

中医古籍临床新用丛书

外科正宗精要

原著 明·陈实功

丛书主编 ■ 余瀛鳌 卢祥之
本册主编 ■ 张斌仁 孟颖霞



贵州科技出版社



责任编辑：熊兴平

封面设计：张 彪



ISBN 978-7-80662-532-3



9 787806 625323 >

ISBN978-7-80662-532-3/R·151 定价：26.00元

中医古籍临床新用丛书

外科正宗精要

原著
明·陈实功

丛书主编 ■ 余瀛鳌 卢祥之


本册主编 ■ 张斌仁 孟颖霞



《中医古籍临床新用丛书》编委会

主 编	编：	余瀛鳌	卢祥之	
	委：	杜惠芳	李庆生	王宏芬
		李文泉	卢祥生	王仁娟
		赵英鹏	陈晓雷	汤楠
		李薇	杨果	齐放
		宋孝瑜	常德增	张东杰

贵州科技出版社



图书在版编目(CIP)数据

外科正宗精要/张斌仁,孟颖霞主编. —贵阳:贵州科技出版社,2008.4

(中医古籍临床新用丛书/余瀛鳌,卢祥之主编)

ISBN 978-7-80662-532-3

I. 外… II. ①张…②孟… III. 中医外科学-中国-明代 IV. R26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 032312 号

出 版 贵州科技出版社
发 行
出版人 施福根
地 址 贵阳市中华北路 289 号 邮政编码 550004
经 销 各地新华书店
印 刷 贵阳云岩通达印务有限公司
开 本 850mm × 1 168mm 1/32
印 张 12.375
字 数 360 千字
版 次 2008 年 4 月第 1 版
印 次 2008 年 4 月第 1 次印刷
印 数 1~3 000 册
定 价 26.00 元



前 言

半个多世纪以来,中医研究的内容与方法,大致有五个方面:

1. 文献研究:从上世纪 50 年代至文化大革命前,对古代医籍进行了大量的收集、保存、点校、注释、语释、影印和出版。这一阶段的文献整理研究,给中医作了“留种”的工作。

2. 理论研究:上世纪 50 年代以来,由卫生部或卫生署辖行政部门组织、集体编写了高等中医院校统编教材。从 1958 年到上世纪末,共编写了六版教材,对中医基础理论进行了较系统的阐释。几十年来,一代又一代的中医学子,主要就是靠这套教材学习中医。

3. 临床研究:集中在对证的研究(证本质、证候学),再如辨证论治的规范化研究、中医病名研究、治则治法研究、方药研究等都具有一定规模和影响。

4. 多学科研究:从古代哲学研究中医,如周易与中医、道学与中医;从哲学方法论、控制论、信息论、系统论、生物全息理论等解释中医理论;从天文学、气象学、太阳黑子活动周期来研究五运六气,还有从数学研究制作五行的数学模型等。

5. 实验研究:采用西医的若干理论指标分析验证中医药的疗效。如清热解毒、养阴生津方药对一些传染病、感染性疾病的疗效;通里攻下方药对某些急腹症的疗效;活血化瘀方药对冠心病的疗效等,进一步深入到探讨八纲辨证的病理解剖学基础等,从早期的抑菌抑毒实验,到多方法、多层面、分子水平上更为微观的研究,对中医药理论和临床方药机理的探讨采用了另一条途径和方法。

从内容上看,这些研究工作,对某一理论、某些具体的理法方药的理论研究较多,从整体研究和构建中医学理论体系者少;从发展趋势上,以现代医学思路和方法指导者越来越多,以中医思路为指导,从中医理论自身发展规律研究者少,从中国医学之所以能经久不衰的实践

根基入手的更少。

近年来,许多青年学生和初涉临床工作的年轻医生,提出阅读古籍,结合临床实用,感觉无从下手,有许多不便,有鉴于此,我们与诸多学者探讨以后,决定立足在不仅是给古医籍点校做一番“整容”,而是根据古籍的基础,在临床研究、实践上,做些印证的检索和说明的工作,这样做,第一是对古籍保护、流传有所促进;第二是对初涉临床者和青年中医学生提供深入研究的一些线索。这也是一种尝试,这种尝试,对于繁荣中医文献,也许有一定益处。这种作法,得到了国务院古籍整理办公室的肯定和支持。

中国出版工作者协会国际合作出版促进委员会研究中心与贵州科技出版社自2004年开始组织中国中医科学院(原中国中医研究院),以及山东、江苏、山西、湖南、四川中医文献研究、临床教学人士就此项目开展评注和补缀工作,历时两年有余,始见端倪,寄望丛书,能对后学有所裨益。

《外科正宗》的现代研究

陈实功,字毓仁,江苏南通人,生于明嘉靖、崇祯年间(1555~1636年),为明代著名外科学家。陈氏在继承古代外科学术的基础上,通过40年的临床实践,将所得的实践经验与理论结合著成《外科正宗》一书,全书共分4卷,涉及外科疾病100多种,首论病理,次叙症象,再论治法,并附以典型病例,最后又介绍了炼取诸药法。《外科正宗》一书内容全面系统、精简扼要、条理清晰,从理论到实践都有独到之处,为一般外科文献所不及。该书对中医外科学的发展作出了重要贡献,乃称中医外科三大流派之首——正宗派。清代徐灵胎对之有“列症详,论治精”的评价,《外科正宗》对现代临床不仅有重要的指导意义,而且有广泛的临床应用价值,现将现代研究归纳如下:

一、病因病机

(1)整体观念:陈实功在所著的《外科正宗》内,理论上非常突出整体观念。他认为“外之症则必根于其内”,也就是说外症的发生不仅仅是体表的病变,而是与内在因素有着十分密切的联系。如痈疽,他认为六淫、七情等致病因素先使气血、脏腑发生乖变,而后乃外发为痈疽,故曰:“六淫伤气血,七情干脏腑”,“凡发痈疽者,未有不先伤五脏而后发之”,“痈疽多由脏腑乖变,关窍不得宣通而发”。这就提醒后人,痈疽的发生与气血、脏腑有密切的联系,气血、脏腑的异常能直接影响痈疽症情的变化。换言之,即痈疽在体外发生的症状也反映了体内气血、脏腑的异常变化,不能孤立地来看痈疽,而应当根据人体的整体状况来鉴别痈疽。“初生如粟,里可容谷,外面如麻,里面如瓜,外面如钱;里可容拳,起势大终无害,未老先白,无脓软陷休”,“疮从疙瘩起,有脓生方许”,“肿溃气昂昂,不治自安康”。他在辨识方法上能以八纲为基础,抓住“阴阳虚实之原委”,对痈疽的属性进行准确的辨别。如他说:“纯阳初起必肿,又兼身热有微寒,顶如尖字高突起,肿如弯弓

有根盘，七日之间多痛，二七之期脓渐漫，动息自宁食知味，二便调匀无泻干，肿消脓溃精神爽，脱腐生新气血充，五善自然臻并至，七恶全无半点干，痛便随脓减，肿退自肌宽，新肉已生红艳艳，腐皮自敛白漫漫，一身多爽快，五脏尽和欢，此属纯阳多易治，百人百可保安全。”同时，他对阴症的描述更为逼真：“纯阴初起不知疮，粟米之形疮瘡僵，不红不肿不知痛，少热少焮少提防，七朝之后身体倦，疮根平大喜浇汤，顶不高兮根不活，色不光兮腐不酿，软陷无脓空结聚，脉浮散大细飞扬，饮食不餐身战战，尝汤止许意茫茫，疮上生衣如脱甲，孔中结子似含芳，脓多臭秽身难便，举动惶惶韵不长，疮形成紫黑，面色变青黄，精神昏聩多鼾睡，言语无人自发扬，口干多舌强，痰喘定身亡，此属纯阴俱不治，百人百可到泉乡。”上面的描述正是他运用八纲结合外症的各种证情总结而得，不仅十分细致，而且非常符合于临床实际。

陈实功《外科正宗》对肿瘤的病名和分类的记载，继承了前人大多以肿瘤所出现的症状、体征为之命名的特点，并做了较为系统的论述。他认为肿瘤的发病多与六淫乘虚侵入，七情刺激，饮食不节，劳伤房欲，正气不足等因素有关。在这些致病因素作用下，机体阴阳失调，脏腑功能障碍，导致经络阻塞，气滞血瘀，痰凝邪毒相互胶结而造成肿瘤的发生。指出：“内因者，皆起于七情蕴积于内，又兼厚味膏粱熏蒸脏腑，房欲劳伤亏损之气，乃五脏受之，其病由此内发。”“外因者皆起于六淫体虚之人”，“不内外因，其病得之于饥饱劳役，喜怒不常，饮食者冷热不调，动作者勤劳不惜，以致脏腑不和，荣卫不顺，脾胃受伤，经络凝滞。”对肿瘤的良性与恶性，已有初步的分类，如乳岩、失荣、茧唇、瘦瘤。他提出“初如豆大，渐若棋子；半年一年，二载三载，不痛不痒，渐渐而大，始生疼痛，痛则无解，日后肿如堆粟，或如覆碗，紫色气秽，渐渐溃烂，深者如岩穴，凸者若泛莲，疼痛连心，出血则臭，其时五脏俱衰，四大不救，名曰乳岩。”从以上记载可以看出，陈氏当时对乳腺肿瘤的观察和认识已相当深入。由于乳腺癌的肿块高低不平，坚硬如石，深者如岩穴，凸者若泛莲，故名曰乳岩。乳岩和现代医学中乳腺癌的病名颇为相似。失荣病名始见于陈实功《外科正宗》：“失荣者，……其患多生肩之以上，初起微肿，皮色不变，日久渐大，坚硬如石，推之不

移,按之不动;半载一年,方生阴痛,气血渐衰,形容瘦削,破烂紫斑,渗流血水。或肿泛如莲,秽气熏蒸,昼夜不歇,平生疙瘩,愈久愈大,越溃越坚,犯此俱为不治。”这些典型临床症状极似现代医学中颈部淋巴结转移癌或恶性淋巴瘤。而且陈氏在对肿瘤各症的论述过程中,将恶性度高的肿瘤列为“不治之症”,把预后好与坏作为良、恶性肿瘤的区别。对恶性肿瘤如乳岩、失荣等患者的死亡病例作了如实的记载,并提出及早发现及早治疗,或有一线生机。他认为肿瘤发病多与情志内伤、饮食不节、房欲劳伤等因素有关。以上因素导致脏腑失调,气血阻滞,经络瘀阻,最终形成癌瘤。故曰:“内因者,皆起于七情蕴结于内,又兼厚味膏粱熏蒸脏腑,房欲劳伤亏损元气,乃五脏受之,其病由此内发者。”《外科正宗》指出:“夫脱疽者,外腐而内坏也。此因平昔厚味膏粱熏蒸脏腑,丹石补药消烁肾水,房劳过度,气竭耗伤……多致阳精煽惑,淫火猖狂,其蕴蓄于脏腑者,终成燥热火症;其毒积于骨髓者,终为疽毒阴疮。”或因“冬月严寒,主使赤脚,履地不敢移,随后血水麻木,次日十指俱紫”。乃由于久居寒湿之地,气血为之凝滞,血脉不通,发为脱疽。其对病因的论述与现代医学对动脉硬化闭塞症、糖尿病足的发病机理认识是相符的。“起疮不渴,口润舌和,性志寻常,无妄暴急,循礼为吉;初出形如麻子,焮热作痛,一指皆肿,根脚收束者吉;已成头便作腐,肉不紫黑,疼痛有时,脓出肿消者吉;已溃先脓后腐,肉色红活,毒不走散,气不腥秽者吉。未疮先渴,喜冷无度,昏睡舌干,小便频数,阳痿者逆;初起形如粟米,肉便紫色,不肿刺痛,黑色延散者逆;已成疮形枯瘪,肉黑皮焦,痛如刀刺,毒传好指者逆;已溃肉枯筋腐,血水臭汗,疼痛应心,零仃彻骨者逆。”此即详尽描述了脱疽不同证候的不同预后。

(2)脾胃论:同时陈氏对脾胃也有相当的认识,认为“脾为仓廩之官,胃为水谷之海”。脾胃为中焦,是气机升降之枢纽,乃气血生化之源。若升降有序,化源充盈则脏腑穴通而壮实,有利于疮疡恢复。所以他说:“疮疡全赖脾土”,“外科尤以调理脾胃为要。”又说:“首尾俱不可伤元气,脾胃尤为重要。”脾胃运化正常,运行不息,生化无穷,则气血充盛,五脏六腑得以充养,则百病不生。反之如脾胃失运,则生化

匮乏,脏腑无以充养,致生百病,是谓“得土者昌,失土者亡”。由此可见脾胃在人体生理活动及疾病的治疗中都有着极其重要的作用。在整个诊治疾病过程中都要重视脾胃,这是陈氏脾胃观的核心,对一切外科疾病的辨证施治都应重视脾胃,脾胃一旦受损,则御邪无力,生肌无能,可影响整个疾病的治疗及预后,“故知脾胃不可不端详矣”。正因如此他在调理脾胃方面运用的治法也较多而灵活,有益气升阳,补脾健胃,温中运脾,养阴和胃,利湿化痰等法,并根据病程长短,进行不同的调理,病程长的分阶段调理,病程短的病后调理。因邪盛而致体虚、脾运失常者调补与攻邪并进,这些宝贵的经验在后人的临床应用中取得了良好的疗效。

二、内治法

陈实功认为“外科者不可不兼明内科”。如他认为外疡的发生为“凡发痈疽者,未有不先伤五脏而后发之”,“盖以痈疽言之为外科,以气血言之即内伤”。因此在治疗外疡时强调内外配合,这样因内伤而致脏腑的虚,故在内治方面他也主张以补、托为主。他说痈疽虽属外科,用药即同内伤,“托里则气血壮而脾胃盛,使脓秽自排,毒气自解,死肉自溃,新肉自生,饮食自进,疮口自敛”。同时他还强调“即使是阳症高肿也忌用内消攻伐之剂,宜托里使速将邪毒外泄,阴症平塌更须托里温中,摧托毒气外出”。陈实功在运用补托法治疗外病方法,随机制宜,灵活而不偏执。如在运用补法方面有补中益气,温阳和血,益气摄血,益气养荣,养血安神,气血双补,醒脾益胃等多种。同时在托法方面的运用也颇全面,如托里温中,托里建中,托里和中,托里清中,托里透脓,托里消毒,托里安神,托里解表,托里排脓,托里定痛等10余种方法较常使用。一般情况下,疮疡早期,毒邪初入,人体气血旺盛,真气内存,主张从局部入手,应以祛邪为主,如“痈疽发背,急生医,不论阴阳先灸之,不痛灸至痛,痛灸至不痛时”。疮疡中期,邪毒炽盛,正气亦不衰,主张在攻局部毒邪时,要注意整体正气,做到祛邪不伤正。如“内热甚者,是加消毒清剂,便秘者,忌用攻利之药,以伤元气”。疮疡后期,脓液溃出后,毒邪已泄,治疗应从整体入手,“法当纯补”,“凡疮溃脓以后,五脏亏损,气血大虚,外形虽似有余,而内脏真实不足,法

当纯补”。

《外科正宗》认为脱疽发病初起“水窠黄泡者，即灸之。初生如粟，里可容谷，皮色紫赤，不作焮肿，发扎仍灸。已灸之后，疮受火气，发泡作脓，外药箍之，内兼补托。毒势已成，疮形稍陷，但紫色未攻脚面者，评议割取。即割取之后，血水淋漓，疼痛不减，和气血、补脾胃。已成饮食减少，身体倦怠，便数口干，滋津液、壮肾水。破后气血受伤，脾胃虚弱，自汗盗汗，恶心干呕，睡卧不宁，日晡发热，疼痛苦楚，烦闷谵妄，俱宜大补气血。”论述了对此病不同时期所采用的不同的外科治疗方法，如灸之、外药箍之、割取等，并根据全身证候拟订内兼托补的治疗原则。其具体治疗：“脱疽初起以蟾酥、轻粉、枯矾、寒水石、明矾、雄黄、朱砂、麝香、铜绿、蜗牛外用，并根据病情选用解毒济生汤、阴阳二气丹、清神散、金液戊土丹、十全大补汤、参术地黄膏、托里消毒散、人参败毒散等方内服，以和气血、补脾胃、滋津液、壮肾水”；“毒势已成，疮形稍陷，但紫色未攻脚面者”为病势蔓延，此时“治之得早，乘其未及延散时，用头发十余根，缠患指本节尽处绕扎十余转，渐渐紧之，毋得毒气攻延良肉。随用蟾酥饼，放原起粟米头上，加艾灸至肉枯疮死为度，次日本指尽黑，方用利刀寻至本节缝中，将患指徐顺取下，血流不住，用金刀如圣散止之，余肿以妙贴散敷之”。

治疗肿瘤方面：对瘰疬的治疗，陈氏主张“初起自无表里之症相兼，但结成形者，宜行散气血。已成无痛无痒，或软或硬色白者，痰聚也，行痰顺气。已成色红坚硬，渐大微痒微疼者，补肾气，活血散坚。……已破流脓不止，瘤仍不消，宜健脾胃为主，佐以化坚。已溃出血不常，瘤口开泛者，宜养血凉血，佐以清肝。溃后瘤肿渐消，脾弱不能收敛者，补肾气，兼助脾胃”。并总结了瘰疬主治方清肝芦荟丸、芩连二母丸、顺气归脾丸、通气散坚丸、调元肾气丸、海藻玉壶汤、活血散瘀汤、六军丸等相应方剂分治各种瘰疬，至今仍为临床医家所喜用。对失荣症的治疗，陈氏根据自己的临床实践，首创和荣散坚丸内服和外用飞龙阿魏化坚膏的治法，疗效甚佳。

陈实功《外科正宗》在剂型和煎服法上也颇有特色。如陈氏研制的蟾酥丸，蟾酥（酒化）6克，轻粉、枯矾、寒水石、铜绿、乳香、没药、胆

矾各3克,麝香1.5克,雄黄6克,蜗牛21个,朱砂9克。蜗牛研烂,同蟾酥和研调黏,再入其他各药(先各研为末),共捣均匀,做丸如绿豆大,每服3丸,用葱白5寸,嚼烂包药用无灰热酒送下,盖被出汗为度。治疗疔疮、发背、脑疽、乳痈、附骨疽等及一切恶症歹疮。陈氏在《外科正宗》中以毒攻毒的药物较多,大致上可分为动物类、金石矿物类和植物类。动物类药有蟾酥、全蝎、蜈蚣、斑蝥、白僵蚕等,代表方剂如蟾酥丸、六军丸、飞龙阿魏化坚膏等;金石矿物类药有雄黄、硃砂、砒石、轻粉等,代表方剂如枯瘤方、秘传敛瘤膏、三品一条枪等;植物类药有巴豆、草乌、狼毒、生半夏、生南星等,代表方剂如四虎散、九龙丹等,实验研究证明许多毒药对癌细胞有直接的细胞毒作用。

陈氏在辨证施治过程中始终注意:①攻邪毋忘脾胃:提出了“药难执方,全在治法,大抵关节首尾,俱不可损伤元气、脾胃为要”。强调了脾胃的重要性,攻邪同时勿忘脾胃,以“脾胃为要”,“慎用内消攻伐之药,以伤脾气,脓反难成,多致不能溃敛”。疮疡初发“自然高起者,此原属阳证,而内脏原无深毒,且毒仅发于表”,宜托里透脓,因势利导,忌苦寒之品内消攻伐以伤脾胃。受病之初,元气未弱,可用消法,但须“中病即止”,待邪去大半“邪正相距,其元气未有不衰弱者,纵有余症、杂症、坏症,俱当先固其本,调理脾胃,而后调之、和之、散之”;在具体临床中,对形体壮实,毒势较盛者,可用寒凉败毒之剂,更要慎用攻伐之品。②托补依赖脾胃:治疗外疡遵循消、托、补三大治法,其中托补之法中更加体现了陈氏的脾胃观,治法中常有“脾胃”二字。陈氏云:“盖托里则气血壮而脾胃盛,使脓秽自排,毒气自解,死肉自溃,新肉自生,饮食自进,疮口自敛”,“阴疮初起,不高不赤,平塌散漫者,此乃元气本虚”,急宜托里、温中、健脾、益气,务要催托毒气外出。③攻伐勿伤脾胃:大胆运用各种败毒攻邪之品,目的是祛邪外出,主张“泄毒外出为第一要”的思想,同时攻伐勿伤脾胃。陈氏组方选药是据病之深浅、火之虚实、热之盛衰,随证而异,绝不拘于疮由“火毒”内攻之说而妄用寒凉克伐之品。即使万不得已也非纯用攻利,时刻提防损伤脾胃,认为“命赖以活,病赖以安,况外科尤关紧要”。陈氏用药经验:如风温、风热客于肌表,固然首选辛凉轻剂,但此类药轻清有余,发散不

足,若表闭无汗或汗出不畅者,每难奏效,有时甚至反有败胃凉遏之弊,对此不可囿于丹溪所言“凡疮未破,一毫热药断不可用”之论,须在辛凉中佐以辛散开达、微温不燥之品。故治颈痈、时毒初起喜用荆防败毒散、普济消毒饮,即佐以荆、防、豉、羌等辛温药加强散邪之功;如风热壅盛,表里俱实者,尚可再添麻黄之类以开闭透表泄毒。故治痈疽、发背诸肿毒多用防风通圣散或双解散;如热极逼毒内攻,火毒炽盛的里热实证,用寒凉泄火时宜寓“透”于“清”,清透结合。“清”即用芩、连、柏、栀及蒲公英、紫花地丁、大黄等苦寒直折火毒,“透”即用辛凉之品连翘、薄荷、牛蒡子、僵蚕,甚或用辛温之品荆芥、防风、羌活、生姜等辛散开泄,令邪由里出表,既为寒凉之佐,又防过寒伤脾败胃。故陈氏治大面积烧伤火毒内攻者,急投四顺清凉饮,治痈疽邪毒在脏者多选内疏黄连汤,治发背并五脏内痈、尻臀诸肿、大小肠痈、肛门脏毒之里热实证者均可用内消沃雪汤。④调护须培补脾胃。陈氏提出了“善养生者,节饮食调寒暑,戒喜怒,省劳役,此则不损其脾胃也”,“至脓溃之后,生冷硬物一概禁之,不然伤脾损胃,脓必难成,致疮软陷,又难溃敛”。可见其非常重视调理,在调理之中又以培补脾胃为重,脾胃强盛,气血充实,则可缩短病程。凡疮溃后“五脏亏损,气血大虚,外形虽似有余,法当纯补”。指出“不论首尾,难拘日数,但见脉症虚弱,便与滋补”。“盖托里则气血壮而脾胃盛,使脓秽自排,毒气自解,新肉自生,疮口自敛”。陈氏认为:“凡人无病时不善调理而致生百病,况既病后若不加调摄,而病岂能得愈乎?”告诫人们在起居生活中“节饮食、调寒暑、戒喜怒、省劳役,此不损其脾胃也”。脾胃功能正常则新肉自生、饮食自进、气血充足、疮口自敛。书中除了列举24个方剂用于疮疡后期调理外,还特别注意食疗,如创制八仙糕、参术膏、白术膏、人参膏等开胃助脾的食疗方调补脾胃。

三、外治法

陈实功作为一代医家,常有治外较难于治内的感叹,疮疡、脱疽、肿瘤等疾病不仅需要内治,还必须外治,而今古治外者少良法神术,仅内治不免束手。他主张内外治疗相配合,认为外治法是“在肉则割,在指则切”,不仅进行手术治疗,还注意换药和创面不愈的护理。

(1) 手术疗法:陈实功在临床上善用刀针治疗痈疽、疔疮、瘰癧、脱疽、痔瘻、重舌、肿瘤等症。这是与他主张“排毒外出”,“开户逐贼”的治疗宗旨有关。他常把开泄放毒与腐蚀药结合起来运用,这样可以提早使毒邪外泄,此法至今仍不失临床意义,并具有一定的科学道理。因毒邪早日排出,既可减少对正气的伤害,又可避免毒邪久居而生变端。陈实功的手术疗法,对现代手术治疗有重大的指导意义。例如:《外科正宗》提出了手术切开的原则与方法,“脓已成,当以针通”、“当头点破”使毒随脓出,开户逐贼;对阴疮紧硬不溃可用火针、烙法;溃后脓出不畅者用家传秘方药筒拔法,拔提毒气外出“屡经有验”。这种类似现行的拔罐疗法,“有回天之效”。凡疮初起,除头面疔外“无论阴阳、表里,俱当先灸”,且“早灸为佳”。“盖艾火拔引郁毒、透通疮窍,使内毒有路而外发”。诚为“疮科首节第一法也”。尤其独特的是灸法不仅用于阴寒证,也用于阳热证,认为“诸疮原因气血凝结而成”,况“人之气血喜暖而恶寒”,遇寒则结,遇热则散,必当用灸法“温暖、散滞、行瘀、拔毒”,则肿疡未成者易于消散,既成者易于溃脓,既溃者易于生肌收口。如治疗疮疡方面,“若疔疮初生项之上者,必先针刺,以去恶血,庶毒不攻内”。《外科正宗》治疗外科疾病除了善用灸法外,亦善用针法,以针排脓,“脓既已成,当以针通”。如疮疡脓已成,又可用药筒拔脓,还可采用手术排脓,“既若脓已成,须用拔针、利剪等器械,剪出脓管处,若内有聚脓,自然涌出”。此外还用挑治法治红丝疔、田螺泡,针砭法治小儿赤游丹毒,火针法治鱼口便毒,刺络放血法治喉闭,刺络砭血法治时毒等。

《外科正宗》曰:“溃后脓出不畅者用家传秘方药筒拔法。”陈氏家传的秘方“煮拔筒方”以羌活、独活、紫苏、艾叶、鲜菖蒲、甘草、白芷、连须葱纳入新鲜嫩竹筒中煮滚,弃药,乘热将竹筒覆于已用铍针切开疮顶的发背上,约待片刻,取下药筒,视拔起脓血色泽,如脓血鲜明红黄是活疮,治必终愈,若拔出纯是败血气秽紫黑稀水,是死疮,强治亦无功。可见此药筒不但可泄毒气,且可辨预后,是一种药物与拔罐结合的治疗方法。同时每次都使用新鲜嫩竹,对防止交叉感染给予我们有益的启迪。

首创铜丝套摘鼻息肉的手术：“先用回香草药连吹二次，次用细铜箸二根，箸头钻一小孔，用丝线穿孔内，二箸相离五分许，以二箸头直入鼻痔根上，将箸线绞紧，向下一拔，其痔自然拔落，置水中观其大小，须用胎发烧炭同象牙末等分吹鼻内，其血自止。”目前，这一手术治疗方法原则仍为现代医学所采用，只不过是在器材、药物上作了改进。在300多年前即能开创这一行之有效的手术方法，这在中外医学史及临床上都具有重要意义。

陈氏在尊古的基础上不泥古，其创新和进取之心令人叹服。他对脱疽结扎法后的截肢术，自刎者丝线缝合刀口法，取咽喉食道铁针法，大疮面的棉垫加压法等都是在300多年前积累的经验，至今仍有临床指导意义。

(2) 腐蚀药品：疔疮之用“立泻四疔丹”（蟾酥、硃砂、轻粉、公丁香、蜈蚣、雄黄、硃砂、乳香、麝香、金顶砒）插入疔疮溃口内，可追出脓血疔根；瘰癧用“枯瘤方”（白砒、硃砂、黄丹、轻粉、雄黄、乳香、没药、硼砂、斑蝥、田螺）敷之，其瘤自然枯落；瘰癧、疔疮、发背、脑疽、痔痿用“三品一条枪”（明矾、白砒、雄黄、乳香）研末炼制成药条，阴干后插入疮孔内，可使疔头腐肉、管壁诸物自然排出。丹石内用对人体有危害，但外用有腐蚀拔毒的治疗作用，他提出“丹石补药，消灼肾水”。他用丹石自制成散剂、膏剂、药线，外用消蚀癌瘤，这样以药代刀切除病灶，瘤祛而不伤血，癌除而不伤正。制作了消瘤蚀癌的冰狮散、蟾蜍丸、朱砂散、三品一条枪、枯瘤方等，敛瘤生肌收口的玉红膏、敛瘤膏、珍珠散、翠云靛、红黑二膏等。上述药品的炼制使用，对后世运用腐蚀药起了承先启后的作用，影响很大。现在仍在临床上使用的白降丹、黄升丹、红丹均从“三品一条枪”演变而来。由此可见，陈实功在运用腐蚀药方面，是匠心独具的，并为后世在广泛使用腐蚀药物治疗多种疾病甚至恶疮顽疾起到了极大的推动和指导作用。

此外，《外科正宗》里药物外治法更是琳琅满目：如熏、洗、熨、插药、漏渍法，外用膏、散、鲜药等也是各具特色，不胜枚举。如洗涤之法，有荡涤之功，气血自然舒畅，其毒易于溃腐，而无壅滞。陈氏常用葱艾汤淋洗疮上，使气血疏通，易于溃散。以猪蹄汤温覆疮上，具瘀滞

得通,血气得疏,毒气得解,腐肉得脱,疼痛得减之功。神灯照法为药气入内,毒随火散,能使未成者自消,已成者自溃,不起发者即起发,不腐者即腐。桑柴火烘法是用之助阳气,散瘀毒,暖肌寒,生肌肉。尤其应该提出的是,陈氏注重疮疡的清洁换药。疮疡贴药前必以葱艾汤淋洗或葱归溺汤热敷患处,取葱、艾辛香散邪,使气血疏通,促疮消散;已溃流脓时用猪蹄汤清洗疮面,“消毒气,去恶肉,回死肌,润疮口”然后换药。对脑疽、发背阴证常用神妙拔根方:“十日以前用铍针当顶插入知痛处方止,随将蟾酥条插至疮底……至十三日其根自脱。”还用“三品一条枪”治瘰癧、痰核等阴证疮疡。这两种疗法既有提脓、化腐、消坚之功,又起到换药引流的作用。

四、治学严谨、崇尚医德

陈实功一生致力于外科学,力主医者应备相当文化素养为学医基础。他对医学的钻研是既“勤”又“精”,他“勤读古书,手不释卷,一一参明融化,得之于心,应之于手”,“余少时即研精此业”,“心习方,目习症”,把所学的岐黄之术严谨地运用于临床,在实践中加以总结提高。尝云“一要先知儒理,然后方知医业”;强调“勤读先古明医确论之书”,参阅“近时明公新刊、医理词说”,“一一参明,融化机变”,“以进学问”。这在守旧成风的封建时代委实难能可贵。正因他的好学钻研,陈氏集40年外科临床理论研究和经验总结,撰《外科正宗》一书,即是这一思想的集中体现。无论在理论上或实践上均有独到的建树,该书的编辑形式和外科疾患的论述(从病因到症状到诊断乃至治法与处方)和所附的典型病例报告,已成为中医外科专著的基本形式,《医宗金鉴》、《外科心法》中均采纳了该书的观点,可见其影响之大。他临证中理论联系实际,既重视内治,又精于外治;既强调宜手术者的早期手术,又反对不宜手术者的盲目施刀;他科学地主张外科治疗中必须配合饮食营养,认为“饮食何须忌口”,批判了无原则的饮食禁忌;他反对内科医生轻视外科的错误观点;严厉批评外科医生轻诊断、乱投药和滥施针刀的不良倾向。在外科领域内,他是一位敢于创新,不墨守成规的学者。

对待病人,明代南通大诗人范凤翼云:“吾里若虚陈君,慷慨重然

诺,仁爱不矜,不张言灾祸以伤人之心,不虚高气岸以难人之请,不多言夸严以钩人之贿,不厚求拜谢以殖己之私。”陈氏“谦和谨慎”,主张“年尊者,恭敬之,师事之;骄傲者,逊让之;不及者,荐拔之”。对于医者来说,此训可以为目中无人者戒,可以为故步自封者戒,可以为不学无术者戒,更可以为具有“妒贤嫉能,同根相煎”之恶习者戒。陈实功有良好的医德,他“无论病家大小贫富,有请便往,勿得迟延厌怠,药金不计较轻重,一律尽心施治”,“病愈之后,不得图求匾礼,不得请托人情”等。这些不正是我们现在讲究医德方面所要求做到的吗?他待病人如宾客,体贴入微,遇有疑难病症,不固执己见,“必与高明”,这种敬业精神是具有重要现实意义的。陈氏提倡医家“五戒十要”,其严谨的治学,高尚的医德是他数百年来驰名杏林的重要原因,成为后世医家执业之绳墨,因而其不朽巨著《外科正宗》方能在人类医学史上流芳百世。当然陈实功《外科正宗》因所处时代和个人经验的限制也存在一些错误和不当之处,在探讨其学术思想上应去芜存精,舍短取长,不宜苛责前人。

目 录

卷之一 痈疽门	(001)
痈疽原委论第一	(001)
痈疽治法总论第二	(005)
痈疽阳症歌第三	(014)
痈疽阴症歌第四	(014)
痈疽半阴半阳症歌第五	(015)
痈疽五善歌第六	(015)
痈疽七恶歌第七	(015)
治病则例歌第八	(015)
痈疽灸法并禁灸疮穴第九	(017)
论病生死法第十	(017)
察形色顺逆第十一	(018)
病有三因受病主治不同论第十二	(018)
调理须知第十三	(019)
杂忌须知第十四	(020)
疮疡看法	(020)
肿疡治法	(020)
痈疽治验	(021)
肿疡主治方	(025)
托里消毒散的临床新用	(029)
透脓散的临床新用	(033)
如意金黄散的临床新用	(039)
冲和膏的临床新用	(045)
生肌玉红膏的临床新用	(049)
溃疡治法	(052)

溃疡主治方	(053)
十全大补汤的临床新用	(053)
八珍汤的临床新用	(056)
补中益气汤的临床新用	(059)
人参养荣汤的临床新用	(070)
圣愈汤的临床新用	(075)
独参汤的临床新用	(080)
香砂六君子汤的临床新用	(083)
清震汤的临床新用	(089)
痈疽诸症疮名十律	(094)
卷之二 上部疽毒门	(097)
脑疽论第十五	(097)
脑疽看法	(098)
脑疽治法	(098)
脑疽治验	(099)
脑疽主治方	(102)
脑疽应用方	(105)
疔疮论第十六	(105)
疔疮看法	(106)
疔疮治法	(107)
疔疮治验	(107)
疔疮主治方	(109)
黄连解毒汤的临床新用	(110)
疔疮应用方	(119)
脱疽论第十七	(120)
脱疽看法	(121)
脱疽治法	(121)
脱疽治验	(121)
脱疽主治方	(124)
脱疽应用方	(126)

瘰癧论第十八	(126)
瘰癧看法	(127)
瘰癧治法	(127)
瘰癧治验	(128)
瘰癧主治方	(130)
逍遥散的临床新用	(133)
瘰癧应用方	(143)
鬓疽论第十九	(143)
鬓疽看法	(144)
鬓疽治法	(144)
鬓疽治验	(145)
鬓疽主治方	(146)
鬓疽应用方	(148)
咽喉论第二十	(148)
咽喉看法	(149)
咽喉治法	(149)
咽喉治验	(150)
咽喉主治方	(150)
苏子降气汤的临床新用	(154)
冰硼散的临床新用	(156)
咽喉应用方	(159)
时毒论第二十一	(159)
时毒看法	(160)
时毒治法	(160)
时毒治验	(161)
时毒主治方	(162)
通气散的临床新用	(163)
时毒应用方	(165)
瘰癧论第二十二	(165)
瘰癧看法	(166)

瘰疬治法	(167)
瘰疬治验	(167)
瘰疬主治方	(168)
瘰疬应用方	(171)
肺癰论第二十三	(172)
肺癰看法	(172)
肺癰治法	(173)
肺癰治验	(173)
肺癰主治方	(174)
肺癰应用方	(178)
卷之三 下部痈毒门	(179)
流注论第二十四	(179)
流注看法	(180)
流注治法	(180)
流注治验	(180)
流注主治方	(181)
木香流气饮的临床新用	(182)
流注应用方	(186)
乳癰论第二十五(附:乳岩)	(186)
乳癰乳岩看法	(187)
乳癰乳岩治法	(187)
乳癰治验	(187)
乳癰主治方	(188)
乳癰应用方	(191)
附骨疽第二十六(附:鹤膝风)	(191)
附骨疽看法	(192)
附骨疽治法	(193)
附骨疽治验	(193)
附骨疽主治方	(194)
附骨疽应用方	(200)

肠痈论第二十七	(200)
肠痈看法	(201)
肠痈治法	(201)
肠痈治验	(201)
肠痈主治方	(202)
大黄汤的临床新用	(203)
失笑散的临床新用	(205)
肠痈应用方	(210)
脏毒论第二十八	(210)
脏毒看法	(211)
脏毒治法	(211)
脏毒治验	(211)
脏毒主治方	(212)
脏毒应用方	(213)
痔疮论第二十九	(214)
痔疮看法	(214)
痔疮治法	(215)
痔疮治验	(215)
痔疮主治方	(216)
生肌散的临床新用	(220)
痔疮应用方	(225)
下疳论第三十	(225)
下疳看法	(226)
下疳治法	(226)
下疳治验	(226)
下疳主治方	(227)
清心莲子饮的临床新用	(228)
八正散的临床新用	(229)
珍珠散的临床新用	(232)
下疳应用方	(234)

鱼口便毒论第三十一	(234)
鱼口便毒看法	(234)
鱼口便毒治法	(234)
鱼口便毒治验	(235)
鱼口便毒主治方	(236)
鱼口便毒应用方	(237)
囊痈论第三十二	(237)
囊痈看法	(238)
囊痈治法	(238)
囊痈治验	(238)
囊痈主治方	(239)
囊痈应用方	(241)
悬痈论第三十三	(241)
悬痈看法	(242)
悬痈治法	(242)
悬痈治验	(242)
悬痈主治方	(243)
悬痈应用方	(244)
臀痈论第三十四	(244)
臀痈看法	(245)
臀痈治法	(245)
臀痈治验	(245)
臀痈主治方	(246)
臀痈应用方	(247)
杨梅疮论第三十五	(247)
杨梅疮看法	(247)
杨梅疮治法	(248)
杨梅疮治验	(248)
杨梅疮主治方	(249)
杨梅疮应用方	(251)

结毒论第三十六	(252)
结毒治验	(252)
结毒主治方	(253)
结毒应用方	(257)
多骨疽论第三十七	(258)
多骨疽治验	(258)
多骨疽主治方	(259)
多骨疽应用方	(259)
卷之四 杂疮毒门	(260)
阴疮论第三十八	(260)
阴疮治验	(261)
阴疮主治方	(262)
阴疮应用方	(263)
伤寒发颐第三十九	(264)
瘤发第四十	(264)
瘰疽第四十一	(265)
小腹痛第四十二	(265)
鹤口疽第四十三	(265)
龙泉疽虎须毒第四十四	(267)
石榴疽第四十五	(267)
穿踝疽第四十六	(268)
大麻风第四十七	(268)
苦参丸的临床新用	(270)
翻花疮第四十八	(272)
腋痛第四十九	(273)
胁痛第五十	(273)
鼻痔第五十一	(273)
骨槽风第五十二	(274)
紫白癜风第五十三	(275)
齿病第五十四	(276)

脑漏第五十五	(278)
破伤风第五十六	(279)
跌扑第五十七	(280)
金疮第五十八	(281)
杖疮第五十九	(282)
汤泼火烧第六十	(283)
甲疽第六十一	(284)
茧唇第六十二	(285)
痞癖第六十三	(285)
天蛇毒第六十四	(286)
头痛第六十五	(287)
合谷毒第六十六	(288)
鼻出血第六十七	(288)
牙缝出血第六十八	(289)
清胃散的临床新用	(289)
血箭血痣第六十九	(292)
鹅掌风第七十	(292)
肾囊风第七十一	(293)
疥疮论第七十二	(293)
消风散的临床新用	(294)
当归饮子的临床新用	(298)
疔疮论第七十三	(301)
血风疮第七十四	(302)
顽癣第七十五	(303)
脓窠疮第七十六	(304)
蛇床子散的临床新用	(305)
冻风第七十七	(307)
火丹第七十八	(307)
天泡第七十九	(308)
肺风粉刺酒渣鼻第八十	(310)

雀斑第八十一	(310)
油风第八十二	(311)
白屑风第八十三	(312)
耳病第八十四	(312)
漆疮第八十五	(313)
竹木刺第八十六	(314)
瘰癧疮第八十七	(314)
苦参汤的临床新用	(315)
疥腮第八十八	(318)
痰包第八十九	(319)
加味二陈汤的临床新用	(319)
癩风第九十	(322)
湿肿第九十一	(322)
咬伤第九十二	(323)
疯犬伤第九十三	(324)
女人面生黧黑斑第九十四	(325)
纽扣风第九十五	(325)
枯筋箭第九十六	(325)
妇人脚丫作痒第九十七	(326)
手足破裂第九十八	(326)
眼丹第九十九	(326)
黑子第一百	(327)
眼胞菌毒第一百零一	(327)
体气第一百零二	(328)
白秃疮第一百零三	(328)
奶癖第一百零四	(329)
蟾拱头第一百零五	(329)
小儿遗毒烂斑第一百零六	(330)
蜈蚣串第一百零七	(331)
小儿痘风疮第一百零八	(331)

小儿赤游丹第一百零九	(331)
升麻葛根汤的临床新用	(332)
走马疳第一百一十	(336)
重舌第一百一十一	(337)
黄连泻心汤的临床新用	(337)
胎瘤第一百一十二	(341)
鹅口疮第一百一十三	(342)
痘痛第一百一十四	(342)
保元汤的临床新用	(343)
痘疔第一百一十五	(345)
黄水疮第一百一十六	(345)
大人口破第一百一十七	(346)
臭田螺第一百一十八	(347)
牛程蹇第一百一十九	(347)
僵螂蛀第一百二十	(347)
田螺泡第一百二十一	(348)
皴痛第一百二十二	(348)
阴虱第一百二十三	(348)
葡萄疫第一百二十四	(349)
百虫入耳第一百二十五	(350)
恶虫叮咬第一百二十六	(350)
人面疮第一百二十七	(351)
误吞针铁骨哽咽喉第一百二十八	(351)
中砒毒第一百二十九	(351)
落下颏拿法第一百三十	(352)
救自刎断喉法第一百三十一	(352)
阴毒第一百三十二	(353)
失荣症第一百三十三	(353)
试知百病死生法第一百三十四	(354)
仙方活命饮今古不同论第一百三十五	(355)

仙方活命饮的临床新用	(355)
拾遗症第一百三十六	(358)
唇风第一百三十七	(359)
绷缚背疮第一百三十八	(360)
痈疽内肉不合法第一百三十九	(360)
炼玄明粉法第一百四十	(360)
取红铅法第一百四十一	(361)
炼金顶砒法第一百四十二	(362)
炼硝石法第一百四十三	(362)
取蟾酥法第一百四十四	(362)
制附子法第一百四十五	(362)
升白灵药法第一百四十六	(362)
制寒食面法第一百四十七	(363)
制炒诸药第一百四十八	(363)

卷之一

痈疽门

痈疽原委论第一

痈疽发背为何生，好好身躯出此形。

凡人处世而无疾病者，水升火降精秘血盈也。《养生篇》曰：毋摇尔精，毋劳尔形，皈心静默，可以长生，此皆远世俗、忘名利、无贪嗔、却疾病，此惟修身保命之士所能，今人岂能及哉！盖谓静则生水，动则生火；又水能生万物，火能克万物，故百病由火而生。火既生，七情六欲皆随应而入之；既入之后，百病发焉。发于内者，为风劳、蛊膈、痰喘、内伤；发于外者，成痈疽、发背、对口、疔疮，此皆言其大略也。故成痈者壅也，为阳，属六腑毒腾于外，其发暴而所患浮浅，因病原稟于阳分中。盖阳气轻清浮而高起，故易肿、易脓、易腐、易敛，诚为不伤筋骨易治之症也。疽者沮也，为阴，属五脏毒攻于内，其发缓而所患深沉，因病原稟于阴分中。盖阴血重浊性质多沉，故为伤筋蚀骨难治之症也。凡年壮气血胜毒则顺，年老毒胜气血则险。治法载于第二论中，宜详观之。

内被七情干脏腑，忧悉思虑总关心。

七情六欲者，盗人元气之贼也。人能疏于此者，无不多安多寿，人若亲于此者，无不有损有伤，但人能疏之者鲜矣。盖情欲之动作，无所不好，无所不为，故喜伤心，怒伤肝，忧伤肺，思伤脾，悲伤于魂魄，恐伤肾，惊伤胆。此等七情，皆耗人一身元气之萌蘖也。至于六欲者，耳听声音，眼观物色，鼻闻香气，舌贪滋味，心帷大地，意幄万方，此等六欲，皆损人三世锤灵之真性也。又所以为苦、为疾、为夭、为疼，以及休废

衰败，诸病诸疮，尽皆出于此等之情欲也。医者患者，亦宜慎察之。

外又六淫伤气血，风寒暑湿火相临。

六淫者，风、寒、暑、湿、燥、火是也。风为四时不正浩荡肃杀之气，发而最能中人；寒乃节候不调、疾风暴雨、冰雪严寒所伤，或口贪生冷之物；暑因亢阳酷日、烁火流金、湿热熏蒸而中；湿从坐卧久卑卑湿之地，或身骤临风雨潮气所侵；燥为阴虚内热，消烁津液，不能滋润脏腑，以致皮肤枯槁、便干为燥；火生于心绪烦扰、醇酒膏粱、房欲不闲所动。此六淫者，皆从外而入之，体实之人遇而不中者有，体弱之人感而随发者多。又有感之不发，邪气客于脏腑、经络、关节之内，积袭日久，或待内伤，或因外感，邪气触而发之，既发之后，当参寒热温凉、邪正胜负而治之。

膏粱厚味多无忌，劳伤房欲致亏阴。

膏粱者，醇酒肥鲜炙煖之物也。时人多以火炭烘熏，或以油酥燥煮，其味香燥甘甜，其性咸酸辛辣，又至于涂藏厚料，顿煮重汤，以取其爽口快心，不顾其消阴烁脏。又得于宠妾满前，精神飞旷，温床厚被，炉火围匡，每至于未饥先食，未冷先绵，快意从心，色力太过，稍有不及，便去兴阳，惟取快意于一时，不觉阴消于平日。况所生是疾者，不起于藜藿，尽属于膏粱，谁识膏粱味短不及藜藿味长。凡知命者，当远之避之，择而用之可也。

故将五脏多乖变，自然六腑不调匀。

五脏属五行，金、木、水、火、土是也。常欲相顺相生，所得木生火，火生土，土生金，金生水，水生木。此五脏相合相生，理禀太和之气，其疾何以生焉。是为疾者，五脏必相反相克，所被木克土，土克水，水克火，火克金，金克木。此五脏相刑相克，理返互变之机，其疾再无不作者，所谓相生者昌，相克者亡。此诚为万物生克一定之理，岂止于疾病言哉！又谓五脏不和则六腑不通，六腑不通则九窍疲癯，九窍疲癯则留结为痛。盖痛疽必出于脏腑乖变，开窍不得宣通而发也。治当寒邪而痛者，以温热散之；湿肿强痛者，渗而导之；燥搐挛痛者，滋而润之；泄而痛者，温之；塞而痛者，通之；虚而痛者，补之；实而痛者，泻之；阴阳不和者，调之；经络秘涩者，冲和之；脓胀而痛者，开之；恶肉侵蚀者，

去之；劳而痛者，逸之；损而痛者，续之。此等皆为活法，惟在用者详之。

发于心上多危险，五脏相干事可明。

五脏者，心、肝、脾、肺四脏皆系于背，惟肾经一脏独居于下。虽居于下，其脏精华、津液、元气、元神尽行灌溉荣注于上，故四脏之火，皆赖一脏之水以济之。所谓五脏根本皆系于背，即此之意也。凡发痈疽者，未有不先伤五脏而后发之，况背乃太阳膀胱、督脉所主。太阳者，六经之首领也；督脉者，十二经络之统脉也。所以疮生于背，毒犯于此，况心乃又属君主之位，岂容毒相犯之。凡发于此，故多成危险难治之症，医者不可不慎而察之。

心之已下多成顺，六腑之因亦许评。

凡疮生于心之以下者，除肾俞一穴外皆为缓。六腑者，足阳明胃经、手太阳小肠经、足太阳膀胱经、手厥阴心包络经、手少阳三焦经、足少阳胆经。此六经，其名属腑，其形在下，其气主表，其病为痈。故疾发于五脏者为重，生于六腑者为轻，此为表里脏腑轻重之别也。

脾家积毒生肩脊。

发生于肩下脊上者，乃因饮食膏粱积毒所致。发出高肿鲜明，根脚不过两肩者为顺，先宜解毒护心为主，次宜内托清心为要，间用蜡矾丸、护心散防毒攻心。如肿平坚硬，渐大渐开，攻注两肩胸项、肿而不定者危。

心经火毒对心临。

对心发者，乃心火妄动热极而发之也。况心为主宰，周身蕴热流会于此，其结为患，又称毒划。君位最易伤人，刑截督经，害非轻浅。况此穴背脊多坑，固难起发，疮形落陷，肿不高尖，治当大降心火，急疏蕴热，顶用针通，随行拔法，务使毒气内外疏通，各从门出，庶不内攻，方为成守。保至十五日后，内无变症，得脓为解。如是期变症渐生，坚硬渐大不作脓者，死在二十二朝先后。但此症贵在乎早治，十中可保其三、四也。

两肩左右双生发，肺肝积受不虚名。

左搭属肝，右搭属肺，俱生于左、右肩骨移动之处为可治。古云：

左搭串右,右搭串左,俱为难治。今治不然。余每医左、右相串者,未尝见其死,惟在治法得宜。有此症者,先用万灵丹发汗疏通内外,次以清肝解郁汤、柴胡清肝汤。气用四君子汤,血用四物汤,溃后八珍汤,俱兼六郁汤参而调治,诚为妥当。但此症原起于痰凝、气滞、火郁、气血不调所生。正谓郁者开之,滞者行之,如误用疮科解毒泄气、误补误攻之药,必致多危。

莲子蜂窠防毒陷。

蜂窠、莲子二发,多生于背,与心相近,与脊中平,轻者形长高肿,或偏半背;重者形斜平塌,两胁俱伤,孔似蜂窠,突如莲子,疮形虽畏,常能多险。多生老弱不堪,反取常安常稳。大规只怕不纯阳,治法何妨疮势恶。护心护膜,丸丹须要调停;执药执方,活法在乎医意。机参总论,法决存亡。

腰间肾俞发难生。

肾俞发者,生于两腰内肾陷肉之间,或正中亦发,凡生于此者,最为险候。盖内肾乃为性命根本,藏精、藏气、藏神,又谓受命先天,育女、育男、育寿,此等皆出于肾脏之一窍也。是为疾者,房劳过度,气竭精伤,欲火消阴,外阳煽惑,以致真水真阴从此而耗散。既散之后,其脏必虚,所以诸火诸邪乘虚而入,既入之后,凝结为疮。如本脏稍有真阴制火,疮形自可红活高肿为脓,治以人参养荣汤加山萸、五味子、黄柏、知母及加减八味丸以救其源也;若疮形色紫黑干枯、坚硬不作脓者,为真阴内败,再无可生之理,必死在十五日前后为期也。

督脉经虚从项发,俗名对口故相称。

对口者,生于项后而对前口者是也,但有偏、正之不同。发于正者,属督脉所主;发于偏者,乃太阳膀胱所司。二者皆起于湿热上攻凝结而成也。督脉者,发疮虽正而反为易治。因督脉起于下,而贯脊行于上,故毒气得之,反能冲突高肿,使邪毒不致下流低陷,乃为外发,故多易治。膀胱者,发疮虽偏,而每为难治。盖膀胱之脉起于巅顶,贯项两旁、顺下而行,乃与疮毒交会下流,故疮多平塌;又太阳膀胱主司寒水,其质多冷多沉,故疮于此多难起发,形色多难红活,坚硬难溃,又易流注,两肩、胸、项作肿,十五日外无脓者,必然变黑归阴,故多不治。

俗呼以正为重,以偏为轻,此皆庸说,不得其消息故也。治以黄连消毒饮主之,余皆降火、化痰、解毒、清心、托里为要也。

何期耳后多生发,疔疽锐毒不非轻。

发生于耳后一寸三分致命之处,诚为险恶之候。又左为疔疽,右为锐毒。疔者,妖变之物也,故属肝木;锐者,锋利之器也,是属肺金。二者皆起于积想在心,谋虑不决,致火旺而又郁,郁而又旺以成此疾也。故形多坚硬,头多隐伏,未溃先黑,未脓先腐,臭秽易生,元气易败,常得此者,毒气多致不得外发,后必内攻而死。但此症者,初生起于隐微,令人多不知觉,及其知觉,毒已入内矣,如红活高肿,易脓易腐者无妨。

又有脱疽生手足,丹房补术孽根生。

脱疽之发,脱者,落也;疽者,黑腐也。此毒皆……多生手足。发在骨筋,初生如粟,色似枣形,渐开渐大,筋骨伶仃,乌乌黑黑,痛割伤心,残残败败,污气吞人,延至踝骨,性命将倾,此非天命,自丧其身。古人有法,截割可生,今人谁肯,割截为名,治法虽有,详在后文。

漫肿难治焮肿易,总论中间法可凭。

漫肿者,肉肿疮不肿是也;焮肿者,疮肿肉不肿亦是也。此二者,发疮阴阳之大体,辨症顺逆之末节,由此观之,一决而定也。疮之初起,理当升发;溃脓之后,不可用内消,宜用托药。如不应者,乃毒胜气血,死在旬日。或已发出而不腐溃,根脚坚硬;或软而散大者,急投托药,大补脾胃,不应死在二旬。若已溃而色不变红活,亦不生肌收敛,疮口晕大,肿痛不减,胃气不回,急须峻补;不应者,乃脾崩,死在月余。

诸疮另有分门说,岂许轻于紊此呈。

痈疽治法总论第二

痈疽发背怎生医,不论阴阳先灸之,不痛灸至痛,疼灸不疼时。

凡看痈疽脑项等发大疮,先要从容立定主意,以见标日期为始,到今几日,看疮形与日期可否相对,相应则多吉,不应则多险。次看受病之源,发于何脏腑,出于何部位,但身体有上下,部位有险否,形色辨顺

逆,精神论有无。再看年纪老壮,气血盛衰,发阴发阳,毒深毒浅,以阳为易治者多生,以阴为难治者多死。方诊脉之虚实,可知顺险,以决其终。凡疮未溃前,脉要太过一、二至,已溃后,又宜不及二、三分,此为脉病相应,首尾自不变生;如其相反,恐防不测。但看法全在目力精巧,与心相应,一一参明,表里透彻,然后方定治法。凡疮七日以前,形势未成。元气未弱,不论阴阳、表里、寒热、虚实,俱先当灸,轻者使毒气随火而散,重者拔引郁毒,通彻内外。所得火引毒气混合为阳,方能发肿作痛,然后可汗可攻,或消或托,兼求标本参治,必以脉合药,以药合病,如此治之,自然无错矣。故药难执方,全在活法。大抵关节首尾,俱不可损伤元气、脾胃为要。

内服蟾酥丸一服,外将神火照三枝。

凡疮初起,七日之前,或已灸之,后未服他药,宜用蟾酥丸一服得汗解为妙,或万灵丹发汗亦可。所谓毒气随汗而散,最为捷径。如二药服后,发汗不出,此乃表里闭塞之故,毒亦不轻,当神妙拔根方施治,神灯照法甚效。亦不可用之太早,如疮四、五日之间,形未聚,毒未出,若用之早,恐留郁而内毒反致难出,用须在八、九日之后,疮势已定,毒气已聚,未成脓腐之时,用此照之,已成者自高,未成者自消,不溃者自溃,不脱者自脱,亦且解毒活血、消肿散瘀之良法也。用膏贴顶上,敷药四边围。

凡疮最忌风寒所袭,初起之时,或已灸之后,俱当用太乙膏盖贴顶上,功效在于拔毒、提顶、提脓、防御风寒不入;如焮痛高肿,阳疮七日以后,疮头自有黄色稠脓相粘膏上,余肿红色,光亮鲜明,每日宜用葱汤洗净,换药贴之,其正脓定在十一日前后出也,此为易治易安之症。如七日之后,疮不大肿高,四边又不焮痛,疮头亦无脓意相粘,此为阴阳相等之症。宜用化腐紫霞膏涂疮顶上,外以膏药盖之,换至十日后,疮顶渐腐,余肿渐高,似有脓意之象,其正脓只在十五日之后可出也,此为以险成顺之症。至于二十日以后无脓者,乃纯阴之症,纵治亦无效矣。又如疮之四边根脚余肿,其功又在敷药收束根本庶不开大,初起时,宜用金黄散敷于四边,乃拔毒、消肿、止痛;既溃后,当用铁桶膏箍之,庶疮根渐收渐紧。但诸疮原因气血凝滞而成,切不可纯用凉药,

冰凝肌肉，多致难腐难敛，必当温暖散滞、行瘀、拔毒、活血药用之方为妥当也。

气盛兮，顶自高而突起；血盛兮，根脚束而无疑。

气血者，人之所原禀，老者尚或有余，少者亦有不足，人之命脉，全赖于此。况百病生焉，失此岂能无变，独疮科尤关系不浅。但肿疡时若无正气冲托，则疮顶不能高肿，亦不能焮痛；溃脓则无真阴相滋，则疮根不能收束，色亦不能红活收敛。凡视疮之顶高根活，不论老少，定知气血有余，故知老幼俱可无妨。又宜交会明白，交会者，疮根与好肉交界之处，高低自然。分别明白者，疮形与好形各无混杂，自然分明也。以此观之，了然明白矣。

高肿起者，忌用攻利之药，以伤元气；平塌漫者，宜投补托之剂，以益其虚。

凡疮初发自然高起者，此疮原属阳症，而内脏原无深毒，亦且毒发于表，便宜托里以速其脓。忌用内消攻伐之药，以伤脾气，脓反难成，多致不能溃敛。又疮初起，不高不赤，平塌漫者，此乃元气本虚，急宜投托里温中健脾之药，务要催托毒气在外，庶无辨证矣。

内热甚者，量加消毒清剂；便秘燥者，必须通利相宜；使脏腑得宣通，俾气血自流利。

肿疡时内热口干，脉实烦躁，便秘喜冷者，此为邪毒在里，急与寒凉攻利，宜内疏黄连汤、四顺清凉饮、内消沃雪汤俱可选用。又兼有表症者，防风通圣散去麻黄，或双解散加桔梗、天花粉。又或小便不利者，兼入天水散、五苓散俱可合用，务使二便通利以杜其源。又有元气素虚者，恐不胜前药，以托里消毒散加蜜炒大黄，或兼猪胆套^①法亦得，通利为度。首尾俱要闭而不结，通而不泄，得脏腑和平，表里透彻，方可便^②用托里、排脓、内补之药。又如溃瘍时虽有口干便秘，脏腑不和，小水不利等症，此因溃后脓水出多，内亡津液，气血虚耗，不能荣润脏腑所致。其人必脉细而数，口和而干，饮食减少，好饮热汤，此乃虚阳

① 套：疑作“导”。

② 便：清·泾南海学刊本卷一作“使”。

之火为病,非前说有余所比,只宜养气血、滋津液、和脏腑、理脾胃。如此治之,则二便自和,亦无变症,常有误行攻利,多致不救者有矣。

十日之间疮尚坚,必用铍针,当头点破。

凡疮十日以后,自当腐溃为脓,如期不作脓腐,仍尚坚硬者,此属阴阳相半之症。疮根必多深固,若不将针当头点入寸许,开窍发泄,使毒气无从而出,必致内攻也。倘内有脓,又便易出,此为开户逐贼之意也。亦有十日外,疮虽不腐溃,形尚红活、焮热、肿痛,此虽脓迟,后必有出,此又不必针之。盖缘元气不能充足,或失用补托之药,又误用寒凉,或盖覆未暖,多致脓迟,有此症者,宜用补中健脾、大托补药,以得脓为效。又以十五日至二十一日为期,过此外者,纵有稀脓,但元气被毒相距日久,必致耗散,诚难归结也。

半月之后脓亦少,须将药筒对顶拔提,有脓血之交粘,必腐肉之易脱。

如疮半月后仍不腐溃、不作脓者,毒必内陷,急用铍针品字样当原顶寸许点开三孔,随疮之深浅一寸、二寸皆可入之,入针不痛,再深入不妨,随将药筒预先煮热,对孔窍合之良久,候温取下。如拔出之物,血要红而微紫,脓要黄而带鲜,此为血气营运活疮,其人必多活。又谓脓血交粘,用药可全,色鲜红活,腐肉易脱。如拔出瘀血紫黑,色败气秽,稀水无脓者,此为气血内败死疮。所谓气败血衰,神仙叹哉!此等之疮难久,候其人必在月终亡。

且如斯时内有脓而不得外发者,以针钩向正面钩起顽肉,用刀剪当原顶剪开寸余,使脓管得通流,庶疮头无闭塞。

已用药筒拔脓之后,外既有孔,内窍亦通,疮期又当大脓发泄之候。如尚脓少,亦非自然得出,故疮头必有瘀腐涂塞,内肉亦有顽膜阻隔,多致脓管不通,自难出也。须用针钩钩起疮顶顽肉,以铍针、利剪随便取去寸余顽硬之肉,取之微痛,亦自血出,俱自不妨,随用两手轻重得宜,从疮根焮处渐渐擦至中间,剪出脓管处,内有聚脓,自然涌出,以黄色稠厚为吉,其脓日渐多者为轻,反此为虑。此功务使涂塞者开之,令脓毒外发也。

频将汤洗,切忌风吹。

凡疮未溃前,或已用照药后,俱要煎葱艾汤每日淋洗疮上一次,甚者早晚二次,使气血疏通,易于溃散。又已溃时及药筒提拔之后,尤宜避风,先去旧药,用方盘靠身疮下放定,随用猪蹄汤以软绢淋汤疮上,并入孔内轻手捺净内脓,庶败腐宿逐随汤而出,以净为度。再以软帛叠成七、八重,勿令大干,带汤覆于疮上,两手轻盈旋按片时,帛温再换,如此洗按四、五次,使血气得疏,患者自然爽快。亦取瘀滞得通、毒气得解、腐肉得脱、疼痛得减,此手功之要法,大疮不可缺也。候腐脱已见红肉时,洗后随用玉红膏,用抵脚挑膏于手心上捺化,捺涂患之新旧肉上,外用太乙膏盖之,四边根脚已消处不必箍药,每日如此。用之不

数日间,脓腐尽脱,新肉顿生,更加内补调理得宜,轻疮只在月余,大疮不过七十日必完口而愈。

又关节在于斯时,变生出于此候。

关节者,阳疮以十四日为关,阴疮二十一日为节。此时务要出脓,势定不可过攘,但脓出方自腐脱,腐脱方自肌生,肌生方自收敛,收敛方自疮平,此为疮之关节,亦由次序来也。如期不得脓者,后必便有变生,为一关顺后必多顺,一关逆后必多逆,以此观之,不可不察也。

治当大补,得全收敛之功。切忌寒凉,致取变生之局。

凡疮溃脓之后,五脏亏损,气血大虚。外形虽似有余,而内脏真实不足,法当纯补,乃至多生。但见已溃时发热恶寒,脓多自汗作痛者,便进十全大补汤;但见虚热少睡,饮食不甘者,便进黄芪人参汤;但见皮寒虚热,咳嗽有痰者,便进托里清中汤;但见四肢倦怠,肌肉消瘦,面黄短气者,便进人参养荣汤;但见脓多,心烦少食,发躁不睡者,便进圣愈汤;但见脾亏气弱,身凉脉细,大便溏泄者,便进托里温中汤;但见饮食不甘,恶心呕吐者,便进香砂六君子汤;但见脾虚下陷食少,虚热间作者,便进补中益气汤;但见肾虚作渴,不能相制心火者,便进加减八味丸,仿此选用。盖托里则气血壮而脾胃盛,使脓秽自排、毒气自解、死肉自溃、新肉自生、饮食自进、疮口自敛。若不务补托,而误用寒凉,谓之真气虚而益虚,邪气实而益实,多至疮毒内陷、脓多臭秽,甚则脉洪大渴,面红气短,此真气虚而死矣。

盖疮全赖脾土，调理必要端详。

脾胃者，脾为仓廩之官，胃为水谷之海。胃主司纳，脾主消导，一表一里，一纳一消，运行不息，生化无穷。至于周身气血，遍体脉络、四肢百骸、五脏六腑，皆借此以生养。又谓得土者昌，失土者亡。盖脾胃盛者，则多食而易饥，其人多肥，气血亦壮；脾胃弱者，则少食而难化，其人多瘦，气血变衰。所以命赖以活，病赖以安，况外科尤关紧要。善养生者，节饮食，调寒暑，戒喜怒，省劳役，此则不损其脾胃也。如不然，则精神气血由此而日亏，脏腑脉络由此而日损，肌肉形体由此而日削，所谓调理一失，百病生焉。故知脾胃不可不端详矣。

冬要温床暖室，夏宜净几明窗。

但人之气血，喜暖而恶寒。又谓遇寒则结，遇热则散，况疮乃肌肉破绽之病，若不御风寒，最为易袭。凡看疮时，冬要着紫炭之火，旺旺暖气，逼尽余寒；夏宜净几明窗，亦庶外风不入，然后方可揭膏洗贴疮上。常见患者夏月纵意当风取凉，或睡卧阴湿之处，冬又不从温床暖室，多致寒侵，轻则有妨生肌完口，重则变为崩塌不脓、不敛阴症，此常有也。凡重命君子，可不预慎哉。

饮食何须戒口，冷硬腻物休餐。

饮食者，人之所赖以生养，必要适其时而食之。如人之病中肿痛时，自然痛伤胃气，诸味不喜。直待溃后，脓毒一出，胃气便回，方欲思食，彼时但所喜者，便可与之以接补脾胃。如所思之物不与，此为逆其胃气，而反致不能食也，切要不可太过。惟忌者，生冷伤脾，硬物难化，肥腻滑肠，故禁之。余随使用也。

痈疽虽属外科，用药即同内伤。

古之以外科推为杂病之先，盖此伤人迅速，关系不浅，故特设于前也。且如痈疽、脑项疔毒大疮，形势虽出于外，而受病之源实在内也。及其所治，岂可舍于内而治外乎？所以外不起者内加托药，表热甚者内必清解，血虚宜用四物汤，气虚宜用四君子，脉虚足冷温中，脉实身热凉膈。以此推之，内外自无两异。但世以疮形言之，曰外科；治以气血言之，即内伤。凡医者治法，不可混于内理，以致生变症。

脉虚病虚，首尾必行补法；表实里实，临时暂用攻方。

丹溪云：凡疮未破，毒攻脏腑，一毫热药断不可用；凡疮既破，脏腑已亏，一毫凉药亦不可用。诚哉是言也。兹说又有不然，且如初病未破时，脉得微、沉、缓、涩、细、数、浮、空，外形又兼身凉、自汗，便利，呕吐少食者，疮形又不起发，不焮不痛，无溃无脓，此等症者，皆缘气血虚弱之故，若执前云未破毒攻脏腑之说，必投凉药攻之，复损元气，患者其生乎？其死乎？予论治病，不论首尾，难拘日数，但见脉症虚弱，便与滋补，乃可万全。如补不应，未可安然，虚弱甚者，须用参术膏、八仙糕；阳虚自汗、食少者，单人参膏，或六君子汤加砂仁、木香，甚加附子；泄泻肠鸣，胃虚呕逆者，参苓白术散加豆蔻、山药、木香、柿蒂；脾虚下陷溏泄及肛门坠重者，补中益气汤加山药、山萸、五味子，以此选用。又有表实者，身体发热，无汗恶寒；里实者，脉大身热，便燥口干。假如表症急者，先用荆防败毒散以解其表；里症急者，先用四顺清凉饮以攻其里；表里相兼者，宜防风通圣散发表攻里。此随其表里先后，皆在活法暂时之用也。于意受补者，自无痰火内毒之相杂；不受补者，乃有阴火湿热之兼攻。又谓补而应药者多生，虚而不受补者不治。

病要论久新，要法在于宽治猛治。

且如人之病有新久，势有缓急，如受病之初，元气未弱，治当随症迎刃而解。若惧行霸道猛剂，定不能决效于危急时也。但要中病即已，故谓药不瞑眩，厥疾不瘳。且如表症盛者，用万灵丹大加表散；里症急者，以内疏黄连汤急与通行。又如受病日久，邪正相拒，其元气未有不衰弱者，纵有余症、杂症、坏症，俱当先固其本，而后调之、和之、散之，使病气渐退、元气渐醒、饮食渐进、根本渐实，则余患再无不愈之理。所谓势孤则守，本立道生。常见治者，不论病之新久，本之盛衰，又不悟因虚致病，因病致虚，其中又有虚热、虚寒之别。一例妄行攻治，如盲人骑瞎马，半夜临深池，岂不致危哉。

药必求标本，功莫别于先医后医，若一概之攻补，恐两途之误用。

凡物理皆有标本，而身病之标本，尤其莫切焉。且以天地运气标本言之，以五运为本，六气为标，此所以参天地之化育，明五行之生克，考节候之寒温，察民病之凶吉，又主万物荣者皆荣，疾者皆疾，此所属天地气运之标本也。以身体标本言之，以五脏为本，六腑为标。五脏

主里、主血，六腑属表、属气，此所以主脏腑气血之盛衰，禀筋骨髓脑之强弱，司疾病之浅深，发生成之寿夭，此所属身体阴阳之标本也。以疾病标本言之，先以初病为本，后以传病为标；又以元气为本，病气为标。此所主寒热、表里、缓急之病，应汗下、补泻、和解之方。凡治病者，必先治其本，后治其标，诚为妥当。若先治其标，后治其本，使邪气滋甚，其病益增。又谓缓则治其本，急则治其标，假如先得疮疾，而后得泄泻、呕吐、食少等症，此又宜舍本从标之法治之，候泄止、呕定、食进，方再治疮，余皆仿此。若一概攻补，必两途误用，此所属疾病邪正之标本也。

又说阳变为阴，内外被寒凉克伐。

疮本发于阳者，为痈、为热、为实、为疼。此原属阳症易治，多因患者不觉，以为小恙，不早求治，反又外受风寒，内伤生冷；或又被医者失于补托，而又以凉药敷围，图其内消之以合病家之意，多致气血冰凝，脾胃伤败，使疮毒不得外发，必致内攻，凡此症往往不救者多矣。如疮变在十一日未出脓之前，形势与好肉相平，不疼不热，软漫相兼，疮孔止流清稀肥水，更兼身体不热，脉亦细微，饮食厌餐，精神昏短，有此症者，疮毒变入，真阴虽强，投温中健脾之剂不应者，百无一生之理。如疮变在十五日之后已出脓时，毒气已将外发，如有调摄失宜，误餐冷物，忽变为阴者，急投托里温中汤、十二味异功散，轻者十全大补汤，俱倍加参、芪、桂、附以救之，须得疮热作痛，脓出身温，脉起食进者为吉。但疮原本为阳，其人故得多生者有矣。

岂期阴变为阳，首尾得辛热扶装，病分真似，理究阴阳。

疮本发于阴者为疽、为冷、为硬、为虚，此原属阴症难治。患者知觉，欲其生而故将辛香酒煎、大方热药以助之；医者又欲患处高肿焮热作脓，敷以热药，图其起发，故疮得药性大热，而转阴为阳。其疮虽得微肿、微热、微痛、微脓，但疮形终不似真阳红活，亦不能得其真厚黄脓，如此者，其疮不久复归阴矣。但疮原本于阴，其人故多死，凡值此症，若患者方寸不杂，托信于医，而医者又得机关透彻，治法得宜，内外融和，偶偶中节，其中亦有可生者，十中一、二矣。其要如救焚拯溺，可施者毋待少顷；其切似履冰渊，可禁者毋妄丝毫。如此而不得其生，患

者实天命而已。

既有针工之异说,岂无线药之品详。

凡疮毒既已成,当托其脓。脓既已成,当用针通,此举世自然之良规也。必当验其生熟、浅深、上下而针之。假如肿高而软者,发于肌肉,脓熟用针只针四、五分;肿下而坚者,发于筋脉,脓熟用针只在六、七分;肿平肉色不变者,毒气附于骨也,脓熟用针必须入深寸许方得见脓。又轻按热甚便痛者,有脓且浅且稠;重按微热方痛者,有脓且深且稀。按之陷而不起者,脓未成;按之软而复起者,脓已成。按之都硬不痛者无脓,非是脓即瘀血也;按之都软不痛者有脓,非是脓即湿水也。所谓有脓即当针,脓孔宜顺下。若脓生而用针,气血反泄,脓反难成;若脓熟而不针,腐溃益深,疮口难敛;若脓深而针浅,内脓不出,外血反泄;脓浅而针深,内脓虽出,良肉受伤。元气虚者,必先补而后针其脓,诸症悉退。又有气瘰,肿而绵软不痛者,血瘰肿而内垒成块者,顽毒结之日久,皮腐、肉紫、根硬,四边红丝缠绕者,以及结核之症渐大、渐痛、渐腐者。已上四症,俱不可轻用针刀掘破,若妄用之,定然出血不止者立危。但用针之法,妙在脓随针出而寂然无所知觉也。至于瘰瘤、瘰疬、诸痔、诸漏、疔毒、坚硬顽疮,此等症者,若非线药之功,亦不能刻期取效。夫线药乃有五、六种,难以概说,与其各病相应者,亦随症附列于各门,以便选用,故未述于此篇。凡用者,宜善而用之。

汤散丸丹要在发而必中,神圣工巧诚为学者机关。

为医善用方,如将善用兵。善于水者,涉海潜波,瞞津扑浪;善于陆者,穿山越岭,附葛攀藤。奇偶者,鼓舞飞扬;蹊径者,浮沉钻凿。弱者可守,强者当敌,此为将得兵用兵之大法也。如为医者,理皆仿此。其要在知人之强弱,识病之内、外,究病之浅深,察时之顺逆,然后可汗、可攻,或吐、或下,或宜和解,或宜补益,又知某汤善汗,某散善攻,某丸善和,某丹善补,因其病而用其方,如矢发机投之必中,中之必胜,胜之则病无不愈之理。此为医得方,用方之大法也。又如望、闻、问、切、神、圣、工、巧亦可兼之,所谓望其形而通其神,闻其声而明其圣,问其由而得其工,切其脉而续其巧。此四者,诚为初学之绳墨也。

至于千方百症,难将说尽短长。

方不在多，心契则灵；症不在难，意会则明。方不心契，症不意会，如疏散之交；寡游之地，性情形势不切，何以便托用哉！故药不应病，病不应药，即此据也。

治在活法，贵在审详。

尝言昔者承平，今时扰攘，所以动静世务不同，劳逸机关已异，当原受病，从外而来；今之受病，从内而发。又古者多实，设方宜散宜宣；故今者多虚，治法宜滋、宜补。若医者不识古知今，一概施与，必多致其夭亡者也。

用之必得其当，医斯可以称良；词虽近于粗鄙，可为后学提纲。

痈疽阳症歌第三

痈疽不论上中下，惟在阴阳二症推，发背虽有正与偏，要取高低两样看。纯阳初起必焮肿，更兼身热有微寒，顶如尖字高突起，肿似弯弓根有盘。七日之间多焮痛，二七之间脓渐漫，动息自宁食知味，二便调匀无泻干。肿消脓溃精神爽，脱腐生新气血完，五善自然臻并至，七恶全无半点干。痛便随脓减，肿退自肌宽。新肉已生红艳艳，腐皮自敛白漫漫，一身多爽快，五脏尽和欢。此属纯阳俱易治，百人百可保安全。

痈疽阴症歌第四

纯阴初起不知疮，粟米之形疙瘩僵，不红不肿不知痛，少热少焮少提防。七朝之后身体倦，疮根平大喜浇汤，顶不高兮根不活，色不光兮腐不穰。陷软无脓空结聚，脉浮散大细飞扬，饮食不餐身战战，尝汤止许意忙忙。疮上生衣如脱甲，孔中结子似含芳，脓多臭秽身难便，举动惶惶韵不长。疮形成紫黑，面色变青黄。精神昏愤多鼾睡，言语无人自发扬，口干多舌强，痰喘定身亡。此属纯阴俱不治，百人百可到泉乡。

痈疽半阴半阳症歌第五

阴阳之症两相交，生死同兼事可招，微热微寒微赤肿，半昏半爽半平高。脉来虽数多无力，饮食虽餐便不消，肿而不溃因脾弱，溃而不敛为脓饶。大便多溏小便数，上身有汗下身焦。五善虽兼有，七恶未全逃。口渴喜茶肠腹痛，面浮厌饮足心高。心烦不稳睡，神乱怕音焦。投方应病方为妙，阴转为阳渐可调。心真造化，尔命坚牢，逢之任是神仙手，半死余生定莫逃。

痈疽五善歌第六

心善精神爽，言清舌润鲜，疮疼兼不渴，睡醒得安然。肝善身轻便，因烦自不烦，指头红活色，坐起觉平康。脾善唇滋润，衾帟兰麝香，凡餐俱有味，脓厚更肥黄。肺善声音响，无痰韵更长，肌肤多滑润，大便自寻常。肾善诚为要，水升火自降，口和兼不渴，小水得稀长。

痈疽七恶歌第七

一恶神昏愤，心烦舌上干，疮形多紫黑，言语自呢喃。二恶腰身强，目精邪视人，疮头流血水。三恶形消瘦，脓清臭秽生，疮形多软陷，脾败不知疼。四恶皮肤槁，声嘶韵不长，疼多兼喘急，鼻动肺将亡。五恶成消渴，随饮即随干，形容多惨黑，囊缩肾家端。六恶身浮肿，肠鸣呕呃频，大肠多滑泄，脏腑并将倾。七恶疮倒陷，形如剥鳞同，四肢多冷逆，污水自流通。

治病则例歌第八

外科之疮有治例，说与君家须切记，病端百出别根因，方法一囊岂同类。热与寒，通与秘，其中消息知端的。通多不足秘多余，热实寒虚

分症治。阳似阴，阴似阳，似中妙理要推详。不分表里一例治，轻变重而重变亡。医者贵乎多应变，不可偏执用其方。且如表症恶寒，宜用荆防败毒散；里症发热，可将内疏黄连汤。疮势已成，托里消毒散诚为正法。内脓将溃，十全大补汤最得相当。人参养荣汤治溃后虚热发作，木香流气饮散结肿寒湿为殃。饮食不甘，定用香砂开胃；精神怯少，须将参术回阳。阴虚阳虚，须八珍最为要领；盗汗自汗，得独参一味可强。溃后多疼，乳香定痛散功奇莫缓；脾虚下陷，补中益气汤功效尤良。口燥谵言，泻实火须黄连解毒（汤）；心烦衄血，理虚阳必犀角地黄（汤）。古法治痈疽，称述仙方活命饮；今时医发背，还期神授卫生汤。蟾酥丸在外科称为独品，护心散解内毒号曰无双。诘知蜡矾丸护膜，护心，可羡淡中有味；还赞玉红膏生肌、生肉，堪夸坏里呈祥。身凉自汗，腹痛肠鸣、呕逆，岂逃异功散；睡卧不宁、虚阳发躁、脓多定用圣愈汤。生脉散接虚羸脉来微细，归脾汤除惊悸睡得安康。竹叶石膏（汤）治虚烦、身热者何须疑虚，麦冬清肺（饮）除膈热有痰者毋待商量。金鲤汤治肺痈吐脓气急，玄龟丹攻结毒臭腐顽疮。风热生疮通圣散，疮疡狂躁破棺丹。小柴胡（汤）除客邪往来潮热；大防风（汤）攻腿膝寒湿为殃。咽肿咽疼定用清咽利膈散，斑红斑紫岂逃化斑解毒汤。八味丸捐口干妙药，二神丸治脾泄奇方。香连丸为脏腑泻痢通用，甘露饮治口齿腐烂相当。六和汤和脾止吐泻，双解散解表理内伤。逍遥散善治女人诸病，保元汤常扶赤子多伤。皮肤毛发干焦，芦荟丸效应甚捷；咽喉口齿肿痛，冰硼散功实非常。滋肾丸治下元肾虚不固，凉膈散解上焦膈热多烦。九龙丹消鱼口吞之灭迹，二蛟散行湿肿服下安康。吕祖一枝梅止痢定惊，称为仙药；真君妙贴饮消疼痛，号曰神方。痔漏、瘰疬、疔毒，古夸三品锭；痈疽、流注、诸风，今羨万灵丹。柴胡清肝汤治鬚疽肝胆有效，黄连消毒饮医对口督脉尤良。小儿口内生疳必用人中白散，大人咽喉肿痛须将金锁匙汤。下疳新久珍珠散，小便淋涩木通汤。玉真散破伤风效，复元汤跌扑称强。提肩散治胳膊强直作痛，拈痛汤除腿风湿相伤。小便生疳，龙胆泻肝汤可羨。大头肿痛，普济消毒饮何妨。便毒悬痈，内消散吞何足虑，臀痛腿病，芪柴汤下自无殃。又有女子阴疮，能肿能疼能至痒，在人活法，或消或补或

驱虫。盖男子之囊痈，泻肝经之湿热。小儿赤游丹，解毒兼砭血。凡治杨梅疮，戒熏为至切，舌下发痰包，利剪方能泄，出如鸡蛋清，消痰是真诀。结毒与顽疮，紫金膏可设。风疮彻骨痒，雄黄散效绝。疔疮先刺血，内毒宜宣泄，禁灸不禁针，怕绵（绵者，毒陷也）不怕铁（铁者，入针坚硬有声）。又有失荣肿，坚硬如岩凸。强阴失道症，形状要分别。妇人之乳岩，此中一例决，未破肉嵒棱，已溃流臭血。如此几般症，古今无治说。疮有数百种，难以都陈曰。惟在一点心，何须三寸舌。学者若精灵，万事皆通彻，此为粗糙歌，可讥亦可阅。

痈疽灸法并禁灸疮穴第九

凡疮初起，惟除项之以上，余皆并用艾火，随疮势之大小，灸艾壮之多少，用蒜切成薄片，安于疮顶上，着艾炷蒜上，点火三壮，一换蒜片，初灸觉痛，以不痛似痒为止；初灸不痛，以知痛痒为住。如初灸，全然不觉痛痒，宜去蒜，当明灸之。又阴疮日数多者，艾炷不及其事，以蒜捣烂铺于疮上，以艾亦铺蒜上，点火灸之，必知痛甚为效。此为火气方得入里，知痛深处方是好肉。盖艾火拔引郁毒，透通疮窍，使内毒有路而外发，诚为疮科首节第一法也。贵在乎早灸为佳。又有禁灸数症，亦以参详。头乃诸阳之首，纯阳无阴之处，凡生疮肿俱有亢阳热极所致，如再加艾火使毒气炽甚，随后反加大肿，最能引动内痰，发之必死，面生疔毒亦然。又有肾俞一穴，在于两腰脊傍，系内肾命根所系之处，此穴发疮，多因房劳素亏，肾水枯竭而成。若再加艾灸，火烁其源，必致内外干涸，多成黑陷，昏闷而死。又有患者元气素虚，发疮多不高肿，其人体必倦怠，精神必短而昏，脉必浮散空虚数而不鼓，此内无真气抵挡火气，如灸之，其人必致错悞而死。常谓艾火不亏人，此言误之多矣，医者亦宜详察之。

论病生死法第十

初生如粟，里可容谷。外面如麻，里面如瓜；外面如钱，里可容拳。

起势大，终无害，未老先白头，无脓软陷休。疮从疙瘩起，有脓生方许，肿溃气昂昂，不治自安康。根高顶又高，八十寿还饶，焮痛易腐烂，任大终无恙。疮高热焮疼，虽苦必然生，疮软无神气，应补方为益。肉肿疮不肿，必竟生疑恐，脓秽不进食，泄泻黄泉客。疮色猪肝紫，无脓必定死，绵溃不腐烂，内怕葡萄嵌。仰卧不知疼，阴症命难生，腐尽有败气，笑里终生戾。根散疮平塌，神仙无治法，久病目露神，必竟命难存。面忽似涂脂，十日后分离，败中有红肉，虽重生门路。新肉如板片，不食终须变，手足皮枯槁，血败生难保。唇白眼无神，腹胀泻将倾，脘气不滯气，虽重多生意。眼匡黑气浓，痈疽怕此逢。房中香馥馥，是病终为福。疮热身微热，轻病何须说，生死此中求，片言一可决。

察形色顺逆第十一

凡看人病，兼视其形色，后与脉病相参，诚识于始，以决其终，百无一失矣。何以知之？阴病见阳色，腮颧红献；阳病见阴色，指甲呈青，此二者俱死。又身热脉细，唇吻反青，目珠直视者死。面如涂脂，色若土黄，油腻黑气涂抹者死。唇舌干焦，鼻生烟煤，眼神透露者死。形容憔悴，精神昏短，身形缩小者死。喘粗气短，鼻掀睛露，语言谵妄者死。循衣摸床，遗尿失禁，撮空者死。头低项软，眼视无神，吸吸短气者死。皮破无血，肉绽烂斑，麻木不知痛痒者死。齿黄色如煮豆，唇白反理无纹，耳黑枯焦不听，人中缩而坦平，口张气出无回闭，鼻煽相随呼吸行，汗出如珠不散，痰若胶而坚凝，白血红如肺色，指甲弯而带青，神昏神浮、神乱神离，缟衣生满面，黑气惨天庭，逢之都没命，法在此中评。

病有三因受病主治不同论第十二

三因者，内因、外因、不内外因。此说从于先古，其词意尚有发而未尽者。内因者，皆起于七情蕴结于内，又兼厚味膏粱熏蒸脏腑，房欲劳伤亏损元气，乃五脏受之，其病由此内发者，但发之多在富贵人及肥胖者十有八、九。其见症，疮多坚硬，根蒂深固，二便不调，饮食少进，

外软内坚,平陷无脓,表实里虚,毒多难出,得此者即病症之内伤也,故曰内因。外因者,皆起于六淫体虚之人,夏秋露卧,当风取凉,坐眠湿地,以致风寒湿气袭于经络;又有房事后得之,其寒毒乘虚深入骨髓,与气血相凝者尤重;或外感风邪,发散未尽,遂成肿痛。此肌肉血脉筋骨受之,其病由此外来者,发之多在不善调摄,劳碌人,十有八、九。见症多寒热交作,筋骨疼痛,步履艰辛,湿痰流毒以及诸风瘫痪,口眼歪斜,半身不遂,风湿、风温、天行时毒等症,得此者即疾病之外感也。故曰外因。又有不内外因,内无七情干内,外无六淫伤外,何由来也?其病得之于饥饱劳役,喜怒不常,饮食者冷热不调,动作者勤劳不惜,以致脏腑不和,荣卫不顺,脾胃受伤,经络凝滞。故为疾者,外无六经形症,内无便溺阻隔,其病多生于膜外肉里肌肤之间,似瘰癧、痰注、气痞、癭瘤之属,治法不必发表攻里,只当养气血,调经脉,健脾和中、行痰开郁治之,法为最善。此是三因理之尽矣。

调理须知第十三

凡人无病时,不善调理而致生百病。况既病之后,若不加调摄,而病岂能得愈乎。其调治有法,初起病时,先看病者元气虚实,次者疮之阴阳险否,然后用药调治。当攻即攻,可补便补,不可因循耽误,以致变态不虞也。且患者又当安定心神,相忘诸念,毋使惶惶,乃保神气不得变乱也。再顺天时,假如夏热坐卧不可当风,忌置水于榻前床下;冬寒须避起居,常要温和,非柴火不可开疮看视,常有寒侵致生多变。又未溃之先,毒气内作,倘有口干渴症者,凉物须当少少与之,以滋蕴热。至脓溃之后,生冷硬物一概禁之,不然伤脾损胃,脓必难成,致疮软陷,又难收敛。饮食须当香燥甘甜,粥饭随其喜恶,毋餐过饱,宜少、宜热、宜浓,方无停滞,又得易化故也。如大疮溃后,气血两虚,脾胃并弱,必制八仙糕,早晚随食数饼以接补真元、培助根本,再熬参术膏。如患者脾胃俱虚,欲食减少,胸膈不宽,饮食无味者,用白术膏三匙,人参膏二匙,清米汤空心化服,喜饮者酒化亦可。若精神短少,昏沉多睡,自汗劳倦,懒于动作者用人参膏三匙,白术膏二匙,亦酒化服。如肌肤粗

涩，面苍不泽，或大便血少虚秘，以及皮干发槁者，同地黄膏各二匙和服，或饮阳春酒更妙。其功强健精神，顿生气血，开胃助脾，润肌荣胃，此二药功甚非小，大疮不可缺之，实非草药之比，病者当信用之，乃无更变。虚视者，又多反复不常，故有易愈难愈之态，实在乎得此失此之规也。

杂忌须知第十四

凡病虽在于用药调理，而又要关于杂禁之法，先要洒扫患房洁净，冬必温帟，夏宜凉帐，庶防苍蝇蜈蚣之属侵之。……牛、犬、腥膻、腌腊、熏藏之物，俱能作渴；生干瓜、果、梨、柿、菱、枣生冷等类，又能损胃伤脾；鸡、鹅、羊肉、蚌、蛤、河豚、虾、蟹海腥之属，并能动风发痒；油腻、煎、炒、烹、炙、咸、酸厚味等件，最能助火生痰；赤豆，弄面动气发病，恼怒急暴，多生痞满。饮食太过，必致脾殃；疮愈之后，劳役太早，乃为羸症。入房太早，后必损寿；不避风寒，复生流毒；不减口味，后必疮痒无度。大疮须忌半年，小疮当禁百日，此诚为知命君子也。

疮疡看法

初起顶高根活，色赤发热，焮肿疼痛，日渐高肿者顺。已成焮痛，皮薄光亮，饮食如常，二便调和，身温者顺。已溃脓稠，色鲜不臭，腐肉自脱，焮肿易消，身轻者顺。溃后脓厚稠黄，新肉易生，疮口易敛，饮食渐进者顺。初起顶平根散，色暗微肿，不热不疼，身体倦怠者逆。已成肿坚色紫，不作脓，不腐溃，惟口干多烦躁者逆。已溃皮烂，内坚不腐，肿仍不消，痛仍不减，心烦者逆。溃后脓水清稀，腐肉虽脱，新肉不生，色败臭秽者死。

肿疡治法

初起知痛或不痛，起发或不发，毋论阴阳表里，日数远近，但未见

脓者，俱宜灸之。既灸不知痛痒，明灸之。掀肿发热，疼痛有时，脉来浮数无便秘者，宜药托之。身体拘急，脉紧恶寒，饮热就暖者，邪在表也，宜汗之。肿硬痛深，口干便秘，身热脉实者，邪在里也，宜下之。掀痛势甚，烦躁饮冷，舌干口渴者，火在上也，宜清之。肿痛坚硬，背如负石，恶心干呕，邪毒在内，解毒拔之。肿痛日深，内脓不出，瘀肉涂塞疮口者，急宜开割之。软漫不作脓，及不腐溃者，阳气虚也，壮脾胃、助阳气。身凉自汗，手足并冷，六脉虚细，便泄阳脱也，急温之。

痈疽治验

一男子年五十余，背心生疽十三日矣。汤水全然不入，坚硬背如负石，烦闷不语，请视之。疮势虽重，皮色亦紫，喜其根脚交会明白，毒尚结局于此，未经入内，故可治之。须行拔法，使毒气外发，不致内攻为要。随煮药筒提拔二次，共去恶血碗许。又脉实便秘，以内疏黄连汤及猪胆套法，大便通利二次，使内外毒气皆得通泄，随夜睡卧得宁，背重失其大半。次用托里排脓之药，外以桑木灸法，肿硬渐腐，脓毒渐出，换服十全大补汤加麦冬、五味数服，腐肉自脱，饮食渐进，疮口渐合，调理两月余而愈。

一老妇年近七旬，背疮已过半月，形势全然可畏，彼家俱置不治，惶惶整备后事。召予看童稚疮恙，见问其故，举家大小咸言待毙朝夕，予强借观可否？视之疮形半背皆肿，疮虽不高，亦不内陷，以手按之外实而内腐。老年内虚，脓毒中膈，不得外发故也。虽饮食不餐，且喜根脚两无混杂，脏腑各无败色，乃有生之症也。病家故执不信，又言签龟命卜，俱断必死，治岂生乎？予嗟可惜也！再三、四日不治，内膜穿溃必死，此命陷于无辜矣。次日予心不服，自往讨治，喟然叹曰：予非相强，实见其有生，不忍舍其待死。固欲强之，医后药金分毫不取，直待患者果愈，随其酬补何如？彼众方肯。先用葱艾汤淋洗疮上，外面俱是不腐顽肉，随用铍针、利剪，正中取去二寸顽肉，放通脓管，以手轻重之间捺净内蓄脓血，交流不住约有三碗，傍视者无不点头失色。待脓血稍尽，仍换前汤洗净，用膏封贴。内用回元大成汤二服以接补真气，

后用人参养荣汤倍参、术加香附，早以八味丸、八仙糕相兼调理，欲其脾健食进，腐脱肌生。况此妇谨慎调理，并未更变，不出百日，疮愈身健而安。自后方信予言无谬也。

一监生年过五旬，素有渴症，身又肥胖之极，生背疽约有尺许，至十二朝后请治。视期疮势微肿，色淡微红，根脚半收半散，此阴阳相等之症也。况肥人内虚，疮势又大，非补托疮必难起，毒必易陷，恐后不及事也。初服便以托里散固其内，候至十五日外，用铍针小小从顶放通三孔，庶使内脓内毒有路而出，势大不可过放走泄元气，恐脓难成，内用参芪内托散倍加人参、黄芪各三钱，服至二十日，大脓将发，日至升许，早以参术膏、午用十全汤加参、芪各四钱，麦冬、五味子各一钱，服至月余，肉腐通溃，浓似泉涌，间用圣愈汤、八仙糕兼之调理，保助脾胃，增进饮食，后恐前药不胜其事，药中加熟附一钱，喜其脾健、脓稠色黄而止。至四十日外，疮势方得微退。时值仲夏，天炎酷热，患者生烦，误饮冷水二碗，至晚疮随下陷，忽变为阴，不痛无脓，身凉脉细，腹痛足冷，彼觉请视，疮形软陷，脉亦细微，此疮因寒变之故也，非辛热不可回阳。急用十二味异功散倍人参、熟附各三钱，不应，此药力不胜其寒也。换用生附、人参各五钱，早晚二服，方得身温脉起，疮高腹痛，又二服，脓似前流，大脓出至一月，约有百碗余，竟不减少。外皮红退，亦不腐烂，此肥人外实而内虚，皮故不腐而内溃也。又用红玉膏搽于棉花片上推入患内膏盖之，其内腐渐脱渐出。又十日后，出大腐一块，约有六两，自然肿消。身便脓少，渐长生肌，百日外方得平复。人参服过五斤外，附子亦有十两余，方得全安。此症设用解毒、伤脾、宣利等药，不用辛热峻补，岂有得生之理。

一乡官年逾七旬余，发疮右背，已经八日。外视之疮虽微肿，色淡不红。势若龟形，根漫不耸，此老年气血衰弱之故也。诊其脉带微数而有力，此根本尚有蒂也，虽老可治，随用排脓内托散加皂刺以溃脓、托里为要。服至十三日后，疮渐肿高，色亦渐赤，便不能腐溃为脓，此食少脾弱，不能培养之故也。又用十全大补汤数服，脓亦渐出，不能快利。凡脓涩滞者，内膜中隔不通故也，不可惜其老而误其大事，随用铍针当头取开寸许，捺通脓管，果脓随出，以猪蹄汤洗净膏盖后，用照药

每日一次,外肉渐腐为脓。患者形色枯槁不泽,更用人参养荣汤倍加参、芪托里,腐肉将脱者取之,新肉欲生者培之。但老年气血不能速效,又加服参术膏早晚二次,以后新肉方生,饮食顿倍,调理七十五日而安。

一庠生年六十余,患背疽十日。外视其疮形坚硬,色亦深紫,头发甚多,含若螺子,竖长尺余,根横半背,且喜其弓肿光亮,发热焮痛,脉得洪数而有力。此疮得于膏粱、醇酒湿热交蒸之故也,虽重不妨。随用照药三条相应照毕,其头内含螺子尽欲吐出,亦用扞脚括去,又流恶血钟许。葱汤洗净搽上腐药,用纸盖贴,周围根脚用吸毒散敷之。收其毒气,庶不开大,次日仍照旧敷。三日后,外肉渐腐,内加托药培助脾胃,解毒为脓,早服八味丸以滋肾水。换洗蹄汤,仍将膏贴,候其腐尽深入寸余,随用红膏日渐日长。但此公素性好饮,虽在恙中不能相忌,两月后新肉虽平,娇嫩不能结皮完口。因嫌戒饮,复将浮嫩之肉尽行剪去,用膏贴数日,待肉老平,换用珍珠散掺上数次,方结老盖,八十日而安。

一老年人患疽半月,其疮贯脊,遍背皆肿,上至肩膊,下至腰胁,肿若瓜形,头计数百,彼家以为势重不治。予诊其脉微洪而不鼓,又兼肿焮外发,询问饮食知味,其年虽老,而根本尚有余也,虽老何虑。先用托里消毒散二服,其势稍定。外用桑木灸法助力腐溃,根以铁筒膏箍之,更服排脓内托散,候正脓渐出。但老年气血外肉不能易腐,视其肉色相变不能腐化者,随用针钩、利剪徐徐剪去其形腐凹寸余长,低尺许,凡见红肉便用膏涂,其新肉已生将半时。值隆冬,患家自行开疮洗看,失着柴炭之火,又兼盖护未暖,外被寒侵,次后疮色淡白,脓反清稀,饮食减少,气体不舒。请视之,此不遵调法爱护,乃被寒气侵入也。虽变不妨,因疮原禀于阳,故能不失阳矣,房中即着柴火,烘熏暖气,逼尽余寒,开疮相看,果应前言也。随用浓葱汤乘暖淋洗,将红膏烘化搽上,外用膏贴,以热绵软绢复叠数层绷盖甚密,内用神功托里散,早晚连进二服,次早复看,其疮自回阳矣。以后遵法调理,百日而安。

一老人年过六旬,患背疽十二日矣。视其疮形,半肿半红,微痛微热,其患发于背心之下,肾俞之上,高低平等,广开八寸,根脚泛肿,色

若水喷，顶软无神，似腐非腐，兼诊脉浮而大，重按而虚。此疮利于肿溃，不利于收敛，辞不可治。彼家喟然而笑，复请里中老医视之，见患者起居平和，言语清利，举动如常，饮食有味，此为五善俱具，是安若泰山之症也，何必相虑。彼家得此欣跃万态，随用其药，日渐有功，脓溃肿退，腐尽肌生，彼此以为万全之象也。予常对患家亲族言：此病不可待，必死于收口至钱大时也。众若以予为胡说，后问收口只有钱许未合，予曰：不久居也，急备后事，恐不及矣。不数日，变症一出，不四朝而死。后里人始信予之前言是矣。

一男人六旬有二，发生右搭。先用艾灸，次渐形势高肿，坚硬不痛。十五日后，尚未溃脓，日生烦闷，恐其毒陷，先用针通，随行拔法，拔出恶血钟许，以后稍得轻便，搽上化腐之药膏盖。用至三日，其疮渐作腐溃，至二十日，亦出正脓，坏肉渐脱，新肉渐生，此外治之法尽矣。因病家与内科一医平交甚切，托彼用药内服，而不遵外科补托之法，自执己见，不听予言，失于峻补，每日人参不过二钱，以为足用。予曰：不足，法当五钱，兼熟附二钱方为称病，不然必生变矣。彼此不信，后果肉色淡白，疮口散大，脓水清稀，饮食减少，此败症具矣。后虽强投温中健脾大补之药，终则不应，至于形体消瘦，脓水臭秽，延至六十日，历尽气血而亡。然后方自懊悔。殊不知，凡大疮每日脓出一碗，用参必至三钱，以此为则，况本病出脓日有三碗，用参二钱，谓之大损小补，岂不归死？又外科乃破漏之病，最能走泄真气，如损补两不相敌，无以抵当，往往至于不救者多矣！此为不信于补而执俗见，自取败亡者也。可惜！

一男子年近六旬，时值仲夏，背生热疔二十余处。彼家邀请视孙疮恙，见彼坐于堂，满背皆疔，予略视之，内有一疮比疔甚小，其毒甚大。予对曰：此非疮疔比也，后发势不可及。彼笑而答之：无恙也。乃即送到门庭，予又嘱曰：可急请他医治之，不可缓待。俱不听信。又至十日，形势稍发，命里中一医治之，又曰：是疔也。又十日，形势内陷，败症齐出，稍信前言，方央亲友邀予相视，其人睡卧于堂，帛覆疮上，登堂未进二、三步即退，人曰：何也？予曰：败气满前，死期速矣，何必视疮，急备后事，再七日死。后果如言，不差时刻，此为讳疾忌医，致其自

败者也。可惜！

以上治法种种，不能枚举，聊陈数条与同志者采访观之，所谓得其要者，一言而终；不知其要者，流散无穷。但病不参透，举手错乱，医理精明，决断自成。

肿疡主治方

神授卫生汤

神授卫生方芷甲 羌乳红沉石决明

皂翘归尾银花草 大黄花粉效如神

治痈疽、发背、脑疽、对口、丹瘤、瘰癧、恶毒疔疮、湿痰流注及外科一切疮症。但未成者即消；已成者即溃。能宣热散风，行瘀活血，解毒消肿，疏通脏腑。且药性平和，功效甚速，诚外科首用方也。

羌活八分 防风 白芷 川山甲（土炒研） 沉香 红花 连翘 石决明（煅）各六分 金银花 皂角刺 归尾 甘草节 花粉各一钱 乳香五分 大黄（酒拌炒二钱，脉虚便利者不用）

水二碗，煎八分，病在上部先服药，随后饮酒一杯；病在下部先饮酒一杯，随后服药以行药势。

内消沃雪汤

内消沃雪青陈皮 乳没翘针甲芷芪

射干芍贝银花粉 木香甘草大黄归

治发背并五脏内痛，尻臀诸肿，大小肠痈，肛门脏毒，初起但未出脓，坚硬疼痛不可忍者并服。

青皮 陈皮 乳香 没药 连翘 黄芪 当归 甘草节 白芷 射干 天花粉 川山甲 贝母 白芍 金银花 皂角刺各八分 木香四分 大黄二钱

水、酒各一碗，煎至八分，量病上下，食前后服之。

内疏黄连汤

内疏黄连汤木香 梔归芩芍薄荷榔

桔梗甘草连翘等。大黄加倍效能强

治痈疽肿硬，发热作呕，大便秘涩，烦躁饮冷，哆呃心烦，舌干口渴，六脉沉实有力，此邪毒在脏也。急宜服此以内除之，使邪气不得传变经络。

木香 黄连 山梔 当归 黄芩 白芍 薄荷 槟榔 桔梗
连翘各一钱 甘草五分 大黄二钱

水二茶盅，煎八分，食前服，临服加蜜二匙亦可。

保安万灵丹

保安万灵丹术蝎 天麻归斛草芎朱

羌活荆防细辛等 麻雄黄二共三乌

治痈疽、疔毒、对口、发颐、风湿、风温、湿痰流注、附骨阴疽、鹤膝风症，左瘫右痪，口眼歪斜，半身不遂，气血凝滞，偏身走痛，步履艰辛，偏坠疝气，偏正头痛，破伤风牙关紧闭，截解风寒，无不应效。

茅术八两 全蝎 石斛 明天麻 当归 甘草(炙) 川芎 羌活
荆芥 防风 麻黄 北细辛 川乌(汤泡，去皮) 草乌(汤泡，去皮尖)
何首乌各一两 明雄黄六钱

上为细末，炼蜜丸弹子大，每药一两分作四丸，一两作六丸，一两作九丸三等做下，以备年岁老壮、病势缓急取用。预用朱砂六钱，研细为衣，磁罐收贮。如恶疮初起二、三日之间，或痈疽已成至十朝前后但未出脓者，状若伤寒，头疼烦渴，拘急恶寒，肢体疼痛，恶心呕吐，四肢沉重，恍惚闷乱，坐卧不宁，皮肤壮热。又治伤寒四时感冒，传变疫症，但恶寒身热表症未尽者俱宜服之。用连须大葱白九枝煎汤一茶盅，将药丸乘热化开，通口服尽，被盖出汗为效。如服后汗迟，再用葱白汤催之，后必汗如淋洗，渐渐退下覆盖衣物，其汗自收自敛，患者自然爽快，其病如失。但病未成者，随即消去；已成者，随即高肿溃脓。如诸疾无表症相兼不必发散者，只用热酒化服。此方原载于诸风瘫痪门，予每用之发散疮毒，其功甚捷，故移录于此。详观此方，治肿疡甚效者何也？凡疮皆起于荣卫不调，气血凝滞，乃生肿痛。观此药性专发散，又能顺气搜风，通行经络，所谓结者开之，况疮毒又乃日积月累结聚所

发,苟非甘温辛热发泄,以汗疏通,安能得效。所谓发散不远热,正合此方之意无谬也,服后避风,当食稀粥,忌冷物、房事,孕妇勿服。

双解复生散

双解荆防芎芍芪 麻黄甘草荷山栀

归翘滑石银羌活 参术硝黄共得宜

治痈疽、发背,诸般肿毒。初起憎寒发热,四肢拘急,内热口干,大小便秘,宜此药发表攻里并效。

荆芥 防风 川芎 白芍 黄芪 麻黄 甘草五分^① 薄荷 山栀 当归 连翘 滑石 金银花 羌活 人参 白术各八分 大黄芒硝各二钱

水二碗,表症甚者,姜三片,葱头二茎;里症甚者,临服加生蜜三匙和服,为发表攻里双解药也。

内消散

内消散内用银花 知贝天花白芫加

半夏川山并皂刺 乳香功效病无嗟

治痈疽、发背、对口、疔疮、乳花百种,无名肿毒,一切歹疮。此药能令内消,化毒为黑水从水便而出,势大者,虽未全愈,亦可转重就轻,称深居浅。

金银花 知母 贝母 天花粉 白芫 半夏 川山甲 皂角针乳香各一钱

水、酒各一碗,煎八分,随病上下食前后服之。留药渣捣烂加秋芙蓉叶细末一两,白蜜五匙,同渣调敷疮上,一宿自消,重者再用一服,忌口效。

清热消风散

清热消风散芎芍 归粉银花翘皂角

柴苓防草与红花 陈皮苍术芪无落

治痈疽、诸毒,疮肿已成未成之间,外不恶寒,内无便秘,红赤高

① 五分:疑为“各五分”。

肿，有头焮痛，宜服此药和解之。

防风 川芎 当归 黄芩 白芍 天花粉 金银花 甘草五分
连翘 红花 柴胡 苍术 陈皮 黄芪 皂角刺各一钱
水二茶盅，煎八分，食远服，妇人加香附（童便炒）。

以上七方，痈疽七日以前疮势未成，形体壮实，表里之症相合者宜服，病退即已。如过七日以后，形势已成，便宜用后托里等药，催毒在外，以速其脓，禁前表下之药，损伤元气，致生多变矣。

内固清心散

内固清心散茯苓 砂雄豆蔻乳香称

甘草绿豆玄明粉 人参冰片可清心

治痈疽、发背、对口、疔疮，热甚焮痛，烦躁饮冷，有此症者可预防毒气内攻，当服此药，庶不变症。

茯苓 辰砂 人参 玄明粉 白豆蔻 甘草 乳香 明雄黄
冰片一钱^① 真豆粉二两

上为细末，每服一钱五分，蜜汤调下，不拘时候。

护心散

护心散中豆粉佳 乳香甘草共朱砂

每服二钱频送下 敢交呕吐自无他

治疮毒内攻，口干烦躁，恶心呕吐者，宜用此药。

真豆粉一两 乳香（净末）三钱 朱砂一钱 甘草末一钱

上共研极细，每服二钱，白滚汤调服，早晚二次。

琥珀蜡矾丸

琥珀蜡矾丸琥珀 明矾黄蜡与朱砂

雄黄蜂蜜丸成就 护心护膜效堪夸

治痈疽、发背已成未脓之际，恐毒气不得外出，必致内攻，预服此丸护膜护心，亦且散血解毒。

白矾一两二钱 黄蜡一两 雄黄一钱二分 琥珀（另研极细）一钱 朱砂

① 一钱：疑为“各一钱”。

一钱二分 蜂蜜二钱临入

上四味,先碾研极细,另将蜜蜡铜杓内溶化,离火片时,候蜡四边稍凝时方入上药,搅匀共成一块,以一人将药火上微烘,众手急丸小寒豆^①大,用朱砂为衣,磁罐收贮。每服二、三十丸,白汤食后送下。病甚者,早晚日进二次,其功最效。

托里消毒散

托里消毒散人参 芎芍芪归术茯苓

角针白芷银花等 桔梗甘草效如神

治痈疽已成不得内消者,宜服此药以托之,未成者可消,已成者即溃,腐肉易去,新肉易生,此时不可用内消泄气、寒凉等药,致伤脾胃为要。

人参 川芎 白芍 黄芪 当归 白术 茯苓 金银花各一钱
白芷 甘草 皂角刺 桔梗各五分

水二盅,煎八分,食远服。脾弱者去白芷,倍人参。

托里消毒散的临床新用

1. 皮肤久溃不愈或创伤久不愈合之证

张胜德用本方加减治疗 15 例皮肤久溃不愈或创伤久不愈合之证。若气血皆虚久不收口,伤口灰白,脓液清稀或少有脓液,神疲乏力,舌淡苔薄白、脉细,则加重黄芪用量,再加肉桂 6 克,连翘 15 克;若脓较稠厚间有热象,则减肉桂用量至 3 克,再加金银花、连翘、蒲公英各 20 克。患者视伤口范围大小,均在 4~15 天内收口痊愈,最少服 3 剂,最多服 10 剂。

张胜德. 陕西中医, 2004, 25(12): 1123

2. 鼻渊

陈兆洋用本方治疗慢性鼻窦炎 126 例,主要症状:鼻塞、流涕,时

① 小寒豆:疑为“小绿豆”。

见鼻涕倒流入口,嗅觉减退,记忆力差,经常头昏头痛,或头有闷胀感。局部检查:双中鼻甲多肿胀肥大,或呈息肉样变,双中、上鼻道可见脓性引流物。X线鼻窦摄片均示慢性鼻窦炎。治以托里消毒散加减:人参6克,川芎10克,白芍10克,生黄芪12克,当归10克,白术10克,茯苓15克,金银花30克,白芷9克,甘草6克,皂角刺6克,桔梗6克,苍耳子10克,辛夷10克。每日1剂,10天为1个疗程,总有效率94%。

陈兆洋. 中国医药学报, 2001, 16(6): 74

3. 脓耳

张世磊用本方治疗1例,证属脾肾双虚,清阳不升,湿浊留恋,闭塞清窍。药用:黄芪30克,当归10克,人参10克,茯苓9克,白术9克,川芎10克,桔梗10克,金银花15克,皂角刺15克,白芷9克,山萸肉15克,苡米30克,制附片10克。共服20剂,诸症悉除,听力亦渐恢复。

张世磊. 四川中医, 2003, 21(8): 90

4. 附骨疽

张世磊治疗1例。初以仙方活命饮合以四妙勇安汤配合静脉滴注林可霉素治疗,限制活动。病情控制后,改为托里消毒散加山萸肉12克,补骨脂12克,土茯苓20克,山甲10克,并加大金银花剂量至30克,连服50余剂,并嘱渐增运动,量力负重。2月后,肿消痛止,查血沉为8毫米/小时,X线拍片示左小腿骨密质均匀,形同健侧。3年来,劳作如常。

张世磊. 四川中医, 2003, 21(8): 90

5. 复发性睑腺炎

陈金川用托里消毒散加味治疗本病。红肿明显者加蒲公英10克,野菊花10克。每日1剂,同时予0.25%氯霉素眼药水点眼,每日4~6次。若已成脓,则切开排脓,至痊愈后,中药予上方去金银花、白芷、皂角刺、蒲公英、野菊花,每日1剂,续服7日。平均治愈时间6.4日。

陈金川. 河北中医, 2001, 23(03): 171

6. 消化性溃疡

患者有慢性节律性上腹痛病史, 经纤维胃镜确诊为活动期 PU, 无心、肝、脾、肺、肾等并发症, 活检标本做快速尿素酶实验, 确定幽门螺杆菌(HP)感染情况。治疗用托里消毒散。痛甚者加制乳香、制没药各 8 克。3 次/天, 饭后 30 分钟服用。结果总有效率为 94.23%。

朱卫东. 时珍国医国药, 2001, 12(03): 240

7. 原发性肝癌栓塞化疗不良反应

明确诊断为原发性肝癌并以 Seldinger 方法首次栓塞化疗的患者, 栓塞化疗后出现发热(体温一般在 39℃ 以上)、恶心、呕吐、腹痛、肝区疼痛等症状; 肝功能指标均比栓塞前升高。治疗方法: 栓塞化疗后第 1 天均进行西医常规处理, 加用化裁的托里消毒散, 处方由党参、北黄芪、茯苓、白术、甘草、白芍、当归、川芎、桔梗、白芷、金银花、皂角刺、白花蛇舌草组成。每天 1 剂, 7 天为 1 个疗程。结果显示托里消毒散对肝瘤化疗栓塞术所致的大片组织坏死以及药物和栓塞引起的正气亏虚的副作用有拮抗作用, 能减轻栓塞化疗引起的不良反应。

罗丹峰. 北京中医药大学学报, 2000, 23(05): 57

8. 糖尿病足

张志明治疗的 36 例患者均符合 WHO 糖尿病诊断标准。治疗在控制血糖、控制感染, 给予脉络宁注射液、山莨菪碱注射液、精制蝮蛇抗栓酶的同时予以中药治疗。方选托里消毒散加减: 金银花 20 克, 黄芪 30 克, 紫花地丁、川芎、赤芍、天花粉、生地黄、麦冬、白芷、玄参、牛膝、黄柏各 10 克, 皂角刺 10 克。每天 1 剂。同时要注意坏疽局部处理。治疗结果: 36 例患者全部治愈。

石莹. 新中医, 2002, 34(10): 35

9. 慢性前列腺炎

杨海魁用本方治疗慢性前列腺炎。若阳虚征象明显者加附子 9 克; 小便终末余沥加益智仁 15 克, 乌药 12 克; 疼痛症状明显者加延胡索、川楝子各 12 克; 血精加白茅根 30 克, 生地黄 15 克; 尿路刺激症状

明显者加车前子 15 克,木通 9 克;腰膝酸软加杜仲、续断各 15 克;附睾慢性炎症者加橘核、荔枝核各 30 克。湿热明显者黄芪用量减至 15 克。每天 1 剂,20 天为 1 个疗程,连续用药 3 个疗程后复查前列腺液(镜检)及测定前列腺液 SLGA 含量。结果表明:由托里消毒散治疗慢性前列腺炎是通过调节机体及前列腺局部免疫反应,同时促进局部血运及抗炎抗毒综合作用的结果。

杨海魁.新中医,2002,34(10):35

排脓内托散

排脓内托散 芎归 参术苓陈芍茯苓

甘草桔梗并肉桂 随方加减在人为

治痈疽、脑项诸发等疮已溃流脓时,宜服此药。

当归 白术 人参各二钱 川芎 白芍 黄芪 陈皮 茯苓各一钱

香附 肉桂各八分 甘草五分 白芷项之上加三分 桔梗胸之上加五分
牛膝下部加五分

姜三片,水二茶盅,煎八分,食远服。

乳香黄芪散

乳香黄芪散 乳没 粟壳参芪甘草撮

芎归白芍与陈皮 加上熟地疼即脱

治痈疽、发背、诸毒、疔疮疼痛不可忍者。或未成者速散,已成者速溃,败腐脓毒,不假刀砭,其恶肉自然脱下,及治打扑损伤,筋骨疼痛并服之。

乳香 没药各五分 黄芪 粟壳(去筋膜,蜜炒) 人参 甘草 川芎
归身 白芍 陈皮 熟地黄各一钱

水二盅,煎八分,量病上下,食前后服之。

神功内托散

神功内托散 芎芪 归术陈皮白芍宜

附子木香甘草炙 参苓山甲起颠危

治痈疽、脑项诸发等疮,至十四日后,当腐溃流脓时不作腐溃,更兼疮不高肿,脉细身凉者用。

当归二钱 白术 黄芪 人参各一钱五分 白芍 茯苓 陈皮 附子各一钱 木香 甘草(炙)各五分 川芎一钱 山甲(炒)八分

煨姜三片,大枣二枚,水二茶盅,煎八分,食远服。

透脓散

透脓散内用黄氏 山甲芎归总得宜

加上角针头自破 何妨脓毒隔千皮

治痈疽、诸毒,内脓已成不穿破者宜。服之即破。

黄芪四钱 山甲炒末一钱 当归二钱 皂角刺一钱五分

水二盅,煎一半,随病前后服,临入酒一杯亦好。

透脓散的临床新用

1. 产后缺乳

用本方加味治 66 例产后缺乳患者。方药组成:黄芪 12 克,当归 6 克,穿山甲 3 克,皂角刺 5 克,川芎 9 克,王不留行 12 克,藜芦 10 克,通草 10 克,猪前蹄 1 对。伴肝郁气滞加香附、郁金、柴胡,气血不足加党参、白术、丹参。每日 1 剂,分 2 次温服。5 天为 1 个疗程。治愈率为 89.39%。

邱兆利. 吉林中医药, 2005, 25(1): 28

2. 中晚期难愈性深度烧伤

用本方治疗中晚期难愈性深度烧伤。纳差者加神曲 10 克,鸡内金 10 克;面色苍白、乏力者加白术 10 克,熟地 20 克,首乌 15 克;盗汗、潮热者加黄柏 10 克,知母 10 克,地骨皮 10 克。水煎取汁,每日 1 剂,分 2 次口服。创面外涂 10% 磺胺嘧啶银悬液并用网眼凡士林纱布包扎,西医常规抗感染,直至创面愈合或手术植皮,疗程 10~20 天。治疗组总有效率为 97.5%。

张一戈. 湖南中医学院学报, 2004, 24(4): 51

3. 化脓性扁桃体炎

(1) 张爱梅用本方治疗化脓性扁桃体炎 20 例。若兼风热加银花、

僵蚕;若肺胃热盛加炒芩、山豆根、天花粉、芦根;若兼虚火上炎可加炒黄柏、麦冬、天冬、知母等;兼虚阳上浮可加肉桂、干姜;若气虚明显者上方重用黄芪或加苏条参、炒白术;病程迁延不愈,久不收口,可加桃仁、红花。每天1剂,7剂为1个疗程,若效果不显再续服。治疗结果:治愈10例,好转7例,无效3例。

张爱梅. 云南中医中药杂志, 2002, 23(2): 25

(2)用本方治疗急性化脓性扁桃体炎,处方:生黄芪30克,当归15克,穿山甲15克,皂角刺15克,川芎15克,金银花15克,牛蒡子15克,白芷15克。每日1剂,每日4次,吞咽困难者少量频服,总有效率92%。

王筠等. 中国中医急症, 2003, 12(3): 277

4. 胆结石

邹世忠用本方治疗42例胆结石患者。其中36例胆总管不扩张。基本方:黄芪30克,川芎15克,当归15克,皂刺10克,炮甲珠15克,茵陈20克,金钱草30克,大黄10克,元胡10克。日服2次,每周5剂。疼痛剧烈者,适当肌注阿托品或654-2;不能进食者给予补液;急性炎症给予抗生素,结石小于1厘米者,每周1次。随症加减。治疗结果:治愈占73.5%;好转占14.2%;显效占11.9%。急性发作期一般5剂后临床症状消失,疗程最短1周,最长3个月。

邹世忠. 中国中医药科技, 2004, 11(4): 255

5. 耳前瘻管感染

周玉霞等治疗耳前瘻管感染半月以上未愈,不易成脓或自行溃破不收口或切开引流后久不收口,甚至有肉芽生长的病例70例。以透脓散为基本方,若邪毒盛加蒲公英、金银花、连翘。气虚加党参、白术。血虚加白芍、熟地。阴盛加沙参、玉竹、生地、花粉。阳虚加肉桂。色暗滞加桃仁、红花、丹参。肉芽生长加海藻、昆布、桃仁、红花。每日1剂,同时外敷独角膏,每日1次,换药,如有肉芽生长应先刮除肉芽;已溃者常规消毒后敷药。结果:治愈率为85.7%,显效率为97.5%。

周玉霞,等:实用中医内科杂志, 2003, 17(3): 206

6. 乳痈

石富娟用本方治疗乳痈 40 例。基本方用透脓散,病初起时加大穿山甲、皂角刺、蒲公英的剂量以消之,久治未愈脓水淋漓者宜加大生黄芪的剂量以补托之,有其他兼证者则随症化裁治疗。有效率为 100%。

石富娟. 江西中医药, 2004, 35(2): 26

7. 慢性骨髓炎

治疗方法:均采用病灶及死骨清除术,残腔大的行带肌瓣填充术,置硅胶管行连续闭式冲洗。药用:蒲公英 150 克,紫花地丁 150 克,金银花 150 克,黄连 100 克,大青叶 100 克,当归 30 克,白芷 100 克。煎汁后离心过滤制成灌洗液,24 小时连续滴注冲洗,每日 1 次,连续 2 周。2 周后拔管。同时辨证给药。方用阳和汤、托里透脓散加减:熟地黄 30 克,肉桂 3 克(研末),麻黄 2 克,鹿角胶 9 克,白芥子 6 克,姜炭 2 克,生甘草 3 克,生黄芪 12 克,当归 6 克,穿山甲 3 克,皂角刺 5 克,川芎 9 克。每日 1 剂,连续 2 周。有效率为 95.83%。

王剑平. 河南中医, 2003, 23(5): 43

8. 内痈

凌华等治疗 21 例内痈患者中,肝脓肿 10 例,肾脓肿 5 例,肺脓肿 6 例。基本方:生黄芪 20~100 克,全当归 10~40 克,炮山甲 10~15 克,皂角刺、川黄柏、蚤休、炒谷芽、炒麦芽各 10 克,蒲公英、忍冬藤、银花各 15 克,生甘草 5 克。肝脓肿加小青皮 10 克,肾脓肿加狗脊 10 克,肺脓肿加鱼腥草 30 克,丝瓜络 10 克;热甚加生石膏(先煎)10~20 克,三叶青 10 克。每日 1 剂,经上述方法治疗 15~60 天,18 例痊愈,2 例有效,1 例无效。

凌华,等. 浙江中医杂志, 2002, 37(4): 174

9. 慢性附件炎性包块

许金珠治疗慢性附件炎性包块。基本方:生黄芪 12 克,生苡仁 20 克,当归 10 克,海藻 10 克,皂角刺 10 克,穿山甲 6 克,水蛭 6 克。伴神经衰弱者加琥珀、白茯苓;带下臭秽者加红藤、败酱草;舌淡苔白腻者

加白芥子、桂枝。开始每日1剂,水煎服,包块消散后改为隔日1剂。经期停药。1个月为1个疗程。总有效率为93%。

许金珠. 中国民间疗法, 2001, 9(10): 43

10. 脓毒血症后发热不退

林仰光治疗10例原发病均为身体某处的化脓性感染恢复期。治疗以透脓散为基本方, 小儿剂量酌减, 每日1剂, 15天为1个疗程, 若15天内任何一天已热退, 则从热退起继服3天以巩固疗效, 若15天内体温明显下降, 但未完全恢复正常, 则停药3天后, 再开始第2疗程。治疗结果: 平均退热天数为 7.67 ± 3.09 天。

林仰光. 中医杂志, 2000, 41(03)

竹叶黄芪汤

竹叶黄芪汤草芩 芎归芪芍共人参

半夏石膏兼淡竹 麦冬生地可回津

治痈疽、发背, 诸般疔肿, 表里热甚, 口干大渴者。

黄芪 甘草 黄芩 川芎 当归 白芍 人参 半夏 石膏
淡竹叶十片 麦冬各八分^① 生地黄一钱

水二盅, 姜三片, 灯心十二根, 煎八分, 食远温服。

回阳三建汤

回阳三建附参芪 归术芎苓杞活黄

陈朴木红甘紫草 阴疽危症效堪推

治阴疽发背, 初起不疼不肿, 不热不红, 硬若牛皮, 坚如顽石。十日外脉细身凉, 肢体倦怠, 皮如鳖甲, 色似土朱, 粟顶多生, 孔孔流血, 根脚平散, 软陷无脓。又皮不作腐, 手热身凉者俱急服之。

附子 人参 黄芪 当归 川芎 茯苓 枸杞 陈皮 茵肉各一钱 木香 甘草 紫草 厚朴 苍术 红花 独活各五分

煨姜三片, 皂角树根上白皮二钱, 水二碗, 煎八分, 入酒一杯, 随病上下, 食前后服之。用绵帛盖暖疮上, 预不得大开疮孔走泄元气为要。

① 淡竹叶十片麦冬各八分: 疑为“麦冬各八分淡竹叶十片”。

愚按：凡背疽属阴者，皆由脏腑先坏而内毒不得发越于外也。旧有用鸡冠剪血滴于疽上者，有醋煮雄艾敷用者，猪脑热药敷围者，神灯火气灼照者。此数法皆阴疽之用，予虽常用，未见其实。但阴疽不起者，如树木之根坏，强力培植枝叶，而终无发生之理。予常据理用药，固有得其生者，十中三、四。譬如先要疏其嫁土，通其地脉，助其根本，回其阳气，此四者缺一不可。用苍术、厚朴、茯苓、陈皮疏其土；川芎、当归、紫草、红花通其脉；人参、黄芪、枸杞、山萸助其本；附子、木香、甘草、独活回其阳。如此用之，但根本内有一脉未绝之气，服之俱可得其生。又验其手足温暖，疮便发热，渐作焮肿，复生疼痛，色暗得活，坚硬得腐，胃气得回，此是药之效验。必在三服中应之为吉，外兼照法接助回阳，此通治阴疽之大法也。

黍米寸金丹

黍米寸金丹乳没 雄黄狗宝麝蟾酥

轻粉粉霜硃黑石 丁香狗鲤胆蜈蚣

二名返魂丹，三名再生丸，四名追命丹，五名延寿丹，六名来苏圆，七名知命丸，八名得道丸。

此方昔出异人所传，常有暴中急症，忽然卒倒者，斡开牙关，研灌三丸，其人即活。又能治发背、脑疽、遍身壅肿、附骨痈疽等症，初起憎寒壮热，四肢倦怠沉重者，毋分表里、老幼、轻重，并宜服之。

麝香五分 乳香 没药 雄黄 狗宝 轻粉 乌金石各一钱 蟾酥二钱 粉霜（水银炼白色者） 黄蜡各三钱 硃砂二钱 鲤鱼胆（阴干）三个狗胆（干用）一个 白丁香四十九根 金头蜈蚣（全者，酥炙黄色）七条 头胎男乳一合

上件为细末，除黄蜡、乳汁二味，熬成膏子同药和丸绿豆大，大人三丸，小儿用一丸，病重者五丸，冷病用葱汤、热病用新汲水送下，衣被密盖，勿令透风，汁出为度，诸病如失。后食白粥调理。

熏发背奇方

发背诸方此独奇 谁期照药罕人知
雄竭麝砂并没药 为灯一照脱藩篱

治发背初起，七日前后，未成者自消，已成者自溃。不起发者即发，不溃腐者即腐。诚为良法也。

雄黄 朱砂 血竭 没药各二钱 麝香四分

上五味，研为细末，每用三分，绵纸裹药为燃，长约尺许，以真麻油润透灼火，离疮半寸许，自外而内，周围徐徐照之。火头向上，药气入内，疮毒随火解散，自不内侵脏腑。初用三条，渐加至四、五条，候疮势渐渐减，熏后随用敷药，如已溃大脓发泄时，不必用此照敷，只宜用膏药盖贴。

敷药方

熏后敷方有四般 车前豨莶五龙堪

米粉银花为糗和 敷之百肿自当安

车前草(连根叶) 豨莶草 五龙草 金银花各等分

上四味，鲜草药一处捣烂，加三年陈米粉，即常用糗衣者，初起仍入飞盐末二、三分，共打为稠糊，遍敷疮上，中留一顶，以膏盖贴避风，自然拔出脓毒。若冬月草无鲜者，预采蓄下阴干为末，用陈米醋调敷，亦如前法并效。今恐前敷药内用五龙草，随地或有缺少，不便合用。予常熏后项惟膏盖周围肿上，以如意金黄散代敷亦效。

如意金黄散

如意金黄散大黄 姜黄黄柏芷陈苍

南星厚朴天花粉 敷之百肿自当安

治痈疽、发背、诸般疔肿、跌扑损伤、湿痰流毒、大头时肿、漆疮、火丹、风热天泡、肌肤赤肿、干湿脚气、妇女乳痈、小儿丹毒。凡外科一切诸般恶肿毒，随手用之，无不效，诚为疮家良便方也。

天花粉(上白)十斤 黄柏(色重者) 大黄 白芷 姜黄各五斤 紫厚朴 陈皮 甘草 苍术 天南星各二斤

以上共为咀片，晒极干燥，用大驴磨连磨三次，方用密绢罗厨筛出，磁器收贮，勿令泄气。凡遇红赤肿痛，发热未成脓者，及夏月火令时，俱用茶汤同蜜调敷；如微热微肿及大疮已成，欲作脓者，俱用葱汤同蜜调敷；如漫肿无头，皮色不变，湿痰流毒、附骨痈疽、鹤膝风症等

病,俱用葱酒煎调;如风热恶毒所生,患必皮肤亢热,红色光亮,形状游走不定者,俱用蜜水调敷;如天泡、火丹、赤游丹、黄水漆疮、恶血攻注等症,俱用大蓝根叶捣汁调敷,加蜜亦可;汤泼火烧,皮肤破烂,麻油调敷。具此诸引理取寒热温凉制之。又在临用之际,顺合天时,洞窥病势,使引为当也。

如意金黄散的临床新用

1. 慢性前列腺炎

杨玉英等用本方治疗慢性前列腺炎。方法:每晚睡前取如意金黄散放入清洁瓷盆中,用开水冲泡溶解,利用药液的蒸汽对会阴部进行熏蒸;待中药溶液稍冷,用毛巾蘸药液频频淋洗会阴部。每天1次,连续3个月。治疗期间注意生活习惯和营养护理。结果显示如意金黄散熏洗治疗慢性前列腺炎的疗效肯定,可明显改善临床症状,减少前列腺液中的白细胞,增加前列腺液中的卵磷脂小体。

杨玉英,等. 护理与康复,2005,4(2):86

2. 流行性腮腺炎

(1)永泉取如意金黄散适量,用陈醋或凡士林调成糊状,外敷患处,每日换药1次,直至症状消失为止。一般用药2~7天即愈,且无后遗症。

永泉. 医药与保健,2002,10(8):18

(2)李军等用中药雄黄5克,青黛5克,芒硝5克,冰片2克,共研为细末。如意金黄散10克加上述中药混匀,用适量陈醋、蜂蜜按一定比例调成糊状,外敷患处,每日2次。高热者可服用板蓝根冲剂,不用抗生素。

李军,等. 河北中医,2002,24(8):638

3. 风湿性关节炎

永泉用如意金黄散适量,加水调成稠糊状,摊于油纸上,厚约5~7毫米,面积略大于红肿处,外贴患处,每日换药1次。一般外用2~3

天即可见效,红肿热痛即可大减,继而恢复正常。

永泉. 医药与保健,2002,10(8):18

4. 脓性指甲炎、甲沟炎

永泉用如意金黄散适量,加入蜂蜜调成糊状。无伤口者将药敷于红肿处约5毫米厚,纱布包扎,每日换药1次;切开引流或自破的伤口,按外科常规放置引流物,在伤口周围红肿浸润区敷药,每日换药1次,一般用药1~2周后,即可治愈。

永泉. 医药与保健,2002,10(8):18

5. 静脉炎

(1)永泉用如意金黄散适量,以醋调成稀糊状后外敷患处,每日2次,连续用药3天后即可收效。若系应用化学药品而致静脉炎,宜将如意金黄散与凡士林按2:8的比例配成膏剂备用。若局部红肿疼痛的炎症,每日外敷1次;若局部已经溃烂,脓性分泌物较多,先清洁疮口后,再撒上如意金黄散粉剂,周围外敷金黄膏。

永泉. 医药与保健,2002,10(8):18

(2)王作胜等用如意金黄散外涂治疗化疗后静脉炎64例。以食醋将如意金黄散调成糊状局部外涂,所涂范围超过病灶约3厘米,最初每日外涂3次。有效率为96.9%。

王作胜,等. 山东中医杂志,2001,20(05):342

6. 带状疱疹

永泉用如意金黄散、雄黄、生白矾各500克,蟾酥10克,冰片6克,共研为极细粉末,以凡士林6000克调成膏状,外敷患处,每日1次。一般用药5天即可获愈。

永泉. 医药与保健,2002,10(8):18

7. 乳腺增生

永泉用如意金黄散2000克,生附子、生半夏研末各100克,混合均匀,再将以上药物与凡士林按3:7的比例调和均匀,装入瓶内密闭备用。用时,先用氩氦激光针照射乳房肿块5分钟,再将加味金黄膏均匀摊在纱布上,贴敷于患处。隔日用氩氦激光针照射及换药1次,5

次为1个疗程。连续用药至乳房肿块消失时止。

永泉. 医药与保健, 2002, 10(8): 18

8. 麦粒肿

永泉用如意金黄散(研为细末)30克,羊毛脂10克,冰片2克,凡士林70克。先将凡士林、羊毛脂加温溶化,再迅速将如意金黄散兑入搅匀,然后将冰片用95%乙醇少许溶化后兑入再搅拌均匀,待凉后装入瓶内备用。用时,宜先用抗生素眼膏涂于结膜囊内,以保护角膜,再将上述药膏摊于敷料上,外贴患处,胶布固定,每日换药1次。一般用药4次,症状及体征即可消失。

永泉. 医药与保健, 2002, 10(8): 18

9. 重度褥疮

永泉用如意金黄散10克,猪胆汁100毫升,调匀成如意金黄散胆汁糊剂。先用络合碘消毒患处周围皮肤,去除坏死组织,再用生理盐水清洁创口,然后用消毒棉签蘸取如意金黄散胆汁糊剂涂于疮面,厚约5毫米,再用消毒纱布覆盖患处,每日换药1次。逐渐改为隔日1次。一般用药20~42天即愈。

永泉. 医药与保健, 2002, 10(8): 18

10. 内痔便血

永泉用如意金黄散30克,淀粉2克,加入热开水150毫升,调成糊状,待微温,每次以甘油灌肠器抽取10毫升,插入肛门,推进药物,每日1次。并发溃疡性直肠炎者,剂量增至20毫升;并发炎症性外痔或血栓性外痔者,宜加用20%如意金黄膏外敷。一般用药3~5次后,内痔便血即可消失。

永泉. 医药与保健, 2002, 10(8): 18

11. 小儿脐疮

永泉取如意金黄散与凡士林按1:4比例混合均匀,装入瓶内备用。同时,先将患儿脐部用络合碘消毒,再将药膏贴患处,每日换药1次,5次为1个疗程。一般用药1~2个疗程即可痊愈。

永泉. 医药与保健, 2002, 10(8): 18

12. 跌打损伤

永泉用如意金黄散适量,加鲜猪胆汁调成糊状,摊在敷料上,外贴患处。每日换药1次,连用7~12天,即可显效或痊愈。

永泉. 医药与保健,2002,10(8):18

13. 黄水疮

永泉用如意金黄散适量,用白开水调敷患处,每日4~6次,药干后再用白开水湿润。一般用药1小时后灼痛可止,经过1~3天后可疮消病愈,且愈后不留瘢痕。

永泉. 医药与保健,2002,10(8):18

14. 化疗药物外渗

朱福琴用本方治疗30例肿瘤患者因化疗药物外渗引起的局部肿胀、疼痛。治疗组:对外渗区用冰袋敷24小时后,再用如意金黄散1包(12克),加食醋调成糊状,涂于纱布上。外加一层塑料薄膜,以防药液外渗,每日敷1~2次。每次换敷料时都要用生理盐水清洗局部。连续用药3日为1个疗程。

朱福琴. 现代医药卫生,2001,17(9):735

15. 外伤性肿胀

蒋菁用本方治疗外伤性肿胀。治疗予以如意金黄散100克,成人开塞露205支,食用米醋100毫升,地塞米松针剂5毫升×5支混合,均匀搅拌呈糊状不流动为宜,骨折病人手法复位固定前后两端肿胀处外敷或根据肿胀部位外敷,以0.8~1.0厘米厚度覆盖于患处,并用绷带轻松包扎固定,每日2次,7天为1个疗程,同时抬高患肢,动静结合,治疗期间除加用一般活血化瘀药物外,不做其他处理。

蒋菁. 中医外治杂志,2001,10(2):20

16. 浅静脉炎

王永珍用本方防治浅静脉炎。具体方法:①静脉穿刺选取前臂及肘部静脉。②静脉穿刺方向迎向静脉血液回流方向。③如静脉感到疼痛时,可用如意金黄散涂于胶布中央后敷贴静脉疼痛处,每日1~2次;同时将青霉素注射剂橡皮塞用胶皮加压固定在距注射部位4~6

厘米的近心端,使血流改道和分流至其他静脉分支,可立即缓解症状,待疼痛消除 30 分钟至 1 小时后揭去。

王永珍. 实用中西医结合临床,2005,5(1):48

17. 桡骨茎突腱鞘炎

张帆等采用如意金黄散,每次取 20 克,用适量的 25% 硫酸镁溶液调匀如稠糊状,摊涂在纱布上,然后贴敷患处,并用弹性绷带稍加压包扎,每次贴 12 小时,隔天 1 次,共 3~10 次。有效率为 94%。

张帆,等. 中医正骨,2004,16(12):10

18. 外伤性瘀血肿胀

张志松等用本方治疗外伤性瘀血肿胀。方药:天花粉 10 克,黄柏 5 克,姜黄 5 克,白芷 5 克,生大黄 5 克,陈皮 2 克,苍术 2 克,胆南星 2 克,厚朴 2 克,冰片 1 克。取上药末适量,加蜂蜜调成糊状,摊于纱布上,环形包敷于损伤四周。脱臼及骨折有移位者需先行复位方予敷药,最后施以适当外固定。每日换药 1 次,有外固定者 2~3 天换药 1 次。治疗 160 例患者,敷药后疼痛消除时间最短者 2 小时,最长者 72 小时,平均 24 小时;肿胀消退时间最短者 36 小时,最长者 7 天,平均 3 天。

张志松,等. 吉林中医药,2001,21(4):42

19. 痛风急性发作

张友安治疗痛风急性发作。在内服中药的基础上外用如意金黄散适量,冷开水调成糊状,外敷患处,局部须保持药物湿润。每日换药 1 次,连用 1 周。治疗期间停用治疗痛风的西药及解热镇痛药。

张友安. 山西中医,2001,17(01)

20. 毒蛇咬伤肢肿

程祖耀治疗毒蛇咬伤肢肿。首先将患者按常规予以清创排毒和静滴抗蛇毒血清。然后外敷如意金黄散。若有创面,可先用 0.02% 呋喃西林纱布覆盖后再敷药。每 2 日换药 1 次,3 次为 1 个疗程。结果:92 例中 65 例治愈,肿胀完全消退;25 例显效,肿胀消退大半;1 例有效,肿胀有所消退;1 例无效,肿胀无明显消退。

21. 慢性盆腔炎

许靖用如意金黄散药物粉碎过 100 目筛后备用。每次取约 20 克用开水浸泡, 冷却后滤去药渣, 每晚睡前保留灌肠。另用如意金黄散约 30 克以米醋调湿, 敷下腹部, 并用热水袋装热水后敷盖, 水冷即可撤药。7 天为 1 个疗程, 共治疗 2~3 个疗程。总有效率 100%。

许靖. 广西中医药, 2003, 26(2): 30

四虎散

四虎散内用南星 草乌半夏效通灵

药内再添狼毒力 痈疽顽肿即安宁

治痈疽肿硬, 厚如牛领之皮, 不作脓腐者宜用。

南星 草乌 半夏 狼毒各等分

上为细末, 用猪脑同捣, 遍敷疮上, 留正顶出气。

真君妙贴散

真君妙贴散奇功 荞面硫黄白面同

诸般异症皆堪效 常取收功掌握中

治痈疽、诸毒, 及异形异类, 顽硬大恶歹疮, 走散不作脓者, 宜用此药。不痛者即痛, 痛甚者即止。

明净硫黄(为末)十斤 荞面 白面各五斤

共一处, 用清水微拌, 干湿得宜, 木箱内晒成面片, 单纸包裹, 风中阴干收用。临时再研极细, 用新汲水调敷; 如皮破血流, 湿烂疼痛等症, 麻油调搽; 天泡、火丹、肺风、酒刺、染布青汁调搽并效。

回阳玉龙膏

回阳玉龙膏肉桂 白芷军姜仍在位

草乌赤芍与南星 热酒同调功更倍

治背疽阴病, 不肿高, 不焮痛, 不发热, 不作脓及寒湿流注、鼓风久损、冷痛痹风、诸湿脚气、手足顽麻、筋骨疼痛, 及一切皮色不变, 漫肿无头, 鹤膝风等, 但无皮红肌热者, 一概用之, 俱有功效。

草乌(炒)三两 军姜(煨)三两 赤芍(炒) 白芷 南星(煨)各一两

肉桂五钱

上制毕，共为细末，热酒调敷，此药有军姜、肉桂，热血生血，既生既热，恐不能散而有害，故有草乌、南星可以破恶气，祛风毒，活死肌，除骨痛，消结块，回阳气；又有赤芍、白芷，足以散滞血，住痛苦；加以酒行药性，攻通气血，虽十分冷症，未有不愈者。诚为寒灰之焰，枯木之春，大抵病冷则肌肉阴烂，不知痛痒。其有痛者，又多附骨之痛，设若不除，则寒根透髓，寻常之药固莫能及矣。

冲和膏

冲和膏内紫荆皮 独活菖蒲赤芍宜

白芷随方加减法 诸般百症可堪医

治痈疽、发背，阴阳不和，冷热不明者，宜用此药。

紫荆皮(炒)五两 独活(炒)三两 赤芍(炒)二两 白芷一两 石菖蒲一两半

上为细末，葱汤、热酒俱可调敷。药中紫荆皮乃木之精，能破气、逐血、消肿；独活土之精，动荡凝滞血脉，散骨中冷痛，去麻痹湿；石菖蒲水之精，善破坚硬，生血止痛，破风消肿；白芷金之精，能去风生肌定痛；赤芍药火之精，能生血活血，散瘀除痛，盖血生则肌肉不死，血动则经络流通。故肌活不致烂痛，经通不致壅肿，此为散风行气，活血消肿、祛冷软坚之良药也。其中五行相配用者，再无不效之理，又流毒、骨疽冷症尤效。

冲和膏的临床新用

1. 小儿肠痉挛

孙志梅等用本方治疗小儿肠痉挛。方药组成：紫荆皮 15 克，炒独活 10 克，炒赤芍 10 克，炒白芍 30 克，白芷 6 克，石菖蒲 6 克，元胡 6 克，炙甘草 10 克，葱白 2 段(后下)。伴厌食者加白术、焦三仙；伴呕吐者加姜半夏；伴便秘者加炒莱菔子、槟榔片；伴腹胀者加广木香。每日 1 剂，忌生冷。药渣可腹部热敷。总有效率 94.3%。

孙志梅，等．中国社区医师，2002，18(5)：29

2. 急性乳腺炎

张维国用本方加減、负压吸引治疗急性乳腺炎。本方药研细末。取白葱 500 克,加水煮烂,取适量中药末与葱白汁适量混匀,涂于纱布之上,外敷患乳,2~3 天更换 1 次。负压吸引每日 3 次。治愈率达 93.33%。

张维国. 中医外治杂志,2001,10(03):30

3. 糖尿病合并疮疡

杨葵治疗糖尿病合并疮疡。治疗方法:在控制糖尿病同时,对疮疡未溃者,外敷金黄膏;成脓者用注射器抽脓后,再外敷金黄膏和冲和膏。若疮疡已溃者,行“十”字切开引流。外治同时,内服滋阴补肾、清热凉血汤剂。治疗结果:治疗 12 例中,痊愈 10 例;好转 2 例。

杨葵. 湖北中医杂志,2001,23(08):39

铁桶膏

铁桶膏中铜绿倍 胆矾轻粉郁金香

还有晋矾并白芨 醋调箍肿不开张

治发背将溃已溃时,根脚走散不收束者用此。

铜绿五钱 明矾四钱 胆矾三钱 五倍子(微炒)一两 白芨五钱 轻粉 郁金各二钱 麝香三分

上为极细末,用陈米醋一碗,杓内慢火熬至一小杯,候起金色黄泡为度。待温用下药一钱搅入膏内,每用顿温,用新笔涂膏疮根上,以绵纸盖其疮根,自生绉纹,渐收渐紧,再不开大为效。

煮拔筒方

拔筒奇方有羌活 紫苏蕲艾石菖蒲

甘草白芷生葱等 一筒拔回寿命符

治发背已成将溃时,脓毒不得外发,必致内攻,乃生烦躁,重如负石,非此法拔提毒气难出也。

羌活 独活 紫苏 蕲艾 鲜菖蒲 甘草 白芷各五钱 连须葱二两

预用径口一寸二、三分新鲜嫩竹一段,长七寸,一头留节,用力划

去外青，留内白一半，约厚一分许，靠节钻一小孔，以栅木条塞紧，将前药放入筒内，筒口用葱塞之，将筒横放锅内，以物压勿得浮起。用清水十大碗淪筒煮数滚，约内药浓熟为度候用。再用铍针于疮顶上一寸内品字放开三孔，深入浅寸，约筒圈内，将药筒连汤用大磁钵盛贮患者榻前，将筒药倒出，急用筒口乘热对疮合上，以手捺紧其筒，自然吸住，约待片时，药筒已温，拔去塞孔木条，其筒自脱，将器倒出筒中物色看其何样，如有脓血相粘，鲜明红黄之色，亦有一、二杯许，其病乃是活疮，治必终愈。如拔出物色纯是败血气秽，紫黑稀水，而无脓意相粘者，其病气血内败，肌肉不活，必是死疮，强治亦无功矣。此法家传，屡经有验，如阳疮易溃、易脓之症，不必用此以伤气血，此法阴疮之用，要在十五日前后，坚硬不溃、不脓者行之最当，此法的有回天之效，医家不可缺也。

猪蹄汤

猪蹄汤内羌甘草 赤芍黄芩白芷归

加上露蜂房更妙 诸疮一洗脱凡衣

治痈疽、诸毒已溃流脓时用此汤洗，消毒气、去恶肉，回死肌、润疮口，又能散风消肿，腐尽则已。

羌活 甘草 赤芍 黄芩 白芷 当归 蜂房各等分

上为粗末，看疽疮大小用药多少。先将猪前蹄一只，用白水六碗，煮蹄软为度，将汁滤清，吹去汁上油花，用药一两投于汁中，再用微火煎十数沸，密绢滤去药渣，候汤半热，将软绢蘸汤淋于疮上，轻手搥去瘀脓腐肉，其恶物随汤而下。洗讫，以绢帛挹干，照前总论次第如式用药。

又：洗药方

洗药方中归独活 葱头白芷甘草撮

痈疽腐尽此淋之 生肌长肉常夸说

当归 独活 白芷 甘草各二钱 葱头五个

用水三碗，煎至药烂，滤清以绢帛蘸汤挹净疮上，随搽贴红黑二膏盖之，洗时切忌风寒为要。常治背疮轻易者，以此代猪蹄汤用，其功亦

效。

加味太乙膏

太乙膏中桂芷归 乳没丹参地芍魏

将军林鳖兼轻粉 血余槐柳共称奇

治发背、痈疽及一切恶疮，跌扑伤损、湿痰流毒、风湿、风温，遍身筋骨走注作痛，内伤风郁，心腹胸背攻刺作痛，腿脚酸软，腰膝无力，汤泼火烧、刀伤、棒毒、五损内痛，七伤外症俱贴患处。又男子遗精，妇人白带俱贴脐下。脏毒肠痢亦可丸服。诸般疮疖，血气癰痒，诸药不止痛痒者并效。

肉桂 白芷 当归 玄参 赤芍 生地 大黄 土木鳖各二两
真阿魏三钱 轻粉四钱 槐枝 柳枝各一百段 血余一两 东丹四十两
乳香(末)五钱 没药(末)三钱

上十味，并槐柳枝，用真麻油足称五斤，将药浸入油内，春五、夏三、秋七、冬十，候日数已毕，入洁净大锅内，慢火熬至药枯浮起为度。住火片时，用布袋滤净药渣，将油称准足数，将锅展净，复用细旧绢将油又滤入锅内，要清洁为美。将血余投下，慢火熬至血余浮起，以柳棒挑看似膏溶化之象，方算熬熟。净油一斤，将飞过黄丹六两五钱徐徐投入，火加大些，夏秋亢热，每油一斤加丹五钱，不住手搅，候锅内先发青烟，后至白烟叠叠旋起，气味香馥者，其膏已成。即便住火，将膏滴入水中，试软硬得中，如老加熟油，若稀亦加炒丹每各少许，渐渐加火，务要冬夏老嫩得所为佳。候烟尽，端下锅来，方下阿魏，切成薄片，散于膏面上化尽。次下乳没、轻粉搅匀倾入水内，以柳棍搂成一块，再换冷水浸片时，乘温每膏半斤扯拔百转成块，又换冷水投浸，随用时每取一块铜杓内复化，随便摊贴至妙。

生肌玉红膏

生肌玉红膏更奇 其中淡味少人知

芷草归身轻粉竭 白占紫草效堪推

此膏专治痈疽、发背，诸般溃烂、棒毒等疮，用在已溃流脓时。先用甘草汤，甚者用猪蹄药汤淋洗患上，软绢挹净，用抿脚挑膏于掌中捺

化,遍搽新腐肉上,外以太一膏盖之。大疮早晚洗换二次,内兼服大补脾胃暖药,其腐肉易脱,新肉即生,疮口自敛。此乃外科收敛药中之神药也。

白芷五钱 甘草一两二钱 归身二两 瓜儿血竭 轻粉各四钱 白占二两 紫草二钱 麻油一斤

先用当归、甘草、紫草、白芷四味,入油内浸三日,大杓内慢火熬药微枯色,细绢滤清,将油复入杓内,煎滚下整血竭化尽,次下白占,微火亦化。先用茶盅四枚,预顿水中,将膏分作四处,倾入盅内,候片时方下研极细轻粉,每盅内投和一钱搅匀,候至一伏时取起,不得加减,致取不效。

生肌玉红膏的临床新用

1. 脓疮疮

刘德益用复方生肌玉红膏治疗脓疮疮 106 例。用生肌玉红膏与氟氢松膏 5 克,共搅拌均匀,先除去脓疮和痂皮,用 0.05% ~ 0.1% 新洁尔灭溶液清洗完分泌物,再用生理盐水冲洗干净,消毒棉球拭干,搽上复方生肌玉红膏,反复多次揉搽药膏至疮面,便于吸收,每日 3 次,每次用药前都要清洗干净疮面。用药期间禁食辛辣、油腻、鱼腥食物。治愈率达 100%。

刘德益. 中医外治杂志, 2005, 14(2): 35

2. 褥疮

(1) 张清云用自制的生肌玉红膏治疗褥疮 68 例。治疗时先用 1:5 000 的呋喃西林液将褥疮创面的脓性分泌物冲洗擦净,再将浸有生肌玉红膏的无菌纱条贴敷创面,无菌纱布包扎固定,每天更换 1 次。愈合时间最长 65 天,最短时间 4 天。

张清云. 前卫医药杂志, 2001, 18(1): 22

(2) 朱保华等用本方治疗重度褥疮 18 例,先清除坏死组织,冲洗疮面擦干净后,用生肌玉红膏油纱条填塞疮面,外用无菌敷料覆盖,开

始时每天换药1次,数日后分泌物减少时改为2~3天换药1次,直至疮口愈合。18例褥疮患者,21处创面全部愈合,平均愈合时间4~20天。

朱保华,等.中医外治杂志,2004,13(6):17

(3)姚昶用本方治疗老年性褥疮,首先局部彻底清除坏死组织,然后治疗组予以生肌玉红膏外敷,治疗组在治疗3~15天后各指标显著高于对照组,说明生肌玉红膏在创面愈合之增殖期具有促进创面收缩、肉芽生长及疮面微循环再生作用。

姚昶.实用老年医学,2000,14(03):161

3. 鼓膜穿孔

孙艳等用生肌玉红膏贴补法修补鼓膜穿孔75例。常规消毒外耳道皮肤、麻醉后,刮除穿孔边缘上皮暴露纤维层形成新鲜创面约1.5毫米。将生肌玉红膏贴片敷于创面,使之完全覆盖并紧密接触。总有效率94.28%。

孙艳,等.中医药学报,2001,29(3):37

4. 愈合不良伤口

钟冬梅使用生肌玉红膏治疗难愈合伤口72例。将药膏匀涂纱布上贴敷患处。总有效率为100%。

钟冬梅.现代诊断与治疗,2004,15(6):350

5. 皮肤疮疡

(1)姜礼用本方治疗皮肤疮疡118例。清洗创面脓性分泌物,除去坏死组织,以疮面的大小外敷生肌玉红膏纱布,每日1次。总有效率98.3%。

姜礼.中国中医药科技,2004,11(1):59

(2)沈敏娟等用本方治疗慢性皮肤溃疡157例。先常规消毒创面,如创面脓性分泌物多,或创面四周皮肤色泽苍白者用少量的脱管散,然后放置生肌玉红膏油纱条并用纱布包扎。若创面新鲜,可见散在的粉红色肉芽组织生长缓慢者,可用少量的生肌散后覆盖生肌玉红膏油纱条并用纱布包扎,每天换药1次。

沈敏娟,等.新中医,2004,36(2):62

(3)王荣初等用本方治疗体表慢性溃疡32例。每日疮周以75%的酒精消毒,创面以1:5000呋喃西林常规消毒后,将膏匀涂纱布上,敷于创面上,干纱布盖贴包扎,每日换药2次。平均愈合时间为 (25.17 ± 10.03) 天。

王荣初.齐齐哈尔医学院学报,2003,24(8):877

6. 外科绿脓杆菌感染

刘云岭等用自制生肌玉红膏治疗35例外科绿脓杆菌感染病人。在综合治疗的基础上,用生理盐水棉球将疮面分泌物擦拭干净,然后用所制药膏遍敷创面上,重者每天换药1次,轻者隔天换药1次。治愈率达100%。

刘云岭,等.中华护理杂志,2004,39(6):439

7. 丝裂霉素静滴致皮肤坏死

姜礼等治疗丝裂霉素静滴致皮肤坏死1例。给予2%新洁尔灭清创,然后放置用高温消毒的生肌玉红膏纱布包扎,每日1次。2周后见红肿逐渐消退,肉芽组织开始生长。4周后创面缩小,开始结痂。6周后创面愈合。病愈出院。

姜礼,等.甘肃中医,2003,16(7):26

8. 截趾术后伤口组织血运性坏死

贾俊海运用生肌玉红膏治疗脚趾截除术后末端组织坏死患者2例。药用生肌玉红膏,另加入麝香1克拌匀备用。清除创面内已明确的坏死组织,部分失活组织界限不明者可保留,碘伏消毒后盐水棉球拭净创面,将生肌玉红膏适量均匀涂敷在纱布上后塞入伤口内引流,外用无菌敷料包扎。第1周内隔日换药1次。约1周后创面内坏死及失活组织完全分解脱落,拭去脓性分泌物可见创面较为新鲜,有健康肉芽组织生长,此时可3日同法换药1次,换药时注意勿损伤新生成的肉芽组织,直至创面完全愈合,平均愈合时间为35天。

贾俊海.甘肃中医,2003,16(2):26

9. 溃疡性结肠炎

王桥专采用生肌玉红膏灌肠治疗溃疡性结肠炎40例。治疗方

法:生肌玉红膏20克,加生理盐水80毫升,置三角烧瓶中隔水加温,溶化成乳剂,凉至37℃左右,行保留灌肠,每日早晚各1次,10天为1个疗程。若未痊愈,停药3天后行第2疗程,一般用2个疗程。总治愈率92.5%。

王桥专. 现代中西医结合杂志,2002,11(2):119

10. 脓疮

张晓琳等用本方治疗脓疮。将生肌玉红膏均匀地涂在纱布上,敷贴于患处。隔日换药1次,并依溃疡局部情况,可掺提脓、祛腐药于膏上同用,效果更佳。总有效率96%。

张晓琳,等. 中医药信息,2002,19(2):57

化腐紫霞膏

化腐紫霞膏粉竭 巴豆草仁金顶砒

螺肉瘁冰同共末 敷之铜铁也成灰

治发背已成,瘀肉不腐及不作脓者。又诸疮内有脓而外不穿溃者,俱用此膏。不腐烂者自腐,不穿溃者自破。其功甚于乌金膏及碧霞锭子。

轻粉 草麻仁(研)各三钱 血竭二钱 巴豆(研,白仁)五钱 朝脑一钱
金顶砒五分 螺蛳肉(用肉晒干为末)二个

上各为末,共碾一处,磁罐收贮。临用时旋用麻油调搽顽硬肉上,以绵纸盖上或膏贴俱可,至顽者不过二次即软,腐烂为脓,点诸疮顶亦破。

以上三十二方,凡大疮诸毒初起及已成时选用。

溃疡治法

脓熟不溃,疮不焮热,食少便溏者,脾虚也,补托温中。脓清或多,疮口散大,不生肌者,里虚欲变症,峻补之。腐肉虽脱,新肉生迟,如冻色者,肉冷肌寒,大温气血。溃后食少,心烦不睡,发热作渴,脾弱阴虚,补中益气。身凉脉细、倦怠懒言,食不知味者,脾弱也,醒脾助胃。

风寒袭于疮口，皮白绽而不收敛者，外照而内温补。溃后面黄肌瘦，脓水清稀，疮色淡白者，当香燥助脾。脉大无力，细涩微沉，自汗身凉者，气血俱虚，峻补之。出血或脓多，五心烦热，燥甚不眠者，亡阳也，急补之。疮口已合，经犯房劳，或值急暴复崩溃者，仍助气血。

溃疡主治方

十全大补汤

十全大补参芪芍 肉桂川芎熟地黄

归术茯苓甘草炙 枣姜加上号全方

治溃疡发热，或恶寒、或作痛、或脓多、或清、或自汗、盗汗及遍身流注、瘰癧、便毒诸疮。久不作脓，或脓成不溃，溃而不敛。若气血不足之人，结肿未成脓者，宜加陈皮、香附、半夏、连翘，服之自消。

人参 黄芪 白芍 肉桂 川芎 熟地 当归 白术 茯苓各一钱 甘草(炙)五分

水二盅，姜三片，枣二枚，煎八分，食前服。

十全大补汤的临床新用

1. 骨折迟缓愈合

张杰等用本方加减治疗骨折迟缓愈合 80 例，药用：熟地 15 克，当归 10 克，川芎 10 克，赤芍 10 克，党参 10 克，白术 10 克，茯苓 10 克，甘草 10 克，黄芪 10 克，桂枝 10 克，土鳖虫 10 克，红花 10 克，鸡血藤 20 克，地龙 10 克。上肢骨折加桑枝 15 克，羌活 10 克；下肢骨折加牛膝 10 克，杜仲 15 克，独活 10 克。水煎服，每日 1 剂，10 天为 1 个疗程，停 3 天继续下一疗程治疗。平均治疗 3 个疗程后，全部骨性愈合，肢体功能恢复正常。

张杰．医学理论与实践，2001，14(3)：242

2. 介入化疗术后

采用十全大补汤加减对介入化疗术后部分患者进行治疗，效果良

好。药用:黄芪40克,党参40克,白术、茯苓、当归、川芎、白芍、熟地各15克,肉桂2克,甘草9克。脾虚加砂仁、半夏、陈皮;血虚有热加白茅根、麦冬、沙参,减肉桂。术后第2天开始,水煎,1次顿服,每日1剂,连续服用20天。结果表明本方服用较长时间有直接的抗癌活性。

郑章和. 福建中医药,2004,35(6):23

3. 晚期肺癌

对晚期肺癌患者给予中药鱼腥草注射液配合十全大补汤加味治疗,使带瘤生存生活质量明显提高,延长了生存期。治疗给予鱼腥草注射液每日1次,静滴,同时给予十全大补汤加味口服,每日2次,伴感染者对症给予抗生素。3个月为1个疗程,其中鱼腥草注射液用3周,休1周。1个疗程结束后,休3个月,再重复以上治疗,每年共2个疗程。总有效率37.5%。

赵小青. 辽宁中医学院学报,2001,3(2):163

4. 多发性骨髓瘤化疗后

方坚报道本方对多发性骨髓瘤化疗后患者生活质量的影响,治疗中药以补中益气汤、十全大补汤为主方加减,西医化疗。结果表明,采用中西药结合治疗多发性骨髓瘤与单纯化疗方法相比,明显改善了患者的生活质量,有效解除了患者食欲减退、情绪低落及精神状态萎靡等症状,有利于化疗药物正向治疗作用的发挥。

方坚. 广州中医药大学学报,2004,21(6):427

5. 肺心病急性发作期

谢东霞等在治疗肺心病急性发作期时,在抗感染对症支持疗法基础上加用自拟方(十全大补汤和牵正散加减化裁),合并肺性脑病而见神志障碍者加石菖蒲20克,郁金10克;合并心衰、水肿者加葶苈子10克,大腹皮20克,茯苓15克,泽泻10克,车前子10克。每日1剂,7天为1个疗程。结果证明该方可维护正气,兼顾了本虚邪实的病机特点;虫类药与补气药同时使用可明显改善肺内小血管痉挛,缓解支气管痉挛,改善微循环,降低肺动脉压,改善肺通气,减少残气量,且可改善心肌供血供氧;提高机体免疫力,改善症状,缓解肺心病急性发作。

谢东霞,等. 山西中医,2001,17(01):26

6. 牙周炎

胡壮等治疗属气血两虚型牙周炎患者。治以十全大补汤加减:党参9克,白术12克,当归9克,白芍药6克,熟地黄12克,茯苓9克,川芎9克,甘草3克,黄芪9克,肉桂3克,牙龈渗血甚者可加阿胶9克,仙鹤草9克。每天1剂。服用中药治疗期间,一律停用其他消炎药物,总有效率为81.25%。

胡壮,等. 上海中医药杂志,2003,37(3):34

7. 化疗引起的骨髓抑制及感染性发热

倪敏等报道在化疗同时服用十全大补汤,连用3周,结果显示十全大补汤可明显减轻化疗对骨髓的抑制作用,减轻WBS下降幅度,缩短WBS、HB、PC恢复的时间,减少感染性发热的机会,保证化疗疗程的顺利实施。

倪敏,等. 中国肿瘤临床与康复,2003,10(5):446

8. 边缘性骨髓炎

王吉英等治疗边缘性骨髓炎37例。治以十全大补汤加味,药用:人参5克,黄芪、茯苓各10克,当归15克,川芎5克,熟地20克,白芍10克,肉桂、生姜各15克,乳香20克,白芷10克,金银花15克,炙甘草、没药各20克。服药期间停用西药及外用药。6天为1个疗程,连续服用5个疗程,总有效率为91.89%。

王吉英,等. 中国中医急症,2002,11(1):65

9. 胃癌术后化疗

赵敏等用FAM方案治疗,4周为1周期,3周期为1个疗程,配合十全大补汤加减。舌紫加莪术、三棱;呕恶、腹胀加半夏、竹茹、薏苡仁;颧红、低热盗汗、舌红、苔黄去菟丝子、补骨脂,加制首乌、玄参、地骨皮;口干加芦根、天花粉。结果表明:合用十全大补汤能顺利完成化疗疗程,降低化疗毒副反应。

赵敏,等. 浙江中西医结合杂志,2000,10(02):93

八珍汤

八珍汤擅理阴阳 芍药当归熟地黄

还要相兼四君子 何愁虚弱不荣昌

治溃疡诸症,调和荣卫,顺理阴阳,滋养气血,进美饮食。和表里,退虚热,为气血俱虚之大药也。

川芎 白芍 当归 熟地黄 人参 白术 茯苓各一钱 甘草
(炙)五分

水二盅,姜三片,枣二枚,煎八分,食前服。

八珍汤的临床新用

1. 心律失常

冯纯惠等应用常规西药配合自拟加味八珍汤治疗 36 例。药物组成:熟地、黄芪各 30 克,白芍、太子参、茯苓各 20 克,白术、当归、川芎、炙甘草各 10 克。阴虚火旺型加麦冬 20 克,玄参、酸枣仁各 10 克,黄连 3 克;心阳不振型加肉桂、桂枝、三七、丹参、红花各 10 克;血虚型加阿胶 50 克(烔化)。配合异搏定、心律平、利多卡因等常规西药,总有效率 96%。

冯纯惠,等. 陕西中医,2004,25(7):593

2. 慢性肾功能衰竭

刘延东等用八珍汤加减治疗慢性肾功能衰竭 40 例。自拟加减八珍汤:人参 10 克,茯苓 10 克,白术 10 克,当归 20 克,生地 15 克,白芍 15 克,川芎 20 克,丹参 30 克,川牛膝 20 克,生大黄 15 克,黄柏 10 克,泽泻 15 克。每日 1 剂,连服 2 月为 1 个疗程。对腹泻者调整大黄剂量;属肾虚未固者加芡实、金樱子;属阴虚阳亢血压较高者加草决明、钩藤;肝胆湿热者加龙胆草、栀子;血尿者加炒蒲黄、三七粉;水肿较重者加猪苓、白茅根。同时予高热量优质低蛋白饮食。总有效率 87.5%。

吴世杰,等. 中国中医药科技,2004,11(3):179

3. 儿童弱视

刘英等用八珍汤加减联合光学治疗儿童弱视 32 例,方选八珍汤

加減：黨參、白朮、云茯苓、炙甘草、陳皮、熟地、當歸身、白芍、川芎、焦山楂。食滯者，去熟地、白芍，加神曲、炒麥芽、雞內金、萊菔子；脾腎陽虛者，去白芍，加枸杞、黃精、鹿茸。每日1劑，1月為1個療程。服中藥同時配合屈光矯正、遮蓋療法和家庭視覺訓練。總有效率達96.15%。

劉英，等．湖南中醫藥導報，2003，9(5)：54

4. 冠心病

仲英用八珍湯加減治療冠心病2例，均為氣血兩虛，本虛標實之証。1例由於痰阻血瘀互結，痹阻胸陽，血脈不通，造成缺氧缺血而產生心絞痛，故加黃芩除胸中之熱，瓜蒌、杏仁、甘草、半夏化痰；白茅根、薏苡仁祛濕；丹參、桃仁、紅花活血通絡；黃芪、黨參補中益氣，使氣復血行。1例患者氣短症狀明顯，所以治宜重用黃芪、黨參補中益氣，川芎、延胡索止痛，白茅根使補中有利，相輔相成，補而不熱，服後病情穩定，至今未見復發。

仲英．吉林中醫藥，2002，22(2)：53

5. 慢性扁桃體炎

趙麗明以八珍湯為主方加減治療慢性扁桃體炎50例。藥用黨參15克，當歸10克，茯苓、白朮、白芍、熟地各9克，川芎、甘草各6克。低熱、易汗出者，加黃芪15克；痰多、咽部室悶不適者，加桔梗6克。每日1劑，10日為1個療程。總有效率達98%。

趙麗明．四川中醫，2004，22(3)：86

6. 有機磷農藥中毒後遲發性神經病

孫伯青以八珍湯為主治療有機磷農藥中毒後遲發性神經病35例。手足麻木不仁、舌質黯、脈澀者加桃仁、紅花各10克；上肢重者加桑枝10克；下肢重者加牛膝10克；有身熱心煩、舌赤者加黃柏、山梔各10克；身重肢沉、頭暈欲眠、苔膩、脈滑者加蒼朮10克，黃柏8克；潮熱盜汗、舌干苔少者加龜板15克，玄參、知母各10克。水煎服，每日1劑，上下午分2次溫服，結合適當的肢體功能鍛煉。1個月為1個療程。收到良好效果。

孙伯青. 浙江中医杂志, 2003, 38(11): 484

7. 椎基底动脉供血不足眩晕

阳碧发等用八珍汤加味治疗椎基底动脉供血不足眩晕 40 例。药用: 白术 25 克, 葛根、茯苓各 30 克, 当归、川芎各 15 克, 熟地、白芍、天麻、鸡血藤、丹参各 20 克, 泽泻 40 克, 人参、炙甘草、水蛭各 10 克。水煎分 6 次服, 2 天 1 剂。20 天为 1 个疗程。总有效率为 95%。

阳碧发, 等. 陕西中医, 2003, 24(4): 347

8. 产后风湿病

吴俊荣用本方加减治疗 47 例。药物组成: 黄芪 30 克, 人参 10 克 (另煎兑服), 白术 12 克, 茯苓 12 克, 当归 12 克, 川芎 10 克, 白芍 12 克, 熟地黄 12 克, 羌活 10 克, 独活 10 克, 鸡血藤 15 克, 桂枝 6 克, 秦艽 15 克, 杜仲 10 克, 陈皮 10 克, 阿胶 10 克 (烔化), 甘草 6 克。偏于颈部者加葛根 30 克, 并重用白芍和甘草; 偏于上肢者加桑枝 30 克, 白芷 10 克; 偏于下肢者加木瓜 15 克, 牛膝 12 克; 阴雨天加重者加防风 10 克, 荆芥 10 克; 大便干者加柏子仁 10 克; 疼痛甚者加延胡索 10 克, 白芷 10 克; 病程日久, 迁延不愈者加穿山甲 10 克。总有效率 93.8%。

吴俊荣. 山东中医杂志, 2003, 22(1): 24

9. 麻风病神经痛

用本方加味治疗 20 例。药用党参、黄芪、熟地黄各 25 克, 白术、丹参、川芎、续断各 20 克, 当归、茯苓各 15 克, 甘草、三七各 10 克, 蜈蚣 9 条, 后 2 味药合研, 分 3 次用药液冲服。痛处发凉, 神经肿大, 结节坚硬者加麻黄、桑枝、淫羊藿、葛根; 神经肿大疼痛, 时感灼热者加黄柏、防己、金钱草、木通。每天 1 剂。20 例全部治愈, 无复发。

徐忠健. 新中医, 2002, 34(6): 54

10. 中老年气血亏虚型便秘

八珍汤加减治疗 50 例。药用: 当归 10 克, 川芎 5 克, 白芍 8 克, 熟地 15 克, 人参 3 克, 白术 10 克, 茯苓 8 克, 甘草 5 克。每天 1 剂, 10 天为 1 个疗程。兼脾肾阳虚者去白芍、熟地, 加仙灵脾、胡桃肉等。兼肝气郁滞者, 去党参、茯苓, 加香橼、佛手、郁金等。缓解期根据患者身体

状况,每周2剂八珍汤,连续服用3个月,并嘱患者平时注意饮食和情志的调节,以期达到防治结合。总有效率为100%。

王文静. 广西中医学院学报,2002,5(1):13

11. 早期先兆流产

用本方治疗早期先兆流产。伴呕吐者加陈皮5克,砂仁5克;出血多时,去当归、川芎,加侧柏炭10克,荆芥炭10克,黄芪10克;伴腰痛下坠者,加升麻5克,乌药5克;伴腰酸者,加桑寄生15克,川续断15克;每天1剂,煎服15天停药。凡是有自然流产史者服药时间应超过上次流产时间10天左右停药。有效率91%。

吴春娇,等. 浙江临床医学,2002,4(3):237

补中益气汤

补中益气汤甘草 黄芪人参白术归

柴胡升陈三味少 还兼姜枣效堪推

治疮疡元气不足,四肢倦怠,口干发热,饮食无味,或饮食失节,或劳倦身热,脉洪大而无力。或头痛而恶寒,或声高而喘,身热而烦,俱宜服此。

黄芪一钱五分 甘草(炙) 人参 当归 白术各一钱 升麻 柴胡 陈皮各三分 麦门冬六分 五味子(炒)五分

水二盅,姜三片,枣二枚,煎一盅,空心热服。

补中益气汤的临床新用

1. 胃脘痛

郑通美治疗脾胃虚寒型胃脘痛1例,以补中益气汤加味:党参20克,黄芪20克(炙),白术15克(炒),甘草12克(炙),当归10克,陈皮6克,升麻、柴胡各5克,桂枝12克,白芍20克(炒),乌药8克。嘱饮食定时适量,远冷物,节体力。5剂后告知胃脘痛减轻,食欲大增。共以本方稍事加减服30剂而胃脘痛告休。病情稳定。

郑通美. 现代中西医结合杂志,2005,14(9):1186

2. 食后即便

郑通美治疗脾气不足,中气下陷,食后即便1例。以补中益气汤加减:党参20克,黄芪20克(炙),白术、苍术各15克,甘草10克(炙),茯苓30克,升麻、柴胡各6克,葛根10克,陈皮6克,薏苡仁30克(炒)。并嘱忌食生冷等物,定时适量进食。3剂后二诊:药后食味转香,眩晕减轻。拟原方续服5剂。三诊:大便次数明显减少,余证亦不同程度改善,守方共服20剂,解便已规律,余证消失。未复发。

郑通美. 现代中西医结合杂志,2005,14(9):1186

3. 腰痛

郑通美治疗属脾胃虚弱,中气下陷,升清不力,运化失健;湿浊不化,滞于肾之外府之腰痛,药用补中益气汤加味:党参20克,黄芪20克(炙),白术30克,当归10克,甘草12克(炙),陈皮6克,升麻5克,柴胡5克,小茴香8克,淮牛膝20克,巴戟天15克。5剂。每日1剂。嘱适当休息,避卑湿之地,卧硬板床。腰痛未复发。

郑通美. 现代中西医结合杂志,2005,14(9):1186

4. 药流后漏下不止

刘培智等治疗气不摄血,药流后漏下不止1例。用本方加味:党参15克,甘草6克,白术12克,当归9克,陈皮9克,黄芪15克,升麻6克,柴胡6克,枳壳12克,益母草20克,鲜马齿苋60克。3剂后,下血量明显减少,效不更方,续服3剂收功。

刘培智,等. 河南中医,2005,25(4):38

5. 产后发热

刘培智等治疗气虚外感产后发热1例。选本方加味:党参12克,白术15克,当归6克,陈皮6克,黄芪12克,升麻6克,柴胡9克,甘草9克,炒山楂15克,神曲15克,荆芥9克,防风9克。水煎2剂,1日1剂,服药后热退纳香,继以保和丸调理而愈。

刘清,等. 河南中医,2005,25(4):38

6. 胎动不安

刘培智治疗属中气不足伴有肾虚胎动不安1例。用本方加味:党

参30克,黄芪15克,白术12克,当归6克,陈皮3克,升麻9克,柴胡6克,川续断15克,桑寄生15克,菟丝子15克。日1剂。药进5剂,下坠感减轻,小便次数减少。效不更方,再服10剂而告愈,按时顺产一女婴。

刘培智. 河南中医,2005,25(4):38

7. 胃下垂

(1)张士金治疗中气下陷型胃下垂46例。用本方加减:黄芪30克,白术10克,当归10克,陈皮6克,升麻3克,柴胡9克,茯苓9克,党参12克,枳壳10克。同时用针灸或按摩治疗。有效率为100%。

张士金. 河南中医,2005,25(3):64

(2)本方加味治疗胃下垂75例。气虚严重者加炙黄芪90克,同时改党参为高丽参10克;血虚者加当归12克,阿胶10克(烔化);脾胃虚寒者加干姜3~6克,吴茱萸3克;胃阴虚者加沙参30克,玉竹20克,石斛20克;腹胀甚者加广木香15克,砂仁12克;纳呆者加鸡内金20克,炒麦芽30克,山楂15克;痛甚者加延胡索10克,川楝子10克。30天为1个疗程。总有效率为97.30%。

林燕琴. 中国民间疗法,2005,13(1):55

8. 黄褐斑

用本方治疗黄褐斑。药用:黄芪15克,红参5克,当归6克,白术10克,茯苓10克,柴胡3克,升麻3克,山药10克,白芍10克,熟地10克,杜仲10克,巴戟天10克,甘草3克。每日1剂。总有效率为95%。

蔡大庆. 中国乡村医药,2005,12(5):51

9. 老年性便秘

本方加味治疗老年性便秘38例。药物组成:黄芪30克,白术20克,党参20克,玄参10克,生地20克,柴胡15克,升麻10克,当归15克,炒枳壳10克,炒厚朴10克,肉苁蓉12克,制大黄6克。阳虚者加附片15克。每日1剂。总治愈率90.7%。

陈霞. 云南中医中药杂志,2005,26(1):21

10. 单纯性声带闭合不全

本方加味治疗单纯性声带闭合不全102例。兼肺阴虚者加玄参、

百合各10克;兼痰湿者加石菖蒲10克,薏苡仁15克;兼瘀血者加丹参15克,路路通10克;兼肾阳虚者加淫羊藿15克,巴戟天10克;兼肾阴虚者加枸杞子、山药各10克。每天1剂。30天为1个疗程,治疗2个疗程。总有效率100%。

金丕琳. 新中医, 2005, 37(4): 78

11. 腰椎间盘突出症

本方加味治疗腰椎间盘突出症52例。药用:黄芪60克,党参30克,白术20克,川断15克,柴胡、当归各12克,升麻、陈皮、黑杜仲、全蝎各10克,红花10克,炙甘草6克。每日1剂,7剂为1个疗程,连服3个疗程,服药治疗期间,卧平板床休息,忌劳累、负重。总有效率94.2%。

曹建恒. 陕西中医, 2005, 26(4): 328

12. 妊娠合并肾盂积水

本方配合西药治疗妊娠合并肾盂积水60例。治疗以西医常规治疗,中医治疗药用:黄芪、党参各30克,川断、杜仲、茯苓各15克,柴胡、陈皮、当归、白术、泻泽、炙甘草各10克,升麻6克。下肢浮肿加赤小豆15克,冬瓜皮30克;腰背痛者,加炒白芍15克,枸杞30克。每日1剂,7天为1个疗程。总有效率93.33%。

陈素娟. 陕西中医, 2005, 26(4): 319

13. 尿闭

(1) 门龙翔用本方治疗尿闭1例,证属脾肾虚而致清气不升,气不化水,气化失常。药物组成:黄芪60克,党参30克,白术9克,升麻6克,柴胡6克,当归9克,陈皮6克,云苓12克,泽泻9克,川牛膝9克,肉桂6克,巴戟肉9克,车前子6克(包煎),甘草6克。1剂翌日即见效,不用导尿管,守原方再进3剂,痊愈而出院。

门龙翔. 中国社区医师, 2005, 21(3): 42

(2) 本方加味配合探吐法治疗产后尿闭47例。方药:黄芪30克,党参、当归、白术、升麻各12克,陈皮、枳壳、桔梗各9克,柴胡、木通各6克。每日1剂。其中首服可配用探吐法,剖宫术者除外,以免引起术

口疼痛。有效率为 95.7%。

宋玉柱. 安徽中医临床杂志, 2001, 13(5): 384

14. 妇科术后发热

补中益气汤加减治疗妇科术后发热 46 例。方药: 白术 15 克, 黄芪 18 克, 柴胡 15 克, 陈皮 12 克, 当归 12 克, 甘草 6 克, 桃仁 12 克, 莪术 10 克, 黄芩 12 克。冬季酌加荆芥 9 克, 防风 9 克, 桂枝 12 克; 血虚者加熟地 24 克, 阿胶 24 克; 阴虚加青蒿 12 克, 鳖甲 12 克; 血瘀者加益母草 24 克, 牡丹皮 15 克, 蒲黄 12 克, 五灵脂 12 克; 大便秘结者加大黄 9 克, 木香 12 克。治愈率 91.3%。

黄性灵. 中国民间疗法, 2005, 13(3): 54

15. 复发性口腔溃疡

补中益气汤加味治疗复发性口腔溃疡 37 例。药物组成: 黄芪、党参各 30 克, 白术、当归、知母、黄柏各 10 克, 升麻、柴胡各 6 克, 陈皮 5 克, 炙甘草 3 克。1 日 1 剂。7 天为 1 个疗程, 一般治疗 1~3 个疗程。疗效显著。

应武江. 江西中医药, 2005, 36(3): 38

16. 返流性食管炎

本方随症加味治疗返流性食管炎 57 例。灼痛明显加延胡索 9~12 克, 郁金 9 克; 倦怠乏力加茯苓 12 克, 枳壳 9 克; 咽部不适、咽下困难加瓜蒌、川厚朴各 9 克。1 个月为 1 个疗程, 有效率 91.2%。

李传杰. 安徽中医临床杂志, 2001, 13(3): 183

17. 慢性疲劳综合征

本方治疗慢性疲劳综合征 36 例。低热不退加胡黄连、青蒿、鳖甲; 头痛较甚加羌活、川芎、白芷; 咽痛较甚加板蓝根、大青叶、射干; 外周淋巴结肿大明显且疼痛较甚者加白花蛇舌草、半枝莲; 烦躁、失眠多梦加酸枣仁、黄连、石菖蒲; 汗出较甚者加桂枝、五味子; 周身乏力、恶风畏寒较甚者加桂枝、高良姜; 关节疼痛较甚加牛膝、伸筋草、木瓜; 纳差、饱胀、食欲不振者加茯苓、焦三仙。每日 1 剂。2 周为 1 个疗程。治疗总有效率 91.69%。

丁强. 江西中医药, 2005, 36(1): 54

18. 尿频

本方加味治疗尿频 50 例。处方: 黄芪 10 克, 党参 10 克, 白术 6 克, 当归 6 克, 陈皮 6 克, 柴胡 6 克, 升麻 3 克, 炙甘草 6 克, 芡实 10 克, 金樱子 6 克, 山药 10 克, 熟地 10 克, 益智仁 3 克, 生姜 3 片, 大枣 3 枚。每日 1 剂。以上为儿童剂量, 成人酌加。6 剂为 1 个疗程。本组 50 例, 均治愈。

马艳锋. 中国民间疗法, 2005, 13(1): 51

19. 男性不育症

本方加味治疗男性不育症 60 例。药用: 黄芪 15 克, 党参 15 克, 升麻 5 克, 甘草 5 克, 陈皮 10 克, 白术 10 克, 柴胡 6 克, 生地 10 克, 黄柏 10 克, 巴戟天 10 克, 淫羊藿 10 克, 枸杞 15 克, 何首乌 15 克, 大枣 15 克, 车前仁 10 克, 砂仁 10 克, 山茱萸 10 克。每日 1 剂, 连续服用 1 个月为 1 个疗程。治疗结果: 女方怀孕占 65%。

胡吉元. 中国临床医生, 2005, 33(1): 52

20. 心动过缓

莫学德等以本方为基本方治疗心动过缓 58 例。若兼有阳虚者加桂枝、附子、檀香; 兼有气虚者加重人参、黄芪用量; 兼有血瘀者加赤芍、川芎、桃仁、红花、郁金、元胡; 兼有痰浊者加法夏、白术、瓜蒌、白蔻仁、竹茹等。对部分病人予复方丹参针、维生素 C 针等静滴, 必要时用对症支持治疗。结果治愈 31 例, 显效 15 例, 有效 9 例。

莫学德, 等. 云南中医中药杂志, 2004, 25(6): 24

21. 药物流产后出血

本方加味治疗药物流产后出血 56 例。药物组成: 黄芪 30 克, 党参、旱莲草各 20 克, 白术 15 克, 当归、茜草各 12 克, 陈皮、焦山楂各 10 克, 炙甘草、三七粉(冲服)、柴胡、升麻各 6 克。血色紫暗有异味加苡仁 20 克, 红藤 15 克; 小腹冷痛者加元胡 12 克, 艾叶 10 克; 血虚重加阿胶(烊化) 12 克; 腰膝酸软加山药 15 克, 炒杜仲 12 克。每日 1 剂, 10 天为 1 个疗程。总有效率为 89%。

王嘉梅. 四川中医, 2004, 22(12): 65

22. 直肠黏膜内脱

本方加味治疗直肠黏膜内脱 30 例。药用: 黄芪 30 克, 党参 25 克, 甘草 6 克, 白术 20 克, 当归 18 克, 升麻 6 克, 柴胡 9 克, 肉苁蓉 25 克, 杏仁 12 克。7 天为 1 个疗程。30 例患者中有 23 例痊愈, 4 例显效, 2 例有效, 1 例无效。

吴至久, 等. 川北医学院学报, 2004, 19(4): 102

23. 变应性鼻炎

本方加减治疗变应性鼻炎。药物组成: 黄芪 15 克, 党参、白术各 12 克, 当归 9 克, 炙甘草 6 克, 陈皮、升麻、柴胡各 3 克, 泽泻 9 克, 白芷、辛夷、苍耳子各 12 克, 细辛 3 克。每日 1 剂, 10 天为 1 个疗程。收效满意。

于圣立. 中国药物与临床, 2005, 5(1): 60

24. 肠套叠

本方治疗肠套叠属中医中气下陷、大肠下垂所致虚痞。处方: 党参 30 克, 黄芪 20 克, 升麻 15 克, 柴胡 15 克, 白术 15 克, 陈皮 15 克, 当归 15 克, 木香 15 克, 制附子 10 克, 干姜 10 克, 乌药 10 克, 枳壳 10 克。1 日 1 剂。上药服 10 剂后, 腹胀止, 腹痛除。又经 X 线等复查, 肠套叠解除。

史宇莹. 吉林中医药, 2005, 25(1): 49

25. 原发性低血压

本方治疗原发性低血压 20 例。夹痰湿者加清半夏 9 克, 茯苓 15 克; 夹瘀血者加丹参 15 克, 川芎 10 克。1 日 1 剂, 1 个月为 1 个疗程, 必要时可重复 1~3 个疗程。总有效率 95%。

孙晶. 实用中医药杂志, 2004, 20(10): 560

26. 眼型重症肌无力

本方结和西医治疗眼型重症肌无力 80 例。方药: 黄芪、白术、人参、陈皮、升麻、柴胡、甘草、当归身。1 日 1 剂。同时配合溴吡斯的明片口服, 服药后腹痛较剧者减量停药; 加兰他敏肌注, 日 1 次, 10 天后

效果显著者改为隔日1次。80例中近期治愈74%。

熊丹娟. 湖南中医药导报, 2001, 7(6): 329

27. 老年混合痔

补中益气汤为主方加减治疗老年混合痔75例。处方: 炙黄芪15克, 党参15克, 白术20克, 茯苓10克, 升麻6克, 柴胡6克, 陈皮6克, 当归15克, 白芍20克, 黄连3克, 连翘10克, 泽泻10克, 甘草6克。出血加槐角12克, 地榆12克; 脱垂重用黄芪、党参各30克; 疼痛加延胡索10克, 便秘加麻仁12克。每日1剂, 20天为1个疗程。总有效率为94.6%。

徐伟. 江苏中医药, 2004, 25(12): 33

28. 小儿血尿

本方加味为主方治疗小儿血尿32例。药用: 黄芪、党参、白术各15克, 当归10克, 陈皮、升麻、柴胡、炙甘草各6克, 鲜小蓟、鲜猫须草各30克。有外感者加银花、连翘、蒲公英; 腹痛便溏者加焦三仙、苡仁; 自汗者加防风、浮小麦; 眠差易惊多梦者加煅龙牡、枣仁。每日1剂, 20天为1个疗程。总有效率96.9%。

施金柳. 现代中西医结合杂志, 2001, 10(2): 159

29. 肺癌晚期胸腔积液

本方加减治疗肺癌晚期胸腔积液1例。处方: 黄芪50克, 党参30克, 白术、陈皮、茯苓、升麻、柴胡、桑白皮、莱菔子、砂仁、焦三仙、炙甘草各15克。服药4剂, 病人自觉症状明显改善, 再进药6剂, 病人气短、乏力等症状基本消失, 且食欲大增, B超提示局部仅有少量腹水, 再继续服药20剂, 腹水基本消失, 后胸水未复发。

毕湘杰. 中医药信息, 2001, 18(5): 39

30. 慢性盆腔炎

本方加味治疗慢性盆腔炎86例。腹痛重者合失笑散(五灵脂10克, 蒲黄12克), 或加元胡12克; 有包块者加鸡内金12克, 牡蛎15克, 三棱、莪术各10克; 以白带多为主者加苍术12克, 山药10克。每日1剂, 经期不停服。15天为1个疗程。

王嘉梅·陕西中医,2002,23(5):417

31. 慢性肝炎

本方加味治疗慢性肝炎 56 例。脾虚湿困,舌苔较腻,胸闷,腹胀较著者,可加茯苓、苍术、茅根;脾郁气滞,胁痛较著,得暖气则舒者加香附、木香;舌苔黄腻,口苦,有黄疸,湿热较著者加茵陈、黄芩、金钱草;肝脾肿大显著,有血瘀症状者,可加丹参、红花、桃仁;浮肿加大腹皮、车前子、茅根。每日 1 剂。西药用维生素 C、复合维生素 B、肝太乐等保肝药物,比较重者加强支持疗法,3 个月为 1 个疗程。总有效率 85.7%。

朱开学·陕西中医,2002,23(2):131

32. 糖尿病神经源性膀胱

本方加味治疗糖尿病神经源性膀胱 27 例。兼阳虚加制附子 6 克,桂枝 9 克;兼腰酸加熟地 10 克,枸杞子 12 克;兼小便刺痛灼热加滑石 9 克,栀子 10 克。1 日 1 剂。10 天为 1 个疗程,一般病人 3 个疗程见效。总有效率 92.6%。

庞淑珍·四川中医,2001,19(3):42

33. 梅核气

补中益气汤加减治疗梅核气 30 例。药用:黄芪、党参各 15 克,白术 10 克,陈皮 6 克,当归 12 克,炙甘草、炙柴胡各 5 克,炙升麻 3 克,越鞠丸 18 克,桔梗 3 克,威灵仙 10 克,苏梗、远志各 12 克。痰湿偏重加制半夏、苍术各 6 克,川朴 3 克,茯苓 12 克,菖蒲 6 克。偏阴虚加南北沙参、生地各 12 克,砂仁 3 克,麦冬、西青果各 12 克,象贝 6 克。咽喉部结缔组织增生,威灵仙加至 20 克,另加赤芍、炒僵蚕各 12 克,全蝎 3 克,地鳖虫 6 克。每日 1 剂,10 天为 1 个疗程。30 例中治疗 1 个疗程 7 例,2 个疗程 15 例,3 个疗程 8 例。

顾仲道·内蒙古中医药,2001,20(3):13

34. 颈性眩晕

本方加味治疗颈性眩晕 400 例。方药组成:炙黄芪 25 克,全当归 12 克,炒白术 9 克,广陈皮 9 克,炙升麻 9 克,软柴胡 9 克,潞党参 15

克,紫丹参12克,炙地龙9克,炒白芍药12克,首乌、首乌藤各15克,生甘草9克。每日1剂,连续服用4周,4周后可服用补中益气丸以巩固疗效,总有效率达95.3%。

乔根宝,等. 上海中医药杂志,2004,38(7):14

35. 冠心病

口服补中益气汤每日1剂,同时应用硝酸异山梨酯每次10毫克,每日3次,肠溶阿司匹林75毫克,每日1次,2周为1个疗程。治疗冠心病104例,显效64例,有效40例。

姜惠卿,等. 齐鲁医学杂志,2004,19(4):348

36. 气虚型头痛

补中益气汤加味治疗气虚型头痛76例。药物组成:北芪30克,党参30克,陈皮6克,升麻6克,柴胡6克,白术12克,当归10克,川芎15克,白芷10克,蔓荆子10克。随症加减,每天1剂。总有效率94.7%。

李捷君. 齐齐哈尔医学院学报,2004,25(8):878

37. 妇女外阴尖锐湿疣

本方加味治疗妇女外阴尖锐湿疣。患者首先用激光对全部肉眼可见的疣组织进行烧灼去除,使赘生物全部脱落。药用:黄芪50克,甘草15克,党参20克,当归、橘皮各15克,柴胡10克,白术15克,升麻5克。湿重加茯苓20克,苍术15克;偏肾阳虚加肉桂10克,巴戟天20克。每日1剂。外用中药熏洗坐浴,经期停用。上述治疗21天为1个疗程。总有效率97.92%。

冯欢. 辽宁中医杂志,2004,31(8):675

38. 中风后遗症

本方加减治疗中风后遗症32例。初用此方时,党参改为人参,用3~6天,天热用白参10克,天冷用红参10克;血瘀阻络者加丹参15克,川芎10克;肝阳上亢者加天麻10克;风痰阻络者加制南星6克,白附子5克;阴虚风动者加龟板10克,鳖甲10克;便秘者加火麻仁10克,柏子仁10克。1日1剂,1个月为1个疗程,服药期间,配合肢体的

康复运动。总有效率93.7%。

万春,等. 中医研究,2001,14(01):45

39. 盆底松弛综合征

本方为基本方加麦麸治疗盆底松弛综合征35例。基本方:炙黄芪30克,党参15克,白术10克,当归15克,陈皮10克,柴胡10克,枳壳10克,升麻10克,炙甘草10克。气虚甚者黄芪增至50克;气阴虚者加干地黄30克,玄参15克;分别水煎取汁送服麦麸10克,早晚服。总有效率为94.3%。

唐清珠. 湖南中医药导报,2003,9(3):32

40. 美尼尔氏病

本方加味治疗美尼尔氏病74例。有痰湿者,加石菖蒲15克,制半夏15克,竹茹3克及二陈汤等;阴血不足者,加熟地15克,白芍6克,何首乌12克,山萸肉6克,玉竹10克;火盛者,加连翘6克,生地15克,玄参12克,丹皮10克;阳虚者,加杜仲10克,菟丝子10克,沙苑子10克,巴戟10克;皖闷纳差者,加木香6克,砂仁6克;有瘀血者,加丹参12克,川芎10克,三七6克。总有效率为81.8%。

黄伟震. 国医论坛,2002,17(3):21

41. 耳鸣

本方加味治疗耳鸣,基本方:黄芪20克,党参20克,炙甘草9克,当归10克,白术10克,升麻6克,橘皮6克,柴胡6克,蔓荆子9克,葛根10克。气血虚者加熟地黄15克,黄芪、党参各增加至30克;肾阴虚者加女贞子12克,旱莲草12克;肾阳虚者加肉苁蓉15克,杜仲12克;肝胆火旺者加龙胆草10克,黄芩6克;瘀血内阻者加桃仁6克,红花6克。每日1剂,5天为1个疗程,连续服药3个疗程。总有效率为97%。

孙文丽. 现代中西医结合杂志,2004,13(11):1509

42. 口腔白斑病

本方加味治疗口腔白斑病24例。药用:党参、节菖蒲各9克,黄芪、白术、当归、茯苓各12克,陈皮、升麻、柴胡、炙甘草各6克。隔日1

剂,忌食生冷油腻。10剂为1个疗程。一般治疗1~3个疗程。病情控制后,改服补中益气丸巩固治疗。总有效率为91.7%。

宋翠叶. 四川中医, 2004, 22(2): 84

人参养荣汤

人参养荣参术归 陈皮白芍桂心芪

甘草地黄并五味 茯苓远志枣姜宜

治溃疡发热恶寒,或四肢倦怠,肌肉消瘦,面色痿黄,吸吸短气,饮食无味,不能收敛。或气血原不足,不能收敛。若大疮愈后,多服之不变他症。

白芍一钱五分 人参 陈皮 黄芪 桂心 当归 白术 甘草各一钱 熟地黄 五味子 茯苓各八分 远志五分

姜三片,枣二枚,水二茶盅,煎八分,食远服。

人参养荣汤的临床新用

1. 中心性浆液性视网膜病变

杨高社治疗气血两虚中心性浆液性视网膜病变。自觉视物昏朦、目涩难睁、神疲乏力、面色无华、心悸怔忡、纳食不香,舌质淡、脉细。以人参养荣汤加减治疗。取得较为满意的疗效。

杨高社. 浙江中医学院学报, 2005, 29(5): 49

2. 恶性肿瘤化疗后粒细胞减少症

曹奕在口服利血生片的基础上,采用人参养荣汤治疗恶性肿瘤化疗后粒细胞减少症42例。基本方:太子参、黄芪各30克,白芍、当归各15克,炒白术、熟地、茯苓各20克,肉桂3克,五味子、远志各5克,陈皮、炙甘草各10克。每日1剂。1个月为1个疗程。总有效率88.1%。

曹奕. 浙江中医杂志, 2005, 40(10): 434

3. 伴有贫血倾向的骨质疏松

郭恒岳在给予维生素K₂、活性型维生素D₃、降钙素等制剂作为基

础治疗。加用人参养荣汤颗粒剂2.5克/次,3次/天。观察治疗12个月,比较治疗前后红细胞数、血红蛋白、骨密度及YAM比值。结果认为,人参养荣汤通过改善贫血等症,抑制骨质疏松的进展。

郭恒岳. 国外医学·中医中药分册,2004,26(6):345

4. 单疱病毒性角膜炎

叶晓群等治疗气血两亏型单疱病毒性角膜炎,方用人参养荣汤加減:党参、当归、白芍各20克,炙黄芪30克,白术、茯苓、谷精草各10克,银花15克,蝉衣、炙甘草5克。每天1剂。以7天为1个疗程,连服3~5个疗程。同时用田基黄眼药水或阿昔洛韦眼药水滴眼。病情较严重者,用1%阿托品眼药水滴眼。总效率为98.1%。

叶晓群,等. 湖南中医杂志,2003,19(5):47

5. 胃下垂

马士轩等用本方合木香顺气散化裁治疗胃下垂60例。药用:党参10克,当归10克,白芍药10克,熟地黄12克,黄芪12克,白术12克,茯苓12克,五味子6克,远志6克,陈皮10克,木香10克,青皮10克,枳壳10克,香附10克,乌药10克,苍术6克,砂仁6克,鸡内金10克,川芎6克,续断12克,肉苁蓉12克。水煎服,1日1剂。总有效率85%。

马士轩,等. 河北中医,2003,25(4):290

6. 视神经萎缩

陈明英等治疗心营亏虚型视神经萎缩时在选取经络穴位针刺,得气后立即注入胞二磷胆碱,1日1次,10次为1个疗程,同时用中药人参养荣汤加減:当归、白芍、熟地、白术、云苓、五味子、远志、陈皮、赤芍、牛膝各15克,党参10克,川芎12克,黄芪20克,炙甘草、肉桂各6克。平均3个疗程治愈。

陈明英,等. 实用中医药杂志,2003,19(9):473

7. 雷诺氏病

患者对称性手指、足趾遇寒凉麻木,皮色苍白,紫紺,继而潮红,发凉疼痛,经揉按、保温方可缓解,秋冬二季反复发作,不敢近凉水,舌淡

苔白,脉沉细。予人参养荣汤 12 剂,症状明显好转,为巩固疗效继服 10 剂。1 个月后来诊,症状基本消失,嘱其服人参养荣丸以善其后。

周宇. 辽宁中医杂志,2003,30(9):732

8. 老年自觉衰老症

患者自觉头晕耳鸣,失眠,心悸,烘热汗出,体倦乏力,腰膝酸软,畏寒肢冷,纳呆少食 3 个月,舌淡苔白,脉沉细。性欲减退 1 年有余。经心电图、脑血流图等检查未见异常。予人参养荣汤 3 剂,诸症悉减,共服 12 剂,临床症状消失。嘱其按原方继服 20 剂。

周宇. 辽宁中医杂志,2003,30(9):732

9. 慢性肾功能衰竭

杨永铭等在透析治疗基础上加用人参养荣汤加减:人参 10 克,黄芪 30 克,熟地 24 克,茯苓 20 克,淮山药 20 克,白术 15 克,当归 15 克,五味子 12 克,白芍 10 克,陈皮 6 克,甘草 6 克,肉桂 1 克。每日 1 剂。结果证明用人参养荣汤加减佐治慢性肾功能衰竭患者,可加速患者症状消退,改善营养状况,提高生活质量。

杨永铭,等. 中国中西医结合急救杂志,2002,9(3):148

10. 椎动脉型颈椎病

用人参养荣汤加减治疗。药用:党参 10 克,黄芪 30 克,白术 15 克,茯苓 10 克,熟地 15 克,白芍 20 克,当归 15 克,陈皮 15 克,远志 10 克,五味子 20 克,炙甘草 10 克,生姜 3 片,大枣 5 枚。头痛者加川芎、细辛、白芷;颈、肩、背、上肢疼痛、麻木者加川芎、姜黄、威灵仙;腕腹纳呆、恶心呕吐者加半夏、厚朴、木香;失眠者加茯神、酸枣仁、龙眼肉;耳鸣、虚烦者加黄精、何首乌、枸杞子。每日 1 剂。10 日为 1 个疗程。显效率 88.6%。

周志彬. 湖南中医杂志,2002,18(2):33

11. 晚期消化道肿瘤

急晓瑜治疗晚期消化道肿瘤 12 例。所有病例均给予华蟾素静滴 20 天,同时根据患者临床表现辨证施治。气血两亏型用八珍汤或人参养荣汤加减,延长了患者的生命,提高了患者的生活质量。

急晓瑜. 陕西中医, 2001, 22(7): 436

12. 腹部手术创口不愈合

人参养荣汤原方治疗腹部手术创口不愈合 45 例。孝长山用此方以人参易党参, 如用人参可用 20 克。1 日 1 剂, 分 2 次温服, 小儿用量酌减。治愈率为 100%。

孝长山. 世界今日医学杂志, 2000, 1(4): 397

13. 小儿佝偻病

以本方加减为基本方治疗小儿佝偻病。肺气不足、营卫失调者, 去熟地、当归、陈皮, 加浮小麦 10 克, 防风 6 克; 脾胃虚弱、气血溃乏者, 可加龟板、鹿角胶各 6 克, 茯苓、白术增至 10 克; 肝肾阴亏、发育迟缓者, 去白术、陈皮、桂枝、茯苓, 加山萸肉、龟板、牛膝各 10 克; 脾肾阳虚者, 去白芍、陈皮、当归、桂枝, 加补骨脂、巴戟天、淫羊藿各 6 克, 肉桂 3 克。治愈 71.5%, 好转 28.5%。

李宗伟. 中医正骨, 1999, 11(12): 40

14. 排尿性晕厥

人参养荣汤化裁, 治疗排尿性晕厥 25 例, 痊愈 20 例, 显效 3 例, 有效 1 例, 无效 1 例。若有表证者加防风、紫苏叶; 阳虚明显者加淫羊藿、补骨脂; 阴虚明显者加制首乌、麦门冬、玉竹; 瘀血明显者加川芎、桃仁、红花、益母草; 纳少便软者加生山楂、谷芽、麦芽。

徐振华. 实用中医药杂志, 1996, 12(1): 12

人参黄芪汤

人参黄芪汤罕稀 麦冬二术草陈皮

黄柏归身五味子 升麻神曲枣姜随

治溃疡虚热, 不睡, 少食, 或秽气所触作痛者效。

黄芪 人参 白术 麦冬 归身 苍术 陈皮 升麻 神曲各五分 黄柏(酒拌炒)三分 五味子(炒)五分

水二盅, 姜三片, 枣二枚, 煎八分, 食远服。

内补黄芪汤

内补黄芪汤桂芍 归苓熟地草门冬

川芎远志人参等 枣姜加上起痰癰

治痈疽、发背，诸疮已破后虚弱无力，体倦懒言，精神短少，饮食无味，自汗口干，脉涩不睡并效。

黄芪 人参 茯苓 川芎 归身 白芍 熟地 肉桂 麦门冬

远志各一钱 甘草五分

水二盅，姜三片，枣二枚，煎一盅，食远服。

托里清中汤

托里清中汤茯苓 冬参五叶术梗陈

枣姜半夏同甘草 疮疡咳嗽最能清

治痈疽脾胃虚弱，咳嗽痰气不清，饮食少思者。

人参 白术 桔梗 陈皮 半夏 茯苓各一钱 麦门冬 五味子

甘草各五分

水二盅，姜三片，枣二枚，煎八分，食远服。

托里和中汤

托里和中汤半夏 白术参苓功不亚

陈皮甘草木香宜 煨姜效值千金价

治痈疽中气虚弱，饮食少思，肿不消，溃不敛者。

半夏 白术 人参 茯苓 陈皮 煨姜各一钱 木香 甘草各五分

水二盅，姜三片，枣二枚，煎八分，食远服。

托里建中汤

托里建中汤炮姜 参苓白术附子强

半夏还兼甘草炙 建中功效可回阳

治痈疽元气素虚，或因寒凉伤脾损胃，饮食少思，凡食无味或作呕、泄泻等症，急服以建中气。

人参 白术 茯苓各二钱 半夏 炮姜各一钱 甘草五分 熟附子

八分

水二盅，煨姜三片，枣二枚，煎八分，不拘时服。

托里温中汤

托里温中羌益智 丁木沉香白蔻是

参苓陈术炮干姜 附子加之功全备

治痈疽阳弱阴寒,脉虚身冷,或疮为寒变,反致不疼;或脓水清稀,心下痞满。肠鸣腹痛,大便微溏,食则气短、呕逆,不得安卧,时发昏愤者服之。

白术 茯苓 木香 丁香各五分 半夏 陈皮 羌活 益智 干姜(炮) 人参 白蔻 甘草各一钱 附子二钱

水二盅,姜三片,枣一枚,煎八分,不拘时服。

方与旧不同。予制此尝治痈疽阴症及杂症阳气脱陷与寒气逼阳于外者,发热烦躁,口干作渴,投以姜、附之类,其津液顿生,烦热顿退,其应如响。

圣愈汤

圣愈汤凭熟地芪 芎归生地等相宜

人参六品真堪羨 脓甚心烦此最奇

治溃疡脓水出多,气血虚极,脉细,空而无力,以致心烦不安,眠睡不宁,或五心烦躁等症并服。

熟地 生地 川芎 人参各五钱 归身 黄芪(盐水炒),各一钱
作一剂,水二茶盅,煎八分,食远服。

圣愈汤的临床新用

1. 不孕症

喻峰用本方加味治疗不孕症 354 例。经期提前者去丹参加田七;肥胖者加苍术 15 克,莱菔子 15 克;腰痛加川断、狗脊,或鹿角霜;伴有盆腔炎,或输卵管阻塞者,加蒲公英或鳖甲,或丹参易甲珠;带下色黄有异味者加败酱草。每日 1 剂,连服 25 天为 1 个疗程。第 1 个疗程内治愈 95 例,第 2 个疗程内治愈 74 例,第 3 个疗程内治愈 65 例,共受孕 294 例。原发性不孕 126 例中 96 例受孕,228 例继发性不孕中 198 例受孕。

喻峰. 中国中医药信息杂志,2000,7(12):70

2. 中晚期胃癌化疗毒副反应

章凤杰用本方治疗中晚期胃癌化疗毒副反应。患者均采用 MFO 方案治疗 4~6 周期,治疗组在化疗前 3 天服用圣愈汤,少量频服。每日 1 剂。结果证明:化疗期间服用圣愈汤,疗效可靠,能减轻化疗毒副反应,保护骨髓,增强机体免疫功能,提高化疗完成率。并有利于化学药物效能的发挥。

章凤杰. 长春中医学院学报,1997,13(1):18

3. 特发性浮肿

王华宁用圣愈汤合四苓散治疗特发性浮肿 53 例。方药组成:熟地 20 克,杭芍 15 克,川芎 10 克,潞党参 15 克,当归 10 克,黄芪 12 克,茯苓 20 克,猪苓 15 克,泽泻 10 克,白术 12 克。每日 1 剂,3~4 周为 1 个疗程。痊愈 32 例,好转 17 例,无效 4 例。

王华宁. 云南中医中药杂志,1995,16(2):30

4. 胎位不正

圣愈汤加味治疗胎位不正 96 例。药用:当归身 10 克,杭白芍 10 克,川芎、熟地 12 克,台党参 15 克,黄芪 15 克,菟丝子 15 克,桑寄生 10 克,枳壳 6 克。每日 1 剂,3 日为 1 个疗程。3 剂服完,孕妇晚间平卧于床,可感觉到胎儿运转,但无任何不适。翌日复检胎位,胎位如已矫正,即可停止用药。如未矫正,再行第 2 疗程治疗。嘱患者适当增加营养,避免劳累过度,禁忌房事,治愈率为 95.8%。

彭芷美. 江西中医学院学报,1994,6(2):21

5. 气血亏虚眩晕

基本方:熟地黄 10 克,当归、川芎、人参(另煎)、柴胡、薄荷(后下)、防风各 6 克,菊花 12 克,黄芪 30 克,白芍、枸杞子、葛根各 15 克。心悸少寐者去防风、薄荷,加酸枣仁、蜜远志;腹胀纳呆者去熟地黄、黄芪,加生怀山,炒白术;头昏晕痛者去人参、熟地黄,加元胡、白芷;下虚甚者去防风、薄荷,加杜仲、山茱萸。每日 1 剂,全部治愈。

石焕明. 四川中医,1994,12(3):35

6. 经期延长

本方加减治疗经期延长 80 例。若气虚失于统摄,冲任不固而致

经血淋漓不净者,重用参、芪,去丹皮,加蒲黄炭、白术;若正值更年期加炒续断、炒杜仲;若流量多伴贫血者加阿胶、姜炭;若阴虚内热,热扰冲任,加地骨皮、女贞子、炙龟板、焦柏、茜草,去乌贼骨、党参、香附;若见色暗黑有血块,B超提示宫腔积液加败酱草、白花蛇舌草、益母草。每日1剂,并于行经第4天开始服药至月经干净停药,3个月经周期为1个疗程。总有效率为96.25%。

顾玉凤. 云南中医中药杂志,2005,26(5):14

7. 黄褐斑

本方为基本方治疗黄褐斑56例。偏于肾阴虚者,加入女贞子、旱莲草等;偏于肾阳虚者,加入肉苁蓉、杜仲、续断、淮牛膝等;兼有血热者,去泡参,加丹皮、山梔子等凉血活血之品;血虚夹瘀者,酌加丹参、鸡血藤、益母草等补血、活血化瘀调经之品;肝郁气滞者,加柴胡、陈皮、玄胡等疏肝解郁,行气止痛之品。每日1剂。总有效率89.29%。

胡冰. 成都中医药大学学报,2005,28(4):32

8. 崩漏

圣愈汤加减治疗崩漏32例。药用:生黄芪18克,党参10克,当归8克,白芍10克,熟地10克,川芎8克,阿胶10克,白芨10克,乌贼骨10克,地榆炭10克。素体阳盛或肝火内炽者,熟地改为生地,加用地骨皮、沙参;脾气虚弱、中气下陷者,黄芪加至30克;肾气不足者,加入山萸肉、杜仲、续断。每日1剂。经治疗32例全部治愈。

刘新华. 中国民间疗法,2005,13(2):49

9. 椎动脉型颈椎病

圣愈汤为基础方治疗椎动脉型颈椎病60例。偏于清阳不升者加生地12克,熟地12克,炒升麻9克,葛根12克,蔓荆子12克,鸡血藤15克,炙甘草5克;痰湿内阻者加姜半夏9克,天麻12克,炒白术12克,茯苓12克,防己12克,炙甘草5克;湿热内扰者加姜半夏9克,陈皮6克,炒竹茹12克,炒枳壳9克,茯苓12克,防己12克,炙甘草5克。每天1剂,15天为1个疗程。总有效率为91.67%。

吴杰. 中医正骨,2005,17(2):29

10. 冠心病心绞痛

圣愈汤加味治疗冠心病心绞痛 58 例。药用:太子参、黄芪各 30 克,熟地 10 克,白芍、川芎、当归各 12 克,丹参 15 克,砂仁 9 克。每日 1 剂,同时加用极化液静滴,每日 1 次。消心痛片 10 毫克,每日 3 次口服。总有效率 91.38%。

蔡文. 陕西中医, 2005, 26(2): 120

11. 背冷

圣愈汤加味治疗背冷 50 例。方药:黄芪、熟地、当归、制附片(先煎 2 小时)、干姜各 30 克,白芍、桂枝、人参(开水泡服)、生地、锁阳各 20 克,川芎 15 克。2 日 1 剂,1 周为 1 个疗程。总有效率 100%。

杨贵荣. 实用中医药杂志, 2004, 20(8): 433

12. 节育器致月经失调

郑优琛用圣愈汤每日 1 剂分 2 次空腹服,连服 7 天为 1 个疗程。结合西药消炎痛片、氧氟沙星片,均日 2 次,饭后服,共 5 天为 1 个疗程。中西药均为每月经周期第 4 天开始服用,连服 3~4 个疗程。总有效率 95.5%。

郑优琛. 浙江中医学院学报, 2004, 28(4): 48

13. 妇女上环反应

圣愈汤加味治疗妇女上环反应 32 例。药用:生地 24 克,白芍 15 克,当归 12 克,川芎 12 克,炙黄芪 30 克,红参 4 克(或党参 30 克),杜仲 15 克,阿胶珠 15 克,仙茅 15 克,仙灵脾 15 克,甘草 6 克。出血量多者杜仲、生地炒炭,加茜草 15 克;腰酸、腿软、耳鸣、小腹空坠感者加菟丝子 12 克、沙苑子 12 克;白带清稀者加山药 12 克,白术 15 克。调治 1~3 月。治愈 26 例,6 例明显好转。

郭华兰. 医学理论与实践, 2003, 16(4): 496

14. 原发性痛经

张梅香等用本方加减治疗气血虚弱型原发性痛经。处方:黄芪、党参各 30 克,茯苓、白芍、丹参、鸡血藤、熟地各 15 克,白术、当归、元胡各 12 克,川芎、香附各 10 克。腰膝酸软者加牛膝、续断各 12 克。有效

率 87.50%。

张梅香,等. 实用中医药杂志,2003,19(9):457

15. 月经过多

圣愈汤加减治疗月经过多 48 例。药用:人参(用红参 10 克或党参 20 克),黄芪 20 克,白术 15 克,补骨脂 15 克,赤石脂 20 克,龙骨 20 克,地龙 30 克,牡蛎 30 克。血热者加黄连、黄芩、栀子;血瘀者加蒲黄、茜草、桃仁、益母草。每日 1 剂,于月经来潮当日开始服用,10 天为 1 个疗程。共服 3 个月经周期后停药。总有效率达 83.4%。

冯力伟. 福建医药杂志,2003,25(4):222

16. 缺乳

张秀梅等治疗缺乳虚证用圣愈汤加减,药用党参、黄芪、熟地黄、当归、白芍、木通、枸杞子等。收效明显。

张秀梅. 吉林中医药,2002,2(6):12

保元大成汤

保元大成汤接命 参苓归术芪陈定

木香芍附草砂萸 枣姜五味功奇应

治溃疡元气素虚,精神怯弱,或脓水出多,神无所主,以致睡卧昏倦,六脉虚细,足冷身凉,便溏或秘。胸膈或宽不宽,舌虽润而少津,口虽食而无味,脉弦不紧,肉色微红,总由不足,大补堪题。

人参 白术 黄芪(蜜水拌炒)各二钱 茯苓 白芍 陈皮 归身 甘草(炙) 附子 山萸肉 五味子各一钱 木香 砂仁各五分

水二盅,煨姜三片去皮,大枣三枚,煎八分,食远服。服至精神回、手足暖、脾胃醒、肉色红为度。上数症乃元气虚脱,已欲变坏之病,非此不回也。

独参汤

人参一味独称强 济困扶危立大纲

气血两亡并自汗 脉虚寒热并皆尝

治溃疡脓水出多,气血虚极。或恶寒,或发热,或自汗、冷汗,或手足指甲青冷,或身凉脉细并宜。

人参(切片)二两

作一剂,水二盅,枣十枚,煎一盅,徐徐服之,若煎至稠厚,即为膏矣。作三次,用好温酒化服亦可。

独参汤的临床新用

1. 创伤性休克

李锡彪治疗创伤性休克 73 例。在常规处理的基础上,气虚欲脱、脉微欲绝者单用人参大量浓煎鼻饲或灌服;四肢厥冷、阳气衰微者予人参、制附子益气回阳;汗多口渴、气阴两伤者予麦冬、五味子益气敛阴。总有效率 95.89%。

李锡彪. 中西医结合实用临床急救,2003,12(5):413

2. 老年危急症

张觉人用独参汤治疗老年中阳衰败、心阳欲脱、气随血脱、肺气欲竭、胃阴告竭的急症取得满意疗效,使危病化险为夷。

张觉人. 辽宁中医杂志,1989,13(5):30

3. 急性心肌梗塞

夏学全治疗急性心肌梗塞患者,常规应用肝素、国产尿激酶加入生理盐水中 15 分钟内滴注完毕,东北白参(不可用红参)20 克,每天服 1 次,共 3 天。结果证明人参能起到防治心肌梗塞后再灌注性损伤的作用。

夏学全. 佳木斯医学院学报,1993,16(2):32

4. 在产程中的应用

郑永新等把独参汤制剂应用于第一、二产程中,产妇服本院独参汤制剂,对比观察发现,应用独参汤制剂不但方法简单,产妇易接受,在增强产力、缩短产程、减少难产方面也优于常用的进食和静滴。

郑永新. 成都医药,2002,28(4):215

5. 产后痿证

张亚密治疗产后痿证 1 例,辨证为阴阳气血亏虚,入院第 1 天急

用独参汤(红参45克),水煎频服以益气固脱;第2天患者汗出较前减少,继给人参15克,3剂,1日1剂,水煎顿服,患者双下肢麻木减轻,胸闷、气短消失,汗少,仍盗汗,手足心热,双下肢不温,舌质淡,苔薄白,脉弦细。再以参附汤合十全大补汤益气养阴,固表敛汗,药用:人参10克,炙附片10克,茯苓12克,白芍10克,熟地15克,黄芪20克,地骨皮10克,枸杞子10克,紫河车10克,煅牡蛎10克,浮小麦10克,大枣10枚。5剂,每日1剂,水煎服。出院后继守方服10剂,半年后随访,患者肌力恢复,行走如常。

张亚密. 陕西中医学院学报,1998,21(1):29

6. 恶性心包积液

付文胜治疗恶性心包积液52例,均予利尿、对症处理,另予独参汤,每日1剂,半月为1个疗程,治疗后复查心脏B超,并观察患者有无充血性心力衰竭症状。有效率为42.31%。

付文胜. 中国中医急症,2006,15(2):185

7. 扩张型心肌病

郑发红用独参汤治疗扩张型心肌病20例。全部病人均采用卧床休息,低盐低脂饮食,营养心肌,扩冠、强心、利尿等措施,对于心功能Ⅳ级患者根据病情需要给予适当氧疗,加用人参10~15克水煎,口服每日1次,连用10天。10天后病情均有好转,平均住院20.5天。

郑发红. 中国临床药理学与治疗学杂志,1997,2(1):12

8. 上消化道出血

杨维涛用独参汤治疗上消化道出血67例。病人除应用止血措施外,以独参汤冲服七芩散治疗。每次红参汤冲服七芩散10克。每日4~6克。取得良好效果。

杨维涛. 甘肃中医,1995,8(5):9

9. 顽固性泄泻

王东周等用独参汤治疗顽固性泄泻76例。红参一味,每剂10克,用滚开水浸泡于喝水杯中,10分钟后即可饮用,日服数杯,连饮7天后连汤带参服,第8天开始服第2剂,连服4剂。在服药期间禁止饮酒及

进食性寒食物等。总有效率 97.36%。

王东周,等. 中华实用医学,2000,2(5):95

10. 心原性休克

刘保存用独参汤治疗急性心肌梗塞所致休克 2 例。结果证明人参能增加心脏收缩,增加心搏量。并具有改善微循环,使四肢转温,出汗减少等功能。从而起到提高血压,达到纠正休克之目的。

刘保存. 中西医结合实用临床急救,1996,3(11):488

11. 急性心肌梗死

龚翔等用溶栓联合独参汤治疗急性心肌梗死。在溶栓治疗的同时加用独参汤(野山参汤)50 毫升,每日 3 次,连服 5 天。有糖尿病、高血压患者积极控制血糖、血压;有心力衰竭患者采取强心、利尿、扩血管治疗。治疗组 15 例患者全部治愈出院。

龚翔,等. 中国中西医结合急救杂志,2004,11(2):126

12. 新生儿硬肿症

李月英以独参汤为主的综合疗法治疗新生儿硬肿症 30 例。采用高丽参 3 克炖水鼻饲注入,每天 1 次,至病情好转,一般为 3 天。其余疗法按一般综合治疗进行。治愈率 86.7%。

李月英. 广东医学院学报,1994,12(1):49

13. 新生儿呼吸窘迫综合征

黄德友在治疗新生儿呼吸窘迫综合征时均按西医常规综合治疗基础上,辅以中药独参汤内服。用消毒棉签蘸药汁频频湿润患儿口腔,用完再煎。待呼吸状况改善后,可改用一次性头皮针注射器吸进药汁,去掉针头,从患儿嘴角缓慢滴入口中,每日 1 剂,连服 3 天。治疗 1 周,11 例痊愈 8 例,好转 3 例。

黄德友. 现代中西医结合杂志,2003,12(20):2169

14. 异位妊娠

朱中慧对于急性型异位妊娠如有休克征象者除给予输液、输血等法抢救外,并予独参汤或参附汤灌服,西药常规应用青霉素、氨苄青霉素、甲硝唑等预防感染及对症支持治疗。总有效率为 91.11%。

朱中慧·国医论坛,2005,20(5):40

15. 独参汤抢救极低体重儿的疗效观察

曹珉等在用独参汤抢救极低体重儿的治疗中,患者都按早产儿护理常规,为加强支持疗法,静滴白蛋白或血浆每周1~2次,应用维生素C及维生素E,并加用独参汤,1日服1克,每8小时1次,连用5~7天,获得满意效果。

曹珉,等.中国中医急症,1996,5(2):69

香砂六君子汤

记得香砂六君子 参苓白术陈皮比

砂仁半夏藿香同 枣姜甘草同煎美

治溃疡脾胃虚弱,恶心呕吐,或饮食不思等症。

人参 白术 茯苓 陈皮 半夏各一钱 甘草 藿香 砂仁各五分
姜三片,枣二枚,水二盅,煎八分,食远服。

香砂六君子汤的临床新用

1. 小儿厌食症

本方加味配合补锌治疗小儿厌食症42例。药用:党参、白术、苍术、茯苓各5克,山楂、谷芽、麦芽、鸡内金、法半夏、砂仁、木香、香附、陈皮各3克,甘草2克。湿热重去党参,加藿香、山栀;腹中有虫加使君子、槟榔;若脾胃阴虚明显去党参、白术、木香、法半夏、砂仁,加北沙参、石斛、乌梅、花粉。上述中药为4岁小孩量,每天1剂,分4次口服。同时服葡萄糖锌片,分3次口服,2周为1个疗程。总有效率95.23%。

罗嗣尧.中国中西医结合脾胃杂志,1999,7(1):41

2. 慢性胃炎

庄柏以本方加味治疗慢性胃炎100例。组方:木香、茯苓、白术、黄连各15克,砂仁、甘草、陈皮、半夏各10克,生党参、蒲公英各20克,生北芪30克。疼痛重者加佛手、香附;口苦灼热者加黄芩、柴胡;胃酸过多者加海螵蛸、浙贝母;失眠多梦者加枣仁、五味子、夜交藤;伴有阴

虚者加沙参、玉竹。每天1剂,10天为1个疗程,胃脘痛、腹胀、反酸为主要症状者经2~4个疗程治疗有明显的改善。

庄柏. 中国中西医结合脾胃杂志,1999,7(1):59

3. 化疗恶心呕吐

陈孟溪用香砂六君子汤联合西药低剂量枢丹防治化疗恶心呕吐。化疗期间以香砂六君子汤为基础方,并根据病情适当加用解毒、化痰、养阴中药。联合化疗开始前1天应用,服至化疗给药结束后5天。每日1剂,恶心、呕吐得到有效控制。

陈孟溪. 新中医,1999,31(3):28

4. 妊娠恶阻

廖满林以香砂六君子汤为基础方,治疗妊娠恶阻36例。恶心呕吐较甚者加白蔻仁5克,生姜5片;兼有热者加黄芩5克,竹茹10克;腰部酸痛者加杜仲15克,川断15克;腹部胀满甚者加枳壳10克(本方人参可用党参代替)。治愈29例;好转6例;无效1例。

廖满林. 赣南医学院学报,1998,18(4):376

5. 十二指肠溃疡

治疗组每日早晨空腹吞服20毫克洛赛克,同时加服香砂六君子汤加味,每日1剂。方药:党参30克,白术1.5克,茯苓15克,炙甘草10克,半夏10克,陈皮10克,木香10克,砂仁10克,高良姜10克,香附10克,神曲15克。连服4周。胃脘冷痛,四肢不温加吴茱萸、干姜;吐酸者加海螵蛸、煅牡蛎;疼痛剧烈难忍加白芷、甘草。嘱患者调情志,忌生冷辛辣食物。总有效率97.9%。

董建华. 山东中医杂志,1998,17(10):462

6. 奔豚气

本方加味治疗奔豚气13例。方药:党参15克,白术12克,茯苓15克,陈皮12克,半夏12克,木香10克,砂仁(后下)6克,炙甘草6克。肝气上逆明显者加桑白皮、代赭石、白芍;心肾阳虚,水饮内动者重用茯苓,加桂枝;恶心明显者加生姜、代赭石;腹痛者加芍药、甘草;腹痛欲泻,泻后痛减者合痛泻要方;腹胀纳呆者加焦三仙、厚朴;热象

明显者加黄芩、葛根。总有效率为 84.6%。

王丽华. 中国农村医学, 1997, 25(8): 55

7. 化疗消化道毒性

蒋传琪等用香砂六君子汤为基本方加味对化疗消化道毒性的治疗有效率达 94.4%。呕吐酸苦水加黄连 6 克, 姜竹茹 10 克; 腹泻加山药 15 克, 莲子 10 克, 芡实 10 克; 舌红少苔、口干咽燥加石斛 30 克, 玉竹 15 克, 南北沙参各 10 克; 胃脘疼痛窜肋加川楝子 10 克, 元胡 10 克或左金丸; 气短乏力加西洋参 10 克。忌食生冷油腻食物。

蒋传琪, 等. 蚌埠医学院学报, 1996, 21(5): 331

8. 胆汁返流性胃炎

本方加味配合西药治疗胆汁返流性胃炎。药用: 木香 15 克, 砂仁 15 克, 党参 12 克, 白术 12 克, 茯苓 10 克, 陈皮 10 克, 清半夏 10 克, 柴胡 10 克, 郁金 12 克, 焦山楂 15 克, 神曲 15 克, 甘草 12 克。有胆囊结石者加金钱草 30 克, 海金沙 15 克, 车前子(包) 12 克, 滑石 15 克; 有胆囊炎者加穿心莲 20 克, 半枝莲 20 克, 黄芩 12 克, 茵陈 15 克; 有巩膜黄染, 小便短赤者加竹茹 12 克, 焦山栀 12 克, 虎杖 15 克; 上腹部疼痛明显者加川楝子 12 克, 延胡索 12 克; 老年患者加紫丹参 20 克, 川芎 12 克。每日 1 剂。15 剂为 1 个疗程。配合运用硫酸庆大霉素、吗丁啉, 有胆囊炎胆石症加服熊去氧胆酸, 有溃疡病者加服雷尼替丁。总有效率为 100%。

黄佐杰. 中国中西医结合杂志, 1995, 15(4): 234

9. 乳糜尿

本方加味治疗乳糜尿 52 例。伴脾气不升者, 加黄芪 60 克, 升麻 6 克, 柴胡 10 克; 伴肾阳虚者, 加菟丝子 20 克, 附子、肉桂各 10 克; 伴肾阴虚者, 加熟地 20 克, 龟板、萸肉各 10 克; 伴瘀血者, 加益母草 20 克, 白茅根、丹参各 30 克, 三七 5 克; 若下焦湿热重者, 加赤芍、黄柏各 10 克。服药期间, 勿劳累, 勿食大量肥肉。结果: 痊愈 41 例, 显效 7 例, 好转 3 例, 无效 1 例。

高松山. 浙江中医杂志, 1993, 28(2): 55

10. 肠激惹综合征

本方加味:人参 10 克,茯苓、白术、陈皮各 9 克,半夏、黄芪、吴茱萸、五味子各 12 克,炙甘草、香附、砂仁各 6 克。每日 1 剂,治疗肠激惹综合征 43 例。腹冷者,加附子;肝郁气滞加枳壳;疼痛明显加延胡索;湿重茯苓加量;下坠感明显加升麻;纳差纳呆加神曲;湿热重去吴茱萸加黄连。结果:43 例全部有效,其中治愈 36 例,好转 7 例。

王元周. 陕西中医, 2006, 27(1): 84

11. 泄泻

香砂六君子汤加减治疗泄泻 120 例。药用:广木香 15 克,砂仁 12 克,半夏、橘皮、茯苓各 18 克,炙甘草 6 克,党参、炒白术各 20 克。发热伴表寒者加荆芥、防风、白芷、苍术;发热伴舌苔黄厚腻者加荷叶、葛根、姜汁炒黄连;伤食伴呕吐者加山楂、神曲、莱菔子、青皮;腹胀者加柴胡、小茴香、防风;小便清长、四肢不温者加附片、炮姜。有脱水者根据脱水程度给予口服补液或静脉补液。总有效率 97. %。

王宏明. 实用中医药杂志, 2006, 22(3): 138

12. 功能性消化不良

朱瑞华以本方合四磨汤为基本方加减治疗功能性消化不良 58 例。药用:党参 15 克,白术、半夏、陈皮、槟榔、木香、乌药各 10 克,甘草 3 克,砂仁、沉香粉(冲服)各 4 克,茯苓 12 克。腹胀明显加枳壳 15 克,早饱厌食加鸡内金 10 克,恶心嗳气频繁者加旋覆花 10 克,泛酸者加煅瓦楞子 30 克。每日 1 剂。总有效率 94. 83%。

朱瑞华. 实用中医药杂志, 2005, 21(12): 720

13. 激素依赖性肾病综合征

梁国权用中医辨证治疗激素依赖性肾病综合征。脾虚湿泛,肺失宣降型,用香砂六君子汤合杏苏散加减。脾肾两虚型,用香砂六君子汤合六味地黄汤加减。兼外感风邪出现咳嗽、发热时加防风、连翘、枇杷叶、黄芩、桑白皮、川贝母;肝功能异常加板蓝根、五味子、柴胡、郁金;为防止激素治疗过程中出现感染、骨质疏松,每 2 周肌注两种球蛋白 1 次,连用 3 月;口服盖中盖口服液,连用 3 月。全部病例治疗 1 月

左右尿蛋白完全转阴,治疗3月肾病综合征症状完全缓解,继续服中药治疗6月,停药后未见复发。

梁国权. 河南中医, 2005, 25(11): 41

14. 术后头晕、呕吐

莫行友用本方加藿香、陈皮治疗术后头晕、呕吐42例。伴头痛者加川芎;伴大便干燥者加郁李仁、火麻仁。每日1剂。5日为1个疗程。总有效率92.9%。

莫行友. 中医药导报, 2005, 11(2): 31

15. 晚期癌痛

贺松其等用芬太尼透皮贴剂的同时给予香砂六君子汤加味治疗晚期癌痛42例。便秘者加决明子20克;夜寐不安者加夜交藤30克;乏力、白细胞下降者加黄芪30克,黄精20克,鸡血藤30克;腹胀者加枳实10克,厚朴10克;疼痛较重者加玄胡10克;食欲差者加炒谷芽、炒麦芽各15克。每日1剂,疗效为92.8%,治疗后生活质量有明显改善。

贺松其,等. 上海中医药杂志, 2005, 39(2): 18

16. HBsAg 携带者

HBsAg携带者,中医诊断:纳呆(脾虚蕴湿)。治疗用香砂六君子汤加减:生黄芪15克,党参6克,炒白术9克,淮山药30克,云苓12克,炙甘草、法半夏、陈皮各6克,旋覆花10克,木香5克,砂仁3克,山楂、茵陈各10克,独活6克。5剂后患者食欲大增,大便较前成形,舌苔渐化。在上方基础上加佩兰10克,草豆蔻6克,7剂。再诊时患者已无任何症状,自觉状态良好。上方减茵陈,黄芪改为生炙黄芪各10克。共服药3个月余。复查乙肝五项:HBsAg阴性,抗HBsAg阳性。

张林军. 河北中医药学报, 2004, 19(2): 48

17. 肝硬化腹水

王玉慧以香砂六君子汤为基础方治疗。药用:人参15克,白术25克,茯苓30克,炙甘草15克,白芍30克,半夏15克,陈皮、香附各20克,砂仁15克,川楝子、厚朴各20克。日服1剂,水煎2次,合而分匀,

早晚饭后服用,可根据病人具体情况增减药物或增减相关剂量,3周为1个疗程,观察1~3个疗程,每1个疗程后测定肝功能和B超检查。症状有效率100%。

邬金迪. 辽宁中医杂志,2004,31(7):571

18. 白细胞减少症

曹际海治疗白细胞减少症中气虚型42例,心脾两虚型28例,气阴两虚型5例。以上病例均曾在门诊或病房接受西医治疗1个月以上,效果不理想而改用本方治疗。香砂六君子汤加减:党参30克,黄芪60克,陈皮9克,半夏9克,木香6克,砂仁9克,茯苓15克,菟丝子15克,女贞子15克,仙茅12克,仙灵脾12克,紫河车12克,当归12克,白术15克。水煎浓缩,每日1剂,早晚2次服完。其中,肝肾阴虚者加枸杞子10克,山萸肉10克;失眠多梦者改茯苓为茯神,加远志15克,夜交藤15克;易伤风感冒者合用玉屏风散;心慌、心悸者加朱砂1克(研末冲服),食欲不振者加鸡内金12克,炒谷芽12克;气阴两虚者合用生脉饮。总有效率为93.2%。

曹际海. 中华医学全科杂志,2004,3(11):37

19. 急性胰腺炎恢复期

张黎等用中西医结合治疗急性胰腺炎恢复期总有效率达95.92%。患者均给予禁饮水,胃肠减压,纠正水电解质酸碱平衡失调,应用抗生素,抑制胰酶分泌药物,痛甚者给予镇痛处理等。中药用本方合增液汤加减:党参、白术、茯苓各12克,砂仁、木香、柴胡、黄芩、元胡各10克,生地、玄参、麦冬、丹皮各20克,丹参15克。热甚,加金银花、山栀;湿甚,加薏仁、苍术、藿香、佩兰;气虚甚,加黄芪;气滞甚者,加川楝子、乌药;血瘀甚,加桃仁、红花、三棱。1日1剂,20天为1个疗程。总有效率95.92%。

张黎. 新疆中医药,2004,22(1):24

20. 糖尿病胃轻瘫

王卫平以本方加减治疗糖尿病胃轻瘫。所有病人均控制饮食,用降糖药物控制血糖。本方为基础方,恶心、呕吐等胃气上逆为主症者,

加旋覆花(包)20克,川朴10克;兼两肋胀满、口苦、心烦、易怒,苔薄白、脉弦者,提示兼肝郁气滞,加柴胡、白芍各12克;泛吐清水,胃脘胀痛喜热饮,得热则舒者,此兼脾胃阳虚,加干姜、肉豆蔻各10克;口中甜腻、大便不爽、苔腻,加槟榔、苍术、佩兰各12克;便秘,舌红少苔或无苔,加麦冬、玉竹各12克。以上各型若见舌质暗有瘀点或瘀斑者,均加红花9克。每天1剂。10天为1个疗程。治疗期间,停用其他胃肠动力药、消化酶制剂、中枢镇吐药及类似处方中药等。总有效率为81.9%。

王卫平. 基层医学论坛, 2004, 8(2): 144

21. 复发性口疮

王秀云用本方加味治疗复发性口疮33例。药用:党参15克,炒白术15克,茯苓20克,炙甘草15克,半夏10克,陈皮10克,木香10克,砂仁15克,黄连10克,生石膏20克,丹皮15克。每日1剂,1日2次。10天为1个疗程。总有效率96.9%。

王秀云. 中医函授通讯, 2000, 19(2): 27

清震汤

清震汤中益智仁 参苓柿蒂甘草陈

香附附子泽半夏 枣姜呃逆效如神

治溃疡脾胃虚弱,或误伤生冷,或气恼劳役,或入房梦遗致火邪乘入中脘,乃生呃逆,急服之。

益智仁 陈皮 半夏 茯苓 人参 甘草 香附各一钱 柿蒂二十四个 泽泻三分 熟附手足冷者用一钱

姜三片,枣二枚,灯心二十根,水二盅,煎八分,不拘时服。如身热口干、便燥火呃者,加黄连五分。

清震汤的临床新用

1. 颞动脉炎

黄粤等用清震汤加味治疗颞动脉炎,辨证属湿热夹瘀,阻滞少阳

经脉。药用:土茯苓 90 克,升麻 15 克,荷叶 12 克,苍术 9 克,川芎 9 克。当归 18 克,天麻 15 克,浙贝母 15 克,羚羊粉 1 克(冲),珍珠粉 2 克(冲)。复诊:上述药进 3 剂,右颞部剧痛消失。偶感一丝隐痛,以太阳穴为主,睡眠好转,湿热渐化,而阴亏之象已现,治以上方加石斛 15 克,枸杞 15 克。三诊:头痛未作,右眼视力逐渐改善。精神好,睡眠佳,大便正常。上方继服 12 剂。头痛未作,视力明显提高,右眼视物模糊。服药 18 剂后,视力基本恢复正常,右颞动脉搏动正常。

黄粤,等. 山东中医杂志,2006,25(1):33

2. 偏头痛

郭明玉等用本方加味治疗偏头痛 55 例。方药由升麻、荷叶、苍术、白芷、蔓荆子、白芥子、柴胡、香附各 10 克,川芎、藁本各 15 克,生白芍 24 克等组成,每日 1 剂。总有效率为 96.4%。

郭明玉,等. 福建中医药,2005,36(4):59

3. 痤疮

杨军用本方治疗痤疮 1 例,反复颜面部丘疹 1 年余。证属脾胃湿热,药用:苍术、生苡仁各 30 克,升麻、荷叶、连翘 10 克,枇杷叶 15 克。每日 1 剂,5 剂后自觉面部皮疹明显减少,原方苍术减为 15 克,继服 10 剂,皮疹基本消退。继服 10 剂以巩固疗效,未见复发。

杨军. 实用中医药杂志,2001,17(8):38

4. 急性鼻窦炎

杨军治疗 1 例急性鼻窦炎,中医辨证为鼻渊(湿热壅遏型)。药用清震汤加味:苍术 30 克,升麻、白芷、藿香各 10 克,荷叶 12 克,鱼腥草 15 克。每日 1 剂,3 剂后症状明显改善。流涕转白,量减,头晕头痛减轻,原方继进 5 剂而愈。

杨军. 实用中医药杂志,2001,17(8):386

6. 脑外伤综合征

杨军用本方治疗 1 例脑外伤综合征,证属中气亏虚,痰瘀交阻。药用清震汤加味:苍术、生黄芪各 30 克,炮山甲、川芎各 8 克,荷叶、升麻、白蒺藜、白芷各 10 克,泽泻 15 克。5 剂后自觉头晕重感减轻,仍觉

体疲乏力、善忘，原方加党参 20 克，枸杞子、巴戟天各 10 克，再进 10 剂，诸症皆愈。

杨军．实用中医药杂志，2001，17(8)：38

7. 咳嗽

滕美林治疗 1 例证属风邪夹湿内蕴，痰浊中阻，肺失清肃之咳嗽。药用本方加味：生升麻 10 克，苍术 15 克，荷叶 12 克，半夏 10 克，陈皮 10 克，茯苓 15 克，甘草 6 克，桔梗 10 克，白前 10 克，杏仁 10 克。3 剂药后，症情稍减，微咳，痰咯较前爽快，苔较前薄净，上方苍术改 10 克，续进 3 剂，后以六君子汤善后收功。

滕美林．江苏中医，1996，17(1)：13

醒脾益胃汤

醒脾汤用参山药 二术二苓陈半夏

麦芽泽泻朴木香 山楂苏子同堪嚼

治溃疡脾胃虚弱，过伤饮食生冷，以致胸膈不宽，四肢面目浮肿及小水不利等症，并宜服之。

人参 陈皮 茯苓 半夏 山药 白术各一钱 苍术 厚朴 泽泻 麦芽 木香 山楂 苏子 猪苓各五分 老黄米(炒黄)一钱

水二盅，姜三片，灯心二十根，煎八分，食前服。

托里定痛散

托里定痛散当归 乳没川芎白芍随

粟壳桂皮并熟地 疮疡疼痛效堪题

治痈疽溃后，血虚疼痛不可忍者宜服之，甚效。

归身 熟地 乳香 没药 川芎 白芍 肉桂各一钱 粟壳(泡去筋膜，蜜炒)二钱

水二盅，煎八分，随病上下，食前后服之。

神应异功散

异功散中丁木香 桂苓归术附子强

半夏陈皮参肉蔻 枣姜厚朴可回阳

治溃疡阴盛阳虚，发热作渴，手足并冷，脉虚无力，大便自利，至饮

沸汤而不知其热者必服之。

木香 官桂 当归 人参 茯苓 陈皮 白术各一钱 半夏 丁香 肉豆蔻 附子 厚朴各五分

水二盅,姜五片,枣三枚,煎八分,不拘时服此方。痈疽阴症,凡杂症阳气脱陷与寒气逼阳于外者,发热烦躁,口干作渴,投以姜、桂、附子之类,津液顿生,烦热顿退,其应如响。人但不习而察之。

参术膏

参术膏中大补功 地黄三味效堪雄

补气补脾并补血 尝堪委命在其中

治痈疽、发背等症,大脓后气血大虚,急宜用此。

上好人参半斤(切片,用水五大碗砂锅内慢火熬至三碗,将渣再煎汁一碗,共用密绢滤清,复熬稠厚,磁碗内收贮听用) 云片 白术六两 怀庆熟地六两(俱熬,同上法)

以上三膏各熬完毕,各用磁碗盛之,顿入水中,待冷取起,盖勿泄气。如患者精神短少,懒于言动,短气自汗者,以人参膏三匙,白术膏二匙,地黄膏一匙,俱用无灰好酒一杯顿热化服。如脾气虚弱,饮食减少,或食不知味,或已食不化者,用白术膏三匙,人参膏二匙,地黄膏一匙,好热酒化服。如患者腰膝酸软,腿脚无力,皮肤手足粗涩枯槁者,用地黄膏三匙,人参、白术膏各二匙化服。如气血、脾胃相等无偏胜负者,三膏每各二匙,热酒化服。此膏用于清晨并临睡时各进一次,自然强健精神,顿生气血,新肉易生,疮口易合,任疮危险势大脓多者,可保终无变症。夏炎天热恐膏易变,分作二次熬用亦好,愈后能服,须发变黑,返老还童,以上诸方,功难及此。

八仙糕

八仙糕为何因设 健脾养胃兼止泄

参苓山药芡实莲 白糖米粉延生说

治痈疽脾胃虚弱,精神短少,饮食无味,食不作饥,及平常无病、久病但脾虚食少、呕泄者并妙。

人参 山药 茯苓 芡实 莲肉各六两 糯米三升 粳米七升 白糖霜二片 白蜜一斤

上将人参等五味各为细末，又将糯、粳米亦为粉，与上药末和匀，将白糖和蜜汤中顿化，随将粉药乘热和匀摊铺笼内，切成条糕蒸熟，火上烘干，磁器密贮。每日清早用白汤泡用数条，或干用亦可。但遇知觉饥时，随用数条甚便，服至百日，轻身耐老，壮助元阳，培养脾胃，妙难尽述。

胃爱丸

胃爱丸中参茯苓 紫苏山药豆蔻陈

莲肉甘草蜜丸灵 脾虚不食效如神

治溃疡脾胃虚弱，饮食诸味不喜，用过开胃进食之药不效者，此脾崩之象。宜服之，食进为吉。

云片 白术一两（鲜白者，米泔浸去涩水，切片晒干，同麦芽拌炒） 怀庆山药一两（肥大上白者，切片用男乳拌湿，候润透，晒，微焙） 上白茯苓一两（切一分厚，咀片，用砂仁二钱，用茯苓合碗内饭上蒸熟，只用茯苓） 清河人参一两（制毕晒干，共为细末） 白豆蔻三钱 陈皮（用陈老米先炒黄色、方入同炒，微燥勿焦）六钱 小紫苏（蜜拌透，晒干，微蒸片时，连梗叶切片）五钱 莲肉（去皮心，切片）五钱 甘草（炙）三钱

上共为细末，用老米二合微焙碾粉，泡荷叶汤打糊，丸梧子大，每服八十丸，清米汤不拘时服。

二神丸

二神丸来有大功 谁知二味气雄雄

肉果相兼破故纸 姜同枣煮起疲癃

治痢疽脾胃虚弱，饮食不消，大便溏泄必服之。

破故纸（微炒香色）四两 肉果（肥大者，生用）二两

用大枣四十九枚，老生姜四两切片，水浸枣、姜，煮至水干为度。取枣肉为丸梧子大，每服七十丸，清米汤空心送下。及治寻常肾虚脾泄俱效。

加减八味丸

八味丸中丹皮桂 山药山萸兼五味

茯苓泽泻地黄同 生津止渴如甘露

治痈疽已发未发，口干作渴，舌干黄硬者宜服。

茯苓 山药 丹皮各四两 山萸(肉)五两 泽泻(熟)三两 五味子(炒)三两 肉桂六钱 熟地(捣膏酒煮)八两

上共为末，炼蜜丸如梧子大，每服二钱，空心服盐汤送下，寻常酒服亦可。此又渗湿润燥药也。

红铅造化丹

红铅造化出天工 山药参苓甘乳同

矾面辰砂冰片麝 此方原自出仙宫

治痈疽元气不足，软陷不起发，或已发复被风寒内外所侵，以致疮毒下陷，变为阴塌不痛者，急宜服此。亦可转阴为阳，返出毒气，复肿为吉。

红铅二钱 人参 茯苓 山药各一两 甘草(炙) 枯矾各五钱 辰砂 寒食面各七钱五分 麝香八分 冰片六分 乳粉二钱(用头生男乳，每盘内用一小盅，晒干共收用之)

上各研精细，方为一处共再细研。用白蜜二两，再同头生男乳一大杯，慢火重汤内用磁碗顿蜜，滴水不散为度。候稍温和入前药，软硬得宜，丸龙眼核大，金箔为衣，磁罐收用，或以蜡固亦妙。每用一丸，好热酒一杯化药食远服之。用厚绵帛复暖患上，其热如蒸，疮必复起作痛，乃此丹之效也。诸症呕吐、怔忡、泻痢，屡药不瘥，异症并效。大率心经之病石菖蒲；肝经之病用远志；脾经之病用生姜；肺经之病麦门冬；肾经之病五味子，各随五经之症，用五引煎汤化服，其应如响……。

以上二十四方，治痈疽已溃，至于收敛，正病、杂病、变症、坏症，此四者俱在其中选用，毋得错乱，以保终吉。若不遵此法，妄设他说，别以奇方、秘法治之，终致多变。但溃后气血根本无有不亏伤者，大抵补怯扶羸、理劳续损，皆不出于前方，此外无法也。

痈疽诸症疮名十律

其一

背之左右谓疽痈，手膀肩臂亦相同，

肺疽居右痈居左，蜂痈左右近喉咙。
耳后右为锐毒看，天疽左耳后相逢，
左右两肩名搭手，井疽正发在心中。

其二

流注牵藤六七成，发于心上止脐平，
胁痈胁疽生胁下，阴疽大体近箕门。
穿踝疽穿孤拐下，脚气原来脚底生，
左为便毒右鱼口，鹤膝风从膝眼成。

其三

肩下臑痈腋下疽，喉咙上下气痈医，
当脉兑疽君可记，三寸相离穿骨基。
红丝疔从手上起，蛾子喉风口内随，
肾疽当肾生左右，三里穴发附阴疽。

其四

离脐四寸为吓痈，再高三寸号幽痈，
肠痈还从脐突起，胸疽乳上心肺中。
合谷一疔名虎口，蛇头鱼肚指头逢，
脑后一疽名玉枕，莫作如常一样同。

其五

肩疽乐疽居右手，石榴离肘上三分，
左玄阴右裆疽发，咬骨阴包穴上生。
渊疽肾上腿附骨，佛顶疽生脑顶门，
人世毒疮当切记，敢交患者即安生。

其六

颧骨为疔唇上疽，鬓边所发亦疽医，
眉中凤眉防侵脑，黑疔耳内不为奇。
鼻内生疔当速疗，透脑原来发际基，
眉尾瘰疽能大毒，颊疔鱼眼近腮齐。

其七

马刀瘰癧气瘰疮，一气生来在颈项，

虎毒龙泉唇上下,对口原来发下藏。
牙根唇上痈莫异,牙下生之疽一行,
顶牙缝突为疔治,休作人间容易疮。

其八

心肝脾肺肾痈疽,当看胸中穴道医,
更有黄头并白泡,发无定处速如飞。
左为坐马右下马,尾骨头尖鹤口疑,
此物杀人能致命,火急攻医切莫迟。

其九

妇人之乳有数种,高肿为痈坚硬疽,
还有乳岩真恶症,肿如顽石破如墟。
纽扣之风生颈项,裙带风疮脚下需,
又有湿赚疮等疾,总生下腿上安居。

其十

婴儿走马烂牙疳,黑腐沿开臭不堪,
赤游丹毒浑身到,鹅口疮苔满口漫。
风疮奶癣多搔痒,血灌脓窠痛欠安,
还有心脾治热症,口疳重舌一般看。

卷之二

上部疽毒门

脑疽论第十五

夫脑疽者，俗称对口是也。但所发不同，其源有二，得于湿热交蒸从外感受者轻；五脏蕴结从内发外者重。其理何也？湿热之为病，天行气候，寒暑不调，节序温凉，阴阳失度，凡有体虚者易于侵袭，项后虽属督脉，又主太阳寒水司行之道，所有侵袭，气血必凝。凝则后必为肿，此从外感受者。其患初起有头，多生正穴，三、四日间，多作焮痛，始生寒热，口和而干，色红根活，疮势渐高，形不散大，时止时痛，易脓易腐，饮食知味，起坐寻常，外势虽可畏，而内无七恶之症相干，此属阳症。其由从外来矣，故多不治可愈。所有五脏蕴结而成者重，其源有五：盖心主血，故心绪烦扰，煽动不宁，以致火旺而沸腾，行于项间与寒水交滞而为肿者，一也；肝统筋，故恼怒伤肝，项乃三阳统筋之所，肝伤则血脉不潮，筋无荣养凝结为肿，故项紧急强痛，不能转侧，其患未溃前肉色紫暗，坚硬漫肿，破流血水，木痛无脓，此等之症皆肝气受伤者，二也；脾主肌肉，故思虑伤脾，脾气日损，又或膏粱损胃，胃汁干枯，以致中脘痞塞，气不运行，逆于肉里，乃生壅肿，其患外皮虽腐而内坚不溃，口燥舌干，饮食不进，根脚走散，脓秽色败。此等之症皆脾气受伤者，三也；肺主皮毛，故忧郁伤肺，肺伤则毛窍闭塞，腠理不通，气不舒畅，纵横经络，结而为肿，其形疮多平陷，色淡不毕，皮腐脂流，形如汤泼，气粗短促，鼻微鼻掀，碌碌生痰，殷殷发嗽，此等之症皆肺气受伤者，四也；肾主骨髓，故恣欲伤肾。肾伤则真阴之气败矣，真阴一败，相火自生，此火最能自升自降。或动或静，煎熬脏腑，消烁津液，更变形

容,改换声音,疮形紫黑,脉数乖度,烦躁口干,随饮随渴,此等之症皆肾气受伤者,五也。凡治此症,必内分虚实,外辨阴阳,体顺天时,察其病理,七日以前疮势未成者,当通窍,以汗发之。七日以后病势已成,治当兼补以托之,此则毒不内攻,外无变症,如药攻利太过,元气受伤,毒多难出,又敷围凉药,气血冰凝,则肌肉多死,反难腐溃。予尝治此及诸发背初起未成者,用铍针当顶点入知痛处,出其恶血,通其疮窍,随插蟾酥条直至疮底,外用膏盖;内服万灵丹或蟾酥丸发其大汗,解散内蕴之毒,次日患上或肿或不肿,或痛或不痛,仍插仍贴,直至患顶肿高,根脚突起,四围列缝有脓方住插药。轻浅者,九日后吐出病根坚硬不化之物;毒甚者,不能顿然脱落,亦可渐腐成脓,为转重就轻之良法。外用玉红膏长肉,内服补托收敛其患,不久自愈。如阳症轻浅者,候自腐溃,不用前法针刺,如不肿不疼,灸亦不痛,阴症尤当速用,不必迟延,此为移深居浅之大法也。

脑疽看法

初起顶高根活,色红皮薄,作疼焮热,肿不开散者顺。已成无论偏正,疮形猷起,疼痛发热,易脓易腐者顺。已溃脓稠,肉色红活,瘀腐易脱,焮肿渐消,痛减者顺。溃后腐脱,新肉便生,疮口渐敛凝结,痴脓作痒者顺。

初生一点黄泡,或似疔瘡,不肿不疼,自不知觉者逆。已成不发高肿,亦不焮痛,疮顶软陷,根脚平散者逆。已溃脓清,肉色紫黑,外皮不腐,内生臭秽,不食者逆。腐肉虽尽,新肉不生,疮口散大软陷,无神色败者逆。

脑疽治法

初生有头或无头,大痛或不痛,俱隔蒜灸,兼服解毒。已成坚硬,发热焮痛,口干便秘者,邪在内也,宜泄之。坚肿不痛,发热恶寒,头痛四肢拘急者,兼发表攻里。肿硬日深,形色紫黑,外皮不腐,内脓不溃,

宜行拔法。项强头面焮热，口燥、恶心、呕吐者，邪在上也，宜清之。焮热肿痛，红色光亮，疼苦有时，内脓胀痛者，急开之。将溃不溃，微热微红，不作腐溃者，脾胃虚也，宜补之。溃后腐肉不脱，脓水清稀，肿痛仍作者，当大养气血。大便多溏，小便短涩，自汗食少，脉细身凉，温中健脾。

脑疽治验

一男人项疽十余日，视其疮势颇甚，根连左右，耳项并肿，红赤焮热，脉浮而数。先用黄连消毒散二服退其大势。根脚消定后，用托里消毒散，数服不觉腐溃，但诊脉浮无力。询知患者年过五旬，久艰嗣息，房中又有妾人，多兼思虑劳欲大^①过，损伤元气故也。又疮形势大，止能起发，不能培养为脓，更用十全大补汤加桔梗、白芷，倍人参、白术各三钱，外用桑木灸法，早晚二次灸之。又涂紫霞膏，数日患者头面俱肿，双目合缝，形状可畏，然后腐溃，并作脓出，日至数升。如此半月，因前药不胜其事，内加烦躁不宁，五心烦热，饮食渐少等症，此谓脓水出多，气血走泄，为虚火假症之故，虽变不妨。随用圣愈汤，一服不应；又进一服，加熟附子二钱方应，前症悉退。次以人参养荣汤加麦冬、五味、参、术，常倍至三钱。调理月余。后至脑骨腐肉连发片片脱下，其状狼狈，不可观瞻，凡相视者无不点头惊讶！又恐腐溃深大，补不及事，每日粥食中用人参三钱，凡餐分入同煮食之以接补脾元。后方元气渐醒，调理四月方愈。彼后一年，反生其子，以承后祀也。

一监生项疮初起，请视疮头偏于右半，不可轻待，必用艾灸为上。隔蒜灸至十五壮，知痛乃住。后彼视为小恙，失用内药，又四日，其疮复作，颈肿项强，红紫木痛，便秘，脉实有力，以内疏黄连汤加玄明粉二钱通其大便。次用消毒救苦汤二服，肿势仍甚。此内毒外发也，不可再消之，换服托里消毒散，至近二十日，因患者肥甚，外肉多紧，不作腐

① 大：疑为“太”。

溃，予欲行针开放，彼家坚执强阻。岂后变症一出，烦闷昏愤，人事不醒，彼方惊悔。随用铍针左右二边并项之中各开一窍，内有脓腐处剪割寸许顽肉，放出内积瘀毒脓血不止碗许，内服健脾胃、养气血、托脓补虚之药，其脓似泉水不歇，每朝夕药与食中共参六、七钱，服至腐肉脱尽，新肉已生。又至四十日外，患者方得渐苏，始知人事，问其前由，径不知其故也。此患设若禁用针刀，不加峻补，岂有生乎？因其子在庠，见识道理，从信予言，未百日而愈也。

一男子项疮五六日，就肆看视，头便黄色，根亦平散，予曰：此当急治方可。彼面色不悦而去。又请里中一医视之，乃曰：小恙也。因喜其说，用药又至五日外，其疮势坚硬，根脚开大，毒气已过两肩，流注前项，胸乳皆肿，呕吐恶心，寒热不食，疮势形色俱觉可畏，始信前言。复请予治，其疮形状不可观也。此非药力可及。先用葱艾汤洗净旧药，连煮药筒拔提二处，拔出瘀血碗余，随用银针斜斜插入根脚，透通患底数处，以蟾酥条插入孔内。此最解毒为脓，总以膏盖，走散处以真君妙贴散敷之。日渐日消，其毒收归后项原处，又兼服内托、降火、化痰之药，三、四日候其大势已退，内脓已通，换服十全大补汤。凡坚而不化者照之，腐而不痛者取之，新血生迟者培之。如此调理将近三月，方得完口平复。此为患者讳疾忌医之过，几乎至于丧命者多矣。

一女人年过六旬，系宦族，素稟怯弱，项间患疽，初起头便如粟，谓里可容谷之病也。喜其形体不肥，虽发之后，必易于腐溃，此则不妨。前说先用隔蒜灸之，次用蟾酥饼贴灸上，四边以吸毒散敷之，收其根脚不散。内服托里消毒散，数服疮势坚硬，疼痛不止。予曰：到某日方止。况今疮不腐溃，诊其脉细数而无力，此内虚之故，不能解毒为脓，以疼为要，岂可得止。次换益气养荣汤加角针、白芷三服，肿亦渐起。外用桑木灸法，其坚渐软，脓出稠而不多，前方去角针、白芷加香附倍用参、芪，又数服方得脓溃，溃后痛亦不止。予曰：再三日，午后痛可止也。至期腐肉将脱小半，临午用乳香定痛散一服，午后疼痛顿退，安睡不醒，患家欣悦。予曰：不然，此在用药适其时也。虽半月之言，应于今刻，惟信则不失耳。后当某日腐尽，某日肌平，某日完口。此二者患家以墨绳记候期日，果实并无过与不及也。此法要在眼力精巧，量病

难易，新腐迟速，补助有无，用药合式，然后相量日数，可决于前发之必中也。

一妇壮年，项疮三日，其形径对前口，彼家相畏，人胖不当疮发此穴也。予视顶高脚活，虽发不妨。彼欲内消之方妥，予曰：药消则不能，针消则可取。彼从之，用铍针当顶针入六、七分，点至软肉方住，随去瘀血，又以蟾酥条插入孔内，服蟾酥丸得大汗而解。次日疮上微脓出之渐消，尤恐内毒未尽，又用消毒清热之药数服，不出十日而安。大抵凡欲消疮，先断根本，次泄毒气，使毒自衰无得内攻为妙。

一男子耳后生疽十余日，自谓小恙不治。将近半月，根脚渐大，疮头惟流血水，稀恶污秽，四边紫黑，软陷无脓，面惨鼻坼，手冷气促，脉诊散大无根，此内败症也，何必治之。辞不用药。又延客医治之。因询无事，患者恨予不治，凡遇亲友，勉力支持，厉声自囑决不甘死。予曰：心不服死也。再五日必死。果然。予尝观疮，但犯此症，虽山岳之躯，一败无不倾倒。

一妇人正对口四、五日，自灸廿余壮，径不知痛，灸疤焦黑，平塌如故。诊之脉微数而无力，此内虚症也。若假药力则误其事，用铍针当顶刺入寸许，不知痛，亦无血出，此毒滞而未发扬者。用蟾酥条插入针孔，每日一次，膏盖其上，至七日后周围裂缝出脓。内服纯补之药，至十四日，落出疮根一块，指大长寸余，后以玉红膏平长肌肉。又半月，其口已平，以珍珠散掺上，即刻生皮而愈。此症设若不用针工，专假药力攻托，虽不至死，岂能得其速愈者哉。

一妇人四句肥甚，项疮五、六日，视之肉肿疮不肿，必竟生疑恐，又兼口燥心烦，坚硬色紫，根脚散平，六脉洪大，此大过症也，后必无脓，相辞不治。彼又请医视之，有言外托者，又言内消者，有称年壮不妨，又说脉大易治。众人纷纷不定，仍各用药，又至七、八日，前后胸、项俱肿，木闷坚硬，仍复请视决之。予曰：此不治者何也？初起肉肿疮不肿、顶陷者一也；根脚平散，真气内败，不能收束毒气二也；口燥心烦，邪火内淫三也；形色紫暗，血死毒滞，不作腐溃者四也；六脉洪大，疮毒大盛，正气受克，无以抵当，故疮终变软陷，邪毒内攻而死者五也。当备后事为要，此终于二十七朝前后足矣。后果至期而歿。观此言正顺

理之病，可叹时人何为纷纷妄治也。

脑疽主治方

黄连救苦汤

黄连救苦汤升葛 柴芍芎归翘梗芩

羌活防风银共草 脑疽煎服可安宁

治脑疽、发鬓、发颐及天行时毒。初起憎寒壮热，头面耳项俱肿服之。未成者自消，已成者自溃。

黄连 升麻 葛根 柴胡 赤芍 川芎 归尾 连翘 桔梗
黄芩 羌活 防风 金银花 甘草节各一钱
水二碗，煎八分，临服入酒一杯，食后服。

解毒天浆散

解毒天浆石决明 僵蚕山甲防风评

连翘羌活乳香迎 银花归尾大黄行

治脑疽积毒日深，坚肿木硬，口燥舌干，恶心烦渴，六脉沉实有力，大便闭结不通者，并宜服之。

石决明(生研) 僵蚕 川山甲(土炒) 防风 连翘 羌活 乳香
甘草 金银花 黄连 归尾各一钱 大黄三钱 天花粉四两(新鲜未晒者，石臼内捣烂，投水一碗搅匀，绞去渣用)

上花粉净汁一碗半，同药煎至八分，入酒一杯，空心热服。行过三次方用饮食，忌食煎炒发物。

内托千金散

内托千金散芍芪 芎归防桔桂花随

人参白芷萎根草 痛加乳没效堪推

治脑疽、发背、诸毒，恶疮已成不消者，服之易溃。

白芍 黄芪 川芎 当归 防风 桔梗 天花粉 金银花 人
参各一钱 肉桂 白芷 甘草各五分 乳香 没药(二味痛甚加入)
上水二碗，煎八分，临服入酒一小杯，食远服。

回毒银花散

回毒银花散最奇 痈疽阴毒总堪医
借问君家何等药 银花甘草协黄芪
治脑疽及诸发阴疮不起，色变紫黑者急服之。

金银花(连枝叶)二两 黄芪(生切)四两 甘草(切)一两

用细酒二十两，同药入小口砂罐内密封，重汤内煮，尽三香为度。取起滤清服之，盖暖患上，其疮渐渐高肿，此转阴为阳吉矣。后用托药溃脓，如服后不痛、不起，疮头流出黑水，此真阴不治。

梅花五气丹

梅花五气丹轻粉 乳没辰砂麝片酥
还有粉霜雄血竭 此方原自出仙都

治脑疽、发背、诸般疔肿。初起寒热交作，筋骨疼痛，有似伤风，恶心呕吐，但未成脓者并宜服之。

梅花片五分 当门麝五分 轻粉 辰砂各六分 乳香 没药 瓜儿血竭 明雄黄各一钱 真酥散预于端午前寻之，至午日，取酥二钱，用头男乳调膏上前药各研极细，对准分数，于端午日辰时制度，候至午时，将上药九味和入蟾酥膏内，向日丸之如茄子大，一时内晒干。用川椒二十七粒，灯心二十七段同药收于磁罐内养之，以蜡封口，不泄药气为妙。凡遇恶疮大毒，开器取出一枚，先用美饌食饱，次用无根水漱净口内。再含水一口，少顷待温，用葱白五寸同水嚼烂咽下，随将药饼安放舌下，睡于暖处，以被覆盖，药化苦水，徐徐咽之，疮势大者，二、三饼亦可。药尽其汗即到如淋，诸病若失。如冬月天寒难汗，嚼后将葱白汤催之亦妙，凡治无有不效。如暗疔人所不知觉，及知觉而失治者，毒气入里，人便昏沉，一中便倒，不能依法服药，急用连须葱白七个，煎酒一杯，研药五饼灌下，药气到心，其功如汤泼雪，患者即便苏醒。此为外科第一奇方也。

小保安汤

小保安汤归藿苓 黄芪半夏麦冬陈
甘桔人参并白术 枣姜煎服用阳春

治脑疽、诸发已溃流脓时，平常服之，庶不更变。

当归 茯苓 川芎 黄芪 麦门冬 陈皮 桔梗 人参 白术各一钱 半夏 甘草 藿香各五分
姜三片，枣二枚，水二茶盅，煎八分，食远服。

大保安汤

大保安汤木附归 参苓芍药桂山萸

黄芪山药丹皮草 麦冬五味地黄随

治脑项诸发、痈疽、恶疮大毒已溃之后，脓水出多，气血虚弱，精神短少，饮食少思，坐卧不宁，烦躁不眠，昼则安静，夜则发热，及虚阳烦渴等症。

白术 当归 人参 茯苓 川芎 白芍 山萸 黄芪 山药 丹皮 熟地 五味子各一钱 肉桂 甘草 麦门冬 熟附子各五分
煨姜三片，大枣二枚，连肉七粒，水煎，食前后服。

阳春酒

一盏阳春酒罕稀 天冬杞术地黄随

人参柏子归远志 百补方中让此医

治脑疽、诸发已溃流脓腐尽时，脾胃虚弱，肌肉生迟；或气血原不足，以致肉色淡白，不能长发收敛，宜服此酒生长肌肉，强健脾胃，美悦颜色，滋润皮肤。凡大疮后饮此，不惟却病，亦且延寿。

人参(切片) 白术 熟地各五钱 当归身(切片) 天门冬 枸杞各三钱 柏子仁 远志各二钱五分

上上药，用绢袋宽贮，以无灰好酒五斤，磁罐内浸至一伏时，每早、午、晚各饮一杯热服。如夏月天炎易坏，不堪久服，将药分作五分，每次用酒一斤随便浸服亦效。如酒将完，药尚有味，再添酒浸饮之，一次以后，药淡无味，不必再浸用之。

桑木灸法

治诸疮毒，坚而不溃，溃而不腐，新肉不生，疼痛不止。用新桑木长七寸，劈指大，一头燃着向患上灸之，火尽再换，每次灸木五、六条，肉腐为度。

神妙拔根方

治脑疽、发背阴症。初起不肿高、不焮热，灸不痛，其病将来难果，必致坏人。十日以前，用铍针当顶插入知痛处方止，随用蟾酥条插至孔底，每日二条膏盖。三日后，另添插药，其根高肿作疼，外用神灯照法，助阴为阳。插、照七日，其疮裂缝流脓，至十三日，其根自脱。如日多根深蒂固不能脱者，铍针取之，内用玉红膏。不脱者自脱，不敛者自敛，此法百人百活，再无不愈者。

脑疽应用方

隔蒜灸法 拔筒法 琥珀蜡矾丸 太乙膏 真君妙贴散 护心散(方俱见肿疡门)

蟾酥丸 蟾酥条(俱见疔疮门)

十全大补汤 人参养荣汤 乳香定痛散 圣愈汤(方俱见溃瘍门)

疔疮论第十六

夫疔疮者，乃外科迅速之病也。有朝发夕死，随发随死，有三日、五日而不死，一月、半月而终死，此在于毒中之浅深，脏腑之乖逆，节候之寒温，肃杀人瞬息，畜类尸忤，性情激变，暴戾一时，发生立判。人之气血虚者，各随脏腑而中之。

且如毒气发于心经者生为火焰疔。其患多生唇口、手掌、指节间，其发初生一点红黄小泡，抓动痒痛非常，左右肢体麻木；重则寒热交作，头晕眼花，心烦发躁，言语昏愤，此等出于心经之病也。

毒气发于肝经者生为紫燕疔。其患多生手足、腰胁、筋骨之间，初生便作紫泡，次日破流血水，三日后串筋烂骨，疼痛苦楚；重则眼红目昧，指甲纯青，舌强神昏，睡语惊惕，此等出于肝经之病也。

毒气发于脾经者生为黄鼓疔。其发初生黄泡，光亮明润，四边红色缠绕其患，初生口角、腮颧、眼胞上下及太阳正面之处，发之便作麻

痒，绷急硬强；重则恶心呕吐，肢体木痛，寒热交作，烦渴干嘔，此等出于脾经之病也。

毒气发于肺经者生为白刃疔。其发初生白泡，顶硬根突，破流脂水，痒痛骤然，易腐易陷；重则腮损咽焦，毛耸肌热，咳吐脓痰，鼻煽气急，此等出于肺经之病也。

毒气发于肾经者为黑靥疔。其患多生耳窍、胸腹、腰肾偏僻软肉之间，其发初生黑斑紫泡，毒串皮肤，渐攻肌肉，顽硬如疔，痛彻骨髓；重则手足青紫，惊悸沉困，软陷孔深，目睛透露，此等出于肾经之病也。

以上五疔，相应五脏。又红丝疔起于手掌节间，初起形似小疮，渐发红丝上攻手膊，令人多作寒热，甚则恶心呕吐，迟者红丝至心，常能坏人。用针于红丝尽处挑断出血，寻至初起疮上挑破，俱用蟾酥条插入，膏盖，内服汗药散之自愈。凡治此症，贵在乎早。初起即治者十全十活，稍迟者十全五、六，失治者十全一、二。初起项以上者，三阳受毒，必用铍针刺入疮心四、五分，挑断疔根，令出恶血，随用回行丹或蟾酥条插入孔内膏盖之。如项之以下者，三阴受毒，即当艾灸，灸之不痛，亦须针刺、插药方效；随后俱用蟾酥丸，冬月万灵丹发其大汗，毒方得解，庶不稽留毒气，致生变症。今人治法，不论阴阳、表里、部位上下，凡见是疮，便加艾灸，殊不知头乃诸阳之首，亢阳热极所致，其形虽小，其恶甚大，再加艾灸，火益其势，逼毒内攻，反为倒陷走黄之症作矣。即作之后，头、面、耳、项俱能发肿，形如尸胖，七恶顿起，治虽有法，百中难保一、二。外又有疔名数种，形状纷纷，故有旧说未及重录也。

疔疮看法

初起如疥，形如粉刺，或小泡、或疙瘩，结肿不散者顺。疮肿不作寒热，亦不恶心，饮食有味，手足温暖者顺。形已成肿肉不肿，四围白色，多痛少痒作脓者顺。已溃出脓，疮仍高肿，肉色鲜明，根内红活渐平者顺。

初起似疔非疔，软漫灰色，四边疮根平塌漫肿者凶。未发前先作

寒热如疟，恶心不食，后出疮如蚊迹蚤斑，或青紫黑泡，软陷无根，腐烂深孔，气粗足冷者逆。疮形似鱼脐，顶凹灰白，软漫相兼，脉细身冷者多逆。

已成肉肿疮不肿，根脚走散，疮顶空腐，血水气秽死。凡疔项之以上针刺不疼，项之以下灸之不痛俱死。已经走散，头、面、耳、项俱肿，烦躁脉细、痰动喘急者死。日久原疮无迹，走散之处仍复作脓，脉数唇焦终死。病虽险恶，岁运顺者可活；疮虽微险，岁运逆者常危。

疔疮治法

初生项之以上者，必先针刺，以去恶血，庶毒不攻内。初发项之以下者，必先艾灸，以杀其势，庶不侵良肉。发热恶寒，身体拘急，六脉紧数，邪在表也，宜汗散之。身体发热，口燥咽干，脉实有力，二便秘涩者宜下之。针刺之后，疮不作腐，边肿不消，仍加插药，内亦补托。初起误灸，致毒走黄不住者，急当随走处砭去恶血。发热干呕，心烦作渴，闷乱神昏，解毒清心，托里护膜。溃后气血受伤，神怯食少，睡卧不宁，助脾胃，敛神气。将愈后气血渐复，饮食当进，仍作渴者，急滋养肾水。

疔疮治验

一监生右颧下生疔，三日形如鱼目。询问起居，但今麻痒不常，此即肺经受毒之症也。用针刺入四、五分，其硬如骨有声，随用蟾酥条，插至三日，犹不腐化，此坚顽结聚之病也。此药力不及其事，换用三品一条枪，插至七日外用糊纸封盖，至十一日脱出疔根一块，约有指许，以长肉玉红膏渐搽渐长，先服托里消毒散加金银花二钱、白芷五分，脱后用八珍汤加天花粉、麦门冬、黄芪、陈皮各一钱，调理月余，候疮生肉已平，用珍珠散掺上结皮而愈。

一监生中年妻丧，继娶幼室，乃娇态人也。自服补肾助阳之药，以致肾水受伤，不能上制心火，左颧发生一泡，先紫后黑，麻木不知痛痒。凡黑者肾经之毒也，其毒岂浅？且喜疮之四边尚未走散，此犹可取。

随用针刺疗上，量别药不济其事，用冰蛭散厚糊作条插入患孔，用糊纸密封，勿令泄气。朝服加减八味丸以滋肾水，午服益气养荣汤接补气以滋不足，晚用琥珀蜡矾丸护心解毒。候至十一日外，疗根与药结成一块，依期脱落，次用生肌敛口、补助调理脾胃之剂，二十日而愈。后因此公不慎调理，失于保节，几及三年，复成虚损劳瘵而歿。

一妇人年近四旬，夫主不利，愁郁种种，抱怀不散。时值季夏，岁荒之极，腮发一疔，六日后方延予视，其时疔毒已经走散，头、目、唇、项俱肿，形色紫赤，予曰：肉肿疮不肿，乃疔毒走黄不治之症。彼妇流涕叹曰：一家皆绝也。予问曰：何其如此？妇又曰：吾夫乃不肖之人，妇有一女二子，俱未适配，设若妇死寄托于夫，子女日后必为流荡辈也。故妇在一家生，妇逝一家死，自然之理。予时闻之，沉吟不已。如此何以得生？不忍弃治，况此疮势大，又非药力可回。……用火酒数杯，随用针刺肿上十余处，令……吸恶血数碗，将温汤洗净，用蟾酥锭磨浓涂之，四围敷金黄散早、晚二次，内以护心散、蜡矾丸清心护理。兼服降火化痰、开郁安神之药调治，庶保不变，吸血之后，余肿稍退。又至六日，夫又对言何其不死？彼妇相闻甚苦，暴怒之极，仍又复肿，比前尤甚也。复用针刺肿甚上约十余处，出血三、四碗，针孔上小膏盖贴，余肿仍敷。其人出血多而其内必虚，以人参养荣汤加香附、贝母服数日后，针口渐脓，余肿渐消，原疮处复得高肿，仍用蟾酥条插化，亦渐腐溃。外用生肌敛口，内服开郁和中、养血健脾等剂调理百日外方愈。此病设若相论疮势形色者百无一生之理，此功出于强勉行之，亦得其生者。此妇愈后，二子一女俱以婚配，其夫亦守其终，见今已六旬半矣。

一妇人二十二岁，右耳垂向前一寸生疔二日，请予视之。形有豆大，顶陷灰色，此肺经感毒发为白刃疔也。又验其根脚绵软，毒不结聚，为陷伏阴症也。未及针刺，伊舅曰：何恙也？予直告曰：疔疮症。彼听冷笑不信是言也。予因辞不用药，随其信否。彼复请客医治之。视曰：风热疙瘩，乃小恙也。彼家告以某医曾曰是疔疮，医者点头而笑曰：此真胡说。患家喜悦，天下事大相悬绝。医用消风散，药二服，毒气全收，随发昏愤、喘急而即死。后里中人询问何速之甚？彼初时因

不信予言，自误其死，真可惜也！

一年少妇颧下生疔，疙瘩作痒，予欲针之，彼家不信，辞后自灸。次日，四边渐肿，疮渐软陷。又三日，头面大肿，复请治之。予观原疮灸上已结黑靥，干陷无脓，此毒气内陷，外肉已死。又面目浮肿光亮，发热形状不堪，此正气衰而邪气实也。虽治亦不效，后必终死。彼家方悔自误之说，后延半月，果然归寝。

疔疮主治方

蟾酥丸

蟾酥丸效独称雄 乳没砂矾轻粉同

铜绿蟾酥寒水麝 蜗牛又有用蜈蚣

治疗疮、发背、脑疽、乳痈、附骨臀腿等疽，一切恶症歹疮，不痛或麻木、或呕吐，病重者必多昏愠。此药服之不起发者即发，不痛者即痛，痛甚者即止。昏愠者即苏，呕吐者即解，未成者即消，已成者即溃。真有回生之功，乃恶症中至宝丹也。

蟾酥二钱(酒化) 轻粉五分 枯矾寒 水石(煨) 铜绿 乳香 没药 胆矾 麝香各一钱 雄黄二钱 蜗牛二十一个 朱砂三钱

以上各为末，称准，于端午日午时，在净室中先将蜗牛研烂，再同蟾酥和研稠粘，方入各药共捣极匀，丸如绿豆大。每服三丸，用葱白五寸，患者自嚼烂，吐于男左女右手心，包药在内，用无灰热酒一茶盅送下。被盖，如人行五、六里出汗为效。甚者再进一服。

·按：方中无蜈蚣，而歌诀有之。

黄连解毒汤

黄连解毒汤黄柏 山栀甘草共连翘

内热口干烦躁甚 更加牛子寂然消

治疗毒入心，内热口干，烦闷恍惚，脉实者宜用。

黄连 黄芩 黄柏 山栀 连翘 甘草 牛蒡子各等分

水二盅，灯心二十根，煎八分，不拘时服。

黄连解毒汤的临床新用

1. 带状疱疹

本方加減配合刺絡拔罐治療帶狀疱疹。藥用：黃連 12 克，黃芩 12 克，黃柏 12 克，梔子 12 克，紫花地丁 9 克，生地黃 9 克，蒲公英 9 克，赤芍 9 克，滑石 9 克，甘草 6 克。1 日 1 劑。配合刺絡拔罐。總有效率 95.3%。

王建良．山東中醫雜誌，2006，25(1)：59

2. 頑固性鼻出血

柴峰等用本方油紗條治療頑固性鼻出血。用油紗條直接壓迫出血和糜爛部位，48 小時後取出所填塞油紗條；若仍有出血，則再次填塞；若出血停止，則取黃連解毒湯膏塗敷糜爛創面，至糜爛黏膜完全恢復。全身給予對症處理。治癒率為 100%。

柴峰，等．中國中西醫結合耳鼻咽喉科雜誌，2005，13(6)：314

3. 潰瘍性結腸炎

本方治療潰瘍性結腸炎 52 例。急性期原方每日 1 劑，連服 5 天，然後改用緩解期方法治療 1 個療程。總有效率 87.5%。

劉桂軍．江西中醫藥，2005，36(12)：19

4. 急性細菌性病疾

本方加味直腸點滴治療普通型急性細菌性病疾 52 例。藥用：黃芩、黃連、黃柏、銀花、連翹、赤芍、白芍、白頭翁、生地榆各 10 克，梔子 6 克，大黃(後下)、生甘草各 5 克。濕熱夾表証加荊芥 6 克，葛根 10 克。煎後靜置去其雜質，直腸點滴，每次點滴 0.5 小時左右，每日 3 次，3 天為 1 個療程。有高热、水電解質紊亂者予以對症處理。總有效率 100%。

王際國．實用中醫藥雜誌，2005，21(12)：727

5. 腦出血

本方加味治療腦出血 48 例。採用西醫常規綜合治療的基礎上加

服加味黄连解毒汤:夏枯草、鸡血藤各30克,瓜蒌12克,野菊花、黄芩各15克,黄连、大黄、泽泻、滑石、重楼、茯苓各10克,每日1剂,14天为1个疗程。显效率为83.3%。

青发基,等. 安徽中医学院学报,2005,24(5):13

6. 疱疹性咽峡炎

本方加减治疗疱疹性咽喉炎获效。药用:黄连3~5克,黄芩3~5克,栀子3~7克,射干3~7克,大黄1~3克,茵陈3~6克,薄荷2~5克,甘草1~3克。每日1剂,疗程2~4天。有效率93.7%。

王华光. 中国基层医药,2005,12(9):1213

7. 中毒性痢疾

田爱存等用本方结合西医治疗中毒性痢疾15例。在西医常规治疗的基础上,若毒热内闭者给予黄连解毒汤合白头翁汤加減:黄连3克,黄芩、黄柏、栀子各6克,白头翁15克,秦皮、石菖蒲各9克。水煎灌肠。结论:中西医结合组死亡率低于西药组,疗效满意。

田爱存. 时珍国医国药,2004,15(5):314

8. 急性肛窦炎

本方为主方加减治疗急性肛窦炎81例。药用:黄连10克,黄柏20克,栀子15克,红藤30克,木香10克,白芍10克,冰片(冲入)0.5克,地榆15克,甘草5克。水煎灌肠,肛内保留20分钟。同时口服氟哌酸、灭滴灵。7天为1个疗程。总有效率96.2%。

徐伟. 吉林中医药,2004,24(12):29

9. 波状热

本方加附子治疗波状热12例。7天为1个疗程。12例患者全部治愈。

温忠景. 中医药信息,2004,21(3):35

10. 痤疮

用本方合五味消毒饮治疗痤疮30例。药用:紫花地丁20克,天葵10克,金银花、蒲公英各15克,菊花、黄连各6克,黄芩12克,黄柏、栀子、皂角刺、赤芍各10克。胃热加大黄6克,茵陈12克;痰热瘀结加半

夏 10 克, 陈皮 12 克, 夏枯草、丹参各 15 克。每日 1 剂。再将药渣加清水煮沸后熏洗患处, 10 天为 1 个疗程。总有效率 100%。

胡新霞. 辽宁中医杂志, 2004, 31(11): 942

11. 梅毒

赵晓芳用中西医结合治疗早期梅毒 53 例。西医用: 美满霉素、强的松。中医辨证毒热内蕴型用本方合五味消毒饮, 药用: 黄连 10 克, 焦栀子 10 克, 金银花 30 克, 野菊花 30 克, 蒲公英 30 克, 紫花地丁 30 克, 土茯苓 15 克, 炒槐花 15 克。有效率为 98.11%。

赵晓芳. 河南中医, 2004, 24(11): 66

12. 漏睛疮

林华用本方加味治疗漏睛疮 116 例。药用: 黄连 6 克, 黄柏、栀子、白芷、丹皮各 9 克, 蒲公英 30 克, 紫花地丁、天花粉、竹叶、薏苡仁各 15 克, 生地 12 克, 甘草 3 克。便秘者加大黄 6 克; 伴有头痛者加蔓荆子 9 克, 川芎 6 克; 年老体弱者, 加茯苓、淮山药各 12 克, 鸡内金 9 克。结合外用药湿冷敷、同侧耳尖刺出血、泪囊冲洗。本组痊愈 74%, 好转 26%。

林华. 海峡药学, 2004, 16(6): 115

13. 流行性出血热

本方结合西医治疗流行性出血热获效。在使用综合治疗措施的基础上中药用本方加味: 黄芩 10 克, 黄连 6 克, 黄柏 10 克, 炒栀子 10 克, 金银花 30 克, 连翘 20 克, 菊花 15 克, 石膏 60 克, 知母 10 克, 生地 30 克, 丹皮 10 克, 丹参 30 克, 生大黄 10 克, 黄精 30 克, 白茅根 200 克。高热抽搐加天麻 10 克, 钩藤 10 克, 炒僵蚕 10 克; 神志昏迷加安宫牛黄丸 1 粒。每日 2 剂。结论: 西药改善肾衰症状迅速, 中药控制、杜绝重型流行性出血热并发症的发生及抗流行性出血热病毒有效, 故中西医结合治疗重型流行性出血热效果可靠。

高俊海, 等. 江西中医药, 2003, 34(9): 34

14. 寻常型银屑病

本方加味治疗寻常型银屑病。药用: 黄芩、黄连、黄柏、栀子各 10

克,大黄5克,熟地、生地各20克,枸杞子10克,丹参、莪术、白茅根各15克,生槐花10克,茯苓20克,猪苓10克,甘草20克。每日1剂。总有效率96.67%。

张永熙,等. 辽宁中医杂志,2003,30(10):830

15. 急性唇炎

本方合五味消毒饮治疗急性唇炎23例。药用:金银花30克,菊花15克,蒲公英15克,紫花地丁15克,紫背天葵12克,黄连9克,黄柏9克,黄芩12克,栀子6克,石膏30克。若红肿甚则加赤芍12克,丹皮12克,生地15克;大便燥结加大黄9克。每日1剂。有效率100%。

杨宝泉. 中华实用中西医杂志,2002,(5):538

16. 类丹毒

本方加味治疗类丹毒23例。药用:黄连6克,黄芩10克,黄柏12克,栀子10克。热痛甚加连翘20克,生石膏(先煎)20克,七叶一枝花10克;斑块赤甚加赤芍药10克,牡丹皮10克,大青叶15克;便结溲黄加生大黄10克,蒲公英20克,土茯苓10克。每日1剂。内服药第3煎药汁外洗或浸泡患处,同时用青敷膏敷患处,每日1次。痊愈18例,显效4例,无效1例。

汤忠华. 河北中医,2002,24(6):446

17. 舌癌

本方加味治疗舌癌30例。若舌体肿痛加露蜂房、土鳖虫各12克;舌体溃烂、痰多加浙贝、瓜蒌皮、花粉各15克;体虚纳少加黄芪、党参各30克;肝肾阴虚者加女贞子15克,旱莲草30克;气滞血瘀者加三七10克,丹参30克,赤芍12克;瘀毒化热明显者加蒲公英30克,蜈蚣5条,栀子12克,先煎犀角2克(或先煎水牛角50克),每天1剂。总有效率83.3%。

郭晓东. 陕西中医,2002,23(12):1078

18. 宫颈糜烂

本方化裁治疗宫颈糜烂38例。方药:黄连、黄柏、黄芩、栀子、苦参各100克,明矾20克,共碾成粉。清洁宫颈及阴道后,将适量药粉喷

洒至宫颈糜烂面。伴腰腹痛、性交痛者配合静脉滴注氧氟沙星注射液及甲硝唑注射液。7天为1个疗程。总有效率为92.1%。

糜澜. 实用中医药杂志, 2002, 18(11): 42

19. 脑梗死

本方加味治疗脑梗死58例。药用: 黄连、黄芩、黄柏、焦栀子各9克, 当归、川芎各12克, 牛膝、全蝎各10克, 炙甘草6克。夹风型加防风、僵蚕、白花蛇; 夹痰型加陈胆星、天竺黄、石菖蒲; 阴虚阳亢型加白芍、元参、钩藤、天麻、生龙牡; 气虚型加党参、黄芪; 脾虚纳呆者加炒白术、焦三仙, 每日1剂。收效满意。

史春生. 中国社区医学, 2002, 8(1): 49

20. 急性痛风性关节炎

本方治疗急性痛风性关节炎46例。若热盛加石膏、知母; 湿盛加茯苓、白术; 肾虚加菟丝子、杞果; 血瘀加血竭、田三七。1日1剂。服药期间忌食辛辣及含嘌呤多的食物, 限制酸性饮品的摄入。同时用三七研末, 鸡蛋清调局部外敷。总有效率为97.4%。

兰墨赭. 河南中医药学刊, 2001, 16(4): 58

21. 病毒性心肌炎

李毅用黄芪黄连解毒汤加减治疗急性病毒性心肌炎。药用: 黄芪60克, 黄连10克; 黄芩、黄柏各6克, 山栀、连翘、葛根各10克, 丹参、茯神各30克, 丹皮、麦冬、生甘草各10克。口服, 同时卧床休息, 吸氧。初期可加蚤休30克, 蒲公英、大青叶各15克; 胸闷较甚加川广郁金、川芎各10克, 全瓜蒌15克; 心悸较重加龙齿(先煎)、灵磁石(先煎)各30克, 酸枣仁10克; 慢性期正虚邪存加生晒参、沙参、苦参各10克。治疗3个月后, 治愈率为31%, 6个月后治愈率为80%。

李毅. 辽宁中医杂志, 2001, 28(6): 34.

22. 高血压

本方加减治疗高血压病30例。药用: 黄芩9克, 黄连9克, 栀子12克, 黄柏12克, 人工牛黄0.5克(冲服), 珍珠粉0.5克(冲服)。1日1剂, 15天为1个疗程, 总有效率93.39%。

李运伦·国医论坛,2000,15(2):38

23. 淋病

本方加减治疗淋病32例。药用:黄连12克,黄芩、黄柏、车前仁、大黄各10克,栀子9克,败酱草15克。口干咽痛加花粉、金银花;小便涩甚者加滑石;尿中带血者加琥珀、小蓟;心烦有热者加知母;大便稍稀者减大黄。每日1剂,7天为1个疗程。总有效率占96.9%。

胡江来·实用中医药杂志,1998,14(12):19

立马回疔丹

立马回疔丹轻粉 蟾蜍蛇麝白丁香

雄乳朱砂金顶等 化疔如雪去投汤

治疗疮初起,已用针刺后又或误灸失治,以致疮毒走散不住,乃疔走黄险恶症也,急用此插。

蟾酥(酒化) 硃砂 轻粉 白丁香各一钱 蜈蚣一条(炙) 雄黄朱砂各二钱 乳香六分 麝香一字 金顶砒五分(注未卷)

共为细末,糊成麦子大,凡遇疔疮,针破用此一粒插入孔内膏盖之,次后追出脓血疔根为效。

疔毒复生汤

疔毒复生汤牡蛎 山梔乳没骨连翘

花粉银花黄皂刺 木通牛子不相饶

治疗毒走黄,头面发肿,毒气内攻,烦闷欲死者。

牡蛎 山梔 银花 木通 连翘 牛蒡子 乳香 没药 角刺花粉 大黄 地骨皮各八分

水、酒各一茶盅,煎一半,食远服。不能饮者水煎,临服入酒一杯和服亦效。脉实便秘者,加朴硝。

七星剑

疔疮最怕七星剑 野菊苍耳豨莶半

麻黄地丁紫河车 斩断诸疔及人面

治十三种疔疮。初起憎寒作热,恶心呕吐,肢体麻木,痒痛非常,心烦作躁,甚者昏愤,急宜服之。

野菊(嫩头) 苍耳头 豨莶草 半枝莲、地丁草各三钱 麻黄一钱
紫河车二钱

用好酒一斤,煎至一碗,滤清热服,被盖出汗为度。冬月无鲜草,宜预采阴干,临时煎服之亦效。

铅粉散

铅粉散治冷疮 麝香松脂及黄丹

轻粉黑铅为黑粉 诸般阴烂可回阳

治冷疮生于脚上,初起紫白泡,疼痛彻骨。渐至腐烂,深孔紫黑血水气秽,经久不瘥,用此大效。

黑铅(四两,铁杓化开倾入水中,取起再化,如此百遍,以铅尽为度,去水澄下者)三钱 松脂一钱 黄丹(飞炒)五分 轻粉五分 麝香一分

共研,先用葱汤洗净,麻油调涂疮口,油纸盖外。

化疗内消散

化疗内消散山甲 知母天花粉半夏

甘草白芨紫河车 皂角银花赤芍药

治疗疮初起,或已针已灸之后,服之能令内消。

皂角针 金银花 知母 贝母 天花粉 穿山甲 白芨 乳香
赤芍 半夏 甘草 紫河车各一钱

水、酒各一茶盅,煎一半,量病上下,食前后服之。

束毒金箍散

束毒金箍散大黄 白芨白芨白芷当

黄柏郁金轻豆粉 敷围诸毒不开张

治疗疮针刺之后,余毒走散作肿,宜此药箍之。

郁金(蟬肚者) 白芨 白芨 白芷 大黄各四两 黄柏二两 轻粉
五钱 绿豆粉一两

共为细末,酸米浆调箍四边,夏热甚者,蜜水调。

解毒大青汤

解毒大青汤石膏 玄参知母麦冬饶

麻梔木桔烧人粪 加上人中黄更高

治疗疮误灸，逼毒入里，致生烦躁、谵语不定者。

玄参 桔梗 知母 大青叶 升麻 石膏 山梔 人中黄 麦
门冬 木通各一钱 大黄(便秘加) 烧人粪(闷乱加)

水二茶盅，淡竹叶、灯心各二十件，食远服。

消疔简便方

消疔简便方容易 葱白原来共白矾

每服三钱温酒下 如汤泼雪胜灵丹

治疗疮及诸恶毒，初起但未成脓者，服之即效。

白矾末三钱 葱白七茎

上二味，同捣极烂，分作七块，每块用热酒一杯送下，服毕用厚被盖之，再吃葱白汤一钟，少顷汗出如淋，从容去其覆物，其病若脱。此虽味涩难服，其效更妙。凡居乡村之处，倘有紧病不及请治，只传此方，服之活人甚众，诚为良便方也。

太乙紫金丹

太乙紫金丹大戟 茨菇文蛤共千金

雄麝朱砂凡七品 诸疮百症总通神

解诸毒，疗诸疮，利关窍，通治百病。此药真能起死回生，制之济人，奇效不可尽述。凡居家出入，兴大工，动大兵，及闽、广、云、贵仕宦者，不可无之。

山茨菇(洗去毛皮净焙)二两 川文蛤(一名五倍子，槌破净焙)二两 麝香(拣净毛皮，干者研净)三钱 千金子(一名续随子，仁白者去油)一两 红芽 大戟(杭州紫大戟为上，江南土大戟次之，北方绵大戟色白者、性烈峻利，反伤元气，弱人服之，有致吐血，慎之勿用。取上品者，去芦，根洗净，焙干为末)一两五钱 整朱砂(有神气者，研极细末)三钱 雄黄(鲜红大块者，研细末)三钱

以上之药，各择精品于净室中制毕。候端午、七夕重阳……之辰，凡入室合药之人，三日前俱宜齐沐，更换新洁衣帽，临日方入室中，净手熏香……各将前药七味复等称准入于大乳钵内，再研数百转，方入细石臼中，渐加糯米浓饮调和，软硬得中，方用杵捣千余下，极至光润为度。每錠一钱，每服一錠，病势重者，连服二錠，以取通利，后用温粥

补之。修合时除合药洁净之人，余诸忌见，此药惟在精诚洁净为效。

治一切饮食药毒，蛊毒、瘴气、恶菌、河豚中毒，自死牛、马、猪、羊六畜类之肉，人误食之，必昏乱卒倒，或生异形之症，并用水磨灌服，或吐或泻，其人必苏。

南方山峦瘴气，烟雾疔疫，最能伤人，感之才觉意思不快，恶寒恶热，欲呕不呕，即磨一铤，服之得吐利便愈。

痈疽、发背、对口、疔疮、天蛇、无名肿毒、蛙节、红丝等疔，及杨梅疮，诸风瘾疹，新久痔疮，并有无灰淡酒磨服。外用水磨涂搽疮上，日夜数次，觉痒而消。

阴阳二毒，伤寒心闷，狂言乱语，胸膈塞滞，邪毒未出，瘟疫烦乱、发狂，喉闭，喉风，俱用薄荷汤待冷磨服。

赤白痢疾，肚腹泄泻急痛，霍乱绞肠痧及诸痰喘，并用姜汤磨服。

男子女人急中颠邪，渴叫奔走，鬼交、鬼胎、鬼气、鬼胎，失心狂乱，羊儿、猪颠等风，俱用石菖蒲煎汤磨服。

中风、中气，口眼歪斜，牙关紧急，言语蹇涩，筋脉挛缩，骨节风肿，遍身疼痛，行步艰辛，诸风诸痛，并用酒磨顿热服下。

自缢、溺死、惊死、压死、鬼魅迷死，但心头微温未冷者，俱用生姜、续断酒煎磨服。

一切恶蛇、风犬、毒蝎、溪涧诸恶等虫伤人，随即发肿，攻注遍身，甚者毒气入里，昏闷响叫，命在须臾，俱用酒磨灌下；再吃葱汤一碗，被盖出汗立苏。

新久疟疾，临发时东流水煎桃柳枝汤磨服。

小儿急慢惊风、五疳、五痢、脾病黄肿、瘾疹、疮瘤，牙关紧闭，并用薄荷浸水磨浓加蜜服之，仍搽肿上。年岁幼者，每铤分作数服，牙痛酒磨涂痛上，仍含少许，良久咽下。

小儿父母遗毒，生下百日内皮塌烂斑，谷道、眼眶损烂者，俱用清水磨涂。

打扑伤损，松节无灰酒研服。

年深月近，头胀头疼，太阳痛极，偏头风及时疮愈后，毒气攻注，脑门作胀者，俱用葱酒研服一铤，仍磨涂太阳穴上。

妇女经水不通，红花汤下。

凡遇天行疫症，延街及巷相传遍染者，用桃根汤磨浓搭入鼻孔，次服少许，任入病家再不传染。

又治传尸劳瘵，诸药不能禁忌，一方士指家服此，每早磨服一铤，至三次后逐下恶物、尸虫、异形怪类，后得脱利，以此相传，活人不计其数。

一女子久患劳瘵，为尸虫所噬，磨服一铤，片时吐下小虫十余条，后服苏合香丸，其病顿失，调理月余而愈。真济世卫生之宝药也。

人参清神汤

人参清神汤术芪 归苓甘草麦冬宜

柴陈远志黄连等 功效堪同地骨皮

治疗疮溃脓后，余毒未尽，五心烦躁，精神恍惚不宁，言语睡卧不清，服之降火清心，保扶元气。

人参 黄芪 当归 白术 麦门冬 陈皮 茯苓 地骨皮 远志各一钱 甘草 柴胡 黄连各五分

水二茶盅，糯米一撮，煎八分，食远服。

内托安神散

内托安神散术芪 茯神酸枣志陈皮

麦冬五味菖蒲草 加上人参玄又奇

治疗疮针后已出脓，时元气虚弱，睡卧惊悸，心志不宁。或毒未尽流入心窍，致生健忘，亦宜服。

人参 茯神 黄芪 白术 麦门冬 玄参 陈皮各一钱 酸枣仁 远志 甘草 石菖蒲 五味子各五分，

水二盅，煎八分，临入朱砂末三分和匀，食远服。

疗疮应用方

蟾酥条（即前蟾酥丸作条捏饼用之）

琥珀蜡矾丸 玉红膏 如意金黄散 护心散托里消毒散（见肿疡

门)

八珍汤 益气养荣汤 加减八味丸 人参养荣汤(见溃疡门)

珍珠散(下疳门)

冰蛭散(瘰癧门)

脱疽论第十七

夫脱疽者,外腐而内坏也。此因平昔厚味膏粱熏蒸脏腑,丹石补药消烁肾水,房劳过度,气竭精伤,……多致阳精煽惑,淫火猖狂,其蕴蓄于脏腑者,终成燥热火症,其毒积于骨髓者,终为疽毒阴疮。诚为巧人行拙,谁防祸起萧墙,智者多愚,自谓喜从天降,不顾后日也。骨枯髓涸,脏败腑亡,方知今日罹殃有故,解脱无方。凡患此者,多生于手足,故手足乃五脏枝干,疮之初生,形如粟米,头便一点黄泡,其皮犹如煮熟红枣,黑气侵漫,相传五指,传遍上至脚面。其疼如汤泼火燃,其形则骨枯筋练,其秽异香难解,其命仙方难活。故谓血死心败、筋死肝败、肉死脾败、皮死肺败、骨死肾败。此五败者,虽有灵丹竟丧命而已。是生此疾者,死生付于度外。孙真人曰:在肉则割,在指则切,即此病也。治之得早,乘其未及延散时,用头发十余根缠患指本节尽处,绕扎十余转,渐渐紧之,毋得毒气攻延良肉。随用蟾酥饼,放原起粟米头上,加艾灸至肉枯疮死为度。次日本指尽黑,方用利刀寻至本节缝中,将患指徐顺取下,血流不住,用金刀如圣散止之,余肿以妙贴散敷之。次日倘有黑气未尽,单用蟾酥锭研末掺之膏盖,黑气血退。患上生脓,照常法用玉红膏等药生肉护骨完口,此为吉兆。内服滋肾水、养气血、健脾安神之剂。若内无变症,外无混杂,此十中可保其三、四矣。若割取之后,黑色仍漫,痛肿尤甚,败恶无脓,口干舌硬,精神不爽,食不知味者终死。凡治此,不可一己医治,必与高明众议,听患者愿情割取,况此症首尾吉凶,变驳难定,故不可轻易用之。又有形似而来非,穴真而受异,详注在后,宜参观之。

脱疽看法

起疮不渴，口润舌和，性志寻常，无妄暴急，循礼为吉。初出形如麻子，焮热作痛，一指皆肿，根脚收束者吉。已成头便作腐，肉不紫黑，疼痛有时，脓出肿消者吉。已溃先脓后腐，肉色红活，毒不走散，气不腥秽者吉。

未疮先渴，喜冷无度，昏睡舌干，小便频数，阳痿者逆。初起形如粟米，肉便紫色，不肿刺疼，黑气延散者逆。已成疮形枯瘪，肉黑皮焦，痛如刀剐，毒传好指者逆。已溃肉枯筋腐，血水臭汗，疼痛应心，零仃彻骨者逆。

脱疽治法

脱疽多生足指^①，少生手指，初起水窠黄泡者，即灸之。初生如粟，里可容谷，皮色紫赤，不作焮肿，发扎仍灸。已灸之后，疮受火气，发泡作脓，外药箍之，内兼补托。毒势已成，疮形稍陷，但紫色未攻脚面者，评议割取。既割取之后，血水淋漓，疼痛不减，和气血、补脾胃。已成饮食减少，身体倦怠，便数口干，生津液、壮肾水。破后气血受伤，脾胃虚弱，自汗盗汗，恶心干呕，睡卧不宁，日晡发热，疼痛苦楚，烦闷谵妄，俱宜大补气血。富贵及膏粱，素饕色欲，每淤房术，纵恣日久，禁止割法。

脱疽治验

一男子年近五旬，右足小指初生如粟米，渐成白泡，三日始痛，请治。头已腐烂，一指紫肿，此脱疽也。随用艾火明灸十三壮，始大痛乃

① 指：按文义作“趾”。

止。又用针刺灸顶，以蟾酥饼贴灸上，膏盖本指，肿上用铍针击刺七、八处，发泄毒血，用蟾酥锭磨浓涂之。肿外以真君妙贴散敷护良肉，庶不外侵。其时患者脉数，身发寒热，恶心体倦，先用人参败毒散解其表症，次用黄连内疏汤通其大便，而恶心烦热亦止。又以托里消毒散加金银花、牛膝数服，早以八味丸，晚用蜡矾丸相兼服之，喜其火疏毒气，随又针刺并泄其毒，故不变作，解毒为脓，肿方不散。后用十全大补汤加山萸、五味、麦冬等药，调理月余而愈。此疽若不针灸发泄毒气，专假药力敷围，再加峻药攻利，必致伤其元气，岂能保固毒不侵犯得安之理。

一客商右足次指生一紫泡，痒痛异常。次日，指甲俱紫欲黑，视之乃肝、肾二经之毒。彼曰：何别也？予曰：甲乃肝之余气，甲紫则肝受毒也；骨乃肾之余，肾伤则骨黑，此理甚明。彼又曰：何以致之？予曰：凡人劳疲筋力伤于肝，误服热药伤于肾。傍者曰：情实有此，因彼久居客旅，交结妓女，情怀最密，极力承奉，旦夜并服兴阳细丸，期许常至，立交戏谑，有此二年矣。前言正中其病，此劳力、热药伤肾、伤筋之实也。其病尤险，欲辞不治。彼哀告客途欲得生返，再三求治，予又斟酌，先取妓者顶发十余根，拈线缠扎患指尽处，随将艾炷安于所扎上面紫色处。排匀三处，每灸七壮，各放蟾酥饼膏盖。次后胀痛相忍不舍，解去扎发，过夜一指皆黑，相量筋骨皮肉俱死，仍用利刀顺节取脱患指，乃冰冷恶物；预煎甘草汤浸洗良久，候瘀血稍尽，以止血散掺之，次日灸上紫色不退，恐其上延，又以神灯照法照之，候血散皮绌，旋合蟾酥丸料多加海羊研烂敷之，早晚二次，肿不复作，紫色变红，红色溃脓；外用生肌止痛、活血收敛之药。又熬参术地黄膏朝服接补真元；午服健脾药以回胃气；晚用金液丹以解药毒；如此调理三月而愈。

一妇人中年肥胖，患渴三载，右手食指麻痒月余，后节间生一小泡，随后本指渐肿，疼胀不堪，视之原泡处已生黑斑，半指已变紫黑。此亢阳之极，乃成脱疽。诊之脉洪大、数而有力，此与肥人相反，如再黑色上延，坏人迅速。询问此妇先居富室无嗣，每纵膏粱，架烘炉炭，又兼多服种子热药，中年丧夫，家业尽被嗣人侵费，致久怀忧郁，后与寡母同栖，身耽寂寞，此先富后贫，所愿不得，又为失荣症也。辞不可

治。彼妇母子再三哀恳。予亦无之奈何，乃遵孙真人治法，在肉则割，在指则切，此外无他，彼愿从之。先用人参养荣汤，随有软绢条尺许，缠裹黑色尽处好肉节上，以渐收紧扎之，庶不通行血络，次用利刀放准，依节切下，将手随浸甘草温汤中片时，其血不大多，其疼亦不大甚，患者曰：惟心之惧不知而下以神力之佑也。予曰：所嫌者切而不痛，此为气血筋骨俱死。此物虽脱，其症未可得愈。每以八味丸料加人参、麦冬大剂煎服，先救肾水，次扶脾胃，间用金液戊土丹以解药毒。后三日，所扎指上渐渐放松，以通血脉，搽贴红、黑二膏生肉止痛，次后手背手掌日渐发肿，势恶之甚，惟不黑色，此内毒已出之故，仍用神灯照法，兼以猪蹄汤淋洗。后又肿上皆出数头，流出脓血，不计其许，两月外方得原肿稍退，脓秽稍减，又以参术膏、人参养荣汤兼服，半年外方妥，此妇虽活，五指失矣。

一男仆，冬月严寒，主使赤脚，履地不敢移，随后血冰麻木，次日十指俱紫。又数日，全变黑色，麻木不痛。请视之，强用辛热散寒、活血熏洗等药，终至不应，后必十指齐脱，又延黑脚面，骨节一段甚作疼痛，彼主恐脱疽也。予曰：似是而来非，后必不妨，令患者常用桑木火灸之，取其温暖活血，又能解散郁毒，其患渐腐渐脱，自不走散。内服健脾养血之药调理，外用生肌红、黑二膏培长肌肉，百日外愈矣。

一侍女年十二岁，容貌颇通，新主嫌其脚大，用脚布任意缠紧，以线密缝其脚，胀痛不堪，诉主不听。至半月后流出臭水方解视之，其双足前半段尽皆黑腐，请视之，骨肉已死。予曰：此已坏者不能复活，只救将来未坏者可也。先煮参粥食之，次煎葱汤，令彼家侍妇将患足浸入汤内淋洗，再换汤浸，但腐肉不痛者，逐一剪割，连续知痛者又以花蕊石散搽之。保将患者复其生，已坏者得其脱，内服补中益气汤接其劳，外搽生肌玉红膏长其肉。后虽得愈，但二者俱致疲疾终身，此为穴真而受异也。

一男人，右足小指缝中初生一点黄粟泡，皮肉随变紫色，阴疼不肿，常如刀刺，视其形色，真脱疽也。诊其脉又得细数无力，此肾经伤败症也。但患者生平大饮，内有正副三人，此必精力已竭，纵治无功。予强辞之，后必延至脚面、足底皆穿，痛彻不已，又饮食日少，气血日

衰,形体日削,两月后百苦而终。

脱疽主治方

解毒济生汤

解毒济生汤 草芎 花粉 柴芩 归茯苓

知柏 红花 并远志 犀角 升麻 牛膝同

治脱疽初起,恶寒体倦,发热作渴,或肿或紫,或麻或痛,四肢倦怠,神志恍惚不宁者,并宜服之。

川芎 当归 黄柏 知母 天花粉 金银花 麦门冬 远志
柴胡 黄芩 犀角 茯神各一钱 甘草 红花 升麻(手指加) 牛膝
(足趾加)各五分

水二盅,煎八分,临服入童便一杯,随病上下服。

阴阳二气丹

阴阳二气 麦天冬 片柏 玄参 青黛同

泽泻 辰砂 矾五味 人参 甘草 解烦癰

治脱疽久服丹石补药,致亏肾水,多成口燥咽干,至饮冰雪不知其冷,此孤阳独旺,宜服此解。

天门冬(捣膏) 麦门冬(捣膏) 五味子(砂研) 黄柏 人中白(小儿溺者,生用研) 玄参(汤泡,去粗皮的捣膏)各一两 青黛(色娇嫩者) 甘草 枯矾 辰砂(为衣) 泽泻各三钱 冰片一钱

各为细末,同玄参二冬膏子加炼蜜少许,再捣千余下,软硬得中,丸如桐子大,每服六十丸,童便、乳汁各一盅,空心送下,安睡一时,其功如神。

清神散

清神散内用朱砂 豆粉 梅花 冰片 佳

解毒共于甘草节 诸疮烦呕自无他

治脱疽、疔疮、发背毒积甚者,腠理发越不尽,多致烦躁闷乱,睡则

谵言，呕吐不食者，并宜服之。

甘草节五钱 真豆粉一两 大朱砂三钱 梅花片五分 牛黄三分
上为细末，每服一钱，淡竹叶、灯心汤调服。

雌雄霹雳火

雌雄霹雳火纯阳 蕲艾双黄丁麝香

阴毒阴疽阴发背 逢之一灸自回阳

治脱疽及一切发背，初起不疼痛者，并宜灸之。

艾茸二钱 丁香 雌黄 雄黄各二分 麝香一钱

上下四味，共研极细，搓入艾中，作安豆大丸放于患上灸之，毋论痛痒，以肉焦为度。如毒已经走散，就红晕尽处排炷灸之；痛则至痒，痒则至痛为妙。灸后仍用提疔麦子贴上膏盖，次服蟾酥丸及解毒济生汤兼治，转回活色有脓为妙。

金液戊土丹

金液戊土丹五味 牛黄神志石菖蒲

砂雄硝石乌梅等 片射人中黄不殊

治脱疽及疔疮、发背，纵食膏粱厚味法酒，又或丹石补药，勉力房劳，多致积毒脏腑。久则胃汁中干，肾水枯竭，不能上制心火，以致消渴、消中、消肾。饶饮多干，能食多瘦，九窍不通，惊悸健忘，此症若出后必发疽，多难治疗。宜预服此，亦可转重就轻，移深就浅，又解五金八石之毒药也。

人中黄（法在末卷） 乌梅肉 茯神 胡黄连 五味子各一两 石菖蒲 辰砂 雄黄 远志 硝石各三钱 牛黄 冰片各一钱 金箔二十张（为衣）

各为净末，配准前数，共入乳钵内再研小转，于端午、七夕，或二至、二分吉辰，在净室中先将乌梅、地黄二膏捣极烂，和药渐加炼蜜少许，徐徐添捣，软硬得中，每药一两，分作十丸，金箔为衣。每服一丸，用人乳、童便共一大杯化药，随病上下，食前后服之。此药最解膏粱、金石药毒，杀三尸，除劳热，极有奇功。又治烦颠，主安神志、辟瘴、辟瘟及诸邪魅，谵语妄情，失心丧志者俱效。……此药用蜡封固收藏，不泄药味，愈久愈效。

脱疽应用方

针刺法 蜡矾丸 蟾酥饼 蟾酥丸(见疔疮门)
 神灯照法 太乙膏 真君妙贴散 内疏黄连汤 猪蹄汤 玉红膏
 托里消毒散(见肿疡门)
 十全大补汤 参术地黄膏 人参养荣汤 补中益气汤 加减八味丸(见溃疡门)
 桑木灸法(见脑疽门)
 人参败毒散(见时毒门)
 花蕊石散(见金疮门)

瘰癧论第十八

夫瘰癧者，有风毒、热毒、气毒之异，又有瘰癧、筋癧、痰癧之殊。风毒者，外受风寒搏于经络，其患先寒后热，结核浮肿；热毒者，天时亢热，暑中三阳，或内食膏粱厚味，酿结成患，色红微热，结核坚肿；气毒者，四时杀厉之气感冒而成，其患耳、项、胸、腋骤成肿块，令人寒热头眩，项强作痛。瘰癧者，累累如贯珠，连接三五枚，此不足寒热其患，得于误食虫、蚁、鼠残不洁之物，又或汗液、宿茶陈水混入而餐，其患先小后大，初不觉疼，久方知痛；筋癧者，忧愁思虑，暴怒伤肝，盖肝主筋，故令筋缩结蓄成核，生于项侧，筋间形如棋子，坚硬大小不一，或陷或突，久则虚羸，多生寒热，劳怒则甚；痰癧者，饮食冷热不调，饥饱喜怒不常，多致脾气不能传运，遂成痰结，初起如梅如李，生及遍身，久则微红，后必溃破，易于收敛。凡观此症，别其风毒者散其风，除其湿，如防风解毒汤之类是也。热毒者，清其脾、泻其热，连翘消毒饮之类是也。气毒者，调其血、和其气，藿香正气散之类是也。瘰癧者，散其坚、和其血，散肿溃坚汤之类是也。筋癧者，清其肝、解其郁，柴胡清肝汤之类是也。痰癧者，豁其痰、行其气，芩连二陈汤之类是也。又有寡妇、尼僧、嫖夫、庶妾，志不得发，思不得遂，积想在心，过伤精力，此劳中所得

者，往往有之，最为难治。有此先养心血，次开郁结，益肾安神，疏肝快膈，如归脾汤、益气养荣汤，俱加香附、青皮、山梔、贝母、木香之类是也。又男人不宜太阳青筋，潮热咳嗽，自汗盗汗；女人又忌眼内红丝，经闭骨蒸，五心烦热。男妇有此，后必变为癰瘰难治之症。但此体实者，初起可服散肿溃坚攻利之药，得效者十中三、四。有不察虚实，尽剂追伐，损伤元气，至致成坏病者十有八、九，此非患者之命自出医人之手。予常治初起成核，服前药未效者，用针刺核内深入三、四分，用冰蛭拈成条子插入核内，糊纸封上。待至二七后，核子自然落出，随用红、黑二膏搽贴。内服补剂，不久便愈。又常见斑蝥、牵牛、巴霜、大黄追蚀等用，往往致其危亡者多矣。切宜戒之。

癰瘰看法

初起核高肿痛，色红软活，微作寒热，肩项不强易。已成根不坚硬，内无小核相丛，脾健气血不衰者易。

已溃脓稠，肉色红活，核肿渐消，肩项自便、渐敛者顺。溃后易消易敛，气体平和，胸膈宽利，饮食知味者顺。

未成形体消瘦，寒热往来，结核顽硬，痰嗽相兼者险。已成核坚，连续如珠，大小不等，项强筋急，脉虚者险。

已溃脓水清稀，肌肉消铄，自汗盗汗，寒热不睡者逆。溃后阴虚烦躁，作渴泄秘，男子骨蒸，女人经闭俱逆。

癰瘰治法

初起肿痛，憎寒壮热，四肢拘急，项强头眩者，表散之。肿硬发热，便秘口干，胸膈不利，恶心脉实者，宜利之。膏粱厚味，醇酒积热，湿痰凝结而成，化痰、降火、清中。忧思过度，郁怒伤肝，筋缩结核者，宜养血、开郁、疏肝。房欲劳伤，阴虚晡热，自汗咳嗽，形消瘦者，滋肾健脾。失利忘名，怀抱郁结，积想在心，所如不得，乖隔阴阳，虚熬岁月。所得此者，精血俱伤，先养正气，次治标病。坚而不溃，腐而溃之，溃而不

敛，补而敛之，皆活法也。

瘰癧治验

一男人项核肿痛，拘急恶寒，用荆防败毒散二剂，表症悉退，余核不消。用散肿溃坚汤加川芎、香附、贝母十余服，其核渐消。外以琥珀膏贴之，月余而安。

一男人仲冬渡江，暴发雾气，又值惊恐，次日寒热交作，头、面、耳、项俱肿，先以藿香正气散二服，寒热亦止，面肿渐消。惟项间坚肿不退，红焮作痛，此毒聚必欲作脓，仍用正气散加芎、归、皂刺数服，候脓熟针之，肿痛顿退，又以十全大补汤，脾健肌生完口。

一女人孀居六载，子幼未立，忧郁成核半年；又兼经水不调，寒热交作，形体消瘦，脉亦弦数，此劳伤气血，肝火妄动而成斯疾也。所谓损者益之，不可用追蚀之药损而复损。先用逍遥散加香附、牡丹皮、贝母和其血脉，和其肝气，使寒热尽退。次用益气养荣汤，服至月余，气血渐复，经事渐调，元气渐醒。外用火针核上，点破四孔，用黄线药插入五、六次，候至孔大，换用冰蛭散搽于核上封之，至十三日外，其核自落，外搽红膏生肌收敛，内换人参养荣汤加香附、木香三十余服，其口自完。此妇慎起居、回七情、戒口味、尽调理，故可得愈，否则必不能矣。

一室女年二七，因父择婿不遂，耽至二旬，怀抱日久，项生数核，坚硬如石，此肝经凝结筋缩之病也。又兼经水断绝，寒热如疟，咳嗽脉数，惟不颧红，此阴虚火动，已成癆瘵症也。非药能愈，视其形状，喜无败色。予曰：欲治此病，先治其心犹可。父问曰：何药治心？予曰：非药也。《易》云：天地氤氲，万物化醇，男女媾精，万物化生，此天地男女生成化育之道也。斯病独起于孤阴，寡阳不生不化，所谓逆理之病，此女大失配，谓当至而不至，渐成失度之疾，其病不生而自生，非已作也，由时变也。故药不能挽回，必得阴阳和而雨泽降，夫妇和而家道成，斯时之后，用药可方。彼父始悟，随即择嫁，三月后，复请视之，前症稍定，先用逍遥散加香附、青皮、山栀、丹皮、贝母十余剂开郁疏肝，寒热

渐止。次以人参养荣汤加丹皮、红花通其血脉，使心血易生，容颜稍泽。又用益气养荣汤倍参、术培助脾胃，增进饮食。间用归脾汤加麦冬、五味、远志、沙参收敛神气，宽慰性情。又制参术地黄膏，服至半年，精神顿复，经事亦通，惟核不能全退，用火针点破一核，琥珀膏贴之，渐腐为脓，又两月而得收敛。余肿三核，渐针渐溃渐敛，首尾纯用补脾开郁药，调整一年，始得全愈。

一男子年近三十，项生数核，面白神劳，皮粗脉数，此元气受伤之症也。先当补养气血，待根本壮实后治其疮，随用养荣健脾药十余剂未效，彼以为缓，又信方士所惑，图内消之，自服斑蝥、巴、麝之药，连泻十数行后，致小便淋漓不已，虚热更增，饮食减少。又复请视，形色内败，不堪调理，辞而不治。彼后悔，虽请内医，强投扶助降火之药，终不应而死。

一妇壮年性急，夫荡不为家，左项生核半载，渐至鸡卵大，坚硬如石，皮外红丝缠绕，左右脉俱弦数。弦属肝火妄动，数乃脾热之甚。先用梔子清肝汤平伐肝木，五服后而脉始平。又以清肝解郁汤数服散其郁结，次用益气养荣汤调其气血，间服散肿溃坚汤软其坚肿。外以琥珀膏贴之，调理百日而元气乃复。坚硬已消八、九，止存小核未尽，彼以为愈，止不服药。后又一载，值夫赌讼未胜，暴急惊恐，前肿复作，两手脉诊细而多数。此阴血亏损，阳火乘之，非前有余症也。又兼胸膈不利，饮食无味，经水先期过多，形容憔悴不泽，此神伤于思虑则肉脱，意伤于忧愁则肢废，魂伤于悲哀则筋挛，魄伤于喜乐则皮槁，志伤于暴怒则腰脊不能俯仰，以上俱七情内损症也。法当滋养气血，调和脾胃，益肾清心，开郁散滞，庶保无虞。彼不肯信，仍前欲服散肿溃坚之药，欲灸肿上，图内消之。予曰：此非前比，今则不敢治也。请客医自制前药，亦灸患上，并灸肘尖，此为真气虚而益虚，邪气实而益实。后果反加发热自汗，咳嗽项强，四肢不收，灸疮无脓，血水不绝，肿亦炽盛，此脏腑已损之候，必不久居也。又月余传为气急声哑，痰血交出而歿。予尝见庸医不辨虚实，患者有信，正理偏废，服药往往多致不救者十有八、九。凡医者、患者俱当省而慎戒之。

瘰癧主治方

防风解毒汤

防风解毒汤荆桔 牛子连翘草石膏

薄荷枳壳芎苍术 知母灯心共岂逃

治风毒瘰癧，寒暑不调，劳伤凑袭，多致手、足少阳分耳、项结肿，或外寒内热，痰凝气滞者并效。

防风 荆芥 桔梗 牛蒡子 连翘 甘草 石膏 薄荷 枳壳
川芎 苍术 知母各一钱

水二盅，灯心二十根，煎八分，食后服。

连翘消毒饮

连翘消毒饮陈皮 甘桔玄参芩芍归

梔葛射干花粉等 红花还与大黄随

治热毒瘰癧，过食炙煿、醇酒、膏粱，以致蕴热，腮、项成核。或天行亢热，湿痰作肿，不能转侧者效。

连翘 陈皮 桔梗 玄参 黄芩 赤芍 当归 山梔 葛根
射干 天花粉 红花各一钱 甘草五分 大黄（初起便燥者加之）

水二盅，煎八分，食后服。有痰者，加竹茹一钱。

加味藿香散

加味藿香散甘桔 青陈柴苏半夏撮

术苓白芷厚朴芎 夏枯草效君当说

治气毒瘰癧，外受风邪，内伤气郁，以致颈项作肿，肩膊强痛，四肢不舒，寒热如疟及胸膈不利。

藿香 甘草 桔梗 青皮 陈皮 柴胡 紫苏 半夏 白术
茯苓 白芷 厚朴 川芎 香附 夏枯草各等分

姜三片，枣二枚，水二盅，煎八分，食远服。

滋阴散坚汤

滋阴散坚四物汤 甘桔参苓海粉当

陈术升麻香附贝 红花昆布共煎尝

治一切瘰癧，忧抑所伤，气血不足，形体瘦弱，潮热咳嗽，坚硬肿痛。毋分新久，但未穿溃者并效。

川芎 当归 白芍 熟地 陈皮 茯苓 桔梗 白术 香附各一钱 甘草 海粉 贝母 人参 昆布各五分 升麻 红花各三分

水二盅，姜三片，枣二枚，煎八分，食远服。身热加柴胡、黄芩；自汗、盗汗，去升麻倍人参、黄芪；饭食无味加藿香、砂仁；食而不化加山楂、麦芽；胸膈痞闷加泽泻、木香；咳嗽痰气不清加杏仁、麦冬；口干作渴加知母、五味子；睡卧不宁加黄柏、远志、枣仁；惊悸健忘加茯神、石菖蒲；有汗恶寒加薄荷、半夏；无汗恶寒加茅术、藿香；女人经事不调加玄胡索、牡丹皮；腹胀不宽加厚朴、大腹皮。

益气养荣汤

益气养荣汤术芪 参苓陈贝附归宜

芎芍桔甘兼熟地 劳伤瘰癧大堪题

治抑郁或劳伤气血，或四肢、颈项筋缩，结累累如贯珠者，谓之筋病。此患皆由思虑太过，神气受伤，乃劳中所得者也。其患或软或硬，或赤不赤，或痛不痛，或日晡发热，或溃而不敛者是。

人参 茯苓 陈皮 贝母 香附 当归 川芎 黄芪 熟地 白芍各一钱 甘草 桔梗各五分 白术二钱

姜三片，枣二枚，水二盅，煎八分，食远服。

如胸膈痞闷加枳壳、木香；饮食不甘暂加厚朴、苍术；往来寒热加柴胡、地骨皮；脓溃作渴倍参、芪、归、术；脓多或清倍当归、川芎；胁下痛或痞加青皮、木香；肌肉生迟加白蔹、肉桂；痰多加半夏、橘红；口干加麦门冬、五味子；发热加柴胡、黄芩；渴不止加知母、赤小豆；脓不止倍加人参、黄芪、当归；溃后反痛加熟附子、沉香；虚烦不睡者倍人参、熟地黄、远志、枣仁。

苓连二陈汤

苓连二陈汤半夏 甘桔连翘花粉苓

木香牛子夏枯草 消痰散核效如神

治瘰癧生于少阳部分、项侧结核，外皮漫肿，色红微热。或至缺盆高骨上下发肿，形长坚硬作痛，名曰马刀。初起并宜服此，已成气弱者不宜。

黄芩 黄连 陈皮 茯苓 半夏 甘草 桔梗 连翘 牛蒡子
花粉各一钱 木香三分 夏枯草二钱

姜三片，水二盅，煎八分，食后服。渣再煎，临睡服。

散肿溃坚汤

散肿溃坚芩芍归 升柴胆草葛根随

知翘连柏三棱术 昆布甘花粉莫遗

治瘰癧马刀疮，坚硬如石，或在耳下，或在缺盆，或在肩上，或在肋下，皆手、足少阳经症。又发于下颔，或在颊车，坚而不溃；或已破流脓，又属足阳明症也。此治有余症而效多，不足症而效少。

黄芩八分 白芍 当归 龙胆草 桔梗 知母(酒炒) 黄柏(酒炒)

昆布 天花粉各五分 连翘 葛根 炙甘草 黄连 三棱(酒拌炒)

广木各三分 柴胡四分 升麻三分

水二盅，煎八分，食后服。临服入酒一小杯亦效。此药可为末，炼蜜为丸桐子大，每服八十丸，即散肿溃坚丸，治症同前。临睡、食后俱白滚汤下。

升麻散坚汤

升麻散坚汤甘草 莪术三棱陈桔连

葛根龙胆夏枯等 芍药归翘芩共煎

治瘰癧绕颈或至颊车，属足阳明，核深远陷，陷曲肉底，又属足少阴，俱作肿块，坚硬大小不一。

升麻 甘草 莪术 三棱 陈皮 桔梗 黄连 龙胆草 葛根

川芎 白芍 夏枯草 连翘 黄芩 当归各五分 天花粉(有痰加)

水二盅，煎八分，食后热服。再用上药加倍为末，蜜丸绿豆大，每百丸，黄酒临睡服，头不枕更妙。

夏枯草汤

夏枯草汤归术陈 桔甘生地贝母芩

香附柴胡芷芍能 加上红花效若神

治癰瘍馬刀，不問已潰未潰，或已潰日久成漏，形体消瘦，飲食不甘，寒熱如疰，漸成癰瘍并效。

夏枯草二錢 當歸三錢 白朮 茯苓 桔梗 陳皮 生地 柴胡
甘草 貝母 香附 白芍各一錢 白芷 紅花各三分

先用夏枯草、水三碗，煎至二碗，濾清；同藥煎至八分，食後服。將藥渣同前夏枯草渣共再煎六、七分，臨臥入酒半小盅和服，宜食淡味物件。

活血化堅湯

活血化堅湯朴芷 芎歸貝芍桔針蚕

花粉銀花陳皮草 乳香靈脂共成緣

治一切癰瘍及癭瘤、痰核，初起未潰膿者并效。

赤芍 歸尾 天花粉 金銀花 貝母 川芎 皂角刺 桔梗各一錢 僵蚕 厚朴 五靈脂 陳皮 甘草 乳香 白芷梢各五分

水二盅，煎八分，臨服用酒一小杯，食後服。

逍遙散

逍遙散當歸芍藥 白茯苓香附柴胡

牡丹皮薄荷甘草 云片術女病甚扶

治婦人血虛，五心煩熱，肢體疼痛，頭目昏重，心忡頰赤，口燥咽干，發熱盜汗，食少嗜臥；及血熱相搏，月水不調，臍腹作痛，寒熱如疰；及治室女血弱，榮衛不調，痰嗽潮熱，肌體羸瘦，漸成骨蒸。

當歸 白芍 茯苓 白朮 柴胡各一錢 香附八分 丹皮七分 甘草六分 薄荷 黃芩（有熱加）各五分

水二盅，煎八分，食遠服。有寒加姜三片，棗二枚。

逍遙散的臨床新用

1. 肝咳

本方加減治療肝咳 32 例獲效。若火旺加丹皮 15 克，焦山梔 12

克;咳逆上气加旋覆花 10 克,枳壳 6 克;痰液黏稠难咯加浙贝、瓜蒌各 10 克;咽喉中有异物感、胸膈满闷加苏子、厚朴、姜半夏各 10 克;胸痛加郁金 10 克,香附 6 克;胃纳减少加木香、砂仁各 3 克;咽痒加牛蒡子 6 克,前胡 10 克;咽痛加玄参 12 克,射干 6 克;咽燥口干、咳嗽日久不减加沙参 15 克,麦冬、天花粉各 15 克,诃子 6 克;咳血甚者加仙鹤草 30 克,藕节 10 克。1 周为 1 个疗程,总有效率 90.62%。

汪玉冠. 浙江中西医结合杂志,2006,16(3):175

2. 肠易激综合征

本方为基础方治疗肠易激综合征 78 例。脾肾阳虚者逍遥散合四神丸加减;脾虚湿盛者以逍遥散合六君子汤加减。每日 1 剂,15 天为 1 个疗程。总有效率 97.44%。

吴军. 陕西中医,2006,27(1):61

3. 经前期综合征

本方治疗经前期综合征 300 例。治疗于月经前 14 天开始口服逍遥散。每日 1 剂,连用 10 天为 1 个周期,月经期停服,3 个周期为 1 个疗程。有效率 98.5%。

岳秀娟. 实用医技杂志,2005,12(09B):2572

4. 纤维肌痛综合征

本方加减治疗纤维肌痛综合征 22 例。药用:柴胡 10 克,白芍 20 克,当归 10 克,茯苓 15 克,白术 10 克,黄芪 20 克,香附 10 克,穿山甲 10 克,合欢花 15 克,夜交藤 15 克,威灵仙 15 克,甘草 10 克。颈项僵痛加葛根 15 克;夜间疼痛加重、固定不移加灵脂 10 克,没药 10 克,丹参 15 克;舌质红、烦躁明显加丹皮 10 克,黄芩 10 克,栀子 10 克。40 天为 1 个疗程。另外在疼痛部位外敷雪山金罗汉止痛涂膜剂。总有效率 95.4%。

丁和义. 中国实用乡村医生杂志,2005,12(12):40

5. 水肿

本方加减治疗特发性水肿 35 例。药用:当归 12 克,白芍 12 克,柴胡 10 克,茯苓 15 克,生白术 20 克,薄荷(后下)10 克,山药 20 克,香附

12 克,益母草 30 克,车前子(包)12 克。每日 1 剂,7 剂为 1 个疗程。若头晕、耳鸣、盗汗、四肢乏力加山茱萸、枸杞子、五味子;心烦易怒、口苦、目赤加龙胆草、栀子;失眠多梦加合欢花、炒枣仁;纳呆、便溏、腹胀加砂仁、炒扁豆,生白术改炒白术;气短加黄芪、太子参;胸闷善叹息加郁金、枳壳。总有效率 88.6%。

李伟. 中国中医药信息杂志,2005,12(11):70

6. 女性灼口综合征

本方加减治疗女性灼口综合征 45 例。伴胁肋刺痛、舌质紫黯、脉弦涩加枳壳 10 克,红花 15 克;伴有口苦口干、急躁易怒、头痛、舌红、苔薄黄、脉弦数加牡丹皮 15 克,栀子 10 克;伴有口燥咽干、头晕目眩、失眠多梦、潮热多汗、舌红、少苔、脉弦细加熟地黄 25 克,枸杞子 15 克,龟甲 20 克,夜交藤 20 克。每日 1 剂,2 周为 1 个疗程。总有效率 93.33%。

尹沂平. 中国中医药信息杂志,2005,12(10):66

7. 痛经

本方加桃仁、红花治疗青年血瘀性痛经。设对照组用桃红四物汤,治疗组 66 例痛经患者中,显效 54 例,有效 9 例,无效 3 例。对照组 66 例中,显效 28 例,有效 29 例,无效 9 例。

罗永宽. 实用医药杂志,2005;22(10):893

8. 心脏神经官能症

本方合血府逐瘀汤治疗心脏神经官能症 30 例。方药:柴胡、白术、茯苓、当归、薄荷、生地黄、桃仁、红花、枳壳、赤芍、桔梗、川芎、牛膝、甘草等随症加减,每日 1 剂。有效率 93%。

陈兴旺. 河南中医学院学报,2005,20(5):52

9. 胆囊术后综合征

本方为主治疗胆囊术后综合征 30 例。胁痛吐酸,苔黄脉弦数加金铃子 5 克,延胡索 15 克,黄连 5 克,吴茱萸 5 克,丹皮 10 克,栀子 10 克;便秘或不畅加麦芽 30 克,杏仁 15 克;胁痛苔少,脉细弦加枸杞子 15 克,沙参 15 克,麦冬 15 克,白蒺藜 15 克;胸闷抑郁,喜叹息加丹参

15 克,合欢花 10 克;睡眠差者加枣仁 15 克,远志 10 克;纳差便稀加木香 10 克,扁豆 15 克;腹痛即泻,泻后痛失加陈皮 10 克,防风 10 克;恶心欲吐加旋覆花 10 克(包煎),代赭石 15 克,半夏 10 克。结果:痊愈 16 例,好转 14 例。

王雨旺. 中华实用中西医杂志,2005,18(8):1190

10. 高催乳素血症所致不孕症

本方加减治疗高催乳素血症所致不孕症 100 例。药用:白芍 15 克,柴胡 10 克,当归 15 克,茯苓 10 克,白术 10 克,香附 10 克,麦芽 50 克,山楂 15 克,丹皮 10 克,甘草 10 克。1 日 1 剂,1 个月为 1 个疗程。伴阴虚者可加女贞子、旱莲草、知母、熟地;伴气血不足者可用党参、黄芪、阿胶、熟地;伴痰湿者可加用苍术、南星、川贝、瓜蒌。总有效率为 100%。

高振东. 中华实用中西医杂志,2005,18(10):1541

11. 慢性迁延性乙型肝炎

本方加味治疗慢性迁延性乙型肝炎 27 例。药用:白芍 15 克,当归 10 克,柴胡 10 克,茯苓 10 克,白术 10 克,甘草 4 克,蒲公英 20 克,夏枯草 15 克。若 ALT 或 AST 升高者加五味子、虎杖、郁金;球蛋白升高者加黄芪、枸杞;纳差者加山楂、麦芽;胆红素升高或便秘者加大黄。每天 1 剂。设对照组口服葵花牌护肝片。两组均 60 天为 1 个疗程。治疗组总有效率 85%;对照组总有效率 60%。

谭林祥. 江西中医药,2005,36(10):26

12. 性病恐怖症

本方加减治疗性病恐怖症 60 例。药用:当归 10 克,白芍 20 克,柴胡 15 克,白术 15 克,茯苓 15 克,薄荷 5 克。伴有心悸、失眠、健忘、面色萎黄者加黄芪 20 克,茯苓 10 克,炒酸枣仁 15 克,远志 10 克;腰膝酸软、盗汗、遗精、手足心热者加熟地黄 12 克,山茱萸 10 克,山药 20 克,女贞子 10 克,旱莲草 10 克;形寒畏冷、纳差便溏、性欲减退、勃起功能障碍、早泄者加淫羊藿 10 克,枸杞子 10 克,肉桂 3 克。1 日 1 剂,配合心理疗法。1 月为 1 个疗程。有效率为 85%。

孟军. 山东中医杂志, 2005, 24(9): 541

13. 经前乳房胀痛

本方为基础方治疗肝郁气滞型经前乳房胀痛 36 例。若月经紊乱, 先后不一者酌加赤芍药、丹参; 月经量少加牛膝、益母草、泽兰; 月经量多加地榆炭、血余炭; 纳差脘痞加炒谷芽、炒麦芽; 胸闷不舒加佛手。1 日 1 剂, 7 剂为 1 个疗程。结果痊愈 27 例, 好转 9 例。

冯长柏. 河北中医, 2005, 27(10): 785

14. 头痛

本方为主治疗紧张性头痛 30 例。若肝郁气滞明显者加合欢皮、素馨花、佛手各 10 克; 睡眠差者加酸枣仁、百合、浮小麦各 20 克; 血虚明显者加何首乌、桑椹子、大枣、五味子各 20 克。每日 1 剂, 同时按摩颈肩部肌群和痛点。总有效率 73.3%。

黄年斌. 按摩与导引, 2005, 21(9): 7

15. 消化不良

本方加味治疗功能性消化不良 46 例。若胃脘灼痛、嘈杂明显, 去生姜, 加黄连 6 克, 吴茱萸 3 克; 泛酸明显, 加煅瓦楞 15 克(先煎), 乌贼骨 10 克; 胃脘胀满甚者, 加青皮、槟榔各 10 克; 便干苔厚者, 加生大黄 6 克(后下), 厚朴 10 克; 肝火旺盛者, 加栀子、丹皮各 10 克; 神疲乏力者, 加党参 15 克, 炙黄芪 20 克。每日 1 剂。对照组口服西沙必利, 两组均 4 周为 1 个疗程, 治疗组总有效率 82.61%; 对照组总有效率 71.74%。

王捷虹. 实用中医内科杂志, 2005, 19(6): 551

16. 经期延长

本方加减治疗更年期经期延长 49 例。若月经量多、夹有血块、手足心热、咽干干燥者加熟地 20 克, 阿胶 15 克, 黄芩 15 克, 茜草 15 克, 白茅根 20 克; 腹部疼痛者加女贞子 20 克, 旱莲草 20 克。月经期间每日 1 剂, 7 天为 1 个疗程。经血停止 3 天后, 予以经后辨证调治, 治疗期间禁食辛辣油腻。总有效率达 96%。

王淑媛. 吉林中医药, 2005, 25(12): 32

17. 痤疮

刘丰兰等用丹栀逍遥散加减治疗经前期痤疮 52 例。若胸胁胀痛甚者,加郁金 15 克,枳壳 10 克;乳房胀痛甚者,加青皮 6 克;少腹胀痛甚者,加川楝子、延胡索各 10 克;经血量多夹血块者,加炒地榆、益母草各 15 克;发热、有脓头者,加蒲公英、白花蛇舌草各 30 克;大便干结者,加大黄 10 克,生地 15 克;瘙痒甚者,加白鲜皮 15 克,地肤子 10 克。总有效率为 94.2%。

刘丰兰,等. 实用中西医结合临床,2005,5(5):55

18. 心绞痛

本方加减治疗女性微血管性心绞痛 33 例。在基础治疗的同时服用本方加减,每日 1 剂。兼心烦易怒、口干面赤者,加牡丹皮、山栀子;兼气短、乏力、神疲、食少者,加党参、黄芪;兼心悸怔忡、虚烦失眠者,加远志、酸枣仁、柏子仁;兼头晕耳鸣、五心烦热者,加生地、麦门冬、枸杞子、知母、黄柏。治疗 7、14、21、28 天时的总有效率分别为 39.3%、73.3%、81.8%、96.9%。

高爱爱. 中国民间疗法,2005,13(5):33

19. 闭经

本方加味治疗闭经 1 例。药用:柴胡 15 克,当归 15 克,赤芍 15 克,白术 18 克,茯苓 18 克,泽兰 12 克,香附 15 克,郁金 15 克,益母草 20 克,炙甘草 15 克。3 剂后月经来潮,症状改善,第二经期又迟半月未至,烦躁等症又发,但较前为轻,继服上方 3 剂,月经来潮,诸症悉平,此后渐趋正常,未再服药。

骆国俊. 山东中医杂志,2005,24(5):296

20. 慢性前列腺炎伴随情绪障碍

本方加减治疗慢性前列腺炎伴随情绪障碍 70 例。药用:柴胡 15 克,白芍药 20 克,川芎 12 克,当归 15 克,生地黄 30 克,白术 10 克,茯苓 12 克,香附 10 克,牡丹皮 15 克,薏苡仁 30 克,知母 12 克,珍珠母 15 克,龙骨 30 克,牡蛎 30 克,甘草 10 克,丹参 15 克。每日 1 剂,连服 10 日。若前列腺感染症状明显,另用抗生素治疗。总有效率 80.0%。

邢军,等. 河北中医,2005,27(3):223

21. 神经衰弱

本方加减治疗神经衰弱 90 例。药用:当归 12 克,白芍药 15 克,白术 15 克,茯苓 15 克,柴胡 15 克,薄荷 12 克,炙甘草 6 克,佛手 10 克,木香 10 克,煨姜 3 片。每日 1 剂。郁久化火,肝火上炎型宜予逍遥散合龙胆泻肝汤加减治疗;忧郁伤神,心脾两虚型宜予逍遥散合甘麦大枣汤加减治疗;若咽中不适,咳之不出,咽之不下者,加半夏 12 克,厚朴 10 克,苏叶 10 克;若心烦、失眠严重者,加服朱砂安神丸;若男子遗精者加金樱子 15 克,牡蛎 20 克,芡实 15 克;若汗出恶风,容易感冒者加黄芪 20 克,防风 6 克,浮小麦 30 克。总有效率 94.4%。

刘建孝. 河北中医,2005,27(1):31

22. 黄褐斑

本方加味治疗黄褐斑获效。药用:白芍、茯苓、白术、红花、香附、牛膝、川楝子、当归各 10 克,柴胡 12 克,丹参 20 克,薄荷 5 克,党参 20 克,甘草 6 克。每日 1 剂,15 天为 1 个疗程。

庞达通. 医学文选,2004,23(3):340

23. 妊娠期肝内胆汁淤积

周莉等用丹栀逍遥散加味治疗妊娠期肝内胆汁淤积 7 例。处方:丹皮 12 克,栀子 9 克,柴胡 15 克,当归 12 克,白芍 15 克,茯苓 15 克,白术 12 克,黄芩 9 克,生地 12 克,茵陈 12 克,僵蚕 9 克,蝉蜕 9 克,甘草 6 克。每日 1 剂。本组 7 例,经服中药 6~10 剂,均获痊愈。

周莉,等. 中国民间疗法,2004,(8):48

24. 女童性早熟

本方加味治疗女童性早熟 34 例。药用当归、茯苓、首乌、白术、柴胡、甘草等。每个疗程服药 3 周,停 1 周,3 个疗程后观察疗效。视情况确定是否继续服药。平均 4 个疗程后全部治愈。

刘百祥. 湖南中医杂志,2004,20(4):67

25. 产后风湿证

本方为基本方治疗产后风湿证 32 例观察。若关节疼痛者加羌

活、木瓜、桑枝、丝瓜络；腰背不适者加杜仲、寄生、首乌藤、细辛；颈项僵硬者加葛根、羌活、元胡；足跟痛加怀牛膝、独活、首乌藤；畏寒怕冷加黄芪、党参、防风、桂枝；头痛加白芷、细辛、藁本、蜈蚣；乳房胀痛、月经不调加益母草、红花、当归、元胡；失眠加百合、炒枣仁、郁金；便秘加生地、火麻仁；舌质红有热象加丹皮、栀子、黄芩；湿浊内蕴加藿香、佩兰、苡仁。1日1剂。10天为1个疗程。总有效率96.9%。

袁利. 四川中医, 2003, 21(10): 62

26. 偏头痛

本方加减治疗偏头痛30例。若肝胆火盛加丹皮、黄芩各15克；失眠多梦加酸枣仁15克；月经不调加香附15克；痰多加半夏、胆星各15克；如久痛入络可加白芥子、地龙各15克。1日1剂。总有效率90%。

祝云. 中华实用中西医杂志, 2001, 14(12): 2626

通治療癆方

通治療癆瘡陳術 柴桔芎歸苓芍翹

苓芷藿香夏枯草 甘草半夏附相饒

治癆病不分新久, 表里、虛實及諸痰結核并效。

陳皮 白朮 柴胡 桔梗 川芎 當歸 白芍 連翹 茯苓
香附(醋炒) 夏枯草 黃芩各一錢 藿香 半夏 白芷 甘草各五分

姜三片, 水二盅, 煎八分, 入酒一小杯, 臨睡時服。

芎歸養榮湯

芎歸養榮湯朮 參芍砂仁熟地黃

五味茯神丹遠志 麥冬甘草共煎嘗

治癆病、流注及一切不足之症。不作膿, 或不潰, 或已潰不斂, 或身體發熱惡寒。肌肉消瘦, 飲食少思, 睡臥不寧, 盜汗自汗, 驚悸恍惚, 并皆治之。

當歸身二錢 人參 黃芪 白朮 川芎 白芍 熟地各一錢 五
味子 麥門冬 遠志 甘草 茯苓各五分 牡丹皮 砂仁各三分

水二盅, 姜三片, 棗二枚, 煎八分, 食遠服。

冰蠅散

冰蠅散內用田螺 砒塊將來紙面糊

龙脑硃砂为细末 总将津拌患头涂

治療痂日久，坚核不消，及服消药不效者。用此点落痂核，如马刀根大面小及失荣等症忌用。

大田螺五枚（去壳，日中线穿晒干） 白砒一钱二分（面裹煨熟） 冰片一分 硃砂二分

用晒干螺肉切片，同煨熟。白砒碾为细末，加硃片再碾，小罐密收。凡用时先用艾炷灸核上七壮，次后灸疮起泡，以小针挑破，将前药一、二厘津唾调成饼，贴灸顶上。用绵纸以厚糊封贴核上，勿动泄气。七日后四边裂缝，再七日其核自落，换搽玉红膏，内服补药兼助完口。此药又治癰瘤患大蒂小及诸般高突、异形难状者并效。

紫霞膏

紫霞膏品不多般 铜绿松香一处攢

煎入麻油如紫漆 百般顽症贴当安

治療痂初起，未成者贴之自消，已成未溃者贴之自溃，已溃核存者贴之自脱。及治诸色顽疮、癰疮、湿痰、湿气、新久棒疮，疼痛不已者并用之。

明净松香（净末）一斤 铜绿（净末）二两

用麻油四两，铜锅内先熬数滚，滴水不散，方下松香熬化；次下铜绿，熬至白烟将尽，其膏已成，候片时倾入磁罐。凡用时汤内顿化，旋摊旋贴。

琥珀膏

琥珀膏内桂防归 松脂朱砂木鳖随

丁木二香革麻子 木通白芷共相宜

治療痂及腋下初如梅子，结肿硬强，渐若连珠，不消不溃。或溃脓水不绝，经久不瘥，渐成漏症。

琥珀一两 木通 桂心 当归 白芷 防风 松脂 朱砂 木鳖（肉） 蓖麻（肉）各五钱 丁香 木香各三钱 麻油二斤二两 黄丹（飞炒）十四两

先用琥珀、丁香、桂心、朱砂、木香为细末，其余为咀，浸油内七日，入锅内慢火熬至群药焦黄为度；绢滤净油，徐下黄丹；以柳枝手搅，候

至膏成，滴入水中，软硬得中，掇下锅来，以盆顿稳；搅至烟尽，方下群药搅匀，磁器盛之，临取少许摊贴。

大红膏

大红膏 血竭 银朱 硝石 章冰 味不殊

轻粉 南星 并石 矿 乳香 猫骨 效堪涂

治瘰癧、痰核，结块不分新久，但未穿破者并效。

南星二两 银朱 血竭 硝石 朝脑各三钱 轻粉 乳香各二钱

猫头骨一具（煨） 石灰一两（用大黄三钱，切片同炒，石灰红色去大黄）

上共为细末，陈米醋熬稠，调药敷核，三日一换。敷后皮嫩微损者，另换紫霞膏贴之，其核自消。

火针法

火针之法独称雄 破核消痰立大功

灯草桐油相协力 当头一点破凡笼

治瘰癧、痰核，生于项间，初起坚硬，或如梅李，结聚不散，宜用此法针之，插药易消，用缝衣大针二条，将竹箸头劈开，以针双夹缝内，相离一分许，用线扎定。先将桐油一盏，用灯草六、七根油内排匀点着，将针烧红，用手指将核捏起，用针当顶刺入四、五分，核大者再针数孔亦妙。核内或痰、或血，随即流出，候尽以膏盖之。次日针孔必渐作脓，轻者用黄线药插之。核坚硬者，用冰蛭散糊打成条、晒干，插核针孔内，外以糊纸二重封固。次日，其核发肿作痛不妨，乃药气攻入于内，又至七日外，自然核外裂开大缝。再至七日，其核自落，葱汤洗净。孔大换用玉红膏搽入，外以膏盖，内服益气养荣汤或十全大补汤加香附。兼戒劳动、气恼、房事、发物、煎炒、海腥等件。

三品一条枪

三品一条枪最灵 雄矾砒信少人闻

加上乳香为线药 疔疽痈漏尽承平

上品錠子去十八种痔，中品錠子去五漏、翻花、癰瘤、气核，下品錠子治瘰癧、疔疮、发背、脑疽等症。此为古之三品錠子，但药同而分两不同，治病故有分别。今注一条枪，本方三品以下之症，并皆用之，俱

各相应。况又药品简易而不繁,是曰三品一条枪之说也。凡同志者随试而用之。

明矾二两 白砒一两五钱 雄黄二钱四分 乳香一钱二分

砒、矾二味,共为细末,入小罐内,加炭火段红,青烟已尽,旋起白烟,片时约上下红彻住火。取罐顿地上一宿,取出约有砒、矾净末一两,加前雄黄二钱四分,乳香一钱二分,共研极细,厚糊调稠,搓成如线条阴干。凡遇无孔者,先用针放孔窍,早晚插药二次,插至三日后,孔大者每插十余条。插至七日,患孔药条满足方住。以后所患四边自然裂开大缝,共至十四日前后,其疔核、瘰癧、痔漏诸管自然落下,随用汤洗,搽上玉红膏,虚者兼服健脾之药。

瘰癧酒药方

治年久瘰癧结核,串生满项,顽硬不穿破者服。

鹤风草半斤 忍冬藤六两 野蓬蒿四两 野菊花四两 五爪龙三两
马鞭草一两五钱

上药切碎,用老酒十五斤,袋贮药悬于酒内,封口,煮三香为度。取起水顿,浸一伏时,初服尽醉出汗为效。以后随便应之,其酒一料,病愈不发。

瘰癧应用方

玉红膏 太乙膏(见肿疡门)

柴胡清肝汤 栀子清肝汤(见鬚疽门)

荆防败毒散(见时毒门)

十全大补汤(见溃瘍门)

归脾汤(见痔疮门)

鬚疽论第十九

夫鬚疽者,乃手少阳三焦相火妄动,又兼肾水不能生水,或外受热

所感。但此经多气少血，肌肉相薄，凡有患最难腐溃。此皆起于性情急暴，房欲、血虚火动，肝气凝结而成。疽之初起，寒热交作，头眩痛彻太阳，甚则耳目连鬓通肿。治法不可妄用针灸，必分阴阳、表里、邪正、虚实治之，庶不有误。且如初见疮时，多寒少热，口干作渴，好饮热汤，六脉虚数无力。又兼患上坚硬，多不焮痛，无溃无脓，疮根流散，此等之症，乃真气虚而邪气实也。治以托里为主，消毒佐之，如清肝养血汤、托里消毒散之类是也。又如见症时热多寒少，头眩作痛，口燥舌干，渴欲饮冷，二便秘涩，六脉沉实有力，疮亦焮肿疼痛，身体发热，易腐易脓。根脚不开，肿焮在外，此乃正气实而邪气虚也。治以消毒为主，托里佐之，如梔子清肝汤、鼠粘子汤之类是也。大抵正气胜则实，邪气胜则虚，必然一胜则一负，邪正不并立，欲其虚而不待损而自虚矣。又有未见疮时，先作渴症，或一年半载，日久日重，然后发为鬚疽。其形色多紫黑，疮多平陷，坚硬无脓，毒流耳项。又兼气味不正，形容不泽，精神不明，饮食不进者，俱为不治。

鬚疽看法

初起无口干，无寒热，饮食有味，举止寻常，发疮者顺。已成疮头肿起，根脚不散，形色红活，焮痛溃脓者顺。已溃脓稠，色鲜红活，肿消痛止，项便、头轻、口和者顺。溃后瘀肉易腐，新肉易生，疮口易平，饮食有味者顺。

初起疮头如粟，顶软不高，色紫根散，木痛食少者逆。已成疮形紫黑，软陷无脓，足冷身凉，便利脉虚者逆。已溃脓水清稀，多生臭秽，坏肉不腐，新肉不生者逆，溃后饮食饕餐，身体发热，口干不眠，肉削皮粗者逆。

鬚疽治法

初起焮肿坚硬，内热口干，脉数有力，邪实也，当利之。已成憎寒壮热，四肢拘急，脉浮者，邪在表也，宜散之。赤肿作痛，血凝滞也，散

血清肝；色黯漫肿，升阳助胃。已溃坚肿不退，脉细而数，日晡发热者，宜滋阴健脾。肝胆怒火上攻，心烦作躁，腮颧红热者，宜抑阴降火。已溃脓清，肿痛尤其，虚烦食少者，宜养气血、健脾胃。溃后气血俱虚，身凉脉细，大便多溏者，宜峻补温中。溃后不敛，新肉生迟，疮口淡白，脓水不止，健中补脾。

鬓疽治验

一男子患此三日，焮肿寒热，脉浮数。以荆防败毒散一剂，表症悉退，肿痛仍作，已欲作脓，以托里消毒散，脓溃又以益气养荣汤加麦冬、五味渐敛而愈。

一男子患此五日，顶高根若钱大，形色红活，此肝经湿热为患。用麻子大艾灸七壮，以梔子清肝汤二服，肿势稍止。以蟾酥饼膏贴灸上，更以柴胡清肝汤加白芷、黄芪、天花粉数服，脓溃肿消，半月收敛。

一男子渴疾三年，寒热半月，自以为疰，鬓间忽生一小疮，三四日，外形如粟，疮平坚硬，色暗不泽，又兼脉洪数而无力，此水竭火旺之症也。终难溃敛，辞不敢治。复请医，视为易治，用针刺肿上，去紫血钟许，内服解毒药，次日边傍愈肿。医者谓肿高属阳易治，彼家欢悦。又三日，腮项俱肿，口噤不食，用针又刺肿上，日加昏愦。又复请视，予曰：死将及矣。但此症未病先作渴，肾水已竭。外形如粟，里可容谷，形色紫黑，气败血衰。脉洪无力，元气内败，如此干涉，岂有不死者。彼家方信晚矣。共二十一日而歿。

一男子肿焮五六日，彼欲内消，外敷凉药，内服大黄泄气等剂，随后焮肿虽退，乃生寒热，恶心干呕，肩膊牵强，诊之脉数无力，此内虚毒气入里，凉药之过也。东垣云：疮疽之发，受之有内外之别；治之有寒温之异。受之外者，法当托里以温剂，反用寒药攻利，损伤脾胃，多致内虚，故外毒乘虚入里；受之内者，法当疏利以寒剂，反用温剂托里。初病则是骨髓之毒，误用温剂使毒上彻皮毛，表里通溃，共为一疮，助邪为毒，苦楚百倍，轻则变重，重则死矣。前症既出寒药之过，以托里健中汤，二服呕吐全止；又以十全大补汤加白芷，数服而原疮渐起；又

以人参养荣汤间服，腐溃脓稠；两月余，疮口收敛。

一妇人患此，肿硬寒热，口干焮痛，脉洪大有力，此表里俱实也。以防风通圣散一剂，行二次，前症稍退。又一剂，大行数次，热退渴止。惟原疮肿硬，用银针点破，插入蟾酥条，内服托里消毒散，渐溃脓而安。

一男子患此，三、四日顶高根活，且无表里之症。此肝经湿热为患。用针挑破疮顶，以蟾酥饼盖贴，内服加味逍遥散加皂角针数服，头出微脓，根肿亦消。

鬓疽主治方

柴胡清肝汤

柴胡清肝芍药归 黄芩栀子地黄随

防风牛子天花粉 甘草连翘一处宜

治鬓疽初起未成者，毋论阴阳、表里俱可服之。

川芎 当归 白芍 生地黄 柴胡 黄芩 山栀 天花粉 防风 牛蒡子 连翘 甘草节各一钱

水二盅，煎八分，食远服。

鼠粘子汤

鼠粘子汤甘桔归 赤芍连翘地骨皮

玄参麦冬天花粉 防风大黄不可遗

治鬓疽初起，热多寒少，头眩作痛，口燥咽干，渴常饮冷，二便秘涩，六脉沉实有力，烦闷疼痛者。

鼠粘子 桔梗 当归 甘草梢 赤芍 连翘 玄参 地骨皮 防风 天花粉 木通各一钱 大黄(炒)二钱

水二盅，煎八分，食前服，渣再煎服。

加味逍遥散

加味逍遥白术苓 红花丹芍柴胡陈

当归梔贝天花粉 甘草羚羊效更奇

治鬓疽七日以上，根盘深硬，色紫焮痛者宜服。

白术 茯苓 牡丹皮 白芍 柴胡 陈皮 当归 山栀 贝母
天花粉各八分 甘草 红花 羚羊角各五分
水二盅，淡竹叶二十片，煎八分，食后服。

栀子清肝汤

栀子清肝汤 牛子 柴苓 芍药 石当归
黄连 甘草 丹皮等 用水同煎一处煨
治少阳经虚，肝火风热上攻，遂成鬓疽。痛连颈、项、胸、乳、太阳
等处，或寒热哺甚，胸满、口苦、舌干。
牛蒡子 柴胡 川芎 白芍 石膏 当归 山栀 牡丹皮各一钱
黄芩 黄连 甘草各五分
水二盅，煎八分，食后服。

清肝解郁汤

清肝解郁汤 归芍 苓术 栀柴 贝母 随
人参 半夏 丹皮 附 川芎 熟地 草 陈皮
治暴怒伤肝，忧思郁结，致肝火妄动，发鬓疽。头眩痛彻太阳，胸
膈痞连两胁，呕酸水，皆服之。
当归 白芍 茯苓 白术 贝母 熟地 山栀各一钱 半夏 人
参 柴胡 丹皮 陈皮 香附 川芎各六分 甘草四分
水二盅，姜三片，煎八分，食远服。

参苓内托散

参苓内托散 归芪 芍药 陈皮 白术 随
山药 熟地 并官桂 附子 甘丹 地骨皮
治鬓疽已成，坚而不溃，溃而不敛，气血俱虚，身凉脉细，饮食少
思，口淡无味及形体消瘦者服。
归身 黄芪 川芎 白芍 陈皮 白术 山药 熟地 茯苓
人参各一钱 甘草 肉桂 熟附子 牡丹皮 地骨皮各五分
姜三片，枣二枚，水二盅，煎八分，食远服。
保安万灵丹（见痈疽门）
治鬓疽初起，憎寒壮热，头眩恶心，四肢拘急者。

鬓疽应用方

托里消毒散(见肿疡门)

荆防败毒散(见时毒门)

蟾酥饼子(见疔疮门)

人参养荣汤 托里建中汤 益气养荣汤 十全大补汤(俱见痈疽溃
疡门)

防风通圣散(见时毒门)

咽喉论第二十

夫咽喉虽属于肺,然所致有不同者,自有虚火、实火之分,紧喉、慢喉之说。又咽为心、肺、肝、肾呼吸之门,饮食、声音、吐纳之道。此关系一身,害人迅速,故曰:走马看咽喉,不待少顷也。假如虚火者,色淡微肿,脉亦细微,小便清白,大便自利,此因思虑过多,中气不足,脾气不能中护,虚火易至上炎,此恙先从咽嗑干燥,饮食妨碍,咳吐痰涎,呼吸不利,斑生苔藓,垒若虾皮,有如茅草常刺喉中,又如硬物嗑于咽下,呕吐酸水,啰出甜涎;甚则舌上白胎^①,唇生矾色,声音嘶哑,喘急多痰。以上等症,皆出于虚火、元气不足中来。治此不可误投凉药,上午痛者属气虚,补中益气汤加麦冬、五味子、牛子、玄参;午后痛者属阴虚,四物汤加黄柏、知母、桔梗、玄参。如服不效者,必加姜、附以为引导之用,亦为佐治之法也。实火者,过饮醇酒,纵食膏粱,叠褥重衾,铺餐辛烈,多致热积于中,久则火动痰生,发为咽肿。甚者风痰上壅,咽门闭塞,少顷汤水不入,声音不出,此为喉闭、紧喉风是也。用药不及事,先用针刺喉间,发泄毒血,随用桐油钱鸡翎探吐稠痰,务使痰毒出尽,咽门得松,汤药可入,语声得出,乃止。内服清咽利膈汤疏利余毒,如牙关紧闭难入,必当先刺少商出血,其闭自开。如针刺、探吐无痰,声如

① 胎:“苔”。

拽锯,鼻掀痰喘,汤水不入,语声不出者。真死候也。又有喉痛、喉痹、乳蛾、上腭痛等症,其患虽肿而咽门半塞半开,其病虽凶,而喉道又宽又肿,此皆标病,虽重无妨。当用金锁匙吐出痰涎,利膈汤推动积热脓,胀痛者开之,损而痛者益之,其患自安。凡喉闭不刺血,喉风不倒痰,喉痛不放脓,喉痹、乳蛾不针烙,此皆非法。又有痰火劳瘦、咳伤咽痛者,无法可治。

咽喉看法

初起红色肿痛,语声清朗,亦无表里之症相兼者轻。已成肿痛,咽喉半闭半开,咯吐痰涎,饮食稍进者顺。

咽喉肿闭,牙关紧急,言语不清,痰壅气急、声小者险。咽喉骤闭,痰涎壅塞,口噤不开,探吐不出、声喘者死。时疮之后,毒结咽间,肿痛腐烂,吐纳不堪、声哑者重。久嗽痰火,虚阳上攻,咳伤咽痛,但见声嘶面红者死。

咽喉治法

初起肿痛,寒热交作,头眩拘急者,邪在表也,宜发散。初起肿痛发热,脉有力而便秘者,邪在内也,宜下之。肿痛寒热,口干作渴。脉洪大而有力者,宜发表攻里。咽喉肿痛,痰涎壅甚,面红口干,邪在上也,宜探吐之。喉闭痰涎壅塞、气急,口噤难开,先刺少商,后行吐法。已成胀痛,咽喉涂^①塞,汤水不入,脓已成也,宜急针之。肿痛微红,脉虚无力,午后痛者属阴虚,宜滋阴降火。肿痛色白,咯吐多涎,上午痛者属阳虚,宜补中健脾。

① 涂:疑作“堵”。

咽喉治验

一男子咽喉肿痛,发寒体倦,脉弦有力。此邪在表,以荆防败毒散加牛子、玄参一剂,表症已退,肿痛仍作。又以玄参解毒汤二剂,肿痛减半,又二剂而安。

一男子咽喉肿痛,痰涎壅盛。用金锁匙先吐稠痰,清咽利膈汤推荡积热,肿痛稍减,惟色红甚,此火热也。又以黄连解毒汤加桔梗二剂,红肿亦退而安。

一男子素饮火酒,一时咽喉肿闭,口噤舌强,痰涎壅塞,势颇危急。用针先刺少商二穴,口噤方开。以桐油钱鸡翎探吐稠痰数碗,语声方出。仍用针刺肿上,出紫血钟许,温汤漱净,冰硼散搽之,以凉膈散加芒硝、天花粉利去积热。又以连翘散二剂而安。

一妇人肥甚,暑热咽间肿痛,痰涎上壅,语声不出甚危。先用针刺毒血,次以金锁匙吐去稠痰五、六碗,以清咽利膈汤一服,肿痛少减,去硝黄又服而安。

一男子劳甚,咽喉肿痛。自服清咽利膈药不应,诊之脉细而虚,此劳伤虚火之症。朝以补中益气汤加麦冬、五味子、桔梗、玄参。晚以四物汤加黄柏、知母、炒黑干姜,服加童便,不数日,肿痛亦消,疲回咽愈。

一妇人咽痛,微肿色白,吐咽不利,诊之脉亦细微,此中气不足,虚火假症也。用理中汤二服,其疼顿止。又以补中益气汤加炒黄柏、知母数服。再不复作。

一男子肿痛日甚,服清咽利膈药不应,必欲作脓,以防风通圣散去硝、黄二服,喉脓胀痛,而下针便愈。

咽喉主治方

清咽利膈汤

清咽利膈汤翘芩 甘桔荆防梔薄银

大黄牛子黄连等 朴硝加上再玄参

治积热咽喉肿痛,痰涎壅盛及乳蛾、喉痹、喉痛、重舌、木舌,或胸膈不利,烦躁饮冷,大便秘结等症。

连翘 黄芩 甘草 桔梗 荆芥 防风 山梔 薄荷 金银花
黄连 牛蒡子 玄参各一钱 大黄 朴硝各二钱

水二盅,煎八分,食远服。

玄参解毒汤

玄参解毒汤梔子 甘草黄芩桔梗随

葛根生地并荆芥 竹叶灯心共得宜

治咽喉肿痛,已经吐下,饮食不利及余肿不消。

玄参 山梔 甘草 黄芩 桔梗 葛根 生地 荆芥各一钱

水二盅,淡竹叶、灯心各二十件,煎八分,食后服。

连翘散

连翘散内葛根芩 赤芍山梔桔梗升

门冬牛子并甘草 木通加上效如神

治积饮停痰,蕴热隔上,以致咽喉肿痛,胸膈不利,咳吐痰涎,舌干口燥,无表里症相兼者服此。

连翘 葛根 黄芩 赤芍 山梔 桔梗 升麻 麦门冬 牛蒡子 甘草 木通各八分

水二盅,竹叶二十片,煎八分,食远服。

凉膈散

凉膈散中荆芥防 薄荷粉桔连大黄

玄参石膏牛蒡子 贝母山梔总在藏

治咽喉肿痛,痰涎壅甚,膈间有火,大便秘涩。

防风 荆芥 桔梗 山梔 玄参 石膏 薄荷 黄连 天花
牛蒡子 贝母 大黄各等分

水二盅,煎八分,不拘时服。

金锁匙

金锁匙中用焰硝 僵蚕片脑雄黄饶

加上硼砂效更高 咽喉肿闭即时消

治喉闭、缠喉风，痰涎壅塞，口噤不开，汤水不下。

焰硝一两五钱 硼砂五钱 片脑一字 白僵蚕一钱 雄黄二钱

各另研为末，和匀，以竹筒吹患处，痰涎即出。如痰虽出，肿痛仍不消，急针患处，去恶血，服前药。

理中汤

理中汤内药四般 甘草干姜白术攒

加上人参仔细看 虚阳之火立时安

治中气不足，虚火上攻，以致咽间干燥作痛，吐咽妨碍，及脾胃不健，食少作呕，肚腹隐疼等症。

人参一钱 甘草(炙)八分 干姜(炒黑)五分 白术二钱

水二盅，煎八分，食远服。

桐油钱

桐油钱伍桐油钱 治的喉风如神见

探吐顽痰日照霜 回生起死真堪羨

治喉风、喉闭，其症先两日胸膈气急，呼吸短促，蓦然咽喉肿痛，手足厥冷，气闭不通，顷刻不治。先用温汤半碗，加入桐油三、四匙搅匀，用硬鸡翎蘸油探入喉中，连探四、五次，其痰壅出，再探再吐，以人苏醒声高为度。后服清咽利膈之药。

治喉乌龙散

乌龙散只一品药 十八喉风总堪嚼

开关利膈效如神 虚火实火要斟酌

歌曰：

十八喉风各有名 原来总是一根因

子孙代代宜珍惜 誓不轻传与世人

用猪牙皂角七条，去皮弦，为粗末。水一盅，煎五分，入人乳三匙冷服，即时非吐即泻。治咽喉肿痛，痰涎壅盛，喉风、喉痛、乳蛾等症并效。惟缠喉风、牙关紧闭者不可与，恐痰上出而口不开，壅塞无路而出故也。除此皆效，又久病咽痛忌用。

神效吹喉散

神效吹喉散薄荷 僵蚕青黛朴硝和

白矾火硝黄连多 加上硼砂病自瘥

治缠喉风闭塞，及乳蛾、喉痹、重舌、木舌等症效。

薄荷 僵蚕 青黛 朴硝 火硝 黄连 硼砂各五分

上药各为细末，腊月初一日取雄猪胆七、八个，倒出胆汁，用小半和上药拌匀，复灌胆壳，以线扎头，胆外用青缸纸包裹。将地掘一孔，阔深一尺，上用竹竿悬空横吊，上用板铺用泥密盖，候至立春日取出，挂风处阴干，去胆皮、青纸，磁罐密收。每药一两，加冰片三分同研极细，吹患上神效。

歌曰：此法端的通神圣，万两黄金方不传。

少阴甘桔汤

加味甘桔汤黄芩 柴胡羌活玄参陈

川芎升麻葱白灵 少阴咽痛即安宁

治少阴咽痛、头眩，脉沉细而身犹热者宜服之。

桔梗二钱 甘草一钱 陈皮 川芎 黄芩 柴胡 玄参各六分 羌活 升麻各四分

水二盅，葱白一根，煎八分，不拘时服。

清音噤化丸

清音噤化丸诃子 天麦归苓黄柏参

阿胶知母生熟地 乌梅人乳棗牛津

治肺气受伤，声音嘶哑，或久咳嗽伤声哑亦宜。

诃子 真阿胶 天门冬（盐水拌炒） 知母各五钱 麦门冬（去心）

白茯苓 黄柏（蜜炙） 当归 生地 熟地各一两 人参三钱 乌梅肉十五个 人乳 牛乳 梨汁各一碗（共熬稠膏）

共为细末，和入前膏，加炼蜜捣成丸，如鸡头实大，每用一丸，仰卧噤化。日用三丸，如改作小丸，每服一钱，诃子煎汤，或萝卜汤送下亦可取效。

治暴失音

暴失音方猪板油 再加白蜜两相投

慢火煎至稠膏住 每日三匙不用忧

公猪板油一斤,入锅先炼成油,滤去渣,入白蜜一片,再炼少顷,绢滤净,磁器内冷定成膏。不时挑服一茶匙,其音渐清,无疾时亦可常服润肺。

噤化丸

噤化丸中用白矾 硼砂牙皂共雄黄

胆矾枣肉丸成就 吐咽艰难第一方

治梅核气,乃痰气结于喉中,咽之不下,吐之不出,如毛草常刺作痒。新则吐酸妨碍,久成闭塞。

胆矾 硼砂 明矾 牙皂 雄黄

各等分为末,红枣煮烂,取肉为丸芡实大,空心噤化一丸,温黄酒一杯过口,内服苏子降气汤。

苏子降气汤

苏子降气汤厚朴 陈皮半夏共前胡

官桂相兼甘草用 生姜为引效堪图

治虚阳上攻,气不升降,致结患咽嗝,痰涎壅塞。

苏子一钱五分 厚朴 陈皮 半夏 前胡 官桂各一钱 甘草五分 水二盅,姜三片,煎八分,食远服。

苏子降气汤的临床新用

1. 创伤性血胸

卢红等用本方加减治疗创伤性血胸 32 例。患者均采用苏子降气汤加减内服。处方:苏子、法夏、杏仁、牛膝、木通、厚朴各 20 克,桃仁、红花、丹皮、旋覆花各 15 克,栀子 12 克,川贝 10 克(研末后服)。每日 1 剂。总有效率 95.7%。

卢红,等. 四川中医,2003,21(1):66

2. 支气管哮喘

张学兰用本方结合西药治疗本病。先予喘乐宁气雾剂吸入暂时

缓解哮喘症状,继用本方加射干麻黄汤加减,方药:苏子、法夏、当归、红花、地龙、前胡、厚朴、射干、麻黄、桑白皮、冬花各10克,甘草6克。每日1剂。同时用川芎嗪注射液静滴,15天为1个疗程。总有效率86.7%。

张学兰. 陕西中医,2003,24(4):300

3. 慢性心衰

用本方治疗慢性心衰获效。方药:紫苏子30克,制半夏15克,陈皮15克,当归15克,前胡10克,肉桂6克,厚朴15克,川牛膝15克,泽兰20克,益母草20克,甘草5克。1日1剂。5天后血压下降,症状减轻;10剂后水肿缓解,心慌气短消失。随访半年未有复发。

宁保刚. 中华临床医药杂志,2003,(62):90

4. 闭合性气胸

杨进林治疗本病1例。患者于10天前从高处跌下,右侧胸肋部着地,感右侧胸肋部疼痛,且喘、咳。证属损伤气滞瘀血壅盛,药用苏子降气汤加减:苏子15克,陈皮15克,半夏10克,前胡15克,川楝子15克,旋覆花15克,代赭石15克,甘草10克,牛膝15克,五味子10克,山萸肉15克,葶苈子15克,桑白皮15克,鱼腥草15克,川贝10克,三七15克,杏仁15克。2日1剂,患者服3剂后症状明显减轻,继进3剂,胸腔中积气、积血已基本消失,于原方去牛膝、山萸肉,加青皮15克,柴胡15克,瓜蒌15克,郁金15克,枳壳15克,冬花15克,继续调治月余,诸证消失。

杨进林. 光明中医,2002,17(2):004

5. 小儿哮喘非急性期夜间症状

罗光亮用本方加味治疗本病,药用:苏子6克,法半夏8克,前胡8克,厚朴8克,当归6克,肉桂6克,甘草6克,白芍10克,银杏12克,钩藤8克,连用7天,免服其他药。总有效率90%。

罗光亮. 中华临床新医学,2002,2(1):66

6. 老年性喘息型支气管炎慢性迁延期

何洁以苏子降气汤煎汤治疗老年性喘息型支气管炎慢性迁延期。

每日1剂。对照组运用西药,抗感染、解痉平喘、止咳化痰。两组疗程均为2周。结论:苏子降气汤治疗本病疗效可靠,在改善临床症状、提高远期疗效、改善肺功能方面有明显效果。

何洁. 中国药业,2002,11(9):70

7. 胃脘痛

本方治疗慢性浅表性胃炎1例,6剂后发作渐稀,痛已轻微,继增白芍12克,进5剂,胃痛未作,饮食渐进,原方出入改用丸剂,调理2月告愈。

吕玉伦. 陕西中医,1995,16(8):358

冰硼散

冰硼散效实堪夸 玄明粉再共朱砂

硼砂冰片相兼佐 咽喉口齿病无他

治咽喉、口齿新久肿痛,及久嗽痰火咽哑作痛。

冰片五分 朱砂六分 玄明粉法注未卷 硼砂各五钱

共研极细末,吹搽患上,甚者日搽五、六次最效。

冰硼散的临床新用

1. 寻常痤疮

朱平东等用本方合泻白散内外治疗寻常痤疮150例。患者均给予泻白散加减治疗。外用冰硼散0.5克兑开水10毫升外搽。每日早晚各搽1次。1周为1个疗程。总有效率95.33%。

朱平东,等. 内蒙古中医药,2006,25(1):12

2. 宫颈糜烂

本方治疗宫颈糜烂。于月经干净后3天起进行治疗。外阴、宫颈及其邻近部位常规消毒,宫颈Ⅰ度糜烂及宫颈肥大者,宫颈多点局部封闭。对宫颈糜烂Ⅱ度以上或表面渗血者,直接喷撒宫颈糜烂面上,隔日1次。12天为1个疗程。疗效不显著者,下次月经后进行第2个疗程。总有效率95%。

阿米娜·托尔地阿布来提. 中国实用乡村医生杂志, 2005, 12(11): 41

3. 口腔溃疡

刘宇治疗复发性口腔溃疡 50 例。患者均口服维生素 B₂, 维生素 C。加中药黄芩、黄柏、栀子各 10 克, 黄连 5 克, 每日 1 剂, 并于患处涂敷冰硼散, 每次少量。治愈率为 78%。

刘宇. 现代医药卫生, 2005, 21(15): 2030

4. 新生儿脐炎

李淑玉用本方治疗新生儿脐炎的护理。患儿充分暴露脐部, 消毒脐部, 待干后把少量冰硼散吹敷患处, 然后用无菌纱布覆盖于脐部, 并固定, 每日 2 次。结果显示冰硼散具有清热解毒、消肿止痛之功效, 所以疗效显著, 便于脐炎的恢复。

李淑玉. 河北中医, 2005, 27(4): 291

5. 念珠菌阴道炎

秦理用本方治疗念珠菌阴道炎 300 例。在清洁外阴, 用棉球擦净分泌物, 将冰硼散 1 克送入阴道后穹隆, 每日 1 次, 7 天为 1 个疗程。设对照组外用制霉菌素。结果证明: ①冰硼散对阴道分泌物, 局部红肿, 瘙痒症状的改善时间比对照组提前。②冰硼散组病员的舒适感优于对照组。

秦理. 中国医学杂志, 2004, 2(8): 488

6. 百日咳

胡献国用本方治疗百日咳。冰硼散用鸡胆汁、米醋调糊, 于每晚睡前敷于双手足心, 外盖油纱布固定, 次晨取下, 每晚 1 次, 10 天为 1 个疗程, 连续 1~2 个疗程。可清热解毒、宣肺止咳。

胡献国. 中国保健食品, 2004, (3): 69

7. 婴幼儿外耳道湿疹

冰硼散外用治疗婴幼儿外耳道湿疹 20 例。患者均口服扑尔敏, 清洗患处, 用冰硼散粉外撒患处。结果显示: 冰硼散外用治疗湿疹具有皮质激素样作用, 而对婴幼儿皮肤刺激小, 避免了皮质类外用药物易致局部皮肤增厚等弊端, 值得推广运用。

姜明煤. 湖北中医学院学报, 2004, 6(2): 50

8. 足癣

胡献国用本方治疗足癣。每晚洗脚后擦干, 视患处面积大小, 撒敷冰硼散约 2 毫米厚, 后套上干净袜子, 翌晨复用 1 次, 若有小水泡, 可用消毒针头挑破, 放液后再撒敷药粉, 一般在 5~7 天即可治愈。可解毒利湿。

胡献国. 医药与保健, 2003, 11(9): 37

9. 霉菌性阴道炎

张瑶用冰硼散配合中药坐浴治疗霉菌性阴道炎 50 例。棉球清洗阴道后倒入冰硼散 3 克, 每日上药 1 次, 10 天为 1 个疗程。上药同时, 每晚用药液坐浴熏洗 20 分钟, 每日 1 次, 10 天为 1 个疗程。收效显著。

张瑶. 新疆中医药, 2002, 20(3): 28

10. 带状疱疹

代翔等用本方治疗带状疱疹。用冰硼散调配适量凡士林, 若有合并细菌感染, 可调配红霉素软膏外敷, 每天 3 次。同时用抗病毒药物、维生素、止痛等方法。治疗 30 例患者中, 治愈 21 例, 显效 9 例。

代翔, 等. 中国临床医生, 2003, 31(6): 41

11. 慢性牙根尖周炎瘘管

冰硼散治疗慢性牙根尖周炎瘘管取得满意疗效。患牙充分暴露髓腔, 去除感染牙髓, 最后拭干根管, 在瘘管中放入少量冰硼散。3 天后复诊。重复上述治疗。瘘管不愈者可再放入冰硼散。如有明显症状者, 可在髓腔封药时于瘘管内同时放入少量冰硼散。3 天后再复诊。全部患者均局部用药。但与瘘管相通的根管必须进行根管填充。全部患者经冰硼散治疗 1 周后内颊、黏膜、瘘管炎症都消失。

和福光. 中华综合临床医学杂志, 2003, 5(12): 84

12. 疱疹病毒性皮肤病

周培英等用冰硼散以芝麻油调成糊状, 涂患处(有破溃感染者常规消毒), 每日 2 次, 治疗疱疹病毒性皮肤病 80 例, 全部治愈。

周培英, 等. 山东中医杂志, 2002, 21(7): 406

13. 花斑癣

杨红英用棉花沾冰硼散药粉,轻轻摩擦患处,擦至微热为止,1天2次,5天为1个疗程。总有效率为93%。

杨红英. 福建中医药,2002,33(6):2

14. 外阴瘙痒

治疗时针对病因进行治疗。同时保持外阴清洁干燥。减少摩擦,苏春燕以温开水洗净外阴并拭干,局部涂搽冰硼散,每日2次,5~7日为1个疗程,治疗外阴瘙痒86例。总有效率达91.9%。

苏春燕. 中华实用中西医杂志,2001,14(11):2442

15. 化脓性中耳炎

患者均应先清洁耳道,然后注入冰硼散0.5克。3天1次,6天为1个疗程。总有效率100%。

阮忠禄. 中西医结合实用临床急救,1996,3(8):371

咽喉应用方

防风通圣散 荆防败毒散(见时毒门)

补中益气汤 四物汤(见痢疽溃瘍门)

黄连解毒汤(见疔疮门)

少商穴:在手掌外侧,去爪甲角二分是穴,棱针刺血。

时毒论第二十一

夫时毒者,天行时气之病也。春当温而反寒,夏当热而反凉,秋当凉而反热,冬宜寒而反温,此四时不正之气,感于人发成斯疾也。自有阴阳、表里、寒热、虚实分治。初起与风寒相类,惟头、面、耳、项发肿为真,其患既得,寒热交作,体强头眩,脉浮紧数者,为邪在表。以荆防败毒散或万灵丹发汗以散之。如两目鼻面渐次传肿者,乃正阳明受病。其患焮肿发热,便秘口干,多热少寒,脉数有力,为邪在里。五利大黄

汤、四顺清凉饮下之。又头角两耳前后结肿者，乃手少阳经受之，其患耳鸣筋痛，寒热呕吐，口苦咽干，烦躁时甚，当以知母石膏汤、小柴胡汤和之。通用防风通圣散加牛子、玄参解毒攻里。劳役凶荒，沿门闾巷传染者，普济消毒饮、藿香正气散以安之。表里俱解，肿尚不消，宜砭去恶血。肿热甚者，如意金黄散敷之。微热不红坚硬者，冲和膏选而用之。自后仍不消者，必欲作脓，宜托里消毒散加白芷、皂角针托之。已溃体倦食少者，补中益气汤；脓秽脾虚、食而呕吐者，香砂六君子汤；溃而不敛者，十全大补汤。又有毒中三阳，自项之以上俱发肿者，光如水色，双目合缝，唇似猪形，口角流涎，肿不消溃，声音不出，饮食不入，咽喉肿闭，牙关难开，破流臭水，秽气连绵不绝者，犯此俱为不治。

时毒看法

初起寒热交作，头面一处作肿，红赤发热疼痛者易。已成高肿，发热疼痛，有时语声清朗，汤药易入者轻。已溃脓稠，坚肿渐消，疼痛渐减，饮食渐进，身温者吉。溃后脓水渐止，肿退肌宽，神采精宁，睡卧安稳者顺。

初起多寒少热，头面耳项俱肿，光如水晶，不热者险。已成漫肿无头，牙关紧闭，汤水不入，声音不出者逆。已溃脓水清稀，气味败臭，肿痛不除，如尸发胖者死。溃后臭水淋漓，肿不知痛，手足多冷，常出谵语者死。

时毒治法

寒热交作，头眩体痛，六脉浮紧，邪在表也，宜汗散之。头面赤肿作痛，口燥咽干，大便秘实，邪在里也，下之。外有寒热，内亦口干，脉弦有力，表里俱实，发表攻里。表里俱解，肿痛仍不消者，乃瘀血凝滞，宜砭去恶血。砭血之后，肿痛仍作不消者，已欲作脓，宜托脓健脾。肿痛日多而胀痛者，已有脓，急针之，更兼补托脾胃，溃后肿痛不减，脓清

腥秽,脾胃弱也,更宜温中健脾。饥年时毒流行传染者,忌用攻发^①,当和解、宜养正气。

时毒治验

一男子耳项肿痛,发寒热,脉浮数。以荆防败毒散一剂,寒退热存。又以连翘消毒饮一剂,便行三次,内热顿退,余肿不消,本方去大黄加川芎数剂而愈。

一男子先发寒热,次日头面俱肿,又二日,口噤汤水下入,诊之脉洪数而有力,此表里俱实也。又咽喉妨碍,汤药难下,先用针刺咽间,去恶血钟许,牙关稍开。以防风通圣散一剂徐徐服之,便去三、四次,肿上砭去恶血,以金黄散敷之。次日肿势稍退,又以普济消毒饮二剂,面肿渐消,惟两耳下坚肿不退,此必作脓。又以托里消毒散数服,候脓熟而针之,次以十全大补汤去肉桂加陈皮,十余剂而敛。

一男子牙根肿痛,次传腮、项俱肿,顿生寒热。此阳明湿热上攻,用荆防败毒散加石膏一剂,寒热顿退,惟腮肿不消,以针刺牙根肿上出毒血,以冰硼散搽之,外敷真君妙贴散,内服牛蒡子汤,数服而愈。

一男子冬月耳面赤肿,发热口干,脉洪实而便秘,此三阳蕴热症也。必舍时从症治之,以五利大黄汤一剂,便行二次,赤肿稍退,内热稍疏,又以升麻解毒汤二服,肿亦消而病愈。此为用寒远寒之意也。

一妇人冬月面肿咽痛,口噤难开,脉诊洪数有力。又见房中暖气如烘。此因炉火盛也。以黄连解毒汤加玄参一剂,次日肿消咽利,又用二剂,其疾痊愈。

一男子劳甚,鬓间肿硬,肉色不变。予曰:劳伤气血,湿痰凝滞之症,与夫外感时毒不同。又诊脉细数而无力,为内伤损病。治当养气血、调经脉,理劳续损治之。彼欲内消,自服仙方活命饮二服,肿不觉消,脾胃已损。又请一医,乃行攻利,复损脏腑。数日后饮食不进,便

^① 发:疑作“伐”。

泄不止，肿硬愈坚，痰涎愈甚。复请视之，辞不可治。予曰：凡疗理，病有主末，治有权宜。此病初起肉色不变者，血不足也；坚硬不热者，脾胃弱也；脉细数而无力，正气衰也。岂可用前有余之药以攻不足之病，后又强投温中补剂，不应而死。

时毒主治方

荆防败毒散

荆防败毒散人参 羌独前柴芎桔梗

茯苓枳壳同甘草 寒甚加葱共得名

治时毒初起，头眩恶寒，腮、项肿痛，脉浮者服之。

荆芥 防风 羌活 独活 前胡 柴胡 川芎 桔梗 茯苓

枳壳各一钱 甘草 人参各五分

姜三片，水二盅，煎八分，食远服，寒甚加葱三枝。

五利大黄汤

五利大黄汤黄芩 升麻栀子朴硝评

时毒焮肿大便秘 服之敢取即安宁

治时毒焮肿赤痛，烦渴便秘，脉实有力者服之。

大黄(煨) 黄芩 升麻各二钱 芒硝 栀子各二钱三分

水二盅，煎八分，空心服，未利者，渣再煎服。

连翘消毒饮

连翘消毒饮芎归 赤芍牛蒡薄荷随

黄芩花粉桔梗草 枳壳升麻共所依

治时毒表里二症俱罢，余肿不消，疼痛不退者。

连翘 川芎 当归 赤芍药 牛蒡子 薄荷 黄芩 天花粉

甘草 枳壳 桔梗各一钱 升麻五分

水二盅，煎八分，食后服。便燥者，加酒炒大黄。

防风通圣散

防风通圣将军芍 薄荷芎归草朴硝

桔梗 梔子 芩白术 荆芥 麻黄 滑石膏

治时毒恶寒发热，烦躁口干，表里脉症俱实者。

防风 白芍 薄荷 川芎 桔梗 山梔 黄芩 白术 当归
连翘 荆芥 麻黄 滑石 石膏各一钱 甘草五分 芒硝一钱五分 大
黄(酒炒)二钱

水二盅，煎八分，空心温服。

普济消毒饮

普济消毒饮 芩连 玄草 参陈 牛子 攒

柴桔 翘蓝 并马勃 升麻 僵蚕 共水煎

治时毒、疫疔。初觉憎寒发热，肢体沉重，次传头面作肿。或咽喉不利，舌干口燥，烦渴不宁者服。

黄芩 黄连各二钱 人参一钱 陈皮去白 玄参 甘草 柴胡 桔
梗(炒)各一钱五分 连翘 牛蒡子 马勃 板蓝根 升麻 僵蚕各五分

水二盅，煎八分，食后服。如大便燥，加酒煨大黄一钱或二钱，以利为度。肿热甚者，宜祛去恶血。

通气散

通气散内用玄胡 羊躑躅花与藜芦

川芎牙皂共为末 捻于鼻内嚏无危

治时毒掀肿疼痛，咽喉不利，语言不爽者用之。

玄胡索一钱五分 川芎 牙皂角各五分 藜芦三分 羊躑躅花二钱五
分

为细末，用纸拈蘸药少许，捻于鼻内取嚏为效。

通气散的临床新用

1. 感音神经性耳聋

本方加味结合穴位注射治疗感音神经性耳聋 30 例。方药：柴胡、川芎、香附、骨碎补、牛膝、熟地各 20 克，石菖蒲 15 克，葛根 30 克。每日 1 剂，2 周为 1 个疗程。同时作穴位注射。结果 6 例治愈，7 例显效，

12 例好转,5 例无效。

肖明珍. 浙江中医杂志,2004,39(11):488

2. 干燥性鼻炎

本方配伍维生素治疗干燥性鼻炎获效。用通气散干粉每日早晨 10 克温水服下。维生素 B10 毫克/次,3 次/日,维生素 C100 毫克/次,3 次/日,鱼肝油丸 2 粒/次,3 次/日,口服,共 8 周。显效率 91.2%。

魏晓丽,等. 中国中西医结合耳鼻咽喉科杂志,2003,11(2):75

3. 手术后腹胀

·朱其卉等报道,腹部术后 6 小时取通气散 26 克,加醋 5 毫升调成糊状置神阙穴中央,用医用橡皮膏固定。4 小时更换药物 1 次,6 次/日,至肛门排气。有效率 98.33%。

朱其卉,等. 护理学杂志,2003,18(8):575

4. 不孕症

本方治疗本病,属肝郁气滞、冲任失调。药用:柴胡 10 克,香附 10 克,白芍 15 克,当归 15 克,玫瑰花 10 克,益母草 20 克。每日 1 剂。嘱每于经前 10 天开始服药,至经来停药,为一周期,并注意调摄情志避免精神刺激,共服 4 周期,诸症悉除而孕。

傅延斌. 中医函授通讯,2000,19(6):22

5. 产后缺乳

傅延斌等治疗 1 例。证属肝气郁结、乳络不畅,药用:柴胡 10 克,香附 10 克,川芎 15 克,花粉 15 克,桔梗 10 克,穿山甲 10 克,王不留行 10 克。每日 1 剂,2 剂后乳汁增多,继服 3 剂,症消乳畅。

傅延斌,等. 中医函授通讯,2000,19(6):22

6. 经行乳胀

傅延斌等治疗 1 例。证属肝郁气滞、脉络受阻。药用:柴胡 10 克,香附 10 克,川芎 10 克,川楝子 10 克,延胡索 10 克。每日 1 剂,嘱至经前 10 天开始服药,至经停止为一周期,服用 2 周期病愈。

傅延斌,等. 中医函授通讯,2000,19(6):22

托里消毒散(见肿疡门)

治时毒表里俱解,肿尚不退,欲其作脓者服之。

牛蒡子汤

牛蒡子汤用葛根 还将贯仲共相呈

江西豆豉同甘草 煎尝时毒可安宁

治时毒热甚肿痛,脉浮数而无力者宜服之。

葛根 贯仲 甘草 江西豆豉 牛蒡子(半生半熟,研)各二钱
水二盅,煎八分,食后服。

大全大补汤(见溃疡门)

治时毒溃后,脓水清稀,形容消瘦,脾胃虚弱,饮食减少,虚热不睡,自汗、盗汗及不收敛者服之。

时毒应用方

金黄散(见肿疡门)

黄连解毒汤(见疔疮门)

冰硼散(见咽喉门)

升麻解毒汤(见杨梅疮门)

真君妙贴散(见肿疡门)

癰瘤论第二十二

夫人生癰瘤之症,非阴阳正气结肿,乃五脏瘀血、浊气、痰滞而成。癰者阳也,色红而高突,或蒂小而下垂;瘤者阴也,色白而漫肿,亦无痒痛,人所不觉,薛立斋分别甚详。肝统筋,怒动肝火,血燥筋挛曰筋瘤。心主血,暴急太甚,火旺逼血沸腾,复被外邪所搏而肿曰血瘤。脾主肌肉,郁结伤脾,肌肉薄弱,土气不行,逆于肉里而为肿曰肉瘤。肺主气,劳伤元气,腠理不密,外寒搏而为肿曰气瘤。肾主骨,恣欲伤肾,肾火郁遏,骨无荣养而为肿曰骨瘤。予曰:筋瘤者,坚而色紫,垒垒青筋,盘曲甚者,结若蚯蚓。治当清肝解郁,养血舒筋,清肝芦荟丸是也。血瘤

者，微紫微红，软硬间杂，皮肤隐隐，缠若红丝，擦破血流，禁之不住；治当养血凉血，抑火滋阴，安敛心神，调和血脉，芩连二母丸是也。肉瘤者，软若绵，硬似馒，皮色不变，不紧不宽，终年只似复肝然；治当理脾宽中，疏通戊土，开郁行痰，调理饮食，加味归脾丸是也。气瘤者，软而不坚，皮色如故，或消或长，无热无寒；治当清肺气，调经脉，理劳伤，和荣卫，通气散坚丸是也。骨瘤者，形色紫黑，坚硬如石，疙瘩高起，推之不移，昂昂坚贴于骨；治当补肾气，养血行瘀，散肿破坚，利窍调元，肾气丸是也。此瘤之五名，治瘤之五法，惟在此也。又观立斋云：筋骨呈露曰筋癭，赤脉交结曰血癭，皮色不变曰肉癭，随忧喜消长曰气癭，坚硬不可移曰石癭，此癭之五名也。通治癭瘤初起，元气实者，海藻玉壶汤、六军丸；久而元气虚者，琥珀黑龙丹、十全流气饮，选服此药，自然缩小消磨；切不可轻用针刀，掘破出血不止，多致立危；久则脓血崩溃，渗漏不已，终致伤人。又一种粉瘤，红粉色，多生耳项前后，亦有生于下体者，全是痰气凝结而成；宜铍针破去脂粉，以三品一条枪插入，数次以净内膜自愈。又一种黑砂瘤，多生臀腿，肿突大小不一，以手摄起，内有黑色是也；亦有针刺，内出黑砂有声，软硬不一。又一种发瘤，多生耳后发下寸许，软小高突，按之不痛，亦针之，粉发齐出。又一种蛔虫瘤，生于胁下；又一种疽瘤，连生肩膊，详在后治验中。予观古又有虱瘤矣，但其形状之异，皆五脏湿热、邪火、浊气、瘀血各感而成，此非正病也。以上数瘤，皆亲手治验非谬也。

癭瘤看法

初起红色光亮，微热微痛，根脚浮浅、不坚实者为易。已成红赤高肿，作热焮痛，顶破皮穿，脓溃肿消者易。已溃脓稠色鲜，根脚缩小，内肉渐生，外皮渐紧者顺。溃后气体平和，饮食如故，肿痛消止，口平收敛者顺。

初起肉色不变，寒热渐生，根脚散漫，时或阴痛者险。已成坚硬如石，举动牵强，咳嗽生痰，皮寒食少者逆。已溃无脓，惟流血水，肿不消，痛不止。脾气衰弱者逆。破后血水不止，肿硬更增，败腐不脱，吮

气恶心者死。

瘰癧治法

初起自无表里之症相兼，但结成形成者，宜行散气血。已成无痛无痒，或软或硬色白者，痰聚也，行痰顺气。已成色红坚硬，渐大微痒微疼者，补肾气、活血散坚。形如茄蒂，瘤大下垂者，用药点其蒂茄落，生肌收敛。已破流脓不止，瘤仍不消，宜健脾胃为主，佐以化坚。已溃出血不常，瘤口开泛者，宜养血凉血，佐以清肝。溃后瘤肿渐消，脾弱不能收敛者，补肾气，兼助脾胃。

瘰癧治验

一男子臀瘤五年，形如复瓢，按之隐隐黑色，此黑粉瘤也。以针破之，按出黑砂兼黑粉共约碗许，用三品一条枪插入患内十余日，每次捺出黑膜，其瘤渐消。内服十全大补汤，健脾胃，养气血，月余而敛。

一男子腮上生瘤半年，形若复桃，皮色不变，按之微红，此粉瘤也。针破之，捺出脂粉，插前药半月而愈。

一义乌兵士，肩膀上连生小瘤五枚三月余，渐发痒异状，以手扞之，内则嗡嗡攻动。予视之，内动果如虾鞠，此必有异虫；以针破其一枚，先出红水一匙，少顷攻出黑嘴粉红虫一条，形如蛆样，长六、七分；又破一枚，依然如是，其人渐觉昏晕，此泄气之过也。余瘤停止，服补中益气汤数剂，外以膏盖，又五、六日，患者方健，渐渐破之，仍以补药十余服而愈。

一妇人并一女子，耳后、发际下一寸，各生一瘤半年余，渐渐而大，此乃粉瘤。用针破之，先出脂粉，后出头发数根，长约二尺余，齐根剪断，出血微许。俱用插药，数日化出内膜而愈。以此观之，知有发瘤也。

一妇人腰间生一肉瘤，三年余方渐微痛，一日溃后出小蛔三条，长约五寸，置温汤中游动半时方息。其时患者形体衰弱，面黄肌瘦，口干发热，朝以八味丸，午用人参养荣汤，服至百日外，元气渐醒，又百日，

其口方收。予意度之，其蛔乃经络气血所化。

一妇人气冲穴生瘤，红紫坚硬，乃血瘤也。请视之，心、肝二脉俱已洪数，其患得之心气郁结，肝气受伤之故，辞不可治。后请京师明公医治，其时头已穿溃，虽强投补托、化坚、凉血等剂，日溃日烂，终至不应。破经两月，一旦涌出紫血盆许，随即身亡。后人问曰：何以致此？予曰：心脉洪数，心火旺也；肝脉弦数，肝气伤也。火旺逼血妄行，肝气伤不能藏血，后破之必出血不止，多致危亡，预辞不治者此意也。

瘰癧主治方

清肝芦荟丸

清肝芦荟丸 芍药 昆布青连皂地黄

海粉还兼甘草节 当归加上共成方

治恼怒伤肝，致肝气郁结为瘤，其坚硬色紫，垒垒青筋，结若蚯蚓，遇喜则安，遇怒则痛者服之。

川芎 当归 白芍各二两 生地(酒浸，捣膏)二两 青皮 芦荟 昆布 海粉 甘草节 牙皂 黄连各五钱

上为末，神曲糊为丸，如梧桐子大，每服八十丸，白滚汤量病上下、食前后服之。

芩连二母丸

芩连二母丸 芍药 熟地当归羚羊角

蒲黄生地与骨皮 甘草柏叶同丸服

治心火妄动，逼血沸腾，外受寒凉，结为血瘤。其患微紫微红，软硬间杂，皮肤隐隐，缠如红丝，皮破血流，禁之不住者宜服。

黄连 黄芩 知母 贝母 川芎 当归 白芍 生地 熟地 蒲黄 羚羊角 甘草(减半) 地骨皮各等分

上为末，侧柏叶煎汤，打寒食面为丸如桐子大，每服七十丸，灯心汤送下，或作煎剂服之亦效。

顺气归脾丸

顺气归脾汤 贝母 乌附芪陈术茯神

枣仁远志人参等 木香甘草合欢灵

治思虑伤脾，致脾气郁结乃生肉瘤，软如绵，肿似馒，脾气虚弱，日久渐大，或微疼或不疼者服。

陈皮 贝母 香附 乌药 当归 白术 茯神 黄芪 酸枣仁
远志 人参各一两 木香 甘草(炙)各三钱

上为末，合欢树根皮四两，煎汤煮老米糊，丸如桐子大，每服六十丸，食远白滚汤送下。

通气散坚丸

通气散坚丸半夏 陈贝芎归粉草苓

香附桔菖参海藻 南星枳实共黄芩

治忧郁伤肺，致气浊而不清，聚结为瘤，色白不赤，软而不坚，由阴阳失度，随喜怒消长者宜服。

陈皮 半夏 茯苓 甘草 石菖蒲 枳实(炒) 人参 胆南星
天花粉 桔梗 川芎 当归 贝母 香附 海藻 黄芩(酒炒)各等分

上为末，荷叶煎汤，泛为丸如豆大，每服一钱，食远灯心二十根、姜三片，泡汤送下。

调元肾气丸

调元肾气丸参地 山药丹归萸泽苓

麦冬龙骨香砂柏 骨皮知母效如神

治房欲劳伤，忧恐损肾，致肾气弱而骨无营养，遂生骨瘤。其患坚硬如石，形色或紫或不紫，推之不移，坚贴于骨，形体日渐衰瘦，气血不荣，皮肤枯槁。甚者寒热交作，饮食无味。举动艰辛，脚膝无力者并服之。

淮生地(酒煮，捣膏)四两 山萸肉 山药 牡丹皮 白苓各二两 人
参 当归身 泽泻 麦门冬(捣膏) 龙骨 地骨皮各一两 木香 砂
仁各三钱 黄柏(盐水炒) 知母(童便炒)各五钱

上为末，鹿角胶四两，老酒化稠加蜜四两同煎，滴水成珠，和药为丸如桐子大，每服八十丸，空心温酒送下。忌白萝卜、火酒、房事。

海藻玉壶汤

海藻玉壶汤青陈 翘贝芎归昆布评

半夏独活并甘草 海带煎来效有灵

治癭瘤初起，或肿或硬，或赤不赤，但未破者服。

海藻 贝母 陈皮 昆布 青皮 川芎 当归 半夏 连翘

甘草节 独活各一钱 海带五分

水二盅，煎八分，量病上下，食前后服之。凡服此门药饵，先断厚味大荤，次宜绝欲虚心者为妙。

活血散癭汤

活血散癭汤 芍归 青皮 芎半地黄随

参苓 昆布 丹皮 草 红花 肉桂 木香 催

治癭瘤已成，日久渐大，无痛无痒，气血虚弱者。

白芍 当归 陈皮 川芎 半夏 熟地 人参 茯苓 丹皮各一钱 红花 昆布 木香 甘草(节)各五分 青皮 肉桂各三分

水二盅，煎八分，量病上下，服后饮酒一小杯。

六军丸

六军丸内用蜈蚣 全蝎 僵蚕 蝉脱同

夜明砂与穿山甲 诸肿癭瘤可觅功

治癭瘤已成未溃者，不论年月新久并宜服之。

蜈蚣(去头足) 蝉脱 全蝎 僵蚕(炒，去丝) 夜明砂 穿山甲

以上等分为细末，神曲糊为丸粟米大，朱砂为衣，每服三分，食远酒下。忌大荤煎炒，日渐可消。

枯瘤方

枯瘤方用白砒 硃砂 黄丹 轻粉 雄黄 饼

乳香 没药 硼砂等 斑蝥 田螺米粥调

治瘤初起成形未破者，及根蒂小而不散者用。

白砒 硃砂 黄丹 轻粉 雄黄 乳香 没药 硼砂各一钱 斑蝥二十个 田螺三枚(大者，去壳，晒干切片)

共研极细，糯米粥调安，捏作小棋子样，暴干先灸瘤顶三炷，以药饼贴之，上用黄柏末水调，盖敷药饼。候十日外，其瘤自然枯落，次用敛口药。

秘传敛瘤膏

秘传敛瘤膏血竭 轻粉龙骨海螵蛸

象皮乳香各等分 鸡子熬油一处调

治瘰瘤枯药落后,用此搽贴,自然生肌完口。

血竭 轻粉 龙骨 海螵蛸 象皮 乳香各一钱 鸡蛋十五枚(煮熟用黄熬油一小盅)

以上各等细末,共再研,和入鸡蛋油内搅匀,每日早晚甘草汤洗净患上,鸡翎蘸涂,膏药盖贴。

琥珀黑龙丹

琥珀黑龙丹海带 南星血竭五灵脂

海藻木香并京墨 麝香加上效堪随

治五癭六瘤,不论新久,但未穿破者并宜用之。

琥珀一两 血竭二两 京墨 五灵脂(炒) 海带 海藻南星(姜汁拌炒)各五钱 木香三钱 麝香一钱

以上各为细末,和匀再研,炼蜜丸一钱重,金箔为衣,晒干密收,每用一九,热酒一杯量病上下、食前后化服。如患在下部,服后随用美膳压之。

十全流气饮

十全流气饮陈皮 赤茯苓皮香附随

木香乌药芎归芍 甘草同煎效可奇

治忧郁伤肝,思虑伤脾,致脾气不行,逆于肉里,乃生气癭、肉瘤,皮色不变,日久渐大,宜服此药。

陈皮 赤茯苓 乌药 川芎 当归 白芍各一钱 香附八分 青皮六分 甘草五分 木香三分

姜三斤,枣二枚,水二盅,煎八分,食远服。

瘰瘤应用方

三品一条枪(见痔疮门)

人参养荣汤(见瘰癧门)

补中益气汤 八味丸 十全大补汤(俱见痢疽溃瘍门)
寒食面(注末卷)

肺痈论第二十三

夫肺痈者,金受火刑之症也。盖肺为五脏华盖,其位至高,其质至清,内主乎气,中主声音,外司皮毛,又兼主乎寿夭。金清而气管深长者,其音自清,其韵自高,其声自洪,此三者主寿,亦主通达。如金浊而气管短细者,其音自焦,其韵自低,其声自小,此三者主夭,亦主蹇滞。故肺金独旺于秋者,应其轻清之候也。倘有所克,其病自生。致患肺痈者,先因感受风寒,未经发越,停留肺中,初则其候毛耸恶风,咳嗽声重,胸膈隐痛,项强不能转侧者,是其真候也。久则鼻流清涕,咳吐脓痰,黄色腥秽,甚则胸肋胀满,呼吸不利,饮食减少,脉洪自汗。法当清金甘桔汤主之,麦冬清肺饮调之。又久嗽劳伤,咳吐痰血,寒热往来,形体消瘦,咯吐瘀脓,声哑咽痛,其候传为肺痿,如此者百死一生之病也。治宜知母茯苓汤主之,人参五味子汤调之。又有七情、饥饱、劳役损伤脾肺者,麦冬平肺饮主之,紫菀茸汤调之。又有房欲劳伤,丹石补药消铄肾水者,宜肾气丸主之,金液戊土丹调之。又劳力内伤,迎风响叫,外寒侵入,未经解散致生肺痈者,初起脉浮微数,胸热气粗,寒热往来,咳嗽生痰者,当以小青龙汤主之,麦冬清肺饮调之。通用金鲤汤、蜡矾丸、太乙膏相间服之亦效。如手掌皮粗,六脉洪数,气急颧红,污脓白血,呕哕滯水,鼻煽,不餐饮食者,俱为不治。此症以身凉脉细,脓血交流,痰色鲜明,饮食知味,脓血渐止者俱为无妨,反此则死。

肺痈看法

初起脉浮虚细,身体不热,咳嗽有痰,呼吸调匀者顺。已成脉浮微数,咳吐脓痰,形色鲜明,语声清朗者吉。溃后咯吐脓痰,间吐鲜血,时发时止,饮食知味者顺。

吐脓渐渐稀少,胸肋不痛,面色微微带黄,便调多秽。初起脉洪弦

数，身热多寒，胸疼气喘，面红多汗损寿。已成咯吐脓痰，气味滯臭，黄痰如胶粘固，唇反终亡。咯吐再兼白血，气急多烦，指甲紫而带湾，终归冥路。手掌反如枯树，面艳颧红，咽痛音如鸭声，鼻焮终死。

肺痛治法

初起风寒相入，头眩恶寒，咳嗽声重者，宜解散风邪。汗出恶风，咳嗽气急，鼻塞项强，胸膈隐痛，实表清肺。日间多寒，喜复衣被，夜间发热，多烦去被，滋阴养肺。口干喘满，咽嗽而渴，咳嗽身热，脉弦数者，降火抑阴。胸满喘急，咳吐脓痰，身热气粗，不得安卧，平肺排脓。热退身凉，脉来短涩，精神减少，自汗盗汗，补肺健脾。

肺痛治验

一义官仲冬时督工河道，常迎风呼唤，致肺受伤，后发此症。初起寒热交作，咳嗽声重，气急生痰，请内医治之，越治越重。后予视，诊其脉浮而数，面光面泽，此肺痛也。视其痰果有脓意相粘，以桔梗汤二服，咳嗽稍止。以排脓散四服，其脓渐多，惟胸膈疼痛不减，脉亦带芤，此胸中有瘀血也。以四顺散加红花、牡丹皮二服，吐出紫血碗许，随后膈痛渐止。又以金鲤汤兼人参五味子汤间服，月余而愈。

一男子久嗽不已，咳吐脓痰，面白神劳，胸中隐痛，诊之脉浮微数，此属肺气不足，火尚有余。以知母茯苓汤数服，其脓渐少，又以清金宁肺丸服之而愈。

一男子因劳伤咳嗽不止，至夜身热尤甚，日久咯吐脓血，诊之脉弦而数，此虚火假症也。先以童子小便，日饮三、四次，又服紫菀茸汤数剂，至夜身热不发，又间服金鲤汤月余而渐瘳。此非童便之功，而阴火岂能得退，尝治疮疡热不退者，用此极效。

一男子郁郁不遂意，患嗽半年，时或咳吐脓血，且形体衰弱，饮食减少，脉亦微数，声渐将嘶。惟面不红，其病将成肺痿，而尚可治。以清金二母汤十余服，咳吐减半，又以金鲤汤与人参五味子汤间服之，又

早饮人乳、晚饮童便各一钟，调理百日外而安。

一男子生平好饮，口干作渴，致肺壅热成痈，咳吐脓痰，喘满难卧，又以葶苈散二服，而喘定易睡。又以紫菀茸汤加干葛、天花粉十余服而脓痰渐少。早以加减八味丸，午用清金宁肺丸间服之，两月而愈。

一男子五十余岁，平素宠妾，膏粱，复生咳嗽发热，吐痰腥臭，视之手掌枯涩，面隐微红，痰中白血，脉亦细微而数，此肺痈所忌症也。辞不治。后医强许其生，而用药终至不应乃死。人问曰：何以致之？予曰：手掌干涩，血枯土伤，不能生其金也。面色微红，相火已动。痰中白血，正肺受伤。脉细而数，真气虚败。凡肺痈犯此，岂有不死者乎！以此言之，人乃服。

肺痈主治方

麦冬平肺饮

麦冬平肺饮人参 赤芍槟榔赤茯苓

陈皮甘桔同成剂 肺痈咳嗽可回春

治肺痈初起，咳嗽气急，胸中隐痛，呕吐脓痰者。

人参 麦门冬 赤芍 槟榔 赤茯苓 陈皮 桔梗各一钱 甘草

五分

水二盅，煎八分，食远服。

玄参清肺饮

玄参清肺饮柴陈 甘桔槟榔参茯苓

麦冬骨皮薏苡仁 生姜童便可安宁

治肺痈咳吐脓痰，胸膈胀满，上气喘急发热者。

玄参八分 银柴胡 陈皮 桔梗 茯苓 地骨皮 麦门冬各一钱

薏苡仁二钱 人参 甘草各五分 槟榔三分

水二盅，姜一片，煎八分，临入童便一杯，食后服。

宁肺桔梗汤

宁肺桔梗汤贝芪 归蔘枳壳草桑皮

防己百合葶五味 杏仁知母地骨皮

治肺病胸膈隐痛，两肋肿满，口燥咽干，烦闷多渴，自汗盗汗，眠卧不得，时吐稠痰腥臭者服之。

桔梗 贝母 当归 瓜蒌仁 黄芪 枳壳 甘草节 桑白皮
防己 百合 苡仁各八分 五味子 甜葶苈 地骨皮 知母 杏仁各五分

水二盅，姜三片，煎八分，不拘时服。咳甚加百合；身热加柴胡、黄芩；大便不利加蜜炙大黄一钱；小便涩滞加灯心、木通；烦躁兼血加白茅根；痛甚加人参、白芷。

四顺散

四顺散内有奇功 桔梗紫菀贝母同

甘草杏仁相协力 肺病喘嗽永无踪

治肺病吐脓，五心烦热壅闷，咳嗽气急不能安。

贝母 紫菀 桔梗各一钱五分 甘草 杏仁各七分

水二盅，煎八分，食远服。或为末，白汤调服二钱。

清金宁肺丸

清金宁肺贝甘陈 参桔归苓地骨芩

银柴天麦芎连芍 五味白术生熟凭

治肺病咳嗽日久，脓痰不尽，身热虚羸，渐成劳瘵者服之效。

陈皮 茯苓 桔梗 贝母 人参 黄芩各五钱 麦门冬 地骨皮

银柴胡 川芎 白芍 胡黄连各六分 五味子 天门冬 生地（酒浸，捣膏） 熟地（捣膏） 归身 白术各一两 甘草三钱

上为细末，炼蜜为丸如梧子大，每服七十丸，食远白滚汤送下。

人参五味汤

人参五味汤陈术 芪桔归苓枳地黄

桑皮柴前地骨草 肺病虚乏可煎尝

治气血劳伤，咳脓或咯血，寒热往来。羸瘦困乏，一切虚损之症并效。

人参 五味子 前胡 陈皮 白术 桔梗 当归 茯苓 熟地

甘草各一钱 黄芪 地骨皮 桑白皮 枳壳 柴胡各五分
水二盅，姜三片，煎八分，食后服。

紫菀茸汤

紫菀茸汤参犀角 冬花桑叶草半夏

杏仁百合与阿胶 贝母蒲黄姜莫却

治膏粱厚味，饮食过度，或煎炒、法酒，致伤肺气，咳嗽咽干、吐痰、唾血、喘急，胁痛不得安卧并服。

紫菀茸 犀角 炙甘草 人参各五分 桑叶（用经霜者） 款冬花
百合 杏仁 阿胶 贝母 半夏 蒲黄（生）各七分

水二盅，姜三片，煎八分，入犀角末，食后服。

排脓散

排脓散内用黄芪 白芷人参五味宜

每服三钱蜜调下 肺痈痰吐效堪奇

治肺痈已吐脓后，宜服此药，排脓移，补肺气。

黄芪 白芷 五味子 人参各等分

上为细末，每服三钱，食后蜜汤调服。

知母茯苓汤

知母茯苓汤桔芩 薄荷五味草人参

柴半冬花芎白术 阿胶麦冬仔细凭

治肺痿喘嗽，咳吐痰涎，或自汗盗汗，往来寒热。

茯苓 黄芩各一钱 知母 甘草 桔梗 薄荷 人参 五味子
柴胡 半夏 川芎 款冬花 白术 阿胶 麦门冬各六分

水二盅，姜三片，煎八分，加童便一杯，食后温服。

涤痰汤

涤痰汤内二陈先 麦冬枳实胆星前

人参桔梗黄连煎 竹茹加上病安然

治心火克肺金，久而不愈，传为肺痿，咽嗑嘶哑，胸膈痞闷，呕吐痰涎，喘急难卧者并服之。

陈皮 半夏 茯苓 甘草 麦门冬 胆南星 枳实 黄连 人

参 桔梗各五分 竹茹一钱

水二盅，煎八分，食后服。

宁肺丸

宁肺丸中二般药 乌梅粟壳去筋膜

每服二钱功有灵 肺病肺痿同堪嚼

治久嗽咯吐脓血，胸膈不利，咳嗽痰盛，坐卧不安，言语不出，甚则声音哑啞者服之。

乌梅蜜拌蒸，取肉八钱（捣膏） 罌粟壳（去膜，蜜拌炒为末）一两

用乌梅膏加生蜜少许调作丸，每服二钱，乌梅汤不拘时下。

清金二母汤

清金二母汤芩桔 知母苏柴术杏苓

萎桑五味陈皮麦 甘草当归共此呈

治肺痿多嗽少痰，午后发热，口干烦躁宁者。

知母 贝母 桔梗 茯苓 当归 白术 陈皮各一钱 桑皮 紫
苏 杏仁 柴胡 瓜蒌仁 黄芩 五味子 甘草 麦门冬各五分

水二盅，煎八分，童便一杯，食后服。

梔子仁汤

梔子仁汤大青叶 石膏淡豉共黄芩

杏仁知母赤芍药 升麻柴胡甘草行

治肺痿发热潮热，或发狂乱烦躁，面赤咽痛者。

梔子 仁赤 芍药 大青叶 知母各七分 黄芩 石膏 杏仁
升麻各一钱五分 柴胡六分 甘草五分 淡豆豉百粒

水二盅，煎八分，食远服。

加味理中汤

加味理中汤半夏 茯苓白术共陈皮

干姜细辛并甘草 人参五味效同推

治肺胃俱虚，咳嗽声重，发热不已，又兼脉浮数而无力者服之。

炙甘草 半夏 茯苓 干姜（泡） 白术 陈皮 细辛 五味子
人参各五分

水二盅，煎八分，食远服。

金鲤汤

金鲤汤中效罕稀 独将贝母效真奇

童子小便重汤顿 肺痈痰吐最堪医

治肺痈已成未成，胸中隐痛，咯吐脓血服之。

金色活鲤鱼一尾，约四两重 贝母一钱

先将鲤鱼连鳞剖去肚肠，勿经水气，用贝母细末掺在鱼肚内线扎之。用上白童子小便半大碗，将鱼浸童便内，重汤顿煮，鱼眼突出为度。少顷取起去鳞骨，取净鱼肉浸入童便内顿热；肉与童便作二、三次，一日食尽一枚，其功效甚捷。

葶苈散

葶苈散中薏苡仁 甘草桑皮用葛根

瓜蒌升麻桔梗等 肺痈服下可回春

治过食炙煿，或饮酒过度，致肺热气壅，喘急不卧。及肺痈浊吐腥臭，胸膈胀满不食者，并服之。

甜葶苈 桔梗 瓜蒌仁 川升麻 薏苡仁 桑白皮 葛根各一钱
炙甘草五分

水二盅，姜三片，煎八分，食后服。

肾气丸

治肾气素虚，不交于心，津液不降，败浊为痰，致生咳逆。

干山药四两 山茱萸(去核，酒拌)四两 泽泻(蒸) 牡丹皮(白者佳)
白茯苓各三两 熟地用生者八两(酒拌铜器蒸半日，砂器亦可，捣膏)

上为末，地黄煮烂，杵膏蜜丸如桐子大，每服七、八十丸，空心滚汤、盐汤、温酒送下。

肺痈应用方

金液戊土丹(见脱疽门)

卷之三

下部痈毒门

流注论第二十四

夫流注者，流者行也，乃气血之壮，自无停息之机；注者住也，因气血之衰，是以凝滞之患。故行者由其自然，住者由其瘀塞。其形漫肿无头，皮色不变，所发毋论穴道，随处可生。凡得此者，多生于体虚之人，勤劳之辈，不慎调燮，夏秋露卧，纵意取凉，热体当风，图身快爽；或中风邪，发散未尽，或欲后阴虚，外寒所侵。又或恼怒伤肝，郁结伤脾，荣气不从，逆于肉里；又或跌打损伤，瘀血凝滞；或产后恶露未尽，流宿经络。此等种种，皆成斯疾也。既成之后，当分表里、寒热、虚实、邪正、新久而治之。初因风寒相中，表症发散未尽者，人参败毒散散之。房欲之后，体虚寒气外侵者，五积散加附子温之。劳伤郁怒，思虑伤脾而成者，归脾汤加香附、青皮散之。跌扑伤损，瘀血凝滞而成者，复元活血汤逐之。产后恶露未尽，流注经络而成，木香流气饮导之。此皆初起将成之法，一服至三、四服皆可；外俱用琥珀膏敷贴，其中亦有可消者，十中五、六。如服前药不得内消者，法当大养气血，培助脾胃，温暖经络，通行关节，木香流气饮、十全大补汤俱加熟附子、香附培助根本；此则未成者自消，已成者自溃，已溃者自敛，而终无残败破漏不敛之症。且如有脓宜急开之。患者又当慎起居，戒七情，远寒就温，俱可保全；若误用寒凉剋伐、内消等药，终至不救者多矣。

流注看法

初起漫肿,皮色光亮,微热微疼,筋骨不欠强者为顺。已成身体微热,饮食有味,疼痛有时,肿生红色者顺。已溃脓稠而黄,肿消痛止,身体轻便,起坐如常者顺,溃后内肉易生,脓水易止,精神易复,脓口易合者顺。

初起身体发热,脉细而数,皮色微肿,痛彻筋骨者险。已成饮食少思,口干作渴,身体疼痛,四肢沉重者险。已溃脓水清稀,肿仍不消,虚热不退,疼痛不减者逆。溃后脓秽不止。肌肤瘦削,饮食不餐,发热皮粗者死。

流注治法

初因风寒表散未尽,而后复生肿痛者,再宜和解之。表邪已尽,而后复生流注者,宜清热消肿、行散气血。暴怒所伤,抑郁所致,胸膈痞闷,中气不舒,顺气宽中。肿硬已成而不得内消者。宜和气血,更兼补助脾胃。跌扑闪肭,瘀血凝滞为患者,宜调和气血、通行经络。寒邪所袭,筋挛骨痛及遍身疼痛者,温经络、行气血。产后败血流注关节致生肿痛者,当散败瘀、养气血。溃后脓水不止,而形衰食少者,宜滋气血、峻补脾胃。

流注治验

一男子风寒表散未尽,两腮肿痛,微热不退,小柴胡汤加川芎、天花粉、桔梗、连翘二服,余热顿退;又以二陈汤加桔梗、黄芩、牛蒡子、连翘四服,十日而安。

一男子劳伤受寒,背生三肿,皮色不变,寒热交作,至夜尤甚。先以万灵丹洗浴发汗,寒热顿退;惟肿硬不消,以琥珀膏敷之,三次其肿消痛止,渐渐而平。

一妇人因怒胁下结肿，将近半年方痛，此得之肝气郁结之症。以木香流气饮四服，其肿渐红，此日久之病必欲作脓，不可内消；又以十全大补汤加木香、香附、青皮十余服，其肿渐高；又以本方加皂角刺五服，其脓方溃，且清且多。此劳中所得者，元气已经亏损，其脓故多而清，以人参养荣汤加熟附子月余，脓稠且少，又本方倍参、芪、归、术两月而愈。

一男子元气素虚，因暴怒膊生肿块，疼痛牵强，寒热往来，饮食日减，以补中益气汤加香附、贝母十余服，寒热渐止；又以益气养荣汤月余而肿溃。间以八珍汤服之，外用附子饼日灸二次，脾胃健而安。

一孀妇项间乳上各肿一块，将近一年，渐大方痛，诊之脉细数而无力，此思虑过伤之病也。以归脾汤加桔梗、香附十余服，其肿渐高；外以琥珀膏敷之，肿顶红色；欲其作脓，又以十全大补汤加桔梗、贝母服之，半月脓熟；针之后，头腐脓清，虚热复作，食少不睡，仍以归脾汤间以逍遥散，服之三月而愈。

一男子平素怯弱，腰后微肿一块，饮食少思，口干发热，此得之肾伤之病也。治当朝以附桂八味丸，午用人参养荣汤扶植根本为要。彼以口干发热内火之故，欲投清凉之剂解之，予辞不敢治。请内医视之，以退热为主，正合病家之意。投药三剂，腹痛作泻，又以猪苓、泽泻、厚朴泄气等药，大热发作，形体更变，复请予治。予曰：死之速矣。伊不知因虚致病，法当滋补。况是腰间肿块，内肾受伤；口干作渴，肾水枯竭；发热不退，阴虚血少，今以有余之药而疗不足之症，岂有不死者。始信前误，又半月而死。

流注主治方

调和荣卫汤

调和荣卫汤甘草 陈独芎归芪大茜

赤芍白芷并乌药 牛膝红花相共随

治流注初起，气血凝聚，结肿不散，已成未成服。

川芎 当归 陈皮 独活各一钱 赤芍 白芷 乌药 大茴香
黄芪各八分 甘草(炙) 红花各五分 牛膝(下部加)

水二盅,煎八分,入酒一杯,量病上下服。

木香流气饮

木香流气饮芎归 苏桔青皮乌泽芪

枳壳槟榔防半夏 腹皮半芍膝甘随

治流注、瘰癧及郁结为肿。或血气凝滞,遍身走注作痛;或心胸痞闷,嗝咽不利,胁腹膨胀,呕吐不食,上气喘急,咳嗽痰盛,或四肢面目浮肿者并服之。

川芎 当归 紫苏 桔梗 青皮 陈皮 乌药 黄芪 枳实
茯苓 防风 半夏 白芍各一钱 甘草节 大腹皮 木香 槟榔 泽
泻 枳壳各五分 牛膝(下部加)一钱

水三盅,姜三片,枣一枚,煎八分,食远服。

木香流气饮的临床新用

1. 慢性结肠炎

杨越用本方治疗慢性结肠炎 62 例。如大便稀溏可去大黄。2 周为 1 个疗程,一般用药 1~2 个疗程。对照组采用氟哌酸,柳氮磺胺嘧啶,15 天为 1 个疗程。治疗组总有效率为 79.03%,无副作用发生。对照组总有效率为 56.25%,20 例出现胃痛、胃胀、食欲不佳。

杨越. 右江民族医学院学报,2004,26(5):755

2. 慢性胃炎

本方加减治疗慢性胃炎 80 例。方药:党参、白术、青皮、陈皮、生半夏、白芷、香附、紫苏叶、厚朴、槟榔、麦门冬各 15 克。反酸加白芨、乌贼骨、莱菔子各 15 克;胃寒加高良姜 10 克,甘草、大黄各 5 克;上腹疼痛加延胡索 20 克,白芍 30 克;体虚加黄芪 20 克。每日 1 剂,1 个月为 1 个疗程。有效率 96.3%。

刘新萍. 中医药信息,2004,21(1):21

3. 乳癖

何胜琳用本方治疗乳癖 18 例。若乳房触及肿块,形如梅李、鸡卵,质硬者,加三棱、莪术,每日 1 剂。10 剂为 1 个疗程。治疗结果 18 例中,痊愈 12 例,好转 5 例,无效 1 例。

何胜琳. 湖北中医杂志, 1993, 15(5): 18

六郁汤

六郁汤内用川芎 半夏陈苓香附同

甘栀苍术砂仁等 湿痰流注即时通

治诸郁结肿,及左右二搭相串,湿痰流注等症。

川芎 半夏 茯苓 香附 陈皮 山栀各一钱 苍术 砂仁 甘

草各五分

姜三片,水二盅,煎服。

附子八物汤

附子八物汤芎芍 熟地人参术茯苓

甘草肉桂当归等 木香姜枣效通神

治房欲后阴虚受寒,致生肿块,又或遍身腿脚疼痛,不能步履。

川芎 白芍 熟地 人参 白术 茯苓 当归 附子各一钱 肉

桂五分 木香 甘草各三分

水二盅,姜三片,枣一枚,煎八分,食远服。

疮科流气饮

疮科流气饮芎归 甘桔苏槟芍桂芪

防风枳壳香乌药 白芷人参厚朴随

治流注及一切郁怒凝滞气血,作肿疼痛;或胸膈痞闷,或风寒湿毒搏于经络,结成肿块者服。

当归 甘草 紫苏 人参 白芍 官桂 黄芪 防风 枳壳

乌药 桔梗 厚朴各七分 槟榔 木香 川芎 白芷各五分

水二盅,煎八分,食远服。

通经导滞汤

通经导滞汤香附 赤芍芎归熟地随

陈皮丹皮苏草节 牛膝红花独活奇

治妇人产后，败血流注，经络结成肿块疼痛者。

香附 赤芍 川芎 当归 熟地 陈皮 紫苏 牡丹皮 红花
牛膝 枳壳各一钱 甘草节 独活各五分
水二盅，煎八分，入酒一小杯，食前服。

香附饼

香附饼最散风寒 酒和调成患上安
熨底热攻寒气散 敢教苦楚即成欢
治风寒流注袭于经络，结成肿痛。用香附为末，酒和，量疮大小，
做饼覆患处；热熨斗熨药上，未成者自消，已成者自溃，风寒湿毒宜姜
汁作饼。

醒脾汤

醒脾汤中白术芪 人参酸枣地骨皮
茯神远志柴甘桔 香附木香共得宜
治怀郁抱结，思虑伤脾，致脾气不行，逆于肉里，乃生壅肿；疼痛不
眠，心烦不安，神气不清等症。

白术 黄芪 人参 茯神各一钱 酸枣仁 地骨皮 远志各七分
柴胡 甘草 桔梗 黄连 木香 香附各五分 龙眼肉七个
水二盅，姜三片，枣二枚，煎八分，不拘时服。

调中大成汤

调中大成汤术附 苓归芍药藿黄芪
砂仁远志丹皮草 肉桂煨姜黑枣随
治流注溃后，脓水清稀，饮食减少，不能生肌收敛。
白术 茯苓 归身 白芍 陈皮 山药 黄芪 牡丹皮各一钱
人参二钱 藿香 砂仁 远志 甘草各五分 附子 肉桂各八分
水二盅，煨姜三片，枣二枚，煎八分，食远服。

黄芪六一汤

黄芪六一汤甘草 加上人参三味奇
流注脓多并作渴 更兼烦躁效堪推

治流注溃后，脓水出多，口干作渴，烦躁不宁服之。

黄芪（半生、半蜜水炒）六钱 甘草（半生，半炙）一钱五分 人参一钱
水二盅，煎八分，食远服。

散血葛根汤

散血葛根汤半夏 芎防羌葛芷升麻

甘草细辛并苏叶 桔梗香附与红花

治跌扑伤损，瘀血凝滞，结成流注，身发寒热者。

干葛 半夏 川芎 防风 羌活 升麻 桔梗各八分 白芷 甘
草 细辛 苏叶 香附 红花各六分

水二盅，葱三根，姜三片，煎八分，不拘时服。

先天大造丸

先天大造丸归杞 熟地生苓兔肉黄

乌茅巴骨香牛膝 远志青盐故纸方

治风寒湿毒袭于经络，初起皮色不变，漫肿无头；或阴虚外寒浸入，初起筋骨疼痛，日久遂成肿痛，溃后脓水清稀，久而不愈，渐成漏症者服。

紫河车（酒煮，捣膏）一具 熟地黄（酒煮，捣膏）四两 归身 茯苓 人
参 枸杞 菟丝子 肉苁蓉（酒洗，捣膏） 黄精 白术 何首乌（去皮，用
黑豆同煮，捣膏） 川牛膝 仙茅（浸去赤汁，煮熟去皮，捣膏）各二两 骨碎补
（去心，微炒） 川巴戟（去骨） 破故纸（炒） 远志（去心，炒）各一两 木香
青盐各五钱 丁香三钱 黑枣肉二两

上为细末，炼蜜丸如桐子大，每服七十丸，空心温酒送下，此方非独流注成漏者。又补一切气血虚羸，劳伤内损，乃男妇久无嗣息，并有奇功。

琥珀膏

琥珀膏中用大黄 南星白芷郁金香

同蒜捣稠敷患处 管教流毒即安康

治一切皮色不变，漫肿无头，气血凝滞，结成流毒；毋论身体上下、年月新久，但未成脓者并效。

大黄二两 郁金 南星 白芷各一两

共为细末,用大蒜头去壳捣烂,入上药再捣稠,入酒一二匙调匀。遍敷肿上,纸盖;随即热痛,又有不痛,俱待药干便效。次日又有起泡,又有不起泡者,如有泡起,挑去泡中黄水,膏贴之自效。

流注应用方

十全大补汤 人参养荣汤 补中益气汤 益气养荣汤 八珍汤
(俱见痈疽溃疡门)

万灵丹(见痈疽肿疡门)

小柴胡汤 二陈汤(俱见瘰癧门)

乳痈论第二十五(附:乳岩)

夫乳病者,乳房阳明胃经所司,乳头厥阴肝经所属,乳子之母,不能调养,以致胃汁浊而壅滞为脓。又有忧郁伤肝,肝气滞而结肿,初起必烦渴呕吐,寒热交作,肿痛疼甚,宜牛蒡子汤主之。厚味饮食,暴怒肝火妄动结肿者,宜橘叶散散之。又忧郁伤肝,思虑伤脾,积想在心,所愿不得志者,致经络痞涩,聚结成核,初如豆大,渐若棋子;半年一年,二载三载,不疼不痒,渐渐而大,始生疼痛;痛则无解,日后肿如堆粟,或如覆碗,紫色气秽,渐渐溃烂,深者如岩穴,凸者若泛莲,疼痛连心,出血则臭,其时五脏俱衰,四大不救,名曰乳岩。凡犯此者,百人百必死。如此症知觉若早,只可清肝解郁汤或益气养荣汤,患者再加清心静养、无挂无碍,服药调理只可苟延岁月。……惟初生核时,急用艾灸核顶,待次日起泡挑破,用铍针针入四分,用冰蛭散条插入核内,糊纸封盖;至十三日,其核自落,用玉红膏生肌敛口,再当保养不发。又男子乳节与妇人微异,女损肝胃,男损肝肾,盖怒火房欲过度,以此肝虚血燥,肾虚精怯,血脉不得上行,肝经无以荣养,遂结肿痛。治当八珍汤加山栀、牡丹皮,口干作渴者加减八味丸,肾气素虚者肾气丸,已溃作脓者十全大补汤。怀孕之妇乳疾曰内吹。因胎气旺而上冲,致阳

明乳房作肿，宜石膏散清之，亦可消散；迟则迁延日久，将产出脓，乳汁亦从乳窍流出，其口难完，有此者，纯用补托生肌，其口亦易完矣。

乳痈乳岩看法

初起红赤肿痛，身微寒热，无头眩，无口干，微痛者顺。已成焮肿发热，疼痛有时，一囊结肿，不侵别囊者轻。已溃脓黄而稠，肿消疼痛渐止，四边作痒，生肌者顺。溃后脓水自止，肿痛自消，新肉易生，脓口易合者顺。

初起一乳通肿，木痛不红，寒热心烦，呕吐不食者逆。已成不热不红，坚硬如石，口干不眠，胸痞食少者逆。已溃无脓，正头腐烂，肿势愈高，痛热愈盛，流血者死。溃后肉色紫黑，痛苦连心，洩气日深，形体日削者死。

乳痈乳岩治法

初起发热恶寒，头眩体倦，六脉浮数，邪在表，宜散之。发热无寒，恶心呕吐，口干作渴，胸膈不利者，宜清之。忧郁伤肝，思虑伤脾，结肿坚硬微痛者，宜疏肝行气。已成焮肿发热，疼痛有时，已欲作脓者，宜托里消毒。脓已成而胀痛者，宜急开之。又脾胃虚弱，更兼补托。溃而不敛，脓水清稀，肿痛不消，疼痛不止，大补气血。结核不知疼痛，久而渐大，破后惟流污水，养血清肝。

乳痈治验

一妇人因怒左乳肿痛，寒热交作。以人参败毒散一剂，表症已退；又以牛蒡子汤，二服肿消，渐渐而安。

一妇人忧思过度，久郁成癆，左乳结核如桃半年，似痛非痛，咳嗽生痰，身发潮热，诊之脉微数而无力，此真气虽弱，而邪火尚未有余，如用药合理，亦堪调治。先用逍遥散加香附、贝母，十余服而咳嗽渐止，

寒热间作；又以八珍汤加香附、牡丹皮、柴胡、远志十余服，身热去其八、九；又以益气养荣汤加青皮、木香两月余，其胸膈得利，暖气得舒，饮食渐进，肌肤渐泽，外肿以阿魏化痞膏贴之，半年余而消。

一妇人右乳疼痛，肿如覆碗，诊之脉数有力，此有余症，欲作脓也。以托里消毒散，数服而胀痛，即针之出脓碗许，又以十全大补汤加香附十余服而安。

一妇人暴怒，左乳结肿疼痛，自服仙方活命饮，二服疼痛稍止，结肿不消；仍服清凉败毒之剂，肿痛反作，形体日弱，予诊之脉浮数而无力，此属真气虚而邪气实也，非补不可，以益气养荣汤四、五服，其肿始高，寒热亦退；又十余服而脓溃，兼以十全大补汤，两月而痊。此非纯补之功，其疾岂能得愈。

一男子年过五旬，因妻丧子不成立，忧郁伤肝，左乳结肿，半年痛甚作腐，肝脉弦数。先以小柴胡汤加青皮、山梔、远志、贝母，数服而肝脉稍平；又以八珍汤仍加前药十余服，其肿渐腐为脓；更服益气养荣汤，庶保收敛。彼为内医所惑。谓郁怒伤肝，肝经有火，不必用补，更服降火、流气、宽中等剂，致食少便秘，发热作渴，复请予治。肝脉复弦，口干作渴，邪火内淫；饮食减少，脾土受伤；便秘发热，阴血竭而为燥为热。已上俱内损症也，辞不治。后月余果死。

一妇人左乳结核，三年方生肿痛，诊之脉紧数而有力，此阳有余而阴不足也。况结肿如石，皮肉紫色不泽，此乳岩症也。辞不治。又一妇左乳结肿，或小或大，或软或硬，俱不为痛，已半年余，方发肿如覆碗，坚硬木痛，近乳头垒垒遍生疙瘩，时痛时痒，诊之脉弦而数，肿皮惨黑不泽，此气血已死，辞不可治。又一妇已溃肿如泛莲，流血不禁，辞后果俱死。

乳痈主治方

牛蒡子汤

牛蒡子汤瓜蒌仁 银花山梔甘草陈

黄芩连翘柴花粉 青皮牛子角针平

治乳痛、乳疽、结肿疼痛，毋论新久，但未成脓服。

陈皮 牛蒡子 山梔 金银花 甘草 瓜蒌仁 黄芩 天花粉
连翘 角针各一钱 柴胡 青皮各五分

水二盅，煎八分，入酒一杯和匀，食远服。

橘叶散

橘叶散内有柴陈 川芎山梔青皮迎

石膏黄芩连翘行 甘草加之效有灵

治妇人怀孕胎热为内吹，有儿吃乳名外吹。致乳结成肿痛，寒热交作，甚者恶心呕吐并服之。

柴胡 陈皮 川芎 山梔 青皮 石膏 黄芩 连翘各一钱 甘草五分 橘叶二十个

水二盅，煎八分，食远服，渣再煎服。

清肝解郁汤

清肝解郁汤陈芍 桔半芎归贝茯神

青皮生附并苏叶 通草山梔远志评

治一切忧郁气滞，乳结肿硬，不疼不痒，久渐作疼，或胸膈不利，肢体倦怠，面色痿黄，饮食减少。

陈皮 白芍 川芎 当归 生地 半夏 香附各八分 青皮 远志 茯神 贝母 苏叶 桔梗各六分 甘草 山梔 木通各四分

水二盅，姜三片，煎八分，食远服。

鹿角散

鹿角散效独称雄 消乳专于建大功

每服三钱酒调下 能教肿痛永无踪

治乳痛新起结肿疼痛，憎寒发热，但未成俱效。鹿角尖三寸，用炭火内煨稍红存性碾末，每服三钱，食后热酒一茶盅调服，甚者再一服必消。

回乳四物汤

回乳四物汤最灵 芎归白芍熟地呈

加上麦芽能散乳 最消肿胀得和平

治产妇无儿吃乳，致乳汁肿胀，坚硬疼痛难忍。

川芎 当归 白芍 熟地各二钱 麦芽(炒为粗末)二两

水二盅，煎八分，食远服。用脚布束紧两乳，以手按揉其肿，自然消散，甚者再用一服。

灸乳肿妙方

灸乳肿痛方来异 恼怒劳伤气不调

将碗覆于患上灸 诸般肿疼寂然消

治气恼劳伤，或寒热不调，乳内忽生肿痛。

用碗一只，内用粗灯草四根，十字排匀，碗内灯草头各露寸许，再用平山粗纸裁成一寸五分阔纸条，用水湿纸贴盖碗内灯草上，纸与碗口相齐；将碗覆于肿乳上，留灯草头在外，将艾大圆放碗足底内，点火灸之；艾尽再添，灸至碗口流出水气，内痛觉止方住，甚者次日再灸一次必消。

保安万灵丹(见痈疽肿疡门)

治乳痈初起，发热恶寒，头眩，肢体作痛者立效。

益气养荣汤(见瘰癧门)

治郁怒伤肝，七情内结，以致乳中生核，不疼不痒，日久方痛；甚者胸膈不利，吞酸呕吐，头目昏眩，四肢倦怠；或已破溃，脓水清稀，不能收敛，饮食减少，口淡无味，自汗盗汗，肢体羸瘦者并效。

治乳使用方

治乳蒲公英常说 同酒煎来乘热啜

再加葱汤催汗泄 消肿犹如汤泼雪

治乳痈初起肿痛未成脓者。

用蒲公英春秋间开黄花似菊，取连根蒂叶二两捣烂，用好酒半斤同煎数沸，存渣敷肿上，用酒热服，盖睡一时许，再用连须葱白汤一茶盅催之，得微汗而散。此方乡村偏僻无药之所用之极妙，亦且简便。

下乳天浆散

下乳天浆散四物 茯苓花粉麦门冬

王不留行并山甲 漏芦甘草木通逢

治乳母元气虚弱,乳汁微少,或生儿日久乳少。

川芎 当归 白芍 熟地 茯苓 天花粉 甘草 王不留行(炒)
麦门冬 漏芦 川山甲(炒) 通草各一钱

用健猪前蹄一只,煮蹄烂,取汁两碗,同药煎至碗半,二次顿热,食远服之。以热木梳梳其乳房,其汁如泉涌而来。

木香饼

木香饼同生地黄 二物和匀患上装

气滞肿疼并闪肭 用之一熨自无殃

治一切气滞结肿成核,或痛或闪肭,风寒所伤并效。

木香五钱 生地黄(捣膏)一两

上木香为末,同地黄和匀,量患处大小,作饼置肿上,以热熨斗熨之;坚硬木痛者,间日熨之妙。

乳痛应用方

十全大补汤 八珍汤(见痈疽溃疡门)

逍遥散 冰蛭散 小柴胡汤(见瘰癧门)

托里消毒散(见肿疡门)

阿魏化痞膏(见痞疾门)

附骨疽第二十六(附:鹤膝风)

夫附骨疽者,乃阴寒入骨之病也。但人之气血生平壮实,虽遇寒冷则邪不入骨。凡入者,皆由体虚之人,夏秋露卧,寒湿内袭;或房欲之后,盖覆单薄,寒气乘虚入里,遂成斯疾也。初起则寒热交作,稍似风邪;随后臀腿筋骨作疼,不热不红,疼至彻骨。甚者屈伸不能转侧,日久阴变为阳,寒化为热,热甚而腐肉为脓,此疽已成也。凡治此症,初起寒热作痛时,使用五积散加牛膝、红花发汗散寒,通行经络,或万

灵丹发汗亦可；次以大防风汤行经活血、渗湿补虚。又有生于尻臀部位漫肿作疼者，内托羌活汤；腿内近膝股，漫肿木痛者，内托芪柴汤；腿外侧者，内托酒煎汤。初起通用人参败毒散加木瓜、牛膝、苏木、红花，虚者十全大补汤加羌活、防己、牛膝；已成欲作脓者，附子八珍汤；脓成胀痛者，即针之；脓稠而黄体实者，十全大补汤；脓清色白体虚者，保元大成汤；食少体倦者，香砂六君子汤；脾虚寒热者，补中益气汤，以此调理可也。又有风湿相乘之症，初起寒热交作，次传腿肿作痛，其形光亮微红，发热肿痛，按之如泥不便起者，宜当归拈痛汤或茯苓佐经汤，间服万灵丹和之。以上之症，皆由元气不足中来，不可误用损脾、泄气、败毒等药，外禁寒凉等法，如误用之，必致气血冰凝，内肉瘀腐，日久化为污水败脓，流而不禁者终死。又有房欲劳伤，寒热互变，气血乖违，经脉横解，受病日深以成斯疾者，其患大腿渐渐肿如冬瓜，上过胯腹，下连足底，牵连漫肿，皮色不红，日久溃脓，色白腥秽，肿仍不消，痛仍不减，元气日衰，身体缩小，唇舌干焦，二便枯秘，诸药不效，饮食不进者，终为不治。又有鹤膝风，乃足三阴亏损之症。初起寒热交作时，亦宜五积散加牛膝、红花，或万灵丹发汗俱可；如汗后肿痛仍不消减，此阴寒深伏，以大防风汤温暖经络，重者兼灸膝眼二穴，敷以琥珀膏，亦可渐渐取效。又如以上之法俱不效者，终成痼疾，不必强药消之，只宜先天大造丸、史国公酒药每常服之，终年亦可转重就轻，移步行履，尚可图也。

附骨疽看法

初起身微寒热，饮食如常，结肿微红，疼不附骨者顺。已成举动自便，结肿成囊，疼痛有时，脓易成者为吉。已溃脓稠，肿消痛减，身体轻便，醒苏睡稳、不热者吉。溃后元气易复，饮食易进，内肉易实，脓水易干者吉。

初起身发寒热，漫肿色白，肢体牵强，疼痛附骨者险。已成举动不便，通腿漫肿，不热不红，不作脓者为险。已溃脓水清稀，气秽腥臭，肿痛不消，形体日削者死。溃后脾胃虚弱，饮食无味，口渴不止，唇白皮

枯者死。

附骨疽治法

初起发热恶寒,身体拘急,腿脚肿疼,脉浮紧者散之。已成腿脚肿痛,皮色不变,上下通肿者,散寒、温经络。寒热作肿,色白光亮,按之如泥不起者,宜健脾渗湿。身体无热恶寒,脉迟而涩,腿肿不热者,养血、温经络。暑中三阴,脉洪而数,腿脚焮肿,口干便燥者,宜下之。已溃脓水清稀,饮食减少,形体消瘦者,补中健脾胃。溃后肿痛不减,脓水不止,虚热不退者,温中养气血,愈后筋骨牵强,屈伸不便者,宜滋养气血,通利关节。

附骨疽治验

一男子中寒发散未尽,大腿肿痛,脉浮数而无力,此风寒未尽内虚故也。以五积散去麻黄加牛膝二服,疼痛稍减;又以内托黄芪酒煎汤,四服通肿俱消。惟腿外侧结肿一块不退,此瘀血凝滞欲作脓也,以托里药候脓熟针之,更以十全大补汤而敛。

一男子劳碌遇寒,每发腿痛,发则寒热呕吐,胸痞不食,此因气恼、饮食不节,脾胃受伤,故脾气有亏,饮食不能运化痰滞,中脘湿热动而下流注为脚气。以开结导引丸二服,行去停痰;又以半夏佐经汤数服,呕止膈利,更以附子六物汤,数剂消而不发。

一老人年六旬,过欲肾虚,致筋挛痹缩,脚膝无力,不能步履。外贴祛风逐湿膏,内服三因胜骏丸而愈。

一男子右腿肿痛两月余。予曰:脓已成久,何不开之?彼曰:二老医同治,具称内消无脓,其脓不知真否?此当再请二老决之。又曰:此必无脓。但患者昏沉不醒,命在铰笃。予强开之,出脓盆许,以独参汤连进二服而苏,后以十全大补汤调理百日外而安。

一男子房事后遇寒,大腿无形作痛,至夜尤甚,不能步履。医以散寒除湿、消痰止痛药治之,其疼益增,诊之脉细涩而无力,此气血不足,

寒气所乘之症。当以大防风汤，二剂疼痛顿减；又四剂，其疾痊愈。

一男子暑月浴后，当风睡卧，致寒气袭于左腿，遂成肿痛，寒热交作，胸痞不食。以保安万灵丹葱汤化服，洗浴发汗，以散骨髓寒毒。后以大防风汤去羌活加红花、破故纸温暖肾经，通行经络，肿痛渐消，血脉渐和，后以三因胜骏丸间服调理，两月而愈。

一监生似前浴后受寒，致成腿痛，予以暖肾经、温经络、散寒邪药治之。彼以为缓，请内医，投服表散之剂，外邪虽散，其内必虚。又以小柴胡汤等药调理，致虚热发作，口燥咽干，烦渴不已；又以知母石膏汤清其上，防风、木瓜、威灵仙等剂攻其下，众议纷纷，杂药妄进，致病愈剧，仍复请治，其时患腿愈肿，其形缩小，此必死症也。况此症原从肾经受寒，非附子、破故纸不能通达关节；非羌活、防风、牛膝不能通行闭滞；非人参、白术、炙甘草不能使脾气行达四肢；非川芎、当归、白芍、熟地、红花不能养血活血。凡病从虚而入者，先补其虚，后攻其病。况治此症，不加温补而反用发散解肌，以正风寒有余之法治之，不死何愈？后果死。医者众误，始信而服之。

附骨疽主治方

五积散

五积散 桂芎归桔 苍半麻陈芍茯苓

枳壳干姜并厚朴 白芷甘草共姜行

治风寒湿毒客于经络，致筋挛骨痛，或腰脚酸疼，或遍身拘急，或发热恶寒、头痛者，并宜服之。

苍术二钱 陈皮 桔梗 川芎 当归 白芍各一钱 麻黄 枳壳
桂心 干姜 厚朴各六分 白芷 半夏 甘草 茯苓各四分

姜三片，水二盅，煎八分，不拘时服。头痛恶寒者，加连须葱头三根，盖汗为效。下部加木瓜、牛膝。

内托羌活汤

内托羌活汤 苍柏 防桂连翘藁本芪

归尾陈皮兼甘草 红花加上效堪推

治尻臀患痛，坚硬肿痛，两尺脉紧数，按之无力。

羌活 黄柏 防风 归尾 藁本 肉桂各一钱 黄芪一钱五分 连翘 甘草 苍术 陈皮各六分 红花五分
水、酒各一茶盅，煎八分，食前服。

当归拈痛汤

当归拈痛汤二术 羌活防芩泽泻苓

升麻茵陈甘草节 人参知母要调匀

治湿热下注，腿脚生疮，赤肿作痛；或腰脚酸痛，或四肢遍身重痛，或下部顽麻作痒，或成血风。

羌活 当归 防风 茵陈 苍术各一钱 苦参 升麻 白术各七分
葛根 甘草 黄芩 知母 泽泻 猪苓 人参各五分 黄柏三分
水二盅，煎八分，食前服。

内托黄芪汤

内托黄芪汤黄柏 羌活当归生地黄

柴胡肉桂连翘等 木瓜加上效非常

治湿热腿内近膝股患痛，或附骨痛初起肿痛，此太阴厥阴之分也。脉细而弦，按之洪缓有力。

黄芪（盐水拌炒） 当归 柴胡 木瓜 连翘各一钱 羌活 肉桂 生地黄 黄柏各五分

水、酒各一盅，煎一半，空心热服。

内托酒煎汤

内托酒煎汤桂芪 柴胡连翘黄柏宜

甘草升麻大力子 煎同水酒效堪推

治寒湿发于腿外侧少阳经分患痛，或附骨痛坚硬漫肿作痛，或流至足阳明经作肿亦治之。

黄芪 当归各二钱 柴胡一钱五分 连翘 肉桂 大力子各一钱
升麻 黄柏 甘草各五分
水、酒各一茶盅，煎一半，食前服。

茯苓佐经汤

茯苓佐经汤半夏 二术陈皮草葛根

藿香泽泻柴胡等 木瓜厚朴共同行

治足少阳经为四气所乘,以致腰腿发热疼痛,头目昏眩,呕吐不食,胸膈不利,心烦热闷等症。

茯苓 陈皮 半夏 白术 苍术各一钱 藿香 泽泻 甘草 葛根 柴胡 厚朴 木瓜各五分

水二盅,姜三片,煎八分,食前服。

附子六物汤

附子六物汤甘草 防己白术桂枝苓

同水二钟姜三片 太阴足肿最消痿

治四气流注于足太阴经,骨节烦痛,四肢拘急,自汗短气,小便不利,手足或时浮肿,并皆服之。

附子 甘草各一钱 防己 白术 茯苓各八分 桂枝五分

水二盅,姜三片,煎八分,食远服。

麻黄佐经汤

麻黄佐经汤葛根 羌活防风苍术苓

防己甘草细辛等 桂心姜枣效通神

治风寒暑湿流注足太阳经,腰足挛痹,关节重痛,憎寒发热,无汗恶寒或自汗恶风、头痛等症。

麻黄 葛根 羌活 防风 苍术 茯苓 防己各一钱 桂心 细辛 甘草各五分

水二盅,姜三片,枣二枚,煎八分,食前服。

小续命汤

小续命汤芍白术 防风防己共人参

附子麻黄桂枝等 白芍黄芩甘草凭

治寒湿之气中于三阳,致身不热,所患烦痛或脚转筋,或肿或不肿,或膝腿顽痹,或时缓纵不随,或遍身百节挛痛,或小肠疝气攻冲并服之。

川芎 白术 防风 人参 防己 附子(生用) 麻黄(有汗去之)

桂心 黄芩 白芍各一钱 甘草五分

水二盅,煎八分,入姜汁一匙和匀,食前服。又暑中三阴,所患必热,去附子、减桂枝一半。

大防风汤

大防风汤术附归 参芍川芎杜仲芪

羌活牛膝并甘草 姜引加之熟地随

治三阴之气不足,风邪乘之,两膝作痛,久则膝愈大而腿愈细,因名曰鹤膝风,乃败症也。非此方不能治。又治附骨疽,皮色不变,大腿通肿,疼痛无奈,及痢后脚痛缓弱不能行,或腿膝肿痛。

人参二钱 防风 白术 附子 当归 白芍 川芎 杜仲 黄芪
羌活 牛膝 甘草 熟地各一钱

水二盅,姜三片,煎八分,食前服。

槟苏散

槟苏散内用木瓜 香附陈皮大腹加

羌活木香姜作引 敢教风湿疾无他

治风湿流注,脚胫酸痛,或麻痹不仁,呕吐不食。

槟榔 紫苏 木瓜 香附 陈皮 大腹皮各一钱 木香三分 羌
活五分

水二盅,姜三片,葱白三茎,煎一盅,空心服。

独活寄生汤

独活寄生汤茯苓 芎归防芍细辛参

桂心杜仲秦艽膝 熟地甘草共相平

治肝肾虚弱,风湿内攻,足胫缓纵或膝痹挛重。

独活二钱 茯苓 川芎 当归 防风 白芍 细辛 人参 桂心
杜仲 秦艽 牛膝 熟地 桑寄生(真者)各一钱 甘草五分

水二盅,姜三片,煎八分,食前服。

神应养真丹

神应养真丹木瓜 当归芍药共天麻

羌活熟地菟丝子 蜜丸酒服效堪夸

治厥阴经为四气所袭，脚膝无力，左瘫右痪，半身不遂，手足顽麻，言语謇涩，气血凝滞，遍身疼痛者并服。

当归 川芎 白芍 天麻 羌活 熟地(捣膏) 木瓜 菟丝子各等分

上为细末，入地黄膏加蜜，丸如桐子大，每服百丸，空心温酒、盐汤任下。

三因胜骏丸

三因胜骏膝附归 防麻枣熟木槿随

麝乳戟甘羌没藤 苍蝎苁蓉故纸宜

治元气不足，真气虚弱，及诸虚被寒，湿气侵袭，手足拳挛，脚趾连脚面拘急，走注疼痛，筋脉不伸，行步不随。常服益真气、壮筋骨，黑髭须、滑皮肤，一切足弱、鹤膝风症，膝愈大而腿愈细并治。

附子一枚(一两之外制之) 当归 明天麻 牛膝 酸枣仁 熟地(捣膏) 防风各二两 木瓜四两 全蝎(净身)一两 麝香一钱 乳香 木香

没药 羌活 甘草(炙)各五钱 槟榔 川草薢 肉苁蓉 破故纸巴戟(去心) 苍术各一两

上为细末，炼蜜丸桐子大，每服七十丸，空心淡盐汤、温酒任下。病近者七日，年深者半月见效。

健步丸

健步丸中用苦参 防风防己泽柴呈

羌活滑石瓜蒌等 甘草川乌肉桂抒

治生平好饮，食烧酒多，伤于脾肺，膝中无力，伸不能屈，屈不能伸，膝脊腿脚沉重，行步艰难者。

苦参酒洗 防己(酒浸，微焙) 羌活 柴胡 滑石(炒) 瓜蒌根 甘草各五钱 防风 肉桂各三钱 泽泻一两半 川乌(泡)二钱

上为细末，酒糊为丸如桐子大，每服三十丸，空心温酒送下。

大腹子散

大腹子散苏木瓜 羌荆赤芍木通加

独活桑皮并枳壳 甘草青皮效可夸

治风毒脚气上攻，寒热交作，肢节烦疼，心神壅闷。

大腹子 紫苏 木瓜 羌活 荆芥 赤芍 木通 独活 桑白皮 青皮各五分 枳壳一钱 甘草三分

水二盅，姜五片，葱白三茎，煎八分，空心服。

加味败毒散

加味败毒散人参 羌独前柴芎桔梗

茯苓枳壳同甘草 木瓜苍术此为能

治足三阳经湿热，毒气流注脚踝，焮赤肿痛，寒热如疟，自汗恶风，或无汗恶寒，或恶闻饮食者。

人参 羌活 独活 前胡 柴胡 川芎 桔梗 茯苓 枳壳 甘草 木瓜 苍术各八分

水二盅，姜三片，煎八分，食前服，便秘加炒大黄。

千里健步散

千里健步散奇功 细辛防风白芷同

加上草乌为细末 长安瞬息即时通

治远行两脚肿痛，若用之可行千里轻便甚妙。

细辛 防风 白芷 草乌

上等分为末，掺在鞋底内，如底干即以水微湿过，掺药着脚行走，自不吃力，再不作肿。

雷火神针

雷火神针效罕稀 丁香藜艾麝香随

风寒湿毒艰难病 针之患上效堪推

治风寒湿毒袭于经络为患，漫肿无头，皮色不变，筋骨疼痛，起坐艰难，不得安卧者，用此针之。

藜艾三钱 丁香五分 麝香二分

药与藜艾揉和，先将夹纸作筒如指粗大，用艾药叠实收用。临用以萧山纸七层平放患上，将针点着一头对患向纸捺实，待不痛方起针，病甚者再复一次，七日后，火疮大发，自取功效矣。

追风逐湿膏

逐湿膏中川草乌 麻藤星桂半草图

羌辛芷术归豨莶 大黄独活共相扶

治风寒暑湿相伤，以致骨节疼痛，筋挛不能步履，或麻木湿痹等症并效。

豨莶草 麻黄 川乌 风藤 半夏 南星 羌活 草麻子打碎
桂枝各三两 独活 细辛 当归 白芷 苍术 大黄各二两

以上药各切咀片，用葱汁、姜汁各二碗拌药先浸一宿。次日用香油半斤，同药入锅内慢火煎至葱、姜二汁将干，不报时，油方与药相煎渣枯为度；细绢滤清，每油一斤，下飞过炒丹十两为准配用，再将前油入锅内煎滚，以油滴水成珠不散方下黄丹，徐徐搅入，其膏已成；再下碾净松香净末一片四两，再同熬化，取下锅来，以盆顿稳，再下乳香、木香、胡椒、轻粉各末二两，白芥子细末四两，渐入搅匀，倾入钵内盛贮，渐用热汤顿化，绫缎摊贴。七日后，诸病可痊，百发百中。

附骨疽应用方

保安万灵丹（见痈疽肿疽门）

十全大补汤（见溃疡门）

小柴胡汤（见瘰癧门）

肠痈论第二十七

夫肠痈者，皆湿热、瘀血流入小肠而成也。又由来有三：一、男子暴急奔走，以致肠胃传送不能舒利，败血浊气壅遏而成者一也；二、妇人产后，体虚多卧，未经起坐，又或坐草艰难，用力太过，育后失逐败瘀，以致败血停积，肠胃结滞而成者二也；三、饥饱劳伤，提负重物，致伤肠胃，又或醉饱、房劳过伤精力，或生冷并进以致气血乖违，湿动痰生，多致肠胃痞塞，运化不通，气血凝滞而成者三也。总之，初起外症

发热恶寒，脉芤而数，皮毛错纵，腹急渐肿，按之急痛，大便坠重，小便涩滞若淋甚者，脐突腹胀，转侧水声，此等并见则内痈已成也。初起未成时，小腹殷殷作痛，俨似奔豚，小便淋涩者，当大黄汤下之，瘀血去尽自安，体虚脉细不敢下者，活血散瘀汤和利之。已成腹中疼痛，胀满不食，便淋刺痛者，薏苡仁汤主之。腹濡而痛，小腹急胀，时时下脓者，毒未解也，用牡丹皮汤治之。如脓从脐出，腹胀不除，饮食减少，面白神劳，此皆气血俱虚，宜八珍汤加牡丹皮、肉桂、黄芪、五味子敛而补之。如积袭日久，因循不识此症，误作胀病治之，以致毒攻内脏，肠胃受伤；或致阴器攻烂，腐靨黑斑，色败无脓，每流污水，腹连阴痛，烦躁不止，身热口干，衾帟多臭，卧房难进者，凡犯之俱为不治证，宜斟酌之。

肠痛看法

初起小腹疼痛，小便不利，六脉微缓，不作寒热者轻。已成小腹胀而坚硬，小便数而不利，六脉洪数者险。已溃时时下脓，里急后重，日夜无度，疼痛不减者重。溃后脓腥臭秽，或流败水浊瘀；虚热更增不食者死。

肠痛治法

初起小腹疼痛，或软或硬，脉芤数者，瘀血也，宜下之。小腹作痛有块，大便秘涩，小便如淋者，宜和而利之。已溃时时下脓，腹痛不止，饮食无味者，宜托而补之。产妇恶露不尽，流注小肠作痛脉数者，宜和而导之。腹胀日久，脐高突出，转侧响如水声，脓内蓄急针之。

肠痛治验

一男子小腹胀痛，里急后重，时时下脓，医作痢疾治之愈重，诊之脉芤而数，此小肠痈也。薏苡仁汤一服，下脓升许，随不坠重，更以牡丹皮散六服而安。

一幼妇产后月余，腹中渐痛，肿胀如蛊；内医纷纷认为蛊病。又月余，沉重昏愤，彼家已弃不治。请予视童稚疮恙，偶言此，予讨诊之。彼时人虽昏愤不苏，诊之其脉细数有力，此内痈脓病也，犹似不妨。彼家曰：无生之理。予曰：腹肿上见而按之，一决其生何如？随视肿皮，紧急光亮，脐下大热，此内痈不妨，乃万无一失之病。彼家欢悦，吩咐先备净桶，用滚汤半桶盖之听用，先以薏苡仁汤加酒炒大黄二钱，徐徐灌服，待腹中觉痛，搭起患者坐桶上，热气熏蒸，其脓下如涌泉，连汤与脓，约共满桶，其患即苏。更服八珍汤加牡丹皮、五味子，调理月余而安。

一妇人小腹胀痛，小便如淋，诊之脉缓而扎。此得之行经时误餐生冷，又兼恼怒，肝火急驳瘀血而成内痈。脓尚未成也，以大黄汤下之，瘀血出尽而安。

一妇人小产，瘀血未尽，劳动之早，小腹内外肿痛月余，大便秘燥，小便涩滞，口燥咽干，烦闷不睡。内医调理其病日重，偶见问之。予曰：恐内痈也。请视脉数实而有力，此肠痈已成。用薏苡仁汤加大黄一服，下脓数腕，胀痛顿退；外肿坚硬不散，仍熨作痛，此欲溃脓从外泄也，以十全大补汤，三服脓胀痛而针之；更服八珍汤加牡丹皮、五味子，月余而敛。

一妇人腹胀如鼓，脐突寸许，小水涩滞，转侧腹有水声，此内脓已成。用针刺脐上突顶，出脓盆许；以牡丹皮散五、六剂，其脓渐少，朝以八味丸，暮以八珍汤加泽泻、牡丹皮、黄芪、破故纸服之，月余而愈矣。

肠痈主治方

大黄汤

大黄汤中用朴硝 丹皮白芥不相饶

加上桃仁病即消 肠痈腹痛自然调

治肠痈小腹坚硬如掌而热。按之则痛，肉色如故；或焮赤微肿，小

便频数,汗出憎寒,脉紧实而有力,日浅未成脓者,宜服之。

大黄(炒) 朴硝各一钱 牡丹皮 白芥子 桃仁(去皮尖)各二钱
水二盅,煎八分,食前或空心温服。

大黄汤的临床新用

1. 肠麻痹

陈佐会在常规治疗肠麻痹的基础上,加用本方保留灌肠治疗,每次100~150毫升,每天2~4次,直到肠功能恢复正常。对照组按常规方法治疗。结果:大黄辅助治疗组的治疗显效率和总有效率均明显高于常规治疗组,两组治疗效果存在差异显著性($P < 0.01$)。

陈佐会. 中华实用中西医杂志,2005,18(19):1175

2. 慢性肾功能衰竭

陈吉在采用上述西医治疗的基础上,另加大黄汤保留灌肠。病情严重者每日灌肠2次,以每天排便2~4次为宜。结果有效率85%。

陈吉. 中华临床医药杂志(北京),2004,5(16):115

3. 慢性前列腺炎

刘艳春等用本方配合氟哌酸口服、静滴甲硝唑治疗慢性前列腺炎38例,有效率94.3%。

刘艳春,等. 临床军医杂志,2003,31(1):109

4. 子宫肌瘤

本方治疗子宫肌瘤,全部病例双侧子宫动脉血流完全阻断。药用:大黄、水蛭各10克,桃仁12克,党参、黄芪、茯苓各20克,白术15克,白芍20克,柴胡12克,山茱萸、女贞子各15克,菟丝子12克,沙苑子15克,全蝎10克,鳖甲15克,益母草20克。每日1剂,疗程1个月,连续服用3个疗程。对照组子宫动脉栓塞术后不加任何药物。结果与对照组比较,治疗组腹痛、发热、胃肠道反应、肢体乏力等症状消失改善早,阴道流血持续时间缩短;月经过多、经期延长改善早,经期出血量较对照组减少17% ($P < 0.05$),卵巢内分泌激素无变化;子宫

及肌瘤缩小改善早,肌瘤较对照组缩小 22.7% ($P < 0.05$)。

周妙英,等. 辽宁中医杂志,2003,30(7):561

5. II 型糖尿病

周军怀自拟芪麦大黄汤随症加减治疗 II 型糖尿病 98 例。药用:生黄芪 40 克,麦冬 15 克,熟大黄 10 克,人参 10 克,天花粉 20 克,玉竹 10 克,五味子 10 克,淮山药 15 克,石斛 10 克,丹参 20 克,泽泻 20 克,生地 15 克,川芎 10 克。肺燥津亏加沙参、知母、天冬、桑白皮、金荞麦根等;胃燥津伤加石膏、熟地、黄连、葛根、荸荠等;肾阴亏虚加枸杞、枣皮、熟地、黄连、女贞子、旱莲草等;阴阳两虚加附片、肉桂、覆盆子、桑螵蛸、金樱子等。1 日 1 剂,同时加服小剂量格列齐特。1 个月为 1 个疗程,连续 2 个疗程。结果:总有效率 FBG 为 88.78%、PBG 为 89.8%。

周军怀. 湖南中医药导报,2001,7(11):548

活血散瘀汤

活血散瘀汤赤芍 芎归苏木与丹皮

瓜蒌枳壳桃仁等 槟榔加上大黄随

治产后恶露不尽,或经后瘀血作痛,或暴急奔走,或男子杖后,瘀血流注肠胃作痛,渐成内痛,及腹痛大便燥者,并宜服之。

川芎 归尾 赤芍 苏木 牡丹皮 枳壳 瓜蒌仁(去壳) 桃仁(去皮尖)各一钱 槟榔六分 大黄(酒炒)二钱

水二盅,煎八分,空心服,渣再煎服。

牡丹皮散

牡丹皮散芍参芪 茯苓薏苡牡丹皮

甘草白芷芎归等 桃仁官桂木香宜

治肠痛腹濡而痛,以手重按则止,或时时下脓。

人参 牡丹皮 白芍 茯苓 黄芪 薏苡仁 桃仁 白芷 当归 川芎各一钱 甘草 官桂各五分 木香三分

水二盅,煎八分,食前服。

七贤散

七贤散内参山药 萸肉丹皮熟地黄

茯苓还有黄芪辈 姜枣同煎理内伤

治肠痢溃后,疼痛淋漓不已;或精神减少,饮食无味,面色痿黄,四肢无力,自汗盗汗,睡卧不宁。

茯苓 山药 牡丹皮 山茱萸 熟地黄 人参各一钱 黄芪二钱
水二盅,煨姜三片,大枣二枚,煎八分,食前服。

失笑散

失笑散用五灵丹 还有蒲黄相更随

心腹诸疼并疝痛 吞之即可乐嘻嘻

治产后心腹绞痛欲死,或血迷心窍,不省人事,及寻常腹内瘀血或积血作痛。又妇人血气为病作痛之圣药也,及治男子诸疝疼痛不已者。

五灵脂 蒲黄(俱炒)等分

上为细末,每服三线,醋一合,调稠熬数滚,入水一盅,煎七分,食前连药服用,醋为丸,每服二钱,淡醋汤下,治前症亦妙。

失笑散的临床新用

1. 室女痛经

本方治疗室女痛经 46 例。药用:肉桂 3 克(后下),干地黄 20 克,炒白芍 30 克,当归 10 克,炙甘草 6 克,乌药 10 克,失笑散 15 克(包煎)。若腰痛甚加川续断、桑寄生;畏寒明显加补骨脂、桂枝;呕吐加姜半夏、陈皮;腹泻加炒白术、怀山药。总有效率 91.3%。

承小敏. 四川中医, 2005, 23(10): 87

2. 慢性盆腔炎

本方治疗慢性盆腔炎 80 例。药用:五灵脂 10 克,蒲黄 10 克,当归 10 克,赤芍 15 克,白芍 15 克,香附 10 克,郁金 10 克,丹参 15 克,益母草 30 克,栀子 15 克,甘草 5 克,败酱草 30 克。每日 1 剂,1 个月为 1 个疗程。对照组服用妇科千金片。结果治疗组总有效率 89%,对照组有效率 63%。

林秋燕. 中华现代中西医杂志, 2005, 3(13): 1222

3. 药物流产后宫内组织残留

黄瑛治疗药物流产后宫内组织残留 30 例。在给予抗感染、止血剂治疗基础上服本方与生化汤加减: 当归、川芎、桃仁、生蒲黄、五灵脂、川牛膝、炮姜、香附各 10 克, 乳香、没药、甘草各 6 克。每天 1 剂, 共 6 剂。气虚夹瘀伴小腹空坠者加党参、北芪; 瘀久化热、恶露臭秽者加红藤、败酱草。治愈 24 例, 有效 5 例, 无效 1 例。

黄瑛. 现代中西医结合杂志, 2005, 14(11): 1450

4. 药流后阴道出血

本方合生化汤加味治疗药流后阴道出血。药用: 当归、川芎、桃仁、香附、柴胡、五灵脂、炒蒲黄各 10 克, 益母草 30 克, 赤芍药 12 克, 白芍药 12 克, 炙甘草 6 克。出血多加茜草 10 克, 三七粉(冲) 3 克; 腹痛加川楝子、延胡索各 10 克; 出血日久血虚加熟地黄 10 克, 阿胶(烔) 20 克, 黄芪 20 克; 热重加栀子 10 克, 黄柏 5 克; 瘀血内阻加血竭 10 克, 丹参 10 克。日 1 剂。本组 36 例, 治愈 26 例, 有效 7 例, 无效 3 例。

张新华. 河北中医, 2005, 27(1): 18

5. 冠心病心绞痛

本方加味治疗冠心病心绞痛获效。若夹痰浊者合瓜蒌薤白半夏汤加减; 夹寒凝者加荜拨、桂枝、细辛等; 兼气滞者加厚朴、玄胡、郁金等, 兼阳虚者加黄芪等, 兼阴虚者加西洋参、麦冬、五味子等。每日 1 剂, 1 月为 1 个疗程, 2 个疗程后评定疗效。观察期间停服其他治疗冠心病的主要药物, 心绞痛发作时予以硝酸甘油或速效救心丸舌下含服。显效 23 例, 有效 32 例, 无效 5 例。

王远怀, 等. 中国现代医药, 2005, 4(2): 68

6. 功能性子宫出血

王德余等用四物汤合失笑散加味治疗功能性子宫出血 136 例。药物组成: 当归 10 克, 炒白芍 10 克, 川芎 3 克, 炒桃仁 10 克, 红花 10 克, 蒲黄炭 10 克(包煎), 炒五灵脂 10 克(包煎), 制香附 12 克, 茜草炭 10 克, 小蓟炭 10 克, 三七粉 2 克(冲)。每日 1 剂, 水煎 2 次, 连服 3

剂。结果:痊愈116例,占85.3%;好转16例,占11.8%;无效4例,占2.9%,总有效率为97.1%。

王德余,等. 中国社区医师,2005,7(1):39

7. 子宫肌瘤

本方合黄药子治疗子宫肌瘤5例。药用:五灵脂15克,蒲黄10克(包煎),黄药子15克。每日1剂煎服,20天为1个疗程。气虚加黄芪30克;血虚加当归15克,白芍15克,熟地20克,制首乌20克;腰痛加桑寄生30克,川续断20克;月经量多加贯众30克,侧柏叶20克,仙鹤草20克;白带量多加土茯苓30克,败酱草30克。服药3个疗程。B超检查提示:其中有3例患者肌瘤已消失,1例患者肌瘤缩小,1例患者肌瘤没有变化。

熊招. 中国民族民间医药杂志,2004,(3):161

8. 子宫内膜异位症

本方加味治疗子宫内膜异位症38例。药物组成:蒲黄12克,五灵脂10克,当归10克,川芎10克,赤白芍各10克,桂枝10克,生黄芪20克,淮牛膝15克,生地12克,炙没药10克,续断30克,菟丝子30克,香附15克,甘草6克。肝郁气滞加柴胡、川楝子;经血夹块加红花、益母草;纳食少加白术、鸡内金;带下色黄加炒地榆、败酱草。每日1剂,每次月经周期前1周开始服用,连服10天,3个月经周期为1个疗程。结果:治愈15例,好转20例,无效3例,总有效率为92%。

邱江红. 云南中医中药杂志,2004,25(3):14

9. 过敏性紫癜

本方合桃红四物汤加味治疗过敏性紫癜51例获效。在给予黄芪注射液、香丹注射液静脉滴注基础上,口服桃红四物汤合失笑散加味。药物组成:桃仁10克,红花10克,川芎10克,白芍10克,生地黄12克,当归10克,蒲黄15克,五灵脂6克,天花粉10克,苦参6克,牡丹皮12克,丹参10克,白鲜皮10克。10~15天为1个疗程。

王纪云,等. 中国中医药信息杂志,2004,11(1):60

10. 老年带状疱疹

乔艳贞等以柴胡疏肝散合失笑散为基础方加减治疗老年带状疤

疹 103 例。方药组成:柴胡 10 克,赤芍、白芍各 10 克,川芎 10 克,枳壳 9 克,陈皮 6 克,香附 9 克,蒲黄 10 克,五灵脂 15 克,马齿苋 15 克,甘草 6 克,淡竹叶 3 克。疼痛甚者加醋延胡索 15 克,醋郁金 15 克,细辛 3 克;热象重者加黄芩 10 克,大青叶 30 克,板蓝根 20 克,栀子 10 克;痰湿盛者加竹茹 6 克,泽泻 15 克,大黄 10 克;倦怠乏力者加黄芪 15 克,白术 10 克;肝胆热盛者加龙胆草 10 克;血瘀明显者加重蒲黄、五灵脂用量。上药加水、醋适量,每日 1 剂,早晚分服。7 天为 1 个疗程,病情轻者服 1 个疗程,病情重者连服 2~3 个疗程,治疗期间停用其他药物,并保持皮肤局部干燥、清洁,注意休息,忌食辛辣肥甘厚味。总有效率为 93.2%。

乔艳贞,等. 吉林中医药,2004,24(5):32

11. 食管源性胸痛

谢静用戊己丸合失笑散加味治疗食管源性胸痛 90 例。药物组成:黄连、吴茱萸各 3 克,白芍 15 克,五灵脂(包煎)、蒲黄(包煎)各 10 克。热象明显者黄连倍量,寒象偏胜者吴茱萸倍量;兼阴虚者加百合、石斛、乌梅;气血虚者加黄芪、当归、阿胶;痰湿者加半夏、大贝母。每日 1 剂,分早、晚水煎服,2 周为 1 个疗程。治疗组总有效率 92.3%。

谢静. 实用中医药杂志,2004,20(11):625

12. 黄体破裂

严宇仙以失笑散和桂枝茯苓散为基本方治疗黄体破裂 13 例。药用:蒲黄 10 克,五灵脂 10 克,桂枝 10 克,茯苓 10 克,丹皮 10 克,桃仁 10 克,赤芍 10 克,当归 12 克,败酱草 30 克,红藤 30 克,香附 12 克,山甲 10 克,川楝子 10 克,玄胡 10 克。其中服药 10~15 剂痊愈的 4 例,15~20 剂痊愈的 6 例,服用 20 剂以上痊愈的 3 例。

严宇仙. 职业与健康,2001,17(2):123

13. 前列腺痛

朱明自拟加味失笑散治疗前列腺痛 42 例。药物组成:蒲黄(布包)、泽兰、王不留行、牛膝各 15 克,五灵脂、元胡、川楝子各 10 克,三七粉(冲服)、琥珀粉(冲服)各 3 克。会阴部胀痛较甚,舌有瘀斑者加

乳香、没药、丹参；小便淋漓不尽，或有尿频急较甚者加用车前子、白茅根、蒲公英；伴有阳痿、早泄者，加用仙灵脾、金樱子、菟丝子。水煎服，每日1剂，分2次服用，连服2周为1个疗程。总有效率92.9%。

朱明．实用中医药杂志，2001，17(4)：9

14. 肾绞痛

巫德文用失笑散合四逆散治疗肾绞痛48例。处方：生蒲黄15克，生五灵脂15克，柴胡10克，枳实12克，白芍15克，炙甘草6克。若尿频、尿急、尿坚涩、尿色黄赤明显者，加木通10克，精石30克，白茅根30克；大便秘结者，加大黄10克(后下)，芒硝10克(冲服)；年老体弱者加黄芪15克，党参12克。服法：每日1~1.5剂，水煎，分3次口服，收效显著。

巫德文．江西中医药，1995，26(4)：9

15. 高脂血症

苏文凝用失笑散加味治疗高脂血症疗效显著。药物组成：蒲黄15克，五灵脂15克，生黄芪15克，茯苓30克，泽泻15克。每日1剂，分早晚2次服用。对照组：应用绞股蓝总甙片治疗，每日3次，治疗组有效率高于对照组。

苏文凝．天津中医学院学报，1996，15(4)：20

排脓散

排脓散内用黄芪 白芷芎归山甲宜

银花再兼瓜蒌等 防风加上效堪推

治肠痈小腹胀痛，脉滑数，里急后重，时时下脓。

黄芪 当归 金银花 白芷 川山甲 防风 川芎 瓜蒌仁各一钱

水二盅，煎八分，食前服。或为末，每服二、三钱，食远蜜汤调下亦可。

瓜蒌子汤

瓜蒌子汤薏苡仁 桃仁丹皮共此呈

产后恶露并瘀血 肠胃停来用此清

效。治产后恶露不尽,或经后瘀血停滞肠胃作痛,纵非是痛,服之亦

薏苡仁四钱 桃仁 牡丹皮 瓜蒌仁各二钱
水二盅,煎八分,食前并空心服。

薏苡仁汤

薏苡仁汤功效奇 肠痛腹痛最堪医
桃仁加上瓜蒌子 白芍丹皮在后随
治肠痛腹中疼痛,或胀满不食,小便涩滞,妇人产后多有此病,纵非痛,用之尤效。

薏苡仁 瓜蒌仁各三钱 牡丹皮 桃仁(去皮尖)各二钱 白芍一钱
水二盅,煎八分,空心服。

肠痛应用方

八珍汤 十全大补汤 八味丸(俱见溃疡门)

脏毒论第二十八

夫脏毒者,醇酒厚味,勤劳辛苦,蕴毒流注肛门结成肿块。其病有内外之别,虚实之殊。发于外者,多实多热,脉数有力,肛门突肿,大便秘结,肚腹不宽,小水不利,甚者肛内肉泛如箍,孔头紧闭,此为外发,属阳易治。宜四顺清凉饮、内消沃雪汤通利大小二便;痛甚者,珍珠散、人中白散搽之;脓胀痛者针之。发于内者,属阴虚湿热渗入肛门,内脏结肿,刺痛如锥,小便淋沥,大便虚秘,咳嗽生痰,脉数虚细,寒热往来,遇夜尤甚,此为内发,属阴难治。宜四物汤加黄柏、知母、天花粉、甘草,兼以六味地黄丸调治,候内脏脓出则安。又有生平性情暴急,纵食膏粱,或兼补术,蕴毒结于脏腑,火热流注肛门,结而为肿,其患痛连小腹,肛门坠重,二便乖违,或泻或秘,肛门内蚀,串烂经络,污水流通大孔,无奈饮食不餐,作渴之甚,凡犯此未得见其有生。又有虚

劳久嗽，痰火结肿肛门如粟者，破必成漏，沥尽气血必亡。此二症乃内伤之故，非药可疗，不可勉治也。

脏毒看法

初起肿痛，红色光亮，疼痛有时，肛门不坠、便和者易。已成掀赤肿痛，发热不渴，小便不数，辗转自便者顺。已溃脓稠，色鲜不臭，脓中渐消，疼痛渐减、能食者顺。溃后脓水渐止，新肉易生，不疼多痒，疮口易干者顺。

初起坚硬漫肿，内脏闭痛，小便频数，大便秘结者险。已成疼痛日甚，肿连小腹，肛门闭紧，下气不通者重。已溃臭水淋漓，疼痛不减，肿仍不消，身热唇焦者逆。

脏毒治法

初起寒热交作，大便坠痛，脉浮数者，宜用轻剂解散。已成内热口干，大便秘结，脉沉实而有力者，当下之。肛门肿痛，常欲便而下坠作痛者，导湿热兼泻邪火。肛门掀肿疼痛，小便涩滞，小腹急胀者，清肝、利小水。出脓腥臭，疼痛不减、身热者，养血、健脾胃，更兼渗湿。脓水清稀，脾胃虚弱，不能收敛者，滋肾气，急补脾胃。

脏毒治验

一男子肛门肿突，红紫痛甚。以内消沃雪汤二服，大便已通数次，疼痛稍减；外肿上以珍珠散清蜜调搽，早晚二次，其肿渐消，更以凉血地黄汤而痊愈。

一妇人产后用力太过，肛门坠肿，疼痛之甚。先以枳壳、紫苏煎汤熏洗，后以珍珠散加冰片、猪脊髓调搽，内以四物汤加升麻、苍术、丹皮、枳壳服之而消。

一男子夏月好饮火酒，热毒流入肛门，结肿坚硬，形色紫黑，坠痛

便秘。以黄连解毒汤加大黄、枳壳，二剂便通，疼痛稍止；又以四物汤合前汤数剂，其肿渐消。存坚肿粟大不散，以脏连丸服至月余而愈。

一妇人肛门肿突，坚硬痛极。用攻利、解毒药俱不应，以神灯照法照之，早晚二次，其疼方减。以蟾酥锭磨浓涂之，坚硬渐腐为脓；仍服内消沃雪汤，二剂便通，疼苦减其大半。又以四物汤加黄柏、知母、厚朴、苍术，外以珍珠散加冰片、猪髓调搽，月余而平。

一男子素有内痔便血，常欲脱肛。一朝肛门坠重不收，肿痛突起，光亮紫色，此湿热流注结肿，固难收入，以黄连除湿汤二剂，外用珍珠散加冰片清蜜调涂，其肿痛渐减；后以补中益气汤加生地、黄连、苍术、天花粉、牡丹皮，服之数剂，其肿痛渐减而平。

一监生素性急暴，每纵膏粱，因积毒流于大肠，内如针刺，外肛不肿，常欲后重，便则秘结，诊之脉空数而无力，此真气不足，邪火有余，内脏亏损症也。后必难痊，辞不可治。后请别医，用药月余，肛门内腐，败水无禁，复请视之。予曰：决不可疗也。脉来虚数，邪胜正也；手掌不泽，脾气败也；至夜发热，阴虚火旺；败水无禁，幽门已坏；面若涂脂，元气走散；鼻如烟煤，肺气将绝；口干舌燥，肾水已竭，犯此岂有不死之理？患者不服，强用解毒、滋阴药饵，不效而死。

脏毒主治方

黄连除湿汤

黄连除湿汤 芩朴 苍术陈归枳壳翘

防风甘草硝黄等 脏毒悬痛此莫逃

治脏毒初起，湿热流注肛门，结肿疼痛，小水不利，大便秘结，身热口干，脉数有力，或里急后重。

黄连 黄芩 川芎 当归 防风 苍术 厚朴 枳壳 连翘各一钱 甘草五分 大黄 朴硝各二钱

水二盅，煎八分，空心服。

凉血地黄汤

凉血地黄汤 连芍 生地芎归术地榆

人参花粉茯苓草 山梔加上效应桴

治脏毒已成未成、或肿不肿，肛门疼痛，大便坠重，或泄或秘，常时便血，头晕眼花，腰膝无力者。

川芎 当归 白芍 生地 白术 茯苓各一钱 黄连 地榆 人参 山梔 天花粉 甘草各五分
水二盅，煎八分，食前服。

内托黄芪散

内托黄芪散芍归 川芎山甲共陈皮

角针白术槟榔等 脏毒将成此药医

治脏毒已成，红色光亮，已欲作脓，不必内消，宜服此药溃脓。

川芎 当归 陈皮 白术 黄芪 白芍 穿山甲 角针各一钱
槟榔三分

水二盅，煎八分，食前服。

黄连解毒汤（见痢疽肿疡门）

治好饮酒法，纵食膏粱，积热流入大肠，致肛门结成肿痛，疼刺如锤，坚硬如石宜服。

金液戊土膏（见痢疽门）

治脏毒出于骄奢情性，惯于急暴，烈火猖狂，思不如愿，水已枯竭，火不发泄，旺而又郁，郁而又旺，以致肛门结肿，毒攻内脏，痛如芒刺，炽如火炕，臭水淋漓，生命难望，宜服此药，免生惆怅也。

珍珠散（见下疳门）

治肛门肿泛如箍，红紫急胀，坚硬痛极。本方加冰片研极细，猪脊髓调涂患上，早晚日用二次。

脏毒应用方

六味地黄丸（见肺癰门）

四顺清凉饮（见汤泼火烧门）

内消沃雪汤 神灯照法 蟾酥錠（俱见肿疡门）

四物汤 补中益气汤(俱见溃疡门)

人中白散 珍珠散(俱见下疳门)

脏连丸(见痔疮门)

痔疮论第二十九

夫痔者,乃素积湿热,过食炙煿,或因久坐而血脉不行,又因七情而过伤生冷,以及担轻负重,竭力远行,气血纵横,经络交错;又或酒色过度,肠胃受伤,以致浊气瘀血流注肛门,俱能发痔。此患不论老幼男妇皆然,盖有生于肛门之内,又突于肛外之傍。治分内外,各自提防。大者若莲花、蜂巢、翻花、鸡冠、菱角、珊瑚等状;小者如樱珠、鼠尾、牛奶、鸡心、核桃、蛭肉之形。故积毒深者,其形异而顽恶;毒浅者,其形正而平常。久则崩溃成漏。新则坠肿刺疼,甚者粪从孔出,血从窍流,气血日有所伤,形容渐有所削,若不早治,终至伤人。因常治法多用针刀、砭、硃、线坠等法,患者受之苦楚,闻此因循都不医治。予疗此症,药味数品,从火煅炼,性即纯和,百试百验,此方法由来异矣。凡疗内痔者,先用通利药荡涤脏腑,然后用唤痔散涂入肛门,片时内痔自然泛出,即用葱汤洗净,搽枯痔散,早、午、晚每日三次,次次温汤洗净搽药,轻者七日,重者十一日,其痔自然枯黑干硬。停止枯药,其时痔边裂缝流脓,换用起痔汤日洗一次,待痔落之后,换搽生肌散或凤雏膏等药生肌敛口,虚者兼服补药,其口半月自可完矣。外痔者,用消毒散煎洗,随用枯痔散照内痔搽法用之,首尾至终无异,完口百日入房乃吉。又至于穿肠久漏者,此则另有二方,亦具于后,以致深患者服之,又不用针刀,挂线,效如拾芥耳。

痔疮看法

初起形如牛奶,不肿不红,无焮无痛,行走不觉者轻。已成肿痛,有时遇劳而发,或软或硬,头出黄水者轻。久如鸡冠、蜂巢、莲花、翻花等状,流脓出血不止者重。久漏穿通臀腿,脓水淋漓,疼痛不已,粪从

孔出者逆。

痔疮治法

初起及已成渐渐大而便涩作痛者，宜润燥及滋阴。肛门下坠，大便出血，时或疼痛坚硬者，宜清火渗湿。紫色疼痛，大便虚秘兼作痒者，凉血祛风、疏利湿热。肿痛坚硬，后重坠刺，便去难者，外宜熏洗，内当宣利。内痔去血，登厕脱肛而难上收者，当健脾、升举中气。便前便后下血，面色痿黄，心忪耳鸣者，宜养血健脾。诸痔欲断其根，必须枯药，当完其窍，必杜房劳乃愈。

痔疮治验

一男子患痔六年。每遇酒色劳役，痔则发肿，坚硬疼痛，十余日方得稍可。彼欲断其根，以枯痔散上至七日外，其痔渐黑裂缝，到十六日痔枯脱落，孔若鸡心，以生肌散逐日用之，内补养血健脾药而愈。

一男子患痔，掀肿作痛，大便结燥，脉数有力。以内疏黄连汤二服，便行痛止。又以四物汤加芩、连、枳壳、天花粉，数剂而肿消，更以脏连丸一料而不复发。

一男子患痔，凡遇劳发肿作痛，以枳壳汤熏洗，内服防风秦艽汤，数服肿痛俱减，令彼常洗前汤，每月五、六次，内与六味地黄丸加黄柏、知母服之不发。

一男子好饮多欲，内痔虚坠下血。以四物汤加芩、连、升麻、葛根，数服虚坠乃止。又以当归郁李仁汤二剂，痔肿亦消；更服脏连丸月余，便血亦止；又月余，兼节酒色不发。大抵醉饱入房，经脉横解，或精气一泄，脉络必虚，酒食之毒，乘虚流结；或淫极强固精气，以致败精浊血遂传大肠；又或饮食厚味，燥湿流注俱成斯疾。所受病者燥气也，为病者湿气也。初宜泻火和血、润燥疏风，久宜养血滋阴、健脾渗湿，治之自愈。若不节酒色，不慎起居，不戒口味，破必成漏，久则穿肠串臀，秽从孔出，臭水淋漓，昼夜无禁。凡得此者，虽不伤生，每苦瘀污，可叹息

哉！

一男子患痔十余年，头已穿溃，未及通肠，每发疼痛。以三品一条枪插至七日，痔变黑色，疮边渐渐裂缝，至十五日脱落；以凤雏膏搽至半月，敛口而平。

一男子怯弱，内痔便血，面色痿黄。自服凉药、止血药不应，诊之脾脉虚而无力，此中气不足，不能统血；以补中益气汤十余服，精神顿倍，便血亦少；又以加味四君子汤兼前汤间服，月余不发。大抵此症所致之由不同，当究其因治之，如元气有余，形黑气盛，先粪而后紫血者，更兼脉实有力，此属有余，法当凉血止血，药应自效。至若形体瘦弱，面色痿黄，先鲜血而后粪者，更兼脉虚无力，此属不足，岂可反用凉药止之，致伤脾胃。此症若不温中健脾、升举中气，其血不得归原，故药难效。远其根本也。

痔疮主治方

防风秦艽汤

防风秦艽汤 芍归 芎芩草 地 地黄随

槟翘 槐角 山梔壳 白芷 还兼 苍术宜

治痔疮不论新久，肛门便血，坠重作疼者并效。

防风 秦艽 当归 川芎 生地 白芍 赤茯苓 连翘 各一钱
槟榔 甘草 梔子 地榆 枳壳 槐角 白芷 苍术 各六分

水二盅，煎八分，食前服，便秘者加大黄二钱。

提肛散

提肛散内用 芍归 参 术 芪 陈 甘草随

升麻 柴 芩 并 白芷 加上 黄连 效可奇

治气虚肛门下坠，及脱肛、便血、脾胃虚弱等症。

川芎 归身 白术 人参 黄芪 陈皮 甘草 各一钱 升麻 柴
胡 条 芩 黄连 白芷 各五分

水二盅，煎八分，食远服，渣再煎服。

加味四君子汤

加味四君子汤术 茯苓扁豆与人参

黄芪甘草姜枣等 痔疮脾倦效如神

治痔疮、痔漏，下血不止，面色痿黄，心忪耳鸣，脚弱气乏，及一切脾虚口淡，食不知味；又治中气虚，不能摄血，致使血不禁者并效。

人参 白术 茯苓 白扁豆 黄芪(炙) 甘草(炙)各一钱

水二盅，姜一片，枣二枚，煎八分，食前服。

当归郁李汤

当归郁李汤生地 大黄泽泻共秦艽

麻仁枳实并苍术 皂子相兼用莫逃

治痔大便结燥，大肠下坠出血，苦痛不能忍者。

当归 郁李仁 泽泻 生地黄 大黄 枳实 苍术 秦艽各一钱

麻子仁(研)一钱五分 皂角一钱

水二盅，煎八分，空心服。

芎归汤

芎归汤内用芎归 失血虚羸大得宜

妇人产后虚烦热 煎尝顷刻脱藩篱

治便血或失血过多，兼妇人产后血虚烦热，头眩昏晕、盗汗等症并效。

川芎三钱 当归(酒拌)五钱

水二盅，煎八分，食前服。自汗手足冷者，加人参二钱。

三黄二地汤

三黄二地汤苍术 厚朴陈皮白术归

人参防风兼甘草 地榆泽泻共乌梅

治肠风诸痔，便血不止；及面色痿黄，四肢无力。

生地黄 熟地各一钱半 苍术 厚朴 陈皮 黄连 黄柏 黄芩
归身 白术 人参各一钱 甘草 防风 泽泻 地榆各六分 乌梅二

个

水二盅，煎八分，食前服。

粟壳散

粟壳散内用归芪 生熟地黄苍柏宜

参苓厚朴陈皮草 荷蒂芡升地骨皮

治诸痔作疼及肠风下血，诸药不止者，宜服之。

粟壳（温汤泡去内穢，去蒂切丝，蜜水拌炒）二钱 当归 陈皮 秦艽 黄
芪 生地黄 熟地各一钱 黄柏 黄芩 人参 苍术 厚朴 升麻各
六分 荷叶蒂七个 甘草五分 地骨皮一钱二分

水二盅，煎八分，食前服。或为细末，每服二钱，空心温酒调服。

洗痔枳壳汤

洗痔枳壳汤捐痛 癩虾蟆草相成共

用此煎汤洗痔疮 诸般疼苦随时送

治痔疮肿痛，肛门下坠，毋论新久，洗之肿自消。

枳壳二两 癩虾蟆草（一名荔枝草，四季常有，面青背白，麻纹垒垒者是）二两
河水三瓢，同上二味煎数滚，先熏后洗，良久汤留用热熏洗，甚者，
三次即消。洗净当搽后药。

五倍子散

五倍子散是蟆草 加上轻粉冰片好

痔疮肿痛及坠疼 用之搽上如同扫

治诸痔举发，坚硬疼痛难忍，或脏毒，肛门泛出肿硬不收亦效。

五倍子大者，敲一小孔，用阴干癩虾蟆草揉碎填塞五倍子内，用纸
塞孔，湿纸包煨，片时许取出待冷，去纸碾为细末，每一钱加轻粉三钱、
冰片五厘，共研极细，待前汤洗后，用此干搽痔上。即睡勿动，其肿痛
即除。凡外痔用二方搽洗，亦可除根，永不再发，极效极效。

田螺水

田螺水治痔疮疼 冰片加之效罕闻

脱肛诸痔虽难愈 将来一扫效如神

治痔疮坚硬作痛，及脱肛肿泛不收者并用之。

以大田螺一枚，用大冰片五厘研末，用尖刀挑起螺盖，将冰片入
内，平放片时，待螺渗出浆水，用鸡翎蘸搽患上，勤勤扫之，其肿痛自然

消散。

唤痔散

唤痔散上刺猬皮 草乌盐麝共能医

枯矾冰片同研末 津唾调搽痔出齐

凡医内痔不得出,用此药填入肛门,其痔即出。

草乌(生用)一钱 刺猬皮(一钱,烧存性) 枯矾五钱 食盐(炒)三钱
麝香五分 冰片二分

上碾细末,先用温汤洗净肛门,随用津唾调药三钱,填入肛门,片时痔即当出,去药上护痔膏。

护痔膏

护痔膏中用石膏 黄连冰片麝香饶

还加白芨同为末 蛋白相调效岂逃

用唤痔散痔出之后,先用此药围护四边好肉。

白芨 石膏 黄连各三钱 冰片 麝香各二分

共碾细末,鸡蛋清调成膏,护住四边好肉,方上枯痔散。

枯痔散

枯痔散内用白矾 蟾酥轻粉共砒良

再加童子天灵盖 枯痔方中效岂凡

凡痔疮泛出,即用此药涂之。年浅者五、七日,年深者八、九日,待痔干黑后,不用此药,每日用落痔汤洗之。

白矾二两 蟾酥二钱 轻粉四钱 砒霜一两 天灵盖四钱(用清泉水浸,以天灵盖煨红,水内浸煨七次)

共研极细末,入小新铁锅内,上用粗磁碗密盖,盐泥封固;炭火煨至二炷京香,待冷取开,将药研末搽痔上,每日辰、午、申三时用温汤洗净,上药三次,上至七、八日,其痔枯黑坚硬,住药裂缝,待其自落,换洗起痔汤。

起痔汤

起痔汤中芩柏连 大黄荆芥苦参前

防风甘草山梔等 朴硝槐角共相煎

治诸痔上枯药之后,黑色坚硬裂缝,宜此药洗。

黄连 黄柏 黄芩 大黄 防风 荆芥 梔子 槐角 苦参
甘草各一两 朴硝五钱

以上药分作三次,用水煎洗,待痔落之后,换搽生肌散。

生肌散

生肌散乳香没药 海螵蛸龙骨黄丹

赤石脂轻粉熊胆 珍珠竭冰片须参

治痔上枯药之后脱落、孔窍不收者,宜用此掺。

乳香 没药各一两 海螵蛸(水煮)五钱 黄丹(飞炒)四钱 赤石脂
(煨)七钱 龙骨(煨)四钱 血竭夏三钱 熊胆四钱 轻粉五钱 冰片一钱
麝香八分 珍珠(煨)二钱

共研极细末,磁罐收贮,早晚日搽二次,盖膏渐敛而平。

生肌散的临床新用

1. 褥疮

周燕飞用生肌散治疗褥疮 52 例。在常规综合护理基础上,予以生肌散治疗。药物组成:煨炉甘石粉 15 克,滑石粉 15 克,乳香 15 克,没药 10 克,生黄芪 20 克,当归 20 克,苍术 10 克,黄柏 10 克,五倍子 15 克,白芨 20 克。将上药研制成粉末,混合均匀后备用。用法:疮面先用 3% 双氧水进行清洗,尽量剪除坏死组织,再用生理盐水洗净,周边皮肤用 75% 酒精消毒,然后将生肌散均匀地撒在疮面上,以覆盖并超过全部疮面至周围正常皮肤为宜,再盖上 2 层无菌纱布,换药 1 天 1 次。有效率 88.46%。

周燕飞. 中医药导报,2005,11(4):53

2. 糖尿病溃疡

常文青等用祛腐生肌散治疗糖尿病溃疡 120 例。药物组成与制作:炉甘石 20 克,轻粉 2 克,珍珠粉 10 克,黄连 10 克,血竭 10 克等,研成极细末混合,高温消毒后备用。常规对溃疡面彻底清创后,均匀覆

盖一薄层祛腐生肌散,如溃疡面干燥,可使用凡士林油纱布覆盖。开始时可每日换药1次,口服降糖药物或皮下、静脉应用胰岛素及其他对症处理药物,120例患者的溃疡全部治愈。

常文青,等. 武警医学院学报,2005,14(1):48

3. 难治性创面溃疡

李宪武用消炎生肌散治疗难治性创面溃疡68例。药用:蜈蚣、全蝎、蝉蜕、乳香、白芨1:2:3:3:6的比例配取。用碘伏常规消毒创面周围皮肤,2%过氧化氢(双氧水)洗净创面脓液,然后用生理盐水冲洗并剪去腐肉。将消毒的蜂蜜涂于创面,用量以不往外溢出为宜。再将适量的消炎生肌散均匀地撒于蜂蜜上,盖一层凡士林纱布。根据溃疡面积大小及创面感染情况1~3天换药1次。经2次换药治愈37例,换药3次治愈24例。2例因多年脉管炎形成双下肢溃疡,创面感染严重,周围血液循环较差,经继续换药后在20天内治愈。5例创面较大者,经3次换药感染控制、病情好转后改行局部创面植皮术,术后7~9天内治愈。

李宪武. 实用医技杂志,2004,11(7):1242

4. 龟头包皮炎

吕健用化腐生肌散治疗龟头包皮炎16例。基本方:大黄、黄柏各50克,乳香、没药各10克,冰片、血竭各5克,儿茶3克。各药研成细末,装瓶备用。用时取10克为1剂。先用0.9%盐水或0.2%的高锰酸钾溶液将皮肤黏膜上的分泌物或脓汁冲洗干净后,用消毒棉签将药粉撒于患处,1日数次,如有渗出可反复撒药。待患处结痂有裂纹时,可用麻油调成糊状涂于患处,1日2~3次,至干痂脱落痊愈为止。切记不可强行撕痂,疗程9天。本组全部治愈。

吕健. 中国临床医药研究杂志,2004,(122):54

5. 复发性口腔溃疡

刘向岩等用牛黄生肌散治疗复发性口腔溃疡140例。药物组成:牛黄、冰片、青黛、黄芩、黄柏、胆草、甘草。制成粉剂,涂布于溃疡表面(在用药期间,不再使用任何其他药物治疗),每天4次,分别于三餐之

后及睡前半小时涂用,5天为1个疗程。总有效率97.2%。治疗时间最短3天,最长11天。

刘向岩. 中国中医药科技,2003,10(6):332

6. 宫颈糜烂

于淑云等用抗官炎汤联合生肌散宫颈上药治疗宫颈糜烂100例。所有病例治疗均在月经干净后4~8天进行。治疗组采用内服抗官炎汤联合生肌散宫颈上药治疗。对照组单用生肌散宫颈上药治疗。结果:总有效率治疗组为100%,对照组91%,治疗组疗效明显高于对照组。

于淑云,等. 四川中医,2003,21(6):54

7. 口疮

吴雪梅用珍珠生肌散治疗口疮34例。药物组成:生硼砂30克,灯心草12克,珍珠粉6克,冰片6克,青黛10克,淡秋石20克,生甘草10克。将硼砂、冰片、青黛、珍珠粉、淡秋石、生甘草研极细末,将灯心草置铁锅内制成灯心炭,研极细末,共同混合装瓶备用,用时将药粉涂于患处,每日3次。结果34例病人全部治愈,其中用药2天治愈11例,5天治愈18例,12天治愈5例。

吴雪梅. 河南中医药学刊,2002,17(1):47

8. 尿道综合征

田英等用内托生肌散加减治疗尿道综合征获效。药物组成:生黄芪30克,生甘草6克,生没药、丹参各12克,白芍、天花粉各20克。原方中有乳香,因其苦,且煎后浑浊碍胃,故去而不用。加减法:若脾胃气虚较甚,气化不及州都,渴而小便不利者,合春泽汤,并加少量升麻、柴胡;若肾气虚弱,腰膝酸痛者,合六味地黄汤;兼肢冷便溏者,加桂枝、附子;五心烦热者加龟板、女贞子;若燥火上聚,寒水下结,口渴小便不利者,合瓜蒌瞿麦丸;若证兼湿热,邪在三焦,脘痞纳呆者,合杏仁、厚朴、茯苓;邪在膀胱,渴而兼瘀者,合五淋散;邪在下焦不渴者,合通关丸。

田英,等. 湖北中医杂志,2001,23(9):37

9. 上消化道出血

刘振宇等用止血生肌散加西药治疗上消化道出血43例。患者入院后均予西药治疗,主要用西咪替丁或洛赛克。失血量较大者补充血容量、输血、对症治疗。治疗组在上述治疗的同时,合用止血生肌散:儿茶、三七按6:4比例配制,每包10克;番泻叶制成袋泡茶,每包3克。服法:每次用热开水100毫升浸泡番泻叶袋泡茶1包,冷却后去渣取汁送服止血生肌散1包,每日3次,大便隐血转阴后停药。服药期间忌辛辣酸冷、鱼腥及含血肉食物和蚕豆等食物。总有效率93%。

刘振宇,等. 实用中西医结合临床,2001,1(1):19

洗痔肿痛方

洗痔肿痛方朴硝 鱼腥苦楝不相饶
 还有瓦花马齿苋 煎汤熏洗痔疼消
 鱼腥草 苦楝根 朴硝 马齿苋 瓦楞花各一两
 水十碗,煎七、八碗,先熏后洗,诸痔肿痛可消。

人中白散(见口瘡门)

治诸痔肿痛坚硬、坠重脱肛等症。先用温汤洗净,随后搽药患上,即卧勿动,其肿痛渐减,此药常有便于痔,故附录而用之。

三品一条枪(见瘰癧门)

治十八种痔漏。凡用药线插入痔孔内,早晚二次,初时每次插药三条,四日后每次插药五、六条,上至七、八日,药力满足,痔变紫黑,方住插药;候痔四边裂缝流脓,至十四日期满痔落,用甘草汤洗净,换搽凤雏膏或玉红膏,俱可生肌收敛。虚弱者兼服养血健脾之药,最为稳当。大抵医人能取痔者,皆此方也,不可轻其药而弃之。

生肌凤雏膏

生肌鸡卵凤雏膏 乳香轻粉不相饶
 血竭再加白龙骨 生肌长肉发生苗

用鸡蛋煮熟,去白用黄,十余个铜杓内熬油,倾入盏内,约油三钱加轻粉细末一钱,乳香、血竭、龙骨各末五分,共入油内和匀,每日早、午、晚鸡翎蘸涂患孔内,膏盖避风,深者半月,可以完口。

煮线方

煮线方中用壁钱 芫花二味共相煎

白丝扣线将同煮 诸痔瘰瘤用此捐

治诸痔及五瘰六瘤。凡蒂小而头面大者，宜用此线系其患根自效。

芫花五钱 壁钱二钱

用白色细扣线三钱，同上二味用水一碗盛贮小磁罐内，慢火煮至汤干为度，取线阴干，凡遇前患，用线一根，患大者二根，双扣系于根蒂，两头留线，日渐紧之，其患自然紫黑、冰冷不热为度。轻者七日，重者十五日后必枯落，后用珍珠散收口至妙。

脏连丸

脏连丸本是黄连 猪脏将来灌煮煎

同捣为丸温酒服 敢教诸痔不缠绵

治痔无论新久，但举发便血作痛，肛门坠重者。黄连净末八两，用公猪大肠尽头一段，长一尺二寸，温汤洗净，将连末灌入肠内，两头以线扎紧，用时酒二斤半，砂锅内煮，酒将干为度，取起肠药，共捣如泥。如药烂，再晒一时许，复捣丸如桐子大，每服七十丸，空心温酒送下，久服除根。

胡连追毒丸

胡连追毒丸来异 痔漏通肠效罕稀

麝香刺猬皮丸服 排尽瘀脓换好肌

治痔漏不拘远年近日，有漏通肠，污从孔出者。先用此丸追尽脓毒，服后丸药自然取效最稳。

胡黄连一两（切片，姜汁拌炒） 刺猬皮一两（炙，切片再炒黄为末） 麝香二分

软饭为丸麻子大，每服一钱，食前酒下，服药后脓水反多。是药力到也，勿惧之。

黄连闭管丸

胡连闭管丸窥易 得此之功难上难

决明山甲槐花等 服下忧容换笑颜

胡黄连(净末)一两 穿山甲(麻油内煮黄色) 石决明(煅) 槐花(微炒,各末)五钱

炼蜜丸如麻子大,每服一钱,空心清米汤送下,早晚日进二服,至重者四十日而愈。此方不用针刀、挂线,不受苦楚,诚起痼疾之良方也。如漏之四边有硬肉突起者,加蚕茧二十个,炒末和入药中,此及遍身诸漏皆效。

痔疮应用方

内疏黄连汤(见肿疡门)

补中益气汤 四物汤(俱见溃瘍门)

六味地黄丸(见肺癰门)

下疳论第三十

下疳者,邪淫欲火郁滞而成。其来有三:一由男子欲念萌动,阳物兴举,淫火猖狂而未经发泄者,以致败精浊血流滞中途,结而为肿者一也;二由妇人阴器瘀精浊气未净,接与交媾,以致淫精传袭而成者二也;三由……热药,……多致火郁未发而成者三也。男子萌念火郁之症,初起先必涩淋,小便溺痛,次流黄浊败精,阳物渐损,甚则肿痛腐烂,法当疏利肝肾邪火,如八正散、清肝导滞汤之类是也。妇人阴器不洁,初起先从皮肿光亮,甚如水晶,皮破流水,肿痛日生,痒麻时发,治当解毒消风,如龙胆泻肝汤兼平胃散合而用之。男妇房术所伤,蕴毒所致,初起阳物痒痛,坚硬紫色,疙瘩渐生,腐烂渐作,血水淋漓,不时兴举,治当泻火解毒,如黄连解毒汤、芦荟丸之类是也。外以银粉散、珍珠散、人中白散选用。又有先发时疮,误用熏条擦药结毒于此者,详注结毒门,不在此类推之。

下疳看法

初起不红不肿，睡不举阳，玉茎微损，小水自利者轻。已成微热微肿，皮色光亮，小便赤色，更兼白浊者平。已损肉色红活，焮无坚肿，小便不疼，大便不秘者可。初起小便淋漓，次损阳物，坚硬作痛，腐烂渐开者险。已成腐溃内攻，伤损玉茎，色紫无脓，疼如针刺者重。

下疳治法

初起肿痛发热，小水涩滞，肝经湿热也，宜泻肝渗湿。肿痛坚硬，焮发寒热，口燥咽干，大便秘者，通利二便。玉茎肿痛，小便如淋，自汗盗汗，时或尿血，清心滋肾。茎窍作痒，时出白浊，发热口干，津液少者，益肾清心。溃后肿痛，小便赤涩，日则安静，夜则疼甚，滋阴泻火。溃烂不已，肿痛又作，疼痛日深，秽气不回，清肝解毒。

下疳治验

一童子十五岁，玉茎肿痛，外皮浮肿，比常粗大一倍。他医治之以解毒清肝等药，愈肿愈痛。予视之，亦用泻火清热渗湿等剂，俱不见效，诊之脉细数而无力，此中气不足，脾经湿水乘虚流注、停聚不散，当行从治法也。以四物汤合平胃散加木香、熟附子、人参各五分，一服肿痛顿退，又四、五服而全消。

一男子肿痛发寒热，以荆防败毒散二服而退。又以龙胆泻肝汤，肿痛亦减；用四物加黄柏、知母而消。

一男子年四十，色欲过度，小便涩痛，出如白浆，结冻成块，此肾伤湿热为患。朝以八味丸，午用八珍汤加山萸、牡丹皮、黄柏、知母，服之月余而涩肿亦退，小便渐清，但窍中常有滑精，不时渗出，久致腰弯脚膝无力。偶以三因胜骏丸，服至月余，前症悉愈。

一男子茎头腐烂，小水涩痛。外以珍珠散，内服木通汤，四服涩痛

亦止。更服四物汤加黄柏、花粉而痊。

一男子初婚玉茎伤损，出血疼甚。先以葱汤浸洗良久，随用珍珠散加冰片掺之，腐皮渐干，痛亦渐止；内服四物汤加木通、山梔，四服其肿痛渐止而愈。

一男子皮肿光亮，发热疼甚。外敷如意金黄散，内服龙胆泻肝汤加大黄，便痛稍愈，去大黄又服而消。

下疳主治方

清肝导滞汤

清肝导滞汤瞿麦 滑石甘草并篇蓄

大便秘之加大黄 灯心为引空心服

治肝经湿热，玉茎肿痛，小水涩滞作疼者服之。

篇蓄四钱 瞿麦三钱 滑石二钱 甘草一钱 大黄二钱（便秘加）

水二盅，灯心二十根，煎八分，空心服。

龙胆泻肝汤

龙胆泻肝汤地黄 车前泽泻麦冬当

黄芩梔子甘草等 湿用黄连秘大黄

治肝经湿热，玉茎患疮，或便毒、悬痈，小便赤涩，或久溃烂不愈。

又治阴囊肿痛，红热甚者并效。

龙胆草 连翘 生地黄 泽泻各一钱 车前子 木通 归尾 山

梔 甘草 黄连 黄芩各五分 大黄二钱（便秘加）

水二盅，煎八分，食前服。

清肝渗湿汤

清肝渗湿汤二术 苓朴昆陈粉木通

山梔泽泻川芎等 当归甘草木香同

治阴囊玉茎湿肿如猪肚，小水不利，坠重作痛。

苍术 白术 茯苓 山梔 厚朴 泽泻 陈皮 木通 天花粉

昆布各一钱 甘草五分 木香三分 川芎 当归各六分

水二盅,煎八分,空心服。作热红色加黄连、龙胆草各七分。

清心莲子饮

清心莲子饮黄芪 赤茯苓人参地骨皮

黄芩甘草并泽泻 麦冬加上效堪题

治心经蕴热,小便赤涩,玉茎肿痛,或茎穹作疼;及上盛下虚,心火炎上,口苦咽干,烦躁作渴。

治虚阳口干,小便白浊,夜则安静,昼则发热者。

石莲肉 黄芪 黄芩 赤茯苓 人参各一钱 炙甘草 泽泻 麦冬 地骨皮各五分

水二盅,煎八分,空心并食前服。

清心莲子饮的临床新用

1. 肾小球肾炎

刘景龙等用加味清心莲子饮治疗肾小球肾炎。药物组成:黄芪 50 克,党参 20 克,地骨皮 20 克,麦冬 20 克,茯苓 15 克,柴胡 15 克,黄芩 15 克,车前子 20 克,石莲子 15 克,白花蛇舌草 30 克,益母草 30 克,甘草 15 克。水煎服。取得满意疗效。

刘景龙,等. 吉林中医药,2003,23(12):25

2. 慢性肾盂肾炎

朱安龙用清心莲子饮加味治疗慢性肾盂肾炎 40 例。方药组成:炙黄芪 30 克,太子参 15 克,麦冬 10 克,地骨皮 10 克,茯苓 10 克,车前子 15 克(布包),丹参 30 克,白茅根 30 克,白花蛇舌草 30 克,莲子肉 15 克,女贞子 15 克,桑寄生 10 克,川牛膝 10 克,甘草 6 克。腰酸痛明显者加续断 10 克,杜仲 10 克;低热不退者减黄芪量至 12 克,加生地 15 克,炒黄柏 9 克,青蒿 15 克;水肿明显者加泽泻 15 克,益母草 30 克;夜尿频多者加覆盆子 15 克,菟丝子 15 克,桑螵蛸 10 克;尿道激惹症状严重者加瞿麦 10 克,石韦 30 克,琥珀 5 克(冲服)。食欲减退者加炒山楂、炒麦芽、炒神曲各 10 克,鸡内金 15 克。每日 1 剂,水煎分 2

次服。6周为1个疗程,1个疗程结束后统计疗效。有效率为90.0%。

朱安龙. 安徽中医临床杂志,2002,14(6):461

3. 儿童隐匿性肾炎血尿

王荣欣等用清心莲子饮治疗儿童隐匿性肾炎血尿62例。药物组成:黄芪、小蓟、生地黄各20克,党参、麦门冬、女贞子、旱莲草、地骨皮各15克,白茅根50克,甘草10克。如兼恶寒发热、咽痛等外感症者,酌加金银花、连翘、玄参各10克;如兼手足心热、口干咽干等阴虚内热证者,酌加侧柏叶、茜草各20克;如见唇舌紫暗,舌有瘀斑瘀点、舌下青紫等血瘀征象者,酌加牡丹皮10克,当归15克。每日1剂,水煎分早晚2次温服,3个月为1个疗程。结果:治疗组34例,总有效率73.53%。对照组28例,总有效率28.57%。

王荣欣,等. 中医药学报,2002,30(1):20

八正散

八正散中用木通 车前瞿麦大黄同

篇蓄山栀并滑石 加之甘草效无穷

治肝经积热,小便淋闭不通,及一切淋病俱效。

大黄 车前子 瞿麦 篇蓄 山栀 木通 甘草各一钱 滑石二

钱

水二盅,煎八分,食前服。

八正散的临床新用

1. 膀胱炎

潘英用八正散加减治疗膀胱炎35例。药物组成:车前子15克,大黄15克,滑石30克,瞿麦15克,山栀15克,甘草20克。如大便秘结腹胀者重用生大黄20克,枳实15克;见寒热、口苦呕恶者可加柴胡15克,黄芩15克,半夏15克;腹痛严重者可加元胡15克,川楝10克;血尿严重者可加小蓟15克,茅根15克。35例病人治愈28例,好转5例,无效2例。总有效率94%。

潘英. 实用中医内科杂志, 2006, 20(1): 85

2. 尿路结石

赵成国等用八正散加减治疗尿路结石。主要药物: 金钱草 70 克, 瞿麦 30 克, 海金沙、车前子(包煎)、滑石(包煎)、石韦、鸡内金、通草各 15 克, 冬葵子 20 克, 甘草 15 克。若疼痛重加延胡索; 湿热重加知母、黄柏; 若血尿明显加大蓟、小蓟、桃仁; 若肾积水加茯苓、泽泻; 病久气虚加黄芪、党参, 若结石稍大加活血行气之三棱、莪术。每日 1 剂。7 天为 1 个疗程, 连服 2~3 个疗程。服药期间忌食辛辣、腥冷、油腻之品。总有效率为 93.8%。

赵成国, 等. 中医学刊, 2005, 23(12): 2264

3. 前列腺增生

范黎伟用加味八正散治疗前列腺增生获效。在对照组疗法的基础上用加味八正散口服。方药组成: 大黄 9 克, 滑石 18 克, 瞿麦 15 克, 车前子 15 克(包), 山栀子 9 克, 鱼腥草 9 克, 醋三棱 9 克, 酒莪术 9 克, 血余炭 9 克, 甘草梢 5 克, 灯心少许, 琥珀 5 克(冲)。水煎服, 每日 2 次, 空腹温服。泌尿系感染, 发热加黄连、黄芩、黄柏、连翘、一见喜、白菊花, 尿道刺痛加双花、连翘、大青叶; 水逆犯胃呕吐加竹茹、苇根、半夏; 水肿加茯苓皮、瓜蒌、冬瓜皮、大腹皮等。治疗组 25 例, 3 天显效 10 例, 5 天显效 12 例, 好转 3 例。

范黎伟. 中华实用中西医杂志, 2005, 18(9): 1309

4. 盆腔炎

吴修蓉用八正散加味治疗盆腔炎 45 例。药物组成: 车前子、瞿麦各 12 克, 滑石、山栀子各 15 克, 木通 10 克, 酒大黄 5 克, 甘草 6 克。湿热蕴结型加蒲公英 30 克, 黄柏 10 克; 血瘀型加当归、香附、桃仁、红花; 包块明显加橘核、三棱、莪术; 寒凝型加桂枝 8 克。每日 1 剂, 水煎, 分 3 次温服, 10 天为 1 个疗程, 治疗 3 个疗程。痊愈 32 例, 显效 8 例, 有效 5 例。总有效率 100%。

吴修蓉. 实用中医药杂志, 2005, 21(10): 604

5. 尿道炎

证属热淋(湿热下注), 药用八正散加味: 云木通 10 克, 瞿麦 10

克,车前子15克,滑石6克(布包),大黄5克,栀子10克,灯心草6克。湿热重加土茯苓20克,苍术15克,虎杖10克,每日1剂,1日3次,7天为1个疗程,2个疗程后统计疗效。治愈52例,有效29例,无效8例,总有效率为91%。

杞学文·云南中医中药杂志,2005,26(2):65

解毒木通汤

解毒木通汤 柏连 胆草 山梔 芦荟 全

瞿麦 滑石 并甘草 还用灯心作引煎

治男妇房术热药所伤,致玉茎、阴户痒痛,小水涩滞,白浊滑精,至夜阳物兴举不得眠者服之。

木通 黄连 龙胆草 瞿麦 滑石 山梔 黄柏 知母各一钱
芦荟 甘草各五分

水二盅,灯心二十根,煎二分,食前服。

芦荟丸

芦荟丸中用二连 芩薹 鹤虱 共雷丸

青皮 麝木香 同等 饼糊丸来共此全

治下疳溃烂作痛。又治妇人阴蚀疮作痒,及小儿肝积发热,口鼻生疮,牙龈蚀烂等症。

胡黄连 黄连 芦荟 白芩薹 青皮 白雷丸 鹤虱草各一两
麝香一钱 木香三钱

上为末,蒸饼糊丸如麻子大,每服一钱,空心清米汤送下。

银粉散

银粉散效真罕稀 锡炒朱砂效不微

轻粉水银并煅粉 下疳结毒敢相违

治下疳毋论新久,但腐烂作痛及杨梅疮熏后结毒,玉茎腐烂,或阳物半伤半全者,并宜用之。

好锡六钱化开,下朱砂末二钱搅炒,砂枯去砂,留锡再化开,搅水银一两,和匀倾出听用;杭粉一两研细,铺夹纸上,卷成一条,一头点火,煨至纸尽为度;吹去灰用粉同煎末,锡加真轻粉一两,共成一家研

细。凡遇前患,先用甘草汤淋洗,挹干随用此药掺上,止痛生肌,收效极妙。

珍珠散

珍珠散效实堪夸 轻粉还兼缸子花

诸肿诸疮诸痛疾 用之一掺自无他

治下疳皮损腐烂,痛极难忍;及诸疮新肉已满,不能生皮。又汤泼火烧,皮损肉烂,疼痛不止者。

青缸花五分(如无,用头刀旋花轻虚色翠者代之,终不及缸花为妙) 珍珠一钱
(不论大小以新白为上,入豆腐内煮数滚,研为极细无声方用) 真轻粉一两

上三味,共研千转,细如飞面,方入罐收。凡下疳初起皮损,搽之即愈。腐烂疼痛者,甘草汤洗净,猪脊髓调搽;如诸疮不生皮者,用此干掺即可生皮。又妇人阴蚀疮或新嫁内伤痛甚者,亦可此搽极效。汤泼火烧痛甚者,用玉红膏调搽之。

珍珠散的临床新用

1. 慢性结肠炎

杨佳丽等用珍珠散灌肠并服煎剂治疗慢性结肠炎 36 例。用自制珍珠散(珍珠 0.4 克,儿茶 2 克,白芨 4 克,黄连 4 克,黄柏 4 克,大黄 2 克)10 克加水保留灌肠,每晚 1 次,并辨证服用中药汤剂,每日 1 剂,2 周为 1 个疗程。多数患者 2 个疗程即愈。脾虚者服参苓白术散;脾虚挟郁服参苓白术散加木香、蒲黄等;大肠湿热服白头翁汤加减;脾肾阳虚用真人养脏汤加减;肠风下血用槐花散加味。据此标准治愈 17 例,基本治愈 13 例,好转 6 例。

杨佳丽,等. 中国煤炭工业医学杂志,2006,9(4):402

2. 复发性口腔溃疡

王彦如用珍珠散为主治疗复发性口腔溃疡 108 例。药用:珍珠 20 克,血竭 40 克,朱砂 20 克,硼砂 60 克,冰片 20 克,赤石脂 60 克,雄黄 5

克,青黛10克,炉甘石10克,麝香3克,牛黄3克。上药共为极细末,密闭保存。同时以消毒棉签蘸药末少许涂于溃疡部位,以能覆盖溃疡面为宜。每日涂药5次。同时内服中药治疗,总有效率100%。

王彦如. 实用中医内科杂志,2004,18(4):372

3. 溃疡性结肠炎

马术强等用三七珍珠散加减治疗溃疡性结肠炎获效。用中药三七珍珠散5~10克加生理盐水50~100毫升,保留灌肠,睡前1次,15天为1个疗程。总有效率97.22%。

马术强. 中华临床医学研究杂志,2005,11(8):1111

4. 烫伤肉芽创面

陈华良用珍珠散治疗烫伤肉芽创面62例。药物组成:珍珠、淮山、没药各等分,冰片适量。将上述各药研末,过120目筛;加入冰片,混合均匀后,再加液状石蜡适量即成,置瓶内密封保存备用。用时先以1%新洁尔灭液清洗创面及周围皮肤,彻底清除创面痂皮、脓苔及坏死组织,消毒干棉球拭净创面液体及血渍后,用浸泡珍珠散药液纱布覆盖于创面,包扎或暴露视病情而定,2~3日更换1次。总有效率为96.8%。

陈华良. 四川中医,2004,22(5):80

5. 宫颈炎

时燕萍用大黄珍珠散治疗宫颈炎33例。珍珠适量粉碎后水飞法提取,烘干,过180目筛得细粉;大黄适量切片,干燥,粉碎,过100目筛。二者再按适当比例混合成大黄珍珠散。用药方法:患者取截石位,清洗外阴,用窥阴器暴露宫颈,擦净宫颈表面分泌物后,将大黄珍珠散敷涂于宫颈糜烂面。一般1次用大黄粉5克,珍珠粉1克。待药末吸附后,再将少许药粉洒于特制带尾线的棉纱球表面填塞于阴道内,使药粉贴附于宫颈表面,12小时后取出棉纱球。经净后3天开始用,每日1次。10天为1个疗程,连续用2个疗程,停药20天后复查。总有效率为84%。

时燕萍. 湖北中医杂志,2004,26(11):44

疔疮简便方

用油透罗缎旧帽檐烧灰，杭粉瓦上煨黄色各等分，共研极细，磁罐收贮。先用红枣十五个，甘草三钱，煎汤温洗患上，搽干搽药即效。

太乙膏（见肿疡门）

治玉茎皮损疼痛不止者，用此贴之，其疼即止。

下疳应用方

四物汤 八味丸 八珍汤（俱见溃疡门）

三因胜骏丸（见附骨疽门）

鱼口便毒论第三十一

夫鱼便者，左为鱼口，右为便毒。总皆精血交错，生于两胯合缝之间，间结肿是也。近之生于小腹之下，阴毛之傍，结肿，名曰横痃，又名外疳是也。得之入房忍精，强固不泄，或欲念已萌，停而不遂，以致精血走动凝滞，结而为肿。治当散滞行瘀、通利大小二便，九龙丹、山甲内消散是也。七日以后，服之根本坚固，恐其作脓，宜用火针法刺之亦妙；已出脓者，十全大补汤服之。庶易收敛。迟则恐生别症难愈。

鱼口便毒看法

起初结肿，不红微热，行走稍便，无寒热交作者为轻。已成红赤肿痛，发热焮痛，举动艰辛，至夜尤甚者易。已溃脓稠，肉色红活，肿消痛止，新肉易生，作痒者顺。初起结肿，坚硬如石，牵强刺疼，起坐不便，寒热者重。已溃腐烂，肿痛不减，脓水清稀，孔深口大不敛者险。

鱼口便毒治法

初起漫漫，结肿疼痛，两胯牵强，身发寒热，宜散表邪。已成坚硬，

发热疼痛,内热口干,大小便秘,宜通利之。发散疏利之后,肿痛仍作,欲其作脓,宜用托里消毒。脓肿发热,疼痛日久,急胀苦甚,内脓已成,宜急开之。已溃之后,脓水不干,新肉生迟不敛,健脾胃、补气血。

鱼口便毒治验

一男子左胯肿痛,身发寒热,脉弦而数。以人参败毒散一剂,表症悉退,次以山甲内消散二剂而痊愈。

一男子横痃,肿痛坚硬,二便涩滞,以九龙丹一服,通利大便,肿痛稍减;间日又用一服,二便通利而消。

一男子患此十余日,形势已成,肿痛日甚,因公事急出,不能行走。以火针法针之,出紫血钟许,外用膏贴拔出微脓,服托里消毒散而便可行,亦且速愈。

一男子溃而口大不敛,此先泄药之过也。以十全大补汤加泽泻、丹皮十余剂,外搽玉红膏月余而敛。

一男子先出疳疮,久而不愈,后发横痃,十余日始生肿痛。予欲托里溃脓以泄毒气,彼欲内消,自服槐花酒、蜈蚣、全蝎等药,肿未得消,元气已损,转致筋骨疼痛,举动艰辛,仍复请治。形体瘦弱,脉虚而数,此真元受伤,邪气从之,虽当补养,后必欲发时疮方愈。彼不为信,自仍服败毒消风等药,元气愈虚,饮食不进,筋骨疼甚,彻夜不睡。又复请治。先用补中益气汤倍参、芪,六服元气稍醒;又以八珍汤加麦门冬、五味子、远志、酸枣仁、牡丹皮,十余服夜间方睡,惟疼痛不能大减,此内虚疮毒下陷,故难取效,朝以六味丸、午服十全大汤,又十余服,遍身方发红点。此疮毒欲出,仍服前药,红点渐高,始成疮样,彼时疮毒一出,疼痛顿减,元气渐复。更服八珍汤加米仁、银花、土茯苓,服至半年,其疮方得渐渐而痊。彼悔执方治病之尤,始信因病用方之妙。

鱼口便毒主治方

山甲内消散

山甲内消散大黄 加上僵蚕甘草当

木鳖牵牛内协力 鱼口便毒自无妨

治鱼口、便毒、骑马痈、横痃等症，初起未成脓者。

当归梢 甘草节 大黄各三钱 穿山甲(炒)三大片 僵蚕 黑牵牛
各一钱 土木鳖三个

水、酒各一碗，煎八分，空心服。渣再煎服，大便行三、四次，方吃稀粥，淡味饮食为妙。

九龙丹

九龙丹药真堪羨 血竭儿茶乳没炼

木香巴豆等分同 鱼便横痃立消见

治鱼口、便毒、骑马痈、横痃初起未成脓者服之。

儿茶 血竭 乳香 没药 巴豆不去油 木香

上各等分为末，生蜜调成一块，磁盒盛之，临时旋丸寒豆大，每服九丸，空心热酒一杯送下，行^①四、五次，方吃稀粥。肿甚者，间日再用一服自消。

红花散瘀汤

红花散瘀汤苏木 翘贝僵蚕乳决明

归尾大黄角针等 牵牛山甲酒煎行

治入房忍精强固不泄，以致瘀精浊血凝结两胯，或小腹之傍结成肿痛，小水涩滞者并服之。

当归尾 皂角针 红花 苏木 僵蚕 连翘 石决明 穿山甲
乳香 贝母各一钱 大黄三钱 牵牛二钱

水、酒各一碗，煎八分，空心服，行五、六次，方吃稀粥补之。

① 行：“行”字前疑有“大便”二字。

黄芪内托散

黄芪内托散芎归 白术银花泽泻随

花粉角针与甘草 鱼口便毒此能医

治鱼口、便毒、横痃等症，已成不得内消者服之。

川芎 当归 黄芪各二钱 白术 金银花 天花粉 皂角针各一钱
甘草 泽泻各五分

水二盅，煎八分，食前服。

玉红膏（见溃疡门）

治鱼口、便毒、横痃腐溃口不合者，用此搽之效。

火针法

火针之法由来异 胜如服药并奇治

将针一点破皮囊 肿消痛止随游戏

治鱼口、便毒、横痃等症，用行药不得内消者。

用粗线针二条，将竹筋一头劈开，将针离分许夹在筋头内，以线扎紧，用桐油灯盏内贮之；灯草五根，排入油内，点着用针蘸油烧红，向患顶重手刺入五、六分，随出或血或脓，以膏盖贴，即得轻便，以后渐愈。虚者兼服十全大补汤完口。

鱼口便毒应用方

托里消毒散（见肿疡门）

十全大补汤 补中益气汤 八珍汤（俱见溃疡门）

六味地黄丸（见肺癰门）

囊痈论第三十二

夫囊痈者，乃阴虚湿热流注于囊，结而为肿。至溃后睾丸悬挂者，犹不伤人，以其毒从外发，治当补阴、清利湿热，取效者十有八、九。近时人误用疝家热药，多致热甚为脓，虑难收敛。初宜龙胆泻肝汤，稍久

滋阴内托散，外敷如意金黄散，俱可内消。又一种水疔，皮色光亮，无热无红，肿痛有时，内有聚水，宜用针从便处引去水气则安。如肿痛日久，内脓已成胀痛者，可即针之；内服十全大补汤加山茱萸、牡丹皮、泽泻治之，间以六味地黄丸服之亦愈。

囊痈看法

初起不红微肿，肾子引痛，不作寒热，起坐自便者轻。已成红肿发热，形色光亮，疼痛有时，饮食有味者顺。已溃脓稠，肿消痛止，新肉渐生，不痛作痒，收敛者吉。溃后腐烂，囊皮脱落，甚者睾丸突出，能食不痛者可。

初起坚硬紫色，日夜痛甚，小便不利，大便秘泄者重。已成坚而不溃，头腐无脓，疼痛无时，常流血水者重。溃后脓口开张，肿痛不减，身发寒热，睡卧不宁者重。

囊痈治法

初起寒热交作，肾子肿痛，疼连小腹者，宜发散寒邪。已成红肿发热，口干焮痛，小水不利，大便秘者利之；已溃疼痛不减，脓水清稀，朝寒暮热者，宜滋阴内托；溃后不能收敛，日晡发热，饮食减少者，宜养血健脾；溃后睾丸悬挂不能收敛者，当外用生肌，内加补托。

囊痈治验

一男子风寒未经发散，寒中肾囊，作肿痛甚。以万灵丹一服洗浴发汗，寒邪顿退；又以四物汤加泽泻、苍术、山栀、天花粉，外敷如意金黄散数次而痊愈。

一男子囊肿甚大，不热胀痛，按之软而即起。此湿水流注，聚而不散，以铍针导去黄水碗许，以导水消肾丸服月余而肿消。又以木香补肾丸服之不作。

一男子患此十余日，肿甚胀痛，内脓已成。针之出脓碗许，以十全大补汤加泽泻、丹皮十余剂而收敛。

一老年人素有疝气，因怒伤肝，举发疼痛。自服盘葱散热药，肿痛益甚，视之肾囊半边坚硬，皮损紫黑，此俗腐烂见辜丸候也。彼不为信，尚欲内消，请别医治之，内服龙胆泻肝汤，外敷四黄散寒凉等药，坚硬果腐，饮食少进，虚热不睡，痛甚昏愤，又覆请治。予曰：凡病有主末，治有权宜，初起以药治疝非疝也。凡疝为患，小腹作疼，牵引肾子，多寒少热，好饮热汤。此症乃恼怒伤肝，阴虚湿热为患，其囊红肿发热，小便赤涩，内热口干，坠重作痛，此为囊痈之候。初宜清利湿热，而反疝家热药；已成宜用补阴，况又用泻肝凉剂，此年老气血有亏，攻补机关已误，其疾岂有不致危亡者。即当养气血、固根本为主，而佐以安神定痛之药接补元气，死生在进退之间尚可转也。随以八珍汤加麦冬、五味子、远志、牡丹皮，外以甘草汤淋洗腐上，将已坏黑肉尽行剪落，其辜丸已露；数日后，其患得于补力，前症渐退，饮食渐进，外腐已尽，肾子已突大半。搽玉红膏，外以膏盖，长肌渐收，调理半年外而得始安。

一男子肿痛十余日，坚硬无脓，囊头肿上紫色作烂。此欲外腐，以蟾酥锭为末掺上膏盖，三日腐肉脱下，搽玉红膏、太乙膏掩之，内服补阴滋肾药而安。

一男子浴后受寒，致阴囊牵引小腹作痛，恶寒发热，诊之脉紧数而无力。以五积散一服，寒热乃退，痛亦稍止，更以八珍汤加肉桂、丹皮、泽泻，数服而愈。

囊痈主治方

清肝渗湿汤

清肝渗湿汤归地 芍药柴通泽泻芩

山栀胆草天花粉 灯心甘草效如神

治囊痈肝经湿热结肿，小水不利，发热熯痛者。

川芎 当归 白芍 生地 柴胡 龙胆草 山梔 天花粉 黄芩各一钱 泽泻 木通 甘草各五分

水二盅，灯心二十根，煎八分，食前服。

滋阴内托散

滋阴内托散 芎归 白芍还兼熟地芪

角针泽泻并山甲 囊痈日久服相宜

治囊痈已成，肿痛发热，服之有脓即可穿溃也。

当归 川芎 白芍 熟地 黄芪各一钱半 皂角针 泽泻 穿山甲各五分

水二盅，煎八分，食前服。

导水消肾丸

导水消肾丸功捷 茅术牵牛与木通

更加肉桂老米等 打糊丸成建大功

治囊痈内伤生冷，外受风寒，以致寒湿侵入囊中，小者如升，大者若斗，皮肤顽厚，阳物短缩，小水不利，不痛多冷，俗称沙疔是也。宜服此药引导水气，日久渐消，终身不为废疾也。此方常验。

茅山 苍术一斤（米泔水浸，切片炒黄） 木通半斤 肉桂一两（刮去粗皮）
牵牛二两（微炒） 木香一两

共为细末，陈米粉打糊丸，如桐子大，每服百丸，空心白滚汤，清米汤任下。忌生冷面食，此囊虽夏月炎天，亦以衣被覆之为妙。

偏坠灸法

偏坠灸法最多灵 晴日将来仰卧身

木肾尽头为灸穴 安来七壮自然平

候取天晴……日，患者平身仰卧，取木肾子根下硬根尽处，以墨点记，用安豆大艾炷，三年之内灸七壮，年久者灸九壮、十一壮为止。内服木香补肾丸，戒食生冷，兼忌房事百日为妙。

木香补肾丸

木香补肾丸精地 枣膝蛇苁菟志归

丁香茴香枸杞戟 人参青盐杜仲挥

治偏坠一名木肾。不疼不痒，渐渐而大，最为顽疾，有妨行动，多致不便，但灸后宜服此药，俱可内消。此药功效不独治疝，中年后宜服之，益寿延年，黑发、壮筋、填髓，明目、聪耳、补肾，助元阳、调饮食，其功不可尽述。妇人服之，颜如童女，肌肤莹洁如玉。又精寒血冷，久无嗣息者服之更妙。

淮庆生地四两(酒煮，捣膏) 菟丝子 肉苁蓉 黄精 黑枣肉 牛膝 蛇床子(微炒) 茯苓 远志各一两二钱 当归身二两四钱 丁香三钱 大茴香 木香各六钱 枸杞子一两五钱 巴戟 杜仲各一两 青盐五钱 人参五钱

上为细末，炼蜜丸如梧桐子大，每服六、七十丸，空心温酒送下，又诸疝不常举发者，服之亦宜。

如意金黄散(见肿疡门)

治囊痈初起，红赤肿痛，发热坠重者，用葱汤同蜜调敷。夏月湿热红甚者，温茶汤同蜜调敷妙。

囊痈应用方

万灵丹 蟾酥锭 太乙膏 玉红膏(俱见肿疡门)

大全大补汤 四物汤(俱见溃疡门)

五积散(见附骨疽门)

龙胆泻肝汤(见下疳门)

悬痈论第三十三

夫悬痈者，乃三阴亏损、湿热结聚而成。此穴在于谷道之前，阴器之后，又谓海底穴也。初生状如莲子，少痒多痛，日久渐如桃李，赤肿焮痛，欲溃为脓，破后轻则成漏，重则沥尽气血变为癆瘵不起者多矣。初起时元气壮实，宜用九龙丹泻去病根；稍虚者内消沃雪汤利去湿热；亦有可消者十中三、四。如十余日后，肿势已成，不得内消，宜托里消

毒散加山甲、皂角刺，服之自破。如肿高光亮，脓熟不破头者，用针急破之，秽脓一出，其患易安。如脓出之后，朝以六味地黄丸，午以十全大补汤加牡丹皮、泽泻温补滋阴。又有厚味膏粱气体壮实者，初服龙胆泻肝汤，溃服滋阴八味汤以清蕴热。体瘦房劳气血虚弱者，初服八珍汤加泽泻、制甘草，溃后十全大补汤加牡丹皮、熟附子。脾弱者，补中益气汤以滋化源。日久成漏者，国老膏化汤吞服蜡矾丸。首尾误服寒凉，损胃伤脾，冰凝气血，以致患孔渐开，秽脓不止者，亦定变成虚羸癆瘵，终为难愈。

悬痈看法

初起如松子，渐大若梅李，红赤肿痛，光亮发热者轻。已成高肿作痛，根脚不散，皮薄易破，脓成胀痛者易。已溃脓稠而黄，气味不臭，焮痛亦消，痛止作痒者顺。初起色紫坚硬，根脚漫肿，痛连臀膝，二便不利者重。已成肿如黄瓜，紫斑腐烂，秽水无脓，痛甚气急者难。已溃秽脓不绝，疮口开张，肉不红活，虚热食少者逆。

悬痈治法

初起寒热如疟，喜覆衣被，口干好饮热汤，宜当发散。已成焮热作痛，内热口干喜冷，大便秘涩者，微利之。日久内脓已成，不破头而胀痛者，急针之，法当补托。溃后脓水清稀，虚热不退，肿痛不消者，宜滋阴健脾。疮口不敛，饮食减少，余肿不消，新肉不生，峻补脾胃。

悬痈治验

一男子结肿四日，作痒微痛。以九龙丹一服，利^①五、六次，其肿渐

① 利：“利”前疑有“大便”二字。

消；又以四物汤加花粉、黄柏、知母而愈。

一男子患此十余日，焮肿作痛，至晚发热尤甚，又兼小水不利。以龙胆泻肝汤二服，小水稍通，微痛不止，此欲作脓，以托里消毒散加穿山甲、皂角刺、泽泻，二服而脓出，又以十全大补汤服之月余而敛。

一男子患此肿甚胀痛，此内脓已成。即针之，出臭脓碗许，疼痛顿减；以十全大补汤十余服而饮食渐进，焮痛亦消，惟疮口原溃之甚，不易完合，间用制甘草吞蜡矾丸，外以附子饼灸之，调理三月而愈。

一男子素有痰火，久服降下之药，致此结肿疼痛，脉细而数，此阴虚湿热流注而成，溃后必难收敛，辞不治。后果出臭脓，不禁日渐开大，发热不止，饮食不进，强以温中健脾、补托气血药，终至不应而歿。

悬痈主治方

滋阴八物汤

滋阴八物汤生地 赤芍丹皮花粉归

甘草川芎泽泻等 灯心为引效堪推

治悬痈初起，状如莲子，红赤渐肿，悠悠作痛者。

川芎 当归 赤芍 生地 牡丹皮 天花粉 甘草节各一钱 泽泻五分 大黄（便秘加，蜜炒）一钱

水二盅，灯心二十根，煎八分，食前服。

炙粉草膏

炙粉草膏药二般 当归甘草效常堪

制度熬膏好酒服 悬痈肿痛已成欢

治悬痈已成，服药不得内消者服之，未成者即消，已成者即溃，既溃者即敛，此治悬痈良药也。

大粉草四两，用长流水浸透，炭火上炙干，再浸再炙，如此三度，切片，甘草三两，当归身三两，水三碗，慢火煎至稠膏，去渣再煎，稠厚为度。每日三钱，无灰好热酒一大杯，化膏空心服之最妙。

還元保真汤

還元保真汤四物 参苓丹皮并白术

甘草黄芪枸杞同 附子肉桂泽泻入

治悬痈已溃，疮口开张，脓水淋漓，不能收敛者。

当归 川芎 白芍 熟地 白术 茯苓 人参 黄芪各一钱 牡
丹皮 枸杞子各八分 甘草(炙) 熟附子各五分 肉桂 泽泻各三分
水二盅，煨姜三片，大枣二枚，煎八分，食前服。

滋阴九宝饮

滋阴九宝饮芎归 白芍黄连生地随

花粉知母并黄柏 大黄煎服效堪题

治悬痈厚味膏粱、蕴热结肿，小水涩滞，大便秘结，内热口干，烦渴
饮冷，及六脉沉实有力者服。

川芎 当归 白芍 生地 黄连 天花粉 知母 黄柏 大黄
(蜜水拌炒)各二钱

水二盅，煎八分，空心服。

悬痈应用方

托里消毒散(见肿疡门)

肾气丸(见肺痈门)

十全大补汤 八珍汤 补中益气汤 四物汤(俱见溃疡门)

内消沃雪汤 蜡矾丸(见肿疡门)

九龙丹(见鱼口门)

龙胆泻肝汤(见下疳门)

附子饼(见附骨疽门)

臀痈论第三十四

臀痈生于小腹之后，位远僻奥，气亦罕到，血亦少来，凡生此者，湿
热凝滞结聚乃成。得此毒必外发，庶不内攻。初起毒从五脏蕴积者，
患必有头红热，坠重如石，内必口干发热，宜内消沃雪汤通利积热，外
以膏贴疮顶，四边以如意金黄散敷之，拔出瘀脓紫血，内兼托药自愈。

常有不知，内服败毒寒剂，外敷凉药，气血冰凝，毒气不得外发，反致内攻，其疮头软陷无脓，根脚平散不痛，内热口干，烦躁谵语，痰喘气粗，恍惚不宁者，俱为不治。但此多从毒积于内，自里至表者十有八、九，而从风寒暑湿自外至里者，百中一、二，既出而复入里者，终为死候。

臀痈看法

初起有头，红赤肿痛，顶高发热，根脚高耸者，为易治。已成焮热发肿，疼痛有时，皮薄光亮，色红易脓为顺。已溃脓稠而黄，色如猪脑，肿消痛止，起坐自便者易。初起粟米形或黄泡一点，平塌作痒，根脚散漫者重。已成色紫坚硬，臀腿俱肿，小便涩滞，日久无脓者险。溃后无稠脓，顶空根软塌，手按不知疼，神昏无治法。

臀痈治法

初起恶寒体倦，喜覆衣被，脉浮紧而在表者，微散之。已成内热口干，好饮冷物，小水涩而大便秘者通之。顶高色赤，焮痛发热，疼痛有时者，宜托里更兼解毒。肿已高而作疼，脓已熟而不破，胀痛难忍，宜即针之。溃后坚硬不消，脓水不止，饮食无味者，宜补虚健脾。

臀痈治验

一男子患此四、五日，始生疼痛，至晚作寒，六脉浮而带数。以人参败毒散二剂，寒热顿退，疼痛稍止；彼值公务相关欲出，乃用针点入患顶五、六分，流出紫血，用蟾酥条插入膏盖，以活血散瘀汤二服，次日流出紫血，随便可行，更服托里药五、六服而安。

一男子患此六、七日，焮痛发热，口干便燥。以托里消毒散加花粉、大黄，二服便通渴止，仍用前汤加角针、山甲，数服而脓溃；又以十全大补汤，半月而敛。

一男子患此，坚硬不溃，此先寒凉之过也。以十全大补汤加角针、

苍术、丹皮四剂，坚硬渐软；又以透脓散二服，脓熟针之，以前汤倍参、芪、归、术，月余而敛。

一男子暑月患此，自为内毒。外用老鸦藤捣烂敷之，每日续饮凉水十余碗，如此三日，疮毒内陷，患上平塌冰冷，口噤不言，六脉虚细如丝，辞不可治，至夜而死。又一人冬月患此，外用四黄散凉水调敷，内服败毒凉药，毒亦内陷，烦躁口干，鼻煽气急，患上平塌，原头存一空洞，无水无脓。予曰：疮毒已陷，定不可治。复请别医，俱曰无事，予曰：臀居小腹之后，肌肉顽厚，毒既到此，必须内托为脓，溃后最易收敛；今已内外寒凉，毒既内入，岂能再出。众医强投内消解毒、定躁除烦之药，终至不应，半月而死。

臀痈主治方

活血散瘀汤

活血散瘀汤枳壳 芎归苏木角红花

连翘花粉防风等 大黄赤芍一齐加

治臀痈初起，红赤肿痛，坠重如石及大便秘涩。

川芎 当归 防风 赤芍 苏木 连翘 天花粉 皂角针 红花 黄芩 枳壳各一钱 大黄二钱

水二盅，煎八分，食前服。便通者，去大黄加乳香。

黄芪内托散

黄芪内托散堪夸 山甲芎归皂刺加

金银花与甘草节 臀痈诸肿乐无涯

治臀痈已成，服前药势定者，欲其溃脓宜服之。

黄芪二钱 当归 川芎 金银花 皂角针 穿山甲 甘草节各一钱

水二盅，煎八分，入酒一杯，食前服。

臀痛应用方

内消沃雪汤 如意金黄散 人参败毒散 托里消毒散 透脓散
(俱见肿疡门)

蟾酥条(见疔疮门)

十全大补汤(见溃疡门)

杨梅疮论第三十五

夫杨梅疮者,以其形似杨梅;又名时疮,因时气乖变,邪气凑袭;又名绵花疮,自期绵绵难绝。有此三者之称,总由湿热邪火之化,但气化传染者轻,精化欲染者重。故气化乃脾肺受毒,其患先从上部见之,皮肤作痒,筋骨不疼,其形小而且干;精化乃肝肾受毒,其患先从下部见之,筋骨多疼,小水涩淋,其形大而且硬。如气化者,毒在皮肤,未经入里,宜服万灵丹洗浴发汗,解散皮肤之毒。精化者,毒在骨髓,未透肌肤,宜服九龙丹通利大小二便,以泻骨中之毒,甚者二服皆可。行散之后,体实者升麻解毒汤,体弱者归灵内托散。服至筋骨不疼,疮根淡白,内毒已解,方用点药,轻者半年,重则一载,始方得愈。如患者不遵此法,欲其速愈,妄用熏条、擦药等法,往往致成后患者多矣。患者熟思之。

杨梅疮看法

初起无头疼,筋骨不作痛,上水无涩淋,疮干细者轻。已生头面稀少,口角无疮,项下胸背虽多谷道无,可初生疮发下疳,次生鱼口,复作筋骨疼痛,疮发非痒。疮生红紫坚硬,手足多生,形如汤泼泡生,害非轻浅。

杨梅疮治法

初起先从涩淋，次传筋骨作疼，后发其疮，亦宜攻利。生此外无疳疮，内无筋骨作痛，时气所感者，微散之。疮从交媾不洁，乃生下疳，小水涩滞不通，当行导利。上部作痒疮多，消风清热；下部作疼痒甚，泻湿为先。红紫毒盛疮高，凉血解毒，淡白毒轻疮薄，攻利兼行。手足皮肤枯槁，鹅掌风生，柏叶、二矾煎汤熏洗即好。

头发眉毛脱，油风何须说，神应养真丹，早服稀疏脱。点点杨花癣，片片癫风疮，宜服换肌丸，效应如同扫。

杨梅疮治验

一男子患此两月余。自服败毒凉剂不应，筋骨疼痛尚在，此表里寒凉、毒沉难出，必以辛热发之，用万灵丹，葱、酒煎服，洗浴盖之；先出冷汗如雨，次出热汗，疼痛减其大半，以归灵汤服至月余，疮势始定。又以萆薢汤兼补中益气汤，又两月余而始痊愈。

一男子小便白浊作痛，次出疳疮，发肿作烂，筋骨微痛。予曰：欲发时疮。彼不为信，请他医以熏药照之，虽然疳疮稍愈，而筋骨更疼，头胀欲破，又复请治。其时红点满面，此火气郁遏难出，先用黄连解毒汤二服泻其火毒，次以蟾酥丸发汗，使毒透出肌表，以后红点渐渐为疮，筋骨头疼，从此渐减。以加味遗粮汤服至两月，疮始出尽，骨疼方止。又以解毒天浆散相兼服至百日，其疮始退，又百日而平。

一女人，丈夫生疮所袭，筋骨至疼，遇晚寒甚，以人参败毒散四剂，其寒乃退；疼尚不止，又以万灵丹发汗二次，方出点如豆大，头面及背肉无余隙，此毒之盛也。以防风通圣散二剂，通利大小二便，去硝黄加皂角针、金银花，又十余剂，其疮渐大，小者如钱，大者若杯，气秽作烂，起坐不堪。外以石珍散掺烂上结疤，又烂又掺，内服加味遗粮汤，两月余疮始渐干，轻者收敛而脱，重者又半年方得痊愈矣。

一庠生患此月余，乃求速愈。予曰：此患非他恙所比，若速愈必遗

毒于后日，辞不敢治。更医对曰：半月全愈，后亦无患。因喜不胜，用水银、胆矾等药搽手足二心，半月内其疮果愈。随后骨疼，诸药不应，半年后，内毒方出作烂，疼不堪言，遍腿相串，并无一空；又二年腿脚曲而不直，径成痼疾终身，又兼耳聋，全不相听。又一人嫖妓生疮，筋骨疼痛。予曰：升发方可。彼欲内消，请他医以丸药七圆，每用一圆，置炭上燃着以口吸烟，至三圆鼻流鲜血，至夜而死。又一妓者患此，欲其速愈，以照药熏之，三日后，吐鲜血数盆亦死。此求速愈，自取危亡者无怨。

杨梅疮主治方

加味遗粮汤

加味遗粮汤 木瓜 芎归 防苡 术 银花

鲜皮 皂子 灵仙等 木通 甘草 共参 夸

示杨梅疮初起筋骨疼痛，及已成数月，延绵不已。并杨梅风毒误服轻粉，瘫痪骨疼，不能动履。

川芎 当归 防风 薏苡仁 木瓜 金银花 木通 白鲜皮
苍术 威灵仙各一钱 甘草五分 皂荚子五个(切片微炒) 仙遗粮二两
人参(疮久气虚者加)

水二碗，煎八分，量病上下，食前后服。腿脚之下加牛膝一钱，病浅者一月可退，病深者百日可痊。忌牛肉、烧酒、海腥、煎炒，此疮发时多先起于下疳，若以此方预服之，可以止其不发梅疮也。

解毒天浆散

解毒天浆散 角针 防风 防己 膝风藤

芎归 翘粉 银花草 木瓜 蝉蜕 薏苡仁

治杨梅疮不问新久，遍身溃烂及筋骨作疼者。

天花粉二钱 防风 防己 皂角针 白鲜皮 连翘 川芎 当归
风藤 木瓜 金银花 蝉蜕 薏苡仁各一钱 甘草五分 土茯苓二两
牛膝(下部加)一钱

水二盅，煎八分，临服入酒一杯，量病上下服之。

升麻解毒汤

升麻解毒汤传易 去病应知却不难

同煎皂刺加油服 那怕多年结毒顽

治杨梅疮筋骨疼痛，久而不愈，及治远年近日流注结毒，皮肉破烂，咽喉损破者并宜服之。

川升麻、新鲜皂角针各四钱，上白土茯苓一斤，项之以上加白芷，咽内加桔梗，胸腹加白芍，肩背加羌活，下部加牛膝各一钱，用水八碗，煎至四碗，作四次一日服尽，每次顿热加麻油三茶匙和匀，量病上下，食前后服之。疮甚者不过十服。

归灵汤

归灵汤中四物宜 木瓜防己白鲜皮

米仁参术银花粉 甘草白芷牛膝随

治杨梅疮不论新久，但元气虚弱者，宜服此药。

川芎 当归 白芍 熟地 米仁 木瓜 防己 天花粉 金银花 白鲜皮 人参 白术各一钱 甘草五分 威灵仙六分 牛膝(下部加)五分 土茯苓二两

水三盅，煎二盅，二次量病上下，食前后服之，渣再煎八分服。

防风必效散

防风必效散荆防 槐术翘藤鲜芷当

角针木通番白草 银花花粉木瓜商

治杨梅疮湿热太盛，疮高稠密，元气素实者服。

防风 防己 荆芥 白鲜皮 连翘 槐花 苍术 皂角针 风藤 木通 白芷 天花粉 木瓜 金银花 番白草各一钱 甘草五分 土茯苓四两 大黄(初起加)三钱

水三碗，煎二碗，二次服。渣再煎一碗，服后饮酒一大杯，即静睡一时许更妙。

金蟾脱甲酒

治杨梅疮，不拘新久轻重皆效。好酒五斤，用大虾蟆一个浸酒封

瓶口，煮香二枝，取起，待次日随量之大小，以醉为度，冬夏盖暖出汗为效；存酒次日只服量之一半，酒尽疮愈。又治杨梅结毒、筋骨疼痛，诸药不效者更妙；服酒七日后，不许见风为要，忌口及房事，百日绝根矣。

翠云散

翠云散中用铜绿 胆矾轻粉石膏加

湿用胆调干末掺 梅疮一点便生疤

治杨梅疮已服内药，根脚不红，疮势已退者用。

铜绿 胆矾各五钱 轻粉 石膏(煨)各一两

共研极细，磁罐收贮。湿疮干掺，干疮公猪胆汁调点，三日点三次，其疮自干而愈。

又：点药方

点药方中用杏仁 雄黄轻粉共相称

猪胆汁调疮上点 敢教三日自承平

杏仁四十九粒(去皮、尖) 雄黄一钱 轻粉二钱

先将杏仁捣细，加雄黄、轻粉细末再研匀，猪胆调点。

鹅黄散

鹅黄散用真轻粉 石膏黄柏要称准

等分为末掺烂疮 杨梅腐痛最安稳

治杨梅疮溃烂成片，脓秽多而疼甚者宜用之。

石膏(煨) 轻粉 黄柏(炒)

以上各等分为极细末，干掺烂上，即可生疤，再烂再掺，毒尽乃愈。此解毒、止痛、收干之效药也。

杨梅疮应用方

万灵丹 黄连解毒汤(见肿疡门)

人参败毒散 防风通圣散(见时毒门)

蟾酥丸(见疔疮门)

补中益气汤(见溃疡门)

九龙丹(见鱼口门)

神应养真丹(见鹤膝风门)

祛风换肌散(见风痹门)

柏叶二矾汤(见鹅掌风门)

结毒论第三十六

结毒者,熏火收遏疮毒而沉于骨髓也。又有未经熏擦,见苗未久,服药不多,内毒未尽,便用点药收敛,郁遏毒气者,亦能致之。发则先从筋骨疼痛,日后渐渐肿起,发无定处,随便可生。发在关节中则损筋伤骨,纵愈曲直不便;发于口鼻则崩梁缺唇,虽痊愈破形更相;发于咽喉者,更变声音;发在手足者,妨于行走。原来苦楚一生,毒遗数代;情关一错,祸起百端。初起筋骨冷痛,金蟾脱甲酒发汗自愈。虚弱者,芎归二术汤;头疼欲破者,天麻饼子并吹鼻碧云散;年余流串筋骨不愈者五宝散;虚弱溃烂疼痛不敛者,十全大补汤同土茯苓煎服。初起筋骨痛甚者雷火针法。已溃腐烂者,解毒紫金膏依法施治。年远毒盛者,玄武丹兼外搽灵药;年近毒浅者,只在百日,自然可愈。毋得再熏,为祸伤人耳。

以下看法治法,俱照本论。医治自有条款,未及重录。

结毒治验

一男子熏药之过,六年后两腿骨痛,半年始肿。以雷火针,肿小者一处,肿大者三处,针之七日后,作脓腐溃,内服仙遗粮汤,两月余其疼渐止,肿亦渐消;又两月,方得腐尽肌生,更十全大补汤,三月而敛。

一男子玉茎患止半年,阳物已损七、八。遇一方士,以熏药照之,患上流血不止,人似鬼形。予曰:毒发已伤元气,再加熏火一逼,血得热而妄行,故去盆许,此有限之物也,恐其难保。先以四物汤兼黄连解毒汤合而服之,二剂其血乃止;更八珍汤加麦冬、五味子、黄柏、知母,十余服元气乃定。外以甘草汤浴洗患上,以银粉散搽之,如此月余,气

血渐醒,红肉渐生,阳物复长大半。仍用前汤加土茯苓二两煎服,此不舍其根本,共约有四月之余,其疾乃愈。

一男子患此,头疼欲破,至夜尤甚,苦楚不睡。自以解毒药治之,俱不相应。诊之寸关脉细数而无力,此虚阳之火上攻,以补中益气汤加土茯苓一两,服至三剂,其疼渐止;又十余剂,其疾全安而不再发。

一男子患此,自膝以下腐烂无空,伏枕半年,内以芎归二术汤,外以甘草、白芷、归尾、葱白煎洗,三日一度,以解毒紫金膏搽之,如此三月余,渐渐而安。惟足不能步履,以史国公酒药加土茯苓一斤浸煮,又服半年,其足方能步履。又一料,行步亦然如旧。

一妇人患此,头疼手腕俱痛。诊之脉滑而弦,此痰毒相兼之病也。以天麻饼子服之半月,头痛痊愈。又以二陈兼四物加红花、升麻、黄芩,服至月余而愈。

一男子头额腐烂,外搽解毒紫金膏,内以草薢汤两月余而敛。又一人小腿患之年余,仍以前药而愈。

一妇人咽间损坏半年,汤药难下几死。服结毒紫金丹,外吹结毒灵药,一月内其疾痊愈。又一女人手膊、头、背肿痛六、七年不溃,诸药不应,仍服前药而安。

一男子咽喉腐烂。予以遗粮汤内服,外用解毒生肌药治之,彼以为缓,仍用熏药照之,口烂几死,大便纯去黑血,及遍身浮肿,饮食不进,肌破三月而死。

结毒主治方

仙遗粮汤

仙遗粮汤荆芷防 银花花粉葛芎当

蒺藜灵仙杞膝草 芩连翘共水煎尝

治杨梅结毒,初起筋骨疼痛已破,肌肉溃烂者。

仙遗粮(即俗称土茯苓)四两 防风 荆芥 川芎 当归 天花粉
金银花 白蒺藜 薏苡仁 威灵仙各一钱 山栀 黄连 连翘 干葛

白芷 甘草 黄芩各六分 牛膝(下部加)五分

水三碗,煎二碗,量病上下,食前后服。渣再煎一碗,服后饮酒一杯,忌牛肉、火酒、房事等件更妙。

芎归二术汤

芎归二术汤防朴 独活参苓薏苡仁

木瓜皂刺精猪肉 草甲银通土茯苓

治杨梅结毒,已成未成,筋骨疼痛,步履艰辛,及溃后腐肉臭败,不能生肌收敛者,宜服之并效。

白术 苍术 川芎 当归 人参 茯苓 薏苡仁 皂角针 厚朴 防风 木瓜 木通 穿山甲(炒) 独活各一钱 金银花二钱 甘草

精猪肉二两 土茯苓四两

水三碗,煎一半,量病上下服之,渣再煎服。

消风脱甲散

消风脱甲散红花 番白灵仙梔蛻瓜

风子薄藤银皂刺 翹通苍术草齐加

治杨梅结毒,筋骨疼痛,腐烂作臭,气血壮实者。

歌曰:

十年十五半年五 二十年来三十补

纵然臭烂不堪闻 管教逢人再不吐

番白草 红花 甘草 威灵仙 山梔 蟾蛻 连翹 皂角针 大风子肉 薄荷 风藤 金银花 冬瓜皮 木通 苍术各一钱 土茯苓四两

水三碗,煎二碗,二次服用。好酒一大杯过口,渣再煎服。

熏洗结毒方

熏洗结毒方堪效 苍术川椒共水煎

任是腐痛多彻骨 将来一洗即时捐

苍术一两,点结川椒三钱,水五碗,煎至四碗入罐内;将患上对罐口以热气熏之,半热倾药盆内淋洗患上,以洁净布挹干,搽后解毒紫金膏。

解毒紫金膏

解毒紫金膏最易 取功奏效识应难

矾红只与松香等 去腐生新解笑颜

治杨梅结毒，腐烂作臭，脓水淋漓，诸药不效者。细块矾红，明净松香各一斤，共碾极细末，麻油调稠；先将患处用前汤熏洗洁净，搽上此药，油纸盖上，以软布条要扎至紧，毋令血行，三日一换。如无前汤熏洗，只煎葱、艾、甘草等汤，俱可洗换。又治诸毒顽赚等疮神效，愈后忌发物煎炒。

神仙碧玉膏

神仙碧玉膏朝脑 轻粉杭粉岂可饶

乳香没药并白占 猪油调搽腐烂好

治结毒溃烂臭秽，疼痛不敛，及风、赚等疮俱效。

轻粉一两 杭粉一两 白占五钱 乳香 没药各三钱 章冰二钱

用公猪净熟油五两，同白占熬化倾入碗内，入上药和匀，水内顿一时取起，临用搥脚挑膏手心中捺化，摊油纸上，用葱汤洗净疮，对患贴之。

五宝散

五宝散内用朱砂 琥珀珍珠冰片加

飞罗面同滴乳石 饭团煎和效堪夸

治结毒筋骨疼痛，腐烂口鼻，诸药不效者服之。

滴乳石（如乳头下垂，敲破易碎，亮似蜻蜓翅者方真）四钱 琥珀 珍珠朱砂各二钱 冰片一钱

上各研极细，对准共为一处，再研数百转，磁罐密收。用药二钱，加飞罗面八钱，再研和匀，每用土茯苓一斤，水八碗，煎至五碗，滤清作五次，每次加五宝散一分和匀，量病上下服，一日服完，十服自愈。如鼻子腐烂，每日土茯苓内加辛夷二钱煎服，引药上下，忌食海腥、煎炒，房事等件。

结毒紫金丹

结毒紫金丹罕稀 此方原不欲人知

决明龟板朱砂等 米饭为丸脱苦篱

治远年近日杨梅结毒，筋骨疼痛，日久腐烂，臭败不堪闻者；或咽喉唇鼻破坏，诸药不效者妙。

龟板（放炭火上炙焦，用新安酒浆、浓笔蘸浆涂上，反复炙涂三次，以焦黄为末）二

两 石决明（用九孔大者，煅红，童便内渍之一次） 朱砂（明亮者）各末二钱

共再碾极细，烂米饭为丸麻子大，每服一钱，量病上下，食前后、筋骨疼痛酒下，腐烂者土茯苓汤下，至重者四十日而愈。此功力胜于五宝散。

结毒灵药方

结毒灵药方水银 朱砂雄黄硫黄称

加上轻粉共研成 掺于腐上效如神

治杨梅结毒，腐烂作臭，或咽喉、唇、鼻腐坏日甚者并效。

水银一两 朱砂 雄黄 硫黄各三钱

共研细，入阳城罐内，泥固铁盞梁兜固紧封口，点三香为度，用水擦盞内，火毕，次日取出盞底灵药，约有一两五、六钱。治寻常腐烂之症，灵药五钱、轻粉五钱，和匀碾细，小罐盛贮，纱封罐口，临用甘草汤洗净患上，将罐倒悬，纱眼内筛药患上，用后单油膏药盖之，一日一换自效。男子、妇人咽烂者，灵药一钱，加入中白二分，研细吹之，日用三次，内服不二散，其疼即止，随可饮食。

硫黄不二散

硫黄不二散功奇 止痛除危效不疑

加上靛花研细末 服之犹自遇神医

治杨梅结毒发于咽内，腐烂疼痛，汤水难入者。

硫黄一钱 靛花一分

共为细末，凉水一大酒杯调服，其疼即止，饮食可用。

铅回散

铅回散内药蹊跷 筋骨多疼功不饶

加上硫黄为末服 敢教苦楚寂然消

治杨梅结毒，筋骨疼痛，朝轻夜重，喜热手按揉者。

用铅半斤，铜杓内化开，倾入水内，将铅取起，再化再倾，如此百遍，铅尽为度。候半日，待水澄清，倾去用钵底内沉下铅灰，倾在三重纸上，下用灰收干水气，取起晒干，与硫黄等分研细罐收。每服一钱，温酒调服，至重者不过三次即效。

单油膏

单油膏药用麻油 杭粉将来渐渐投
熬化成膏倾水内 护肌护药不开流
贴结毒疹药上。

用麻油二斤熬，滴水成珠，续下杭粉十三两，搅匀成膏，倾水内，片时取起摊用。

草薺汤

草薺汤蒲苳柏苍 灵仙龟板草红当
胡麻羌活川椒等 结毒筋毒皆可尝
治结毒筋骨疼痛，头胀欲破及已溃腐烂并效。

川草薺二钱 苦参 防风 何首乌各五钱 威灵仙 当归 白苳
苍术 胡麻 石菖蒲 黄柏各六分 羌活 川椒各四分 龟板一钱五
分 红花三分 甘草五分

水二盅，煎八分，临服入酒一杯，量病上下服之。

碧云散

吹鼻碧云散川芎 鹅不食草一般同
青黛共研为细末 吹之鼻内有神功
治结毒入于颠顶，以致头疼胀痛如破者吹之。

鹅不食草一两 川芎一两 青黛一钱
共为细末，患者口噙凉水，以芦筒吹药疼之左右鼻内，取嚏为效。

结毒应用方

十全大补汤 补中益气汤 四物汤 八珍汤(俱见溃疡门)

金蟾脱甲酒(见杨梅疮门)

天麻饼子(见头痛门)

雷头神针(见附骨疽门)

史国公酒药(见风湿门)

二陈汤(见痰病门)

黄连解毒汤(见疔疮门)

银粉散(见下疳门)

多骨疽论第三十七

多骨疽者,由疮溃久不收口,乃气血不能运行至此,骨无荣养所致。细骨由毒气结聚化成,大骨由受胎时精血交错而结,日后必成此疽也。但肾主骨,宜服肾气丸、十全大补汤先补脾肾;次用艾附饼灸之令温暖,腐毒朽骨自然脱尽,生肌敛口而愈。

多骨疽治验

一男子上腭肿痛月余,以散风清热药俱已不效;又两月,破流血水,百日外方出细骨,大小三十余块,以十全大补汤并吹生肌散,两月余而敛。中存一小孔簪脚大,通鼻透气,致难全敛,为愈而不愈也。

一男子左上膊结肿,年余方出烂斑,破流稀脓;延至半年,方出多骨一条,如鹅膊骨,一同长约四寸。内服养血健脾药,外搽玉红膏膏盖,又月余而敛。

一男子小腿正面腓骨肿痛二年,诸药不应,此多骨疮也。后破出骨一块,肌肉腐烂,元气虚弱,以十全大补汤加山茱萸、牛膝、木瓜,服至两月余不敛;每日以神灯照法将火助之,又出朽骨一块,上有蛙眼数十孔,以二骨炭火煨红为末,入生肌药中用之收敛。问曰:用骨者何?此骨原禀气血结成,故用之复还元气也。后人闻之,知理合天然之数矣。

一女人左口上牙根突肿如栗,坚硬如石不痛,此多骨疽也。药亦不效,后三年始痛,破流臭脓,后出多骨,形如小鳖;肿仍不退,此骨未

尽,稍入又出小骨二块,枯色棱蹭,其肿方退。以四君子汤加升麻、陈皮,外以甘草煎汤漱口,生肌散日搽三次而收敛。

多骨疽主治方

固本养荣汤

固本养荣汤四物 山药人参并白术

山萸甘草牡丹皮 肉桂黄芪五味宜

治骨疽已成,骨不吐出,或既出不能收敛,由气血之虚、脾胃弱也宜服之。骨不出者自出,不收敛者自敛。

川芎 当归 白芍 熟地 白术 山药 人参 牡丹皮 山萸肉 黄芪各一钱 甘草 肉桂 五味子各五分

水二盅,姜三片,枣二枚,煎八分,食前服。

生肌散

生肌散内石膏丹 石脂轻粉竭乳香

龙骨再加朝脑和 用之完口不须难

治腐骨脱出,肌肉生迟,不能收敛者,用此搽之。

石膏 轻粉 赤石脂各一两 黄丹(飞)二钱 龙骨 血竭 乳香

1 朝脑各三钱

上为细末,先用甘草、当归、白芷各一钱,煎汤洗净患上,用此干掺,软油纸盖扎,二日一洗一换。

多骨疽应用方

神灯照法 玉红膏(俱见肿疡门)

十全大补汤 四君子汤(俱见溃疡门)

肾气丸(见肺癰门)

卷之四

杂疮毒门

阴疮论第三十八

妇人阴疮，乃七情郁火伤损肝脾、湿热下注为患。其形固多不一，总由邪火所化也，阴中有如挺出一条，蛇形尺许，坠重、流水、潮湿者，乃脾气下陷，肝火从之，朝服补中益气汤，晚服龙胆泻肝汤，外涂雄黄藜芦散，其患渐收。阴中突出如菌子、如鸡冠，四边肿痛者，乃肝郁脾虚所致，先以补中益气汤加山梔、茯苓、青皮，清肝补脾、兼升中气；更以归脾汤加山梔、川芎、茯苓、香附、陈皮调理。阴户忽然肿突作痛，因劳伤血分，湿火下流，宜四物汤加丹皮、泽泻、花粉、柴胡治之。阴中生虫，愚如小蛆者，乃心气郁而邪火所化，宜四物加黄连、胆草、木通、石菖蒲，以通散心窍郁滞，外以银杏散纳入阴中。阴器外生疙瘩，内生细虫作痒不可忍者，此虫食人脏腑即死；令人多发寒热，与癰瘰相似，有此症之妇人畏羞都不肯说，因循日久，面黄肌瘦，身发寒热，咳嗽生痰，往往不治者多矣。如有此症，急与逍遥散吞芦荟丸，草晚二服，外用银杏散绵裹塞入阴中，杀虫止痒，半月渐愈。阴户开而不闭者，忧思过也；逍遥散、归脾汤俱加柴胡、山梔、白芍、丹皮间服。交接出血者，肝虚有火，不能藏血，四物汤加胆草、黄芩、山梔、柴胡；新交房事伤而肿痛者，珍珠散猪脊髓调搽。又妇人久居寡室，淫火妄而又郁，郁而又妄，邪火久注，多致阴中作痒生虫，此虫食人内脏，阴中腐烂，攻刺疼痛，臭水淋漓，口干发热，形消不食，有此症者，非药能愈，终归于死。又名失合症也。

阴疮治验

一妇人阴器肿痛，小水涩滞，遇晚寒热交作，此肝经湿热为患。以龙胆泻肝汤二服，小水通利；又以四物汤兼小柴胡加天花粉、木通、炒山栀，服之而愈。

一妇人无辜发热月余，忽阴中突出一物，如鸡冠一片，此肝郁脾虚所致。以补中益气汤加青皮、山栀、柴胡、黄芩，外以甘草、白芷、苍术、紫苏煎汤，每日熏洗，十余日其患渐小，仍用前汤倍参、术，月余而安。

一妇人阴中作痒，遇夜五心烦热，作渴不睡，此思虑太过，致心肾不交。以四物汤加龙胆草、山栀、黄连、知母，外以银杏散纳入阴中，二日其痒渐止。又朝以八味丸、午用归脾汤加银柴胡、茵陈，月余而愈。

一妇人阴器半边肿痛，身发寒热，口干便秘，脉实有力。以内疏黄连汤一剂，大便通利，口干乃止，惟肿痛尤甚，此湿毒结聚欲为脓也。以四物汤加角针、泽泻二剂，脓熟胀痛，又以透脓散一服，出臭脓钟许，疼痛顿止；以八珍汤加丹皮、泽泻十余剂而安。

一妇人肝经风湿下流阴器，浮肿痒甚，致抓出血不痛。以消风散加苦参、胆草、泽泻、木通、山栀，外以蛇床子汤熏洗，搽擦银杏散，十余日痒止肿消而愈。

一妇人孀居十余载，阴器作痒生虫，含忍不说，后阴器食烂，已食内脏，人形消瘦，发热作渴，脉洪浮数，方请医治。询问间痒痛日久，阴器黑腐，小水不禁，内脏已坏，不可用药，彼苦求治，予曰：痒者虫也，痛者损也。先用鲫鱼数枚，以香料掺炙鱼熟，以丝绵薄裹纳入阴中，夹之良久，取出红虫长者一寸，短者五、六分，细如丝钱，约有二十余条，置温水中摇摆片时方死。彼家欢悦，以为可治。予曰非也，再取再有，生化无穷。强投养血清肝药，终至不痊而死。

阴疮主治方

清肝渗湿汤

清肝渗湿汤四物 泽泻翹连胆草栀

木通滑石银柴等 甘草防风芦荟宜

治肝经郁滞，邪火流行，致阴肿痛，或风热作痒。

川芎 当归 白芍 生地 山栀 黄连 连翹 龙胆草各一钱
银柴胡 泽泻 木通各六分 滑石二钱 芦荟五分 甘草三分 防风八分
水二盅，淡竹叶、灯心各二十件，煎八分，食前服。

凉荣泻火汤

凉荣泻火汤黄芩 四物山栀知母全

柴胡木通茵陈草 麦冬龙胆大黄煎

治妇人怀抱忧郁不清，致生内热，小水涩滞，大便秘结，及阴中为郁作痛，亦如涩淋，宜此泻之。

川芎 当归 白芍 生地 黄芩 黄连 山栀 木通 柴胡
茵陈 胆草 知母 麦门冬各一钱 甘草五分 大黄(酒炒)二钱
水二盅，煎八分，空心服，便利去大黄。

银杏散

银杏散内用杏仁 水银轻粉雄黄称

枣肉为丸绵裹成 阴中作痒功效灵

治妇人湿热下注，阴中作痒，及内外生疮并用。

杏仁(去皮尖，研) 轻粉 水银铅制 雄黄各一钱

上各为细末，共和一处，每用五分，枣肉一枚和丸。用丝绵包裹，留一绵条拈线在外；用塌痒汤煎洗，药枣安入阴内，留线在外，恐小便取出再入，一日一换，重者只四、五枚痊愈。仍兼服前药。

塌痒汤

塌痒汤中有苦参 狼毒灵仙床子真

归尾鹤虱同煎洗 搔痒之人笑眼生

治症同上，以此熏洗之。

苦参 威灵仙 蛇床子 当归尾 狼毒各五钱 鹤虱草一两

用河水十碗煎数滚，滤清贮盆内；乘热先熏，待温后洗，临洗和入公猪胆汁二、三枚，同洗更妙。

雄黄藜芦散

雄黄藜芦散鳖头 轻粉冰片共相求

芎归汤沸乘温洗 蛇菌鸡冠不久留

治妇人阴中突出如蛇，或似鸡冠、菌样者并治。

雄黄一钱 葱管 藜芦二钱（碾细如面） 轻粉鳖头（煨黄色）各一钱 冰片二分

以上各研极细末，和匀再研，磁罐收贮。先用芎归汤煎洗，随后搽药，早晚二次，其患渐收。

芎归汤

芎归汤洗阴中痒 蛇菌鸡冠并此求

白芷甘草并胆草 熏洗余殃尽缩头

治症同上，以此洗之。

川芎 当归 白芷 苦草 胆草

上各等分，每用五钱，煎汤浴洗患上，随后搽药。

阴疮应用方

内疏黄连汤 透脓散（俱见肿疡门）

补中益气汤 八珍汤 四物汤 八味丸（俱见溃疡门）

逍遥散 小柴胡汤（俱见瘰癧门）

龙胆泻肝汤 珍珠散（俱见下疳门）

归脾汤（见痔疮门）

消风散（见风疹门）

蛇床子汤（见肾囊风门）

芦荟丸（见下疳门）

伤寒发颐第三十九

伤寒发颐亦名汗毒。此因原受风寒，用药发散未尽，日久传化为热不散，以致项之前后结肿疼痛，初起身热口渴者，用柴胡葛根汤清热解毒；患上红色热甚者，如意金黄散敷之。初起身凉不渴者，牛蒡甘桔汤散之；患上微热不红疼痛者，冲和膏和之；肿深不退欲作脓者，托里消毒散；已溃气血虚弱食少者，补中益气汤。以此治之，未成者消，已成者溃，已溃者敛，亦为平常黄道之法也，用之最稳。

柴胡葛根汤

柴胡葛根汤花粉 甘草连翘牛子芩

石膏桔梗升麻等 伤寒颐毒效多灵

治颐毒表散未尽，身热不解，红肿坚硬作痛者。

柴胡 天花粉 干葛 黄芩 桔梗 连翘 牛蒡子 石膏各一钱
甘草五分 升麻三分

水二盅，煎八分，不拘时服。

牛蒡甘桔汤

牛蒡甘桔汤赤芍 花粉黄加苏木陈

加上川芎为效药 伤寒颐毒尽承平

治颐毒表邪已尽，耳项结肿，微热不红疼痛者。

牛蒡子 桔梗 陈皮 天花粉 黄连 川芎 赤芍 甘草 苏木各一钱

水二盅，煎八分，食后服。

如意金黄散 冲和膏（俱见肿疡门）

补中益气汤（见溃瘍门）

托里消毒散（见肿疡门）

痈发第四十

痈发，乃天时不正之气感而发之，非毒内作也。此患多生于手足

掌心或腰、腿、臀下伸缩之处，漫肿无头，憎寒发热，四肢沉重，烦渴为甚。初起宜服万灵丹发汗解表；肿仍不消者，必欲作脓，托里消毒散兼蜡矾丸间服，后法俱照痈疽溃疡法推治为当。

万灵丹 托里消毒散 蜡矾丸（俱见肿疡门）

瘰疬第四十一

瘰疬一名蛇瘰，川、广烟瘴地面有之。初出先作红点，次变黑色，腐烂筋骨，小者如粟如豆，大者如梅如李，发无定处，初有蟾酥饼膏贴患上，寒热交作者，黍米寸金丹或飞龙夺命丹亦可。红肿游走不定者，真君妙贴散加雄黄敷之，自然截住；破后脾胃虚弱，食少干呕者，补中益气汤加黄连、麦冬。补而不应，肿高疼甚，惟出清水秽汁者，俱为不治之症。

飞龙夺命丹（即蟾酥丸加金头蜈蚣二条）

黍米寸金丹 真君妙贴散（见肿疡门）

补中益气汤（见溃疡门）

小腹痛第四十二

小腹痛，乃七情火郁，以致脾虚气滞而成。其患小腹漫肿坚硬，肉色不变。有热渐红者，属阳易治；无热不红者，属阴难治。初起七日以前，用艾当肿顶灸七壮，膏盖，首尾内服壮脾胃、养气血、行经补托之剂，可保终吉。如误用克伐攻利凉药者，败症必出，十全大补汤倍加参、芪、姜、附以救之。内腐深陷者，玉红膏长肌收敛。又补托不应者，终久纵愈成漏。

十全大补汤 玉红膏（俱见溃疡门）

鹤口疽第四十三

鹤口疽，乃三阴亏损督脉之经浊气，湿痰流结而成。其患发在尾

间之穴，高骨头尖，初起形似鱼脰，久则突如鹤嘴，朝寒暮热，日轻夜重，溃后稀脓出而无禁，又或鲜血出而不停。凡发此者，壮年犹可，老年为虑。初起宜滋阴除湿汤和之；已成未溃者，和气养荣汤托之；溃而不敛者，滋肾保元汤补之；久而成漏者，琥珀蜡矾丸兼先天大造丸，服之甚妙。

滋阴除湿汤

滋阴除湿汤知母 白芍芍归熟地苓

柴陈贝母兼泽泻 骨皮甘草效多灵

治鹤口疽。初起朝寒暮热，日轻夜重，如疔等症。

川芎 当归 白芍 熟地各一钱 柴胡 黄芩 陈皮 知母 贝母各八分 泽泻 地骨皮 甘草各五分

水二盅，姜三片，煎八分，食前服。

和气养荣汤

和气养荣汤术芪 参苓熟地共陈皮

丹皮甘草沉香等 还有当归在后随

治前症已成不得内消者，宜此药托之。

人参 陈皮 白术 黄芪 茯苓 丹皮 当归 熟地各一钱 沉香 甘草各五分

水二盅，煎八分，食前服。

滋肾保元汤

滋肾保元汤杜仲 参芪术附桂丹皮

归苓萸肉并甘草 枣姜熟地要相随

治前症元气虚弱，脓水淋漓，久而不敛者服之。

人参 黄芪 白术 茯苓 归身 杜仲 山萸肉 牡丹皮 熟地各一钱 附子 肉桂 甘草各五分

水二盅，姜三片，枣二枚，莲肉七枚，食前煎服。

琥珀蜡矾丸（见肿疡门）

先天大造丸（见流注门）

龙泉疽虎须毒第四十四

此二毒乃任督二脉分合行布，骤被外邪所搏而成。龙泉疽发在人中之间，虎须毒生于地角之上。初起疙瘩，次生肿痛，渐发寒热，甚者恶心干呕，腮项俱肿。此穴忌灸，初起宜线针挑破患顶，以蟾酥饼放上膏盖，使毒有门而泄；四边焮肿，上如意金黄散敷之。内有表症者，荆防败毒散加芩、连、牛子，里症内疏黄连汤。已成欲其作脓，芎归内托散；脓成胀痛者，针之即愈。溃脓后只宜膏药换贴，其口易完。此症多生于元气壮实者，故多不必服药自愈。

芎归内托散

芎归内托散 陈皮 桔梗 花粉 茯苓 随

黄芪 甘草 银花等 虎毒 龙泉服最宜

川芎 当归 陈皮 茯苓 天花粉 桔梗 银花 黄芪 各一钱

甘草五分

水二盅，煎八分，食后服。

如意金黄散 内疏黄连汤 荆防败毒散（见时毒门）

石榴疽第四十五

石榴疽者，乃少阳相火与外湿煎搏而成，其患生在肘尖上一寸是也。初起一点黄粟小泡，根便开大，色红坚硬，肿如覆碗，皮破泛出，叠如榴子，令人寒战，犹如重疟。初起即灸九壮，内服蟾酥丸发汗以解蕴毒；灸顶上，蟾酥饼贴之膏盖；掀痛处金黄散敷之。内服菊花清燥汤、琥珀蜡矾丸；烦躁热甚者，护心散、金液戊土丹。九日后，患上作脓稠黄，疼痛稍减，表里症退，饮食微进者，可保无虞，反此为逆。溃后元气虚弱，杂症相兼者，照痈疽调理法治之。

菊花清燥汤

菊花清燥汤 生地 知母 川归 熟地 皮

柴芩甘草升麻等 犀角门冬白芍宜

甘菊二钱 川芎 当归 知母 贝母 白芍 生地 麦门冬 地骨皮各一钱 升麻 犀角 甘草 柴胡 黄芩各五分
水二盅,淡竹叶、灯心各二十件,煎八分,食后服。
蟾酥丸(见疔疮门)
琥珀蜡矾丸 护心散 如意金黄散(俱见肿疡门)
金液戊土丹(见脱疽门)

穿踝疽第四十六

穿踝疽,乃足三阴湿热下流停滞而成。初起内踝肿痛,疼彻骨底,举动艰辛,甚则串及外踝通肿。有头者属阳,易破;无头者属阴,难溃。此二者,初起必寒热交作,宜荆防败毒散加牛膝散之,日久脓成胀痛者针之。腐而不敛孔大者,玉红膏培之;形体虚弱者补之。此症若不早治,因循致成废疾也有矣。

荆防败毒散(见时毒门)

玉红膏(见肿疡门)

大麻风第四十七

大麻风症,乃天地间异症也。但感受不同,有体虚之人因骤被阴阳暴晒,露雾风雨之气所侵,感之不觉,未经发泄,凝滞肌肤,积久必作。又有房欲后体虚为风邪所袭,或露卧当风,睡眠湿地;或洗浴乘凉,希图快意;……此等相感俱能致之。

其患先从麻木不仁,次发红斑,久则破烂,浮肿无脓。又谓皮死麻木不仁,肉死刀割不痛,血死破烂流水,筋死指节脱落,骨死鼻梁崩塌。有此五症,俱为不治。又曰心受之先损于目,肝受之面发紫泡,脾受之遍身如癬,肺受之眉毛先脱,肾受之足底先穿,又为五败症也。总皆风湿相乘,气血凝滞,表里不和,脏腑痞塞,阳火所变,此其根蒂也。初起麻木不仁,肌肉未死者,宜万灵丹洗浴发汗,以散凝滞之风;后服神应

养真丹加白花蛇等分，久服自愈。年久肌破肉死者，先用必胜散疏通脏腑；次服万灵丹，每日酒化一丸，通适血脉，服至一日，换服苦参丸，轻者半年，重者一载渐愈。或兼服酒药，忌戒房事，厚味、动风等件，可保终年不发矣。

万灵丹（见痢疽肿疡门）

治大麻风初起麻木不仁，或既久皮肤破裂、手足拳挛，肢体不便，但未指脱足穿者，并宜服之。

必胜散

必胜散中用大黄 白丑槟榔共粉霜

姜汁砂糖同末服 管教患者渐安康

治大麻风血热秘结，脏腑不通，宜用此药利之。

大黄 槟榔 白牵牛各一钱 粉霜一钱五分

上各为细末，年壮者作五服，中年久虚者作七服。用生姜四两捣汁，赤砂糖三钱，加水一大杯，三味和匀，临睡时腹中稍空、顿温通口服之即睡；至三更，遍身麻木如针刺，头、目、齿缝俱痛，此药寻病之功已达，行出大、小二便，或青白黑黄，又或红虫之类，此乃病根也，一月内服药三次渐痊，眉发俱生，肌肤如旧。齿缝有血，宜漱后药。

漱药方

漱药方中有二般 贯众黄连一处攢

水煎加入些冰片 止血何愁甚不安

贯众、黄连各三钱，水二盅，煎一半，入冰片少许，每日陆续漱之，其血自止，兼忌动风、油腻之物。

苦参丸

苦参丸内药多般 品味难将一一刊

新久麻风诸坏症 将来久服自能安

治大麻风毋分新久，穿破溃烂，老幼俱可服之。

苦参一斤 中风子肉六两 荆芥十六两 防风 白芷各六两 全蝎
何首乌 白附子 枸杞子 威灵仙 当归 大胡麻 川芎 蒺藜
大皂角 川牛膝 牛蒡子 独活各五两 蔓荆子 风藤 羌活 连

翹 苍术 天麻 杜仲 草乌(泡去皮尖) 甘草各三两 人参一两 砂仁二两 白花蛇二两(切片炙黄)

上药共为细末,醋打老米糊为丸,梧桐子大,每服三、四十丸,温酒食前后任下,避风、忌口为妙。

苦参丸的临床新用

1. 阴囊湿疹

程晓春等用当归贝母苦参丸加味为主治疗阴囊湿疹 60 例。药物组成:当归、苦参各 15 克,浙贝母、生地、黄柏、徐长卿各 12 克,苍术 9 克,苡仁 30 克,甘草 6 克。渗出明显者加龙胆草、车前子各 12 克,茯苓 15 克;瘙痒甚者加地肤子、白鲜皮各 5 克,龙骨、牡蛎各 30 克;皮疹潮红热盛者加丹皮、赤芍、梔子各 12 克,紫草 15 克;皮损粗糙肥厚者加丹参、鸡血藤各 30 克,桃仁、红花各 9 克。1 日 1 剂,水煎服。同时配合外用治疗,有渗出者用自制湿疹溶液湿敷,皮损粗糙肥厚者外用激素软膏。10 天为 1 个疗程,2 个疗程后统计疗效。治疗期间避免局部烫洗、搔抓,忌食辛辣刺激性食物。痊愈 55 例,好转 5 例。

程晓春,等. 实用中医药杂志,2004,20(4):181

2. 产后尿潴留

王珏用当归贝母苦参丸加味治疗产后尿潴留 76 例。药用:当归 10 克,象贝 10 克,苦参 15 克,黄柏 6 克,滑石 15 克,车前子 15 克,益母草 15 克,生蒲黄 6 克,马齿苋 30 克,肉桂 3 克。1 日 1 剂,水煎服。治疗效果:2 剂后恢复自主排尿者 19 例,3 剂后恢复自主排尿者 40 例,5 剂后恢复自主排尿者 11 例,6 剂后恢复自主排尿者 6 例。

王珏. 中国中医药科技,2002,9(4):218

3. 前列腺增生症

褚洪飞用当归贝母苦参丸治疗前列腺增生症 31 例。药物组成:当归、浙贝母、泽兰叶各 10 克,苦参 15 克,石菖蒲 5 克,昆布、海藻、益母草各 20 克。尿频涩痛加蒲公英、六一散;腰膝酸软加杜仲、牛膝;咽

干舌红加生地、丹皮；咳嗽、喘息加桑白皮、桔梗；少气倦怠加黄芪、党参；畏寒肢冷加制附子、肉桂；小便滴沥不畅加穿山甲、王不留行。1日1剂，早晚分服，15天为1个疗程，2个疗程后统计疗效。结果：显效17例，有效11例，无效3例，总有效率90.3%。

褚洪飞. 实用中医药杂志, 2002, 18(11): 14

4. 急性肾炎

吉德平等用苦参丸治疗急性肾炎25例。在常规疗法的基础上加服苦参丸，15岁以上者每次10克，1日3次；15岁以下者每次6克，1日3次，效果显著。

吉德平, 等. 中国乡村医药, 2002, 9(9): 39

5. 肺胀喘悸

王伯章用茯苓甘草汤合当归贝母苦参丸治疗肺胀喘悸83例。药物组成：桂枝、茯苓、川贝母、苦参、当归、杏仁、厚朴各10克，生姜6克，炙甘草8克，紫菀15克。兼外感者加麻黄、防风各10克；伴心下动悸者茯苓加至15克，酸枣仁15克；唇舌暗紫者，加桃仁5克；热咳甚者加桔梗12克，枇杷叶10克；寒咳者加干姜6克，五味子6克；痰多者加葶苈子10克；无痰而喘者加熟地30克，石膏20克；痰黄或发热者加金银花、连翘各15克，黄芩10克。每日1剂，水煎分2次温服，10天为1个疗程。总有效率为78%。

王伯章. 湖北中医杂志, 2001, 23(7): 33

6. 膀胱炎

蒋翹等用当归贝母苦参丸加味治疗膀胱炎230例。基本方药：当归15克，川贝母10克，苦参20克，生地15克，木通10克，淡竹叶10克，甘草梢10克，车前子10克（包煎）。每日1剂，水煎少量频饮，5剂为1个疗程。加减：膀胱湿热者加大黄、琥珀末；肝胆湿热者加龙胆草、金钱草；肾阴不足、湿热留恋者加知母、黄柏、山药、枣皮、杞果；妊娠者去木通加黄芩。总有效率100%。

蒋翹. 国医论坛, 1999, 14(5): 9

7. 胃脘痛

毕明义用当归贝母苦参丸治疗胃脘痛180例。药物组成：当归5

~30克,贝母10克,苦参15克。1日1剂,饭前服。加減:若属郁火伤阴用川贝母;若属湿热中阻、肝胃郁热用大贝母;痛势急迫者合芍药甘草汤(白芍30克,甘草15~30克);兼气滞者,加九香虫10克,甘松10克。总有效率为99%。

毕明义. 河南中医, 1992, 12(1): 17

麻风药酒方

麻风酒 膝术 防归 · 苦杞 姜秦 虎节 随

羌活 草麻 并鳖甲 茅根 加上效甚推

防风 当归 虎骨 秦艽 · 羌活 苦参 牛膝 僵蚕 松节

鳖甲 苍术 枸杞子 白茅根各二两 草麻子仁一两

用好雪酒二十五斤,用药袋盛浸酒内,封坛口,煮香二枝取起,水内浸一伏时,取服数杯自效。

雄硫散

雄硫散内凤凰皮 山甲相兼滑石随

桃肉共和猪胆汁 眉毛脱落擦之宜

治大麻风眉毛、须、发脱落作痒者,宜此药擦之。

雄黄 硫黄 凤凰皮(即雏鸡壳,烧黄存性)各五钱 川山甲十片(炒黄)

滑石一两

上各为细末,用半油核桃肉一两捣烂,同公猪胆汁一个同前药和匀,用青纱包药擦之。日用三次,其发渐生如旧。

又擦麻风病,面生紫块疙瘩。方用:川山甲灰炒,川椒为末各二钱,生姜汁、土大黄根二汁,调稠绢包擦患上,如久药干,加水调擦亦效。忌动风、发物等件。

翻花疮第四十八

翻花者乃头大而蒂小,小者如豆,大者若菌,无苦无疼,揩损每流鲜血,久亦虚人。以津调冰蛭散遍擦正面,上用软油纸包裹,根蒂细处用线连纸扎紧,十日后其患自落;换珍珠散掺之收口。又有根蒂不小,

如鳖棋子样难扎,以前药搽上,用面糊绵纸封上二重,用心勿动,亦以十日外落之,掺珍珠散。

冰蛭散(见瘰癧门)

珍珠散(见下疳门)

腋痈第四十九

腋痈俗称夹痈,此肝、脾二经为患。肝经血滞、脾经气凝共结为肿。初起皮色不变,漫肿无头,日久方疼,乃生寒热,此患难消,终必作脓。未破者柴胡清肝汤,已破者十全大补汤去肉桂加香附、陈皮。软肿胀痛者针之、膏贴。但此症首尾温补,忌用寒凉也。

柴胡清肝汤(见鬚疽门)

十全大补汤(见溃疡门)

胁痈第五十

胁痈多从郁怒肝火者发之,肥胖内实者鲜此症。初起宜梔子清肝汤、柴胡清肝汤解郁泻火。已成者,托里消毒散加青皮、香附;脓已成者即针之,勿伤内膜。已破后八珍汤加丹皮、山萸、泽泻,兼滋肾水。又虚劳所得者,破流臭败稀脓,补托不应者必死。

托里消毒散(见肿疡门)

梔子清肝汤 柴胡清肝汤(俱见鬚疽门)

八珍汤(见溃疡门)

鼻痔第五十一

鼻痔者,由肺气不清、风湿郁滞而成,鼻内息肉结如榴子,渐大下垂,闭塞孔窍,使气不得宣通。内服辛荑清肺饮,外以硃砂散逐日点之,渐化为水乃愈。兼节饮食、断厚味、戒急暴、省房欲,愈后庶不再发。

辛荑清肺饮

辛荑清肺饮黄芩 百合山梔知母称

麦冬甘草石膏等 升麻枇杷叶一同论

治肺热鼻内息肉，初如榴子，日后渐大，闭塞孔窍，气不宣通者服之。

辛荑六分 黄芩 山梔 麦门冬 百合 石膏 知母各一钱 甘草一分 枇杷叶三片(去毛) 升麻三分

上水二盅，煎八分，食后服。

硃砂散

硃砂散内用雄黄 粉霜冰片在其藏

为末将来患上点 能消息肉自然光

治鼻生息肉，初中榴子，渐大下垂，名为鼻痔也。

硃砂一钱 轻粉三分 冰片五厘 雄黄三分

上共为末，用草桔咬毛蘸药勤点痔上，日用五六次，自然渐化为水而愈。

取鼻痔秘法：先用回香草散连吹二次，次用细铜箸二根，箸头钻一孔，用丝线穿孔内，二箸相离五分许，以二箸头直入鼻痔根上，将箸线绞紧，向下一拔，其痔自然拔落；置水中观其大小，预用胎发烧灰同象牙末等分吹鼻内，其血自止。戒口不发。

回香草散

回香草散有奇功 加上良姜二味同

为末共吹于鼻痔 尤如拾芥在其中

回香草、高良姜晒干，等分为末，用此先吹鼻痔上二次，片时许，随后方行取法，其痔自然易脱。

骨槽风第五十二

骨槽风，初起生于耳前，连及腮项，痛隐筋骨；久则渐渐漫肿，寒热如疟，牙关紧闭，不能进食。此得于郁怒伤肝，致筋骨紧急；思虑伤脾，

致肌肉腐烂，膏粱厚味，致脓多臭秽。初则坚硬难消，久则疮口难合，初宜艾灸肿顶及耳垂下五分，各灸七壮，膏贴以泄内毒，真君妙贴散敷肿上；牙关内肿，用线针刺去恶血，冰硼散搽之，使内外毒气得解，宜服降火化痰、清热消肿之剂；溃后当托里药中加麦冬、五味，外腐者玉红膏，使水升火降、脾健金清乃愈。又有外腐不合，虚热不退，坚肿不消，形焦体削者死。

清阳散火汤

清阳散火汤翹芩 白芷升麻牛子迎

石膏甘草荆防等 加上当归蒺藜成

治牙根尽处结肿，连及耳项作痛，名骨槽风也。

升麻 白芷 黄芩 牛蒡子 连翹 石膏 防风 当归 荆芥

白蒺藜各一钱 甘草五分

水二盅，煎八分，食后服。

中和汤

中和汤芍药芎归 甘草参芪白芷宜

桔梗肉桂防风等 藿香姜枣效堪题

治前症已经穿溃，流脓臭秽疼痛不止者服之。

人参 黄芪 白术 白芷 川芎 当归 甘草 桔梗 白芍各一

钱 肉桂 麦冬 藿香各五分

水二盅，姜三片，枣二枚，临服入酒一杯，食后服。

真君妙贴散 玉红膏（俱见肿疡门）

冰硼散（见咽喉门）

紫白癜风第五十三

紫白癜风，乃一体二种。紫因血滞，白因气滞，总由热体风湿所侵，凝滞毛孔，气血不行所致，此皆从外来矣。初起毛窍闭而体强者，宜万灵丹以汗散之，次以胡麻丸常服，外用蜜陀僧散搽擦，亦可得愈。

胡麻丸

胡麻丸内用防风 白附威灵甘草同

苦参独活菖蒲等 癜风赤白效神功

治癜风初起，皮肤作痒，后发癜风，渐生开大者。

大胡麻四两 防风 威灵仙 石菖蒲 苦参各二两 白附子 独活各一两 甘草五钱

上为细末，新安酒浆跌成丸子，每服二钱，形瘦者一钱五分，食后临卧白滚汤送下。忌动风发物、海腥、煎炒、鸡、鹅、羊肉、火酒等件，愈后戒百日。

雌雄四黄散

雌雄散用石硫黄 川槿皮同白附当

还有雌黄饶不得 管教癜症一时光

治紫白癜风，皮肤作痒，日渐开大，宜用此搽之。

石黄 雄黄 硫黄 白附子 雌黄 川槿皮各等分

上为细末，紫癜醋调，用竖槿木毛头蘸药擦患上；白癜用姜切开蘸药擦之，擦后三日，忌下汤水。戒食鸡鹅羊肉、煎炒、海腥、火酒等件，不复发。

又方

白癜紫癜一般风 雄黄朱砂等分同

茄蒂端来擦患处 不消三日有神功

白加蛇壳同来擦 管教前患永无踪

肥皂方

癜风酒刺雀斑方 皂角甘松山柰藏

附子豆粉獐冰等 白芷陀僧楮实芽

皂角 甘松 山柰 白芷各二钱 密陀僧 白附子 朝脑各一钱 楮实子 绿豆粉各三钱

上为细末，用去净皮弦肥皂一斤，捶匀，洗擦患上，日久自效。

密陀僧散（见汗斑门）

齿病第五十四

齿病者，有风、有火，亦有阳明湿热，俱能致之。风痛者，遇风发作

浮肿,随后生痛,以消风散治之;火痛者,则齿根必牵扯腮颧,阵阵作痛,时发时止,以冰硼散擦之,出涎自愈;阳明经湿热作痛者,其患腮颧浮肿,甚者牵引太阳,疼连颞项,口中热气,大便结燥,当宜凉膈散加石膏治之。又肿高软者,内必有脓,用针刺破,出脓自愈。有齿龈腐烂,出血不止者,内服犀角地黄汤,外搽人中白散。又小儿钻齿疳,牙根尖穿出齿根肉外,芒刺嘴唇作痛,用铍针挑破牙面好肉,以手取出本牙,出血不止,以湿纸换贴二三次,其血自止。必兼戒厚味,其牙复生如旧。

凉膈散

凉膈散中用石膏 山栀薄荷共连翘

黄芩甘草淡竹叶 还有大黄岂可逃

治阳明经湿热上攻,致牙根、腮、项作肿多痛者。

连翘 山栀 黄芩 薄荷各一钱 甘草五分 大黄二钱 朴硝一钱
五分 石膏一钱五分 淡竹叶三十片

上水二盅,煎八分,入蜜三匙和匀,食远服。

清中散

清中散内牡丹皮 生地黄连甘草归

升麻还与山栀子 胃经积热效堪推

治胃经积热,牙齿或牙龈肿痛,或牵引头脑作痛,或面热耳红,并皆治之。

当归 黄连 生地 山栀各一钱 牡丹皮六分 升麻八分 甘草五分

上水二盅,煎八分,食远服。

荜拨散

荜拨散中真阿魏 麝香冰片共相依

虫牙风痛皆堪点 管教时刻乐嘻嘻

治风湿虫牙作肿疼痛,如阳明内热作疼勿用。

荜拨 真阿魏各二钱 冰片 麝香各一分

上为细末,每用半豆许,擦放牙根痛缝中,吐去热涎,温汤漱之,再

搽即愈。

又：牙疼方

牙疼方中君草拔 蟾酥必定与川椒
飞盐加入同来点 诸般牙痛即时消
草拔一钱 蟾酥二分 川椒五分 飞盐三分
上共为末，用草桔咬毛蘸药搽点痛牙根上妙。

犀角地黄汤

犀角地黄汤芍药 更兼一味牡丹皮
阳明积热皆堪服 止血还须用此医
治阳明积热，牙龈腐烂，出血不止，及诸吐血、衄血、呕血，通治之。
犀角(镑) 生地 白芍 牡丹皮各等分
每五钱，水二盅，煎八分，不拘时服。面色痿黄，大便黑者，更宜服之。又牙缝中无辜出血者亦妙。

止血四生汤

止血四生汤荷叶 生艾柏枝地黄列
用水同煎饮一盅 诸般血症登时别
生荷叶 生艾 生柏叶 生地黄各三钱
水二盅，煎一盅，食后温服，临入童便一杯更妙。
人中白散(见口疳门)
消风散(见疥疮门)

脑漏第五十五

脑漏者，又名鼻渊。总因风寒凝入脑户与太阳湿热交蒸乃成。其患鼻流浊涕，或流黄水，点点滴滴，长湿无干，久则头眩虚晕不已，治以藿香汤主之，天麻饼子调之，亦可渐愈。如日久虚眩不已，内服补中益气汤、六味地黄丸相间服，以滋化原始愈。

奇授藿香汤

元来奇授藿香汤 猪胆同功效莫量

鼻渊脑漏皆堪羨 不过三服永无殃

治鼻渊黄水浊涕长流,致脑户虚眩不已。

用藿香连枝带叶者五钱,水一碗,煎七分,加公猪胆汁一枚和匀,食后通口服之,至重者不过三服。如此药苦甚不堪服用,藿香末一两,公猪胆汁熬稠膏为丸,每服二钱,食后白滚汤送下亦效。

补中益气汤(见溃疡门)

六味地黄丸(药见肺癰门肾气丸)

天麻饼子(见头痛门)

破伤风第五十六

破伤风,因皮肉损破,复被外风袭入经络,渐传入里,其患寒热交作,口禁咬牙,角弓反张,口吐涎沫;入阴则身凉自汗,伤处反为平陷如故,其毒内收矣。当用万灵丹发汗,令风邪反出,次以玉真散患上贴之,得脓为效。如汗后前症不退,伤处不高,渐醒渐昏,时发时止,口禁不开,语声不出者,终为死候。

玉真散

玉真散内用南星 白芷防风羌活灵

天麻还兼白附子 破伤风症奏功能

治破伤风牙关紧急,角弓反张,甚则咬牙缩舌。

南星 防风 白芷 天麻 羌活 白附子各等分

上为末,每服二钱,热酒一钟调服,更敷伤处。若牙关紧急,腰背反张者,每服三钱,用热童便调服,虽内有瘀血亦愈。至于昏死心腹尚温者,连进二服,亦可保全。若治疯犬咬伤,更用漱口洗净,搽伤处亦效。

万灵丹(见肿疡门)

治破伤风牙关紧急,角弓反张,时昏时止者服。

镇风散

镇风散用鳔胶矾 杭粉朱砂在此间

每服二钱和热酒 破伤风症自回还

治破伤风诸药不效，事在危急者，用之必应也。

鳔胶(切段，微焙) 杭粉(焙黄) 皂矾各一两(炒红色) 朱砂三钱(另研)

上为细末，每服二钱，无灰热酒调服。如一切猪、羊等风，发之昏倒不醒人事者，每服三钱，二服即愈不发。外灸伤处七壮，知疼痛者，乃为吉兆。

跌扑第五十七

跌扑者，有已破、未破之分，亡血、瘀血之故。且如从高坠堕而未经损破皮肉者，必有瘀血流注脏腑，人必昏沉不省，二便必难，当以大成汤通利二便，其人自苏，不醒者独参汤救之。寻常坠堕，轻者以复元活血汤调之。又如损伤骨节，筋断血流不止者，独胜散止之，次用花蕊石散搽之。又有跌断骨节大损等症，此则另有专门接骨扎缚，未及详注也。

大成汤

大成汤内朴硝黄 苏木当归甘草良

陈皮厚朴红花等 木通枳壳共煎尝

治跌扑伤损，或从高坠下以致瘀血流入脏腑，昏沉不醒，大小便秘，及木杖后瘀血内攻，肚腹膨胀，结胸不食，恶心干呕，大便燥结者并服之。

陈皮 当归 苏木 木通 红花 厚朴 甘草各一钱 大黄三钱
枳壳二钱 朴硝二钱

上水一碗，煎八分，不拘时服，服后二时不行，渣再煎，临卧服，入蜜二匙亦妙。

调中二陈汤

调中二陈汤枳壳 芪芍芎归乌药苓

青皮紫苏防风实 桔红苏木腹楝灵

治前症已服行药之后，当进此药二三服调之。

陈皮 半夏 茯苓 甘草 枳壳 大腹皮 红花 川芎 当归
白芍各八分 防风 槟榔 黄芪 桔梗 青皮 乌药 苏木 枳实
黄芩 紫苏各六分 木香三分

上水二盅,姜三片,枣二枚,煎八分,不拘时服。

独参汤

独参汤力最专功 跌扑金疮出血多

昏沉不省人事者 灌之入腹起疲癢

治跌扑损伤,或金疮出血过多,昏沉不醒者服。

人参一两切片,水二碗,煎一半,不拘时通口服之;渣再煎服,其人自苏。再用渣加川米一合,煎汤温服。

花蕊石散

花蕊石散麝檀香 乳没辛苏乌朴当

羌龙白芷蛇含石 木降香南星粉霜

治跌扑伤损及金疮、刀、箭、兵刃所伤,断筋损骨,疼痛不止,新肉不生者并效。

乳香 没药 羌活 紫苏 细辛 草乌蛇 含石(便煅三次) 厚朴 白芷 降香 当归 苏木 檀香 龙骨 南星 轻粉各二钱 麝香三分 花蕊石(童便煅七次)五钱

上共研极细,罐收听用。葱汤洗净,用此掺之,软绵纸盖扎,一日一换神效。此药一时未备,可用多骨疽门生肌散代之暂用,亦可取效危急也。

· 玉红膏(见肿疡门)

治跌扑损伤或金疮断损筋骨,已经血止,疼痛作脓,宜用此膏。葱汤洗净,日搽伤处,黑膏盖之。

金疮第五十八

金疮乃刀刃所伤,或有磁锋割损,浅者皮破血流而已,深者筋断血飞不住。皮破者,桃花散掺之,其血自止;筋断者,如圣金刀散掺扎。

止复又流者，止症急用玉红膏涂伤处，膏盖长肉，盖筋、骨、肉方断，斯人面色必黄，外避风寒，内忌冷物，终保无妨。有失血过多者，独参汤、八珍汤补助为要，此无外法矣。

如圣金刀散

如圣金刀散二矾 松香细末共加参

刀伤损破肌流血 掺上应知效不难

治刀刃所伤，皮破筋断，飞血不止者。

用松香净末七两，枯矾、生矾各一两五钱，共为极细末，罐密收，掺伤处，纸盖绢扎；止后三四日，后必焮痛作脓，换掺生肌散，三日三次，其疼即止；以后日用葱汤洗之，换搽玉红膏长肉生肌，避风为要。

桃花散

桃花散最治金疮 止血消瘀效莫量

大黄同与石灰炒 将来一掺即无妨

治金疮出血不止。

用石灰半升，同大黄一两五钱切片同炒，石灰变红色为度，去大黄，筛细掺损上，纸盖绢扎；止血后用葱汤洗净，换搽玉红膏长肌收敛，兼戒口味、房事为要。

独参汤（见跌扑门）

八珍汤（见溃疡门）

杖疮第五十九

杖疮乃良肉受伤之患，有已破未破之分，正刑酷刑之说。已破肌肉者，随杖后以清凉拈痛膏敷之，疼肿即消。未破瘀血内攻者，用针放出内蓄瘀血，再以大成汤下之，便通自愈。如伤处瘀腐已作疼痛者，玉红膏搽之，自然腐化生新而愈。至于辱刑、重刑难受之时，宜预服铁布衫丸，方得保身全命也。

铁布衫丸

铁布衫丸乳没归 地龙苏木自然随

木鳖再加无名异 救尽人间苦杖危

治情不由己,事出不虞受害,一身重刑难免,当预服之,受刑不痛,亦且保命。

自然铜(煅红,醋浸七次) 当归(酒洗,捣膏) 无名异(洗去浮土) 木鳖子(香油搽壳上,灰焙用肉) 乳香 没药 地龙(去土,晒干) 苏木

上八味,各等分为细末,炼蜜丸如鸡头实大,每服三丸,预用白汤送下,纵非刑辱拷,可保无虞。

散瘀拈痛膏

散瘀拈痛膏罕稀 麻油石灰水共齐

加上獐冰金黄散 杖疮敷上笑嘻嘻

治杖后皮肉破损,红紫青斑,掀肿疼痛重坠者。

用肿疡门如意金黄散一两,加獐冰三钱碾匀,以白石灰一升,用水二碗和匀;候一时许,用灰上面清水倾入碗内,加麻油对分 and 匀,以竹箸搅百转,自成稠膏,调前药稀稠得所听用;杖后带血,不用汤洗,将药通便敷之,纸盖布扎。夏月一日,冬月二日,方用葱汤淋洗干净,仍再敷之,痛止肿消,青紫即退,伤重者,另搽玉红膏完口。

又方

杖刑之后肉不破 瘀血攻疼没门路

将针点破脓血流 管教患者随行步

大成汤(见跌扑门)

治杖后瘀血内攻,肚腹膨胀,恶心便秘者服之。

珍珠散(见下疳门)

治杖疮已经长肉平满,惟不生皮,用此擦即愈。

汤泼火烧第六十

汤泼火烧,此患原无内症,皆从外来也。有汤火热极,逼毒内攻;又有外伤寒凉,极毒入里,外皮损烂者,以清凉膏、栗壳膏涂之;毒气入里,烦躁口干,二便秘涩者,四顺清凉饮下之;泡破珍珠散搽之自愈。

四顺清凉饮

四顺清凉饮赤芍 防风羌活共连翘

当归甘草山梔等 大黄加上热俱消

治汤泼火烧,热极逼毒入里,或外被凉水所汲,火毒内攻,致生烦躁,内热口干,大便秘实者服。

连翘 赤芍 羌活 防风 当归 山梔 甘草各一钱 大黄(炒)二钱

上水二盅,灯心二十根,煎八分,食远服。

罂粟膏

罂粟膏医汤火烧 麻油白蜡共煎熬

将凝加上真轻粉 涂于患上痛随消

治汤泼火烧,皮肉损烂,疼苦熇热,起泡流水者。

麻油四两,罂粟花十五朵,无花以壳代之,浸油内,煎枯滤清,将油再入杓内,下白占三钱,熬化倾入罐内,待四边将凝时,下真轻粉细末二钱搅匀,水内顿冷取起。临用将泡挑破,用抵脚挑膏手心中捺化捺患上,软绵纸盖扎,日换二次,其疼即止。次日将软帛搨净腐皮,再捺之自愈。

珍珠散(见下疳门)

治汤泼火烧,腐皮已尽,疼痛已上,用此掺即愈。前杖疮门中石灰水调麻油成膏,即清凉膏也,捺汤泼火烧亦效。

甲疽第六十一

甲疽者,或因甲长侵肌,又因修甲损伤良肉,靴鞋窄小,俱易生之。其患胬肉裹上,指甲肿痛异常,难于步履,初宜三品一条枪,贴胬肉上化尽自愈;日久胬肉坚硬,须凉蚬散化之,后用珍珠掺上必瘥。

三品一条枪(见痔疮门)

珍珠散(见下疳门)

茧唇第六十二

茧唇乃阳明胃经症也。因食煎炒，过餐炙煿，又兼思虑暴急，痰随火行，留注于唇，初结似豆，渐大若蚕茧，突肿坚硬，甚则作痛；饮食妨碍，或破血流久则变为消渴、消中难治之症。初起及已成无内症者，用麻子大艾炷灸三壮，贴蟾酥饼膏盖，日久渐消。内症作渴者，早服加减小八味丸，午服清凉甘露饮，以滋化源。日久流血不止，形体瘦弱，虚热痰生，面色熏黑，腮颧红现，口干渴甚者，俱为不治之症也。

清凉甘露饮

清凉甘露饮柴芩 麦冬犀角共茵陈

石斛枳壳甘生地 知母枇杷叶可寻

治茧唇膏粱所酿，暴怒所结，遂成斯疾，高突坚硬，或损破流血，或虚热生痰，或渴症久作并治。

犀角 银柴胡 茵陈 石斛 枳壳 麦门冬 甘草 生地 黄芩 知母 枇杷叶各一钱

水二盅，淡竹叶、灯心各二十件，煎八分，食后服。

加减小八味丸（见溃疡门）

蟾酥饼（见疔疮门）

痞癖第六十三

痞癖皆缘内伤过度，气血横逆结聚而生，初起腹中觉有小块举动牵引作疼，久则渐大成形，甚者翕翕内动，斯时必气血衰弱，饮食减少。内服阿魏化痞散，外贴乾坤一气膏，祛邪养正气，攻补自全安。

阿魏化痞散

阿魏化痞散芎归 白术红花赤茯随

荞面大黄并鳖甲 空心还用酒调宜

川芎 当归 白术 赤茯苓 红花 阿魏 鳖甲尖（酥炙研）各一钱

大黄(酒炒)八钱 莽麦面一两(微炒)

上共为末,每服三钱。空心好酒一茶钟调稀服,三日后腹痛、便出脓血为验。忌生冷、腥荤等件。

乾坤一气膏

一气膏归芷附棱 巴菰蓬甲续灵成

赤白芍玄生熟地 桂阿乳没鳖香能

此膏专治痞疾,毋论新久立效。又治诸风瘫痪,湿痰流注,各样恶疮,百般怪症。男子夜梦遗精,妇人赤白带下;又男女精寒血冷、久无嗣息者并贴之。

当归 白附子 赤芍 白芍 白芷 生地 熟地 川山甲 木鳖肉 巴豆仁 草麻仁 三棱 蓬术 五灵脂 续断 肉桂 玄参各一两 乳香 没药各一两二钱 麝香三钱 真阿魏二两(切薄片听用)

上咀片,用香油五斤,存下四味,作皆入油浸,春三、夏五、秋七、冬十期毕,桑柴火熬至药枯,细绢滤清;每净油一斤,入飞丹十二两,将油入锅内,下丹,槐枝搅搂,其膏候成,端下锅来;用木盆坐稳,渐下阿魏片,泛化已尽,方下乳、没、麝香,再搅匀,乘热倾入磁罐内,分三处盛之。临用汤中顿化,痞病红绶摊贴,余病绶绢俱可摊之,有肿者对患贴之。男子遗精、妇人白带,俱贴丹田,诸风瘫痪,贴肾俞穴并效。

天蛇毒第六十四

天蛇毒,一名蛇头疔也。乃心火旺动攻注而成,其患指大肿若蛇头,赤肿焮痛,疼及连心,甚者寒热交作,肿痛延上,肿顶上小艾灸五壮,以雄黄散涂之,内服蟾酥丸发汗解毒,轻者渐消,肿者溃脓,甚则腐烂。破后肿仍不消者,以蟾酥条插入孔内膏盖自效;腐烂者,玉红膏搽之,虚而不敛者兼服补剂。

雄黄散

雄黄散内用蟾酥 凉片还将轻粉和

四味同来为细末 水调患处日三涂

治天蛇毒。初起红肿发热,疼痛彻心者,宜用之。

雄黄(明亮者)二钱 蟾酥二分(微焙) 冰片一分 轻粉五分
共为细末,新汲水调涂,纸盖,日用三次极效。

蟾酥丸(见疔疮门)

玉红膏(见肿疡门)

头痛第六十五

头痛者,风、火、湿、痰四者皆能致之。又杨梅疮毒上攻,亦有此症;或妇人产后梳洗,当风太早亦致之,名曰头风。宜用后方,毋论病之新久,受之真似并效。

天麻饼子

天麻饼子草川乌 芎芷甘防苍术呼

薄荷细辛松白附 雄黄全蝎一相途

治头痛因风、火、湿、痰上攻,及杨梅疮毒所致。兼治头目昏眩,项背拘急,肢体烦痛,肌肉蠕动,耳哨蝉鸣,鼻塞多嚏,皮肤顽麻,瘙痒瘾疹。又治妇人头风作痛,眉棱骨疼,牙齿肿痛,痰逆恶心者,并皆治之。

天麻 草乌(汤泡去皮) 川芎 细辛 苍术 甘草 川乌(汤泡去皮) 薄荷 甘松 防风 白芷 白附子(去皮)各五钱 雄黄 全蝎各三钱

上为细末,寒食面打糊捣稠如寒豆大,捻作饼子,每服二三十饼,食后细嚼,葱汤送下,属火热痰痛者茶汤下。甚者日进二服,忌诸般发物。

三圣散

三圣散用闹杨花 槿树红花总一家

二味再加风子肉 头风偏正乐无涯

治男妇头痛,不论偏正新久,但夏月欲重绵包裹者并效。

闹杨花(净末)一钱 槿树花(净末)一钱 大风子(白肉去油)五分
共研,每服六分,葱、酒调服,洗浴发汗自愈。

合谷毒第六十六

合谷疔，俗称虎口百丫也。此患多有疙瘩泡起，亦有红丝走上，故有疔名之称。此手阳明、胃经湿毒攻注作痒，痒热焮疼，初起挑破，贴蟾酥饼膏盖，金黄散敷之；三日后，肿聚必欲作脓，换膏贴之。软肿胀痛者，脓已成，针之即愈。肿甚寒热者，必内外消托。

金黄散(见肿疡门)

蟾酥饼(见疔疮门)

鼻出血第六十七

鼻中出血，乃肺经火旺，逼血妄行而从鼻窍出也。外用紫土散敷囟顶上，内服羚羊清肺汤亦可自止。

羚羊清肺汤

羚羊清肺汤柴芍 甘藕蒲黄地骨皮

玄地芍归石膏等 梔连芦荟白茅宜

治鼻中无故出血不止，及寻常吐血、咳血并效。

羚羊角(镑) 黄连 银柴胡 玄参 石膏 川芎 当归身 白芍

生地 蒲黄 地骨皮 山梔各一钱 芦荟 甘草各五分 藕节三个

白茅根四两(捣汁，用水一碗，和绞去渣)

用茅根汁一大碗，煎七分，入童便一杯，食后服。

紫土散

紫土散须从治法 更兼火酒要调稠

将药敷于囟顶上 自然自止不相流

治鼻中无辜出血不止。用倾银紫土新罐碾细，以火酒调敷囟门上，其血自止，此从治之法也。

牙缝出血第六十八

牙缝出血,阳明胃经实火上攻而出也。又有胃虚火动,腐烂牙龈,以致淡血常常渗流不已。实火清胃散、楝果裘塞之,虚火芦荟丸、人中白散服搽自愈。

清胃散

清胃散中用石膏 芩连生地不相饶

丹皮加上升麻好 阳明胃热即时消

治胃经有热,牙齿或牙龈作肿、出血不止并效。

黄芩 黄连 生地 丹皮 升麻 石膏各一钱

水二盅,煎八分,食后服。

清胃散的临床新用

1. 复发性口疮

曲少华等用清胃散治疗复发性口疮24例。药物组成:黄连10克,升麻10克,当归10克,生地10克,丹皮10克,郁金10克,石膏30克(打碎先煎),鸡内金10克,薏苡仁21克,甘草6克。大便秘结者加大黄6克(后下),枳实6克。每日1剂。对照组予复合维生素B₂片,每日3次口服,维生素C0.2克,每日3次口服,并予口腔溃疡膜外贴溃疡面。15天为1个疗程。治疗组总有效率91.67%,对照组总有效率66.67%。

曲少华,等. 中国中医急症,2006,15(3):244

2. 牙周炎

胡景团等用清胃散联合甲硝唑治疗牙周炎36例。在采用牙周基础治疗,应用甲硝唑等基础上加用本方:大黄12克,知母10克,麦冬12克,丹皮12克,黄芩9克,槐米15克,延胡索10克,丹参18克,露蜂房18克,骨碎补15克,防风12克,牛膝15克,淮山药18克,薏苡仁24

克。每日1剂。1个月为1个疗程,总有效率70.96%。

胡景团,等. 中国社区医师,2005,21(24):31

3. 三叉神经痛

姜惠卿等用清胃散加味治疗三叉神经痛。药物组成:升麻6克,黄连3克,黄芩9克,当归9克,生地10克,牡丹皮10克,防风6克,白芷10克,地龙10克,全蝎6克。每日1剂,10日为1个疗程。一般治疗1个疗程即可见效。

姜惠卿,等. 中国民间疗法,2005,13(6):36

4. 痤疮

荣鸿用清胃散加挑刺法治疗痤疮138例。药物组成:升麻10克,黄连2克,牡丹皮20克,生地黄15克,当归15克,石膏15克,金银花15克,蒲公英15克,丹参20克,紫草10克,生大黄6克,甘草6克。痒甚者加白蒺藜10克;口渴不甚者去石膏。每日1剂,6天为1个疗程。同时加三棱针穴位挑刺法。总有效率90.6%。

荣鸿. 中国中医药信息杂志,2004,11(5):432

5. 腮腺炎

卢志雁等用清胃散加味治疗腮腺炎获效。药物组成:当归15克,生地黄20克,黄连10克,升麻15克,丹皮12克,石膏(先煎)30克,麻黄9克,板蓝根10克。总有效率为91.7%。

卢志雁,等. 山西医药杂志,2003,32(1):74

6. 唇风

马军妹用清胃散加减治疗唇风52例。药物组成:黄连5克,生石膏30克,当归10克,生地黄15克,丹皮12克,升麻9克,防风9克,蝉衣15克,苦参10克。每日1剂,水煎分2次温服。肿甚加地肤子、白鲜皮;口干、便秘加玄参、生大黄、麦冬。治疗期间忌食腥辣油腻之物及烟酒。10天为1个疗程,治疗1~3个疗程。总有效率98.1%。

马军妹. 上海中医药杂志,2002,36(8):37

7. 肉轮疾患

马淑兰用清胃散加味治疗肉轮疾患获效。药物组成:升麻10克,

黄连 10 克,当归 10 克,生地 20 克,石膏 20 克,丹皮 10 克,大黄 6 克,知母 10 克,牛膝 15 克,银花 30 克,黄芩 10 克,草河车 10 克。水煎服 3 剂后好转。5 剂后痊愈。

马淑兰. 北京中医,1998,17(4):50

8. 急性冠周炎

刘一平等用清胃散加味治疗急性冠周炎 104 例。在用抗生素治疗的同时配合用清胃散:黄连 10 克,生地 12 克,丹皮 10 克,当归 10 克,升麻 6 克。局部肿胀甚者加银花 15 克,蒲公英 15 克;发热、口渴者加生石膏 20 克,芦根 10 克;大便秘结者加生大黄 6 克,龈瓣下溢脓者加连翘 10 克,皂角刺 10 克。每日 1 剂,5 天为 1 个疗程,收到满意效果。

刘一平,等. 湖南中医药导报,1997,3(2):35

9. 口臭

谢红用自拟养阴清胃散治疗口臭 52 例。药物组成:玄参 10 克,麦冬 10 克,芦根 30 克,生地 10 克,丹皮 10 克,升麻 10 克。若口干,加天花粉。1 天 1 剂,4 天为 1 个疗程,一般 1 个疗程即可见效,顽固性口臭 2~3 个疗程即可。

谢红. 时珍国医国药,2001,12(11):967

10. 胆汁返流性胃炎

金先红等用加味清胃散治疗胆汁返流性胃炎 112 例。药物组成:黄连、升麻、丹皮、当归各 10 克,生地 12~24 克,生石膏、蒲公英各 30 克。水煎服,每日 1 剂,分早晚 2 次服。7 日为 1 个疗程,连服 4 个疗程,并根据中医辨证分型加减治疗。脾胃蕴热型(43 例):基本方(重用生地)加代赭石 30 克,竹茹、旋覆花各 15 克,大黄、甘草各 3 克,热淫肝胆型(28 例):基本方加柴胡、黄芩、龙胆草、山栀子各 10 克。胃阴不足型(23 例):基本方加玄参、麦冬、沙参各 30 克。肝胃不和型(18 例):基本方加柴胡、半夏、佛手、白芍各 10 克,枳壳 15 克。总有效率为 92.85%。

金先红,等. 新中医,1996,28(9):19

楝果裘

治阳明胃经实火上攻，血从牙缝流出。

用楝树果二个，连肉、核捣烂，丝绵包裹，先用温汤漱净瘀血，塞于牙缝内，其血自止。

芦荟丸 人中白散（见口疳门）

血箭血痣第六十九

血箭出于心经火盛，逼血从毛窍出也；血痣由于肝经怒火郁结，其形初起色红如痣，渐大如豆，揩之血流。治血箭以桃花散凉水调敷，或金墨涂搽自止。血痣须用冰蛭散枯去本痣，以珍珠散搽之。生皮乃愈。血甚者，内服凉血地黄汤，兼戒口味始痊。

凉血地黄汤

凉血地黄汤 黄连 当归 甘草 山梔全

加上玄参效更添 无辜出血即安然

治血箭、血痣，内热甚而逼血妄行，出血如飞者。

黄连 当归 生地 山梔 玄参 甘草各等分

水二盅，煎八分，量病上下服之。

桃花散（见跌扑门）

冰蛭散（见癰疽门）

珍珠散（见下疳门）

鹅掌风第七十

鹅掌风由手阳明、胃经火热血燥，外受寒凉所凝，致皮枯槁；又或时疮余毒未尽，亦能致此。初起红斑白点，久则皮肤枯厚破裂不已，二矾汤熏洗即愈。

二矾汤

二矾汤中白皂矾 儿茶柏叶在其间

先熏后洗油烟照 鹅掌风顽愈不难

治鹅掌风皮肤枯厚、破裂作痛，宜用此汤熏洗，轻则不宜，越重越效。

白矾 皂矾各四两 孩儿茶五钱 柏叶半斤

用水十碗，同上药四味煎数滚候用。先用桐油搽抹患上，以桐油蘸纸沾点着，以烟焰向患上熏之，片时方将前汤乘滚贮净桶内，手架上用布盖，以汤气熏之，勿令泄气，待微热倾入盆内，蘸洗良久，一次可愈。七日忌下汤水，永不再发。

肾囊风第七十一

肾囊风，乃肝经风湿而成。其患作痒，喜浴热汤；甚者疙瘩顽麻，破流脂水，宜蛇床子汤熏洗二次即愈。

蛇床子汤

蛇床子汤当归尾 苦参毕竟用灵仙

河水同煎熏患处 坚囊风痒得安然

治肾囊风湿热为患，疙瘩作痒，搔之作疼宜洗。

蛇麻子 当归尾 威灵仙 苦参各五钱

水五碗，煎数滚入盆内，先熏，待温浸洗二次愈。

狼毒膏

狼毒膏内枫子肉 槟榔五倍子相同

川椒床子硫猪胆 油沸投硝共此求

治症同前。

狼毒 槟榔 硫黄 五倍子 川椒 枫子肉 蛇床子各三钱

上为末，用香油一大杯，煎滚入皮硝三钱，再煎滚；次下公猪胆汁一个，和匀调前药搽擦患上，此药诸痒疮用之并效。

疥疮论第七十二

夫疥者，微芒之疾也。发之令人搔手不闲，但不知其何以生者？

疥曰：吾不根而生，无母而成，乃禀阴阳气育，湿热化形，常列于王侯掌上，何妨士庶之身，可使文人怕笔，绣女停针，毋分贵贱，一例施行。医问曰：不生于身，独攻于手者又何也？疥曰：手掌乃太阴湿土所主，手心又少阳相火所司，土能生我，火能化我，此生皆赖湿土阳火所化，故生者必自出于手掌。医曰：然哉！但其形知动而不知静，能进而不能退，自非清气所化也；又脾主消纳，胃主传化，人之饮食未有不从厚味者，厚味之中，湿热并化，致生此疮。又清气随脉循行，浊气留滞不散，停留肌肤，积日不解，随后生热发痒，故痒热之中，湿火混化为虫，形随湿化，动随火化，此无情而之有情也。即化之后，潜隐皮肤，辗转攻行，发痒钻刺，化化生生，传遍肢体，近则变为疥癣，久则变成顽风，多致皮肤枯槁，浸淫血脉，搔痒无度，得汤方解。外以绣球丸搽擦，堪为止痒杀虫；内服消风散，亦可散风凉血。必得兼戒口味，辛热莫啜，忌洗热汤，其烦自脱。此为小恙，不当陈说，闲中之言，随笔而曰。

消风散

消风散内归生地 蝉脱荆防苍苦参

胡麻知母牛蒡等 石膏甘草木通行

治风湿浸淫血脉，致生疮疥，搔痒不绝，及大人小儿风热瘾疹，遍身云片斑点，乍有乍无并效。

当归 生地 防风 蝉脱 知母 苦参 胡麻 荆芥 苍术
牛蒡子 石膏各一钱 甘草 木通各五分

水二盅，煎八分，食远服。

消风散的临床新用

1. 瘙痒性皮肤病

张江林用加减消风散治疗瘙痒性皮肤病 88 例。药物组成：生地 20 克，防风 10 克，蝉蜕 10 克，苦参 20 克，苍术 10 克，白鲜皮 10 克，元参 10 克，丹皮 10 克，山栀 10 克，甘草 6 克，川芎 10 克，知母 10 克。荨麻疹加紫草 10 克，羌活 6 克；风疹、接触性皮炎加连翘 10 克，荆芥 10

克;瘙痒症、痒疹加紫草 10 克,生首乌 20 克。每日 1 剂,煎服。5 剂为 1 个疗程。1 个疗程未愈者再服 1 个疗程。结果收到满意效果。

张江林. 皮肤病与性病, 2006, 28(1): 34

2. 亚急性湿疹

朱霞等用凉血消风散治疗亚急性湿疹 60 例。药用:荆芥 10 克,防风 10 克,牛蒡子 10 克,蝉蜕 6 克,苍术 6 克,苦参 10 克,石膏 15 克,知母 10 克,当归 10 克,胡麻仁 15 克,生地 15 克,木通 3 克,甘草 5 克,紫草 10 克,丹皮 10 克,赤芍 10 克。水煎服,每日 1 剂,分早晚 2 次服。7 天为 1 个疗程,共 4 个疗程。对照组:白天予以地氯雷他定片,晚上睡前半小时予以扑尔敏。治疗组总显效率 70%,对照组为 50%。

朱霞,等. 中医药导报, 2005, 11(9): 33

3. 慢性荨麻疹

黄河用复方甘草酸铵联合消风散治疗慢性荨麻疹疗效显著。治疗组采用复方甘草酸铵注射液 40 毫升加入 10% 葡萄糖 250 毫升中静脉滴注,每日 1 次,同时服用消风散加减:荆芥 15 克,防风 15 克,牛蒡子 10 克,苦参 10 克,蝉蜕 6 克,生石膏 10 克,生地 15 克,当归 10 克,知母 10 克,胡麻仁 10 克,苍术 6 克,甘草 6 克。每日 1 剂。治疗 4 周后判断疗效。总有效率 90.9%。

黄河. 医学文选, 2005, 24(4): 567

4. 咽源性咳嗽

屠庆年等用消风散化裁治疗咽源性咳嗽 30 例。药物组成:荆芥 12 克,防风 12 克,蝉蜕 10 克,当归 12 克,生地 15 克,石膏 20 克,知母 10 克,牛蒡子 9 克,苦参 10 克,杏仁 10 克,桔梗 10 克,赤芍 15 克,炙甘草 10 克。咳少量白稀痰者,去石膏、知母,改用半夏 10 克,车前子 20 克;咽痛加用金银花 20 克,连翘 15 克;阵发性咳嗽加用柴胡 9 克,黄芩 10 克。7 天为 1 个疗程。总有效率 86.6%。

屠庆年,等. 天津中医药, 2005, 22(6): 470

5. 痤疮

于亚涛等用消风散口服,加上外用消痤面膜治疗痤疮 30 例。消

风散药用:荆芥、防风、蝉蜕、牛蒡子、苦参、苍术、石膏、知母、当归、生地、胡麻、甘草。消痤面膜药用:金银花、连翘、野菊花、大黄、白芷等比例,共研末,过120目筛,在治疗时,按治疗要求,患者平卧位,清洁面部,局部用按摩膏按摩后,以消痤面膜20克加医用石膏20克,以纯净水调成糊状,自鼻根部下均匀排开成面具型,20分钟后去膜。总有效率97%。

于亚涛,等. 辽宁中医杂志,2005,32(6):547

6. 皮肤过敏

于红等用消风散治疗皮肤过敏9例。药物组成:当归、地黄、苍术、防风、木通、牛蒡子、知母、胡麻仁、苦参、荆芥、蝉蜕、石膏、甘草。根据不同患者的临床症状进行加减,水煎服每日1剂,分2次服用。症状完全消失后,于当年或次年皮肤过敏易发季节之前再行巩固治疗1~2个疗程。9例皮肤过敏症患者均有不同程度的治疗效果,其中7例症状完全消失后,随访2年未复发,2例复发频率明显减少,且复发时症状明显减轻。

于红,等. 中国社区医师,2005,21(10):38

7. 扁平疣

吕丽红用消风散加味治疗扁平疣120例。药物组成:羌活15克,荆芥10克,防风10克,川芎10克,厚朴10克,党参15克,茯苓35克,陈皮10克,甘草10克,僵蚕15克,蝉蜕15克,藿香10克。加减:赤芍10克,三棱10克,莪术10克,大青叶20克,金银花20克,板蓝根2克,马齿苋20克,紫草15克,薏苡仁20克。1月为1个疗程。总有效率90.0%。

吕丽红. 吉林中医药,2004,24(6):24

8. 寻常型银屑病

姚琨琳用消风散为主治疗寻常型银屑病。方药组成:荆芥12克,防风12克,蝉衣5克,苦参12克,生地15克,牛蒡子12克,当归12克,白鲜皮12克,连翘15克,车前子(包)10克,生石膏(先煎)30克,生甘草5克。随症加减:血热旺盛者,加用赤芍、黄芩、丹皮;湿热蕴积

者,酌加苡仁、泽泻;火毒炽盛者,添加金银花、黄连、玄参等。总有效率97%。

姚琨琳. 江苏中医药, 2003, 24(6): 35

9. 肛门瘙痒症

李洪杰等用消风散合自拟止痒外洗方治疗肛门瘙痒症37例。内服基本方:蝉蜕10克,荆芥10克,防风10克,苦参20克,黄柏12克,白蒺藜10克,徐长卿12克,甘草6克。风毒盛者加大青叶、金银花、连翘;血热盛者加赤芍、丹皮、玄参;湿热盛者加黄连、车前子;兼血虚者加当归、白芍、何首乌。水煎服,每日1剂,早、晚分服,2周为1个疗程。外洗用自拟止痒外洗方:地肤子20克,蛇床子20克,五倍子25克,百部25克,黄柏25克,苦参25克,蝉蜕20克,白鲜皮25克,冰片10克。总有效率为81.1%。

李洪杰,等. 广西中医药, 2003, 26(3): 35

10. 氨苄青霉素药疹

王礼华等用四物消风散治疗氨苄青霉素药疹22例。首先停用氨苄青霉素。药用:当归、牛蒡子、地骨皮、蝉蜕、荆芥、防风、赤芍、紫草、丹皮各13克,元参、生地、双花各30克,川芎6克。水煎服,每日1剂,早晚2次分服,7剂为1个疗程。总有效率为100%。

王礼华,等. 中国实用医学研究杂志, 2003, 2(3): 354

当归饮子

当归饮子芍药芪 生地防风白蒺藜

甘草何首乌荆芥 诸风疮痒服相宜

治血燥皮肤作痒,及风热疮疥瘙痒,或作疼痛。

当归 川芎 白芍 生地 防风 白蒺藜 荆芥 何首乌各一钱
黄芪 甘草各五分

水二盅,煎八分,食远服。

当归饮子的临床新用

1. 慢性荨麻疹

余先华用当归饮子配合西药治疗慢性荨麻疹 69 例。药物组成:生地、当归、白芍、川芎、何首乌、黄芪、白蒺藜、荆芥、防风、甘草。每日 1 剂,2 次分服,4 周为 1 个疗程。2 个疗程治愈率 100%。

余先华. 中国中医药科技,2005,12(6):406

2. 老年性皮肤瘙痒症

杨晓丽等用当归饮子加减治疗老年性皮肤瘙痒症 60 例。药物组成:生地黄 15 克,当归 10 克,白芍 10 克,川芎 10 克,生黄芪 30 克,生何首乌 15 克,白蒺藜 30 克,荆芥 10 克,防风 10 克,甘草 10 克,白鲜皮 15 克,地肤子 15 克,蝉衣 10 克,僵蚕 15 克。每日 1 剂,水煎服。若心烦不寐者,加酸枣仁 20 克,生龙牡各 20 克;瘙痒剧烈,遇风加重者,加钩藤 20 克;头晕目涩者,加菊花 12 克,桑叶 10 克;口干苦者,加北沙参 15 克,黄芩 10 克;大便秘结者,加牛蒡子 12 克,火麻仁 2 克;每晚临睡即痒者,加知母 12 克,生牡蛎 30 克(先煎)。15 天为 1 个疗程,一般治疗 1~2 个疗程。总有效率为 98.33%。

杨晓丽,等. 中国中医药信息杂志,2005,12(4):68

3. 环状红斑

刘钊等用当归饮子治疗环状红斑 1 例。证属湿热阻络,复感风邪。处方:当归 15 克,川芎 15 克,赤芍 15 克,生地 50 克,荆芥 15 克,防风 15 克,黄芪 30 克,白蒺藜 30 克,何首乌 20 克,甘草 10 克,车前子 30 克。水煎服。上方服用 5 剂后,红斑略消退,瘙痒明显减轻。患者继续以上方为主药,加桃仁、红花、紫草、乌梅、鸡血藤等药,坚持服用半年余,红斑面积逐渐减少,最后消失而愈。

刘钊,等. 吉林中医药,2005,25(2):36

4. 过敏性鼻炎

葛银燕等用当归饮子治疗过敏性鼻炎 72 例。药物组成:当归、川

芎、白芍、生地各 10 克,荆芥 12 克,防风、白蒺藜、制首乌、黄芪各 15 克,甘草 3 克。头痛者加细辛 5 克;阵发性喷嚏、流清涕者加徐长卿 15 克;鼻塞重者加辛夷 10 克,白芥子 3 克;畏风怕冷,遇风冷易发者,倍黄芪加白术 10 克。水煎服,每日 1 剂。14 天为 1 个疗程,总有效率为 93%。

葛银燕,等. 四川中医,1999,17(2):48

5. 慢性阴囊湿疹

汪卫平用当归饮子加味治疗慢性阴囊湿疹 48 例。药物组成:当归、白芍、地肤子各 15 克,徐长卿、丹参各 20 克,生地、防风、白蒺藜、荆芥、何首乌、川芎、生黄芪、生甘草各 10 克。每日 1 剂,水煎服。中药外用:苦参 30 克,白鲜皮 20 克,蛇床子、川黄柏、明矾各 15 克,水煎汁 150 毫升外洗和湿敷患处,早晚各 1 次。总有效率 93.8%。

汪卫平. 浙江中医杂志,2004,39(7):296

6. 过敏性紫癜肾炎

邓元龙用当归饮子加减治疗过敏性紫癜肾炎 28 例。药物组成:当归 10 克,赤芍 10 克,白芍 10 克,生地 10 克,川芎 8 克,黄芪 15 克,首乌 15 克,旱莲草 15 克,荆芥炭 10 克,防风 10 克,白蒺藜 10 克。药物剂量随年龄适当增减。若尿检红细胞、潜血阳性者,选加茜草、白茅根;尿蛋白阳性者,选加芡实、金樱子等。水煎服,每日 1 剂,30 天为 1 个疗程,连服 2~3 个疗程。总有效率 89.3%。

邓元龙. 山西中医学院学报,2004,5(3):32

7. 斑秃

陈已明等用当归饮子合逍遥散治疗斑秃 72 例,疗效显著。方药组成:当归、白芍、生地黄、防风、白术、茯苓、白蒺藜、荆芥穗、何首乌、黄芪、柴胡、薄荷、炙甘草、生姜 3 片。水煎服。1 日 1 剂,分 2 次服用,15 天为 1 个疗程。服药 2~4 个疗程,舌有瘀斑者加丹参、赤芍、鸡血藤;两胁胀痛者加川楝子、元胡;失眠多梦者加炒枣仁、夜交藤。

陈已明,等. 中华实用中西医杂志,2003,16(8):1129

8. 癣病

马林庆等用当归饮子与克霉唑软膏合用治疗癣病 2 例。药物组

成：当归、川芎、白芍、生地、防风、白蒺藜、地肤子、蛇床子、苦参、荆芥、首乌、百部、黄芪、甘草。每日1剂，分2次服，外用克霉唑软膏每日外涂3次，每次不少于1小时，治疗期间忌食葱、蒜、辣椒等刺激性食物，并避免接触肥皂、洗衣粉之类物品。1周为1个疗程。2例皆在服药1周后病变明显减轻，2周后病变消失。

马林庆，等．齐齐哈尔医学院学报，2002，23(5)：595

9. 顽固性生殖器疱疹

戴晓萍用当归饮子加减治愈顽固性生殖器疱疹。处方：当归12克，生熟地各18克，赤白芍各12克，川芎12克，荆防各10克，黄芪18克，白蒺藜12克，龙胆草12克，黄连10克，黄芩10克，土茯苓20克，白鲜皮20克，甘草6克。1日1剂。3剂明显减轻，继服前方5剂，药后症状全部消失，糜烂亦愈合，自觉出气热、咽干。继上方生熟地加到20克，再加玄参12克，麦冬12克，加强滋阴作用，继服5剂，以调善后。

戴晓萍．陕西中医函授，1996，(2)：31

绣球丸

绣球丸内用獐冰 轻粉川椒共水银

雄黄枯矾枫子肉 诸疮痒疥擦安宁

治一切干湿疥疮及脓窠烂疮，瘙痒无度者效。

獐冰 轻粉 川椒 枯矾 水银 雄黄各二钱 枫子肉一百枚(另碾)

以上共为细末，同大枫子肉再碾和匀；加柏油一两化开，和药搅匀，作丸圆眼大，于疮上擦之。

诸疮一扫光

诸疮一扫光硫柏 木鳖床椒枯白矾

水银枫子獐冰等 砒苦参烟胶共参

此药凡治痒疮，不论新久及身上下，或干或湿，异类殊形，但多痒少痛者，并宜用之，俱各有效。

苦参 黄柏各一斤 烟胶一升 木鳖肉 蛇床子 点红椒 明矾

枯矾 硫黄 枫子肉 獐冰 水银 轻粉各二两 白矾五钱

共为细末，熟猪油二斤四两，化开入药搅匀，作丸龙眼大，磁瓶收贮。用时搽擦患上，二次即愈。

洗痒疮方

洗痒疮方只二般 苦参猪胆共相攪

河水煎汤频浴洗 管教诸痒即当安

苦参半斤切片，用河水三、四瓢煎药数滚，掺水二瓢，住火片时，滤去渣。临洗和公猪胆汁四、五枚，搅匀淋洗痒上，三日一洗，三次亦可痊愈矣。

臃疮论第七十三

臃疮者，风热湿毒相聚而成，有新久之别，内外之殊。新者只有三香膏、乳香法纸贴之自愈；稍久紫黑者，以解毒紫金膏搽扎渐可。又年久顽臃，皮肉乌黑下陷，臭秽不堪者，用蜈蚣钱法去风毒、化瘀腐，方可得愈。外臃多服四生丸，内臃多服肾气丸妙。

三香膏

三香膏内乳松香 轻粉油调纸内藏

先洗葱汤方贴扎 何妨新久烂臃疮

治臃疮初起多疼少痒，未经受风紫黑者宜用。

乳香 松香 轻粉各等分

上为细末，香油调稠，用夹纸一面，以针密刺细孔，将药夹搽纸内，先以葱汤洗净，将纸有孔一面对疮贴之，三日一换自效。忌房事、煎炒等件。

乳香法纸

乳香法纸有奇攻 疼痛臃疮欲此逢

功在粉霜相协力 三朝一换笑颜浓

治臃疮作痛不愈。

先用乳香碾细末一两听用。以呈文油纸四张，每纸一张，摊平筛

乳香末二钱五分匀筛纸上，双折卷一寸阔，将卷纸复作三折，两头以线扎之；用甘草一两二钱，水三碗，将卷过药纸浸入甘草汤内，上用重物压之；煮数滚，取起纸来，解去扎线，将纸摊开桌上，每张用轻粉三钱掺乳香，上用棕糊刷排刷相匀，提起药纸，带湿以无药一面对板壁上贴之，阴干收用。临时随患大小剪纸多少，先用温汤洗疮，随将纸有药一面对疮贴之，绢扎三日一换，自然止痛生肌。如贴后内无水出，不必换贴自愈。

蜈蚣钱

蜈蚣钱治久顽疔 独活桐油白芷煎
甘草加上同煎煮 倾入疮中黑腐罨
治疔疮多年，黑腐臭烂作疼，诸药不效者。

用桐油二两，独活、白芷、甘草、蜈蚣各一钱，入油内煎滚；先将疔疮洗净，用白面水调作圈，围在疮之四边，毋令泄气走油。将脚放平，以茶匙挑油渐渐乘热加满，待油温取去，以后腐肉、风毒自然脱下，用解毒紫金膏搽上，纸盖绢扎，三日一换。

解毒紫金膏（见结毒门）

治疔疮毋论新久，及顽疮年久不愈者并用之。

四生丸

四生丸疗久疔疮 骨节多疼举动妨

地龙白附僵蚕等 草乌灵脂莫相忘

治外疔血风顽疮，骨节疼痛，不能举动，或行步不前，或浑身瘙痒，或麻痹不仁，或生斑疹并效。

地龙（去土） 僵蚕（炒，去丝） 白附子 五灵脂 草乌（去皮尖，泡）各等分

上为细末，米糊丸桐子大，每服三四十丸，食前茶、酒任下。

肾气丸（见肺癰门）

血风疮第七十四

血风疮，乃风热、湿热、血热三者交感而生。发则搔痒无度，破流

脂水，日渐沿开。甚者内服消风散加牛膝、黄柏，外搽解毒雄黄散，或如意金黄散俱可敷之。如年久紫黑坚硬，气血不行者，用针砭去黑血，以神灯照法熏之，以解郁毒，次以前药敷之方效。

解毒雄黄散

治风湿流注腿脚，致生血风顽疮，紫黑瘙痒者。

雄黄四两 硫黄八两

上二味，共碾细末，柏油调搽，纸盖之，三日一换。

如意金黄散（见肿疡门）

治症同前。

用公猪胆汁调稠敷患上，油纸盖托勿动，待其自脱，脱后色红再敷之，以色白为度。

神灯照法（风肿疡门）

治年久紫黑血风顽疮，流水作痒不绝。

先用葱汤洗净患上，点火以灯焰熏之，每熏二拈为度。

凉血消风散（见疥疮门）

顽癣第七十五

顽癣乃风、热、湿、虫四者为患。发之大小圆斜不一，干湿新久之殊。风癣如云朵，皮肤娇嫩，抓之则起白屑；湿癣如虫形，搔之则有汁出；顽癣抓之则全然不痛；牛皮癣如牛项之皮，顽硬且坚，抓之如朽木；马皮癣微痒、白点相连；狗皮癣白斑相簇，此等总皆血燥风毒克于脾、肺二经。初起用消风散加浮萍一两，葱、豉作引，取汗发散。久者服首乌丸、蜡矾丸，外擦土大黄膏，用槿皮散选而用之，亦可渐效。

土大黄膏

土大黄膏用白矾 硫黄八两共加参

川椒三味研成末 顽癣搽之不费难

治干湿顽癣，不论新久，但皮肤顽厚，串走不定，惟痒不痛者。

硫黄八两 生矾四两 点红川椒二两

上各为末,用土大黄根捣汁,和前药调成膏碗贮,新癣抓损擦之,多年顽癣加醋和擦,如日久药干,以醋调搽;牛皮癣用穿山甲,抓损擦之妙。

顽癣必效方

顽癣必效川槿皮 轻粉雄黄巴豆宜

斑蝥大黄百药煎 阴阳水和海桐皮

治多年顽癣,诸药熏擦搽洗不效者,用之即愈。

川槿皮四两 轻粉 雄黄各四钱 百药煎四饼 斑蝥(全用)一钱 巴豆(去油)一钱五分 大黄二两 海桐皮二两

上为极细末,有阴阳水调,抓损敷药,必待自落。

又:顽癣方

顽癣方中川槿皮 斑蝥轻粉各相宜

再加七个枫子肉 新笔涂将患处医

川槿皮二钱 轻粉五分 斑蝥七个 大枫子七个

河、井水共一盅,煎一半,露一宿,笔蘸涂之。

顽癣浮萍丸

浮萍丸内苍耳草 苍术黄芩共苦参

僵蚕钩藤并稀荳 酒丸服下可回春

紫背 浮萍 苍术 苍耳草各二两 苦参四两 黄芩 僵蚕各一两
钩藤一两五钱 稀荳草二两(酒蒸)

共为末,酒糊丸,白滚汤每服二钱,随病上下服。

脓窠疮第七十六

脓窠疮,乃肺经有热,脾经有湿,二气交感,其患先从小泡作痒,后变脓泡作疼,所成脓窠疮也。甚者清热散风,凉血除湿治之,凉血清风散是也。外以蛇床子散,或诸疮一扫光搽之亦效。兼戒口味自愈。

蛇床子散

蛇床子散用黄丹 轻粉枯矾枫肉良

大黄不少松香末 麻油调许治脓疮

治脓窠疮生于手足遍身,根硬作胀,痒痛非常。

蛇床子 大枫子(肉) 松香 枯矾各一两 黄丹 大黄各五钱 轻粉三钱

上为细末,麻油调搽,湿烂者干掺之。

蛇床子散的临床新用

1. 病毒性疱疹

何天佑等用蛇床子散化裁治疗病毒性疱疹 87 例。药物组成:地肤子 10 克,黄柏 10 克,蛇床子 15 克,白鲜皮 7~12 克,地骨皮 10 克,苦参 10 克,桑白皮 10 克,五倍子 10 克,仙鹤草 15 克,明矾 10 克。用法:取汁外洗,每天 3~4 次,连用 3~4 天,配合清热解毒的中成药或汤剂如黄连解毒汤、清瘟败毒饮、凉血解毒汤等化裁煎服。有效率达到 99%。

何天佑,等. 云南中医中药杂志,2004,25(5):18

2. 阴道炎

李艳敏用加味蛇床子散治疗阴道炎 27 例。药物组成:蛇床子 30 克,苦参 30 克,黄柏 15 克,茵陈 18 克,土茯苓 18 克,川椒 6 克,明矾 6 克,蝉蜕 12 克,薄荷 12 克。水煎 30 分钟,于每晚坐浴 1 次,坐浴前取药液放于干净的容器中,坐浴后用消毒棉球系线蘸药液塞入阴道,次晨取出。每日 1 剂,连用 7 天为 1 个疗程。一般于月经干净后用,用药 1 周后复查。坐浴前应先清洗外阴及阴道,滴虫性阴道炎用食醋水清洗,霉菌性阴道炎用小苏打水清洗,老年性阴道炎用清水冲洗即可。治疗期间禁房事,勤换内裤。滴虫性阴道炎总有效率 93%,老年性阴道炎总有效率 100%。

李艳敏. 中华实用中西医杂志,2003,16(7):936

3. 阴痒

赵纯用加味蛇床子散熏洗治疗阴痒 40 例。方药组成:蛇床子 30

克,苦参30克,花椒15克,百部15克,土茯苓30克,明矾15克,白头翁30克。加減:局部搔破潰瘍者,去花椒,加黃柏20克;瘙癢甚者,加蒼耳子20克;外陰濕疹者,加石榴皮20克,地膚子20克;外陰白斑者,加白鮮皮30克,地骨皮20克;滴蟲性陰道炎者,可配合外用滅滴靈等。先熏后洗,已婚婦女可用干淨紗布蘸洗陰道口內,將陰道內分泌物清洗排出,使藥液能較多的進入陰道,則療效更佳。每日可熏洗2次,連續洗6天。9天為1個療程。同時辨證內服中藥。

趙純. 河南中醫,2003,23(8):45

4. 梅毒

楊素蘭等用中藥治療梅毒16例獲效。桔梗解毒湯,藥用:土茯苓30克,桔梗12克,川芎10克,黃芪30克,芍藥15克,當歸6克,木通12克,生大黃6克,防風10克,生甘草5克。搜風解毒散,藥用:土茯苓30克,薏苡仁15克,金銀花30克,防風10克,木瓜9克,白鮮皮15克,皂角刺6克。蛇床子散,藥用:蛇床子15克,百部12克,硫黃、雄黃、苦參、明矾各10克。桔梗解毒湯、搜風解毒散,交替使用,每日各1劑。每6劑為1個療程。一般連用4~6個療程。配以蛇床子散煎后,先熏后洗7~10天。總有效率87.5%。

楊素蘭,等. 遼寧中醫雜誌,2002,29(12):737

5. 龟头包皮念珠菌病

馮橋用蛇床子散加減治療龟头、包皮念珠菌病25例。藥物組成:蛇床子30克,苦參30克,百部30克,地膚子30克,明矾15克,黃柏30克,龍胆草30克,白鮮皮30克,冰片0.3克。局部潮紅甚者加旱蓮草15克,赤芍15克;腫脹明顯加露蜂房15克。每天1劑,水煎取藥液,搽洗患處,每次30分鐘,10天為1個療程。治療期間忌食辛辣和油膩之物,避免性生活。總有效率96%。

馮橋. 廣西中藥,1999,22(3):35

膿窠又方

膿窠方中用石膏 黃柏黃丹輕粉燒

還有枯礬能燥濕 搽之痛癢即時逃

黄柏(一两,以公猪胆汁搽之,火上炙)三钱 石膏(煨)一两 轻粉二钱
黄丹 枯矾各三钱

上为末,麻油调搽,湿者干掺。

凉血消风散 诸疮一扫光(俱见疥疮门)

冻风第七十七

冻风者,肌肉寒极,气血不行,谓肌死患也。初起紫斑,久则变黑,腐烂作脓者,以碧玉膏主之,生肌敛口。

碧玉膏(见结毒门)

治冻风皮肉损坏,脓水淋漓,疼痛不止者用之。

独胜膏

独胜膏来最散寒 冻风冻耳一般安

六月每逢三六日 搽之冬冻不相干

治冻风冻跟、冻耳,每逢冬寒则发。

六月初六、十六、二十六日,用独蒜捣膏,日中晒热,在于遇冬所发之处擦之,忌下汤水,一日共擦三次不发。又每常冻风用茄根同葱汤浸洗,再不重发。

火丹第七十八

火丹者,心火妄动,三焦风热乘之,故发于肌肤之表,有干湿不同,红白之异。干者色红,形如云片,上起风粟,作痒发热,此属心、肝二经之火,治以凉心泻肝,化斑解毒汤是也。湿者色多黄白,大小不等,流水作烂,又且多疼,此属脾、肺二经湿热,宜清肺、泻脾、除湿,胃苓汤是也。腰肋生之,肝火妄动,名曰缠腰丹,柴胡清肝汤。外以柏叶散、如意金黄散敷之。

化斑解毒汤

化斑解毒汤石膏 玄参知母共连翘

黄连升麻蒡子等 甘草人中黄更高

治三焦风热上攻，致生火丹，延及遍身痒痛者。

玄参 知母 石膏 人中黄 黄连 升麻 连翘 牛蒡子各等分
甘草五分

水二盅，淡竹叶二十片，煎八分，不拘时服。

除湿胃苓汤

除湿胃苓汤草朴 陈皮二术泽猪苓

防风滑石山栀等 木通薄桂赤苓名

治脾、肺二经湿热壅遏，致生火丹作烂疼痛者。

防风 苍术 白术 赤茯苓 陈皮 厚朴 猪苓 山栀 木通
泽泻 滑石各一钱 甘草 薄桂各三分

水二盅，灯心二十根，煎八分，食前服。

柏叶散

柏叶散中蚯蚓粪 赤豆大黄君莫混

加上黄柏轻粉霜 水调敷上何须问

治三焦火甚致生火丹，作痒或作痛，延及遍身。

侧柏叶（炒黄为末）五钱 蚯蚓粪（韭菜田内者佳） 黄柏 大黄各五钱
赤豆 轻粉各三钱

上为细末，新汲水调搽。

缠腰火丹，方用宝钞一张，烧化存性，研为细末，用米醋调稀，鸡翎蘸涂患上，一日三次即愈。忌食发物。

如意黄金散（见肿疡门）

治火丹不论新久痒痛，用新汲水调敷，靛汁亦好。

天泡第七十九

天泡者，乃心火妄动，脾湿随之，有身体上下不同，寒热天时微异。

上体者风热多于湿热，宜凉血散风；下体者湿热多于风热，宜渗湿为先，外用胡粉散、石珍散搽之自愈。此不早治，变为顽风紫癜难痊。

解毒泻心汤

解毒泻心汤 芩连 荆防牛子石膏全

山梔滑石玄参草 木通知母共相煎

治心经火旺，酷暑时临致生天泡发及遍身者。

黄连 防风 荆芥 山梔 黄芩 牛蒡子 滑石 玄参 知母

石膏各一钱 甘草 木通各五分

水二盅，灯心二十根，煎八分，食远服。

清脾甘露饮

清脾甘露饮 茵陈 术地翘芩梔赤苓

麦冬泽泻苍枳壳 玄明粉草共灯心

治脾经湿热郁遏，乃生天泡，下体多而疼痛者。

白术 赤茯苓 山梔 茵陈 麦门冬 生地 黄芩 枳壳 苍

术 泽泻 连翘 甘草 玄明粉各等分

水二盅，竹叶、灯心各二十件，煎八分，食前服。

胡粉散

胡粉散治天泡疮 杭粉轻粉石膏当

蛤粉共将研细末 丝瓜汁和效无双

治天泡红肿发热，急胀疼痛，用针挑破掺此药。

杭粉一两 轻粉 石膏(煨) 蛤粉各三钱

共研极细，挹干患上，用此掺之，或用丝瓜叶捣汁调搽亦好。如冬

月无此，用染布青缸汁调搽。

石珍散

石珍散中煨石膏 还兼轻粉不相饶

青黛再添黄柏木 将来一掺疾然消

治天泡日久作烂，疼痛不已，脓水淋漓者宜用。

石膏(煨) 轻粉各一两 青黛 黄柏末各三钱

上共研细，甘草汤洗净，以此药掺之，其疼即止。

肺风粉刺酒渣鼻第八十

肺风、粉刺、酒渣鼻三名同种。粉刺属肺，渣鼻属脾，总皆血热郁滞不散。所谓有诸内、形诸外，宜真君妙贴散加白附子敷之，内服枇杷叶丸、黄芩清肺饮。

枇杷叶丸

枇杷叶丸 天花粉 甘草 黄芩 酒跌丸

肺风粉刺并渣鼻 三症吞之俱可安

治肺风、粉刺、鼻渣，初起红色，久则肉皰发肿者。

枇杷叶（去毛刺）八两 黄芩（酒炒）四两 甘草一两 天花粉四两

共为末，新安酒跌丸桐子大，每服一钱五分，食后并临睡白滚汤、茶汤俱可送下，忌火酒、煎炒。

黄芩清肺饮

黄芩清肺饮 芎归 赤芍 防风 生地 随

连翘 干葛 天花粉 薄荷 红花 共此为

治症同前。

川芎 当归 赤芍 防风 生地 干葛 天花粉 连翘 红花各一钱 黄芩二钱 薄荷五分

水二盅，煎八分，食后服，用酒一杯过口。

真君妙贴散（见肿疡门）

治肺风、粉刺、渣鼻红赤紫肿。早晚用凉水调敷。

雀斑第八十一

雀斑，乃肾水能荣华于上，火滞结而为斑，当以六味地黄丸以滋化源；外以玉容丸早晚搽洗渐愈。

玉容丸

玉容丸 梔羌独松 荆矾 辛柰 芷麻风

芡苢椒檀蚕藁本 陀僧红枣菊花逢

治男妇雀斑、酒刺，及身体皮肤粗糙，并用此洗。

甘松 山柰 细辛 白芷 白芨 防风 荆芥 僵蚕 山柅
藁本 天麻 羌活 独活 陀僧 枯矾 檀香 川椒 菊花各一钱
红枣肉七枚

以上共为细末，用去净弦膜肥皂一斤，同槌作丸，如秋冬加生蜜五钱，如皮肤粗槁加牛骨髓三钱，早晚洗之，肌肤自然荣洁如玉，温润细腻。

玉肌散

玉肌散用生绿豆 滑石白芷同成就

碾末还兼白附子 肺风酒刺真不谬

一切风湿、雀斑、酒刺、白屑风皮肤作痒者并效。

绿豆半升 滑石 白芷 白附子各二钱

共为细末，每用三匙，早晚洗面时，汤调洗患上。

六味地黄丸（药见肺癰门肾气丸）

油风第八十二

油风，乃血虚不能随气荣养肌肤，故毛发根空，脱落成片，皮肤光亮，痒如虫行，此皆风热乘虚攻注而然。治当神应养真丹服之，外以海艾汤熏洗并效。

海艾汤

海艾汤中甘菊花 防风薄荷藿香加

甘粉藁本蔓荆子 荆芥同煎效可夸

治油风血虚风热所致，皮肤光亮，眉发脱落者。

海艾 菊花 薄荷 防风 藁本 藿香 甘松 蔓荆子 荆芥
穗各二钱

用水五、六碗，同药煎数滚，连渣共入敞口钵内，先将热气熏面，候汤温蘸洗之，留药照前再洗。

神应养真丹(见鹤膝风门)

治风、寒、暑、湿袭于三阳部分,以致血脉不能荣运肌肤,虚痒发生,眉发脱落,皮肤光亮者服之。

白屑风第八十三

白屑风,多生于头、面、耳、项发中,初起微痒,久则渐生白屑,叠叠飞起,脱之又生,此皆起于热体当风,风热所化,治当消风散,面以玉肌散擦洗;次以当归膏润之。发中作痒有脂水者,宜翠云散搽之自愈。

祛风换肌丸

祛风换肌丸苍术 首乌牛膝石菖蒲

苦参甘草灵仙等 芎归花粉共相和

治白屑风及紫白癫风、顽风顽癣、湿热疮疥、一切诸疮,搔痒无度,日久不绝,愈之又发宜服之。

威灵仙 石菖蒲 何首乌 苦参 牛膝 苍术 大胡麻 天花粉各等分 甘草 川芎 当归减半

上为末,新安酒泛丸绿豆大,每服二钱,白汤送下,忌牛肉、火酒、鸡、鹅、羊等发物。

消风散(见疥疮门)

翠云散(风杨梅疮门)

玉肌散(见雀斑门)

润肌散(见白秃疮门)

耳病第八十四

耳病,乃三焦肝风妄动而成,大人有虚火、实火之分,小儿有胎热、胎风之别。虚火者,耳内蝉鸣,或兼重听,出水作痒,外无焮肿,此属虚火妄动之症也;四物汤加牡丹皮、石菖蒲及肾气丸主之。实火者,耳根耳窍俱肿,甚则寒热交作,疼痛无时,宜柴胡清肝汤治之。又有耳挺结

于窍内,气脉不通,疼痛不止,以梔子清肝汤为治,外用黄线药插入挺肉缝傍,化尽乃愈。小儿胎热或浴洗水灌窍中,亦致耳窍作痛生脓,初起月间,不必搽药,治早项内生肿,候毒尽自愈。如月外不瘥,以红绵散治之则安矣。

红绵散

红绵散内用枯矾 麝香胭脂在其间

小儿耳内流脓疾 一掺将来换笑颜

治耳内流脓,肿痛已消,脓尚不止,方用此掺之。

枯矾(上白)三钱 干胭脂二钱 麝香一分五厘

共研极细末,磁罐收贮,先用绵球绞尽耳内脓湿,绵球滚药送入耳底自愈。

聪耳芦荟丸

聪耳芦荟丸木香 芩归胆草与大黄

山梔青黛南星等 柴麝青皮共此良

治肝胆有火,耳内蝉鸣,渐至重听不闻声息者。

芦荟 大黄(蒸熟) 青黛 柴胡五钱 龙胆 当归 山梔 青皮
黄芩各一两 木香二钱 南星三钱 麝香五钱

上为末,神曲糊为丸,绿豆大,每服二十一丸,食后姜汤送下,日服三次渐效。

柴胡清肝汤 梔子清肝汤(俱见鬓疽门)

四物汤(见溃疡门)

肾气丸(见肺癰门)

漆疮第八十五

漆疮由来自异,有感而弗感也,欲称木生人感之非也。但漆乃辛热火象有毒之物,人之皮毛腠理不密,故感其毒。先发为痒,抓之渐似瘾疹出现皮肤,传遍肢体,皮破烂斑,流水作痛,甚者寒热交作,宜韭菜汁调三白散涂之,服化斑解毒汤。忌浴热水,兼戒口味,不然变为顽

风、癬、癩，愈而又发者多矣。

三白散

三白散中用石膏 杭粉轻粉不相饶

调搽必用生韭汁 漆疮敷上即时消

杭粉一两 石膏三钱 轻粉五钱

各为末，韭菜汁调敷，纸盖，如无菜汁，凉水调敷。

化斑解毒汤（见火丹门）

竹木刺第八十六

竹木刺，外人之患，有软硬之分，浅深之异。软浅者，以针头拨见刺形，拨出则愈。硬深难出者，用蜈蚣捣烂涂刺上一时许，其刺自然吐出，取去之则愈矣。

花蕊石散（见跌扑门）

治竹木刺伤，肿痛流脓，以葱汤洗净，用此掺之。

痃痒疮第八十七

痃痒者，密如撒粟，尖如芒刺，痒痛非常，浑身草刺，此因热体见风毛窍所闭。宜服消风散，洗用苦参汤；甚者皮损，匝匝成疮，以鹅黄散软绢帛蘸药扑之。

苦参汤

苦参汤用大菖蒲 河水煎来患上磨

临洗再加猪胆汁 可教诸痒自然除

治痃痒疮作痒，抓之又疼，坐如糠稳，难以安睡。

用苦参四两，大菖蒲二两，河水五瓢，同煎数滚，添水二瓢，盖片时；临洗和入公猪胆汁四五枚，淋洗患上，不二三次全愈。愈后避风，忌食发物。

苦参汤的临床新用

1. 湿疹

李昆三采用桃红苦参汤治疗湿疹82例。药物组成:生地20克,当归12克,川芎10克,白芍12克,番红花1.5克,桃仁8克,苦参6克,白鲜皮15克。若失眠者加枣仁10克;便秘者加麻仁10克,郁李仁10克;皮肤渗液多者加苍术10克;纳呆者加鸡内金6克。水煎,每日1剂。1周为1个疗程,3周后统计疗效。本组病例均不采用其他抗过敏药或激素类药治疗。总有效率96.3%。

李昆三. 湖南中医杂志,2006,22(2):50

2. 尿潴留

徐志奎用当归贝母苦参汤加味治疗尿潴留获效。基本方:当归、苦参、桔梗各10克,浙贝母15克(碎),甲珠粉6克,鲜葱白20克。若老年或气虚者加生黄芪30克;大便不通者加厚朴15克,大黄10克;血瘀者加水蛭5克;阳虚明显者加桂枝20克;湿热较甚者加黄柏10克,茯苓20克。每日1剂,总有效率为96.3%。

徐志奎. 中国民族民间医药杂志,2005,(1):25

3. 外阴瘙痒症

龙蛇苦参汤治疗外阴瘙痒症75例。药物组成:龙胆草、蛇床子、苦参、地肤子、百部各30克,土茯苓、白鲜皮各20克,黄柏、紫花地丁各15克,花椒、白矾各10克。第一次煎药液,用纱布滤过放温装入妇用卫生器中冲洗阴道,药液保留10~15分钟。第二次煎药,先熏洗后坐浴15~20分钟,每日用药1剂。7天为1个疗程,一般用药1~3个疗程。总有效率96.0%。

杨烈文. 中医药学刊,2005,23(4):745

4. 阴虱

王某,男,42岁,因洗桑拿浴而患阴虱之症,奇痒难忍,苦不堪言,曾在多家皮肤科就诊,均无效。姚普用百部苦参汤(百部30克,苦参

30 克,蛇床子 30 克,川椒 6 克,枯矾 6 克,白头翁 12 克,蒲公英 15 克)煎液外洗治疗,早、晚各 1 次,3 剂而愈。

姚普. 中医外治杂志,2004,13(4):40

5. 手足癣

李银兰等用复方乌梅苦参汤治疗手足癣获效。外涂美克霜,同时外用复方乌梅苦参汤浸泡皮损处。组方:乌梅 15 克,苦参 15 克,黄芩 10 克,黄连 10 克,地肤子 10 克,蛇床子 10 克,白鲜皮 10 克,水泡型加明矾 9 克。每日浸泡 2 次,每剂药浸泡 1 天,每组疗程为 1 周,待皮损完全消退,自觉症状消失,真菌镜检阴性后再继续用药 2 个疗程。总有效率 86.7%。

李银兰,等. 光明中医,2004,19(6):29

6. 病毒性心肌炎

李细英用苦参汤治疗病毒性心肌炎 15 例获效。药物组成:苦参 30 克,忍冬藤 30 克,黄芪 50 克,生晒参 15 克,麦冬 10 克,五味子 10 克,丹参 30 克,石菖蒲 10 克,炙甘草 10 克,瓜蒌壳 15 克,酸枣仁 20 克。7 天为 1 个疗程,连服 3 周,总有效率 92%。

李细英. 江西中医药,2004,35(5):27

7. 寻常型银屑病

用本方外洗治疗寻常型银屑病 58 例。药物组成:苦参 60 克,菊花 60 克,金银花 30 克,白芷 15 克,地肤子 15 克,蛇床子 30 克,石菖蒲 10 克。将新鲜猪胆汁 1 个倒入药汁中搅匀,用棉花蘸药汁外擦皮损部位,每日 2~3 次(用过的药渣,可重复煎 2 次)。总有效率 98.2%。

段有超. 中医药信息,2004,21(5):27

8. 尖锐湿疣

本方加味治疗尖锐湿疣获效。方药组成:苦参 60 克,蛇胆子 30 克,白芷 15 克,双花 30 克,野菊花 60 克,黄柏 15 克,地肤子 15 克,菖蒲 8 克,明矾 5 克。运用时将其他 8 味中药煎熬后放入容器中,再将明矾溶化,趁热连熏带洗湿疣部位,反复运用 1 周,亦可继续巩固 1 周,疣体可自动脱落而愈。

段雅丽. 中华医学丛刊, 2004, 4(10): 77

9. 宫颈糜烂

川椒苦参汤治疗宫颈糜烂 102 例。药物组成: 苦参 30 克, 蛇床子 15 克, 土槿皮 20 克, 地肤子 20 克, 白鲜皮 20 克, 白花蛇舌草 20 克, 川椒 10 克, 黄柏 10 克。每日 1 剂, 加水、食醋再煎沸, 然后趁热用药液熏洗外阴和阴道, 每日 2 次, 7 日为 1 个疗程, 2 个疗程后评定疗效。本组经治疗全部获效, 其中治愈 46 例, 显效 38 例, 有效 18 例。

沈继成. 中国民间疗法, 2003, 11(5): 53

10. 顽固性频发室性早搏

本方加炙甘草治疗顽固性频发室性早搏疗效显著。药用: 炙甘草 15 克, 红参(另冲)、桂枝各 5 克, 苦参 50 克, 生地、麦冬、阿胶、麻仁各 10 克, 大枣 20 克。若早搏频繁, 红参易高丽参(另冲)5 克, 加龙骨、牡蛎各 30 克, 远志、合欢皮、柏子仁各 10 克; 若偏阴虚, 红参易西洋参(另冲)5 克, 加五味子、天门冬各 10 克; 若偏阳虚, 加杜仲、菟丝子各 10 克; 若胸闷明显, 加薤白、全瓜蒌、枳壳各 10 克; 若痰湿较盛, 加石菖蒲、竹茹、半夏各 10 克; 若失眠, 加枣仁、柏子仁各 15 克, 夜交藤 30 克; 若便秘, 加柏子仁、郁李仁各 10 克, 每日 1 剂。治疗组 30 例中显效 9 例, 有效 13 例, 无效 7 例, 恶化 1 例, 总有效率为 73%。

朱红. 现代中西医结合杂志, 2003, 12(16): 1713

11. 急性菌痢

吕国英用木香苦参汤治疗急性菌痢 98 例。药物组成: 木香 10 克, 苦参 20 克, 地榆 20 克。如脱水严重者给予补液支持。所有病例均未加用任何抗生素治疗, 1 日 1 剂, 水煎日服 2 次。总有效率为 97.9%。

吕国英. 时珍国医国药, 2003, 14(7): 415

12. 斑秃

潘权用本方治疗斑秃 21 例。药物组成: 苦参 10 克, 鲜侧柏叶 30 克, 何首乌 5 克, 鸡血藤 10 克, 三棱 5 克, 莪术 5 克, 卷柏 10 克。熏洗患部, 隔夜 1 次, 连用 3 个月以上。总有效率为 95.3%。

潘权. 哈尔滨医药, 2003, 23(5): 41

13. 急性腰扭伤

沈以凤等用苦参汤治疗急性腰扭伤获效。用法:苦参 30 克水煎煮 2 次,每次 30 分钟,合并滤液,混匀。滤液 1 日分 2 次口服。连续服用 3 天。本组病例全部有效,经 1 剂治疗后,痊愈 32 例,占 20%;好转 74 例,占 80%,继续口服 2 剂后痊愈;治疗过程中无 1 例无效。

沈以凤,等. 天津药学,2000,12(4):65

14. 痤疮

张峰等用黄芩苦参汤治疗痤疮 82 例。药物组成:黄芩 15 克,桑白皮 15 克,黄连 12 克,栀子 12 克,苦参 15 克,枯矾 3 克,地肤子 20 克,香附 10 克,白芷 10 克。便秘者加大黄 6 克;热象不甚者去黄连,加苍术 15 克;瘙痒甚者加白鲜皮 10 克,蛇床子 15 克,乌梢蛇 30 克。1 日 1 剂,水煎分 2 次服。5 日为 1 个疗程。治疗效果显著。

张峰,等. 河南中医药学刊,1999,14(5):49

15. 慢性溃疡性结肠炎

本方加味治疗慢性溃疡性结肠炎 28 例。药物组成:苦参 30 克,白头翁 30 克,椿根皮 30 克,紫草 30 克,黄连 10 克。排便后药液保留灌肠。总有效率为 96.5%。

李立. 甘肃中医,1998,11(2):27

鹅黄散

鹅黄散中真豆粉 黄柏滑石轻粉称

四味将来研细末 止痛收干遂吾心

治疮痒作痒,抓之皮损,随后又疼,用此扑之。

绿豆粉一两 滑石五钱 黄柏三钱 轻粉二钱

上为细末,以软绢帛蘸药扑于患上,止痛收干。

消风散(见疥疮门)

疥腮第八十八

疥腮乃风热、湿痰所生,有冬温后天时不正感发传染者多。两腮

肿痛,初发寒热,以柴胡葛根汤散之,外敷如意金黄散。在里内热口干,二便不利者,四顺清凉饮利之。表里俱解,肿仍不消,必欲作脓,托里消毒散,脓成者即针之。体虚人兼服补托自愈。

柴胡葛根汤(见伤寒发颐门)

四顺清凉饮(见汤泼门)

痰包第八十九

痰包,乃痰饮乘火行凝注舌下,结而饱满。绵软不硬,有妨言语。作痛不安,用利剪刀当包剪破,流出黄痰;若蛋清稠粘难断,捺尽以散搽之,内服二陈汤加黄芩、黄连、薄荷数服。忌煎炒、火酒等件。

加味二陈汤

加味二陈汤半夏 茯苓甘草共陈皮

芩连薄荷姜三片 痰饮生来服此宜

治痰饮流注舌下,发肿作痛,针刺已破者服之。

陈皮 半夏 茯苓 甘草 黄芩各八分 黄连 薄荷各五分

水二盅,姜三片,煎八分,食前服。

冰硼散(见咽喉门)

加味二陈汤的临床新用

1. 小儿咳嗽

余守雅用本方治疗小儿咳嗽 146 例。处方:陈皮 5~10 克,半夏 2~6 克,鱼腥草 6~12 克,桔梗、白前、茯苓、黄芪、炙瓜蒌皮各 3~9 克,射干、炒莱菔子各 1~6 克,荆芥、炙甘草各 3~6 克,生姜 3 克,红枣 4 枚。根据年龄及病情,药物剂量酌情加減。每日 1 剂,每 4 小时 1 次或不拘时温服。服药后注意避风,饮食宜清淡。总有效率 100%。

余守雅. 辽宁中医杂志, 2005, 32(10): 1027

2. 发作期喘息性支气管炎

周江等用本方治疗发作期喘息性支气管炎 60 例。处方:当归、陈

皮、半夏、甘草、五味子、白茯苓、桑皮、川贝、杏仁各6克。服药期间忌烟、酒、茶、盐、葱、蒜、辣。7~8天为1个疗程。结果:痊愈36例,其中1个疗程治愈19例,2个疗程治愈17例;好转24例,均为2个疗程未治愈者。

周江,等. 新疆中医药,2005,23(5):23

3. 喉源性咳嗽

濮欣等用本方治疗喉源性咳嗽206例。药物组成:陈皮5克,法半夏10克,茯苓15克,甘草5克,紫菀10克,前胡10克,北杏仁10克。若咳痰不爽,加桔梗10克,天花粉15克;痰黄黏稠,加黄芩15克,鱼腥草15克,咽喉瘙痒,加薄荷5克,生姜10克;咽喉疼痛,加板蓝根20克,牛蒡子10克;声音嘶哑,加蝉蜕5克,僵蚕10克;口淡痰稀,加制附子10克,桂枝10克,干姜5克。待温热适中,徐徐咽下。每日1剂。治疗期间忌生冷、煎炸、辛辣食品,戒烟酒。总有效率95.63%。

濮欣,等. 中医研究,2005,18(5):33

4. 高脂血症

孟辉等用本方治疗高脂血症82例。药物组成:陈皮、法夏、制南星、大黄各10克,泽泻、山楂、三七各15克,茯苓20克,甘草6克。每日1剂,连续服用2个月为1个疗程,观察1个疗程,复查结果。若血压高者加天麻10克,钩藤12克;糖尿病患者加黄精、花粉各10克,重用山楂20克;冠心病患者加丹参、黄芪各20克;脂肪肝者加浙贝母、天竺黄各10克。总有效率为94%。

孟辉,等. 陕西中医,2004,25(11):1000

5. 慢性胃炎

顾维明用本方治疗慢性胃炎40例。基本方:法半夏、陈皮、砂仁(后下)、瓜蒌皮各10克,白芍、茯苓各15克,炙甘草、川黄连各5克,枳实6克,薏苡仁30克。加减:嗝气甚者加沉香、代赭石;脘腹胀甚者加佛手;脾虚甚者加太子参、白术;返酸者加乌贼骨、煅瓦楞;疼痛较剧者加延胡索、川楝子;食滞加鸡内金;阴虚者加梔子、百合;胃痛恶寒喜暖,遇寒痛增者加高良姜。每日1剂,水煎2次。温服。3周为1个疗

程。显效(临床症状消失或基本消失,1年以内未复发者)31例;有效(临床症状明显减轻)7例;无效(治疗后临床症状无改变)2例。总有效率为95%。

顾维明. 湖北中医杂志,2003,25(4):38

6. 美尼尔氏病

彭建雄用本方合西比灵治疗美尼尔氏病45例。药物组成:制半夏、陈皮各8克,茯苓30克,白术、牛膝、泽泻各12克,钩藤、菊花、天麻各15克,代赭石25克。每日1剂。并联合用西比灵胶囊,每日10毫克,晚间睡前服用。总有效率97.8%。

彭建雄. 四川中医,2002,20(4):50

7. 反酸症

周子杰等用本方治疗反酸症55例。药用:陈皮10克,半夏10克,茯苓10克,乌贼骨15克,煅瓦楞15克,浙贝10克,白芨10克,厚朴10克,甘草6克。若脾胃虚寒加桂枝10克,白术10克,代赭石15克,旋覆花10克;脾胃虚弱加党参10克,白术10克,砂仁10克,木香10克;胃脘部热加川连10克,丹皮10克,蒲公英15克,生大黄6克;肝胃不和加川连10克,吴萸5克,柴胡10克,香附10克;脾胃湿热加川连10克,白蔻仁10克,生苡仁15克,竹茹10克。每日1剂。2~4周为1个疗程。治愈率为58.2%,高于对照组治愈率(33.3%)。

周子杰. 中国民间疗法,2000,8(9):27

8. 复发性睑板腺囊肿

陈智军用本方治疗复发性睑板腺囊肿获效。药物组成:陈皮12克,制半夏10克,茯苓10克,炙甘草3克,青皮10克,香附10克,赤芍12克,贝母10克,夏枯草10克。每日1剂,药液内服,药渣湿热敷。2周为1个疗程。若伴消化不良,胃脘痞满或小儿食积不化,上方减赤芍、夏枯草,酌加山楂、鸡内金、神曲、槟榔;若伴口干渴、舌红苔黄,囊肿结膜面色泽红赤者,上方去香附,加生石膏、栀子、黄连、天花粉。本组治愈16例。好转2例,继服上方2个疗程后痊愈。

陈智军. 中国中医眼科杂志,1996,6(2):95

癩风第九十

癩风，乃阳明湿热沸腾于肌表，或外受风寒侵袭而成。其患初起水泡，作痒成疮，破流脂水，痒至彻骨；久则成片，传及遍身，好浴热汤，形如风癩。初起上体多者，防风通圣散去硝黄，加葱头三茎，发汗以散外毒。下体多者，去麻黄以攻内毒，久服祛风换肌丸，初服消风清燥汤，外搽诸疮一扫光。成片流水者，真君妙贴散；皮肤顽厚有虫者，麦钱散搽之。

消风清燥汤

清风清燥汤生地 芍药防归芩黄连

花粉苦参并蝉蜕 甘草灵仙共此全

川芎 当归 白芍 生地 防风 黄芩 黄连 天花粉 蝉蜕
苦参 灵仙各一钱 甘草五分

水二盅，煎八分，食远服。

防风通圣散（见时毒门）

祛风换肌丸（见白屑风门）

真君妙贴散（见肿疡门）

诸疮一扫光（见疥疮门）

湿肿第九十一

湿肿者，皆脾气受伤之病。或饮食后骤受风寒所侵，或饥渴时误餐生冷所滞，寒积于中，食不克化，其患胸膈不宽，小水不利，面目浮肿，渐至遍身，此土伤不能生化之故也。宜用二蛟散疏通稼土，温养脾元，其小水自利，浮肿自消。此方百发百中之妙。

二蛟散

二蛟散内焙皮硝 陈米三年要炒焦

湿肿糖汤调服下 如蛟行水自然消

治生冷、恼怒伤脾，致胸膈不宽，小水不利，面目四肢浮肿，诸药不效。

用三年老黄米炒焦黄色为末，提净芒硝三两，锅内溶化，炒干为末，每用一平杯，和匀再碾极细，大人壮实者每服三钱，小儿十岁上下者一钱二分，俱用赤砂糖三茶匙和白滚汤半茶盅，空心的调服。至午大便一次，至晚再大便一次，其疾先从眼胞消起，日久元气虚者，与加味胃苓汤间服，至重者，不过五服愈。

加味胃苓汤

加味胃苓汤术苓 参楂芍半藿香陈

泽泻猪苓并厚朴 甘草香附效如神

治脾胃受伤，胸膈不宽，两胁膨胀，小水不利，面目四肢浮肿者服之。

陈皮 茯苓 白术 白芍各一钱 藿香 人参 厚朴 山楂 泽泻 半夏各五分 甘草 猪苓各三分 香附女人加一钱

姜三片，灯心二十根，水二盅，煎八分，食前服。

咬伤第九十二

人咬为患，良肉受伤，但齿乃阳明胃经有余脏腑，多火多热，生穴于此，凡食经此，无不腐烂下咽；又饮食炙搏之毒，无不侵袭。故人发肿，其痛异常，臭脓腐烂，痛彻连心，是感牙之毒也。初咬时一日内，众撒热小便浸伤外，洗净牙黄瘀血，咬孔上蟾酥饼贴之膏盖，后出微脓渐愈。如咬时未经此法，致肿痛发胖疼甚者，亦与童便浸洗，挹干用粗纸捻蘸麻油点火，用烟焰熏肿痛上，良久方住，以解牙毒；仍以蟾酥条插入孔内膏盖，候肿消时换玉红膏搽之，长肉完口。如有杂症相兼者，亦随症而治。

葱白甘草汤

葱白甘草汤容易 咬伤疼痛兼臭秽

每日常将频洗之 消瘀散肿功全备

治咬伤焮肿疼痛，脓血淋漓，臭秽腐烂者。

用葱白二两，粉草五钱，水三碗，煎至二碗，每日洗净伤处瘀腐脓血，方用玉红膏搽之。黑膏盖渐愈。

蟾酥饼（见疔疮门）

玉红膏（见肿疡门）

疯犬伤第九十三

疯犬伤，乃朝夕露卧非时不正之气所感，故心受之，其舌外出；肝受之，其目昏蒙；脾受之，其涎自流；肺受之，其音不出；肾受之，其尾下拖。此五脏受毒，成为疯犬，乃禀阴阳肃杀之气，故经此必致伤人。随咬即服救生散，小便中行出血片。忌诸口味、麻物、赤豆等俱不可见，百日乃安。治之迟者，毒大而小便难出，必攻脏腑，久则成形，腹胀攻急，人声若犬，眼神露者，俱为不治。有愈后复犯前禁，触之仍死。

救生散

救生散用七斑蝥 惟用全身翅足饶

杭粉一钱同作末 空心酒服效功高

治疯犬咬伤，用生斑蝥七个去头、翅、足，杭粉一钱同研，空心温黄酒调服，一时许小便行出血片、白脂，乃恶物也。如便痛，煎甘草汤饮之自利；如毒未尽，次早再一服，以小便清白方为毒尽。

追风如圣散

追风如圣散防风 川草乌芎薄荷同

白芷细辛苍术等 雄黄加上效无穷

治疯犬咬伤，随用敷之，其毒即可拔出。

细辛 防风 川乌 薄荷 草乌 川芎 白芷 苍术各一两 雄

黄四钱

共为末，温酒调敷伤处，以纸盖扎，早晚换二次。

疯犬伤之要静居 诸麻赤豆大荤祛

百日之中都忌见 敢教患者乐年余

女人面生黧黑斑第九十四

黧黑斑者，水亏不能制火，血弱不能华肉，以致火燥结成斑黑，色枯不泽，朝服肾气丸以滋化源，早晚以玉容丸洗面斑上。日久渐退。兼戒忧思、动火、劳伤等件……

肾气丸（见肺癰门）

玉容丸（见雀斑门）

纽扣风第九十五

纽扣风，皆原风湿凝聚生疮，久则搔痒如癬，不治则沿漫项背。当以冰硫散擦之。甚者服消风散亦妙。

冰硫散

冰硫散内用川椒 朝脑生矾岂可饶

萝卜内藏煨熟药 还将猪胆共相调

硫黄一两 獐冰 川椒 生矾各二钱

共为末，先用白萝卜一个，抠空其内，将药填满，复将原皮盖之，湿纸包三、四层，灰火内煨半时许；待冷取开，用药同熟猪油调稠、搽患上自愈。

消风散（见疥疮门）

枯筋箭第九十六

枯筋箭，乃忧郁伤肝，肝无荣养，以致筋气外发，初起如赤豆大，枯点微高，日久破裂，翘出筋头，蓬松枯槁，多生胸乳间，宜用丝药线齐根系紧，七日后其患自落；以珍珠散掺之，其疤自收。兼戒口味不发。

丝药线（见瘰癧门）

珍珠散（见下疳门）

妇人脚丫作痒第九十七

妇人脚丫作痒，乃从三阳风湿下流凝聚不散，故先作痒而后生湿烂。又或足底弯曲之处，痒湿皆然。

枯矾散

枯矾散中煨石膏 黄丹轻粉不相饶

四味将来为末掺 脚丫湿痒即时消

枯矾五钱 石膏(煨) 轻粉 黄丹各三钱

上为末，温汤洗净，搽药即愈。

手足破裂第九十八

手足破裂，破裂者干枯之象，气血不能荣养故也。因热肌腠被风寒所逼，凝滞血脉，以致皮肤渐枯渐槁，乃生破裂；日袭于风，风热相乘，故多作痛。以玉肌散洗擦，润肌膏润之，甚者兼服当归饮子为妙。

玉肌散(见雀斑门)

润肌膏(见白秃疮门)

当归饮子(见疥疮门)

眼丹第九十九

眼丹脾经有风，胃经多热，共结为肿。风多者则浮肿易消，热甚者则坚肿难收。初起宜用金黄散敷之，有表症者荆防败毒散，里症者清胃散加大黄利之，如后不散，必欲作脓，宜换膏贴之，脓成者即针。迟则眼头自破，此乃睛明穴，内空难敛，成漏者多。

荆防败毒散(见时毒门)

清胃散(见牙缝出血门)

金黄散(见肿疡门)

黑子第一百

黑子，痣名也。此肾中浊气混滞于阳，阳气收束，结成黑子，坚而不散。……宜细铜管将痣套入孔内，捻六、七转，令痣入管，一拔便去。有痣浮浅不能拔者，用针挑损痣上，搽冰蛭散少许，糊纸盖之，三日自脱，或灰米膏点之亦可；落后珍珠散干掺生皮而愈。忌酱、醋无斑。

灰米膏

用成块火灰碱水调稠，将白川米插入灰内，留半米在外，片时许，候米熟用米点痣上可落矣。

冰蛭散（见療癰门）

珍珠散（见下疳门）

眼胞菌毒第一百零一

菌毒者，乃脾经蕴热凝结而成。其患眼胞内生出如菌，头大蒂小，渐长垂出；甚者眼翻流泪，亦致昏蒙。治宜用软绵纸蘸水蒙之眼胞上，少顷用左手大指甲佃于患根，右手以铍针尖头齐根切下，血出不妨；随用翠云锭磨浓涂之，其血自止。内服凉膈清脾饮二服，仍忌海腥、煎炒、椒、姜、火酒等件不发。

凉膈清脾饮

凉膈清脾饮薄荷 荆防生地石膏图

黄芩赤芍连翘等 甘草山梔岂可无

防风 荆芥 黄芩 石膏 山梔 薄荷 赤芍 连翘 生地各一钱 甘草五分

水二盅，灯心二十根，煎八分，食后服。

翠云锭

治眼胞菌毒，用针割后涂之。杭粉五两，铜绿末一两，轻粉一钱，共研极细，用黄连一两同川米百粒，水一碗，煎一半，再熬折去二分，和

药作锭阴干；临用清水少许净硃上磨浓，鸡翎蘸搽患上。又治烂弦风眼或暴赤肿痛者，簪搽更效。

体气第一百零二

体气一名狐气，此因父母有所传染者，又有狐胎而受生者，故不脱本来气质。凡此腋下多有棕纹数孔，出此气味，常以五香散擦之，内用蒜肚时常作饌食之，亦可解其气味，可渐而退，此法常取效也。

五香散

五香散内用沉檀 还有零零并木香

加上麝香功更捷 敢教体气不相妨

沉香 檀香 木香 零零香各三钱 麝香三分

共为细末，每用五厘，津调搽擦两腋下，三日一次，或用香末二钱，绢袋盛贮挂于腋下亦效。

蒜肚方

用公猪肚一具，入大蒜囊四十九枚，去壳入肚内。以线扎口，水煮极烂；用盐、醋蘸肚随便食之。气味甚者，用癞虾蟆一个入内同煮，肚烂去虾蟆、大蒜，用热酒食之，洗浴发汗。避风三日，其气顿改。

白秃疮第一百零三

白秃疮，因剃发腠理司开，外风袭入，结聚不散，致气血不潮，皮肉干枯，发为白秃，久则发落，根无荣养。如秃斑光润不痒，内血已潮，以姜蘸润肌膏常擦，其发渐生。秃斑干枯作痒者，内必有虫，宜用麦钱散搽之，虫死、风散、发生可愈。后忌动风、发物等件。

麦钱散（见痘风疮门）

治秃疮头毛脱落，白斑如癣，疮痂垒垒，叠起痒甚，犹若虫行。葱汤洗净疮痂，用麻油调搽，以毡帽戴之，随后作疼发肿，忍之三日，后其痂渐渐而脱。愈之后不复作，其发亦生，戒诸发物。

诸疮一扫光(见疥疮门)

治秃疮发脱作痒。本药一钱,加倒挂尘二分,加灯窝宿油调搽自愈。

润肌膏

润肌膏内用麻油 紫草当归一处投

能搽秃疮枯槁色 加之黄蜡效应收

治秃疮干枯白斑,作痒发脱。

用麻油四两,当归五钱,紫草一钱同熬,药枯滤清,将油再熬,加黄蜡五钱化尽倾入碗内,顿冷搽擦患上渐愈矣。

奶癣第一百零四

奶癣,儿在胎中,母食五辛,父餐炙搏,遗热与儿,生后头面遍身发为奶癣,流脂成片,睡卧不安,搔痒不绝。以文蛤散治之,或解毒雄黄散,甚则翠去散妙。

文蛤散

文蛤散用点胡椒 二味将来同炒焦

加上轻粉香油和 婴儿奶癣即时消

文蛤四两 点红川椒二两 轻粉五钱

先将文蛤打成细块,锅内炒黄色,次下川椒同炒,黑色烟起为度,入罐内封口存性,次日入轻粉,碾为细末,罐收贮;香油调搽,奶母戒口为妙。

解毒雄黄散(见血风疮门)

翠云散(青缸汁调搽,见杨梅疮门)

蟾拱头第一百零五

蟾拱头,患小而禀受悠远,皆父精母血蓄毒而成。生后受毒者,只发一次,其患肿高,破之又肿,皆禀受时原有衣膜相裹,毒虽出而膜未

除，故愈又发。肿甚脓熟者，用针刺破，以三品一条枪插入孔内，化尽内膜自愈。又有不肿而不收口者，此必风袭患口，宜败铜散搽之，兼戒口味自愈。

败铜散

败铜散效为何因 铜锡铅碯总化成
性热亦能收湿水 一干不再复回津
治蟾拱头已破后，脓水不干，愈之又发，久不收口。
用化铜旧罐为末，洗净患上，香油调搽。忌口。
三品一条枪（见痔毒门）

小儿遗毒烂斑第一百零六

遗毒乃未生前在于胞胎禀受，因父母杨梅疮后余毒未尽，精血孕成。故既生之后，热汤洗浴，烘熏衣物，外热触动，内毒必发于肌肤之表，先出红点，次成烂斑，甚者口角、谷道、眼眶、鼻、面皮肉俱坏，多妨乳哺，啼叫不安。初治宜早，内与土茯苓汤调人中黄末，每日数次，共饮四五分；外用解毒紫金丹磨涂患上，效者可保十中三四。迟延毒甚、烂斑遍身、不乳者，百中难活一二。此由根蒂受毒之深故也。

人中黄治小儿诸胎毒、痘疹，黑陷内收，唇焦口干，风热斑疹，赤游丹毒；兼治大人伤寒阳症发狂，或诸恶疮毒气入里，口燥咽干，烦渴闷乱，中诸砒草河豚等毒，诸般急病，无有不效。用毛竹一段，两头留节，一头钻一小孔，用粉草磨为细末，从孔灌满，以木条塞紧孔眼，用砖扎之，沉入大粪池内；半年取起。长流水浸一日，带竹风干，磁罐收贮。大人每服二钱，小儿每服三四分，凉水调服。小儿胎毒烂斑。土茯苓汤调服；寻常热病，入应病药中调服即效。

真君妙贴散（见肿疡门）

治小儿胎毒，皮肉腐烂，疼痛不安，用此敷即效。

解毒紫金丹（见疔疮门）

蜈蚣串第一百零七

蜈蚣串者，乃得于思虑伤脾，脾气郁结所生。是疾气血浇薄者多，盖四肢属脾土，其患多生于两手，初起骨中作痛，渐生漫肿坚硬，不热不红，手背及内关前后连肿数块，不能转侧；日久出如豆腐浆汁，串通诸窍，日夜相流，肿痛仍在，患者面黄肌瘦，饮食减少，日则寒热交作，内症并出。首尾俱宜益气养荣汤、加味逍遥散调和气血，扶助脾胃，其中可生者十有二三矣。补而不应，气血沥尽而亡者多。

益气养荣汤 加味逍遥散（见瘰癧门）

小儿痘风疮第一百零八

痘风疮，因痧、痘后毒发未尽，留热肌肤，复被外风侵入，其患先从细疮作痒，次渐沿开成片，脂水生痂，搔之无度，因用麦钱散搽之，兼戒口味，避风自愈。

麦钱散

麦钱散治痘风疮 硫黄人信要相当

川椒生熟枯矾等 麻油调擦自然光

治小儿痘风作痒，叠叠成片，甚则顽麻不知痛。

用小麦一升炒枯黄色，乘热入钵内，和硫黄四两、白砒一两，细末搅匀，待冷取起；加烟胶半斤，川椒三两，生枯矾各二两，共碾细末，临用葱汤洗净，用麻油调搽，油纸盖扎，三日一换，三次愈。

小儿赤游丹第一百零九

赤游丹，受毒于未生前，发病于有生后。盖身在胞胎，皆赖父精母血借以生养，父母不能节其欲，多致淫火猖炽，胎必侵受；又不能戒诸厚味，以及炭火烘熏、重衾叠褥，往往受热，子无弗有，及致生后，热汤

洗浴,烘熏衣物,触动内毒,而欲发之时,先发身热、啼叫、惊搐,次生红肿光亮、发热,瞬息游走,发无定处。先从头额起者,名天夺丹,以升麻葛根汤母子同服。余皆起于腹背,流入四肢者轻,起于四肢,流入胸腹者重,有此总皆先砭恶血为要。砭血之后,先用精猪肉缝片贴之一时许,换如意金黄散,用水芭蕉根捣汁调敷,甚者日换二次。内以大连翘饮、消毒犀角饮、五福化毒丹。毒气入里,腹胀坚硬不乳者,紫雪散下之。三日后身渐彻凉,砭血之处肉便软活,声清腹软,乳哺如常者顺,反此为逆。

升麻葛根汤

升麻葛根汤芍药 柴胡栀子共连翘

木通甘草同煎服 丹毒游行效最高

治丹毒身体发热,面红气急,啼叫惊搐等症服。

升麻 干葛 白芍 柴胡 黄芩 山栀各一钱 木通 甘草各五分
水二盅,煎八分,不拘时,母子同服。

升麻葛根汤的临床新用

1. 鼻渊

郑通美用升麻葛根汤加味治疗鼻渊 1 例。药用:升麻、葛根、赤芍各 15 克,苍耳子、黄芩各 12 克,银花、连翘各 20 克,白芷、生甘草各 10 克。每日 1 剂。加減共服 30 剂,鼻塞流涕除,头昏头痛消,继以玉屏风胶囊合通窍鼻炎片巩固疗效。随访半年,偶有鼻塞,但无浊涕。

郑通美. 实用中医药杂志,2004,20(12):709

2. 皮肤粟疹

郑通美用升麻葛根汤加味治疗皮肤粟疹 1 例。药用:升麻、葛根、赤芍各 15 克,生甘草、桑叶各 12 克,蝉衣、丹皮各 10 克,野菊花 20 克。3 剂,水煎服,1 日 1 剂。嘱忌食辛辣刺激食物。服药后症減大半,效不更方,原方续服 3 剂,疹消颜净,随访 3 个月,粟疹未发。

郑通美. 实用中医药杂志,2004,20(12):709

3. 眩晕

郑通美用升麻葛根汤加味治疗眩晕1例。药用:升麻6克,葛根10克,党参、炙黄芪、酒白芍、熟地各20克,炙甘草12克。5剂,水煎服,每日1剂。服药后诸症略减轻,再服原方5剂后眩晕大减,步履已稳健。再服5剂,诸症基本未发,后以补中益气丸合六味地黄丸善后,随访半年,眩晕偶作。

郑通美. 实用中医药杂志, 2004, 20(12): 709

4. 急性卡他性中耳炎

王本祥等用本方治疗急性卡他性中耳炎1例。处方:升麻10克,葛根10克,白芍10克,白术10克,黄芪15克,菖蒲10克,柴胡10克,川芎10克,香附10克,白芷10克,甘草10克。嘱自行捏鼻鼓气数次,并行鼓膜按摩,1日数次,服药4剂后,自觉症状消失,查鼻腔黏膜充血已退,下鼻甲不大,捏鼻鼓气法,咽鼓管通畅,鼓膜充血消失,听力正常。

王本祥,等. 四川中医, 2002, 20(1): 70

5. 慢性咽炎

王本祥等用本方治疗慢性咽炎1例。处方:升麻10克,葛根10克,黄芪15克,党参10克,白术10克,陈皮10克,当归10克,麦冬10克,元参10克,五味子10克,甘草10克,知母10克。服药4剂后,症状消失,复查咽部正常,未复发。

王本祥,等. 四川中医, 2002, 20(1): 70

6. 破伤风

张团昌用本方治疗破伤风1例。方用:白芍、葛根、钩藤、独活各15克,木瓜、木通、牛膝各12克,全蝎、木香各9克,蜈蚣3条,升麻、甘草各6克。浓煎取汁,每3小时服1次,1日1剂。二诊:上方服8次后,头及右侧手足掣痛大减,略能起坐,开始进食。予前方加防风、蝉蜕各12克,1日1剂,水煎服,又服3剂。四诊:四肢掣痛、角弓反张基本痊愈,能自己来诊。拟方善后:生地、白芍、玉竹、天麻、首乌各12克,牛膝、石斛、秦艽、续断各10克,连服6剂善后。

张团昌. 山西中医学院学报, 2003, 4(4): 36

7. 口眼歪斜

张团昌用本方合四物汤加味治疗口眼歪斜 1 例。药用: 升麻、防风、僵蚕各 9 克, 葛根、白芍、生地、钩藤各 12 克, 当归 10 克, 川芎 9 克, 怀牛膝 6 克, 全蝎、甘草各 3 克。上药 5 剂, 日 1 剂, 水煎服。二诊: 口眼歪斜转正, 目赤涩胀全退。拟方善后: 当归、藁本、白芷、威灵仙、陈皮各 5 克, 白芍、蔓荆子、桔梗各 10 克, 川芎 8 克, 钩藤 12 克, 生地 15 克, 怀牛膝 6 克, 甘草 3 克, 连服 4 剂, 未再复发。

张团昌. 山西中医学院学报, 2003, 4(4): 36

8. 丙型肝炎

李光等用本方加复方丹参注射液治疗丙型肝炎 78 例。基本方: 升麻、葛根、白芍、甘草。若黄疸重者, 加茵陈、赤芍; 胁痛者, 加郁金、元胡; 口苦、便秘者, 加大黄、龙胆草; 胁下痞块触之痛者, 加三棱、莪术、醋鳖甲; 心烦失眠者, 加黄连、栀子; 恶心、纳差者, 加半夏、竹茹、焦三仙。每日 1 剂。水煎服。显效 38 例, 有效 28 例, 无效 12 例。

李光, 等. 河南中医药学刊, 2001, 16(2): 36

9. 乙型肝炎

朱伊彬用升麻葛根汤加味治疗乙型肝炎 300 例。方药: 升麻、葛根、赤芍、金银花、黄芪各 30 克, 陈皮、甘草各 6 克。有黄疸者加茵陈、金钱草各 30 克; 伴肝区隐痛者加川楝子、醋延胡索各 30 克; 伴腹胀纳差者去黄芪, 加木香 10 克, 炒麦芽 20 克, 砂仁 6 克; 伴有腹水者加白术、白茯苓、猪苓、泽泻各 10 克, 车前子 15 克。3 个月为 1 个疗程, 一般治疗 1~3 个疗程, 每疗程后复查肝功能及乙肝 5 项, 肝脾 B 超异常者复查 B 超。治愈 195 例, 显效 76 例, 好转 28 例, 无效 1 例。

朱伊彬. 安徽中医临床杂志, 1997, 9(5): 252

10. 麻疹

牛忻群用加味升麻葛根汤治疗麻疹 17 例。药物组成: 升麻、葛根、麻黄、白芍、桑叶、牛蒡子、蝉蜕、荆芥穗、桔梗、金银花、连翘各 10 克, 甘草 6 克, 芫荽 1 根。每日 1 剂, 分 2 次煎服, 1 周为 1 个疗程。治

愈率为100%。

牛忻群·实用中医药杂志,1996,8(4):176

大连翘饮

大连翘 饮梔 芍归 车前 滑石 石膏 随

荆防 甘麦 柴芩等 蝉蜕 木通 牛子 宜

治小儿丹毒,发热痰涎壅盛,一切诸疮痧疹,颈项生核;或伤风伤寒,时行发热等症,并宜服之。

连翘 瞿麦 滑石 车前子 牛蒡子 赤芍 山梔 木通 当归 防风 黄芩 柴胡 甘草 荆芥 蝉蜕 石膏各五分

水二盅,灯心二十根,煎八分,母子同服。

消毒犀角饮

消毒犀角饮 防风 加上黄连 甘草 同

还用灯心为引使 赤游丹 肿效神功

治小儿丹毒,身热气粗,啼叫、惊搐不宁等症服。

犀角(镑) 防风各一钱 甘草五分 黄连三分

上水二盅,灯心二十根,煎四分,徐徐服之。

紫雪散

紫雪 羚羊犀角同 升麻 寒水石 石膏 逢

玄参 沉香 甘草 硝片 朱砂 金箔 从

治小儿赤游丹毒,甚者毒气入里,肚腹膨胀,气急不乳,即宜此药救之。又治伤寒热燥发狂,及外科一切蓄毒在内,烦躁口干,恍惚不宁等症。

升麻 寒水石 石膏 犀角 羚羊角各一两 玄参二两 沉香 木香各五钱 甘草八钱

水五碗,同药煎至五碗,滤清再煎滚,投提净朴硝三两六钱,微火慢煎,水气将尽欲凝结之时,倾入碗内,下朱砂、冰片各二钱,金箔一百张,各预研细和匀,碗顿水内,候冷凝成雪也。大人每用一钱,小儿二分,十岁者五分,徐徐咽之即效。病重者加一钱可,或用淡竹叶、灯心汤化服。

针砭法

针砭法来针砭法 铍针头向患中插

箸头复向针上敲 敲出血来以箸刮

治小儿赤游丹毒,红赤焮肿,游走不定,须砭之。用铍针锋尖向患上,以乌木重箸在针上面击之,密砭去血多者为妙;血红者轻,紫者重,黑者死。砭毕温汤洗净,用干精猪肉缝大片,贴砭处一时许,方换如意金黄散,水芭蕉根捣汁调敷。

如意金黄散(见肿疡门)

治小儿赤游丹毒,红如朱,热如火,走如云,散及遍身不定者,用水芭蕉根捣汁调敷;加蜜亦可。

五福化毒丹(见胎瘤门)

走马疳第一百一十

走马疳,言患迅速不可迟延故也。其患多在痧痘余毒所中,又有杂病热甚而成者。其患牙根作烂,随便黑腐作臭,甚者牙根脱落,根柯黑朽;不数日间,以致穿腮破唇,诚为不治。初起宜用芦荟消疳饮,外用人中白散或冰硼散二药搽之;取去黑腐,内见红肉血流者为吉。如取时顽肉不脱,腐烂渐开,肿外散,臭味不止,更兼身热不退者,俱为不治。

芦荟消疳饮

芦荟消疳饮薄荷 玄参甘草共柴胡

升麻牛子羚羊角 梔子黄连竹叶扶

治小儿走马牙疳,身热气粗,牙龈腐烂,气味作臭,以及穿腮破唇者并服之。

芦荟 银柴胡 胡黄连 川黄连 牛蒡子 玄参 桔梗 山梔
石膏 薄荷 羚羊角各五分 甘草 升麻各三分

水二盅,淡竹叶十片,煎六分,食后服。

人中白散

人中白散功奇绝 黄柏儿茶青黛列

薄荷冰片要精研 口疳掺上汤沃雪

治小儿口疳、走马疳，及牙龈腐烂黑臭者极效。

人中白(溺壶者佳，煨红)二两 孩儿茶一两 黄柏 薄荷 青黛(各末)六钱 冰片五分

共再研极细，先用温汤漱净，吹药疳上，日用六七次，吹药涎从外流为吉，内收涎毒入里为凶。

冰硼散(见咽喉门)

牙疳五不治：

口臭涎秽者一不治，黑腐不脱者二不治，牙落无血者三不治，穿腮破唇者四不治，用药不效者五不治。

重舌第一百一十一

大人、小儿重舌，乃心火妄动发之。当以线针点刺患上，令出恶血，内服解毒泻心汤，外以冰硼散搽之。又有紫舌、木舌，亦由心火而发，用飞盐及冰片少许，勤搽出涎自愈。又有痰气结于舌上，成核作痛硬强者，用线针点破出血，用冰硼散搽之，服后药。

黄连泻心汤

黄连泻心汤 芩连 荆芥 山栀 牛子 攒

薄荷 甘草 连翘等 木通 加上效如拈

治大人、小儿心火妄动，结成重舌、木舌、紫舌，肿胀坚硬，语言不利者，并宜服之。

黄连 山栀 荆芥 黄芩 连翘 木通 薄荷 牛蒡子 各一钱
甘草五分

水二盅，灯心二十根，煎八分，食后服。

黄连泻心汤的临床新用

1. 麻疹后肺炎

张时根用大黄酒黄连泻心汤化裁治疗麻疹后肺炎1例。药物组成：

生大黄 10 克(后下),黄连 6 克,黄芩 10 克,鱼腥草 20 克,生石膏 40 克(先煎),大生地 12 克,淡竹叶 10 克。1 剂急煎,频频少量灌服。另又以清开灵加入 5% 葡萄糖液静脉滴注,1 天 1 次,连滴 4 天,药后先泻下大便 3~4 次,体温逐渐降至 38℃,他症亦有明显改善,后以清热解毒、滋阴益气之品而收效,1 周后痊愈。

张时根. 实用中西医结合临床,2004,4(6):64

2. 高热惊厥

张时根用大黄黄连泻心汤化裁治疗高热惊厥 1 例。药用:生大黄 9 克(后下),黄连 3 克,黄芩 5 克,连翘 9 克,僵蚕 5 克,钩藤 9 克,生甘草 3 克。2 剂煎服,因中药未能及时进服,先予针刺,清开灵针加入 5% 葡萄糖液静脉点滴及酒精擦浴降温。患儿清醒,体温降至 38.5℃,约 1 小时后体温复升至 40℃,遂频频灌服中药。服药后泻下 3 次,量多,体温降至 38℃,不复升,后用竹叶石膏汤加减以祛余邪。

张时根. 实用中西医结合临床,2004,4(6):64

3. 小儿口疮

师建国用黄连泻心汤化裁治疗小儿口疮(疱疹性口炎、卡他性口炎、细菌性口角炎等)150 例。药物组成:黄连、黄芩各 3 克,竹叶、生地、木通、赤芍各 6 克,元参 5 克,连翘 10 克,生甘草 2 克。加减:发热加生石膏 20 克(先煎),薄荷 5 克,大便干加大黄 2 克(后下);阴虚者加麦冬、石斛各 5 克,湿浊重者加藿香 5 克。3 岁以下小儿酌情减量,8 岁以上儿童酌情加量。水煎滤汁,每日分 5 次服完,每日 1 剂,3 日为 1 个疗程。1 个疗程治愈 88 例,2 个疗程治愈 51 例,3 个疗程治愈 11 例。总治愈率为 100%。

师建国. 四川中医,2001,19(12):55

4. 放射性口腔黏膜炎

路军章等用大黄黄连泻心汤含漱防治放射性口腔黏膜炎。治疗组自放疗开始即予大黄黄连泻心汤(大黄 10 克,黄连 10 克,生甘草 6 克),每日 1 剂,水煎取汁煎汤含漱;对照组予复方呋喃西林液含漱,直至放疗结束。治疗组 60 例,于放疗第 4 周后全部(100%)出现轻度口

腔黏膜炎,至放疗第5周后有22例(36.67%)出现中度口腔黏膜炎,10例(16.67%)出现重度口腔黏膜炎。对照组30例,于放疗第2周后均出现(100%)轻度口腔黏膜炎,第2~3周后有25例(83.33%)出现中度口腔黏膜炎,第5周后有16例(53.33%)出现重度口腔黏膜炎。治疗组中度以上放射性口腔黏膜炎发生率明显低于对照组($P < 0.01$),而且出现时间较对照组为晚。

路军章,等. 中国中医急症,2004,13(7):438

5. 胃病

应用大黄黄连泻心汤加味辨证治疗胃溃疡、胆汁返流性胃炎、萎缩性胃炎均收到良好疗效。用此方加减治疗HP相关性胃病68例,痊愈26例,好转37例,无效5例,总有效率达91.38%。

段好磊. 辽宁中医学院学报,2003,5(4):343

6. 上消化道出血

(1)徐国祥用此方加减治疗胃溃疡出血23例,十二指肠壶腹出血证属胃热伤络型25例,均收到良好效果,总有效率达97.9%。

徐国祥. 中国中医,2003,5(4):343

(2)陈芳用本方结合辨证加减,必要时配合输血、止血等对症处理,共治疗胃热内生型上消化道出血360例,显效207例,有效133例,无效20例,总有效率为94.4%。

陈芳. 中国中医,2004,13(7):438

(3)罗舜达应用本方加味配合西药治疗急性出血坏死性肠炎50例,均收到良好的效果。

罗舜达. 中国中医,2003,5(4):343

7. 急性脑血管病

董少龙采用中西医急救治疗脑出血及大面积梗塞并发消化道出血36例。插胃管后冰盐水洗胃,用云南白药、白芨粉、大黄黄连泻心汤、氢氧化铝凝胶、西咪替丁自胃管注入,维持对原发病的治疗,结果有效止血存活30例,因止血无效死亡6例。国外有人用此方提取剂治疗脑血管障碍,据称有防止脑出血和脑梗塞复发的作用。

董少龙. 中国中医, 2004, 13(7): 438

8. 小儿急性菌痢

陈建平用此方加减(生大黄、黄芩、黄连、秦皮、白芍), 每天1剂, 水煎, 分3次微温保留灌肠, 3天为1个疗程, 共治小儿急性菌痢84例, 痊愈68例, 显效11例, 无效5例, 总有效率为94.05%。

陈建平. 四川中医, 2001, 19(12): 55

9. 高血压病

日本小泉正夫用此方加减制成胶囊治疗高血压、动脉粥样硬化, 服药1个月后, 头重感消失, 自觉非常好, 因血压尚未降至正常而并用利尿降压剂, 此后用胶囊4周, 未见副反应。此方与Ca离子拮抗剂通用治疗高血压病6例, 均收到良好的降压效果。

小泉正夫(日本). 中国中医急症, 2003, 5(4): 343

10. 精神分裂症

用本方加减(生大黄、黄芩、黄连、黄柏、生石膏)制成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号方, 辨证治疗肝郁火旺型、血虚痰火型、阳明湿热型精神分裂症500例, 痊愈401例, 好转93例, 无效6例, 治愈率80.2%, 总有效率98.8%。

韩涛. 辽宁中医学院学报, 2003, 5(4): 343

11. 戒断综合征

刘东亮用此方加减, 每天1剂, 水煎连服21天为1个疗程。治疗阿片成瘾戒断综合征20例, 治愈17例, 好转3例, 总有效率100%, 且治疗后血清可卡因吗啡烟碱明显降低。

刘东亮. 辽宁中医学院学报, 2003, 5(4): 343

12. 小儿急性口疮复发口腔溃疡

李细春应用大黄黄连泻心汤加减治疗小儿急性口疮33例, 服药后1天退热10例, 2天退热16例, 3天退热7例, 溃疡在2~5天内愈合者25例, 5~7天内愈合8例。

李细春. 实用中医药杂志, 1996, 8(4): 176

13. 疱疹性口炎

用黄连泻心汤加减治疗疱疹性口炎31例。方药组成: 黄连6克,

淡竹叶6克,黄芩12克,焦山栀12克,连翘10克,银花12克,丹皮12克,赤芍12克,生地12克,玄参12克,麦冬12克,甘草6克。淋巴结肿大者加夏枯草10克,天花粉12克;夹湿浊、舌苔厚腻者加藿香10克;溃疡面及牙龈出血者加茅根20克,侧柏叶10克。水煎去渣取汁,分4次口服,疗程1周。喂养困难、拒食的患者,给予液体疗法。全部发热病例在1~4天内体温降至正常。其中24小时内体温降至正常者5例,48小时者10例,72小时者13例,96小时者3例,平均退热时间58小时。全部病例在3~6天内溃疡愈合,黏膜色泽恢复正常。其中溃疡愈合时间低于3天者7例,低于4天者10例,低于5天者11例,低于6天者3例。平均溃疡愈合时间4.2天。

黄金诚. 浙江创伤外科, 2001, 6(03): 199

针刺法

治重舌、木舌、紫舌等疾,肿胀疼痛,硬强不语;又兼舌根并两齿合缝尽处作肿,瘀肉涂塞,口禁难开,俱用此法刺之。用粗线针扎在箸头上,在患处点刺出血,红紫毒轻,紫黑毒重,患甚者数十点皆可;血尽温汤漱之。甚者金锁匙,轻者冰硼散搽患上,流去热涎,内服凉膈散、清凉饮,俱可选用。

金锁匙 冰硼散 凉膈散 四顺清凉饮(俱见咽喉门)

胎瘤第一百一十二

胎瘤者,初生小儿头上、胸乳间肿起,大者如馒,小似梅李,此皆胎中瘀血凝滞而成,须候儿满月外,方可用针刺破,内如赤豆汁则安,内服五福化毒丹。

五福化毒丹

五福化毒丹连桔 青黛人参赤茯苓

玄参胆草牙硝片 甘草朱砂金箔呈

治小儿蕴积胎毒,以及诸疮、瘾疹、伤风斑症,口舌生疮,痰涎壅盛,谵语烦躁,夜睡不宁者并效。

玄参 桔梗 赤茯苓各二两 人参三钱 黄连 龙胆草 青黛
牙硝各一两 甘草五钱 冰片五分 朱砂三钱 金箔二十张(为衣)

上为末,炼蜜丸芡实大,每服一丸,薄荷、灯心汤化服。及治疮疹
后余毒上攻,口齿涎血臭秽,以生地黄汁化下,如无地黄,竹叶灯心汤
亦可用。

鹅口疮第一百一十三

鹅口疮,皆心、脾二经胎热上攻,致满口皆生白斑雪片;甚则咽间
叠叠肿起,致难乳哺,多生啼叫。以青纱一条裹箸头上,蘸新汲水揩去
白胎,以净为度,重手出血不妨,随以冰硼散搽之,内服凉膈之药。

冰硼散(见咽喉门)

凉膈散(见齿病门)

痘痈第一百一十四

痘痈,乃原痘溜浆不足,流毒于脾、肺二经,致手、脚、胸、背结成漫
肿,大如桃李,此多发于收靥之后、身凉不渴者为吉。有此不必内消,
宜太乙膏贴上,候脓熟针之。元气虚弱者,兼服保元汤,助脾健胃为
要。

保元汤

保元汤力效无穷 救困扶危立大功

甘草参芪兼白术 枣姜加上起疲癯

治痘痈出脓之后,脾胃虚弱、脓清不敛者服之。

人参 黄芪 白术各一钱 甘草三分

姜一片,枣二枚,水二盅,煎八分,食远服。

保元汤的临床新用

1. 老年性膝关节炎

王敖明等用调中保元汤(潞党参、黄芪、白术、熟地黄、淮山药、山萸肉、川续断、补骨脂、枸杞子、炙龟板、鹿角、陈皮、茯苓、甘草)为基础方加减。若痰湿盛者加牛蒡子、僵蚕合四妙丸;瘀滞者加三棱、莪术、炙山甲片合四物汤。服法:每日1剂,水煎分2次口服。一般1个月为1个疗程,病情较重者,可连服2~3个疗程。118例老年性骨关节病患者,经1~3个疗程的治疗,痊愈15例,显效37例,有效54例,无效12例。总有效率89.83%。

王敖明,等. 上海中医药杂志,2001,35(7):35

2. 小心脏综合征

王靖用保元汤加味治疗小心脏综合征11例。处方:红参10克,黄芪40克,当归、陈皮各6克,五味子3克,桂枝、炙甘草各5克。加水浓煎,分早晚2次口服。怕冷者加炮附片10克;阴阳两虚者加麦冬、玉竹各10克;寐差者加酸枣仁10克,合欢皮15克;便秘者当归增至10克,并加首乌10克。经服药18~80剂,平均36.6剂,显效9例,有效2例,总有效率100%。

王靖. 四川中医,2001,19(1):23

3. 顽固性心力衰竭

吕勇辉用强心保元汤治疗顽固性心力衰竭获效。方药组成:红参10克,制附子10克,黄芪30克,炒白术15克,茯苓15克,泽泻15克,葶苈子30克,丹参30克,川芎10克,赤芍15克,麦冬15克,五味子15克,益母草15克,炙甘草9克。加减:咳嗽、痰多者,加陈皮、半夏、紫菀、冬花;水肿明显者,加车前子、猪苓;肝脏肿大明显者,加三棱、莪术;喘促重者,加苏子、杏仁;心悸较重者,加桂枝、龙骨、牡蛎、柏子仁。每日1剂,水煎分别于早晚餐后半小时温服,以2周为1个疗程,治疗2个疗程后统计治疗结果。共治疗28例,其中显效11例,有效14例,

无效 3 例,有效率 89.29%。

吕勇辉. 河南中医, 2004, 24(8): 32

4. 小儿尿道综合征

彭立夫用保元汤治疗小儿尿道综合征 60 例。药物组成: 黄芪 30 克, 人参 15 克, 肉桂 9 克, 甘草 6 克。每日 1 剂, 水煎分 2 次早晚温服。伴小便热赤者加淡竹叶 15 克, 白茅根 30 克; 小腹下坠者加升麻、柴胡各 9 克; 尿痛显著者加元胡、白芍各 12 克; 腰酸不适者加川断 15 克, 山萸肉 12 克; 伴心烦失眠者加焦栀子 10 克, 生地 10 克; 畏寒肢冷者加制附片 10 克。随症加减, 服药期间停用其他神经调节药物。总有效率 95%。

彭立夫. 四川中医, 2003, 21(12): 63

5. 慢性肾功能衰竭

刘卫平等用益肾保元汤治疗慢性肾功能衰竭(脾肾亏虚型)。在常规治疗基础上, 予以益肾保元汤: 黄芪 30 克, 熟地 25 克, 山药 20 克, 白术 20 克, 山茱萸 20 克, 丹参 10 克, 泽泻 10 克, 茯苓 10 克, 大黄 6 克, 山楂 15 克, 麦芽 15 克, 当归 10 克, 赤芍 10 克, 水蛭 10 克, 车前子 20 克, 枸杞子 15 克, 菟丝子 10 克。水煎服, 1 日 1 剂, 分 2 次服。对照组在常规治疗基础上, 口服尿毒清 10 克, 1 日 3 次。结果治疗组与对照组显效率、总有效率分别为 85.9%、71.7% 和 36.7%、26.7%, 治疗组显效率及总有效率明显高于对照组。

刘卫平. 湖南中医学院学报, 2003, 23(3): 56

6. 习惯性流产

张华山用益气保元汤治疗习惯性流产 108 例。药物组成: 生黄芪、潞党参、桑寄生、生谷芽各 30 克, 炒白术 20 克, 升麻 10 克, 炙甘草 5 克, 加减法: 中气虚甚者, 重用黄芪、党参; 脾虚纳减者, 重用白术, 并加怀山药; 少腹坠胀较甚者, 重用升麻, 再加柴胡; 腰酸痛甚或坠痛者, 重用桑寄生, 酌加杜仲、菟丝子; 腹痛者, 加炒白芍、乌梅; 出血量多者, 加阿胶、仙鹤草。10 剂为 1 个疗程, 获效病例服药至 3 个月后, 改为每月服 5 剂, 直至足月。

张华山·浙江中医杂志,2001,36(07):78

痘疗第一百一十五

痘疗,乃痘毒升发不尽,留痘心、肝二经者发之。初生紫点,次日变黑,毒浅者,浮高而润;毒甚者,深陷而焦。其发多出于七朝上下将靨之际,又生于臀、腿、手、足,身温疤润音清者吉;发在肚腹、腰肾,身热色枯声哑者凶。凡见此者,急用针刺疗根,插入蟾酥条,候四边裂缝,疗摇动者,用刀割去,搽玉红膏生肌完口;如针无血,插药干枯不变脓者,终为不治。但此症属有余,首尾俱宜加减鼠粘子汤为要也。

加减鼠粘子汤

加减鼠粘子汤 花粉知母其藏

荆芥山梔甘草 灯心竹叶难忘

鼠粘子 天花粉 知母 荆芥 山梔各六分 甘草三分

水二盅,淡竹叶、灯心各二十件煎服。身热加柴胡、黄芩,有痰加麦冬、贝母,咽哑加玄参、桔梗,咬牙加薄荷、石膏,便秘加蜂蜜、玄明粉,昏愤加黄连、朱砂,痂枯加当归、生地,恋疤加蝉蜕、川芎。

八珍汤(见溃瘍门)

治痘疗落后,气血虚弱,脓水出多,不能生肌收敛,宜服之。

蟾酥条(见疗疮门)

玉红膏(见肿瘍门)

黄水疮第一百一十六

黄水疮于头面、耳项,忽生黄色、破流脂水,顷刻沿开,多生痛痒。此因日晒风吹,暴感湿热,或因内餐湿热之物、风动火生者有之,治宜蛤粉散搽之必愈。

蛤粉散

蛤粉散治黄水疮 脓水沿开痒痛当

石膏黄柏并轻粉 水调敷上即时光

蛤粉 石膏(煨)各一两 轻粉 黄柏(生研)各五钱

共为细末,凉水调搽,冬月麻油调亦好。

真君妙贴散(见肿疡门)

治黄水疮,痒痛脂水亦效。

大人口破第一百一十七

口破者,有虚火、实火之分,色淡、色红之别。虚火者,色淡而白斑红点。甚者陷露龟纹,脉虚不渴;此因思烦太甚,多醒少睡,虚火动而发之,四物汤加黄柏、知母、丹皮、肉桂,以为引导,从治法也。外以柳花散搽之。实火者,色红而满口烂斑,甚者腮舌俱肿,脉实口干;此因膏粱厚味,醇酒炙搏,心火妄动发之,宜凉膈散,外搽赴筵散,吐涎则愈。如口舌生疮,舌干黄硬作渴者,加减八味丸以滋化源。俱禁水漱。

柳花散

柳花散内君黄柏 青黛肉桂柏兼续

冰片加之为末吹 虚阳口破功奇速

黄柏(净末)一两 青黛三钱 肉桂一钱 冰片二分

各为细末,共再研,磁罐收贮,每用少许吹之。

赴筵散

赴筵散内柏芩连 梔子干姜一处攒

细辛加之各等分 吹搽口破即安然

黄连 黄柏 黄芩 梔子 干姜 细辛各等分

为末吹患上。

四物汤(见療癰門)

凉膈散(见咽喉門)

加減八味丸(癰疽潰瘍門)

臭田螺第一百一十八

臭田螺，乃足阳明胃经湿火攻注而成。此患多生足指脚丫，随起白斑作烂，先痒后痛，破流臭水，形似螺靥；甚者脚面俱肿，恶寒发热，先宜甘草汤洗净，贴蟾酥饼，三日三枚，后用珍珠散、猪脊髓调搽膏盖，焮肿上真君妙贴散敷之，其肿渐消。戒便步履。

蟾酥饼（见疔疮门）

珍珠散（见下疳门）

真君妙贴散（见痈疽肿疡门）

牛程蹇第一百一十九

牛程蹇，程途奔急，热脚下水见风，以致气滞血枯，结成顽硬，皮肉荣卫不滋，渐生肿痛；肿高突起，支脚难行，久则破裂，脓水相流。每日温汤净洗，搽牛角散。又有内脓攻注，皮顽难破者，以大线针眠头挑破，出脓乃宽。硬皮敲破者，剪而去之；肉不生者，玉红膏长之；肉满不生皮者，珍珠散搽上，生皮乃愈。

牛角散

牛角散中牛角烧 松香轻粉不相饶

本方加上水龙骨 丑髓相兼好和调

牛角尖 烧灰水 龙骨 松香 轻粉各等分

共为末，牛骨髓调搽。虚弱者，兼服十全大补汤。

玉红膏（见肿疡门）

珍珠散（见下疳门）

僵螂蛙第一百二十

僵螂蛙，多生手指节中，不红不热，肿如蝉腹，乃手少阴痰气凝滞

而生。初起不疼，日久方痛，痛久方腐，肿仍不消，蟾酥饼膏贴，渐作稀脓；近者一载，远者三年，此属体弱者有之。内兼补剂，免变痲瘰之病。

蟾酥饼（见疔疮门）

田螺泡第一百二十一

田螺泡，多生手足，忽如火燃，随生紫白黄泡，此脾经风湿攻注，不久渐大，胀痛不安。浅针皮泄去毒水，太乙膏盖。挑破又生者，内服解毒泻脾汤可愈。

解毒泻脾汤

解毒泻脾汤 牛子 防风 苍术 共山梔

石膏 甘草 黄芩等 木通 灯草 效堪推

防风 牛蒡子 山梔 石膏 黄芩 苍术 甘草 木通 各一钱
水二盅，灯心二十根，煎八分，量病食前后服之。

太乙膏（见肿疡门）

蟾酥条（见疔疮门）

玉红膏（见肿疡门）

皴痛第一百二十二

皴痛，皆起于手足，乃风寒气郁于皮毛，致血不荣于肌表，谓皮槁则多痛，似无皮之状，是皴苦生焉。将患上葱汤浸洗良久，随以润肌膏擦之，就暖勿见风冷自愈。又每久逢冬即发者，须三伏时晒捣烂大蒜，间擦三次，不再发。谓寒因热治，其理甚明矣。

阴虱第一百二十三

阴虱，又名八脚虫。乃肝、肾二经浊气而成。生此银杏散津调擦之；内服六味地黄丸，每斤加蜜炒黄柏一两，芦荟五钱，以清化源，愈后

不发。

银杏无忧散

银杏无忧散麝香 水银轻粉杏仁良

雄黄狼毒并芦荟 一擦何须不笑颜

水银(铅制) 杏仁(去皮、捣膏) 轻粉 雄黄 狼毒 芦荟各一钱

麝香一分

除水银、杏仁膏，余药共碾筛细，入上二味再研匀，先用土菖蒲煎汤洗之；用针挑去虱孔，随用津唾调擦，使药气入内，愈不复生。切忌牛、犬、鳖肉。

六味地黄丸(见肺癰门)

葡萄疫第一百二十四

葡萄疫，其患多生小儿，感受四时不正之气，郁于皮肤不散，结成大小青紫斑点，色若葡萄，发在遍体头面，乃为腑症；自无表里，邪毒传胃，牙根出血，久则虚人，斑渐方退。初起宜服羚羊散清热凉血，久则胃脾汤滋益其内，又有牙根腐烂者，人中白散。

羚羊角散

羚羊角散同知母 黄芩牛子共玄参

甘草麦冬淡竹叶 止血消斑功最灵

羚羊角 防风 麦冬 玄参 知母 黄芩 牛蒡子各八分 甘草

二分

水二盅，淡竹叶十片，煎六分，食远服。

胃脾汤

胃脾汤内甘草陈 麦冬五味共沙参

茯神白术并远志 脉虚有汗服安宁

白术 茯神 陈皮 远志 麦冬 沙参各六分 五味子 甘草各

五分

水二盅，煎六分，食远服。虚弱自汗者，去沙参加人参、黄芪各五分。

人中白散(见口疳门)

百虫入耳第一百二十五

百虫入耳,乃偶然误入之,如蝇、蚊细虫入耳,以麻油数点滴入窍中,虫亦自死取出。如蜈蚣、蜜蜂等大虫入者,以肉炙香安耳边,其虫闻香自出;有虫夜间暗入者,切勿惊慌响叫,逼虫内攻,宜正坐点灯光向耳窍,其虫见光自出,对面有人见,其虫不出。

恶虫叮咬第一百二十六

恶虫乃各禀阴阳毒种而生。见之者勿触其恶,且如蜈蚣用钳,蝎蜂用尾,恶蛇以舌螫人,自出有意附毒害人,必自知其恶也。凡有所伤,各寻类而推治。

蜈蚣咬伤,疼肿骤发。用蟾酥饼磨浓涂伤处,用粗纸捻蘸麻油,点火用烟焰薰之,疼肿自消。又方用雄鸡粪搗水涂之。又方用头垢搽伤处,以捻焰薰之。

蝎有雌雄二种:雄者螫人,痛在一处;雌者痛牵遍体。用井底泥敷痛处,干则易之,一时无泥,取新汲水,以青布随痛处搭之,温则再易。又方五月五日,用黄蜡二两溶化,将凝时投雄黄、朱砂细末各三钱和匀,捏成饼窝,仍用猫儿眼草白汁,端午时滴入窝内阴干,愈久愈佳。复捏成块密收,临用一米许刺针尖上,以灯焰化开,滴正螫之处,其疼即止矣。

蛇毒伤人,用雄黄末、兰叶捣汁,调敷肿上;内用半枝莲捣烂,取汁二两,热酒四两和汁服之。盖汗为效,仍用渣敷伤处亦妙。又方随伤即用端午收采苍耳末五钱,水煎一钟热服,盖汗即安;如无端午收采者,便用常日采取阴干,煎服一两,发汗亦效。

七寸蛇,青色扁形,尖尾短足。红口者毒轻,青口者毒重,以舌螫人,其毒最恶。初螫时,用雄黄末一钱,生矾二钱,杓内溶化,将箸头点药伤处,冷收则易之,连点七次遂愈。毒气入里者,解毒紫金丹酒磨服

一钱，盖汗即愈。迟延毒走肿痛者，麻油焰薰之亦瘥。

河豚毒、血毒中人，舌麻心闷，白茅根捣汁冷饮；子毒中人，昏闷腹胀，口禁难言，金汁解之。非此不能也。

人面疮第一百二十七

人面疮，古言有生者，近世之罕闻矣。其生病异，而受之必异，疮象全似人面，眼鼻俱全，多生膝上，亦有臂患者。……服十全流气饮，外用贝母为末敷之，乃聚眉闭口，次用生肌敛口药，亦可得愈矣。

十全流气饮^①（见流注门）

误吞针铁骨哽咽喉第一百二十八

误吞针刺哽咽痛者，用乱麻筋一团，搓龙眼大，以线穿系，留线头在外汤湿，急吞下咽，顷刻扯出，其针头必刺入麻中同出；如不中节，再吞再扯，以出为度。误吞铜物者，多食荸荠，化坚为软；若吞铁骨之物，肠中不能转送觉坠者，多食青菜、猪脂，自然送入大肠，从粪同出。诸骨哽喉，用玉簪花根八钱，各随所犯之肉为引煎汤服之，转出乃愈。又诸骨哽于咽下，不能外出者，乌龙针推之，骨下则安矣。

乌龙针：治骨哽于咽下难出者。用细铁线烧软，双头处用黄蜡作丸龙眼大，裹铁丝头上，外用丝绵裹之，推入咽内哽骨处，其骨自然顺下矣，不下再推。

又方治诸骨哽喉，玉簪花根切片煎汤漱之，徐徐吐出，其骨自软，再用干饭咽之自下。

中砒毒第一百二十九

砒毒者，阳精大毒之物，服之令人脏腑干涸，皮肤紫黑，气血乖逆，

① 十全流气饮：流注门无此方，疑为“疮科流气饮”。

败绝则死。初服知觉早者，大兰根叶捣汁灌之，轻则可解。无兰处，以生绿豆同水研烂，以水灌之，多则为效；如不解者，以金汁灌之必苏。苏后如颠不语者，每日以绿豆水饮之，毒尽则愈。

取金汁法：用大毛竹一连二节，用刀劈去外青一半，用砖扎节中，沉入大粪池内，一年后取起，以长流水浸一日，取起钻开节孔，内蓄粪清，磁罐收贮。凡遇有中砒毒、河豚，伤寒阳毒发狂、疔疮、痧症，毒气入里，烦躁口干，渴欲饮水，脉大有力者，并宜此药。

落下颏拿法第一百三十

落下颏者，气虚之故，不能收束关窍也。患者平身正坐，以两手托住下颏，左右大指入口内，纳槽牙上，端紧下颏，用力往肩下捺开关窍，向脑后送上；即投关窍，随用绢条兜颏于顶上半时许，去之即愈。

救自刎断喉法第一百三十一

自刎者，乃迅速之变，须救在早，迟则额冷气绝，必难救矣。初刎时，气未绝，身未冷，急用丝线缝合刀口，掺上桃花散，多掺为要；急以棉纸四、五层，盖刀口药上，以旧布裹脚，将头抬起，周围缠绕五、六转扎之。患者仰卧，以高枕枕在脑后，使项郁而不直，刀口不开，冬夏避风，衣被覆暖，待患者气从口鼻通出，以姜五片，人参二钱，川米一合煎汤，或稀粥每日随便食之，接补元气。三日后，急手解去前药，用桃花散掺刀口上，仍急缠扎，扎二日，急用浓葱汤软绢蘸洗伤处，挹干，用抿脚挑玉红膏，放手心上下擦化，搽于伤口处，再用旧绵花薄片盖之，外用长黑膏贴裹，周围交扎不脱，近喉刀口两傍，再用黑膏长四寸，阔二寸，竖贴膏上，两头沾贴好肉，庶不脱落；外再用绢条围裹三转，针线缝头，冬月三日，夏月二日，每用葱汤洗挹换药，自然再不再疼痛，其肉渐从两头长合。内服八珍汤调理月余，如大便结燥，用猪胆套法，不可利药利之；又颏俱断者，百日单断者，四十日必收功完口。此法曾治强盗郭忠，皂隶沙万，家人顾兴，俱双颏齐断将危者，用之全活。单颏伤断者

十余人，治之俱保无虞矣。

桃花散（见跌扑门）

玉红膏（见肿疡门）

如圣金刀散（见金疮门）

八珍汤（见溃疡门）

阴毒第一百三十二

阴毒乃纯阴无阳，被天时寒冷肃杀之气，侵入肌肤，沉于骨髓，致气不能升，血不能行，凝滞经络，疼痛切骨。初起不肿不热，朝轻暮重；久则作肿渐红，烂斑黑靨，臭水淋漓，秽气熏蒸，腐烂渐开，终久必死。

一人年三十岁，冬月隔沟与邻妇私交，房事方毕，忽妇夫回，慌忙隔沟赴水而走，热身受寒。五日后，小腹、大臀阴痛不肿，日夜响叫，至一月后，谷道傍生一烂斑，黑靨倒陷，诸药不效；至半月大臀连黑，腐烂作臭，干靨无脓；十日大脏俱坏，黑败而死也。又一人年四十岁，夏月好饮火酒，至夜赤身露卧，手膊连背阴疼难忍，一月后肩发烂斑一块，周围微硬，色如红枣，日渐延开，半月后手膊、半背共成黑靨，臭秽不堪，一月不食而死。一人中年肥胖，亦冬夏好饮火酒，饮后随吃凉水，方卧一日，颈项作疼微肿，坚硬如石，二月外项大如头，石硬不热，此阴毒也，辞不可治。后请别医治之，项同身大乃异症，不食而死……

失荣症第一百三十三

失荣者，先得后失，始富终贫，亦有虽居富贵，其心或因六欲不遂，损伤中气，郁火相凝，隧痰失道停结而成。其患多生肩之以上，初起微肿，皮色不变，日久渐大，坚硬如石，推之不移，按之不动；半载一年，方生阴痛，气血渐衰，形容瘦削，破烂紫斑，渗流血水。或肿泛如莲，秽气熏蒸，昼夜不歇，平生疙瘩，愈久愈大，越溃越坚，犯此俱为不治。予立二方，曾治数人，虽不获全愈，而不夭札速死者，诚缓命药也。

和荣散坚丸

和荣散坚归地参 茯陈术附贝南星

丹酸远柏并龙齿 芦荟朱砂与角沉

治失荣症坚硬如石,不热不红,渐肿渐大者服。

归身 熟地 茯神 香附 人参 白术 橘红各二两 贝母 南星 酸枣仁 远志 柏子 仁丹皮各一两 龙齿一对(煨。无龙齿,鹿角尖二两煨代之) 芦荟 角沉各八钱 朱砂六钱(为衣)

上为细末,炼蜜丸桐子大,每服八十丸,食后用合欢树根皮煎汤送下。患者若改往从新,淡薄甘命,其中有得愈者,十中一二,否则难脱然也。

飞龙阿魏化坚膏

治失荣症及癭瘤、乳岩、瘰癧、结毒,初起坚硬如石,皮色不红,日久渐大,或疼不疼,但未破者,俱用此贴。

用蟾酥丸药末一料,加金头蜈蚣五条,炙黄去头足研末,同人熬就,乾坤一气膏二十四两化开搅和,重汤内顿化;红缎摊贴,半月一换,轻者渐消,重者亦可停止,常贴保后无虞矣。

试知百病死生法第一百三十四

死生非神圣不能洞其机关,疾病无名医亦不能决其凶吉。否则,使人疑或决断不常,予异授吕祖一枝梅,真仙方也,不敢私秘,一例刊注,以传概世云。

吕祖一枝梅

堪羨吕祖一枝梅 巴豆蓖仁灵脂随

雄麝银朱砂胭脂 识死知生不改移

治大人男妇、小儿、新久诸病生死难定之间,用药炭实大一饼,贴印堂之中,点官香一枝,香尽去药,以后一时许,药处有斑晕色肿气飞散,谓红霞捧日,病虽危笃,其人不死。如贴药处一时后,无肿无红,皮肉照旧不变,谓白雪漫野,病虽轻浅,终归冥路。小儿急、慢惊风,一切

老幼痢疾,俱贴之,红肿即愈。此方用之,可预知生死也。

朱砂三钱 银朱一钱五分 五灵脂三钱 麝香二分 蓖麻仁五分 雄黄 巴豆仁各五钱(不去油)

上各研细,于端午日净室中午时共研,加油胭脂为膏,磁盒收藏。勿经妇女人手。临用豆大一圆捏饼贴印堂中,其功立见,用过饼送入河中。

仙方活命饮今古不同论第一百三十五

古人朴实,其七情干涉者少,而从风、寒、暑、湿外感凝滞者多。故设仙方活命饮攻散所滞之肿,服此得效者十常八九,乃患者五脏不虚耳。今人穿凿太过,七情烦扰之甚,而内脏无有不伤,每见此症,曾服过此药,其疮必不起发,脾胃再无不损。若疮不起发,脾胃伤败,患者岂有得生,至此自干天命。今之治法,不论首尾标本,先必固脾胃,次行托药,谓本立而道生,病无不活,予见如此,幸同道者察焉。

仙方活命饮的临床新用

1. 阳症肿疡

张树军等用仙方活命饮治疗40例阳症肿疡获效。药物由白芷、浙贝母、防风、赤芍、当归尾、炒皂角刺、炙山甲、天花粉、生甘草梢、乳香、没药各3克,金银花、陈皮各9克组成。用药至病人痊愈。治疗组局部红、肿、热、痛情况改善优于对照组。

张树军,等. 中国实验方剂学杂志,2005,11(2):48

2. 输卵管阻塞性不孕症

高雪等用仙方活命饮配合输卵管通液术治疗输卵管阻塞性不孕症33例。药物组成:金银花21克,当归12克,赤芍12克,皂角刺12克,穿山甲12克,乳香9克,没药9克,白芷9克,贝母9克,防风9克,天花粉6克,陈皮6克,甘草6克。1日1剂,每周5剂,周末停药,经期

停药,并且月经干净3~5天行输卵管通液术,每月1次,3个月经周期为1个疗程。总有效率93.94%。

高雪,等. 中国中医药科技,2001,8(5):324

3. 颌下腺炎

王俊录用仙方活命饮治疗颌下腺炎43例。处方:双花12克,防风9克,白芷12克,当归12克,赤芍15克,浙贝6克,乳香6克,没药6克,穿山甲6克,皂刺6克,生甘草3克。冷水煎频服,1日1剂,小儿量减半。合并腮腺炎者加瓜蒌、黄连、紫花地丁、柴胡;口腔感染加大青叶、板蓝根、贯众;面部疖肿者加黄芩、川芎、蒲公英等;有硬结者可配合外敷白降丹,总有效率97.7%,服药最短者2天。

王俊录. 陕西中医函授,2001,(1):21

4. 脑肉芽肿

罗华玉用仙方活命饮加减治疗脑肉芽肿16例。药物组成:双花、连翘、黄芪各30克,皂刺、川贝、全蝎、白芷、穿山甲各10克,夏枯草20克,蜈蚣2条。口干渴加沙参30克,葛根20克;抽搐加钩藤20克,茯苓15克,天麻、胆南星、防己各10克;发烧加柴胡10克,生地30克。水煎服。1日1剂。总有效率达87.5%。

罗华玉. 四川中医,2001,19(2):26

5. 慢性胆囊炎

杨华用仙方活命饮治疗慢性胆囊炎85例。药物组成:金银花、当归、赤芍、大贝母、天花粉各15克,防风、白芷、陈皮、皂角刺各10克,制乳没、炮山甲、甘草各6克。加减:实热型用原方加大黄、生薏苡仁、金钱草、焦栀子等;瘀血型用原方加生山楂、桃仁、丹参;胁胀甚者加香附子、川楝子。每日1剂,煎2次取汁500毫升,分2次于饭后2小时服下。连服1月为1个疗程,B超复查。总有效率97.6%。

杨华. 河南中医,2001,21(4):39

6. 寻常痤疮

陈月嫦用仙方活命饮治疗寻常痤疮50例。药物组成:银花、浙贝各15克,白芷、当归、穿山甲、皂角刺、防风、天花粉各10克,苡仁20

克,枇杷叶、赤芍各12克,甘草6克。1日1剂,温服,连服6天,停药1天,再服6天。总有效率90%。

陈月嫦. 实用中医药杂志, 2004, 20(7): 366

7. 肛痛

李立用仙方活命饮治疗肛痛72例。药物组成:白芷、浙贝母、防风、赤芍、当归、皂角刺、穿山甲、天花粉、陈皮各15克,甘草6克,乳香、没药各9克,金银花30克。红肿热痛较甚加黄芩、黄连、黄柏;大便实加大黄;苔黄腻加苦参;疼痛较甚加元胡;肿胀甚加荆芥。1日1剂,水煎服,1日2次。药渣再煎500毫升,先熏后洗,或用毛巾蘸药汁趁热敷患处。总有效率91.67%。

李立. 实用中医药杂志, 2002, 18(10): 10

8. 乳腺增生病

申延琴用仙方活命饮加减治疗乳腺增生病40例。方中重用皂角刺、炒甲珠两味通行经络的药物,再加以疏肝理气之品。药用:皂角刺40克,炒甲珠20克,贝母、花粉、当归尾、赤芍、陈皮、金银花各20克,乳香、没药、川芎、青皮、甘草各10克,郁金、香附、延胡索、川楝子各20克。水煎,1日1剂,分2次早晚服。30天为1个疗程,视病情可连服3个疗程。总有效率为97.5%。

申延琴. 中医药学报, 2003, 31(2): 39

9. 急性附睾炎

孙自学用仙方活命饮加减结合西药治疗急性附睾炎42例。中药组和对照组均以头孢噻肟钠针剂2克加入生理盐水250毫升中静脉滴注,连续使用14天,前3天所有患者均静脉滴注地塞米松10毫克。中药组加服仙方活命饮加减:金银花30克,皂角刺12克,连翘15克,浙贝母10克,玄参15克,土茯苓15克,生大黄10克,赤芍12克,炒山甲5克,制乳香5克,制没药5克,川楝子10克,生甘草10克。治疗开始前3天,每天1剂,水煎服,药渣待凉后再敷患处,后3天上药方加三棱12克,莪术12克,生牡蛎30克,每天1剂水煎服,并用药渣热敷患处,两组均14天为1个疗程,治疗1个疗程观察疗效。结果:治疗组

42例,痊愈31例,显效9例,有效2例;对照组30例,痊愈12例,显效15例,有效3例。

孙自学. 中国中西医结合杂志,2003,23(3):169

10. 炎性突眼

郑宏飞用仙方活命饮治疗炎性突眼20例。服药剂数视眼部具体情况而定,7天为1个疗程,一般治疗2~4个疗程,剂量视年龄及患者体质而定,一般15岁以下者减量或减半。处方:银花30克,天花粉12克,防风、白芷、当归尾、陈皮、皂角刺、贝母、制乳香、制没药、炮山甲、赤芍、生甘草各10克。若眼部红肿、疼痛剧烈,减白芷、陈皮至6克,加蒲公英20克,夏枯草、蔓荆子各10克;便秘加酒大黄、枳壳各10克;舌红偏绛、高热头痛,去防风、白芷,加生地15克,丹皮、黄连各10克,若服药1~2个疗程后,眼部红肿、疼痛已消,但仍有上睑下垂、瞳孔散大,或有口干神疲,脉虚者,改拟益气养阴、疏风散瘀法治疗,方用还睛丸加减。总有效率100%。

郑宏飞. 浙江中医杂志,2002,37(2):62

11. 小儿乳蛾

鲁艳芳用仙方活命饮化裁治疗小儿乳蛾30例。治疗组药用:银花、花粉、板蓝根各15克,防风、赤芍、白芷、皂角刺、浙贝、连翘、蝉衣各10克。发热、恶寒、无汗者加荆芥10克,大便干结者加生大黄10克,热甚者加生石膏15克。抗生素的用法同对照组。对照组:每日静滴青霉素及氨苄青霉素1次,常规剂量。患者体温超过39.5℃者,均以临时退热处理。结果治疗组退热、咽痛消失及喉核肿大减轻的时间短于对照组。

鲁艳芳. 湖北中医杂志,1999,21(5)

拾遗症第一百三十六

拾遗者,因条款分门遗失,未及细详,但本病立门以正病为主,而从病故有失焉。今查补注,以便观治之。

鼻疔生于鼻内，痛引脑门，不能运气，胀塞鼻窍，甚者唇腮俱肿。牙疔生于牙缝之中，顶高突起；痛连腮项，破则流血。黑疔生于耳窍之内，黑硬腐烂，破流血水，疼及腮颧。以上之症，俱先针刺，次行发汗，仍照疔类调治。

喉痈生于咽外正中，肿痛妨碍饮食，红肿发热，必欲溃脓，软而胀痛者针之；内服补托之药，玉红膏搽贴，长肌完口。又有腐溃内通，汤水随孔出者，曾治数人，俱亦无妨。

疔疽生在膊上，连肩通肿，长坚而硬。兑疽生在当手动脉之处，肿痛寒热，痛彻手膊，举动不便。凤眉疽发在两目之间，形长皮赤，痛动脑户，二目合缝，光肿发热。透脑疽发在额上发际之间，多发寒热，头疼如斫，不可忍耐，先用万灵丹发汗、解散风邪，次宜清托。附阴疽生在踝上三寸，痛连阴子，小腹亦痛。玄疽生于左腿夹缝之下三寸，初生小泡，渐生赤肿，破流血水，痛亦彻骨，不能步履。咬骨疽发在大腿内股，不肿不红，痛彻骨髓，初宜雷火针针之，内服万灵丹酒调服效。阴疽生于右腿夹缝之下三寸，漫肿连阴子，小腹亦痛。玄疽生于左腿夹缝下三寸，漫肿连阴，疼及大腿。渊疽发在胁下，初起不红坚硬，久则破溃，有声如婴儿啼状，膏盖，无声去膏，仍有异哉难治，晒不能也。玉枕疽生在脑后枕骨中，坚而难溃，痛引肩项，鼻塞气粗，此太阳膀胱湿热凝滞而成。大抵以上之症，有名而生者鲜矣。初起有表症者便宜解表，有里症者即与通利，溃后宜补托，久则宜收敛，此为一定治法。不可混乱妄投药饵，致其危亡也。

唇风第一百三十七

唇风，阳明胃火上攻，其患下唇发痒作肿，破裂流水，不疼难愈。宜铜粉丸泡洗，内服六味地黄丸自愈。

铜粉丸

铜粉丸中官粉矾 轻粉铜青与麝香
黄连膏子同冰片 烂眼唇风并不难

铜青五钱 官粉三钱 明矾一钱五分 轻粉一钱五分 麝香一分五厘
冰片一分二厘 黄连二两(切片煎稠膏)

上共为细末,黄连膏丸如芡实大,每用一丸,汤泡纸盖,每洗顿热,上面清水勤洗之,其患自愈。

绷缚背疮第一百三十八

至于发背、对口、大疮等疾,已溃流脓时,冬夏宜绢帛四、五层,放贴膏药,外再用绵布见方八寸四角,用蛇皮细带缠之,安盖绢上,以带扎在前胸绷实疮上,庶使疮中暖气不泄,易于腐溃。洗疮时预备二绷更换,务要患内暖气烘烘,此法最善,故亦补之。

痈疽内肉不合法第一百三十九

痈疽、对口、大疮内外腐肉已尽,惟结痂脓时,内肉不粘连者,用软绵帛七八层放患上,以绢扎紧,将患处睡^①实数次,内外之肉自然粘连一片,如长生成之肉矣。有患口未完处,再搽玉红膏,其肉自平矣。

炼玄明粉法第一百四十

冬至后,用洁净朴硝十斤,用水一斗五升,白萝卜五斤打碎,同硝入锅内煮化,候汤滚足,捞去萝卜;将竹丝箕以绵纸二层摊铺箕内,架在新缸上,以硝汤徐入箕内,候折再添以汤,滤尽为度。将缸搭在天井露三日,其硝结在缸边,倾去余水,沥干为止。将硝取下,再用砂锅顿炭炉上,将硝一碗化开煎滚,以铜匙铲搅,将成凝结时,铲入小鱼酢罐内,上空寸许,再下硝炼;如此已毕,每一罐下用三钉品字样钉入土地,上留寸半在外,将罐浮顿钉头上,用瓦片盖口,周围用段砖砌围绕,离

① 睡:疑作“锤”。

罐寸半许，将着炭火入炉内，四围底火顶火，一概相护，候罐硝红为度。次日取出硝来，预用大绵纸摊在洁净阴土地上，将硝碾细，用绢筛筛在纸上一钱厚，再不许多，将门榻俱已关闭，不许与人见之；三日后，其硝自然复活，色白如粉，轻虚成片，将钵盛收、纸盖之，上再用乱纸寸许以收潮气，庶不凝结。此品最能降火化痰，清利脏腑，怪症服之可蠲，狂躁用之即愈；搜除百病，安敛心神。况此服之，不伤元气，惟久病泻痢者不宜。大人每服三四钱，小儿五分至一钱皆可，俱用白滚汤或葱汤空心化服。候行二三次，随饮稀粥，自然爽健，精神调和，脏腑津液顿生，百病如失。又煨过硝石六两，加朱砂三钱，青黛一钱，冰片一钱五分，共碾细末，照前筛纸上，再用纸盖一层，四边以戒尺压紧，勿令走气，候三日外取起密收，又名阳春紫雪。最治失心忘志，癫痫健忘，小儿急惊，大人异症，每服五分至一钱，俱用淡竹叶、灯心汤化服，屡有奇效，不可尽述。玄明粉乃神仙保命，服食每一斤加生熟甘草末一两，葱汤化服二、三钱，令人悦泽容颜，轻身耐老矣。

取红铅法第一百四十一

女子十四岁而天癸至，此阴中之真阳，气血之元稟。遇此将行时，两腮先若桃花之状，阳献阴藏，其经只在半月之里必来。预用白绵绸一尺五寸，洗净，时常用绵带一条束脐下，绵绸两尖头前后系带上，中间常兜阴器，小便解一头，便罢即系之。经至尽绸上，取初至红铅一颗，大如鱼眼，红色明亮如珠，此为接命至宝，随与酒一杯和服，一时后如醉不醒，只以人乳饮之，一日后自苏，以后能绝房事者，延寿一纪。余经换绸兜取，阴干浸上白童便内片时，其经自然脱下，以置磁盘内，阴干听用。如不升炼者，谓之垒红铅，亦可补益虚劳，接续命脉。如次经以后，但未破身者，俱可取聚阴干，磁盘升炼，色如紫霜一般，合入三元丹内，人乳服之，接命长年，却除百病。此方神秘不宜轻泄，故不可传，但取红铅之女，生平爱惜，饱暖适时，无拘束为上。

炼金顶砒法第一百四十二

用铅一斤，小罐内炭火煨化，投白砒二两于化烊铅上炼，烟尽为度；取起冷定打开，金顶砒结在铅面上，取下听用。

炼硝石法第一百四十三

用洁净朴硝半斤，罐内炭火熔化，煎干煨红，住火冷定，取出即成硝石，罐收听用。利实火、不利虚火也。

取蟾酥法第一百四十四

用蟾不拘大小，其酥俱有。用阔铜镊镊蟾眉棱高肉上微紧，拨出酥来，凝聚镊里，多则刮下，阴干听用。其取过之蟾，避风二日，仍送青草园中，自然不伤其生；如取之便见风，下水俱成破伤风，颠狈而死。

制附子法第一百四十五

大附子一两之外方用，随数几枚，以童便浸三寸，每日换便，浸至夏三、冬五，更换童便，煮尽二香为度，去皮脐，线穿阴干，或日中晒硬亦可，收藏听用。

升白灵药法第一百四十六

水银二两，用铅一两化开，投入水银听用。火硝二两，绿矾二两，明矾二两，共碾为末，投入锅内化开，炒干同水银碾细，入泥护阳成罐内，上用铁盏盖之，以铁梁、铁兜左右，用烧熟软铁线上下扎紧，用紫土盐泥如法固口，要烘十分干燥为要，架三钉上，砌百眼炉，先加底火二寸，点香一枝，中火点香一枝，顶火点香一枝；随用小罐安滚汤在旁，以

笔蘸汤搽擦盏内，常湿勿干。候三香已毕，去火罐，待次日取起，开出药来，如粉凝结盏底上，刮下灵药，收藏听用。凡疮久不收口，用此研细掺上少许，其口易完。若入于一概收敛药中，用之其功奇甚捷。

制寒食面法第一百四十七

用白面一斤，外再以面半斤调稠厚，捏成薄片二块，将前面包合于中。周围捏紧合口。于清明正日，蒸熟挂透风处阴干，用面包藏，勿经女手，越久越效。

制炒诸药第一百四十八

前方诸药，未注炮炙，今开于后，凡药必遵雷公炮炙，入药乃效。如未制，生药入煎，不为治病，反为无益，譬如人食肴饌，不用烹炮，生食者岂不害人，当熟思之。

人参润色明亮、坚实为主，轻脆不堪

天门冬汤泡，去心

生地黄酒浸

白术米泔浸，炒

黄芪蜜水拌，炒

酸枣仁炒，研

五味子炒，研

牛膝酒洗

当归酒洗

白蒺藜去刺

香附童便浸，炒

黄芩酒炒

龙胆草酒炒

瓜蒌仁去壳，去油

陈皮去白

麦门冬去心

熟地黄酒蒸

苍术米泔浸，炒

甘草消毒生用，补托炙熟

远志汤泡，去心，微炒

肉苁蓉去鳞，酒洗

破故纸炒

白芍微炒黄色

元参去根

柴胡去芦

黄连解毒生用，止呕姜汁拌炒

知母盐水拌，炒

贝母去心

桔梗微炒

- 防风去芦
 附子童便浸煮
 川乌汤泡,去皮
 巴戟汤泡,去心,微焙
 威灵仙去根
 三棱汤泡
 大黄实人生用,虚人炙用
 昆布酒洗,切丝
 王不留行炒,碾
 连翘去梗,碾
 牵牛生用,炒用
 肉桂去粗皮
 枸杞子去蒂
 山梔碾,炒焦
 山茱萸去核
 桑皮蜜水拌,炒
 乳香去油,为末
 枳壳麸皮炒
 巴豆去油为霜
 五倍子去蛀,末,炒
 山楂去核
 杏仁泡去皮尖,微炒
 石膏煨,碾末
 硫黄去脚
 硼砂白色透明
 自然铜醋煨七次
 龙骨生用,煨用
 麝香去毛皮
 羚羊角镑末
 蜂蜜炼去白沫
 干姜炒黑
 半夏姜汁水煮
 草乌汤泡,去皮尖
 南星煨,有为末入牛胆内者
 仙茅米泔浸蒸,去皮
 泽泻蒸
 海藻酒洗
 牡丹皮去枯
 牛蒡子炒,碾
 金银花去梗叶
 地骨皮去梗
 茯苓去匏粗皮
 琥珀布包捶碎,灯心同碾,研如面细
 黄柏盐水拌,炒
 杜仲盐水拌,炒,断丝
 辛荑去蒂
 没药去油,为末
 厚朴姜汁制炒
 皂荚去皮弦,子煨
 莲肉泡去皮心
 桃仁泡去皮尖
 芒硝提净
 雄黄透红明亮
 硃砂净明洁白
 砒霜白色明亮者,有生、煨两用
 黄丹水飞,炒紫
 牛黄轻虚色黄
 犀角镑末
 龙齿煨,存性
 蝉蜕去土

斑蝥川米炒，去翅足

僵蚕去丝，微炒

全蝎酒洗去毒

蜈蚣炙去头足

蚯蚓翻去腹土

田螺去壳，晒干

牡蛎煨，研

石决明煨

珍珠豆腐内煮数滚，布包捶碎，同灯心碾末

人中白煨，研

红铅法注末卷

以上药品，凡本书内应用制、炒、炮、炙者录之，不炮炙者未录。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名 = 外科正宗精要

作者 = 张斌仁，孟颖霞主编

页数 = 365

SS号 = 12013361

出版日期 = 2008 . 4

封面
书名
版权
前言
目录
卷之一

痈疽门.....	
痈疽原委论第一.....	
.....	
痈疽治法总论第二.....	
痈疽阳症歌第三.....	
痈疽阴症歌第四.....	
痈疽半阴半阳症歌第五.....	
.....	
痈疽五善歌第六.....	
痈疽七恶歌第七.....	
治病则例歌第八.....	
痈疽灸法并禁灸疮穴第九.....	
论病生死法第十.....	
察形色顺逆第十一.....	
病有三因受病主治不同论第十二.....	
.....	
调理须知第十三.....	
杂忌须知第十四.....	
疮疡看法.....	
肿疡治法.....	
痈疽治验.....	
肿疡主治方.....	
托里消毒散的临床新用.....	
透脓散的临床新用.....	
如意金黄散的临床新用.....	
冲和膏的临床新用.....	
生肌玉红膏的临床新用.....	
溃疡治法.....	

	溃疡主治方.....
	十全大补汤的临床新用.....
	八珍汤的临床新用.....
	补中益气汤的临床新用.....
	人参养荣汤的临床新用.....
	圣愈汤的临床新用.....
	独参汤的临床新用.....
	香砂六君子汤的临床新用.....
	清震汤的临床新用.....
	痈疽诸症疮名十律.....
卷之二	上部疽毒门.....
	脑疽论第十五.....
	脑疽看法.....
	脑疽治法.....
	脑疽治验.....
	脑疽主治方.....
	脑疽应用方.....
	疗疮论第十六.....
	疗疮看法.....
	疗疮治法.....
	疗疮治验.....
	疗疮主治方.....
	黄连解毒汤的临床新用.....
	疗疮应用方.....
	脱疽论第十七.....
	脱疽看法.....
	脱疽治法.....
	脱疽治验.....
	脱疽主治方.....
	脱疽应用方.....
	瘰癧论第十八.....
	瘰癧看法.....
	瘰癧治法.....

.....	瘰癧治验.....
	瘰癧主治方.....
	逍遥散的临床新用.....
	瘰癧应用方.....
	鬘疽论第十九.....
	鬘疽看法.....
	鬘疽治法.....
	鬘疽治验.....
	鬘疽主治方.....
	鬘疽应用方.....
	咽喉论第二十.....
	咽喉看法.....
	咽喉治法.....
	咽喉治验.....
...	
	咽喉主治方.....
	苏子降气汤的临床新用.....
	冰硼散的临床新用.....
	咽喉应用方.....
	时毒论第二十一.....
	时毒看法.....
	时毒治法.....
	时毒治验.....
	时毒主治方.....
	通气散的临床新用.....
	时毒应用方.....
	瘰癧论第二十二.....
	瘰癧看法.....
	瘰癧治法.....
	瘰癧治验.....
	瘰癧主治方.....
	瘰癧应用方.....

	肺痈论第二十三
	肺痈看法
	肺痈治法
	肺痈治验
	肺痈主治方
.....	
卷之三	肺痈应用方
	下部痈毒门
	流注论第二十四
	流注看法
	流注治法
.....	
	流注治验
.....	
	流注主治方
	木香流气饮的临床新用
	流注应用方
	乳痈论第二十五（附：乳岩）
.....	
	乳痈乳岩看法
	乳痈乳岩治法
	乳痈治验
	乳痈主治方
	乳痈应用方
	附骨疽第二十六（附：鹤膝风）
.....	
	附骨疽看法
	附骨疽治法
	附骨疽治验
	附骨疽主治方
	附骨疽应用方
	肠痈论第二十七
.....	

	肠痈看法.....
	肠痈治法.....
...	
	肠痈治验.....
	肠痈主治方.....
	大黄汤的临床新用.....
.....	
	失笑散的临床新用.....
	肠痈应用方.....
	脏毒论第二十八.....
	脏毒看法.....
	脏毒治法.....
	脏毒治验.....
	脏毒主治方.....
	脏毒应用方.....
	痔疮论第二十九.....
	痔疮看法.....
	痔疮治法.....
	痔疮治验.....
...	
	痔疮主治方.....
	生肌散的临床新用.....
	痔疮应用方.....
	下疳论第三十.....
	下疳看法.....
	下疳治法.....
...	
	下疳治验.....
	下疳主治方.....
	清心莲子饮的临床新用.....
	八正散的临床新用.....
	珍珠散的临床新用.....
	下疳应用方.....

鱼口便毒论第三十一	
鱼口便毒看法	
鱼口便毒治法	
鱼口便毒治验	
鱼口便毒主治方	
鱼口便毒应用方	

.....

囊痈论第三十二	
囊痈看法	
囊痈治法	
囊痈治验	
囊痈主治方	
囊痈应用方	
悬痈论第三十三	
悬痈看法	
悬痈治法	
悬痈治验	
悬痈主治方	
悬痈应用方	
臀痈论第三十四	
臀痈看法	

...

臀痈治法	
臀痈治验	
臀痈主治方	
臀痈应用方	
杨梅疮论第三十五	
杨梅疮看法	
杨梅疮治法	
杨梅疮治验	
杨梅疮主治方	
杨梅疮应用方	
结毒论第三十六	

	结毒治验.....
	结毒主治方.....
	结毒应用方.....
...	
	多骨疽论第三十七.....
.....	
	多骨疽治验.....
	多骨疽主治方.....
	多骨疽应用方.....
卷之四	杂疮毒门.....
	阴疮论第三十八.....
	阴疮治验.....
	阴疮主治方.....
	阴疮应用方.....
	伤寒发颐第三十九.....
	痼发第四十.....
	瘰疽第四十一.....
	小腹痛第四十二.....
	鹤口疽第四十三.....
...	
	龙泉疽虎须毒第四十四.....
	石榴疽第四十五.....
	穿踝疽第四十六.....
.....	
	大麻风第四十七.....
	苦参丸的临床新用.....
	翻花疮第四十八.....
	腋痈第四十九.....
	胁痈第五十.....
	鼻痔第五十一.....
	骨槽风第五十二.....
	紫白癰风第五十三.....
	齿病第五十四.....

.....

脑漏第五十五.....	
破伤风第五十六.....	
跌扑第五十七.....	
金疮第五十八.....	
杖疮第五十九.....	
汤泼火烧第六十.....	
甲疽第六十一.....	
茧唇第六十二.....	
痞癖第六十三.....	
天蛇毒第六十四.....	
头痛第六十五.....	
合谷毒第六十六.....	
鼻出血第六十七.....	
牙缝出血第六十八.....	
清胃散的临床新用.....	
血箭血瘰第六十九.....	
鹅掌风第七十.....	
肾囊风第七十一.....	
疥疮论第七十二.....	
消风散的临床新用.....	
当归饮子的临床新用.....	
臃疮论第七十三.....	
血风疮第七十四.....	
顽癣第七十五.....	
脓窠疮第七十六.....	
蛇床子散的临床新用.....	
冻风第七十七.....	
火丹第七十八.....	
天泡第七十九.....	
肺风粉刺酒渣鼻第八十.....	
雀斑第八十一.....	
油风第八十二.....	

白屑风第八十三.....
耳病第八十四.....
漆疮第八十五.....
竹木刺第八十六.....

.....

瘰癧疮第八十七.....
苦参汤的临床新用.....
疥腮第八十八.....
痰包第八十九.....
加味二陈汤的临床新用.....
癩风第九十.....
湿肿第九十一.....
咬伤第九十二.....
疯犬伤第九十三.....
女人面生黧黑斑第九十四.....
纽扣风第九十五.....
枯筋箭第九十六.....
妇人脚丫作痒第九十七.....
手足破裂第九十八.....
眼丹第九十九.....

.....

黑子第一百.....
眼胞菌毒第一百零一.....
体气第一百零二.....
白秃疮第一百零三.....

.....

奶癖第一百零四.....
蟾拱头第一百零五.....
小儿遗毒烂斑第一百零六.....
蜈蚣串第一百零七.....
小儿痘风疮第一百零八.....
小儿赤游丹第一百零九.....
升麻葛根汤的临床新用.....

走马疳第一百一十.....
重舌第一百一十一.....
黄连泻心汤的临床新用.....
胎瘤第一百一十二.....
鹅口疮第一百一十三.....
痘痛第一百一十四.....
保元汤的临床新用.....
痘疗第一百一十五.....
黄水疮第一百一十六.....
大人口破第一百一十七.....
臭田螺第一百一十八.....
牛程蹇第一百一十九.....
僵螂蛀第一百二十.....
田螺泡第一百二十一.....
皱痛第一百二十二.....
阴虱第一百二十三.....
葡萄疫第一百二十四.....
百虫入耳第一百二十五.....

.....
恶虫叮咬第一百二十六.....
人面疮第一百二十七.....
误吞针铁骨哽咽喉第一百二十八.....

.....
中砒毒第一百二十九.....
落下颏拿法第一百三十.....
救自刎断喉法第一百三十一.....
阴毒第一百三十二.....
失荣症第一百三十三.....
试知百病死生法第一百三十四.....

...
仙方活命饮今古不同论第一百三十五.....

.....
仙方活命饮的临床新用.....

拾遗症第一百三十六.....
唇风第一百三十七.....
绷缚背疮第一百三十八.....
痈疽内肉不合法第一百三十九.....

...

炼玄明粉法第一百四十.....
取红铅法第一百四十一.....
炼金顶砒法第一百四十二.....
炼硝石法第一百四十三.....
取蟾酥法第一百四十四.....
制附子法第一百四十五.....
升白灵药法第一百四十六.....
制寒食面法第一百四十七.....
制炒诸药第一百四十八.....