

中医古籍临床新用丛书

疡医大全精要

原著
清·顾世澄

丛书主编 ■ 余瀛鳌 卢祥之
本册主编 ■ 赵 勇 李明奎



贵州科技出版社



责任编辑：熊兴平

封面设计：张 彪

ISBN 978-7-80662-529-3



9 787806 625293 >

ISBN978-7-80662-529-3/R·148定价：32.00元

中医古籍临床新用丛书

疡医大全精要

原著 清·顾世澄

丛书主编 ■ 余瀛鳌 卢祥之

本册主编 ■ 赵 勇 李明奎



《中医古籍临床新用丛书》编委会

主 编	编：	余瀛鳌	卢祥之	
	委：	杜惠芳	李庆生	王宏芬
		李文泉	卢祥生	王仁娟
		赵英鹏	陈晓雷	汤楠
		李薇	杨果	齐放
		宋孝瑜	常德增	张东杰

贵州科技出版社



图书在版编目(CIP)数据

疡医大全精要/赵勇,李明奎主编. —贵阳:贵州科技出版社,2007.4
(中医古籍临床新用丛书/余瀛鳌,卢祥之主编)
ISBN 978-7-80662-529-3

I. 疡… II. ①赵…②李… III. 中医外科学 IV. R26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 036326 号

出 版 贵州科技出版社
发 行
出版人 施福根
地 址 贵阳市中华北路 289 号 邮政编码 550004
经 销 各地新华书店
印 刷 贵阳云岩通达印务有限公司
开 本 850mm × 1 168mm 1/32
印 张 15.125
字 数 430 千字
版 次 2007 年 4 月第 1 版
印 次 2007 年 4 月第 1 次印刷
印 数 1 ~ 3 000 册
定 价 32.00 元

数字图书馆
PDG

前言

半个多世纪以来,中医研究的内容与方法,大致有五个方面:

1. 文献研究:从上世纪 50 年代至文化大革命前,对古代医籍进行了大量的收集、保存、点校、注释、语释、影印和出版。这一阶段的文献整理研究,给中医作了“留种”的工作。

2. 理论研究:上世纪 50 年代以来,由卫生部或署辖行政部门组织、集体编写了高等中医院校统编教材。从 1958 年到上世纪末,共编写了六版教材,对中医基础理论进行了较系统的阐释。几十年来,一代又一代的中医学子,主要就是靠这套教材学习中医。

3. 临床研究:集中在对证的研究(证本质、证候学),再如辨证论治的规范化研究、中医病名研究、治则治法研究、方药研究等都具有一定规模和影响。

4. 多学科研究:从古代哲学研究中医,如周易与中医、道学与中医;从哲学方法论、控制论、信息论、系统论、生物全息理论等解释中医理论;从天文学、气象学、太阳黑子活动周期来研究五运六气,还有从数学研究制作五行的数学模型等。

5. 实验研究:采用西医的若干理论指标分析验证中医药的疗效。如清热解毒、养阴生津方药对一些传染病、感染性疾病的疗效;通里攻下方药对某些急腹症的疗效;活血化瘀方药对冠心病的疗效等,进一步深入到探讨八纲辨证的病理解剖学基础等,从早期的抑菌抑毒实验,到多方法、多层面、分子水平上更为微观的研究,对中医药理论和临床方药机理的探讨采用了另一条途径和方法。

从内容上看,这些研究工作,对某一理论、某些具体的理法方药的理论研究较多,从整体研究和构建中医学理论体系者少;从发展趋势上,以现代医学思路和方法指导者越来越多,以中医思路为指导,从中医理论自身发展规律研究者少,从中国医学之所以能悠久不衰的实践

根基入手的更少。

近年来,许多青年学生和初涉临床工作的年轻医生,提出阅读古籍,结合临床实用,感觉无从下手,有许多不便,有鉴于此,我们与诸多学者探讨以后,决定立足在不仅是给古医籍点校做一番“整容”,而是根据古籍的基础,在临床研究、实践上,做些印证的检索和说明的工作,这样做,第一是对古籍保护、流传有所促进;第二是对初涉临床者和青年中医学生提供深入研究的一些线索。这也是一种尝试,这种尝试,对于繁荣中医文献,也许有一定益处。这种作法,得到了国务院古籍整理办公室的肯定和支持。

中国出版工作者协会国际合作出版促进委员会研究中心与贵州科技出版社自2004年开始组织中国中医科学院(原中国中医研究院)以及山东、江苏、山西、湖南、四川中医文献研究、临床教学人士就此项目开展评注和补缀工作,历时两年有余,始见端倪,寄望丛书,能对后学有所裨益。

《疡医大全》的现代研究

中医外科学是中医学的重要组成部分,古代对凡是生长在皮里膜外的一切有形可见之外症,概列入中医外科范畴。中医外科学总结了我国几千年来劳动人民和外科医家防治疾病的丰富经验和成就,是祖国医学宝库中的重要组成部分,在古今医疗实践中都占有重要地位。中医外科学历史悠久,内容丰富,范围广泛。《周礼》记载的医学分科中,已有相当于外科医生的“疡医”,负责治疗肿疡、溃疡、金疡、折疡一类外科疾病,这说明外科在我国周代已发展到一定水平。明清时期,中医外科逐步成熟,出现了学说、著作及不同学术流派,突出并不断完善辨证论治在外科学上的意义,吸收温病学的精华,出现了很多治疗急重、难、危外科病证的著名方药。清代 200 余年出现了大量外科类著作,尤其一些外科之专著著作更为丰富。其中出现了多种大型综述性外科巨著,在提高和普及外科医疗技术方面发挥了重要作用,有代表性、影响深远者如《外科大成》、《外科心法要旨》、《洞天奥旨》(又名《外科秘录》)、《外科证治全生集》、《疡医大全》等等。其中《疡医大全》是清朝以前外科学内容最为丰富的一部巨著,约 150 余万字,对外科学术发展有着广泛而深入的影响。

《疡医大全》是现存中医外科古籍中内容最为丰富的一部,40 卷。清·顾世澄撰。刊于 1760 年。本书是作者积 40 余年的临床经验,汇集上自《内》、《难》诸经,各家学说,下至当时名医的言论以及古今验方,参以自己的实践心得,不存门户之见,兼收并蓄,有选择的编撰而成。内容除全身各种外证外,还包括脉诊、内景图说等项。有图有文,并注明出处。论述时,按证立方,并在每证后附有具体的外治法,除了古今成方定法外,对于他的家传经验方法,都列附诸证之下,分门别类。本书中所有证候均予以命名,每一病证都有相应的治疗方法,附有相应的证形图,使读者可以按图施治,脉络清楚,是中医外科学中不

可多得的名著之一,对外科学术发展有着广泛而深入的影响。本书比《疡医证治准绳》、《外科正宗》更为完备,可与《外科全生集》相媲美,是继《医宗金鉴·外科心法》后又一部外科巨著。现存多种清刻本、石印本,主要版本有:清乾隆二十五年(1760年)达安堂刻本、清乾隆三十八年(1773年)刻本、清同治九年(1870年)敦仁堂藏板本,1987年人民卫生出版社曾刊行点校本。

顾世澄,一名澄,字练江。生卒年代无确考。清代芜湖(今安徽)人。世医出身,祖父顾宁华,父亲顾青岩,都是当地有名的医生,精通于医道而喜藏书,家蕴秘典珍笈颇丰。至世澄,少年时代,专心攻读儒家经典,由于试而不中,于是在壮年以后便继承家学,再加之聪明好学,有牢固扎实的文史根底,自幼受祖父、父亲业医的熏陶,因而学习以后,便很快学有所成,对临床各科均有体会。后迁居扬州,业医40余年,闻名于当时,临证经验丰富,尤以治疡科著称。他认为张景岳、刘完素、朱丹溪、李东垣的著作,以及当时各位医家的著述,都在内科方面阐发较多,而外科方面完整的著作较少。于是他便全力以赴搜集古今名医方论,以“治外必本诸于内”为治则,倡导疡医须谙内科证治、脉理等。在汇集自《内经》以来历代外科著作及30多位著名医家有关疮疡理法方药的基础上,参照其祖父宁华、父亲青岩家藏秘方,结合自己多年临证体会,经过30多年辛勤努力,辑《疡医大全》40卷,刊行于乾隆二十五年(1760年)。

《疡医大全》新安健堂汪立德撰序中如此介绍和评价顾世澄及其所著的《疡医大全》:“顾君练江,鸠江儒士,三世业医。今侨居广陵四十余年,丹荔青芝,起颠连而济仁寿者,指不胜数。因念张、刘、朱、李诸书,以及时贤立论著述,成于内证阐发无遗,而外科亦间施治有方,终未能窥全豹。不憚岁月,殚精竭神,搜括古今确论,都成一集,名曰《疡医大全》。下向于余,余披阅数过,深叹顾君之学问渊深,而用心良厚也。”

顾世澄在自序中说:“澄生逢尧舜之世,身为太平之民,每念圣天子宵旰勤劳,唯恐四海乃民有纤芥之苦,御极之始,沉疴立起……澄本一介布衣,赋性迂拙,圣贤之书读而未竟,业医自瞻,碌碌无闻……不

惮精神劳瘁，搜括古今名医确论，首标《内经》义旨，宣明派法元微，详分经络穴道，汇集内景证形，上自巅顶，下到涌泉。凡涉及外证者，绘图立说，按证立方，诸如汤火刀伤，弄杖跌仆，兽伤虫咬……况所备诸方悉俱，养正驱邪，调卫和荣，虽云小道，利济非轻。”

本书虽名“疡医”大全，实际上已远远超出了目前临床所说的“疮疡肿毒”外科范畴，除外科以外，还涉及内、妇、皮、儿、性病、男科、传染科等，凡有外证可见者，无不涉及，故言此书为外证全书，而不言其为外科全书。本书除汇集上自《内》、《难》、各家学说，下至当时名医言论之外，更可贵的是记述了作者 40 年临证独特经验，并录其先祖宁华、父青岩家藏秘方，从经文注释、脏腑论述，诸疮诊治之法，到虫兽咬伤，奇证法治，均有广泛记述。因此，该书不仅有重要的文献价值，而且具有极高的临床使用价值。

《疡医大全》全书 40 卷，有论有述，有注有释，有图有文，有歌有诀，分门别类进行编排。首列《内经》纂要，次列诊断、脏腑、五运六气等，再按头面、眼目等部位介绍外科、皮肤病的证治以及小儿疮、痘，跌打损伤、急救、诸虫咬伤等。书中所论及方药，引录前人见解，多附顾氏按语及经验方案，全书资料丰富，病名详细，是一部较为全面的外科临床参考书。卷一集中引录《内经》有关原文 51 篇，并逐句加以注释，以拮其中精义，作为本书论述的理论依据。卷二专论脉诊，根据《内经》有关脉诊理论，进一步论述三部脉分候脏腑及所主病证，结合外科疮疡特点，引证前贤有关脉学精论，推断疾病预后吉凶。卷三至卷五载内景图，五运六气及太极图治，并结合脏腑经络穴道，测知疮疡发于何经何脏，以确定病位。卷六至卷九，论述各种疮疡痈疽的辨证治疗、主方主药以及艾灸、针烙、刀针砭石、敷药等外治方法。卷十至卷十九，按头面、咽喉、颈项、胸腋、脐腹、二阴、四肢等部分，全面介绍身体各个部位所发疮疡的具体辨证治疗方法。卷三十至卷三十三，为专门介绍小儿诸疮及痘疹的辨证论治。卷三十四和三十五，为诸疮证治，包括疔疮、杨梅疮、疥疮、天泡疮等。卷三十六至四十，为各种跌打损伤，蛇虎狗猫咬伤证治以及各种急救方法。

《疡医大全》是现存中医外科古籍中内容最为丰富的一部专著。

“选择治疗外证之效方，在疡科书中最为完备”是对本书恰当的评价。其学术观点如下：

一、注重整体观念与辨证论治

明清时期中医内科学发展迅速，顾世澄行医先后达40余年，深感外疡之成因，必本于内，而慨叹时下医工，业外科者仅重局部，而不深究脉理、脏腑虚实，一有变化，推诿内科，而习内科者又不谙外证，致使彼此相左；更有甚者，终身亦不知脉象为何，深为痛心。顾世澄在外科学术上重视整体观念，认为疮疡虽属外证，“必先受于内，然后发于外”，反对疡科“只仗膏丹，不习脉理”的以局部为主的治疗方式。因此，诊余之暇，不憚岁月，殚精竭神，广搜古今确论，上自《内》、《难》，下及金、元、明、清，并结合个人临证经验，家藏秘笈效方，无不搜罗采录，其内容之丰富，治法之详备，实为后来医者所推崇。

整体观是中医的灵魂。所谓整体观念，即是中医学对于人体本身的统一性、完整性，以及对人与自然相互关系的整个认识。中医学不仅从整体上来探索人体生命活动的规律，而且在分析疾病的病因病机时，亦着眼于整体，着眼于局部病变所引起的整体病理反应。强调用“有诸内，必形诸外”、“治外必本诸内”的人体内、外统一的理论去认识疾病的发生和发展，用全身治疗和局部治疗相结合的方法防治疾病，提高中医外科治疗及养生水平。

在整体观念指导下的辨证论治是中医的特色和优势，准确的辨证是临床立法、处方和用药的依据。顾氏认为中医外科疾病是以体外局部症状为主要临床表现的一系列疾病，临床辨证具有独特的理论体系，整体与局部辨证相并重。除遵循八纲辨证和脏腑、经络、气血等辨证方法外，还结合局部肿、痛、脓、痒、麻木、溃烂及溃疡形色等特征辨证。既重视全身脏腑、经络、气血紊乱在外科疾病发病中的作用，又注意局部病变对全身脏腑、经络、气血的影响，以达到辨证的完整性。因此，在治疗上，强调内外治法紧密结合，除灸、烙、割、洗、内服等方法外，还配合应用手术疗法。在治疗方面都比其他外科著作有创见。

二、重视基本理论

顾世澄首重《内经》，发明玄奥。他认为疮疡虽曰外证，必先受于

内,然后发于外,故不得不宣明《灵》、《素》,阐发机微;“司医者,平时宜多读书则见识广”。他意识到当时临床疡科医生“只仗膏丹,不习脉理”,遇到外治法不能有效治疗的疾病,便让患者找内科医生服用汤药的基本现状,特论诊候形状,以别表里虚实,以决顺逆死生,通过汇集脉法,使疡科医生能够留心脉理。

三、疡必有名,医必有法

顾氏治学态度严谨,著书立说从不马虎。该书论证广泛,凡疡必有名,治必有法,所论疡证有痈疽、疮疡、皮肤病、大麻风、金疮、跌打损伤、小儿痘疹、中毒急救、奇病治法等。从发病部位来说,全书依体表部位划分为30余部。仅头面部就列病名156种,可见他所列病证之多。首先列出《内经》观点,阐发“外症必发于内”的观点,其次论疡科诸症形候,在治疗上强调辨证施治的重要性。并且依据《内经》经络学理论,标示所在部位分经路线,气血多寡理论,详列全身头面、躯干各部经脉路线与内属脏腑之关联,提示学者识别,致使后之业外科者,如无锡高秉钧《疡科心得集》里,亦都贯穿他这种治疗理论,对后世受其启迪颇大。在论每病每证时,辄引用先贤精言,或荟集历代医家真知灼见以广开思路,启迪后学。他在全书中逐一介绍全身各部位的疮疡名称,以及各疮疡的辨证及治疗方法。

四、论治诸病,详尽全面

他论述诸病,详尽全面,内容除外科以外,还涉及内、妇、儿、皮、口腔、性病、男科、传染科等,注重理论联系实际,用方广泛而实用,并且都是经验之谈。总之,他提出病初起时,应尽力使它消除,病已成应使其容易溃瘍,已溃瘍应使其迅速收敛,使人无破漏的危险,更可免除酿痛之患。

五、内外治法结合,敢于创新

外科疾病的治疗方法,分内治和外治两大类。内治法从整体观念出发,进行辨证论治,其中透脓、托毒等法为外科显著的特点。外治中的外用药物、手术疗法和其他疗法中的药线、垫棉等法,则为外科所独有。顾世澄对外科诸疮论治得法,用方有验,内外治法紧密结合。医疗方法由痈疽初起之内消到脓已成之切开引流,非药石所能治愈疾病

的外科手术方法与步骤等等,均有着详细而且具体的论述。初起时,力主内治,提出不宜运用寒凉剂,使其消散,要求养正驱邪,调和营卫,使其消散,以免成脓后受刀针之苦,所以他提出消肿疡贵在早治。他对外科诸疮论治得法,用方有验,内外治紧密结合,除灸、烙、刺、割、熨、洗、内服等法外,还配合手术疗法,反映了清代外科学的水平,如当时的唇裂修补术,肛门闭锁、阴道闭锁等手术及缝合止血、麻醉护理等方面,都相当接近现代水平。如关于唇裂修补术,顾世澄说:“先将麻药涂缺唇上,后以小锋刀融唇缺处皮,以磁盘贮流出的血,调前药,即以绣花针穿丝钉住两边缺皮,然后搽上血调之药,三、五日内不可哭泣及大笑,又怕冒风打嚏,每日只吃稀粥,俟肌生肉满,去其丝,即合成一唇矣”,所述方法步骤与护理要求较符合实际。

六、临证注重实践

顾氏学医业成,侨寓江苏广陵(扬州),当时乾隆盛世,扬州乃繁华之地,商旅群集,人口流动性大,其时上层富贵人家,生活奢靡,饮食失调,又加娇养成性,性情乖张,而地方性脚气疾病流行,数十年间频发不绝,其症始则下肢红肿胀痛,继则肚腹作痛,呕吐涎沫,阵阵冲攻,甚则昏昧。医者咸遵古法脚气病治之,予以辛温祛风化湿之品,初尚有效,继则越发越剧,世澄至扬后,其病已波及江都、仪征、甘泉三县,疾病流行,庶民不胜其苦。他通过细心诊疗,推究其致病之由,发病之机,断为风湿外因是标,内因肝脾失和为病之本,撰专论释其病之本末,立调治初中末之治则方药,实践效果显著,救治了不少患者,声名由此大噪,医誉远布海内。

七、对后世影响深远

此书自乾隆二十五年(1760年)刊行后,至乾隆三十八年癸巳(1773年)又刊本,同治九年(1870年)又有敦仁堂刊本;光绪二十七年(1901年)上海图书集成书局亦有石印本;最近者为人民卫生出版社点校本。由于顾氏此书,内容广博,论见精辟,摘取其要,予以改编,如中国中医研究院图书馆藏有《喉症三书节钞》,即采摘《疡医大全》中治喉病诸篇合与《杂病源流犀烛》、《续验方集》而成。道光壬寅(1842年)江苏常熟徐德圭,更摘抄顾书中“痈疽论”、“论分经络部位气血多

寡”、“论面赤不可攻下”、“论未溃不可概用败毒之药”……等篇十数节,以及《疡医大全》中验方秘论等等,著成《外科选要》,全书共6卷,序文、凡例中皆不记叙所选材料来本及出处,分明将顾氏之书,占为己著,特别是上举所论,皆属世澄临证实践经验按语,徐亦照抄全录,下不注明,致使现之读者,有未读过《疡医大全》者,意不明源流,引以为此乃徐德圭之学术见解,真是谬之甚矣。

总之,顾世澄是清初名医之一,在外科方面有颇高的造诣,所著的《疡医大全》集证广泛,论理有据,辨证详尽,施治全面,所以深受学者赞誉,实为疡证大全。可以说,他的一生,呕心沥血,为我们留下了宝贵的财富,为中医药学的发展做出了不朽的贡献。作为后学之人的我们,应该学习他,包括他的医学理论和治学态度,取其长,真正为我们所用。

目 录

卷之一 颧脸部	(001)
面部望色辨证门主论	(001)
面热门主论	(001)
面热门主方	(002)
面寒门主论	(002)
面寒门主方	(002)
面痛门主论	(003)
粉花疮门主论	(003)
粉花疮门主方	(003)
面游风毒门主论	(003)
面游风毒门主方	(004)
面上热毒恶疮门主论	(004)
面上热毒恶疮门主方	(004)
肺风粉刺门主论	(004)
肺风粉刺门主方	(005)
雀斑门主论	(006)
雀斑门主方	(006)
面生黑斑门主论	(008)
面生黑斑门主方	(008)
痣门主论	(009)
痣门主方	(009)
脸发门主论	(009)
脸发门主方	(010)
颧痛门主论	(010)
颧骨肉疽门主论	(010)

疔疽门主论	(011)
托腮痈门主论	(011)
腮颌发门主论	(011)
颐发门主论	(012)
颐发门主方	(013)
疔腮门主论	(013)
疔腮门主方	(014)
大头伤寒门主论	(015)
伤寒瘥后遗毒门主论	(015)
时毒门主论	(016)
时毒门主方	(017)
伤寒瘥后碗头疮门主论	(018)
鼻部望色辨证门主论	(019)
过梁疔门主论	(019)
鼻疽门主论	(019)
鼻疔门主论	(020)
鼻肿门主论	(020)
鼻疮门主论	(020)
鼻疮门主方	(021)
鼻疳门主论	(021)
鼻疳门主方	(021)
鼻痔门主论	(022)
鼻痔门主方	(022)
普济消毒饮的临床新用	(023)
茜根散的临床新用	(029)
卷之二 正面耳颈部	(031)
耳痈门主论	(031)
耳发疽门主论	(031)
耳后疽门主论	(032)
耳疔门主论	(032)

耳疳门主论	(032)
耳疳门主方	(032)
聃耳门主论	(033)
聃耳门主方	(033)
震耳门主论	(033)
缠耳门主论	(034)
脓耳门主论	(034)
脓耳门主方	(035)
耳风毒门主论	(036)
耳聾耳痔门主论	(036)
耳痛门主论	(037)
耳痛门主方	(037)
耳痒门主论	(037)
耳痒门主方	(038)
耳烂门主方	(038)
卷之三 唇口部	(039)
唇口望色辨证法	(039)
辨口味察证法	(040)
唇病门主论	(040)
唇紧门主论	(041)
唇紧门主方	(041)
唇瞬门主论	(041)
唇瞬门主方	(042)
唇风门主论	(042)
唇疔门主论	(042)
唇疮门主论	(043)
唇疮门主方	(043)
唇口疽门主论	(043)
唇奇病门主论	(043)
唇奇病门主方	(044)

甘露饮的临床新用 (044)

柳花散的临床新用 (048)

卷之四 舌部 (049)

察舌胎辨证法 (049)

舌出不入门主论 (050)

舌出不入门主方 (050)

舌缩不出门主论 (050)

舌缩不出门主方 (050)

弄舌舒舌门主论 (051)

弄舌舒舌门主方 (051)

舌嗜门主论 (051)

重舌门主论 (052)

重舌门主方 (053)

木舌门主论 (054)

木舌门主方 (055)

舌胀门主论 (055)

舌胀门主方 (056)

舌痹门主论 (056)

舌痹门主方 (056)

舌黄门主论 (057)

舌菌门主论 (057)

舌疳门主论 (057)

舌疮门主论 (057)

舌疮门主方 (058)

舌疳门主论 (059)

卷之五 齿部 (060)

钻齿疳门主论 (060)

齿踞门主论 (060)

齿窟疮门主论 (060)

骨槽风门主论 (061)

骨槽风门主方	(062)
重龈门主论	(062)
齿迟门主论	(062)
长齿门主方	(062)
固齿门主方	(063)
石膏汤的临床新用	(065)
卷之六 咽喉部	(074)
咽痛门主论	(074)
咽痛门主方	(084)
喉痹门主论	(089)
喉痹门主方	(093)
喉风门主论	(095)
喉风门主方	(097)
喉痈门主论	(100)
喉痈门主方	(101)
喉癰门主论	(101)
牛黄清心丸的临床新用	(102)
紫雪散的临床新用	(105)
冰硼散的临床新用	(106)
冰片散的临床新用	(110)
卷之七 颈项部	(112)
颈项痛门主论	(112)
夹疽门主论	(112)
气颈门主论	(112)
气颈门主方	(113)
颈痈门主论	(113)
环项发门主论	(113)
颈蝗门主论	(114)
风热锁喉毒门主论	(114)
无辜疔伤疮门主论	(114)

无辜疔疮门主方	(114)
瘰癧门主论	(115)
瘰癧门主方	(118)
瘰癧门主论	(121)
瘰癧门主方	(128)
千捶膏的临床新用	(141)
四海舒郁丸的临床新用	(142)
加味逍遥散的临床新用	(143)
卷之八 脑背部	(150)
脑疽门主论	(150)
发际疽门主论	(151)
后脑发门主论	(151)
头后蜂窝疽门主论	(151)
天疽锐毒门主论	(152)
耳下石疽门主论	(152)
项门痈门主论	(152)
项后肉龟疮门主论	(153)
项后生疔瘡门主方	(153)
卷之九 后阴部	(154)
鹤口疽门主论	(154)
尾闾发门主论	(154)
臀痈门主论	(155)
臀痈门主方	(156)
瘰癧疮门主论	(156)
瘰癧疮门主方	(156)
痔疮门主论	(158)
痔疮门主方	(162)
痔漏门主论	(170)
痔漏门主方	(171)
脏毒门主论	(179)

脏毒门主方	(180)
肠风门主论	(181)
肠风门主方	(183)
寒火疮门主论	(185)
脱肛门主论	(186)
脱肛门主方	(187)
脏头风门主方	(188)
风疳门主论	(189)
风疳门主方	(189)
股阳疽门主论	(189)
股阴疽门主论	(189)
骑马痈门主论	(189)
骑马痈门主方	(190)
坐马痈门主论	(190)
上马痈门主论	(190)
下马痈门主论	(191)
涌泉疽门主论	(191)
穿裆疽门主论	(191)
槐角丸的临床新用	(191)
苦参汤的临床新用	(192)
卷之十 腿膝部	(197)
骨痿疮门主论	(197)
腿游风门主论	(197)
肚门痈门主论	(197)
上水鱼门主论	(198)
黄鳅痈门主论	(198)
大肠痈门主论	(198)
附骨疽门主论	(199)
附骨疽门主方	(201)
多骨疽门主论	(203)

多骨疽门主方	(204)
咬骨疽门主论	(205)
箕门痈门主论	(205)
肉蜈蚣门主论	(205)
玄疽门主论	(206)
阴疽门主论	(206)
膝盖痈门主论	(206)
膝眼毒门主论	(206)
膝眼风门主论	(207)
鹤膝风门主论	(207)
鹤膝风门主方	(209)
消毒散的临床新用	(211)
二妙散的临床新用	(213)
夹纸膏的临床新用	(216)
卷之十一 癰癤部	(217)
蛇虱门主论	(217)
乌白癰门主论	(217)
沉紫亮十四种癰证歌诀	(218)
辨六经癰形	(218)
癰门主论	(219)
癰门主方	(220)
癰疹门主论	(227)
癰疹门主方	(230)
葡萄疫门主论	(231)
葡萄疫门主方	(231)
湿痰流注门主论	(231)
湿痰流注门主方	(234)
腹痛门主论	(241)
伤寒瘥后发肿门主论	(241)
伤寒身痒门主论	(241)

肿块门主论	(242)
肿块门主方	(242)
汗斑门主论	(242)
汗斑门主方	(242)
卷之十二 痘疹部	(244)
痘疹门主方	(244)
痘疗门主论	(260)
痘疗门主方	(260)
痘痈门主论	(261)
痘痈门主方	(262)
痘疽门主论	(264)
痘疽门主方	(264)
痘风疮门主论	(264)
卷之十三 诸疗部	(265)
疗疮门主论	(265)
疗疮门主方	(270)
水疗门主论	(275)
水疗门主方	(275)
红丝疗门主论	(276)
红丝疗门主方	(276)
卷之十四 诸疮部	(277)
疥疮门主方	(277)
薄皮疮门主论	(284)
薄皮疮门主方	(284)
肥疮门主论	(284)
肥疮门主方	(284)
天泡疮门主论	(286)
天泡疮门主方	(287)
翻花疮门主论	(288)
鸦啖疮门主论	(288)

鸦啖疮门主方	(288)
面上热毒恶疮门主方	(289)
黄水疮门主论	(289)
黄水疮门主方	(289)
香瓣疮门主论	(290)
香瓣疮门主方	(290)
金丝疮门主论	(291)
金丝疮门主方	(291)
火珠疮门主论	(291)
火珠疮门主方	(291)
热疮门主论	(291)
热疮门主方	(291)
寒疮门主论	(292)
冷疮门主论	(292)
肉刺毛门主论	(292)
鱼脊疮门主论	(292)
赤炎疮门主论	(293)
癌疮门主论	(293)
癰疮门主论	(293)
日晒疮门主论	(293)
水渍疮门主论	(293)
水渍疮门主方	(294)
冻疮门主论	(294)
冻疮门主方	(294)
汗渍疮门主论	(297)
汗渍疮门主方	(297)
皴裂疮门主论	(297)
皴裂疮门主方	(297)
蜘蛛疮门主论	(297)
蜘蛛疮门主方	(298)

漆疮门主论	(298)
漆疮门主方	(298)
恶疮门主论	(299)
恶疮门主方	(300)
顽疮门主论	(301)
席疮门主论	(301)
席疮门主方	(302)
血箭门主论	(302)
血痣门主论	(302)
血疳门主论	(303)
疣门主论	(303)
疣门主方	(303)
千日疮门主论	(303)
千日疮门主方	(304)
卷之十五 跌打部	(305)
跌打损伤门主论	(305)
跌打损伤门主方	(320)
落下颏拿法门主论	(336)
落下颏拿法门主方	(336)
人咬门主论	(337)
玉真散的临床新用	(337)
神效散的临床新用	(340)
卷之十六 救急部	(342)
解救砒霜门主论	(342)
解救砒霜门主方	(343)
救误服蒙汗药门主论	(344)
救误服蒙汗药门主方	(344)
救饮鸩酒毒门主论	(345)
救饮鸩酒毒门主方	(345)
救误服水银门主方	(345)

救误吞五金门主方	(345)
救误吞针门主方	(346)
误吞诸木竹钗门主论	(347)
救误吞磁锋门主论	(347)
解误服铅粉门主论	(348)
解误服铅粉门主方	(348)
解误服银朱藤黄门主方	(348)
验中蛊毒门主论	(348)
解中蛊毒门主方	(349)
解中断肠草毒门主论	(350)
解中断肠草毒门主方	(350)
解中药毒门主论	(350)
解中药毒门主方	(351)
解服盐卤门主论	(352)
解服盐卤门主方	(352)
中饮食毒门主论	(353)
中饮食毒门主方	(353)
解烧酒毒门主论	(353)
解烧酒毒门主方	(354)
解中煤炭毒门主方	(354)
解中闭口椒毒门主方	(354)
解误食桐油毒门主方	(355)
救误吞田螺门主方	(355)
救误吞桃李门主方	(355)
救误吞猪骨门主方	(355)
救误吞鸡骨门主方	(355)
救误中猪肉毒门主方	(355)
救误吞头发门主方	(356)
救误吞蜈蚣门主方	(356)
救误吞蚂蝗门主论	(356)

救误吞蚂蝗门主方	(357)
救误中蛇虺百虫毒门主方	(357)
解中蜈蚣毒门主方	(357)
解中蜘蛛毒门主方	(357)
解中蚯蚓毒门主方	(357)
解中瘟牛肉毒门主论	(358)
解中瘟牛肉毒门主方	(358)
解中马肉毒门主方	(358)
解中犬马肉毒门主方	(358)
解中河豚毒门主论	(359)
解中河豚毒门主方	(359)
解食鱼中毒门主方	(360)
解黄鳝鱼毒门主方	(360)
解误食毒蟹毒门主方	(360)
解中鳖毒门主论	(360)
解中鳖毒门主方	(361)
解中野菌地蕈灵芝毒门主论	(361)
解中野菌地蕈灵芝毒门主方	(361)
解豆腐毒门主方	(362)
解面毒门主方	(362)
解中白果毒门主方	(362)
解误服轻粉门主方	(362)
救六畜瘟疫法	(362)
解中樱桃毒门主方	(363)
红升丹的临床新用	(363)
化痢汤的临床新用	(367)
太乙膏的临床新用	(368)
内消散的临床新用	(370)
四妙汤的临床新用	(375)
银花甘草汤的临床新用	(380)

消痛汤的临床新用	(381)
太乙紫金丹的临床新用	(389)
冲和汤的临床新用	(392)
芙蓉膏的临床新用	(393)
四虎散的临床新用	(396)
如意金黄散的临床新用	(398)
消肿止痛散的临床新用	(402)
透脓散的临床新用	(403)
生肌膏的临床新用	(406)
圣愈汤的临床新用	(408)
雄黄散的临床新用	(412)
蜈蚣散的临床新用	(414)
通脉汤的临床新用	(417)
十全大补汤的临床新用	(427)
百合汤的临床新用	(429)
桔梗汤的临床新用	(432)
升麻葛根汤的临床新用	(435)
射干汤的临床新用	(437)
乌药散的临床新用	(439)
导气汤的临床新用	(441)
独活汤的临床新用	(442)
加味二陈汤的临床新用	(444)
独圣散的临床新用	(446)
愈风汤的临床新用	(447)
万应膏的临床新用	(449)
化斑汤的临床新用	(450)
珍珠膏的临床新用	(452)
双解散的临床新用	(454)

卷之一

颧脸部

凡属颧脸、腮颊、颐鼻一切痈疽疮毒，皆汇于此部中，以便检阅参治。

面部望色辨证门主论

面颧颊赤，在午后，此虚火上升，不可作伤寒治。

面赤，脉数无力，此伏阴病，假热也。

面赤，脉沉细，此少阴病，外热内寒，阴盛格阳，宜温，误用寒凉者死。

面赤，脉弦数，此少阳病，宜小柴胡和解。

面部通赤色，此阳明表证未解，宜解肌不可攻里。

面唇青，是阴寒极。

面青兼舌卷囊缩，是阴寒。

面青兼小腹疔痛，是夹阴伤寒。面目身黄，兼小水短涩，是湿热。

面目身黄，小腹胀满硬痛、小便利，是蓄血伤寒。

面白而无神，或汗多，是脱血所致。

面白人不宜大汗。

面黑人在伤寒内涉虚，不宜参术大补，盖气多实故也。

面热门主论

《灵枢》曰：手面与身形也，天寒则裂地凌冰，或手足懈堕，然而其

面不衣,何也?曰:十二经脉三百六十五络,其血气皆上于面而走空窍,其精,阳气上走于目而为睛,其别,气走于耳而为听,其宗气,上出于鼻而为臭,其浊气出于胃,走唇舌而为味,其气之津液,皆上熏于面,而皮又厚其肉坚,故天热甚寒,不能胜之也。

东垣曰:饮食不节则胃病,胃病则气短精神少,而生大热,有时而火上独燎其面,盖阳明经多气多血,又兼挟风热上行,诸阳皆会于头面,故令面热如醉。治宜先散其风热,或以调胃承气汤加黄连、犀角,疏下两三行,彻其本热,散其风热,以升麻汤加黄连主之。

冯鲁瞻曰:手足六阳之经,皆上至于头,而惟阳明胃脉,起鼻交颊中,入上齿中,挟口环唇,循颊车上耳前,过客主人,故人之面部,阳明之所属也。其或胃中有热,有郁火,则面热,升麻汤加黄连;若风热内甚而上攻,令人面目浮肿,或面鼻紫色,或风刺瘾疹,随证治之。

面热门主方

升麻加黄连汤 治面热。

升麻 葛根各一钱 白芷七分 炙甘草 白芍 生犀角 川芎 荆芥穗 薄荷各五分 黄连酒炒四分 水煎温服。

面寒门主论

冯鲁瞻曰:胃中有寒则面寒,宜先以附子理中汤,温其中气,次以升麻汤加附子主之。

面寒门主方

升麻加附子汤 治面寒。

升麻 葛根 白芷 黄耆 熟附子各七分 炙甘草 人参 草豆蔻各五分 益智仁三分 连须葱头二茎 水煎温服。

面痛门主论

冯鲁瞻曰：面痛为火，盖诸阳之汇，皆在于面，而火，阳也；心之华在面，而心，君火也。然暴痛多由火实，久痛多因血虚，盖胃主正面，而以肠胃为市，因饮食之热毒聚于中，则发于外，故为痛。更有过劳与饥则痛者，此中气不足也。

粉花疮门主论

证曰：粉花疮多生于室女，火浮于上，面生粟累，或痛或痒，旋灭旋起。亦有妇女好搽铅粉，铅毒所致。兼有欲后汗出，迎风挥扇而生。

粉花疮门主方

妇女面上粉花疮

铅粉五钱 轻粉五分 枯矾三分

研匀，菜油调稠涂磁碗底内，外用蕲艾一两，放炭火上烧烟熏碗内，待艾尽为度，覆地上出火毒。逐早搽面上，疮自愈。

验方 上净桶出恭时，用粗纸先从脸往下一揩，再揩恭，随手掷净桶内，数次自消。

又方 干荷叶揉碎，每用五分，每日冲滚汤服之，久服之自消。

面游风毒门主论

王肯堂曰：面游风毒，此积热在内，或多食辛辣厚味，或服金石刚剂太过，以致热壅上焦，气血沸腾而作，属足阳明胃经。初觉微痒如虫蚁行，搔损则成疮，痛楚难经。《准绳》。

《心法》曰：此症生于面上，初发面目浮肿，痒若虫行，肌肤干燥，时起白屑，细如鱼鳞，次后极痒；抓破湿热盛者津黄水，风燥盛者津血，痛

楚难堪。皆由平素血燥，过食辛辣厚味，以致阳明胃经湿热受风而成。痒甚者，宜消风散痛，甚者宜服黄连消毒饮，外搽摩风膏。

面游风毒门主方

摩风膏

麻黄五钱 白檀香 白芨 当归身各一钱 升麻 防风各二钱 羌活一两

香油五两，浸五日，文火熬黄去渣，加黄蜡五钱，熔化绢滤冷涂。

面上热毒恶疮门主论

书曰：面上热毒恶疮，乃醇酒炙搏，饮食热毒，聚于胃腑，故发于外，宜柏连散主之。

面上热毒恶疮门主方

柏连散

胡粉 黄柏炙 黄连各等分

研末，猪脂调敷。

肺风粉刺门主论

申斗垣曰：肺气不清，受风而生，或冷水洗面，热血凝结而成。《启玄》。

粉刺即粉疵。乃肺热而风吹之，多成此疵，虽无关人累，然书生娇女，各多此病，亦欠丰致。治以灭瘢丹为之添容。《秘录》。

冯鲁瞻曰：肺风，是鼻生紫赤刺、瘾疹。《锦囊》。

陈实功曰：肺风属肺热，粉刺、酒渣鼻、酒刺，属脾经，此四名同类，皆由血热郁滞不散。又有好饮者，胃中糟粕之味，熏蒸肺脏而成。经

所谓有诸内形诸外，当分受于何经以治之。《正宗》。

又曰：酒刺俗名谷嘴疮。

又曰：面上酒刺并酒渣，切忌手搔手挤，只用无灰好盐炒过，如痒，即将炒盐擦之；如出血出水，即将盐按在伤处立止。久即除根。

肺风粉刺门主方

面上粉刺《肘后方》。捣菟丝子绞取汁涂之。

灭瘢丹岐天师。

轻粉 白附子 黄芩微火略炒 白芷 防风各等分，研细末

蜜丸。于每日洗面之时多擦数次，临睡之时又重洗面擦之，不须三日，自然消灭瘢矣。

肺风粉刺酒渣鼻鼻头肿面赤

杏仁二十粒，去皮，瓦上焙，勿焦 油核桃二枚连皮，瓦上焙，勿焦 大枫肉三粒 水银三分，唾津在手掌心内研成黑水

共研匀搽之，二、三次即愈。

面部鼻脸生疮赤风粉刺神方《准绳》。

生硫黄 白芷 瓜蒌仁 膩粉各五分 蝉蜕洗 芫青去翅、足 全蝎各七枚

上研细听用。以麻油、黄蜡火熬化，离火入药在内，每用少许涂面上，勿沾眼内。

清肺散 治谷嘴疮。

连翘 川芎 白芷 黄连 苦参 荆芥 山栀 黄芩 贝母 桑白皮各一钱 河水煎服。

面上酒刺

枯矾一两 白附子 硫黄各二钱

研细末。临晚以唾津调搽，朝上洗去。

肺风、酒刺赤鼻

大枫子仁 木鳖子仁 轻粉各等分

研细，夜以唾津调涂。

皂角三斤 桃花瓣一升 升麻八两 楮实子五两 白芷 天花粉
绿豆 白芨各一两 砂仁 白丁香 甘松各五钱 三柰三钱
共为细末，糯米饭捣丸或加肥皂肉捣丸。洗面时擦之。如擦下
部，换用炼蜜捣成团擦洗。

满脸肺风、酒刺

乳香去油 没药去油 杭粉各三钱 花椒五分 胶枣一枚 白果三枚
共研细为丸。清晨洗脸时擦。

酒刺

榧子肉一千个 甘菊花二两

水酒各一碗同煮干，再用微火烘脆。每日嚼食，食完自愈。

颠倒散

硫黄 大黄各等分

研末，凉水调敷。

肺风疮 无灰酒于砂钵内，磨鹿角尖浓汁敷。

雀斑门主论

陈实功曰：雀斑，乃肾水不能荣华于上，火滞结而为斑。治当六味
地黄丸以滋化源，搽洗兼施。《正宗》。

又曰：面生黑斑，乃水亏不能制火，血弱不能华肉，以致火燥结成
斑，黑色枯不泽。宜服肾气丸以滋化源，用玉容丸早晚擦之。

雀斑门主方

玉容丸 男妇雀斑、酒刺及身体皮肤粗糙。

甘松 明天麻 藁木 北细辛 白蔹 白僵蚕 防风 山梔仁
川椒 香白芷 荆芥 密陀僧 山茶 枯白矾 白芨 檀香末
羌活 甘菊花 独活各一钱 红枣肉七枚

磨细末，用去净弦膜肥皂一斤同捶作丸。如秋冬加生蜜五钱，如
皮肤粗糙加牛骨髓三钱。早晚洗之，肌肤自然莹洁如玉 温润细腻。

玉肌散 一切风湿、雀斑、酒刺、白屑风、皮肤作痒。

白附子 白芷 滑石各二钱

加绿豆半升研细。每用三匙，早晚洗面。

改容丸

大贝母去心 白附子 菊花叶 防风 白芷 滑石各五钱

共为细末。用大肥皂十莢蒸熟，去筋膜捣丸，同药做丸，早晚擦面。

又方

白丁香五钱，即小鹊粪 鹰粪三钱 羊蹄根二两 白附子一两 白芨八钱 白芨七钱

共研末。肥皂一斤去皮弦，同药捣丸擦于面上。

又方

雄雀粪 瓦花各等分

研细同菜油调，搽一月即光。

又方

霜梅肉 樱桃枝 牙皂角 紫浮萍

共捣丸，擦面。

又方 蓖麻仁同肥皂捶擦。

又方

白丁香 白芨 白僵蚕 白芷 白附子 白梅肉 夜明砂 皂角 白芨 甘松

共研细，蜜捣做饼，洗面时擦之。

玉盘散 男妇面上雀斑、粉刺。

白牵牛 甘松 香附 天花粉各一两 藁本 白芨 白附子 宫粉 白芨 大黄各五钱

肥皂一斤捶烂同药和匀，每日擦面有效。

玉容肥皂 去白癍、黑点、白癣、诸般疮痕，令人面色好。

白芷 白附子 白蒺藜 白僵蚕 白芨 白丁香 甘松 草乌 杏仁 绿豆粉各一两 儿茶三钱 密陀僧 樟脑各五钱 白芨 三奈 猪牙皂各四钱 肥皂去裹外皮筋并子，只取净肉一茶盅 轻粉三钱

先将肥皂肉捣烂入鸡子清和，晒去气息，将各药末同肥皂鸡子清和丸，擦面。

澡豆方 洛生。雀印或面生疮疖，疤痕色变赤黑，大效。

密陀僧另研 甘松 杏仁生用 白芷 蛇床子各一两 白果肉四十
个 草麻仁四十九粒 白蒺藜杵去刺 白牵牛酒浸，各三两 白僵蚕二两
肥皂去皮弦子三斤，捣细

同药末为丸，早晚擦面，洗去。

面生黑斑门主论

陈实功曰：女子面生黧黑斑，此乃水亏不能制火，血弱不能华肉，以致火炼结成黑斑，色枯不泽。妇人生此，不利于夫主。又疑事不决者，多有之。治当朝以肾气丸以滋化源，早晚玉容丸洗擦自退。当戒忧思、动火劳伤等事。《正宗》。

古一人登厕，被臭气熏触，隐忍良久，明日满面皆黑色，月余不散。相士云：不出月必死。一良医令以沉、檀香各一两，剉碎安炉中烧熏帐内，以被盖定，令病者瞑目端坐，候香尽方可出帐门，日引鉴照之，面上黑色渐散矣。盖臭腐属水，香属土，土胜水也。

面生黑斑门主方

验方

白僵蚕 黑牵牛各二两 北细辛二两

研细蜜丸弹子大，日洗数次。一月后其斑自退，并治雀斑面生黑点。神效。

玉容散 面上黑点雀斑。

甘松 三柰 茅香各五钱 白芷 白僵蚕 白芨 白蔹 白附子
天花粉 绿豆粉各一两 肥皂二个 防风 藁本 零陵香各三钱
为细末，每洗面用之。

痣门主论

陈实功曰：痣名黑子，此肾中浊气，混滞于阳，阳气收束，结成黑子，坚而不散。凡人生此，终为不吉，面部不善者，去之。《正宗》。

又曰：冰蛭散点之，自落。

《心法》曰：痣，乃孙络之血滞于卫分，阳气束结所致。

痣门主方

点痣法 糯稻数粒去壳，用银炉灰少许入水拌匀，以糯米插灰中，将痣用针挑破，将稻米点之，任其自脱。

又方 糯米七粒捣烂，石灰和匀，挑破点之，即落。

又方 用栝炭灰半盅，以水调不干不稀，以手按实；入糯米数粒按在灰中仍按实；将碗覆于地上勿动，俟明早灰中流出白浆如饴，用盞取下，看痣大小点之。听其自落。

又方 夏至或冬至用酵碱同石灰捣匀水磨，点之，自落。

又方 白降丹水调少许，点之，自落。

脸发门主论

申斗垣曰：脸发乃足阳明胃经，多气少血，其疮发于眼下脸上四白穴、在目一寸，直目瞳子。巨髎穴。挟鼻旁八分，直目瞳子。色似葡萄，形渐大或生子母疮者，八日死。在左用内托药加当归两倍、右加三倍，妙在斯也。《启玄》。

周文采曰：气血上壅，结聚脾经，故毒发于面，名曰面毒。《集验》。

窦汉卿曰：面发毒，多起于房劳太过，乘虚风入经络，阳明经虚，发于面也。或面生疔瘰，患者欲求速愈，而庸医或以毒药敷点，或以艾火灸之，或以针刀刺之，或犯戾神恶宿，或破后房事不戒，或受狂风霜雪寒露暴戾之气，或服金石草木诸部恶毒相攻，相反之剂，以致病症日

剧。殊不知面为诸阳之首，禁火、禁刀、禁毒，况耳目口鼻之官，总系一处，比四肢不同，若不保重，命亦难生。何也？面为阳，火气入之，熏蒸肌肉；刀针刺之，即伤经络；毒药点之，暴剥皮肉。辗转为患，继之以风邪入之，则头面虚肿，目鼻肿胀，患处日腐，其臭秽难闻，脾胃日削，寒热交作，痛楚万状，难以尽言。若有五善而无七恶，外敷清凉拔毒之药，内服参术内托之剂，再合犀角郁金散服之，以拔积毒，其命方可保也，否则难生。《全书》。

奎光曰：面痈，大抵属郁，防内攻，宜用碧丹。方载咽喉门。兼服煎药，外敷三黄散。

脸发门主方

犀角郁金散 龚汉卿。治面发毒。

犀角 郁金 珍珠 西牛黄 粉甘草 乳香 真粉 辰砂
上为细末，炼蜜为丸噙化。

颧痛门主论

《心法》曰：颧痛，初小渐大如榴者，发阳分，由风热而生。初起焮红、浮肿、疼痛，七日即溃，为毒轻、根浅，易愈。颧疽者，发阴分，由积热而生，色紫漫肿，坚硬、麻木、疼痛，三七方溃，为毒重、根深，难愈。俱发于颧骨尖处，不论左右，皆属小肠经。

证曰：治法悉同痈疽，但不可妄用追蚀之药。盖颧部骨多肉少，防其穿溃过深，致令颧骨倒陷之患，不可不慎。

颧骨肉疽门主论

王肯堂曰：颧骨肉疽，颧骨内卒然而痛，经宿而痛甚，寒热大作，属上焦与阳明经郁火所致。汗之可消，药宜水酒同煎。《准绳》。

《灵枢经》曰：心病者颧赤，肾病者颧与颜黑。然则当察其色赤者，

宜以黄连安神丸降心火，补心丸养心血；黑者，宜以地黄丸滋肾水，未可专委之阳明郁火也。

疔疽门主论

王肯堂曰：两腮及鼻下焮肿生疮，恶血淋漓，此名疔疽，属足阳明胃经。三日口噤如痉，角弓反张，按之如疔钉着，骨痛不可忍者，是也。治之稍缓，则毒攻心，呕吐不食，昏迷躁乱，谵语者死。《准绳》。

证曰：疔疽者，乃醇酒炙煿，膏粱厚味，或误飧自死牛马、宿茶陈菜，食中汗毒而成。不可妄用刀针，当照疔疮门方法治之。故毋庸另立主方。

托腮痈门主论

奎光曰：托腮痈，生腮下，乃饮食厚味，醇酒热毒所结而成。

腮颌发门主论

王肯堂曰：腮颌发生腮脸，属足阳明经风热所致。《准绳》。

又曰：金腮疮，生于颊腮，初如米粒，渐大如豆，久而不治，溃蚀透颊，属阳明经。治不得法，溃烂不敛，口吐臭痰，喘急神昏者死。

冯鲁瞻曰：腮痈，乃胃家经络也。《锦囊》。

又曰：咽痛颌肿，脉洪大面赤者，羌活胜湿汤加黄芩、甘草、桔梗各五分。

朱丹溪治两腮肿，用细辛、草乌等分为末，入蚌粉、猪脂调敷。口含白梅，置腮边良久，出涎，肿退消时，肿必先向下。

古一人因惊骇后，常用手指甲掐住两颊，遂致两颊破损，心懊憹不安，脉数而实，诸药不愈。用《活幼方》中牛黄清心凉膈丸，数服而愈。

证曰：腮颌发者，其势大，即腮痈，又名鱼腮毒。而金腮疮者，其势小，多生于嗜酒之人，糟粕之味熏蒸胃腑，是以腮颌结肿焮痛。初起，

四妙汤主之，寒热加荆芥、防风、葛根、赤芍；已成加白芷；将溃加穿山甲、皂角刺；溃后四妙汤加白芷排脓。二、三剂脓尽，速于生肌收口，不得妄自追蚀提药，防其透膜。此症全赖补托，兼戒房事，庶不致收口腮凹，亦可免夫成鱼腮漏，终年淌水也。均照痈疽门治法，毋庸另立主方。

颐发门主论

王肯堂曰：颐发生于颧骨之下，腮颌之上，耳前一寸三分，古云不治，属足阳明胃经热毒上攻。若治不得法，延及咽嗑溃烂，穿口不食者死。《准绳》。

又曰：《素问》云：肾热者颐先赤。故颐属足少阴肾经也。而今医师以耳后一寸三分发锐毒者，名曰发颐，则是少阳分野，而薛氏亦以为属足少阴经，当补肾水者，何也？盖肾为相火之宅，宅完且固，而火得归息焉，则治肾正所以治少阳也。此证伤寒汗出不彻者，多患之。亦有杂证客热，久而不散，而发于颐者，宜以药速消散之。失治成脓，则费手矣。倘误服克伐之药，而不滋补其气血者，即穿口破唇而死。

申斗垣曰：颐发，乃足阳明胃经多气少血，在唇旁腮上颊车穴、穴在耳下曲颊端陷中。大迎穴。穴在曲颌前一寸三分陷中动脉。上下左右相同，双发最凶。如肿痛不可忍者，八日可刺。脓汁出，四畔软者生，如反硬，牙关紧，不能食，似蜂巢涓流黄水，十无一生。女子患此，主四、五日死。《启玄》。

窦汉卿曰：发颐乃伤寒发汗未透而成。在头耳一寸三分、在心窝两胁、在身者可治；在身后，相连咽喉，恐毒气内攻，难进饮食药饵。鼻流清脓、两耳闭塞者，即死不治。

陈实功曰：发颐又名汗毒。此症原因风寒用药发表未尽，日久传化为热，不散，以致项之前后结肿疼痛。初起身热口渴，当用柴葛汤清热解毒；如患上红肿热痛者，如意金黄散敷之。《正宗》。

又曰：如身凉不渴者，宜牛蒡甘桔汤。

冯鲁瞻曰：头痛肿大如斗，是天行时疫，大头病也。夫身半以上，

天之气也；身半以下，地之气也。邪热客于心肺之间，阳明少阳之火复炽，且感天地四时瘟疫之气，所以上焦壅热不散，干犯清道，湿热上乘巅顶而为肿，木挟火邪而为痛，甚至溃裂脓血，复染他人，所以谓之疫疔。轻者名为发颐，肿在两耳前后，有以承气下之，泻胃中之实热，是诛伐太过矣。治法不宜药速，速则过其病，所谓上热未除，中寒复生，必伤人命。宜用缓药，徐徐少与，再视肿势在于何方，随经治之。阳明为邪，首大肿；少阳之邪，出与耳前后也。大概饮主之。

颐发门主方

牛蒡甘桔汤 颐毒表邪已尽，耳项结肿，微热不红，疼痛者。

黄连 赤芍药 桔梗 广陈皮 苏木 牛蒡子 川芎 天花粉 甘草 水煎服。

汗颐疔腮

平头红豆即平常红豆，每升用生姜四两，取自然汁拌晒，研为细末

用鸡蛋清调敷，中留一孔透气，干则以葱汁润之，一日立消，又且定痛。

疔腮门主论

陈实功曰：疔腮乃风热湿痰所主，或冬温后，天时不正，感发传染，两腮肿痛。初发寒热，以柴胡葛根汤散之，外敷如意金黄散，如在里，内热口干，二便不利者，四顺清凉饮利之，表里俱解；如肿仍不消必欲作脓者，托里为主。脓熟者针之。《正宗》。

冯鲁瞻曰：胸膈蕴积热毒，致生风痰，上攻头面，壅滞不散，发为疔腮。重则磁锋刺去恶血，轻则或涂或点，次投汤剂，散风清热，解毒消痰，自愈也。《锦囊》。

王肯堂曰：所患在肌肉、浮而不着骨者，名曰疔腮。属足阳明经风热所致。

《心法》曰：疔腮一名髭发、一名含腮疮，生于两腮肌肉不着骨之处，总发端于阳明胃热也。初起高肿色红焮热者，系阳明风热；若平肿色淡不鲜者，由胃经湿热。

疔腮门主方

敷疔腮 染坊靛花频敷自消。

又方 肥皂同砂糖捣敷，纸盖留顶出气。

又方 黄柏、铅粉各等分，研匀凉水调敷。

又方

猪胆汁三个 生姜汁 米醋各半酒杯

和匀磨京墨，一敷即消。

腮肿

土茯苓二斤 天花粉 苦参各二两

咀片分七剂，每剂加皂角子七粒水煎，露一宿，食后温服，并治瘰疬。

时行风热腮肿 赤小豆捣细，鸡子清或米醋调敷，立消。

又方 霜后丝瓜煨存性，猪胆汁调敷，即消。

又方 扁柏叶捣汁，调蚯蚓泥搽上，立消。

《朱氏集验方》：宋仁宗患疔腮，道士赞宁用赤小豆七粒为末敷之，立愈。

腮毒 大黄末、姜汁调敷，中留一孔透气，自消。

两腮红肿

百合一两 贝母 山芝麻根去皮 元明粉各一钱 银朱七分 白面
少许 同捣敷。

大头伤寒门主论

发于鼻额，红肿，以至两目肿盛而不开，额上面部皆赤而肿者，属阳明也。或壮热气喘，口干舌燥，咽喉肿痛不利，脉来数大者，用普济消毒饮主之。如内实热盛者，用通圣消毒饮。若发于耳之上下前后，并头角红肿，此属少阳也，或肌热日晡热，寒热往来，口苦咽干，目疼胁下满，宜小柴胡汤加花粉、羌活、荆芥、连翘、芩、连主之。若发于头上，并脑后项下，及目后赤肿者，此属太阳也，宜荆防败毒散主之。若三阳俱受邪，并于头面耳目鼻者，以普济消毒饮，外用清凉救苦散敷之。治法当先缓后急，否则邪伏也。先缓者，宜退热消毒；虚人兼扶元气，胃虚食少者，宜助胃气；候其大便内结热甚，方以大黄下之，拔其毒根，此先缓后急之法也。盖此毒先肿于鼻额，次肿于目，又次肿于耳，从耳至头，上络后脑，结块则止，若不散必成脓也。俗云：大头天行，亲戚不相访问。染者多不救。泰和间多有病此者，医以承气加蓝根下之稍缓，翌日如故，下之又缓，终莫能愈，渐至危笃。东垣视之曰：夫身半以上，天之气也，身半以下，地之气也。此邪热客于心肺之间，上攻头面为肿盛，以承气泻胃中之实热，是为诛伐无过，遂处普济消毒饮子。全活甚众。

伤寒瘥后遗毒门主论

伤寒汗下不彻，余部结在耳后一寸二、三分，或两耳下俱硬肿者，名曰遗毒。宜速消散，缓必成脓，以连翘败毒散治之。如项肿痛，加威灵仙；大便实，加大黄、穿山甲。如发肿有脓不消，或已破未破者，但用内托消毒散加皂针、升麻、银花、甘草之类。然古人方书之论如此，但实多由于久热伤阴。盖少阳、少阴，阴亏已极，乃因虚火上冲，所以腮颊耳后肿痛也。经曰：荣气不从，逆于肉裹，乃生痈肿。况耳后方圆一寸，皆属于肾，有何毒之谓欤！治宜以滋阴化痰，散郁和肝，而肿自愈。如熟地、麦冬、土贝母、白芍、连翘、甘、桔之类，略佐青皮、柴胡少许足

已。若尺脉甚弱者，竟用上病下之法，投以引火归源之药，则肿不治而自散。若误认以毒为事而攻之，不惟肿痊愈固而愈甚，必致变生别病而危矣。当详酌之。

时毒门主论

陈实功曰：天行时气感之而发，初起与风寒相类，惟头面耳项为真。寒热、体强、头眩、脉浮紧数者，为邪在表，宜荆防败毒散、万灵丹发汗；如两目鼻面渐次传肿者，乃正阳明受病，其患焮肿，发热便秘，多热少寒，口干，脉数有力，为邪在里，宜五利大黄汤下之。又头角两耳前后结肿者，乃手少阳经受之，其患耳鸣筋痛，寒热呕吐，口苦咽干，烦躁时甚，当以知母石膏汤、小柴胡汤和之；如凶荒沿门传染者，普济消毒散、藿香正气散以安之。表里俱解，肿尚不消，宜砭去恶血；肿热甚者，如意金黄散敷之。自后仍不消者，必欲作脓，宜托里消毒散加白芷，皂角针托之，脓秽食呕者，香砂六君子汤。又有毒中三阳，自颈项以上俱发肿，光如水色，双目合缝，唇似猪形，口角流涎，肿痛不消，声音不出，饮食不入，咽喉肿闭，牙关难开，破流臭水，秽气连绵不绝者，犯此俱为不治。《正宗》。

李东垣曰：夫时毒者，乃四时邪毒之气，而感之于人也。其候发于鼻面、耳项、咽喉，赤肿无头，或结核有根，令人憎寒壮热、头痛、肢体作疼甚者，恍惚不宁，咽喉闭塞，人不识者，将谓伤寒，便服解药一、二日，肿气增益，方悟始召医治。原夫此疾古无方论，世俗通为丹瘤，病家恶言时毒，窃恐传染。尝考之与经曰：人身忽经变赤，状如涂丹，谓之丹毒，此风热恶毒所为，谓之丹瘤，与夫时毒特不同耳。盖时毒者，感四时不正之气，初发状如伤寒，五、七日之间乃能杀人，治之宜精辨之。先诊其脉滑数浮洪，沉紧弦涩，皆其候也。盖浮数者，邪气在表也，沉涩者，邪气深也。时毒气实者，攻之下之；有表者发之；年高气弱者，连翘汤主之。又于鼻内通气散，取十余嚏作效。如出脓血者，治之必愈。病人每日用嚏药三、五次，以泄热毒，此治时毒之良法也。经三、四日不解者，不可大下，犹宜和解之；至七、八日，大小便通利，头面肿起高

赤者，可服托里黄耆散，宜针镰砭割出血泄其毒气；十日外不治，自愈也。此病若五日以前，精神昏乱，咽喉闭塞，语声不出，头面大肿，食不知味者，必死之候，治之无功矣。然此疾有阴有阳，可汗可下，切不可但云热毒只用寒药混治。《精义》。

窦汉卿曰：时毒乃凶荒劳役患之，安里为主，用普济消毒饮最善。然而此症有阴有阳，有可汗有可下，若误认为热毒而用寒药，则误矣。《全书》。

《心法》曰：时毒初起状类伤寒，或兼咽痛，一、二日间，发于腮项颌颐，作肿无头，渐渐红赤疼痛，或似结核，方有根漫肿色赤，俱由感冒四时不正邪气，客于经络酿结而成，非发于病后之颐毒也。惟在医者精察疮色，辨别虚实，治法须宜疏解，不可骤用寒凉，致毒不得外发，而内攻咽喉者，则险矣。

时毒门主方

加味甘桔汤

甘草 桔梗 荆芥各三钱 牛蒡子炒，二钱 贝母一钱五分 薄荷五分 水煎服。

若两颐肿盛者加丹皮三钱，柴胡一钱五分。

普济消毒饮 神治天行疫毒、大头诸病。

牛蒡子炒 连翘 桔梗 甘草 板蓝根 马屁勃 橘红 玄参 柴胡 僵蚕炒，各二钱 黄芩酒炒 黄连酒炒，各五钱 新升麻七分 人参三钱

为末。汤调服之或蜜丸嚼化，或有加当归、川芎。如便闭加酒炒大黄一钱利之，肿热甚者砭法刺之。一方有薄荷一钱，无人参。

此方黄连、黄芩味苦，泻心肺热以为君；橘红、玄参苦寒，生甘草甘寒，泻火补气以为臣；连翘、鼠粘、薄荷味苦辛平，板蓝根味甘寒，马屁勃、僵蚕味苦平，散肿消毒以为佐；升麻、柴胡苦平，行少阳、阳明不得伸之郁气，桔梗味辛温为舟楫，不令下行。如是调治，方可保全。

耳边腮肿 五倍子湿纸包烧存性研末，鸡子白调糊遍敷，立消。

无风寒腮赤肿 安丝鱼煨汤吃自消。

敷法 如意金黄散用葱汁、黄蜜调敷，中留一孔透气，外用桑皮纸扯碎贴之，如干，纸外以蜜水润之，自消。

时毒炸腮 治风寒郁热，耳边腮颐结肿，恶寒发热，焮赤口干，每年仲春小阳时令，必多此症。有只肿一边者，有先肿一边，一、二日又肿一边，亦有两边齐肿者，名曰时毒。更有两颊硬肿颌下肿者，名曰虾蟆毒。均宜疏寒散热，不得骤用寒凉冰伏。

葛根 荆芥 防风 桔梗 甘草 白芷 赤芍 连翘 泽泻

白水煎。二、三剂后加贝母、牛蒡子、玄参、银花、夏枯草、丹皮、山梔、柴胡，按症加减，七日自消。头疼、耳边发肿、太阳炸腮，俱疼不可忍周鹤仙。

生大黄一两 青木香 姜黄 槟榔各三钱

共为细末，醋蜜调敷患处，中留一孔出气，干则换敷，二、三次即愈。

又方 生大黄末葱汁调敷四围，中露一顶自消。

又方 醋调石灰，敷之即消。

又方

生大黄 黄柏 赤小豆 石膏 穿山甲等分

共研细末，醋调敷。

伤寒瘥后碗头疮门主论

冯鲁瞻曰：碗头疮者，亦有汗下后余毒不尽，故瘥后而发碗头疮也。只以黄连、甘草、归尾、红花、防风、苦参、荆芥、连翘、羌活、白芷之类煎服，外用芒硝、赤小豆、青黛为末，以鸡子清和猪胆汁调敷疮上，最效。

勿动其靨，待其自脱。

鼻部望色辨证门主论

鼻色青,主腹中痛,若冷者死。

鼻色微黑者,有水气。

鼻色黄,主小便难。

鼻色白,主气虚。

鼻色赤,属肺热。

鼻色鲜明者,有留饮。

鼻孔干燥者,必衄血。

鼻色燥如烟煤者,阳毒热极。

鼻孔冷滑色黑者,阴毒冷极。

鼻流浊涕者,属风热。

鼻流清涕者,是肺寒。

鼻孔癰胀者,肺热有风。

黑气入耳、目、鼻、舌者死。

过梁疔门主论

申斗垣曰:过梁疔,乃劳伤太甚,忧虑伤于肺经,致气血停滞,热毒内攻,穿于心胸,缠于四肢,筋骨酸疼,六、七日添恶心,八、九日肿过耳目,至十一日命促。此疔生于眉心鼻上,初起未见疔形,最难识认,五、六日头破身寒,若痛甚冷汗出者,不治。救治均同疔疮门施治。《启玄》。

鼻疽门主论

王肯堂曰:鼻疽生于鼻柱,属手太阴肺经风热及上焦郁火所致。《准绳》。

证曰:鼻疽乃肺经蕴积热邪,或忧思损伤脾肺,或过食五辛,嗜饮

炙搏而成。初起鼻柱壅肿，两窍不通，焮痛难忍。因蕴热嗜饮而成者，当用银花甘草汤加麦冬、花粉、贝母、赤芍、当归，以清肺热，稍分其炎燔之势。如忧思内伤而成者，又当保固肺脾为主。

败毒清凉损气伤脾之药，均不可滥施也。治法于痈疽门中采择用之，毋庸另立主方。

鼻疗门主论

申斗垣曰：鼻疗乃忧郁太过，劳伤太重，脏腑毒气传于经脉而成。二、三日神思困倦，筋骨酸痛；四、五日寒热交作，毒气攻心，头面肿大；八、九日呕逆昏迷，痰升气促，十难救一，医者不可不察。初起治法，从疗疮门施治。《启玄》。

陈实功曰：鼻疗生于鼻内，痛引脑户，不能运气，胀塞鼻窍。甚者唇腮俱肿，先宜针刺，次照疗疮治法。《正宗》。

证曰：鼻疗生于鼻窍之中，乃忧郁伤肺，或房欲传肾，火乘金位，燔灼而成。治当悉按疗疮治法，毋庸另立主方。

鼻肿门主论

岐天师曰：鼻肿者，乃肺经火盛也。用皂角末吹入，打清嚏数十即愈。盖鼻因气塞，今打嚏则壅塞之气尽开散，故不用甘桔汤清肺而鼻肿自消也。《秘录》。

又曰：有人鼻大如拳，疼痛欲死，此乃肺经之火，热壅于鼻而不得泻。法当清其肺中之邪，去其鼻间之火可也，以解壅汤主之。此方全在群入肺经，以去其火邪，又何壅肿之不消耶。

鼻疮门主论

证曰：鼻乃肺之窍，肺有蕴热，或醇酒炙搏，胃热熏金，或肺火亢甚，是以鼻窍生疮，燥裂作痛，多起赤靥。当用石斛麦冬汤清之，或六

味地黄汤加麦冬治之。

陈实功曰：鼻疮乃肺经实火郁热，故生疮也。《正宗》。

鼻疮门主方

解郁汤 岐天师。

桔梗 天门冬各五钱 黄芩 麦门冬 甘草 天花粉各三钱 紫菀
二钱 紫苏叶 百部各一钱

水煎服。四剂鼻疮全消。

鼻疮

宫粉 血丹 松香各一钱 艾叶五钱

研细。纸卷香油浸透，火燃滴油，搽鼻内神效。

又方 杏仁研烂人乳和敷。

又方 乌牛耳垢敷。

鼻下生疮 牛鼻中旧木卷煨研，敷之。

鼻头红肿破裂 皂矾和灰面研匀，水调贴之。

鼻疳门主论

冯鲁瞻曰：风邪客于皮毛，是以津液不收，致流清涕，头楚若锯者，名曰鼻鼽。更有金不生水，则六阳虚火上升，而成鼻干者。更有风湿之气，壅成内热，或因气疳，故鼻下两旁疮湿痒烂，是名鼻疮。不甚痛，汁所流处即成烂疮。《锦囊》。

申斗垣曰：鼻疳，鼻乃肺窍，鼻孔生疳，乃肺中有积热。若不早治，蚀其鼻内关窍，令人言语不明。《启玄》。

鼻疳门主方

验方《启玄》。

儿茶五钱 雄黄 轻粉各一钱 冰片一分

研细吹之。如臭加锅墨五分。

又方 杏仁不拘多少，去皮，尖，捣碎，取连四纸压去油如白粉一样，只用二分轻粉一钱

吹患处。三、四次自愈。

鼻疳烂通其孔者

鹿角剉碎，焙焦 枯白矾各一两 头发五钱，灯上烧灰

共研极细末。先用椒水洗净疳孔，然后搽之。如不收口，可用瓦松烧存性，研末搽之。

鼻痔门主论

陈实功曰：肺气不清，风湿郁滞，而成鼻痔也。如鼻生息肉，结如榴子，渐大下垂，闭塞孔窍，气不宜通，宜服辛夷清肺饮，外用点药，渐化为水，自愈。《正宗》。

冯鲁瞻曰：湿热之气，外郁皮毛，内应太阴，故三焦之火，得以上炎，为鼻生赘，如灶火上炎，而成煤也。又有胃中食积，热痰流注，是以上燎而鼻生息肉，犹湿地得热，而生菌也。治宜利膈去热，切勿因碍伤动，否则变成鼻痔矣。《锦囊》。

又曰：鼻为呼吸之门户，热气蒸于外，则为肺风赤鼻，不独因于酒也。热气壅于内，则为息肉鼻疮，故息肉者，上焦积热，郁塞而生也。

窦汉卿曰：鼻居面中为一生之血运，而鼻孔为肺之窍，其气上通于脑，下行于肺，肺气壅盛，一有阻滞，诸病生焉，故有鼻痔之患。

又曰：亦有热伏于脑，外寒侵袭，鼻流鼻涕，所谓脑寒、脑漏、鼻渊，均由此成。

鼻痔门主方

鼻痔鼻生息肉

硃砂五分 枯矾二钱

研细,每用少许点鼻痔上即消。

验法 先用麻油扫鼻孔四周,再以白降丹少许,清水调点其痔自落。

又方

明矾一两 甘遂一钱,灰火煨 白降丹一分或二分 明雄五分

共乳细,吹痔上自愈。

又方

明矾一两 草麻仁七粒 盐梅五枚,去核 麝香一分

共研成丸如枣核大,绵包塞鼻内自化。

又方 枯矾末和猪脂绵包,塞数日自消。

又方 藕节有毛处烧存性为末,吹之。

脑崩鼻息 甘草四两煎汤,用有嘴壶贮,以鼻嗅之。

鼻中息肉下垂 冰片点之。

又方 黑牛耳垢敷之。

又方 雄黄塞之,十日自落。

又方 雄鸡肾塞之,十日落。

又方

黄连 白蒺藜

煎汁灌鼻中,涕出息落。

鼻漏、鼻孔中长出一块

辛夷去毛 桑白皮蜜炙,各四两 梔子一两 枳实 桔梗 白芷各二

两

共为细末,每服二钱,淡萝卜汤调服。

普济消毒饮的临床新用

1. 流行性腮腺炎

用本方加减治疗流行性腮腺炎 40 例。全部患者均肌肉注射板蓝根注射液每日 2 次。普济消毒饮加减:板蓝根 30 克,银花 15

克,连翘9克,玄参12克,马勃9克,僵蚕9克,牛蒡子9克,荆芥9克,薄荷3克,桔梗9克,甘草3克,每日1剂,水煎服。高热者物理降温或常规量口服复方阿司匹林片,卧床休息,直到肿胀消退。结果:全部患者5~7天痊愈。

滕国樑. 河北中西医结合杂志,1995,(1):78

2. 急性扁桃体炎

张厚东等运用本方为基本方加减治疗急性扁桃体炎160例。高热者重用柴胡30克,加葛根30克;伴恶寒加荆芥10克;大便秘结不通加生大黄10克;扁桃体脓点或脓肿加丹皮15克,赤芍10克。每日1剂,水煎分2~3次服,儿童用量酌减,高热者给予安痛定肌肉注射;不能进食或高热汗多者,酌情补液。结果:治愈104例(65.0%),好转49例(30.63%),无效7例(4.37%),总有效率95.63%。

张厚东,等. 中医研究,1997,(6):33

3. 淋巴结炎

张继运用本方加味治疗淋巴结炎120例。经治疗后,结果:痊愈112例,好转8例。

张继. 四川中医,1997,(11):32

4. 单纯疱疹性角膜炎

王诗侠等运用本方加减治疗单纯疱疹性角膜炎26例。药用:柴胡、赤芍、菊花、蝉蜕各15克,钩藤、板蓝根各30克,大青叶、夏枯草、蒲公英、青箱子、谷精草各20克,黄芩、薄荷各12克,甘草10克。口干咽痛加天花粉、麦冬;小便赤涩加木通;大便燥结加大黄、芒硝;结膜充血严重加丹皮;充血减退后可酌加养阴退翳药,如当归、生地黄、白芍、玄参、木贼草。每日1剂,煎汁600毫升,分2次服,停用其他药物。结果:26例患者中,痊愈22例,占84.6%;好转3例,占11.5%;无效1例,占3.8%,总有效率96.2%。

王诗侠,等. 安徽中医学院学报,1997,(5):32

5. 耳胀

雷京生运用本方加减治疗耳胀1例。结果服用本方10剂后痊愈。

雷京生. 北京中医, 1997, (1): 55

6. 喉源性咳嗽

运用本方加减治疗喉源性咳嗽46例。治疗组服用黄芩10克, 玄参10克, 板蓝根15克, 牛蒡子10克, 薄荷(后下)3克, 僵蚕10克, 桔梗3克, 蝉蜕6克, 浙贝母10克, 柴胡6克, 甘草5克。每日1剂, 5天为1疗程。对照组治疗: 口服阿莫仙胶囊, 每次0.5克, 每日3次; 同时口服非那根止咳糖浆, 每次10毫升, 每日3次。5天为1疗程。两组均治疗2个疗程。结果: 治疗组治愈35例, 有效11例, 治愈率76%, 总有效率100%; 对照组治愈10例, 有效12例, 无效8例, 治愈率33%, 总有效率73%。

何胜恬. 浙江中医学院学报, 1997, (6): 38

7. 晚期癌症疼痛

任跃龙运用本方加减治疗晚期癌症疼痛20例。方药: 黄芩15克, 黄连15克, 陈皮6克, 生甘草6克, 玄参20克, 柴胡6克, 桔梗10克, 连翘10克, 板蓝根10克, 马勃10克, 牛蒡子5克, 薄荷3克, 僵蚕5克, 升麻3克。每日1剂, 水煎服。高热者加生石膏、知母; 便秘者加大黄、芒硝; 尿血者加鲜茅根、小蓟; 黄疸者加茵陈、前仁; 气虚者加黄芪、党参。结果: 完全缓解3例, 明显缓解5例, 部分缓解10例, 无效2例, 总有效率90%。

任跃龙. 湖南中医药导报, 2004, (4): 13

8. 小儿颌下腺炎

王毅力运用本方加减治疗小儿颌下腺炎45例。方药: 黄芩2克, 生石膏20克, 连翘6克, 薄荷(后下)、牛蒡子、僵蚕、玄参、板蓝根各9克, 桔梗、升麻、柴胡、生甘草各2克。水煎服, 每日1剂, 煎2次分服, 连服2~3剂。热退后, 去生石膏、薄荷加牡丹皮6克, 神曲20克, 每日1次, 继续服3~7剂。结果: 45例患儿服1剂之后,

体温有不同程度下降,其中26例体温降至正常,服2剂后又有19例体温降至正常,3剂后全部患儿体温降至正常,颌下胀痛势减,精神转佳,并以去生石膏、薄荷方继续服3~7剂后颌下肿胀逐渐消退。

王毅力. 陕西中医, 1997, (8): 360

9. 丹毒

用本方加味治疗丹毒45例。治疗组45例,若发生于头面部者重用僵蚕加蝉蜕8克;发生于肋下、髂部者加龙胆草10克;发生于下肢者加黄柏10克,旱莲草15克,紫草10克;病程2天至2年;对照组30例使用青霉素钠320万单位/天,分2次静脉注射,病程12天至3年。结果:治疗组治愈33例,有效10例,无效2例,总有效率95.5%;对照组治愈24例,有效5例,无效1例,总有效率96.6%。

冯桥. 广西中医药, 2005, (1): 28

10. 面瘫

徐分根运用本方加味治疗面瘫12例。方药:牛蒡子、黄芩、玄参、僵蚕、蝉衣、柴胡各10克,桔梗、升麻、薄荷各5克,地龙、板蓝根各20克,炙蜈蚣2条。加减:有风寒表证者加羌活、白芷各10克。15剂为1疗程,一般服2个疗程。12例服2个疗程全部康复。

徐分根. 时珍国医国药, 2000, (5): 461

11. 过敏性紫癜

陈永红运用普济消毒饮与消斑青黛饮加减治疗过敏性紫癜31例。药用:金银花15克,连翘、黄连、黄芩各10克,生石膏20克,知母、栀子各10克,青黛、玄参、生地各15克,广角丝1克,板蓝根25克,生甘草5克,牡丹皮10克。腹痛重者加白芍15克;合并肾炎尿血者加茅根、藕节各10克,菟丝子20克。常规服药,2周为1疗程,治疗1疗程后,结果:治愈1例,好转9例,无效3例;总有效率为90.3%。

陈永红. 辽宁中医学院学报, 2003, (1): 31

12. 睑缘炎

田道国等运用本方治疗睑缘炎 30 例(46 只眼),4 剂为 1 个疗程,2 个疗程后,结果:痊愈 19 例(26 只眼),显效 8 例(14 只眼),好转 2 例(4 只眼),无效 1 例(2 只眼),总有效率 96.9%。半年后随访,痊愈中复发 1 例为眦部性;显效中复发 3 例,2 例为溃疡性,1 例为鳞屑性;好转中复发 2 例,均为溃疡性。

田道国,等. 山东中医杂志,1996,(12):568

13. 急性咽喉炎

姜蓉运用本方治疗急性咽喉炎 67 例,内服本方每天 1 剂,5 天为 1 疗程。外治:取荆芥 10 克,菊花 12 克。煎水含漱。结果:痊愈 45 例,显效 22 例。见效时间最快 1 天,最慢 3 天,平均治愈时间 7 天。

姜蓉. 新中医,2001,(6):63

14. 颈痛

金淳民运用本方治疗颈痛 56 例。随证加减:如热毒炽盛者加银花 15 克,紫花地丁 30 克,丹皮 10 克,生军 6 克;如气虚者加生黄芪 15 克。每日 1 剂,水煎,早晚各服 1 次。并局部外敷金黄膏,每 1~2 日更换 1 次。结果:痊愈 42 例,好转 2 例,无效 2 例,总有效率 96.6%。治疗时间最长者 15 天,最短者 3 天,平均 7 天。

金淳民. 江苏中医,2000,(3):25

15. 皮肤病

(1) 银屑病

傅子健运用本方加减治疗银屑病,服用 14 剂共治疗 46 天后痊愈,随访 3 年,未见复发。

(2) 湿疹

傅子健运用本方加减治疗湿疹,服用 4 剂,余渣煎汤外洗,痊愈。

(3) 系统性红斑狼疮

傅子健运用本方加减治疗系统性红斑狼疮,服用月余,诸症悉

除。随访一直健康。

(4) 皮肤瘙痒病

傅子健运用本方加减治疗皮肤瘙痒病,每日1剂,服用1个月,瘙痒大减。继服1个月,其病告愈。随访3年,未见复发。

傅子健. 江西中医药, 2000, (6): 35

16. 痤疮

曲战河等运用本方加减治疗青年痤疮36例。随证加减:有脓疮、色赤肿痛者加蒲公英、紫花地丁各15克;大便干结、小便短赤者加大黄、芒硝(冲)各6克;丘疹流水瘙痒难忍者去玄参、丹皮,加苦参、泽泻、苍术各10克;伴有瘢痕损害者去甘草,加三棱、莪术、丹参各10克,昆布、海藻各10克。每日1剂,水煎,早晚各1服。另两煎后药渣再加入大黄9克,煎水外洗患处,每日3~4次,15天为1疗程。加重者为无效。结果:痊愈29例,占80.5%;好转5例,占14%;无效2例,占5.6%。总有效率为94.4%。

曲战河,等. 国医论坛, 1995, (4): 36

17. 急性病毒性心肌炎

师卿杰运用生脉散合普济清毒饮加减,每日1剂,15天为1疗程,若气虚者,加人参;阴虚者,加生地、阿胶;痰湿者,加法半夏、云苓;气滞血瘀者,加红花、川芎;胸痛者,加蒲黄、五灵脂;阴虚者,加附片;浮肿者,加车前子、泽泻等;亡阳脱证者,加服参附龙牡汤,部分病人给氧,加用抗心律失常西药。对照组:每日用维生素C,静脉滴注,10天为1个疗程,注意休息,给予抗病毒、营养心肌药物。对快速型心律失常用多种小剂量抗心律失常药物联合应用,对缓慢型心律失常酌加阿托品、异丙肾上腺素,部分病例给氧,加用抗生、激素、纠正水盐代谢和酸碱平衡等。结果:治疗组治愈16例,有效28例,无效4例;对照组治愈10例,有效25例,无效9例,死亡1例。治疗组总有效率为91.66%,对照组总有效率为77.8% ($P < 0.01$),疗效显著。

师卿杰. 河南中医药学刊, 2002, (5): 50

18. 前色素膜炎

王晶等运用普济消毒饮治疗前色素膜炎 30 例。药用黄芩、黄连、玄参、甘草、薄荷、金银花、菊花、连翘、牛蒡子。若风热侵目，眼部症状较轻，视力下降缓慢，舌红苔薄，脉浮加僵蚕、谷精草、马勃、木贼、葛根；若肝胆实热，眼部症状较重，红肿疼痛及眶，视力急剧下降，发病急，进展快，头痛目眩，口苦咽干，溲黄便秘，舌红苔黄，脉数，加龙胆草、夏枯草、木通、泽泻、大黄、栀子、苦参；若湿热内蕴，头胀身重，关节疼痛，四肢懈怠，胸前作闷，舌苔黄腻，脉濡数，加秦皮、秦艽、防己、羌活、独活、蚕砂；若正气虚弱，眼部症状较轻，或久病迁延不愈，或年老体弱，少气懒言，神疲乏力，舌淡苔薄，脉细弱，加黄芪、人参（或党参）、白术、黄精、山药；若肝肾阴虚，眼部症状轻，反复发作，兼有五心烦热，口燥咽干，腰膝酸软，舌红苔薄脉细数，加知母、黄柏、生地、山茱萸、枸杞子。取上方浓煎，每日 2 次。早晚各服 1 次，1 个月为 1 疗程。结果：除 2 例患者服药半个月，自认无效，中断治疗外，其余 28 例患者均治愈。用药最短时间半个月，最长时间 2 个月，平均 1 个月左右，对其中经常复发的患者进行随访 2 年，均未复发。

王晶，等. 中医函授通讯，1996，(6)：36

茜根散的临床新用

血证

(1) 鼻衄

曹爱梅等运用本方加减治疗鼻衄。随证加减：茜草根 30 克，生地 18 克，黄芩 10 克，侧柏叶 30 克，阿胶（烊化）6 克，龙胆草 30 克，炒栀子 6 克，甘草 6 克，水煎服，日 1 剂，服药 4 剂后鼻衄未再发作，余症亦好转，嘱按前方再进 3 剂以善后。

(2) 肌衄

曹爱梅等运用本方加减治疗肌衄，水煎服日 1 剂，口服 10 剂后

紫斑消失而愈。

(3)尿血

曹爱梅等运用本方加减治疗尿血,水煎服日1剂,口服15剂后尿血肉眼直观消失,尿常规复查呈阴性,告愈。

曹爱梅,等.光明中医,1998,(3):27

卷之二

正面耳颊部

自耳起至下颊髭须止,凡一切痈疽疔毒,皆汇于此部中,以便检阅参治。

耳痛门主论

王肯堂曰:耳痛,寒热间作,内外红肿,疼痛日增。《准绳》。

冯鲁瞻曰:火壅上焦,或作大痛,或脓流于外,或脓塞胀痛,有因纵怒纵酒,湿热相乘,耳肿作痛者,所主宜平肝除热疏风。《锦囊》。

证曰:耳痛之证,痛者壅也,与脓耳初起有间。非醇酒炙搏,即怒火遏郁,更有色欲过甚,真阴耗竭,相火亢盛,或肝胆火逆,是以耳窍壅肿,耳根焮热胀痛。初起俱宜梔子清肝汤、加味逍遥散;如内脓已成,用四妙汤去黄耆加白芷、丹皮;已溃出脓者,用八珍汤去川芎加银花,脓尽换用地黄汤加麦冬、牛膝自愈。外治内已有脓,用红升丹少少提之。耳门不可贴膏药遮挡闭窍。耳畔红肿,用黄敷药敷之自消。

耳发疽门主论

王肯堂曰:耳发疽生耳轮,属手少阳三焦经,风热所致。六七日渐肿如桃,或如蜂房之状,或赤或紫,热如火痛彻心是也。十日刺出黄白脓者生;刺之无脓,时出鲜血,饮食不下,神昏狂躁者死。《准绳》。

申斗恒曰:耳发疽,乃足少阳胆经,其经多气少血,其疽发于鬓下耳旁近脸,悬厘、主客二穴上下,五、六日渐长蜂窝,皮紫焰热如火灼

痛。十日内刺之,有脓者生,无脓出血,精神恍惚,二十四朝必死,不可救也。《启玄》。

《心法》曰:耳发疽,生耳折间,连耳轮通肿,甚则脓窜耳窍。

耳后疽门主论

《心法》曰:耳后疽,生耳上梢之后,角孙穴。开口有空陷下之处者是。

耳疔门主论

王肯堂曰:耳疔,寒热大作,痛楚难禁者,是也。《准绳》。

窦汉卿曰:耳疔,以烧酒滴疔根上,方得脱。随用苦茶洗,解去酒毒。

陈实功曰:黑疔生于耳窍之内,黑硬腐烂,破流血水,疼连腮颧,宜针刺之。照疔疮门治法,《正宗》

耳疳门主论

王肯堂曰:耳疳生疮臭秽,乃足少阴手少阳二经风热上壅而成。《准绳》。

冯鲁瞻曰:耳内疳臭谓之耳耳。乃肾气有余,积热上冲,或因风水起。《锦囊》。

李东垣曰:小儿耳后生疮,名肾疳。

耳疳门主方

耳生疳疮。

黄连去毛须,蜜炙数次 儿茶各等分 轻粉半匙 冰片 麝香各少许 共

乳细搽。

耳后生疮名肾疳。

地骨皮研末，粗者煎汤洗耳，细者香油调搽。

耳疳出脓。

核桃仁研烂，取油一钱，入冰片三分，每用少许滴入。

聤耳门主论

王肯堂曰：聤耳又曰耳湿，常出黄脓。《准绳》。

又曰：乃足少阴，手少阳二经，风热上壅而成。

冯鲁瞻曰：实热者，即肾气有余，积热上冲，津液壅结，故成聤耳。聤耳之名，更有五般：常出黄脓者，谓之聤耳；常出红脓者，谓之脓耳；耳内疳臭者，谓之互耳；白脓出者，谓之缠耳；耳内虚鸣，时出青脓，谓之囊耳。其名虽异，总由积热上壅，或风水入耳所致。若不速治，久则成聋。治宜清火养血，或去湿化毒，其患自愈。《锦囊》。

聤耳门主方

千金不换丹秘方。

水龙骨一钱 硼砂五分

研末。吹入耳窍，以绵塞之，二次除根。

聤耳不论已未出脓，神效方周鹤仙。头发在新瓦上烧灰存性，为细末，罗过，每灰一钱加真冰片七厘研匀，吹少许入耳内。极验。

验方 胭脂烧灰为末，加冰片少许，吹之。

验方 酱茄子挤汁，滴耳内即愈。

震耳门主论

王肯堂曰：耳内虚鸣，常出清脓，名曰震耳。乃足少阴、手少阳二经风热上壅而成。《准绳》。

冯鲁瞻曰：耳内虚鸣，常出青脓，名曰囊耳。乃肾气有余，积热上壅，或风水入耳所致。法宜清火养血，或去湿化毒。《锦囊》。

缠耳门主论

王肯堂曰：耳中常出白脓，名曰缠耳。乃足少阴、手少阳二经风热上壅而成。《准绳》。

冯鲁瞻曰：白脓出者名曰缠耳。仍肾气有余，积热上冲，或风水入耳所致。《锦囊》。

脓耳门主论

陈实功曰：耳病乃三焦、肝风妄动而成，大人有虚火实火之分。小儿有胎热、胎风之别。虚火者，耳内蝉鸣，出水作痒，外无掀肿，实火者，耳根耳窍俱肿，甚则寒热交作，疼痛无时。《正宗》。

又曰：初生小儿胎热，或洗浴水灌窍中，亦令耳窍作痛生脓。切记不可吹药，若治早项内生肿，莫若候毒尽自愈。如一月外不瘥，以红绵散治之，自安。

冯鲁瞻曰：耳者，宗脉之所聚，肾气之所通也。有小儿肾经气实，其热上冲于耳，遂使津液壅而为脓，或为清汁，然则厥阴之与足阳明，手少阴之与足太阳，为证尤甚。推其所致之由，其原有七：有实热，有阴虚，有因痰，有因火，有气闭，有肝风，有胎元所发而为病也。证有五：为鸣、痛、肿、聋、聾是也。当分其所因而治之。《锦囊》。

又曰：常出红脓，谓之脓耳。

又曰：胎元而成者，是因父母不谨，故先天火毒攻冲，脓臭流处成疮，四傍肿赤，时发时愈。所主宜化毒滋肾。

陈远公曰：人有双耳忽肿痛，内流清水，久则变脓血，身发寒热，耳内如沸汤响，或如蝉鸣，此少阳胆气不舒，而风邪乘之，火不得散，故生此病。法宜舒发胆气，佐以散风泻火之味，则愈矣。然有不效者，何也？盖胆受风火之邪，燥干胆汁，徒用祛风泻火，则胆汁益干，胆火益

炽，风藉火威，愈焚灼也，病益甚矣。润肠汤主之，当归、白芍、玄参各一两，黑梔子二钱，柴胡一钱，花粉三钱，石菖蒲八分，水煎服。一剂疼轻，二剂肿消，三剂脓血止，四剂寒热除，十剂全可也。此方归、芍不但入胆，且入肝也。胆病，肝亦必病，平肝则胆亦平也。柴、梔亦舒肝胆之味，舒肝正所以舒胆也。肝舒则血必旺，而胆汁有不濡润者乎！胆汁既濡，邪风邪火，已有不治自散之机，加天花粉逐痰，则风火无党，以石菖蒲通耳中之窍，玄参退浮游之焰，自然风火渐祛，上焦清凉，耳病随痊也。《冰鉴》。

汪省之曰：虚火治以四物汤加牡丹皮、石菖蒲、肾气丸主之。实火，治以柴胡清肝汤主之。《理例》。

脓耳门主方

红棉散 耳内生疮流脓，乃肝经郁火所结。

枯白矾三钱 胭脂一钱，煨存性，如能用干胭脂更佳

研匀。先用棉杖子搅去脓水，另以柳杖子蘸药掺入耳底，自干。若聾耳加麝香五厘。

耳底流脓

枯矾 黄丹 龙骨 海螵蛸 麝香 干胭脂研细吹之。

又方

青黛 人中白 枯矾 雄黄 冰片 黄柏各等分，研细吹。

又方 橄榄核煨存性研细，加冰片少许吹。

又方 大红千叶石榴花瓣研细吹。

又方 枯矾入人乳内，放炭火上炖滚变黑色，研细吹。

又方 芦柴梗、叶箬煨存性，加冰片少许，研细吹。

又方 陈皮煨灰一钱，加麝香少许，吹。

又方 白耆牙二个煨，加冰片，研细吹。

又方

水龙骨即船底陈油石灰，一两 硼砂二钱五分

共研极细。每用少许吹。

又方

许

黄丹水飞,二钱 龙骨煨 枯矾 胭脂各一钱 海螵蛸五分 麝香少

研细。以棉杖子搨去脓水,用少许吹耳内,每日吹一次,勿令风入。

煎方 蔓荆子 升麻 前胡 桑白皮 甘草 麦门冬 赤茯苓 赤芍

耳内肿痛出脓出水 金丝荷叶即虎耳草揉汁,灌入耳内自愈。此味乃治耳病之妙药,如有脓可加枯矾少许。

又方 头发烧存性研细,每用少许吹入。

又方 五倍子一个,略挖破,入生明矾于内,纸包浸湿火内烧存性,研细。每用少许吹入。

又方 鲜白果捣烂,用棉裹绞汁入耳,脓血自止。

又方 蛇蜕卷条插入耳内,其脓吸尽自愈。

又方 红枣一枚去核,入雄黄三分,烧干研末,用管吹入耳内。

又方 柿蒂不拘多少,煨存性,研细吹。

耳风毒门主论

王肯堂曰:耳风毒,耳中常出红脓,此足少阴、手少阳二经,风热上壅而成。《准绳》。

胡公弼曰:耳风毒,即耳门毒。《青囊》。

又曰:耳之上下前后,皆属少阳,最不可破。如毒一有溃破,便要仔细详审,不可轻忽。

窦汉卿曰:耳风毒受在心肾,气不流行,壅在心经,致伤于耳。

耳聾耳痔门主论

王肯堂曰:耳聾、耳痔,则不作脓,亦不作寒热,外无壅肿。但耳塞不通,缠绵不已,令人耳聋。《准绳》。

陈实功曰:又有耳挺,结于窍内,气脉不通,疼痛不止,当用白降丹

点之，化尽乃愈。《正宗》。

窦汉卿曰：耳痔、耳聾，先用针刺破，用红玉膏点之；耳胀痛，用虎耳草汁滴入耳内，痛即止。

汪省之曰：耳挺治以梔子清肝汤，外以白降丹或线蘸药插入挺肉缝内，化尽自愈。《理例》。

耳痛门主论

《易》说：卦坎为耳痛。

王肯堂曰：脑里虚癆，虚癆者即无名肿毒之谓。耳中疼痛，不可当者。《准绳》。

冯氏曰：耳痛、耳鸣、耳痒、耳脓、耳疮，亦当从少阴正窍分寒热虚实而治之，不可专作火与外邪。凡耳鸣，以手按之而不鸣，或少减者，真虚也；手按之而愈鸣者，火实也。昔王万里时患耳痛，魏文靖公劝以服青盐鹿茸煎雄附为剂，且言此药非为君虚损服之，曷不观易之坎为耳痛，坎水藏在肾，开窍于耳，在志为恐，恐则伤肾故耳痛。气阳运动常显，血阴流行常幽，血在形如水在天地之间，故坎为血卦，是经中已着病证矣。竟饵之而愈。《锦囊》。

耳痛门主方

立效散 耳内忽作大痛，如有虫在内奔走，殊痛，或出血、或出水、或干痛，不可忍者。蛇退火烧存性，研末，鹅管吹入立止。一方加冰片。用蛇退者，取蛇之善脱以解郁火也。

耳痛不可忍者 磨刀铁浆滴入耳中即愈。

又方 番木鳖子去壳，磨冰麝油，滴入耳中，自止。

耳痒门主论

《后汉·律历志》：春分晷长七尺二寸四分，当至不至，多病耳痒。

岐天师曰：有耳中作痒以木刺之，尚不足以安其痒，必以铁刀刺其底，铮铮有声，始则快然，否则痒极欲死。此肾肝之火结成铁底于耳中，非汤药可救，宜救痒丹主之。愈后服六味地黄丸三十斤可也。

耳痒门主方

耳痒，并治耳中有核，或耳屎凝结难取 胡桃肉煨热塞耳内，食顷即通。

耳痒或耳屎结于耳底 火酒滴入，片时即止。

救痒丹岐天师。

龙骨一钱 冰片三分 皂角刺一条，烧灰存性

先将药研细。用雄鼠胆一枚，水调匀，加人乳再调如厚糊，尽抹入耳孔内，必然痒不可当，必须人执其两手，痒定则自愈矣。

耳烂门主方

耳轮赤烂 桑、枣、槐、柳、桃嫩枝摘来煎汤，日洗三次。

又方 贝母、轻粉研匀干掺。

卷之三

唇口部

凡一切唇口、上腭、风疽疮毒，皆汇于此部中，以便检阅参治。

唇口望色辨证法

唇口焦红者，吉。

唇红者，主烦躁渴饮也。

唇燥裂者，是脾热。

唇口俱肿赤者，是热极。

唇口俱青黑者，是寒极。

唇白者，主吐涎呕逆，诸失血证也。

唇黄者，主脾受积热也。

唇青者，主血虚脾寒也。

唇红紫者，主虫啮积痛也。

唇口舌胎有断纹者，难治。

唇口焦黑者，凶。

唇青舌卷者，死。

唇吻色青者，死。

环口黧黑者，死。

口张气直出者，死。

黑色自人中入口者，死。

人中平满者为唇反，唇反者肉先死。

上唇生疮，虫食其脏；下唇生疮，虫食其肛。此伤寒狐惑证。

辨口味察证法

口甜,是肝热脾湿,胃有痰滞。

口淡,是胃热。

口干口燥,是胃家热极。

口咸,是肾水上泛,肾热。

口酸,是肝热。

口干,是脾热。

口辛,是肺热。

口臭,是胃热。

口苦,是心热或胆热。更有因谋虑不决,肝移热于胆,而口苦者。

盖肝主谋虑,胆主决断,遇事或胆不决则恚怒,胆汁上溢而口苦。

口酸,有脾胃气弱,木乘土位而酸者。

口糜,有膀胱移热于小肠,而口糜溃烂者。

唇病门主论

《折衷》云:脾脏应肾,通口气,脾胃为合,足阳明胃之经,其脉挟口环唇,故脾胃受邪,则唇为之病。风则动,寒则紧,燥则干,热则裂,气郁则生疮,血少则涩而无血色。然六腑之华,亦在唇。经云:脾胃、大肠、小肠、三焦、膀胱者,仓廩之本,营之居也,其华在唇。且肝脉、督脉、冲脉、任脉皆络于唇,一有受邪,则唇为病。

又曰:喘而唇缩者,死。

又曰:小儿唇红如丹,即发渴候,红甚焦黑则危。

冯鲁瞻曰:唇本脾之外候,然足阳明脉亦起鼻而环于唇,故凡停滞伤脾,必气粗唇坚而发肿,名曰唇肿。至有伤寒,或发惊候,是以眉棱骨痛,厥热眩闷,气秽颐浮,或舌苔,或齿击,或狂逆,则又色白肿甚,名曰茧唇。若至胃伤极而唇烂,壮热移甚见痘者,名曰胃烂唇泉,十救

一、二。如忧愁劳极，满唇破裂者，亦名曰口糜。如风寒乍乘，唇青带白者，宜温胃驱风。如吐后而唇白者，治宜养胃调气。如怒气上冲，唇青者，治宜顺气平肝和胃。更有唇口蠕动者，脾虚不能收摄也。

唇紧门主论

冯鲁瞻曰：唇口紧小不能开，饮食不得入者，名曰唇紧。《锦囊》。

《折衷》云：脾胃受邪，则唇为之病，得寒则紧也。

窦汉卿曰：口紧，一名月阙疮，雁来风，虫蚀疮。此证急用马齿苋捣汁洗紧唇；仍用黄芩汁灌去风痰，冰片散吹之。如毒气归心，胸前胀满，上气频促，下部洞泄不止，必死难治。

胡景周曰：唇紧湿烂，乍好乍发，经年累月，又名唇沈。音渗，汁也。乃脾家湿热也。

唇紧门主方

口唇燥裂 橄榄泡汤服，核中仁研烂敷患处。

又方 胭脂敷。

唇紧湿烂，经年累月，乍好乍发。葵根烧灰，猪脂和涂。

唇紧口小不能开 鳖甲、鳖头烧为末，敷之。

又方 马齿苋煎汁洗之。干者亦可。

唇紧难开灸法 承浆穴在颐前唇下陷中，足阳明之会，一名天池。灸三壮。

合谷穴在大指歧骨间，一名虎口。男左女右，灸三壮。

冬月唇干血出 桃仁研烂，猪油调涂。

唇润门主论

窦汉卿曰：脾胃受风，则唇润动裙揭矣。

冯鲁瞻曰：如唇口蠕动者，脾虚不能收摄也。误治为痰，则津液愈枯，筋脉失养，抽掣诸证作矣。《锦囊》。

唇腭门主方

唇口腭动

薏苡仁 赤小豆 防己 甘草 水煎服。

唇风门主论

陈实功曰：阳明胃火上攻，其患下唇发痒作肿，破裂流水，不疼难愈。宜铜粉丸泡洗，内服地黄丸。自愈。《正宗》。

胡景周曰：凡下唇肿痛，或生疮，名驴嘴风。上唇肿痛生疮，名鱼口风。以井华水常润之，乃可搽药，以芒硝涂之。

唇疔门主论

申斗垣曰：唇疔初起如粟，或不痛，或痒甚，其形甚微，其毒极深，其色或赤或白。若唇口上下紫黑色者，根行甚急，不一日间头面肿大，三、四日内即死不救。医者于初起时，即用快刀割去此毒。唇缺亦所难顾，再从容补唇，诚为救命之捷径也。《启玄》。

陈远公曰：有唇上生疔者，或口角旁，或上下唇，不论大小，大约皆脾胃火毒也。宜早散之，否则毒气炽炎，必且艰于饮食，往往有腐烂死者。疔毒以愈小而愈横也。治法急泄其火毒，不可损伤脾胃之气，毒易散矣。救唇汤：金银花一两，紫花地丁一两，白果二十个，桔梗三钱，生甘草三钱，知母一钱，水煎服。一剂疼止，二剂疔消，三剂痊愈。已烂者又二剂。

此方治头面疔疮亦效。此以白果、桔梗引银花、地丁至生疔之处，而尽去其毒也。《冰鉴》。

《心法》曰：唇生疔毒，细看腿弯中紫黑筋，用长针刺破，血出即愈。

唇疮门主论

《折衷》云：脾气郁则唇生疮。

冯鲁瞻曰：有胃伤极而唇糜，壮热秽甚见痘者，名曰胃烂唇泉。十救二、三。《锦囊》。

唇疮门主方

唇疮《准绳》。 甑上滴下汗，敷之神效。

唇生疮连年不瘥《千金》。 八月蓝叶一斤，捣汁洗之。不过三日。

唇疮《准绳》。 白荷花瓣贴之神效。开裂出血者即止。

嘴唇破 石蟹磨水搽之。

又方 东壁土研细搽。

又方 轻粉敷。

又方 头垢敷。

唇疮痛痒 黄柏末用野蔷薇根取汁调涂。

唇口疽门主论

蒋示吉曰：又有脱疽生手足或生口面，命难存。《说约》。

胡公弼曰：唇口疽即脱疽。初起如粟，其色如褐，或如枣皮渐黑渐开渐大，不知痛痒，臭秽难闻。小儿多从积热之毒，大人多因过服辛温燥剂。古人虽有割法，大约六、七日多死。

唇奇病门主论

岐天师曰：有人唇上生疮，久则疮口长牙齿于唇上者，此乃七情忧郁、火动生齿奇病也。《秘录》。

唇奇病门主方

煎方岐天师。

生地 当归 白芍 柴胡各三钱 天花粉二钱 黄连 黄芩 川芎各一钱 白果十枚 煎服。

掺药岐天师。

冰片 直僵蚕各一分 黄柏炒,三钱

研细末掺之,齿自消矣。

甘露饮的临床新用

1. 慢性乙型肝炎

刘昌海运用甘露饮原方去枇杷叶治疗复发性口腔黏膜溃疡 30 例。方药:生地黄 15~20 克,熟地黄 15 克,天冬 15 克,麦冬 15 克,石斛 15 克,黄芩 10 克,茵陈 10 克,枳壳 9 克,甘草 10 克。胃火炽盛,口渴甚加知母 12 克;大便秘结加芦荟 5 克;肝火炽盛、口苦、烦躁易怒加牡丹皮 15 克,栀子 9 克;合并感染,溃疡分泌物多,口臭或有低热加蒲公英 30 克,紫花地丁 30 克。水煎服,日 1 剂,14 剂为 1 个疗程。结果:治愈 18 例,有效 8 例,治愈率 60%,总有效率为 86.60%。

刘昌海. 山东中医杂志,2004,(6):347

2. 复发性麦粒肿

王伟运用本方加减治疗复发性麦粒肿 82 例(114 只眼)。基本方:生地黄 10 克,熟地黄 10 克,石斛 10 克,天冬 12 克,麦冬 12 克,黄芩 10 克,茵陈 10 克,枳壳 10 克,枇杷叶 4 克,甘草 6 克。每日 1 剂,水煎服,分上下午 2 次温服。如见面白,倦怠乏力者可加党参、黄芪、白术;红肿较甚者加蒲公英、野菊花、桑白皮;脓出不畅者可加黄芪、银花、皂角刺。结果:治愈 68 例(87 只眼),好转 12 例

(23 只眼), 无效 2 例(4 只眼)。治愈率为 76.3%, 有效率为 96.5%。疗程最短 5 天, 最长 4 周, 一般 5~10 天。

王伟. 中国民间疗法, 2002, (2): 48

3. 糖尿病湿热证

罗燕楠运用本方加减治疗糖尿病湿热证。随证加减: ①湿热内蕴伴阴津损伤, 临床表现: 口渴多饮, 口臭, 多食易饥, 大便秘结, 小便短少而频, 舌苔黄腻, 脉滑细数, 治宜清热利湿、滋阴降火。方药: 甘露饮(茵陈 20 克, 黄芩 10 克, 生、熟地黄各 20 克, 枳壳 10 克, 枇杷叶 12 克, 石斛 10 克, 天冬、麦冬各 10 克)加玄参 10 克, 苍术 10 克, 全瓜蒌 20 克, 苔厚腻者加佩兰 10 克, 饥饿感重者加生石膏 20 克。②湿热内蕴伴气机阻滞, 临床表现: 口渴多饮、口苦, 多食易饥, 胸脘痞闷, 烦躁易怒, 大便秘结, 小便黄赤, 舌红苔黄腻, 脉弦滑数, 治宜清热利湿、疏肝理气。方药: 甘露饮加柴胡 10 克, 厚朴 10 克, 陈皮 10 克, 白芍 20 克, 玉竹 10 克, 知母 10 克。③湿热内蕴伴气阴两伤, 临床表现: 口中淡而无味或口苦, 食欲不振, 疲乏无力, 易汗出, 大便秘结或溏薄, 小便混浊而频, 舌红苔黄腻, 脉细滑。治宜清热利湿, 益气养阴。方药: 甘露饮加黄芪 30 克, 太子参 20 克, 山药 30 克, 佩兰 10 克, 玉竹 10 克。④湿热内蕴伴瘀血阻络, 临床表现: 面色黧黑, 口臭, 牙龈出血, 视物模糊, 或手足末梢刺痛、麻木, 大便秘结, 小便频数, 舌质紫暗, 有瘀斑, 苔黄腻, 脉沉湿, 治宜清热利湿、活血通络。方药: 甘露饮加当归 10 克, 丹皮 10 克, 赤芍 10 克, 菊花 10 克, 丹参 15 克, 白茅根 20 克, 生三七粉 3 克(冲)。⑤湿热内蕴伴肝肾亏虚, 临床表现: 两目干涩, 腰膝疲软, 耳鸣, 口干、口苦或口臭, 齿衄, 多食易饥, 消瘦, 大便秘结, 小便频多, 舌暗红, 苔黄腻, 脉细数而滑。治宜清热利湿、滋补肝肾。方药: 甘露饮加玄参 10 克, 枸杞子 15 克, 女贞子 12 克, 墨旱莲 12 克, 牛膝 10 克, 白茅根 12 克, 侧柏叶 12 克。

罗燕楠. 中国中医药信息杂志, 2002, (8): 59

4. 小儿扁扁桃体炎

杜建新以本方加减治疗小儿扁扁桃体炎 56 例。随证加减:高烧者加生石膏 15~30 克,大黄 6~9 克,紫雪散 1.5~3 克(冲服);淋巴结肿大者加柴胡 6~9 克,蒲公英 20 克,夏枯草 10 克;合并疱疹性咽峡炎者加大青叶 15 克,板蓝根 15 克;合并支气管炎者加川贝母 6 克,杏仁 6~10 克,桃仁 6~10 克,瓜蒌 15~30 克,鱼腥草 15~30 克。对照组全部应用西药治疗,给青霉素肌注(用量同上)或静脉滴注(20~40 万单位/千克/日)。对高烧、局部出现化脓性炎症者,给先锋霉素静脉滴注(20~100 毫克/千克/日)。对病毒感染者加用病毒唑肌注(每次 0.1 毫克,每日 2 次)或静脉推注(每次 0.2 毫克,每日 1 次),同时配合应用华素片含化及对症治疗。结果:治疗组痊愈 29 例,占 51.78%;有效 24 例,占 42.86%;无效 3 例,占 5.35%;总有效率 94.64%。对照组痊愈 12 例,占 28.57%;有效 20 例,占 47.61%;无效 10 例,占 23.81%;总有效率 76.19%。

杜建新. 中国中西医结合耳鼻喉科杂志, 1996, (2): 92

5. 复发性口疮

郭明玉以本方加味治疗复发性口疮 52 例。治疗组:药用甘露饮加味:生地、熟地、茵陈、枇杷叶、天冬、麦冬、玄参各 15 克,黄芩、枳壳、石斛、竹叶各 1 克,甘草 3 克。每日 1 剂,水煎分 2 次服,7 天为 1 个疗程。对照组:维生素 C、维生素 B₁、维生素 B₂,每日 3 次,每次各 2 片,疗程同上。2 组均局部外用双料喉风散,每日 3 次。结果:治疗组痊愈率为 76.9%,总有效率 92.3%;对照组痊愈率为 36.5%,总有效率 78.8%,2 组疗效经统计学处理有显著差异($P < 0.01$)。

郭明玉. 福建中医药, 2000, (1): 46

6. 口腔炎

黄旺惠运用甘露饮加味治疗口腔炎 88 例。方药组成:二冬各 12 克,二地各 12 克,黄芩 9 克,石斛 12 克,茵陈 15 克,枇杷叶 10 克,甘草 3 克,竹叶 12 克,木通 8 克,升麻 8 克,热甚加石膏 30 克,

栀子 10 克(小儿应根据年龄大小酌情减量)。日服 1 剂。结果:痊愈 86 例,其中服 1~3 剂痊愈者 62 例,服 4~10 剂痊愈者 24 例,无效 2 例。有效率达 97%。

黄旺惠. 福建中医药, 1995, (6): 39

7. 慢性咽炎

王丽超运用本方加味治疗慢性咽炎 46 例。方药:玄参 20 克,熟地、生地各 15 克,麦冬、天冬、茵陈、黄芩、桔梗、香附、浙贝各 10 克,枳壳、枇杷叶各 12 克,水煎服,1 日 1 剂,7 天为 1 个疗程。结果:经 2~4 个疗程治疗后,治愈 28 例,好转 16 例,无效 2 例,在治疗过程中,全部病例均无毒副作用。

王丽超. 江西中医学院学报, 2000, (3): 59

8. 阴虚热痹

傅谦运用本方加味治疗阴虚热痹型急性风湿性关节炎 80 例。基本方:生地 15 克,天麦冬各 10 克,石斛 12 克,白芍 12 克,甘草 5 克,秦艽 12 克,丝瓜络 10 克,络石藤 15 克,海风藤 15 克,木瓜 12 克,怀牛膝 12 克,生薏苡仁 15 克,桑枝 30 克。加减:阴虚化热较重而发热者,加生石膏 30~45 克,忍冬藤 30 克;兼见气阴两虚,汗出较多者加太子参 15 克,玉竹 15 克,五味子 15 克,甚者加山萸肉 15~30 克,煅龙牡各 30 克;脾虚便溏者加山药 24 克,砂仁 6 克;阴损及阳者加肉桂 3~5 克(后下,煎 5 分钟)。每日 1 剂,水煎服。20~30 天为 1 疗程,一般连用 2~3 个疗程。结果:痊愈 33 例,占 41.3%;好转 45 例,占 56.2%;无效 2 例,占 2.5%;总有效率为 97.5%。

傅谦. 山西中医, 1998(1): 8

9. 中心性浆液性视网膜病变

张凤梅等运用内服中药甘露饮加味治疗中心性浆液性视网膜病变 58 例(60 只眼)。10 天为 1 个疗程。服药期间停用其他中西药物。情志不畅,眼胀不舒,两胁胀痛者,加柴胡、香附、郁金;面色紫暗,舌质暗红或有瘀斑,眼底有出血者,加丹参、丹皮、旱莲草;湿

热偏盛者加龙胆草、木通、青箱子；眼底水肿明显，脾胃气虚者，加泽泻、白术、党参、云苓、猪苓；有湿痰或眼底渗出长时间不退者，加陈皮、半夏、大贝、竹茹、胆星、三棱、莪术等。结果：治愈 51 只眼，有效 9 只眼。出现疗效天数最短 5 天，最长 15 天，平均 9 天；疗程最短 20 天，最长 90 天，平均 33 天。总有效率 100%。初发 32 只眼治愈 32 只眼（100%），平均治愈时间 23 天；复发 28 只眼，治愈 19 只眼（67%），平均治愈时间 41 天。

张凤梅，等. 江西中医药，1994，(25)增刊：67

10. 脑出血

王永民运用本方治疗脑出血 30 例。药物组成：鹿茸 6 克，巴戟天 6 克，熟地 9 克，肉苁蓉 9 克，黄精 12 克，天门冬 12 克，石斛 12 克，川芎 12 克，丹参 12 克，鸡血藤 12 克，地龙 12 克，黄芪 12 克。于病情稳定后或患病后 2 周服用。上药加水浸泡后煎 2 次取汁混合，日服 2 次，每日 1 剂；或将上药烘干粉碎，装 0 号胶囊，每次服 2~3 克，每日 3 次，1 个月为 1 疗程。伴高血压病者加服降压药，颅压升高者加用甘露醇。结果：基本治愈 17 例，显著进步 8 例，进步 5 例。CT 复查示出血灶均吸收，治疗中未见明显毒副作用。

王永民. 中国中医急症，2002，(10)：406

柳花散的临床新用

尿毒症合并念珠菌性口腔炎

赵纪生等运用本方加味治疗尿毒症合并念珠菌性口腔炎 16 例。药用：黄柏 20 克，青黛 9 克，肉桂 3 克，冰片 0.5 克，大黄 10 克。共研极细末，混匀备用。外搽口腔黏膜，每次 3~4 克，每日 2~3 次。另装入胶囊口服，每次 5 克，每日 2~3 次。结果：痊愈 9 例，好转 5 例，无效 2 例。好转率为 87.5%，平均治疗时间 4.8 天。

赵纪生，等. 山西中医，1997，(6)：6

卷之四

舌 部

凡一切舌疽疮痹，皆汇于此部中，以便检阅参治。

察舌胎辨证法

舌为心苗，应南方火。邪在表，则未生胎；邪入里，津液搏结，则生胎而滑。胎白者，丹田有热，胸中有寒，邪在半表半里也。热入渐深则燥而涩，热聚于胃矣，宜承气、白虎。若热病口干舌黑，乃肾水刑于心火，热益深而病笃矣。然有胎黑属寒者，必舌无芒刺，口有津液也，即小便之赤白，口中之润燥，舌胎之滑涩，亦皆因乎津液之荣枯，未足凭以遽断寒热也，故尤宜以脉之有力无力细辨之。总之，医家治病，须随机应变，活泼泼地，不可胶执一方，不可泥滞一药，不必以药治病，惟以药治脉可也。古今气运不同，旧方新病，何能符合，只可读其书，广其义，考其方，得其理，潜心默究，自得其神，即罗氏譬之拆旧料而改新房，务必工稳耳。

白胎是热聚丹田，寒留胸膈，湿气熏蒸所致。治宜燥湿和中。

滑白色者，邪未入腑，半表半里也，宜和解之。热入渐深，则燥而涩矣。

黄胎者，胃腑有邪热也，宜下之。

舌上有黑胎生芒刺者，其因有二：非水来克火为寒极，即火极似水为热极，以脉迟数无力有力辨之。一宜大承气，一宜理中汤。然十有九死之证也。

舌上黑胎生芒刺，刮不去易生者死。

舌卷囊缩，爪甲青黑，不知人事，面青作搐者，肝绝也。

舌出不入门主论

岐天师曰：人舌吐出，不肯收进，乃阳火盛强之故。《秘录》。

窦汉卿曰：伤寒舌出寸余，连日不收。用梅花冰片五钱掺舌上，即收。《全书》。

张仲景曰：伤寒舌出者死。

舌出不入门主方

舌出口数寸，冰片为末敷。

人舌吐出，不能收进，乃阳火盛强之故。冰片点过，服。

黄连 人参 白芍药各三钱 柴胡 石菖蒲各一钱

水煎服，二剂愈。

又方 蓖麻子为末，装纸条内烧烟熏之。鼻孔有涎流出，即愈。

舌缩不出门主论

岐天师曰：人舌缩入喉咙，不能语言者，乃寒气结于胸腹之故。《秘录》。

证曰：舌乃心苗，气虚与心脾积热，俱能令人舌短，不仅寒凝胸腹，当详辨之。

舌缩不出门主方

神方 治舌忽缩入喉咙，不能言语，乃寒气结于胸腹。

人参三钱 白术五钱 肉桂 干姜 熟附子各一钱

水煎服，其舌自舒矣。

气虚舌短，人参煎汤服。

心脾积热舌短，黄连、石膏，或只用一味，或兼用，煎汤服。

弄舌舒舌门主论

经曰：舌乃心苗。又曰：心开窍于舌。心火亢盛，肾阴不能上制，所以舌往外舒，肝火助焰，风主动摇，胃热相煽，舌难存放，舌如蛇舔左右上下，伸缩动摇，谓之弄舌。当清心胃之火，则肝风自息矣。

冯鲁瞻曰：弄舌者，是脾藏小热，舌络微紧，时时舒舌。治之勿过用凉药，即有饮水者，亦脾虚津液不足耳。若于大病之来^①而弄舌者凶。

又曰：凡出长而收缓者，名曰舒。微露即收，舌干肿涩者，名曰弄舌。

骆潜庵曰：舌忽舒长，舌忽卷缩，舌忽肿满，皆属风热盛而妨乳食也。宜延寿丹。

弄舌舒舌门主方

清胃散

防风 天花粉 黄芩 熟石膏 厚朴姜制 枳壳 黄连 陈皮 甘草 水煎服。

又方 以西牛黄一厘涂舌上，即止。

舌喑门主论

冯鲁瞻曰：舌喑者，中风而舌不转运，舌强不能言是也。经曰：喉咙者，气之所以上下。会厌者，声音之户。舌者，声音之机。唇者，声音之扇。横骨者，神气所使，主发舌者也。然心之本脉，系于舌根，脾之络脉，系于舌傍，肝脉循阴器，络于舌本，少阴之脉之喉咙，系舌本。足

① 来 光华堂本作“末”。

四经之脉，皆上于舌，邪中其经，则痰涎闭其脉道，舌不能转运而为之暗矣。有喉暗者，劳嗽失音，即喉哑是也。故喉暗者，喉中之声嘶，而舌本能言，舌暗者，舌本不能言，而喉中之声如故，中风而舌暗者，舌与喉俱病，而音声不能发于会厌也。然有外感内伤之因。外感者，风寒火热之邪也。经曰：诸热暴暗，皆属于火。内伤者，心肺肾三经致病，亦多由痰火壅塞上窍，气血两虚，不能上荣，则舌机不转也。有肾虚而气不归源，内夺而胞络内绝，不能上接清阳之气者；有元气不足，肺无所资者；有血衰而心失所养者。盖心为声音之主，肺为声音之户，肾为声音之根。经曰：三焦之气，通于喉咙，气弱则不能上通矣。治者能于根本用力，则丹田清阳之气，自能宣扬振作，故古人每以独参汤、地黄饮子取效也。然中风不语之证有六：有失音不语者；有舌强不语者；有神昏不语者；有口噤不语者；有舌纵语涩不语者，有舌麻语謇不语者。可不详欤！

重舌门主论

陈实功曰：重舌，乃心火妄动发之，舌下又有一舌也。当以线针点刺患上，令出恶血，内服黄连泻心汤，外用冰硼散搽之。《正宗》。

冯鲁瞻曰：重舌者，心脾有热也。盖心候舌而主血，然脾脉络于舌下，火土又子母也，有热即与血气俱盛。其状附舌下，而近舌根，生形如舌而微短小，色异，亦宜针刺。《锦囊》。

窦汉卿曰：重舌，乃舌下生一小舌，其舌鲜红，其外证颌下浮肿，有硬核。此心经受热，毒气出于舌下。先用紫雪掺之，流出热涎，急服甘桔汤加姜灯心煎服。《全书》。

又曰：莲花重舌，乃蕴热乘风而发，心火炎上之义。

又曰：莲花舌，乃舌下生三小舌，其状如莲花之形。但舌乃心之苗，心火上炎，或思虑太过，或火气所伤，或酒后当风取凉，以致风痰相搏而成。此候急用清凉解毒汤加减服之，再吹。如肿不散，须用小刀针出紫血为妙。

又曰：舌下生小舌，名曰重舌。盖舌乃心苗，心火上炎故生之。用

小刀点紫黑处，吹冰片散，服甘桔汤加山梔、连翘之属。

又曰：咽喉有肿，复生重舌，此两经受病，俱有邪也，心邪发于舌下，胃邪出于喉咙。盖因喉间之邪，触起于心经之邪，则其病俱发。外证头疼项强，身发潮热者，是也。探痰法同前，再用紫雪、冰片散治之。

汪省之曰：重舌，大小男女俱生。乃心火妄动，当以线针点刺患上。《理例》。

骆潜庵曰：脾之脉络系舌傍，肝之脉络系舌本，心之脉络系舌根，三经受胎毒而上攻，舌下又像有一舌也，名曰重舌。宜延寿丹。《推拿秘书》。

证曰：重舌、莲花重舌，有男妇心绪遏郁，忧思过度之人，每生此证。因循日久，以致溃烂腐秽。舌头一烂，外壳虽存，其中如烂鱼肠相似，断不可用升炼药吹搽，一用即血出如泉，穿腮腐龈，百不一生。证见数证，俱因庸工妄治而亡，不可不慎。

重舌门主方

重舌涎出，水浆不入《圣惠方》。

玄精石二两 牛黄 朱砂 冰片各一分

研末。以针舌上去血，盐汤漱，掺末咽津。效验如神。

重舌、木舌、紫舌

黄连 连翘 山梔 黄芩 木通 荆芥 薄荷各一钱 牛蒡子一钱 甘草五分

灯心十根，煎服。

当归连翘汤 治心脾有热，重舌、木舌。

当归尾 连翘各三钱 川白芷二钱 大黄 甘草各一钱 水煎服。

消毒犀角饮 治内蕴热邪，咽膈不利，重舌、木舌，一切热毒。

鼠粘子微炒，四钱 荆芥 黄芩 甘草各一钱 防风 犀角各五钱 水煎服。

木舌门主论

陈实功曰：木舌、紫舌，亦由心火而发。用飞盐加冰片少许，勤搽出涎自愈。《正宗》。

冯鲁瞻曰：木舌者，因脏腑壅热，心脾积热，其气上冲。是以舌肿尖大，塞满口中，若不急治，则致害人。更不可用手去按，按则舌根乃损，长成语言不正。如至啼叫无声，面色频变而惊疼者，不治。然舌固属心脾，但肝脉亦络舌本，故伤寒邪传厥阴，则舌卷囊缩，概可见矣。《锦囊》。

张宪伯曰：舌忽胀大，硬肿塞满，即时气绝，名曰戛舌。《闲抄》。

窦汉卿曰：木舌症硬如穿山甲，见人舌做一拳。外证憎寒壮热，语言謇涩，此心经受热。心者舌之本，因心而病。治法以小刀点紫黑处，煎药内多加山梔。山梔乃泻火之要品也。《全书》。

又曰：木舌、乳蛾，此证为因心经热毒，或因酒后温床厚被，以致热气攻于心经。故生单蛾及舌胀而紫，吐出风痰，急用三棱针刺舌下金津、玉液二穴，及刺乳蛾，俱破出血痰，即用胆硝丹吹入喉中，仍服荆防败毒散。

又曰：舌上有白胎结硬，必作木舌。用前法治之。

又曰：凡舌证白胎坚硬，药味不得入者，揩拭洁净，用竹刀刮舌，然后用药。

又曰：舌卷大不得吞咽，皆由热毒冲上。急用紫雪加冰麝掺舌上，再用冰片散吹之。

汪省之曰：舌胀色紫如肝，名曰紫舌。凡舌转掉不仁，名曰木舌，此乃因心火而发。《理例》。

奎光曰：木舌者，舌肿大如煮熟猪肝，不能转动。又有一肿生舌根下，状如白枣，有青紫筋，不能速愈。初起不疼，不发寒热，渐渐肿大，速治可愈。迟则难痊，皆由忧郁所致。

又曰：治口舌证，吹药后，如舌上无涎，或如干橘核者，不治。

又曰：凡遇口舌糜烂无血出者，不治。

又曰：凡舌肿大，用生石膏加冰片敷。如出血者石膏炒用。

又曰：舌肿胀满口，吐舌在外，难以纳药者，用僵蚕、牙皂制过为极细末，用少许吹鼻中，口自开，痰涎自出。用箸绕丝绵蘸甘草汤润其舌。用四味口疳药多加冰片频吹。

又曰：木舌，初则金丹、碧丹同用，方载咽喉门。后则单用金丹内服煎药。

张仲景曰：伤寒舌肿者，难治。

骆潜庵曰：舌肿如木，名曰木舌，乃风热盛也。宜延寿丹。

木舌门主方

治木舌口舌俱硬不能开《秘方》。

薄荷 细茶各等分

共煎。露一宿，青绢裹箸上，蘸药徐徐抹上自消。

重舌木舌。

黄连蜜炙二钱 白僵蚕一钱

共乳细。掺舌上涎出即好。

又方 生姜切片蘸硼砂末擦之。

重舌、木舌、紫舌，及咽喉口齿新久肿痛，并久嗽痰火，咽喉作痛

玄明粉 硼砂各五钱 朱砂六分 冰片三分

共乳细。每日吹五、六次。

舌胀门主论

奎光曰：紫舌胀属心火。内必烦躁闷乱，宜吹碧丹。方载咽喉门。内服加减犀角地黄汤。

《医统》曰：七情所郁及心经热壅，则舌肿满不得息。心热则舌裂而疮，肝热则舌木而硬，脾热则舌涩而胎，肺热则舌强，热甚则舌燥如锯，舌卷囊缩者，不治。厥阴绝也。

《心法》曰：舌忽肿出口外，是受蜈蚣毒。宜用雄鸡血一小杯浸之，

即缩入。

舌胀门主方

娶舌，破棺而治，无不立效，并治重舌、木舌。皂矾不拘多少，新瓦上火煅变红色，放地上候冷，研细，将病人用铁钳撬开牙关，用此擦舌，立愈。

又方 真蒲黄筛细末，频刷舌上，其肿自退。若能咽药，以黄连酒煎，细细咽之，泻去心火尤妙。

又方 舌肿胀不能开，草麻仁研烂，绵纸取油捻作纸捻，灯上点着吹灭，将烟熏之，良久自消。

舌肿 黄柏以竹沥浸一宿，研末，敷舌上。

舌肿胀出口外，冬青叶煎浓汁浸之。

舌肿塞喉

朴硝 白矾等分

研细搽之，立消。

舌肿胀

百草霜 海盐各等分

研末，井华水调下。

舌痹门主论

舌痹者，强而麻也。乃心绪烦扰，忧思暴怒，气凝痰火而成。

舌痹门主方

验方

荆芥穗 雄黄各等分

研末。木通煎汤调下一钱。

痰壅舌麻，生矾研末掺之。

又方 皂角末掺之。

舌黄门主论

奎光曰：舌黄，乃舌上生黄，肿痛，亦属心火。

舌菌门主论

奎光曰：舌菌属心火，多因气郁而生。舌上或如木耳，或如菌状，其色红紫。

舌痛门主论

奎光曰：舌痛初起，舌红而肿大，心经火盛，地角亦红肿。初起用金丹、碧丹吹舌根。方载咽喉门。煎药内加黄连、山栀、犀角。

舌疮门主论

经曰：心开窍于舌。

陈实功曰：心火盛则口舌生疮。《正宗》。

岐天师曰：舌乃心苗，心火郁热，故舌先见证。《秘录》。

冯鲁瞻曰：经曰：舌乃心之苗。又曰：中央黄色，入通于脾，开窍于口，藏精于脾，故病在舌。又曰：心脉系舌本，脾脉络舌旁，系舌下，故发为病，或生疮，或重舌、木舌诸证，皆二经之所致也。然肝脉亦络舌本，故风寒则卷缩而不言，七情所郁则肿满而不消。心热则裂而疮，脾热则滑而胎，脾寒则白胎如雪，肝壅热则血上壅。若人无故舌痹者，不可作风热治。盖由心血不足，血虚火烁耳，理中汤合四物汤治之。《锦囊》。

又曰：昔有人舌上生疮，久蚀成穴，服凉药不效。此下元虚寒，虚

火不降，投养正丹遂愈。

岐天师曰：倘口中忽生疮于舌上，吐出在外寸余，上结成黄靨，难以食物，人以为病在心也。心热故生此疮，此亦近理之谈，而不知非也，亦有祟以凭之也。方用冰片一分，纳入蚌口内，立化为水，乃以鹅翎数扫其上，立刻收入其舌，便可饮食矣。蚌乃至阴之物，以至阴之物攻至阴之邪，则邪自退走。况又加以冰片之辛温逐邪，不遗余力，自然手到成功也。

窦汉卿曰：热毒攻于舌，则舌生疮，客风吹干津液，则舌硬也。王叔和云：三部俱数心家热，舌上生疮唇破裂。治法宜凉心清热。《全书》。

又曰：咽喉有肿兼舌上生疮，此心经受热也。邪热存心日久，则为喉闭，余毒在心，则舌生疮也。须用冰片散、元参升麻汤加减治之。

窦梦麟曰：口舌生疮如黄粟，外证怯寒而口张。先用蚌水，或田螺水，或茶漱净，然后搽药。

李时珍曰：舌下有四窍：两窍通心气，两窍通肾液。心气流于舌下，为神水，肾液流于舌下，为灵液。道家谓之金浆玉醴。溢为醴泉，聚为华池，散为津液，降为甘露。所以灌溉脏腑，润泽肢体，是以修养家咽津纳气，谓之清水灌灵根。人能终日不唾，则精气常留，颜色不槁；若久唾则损精气成肺病，皮肤枯涸。故曰远唾不如近唾，近唾不如不唾。人若有病则心肾不交，肾水不上，故津液干而真气耗也。《难经》曰：肾主玉液，入肝为泪，入肺为涕，入脾为涎，入心为汗，自入为唾也。

舌疮门主方

舌疮 吴茱萸研末，酒调涂两足心。

口舌生疮《秘录》。

黄柏 白僵蚕各一钱 枳壳烧灰 山豆根 苏薄荷 甘草各五分
冰片三厘

共为末。一日搽三次，第一日稍快次日全愈。

又方

黄连二钱 菖蒲一钱 水煎服。

小儿舌疮不能饮乳《幼科良方》。 白矾和鸡蛋置醋中，涂儿足底，二七日愈。

舌证主方奎光。

黄连 黑山栀 木通 犀角 连翘 生地 牡丹皮 甘草 麦门冬 赤芍

水煎服。如兼口唇，必加熟石膏少泻脾火；如有肺火兼有痰，加川贝母，便秘加玄明粉、大黄、枳壳。

小儿口舌生疮 桑树皮中白汁涂之，即效。

舌疮鹅口重舌

青黛 朴硝各一钱 龙脑一字

为末。鹅翎搽上少许。

舌疳门主论

《心法》曰：舌疳者，由心脾毒火所致。其证最恶，初如豆，次如菌，头大蒂小，又名舌菌。疼痛红烂无皮，朝轻暮重，急用北庭丹点之，自然消缩而愈。若失于调治，以致焮肿，突如泛莲；或有状如鸡冠，舌本短缩，不能伸舒，妨碍饮食言语，时流臭涎；再因怒气上冲，忽然崩裂，出血不止，久久延及项颌，肿如结核，皮色如常，顶软一点色黯木红；破后时流臭水，腐如烂绵，其证虽破，坚硬肿痛仍前不退，此为绵溃。甚至透舌穿腮，汤水漏出，是以又名瘰癧风也。盖舌本属心，舌边属脾，因心绪烦扰则生火，思虑伤脾则气郁，郁甚而成斯疾。其证外势颇类喉风，但喉风则咽喉常肿，汤水不能下咽，此证咽喉不肿，可以下咽汤水，胃中亦思饮食。因舌不能转运，迭送饮食，故每食不能充足，致令胃中空虚，而怯证悉添，日渐衰败，颌下肿核。初起宜用导赤汤加黄连，外用锦地罗蘸醋磨敷；虚者归脾汤；便溏者归芍异功汤。自古治法虽多，然此一证，百无一生，纵施药饵，不过苟延岁月而已。

卷之五

齿 部

钻齿疳门主论

陈实功曰：钻齿疳乃小儿牙根尖穿出齿根肉外，芒刺嘴唇作痛。用铍针挑破牙傍好肉，以手取出本牙；出血不止，以凉水湿纸换贴二、三次，其血自止。必兼戒厚味，其牙复生如旧。《正宗》。

齿踞门主论

申斗垣曰：齿断上长出如鸡足踞，长一、二寸，不痛，误触之则痛连心，乃足阳明胃经之毒。当用芫花线系之，二日自落。如断下是手阳明大肠经，亦用芫花线系，用药则当分经泄毒。《启玄》。

齿窟疮门主论

申斗垣曰：凡人年老齿落，其根最深，其窟最大，气血虚衰不能长合；忽被硬物硌破，其痛切骨至心及脑，饮食不便，疮口最难合，名曰齿窟疮。用生肌散二、三分，旧棉花托入窟内，或饭捣和塞之，过夜，亦妙。《启玄》。

骨槽风门主论

王肯堂曰：骨槽风又名穿腮毒，牙龈肿痛，寒热大作，腐烂不已，由忧愁思虑，惊恐悲伤所致。初起生于耳下及颈项间，隐隐皮肤之内，略有小核，渐大如胡桃，日增红肿，或上或下，或左或右，牙关紧急，不能进食。先用鹅翎探吐风痰，切不可用刀针。《准绳》。

窦汉卿曰：骨槽风，一名穿珠，一名附骨，一名穿喉，一名牙槽风，一名穿腮。此乃忧思惊虑，太阳受证，结于大肠之间，邪毒交生，灌于经络之内。初起生于耳下及项间，隐隐皮肤之内，略有小核，渐长如李子之状，便觉红肿，或上或下，或左或右，牙关紧急，口噤不开。急用鹅毛搅出风痰，即服煎剂。

陈实功曰：骨槽风初起生于耳前，连及腮项，痛引筋骨，久则渐渐漫肿，寒热如疟，牙关紧闭，不能进食。此得于郁怒伤肝，致筋骨紧急；思虑伤脾，致肌肉腐烂，膏粱厚味，致脓多臭秽。初则坚难消。久则疮口难合。初宜艾灸项及耳垂下五分，各七壮，膏贴以泄内毒；牙关内肿，以线针刺去恶血，冰硼散搽之，使内外毒气得解，内服降火化痰清热消肿之剂；溃后补托药中加麦冬、五味。如外腐不脱，虚热不退，坚肿不消，形焦体削者死。《正宗》。

蒋示吉曰：治此必使水升火降，脾健金清乃愈。《说约》。

又曰：牙槽风久而不愈，齿缝中出白脓，极难调治。甚则齿落，如上左边门牙落者不治。治用口疳药，方载咽喉门。加牛黄、倍珍珠儿茶。初起五日用之，紫色退至白色，再五日长肉，再五日自愈。

又曰：牙槽风久而不愈，即名牙漏吹。同牙槽风法，兼服滋阴降火之剂。戒酒色、发物。

《心法》曰：骨槽风；一名牙疔发，又名穿腮发，乃手少阳三焦，足阳明胃二经风火也。起于耳前连及腮颊，筋骨隐痛，日久腐溃，腮之里外筋骨，仍然漫肿硬痛，牙关拘急，皆由邪风深袭筋骨故也。此证属在筋骨阴分，故初起肿硬难消，溃后疮口难合，多致不救。亦有过服寒凉，以致肌肉坚凝腐臭，非理中汤佐以附子不能回阳，非僵蚕不能搜风。

如法治之，诸证俱减，惟牙关拘急不开，宜用生姜片垫灸颊车穴在耳垂下五分陷中。二七壮，每日灸之，兼用针刺口内牙尽处出血，其牙关即开。若寒热不退，形焦体削，痰盛不食，或口内腐烂，甚则穿腮落齿者，俱为逆证。当腐烂之初，治法同牙疳施救，亦不过稍尽人事耳。

骨槽风门主方

骨槽风、牙疳奇方

古庙屋上多年干猫屎白色者，取来阴阳瓦焙存性，每一钱加冰片二分，研细收贮。每用浓松萝茶洗净，然后吹之蚀烂处，自生肌收口。

重龈门主论

冯鲁瞻曰：重龈者，初生贴着牙龈有物胀起者是也。此候乃脾胃挟热，气血不能收敛。治法速宜绵缠长针露锋，刺肿之处去其恶血则消，若再生再刺，否则有妨乳食。总缘小儿出胎之后，血气收敛成血，则口内、舌上、喉颊皆净；若血气不敛，胎毒上攻，则乃成矣。《锦囊》。

齿迟门主论

冯鲁瞻曰：男子八月而生齿，八岁而龋；女子七月而生齿，七岁而龋。有齿迟者，乃禀受肾气不足而髓不强。齿为骨余，骨之所络而为髓，髓不足故不能上充于齿而迟也。若能调气血，固本复元，则齿自生而骨力坚凝矣。《锦囊》。

长齿门主方

长齿法岐天师。

雄鼠脊骨全副，余骨不用，尾亦不用，头亦不用，肉亦不用，新瓦上焙干，不用烧焦，留其生气也。熟地黄须亲身用竹片挖取生地黄，用瓦器煮熟，身怀令干为末，三

钱。如市卖地黄，经铁针穿孔者，即不效矣 北细辛 榆树皮各三分 青盐二钱
杜仲 当归各一钱

忌犯铁器，共研细末。用一磁瓶盛之，每日五更时不可出声，将此药轻擦在无牙之处三十六擦，药任其咽下。不可用水漱口，一月如是。日间午间擦之更佳，亦如前数，但经铁器便不效矣。

齿痛落去复生法

胆矾研细，人乳和搽孔中，日三、四次，俱用新汲水漱净。久之其齿复生。

固齿门主方

擦牙散

藿香 北细辛 沉香 白芷 青盐 广木香 破故纸各三钱 石膏煨，一斤

研细，早晚擦。

又方 香附一斤，去毛，用青盐四两煮干，炒黄色 馒头四两，煨 生石膏熟石膏各八两 三柰 甘松各二两 研细擦。

又方 青果煨存性，四两 旱莲草一斤，青盐四两，用浅水浸煮晒干 研细擦。

又方 腊肉骨煨灰 石膏煨 扁柏叶焙 香附 枯白矾 青盐各等分 研细，擦。

又方 干槐枝端午向东南方取嫩枝风干 鲜槐枝嫩者 白芷 皂角刺猴姜去皮捣碎 青盐各等分

先将盐入锅内，水一盞化开入药，焙黑色，磨细，擦。

又方 熟地酒浸 破故纸 青盐 地骨皮 槐角各一两 软石膏百药煎 侧柏叶 腊肉骨煨，各五钱 香附 细辛各二钱 没石子一钱 研细擦。

固齿法岐天师。

雄鼠脊骨一副 熟地 骨碎补 榆树皮面各三钱 杜仲三钱 当归细辛 青盐各一钱

共为末裹棉纸内成条，咬在牙床上以味尽为度，用一条永不齿落矣。然亦不可犯铁器，犯则不效。一方有没石子，少杜仲、骨碎补。

至宝丹《冯氏秘方》。

雄鼠骨一副，其鼠要八两以上者，越大越好，理毛，用草纸包七层，再用稻草包紧，黄泥封固，用稻糠煨熟去肉，拣出全骨，酥油炙黄，研为细末，入后药 北细辛洗净土，晒 真沉香各一钱五分 破故纸青盐水炒 白石膏青盐水炒 骨碎补去净毛，蜜水炒 全当归酒炒 旱莲草酒炒，各五钱 香白芷青盐水炒 怀生地酒炒各三钱 绿升麻焙，二钱 没石子雌雄一对，酒煮火烘

上为细末。同鼠骨末合在一处拌匀，用银盒或铅盒盛之。每早擦牙漱口，久而不断。牙齿动摇者，仍可坚固，不动者永保不动，甚之少年有去牙一二，在三年以内者，竟可复生，颇小而白，久则如故，妙不可言。

又方《保元》。

旱莲草阴干切碎，半斤，香附米四两，入砂锅共炒黑存性为末，擦牙固齿乌须。

又方《急救》。

柳椹阴干为末。日用擦牙，去风明目，乌须固齿。久用不彻，可咀金石。

齿疏陷物《集玄》。

芦甘石煨 寒水石各等分

为末。每用少许擦之。忌用刷牙，久则自密。

擦牙永不疼痛周鹤仙方。

青盐三两 硼砂三钱 胆矾三分 皂角盐内者，一钱

共为细末。捡大个五倍子七枚，将药末匀装五倍子内，用火纸每个包过七次，又共包七次，将黄泥包裹，炭火煨炼去绿烟为止，取出研细收贮。每早晨擦牙一次，其功甚大，此晓园验方也。

又方 肥皂肉捣烂，擦牙。

又方

生石膏 生明矾各等分

共研细末。擦牙。固齿如神。

又法 凡大小便时,将牙齿咬紧。久久行持此法,牙齿到老不落不痛。

牙齿摇动及外物所伤,诸药不效欲落者。

川五倍 干地龙去土微炒,各等分

研细。用生姜揩牙龈后,以药末敷之,五日内不得咬硬物。如齿初折落时,乘热将齿放齿槽中安好,敷药齿之内、外,即牢如故。

固齿将军散 治牙痛牙伤,胃火糜肿,久用牢牙固齿。

青盐四两 杜仲炒半黑 锦文大黄炒微焦,各十两

为末。清晨擦牙漱口。火盛者咽之亦可。

石膏汤的临床新用

1. 夏季外感发热

孙靖峰运用本方治疗夏季外感发热 125 例。方药:生姜 6 克,生石膏(先煎)40 克,淡豆豉 15 克,薄荷 6 克,银花 20 克,连翘 20 克,板蓝根 30 克,桔梗 6 克,生甘草 5 克。加减:头昏头痛加菊花 10 克,羌活 10 克;恶寒明显加荆芥 10 克,防风 10 克,羌活 10 克;鼻塞流涕加辛夷花 10 克;咽痛加牛蒡子 10 克,射干 10 克,黄芩 10 克;扁桃体红肿加大贝母 10 克,赤芍 15 克,黄芩 10 克;咳嗽加杏仁 10 克,紫菀 10 克;痰黄加黄芩 10 克,桑叶、桑白皮各 10 克;小溲黄赤加车前子(包煎)20 克。煎服法,头煎,诸药用凉水浸泡 1 小时,生石膏加水 200 毫升先煎 20~30 分钟,和余药一起用武火煎开后 3~5 分钟;二煎加水,用武火煎开后 3~5 分钟,两煎混合,分 3 次趁热口服,药后盖被发汗。结果:显效 38 例,有效 86 例,无效 1 例,总有效率 99.2%。

孙靖峰. 江苏中医药,2003,(10):27

2. 小儿厌食症

魏雪飞以本方加减治疗小儿厌食症 68 例。随证加减:伴食积胃脘胀闷,甚至嗳气吞酸或呕吐酸腐食物者,加山楂、谷芽、建曲;

伴便溏、面萎黄、形瘦者,加党参、白术、芡实;苔红苔净或花剥者,加玉竹、生地、石斛;性躁易怒,好动多啼者,加柴胡、白芍、枳实;伴胃隐痛、遇冷加剧、得温则减或肢凉喜暖者,去石膏,加干姜。本方剂量随患儿年龄酌定,每日1剂,水煎,分3次服,5天为1疗程,1个疗程统计疗效。结果:治愈53例,占77.94%;好转15例,占22.06%;总有效率100%。

魏雪飞. 实用中医药杂志, 2001, (2): 16

3. 鼻渊头痛

王福兴等运用本方加减治疗鼻渊头痛。方药:苍耳子10克,辛夷12克,白芷30克,薄荷12克,生石膏10克,柴胡12克,黄芩12克,半夏10克,鱼腥草3克,桔梗12克,甘草6克,生姜3片,大枣3个,水煎服,每日1剂,早晚分服,小儿酌减。一般3~6剂头痛即止,10余剂诸症皆伏,且不易复发,有效率达98%以上。

王福兴,等. 现代中西医结合杂志, 1999, (7): 1109

4. 流感高热

隋洪臻运用本方加减治疗流感高热36例。方药:柴胡15克,黄芩15克,生石膏30克(先煎),知母15克,荆芥15克,薄荷6克(后下)。体温过高者加羌活15克,独活15克,防风15克,青蒿20克,板蓝根30克;身体疼痛明显者加姜黄15克;咽痛者加金银花15克,连翘30克;咳嗽者加桑白皮15克。每剂水煎2次,分2次服,直至体温恢复正常。观察服药后24、48、72、96小时的体温,以48小时内体温恢复正常者为治愈,72小时恢复正常者为显效,96小时恢复正常者为有效。结果:36例中治愈24例,其中9例服药24小时内体温恢复正常,15例于48小时内恢复;7例获显效;5例有效。

隋洪臻. 中国民间疗法, 2004, (3): 45

5. 小儿外感高热

秦仁生运用本方加减治疗小儿外感高热210例。方药:柴胡5克,黄芩5克,生石膏(先煎)15~30克,淡竹叶6~10克,荆芥6

克,防风6克,蝉衣6克,银花10克,连翘10克,钩藤(后下)3~5克。若咽喉肿痛加板蓝根10克,马勃5克;咳嗽加杏仁6克,象贝母10克;烦躁不安加山栀、豆豉各5克;惊厥加蜈蚣、全蝎各2克(研末冲服)。每日1剂,水煎,沸后5分钟即取汁饮服。1日2次。结果:服药3天内体温恢复正常者计134例,占63.8%;服药4~6天体温恢复正常者计69例,占32.8%;服药6天体温仍未恢复正常者判为无效,计7例,占3.4%。总有效率为96.6%。

秦仁生. 江苏中医, 1998, (4): 40

6. 三叉神经痛

刘延丰运用本方加减治疗三叉神经痛。治疗组方药:生地30克,玄参30克,生石膏30克(打碎先煎),杭芍24克,羌活6克,没药15克,细辛3克,升麻3克,每日1剂,水煎服,每7天为1疗程,治疗最多不超过3个疗程。对照组用卡马西平片,开始时每次服100毫克,1天2次,如不能止痛,以后每日增加100毫克,直到能控制疼痛为止,最大量不超过每日1200毫克,每7天作为1个疗程,治疗最多不超过3个疗程。结果:治疗组治愈20例,显效14例,有效3例,无效1例,总有效率和总显效率分别为97.4%和89.5%;对照组治愈18例,显效12例,有效2例,无效6例,总有效率和总显效率分别为84.2%和78.9%。经检验,治疗组的总有效率明显高于对照组($P < 0.05$),而两组间显效率无明显差异($P > 0.05$)。

刘延丰. 河北医学, 2004, (5): 424

7. 前列腺肥大症

张希荣运用电针配合竹叶石膏汤加减治疗前列腺肥大症38例。①电针疗法:刺双侧维道,针尖向曲骨,约2~3寸,采用断续波,刺激量逐渐加强,通电15~30分钟。②竹叶石膏汤加减:湿热重加车前子、薏苡仁、黄柏;肾气虚加寸云、菟丝子、肉桂;脾虚改太子参为人参,黄芪重用。结果:本组38例,治愈28例,占73.9%;好转8例,占21%;无效2例,占5.1%;总有效率为94.7%。

张希荣. 针灸临床杂志, 1997, (3): 17

8. 血管性头痛

瞿忠灿等运用本方加减治疗血管性头痛 52 例。随证加减: 伴有头痛及颈强者加羌活、葛根; 头顶痛者加藁本、吴萸; 头痛眩晕者加石决明、钩藤; 鼻塞者加辛夷花、苍耳子; 两侧痛兼有口苦者加柴胡、龙胆草; 便秘者加大黄 15 克(另包), 开水泡后兑服, 全方水煎服, 3~4 次/天, 7 天为 1 个疗程。结果: 治愈 36 例, 占 69.23%; 好转 12 例, 占 23.08%; 无效 4 例, 占 7.69%, 总有效率为 92.31%。

瞿忠灿, 等. 传统医药, 2003, (5): 31

9. 慢性鼻窦炎

胡德华运用本方加减治疗慢性鼻窦炎 68 例。方药: 川芎、白芷、防风、蔓荆子、藁本、黄芩、菊花、羌活各 12 克, 生石膏 30 克, 细辛 5 克, 全蝎、生甘草各 6 克, 石菖蒲 15 克。日 1 剂, 水煎取汁, 分 3 次温服, 15 天为 1 疗程。结果: 治愈 38 例, 占 55.9%; 好转 25 例, 占 36.7%; 无效 5 例, 占 7.4%; 总有效率 92.6%。治疗最短 9 天, 最长 26 天, 平均 13 天。

胡德华. 实用中医药杂志, 2004, (3): 135

10. 急性化脓性扁桃体炎

刘尚敏运用本方加减治疗急性化脓性扁桃体炎 117 例。随证加减: 肺胃热盛, 症见高热畏寒, 咳嗽咯痰不利, 舌苔白厚, 脉浮数者, 加青天葵 15 克, 桑白皮 15 克; 脾胃蕴热, 症见口干渴, 高热喉痛, 大便秘结, 腹满, 舌苔黄厚或垢腻, 脉数实者, 加川连 12 克, 枳实 10 克, 大黄 8 克(后下); 肝经郁热, 症见口苦胁痛, 高热喉痛, 舌苔白厚, 舌尖红, 脉弦数者。加龙胆草、丹皮各 12 克, 栀子 10 克。每天 1 剂。以上为成人剂量, 小儿酌减。结果: 治疗 2 天痊愈 39 例, 3 天痊愈 61 例, 4 天痊愈 14 例, 5 天痊愈 3 例, 治愈时间平均为 2.84 天。

刘尚敏. 实用医学杂志, 1995, (2): 113

11. 外感高热

张双春运用本方加减治疗外感高热 200 例。临床按温病卫气营血辨证方法,卫分证或卫气同病加豆豉、芦根、薄荷等清透之品;气分证加大青叶、野菊花、玄参;便秘加川军;气热淫营证加生地、赤芍等以凉血活血。在辨病的基础上,肺炎咳喘加麻黄、杏仁、苏子;化脓性扁桃腺炎加锦灯笼、山豆根、玄参;上呼吸道感染加豆豉、芦根、薄荷;往来寒热加柴胡、黄芩。结果:24 小时内退热者 104 例,占 52%;48 小时内退热者 70 例,占 35%;72 小时内退热者 18 例,占 9%;无效 8 例,占 4%。总有效率为 96%。退热时间最短为 8 小时,最长为 72 小时。服药后体温呈阶梯式下降,退热平稳且无反复。62 例周围血象白细胞升高者中,56 例于 72 小时内恢复正常。

张双春. 北京中医,1999,(2):27

12. 红斑性肢痛症

周长有运用本方加减治疗红斑性肢痛症,加黄连、黄芩、黄柏,并合用四妙勇安汤后治愈,1 年后随访,未发。

周长有. 江苏中医,1994,(12):12

13. 疱疹性口炎

姚志雄运用本方加减治疗疱疹性口炎 150 例。方药:鲜生地 15 克,石膏 30 克,车前草 15 克,碧玉散 10 克,麦冬 10 克,马鞭草 15 克,鲜竹叶 5 克,每日 1 剂,水煎 3 次,分早、中、晚频频口服。随证加减:大便秘结者加生大黄 5 克,或芒硝 2 克冲服,发热、流涕加薄荷 8 克(后下),连翘 15 克。溃疡多见于唇、颊部者加淡黄芩 10 克;舌尖溃疡明显加川连 3 克。结果:均获得较好疗效,一般用药 2~3 剂即愈。

姚志雄. 口腔医学,1994,(2):76

14. 口腔颌面部间隙感染

向左成等运用本方加减治疗口腔颌面部间隙感染 64 例。方药:乌贼骨、紫花地丁、菊花、生石膏、生甘草各 30 克,银花 15 克,丹

皮 10 克,连翘、黄芩、生地、花粉、玄参各 12 克。一般服 3~5 剂,每日 1 剂,分早、晚饭前 1 小时各服 1/2。保持口腔清洁,可酌情以 0.2% 呋喃西林液含漱。结果:治愈 38 例,占 53.4%;好转 24 例,占 37.5%;无效 2 例,占 3.125%。总有效率 96.875%。

向左成. 四川中医,1997,(9):53

15. 睾丸炎

吕陞昌运用本方加减治疗睾丸炎。方药:柴胡 25 克,清半夏、人参各 10 克,甘草 20 克,石膏 100 克,荔枝核、黄芩各 15 克,生姜 3 片,大枣 3 枚,水煎 2 次,取汁 300 毫升,每日早晚服。随证加减:湿热重加蒲公英、车前子;舌红苔微黄,脉数者加连翘、夏枯草;有炎性包块者酌加三棱、莪术、香附。结果:6 例患者肿瘤均消失,治愈不留痕迹者 5 例,留有绿豆大小硬结者 1 例,服药时间最短 7 天,最长 26 天。

吕陞昌. 中医药信息,1998,(2):38

16. 血管扩张性头痛

杨祥运用本方加减治疗血管扩张性头痛 62 例。随证加减:风热偏重加桑叶、黄芩、防风各 10 克;肝火偏旺加栀子、龙胆草各 10 克,夏枯草 15 克。每天 1 剂,水煎分早晚 2 次服。对照组:口服镇脑宁胶囊,每次 5 粒,每天 3 次。2 组均以 7 天为 1 疗程,最长不超过 3 个疗程。结果:治疗组治愈 15 例,显效 26 例,好转 19 例,无效 2 例,总有效率 96.77%。对照组治愈 2 例,显效 7 例,好转 14 例,无效 7 例,总有效率 76.67%。总有效率比较,差异有显著性意义 ($P < 0.05$)。

杨祥. 新中医,2003,(2):600

17. 小儿急性肾炎

刘小菊运用本方加减治疗小儿急性肾炎 112 例。随证加减:伴咽喉肿痛者加忍冬藤 15~30 克,芦根 10~15 克;伴血压偏高者加夏枯草 6~9 克,钩藤 6~9 克;伴尿中白细胞者加小蓟草 10~15 克,一枝黄花 9~12 克。每日 1 剂,水煎 2 次服。西药治疗:青霉素

钠盐 40 万单位,肌肉注射,1 日 2 次,连用 7~10 天。结果:治疗 2 个月,痊愈者 107 例,好转 5 例,临床治愈率为 95.5%。

刘小菊. 四川中医,2000,(11):39

18. 牙痛

运用本方加减治疗牙痛 96 例。方药:生石膏 40 克,竹叶 15 克,知母、山栀、升麻各 12 克,玄参 10 克,糯米 20 克。先将上药用水浸泡 30 分钟,放入糯米,煎至米熟为度。每剂先后煎 2 次,将药液混合,1 日内服完,每次饭前温服。结果:治愈 90 例,好转 5 例,无效 1 例。治愈 1 个月开始随访,6 个月未见复发病例。

杨金凤. 四川中医,1994,(10):52

19. 流行性出血热

冯玉然等运用本方加减治疗流行性出血热 34 例。在西医常规用药基础上,运用竹叶石膏汤为主辨证治疗,基本方:淡竹叶 15 克,生石膏 35 克,法半夏 10 克,党参 15 克,麦冬 12 克,粳米 15 克,甘草 4 克。随证加减:发热期,多为气血两燔,血热炽盛,去党参,重用石膏;有卫分证者,加金银花、连翘以清热解毒;口渴加天花粉、生地、金石斛以生津养阴。低血压期,多属热伤真阴,气虚欲脱,重用党参或人参,加五味子等益气固脱;若出现肌肤斑疹,舌红绛,脉弦数等症,加丹皮、赤芍、水牛角等以凉血救阴。少尿期,属邪热深入营血,津伤液竭,重用生石膏,加白茅根、元参、水牛角等以养阴凉血生津;口渴加天花粉、金石斛;若出现神昏谵语、烦躁等逆传心包的证候,可加清心开窍之品。多尿期,属气液两伤,肾气不固,统摄无权,制约失职,可加生山药、五味子、益智仁、覆盆子、菟丝子、桑螵蛸以育阴生津补肾益气;若伴有肾阳虚者,加肉桂、黑附子等。恢复期属邪退正虚之候,气虚加生黄芪;血虚加当归、熟地等。无论气虚或血虚,均可选加玉竹、黄精、生山药等。结果:全部治愈。疗程最短 7 天,最长 1 年,为了观察远期疗效,对有条件的 18 例患者,在 3 个月至 1 年内进行了随访,未见复发。

冯玉然,等. 河南中医药学刊,2000,(6):53

20. 癌性发热

杜小艳运用竹叶石膏汤治疗癌性发热 32 例。方药:竹叶 10 克,生石膏 30 克,制半夏 10 克,麦冬 10 克,人参 10 克,山药 15 克(代替粳米),甘草 6 克。津伤重,少苔者加沙参、天花粉、乌梅;多汗者加黄芪、防风。每日 1 剂,水煎分 2 次口服,7 天为 1 疗程。结果:显效 7 例,有效 19 例,无效 6 例。总有效率为 81.25%。

杜小艳. 湖南中医杂志,1997,(6):25

21. 胆道术后呕吐

李继荣运用竹叶石膏汤治疗胆道术后呕吐 12 例。方药:竹叶 10 克,石膏 30 克,半夏 10 克,麦冬 15 克,党参 15 克,粳米 50 克,甘草 10 克。分 3~4 次口服。结果:12 例患者全部治愈。服 1 剂者 6 例,服 2 剂者 4 例,服 3 剂者 2 例。

李继荣. 时珍国医国药,2001,(7):631

22. 急性病毒性心肌炎

杨素娟运用本方加减治疗急性病毒性心肌炎。两组均给予能量合剂静滴,每日 1 次,合并感染者加用抗生素,心律失常、心力衰竭等予对症处理。治疗组另予竹叶石膏汤加减:竹叶、制半夏、麦冬、连翘各 15 克,石膏 20 克,苦参、丹参、板蓝根各 30 克,人参、金银花、甘草各 10 克。水煎,每日 1 剂,日服 2 次。两组均治疗 4 周。结果:治疗组 47 例,显效 31 例,有效 11 例,无效 5 例,总有效率 89.63%;对照组 47 例,显效 26 例,有效 6 例,无效 15 例,总有效率 68.09%。两组总有效率差异有显著性($P < 0.05$)。

杨素娟. 中国中医急症,2004,(5):272

23. 伤寒高热不退

崔德彬运用本方加减治疗伤寒高热不退 50 例。竹叶石膏汤水煎,饭后温服,根据服药后热退的情况,1 日内可以服 1~2 剂,3 日内可以服 3~5 剂。一般情况下,服 3 剂后体温即可退至正常。加减:夹湿者加藿香 15 克,佩兰 15 克,大豆黄卷 10 克;衄血、便血者加生地榆 15 克,丹皮 10 克,藕节 30 克,生白茅根 30 克;夹食滞

者加炒麦芽 15 克,神曲 10 克;出现谵妄、惊厥、昏睡者加水牛角粉 15 克。结果:治愈 42 例,占 84%;好转 6 例,占 10.4%;无效 2 例,占 5.6%,总有效率为 94.4%。

崔德彬. 湖南中医杂志,1999,(10):67

24. 顽固性不寐

戴子辰运用本方加味治疗顽固性不寐 58 例。方药:竹叶 10 克,石膏 15~30 克(先煎),制半夏 10 克,太子参、麦冬各 15 克,炙甘草 6 克,粳米 15 克,夜交藤 20 克。随证加减:头痛头晕加川芎、钩藤各 10 克;心中烦躁不宁加焦栀子、淡豆豉各 10 克;心悸、健忘加酸枣仁 15 克,炙远志 10 克;多梦者加丹参 15 克,琥珀末 5 克(冲服);胃纳欠佳者减石膏至 15 克,加陈皮 10 克。每天 1 剂,水煎头汁、二汁混合,入粳米,煎至米熟,去米分 2 次温服。对照组用安定片,每晚睡前口服 5 毫克,两组均以 7 天为 1 疗程,轻者 1 个疗程,重者 2 个疗程。结果:治疗组治愈 35 例,好转 19 例,无效 4 例,总有效率 93%。对照组治愈 13 例,好转 10 例,无效 7 例,总有效率 77%。

戴子辰. 中国中医药科技,2001,(2):122

25. 小儿盗汗

黄晓华运用本方加减治疗小儿盗汗 86 例。方药:竹叶、制半夏各 6~12 克,石膏 18~30 克,麦冬 10~20 克,白晒参 5~10 克,炙甘草 3 克,粳米 8 克,柴胡 6 克(或夏枯草 15 克)。随证加减:脾胃积热盛者可加黄连 6 克;气阴虚甚者加黄芪 20 克,生地 12 克;胃热津伤甚者加石斛 10 克,沙参 6 克;水煎服,每日 1 剂,酌情分 3 次或多次服完。8 剂后显效即停服。结果:治愈 68 例,占 79%;有效 17 例,占 19.85%;无效 1 例。

黄晓华. 四川中医,2001,(1):49

卷之六

咽喉部

凡一切咽喉痈疽、风痹、音哑，皆汇于此部中，以便检阅参治。

咽痛门主论

陈实功曰：咽喉虽属于肺，然所致各有不同，有虚火实火之分，紧喉慢喉之说。咽为心肺肝肾呼吸之门，饮食声音出纳之道，此关系一身，害人迅速。虚火色淡微肿，脉亦细微，小便清白，大便自利，此乃思虑过多，中气不足，脾气不能中护，虚火易于上炎，咽嗑干燥，饮食妨碍，咳吐痰涎，呼吸不利，斑如苔藓，累若虾皮，有如茅草，当刺喉中。又如硬物嗑于咽下，呕吐酸水，啞出甜涎，甚则舌上白胎，唇生矾色，声音雌哑，喘急多痰。以上现证皆出于虚火，元气不足中来，治此不可误用寒凉，上午痛者属气虚，补中益气汤加麦冬、五味、牛蒡、元参，午后痛者属阴虚，四物汤加知母、桔梗、元参、黄柏，如服不效，必加姜、附以为引导，即佐治之法也。实火者醇酒辛烈，热积于中，久则火动痰生，发为咽肿，甚则风痰上壅，咽门闭塞，少顷汤水不入，声音不出，此为喉痹紧喉风是也。用药不及，事先用针刺喉间发泄毒血，随用桐油钱鸡翎探吐稠痰，务使痰毒出尽，咽门得松，汤药可入，语声得出乃止。内服清咽利膈汤疏利余毒，如牙关紧闭难入，必当先刺少商穴出血，其闭自开。如针刺探吐无痰，声如拽锯，鼻掀痰喘，汤水不下，语声不出者，真死候也，难治。《正宗》。

又曰：虚火得者名慢喉风，实火得者名紧喉风。

经曰：凡喉闭不刺血，喉风不吐痰，喉痛不放脓，喉痹喉蛾不针烙，此皆非法。

岐天师曰：如虚火沸腾于咽喉口齿间，用寒凉之药入口稍快，少顷又甚，又用寒凉，腹泻肚痛而上热益炽，欲用热药凉饮而病人不信，不肯轻治，乃用外治之法引之而愈。方用附子一个为末，米醋调成膏药，贴在涌泉穴上，少顷火气衰，又少顷而热止，退变成冰凉世界，然后以六味地黄汤大剂与之，则火不再沸腾矣。盖此火乃雷火也，见水则愈酷烈。子不见雷霆之震，浓阴大雨之时，愈加震动，惊天轰地，更作威势，一见太阳当空，则雨歇声消，寂然不闻矣。又不见冬令之天地耶，严寒霜雪，冰冻郊原，雨雪霏霏，阴风惨厉，此天气下行而地气反上，盖下热则上自寒也。又不见夏日之天地乎，酷日炎蒸，蕴隆火热，烁木焚林，燔汤沸水，天气上升，地气下降，此上热而下寒也，人身虚火亦犹是也。今既火腾于上，则下身冰冷，今以附子大热之药涌泉引之者，盖涌泉虽是水穴，水中实有火气存焉，火性炎上而穴中正寒，忽然得火，则水自沸温，水温则火自降，同气相交，必归于窟宅之中矣。火既归于窟宅，又何至沸腾于天上哉。此咽喉口齿之火，忽然消除，有不知其然而然之妙，此引治之巧又当知之者，此即外施引火归原之法也。《秘录》。

戴氏曰：硬舌根而烂两旁。此名缠舌喉风，须用羊毛笔蘸甘草汤洗之，然后再吹药。

冯鲁瞻曰：咽喉者，一身之总要，水谷之道路也。若胸膈之间蕴积热毒，致生风痰，壅滞不散，发为咽喉之疾，或内生疮，状如肉腐，窒塞不通，吐咽不下，如单肉蛾、双肉蛾及疳腮肿胀，甚者内外皆肿，上攻头面。

治宜先吐风痰以通咽膈，然后解热毒，清肺胃，迟则不救。《锦囊》。

又曰：咽疮喉痛，多属虚热，血虚虚火游行无制，客于咽喉也。虚者八味地黄汤加牛膝、五味子煎与食前冷服；实者黄连、荆芥、薄荷、姜汁，蜜噙化。喉痛必用荆芥；阴虚火炎上，必用玄参，有用茜草一两作一服者，以其能降血中之火也。

又曰：喉与咽不同。喉者肺脰呼吸之门户，主出而不纳；咽者胃脰水谷之道路，主纳而不出。盖咽喉司呼吸，主升降，此一身之紧关橐龠也。经曰：足少阴所生病者，口渴舌干，咽肿上气，噤干及痛。《素问》云：邪客于足少阴之络，令人咽痛，不可纳食。又曰：足少阴之络，循喉

咙,通舌本。凡喉痛者,皆少阴之病。但有寒热虚实之分。少阴之火直如奔马,逆冲于上,到此咽喉紧锁处,气郁结而不得舒,故或肿或痛也,其证必内热口干血赤,痰涎涌上,尺脉必数而无力,盖缘肾水亏损,相火无制而然。须用六味地黄汤加麦冬、五味子,大剂作汤服之。又有色欲过度,元阳亏损,无根之火游行无制,客于咽喉者。须用八味肾气丸大剂煎成,冰冷与饮,引火归原,庶几可救。此论阴虚咽痛者,如此治法,正褚氏所谓上病疗下也。

又曰:阴气大虚,虚火无制,孤阳飞越,客于咽喉,遂成咽痛者,脉必浮大,重取必涩,去死则近。宜人参一味浓煎,细细饮之。如作实证,用以清降之药,祸在反掌。愚用人参必同童便、制附子同煎,温和食前顿服,则监制虚火下归乃愈。如单用人参细细饮之,恐浮火益炽,亦非稳当。奈世人但知热咽痛,不知有寒咽痛也。经曰:太阳在泉,寒淫所胜,民病咽痛颌肿。陈藏器用附子去皮、脐,炮制切片,以蜜涂炙,令蜜入内,噙咽其津,甘味尽,更易之。仲景云:下利清谷,里寒外热,脉微欲绝,面赤咽痛,以通脉四逆汤。又曰:冬月伏寒在于肾经,发则咽痛下利,附子汤温其经则愈。

又曰:又有司天运气,其年乡村相染。若恶寒者多是暴寒折热,寒闭于外,热郁于内。切忌胆矾酸寒之剂点喉,反使阳郁不伸;又忌硝黄等寒剂下之,反使阳陷入里,祸不旋踵。须用表散若甘桔汤之类。

又曰:有咽痛而诸药不效者,此非咽痛,乃是鼻中生一条红线,如发悬一黑泡,大如樱桃,垂挂到咽门而上,难以探取。宜用土牛膝根即鼓槌草独条直而肥大者,捣碎入好醋三、五滴同研,取浓汁滴入鼻中二、三点,即刻系断珠破,吐出瘀血即安。

李东垣曰:夏伤寒伏于肾少阴之经,多咽痛者,名肾伤寒也。宜热药冷饮之。

陈远公曰:咽喉干燥,久而疼痛,人以为肺经之燥热也,孰知肾水涸竭乎!夫肺金生肾水也,肺气清肃,自下生水,惟肺气虚则肺液只可自养,无如肾水大耗,故欲救肺之干燥,必先救肾之涸也。子母两富汤:熟地三两,麦冬二两,水煎服,一剂燥少止,三剂痰少止,十剂全愈。《冰鉴》。

又曰：生长膏粱，素耽于酒，劳心过度，以致咽喉臭痛，人以为肺气伤也，谁知乃心火太盛移热于肺乎！夫饮酒伤胃，胃热熏蒸，宜乎肺热矣。然胃火熏肺，而胃土实生肺也，故饮酒尚不伤肺，惟劳心过度，则火起于心，而肺受刑矣。胃火助之则火旺，炎上而咽喉成燔烧之路，自然唾涕稠黏，口舌干燥，气味腥臭而痛矣。盖心主五臭，入肺为腥臭矣。解腥汤：甘草、桔梗、麦冬、贝母各五钱，桑白皮、天冬、生地、丹皮各三钱，枯芩一钱，水煎连服二剂痛止，又四剂臭除。此方治肺而兼治心，又兼治胃者也。因膏粱之人，心肺之气血原虚，下滋二经之气血，但泻其火，则胃之气血必伤，反增火之焰矣。妙在补肺以凉肺，补心以凉心，补胃以清胃，火自退舍，不止喉痛而痛自止也。

《医论选要》曰：夫咽喉者，一身之总要，气与食出入之门户也。咽以纳气，故咽气通于天，喉以纳食，故喉气通于地。自其风邪客于喉间，气郁而热。则壅遏而为咽疼，自其热气生于肺胃，风毒蕴隆，则肿结而为喉痹。又有尸咽谷贼之证。尸咽者，阴阳不和，脾肺壅盛，风热毒气不能宣通，故令尸虫发动，上蚀于喉，或痒或痛；谷贼者，稻芒强涩，藏于米而误食之，滞于咽间，不能传化，故风热并聚与血气搏，遂令肿刺如咽嗌之生谷刺也，胃脘实热熏蒸上焦，发为白颐赤根，固有咽疮之候。

窦汉卿曰：呼者因阳出，吸者随阴入，呼吸之间，肺经主之。喉咙以下，言五脏为手足之阴，咽门以下，言六腑为手足之阳。盖诸脏属阴为里，诸腑属阳为表，以脏者藏也，藏诸神流通也；腑者府库，主出纳水谷糟粕转输之谓也。自喉咙以下五脏，喉应天气，乃肺之系也，以肺属金，干为天，干，金也，故天气之道，其中空长，可以通气息。但喉咙与咽并行，其实两异，而人多惑之。盖喉咙为息道，咽中下水谷，其喉下接肺之气。一云喉中三窍者非。果喉中具三窍，则谷与气各从一窍而俱下肺中，肺下无窍何由传送水谷入于下焦。《全书》。

黄帝书云：肺为诸脏之华盖，藏真高之气于肺经也，故清阳出上窍，浊阴出下窍。若世人不知保养，六气七情，役冒非理，百病生焉。病疡既成，须寻所自。若喉痹、乳蛾、缠喉风、喉疮、喉痹、风毒、热毒等证，当刺则刺，不可乱医，当吐则吐，不可妄治。此等证系性命之根本，

生死立见，不识其标本而攻之，失其法则祸不旋踵矣。

丹溪曰：咽喉者一身总要，与胃相授，呼吸之所从出。若胞膈蕴积热毒，致生风痰，壅滞不散，发而为咽喉之病，喉内生疮，或状如肉，赤肉为肿，室塞不通，吐咽不下，甚则生出重舌。大法先去风痰以通咽膈，然后解其热毒，迟则有不救之患。又有热毒冲上腭而生疮，谓之悬痈，及腑寒亦能令人咽闭，舌吐不利。宜用解施法，或曰治法视火微甚，微则正治，甚则反治，探痰出血，随所施治；或于手大指少商穴出血行气，冲达于外者，必外敷以药。予尝以鹅翎蘸米醋缴喉中，摘去痰涎。盖酸能收痰，又能消积血，乳蛾而不散者，以小刀就蛾上出血，皆用马牙硝吹点咽喉以退火邪，服射干、青黛、甘草、桔梗、黄芩、山梔、大黄、白矾、牛蒡之类，随证加减为方，以散上焦之热，外所敷药如生地、伏龙肝、韭根皆可用。若咽喉生疮，或白或赤者多血，大率多是痰热，先以桐油吐之，后用甘草汤解桐油之气。

窦梦麟曰：咽喉一科，昔先太师公立论于前矣，余岂敢复言乎！独座细思，又不容已也。咽喉之证，司性命出纳气饮之所，深为至重。然饮食精气之要路，肺与大肠表里之别，脏腑上通咽喉，下由大肠出入之门户，肺为华盖，发阴五脏，死生之玄门也。入谷则昌，绝谷则亡，朝生暮死，暮生朝死，须臾之间，变证不一。惟肺主金，生生不已，循环无端，顺则五脏华敷，百关通畅，此所谓养身之道也。阳明燥金，以致火克而生疾矣。咽喉之证，从热而系乎太阳之标，故推而治之，可以解热除毒，祛风顺气，则自然平金也。丹溪以米醋搅口中以出痰，酸以收之义也。愚见以为太酸则燥，先用黄蘗汁加玄明粉少许，灌喉中以吊其痰，次用酸水，仍前加玄明粉灌之，后用蜜汤润之，渐渐探吐其痰，则咽喉开利矣，复以冰片散滋之，无有不效。若缠喉风用前三法，不能探吐其痰，宜用生桐油灌之，鹅翎搅之，再用蜜汤润之，急服牛黄清心丸，或豁痰丸，以坠其痰，旋以二陈汤加减服之，无不愈者。若喉中声出如雷，呛食眼张，天柱倒陷，面黑唇焦，鼻无气息，目睛突出，汗出如珠，卢扁复生，不能生矣。然既患咽喉口舌之证，延及颈项头面而发肿，红如火光，万不可疗，急用磁锋砭去恶血，用鸡子清调乳香末润之立瘥。再用芭蕉根汁润之，以解其毒。若口舌肿大紫黑，急用针点去血，随吹末

药甚效。余久以此法行之，颇活甚多。故以此理论而发明之，再俟高明校裁，勿罪迂谬，幸甚。

又云：伤寒病四、五日，发热鼻干，口燥咽痛者，阳明自病也。阳明属胃，汗多则胃汁干，故津液不能潮咽而干痛者，宜用人参败毒散主之。

又云：伤寒三、五日，咽喉中有肿，其色鲜红，痰涎自出，头痛项强，须知属太阳经邪气入于经络，触动心间。但积热之毒攻咽，则咽喉肿痛，宜甘桔汤内加牛蒡子、玄参、生川连三味，吹药同前。

又云：伤寒八、九日以上，身无潮热，腹痛自利，而咽喉痛者，此太阳经受病也。伤寒得汗已不解，转入太阴，腹满时痛自利，而咽喉肿痛，其色微白，此证可治，用真武汤主之，所谓真武者能补下元，助阳正气，以手足和暖为妙。经云：但要口中红活有痰可治，宜随证加减用药；若口中黑则血已枯干，声哑目上视汗出者，不能治矣，切宜仔细看证。

又云：伤寒八、九日以上，得汗已不散，喉咙痛，舌干唇燥者，此少阴经自病也。太阴经受病，得汗后未解，传入少阴经，少阴属肾，汗多则肾汁干，其肾水不能潮润咽喉，故其病也。如自利腹中痛，手足厥冷，咽中肿痛，不可吞咽，如无涎唾及舌上干者不治。

又云：病人八、九日以上，身微热无他证，但喉中痛而无肿，声哑者不治。

又云：伤寒十余日以上，得汗已病解，无潮热，脉平静而咽喉痛者，此余毒上攻也。宜用粘子解毒汤。

又云：阴毒伤寒身体重，背强，眼痛不堪任，小腹急痛青黑毒气冲心，四肢厥冷，恶心吐逆，咽喉不利，脉沉细。若能速治，调医数十日之内全愈，否则难生。

又云：若伤寒传经日久，证变后烦满咽喉痛，舌卷而卵缩者，不治。

又云：伤寒十余日以上，病不解，传变咽喉痛，外证唇青舌卷者，此属厥阴经受病也。难治。

又云：咽喉干痛无痰，不治。

又云：咽喉痛而唇卷，不治。

又云：咽喉痛而盗汗出，不治。

又云：鼻中塞者，不治。

又云：口中黑者，难治。

又云：口中干夜间潮热，不得睡卧，时发谵语，举足妄动者，用十味人参散主之。

又云：若病人手足厥冷，口唇摇动者，宜用小续命汤，姜枣煎，热服。

又云：凡病传咽喉右畔者，乃余毒未除，急服牛蒡子汤，降气汤加减，治之。

又云：口中红活吐得血，又有痰涎息而清者，不治。

又云：手足冷者，不治。

又云：声音不响，喉中无肿干痛者，不治。

又云：手足冷，不能自收，颈低不能自举，眼昏暗者，不治。

又云：虚阳上攻，上下不升降，水火不既济，腰冷不知痛痒，口中痰多唇黑者，不治。

又云：喉中如雷声或呛食，不治。

又云：面赤目睛上视，不治。

又云：心胸紧满吐痰不出，不治。

又云：面黑头汗出，不治。

又云：自利不治。

又云：潮热往来时发谵语，不治。

又云：自利而喘，不治。

又云：胸腹胀急，不治。

又云：手足厥冷，不治。

又云：心促四肢厥冷不治。

又云：心中怔忡，胸前红甚，舌卷面赤，目上视者不治。

又云：妇人胎前咽喉痛而脉浮者，不治。

又云：男妇法则，一般惟女人喉中有肿而色红者，此月经不调也。经不能行则壅塞于上，故咽肿痛也，盖由荣卫不和，但男子以气为主，女人以血为主，男妇各随其气血之分调治，宜调荣汤可也。如病势重，

其色微白脚者，此虚阳上攻，宜服降气汤探痰，吹药同前。妇人有孕心头痛者，不治。

又云：妇人伤寒，身发潮热咽痛者，此经行也。《活人书》云：妇人伤寒，经水适来，昼则明明，暮则谵语如见鬼神状，此乃热入血室，无犯胃气及上二焦，不可下也，小柴胡汤主之。今咽喉痛而潮热往来，面赤唇红者，此热邪上壅也，不用小柴胡汤，宜用竹叶石膏汤，清上膈，除心烦，所以为妙，次用四物汤。

又云：喉中有疮，共色带黄，探痰同前。用小刀点疮上，出脓后即吹冰片散，宜用鼠粘子解毒汤。

窦梦麟曰：喉肿乃毒起于脾经，因食煎煇油腻等物，及饮酒太过而行房事，以致毒气不能流行，聚结于喉根，若不速治，溃毒闭急即死。治法先用醋水蘸汁搅去痰涎，再吹药。

又曰：咽喉间生肉，层层相叠，渐渐肿起，有孔出臭气，用臭狗橘叶煎，频服之而愈。

汪省之曰：虚阳上攻，气不升降，致结患咽嗑，痰涎壅塞，治以苏子降气汤。《理例》。

证曰：咽喉之病，近世最多者有数证：曰单乳蛾、双乳蛾，曰子舌胀、木舌胀、缠喉痹、走马喉痹。其热气上行，转于喉之两旁，近外结肿，以其形似是谓乳蛾，一为单二为双也。其比乳蛾差小者为喉痹；热结于舌下，复生小舌，名曰子舌胀；热结于舌中，舌为之肿，名曰木舌胀；木舌者，强硬而不柔和也，热结于咽喉，肿绕于外，且麻且痒；肿而大者，名曰缠喉风痹，暴发痰涎涌盛，水浆不入。然名虽不同，其证总不外乎手少阴君火手少阳相火为病也。二脉并络于喉，气热则内结，结甚则肿胀，胀甚则痹，痹甚则不通而死矣。其危者可以咸软之，而大者以辛散之，如薄荷、乌头、僵蚕、白矾、朴硝之类，用之自可消除。至于走马喉痹，则非此等所疗，以其生死只在反掌之间耳。急救之法，无如砭针出血，血出则病已，此上策也。后之患者，万勿畏针以自毙其命；后之君子，万勿执小方而曰吾药不动脏腑，又妙于不用针砭出血，在小疾幸而获愈，而大疾必致死亡。特为拈出，以告病者、医者，勿自误以误人也。

又曰：凡咽喉用针后，有针创者，宜捣姜块和以熟白汤，时时呷之，则创口易合。

王奎光曰：咽喉为人身饮食门户，呼吸关隘，方寸之地，受病危险，其证甚繁，大约总归于火。盖少阴少阳君相二火，其脉皆络于咽喉，故往往为火证之所结聚。君火势缓，则结而为疼为肿；相火势速，则肿甚不仁而为痹，痹甚不通而痰塞以死。经云：一阴一阳结谓之喉痹。火者痰之本，痰者火之标，火有虚实，实火因过食煎炒炙煿，蕴结积毒，其证口渴，二便秘塞，风痰上壅，将发喉痹，必先胸膈不利，脉弦而数。治宜先去风痰，后解热毒虚火；或因饮酒太过，或因忿怒，或因色欲，火炎上攻咽喉干燥，必二便如常，少阴脉微，治宜补虚泻火。凡用药不宜纯用寒凉，取效目前，上热未除，中寒复起，毒气乘虚入腹，胸前高肿，上喘下泻，手足指甲青黑，七日以后全不进食，口如鱼口者死。且治咽喉，最忌发汗，针砭出血已寓出汗之意，何堪更发其汗。凡伤寒于肾及帝中喉名肿者，断不宜针。至如内伤虚损，咽喉失音，无法可治。

又曰：喉证初起，一日寒战即生发者，发后身凉口不碎，又无重舌，或二便俱利，不可认作热证。皆因阴气虚寒而发，其痰不可吊尽，此痰即身内之津液所化，与热证乳蛾之痰壅一处，以流尽则毒愈者不同。若亦流尽，则精神竭而必毙。先宜药吹或用水换之法，使喉一通，即便服药，初剂发散和解，第二剂即施温补滋养之药。设三、四日再发寒战，或心疼、骨痛、胁疼等证，皆属难治。

又曰：发时牙关紧闭，舌喉俱肿，口碎而臭，或有重舌，及舌上有黄屑者，发后下午再发寒热，二便闭塞者，即作热证。用石膏败毒散主之，然亦易愈之证。如渐起三、四日后而寒热者，虽极凶亦不为害。惟有证未减而牙关反不紧闭，唇口不肿，纹如好人者不治。舌肿满口者不治。色如胡桃，如茄子，如砂纸者不治。或连重舌发寒热者，犹可治也。舌以箸按之若色雪白，起箸即紫红色者，此身内血已死，然口若臭犹或可生；尤忌口渴气急，痰多而稠如桃胶者，死期已速。

又曰：一颈俱红肿者，亦极危也。面带红紫，面青带白，神气少者俱无救。不语者死。略能语者尚有可生之机。面色少神，喜坐低处者，亦难治。帝中喉也乃性命攸关，舌系下通于肾，白肿不治伤之者死。

又曰：凡喉证至五日即重。三日前证虽重，尚未成脓，药能消散。若至五、六日，患处多成脓，随便穿破后烂成窝，为难愈。如烂用口疳药多加龙骨、珍珠。

又曰：凡喉非急证者，一、二日未必发热，病尚轻缓；若至三日发热证必加重。须问其大小便通利与否，如二便利，证候虽加，不过浮火上攻，服解毒消风消火之药即愈；若二便不通利，必内有实火，非用降火解毒重剂及通利二便之药，火何从而出？病何从而解？亦须问其头痛与否，如头痛即兼伤寒难治。凡喉证必俟大便去后，方可望痊；若大便秘结，未可轻许。

又曰：凡喉证初起，大便秘结，宜大黄、玄明粉通之，则大便降而易痊。若至五、六日，久而不食，大便结，用之立毙。盖病久元气已虚，岂宜再用硝、黄？当有善法以处之。

又曰：凡患喉证者，无痰不治。

又曰：凡喉证先碎者，先吹长肉药，后吹碧丹。

又曰：凡吹喉证，须吹药四、五管，方得痰出，三次可以痊愈。其出痰初吹宜多用金丹，必直对帝中，重吹之，急提出管，恐痰即呕出也。

又曰：妇人喉证肿痛，有因经闭致火上攻而成者，宜内服通经药，月事通则愈。

又曰：凡喉中无形红肿者，当用灯心。

又曰：凡喉证凶者，面发肿，白亮无光彩，脉微沉无力，是神气外泄，无阳之证，断不治。若面发红肿，脉来洪大有力，证虽极重，是有元气，火气盛治之易痊。

又曰：凡吹喉咙药，医家吹时，气须和平，用管周遍为妙。

又曰：凡初起吹药，须令患者低头，流出涎痰。

又曰：凡吹喉证，欲出痰涎，药中用皂莢末少许。

《伤寒论》曰：咽中闭塞，不可发汗，发汗则吐血，气欲绝。

又曰：咽喉干燥者，不可发汗。

咽痛门主方

窦氏新增一切咽喉、口舌等证神效方

牛胆硝 生黄连 黑山栀 生黄耆 白硼砂各三钱 青黛水飞去渣晒干 青梅干煨存性 人中白煨各五钱 鸡内金即鸡肫内黄皮 雄黄各一钱 枯矾二钱

各为细末和匀，加真麝香三分，真冰片六分，再研和入小罐内，用乌金纸塞紧罐口，每用芦管抄药吹入患上，一日夜吹十余次，徐徐流出痰涎渐愈。如有腐臭，急用蚌水灌净，或用猪牙草、扁柏子和捣，加水去渣灌净，前药五钱加牛黄二分，铜青、熊胆、珍珠各五分，儿茶八分研吹。近世喉科每每勒财，下药者多，凡有力之家，宜修合施人，以积子孙。

附制牛胆硝法：冬月入朴硝在黑牛胆内，挂在风处一百二十日，去皮收之。

附制青梅干法：大青梅一斤去核，入白矾、食盐各五钱拌和，再加蜻蜓不拘多少，层层间之，一日夜取梅晒干，收尽汁，再晒干，煨灰存性，用时加入。夏月宜服冷香薷，其灌口用雪里红捣汁灌之。

冰片散 窦太师。

真冰片 鸡内金烧存性 生甘草 枯矾各一钱 黄连 玄明粉 黄柏蜜炙 雄黄各二钱 鹿角霜一两 硼砂五钱 靛花二钱

各研细和匀，吹入口中。气臭加人中白煨三分，铜青略煨，不宜太过，五分。

紫雪 窦太师。

青矾不拘多少，火煨通红，取出放地上出火毒 硼砂 玄明粉 冰片 麝香

研极细，放舌下或喉间。

雄黄化毒丸 窦太师。

巴豆仁三十五粒 雄黄水飞 绿豆粉 甘草节 郁金如无，用蝉肚姜黄代之，各一钱

研末。醋糊为丸黍大，每服七丸，茶清下，吐出痰涎立醒。未吐再服七丸。如人死者、心尚热，研末灌之。

牛黄清心丸 龔太师。

胆南星一两 防风 川黄连 雄黄各二钱 五倍子 元参 天竺黄 桔梗 白茯苓 当归 乌犀角镑 荆芥各一钱 真冰片 珍珠 真麝香各五分 轻粉三分

上为细末和匀。甘草膏为丸如龙眼大，辰砂为衣，日中晒干，入磁瓶内塞紧瓶口，勿令出气，临服用薄荷汤磨服一丸。

冰硼散 毋论新久咽喉，口齿肿毒，及久嗽痰火，咽哑作痛。

玄明粉 硼砂各五钱 朱砂六分 冰片五分

研极细：吹患上，甚者日吹五、六次。

柳华散 治喉疮及口舌生疮，走马牙疳、咽喉肿痛。

蒲黄炒 黄柏炒 人中白煨 青黛各一两 冰片五分 硼砂五钱
共为细末。吹喉极效。

漱药

山豆根 夏枯草 松罗茶陈者 嫩菊叶 苏薄荷各等分 煎汤频漱。

三黄解毒汤

黄连二钱 黄芩 黑山栀 黄柏各一钱五分 水煎服。

清胃汤

生地二钱 升麻 连翘 牡丹皮 黄连 水煎服。

引火汤 雷真君。

熟地 元参各一两 白茯苓五钱 白芥子二钱 山茱萸 山药各四钱 北五味二钱 肉桂一钱 水煎服。

生肌散 痧痘口疮臭烂。

黄连土炒 地骨皮 黄柏 五倍子 生甘草各等分

研细干掺之。若仍有作热作脓而不即愈者，乃内毒未尽也。仍用大连翘饮解之。

二圣散 痧痘咽喉肿痛，不拘初起回后。

白僵蚕二钱 苦参三钱

研细。吹入三、四次，即肿消痛止。

败毒散 疹后口臭口疮唇烂，咽喉疼痛。

生地一钱五分 桔梗 连翘 牛蒡子 天花粉 元参 金银花各八分
粉丹皮 柴胡各七分 生甘草三分 黄柏蜜水炒 薄荷 赤芍药各五分
熟石膏一钱

加淡竹叶一钱，灯心五十寸同煎，再加生犀角磨汁和药服。每日用米泔水洗十余次。若不频洗，又不服药，内热炽甚，则变走马牙疳矣。

喉间肿长如瓜蒂者不可刺，刺破则伤人，盐煨过研细，以鸡翎蘸搽即消。

喉下诸般肿 蜗牛飞面研匀，贴肿处。

紫袍散周鹤仙。治咽喉十八种证。

石膏 青黛 朱砂 白硼砂各一两 人中白煨 元明粉 胆矾
山豆根 真冰片三分

共乳极细末。磁瓶密贮，急时用二、三厘吹咽喉即愈。

热痛咽痛 童便三合含咽。

咽喉破烂 倒挂尘阴阳瓦煨，七分 明矾三分 研细吹。

回生救苦上清丹徐峨峰。治咽喉十八种急证如神。

白僵蚕焙存性，一钱 生硝 煨硝 白硼砂各五分 明矾 熟矾各二分
海螵蛸三分 冰片一分

共研极细末。磁瓶收贮，每用少许吹上，吐去痰涎，即愈。

咽喉危证 野荞麦春间初发红嘴形类海棠，六、七月间可长四、五尺，其茎叶颇似海棠，节有红节，叶大如掌。每采鲜叶捣汁，入醋一匙，以绵蘸扫，涎出即活。

奎光秘传咽喉口齿合药法：

玉丹此宜预先多制，愈久愈神。将明矾指头大块者入罐内，放桴炭火上熔化，以箸试看罐底无块时，随投火硝一两，硼砂一两。少顷又投明矾化尽，又下硝硼如前法，逐层投完。待罐口铺地如馒头样，方用武火炼至干枯，用净瓦覆罐口，一时取起，将研细牛黄少许，用水五、六匙调和，以匙挑滴丹上，将罐仍入火内烘干，即取起。连罐覆净地上，下以

纸衬地上,用瓦盖七日,收贮听用。

制黄柏法:拣好黄柏切片,用荆芥穗为君,甘草佐之,煎浓汁浸软,摊瓦上缓缓炙黄,不可令焦,洒白蜜汤晒干,研末听用。

制灯心灰法:取白色灯心,先用水洒潮,以厚笔管将灯心塞令紧,笔管两头用纸塞实,入火缓缓烧过,去竹管塞纸开看,如烧不过则生,如烧太过则无有矣。制须得法为妙。

制猪牙皂角法:取坚小不蛀猪牙皂角放瓦上火炙脆,去两头,研末。磁瓶密贮听用。

制硝法:入金丹用者,火硝以温汤蘸过绵纸挹干包好,放灶上洞内五、六日,收其湿气。入玉丹内,不必如此。

合碧丹法:每用玉丹三分,配百草霜半匙研匀,入灯心灰一厘,甘草末三匙,苏薄荷叶末三分,研极细。然后入好冰片五厘,多些更妙。再研匀,入小磁瓶内,勿泄气。此丹宜临用旋合,不可出三日,不可过阴天。春夏宜多加苏薄荷叶末,其色青。秋冬宜多加玉丹,其色白。欲出痰加皂荚少许。

合金丹法:每用提过硝一钱八分,人生蒲黄罗细末四分,共研细。次下僵蚕末一分,猪牙皂角一分,和研成淡黄色,加冰片一分,再研。此药可以久留,冰片临用时加。

按金丹功主消肿出痰,并牙咬舔舌穿牙疗毒,专用此丹治之。咽喉等证则兼用碧丹,看证轻重加减。如证重者再加牛黄于本方内。如喉肿证及喉风,加僵蚕、牙皂。轻证只用硝与蒲黄。盖碧丹消痰清热,解毒驱风,固为良剂,尚属平缓,不如金丹消肿毒,除风热,开喉闭,出痰涎,最为神效。但喉证初起,金丹不宜多用,因其能直透入内,且善走散,初起若多用之,恐轻证不胜药力,反捍格难入也。凡喉证及单双蛾,只用碧丹,其他重证,金碧兼之,须分先后多寡,初起碧丹九,金丹一,吹五管后,碧丹八,金丹二,再吹碧丹七,金丹三,如证重者碧丹金丹各半,用至三、五次后,痰涎必上涌,然后金丹六,碧丹四,将管直入喉中,重吹一次,随收出管,即吊出痰。竟用金丹八,碧丹二,亦可。

膏滋药法 苏薄荷为君,玉丹为臣,川贝母为佐,灯心灰、百草霜、甘草、冰片为使,先将玉丹、百草霜研和后,入灯心灰再研,再入薄荷、甘

草、贝母研极细，方入冰片研，蜜调服。凡喉痛喉菌须时时噙咽之，证重则兼煎药及吹药。

喉证主方

牛蒡子炒研 前胡 连翘炒 桔梗 黑山栀 瓜蒌根 枯黄芩
元参 甘草或加金银花 发热加柴胡 头痛加熟石膏 口渴加麦冬、知母 胸膈饱
加枳壳 郁热加芍药、贝母 水煎服。

三黄散方 生地为君，蒲黄为臣，牛黄为佐，冰片为使，共为极细末，用芭蕉根汁或扁柏叶汁和蜜调敷。此药治头痛面痛。如肿硬不消，因气凝血滞，或痰块结而不散，则兼阴证矣。宜用姜汁、葱汁为要。兼治小儿丹毒。

玉锁匙方 巴豆压油于纸上，捻成条子，点灯灭火，以烟熏入鼻中，一时鼻若流涕，其关即开。

犀角解毒丸

犀角镑，一钱 桔梗一两 赤茯苓 牛蒡子 生地各五钱 元参 连翘各六钱 朴硝 甘草 青黛各二钱

共研极细末。炼蜜为丸如龙眼大，薄荷汤化下，挟惊者朱砂为衣。此通治小儿诸疮毒，及痧痘后余毒喉齿等证。

口疳药即兼长肉方 每薄荷三分配儿茶一分五厘，制黄柏厘许，龙骨二厘，白芷二厘五毫，如肿痛即用三、四厘，甘草珍珠各五厘，各研细。配合再研。加冰片三厘再研匀，入磁罐内。凡遇口碎及各种口疳用此。若初肿起而热甚者，多用薄荷；若不肿不甚热病久，宜用长肉为主，本方多加儿茶、珍珠、龙骨；如色成紫及一切喉证碎者，亦用此长肉。如治走马疳，穿牙疔，及重舌口疳，初生小儿胎毒、口疳，本方中加牛黄，倍珍珠，无不奏效。若黑而臭腐者不治。小儿黄色胎疳，如干橘穰者不治。如治痧痘后口疳，去黄柏、龙骨，加牛黄、倍珍珠各五厘，多更妙。大抵遇极凶证难效者，或欲速愈见效，加牛黄、珍珠各五厘，多些更妙。

痘后疳非此不效，余证加之，亦无不神应。凡用碧丹，看证凶险时，冰片宜多加些，将愈甘草宜多加些。

吹咽痛

壁蟾窝二十个 橄榄核三个

共于阴阳瓦上焙存性，研细吹。

冰梅 治咽喉百病。

半熟大梅子一百枚，五月五日午时，用食盐、朴硝各四两，水三碗，入坛内浸梅子，其水约过梅子一指，浸一宿，后人猪牙皂如眉毛大者作去核、去弦 防风 甘草 白矾各四两 鲜南星切片 鲜半夏切片各三十五枚 桔梗二两

研细拌入。浸七日取梅晒干，又浸又晒，以汁尽梅上起白霜为度，磁瓶收贮。凡用取梅一枚，丝棉包噙口内，有水先咽五、六口，后有痰涎吐尽，以口内无痰，只有清水，方去梅子，可以食粥，一枚可治二病。

赤麟丹 吴振华。治喉痹喉风喉蛾喉痛七十二证如神。用倾元宝罐一个，入明矾二两，好血竭二钱，于罐内放巴豆仁二十一粒于矾内，放炭火上煨，令烟尽，冷定加白硼砂二钱，冰片一钱，共研极细，磁瓶密贮。每用少许吹之。

喉痹门主论

陈实功曰：喉痹咽喉肿痛，半塞半开，又宽又肿，此乃标病，虽重无妨。用金锁匙吐出痰涎，利膈饮推荡积热。《正宗》。

冯鲁瞻曰：喉痹者，即缠喉风类是也。其候面赤气粗，咽喉肿闭，乃蓄热生风，积聚毒痰而作。甚者内壅肉瘤一块，气闭不通。若至鼻而青黑，塞噎头低，痰胶声锯者不治。更有脏寒，亦能令人咽闭而吞吐不利者。盖诸证下寒过极，则上热反盛，不独此也。其候与蛾证相近，而治法不能无异，大抵无形肿闭者为痹，有形肿痛者即是蛾耳。先吐风痰者，急则治其标也。后解热毒者，缓则治其本也。至于上热下寒者，用热药食前冷服之，不可误服凉药也。

又曰：经曰：一阴一阳结谓之喉痹。一阴君火也，一阳少阳相火也，手少阴心脉挟咽，足少阴肾脉循喉咙，其人膈间素有痰涎，或因饮酒过度，或因忿怒失常，或因房室不节。盖饮酒过度，胃火动也，富贵人多犯之；忿怒失常，肝火动也，妇人多犯之；房室不节，肾火动也，男子多犯之。火动痰上而痰热熏灼，壅塞咽嗌之间，痰者火之本，火者痰

之标,火性急速,所以内外肿痛,水浆不入,乃外证之最危者。治疗之法,急则治标,缓则治本,治标用丸散以吐痰散热,治本用汤药以降火补虚。奈何治者但云治脾肺火,而未云降肝肾火也,必须以内经从治之法,切不可骤用寒凉,益促其危耳。故实火须用正治,虚火须用从治,须分明白不可少误。

又曰:咽与喉,会厌与舌,四者同在一门,其用各异。喉以纳气,故喉气通于天;咽以纳食,故咽气通于地;会厌管乎上,以主开阖,掩其气喉,令水谷能进食喉而不错,四者交相为用,阙一则饮食废而死矣。云喉痹者,谓喉中呼吸不通,言语不出,而天气闭塞也。云咽痛及噬痛者,谓咽喉不能纳唾与食,而地气闭也。云喉痹咽噬痛者,谓咽喉诸病,天地之气,并闭塞也。按咽之低处为噬。

又曰:咽在后主食,喉在前主气,十二经中惟足太阳主表,别下项,余经皆内循咽喉,尽得以病之。而统在君相二火,喉主天气,属肺金,变动为燥,燥则涩而闭。咽主地气,属脾土,变动为湿,湿则肿而胀。皆火郁上焦,致痰涎气血结聚咽喉,肿达于外,麻痒且痛为缠喉风,肿于两旁为喉痹,其单蛾、双蛾、木舌、舌胀、缠喉、走马、喉风,病同于火故不分也。惟缠喉走马,杀人最速。

又曰:喉痹多属痰热,重者用桐油探吐。缠喉风亦属痰热,谓其咽喉里外皆肿者,是也。亦用桐油以鹅翎探吐。

又曰:肺绝喉闭,其脉浮散而微细,其声如鼾,有如痰在喉中响者,此为肺绝之候。宜速用人参汤调入竹沥、姜汁服之。若早治者十全七、八,次则十全三、四,迟则十不救一。

又曰:喉痹用陈年霜梅,入蜒蚰令化,每患喉痹等证,用梅噙于口中,神效。《锦囊》。

张子和曰:治喉痹用针出血,最为上策。《内经》火郁发之。发谓发汗,出血者,乃发汗之一端也。

《医论选要》曰:脏腑停寒,寒则气缩,如物窒碍于其间。固有喉痹之证。

又曰:阴证下虚,令人喉痹,又当治其下寒,则痹自通矣。

又曰:走马喉痹者,谓喉痹急甚,其死又速,药缓不及救也。惟针

出毒血，病即时愈。

窦汉卿曰：或问风毒喉痹，内外俱肿，其故何也？风毒之气结于喉间，则壅塞喉间，乃风毒与痰相搏故也。《素问》云：无风则不动痰，无痰则不受风，风痰相搏，结塞咽喉。其外证咽喉形如鸡子，其色微白，外面腮上有肿，其形似疮，身发寒热，牙关紧强，语声不出者，是也。先用齑汁加元明粉，或蜜汤探取其痰，急服荆防消毒散，牙间肿处紫黑，用小刀点破，即用冰片散吹之。无不效验。《全书》。

又云：风热喉闭，内外俱肿者，谓其人久积热毒，因而感风，风热相搏，发出外来则壅喉间。其人面赤腮肿，身发寒热，喉中有块如拳，外血鲜红。先用玉字药蜜调点之，次用荆防消毒加减治之。

又云：如牙关紧强不得开者，此皆风痰相搏，壅塞咽喉。先用木针排开，或黄齑菜汁，或温蜜汤，或醋水，俱入元明粉灌喉，再用鹅翎搅之，吐出痰涎几碗，外用五倍子醋调敷之，急服荆防二陈汤，吹冰片散。

又云：虚阳上攻，由于久病元气虚弱，邪火上行，咽喉肿痛，上下不升降，水火不既济，心火冲喉故肿痛而闭塞，其形若何？曰语声不出，牙关紧急，痰涎满口，手足厥冷，头目昏眩者是也。治法如前。

又云：或厥重不省人事，目张直视，可用吴茱萸研烂，醋调涂两脚心，然后用降气汤治之；气喘加前胡、乌药，气短加沉香、人参，待手足温，饮薄粥以敛元气。入谷则昌，绝谷则亡，此之谓也。

又云：如腮颌浮肿，外面赤者，此必感于风毒，急用紫苏、枫叶、柏枝煎汤洗之，外用荆防羌活汤以祛其风。或十宣散。

又云：酒毒喉痹，乃酒毒蒸于心脾二经，则壅咽喉，其人面赤而目睛上视者是也。取痰法如前，再用冰片散吹之，清凉散饮之。

又云：酒毒喉痹其形若鸡子，其肿鲜红，其光如镜。外证发热恶寒，头痛颈强。此上焦积热，心脾受之，盖心脾二经主上焦。宜服粘子解毒汤。

又云：风热喉痹由于忧思劳碌太过，或对风言语，风入肺经作痰，务多去痰为要。其色鲜红，久而紫赤，急用小刀点之，或用芦刀点之，血微出火已泻矣。再服煎剂，并冰片散吹之甚效。凡紫赤色者变为淡红色，愈之渐也。

又云：气痛喉痹，此证为因聚毒塞于喉间，痰涎稠实，发寒热者，仍分上中下三关。毒在下关者难治，上中二关用吹药吹喉，茶汤送下雄黄化毒丸七粒。

寔梦麟曰：喉闭，此证因外感寒邪，内伤热物，或大寒后便入热汤洗，故将寒气逼入脾经，冷气阻于中脘，邪气热客于心经，故生此疾。急用三棱针刺手腕中紫筋上，或少商穴出血，却将雄黄化毒丸冷茶磨化灌之，仍将冰片散吹入喉中，待漱出风涎稠痰为愈。

又云：风毒喉痹，外赤肿，内肿微红带白色，其形似蒸饼，连腮肿痛。外证身恶寒而无热，腮颌浮肿，牙关紧强，此乃风痰相搏，结寒喉间。治法必以去痰为主，吹药吹之。若外面肿红，用围药敷之，中留一小孔，再润之，以助药力。

又云：风热喉痹，其肿红而微紫，其形如拳，其人面青而目上视。外证壮热恶寒，俨若伤寒，此病人久积热毒，因而感风所致。如病人声音不响，宜用润肺之药治之。

又云：酒毒喉痹，其肿黄，其血黑，其形若臂，其肿若坎。外证面赤，目睛上视，此乃热毒伤于心脾，气通于口，循环上下，故咽喉痛。治法先取其痰，再吹药，鼠粘子汤多加干姜、花粉、生黄连、山梔、枳壳、连翘、桔梗、元参。

又云：阴毒喉痹，肿如紫李，现黑色，其色光血红可治；阴毒血黑不治。外证恶寒，其身颤动振，腰痛脚冷，此乃冬月感阴湿火邪相干也。其血微红及肿处软，喉中有痰可治；血红黑甚，肿硬喉干难治。先服五福化毒丹，次以苏子降气汤，再吹药，一月之内戒酒。

又云：伤寒喉痹，乃伤寒遗毒不散，致八、九日后喉痹。皆因热毒入于心脾二经，吹冰片散。

钱青抡曰：喉闭必先两日胸膈气紧，出气短促，蓦然喉痛，手足厥冷，气闭，命悬顷刻。速用鸡翎或鹅毛蘸桐油，喉间搅探吐痰立开。切忌牛黄，入口不救。如无药或有药不进者，急将两臂以手勒数十次，取油头绳扎大拇指，以针刺指甲边，即少商穴。血滴下其喉即通。只刺男左女右，重者两手齐针。《单方全集》。

丹溪曰：喉痹属痰、属风、属热，皆因郁火而兼热毒，肿甚不红者，

乃咽喉之虚证。

奎光曰：伤寒后发喉痹乳蛾难治。为气闭不通，无形无势，其证喉项强硬，目睛上视，故多不治。

喉痹门主方

秘法 如初觉咽喉壅塞，即以纸捻取嚏，或皂角末吹鼻中取嚏，可散热也。

喉痹《锦囊》。 取山豆根汁含咽即开。有药不能进者，急取病人两臂捋数十次，使血聚大指上，以发绳扎住拇指，针刺指甲缝边出血，如放痧一般，左右手皆然，其喉即宽。

蜜附子法《三因》。 治感寒咽闭不能咽。大附子一枚，生去皮、脐，切作大片，蜜涂炙令黄。每用一片口含咽津，候甘味尽，再换一片含之，以效为度。

喉痹 鸭嘴胆矾研细，醋调灌，吐胶痰。

喉痹双单蛾 地骨皮阴阳瓦焙，研细末，芦管吹入，即吐痰涎。

喉痹乳蛾 虾蟆衣、凤尾草，搗细。入盐霜梅肉酒煮，各少许和匀研，布包绞汁，以鹅翎刷患上，吐痰即消。

喉痹喉蛾《急救方》。 乌梅肉包鼻涕虫于内，如元眼大，绢包噙口内，即愈。

喉痹

壁钱即蜘蛛窝，七个，新瓦上焙用 硼砂五分 冰片一分

研细密贮，先用土牛膝草煎汤漱口，吹少许。

喉痹双单蛾 猪胆将糯米灌满阴干，共捣为末，加冰片乳极细，吹三次吐痰愈。

喉闭周鹤仙。 缠喉风急喉痹单双蛾汤药不下者。

巴豆七粒，三粒生用，再以四粒灯头上烧存性 明雄皂子大一块 郁金一个，如蝉肚大者佳

共为细末。每用一半，清茶调服，如口噤咽塞用竹管吹入喉中，须臾吐痰即愈。但能灌下无有不活者。

凡患喉痹在穷乡僻野药石不便者 急将病人面朝上,卧于地下,令一人两手揪住头发,两脚踏其肩头,息散。

又方 食盐炒红研末,以竹管吹五、六次,吐出痰涎即安。

治喉痹乳蛾,咽喉肿痛,汤水不入,死在须臾 巴豆去壳研末,入北细辛少许同研,卷在纸中间,成条剪断,用针穿一孔,如患在左塞右鼻孔,患在右塞左鼻孔,左右俱患塞两鼻孔,咽喉立通。

又方 墙上壁钱七个,内要活蟾蛛二个,捻作一团,再用生明矾七分一块,倾银罐内化开,将壁钱入矾内,煨存性,为末,竹管吹入立时就好,虽将死者,亦能复活。忌食热物硬物。

又方 真蟾酥为末,用箸头点入对嘴上,即时消散。

又方

白矾 黄连 猪牙皂角各等分

同放新瓦上焙干为末。每用五分,吹入喉中,少顷脓血即出而愈。

又方 青靛吹喉痹乳蛾,如神。

又方

胆矾二钱 冰片二厘

研匀,吹上即消。

又方 生芝麻油一合,灌之。

又方 韭菜地上挖取红小蚯蚓,同醋搗汁灌之,即吐痰血而愈。

又方 枯白矾末吹入喉中,急用灯盏内油脚灌之,即消。

又方 马屁勃研末吹咽喉,立效。

又方 蛭蟥虫取汁点入,得下即通。

又方 马兰草叶入香油少许,捣汁点上,即消。

又方 生韭菜捣敷项上,立效。

又方 硼砂含咽,大能泻热利膈,消肿清咽化痰。

喉痹及喉中热痛口生疮 好雪梨取汁频饮,多食亦可。

二生散 治喉闭并吹乳痈肿恶疮。

生明矾 生雄黄各等分

研为极细末。喉闭吹入,吐出毒水,日三次。疮毒醋调或凉水调

敷。

喉痹喉风

儿茶 硼砂 胆矾各等分

共入铁杓内熔化枯，冷定刮下，研细吹。

喉痹

青鱼胆阴干为末，收好 壁钱焙 秧根上螺蛳用尖

各等分，研细吹之。如吹三次不开关，则无救矣。

喉痹喉风壅肿 直僵蚕一两，葱一把，煎汤洗项下，风热即散，然后吹药。

喉风门主论

《医论选要》曰：缠喉风者，热结于喉，肿绕于外，且麻且痒，肿而大也。治疗之法，微者可以咸软之，大者可以辛散之，或去风痰，或解热毒。如肿甚药不能下者，以药灌鼻中，令吐之。外以拔毒之剂敷之，热退肿消为吉。

窦汉卿曰：夫缠喉风属痰热，咽喉里外皆肿者，是也。外面无肿者，必身发热面赤，此乃热毒之气极也。外面有肿者，身亦发热，邪火发外之原也。或牙关不强，外面不肿，但喉中红者，曰暴感，热在心，如左边病退传右边，此余毒未尽故也。咽喉有数证，有积热，有风热，有客热，有病后余毒未除，变化双乳蛾者，且如病中喉间有肿红色数月，其光似镜者，此积热也。且如喉中有肿，其色微白，其形若臂者，此风毒喉痹也，此热毒因而感风相搏而发故也。或咽中有肿，其色带紫色者，此乃客热，谓其人暴感热毒之气，壅塞喉间，须用木通、元参、生地、黄芩、黄连、山梔仁，泻心经之火为要。或有传变木舌者，皆心热蕴积于胸中，故口中痰臭，服剂以凉膈为要，搓药以冰片散佐之，或用小刀点之，以出紫血。《全书》。

又云：缠喉风外证如蛇缠颈，身发潮热，头目大痛，其证肿如紫糖色，内证其肿红线白色，肿塞不见咽下。吹药内加雄黄、冰麝，服荆防粘子二陈汤，急用鹅毛蘸灯窝浊油，搅去痰涎三、四碗方活；如痰不能去，难生矣。须要避风。

又云：哑瘵喉风，乃风痰犯于咽膈之间，因此口不能言，牙关不开。急用蟾酥磨水滴入鼻孔即开，随用桐油滴入喉中，仍将鹅毛搅喉间，风痰出尽，再用甘草汤解桐油之气，吹药，更服荆防败毒散。如若面紫舌青唇黑，鼻流冷涕，爪甲俱青，目中多泪，俱不治。

又云：弄舌喉风，此证哑不能言，舌出常将手拿，急将两手大指侧爪甲缝用三棱针，每指刺三针，有血可治，无血不治。若针少商穴亦妙。用铜匙排开口，用胆硝丹吹入喉中，灯窝内油脚再用鹅翎蘸搅出痰涎，仍服雄黄化毒丸七丸，清茶送下，后服疏风甘桔汤，频吹冰片散。

窦梦麟曰：缠喉风因肾经有热，内枯不能上润，致令心火强盛，故发此证。如喉间雷响者不可治，切宜仔细。

又曰：呛食喉风，此证因热毒在于心经，咽喉燥而无痰。若呛食者不可治；如久不治，变为飞丝劳毒，能伤人命。

又曰：脚跟喉风，此证脚跟发起，至于喉间，或一年发一次，半年发一次。切忌热物，不得伤于怒气。其病一日行一穴，至七日行七穴，虽然不妨，只是要发。用吹喉药，仍服败毒药。如肿恶发泡者死。

男子患缠喉风肿，表里皆作，药不能下。余以疏风清热药灌六十余次，外以阳起石烧研同伏龙肝等分调和匀，新汲水调扫百遍，三日热始退，肿始消。

胡景周曰：如用桐油探吐，或吹药吐痰后，而肿不消，或人事不知者，急用针刺患处，以去恶血即苏。

奎光曰：缠喉风因心中急躁而发，先二日必胸膈气紧，出气短促，忽然咽喉肿痛，手足厥冷，颈如搅转，热结于内，肿扰于外，且麻且痒，喉内红丝缠绕，手指甲白，手心壮热，喉肿而大，风痰壅盛，声如拽锯，是候也，最为急证。初起一日夜，目直视，喉中如雷声者，不治；灯火近患人口吹灭者，不治；若喘急额汗，危在旦夕。

又曰：缠喉风者，热结于喉，肿绕于外，且麻且痒也。

又曰：缠者自颐缠绕，赤色寒热也。

又曰：缠喉风初起，用金丹、碧丹等分频频吹之，内服煎剂下药，须兼牛黄。方载咽喉门。

喉风门主方

缠喉风喉痹 此证胸膈气急，忽然咽喉肿痛，手足厥冷，气闭不通。

真郁金一钱 明雄二钱 巴豆霜三分

研细。水丸如芥菜子大，每服十二丸，用滚水些须送下。如口噤喉塞，用小竹管纳药入喉中，须臾吐痰，即活。

急喉风喉痹 端午午时取蜻蜓百条，放瓶内候化为水，再用霜梅不拘多少，浸在蜻蜓汁内三昼夜，取梅晒干，复投汁内，浸透又晒，汁尽为度，磁瓶收贮。每用一梅，患者噙之。

锁喉风 万年青捣汁和滴醋含漱，即愈。

缠喉风 麻油调白矾末，和鸡子白灌之。

紧喉风 灯窝油和浆水，灌之。

又方 土牛膝根捣烂，和醋灌之。

又方 针刺红肿之处，发泄毒血自愈。

锁喉风喉痹不能吞物，数年不愈者。

土牛膝草不拘多少 扁柏叶一把

用井水浸透捣取汁大半碗，加牛乳一酒杯和匀，含吞数口，二、三次即愈。

缠喉风神方活人甚众 白矾细末五分，乌鸡子一个，调匀灌喉中立效。

神效吹喉散 治缠喉风闭塞，及乳蛾、喉痹、重舌、木舌等证。

苏薄荷净叶 朴硝 枯白矾 青黛 白僵蚕 火硝 白硼砂 黄连各等分

共研细末。腊月初一日取雄猪胆七、八个倒出胆汁，以猪胆一个拌上药五钱为率，复灌胆壳内，以线扎好，胆外用青缸纸包裹，将地掘

一地窟^①，深^②一尺，上用竹竿悬空横吊，再用板铺以泥密盖，候至立春取出，挂风处阴干，去青纸胆皮，磁罐密收。每药一两加冰片三分同研极细，吹患上神效。

金钥匙 缠喉风喉闭，痰涎壅塞，口噤不开，汤水不下。

焰硝一两五钱 硼砂五钱 雄黄二钱 白僵蚕一钱 冰片二分五厘

各另研和匀。以竹管吹患处，痰涎即出。如痰已出，肿痛仍不消，急针患处去恶血，服煎剂。

又方 多年溺壶垢半盏，蜜五匙灌下，愈。

又方 牵牛鼻绳烧灰吹之。

又方 腊月初一日取猪胆不拘大小五、六枚，黄连、青黛、苏薄荷、僵蚕、白矾、朴硝各五钱，研细装入胆内，青布包好，将地掘一孔，方，深一尺，以竹横悬此胆在内，以物盖定，候立春日取出待风吹，去胆皮青布，研末密收，每吹少许。

百灵丸〔简便〕。喉中结块不通水食者，百草霜研细，炼蜜为丸芡实大，水化一丸灌下，甚者不过二丸。

吹喉药秘方。

硼砂二钱五分 雄黄三钱 儿茶一钱 冰片三分 苏薄荷三两，另研

和匀密贮，不可泄气。用芦管吹入少许，或用茶匙挑入舌上噙一刻咽下，日八、九次。若锁喉风口内干枯者，以井水调灌，即能开关生津。若脾泄胃弱者，不宜多用。余无禁忌。

急锁喉风 升麻四两剉碎，水四碗煎一碗，灌服。

又方 皂荚捶碎，搗水灌服取吐，即不吐亦安。

又方 巴豆去壳取仁，绵纸微裹，随左右塞鼻孔中，立通。

又方 鸭嘴胆矾一块含口中，其痰涎自壅出，吐尽即愈。

喉风口噤死在须臾周鹤仙。

胆矾五分，半生半熟 木香各三分

共为细末。用番木鳖磨并华水调和，以鸡翎蘸扫患处，如势急口

① 窟 光华堂本作“坑”。

② 深 光华堂本此字上有“阔”字。

噤，用箸启齿扫下，即消。

时气缠喉风，咽喉闭塞，水谷不下，牙关紧急，不省人事。

雄黄 枯矾 藜芦生用 猪牙皂炙黄，各等分

研细。每用豆大许，吹入鼻内，吐痰自愈。

缠喉风痰涎闭塞 蛇蛻揉碎烧烟，竹筒吸之即破。

又方 人指甲煨灰，冰片五厘，同研吹。

又方 雄黄一块，新汲水磨急灌，得吐而愈。

又方 朴硝一两，细细含咽。

又方 桐油或灯盏油脚。以鹅翎扫入喉中探吐。再用远志研末，水调敷项外。

敷喉痹喉风，汤饮不下 皂角阴阳瓦焙，研细末，滴醋调敷喉外即愈。

夺命无忧散 治缠喉风咽喉疼痛，痰涎壅盛，口舌生疮，心腹胀满，脾积症块，小儿奶癖，误吞骨屑，鲠塞不下，以及诸般药毒，热盛喉闭涎满，气急闷乱，不省人事，并效。

寒水石煨，三两 玄参 黄连 贯仲 山豆根 荆芥 甘草 硼砂 滑石 砂仁 白茯苓各五钱

共为极细末。每用一钱，干掺舌上后，以新汲水咽下，不拘时服。

白降雪丹

硼砂一钱 熟石膏一钱五分 焰硝 胆矾各五分 元明粉三分 冰片二分 研细，吹。

喉风

番木鳖一个 冰片二分 研细，吹。

又方

短头发五钱 雄黄五分 明矾一钱 蟾蜍窝三十个 共入罐内，煨存性，研细，吹。

又方

巴豆仁三尖粒 明矾三两

同以大银罐内煨枯冷定，取粘巴豆的矾，研细末。

喉风急救方 生艾叶捣汁灌下，如喉中壅闭，不能灌入，

即灌在鼻孔内,立刻开关。

又方 用蛇床子烧烟熏喉中,即流涎开关,如神。

十八般喉痹喉风咽蛾 用黄脚公鸡取不见水鸡脱皮,以布揩净,阴干粗纸包藏怀内,俟干燥乳细,加冰片五厘吹之。

喉痛门主论

王肯堂曰:喉痹当结喉生,又名猛疽,以其毒势猛烈可畏也。属任脉及手太阳、手少阴经积热忧愤所致。若过时不治,溃穿咽嗑者死。《准绳》。

《灵枢》云:痛发于嗑中,名曰猛疽。猛疽不治,化为脓;脓不泻,塞咽半日死,其化为脓者泻,则合豕膏,冷食三日而已。

朱丹溪曰:喉痹生于结喉之间,名曰海门第一关,最为恶毒。乃心肝火焰于脾肺,毒气攻喉,切忌刀针。

陈实功曰:咽喉红肿,瘀塞作痛,此属标病,脓自出愈。当以金锁匙吐出痰涎,推荡积热,脓胀痛者开之,损而痛者益之,其患自安。《正宗》。

经曰:喉痹不放脓,治皆非法。

蒋示吉曰:喉痹生于咽外正中,肿痛妨碍饮食,红肿发热,如必欲溃脓,软而胀痛者针之,内服补托之剂,玉红膏搽贴其肌完口。又有腐溃内通,汤水随孔出者,曾治数人,俱亦无妨。《说约》。

窦汉卿曰:积热喉痹,其肿如黄糖李微黄,上面红丝,外证项上痛齿痛,此胃经受热。胃气通于喉咙,故患喉痹,患痰法同,吹药加元明粉,煎药加当归、黄耆,倍片芩。《全书》。

又曰:喉痹,此毒因七情郁结而成。毒生喉间,若不速治,恐毒气内攻喉骨。若溃必致口内出脓,虽不伤命,即成冷瘰,终身之痼疾也。

汪省之曰:喉痹虽肿,而咽门半塞半开。其病虽凶,而喉道又宽又紧。此皆凶证,虽重无妨。《理例》。

奎光曰:喉痹因过食辛辣炙煿,厚味醇酒,感热而发,属肺。喉间无形,但红肿而痛,虚者亦发热,四、五日可愈。

又曰：喉痛，肥人感热性燥者多患此。凡舌下生如小舌，连喉肿痛即发痈。大抵兼者势凶。

又曰：治喉痛用碧丹加金丹少许，内服膏子药煎药。方载咽喉门。

又曰：凡患喉痛，如大便秘，煎药内加元明粉、大黄，小便不利，内加六一散治之。

又曰：喉痛用加减犀角地黄汤，舌用金丹吹舌根及两旁，莫间断。喉用碧丹，金丹，频频吹入。

喉痛门主方

治喉痛喉癣口疳

风蛭即抱鸡蛋壳烧存性 儿茶 橄榄核烧存性，各等分

共研细。每一钱加冰片三分，吹。

咽喉悬痈舌肿塞痛《外科秘宝》。

五倍子 白僵蚕 甘草各等分

研末。用白梅去核，捣丸如弹子大，噙嚥，其痛自破。

喉癣门主论

书云：喉癣即肺花疮。

冯鲁瞻曰：阴虚咳嗽，久之喉中痛者必有疮，名曰肺花疮。用坎离汤加元参、桔梗、甘草。不可用冰片吹药，恐辛散疮转溃也。《锦囊》。

陈实功曰：凡痰火劳嗽，咳伤咽痛者，无法可治。《正宗》。

汪省之曰：肺花疮，即俗谓喉生鱼鳞刺也，难救。《理例》。

奎光曰：喉刺多因先患癆病重证，既多虚火上升，血已枯，其喉上腭有红点密密如蚊蚤咬者，死勿治。

陈远公曰：人有生喉癣于咽门之内，以至喉痛。其证必先作痒，面红耳热而不可忍，后则咽唾随觉干燥，必再加咽唾而后快，久则成形作疼，变为杨梅红瘰，或疼或痒，而为癣矣。夫癣必有虫在咽喉之地，此因肾水之耗，以致肾火上冲而肺金又燥，兼治杀虫以治癣，庶几正固邪

散,虫可尽扫也。化癍神丹:元参、麦冬各一两,白苏子、白薇、甘草、紫菀、鼠粘子、白芥子各一钱,百部三钱,水煎服,二剂疹少止,又四剂癍虫尽死。换用润喉汤:熟地、麦冬各一两,薏仁五钱,桑白皮、生地各三钱、山萸肉四钱,贝母、甘草各一钱,水煎服,十剂痒痛俱除矣。方中再加肉桂一钱饥服,为善后之计,万举万全也。《辨证冰鉴》。

奎光曰:喉癍,乃虚火上炎,肺金太旺,致攻牙关,生如哥窑纹样,又如秋叶背后红丝,饮食阻碍,咽痛虽不致殒命,久则咽喉失音而不救。

又曰:喉癍用碧丹吹,不时服膏子药,再服煎剂加大贝母下气,守戒一月愈。方载咽喉门。

牛黄清心丸的临床新用

1. 颅内高压昏迷

方琦等运用本方治疗颅内高压昏迷 36 例。方氏对患者均常规使用脱水剂、激素、抗生素,加用牛黄清心丸(北京同仁堂生产),每次 1 粒,每日 2 次,磨研后胃管输灌入,痰量明显减少。

方琦,等. 广东医学院学报,1996,14(4):355

2. 脑卒中伴有意识障碍

金氏观察 43 例脑卒中住院患者,他们发病 7 天内伴有意识障碍,平均住院 30.77 ± 2.52 天,服用牛黄清心丸平均 14.79 ± 0.94 粒。服药 6.31 ± 1.38 天后,意识障碍改善; 11.35 ± 1.38 天后语言障碍开始改善; 9.35 ± 1.38 天后,运动障碍开始改善,出院时运动障碍显著性改善。脑卒中急性期,牛黄清心丸可作为急救药给患者服用,而且在意识障碍改善后可继续服用。

金东雄. 大韩韩医学会杂志,1994,15(1):203

3. 痰热扰心重症不寐

周氏治疗一患者,女,50 岁。平素肥胖,失眠 4 年,经常服用安眠药可入睡。多次求治于西医内科,诊为“更年期综合征”、“植物神经功能紊乱”。近期因恼怒气郁,夜不能寐,服用西药罗拉舒乐

安定,仅能入睡2~3小时。白天更觉倦怠少力,胸闷纳呆。稍有不顺,大发脾气,排解不能。望其舌尖边有红斑,苔黄腻,脉弦滑。辨证为痰热扰心,肝郁气滞。治宜选用局方牛黄清心丸早晚各1丸。半月后,白天神爽气顺,夜晚能安然入睡5小时以上。知其顽疾已愈,复嘱每日改为临睡服用1丸,再服半月,以资巩固。

周丽亚.河北中西医结合杂志,1998,7(7):1061

4. 本虚标实健忘重症

周氏治疗一患者,女,18岁。一年来学习紧张,睡眠不足,思虑过度渐出现健忘,注意力不能集中,精神恍惚,头胀,寐劣,口中黏苦,舌尖红而少润泽,苔薄黄腻,屡进养血安神之剂,终未能改善。此为思虑过度,心阴耗伤,心火独炽,灼液为痰,痰随火升,累及心神。予服局方牛黄清心丸早晚各1粒,连服40粒,诸恙悉平,记忆力佳,睡眠改善。

周丽亚.河北中西医结合杂志,1998,7(7):1061

5. 心火肝风小儿舞蹈病

周氏治疗一患者,男,9岁。3年前仲夏,因发热4天,经西医治疗热退,1周后发现摇头,抽颈,皱眉,眨眼,缩唇。经治疗后症状减轻,但疲劳后,反复发作,从而影响正常学习,曾予核磁共振、CT头颅扫描等检查,均未发现器质性病变,考虑为风湿性舞蹈病,但经治无效,病情逐渐加重。其发作时,时而抬肩屈肘,左前臂向前内侧抽起,左下肢屈膝抬腿,行动不能自控,似有冲动之举,甚者端坐或运动时发作则手足呈跳跃而起,正似舞蹈之状,舌质稍红,苔薄黄,脉弦细而数,拟作心火肝风,风痰窜络证治。嘱早晚各服局方牛黄清心丸1丸。自从服用该丸药后,半个月期间曾发作过1次,但症状较前明显减轻。嘱再连服3个月。其后,复发时但见皱眉摇头,主要症状已消失。再嘱服用1月巩固,症状完全控制。随访2年未复发。

周丽亚.河北中西医结合杂志,1998,7(7):1061

6. 中青年良性室性早搏

张小良运用中西医结合治疗中青年良性室性早搏 50 例。用药方法:倍他乐克 12.5~25 毫克口服,每天 2 次(参考心率情况),牛黄清心丸 1 丸(1.5 克/丸)口服,每天 2 次,用药疗程为 2 周。结果:早搏数评定:显效 17 例占 34%,有效 21 例占 42%,无效 12 例占 24%;症状缓解评定:有效 44 例占 88%,无效 6 例占 12%。

张小良.现代中西医结合杂志,2003,(11):1158

7. 复发性口疮

梅全喜运用牛黄清心丸治疗复发性口疮 35 例。用法是牛黄清心丸 2 丸,1 日 2 次,大补阴丸 5 克,1 日 2 次,服至无新发溃疡后,停药牛黄清心丸,续服大补阴丸 4 周。结果:显效 5 例,有效 19 例,无效 11 例,总有效率为 68.2%。

梅全喜.家庭中医药,2003,(6):51

8. 脱发

申永合运用本方治疗脱发 1 例。许某,男,30 岁,因出现脱发月余而就诊,开始洗头梳头时头发成撮而落,头皮常发痒,曾自购养血生发丸服 3 瓶后,症状未得到控制,头发反而成片脱落。患者自诉,平素情绪易激动,嗜好烟酒,心胸常烦热,夜间难以入睡,白天头脑昏胀不清,记忆力减退,查脉滑细数,舌红苔黄腻,此乃心火独盛,痰热内蕴之证。嘱服同仁堂牛黄清心丸,每次 1 丸,每日 2 次,服 1 周后,患者复诊自诉,精神明显好转,情绪稳定,头皮不痒,脱发减少。后改用日服 1 丸,坚持治疗 3 周,患者再诊,头发已生长如常,脱发痊愈。

申永合.河南中医,2000,(3):63

9. 风疹块

申永合运用本方治疗风疹 1 例。刘某,男,24 岁,自诉与爱人外出旅游 10 天,回家后自感身体不适,继而出现恶寒,发热,体温 39.4℃,皮肤瘙痒难受,经邻近卫生所医生诊为感冒合并荨麻疹,给药治疗后,热退但瘙痒不减,曾用扑尔敏、息斯敏、静注葡萄糖酸

钙等抗过敏药物,并同服中成药防风通圣丸,症状仍不稳定,1周来时发时止,反复发作。查患者精神烦躁,躯干四肢散发大小形状不等,粉红色风团样扁平皮疹,部分皮疹融合成大片,色赤鲜红,呈水肿性反应,可见搔痕,受热则剧,脉滑数,舌红苔黄。此乃风火蕴于血分,遂投以同仁牛黄清心丸,每次1丸,4小时1次,服3次后,瘙痒得以控制,疹块消失,为巩固疗效,又继服2丸,后未复发。

申永合.河南中医,2000,(3):63

紫雪散的临床新用

1. 口疮

翟瑞庆等运用本方加减治疗口腔溃疡100例。以三七、紫雪丹各等分,研细末,混匀,治疗时先用淡盐水漱口,以消毒棉签蘸药涂口腔溃疡患处,保持散剂在创面浸润时间,每日2~3次。结果:痊愈92例,有效6例,无效2例。一般患者用药1次疼痛减轻,2~5次痊愈。

翟瑞庆,等.四川中医,1997,15(3):53

2. 高热

方琦等运用本方加减治疗外感高热证102例。针剂,每次10毫升(儿童用量:周岁每次2毫升,每增1岁增加药量0.5毫升);对照组采用紫雪散治疗,每次1.5克,均为每日2次,疗程不超过4天。结果:两组异常血象复常情况的比较:治疗组血象异常者治前62例(62/102),治后11例,复常率为82.26%(51/62);对照组血象异常者治前17例(17/31),治后4例,复常率为76.47%(13/17)。两组复常率无显著差异($P > 0.05$)。

方琦,等.实用中西医结合杂志,1997,10(1):81

3. 唇风

龚正生运用本方外治唇风23例。其中唇肿未溃者,用药2天治愈7例,3天痊愈11例,已溃者用药后3天结痂痊愈3例,4天痊

愈2例,总有效率100%。

龚正生,等.江西中医药,1996,增刊:120

4. 小儿高热惊厥

严玉莲等运用本方治疗小儿高热惊厥。口服,每日3次,1岁以内每次1/3瓶,3岁每次1/2瓶,3~5岁每次2/3瓶,5岁以上每次1瓶。结果:住院病例显效16例,有效4例,门诊病例显效8例,有效5例,无效1例。总有效率97.05%。

严玉莲,等.中华实用中西医杂志,2000,(13):2671

5. 其他

朱传伟以紫雪散治疗辨证属于肝阳暴亢型眩晕1例。结果:治愈。

朱传伟.山东中医杂志,2000,(7):440

冰硼散的临床新用

1. 化脓性中耳炎

武春喜运用本方治疗化脓性中耳炎102例。本病是以耳内流脓疼痛,或鼓膜穿孔,听力障碍等为特征。方法:朱砂1克,冰片3克,硼砂3克,元明粉3克,共研细末。先用3%双氧水清洗耳道脓性分泌物,然后取中药粉约0.01克,放置纸筒上,轻轻吹入患耳,每日2次,5日为1疗程,停药2日,开始第2疗程。结果:耳内流脓停止,耳痛消失,耳道干燥,听力恢复为痊愈,计87例(132只耳),占85%;显效,计11例(17只耳),占10%;无效,计4例(9只耳),占5%;总有效率为95%。

武春喜.山西中医,1994,(3):29

2. 子宫颈糜烂

王美莲运用本方治疗子宫颈糜烂65例。治疗组(65例)用冰硼散合甲硝唑治疗。患者取膀胱截石位,常规外阴消毒,放入窥

器,用甲硝唑液冲洗阴道后擦净,将冰硼散涂到子宫颈上,再用无菌棉球覆盖其上,以防药物漏出。隔日治疗1次,2次后改为隔2天治疗1次,一般治疗5~7次。对照组(37例)外用氯己定栓,每日1次,一般治疗7次。结果:治疗组全部治愈,对照组治愈17例,有效20例。1个月后随访,治疗组无复发,对照组复发15例。

王美莲. 山东中医杂志, 2001, (3): 1

3. 婴幼儿外耳道湿疹

颜琼瑛运用本方治疗婴幼儿外耳道湿疹20例。两组均口服扑尔敏,局部用39%双氧水清洗患处。治疗组(28只耳):运用中药冰硼散外撒患处;对照组(25只耳):采用西药糖皮质激素类软膏外搽。两组均每天2次,7天为1个疗程。结果:治疗组痊愈24只耳,有效4只耳,无效0。对照组痊愈21只耳,有效4只耳,无效0。

颜琼瑛. 湖北中医学院学报, 2004, (2): 50

4. 疱疹病毒性皮肤病

周培英等运用本方为主治疗疱疹病毒性皮肤病80例。以芝麻油将冰硼散调成糊状,涂患处(有破溃感染者常规消毒),每日2次。根据皮损大小临用现调。单纯疱疹可不需全身用药;带状疱疹、水痘需肌注聚肌胞2~4毫克隔日1次,复方大青叶片4片,每日3次。成人用龙胆泻肝丸或复方大青叶片;小儿用大青叶合剂。1周为1个疗程,共治疗1~2个疗程。结果:全部治愈。单纯疱疹30例1个疗程内痊愈;带状疱疹1个疗程治愈36例,2个疗程治愈8例;水痘1个疗程治愈4例,2个疗程治愈2例。2个疗程治愈者多为就诊时病情较重,病程较长或合并感染。

周培英,等. 山东中医杂志, 2002, (7): 406

5. 流行性腮腺炎

帅金花运用本方加减外敷治疗流行性腮腺炎60例。治法:摘鲜蓖麻叶几片捣烂,看肿的范围大小,用吸水性差的纸剪成相应大小,用捣烂蓖麻叶敷平在纸上,再撒上少量冰硼散,立即敷在肿大的一侧或二侧,再外盖纱布,用胶布固定,24小时换药1次,一般用

2~5次即可;发热者可配合肌注板蓝根、病毒唑针剂(1日2次),高热者用退热药。结果:全部治愈,用2次愈8例,3次愈15例,4次愈25例,5次愈12例。

帅金花. 江西中医学院学报, 2000, (3): 105

6. 口疮

闫冬梅等运用本方治疗口疮42例。药物由冰硼散加少许朱砂粉而成,将药物涂在溃疡面上即可,每日3次,对因痛不能进食者,饭前可加涂1次。结果:用药1天止痛者8例;2天内止痛者16例;3~6天内止痛者12例;余者均有好转。5天内溃疡面愈合者26例;10天内愈合者12例,余者均较用药前缩小。

闫冬梅,等. 黑河科技, 1996, (4): 39

7. 霉菌性阴道炎

张瑶运用本方加减治疗霉菌性阴道炎50例。用一次性扩阴器打开阴道,首次用药先用1:1000新洁尔灭棉球清洗阴道后倒入冰硼散3克,再用压舌板边推药边退扩阴器,至药粉全部倒入阴道,尽量倒深,取出扩阴器,每日上药1次,10天为1疗程。上药同时,每晚用蛇床子、地肤子、艾叶、黄柏、苦参、白鲜皮药液坐浴熏洗10~20分钟,每日1次,10天为1疗程。结果:治愈48例,占96%;好转2例,占4%。

张瑶. 新疆中医药, 2002, (3): 28

8. 脚湿气

曾声强运用本方治疗脚湿气。先将患脚用温开水洗净,再用0.3%~0.5%高锰酸钾溶液浸泡患脚5分钟以上,然后擦干患脚。取冰硼散适量,均匀干撒于患处,然后用消毒纱布或脱脂棉少许盖于患处,用胶布固定。每2日换药1次,一般3~7日即愈。

曾声强. 成都中医药大学学报, 1995, (1): 27

9. 干槽症

冯灵智运用本方治疗干槽症59例。方法:不进行麻醉,先用带冲洗针头的注射器抽取3%双氧水4~6毫升冲洗牙槽窝,自来

水含漱,再用干棉球拭干牙槽窝,隔湿,在牙槽窝内壁撒上一薄层冰硼散,用纱布球或棉球横过牙槽嵴顶盖住牙槽窝口(不要塞入牙槽窝内),嘱患者咬住纱布球(或棉球)至少半小时,咬住期间不要漱口、进食及饮水,可在1~2天后再进行1次以上操作。结果:显效46例,有效12例,无效1例。

冯灵智.广东牙病防治,2001,(2):131

10. 咽喉部急性血肿

仇光平等运用本方治疗咽喉部急性血肿1例。郝某,男性,32岁,1999年9月17日就诊。因进食煎饼夹油炸小鲫鱼时不慎被鱼刺所鲠,随即感咽喉部刺痛不适,急强力吞咽煎饼以求将鱼刺带入胃中。须臾自觉咽喉部灼热剧烈胀痛,憋胀感明显而呈进行性加重,呛咳频频,急来医疗队求救。刻诊:患者痛苦面容,额部大汗淋漓,双手震颤;查见紫红色血肿填满咽部。限于医疗条件,无抽吸血肿器械,仅有冰硼散,急取之少许摊于洁净纸上吹入患者咽喉。患者已能言,10分钟后局部疼痛大减,呛咳缓解,并可进水,再观其血肿已消大半,病告小愈。令其禁食半天,予金银花24克,玄参18克,生甘草3克,水煎代茶频饮之;并予冰硼散1支每日分4~6次吹入咽部,连用3天。10天后随访告知病愈。

仇光平,等.中国中医急诊,2003,(4):344

11. 隐翅虫皮炎

肖桂兰等运用本方治疗隐翅虫皮炎100例。病程6小时至3天,皮肤损伤具有隐翅虫皮炎特征,采用此方法治疗时未用其他药物治疗。治法:根据皮损范围,用冰硼散与0.25%利多卡因注射液调合成糊状,随即擦在病变部位,并略超出皮疹,每天2~3次。结果:擦药1天后痊愈45例,2~3天后痊愈55例,总有效率为100%。

肖桂兰,等.临床皮肤科杂志,1999,(4):250

12. 溃疡性结肠炎

郭保全等运用四妙勇安汤加冰硼散直肠给药治疗溃疡性结肠

炎 39 例。方药:金银花 50 克,玄参 30 克,当归 15 克,甘草 6 克,冰硼散 2 克(另包)。方法:取上方药 1 剂,加水 500~800 毫升,浸泡 30 分钟左右,煎至 150 毫升,用纱布过滤后,装入输液瓶内,放入冰硼散摇匀,保持温度 37~40℃,进行直肠点滴(即用一次性输液器,除去针头,接上导尿管,蘸润润滑液,插入肛门 20~30 厘米,类似输液点滴),30~60 分钟滴完,1 天 1 次,10 次为 1 个疗程。结果:痊愈 28 例,好转 4 例,有效 4 例,无效 3 例,总有效率 92.31%。治疗期间均未出现不良反应。

郭保全,等. 中医研究,2004,(3):37

13. 花斑癣

杨红英运用本方外用治疗花斑癣 45 例。方药:硼砂 15 克,冰片 1.2 克,硫黄 2 克,枯矾 1 克。共研细末,混匀,用棉花沾药粉,轻轻摩擦患处,擦至微热为止,1 天 2 次,5 天为 1 个疗程。用药 1 个疗程。结果:32 例痊愈,10 例有效,3 例无效。总有效率为 93%。

杨红英. 福建中医药,2002,(6):2

14. 外阴溃疡

于建光等运用中西医结合治疗外阴溃疡 22 例。内服伊曲康唑 200 毫克,每日 1 次,连用 4 天为 1 个疗程,未愈者 1 个月后开始服用第 2 个疗程。同时采用中药复方外阴洗剂坐浴,浴后溃疡面外敷复方冰硼散。坐浴,每日 1 剂,连用 7 天(经期停用);将复方冰硼散适量撒溃疡面。结果:1 个疗程结束后,治愈 8 例,第 2 个疗程结束后痊愈 11 例,总治愈率 86.4%,总有效率 92%。

于建光,等. 山东中医杂志,1999,(6):269

冰片散的临床新用

1. 小儿便秘

宋秋英等运用本方治疗小儿便秘。将大黄冰片散醋调为糊,

置于伤湿止痛膏中心敷脐,12 小时换药 1 次,为巩固疗效,可连续贴 2~3 次。结果:一般 1 次即愈,未发现明显副作用。

宋秋英,等. 中医外治杂志,2001,(1):37

2. 阑尾周围脓肿

杨屈运用本方治疗阑尾周围脓肿。治疗组:应用大黄、芒硝、冰片按 3: 10: 1 比例混合研粗末制成散剂装入纱布袋外敷患处,24 小时更换 1 次。同时静脉滴注氨苄青霉素、庆大霉素和甲硝唑进行抗炎治疗。对照组:单纯应用氨苄青霉素、庆大霉素和甲硝唑静脉滴注进行抗炎治疗。结果:治疗组 38 例中,治愈 27 例(71%),有效 11 例(29%),总有效率 100%。对照组 36 例中,治愈 14 例(39%),有效 13 例(33%),无效 9 例(28%),总有效率 71% ($P < 0.05$)。

杨屈. 四川中医,1996,(10):39

3. 胆囊炎

王远进运用本方加减治疗胆囊炎 50 例。治法:芒硝 50 克,冰片 5 克混匀,用一块大小适合的纱布块平铺桌面上,撒上药粉约 1 厘米厚,纱布向一面折数层,将薄层面敷于腹部胆囊投影区,用胶布固定,再裹数层纱布,3 天换药 1 次,3 次为 1 疗程。结果:敷药 2 次症状体征消失 38 例(76%),敷药 3 次症状体征减轻 10 例(20%),其中慢性结石性胆囊炎 5 例,无改善 2 例(4%,均为慢性结石性胆囊炎)。

王远进. 中国乡村医药杂志,2005,(2):44

卷之七

颈项部

自颈项至结喉止,凡一切痈疽、癭瘤、瘰癧、马刀,皆汇于此部中,以便检阅参治。

颈项痛门主论

邪客三阳则痛,寒搏则筋急,风搏则筋弛。左多属血,右多属痰。丹溪治一人,项强痛甚,不可以回顾,作痰客太阳经治之,用二陈汤加酒芩、羌活、红花,服二剂而愈。有挫闪及失枕而项强痛者,皆由肾虚不能荣筋也,六味地黄汤加秦艽。

夹疽门主论^①

王肯堂曰:夹疽生喉之两旁,属手少阴心经、足太阴脾经,足厥阴肝火热毒上攻而成。内溃者难治;虚火上升痰壅,饮食不进者死。《准绳》。

气颈门主论

汪省之曰:气颈乃七情抑郁不伸,肝脾气郁不舒,结喉之间,气结如胞,随喜怒消长,甚则饮食嗑碍,治以四海舒郁丸主之。《理例》。

① 夹疽门主论原本脱,据目录补。

气颈门主方

四海舒郁丸

青木香五钱 陈皮 海蛤粉各三钱 海带 海藻 昆布 海螵蛸
各二两，俱用滾水泡去盐

共研细，每服三钱，不拘酒水，日服三次；渣沉在碗底内者，敷气颈上。愈后用黄药子四两，生酒三大壶，煮三炷香，窨一七去火毒，早晚任饮数杯，酒完永除根。

颈痈门主论

王肯堂曰：颈痈属手少阳三焦经郁火，积愤惊惶所致。初觉即隔蒜灸；若溃后不敛，烦躁胀满，小便如淋，呕吐者死。《准绳》。

《灵枢》云：发于颈者，名曰夭疽。其痈大而赤黑，不急治，则热气下入渊腋，前伤任脉，内熏肝肺，熏肝肺，十余日而死矣。

申斗垣曰：颈左发为痈，右发为疽，皆由脏腑热毒，风气伏结风府之间，故毒发于颈之上下，但内近咽喉，饮食气道呼吸所关。其见证也，寒热往来，喉咙疼痛，饮食妨碍，亦恶候也。《启玄》。

奎光曰：颈痈，胸前红肿，形势在外，防其内攻，甚则红肿出脓。

环项发门主论

王肯堂曰：环项发，发于项之周围，故名。又名落头痛。先看何处肿起，如从后天柱穴起，是足太阳兼督脉哑门穴下，作寒热，拘倦闷乱，恐怖不食，如连前项俱肿，乃毒流入足少阳，连耳肿，是流入阳明，当分经络治之。不应者死。《准绳》。

颈蝗门主论

汪省之曰：颈蝗其毒不红，其形坚硬无脓，一年半载，长久如此，不能穿溃，两尖锁颈，嗜人脂血，食血一饱，病人即将危矣。毒发之初，先服益气养荣汤十余剂，即将两患头上用三棱针针住，以艾炷针灸七壮或九壮，次服神效瓜蒌散，方见乳证门。自消。《理例》。

风热锁喉毒门主论

窦汉卿曰：颈项间忽痛如失枕之状，名曰风热锁喉毒。久则红色绕于肩背，坚硬难治。《全书》。

无辜疔疮门主论

申斗垣曰：无辜疔疮，乃因小儿衣物洗濯晒晾，误被雌鸟粪及羽毛落于上，有虫入于皮毛间，致令小儿脑后项边，有核如弹丸在肉内，推之则动，软而不痛；久则虫化入于脏腑，令儿羸瘦壮热，便脓血，头骨开缝，肢体生疮。治宜消疔鳖甲丸主之。《启玄》。

冯鲁瞻曰：无辜疔者，因浣衣夜露，被无辜落羽所污，小儿服之，令身体发热，日渐黄瘦，便痢脓血是也。

《心鉴》曰：脑后项边有核如弹，按之转动，软而不痛，其间有虫如米粉，如不速破而去之，即虫随热气流散，遍体生疮，一入脏腑，便痢脓血。须以银针刺破，贴以膏药可也。

又曰：更有疔虫，或如发丝，或如马尾，出于头顶腹背之间。黄白及赤者生，紫黑青者死。

无辜疔疮门主方

鳖甲丸

夜明砂净，微炒 鳖甲醋煮令黄，去肋 枳壳 黄连各二两 雄全蝎一个 诃子生一枚，熟一枚
共为末。入麝香少许，蜜为丸如绿豆大，每服五丸，食后用米饭送下。

瘰癧门主论

陈实功曰：瘰癧非阴阳正气结肿，乃五脏瘀血，浊气痰滞而成也。瘰者，阳也。色红而高突，或蒂小而下垂。癧者，阴也。色白而漫肿，亦无痒痛，人所不觉。《正宗》。

又曰：筋骨呈露曰筋瘰，属肝。赤脉交结曰血瘰，属心。皮色不变曰肉瘰，属脾。忧喜消长曰气瘰，属肺。坚硬不移曰石瘰，属肾。治宜消散。自然缩小，切不可轻用刀针掘破，出血不止，多致危亡，久则脓血崩溃，渗漏不已，终致伤人。《正宗》。

又曰：筋瘤坚而色紫，累累青筋盘曲，甚则结若蚯蚓。此乃肝统筋，怒动肝火，血燥筋挛而成也。治当清肝解郁，养血舒筋为主。清肝芦荟丸主之。

又曰：血瘤，微紫微红，软硬间杂，皮肤隐隐，缠若丝缕色红，擦破血流，禁之不住，此乃心主血，暴急太甚，火旺逼血沸腾，复被外邪所搏而成也。治当养血凉血，抑火滋阴，安敛心神，调和血脉为主。芩连二母丸主之。

又曰：肉瘤软如绵，硬似馒，皮色不变，不紧不宽，终年只似覆肝，此乃脾主肌肉，郁结伤脾，肌肉消薄，土气不行，逆于肉里而为肿也。治当理脾宽中，疏通戊土，开郁行痰，调理饮食为主。加味归脾汤主之。

又曰：气瘤，软而带坚，皮色如故，或消或长，无热无寒，此乃肺主气，劳伤元气，腠理不密，外寒传而为肿也。治当清肺气，调经脉，理劳伤，和荣卫为主。通气散坚丸主之。

又曰：骨瘤形色紫黑，坚硬如石，疙瘩高起，推之不移，昂昂坚贴于骨，此乃肾主骨，恣欲伤肾，肾火郁遏，骨无荣养而为肿也。治当滋补

肾气，养血行瘀，散肿破坚利窍为主。调元肾气丸主之。

又曰：粉瘤，红粉色，多生耳项前后，亦有生于下体者，全是痰气凝结而成。宜用铍针破去脂粉，以三品一条枪插入，数次化尽内膜自愈。

又曰：黑砂瘤多生臀腿，肿突大小不一，以手捏起，内有黑色是也。亦用铍针刺内，出黑砂有声，软硬不一。

又曰：发瘤多生耳后发下寸许，软小高突，按之不痛，针之粉发齐出。

又曰：蛔虫瘤生于胁下。

又曰：蛆瘤生于肩膊。

又曰：虱瘤破之虱出，但诸瘤形状之异，皆由五脏湿热邪火，浊气瘀血，各感而成，非正病耳。

又曰：小儿胎瘤，初生头上、胸乳间，肿起大者如馒，小似梅李，此乃胎中瘀血凝滞而成。须候小儿满月以后，方可用针刺破，内如赤豆汁则安，内服五福化毒丹即愈。

又曰：治瘰之法，初起元气实者，海藻玉壶汤、六军丸，久而元气虚者，琥珀黑龙丹、十全流气饮。选而治之。

薛立斋曰：瘰瘤诸证，只宜服药消磨，切不可轻用刀针掘破，血出不止，多致立危。医家病家，均当慎之，万勿孟浪。

冯鲁瞻曰：瘰则着于肩项，瘤则随气凝结，戒食厚味，忌妄破掘，五瘰皆不可妄掘破，惟胎瘰破而去其脂粉则愈。《锦囊》。

李东垣辨瘤法：若发肿都软而不痛者，血瘤也。发肿日渐增长而大，不热、时时牵痛者，气瘤也。气结微肿，久而不消，后亦成脓，此是寒热所为也。留积经久，极阴生阳，寒化为热，以此溃必多成瘰。宜早服内塞散以排之，诸瘰瘤疣赘等至年衰，皆自内溃，理于壮年，可无后忧。《十书》。

《百效全书》曰：夫瘰瘤皆因气血凝滞，结而成之。瘰则喜怒所生，多着于肩项，皮宽不急，垂垂而重者是也。瘤则随留所住，初如梅李之状，皮嫩而光，渐如怀卵者是也。瘰虽有五，瘤则类多，不痛不痒，切不可掘破，恐脓血崩溃，渗漏无已，必致杀人；惟肉瘤更不可攻疗。如脂瘤、气瘤体气充实者，如海藻散坚丸、东垣散肿溃坚汤多服，亦可消散。

如虚弱者，又宜斟酌，不可纯用化痰行气破坚之药。

《灵枢》曰：虚邪之人于身也深，寒与热相搏，久留而内着，寒胜其热，则骨疼肉枯，热胜其寒，则烂肉腐肌为脓，内伤骨，内伤骨为骨蚀。有所疾前筋，疾前二字，衍文也。筋当作结。筋结不得伸，邪气居其间而不及，发为筋瘤。有所结，气归之，卫气留之，不得反，津液久留，合为肠瘤，久者数岁乃成，以手按之柔。已有所结，气居为昔瘤，以手按之坚。有所结，日以易甚，连以聚归之，津液留之，邪气中之，凝结深中骨，气固于骨，骨与气并，日以益大，则为骨疽。有所结，中于肉，宗气居之，邪留而不去，有热则化而为脓，无热则为肉疽。凡此数气者，其发无常处，而有常名也。刺节真邪篇。此皆虚邪中人为病，不去而久留着，故积岁累月而成疽瘤也。

《三因》云：瘰多着肩项，瘤则随气凝结。

岐天师曰：瘰瘤不同，瘰者连肉而生，根大而身亦大；瘤者根小而身亦大也。即瘤之中，又各有不同，有粉瘤，有肉瘤，有筋瘤，有物瘤。筋瘤不可治，亦不必治，终身十载，不过大如核桃。粉瘤则三年之后，彼自然而破，出粉如线香末，出尽自愈，亦不必治也。肉瘤最易治，用水银、硼砂各一钱，血竭、儿茶各三钱，黄柏五钱，冰片、麝香各三分，共为细末，将此药擦于瘤之根处，随擦随落，根小者，无不落也。物瘤则根大，最难治，不时而动，无故而鸣，或如虫鸣，或如鸟啼，必须用刀破其中孔，则物自难居，必然突围而出，后用生肌神药，则瘤化为水，平复如故矣。《秘录》。

又曰：物瘤乃不敬神鬼，触犯岁君而得。病不可测，非理可谈，故《内经》不言，然世未尝无此病也。

又曰：瘰固不同，形亦各异，然皆湿热之病也。由小而大，由大而破，由破而死矣。初起之时，即宜用小刀割破，略出白水，以生肌散敷之立愈。倘若失治，渐渐大来，用药一点，点其陷处，半日作疼，出水，其色白者易愈，如黄者、红者皆难愈。

张仲景曰：人有手臂生疮，变成大块，更有肚上生疮，结成顽块，终年不去者，或如拳头大者，必须用刀割去，人必晕绝，不可学也。止用小刀略破其皮一分后，以化毒丹敷之，即化为水，此方神奇，不可轻视。

如足上生瘤如斗大者，不必破碎治之，止用针轻轻刺一小针眼，以化毒丹敷之，必流水不止，急用煎方治之，方用人参、黄耆各三两，生甘草、薏苡仁各五两，白芥子三钱，水煎服。二剂即消尽其水，而人绝无惫色，此内外双治之法。然此方之妙，乃补其本源之气，又利水而不走其气，刺其孔而出水，未免大损元气，今补其气，又何惧水之尽出哉？此方之所以奇也，妙也。

岐天师曰：人有喉患大肿，又非癭瘤，忽痛忽不痛，外现五色之纹，中按之半空半实，此乃痰病结成，似瘤非瘤，似癭非癭也。宜消痰汤主之，此方乃消上焦之痰圣药也。又有海藻、昆布以去癭瘤之外象，消其五色之奇纹，妙在消痰而仍不损气，则胃气健而痰易化也。一剂知，二剂消大半，三剂则全消，四剂永不再发。此方兼可治癭证神效。《秘录》。

癭瘤门主方

清痞芦荟丸〔正宗〕。治恼怒伤肝，肝气郁结而为瘤，坚硬色紫，累累青筋，结若蚯蚓，遇喜则安，遇怒则痛者服之。

生地黄酒煮，捣膏 当归 白芍药 川芎各二两 甘草节 昆布 川黄连 青皮 海蛤粉 牙皂 芦荟各五钱

共为细末，神曲糊丸桐子大，每服八十丸，白汤量病上下，食前后服之。无不有效。

通气散坚丸 治忧郁伤肺，致气浊而不清，聚结为瘤，色白不赤，软而不坚，由阴阳失度，随喜怒消长者宜服。

黄芩酒炒 石菖蒲 当归 制半夏 陈皮 香附米 川芎 天花粉 海藻 白茯苓 甘草 陈枳壳 桔梗 川贝母 人参 胆南星各等分

研细。薄荷煎汤，丸豌豆大。每服一钱，食远服，灯心二十根，姜三片，泡汤送下。

琥珀黑龙丹 治五癭六瘤，不论新久，但未穿破者并效。

天南星姜汁拌炒 京墨 五灵脂炒 海带 海藻各五钱 血竭二两

琥珀一两 广木香三钱 麝香一钱

各研细和匀，炼蜜丸一钱重，金箔为衣，晒干密贮。每服一丸，热酒一杯，量病上下，食前后化服。

如患在下部，服后用美物压之。

破结散《锦囊》。治五癭极佳，丹溪曰：癭气先须断厚味。

麦面四分 松萝 半夏 贝母 海藻洗 龙胆草 海蛤 通草 昆布 枯矾各三分

研末。酒服一钱，日三。忌鲫鱼、猪肉、五辛、生菜、毒物。二十日愈。一方加青皮。

点瘤赘神验方 凡瘤有六，骨瘤、脂瘤、肉瘤、脓瘤、血粉瘤，即胶瘤也。惟粉瘤与脓瘤可决，余瘤皆不可决溃，肉瘤尤不治，治则杀人。

桑柴灰 枣木灰 黄荆灰 荞麦灰 桐壳灰各二升五合

以沸汤淋汁三碗，澄清，入斑蝥四十个，穿山甲五片，乳香、冰片不拘多少，煎作两碗，以磁器盛之。临用时入新石灰调成膏，敷瘤上，干则以清水润之，其效如神。

瘤枯方 治瘤初起，成形未崩者，及根蒂小而不散者用之。

斑蝥二十个 轻粉 白砒 硃砂 硼砂 雄黄 黄丹 没药去油 乳香去油，各一钱 大田螺三个，去壳切片、晒干

共研极细，糯米粥调匀，捏作小棋子样，晒干。先灸瘤顶三壮，以药饼贴之，上用黄柏末，水调敷，盖药饼。候十日外，其瘤自然枯落，次用敛口药敛之。

秘传敛瘤膏 癭瘤枯药，枯落后用此搽贴，自然生肌收口。

血竭 海螵蛸 象皮 乳香去油 轻粉 龙骨各一钱

研极细。用鸡蛋十五枚，煮熟去白，将黄熬油一小杯，将药和匀，每日早晚用甘草汤洗净患上，鸡翎涂之，膏药盖贴。

灸法 先将瘤上用面包好，然后照其大小，用杏核或桃核半个，内填极干人粪，合瘤上以艾圆灸之，知痛即止。

秘方 用竹刺将瘤顶略拨损油皮，勿令见血，入铜绿细末少许，膏盖自消。

又方 极细生铁屑醋拌，放铜勺内煅干，再拌再煅，如此三度，研

极细，再以醋调敷上，便觉瘤上不甚适意，过一宿，剥去再敷，以平为度。

瘤生面上初起 鲜蒲公英摘断，以白浆点瘤上，干了又点，数日全消。

丹瘤朱丹溪。 苘麻子去壳，研入面一匙，搽之甚效。

生肌神散岐天师。 治物瘤割破，以此搽之。

石灰千年者佳 三七根 麒麟竭各三钱 人参 象皮 乳香去油 没药去油 木香各一钱 儿茶二钱 轻粉五分

各为绝细末，研至无声为度。修合时须用端午日，不可使一人见之。

点瘰法岐天师。 用此点在瘰之陷处，半日作疼，必然出水。

水银 鹰粪 绿矾 鹊粪 皂矾 轻粉 硼砂各一钱 潮脑 冰片各五分 麝香三分

研为绝细末。用针刺一小孔，然后乘其出血之时，将药点上，即粘连矣。约用一分，以人乳调之，点上如鸡头子大，一日点三次，第二日必然流水，流水之时，不可再点，点则过疼，转难收口矣。三日后，必水流尽而皮宽如袋，后用煎方，自然平复如故。

煎方

黄耆 薏苡仁各一两 人参 山药各三钱 白芍 白茯苓各五钱 泽泻二钱 猪苓 生甘草 陈皮各一钱

水煎服。十剂全消如故。但忌房事一月，余无所忌。若犯房事，必破不能收口，终身成漏。

消痰汤岐天师。

白茯苓五钱 海藻 半夏 贝母 白芥子 天南星 人参 桔梗各三钱 昆布 生甘草各一钱 附子一分

水煎服。

化毒丹张仲景。

人参三钱 甘草一钱 硼砂 冰片各一分 轻粉五厘

各为细末和匀，掺上，即化为水矣。

灰浆膏胡公弼。 消瘤神效。

天南星 半夏各一两 草乌煨存性,五钱

三味煎浓汁,去渣,入木莲蓬蒂上白浆一、二两,采时以蛤蜊壳在蒂上刮取。搅匀,再用石灰以竹片拨炒,俟竹片焦黑成炭为度。徐徐投下,调成不稀不厚膏子,入磁瓶收贮,黄蜡封口。用时如干,以唾津润开,敷瘤上,或木莲蓬浆润敷尤妙。二、三日即愈。

消瘤程蔚门。银炉上飞灰一斗,入水煎数十沸,用棉布滤去渣,取清汁入川大黄八两,煎好,滤去大黄不用。

又用矿石灰一斤,放钵头内,将灰汁倾入钵内,再入蟾蜍、生南星各三两,研为细末,和入汁内收贮。看瘤大小,用羊毛笔蘸汁扫瘤上,一日扫十二、三次,三日自枯,其瘤落下。如去皮石榴,将白灵药掺之,三日消尽。又用红升药掺上生肌长皮,再上白霜,自然全愈。

消瘤法 俟人家入殓时钉棺,斧声敲一下,以手按瘤一下,斧声歇亦止,其瘤自消。

颈上瘰瘤,不疼不痛,俱是痰结

川黄柏 海藻各一两

研细收贮,每用五分,放手心,以舌舔之,一日三、五次即消。

消瘤

硼砂 阿魏各等分 麝香少许

研细末。以大蒜捣烂,看瘤大小,敷之自消。

禁瘤法 每年行此法一次,其瘤即不长。大凡遇死尸,将死人手在瘤上一摸,可保一年不长;次年又行此法,又保得一年不长,终身行之,则其瘤皆如初起时也。若空一年不用死人手摸,其瘤即大。

瘰癧门主论

寒热篇。帝曰:寒热瘰癧在于颈腋者,皆何气使然?岐伯曰:此皆鼠瘻寒热之毒气也,留于脉而不去者也。鼠瘻之本,皆在于藏,其末上出于颈腋之间,其浮于脉中,而未内着于肌肉,而外为脓血者,易去也。帝曰:去之奈何?岐伯曰:请从其本,引其末,可使衰去而绝其寒热,按其道以予之,徐往徐来以去之,其小如麦者,一刺知,三刺而已。帝曰:

决其死生奈何？岐伯曰：反其目视之，其中有赤脉，上下贯瞳子，见一脉，一岁死；见一脉半，一岁半死；见二脉，二岁死；见二脉半，二岁半死；见三脉，三岁死；见赤脉不下贯瞳子，可治也。

《外台秘要》曰：肝肾虚热，则生瘰癧。

《病机》云：瘰癧不系膏粱丹毒火热之变，总因虚劳气郁所致。止宜以益气养荣之药，调而治之，其疮自消，不待汗之下之而已也。

朱丹溪曰：瘰癧必起于足少阳一经，不守禁忌，延及足阳明经，食味之厚，郁气之久，曰毒、曰风、曰热，此三端拓引变换，须分虚实，实者易治，虚者可虑。此经决断，有相火，且气多血少，妇人见此，若月水不调，寒热变生，稍久转为潮热，自非断欲食淡，神医不能疗也。

又曰：灸瘰癧法，取肩尖、肘尖骨缝交接处各一穴，即手阳明经肩髃、曲池二穴也。各灸七壮，在左灸左，在右灸右，左右俱病者，俱灸之。余常用之甚效。薛氏以曲池云附髀，似未的也。

薛立斋曰：凡男子妇人，若因悲怒伤肝，气血壅遏而不愈者，宜灸此穴以疏通经络。如取此穴，当以指甲掐两肘两肩四所患处，觉有酸麻，方是其穴。此治瘰癧之秘法也。

戴复庵曰：瘰癧之病，皆气血壅结，根在脏腑，多结于颈项之间，累累大小无定，发作寒热，脓血溃烂，此没而彼起。

王肯堂曰：单窠瘰癧者，生一个也。发于颈项最难治，或发于凶骨，亦难治。用毒药疗之，勿令浸渍日久。《准绳》。

又曰：莲子瘰癧，一胞裹十数枚，生于项之左右，以手触则能转动，尚可用药治疗；如坚硬挨不动者，乃不可生，憎寒发热躁渴，凡遇此证，至难治，虽神圣亦无如之何也已。

又曰：重台瘰癧，生于颈项，或左或右，初则单窠结在上，或在下，重叠见之，是名重台瘰癧。此证药不可疗，不可针灸。若是毒行其肿痛，发渴生痰，百死一生，害人极速。初觉有之，急用小犀角丸、粉金散治之。

又曰：燕窠瘰癧，形似燕窠不可治。

陈远公曰：有生痰块于项，坚硬如石，久则变成瘰癧，流脓流血，一块未消，一块复长，未几又溃，或耳下，或缺盆，或肩上肋下，有串走之状，故名鼠疮，又名串疮，如鼠之穿也。人谓食鼠窃余以成此证，而不

尽然也。盖此证多起于痰，痰块之生，多起于郁，未有不郁而生痰，无痰而成瘰癧者也。故治法必以开郁为主。然郁久气血必耗，况流脓血则气血更亏，消痰而不解郁，解郁而不化痰，皆虚其虚也。消串丹：白芍一两，白术一两，柴胡二钱，蒲公英三钱，茯苓五钱，陈皮一钱，附子一片，甘草一钱，天花粉三钱，紫贝天葵五钱。水煎服，八剂痰块渐消，又十剂尽化，又一月全愈。愈后服六君子汤为善后计，不再发也。此方妙在蒲公英天葵为消串神品，然非佐以柴、芍，则肝木不平，非助以苓、术，则脾胃土不健，又何能攻痰破块哉！惟其有攻有补，又得附子之力引各味直捣中坚，所以能除夙痰于旦夕耳。《冰鉴》。

又曰：有久生瘰癧，颈间尽烂，且及于胸膈，无非痰块，以至身体发热发寒，肌肉消瘦，不思饮食，自汗盗汗，惊悸恍惚。此证原难医治，然治得法，亦在可救也。夫此证初起，宜解郁为先，佐之补虚，以消其毒；倘执寻常治法，以祛痰败毒为事，鲜不速之亡矣。用转败丹：人参二两，柴胡二钱，白芍三钱，金银花三两，当归二两，半夏五钱，白术一两，生甘草三钱。水煎服，四剂，痰块在胸者尽消，又四剂，颈上溃烂亦愈，将方减半，再服十剂，疮口渐平，不再发也。此方补多于消，而开郁寓于中，化痰存于内，从未有知此治法，但一味攻毒，所以愈坏也。杀运无穷，神方难信，人见此方，无不讪笑者，谁知乃祛病之仙丹，夺命之异药哉！余不胜掩卷叹息也。

陈实功曰：夫瘰癧者，有风毒、热毒、气毒之异；瘰癧、痰癧、筋癧之殊，当察而治之。风毒者，乃外受风寒。搏于经络，先寒后热，结核浮肿，治当散其风，除其湿，热毒者，乃天时亢热，暑中三阳，或内食膏粱厚味，酿结而成，色红微热，结核坚硬，治当清其脾，泻其热，气毒者，乃感冒四时杀厉之气而成，其患耳项胸腋，骤成肿块，令人寒热头眩，项强作痛，治当调其血，和其气；瘰癧者，累累如贯珠，连接三、五枚，其患先小后大，不作寒热，初不觉疼，日久渐痛，坚硬如棋子，大小如梅李，绕颈延腋，得之于误食虫蚁鼠残之物，又或汗液宿水陈茶，混入而餐，乃食毒郁结之久病也，最难消散，治当散其坚，和其血；痰癧者，初起如梅如李，生乃遍身，久则微红，后必溃破，易于收敛，此乃饮食冷热不调，饥饱喜怒不常，多致脾气不能传运，遂成痰核，治当豁其痰，行其

气；筋病者，生于项侧筋间，形如棋子，坚硬大小不一，或陷或突，久则虚羸，多生寒热，劳怒则甚，此乃忧愁思虑，暴怒伤肝，故令筋缩，结蓄成核，治当清其肝，解其郁。《正宗》。

又曰：如寡妇尼僧，鰥夫庶妾，志不得发，思不得遂，积想在心，过伤精力，此劳中所得者，最难调治。有此先养心血，次开郁结，益肾安神，疏肝快膈，如归脾汤、益气养荣汤，俱加香附、青皮、山栀、贝母、木香之类是也。

又曰：男子不宜太阳青筋，潮热咳嗽，自汗盗汗；女人忌眼内红丝，经闭骨蒸，烦热后必变为癆瘵。忌用巴霜、牵牛、斑蝥、大黄追蚀等药，往往克伐太过，致其危亡者多矣。切宜戒之慎之。

又曰：蛇蟠病，绕项起核者是。

又曰：耳项胸腋，骤成肿核，色红微热，寒热头痛，此乃风寒暑热之暴病也。此证易于消散，宜用荆防败毒散加贝母、夏枯草，不应，再加软坚开郁之品。

又曰：瓜藤病，自颈项延及胸腋者是。

冯鲁瞻曰：凡颈项眉颊，结核久凝，皆为气血太虚，切勿攻克。《锦囊》。

又曰：瘰癧者，先贤名曰九漏，是由其人阴虚火盛，冲击关津管束之处，而又过食博炙，风痰热毒，相搏而结成顽核，郁滞不散，久则内溃而为瘰癧。治宜养阴和肝，理脾舒郁，化痰清利，切勿徒事克伐，以损真元。若夫婴儿产下，因胎毒而即患者，此禀母之肝胆二经火郁气滞，亦宜平肝滋肾化毒为主。盖瘰癧之源，虽由于肝，实根于肾；夫肝火之有余，乃肾阴之不足也。故其本在脏，其末上出颈腋之间，若浮于脉中，未着于肌肉而为脓血者，易去也。若反其目而视之，赤脉贯于瞳人，如见一脉，即一岁死；见一脉半，即岁半死；二脉三脉亦如之，若赤脉不见，庶可治也。其始必发一枚，次必连生大小十数，缠绕项下，先肿作脓，穿破难干，故名漏项。若在胸旁，或两胁者，此名马刀。至若其口深黑，内溃蚀烂，穿透咽喉，饮食不进，目肿舌出，耳出黄脓者，不治。更有无故寒热，身体颈项结核如病，及心胸腹背皆有坚核而不痛者，此名为结风气肿也。审其是风是火，或虚或实治之。

又曰：瘰癧者，手足少阳蕴热结滞而致也。二经多气少血，所以结核坚而不溃，延蔓串通。若阳明经则气血多而溃矣，即俗名烂疔。惟少阳起者，当从本治，俗医不知，概以毒药攻之，如负薪救火，为害更甚，元气弱者，反成痼疾矣。

又曰：夏枯草能散结气，而有补养血脉之功，能退寒热，虚者尽可用之；若实者佐以行散之药，外施艾灸，亦渐取效。

又曰：凡结核或在项，或在臂，或在身，或在耳后，或在顶门，如肿毒不红不痛，不作脓者，皆是痰注，气滞不散，不外乎曰痰、曰气、曰热三者，久而不已，则成瘰癧。宜早治之。大抵因七情之气郁结，或因饮食之时，触犯恼怒，遂成此疾，妇人女子患此最多，治宜开郁顺气，利隔化痰，清肺。然未有不由阴虚火旺而有痼疾根脚者，更宜兼乎补阴，乃其治也。

周文采曰：瘰生于头项上交，名蛇蟠瘰。宜早治之。《启玄》。

李东垣曰：瘰癧结核，寒热发渴，经久不消者，其人面色痿黄，潮热上蒸，已成脓也。《十书》。

申斗垣曰：九漏瘰，名曰狼漏，其根在肝，因所欲不遂，蓄怒而得。曰鼠漏，其根在胃，因食鼠膻之物，胃受毒而播于肝。曰脓漏，其根在胆，因志不遂而得之。曰螻蛄漏，其根在大肠，因食螻蛄及蝎虎所伤之物，误食之而得。曰蜂漏，其根在脾，因食蜜物及蜂毒得之。曰蜈蚣漏，其根在肺，因食蜈蚣所游之物而得之。曰蛭蟥漏，其根在心，因喜之太过而得之。曰瘰癧漏，其根在肾，因食血发及诸肾得之。曰转脉漏，其根在小肠，因惊恐失枕而得之。故瘰癧古人称为九漏，此之谓也。

窦汉卿曰：独形者为结核，续连结者为瘰癧。此证原非膏粱之变，乃虚劳气郁所致。宜服益气养荣之剂，忌用金石暴悍之法，徒伤气血。

又曰：溃后宜十全大补汤加贝母、香附、远志。

汪省之曰：瘰癧初起者，用四棱铁环按定，针一孔，以纸捻纆之，勿令合口，以绝其源，功效甚速。《理例》。

胡公弼曰：夫瘰癧者，乃颈项坚结之核也。或在耳前，或在耳后，或在耳下，皆属手足少阳经多气少血之患也。初如豆粒相似，不觉疼

痛,及后长如桃榴梅李之状,方见疼痛,头眩昏闷,四肢作痛作胀,寒热往来如疟。书云:有痰核,有气瘰,有风痹,有筋痹,有血痹,有串颈鼠尾痹。头未破时,如弹丸相似,或一枚,或三、五枚,或多不计其数,累累连连,贯串沿漫,血胀皮薄,而自破出脓者有之;浸淫溃烂者有之;或医家以刀针烂药刺破者亦有之;年深日久,竟不能痊者,亦有之。殊不知此证原是七情伤于内,血气淫于外,气多血少,痰多壅盛,致伤于肝。肝主筋,故此毒结于胸膈上焦之处,结于耳前及颐颌至缺盆者,名曰瘰癧,此手少阳三焦经证也。凡看瘰癧,不宜过心,过心者必死。只问推之动与不动,不问大小枚数,破与不破,须察推之动者易治,不动者难医,辨明五善七恶,不可一例混治。大法宜用火针,针破其核,将药线插入六、七次,看疮大小,大则多换,小则少换;量核浅深,务溃其根,或烂断血筋。血流不止者,速以百草霜掺之;病人若血去多而晕,治当补血,外用敷药,敷疮四围,其核自脱,脱后换用生肌药,长肉收功。《青囊》。

刘河间曰:结核者,乃火气热甚,则郁结坚硬如果中核也。不须溃发,但热气散则自消。

朱丹溪曰:结核或在项、在颈、在臂、在身,皮里膜外,不红不肿,不硬不痛,多是痰注作核不散,当问平日好食何物,吐下后,用药散核。

又曰:结核在颈项,用白僵蚕、炒大黄酒浸、青黛、胆南星各等分,蜜丸噙化。核在下颌,用二陈汤加酒炒大黄、柴胡、桔梗、连翘。核在臂,二陈汤加连翘、防风、川芎、酒芩、苍术、皂角针、白僵蚕、麝香,行太阴厥阴之积痰,使结核自消甚捷。风热结核,用大连翘饮加白僵蚕、牛蒡子。如风核以去风消核散常服消之。

又曰:凡一切风核疼痛,用大荞麦根、葫芦根磨末,半泔半醋暖涂之。

蒋示吉曰:如瘰癧证,男子骨蒸,女人经闭,已成坏证,若专攻其病,是速其毙也。理宜调理脾胃,补养气血,使根本既固,然后再理其疮,庶有可生之机也。《说约》。

又曰:瘰癧之作,七情六欲,痰饮郁热,积久而成,实非一朝一夕之故也。故当以益气养荣为主,而佐以治瘰之品。盖恐荣卫一衰,变证

蜂起，虽欲治疔，而不可得矣。

又曰：凡遇瘰癧等证，须察虚实，不得尽剂攻伐，损伤元气，致成坏病者，十有八九。此非患者之命，自出医人之手，不得不留心斟酌。

《圣济总录》曰：瘰癧在耳后项缺盆，乃手少阳三焦经主之。

《内经》曰：陷脉为痿，留连肉腠，即此病也。

《病机》云：瘰癧不详脉证，经络受病之异者，下之则犯经禁、病禁。虚虚之祸，如指诸掌。

刘河间曰：瘰癧生于耳后及项间，一名九子包，又名老鼠疮。其突起者，瘰癧也，多起厥阴少阳之二经，以其多气少血故也。由嗜欲太甚，饮酒太过，食味太厚，思想太穷，所愿不遂，意淫于外，内蕴七情，中伤六欲，或传染，或误治，种类不同，为害则一。男子患此，潮热顿生；女子患此，月经不调，渐渐不治，神仙难救。神方：于初起或二、三核时，耳后项下有连珠，就于初起大核之上，着艾炷灸之，每核上各灸六、七壮，或十余壮，更于肩井、风池、肺俞、缺盆穴上各灸三壮，真起死回生之妙法，可收全功。今人不行艾灸之法，而听下工敷贴钩割，多取丧亡之咎。治宜养血清神，化痰散郁，更宜清心养性，淡味节食，可保终吉。此证生于富贵膏粱之人，多费调理，以味厚欲深故也；生于藜藿之人，可保无虞，以味淡欲少故也。古云：膏藿不同治，正此义也。

《心法》曰：瘰癧小者为瘰，大者为癧，当分经络。如生项前，属阳明经，名为痰瘰；项后属太阳经，名为湿瘰；项之左右两侧，属少阳经，形软遇怒即肿，名曰气瘰。坚硬筋缩者，名为筋瘰，若连绵如贯珠者，即为瘰癧；或形长如蛤，色赤而坚，痛如火烙，肿势甚猛，名曰马刀瘰癧。又有子母瘰，大小不一；有重台瘰，瘰上堆累三、五枚，盘叠成攒。有绕项生者，名蛇盘瘰；如黄豆结荚者，又名锁项瘰；生左耳根者，名蜂窝瘰；生右耳根者，名惠袋瘰；形小多痒者，名风瘰；颌红肿痛者，名为燕窝瘰；近及胸腋者，名瓜藤瘰；生于遍身，漫肿而软，囊内含硬核者，名流注瘰。独生一个在囟门者，名单窠瘰；一包生十数个者，名莲子瘰。坚硬如砖者，名门臼瘰；形如荔枝者，名石瘰；形如鼠形者，名鼠瘰，又名鼠疮。以上诸瘰，推之移动，为无根，属阳，外治宜因证用针灸、敷贴、蚀腐等法；推之不移动者，为有根且深，属阴，皆不治之证也。

切忌针砭及追蚀等药，如妄用之，则难收敛。瘰癧形名各异，受病虽不外痰湿风热，气毒结聚而成，然未有不兼恚怒气郁幽滞，谋虑不遂而成者也。

瘰癧门主方

紫霞膏 治瘰癧初起，未成者贴之自消，已成未溃者，贴之自溃，已溃核存者，贴之自脱，并治诸色顽疮疔疮，湿痰湿气，新久棒疮，疼痛不已者，并用之。

明净松香净末，一斤 铜绿净末，二两

用麻油四两，铜锅内先熬数滚，滴水不散，方下松香熬化，次下铜绿，熬至白烟将尽，其膏已成，候片时倾入磁罐，凡用时汤内炖化，旋摊旋贴。

瘰癧初起，已溃未溃并治

苦杏仁去皮尖，三十粒 草麻仁去衣，四十九粒 松香研细末，一两

先将杏仁捣至无白星为度，再入草麻仁捣如泥，方下松香，再捣千下摊贴。

千捶膏 初起贴之自消，将溃贴之，毒从毛窍中出，不致穿溃。

杏仁 草麻仁各四十九粒 琥珀灯心同研 冰片各三分 珍珠豆腐包煮

麒麟竭 当门子 乳香去油 没药去油 铜绿 黄丹 龙骨 轻粉各六分 水安息龙眼肉大，三块 松香入锅内，小火化开，用麻布滤去渣，冷定，用豆腐水煮数次，再用绿豆汤煮三次，又用葱、韭、生姜汁各一盅煮干，研细末，八钱

先将杏仁、草麻捣如泥，次将前药细末逐渐加入，捶千余下用大红缎摊贴，忌见火。若内觉有脓未熟，恐穿溃难于收功，可加木鳖子去壳，七枚 黑驴蹄研细，五分 于膏内，即能隔皮取脓。

又方

羌活 独活 白芷 细辛 龟板 乱发 防风 当归 全蝎

蜈蚣各三钱

用麻油一斤浸一日，煎时柳枝频搅，药枯去渣，再熬至滴水成珠，然后下东丹水飞，炒透，半斤，白蜡、儿茶各二钱，离火片时，下麝香五

分,不可多用。

琥珀膏 治瘰癧及腋下初如梅李,结肿硬强,渐若连珠,不消不溃,或溃脓水不绝,经久不瘥,渐成漏证。

琥珀一两 广木香 丁香各一钱 桂心 朱砂 松香以上研细,不入油熬 当归 木通 防风 木鳖子净肉 草麻仁 白芷各五钱,咀片

麻油二斤二两,浸七日,入锅内慢火熬至焦黄为度,绢滤净油,徐下黄丹飞炒,四两,以柳枝不住手搅,候至膏成,滴入水中,软硬得中,掇下锅来,以盆顿稳,搅至烟尽,方下群药搅匀,磁器盛之。临用取少许摊贴。

蛭蜒丸 蛭蜒虫不拘多少,焙干研末,红枣去衣去核,共捣为丸,桐子大,每清晨白汤送下三钱。

鼠疔马刀丸 凡服此丸,宜先服六味地黄汤加益母草三剂,再服此丸。

大枳壳七个,切作十四片,滚水泡软,去穰,每两片内纳斑蝥一个,大黄九分,两片合紧,用线扎好,入砂锅内,放半砂锅水,煮至水干为度,去斑蝥大黄,只取枳壳晒干研细。

炼蜜丸如绿豆大,每日三服,每服三分,白汤下。

鼠疔土瓜丸 吴涓采。已溃未溃并效。

土瓜根 白芨 泽兰叶 漏芦 胡桃肉 射干 夏枯草 沙参各三两 草连翘去心,六两

磨细,酒糊为丸,桐子大,每服三十丸,小儿减半,空心盐酒下。

消疔丸 此方奇效,愈者不可胜计,可刊方普送。

元参蒸 川贝母去心,蒸 牡蛎火煨醋淬,各四两

磨细,炼蜜为丸,每服三钱,白汤下,日二服。

神效消疔丸

大熟地二两 泽泻 白茯苓 山药 山萸肉各一两 玄胡索 牡丹皮 牡蛎各一两二钱

磨细,炼蜜为丸,桐子大,每服三钱,白汤送下。

一方用元参,无玄胡索。

消疔丸

夏枯草 连翘 草麻仁各四两

磨细，装入猪大肠一段内，两头扎紧，酒浸蒸烂，捣丸如桐子大，每服五十丸，酒下。

瘰癧未破者 大五倍子一个，挖一孔，入南蜈蚣一条，切作数段，装入倍子内，以醋面裹作一球，用麸子半碗同炒，以麸焦为度，剥去外面面球，取去内里蜈蚣，只用倍子研细，醋调敷。

已溃 健猪胆汁三个，倾入铜勺内，慢火熬至滴水成珠，再加轻粉一钱，冰片三分，搅匀摊贴。

疔串初起 豆腐店浸豆水滤清，用砂铤慢火熬膏，每早白汤冲服数匙，疔上亦以此膏敷贴。

鼠疔初起

紫花地丁四两 火酒一斤

浸七日，饮之自愈。

加味逍遥散 治肝经郁火，致生瘰癧，并胸胁胀痛，或作寒热，甚至肝热生风，眩运振摇，或咬牙发痉诸证。

经云：木郁达之是也。

柴胡 薄荷叶 白术 白茯苓 当归 山梔仁 甘草 牡丹皮 白芍

水煎服。

瘰癧煎方 初起自消。

大贝母一钱五分 半夏 当归尾 穿山甲炒 白茯苓 白附子 连翘各一钱 桔梗 广皮 枳壳各八分 白僵蚕一钱五分 甘草节五分 加灯心十根，同煎服，四剂，换服海龙丸。

海龙丸

海藻酒洗炒 昆布酒洗炒 白茯苓炒 穿山甲炒，各二两 全蝎一百个，尾全者 龙胆草酒洗炒，一两五钱 当归身炒，一两 核桃五十个，劈开去肉，将全蝎嵌在核内，合紧煨存性

研细，荞麦面打糊为丸，桐子大，每早晚白汤送下三钱，酒下亦可。

治疔奇方 全蝎七个，桃壳六个，每壳装蝎一个，五个壳装去五个蝎子，仍有一壳装两个全蝎，以面包煨熟，研末作六包，用黄酒调服，每

日服一次，将两个蝎子过一服，作个记号，留为末服。服完隔两三日，如未全愈，可照此方再制一两料服之，自必全愈矣。服此药，每日须肉食滋养。

又方

真牛黄二钱 全蝎一百枚，去净头、尾、脚，用新瓦焙存性

研细，以核桃肉捣丸如桐子大，每服二十丸，空心白汤送下。

如患处破皮，便将取下蝎头、尾、脚焙研细末，搽上，再以膏贴二十一日即愈，永不再发。

药酒方

摩罗藤，夏日用鲜者二斤，陈木瓜酒五斤，烧酒五斤，冬月用枯者四斤，陈木瓜酒八斤，烧酒二斤；入小口瓦坛，用湿面糊坛口，重汤煮一炷香为度。每食后随量饮之，常服除根。

除痹方 活鲫鱼四、五寸长者，竹刀刮去鳞肠，入独核肥皂子七个，以黄泥为匣，入鱼匣内，上下用炭火烧煨，无烟，取出候冷，研细，每服三钱，清晨木瓜酒下。

又方 白亮松香研极细末，以雄猪骨髓调搽即愈，三、五年各药不效者，用此方俱效。只在研调敷之手法要紧，用左手，即用左手到底，用右手，即用右手到底，研药调药敷药，俱要认定一只手。忌阴人拿。

又方 夏枯草乃生血补虚消毒之圣药，或煎汤饮，或浸酒饮，病上单用夏枯草煎浓膏涂之。

益气养荣汤 治抑郁劳伤，思虑太过，心神俱惫，以致四肢颈项筋缩，结成累累如贯珠，或硬或软，或赤或白，或痛或不痛，日晡发热及溃而不敛者，并效。

人参 白茯苓 广皮 白芍药 熟地黄 香附 当归身 川芎
白术 嫩黄耆 贝母各二钱 桔梗 粉甘草炙，各五分

生姜三片，大枣二枚，煎服。

胸膈痞闷，加枳壳、木香。饮食不甘，暂加厚朴、苍术。寒热往来，加柴胡、地骨皮。脓多或清，倍加当归、川芎。脓溃作渴，倍加人参、黄耆、白术、当归。胁下痞痛，加青皮、木香。肌肉生迟，加白蔹、肉桂。痰多加橘红、半夏。干加麦冬、北五味子。发热加柴胡、黄芩。渴不

止，加知母、赤小豆。脓不止，加人参、黄耆、当归。溃后反痛，加熟附子、沉香。虚烦不眠，倍加人参、熟地、远志、枣仁。

桃蝎散 治忧思郁结，痰留气滞，乃生瘰癧。

大核桃二十一个，劈开去肉，将蝎装入扎紧，火煨存性，每用一枚，研末，临卧陈酒下。

孙真人治瘰癧初起，并治溃烂久不收口。壁虎一条，裹泥中，火煨存性，去泥，研末，临卧陈酒调下。

治火郁结核，不拘男妇俱效。用交媾阴精涂搽，如孀妇即以自己阴精涂之。

大红膏 治瘰癧痰核，结块不分新久，但未穿破者并效。

石灰一两，用大黄三钱切片同炒，石灰红色，去大黄 滴乳香去油 轻粉各二钱 银珠 血竭 潮脑 硝石各三两 天南星二两

上为细末。陈米醋熬稠，调药敷核上，三日一换，敷后皮嫩微损者，另换紫霞膏贴之，其核自消。

气瘰癧 北煤炭捣碎，同生桐油脚调敷自消。

瘰癧验方孙展鸿。多年点灯竹灯挂一个，用火点着，下置磁器盘，使油滴入盘内，放土地上，出火气三日，以鹅翎扫患处，不过数遍，已溃者自敛，初起者自消。

敷项下痰核病块内消法《明医集》。

鲜山药一两 草麻仁四两

共捣成膏，敷上即消。

冰蛭散 治瘰癧日久，坚核不消，及服消药不效者，用此点落瘰癧核，如马刀根大面小及失荣等证忌用。

大田螺肉五枚，日中线穿晒干 白砒一钱二分 面包煨熟 真番硃砂二分 冰片一分

先将砒、螺研细。再将硃片研匀，小罐密收。凡用时先将艾炷灸核上七壮，次后灸疮起泡，以小针挑破，将前药一、二厘，津唾调成饼，贴灸顶上，用绵纸以厚糊封贴核上，勿动，恐其泄气，七日后四边裂缝，再七日，其核自落。换搽玉红膏，内服补药，培助完口。此药又治瘰癧，患大蒂小，及诸般高突异形怪状者并效。

火针法 治療癰核，生于项间，初起坚硬，或如梅李，结聚不散，宜用此法针之，插药易消也。

用缝衣大针两条，将竹箸头劈开，以针尖夹缝内，相离一分许，用线扎定，先将桐油一盞，用灯草六、七根，油内排匀点着，将针烧红，用手指将核捏起，用针当顶刺入四、五分，核大者，再针数孔亦妙。核内或痰或血，随即流出，候尽，以膏盖之，次日针孔必渐作脓，轻者用黄药插之，核坚硬者，用冰蛭散糊打成条，晒干，插核内，针孔外以纸糊二重封固，次日其核发肿作痛，不妨，乃药气攻入于内，候至七日外，自然核外裂开大缝，再至七日，其核自落，葱汤洗净，孔大换用玉红膏搽入，外以膏盖。后服益气养荣汤，或十全大补汤加香附。兼戒劳动气恼，房事发物，煎炒海腥等件。

三品一条枪 上品錠子去十八种痔；中品錠子去五漏翻花，瘰疬气核；下品錠子治療癰疔疮，发背脑疽等证；此为古之三品錠子，但药同而分两不同，治病故有分别。今注一条枪，本方三品以下之证，并皆用之，俱各相应，况又药品简易而不繁，是曰三品一条枪之说也。凡同志者，随试而用之。

白砒一两五钱 明矾二两 乳香一钱二分 雄黄二钱四分

砒矾二味，共研细末，入小罐内，加炭火煅红，青烟已尽，旋起白烟片时，约上下红彻，住火，取罐顿地上一宿，取出约有砒、矾净末一两，加雄黄、乳香，共研极细，厚糊调稠，搓成如线条，阴干。凡遇前证，有孔者经入孔内，无孔者先用针放孔窍，早晚插药二次，插至三日后，孔大者每插十余条，插至七日，患孔药满足方住，以后所患四边，自然裂开大缝，共至十四日前后，其疔核、癰疔、痔漏诸管，自然落下，随用汤洗，搽上玉红膏。虚者兼服健脾之药。

癰疮痰核噤药 龚太师。

昆布酒洗 海藻酒洗 大黄酒拌蒸三次 白僵蚕姜汁拌炒 真青黛水飞 胆南星 连翘各二两 桔梗 柴胡 瓜蒌仁 川黄连酒炒 片黄芩酒炒 橘红各一两

研细，炼蜜丸如芡实大，不拘日夜噤之。

二贝丸 萧纯源。 专消痰疔。

朱砂七钱 大贝母 紫贝天葵各二两 海藻 海粉 明矾各一两
共研细末，用夏枯草二斤，熬膏为丸，桐子大，临卧，茶清送下三钱。

人牙散 专消瘰癧，各种肿毒。

人牙二两 麝香五分 羌活酒洗，六钱
研细，炼蜜丸龙眼大，白汤或酒磨，服一丸。

海上仙方 消瘰癧如神。

斑蝥一岁用一个，去头、足 红娘子一对 糯米一升

三味入锅同炒，候米黄色为度，去斑蝥、红娘子不用，只吃炒米。米尽则瘰消矣。

三阳酒 陆公节。 远年近日瘰癧，毋论已溃未溃。三阳草即蛇莓藤，连藤叶红果，采取二斤，浸火酒十斤，煮三炷香，出火气，埋土中，十四日取出，每饮数杯，酒尽患愈。

白果叶散 吴氏家秘。 能捫诸瘰，不使漫生，即能消散。

珍珠 银粉各二钱 雄黄一钱 白果叶去梗，瓦上微火焙干研末，三钱

先将珍珠、雄黄研末，同虾蟆心肝十副捣烂，围住瘰疮四边，再将白果叶末、银粉，好醋调搽瘰疮中心，不过二次即消。破烂者，用醋浸白果叶一昼夜，贴破瘰上。

连翘丸 治项间结核，寒热往来，日久不愈，若患在面臂，尤宜此丸。

连翘 防风 黄柏 肉桂 淡豆豉 独活 秦艽 桑白皮 牡丹皮各五钱 海藻二钱五分

上为细末，炼蜜丸绿豆大，每服十丸，灯心汤下。

内消瘰癧 柏树叶捣烂敷核上，以炒盐熨之，一日三、五次，以消为度。

瘰癧毋论已溃未溃《济生》。 夏枯草熬膏，食远滚汤调服，兼服十全大补汤加远志、贝母、香附。

又方

茜根一两 鹅蛋十个，略煮去壳，再同茜根同煮

每次一枚，食后同酒煮食之。

内消散 吴中书。治痂核不拘久近，已破未破。

天花粉 苦参各五钱 皂角刺四十九个 土茯苓三斤

共煎汤当茶饮。忌牛肉，屡试屡验，奇异方也。

治痂简易方

枇杷叶一斤四两，去毛梗净，焙燥为末 冰糖一斤

和匀，不拘时服，白汤过口，服完即愈。

神效散 谈野翁试验。未破用此即消，已溃烂延至两肩胸腋，茄子大，四、五年不愈者，其效如神。

沉香五钱 芫花炒，三钱 月季花即月月红，二钱

上剉碎，取大鲤鱼一尾，放尿内游死，将药入鱼腹中，就以鱼肠封固，酒水各一碗，煮熟服之即愈。

初起神效方《回春》。

穿山甲土炒 丁香 白丁香 苦丁香 红小豆 磨刀泥 僵蚕去头、足，酒炒 斑蝥去头、足，酒炒，各一钱

上为细末。每服一钱，五更时无根水调服，至未时打下毒物，其形如鼠，后用野菊花焙黄为末，陈醋调敷。一日一换，七日愈。

乳痂溃烂已见脏腑抄本。

土楝树子经霜者佳，川楝不用 雄鼠尿即两头尖者 露蜂房各三两

俱煨存性，为末，每服三钱，酒调服，间三日一服，不数日，脓尽自敛。

瘰癧秘方。初起成块未破者，将面捏成薄条，照疮大小，略离患处作圈围着，再取槐树根在土内掘出者，白皮数条，照面皮作圈，放面圈之上，用艾作小丸，放痂子中心灸之。肉上略觉痛，即拂去艾丸，另取艾丸再灸三过，其面圈不动，只换槐根白皮三次，连灸三日自消。

一方 不拘已破未破。

沥青好者，一两 蓖麻仁四十九粒 杏仁去皮、尖，十三粒半

共捣千余捶，自然粘软成膏，摊贴痂上神应。内须服昆布、海藻、海带、贝母、连翘、甘草、元参。

消痂方 范令闻。真象牙末，乳极细，每服三分，清晨煮热鸡蛋一个，去壳，蘸象牙末，食之自消。

内消瘰癧方周鹤仙。

鼠粪七钱 大枫子五钱 巴豆三钱

共捣匀入大鲫鱼肚内，用纸包缚，再用黄泥封固，如法煅炼，俟烟尽取出冷定，研为细末，米糊为丸，绿豆大。每服二钱，空心黄酒送下，十日全消，神效。

瘰癧奇方周鹤仙。 鸡蛋一枚，头打一孔，采绿萼梅花将开者七朵，入蛋内封好，煮熟去花食蛋，如此七枚全愈。

瘰癧秘方何轿店验过。 鸡蛋七枚，将蛋打一孔，取活蝙蝠七枚，每蛋一个，装蝙蝠一个，封口放锅内蒸熟，取放阴阳瓦上，逐个煅存性，研细，无灰酒调服，一日服一次，七日服完即效。

瘰癧痰核三剂即消王见字。

当归尾 大黄 金银花各五钱 僵蚕四钱 穿山甲 全蝎 夏枯草 连翘 皂角刺 生地各三钱 赤芍药 川芎 川贝母 白芷各二钱 土木鳖一钱，去壳

酒水各一碗，煎一碗，空心服，渣再煎服。

瘰癧仙方刘氏家秘。 兼治痈疽发背，无名肿毒。

穿山甲四足上者佳。四两分四制：一两用紫草茸五钱煎煮甲片干，再晒。一两用红花五钱，煎煮甲片干，再晒。一两用猪牙皂五钱，煎煮甲片干，再晒。一两用苏木五钱，煎煮甲片干，再晒。蜈蚣十六条，分为四制：四条用香油炙干。四条用浓醋炙干。四条用真酥油炙干。四条用姜汁炙干。此二味制毕，俱要随即研末。如多时，就要回潮难研 每用穿山甲、蜈蚣末各一钱，再加：川归尾五钱 大黄 乳香去油 全蝎 没药去油 荆芥 桔梗各二钱 蝉蜕二十个 僵蚕炒去丝，二十五个 朱砂另研为衣 羌活 防风各二钱五分 连翘 黄芩各三钱 广胶土炒烱，一两 雄黄另研，七分 蛇蜕焙，五钱

共为细末，好米醋打糊为丸，每丸重一钱二分，入麝香五分，在罐内养之，收贮。凡遇此证，每用一丸，研末，温酒调服。未成内消，已成催脓，速效如神。

瘰癧病刘氏家秘。

斑蝥去头、足、翅同糯米炒，看糯米炒黄色，即拣去糯米，只用斑蝥 黑牵牛半生半熟 白术 郁李仁去皮、尖 甘草 密陀僧 槟榔 防风各五钱

共为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，清晨槟榔甘草汤送下，腹内作痛，小便下毒，如鱼目状，已破自敛，未破自消。如小便全无，以灯心煎汤利之；如小便痛，以葱茶煎汤解之。服此丸宜夏枯草煎浓汤当茶。

未破瘰癧

沉香 芫花 干月月红花各三钱

共为细末。用大活鲫鱼一尾，放尿桶内浸死，取鱼剖肚去肠剖鳞，以前药入内，用线缝好煮熟，将好酒同食，必要连药吃下，尽量饮醉，服后听泻自止。忌房事，并鲜发之物，数日即愈。

已破瘰癧

珍珠一钱 轻粉二钱 陈白蛭壳火煨，四钱

上乳极细末，用猪脊髓调，将疮挑开出子一个，将药补满，自然收功，不必惊惶。再服煎剂十贴：当归、川芎各八分，白茯苓七分，白芍四分，独活三分，陈皮、羌活、赤芍、甘草各五分。食后服。

二仙丹 治瘰癧。

枳壳一斤。每个切两开，去穰，入斑蝥去翅、足七个，仍将两片合住，以线十字扎紧，用上好醋浸七天足，再以醋煮五炷香，必要多加好醋，煮透冷定，解去线，拣去斑蝥，只将枳壳切片阴干 紫背天葵一斤。如无，以九头狮子草代之

共磨细末。将前煮枳壳多余醋，打糊为丸，如梧桐子大，每服五十丸，酒水任下，早晚各一服。未出头者自消，已出头者用膏贴之自愈。

瘰癧刘长随。

当归 蛇盘草各二钱 灯笼果七个 白茯苓八分 皂角刺 苦参各七分 昆布六分 黑丑五分 土茯苓一两，先煎汤

药入土茯苓汤内煎，食后临卧服之。忌猪首、鹅、羊、鱼、虾子、鸡、香蕈、蛋、白果、栗子、酱、醋、茶、煎炒，一切动风动火等物，房事。愈后用火酒十斤，金银花半斤，入坛内浸一日，煮一炷香，埋土内七日取出。早晚饮之，永除根矣。

瘰癧黄君尚。壁虎不拘几条，捉来活放酒酿内，浸至第二日，将阴阳瓦炙干，又浸如此九次，再乳为细末，每用壁虎六钱，透明雄黄四钱，共成一两。每用三厘，胖人五厘，好酒调下，忌盐三七二十一天，只用

精猪肉煮熟，以醋蘸吃。

外面用贴过旧膏药贴之。将收口，用猪首上栗子肉烧灰，敷上即收口矣。此丹未破者内消，已破者即收口。愈后再将男左女右手腕处灸七壮，永不再发。

療癰膏

金线重楼 金线吊虾蟆 草麻仁 商陆各四两 天南星 半夏
露蜂房 防风 蛇蛻各二两 大黄 土木鳖 穿山甲 番木鳖 射干
川乌 草乌 枳壳 当归 红花 白芷 僵蚕 紫花地丁 紫背
天葵各一两 活雄鼠大者 干蟾各一个 芫花一两五钱 巴豆肉 急性子
各五钱 鲫鱼四尾

用麻油三斤，浸七日，熬枯去渣，复入净锅内，熬至滴水成珠，称熟油一斤，入银朱八两，收之成膏，再下净黄蜡八两，再下乳香去油，没药去油，血竭、儿茶各五钱，麝香二钱，潮脑二两。乳细下之，搅匀收贮。摊宜厚些，速效如神。

消癰癰方江仁度。

甘遂一两熬膏 甘草一两熬膏

先将甘遂膏涂病上，离一灯草远，将甘草膏箍之，其核自缩，洗去，次日又用甘遂膏涂之，仍离一灯草远，又以甘草膏箍之，以消为度。

又方江仁度。

铁砂四两。用旧锅铁研碎，或在爆竹店买

铁砂研末，用滴醋煎成饼，复打碎，又用醋煎成饼，又打碎，再用醋煎，如此七次，乘铁砂潮热之时，敷癰癰上，以消平为度。

又方胡景周。鼠屎三钱，盐水拌炒为末，以一钱拌砂糖为糗，以二钱和面，随人大小多寡，作饼七个，包糗焙熟，令一日吃尽，隔两日服一次，不过三服愈。如未除根，再服。

療癰膏

川倍子八两，炒黑研末，只用四两 川乌甘草汤泡 生南星 草乌 半夏各一钱 川贝母去心，五钱 绿色海粉四两，炒黑，只用二两
各研细末，共一处，炼蜜茶汁和成胶，贴患处，油纸护之。

地龙膏李养荣。癰癰未破者立消。

地龙粪 雄黄 小麦面各等分

研细。醋调涂。

专治瘰癧有核成疮者，皆能速愈 花壁虎一条装入鸡蛋内封固，放火上蒸熟，取起去壳，将壁虎同蛋捣烂为丸，如绿豆大，阴干分二十日，空心茶汤或米饮皆可送下。服完百日内，忌发物及生姜、椒、蒜、鸡鹅羊肉，遗精、房事，为要。

瘰癧 蛇蛻一条，白者佳，锅内炒脆，研末，临卧，食后酒调服。在膈上取汗，次早，溃者脓少。未溃者消；其溃者一时难收口，须用花椒汤洗，再用黄连末掺之。

消瘰核吴近宸。

生半夏 生香附各等分 生附子少许

研细，熬滴醋调敷核上自消。

内消散任中嵒。

治瘰癧宜先服益气养荣汤十多剂后，再服：朱砂 血竭各一钱 生斑蝥去翅、足，三分

上为细末。每服一分，空心烧酒调服，未破者三、五日立消。已破者，内服此药，外用金头蜈蚣一条，研极细末，用麻油一小盅，浸两昼夜，搽患处。其疮即肿溃，过一、二日肿消，可贴膏药。疮势大者二十日痊，小者十余日平复。

消瘰癧吴播珽 朝北搦搦藤，阴干煨存性，研细，米糊为丸，桐子大，每服三钱，白汤送下。未成即消；已成即溃。

治瘰癧《杨氏家藏》。

荆芥 白僵蚕炒去丝 黑牵牛各二钱 斑蝥二十八个，去头、翅、足，同米炒

上为末，临卧时先将飞滑石末一钱，用米汤调服，半夜时再将滑石调服一钱，至五更时，用温酒量人之强弱，调前药末一钱，或二、三钱服之。服后如小水内并无恶物行下，次日早，再用一服。倘仍不通利，第三日五更时，先吃白糯米粥，再服前药一服，更用灯心汤调琥珀末一钱服之，以小水内利去恶物为效。

如尿管痛用青黛一钱，以甘草梢煎汤调服，其痛立止。此方治误

食毒物，致成瘰癧，其功甚速。

内消瘰癧丸

夏枯草八两 元参 青盐各五两 海藻 川贝母 薄荷叶 天花粉 海粉 白蔹 连翘去心 熟大黄 生甘草 生地 桔梗 枳壳 当归 硝石各一两

共磨细，酒糊丸，桐子大，临卧白汤送下三钱。

瘰癧痰核 猫一只，煨熟，数次食完自消。

又方 如意草焙为末，鸡蛋清调敷。

消核黄汉升 健猪胆七个，用铜锅熬，以朝北柳枝顺手搅，不可反手搅，熬至滴水成珠为度，倾磁器内，放朝北地上冷一伏时，用缎子摊贴。

槐条膏 治瘰癧如神，并贴疮毒。

嫩槐条要采一枝有七个头者，取四十九枝，剉碎

麻油一斤，浸三日，用小火熬枯去渣，入炒铅粉八两收膏摊贴。宜春夏熬收。

瘰癧串痰

人信四钱九分 黑枣七个，去核

每枣入信七分，阴阳瓦焙尽烟为度，埋土内一个月取出，研细末，柏油调搽，以软纸贴之。如无脓血流出，即不必换药，自然长肉结疤。

验方

糯米肥皂一斤，去核，水浸一宿，去皮筋弦，石臼捣烂，加上好米醋一斤再捣，以新布搅汁去渣，入新砂钵内，熬如米汤色，用柳枝不住手搅，再入白蜡一两，熔化成膏

出火气，油纸摊贴，如已溃者效更速。

熬时择净室，妇女、鸡、犬忌见。

瘰癧丸

牡蛎煨 元参炒，各五两 土茯苓炒，二两五钱

端午日共磨细，用酒打面糊为丸，如绿豆大，患在上身，每清晨酒下二钱五分，晚下二钱；患在下身，早服二钱，晚服二钱五分，自然渐消。

消气核瘰癧便秘。

全斑蝥二个 白僵蚕二十个

火酒二斤同浸,每日饮少许即消。

瘰癧已溃未溃便秘。 每岁用金头蜈蚣一条,阴阳瓦焙研,取鸡蛋一个,打一孔,将药装入糊好,饭上蒸熟,每日一个,服至患者年岁若干为止。未溃即消,已溃自敛。

瘰癧 蛇头果子草,四、五月间生时采来,焙干,浸酒饮之尽醉,发汗。如此三次,以后只饮酒,不必取汗。

未溃者消。已溃者膏贴。

瘰癧溃烂绕颈垂危者 用苦丁草十多斤,洗净熬膏摊贴。初贴之时极痛,必须忍耐,贴三、四日,即不痛矣。虽烂见咽喉胸胁者,俱能全愈。

千捶膏的临床新用

1. 扁桃体炎

王银狮等运用本方治疗扁桃体炎 1 例。治用千捶膏掺药(蟾酥、蝎尾、冰片研细末)贴敷扁桃穴(即下颌角前下方 2 厘米,扁桃体对应部位)。配合少商穴、商阳穴点刺放血。治后 3 小时后热退,3 天症状消失,3 天换药 1 次,连贴 3 次,随访半年未犯病。

王银狮,等. 中国民间疗法,2002,(2):48

2. 面神经炎

王银狮等运用本方治疗面神经炎 1 例。治用千捶膏掺药(蝎尾、血竭、冰片研细末)贴敷右侧面颊部,3 天换药 1 次,9 天后症状消失,功能恢复正常。

王银狮,等. 中国民间疗法,2002,(1):43

3. 中耳炎

运用本方治疗慢性中耳炎 1 例。治用千捶膏贴敷乳突部、下关穴,配合 3% 双氧水清洗耳道,擦干后点滴 0.25% 氯霉素溶液。6 日后症状消失,继治 6 日以巩固疗效,随访 6 个月未犯。

马冬梅. 实用医技,2001,(8):597

4. 颜面部疔疮

邓君朴运用本方加减治疗颜面部疔疮。方药:土木鳖5个(去壳),巴豆肉5粒,杏仁(去皮)3克,蓖麻仁23克,真铜绿3克,制乳香10克,制没药10克,嫩松香125克。将此方做成药膏置胶布或膏药上外贴,未溃3天一换,已溃2天一换,一般3~7天即愈。肿胀范围较大者,可加贴马氏膏敷;全身症状明显或有并发症者,可选用七星剑汤、五味消毒饮、黄连解毒汤、疔毒复生汤、犀角地黄汤,随证加减内服。

邓君朴. 中医外治杂志, 2000, (5): 55

5. 疮疡

孙常林等运用本方治疗疮疡89例。方药:大风子8个,木鳖子4个,铜绿8克,杏仁16克,松香120克,红蓖麻子120个。将上方做成膏药,摊于黑布上,盖贴患处,4天更换1次,用药4~8天。结果:治愈78例,有效5例,无效6例(其中2例用药期间外出,因无法统计,按无效处理),总有效率93.26%。

孙常林,等. 中国中西医结合杂志, 2001, (2): 122

四海舒郁丸的临床新用

1. 多发性肉芽肿

麻土兴运用本方加减治疗多发性肉芽肿1例,服用79剂后治愈。

麻土兴. 河南中医, 2003, (5): 28

2. 甲状腺腺瘤

孔海燕运用四海舒郁丸合逍遥散加减治疗甲状腺腺瘤9例。方药:柴胡6克,赤白芍各15克,昆布20克,浙贝母10克,半夏10克,生牡蛎30克,茯苓30克,当归10克,炒枳实10克,桔梗15克,炙甘草6克。每日1剂,水煎服,连服1个月后复查,有效者再拟上方去茯苓、炒枳实,加鳖甲30克,龟板30克,夏枯草15克,继续服

用,总疗程半年。结果:9例患者,6例痊愈,占67.7%;1例基本痊愈,占11.1%;1例有效,占11.1%;1例(为合并甲亢患者)无效,占11.1%。总有效率为88.9%。6例痊愈患者随访1年,甲状腺肿块均未复发。

孔海燕. 中原医刊, 2001, (7): 57

加味逍遥散的临床新用

1. 乳腺增生症

薛凤玉运用加味逍遥散治疗乳腺增生50例。方药:当归15克,赤芍15克,柴胡15克,茯苓20克,白术15克,枳壳15克,瓜蒌壳15克,荔枝核15克,浙贝15克,丹参20克,青皮15克,香附15克,郁金15克,生甘草15克。胸闷、纳差者加白豆蔻10克,神曲20克;失眠者加远志15克,枣仁20克。每日1剂,20天为1疗程,于月经干净后3天开始服用,至月经来潮停药。金刚藤糖浆每瓶规格为150毫升,每天3次,每次服20毫升,10瓶为1疗程,可以与汤药同时服用,也可和汤药间隔20分钟服用。结果:经2个疗程治愈者26例,治愈率52.0%(26/50);3~4个疗程治愈者8例,治愈率33.3%(8/24);显效者11例,显效率45.8%(11/24);其余5例经第5个疗程治疗后,好转者3例,无效者2例。

薛凤玉. 中国乡村医药杂志, 2003, (4): 30

2. 痤疮

李志新运用本方合中药面膜外用治疗痤疮50例。随证加减:咽干口渴者加玄参、麦冬、天花粉各10克;大便秘结者加生大黄、芒硝各10克;月经不调者加香附10克;脓疮多者加银花、土茯苓各30克;结节难消者加三棱、莪术各10克;有肝病者加茵陈、虎杖各15克;病程日久者加穿山甲10克,鸡血藤30克。每日1剂,7天为1疗程。面膜中药组成:归尾10克,丹参30克,赤芍15克,白芷10克,银花15克,蛇舌草30克,益母草30克,黄芩10克,共研成细末

制成面膜粉,3天1次,3次1个疗程。结果:痊愈28例,占56%;显效15例,占30%;有效6例,占12%;无效1例,占2%;未痊愈的22例继续治疗半个月后痊愈20例,余2例亦分别达到显效和有效标准,经过1个月的治疗总有效率达100%。

李志新. 深圳中西医结合杂志,2000,(5):219

3. 银屑病

叶建州以自拟加味逍遥散为基础方治疗,每日1剂,水煎服。若瘙痒甚者加苦参、全蝎、海桐皮;兼咽痛加玄参、板蓝根;斑片肥厚,加乌梢蛇、蜈蚣;咽干口燥,舌红乏液则加花粉、沙参。局部外用紫连膏或维生素B₆软膏润肤。连续用药10周。在上述药物施治的同时,配合心理咨询治疗。结果:基本痊愈14例(41.12%),好转17例(50.06%),无效3例(8.82%),总有效率为91.18%。34例患者中,除个别药后有轻微胃肠道反应外,均无特殊不良反应。

叶建州. 云南中医中药杂志,1997,(5):12

4. 梅核气

戴春禧以本方加减治疗梅核气68例。随证加减:气郁加香附;咽痛咽干加射干、玄参、黄芩;睡眠不安加夜交藤、珍珠母;有痰加桔梗、苏梗或合用半夏厚朴汤加减;气虚合用补中益气汤加减。全部病例均以2周为1疗程,治疗1~2个疗程。结果:治愈52例,占79%;好转12例,为17.6%;无效4例,为5.8%。总有效率94%。

戴春禧. 中国临床医生,2004,(9):52

5. 胆绞痛

冯茂森以本方为基础方治疗胆绞痛157例。随证加减:痛剧白芍可加至30克,延胡索加至20克;呕吐加姜半夏20克;胆道蛔虫去甘草加乌梅10克;伴黄疸去金钱草,加茵陈30克。每日1剂水煎服。结果:显效11例,有效42例。一般服药1~3剂疼痛即减轻,大多服6~10剂而痛止。

冯茂森. 安徽中医学院学报, 1995, (2): 28

6. 儿童性早熟

金传相以本方为基础方治疗儿童性早熟 70 例。随证加减: 阴道分泌物增多加黄柏 10 克, 知母 10 克; 患病时间较长加三棱 10 克, 莪术 10 克; 乳房疼痛加川楝子 10 克; 盗汗明显加女贞子 10 克, 墨旱莲 10 克; 纳食差加山楂 10 克。1 个月为 1 个疗程, 待症状消失再交替服用逍遥丸、六味地黄丸以巩固。结果: 用药 1 个月后痊愈 68 例, 有效 2 例, 总有效率 100%, 2~3 年后有 5 例复发, 服中药后再消失。

金传相. 苏州医学院学报, 1999, (2): 187

7. 高泌乳素血症

杨宾运用本方治疗妇女高泌乳素血症 2 例, 连续用药 20 余剂后治愈。

杨宾. 四川中医, 1999, (7): 35

8. 腹泻型肠易激综合征

申亚东等以本方为基础方治疗腹泻型肠易激综合征 85 例。随证加减: 腹胀甚者, 加升麻 6 克, 炒萝卜子 15 克; 遇寒则泻甚者加附片 9 克, 干姜 9 克; 腹泻次数特多者, 可酌加米壳 15 克。1 日 1 剂, 分 3 次温服, 10 天为 1 疗程, 间歇 3 日, 可继服第 2 疗程。同时配合物理治疗, 如有效后, 可服用浓缩健脾丸(宛西制药厂产)2 个月以巩固疗效。结果: 经 2 个疗程治疗后, 痊愈 79 例, 好转 5 例, 无效 1 例, 有效率 98.6%。

申亚东, 等. 河南中医药学刊, 2000, (6): 37

9. 高脂血症

朱建军以本方为基础方治疗高脂血症 40 例。随证加减: 肝阳上亢者加天麻、钩藤、地龙; 痰浊阻滞者加石菖蒲、胆南星、法半夏; 肾阴亏虚者加首乌、枸杞子、旱莲草; 肾阳虚者加补骨脂、锁阳、巴戟天; 气虚者加党参、黄芪; 气滞血瘀者加三七、水蛭、蒲黄。每日 1 剂, 水煎分服。对照组口服烟酸肌醇酯片, 每次 0.4 克, 每日 3 次。

两组均以1个月为1疗程,疗程结束后复查血清胆固醇、甘油三酯等指标。结果:治疗组40例中,临床控制15例,显效14例,有效8例,无效3例,总有效率为92.5%。对照组20例中,临床控制3例,显效7例,有效5例,无效5例,总有效率为75%。两组经统计学处理有显著性差异($P < 0.05$)。

朱建军. 浙江中医杂志,1999,(12):515

10. 更年期综合征

钱晓琴等运用本方加减治疗更年期综合征30例。治疗组采用加味道遥散加减:湿热重者加苍术12克,薏仁5克;腰酸耳鸣重者加菟丝子12克,川断12克;失眠重者加夜交藤15克,远志10克;关节痛重者加宣木瓜12克,怀牛膝15克,羌独活各9克。每日1剂,水煎服。对照组:倍美力0.625毫克/天,谷维素60毫克/天,盖福润1粒/天,均口服。两组均以2个月为1疗程。结果:治疗组显效19例,有效9例,无效2例,总有效率为93.3%;对照组显效12例,有效10例,无效8例,总有效率为73.3%。治疗组明显优于对照组($P < 0.05$)。

钱晓琴,等. 山西中医,2002,(2):21

11. 功能性消化不良

郭墨绪以本方加减治疗功能性消化不良245例。随证加减:湿热重者加黄芩12克,苡仁15克;腹痛重者加木香10克,延胡索24克;呕吐者加竹茹15克,半夏9克;泛酸明显者加海螵蛸15克;病久瘀血阻络者加田七3克(冲),丹参15克。每日1剂,水煎2次温服,连服4周。结果:245例病人,总有效率为86.3%。且治疗前后,血尿常规及肝肾功能无变化。

郭墨绪. 陕西中医,1999,(4):164

12. 黄褐斑

刘俊杰以本方为基本方治疗黄褐斑52例。随证加减:月经不调,血瘀明显者加桃仁10克,红花10克;脾虚明显者加茯苓15克,泽泻15克;肾虚明显者加女贞子15克,旱莲草15克。每日1剂,1

月为1个疗程,若未愈再进行第2个疗程。结果:痊愈38例,显效12例,无效2例,有效率为96.1%。

刘俊杰.河南中医,2003,(9):77

13. 口腔疾病

夏钦再等运用加味逍遥散煎剂治疗口腔疾病22例。并根据病情适当加减,每日1剂,分2次煎服,经前期紧张症患者在月经前10~14天开始服用,月经来潮即停止服用,此为1个疗程。口腔扁平苔藓和舌感觉异常症患者,10天为1个疗程。结果:经前期紧张症口腔溃疡13例,显效3例;好转4例,无效3例。口腔扁平苔藓:痊愈1例,显效1例,有效3例,无效3例;舌感觉异常症1例痊愈。

夏钦再,等.北京中医杂志,1994,(5):37

14. 慢性活动性肝炎及肝硬化

马德安运用本方治疗慢性活动性肝炎及肝硬化28例。方药:赤芍、茯苓各15克,当归、郁金各10克,白术、柴胡、三棱、莪术各9克,丹参30克,薄荷、甘草各6克。膈下痞满者(肝脾肿大)去薄荷,加鳖甲15克;黄疸者加茵陈30克,金钱草15克;腹水者加车前子、大腹皮、猪苓、泽泻各12克;ALT升高者加五味子12克。水煎服,1日1剂。同时根据病情配合用保肝、利尿西药;对严重低蛋白血症、浮肿及大量腹水者采用适当输入白蛋白或腹水直接回输;对肝性脑病给食醋灌肠及六合氨基酸静滴;严重贫血者适当输血及其他对症治疗。结果:痊愈4例,显效9例,有效11例,无效4例,总有效率85.7%。

马德安.陕西中医,1997,(6):286

15. 慢性活动性乙型肝炎

马承启等运用加味逍遥散治疗慢性活动性乙型肝炎58例。方药:柴胡15克,甘草6克,赤芍15克,郁金15克,丹参30克,白花蛇舌草30克,茵陈30克,黄芩15克,苡仁30克,当归12克,白术15克,茯苓15克。水煎2次分服,1日1剂,15天为1疗程。随证加减:转氨酶持续升高,湿热毒邪内蕴,舌质红苔黄腻者,加羚羊

粉1克(冲服),龙胆草9克,垂盆草30克,田基黄30克,山豆根12克,赤小豆30克;久病多痰,痰热互结者加夏枯草15克,象贝9克,白矾0.1克,蝉蜕9克,土茯苓30克;白蛋白降低,比例异常,脾肾虚,乏力,浮肿者加冬虫夏草12克,山药30克,黄精15克,菟丝子15克;病人肝脾肿大,牙龈出血,皮下紫斑者加三七粉3克(冲),小蓟30克,水红花子15克,生瓦楞子15克;小便量少加猪苓30克,通草6克,冬瓜皮30克;纳差、恶心、口黏腻者加内金15克,谷稻芽各15克,砂仁9克,白蔻9克;腹胀加青陈皮各9克,大腹皮30克,胁痛者加元胡12克,穿山甲9克。结果:基本治愈(自觉症状消失,肝脏肿大稳定,上腹无压痛,肝功能检查正常,病毒复制标志消失)23例,占39%。好转(主要症状消失,肝脾肿大稳定无变动,且无明显压痛,肝功能检查正常和轻微异常,病毒复制标志水平降低)29例,占50%。无效(症状体征及实验室检查未见明显效果)6例,占11%,总有效率89%。

马承启,等. 内蒙古中医药,2000,(1):17

16. 慢性疲劳综合征

田由兰等运用加味逍遥散治疗慢性疲劳综合征30例。方药:当归20克,白芍15克,柴胡12克,薄荷6克,茯苓20克,白术10克,甘草10克,郁金10克,人参(阴虚火旺者用党参或太子参)10克,五味子20克,灵芝15克。月经不调加益母草12克,红花10克;胸闷重加青皮10克;失眠重加炒枣仁12克,合欢皮12克。每日1剂水煎服。在服用汤药的同时,辅以心理疏导,调节情志,并嘱患者加强锻炼。结果:21例显效,8例好转,1例无效。

田由兰,等. 中国民间疗法,2000,(10):36

17. 慢性前列腺炎

何永生等运用加味逍遥散加减治疗慢性前列腺炎。方药:柴胡10克,白蒺藜、当归各12克,白芍、白术、茯苓各15克,炙甘草6克。随证加减:若湿热久蕴者加滑石、车前子、瞿麦、篇蓄、龙胆草、金钱草等;阴虚火旺者加知母、黄柏、丹皮、泽泻等;肾气不足者加

菟丝子、沙苑子、熟地、益智仁、川断等；瘀血阻滞者加丹参、桃仁、红花、王不留行、玄胡、穿山甲等。水煎服，每日1剂，早晚2次饭后温服，连服4周为1疗程，病情未愈者，停药中药3天后即可进入下1疗程，最多服中药3个疗程。结果：痊愈17例，占28.33%；显效21例，占35.00%；有效19例，占31.67%；无效3例，占5.00%；总有效率95.00%。

何永生，等. 实用中医内科杂志，2003，(2)：104

18. 慢性咽炎

戴春禧运用本方治疗慢性咽炎68例。方药：柴胡10克，当归10克，白芍20克，茯苓30克，白术15克，薄荷6克，甘草5克。随证加减：气郁加香附；咽痛咽干加射干、玄参、黄芩；睡眠不安加夜交藤、珍珠母；有痰加桔梗、苏梗或合用半夏厚朴汤加减；气虚合用补中益气汤加减。服药1~3周43例，3~4周25例，2周为1疗程，治疗1~2个疗程。结果：治愈52例，占76.4%；好转12例，占17.6%；无效4例，占6.0%；总有效率为94%。

戴春禧. 海南大学学报，2004，(2)：173

19. 特发性水肿

耿丽萍运用本方治疗特发性水肿48例。方药：柴胡12克，当归12克，白芍12克，白术12克，茯苓15克，薄荷6克，天仙藤12克，生姜3片。随证加减：如面足水肿甚者，酌加防己10克，冬瓜皮10克；月经不调者，酌加益母草15克，泽兰10克；面红升火、头晕、头痛、心悸失眠者，加生龙牡各30克；体重渐增者，加草决明10克，丹参12克，山楂10克；自汗、气短、无力，加黄芪15克。水煎服，每日1剂，10日为1疗程。结果：48例病例中，痊愈26例，占54.16%；显效7例，占14.58%；有效12例，占25%；无效3例，占6.25%。总有效率93.75%。

耿丽萍. 内蒙古中医药，1997，(2)：11

脑背部

自脑后、肩脊、背腹、痈疽，皆汇于此部中，以便检阅参治。

脑疽门主论

《鬼遗方》云：正脑上一处起为脑痈及脑疽，脑烁并在大椎骨上，入发际生。

王肯堂曰：脑痈皮起，易得破穴，急破急出脓不害。脑疽皮厚，难得破穴，须急发内毒，使破穴方可。脑烁一处初起如横木掘，上起顶门，下止大椎，发肿如火烧，其色青黑如靴皮，硬不见脓，即损外皮，如犬咬去肉之迹，难愈。《准绳》。

《灵枢经》云：阳气大发，消脑溜项，名曰脑烁。脑项如刺以针，烦心者死，不可治。

薛立斋曰：脑属足太阳膀胱经积热，或湿毒上涌，或阴虚火炽，或肾水亏损，阴精消涸，始成疽也。

陈远公曰：有生疽于头顶者，始名脑疽。若对口偏对口，俱非真脑疽也。此疽九死一生，大约生此疽者，皆肾火沸腾也。脑为髓海，通于肾，肾无火则髓不能化精，肾多火髓亦不能化精，不但不化精，而随火升降，且化为毒以生痈疽矣。盖肾之化精，必得脑中之气以相化，火性炎上，不及下降，即于脑中髓海自发其毒，较之脑气不流而为毒者更甚。故往往有更变形容，改换声音，疮形紫黑，烦躁口干，甚至脑骨俱腐，片片脱下，狼狈之状，不可言语形容者，又何以救之耶！此证须问饮食若何，倘饮食知味，即可用药。名曰五圣丹：金银花八两，玄参、麦

冬各三两，黄耆四两，人参二两。水煎服，四剂渐愈，改用十全大补汤，重四两，服四剂，又改用八味地黄汤，恣其酣饮，自可痊愈矣。此救九死一生之法，然舍此实无第二法也。此疽得于房欲者居多，兴阳涩精，俱是丹石燥烈之品，霸阻精道，日积月累，真阴枯烁，髓竭火发，遂至溃顶而不可救，人又何苦博女子之欢，丧千金之命耶！《冰鉴》。

窦汉卿曰：脑疽若色黯不溃，或溃而不敛，乃阴精消涸，名曰脑烁为不治。《全书》。

发际疽门主论

王肯堂曰：发际疮，初起如粟米，头白肉赤，热痛如锥刺，妇人患此者多，丈夫患此者少。始因风湿上攻，或因风热上壅，若如茱实，漫肿寒热，或痛或痒者，是发际疽也。《准绳》。

《心法》曰：此疽生项后发际，形如黍豆，痛如锥刺，痒如火燎，破津脓水亦有浸淫发内者，此由内郁湿热，外兼受风相搏而成。掀肿高肿者易治；平塌漫肿，毒流肩背，未脓先腐者，难治。十四日得脓为吉。

后脑发门主论

申斗垣曰：玉枕疽即后脑发。乃足太阳兼督脉阳维脉所主，多血少气，在玉枕穴风府穴端。《启玄》。

陈实功曰：玉枕疽生于脑后枕骨，中坚而难溃，痛引肩项，鼻塞气粗，此足太阳膀胱湿热凝滞而成。痛痒不一。《正宗》。

头后蜂窝疽门主论

申斗垣曰：蜂窝疽乃热毒结成，形如蜂窝，中多碎孔，多生头后。掀痛红肿者可治；疾发者难治。毒流两肩不可救矣。《启玄》。

胡公弼曰：此证与蜂窝发背不同，与对口同治。《青囊》。

天疽锐毒门主论

陈实功曰：天疽锐毒，生于耳后一寸三分致病之处。左为天疽，夭者，妖也，妖变之物，属于肝木。上为锐毒，锐者，利也，锋利之器，属于肺金。二者皆起于积想在心，谋虑不决，以致火旺而又郁，郁而又旺，诚为险恶之候。故形多坚硬，头多隐伏，未溃先黑，未脓先腐，臭秽易生，元气易败。凡得此者，毒多不得外发，后必内攻而死。初起生于隐微，令人多不知觉，及其知觉，毒已入内矣。倘红活高肿，易于脓腐者，无妨。《正宗》。

汪省之曰：天疽锐毒，又名瘤发，又名耳后发。《理例》。

胡公弼曰：耳后锐毒，乃心肾二经受毒。若不急治，恐热气壅心，毒攻喉下，必致伤命。《青囊》。

耳下石疽门主论

冯鲁瞻曰：耳下石疽者，不脓不疼是也。大宜养肝血，滋肾水，温补可化。如少年脉实者，少佐以清肝，然不可轻用行气破血之药。《锦囊》。

汪省之曰：石疽多生耳项。《理例》。

窦汉卿曰：石疽与石痈同，惟石疽深寒客于经络，血气结聚不散，隐于皮内，坚肿按之如石；此毒若连颈项之节，内先腐烂，方出皮肤。如脓出颈项者即死。初起宜艾灸三四十壮，发于额面者，不可灸也。

又曰：商陆捣敷石疽最效。

项门痈门主论

汪省之曰：项门痈乃阴阳不调，气热壅上，结在风府之傍，聚而成毒，伤于脑后。此恶候也。治同痈疽法。《理例》。

项后^①肉龟疮门主论

《心法》曰：肉龟疮，即胖人项后发际疽。盖胖人项后发际肉厚而多折纹，其发反刺疮内，因循日久不瘥，又兼外袭风寒，凝结形如卧瓜，破烂津水，时破时敛，俗名谓之肉龟。经年不愈，亦无伤害。

项后生疮瘡门主方

项后生疮瘡，肉色不变，不论大小，年深日久者。

生山药去皮一块 蓖麻仁十粒

捣烂。摊帛上贴之，奇验。

① 后 原本作“上”，据目录及文义改。

卷之九

后阴部

自尾闾谷道起至臀股止，一切痔漏疮疽，皆汇于此部中，以便检阅参治。

鹤口疽门主论

《灵枢》曰：发于尻名曰锐疽。其状赤坚大。急治之，不治三十日死矣。

《鬼遗方》云：涌泉疽，肿起发，太阴太阴，尻尾前是也。如伏鼠，二十日不死，十日可刺，发清脓赤黑者死，白色可治。

陈实功曰：此乃三阴亏损，督脉之经浊气湿痰流结而成。其患发在尾闾之穴高骨尖上。初起形似鱼胞，久则突如鹤嘴，朝寒暮热，日轻夜重，溃后稀脓出而无禁，又或鲜血出而不停。凡发此者，壮年犹可，老者可危。《正宗》。

汪省之曰：初起滋阴除湿，已成和气养荣，已溃滋肾保元。久而成漏，宜琥珀蜡矾丸、先天大造丸兼服。《理例》。

证曰：鹤口疽老弱难敛，易于成漏。

尾闾发门主论

王肯堂曰：尾闾发生于尾闾穴，乃督脉所主，最痛难忍。更难得脓。《准绳》。

申斗垣曰：得之奔走劳伤，或久坐血凝气滞者易治。得之酒色过

度,忍精强战,督脉亏损者,破必成漏,难以收功。《启玄》。

臀痈门主论

王肯堂曰:肿高根浅为臀痈;肿平根深为臀疽。俱属足太阳膀胱经湿热所致。《准绳》。

薛立斋曰:臀乃膀胱经部分也,居小腹之后,此阴中之阴,其道远,其位僻,虽太阳多血,气运难及,血亦罕到,中年后尤虑此患。治者毋伤脾胃,毋损气血,但当固根本为主。

陈实功曰:臀痈生于小腹之后,位远僻奥,气亦罕到,血亦少来,凡生此者,湿热流结凝滞而成。此证必须托毒外发,庶不内攻。初起毒从五脏蕴积者,患必有头,红肿坠重如石,内必口干发热。治当通利积热,外以膏贴金黄散,敷四围,拔出瘀脓血,内兼补托自愈;若误用败毒寒剂,外敷凉药,冰凝气血,毒气不得外泄,反致内攻。如疮头软陷无脓,根脚平散不痛,口干烦躁谵语,痰喘气粗,恍惚不宁者,俱为不治。但此证多从毒积五脏,自内至表者,十有八、九;风寒暑热,自外至里者,百中一、二;尝既出而复入里者,终为死候。《正宗》。

申斗垣曰:臀疽乃太阳膀胱经多血少气,生于承扶穴最痛,宜托之。生于实处者易治。近大小便处者,难治。《启玄》。

冯鲁瞻曰:痈发于臀,乃膀胱之湿毒蒸热,或禀赋阴虚,此地最难高耸溃脓。大宜托里为要。《锦囊》。

朱丹溪曰:臀痈生于臀上胯下近大腿处,由湿热相侵,气血凝聚郁毒而成。形如大盘,肿阔盈尺,上覆其腰,下遮其胯,此为阴中之阴,务须宣热拔毒,大补气血,培养肾胃,滋补根源。如此庶血易聚而脓易作,毒易出而热可宣,不然经年累月,肿仍如故,疼痛日深。是以中年之后,犹虑患此。一见虚弱便与滋补,可保终吉。若妄以清凉败毒内服外敷,则气血得寒益凝,多致不救。

臀痛门主方

臀痛 五爪龙草连根捣汁，酒冲服，日进四、五次，脓从大便出。未成者立消，已成脓者以渣敷上，立消。洗臀痛溃后并治股疮。

苦参 金银花 白芷 当归 黑皮硝各等分

绢包，砂铫内煎浓汁，先熏后洗。

消臀痛

金银花四两 甘草节一两

熬膏。每日空心和酒服。渣留煎汤熏洗。

瘰癧疮门主论

陈实功曰：瘰癧疮者俗名坐板疮。生于两股，密如撒粟，尖如芒刺，痒痛非常，浑身毛刺。此因热体见风，毛窍所闭，或因患疮湿热留结于此。洗用苦参汤，甚者皮损粘衣，治以鹅黄散主之。《正宗》。

蒋示吉曰：坐板疮或有因久坐卑湿之地，或坐烈日石上，酿成湿热，皆能致之。《说约》。

申斗垣曰：此乃脾经湿热，湿毒郁久而成，最痛最痒。况股乃至阴之所，血亦罕来，药力少至，当用外治之药治之。《启玄》。

《心法》曰：坐板疮一名风疳。

瘰癧疮门主方

苦参汤 治坐板疮作痒，抓之又疼，坐如糠稳^①，难以安睡。

苦参四两 大菖蒲二两

河水五瓢，同煎数滚，添水二瓢盖片时，临洗入公猪胆汁四、五枚，

① 坐如糠稳 《外科正宗》作“坐如芒刺”。

淋洗患上，不二、三次全愈。愈后避风，忌发物。

又方 槽坊吊大麦酒底水，洗三、四次，效。

鹅黄散 治痃疽疮作痒，抓之皮损，随后又疼，用此扑之。

绿豆粉一两 黄柏三钱 轻粉二钱 滑石五钱

研细以软绢帛蘸药，扑于患上，止痛收干。

又方

姜黄一钱 当归 苦参各五分 红花三分

用麻油一盏同药熬枯，滤去渣，入研细松香末五钱，搅成嫩膏，日搽二次。忌口味。

又方

麻黄 枯矾 猪油煎枯滤清，以热油擦之。

又方岐天师。

轻粉一钱 冰片半分 杏仁去皮尖十四粒 萝卜种子三钱

研细，擦之。

又方 鸡蛋一个，凿孔入硫黄，明矾细末各三钱，调匀糊口，灰火内煨研细，麻油调搽。

又方《醒斋笔记》。

松香五钱 雄黄一钱 如湿加苍术二钱

研末和匀。棉纸条作捻两个，腊猪油溶化浸透，火烧滴下油，搽疮上立效。

又方 明矾煎汤洗。

又方 冬青叶 牛舌草煎汤熏洗。

又方

松香五钱 雄黄一钱

研细。如湿痒加苍术三钱和匀。以棉纸卷成药条，用腊月猪油或麻油浸透，点火烧着，取滴下油搽之。加潮脑治疥。

又方

芫花 川椒 黄柏

熬汤温洗，即消。

毒盛痒痛不止 油缸青布三指宽一条，香油调雄黄末一钱，摊于

布上，卷紧燃着，吹灭焰头向疮熏之，痒痛即止。

坐板疮

朱砂 雄黄各一钱 轻粉 枯矾 黄柏各三钱

研细。先用川椒煎洗，后搽。

坐板疮并阴囊发痒 陈荷叶煎汤，入白矾洗一、二次。

坐板疮陈仑友。 生白萝卜捣烂擦之，不过三次。或萝卜子研细擦。

又方 硫黄一块，放豆腐内煮数滚，加苍术各等分，为末。用腌猪油捣烂搽。

痔疮门主论

陈实功曰：夫痔者，乃素有湿热，热食炙搏，或因久坐而血脉不行；又有七情，过伤生冷，以及担轻负重，竭力远行，气血纵横，经络交错；又或酒色过度，肠胃受伤，以致浊气瘀血流注肛门；又有妇人临产用力过甚，血逆肛门，亦能致此。初起为痔，久则成漏。《正宗》。

陈远公曰：人肛门内外四旁忽生红瘰，先痒后疼，后成为痔。日久不愈，此乃湿热所致也，而得之纵饮者为多。江南人常多患此，皆由地之湿热，加之酒热之毒，所以结于肛门不能遽化也。夫肛门通于大肠，凡有湿热，应随大便同出，何以积而成痔？盖湿在大肠，不能久留，必尽趋肛门，而肛门乃大肠锁钥，有防范之司，不容湿热出于门外，于是蓄积既久，而湿热之毒肛门独受之矣。有毒必然外形，不生肛门之内，必生肛门之外，虽内外殊，而作楚则一也。治法乌可舍湿热而他求乎！但肛门去脾胃甚远，化湿热之毒，必假道于脾胃，肛门未必受益，而脾胃先损，所以无功耳。故用药必须毋损于脾胃，有益于肛门者，始可奏功。益后汤治之：白芍、茯苓、山药、薏仁各一两，地榆三钱，穿山甲一片土炒，水煎服，四剂肛门宽快，又四剂内外痔消，再以此方十倍蜜丸，每日开水下五钱，服完一料不再发。《冰鉴》。此方利水去湿，既无损于脾胃，又有益于脾与肛门两得也。

又曰：有肛门边先生小疔，因不戒酒色，以致腐烂变成痔漏，不能

收口，长成肉管，每年一管^①，流脓淌血，甚以为苦。世人治法，多用刀针挂线，徒受苦楚而内毒未除，外口难张，经年累月，难以奏功，岂漏疮终不可治乎？抑犯酒色之戒乎？皆治不得法耳。夫肛门之肉，不比他处，肛门之皮，亦不比他处，他处肌肉非横生即直生，惟肛门肌肉有纵有横，最难生合，况大便不时出入，加以刀针挂线是已伤又伤，安能遽长皮肉乎！故刀针挂线，切戒轻试，惟消湿热之毒内治为佳，然漏卮既久，勿论漏不可止，而气血反伤，终难奏效也。当于补中兼消，则何患漏之不痊哉！青龟丸：乌龟一个，茯苓五两，黄耆八两，当归三两，人参二两，薏仁六钱，穿山甲五钱，土炒，瓦松二条，阴干不可见火，白芷、槐米、干青苔各一两，羊蹄后爪四副，土炒，研末。将龟石臼内捣死，以药末拌之，饭锅内蒸熟，将龟肉与甲火焙干为末，同前药蜜丸，每日服三钱。一月漏痔干，二月漏痔满，服完全愈不复发。但服丸时，必戒酒色三月，倘犯之不能奏功。此方治漏神效，非俗方可比，有不可思议之妙，去湿而不散气，败毒又不损血，补破于无形，填隙于有孔，愿人敬信此方，坚三月之戒，以去宿疾也。

又曰：有大便时，先射血几许，始下粪者，人以为便血证，谁知肛门暗生血痔乎！夫痔久必变漏，宜流脓血，殊不知受病不同，见证亦异，此多得过饮火酒，热走直肠而不得遽泄，乃结成小痔，久则皮破血出，此血乃外出直肠之外，非出直肠之中，乃膀胱之血也。夫膀胱化气而不化血，酒毒渗入膀胱，将酒气化水出于阴器，而酒毒烁血不能从阴器而出，不得趋大肠肛门而出矣。无奈门径各别，户口牢闭，无可出路，而酒毒结直肠之外，毒向内攻而直肠之痔生矣。痔生必破，有隙可乘，而膀胱之血注之，久则以血引血，不但膀胱之血尽归之也，乘大便之开关，血先夺门而出耳。治当急填其隙，使血出而无路，然私窾既开，漏卮易泄，不急清上游之源，而但截下流之隙，非计之善也。清源散：黄连、槐花、地榆、人参各三钱，茯苓、白术各五钱，车前子、葛根各三钱，白芷三分，穿山甲土炒一钱，研末，三七根研末三钱，水煎调末服，三剂血较前更多，减去黄连，又三剂血止痔愈。必须戒酒，终身勿服也。若

① 每年一管 光华堂本作“每年生一管”，《冰鉴》作“每岁一管”。

女色只忌三月,永不再发。倘不能禁,不必徒治湊吾方也。此方妙在多用黄连以解酒热之毒,所谓清源也。上游无病,下流自安,各药又分派得宜,无非去湿化热,堵截有方,何患洪流冲决哉。

蒋示吉曰:痔类不一,有牛奶痔、鸡心痔、鸡冠痔、菱角痔、莲花痔、珍珠痔、珊瑚痔、蜂窝痔、鸡肝痔、翻花痔、穿肠痔、鼠奶痔、樱桃痔、鼠尾痔、核桃痔、蜆肉痔、内痔、外痔,因形定名,总不外乎醉饱入房,膏粱醇酒,负重致远,以致湿热风燥,浊气瘀血流注肛门,俱能生痔。妇人产后用力太过,瘀血凝滞,亦能致此。毒浅者其形正而平常,毒深者其形异而顽恶。久则崩溃成漏,新则坠重刺疼,甚者粪从孔出,血自窍流。气血日亏,形容日削,治法当以凉血行气为主,其外治法,须分内外,内痔以唤痔、枯痔之法治之,外痔疼甚者清之,头大蒂小者线结之,头小根大者枯之。《说约》。

又曰:凡疮久不收口,日流脓水,甚而医家任意以纸捻入,日逐磨磷,渐生脓管,如灯草葱管,遂名曰漏证。此皆气血亏损,热毒郁结,使荣卫运行而失职也。遍身虚怯处多有之,惟痔疮成漏最易。若用刀针挂线,徒受痛楚,不若以推车客散内消之为妙也。内服十全大补汤、补中益气汤以培助之。

冯鲁瞻曰:痔漏其名有五:曰牡、曰牝、曰气、曰血、曰酒。又有肠风痔、脉痔、雌雄痔,皆五痔之别名也。初生具在肛边,状如鼠乳,或结小核,痒痛注闷,甚者身热恶寒,皆由房劳饮酒过度,久嗜甘肥,不慎醉饱,以致阴阳劳挠血脉,肠澼渗漏,冲注下部而成。治法:始觉便服秦艽、槐角、连翘、土贝之类,外用熏洗以取内消,倘仍恣情嗜欲,则腐溃脓血,逗留日久,傍穿窍穴,即变为漏。必须补气血,慎调摄,方可以渐收功。《锦囊》。

又曰:痔者,肛门之傍生疮肿痛者是也。亦有生疮有孔,恶水不干,而为漏者。皆由母食酒面煨炙,在胎受之,或因后天失调,心经蕴热,热传于肺,注于大肠而成者。治小儿痔疮,宜内服凉血解毒,外用熏洗可也。

又曰:痔漏之源,受病者,燥气也,为病者,湿热也。皆由酒色过度,湿而生热,充于脏腑,溢于经络,坠乎谷道左右,冲突为痔。虽见证

于大肠,实阴虚而火实所致,经所谓开窍于二阴,久则溃而成漏。然痔轻而漏重,痔实而漏虚。治痔不过凉血清热,治漏初则凉血清热燥湿,久则涩窍杀虫,兼乎温散。或曰痔漏,火是根源,何故而用湿涩?殊不知痔只出血,始终是热,漏流脓水,始是湿热,终是湿寒,不用温药,何以去湿而散寒乎!非止痔漏,百病中多有始热而终寒者,即如泻利呕吐,初则肠胃气实而热,久则肠胃虚为寒。丹溪下血条云:下血久不愈者,后用温剂,正此义也。

朱丹溪曰:漏疮须先服补药生气血,参、术、耆、归为主大剂服之,随以附子末唾和作饼如钱厚,以艾灸之,漏大炷大,漏小炷小,灸令微热,不可使痛,干则易饼再灸,如困则止,来日又灸,直至肉平为效。亦有用附子片灸,仍用前补剂膏贴之,尤妙。治漏法。

李东垣曰:肠头成块者,湿也;作大痛者,风也;大便燥结者,兼受火热也。是湿热风燥四气合邪,法当泻火润燥,疏风和血止痛,是其治也。《十书》。

冯鲁瞻曰:痔漏初起,须用芩、连之类,以凉大肠,枳壳以宽大肠。涩窍用赤白石脂、枯矾、黄丹、脑子之类。《锦囊》。

又曰:痔漏若能味无味之味,正味足矣,事无事之事,百事备矣。若服饵调节谨慎合宜,未有不瘥者也,若不知谨慎,强治无功。

窦汉卿曰:大法治痔以凉血为主,如肛旁别有一窍出脓血,名曰单漏。治之宜温暖之剂补其内,生肌之药敷其外。

窦梦麟曰:窍在皮肤者易愈,脏腑有损而致窍者,未易治也。

《养生必效方》载:干义传,僧觉海少年患痔疾,其行业比冰霜,缘此饱食久坐,知痔疾者,不必酒色过度矣。故《素问》云:因而饱食,筋脉横解,肠澼为痔。三神丸治僧道痔疾,故治有不同也。

岐天师曰:人有粪门内拖出一条,似蛇非蛇,或进或出,便粪之时,又安然无碍,此乃大肠湿热之极,生此怪物,长于直肠之间,非蛇也乃肉也。但伸缩如意,又似乎蛇,法当用逐邪杀蛇丹服之,外用好木耳一两煎汤洗之,洗后用冰片一分,研末扫上,扫尽即缩进而愈,神验。《秘录》。

证曰:治痔漏鹳口等证,患者欲坐不能,须铺极厚芦花坐垫,中开

一洞，将患处坐向洞中，自无压挤伤疮之患。

痔疮门主方

诸痔初起煎方

槐角子 黑牛胆制 生地 当归 连翘 枳壳 升麻 荆芥穗 陈皮 防风 地榆各等分 黄连 黄柏 黄芩 此三味春秋用七分，夏用一钱五分，冬用五分

水煎空心服。大便秘加蒸大黄、火麻仁。

又方

柴胡 甘草 厚朴 独活 生地 牡丹皮 陈皮 槐角子 黄芩 白芍 金银花 当归 黄柏 水煎服。

痔疮初起大便下血，未破无脓，皆可内消。

象牙煨 白僵蚕煨 地榆煨 胡黄连各一两 槐花火酒拌炒 贯众火酒拌炒 生地各二钱 石燕一对，火煨醋淬

研细蜜丸。清晨淡盐汤送下二钱。

熊胆散 痔疮坚硬作痛，脱肛肿泛不收。冰片一分，熊胆二分，研细。先将大田螺一个，用尖刀挑起螺厣，入药在内，放片时，待螺化出浆水，用鸡翎扫痔上，频频用之即愈。

又方 田螺水养伺其厣开，入冰片少许，螺自化水，鸡翎扫上。

又方 槐花研末。灌入雄牛胆内阴干为丸，白汤送下三钱。

又方 雄鹅胆汁调冰片搽之。

又方

白鹅胆取汁，三、四枚 熊胆二分 冰片一分

调匀，涂痔上。

又方

橄榄核煨灰 熊胆二钱 冰片六分

研匀，鹅胆汁调搽。

内痔 树上干桃数枚，阴阳瓦焙研细末，冰片三分入瓶内，加猪胆汁挤入肛内。

立止痔疼 乌梅肉七枚，阴阳瓦焙干，再入冰片三分，儿茶七分。研细末，先以瓦松皮硝汤洗过，再搽。

又方 活蚯蚓洗净泥土，捣烂冲热酒服，外用猪胆调杏仁冰片末，鸡翎扫上。

痔内生虫 鳊鲤鱼骨烧烟熏肛门，其痔内虫尽死。

药线方 诸痔瘻瘤，凡根蒂小而头面大者，用此线系，其患根自落。

芫花五钱 壁钱二钱 白色细扣线三钱

水一碗，同浸小磁罐内，慢火煮，水干为度，取线阴干，凡遇前患，用线一根，患大者二根，双扣系于根蒂，两头留线，日渐紧之，其患自然冰冷紫黑，枯落后长肉药收口。

又方 蜘蛛网四边粗丝合成线，结患根上。

枯痔法 凡痔疮泛出，即用此药涂之，痔自干黑枯落。欲用此方，四边好肉须先用护痔散护住良肉。

明矾四两 轻粉 朱砂各三钱 白砒四钱

先将矾入铜杓内煅滚，次入砒末搅匀，以矾枯为度，去火毒片时，次入轻粉朱砂，再研极细，磁罐收贮。每日辰、午、申三时，以温汤洗净痔上，唾津调涂，七、八日其痔自然枯尽，方上生肌药。

护痔散

白芨 大黄 苦参 寒水石 绿豆粉 黄柏各等分

研细热水调涂四边好肉上，方搽枯痔药。

唤痔散 痔在肛门内肠头上，外面看不见，痛苦不胜，用此药唤出痔来，以葱汤洗净上药。

磁石一两，活而吸铁者 草乌尖生用五分 枯矾五钱 干姜三分，泡，另研

共研极细。用生姜汁或葱汁调涂肛门上，少顷肛自内脱出，痔疮上下洗净，四边好肉上用前护药，次上枯药，一日三上，洗用新笔蘸药洗之。如此六、七日脱尽痔根，即用生肌药收口，后用贴顶升阳散收入其肠，内服槐角丸。

贴顶升阳散

草麻子四、五粒去壳 麝香三分

共捣膏。将头心发去钱大一块，贴此药少顷，其肛即收入。如缓再用醋一口喷患人面上，立收。

熏痔法 莲蓬壳一个，五倍子一个，将倍子开一孔纳明雄五分子内，再将倍子有孔一头纳入莲蓬壳内，以线扎紧，入小口砂锅内水煎十数沸，对痔上熏之，冷则又温，频熏自效。

又方

苍耳子 荆芥 黄芩 花椒 马齿苋 瓦松 皮硝 白矾 槐花各等分

每用五钱加葱白五根，煎汤熏洗。

又方 鱼腥草煎汤熏洗，仍以草挹痔上。

又方 凤尾草煎汤熏洗。

又方 梓桐树枝叶煎汤熏洗。

又方 豨莶草连根煎汤熏洗。

又方 槐花泡汁当茶饮，渣再煎熏洗。

又方 新蚕豆花梗叶煎汤熏洗。

又方 芒硝、瓦松、陈莲蓬壳煎汤熏洗。

又方 陈枳壳、干茄蒂、冬瓜皮、陈槐花各等分，煎汤熏洗。

又方 桃树根皮煮汁，每日熏洗三、四次。

又方 马齿苋煎汤熏洗，内食生熟荸荠。

又方 苦参、茵陈各五钱，煎汤熏洗，兼治脱肛。

又方 枳壳二两，荔枝草四两，河水煎汤，先熏后洗。

又方 无花果叶煎汤熏洗。

洗痔黄硝汤 痔疮肿痛。大黄二两，水十二碗煎至八碗，再入朴硝一两，略滚倾桶内熏洗之。

肛门四边肿硬痒痛不可忍者 白矾三分研碎，用童便化开洗痔上，每日二、三次。

洗痔膏 此膏能洗痔疮，用刀剪不疼不痛。

槐花 明矾各一斤，或用胆矾

先将槐花用河水熬取浓汁，滤清复入净锅内，投矾于内熬至极稠，磁罐收贮。每用少许入开水内化开洗之，其痛立止。

外痔 瓦花朝北者同冰片捣敷。

外痔

五倍子五个焙 冰片五厘

研细，麻油调搽。

痔疮初起

熊胆三钱 冰片四分

研细，猪胆汁调搽痔上。如已溃者不可用猪胆汁，如用在已破之疮便要极疼。

消痔千金散

孩儿茶 黄连 寒水石各五分 硼砂 赤石脂 芦甘石各三分 熊胆二分 冰片一分

研细，清茶调敷患上，肿痛立止。

蜗牛膏《集验》。 蜗牛一枚，加麝香、冰片研烂，磁盒盛，次早取汁涂。

消痔丸 痔疮痔漏初起，人壮便秘，血分壅热者。

生地四两 水洗片芩一两五钱 金银花 枳壳麸炒 秦艽各一两 防风 大黄九制 当归 苍术米泔浸炒 地龙 槐花炒 赤芍各二两
研末，炼蜜为丸，空心白汤送下三钱。

又方 白鸡胆二、三枚取汁，入熊胆二分，冰片五厘共研一处，磁盒收藏，勿使出气。用时以手指搽之。

神茧散 蚕茧纳入男子指甲，以满为度，外用童发缠裹烧灰存性，研细蜜调搽。

鲫鱼散 鲫鱼一尾刮去肠净，入白矾令满，瓦上煨存性，研末用鸡毛扫上。

猪甲散 猪悬蹄甲为末，每空心米汤调下二钱。

翻花痔 荆芥、防风、朴硝煎汤熏洗，再用木鳖子、郁金研末，加冰片、熊胆少许，水调敷。

洗痔 槐花、枳壳、荆芥、艾叶水煎，入白矾先熏后洗。

又方 木鳖子净仁七个研，加白矾二钱，水煎熏洗。

痔疮灸法 大蒜一片，头垢捻成饼子，先放痔上，再安蒜艾灸。

痔疮头大蒂小 芫花根洗净，木臼捣，以少水绞汁于银铜器内，慢火煎成膏，将丝线于膏内浸透，系痔疮根上。

系时微痛，候心躁痔落时，以纸蘸膏捻入窍内除根。

偷粪鼠 牛皮胶一两，好酒一碗，顿化服，一、二次自消。

三神丸《养生》。治僧道痔疮。

枳壳炒去穰 皂角烧存性 五倍子各等分

上为细末。炼蜜为丸桐子大，每服二、三十丸，温水食前送下，其效如神。

治痔 每日食海螺蛳半升，用苦茶漱口，约食二斗即消矣。痔乃脏火属阳，海螺蛳性寒味咸属阴，寒能敌火，咸能软坚，茶又苦凉，深得旨矣。

小儿生痔 甘草熬膏，空心服之自愈。

痔疮初起痛痒不止 旧布鞋底烘热频频熨之，冷则再烘再熨，其痛痒则已。

洗痔奇方

夏枯草 黄柏 枳壳 槐花 马齿苋 五倍子各二钱

上药装夏布袋内，入磁罐中，加明矾八两，开水冲洗，立刻止痛。

治痔疮并脱肛

黄蜡 白蜡各一两 雅连三钱

研细熔化为丸，每服三钱，白汤送下。

痔疮 熊胆涂之。

又方

秦椒即大椒

晒干磨细，取净末一斤，浸麻油十斤封口，每饮食时以椒油或下面、或蘸菜吃，神效。

又方 大田螺一个，入铜青、麝香、冰片各五厘，入螺内，取水搽之。

又方 旱莲草一把连根洗净，捣烂滚酒冲汁服。

又方 秦椒同饭捣烂为丸，每服二钱，白汤送下，止痛神效。

清脏补漏丸 汤阿松道士。

穿山甲炮，一两 槐花炒 明矾各二两
共磨细。以黄蜡二两熔化为丸，每早空心白汤送二钱。一料除根。

又方 以绢袋装银硝二两，缝长条，以带系腰中，如坐即将硝袋垫肛门痔上，久久自愈。

偷粪鼠 猫屎、井底泥和匀，围之立愈。

痔疮神验方周鹤仙。 生甘草节大者一百个，为末，炼蜜为丸桐子大，每空心用槐米煎汤送下，轻则三钱，重则五钱，服半料或一料即愈。戒房事百日，永不再发，神验无比，此天下第一奇效方也。若痔肿痛难忍，发而极重者，用地骨皮一两，荆芥、槐角子、枳壳、金银花各三钱，煎汤频洗，午后空心再进一服，自然渐渐消去而愈，不可以平易忽视。

大肠火盛，肛门肿痛难于大便，或生痔并肛门边生疔毒者 槐米不拘多少，炒深黄色，放地上去火毒，为末，空心黄酒调服三钱，服三、四次即愈。若生痔并一切疔毒，多服自消，极验。

痔疮丸

黄连 苦参 乳香去油 没药去油 雄黄各一两 连翘 僵蚕 蝉蜕 防风 全蝎 槐角入牛胆汁煮 生地 牛膝 陈皮 穿山甲 当归 枳壳 地龙去泥晒干，各二两 蜈蚣焙，去头、足，二十条 象牙末五钱 人参二钱五分 蜂房一个，入玄明粉于眼内，草纸湿透包好，用微火煨之

各制为末，炼蜜为丸，空心开水送下三钱。忌一切火酒、发物、房事，服过六、七日，再用后方洗。

洗痔法

荔枝草 马鞭草阴干，各半斤 蒲公英二两 甘草三钱

入罐煎好，再入皂矾一两，略煎数沸，皂矾煎久，升去无功。先熏后洗。

痔疮初起 通州膏子眼药搽之，自消。

痔疮江仍度。

粉甘草八两，用青盐四两和水拌，晒干又拌又晒，汁尽为度 粉甘草八两，生晒共磨末，炼蜜为丸，每早白汤送下三钱。

又方 生桐油频涂。

痔疮痛不可忍 羊胆一个，取汁入冰片五分，和匀扫上。

痔疮蜡矾针 黄蜡熔化，入枯矾末少许于内，揉成长条如线，看痔漏深浅插入，待脓尽再上生肌药收功。

又方 川贝母、五倍子等分，研末搽之。

痔疮突出疼痛坐立不便 先用韭菜洗净，煎沸汤于瓦木器中熏之，通手沃洗即愈。如未消用生姜切薄片放于痔上痛甚处，以熟艾作炷于上，灸三炷，黄水即出自消。若肛门上有三、两个痔，三、五日后如前法逐一灸之，屡验。

肛门起窠作痛 野薄荷、明矾各等分，煎汤熏洗自消。

外痔 红枣去核，入铜青线扎，炭火煨存性，研细末，痔潮干掺；痔干以津润湿搽之。

痔痛下血

川芎 当归 黄耆 神曲 槐花 地榆各一两 阿胶炒珠 血余 荆芥穗炒黑 木贼草炒黑各三钱

炼蜜丸如桐子大，每服五十丸，食前米饮送下。

痔疮定痛

白壳旱螺七个 杭粉一钱

共研一处晒干，入冰片三分，研细瓶贮，每以木鳖子、全猪胆汁磨浓调搽。

洗虫痔 河堤柳根上须，一把，花椒、白芥子煎汤熏洗，其虫头黑身白，从痔疮孔内出。

洗痔吴韵清。

鱼腥草 夏枯草 马齿苋各一两 五倍子 枳壳 黄柏各五钱 明矾四两

共煎浓汁，每用一杯，搀滚汤熏洗。

又方

瓦松 马齿苋 槐花 五倍子去虫 皮硝各一两 葱白十个
共装绢袋内煮汤，每日熏七、八次。

消痔脱管奇方

刺猬一个，皮纸湿包烧灰、存性 牛角腮一枚烧灰存性 猪悬蹄十个烧灰存性 苦参二两 木耳 石菖蒲 陈棕烧灰存性 枯矾各一两 地榆 槐

角子 胡麻仁 雷丸 防风 漏芦 芫莢 麝香各五钱

共磨细末，炼蜜为丸桐子大，每服一钱，日三服，白汤送下。

洗方 喇叭花即土地黄苗煎汤，日洗二次。

却毒汤

瓦松 马齿苋 川椒 川文蛤 防风 生甘草 枳壳 侧柏叶
苍术 葱白各三钱 焰硝一两

煎汤，日洗三次。

牝痔并一切内外痔疼痛不可忍 新黄瓜萎一枚，以刀旋下顶，不去穰，选不蛀皂角子填满，将顶盖好，外用纸筋泥固济约三指厚，以炭火簇合烧令红，放于地下坑内出火毒，一宿取出，加麝香一钱，每服一钱，研极细，磁瓶收贮，米饮调服。

新久痔痛 海螵蛸去粗皮，研细末，用生麻油调成膏，用鸭翎扫上，每日夜用之，日久自消。

外痔神消散

杜秘。

红梔子捣碎 黄柏 胡黄连各一两

水二碗煎一碗，二煎、三煎俱煎一碗，共三碗，去渣，入皮硝一斤炖化，撤去泥脚，取上清硝汁，以文火慢炼成硝。大田螺十六个，每个人冰片一厘待螺化成水，将水拌入硝内，再加熊胆儿茶各五钱，研细和入硝内拌匀听用。每用头一次用苦参一两，水三大碗煎成二碗，去渣，入制硝末一两，煎二、三滚，倾盆内，先熏后洗，每日洗三次，第二日仍用洗剩药水，再加苦参一两，加水一大碗煎成，加制硝末五钱，如上熏洗。第三日照第二日洗法。第四日旧药水俱不用，照第一日换新水煎苦参制硝洗之。以三日又换一次，其痔自消，永不再发。

痔疮 线香为丸，每服二钱，白汤送下。

痔漏神方 顾玉书。

抱鸡蛋壳内皮煨存性 血余各三钱 石膏煨二钱 冰片 儿茶各五分
血竭三分

共乳极细搽痔上，脓水自干，管根自落，用真耿饼一斤，粉甘草半斤，捣匀为丸，每早空心白汤送下三钱。此乃秘方，经验多人，用之必效。

内痔 冬青树叶煎汤熏洗。

外痔 鳖甲、五倍子，煎汤熏洗。

痔疮 广元肉一个，包明矾五分，嚼碎滚水吞下，七日后用明矾一钱，十四日后用明矾一钱五分，待痔枯即止。

又方 青饼一个入黄蜡一钱于内，置碗中，于饭上蒸熟，清晨开水细嚼一枚，以愈为度。

又方 梓桐树皮叶煎汤洗。

又方 豨莶草连根煎汤洗。

痔疮肿痛 冬瓜煎汤洗。

痔漏门主论

证曰：痔疮初起，有奔走过急，瘀凝肠分，流注肛门者；有色欲违度，忍精强固者；有耽于醇酒者；有好嗜辛辣煎炒炙煨者；有湿热流滞者；有久嗽气虚，群火灼阴而成者；有久坐气血凝聚者；又有妇女血燥，大便秘结，用力努挣而成者；亦有生产用力太过，瘀血流结而成者；更有脾泻肾泄、元气下陷而成者；又有久痢气陷而成者，种种皆能成痔。而痔类甚多，有因其形而名者；有因其部位前后左右内外而名者；既溃之后，每每多成漏管，不能收口者。非内服外洗，纯用苦寒，致令脾元日损，肌肉难生，即系医家妄用刀针，药线系扎，铅丸悬坠，利剪割切，良肉受伤，日施药线，插入拔出，日逐将疮内四旁新肉磨成硬管，愈插愈深。此故医家之过，然病家见痔疮溃后，虽流脓血，不疼不痛，嗜饮者依然畅饮，好色者仍复贪欢，善啖者辛辣煎炒全不禁戒，虽无刀剪药线之害，亦断无不成漏者。更有等自愚之辈，每言痔漏不可医痊，留此门户为湿热外渗之地，若收功完口，湿热反无门可出矣。殊不知肾开窍于二阴，谷道即肾之门户，若使终年破流血水，则真阴由此而耗，正气从此而亏，安能保其不成癆瘵乎！况湿热若果由大肠而来，自由大肠直出，岂有归大肠而不出，反由漏口徐徐而泄哉！是以痔贵早为培补，益气保元，不可用苦寒内服外涂淋洗，病者谨戒百日醇酒房劳，再无不收口之理。若不遵禁忌，虽有灵丹，亦难奏效。

痔漏门主方

退管丸周鹤仙。

当归酒洗 露蜂房槐树上的微妙 川连酒炒 象牙各五钱 槐花微妙
川芎炒 滴乳香包在新鲜箬叶内，去油净，各三钱

共研细末，取黄蜡二两，熔化为丸如桐子大，每空心以漏芦、芦甘石煎汤送下，其管退出，用剪剪去；亦有化为脓血出者。服此药忌房事、豆腐、火酒。虽愈仍忌四十九日。

捷法 柏油一两，置有涌盆中，用大蜈蚣一条，养在盆内，勿令游去，伺蜈蚣将油食尽为度，用竹签将蜈蚣棚住，竹刀剖开取腹内油，搽痔漏上，务将脓血洗净再搽。

琉璃饼

陈芥菜切碎 陈琉璃炙各五钱 螳螂壳水洗，阴阳瓦焙，三钱 陈猬皮煨灰六钱 田螺二个，冰片化水 珍珠一粒，如无用药珠代

五味同为细末，取田螺水和药，乘潮捏饼，先用天芥菜入砂锅内煎汤，倾入小口瓶内，对患处热熏温洗，如无天芥菜，即用番白草或苦参煎汤熏洗亦可。洗后拭净，将药饼放患顶上膏封。一日一换，痔管内仍用所存药末，鹅毛管吹入。

痔漏丸

大熟地四两 白茯苓 山药 山萸肉 牡丹皮 白芍各二两 象牙一两五钱 鳖 肉苁蓉 何首乌各三两 炼蜜为丸如桐子大，白汤送下三钱。

又方

象皮二两 人乳浸一宿，瓦上焙脆存性 荔枝核二十八个焙脆

研细。用猪肝四个，白酒洗去油。入砂锅内加酒半斤许，糯米一撮，煮烂为度，捣烂和药为丸，每服二钱白汤下，虚人用人参汤下。

又方 雄牛胆汁入铜锅微熬，飞面收为丸，空心白汤送下，管从大便而出。

又方

槐花炒黑 青黛各半斤 当归酒洗晒干，一两

打糊为丸，先嚼核桃肉一枚，淡盐汤送下三钱，退管至速。

又方

胡黄连二两 石决明火煅 槐花 穿山甲各五钱，麻油一斤，磁瓶内煮黄色

研细饭丸，每早米汤送下一钱。四十日见功。

又方

胡连姜汁拌炒 刺猬皮炒各一两 指甲炙五钱 蛭螂七个 麝香二分

研细饭丸，每早淡酒送下一钱。忌火酒、椒姜等味。

退管如神 活獾子一只，杀之退毛净，又将肠内粪去净，入石臼内连骨舂碎，盛坛内封固，埋背阴地下，或背阴房内，过三伏天听用。看管大小，用纸捻蘸坛内浮油插入，其管即出，生肌敛口。

金蝉补漏

推粪虫七个 滴乳香去油 没药去油，各五钱 炙甘草 生矾 生甘草 熟矾各七钱五分

研细，黄蜡四两熔化，乘热丸桐子大，先服八分，渐加至二钱，酒送下，其管自退。

退管 牛皮末晒炒研一斤，槐角子半斤，蜜丸白汤送下。

又方 木耳一斤，用扁柏叶煎水洒上，晒干研末，每岁一分，日逐加一分，如二十五岁可递加至二钱五分为止。俱用白汤调下，如管未退，到二十六天递减一分，只服二钱四分，日逐减至一分为止。

狗肠丸

象牙屑 建青黛 陈松萝 女真子各等分

研细。用黄狗肠一具，洗净蒸烂为丸，每早白汤送下三钱。

混元球 治痔漏如神。

白马屎七粒 真川椒三十七粒 蕲艾 河蚬各七钱 槐皮一斤，切片研末

用蚯蚓屎作球，包众药在内晒干，每日一球，安于马桶内烧取烟熏。

痔漏《济生》。

血竭 象牙末各二两 乳香去油，六钱 蝉蜕 没药去油 朱砂各二钱 白僵蚕 蜂房各三钱

上为细末，黄蜡丸弹子大，每空心温酒下三丸。

狐仙封脏丸 此方并不治痔，而治痔有神效之功。十日见效，服完一料，永不再发。久服可延年益寿。但服此当禁色欲。

枸杞子去蒂，酒拌蒸 菟丝子 白茯苓乳拌，蒸晒五次 赤茯苓 大生地竹刀切片 大熟地 甘菊花 女真子 何首乌同女真子蒸晒五次 山萸肉 远志肉甘草水浸二日 当归身 人参 莲须 柏子仁 天门冬 眼肉 麦门冬去心 酸枣仁各四两 北五味 川牛膝 粉丹皮 石菖蒲 泽泻各二两

炼蜜为丸，每服二钱，白汤送下。

痔漏丸 此方退管生肌，屡用屡验。

石莲蓬 冬青子各三两 川黄连 真川芎 牛膝酒炒 赤芍 当归酒洗 黄芩 黄柏 熟大黄各一两 槐角子 象牙末各二两 蛇蜕去头尾 全蝎各五钱 金墨一铤约重三钱

共研细末，炼蜜为丸，每早服三钱，至七日后服二钱五分，又七日报服二钱，忌火酒，又七日报服一钱五分，每早晚用柳须、花椒煎水熏洗一料，服完永不再发。忌羊肉、驴肉、公鸡、鲤鱼、辛辣。

又方

蚯蚓半斤，用竹刀剖开去净腹内泥，砂锅上焙干 象牙二两

共研极细末。用白糖水和匀为丸如梧桐子大，每早空心用陈无灰酒送下三钱。三服后即有效验，服至十日，有管者渐渐退出，内自生肌。勿吃一切发物，腥、酒，猪首、公鸡等类，尤忌房事。此方屡用验过多人，万勿轻视。

推车客散 痔漏不论远年近日，最凶者百日收，其管自出。

酸枣仁炒 远志肉 苍术盐、醋、米泔、童便四制 穿山甲炙 侧柏叶白矾水煮 枳壳醋煮

地骨皮各一两 槐角子炒 贯众酒拌、九蒸、九晒 陈棕炭各三两 猬皮煨存性一两 白花地丁七八月采生白花者六两

如法制为极细末，空心酒调服三钱，或白汤亦可。服一月后，每服

加推车客即蛻螂细末三分，管自退出。如出以快剪去之。

柏胶丸 内消痔漏。

雄黄同蜜煎老去蜜 小茴香各三钱 川黄连 侧柏叶各一两 广胶八两，切断以牡蛎粉八两炒成珠，去牡蛎 熊胆一钱 槐角子一荚四五粒者佳，四两

研细炼白蜜为丸，早晚各服三钱，白汤送下，荤用鸡蛋，素用豆腐过口。如痔痛极者，加乳香去油，没药去油，各二钱，蟾酥一钱五分。

追毒丸 痔漏通肠，污从孔出，先用此丸追尽脓毒，后服闭管丸立效。

胡连切片，姜汁拌炒 猬皮炙，切片再炒黄色，各一两 麝香二分

研细软饮为丸麻子大每服一钱，食前酒下。服丸后脓水反多，药力到也，莫惧。

闭管丸

胡连一两 槐花微炒 穿山甲麻油内煮黄色 石决明煅，各五钱

炼蜜丸麻子大。每服一钱，空心清米汤送下，早晚日进二服，至重四十日而愈。如漏四边有硬肉突起者，加蚕茧二十个炒，研和入药中。并治遍身诸漏皆效。

痔漏不拘蜂窠翻花通肠三十二孔者，不用刀针挂线，立建神功。

黑丑连皮炒 大黄酒拌，蒸极烂 白莲蕊各三两 红矾醋煮 五倍子炒 五味子炒 川当归各一两 黄连七钱 乳香去油 没药去油各一钱 山豆根五钱

研细，酒叠丸，每服一钱五分；肉汤送下。

退管

童血余煅 槐角子炒，各一两 白蒺藜炒，去刺二两 直僵蚕炒 皮硝炒 儿茶 没药去油各五钱 蝉蜕酒洗，焙三钱 蜂房焙四钱 犀角瓦上炙 鹿茸各五钱 肥皂子四十九粒，取肉瓦焙

研细。用黄蜡四钱，狗油一两，化匀和丸如桐子大，每服六、七十九丸，早晚酒送下。半月其管自退。

加味槐角丸 痔漏通用，并治肠风下血。

川芎 真阿胶 白芷各五钱 槐角子 生地 当归身各二两 黄连 条芩 枳壳 连翘 防风 秦艽 地榆 升麻各一两 黄芪二两

研末蜜丸。或酒糊丸桐子大，每服五十丸，渐加至七、八十丸、百丸，空心温酒或米汤送下。

药肠丸 久漏虚漏，肛门肿痛生疮，时有脓血及肠风下血，虚寒久不愈者。

生附子去皮、脐 枯绿矾各一两 诃子煨 枳壳去穰麸炒 天南星生用
白附子 半夏 枯白矾各二两 鸡冠花微炒五两 栝蒌烧后存性 猬皮
烧存性，各二个 胡桃仁十五两，不去油，罐内煨存性

研末醋糊丸桐子大，每服二十丸，空心临卧时，俱用温酒送下。

痔漏出血不止孙真人。

熟附子焙 明矾各一两

研细蜜丸桐子大，每服二丸酒下，一日三服。数日血止，百日除根。

痔漏神方 柿饼放炭火上烧灰存性，每一两入嫩滴乳石一钱，共研^①细末。每服一匙，一日服四、五次，或茶或米饮，或糕或饭，俱可服。俱在食前服。初服五、七日，必流血水，管渐化出，或痛，或不痛，次流黄水，结疤全愈，永不再发。远年者用半斤，近者数两。滴乳石要极嫩的，指甲刮的下者为佳，生用不必煨。

治痔油药灵秘丹药。

苏合油 熊胆各五分 鸡蛋头生者二个，取蛋清

将鸡蛋清熬油，三味和匀敷之。有一赵姓患痔垂死，用之即愈。

治痔药水

片脑一分 朴硝五分 熊胆三分 蜗牛 田螺肉各十两 橄榄核烧灰五分

将蜗牛、田螺肉捣烂，入药浸一夜，取水并药敷疮，无不断根。

痔漏洪武帝亲验。

犀角 象牙 乳香 没药各一两 明矾 黄蜡各五钱

铜器熔化蜡入药，丸梧子大。用连翘、金银花入好酒煎半日，去渣，酒服二十一丸，自愈。

① “研” 光华堂本作“乳”。

槐角丸

槐角子 槐花各八两 槟榔四两 黄芩三两 刺猬皮两个,酒浸焙
共为细末,炼蜜为丸桐子大,空心白汤送下,每服一百丸。

又方《外科秘书》。青苔青石上者焙末,加生矾少许,再研听用,先将瓦花一把水煎滚,加盐卤一碗,坐上浴洗,其痔渐渐缩小,揩干将药抹上,但要痛三、四次即愈,永不再发。

痔漏周鹤仙。

金银花拣净梗叶 粉甘草各一斤

上二味,以一斤为末,炼蜜为丸如桐子大。以一斤浸黄酒,每用一杯,送丸药二钱,一日三服,一料即愈。一切痔俱枯落,漏管渐退出,神效无比。

海州州尊李公方 治痔漏血痔如箭,肠风下血,并效。

橡斗子壳四两 黄耆蜜炙 枳壳麸炒 黄连酒炒 地榆去下半截,只用上头半截,取净末,各二两

共为细末。老米打糊为丸如绿豆大,每清晨用槐花米三钱煎汤送下一钱,重者二钱,半月全愈。至重者兼用小灵丹必效。

小灵丹 番木鳖不拘多少,用麻油煎枯存性,取起为末,面糊为丸,如萝卜子大。临卧时用清茶调服一分六厘,盖暖出汗,切忌不可说话。其油用熊胆为末,冰片少许和匀,留搽外痔。如外痔先以荆芥、防风、瓦松煎汤熏洗涂药,如内痔则只服二方丹药自愈。此丹兼治中风,口眼喎斜,如神。

痔漏

活磁石六两,打如豆大,用硫黄一两研细,以白芨水浸磁石,将硫黄为衣,晒干

入阳城罐内,铁盏盖定,盐泥固济,升七炷香,冷定开看,其灵药只有三钱,听用。又用:

朱砂 明矾 火硝 青盐各四两

入阳城罐内,照前升七炷香,刮取灵药。又用:纹银一两 硫黄三钱 白砒三分

入倾银罐内,炼化搅成粉,将三项药各称一分,米饭为丸,空心白芷煎汤送下一分,半日许下部作胀痛时,要人手拍左右,其管退出;外

用好生肌药收口，其功甚速，如疮口小，可另用好烂药烂开疮口，其管更易退出。如欲速于退管，可用草麻子一两煎水熏洗，其退更速。

治痔良方 夫痔何由而生，乃心经之积热，流于大肠经，为害于谷道，古人名之曰痔、曰漏，此证男女皆患。盖缘美味多飧，醇醪过饮，醉饱贪欲，喜怒交加，渐积而成。其患初起结累如牛乳鸡心，不破为痔，破流脓水为漏，变为莲花通肠鸡冠，其祸不小，不医则患重于一切。世人不审痔源，不解漏根，动辄药线穿蚀，致受痛苦，男子强求一时之功，而妇人岂能穿线乎！譬夫瓦破则漏水下流，不补其瓦，漏安能免，予得此方，男妇并治，不理其疮，惟补其气血为主，使其上不漏则下无害矣。且无号痛之惨，溃烂之险，服此药者，不惟能愈痔漏，抑且以保寿延年耳。

人参 甘枸杞 生地 当归身各一两五钱 茯苓 麦门冬去心 枣仁炒 远志肉 白芍酒炒，各八钱 粉甘草去皮，五钱 白术土炒，一两

上为细末，用猪心血略加炼蜜，为丸如桐子大。每临卧时，无灰酒送下七、八十丸。先看疮之轻重，轻者煎五、六剂，重者十剂，候疮痛止水收。再照方合丸药服。服时仰卧一、二时，勿令心乱妄想，宜少房欲，忌火酒、葱、蒜、生酒、小鸡，宜永断羊肉。

痔漏方方君达。若久漏倍人参二三两，鸡冠、石榴等痔，先宜止痛为主，再搽枯痔药、冰螺散，或用熊胆磨搽，或番木鳖磨搽。

阿魏一两 人参五钱 生地三两 熟地 全蝎米泔浸洗 槐花去梗灰炒 阿胶蛤粉炒，各二两 陈皮土炒 红花 川连各五钱 柿饼八两，陈茶浸、同生熟地捣膏 槐角子连子炒，二两

上为末，以柿饼膏和杵为丸如绿豆大。每早晚空心开水送下二钱，戒气恼房事，生冷发物，如痔流水时，不可行走，内外痔漏，并下部有漏，久服神效。

痔漏混元丹郭朗仙。

青礞石八两，黑色打碎有金星者佳 黑铅三两，同硫黄四两炒成青金色 陈明瓦三两二钱 明雄 水银 雌黄各二两 白砒八钱 皂矾四两 牙硝六两，同青礞石煅金色

各研粗末，用升量有多少，好做混元球大小。先以灰如药数成球，

庶不致药多球小也。球成将药装入混元球内，以泥盖盖之封固，入灰缸内，用金粟火煨一日至夜，又翻转四面俱煨到。取起去盖看时，如药茶褐色，黄色俱好，如白色、黑白色可再封口煨之。养火一日，取出配后药，每灵药一两，加风头贯众去心，净二两，以湿纸包盐泥固济晒干，入炭煨红取出，闷息存性，研细末一两，黑枣肉一两二钱，同入石臼内杵为丸如黄豆大，每空心酒下三、四丸，或五丸。服后倘喉痛破损，止药一、二日，待喉中不痛，照前又服，以愈为度。

做紫土混元球法 用紫土槌熟，加旧草鞋或旧棉絮和入土内，多杵为妙，再以旧绢一小方，药多少即用灰多少于内，包裹成球，要圆些，上扎之，入泥内包裹成球，以木板打之，入灰内，过一、二日换灰，取起又打之。待干，若有缝以泥涂之，以无缝为度。俟极干透，解去绳，取去灰，入药内，其口先做有口子小盖，现成装药入内，以盖盖之，再以熟泥封固，要紧，再下缸煨之。

五午丹 治痔疮痔漏，能止脓水，不用退管，自然敛口，诚乃痔中之圣药也。

马蔺子三钱，炒研细 牛黄三厘

梨一个去皮，上刺一孔去心，将药装入梨内，仍以盖盖之，竹签扞好，饭锅内炖熟，不可入水，服时入白蜜七、八钱，槌烂食之。一日吃一个，奏功最捷。内外痔均效。

凡痔漏发背，疔毒脓疮，破流黄水，到处起疮 杭粉一两，入银罐内化开，成老金色，冷定研末，加冰片三分，搽之其水自止，其痛亦定，即不成疮矣。

痔漏退管

猫耳朵刺即十大功劳，五钱 槐花一两

煎汤，先熏后洗，如打喷嚏，其管即脱下。

治痔漏二、三十孔出粪者

犬肉 青黛福建者，各八两

共捣千杵为丸，每空心白酒或白汤送下二钱；至重者一斤，全好。

熏洗痔漏 瓦松、皮硝、川椒、地骨皮、槐条，用鳖一个，煨汤煎药，倾净桶内，先熏后洗。

又方 花椒、艾叶、葱白、白茄根、马齿苋、皮硝、五倍子，煎汤，先熏后洗。

猬皮丸

刺猬皮三、四个，酒浸焙 经霜槐角子一斤 当归三两
共为末，炼蜜丸，桐子大，每服一、二百丸，温酒送下。

痔漏汤道士。

穿山甲炙一两 槐花 明矾各二两

共研细，黄蜡二两熔化为丸，每服一钱五分。

痔漏丸

金银花一斤 甘草节 连翘去心各三两

共研细末，用夏枯草八两熬膏，加炼蜜少许，和杵为丸如弹子大，约重三钱。每早晚用开水或酒调服一丸。戒色欲，烧酒，余者不忌。一料全愈。

痔漏 象牙屑二斤，研极细末，每早用熟鸡蛋三个蘸屑吃。或入稀粥内，服完一料全愈。

三十年痔漏三料除根

白莲须 黑牵牛各一两五钱 当归五钱

研末，每服二钱空心酒下。忌热物。五日见效。

脏毒门主论

陈实功曰：脏毒生于肛门之两旁，乃湿热相火内灼肺金而成也。或醉酒膏粱，勤劳辛苦，蕴毒流注肛门，结成肿块。发于外者，多实多热，脉数有力，肛门突肿，大便秘结，肚腹不宽，小水不利，甚则肛门肉泛如箍，孔头紧闭，此为外发，属易治。宜通利大小二便，珍珠散、人中白散搽之，脓熟针之。发于内者属阴虚，湿热渗入肛门，内脏结肿，刺痛如锥，小便淋漓，大便虚秘，咳嗽生痰，脉数虚细，寒热往来，遇夜尤甚，此为内发，属阴难治。当用四物汤加知母、黄柏、花粉、甘草，兼以六味地黄丸调治。候内藏脓出则安。又有生平性情暴急，纵食膏粱，或兼补术，蕴毒结于脏腑，火热流注肛门，结而为肿，其患痛连小腹，肛

门坠重，二便乖违，或泻或秘，肛门内蚀，串烂经络，污水流通，大孔无禁，饮食不食，作渴尤甚，凡犯此候，未得见其有生。又有虚劳久嗽，痰火结肿，肛门如粟，破必成漏，此名瘡症，乃内伤坏证，不可勉治。《正宗》。

《心法》曰：脏毒有内外阴阳之别。发于外者，由醇酒厚味，勤劳辛苦，蕴注于肛门两旁，肿突形如桃李，大便秘结，小水短赤，甚者肛门重坠紧闭，下气不通，刺痛如锥，脉数有力，多实多热，属阳易治。发于内者兼阴虚，湿热下注，肛门内结壅肿，刺痛如锥，大便虚闭，小水淋漓，寒热往来，遇夜尤甚，脉微细，为虚为湿，属阴难治。

冯鲁瞻曰：内证中有谓脏毒者，乃肠风日久，气血俱虚，下陷日甚，大肠湿热蕴积，遂生窠穴，为积血之器，从便之前后而来，其腹则痛，血浊而色黯者，名曰脏毒。内伤蕴积久而始发者也，谓之挟热下血。虽有毒名，实非毒也。肠风者，风邪淫乎肠胃也；脏毒者，湿邪淫乎肠胃也。若血射如线者，虫痔也。肠风脏毒之血，自肠脏而来；五痔之血，自肛门蚀孔处出也。

脏毒门主方

脏毒下血《三吴医案》。

槐花 木耳各三钱 大黄酒浸，九蒸九晒，二两 郁李仁 皂角子
象牙屑 条芩 升麻 血余炭 荆芥穗各五钱

共为细末，炼蜜为丸如赤豆大，外以四物汤加黑蒲黄各一两为衣，米汤送下，空心及下午各二钱，服完立愈。

又方 干柿饼烧灰，米饮调下二钱。

加味脏连丸 治脏毒。

黄连八两 枳壳六两 大麦馅子一升 甘草四两

先为粗末，装入健猪大肠内，不拘几段，用线扎紧，酒水同煮极烂，捣成饼，晒干，为细末，水叠为丸，白汤送下二钱。

洗脏毒痔疮叶台山。

五倍子 当归 黄柏 槐花 木鳖子各一两 瓦松十根 红花五

钱 煎汤熏洗。

消毒百应丸 治脏毒痔漏。

苍术 猪牙皂 槐花或槐角子 金银花 黄柏 当归各四两

上六味用河井水各四碗，煎取浓汁滤清，入锦纹大黄一斤，石槌打碎，浸透取起晒干，又浸又晒，汁尽为度，研细末，用陈荞麦面和杵为丸，如绿豆大，如血多加地榆四两煎汤，寻常用二十丸，沉重用六十四丸；体厚者用八十一丸，白汤送下。并治内外诸证。汤引开后：心痛艾醋煎汤下，追虫下积槟榔汤下，肚痛干姜汤下，咳嗽姜汤下，伤食酒下，夜多小便山茱萸汤下，疝气茴香汤下，风火时黄连汤下，白痢姜汤下，赤痢甘草汤下，浑身痛乳香汤下，五劳七伤盐汤下，肠风下血、吐血当归汤下，难产童便下，五淋、大小便秘大黄汤下，痔疮漏疮、头痛眼胀、伤寒发热、紫苏汤或大黄汤下，经水不通、红花汤或当归汤下，肚大青筋膨胀石榴汤下，黄肿陈皮汤下，四肢无力熟地汤下，疔疮磨刀水下。

脏毒下血丹溪。 车前草连根一握，生姜一小块，和新水捣烂，去渣取汁，候血欲下时，腰间必觉重，即服此一盞，少顷渐觉冷下腹中，登厕便不见血矣。

脏毒下血《锦囊》。 黄连四两，酒浸，春秋五日，夏三日，冬十日，晒干为末，乌梅肉六两，捣烂丸桐子大，每服二、三十丸，空心白汤下。

肠风门主论

林氏曰：或问风邪何由入于大肠，毒气何因聚于脏腑，此风与毒有所分别否？答曰：此风非外感风寒之风，此毒非痈疽脓血之毒，总当以气字看。而肠风亦如春伤于风之义，本足阳明清气不能升发透达于四肢腠理之间，而反下陷于大肠，大肠之血脉亦随此气而虚陷，陷久则气血郁结而化为湿热，因此血随气滞，凡登圜气陷火迫之时，其血先瘀而至，至则清散不多。初起谓之肠风，盖因方中多用荆芥、防风、升麻诸风药，升举清阳之气，遂疑为外感之风也。即使是风，亦血热所化之风，岂外风能入于大肠也哉！至于脏毒者，因肠风日久，气血两虚，虚陷之气日甚，而大肠之湿热蕴积日深，手阳明大肠为积血之处，其势必

随气下陷，从粪之前后而来，来虽不痛，而其色多黑黯成块，故有毒之名，而实无痔漏、肠痈、脓血疼痛之毒也。若其病久远，气血愈亏，则脾胃之元气谅必先亏，不能统运周身血脉，使之流行无碍，亦随陷于大肠而成结阴便血之证，在下清气不举，便血而兼飧泄之病，在上浊气凝结，中满而兼喘嗽之恙，甚至肢体浮肿，胸腹胀闷而死。是证应分为三：轻曰肠风，甚至脏毒，重则结阴也。《活人录汇编》。又曰：初起之脉，或沉数有力，或弦数不清，久则芤数无力，或沉涩而弱，或结阴脾虚之脉，非芤涩则虚搏。初则宜于升阳清热，次则清补相兼，和血解毒；结阴则当升清利浊，兼于温补其血可也。又曰：近世患痔者多，而痔中出血者亦不少，多有误认肠风脏毒，而用寒剂者不止，复用升提者再不应，而亦用温补者，总与痔血无干，而补泻尽属妄投。及余细审脉证，方知此血实从痔疮中出，痔愈则血不治而自止，于是病者大悟，求治于专门者，痔果全愈而血从此止，医者亦当细心体察，特详赘以诏后学。

《医论选要》曰：肠癖者，大便下血也。经云：风客淫气，其精乃亡，邪伤肝也。因而饱食，筋脉横解，肠癖为痔，盖缘风气通于肝，肝生风。风生热，风客则淫气伤精，精亡则邪热伤肝，因饱行房，则筋脉横解而肠癖痔漏之证生焉。人之不避风毒，恣饮醇酒炙搏之物，纵欲，喜怒无常，脏腑郁抑，饮食自倍，肠胃乃伤，阴阳不和，关格壅滞，热毒下注，血渗大肠，而成肠癖痔漏之疾矣。俗谓之肠风，脏毒是也。其病身寒脉沉者生，身热脉浮者死。治法宜祛风消毒，解热凉脏，和血润燥为主。

钱青抡曰：肠风下血贵在节欲戒酒，方可除根。

朱丹溪曰：肠风独在胃与大肠，出血兼风者宜苍术、秦艽、香附、芍药之类。

冯鲁瞻曰：肠风者，邪气外人，随感随见，所以色清。脏毒者，蕴积毒久而始见，所以色浊。治肠风以散风行湿，治脏毒以清热凉血。又要看其虚实新久，新者实者，降之泻之；虚者久者，升之补之。夫血之在身有阴有阳，阳者顺气而行，循流脉中，调和五脏，洒陈六腑，谓之营血。阴者居于络脉，专守脏腑，滋养神气，濡润筋骨，若感内外之邪而受伤，则或循经之阳，血至其伤处为邪气所阻，漏泄经外，或居络之阴，血因留着之邪溃裂而出。则皆渗入肠胃而泄矣。世俗率以肠风名之，

不知风乃六淫之一耳。若肠胃受火热二淫，与寒燥湿怫郁其气，及饮食劳力，伤其阴络之血者，亦可谓之肠风乎？《针经》曰：阳络伤则血外溢而吐衄；阴络伤则血内溢而便溺是也。不可纯用寒凉药，必加辛散为佐，久之不愈，宜理胃气兼升举药。盖精气、血气，皆生于谷气，大便下血，多以胃药收功，从用苦寒，而不理脾胃，是绝气危生之下工也。

又曰：肠胃本无血，而有下血者，大肠之病也，大肠何以病下血，邪以感之也。盖阴络不伤，肠胃不虚，虽有外邪，亦不能患。惟醉饱房劳，坐卧风湿，恣啖生冷，以致湿热阴络受伤，外邪得以乘之。经云：阴络伤则血内溢而便血。又云：结阴者便血一升，再结二升，三结三升。此言阴气内结，不得外行，渗入肠间，乃寒湿生灾而阴邪之胜也。外邪者何？风、寒、暑、湿、热是也。风喜伤肝，肝伤则不能藏血而下者，醉后饮冷，寒饮内伤，血为寒凝，渗入大肠而下者；内外伤湿，湿伤凝胃，随气下流而致者；膏粱人厚味、酒色，藜藿人劳役过度，以致热积下焦而致者。然湿毒下血者，腹中不痛；热毒下血者，腹中多痛。更有内伤阳气不足，下焦之阴无元阳以维之而下血者，书所谓病人面无色，脉浮弱，平按之绝者，下血是也。有脾虚阳气下陷，不能统血，以致血随气降而下者。盖阴必从阳，血必从气，脾为气血生化之源，故必赖补中升阳，以胃药收功。有以先便后血者为远血，由足阳明随经入胃。先血后便者为近血，由手阳明大肠随经下渗。有以心肺为远血而属阳，肝肾为近血而属阴。以论者名为肠风脏毒，实非外感之风，肿热之毒之谓，盖阳明之气不能上越，下陷大肠，肠胃之脉随气虚陷，陷久则湿热蕴毒，随气陷而先至，其腹不痛，血清而色鲜者，名曰肠风。邪气外人，随感而见者也，谓之挟寒下血。后人因古方多用荆防升散而窒之，为风寒，非风也。

又曰：凡下血身凉血寒者生，身热血温者死。

肠风门主方

通治肠风主方《活人录》。

防风三钱 生黄耆 山药各一钱五分 茜根 槐米 秦艽各一钱

黄连五分 甘草三分

水煎空心午后服。防风佐黄耆，达清升之气以透表，山药、甘草和中益脾，使血无虚渗之虞。秦艽、茜根清风热以和血。黄连、槐米消蕴积之热毒。初起加炒黑荆芥、黄芩各一钱，去黄耆之骤补。日久加黑荆芥一钱，乌梅肉、升麻各五分。再久则加生地三钱，白芍二钱，升麻五分。以上气血未亏，火盛便燥，可服剪红丸，或犀角地榆丸。如脏毒加生地三钱，茜根、升麻、陈皮各五分，减防风一半，去槐米。日久气血两虚，加人参、白芍各一钱五分，当归头一钱，升麻、陈皮各五分，减防风二钱，去槐米、秦艽，服犀角解毒丸。如结阴便血，浮肿气喘者，加茯苓二钱，人参、桑皮各一钱五分，炮姜、车前各一钱，陈皮五分，减防风二钱，去槐米、秦艽、黄连、甘草，兼服结阴丸。

犀角地榆丸

犀角 黄芩 黄连 地榆 枳壳 槐米 当归 防风各等分 生地黄 乌梅肉 木耳各加倍

蜜丸。早空心滚汤吞服三钱。

犀角解毒丸

犀角 升麻 羌活 防风 甘草 荆芥 牛蒡子 连翘 土枸杞各等分 金银花 当归身 生地黄 白芍药各加倍

蜜丸。早空心滚汤吞服三钱。

肠风便血。壮实者宜。

槐角子五钱 黄连 陈枳壳 地榆 贯众各三钱

水煎服。昔潘大司马患此，孙文垣用此方治之，一服即止，书其方于壁间，遇有便血者，治之无不立愈。

大肠泻血《普济方》。

发灰五钱 鸡冠花 扁柏叶各一两

研细末。卧时酒调下二钱。来早以温酒投之，一服见效。

肠风下血秘方 豆腐末入袋滤出浆者，带渣取出，锅内炒燥研末，每用三钱，如下紫血块者，白糖汤下，红血块者，砂糖汤下。虽远年便血垂危者，每日用三次神效。

又方 唐云峰。陈莽麦面和健猪胆汁，为丸桐子大，每早空心开水送下三钱。

又方 昭隐寺浣尘和尚传。刀豆阴干，阴阳瓦焙，三钱，臭梧桐白根切片，三钱。煎汤调服。

又方 吳韻清。柿餅七个，用好醋一斤同煮，醋将干，取起晒干。每早用开水细嚼一个，服至三、四个即止。血痢亦效。

又方 怀德堂自验。

黄芩炒黑，四两研细 黑枣头半斤，煮烂去皮、核
和捣为丸桐子大，每早晚各服二钱，终剂即愈。

便血江仍度。

黄耆蜜炙 白术土炒黄色 茯苓神各二两 枣仁炒三两 当归身酒炒，
一两五钱 莲鼻酒炒，二十四个 粉甘草蜜炙七钱 山梔酒炒，六钱 远志肉
一两，去心，甘草水炒 地榆酒炒，五钱 姜灰四钱 元眼肉六两，煨烂，捣膏

共磨细末，用龙眼膏略加炼白蜜，和丸如桐子大，每早白汤送下四钱。冬月白蜜不妨多用，夏月白蜜宜少用。

便血方配京。茶馆内地下瓜子壳一撮煎汤，空心服，数次即愈。

肠风下血，久不愈者，兼面黄浮肿者。

蒲公英连根采来，洗净捶烂，青盐腌一宿，晒干收一斤 木耳炒黄存性 槐角
子炒黑，各一两 柿饼炒焦存性 鹿角胶各二两 陈棕煨灰五钱 川连一钱五
分

共为末。神曲糊丸，每服二钱，空心白汤下。

肠风下血，妇人血崩，男子血痔

扁柏叶 明矾各一两 月月红炒黑 陈棕煨 广三七各三两

共研细，炼蜜为丸，白汤送下一钱，或二钱。忌大荤。

肠风下血

青羊粪 秋后茄蒂各等分，俱焙黑

上研末。用荷叶汤打老米糊为丸，白汤送下二钱。

寒火疮门主论

王肯堂曰：寒火疮生肛门外，溃烂如破，时流脂水，每晚发寒，继如火燎，多痒少痛是也。《准绳》。

证曰：曾见江西班粮艘周姓患此，每晚必用矾末掺之，方能定痒安睡，想风湿相乘，湿邪化虫使然也。

脱肛门主论

林氏曰：或问方书云：脱肛有气虚者，有血虚者，有血热或火盛者，人患此四者甚多，何遂至于脱肛也？答曰：肛乃大肠之尽处，凡有形之糟粕从此而出，为人一身之门户，虚滑则滞下不收，枯燥则坚涩而难于转出，皆足以致病，而必责之于一气。盖凡有形之物，全赖无形之元气以转运出入，且肺与大肠为表里，而肺正统一身之元气，故人之登圉，亦由元气为之传导，使大肠有形之糟粕，得以传导而出，出已则清升之气复自下而上达于脏腑腠理四肢，是为常度。若脾肺久虚，气血亏损，则统运转输之机不利，全藉勉力努送而出。久久气滞，则肛门因之脱下矣。其次有病久气虚，气陷而自脱者；亦有气虚不能传导，而血随因之枯涩，于是努力挣脱者；有阳明燥火亢极而热结便燥难出，因用力强挣，火性下迫肛门脱出者；有老年血燥，或产后血虚，液燥结滞难下，气弱无力以送，勉强挣脱者；有久泻或久痢，气血两虚，湿热下陷于大肠，因而滑脱者；有小儿亦因泻痢气虚，湿火下迫而脱者。总由气血不和，失其转输传导出入升降之常度，则有是证。自在医者参其脉证，体其虚实以治之。《活人录汇编》。又曰：久病虚陷自脱者，脉必虚微无力，以补气升提为主；气虚血竭，努力挣脱者，脉必涩弱而虚数，当以益气之中，加补血润燥升清之剂；大肠实火燥结，肛门肿痛而下迫者，其脉洪大而数，或沉实有力，以清火解毒之中，佐以升提；老年产后，总由气虚血少，脉必涩数无力，当以滋补升提；久泻久痢，无论大小脉，必虚微沉弱，虽主补益升提；倘余病未清，则清补相兼。《活人录汇编》。

《医论选要》曰：脱肛治法，内宜温胃厚肠，收敛解毒之剂，外宜温汤频洗令和软，然后摩挲而入，则自愈矣。

冯鲁瞻曰：夫肺与大肠为表里，肛者大肠之门也，肺实则温，温则内气充而有所蓄。虚则寒，寒则内气馁而不能收。是以肠头出露矣。多得于久痢不止，里急后重，努力肛开，外风所吹而致者；或伏暑暴注洞泻，肠头不禁者；或禀赋怯弱，易于感冷，啼叫努气，大肠虚脱者。盖

泻痢未有不因风、暑、湿、热伤脾，脾虚则肺气即弱，大肠亦虚，土为金母，母虚不能生金，是以少被风冷，则肠头即为虚脱。治宜补脾温胃，使金受母之益而上升，次投固肠之剂。外用熏掺等方，若久出而坚者，先以温暖药汤浇软，渐渐纳入。

又曰：肛门为大肠之使，大肠受热受寒，皆能脱肛。且大肠者传导之官，肾者作强之官，酒色过度，则肾虚而盗泄母气，肺因以虚，大肠气无所主，故令脱肛。小儿血气未壮，老人血气已衰，皆有此证。

按丹溪所论，脱肛因气虚血虚者固多，亦有因气热血热者，宜兼脉候详察。气虚者补气，参、耆、术、草、制升麻之类；血虚者四物汤；血热者凉血，四物汤加炒柏；气热者条芩、升麻之类，并宜升提。

脱肛门主方

验方李常山。 梧桐叶煎汤熏洗。

提肛散 久痔气虚，肛门下坠及脱肛便血，脾胃虚弱。

人参 白术 川芎 黄耆 陈皮 当归 甘草各一钱 柴胡 升麻 条芩 黄连 白芷各五分

水煎，食远服，渣再煎。

通治脱肛主方《活人录》。

生黄耆三钱 人参 当归各一钱五分 白术 川芎 陈皮各一钱 柴胡 防风各七分 升麻五分 甘草二分

水煎，空心午前服。补中益气汤，加防风、川芎于至阴之中，升提清阳之气，达于腠理，不外地气上腾之义。若地气上腾，则天气自然下降矣。真气虚寒而自脱者，加附子五分；血枯液竭燥结下坠，及老年产后血燥者，加松子泥五钱，生地三钱，减黄耆一钱五分，去白术、川芎、防风，服益血润肠丸，或滋燥养血润肠丸。阳明燥火自亢，实热下坠者，加黄连一钱五分，生地三钱，白芍二钱，去参、耆、术、芎、防。服搜风顺气丸，或润下丸。脾胃气虚，泄痢而脱者，加茯苓一钱五分，白术、肉果各一钱，去芍归，服培元固本启脾丸，或香连固本丸。小儿久痢久泻，湿热下迫而虚脱者，加白芍一钱、黄连三分，减黄耆一钱五分，人参五分，去芍归，服香连健脾丸，或香连固本丸。

脱肛 人参、黄耆、当归身、升麻、川芎，水二碗，煎八分，食前服。血虚加芍药、熟地，血热加炒黄柏，虚寒加炒黑干姜。外以五倍子末托

而上之。

又方 剃头店荡刀旧青布煨灰，托之即上。

又方 以手托上，用烘热旧鞋底熨之即上。

又方 番木鳖子去壳取仁，用冰麝油磨汁扫上，即缩入。

因久痢脱肛 蜗牛烧灰，猪油和敷立缩。

脱肛因久患泻痢所致者 葱汤熏洗令软送上。或以五倍子末敷之，频频托入。或煎汤洗亦可。

又方 生鳖头烧存性研细，香油调敷托上。

小儿脱肛 黄狗一只，将绳捆狗四足后，将狗倒挂，候其口中流出粘涎搽上，其肛即收矣。

脱肛 白矾三分，童便二盏，炖热洗之即上。

龙骨散 小儿大肠虚肛门脱出。

龙骨二钱五分 诃子煨，去核 没石子各二个 赤石脂 罂粟壳去盖带穰醋炒，各二钱

为极细末。米饮调化，食前服。

伏龙肝散 治小儿阴证脱肛。

伏龙肝一两 鳖头骨五钱 百药煎二钱五分

为细末。用紫苏煎浓候温，和清油同敷。

又方 五倍子二钱，研 白矾一钱 同煎汤洗。

又方 木贼草烧灰存性为末，掺肛门上，按入即愈。

又方 浮萍为末干贴。

又方 陈壁土泡汤，先熏后洗。

粪门生虫，奇痒万状，以人之势进出而后快者，此乃幼时为人戏耍，乘风而入之，故见此怪证也。《石室秘录》。

脏头风门主方

蜜煎止痒丹《石室秘录》。

蛇床子 楝树根各三钱 生甘草一钱

共为细末。同蜜煎成，做如人势，导入粪门，听其自化，一条即止

痒而愈。

风疔门主论

《心法》曰：风疔者，乃风湿客于谷道，形如风癬作痒，破流黄水浸淫，遍体微痛，宜用如圣散治之。

冯鲁瞻曰：谷道痒痛，多因湿热生虫，欲成痔痿，宜以雄黄和艾烧烟熏之，或用桃叶一斤，蒸之极热，纳小口瓶中，坐熏立死。

风疔门主方

如圣膏

当归五钱 巴豆仁三钱

麻油八两熬枯，入黄蜡三两化尽，绢滤，入轻粉二钱，搅匀搽之。

股阳疽门主论

《心法》曰：股阳疽生于股之外侧，胯尖之后，其毒内搏骨节，脓深至骨，故漫肿不变色也。

股阴疽门主论

《心法》曰：股阴疽，一名赤施，发生于股内合缝下，近阴囊之侧，因偏在厥阴经，故名股阴也。

骑马痈门主论

骑马痈，皆由少年人不保重，或串花街柳巷，或贪倚翠偎红，忍精而战，耐饥而守，或将泄而提其气，或已走而再返其阳，或人方泄精，未经洗净，重与交合，皆足以生此恶毒也。治以七味圣神汤主之。盖此

毒乃乘虚而入，必大补其血，而佐以逐邪之品，则病去如失，否则婉转留连，祸不旋踵，与其毒势弥漫，到后来发散，何不乘其初起正气未衰，一剂而大加祛逐之为快哉！方中妙在用金银花，而以当归补血为君，人参为佐，大黄为使，重轻多寡之得宜也。《秘录》。

王肯堂曰：骑马痈，乃手足三阴经所司，毒在肾经，湿热流于大小肠分，热血积而为毒，缓治则成漏证，大小便俱从此出矣。此处不可用刀针，如用只可针一、二分，慎之慎之。

《心法》曰：骑马痈，亦名骗马坠，生于肾囊之旁，大腿根里侧股缝夹空中，由肝肾湿火结滞而成，此处乃至阴之下，医治不可过用寒凉药。

骑马痈门主方

七味圣神汤岐天师。

金银花四两 蒲公英二两 人参 当归 甘草各一两 大黄五钱
天花粉二钱

水煎服。一剂即消，二剂全愈，溃者三剂愈。

骑马痈已成脓者《新都治验》。

黄耆三钱 人参二钱 川芎 当归各一钱 白芷 防风 肉桂 甘草各五分

白水煎，一贴痛止，再服自溃，十贴肉生。

坐马痈门主论

《心法》曰：坐马痈生于尻骨略上，属督经，由湿热凝结而成，虚人患此，易于成漏。

上马痈门主论

《心法》曰：上马痈生于左臀之下折纹中。

下马痈门主论

《心法》曰：下马痈生于右臀之下折纹中。

涌泉疽门主论

《心法》曰：涌泉疽生于尻骨之前，肛门之后长强穴，属督经首穴，由湿热凝结而成。老弱患此，多成冷漏，难痊。

穿裆疽门主论

王肯堂曰：穿裆疽，生背之下极，属督脉及太阳经，由劳伤忧思积郁所致。宜速治，稍缓则溃烂难收敛。欲成漏者，多麻木黑陷。泄泻呕哕，疲倦者不治。《准绳》。

《心法》曰：穿裆疽生于会阴穴，在谷道之前，肾囊之后，此系皮囊空处，如痛连睾丸及腰背肛门。根深迟溃，腐伤尿管，属溺不能收敛者，至险。

槐角丸的临床新用

1. 牙痛

马居林运用本方加减治疗牙痛 30 例。先用 1 寸毫针针刺牙痛穴（掌背三、四掌骨间，掌指关节后 0.5 寸），进针半寸，强刺激，行针 1 分钟，留针 30 分钟，5 分钟行针 1 次，只针 1 次。再服用槐角丸，每次 1 丸（小儿酌减），早、晚饭后服用。连用 5 天为 1 疗程，共服用 1~4 个疗程。忌食辛辣之品，戒酒。结果：30 例患者均在服药 2 日后疼痛明显减轻，1~4 个疗程牙痛均止。1 个疗程内痊愈者 11 例，2 个疗程痊愈者 12 例，4 个疗程痊愈者 7 例，总有效率为 100%。

马居林. 国医论坛, 1995, (5): 40

2. 痤疮

运用本方治疗痤疮 62 例。取槐角丸 1 丸,温开水送服,早晚各 1 次,至痤疮全部消失后,再服用 1 周。服药最长 2 月,最短半月。结果:痊愈 49 例,有效 11 例,无效 2 例,总有效率为 96.8%。对其中 30 例随访观察 3~6 个月,疗效稳定。

谢延新. 陕西中医, 1999, (5): 227

3. 高血压病

运用本方加减治疗高血压病 63 例。方药:槐角 500 克,黄芩、地榆、枳壳、防风、当归各 250 克,制成小蜜丸。服用方法:1 次 10 克,1 日 3 次,开水送服。对高血压Ⅲ期病人加服复方丹参片,1 次 3 片,1 日 3 次。治疗期停用一切降压药,1 疗程 45 天。结果:显效 36 例,其中Ⅰ期 21 例,Ⅱ期 15 例,占 57.14%;有效 21 例,其中Ⅰ期 9 例,Ⅱ期 10 例,Ⅲ期 2 例,占 33.33%;无效 6 例,其中Ⅱ期 1 例,Ⅲ期 5 例,总有效率 90.47%。

董玉轩. 陕西中医, 2001, (10): 604

苦参汤的临床新用

1. 肛门湿疹

吴荣发运用本方加减治疗肛门湿疹 336 例。方药:苦参、白鲜皮、枯矾各 20 克,蛇床子、地肤子、艾叶、苍术、紫草各 15 克,冰片 15 克。随证加減:痒重者加防风、白芷各 10 克;潮红热痛漫肿者加蒲公英、土茯苓、紫花地丁、鱼腥草各 15 克;湿重滋水者枯矾倍量并加五倍子、黄柏各 15 克;病程久者加当归、桃仁各 10 克,赤芍 15 克。上药每剂煎 2~3 次(枯矾冲化),共得药液 2 500 毫升。每日熏洗 2~3 次,每次取药液 500 毫升,再兑热水至 2 000 毫升,先熏 20 分钟,待不烫时再坐浴 30 分钟。同时结合内服二妙丸合四物消风汤化裁,1 日 1 剂。结果:治愈 290 例占 86.3%,其中用药 3~6 剂治愈 197 例,7~9 剂治愈 93 例;显效 36 例,占 10.7%;无效 10 例,占 3.0%。总有效率 97.0%。

吴荣发. 实用中医药杂志, 2001, (3): 35

2. 阴囊湿疹

任新胜运用本方加减治疗阴囊湿疹45例。方药:苦参10克,银花10克,连翘10克,野菊花10克,车前草15克,泽泻10克。痒甚者加白鲜皮、地肤子;焮热疼痛者加黄芩、黄柏;滋水淋漓者加木通、茯苓;大便干结者加生大黄;大便溏薄加淮山药、白扁豆。上药煎汁内服,1日1剂,药渣再煎取汁外洗患处。结果:本组45例均获治愈,其中用药3剂治愈者12例,4~6剂痊愈者20例,7~10剂痊愈者10例,10~15剂痊愈者3例,治愈率为100%。

任新胜. 实用中医药杂志,1997,(6):13

3. 宫颈糜烂

沈继成运用本方加减治疗宫颈糜烂102例。方药:苦参30克,蛇床子15克,土槿皮20克,地肤子20克,白鲜皮20克,白花蛇舌草20克,川椒10克,黄柏10克,上药每日1剂,加水500毫升,煎汁200毫升,加入食醋50毫升再煎沸。然后趁热用药液熏洗外阴和阴道,每日1~2次,每次30分钟,7日为1个疗程,治疗2个疗程。结果:全部获效,其中治愈46例,显效38例,有效18例。

沈继成. 中国民间疗法,2003,(5):53

4. 痔疮发炎疼痛

韦麟运用本方坐浴治疗痔疮发炎疼痛322例。方药:大黄30克,苦参30克,土茯苓60克,五倍子30克,芒硝15克(冲溶)。每日1剂,水煎2次取药液兑匀,分取适量药液坐浴,每日2~4次。坐浴时药液温度保持在40~50℃,并以手指按摩肛周及擦洗肛门部位,每次坐浴30分钟。治疗期间忌食辛辣刺激食物。结果:经治疗后315例单纯用大黄苦参汤坐浴,即可使痔疮发炎疼痛及伴随症状消失,判为有效;另7例治疗后疼痛及伴随症状未见明显减轻,须结合服清热解毒中药或抗生素治疗方能缓解,为无效;总有效率97.8%。

韦麟. 中国民间疗法,2002,(11):25

5. 慢性乙型肝炎

唐长金等运用本方加减治疗慢性乙型肝炎193例。方药:当归10~15克,贝母10克,苦参15~30克。无明显症状似无证可辨者加柴

胡、白术、丹参、茜草；湿热者加茵陈、柴胡、连翘、蒲公英、益母草；黄疸者加柴胡、茵陈、秦艽、郁金；牙宣及其他出血现象者加茜草、丹皮；气虚者加仙灵脾、黄芪或党参、太子参；阴虚者加天花粉、白芍、百合、女贞子；纳差厌油者加生山楂、生麦芽；肝区痛者加葛根、郁金；脘腹胀满是慢性乙肝常见症状，根据其发作时间、部位、性质，可选用理气药制香附、青皮、川楝子、佛手、川厚朴中一味，必须伍用蒲公英。所加药物皆为常用量。结果：经3个月治疗后肝功能轻度97例，中度84例，皆恢复正常；重度12例中8例恢复正常，4例因其他原因转住院治疗，未见恶化及死亡者。经检测的83例中有29例转阴（占34.94%），经复检的193例中有77例转阴（占39.90%）。

唐长金，等. 安徽中医临床杂志，1997，（6）：302

6. 痱子

徐桂和运用本方外用治疗痱子32例。方药：苦参、升麻、白鲜皮、生地各20克，土茯苓、野菊花、黄柏、蛇床子各15克，山栀、荆芥、防风各12克，蝉蜕6克。将上药用布包好，加水2500毫升，煎沸15分钟，过滤外洗患处（温度以皮肤耐受为宜），自上而下，日2~3次，每次30分钟，一剂可反复温煎使用2~3次。并注意保护皮肤清洁。结果：患者全部治愈，其中复发者3例，仍按上方治疗，亦收到良效而治愈。

徐桂和. 中医外治杂志，1998，（4）：36

7. 顽固性霉菌性阴道炎

洪波运用本方加减治疗顽固性霉菌性阴道炎38例。方药：苦参30克，蛇床子20克，地肤子20克，白鲜皮20克，白头翁20克，薄荷10克。上方加水2000毫升，浸泡15分钟后，武火煮沸5分钟入薄荷，续煎10分钟，隔渣倒出药液，乘热熏蒸外阴部，待水变温后坐浴15~20分钟，每日1~2次，连续10天。结果：痊愈33例，占86.8%；好转4例，占10.5%；无效1例，占2.6%。总有效率97.4%。

洪波. 实用中医药杂志，1997，（4）：22

8. 疥疮

李丕玲运用本方加减治疗疥疮100例。方药：苦参、土茯苓、白鲜皮、地肤子、野菊花各30克，明矾、黄柏、百部、苍术、花椒、狼毒各20

克。上方水煎取汁 1 000 毫升,用煎液外洗,每晚 1 次,每剂洗 3 次,连续洗 6~10 天。皮肤搔破者外敷生肌散、红霉素软膏。结果:痊愈率达 98%。其中 10 例并发火毒,外敷生肌散、红霉素软膏,每天 1 次,1 周后痊愈。

李丕玲. 湖北中医杂志, 2000, (7): 38

9. 外阴白斑

刘艳秋运用本方加减治疗外阴白斑 20 例。方药:黄柏 15 克,苦参 30 克,苍术 15 克,荆芥 12 克,蛇床子 30 克,丹参 6 克。可治疗增生型外阴营养不良。对硬化苔藓型营养不良,可去掉黄柏加黄芪 15 克,去掉丹参加赤芍 6 克,莪术 10 克。每 1 疗程为 10 天,1 日 2 次坐浴,治疗期间嘱忌食辛辣等食物。结果:治愈 16 例占 80%,显效 3 例占 15%,总有效率 95%,无效 1 例占 5%。用药 1 个疗程痊愈 10 例,2 个疗程有效 9 例,仅有 1 例效果不佳。

刘艳秋. 实用中西医结合杂志, 1995, (6): 343

10. 皮肤瘙痒

周美芹等运用本方加减治疗皮肤瘙痒 62 例。方药:生龙骨、牡蛎各 30 克,苦参 15 克,乌蛇 15 克,白鲜皮 25 克,生地 30 克,蝉衣 10 克,白蒺藜 15 克,炒枣仁 15 克,甘草 10 克。血热者加赤芍、丹皮;血虚者加当归、黄芪;血瘀者(病久皮肤粗糙、增厚、色素沉着)加桃仁、红花,1 天 1 剂,水煎 2 次,混合后早晚分服。服药间,忌食腥、膻及辛、辣食物。无明显改变者为无效。结果:痊愈 25 例,显效 31 例,有效 5 例,无效 1 例,有效率 98.39%。

周美芹,等. 青岛医药卫生, 1997, (4): 38

11. 外阴尖锐湿疣

唐成桂运用中西医结合治疗外阴尖锐湿疣 50 例。对疣体进行切除或者电灼治疗,予加味苦参汤水煎熏洗外阴,每晚 1 次,同时病灶局部涂复方氟尿嘧啶糊剂,每晚 1 次,不要伤及正常皮肤及黏膜;次晨于病灶及周围涂乙酚糊剂 1 次,全部患者均以 10 天为 1 个疗程。结果:所有患者均治愈,其中 1 个疗程治愈 25 例占 50%,2 个疗程治愈 15 例占 30%,3 个疗程治愈 10 例占 20%。

唐成桂. 现代中西医结合杂志, 2004, (14): 1900

12. 灰指(趾)甲

许进秀等运用本方加减治疗灰指(趾)甲 24 例。外洗方取百部 20 克, 苦参 30 克, 徐长卿 30 克, 白鲜皮 30 克, 蛇床子 30 克, 大黄 20 克, 黄柏 20 克, 黄连 15 克, 葱 3 根, 加米醋 2 000 克, 浸泡 1 周即得。治疗时以此药液浸泡患处, 每日 3~5 次, 每次 20 分钟, 1 周为 1 疗程。用药期间, 忌食辛辣腥膻等刺激之品, 且不得接触碱性肥皂等刺激性物质。结果: 病程最短 1 个疗程, 最长 3 个疗程。治愈 18 例, 好转 6 例, 无效 0 例, 总有效率 100%。

许进秀, 等. 甘肃中医, 2001, (1): 47

13. 痤疮

马俊等运用本方加减治疗痤疮 38 例。方药: 大黄 6 克, 苦参 15 克, 女贞子 10 克, 旱莲草 10 克, 苡仁 30 克, 甘草 6 克。胃肠湿热型加山栀子 10 克, 龙胆草 6 克, 泽泻 10 克, 柴胡 8 克, 黄芩 8 克; 阴虚燥热型加生地 15 克, 玄参 15 克, 麦冬 10 克, 山萸肉 10 克。血瘀痰凝型加丹参 15 克, 桃仁 6 克, 红花 3 克, 浙贝 10 克, 牡蛎 30 克。每日 1 剂, 水煎, 分早晚服。亦可用棉纱沾药汁外敷患处, 每日 2 次, 7 天为 1 疗程, 治疗 3 个疗程统计结果。结果: 治疗 38 例, 临床治愈 29 例; 显效 5 例, 有效 2 例, 无效 2 例; 总有效率为 95%。

马俊, 等. 广西中医学院学报, 1999, (2): 62

14. 斑秃

潘权运用本方加减治疗斑秃 21 例。方药: 苦参 10 克, 鲜侧柏叶 30 克, 何首乌 5 克, 鸡血藤 10 克, 三棱 5 克, 白术 5 克, 卷柏 10 克。取上述药加水 1 500 毫升, 煎沸 20 分钟即可, 然后熏洗患处 10~20 分钟, 隔晚 1 次, 连用 3 个月以上。结果: 毛发如常痊愈者 14 例, 占 66.7%。脱发部位有毛发再生, 毛质如常, 但仍有少量皮斑者 6 例, 占 28.5%。无效者 1 例, 占 4.8%, 总有效率为 95.3%。

潘权. 哈尔滨医药, 2003, (5): 41

卷之十

腿膝部

自胯至腿膝湾止，一切痈疽、疔毒，皆汇于此部中，以便检阅参治。

骨痿疮门主论

申斗垣曰：骨痿疮，乃足少阳胆经多气少血，其疮生于两胯，骨上渐大，筋骨俱痛，荫开流水，水尽则死。如胯间相对生疮者，十无一生，用大马屁勃垫睡，莫令磨着，内服补中益气汤。《启玄》。

腿游风门主论

王肯堂曰：腿游风，腿股忽然赤肿，风热相搏，属足太阳经，宜砭去恶血。《准绳》。

《心法》曰：腿游风在两腿。忽里忽外，忽上忽下不定，红色形如堆云焮痛，由荣卫风热相搏结滞而成。凡遇此证，先施砭石，砭去恶血，外贴牛肉片以拔风甚效。

肚门痛门主论

《心法》曰：肚门痛生于大腿肚，属足太阳膀胱经所主。

上水鱼门主论

《心法》曰：上水鱼生委中折纹两梢，肿如高埂，长若鱼形，色紫作痛，由血热遇外寒稽留，则血瘀凝结而成。外宜向肿埂上砭出恶血，用二黄散即颠倒散香油调敷，甚效。

黄鳅痛门主论

申斗垣曰：黄鳅痛，生于大腿外侧连臀处，有一条如鳅形，深陷窄长，或不见红肿，坚硬如石，约长七八寸，大者为头，小者为尾。鳅头向上者防毒内攻小腹，难治，鳅头向下，毒虽凶不伤命，名为顺证。凡医必寻其头，用三棱针先针住鳅肚，次针鳅尾，再用小针针住鳅头两边，常用艾灸三十壮，左右转针，先起尾针，视鳅形不动，是鳅已死。如动再依前法灸之。内服内托流气饮，或真人活命饮，外以姜汁猪胆汁好醋同调，铁箍散敷之。《启玄》。

《心法》曰：黄鳅痛生小腿肚里侧硬肿，长有数寸，形如泥鳅，其色微红，由肝脾二经湿热凝结而成。如期溃出稠脓者吉，如溃流污水败浆者凶，治同痈疽。《金鉴》。

王肯堂曰：胫阴疽，又名黄鳅痛。生足小肚内侧，微红微肿，坚硬如石，三、四寸许，痛楚难禁，足太阴与足厥阴二经湿热，又积愤所致。若过时溃出清水，虚火上升，呕吐不食者，不治。《准绳》。

大腿痛门主论

陈远公曰：有腿上忽肿一块，其色如常不疼，人以为痈疽也，谁知气虚之故乎！夫痈成于肿，未有肿而不变为痈者，予谓气虚非痈，人谁识之。嗟乎！气所以行血者也，气行则血行，总有邪气，断难成肿，彼邪气之盛，每成于气血之衰，其肿为痈，每每作痛，色必变红赤也。今

即不疼，色又不变，是有肿之名，无肿之实，全是气虚血无以养，非邪盛而气不能鼓也。治法补气以扶正，不必化毒以祛邪。用补中益气汤：人参五钱，白术一两，生黄耆一两，当归五钱，柴胡一钱，升麻五分，陈皮一钱，生甘草二钱，半夏二钱，茯苓三钱。水煎服。十剂肿消，此方益气圣药，非消毒之剂，何以用之消肿耶？盖真气夺则虚，邪气盛则实。真气既虚，邪气益盛，不用补气，气何以行，肿何以化耶！此方补气即所以消肿也，况益以化痰去湿之品，故更易收功耳。《冰鉴》。

冯鲁瞻曰：腿痲者，发于内侧，属肝脾二经，发于外侧，属胆胃二经。平陷坚硬者为气虚，当用内补黄耆汤；势焮肿痛者，当用内托柴胡汤，外用蒜灸。《锦囊》。

申斗垣曰：阴包毒，在大腿内，是足厥阴肝经风热之毒，宜黄耆柴胡汤，此汤治腿内近股痲疽，大有神功。《启玄》。

窦汉卿曰：胝疽在腿内侧，肿高而硬，俗言此疽坚硬无脓，殊不知内脓已成，一时不能透出皮肤，须用内托方溃，脓急宜针。

冯鲁瞻曰：腿前廉为阳明，白芷、升麻为引；后廉太阳，羌活、防风为引；外廉少阳，柴胡为引；内廉厥阴，青皮、吴茱萸为引；内前廉太阴，苍术、白芷为引。治无遗法矣。

附骨疽门主论

陈实功曰：附骨疽，乃阴寒入骨之病，凡受者皆由体虚之人，夏秋露卧，寒湿内袭，或房欲之后，盖覆单薄，寒气乘虚入里。初起寒热交作，状似风邪，随后臀腿筋骨作痛，不热不红，疼至彻骨，甚者曲伸不能转侧，日久阴变为阳，寒化为热，热甚则腐肉为脓，此疽已成也。初起万灵丹发汗散寒，通行经络；次以大防风汤行经活血，渗湿补虚；如生于尻臀部位，漫肿作痛者，内托羌活汤；腿内近膝股漫肿木痛者，内托耆菴汤；腿外侧者内托酒煎汤；虚者十全大补汤加羌活、牛膝、防风、防己；如已成欲作脓者，附子八珍汤；脓成胀痛者针之，切不可误用损脾泄气败毒等药。外忌寒凉敷搽，误治必致冰凝气血，内肉瘀腐，日久化为污水败脓，流而不禁，大腿渐渐肿如冬瓜，上过胯腹，下连足底，牵连

漫肿，皮色不红，日久溃脓，色白腥秽，肿仍不消，痛仍不减，元气日衰，身体缩小，唇舌干焦，二便枯秘，饮食不进者，终为不吉。《正宗》。

冯鲁瞻曰：如环跳穴即胯眼，及脚跟彻痛不已，外皮如故，脉沉数或滑者，防生附骨疽。乃三阴经虚，寒湿流注，毒气附着于骨而成。究竟有何毒气，乃肾经阳和之气不足，故肾部隧道骨缝之间，气不宣行，阴血凝滞，内郁湿热，为溃为脓，所以有久服八味丸，令人无骨疽之语，谓骨暖气行血无壅滞，毒何生焉。《锦囊》。

又曰：凡一切附骨痼疽，皆起于肾，肾主骨，治宜温补肾气，骨得阳和则肿硬自能冰解矣。

李东垣曰：附骨疽者，以其毒气深沉附着于骨也，此疾与贼风相类而不同，人能辨此，庶无误焉。盖附骨疽者，由秋夏露卧，为冷折之，风热伏结，附骨成疽。贼风之候，由风邪之气搏于骨节，故其痛深彻骨髓，遇寒则痛甚，附骨疽痛而不能转侧，初按之应骨，皮肉微急，洪洪如肥状是也。其贼风，皮骨不甚热，而索索恶寒，时复汗出，常欲热熨痛处，即得少宽；其附骨疽，初时但痛无时，乍寒乍热而无汗者，经久不消，极阴生阳，寒化为热而溃也。贼风不治，久而变为挛曲偏枯，所以不同也。

窦汉卿曰：附骨疽，又名贴骨疽。初起用箸头按患处，极痛是穴，以墨点定灸百壮为率，不拘壮数，总以艾壮爆起，乃其验也，可不必多灸矣。大法初宜灸之，方可保命，若待脓成，然后火针刺之，百人之中，能生几何？

又曰：骨疽之发，皆由血凝气滞，彻骨酸疼，或房事过劳，或乘虚入水感风合寒，或风毒邪热侵乎荣卫，或忧郁伤于心、肝、胆、肾，或醇酒炙煷，是以肿痛，日久成脓。初起宜灸百壮，以骨热为度，久则宜用银针破之，血脓乃元气盛易愈，白脓乃气弱难愈。治法以独活寄生汤，兼服十全大补汤倍加茅苍术、新昌白术及肉桂、干姜、人参、黄芪、当归为先锋之要剂，治之无不愈者。外用肉桂、干姜、白芷、防风、苍术、乌药、龟板酥炙、五倍子、陈小粉各等分，为末。加麝香少许和匀，老姜汁五合，醋三合，葱半斤，蜜一两，同捣取汁，火上熬滚，乘热调药搽患处四围，空中出毒气，时用余汁煎热润之，以助药力，少劳戒气，绝欲除想，

十旬方愈。若病人不遵从医师之训，任一己之见，恣情傲物，忧虑万端，不能制六气七情之私，虽天医院灵官，亦不能治，何况中医乎！

胡公弼曰：贴骨疽，即附骨疽，生大腿外侧骨上，高不见高，肿不见红，痛深至骨者是也。《青囊》。

陈实功曰：初起通用人参败毒散加木瓜、牛膝、苏木、红花；虚者十全大补汤加羌活、防己、牛膝；已成欲作脓者，附子八珍汤；脓成针之，体实脓黄，十全大补汤；体弱脓清，保元大成汤。

又曰：又有风湿相乘之证，初起寒热交作，次传腿肿作痛，其形光亮微红，发热肿痛，按之如泥不便起者，宜当归拈痛汤。

又曰：又有房欲伤寒受热互变，气血乖违，经脉横解，受病日深，此等证候，皆由元气不足中来，切不可误用寒凉。

胡公弼曰：附骨疽，皮色不变，势不高阜，微觉痛痒，经久不溃，又无脓血者，发于骨髓，肾主骨，肾经虚惫，寒邪易入，入则骨气冷而患成疽毒，紧附骨而外无形证，是疽之根原起于肾也。宜用八味丸，多加附子以温肾气，更以十全大补汤助之，肾气一温，骨不寒而毒势外出，则疽不附骨，病者自得生机矣。《青囊》。

汪省之曰：附骨疽，乃流注之败证也。如用凉药，则内伤其脾，外冰其血，脾主肌肉，脾气受伤，饮食必减，肌肉不生，血为脉络，血既受冰，则血气不旺而愈滞，宜用甘温大补脾气，脾气一健则中州不寒，而生机畅达，肌肉自长，气血自运行矣。《理例》。

按《准绳》等书咸云，伤寒汗后余邪成流注，流注之坏证成附骨疽。夫汗后流注易愈，惟失治乃为坏证不能复生，似不能变成附骨疽。况附骨疽系调治可愈之证，若果数变之后，则坏而又坏矣，又岂能复有成功乎！是流注坏证变成附骨疽之说，存而不论可也。

附骨疽门主方

雷火神针 治风寒湿毒袭于经络为患，漫肿无头，皮色不变，筋骨疼痛，起坐艰难，不得安卧者，用此针之。

蕲艾三钱 丁香五分 麝香二分

药与蕲艾揉和,先将夹纸筒如指拇大,用艾药叠实收用,临用以萧山纸七层,平放患上,将针点着一头,捺实,待不痛方起针,病甚者再复一次,七日后火疮大发,自取功效矣。

追风逐湿膏 治风寒暑湿相伤,以致骨节疼痛,筋挛不能步履,或麻木湿痹等证,并效。

豨薟草 川乌 天南星 羌活 草麻子打碎 半夏 海风藤 草乌 真桂枝 麻黄各三两 茅苍术 独活 当归 白芷 大黄各一两 北细辛一两

以上药咀片,用葱汁姜汁各二碗拌药,先浸一宿,次日用香油半斤,同药入锅内慢火煎至葱姜二汁将干不爆时,再下香油十斤,方与药相煎渣枯为度。细绢滤清,每油一斤,下飞过炒黄丹十两为准配用;再将前油入锅内煎滚,以油滴水成珠,不散方下黄丹,徐徐搅入其膏;已成再下研净松香末一斤四两,再同熬化,取下锅来,以盆顿稳;再下乳香、木香、胡椒、轻粉各二两,白芥子末四两,渐入搅和极匀,倾入钵内收贮。旋用热汤顿化,绫绢摊贴,七日后诸病可痊,百发百中。

附骨痛将成,用此法即散。其法急掘地坑,以火煨红,沃以童便,赤体坐其上,以被席围抱下截,使热气熏蒸,腠理开,气血畅,毒气解而自愈。

·洗寒湿腿痛

真川椒一钱 蕲艾四两 透骨草一两 煎汤洗。

附骨疽

古铜钱刮末,三分 黄蜡三钱 油核桃肉六个

捣碎和匀,软豆腐衣包好。用酒空心送下。

贴骨痈疽并寒湿气疼痛

川乌河水换煮七次 草乌河水换煮七次 甘草 羊角尖炙研 番木鳖用麻黄五钱煎汤泡一宿,去毛、切片,土拌炒脆 土木鳖去壳,净肉切片,香油炒脆,各一两

共为细末,用赤沙糖打糊为丸如绿豆大。每服一钱,无灰酒送下。

鹤膝筋骨肿痛

熟附子一两 全蝎 黑豆各四十九粒 八角川乌一个 蚯蚓劈开翻新瓦上晒干，一两

研细末，糕糊为丸。每服一钱，温酒送下。

多骨疽门主论

陈远公曰：有大腿边旁长强穴间忽疼痛高肿，变成痈疽，久则肉中生骨，以铁箝取出，已而又生，人以为多骨痛也，谁知是湿热毒所化乎！夫多骨痛之生，因人多食瓜果，湿热所成者也，早治一、二剂便可解散，无如因循失治，以至湿壅添热，热盛而化骨，日久迁延，卧床不能起也。说者谓初起时未尝有骨，可以内散，既生骨后，必须烂骨，外取未可全恃，解散谁知不然，盖多骨证无形所化，非肉中真生骨也，似骨而非骨耳。真骨难化，似骨又何难化之有，治法利湿清热，而主之补气血之药，骨自消矣。五神汤：茯苓一两，金银花三两，牛膝五钱，紫花地丁一两，车前子一两。水煎服。二剂轻，三剂骨消，四剂疮口平，五剂痊愈。此以车前、茯苓利水，地丁清热，牛膝、银花补中散毒，安得不奏功哉。《冰鉴》。

王肯堂曰：多骨疽，又名曰剩骨，又名朽骨。生足胫上，生疽既溃甚久而不愈，腐烂出骨者是。盖因毒气壅盛，结成此骨，非正骨也。此疽因未溃之前，补剂太过，故结毒而不散也。《准绳》。

岐天师曰：多骨疽，乃生于大腿之中，多生一骨者是，乃湿热而生者也，治之得法，则易易耳。否则变生可畏，治以化骨至神丹即愈。苟或失治，即长一骨，横插于皮间作痛，必须取出此骨始愈，以铁铗钳出之，外以生肌膏贴之。此方妙在用白芍，盖白芍能平肝木，又能活筋。多骨疽者非骨也，筋变为骨，似骨而非骨也。白芍不特平肝木之火，兼能散肝木之邪，邪去则筋舒，筋舒则似骨非骨者尽化，又加金银花，原能去毒，此二味之所以相济也。《秘录》。

雷真君曰：大凡毒生环跳之穴，即多骨疽也。

张仲景曰：多骨之生也，虽生于湿热，而成之不由湿热也。必平时喜饮凉水，好食果品而成之，初起宜消毒散敷之。

陈实功曰：多骨疽者，由疮溃后久不收口，乃气血不能运行至此，骨无营养所致，细骨由毒气结聚化成，大骨由受胎时精血交错而结，日后必成此疽也。但肾主骨，宜服肾气丸、十全大补汤，先补脾肾，次用艾附饼灸之，令温暖腐毒，朽骨自然脱尽，生肌敛口而愈。《正宗》。

汪省之曰：多骨疽，患一、二年不愈，常落出骨一片，或细骨或有蛀蚀眼，或三五个月，落骨一片，此骨非营气不从而生，乃母受孕复感精气而成。《理例》。

《心法》曰：多骨疽毋论老小，皆有生者，多在腮腮、牙床、眼胞、颊下、手足、腿膊等处。有因肾虚之人，生疮久硬不消，口不收敛，外被寒邪袭入，与脓毒凝结于中，借人之气血化成多骨者。又有初生落草，肌肉之中按之如有脆骨，由胎元受之，精血交错而致。迨其人长大后，必于脆骨之处，突然发肿而生疽，及溃后多骨脱出，其口方收。亦有多骨出之不休者，名曰骨胀，难愈。以上二因，治法皆同，俱用隔附子并艾灸之，以宣寒凝，令骨速脱。盖骨属肾，遇寒则凝，故从热治也。

多骨疽门主方

固本养荣汤 治骨疽已成，骨不吐出，或既出不能收敛，由气血之虚，脾胃弱也，宜服之。骨不出者自出，口不敛者自敛。

大熟地 当归 白芍药 川芎 牡丹皮 人参 山萸肉 白术 怀山药 黄耆蜜炙，各一钱 北五味 炙甘草 肉桂各五分。

水二盅，姜三片，枣二枚，煎八分，食前服。

生肌散 治腐骨脱出，肌肉生迟，不能收敛者。

石膏 赤石脂 轻粉各一两 滴乳香去油，一钱 潮脑 瓜儿竭 龙骨各三钱

上乳极细末，先用当归、白芷、甘草各一钱煎汤洗净患上，用此干掺，软油纸盖扎，二日一洗一换。

化骨至神丹 岐天师。

金银花 当归 白芍药各一两 茵陈 龙胆草 白术 生甘草各三钱 柴胡一钱 水煎服。

消毒散张仲景。治多骨疽初起,并敷一切痈疽疔毒,无论有骨无骨,用之神效。凡疽生于环跳之间,不用此围药,多成多骨疽,用此药则可免多骨之患。

芙蓉叶晒干 大黄 五倍子各一两 藤黄 生明矾各三钱 冰片 麝香各三分

各为末。米醋调成如厚糊,涂于多骨疽之左右四边,以药围其皮肉,中留一顶如豆大;外以醋用鹅翎不时扫之。若不扫,任药干,围则无益矣。一日夜即内消。

内消神方雷真君。

人参 天花粉各三钱 大黄五钱 蒲公英一两 金银花二两 薏苡仁三两

先用水六碗煎薏苡仁,取汁三碗,投药再煎三碗,分作二次服,一日服两剂,即消,神效。

咬骨疽门主论

陈实功曰:咬骨疽,发在大腿内股,不肿不红,痛彻骨髓,初宜雷火针针之,内用万灵丹以酒调服之。《正宗》。

箕门痛门主论

汪省之曰:箕门痛生于股内近膝,乃是太阴脾经湿毒所生。《理例》。

又曰:骨毒滞疮,又名腿发。乃是太阴脾经,生于腿上箕门穴。如痛可治,不痛难治。十二日可刺,如脓黄赤色可治;青稀腐臭者不治。其疮赤白色,是骨毒气发于外,十日内未脓,必死。

肉蜈蜂门主论

申斗垣曰:肉蜈蜂生大腿外面,皮肤不觉红肿,内里疼痛难忍。治

斯证者,切不可轻用刀刺,若误犯之,毒气直透心胸,疼痛不止,多致不救。治当用白降丹掺膏药上贴,三日后取下,败肉如蜂之状。再用生肌等药收功。《启玄》。

胡公弼曰:肉蜈蜂所生之处,乃足厥阴肝经部位,风湿郁积,气血阻滞,注久而成此毒。一犯刀刺,蜂毒直入心胸,母传子受,肆毒无忌,直犯君主,故多不救。《青囊》。

玄疽门主论

陈实功曰:玄疽生于左腿夹缝之下三寸,漫肿连阴,疼及大腿。《正宗》。

阴疽门主论

陈实功曰:阴疽生于右腿夹缝之下三寸,痛连肾子,小腹亦痛。《正宗》。

膝盖痛门主论

《心法》曰:膝痛生膝盖,色红焮肿疼痛,属气血实,庇疽亦生在膝盖,肿大如痛,其色不变,寒热往来,属气血虚,和软为顺,坚硬如石者逆。经云:肉之小会为溪,溪者二肘二膝四腕也。凡脾病在溪,肾有邪其气留于两腰,凡筋病皆属于节,筋乃肝之余,故又属肝,是以溪会有病,皆从脾肾肝三经邪气乘之也,惟两膝俱生,属败证,不可治也。

膝眼毒门主论

申斗垣曰:膝眼毒,先必膝眼酸痛,乃成此证,乃肾经感受风邪,寒湿相侵而成。《启玄》。

汪省之曰:膝外痈是足少阳胆经,膝内痈是足太阴脾经,俱多气少

血，乃膝间枢纽，骨节行动之处，宜仔细治之，免成废疾。《理例》。

王肯堂曰：托疽生于膝傍腿侧，乃足少阳胆经，多气少血。阳关穴、阳陵泉穴肿焮作痛，半月有脓可治；如不痛出鲜血，或出青黑脓，及长出头渐多，或肿无定处者，不治。《准绳》。

《灵枢》云：发于膝名曰疵疽，其状大，痛色不变，寒热而坚，勿石之，石之者死。须其柔乃石之者生。坚如石者，用生樟六根擦之效。书曰：诸痈疽之发于节而相应者，刘涓子云：应者内发透外也。不可治也。发于阳者，百日死。阳谓诸节之背。发于阴者，三十日死。阴谓诸节之膈郛间。

膝眼风门主论

《心法》曰：膝眼风生于膝眼穴，又名鬼眼穴，在膝盖之下，左右两骨空陷中。由下焦素虚，外邪易于侵袭，先从膝眼隐隐作痛，如风胜则其痛走注不定，寒胜则痛如锥刺，湿胜则肿胀曲不能伸，其病在筋，伸不能曲，其病在骨，动移不遂，沉寒痼冷之候也。惟在临证详辨：单膝生者轻，双膝生者重。若左膝方愈，复病右膝；右膝方愈，复病左膝者，名过膝风，属险。

鹤膝风门主论

王肯堂曰：两膝肿痛，股渐小，曰鹤膝风，一名鼓椎风。起于中湿，或因痢后脚弱缓，痛不能行履，名曰痢风。或伤寒余毒，不能发散，风寒湿气结于经络，血脉不流以致筋愈缩而股愈细，属足少阳、足阳明经。《准绳》。

又曰：膝上肿痛，此非一端，须要辨明，若两膝内外皆肿，痛如虎咬之状，寒热间作，股渐细小，膝愈肿大，名鹤膝风。急宜隔蒜灸，服大防风汤倍加乳香以住痛舒筋。但一膝痛引上下，不甚肿而微红，名膝游风。膝之两旁肿痛，憎寒壮热，昼夜偏剧，肿处手不可近，为膝眼毒。膝盖上肿痛者，属膝痈。《准绳》。

又曰：膝内腠近折纹之处，结核肿痛，但核形长如鱼之状，名上水

鱼。

陈实功曰：鹤膝风乃三阴亏损不足之证，上下腿细，惟膝眼肿大，状如仙鹤膝行。初起寒热交作，亦宜汗解，如汗后肿痛仍不见消，此阴寒深伏，以大防风汤温暖经络，重者兼灸膝眼二穴，敷以琥珀膏，亦可渐渐收功。如以上诸法治之不效，终成痼疾，不必勉强消之。只宜先天大造丸，史国公药酒常常服之，或可转重就轻，移步行履，尚可图也。《正宗》。

岐天师曰：此乃因湿而战，立而行房，水气袭衣，故成此疾。《秘录》。

李子永曰：鹤膝风，古人多用大防风汤，内气血药并用，以病在下焦阴分故也。如岐天师除去血药，想用宜于初起之时，如病久古方恐不可废。

冯鲁瞻曰：膝间肿痛不消，防成鹤膝风，以膝肿如鹤足胫细，脉多弦紧是也。乃三阴经虚寒湿流注为患。人多误为湿热，乃至脓成，气血大亏，已不可救矣。不知此证与附骨疽俱肾虚者多患之。因真气衰弱，邪气得以深袭，前人用附子者，以温补肾经，又能行药势散寒邪也。故体虚之人，为冷气所袭，经久不消，极阴生阳，寒化为热而溃也。若误用寒凉，必成废疾，或挛曲偏枯，或痿弱不起，或坚硬如石为石疽，或日久始溃，皮肉俱腐为缓疽，下部道远，非桂附不能下达也，况肾主骨，而臀以下俱属肾，非桂附不能入其经而宣行也。《锦囊》。

《可法良规》云：鼓椎鹤膝起于中湿，盖足膝属肝，肝有风寒湿气，则血脉阻滞不能流行，注膝成病，下股之血脉有去而无返，是以愈瘦愈冷而筋愈缩，上腿之血脉有积而无散，是以愈肿愈热而肌愈削，其源若起于流注，则肉凝者必烂，烂则冷毒腐骨，腐骨一出，神仙无术，遂成难治废疾。当皮肤未破之时，则肌肉尚未死，急以玉龙膏热酒调敷膝之上腿，回接阳气以住骨痛，又以冲和膏敷上腿冷处，引其气血，使流动而下通贯血脉。又以玉龙膏敷骨膝处，以接引所引之血脉，以验散所积之阴气，内服追风丸倍加乳没，则无有不愈者矣。

又云：一切湿痰湿热，或死血凝滞等证，患在关节，流注不行，非用辛温开发腠理，流通隧道，使气行血和，焉能得效。人畏附子有毒，多

不肯服。若用童便炮制，何毒之有，况中病即已，又不常服，何足为虑。经曰：有是病用是药者此也。故大防风汤、活络丹，治脚气鹤膝风证多效。

张真人曰：此病乃立而行房，风湿侵于两膝，故成此疾。然治法绝不治肾，止治气而自愈，亦不必治风湿也。《良方补遗》。

《心法》曰：鹤膝风一名游膝风，又名鼓椎风，痢后得者为痢风。单生者轻，双生者最重，溃后如出白浆，浮皮肿痛仍前，不可用蚀药，只宜用芙蓉叶、菊花叶五钱研末，大麦米饮拌匀贴之，亦可止痛，或豆腐渣蒸热捏作饼，贴之亦可，此证系外证中之败证，收功甚难。

鹤膝风门主方

神方岐天师。

黄耆八两 薏苡仁四两 白术 白茯苓各二两 防风五钱 上肉桂三钱

水十余碗，煎二碗，分作二服。上午一服，临睡一服，服后以厚被盖之，必出大汗，不可轻去其被，令汗自干，即愈。一服可也，不必再服。此方妙在用黄耆以补气，盖两足之所以能动而举步者，气以行之也。今鹤膝之病，则人之气虚不能周到，行步自然艰难，今用黄耆半斤，则气旺极矣，又佐之肉桂以通其气，又佐之防风以散邪，始相恶而相济，又佐之白术、薏苡仁以去其寒湿之气，邪气去则正气自固，此功之所以速成也。若以为人不能受畏而不用，则反害之矣。

又方

黄耆四两 薏苡仁二两 防风 川草薢各三钱 牛膝二两 上肉桂一钱 秦艽一钱五分

水八大碗，煎四碗，作早中晚三次服，不必盖汗，服下自有汗出，闭坐房中，不可见风，俟汗干再出房门。

又方

怀生地 牛膝各三钱 炙黄耆 白术土炒 赤芍药 防己 川续断 姜黄 独活各一钱 当归 白茯苓各一钱五分 红花 上肉桂各六分 加姜二片，枣二枚，煎服，如浸药酒，照方十倍，用木瓜酒二十斤，

龙眼肉四两浸饮。

又方

生姜 葱须，各三斤

共捣汁，入酒糟半盅，熬一盅听用，先以酒调麝香分许，涂手内擦两膝眼上红赤令透，再用陈油纸摊前膏贴患处，其热如蒸，拔出大小孔如针眼，其腿即可伸缩行动矣。

两膝风

当归 五加皮 生地 薏苡仁 木瓜各一两 牛膝焙，八钱 防己二钱 广皮 半夏各三钱 嫩桑叶炒，二两 秦艽 续断各五钱 火酒八斤浸饮。

鹤膝风

无名异五钱 地骨皮三钱 乳香 没药各一钱五分 麝香一分
研匀，用车前草捣汁，入老酒调敷之，五日愈。

张真人神方

生黄耆一斤 钗石斛四两 远志肉此味最能健膝 怀牛膝各三两

用水十碗，煎二碗，再入金银花一两，煎一碗，一气服之，服后觉两足如火之热，教病人睡了，以厚被盖之，汗出至涌泉，始可去被，否则断断不可去也。一服病去大半，再服痊愈，不分久暂，俱可如法治之。

鹤膝风镇江何仁源。

当归二钱 粟壳 独活 羌活 藁本 蔓荆子 川芎 半夏 甘草各一钱 明天麻一钱一分 白茯苓八分 防风七分 汉防己六分

生姜三片，水二盅，煎服。

鹤膝风 真蕲艾每次半斤煎汤，乘热熏洗，洗一次渐消，一日洗数次消尽。

鹤膝风

番木鳖四两，酒泡蒸去皮，用麻油四两熬枯浮起为度，再用陈壁土炒干研细，只用二两 大枫子净仁二两，灯心同水煮过，研细去油，只用一两 穿山甲洗净土炒研细，一两 西附子二两，大者童便煮过，去皮脐，切片焙干，研细用，一两

以上四味，共五两，和匀收贮磁瓶中，每服七分，空心温酒调服，极醉出汗，七服除根。

消毒散的临床新用

1. 慢性鼻窦炎

陈兆洋运用本方加減治疗慢性鼻窦炎 126 例。方药:人参 6 克,川芎 10 克,白芍 10 克,生黄芪 12 克,当归 10 克,白术 10 克,茯苓 15 克,金银花 30 克,白芷 9 克,甘草 6 克,皂刺 6 克,桔梗 6 克,苍耳子 10 克,辛夷 10 克。每日 1 剂,水煎分 2 次服,儿童酌減。10 天为 1 疗程,一般用药 2~3 个疗程。结果:治愈 30 例,显效 42 例,有效 46 例,无效 8 例,总有效率 94%。治疗最短 1 个疗程,最长 3 个疗程。

陈兆洋. 中国医药学报, 2001, (6): 74

2. 皮肤久溃不愈

张胜德运用本方加減治疗皮肤久溃不愈 15 例。方药:黄芪 30 克,人参、白术、茯苓、赤芍、白芷、桔梗、当归各 10 克,金银花 15 克,甘草、川芎各 6 克,皂角刺 9 克。若气血皆虚久不收口,伤口灰白,脓液清稀或少有脓液,神疲乏力,舌淡苔薄白、脉细,则加重黄芪用量,再加肉桂 6 克,连翘 15 克;若脓较稠厚间有热象,则減肉桂用量至 3 克,再加金银花、连翘、蒲公英各 20 克。结果:治疗期间停用其他疗法,只进行局部清洁,服此方 1~2 剂后,见伤口新鲜,间有血渗出,一般服 3~5 剂就能收到满意效果,此 15 例患者视伤口范围大小,均在 4~15 天内收口痊愈,最少服 3 剂,最多服 10 剂。

张胜德. 陕西中医, 2004, (12): 1123

3. 糖尿病足

张志明运用中西医结合治疗糖尿病足 36 例,在内服托里消毒散的基础上,运用西药口服和坏疽外科处理。结果:36 例患者全部治愈,其中 30 天内治愈 19 例,30~60 天治愈 15 例,60~70 天治愈 2 例。其中 3 例经植皮后创面愈合,术后无 1 例因病变继续扩大而截肢。治疗前后血常规、肝、肾功能检查无明显变化。

4. 慢性骨髓炎

赵保平等运用本方加减治疗慢性骨髓炎 36 例。随证加减: 气血两虚者加黄芪 30 克, 鸡血藤 15 克, 以益气养血通络; 肾虚久不敛者加菟丝子、肉苁蓉各 15 克以补肾敛疮; 脓液清稀, 身冷畏寒者为阳虚寒凝, 加肉桂、干姜各 10 克以温经通脉; 若疮周紫滞疼痛, 舌红、脉弦数者为阴虚火旺, 加知母、黄柏各 10 克以滋阴降火。连服 1 月为 1 疗程, 疗程间隔 1 周, 2~3 个疗程停药观察。外敷: 腐肉未尽而无死骨者用祛腐生肌散(制乳没各 18 克, 乌梅 10 克, 血竭 6 克)干撒或用药捻插入, 外盖金蟾膏(自拟方: 蟾蜍 1 只, 鲫鱼 1 尾, 巴豆、乳没、铅丹、麻油熬膏)。视脓液多少, 2~3 日换药 1 次。若腐肉已尽, 新肌始生时, 干撒或药捻插入生肌散(自拟方: 石膏 30 克, 制乳没各 10 克, 血竭 6 克, 硼砂、朱砂、轻粉各 3 克), 盖黄连膏或生肌玉红膏(上二膏均见《医宗金鉴·外科心法要诀》)。西医: 手术彻底清除病灶, 摘除死骨; 并酌情使用有效和足量的抗生素; 疮面常规换药。结果: 治疗组 36 例中, 痊愈 29 例, 显效 3 例, 好转、无效各 2 例, 总有效率为 94.5%。疗程 30~116 天, 平均 53 天。对照组 30 例中, 痊愈 16 例, 显效 5 例, 好转 3 例, 无效 6 例, 总有效率为 80%。疗程 39~116 天, 平均 62 天。治疗组比对照组平均疗程缩短 9 天。两组有效率经统计学处理, 差异显著 ($P < 0.05$)。

赵保平, 等. 湖南中医杂志, 1997, (3): 56

5. 溃疡性结肠炎

胡丽芳运用本方加减治疗溃疡性结肠炎 31 例。方药: 生黄芪 15 克, 潞党参 15 克, 当归 6 克, 茯苓 12 克, 炒白术 15 克, 金银花 12 克, 川芎 6 克, 白芍 9 克, 桔梗 6 克, 皂角刺 5 克, 炙甘草 6 克。里急后重加广木香 5 克, 槟榔 5 克; 腹痛倍白芍至 18 克, 加丹参 9 克; 血便多加地榆炭 12 克, 三七 3 克, 焦山楂 15 克; 血多偏热再加卷柏 10 克; 发热加黄芩 6 克; 白冻便多加白芨 15 克; 食欲不振加淮山药

30克,扁豆10克;腹胀加薏苡仁15克,砂仁3克;滑泻不止加赤石脂9克;五更泄泻加肉豆蔻9克,吴茱萸9克,五味子(选用)10克;久泻久痢加诃子6克,五倍子6克;大便稀薄去当归;里寒去金银花,以上加减可根据主证、脉象、舌诊综合分析,辨证选用。1个月为1个疗程,3个疗程观察疗效。结果:治愈11例(诸症消失,结肠镜检溃疡面愈合);显效13例(临床症状消失或偶有复发症状轻微,结肠镜检溃疡转变成充血);好转5例(以上临床症状减轻,但不稳定,结肠镜检溃疡面缩小,或无明显改善者);症状无改善者2例。治愈率35.5%,有效率93.5%。

胡丽芳. 安徽中医临床杂志, 2000, (5): 405

二妙散的临床新用

1. 肛门湿疹

祝水国等运用本方加减治疗肛门湿疹32例。方药:苦参30克,地肤子15~20克,蛇床子20~30克,苍术12克,黄柏20克,防风15克,百部30克,大风子15克,冰片3克。上药加水2000~3000毫升,水煎2次,煎液混匀,冲入冰片,先熏,待水温不烫时,坐浴15~30分钟。急性湿疹采用冷湿敷30分钟,每日2次,10天为一疗程,未愈进行第2、第3个疗程治疗。结果:治愈25例,治愈率78.13%;好转6例,占18.75%;无效1例,占3.13%;总有效率96.88%。用药最短6天,均为急性、亚急性患者,最长1个月。

祝水国,等. 深圳中西医结合杂志, 2001, (2): 10

2. 急性附睾睾丸炎

杨志辉运用二妙散合橘核丸加减治疗急性附睾睾丸炎。方药:黄柏、苍术各12克,橘核、荔枝核、昆布、海藻各10克,乌药、延胡索、川楝子、牛膝、车前子、桃仁各9克,柴胡、龙胆草、芒硝(后冲服)各6克。湿热重者,倍车前子、龙胆草,加栀子、蒲公英、紫花地丁、黄芩;肝郁火旺者去昆布、海藻,倍乌药、延胡索、川楝子、车前

子、龙胆草、橘核、荔枝核，加黄芩、泽泻；瘀热交结瘀块硬肿者，去车前子、龙胆草、川楝子、乌药，加红花、三棱、莪术，倍橘核、荔枝核、昆布、海藻。水煎服，取药汁冲泡芒硝，1天1剂，1天3次，口服，5天为1个疗程。结果：治愈（临床症状消失，附睾睾丸恢复正常，无纤维肿块，血常规化验正常）20例，基本治愈（临床肿痛消失，睾丸基本正常，但附睾遗留部分有少许硬结，触之不痛，血常规化验正常）6例，好转（睾丸恢复正常，附睾肿大，按之痛减，血常规化验正常）2例，无效（临床症状未消失，睾丸附睾肿大或红肿加重）2例，基本治愈率为86.7%，治愈时间最短者10天，最长者20天（多为35岁以上者），平均治愈时间15天。

杨志辉. 湖北中医杂志, 2001, (2): 25

3. 膝关节创伤性滑膜炎

邵东旭运用本方合身痛逐瘀汤治疗膝关节创伤性滑膜炎。方药：苍术、黄柏、桃仁、红花各9克，秦艽、羌活、地龙、川芎、没药、当归、牛膝、五灵脂、甘草各6克，香附3克。急性期加三七粉、苏木；积液多而分泌较快酌加茯苓、白芷；湿热重酌加黄芩、滑石；风湿甚酌加防风、独活；气阴两虚酌加黄芪、生地；恶寒肢冷酌加肉桂、乌梢蛇；劳损所致酌加杜仲、续断；肢体麻木、无力酌加天麻、狗脊。每日1剂，水煎早晚分服，1周为1疗程。治疗初期病人膝关节可行石膏托外固定，制动1周，患肢适当抬高。解除外固定后行股四头肌锻炼，以消肿并防止肌肉萎缩，加快膝关节的功能恢复。结果：显效（局部肿胀及疼痛完全消失，关节功能活动正常，浮髌试验阴性，随访1年无复发）35例；有效（局部肿胀及疼痛消失，关节功能活动基本正常，但不易负重，负重时疼痛）15例；无效（治疗前后无变化）2例。本组服药最少6剂，最多25剂，平均15.5剂。总有效率96.2%。

邵东旭. 辽宁中医杂志, 1997, (2): 71

4. 扁平疣

王珏运用本方加减治疗扁平疣95例。方药：苍术15克，黄柏

10克,薏苡仁30克,刺蒺藜15克,生甘草5克,桑白皮10克,路路通10克,白花蛇舌草30克。以上药物用1500毫升冷水浸泡30分钟,武火煮开后,再以文火煮20分钟,1日1剂,分3次饭后服,7天为一疗程,治疗2个疗程。结果:治愈(皮损消失,无新皮疹出现)79例(83.1%);好转(皮疹较前变平,消退30%以上,或有个别新疹出现)11例(12.6%);未愈(无皮疹变化,或消退不足30%)5例(5.2%)。其中2例治疗3个疗程后自动放弃,总有效率94.7%。

王珏. 江西中医药, 2004, (1): 30

5. 阑尾切除术后切口不愈

黄永雄运用本方加味治疗阑尾切除术后切口不愈122例。方药:黄柏、苍术、当归、甘草各10克,白术12克,丹参、淮山、白芍各20克。年老体弱,气虚者加党参、北芪各20克;肥胖湿重者加茯苓15克,薏苡仁30克。每日1剂,加清水500毫升,水煎30分钟,取汁200毫升,二煎加水300毫升,水煎20分钟,取汁100毫升,将两次所煎的药液混匀,早晚分服,治疗10天为1疗程。结果:46例1个疗程切口愈合,72例2个疗程切口愈合,3例3个疗程切口愈合,1例服药38剂切口才愈合,122例全部有效。

黄永雄. 实用中医药杂志, 1999, (4): 18

6. 下肢伤肿

周荣贵运用本方加减治疗下肢伤肿40例。方药:黄柏、苍术、牛膝、当归、泽兰叶、薏苡仁、乳香、没药各10克,穿山甲、甘草各5克,水蛭3克。痛甚者加田三七3克(磨汁冲服);瘀肿明显者薏苡仁用至30克,泽兰叶用至15克。水煎服,1日1剂,分2次服。如果血肿过大,尤其是关节腔内积血积液严重者,可在无菌下辅以穿刺抽吸减压和加压包扎。结果:经3剂治愈者14例,6剂治愈18例,9剂治愈8例。

周荣贵. 湖南中医药导报, 2002, (2): 77

7. 多发性神经炎

方义顺运用本方加减治疗多发性神经炎 44 例。方药:黄柏、当归、牛膝、萆薢、蚕砂各 10 克,苡仁、木瓜各 12 克,苍术 8 克,防己 15 克,龟板 18 克,木通 6 克。水煎服,1 日 1 剂,均治疗 2 周,嘱戒酒。结果:显效(临床症状消失)24 例;有效(症状明显缓解)18 例;无效(症状如故)2 例;总有效率 95%。

方义顺. 四川中医,2000,(8):26

夹纸膏的临床新用

下肢慢性溃疡

马朝群运用本方治疗下肢慢性溃疡 34 例。方药:桐油 25 毫升,铜绿 6 克,黄蜡 30 克,白蜡 12 克,冰片 3 克。先将桐油熬滚,加入黄白蜡溶化,最后加入铜绿、冰片搅匀,乘热用桑棉纸从药油内拖过,冷却后即成绿色双面蜡纸。使用时先将疮面清洗消毒,再按疮面大小剪一片(不要超过溃疡范围)夹纸膏,用消毒酒精擦拭干净,贴于疮面,每日更换 1 次。结果:治愈(溃疡面愈合,干燥)27 例;有效(溃疡面明显缩小,疮面清洁,肉芽新鲜,无渗液)6 例;无效(溃疡面无改变)1 例;总有效率 97%。

马朝群. 江苏中医,1999,(10):23

卷之十一

癩癬部

自蛇虱、乌癩、癬疹起，至湿痰流注止，皆汇于此部中，以便检阅参治。

蛇虱门主论

王肯堂曰：蛇虱遍身起如风疹疥丹之状，其色白不痛但痒，搔抓之起白庖。柏叶一味煎水洗。内服蜡矾丸，金银皂角丸。《准绳》。

《心法》曰：白庖俗名蛇风。生于皮肤，形如疹疥，色白而痒，搔起白皮，由风邪客于皮肤。血燥不能荣养所致。用猪油、苦杏仁等分捣匀，绢包擦。

乌白癩门主论

王肯堂曰：夫癩疾皆是恶风及犯触忌害所得。初觉皮毛变黑，或淫淫苦痒如虫行，或眼前见物如垂丝，言语无定，心常惊恐，皮肉之中或如桃李，癩疹亦黑，手足顽麻，针刺不觉痛，脚下顽痛不得踏地。凡食之时，开口出气而鸣，语亦如是。身体生疮，痛痒而时如虫行，或两肘如绳缚，此名乌癩。又有黑癩。凡二癩之证，大同小异，故不别录也。《准绳》。

又曰：白癩者其语声嘶哑，目视不明，四肢顽痛，身体大热，心中懊恼，手足缓纵，背脊拘急，内如针刺；或生癩疹而起，往往正白在皮肉，鼻有息肉，目生白珠挡于瞳子，视无所见，名曰白癩也。

陈实功曰：癫风乃阳明湿热沸腾于肌表，或受风寒侵袭而成。其患初起水泡作痒成疮，破流脂水，痒至彻骨，久则成片，延及遍身。好浴热汤，形如风癫。上体者汗解外毒，下体者疏泻内毒为主。《正宗》。

陈远公曰：人一身发癫，皮厚生疮，血出如疥，或痛或痒，或湿或干，似虫非虫，人以为湿热留于皮肤，谁知乃气血不能周到滋润乎！世多以苦参煎汤或稀荳、白芷外治不能奏效，正成于气血虚也。夫气血足则经络无闭塞之虞，气血旺则毛窍无枯干之患，且气足血旺，则热散湿消，何至瘀滞不通，结于皮肤之外哉！治法以补气血为主，佐以消湿散热，虽十载沉痾，尚可奏功，矧目前近癫乎！用扫癫丹：黄耆三两，当归、金银花各二两，白术、茯苓、麦冬、白芍、熟地、元参各一两，山萸、川芎各五钱，生甘草、荆芥、花粉各三钱，防风二钱，水煎服，皮色即润，二剂干燥解，十剂痊愈。《冰鉴》。此方大补气血，无异枯涸之田，逢甘霖之滂沛，生机勃勃，水满平畴，而蝗蝻之类自消于无形矣。

沉紫亮十四种癫证歌诀

心经火癫蟋蟀连，肝经木癫风厉偏，脾经上狗癫并属，肺经金癫面白兼，肾经水癫两乌共，胃经酒麻癫总言。

夫癫之为害，较之风证稍轻，然其致害之患一也。但癫愈而形可复，疯愈则元气难复，癫死者少，疯死者多，然皆非善证耳。《医学要则》。

辨六经癫形

心经 火癫如灼之疮，大小不一，或形如癣，裂断皮肤，愈而复发，乃心脏受毒，病深七年方盛，其蟋蟀癫，亦乃心经毒也。

肝经 木癫初起似蚀癣状，大小不同，形色不一，或遍身高低不定，俗呼为棉花癣。

脾经 土癫或先发热呕吐，身发黄肿，即现瘤块，大如鸡卵，小如弹丸，或麻木不仁，穿即成疮，脓气臭秽难闻。

肺经 金癫初发如杨梅疮，上无壳，内泛碎，肉凸起，紫赤溃烂，真

如杨梅，毒入肺经，眉睫毛落，二年鼻梁崩倒，眼塌唇翻，乃金癩之验，若蠹鱼生肺腑，致生面白细虫，举体艾白斑驳，周身如癣，俨然泥壁风之状，外用熏洗则能取效。白癩乃风寒暑湿之气，邪毒凑聚，弥漫肺窍，久则虫蠹食肺管所致。

肾经 水癩必先得水病而停蓄，又为风湿触激，或生在阴茎，蚀于阴囊，两旁发肿块横痃，寒热交作，肿痛难忍，渐大而溃变成烂疮，一年病剧，眉发坠落，水癩之毒在肾，湿久生虫，流注遍身则生青黑赤紫斑驳，以致阴茎痿癩，皮穿肉烂，脓血臭秽。乌癩乃邪毒入肾，虫食精髓，下虚不救，若在胸肋胁腿臂之间，生核如桃李之状，穿烂臭恶，或似漏疮，手足顽痹，针刺不知，此种之证宜大补气血。

胃经 酒癩因醉卧汗出迎风，邪入于胃所致，似赤非赤，似白非白，大者如钱，小者如豆，此证最为难治。

麻癩 由酒毒留滞胃腑，遍发疮毒，状如疥癣，痛痒难忍，或手足发黑白顽痹，形如鹅掌风之状，或发内痔，头硬而碎，形如蟾头，遍体皆然，触之则大痛冷汗，一时即愈。

癩与癰大同小异，但癰轻而癩重，治癰之法，可于癩证门中诸方酌用。

癰 门 主 论

陈实功曰：癰乃风热湿虫四者而成。风宜散，热宜清，湿宜渗，虫宜杀，总由血燥风毒克于脾肺二经耳。《正宗》。

又曰：风癰如云朵，皮肤娇嫩，抓之则起白屑，不知痛痒。

又曰：湿癰如虫形，搔之则有汁出。

又曰：顽癰抓之全不知痛。

又曰：牛皮癰顽硬且坚，抓之如朽木。

又曰：马皮癰微痒，白点相连。

又曰：狗皮癰白斑相簇，时作微痒。

周文采曰：干癰搔之则出白屑，索然雕枯。《集验》。

又曰：刀癰则轮廓全无，纵横不定。

申斗垣曰：白壳疮即癣也。《启玄》。

王肯堂曰：面上风癣，初起渐成细疮，时作痛痒，发于春月，名曰①花癣，女人多生之。此皆肺经蕴积风热，阳气上升，发于面部或生眉目之间，久而不愈，恐成风疾。《准绳》。

蒋示吉曰：上半身为顽癣，治之易，多属风热。《说约》。

又曰：阴癣生在下半身，治之最难，多属寒湿，总之血分受病，以致皮肤不和也。

癣 门 主 方

浮萍散 治风癣疥癩。

当归 川芎 荆芥 赤芍药 甘草 浮萍七月十五日采取阴干，各一钱五分 麻黄七分五厘，夏月只用三分

加葱白二根，豆豉五六十粒，水煎热服取汗。手臂加桂枝，背加羌活，膝加牛膝、薄桂。

遍身风癣

防风 金银花 片芩 山梔仁 生地黄 木通 川黄连 当归 苦参各一钱 飞滑石 升麻各三分 荆芥穗 香白芷各七分 桔梗 生甘草各五分 蝉蜕 皂针 牛蒡子各八分 生姜一片 穿山甲四片

水二盅，煎八分，食远服。未服药先一日，用茄子藤连根叶煎水熏洗，将癣擦透，次日服药，三剂除根。

湿热生癣

干浮萍一两 苍耳子 苍术 苦参各一两五钱 黄芩五钱 香附米二钱五分

酒糊丸。上身多食后服，下身多食前服，白汤送下三钱。

癣

土槿皮一两 斑蝥二个 鸡心槟榔三个 番木鳖四个
火酒半斤，浸一伏时，蘸搓癣上，忌大蒜、火酒。

① 曰 《疡科准绳》作“吹”。

又方

硫黄 轻粉各等分 研匀蜜调搽。

又方 大枣一枚，去核入白砒三分，泥裹煨透，冷定去泥，研细香油调搽。

又方 密陀僧、五倍子各等分，研细蜜调搽。

又方 土槿皮研细，醋调敷，以纸盖之。

又方 商陆根蘸蜜擦之。

又方 土槿皮研细，粗夏布包扎浸火酒一伏时，擦之。

又方 秃菜根蘸人乳擦之。

又方

白降丹三分 轻粉七分 醋调擦之。

又方

土大黄 凤仙花梗 枯白矾水飞

共捣，麻布包扎，蘸醋擦之。

又方

白砒 硫黄 罐口各等分

入杓内化开，将地下挖一孔，将药倾入冷定取出，米醋磨敷。

又方

硫磺三钱 枯矾一分 白芷三分 斑蝥三个，去翅、足

研末抓破擦之。

又方 树上经露水的蜂房一个，以生矾填满房孔，置罐底，以细火煨令矾化为度，取出研细，抓破擦之。

又方

牛舌草即土大黄 白薇 楝树皮各一两 冰片 甘草各一钱 轻粉 蜗牛各三钱，焙干，如无活的，壳亦可用

共研细，用荔枝核将癣抓破，真麻油调搽。

又方 皂矾炒研，猪胆汁调搽。

又方 鲜土大黄捣烂，加川椒、白糖、盐各少许，用布包，入醋内浸半日取起，擦癣。

又方 生天南星、生草乌各等分研细，用土大黄汁调搽。

又方 猪蹄壳内填生白矾，瓦上煨存性，搽之。

又方

蛇床子 藁本 尖槟榔 硫黄 枯矾 白胶香 五倍子各等分
研细。干癣香油调擦，湿癣干擦，顽癣醋调擦。

又方

土槿皮三两 明雄黄 水银各二钱 潮脑一钱 槟榔七分 麝香一分
大枫子 斑蝥 木鳖子各七枚

研细，入火酒斤半封一七，蘸搓。

百部膏 治牛皮癣。

百部 白藓皮 鹤虱 草麻仁 生地黄 黄柏 全当归各一两
麻油半斤入药熬枯去渣，复熬至滴水成珠，再下黄蜡二两，试水不
散为度。拿起锅入雄黄末和匀，稍冷倾入磁钵中收贮，退火气听用。

三五十年顽癣

铁线粉出广西，要对换 海金砂 冰片 麝香末各等分
生姜蘸擦。

又方 枯白矾七分，血丹三分研匀，土大黄根同捣搽。

又方

土槿皮三两 公槟榔一两

不见火晒干磨细，用好滴醋调如薄糊，隔水蒸一炷香，取出敷患
处，棉纸盖上，二、三次即愈。

又方

生白术三两 土槿皮一两五钱

不见火晒干为末，滴醋调搽，三次必愈。

又方 先用生姜汁搽，再用柏油搽。

顽癣阴癣

土槿皮二两 斑蝥十四枚 明雄黄 硼砂各六钱

火酒二斤浸三日，搽之。

项上耳旁湿癣

芦荟一两 甘草五钱

研极细。先将癣以温水洗净，拭干搽之。

厚牛皮癣

全蝎七个 巴豆二十粒 斑蝥十枚 麻油一两 黄蜡一钱

先将巴、蝎、斑蝥入油熬焦黄色，去药取油，如油少，可加麻油炼滚投蜡熔化，收贮擦之。

又方 土地黄根捣烂和蜜擦癣。

顽癣 大公虾一个，取虾大爪抓破癣，见血为度，即以虾脑涂之，二次即消。

阴癣 生明矾 熟明矾各一钱 轻粉二钱 银硝三分 研细。用土地黄根捣烂，布包蘸药末擦之。

头项以上癣，用倾过银子的银罐子大小二个，盛硫黄一两于大罐内，以小罐履住。文武火煨，俟火焰高罐上一寸、约一盅茶时，取出冷定，取上履罐研为细末。用柏油、猪骨髓调匀，将癣用刀刺破搓上，一伏时愈。

又方 旱浮萍草生擦癣觉疼，起泡挑破，再擦三日，不见水，结疤，永不再发。

又方 硫黄细末拌生猪油熬熟，将癣抓破搓擦，自愈。

治癣碧玉散 铜绿、硼砂、白矾各等分，研匀香油调搓。

岐天师神方《秘录》。

楝树皮 大枫子 潮脑各三钱 水银 硫黄 花椒炒 木鳖子 明雄黄 蝉蜕 木通各二钱 全蝎二个 土槿皮四两 斑蝥 公槟榔各七个 皮硝五钱

用火酒三四斤，浸十日，擦之。

又方

芦荟 轻粉 雄黄各一钱 大黄 蛇床子 土槿皮各三钱 槟榔二钱

研末。先将癣刮破，以米醋调搓。

头面荷叶癣 川槿皮研细醋调，汤顿如胶，将癣抓破搓之。

白矾散 遍身生癣，日久不愈，延至头面。独茎羊蹄根捣细，白矾研细，以极酸米醋调，抓破搓癣，隔日再搓，不过两次即愈。

又方

紫苏 潮脑 苍耳草 浮萍 煎汤洗癣。

牛皮血癣

旧银罐一个 露蜂房煨灰,五钱 枯矾二钱

研细,香油调搽。

年久阴癣,数日除根

土槿皮五钱 露水 烧酒各四两

同浸七日,抓破癣皮,用新羊毛笔涂之,每日数次。

《千金方》孙真人。以日午时立日光下,人影有癣处着艾灸之,点艾时念咒。咒曰:癣中虫,毛绒绒,若欲治,待日中。一气念三遍,俟艾火过,添火再念再灸,如此三遍,三炷即愈。

癣疮延蔓《东坡家藏》。

决明子研细 水银 轻粉各少许

再和研,不见水银星为度。刮破上药立瘥。

又方

铜青 雄黄 斑蝥各等分

研匀。无根水调敷,起泡刺破,柏烛油搽,洁净不发。

又方

杜黄连即羊蹄根一握,洗净捣滤汁。 白梅数枚,去核

同汁捣烂,用穿山甲刮破搽,数次即愈。

荷叶癣《古方》。 田螺一个,开厝入信石二分,待肉化水,搽上即愈。

牛皮癣及多年顽癣

红粉霜五分,即红升丹 明矾 杏仁去油皮 川槿皮各一钱 密陀僧三钱

共研细,津调搽,一日三次,三日痊愈。

又方 牛皮烧灰,油调搽。

牛皮血癣《古仙方》。

硫黄九分 白砒一分 巴豆三粒,去油

研细。茶油调搽。

顽癣《秘方》。

白砒一分 硫黄九分 白硝三分 明矾四分 冰片五厘
研末，津调擦之。

杨梅瘡

枯白矾 硫黄各一两八钱 雄黄 胆矾 轻粉各一钱 川椒三钱
研细。用生猪板油去皮入药，擦破数次，其效如神。

杨梅瘡

朱砂 雄黄 没药去油 乳香去油 儿茶各一钱 杏仁四十粒 大
枫肉二十粒

捣烂绢包，擦之。

鹅掌风瘡《秘录》。

川乌 草乌 何首乌 花粉 赤芍药 防风 荆芥 苍术 地
丁各一两 艾叶四两

煎汤。先熏后洗，层层起皮，痛痒自愈。

圈子瘡《集验》。谷树皮剪如瘡样大小，以毛背一面用唾贴瘡上，
以手不时扑之，即愈。

瘡方

硫黄 木炭灰各等分

共为极细末。将瘡用穿山甲刮破，擦上数次愈。

又方 马蹄决明子一两为末，入水银、轻粉少许研，不见水银星为
度，将瘡刮破，擦上立愈。

又方 马蜂窝一个，仰放瓦上，以枯矾填满孔内，炭火炙焦研末，
用蜡醋脚调涂，即愈。

阴瘡 鲜旱莲草揉团，用穿山甲将瘡刮破，擦瘡上奇验。

浑身瘡 羊蹄根捣汁入墨盆内，将白芨磨浓汁搓之。

又方 铅一斤，煎水；日洗数次，即愈。

川槿皮锭刘长随。治一切瘡如神。乌梅肉半斤。用羊蹄根汁浸
一夜，次日重汤炖一炷香，又放饭锅上蒸软透取出，捣如泥。加番打
麻，研细，一两。海螵蛸，研细，五钱，入乌梅肉不捣匀，秤过，每一两加
白降丹八分，白砒七分，再捣匀，入白芨细末一钱，又捣匀做成二、三钱
重的锭子，阴干收贮。凡用以羊蹄根同醋磨浓，搓之。

癬方胡绣溪。

土荆皮三两 尖槟榔 斑蝥去头、足，糯米炒 大枫子 木鳖子各七个
巴豆仁五个 雄黄 潮脑 川乌 白藓皮 草乌各二钱 麝香三分
火酒二斤半，同入小口瓶内封口，浸七日，将癬刮破擦之。

顽癬 黑铅一钱熔化离火，入水银一钱研为极细末，加真轻粉、潮脑各一钱和匀，再研细，取牛舌草根去土净，捣自然汁和匀，再用穿山甲将癬刮破敷上，出尽血水为度，痒时则频频搓之，搓时微痛勿惧。

顽癬脓疮及汤火伤盛惟章。

真川铅粉 银珠各五分 麝香三分

上为末。用鹅油捶和如泥，用油纸一长条将半段用针刺孔摊膏，合转来将光面贴癬，绢帛缚紧，二、三日一换，夏月早晚换。

牛皮癬 穿旧牛皮靴底上皮，阴阳瓦煨存性，研细，将癬刮破擦之。

癬 鸡蛋一个开一小孔，去白存黄，入硫黄、川椒末各三钱，将湿纸封固，灰火内煨熟为末，先以麻线将癬刮破，用谷树浆或羊蹄根汁调搽。

又方 多年竹灯挂一个，火上烤出汁如胶者，另将五倍子去虫炒，为末和匀。用陈醋在火上温热，调搽。

顽癬

硫黄一两 火硝 白砒各一钱

先将硫黄入银罐内化开，再入硝砒末搅匀，倾入土内埋七日，搓三、五次。

癬

雷公藤五分 大枫肉 防风各一钱五分 土槿皮 蚯蚓粪 牛舌草根各三钱

共为末，陈醋调搽。

牛皮癬 桃树根同胆矾捣烂敷。

癬生脸上如钱大，抓之有白屑者。绿豆捶碎以纸糊碗口上，针戳多孔，以碎豆铺纸上，放红炭一块架盖上，俟豆灼尽，纸将焦，去豆揭纸，碗中有水，取搽三、五次。

老癬

轻粉 雄黄 黄丹 银朱各等分

研细,用米醋浸大黄,夏布包,蘸药擦之。

阴癬 盐内皂角擦之。

燥癬 水银、胡粉,研,蛋清调搽。

又方 雄鸡冠血涂。

又方 胡粉炒黄赤色 醋调涂。

又方 捣桃树白皮醋和涂。

湿癬 石硫黄,研,用三年陈醋调敷。

又方

蛇床子 黄柏 黄连 胡粉各一两

研细。入水银一枣子大,和猪油研匀涂之。

又方 用粗碗一只,以皮纸用针戳眼糊碗口上,以水潮纸上令湿,将杉木屑堆潮纸碗上,用火点着,俟杉木屑烧尽,轻轻扫去屑灰,揭开纸用碗中杉木油,取搽癬上,必效。

癩疹门主论

孙真人论曰:《素问》云:风邪客于肌中则肌虚,真气发散,又被寒搏皮肤,外发腠理,开毫毛,淫气妄行,则为痒也。所以有风疹瘙痒,皆由于此。又有赤疹者,忽然起如蚊虫咬,烦痒极者重抓疹起,瘙之逐手起。又有白疹者发冷,亦有赤疹,盖赤疹者发热。

王肯堂曰:夫风癩疹者,由邪气客于皮肤,复遇风寒相搏则为癩疹。若赤疹者,由冷湿搏于肌中,风热结成赤疹也。遇热则极,若冷则瘥也。白疹者。由于风气搏于肌中,风冷结为白疹也。遇冷则极,或风中亦极,得晴明则瘥,着厚暖衣亦瘥也。其脉浮而洪,浮则为风,洪则为气,风气相搏则为癩疹,致身体为痒也。《准绳》。

朱丹溪曰:疹属热与痰在肺,宜清肺火降痰,或解散出汗,亦有可下者。《心法》。

方论皆谓缘肌中有湿。若凉热之气所折，热结不散则成赤疹；若因风邪所折，风热相搏则成白疹。赤疹得热则剧，得冷则减，盖热气郁于内，故恶热宜冷；白疹得阴雨则甚，得晴则消，盖热气散释于外，故恶冷宜热。

热搏于血分，其邪因并发于表则赤，若风湿搏于气分则气脉不行，因邪并发于表则白。夫如是，然后于治法相应，邪热者故恶热而喜凉，邪湿者故恶雨而喜晴矣。方论《内经》所谓汗出见湿，乃生痲疹。又曰：劳汗当风，寒薄为郁乃痲疹；即癰疹属也，此皆谓外邪郁肌肉玄府之热者矣。然则与《内经》言少阳、少阴而君、相二火客热之胜为丹疹外发者，方论中则无有也。故人气君、相二火郁发而变者，宜乎未之及耳，若此条是人气所变之一者也。故二火郁发，出血气之表，与外邪所郁无异。更有小儿发痘疮之外，必有出疹二次，亦是君相二火发出未尽之胎毒也。

又曰：癰疹入腹，亦能杀人。宜用蚕砂煎浓汤洗之。

又曰：癰疹热多则色赤，风多则色白，甚者痒痛，搔之则成疮也。

林氏曰：或问痲疹因何而生，属阴属阳，属虚属实，属表属里，可得闻有详乎？答曰：痲疹之发，有外感风热者，有胃腑实热为病者，有伤寒失下者，有伤寒阳明经证失汗发衄，不衄则发颐，不生颐则发痲疹者，总属阳明胃与大肠之风热亢盛已极，内不得疏泄，外不得透达，怫郁于皮毛腠理之间，轻则为疹，重则为痲，一如火乘金位，金受火克之故，此乃阳毒属表属实之痲疹也。有阴虚血热者，有阳虚血热者，有气血两虚，而虚热郁盛者，此三焦无根之火，乘气血之虚而空发于上，怫郁于皮毛血脉之中，内不得清，外不得散，遂发痲疹，乃阴虚属里之证也。《活人录》。

又曰：或问何以为痲，何以为疹，阴阳既别，何者为重，何者为轻？答曰：痲者成片，不分颗粒，一如云朵拱起，淡红者轻，紫红者重，黑者凶，轻者痒而重者痛。疹者如痲，或类蚊迹蚤虱痕而不盛，一日之中起伏隐现不常，隐隐见于肌肤之间，不大起发者是。大约阳证痲疹易看而易治，阴证痲疹挟虚而发，难看而难治，苟不细审，则阴证误以为阳，立至危殆，可不慎欤！

又曰：身热无汗，烦渴躁闷，或痛或痒，如云若锦，腹痛胸满，二便秘结，六脉浮洪有力或浮数有力者，系手阳明大肠、足阳明胃二经风热为病，所谓阳斑也。若内热自汗，渴不欲饮，心烦身躁，胃弱脾泄，喜湿恶热，色白而不红，但痒而不痛，六脉迟缓微弱，或虚数无力者，手太阴肺，足太阴脾，手少阴心，足少阴肾经之阴火内亢为病，所谓阴斑也。疹形虽与斑异，而致病之因，受病之脏腑，及所现之脉与形证无不同，盖斑有阴阳，则疹亦有阴阳，自在医者审其证之阴阳虚实，脉之无力有力可也。

又曰：两阳合明，其火自盛，兼有食积，致生积热，故斑疹之因，必归过于胃与大肠也，火盛则血热而金烁，盖心为火脏主血脉，肺为金脏主皮毛，火聚胸中，肺受熏蒸，心火愈炽，或热极反兼风化，或客风鼓动内火，其病发于心肺二经，所谓阳斑阳疹。必先清散风热于表，疏导积热于内，表里和解，以救炎炎之势。如二便秘结，急宜利之，若脾肾之阴虚火盛，不能归经固藏，发越于上而心肺受其熏灼而病，亦有因风致火，或因热极生风而发，所谓阴斑阴疹。初则亦宜清解，使其透发，宽其胸膈，解其烦躁；次则察脉之大小虚实，脾胃之实与不实，大便之结与不结，或清补，或温补。

又曰：虽阴阳俱有斑疹，而阳证发斑者多，且多发于热病之末；阳证则发疹者，多发于病之始。盖斑由积热，发之稍缓，疹兼风火，发之犹速。发之速者祸轻，发之缓者其祸反深，则又天下事理必然之势也。至于时气发疹，由风热之邪乘于肺经，必兼鼻塞气粗痰嗽，余热不清遗于阳明大肠，并其糟粕蕴积而为湿热，更成积滞自利，甚至热郁化火，火性急迫，随气滞下而后重不舒者，宜用辛凉升散之剂清其邪热，使郁陷之气透达外解，不惟斑疹自消而湿热亦散矣。若痰嗽不清，加以清火清痰之药，积滞有余，湿热下迫，加以分清利浊，健运化导剂，如木香、黄连、山楂、神曲、车前、泽泻之类；更用枳壳宽胸开郁，升提郁陷之邪。

风湿郁于肠胃，风热逆于肌表，伤于血分，则憎寒壮热，胸中嘈杂，肚腹疼痛，发为赤疹；伤于气分，发为白疹。俱令瘙痒无度，一日三现三隐，俗名风络疹即此是也。第一宜忌香油、煨鲜、面食，并戒酸咸。

倘不知禁戒,轻则成疮,甚则不时举发,致成终身之累。治当疏风散热托疹为主。

痲疹门主方

通治阳证痲疹主方《活人录》。

生地三钱 防风 荆芥各一钱五分 川黄连 犀角屑 牡丹皮各五分
黄芩 桔梗各一钱 甘草三分

水煎。不拘时服。血中伏火,必先凉血,故以生地为君,而丹皮佐之,芩连泻心肺之火,佐桔梗以开郁结,犀角清心家之热毒,而甘草佐之,荆防用以解散内外之风邪。外感重者加羌活一钱,川芎、薄荷各五分,暂去芩连、生地,如阳明胃家热毒,烦躁热渴,无汗背寒,痲疹黑紫色者,速加石膏一两,连翘一钱五分,元参一钱,犀角五分,去防风、桔梗。伤寒邪热入胃,舌胎黄黑有刺,二便不通,谵语狂热者,加大黄五钱,芒硝三钱,枳实二钱,去生地、防风、丹皮。伤寒阳明失表,烦渴外热,半表半里,大便不去,无下症者加干葛三钱,牛蒡子二钱,元参一钱五分,薄荷一钱,去生地、丹皮、黄连、犀角。

通治阴证痲疹主方

白术二钱 白茯苓一钱五分 人参 炮姜各一钱 陈皮 炙甘草
防风各五分 肉桂 三分

水煎。早晚空心服。上方乃治阳虚血热及气热、血热,凡恶寒喜热,二便清利,口不干而反欲热饮,六脉沉微细数,或虚数无神者宜之。此气虚不能统运血脉,致血久郁生热,而有风热之变也。

肾水不足,龙火无制,陡发越于上,心肺受其熏逼而成痲疹者 八味地黄汤导火归原,兼服肾气丸。

治阴虚血热,热郁血中而生痲疹,时发时止,或痛久远不愈者 以此凉血清热,滋肝息风,兼服济阴丸。

生地三钱 制首乌二钱 当归 干葛各一钱五分 秦艽 丹皮 甘
菊 荆芥各一钱 薄荷五分 甘草三分

水煎。午后临睡服。

遍身风疹作痒 生芝麻研碎,擦之。

又方 过年贴过挂络,擦之。

又方 盐蒲包煎汤洗之。

风疹不时举发

真麻油 烧酒各半酒杯

和匀炖热,发时服之。再不发矣。

葡萄疫门主论

陈实功曰:葡萄疫乃小儿感受四时不正之气,郁于皮肤不散,结成大小青紫斑点,色若葡萄,发在遍体头面,乃为腑证。自无表里,如邪毒传胃,牙根出血,久则虚人,斑方渐退。初起宜服羚羊角汤清热凉血,久当滋益其内,又有牙根腐烂者,人中白散主之。《正宗》。

《心法》曰:此证惟腿胫居多。

葡萄疫门主方

羚羊角散《正宗》。

羚羊角 防风 麦门冬 玄参 知母 牛蒡子 黄芩各八分 生甘草二分 淡竹叶十片

水二盅,煎六分。食远服。

胃脾汤《正宗》。

北五味五分 白术 远志肉 陈皮 沙参 麦门冬 茯神 生甘草五分

水二盅,煎六分,食远服。如虚弱自汗者,去沙参加人参黄耆各五分。

非瘡散 治葡萄疫攻牙腐烂。

五倍子炒茶褐色 人中白煨,各一两 冰片四分

研细。用米泔水漱净,吹。

湿痰流注门主论

陈实功曰:流者行也,注者住也,由其瘀壅,其形漫肿无头,皮色不

变,所发毋论穴道,随处可生。皆缘荣气不从,逆于肉里,如风寒相中,表证发散未尽者散之;房欲之后,阴虚外寒所侵者温之;恼怒伤肝,郁结伤脾者归脾汤加青皮、香附散之;跌扑损伤,瘀血凝滞者,和血汤逐之;产后恶露未尽,流注经络而成者,木香流气饮导之。如不得内消者,法当大养气血,培助脾胃,温暖经络,通行关节,十全大补汤加熟附子香附主之。如脓已成,宜急开之。《正宗》。

又曰:禁用寒凉克伐内消等剂。

汪省之曰:夫流者行也,乃气血之壮,自无停息之机,注者住也,因气血之衰,有凝滞之患,故行者由其自然,住者由于瘀壅。凡得此者,多生于体虚之人,勤劳之辈,不慎调燮,夏秋露卧,纵意取凉,热体当风;或中风邪发散未尽,或欲后阴虚外寒所侵,又或恼怒伤肝,郁结伤脾,荣气不从,逆于肉里;又或跌打损伤,瘀血凝滞;或产后恶露未尽,流缩经络,皆成斯疾也。初起外以琥珀膏敷贴,内服行气活血之剂,其中十可消其五、六。如不得内消者,法当大养其气血,培助脾胃,温暖经络,通行关节,如木香流气饮,十全大补汤,俱加熟附子、香附,培助根本。庶未成自消,已溃自敛,不致残败破漏不敛之证。且如有脓宜急开之,忌用寒凉克伐内消等药,犯此终致不救者多矣。《理例》。

朱丹溪曰:凡人身上中下有块者是痰。然痰在皮里膜外,则遍体游行,肿而色白,滞而不痛,宜导达疏利。如痰因火动而走,则体多小块,色红痛甚,流走无定,宜解毒清火为主。

又曰:痰在皮里膜外,非姜汁、竹沥不能通;痰在胁下,非白芥子不能达。白芥子亦能散皮里膜外之痰气,竹沥滑痰,非姜汁不能行经络,痰在四肢,非竹沥不开。

申斗垣曰:三阳经伤寒发汗不透则必痛,痛久则肿,肿久则必为热,热久则破坏,此名阳湿痰破疮。如三阴经失汗,汗郁成痰则痛,痛久则皮色不变而肿,至夜痛反甚,其痛处冰冷,脉亦沉细,日久气血凝注则肌死,肌死则破坏腐臭,名曰阴湿痰破疮。均宜艾灸。《启玄》。

又曰:冷流注多附骨,硬不消,骨寒而痛,筋缩不能伸屈,庸俗误用刀针,又无脓血,止有如屋漏汁,或瘀黑血,宜用回阳玉龙膏;如稍缓,再加军姜、肉桂、白芷、草乌等分,热酒调敷,则骨寒除而痛自止,气温

和而筋自伸,肉亦软而肿自消。亦不可无石菖蒲,以其性能破坚,散肿最妙,亦不可多,多则解群药性也。

又曰:流注首尾敷冲和膏最稳,加乳香、没药治流注筋不能伸,敷之极效。

又曰:走散流注发因受寒冻,凝滞血脉而成。一名流注伤寒,又名瓜藤发背,患生于背,遍身皆有之。经云:伤寒流注尚犹可,流注伤寒急如火。医者当察其寒热虚实治之。

胡公弼曰:流注又曰走注,状似螳形,毒因风盛而生热,气因热盛而走散,午前宜四君子汤加芎归;午后宜四物汤加参耆、麦冬、北五味。断不可用渗利流气等药。《青囊》。

又曰:治流注大法,郁者开之;怒者平之;闪扑及产后瘀血者散之;伤寒余邪者调解之。大要以固元气为主,佐以现证之药。

又曰:流注一个,要表汗一次,如流注三个,须表汗三次,毒自消矣。投治之不早,深为大害。

又曰:如破溃成脓者,先用降药降去败肉,腐尽生肌可也。

《医林集要》云:白虎飞尸留连周期,或展转数岁,冷毒朽骨出尽自愈。若附骨腐者可痊,正骨腐者则为终身废疾矣。

又曰:又有结核在项腋或两乳傍,或两胯软肉处,属冷证也。又有小儿宿痰失导,致结核于颈项臀膊胸背之处,亦冷证也。并宜热药敷贴。

王西圃曰:流痰胸腹流于四肢者可治,四肢流入胸腹者难治。

《心法》曰:流注新发,漫肿无头,皮色不变,凝结日久,微热渐痛,透红一点,方是脓熟,即宜用针开破。若湿痰化成者,脓色黏白;若瘀血化成者,脓色黄黏水;若风湿化成者,脓色白稀如豆汁;若汗后余邪化成者,脓色或黄或黑,稀脓臭秽;以上四证,发于肉厚处可愈,发于骨结及骨空处难愈。若淫欲受寒化成者,脓色稀白而腥,其水中有猪脂水油之状,此为败浆脓也。诸书虽有治法,终成败证。

冯鲁瞻曰:按脏腑津液受病为痰,随气升降,理之常也。若在皮里膜外及四肢关节曲折之地,而脏腑之痰何能流注其所,此即本处津液遇冷遇热,即凝结成痰而为病。断非别部之津液,受病成痰,舍其本位

而移于他部者。况气本无形,故能无微不达,而液随气运,亦可藉气周流,若至津液受病成痰,则变为有形而凝滞,焉能随气流通于至微至密之所耶。

试痰法:用海蜇皮贴上,外以膏贴之。如痰,次日膏药揭得下,海蜇皮揭不下,即是害痰。

湿痰^①流注门主方

香附饼《正宗》。 治风寒流注袭于经络,结成肿痛。

香附为末,酒和,量疮大小做饼覆患处,热熨斗熨药饼上。未成者自消,已成者自溃。风寒湿毒宜姜汁作饼熨之。

醒脾汤《正宗》。 治怀抱郁结,思虑伤脾,以致脾气不行,逆于肉里,乃生壅肿,疼痛不眠,心烦不安,神气不清。

人参 白茯神 白术 嫩黄耆蜜炙 酸枣仁炒,研 远志肉各一钱
地骨皮七分 桔梗 柴胡 川黄连 广木香 炙甘草 香附各五分
圆眼肉七枚

姜三片,枣二枚,水二盅煎八分,不拘时服。

琥珀膏《正宗》。 治一切皮色不变,漫肿无头,气血凝滞,结成流毒。毋论身体上下,年月新久,但未成脓者并效。

生大黄二两 郁金 白芷 天南星各一两

共为细末,用大蒜去壳捣烂,入上药再捣,略入酒一、二匙调匀,遍敷肿上,纸盖。随有热痛,又有不痛,俱待药干便效。次日又有起泡,又有不起泡者,如有泡起,挑去泡中黄水,以膏贴之,自效。

调中大成汤 治流注溃后,脓水清稀,饮食减少,不能生肌收敛。

人参二钱 白术 嫩黄耆炙 陈皮 当归身 山药 白茯苓 白芍药酒炒 牡丹皮各一钱 远志肉 砂仁 藿香 炙甘草各五分 熟附子 上肉桂各八分

① 湿痰 原本脱,据目录、主论补。

煨姜三片，黑枣二枚，煎，食远服。

黄耆六一汤 治流注溃后脓水出多，口干作渴，烦躁不宁。

嫩黄耆六钱，生用蜜炙各半 粉甘草一钱五分，生炙各半 人参一钱
水煎，食远服。

木香饼 治一切气滞结肿成核，或痛或酸，闪肭风寒所致。

生地黄捣膏 广木香减半，研末

和匀，量患处大小，作饼置肿上，以热熨斗熨之。坚硬木痛者，间日熨之自效。

流痰浑身作痛

当归 瓜蒌仁 独活 大川芎 白茯苓 白芷 白芍药 连翘
防己 穿山甲炒 防风 生地黄 金银花 牛膝 天花粉 黄芩
陈皮 川贝母 甘草各五钱

分作六剂，酒水同煎。若上半身痛，食后服；下半身痛，食前服；如遍身痛，只用酒煎，神效。

火龙膏 治风寒暑湿，毒袭经络，筋挛骨痛；或肢节烦痛，湿痰流注作痛，不能行步。鹤膝风、骨节风疼痛，其效犹速。

生姜半斤取汁，牛皮胶二两，入锅内化开，入乳香、没药末各五钱，麝香一钱，调匀待温，摊贴患处。

湿痰流注奇方 赵若予。

木瓜一个 当归五钱 甘草三钱

细酒一斤同煎减半，再加研细乳香、没药各一钱，露一宿，空心热服。未溃自消，已溃自敛。

湿痰内消方

宣木瓜五钱 紫花地丁一两五钱

腊酒二斤煎好露一宿，看证上下，分食前后服。

内消湿痰流注神方

吉祥草根洗净，捣汁半酒杯，和酒冲服取汗即消。且不生疮毒。

锦囊秘授神效观音救苦丹 冯鲁瞻。 神治一切风寒湿气，流注作痛，手足蜷挛，小儿偏搐，口眼喎斜，妇人心腹痞块攻疼，不问年深月久。将药置患处，以灯火点着，候至火灭，连灰罨于肉上，立见痊愈。

重者用药米粒大，轻者用药粃粒大，只须一壮，不必复灸。若患处阔大，连排数壮，一齐灸之，且灸时不甚热痛，灸后并不溃脓，一茶之顷，痼疾如失，屡试屡验，真神方也。固思济之一方，不若利之天下；惠之一时，不若泽之后世，特附于锦囊之中，以广厥传。愿后贤以为半积半养之珍，幸勿专为嗜利之具。

麝香一钱 朱砂二钱 硫黄三钱

各研细末，先将硫黄化开，次入朱麝同化，倾入磁器内候干再研末，隔火化开，候开切作如粃米大，贮磁瓶内，慎勿出气，珍藏听用。

一切肿块湿痰流注

鲜山药 天麻各五钱

酒水各一盅煎服，三剂全消。

敷痰贾颂周 大蒜头十数枚，去皮入皂矾三钱，捣烂听用。用香一炷点起，将药敷患上，以一炷香尽为度。

如是痰即现青红色，如只红色，则非痰也。如其是痰，隔日敷之，三次自消。

又方

天南星 大黄 白芨各等分

研细，姜汁和醋调敷。

又方

白萝卜叶 扁柏叶向北者 干面各等分

研细。醋调敷，日易一次，自消。

敷湿痰肿痛，痈疽发背，无名肿毒

五倍子 瓦焙黄色 生半夏 生南星各等分

共研细，同滴醋熬数沸，加葱姜汁调敷患处留头。如药干用醋不时润之，至重毒证，不过三、四次即消。

敷痰法 生山药一段，洋糖、飞面共捣烂涂敷自消。

摩腰紫金丹《活人录》。风寒湿三气而兼痰饮，留滞于经络血脉之中，闭塞不通而痛，并治腰痛。

附子尖 乌头尖 天南星各二钱五分 雄黄 樟脑 丁香各一钱五分 吴茱萸 肉桂 朱砂 干姜各一钱 麝香二分

蜜熬葱汁和丸如鸡头子大。每丸以姜汁化开，敷涂患处上，贴万灵膏或蠲痛膏。

蠲痛五汁膏 寒湿气袭于经络血脉之中为痛，痛于两臂两股腰背环跳之间。

凤仙梗捣汁 老姜汁 蒜汁 韭汁各等分

熬至滴水成珠，用蓖麻子油同黄蜡收起，每以此膏烘热贴上，迫出湿气水液自愈。

消痰方 岩花研末一钱，枣肉捣匀为丸。在上食后服，在下食前服，白汤送下，即便出秽痰，其肿立消。但此法宜施于壮实初起之人，须忌甘草。

又方

乳香去油 没药去油，各一钱 川贝母去心研，二钱 连翘八钱 万年青三片

煎服自消。

雷火针 风寒湿气痰滞于经络血脉之中，闭塞不通而痛。

蕲艾一两 朱砂二钱 穿山甲土炙 桃皮 草乌 川乌 乳香 雄黄 没药 硫黄各一钱 麝香五分

共为细末。以蕲艾和纸上，入药末三钱卷成筒，如爆竹式，择吉日将药筒入瓶内，以箬叶油纸封口，埋屋下地中四十九日取出任用。此针能针百病，可于患处用青布或红布折二十四层，将针灯上点着吹息，隔布针之。患内暖极即止，不过三次即愈。

治因风郁痰生于颈项，皮肤肿硬白色，不甚疼痛《说约》。 天南星、半夏研末，姜汁调敷。或南星半夏末姜汁和饼，隔蒜灸更妙。

消痰神方 新鲜针线包，不拘多少，捣烂敷上自消。

痰注臂痛汤

天仙藤 白术 羌活 白芷各三钱 姜黄六钱 制半夏
每服五钱，姜五片，水煎服。

湿痰肿痛经年不能行者单方。

水红花 花椒 萝卜莢 甘草 槐花 金银花 苍术 白凤仙花 水龙骨各等分

稀荳草煎熏患处，水稍温即洗之。

神仙外应膏《秘方》。川乌一斤为末，用陈醋入砂锅内，慢火熬如酱色敷患处。如病一年，敷后一日发痒；二年，二日发痒。痒时令人将手拍痒处，拍至不痒为度。先用升麻、皮硝、生姜煎水洗，然后敷药，不可见风。

湿痰流注，初起肿痛无头，皮色不变，久而不治，则发热作脓。知觉早者于未破时急服此方十余剂，即能内消，最称灵验。

橘红 防风 秦艽 木通各一钱 真胆星二钱 川贝母 僵蚕炒
桃红炒 五倍子 金银花各三钱 防己八分 白甘遂刮去皮末，七分 皂
角子鲜者敲碎，九个 肥皂子鲜者敲碎，十个 土茯苓磁锋刮皮打碎，四两

虚弱人加石斛、薏仁各一钱，痰在头顶胸者加夏枯草一钱，痰在背脊者加羌活五分，痰在胁肋者加柴胡五分，痰在肚腹者加赤芍、泽泻各一钱，痰在臂者加独活五分，痰在腿脚者加木瓜一钱，牛膝一钱五分。

上用河水九碗。砂锅内煎三碗，每日早中晚各热服一碗。如痰在心之上者，食后服；痰在心之下者，食前服；如虚弱人分二剂，极虚者分三剂，小儿分四剂。忌食盐、酱、茶、醋、猪肉、鲜鱼、鸡、鸭、鹅一切发物，煎炒姜椒，烟酒生冷。但药内有甘遂与甘草相反，恐别样丸散内有甘草者，切不可服。已破头者止服四、五剂，使气血调和，不至又流他处，随服十全大补汤加川贝母二钱五分，石斛二钱，滴乳香去油四分，须服数十剂方能痊愈。若系多火之人，十全大补汤内减去肉桂。《愿休集》。

治流注抄本。

石膏一两 官硼三钱

飞面作十丸，将丸穿一孔，贯以铁线，炭火煨红，取酒一碗投入，令又烧红，入酒内，以丸尽为度。待酒热即服，一日二服，自消。

又方

金银花 红花各三钱 地榆 苦参各二两

酒水各半煎服。近者三剂，远者七剂即消。

神验方周鹤仙。用姜黄母子，是大姜黄身上小钉子是也。研末。将小红枣去核，药末入内填平，用丝棉扎紧，塞入鼻孔内，随量饮醉，盖暖出

汗。已溃者自然痊愈，未溃者内消神效之极。鼻孔照男左女右塞之。药不可经妇人手。

又方

野花椒 山茱萸各半斤

用酒浸煮三炷香冷定，将酒尽量饮醉，发汗一身，其毒自散，神效。

又方 金银花带叶和酒糟研烂，用净瓦罐盛药，火中煨热，敷患处立愈。

湿痰初起一剂消蕴公和尚。

归尾 大贝母 黄芩 川牛膝 木瓜 白茯苓 槟榔 陈皮各一钱 牡蛎 金银花 土木鳖 白僵蚕各一钱五分 熟大黄三钱，一方去大黄，用扬州产红芽大戟加五分、加至一钱八分止，取效更速

用无灰酒一斤煎一半，空心热服取汗，行二、三次，渣用酒半斤煎四两，再服。

立消浑身上下湿痰，并消一切无名肿毒

穿山甲大片者土炒，七钱 闹羊花一两 猪牙皂炒，一钱 羌活四钱

共研细末。每服一分八厘，加洋糖三钱，热酒调下。

消痰神方杨惊愚。无论流痰痰核。如已经贴有膏药敷药，内脓已成者，务将膏药揭去，敷药洗净，然后服药一服，十消五、六。至重者不过三服。

穿山甲炒 生大黄 生明矾各四两 杏仁去皮，二两

上四味俱用碾槽研极细末，切不可磨，若磨则不效。每服三钱，痰在上部食后服，痰在下部食前服，俱用木瓜酒调下。孕妇忌服。

流痰

紫花地丁一两五钱 宣木瓜五钱

蜡酒二斤煎一斤，露一宿。痰在上身食后热服，痰在下身食前服之。每日一剂，三日后自消。修服时忌经妇人手。

敷流痰王西圃。

生大黄 天南星 白芨各等分

共研细末，生姜汁，江醋调敷。

敷流痰张渔山。

白萝卜叶捣 朝北扁柏叶捣 飞面

和杵敷上，一日一换，即消。敷上宜盖暖出汗。

敷痰徐声士。

土子漆匠熬桐油的 生半夏 川乌 生南星 草乌各等分

研细末，桐油调敷。

敷痰

石灰 当归尾 皮硝 穿山甲 川乌 薄荷叶 草乌各五钱 生
大黄一两

研细末。盐卤打糊调敷。

湿痰流注

葱汁一饭碗 凤仙花一棵捣汁，如无鲜者即用干者一棵研末

先将二汁熬稠，入广胶二钱熔化，再加入人中白细末二钱，和匀摊膏
贴。

又方

蒜瓣三十瓣 皂矾三钱

共捣烂，敷一炷线香时即洗去；次日再敷。起泡无妨。

又方

乳香去油 没药去油 雄黄各三钱 麝香三分 大蜈蚣一条

研细末。用黄蜡三钱熔化为丸。每服三钱，陈酒送下。随量饮醉
出汗自消。

湿热流注杜秘。

连翘心八钱 乳香去油 没药去油 广木香各五钱

引加万年青叶七片，开口花椒四十九粒，水煎服，后饮木瓜酒。

体壮人加黑白丑一钱。

消痰吴天序。

甘草三钱 金银花 羌活 天花粉各一两 蒲公英 紫花地丁各二

两

白水煎，加无灰酒尽量服，出汗如糊，一剂即消。

消痰胡学海。

猪牙皂一钱五分 蜈蚣三条 全蝎五个 乳香去油 川贝母 穿山

甲 明雄 没药去油,各三钱 麝香五分

共研细。黄蜡熔化为丸。每服三钱,木瓜酒下。

消三十六种痰块仙方刘介华。

九头狮子草 川贝母甜味者佳,各一斤

共磨细末,无灰酒为丸。大人每服三钱,小儿减半,木瓜酒送下,或开水亦可,不过三服必消。孕妇忌服。

消痰神方

黑枣八两,去皮核 老鼠花买三文钱,研细

同枣肉为丸如核桃大,每服一丸,白汤嚼下。如是痰,服后必腹痛,吐的也是痰,屙的也是痰。候行过数次,用温粥一盏吃之即止,其痰即消;如未消尽,明日再服,消尽为度。

痲痛门主论

风寒气郁于皮毛,致血不荣于肌表,皮槁多痛,手足似无皮之状,是痲苦生焉。先将葱汤洗净,润肌膏擦之,就暖勿见风冷,自愈。如每逢冬即发者,须三伏时晒捣烂大蒜,间擦三次不再发。经云:寒因热治,其理甚明。

伤寒瘥后发肿门主论

伤寒愈后浮肿,若因水气者宜利之,若胃虚食少者,宜五苓散加苍术、陈皮、木香、砂仁之类;胃不虚者,以商陆一味煮粥食之亦妙。伤寒大病瘥后足肿者不妨,但节饮食,戒酒色,胃气强,肿自消也。

伤寒身痒门主论

凡阳明反无汗,皮中如虫行者,胃主肌肉,阳明久虚也;宜术附汤、黄耆建中汤主之。如风热盛,身痒发热无汗,口燥舌干,大小便秘涩者,宜防风通圣散加羌活主之。如风证身痒者,宜小续命去附子加白

附子主之。如血虚身痒者，宜四物汤加浮萍、蒺藜、防风主之。身上虚痒者，是血不荣于腠理也，用四物汤加黄芩煎调浮萍末服之。

肿块门主论

虚怯人气血乖违，肢体患肿块，或痛或不痛，或风袭于经络，肢体疼痛，或四肢筋挛骨痛，宜用葱熨法，其肿自消。此外补阳气而运散壅滞之法也。

肿块门主方

葱熨法 葱头切细捣烂，炒热熨患处。冷则易之，再熨肿处自己。即跌打损伤肿痛，亦用此法。

凡有肿块处，糯米一、二合炊饭或粽子煮熟，乘热入盐少许，加切碎葱数根，白酒曲一小丸，同捣极烂如膏，烘热贴患处，油纸及布包缚住，自消。

又方 白酒曲一、二丸为末，炒枯热酒调敷，即可内消。

消块止痛丹《冰鉴》。

人参 半夏 白术各三钱 黄耆 薏苡仁 白茯苓各五钱 羌活 防风各一钱 桂枝五分

水煎服。二剂轻，四剂止，二十剂消尽。

汗斑门主论

张仲景曰：汗斑乃暑热之时，人不知而用日晒之手巾，揩其身上之汗，便成此病。最无害而难愈，宜内服苍耳丸主之。

汗斑门主方

验方

硫黄 铅粉各等分

共研细，用生姜切片蘸擦。初则变黑，次则转红，红退则愈。

又方

密陀僧 铅粉各等分

研匀，生姜蘸擦。

又方 用厚布一尺，以白砒研极细末，鸡蛋清和匀，浆于布上，拍匀晒干，不时擦之，数日即愈。兼治一切顽癣如神。

汗斑肥皂

硫黄 雄黄 白砒 明矾 密陀僧各一两 肥皂去筋弦膜，净六两

共捣为大丸，擦汗斑上，停一顿饭时，洗去。将手巾另用清水搓过。切不可擦脸，恐有气息攻目。

汗斑钱怀谷。 先将生姜切片擦汗斑上，再以姜汁调川贝母细末搓上，过宿洗去。

汗斑 粗厚布一块，用瓦上青苔不是瓦上长瓦松。将井水洗净捣汁，浸布晒干，用白芷一两，硫黄五钱同炒研细，以鸡蛋清调匀，浆在布上晒干，以布擦斑上，自愈。

又方

密陀僧 硫黄各一钱 冰片一分

研细，烧酒调搓。

又方 白硼砂研细擦之，即愈。

汗斑杨惊愚。

北细辛 白芷各二钱 硫黄一钱

共研极细末，用花红连蒂切一片，蘸擦除根。

赤白汗斑刘进士。

雄黄 硫黄 全蝎 白僵蚕 白附子 密陀僧各五分 麝香

共为末，蘸生姜于患处擦之。五日除根。

卷之十二

痘疹部

自痘疹主治诸方,以及痘疗、痘痈,皆汇于此部中,以便检阅参治。

痘疹门主方

夹热见痘,大小便红,血热甚者《郡公一百三方》。

当归 白芍 牛蒡子 升麻 黄连 熟地 枳壳 山梔 地骨皮 木通 水煎服。

痘上面收完,足下收迟,声音不亮

天花粉 桔梗 甘草 柯子肉 防风 陈皮 白茯苓 葛根 石膏 灯心引煎。

痘满面连肉一片红者

升麻少许 陈皮 紫草 红花 枳壳 甘草 黄连炒 黄芩炒 生地 木通 苏木 水煎服。

痘顶陷稠密者

人参 桔梗 川芎 白茯苓 白术土炒 甘草 白芷 生黄耆 紫草 防风 穿山甲炮 水煎服。

痘内中有大紫泡者

红花 淫羊藿 白术 白羊粪 甘草 水煎服。

痘口鼻中并出蛔虫者

防风 当归 黄连 直僵蚕 木通 熟地 牡蛎 牡丹皮 水煎服。

痘饮食挫喉痰涎盛者

桔梗 熟地 防风 陈皮 川贝母 麦门冬 瓜蒌仁 厚朴
北五味 杏仁 牛蒡子 天花粉

水煎服。外用山豆根磨水漱口。

痘灰白全无血色者

人参 白术 当归 甘草 黄耆 白芍 熟地 肉桂 川芎
穿山甲炮 水酒各半煎服。

痘泄泻不止者

人参 白术 广木香磨汁^① 诃子肉 麦门冬 肉豆蔻面包煨去油
乌梅

枣引煎，加入牙，煨、乳，酒调服。

痘胸腹胀闷乱气促者

赤茯苓 川芎 当归 熟地 山楂肉 麦门冬 槟榔 枳实
木通 枳壳 大腹皮 泽泻 水煎服。

痘初出血点皮肉白者

生地 黄连炒 枳壳 牡丹皮 陈皮 紫草 木通 川芎 甘草
枣引煎半熟时，加当归。

痘黑陷成斑摸不得手者

升麻 紫草 陈皮 牛蒡子 熟地 枳壳 红花 穿山甲 黄
豆四十粒 生地 糯米引煎服。

痘自首至尾热不除者

地肤子 连翘 当归 柴胡 地骨皮 甘草 牛蒡子 前胡
防风 紫草 黄芩 生石膏 水煎服。

痘遍身作痒者

人参 川芎 生地 何首乌 白芍 淫羊藿 生黄耆 穿山甲
白茯苓

姜枣引煎服。如不止宜烧灯火。

痘后泄泻不止者

① 磨汁 原本脱，据达安堂本补。

人参 白茯苓 白术 广木香 川芎 白豆蔻 肉桂 诃子肉
山药 香附 姜枣引煎服。

痘狂乱语言不正者

人参 远志肉 茯神 天门冬 山楂 石菖蒲

灯心十四根,用水煎服。若还不愈,用滑石、辰砂各三分、冰片五厘、灯心汤服。

痘将收靨遍身黑陷脓臭湿烂者

防风 羌活 桔梗 荆芥 柴胡 黄柏 木通 甘草 水煎服。

痘如十二、三朝不能靨者

人参 何首乌 黄耆各一钱

水煎,入象牙,炒黄色一钱研,调服。

痘初起吐泻不止者

陈皮 半夏 直僵蚕 山楂 白茯苓 黄豆七粒

姜枣引,煎服。

痘初出大热稠密半隐肌肤者

牛蒡子 防风 升麻 白术 白芍 水煎服。

又方

荷叶 丝瓜穰 麻黄 肉桂 甘草 紫草 蝉蜕 水煎服。

神灯照 解痘靨转凶为吉歌。痘不起兮怎奈何?我有神灯通窍多,照动干坎方为主,次照大处①太阳窝,一日三次周流照,其痘中间定发窠,此法上仙留下世,医家少会照沉痾。

紫草上 白芷上 沉香中 北细辛中 三奈中 乳香中 檀香中
肉桂下

共乳细末。将药卷入纸条内,用麻油、黄蜡各五钱熬化,将药捻拖之,燃照痘儿面部周身,一日数照,以解其靨。

异功散 治痘风寒,滋气血,和阴阳,救表里。

人参 广木香 陈皮 肉豆蔻 官桂 白茯苓 当归 熟附子
厚朴 母丁香 半夏 白术 姜枣引煎服。若还用之不当,只消一服即

① 大处 达安堂本作“天庭”,义长。

亡。

小异功散 治痘喘嗽。

人参 麦门冬 杏仁 北五味 陈皮 白术 水煎服。

温中汤 治痘三朝，身凉不渴，口气冷，痘淡白，二便清利。

陈皮 厚朴 人参 白茯苓 黄耆 官桂 半夏 当归 川芎
熟地

姜引煎服。泄泻加白术、泽泻；再不止加诃子肉、肉豆蔻，能保脾胃，助气血，数剂必灌稠浆。

托里汤

人参 黄耆 当归 防风 青皮 生地

水煎服。痘不起速服，莫待痘苗枯。

内托均气散《十二仙方》。 治痘初热。

苏叶八分 干葛七分 广木香六分 黄耆 川芎 甘草各五分 桔
梗四分 白芍 紫草各三分

笋七片引煎服。

苏发散 治小儿感冒，伤寒伤风，咳嗽流涕。

苏叶 陈皮各一钱 苍术 甘草各七分 厚朴 枳壳各三分 葱引
煎服。

灌脓起顶汤 治痘不起发。

人参七分 黄耆二钱 白芷 甘枸杞各一钱 淫羊藿 川芎 甘
草各五分 黄豆七粒

姜枣引，煎服。

结靥散 治痘不收作痒。

白芷一钱 何首乌七分 川芎 甘草各五分 木通 蝉蜕各三分
白术 荷叶各二分 水煎服。

坚肠汤 治痘泄泻

黄耆 白术 肉豆蔻各一钱 山楂肉七分 川芎五分 升麻三分
枣引煎服。

镇胃散 治痘呕吐不止。

藿香 砂仁 白术

姜、枣、糯米七粒引，煎服。

利咽散 治痘咽喉疼痛，难进饮食。

山豆根一钱 桔梗七分 甘草一分 元参一分五厘 绿豆十粒 水煎服。

通肠汤 治痘大小便秘结如神。

黑芝麻三钱 大黄 滑石 枳壳各一钱 当归五分 绿豆七粒 水煎服。加牛膝一钱引经易下。

滑利散 治痘小便不通。

木通三分 茯苓七分 泽泻五钱 灯心二十根 水煎服。

定疼散 治痘肚疼或冷气。

神曲 山楂 当归 熟附子 良姜 甘草 枣引煎服。

斩关散 痘鼻血不止。

生地 牡丹皮 黄芩各五分 茅根 升麻各三钱 藕节一钱 绿豆五十粒引，煎服之。

夺命丹 治小儿风搐痰气，急慢二惊如神。

西牛黄 青黛 甘草各一钱 郁金 明天麻 白僵蚕 白附子 全蝎去头、足 茯神 蝉蜕去头、足 陈胆星各二钱 钩藤钩 桔梗 朱砂各五分

研细蜜丸芡实大，金箔三十张为衣。每服一丸，金银花煎汤调服。

神验稀痘丹 预服可免痘疮。

丝瓜蒂烧存性五钱 西牛黄一钱 辰砂七分 蟾酥乳化二钱 共为细末。一岁一分，砂糖汤调服。

大解散

黄耆 羌活各二钱 赤芍药 桔梗各七分 白芷 黄连 甘草各五分 地肤皮 川芎各三分 明天麻二分 水煎服。

紫草透肌汤

紫草二钱 防风 荆芥 薄荷 山楂肉 梔子 甘草各等分 水煎服。

笑逢散

山梔仁 蝉蜕各等分 水煎服。

七贞汤 治痘二、三日可服。

升麻六钱 川芎五分 甘草三钱 薄荷八分 淫羊藿一钱 穿山甲土炒二片 水煎服。

牙托散

人牙人乳制过，一个 麝香二分

研细，生酒调服。

拔疔丹 治痘疔。

雄黄 朱砂 白芷各等分

乳细，油胭脂调用，银针挑破搓之。

实肠汤 治痘泄泻。

白术土炒一钱 赤石脂五分 甘草四分 龙骨三分 枯矾二分 水煎服。

淫羊补浆汤 治痘不灌浆。

淫羊藿 人参 白术土炒 穿山甲炮，各二钱 防风 生地 甘草 川当归 黄豆炒，各三钱 官桂 广木香 川芎 白芷 陈皮各一钱 白茯苓 黄耆各五分 糯米五钱

竹笋煎汁当水煎，不拘时服。

益气收浆汤 治痘不收靥。

何首乌 白芍 黄耆 桔梗各二钱 人参七分 白术三钱 陈皮 砂仁 甘草各一钱 山楂肉一钱二分 米泔水煎服。

升天散

杏仁 防风 甘草 麻黄 梔子 干葛 干姜各五分 水煎服。

升麻剂

升麻 肉桂 猪苓 泽泻 白茯苓 黄耆 甘草各等分 乌梅一个 水煎服。

清血退心汤

麻黄 山梔 官桂 姜黄 蒲黄 木通 连翘 甘草各等分 水煎服。

独活消痰饮

半夏 天南星 干葛 羌活 木通 甘草各等分 水煎服。

解毒散

黄芩 梔子 连翘 乌梅 苏薄荷 甘草各等分 水煎服。

开关散

直僵蚕炒去丝一钱 陈胆星 麝香各二分 水煎服。

阴阳汤

黄耆 白茯苓 白术 山楂肉 甘草 木通 砂仁 杏仁各等分 水煎服。

化积止利汤

神曲 广木香 槟榔 黄连 砂仁 麦芽 水煎服。

败毒清凉饮

防风 白芍 白术 羌活 黄耆 独活 杏仁 甘草 梔子各等分 水煎服。

水杨柳汤

水杨柳春冬用根，秋夏用枝叶，五斤

水一大锅，煎五、六沸，先用数勺于木盆内，以手探试，不可太热，慢慢添汤洗之，拭干，然后以神灯照其周身，如陷塌处有晕脚起系，便是浆影也，后必满足。倘若不满，又如前法洗之。如虚弱者只洗头面四肢；若洗照不起发者，则津液枯槁难治矣。

四味升葛汤 治痘三日前后可用。

升麻 葛根 芍药 甘草 水煎服。

和劝汤

升麻 葛根 芍药 甘草 人参 川芎 羌活 防风各等分 水煎服。

四配清中饮 治痘七日前可用。

当归 芍药 甘草 大黄 水煎服。

解毒三贤饮 治痘十四日前后可用。

鼠粘子 荆芥 甘草 水煎服。

连翘饮 治痘十四朝用。

连翘 荆芥 芍药 鼠粘子 当归 木通 防风 滑石 瞿麦 车前子 蝉蜕 梔子 黄芩 柴胡 甘草各等分 水煎服。

参苏饮

人参 紫苏叶 半夏 陈皮 甘草 前胡 桔梗 枳壳 干葛各等分 水煎服。

四苓汤 止水泻。

猪苓 泽泻 白术 白茯苓 水煎服。

白螺散 治痘不收靥。

古土墙上白螺蛳壳洗净煨，乳细末，干掺。

金华散 治痘后肥疮，疳疮、疥癣，能凉肌解毒收水。

黄丹 黄柏 黄耆 黄连 大黄 轻粉 麝香

共乳细。湿疮干掺，燥疮熬猪油调搽。

加味平胃散 治小儿吐乳吐食，泄泻伤寒等证。

苍术八分 芍药一钱 白术 神曲 陈皮 厚朴各五钱 白芷甘草各三分

上为细末。人参汤调服。吐泻相兼，用木香汤下。饮食不思，山楂汤下。烦躁口渴，麦冬汤下。二便不利，木通汤下。夜间啼哭，元胡青皮汤下。诸般杂证，米汤下。肚痛不止，芍药花粉汤下。

四仙汤 此为治痘之主宰，而君臣佐使，出入加减，全在慧心。

淫羊藿 陈皮 天门冬 甘草

姜三片，枣三枚，水一盅煎七分服。痘肚痛、渴泄、气促，加天花粉二分、白茯苓三分。痘身热见红粪，加牡丹皮、赤芍、黄芩、黄连、甘草。痘身热，大小便不利，加木通、灯草。痘身热暴躁，心神不安，加枣仁、黄芩、天冬各三钱。痘根窠不红，加人参、白术、黄芩，入人牙为佐。痘不红润，加人参、白术、当归、木香、地黄。痘前后吐泻，加白术、藿香、白豆蔻。痘泄泻不止，小便不利，加白豆蔻、陈皮、诃子、白芍。痘饮食挫喉，加桔梗、贝母、僵蚕、上香^①。痘咬牙寒战加附子、桂枝、丁香少许。痘口裂，加生地、天门冬、枯苓、白茯苓、葛根。痘初热惊风，加僵蚕、天麻、乌梅、朱砂。痘咬牙，加人参、丁香三粒。痘顶陷，加紫草、蝉蜕去头、足，糯米四十九粒。痘头足冷，加附子二片，广木香二分。痘手指冷，加附子、干姜各三分。痘鼻流清涕，加苏叶、桔梗各一钱。痘泄泻，加诃子、肉桂、麦冬。痘痰壅呕吐，加藿香、生姜各五分，杏仁三分。痘鼻中出血，加犀角、赤芍、生地、天门冬。痘汗出不干，加黄耆一钱，浮小麦四十粒。痘初出遍身黑色者，加丁

① 上香 光华堂本作“麝香”。

香一粒，陈皮、白术、砂仁。痘唇口相连者，加麦冬、梔子酒炒用。痘前后舌疼者，加麦冬、石膏、知母。痘大小便结，加木通、灯心、车前子。痘手足拘痠，加木瓜、牛膝、桑寄生，量日期加减。痘牙黑，加黄连、香白芷。痘发疗毒，加荆芥、梔子、牛蒡子。痘后失音，加诃子皮、桔梗、麦冬、五味子。痘后夜啼，加麦冬、青皮、生地、茯神、朱砂。痘后中风不语，加天南星、天麻、辰砂，春秋加麦冬、五味子。痘后腰痛，加地肤子、破故纸，量日期加此二味。痘吐蛔虫，加附子一片，丁香一个，人参二分，再将蛔虫烧灰，共研细末和服。孕妇痘，加苤根、砂仁各五分。

和中散

白术 陈皮各一钱 人参 藿香 白茯苓 甘草各五分 半夏八分
姜引煎服。

托里千金散

人参 当归各一钱 广木香 厚朴 甘草 香附各五分 川芎 白芍药各七分 白芷八分 桔梗四分 糯米四十九粒

鸡汁一盅，笋二两，煎服。

热痘未出者^①

升麻 紫草 苏叶 白芍 牛蒡子 甘草 山楂

葱白一根煎服。如表之仍不出，其痘势重可加败毒散，一岁用一分。

稀痘汤 看耳后红筋枝叶者，乃两经齐发未出者。

升麻 葛根 芍药 甘草各等分

水煎服。如一经发者加牛蒡子。

罩胎法 妊妇出痘，先护其胎，后再治痘。

人参 白术 当归 枳壳 赤茯苓 甘草 陈皮 防风 白芍
条芩 荆芥 桔梗 紫草 赤芍 白芷 柴胡 葛根 阿胶 砂仁 怀山药 川芎 糯米各等分 干柿蒂七个 野苳根七寸 甜瓜蒂一个

金器一件为引。入罐内以薄荷叶封口煎，空心服。如大热加郁金。

① 热痘未出者 光华堂本作“初发热痘未出者”。

换痘法 服之坏痘换为好痘，即痘之狼狽时亦可服。

穿山甲先以紫草汁煮过，再用甘草汁煮过，焙干研细，每用一两 绿萼梅浮瓣
六钱 西牛黄 麝香各少许

共乳细末，磁瓶贮。年长者每服八、九分，小者服五、六分，俱用绿豆、赤豆、黑豆、葱姜煎汤服。

救痘不灌浆，一服即灌 粉甘草不拘多少，切片入青竹筒内，上留一孔，以竹针塞住，外以荷叶油纸包扎数层，冬至日放入粪坑内，至春取起，阴干挂风头，每用三钱，研细，以参汤调下，即发臭汗一身，其浆即灌。

换痘法 大田螺三两，去壳取肉，入麝香三分，牛蒡子九分，捣烂用帛包裹数层，放在痘儿脐上，以熨斗熨脐，待其药纸俱干为度，大便出如黑糖之状，后用汤药一、二服可也。汤药方 干葛、白芍、牛蒡子、槐花、槟榔、甘草煎滚，再投大黄服，量人虚实如何，再用紫草透肌汤治之。

换痘法 煅山甲不拘多少入罐内，以蜡固口，放地上三日，入微火炙七次，取出研末，每次服一分，姜汤调服。

痘收气将绝

胎元 人牙人乳制 鹿牙人乳制 鸡蛋 黄耆 人参 纯阳草 白
木 陈皮 甘草各等分

共乳细末。用人乳姜汁调灌，即刻回生。

痘游移之间，初发热之时用为主

荔枝肉 元眼肉 大枣各七枚 糯米七十粒

姜引煎服，其痘即发出。

化癍汤 痘疮夹癍。

黄连 何首乌 连翘 马鞭草 木通 牡丹皮 蝉蜕 赤芍药
山梔 片黄芩 桔梗 牛蒡子 红花 白茯苓 紫草 生地 荆
芥 防风

水煎服。如大癍口燥加石膏。初起夹癍加葛根、升麻、浮小麦。初热时可加纯阳草。

眼中生痘疮急用此方

龙胆草 菊花 石决明 秦皮 甘枸杞 甘草 密蒙花 黄芩

木贼草 炒黄连 绿豆壳 升麻 谷精草 当归 白蒺藜炒，去刺猪肝四两 纯阳草 顺流水煎服。

牙疳落齿 落苏蒂烧灰入蚕茧内，以嫩松苗近水边生者，捣汁浸透，焙研细末，搓之。

痘时喘急火证 白花地丁三钱，水煎服即解。

三合散 治痘败痰火盛。四君子汤、四物汤、二陈汤各等分煎服。

犀角地黄汤 治痘血热失血。

生地 牡丹皮 白芍各等分

水煎服，磨犀角汁和服。

甘桔汤 治痘咽喉肿痛。

桔梗三钱 甘草一钱 煎服。

生脉散 治痘后灰白，气血两亏。

人参一钱 炙黄耆三钱 煎服。

四圣丸 痘后翳膜。

兔粪四两 家菊花二两 白蒺藜 甘草各一两

炼蜜为丸桐子大，每服三十九，菊花茶送下。

四宝丹 治痘疗。

珍珠三分 豌豆灰 血余各等分 冰片五厘

共乳细。以油胭脂调成膏，每以金银簪刺破将膏填入疮口，即刻红活矣。

痘疮黑陷倒靥干枯不起

蟾酥 冰片各二分 西牛黄一分 朱砂一钱 雄黄三分

共乳细。将猪尾血一钱八分为丸如小豆大，薄荷汤服一丸，即刻生动矣。

痘疮壮热大便秘塞

当归 白芍 甘草各等分 煎服。

大便不通 黄蜜熬至滴水成珠，捻好小指细，纳入谷道内，即通。如秘甚加猪牙皂角末和密条内导之。或猪胆汁、皂角末装葱管内，塞入谷道内，即通。

人虚痘不起浆

炙黄耆二钱 人参 白术 当归 柴胡 升麻 陈皮各一钱 甘草五分 煎服。

防痘伤目 用宁油即济宁油胭脂，涂眼眶上即免。

痘隐不起欲令速出 芫荽子一升同酒煎，不可泄气，待温去渣，除头面不可喷，只从项下喷至前心后心，手脚俱到，喷后包暖，片刻即现。

稀痘百龄方

黑芝麻不拘多少 甜甘草少许

煎服。初生小儿半小杯，作三次服，从洗三服至百日。周岁小儿至五岁，每晚服一杯。六岁至九岁，早晚各服一杯，可保永不出痘矣。

凡痘焦平黑陷全无生意 活公鸡一只约六斤以外者。山羊血一钱，伴饭与鸡吃，半日后将鸡去毛整煮，化为稠汤，取一碗与乳母服之，将乳与小儿吃，再用甘草白芍各五分，金汁一杯，煎好，入山羊血五分调服，少刻痘即转红活矣。

痘疮火证全闭不出 取河底淤泥遍涂婴儿身上，半日后洗去，即有红点现矣。

痘浆半起臭烂者

当归 大黄各五分

煎好调紫雪一分服。

痘疮喘吐

丁香 紫花地丁各一钱

同金银露煎服，即止。

痘疮大小二便秘燥黄赤者

赤芍一钱 黄连八分 冰片三厘

研细，开水冲服。

痘浆不起

白犬头上虱约二十个 镜台后壁钱要有子者一个

用瓦焙干，再用白鸡冠血数匙，酒酿数匙，共入盏内，用白鸽煨汤冲服，即可起浆。

痘疮灰白下陷 取修脚皮一撮煎汤服，即起。

十神解毒汤

当归梢酒洗 红花酒洗 生地酒洗 丹皮 赤芍 桔梗 连翘去心
蒂研 木通 小川芎 大腹皮洗净,姜汁拌晒各五分

水煎服。此方以凉血行血为主,而佐以桔、芎,有开提发散之义,引以腹通,有疏利之能,臣以丹、翘,有清解之良,视古方纯用寒凉冰伏热毒者大不同,痘已出未出,二、三日间,烦闷燥渴,小便赤涩,睡卧不宁者,可用之。

九味神效散 治痘初出稠密,红紫或带焦黑色者。

人参 牛蒡子 黄耆 紫草茸 甘草 红花 前胡 生地 白
芍各等分 水煎服。

荆防解毒汤 治痘夹斑,夹麻、夹丹俱可用。

防风去芦 荆芥穗 升麻各四分 黄芩酒炒 黄柏酒炒 元参 牛
蒡子炒研,各六分 水煎服。

四圣散

紫草 黄耆 甘草 木通各一钱 水煎服。

鼠粘子汤

柴胡 当归 连翘 牛蒡子炒研 黄芩酒炒 炙甘草 黄耆 地
骨皮各等分 水煎服。

保元汤

黄耆三钱 人参 甘草各一分

老生姜一片,大枣一枚去核同煎。有热者黄耆甘草生用,虚者黄
耆蜜炙甘草炒热,更加官桂五分治之。

异功散 治痘灰白痒塌,咬牙寒战,泄泻腹胀,治虚寒证,纯阴无
阳者。

人参 白茯苓 白术 当归 陈皮 厚朴姜汁炒 制半夏 丁香
肉果面包煨熟去油 木香 熟附子 官桂

加姜、枣,水煎服。先服去附子亦可。若内虚泻甚,又不可无附
子。

木香散 治虚寒证纯阴无阳者。

大腹皮黑豆汁洗净 人参 赤茯苓 前胡 诃子肉 半夏姜汤泡洗
七次 青皮去穢炒 丁香 官桂 南木香临时酒磨入 甘草各三分

生姜三片，枣一枚去核煎。如虚加黄耆糯米。

回生丹 痘灰白，虚寒吐泻，手足冷者，可用此方应急。

丁香九枚 干姜一钱 水煎热服。

八正散 小便涩秘，服导赤散不效，用此方。

赤茯苓 篇蓄 山梔仁 瞿麦 车前子 木通各八分 飞滑石二

钱 甘草四分

灯心一团煎，食前服。热盛大便秘者，加大黄一钱。

无价散 黑陷欲死者，用此应急。 用无病小儿粪阴干，将倾银罐二个上下合定，盐泥固济，火煅通红，取出为末，蜜水调服一钱。一方加麝香冰片少许。

升麻葛根汤 解发痘疹良方。

升麻 白芍药 葛根 甘草各等分 水煎服。

人参败毒散 解疫发痘疹之良方，又主腰痛，四时通用。

羌活 独活 前胡 柴胡 川芎 枳壳 桔梗 白茯苓 人参各等分 甘草减半

生姜三片温服。一方有薄荷。

柴葛败毒散 疑似伤寒，以此解发。

柴胡 苏叶 葛根 人参 羌活 防风 荆芥 甘草 桔梗姜引。

香苏败毒散 疑似伤食，以此解发。

香附 苏叶 苍术 厚朴 青皮 甘草 山楂肉 姜引。

双解散 痘疮表里俱实，非此不解。

防风 川芎 当归 白芍 大黄 薄荷叶 连翘各五分 石膏 桔梗 黄芩各八分 桂枝 荆芥穗各二分 滑石二钱四分 甘草一钱 姜引。

消毒保婴丹

缠豆藤黄豆或绿豆梗上缠绕细红丝者是也。八月间生，采之，阴干，一两五钱 黑大豆三十粒 赤小豆七十粒 新升麻 赤芍药各七钱五分 生地黄酒炒焙 牛蒡子炒 辰砂另研水飞 山楂肉各一两 荆芥穗 防风去芦 生甘草 川独活 当归酒洗 黄连去枝梗 桔梗各五钱 老丝瓜隔年经霜者二

个，取连藤蒂五寸，烧存性

上各研细和匀，用净砂糖丸如李核大，每服一九，浓煎甘草汤化下。

代天宣化丸 嘉靖甲午春，痘毒流行，病死者十、八、九，乃一厄也，时有预服三豆汤、丝瓜辰砂散，乃方书所载预解痘毒之法，靡不用之，未见其效。予窃思痘疹疫疠之毒，因岁运灾眚之变，难以药解，而人事未尽，又不可委之天数也。于是检阅古方，乃于韩氏医通得五瘟丹，以五运为主，喜曰此解毒神药也。依方修合，施售与人，但服之者，莫不轻疏，人皆神之，故名之。

甘草甲巳年为君土 黄芩乙庚年为君金 黄柏丙辛年为君水 黄连戊庚年为君火 山梔丁壬年为君木 连翘佐 牛蒡子佐 山豆根佐

先视其年所属者为君，次四味为臣，君药倍用，臣药减半，佐视臣又减半，共为极细末，于冬至日修合，取雪水煮升麻汁打面糊丸，辰砂为衣，竹叶煎汤下。

快斑汤 治起发迟。

人参五分 当归 防风 木通各一钱 甘草三分 木香 紫草 蝉蜕各二分 水煎服。

内托散 治气血虚损，或风秽冲触，使疮毒内陷，伏而不出，或出而不匀快，此活血匀气，调胃补虚，内托使之尽出，易收易腐。

人参 黄耆 当归各二钱 川芎 桔梗 厚朴姜汁炒 白芷 生甘草各一钱 木通 肉桂各三分

此方红紫黑陷属热毒者，去肉桂，加紫草、红花、黄芩。若淡白陷黑陷伏属虚寒者，加丁香救里，肉桂救表。当贯而不贯者，倍参耆当归煎熟，入人乳好酒温服。泄泻加丁香、干姜、肉豆蔻。

真人解毒汤 治痘母。

忍冬花八两 甘草节一两 木通 荆芥 防风 连翘各三钱 分三剂，水酒各半煎，以肿消痘出为度。

紫草饮 治痘疮黑陷不起。

紫草 芍药 麻黄 当归 甘草各等分 水煎服。

加味四圣散 治痘黑陷倒陷。

紫草 木通 木香 黄耆炙 川芎 甘草 人参各等分 蝉蜕十个

糯米百粒，水煎服。

元参地黄汤 治痘疹衄血。

元参 生地 丹皮 山梔 甘草 升麻各五分 白芍一钱 蒲黄炒五分 水煎服。

神应膏 敷护防痘入目。

黄柏一两 甘草四两 真绿豆粉一两五钱 红花二两

研细末。胭脂水同蜜调涂两眶四畔痘上。

麻黄汤 治痘初发热而喘。

麻黄 杏仁 甘草各等分 石膏加倍，一方无石膏有桑白皮

腊茶叶一钱煎服。

清金散火汤 治痘疹初发热而喘。

麻黄 苏叶 桔梗 牛蒡子炒 甘草

水煎服。如腹胀加厚朴、大腹皮。大小便秘加炒葶苈、梔子。

粉扑法 治汗出太多不止。

黄连 牡蛎 粉刺 贝母各五钱 粳米粉一升

为细末扑身上。

败蒲散 止汗。

故蒲扇烧灰，每服三钱，温酒调下三匙。

秘传复生散 治痘疮黑陷不起发。

珍珠 琥珀 雄黄 朱砂 穿山甲 两头尖 香附米各一钱 真蟾

酥五钱，人乳浸化

研细和匀，一岁儿服八厘；二、三岁服一分二厘，用熟蜜水调下。

安胎饮 治孕妇痘疹必用之方。

实条芩沉水者二钱 人参 当归身 白术 白芍 大腹皮黑豆汁浸，

酒洗 陈皮 川芎 柴苏叶各八分 砂仁连壳炒，研 甘草各五分

糯米一撮，煎温服。

辰砂益元散 治痘热毒太甚，狂言燥渴，欲饮水者。

飞滑石六两 甘草末一两 飞辰砂三钱

和匀，每服一钱，灯心汤下。大人加倍。

四顺清凉饮 治里证热大便结。

当归 白芍 大黄 甘草 水煎服。

胭脂涂法 治黑痘良方。

先用升麻一味，煎浓汁去渣，将胭脂于汤内揉汁，蘸汤于痘上拭之。

痘疗门主论

喜泰顺曰：夫疗者，乃毒火郁结，腠理秘密。发热之后，先着其疗，或三、五粒，或一两点独大，色赤平扁而阔，出来必贯黄浆，次日即行收靥。见必烦躁狂乱，辨认得真，即宜银针挑破，口含清水，吸去恶血，外以鸡冠血点之，或以拔毒散敷之，大用清凉发表之剂，痘方得出。书云：冷疗先见，诸痘不敢彰形，若不早刺，则毒火郁结，久则走黄，遍身发肿，痘来隐隐，不能出窍，束手待毙，悔无及矣。医者慎之。

陈实功曰：痘毒升发未尽，留毒心肝二经，发为痘疗。初生紫点，次日变黑，浮高而润者毒浅，深陷而焦者毒深。其发多在七朝上下将靥唇之际，生于臀腿手足，身温疤润声清者吉；发在肚腹腰肾，身热色枯声哑者凶。凡遇此证，急用针刺疗根，插入蟾酥条，候四边裂缝，疗摇者用刀割去，搓玉红膏收口，如针刺无血，插药干枯不变脓者，终为不吉。但此证属有余，首尾但宜加减鼠粘子汤主之。《正宗》。

痘疗门主方

加减鼠粘子汤

鼠粘子 知母 天花粉 山栀 荆芥各六分 甘草三分

竹叶灯心各二十四件，水煎服。

拔毒散 专治痘疗等证如神。透明雄黄不拘多少，研细，再将滚水泡棉胭脂取浓汁，调点疗头上。

四圣丹 专点痘疗，即刻回生。

牛黄一钱二分 儿茶一钱七分 朱砂八分 珍珠二分

乳细，用口嚼胭脂调匀，点之。

珍珠膏 治痘不发，必有痘疔，黑而大臭者，宜急点之。

珍珠五颗 豌豆四十九粒 发灰一钱

乳细，用胭脂汁调膏，拔疔点之，黑疔即变红活矣。

痘疔 甘蔗渣晒干，真香油点灯烧成灰，以津唾调匀，银簪挑破点上，立效。

又方 珍珠研末，油胭脂调搓，神效。

痘痈门主论

喜泰顺曰：痘疮发毒，多见于外靨之证。脓浆溃烂，何由而足，虽云变臭，生意已成，必发痈毒，方为稳兆。发于四肢则伤手足，发于头顶硬处为佳。内服消风化毒汤，外用生黄豆嚼而敷之。此险中得顺，百无一失也。

邵慈庵曰：凡有迟延日久而起，不圆润而靨，既平之际，又发痈肿，人固知其余毒，而不知为何经，当辨之。但气高喘急，胸满肚壮者，余毒在肺也。痰涎稠黏，口咬嘎齿，泄泻不止，口臭者余毒在脾胃也。盗汗热不退而渴者，余毒在心也。梦中多惊，余毒在肝也。耳朵尚热，余毒在肾也。眼合不开，身肿不消，内热不清，郁闷不乐者，余毒诸经皆有矣。

《心法》曰：痘后余毒发出，小如李者为毒，大如桃者为痈。单生一个者，毒在肌肉，属顺易治；连发数处者，船小载重，属险。若结于骨节之间，或成对发出者，其毒已盛；溃破之后，渗泄气血，不能敛，已属逆证。

陈实功曰：痘痈、即是痘毒。缘溜浆不足，毒流于脾肺二经，致手脚胸背结成漫肿，大如桃李。此多发于收靨之后，身凉不渴者吉。初起嚼生黄豆敷之自消；已成用太乙膏贴，候脓熟针之。元气虚弱者，保元汤助脾健胃为主。《正宗》。

胡公弼曰：痘痈宜大连翘饮主之。大便秘加酒炒大黄微利之，如疹后风疮加金银花。

窦汉卿曰：发于面项胸胁者难治，生四肢者易治。

证曰：凡痘后发热，即是余毒未尽，不曾多服败毒药，防发痘毒，宜仔细脱衣看视，乘早消除。

又曰：发于关键要害处，及气血亏败者险。

又曰：痘毒切不可开刀。

痘痈门主方

三豆丹扁鹊。 敷痘毒圣药。

黄豆 赤小豆 绿豆各一合

用醋浸捣研浓浆，时时以鹅翎扫上，红肿退去，其效如神。

三豆饮扁鹊。 凡遇时令不正，宜预服此，以疏解之。

黄豆 赤小豆 绿豆各一升 甘草节二两

水煮熟，食豆饮汁。七日乃止，永保无患。

保元汤 痘痈出脓之后，脾胃虚弱，脓清不敛者服之。

人参 白术 黄耆各一钱 甘草三分

姜一片，枣二枚煎，食远服。

绵茧散 痘后余毒流注各处出清水者。出蛾绵茧不拘多少，用生明矾末填满煨灰，干掺。

回毒即消丹岐天师。

人参二钱 金银花五钱 甘草一钱 元参三钱

水二碗煎三分，与小儿服之。一剂即消大半，二剂痊愈。

岁久不愈神方岐天师。

黄耆二两 生甘草二钱 白芥子三钱 柴胡 肉桂各五分 人参
白术 当归 金银花各一两 薏苡仁三两

先将薏苡仁用水四碗煎汁二碗，再煎前药半碗，饥服一剂。后用：黄耆、薏苡仁、金银花各一两，白术、当归各五钱，生甘草、白芥子各二钱，陈皮三钱，水三碗煎半碗，四剂痊愈。其服药之时，更须用药洗之。

金银花一两，甘草三钱，生葱三根，水二碗，煎洗之。

痘毒溃烂不愈

干百合为细末掺之，数次即愈。

消痘毒

瑞香花叶同冰糖捣敷，中留一孔，透气自消。

消痘毒

糯稻草烧灰入笊箕内，以滚水淋三遍，取稻草浸灰敷之，自消。

消痘毒张綱如《屡验方》。

大蚌一个只取肉，用黄土四围封固，火煨至红，只取蚌肉存性研末，油调敷，立消。

痘毒钱抡。

新瓦磨光洗净，置羯羊粪于瓦上，上下以瓦覆之，文武火炙燥，烟尽存性，取出为末，麻油调敷神效。

痘后余毒《丹方全集》。

人参 白茯苓 犀角 金银花各三钱 甘草一钱五分 羚羊角一钱
珍珠八分研

上为末，蜜丸。每日服一钱，白汤下。日服，神效。

解毒护童膏 金银花一斤，用水入铜器内，煎至渣无苦味为度，粉甘草四两，用水煎至无甜味为度，去渣，二汁和匀，用文武火慢煎，约十碗至三四碗，入米白糖收成膏，埋土内一日，出火气。每早以百沸汤冲一盅与小儿吃，一切痘疮不生，并可稀痘。若初出痘后，煎服此膏，则遗毒皆尽，胜多吃胡桃也。

痘毒久不收功奇方汤聘三。

干百合三钱 血竭二钱 冰片一分

共研极细末干掺，即收功矣。

移痘毒、大毒法 凡毒发虚怯处，骨节关键处，出头便难敛口，可取池塘绿苔敷在肿上，留一空处，或上或下，即移毒于所空之处出头。池塘绿苔，夏月浮在水面上，冬月在水底泥上取。

痘毒已溃

早稻草根连土烘燥，研极细掺之。

痘毒初起张太和。 苦丁草、伏龙肝同蜜调敷。

痘后余毒

生绿豆末 赤小豆末 白蜜各五钱 猪油三钱

用马齿苋汁一碗，同药净锅内熬成膏涂之。

消痘毒 漱净口，将柿饼细嚼敷四围，即消。

痘毒久不收口 多年头油罐子放火上煨红，冷定乳细末，搓上即愈。

消痘毒 热黄牛尿加蚯蚓捣敷，即消。

痘毒久不收功有多骨者 红升丹同人中白煨各等分，研细，搓上膏盖，多骨自出，收功。

痘毒久不收功 鲜马齿苋生捣烂取汁服之，以渣敷痘毒上，肿自消，脓自干，口自敛。

痘瘡門主論

痘瘡，乃痘后余毒未尽，正氣已虧，邪走空竅，是以口、鼻、眼、耳、前陰、后陰，皆可成潰。治當敗毒調元。

痘瘡門主方

驗方

牛糞尖燒灰存性 雄黃各等分

每錢加冰片二分，乳細搓患處，立愈。

痘風瘡門主論

陳實功曰：痘風瘡，是痧痘后毒發未盡，留熱肌膚，后被外風侵入，其患先從細瘡作癢，次漸沿開，成片脂水，生癩搔之無度，宜用麥錢散擦之。《正宗》。

卷之十三

诸疗部

凡疗疮、杨梅结毒，俱汇于此部中，以便检阅参治。

疗疮门主论

华元化曰：疗有五色属五脏。红属心，发于舌根；青属肝，发于目下；黄属脾，发于口唇；白属肺，发于右鼻；黑属肾，发于耳前。以种类言之。

孙真人《千金方》论疗疮一十三种：一曰麻子疗，其状肉起，头如黍米，色稍黑，四边微赤多痒。忌食麻子油，衣麻衣，入麻田中行。二曰石疗，其状皮肉相连，色如黑豆，甚硬，刺之不入肉微痛。忌瓦砾砖石之属。三曰雄疗，其状疱起头黑靨，四畔仰疱将起，有水出色黄，大如钱孔形高者。忌房室。四曰雌疗，其状疮稍黄，向里压亦似灸疮，四边疱浆起，心凹色赤如钱孔者。忌房室。五曰火疗，其状如汤火烧灼，疮头黑靨，四边有烟浆，又如赤粟米者。忌火烧烙。六曰烂疗，其状色稍黑，有白斑，疮中有脓水流，出，疮形大小如匙面者。忌热食烂物。七曰三十六疗，其状头黑浮起，形如黑豆，四畔起赤色，今日生一，明日生二，及至十，若满三十六，药所不能治，未滿三十六可治。忌嗔怒、蓄积愁恨。八曰蛇眼疗，其状疮头黑，皮浮生，形如小豆，状似蛇眼大，体硬。忌恶眼人者，并嫉妒人见，忌毒疮。九曰盐肤疗，其状大如匙面，四边皆赤，有黑粟粒起大。忌食盐。十曰水洗疗，其状大如钱形，如钱孔，头白里黑靨汁出，中硬。忌饮浆水，水洗、渡河。十一曰刀镰疗，其状阔狭如薤菜大，长一寸，左侧肉黑如烧烙。忌刺及刀镰切割、铁刃所伤，可以药治，不可乱攻。十二曰浮沔疗，其状疮体圆曲，少

许不合，长而狭如薤菜大，肉黄外黑，黑处刺之不痛，黄处刺之痛。十三曰牛狗疔，其状肉色疱起，掐不破。已上疔疮十三种，初起疮心先痒后痛，先寒后热，热定则寒，多四肢沉重，心惊眼花。若重者则呕逆，呕逆则难治。麻子疔一种，始终惟痒。以上忌禁者，不得触犯，如触犯者，发作难治。惟浮沬、牛狗二疔无所禁忌，纵不医亦不害人，其状寒热与诸疔不同，故不杀人也。凡疔起后，背强疮痛极甚不可忍者，是触犯禁忌，以此为辨。此条与《外台秘要》、《神巧不全》所论颇同。王肯堂曰：疔之四围有赤肿，名曰护场，为可治。疔之四围无赤肿，名曰不护场，不可治。《准绳》。

又曰：疮证急者有应。如生一疔之外，别处肉上再生一小疮，即是有应，可用针挑破护场，疮四围有赤肿，生多疮者谓之满天星，饮食如常，头痛身热手足温。

陈实功曰：疔疮有朝发夕死，随发随死，诚外科证中迅速之病也。凡治此证，贵在乎早。如在头面，头乃诸阳之首，亢阳热极所致。其形虽小，其恶甚大，再加艾灸，火益其势，逼毒内攻，反为倒陷走黄之证作矣；既作之后，头面耳项俱能发肿，形如胖尸，七恶顿起，治虽有法，百中难保一、二，不可不慎。《正宗》。

又曰：毒发于心经者，生为火焰疔。多生心脏之俞募井之端，唇口手掌指节或手之小指。初生一点红黄小泡，抓破痛痒非常，左右肢体麻木，心烦发躁，言语昏愤。

又曰：毒气发于肝经者，生为紫燕疔。多生手足腰胁筋骨之间，或足大指。初生便是紫泡，次日破流血水，三日后续烂筋骨，疼痛苦楚，眼红目暗，指甲纯青，睡语惊惕。

又曰：毒气发于脾经者，生为黄鼓疔。初生黄泡光亮明润，四围红色缠绕，多生口角腮颧，眼胞上下及太阳正面之处，便作麻痒，绷急硬强，重则恶心呕吐，烦渴干哕。

又曰：毒气发于肺经者，生为白刃疔。多生手大指。初生白泡，顶硬根突，破流脂水，痒痛骤然，易腐易陷，腮损咽焦，毛耸肌热，咳吐脓痰，鼻掀气急。

又曰：毒气发于肾经者，生为黑靥疔。多生耳窍、胸腹、腰肾，及足

小指涌泉偏僻软肉之间。初生黑斑紫泡，毒串皮肤，渐至肌肉，顽硬如钉，痛彻骨髓；重则手足青紫，惊悸沉困，软陷孔深，目睛透露。

又曰：红丝疔起于手足节间。初起形似小疮，渐发红丝上攻手膊，或攻大腿，令人寒热，恶心呕吐。迟者红丝至心，常能坏人。急用针于红丝尽处挑断出血，寻至疔上挑破，插入蟾酥条，膏盖，内服蟾酥丸发汗，追出疔根，得脓自愈。

又曰：唇下疔又名马口疔。

又曰：手掌心疔又名擎珠疔。

又曰：患疔经五六日不瘥，目中见火光，心神昏昧，口干心烦，呕吐不定，皆属疔毒内陷，均须速治。

冯鲁瞻曰：疔者，经曰：膏粱之变。盖因膏粱之人皮肉厚密，内多滞热，故变为疔。然古方计有一十三种，三十六疔之分，总由脏腑积受热毒，邪气搏于经络，以致血凝毒滞，注于毛孔、手足、头面，各随脏腑部位而发。其形如粟米，或痛或痒，渐至遍身麻木，头眩寒热，时生呕逆，甚则四肢沉重，心惊眼花，经虽所载疔色有五，以应五脏，其实紫黑及黄泡者居多，先痒后痛，先寒后热也。宜内服发散解毒攻托之剂，外敷拔毒菊花叶、苍耳草之类。大概疔已成脓，则毒已外泄，可无他虑。惟在初起，最宜谨慎，疔毒攻心，祸如反掌。盖疔由心火蕴结，故其疼痛异常，为害甚速，病人口嚼生豆，不觉豆腥者即是也。若于耳后方圆一寸发者尤甚。盖水枯火炽之极也，不可妄动，如抓破见风毒，即内攻不救。《锦囊》。

又曰：红丝疔者，又名血丝疔，发于两手指，而作红丝，渐渐行至关节，势必杀人。可先以线扎住红纹之处，次将银针砭去恶血，以药涂之，上者血红，次者血紫，下者血黑。若一失治，则稽留不散，轻则烂伤堕指，重则入腹而死。

又曰：《内经》以白疔发于右鼻，赤疔发于舌根，黄疔发于口唇，黑疔发于耳门。青疔发于目下，盖取五色以应五脏，各有所属部位。又有发于或肩或背，或腰或足，发无定处。如在手、足、头、面、骨节间者最急，其余犹可缓也。

李东垣曰：疔上按之疼痛应心者，是疔也。秋冬寒毒久结皮肤中，

变作疔疮，不急治之，日夜根长，流入诸脉数道，如箭入身，颤掉不已。若不慎口味房室，死不旋踵。《精义》。

申斗垣曰：夫疔疮取治，其法不一，当先看其缓急。如缓者，一日疮疱白色而小，二日色白微大，三日色微紫，四日色真紫，此候之缓也；急者五日色青紫小，六日色深青大紧，七日色黑如火灸疮之状，此最急之候。假如身上生一疮，而他处又生一小疮，为之应候。先用针挑破小疮，则泄其毒谓之可治；若只有一疔，他处无小疮，谓之无应候，不可治。疔无应候，是毒气之甚，故不可治也。大抵疔疮四围有红赤焮肿者，名曰有护场。如疔疮四围不赤肿者，即是不护场，不可治也；有护场方可治也。疔之生者，身热头疼，手足温暖，饮食如常，是常疔也。疔之危者，眼转大渴而喘，唇面青，不进食，五心肿，无有脉，四肢冷，不起床，不精神，腹痛甚于常，是有内疔也。《启玄》。

周文采曰：凡疔疔疮，皆宜刺疮中心至痛处，又刺四边十余下，令血出，去尽恶血，敷药。药力得入针孔中方佳，若药不达中，药力难达，反致误事。又看口中颊边舌上，有赤黑如珠子者，是疔也。《集验》。

《养生篇》曰：人汗入肉，食之则生疔疮，不可不慎。

窦汉卿曰：凡疔疮针刺患人手足中指不痛者，难治。又曰：如疔在头面、手足、骨节间者，甚急。又曰：疔疮头陷碧绿色者，不可用针刀出血。又曰：疔疮日久溃烂者，不可用针出血，只可用刀割去腐肉。又曰：疔疮生根入腹者便死，用磨针、刀、铁浆水一碗，丝绵滤净，银锅内煎三四沸，服之，病者须臾肠鸣，行利一、二次苏醒方妙。又曰：疔疮不破则毒入肠胃，惟蝉蜕极效，用一两为末，蜜调下。又曰：疔发于太阳眼边者，名曰钉脑疔，十死一生。又曰：疔疮脓水出，孔如蜂窠，病易瘥也。又曰：凡人暴死多是疔毒，急取灯遍照其身，若是小疮，即是其毒，宜急灸之，并服飞龙夺命丹等药，亦有复苏者。《全书》。

梁梦麟曰：嘴唇痘疔，初生米大，或粉刺挤破，入汤火风气，即要变为疵疮，疵疮即疔之别名也。先用葱白同飞龙夺命丹五粒和嚼烂，熟酒半碗送下，以衣覆患上，略出汗为妙。上午服药，下午即将绝利磁锋划破疮口十字，即掺飞龙夺命丹末在内，而外用蟾舌研烂，蟾肚底皮贴之，内服追风汤剂。若发须发者，即剃去须发，如前法治之。此法静夜

细思,试而行之,百发百中,活人多矣,焉敢自秘,遂并梓行。病人一个月内无色欲者,患处平妥无赘肉,乃其征也。《全书》。

陈远公曰:有生疔疮者,疼痛非常,亦阳毒也。初生之时,人最难辨,但以生黄豆令嚼之,不知腥^①者便是。其疮头必发黄泡中现紫黑之色,细看泡中必有红白一线通出泡外。凡疔生足上,红线由足入脐,疔生手上,红线由手走心,如生唇面,红线由唇面至喉,如见此红线,即于尽处以针刺出毒血,则免毒攻心。若现白丝,不必刺也。总以消毒泻火为主,世人戒用官料之药,此乃不知医之语,毒非药安得除哉!拔疔散治之,紫花地丁、甘菊花各一两,水煎服。一剂红线除,二剂疔散,三剂痊愈,不必外治挑疔之多事也。若已溃烂,加当归二两治之,不必四剂,毒尽肉生也。《冰鉴》。

胡公弼曰:猪疔其形圆而小,口内有油,忌食猪油、猪肉。牛疔其形圆而小,口内无油,疱起掐之不破,有寒热,忌食牛肉。狗疔其形长而带尖,色赤,有寒热,忌食狗肉。羊疔其形长而带白色,有寒热,忌食羊肉。瓜藤疔不计其数,其形圆长如瓜形,因食瓜毒而生,忌食诸瓜。豆腐疔其状白泡,三日内顶陷,因食豆腐,内有人汗而生,忌食豆腐。气疔其形或大或小,疱白如有气在内,因感悲怒而生,忌气恼。鬼疔其形大小不一,因中邪毒之气而生,异于诸疔,比气疔更^②甚,令人言语如见鬼状。红丝疔其形缕缕赤色如丝线,周身缠绕,宜松针刺去血,忌热物。内疔言其于内,脏腑上腔子里面,喉内、口内,与外疔更不同厉害,宜托里追疔。萝卜疔其形黑兼紫如水晶,故名之,疱白黑血毒水宜去之,宜托毒。杨梅疔形黑紫如熏梅,状若遍身杨梅疮,内杂疔疮一、二个,则令通身疮不起发,须针刺出毒,服托里土茯苓等药。鱼脐疔如鱼之肚脐,多生胳膊肚、小腿肚上,乃手足阳明经分毒气,治宜加引经药。蜈蚣疔形长如蜈蚣,亦有头足,发寒热,因饮食中被蜈蚣游走遗毒于内而生,宜加雄黄。

① 腥 原本作“醒”,系讹,据文义改。

② 更 原本作“夜”,据光华堂本改。

程钟^①龄曰：治疗之法，贵在乎早，初起即治者，十全十活，稍迟者十全五、六，失治者十全一、二，内服莫妙于菊花甘草汤。项之以上，三阳受毒，必用针刺挑断疔根，插药膏盖；项之以下，三阴受毒，即当艾灸。灸之不痛。亦须针刺插药自效。《十法》。

疔疮门主方

菊花甘草汤《十法》。 治疗之圣药也。

菊花四两 甘草四钱

水煎顿服，渣再煎服。

反唇疔、擎珠疔 经霜南瓜蒂煨灰，加冰片少许研细，麻油调搓。

马口疔，生唇下者是 新鲜鲢鱼血磨蟾^②酥涂之。

拔疔法

巴豆去壳，半粒 磁石研末

用葱涎和蜜为膏，敷疔上。

血疔、出血不止者是 真麻油一盅，服下自止。

蟾酥饼 兼治脑疽、乳痈、附骨疽、臀痈一切恶证，或不痛，或大痛，或麻木，用此敷贴疮头。

潮脑 朱砂各一钱 真蟾酥酒化 没药去油 乳香去油 明雄黄
巴豆霜各二钱 轻粉五分 麝香三分

以上各为细末，五月五日午时在净室中用蟾酥酒和丸如绿豆大，每用一丸，口涎调贴疔疮上，以膏盖之。

此药为丸、为条、为饼，听便使用。一方去巴豆霜、潮脑，加寒水石煨，枯矾、胆矾各一钱，蜗牛二十一个。

恶疔大毒

金银花 当归身各五钱 天花粉 甘草 地丁各三钱 皂角针二钱
川椒九粒 酒煎服。

① 钟 原本作“山”，字误。

② 蟾 原本作“蝉”，字讹。

疔毒恶疮 家菊花并叶共捣汁，用酒冲服。将渣加盐少许敷上立愈，冬月用根亦可。

又方 紫梗菊花捣碎，白酒煎服。

又方 鲋鱼鳞用荷花瓣夹好，置书页中，遇疔贴上即愈。

大疔恶毒秘方

火硝 北煤系用过倒地上，渣内检出者。各等分

研细末，磁瓶收贮。凡遇一切疔毒，用陈窗糊纸水湿掩疔上，再以此药敷之，疔根自出。

疔疮神方 苍耳草根、叶捣烂，入童子小便，绞汁冷服一盅，日三次。仍以根、茎、叶、苗任取一束，烧灰存性为末，用醋、泔、蓝、靛和如泥，先将疮中心及四边刺破，令血淌出，拭净敷之，不过十次，根即拔出，为诸方第一。

飞龙夺命丹《正宗》。专治疗疮及痈毒发背，脑发乳痈，一切无名肿毒，恶疮及有头不知痛痒者，已成未成神效。

蟾酥酒化 雄黄各三钱 乳香去油 没药去油 铜绿各二钱 胆矾 朱砂 血竭 寒水石各一钱 当门子 冰片 轻粉各五分 蜗牛二十一个 蜈蚣一条，酒浸泡、炙、去头、足

上俱为极细末，用蜗牛连壳研如泥，少加飞罗面，和丸如绿豆大。每用三丸，用葱白三个，令病人嚼烂，吐于男左女右手心，将丸药放在葱内，热酒送下，被盖约人行五、六里，出汗为效；无汗以热酒助之。重者再进一服。病在上食远服，病在下食前服。忌冷水、瓜茄、油腻、猪、鸡、鱼、面及一切发物。孕妇忌服。

走马回疔丹 疔疮初起，针破，用此一粒插入孔内，膏盖之，次后追出脓血疔根为效。

朱砂 雄黄各二钱 蟾酥酒化 硃砂 白丁香 轻粉各一钱 蜈蚣一条，炙 金顶砒 麝香各五分 乳香六分

上为细末，糊和成如麦子大 插疮内，以膏盖之。

铅粉散 冷疔生于脚上，初起紫白泡，疼痛彻骨，渐至腐烂，深孔紫黑，血水气秽，经久不瘥，用此大效。

黑铅四两，铁杓内化开，倾入水中，取起再化，如此百遍，以铅尽为度，去水取澄下

者，三钱 松脂一钱 黄丹飞，炒 轻粉各五分 麝香三分

共研细，先用葱汤洗净，麻油调搽疮口，油纸盖好。

束毒金箍散 疗疮针刺之后，瘀毒走散作肿，宜此药箍之。

生大黄 郁金蝉肚者 白芨 白蔹 白芷各四两 黄柏二两 绿豆粉一两 轻粉五钱

共为细末。酸米浆调箍四边，夏热甚，用蜜水调。

消疔简便方 疗疮及诸恶毒初起，但未成脓者，服之神效。

白矾研，三钱 葱白七茎

上二味同捣极烂，分作七块，每块用热酒一杯送下，服毕用厚被盖之，再进葱白汤一盅。少顷汗出如淋，从容去其覆物，其病如脱。此虽味涩难服，其效甚妙。凡居乡村之处，遇有此证，不及延医，只传此方，服之活人甚众，诚为良便方也。

敷疔

银珠三钱 红枣七个，煮烂去皮核 捣敷留顶。

疔

甘松 三柰各五钱 雄黄研细，一钱 麝香一分

酒水各半，先煎甘松三柰，煎好滤清，调雄黄、麝香服。

红丝疔 用铜钱扣起头处，将木上旧钉起一根，用棉花包裹，蘸桐油点着，令油滴钱眼内，一滴即愈。

疔疮 生葱和蜜捣敷患处，过一饭时，疔即拔出。

保生挺子 疔疮、背疽、瘰癧，一切恶疮。

巴豆四十九粒，文武火炒，研 硃砂三钱 轻粉半大匣 金脚信 雄黄各三钱 麝香一钱

为极细末。用黄蜡五钱熔开，将药合成挺子，冷水浸少时取出，旋丸捏作饼子如钱眼大，将疮头拨开，安一饼于顶上，次用膏贴。

蟾酥丹 蟾酥不拘多少，黄丹、白面等分，为丸如麦粒大，针破疔疮，以一粒纳之，膏盖。

散疔膏 磁石乳细，以葱头十四根取汁，入蜜少许调匀，敷留一孔。一敷即散，妙不可言。内服托里药。

拔疔蛻螂腹下有一白点者即心也。先以针刺破疔头，再将针取出

蛻螂心点疔头上,以膏盖之。半日间血出、根拔而愈。忌羊肉。

一切疔肿孙真人。一色苍耳草连梗叶烧灰,以醋调搽。干即再搽,重者十余次。

吃牛肉中毒生疔 金线重楼即七叶一枝花,不拘多少,切碎,研细,和溲鸡屎调匀搽上,立效。

疔疮怕动刀针 巴豆仁一粒,饭一粒,研贴疮上,立时拔出疔根,再寻癞虾蟆取肝贴上,神效。

诸疔 菊花叶捣汁服一碗,死可回生。

疔毒已笃者二服即愈潘霞山。

土蜂房一具 蛇蛻一条

黄泥固济烧存性为末,每空心好酒服一钱,少刻大痛,痛止,其疮已化为黄水。

烂头疔

白梅二个 大蜒蚰二条 白菊花根一把

共捣烂,加透明雄黄同敷,如干再另敷一、二遍,无不愈者。

扎马疔,切不可食肉,生白酒煎稀荳草、紫花地丁、车前草服之。

追疔夺命汤《赤水玄珠》。

羌活 甘草节 蝉蛻 川黄连 独活 北细辛 青皮 金银花 防风 泽兰叶 僵蚕 金线重楼 赤芍各等分

有脓加何首乌、白芷;要通利加大黄、牵牛、青木香、山梔;毒在下加木瓜各等分。

每服五钱,先将一贴加泽兰叶、金银花各一两、姜十片煎热服,汗出为度;病退再加大黄二钱,煎,热服,取利一二次,去余毒为妙。此方取效如神,百发百中。若心烦呕吐,用甘草节、绿豆粉各等分,酸浆汤调下二钱;如呕逆恶心,用乳香、绿豆粉各等分,甘草汤调下二钱。

小夺命散 治疗疮及脑疽、恶毒,其效如神。

槐花子 地丁 千头子即扫帚子,又名地肤子,各等分

水煎,通口温服,加真蟾酥少许尤妙。

拔疔丹一名疔毒撤回。毕峻功。 凡一切疔疮,无名肿毒,初起磨敷,已成已溃,用一粒放疮上,脓血即拔出,如遇阴疽对口犬证,可用十数

粒铺疮上如神。

巴豆霜 乳香去油 没药去油 真蟾酥酒化开,乳成膏 明雄各二钱
樟冰 露蜂房阴阳瓦焙存性 劈朱砂各一钱 真轻粉 当门子各五分

上各乳极细,照分两称准和匀,以蟾酥膏和杵为丸如药珠大,晒干磁瓶密贮任用。此即蟾酥饼原方加露蜂房也。

疔疮丸 马骥功得自卢成琰传。 专消一切疔疮,兼治湿痰流注,梅疮初起。

巴豆仁去皮、膜 明雄 生大黄各三钱

共研细末,加飞面醋打糊为丸,如金凤花子大,每服二十三丸,热汤送下,泻三四次无妨,弱人只服十九丸自消,得嚏即愈。

髑疔 红丝疔、面白疔,肿胀至目与鼻俱隐入肉里,牙关紧急。昔有一道人用患者耳垢、齿垢,刮手足指甲屑,和匀如豆大,放茶匙内,灯火上炙,少许取作丸,将银簪将疔头挑开抹入,用棉纸一层,津湿覆之,痛立止,半日目可开,肿已消半,次日服活命饮,二剂遂愈。

血疔,或生肘下,或生眼角,疔有一窍如针眼,淌鲜血不止。真香油四两,无灰酒不拘多少,和匀热服,其血立止。随用野菊花浓煎常服,切忌茶汤。

万灵夺命丹 治一切疔毒入腹,烦闷恶心,兼治痈疽发背、恶疮。

朱砂水飞 蟾酥人乳泡 轻粉 胆矾各五钱 铜绿 血竭各一两 雄黄 枯矾各二两

共为细末,面糊丸,芡实大,每服一丸,令病人先将葱白三寸嚼烂,吐在手心,将丸包在葱内,热汤吞下,出汗。

疔

生磁石一钱 麝香一分

研极细,每用少许膏盖。

又方

胡椒二十五粒 大独蒜一个 葱白三根

共捣烂,油纸上作膏贴之,神验。

秘方 用铁钉放屋上受风露之气,日久上锈,以刀刮下,乳极细,加麝香少许,磁瓶密贮。如遇疔疮已破者,搽少许即流黑水,不过三

次，疔根自出。如未破者，以水调点疔上，即可拔疔如神。

疔疮不用刀针杜宝山。

草麻仁七粒 银珠一分

共研细，如干，加唾津少许，疔头让出，即周围敷之，两、三次即出小黄头矣。

拔疔第一方 徐峨峰。

草麻仁四十九粒半 杏仁去皮，十七粒半 松香二两一钱五分 荔枝肉三个半 银朱少许

共捣成膏贴之。

拔疔吴韵清。

荔枝肉一个 溏鸡屎 菊花根叶不拘多少

共捣烂敷上，立愈。

又方 鲋鱼鳞贴之。

水疔门主论

凡人手足一时生出小疮，四围红赤，中间一点漆乌，坚硬如石，痛小可忍者，名曰水疔。破后惟流血水。《启玄》。

水疔门主方

治水疔 土牛膝不拘多少，捣烂入盐少许和匀，敷疔上半日即愈。

又方

陈壁土 食盐各一钱 雄黄三分

共研细末，津液调敷疔上，其疔自落。

水疔 五月五日午时采豨莶草捣细末，酒调服三钱取汗。

又方 荔枝肉一个，贴在疔上，以生白酒饮醉取汗为度。

红丝疗门主论

胡公弼曰：红丝疗一名急疗。生于手足肘腕之间，初起如黄豆大，色似绯袍。此疗根行如箭，日夜行一尺二寸，状如红丝线一般。皆因大喜大怒，气血逆行所致，走入心腹，令人闷乱不救。凡遇此等急证，寻见红丝之处，即用神针针断其根，针入四、五分，取去紫黑恶血，急服追疗夺命丹，随饮浮萍酒，立愈。《无愧青囊》。

红丝疗门主方

浮萍酒陆伯迪。治红丝疗一服即愈。浮萍不拘多少捣烂，用好酒一斤或半斤煎滚，冲浮萍内半时许。通口服，随嚼浮萍草敷疗上。

卷之十四

诸疮部

疥疮门主方

消毒散 遍身痒疥。

金银花 连翘 白蒺藜 荆芥 白芷 牛蒡子 防风 白藓皮
赤芍药 甘草

水煎服。日久不愈加何首乌,干燥加当归,有热加黄芩,下部多加黄柏,小便涩加木通。

疥灵丹

枳壳麸炒 山梔 连翘 荆芥 当归 羌活各七钱 白藓皮炒 白
芷 苦参糯米泔浸一日,各一两

上为细末,炼蜜为丸桐子大。每服五十丸,白汤送下,立可除根。

疥癬脓窠一服除根

何首乌 石菖蒲 荆芥 防风 漏芦各等分

上为末。每服三钱,酒调下。

疗毒汤 治一切久远痛痒诸疮。

何首乌 荆芥 独活 防风 威灵仙 胡麻 石菖蒲 苦参
白汤煎服。

硫黄丸

硫黄精明者,一两

研细末,糕捣丸如桐子大,合三两重。看疮上身多,食后服;下身多,食前服,俱用荆芥汤送下五、六十丸。

搽疥方

大枫子三十枚，去壳同水银研不见星 杏仁十粒，去皮 水银一钱

生猪板油一两同捣烂，麻布包擦，神效。

又方陈在宾。 藜芦 明雄 苍术各三钱

键猪油二两和药包草纸内卷成条，火烧滴油搓之。但此法制时，忌与人见，人若见则油烧不下。

青桃丸

油核桃 猪板油各三钱 白薇二钱 轻粉 防风 苏叶各一钱

捣丸如弹子大，擦之。

减味合掌丸

大枫肉二十一个 水银制，三钱 潮脑一钱 柏油四两。研细丸，弹子大，以火微烘，搓之。

换肌丸

白砒 水银各三分 油核桃五钱 大枫肉一钱

同研，不见星为度。绢包，每临卧时擦心口片时，兼戒口味。

蛇蜕丹

水银 槟榔各一钱五分 潮脑 枯矾 蛇蜕煅 雄黄 油核桃 花椒焙，各五分 杏仁 大枫肉各二十一枚

共研细，陈蜡烛油为丸，每早五更时手搓鼻嗅。

三黄丹

吴贍九。

硫黄 雄黄 黄丹 潮脑 川椒焙 枯矾各等分

用麻油四两，鸡蛋一个，将蛋煎枯如絮，去蛋不用，将药末装粗布袋内，慢慢摆入油内，取起冷定搓之。或同猪板油捣匀搓之亦可。

又方 芝麻炒 硫黄 轻粉 火硝 枯矾各等分 捣丸搓之。

又方 柏油和猪胆汁熬一滚，候冷定搓上，三日全愈。

又方 大枫子肉十三粒捣烂，入轻粉一钱和丸，擦脚底数次即愈。

又方 蛇床子五分，先研细末 白砒九分，二次研细 油核桃三十个，四次研细 水银一两，五次研细

作五次逐味加入研细。临晚浴净，先饮无灰酒，待其作痒，然后抓破，分五日擦之。

三圣丸

水银 潮脑各二钱 川枫子肉五十粒

共研极细，加柏油二钱研匀为丸，周身滚之，立愈。若兼脓窠，加硫黄一钱。

诸疮一扫光 此药治痒疮，不论新久及身上下，或干或湿，异类殊形，但多痒少痛者用之，俱各有效。

苦参 黄柏各一斤 烟胶一升 枯矾 木鳖肉 大枫肉 蛇床子
点红椒 潮脑 硫黄 明矾 水银 轻粉各二两 白砒五钱

共为细末。熟猪油二斤四两，化开入药搅匀，作丸龙眼大，磁瓶收贮。用时搓擦疮上，二次即愈。

又方 苍术一斤研末，铺床上，单被掩之，睡五七夜自痊。

又方 山萸肉五钱 黄豆一两 硫黄三钱

先将萸肉、黄豆炒研，加硫再研，铜锅熬鸡蛋油调搽，三、四日愈。

又方 硫黄 皂矾 枯矾 川椒 油核桃 槟榔各等分

共研细。猪油调搓。

又方

鸽粪 枯矾 硫黄 石膏 蛇床子各等分

共研细。猪油调搓。

又方

轻粉 雄黄 寒水石 枯矾 大枫肉 潮脑各等分

研细，柏油调匀，搓三、五次见效除根。

又方岐天师。

苏叶 防风 轻粉各一钱 白薇二钱 猪板油 油核桃不可去油，各三钱

共捣成丸如弹子大，擦疮上，一日愈。

合掌丸

大枫肉四十九粒 水银制，二钱 枯矾 番木鳖 川椒各三钱 海螵蛸 雄黄各五分

油核肉捣丸。并治沙疮。

又方

水银 东丹各二钱 潮脑 枯矾 铅粉 轻粉各三钱 大枫肉 雄黄各四钱

熟菜油或陈蜡烛油调搽。

青金散

松香二两 蛤粉五钱 青黛二钱 枯矾 轻粉各三钱

为末。烛油调搽，并冶炼眉疥癣。

又方《集验》。治一切恶疮，医所不识者。

明松香 铅粉 水银 黄柏 黄连 甘草 土蜂窝着土壁上者，南方多有之，各等分

先将水银放手掌中，以唾津杀为泥，入磁器中，以生麻油和研。生绢滤如稀汤，和药末再研如稠汤，用温水洗疮，软帛拭干涂之，一次即瘥。有黄水者涂之，随手便干；痒不堪忍者，涂之立止；痛甚者立定。治疥尤佳，抓破搽药。

洗疥 紫背浮萍煎汤洗。

又方 苦参半斤切片，用河水三、四瓢，煎数滚，添水二瓢，住火片时，滤去渣，临洗和公猪胆汁四、五枚，搅匀淋洗疮上，三日一洗，三次其痒立止矣。

又方

苦参一两 蛇床子 黄柏 荆芥各五分 白矾二钱五分 煎汤温洗。

又方

防风 荆芥 野菊花 苦参 马鞭草 白矾 花椒 水煎浓汁熏洗。

又方 苋菜根煎汤洗。

又方岐天师。

苍耳草半斤 生黄耆三两 苦参四两 生甘草 防风 荆芥 金银花各一两

水煎汤一大锅，倾盆内乘热熏之。外用席二条裹在盆外，用衣盖之，使气不散，俟稍凉浴之，必至汤寒而后已，一日再浴，将渣再煎，如前浴之，三日疮疥必全愈也。

诸疮作痒并治痘疮作痒 茵陈一味，烧烟熏之。

身上起窠子，眼胞肿

金银花一两 当归 防风各五钱 薄荷二钱 甘草三钱

煎汤先熏后洗，祛风妙法。

满头癩疮及手足身上、阴器肤囊搔痒，抓烂淋漓

黄连五钱 蛇床子二钱五分 五倍子一钱二分五厘 轻粉一钱五分

研匀。先以荆芥、葱白煎汤洗，拭干，清油调搽。

脓疥疮《集验方》。

烟膏 东丹各一两 雄黄 硫黄各三钱 轻粉一钱

研末，腌猪油调抹。如连片，将油纸摊药，缚好不动，三日脱光。

身上生碎虫疮方。

大枫子 油核桃各二钱五分 水银一钱 信石一分

共重六钱一分，丸做六丸，每日用一丸。上身多于脐上揉之，下身多于脐下揉之，空脐处不揉，连用五丸，歇下一日，再用第六丸收功。

疥癣脓巢神方刘氏秘法。

硫黄五钱 巴豆霜四钱 黄丸子即麦芽黄豆肉为末 雄黄各三钱 银珠二钱 白矾五分

共研细末，每用一钱入后制药油一两和匀，搓之，三日全愈。

附制疮药油法：雄猪油一斤，槟榔、大黄、黄柏、麻黄各一两，水三碗，同药入锅内熬至水干油出，滤去渣，冷定收贮，调一切疮癣擦药，俱有奇功。

刘氏秘制金毛狮子疮药

黄芩 荆芥穗 黄连 五倍子 茜草 槐枝头 芒硝 黄柏各二两

共为粗末。再炒老黄色，再加：土硫黄醋煮，枯矾各二两

共研细末。再加：

巴豆肉三钱 草麻仁五钱 大枫子净肉，二两

共捣如泥，同前药和研匀细。再加：

水银 黑铅各一两，同研 雄黄 潮脑各五钱

共前药研和一处，每用一钱，以前制疮药油调搓。治一切血疯疥癣，手足诸疮如神。凡脚上患血疯疮多年不愈，先以药水洗净拭干，再

以研细轻粉薄薄扫上，再搓疮药。凡搓疮药，先一日用油调鹿角霜细末厚敷疮上过夜，次日再搓疮药更妙。

胡麻丸 小儿风癣疥疮。

苦参五钱 石菖蒲 甘菊花各一两 何首乌 威灵仙 白蒺藜 荆芥穗 牛蒡子 胡麻仁 蔓荆子各三钱

上磨细末，酒糊丸绿豆大。每服一钱，竹叶灯心汤下。

疥疮 雄槟榔磨，麻油搓。

又方

大枫子肉 油核桃肉各四两

共研烂，装入竹筒内封口，放锅内煮一炷香倾出，加陈蜡烛油布包擦。

干湿疥并脓窠黄水疮作痒作痛

枯矾四两 蛇蛻烧存性 露蜂房烧存性，各五分 大枫肉二两 樟冰三钱

共为末。入柏油四两，水银五钱同研成膏，搓。

疥疮及妇人阴蚀疮，诸般恶疮

茺萸 蛇床子各一两 雄黄 大枫肉 川椒 硫黄各五钱 枯矾一两二钱 潮脑 轻粉各二两

共研细，猪油调搓。

一切诸疮发痒

枯矾 干姜各等分

研细，先用细茶，食盐煎洗，再干掺。

诸疮疥癣

烟膏即硝皮坊内，灶上烟熏油腻 黄丹水飞，各二两 硫黄五钱，熔化，地上掘一孔贮醋，倾入冷定 土贝母 白芷 羌活 枯矾各二钱 麝香一钱 轻粉三分

共为细末，磁瓶收贮。有脓水者干搓；无脓水者，如秃疮，剃净头，以豆腐水洗，拭干搓。

又方 熟鸡蛋一个，打破头取去蛋黄，入麻油于内，加硫黄少许，放炭火中坐定，俟油滚起沫，蘸油涂疮上即愈。

参耆丸 治疥疮脓窠。

真黄耆 苦参酒炒 茅苍术米泔炒，各一斤

共磨细末，水法叠丸绿豆大。每服三钱，白汤下。

验方

大枫子四十九粒，去壳捣如泥，放碗内 外用麻黄三钱，去根、去梢 斑蝥七个，去头、足、翅

雄猪油二两同煎化至炭，去渣，将滚油冲入大枫子碗内搅匀，将疮用穿山甲抓破搽之，不过三日全愈。此药妙在外发，并不内收，须勤擦之。

又方

水银 硫黄 枯矾 樟脑各二钱 松香一钱

先将松香水银同麻油研如糊，再入三味研如膏，擦之。

疥疮

水银一钱 松萝茶三钱 麝香一分 大枫肉二十个

上研细，擦前心后心，两手弯，两脚弯，如神。

脓窠疥

大枫肉 杏仁 桃仁各四十九粒

研细。用麻黄五钱，猪油熬去渣，和药调搽。

脓窠疥

北细辛 麻黄 大枫肉各五钱 全蝎二个

上用猪板油十两，熬枯去渣，搓。

疥疮 石灰二升，以汤五升浸取汁，先用白汤洗疮拭干，再以此汁洗之。

又方 捣羊蹄跟和猪脂入盐少许，涂之。

又方

大枫子五钱 水银一钱五分 明矾 花椒各二钱

研匀。以猪油拌药捣烂，搽。

薄皮疮门主论

薄皮疮又名广疮，破后只一薄皮者是。此风热郁于皮毛而成也。

薄皮疮门主方

验方

苦参 密陀僧 蛤粉 儿茶

各等分研细。先将疮洗净，搨去白皮，拭干疮上，陈蜡猪油调搽。如有脓水，干掺可也。

肥疮门主论

陈实功曰：肥疮由胎毒而成者少，因饮食之后油手摩头，或枕头不洁而成者多。《正宗》。

申斗垣曰：此疮宜槐条煎汤洗净，以烟胶、枯矾、轻粉研细，熟油调搽。《启玄》。

冯鲁瞻曰：此疮乃脏腑不和之气上冲，血热之毒上注，小儿阴气未足，阳气有余，故最多犯之。宜内服连翘、天花粉、荆芥、防风、贝母、元参、赤芍药、生地黄、牛蒡子清热解毒，凉血和血之剂，俟毒气少解，方外用药以涂之，切不可骤加寒凉涂遏，以致热毒内攻不救，盖小儿脏腑娇嫩，易入难出也。《锦囊》。

肥疮门主方

肥疮

胡黄连 轻粉 雄黄各三分 胆矾二分 枯矾一钱 猪蹄鞋三个，煨

存性

研细，将疮洗净搽之。

又方 肥皂子煨存性研末，猪胆汁调搽。

又方

松香 血丹各等分

研细，猪板油捣汁，青布卷条烧之取油，搽。

又方

东丹八分 枯矾一钱 真铅粉 松香各二钱，入葱管内，饭上蒸化，待冷去

葱用

共研细末。热香油调搽，猪油亦可。

又方

黄花烧灰 轻粉少许 研匀干搽。

小儿头上肥疮、黄水疮、梅花秃

铜绿 松香各三钱 黄蜡二钱

香油一两五钱，熬匀涂之。

头上生疮，俗名粘疮绝妙方周氏《集验》。

海螵蛸二钱 白胶香 轻粉各五分

研匀。清油润疮，以药干搽。

肥疮极凶者

苦参 何首乌 当归 威灵仙 甘草 金银花 胡麻 石菖蒲
连翘 生地 蝉蜕 酒水同煎。

又方鸿禧东房传。

大枫肉五钱 白信三分 油核桃五个

共捣匀作三丸。夜间取一丸在心口用手擦至二更天气，药散开，仍聚胸膛，仰面而卧，次夕亦然，间一夜再擦一丸，七日后全愈。

头面肥疮经验。

轻粉 飞血丹 白矾 雄黄各等分

研细。装入葱管内两头扎煨过，加龟板灰少许研，菜油调搽，立效。

柏油膏刘氏秘方。 治小儿头上肥疮、羊胡疮、奶癣疮、脓窠疮、脚上血疯疮癣、妇人纽扣疯、裙边疮、耳上湿疮如神。

柏油一斤 麻油四两 明矾 铜绿各二钱 铅粉一两

共入锅内熬成红色，下黄蜡二两化尽，俟温不住手搅匀，离火，入羊胆汁二个，如无，入牛胆汁一个，猪胆汁二个搅匀，磁钵收贮搓之。或调金毛狮子疮药，搓疮更妙。

肥疮王衣兰。紫草浸冰麝，头油搓二、三次愈。

肥疮痢痢 煮鸡蛋黄二个，入铜锅内熬出油，入松香一两五钱熬枯为末。又用麻油一两入蜈蚣一条，去头尾，入油内熬枯，去渣冷定，调前末听用。

先将疮用捋猪汤煎滚，洗透、去腐，或剃头后用鸡蛋数枚加花椒五分，以香油摊煎饼盖头上，用毡帽盖之，过一宿，再用蜈蚣油调松香末搽之。

又方 海螵蛸研末，炒微黄，搽。

又方 厚朴烘碎研细末，麻油调搓。

又方

香附 枯矾各三钱 煎水洗。

又方 老盐鱼一块，香油炙焦去油，以油搽之。

烂眉头疮 小麦炒黑色为末，酒调敷。

头上肥疮 宰猪退毛汤洗数次。

天泡疮门主论

陈实功曰：天泡疮者，乃心火妄动，脾湿随之，有身体上下不同，寒热天时微异。上体者，风热多于湿热，宜凉血散风；下体者，湿热多于风热，宜渗湿为先。若不早治，久则变为顽风紫癜，难愈。《正宗》。

申斗垣曰：此疮属手太阴肺经，肺主皮毛，因受暑热湿蒸之气，故遍身燎浆白泡，疼痛难忍，皮破赤沾也。《启玄》。

王肯堂曰：天泡疮即丹毒之类，而有泡者，由天行少阳相火为病，故名天泡。为风热客于皮肤间，外不得泄，怫热血液结而成泡，如豌豆疮，根赤头白，或头有赤，随处而起。若自里达于外，发在春夏，三焦俱热，则服通圣散；若止从头项、两手起者，此上焦热也，则服凉膈散；若从身半已下起者，则服黄连解毒和四物汤；若发于秋冬，则宜升麻、葛

根、犀角，或加柏苓一、二味，外敷如马齿苋、吴蓝、赤小豆、芫根之类，皆解毒消肿，可用于初起之时。或鳖甲、水龙骨各煨存性，则收湿生肌，可用于浸淫之后。《准绳》。

冯鲁瞻曰：有种天行斑疮，须臾遍身，皆戴白浆，此恶毒气。永无四年此疮自西域东流于海内，但煮食葵菜叶，以蒜齑啖之，即止。《锦囊》。

天泡疮门主方

胡粉散 天泡红肿发热，急胀疼痛，用针挑破，掺之。

石膏煨 蛤蜊粉 轻粉各三钱 杭粉一两

共研极细，挹干患上，用此掺之。或用丝瓜叶捣汁调搽，如冬月无丝瓜叶，用染布青红汁调搽。

石珍散 天泡日久作烂，疼痛不已，脓水淋漓。

石膏煨 真轻粉各一两 青黛 黄柏各三钱

研细。甘草汤洗净，以此药掺之，其痛即止。

又方 银粉煨赤，用鲜丝瓜叶捣汁调搽。

又方 马齿苋捣浓汁，搽。

又方 靛花汁搽。

又方 陈螺蛳壳煨研，干搽。

又方 蚌壳煨研掺。

又方 蛤蜊壳煨研掺。

又方 苈麻根捣汁搽。

又方 井底泥敷。

又方 芭蕉根捣汁敷。

又方 小麦炒焦研末，生桐油调敷。

又方 大红纸剪如疮大，清水润湿，以红纸正面贴疮上。

又方 马桶中垢，刮下新瓦焙干，麻油调搽，七日愈。

又方 蚯蚓泥略炒研末，蜜调敷。

又方 菊花根汁搽。

又方 丝瓜皮汁搽。

又方 荔枝核醋磨搽。

又方《备要》。轻粉、青黛等分研细，瓦花汁调搽立效。

又方 蚕豆壳烧灰涂之。

又方

枯矾 寒水石 青黛各等分

研细。新汲水调搽。

翻花疮门主论

周文采曰：初生如饭粒，渐大而有根，头破血流，脓出肉反如花开之状，故名翻花疮。《集验》。

陈实功曰：此疮头大而蒂小，小者如豆，大者如菌，无苦无痛，揩损每流鲜血，久亦虚人。大法当以津调冰蛭散遍擦正面，外用软油纸包裹，根蒂细处用线连纸扎紧，十日后其患自落，换搽珍珠散收口。《正宗》。

鸦啖疮门主论

窦汉卿曰：鸦啖者久中邪热，脏腑虚寒，血气衰少，腠理不密，发于皮肤之上，相生如钱窍，后烂似鸦啖，日久损伤难治，用鸦啖散。《全书》。

鸦啖疮门主方

鸦啖散 窦氏。

老鸦毛烧灰 大红绒烧灰 黄丹各一钱 珍珠五分 冰片一分 麝香

少许 轻粉三分 枯矾五分
上为细末，先用苦茶洗净，干掺。

面上热毒恶疮门主方

面上生疮。

胡粉 轻粉 松香各等分
研细。鸡蛋黄煎油，调搓。

面上热毒恶疮冯氏。

胡粉 黄柏炙 黄连各等分
研细。猪油调敷。

面上毒疮初起凌潢章秘方。 急寻水蛭蚰一、二条，用酱少许共捣，涂纸上，留一小孔透气，贴上。

黄水疮门主论

申斗垣曰：黄水疮又名滴脓疮。《启玄》。

陈实功曰：头面、耳项忽生黄泡，破流脂水，顷刻延开，多生痛痒，此因日晒风吹，暴感湿热，或内食湿热之物，风动火生者有之。治用蛤粉散，或四味异功散搽之。《正宗》。

冯鲁瞻曰：面上耳边生疮，时出黄水，浸淫不愈，名曰香瓣疮。《锦囊》。

凡初起细疮，手少动之即破，毒水流入何处，即生大水泡疮，即为黄水疮，此热毒郁于皮毛也，当以汤洗之。《秘录》。

黄水疮门主方

四味异功散

松香炼老 生矾 枯矾 银粉

各等分，研细。先将捋猪汤或米泔水熬，洗去净疮靨，拭干秽水，干则麻油调搽，湿则干掺。

面上黄水疮

酸枣 荆芥 羊胡各煨灰存性，一钱 铅粉五钱

研细。先以槐条煎水洗净，将药敷上，其疮自好。

洗法岐天师。

雄黄 防风各五钱

水十碗，敷滚去渣取汁洗疮，即愈。

又方 铅粉用菜油调涂磁碟内，多卷纸板点着合熏，时时搅匀，待遍黄听用，将靨剥去搓上，立愈。

又方周氏抄方。雄猪胆一个，黄柏一两浸，焙干为末，掺之。

又方 松香研细，真麻油调搽。

又方 银粉井水调涂碗底，以艾团烧烟熏转绿色，刮下研细，湿则干掺，干则油调搓。

香瓣疮门主论

申斗垣曰：香瓣疮又名浸淫疮，初生甚小，先痒后痛，汁出浸淫，湿烂肌肉，延及遍身，多生面上耳边。《启玄》。

香瓣疮门主方

面上耳边香瓣疮

殺羊须 荆芥 干枣去核，各煨存性，三钱

研细，入银粉五分，每用少许油调，先以温汤洗净，拭干涂上即愈。

小儿身上起白累如珠缀，一、二日即破，脓水外痒甚，一处方好，一处又起。如意草捣烂敷之，以长布缚定，一夜即安。

又方 鸡蛋壳煨存性，研细，猪油调搽。

又方 紫草一钱，麻油浸，先搽一块，好了再搽一块。

金丝疮门主论

金丝疮形如绳线，巨细不一，上下至心即死。治法将疮头截住刺之出血，再用药治。《集验》。

金丝疮门主方

验方 嚼浮萍草涂之，即愈。

火珠疮门主论

火珠疮其形如珠，始于发中相染不已，亦有伤命者。其热如烙，四畔红赤，中藏明亮如珠，此心肝二经积热炽盛而成。

火珠疮门主方

验方 生萝卜捣烂，将滴醋浸敷疮上。

热疮门主论

申斗垣曰：心神烦躁，遍身发疮，赤烂如火。《启玄》。

李东垣曰：热疮遍身发疮，脓血赤烂如丹，俨如火烧疮。

热疮门主方

验方刘禹锡《传信方》。鸡蛋五枚，煮熟去白取黄，乱发如鸡子大，相和于铁铤中，炭火熬之，初甚干，少顷即发焦，乃有液出，旋取置碗中，以液尽为度。取涂疮上，即以苦参细末敷之如神。

二黄散

川黄连 黄柏各三两 赤小豆 绿豆粉各一两 寒水石 紫苏
漏芦各七钱

共研细末。麻油调搽，一日三次。

寒疮门主论

窦汉卿曰：寒疮令人面上及遍身生疮似猫眼，有光彩，无脓血，久则近眦，此乃脾家湿热所化。宜服雄黄解毒丸，清肌渗湿汤，多食鱼、鸡、葱、蒜自愈。惟鲤、鲇、鱼、虾、蟹不可食。《全书》。

《心法》曰：猫眼疮一名寒疮。每生于面及遍身，由脾经久郁湿热，复被外寒凝结而成。初起形如猫眼，光彩闪烁无血，但痛痒不常，久则近眦。宜服清肌渗湿汤，外搽妙贴散。

冷疮门主论

申斗垣曰：身触风寒冷气，以致血涩不行，其疮顽滞不知痛痒，经久不愈。宜用椒附雄矾腻粉油调敷。《启玄》。

肉刺毛门主论

汪省之曰：肉刺毛隐隐生人遍身皮肤手足间，如虫钻刺，令人难忍。若一犯房欲，其毒直刺心胸，宜硼砂散主之。《理例》。

鱼脊疮门主论

窦汉卿曰：鱼脊疮者，乃脏中积冷，肾气虚寒，故虚热得传经络筋骨之间，发动不知何处。初生如痘疖，破时黄水流注，白泡似鱼脊。若不速治，肉烂脓流，命亦难保。《经验》。

赤炎疮门主论

申斗垣曰：赤炎疮乃手太阴肺经感受风热，肺主皮毛，其经多气少血，故遍身红疮点子，又名赤炎风，乃心火盛，血热也。有赤点，或有或无，久而不愈，变为厉风。《启玄》。

癌疮门主论

直指方云：癌疮上高下深，累垂如瞽眼，其中带青，头上各露一舌，毒孔透里，用生井蛙皮煨存性，蜜水调敷良。详《本草纲目》鼃①部。

癰疮门主论

冯鲁瞻曰：癰疮者，因风热毒气所乘，搏于皮肤，生癰而溃成疮，故名之。《锦囊》。

日晒疮门主论

申斗垣曰：此乃酷日晒曝，先疼后破而成疮，此辛勤劳作，佣工务农之人多有之。宜制柏散加青黛治之。《启玄》。

水渍疮门主论

申斗垣曰：车旋匠及染匠辛苦人，久弄水浆，不得停息，以致手丫湿烂，名曰水渍疮。《启玄》。

① 鼃《集韵》为蛙字之古体字。

水渍疮门主方

验方《启玄》。 矾水浸洗数次自愈。

冻疮门主论

陈实功曰：冻疮乃天时严冷，气血冰凝而成，手足耳边开裂作痛。
《正宗》。

申斗垣曰：冻疮先痛后肿，遇暖发烧，破流脓血。《启玄》。

《石室秘录》云：冻疮乃人不耐寒，而肌肤受冷，骤用火烘，乃成冻疮。至于耳上冻疮，必是人用手温之，反成此累也。

《正字通》云：今俗呼足跟冻疮曰灶瘡。

蒋示吉曰：冻疮乃肌肉寒极，气血不行，所谓死肌患也。初起紫斑，久则变黑，腐烂作脓，碧玉膏主之，生肌敛口。《说约》。

证谓：热肌经冷风所激，凝滞成片作痒，此是冻风，切勿火烤。亦忌热手摸擦，越摸越甚，一经紫黑破损，即成冻疮，宜楝树果煎汤洗，极效。

冻疮门主方

冻疮开裂

桐油八两 白蜡 黄丹各一两

熬膏贴之

又方 楝树果煎汤淋洗，即以楝树绿擦之神效。

又方

五倍子 牛鼻中绳煨灰，各等分

研末，填冻裂处。

又方

松香二两 黄蜡一两

熬匀，瓦罐收贮，先以热汤洗，令皮软拭干，将药于慢火上炙化涂之。

冻耳冻跟 端午日取猪板油四两去皮膜，加乳香二分，轻粉三分，雄黄五分，研入米烧酒内拌匀，再入油拌过，俟收干放悬屋檐下阴干，搽之。

手足开裂经春夏不愈者

生姜捣汁 红糟 食盐 腊猪油

共研烂，擦入皲内，一时虽痛，少顷便软皲合，再用即安。

免冻疮法

杏仁 天花粉一两 红枣十枚 猪胰三副

共捣如泥，用好酒四杯浸于磁器内，早晚搽手及头面。

冬月冻疮皮裂疼痛 黄蜡一两熔化，入松香三分搅匀，每以温汤洗拭裂处，用前药熔化，滴入裂缝，经旬即愈。

冻疮未破者 白矾研末一钱，百沸汤半盅搅和，鸡毛扫涂烘干，擦去患处白屑，再扫再烘，药尽自愈。

洗冻疮 秋茄根煎汤，乘热洗之。如皮破以螃蟹壳煨灰掺之。

又方 白芨二两煎汤洗之，如烂破者，洗后用橄榄核烧研为末，搽之。

又方

陈石灰、黄狗屎露天久者，变成白色，用炭火煨过，各等分，研细末。以麻油调之敷上。虽成疮溃烂，敷上即止痛生肌。

冻疮久烂不愈 糖塔饼杓内炒成灰，研末一两，加冰片少许，干掺。

又方 独蒜煨，杵烂贴。

又方 熬熟桐油调密陀僧末敷。

又方 五倍子研末和牛骨髓填缝内，即好。

又方 荆芥煎汤洗之，三日愈。

又方 生附子为末，面水调敷。或加楝树子肉捣敷。

又方 麻雀脑子涂之。

又方 猪脑子加热酒洗。

又方 腊月羊油悬挂屋内，愈陈愈妙，搽之立愈。

又方 白芨末调敷裂处。

又方 羊屎不拘多少，煨令存性，砂糖调敷。

又方 狗骨煨存性，研末，香油调填裂拆内。

又方 附子皮煎汤洗。

又方 陈蜡烛油同白蜡搽之。

又方 糟汤浸洗，姜汁涂之。

脚指冻风烂化 棉花烧灰掺之。

冻疮 油胭脂搽之。

又方 玉红膏搽之。

又方 五倍子、猪油捣成膏，填入裂缝。

冻耳 姜汁煎涂。

冻跟 茄根煎汤洗。

免冻 樱桃擦耳，擦脚后跟。冬季不生冻疮。

冻疮 旧貂毛煨存性，搓。

又方 冻疮已破者，用黄柏末七分，生皮硝三分。未破者，用黄柏末三分，生皮硝七分，俱用冷水调搓。

又方 鸽粪煎汤洗。

又方 蟹壳烧枯研细，菜油调搓。

又方 先用胡椒煎洗拭干，再用胡椒研细掺上，外以新棉包裹，用布扎好。

又方 鲜蚕豆梗叶煎汤洗。

又方 雪擦洗冻处。

又方 鱼胶熬化，摊膏药贴破裂上。俟长平自落。

又方 甘草甘遂煎汤热洗二次。

冻风裂开

败荷叶梗烧存性 头垢

桐油熬过调膏，搽成一块，临用切作小条，揳在裂缝内。

又方 腌菜卤煎汤滚洗。

汗渍疮门主论

申斗垣曰：肥人夏月久不洗浴，被汗淹渍皮肤，渐烂成疮，痛不可忍，名曰汗渍疮。《启玄》。

汗渍疮门主方

验方

真蛤粉 滑石各等分 研匀扑之。

皴裂疮门主论

凡撑船推车，打鱼染匠，辗玉木瓦辛苦之人，手足皴裂挽动出血，痛不可忍，名曰皴裂疮。《启玄》。

皴裂疮门主方

验方《启玄》。

宜用地骨皮、白矾煎汤洗之至软，再用腊月羊油顿化，入研细轻粉一钱，搽之神效。

蜘蛛疮门主论

陈实功曰：蜘蛛疮或衣沾蜘蛛遗尿，或虫蚁游走而成。初生白泡红根作痒，日渐开成簇作痛。《正宗》。

申斗垣曰：此疮生于皮肤间，如水窠疮相似，淡红且痛，五、七个成簇，亦能荫开，可用苈麻在疮上揉搓出水，即以苈麻烧灰为末，掺在疮上即愈。《启玄》。

汪省之曰：蜘蛛尿着人身上，即生疮如粟粒累累，似蛭虫螫痛，亦

能恶寒发热，即以犀角磨汁涂之则愈。不然以苈麻搓去疮内水汁，用金黄散搽之。《理例》。

蜘蛛疮门主方

验方 公鸡涎扫之。

又方 公鸡嘴、爪甲煨灰敷之。

又方 用蟾酥丸同陈京墨磨，搽。

又方 苈麻搓疮令破出水，以雄黄、枯矾等分研细，干搽。

漆疮门主论

陈实功曰：漆味辛热火象，有毒之物，人之皮毛，腠理不密，故感其毒而成。先发作痒，抓之渐似瘾疹出现皮肤，传遍肢体，皮破烂斑，流水作痛，甚则寒热交作。忌浴热汤，兼戒口味，不然即变顽风癬癩矣。《正宗》。

申斗垣曰：漆疮令人浑身上下肿起，如痒如火，刺刺而痛，皮肤燥裂三、五日，比风热疮或疼或痒为异。《启玄》。

又曰：宜韭菜捣汁，调三白散涂之。

证曰：木形人遇漆起泡发痒变疮，肢肿作痛，甚者寒热交作。此疾虽小，有受者遍身头面似疹癩，浮肿生疮痛痒，毛发脱落，心神恍惚不得眠者，因疗之迟，遂为他证，或成风癩，真可畏也。

漆疮门主方

验方

栗树皮去净外面黑皮，用里面青皮炒焦

煎水冷洗三、四次。

又方 木匠店木柿煎汤洗之。

又方 皮硝不拘多少，用熟水化开，新笔扫之。

又方 生蟹取黄涂之。

又方 老柳树皮煎水洗，一日三次。

又方 干荷叶一斤，水煮浓汁洗。

又方 柳叶煎汤洗二、三遍，内服香油一、二碗，外搽生蟹黄。

又方 铁匠铺磨铁槽中泥，涂之即愈。

又方 蟹沫涂之。

又方 磨刀泥涂。

又方 蟹壳、滑石研细，干者蜜和涂之，湿者干末掺之。

又方 石膏、轻粉、韭汁调搓。

煎方《集验》。

元参 知母 石膏 人中黄 黄连 升麻 连翘 牛蒡子各一钱
甘草五分

淡竹叶二十片煎，不拘时服。忌浴热水，兼戒口味，否则变为顽风癖，愈而又发者多矣。

又方 柳叶搓烂，煎汤洗。

又方 生鸡蛋黄涂，干则又涂，不过三、五次。

又方 捣韭菜洗之。

又方 新鲜松木打碎，煎水洗。

又方 频以盐汤洗之。

凡素常遇漆味即患漆疮者 川椒三四十粒捣碎，涂口鼻上，即不能为害。

恶疮门主论

王肯堂曰：恶疮、诸痛痒疮，皆属于心，诸湿肿满，皆属于脾，心主血，脾主肉，血热而肉湿，汤热相合，溃败肌肤，浸淫不休，不可以定名命之，故谓之恶疮也。然有辨焉，如疥癣癰疹之属，拂郁气血，在皮肤腠理间者，可以表而散，《内经》有谓汗之则疮已是矣。若郁气血在肌肉之分，外达皮肤，作寒热而生脓者，或七情所招，或膏粱之变，皆宜解内热，不宜汗也，张仲景所谓疮家不可发汗，汗之则疮者是矣，一疮而

有宜汗不宜汗之戒，盖热有浅深表里故也。故疮在皮肤，则当因其轻而扬之，汗之浴之，外以杀虫润燥，皆解凝结涎沫之药敷之；疮之在肌肉，则当因其重而减之，泻经络之热，清凉气血，外以化脓生肌膏；疮在头巅则当射而取之，须酒制寒凉剂，更以风药升而上之，外以杀虫解热药敷之。能明此三者，其于治疮思过半矣。《准绳》。

恶疮门主方

验方《种福堂》。

杏仁三十粒，去皮、尖 雄黄一钱五分 轻粉一钱

研末。洗净以猪胆汁调上，二、三日即愈。百发百中。

当归蒺藜煎张景岳。 治痈疽疮疹，血气不足，邪毒不化，内无实热而痛淋漓者，悉宜用之，此与芍药蒺藜相为奇正者，当酌其详。

当归 熟地 芍药酒炒 何首乌各二钱 荆芥穗 炙甘草 防风 川芎 白芷各一钱 白蒺藜炒，捣碎，五钱

或酒或水煎服。然水不如酒以行药力。阳虚不能化毒者，加桂枝，再加干姜、附子；气虚不能化毒者加人参、黄耆；毒陷不能外达者，加山甲、皂针。

芍药蒺藜煎 治通身湿热疮疹，及下部红肿热痛诸疮。

黄芩 龙胆草 木通 山梔 泽泻各一钱五分 生地 芍药各二钱 白蒺藜连刺捶碎，五钱，甚者一两

白水煎服。如火不甚者，宜去龙胆草，山梔。

一切恶疮不愈，白蜜敷之，必效。

诸肿毒疮，疼痛不安，人所不识者 取独头蒜三、四颗捣烂，入麻油和研，厚敷肿处，干再易之。

又方 初起即用赤小豆，井水调敷立消。

丹毒恶疮 马齿苋捣敷。

顽疮门主论

陈远公曰：人久生恶疮，或手足、头面、胸背，经年累月不愈，臭腐不堪，百药无效，人所谓顽疮者，言其冥顽，医功无所施力也，然亦治之不得法耳。人身气血和，必不生疮，即间生疮，旬日速愈，是生疮者乃气血不和也。其不和者或因湿浸，或因热盛，或湿热寒邪交至，以致气结不宣，血滞不散，结于皮而皮生疮，结于肉而肉生疮。久则脓血不净，因而生虫，人又用杀虫之药伤其皮肉，则气血更虚，力难兼到，弃皮肉于膜外而不顾，则成疮矣。故治疮必以行气活血为主，而虫与毒不必计也；然行气活血亦不易也，非补气血不可，盖气得补而气自行一身，血得补而血自活于遍体也。救顽汤：当归、白术、黄耆、熟地、麦冬各一两，山萸、茯苓各五钱，生甘草三钱，柴胡、防风、连翘各一钱，熟附子一片，半夏二钱水煎服。二剂疮口必肿，此乃药助气血与疮战也，乃速愈之兆；又二剂不疼而痒矣；又二剂不再发。《冰鉴》。此方单去行气活血，得补之力也，气行血活，虫将安寄，故不必杀虫，顽疮自愈矣。

又曰：有内股生疮，敛如豆许，翻出肉一块，宛如菌状，人以为虫蚀外翻也，谁知肝经风热血燥之故乎！夫肝热则生风，风乃内风而非外风也；外风清凉，内风蕴热，故外风宜散，内风宜清。然清其风而不补血，则热不能解而风不能疏也，必于养血之中，益以清热之味，则燥者不燥，热退则风自静也。清风汤：白芍一两，人参、当归各五钱，白术、黑梔、丹皮、沙参、花粉各三钱，川芎二钱，柴胡、连翘、甘草各一钱。水煎服。数剂疮口自敛。此方滋血以养肝，非消肉以化毒，何以敛疮而愈？盖疮成于肝木之旺，平肝而血无过燥之虞，自然风散而热无炎灼之患，苟不平肝而内用降火之品，外用追蚀之法，则蚀而又翻，翻而又蚀，其肉愈大。其气益虚，变出非常，恐难援救耳。

席疮门主论

申斗垣曰：席疮乃久病着床之人，挨擦磨破而成。上而背脊，下而

尾间,当用马屁勃软衬,庶不致损而又损,昼夜呻吟也。病人但见席疮,死之征也。《启玄》。

《心法》曰:席疮乃大病后久而生眠疮也,乃皮肉先死,不治。

席疮门主方

验方 马屁勃垫之。

又方 小麦麸绢装成垫褥,垫之。

又方 盖屋陈烂草,研细垫睡。

血箭门主论

陈实功曰:血箭乃心经火盛,逼血从毛窍中出也。治以桃花散凉水调敷,或金墨涂搓自止;内宜凉心凉血。《正宗》。

冯鲁瞻曰:有毛窍中出血者,名曰肌衄。因阳气怫郁于内,不能敷扬于外,以致阴血上乘阳分,留淫腠理,日久阳气开发,则阴血不能归经,故血从毛窍出也,宜开郁清气凉血之剂。如相火内动而乘阴分,以致热血沸腾者,宜滋阴降火之剂。前人主乎肺热,以肺主皮毛也,用男胎发烧灰扑之。有因大喜伤心,喜则气散,血随气而溢于表者,宜凉心以敛之。《锦囊》。

岐天师曰:如有人足上忽毛孔出血如一线者,流之不止即死。急以米醋三升煮滚热,以两足浸之即血止,后用人参一两,当归三两,穿山甲一片火炒研末,以参归汤调服,即不再发。此乃酒色不禁,恣意纵欲所致,世上人多有之,方书未载。《秘录》。

血痣门主论

陈实功曰:血痣乃肝经怒火郁结。其形初起色红如痣,渐大如豆,揩之血流,须用冰蛭散枯去本痣,以珍珠散搽去生皮;内服解郁平肝之剂。如血出不止,过甚者,凉血地黄汤主之。《正宗》。

血疳门主论

窦汉卿曰：血疳乃脏中虚弱，邪气相侵，真气衰少，风毒闭塞腠理，发于肌肤。初如紫疥，破时出血，疮生遍身，行处成疮，损伤皮肉，痒痛难禁。治法先宜养血清热，次宜清肌渗湿。《全书》。

疣门主论

经曰：手太阳之别，名曰支正。上腕五寸，虚则生疣，疣音休，俗乎鸡眼子是也。小者指痂疥，取之所别也。

薛立斋曰：疣属肝胆少阳经风热血燥，或怒火肝火，或肝客淫气所致。盖肝热水涸，肾气不荣，故精亡而筋挛也，宜以地黄丸滋肾水以生肝血为善。若用蛛丝缠、螳螂蚀、着艾灸，必多致误。大抵此证与血燥结核相同，故外用腐蚀等法，内服燥血消毒，则精血愈虚，肝筋受伤，疮口翻突开张，卒成败证矣。

《正字通》云：疣小者，俗谓之瘰子。

疣门主方

验方

地肤子 白矾各等分

煎汤洗数次，瘰子尽消。

千日疮门主论

申斗垣曰：千日疮一名疣疮，又名瘰子，又名晦气疮。此疮如鱼鳞，生于人手足上，生一千日自落，故名之。用鸡肫皮擦之自愈。一法用蕲艾在初生第一个上灸之，余皆自落而痊也。《启玄》。

千日疮门主方

验方谷裕丰。用铜钱一个套在千日疮上按定,取草纸卷了点着烧透,熄下的纸煤子放疮上,以香点着,烧过吹去,又放纸煤烧之,五、七次其疮根随手自落,并不痛楚。

又方杜秘。治身上忽生竖头肉,肉猴子并斑痣。

新石灰 硷各等分

烧酒泡一时即可用,每周扫上即起紫泡,挑破出水结疤,如点斑痣,须以针微挑破,点之。

又方王德山。用蛇蜕擦之,即落。

卷之十五

跌打部

自跌打损伤以及人咬、破伤风等证，俱汇于本部中，以便检阅参治。

跌打损伤门主论

陈远公曰：有跌伤骨折，必用杉木或杉板将骨折凑合端正，以绳缚定，勿偏斜曲，再以布扎。切不可因疼痛，心软少致轻松，反为害事。后用内服药，如皮破血出，须用外治药。但骨折而外边之皮不伤，即不必用外治药，然内外夹攻，未尝不更佳耳。内治法宜活血祛瘀为先，血不活则瘀不去，瘀不去则骨不能接也。续骨神丹：当归二两，大黄五钱，生地、败龟板末、白芍各一两，丹皮三钱，桃仁三十个，续断、牛膝、乳香末、没药末、红花各二钱，羊蹄躑一钱，水煎服。一剂瘀去新生，骨即合也，又二剂去大黄，再服四剂全愈。外治膏药加末药掺伤处为妙。全体神膏：当归、生地、红花各二两，牛膝、续断、刘寄奴、地榆、茜草、木瓜、小蓟、人参、川芎、白术、黄耆各一两，甘草五钱，桑木枝四两，杏仁、皂角、柴胡、荆芥各三钱。麻油三斤熬数沸，以麻布滤去渣再煎，滴水成珠，加入水漂过黄丹一斤四两，收为膏，勿太老。再用自然铜醋浸烧七次，海螵蛸、乳香、花蕊石各三钱，没药二钱，麒麟竭五钱，白蜡一两为末，乘膏未冷，投入膏中，以桑木棍搅匀，取起以瓦器盛之。临时以火炖摊，大约每张重一两，摊毕再入胜金丹：麝香、花蕊石、象皮各三钱，血竭三两，乳香、海螵蛸、没药、樟脑、人参、木耳灰、三七根、儿茶各一两，古石灰、紫石英各二两，自然铜、冰片、干地虱、干大粪、琥珀各一

钱,生甘草五钱,土狗十个,研细和匀,磁瓶密贮。每膏一张用末药三钱掺膏上贴之。凡接骨不须二个也,重则二个,此乃绝奇绝异之方;倘骨未损伤,只贴膏药,不必用胜金丹。内外治法三方,有不可形容之妙,内外兼治,旦夕奏功,得此三方,无折骨之不救也。《冰鉴》。

《丹心》曰:凡金疮及折伤,不可饮冷水,血见寒则凝,人心即死。

蒋示吉曰:跌打损伤,筋断血流不止者,独胜散主之。《说约》。

冯鲁瞻曰:胎前如有跌扑所伤,须逐污生新为主,佛手散最妙。腹痛加益母草服,如痛止则母子俱安;若胎已损,则污物并下,再加童便制香附、益母草、陈皮煎浓汁饮之。如从高坠下,腹痛、下血、烦闷,加生地、黄耆补以安之。如因跌扑腹痛下血,加参、术、陈皮、白茯苓、炙甘草、砂仁末以保之。如胎下而去血过多,昏闷欲绝,脉大无力,用浓厚独参汤冲童便服之。小产本由气血大虚,今当产后,益虚其虚矣,故较正产,尤宜调补。

《素问》云:人有所坠堕,恶血留内,腹中满胀,不得前后,先饮利药,此上伤厥阴之脉,下伤少阴之络,刺足内踝之下,然骨之前血脉出血,刺足跗上动脉,不已,刺三毛上各一疔,见血则已。左刺右,右刺左。善悲惊不乐。缪刺论。

《灵枢》云:有所坠堕,恶血留内,有所大怒,气上而不行,下积于胁下则伤肝。又中风有所击扑,若醉入房,汗出当风则伤脾。又头痛不可取于膻者,有所击堕,恶血在内,若肉伤痛未已,可侧刺,不可远取之也。邪气脏腑及厥阴篇。

《灵枢》曰:身有所伤,出血多,反中风寒,若有所坠堕,四肢懈惰不收,名曰体惰。取小腹脐下之三结交阳明太阴也。脐下三寸,关元也。三结交者,即关元穴是也。寒热篇。

《内经》云:肝脉搏坚而长,色不青,当病堕,若搏因血在胁下,令人呕逆。

《金匱》云:寸口脉浮微而涩,然当亡血若汗出,设不汗者,其身有疮被刀斧所伤,亡血故也。

《脉经》云:从高颠扑内有血,腹胀满,其脉坚强者生,小弱者死。

李东垣曰:夫从高坠下,恶血留于内,不分十二经络,医人俱作中

风,肝经留于胁下,以中风疗之。血者,皆肝之所生,恶血必归于肝,不问何经之伤,必留于胁下,盖肝主血故也。痛甚则必有自汗,但人人有汗出,皆属风证,诸风皆属于肝木,况败血凝泣,逆其所属入于肝也。从高坠下逆其上行之血气,非肝而何,非伤寒无汗,既曰汗必自风化之也。故以破血行经药治之。凡寒凉之剂不可轻用。《医学发明论》。

刘宗厚曰:打扑金刃损伤,是不因气动而病生于外,外受有形之物所伤,乃血肉筋骨受病,非如六淫七情为病,有在气在血之分也。所以损伤一证,专从血论,但须分其有瘀血停滞而亡血过多之证。盖打扑堕坠,皮不破而内损者,必有瘀血。若金刃伤皮出血,或致亡血过多,二者不可用同法而治,有瘀血者宜攻利之,若亡血者兼补而行之,又察其所伤有上下轻重深浅之异,经络气血多少之殊,唯先逐瘀血,通经络,和血止痛,然后调气养血,补益胃气,无不效也。

《脉经》云:金刃跌仆,脉病不相应者死。

戴院使云:扑踏不知曰癰,两手相搏曰扑,其为损一也。

又曰:大法固以血之瘀失,分虚实之补泻,亦当看损伤之轻重,轻者顿挫气血,凝滞作痛,此当导气行血而已。重者伤筋折骨,此当续筋接骨,非调治三、四月不得平复;更甚者气血内停,阻塞真气不得行者必死,急泻其血,通其滞,亦或有可治焉。

《伤损论》曰:夫伤损必须求其源,看其病之轻重,审其损之浅深。凡人一身之间,自顶至足,有斫伤、打伤、跌伤及诸刃伤者皆有之。凡此数证,各有其说。有当先表里而后服损药者,为医者当循其理治之。然医者意也,不知意者,非良医也,或者禀性愚昧,不能观其证之轻重,明其损之浅深,未经表里通利,先服损药,误人多矣。有因此瘀涎上攻,有因此大小脏腑闭结,差之毫厘,谬以千里,所谓医不三世,不服其药,信哉。

凡脑骨伤破不可见风着水,恐成破伤风候。凡脑骨伤碎在硬处可治,若伤在太阳不可治。如伤在发际,须剪剃去发,看皮破不破,好用药敷。凡脑、两肩及后枕或两眉有伤可治,眼睛伤瞳仁,不碎可治。头顶心有损则难治。凡鼻两孔伤凹者可治,血出无妨。齿破伤动者,用蒺藜根烧存性为末,常揩搓之,即牢。结喉伤重,软喉断,不可治;以汤

与之得入肠者可治；若并出者，不可治。凡手脚骨只一边断则可治，若两手脚骨皆断者，不可治。肚上被伤，肚皮俱破，肠出外，只肠全断难医；伤破而不断者，皆可治疗。凡肠出可令病人手搭在医人肩，随其左右收起，以麻油润疮口整入腹，却以通关散吹鼻打喷嚏，令肠自入用桑白皮线同皮肉缝合后，以封口药涂伤处，外以补肌散用鸡子清调匀敷贴。若肠上有小损孔，以灯火照之，肠中有气射灯不可治。凡伤损药中不可缺少乳香、没药，此药极能散血住痛，不可不知。凡伤损初次不可使用自然铜，久后方可用之，折骨者便宜用之，若不折骨、不碎骨，则不可用。修合诸损药，皆要去了。如用自然铜必用火煅，方可服之。然新火者，其火毒与金毒相煽，挟香热药毒，虽有接骨之功，燥散之祸甚于刀剑，戒之。凡损伤妙在补气血，俗工不知，惟要速效，多用自然铜，多成痼疾也。初伤只用苏木活血，黄连降火，白术和中，童便煎服。在下者可下瘀血，但先须补托，在上者宜饮韭汁或和粥吃，切不可饮冷水，血见寒则凝，但一丝血入心即死。

十不治证：系颠扑损伤，或被伤入于肺者，纵未即死，二七难过一；左胁下伤透内者二；肠伤断一半可医，全断者不可治三；小腹下伤内者四；证候繁多者五；脉不实重者六；老人左股压碎者七；伤破阴子者八；血出尽者九；肩内耳后伤透内者，皆不必用药。《得效》。

冯鲁瞻曰：凡跌扑损伤，踉折挫闪，虽由外触，势必内伤，气血凝滞，红肿或青，痛不可忍，故始须用甘辛温散，行气破瘀则痛自退，肿自消，如独活、白芷、荆芥、防风、川芎、当归、没药、古文钱、鹿角灰、苏木、赤芍、红花之类，以水酒煎药，冲入童便尤妙。及其外伤平复，犹宜滋补气血筋骨之药调之。《锦囊》。

又曰：肢体全仗气血，伤损必加补养。在上先消瘀血，在下先为补养，更审胃气，盖去血过多，脉微欲死，独参汤加童便接住元气为急；甚有肢冷脉微者，参、术、附子大剂挽之，势与产妇同也。脉来和缓者生，急疾芤者死，宜虚细，不宜数实，切记避风。

陈实功曰：跌扑者有已破、未破之分，亡血、瘀血之别。从高处堕未损皮肉者，必有瘀血流注脏腑，人必昏沉不醒，二便必难，当以大成汤通利二便，其人自苏，不醒者独参汤救之。《正宗》。

损伤大纲固用药不可差，而整顿手法尤不可孟浪。今以人之周身，总三百六十五骨节开列于后：人身总有三百六十五骨节，以一百六十五字都关次之，首自铃骨之上为头，左右前后至轅骨，以四十九字共关七十二骨。

巅中为都颅骨者一。有势，微有髓及有液。次颇为髌骨者一。有势，微有髓。髌前为顶威骨者一。微有髓，女人无此骨。髌后为脑骨者一。有势，微有髓。脑左为枕骨者一。有势无液。枕就之中附下为天盖骨者一。下为肺系之本。盖骨之后为天柱骨者一。下属脊髓有髓。盖前为言骨者一。言上复合于髌骨，有势无髓。言下为舌本骨者左右各二。有势无髓。髌前为凶骨者一。无势无髓。凶下为伏委骨者一。俚人讹为伏犀骨者是也。无势无髓。

伏委之下为俊骨者一。附下即眉字之分也。无势无髓。眉上左为天贤骨者一。无势无髓。眉上右为天贵骨者一。眉上直目睛也。无势无髓。左睛之上为智宫骨者一。无势无髓。右睛之上命门骨者一。无势无髓。两睛之下中为鼻。鼻之前为梁骨者一。无势无髓。梁之左为颧骨者一。有势无髓。

梁之右为紕骨者一。有势无髓。梁之端为嵩柱骨者一。无势无髓。

左耳为司正骨者一。无势无髓。右耳为纳邪骨者一。无势无髓。

正邪之后为完骨者左右共二。无势无髓。正邪之上附内为嚏骨者一。无势少涎。嚏后之上为通骨者左右前后共四。有势少液。左颌为乘骨者一。有势多液。右颌为车骨者一。有势多液。乘车之后为轅骨者左右共二。有势有液。乘车上下出齿牙三十六事。无势无髓。庸下就少则不满其数。

复次，铃骨之下为膻中左右前后至髻，以四十字关九十七骨。

轅骨之下左右为铃骨者二。多液。铃中为会厌骨者一。无势无髓。

铃骨之下为咽骨者左、中及右共三。无髓。咽下为喉骨者左、中及右共三。无髓。喉下为咙骨者环次共十事。无髓。咙下之内为肺系骨者累累然共十二。无势无髓。肺系之后为谷骨者一。无髓。咙外次下为顺骨者八。少液。顺骨之端为顺隐骨者八。少液。顺下之左为洞骨者一。女人无此。顺下之右为棚骨者一。女人无此。铃下之左右为缺盆骨二。有势多液。左缺盆之前为下厌骨者一。无髓。右缺盆前之下为分膳骨者一。无髓。厌膳之后附下为仓骨者一。无髓。仓之下

左右为髌骨者共八。有势无液。髌之下左为胸骨者一。男子此骨大者好勇。

髌之下右为荡骨者一。女人此骨大者则丈夫贤^①。胸之下为乌骨者一。男子此骨满者发早白。荡之下为臆骨者一。此骨高多讹妄。铃中之后为脊痠骨者共二十二。上接天柱，有髓。脊痠次下为大动骨者一。上通天柱，共二十四椎。大动之端为归下骨者一。道家谓之尾闾。归下之后为篡骨者一。此骨能限精液。归下之前为髻骨者一。此处薄者多处贫下。

复次，缺盆之下左右至肘骨，以二十五字关六十骨。此下只分两手臂至十指之端众骨。

支其缺盆之后为佞甲骨者左右共二。有势多液。佞甲之端为甲隐骨者左右共二。此骨长则至贤。前支缺盆为飞动骨者左右共二。此骨薄病瘕缓。次飞动之左为龙膈骨者一。有势无髓无液。次飞动之右为虎冲骨者一。有势无髓无液。龙膈之下为龙本骨者一。有势有髓。虎冲之下为虎端骨者一。有势有髓。本端之下为腕也。龙本上内为进贤骨者一。男人此骨隆为名臣。虎端上内为及爵骨者一。女人此骨高为命妇。腕前左右为上力骨者共八。有势多液。次上力为驻骨者左右共十。有势多液。次驻骨为搯骨者左右共十。有势多液。次搯骨为助势骨者左右共十。右助外为甲，左助外为爪。爪甲之下各有肘骨左右共十。无势无液。

左肋之端，各有肋隐骨者分次亦十二。无髓。肋骨之下为季肋骨者共二。多液。季肋之端为季隐骨者共二。无髓。右肋之端为肘隐骨者共十二。无髓。髻骨之前为大横骨者一。有势少髓。横骨之前为白环骨者共二。有势有液。白环之前为内辅骨者左右共二。有势有液。内辅之后为骸关骨者左右共二。有势有液。骸关之下为键骨者左右共二。有势有液。键骨之下为髌枢骨者左右共二。有势多髓。髌枢下端膝盖骨者左右共二。无势多液。膝盖左右各有侠升骨者共二。有势多液。

立骨左右各有内外踝骨者共四。有势少液。踝骨之前各有下力骨者左右共十。有势多液。踝骨之后各有京骨者左右共二。有势少液。下力之前各有释欹骨者共十。有势。释欹之前各有起仆骨者共十。有势。起仆之前各有平助骨者左右各十。有势。平助之前各有肘甲

① 贤 原本脱，据达安堂本补。

骨者左右各十。无势少液。释欬两旁各有核骨者左右共二。有势多液。

起仆之下各有初步骨者左右共二。有势无髓有液，女人则无此骨。

凡此三百六十五骨也，天地相乘，惟人至灵，其女人则无顶威、骨洞、右棚及初步等五骨，止有三百六十骨。又男子女人一百九十骨，或隐或衬，或无髓势，余二百五十六骨并有髓液，以藏诸筋，以会诸脉，溪谷相需而成身形，谓之四大，此骨度之常也。

凡医跌打损伤者，忌用葱，若用葱虽医好，遇天阴伤处必发损作痛。梁伟士。

《可法良规》云：凡伤损之证，乃有形器物所伤，为筋骨受病，当从论。盖血得热则妄行，其害甚速，须先伐肝火，清运火，砭患处，和经络，则瘀血不致泛注，肌肉不致遍溃；次则壮脾胃，进饮食，生血气，降阴火，则瘀血易于腐溃，新肉易于收敛，此要法也。若用克伐之剂，虚者益虚，滞者益滞，祸不旋踵矣。论瘀血走注。

又云：凡伤损之证，若棍扑重者，患处虽不破，其肉则死矣。盖内肉糜烂与瘀血相和，如皮囊盛糊，然其轻者，瘀血必深蓄于内，宜急砭刺，即投大补之剂，否则大热烦躁，头目胀痛，牙关紧急，殊类破伤风证，此瘀秽内作而然也，急刺之，诸证悉退。若刺破之后，或有发热恶寒，口干作渴，怔忡惊悸，寤寐不宁，牙关紧急，目赤头痛，自汗盗汗，寒战咬牙，气短喘促，遗尿手撒，身热脉大，按之如无，身热不欲近衣，或欲投水，或恶寒而脉浮大，重按微细，衣厚仍寒，此气血挟虚使然也。皆宜参、耆、归、术之类急补之，如不应，速加附子，缓则不救。或手足逆冷，肚腹疼痛，泻利肠鸣，饮食不入，呃逆呕吐，此寒气乘虚而然也。治法同前用药。如有汗而不恶寒，或无汗而恶寒，口噤足冷，腰背反张，颈项劲强，乃血气虚而发痉也。治法亦同前用药，少佐见证之剂，此痉证往往误投风药，以致不起者多矣。若果是破伤风证，亦系元气耗损，外邪乘虚而致，皆宜峻补先固其本为善，妄投风药，祸如反掌，治者不可不察。论瘀秽内瘀。

又云：伤损之证，若内积瘀血，焮热宜砭刺，不知砭刺则外皮炙干，缩急坚硬，已连好肉，不能腐烂，益加胀痛，俗名丁痂皮是也。以致瘀秽难出，治者因将死肉尽行割去，疮口开张，反难腐溃，怯弱之人，多成

破风证，以致不救。若杖后刺去瘀秽，涂以神效当归膏，投以参、术、归、耆、地黄之类，诸证即退，死肉即溃，丁痂不结，所溃亦浅，生肌之际，亦不结痂，自免皱结之痛。论丁痂皮。

又云：凡损伤之证，若皮肤已破，出血过多而昏愤者，气血虚极也，大补为主，如不应，急加附子。若坠扑太重，皮肤不破，血未出而昏愤者，瘀血在内也，行散为主，如不应，速加酒炒大黄。若下后而有变证者，皆气血虚极也，用十全大补汤。若因痛甚而自汗昏愤者，风木炽甚也，用清肝凉血之剂，则痛自定，汗自止，溃自溃，苟作外因风邪治之，促其危也。论亡血昏愤。

又云：伤损之证，若头脑并致命处所损太重，昏愤良久，将致不起者，急用葱白细切杵烂，炒热罨患处，稍冷更以热者罨之，多自醒矣。醒而肢体作痛，肌肉被伤，宜调养气血。若腹中作痛，手不可近者，瘀血停滞也。不可下，宜用花蕊石散内化之，却以参、耆、归、术补托之。

又云：凡损伤之证，若有瘀血内凝，致大小便不通，若用硝黄苦寒之剂下之，血愈凝而不下，益加胀满，命在须臾，急用木香、肉桂末二、三钱，以热酒灌之，血下乃生，不下即死。如怯弱之人，欲用硝黄，加木香、肉桂同煎益善，盖假其热以行其寒也。论瘀血便秘。

又云：凡伤损之证，若误饮冷水，瘀血凝滞，气道不通，或血上逆，多致不救，若入于心即死。急饮童便热酒以和之。若患重而瘀血不易散者，更和以辛温之剂，睡卧要上身垫高，不时唤醒，勿令熟睡则血瘀不上逆，故患重之人，多为逆血填塞胸间，或闭塞气道，咽喉口鼻不得出入而死。论瘀血气闭上逆。

又云：凡损伤之证，大便秘结。若是出血过多而秘结，此大肠血虚火炽，干燥而不通耳。不可轻用硝黄峻利之剂，宜用润肠丸，以四物汤送下，或猪胆导法为善。论血虚便秘。

又云：凡伤损之证，胸胁肚腹作痛，按之痛甚者，瘀血在内也，大承气汤下之；既下而腹痛不止，按之亦痛者，瘀犹未尽也，四物汤加穿山甲、牛膝补而行之。若腹仍痛，按之却不痛者，血虚也，四物汤加参、耆、白术补而和之。若下后脾胃受伤而腹痛者，补中益气汤为主；下后寒气乘虚而腹痛者，温中益气汤为主，下后昏愤而出汗者，虚极而变证

也，独参汤补之，未应急以大剂人参附子主之，缓则不救。下后呕吐泻，手足厥冷，或指甲青黑者，虚寒之甚也，附子理中汤主之，缓亦不治。若口噤手撒，遗尿痰盛，或唇青体冷，汗出昏愦，气血虚极之坏证也，非参附汤不能救，误作风治者必死。论胸腹作痛。

又云：凡伤损之证，若胁胀痛，脉数浮无力，以手按之，反不胀痛者，此血虚而肝胀也，宜四物汤加参、苓、青皮、甘草治之。若胸胁胀闷或作痛者，按之亦然，左关脉洪而有力者，此怒气伤肝之证也，以小柴胡汤加芎、归、青皮、赤芍、桔梗、枳壳治之。若胸胁作胀，按之则愈痛者，乃瘀血蓄肝之证也，急以四物汤加桃仁、红花、青皮治之。盖证不必论其受责之轻重，问其患处去血之曾否，但被人扭按甚重。蹉跌扑地，努力恚怒，以伤其气血，瘀血归肝，多致前证，甚则胸胁气逆，胀满不通，或血溢口鼻，卒至不救。盖打扑坠堕，恶血宜砭不宜留，况十二经络之血生于心，藏于肝，统于脾，小腹与胁皆肝经部位，恶血蓄而不行，必生胀满，疼痛，自汗，法当破血生血，清厥阴肝经则善。论胁胀痛。

又云：凡伤损之证，多有患处作痛，若出血过多而痛者，血虚火盛也，宜甘寒以降虚火，甘温以养脾气。若汗出多而痛者，肝木火盛也，宜辛凉以清肝火，甘寒以生肝血。若筋骨伤而作痛者，正而治之；肌肉伤而作痛者，调而补之；气血逆而作痛者，顺而补之；气血虚而作痛者，温而补之。热而痛者清之，寒而痛者温之；阴虚火痛者用补阴之剂，脾气虚而痛者，用补脾之剂。作脓而痛者托之，脓焮而痛者开之。切不可概用苦寒，以致复伤脾胃也。论患处作痛。

又云：伤损之证，如所伤之处痛至四、五日不减者，或至一、二日方痛者，皆作脓也，不必用止痛之药，但宜托里之剂，以速其溃，脓去则痛止。若头目所伤作脓，焮赤作痛者，脓出痛亦自止。其或头痛而时作时止者，血虚而痛也，非伤也。若头痛而兼眩者，火也，痰也，气虚也，木旺也，不可作寒治也。

又云：凡伤损之证，肉死而不溃，或恶寒而不溃者，宜补阳气。发热而不溃者，宜益阴血。或因作痛，或因峻剂而不溃者，宜和养脾胃。或因失血，或因汗多而不溃者，宜大补气血。其外面皮黑坚硬而不溃者，内火蒸炙而然也，内服益阴血，制阳火之剂；外涂当归膏以润之，则

自溃也。大抵脾胃主肌肉，腐溃生肌，全在脾胃气血两旺，倘治者不识病机，失于补助，故有死肉不能溃而死者；有死肉已溃，新肉不能生而死者；有死肉溃，新肉生，疮口久不能敛而死者，此三者皆失于不预为补益耳。论死肉不溃。

又云：凡伤损之证，若掀痛而肌肉不生者，火盛也；日晡作热而不生者，血虚也；食少体倦而不生者，脾胃虚也；脓水清稀而不生者，气血虚也；忌敷生肌长肉之药，恐反助其邪也。若脓多而臭秽者邪火也，脉洪大而作渴者，其气虚而邪气实也，斯为难治。大抵伤损证候，内无瘀血即当补脾，脾气得补则肉伤者自愈，肉死者自溃，新肉易生，疮口易合，故云脾健则肉自生。切不可偏用寒凉克伐之剂，复伤元气，致不能生肌收敛，虽行补益，缓不济事矣。论新肉不生。

又云：凡伤损之证，若壅肿不退，或色黯不消，元气虚也，宜补之；青肿胀痛，按之复起，瘀瘀内滞也，宜针之，经曰：气主煦之，血主濡之是也。当以六君子汤加芎、归，培养脾胃元气，则青肿益消，瘀滞自散，脓秽自出。苟服克伐凉剂，虚其气血，益肿、益青、益溃也。若敷贴寒凉等药，则寒气入里，坠道自壅，瘀血益凝，运气不至，近死不远。虽壮实之人，亦寒气生热，肉腐深大，气血衰败，肌肉无由以生，欲望其肿青退，而溃处收敛抑难矣。论青肿不消。

又云：凡伤损之证，若骨已接，骹已入，其肿不消者，此元气怯弱也。怯弱即不能运散，瘀滞益凝故也。经云：壮者气行则愈，怯者则着而为病。惟补中益气汤滋阴助阳，内服十全大补汤，外敷黑龙散，或葱熨之法，则运气健旺，瘀血自救，肿痛自消。若投行气破血之剂，则元气愈怯，运气愈滞，患在骨髓及血气罕到之处，最难调治，尤忌寒凉克伐之药。论肿痛不消。

又云：凡伤损之证，口鼻等窍或患处出血不止者，因木火炽盛，血热错经而妄行也，宜清肝火，养肝血。若中气虚弱，血无所附而妄行者，宜补中益气，使血各归其经。若阳气内脱，不能摄血归经，而血出不止者，独参汤加炮姜治之，不应则急加附子。若血蕴于胃而呕血者，四物汤加童便拌炒山栀、姜汁治之。若因怒气伤肝而呕血者，亦治以前药，更加柴胡、黄芩以清之。如脉大发热喉痛者，参、耆、当归、生地、

荆芥、蜜炙黄柏以主之，凡出血脉大者难治。凡见血证，不可用寒凉之剂，致脾胃受伤，反不能摄血归源也。论出血呕血便血。

又云：凡伤损之证，有出汗者，当审其阴阳虚实而治之。若阴虚阳往乘之，则发热自汗，以甘寒之剂补其气，如补中益气汤之属是也。若阳虚阴往乘之，则发厥自汗，以甘温之剂助其阳，如参附汤之属是也。亦有因痛楚而自汗者，宜补气生血为主。若心孔一片汗出者，养其心血自止。论出汗。一人年四十，坠马亡血，出汗不止，烦躁不安。次日其汗遂止，热躁益甚，口噤手颤，此阴血虚，阳火乘之而汗出，为寒气收敛腠理，故汗不得出，火不得泄，佛郁内甚而益增他证也。若误用祛风之药，愈损气血，促其危矣。

又云：凡伤损之证，有发热者，或出血过多，或大溃之后而发热者，乃阴血耗散，阳气无所依附，遂致浮散于肌表之间，是为阴虚，非实热也，当归补血汤主之。若发热烦躁，肉润筋惕等证，乃亡血也，圣愈汤主之。如汗出不止，乃血脱也，急用独参汤补之。若血脱脉实，汗后脉躁者，难治，细小者易痊。其瘀血内停，发热必肚腹作痛，不在此例。论发热。

又云：凡伤损之证。若出血过多，或大溃之后，肌肤发热，大渴引饮，目赤面红，昼夜不息，其脉洪大而虚，重按全无，此名阴虚发热之病，当归补血汤主之，误认实热，反用寒凉必死。若身体微热，烦躁面赤，其脉沉而微，此名阴盛发躁之病，宜四君子汤加姜附治之。《外台秘要》云：阴盛发躁，欲坐井中，用附子四逆汤加葱白治之。李东垣亦曰：切忌寒凉之剂。凡热来复去，不时而动，乃无根虚火也，用六君子汤加姜、桂，不应急加附子，或八味地黄丸最善。论发躁。

又云：凡伤损之证，有发热者，当分昼夜阴阳而治之。东垣曰：昼则发热，夜则安静，是阳气自旺于阳分也；昼则安静，夜则发热烦躁，是阳气下陷入阴中也，名曰热入血室。如昼夜俱发热烦躁，是重阳无阴也，当急泻其阳而峻补其阴。夫热入血室之证，妇人经水适来，或因损伤，或因大劳，或因大怒而发热必致前证，或有言语谵妄，如见鬼神状者，犹宜小柴胡汤加生地主之。重阳无阴血虚者，亦用小柴胡汤合四物汤治之。论热分昼夜。

又云：凡伤损之证，有作渴者，若出血而作渴者，血脱也，四物汤加

白术补之,不应加人参、黄耆以补气,倍当归、熟地以养血。若溃后而作渴者,大补气血为主。胃热津液耗散作渴者,用竹叶黄耆汤。瘀血内停发热作渴者,用竹叶石膏汤。若脓血大溃而作渴,或小便赤涩,或痛而不通,死在反掌,及痈疽溃烂后多有此证,非六味地黄丸不能救。论作渴。

又云:凡伤损之证,有作呕者,或因痛不止,或因攻伐之剂而作呕者,皆胃气伤也,四君子汤加芎、归、半夏、藿香、姜枣之类主之。或兼忿怒损伤而致呕者,气逆也,小柴胡汤加山栀、枳壳、茯苓、桔梗之类治之。若胃中痰火盛而作呕者,二陈汤加黄连、山栀、生姜治之。胃气虚寒而作呕者,补中益气汤加姜枣主之,或出血过多,或溃后而作呕者,宜大补气血为主。论作呕。

又云:凡伤损之证,出血过多,如面黑胸胀,或膈痛发喘,此肺气虚,瘀血入肺,急以人参苏木饮救之。如咳血衄血,乃火盛气逆,血蕴于肺,宜用十味参苏饮救之,加山栀、黄芩、苏木主之。面黑作喘之证,诸书未尝论及,治者不明,患者必死。惟《产宝百问》内云:产妇瘀血入肺,面黑作喘,用参苏饮救之,其方乃人参一两,苏木二两作一剂煎服。论面黑作喘。

又云:凡伤损之证,小便不利,若因出血,或平素阴虚火燥而渗泄之令不行者,宜滋膀胱之阴。若因疼痛,或平素肺经气虚,不能生化肾水而小便短少者,当补脾肺之气,滋其化源则小便自生。若误用分利之剂,复损其阴,祸在反掌。经云:气化则小便出焉。又云:无阳则阴无以生,无阴则阳无以化。亦有汗出不止而小便短少者,汗止便自利,犹忌分利渗泄之剂。论小便不利。

又云:凡伤损之证,出血太多,或溃烂之际,收敛之后,如有寒热作痛,或自汗盗汗,烦躁作渴,或遍身疼痛,肢体倦怠,牙关紧急,痰涎上壅等证,是血气虚极而作变证也,当峻补元气为主。大凡伤损证有外邪,乃乘虚而入,犹当补助。作外邪治之,祸不旋踵矣。论血气内伤。

又云:凡伤损之证,筋糜肉烂,脓血大泄,阳亦随阴而走,元气丧败,理势必然,气血不虚者鲜矣。智者审之。论血气必虚。

又云:凡伤损之证,脓血大溃,血出过多,兼之恶寒发热,焮痛口

干,肝血自然不足。况肝主筋,血去则筋无以养,筋无血养则燥,遂不能束骨而屈伸自如,故有拘挛之象。宜圣愈汤加柴胡、木瓜、山栀、麦冬、五味子治之。如作风证一治,筋愈燥而血愈涸,挛岂能伸乎!论血虚筋挛。

又云:凡伤损之证,最忌骨气虚惫。肾主骨,肾水足则肝气充溢,经脉强健,虽有伤损,气血不亏而溃敛以时,气路不致于上逆,痰涎何能而上壅。使肾气一虚,水不能生木,则肝气奔腾而不下,痰气亦随之以上升,非风痰也,乃水泛也,是水泛为痰之证也。宜六味地黄丸或六味地黄汤加清肝之剂。论肾虚气逆。

又云:凡伤损之证,其患已愈,而腿作痛,乃受患太重,脓血过多,疮虽愈而肝经血气尚未充也,故湿热乘之,因虚而袭,以致作痛,非风证也。用八珍汤加牛膝、木瓜、苍术、黄柏、防己、炙草以祛湿热,养阴血,痛渐止后去防己、黄柏服之,遂瘳。论湿热乘肝。

又云:凡伤损之证,遍身作痒,或搔破如疮疥,此血不营于肌肤,当作血虚治之。不应,兼补其气,亦有愈后身起白屑,落而又起,或有如布帛一层隔于肌肤,乃气血俱虚,不能营于腠理。宜大补气血为主,若作风邪治之,误矣。论遍身作痒。

又云:凡伤损之证,肢体麻木,若口眼如故,腰背如常而肢体麻木者,气虚也。盖血虚则气虚,故血虚之人肢体多麻木,此是阴虚火动之变证,实非风也。当用升阳滋阴之剂,若作风治,凶在反掌。论肢体作麻。

又云:凡伤损之证,如所伤之处不甚,克伐之剂未用,而四肢困倦,精神短少,懒于动作,胸满气促,肢体沉重,气高而喘,身热而烦,心下痞满,不思饮食,自汗体重,其脉洪大而头痛,是内伤元气之证,以补中益气汤主之。如在夏令是暑热内伤元气之证,用清暑益气汤主之。若遇秋令是湿热内伤元气之证,以清燥汤主之。论四肢倦怠。

又云:凡伤损之证,或其人素多湿痰,或又服辛热破血之剂,则湿热助痰流阻道路,反致遍身作痛。丹溪曰:东南之人多因湿土生痰,痰生热,热生风,证类中风,惟宜清燥汤,或二陈汤加羌、防、归、芍、桔梗、炒芩、苍术治之。论湿痰作痛。

又云:凡伤损之证,或手足生疮,在气血罕到之地,切不可用损元

气之药。若元气虚怯，邪气滋盛，溃烂延上必死，不溃而色黯者亦死。手足心背受病，色黑者多死，手足节髀损去者不死。故伤损骨断，筋皮尚连者，急剪去之，若肉被伤欲去尚连者亦剪之。不尔，溃及好肉，怯弱之人多致不救。如手足与指损去一节，可治不死。惟去其半节留其半节，或骨断筋皮相连者，最为难治。论气遏肉死。

又云：凡伤损之证，不可轻服乌附等味，盖其性味辛热，恐助火以益其患，其平素有失血及血虚之人，虽在冬令，决不宜用，缘滞血得火而益伤，阴血得火而益耗，运血得火而妄行，患肉得火而益坏，新肉得火而复溃，疼痛得火而益甚。若人平素虚寒，或因病而阳气脱陷者，则用之不在此例。论用辛热之非。

又云：凡伤损之证，不宜敷贴硝黄之类，然其性味咸寒，恐济寒以益其伤。若人平素虚弱，患而作痛，虽在夏令，亦不宜用。盖胃气得寒而不生，运气得寒而不健，瘀血得寒而不行，腐肉得寒而不溃，新肉得寒而不生。若内有瘀血停滞，服以通之，不在此例。论用咸寒之非。

又云：凡伤损之证，近用黑羊皮热贴者，盖羊肉性热而补气，彼受刑太重，患处内肉已坏，欲其腐溃者，用之成脓固速。若内非补剂壮其根本，毒气不能内侵，外非砭刺泄其瘀秽，良肉不无伤坏，设受刑轻浅，外皮破伤，外用神效当归膏敷贴，则丁痂不结，伤肉渐溃，死肉自败，焮肿自退，黯色自消。内用四物汤加黄连、柴胡、山梔、白术、茯苓、清肝木，健脾土自愈。若专用黑羊皮罨贴，反助其毒，腐溃益深，难于收敛，智者审之。论用黑羊皮之非。

又云：凡伤损之证，瘀血已去而肌肉糜烂，不肯收敛，属气血俱虚，大补犹恐不及，岂可复用行气破血之剂，又贼其元气耶！当时诸君多蹈此弊，而怯弱者皆致不救。论用行气之非。

又云：凡伤损之证，遇杖坠跌扑，患处如有瘀血，止宜砭出，服壮元气之剂。盖其气血已损，切不可孟浪妄行妄下。此肢末之地，血气难到，再用行气下血等药，复损脾胃元气，则运气愈难营达于下，而反为败证。怯弱者多致夭枉。论下血之非。

又云：或问寒凉能消肿止痛，何以用之反致内溃，不能生肌，且有致死者？答曰：寒凉之剂敷于肌肉而不知痛者，是一遇寒凉，血因之以

凝，气因之以滞，气血凝滞，肌肉皆为死阴，宁复有知其疼痛也哉？故毒不出而内攻，多致不救。当知气血得温则行，得寒则凝，寒极生热，变化为脓，腐溃益深，气血既败，肌肉无由而生，欲望其不危也，几希！论用寒药之非。

又云：凡伤损之证，遇杖扑重者，外皮不破而内肉糜烂，与血相和，甚者臀腿如皮囊盛糊，然若不砭刺发泄，为患匪轻。故当时大理寺大岳诸君失于不砭，以致不起者多矣。是不知伤重而内有瘀秽者也，须急去之，即服补益之剂以固根本，庶保无虞。古人谓瘀秽恶于虎狼，毒于蛇蝎，去之稍缓则戕性命，非虚言也，医者三复之。论不砭之非。

又云：凡伤损之证，贵乎大补气血，则腐肉易于溃烂，疮口易于生肌。每见治者不知气血亏损，往往多用十宣散，又以方内参、耆、芎、归为补益之剂，嫌其中满，多用不过钱许，以厚朴、防己为清毒之药，因其行散，动则倍加，如此何益于气血，而欲责其速溃速敛速生肌乎？无怪其烦躁作渴，饮食益少，因之不起者众矣。论不补益之非。

《得效》云：凡堕压死者，急安好处，以袖掩其口鼻上一食顷，候眼开，先与热小便饮之，若初觉气绝，急擘开口以热小便灌之，利去瘀血。以下载《东医宝鉴》。

又云：凡跌打压伤，或从高堕落，皆惊动四肢五脏，必有恶血在内，专怕恶心。先用通二便药和童便服之，立效，大小肠俱通利，则自无烦闷攻心之患矣。

又云：头上有伤，或打破，或金刃伤，用药糊包缚紧，不使伤风，慎之。

又云：如伤脏腑致命处，一观其脉虚促，危。

《纲目》云：卒堕颠、压倒、打死，心头温，皆可救。将本人如僧打坐，令一人将其头发控放低，以半夏或皂角末吹令人鼻中，如活，却以姜汁香油打匀灌之。

《入门》云：若取药不及，急拨开口，以热小便多灌之。

又云：凡伤损专主血论，肝主血，不问何经所伤，恶血必归于肝，流于胁，郁于腹而作腹痛，实者下之。

又云：凡出血已多而又呕血不止者，难治，宜用苏木煎汤，调蚌霜

散服之。

又云：凡折伤外损筋骨者，可治。内损脏腑里膜及破阴子耳后者，并不治。

《医鉴》曰：人为刀斧所伤，或堕落险地，或扑身体损伤筋骨皮肉，皆出血不止，或瘀血停积，若去之不早，则有人腹攻心之患。

又云：打仆伤损，去血过多，脉当虚细，若得急疾大数者，死。

《丹心》云：跌仆伤损，须用苏木活血，黄连降火，白术和中，以童便煎服，如伤在上，宜饮韭汁。

《回春》云：凡斗殴被打，内有瘀血，其脉坚强者，生，小弱者，死。《脉经》。

《得效》云：凡脚手各有六出臼，四折骨，每手有三处出臼，脚亦三处出臼，手掌根出臼。其骨交互相锁，或出臼则是挫出锁骨之外，须是搦骨于锁骨下归窠，若出外则须搦入内，若出内则须搦入外，方入窠臼。只有手拽，断难入窠，十有八、九成痼疾也。

又云：骨节损折，肘臂腰膝出臼蹉跌，须用法整顿归源。先用麻药与服，使不知痛，然后可用手法。

又云：搦骨归窠，用竹一片，生柳木板片尤佳。夹定一边，一边不用夹，须存屈直处，时时拽曲拽直。不然，则愈后曲直不得。

又云：凡骨碎者，须用麻药即草乌散与服。或刀割开；甚者用剪剪去骨锋，使不冲肉。或有粉碎者，镰去细骨，免脓血之祸。且以药水一日一洗，莫令臭秽。

又云：凡骨碎者，用接骨药火上化开糊骨上，然后夹定，外用夹骨法、活血散、接骨丹、二生膏、糯米膏。

又云：淋洗用蔓荆散。

跌打损伤门主方

黎洞丸 专治跌打损伤，伤筋损骨，断夹棍、刀伤斧砍等证。兼治吐血瘀瘀，噤口伤寒，小儿急、慢惊风，牙关紧闭，妇人难产，下部重伤，

恶血攻心，胸闷发热，产后恶露不尽，儿枕骨痛，寒热，热，干血癆，血①崩，血淋，白带，一切危证。服之护心散血解毒。轻者三分，重者五分，陈酒化服。一切无名肿毒，对口疔疮、乳痈等证，内服外敷，毒蛇蜈蚣，蝎螫草踏虫伤，俱系外敷。

真天竺黄 生大黄 明雄黄 法制藤黄各三钱 真胎骨 瓜儿竭
真广三七 阿魏各一钱五分 梅片 真西牛黄 麝香各三分 没药去油 透明乳香去油，各二钱 五铢钱四个，火煅红，醋淬七次

制研细末，称准和匀，用蜜三两，黄蜡六钱同煎化，离火搅匀，乘热为丸，作两种：一重三分，一重五分。看病人老幼壮弱，病之重轻，用陈酒顿化，尽量饮醉，盖被取汗。

三黄宝蜡丸此方军中救活之人甚众。凡修合此药，最忌妇人并诸膾物。治一切恶证，刀箭枪棒，毒蛇恶虫咬伤，跌打损伤，破伤风，伤力成癆，死血凝滞，遍身四肢麻木不仁，妇人产后恶血不净，致生怪证，瘀血攻心，痰迷心窍，危在顷刻。每用一丸，无灰酒服。如受伤日久，病势重者，连服数丸，能令通身瘀血化为新血，破顽痰，保元气，祛邪毒，活络舒筋，效难尽述，真起死回生之圣药也。凡一切外伤，量疮之大小，麻油少许化药，勿令见火，将鸡翎搓扫疮上，腐肉不须刀割，数次自然生肌长肉。凡军中毒弩所伤，死在顷刻，用五分口内嚼下，则毒气不能封喉攻心，其伤处仍将药敷，数日而愈。若鸟枪打伤未曾死者，亦用三分，黄酒送下，任量饮醉，安眠片时，其枪子即从伤处流出，火烧麻油调敷。专治跌打损伤，恶刀箭毒，毒疮棒疮，毒蛇蛊毒，疯犬咬伤，破伤风，伤力成癆，产后恶露不净，瘀血奔心，痰迷心窍，危在顷刻者。只要口有微气，重者一钱，轻则三分或六分，无灰酒烫热调化服之，如受病日久，连进数服，服后随饮热酒数斤，卧暖处出汗即愈。如被鸟枪伤者，铅子即出，再将上药煎滚取起，离火化药少许，以鸡翎扫敷伤处，痛即止。

法制藤黄四两 真天竺黄 红芽大戟洗净 刘寄奴酒洗 血竭各三两
儿茶 明雄黄各二两 当归尾酒洗，一两二钱 朴硝一两 水银下铅即息
乳香去油 没药去油 水粉各三两 麝香五钱 血珀二钱，灯心同碾

上研极细末，小蜂黄蜡熔化，以热水顿之，勿令冻冷，候火气和平，

① 血 原本后有“山”字，衍文，删。

人诸药于内,用手搅匀,搓如手指条大,同时以刀切薄片,酒炖化服,忌火酒等味。

制藤黄法:藤黄切如豆大,地下掘一小坑,坑底置人粪,用油纸盖粪上,放藤黄入坑内,又将油纸盖藤黄上,再将人粪盖上,用土填踏实,三昼夜取出用。

接骨金丹

半两钱七个或五个,打碎,放炭火上煨去油存性 明乳香去油,三钱 甜瓜子每岁十粒,同半两钱炒黄色,去半两钱,只用甜瓜子

甜瓜子同乳香二味和匀碾末,先用蕲艾煎汤沃洗伤处,以新絮包暖,再用好酒冲服,以醉为度,盖暖被取汗。其骨自然相接,伤在上身食后服,伤在下身食前服。此方旋配旋用即效。如隔宿则不堪用矣。

又方

红花酒炒,八钱 胡桃隔炒 沉香 五加皮酒炒,各五钱 没药去油,四钱 生大黄三钱 当归酒洗,一钱 乳香去油,四钱 土狗子二十一个,酒浆浸炙

共碾细末。每服一钱,煮无灰酒服。

又方 山羊心血碾细末,二三分冲滚酒服,忌鱼腥三日。

又方

半两钱真者一个,用醋一杯,将钱煨红淬入醋内七次,以醋尽为度 土鳖虫大者一个,盛罐内放火上烘干,不可伤去足、尖,以全为妙 自然铜四钱,照半两钱制法,乳钵内碾 滴乳香去油,三钱五分 巴豆仁四十九粒,去油,尽取霜 没药去油,一钱五分 半夏姜汁拌炒 川续断滴醋浸透炒干,各三钱 当门子真者三分,临贮罐时同乳

碾极细末,入磁瓶密贮。每岁一厘,无灰酒尽量饮醉,一觉,次日即效。

又方

猪板油腊月者,十两 白蜡八两 白矾十二两 辰砂 滴乳香去油 没药去油 瓜儿竭各一两 飞丹 自然铜火煨醋淬七次 密陀僧各四两,逐件碾极细,另包听用

先将板油入锅熬枯滤清,复入净锅内熬,下白蜡化尽,离火放地

上,将密陀僧、黄丹、自然铜搅匀投下,再煎滴水成珠为度。始下血竭、辰砂、乳没、明矾,用柳枝不住手搅匀,待凝丸如弹子大,笋壳衬收。凡遇跌打损伤,重者用一丸,再加猪油少许,火上化开涂伤处,以油纸包缚,如最重者以药涂上,灯草裹好,外用竹片夹缚,再用一丸作小丸,用滚热葱酒吞下,若仍痛,再进一丸。骨折者用一丸,如牙痛纳一丸于牙龈即止。

又方

土鳖虫一个,新瓦焙黄 巴豆一粒,去油 生半夏一粒 自然铜火煨醋淬七次 乳香去油 没药去油,各五厘

研极细。每用五厘,滚酒调服,约人行十里汗出,其骨交接有声。忌发物房事一百二十天。

又方

土鳖虫新瓦焙 自然铜火煨淬七次 乳香去油 没药去油 半两钱火煨醋淬七次 甜瓜子各等分

共研细末,每服一分五厘,热酒调下。上体伤食后服,下体伤空心服,接骨如神。

回生丹 治跌打损伤如神。

黑豆炒去皮 蒲黄 当归 桂心 赤芍药 干姜各八两 茄种晒干,四两

择天德、月德日修合,忌生人鸡犬,碾细炼蜜为丸,每服二钱,童便冲酒送下。

接骨紫金丹 治跌打损伤,昏迷不省人事,瘀血攻心,发热。

土鳖虫十个,去头,足,酒浸晒露三日夜,取出炒 骨碎补切片,露三夜晒干 自然铜火煨醋淬七次 巴豆霜 乳香去油 瓜儿竭 没药去油,各五钱 当归尾酒浸一夜焙 硼砂各三钱 地龙十四条,酒浸去土晒干

共碾细末。每服三分,好酒送下。

神效散

肉桂去皮 红花各一钱七分 川乌 草乌各二钱

共碾细末。每服二分,酒调下,伤重者不过三分即愈。此方乃跌打损伤,起死回生,活人千万,富贵之家备以济人。

活血丹

土鳖虫酒浸死，晒干 五加皮 刘寄奴花头 桃仁去皮、尖 山楂各四两 大黄陈酒煮干，八两 元胡索醋煮 蓬莪术醋炒 牡丹皮 当归酒洗 牛膝酒洗 红花各三两 香附童便浸，炒三两 京三棱醋炒 降香节 凌霄花 苏木 青皮 枳实 赤芍药 威灵仙 槟榔 川芎各二两 乳香去油 没药去油，各一两

共碾细末。每服二钱，壮者三钱，陈酒调服，核桃肉四、五枚过口。

透骨丹 治跌打损伤，深入骨髓，或隐隐疼痛，或天阴则痛，或年远四肢沉重无力，此药主之，真神方也。

真血竭 乳香去油 没药去油，各三钱 闹杨花子一两，火酒浸炒三次，童便浸炒二次，再焙干

各碾末称准和匀，再加麝香一分，再碾，磁瓶收贮封固。初服三分，壮者五、六分，不必吃夜饭，要黄昏睡好方服，酒可尽量饮，荤用猪肉过口，素用豆腐过口，服后避风，有微汗出为效。忌房事，酸、咸、茶、醋等物，及诸般血。如虚弱者间五日一服，壮实者，间三日一服。

接骨散

黄麻烧灰，二两 头发烧灰，一两 乳香去油，五钱

碾匀，每服三钱，温酒调服，跌扑闪肭，骨折疼痛立止。

通遵散 折伤跌仆极重，大小便不通，最危之证，先用此药，打下夹血，然后服补药。

枳壳 大黄 皮硝各二钱 陈皮 厚朴 当归 木通 红花 苏木各一钱 甘草五分

水煎热服，以通利为度。但此药切不可用酒煎，令人闷绝而死。凡小儿、孕妇不可服。

和伤活血汤 损伤瘀血腹胀内壅，红肿暗青瘀痛，昏闷欲死，伤最重者服之。

大黄五钱 桃仁打碎，四十九粒 穿山甲炒碾 当归尾 威灵仙 红花 苏木 生地 五加皮各二钱 乳香去油 天花粉 没药去油 川芎各五分 血竭二分 甘草三分

水酒各一碗煎，临服入童便一杯和服，以泻出瘀血为效。

又方

五加皮 茜草 刘寄奴 红花各一钱五分 青木香 枳壳 蓬莪
木 乌药 京三棱 桃仁 赤芍药各一钱 当归二钱
头生酒二斤，煎一斤半，鸡鸣时服。

又方

当归 苏木捶碎 红花 胡桃肉各四两
好酒十碗煎四碗，任饮醉，渣乘热敷伤处。

又方

羊躑躅炒黄 大黄 赤芍药 当归 红花各三钱 生地五钱 牡
丹皮二钱 土狗十个，捶碎 土虱三十个，捣烂

酒煎去渣，入自然铜火煨醋淬七次，碾细，一钱调服，一夜其骨自
合。

又方

泽兰叶三钱 百部三钱 刘寄奴 猴姜 苏木各一钱 陈皮五分
乳香去油，六分

甘草三分 没药去油，六分 金银花一钱五分

酒煎服，盖暖出汗。

泽兰汤 通二便，除肠中瘀血，乃活命之神丹也。

泽兰叶 当归各五钱 牡丹皮三钱 红芍药 青木香各一钱五分 红
花一钱 桃仁十粒，去皮、尖，碾

水煎，热酒冲服。如大便不通，加炒大黄二、三钱。

跌仆停瘀

当归尾 红花 川羌活 没药去油 赤芍药 桃仁去皮、尖 川续
断 猴姜各八分 真桂枝三分

白酒煎服。

打仆损伤，痛不可忍者

于白术五两 当归焙 上肉桂刮去皮 白芷 炙甘草 乳香去油另
研 没药去油另研，各一两

研细末。每服二钱，温酒调下。

跌打损伤药酒

当归 五加皮 生地各一两 破故纸 骨碎补去毛 十大功劳
 薏苡仁 紫荆皮各五钱 广木香三钱 羌活三钱 川芎 杜仲各八钱
 莪术 桃仁各三钱 虎骨酥炙，一两二钱

好酒二十斤入坛封固，隔水煮三炷香，取起退火一七，早晚听饮。

跌打断筋折骨，疼不可忍，路傍墙根脚下人便溺处陈碎瓦片一块。
 洗净火煨米醋淬至酥黄为度，刀刮为末。每服三钱，好酒调服。看伤
 上下分食前后服之。如无碎瓦，碎砖亦可。

又方 活蟹捣汁，冲热酒服。

又方 多年粪窖内砖约三、五十年者，洗净打碎，火煨醋淬，以酥
 为度，研细。每服三钱，热酒调服神奇。

又方

土鳖虫二十个，多更妙 小便霜二钱

白酒冲服。外用熟附子、肉桂、当归、川芎研末，入凤凰胎，如无，
 以小公鸡代之。热糯米饭同捣敷伤处。

跌打损伤兼治夹棍杖疮 麻油半斤，男妇乱发洗净二两，将油滚
 起，入发熬化，再加生酒搅匀吃下，尽量饮醉，被盖出汗，伤处以杉木皮
 扎紧，绵包即愈。

跌打气绝 仙人柴即九里香叶，捣自然汁一杯，灌下即苏。但心
 口有微热，能受此药，无有不活，名救命丹。

治折伤筋骨，遇天阴则痛。益母草不拘多少，用水熬膏，随痛上
 下，食前后用酒化服。

又方 韭菜汁和童便饮之，散去瘀血。骨折者蜜和葱白捣匀，厚
 封患处，酒调白芨末二钱服之。

打伤瘀凝骨节《肘后方》。生铁一斤，酒五斤，煎一斤饮之。

青肿过腿面者《启玄》。三七鲜梗、叶捣烂，敷在青处，瘀血即消，
 如神。如无三七，即白萝卜捣敷亦效。

跌打损伤 生蟹一只，白矾三钱捣化敷伤处，用杉木皮夹好。

又方 马屎炒热包熨之，冷又换。如此二、三十遍，肿消痛止，内
 以干荷叶煨灰，童便冲酒调服。

又方 独核肥皂、生姜、葱头共捣烂，滚烧酒调摊于青布上贴伤

处,如冷用火逼之。再以红花、苏木、胡桃肉、乳香去油,酒煎饮之取汗。

跌打损伤及踢伤折臂不动者

肉桂 硫黄各一两

研末。糯米饭同捣,敷伤处,再敷一次,痊愈。

闪跌 木耳瓦上煨研,每服三钱,酒调服。

共碾细。用无盐陈酒糟和炼成泥,敷上裹紧;隔日药干,以热酒润药,复上前药可也。

打扑坠损,恶血攻心,闷乱疼痛 未展荷叶阴干,一味为末,食前用热童便一盏调服三钱,以利下恶物为度。

韭菜散 石炭同韭菜捣成饼,贴墙上候干,细碾听用,敷之止血如神。

洗跌打损伤

刘寄奴 猴姜 紫苏叶 红花 番白草 青葱 甘草各一两

煎水盈盆,令被伤人稳坐盆内,周围围好,上面遮盖,不可透风,熏透,待温淋洗,疼痛如失。

又方

南独活三两 地骨皮二两六钱 骨碎补一两二钱 透骨草 川续断 五加皮各一两 羌活 食盐各三钱

先用水十碗煎五碗;渣用水八碗煎四碗;三次水六碗煎三碗;四次水四碗煎二碗,共入砂锅内煎滚,熏洗,神效。

洗闪跌 马尾松毛不拘多少,入锅内熬至水面起丝为度,熏洗搓揉。

又方 紫果子藤煎汤揉洗。

跌打破损血出 血竭细末掺之。

又方 飞面遇上即血止结疤,不复溃脓。

黑丸子 治鹤膝风并跌仆损伤风湿,筋骨疼痛,或瘀血壅滞。

白蔹 赤小豆各一两六钱 白芍药 百草霜各一两 当归 白芨 骨碎补焙,各八钱 天南星 川乌各三钱 牛膝六钱

酒糊丸桐子大。每服三十丸,盐汤温酒任下。

折损或金疮出血

五倍子一两 生半夏 枯矾各一两五钱 乳香去油 没药去油,各五钱
· 无名异一两 龙骨 煨,三钱

共为细末搽之,不怕风,不作脓,止血如神。

闪跌疯气痛

硫黄二两 银珠 明雄黄 辰砂各三钱 川乌 草乌各一钱五分
生大黄 黄柏各一钱 麝香一分

先将硫黄熔化,入诸药末搅匀,地上预铺大纸一张,将药倾上,再用纸一张盖上,压扁成块,候冷,每纸一寸,可裁十块,每用一块点着,放粗厚草纸上,不住手以厚纸移熨药尽,又换药点熨至热气透入肌骨,则气血立刻流通,其患如失。

秘制跌打损伤,风疼闪仆,凝血闷气神效膏药

全当归 川乌 白芨 防风 木鳖子 生地黄 赤芍药 白芷
头发 白藜各一两 没药去油,五钱 槐、柳、桑、枣、桃枝各一寸

上药入麻油二斤浸透,桑柴火熬枯去渣,复入净锅内微火熬至滴水成珠,始下飞丹十二两足,务使老嫩合宜,将凝投去油乳香五钱化尽,倾入水盆内揉扯以拔火毒,收用摊贴。临贴时加麝香半分,每张重五钱,重者一张,轻者一张贴三、四人。此方不可加减一时,致取不效。

跌打闪挫,风气痛,冷头风

穿山甲去皮、净,捶碎 番木鳖水泡,刮毛,切片 官桂切片 当归各一两
二钱 槐枝 柳枝各一两 枳壳一两四钱

麻油六斤浸透,先用文火熬至黑色,槐枝棍搅,滤去渣,称油轻重,每油一斤,加丹八两熬滚,徐徐投下,不住手搅匀,滴水成珠,以手试之,老嫩得宜。再入:乳香去油,没药去油,丁香、儿茶各六钱,俱研细,搅匀,入有盖瓶内埋土中七日去火气,任摊贴。

木鳖膏家秘。治跌打损伤,肿痛疮疡,一切诸风气痛。真麻油三斤,番木鳖子一百四十七粒,入锅内熬至番木鳖黑脆为度,熬时以柳枝频搅,将木鳖子捞起,再入铅粉炒黄色三十两,徐徐投下,逐渐成膏。以缸盛井水,将膏倾入,置露处出火气,一宿捞起,听摊。用后掺药。

掺药家秘。

三奈上上者 北细辛 川乌 樟冰 肉桂 当门子 大茴香 母

丁香 乳香去油 没药去油 甘松 自然铜煅红，醋淬七次 半夏 大黄
 芫拔 皂角 干姜 白芷 小茴香各五钱 阿魏三钱

忌见火。即自然铜亦须放倾银罐内煅，逐味另研，合匀密贮，勿泄香气，多少随用可也。如骨碎者不可多用麝香，以其性热而散，能耗髓也。若伤损血积醒醒者，先贴无掺药膏药一个，贴一、二时辰揭起，则伤口血迹被膏揭净，然后用掺药之膏贴之。倘无木鳖膏，即寻常膏药亦可用。

金丝万应膏 治跌仆损伤，并寒湿脚气，痛不可忍；小儿脾疳泻痢，不肯服药贴肚上；咳嗽贴背心。

沥青二斤，净末 草麻子二百粒，去皮壳 木鳖子二十八枚，去壳，切片
 乳香 没药去油，各一两 黄蜡二两 麻油夏二两，春、秋各四两 威灵仙二两
 先将沥青、灵仙下锅熬化焦黄色。滤过，倾入水盆候冷取出，称二斤再下锅熔开。下麻油、黄蜡、草麻子泥，用槐柳枝不住手搅匀，慢火熬至滴水不散，不粘手为度，扯拔如金丝状。如硬加油少许，如软加沥青，试得如法，却下乳香、没药末，起锅在炭火上再用槐柳枝搅数百次，又以粗布漉下水盆内，扯拔如金丝为度。

风气跌扑膏药神方《锦囊》。

男发一大团 草麻子去壳，二百粒 猪脂熬油，二斤八两 麻油八两

以上先熬至发化、草麻子焦枯，再入后药：

熟地 威灵仙各三两 金银花二两 川乌 草乌各六钱 肉桂去皮
 白芷各一两 独活 当归身各一两五钱

以上熬至药色焦枯，去渣，细绢滤过，慢火再熬，不住手搅，入后药收之：

乳香箬上炙，去油，研细 没药箬上炙，去油，研细，各一两 麝香二分 真
 黄丹炒燥罗细，八两 明松香水煮三次，去水熔化，入夏布滤过，净六两

以上先将松香、黄丹下后，炼至软硬得所，滴水成珠离火，再下乳、没、麝打匀藏磁器中，旋用旋摊。

打仆损伤及一切痈肿未破，贴令内消《本事》。

生地黄研如泥 广木香研细末

先以地黄膏随肿大小摊于纸上，掺木香末一层，又再摊地黄膏贴

肿上,不过三、五度即愈。

跌打青肿 真三七嚼涂患处。

蚌霜散《入门》。

蚌霜 百草霜各等分

上为末。每服二钱,糯米饮调服。

乳香定痛散《入门》。治诸伤损疼痛。

白芷 当归 生地黄 牡丹皮 赤芍药 川芎 乳香 没药
白术 甘草各等分

上为末。每二钱,温酒童便各半调匀服之。

乳香散《得效》。治打扑伤损,痛不可忍。

白术 当归 白芷 乳香 没药 甘草各等分

上为末。每二钱,酒调服。

寻痛元《得效》。治诸伤止痛清心,行气活血如神。

草乌生用 乳香 没药 五灵脂各三钱 生麝香少许

上为末。酒糊丸如指头大,朱砂为衣。每一丸,薄荷汤姜汁磨化服。

补损当归散《局方》。治堕仆折伤,疼痛叫号,服此药不复大痛,三日筋骨相连。

川芎一两五钱 桂心 川椒 当归 甘草各七钱五分 附子炮 泽兰各一钱五分

上为末。每二钱温酒调服,其效如神。

伤损肿痛瘀血流注紫黑,或伤眼上青黑不散《医鉴》。大黄为末,生姜汁调敷患处,即消。

散被殴瘀痕,亦治跌仆《圣惠》 麻油、清酒各一碗,煎数沸,服了卧火烧热地上一夜,痛止肿消。

草乌散《得效》。凡骨节出臼,用此麻药麻之,然后用手整顿。

皂角 木鳖子 紫荆皮 白芷 半夏 乌药 当归 川芎 川乌各一两二钱五分 草乌 茴香 坐拿草各二钱五分 木香一钱

并无煨制,为末。诸样骨节出臼窠者,每服二钱,好红酒调下,麻到不识痛处。然后或用刀割开,或剪去骨锋,以手整顿骨节归原,用夹

板夹定,然后医治。治箭镞入骨不出,亦用此药麻后,或钳出,或凿开取出。然后取盐汤或盐水服之立醒。

夹骨法《得效》。小虾蟆四、五个,皮硝三分,生姜一两,酒糟一碗,肿者加红何首乌同捣敷折伤处。

治折伤名活血散《入门》。绿豆粉炒紫色,新汲水调成膏,厚敷折伤处,以桑皮夹定,其效如神。一方热酒调敷。

接骨丹《回春》。骨碎筋断,用此复断如初。

古文钱三个,火煅醋淬七次 当归七钱五分 川芎 骨碎补 没药各五钱
川乌煨,四钱 乳香二钱五分 木香一钱 松香六两 香油一两五钱
各为末。和油成膏,摊油纸,贴患处。

二生膏《医鉴》。治伤筋损骨,痛不可忍,神效。并治折伤手足。

生地黄一斤 生姜四两

上捣烂,入酒糟一斤,炒热布裹罨伤处,熨之。

伤损臂白脱出肿痛《得救》。生地捣烂,摊油纸上,次掺木香末一层,又摊地黄贴患处,明日痛即止。

治折伤断筋损骨《种杏》。生地捣取汁,好酒和服,日二、三次最效。又捣烂蒸热封伤处一月,筋骨连续。盖地黄属骨。

糯米膏《纲目》。治仆伤筋断骨折。

糯米一升 皂角切碎半升 铜钱百个,同炒至焦黑,去钱
上为末。酒调膏贴患处,神效。

蔓荆散《丹心》。治打落筋骨折伤,瘀血结痛顽痛。

荆叶无,则荆芥代之 蔓荆子 白芷 细辛 防风 川芎 桂皮
丁香皮 羌活各一两

上为粗末,每一两入盐一匙,连须葱白五茎,浆水五升,煎七沸,淋洗痛处,冷则易。

遍身打伤 生姜捣汁冲酒服;或生姜切片,酒煎不时服;或生姜斤许捣碎,酒五斤入坛,隔水煮三炷香,放地上一夜,去火毒,次日温服,外用生姜四两,敷干再换。昔有一盗,捶楚身无完肤,服此数日无恙。

跌打闪挫神方家秘。独核肥皂去核,同红糖捶烂敷之。

接骨仙方 骨断粉碎者五加皮四两,雄鸡一只,重六两,黑者更

妙，去毛连骨、皮、血，与五加皮捣烂敷患处，用布包好，准贴一周时揭去，切不可太过，时内自完好，神效无比。再用五加皮五两酒煎服，尽量饮醉，睡为妙。

八厘散 江湖方姓授。

土鳖虫焙干 乳香去油 没药去油 血竭各一钱 生半夏大者 当归酒浸 巴豆霜 砂仁 雄黄 香甜瓜子各五分

共为细末，收贮听用。每服八厘，好酒调下；小儿三厘，但能开口，服下即得活矣。

上部损伤《集效》。如头破见髓，或伤风于内，羌活、防风、半夏、升麻、当归、赤芍、陈皮、生地、甘草、川芎、白芷、白茯苓、天南星、天花粉、蔓荆子、姜三片煎。外加血余炭、落得打各一钱，研末冲服。中部损伤，如手折之类，羌活、防风、当归、赤芍、陈皮、白芷、甘草、秦艽、黄耆、茯苓、生地、官桂、破故纸、天花粉、姜三片煎。外加血余炭一钱，研末冲服。下部损伤，如腿足伤，当归、芍药、陈皮、牛膝、木瓜、防己、川芎、茯苓、羌活、白芷、白术、秦艽、生地、甘草、姜三片煎。外加血余炭一钱，研末冲服。

熨法《回春》。生葱连根切碎，炒令汁干，乘热敷患处；外用绢绵束之，立刻定痛止血。

筋骨折伤《赤水玄珠》。急取雄鸡一只，刺血，量受伤人酒量冲服，痛立止，神效无比。

跌压瘀血，积痛难忍《集验》。

大黄酒蒸，一两 当归尾五钱 桃仁去皮、尖，二十一粒

酒煎。鸡鸣时服，取下瘀血即愈。

跌打损伤《怀德堂笔记》。

九世还魂草 鹿衔草 落得打草 麻皮头 上部此味加倍 土鳖各等分 下部加苎根 内伤加白颈蚯蚓

上五味为君，随便再加红花、苏木等药；酒水煎服，汗发即愈。有一泥工沈姓者，屋上跌下，服此三日全愈。

接骨不知痛 凤仙花根酒磨服半寸，最多一寸，然后揉托入臼，并不知痛。但多服伤人，以一寸为极，不可多用。

跌打骨断原济堂刊施。

金樱子兜即金樱子根也，去皮

煎酒热服，渣敷患处立效。

坠车落马筋骨痛不止《集验》。玄胡索研末，酒服二钱，日进二次即愈。

闪跌胡绣溪。用鱼鳔切片，融化摊新棉花上，乘热贴伤处，拔出青紫伤痕即愈。

跌仆损伤急救散周鹤仙。

当归尾酒洗 自然铜醋煅七次 桃仁去皮、尖 红花各七钱 陈麻皮三钱 地鳖虫烧酒浸、焙，五钱 骨碎补酒洗蒸 大黄酒洗，各二钱 乳香去油 没药去油 胎儿骨 血竭 朱砂 雄黄 麝香各五分

以上共为极细末，收贮勿泄气。如遇跌死、打死，尚有微气者，用酒浆调二厘入口即活；如骨折瘀血攻心，用药八厘，酒调灌之，其伤骨自上而愈，神效之极。

接骨神方

雄土鳖一个，此虫凡雄者用铜刀或竹刀切断，以碗覆之半晌，其虫能接上不死者，是雄的方可用，是雌者不可用。火煨存性 生半夏一个 自然铜醋煅七次，三分 乳香去油 没药去油，各五厘

以上俱忌铁器，共为绝细末。每服二厘，黄酒调下，不可多吃，如多吃恐长出多骨。服药后须保养四十天复旧，此方神效无比。有力之家，宜修合济世。

接骨神方

半两钱钱上只有半两二字者，以火煨成淬入醋内数次，即脆，研极细末，七厘甜瓜子火焙干为末，七厘

二味末和匀，生酒服下即愈。但不宜多服，多则旁长一多骨也。神验。

跌打损伤膏药刘长髓。

当归 三棱 莪术 独活 白芷 川芎 羌活 杜仲 川牛膝 防风 肉桂 红花 续断 防己 五加皮 骨碎补 赤芍药 刘寄奴 秦艽 葱头 土鳖虫各三钱 头发一握

上药用麻油十斤浸七日，入锅将药熬枯，滤去渣，复入净锅内熬至滴水成珠，入后细药末：

龙骨 乳香去油 没药去油 血竭各二两 麝香另收旋加，如皮破骨损者，麝香忌用

入油熬化，磁钵收贮。每药油四两加制松香一斤同熬成膏，倾水缸内扯拔出火毒，收藏。凡摊膏时炖化摊好，放在地上一个时辰，再贴。得土气则土鳖虫有力，易于接骨故也。

面目跌仆青紫 生半夏磨汁涂消。

接骨《李岳》。 远年屋上古旧瓦为细末，好酒调服二、三钱，睡一觉即接上。

跌打

生大黄 肉桂各一两

研细。红糖调敷。

跌打筋骨神方许元植

糯米拣去半粒者 烧酒曲各三钱

研细。无灰热酒调服，厚盖取汗。

跌打吴宇上。 牛皮胶用生姜汁熬化，布摊贴。

黄金膏 治跌打损伤，筋骨断落，刀伤杖疮，汤火伤。麻油半斤熬至滴水成珠，离火入白蜡、黄蜡各五钱搅化，再入藤黄一两搅匀收贮，此药愈陈愈妙。如收久膏老，加熬过麻油炖化搅匀，冷透敷之。惟刎颈者勿用，因藤黄毒入耳。

跌打损伤

松毛要寻孤松树，四围无树倚靠者，十两，清水洗净，带潮切碎，石臼内捶烂 红梔子八十一个 飞面八两

量加水，共捣碎作饼。先以葱汤洗患处敷贴，外以皮纸包裹。至重者一日一换，九日拔出青，伤自愈。

跌打损伤 臭椿树皮旋揭一块，生姜二两，不拘公母鸡绒毛一把，同捣浓敷上，用槿木皮遮护，以一炷香为度，自愈。

接骨仙方

千里马八双，烧灰存性 沉香 广木香各三两 象皮瓦上焙 琥珀灯心

同研 冰片各二两 骨碎补去毛 血竭各一两 虎胫骨醋炙，一对 乳香去油 没药去油，各一两五钱

上各研细和匀，磁瓶收贮，看伤之大小，用药钱许或八分，先用好米醋一茶杯，入铜杓内熬滚，入药再熬片时，调敷患处，不可太热，不可太冷，敷上棉纸，裹好，新棉包紧，十日或八日一换。忌公鸡、鲤、鳝，不忌牛、羊肉，戒房事，百日复旧如神。

跌打损伤

地骨皮 威灵仙 骨碎补 川续断各六钱

入磁罐内，酒二斤，隔汤煮至斤半，服取汗。渣用酒一斤，煎半斤服。

接骨 大虾蟆生捣如泥，敷缚定，其骨自合。

又方 义鸡草叶捣烂取汁，热酒和服，数次即愈。

跌打之后，凡大小便通利者 广三七二、三钱，酒煎饮。

跌打二便闭塞不通 柞树根去心、皮二钱，酒煎服。

木石打伤 水龙骨煨研，桐油调搽。

指甲抓破面皮 生姜汁调轻粉敷好无痕。

跌打损伤，时值暑天，腐烂恐生蛆虫，外虽平满，为害不一 宜用猪血切片，引出蛆虫，再用白蔹、白芨、贯仲为细末，香油调敷，其虫即灭。

伤损愈后，肌肤青肿《圣惠》。 用茄子种通黄极大者，切一指厚，放瓦上焙干为末，酒调二钱，临卧服一夜，消尽无痕。

擦落耳鼻《纲目》。 用油发灰末，乘急以所落耳鼻蘸发灰缀定，以软帛缚定，神效。

自行颠扑，穿断舌心，血出不止《纲目》。 取米醋以鸡翎刷所断处，其血即止。仍用蒲黄、杏仁、硼砂少许为末，蜜调噙化而愈。

接指方《入门》。 苏木为末，敷断指间接定，外用蚕茧包缚完固，数日如故。

伤破阴囊，二丸脱落，悬挂未断，痛苦无任《医鉴》。 须教人慢慢托上，多取壁钱，敷贴伤处，日渐就安，其囊如故。

慈云散 毕峻功。 治痈、疽、疔肿、大毒，及跌打损伤，初起即消，已

成即溃，接骨回生，功效如神。

番木鳖 川乌 土鳖虫 鹿角煅灰，各二两 穿山甲一两六钱 明天麻 草乌 川芎 升麻 当归尾 闹杨花 生香附 僵蚕各一两 蜈蚣 斑蝥各四钱

上各制毕，研极细末。重者用一钱，轻者用六分或八分，俱用无灰酒调服。被盖取汗，不可见风，必须汗干，然后出帷幕。

跌打昏晕不省人事 蟹壳烧灰存性，热酒调服。再将大甘草嚼烂敷之。

跌打青肿 生山梔研，同白面热水调敷。

打伤筋骨，遍体青肿，紫血不行，疼痛难忍

白芷一两 甘松三钱 三奈一钱 麝香三分

共研细。每服三钱，或童便或酒冲，开水调服。

接骨方

乳香 自然铜醋煅 没药去油 龙骨煅，各一钱 麝香三厘 土鳖一个，阴干，临时研用

共为细末。每服三分，服时再入土鳖末一个，须先整定伤骨，方可服用，否则接挫。

落下颏拿法门主论

落下颏者，气虚之故，不能收束关窍也。患者平身正坐，以两手托住下颏，左右大指入口内纳槽牙上，端紧下颏用力往肩下捺开关窍，向脑后送上即投关窍，随用绢条兜颏放顶上，半时许去之，即愈。

脱颏起于肺肾虚损，元神不足，或笑谈高兴忘倦，一时元气不能接续所致。如法拿上，须避风，速服加味六君子汤，不然风邪外受，必致痰涎壅盛，口眼喎斜，而风中脏腑，十无一瘳矣。《集验》。

落下颏拿法门主方

加味六君子汤《集验》。

人参 白术 白茯苓 半夏各一钱五分 天麻火煨 陈皮各一钱
 僵蚕酒炒，去丝 当归各二钱 附子滚汤泡去皮、脐，六分 川芎八分 甘草三
 分

灯心四十根，生姜三片，水煎服。

落下颏 口噤乌梅一、二枚，茶倾自上。

落下颏 乌梅捣碎作饼，塞满牙尽头处；张口流涎，随手托上。

人咬门主论

陈实功曰：人咬为患，良肉受伤，但阳明胃经所属者齿，脏腑多火
 多热。凡食经此，无不烂下咽，又饮食炙搏之毒，无不侵袭。故伤人发
 肿，其痛异常，臭脓腐烂，痛彻连心，是感受牙齿之毒也。初咬时一日
 内，众人撒热尿浸伤处，洗净牙黄瘀血，咬孔上蟾酥饼贴之，膏盖后出
 微脓渐愈。如初咬时未用此法，致肿痛发胖痛甚者，亦与童便洗净搥
 干，用粗纸捻蘸麻油，点火用烟焰熏肿痛上，良久方住，以解其毒，仍以
 蟾酥条插入，太乙膏盖，候肿消时换玉红膏搓之，长肉完口。《正宗》。

玉真散的临床新用

1. 带下病

陈如芳运用本方加减治疗带下病 36 例。方药：白附子 15 克，
 明天麻 15 克，天南星 10 克，羌活 6 克，白芷 6 克，防风 6 克，焦白术
 30 克，炒山药 30 克。随证加减：头痛、眩晕者加钩藤 24 克，桑寄生
 30 克，泽泻 30 克；心悸不安者加菖蒲 10 克，龙牡各 30 克；带下红
 白相兼者加仙鹤草 30 克，三七参 3 克；腰痛如折加狗脊 30 克，川断
 10 克，杜仲炭 10 克；腰重如带五千钱者加干姜 10 克，茯苓 30 克，
 炙草 5 克；双下肢麻木而痛者加红花 10 克，元胡 12 克；月经欠规律
 伴见胁痛、撑胀者加柴胡 10 克，白芍 24 克，芥穗炭 10 克；稀便、腹
 痛者加煨豆蔻 10 克，海螵蛸 30 克，炒车前子 30 克；泛酸、胃脘痞胀

者加黄连片、牡蛎 24 克,煅瓦楞子 30 克。每日 1 剂,两煎取汁 500 毫升,分 2 次温服,早晚各 1 次。9 剂为 1 疗程,可连续观察 3 个疗程。服药期间,忌食生冷、腥臭、肥腻之品,并注意避免过劳或外感。结果:痊愈 32 例(88.9%),显效 3 例(8.3%),无效 1 例(2.8%)。

陈如芳.实用中医药杂志,1994,(3):11

2. 跌打损伤

王永山等运用本方加味治疗跌打损伤 67 例。方药:明天麻、羌活、生南星、防风、白芷、蛇虫、白附子(姜炒)各 30 克,乳香、没药各 10 克。共为细末,每次 6 克,早晚用酒冲服使出汗。若不能饮酒,开水冲服亦可。如有伤口溃烂不收,用石膏 6 克,黄丹 2 克,研末调敷患处。结果:67 例经治疗后,痊愈(局部及全身症状完全消失,功能恢复与伤前无异)54 例,占 80.6%;显效(局部症状消失,关节活动受限,遗留部分功能障碍)9 例,占 13.4%;无效(仅局部症状好转,但活动后又肿胀疼痛,功能恢复不满意,或服药期间转院)4 例,占 6%;总有效率为 96%。

王永山,等.国医论坛,1996,(1):37

3. 慢性滑膜炎

向国强等运用本方加减外敷治疗慢性滑膜炎。方药:生白附子 6 份,防风、生南星、生半夏、天麻、白芷、羌活各等分,研成 100 目细粉备用,或取生玉真散粉末 50 克,浸入 48%~53% 的酒 600 毫升中,每日搅拌 1 次,7 日后取药汁。敷贴在滑膜炎部,外用绷带将其包扎固定,每 2 日换药 1 次。急性者可配口服英太青胶囊 7 天。15 天为 1 疗程,3 个疗程即达临床愈合。对酒过敏的患者禁用。结果:临床治愈 93 例占 68%,显效 37 例占 27%,无效 7 例占 5%,总有效为 95%。

向国强,等.中国中医骨伤科杂志,2003,(5):31

4. 颞下颌关节功能紊乱综合征

周胜红等运用本方加减治疗颞下颌关节功能紊乱综合征 30

例。方药:南星9克,防风12克,白芷12克,天麻9克,羌活12克,制附子6克。随证加减:实证:风火上扰合银翘散加减,风寒外袭合麻黄附子细辛汤加减,胃火炽盛合龙胆泻肝汤加减。虚证:阴虚火旺合知柏地黄丸加减,气血虚弱者合补中益气汤或八珍汤加减。10次为1疗程,疗程中间停药休息1天,3个疗程后停药休息3天。治疗3个疗程。结果:痊愈(关节运动障碍、疼痛、弹响三大症状完全消失,功能恢复正常)25例;显效(三大症状明显减轻或两种症状消失,功能基本恢复正常)3例;有效(三大症状减轻或一种症状消失,功能较治疗前好转)2例。

周胜红,等. 山东医药,2003,(3):35

5. 面神经麻痹

姜淑彦运用本方加减治疗面神经麻痹90例。方药:川羌活10克,防风10克,天麻15克,白附子10克,白芷10克,制南星10克,加蜈蚣3条,全蝎10克,甘草10克。急性期(发病半月内)乳突部压痛者,加双花20克,防风20克,大青叶20克;患侧面部肿胀甚者加地龙10克;病程超过半年的加黄芪30~50克,川芎15克,桂枝20克。结果:平均疗程15~30天。年龄越小疗效越好,其中2例3岁儿童和7岁儿童5天内恢复如初。另外84例均在平均疗程中康复。好转4例(好转:指表情平淡时面部正常,但哭笑时个别部位表情不自然,颜面有不适感)均合并糖尿病。

姜淑彦. 中国疗养医学,1999,(6):42

6. 三叉神经痛

张庆龙运用本方加减治疗三叉神经痛28例。方药:胆南星10克,防风6克,白芷10克,天麻10克,羌活6克,制白附子10克,全蝎6克,川芎10克,延胡索10克,蜈蚣2条。加减法:肝火旺者加柴胡10克,龙胆草10克;胃火盛者加生石膏30克;大便秘结者加生大黄3~6克。水煎服,1日1剂,15剂为1疗程。连服1~2个疗程。结果:治愈20例,好转6例,无效2例。

张庆龙. 中医研究,2001,(3):52

7. 帕金森氏综合征

孙思胜运用本方加减治疗帕金森氏综合征 77 例。方药：天麻 15 克，制南星 10 克，白附子 10 克，白芷 10 克，防风 10 克，羌活 10 克。水煎服，每日 1 剂，两煎混合，早晚分服，10 天为 1 疗程。加味法：胸脘痞闷、呕恶、苔黄腻者，加黄芩、半夏、枳实、竹茹；面色萎黄、神疲乏力者，加黄芪、党参、白术、薏苡仁；头晕耳鸣、腰膝酸软者，加枸杞、牛膝；肌肉强直甚者，加蜈蚣、全蝎、僵蚕等。中药治疗期间一般不使用其他拮抗药物，抗精神病药物不必停服。结果：痊愈 61 例，占 79.2%；有效 13 例，占 16.9%；无效 3 例，占 3.9%。总有效率为 96.1%。

孙思胜. 江苏中医, 2001, (4): 22

神效散的临床新用

1. 乳头皲裂

谢正平运用本方加减外用治疗乳头皲裂 25 例。方药：黄柏、煨月石各 20 克，黄连、青黛各 10 克，煨石膏、滑石粉各 50 克，冰片 4 克，薄荷 2 克。上药共研细末过筛，装瓶密封备用，先用温开水洗乳头部，后将药粉适量用冷开水调成膏，涂搽患处，如干痛或痒痛，用菜油调成膏搽患处，每天搽 2~3 次，连续用药 3 天。结果：痊愈 20 例，显效 3 例，好转 1 例，无效 1 例，总有效率为 98%。

谢正平. 中医药学报, 1997, (3): 5

2. 风热咳嗽

傅福坤运用本方合麻杏石甘汤治疗风热咳嗽 20 例。方药：麻黄 9 克，杏仁 9 克，石膏 24 克，甘草 3 克，蝉蜕 9 克，海浮石 24 克，海蛤 24 克，胆南星 9 克。水煎服，早晚各 1 剂。咳引胸疼痛者加白芍、柴胡、枳壳疏肝行气和血止痛，即有合四逆散之意；咽痛、声哑者配射干、赤芍清热利咽；咯痰不爽，痰黏稠或稠黄加鱼腥草、浙贝清热化痰等。结果：痊愈 9 例，有效 10 例，无效 1 例，服药时间最长

15 天,最短 3 天。

傅福坤. 中医函授通讯,1998,(5):21

3. 急性软组织损伤

石陨运用本方加减治疗急性软组织损伤 386 例。方药:血竭 240 克,大黄 300 克,柏叶 300 克,红花 120 克,生栀子 40 克,白芷 120 克,乳香 120 克,没药 120 克,羌活 240 克,生姜 240 克,桂枝 240 克,赤芍 120 克,海桐皮 120 克,细辛 3 克。将上述药物烘干,研成细粉,混匀装袋备用。根据损伤范围的大小,取药粉适量用冷水和金黄油调成糊状,涂于大小适当的纱布上,厚度约 0.5 厘米,敷于患处,再用绷带包扎 3~4 层固定,隔天换药 1 次,1 周为 1 疗程。治疗时间最长 14 天,最短 3 天。结果:治愈 328 例,显效 56 例,无效 2 例。治愈率 85%,有效率 99%。在用药中有 1 例皮肤瘙痒、丘疹,停药 3 天症状自行消失。

石陨. 中医正骨,2005,(3):41

卷之十六

救急部

大凡解一切中毒以及误吞金石、虫螫等证，俱汇于此部中，以便检阅参治。

解救砒霜门主论

雷真君曰：世人有服砒霜之毒，五脏欲裂者，腹必大痛，舌必伸出，眼必流血而死，最可怜也。急用泻毒神丹饮之，如立时大泻则生，否则死矣。此砒已入于脏，非可用羊血生甘草上吐能愈，特又变下法救之，饮之如不泻，此肠已断矣，又何救乎？倘用之早，未有不生者，不可执吐法而无变通。若初饮砒霜，但饮甘草羊血立吐而愈，如不吐速用泻毒神丹泻之，则无不救矣。《活人录》。

凡中砒毒，其证烦躁如狂，心腹搅痛，头旋欲吐不吐，面色青黑四肢极冷者是。

凡服砒人不可仰卧，恐毒流四肢难治，愈后须忌百日烟、酒、姜、椒、煎、炒。《愿体集》。

凡中信毒，因气恼自服者，急用香油一碗灌之，或吐或下即活。若系酒调者难救，其毒发散于周身也。

陈远公曰：服砒毒疼欲死，若不急救必腐肠胃，吐紫血而死。盖砒石乃天生之石，不曾经火煅炼，何毒至此，不知砒石生南岳之山，中南山火毒，又经火气，则其性大热，酷烈之至，安得不杀人哉！性又善走，砒石下喉，必升降于肠胃之上下，往来数十次，肠剥皮穿，人乃死矣。疼欲死者，正毒气上下攻也，毒药之横，莫此为甚，治法必吐出其毒，然

不能尽出其毒也，必用解毒之味，但初下喉，用羊血吐之，亦有能生之者，食久入胃，则无益矣。宜用救死丹，久暂皆可救，用生甘草一两，玄参二两，地榆五钱，瓜蒂七个，水煎下喉即吐，煮渣服之又吐，砒毒全解矣。

甘草解毒，得瓜蒂上涌而吐，砒能上升，故引之尽出也。然砒又下行，得元参、地榆解大肠之火毒，砒之大毒已从上而出，走下者亦余毒耳，得二味解之，则上下共相解纷，毒又何能施其燥烈哉。况元、榆俱润中解毒，所以能制毒也，此方十可活八，若不吐者，此肠胃已坏，不可救矣，非方不效也。倘药不及，煎于饭锅中煮灌之，庶不至因循失救也。

解救砒霜门主方

解信毒法《愿体集》。速取梁上燕子窠，用井水三、四大碗，放水桶内将手多搅调之，用夏布手巾如榨腐法，滤去泥、叶，取所搅之水，连灌两、三碗自吐。不吐再灌，吐尽方醒。

初中砒毒雷真君《活人录·吐法》。生甘草三两急煎汤，加羊血半碗和匀，饮之立吐即愈。饮之不吐，速用下法。

泻毒神丹雷真君《活人录·下法》。

当归三两 大黄一两 白矾一两 生甘草五钱
水煎汤数碗，饮之立时大泻则生，否则死矣。

又方 黑铅一两，磨水灌之。

凡中砒霜一切毒药垂死者。急用上号洁白糖、旋花、淡豆豉、甘草各等分，研匀，冷水调灌即苏。

又方 无名异即漆匠用者。和生鸡蛋清搅匀，服之。

又方 陈壁土搅水灌之。

又方 急饮人溺及人粪汁，或金汁灌之。

又方 虎耳草叶洗净捣汁，搅冷水灌之。

又方 牙硝不拘多少，研末，冷水调下。

又方 生鸭血灌之。

又方 小蓟根捣汁灌之。

又方 大黄明矾研末，新汲水调灌，得吐利即解。

误中砒毒浑身紫累，有解不效，此名砒霜累疮 黄土地上挖一斗大坑，以井水满之，搅令浑浊，以一碗^①与之，少刻又与之，待浑身紫累俱散，一吐即苏。虽冬月间，亦宜用之，此法必效。

解砒霜及一切药草六畜肉中毒 白花扁豆经过霜者生收，晒干研末，用新汲水调服三钱。

又方 真绿豆粉、黄土各四两，研极细，用生鸡蛋清九个，共一处以浸绿豆，冷水和稀服之即解。若有黑羊血，再灌碗许，更妙。

又方 天竺果煎服。如无，取根捣汁煎服，亦可。

又方 明矾三钱研末，冷水搅匀送下，一吐即愈。

又方 未尽用绿豆、甘草、夏枯草，煎汤冷服。

又方 生漆渣子，瓦上炼存性，研末，滚汤冲服五分。

救误服蒙汗药门主论

蒙汗药大约用天仙子为君，加狐心等物，虽不杀人，然令人迷而不醒。山东村杏多乘心迷，以取财物，醒来全不记忆，恍惚不能辨别，所以道途误服蒙汗药，以致头重足轻，口吐涎沫，目瞪口呆，此迷心之故也。虽不杀人，久迷不醒亦可畏人。凉水解之，亦能少苏，但凉水入心，水停心下，倘虚人必变他证。

或曰：此证必是痰迷心窍，宜生姜开之，投以姜汁乎？殊不知药中天仙子居多，得姜汁愈迷其心矣。故不可用也。

救误服蒙汗药门主方

止迷汤

白茯苓五钱 生甘草二钱 瓜蒂七个 陈皮五分

① 碗 原本作“与”，据光华堂本改。

水煎服，即大吐而醒，其从前事断不遗忘，不似凉水之解，如醉如痴也。

又方 饮凉水即安。

救饮鸩酒毒门主论

凡饮鸩酒，白眼朝天，身发寒战，忽忽不知，大醉之状，心中明白，但不能言，至目闭即死。夫鸩毒乃鸩鸟之粪，非鸩之羽毛，亦非鹤顶红也。鸩羽与鹤顶红，皆不杀人，不过生病。惟鸩粪则毒，此鸟出异国，异国人恐言鸟粪，则人必贱之，故但言鸩，以贵重之也。此鸟非蛇蝎不食，故毒甚于孔雀之粪，孔雀粪冲酒饮，有死有不死者，而饮鸩则无不死也。盖鸩毒性热功缓，善闭人气，所以不能言，必寒战者，心中热毒，心脉通目大眦，心热则目上视，目闭而死者心绝，目乃闭也，幸其缓可施救。鸩音逞。

救饮鸩酒毒门主方

消鸩

金银花八两，煎取汁二碗 白矾 寒水石 天花粉各三钱 石菖蒲二钱 麦冬五钱

同煎灌之，一时后目不上视，口即能言矣。再照方减半煎汤，二剂全愈。

救误服水银门主方

验方 拣开口花椒二两吞下，即裹水银从大便出。

救误吞五金门主方

误吞金银铜铁锡 蚕豆炒研末，砂糖调服，其物从大便出。

又方 猪板油同青菜煮食，自出。

吞金《丹方》。羊胛骨烧焦，研末三钱，米饮调下，从大便出。

吞铁物《丹方》。栗树炭二块，将铁锤捣极细，砂糖和细丸，米饮送下三钱，立出。

吞铜钱 羊胛灰煮粥食之。

吞铜钱或铜 多嚼生荸荠，食之自化。

吞金 红枣煮烂，不时食之，金从大便自出。

吞金银铜锡 先饮生鸭血杯许，再多食炒蚕豆，不切熟韭菜，其物即从大便裹出。

吞铁 艾蒿一把挫，以水五升煮取一升，顿服即下。

吞钱在喉不出 麸炭末指弹入喉中，其钱^①当即咯出。

吞钉及箭、金、针、铁 多食肥羊肉，及诸肥肉自裹出。

吞金环及钗 饴糖一斤一顿，渐渐食尽，多食之，环及钗便出。

知是服金屑死而未绝者 水银一两，灌口中摇动，令下咽喉入腹，金即消灭成泥而出。

解金银铜铁毒 鸭屎汁解之。一人以铜条两个作戏法，由鼻孔进而从口出，忽一日铜条滑入脑中，奇痒难忍，无法可救。黄公曰：尔磕我三百个头，我当救尔。其即连磕其头，叩未百余，其铜条从鼻出，此亦聪明人慧心智囊耳。

吞钱 桑柴烧灰研末米饮，调服二钱。

又方 绿豆粉，冷水调服三钱。

又方 多服饴糖。

吞金银铜铁 砂糖同砂仁煎浓汤，多服自下。

救误吞针门主方

吞针入腹 蚕豆煮熟，同生韭菜食之，针从大便而出。

又方 栳炭末，井水调服三钱。

又方 虾蟆眼睛一对，冷水送下，针穿眼内而出。冬月无虾蟆，在桑根

① 钱 原文作“儿”字，讹，改。

下寻。

又方 黑砂糖和黄泥为丸吞下，泥即裹针在大便中出。

误吞针刺咽中痛者 乱麻筋一团，搓龙眼大，以线穿系，留线头在外，以汤浸湿，急吞下咽，顷刻扯出，其针必刺于麻中而出。如一回不中，再吞再扯。

又方 雄磁石研末，水丸如樱桃大吞下，即服通利之药，针从大便而出。

针入咽喉无药可施 癞虾蟆数个，将头剃去，倒垂流血，以瓯接之，得一杯许，灌入喉中，移时连针吐出，针自软曲。

又方 旧笞篙煨存性，研末，每服三钱，酒调服，亦能化针。

又方 将半生熟出芽蚕豆捣烂，以韭汁为丸，吞下。

又方 磁石如枣核大吞之，其针立出。

又方 磁石研细，将黄蜡和捻如针大小，凉水下，裹针从大便出。

误吞诸木竹钗门主论

验方 取剪刀故锯烧赤入渍酒中，以女人大指甲二枚，烧存性研末，和服。

吞桃枝竹杖 但口中数数，多食白糖，自消去。

木屑呛喉 铁斧磨汁灌之。

竹丝哽 不拘黑白芝麻，炒熟泡汤饮，再以干芝麻嚼服几口。或以生芝麻捣烂嚼食。

救误吞磁锋门主论

验方 生红萝卜捣烂吞下，其磁锋即从大便而出。

解误服铅^①粉门主论

凡服铅粉者,非妇女角口,愤不欲生,冀其铅能坠肠而殒。更有妇女打胎服之,不惟不效,每冀求生不得,欲死不能,且生子多痴呆,身体发疮毒。更有因服铅粉钻筋入骨,老来遍身筋骨疼痛,无法可疗,此故自取之也,深可悯焉。特立此门救之。新增。其见证,面色呈青,腹中坠痛,欲死者是。

解误服铅粉门主方

验方 麻油、黄蜜、红砂糖,搅匀服之。

又方 多食生荸荠即解。

又方 香油灌之即解。

又方 急捣萝卜汁饮之。

解误服银朱藤黄门主方

验方 蘸菜水温服即解。

验中蛊毒门主论

令病人朝取井华水,唾水中唾如柱直下沉者是蛊也,浮者非蛊也。《三因》。

中蛊者,大便黑如漆,或坚或薄,或微赤者,是蛊也。《千金》。

孙真人曰:凡中蛊毒,嚼白矾不涩而味反甘,嚼生黑豆不腥者,是。若含甘草而不吐者,非蛊也。徵今铎。

《遁齐闲览》云:海南鱼有石首,盖鱼枕也。取其石为器,可盛饮

① 铅 原本作“银”,据铸记书局本改。

食，如遇蛊毒，器必裂，其效甚著，闽人制作最精，人但玩其色，而鲜有识其用者。

又曰：唾津在净水中，沉即是，浮则非。

又曰：口含大豆，中蛊者豆即胀而皮脱，无蛊者豆虽胀皮不脱。

又曰：煮鸡蛋一枚去壳，以银簪一只插入蛋中，并含入口内，一饮之顷，取视簪卵俱黑，即为中蛊。

诀曰：脉紧数如钗股弦直，而吐甚者，即中蛊也，急治之。

又曰：脉洪大者生，微细者死。

陈远公曰：有游两粤与女人交好，或与男子成仇，下蛊于饮食之中，食之则两目渐黄，饮食倦怠，一年三载，无药解之，必致暴亡。世传造蛊土人，各将蛊毒与蛇蝎等物共投缸内，彼此相食，食完止存一物不死者，取为蛊母，此讹传也。盖彼地别有蛊药，乃天生之毒也，土人治此证，有方可解，大约用矾石化蛊，恐外人知之，故秘不言。矾石化痰又善化坚，蛊积腹中，内必坚硬，而外以痰包之，所以一物二用，奏功如神。惟人身柔弱者多，强健者少，而蛊积胸腹间，必正气大虚，倘用矾石，不更虚其虚乎？必于补气血之中，加消痰化蛊之味，有益无损，始称万全也。宜破蛊全生汤。

解中蛊毒门主方

治中蛊毒 浓煎石榴皮汁饮之，使吐恶毒。

又方 热茶化胆矾半分，服之令吐。

又方 米饮调郁金末三钱，服之。

又方 微令铎。先取炙甘草一寸，嚼之咽汁，若中毒随即吐出。仍以炙甘草三两，生姜四两，水六升煮二升，日三服，若嚼甘草不吐，则非蛊也。

又方《范石湖文集》。昔李熹为雷州推官，得治蛊方。毒在上用升麻吐之，毒在腹用郁金下之。或合二味服之，不吐则泻，活人甚多。

破蛊全生汤

人参 当归各一两 白矾 生甘草 半夏各三钱 白茯苓五钱

水煎服。

解中断肠草毒门主论

人有服断肠草者，初则胸中隐隐作痛，久则气不能通，及至腹痛，二便俱不能出而死。此草即钩吻也，至阴之物，状似黄精，叶如毛钩子二个，此草喜闭气，尤使血不行，气血闭故尔人死，非肠断也。闽广间多生此草，妇女小忿，往往短见，食之觅死如饴，以其不大苦楚也。有用羊血灌之，得吐则生，然亦有不吐者，往往不救。此草杀人甚缓，用解毒通利之味，无不生者，不似砒之酷也，宜通肠解毒汤《冰鉴》。

解中断肠草毒门主方

误中断肠草，即珍珠兰之类，又曰水莽藤毒 生鸡蛋三、四个，敲开灌之。

又方

黑豆一杯研 生甘草五钱

煎浓汁服之，登时即解。

又方 白矾化水解之。

又方 热羊血灌碗许，以吐尽恶物自苏。

又方 冬青树叶，冷水捣汁服下即解。

又方 鸡抱雏卵，劈开以清油调匀，灌之。

通肠解毒汤

金银花 生甘草各一两 大黄一钱

水煎服，一泻而愈。

解中药毒门主论

凡中草乌、川乌、天雄、附子毒，则心烦躁闷，甚则头岑岑然，遍身皆黑而死。《入门》。

凡服药过多，生出毒病，头肿如斗，唇裂流血，或心口饱闷，或脐腹撮痛，皆中药毒也。

《脉诀》曰：人中百药毒伤，其脉洪大者生，微细者死。

又曰：洪大而迟者生，微细而数者死。凡解药毒汤剂，不可热服，宜凉饮之，盖毒得热则势愈盛也。然此特以中热毒为言耳。若解木鳖、菌蕈、黄连、石膏之类而中阴毒者，岂仍避热而犹堪以寒饮乎！

解中药毒门主方

凡中相反药毒，面青脉绝，腹胀吐血 蚕退纸，即出过蚕的纸，烧灰研一钱，冷水调服，虽危可救其复活。

中草乌、川乌、天雄、附子毒《入门》。 煎绿豆黑豆汁，冷服之。黑豆即马料豆。

又方 防风甘草汤冷饮之，入口即定。

又方 甘草黑豆浓煎饮汁。

川椒毒戟人咽喉气闭欲绝《入门》。 吃大枣三枚解之。

多服犀角则令人烦《入门》。

麝香一字，调水饮之。

解百药毒 绿豆研开，甘草同煎服。

误服巴豆口渴面赤，五心烦热，泄不止者 川黄连一钱，煎服立解。

又方 石菖蒲汁立解。

又方 用小豆汁立解。

又方 藿汁立解。

又方 大豆汁立解。

皂矾毒 急取曲糊一碗，服之。

救中雄斑蝥毒 早用马料豆煎汁，服之。

凡敷搽药内有砒霜，患处作痛或腐溃者 用湿泥频涂换之。若毒气入腹，胸膈苦楚，或作吐泻，冷饮米醋一两杯即止，多亦不妨。生绿豆末麻油调服，亦可。

敷贴雄黄药闷乱或吐泻 防己煎汤解之。

服川乌、草乌等药，闷乱流涎，或昏愤呕吐，或吐血下血 大黑豆、远志肉、防风、甘草，任用一味煎汤解之。

大凡服风药过多，皆宜用之。如不应，急用生姜汁甘草解之。

敷贴巴豆患处作痛，肌肉溃烂 生黄连末，水调敷之，即解。若毒入内，吐泻等证，更以水调服一、二钱，或大小豆，菖蒲汁皆可。

敷贴藜芦毒入内 煎葱汤解之。

解诸药毒 生姜汁灌之。

又方 荠苎汁灌之。饴糖汁灌之。白扁豆汁灌之。米糖汁灌之。

解一切药草中毒 浓煎甘草饮之，无不生也。又食蜜少许^①更佳。

解服盐卤门主论

服盐卤者，口咸作渴，腹痛身蜷足缩而死。夫盐能补肾，何便杀人？不知盐卤味苦，苦先入心，心遇盐卤，气郁不通；卤见心不受，乃犯于肾；肾见味苦，又不受，遂往来心肾之间，心肾之气交相悖，而卤流入于肠，则不可救矣。夫大小肠最恶盐卤人之，必缩小其肠而成结，结则气不通，安得不蜷曲而死乎！治法用甘草汤解之。

解服盐卤门主方

验方 急捣肥皂汁，和水灌之即吐。如吐未尽，用热豆腐浆灌之即吐腐形。如不吐用鹅翎绞喉数次必吐。

甘草汤 生甘草三两，煎汤救之。如卤未久，加淡豆豉一两同煎服之。肠润未必皆死，要在活用之耳。

又方 冷豆腐浆灌之。

又方 抹桌布沥水灌之。

① 食蜜少许 原本作“食少蜜”，据铸记书局本改。

又方 皂角水冷服。

中饮食毒门主论

书云：善解毒者无如火，盖火能革物之性。

陈远公曰：误食漏脯，以致胸膈满饱，上吐下泻，肠如刀割，痛泻不止而有死者。夫漏脯乃隔宿之肉，为屋漏水滴入名之也，似无大害，何以杀人？此言岁久之屋，梁尘甚多，屋上必有蛇蝎行走，尘灰倒挂，蛛网结成，无非毒物天雨之水顺流而下。凡毒气得水则化，然化于水中也。水入肉内，毒将何往，自然结于肉中而不化，食之安得不变生不测哉！亦有食而不死，又何故？此必非岁久之屋，未经毒物故也。虽不死而病必不免，所以为太上所戒！急用解毒之药自可得生。

中饮食毒门主方

凡一切饮食毒 用麻油一两杯饮之，得吐毒即解。

化漏汤

大黄 山楂 厚朴各三钱 白芷 麦芽各二钱 生甘草五钱 水煎服。

解百般饮食毒

生粉甘草二两 绿豆一升

水煎，频频服之。

解烧酒毒门主论

人有恣饮烧酒大醉而死，必身腐烂臭秽。夫酒为大热之物，纯阳无阴，尤为至热。多饮过度，力不能胜，一时醉倒而热性发作，腐烂肠胃。其人已入醉乡，不知生死，用井水频扑其心胸，解开头发，浸头于冷水中，候温即换凉水，后用解炎化酒汤主之。又曰：锡壶盛烧酒过夜有毒，饮之伤人。又曰：鳝鱼浸烧酒内，即成泥。

解烧酒毒门主方

凡过饮烧酒人事昏沉，将醉人放在板门上，矮凳架住，头低脚高，将头发打散，用盆盛水，人生研绿豆于水内，随将头发浸水盆内。如水将温，即另换一盆，浸至酒散人事清白方止。仍用大片热豆腐铺胸前，豆腐蒸变拔出酒毒。又换热豆腐贴之自活。醒后宜吃绿豆汤。

又方 葛花浓煎汁，或葛根汤灌之。

又方 甘蔗削去皮，捣汁饮，干呕自止。

又方 白萝卜汁灌之，并救受狼咽煤炭毒。

又方 热尿灌之。

又方 锅盖上的气汗水数盅，徐徐灌之。

解炎化酒汤

人参一两，如无，用黄耆二两代之 柞木枝二两 白茯苓五钱 黄连 寒水石各三钱 石菖蒲一钱

水煎一碗，待冷灌之，得入口即活。此方用柞木解酒毒，黄连寒水石解火毒，菖蒲引入心中，茯苓分消酒食之气，用人参者所以固真气，使不伤酒而散。盖火酒系气酒也，热极则气易散，固真气则火可泻，毒可解气不脱也。

解中煤炭毒门主方

中煤炭毒者，一时闷倒不救杀人《言瑶方》。急用新汲清水灌之。

中煤毒昏晕恶心跌倒，急移在风凉处所，咸菜水灌之。

解中闭口椒毒门主方

闭口椒食之，令人身冷，吐白沫欲绝《金匱方》。地浆水饮之，即解。

解误食桐油毒门主方

桐油入咽,令人发吐不止《秘方》。急饮热酒即解。

救误吞田螺门主方

误吞田螺,鲠喉不下,死在须臾 活鸭以水灌于鸭子喉中,少顷将鸭倒悬,令鸭吐出涎水,与患者服之,其螺自化。

救误吞桃李门主方

误吞桃李不下 狗骨煮汁,摩头上即下。

又方 以少许水,灌小儿头,承其水与饮之,即下。

救误吞猪骨门主方

验方 象牙刮末,浮于新汲水上,吸之即下。

救误吞鸡骨门主方

验方 来年灶糖食之,自化。

又方 香油煎滚温服即下。

救误中猪肉毒门主方

验方 猪牙烧为末一钱,开水调服。

救误吞头发门主方

吞发绕喉不出 自己乱发煨灰,开水调服一钱。

救误吞蜈蚣门主方

验方 急吞生鸡蛋二个,不可嚼,次日即裹出之。

蜈蚣误入咽喉中咬之垂死 生公鸡热血灌入喉中,蜈蚣即出。

人喉中似有物行动,吐痰则痛更甚,身上皮肤开裂,有水流出,目红肿而又不痛,足如斗肿而又可行,真绝世莫辨之证。此乃人食生菜,有蜈蚣在叶上,不知而食之,乃生蜈蚣于胃口之上,入胃则胃痛,上喉则喉痛,饥则痛更甚也。方用鸡一只煮熟,五香调治,芬馥之气逼人,乘人睡熟,将鸡列在病人口边,则蜈蚣自然外走,倘有蜈蚣走出,立时拿住,不可让其仍进口中,或一条或数条,出尽自愈。大约喉间无物走动,则无蜈蚣矣。然后用全肤汤:茯苓三两,黄耆、当归、薏仁各一两,白芍五钱,生甘草二钱,荆芥、陈皮各一钱,防风五分,水煎服,十剂则皮肤之裂自愈,而双足如斗亦消矣。盖蜈蚣在上焦,非药食能杀,因药下喉即至胃中,而蜈蚣却在胃口之上,故不能杀之也,所以引其外出,然后用药调治其气血自愈。皮肤开裂者,乃蜈蚣毒气盘踞肺边,肺主皮毛,故皮肤开裂。足如斗者,足乃肾之部位,肺居上为肾之母,母病则子亦病,然肾水终是不乏,而毒气留于肾部,故足之皮大而浮,非骨之病也,所以能走也。眼属肝,肝受肺气之毒熏蒸,故红肿也。《秘录》。

救误吞蚂蝗门主论

芹菜内蚂蝗极多,摘洗不净,每每误食下咽,肚腹作痛。

或云:蚂蝗煨灰研细,散于水碗内,露一宿即变细蚂蝗,何况误吞活蚂蝗乎!

蚂蝗一名水蛭，以火焙为灰，见水复活，惟土井及藏芹菜根内，小如米麦，人所难防，误食必害人。若知此物在腹，但以芝麻油润肛门，虫闻香尽出，可无害矣。

救误吞蚂蝗门主方

验方 水田泥为丸如桐子大，每服二、三钱，用水送下。蚂蝗即随泥解出，空心服之更效。

又方 蜜糖一杯，和水服之。

又方 空心饮地浆水少许，自下。

救误中蛇虺百虫毒门主方

验方

雄黄一钱 巴豆去油一粒 干姜五分 麝香一分
共研细末，开水调服。

解中蜈蚣毒门主方

验方 桑汁或桑根，或桑叶煎汤服。

解中蜘蛛毒门主方

验方 蓝青汁服之。

解中蚯蚓毒门主方

凡中蚯蚓毒者，形如大麻疯，眉发脱落 石灰泡热水，候冷浸良久，即愈。

小儿受之 盐汤温洗，或鸭血涂之。

解中瘟牛肉毒门主论

人有食牛、犬肉，一时心疼，不能吐泻，此毒结心胃，不升不降也。亦宜用吐。如吐之不效，当用消肉化毒丹。夫牛犬无毒，本补精血之物，何以毒至于此？必牛犬抱病将死，又加缚束以激动怒气，毒结于皮肉之间，适当其处，人误食之，故食之生病，卒至暴亡也。

凡中马、犬、河豚、鱼、蟹毒者，心下必坚硬，或腹胀口渴，忽发热妄语者是。

解中瘟牛肉毒门主方

凡误食瘟牛肉，口吐白沫，不省人事 早稻草煎汤，灌之立醒。

又方 乌桕树根皮酒煎，同热酒服。

又方 菊花连根捣汁，同热酒服。

消肉化毒丹

山楂 神曲 大黄 雷丸各三钱 枳壳 厚朴各一钱
水煎服。

解中马肉毒门主方

验方 芦根捣汁一碗饮之，或煮汁服，并煎汤洗浴。

解中犬马肉毒门主方

犬马肉毒 杏仁去皮四两研，以百沸汤和仁绞汁，作三服吃，即解。

又方 急吃冷粥一碗，顷刻毒解思食。

犬、马、河豚、诸鱼蟹毒，心下坚硬，或腹胀口渴，发热谵语《梅师方》。
芦根煮汁服，立解。

中六畜肉毒 水煎墙上黄土二钱,饮之即解。

食自死六畜诸肉中毒 捣黄柏末,以水和方寸匕服,未愈再服。

解中河豚毒门主论

人有爱食河豚,以至血毒中人,舌麻心闷,重者腹胀而气难舒,口开而声不出。若久延则害人,夫河豚水族也。有食之死,有食之无事者,何也?乃人之肠胃有宜有不宜耳。大约肝经血燥,胃气又弱者,多能中毒,盖河豚乃鱼中善怒者也。食之自能动气,况肝血本燥之人,肝气自急,以急济急,安得不增急暴之气哉。气急难舒,故心闷也。气急声难出,故舌麻也。治当吐出其肉,则气舒腹宽,声出何有舌麻心闷之害乎。古有拼死吃河豚之语,其实河豚不能杀人,但性怒不甚相宜耳。宜瓜蒂散加味治之。

又曰:河豚鱼血令人麻,子能令人胀,眼睛令人昏,凡食之者,必须洗净血,去其子其眼,庶无害也。

又曰:河豚鱼第一宜洗净血水,第二防有灰尘落在锅内,所以炒河豚卖者,多在露天地上,免灰尘落在锅内也。

又曰:以芦笋同炮,则解毒矣。

解中河豚毒门主方

验方 槐花煎浓汁,服之即解。

又方 橄榄煎汤服。

又方 急饮人粪汁。

中河豚子毒 急取腊鹅煮食,即不胀矣。

河豚菌毒钱氏。多服金汁即解,如难得即于干地上挖一潭,用水和泥浆稍定,服水一、二碗即解。

又方 香油灌之,吐出毒物,即愈。

又方 磨紫金锭服。

加味瓜蒂散

白茅根 芦根各一两 瓜蒂一个
水煎汁服，必大吐，吐后必愈。

解食鱼中毒门主方

验方 冬瓜仁煎汁饮之。
又方 煮橘皮汤停冷饮之。

解黄鳝鱼毒门主方

验方《简便》。 食此犯荆芥，能害人，急服地浆解之。

解误食毒蟹毒门主方

验方 家紫苏汁，或干紫苏煎汤即解。
又方 姜汁服。
又方 靛青汁或小蓝汁服。
又方 蒜汁服。
又方 薤汁饮之。
又方 冬瓜汁服。
又方 黑豆汁煎服。

解中鳖毒门主论

有食鳖腹痛欲死，手足发青而亡者，夫鳖虽介属，本无大毒，然鳖类多属化生，有蛇化，有龟化，有鱼化者，龟鱼所化，皆益人，惟蛇化最毒，其腹下必隐隐蛇皮之状，其色大红，必不可食，食必杀人，腹大痛者，乃毒气攻肠也，不必解鳖之毒，仍当解蛇之毒。

解中鳖毒门主方

误将鳖肉同茺菜吃成鳖腹胀，急饮白马尿一碗，即化。

中鳖毒

白芷 雄黄各三钱 丹砂 山楂 枳实各一钱 白茯苓五钱

水煎服一剂痛止，二剂毒出矣。

又方 饮蓝汁数碗，或靛青水亦效。

又方 盐汁饮。

解中野菌地蕈灵芝毒门主论

陈远公曰：人误食竹蕈，或吞树菌，以致心疼胸胀，肠泻腹痛而死。夫蕈亦芝草之类，生于莎叶朽木，所谓臭腐出神奇，何以毒种于中乎？殊不知竹根树根而生蕈菌者，以土之湿热也，湿热之下，必聚蛇蝎恶虫，其气上腾，而蕈菌得气，易于生发，故较他产更肥，其味极美，而其质实毒也。解菌汤救之。

解中野菌地蕈灵芝毒门主方

验方 黄泥浆灌之即解。地浆能解百毒，真神方也。

又方 橄榄捣为泥食之，即解。

又方 金汁解。

又方 紫金锭磨服，即解。

又方 绿豆研生甘草煎浓汁饮，即解。

解菌汤

生甘草二两 白芷三钱

水煎服，以鹅翎探喉，必尽吐而愈。如已入肠，探引不出，亦必腹痛下泻，可保生全。

解豆腐毒门主方

验方 萝卜汤饮之即解。

解面毒门主方

验方 多食生萝卜即解。

解中白果毒门主方

凡中白果毒,骤然一声即晕去,俨如惊状者是 白蜚头煎汤,灌三、四次即苏。

又方 麝香一分煎汤服。

解误服轻粉门主方

误服轻粉筋骨疼痛 川椒去目,每日清晨白汤不拘多少吞之。

救六畜瘟疫法

立救丹

白硼砂 白附子 高良姜 猪牙皂各一钱 雄黄五分 火硝二分
麝香一分

共乳极细末。凡牛马驴三分,猪羊只用一分,俱吹左鼻孔内,再点眼角,避风立效。

癫犬欲死 用蜈蚣三条研末,入饭与癫犬食之,数日立愈。

解中樱桃毒门主方

验方 甘蔗汁解之。

红升丹的临床新用

1. 腹壁漏管

马铭钧治疗腹壁漏管(术后伤口感染窦道)1例。张某,女,47岁。检查:一般情况良好,下腹部手术疤痕中有绿豆大漏口,探针插入2厘米,基底及四周坚硬,分泌物甚少,探查中亦少有出血,漏口周围皮肤紫黯。诊断为腹壁漏管。治疗:内服四妙汤(黄芪、当归、银花、甘草)加減,每天1剂。外治:初以红升丹药捻插入漏管换药。随漏管逐渐开大,药捻由1根增至3根。3天后,漏管处形成一脓肿,药捻被黄色稠脓包裹,清除脓液后,漏管外口如红枣大呈口大底小的倒圆锥形,发现基底有长约2厘米的粗丝线1根,即取出。之后用拔毒生肌散同黄连膏纱条换药,脓液渐减少。结果:漏管完全愈合。

马铭钧. 湖北中医杂志,1994,(4):39

2. 子痰漏管(附睾、睾丸结核)

马铭钧治疗子痰漏管(附睾、睾丸结核)1例。韩某,男,24岁,睾丸肿痛半年破溃流脓3个月。西医诊断为“附睾、睾丸结核”。检查患者呈痛苦病容,右睾丸肿大如核桃大小,其上有多个硬结,与附睾相对应的阴囊皮肤上有一豌豆大的痰孔,为苍白水肿肉芽所充填,溢出少量黄白色稀薄脓液,左侧睾丸亦肿大并有硬结,附睾如蚕豆大。两侧精索均增粗,触痛明显。舌质淡红,舌边有齿印,苔薄白,脉细弱。治疗:内服四妙汤合消脾丸,加夏枯草、川楝子、橘核、青皮、蒲公英等。每日1剂。外治:以黄连膏纱条、五五丹(煅石膏、升丹各等量,研末)撒于痰孔换药。治疗40天漏管愈

合。继续服用上方,共治疗 93 天。复查:左侧附睾稍大,正常硬度;右侧附睾硬结如蚕豆大小,未全消散。两侧睾丸大小如常。漏孔处阴囊皮肤疤痕粘连,愈合良好。两侧精索增粗无明显硬结。除站久及劳累后感阴囊及少腹轻度坠胀外,无其他不适。

马铭钧. 湖北中医杂志,1994,(4):39

3. 附骨疽漏

马铭钧治疗附骨疽漏(左侧髌骨骨髓炎并漏管形成)1例。陈某,男,15岁,左大腿生疮破溃流脓3个多月,于1982年9月13日来医院就医。检查:面色萎黄,精神萎靡,肌肉不丰,舌淡红,苔薄白,脉细弱。左股前外上方有形如5分硬币大的漏口,为苍白水肿之肉芽充满并凸出于漏口之外,疮周紫黯,按压疮周则溢出黄白色米汤样稀薄脓液。以探针斜向上方,轻轻即可深入5厘米,左下肢呈轻度跛行。X线片:在髌前下棘与髓臼外缘之间骨质密度增加,髌骨外缘有破坏区。提示:左髌骨慢性骨髓炎。治疗:内服以四妙汤合五味异功散。随证加减,每日1剂。外用红升丹药捻插入祛腐化管。换药10天后,漏管脓增多,并由稀薄转稠厚。继续治疗半月精神好转,食欲增加,左髌部已不痛,疮内脓液减少,改用拔毒生肌散、海浮散换药。新肌渐生,共治疗30天,疮面全收。尔后,先以四妙汤合阳和汤,继以人参养荣丸合六味地黄丸巩固治疗2个月,不仅疮无反复,且患者体质明显改善,面色红润,肌肉丰满结实,步态如常人。结果:复查X线片:左髌骨局部密度增高,示慢性骨髓炎已愈。

马铭钧. 湖北中医杂志,1994,(4):39

4. 直肠癌根治术后腔隙不闭

文建国治疗直肠癌根治术后腔隙不闭1例。齐某某,女,75岁。1993年4月1日以大便间断带血10年余,加重2月余,患者自感腹部隐痛、下坠,收住院。肛门指诊:距肛门1厘米7~8点处有约2厘米×1.5厘米大小的肿物,光滑质硬,压痛,触诊阳性。直肠镜活检病理报告为直肠腺癌。于1993年4月7日在硬膜外麻醉

下行直肠癌根治术,其中切除乙状结肠及直肠约15厘米,手术顺利。术后病理诊断报告:①直肠腺癌,侵犯浆膜层;②两断端未见癌细胞侵犯;③未见淋巴结。术后造瘘无感染,排气排便顺利,惟术后原直肠肛管部肉芽多日不生,致所遗腔隙不闭。先以凡士林纱条蘸生肌散(血竭10克,煅龙骨10克,冰片少许,共研细末瓶贮备用)上之,每日1次。5次后,腔隙如故。换以凡士林纱条蘸纯红升丹(把红升丹用纱布匀筛消毒盘内,然后用凡士林纱条滚取)上之。管腔有少许混浊稀薄渗出物(可能部分脱膜),清理后见管腔四壁已有许多丘形突起,此生肌之兆,改间日1次(因药物浓度大,需防伤蚀好肉)。自述肛口部上药后有痛感,1小时后渐消。又外敷红升丹极薄一层2次。此时管深距肛口尚有2厘米左右,遂改用0.9%氯化钠纱条拧干上之,1日1换。8月9日:新肉长满肛口,创面洁净,改用生肌散干撒收功。

文建国. 山西中医, 1994, (10): 51

5. 类风湿性关节炎

董国良治疗类风湿性关节炎1例。黄某,女,32岁。诊断为类风湿性关节炎。服阿司匹林、消炎痛药物好转,但停药即发,遇寒加重。服青霉素等药物有效,但副作用大。尔后多方求医,服用不少中草药效不显,惟有用激素药物维持以缓解剧痛。症见面白浮肿,双足距舟关节与趾关节高隆变形,红肿焮热,跳痛甚激,不可触近,手腕、指、趾关节牵引挛痛,早晨起床有僵直感,舌苔薄白,脉弦紧而缓,临床诊断为风寒湿痹。给双足距舟关节、跳趾关节红肿处,膏药贴盖,2天换药1次。4天后贴药处各起一水泡如烫伤样,水泡随膏药揭开而破裂,溃面渗出淡黄色水液,改用红升丹,膏药贴盖,每日换药1次。随着渗出液逐日减少,肿痛也日渐消退,最后用五五丹或九一丹收敛(对丹过敏者可用八宝生肌散)。不出2周局部肿痛全消,溃面干涸结痂而愈。善后予以蜈蚣蝎痹丸(已申请专利)服用3个月,不仅贴药部位不再肿痛,其他关节亦无不适。随访迄今3年未复发。

董国良. 中医外治杂志, 1999, (12): 47

6. 乳痈

彭德峰治疗乳痈 1 例。刘某, 女, 27 岁。患者产后右侧乳房肿痛 6 日, 经村医手术切排, 见血多脓少, 脓出不畅。术后对症治疗, 但肿痛不消, 身热不退。诊见右侧乳房肿胀, 皮色红, 切口下间有脓液流出, 患者高热不退, 口渴喜饮, 大便干结, 小便黄赤, 舌苔黄, 脉细数。证由乳络不畅, 气血瘀滞, 蕴结化热而成。治宜托里透脓, 清热解毒, 外用八二丹药捻, 并外敷金黄膏, 疮口处垫棉束紧, 使乳汁外排, 每日换药 1 次, 内服中药清热解毒之剂, 辅以通导大便之药。3 日后脓出畅顺, 肿痛渐消, 身热渐退。遂改用九一丹药捻, 外敷金黄膏, 继续治疗 1 周后诸症消除, 疮口愈合。

彭德峰. 中国民间疗法, 2000, (8): 28

7. 面部疔疮

彭德峰治疗面部疔疮 1 例。陈某, 男, 20 岁。5 日前颈部出现一粟米样脓头, 外用抗生素软膏治疗 3 日无效, 用手挤压后疼痛加重, 肿胀明显。诊见疮顶隆起, 四周浸润明显, 触之疼痛, 身有恶寒发热, 舌红苔黄, 脉弦数。证由火毒结聚, 血瘀凝滞所致, 妄加挤压使毒入血分, 有扩散之势。治宜提脓, 凉血清热解毒。疮顶用八一丹、金黄膏盖贴, 四周用玉露膏敷贴, 中药内服黄连解毒汤、五味消毒饮。第 5 日见肿势局限, 脓头破溃, 身热下降。改用九一丹药捻, 外盖金黄膏, 每日换药 1 次, 继续服用清热解毒中药, 治疗 10 日而愈。

彭德峰. 中国民间疗法, 2000, (8): 28

8. 脓疮

彭德峰治疗脓疮 1 例。袁某, 男, 43 岁, 1992 年 7 月 25 日初诊。右小腿内下 1/3 处溃疡 1 年余。诊见右小腿内下方有一钱币大溃疡, 边缘不整, 疮口凹陷, 疮面肉色灰白, 脓水淋漓, 溃疡周围肿胀, 下肢静脉曲张。证由湿热下注, 气滞血凝, 蕴酿成疮, 治宜祛腐生肌, 兼以清热利湿、行气活血。外用九一丹、红油膏盖贴, 每日

换药1次,辅以内服中药。7日后肿胀渐消,疮口肉色转红,脓水变稠,遂改用生肌玉红膏,仍每日换药1次,半个月后痊愈。

彭德峰. 中国民间疗法, 2000, (8): 28

9. 四肢开放性损伤合并感染

张殿玺治疗四肢开放性损伤合并感染62例。经过清创、置管冲洗引流后,用自制的红升丹直接涂敷或制成红升丹药捻,放入窦道和感染的骨质,每天1~2次。用药后感染控制,炎性水肿消退。愈合病例中39例得到0.5~3.5年随访,骨折全部愈合,感染无复发。

张殿玺. 中国中西医结合杂志, 1995, (7): 442

10. 体表化脓性感染

王英章等治疗皮肤病体表化脓性感染102例。治用独圣膏:红升丹50克,凡士林300克,将两者在瓷器内调匀,高压消毒后使用。对溃疡性皮肤病腐肉较多者,用红升丹粉撒于疮面,外敷独圣膏,待腐肉脱落后,单纯使用独圣膏敷贴,直至痊愈;对鳞屑性、苔藓性、角化性等痛痒性皮肤病,用独圣膏局部涂擦。结果:治愈97例。

王英章,等. 齐齐哈尔医学院学报, 1999, 20(2): 134

化痢汤的临床新用

1. 急性乳腺炎

魏霞等治疗乳腺炎40例。内服中药化痢汤:白芷、牛蒡子、柴胡、漏芦、甘草各12克,瓜蒌、连翘、王不留行各15克,穿山甲、通草、桔梗各10克,蒲公英、地丁各25克。水煎服,每日1剂,分2次服,药渣热敷患处。结果:痊愈36例,有效4例。

魏霞,等. 实用中医药杂志, 2001, (5): 27

2. 阑尾炎

林立用化痢汤加减治疗阑尾炎65例。全部病例均经临床、实

验室或B超确诊。方药组成:白花蛇舌草30克,鬼针草、败酱草、两面针各15克,丹参、炒白芍、广木香各10克,蜈蚣2条,全蝎6克。辨证分型加减:①气滞蕴热型:微热,腹痛走窜或痛处固定,恶心欲呕,腹胀暖气,大便秘结或腹泻,苔薄白或薄黄,脉弦,加枳壳10克;夹湿者,伴头身困重,胸脘阻闷,纳呆,苔腻,脉兼滑,加生苡仁30克。②热壅血滞型:发热,右下腹持续性隐痛,阵发性加剧,恶心呕吐,心烦口渴,大便秘结,小便黄,舌质红,苔黄腻,脉弦数,加鸡血藤30克,生大黄9克。③血瘀成脓型:壮热不退,腹痛重,右下腹明显压痛、反跳痛,并可摸及包块,便秘或腹泻,尿短赤,苔黄腻而厚,脉弦数或洪数,加炙山甲、皂角刺各12克,金银花15克。结果:治愈56例。

林立. 中华实用中西医杂志, 2000, (20): 1640

3. 肺脓疡

戴押玉等用化痛汤加减治疗肺脓疡17例。方药:知母、黄芩、天麦冬、桑白皮、地骨皮、赤白芍、海藻各10克,银花、连翘各15克,鱼腥草、芦根各30克,阿胶12克(烊化冲服)。每日1剂,水煎分2次口服。加减:腹满便结者,加用生军;咯血者,加用白芨、藕节、茜草等;病灶愈合较慢者,加用合欢皮、百合。结果:有效率达100%。

戴押玉,等. 四川中医, 1996, (9): 38

太乙膏的临床新用

1. 流行性腮腺炎

管淑兰治疗流行性腮腺炎200例。患者均有不同程度的发热、咀嚼疼痛和腮腺肿大。血常规检查部分病人白细胞总数、淋巴细胞、中性粒细胞都有不同程度的增高。内服流腮合剂:贯众15克,双花15克,板蓝根12克,木蝴蝶6克,熟牛蒡9克,薄荷6克,浓煎150毫升,每次30毫升,日服3次。外用加味太乙膏合溃消散贴敷。加味太乙膏的药物组成及制法:赤芍、白芷、玄参、当归、肉

桂、大黄、木鳖子各 60 克,轻粉 12 克,柳枝、槐枝各 100 段,阿魏、没药各 9 克,乳香 15 克,铅丹 1 200 克,麻油 2 500 克,并将前 14 味药入麻油煎,熬至药枯,滤去渣,再入铅丹,充分搅匀成膏。溃消散:乳香、没药、丁香各 3 克,草乌、山奈、甘松、血竭、白芷各 15 克,共研细末,密封备用。用法:将加味太乙膏烤化摊开,将溃消散撒于药膏中间,趁热贴于患处,隔日换 1 次,一般 1~3 次痊愈。

管淑兰. 滨州医学院学报, 1995(2): 91

2. 腮腺炎

刘树鹏等治疗腮腺炎 1084 例。药物组成:生地、大黄、玄参、赤芍、当归、白芷、肉桂、土木鳖各 25 克,血余 12 克,鲜槐柳枝各 30 克,黄丹 200 克,阿魏 4 克,轻粉 5 克,乳香、没药各 10 克(后 5 味研细末),芝麻油 1 千克。熬制:将前 9 味药及鲜槐柳枝和芝麻油倒入铁锅内,慢火熬至药枯为度,滤净药渣,将黄丹徐徐投入油中,用槐棍搅拌,火稍加大,熬至先冒青烟后变白烟气味香馥时即停火。冷却至烟尽,将后 4 味药末搅匀溶于膏内,将膏倒入冷水中,药膏不烫手时乘温把膏捻成条状,直径 1.5 厘米,切成块,每块 8 克,撒适量滑石粉防粘备用。用法:视腮腺肿块面积大小,用太乙膏 1~2 块稍加温,手沾水均摊于干净布上,厚约 0.2 厘米,外敷患处。隔 3~4 天换膏药,颈、颌下淋巴结炎者也用此膏外敷。疗程 4~8 天。发热 38℃ 以上者口服退热药,并发睾丸炎配合抗生素等药治疗,并发脑膜炎参照病毒性脑炎抢救。除上述情况外,均停用中西药物。结果:痊愈 1032 例,有效 36 例,无效 16 例。

刘树鹏,等. 中医外治杂志, 1996(3): 91

3. 急性乳腺炎

符彦成等治疗急性乳腺炎 166 例。患者乳房均具有肿胀热痛等主症,部分患者伴有局部皮色微红,乳汁排泄不畅,甚则形寒壮热,头痛骨楚,口苦咽干,周身无力等。外敷蟾酥二黄散:藤黄 30 克,雄黄 60 克,蟾酥、制乳香、制没药、樟脑各 9 克。将诸药分别研极细末和匀,装瓷瓶放阴凉干燥处备用。用法:局部常规消毒,将

蟾酥二黄散撒于太乙膏上,敷贴患处,2天换药1次。内服加味瓜蒌牛蒡汤:全瓜蒌、二花、公英各30克,连翘15克,柴胡、当归尾、赤芍、青皮、牛蒡子各12克,通草9克,甘草6克。每日1剂,水煎,早晚2次服。病程在1~2天患者来诊,单用蟾酥二黄散掺于太乙膏敷贴,用药1天后,乳房肿块消散,疼痛消失。病程在3~5天患者来诊,用蟾酥二黄散掺于太乙膏敷贴,配服加味瓜蒌牛蒡汤,用药3天后,全身症状消退,乳房疼痛消失,肿块消散。病程在7~9天患者来诊,外用药敷贴配服中药后,乳房疼痛明显减轻,肿块明显缩小。病程在9天后来诊者,多见脓肿已形成,消之不应,切开排脓。结果:治愈129例,好转21例,无效16例。

符彦成,等. 陕西中医,1997(5):201

内消散的临床新用

1. 子宫肌瘤

黄玉凤等治疗子宫肌瘤168例。患者均以B超确诊,临床症状:下腹不适或疼痛,有的伴有腰骶部痛,除少数病例外,皆有不同程度的月经周期缩短,经期延长经血量多,肌瘤最大的如小孩头大,最小的如鸭蛋大。服用官瘤内消散,每次12克(1袋),每日2次,温开水调服,一般20~180天治愈。

黄玉凤,等. 邯郸医学高等专科学校学报,2000,(1):25

2. 乳痈

余穗娟治疗乳痈101例。局部症状以结硬、焮红、肿胀、疼痛开始。方药:知母10克,象贝10克,花粉15克,制乳香5克,半夏10克,白芨10克,穿山甲10克,皂刺5克,银花15克。发热者加桑叶10克,薄荷5克,牛蒡子5克;乳头破碎者加龙胆草5克,木通6克;乳汁积滞不畅者加王不留行10克,路路通10克;大便干燥者加全瓜蒌30克或生军5克;肿块僵硬,拖延不散,并已用了大量抗生素者,加桔梗5克,鹿角片10克。每日1剂水煎,分早晚服。若

起病急骤伴高热者每日 2 剂水煎,每 6 小时服用 1 次。一般 2~5 剂为 1 疗程。服药期间同时外敷乌莓膏(乌莓一味组成),隔日更换 1 次,可根据肿胀范围决定外敷药量,一般每次 15 克。结果:总有效率为 99%。

余穗娟. 南京中医药大学学报,1995,(5):60

3. 痤疮

李政敏治疗痤疮 104 例。基本方:金银花 25 克,浙贝母、知母、天花粉各 20 克,皂角刺、穿山甲、乳香、半夏、白芨各 10 克;肺热型加枇杷叶、黄芩各 10 克,野菊花 20 克,桑白皮 15 克;脾胃湿热型加生地、茵陈各 15 克,薏苡仁 30 克,大黄(后下)10 克;热毒型加野菊花、白花蛇舌草、赤芍各 15 克;血瘀痰凝型加桃仁、红花各 10 克,赤芍 15 克,牡蛎 30 克;冲任不调型加当归 10 克,益母草、赤芍、丹参各 15 克。1 天 1 剂,水煎早晚分服。药渣加水约 2 000 毫升,煮沸后熏蒸患处,待适温后热敷、外洗患处。1 天 1 次,10 天为 1 疗程。结果:治愈 92 例。

李政敏. 湖北中医杂志,2000,(6):33

4. 丹毒

治疗丹毒 1 例。患者,男,26 岁,1992 年 5 月 6 日初诊。自述发热,寒战,头痛,面部肿胀、酸痛、赤热 2 天。患者平素喜挖鼻孔,3 天前曾因挖鼻孔而致鼻腔出血。检查:体温 38.5℃,左侧面部见一约 3 厘米×3 厘米,边缘清晰而不规则的红斑区,稍高出皮面,压之褪色,放手后即回复原状。舌质红,苔薄黄,脉浮数。诊为:丹毒(颜面)。证属风火邪毒,治以清热解毒,散风消肿。方以内消散加牛蒡子、僵蚕、升麻。水煎服 3 剂,诸症明显减轻,继用 6 剂,症状消失,停药观察 1 周无复发。

黄波. 中国乡村医生杂志,1999,(4):33

5. 脉痹

治疗脉痹 1 例。患者,女,30 岁,1994 年 10 月 20 日就诊。自述右下肢肿胀、灼热,疼痛半个月,加重 3 天。曾就诊于当地医院,

诊为血栓性浅静脉炎。经处理效果不佳,转求中医治疗。检查:右下肢可摸到一长约6厘米的硬索状物,有明显压痛,伴肿胀。身感发热但体温不高,血沉20毫米/小时。诊为脉痹。证属湿热蕴结。治以内消散加玄参、泽兰、鸡血藤。药后效果明显,前后共用药24剂,诸症消失。

于少青. 中国乡村医生杂志,1999,(4):33

6. 肠痈

治疗肠痈1例。患者,女,42岁。1994年8月6日就诊。因患急性阑尾炎,惧怕手术转中医治疗。检查:右下腹疼痛、压痛、反跳痛,及局限性包块。体温38.5℃,舌质红,苔黄腻,脉滑数。中医诊断:肠痈(湿热蕴滞)。西医诊断:急性阑尾炎合并阑尾周围脓肿。治以清热化湿解毒,消肿排脓。方以内消散加红藤、大黄。3剂,水煎服,服药后痛减,体温下降。此方继用6剂。诸症皆减,但因包块未消失,守方继用12剂,包块消失。停药观察1周未见复发。随访半年,亦未再发。

刘卫生. 中国乡村医生杂志,1999,(4):33

7. 颈淋巴结核

徐大成治疗颈淋巴结核1例。李某,男,35岁。1990年8月初诊。颈左侧包块半年有余,累累如珠,推之可移。检查:局部红肿,中央有水疱,范围3厘米(直径)大。平素少言,而喜太息。舌如常,苔薄腻,脉弦。中医诊断:瘰癧。证属气滞痰凝证,治拟行气化痰。七味内消散用凡士林调制成膏状,外敷于颈左侧包块处,1日1次。经治1月,包块消散,继以内治巩固6月。1年后随访未复发。

徐大成. 辽宁中医杂志,2002,(7):437

8. 肠系膜淋巴结核

徐大成治疗肠系膜淋巴结核1例。李某,男,26岁。1992年3月14日初诊。1年前,患肺结核,经治疗后,结核稳定。半年前,左腋下淋巴结肿大,手术切除,病检示:坏死性结核淋巴结炎。近3

个月来,脐周隐痛,时有便溏。检查:腹部触诊,脐周有包块5厘米直径大小,境界不清。B超检查示:肠系膜淋巴结肿大。属中医积聚、腹痛范畴。辨证为脾失健运,痰瘀互结。治拟化痰祛瘀,以健脾助运。七味内消散加白芥子用饴糖调成软膏,外敷脐部,1日1次。经治1月,腹部包块缩小,大便正常。3个月后腹部包块消失,继以内治巩固。

徐大成. 辽宁中医杂志, 2002, (7): 437

9. 颈部蜂窝组织炎

徐大成治疗颈部蜂窝组织炎1例。李某,男,28岁。1992年10月28日初诊。1周前,受凉,引发牙痛,自服去痛片,可安静片刻。近3天来,左侧颈部肿痛难忍,体温39.4℃,便秘尿赤,舌质红绛,舌苔黄腻,脉弦滑数。检查:颈左侧皮肤肿硬,上至颌下、下达左锁骨上,疼痛拒按,张口受限,左侧第二白齿呈龉齿状改变,牙龈红肿。中医四诊合参属颈痛、颈发范畴,证属风温火(热)毒上攻,痰浊凝滞,气血壅阻。治拟清热泻火,透毒消肿,荡浊化痰,畅通气血。七味内消散加芙蓉叶、如意金黄散,用蜂蜜调制而成,敷于颈左侧,1日3次。治疗1周,体温波动在38℃左右,肿势局限,切开排脓,脓出热退,后经中药降丹提脓祛腐而愈。

徐大成. 辽宁中医杂志, 2002, (7): 437

10. 乳腺增生

徐大成治疗乳腺增生1例。郭某,女,35岁。1991年3月27日初诊。左乳房肿块,经前疼痛,经后痛减;情绪急躁时,局部胀甚,心气平和时,局部胀减。触之局部可及长圆形包块2枚,大小各约1厘米(直径),推之可移。舌质红,苔薄白,脉弦。本病属中医乳癖,证属肝郁痰凝。治拟疏肝解郁,化痰散结。七味内消散用蜜调成软膏状,外敷左乳房包块处,1日1次,消癆丸内服。经治1月余,左乳房包块消散。继以逍遥丸善后,并嘱其保持情绪乐观,以防反复。

徐大成. 辽宁中医杂志, 2002, (7): 437

11. 乳腺炎

徐大成治疗乳腺炎1例。石某,女,25岁。1993年3月10日初诊。产后3周出现左乳房胀痛,近3天来,左乳胀痛加剧,托之则缓,表皮肿硬,拒按,尿赤便结,舌红脉数。中医辨病属乳痈范畴,证属肝胃郁热。治拟疏肝清胃。七味内消散加芙蓉叶,用蜜调外敷左乳处。并嘱用三角巾吊起左乳,以保持乳管畅通;清洁乳头,以防热毒入侵。3天后左乳痛减,7天后渐愈。

徐大成. 辽宁中医杂志,2002,(7):437

12. 流行性腮腺炎

徐大成治疗流行性腮腺炎1例。姚某,男,6岁。1992年3月1日初诊。两周前,邻家小孩患腮腺炎,3天前,左耳下肿胀,恶寒发热,体温38℃左右。检查:左侧腮腺连及左颌下腺漫肿,边缘不清,压痛明显,颌下腺旁可及两枚淋巴结,腮腺开口处突起色红。中医诊断:痄腮,证属风热痰毒壅结少阳。治拟疏风散热,化痰散结。七味内消散加如意金黄散,用蜜调制成软膏,外敷患处,1日2次。2天后,热退,5天后,肿消结散。

徐大成. 辽宁中医杂志,2002,(7):437

13. 消化性溃疡

王海峰等治疗消化性溃疡108例。患者有胃脘部疼痛,常伴有痞闷或胀满、泛酸、恶心等症状,均经上消化道钡餐造影及纤维胃镜检查确诊。治以内消散为基本方,方药组成:白芨15克,川贝母10克,知母10克,银花15克,花粉10克,乳香6克,半夏10克,炮山甲10克,皂刺10克。脾胃虚寒证加炙黄芪15克,炒党参10克,炒白术10克,茯苓15克,炮姜6克。肝气犯胃证加柴胡10克,香附10克,白芍10克,枳壳10克。胃阴不足证加沙参10克,麦冬10克,白芍10克,甘草10克。水煎服,每日1剂,早晚各服1次,以6周为1疗程。治疗期间,嘱患者按时服药,生活要有规律,勿吃刺激性食物,忌酒、浓茶、咖啡及多糖饮料,冬季注意保暖。1个疗程后,结果:治愈79例,好转23例,未愈6例。

王海峰,等. 北京中医,2001,(5):28

四妙汤的临床新用

1. 膝关节创伤性滑膜炎

齐振熙运用点穴合四妙汤加味治疗膝关节创伤性滑膜炎 45 例。患者其主要临床症状与体征是疼痛、肿胀和膝关节周围压痛,滑膜有摩擦发涩的声响,局部温度可增高。关节积液多时浮髌试验阳性,膝关节屈曲功能受限。在运用点穴治疗的同时,配以中药四妙汤加味,方药组成:苍术 9 克,黄柏 9 克,淮牛膝 9 克,薏苡仁 15 克。在辨证的基础上,可加上青陈皮、地鳖虫、制乳没、威灵仙、紫荆皮等,以增疗效。结果:痊愈 21 例。

齐振熙. 中国中医骨伤科杂志, 1997, (2): 25

2. 小腿慢性复发丹毒

戴扬治疗小腿慢性复发丹毒 32 例。给患者服用自拟加味四妙汤:黄柏 15 克,薏苡仁 30 克,苍术 10 克,川牛膝 15 克,蒲公英 30 克,忍冬藤 30 克,虎杖 30 克,丹皮 15 克,焦山栀 10 克,车前子 10 克,生甘草 10 克。每日 1 剂,分上、下午煎服。患处敷贴金黄膏,每日更换 1 次。结果:治愈 27 例。

戴扬. 中国中西医结合皮肤性病学杂志, 2003, (1): 49

3. 痛风性关节炎

许少素治疗老年痛风性关节炎 30 例。患者均起病急骤,关节剧烈疼痛,且多在夜间发作,局部红肿热痛明显,行走不便,受累关节多以足拇指趾关节、踝关节为多,伴胃纳差,口干不喜饮,舌淡红,苔黄白厚,脉弦。运用四妙汤清热利湿,散瘀通络,消肿止痛。方药组成:苍术、黄柏、牛膝、防己、蚕沙、川木瓜各 12 克,车前子(包煎)、薏苡仁、银花藤、黄芪各 20 克,桑寄生、杜仲各 15 克,三七末 3 克(冲服)。水煎服,1 日 1 剂。如兼燥热伤阴者,加生地;气虚甚者加党参、白术;疼痛甚者加延胡索、全蝎;大便秘结加大黄。结果:治愈 10 例,好转 17 例。

许少素. 安徽中医临床杂志, 1999, (12): 397

4. 膝关节滑囊炎

杨开云治疗膝关节滑囊炎 126 例。发病部位多呈无对称性的侵袭某膝关节, 疼痛性质无游走性, 疼痛多位于膝关节前而间断性钝痛, 上下楼和膝关节屈曲位以及运动后加重, 特别在屈曲位时突然站立明显无力, 运动时关节弹响, 浮髌试验阳性, 随着天气的变化复发或加重, 发作时患膝关节肿大、灼热、出现伸屈障碍。舌苔薄黄微厚, 脉缓或滑。以加味四妙汤治疗, 药物组成: 川牛膝、防己各 20 克, 薏苡仁 30 克, 苍术、木瓜、秦艽、乌蛇、羌活各 12 克, 黄柏、防风、寻骨风、伸筋草各 10 克。根据病情寒热虚实偏重不同增加药味。寒重可加细辛 3 克, 川乌头、草乌头各 10 克; 热偏重可加金银花藤 20 克, 青蒿 20 克; 偏虚证加生黄芪 20 克。每日 1 剂, 水煎分 2 次服, 每次 200 毫升, 温服, 每 3 周为 1 个疗程。服药期间应有微汗出, 服药后经脉肌肤内如虫蠕动, 应加大药量。服药期间禁生冷、雄鸡、鲤鱼、虾类之食餐。应保暖防寒, 注意体温, 卧床时应适当抬高患下肢。结果: 治愈 108 例。

杨开云. 河北中医, 2000, (10): 753

5. 遗精

段登志治疗遗精 36 例。患者不因性生活而精液排泄, 每周 2 次以上, 甚至午睡时也发生, 或仅有性欲意念即出现精液遗出, 或在小便中或前列腺液中检验到精子。除遗精为主证外, 可伴有小便短黄或混浊, 或小便热涩不畅, 口苦或渴, 心烦不寐, 舌红, 苔黄腻, 脉滑数或濡数, 或尿检有白细胞, 或前列腺液检查卵磷脂小体减少, 可见白细胞 (+ ~ ++), 中医辨证为湿热下注型遗精。自拟加味四妙汤为基础方: 苍术 15 克, 黄柏 15 克, 薏苡仁 30 克, 牛膝 15 克, 车前子 12 克, 草薢 10 克, 滑石 20 克, 石菖蒲 12 克, 白术 15 克, 茯苓 20 克, 丹参 30 克; 遗精频繁者加金樱子 15 克, 芡实 30 克; 心烦少寐者加莲子心 10 克, 炒栀子 15 克, 每日 1 剂, 水煎口服 3 次, 1 个月为 1 疗程。治疗 2 个疗程后, 结果: 痊愈 24 例, 好转 9

例,无效3例。

段登志. 云南中医中药杂志, 2004, (1): 47

6. 阴囊湿疹

曾毅等治疗阴囊湿疹50例。运用加味四妙汤: 黄柏、苍术各12克, 牛膝、栀子、当归、防风各10克, 薏苡仁、茯苓、生地各20克, 白鲜皮15克。随证加减: 剧痒、夜难入睡者加酸枣仁、合欢皮各10克; 干燥脱屑者加地骨皮12克, 枸杞10克, 何首乌15克; 渗出较多者加车前子15克, 木通、泽泻各10克; 大便秘结者加大黄10克。外用地肤子洗方: 地肤子、五倍子各20克, 海桐皮10克, 薄荷6克, 白芷4克。煎汤温洗, 每次5分钟, 每日2次, 内服外洗7天为1疗程。治疗3个疗程后, 结果: 痊愈41例, 显效9例。

曾毅, 等. 中国皮肤性病学杂志, 1997, (1): 47

7. 瘀血阻络型胃溃疡

杨伟文治疗瘀血阻络型胃溃疡17例。患者以胃脘疼痛固定不移, 痛如针刺或刀割, 拒按, 或见吐血紫黑, 便血如墨, 舌质紫暗或有瘀点瘀斑, 脉细涩为主症。运用加味四妙汤治疗: 黄芪30克, 当归10克, 金银花20克, 甘草6克, 白术、煅石膏各10克, 桔梗6克, 口渴加花粉、玄参; 小便不利加滑石去石膏; 胃酸过多加海螵蛸、瓦楞子; 胁痛不适加青皮、枳壳; 涎中带血或便血加三七粉冲服。水煎服, 每日1剂分2次服。治疗期间均停用其他药物, 并禁酒及禁食辛辣刺激之品, 嘱注意生活调理。15天为1疗程, 连续治疗2个疗程。结果: 有效15例。

杨伟文. 甘肃中医, 1998, (5): 19

8. 小儿急性肾炎

蒋雅萍治疗小儿急性肾炎48例。患者发病前均有感受风邪水湿或皮肤疮疡病史, 临床表现为浮肿、少尿、血尿、血压偏高。实验室检查尿常规均示异常, 出现蛋白质、红细胞、管型, 血沉增高, 抗链球菌溶血素“O”滴度增高。治疗方法: 黄柏、苍术各6克, 牛膝、苡仁各9克。加减: 病初有风热表证加桑叶、连翘、赤小豆; 风

寒表证加麻黄、防风、荆芥；见烦躁、发热、口渴、尿赤加黄芩、桑白皮、石膏；皮肤疮疡加蒲公英、紫花地丁、银花；尿少加泽泻、车前子、茯苓等；血尿加大小蓟、白茅根、丹皮；尿液混浊加木通、六一散；伴高血压加钩藤、珍珠母、夏枯草；肾虚腰痛加桑寄生、杜仲、山萸肉；脾虚加太子参、淮山药、白术；热重于湿的加重黄柏用量；湿重于热的加重苍术用量。每日1剂，水煎2次留取药汁200毫升，分早、中、晚餐前服之。

蒋雅萍. 陕西中医, 1997(8):342

9. 血精症

揭建华治疗血精症。陈某，男，40岁，农民，于1980年12月30日初诊。患者性交后见血样精液，射精时疼痛，伴尿频尿痛，小便红赤已1周。尿常规：脓细胞(+)，红细胞(+)，白细胞及黏液均少许。精液常规检查：棕色，黏稠度(++)，脓细胞(+++)，红细胞(+++)，精虫形态正常，活动力10%~20%。检查外阴无异常，两侧睾丸等大，副睾无肿硬，两侧精索静脉轻度曲张，前列腺(-)。诊为精囊炎、尿路感染。西药抗生素等治疗，尿频尿痛好转，血精未愈，而转中医治疗。患者头晕肢倦，腰部酸楚，以往有肾盂肾炎史，口腻不渴，小便红赤，舌质红、苔黄根厚，脉弦。证属下焦湿热，相搏精室，法宜清泄，用四妙汤加味：苍白术各9克，盐黄柏9克，苡米15克，牛膝9克，泽泻9克，云苓12克，淡竹叶9克，生地15克，碧玉散24克。服5剂后，仍感腰酸肢倦，时感会阴部不适，小便清长，舌质红、苔薄黄，脉象弦滑，原方加杭芍9克，柴胡5克，服5剂，射精疼痛已除，精液稍清。精液常规：黄色，黏稠度(++)，脓细胞(+)，红细胞(+)，再照前方继服15剂，1981年1月1日精液常规检查均正常，随访至今未发现血精。

揭建华. 江西中医药, 1999, (6):25

10. 不寐

常向明治疗不寐1例。王某，男，35岁，1993年4月18日就诊。患者近来经常饮酒，其失眠半年，多次请老中医诊治，屡服养

心汤、黄连阿胶汤等方均无效。现症：入睡困难，或时有小憩但梦多，甚至彻夜不寐，心烦不安，口干口苦，舌红苔黄腻，脉滑数。证属湿热上扰，神明无主，治宜清热燥湿，安神定志，以四妙汤上病下治：黄柏 15 克，苍术 10 克，薏苡仁 30 克，川牛膝 10 克，合欢皮 15 克，远志 10 克，茯神 15 克，丹参 15 克，木通 10 克，栀子 10 克。服 6 剂后，心烦减轻，睡眠增加 2~3 小时，又服 10 剂，睡眠正常，诸症消失而愈。

常向明. 吉林中医药, 1996, (1): 28

11. 尿浊

常向明治疗尿浊 1 例。杨某，女，12 岁，1992 年 8 月 8 日就诊。患者近 1 月常游泳。10 天前出现小便混浊如泔水，尿道灼热，口干口苦，舌红苔黄腻，脉濡数。其为尿浊，证为湿热下注，以四妙汤顺势利导：黄柏 15 克，苍术 10 克，薏苡仁 30 克，川牛膝 15 克，枳实 10 克，泽泻 12 克，茯苓 20 克。服药 3 剂后小便转清，追服 7 剂小便清亮，诸症消失而病愈。

常向明. 吉林中医药, 1996, (1): 28

12. 发热

常向明治疗发热 1 例。赵某，女，25 岁，1994 年 5 月就诊。患者 2 个月前冒雨后，发热，体温为 38~39℃，曾服疏风清热药 10 余剂，又改服滋阴清热药 10 余剂，发热时作时止。午后潮热，身热不扬，胸闷纳呆，头晕头重，口干口苦，小便短黄，大便秘结，舌红苔黄腻，脉濡数，以四妙汤调理寒热：黄柏 15 克，苍术 15 克，薏苡仁 30 克，川牛膝 10 克，佩兰 20 克，滑石 15 克（包煎），淡竹叶 10 克，土茯苓 30 克，生大黄 10 克（后下），服 3 剂，胸闷口苦等症明显减轻，体温降至 37.5℃，便通尿多，续服 3 剂去大黄，体温正常，诸症消失而愈。

常向明. 吉林中医药, 1996, (1): 28

13. 水肿

常向明治疗水肿 1 例。丁某，男，16 岁，1993 年 5 月就诊。患

者1月前无明显诱因,出现双下肢浮肿,继而全身浮肿,皮色光亮润泽,心烦,口干口苦,小便短黄,不思饮食,脘腹胀满,舌红苔黄腻,脉沉数。小便常规:蛋白(++)。诊为急性肾小球肾炎。证为湿热壅滞,以四妙汤清热利湿,疏利枢机。方药:黄柏10克,苍术20克,薏苡仁30克,川牛膝15克,椒目10克,茯苓30克,赤小豆15克,大腹皮20克,泽泻12克,玉米须15克,白花蛇舌草、枳实各70克,防己15克,服7剂,全身浮肿基本消退,小便增多,饮食增加,小便蛋白(+),再服上方7剂,诸症消失,小便蛋白转阴。肿退而病愈。

常向明. 吉林中医药,1996,(1):28

14. 痛风

严淦发治疗痛风32例。用石膏四妙汤治疗:生石膏60克,生薏苡仁30克,黄柏10克,苍术15克,川牛膝15克,银花藤15克,虎杖30克,白芷10克,桔梗10克,枳壳10克,晚蚕砂12克,丹参15克,每日1剂,水煎服,早晚各1次,治疗1周,结果:治愈26例,好转4例,未愈2例,治愈率81.25%,有效率93.75%。

严淦发. 安徽中医临床杂志,2001,(2):47

15. 带下病

慢性附件炎、阴道炎、盆腔炎是妇科临床之常见病、多发病,常给妇女带来痛苦。临床以少腹疼痛作胀,腰困酸痛,赤白带下,时有臭味,全身倦怠,四肢沉重等为多见。此乃属祖国医学之“带下病”范畴。靳军等常自拟土茯苓四妙汤(土茯苓、苍术、黄柏、牛膝、苡米、当归、白芍、香附、川断、柴胡)用于妇科临床,每奏良效。

靳军,等. 内蒙古中医药,1993,(3):28

银花甘草汤的临床新用

1. 药疹

临床上经常可见因服用中药或西药引起的过敏反应,以皮肤

荨麻疹或疱疹为主要表现,轻则皮肤瘙痒,重则恶心、呕吐并伴有咳嗽、气短、烦躁不安等,称之为药疹。高连杰等治疗药疹7例。患者中,分别因服复方新诺明,复方草珊瑚含片,阿莫西林胶丸,急支糖浆引起。服药后数小时,局部潮红、痛痒,继而出现红疹,重者可遍及头面、手足及双耳肿胀,并伴有头晕、恶心、心烦、口干。治疗方法:以银花、甘草为主方加味水煎服,每日1剂,早晚分服。结果:7例中5例单纯使用银花甘草汤,2例经西医治疗效果欠佳而改服本方。一般服药1~3剂后药疹明显减退,1周后疹退净,临床症状消失。

高连杰,等.现代医药卫生,2003,(5):587

2. 慢性咽炎

彭学永治疗慢性咽炎40例。所有病例均有咽部干燥不适,或痒、痛、异物感及反复急性发作史。取银绞甘草茶:银花10克,绞股蓝10克,甘草5克,为1天量,用开水泡20分钟后频频饮服。如急性发作期可加大药量至2倍使用。忌烟酒、辛辣及燥热品。方中绞股蓝1味,应用其叶,并作加工,其加工法与茶叶加工法同。结果:治愈28例,占70%;好转12例,占30%;总有效率100%。

彭学永.实用中西医结合临床,2003,(1):35

消痛汤的临床新用

1. 老年慢性萎缩性胃炎

邵寄民治疗老年慢性萎缩性胃炎30例。主要临床表现:胃脘痞满胀痛,饥则嘈杂,纳后作胀,纳呆噎气,神疲乏力,面色无华。用托毒消痛汤治疗:黄芪、毛冬青、蒲公英、皂角刺、赤芍、白芍、金银花各15克,白术、枳壳、乌药各10克,柴胡、莪术各6克,血竭3克(研末吞服)。随证加味:湿盛加厚朴、苍术;热盛加黄连、黄芩;寒盛加吴萸、干姜;脾气虚加党参、升麻;胃阴虚加石斛、麦冬;嘈杂吞酸加黄连、吴萸;消化不良加鸡内金、神曲、山楂;痛甚加五灵脂、

丹参、延胡索；肠上皮化生加蛇舌草、石见穿。上方每日1剂。水煎早晚分服，3个月为1个疗程，每2个疗程复查胃镜观察疗效。治疗结果：显效9例，占30%；有效18例，占60%；无效3例，占10%。总有效率90%。

邵寄民. 江苏中医药 2003, (12): 21

2. 幽门螺杆菌感染性消化性溃疡

唐茂燕治疗幽门螺杆菌感染性消化性溃疡67例。用清幽消痈汤治疗：黄连6克，大黄6克，银花15克，蒲公英20克，青木香12克，鸡内金12克，茯苓12克，升麻3克，甘草6克。上方加水500毫升，煎至250~300毫升，连煎2次，将药液混合，分2次温服，每日1剂，两组均以4周为1疗程，治疗1个疗程后，症状明显改善的为51例，占76.1%。

唐茂燕. 中医药研究, 2001, (4): 10

3. 乳痈

(1) 乳痈是哺乳期妇女一种常见的乳房疾病，相当于现代医学的急性乳腺炎，好发于初产妇，多患于一侧乳房。其特点为乳房肿块、红肿疼痛、易脓、易敛，轻则患者乳汁流出不畅，影响哺乳，若病情严重或治疗不当，可致化脓，常需切开引流，日久不敛。李政治疗乳痈58例，采用自拟瓜蒌消痈汤治疗，方药：青皮10克，当归10克，柴胡10克，黄芩10克，王不留行10克，公英30克，炒山甲10克，皂刺10克。加减：发热头痛者加牛蒡子、连翘疏表邪通营卫；乳汁壅滞明显者加漏芦通窍下乳；口渴者加麦冬、天花粉以养津止渴；久治未愈切开者宜加黄芪、党参补托之品。初发者且病程不超过1周者，给予本方2~5剂，共治愈42例，占72.4%；病程稍长且未成脓切开者，服药1周左右治愈12例，占20.6%；病情严重或在他处失治误治，甚则切开引流者，服药10~20剂获得治愈4例，占7%。

李政. 四川中医, 2005, (1): 78

(2) 迟郁文等治疗乳痈112例。用银青消痈汤治疗：青皮12

克,白芷 12 克,柴胡 12 克,浙贝母 9 克,当归 9 克,天花粉 12 克,金银花 30 克,生地 12 克,连翘 9 克,甘草 9 克。水煎服,每日 1 剂。初起,加防风 9 克;溃破加生黄芪 12 克,党参 12 克;热毒甚,加蒲公英 30 克。结果:痊愈 76 例,显效 21 例,好转 9 例,无效 6 例;最短 2 日,最长 7 日。总有效率为 94.6%。

迟郁文,等. 中医药学刊,1994,(2):37

4. 慢性溃疡性结肠炎

张星耀等以自拟解毒消痢汤口服配合云南白药保留灌肠治疗慢性溃疡性结肠炎 48 例。解毒消痢汤药物组成:败酱草 30 克,薏苡仁 20 克,制附子 6 克,木香 3 克,黄连 6 克,当归 10 克,白芍 10 克,生甘草 3 克。每日 1 剂,水煎服。湿热重者加白头翁 15 克;食欲不振、舌苔白厚腻者加苍术、川朴各 10 克;面色无华、神疲乏力、脉沉细者加生黄芪 20 克。保留灌肠:以云南白药散剂 1 瓶,用生理盐水制成药液 100 毫升,温度以 38℃ 为宜,每日 1 次于晚上排空大便后保留灌肠,保留时间至少 1 小时。2 周为 1 个疗程,4 个疗程后,结果:治愈 23 例,显效 18 例,好转 6 例,无效 1 例,总有效率 97.92%。

张星耀,等. 中国民间疗法,2001,(1):31

5. 痢症

刘康平自拟解毒消痢汤治疗痢症 20 例。处方:银花、蒲公英、野菊花、玄参各 35 克,夏枯草、赤白芍各 20 克,川芎、红花各 10 克。每日 1 剂,煎 2 次去渣,混匀,分 3 次服,1~3 天获痊愈。

刘康平. 国医论坛,1986,(3):48

6. 阑尾脓肿

杨景海治疗阑尾脓肿 36 例。临床表现:发病急,高热(38~39℃),腹痛,腹胀,右下腹拒按,有肿块,恶心,纳谷不香,身倦无力,口干而黏,大便干结或溏,小便赤黄,白细胞计数升高,中性粒细胞增多,舌质红,舌苔薄黄而滑或黄腻,脉弦数或滑小数。治用阑尾消痢汤:败酱草 15 克,金银花 30 克,冬瓜子 30 克,蒲公英 30 克,粉丹皮

10 克,生苡仁 30 克,枳壳 10 克,桃仁 6 克,赤芍 10 克,连翘 12 克,生大黄 9 克,生甘草 6 克。每日 1 剂,水煎 2 次早晚服。加减:热毒盛者可将方中金银花、蒲公英各加至 60 克;大便稀者减大黄;血瘀重者加红藤、丹参;腹胀者加厚朴、木香;气滞者加香附、乌药、川楝子;热重于湿者加黄连、黄芩;湿重于热者加藿香、佩兰;热毒伤阴者加生地、玄参、天花粉;热毒伤阴损阳者加熟附子、干姜;恶心呕吐不思饮食者加姜半夏、生姜;脓肿重者加皂角刺、穿山甲。治疗结果:全部病例均痊愈或基本痊愈。一般用药 16~29 剂。

杨景海.光明中医杂志,1994,(5):25

7. 急性阑尾炎

顾文忠应用内服消痈汤兼按摩阑尾穴治疗急性阑尾炎 75 例。临床表现:有转移性右下腹痛,持续性胀痛,阵发性加剧,马氏点压痛,重者可有反跳痛,腹肌紧张,阑尾穴压痛。发热,恶心呕吐,便秘或腹泻。血检白细胞总数及中性粒细胞增高。以消痈汤为主方治疗,银花、红藤、败酱草、冬瓜仁、生苡仁、太子参各 20~30 克,枳实、丹皮、桃仁、黄芩各 10~15 克,柴胡、生大黄各 6~10 克。若气滞重者,加厚朴 10~15 克,血瘀重者,加红花 6~9 克;有局限性肿块者,加三棱、莪术各 15~30 克,皂角刺 6~9 克;高热、热毒重者,加地骨皮、蒲公英、板蓝根、生石膏各 20~30 克。每日 1 剂,水煎 3 次,每次取汁 150 毫升,混匀后分早、中、晚 3 次口服。7 日为 1 个疗程。最长治疗观察 3 个疗程。阑尾穴(双侧)按摩:用手指压在阑尾穴位上,用力重按并作旋转法按摩(以患者能耐受为度),每日 3 次,每次按摩 3 分钟。疗程与服中药疗程同步。结果:痊愈 53 例(70.7%),好转 15 例(20%),无效 7 例(9.3%)。总有效率为 90.7%。在痊愈者中,治疗 1 个疗程 24 例,2 个疗程 18 例,3 个疗程 11 例。

顾文忠.实用中医药杂志,1995,(2):15

8. 脓胸

脓胸是儿科常见的呼吸道感染性疾病。多见于冬春季。往往

是支气管肺炎失治、误治迁延不愈所致。常见的病原菌为耐药的金黄色葡萄球菌及革兰氏阴性杆菌。34例均采用胸腔穿刺排脓及口服中药煎剂解毒消痈汤治疗。自拟解毒消痈汤药物组成:鱼腥草、丹参各30克,山慈姑25克,制半夏、胆南星各6克,桃仁12克,冬瓜仁10克,鲜芦根24克。加减法:咳嗽重、咯痰黄稠者加全瓜蒌、桑白皮、射干等清肺热化痰之品;高热不退或退而复出者加柴胡、黄连、黄芩、山栀等清肺解毒消痈之品;见大便干燥者加大黄;病程长,全身情况衰竭、汗多体弱者,可用本方加黄芪、党参以扶正祛邪;病程迁延、肺气亏虚、日久不愈、低热、心烦口干者加养阴补肺之沙参、麦冬、百合、阿胶等;脾胃虚弱、纳差者加白术、山楂、神曲等消食健脾之品。用法:每日1剂,分2次服或频服。最长疗程1个月左右,最短疗程10天。治疗结果:痊愈24例,显效6例,无效4例。总有效率88.22%。

周莹. 陕西中医, 1996, (8): 339

9. 男性淋菌性尿道炎

孙义荣治疗男性淋菌性尿道炎72例。临床表现主要为尿频,尿热痛、涩痛,尿混,尿道口红、刺痛、刺痒,尿道口溢浆液性或脓性分泌物;慢性急性发作时可有恶寒发热,舌红苔黄,脉滑或滑数;合并前列腺炎者,会阴、肛门坠胀,小腹拘急、疼痛,尿频明显,肛门指检前列腺质地饱满或质硬,有压痛,中央沟存在或变浅或前列腺肿大;合并精囊炎者,精囊区痛,射精时可加重或伴见血精;合并副睾炎者,副睾肿胀,有胀痛或可触摸到坚硬的结节。实验室检查:尿道分泌物涂片找到淋球菌;合并前列腺炎者,前列腺液培养有淋球菌,镜检有脓细胞或红细胞,卵磷脂小体减少。治疗法则:清热解毒,活血消痈,利尿通淋。治以清通消痈汤:银花30克,紫花地丁30克,蒲公英30克,红藤30克,败酱草30克,制乳没各6克,瞿麦10克,车前子15克,川牛膝10克。随证加减:尿道灼痛甚者加琥珀3克(分冲),石韦15克,以加强利尿通淋作用;便秘者加生大黄10克(后下),以清热荡涤肠中积滞;兼血精者加小蓟20克,黑

蒲黄 10 克(包),以清热利湿、凉血止血;合睾丸炎者加延胡索 10 克,橘核 20 克,荔枝核 30 克,以行气止痛;并前列腺炎者加王不留行 15 克,泽兰 12 克,以加强通瘀滞行血作用;前列腺肥大质硬者加炮山甲 12 克,皂角刺 10 克,以通络软坚散结;日久气血虚者加生黄芪 20 克,当归 10 克,以益气血、托里排脓。上方药每日 1 剂,水煎 3 次。第 1、2 次各煎取汁 200 毫升,2 汁合并,上、下午分服,第 3 次煎取汁 500 毫升,乘热浸洗外阴部。连续用药 1 个月观察疗效。治疗期间及治疗后半月内停用其他中西药物,禁房事,忌饮酒及食用辛辣、油腻、热性食物。治愈标准:治疗结束后 2 周内,在无性接触情况下症状和体征全部消失,治疗结束后 5 天作淋球菌复查阴性。治疗结果:共治愈 61 例,占 84.7%。

孙义荣. 中国中医急症, 2001, (4): 117

10. 面颈部慢性淋巴结炎

冯广告治疗面颈部慢性淋巴结炎 79 例。慢性淋巴结炎分为非特异性与特异性两种。非特异性淋巴结炎大多是机体抵抗力较强,而病原菌毒力较弱的情况下发生的。其主要的病变是在淋巴结内有结缔组织增生形成增殖性的炎症。本病可无自觉症状,或有轻微不适、疼痛及淋巴结反复肿大的病史。检查时能扪出大小不等的淋巴结,呈扁圆形,周界清楚,可以移动,与周围组织无明显粘连;有轻度压痛,中等硬度。一般无明显全身症状,但在机体抵抗力降低时也可急性发作。方药:银花 15 克,防风 9 克,白芷 9 克,归尾 9 克,赤芍 12 克,乳香 6 克,没药 6 克,贝母 6 克,花粉 9 克,陈皮 12 克,炙穿山甲 9 克,皂角刺 9 克,甘草 6 克。内服:1 日 1 剂,水煎服。外用:将药渣捣烂蜜调局部外敷。7 天为 1 疗程,最长为 3 个疗程,最短为 1 个疗程。结果:痊愈 28 例,显效 36 例,有效 13 例,无效 2 例。

冯广告. 中医研究, 1994, (3): 38

11. 急性冠周炎

陈德元治疗急性冠周炎 30 例。治疗方法:局部冲洗上药,冠

周炎盲袋均常规使用 3% 双氧水、生理盐水冲洗,消毒棉球吸干盲袋内水分。患齿颊、舌侧隔湿,用口腔镊子持浸泡的 3% 碘甘油小纱布条置入盲袋内。复方甲硝唑注射液局部封闭:取 0.5% 甲硝唑 5 毫升,2% 利多卡因 2 毫升、地塞米松 2 毫克混匀,分别于盲袋龋组织的颊、舌及远中部位做局部封闭,每日 1 次,3 天为 1 疗程。消痛汤加减:防风 5 克,荆芥 10 克,牛蒡子 10 克,银花 10 克,连翘 10 克,白芷 6 克,栀子 10 克,甘草 5 克,便秘加大黄 9 克(后下);发病已 4~5 日,患处肿胀明显、较硬、色暗红者加丹皮 10 克;赤芍 10 克,当归尾 6 克;口干喜冷饮,舌质红苔薄黄、脉洪数者,加生石膏 30 克,知母 9 克,黄芩 9 克。结果:治愈 27 例,好转 2 例,无效 1 例。

陈德元. 中西医结合,1996,(5):73

12. 附件炎性包块

金家隆等治疗附件炎性包块 36 例。患者均单一服用解毒消痛汤,并随证稍作加减。每日 1 剂,水煎 2 次,上、下午各服 1 次。处方组成:石见穿、半枝莲、蒲公英、红藤、丹参、蛇舌草、败酱草各 30 克,皂角刺、山慈姑、银花、连翘、王不留行各 12 克,桔核、生甘草各 10 克。加减法:血热加丹皮、炒山栀;气滞加乌药、枳壳;小腹痛胀加炒元胡、青皮等;偏寒者加小茴香、官桂。结果:痊愈 26 例,显效 6 例,有效 4 例,总有效率 100%。

金家隆. 中国中医药科技,2000,(5):296

13. 细菌性肝脓肿

曾昭念治疗细菌性肝脓肿 12 例。患者均以持续高热,右上腹疼痛及右肋疼痛,拒按,不能向右侧卧,咳嗽等为主。检查示肝脏均有不同程度肿大,肝区触痛和叩击痛。实验室检查:白细胞总数和中性粒细胞数均增高,B 超检查提示肝肿大及肝内有 1 个或多个大小不等的液性暗区病灶。全部病例均用自拟清肝消痛汤治疗。方药:金银花 30 克,连翘 20 克,紫花地丁 20 克,茵陈 20 克,栀子 15 克,白芍 20 克,当归 10 克,黄芩 10 克,柴胡 10 克,甘草 10 克。加减:热重者加蒲公英 30 克或金银花、连翘量加倍;腹胀者加厚朴 10

克,大腹皮 10 克;阴虚者酌加阿胶 10 克,何首乌 10 克,沙参 10 克,麦冬 10 克;病久体虚者加黄芪 20 克,白术 10 克;湿重者加苍术 10 克,厚朴 10 克。每日 1 剂,水煎 300 毫升,分 3 次服,15 天为 1 个疗程,一般连续治疗 1~2 个疗程。持续高热不退,胃纳呆滞者用支持疗法和退热剂;久病体虚者行少量多次输血等。治疗结果:12 例全部治愈。治愈时间最短 7 天,最长 30 天,平均 20 天。随访 1~6 年均未见复发。

曾昭念. 广西中医药, 1995, (6): 7

14. 腹腔脓肿

蒋薇治疗腹腔脓肿 19 例。药用黄芩 10 克,法夏 10 克,双花 30 克,连翘 15 克,败酱草 30 克,草河车 10 克,薏苡仁 30 克,冬瓜仁 15 克,桃仁 10 克,红花 10 克,赤芍 15 克,木香 6 克,枳壳 10 克,大黄 10 克,水煎服每日 1 剂,口服 2 次。服药期间禁烟酒、忌食辛辣刺激性食物。治疗结果:治愈 13 例,占 68.4%;好转 5 例,占 26.3%;未愈 1 例,占 5.3%;总有效率 94.7%。

蒋薇. 实用中医内科杂志, 2003, (5): 384

15. 肛周脓肿

令狐庆等治疗早期肛周脓肿。临床症状:肛周疼痛、坐卧不安,或无发热,或有发热恶寒。肛检:肛门周围有一局限性肿硬区,皮肤潮红并有压痛,无明显波动感。肛部彩色 B 超检查:脓肿为不均质低回声光团,边缘模糊,呈不规则形状。发病部位以截石位 3~6 点较多,其次为截石位 5~8 点,1~3 点,8~12 点也占相当一部分。治以消痛汤:金银花、紫花地丁、蒲公英各 15 克,乳香、没药、当归、赤芍各 12 克,穿山甲 15 克,漏芦 12 克,天花粉 20 克,川贝母 12 克,陈皮、白芷、防风各 10 克,甘草 5 克,川牛膝 12 克。痛甚加连翘,血热加牡丹皮,便秘加大黄。取上述诸药放入药锅中加冷水 500 毫升浸泡片刻,用武火煮沸后改用微火煎煮 15 分钟,滤出药汁留用,另取 300 毫升冷水倒入药锅中,仍用同法提取药汁,并与前次药液混合后分成两份,早晚饭后 1 小时各服 1 份。同剂药再

分别两次加水各 1 000 毫升,煎取药汁分早晚肛部坐浴 15~20 分钟。每日 1 剂,连服 10 日,同时使用抗生素。结果:显效 74 例,有效 40 例,无效 6 例。

令狐庆等. 辽宁中医杂志,2002,(12):736

太乙紫金丹的临床新用

1. 带状疱疹

沈尔安治疗带状疱疹。紫金锭用醋磨成稀糊状外涂 1 日 3 次,3~7 天为 1 疗程,用药 1 天后即可见疱疹停止发展,继而开始萎缩干涸,疼痛明显减轻,大多 3~4 天治愈。

沈尔安. 家庭中医药,2004,(12):48

2. 瘀胆型肝炎

瘀胆型肝炎属中医黄疸范畴,多始于湿热,湿热郁久不解则蕴而成毒。热毒瘀血胶结,阻滞肝络,胆汁疏泄不利,蓄积于肝内,酿成此疾。谢某,男,45 岁。患肝病半年余,经多方治疗未见好转。就诊时症见:颜面巩膜皮肤深度黄染,色黄晦暗,自觉皮肤瘙痒,神疲乏力,胃纳呆滞,小便色如浓茶,大便 2 日 1 次,舌红边有紫斑,苔黄厚腻,脉弦滑。肝功能检查:血总胆红素 67 单位,谷丙转氨酶 60 单位,B 超检查发现肝缘在肋下 2 厘米,胆囊壁毛糙,诊为瘀胆型肝炎。证属湿热久恋,胆汁瘀积肝内,瘀血热毒互结,疏泄失常所致,治当败毒祛瘀,利湿退黄。方用强力紫金散 15 克,另用茵陈 30 克,金钱草 20 克,白茅根 20 克,煎水冲服,每日 2 次。治疗 1 个月后复查:血总胆红素 30 单位,谷丙转氨酶 25 单位。精神恢复,纳食渐增。守前方去金钱草加党参 20 克,白术 20 克,煎水冲服强力紫金散 10 克。日服 2 次,1 个月后黄疸退尽,肝功能恢复正常,肝 B 超检查正常,随访未见复发。

林春裳. 福建中医药,1995,(4):52

3. 慢性前列腺炎

本病是中年男性常见的疾患,属中医的“尿精”、“白淫”、“尿浊”范畴。本病多由房室不节,忍精不泄,溢液败精,或湿热邪毒由下而入,浸淫于上,深伏精道腺体,阻遏脉络,气血凝滞,致败精血瘀互结,染而成疾。丘某,男,42岁。患者尿频尿急,余沥难尽,反复发作2年余,经B超检查为前列腺炎,久治不愈。就诊时症见尿道口有乳白色分泌物,性欲减退,会阴、睾丸、阴茎、腰区压痛明显,舌质红边紫,苔根黄腻,脉弦滑尺沉。证属精血瘀滞,复感湿热之邪。方用黄芪30克,白花蛇舌草20克,蒲公英20克,篇蓄草30克,水煎冲服强力紫金散12克,日服3次。治疗1个月,主症已瘥。守前方去二草,改黄芪60克,蒲公英30克,煎水冲服强力紫金散8克,日服3次,调治1个月,诸症消失。

林春裳. 福建中医药, 1995, (4): 52

4. 小儿紫癜性肾炎

本病属中医的“斑疹”、“血证”范畴。病责于邪热湿毒内浸,毒邪热蕴,气血凝滞,伤络动血所致。罗某,男,8岁。患儿皮肤紫斑伴血尿,蛋白尿已8个月余,多方诊治,终未获愈。就诊时症见面浮肢肿,皮肤紫癜,颜色深红,低热血尿,腹胀纳减,舌红边暗苔黄,脉细数。尿液检查:红细胞(+++),蛋白(++). 证属湿热流连,郁久化热,络伤血瘀证。方用黄芪20克,白茅根15克,旱莲草15克,煎水冲服强力紫金散5克,加琥珀粉1.5克,日服3次。治疗半个月,紫癜渐退,尿检查红细胞少许,蛋白(+). 守前方去琥珀粉加党参15克,白术10克,煎水冲服强力紫金散4克,日服3次。2周后紫癜退尽,尿检查3次正常。

林春裳. 福建中医药, 1995, (4): 52

5. 血栓闭塞性脉管炎

血栓闭塞性脉管炎相当于中医的“脉痹”、“脱疽”等。古代医家早有“固邪致瘀”之说,邪久留不去,遂生热毒,遂采取祛瘀败毒以治之。李某,男,36岁。患有脉管炎已2年余,时重时轻,久治不

愈。症见右下肢末端紫暗,持续疼痛,行走困难,受冷则加剧,趺阳脉微,夜寐不安,心烦口干,舌红苔腻,脉弦数。辨为寒邪郁久化热,热毒蕴结,络脉阻塞,气血瘀滞所引起。治以益气败毒祛瘀,清热通络止痛。方用:黄芪 50 克,鸡血藤 20 克,桂枝 15 克,牛膝 15 克,煎水 300 毫升,分数次冲服强力紫金散 10 克,日服 3 次,治疗 1 个月,疼痛减轻,肢端皮肤紫色已退,并能自动步履。原方再服 1 个月,主症消失,肢端紫红尽退,为巩固疗效,守原方去牛膝、桂枝,加党参 30 克,白术 20 克,煎水冲服强力紫金散 8 克,每日 2 次,调治 1 个半月后痊愈。

林春裳. 福建中医药, 1995, (4): 52

6. 儿童癫痫

儿童癫痫,是指一过性脑内神经元局限性或弥漫性突然异常放电发作,可引起脑功能短暂失常,以运动、感觉、意识、行为及植物神经等单独或组合出现的功能障碍。以紫金锭治疗本病 50 例,其中原发性 27 例,继发性 32 例。1 岁以内,服 0.15 克,1~5 岁服 0.3 克,6~10 岁服 0.6 克,11~14 岁服 0.9 克,分早晚 2 次开水送服。半年不发病者减半,结果:治愈 16 例(停药 2 年以上不发病),有效 18 例(服药后症状减轻,发作间歇较原来延长 3 倍以上者),无效 16 例。

牛忻群. 家庭中医药, 2004, (5): 48

7. 狂症

狂症大多由恼怒悲愤,伤及肝胆不得宣泄,突然出现狂暴无知,情感高涨,言语杂乱,不避亲疏,或毁物伤人,或哭笑无常,登高而歌,弃衣而走等一系列精神失常的症状。紫金锭有良好涤痰开窍,重镇熄风之效。一般成人锭剂每次 3 克,1 日 1~2 次,磨服或捣碎服,散剂成人每次 1.5 克,婴幼儿每次 0.3 克以下,每日 1~2 次,用之得当痰可消,风可熄,狂可止。

牛忻群. 家庭中医药, 2004, (5): 48

8. 肝硬化腹水

肝硬化腹水多见于肝硬化晚期,多与内分泌紊乱,血浆白蛋白减少时胶体渗透压降低等多种原因有关。而紫金锭性猛峻烈,有良好攻逐水饮,消肿涤痰之效。使用本品视体质因素,一般由小剂量开始,成人每次1~3克,1日1~2次,药后多有腹痛及泻水样便,腹水可缓慢消退,本药药性峻烈,中病即止。

牛忻群.家庭中医药,2004,(5):48

冲和汤的临床新用

1. 软组织损伤

涂自斌等治疗软组织损伤103例。患者损伤部有明显的按压痛,皮下瘀斑,局部青紫、肿胀等。以冲和膏为主方治疗:①冲和膏:石菖蒲、白芷、独活、远志、赤芍、紫荆皮,上药干燥粉碎,过80~100目筛,掺凡士林、液体石蜡作膏。②全蝎粉:全蝎烘干碾末,过80目筛。③樟脑粉:换药前要选用棉垫,棉垫大小以超出损伤部位为宜。将冲和膏薄薄摊在棉垫上,加樟脑粉均匀撒在药膏上,用火将樟脑粉烧化,加上全蝎粉后敷在软组织损伤处,1天1次。结果:治疗组痊愈67例,显效17例,有效12例,无效7例。总有效率为93.1%。

涂自斌,等.湖北中医杂志,1998,(2):41

2. 小儿肠痉挛

孙志梅等治疗小儿肠痉挛89例。方药组成:紫荆皮10~15克,炒独活6~10克,炒赤芍6~10克,炒白芍15~30克,白芷3~6克,石菖蒲3~6克,元胡6克,炙甘草6~10克,葱白2段(后下)。随证加减:伴厌食者加白术、焦三仙;伴呕吐者加姜半夏;伴便秘者加炒莱菔子、槟榔片;伴腹胀者加广木香。煎服方法:煎前以冷水浸泡半小时,中火煎沸10分钟后,入葱白,再煎5分钟取汁,第2次煎沸后约20分钟取汁,二煎混合,总量不少于200毫升,2~4次分服,1日1剂,忌生冷,药渣可腹部热敷。一般病人服用3

~6剂可愈,少数病人服用10剂左右。结果:3剂痊愈者23例,6剂痊愈者37例,9剂痊愈者14例,12剂痊愈者7例,21剂痊愈者1例,2例未坚持服药,3例无效,总有效率94.37%。

孙志梅,等. 中国社区医师,2002,(5):30

3. 褥疮

王国川等治疗褥疮37例。冲和膏(《外科正宗》)主要功用是疏风消肿,活血祛寒,多用于疮疡阴阳不和、冷热相凝者。取紫荆皮(炒)150克,独活90克,赤芍60克,白芷30克,石菖蒲45克,研细末为1份备用。另加舒筋活血的蜈蚣20克,全蝎30条,当归50克,珍珠1克,梅片10克,黄蜡100克,麻油3000克。配制方法:①将全蝎、蜈蚣、当归入麻油内浸泡72小时后炸成焦枯色。②将上药去渣后以文火再熬1小时左右,加入黄蜡,待溶化后离火。③将血竭、珍珠、梅片分别研成细末。④待油稍凉加血竭粉、珍珠粉、梅片粉和1份冲和膏粉,搅拌均匀。⑤待油凉成膏后放入容器中,密闭放入水中24小时,以去火毒,即可应用。使用方法:局部创面用2%黄连液湿敷30分钟,剪除坏死组织,然后敷以薄型加味冲和膏,每日换药1次。

王国川,等. 安徽中医临床杂志,1998,(6):415

芙蓉膏的临床新用

1. 早期褥疮

陆勤芳等治疗早期褥疮30例。将芙蓉膏涂于敷料上,不宜太厚,敷于局部胶布固定。12小时更换1次。结果:显效19例,有效11例。

陆勤芳,等. 安徽中医学院学报,1995,(4):30

2. 初期疮疡

侯勇等运用芙蓉膏外敷治疗初期疮疡103例。结果:治愈77例,好转23例,无效3例,治愈率74.8%,有效率97.1%。

侯勇,等. 安徽中医临床杂志,2000,(1):46

3. 带状疱疹

陶国友治疗带状疱疹32例。以芙蓉膏为主方:黄连250克,黄芩250克,黄柏250克,大黄250克,芙蓉叶250克,泽兰250克,上药研成细末过筛,将凡士林加热至70~80℃,使之溶化,待温度降至40℃时,将上药加入凡士林中,调成20%软膏装入消毒密封罐内备用。使用时先用75%酒精消毒周围皮肤,生理盐水冲洗局部,根据损伤面积大小,取适量药膏均匀摊在纱布上敷于患处,用胶布或绷带固定,每日换药1次。若有张力性疱疹先经抽吸,以消毒纱布覆盖后再外敷药膏。结果:总治愈率100%,随访2~3个月无1例留有后遗症。

陶国友. 中国民间疗法,1998,(5):31

4. 阑尾周围脓肿

王炜等治疗阑尾周围脓肿36例。芙蓉膏由芙蓉叶、藤黄、天南星、薄荷油、麝香、樟脑等加适量凡士林调制而成。直接外敷右下腹肿块处,药膏厚0.5~0.8厘米,范围要超出肿块边缘2厘米以上,药膏上加盖塑料纸,塑料纸周围用宽胶布密封,以免药外漏。其上再用敷料覆盖,用胶布固定。再用热水袋置敷料上热敷12小时,每日更换1次。B超提示有明显液平反射者,敷药前先行穿刺抽脓。用9号注射针头,皮肤消毒后在肿块的中央或B超提示的穿刺点进针,抽尽脓液。视抽出脓液量的多少决定每日或隔日穿刺抽脓1次,一般行2~3次即可。10天内右下腹肿块消失而病愈。

王炜,等. 中国中西医结合外科杂志,2000,(6):416

5. 痛风

韩瑞英等治疗痛风25例。用温水洗净患处,擦干水后,用芙蓉膏均匀敷于患面,厚度3毫米左右,然后用纱布外敷并固定,每24小时换敷1次,直至疼痛红肿消退。同时,无禁忌证者可加服抑制尿酸合成剂别嘌呤醇100毫克,每日1~2次,3天为1疗程。治

疗结果:显效 21 例,有效 4 例。

韩瑞英,等.安徽中医学院学报,1994,(2):35

6. 疮疡

陈学荣等治疗疮疡 61 例。晚秋或初冬时节采集芙蓉叶,洗净,阴干,研粉,过 120 目筛后,按 1:4 的比例加入凡士林,调成 25% 软膏,置于密闭盛具内,高压灭菌后,贮于阴凉干燥处备用。使用时取芙蓉膏适量涂敷患处,厚约 2~3 毫米,覆盖面要超过红肿范围 2~3 厘米,药膏表面覆盖塑料薄膜,以防干燥,外用纱布包扎或胶布固定,每日换药 1~2 次。已化脓者,待其脓肿局限后,行脓肿切开引流术;有肉芽创面者,以芙蓉膏代替凡士林油纱布换药;兼有高热者,用安乃近肌注或物理降温,并给予中药清热解毒方剂煎服及/或青、链霉素肌注。治疗效果:61 例全部治愈。

陈学荣,等.中国民间疗法,1996,(6):37

7. 疔疮

胡金曼治疗疔疮。运用芙蓉花、猪苦胆、玄明粉、凡士林。用法:先将芙蓉花(或叶)洗净晒干,研磨成细末,过 120 目筛,装瓶备用;猪苦胆数只;用刀割破,取其胆汁,放在锅内用火慢慢煎熬,待水分蒸发 1/3 左右(每 100 克胆汁浓缩到 70 克左右)时,即可离火;玄明粉研磨成粉末,然后将以上药物按 25:12:3:60 的比例混合,充分搅拌均匀,调制成膏,即可装瓶,放阴凉干燥处备用。使用时,患部周围用消毒棉签蘸取 75% 酒精作清洁消毒,然后敷上芙蓉膏,外用消毒纱布包扎,每天换药 1 次,直至治愈。

胡金曼.四川中医,1997,(6):19

8. 急性踝关节扭伤

陈晓燕等治疗急性踝关节扭伤 78 例。用赤小豆 60 克,芙蓉叶 30 克,桂枝 30 克,陈醋 20 克。用法:将赤小豆、芙蓉叶、桂枝研末后加老面、陈醋调匀,用荷叶包敷于患处,外加绷带包扎固定,每天换药 1 次,3 天为 1 个疗程。结果:痊愈 55 例,显效 20 例,有效 3 例,无效 0 例,治愈率 70.5%,总有效率 100%。

陈晓燕,等. 江西医药,1998,(6):354

9. 蜂窝组织炎

杜章凤治疗蜂窝组织炎 206 例。爵床又名小青草,是一种草药。将小青草洗净晒干,碾成粉末,过筛、瓶装、高压消毒、备用。芙蓉膏由芙蓉草研末 3 克,凡士林膏 100 克,液体石蜡(少许)混合熬制而成。蜂窝组织炎早期患者,仅局部红肿热痛的,用芙蓉膏外敷,配口服先锋霉素Ⅳ,每次 4 粒,每日 3 次(儿童减半),连服 3~5 天。炎症伴有全身症状者,芙蓉膏外敷,促使炎症局限,并联合肌肉注射或静脉滴注青霉素。成人肌肉注射,每天 2 次,每次 160 万单位;静脉滴注,每天 1 次,每次 800 万单位。儿童按千克体重用药。连用 3~5 天。创面破溃者,芙蓉膏配爵床粉外治,先用高浓度爵床粉溶解坏死组织,使脓苔自行游离,达到祛腐生新的目的,同时每天静脉滴注青霉素或氨苄青霉素,用 5~7 天,促使炎症浸润期迅速转为愈合修复期。炎症早期或创面仅红肿热痛的病人隔日换 1 次药,而创面破溃脓液渗出较多者,每日换 1 次药。治疗期间,嘱患者不饮酒,避麻辣,严防炎症扩散。结果:痊愈 198 例,占 93%;好转 8 例,占 7%。

杜章凤. 四川中医,2001,(6):45

10. 乳痈

徐玲等治疗乳痈 30 例。乳痈溃脓期用芙蓉膏外敷肿块处。结果:治愈 27 例,好转 3 例,总有效率为 100%。

徐玲,等. 中国民间疗法,1997,(5):39

四虎散的临床新用

1. 增生性膝关节炎

郭炳生治疗增生性膝关节炎 30 例。以四虎散加味方为主:生川草乌、生半夏、生南星、生狼毒各 30 克,生马钱子、樟脑各 10 克。将前 6 味药同煎,待煎沸后再煎 30 分钟,滤出药液,投入樟脑,乘热

以毛巾蘸药液外敷膝关节部,药水凉后再加热。每次外敷 30 分钟,每日 2 次。此药可反复加热使用,一般夏季可连用 2~3 天,冬季可用 3~4 天。连续治疗 10 天为 1 疗程,可使用 1~3 个疗程。上述药物还可以制成药液外搽。制作方法:先将前 6 味药浸泡入 500 克麻油中(夏季泡 2 天,冬季泡 3 天),后一起入铁锅煎熬,待药炸枯后去药渣、过滤,加入樟脑搅匀,装瓶备用。每次以少许药液抹擦,直至局部发热为度。治疗结果:显效 19 例,有效 8 例,无效 3 例,临床总有效率 90%。经治疗后 27 例有效病人,随访 3~6 个月除 4 例病人复发外余未见复发。

郭炳生. 四川中医, 2004, (10): 79

2. 急性腰扭伤

刘中民治疗急性腰扭伤 20 例。以四虎散为主方(生川乌、生草乌、生半夏、生南星),另配没药、乳香、大黄、芒硝等,均等量,研细备用,用时用黄酒调成糊状,均随病情适量用药。让患者俯卧于床上,袒露腰部,确定病位,将药物敷于患部,上盖塑料布,用红外线灯照射 30 分钟,每日 1 次,10 天为 1 疗程。结果:痊愈 18 例,显效 1 例,好转 1 例。

刘中民,等. 中医外治杂志, 2002, (6): 45

3. 痛证

(1) 急性外伤疼痛

刘世刚等运用四虎散治疗急性外伤疼痛 40 例,经治疗全部获效,其中治疗 3 日痊愈者 11 例,5 日治愈者 19 例,7 日治愈者 6 例,10 日治愈者 4 例。

(2) 急性关节炎疼痛

刘世刚等运用四虎散治疗急性关节炎疼痛 32 例,经治疗全部获效,其中 1 个疗程治愈者 9 例,2 个疗程治愈者 18 例,3 个疗程治愈者 5 例。半年后随访,复发 5 例,其中因感受风寒而复发者 3 例,仍用上方治疗而愈。

(3) 急性坐骨神经痛

刘世刚等运用四虎散治疗急性坐骨神经痛 50 例,疗程多在 10 天至 3 个月,一般 3~5 日可见效。其中治愈者 5 例,好转 5 例,有效 23 例,无效 17 例,总有效率 66%。

(4) 癌肿疼痛

刘世刚等运用四虎散治疗癌肿疼痛 20 例,肺癌 12 例,肝癌 8 例,一般敷药 5 日疼痛可减轻。其中有 5 例肺癌患者,经治疗 3 个疗程,疼痛基本消失;5 例肝癌患者疼痛减轻,总有效率达 50%。

刘世刚,等. 中国民间疗法,2000,(2):37

如意金黄散的临床新用

1. 乳腺增生

谢珍运用柴胡疏肝散合金黄散加味治疗乳腺增生 90 例。基本方:醋炒陈皮、柴胡、川芎、白芍药、炒枳壳、醋炒香附、炙甘草。水煎,每天 1 剂早晚分服;如意金黄散加味:天南星、厚朴、苍术、大黄、醋炒香附、白芷、川芎、姜黄、天花粉、黄柏、炮穿山甲、乳香、没药等各等量布包,入砂锅加水煎沸 15 分钟后取出药包,待温度适中时热敷患处,每天 1 次,每次 20 分钟,每包药可用 7 天。结果:治愈 63 例,显效 17 例,有效 8 例,无效 2 例,总有效率为 97.8%。

谢珍. 上海中医药杂志,2003,(11):29

2. 原发性肝癌疼痛

刘军运用如意金黄散加减治疗原发性肝癌疼痛 50 例。方药:大黄、黄柏、姜黄、朴硝、芙蓉叶各 50 克,天花粉 100 克,冰片、南星、乳香、没药各 20 克,雄黄 30 克,共研极细粉,加饴糖调成厚糊状,摊于油纸上厚约 3~5 毫米,周径略大于肿块,敷贴于肝区肿块或疼痛处,每日换药 1 次。结果:显效 38 例,有效 11 例,无效 1 例,敷药后局部皮肤反应者 5 例。

刘军. 时珍国药研究,1997,(3):205

3. 静脉脉管炎

刘军运用如意金黄散治疗静脉脉管炎 36 例,全部治愈。方法为:取本剂适量(约 5~15 克),用温开水或温茶水调成糊状,敷于患处,厚约 3~5 毫米,再用塑料薄膜、纱布包扎固定。每天换药 1 次。病情严重者配合三妙散或四妙勇安汤口服。

刘军.时珍国药研究,1997,(3):205

4. 褥疮

刘军运用如意金黄散加猪胆汁外敷治疗重度褥疮 27 例。具体操作取金黄散 10 克,猪胆汁 100 毫升,配成金黄散胆汁糊备用。褥疮常规清创后,用棉签蘸取涂于疮面,厚度约 4 毫米,表面以消毒纱布覆盖。结果:27 例病人均痊愈。

刘军.时珍国药研究,1997,(3):205

5. 麦粒肿

刘军用金黄散油膏敷治麦粒肿 154 例。油膏配制:如意金黄散 30 克,无水羊毛脂 10 克,凡士林 70 克,冰片 2 克。先将凡士林、羊毛脂加温融化,速将金黄散加入搅匀,待冷即成。敷前于结膜囊内先涂入抗生素眼膏以保护内膜不受刺激,再将油膏外贴患眼,少数较重病例,内服清热解毒中药方,由蒲公英 30 克,金银花 10 克,甘草 3 克组成,通常 3~5 剂,亦可服用抗生素以增其效。敷 3 次消退或破头排脓而愈者 100 例,敷 3 次以上者 54 例,加服中药者 10 例,加服抗生素或磺胺药者 44 例。都在 1 周内治愈。未见不良刺激反应。

刘军.时珍国药研究,1997,(3):205

6. 急性软组织损伤

刘军运用如意金黄散治疗急性软组织性损伤 36 例。方法为:用金黄散和万花油调成糊状,敷于受伤部位。每天或隔天换药 1 次,6 天为 1 个疗程。急性损伤 24 小时内,需在患部喷上冷冻剂,再敷药并加压包扎。如果损伤超过 24 小时,患者敷上金黄散后,再以 TDP 灯照射 30 分钟,每日 1 次。结果:痊愈 18 例,显效 9 例,

好转6例,无效3例。

刘军. 时珍国药研究, 1997, (3): 205

7. 阑尾周围脓肿

刘军运用金黄散外敷配合抗生素治疗阑尾周围脓肿102例。方药组成: 天花粉10份, 黄柏、大黄、姜黄、白芷各5份, 厚朴、陈皮、苍术、天南星、甘草各2份。每日2次, 每次3~4小时, 1周为1疗程, 同时配合抗生素治疗。对照组60例用抗生素。结果: 治疗组总有效率100%, 对照组总有效率95%。

刘军. 时珍国药研究, 1997, (3): 205

8. 会阴切口硬结

刘军运用金黄散治疗会阴切口硬结164例。结果: 总有效率100%。治疗方法: 食醋调金黄散呈糊状物置凡士林纱布上, 敷患处, 6~12小时更换1次, 5~7天为1疗程。

刘军. 时珍国药研究, 1997, (3): 205

9. 流行性腮腺炎

林利华运用如意金黄散适量, 用陈醋或凡士林调成糊状, 外敷患处, 每日换药1次, 直至症状消失为止。一般用药2~7天即愈, 且无后遗症。

林利华. 中医外治杂志, 2004, (8): 36

10. 带状疱疹

林利华运用如意金黄散、雄黄、生白矾各500克, 蟾酥10克, 冰片6克, 共研为极细粉末, 以凡士林6000克调成膏状, 外敷患处, 每日1次。一般用药3~5天即可获愈。

林利华. 中医外治杂志, 2004, (8): 36

11. 黄水疮

林利华运用如意金黄散适量, 用白开水调敷患处, 每日4~6次, 药干后再用白开水湿润。一般用药1小时后灼痛可止, 经过1~3天后可疮消病愈, 且愈后不留瘢痕。

林利华. 中医外治杂志, 2004, (8): 36

12. 静脉炎

林利华运用如意金黄散适量,以醋调成稀糊状后外敷患处,每日2次,连续用药2~3天后即可收效。若系应用化学药品而致静脉炎,宜将如意金黄散与凡士林按2:8的比例配成膏剂备用;若局部红肿疼痛的炎症,每日外敷1次;若局部已经溃烂,脓性分泌物较多,先清洁疮口后,再敷上如意金黄散粉剂,周围外敷金黄膏。

林利华. 中医外治杂志,2004,(8):36

13. 脓性指甲炎、甲沟炎

林利华运用如意金黄散适量,加入蜂蜜调成糊状。无伤口者将药敷于红肿处约0.5厘米厚,纱布包扎,每日换药1次;切开引流或自破的伤口,按外科常规放置引流物,在伤口周围红肿浸润区敷药,每日换药1次,一般用药7~14天后即可获得治愈。

林利华. 中医外治杂志,2004,(8):36

14. 小儿脐疮

林利华运用如意金黄散与凡士林按1:4的比例混合均匀,装入瓶内备用。用时先将患儿脐部用络合碘消毒,再将药膏贴患处,每日换药1次,5次为1个疗程。一般用药1~2个疗程即可痊愈。

林利华. 中医外治杂志,2004,(8):36

15. 风湿性关节炎

林利华运用如意金黄散适量,加水调成稠糊状,摊于油纸上,厚约0.5~0.7厘米,面积略大于红肿处,外贴患处,每日换药1次。一般外用2~3天即可见效,红肿热痛即可大减,继而恢复正常。

林利华. 中医外治杂志,2004,(8):36

16. 外伤性肿胀

蒋菁运用如意金黄散合甘油外敷治疗外伤性肿胀123例,用如意金黄散100克,成人开塞露100毫升,食用米醋100毫升,地塞米松针剂5毫升×5支混合,均匀搅拌稠腻呈糊状不流动为宜。以0.8~1.0厘米厚度覆盖于患处,并用绷带轻松包扎固定,每日2次,7天为1疗程。同时抬高患肢,动静结合。治疗期间除加用一

般活血化瘀药物外,不作其他处理。结果:显效 56 例,占 45.53%;有效 66 例,占 53.66%;无效 1 例,占 0.81%。总有效率占 99.19%。

蒋菁. 中医外治杂志, 2001, (10): 20

17. 智齿冠周炎

张国范等运用本方外敷治疗智齿冠周炎 30 例。方药:天花粉、黄柏、大黄、白芷、川厚朴、陈皮、苍术、胆南星、甘草、冰片适量,共为细末,以茶水调成糊状,置纱布上贴敷于患处,每天 2 次,同时以黄芩、金银花、连翘、竹叶、白芷适量,煎液放置至适当温度时含漱。脓肿形成后,除行脓肿切开外,配以青霉素、甲硝唑。结果:经 3~4 天治疗,治愈 27 例,占 90%;有效 3 例,占 10%。总有效率 100%。

张国范,等. 山东中医杂志, 1999(2): 74

18. 慢性盆腔炎

许靖运用本方治疗慢性盆腔炎 32 例。如意金黄散由天花粉、黄柏、姜黄、白芷、大黄、厚朴、陈皮、甘草、苍术、胆南星组成。上药各等份烘干,用粉碎机粉碎,过 100 目筛后备用。每次取约 20 克用 120 毫升开水浸泡,冷却后滤去药渣,每晚睡前保留灌肠。灌肠方法:左侧卧位,装药水的输液瓶挂在床边,输液管上端接瓶,下端的接头剪去后塞入肛门约 15~20 厘米。另用如意金黄散约 30 克以米醋调湿,敷下腹部,并用热水袋装热水后敷盖,水冷即可撤药。7 天为 1 个疗程,共治疗 2~3 个疗程。结果:治愈 29 例,治愈率 90%;好转 3 例;总有效率 100%。

许靖. 广西中医药, 2003, (4): 30

消肿止痛散的临床新用

软组织损伤

(1) 黄璇运用本方外敷治疗软组织损伤 587 例。结果:痊愈

538 例,占 91.65%;有效 49 例,占 8.35%;无效为 0;总有效率 100%。

黄璇. 中医外治杂志, 2003, (6): 31

(2) 陈柯运用本方外敷治疗急性软组织扭挫伤 158 例。结果: 治愈 102 例(占 64.5%), 好转 54 例, 无效 2 例, 局部皮肤过敏, 中途停药, 改用它法。总有效率 98.7%。

陈柯. 陕西中医, 2004, (8): 703

透脓散的临床新用

1. 急性化脓性扁桃体炎

王筠等运用本方治疗急性化脓性扁桃体炎 50 例。方药: 生黄芪 30 克, 当归 15 克, 穿山甲 15 克, 皂角刺 15 克, 川芎 15 克, 金银花 15 克, 牛蒡子 15 克, 白芷 15 克。每日 1 剂, 水煎服, 每次 100 毫升, 每日 4 次; 吞咽困难者少量频服。结果: 临床痊愈 12 例, 显效 27 例, 有效 7 例, 无效 4 例, 愈显率 78%, 总有效率 92%。

王筠, 等. 中国中医急诊, 2003, (3): 277

2. 内痈

凌华等运用本方治疗内痈 21 例。基本方: 生黄芪 20~100 克, 全当归 10~40 克, 炮山甲 10~15 克, 皂角刺、川黄柏、蚤休、炒谷芽、麦芽各 10 克, 蒲公英、忍冬藤、银花各 15 克, 生甘草 5 克。加味: 肝脓肿加小青皮 10 克; 肾脓肿加狗脊 10 克; 肺脓肿加鱼腥草 30 克, 丝瓜络 10 克; 热甚加生石膏(先煎) 10~20 克, 三叶青 10 克。每日 1 剂, 水煎分服。经上述方法治疗 15~60 天, 结果: 18 例痊愈, 2 例有效, 1 例无效。

凌华, 等. 浙江中医杂志, 2002, (4): 174

3. 胆结石

邹世忠运用本方治疗胆结石 42 例。基本方: 黄芪 30 克, 川芎 15 克, 当归 15 克, 皂刺 10 克, 炮甲珠 15 克, 茵陈 20 克, 金钱草 30

克,大黄10克,元胡10克。水煎服,日服2次,每周5剂,疼痛剧烈者,适当肌注阿托品或654-2;不能进食者给以补液;急性炎症给以抗菌素,结石小者,每周总攻1次,并随证加减。结果:42例中治愈31例,占73.5%;好转6例,占14.2%;显效5例,占11.9%;急性发作期一般5剂后临床症状消失,疗程最短1周,最长3个月。

· 邹世忠. 中国中医药科技, 2004, (4): 255

4. 产后缺乳

邱兆利等运用本方治疗产后缺乳66例。方药:黄芪12克,当归6克,穿山甲3克,皂角刺5克,川芎9克,王不留行12克,漏芦10克,通草10克,猪前蹄1对。伴肝郁气滞加香附、郁金、柴胡,气血不足加党参、白术、丹参。每日1剂,早、晚分2次温服,5天为1个疗程。结果:经过1个疗程治疗后,治愈59例,显效6例,无效1例,治愈率为89.39%。

邱兆利,等. 吉林中医药, 2005, (1): 28

5. 盆腔炎性包块、卵巢囊肿

张长强等运用本方治疗盆腔炎性包块卵巢囊肿50例。西药:用卡那霉素、灭滴灵注射液静滴,1日1次,7天为1疗程,于经前7~10天运用。中药药物组成:红藤30克,白花蛇舌草30克,土茯苓30克,败酱草15克,当归12克,皂刺10克,山甲10克,三棱12克,莪术12克,桃仁10克,薏仁30克,地丁30克,小茴香10克,海藻12克,甘草6克。加减:疼痛甚者加金铃子散12克;腰疼腰酸加川续断12克,鸡血藤25克;气血虚者加党参15克,黄芪30克;崩漏不止者加贯众炭12克,仙鹤草30克;白带多者加芡实30克,车前子(包)15克。1日1剂,水煎分2次温服,于经前7~10天服用,至下次月经干净后停用,为1个疗程。结果:盆腔炎性包块17例,其中伴积液8例,治愈22例,好转5例,治愈率为70.58%,治疗时间最短10天,最长45天,平均用药28天;炎性包块伴卵巢囊肿6例,3例治愈,3例好转,治愈率为50%,治疗时间最短14天,最长39天,平均用药24天;单纯卵巢囊肿27例,治愈22例,好转5

例,治愈率为81.48%,治疗时间最短7天,最长36天,平均用药12天。总有效率为100%。

张长强. 中华实用中西医杂志,2002,(3):313

6. 慢性附件炎性包块

许金珠等运用本方加味治疗慢性附件炎性包块100例。基本方:生黄芪12克,生米仁20克,当归10克,海藻10克,皂角刺10克,穿山甲6克,水蛭6克。加减法:伴神经衰弱者加琥珀、白茯苓;带下臭秽者加红藤、败酱草;舌淡苔白腻者加白芥子、桂枝。剂量及服法:开始时每日1剂水煎服,包块消散后改为隔日1剂,经期停服。1个月为1疗程。服药1~2个疗程后,结果:治愈70例,显效17例,有效6例,无效7例,总有效率为93%。

许金珠,等. 中国民间疗法,2001,(10):44

7. 慢性扁桃体炎

管冬元运用本方加味治疗慢性扁桃体炎38例。方药:生黄芪15克,当归10克,炮山甲6克,皂角刺10克,白芷10克,牛蒡子10克,金银花12克,生地12克,玄参15克,麦冬10克,桔梗6克,川牛膝15克。每日1剂,水煎服。若咳嗽甚者加杏仁10克,前胡12克;若兼声音嘶哑者加薄荷10克,蝉衣5克;若兼外感者加荆芥10克,防风10克;若体虚易外感者加太子参20克。嘱病人慎辛辣,戒烟酒。结果:临床治愈30例,好转6例,无效2例。治疗时间最短者10天,最长者23天。

管冬元. 黑龙江中医药,1996,(3):38

8. 迁延性乳腺炎

胡昭林运用本方加味治疗迁延性乳腺炎12例。方药:生黄芪24克,炙山甲10克,川芎10克,当归12克,皂角刺10克,桂枝5克,如肿块较硬可加制乳没各6克。水煎服,每日1剂,5天为1疗程。外治用如意金黄膏掺凉消散敷患处,1天1换。结果:12例患者均用上法进行治疗而获痊愈。

胡昭林. 北京中医,1996,(1):41

9. 乳痈

石富娟运用本方治疗乳痈 40 例。本方加浙贝母、蒲公英、半枝莲、忍冬藤组成,病初起时加大穿山甲、皂角刺、蒲公英的剂量;久治未愈脓水淋漓者宜加大生黄芪的剂量;有其他兼证者则随证化裁治疗。一般病属初发,病程在 1 周以内者,服用本方 5~7 剂即能治愈;病情拖延 1 周以上者,通常须服药 7~14 剂才能治愈;个别病情较为严重,病程拖延较长者,一般须服 20 余剂才能奏效。结果:有效率为 100%。

石富娟. 江西中医药, 2004, (2): 26

10. 糖尿病周围神经病变

运用本方治疗糖尿病周围神经病变 88 例。治疗组以透脓散为主方,处方:生黄芪 30 克,当归 12 克,炒穿山甲 6 克,皂角刺 6 克,川芎 10 克;加减:麻木疼痛甚者加鸡血藤 20 克;肢体沉重明显者加木瓜、桑枝各 10 克;肢冷畏寒加桂枝 10 克;血糖明显增高者加葛根、玄参各 20 克。水煎服,每日 1 剂,早晚分 2 次温服,30 天为 1 个疗程。对照组运用弥可保 50 毫升,每日 1 次口服,30 天为 1 个疗程。结果:治疗组 88 例中显效 60 例,占 81.8%;有效 26 例,占 29.55%;无效 2 例,占 2.27%;总有效率 97.73%。对照组 47 例中显效 10 例,占 21.28%;有效 26 例,占 55.32%;无效 11 例,占 23.40%;总有效率 76.60%。两组比较有显著差异 ($P < 0.05$)。

黄明. 北京中医药大学学报, 2000, (12) 增刊: 67

生肌膏的临床新用

1. 感染创面

欧伦运用本方治疗感染创面 180 例。用生理盐水棉球简单擦洗创面,揩净脓液后,外敷与创面相应大小的拔毒生肌膏并用纱布覆盖伤口,包扎即可。一般 1~2 天换药 1 次。结果:180 例全部治愈。伤口愈合时间最短 4 天,最长 79 天,平均 27 天。

欧伦. 广西中医药, 1996, (2): 11

2. 褥疮

运用本方治疗褥疮 49 例。对于分泌物和坏死组织较多的创面, 先用生理盐水冲洗, 常规消毒后用无菌剪刀剪去坏死和腐烂组织, 用无菌棉签蘸取生肌膏由内到外轻轻涂抹创面, 面积应大于创面 2~3 厘米; 对于溃疡较深, 面积较大的创面, 常规消毒后用生肌膏浸湿的纱布条填塞, 然后外敷无菌纱布固定, 每日换药 1 次。结果: 浅度溃疡治愈 20 例, 显效 7 例; 深度溃疡治愈 6 例, 显效 7 例, 有效 3 例; 有骨膜损伤者治愈 1 例, 显效 2 例, 有效 2 例, 无效 1 例, 总治愈率为 55%, 显效率为 33%, 有效率为 10%, 总有效率为 98%。

侯秀清. 现代中西医结合杂志, 2004, (9): 2455

3. 单纯型子宫颈糜烂

运用本方治疗单纯型子宫颈糜烂 97 例, 全部治愈, 上药次数最少者 1 次, 最多者 5 次, 平均上药 3 次。糜烂面越大、表面充血严重、分泌物呈脓性者治愈越慢。经 2~6 个月随访, 均无复发。

朱欣敏, 等. 中医外治杂志, 1995, (4): 13

4. 烫伤

施国良运用活血生肌膏治疗烫伤 186 例。方药: 生石膏、大黄、黄芩、黄连、黄柏、地榆、虎杖、乳香、没药、冰片、香油, 用凡士林按一定比例调配而成。结果: 经 1 个疗程 (10 天/疗程) 治愈 172 例, 2 个疗程治愈 14 例。均不留疤痕。

施国良. 浙江中西医结合杂志, 2001, (3): 188

5. 镰疮

代霞运用本方治疗镰疮 23 例。方药: 生地黄、大黄各 90 克, 当归、黄芪各 60 克, 紫草、白芷、甘草各 30 克, 血竭、轻粉各 10 克, 珍珠粉 10 克, 白蜡 60 克, 香油 500 克。结果: 全部获效, 其中 22 例痊愈。痊愈时间最短 3 周, 最长 9 周。23 例中复发 1 例。

代霞. 河南中医, 2000, (6): 64

6. 肛裂

王伟东等运用本方治疗肛裂。方药:冰片、煅龙骨粉各10克,朱砂15克,煅甘石60克,煅石膏130克,凡士林360克,麻油适量。一般上药3~5次,便秘者适当应用轻泻剂,肛裂可完全愈合,且无任何不良反应。

王伟东,等. 山西中医,1994,(6):35

7. 慢性疮疡

郭乃丽运用本方治疗慢性疮疡52例。方药:香油480克,血余炭12克,当归12克,生地24克,生龟板24克,生石膏30克,炉甘石48克,蜡90克。结果:患处肿痛消失,疮面愈合,随访1年以上未复发者51例;无效1例。疗程最短7天,最长80天。

郭乃丽. 河南中医,1995,(4):242

8. 糖尿病皮肤感染

索新华等运用象皮生肌膏治疗糖尿病皮肤感染11例。经治疗后痊愈,最短12天,最长32天。

索新华,等. 新乡医学院学报,1993,(3):227

圣愈汤的临床新用

1. 继发性闭经

喻峰运用本方加减治疗继发性闭经46例。方药:柴胡10克,枳壳15克,白芍15克,当归10克,川芎5克,党参40克,黄芪30克,郁金15克,熟地15克,甘草5克。有附件炎、盆腔炎者加丹参30克,蒲公英15克或甲珠10克;腰痛加杜仲15克或鹿角霜15克;有热者熟地易生地或加黄芩15克;肥胖者加莱菔子15克,苍术15克。水煎,日1剂分2次服。结果:经本方治疗有34例月经正常(其中服药15天正常者25例,服药1个月正常者4例,服药2个月正常者5例),12例无效。

喻峰. 湖南中医杂志,1998,(11):35

2. 乳腺小叶增生

喻峰运用柴芍圣愈汤加减治疗乳腺小叶增生 168 例。痛甚者加香附、延胡索各 15 克；阴虚明显者加玉竹、女贞子各 15 克；痰热明显者加瓜蒌 15 克，浙贝 20 克；质较坚或久治不散者加丹参或甲珠、鳖甲。于经净开始服用，至行经第 1 天止服，每月服药 24 天，24 天为 1 疗程。结果：经治疗 3 个疗程后，治愈 126 例，好转 35 例，无效 7 例。总有效率为 95.83%。

喻峰. 湖南中医杂志, 1999, (9): 34

3. 不孕症

喻峰运用本方加减治疗不孕症 354 例。基本方：柴胡 10 克，枳壳 10 克，白芍 15 克，当归 5 克，丹参 15 克，党参 40 克，黄芪 40 克，黄芩 15 克，郁金 15 克，生地黄 15 克，甘草 5 克。经期提前者去丹参加田七；肥胖者加苍术 15 克，莱菔子 15 克；腰痛加川断、狗脊，或鹿角霜；伴有盆腔炎，或输卵管阻塞者加蒲公英或鳖甲，或丹参易甲珠；带下色黄有异味者加败酱草。于月经第 5 天，每日 1 剂，连服 25 天为 1 疗程，3 个疗程完毕进行统计。第 1 个疗程内治愈 95 例，第 2 个疗程内治愈 74 例，第 3 个疗程内治愈 65 例，共受孕 294 例。原发性不孕 126 例中 96 例受孕，228 例继发性不孕中 198 例受孕。

喻峰. 中国中医药信息杂志, 2000, (12): 70

4. 月经过多

冯力伟运用本方加减治疗女性月经过多 48 例。方药：人参 10 克（或用红参 10 克或党参 20 克），黄芪 20 克，白术 15 克，补骨脂 15 克，赤石脂 20 克，龙骨 20 克，地龙 30 克。牡蛎 30 克，血热者加黄连、黄芩、栀子；血瘀者加蒲黄、茜草、桃仁、益母草。每日 1 剂，水煎分 2 次服，于月经来潮当日开始服用，10 天为 1 疗程。共服 3 个月经周期后停药。结果：治愈 26 例，占 54.2%；好转 14 例，占 29.2%，无效 8 例，占 16.6%。总有效率达 83.4%。

冯力伟. 福建医药杂志, 2003, (4): 222

5. 眩晕

石焕明运用本方加减治疗眩晕 98 例。临床表现:发作时症见头晕目眩,眼黑耳鸣,心悸少寐,体倦懒言,神疲纳减,面色苍白,唇甲不华,舌质淡,脉沉细或虚涩无力。基础方:人参(另煎)、当归、川芎、柴胡、薄荷(后下)、防风各 6 克,黄芪 30 克,熟地黄 10 克,菊花 12 克,白芍、葛根、枸杞子各 15 克。心悸少寐者去防风、薄荷,加酸枣仁 15 克,蜜远志 6 克;腹胀纳呆者去熟地黄、黄芪,加生山药 30 克,炒白术 12 克;头昏晕痛者去人参、熟地黄,加元胡、白芷各 12 克;下虚甚者去防风、薄荷,加焦杜仲 15 克,山茱萸 12 克,水煎,早晚服 1 次。结果:全部病例均临床治愈。其中服 2~3 剂症状消失者 21 例,4~5 剂者 38 例,6~10 剂者 24 例,10 剂以上者 15 例。治愈后随访 3 年,其中 4 例复发,仍复投原方而获愈。

石焕明. 陕西中医, 1994, (9): 390

6. 特发性浮肿

王华宁运用本方加减治疗特发性浮肿 53 例。特发性浮肿是指不明原因的浮肿(排除心源性、肾源性、肝源性及内分泌失调等原因所致浮肿)。浮肿部位以颜面、双下肢前及足踝部为多,伴有面色苍白或萎黄,神倦乏力,纳呆,舌淡苔薄白,脉细弱无力等症状。方药:熟地 20 克,杭芍 15 克,川芎 10 克,潞党参 15 克,当归 10 克,黄芪 12 克,茯苓 20 克,猪苓 15 克,泽泻 10 克,白术 12 克。每日 1 剂煎服,3~4 周为 1 疗程。结果:痊愈 32 例,好转 17 例,无效 4 例。

王华宁. 云南中医中药杂志, 1995, (2): 30

7. 崩漏

(1) 赵平运用本方加减治疗崩漏 25 例。基本方:潞党参 15 克,炙黄芪 30 克,阿胶 15 克,当归 20 克,川芎 15 克,熟地 20 克,炒白芨 20 克,仙鹤草 15 克,炒续断 15 克,炒杜仲 15 克,桑寄生 15 克,大枣 5 枚。随证加减:血热量多者加生地 15 克,黄芩 10 克;血瘀有块者加益母草 15 克;食欲不振者加砂仁 10 克,豆蔻 6 克。每

日1剂,水煎2次共400毫升,分2~3次餐前服用15天至1个月,随访6个月至1年。结果:治愈10例,显效10例,有效4例,无效1例,其中无效1例为功能性子宫出血。

赵平. 云南中医学院学报, 2003, (90): 49

(2) 李旭莲运用本方加减治疗功能性子宫出血20例。加减: 出血过多者, 经质稀、色淡重用黄芪、加生地; 出血伴有腹痛重用当归、川芎; 心烦少寐、咽干加知母。结果: 一般服3~6剂出血止。20例中无效3例。建立正常月经周期6例, 无效2例, 总有效率85%。

李旭莲. 河北中西医结合杂志, 1996, (1): 129

8. 缺乳

范美霞等运用本方加减治疗产后缺乳1例。张某, 剖宫产后10天, 乳汁稀少, 两乳房无胀感, 食欲不振, 进食量少, 动则心慌, 恶露量多, 色红。刻诊: 面色苍白无华, 两乳柔软, 无胀感, 舌淡红、苔薄白, 脉细弱。药用: 台参30克, 黄芪30克, 熟地20克, 当归10克, 川芎6克, 白芍10克, 桔梗10克, 花粉、山药各10克, 路路通、王不留行各10克, 穿山甲10克, 甘草10克, 用猪蹄汤煎药。每日1剂, 分2次服。服上方3剂后, 乳量增多, 乳房有胀感, 心慌减轻, 食量有所增加。继用上方3剂, 乳汁如常。

范美霞, 等. 山西中医, 2000, (6): 13

9. 冠心病心绞痛

蔡文运用本方加减治疗冠心病心绞痛58例。方药: 太子参、黄芪各30克, 熟地10克, 白芍、川芎、当归各12克, 丹参15克, 砂仁9克。水煎服, 每日1剂, 早晚各温服100毫升。同时加用极化液静滴, 每日1次; 消心痛片10毫克, 每日3次口服。14天为1疗程, 2个疗程后, 结果: 显效18例, 有效31例, 无效9例, 总有效率为84.48%。

蔡文. 陕西中医, 2005, (2): 120

10. 胎位不正

彭芷美运用本方加味治疗胎位不正 96 例。结果:胎位矫正 92 例,其中 1 个疗程矫正者 87 例,2 个疗程矫正者 5 例,无效 4 例(其中 2 例横位并骨盆畸形,2 例足位服药 1 个疗程就已分娩),治愈率为 95.8%。

彭芷美. 江西中医学院学报,1994,(2):21

雄黄散的临床新用

1. 带状疱疹

葛少亮等运用蜈蚣雄黄散治疗带状疱疹 56 例。方药:蜈蚣 3 条,雄黄 20 克,冰片 4 克,云南白药 5 克,青黛 5 克。先将蜈蚣用文火炒存性,研成极细粉末,后再将研好的雄黄、冰片与青黛、云南白药混匀,装瓶密封备用。使用时加香油调成糊状,外涂于患处,再加消毒纱布覆盖固定,每日换药 1 次。一般 2~7 天后疱疹即结痂而愈。结果:43 例痊愈,自觉症状消失,皮疹消退;8 例有效,自觉症状消失,皮疹消退 85% 以上;3 例好转,疼痛减轻,皮疹消退 45% 以上;另 2 例无效。

葛少亮,等. 中国民间疗法,2004,(3):22

2. 翼状胬肉

李月英等运用本方治疗翼状胬肉 100 例。结果:痊愈。并进行 1~2 年的随访,其中仅有 8 例复发,复发率为 8%,总有效率为 92%,8 例复发者皆为进行期胬肉,另外,手术时未将残留的胬肉组织清理干净,致使角膜面粗糙,也是造成复发的重要原因。

李月英,等. 中医外治杂志,1996,(4):25

3. 小儿腮腺炎

杜安民运用本方外贴治疗小儿腮腺炎 116 例。治疗方法:枯矾、黄柏、雄黄各 50 克,焙干研磨成粉状,加入生理盐水调成糊状,将药糊摊在 2 毫米厚的纱布块上后,再贴在肿大之腮腺上,间日换药 1

次,肿胀严重者每日换药1次,同时常规使用病毒唑、病毒灵等抗病毒药物,配合对症处理。对照组仅常规使用抗病毒药物。结果:治疗组116例,痊愈74例,显效26例,有效16例,有效率100%;对照组60例,显效20例,有效24例,无效16例,有效率73%。

杜安民. 陕西中医,1995,(12):545

4. 黄水疮

宿国进运用本方治黄水疮400余例。方药:雄黄20克,硫黄30克,枯矾40克,诸药共研细末,装瓶备用。用时取上药20克,香油10克,调成糊状,涂于患处,每日3次。结果:有效率99%,一般用药3~5天即可治愈。

宿国进. 山东中医杂志,1995,(8):373

5. 甲疽

陈维挺运用本方治疗甲疽。方药:明矾、食盐各20克,雄黄6克,共研极细末装瓶备用。患甲常规消毒,用消毒的剪刀剪去嵌入肉内的指(趾)甲,再撒上本药末,外盖凡士林纱布,如患甲周围红肿,可加敷如意金黄膏,再用无菌纱布包扎,每天换药1次,换药期间,如患甲赘肉产生角化,须用止血钳轻轻去除,再敷上药末,可缩短治疗时间。

陈维挺. 新中医,2000,(1):14

6. 口腔溃疡

赵光兵等运用本方治疗口腔溃疡68例。方药:五倍子10克,雄黄5克,冰片2克。治疗方法:将上述药物共研细末,用细罗过滤,装瓶备用。患者取坐位,张口充分暴露病灶,将药物涂在溃疡面上。每3小时1次,5天为1个疗程,一般情况下1个疗程均可治愈。少数病情严重者需2个疗程。结果:1个疗程治愈者63例,2个疗程治愈者5例,所有病例全部治愈,疗效肯定。

赵光兵,等. 中国乡村医生杂志,1996,(11):36

7. 银屑病

栾桂香运用本方治疗银屑病20例。方药:雄黄18克,五灵脂

36 克,石决明 18 克,僵蚕 9 克,硼砂 18 克,朱砂 9 克。共研为细末,分成 24 包。每晚临睡前口服 1 包,白酒或黄酒为引子,白开水送服,每次服药后取微汗出。服药期间忌食腥辣之品,24 日为 1 个疗程。结果:痊愈 19 例,占 95%,随访 2 年未复发。显效 1 例,服药 5 个疗程后,病情明显好转。最短者服药 1 个疗程,最长者服药 5 个疗程,平均 2 个半疗程。1 个疗程痊愈者 2 例,2~3 个疗程痊愈者 11 例,3~4 个疗程痊愈者 6 例,显效 1 例,有效率为 100%。

栾桂香.实用中西医结合杂志,1994,(10):619

蜈蚣散的临床新用

1. 慢性皮肤溃疡

李远征等运用本方治疗慢性皮肤溃疡。方药:蜈蚣 1 条,龙骨 10~15 克。制法:把蜈蚣焙干研末,龙骨烤干研成细粉,再将二者混合均匀即成。使用时亦可根据病情适当加入其他消炎类药品。

李远征,等.中国基层医学,1995,(2):307

2. 肺结核

陈硕林运用本方治疗肺结核 36 例。由蜈蚣 600 条,三七 100 克,白芨、紫河车各 200 克,百部、猫爪草各 2 000 克组成。前 4 味研粉制成胶囊服,后 2 味煎水送服。为 100 天(1 个疗程)剂量。治疗组 36 例,配合异烟肼、乙胺丁醇等二联化疗。随证加减:气阴两盛加太子参、南沙参;气血两亏加黄芪、阿胶;肺肾两亏加冬虫夏草。对照组 10 例,以异烟肼、利福平、链霉素、吡嗪酰胺、乙胺丁醇为主进行三联或四联化疗。结果:治疗组 24 例空洞,8 例闭合,9 例缩小,7 例无效;对照组 11 例空洞,仅 2 例缩小,9 例无效。总疗效比较,治疗组显效 14 例,有效 15 例,无效 7 例;对照组显效 2 例,有效 7 例,无效 11 例。

陈硕林.上海中医药杂志,1994,(8):24~25

3. 面神经炎

应理法等运用本方合地巴唑治疗面神经炎 49 例。方药:全蝎 70 克,蜈蚣 30 克,用文火焙干研末。治疗组:全蝎蜈蚣散 5 克,每天 2 次,用 50 毫升黄酒送服;地巴唑 20 毫克,每天 2 次,服后务令微发汗,以发散风邪。10 天为 1 疗程。对照组:强的松 10 毫克,每天 3 次;维生素 B₁ 10 毫克,每天 3 次;地巴唑 10 毫克,每天 3 次,10 天为 1 疗程。结果:治疗组治愈率 73.5%,总有效率 95.9%;对照组分别为 46.8% 和 83%;两组比较有显著性差异 ($P < 0.01$)。

应理法,等. 浙江中西医结合杂志,1999,(4):274

4. 带状疱疹

洪清华运用本方治疗带状疱疹 38 例。方药:蜈蚣 2 条,青黛 15 克,雄黄 5 克,冰片 5 克,食醋适量。先将蜈蚣文火炒存性,研成细粉,再将雄黄和冰片研粉过 120 目筛,将青黛与上药混合,加适量食醋搅成糊状,涂患处,外用纱布覆盖固定,每日 2 次,7 次为 1 个疗程。结果:27 例痊愈,自觉症状消失,皮疹消退,无疼痛后遗症;8 例显效,自觉症状基本消失,皮疹消退 85% 以上,疼痛明显减轻;3 例好转,疼痛有所减轻,皮疹消退 40% 以上。

洪清华. 中国民间疗法,1999,(10):14

5. 化脓性指头炎

赵爱文等运用本方治疗化脓性指头炎 42 例。取蜈蚣 1 条,熏干,研末后用适量猪胆汁(或鱼胆汁)调成糊状,患指常规消毒后均匀敷涂,用无菌纱布包扎,间隔 24~36 小时换药 1 次。结果:用药 1 次治愈 2 例,2 次治愈 21 例,3 次治愈 14 例,4 次治愈 5 例;治愈率 100%,未出现不良反应。

赵爱文,等. 人民军医,2004,(1):59

6. 跟骨慢性骨髓炎

邹扬道运用本方治疗跟骨慢性骨髓炎,外用以等量蜈蚣、炉甘石、煅石膏三味药物组成,将蜈蚣置瓦片上焙至黄色后晾干研末,炉甘石研末水飞,三者混合后用凡士林调和制成凡士林纱条备用。

内服药制作:将单味蜈蚣置瓦片上焙至黄色后晾干研末,装入胶囊中,用加减小妙勇安汤送服。初期每日换药1次,后期2~3天换药1次,口服蜈蚣散胶囊,每日3次,每次5粒,2周1疗程,共治疗约3个疗程。结果:痊愈(全身及局部症状消失,疮口愈合,或较大创面经植皮后愈合,X线片示无死骨,随访无复发)4例;有效(全身症状消失,疮口基本愈合,X线片示病灶明显好转)3例;无效(治疗后无好转)1例,有效率为87.50%。

邹扬道. 中医外治杂志,2001,(2):31

7. 慢性骨髓炎

谭毅运用本方治疗慢性骨髓炎,用蜈蚣10条,重约12克,研粉末装入胶囊(每粒胶囊含生药约0.3克),第1~5天,每天1次,每次6粒;第6~7天,每天1次,每次5粒。7天服完为1疗程。可间隔1周,续用上法服1周。间隔期加服十全大补丸,首次2丸,后改每天3次,每次1丸。外治:局部窦口,常规消毒,用探针探明窦道深度并剔除腐骨败肉,用双氧水冲洗窦道,再用凡士林纱条蘸取蜈蚣粉末,扭成引流条状,缓慢填入窦道内,每天换药1次,7天为1疗程。结果:屡获效验。

谭毅. 新中医,2000,(10):59

8. 眼外肌麻痹

谢立科运用本方治疗眼外肌麻痹2例。蜈蚣20克(每条重约1克),僵蚕50克,红花30克。以上3种药置瓦上焙焦黄,共研极细末,分成20小包,每包5克备用。每日早晚各1包,用5克红参蒸水适量送服。结果:痊愈。

谢立科. 中国中医眼科杂志,1993,(2):109

9. 阳痿

王豪运用本方治疗阳痿40例。每次取蜈蚣20克,晒干研成粉末,制成散剂,每次服0.5克,早晚各服1次,空腹用白酒或黄酒送服,20天为1疗程。服药期间停服其他中西药,并忌生冷饮食,忌恼怒。经治疗1个疗程后,结果:显效32例(每次房事基本能完

成),占80%;有效5例(房事有时能完成,有时失败),占12.5%;无效3例(服药后房事无改善),占7.5%。

王豪.实用中医内科杂志,1994,(2):30

通脉汤的临床新用

1. 冠状动脉粥样硬化性心脏病

郑发顺运用本方加减治疗冠状动脉粥样硬化性心脏病87例。方药:太子参30克,麦冬10克,五味子6克,瓜蒌15克,枳壳10克,川芎10克,丹参15克,赤芍15克,郁金9克,三七3克,甘草3克。首煎药液与复煎药液混合700毫升分2次于上午和下午空腹服下,20日为1个疗程,患者均服药2个疗程。随证加减:胸痛明显者加薤白10克,桂枝9克;形寒肢冷、汗出者加制附子10克,龙骨15克,牡蛎15克;胸闷痞满、痰白、苔白腻者加半夏10克,茯苓15克,石菖蒲10克,胆星6克;胸胁胀闷、嗝气者加香附10克,麦芽15克;血压偏高者加石决明15克,钩藤10克;疼痛剧烈者可针刺人中、膻中和内关等穴。结果:显效28例(占32.2%),有效32例(36.8%),好转18例(20.7%),无效9例(占10.3%);总有效率为89.7%。

郑发顺.中西医结合实用临床急救,1998,(3):119

2. 胸痹心痛

运用本方治疗胸痹心痛218例。方药:黄芪60~100克,丹参40克,赤芍、王不留行各30克,党参、川芎各20克,桂枝15克,桃仁、红花、当归、炙甘草各10克,三七粉(冲服)4克,加生姜3片,大枣3枚。随证加减:阳虚加制附子10~15克;气虚甚者去党参加红参10克;气滞重者加芸香、薤白各10克;痰滞重者加瓜蒌15克,半夏10克,白芥子15克;脘痛纳差者加砂仁10克,焦三仙各15克。水煎2次,早晚分服,并嘱患者忌食生冷、戒烟、禁酒,注意精神饮食上的调养。结果:显效:症状消失,心电图恢复正常者79例(气

滞血瘀型 48 例,痰滞血瘀型 31 例),占 36.2%;有效:症状明显好转,心电图基本恢复正常者 114 例(气滞血瘀型 68 例,痰滞血瘀型 46 例),占 52.3%;好转:症状有所好转,心电图有所改善者 22 例(气滞血瘀型 16 例,痰滞血瘀型 6 例),占 10.1%;无效:症状无好转,心电图无变化者 3 例(气滞血瘀型 3 例),占 1.4%。

刘家磊.甘肃中医,1995,(3):8

3. 脑动脉硬化症

运用本方加减治疗脑动脉硬化症 103 例。治疗组应用补肾通脉汤,方药:丹参、淫羊藿、制首乌、女贞子、骨碎补各 20 克,川芎、泽泻、山楂、玉竹各 12 克,枸杞、桃仁、红花、牛膝各 10 克。随证加减:气虚加黄芪、党参;痰浊加胆南星、半夏;运动障碍加地龙、僵蚕;肝阳上亢加天麻、钩藤。上方每日 1 剂,水煎 400 毫升,分早晚 2 次温服,2~4 周为 1 个疗程。西药对照组应用脑益嗪 25 毫克口服,每日 3 次;PSS100 毫克口服,每日 3 次;低分子右旋糖酐 500 毫升,静脉滴注,每日 1 次,2~3 周为 1 个疗程。两组均可连用 2~3 个疗程,治疗期间停用其他扩血管药物。结果:治疗组 103 例,基本治愈 24 例(23.3%),显效 40 例(38.8%),有效 35 例(34%),无效 4 例(3.9%),总有效率为 96.1%。对照组 35 例,基本治愈 4 例(11.4%),显效 7 例(20%),有效 19 例(54.3%),无效 5 例(14.3%),总有效率为 85.7%。治疗组总有效率及基本痊愈率、显效率均高于对照组($P < 0.01$)。

张志荪.实用中西医结合杂志,1997,(10):1755

4. 冠心病心绞痛

倪美华运用本方治疗冠心病心绞痛 30 例。治疗组方药:黄芪、丹参各 30 克,瓜蒌 20 克,茯苓 15 克,人参、石菖蒲、薤白、郁金、檀香、陈皮各 10 克,三七粉 4 克(冲服)。每日 1 剂,水煎 2 次兑匀,早晚分服。对照组服消心痛 10 毫克,每日 3 次,两组疗程均为 4 周。治疗期间除心绞痛发作时可舌下含服硝酸甘油片剂缓解外,停用其他中西药物。结果:治疗组 30 例,显效 17 例,有效 11 例,无

效2例;对照组28例,显效14例,有效12例,无效2例。

倪美华. 湖南中医杂志, 2005, (3): 12

5. 眩晕

陈淑华运用本方治疗眩晕18例。方药: 当归12克, 桃仁10克, 红花6克, 党参10克, 黄芪15克, 首乌15克, 桂枝10克, 赤芍12克, 甘草6克。随证加减: 若兼肝阳上亢, 血压升高者加石决明30克, 葛根30克, 钩藤15克; 兼阴虚阳亢者加生地10克, 钩藤12克; 兼气虚者重用黄芪35~50克; 兼阳虚者加熟附子9克, 川芎6克; 兼痰浊者加薤白、瓜蒌、法夏各9克; 兼呕吐剧烈者加玉枢丹1.5克; 吞服或肌注胃复安10毫克, 给予复方丹参注射液16毫升, 加入5%葡萄糖注射液或低分子右旋糖酐500毫升中静脉点滴, 每日1次。结果: 用药2天内眩晕及伴发症消失者10例; 用药2天内眩晕大减, 伴症状明显好转者7例; 用药2天内眩晕无减轻反加重者1例。

陈淑华. 黑龙江医药科学, 2000, (1): 76

6. 中风先兆症

刘静运用本方加减治疗中风先兆症40例。治疗组基本方: 黄芪、丹参、生山楂、茯苓各30克, 天麻、地龙各10克, 枸杞子、川芎、当归、赤芍、石菖蒲各15克, 钩藤20克。加减: 肝阳上亢者加生牡蛎、夏枯草、石决明; 痰浊壅滞者加半夏、陈皮; 肾虚血瘀者加何首乌、三七粉等。每日1剂, 水煎服。20天为1疗程, 连服2个疗程, 停药随访观察3个月。对照组给予肠溶阿司匹林75毫克, 每日1次; 维生素E100毫克, 每日3次; 维脑路通0.2克, 每日3次口服。结果: 治疗组治愈32例, 好转6例, 无效2例, 总有效率为95%。对照组治愈7例, 好转15例, 无效14例, 总有效率为61.11%。两组疗效比较有显著性差异($P < 0.001$)。

刘静. 吉林中医药, 2000, (3): 14

7. 动脉硬化性闭塞症

李继军运用本方加减治疗动脉硬化性闭塞症77例。方药: 黄

芪 18~30 克,当归 15 克,川芎 6 克,赤芍 10 克,桃仁 10 克,红花 10 克,牛膝 15 克,丹参 18~30 克,地龙 10 克。随证加减:气虚明显者加党参 15 克;寒甚者加附子 10 克;内热甚者可加玄参 12 克,生地 12 克;局部肿胀者加茯苓 10 克,泽泻 10 克。结果:临床治愈 28 例,占 36.4%;显效 34 例,占 44.2%;进步 9 例,占 11.7%;截肢 3 例,占 3.9%;3 例因合并心、肺功能衰竭而死亡。总有效率 92.3%。

李继军. 甘肃中医,1999,(2):19

8. 脑梗塞

陈德清运用本方加减治疗脑梗塞 129 例。方药:半夏、竹茹、陈皮、枳实、胆南星、菖蒲、泽泻各 10 克,川芎、地龙、赤芍各 15 克,红花、桃仁、生甘草各 6 克,每日 1 剂,水煎分 2 次服。15 天为 1 疗程。同时用 10% 葡萄糖加丹参注射液 20 毫升静脉滴注。一般 15 天停用丹参注射液。结果:86 例治愈(症状、体征基本消失,生活自理,偏瘫肢体肌力达 4~5 级),27 例显效(症状、体征显著好转,生活基本自理,偏瘫肢体肌力达 3 级以上);13 例好转(症状、体征减轻,生活不能自理,偏瘫肢体肌力进步 1~2 级);3 例无效(症状、体征均无明显变化)。总有效率 97.6%。治疗时间最短者 15 天,最长者 112 天,平均 42 天。

陈德清. 中国民政医学杂志,1996,(5):265

9. 输卵管阻塞不孕症

运用本方加减治疗输卵管阻塞不孕症 60 例。方药:当归、赤芍、川芎、生蒲黄、元胡、炮穿山甲、红花各 10 克。症见数年不孕,少腹胀痛,胸胁满闷,乳房胀痛,心烦易怒,经期尤甚者加川楝子、乌药各 10 克,香附 20 克,王不留行 15 克,柴胡 6 克;少腹冷痛,得热则舒者加细辛 3 克,桂枝、大茴香各 10 克,干姜 8 克;黄带量多,质稠,色黄如脓,有臭味,伴腰腹坠痛者加茯苓、蒲公英各 20 克,黄柏 10 克,红藤 12 克,薏米 15 克;形体肥胖,胃脘满闷,白带量多,质黏,少腹两侧疼痛者加苍术、半夏各 10 克,茯苓 15 克,陈皮 12 克,

山楂 20 克;腰酸腿软,畏寒肢冷者加仙灵脾 15 克,紫石英 25 克,覆盆子、巴戟天各 10 克;手足心热,头晕耳鸣,腰疼者加龟板 20 克,枸杞子 12 克,知母、黄柏各 6 克;体倦乏力,大便溏薄者加党参、白术各 15 克,黄芪 12 克以补气健脾通脉;妇科检查有炎性包块者加三棱 8 克,莪术 10 克;B 超检查输卵管积水者加木通 6 克,防己 8 克,茯苓 15 克。本法适用于经色暗红质稠,夹有黑血块;若经色淡,质稀无块者,慎用本方。月经干净后 1 日 1 剂,连服 5 剂。3 个月为 1 疗程。结果:原发性不孕 24 例,治愈 5 例,治愈率为 21%;输卵管通畅 10 例,有效率为 62%;继发性不孕 36 例,治愈 25 例,治愈率 69%;输卵管通畅 7 例,有效率 89%;总治愈率为 50%,总有效率为 78%。

王存兰. 四川中医, 1994, (4): 36

10. 老年性心绞痛

于鹏东等运用本方加减治疗老年性心绞痛 80 例。每日 1 剂,每日 3 次,每次 100 毫升。方药:黄芪、丹参、党参、白术、五味子、麦冬、当归、赤芍、川芎、桃仁、红花、地龙、蒲黄、黄精、甘草。随证加减:胸阳不振加瓜蒌、薤白、桂枝;痰浊阻滞加瓜蒌、薤白、姜半夏、厚朴;阴虚阳亢加牛膝、龙骨、牡蛎;脾肾阳虚加淫羊藿、桂枝、泽泻;阴阳俱虚加麦冬、五味子、淫羊藿。心绞痛发作时临时口服消心痛,严重者静脉滴注硝酸甘油。治疗 1 月为 1 疗程,连续观察治疗 3 个月。结果:显效 49 例,占 61%;有效 25 例,占 31%;无效 6 例,占 8%;总有效率为 92%。心电图表现:服药 1 个月后,显效 6 例,有效 20 例,总有效率为 31%;服药 3 个月后,显效 10 例,有效 27 例,总有效率为 69%。

于鹏东,等. 中国中医急症, 1999, (4): 192

11. 血栓闭塞性脉管炎

韩声宇运用本方加减治疗血栓闭塞性脉管炎 12 例。方药:当归、赤芍、丹参、地鳖虫各 15 克,桃仁 8 克,红花 6 克,川牛膝、川芎各 10 克,甘草 5 克。每日 1 剂,水煎 2 次温服。随证加减:偏虚寒

者加制附子、细辛、肉桂；血瘀痛甚者加炮甲珠、制乳没、马鞭草；郁而化热者加毛冬青、金银花、蒲公英、丹皮；气血两虚者加黄芪、熟地、白芍。4~6周为1个疗程，治疗1~2个疗程。结果：显效（治疗后临床症状消失，复查彩色多普勒超声波示：闭塞处大部再通，侧支循环形成，随访1年以上无复发者）4例，占33.3%；有效（临床症状基本消失或疼痛明显减轻，但长时间活动后仍有疼痛，彩色多普勒超声波示：闭塞处部分再通）6例，占50%；无效（症状及体征与治疗前无明显改善或略好转）2例，占16.7%。总有效率83.3%。

韩声宇. 四川中医, 1999, (7): 2

12. 病毒性心肌炎

潘学敏等运用本方加减治疗病毒性心肌炎60例。方药：黄芪15克，党参12克，麦冬12克，五味子12克，川芎12克，白芍12克，丹参15克，生地12克，炙甘草10克，苦参12克，板蓝根12克，蒲公英15克，木香10克，郁金10克。每日1剂，水煎服。小儿减半。疗程1个月。睡眠差者可加炒枣仁、柏子仁。对急性期患者，可给黄芪注射液20毫升加5%葡萄糖注射液250毫升，静脉点滴2周，心律失常者给西药心律平3~5毫克/千克。结果：经1~3个疗程治疗，60例患者，痊愈48例，占80%；好转10例，占16.67%；无效2例，占3.33%。总有效率为96.67%。

潘学敏, 等. 内蒙古中医药, 1998, (21): 6

13. 精索静脉曲张所致不育

刘广程运用本方加减治疗精索静脉曲张所致不育60例。方药：桃仁10克，川芎10克，丹参30克，赤芍药20克，牛膝30克，黄芪3克，木香10克，苏木10克，刘寄奴10克，水蛭（冲）6克，益母草30克，生地黄10克，当归10克。每日1剂，水煎服，1个月为1疗程，一般服药1~3个疗程。结果：治愈35例（58.3%），好转15例（25%），无效10例（16.7%），总有效率为83.3%。

刘广程. 河北中医, 2005, (2): 50

14. 输卵管不通

马铭霞运用本方加减治疗输卵管不通 69 例。方药:赤白芍各 20 克,丹参 30 克,穿山甲 10 克,桃仁 10 克,红花 10 克,浙贝 10 克,夏枯草 20 克,地丁 30 克,败酱草 20 克,黄柏 10 克,苦参 12 克。随证加减:以湿毒入侵,瘀热互结为主者,加二花 30 克,苡仁 30 克,鱼腥草 30 克;以瘀血内阻,积块坚硬为主者加昆布 10 克,海藻 10 克,路路通 10 克,王不留行 30 克;久病或用上方治疗后有肝肾虚象者加黄芪 30 克,菟丝子 30 克,紫河车 10 克,覆盆子 10 克,女贞子 10 克。水煎服,1 日 1 次。结果:痊愈 56 例,占 81%;显效 9 例,占 13%;无效 4 例,占 6%。总有效率 94%。

马铭霞. 河南中医药学刊, 1999, (4): 61

15. 视网膜静脉阻塞

庞万敏等运用本方加减治疗视网膜静脉阻塞 114 例(116 只眼)。方药:当归、甘草、羌活、防风、木贼、蝉蜕、丹参、赤芍各 10 克。水煎服,每日 1 剂。所有病例均以服用本方为主,据证可酌情加减:如出血初期可加凉血止血药白茅根、大小蓟、炒蒲黄;视网膜水肿明显者加车前子、坤草、茺蔚子以活血祛瘀利水;出血日久,眼底渗出明显者加夏枯草、珍珠母、生龙牡以软坚散结;后期眼底出血吸收但视力恢复欠佳时可加女贞子、菟丝子、枸杞子、车前子以益肾明目恢复视功能。西药:服用维生素 B、维生素 C、芦丁、地巴唑、腺苷辅酶等。血压高者加服复方降压片。7 例病人于发病初期静脉点滴脉通 500 毫升加复方丹参注射液 8 毫升,每日 1 次,共 10 次,因出血增多停用。观察病例中有出血在两个月以上者可肌肉注射安妥碘,每次 0.4 克,10 次为 1 疗程。眼底出血吸收但视力恢复不良者可肌注眼明注射液,每次 2 支,每日 1 次。结果:116 只眼中治愈 43 只眼,占 37.1%;显效 47 只眼,占 40.5%;好转 15 只眼,占 12.9%;无效 5 只眼占,4.3%;退步 6 只眼,占 5.2%。疗程最短 28 天,最长 175 天;疗效出现时间最短 3 天,最长 15 天。

庞万敏,等. 中国中医眼科杂志, 1992, (3): 134

16. 雷诺氏病

赵建群等运用本方加减治疗雷诺氏病 20 例。方药:当归 15 克,桂枝 15 克,白芍药 15 克,木通 5 克,细辛 6 克,附子 12 克,大黄(酒制)10 克,大枣 10 克,甘草 10 克。每日 1 剂,水煎 2 次,共取汁 500 毫升,分 2 次服用。药渣加水适量煮沸后熏洗患处。随证加减:若内有久寒者,加吴茱萸 10 克,生姜 5 克;情绪易激动者加生龙骨、生牡蛎各 30 克;疼痛甚者加白芷 15 克;皮肤紫绀甚者加五灵脂 10 克,水蛭 5 克(研冲)。结果:治愈(症状、体征消失,冷水试验阴性)15 例;好转(症状、体征减轻,冷水试验好转)5 例。

赵建群,等.河北中医,1998,(4):198

17. 中风后遗症

贾琦运用本方治疗中风后遗症 82 例。方药:生黄芪 40 克,人参、酒大黄、当归尾、川芎各 10 克,白芍 12 克,水蛭 8 克。每日 1 剂,水煎 2 次,每次煎 200 ~ 300 毫升早晚各服 1 次,20 天为 1 疗程。随证加减:若痰多者加用制半夏、天竺黄以化痰;口眼歪斜者加白附子、僵蚕、全蝎以化痰通络;语言不利者加菖蒲、远志以开窍化痰;偏寒者去酒大黄,加熟附子以温阳散寒;下肢瘫重者加用杜仲、川牛膝以补肝肾不足。结果:基本痊愈 52 例,显效 20 例,有效 8 例,无效 2 例,总有效率为 93.70%。其中服药时间最短者为 20 天,最长者为 60 天,未见任何毒副反应。

贾琦.陕西中医,1997,(3):104

18. 缺血性脑卒中

王悟云运用本方加减治疗缺血性脑卒中 82 例。方药:黄芪 30 克,全蝎 6 克,川芎 12 克,穿山甲、红花、地龙、桃仁各 10 克,当归、赤芍药、丹参各 15 克。随证加减:头痛剧烈加葛根、泽泻;神志不清加石菖蒲、胆南星;语言障碍加郁金;眩晕头昏加菊花、珍珠粉;血压过高加天麻、白僵蚕、泽泻;血压过低加枸杞子;喉中痰鸣加鲜竹沥、川贝母。水煎服,每日 1 剂,神志不清可鼻饲灌服。结果:基本痊愈 45 例,占 54.9%;显效 25 例,占 30.5%;好转 7 例,占

8.5%;无效5例(其中转由西医治疗的3例,抢救无效死亡的2例),占6.1%;总有效率为93.9%。

王悟云.河北中医,2004,(11):817

19. 老年Ⅱ型糖尿病

瞿伟运用本方治疗老年Ⅱ型糖尿病30例。方药:生黄芪、黄精、生山药、生薏仁、生山楂、葛根各15克,白芥子、水蛭各10克。多饮多食明显者加生石膏30克,肥知母10克;有阴伤之象者加生地15克,玄参10克;兼有高血压者加生龙牡各30克;视网膜病变者加密蒙花、谷精草各10克;1日1剂,早晚分服。另加达美康(天津华津制药厂生产)80毫克2次/天。对照组在饮食控制基础上仅服达美康80毫克2次/天。结果:治疗4周后,显效24例(80.0%),有效4例(13.3%),总有效28例(93.3%)。对照组显效14例(46.7%),有效12例(40.0%),总有效26例(86.7%)。经检验,观察组疗效明显优于对照组($P < 0.05$),显效率差异有极显著性($P < 0.01$)。

瞿伟.南通医学院学报,1997,(2):253

20. 病态窦房结综合征

刘静等运用本方加减治疗病态窦房结综合征30例。方药:人参10克,桂枝、麦冬、五味子各12克,丹参、当归各15克,细辛3~12克,炙甘草10克。随证加减:兼血瘀者加川芎、红花各10克;兼心痛者加延胡索15克,蒲黄10克;脉迟甚者,加炙麻黄6克,附子9克;气虚重者,加黄芪30克,炒白术15克;胸闷痰多者加瓜蒌、薤白、半夏各9克。每日1剂,水煎温服。20天为1个疗程。结果:治疗2个疗程后,显效(临床症状消失,安静状态下心率在60次/分钟以上,或比治疗前提高10次/分钟以上,阿托品试验阴性)17例;有效(临床症状改善,安静状态下心率在55~60次/分钟之间,或比治疗前提高5~9次/分钟,阿托品试验阴性)11例;无效(临床症状改变不明显,心率较治疗前提高低于5次/分钟,阿托品试验阳性)2例;总有效率93.3%。

刘静,等. 吉林中医药,2000,(5):18

21. 多发性大动脉炎

陈建宗等运用本方加减治疗多发性大动脉炎 14 例。方药:附子、干姜、肉桂、细辛、黄芪、当归、丹参、川芎、桂枝、川牛膝、水蛭。临床以此方为基础,辨证加减,10 多年来,治疗多发性大动脉炎 14 例,除 1 例病情无变化,1 例病情呈进行性进展外,其余 12 例临床症状明显缓解、体征明显改善。

陈建宗,等. 江西中医药,1998,(1):37

22. 室性早搏

王泳运用本方加减治疗室性早搏 20 例。本方由党参、黄芪、丹参、苦参、甘松、莪术、白术、龙眼肉、当归、桂枝、三七粉(另吞)、甘草等组成。心阳虚衰加红参、附子,益气温阳;心阴不足加麦冬、制黄精、五味子,滋养心阴;心神不宁加远志、生龙牡,宁心安神;痰湿内阻加茯苓、法半夏、瓜蒌,化痰祛湿;气滞血瘀加红花、川芎,活血理气。每日 1 剂,水煎后分 2 次服用。7 剂为 1 个疗程。治疗 1 个疗程后,复查心电图 1 次,连续观察 3~4 个疗程。结果:显效(治疗后早搏完全消失,胸闷、心悸等症完全消除,半年内无复发)7 例;有效(治疗后早搏比原来减少 50%,胸闷、心悸等症有所改善)11 例;无效(治疗后无变化)2 例。总有效率为 90%。

王泳. 辽宁中医杂志,2000,(10):498

23. 先天性静脉畸形骨肥大综合征

运用中西医结合治疗先天性静脉畸形骨肥大综合征 14 例。术后除常规抗感染以外,口服潘生丁 25 毫克,1 天 3 次;肠溶性阿司匹林 25 毫克,1 天 3 次,连服 1 周,以预防深静脉血栓形成。术后 6 小时开始口服消肿通脉汤(防己 30 克,黄柏、金银花、鸡血藤各 25 克,王不留行、丝瓜络、赤芍各 15 克,丹参、红花、乳香各 10 克),1 天 1 剂,连服 2 周。结果:肢体肿胀明显消退,患者肢体酸胀感消失,术后 4 周造影复查:深静脉显示良好,吻合血管通畅,随访 1 年未见复发。

尹红. 湖北中医杂志, 2001, (9): 17

十全大补汤的临床新用

1. 骨折内固定术后骨感染

蓝桂森运用本方加减治疗骨折内固定术后骨感染 45 例。内服本方补益气血, 清热解毒, 祛瘀通络, 扶正祛邪; 外用玉红生肌膏活血祛瘀、解毒祛腐生肌。结果: 经治疗 3 周, 伤口愈合 26 例; 经治疗 4 周, 伤口愈合 10 例; 经治疗 6 周, 伤口愈合 9 例。其中有 4 例伤口愈合后 2~3 周复发, 经再次治疗, 伤口愈合。随访 1~6 年, 无复发及后遗症。

蓝桂森. 新中医, 2000, (5): 28

2. 低血压症

康永等运用本方加减治疗低血压症 168 例。方药: 人参 6 克, 肉桂 (去粗皮, 不见火) 3 克, 川芎 8 克, 熟地 12 克, 茯苓 12 克, 白术 (焙) 10 克, 炙甘草 8 克, 黄芪 (去芦) 15 克, 川当归 (洗, 去芦) 10 克, 白芍 8 克。上药 1 剂用水 250 毫升, 加生姜 3 片, 大枣 3 个, 同煎至 100 毫升, 每日分 3 次温服。加减: 若气虚较甚者症见身疲乏力, 倦怠短气, 纳少, 舌淡胖, 脉弱甚者, 倍人参、黄芪量, 并加山药、黄精之品; 若阳虚较甚者症见畏寒怕冷, 四肢不温, 肢冷喜按, 大便溏软, 加肉桂至 6 克, 并酌加干姜、肉豆蔻、炮附子之属; 若兼有阴虚者症见手足心热, 午后潮热, 盗汗, 心烦不安, 失眠, 舌红少苔, 脉细数, 可减去肉桂辛温之品以防温燥伤阴, 白术减半或去掉, 加天麦冬、沙参、玉竹、石斛养阴之品; 若血虚较甚者症见头晕目眩, 视物昏花, 面色苍白, 唇甲色淡, 心悸失眠, 舌淡脉细, 宜加重养血之品, 上方倍四物汤之量, 并可加阿胶、桑椹子之属; 兼气滞、血瘀、痰饮、食积等可随症加减。结果: 显效 114 例, 占 67.9%, 服药 1 个疗程 33 例, 2 个疗程 57 例, 3 个疗程 24 例; 有效 48 例, 占 28.6%, 服药 1 个疗程 11 例, 2 个疗程 23 例, 3 个疗程 14 例; 无效 6 例, 占

3.5%；总有效率为96.5%。治疗后头晕目眩、心悸气短、失眠健忘、形寒肢冷等症亦有明显改善和缓解。

康永. 中国中医药信息杂志, 1998, (1): 27

3. 中重度贫血

王常有等运用本方加减治疗中重度贫血42例。方药: 人参6克, 黄芪20克, 云苓15克, 白术20克, 生地20克, 熟地20克, 川芎12克, 白芍20克, 当归20克, 肉桂5克, 益母草15克, 焦三仙各10克, 炙甘草6克。口苦咽干、胸胁胀满者加柴胡、双花; 脘腹痞闷、呕吐不欲饮食者加川朴、木香、陈皮; 出汗较甚者加防风、龙骨、牡蛎; 心悸、失眠多梦者加五味子、枣仁、远志。每日1剂, 武火至沸, 文火煎45分钟, 温服。西医治疗: 根据贫血的性质和类型, 分别施行抗贫血治疗, 选择应用铁制剂、叶酸等, 配合饮食调节。结果: 显效28例, 有效13例, 无效1例, 总有效率为97.6%。

王常有, 等. 恩施医专学报, 1999, (5): 286

4. 阴吹症

赵丰隆运用本方治疗阴吹症6例。方药: 党参、炙黄芪各15克, 当归、熟地各12克, 白芍、白术、阿胶各10克, 茯苓9克, 肉桂、砂仁、炙甘草各3克。中气下陷加升麻3克, 柴胡6克; 大便秘结加火麻仁、炒枳壳各10克。结果: 均痊愈。随访中, 有1例于1年后复发, 后经上方治疗再次获愈, 至今未复发。一般服药20~30剂。

赵丰隆. 安徽中医学院学报, 1989, (4): 34

5. 糖尿病性痢症

李凯等运用本方加减治疗糖尿病性痢症28例。内服本方加减, 常规用量, 随证加减, 每日1剂, 水煎分3次服, 15天为1个疗程。湿烂重者加苡米60克, 炒山药60克, 并适当加大茯苓、白术用量; 感染重者加二花90克, 蒲公英、连翘各30克; 痢症重者加毛冬青90克, 牛膝、鸡血藤、丹参各30克; 疼痛重者加醋延胡索15克, 乳香、没药各10克。外治: 硫酸链霉素粉针剂外用, 每次不超过100万单位。一般1~2天换药1次。对下肢痢症或溃疡者嘱其限

制活动并抬高下肢休息。结果:经治 1~4 个疗程,痊愈 21 例(75.0%),好转 5 例(17.8%),无效 2 例(7.2%)。总有效率 92.8%。在痊愈的 21 例中,用药 1 个疗程治愈者 2 例,2 个疗程治愈者 5 例,3 个疗程治愈者 8 例,4 个疗程治愈者 6 例。一般下肢痈疽患者治愈所需时间相对较长。

李凯,等. 国医论坛,1999,(6):32

百合汤的临床新用

1. 胃脘痛

刘兴旺运用本方治疗胃脘痛 50 例。方药:百合 30 克,乌药 10 克。临证加减:吐酸者加乌贼骨 30 克,川贝母 10 克;呃逆呕吐频作者加代赭石 30 克,姜半夏 15 克;腹胀便秘者加川朴 12 克,大黄 4 克;纳少便溏者加太子参 20 克,茯苓 15 克;得温痛轻者加砂仁 10 克,炮姜 6 克;糜烂性胃炎者加刘寄奴 20 克,蒲公英 15 克;胆汁返流性胃炎者加黄连 3 克,白芍 20 克;萎缩性胃炎者加黄芪 30 克,当归 10 克。水煎服,1 日 1 剂,7 剂为 1 疗程。结果:经过 1~5 个疗程的治疗,15 例临床治愈(自觉症状消失,胃镜或食道造影检查正常);24 例基本痊愈(症状基本消失,经检查病灶显著好转);5 例显效(症状及检查较治疗前好转);6 例无效(症状及检查病灶较治疗前变化轻微或无变化)。总有效率 88.8%。

刘兴旺. 陕西中医,1999,(9):388

2. 老年性皮肤瘙痒症

刘建华运用本方加减治疗老年性皮肤瘙痒症 47 例。方药:当归 10 克,生地 15 克,白芍 10 克,川芎 6 克,鸡血藤 15 克,百合 15 克,白蒺藜 12 克,地肤子 12 克,桑叶 10 克,荆芥 10 克,白鲜皮 12 克,土茯苓 15 克,甘草 6 克。若心悸、失眠者加柏子仁 10 克,酸枣仁 10 克;舌质红,苔黄腻,湿热较重者,去生地、川芎,加山栀子 10 克,紫草 12 克,薏苡仁 15 克;病程长,加丹参 15 克,桃仁 10 克,牛

膝 10 克,白芍改赤芍。上方中药每日 1 剂,水煎服 3 次,1 个月为 1 疗程,连服 3 个疗程。结果:显效 18 例(38%),有效 25 例(53%),无效 4 例(9%),总有效率 91%。

刘建华. 实用中医内科杂志,2003,(6):488

3. 带状疱疹

欧柏生运用本方加减治疗带状疱疹 38 例。方药:柴胡 12 克,郁金 12 克,川楝子 12 克,丹参 15 克,蒲公英 20 克,马齿苋 30 克。水煎服。皮损发于头面部者加蝉衣 10 克,僵蚕 12 克;发于上肢及肩背部者加桑枝 12 克,当归 12 克,木通 12 克;发于胸部者加龙胆草 10 克,板蓝根 15 克;发于腰腹及下肢者加黄柏 12 克,川牛膝 15 克,苡米 15 克。同时配合外治,用马齿苋、蒲公英各 30 克,煎浓液外搽患处,每隔 4 小时 1 次。结果:治愈 36 例,占 94.7%;显效 2 例,占 5.3%;全部有效。一般 3~7 天内皮损大部分结痂或结痂完全脱落,1~2 天内疼痛消失。平均治愈天数为 6 天。

欧柏生. 湖南中医杂志,1996,(3):38

4. 消化性溃疡

吴俊贤等运用本方加减治疗消化性溃疡 34 例。所有患者均停服西药,以本方为基础方治疗:百合、蒲公英各 15 克,甘草、柴胡、郁金、川楝子、黄芩、丹参、乌药各 10 克。上腹胀呕甚加竹茹 15 克,白术 10 克;刺痛不移加桃仁 10 克;胃脘挛急痛重用白芍 30~50 克;偏脾胃虚寒加党参、高良姜各 10 克;偏脾气虚加黄芪、党参各 15 克。每日 1 剂,煎服 2 次,1 个月为 1 疗程,治疗 2 个疗程。治疗期间忌烟酒及酸辣等刺激性食物。结果:治愈 10 例,显效 15 例,有效 7 例,无效 2 例,总有效率 94.1%。

吴俊贤. 广西中医药,2003,(3):44

5. 消化性溃疡

张志标运用本方加减治疗消化性溃疡 48 例。方药:百合 20 克,乌药 10 克,柴胡 10 克,黄连 10 克,丹参 15 克,郁金 10 克,川楝子 10 克,白芍 10 克。郁热证加蒲公英 15 克;虚寒证加良姜 6 克,

黄芪 15 克;瘀血证加五灵脂 10 克,生蒲黄 10 克,刺猬皮 10 克。上药每日 1 剂,水煎分 3 次服。15 剂为 1 个疗程,疗程间休息 2~3 天,共治疗 3 个疗程。服药期间停用西药、忌酒。结果:临床治愈 39 例,显效 7 例,有效 2 例。胃镜疗效显示临床治愈 40 例,显效 4 例,有效 2 例,无效 2 例,总有效率 95.8%。

张志标. 中国民间疗法, 2003, (4): 39

6. 慢性胃炎

郑发顺运用本方加减治疗慢性胃炎 96 例。治疗组服自拟平胃百合汤:苍术 6 克,厚朴 9 克,陈皮 10 克,百合 15 克,乌药 9 克,木香 9 克,香附 10 克,半夏 10 克,麦芽 15 克,茯苓 15 克,甘草 3 克,每日 1 剂,水煎 600 毫升,分 2 次温服。随证加减:胃脘痛明显,可延及两胁者加柴胡 9 克,川楝子 9 克,元胡 9 克;脾胃虚寒,疼痛以饥饿时尤甚者加黄芪 15 克,白芍 15 克;恶心呃逆明显者加旋覆花 10 克;口苦纳呆者加苡米 15 克,神曲 10 克;疼痛日久,瘀血阻络者加蒲黄 10 克,五灵脂 10 克;疗程为 1 个月。对照组 40 例,给予胃复安 10 毫克,庆大霉素 8 万单位,地巴唑 10 毫克,每日 3 次,法莫替丁 20 毫克,每日 2 次,疗程同治疗组。结果:治疗组痊愈 55 例,占 57.3%;好转 32 例,占 33.3%;无效 9 例,占 9.4%;总有效率为 90.6%。对照组痊愈 20 例,占 50%;好转 13 例,占 32.5%;无效 7 例,占 17.5%;总有效率为 82.5%。两组疗效比较,有显著性差异。

郑发顺. 黑龙江中医药, 1997, (4): 15

7. 难治性咯血

吴圣明等运用本方加减治疗难治性咯血 31 例。治疗组:在对病因治疗的基础上,加用蕊石百合汤:花蕊石 50 克,炒大黄 8 克,参三七 3 克(研末服),棕榈炭 20 克(包煎),炒侧柏叶 12 克,白茅根 30 克,百合 12 克,麦冬 10 克,生甘草 3 克。若咳嗽加天竹子 12 克,川贝母 6 克;潮热盗汗加地骨皮 10 克,银柴胡 10 克;脉细气虚加黄芪 30 克;每天 1 剂,煎服 2 次,服药时间最长不超过 10 天,咯

血停止后即中止服药,对于咯血总量大,血色素低的患者,给予输血及其他对症治疗。对照组:在病因治疗及对症治疗的基础上,每天加用垂体后叶素 20 单位,止血芳酸 300 毫克加入 10% 葡萄糖溶液 1 000 毫升中静脉滴注 10 天,咯血量给予输血等治疗。结果:治疗组分别于 3 天内 6 例、7 天内 16 例、10 天内 2 例停止咯血;临床治愈 24 例,好转 3 例,无效 4 例,总有效率 87.1%。对照组治疗 10 天后临床治愈 12 例,好转 8 例,无效 10 例,总有效率 66.6%。两组总有效率对比,治疗组明显优于对照组。

吴圣明,等.实用中医内科杂志,2003,(6):490

8. 抑郁症

魏绪华运用本方加减治疗抑郁症 85 例。方药:百合 18 克,生地黄 20 克,知母 12 克,麦冬 10 克,五味子 10 克。加味:心肺阴虚者加合欢花 20 克,木香 6 克,生姜 3 克,夜交藤 20 克,红枣 6 枚;肝郁阴虚者加青皮 10 克,陈皮 12 克,枳实 10 克,木香 6 克;肺肾阴虚者加地骨皮 10 克,何首乌 10 克,炙鳖甲 16 克(先煎);心肾不交者加川黄连 8 克,肉桂 10 克,生龙骨 20 克,煅牡蛎 20 克,阿胶 3 克(烔化);痰热内扰者加瓜蒌 15 克,杏仁 4 克,枳实 10 克,陈皮 10 克,半夏 14 克,白茯苓 10 克,胆南星 14 克,黄芩 10 克,甘草 4 克。每日 1 剂,分 2 次煎服。结果:显效 34 例(40.00%),有效 39 例(45.88%),无效 12 例(14.12%),总有效率 85.88%。

魏绪华.江苏中医药,2002,(7):25

桔梗汤的临床新用

1. 小儿病毒性与消化不良性肠炎

陈建平运用本方加减治疗小儿病毒性与消化不良性肠炎 136 例。在进行液体疗法、纠正水电解质平衡、调整饮食的同时,服用苍术桔梗汤:苍白术各 6 克,桔梗 5 克,煨葛根 6 克,茯苓、怀山药各 10 克,炒扁豆、车前子(包)各 6 克,炙内金、陈皮各 5 克。1 日 2

剂,水煎少量频服。结果:痊愈(治疗3天内,大便成形,大便次数每日3次以下,全身症状消失,大便镜检正常,病原学检查阴性)79例,占58%;有效(治疗3天内,大便次数明显减少,性质明显好转,但尚未成形,镜检正常或较前好转)51例,占37.5%;无效(治疗3天内,大便次数、性质无改善或症状加重)6例,占4.5%,总有效率95.5%。

陈建平. 四川中医, 1999, (2): 42

2. 放射性食管炎

沈国伟等运用本方治疗放射性食管炎128例。1日1剂,分2次服,10天为1疗程。如疼痛较剧烈者,可加玄参15克,蚤休10克,山豆根、银花、射干各10克;如下咽困难较严重者,可加瓜蒌皮18克,浙贝10克,天门冬10克,竹茹10克,板蓝根15克。结果:1~2个疗程后,治愈87例,好转30例,无效11例,总有效率达91.4%。其中,由食管癌放射治疗引起者治愈50例,好转18例,无效7例;由肺癌放射治疗引起者治愈28例,好转7例,无效3例;由纵隔肿瘤放射治疗引起者治愈9例,好转5例,无效1例。由纵隔肿瘤放射治疗引起的放射性食管炎疗效最好,肺癌次之,食道癌较差,提示与距离食道远近所受照射的剂量最有关,与中药的疗效关系不大。

沈国伟,等. 北京中医, 1996, (6): 16

3. 咳嗽

李瑞雪运用本方加减治疗咳嗽60例。方药:桔梗、半夏、僵蚕、浙贝、牛蒡子、威灵仙、紫菀、百部各12克,甘草10克。每日1剂,水煎服。风热咳嗽,痰多色黄,咽喉肿痛者加射干、黄芩各12克,薄荷10克;风寒咳嗽声重,咽痒,咳痰稀薄色白者加麻黄5克,杏仁12克,苏叶10克;燥咳痰少,咽干唇燥者加桑叶10克,沙参、百合各12克;久咳兼脾虚者加茯苓15克,太子参、白术各12克。结果:治愈(咳嗽及兼症均消失)47例,占78%;好转(咳嗽及兼症均减)11例,占17%;无效(服药7剂症状不减)2例,占3%。其中

风热咳嗽治愈 21 例,好转 3 例;风寒咳嗽治愈 17 例,好转 4 例;燥邪致咳者治愈 5 例,好转 2 例;久咳夹脾虚治愈 4 例,好转 2 例,无效 2 例。服药最少 3 剂,最多 9 剂。

李瑞雪. 实用中医药杂志, 2004, (7): 366

4. 咽炎

孙建平运用本方加味治疗咽炎 193 例。方药: 桔梗 10 克, 甘草 12 克, 银花 6 克, 大海 6 克, 牛蒡子 6 克, 玄参 6 克。急性咽炎者加山豆根 6 克, 板蓝根 6 克; 伴口渴者加麦冬 6 克; 声音嘶哑者加蝉衣 6 克; 痰多者加大贝 6 克。每日 1 剂, 冲洗干净, 以开水闷泡后代茶饮, 反复加水 3~4 遍频服, 一般 8~12 剂可愈。

孙建平. 光明中医, 2002, (4): 46

5. 喉源性咳嗽

李晓静运用本方加减治疗喉源性咳嗽 67 例。方药: 麦门冬 15 克, 白僵蚕 10 克, 桔梗 7 克, 百部 15 克, 蝉蜕 10 克, 杏仁 15 克, 甘草 7 克。随证加减: 伴风热者加金银花、连翘; 伴痰热者加黄芩、全瓜蒌; 伴温燥者加生地、知母; 伴阴虚者加玄参、五味子; 伴气虚者加黄芪、太子参。每日 1 剂, 水煎, 分早、晚饭后 2 次服。服药期间停用其他西药, 5 日为 1 个疗程。儿童酌情减量。结果: 痊愈 61 例(1 个疗程痊愈 29 例, 2 个疗程痊愈 21 例, 3 个疗程痊愈 11 例), 有效 3 例, 无效 3 例。痊愈率 91.04%。

李晓静. 河北中医, 2001, (8): 584

6. 急性化脓性扁桃体炎

王秀娟运用本方加减治疗小儿急性化脓性扁桃体炎 36 例。方药: 冬瓜仁 10~12 克, 芦根 15~20 克, 薏苡仁 10~12 克, 败酱草 12~15 克, 桔梗 8 克, 丹皮 10 克, 赤芍 8~10 克, 甘草 6~10 克。随证加减: 外感初起偏风热者加桑叶、薄荷、杭菊; 严冬感寒者加苏叶、淡豆豉、芥穗; 有阳明经腑证加熟军、玄明粉; 舌红少苔有阴伤之征象时, 加生地、花粉、元参之类, 以顾护肺胃之阴。结果: 显效 27 例, 有效 9 例。

王秀娟. 北京中医, 1998, (5): 45

7. 纵隔良性肿瘤

姚大利运用本方加减治疗纵隔良性肿瘤 12 例。方药: 桔梗 50 克, 甘草 25 克。每日 1 剂, 早晚各 1 次, 空腹服。1 个月后剂量减半, 连续服用半年为 1 疗程。结果: 1 个疗程后, 4 例胸闷、咳嗽、气促症状全部消失, 3 例支气管源性囊肿经 CT 检查肿块较服药前缩小 0.5~0.8 厘米, 9 例经 CT 检查肿瘤均无发展, 生存质量均良好。

姚大利. 中医函授通讯, 1996, (6): 32

升麻葛根汤的临床新用

1. 麻疹

牛忻群运用本方加减治疗麻疹 17 例。服用本方每日 1 剂, 1 周为 1 疗程。结果: 均在 1 周内治愈, 其中服药最多 4 例, 一般 2 剂, 治愈率为 100%。

牛忻群. 安徽中医临床杂志, 1996, (4): 176

2. 丙肝

运用本方加味治疗丙肝 78 例。中药基础方: 升麻、葛根、白芍、甘草。若黄疸重者, 加茵陈、赤芍; 胁痛者, 加郁金、元胡; 口苦、便秘者, 加大黄、龙胆草; 胁下痞块触之痛者, 加三棱、莪术、醋鳖甲; 心烦失眠者, 加黄连、栀子; 恶心、纳差者, 加半夏、竹茹、焦三仙。每日 1 剂, 水煎服。复方丹参注射液 20 毫升 (市售), 加入 5% 葡萄糖注射液 250 毫升内静脉点滴, 每日 1 次。其他治疗用肝泰乐、肌苷、复合维生素 B、维生素 C、强力宁 (或甘利欣)、门冬氨酸钾镁等。对照组 (60 例) 除不用中药和复方丹参液静滴外, 其他治疗与治疗组相同, 30 日为 1 疗程。结果: 治疗组患者显效 (临床症状消失, 肝功能恢复正常) 38 例 (48.7%); 有效 (临床症状明显改善, 肝功能基本恢复正常) 28 例 (35.9%); 无效 (未达到上述标准) 12 例 (15.40%); 总有效率 84.6%。对照组显效 14 例 (23.3%), 有效

24 例(40%),无效 22 例(36.7%),总有效率 63.3%。两组比较有显著差异($P < 0.05$)。

李光. 河南中医药学刊, 2001, (2): 36

3. 乙型肝炎

朱伊彬运用本方加味治疗乙型肝炎 300 例。方药: 升麻、葛根、赤芍、金银花、黄芪各 30 克, 陈皮、甘草各 6 克。有黄疸者加茵陈、金钱草各 30 克; 伴肝区隐痛者加川楝子、醋延胡索各 30 克; 伴腹胀纳差者去黄芪, 加木香 10 克, 炒麦芽 20 克, 砂仁 6 克; 伴有腹水者加白术、白茯苓、猪苓、泽泻各 10 克, 车前子 15 克。水煎服, 每日 1 剂, 每剂 3 煎, 每煎煮沸后文火煎 40 分钟以上。3 煎混匀后分 3 次饭前半小时服。3 月为 1 疗程, 一般治疗 1~3 个疗程, 每疗程后复查肝功能及乙肝 5 项。肝脾 B 超异常者复查 B 超。结果: 治愈 195 例, 占 65.0%, 其中 1 个疗程治愈者 98 例, 2 个疗程 76 例, 3 个疗程 21 例; 显效 76 例, 占 25.3%, 其中 1 个疗程显效者 5 例, 2 个疗程 27 例, 3 个疗程 44 例; 好转 28 例, 占 9.3%, 其中服药 2 个疗程好转者 9 例, 3 个疗程 19 例; 无效 1 例, 占 0.3%。未坚持服药 3 个疗程者未统计。

朱伊彬. 安徽中医临床杂志, 1997, (5): 252

4. 耳鼻喉科病

运用本方加减治疗副鼻窦炎 1 例, 服药 4 剂后, 症状基本消失, 检查鼻黏膜充血减退, 再服 4 剂巩固疗效, 至今 2 年多未复发。

王本祥. 四川中医, 2002, (1): 70

5. 头面部疾病

郑通美等运用本方加减治疗鼻渊 1 例, 水煎分服, 每日 1 剂, 共服 30 剂, 鼻塞流涕除, 头昏头痛消, 继以玉屏风胶囊合通窍鼻炎片巩固疗效, 随访半年, 偶有鼻塞, 但无浊涕。

郑通美, 等. 实用中医药杂志, 2004, (12): 709

射干汤的临床新用

1. 急性咽炎

郑新维运用本方加减治疗急性咽炎 48 例。方药:射干、山豆根、马勃各 15 克,金荞麦、野菊花、杏仁、桔梗、薄荷、贯众、板蓝根、生甘草各 10 克。以上诸药用凉水浸泡 30 分钟,然后用文火煎熬 25 分钟。每日 1 剂,分 2 次服,5~7 天为 1 疗程,小儿剂量减半。若口渴热盛,体温升高者加入生石膏 30 克,生大黄 15 克(后下);咽部灼痛,扁桃体肿大者加刺双手的少商、商阳二穴放血。结果:治愈(咽部肿胀充血、疼痛消除,双侧扁桃体及体温正常)41 例,其中 1 个疗程痊愈 18 例,2 个疗程 20 例,3 个疗程以上者 10 例;好转(咽部肿胀、充血消失,扁桃体稍大,饮食其他均正常)6 例;无效(用药后病情无变化)1 例。总有效率 98%。半年后随访复发者 7 例,经用上述方法治疗又获痊愈。

郑新维. 陕西中医, 1994, (4): 172

2. 小儿喘息性支气管炎

郭晓渊运用本方加减治疗小儿喘息性支气管炎 30 例。对照组给以常规剂量的抗生素及平喘剂(氨茶碱、复方甘草合剂等)治疗。治疗组在上述抗生素治疗的基础上,不用平喘剂,而给予中药麻杏射干汤:麻黄 2 克,杏仁 2 克,射干 4 克,炒地龙 4 克,桃仁 2 克,桔梗 3 克。热甚者加石膏、炒葶苈子、炒莱菔子;寒甚者加干姜、细辛、五味子;便溏者加厚朴花、白芥子;日久者加红花、川芎;咳甚者加炙百部、炙紫菀。水煎 150~200 毫升,分多次口服,每日 1 剂,连用 3 天。结果:治疗组显效 12 例,好转 16 例,无效 2 例,总有效率 93.3%。对照组显效 4 例,好转 16 例,无效 10 例,总有效率 66.7%。

郭晓渊. 中国民间疗法, 2001, (3): 32

3. 鼻咽癌及喉癌术后放、化疗毒副反应

汤国成等运用本方加减治疗鼻咽癌及喉癌术后放、化疗毒副反应41例。方药:桔梗12克,甘草6克,射干、赤芍、浙贝母、麦冬各15克,玄参、半枝莲、白花蛇舌草各30克。每天1剂,复渣再煎,上下午各服1次。淋巴结肿大者加夏枯草12克,海蛤壳20克;失音者加千层纸12克;胸痛或伴有咳嗽者加瓜蒌皮15克,丝瓜络12克;胁痛加郁金20克;腰背痛加葛根30克,豨莶草12克;龈齿及口干较甚者加太子参30克(或西洋参12克,另煎和服),五味子6克,石斛15克;胃纳差者加麦芽30克,山楂10克;大便秘结者加干地黄30克,大腹皮15克,槟榔10克等。结果:患者龈齿干燥、口干、咽干及吞咽不利等症状一般在2~4周内消除或明显减轻。淋巴结肿大者于6~10周明显缩小。胃纳差及大便秘结1周左右可纠正或改善。有肺伴骨骼转移和肝转移之患者,在7~8周内其咳嗽明显减少;胁肋及腰背疼痛明显减轻。前者在8周后复查,后者在10周后复查,均谓病灶较前有所缩小。前者随诊2年,后者随诊2年余,患者仍存活,病症未恶化。喉癌术后都留有气管套管,患者均失音。治疗2~3周后用手指按着气管套管口可发音,5~7周一般可恢复自然发音。但仍有2例近乎失音者。所有患者在服用中药后,精神体力均明显改善。

汤国成,等.新中医,2001,(6):48

4. 慢性外阴营养不良

郝玉凤等运用本方加减治疗慢性外阴营养不良86例。每3个月为1个疗程,一般治疗1~3个疗程,最长则可用药4个疗程。绝大多数患者治疗需2个疗程,半年左右,少数患者1个疗程即有显效。结果:痊愈者46例,占53.5%,表现为病损及临床症状消失,观察半年无复发者;显效28例,占32.5%,表现为病损大部分消失或由Ⅲ度变为Ⅱ度者,症状明显好转或基本消失,观察半年无变化;好转8例,占9.4%,表现为病损变化不大但自觉症状明显好转,观察半年无进展;无效4例,占4.6%,表现为临床症状及病损

无明显变化。总治愈率 53.5%，总有效率 85.7%，无效率 14.3%。

郝玉凤，等. 陕西中医学院学报，1999，(1):27

乌药散的临床新用

1. 慢性泄泻

陆玲菲运用本方加减治疗慢性泄泻 37 例。方药：党参、茯苓、白术、乌药各 10 克，木香 6 克，淮山药 20 克，芡实 15 克，黄连 6 克，炙甘草 5 克。手足发冷，口淡喜吐涎沫者，加淡附片 5 克，干姜 6 克；气虚下陷脱肛者，加黄芪 18 克，升麻、柴胡各 10 克；口苦、苔黄腻者，加薏苡仁 30 克，苍术 8 克。水煎服，1 日 1 剂。最多服用 60 剂，最少 15 剂。结果：治愈 28 例，症状消失，临床检验正常，1 年内未复发。好转 7 例，大便次数明显减少，其他症状改善，半年内未复发。无效 2 例，症状无改善。总有效率 94.6%。

陆玲菲. 浙江中西医结合杂志，2003，(2):123

2. 肠痉挛

王惠娟运用本方加减治疗肠痉挛 105 例，自接受治疗之日起，嘱患者停止其他一切治疗。经用药 3 日后，腹痛停止者 78 例，16 例好转。继服 3 剂后，腹痛均消失。

王惠娟. 中国中医药信息杂志，1998，(12):40

3. 慢性前列腺炎

赵德柱运用本方加减治疗慢性前列腺炎 60 例。方药：茴香 10 克，乌药 10 克，元胡 10 克，荔枝核 10 克，王不留行 10 克，黄柏 10 克，莪术 10 克，丹参 10 克，牛膝 10 克。每日 1 剂，水煎 2 次，混合后共取煎液 300 毫升，早晚 2 次分服。对照组使用利复星治疗，每次 200 毫克，每天 2 次口服，均以 15 天为 1 疗程，治疗 4 个疗程后评定效果，治疗期间停用其他药物，忌酒及辛辣刺激之品，禁房事。结果：治疗组中，痊愈 28 例，显效 20 例，有效 8 例，无效 4 例，总有效率 93.33%；对照组中，痊愈 26 例，显效 23 例，有效 7 例，无效 4

例,总有效率 93.33%。

赵德柱. 黑龙江医学,2004,(12):960

4. 慢性阑尾炎

徐恩歧等运用本方加减治疗慢性阑尾炎 40 例。方药:乌药 15 克,小茴香 10 克,木香 6 克,川楝子 6 克,槟榔 6 克,高良姜 6 克,青皮 6 克,巴豆 7 个。一般 3 服后巴豆加麸皮炒,川楝子改用麸皮炒川楝子继用。气虚较甚者加白术 15~30 克,改巴豆为 3~4 个;疼痛较甚者加元胡 10 克;积热明显者去巴豆加大黄 10 克。结果:用药 7 天者 10 例,8~14 天者 16 例,15 天以上者 14 例,平均服药约 2 周,除 2 例好转,于再次发作行手术根治外,余 38 例全部治愈。

徐恩歧,等. 齐鲁护理杂志,2004,(9):721

5. 胃痛

凌东升运用本方治疗胃痛 84 例。方药:天台乌药 15 克,广木香 10 克,小茴香 6 克,高良姜 6 克,青皮 10 克,陈皮 10 克,槟榔 10 克,川楝子 10 克。随证加减:血瘀者加当归 10 克,延胡索 10 克,乳香 10 克,没药 10 克;胃热者去小茴香、高良姜,加黄连 3 克,连翘 15 克。每日 1 剂,早晚分服。2 周为 1 疗程,平均服药 118 个疗程。结果:治愈 42 例,显效 23 例,好转 12 例,无效 7 例,总有效率为 91.7%。

凌东升. 江苏中医药,2003,(5):29

6. 慢性结肠炎、肠胀气

赵素英等运用本方去巴豆治疗慢性结肠炎、肠胀气 50 例。即小茴香 10 克,乌药 10 克,青皮 10 克,川楝子 10 克,焦槟榔 8 克,高良姜 8 克,木香 6 克。早晚各 1 次,饭后服用。脐疗药:上方加白胡椒 5 克,共研细末,每次适量,腹胀重者用姜汁调;腹痛甚者用食醋调,调成糊状。敷脐部,外用麝香风湿膏固定,热敷半小时。每日更换 1 次,如出现皮肤湿烂、起泡即停止。结果:单纯型 28 例,有 20 例症状全部消失,7 例好转,11 例无效。伴有大便不规律的 22 例,16 例腹胀腹痛消失,大便正常,2 例明显好转,4 例无效,总有效

率达 90%。

赵素英,等.中华实用中西医杂志,1998,(11):996

导气汤的临床新用

1. 小儿腹痛

运用本方加减治疗小儿腹痛 58 例。方药:苍术(米泔浸)5 克,香附子(童便浸)7 克,川芎 4 克,白芷 5 克,陈皮 5 克,干姜(炒黑)5 克,甘草 3 克,茯苓 5 克,滑石 3 克,神曲(炒)5 克。随证加减:腹痛甚者加延胡索 5 克,参三七 3 克;寒性者加肉桂 5 克,吴茱萸 5 克;热性者加黄连 5 克,黄芩 5 克;食滞者加木香 5 克,砂仁 5 克;咽干口燥加沙参 5 克,麦冬 5 克;大便溏稀加党参 7 克,白术 5 克。结果:总有效率 91.8%,其中痊愈 70%,好转 21.8%,无效 8.2%,平均治愈时间为 8~10 天。

李松君,等.中国中医药信息杂志,2000,(9)增刊:65

2. 急性实热型细菌性痢疾

杜云波运用本方加减治疗急性实热型细菌性痢疾 38 例。方药:当归 15 克,白芍 12 克,枳壳 10 克,木香 8 克,槟榔 10 克,黄连 6 克,黄芩 9 克,大黄 6 克。随证加减:恶寒发热者加葛根 10 克;腹痛较重者白芍量增至 18 克,加甘草 3 克,焦山楂 10 克;腹胀者加厚朴 6 克;大便红多白少者加地榆 16 克,去白芍加赤芍 12 克;大便纯红者加地榆 16 克,槐花 12 克,去槟榔;大便纯白者加干姜 3 克;小便涩滞者加六一散 15 克;恶心者加白蔻 3 克,藿香 9 克;胃纳不佳者加生麦芽 10 克,石菖蒲 3 克。水煎成 400~500 毫升,每日 1 剂,早晚分服。临床症状消失 3 天后停药。结果:38 例患者均获治愈,服药量最少 5 剂,最多 15 剂,平均 7.4 剂。

杜云波.中医研究,1999,(6):27

3. 鞘膜积液

杨文清运用本方合五苓散治疗鞘膜积液 11 例。随证加减:若

下坠感甚者可加入人参、黄芪、柴胡、升麻益气升阳；肾气虚，阴囊寒冷者，加巴戟天、肉苁蓉、胡芦巴；病久者可加入元胡、当归、郁金等。上药煎汤每日服1剂，6剂为1疗程，服1个疗程后，休息1天，续进6剂。结果：11例患者全部治愈。

杨文清. 甘肃中医, 1999, (1): 28

独活汤的临床新用

1. 慢性腰腿痛

王爱民运用本方加减治疗慢性腰腿痛31例。方药：红参4克（另煎和服），炮附子10克（先煎），独活10克，金毛狗脊10克，炒杜仲10克，鹿角胶10克（烊化和服），苍术10克，细辛5克，防风10克，乌梢蛇10克，全蝎粉2克（和服），白芥子10克。阳虚甚者加仙茅、仙灵脾；湿重者加防己、茯苓；兼瘀者加桃仁、红花；疼痛重者加炙乳香、没药；肢麻甚者加鸡血藤。结果：痊愈5例，显效15例，有效10例，无效1例，总有效率为96.7%。

王爱民. 中国骨伤, 1997, (6): 47

2. 髌髁关节炎

李发奎等运用本方加减治疗髌髁关节炎62例。方药：独活60克，桑寄生10克，防风10克，秦艽10克，威灵仙30克，川牛膝10克，桂枝10克，细辛5克，甘草10克，当归15克，金毛狗脊15克，蜈蚣3条。加减：肾亏加杜仲10克，枸杞15克；寒湿重加制川乌10克，制草乌10克，苍术15克；痛甚加生白芍30克，玄胡20克，制乳没各10克。水煎服，每日1剂，15天为1疗程。结果：1个疗程临床治愈10例，2个疗程治愈25例，4个疗程治愈8例；显效14例，无效5例，总有效率为91.9%。

李发奎, 等. 中国民间疗法, 1999, (3): 28

3. 颈椎病

梁朱岳运用本方治疗颈椎病26例。10剂为1疗程，忌辛辣、

油炸食物。结果:治愈0例,显著疗效19例,有效7例,无效0例。显效时间最快者2天出现症状好转,大部分患者1周内症状明显减轻或消失,2例患者诉轻微舌麻感,无其他毒、副作用。

梁朱岳. 湖南中医药导报, 2002, (4): 200

4. 类风湿性关节炎

樊万红运用本方加减治疗类风湿性关节炎62例。方药:生黄芪20克,当归15克,防风15克,青风藤20克,秦艽15克,牛膝12克,杜仲15克,伸筋草15克,川芎15克,独活15克,肉桂10克,甘草15克。随证加减:上肢肿痛加羌活、桂枝;肢体怕冷加肉桂、制附子;疼痛剧烈加元胡、全蝎、蜈蚣;肿胀明显加桑白皮、茯苓。水煎服,每日1剂,分2次饭后服,每次约250毫升,1个月为1疗程。1个疗程结束后,结果:临床完全缓解20例,占32.26%;显效34例,占54.84%;有效6例,占9.68%;无效2例,占3.22%;总有效率为96.78%。本组62例治疗前后血常规、肝、肾功能检查均无明显变化,54例女患者月经周期及经量均无显著变化。

樊万红. 山西中医, 2001, (1): 20

5. 原发性坐骨神经痛

刘德忠运用本方治疗原发性坐骨神经痛86例。方药:独活25克,桂枝18克,白芍25克,当归、防风各18克,细辛10克,桃仁15克,红花12克,没药、土鳖虫各15克,乌梢蛇、制二乌(川乌、草乌,先煎30分钟)各25克,川牛膝15克,炙甘草12克,蜂糖80克。水煎服,1日3次。加减:气虚加党参、黄芪各25克;伴腰部疼痛加杜仲、续断各18克;肝肾阴虚加桑寄生20克,女贞子18克;若妇女月经期去没药、土鳖虫、桃仁、红花减量。结果:痊愈(临床症状全部消失,患肢功能活动恢复正常)68例;好转(临床症状明显减轻,患肢功能恢复正常)16例;无效(临床症状无明显缓解)2例。总有效率为97.6%。治疗时间最短5天,最长28天,平均12.5天。

刘德忠. 辽宁中医杂志, 2002, (4): 221

加味二陈汤的临床新用

1. 美尼尔氏病

彭建雄运用本方加味治疗美尼尔氏病 45 例。方药:制半夏、陈皮各 8 克,茯苓 30 克,白术、牛膝、泽泻各 12 克,钩藤、菊花、天麻各 15 克,代赭石 25 克。水煎服,每日 1 剂,并联合用西比灵胶囊(西安杨森制药有限公司生产),每日 10 毫克,晚间睡前服用。对照组(15 例):用 10% 葡萄糖液 500 毫升加维脑路通注射液(江苏扬州制药厂生产)0.4 克,静脉滴注,每日 1 次,两组均以 14 天为 1 疗程,两组均治疗 1 个疗程。眩晕呕吐严重者均可对症处理。结果:治疗组痊愈 42 例,显效 2 例,无效 1 例,治愈率 93.3%,总有效率 97.8%;对照组痊愈 8 例,显效 3 例,无效 4 例,治愈率 53.3%,总有效率 73.3%。治疗组疗效显著优于对照组,经统计学处理有显著性差异($P < 0.01$)。

彭建雄. 四川中医, 2002, (4): 50

2. 反酸症

周子杰等运用本方加减治疗反酸症 55 例。治疗组方药:陈皮 10 克,半夏 10 克,茯苓 10 克,乌贼骨 15 克,煅瓦楞 15 克,浙贝 10 克,白芨 10 克,厚朴 10 克,甘草 6 克。脾胃虚寒加桂枝 10 克,白术 10 克,代赭石 15 克,旋覆花 10 克;脾胃虚弱加党参 10 克,白术 10 克,砂仁 10 克,木香 10 克;脾胃郁热加川连 10 克,丹皮 10 克,公英 15 克,生大黄 6 克;肝胃不和加川连 10 克,吴萸 5 克,柴胡 10 克,香附 10 克;脾胃湿热加川连 10 克,白蔻仁 10 克,生苡米 15 克,竹茹 10 克。水煎服,每日 1 剂,2 次分服。对照组服洛赛克 20 毫克,每日 1 次。服药期间均停服其他抑酸药。每周就诊 1 次,对症状改变加以记录,2~4 周为 1 疗程,并在停药后 1 个月和 3 个月,随访两组的复发情况。结果:治疗组的痊愈率为 58.2% (32/55),对照组痊愈率为 33.3% (10/30),两组间痊愈率有显著性差异($P < 0.05$)。

周子杰,等.中国民间疗法,2000,(9):27

3. 复发性睑板腺囊肿

张智军运用本方加减治疗复发性睑板腺囊肿 18 例。方药:陈皮 12 克,制半夏 10 克,茯苓 10 克,炙甘草 3 克,青皮 10 克,香附 10 克,赤芍 12 克,贝母 10 克,夏枯草 10 克。每日 1 剂,小儿剂量酌减。药液内服,药渣湿热敷。2 周为 1 疗程。随证加减:若伴消化不良、胃脘痞满或小儿食积不化,上方减赤芍、夏枯草,酌加山楂、鸡内金、神曲、槟榔。若伴口干渴、舌红苔黄,囊肿结膜面色泽红赤者,上方去香附,加生石膏、栀子、黄连、天花粉。对囊肿直径在 5 毫米以上,或已化脓,或增殖成肿块的病例均手术后再用上方治疗。结果:用中药治疗 1 个疗程,半年内无复发者为治愈;半年内复发 1 次者为好转;1 月内复发 1 次以上为无效。本组治愈 16 例,好转 2 例,继服上方 2 个疗程后痊愈。

张智军.中国中医眼科杂志,1996,(2):95

4. 口腔黏液腺囊肿

赵敦友运用本方加减治疗口腔黏液腺囊肿 16 例。方药:陈皮 9 克,半夏、茯苓各 6 克,甘草 3 克,黄连 1.5 克,黄芩 2 克,薄荷 0.5 克,生姜 1 克。每日 1 剂,早晚温服。结果:14 例在服药后 5~9 天局部明显消肿,质地变软,无压痛,舌下皱襞充血明显减轻。2 例服药 6 剂,疗效不显,未再复诊;6 例舌下腺导管结石者,服药 8~15 天出现排石,排出的结石小者如粟粒大小,最大者有黄豆大小,其中有 4 例治疗后排石 3~5 颗结石。排石后局部痛觉很快消失,随访 6 例(2 例随访 8 年以上,4 例随访 3 年)均未再复发。

赵敦友.安徽中医学院学报,1992,(1):33

5. 慢性胃炎

顾维明运用本方加减治疗慢性胃炎 40 例。方药:法半夏、陈皮、砂仁(后下)、瓜蒌皮各 10 克,白芍、茯苓各 15 克,炙甘草、川黄连各 5 克,枳实 6 克,薏苡仁 30 克。随证加减:暖气甚者加沉香、代赭石;脘腹胀甚者加佛手;脾虚甚者加太子参、白术;反酸者加乌贼

骨、煨瓦楞；疼痛较剧者加延胡索、川楝子；食滞加鸡内金；阴虚者加栀子、百合；胃痛恶寒喜暖，遇寒痛增者加高良姜。每日1剂，水煎2次，温服。3周为1个疗程。结果：显效（临床症状消失或基本消失，1年以内未复发者）3例；有效（临床症状明显减轻）7例；无效（治疗后临床症状无改变）2例。总有效率为95%。

顾维明. 湖北中医杂志, 2003, (4): 38

6. 中心性浆液性脉络膜视网膜炎

廖玲运用本方加减治疗中心性浆液性脉络膜视网膜炎38例。方药：法夏15克，陈皮10克，白茯苓15克，白术10克，泽泻10克，甘草5克。随证加减：水肿明显者加猪苓10克，车前子10克，白茅根20克；气虚明显者加党参15克；食滞者加神曲10克，谷芽15克，山楂10克；肝肾不足者加枸杞15克，菟丝子10克。每日1剂，水煎2次，10剂为1疗程。结果：临床治愈29例，好转6例，无效3例，总有效率为92.1%。

廖玲. 湖南中医杂志, 1997, (2)增刊: 63

独圣散的临床新用

1. 小儿遗尿、盗汗

曹云运用本方加减外治小儿遗尿、盗汗。治法：五倍子、煨龙骨各等分，研为细末，瓶贮备用，每晚取少许药末，加适量洁净水调成糊状，敷满脐窝，上盖纱布，胶布固定每晚换药1次，一般连敷7~10天即可见效。

曹云. 中医外治杂志, 2004, (1): 46

2. 遗精

周文学运用本方加减治疗遗精41例。治法：生五倍子粉3克，蜂蜜调匀，稀稠适当，敷于神阙穴上，用纱布块覆盖，胶布固定，早晚各用药1次。湿热内蕴型加用生茯苓粉、生草薢粉各2克，调敷法同上。用药期间少食辛辣厚味，并嘱咐患者内裤不宜过紧，被盖

不宜过厚。结果:用药1月内无好转者为无效,总有效率为82%。

周文学. 中药药理与临床, 1989, 5(2): 51

3. 宫颈糜烂

周亚娣运用本方治疗宫颈糜烂37例。治法:白芨研极细粉末,每次经后5天由阴道放药,每天3克,7天为不着疗程。1个疗程不愈者,下次经后重复1个疗程,治疗3个疗程。结果:1个疗程治愈7例,2个疗程治愈17例,3个疗程治愈2例,好转9例,无效2例,总有效率为94.3%。

周亚娣. 陕西中医, 2002, (12): 1112

愈风汤的临床新用

1. 中风后遗症

何光向等运用本方加减治疗中风后遗症49例。方药:生黄芪50~60克,丹参30~40克,当归15克,川芎10克,桃仁10克,赤芍10克,丹皮10克,牛膝15克,红花6克,血竭5克,地龙20克,鸡血藤30克,泽兰30克。随证加减:出血性脑血管疾病加黄芩15克,炒栀子20克,茜草15克;缺血性脑血管疾病加党参30~50克;肝阳上亢头痛者加天麻10克,石决明30克(先煎);口眼歪斜者加白附子10克,全蝎10克;痰盛者加胆南星10克,半夏10克;心烦失眠者加珍珠母(先煎)30克,酸枣仁15克;大便秘结者加大黄(后下)10克;患侧手足肿甚者加茯苓皮30克,米仁30克。上药加水600毫升,煎取250毫升,第2、第3煎各加水500毫升,煎取药汁各250毫升,3次药液混合后装入暖瓶内为1日量,分6~8次服,15天为1疗程。结果:经1~6个月治疗痊愈18例(临床症状消失,言语清楚,能参加适当劳动);23例显效(临床症状和体征基本消失,生活可以自理或语言较前清楚,偏瘫肌体肌力进步Ⅱ级以上);6例有效(临床症状和体征有较明显好转,但生活尚不能自理);2例无效(均为80岁以上的患者,经治疗1个疗程后临床症状和体征均

无改变,一直处在昏迷状态而后死亡)。

何光向,等.实用中医内科杂志,1998,(1):34

2. 脑梗死

孙华锋等运用本方加减治疗脑梗死 48 例。方药:竹茹、枳实、茯苓、法夏、陈皮、秦艽、防风、当归、丹参各 10 克,川芎、赤芍、牛膝各 8 克。随证加减:高血压者去枳实;便秘者加大黄、生地黄;痰热甚者加胆南星、川贝母;头痛甚者加羚羊角、夏枯草;失眠者加珍珠母、夜交藤;无内热者加白附子、全蝎。上方加水 500 毫升,煎取 150 毫升,顿服,1 天 1 剂,15 天为 1 个疗程。服药期间停用其他扩张血管、改善脑血液循环的药物。结果:治愈(症状及体征消失,基本能独立生活)19 例;好转(症状及体征好转,能扶杖行动或生活基本能自理)25 例;未愈(症状及体征无变化)4 例。

孙华锋,等.湖北中医杂志,2001,(10):33

3. 神经性皮炎

张祥德运用本方加减治疗神经性皮炎 56 例。方药:生地 12 克,生槐花 20 克,苦参 15 克,土茯苓 30 克,白鲜皮 15 克,白蒺藜 12 克,威灵仙 12 克,皂角刺 9 克,全蝎 3 克,蛇蜕 6 克,甘草 5 克。每日 1 剂,水煎服。风湿热毒型,加黄连 3 克,山栀子 12 克;血虚风燥型,加生何首乌 12 克,当归 12 克;皮损坚厚,加生牡蛎 30 克(先煎),炮甲珠 12 克(先煎);心烦失眠,加珍珠母 30 克(先煎),炒枣仁 12 克。治疗期间停服其他药物。播散型治疗时间 10~42 天,平均 28.57 天;局限型治疗时间 25~118 天,平均 36.57 天。结果:近期治愈 48 例(85.71%),显效 3 例(5.36%),有效 2 例(3.57%),无效 3 例(5.36%),总有效率为 94.64%(53/56)。

张祥德.新疆中医药,1994,(4):17

4. 银屑病

张祥德等运用本方合复方丹参注射液治疗银屑病。方药:生地、生槐花、苦参、白鲜皮各 30 克,土茯苓 50 克,白蒺藜 20 克,皂角刺 12 克,威灵仙 15 克,全蝎(研末吞服)3 克,蛇蜕(研末吞服)5

克,甘草9克。每日1剂,水煎,分早晚2次温服。风热血热型加赤芍、丹皮;大便秘结加生大黄(后下)、枳实;咽喉肿痛加玄参、山豆根。风热湿热型加黄柏、龙胆草;下肢肿痛加牛膝、防己;上肢肿痛加秦艽、桑枝;皮疹黯褐加红花、鸡血藤。风热毒壅型加黄连、山梔子;壮热烦躁加生石膏(先煎)、知母。风热血燥型加熟地、制首乌;瘙痒剧烈加蛇床子、露蜂房;疲乏无力,面色苍白加黄芪、当归;鳞屑厚积加生牡蛎(先煎)、炮甲珠;焦虑失眠加珍珠母(先煎)、炒枣仁。各证型均加用复方丹参注射液(上海第一制药厂生产)60~100毫升(相当于丹参、降香生药60~100克),用5%葡萄糖盐水500毫升稀释后静脉滴注,每日1次。均以15天为1疗程,治疗期间停止其他相关性治疗,并在治疗前后检查血、尿、粪常规及肝、肾功能。结果:临床治愈72例,显效9例,有效4例,无效2例,总有效率为97.7%(85/87)。获临床治愈的病例进行2年随访,结果治愈的72例中,复发5例(6.9%)。

张祥德,等. 中华皮肤科杂志,1997,(2):136

万应膏的临床新用

1. 原发性痛经

钱天雷等运用本方加减敷脐治疗原发性痛经110例。方药:小茴香、红花各40克,细辛、肉桂各30克,当归50克,益母草60克,延胡索35克。共研为细末,加入樟脑粉适量拌匀备用。每天换1次,从经前3天开始用,10天为1疗程(周期),连续使用3个周期。结果:显效54例占49.1%,有效42例占38.2%,无效14例占12.7%;总有效率87.3%。

钱天雷,等. 中成药,1996,(12):47

2. 跌打损伤

慕文会等运用本方加减治疗跌打损伤100例。结果:显效率达91%。

慕文会,等. 湖南中医杂志,2001,(2):21

3. 复发性网球肘

王正运用本方外敷治疗复发性网球肘 187 例。1 周 2 换, 5 贴 1 疗程, 58 例用 2 个疗程。9 例复发后又采用局部封闭仍然有效。随访 3 个月, 复发 9 例, 7 例治疗后有前臂酸软感觉。

王正. 中国中医骨伤科杂志, 1999, (30): 23

4. 腮腺炎

曹敬兰运用本方合用青黛治疗腮腺炎, 在口服或(和)静滴对症药物的基础上, 配合万应膏合用青黛贴敷患处, 较外用时单独贴敷万应膏提前 2~4 天痊愈, 明显缩短病程。使用时将万应膏温热化开, 取 2~3 克青黛撒于化开的膏药上, 调匀, 贴敷患处。

曹敬兰. 中国药师, 1998, (3): 99

5. 颈、腰椎骨质增生症

田河水等运用本方加减治疗颈、腰椎骨质增生症 285 例。方药: 杜仲、续断、熟地、血竭、川芎、当归、赤芍、红花、桃仁、没药、大黄、柳枝、麻黄、桂枝、葛根、细辛、生川乌、生草乌、雪上一枝蒿、皂刺、生南星、冰片各 50 克, 乳香 30 克, 麝香 2 克, 黄丹 950 克, 麻油 3 000 克。制成膏药用, 贴患处, 1 周 1 换, 1 个月为 1 疗程, 病情轻者用 1~2 个疗程, 较重者用 3 个疗程。治疗期间停用其他治疗骨质增生药物。结果: 经随访 1 年以上, 治愈 228 例(80.00%), 好转 35 例(12.28%), 无效 22 例(7.72%), 总有效率 92.28%。其中 140 例颈椎骨质增生治愈率 103 例(73.57%), 好转 22 例(15.71%), 无效 15 例(10.71%), 总有效率 89.29%; 145 例腰椎骨质增生治愈 125 例(86.2%), 好转 13 例(8.97%), 无效 7 例(4.83%), 总有效率 95.17%。疗程平均 82.4 天, 多数治疗 1~2 个疗程。

田河水, 等. 光明中医, 2000, (5): 51

化斑汤的临床新用

1. 黄褐斑

周亚红运用本方加减治疗黄褐斑 53 例。方药: 仙灵脾、地黄

各15克,菟丝子20克,当归、川芎、芍药、桃仁、红花各12克,僵蚕10克。若阴虚可酌选二至丸、知母、黄柏;阳虚可选肉桂、附片、巴戟、肉苁蓉;仅见额部,属心,酌加丹参、肉桂、川连;仅见左颊,属肝,酌加柴胡、白蒺藜;仅见右颊,属肺,酌加桑白皮、杏仁;仅见唇上,属瘀阻胞宫,加紫石英、地鳖虫。每日1剂,水煎服,早晚各服1次,7天为1疗程,连服4个疗程,经期不停药。对照组:维生素E 50毫克,维生素C 0.2毫克,每日3次口服,亦服4周。结果:治疗组痊愈32例,有效18例,无效3例,总有效率为94.3%;对照组痊愈8例,有效27例,无效12例,总有效率为74.5%。两者相比治疗组明显优于对照组($P < 0.01$)。

周亚红. 江苏中医药, 2003, (10): 31

2. 过敏性紫癜

张子萍运用本方加减治疗过敏性紫癜31例。方药:川芎12克,赤芍12克,桃仁12克,红花8克,当归12克,生地12克,丹皮12克,雷公藤12克,地锦花15克。每日1剂,水煎服。随证加减:外感风热型加蝉蜕、荆芥、白鲜皮;血热妄行型加紫草、黄芩、水牛角。阴虚火旺型加阿胶、龟板、黄柏;气不摄血型加党参、黄芪、山药;腹痛加白芍、甘草、香附子;便血加地榆炭、蒲黄炭、槐花;大量便血、病情危重者应结合西医对症处理,必要时输血;尿血加白茅根、旱莲草、小蓟;关节肿痛加独活。结果:痊愈25例占80.65%,显效3例占9.68%,有效2例占6.45%,无效1例占3.23%,总有效率达96.77%。

张子萍. 河南医药信息, 1997, (5): 49

3. 牛皮癬

魏揖春等运用本方加减治疗牛皮癬65例。方药:石膏30克,知母12克,菝葜30克,白鲜皮30克,生地黄30克,土茯苓12克,犀角6克(冲服),黄芩10克,丹皮10克,玄参9克,生甘草9克,白粳米15克。瘀血甚者去黄芩、玄参加三棱、川芎等;气虚者酌加黄芪、党参等。每日1剂,水煎服,1月为1个疗程,一般2~3个疗

程。外用:雄黄 15 克,斑蝥 6 克,血竭 10 克,土槿皮 10 克,番木鳖 10 克,蜈蚣 10 克,没药 10 克。用水约 1 000 毫升,浸 6~8 日后使用,用药前先将鳞屑刮去,用米醋调涂,每日 1 次或隔日 1 次,不能间断。结果:治愈(皮损全部消退或仅留少量不明显点状损害)47 例,占 72.3%;好转(皮损大部分或部分消退)16 例,占 24.6%;无效(皮损未控制或发展)2 例,占 3.1%。总有效率 96.9%。治愈病人中治疗时间最短 17 天,最长 142 天,平均 63 天。

魏揖春,等. 国医论坛,1997,(3):47

4. 多形性红斑

刘明运用本方加减治疗多形性红斑 12 例。方药:水牛角 100 克(锉碎先煎),生地 30 克,大青叶、玄参各 15 克,丹皮、赤芍、紫草、黄柏、茜草、银花各 10 克。热毒炽盛加紫花地丁 20 克,板蓝根 30 克;便秘结加生大黄 10 克,1 日 1 剂,加水 1 500 毫升,取汁 1 000 毫升,分 2~3 次服。结果:全部治愈。

刘明. 四川中医,1997,(3):49

5. 寻常型银屑病

杨秀珍运用本方加减治疗寻常型银屑病 48 例。方药:槐花 15 克,白茅根 30 克,生地黄 15 克,紫草 15 克,生石膏 30 克,赤芍 15 克,蝉蜕 10 克,鸡血藤 30 克,板蓝根 30 克,土茯苓 30 克,地骨皮 30 克,白鲜皮 15 克,乌梢蛇 10 克,白花蛇舌草 30 克。每日 1 剂,水煎分 2 次服,连服 1 个月为 1 个疗程,服药 2 个疗程后观察疗效。治疗期间忌食辛辣油腻生冷厚味之品,保持心情畅达。结果:临床治愈 32 例,显效 7 例,有效 4 例,无效 5 例。临床治愈率 67%,总有效率 89%。对临床治愈的 32 例,随访 2 年,复发 3 例。

杨秀珍. 广西中医药,1996,(3):22

珍珠膏的临床新用

1. 乳房肿胀

张秀芬等运用本方加减治疗乳房肿胀 60 例。先用温水洗净

患处后,将三黄珍珠膏涂于乳房红肿硬结的皮肤上,用纱布敷盖,用药后3~5分钟,疼痛明显减轻,每天换药3次后硬结缩小并软化,乳汁分泌量增加。对照组(20例)用中草药散结通乳剂水煎服,每日2次,需服2~3帖中药见效。结果:治疗组全部治愈,有效率100%;对照组治愈18例,有效率96%。

张秀芬,等.职业与健康,2000,(9):142

2. 宫颈糜烂

朱建玲等运用本方加减治疗宫颈糜烂59例。治疗组先在宫颈涂上三黄珍珠膏,再用涂上三黄珍珠膏的纱布塞入阴道隔日换药1次,10天为1疗程。对照组(30例)用二氧化碳激光治疗。结果:治疗组治愈51例,好转7例,无效1例;对照组治愈24例,好转4例,无效2例。

朱建玲,等.护士进修杂志,1996,(1):45

3. 褥疮

徐瑛运用本方治疗褥疮22例。用血竭20克,生牛皮粉20克,珍珠粉30克,研制成细末,再用凡士林60克制成消毒纱布条外敷。每天1次,待疮面的肉芽组织新鲜后改为每2天1次,直至愈合。结果:全部愈合,28~36天为17例,占77.2%;37~43天为5例,占22.8%。

徐瑛.浙江中医学院学报,1997,(6):15

4. 烧伤

祝雨清运用本方加减治烧伤46例。方药:黄柏、黄连500克,黄芩1000克,大黄200克,芙蓉花、紫草、白芨、山竹子各500克。以上药物烘干磨粉过筛,珍珠200克放入2500克鲜豆腐内煮药6小时,磨成乳汁,烤干成粉,加冰片粉50克,再将以上药粉与适量麻油搅拌成膏状,消毒密封备用。结果:全部痊愈,有效率100%。最快的1周左右创面脱痂愈合,最长4周左右创面愈合。一般浅(烫)伤45天结痂,7~15天完全脱痂愈合;深Ⅱ度的5~10天结痂,11~18天完全脱痂愈合;深Ⅲ度烧伤一般1个月左右愈合,创

面无需植皮,无毒副作用。

祝雨清. 四川中医, 2000, (2): 43

双解散的临床新用

1. 慢性荨麻疹

马德荣等运用本方加减治疗慢性荨麻疹 30 例。方药: 荆芥 10 克, 防风 10 克, 桔梗 6 克, 大黄 10 克, 芒硝 6 克, 黄芩 10 克, 山栀子 10 克, 连翘 10 克, 石膏 20 克, 滑石 12 克, 川芎 10 克, 当归 15 克, 赤芍 10 克, 白术 10 克, 甘草 6 克。痒甚加苦参 12 克, 蛇床子 20 克; 热盛加金银花 12 克, 重用大黄 15 克(后下)。水煎服, 分 2 次早晚温服, 每日 1 剂, 5 剂为 1 个疗程, 2 个疗程后观察疗效。治疗期间停用一切抗组胺药及皮质激素, 同时饮食禁忌辛辣、鱼虾刺激性食物。结果: 治愈 22 例, 风团及瘙痒完全消失, 划痕试验阴性, 停药 6 个月以上无复发; 显效 5 例, 风团数目、大小减少大于 80%, 无瘙痒, 或 6 个月内复发而之后再用原法治愈者; 有效 2 例, 风团数目、大小减少大于 50%, 有瘙痒但能耐受者; 无效 1 例, 风团及瘙痒无改变甚或加重者, 治愈率为 73.3%, 有效率为 96.7%。

马德荣, 等. 安徽中医临床杂志, 2003, (6): 489

2. 生殖器疱疹

汤志仁等运用本方加减治疗生殖器疱疹 37 例。方药: 白僵蚕 6 克, 全蝉蜕 12 只, 片姜黄 2 克, 防风 30 克, 薄荷 30 克, 荆芥穗 3 克, 当归 3 克, 白芍 3 克, 黄连 3 克, 连翘 3 克, 栀子 3 克, 黄芩 3 克, 桔梗 6 克, 石膏 18 克, 滑石 9 克, 甘草 3 克, 酒浸大黄 6 克, 芒硝 6 克。水煎服, 每日 1 剂。结果: 29 例痊愈, 5 例在半年中发作 1 次, 3 例在 3 年中发作 1 次。

汤志仁, 等. 江苏中医药, 2003, (7): 41

3. 剥脱性皮炎型药疹

罗茂林运用本方加减治疗剥脱性皮炎型药疹 1 例。方药: 防

风 12 克,川芎 9 克,当归 9 克,白芍 12 克,薄荷 18 克,麻黄 9 克,连翘 24 克,石膏 60 克,黄芩 15 克,桔梗 12 克,滑石 24 克,生甘草 6 克,荆芥 12 克,白术 12 克,栀子 15 克。水煎,1 天 1 剂,停用西药,注意皮肤卫生,皮损忌用水洗及搔抓,患者服上方 2 剂,症状明显缓解,守方共服 8 剂而愈。

罗茂林. 安徽中医临床杂志,2001,(5):393

4. 天行赤眼

陈文祥等运用本方治疗天行赤眼 623 例。内服疏风清热解毒的双解散,1 日 1 剂,外用愈红水滴眼日 3~6 次,效果明显。

陈文祥,等. 福建中医药,1994,25(6):9

5. 继发性无汗症

王海成运用本方加减治疗继发性无汗症 23 例。方药:防风 10 克,荆芥 10 克,麻黄 10 克,薄荷 10 克,桔梗 10 克,石膏 15 克,黄芩 15 克,连翘 15 克,山栀 15 克,滑石 30 克,当归 10 克,川芎 10 克,白芍 10 克,白术 10 克,甘草 10 克。体质壮实者去当归、白芍、白术;烦躁甚者重用石膏 30 克,加黄连 6 克;小便赤涩不畅者加泽泻 15 克;皮肤有水泡者加薏苡仁 15 克,竹叶 15 克;口干舌燥者去白术加玉竹、葛根;每日 1 剂,水煎两次各取 300 毫升,早晚 2 次分服。结果:痊愈 17 例,好转 4 例,无效 2 例,总有效率为 91.3%。

王海成. 中华实用中西医杂志,2004,(12):24

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名= 疡医大全精要

作者= 赵勇, 李明奎本册主编

页数= 455

S S 号= 11943650

出版日期= 2007.4

封面
书名
版权
前言

卷之一 颧脸部

面部望色辨证门主论

面热门主论

面热门主方

面寒门主论

面寒门主方

面痛门主论

粉花疮门主论

粉花疮门主方

面游风毒门主论

面游风毒门主方

面上热毒恶疮门主论

面上热毒恶疮门主方

肺风粉刺门主论

肺风粉刺门主方

雀斑门主论

雀斑门主方

面生黑斑门主论

面生黑斑门主方

痣门主论

痣门主方

脸发门主论

脸发门主方

颧痛门主论

颧骨肉疽门主论

疔疽门主论

托腮痛门主论

腮颌发门主论

颐发门主论

颐发门主方

痒腮门主论

疔腮门主方
大头伤寒门主论
伤寒瘥后遗毒门主论
时毒门主论
时毒门主方
伤寒瘥后碗头疮门主论
鼻部望色辨证门主论
过梁疔门主论
鼻疽门主论
鼻疔门主论
鼻肿门主论
鼻疮门主论
鼻疮门主方
鼻疳门主论
鼻疳门主方
鼻痔门主论
鼻痔门主方

普济消毒饮的临床新用

茜根散的临床新用

卷之二 正面耳颈部

耳痛门主论
耳发疽门主论
耳后疽门主论
耳疔门主论
耳疳门主论
耳疳门主方
聤耳门主论
聤耳门主方
震耳门主论
缠耳门主论
脓耳门主论
脓耳门主方
耳风毒门主论
耳聾耳痔门主论
耳痛门主论

耳痛门主方

耳痒门主论

耳痒门主方

耳烂门主方

卷之三 唇口部

唇口望色辨证法

辨口味察证法

唇病门主论

唇紧门主论

唇紧门主方

唇皤门主论

唇皤门主方

唇风门主论

唇疗门主论

唇疮门主论

唇疮门主方

唇口疽门主论

唇奇病门主论

唇奇病门主方

甘露饮的临床新用

柳花散的临床新用

卷之四 舌部

察舌胎辨证法

舌出不入门主论

舌出不入门主方

舌缩不出门主论

舌缩不出门主方

弄舌舒舌门主论

弄舌舒舌门主方

舌嗜门主论

重舌门主论

重舌门主方

木舌门主论

木舌门主方

舌胀门主论

舌胀门主方

舌痹门主论

舌痹门主方

舌黄门主论

舌菌门主论

舌痈门主论

舌疮门主论

舌疮门主方

舌疳门主论

卷之五 齿部

钻齿疳门主论

齿踞门主论

齿窟疮门主论

骨槽风门主论

骨槽风门主方

重龈门主论

齿迟门主论

长齿门主方

固齿门主方

石膏汤的临床新用

卷之六 咽喉部

咽痛门主论

咽痛门主方

喉痹门主论

喉痹门主方

喉风门主论

喉风门主方

喉痈门主论

喉痈门主方

喉癰门主论

牛黄清心丸的临床新用

紫雪散的临床新用

冰硼散的临床新用

冰片散的临床新用

卷之七 颈项部

颈项痛门主论
夹疽门主论
气颈门主论
气颈门主方
颈痈门主论
环项发门主论
颈蝗门主论
风热锁喉毒门主论
无辜瘡伤疮门主论
无辜瘡伤疮门主方
瘦瘤门主论
瘦瘤门主方
瘰癧门主论
瘰癧门主方

千捶膏的临床新用
四海舒郁丸的临床新用
加味逍遥散的临床新用

卷之八 脑背部

脑疽门主论
发际疽门主论
后脑发门主论
头后蜂窝疽门主论
天疽锐毒门主论
耳下石疽门主论
项门痈门主论
项后肉龟疮门主论
项后生疔瘡门主方

卷之九 后阴部

鹤口疽门主论
尾闾发门主论
臀痈门主论
臀痈门主方
瘰癧瘡门主论
瘰癧瘡门主方
痔瘡门主论

痔疮门主方
痔漏门主论
痔漏门主方
脏毒门主论
脏毒门主方
肠风门主论
肠风门主方
寒火疮门主论
脱肛门主论
脱肛门主方
脏头风门主方
风疳门主论
风疳门主方
股阳疽门主论

股阴疽门主论
骑马痢门主论
骑马痢门主方
坐马痢门主论
上马痢门主论
下马痢门主论
涌泉疽门主论
穿裆疽门主论

槐角丸的临床新用

苦参汤的临床新用

卷之十 腿膝部

骨痿疮门主论
腿游风门主论
肚门痢门主论
上水鱼门主论
黄鳅痢门主论
大肠痢门主论
附骨疽门主论
附骨疽门主方
多骨疽门主论
多骨疽门主方

咬骨疽门主论

箕门痈门主论

肉蜈蚣门主论

玄疽门主论

阴疽门主论

膝盖痈门主论

膝眼毒门主论

膝眼风门主论

鹤膝风门主论

鹤膝风门主方

消毒散的临床新用

二妙散的临床新用

夹纸膏的临床新用

卷之十一 癰癤部

蛇虱门主论

乌白癰门主论

沉紫亮十四种癰证歌诀

辨六经癰形

癰门主论

癰门主方

癰疹门主论

癰疹门主方

葡萄疫门主论

葡萄疫门主方

湿痰流注门主论

湿痰流注门主方

腹痛门主论

伤寒瘥后发肿门主论

伤寒身痒门主论

肿块门主论

肿块门主方

汗斑门主论

汗斑门主方

卷之十二 痘疹部

痘疹门主方

痘疗门主论
痘疗门主方
痘痈门主论
痘痈门主方
痘瘤门主论
痘瘤门主方
痘风疮门主论

卷之十三 诸疗部

疗疮门主论
疗疮门主方
水疗门主论
水疗门主方
红丝疗门主论
红丝疗门主方

卷之十四 诸疮部

疥疮门主方
薄皮疮门主论
薄皮疮门主方
肥疮门主论
肥疮门主方
天泡疮门主论
天泡疮门主方
翻花疮门主论
鸦啖疮门主论

鸦啖疮门主方
面上热毒恶疮门主方
黄水疮门主论
黄水疮门主方
香瓣疮门主论
香瓣疮门主方
金丝疮门主论
金丝疮门主方
火珠疮门主论
火珠疮门主方
热疮门主论

热疮门主方
寒疮门主论
冷疮门主论
肉刺毛门主论
鱼脊疮门主论
赤炎疮门主论
癌疮门主论
癰疮门主论
日晒疮门主论
水渍疮门主论
水渍疮门主方
冻疮门主论
冻疮门主方
汗渍疮门主论
汗渍疮门主方
皴裂疮门主论
皴裂疮门主方
蜘蛛疮门主论
蜘蛛疮门主方
漆疮门主论
漆疮门主方
恶疮门主论
恶疮门主方
顽疮门主论
席疮门主论
席疮门主方
血箭门主论
血痣门主论
血瘤门主论
疣门主论
疣门主方
千日疮门主论
千日疮门主方
卷之十五 跌打部
跌打损伤门主论

跌打损伤门主方

落下颏拿法门主论

落下颏拿法门主方

人咬门主论

玉真散的临床新用

神效散的临床新用

卷之十六 救急部

解救砒霜门主论

解救砒霜门主方

救误服蒙汗药门主论

救误服蒙汗药门主方

救饮鸩酒毒门主论

救饮鸩酒毒门主方

救误服水银门主方

救误吞五金门主方

救误吞针门主方

误吞诸木竹钗门主论

救误吞磁锋门主论

解误服铅粉门主论

解误服铅粉门主方

解误服银朱藤黄门主方

验中蛊毒门主论

解中蛊毒门主方

解中断肠草毒门主论

解中断肠草毒门主方

解中药毒门主论

解中药毒门主方

解服盐卤门主论

解服盐卤门主方

中饮食毒门主论

中饮食毒门主方

解烧酒毒门主论

解烧酒毒门主方

解中煤炭毒门主方

解中闭口椒毒门主方

解误食桐油毒门主方

救误吞田螺门主方

救误吞桃李门主方

救误吞猪骨门主方

救误吞鸡骨门主方

救误中猪肉毒门主方

救误吞头发门主方

救误吞蜈蚣门主方

救误吞蚂蝗门主论

救误吞蚂蝗门主方

救误中蛇虺百虫毒门主方

解中蜈蚣毒门主方

解中蜘蛛毒门主方

解中蚯蚓毒门主方

解中瘟牛肉毒门主论

解中瘟牛肉毒门主方

解中马肉毒门主方

解中犬马肉毒门主方

解中河豚毒门主论

解中河豚毒门主方

解食鱼中毒门主方

解黄鳝鱼毒门主方

解误食毒蟹毒门主方

解中蟹毒门主论

解中蟹毒门主方

解中野菌地蕈灵芝毒门主论

解中野菌地蕈灵芝毒门主方

解豆腐毒门主方

解面毒门主方

解中白果毒门主方

解误服轻粉门主方

救六畜瘟疫法

解中樱桃毒门主方

红升丹的临床新用

化痢汤的临床新用

太乙膏的临床新用
内消散的临床新用
四妙汤的临床新用
银花甘草汤的临床新用

消痈汤的临床新用
太乙紫金丹的临床新用
冲和汤的临床新用
芙蓉膏的临床新用
四虎散的临床新用
如意金黄散的临床新用
消肿止痛散的临床新用
透脓散的临床新用
生肌膏的临床新用
圣愈汤的临床新用
雄黄散的临床新用
蜈蚣散的临床新用
通脉汤的临床新用
十全大补汤的临床新用
百合汤的临床新用
桔梗汤的临床新用
升麻葛根汤的临床新用
射干汤的临床新用
乌药散的临床新用
导气汤的临床新用
独活汤的临床新用
加味二陈汤的临床新用
独圣散的临床新用
愈风汤的临床新用
万应膏的临床新用
化斑汤的临床新用
珍珠膏的临床新用
双解散的临床新用