

中医大辞典

妇科儿科分册

《中医大辞典》编辑委员会 编



样 本 库

中医大辞典


妇 科 儿 科 分 册

(试 用 本)

《中医大辞典》编辑委员会 编

中 医 研 究 院 主 编
广 州 中 医 学 院

辽 宁 中 医 学 院 编
湖 南 中 医 学 院



人 民 卫 生 出 版 社

1060809

中 医 大 辞 典

妇科儿科分册

(试 用 本)

《中医大辞典》编辑委员会 编

人民卫生出版社出版

(北京市崇文区天坛西里10号)

兰州新华印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

787×1092毫米16开本 15 1/2印张 4 插页 330千字

1981年7月第1版第1次印刷

印数：1—45,300

统一书号：14048·3873 定价：2.00元

《中医大辞典》分册总目

基础理论分册	医史文献分册
内科分册	外科骨伤五官科分册
妇科儿科分册	中药分册
方剂分册	针灸推拿气功养生分册

《中医大辞典》编辑委员会委员、顾问

(按姓氏笔画为序)

主任委员：李永春

副主任委员：王树岐 刘汝琛 许德良 张鼎臣

委员：丁绪亮 区永欣 邓铁涛 许占民 杨医亚 杨树藩
李经纬 李慕才 肖敏才 吴贻谷 何传毅 余瀛鳌
张自云 张启光 陈玉琦 林建德 欧明 贾维诚
高忻洙 徐廷素 郭振球 裘沛然 蔡景峰 廖品正
谭日强

顾问：朱仁康 任应秋 米伯让 金寿山 黄星垣 鲁之俊

编辑委员会办公室主任：李经纬

妇科学分册编写、审阅人员

(按姓氏笔画为序)

主要编写人员:

白万超 陈玉琦 陈寿熙 易建纯
胡振洲 姜裕琴 郭振球 夏禹甸

参加编写人员:

王秀云 赵有臣

审阅人员:

王伯岳 江育仁 刘弼臣 余瀛鳌
罗元恺 谢剑南 曾敬光 虞佩兰

责任编辑:

贾维诚

出版说明

为了适应我国医学发展的形势，满足医药卫生人员学习中医的迫切需要，经卫生部一九七四年二月批准编写这部《中医大辞典》。

《中医大辞典》是一部供医疗、教学、科研工作中应用的工具书。全书选收中医基础理论、临床、针灸、中药、方剂、人物、文献、推拿、气功等词目约四万五千条（其中包括单字及附条），于一九七五年十月开始编写的。在编写过程中，力求做到既要反映祖国医药学发展的历史继承性，又要反映解放后医药卫生战线的新成就。释文也力求简明扼要，引用文献尽量摘其要者。初稿完成后，各编写单位曾广泛征求了修改意见，最后邀请名老中医、有关方面的专家审阅定稿。

《中医大辞典》先按基础理论、临床各科

以“试用本”分八册出版，广泛征求意见后，再作修改，重新编排，正式合订出版。

本书在编写、审定过程中，得到北京、上海、广东、四川、辽宁、江苏、河北、陕西、湖南等省市有关领导、有关单位和全国许多地方的医务工作者的大力支持和热情协助，谨在此表示诚挚的谢意。

编写出版辞典类工具书，有它一定的特性；再由于水平所限，缺乏经验，因而本书的编写等工作，达不到预期要求，存在一些问题。诚恳希望大家提出宝贵意见，帮助我们提高质量。

本书题笺，是特请郭沫若同志手写的，专此志念。

人民卫生出版社

一九八〇年一月

凡 例

一、本分册共收载妇科、儿科及有关医学单字及精句等词目共3917条；其中包括附词（同义词和衍生词、又名等）。

二、选词力求正确反映祖国医学伟大宝库的实际内容，反映祖国医学理论与临床实践的密切联系，反映其悠久历史及源流。以收集古典医籍的词汇为主，兼收现代中医学发展过程中及中西医结合的新词目。为照顾临床科的完整性，本分册还收入部分基础理论以及内、外、五官科词目，这些词目除与有关分册有必要重复外，更由于取材不同和阐释角度不一，很可能释义互有差别。待全书合并出版时，再作统一处理。

三、本分册有关词目与穴名、药名同名者，虽按一词多义处理，但穴名、药名只作扼要介绍。

四、本分册引用文献，如《医史文献分册》已收的（如《妇人良方大全》、《小儿药证直诀》等），不注年代和作者姓名；如属未收的，则予以注明。所引用方剂，如《方剂分册》已收的（如六君子汤等），只介绍方名；如属未收的，则于方名后括弧内介绍药物组成。

五、引用中医药文献，凡属卷帙或内容较多的，注明卷数或门类；一般文献只介绍

书名。

六、各类词目，一般注明出处。出处属于原始文献记载的，冠以“出”字；出处不确的，冠以“见”字。

七、释文一般先定义，后解释。注意言简意明，通俗易懂，结合实际。引述文献，力求简要。一词多义和单字多音者，以①②③……分别叙述。对学术见解不同的词目，选择介绍各家见解。单字词目，通常只解释与中医学有关的字义，不作全面解释。

八、本分册的简化字采用1964年中国文字改革委员会《简化总字表》，并参考《新华字典》、《辞海》等，按笔画多少编排。

（1）同数笔画，按第一笔笔形一（横）、丨（直）、丿（撇）、丶（点）、㇀（折。包括乚等）为序。

（2）第一字相同，依第二字笔画多少为序；第一字相同，第二字笔画数相同，依第三字笔画多少为序。余类推。但第一字同一字排在一起。

（3）对某些容易混淆的或简化后失去原意的字，仍采用繁体字，如橘、癥等。根据实用，保留了个别古体字、异体字。

（4）除个别字外，一律采用新体字。

书末附汉语拼音索引，以便查索。

检 字

(每字后的页码, 系检索目录的, 根据目录, 再查检词目)

一 画	〔丶〕	长…………… 3	石…………… 4
〔一〕	广…………… 1	反…………… 3	龙…………… 4
一…………… 1	〔乚〕	月…………… 3	〔丨〕
二 画	弓…………… 1	风…………… 4	目…………… 4
〔一〕	女…………… 1	乌…………… 4	四…………… 4
二…………… 1	小…………… 1	丹…………… 4	出…………… 4
十…………… 1	习…………… 2	分…………… 4	〔丿〕
七…………… 1	子…………… 2	〔丶〕	生…………… 5
丁…………… 1	马…………… 2	文…………… 4	失…………… 5
〔丿〕	四 画	六…………… 4	乍…………… 5
人…………… 1	〔一〕	心…………… 4	代…………… 5
八…………… 1	开…………… 2	斗…………… 4	白…………… 5
入…………… 1	天…………… 2	〔乚〕	外…………… 5
九…………… 1	无…………… 2	巴…………… 4	孕…………… 5
儿…………… 1	木…………… 3	引…………… 4	〔丶〕
三 画	五…………… 3	少…………… 4	讨…………… 5
〔一〕	太…………… 3	水…………… 4	立…………… 5
三…………… 1	历…………… 3	双…………… 4	闪…………… 5
干…………… 1	不…………… 3	五 画	半…………… 5
下…………… 1	牙…………… 3	〔一〕	头…………… 5
大…………… 1	〔丨〕	玉…………… 4	〔乚〕
寸…………… 1	日…………… 3	正…………… 4	奶…………… 5
〔丨〕	中…………… 3	甘…………… 4	发…………… 5
上…………… 1	内…………… 3	功…………… 4	六 画
口…………… 1	见…………… 3	节…………… 4	〔一〕
〔丿〕	〔丿〕	本…………… 4	老…………… 5
久…………… 1	手…………… 3	去…………… 4	地…………… 5
	气…………… 3	左…………… 4	耳…………… 5
		右…………… 4	

百.....5
有.....5
灰.....5
达.....5
死.....5
夹.....5
过.....5
邪.....5

〔1〕

壮.....5
早.....5
吐.....5
虫.....5
吊.....5
回.....5

〔J〕

年.....5
先.....5
廷.....5
舌.....5
休.....5
伍.....5
伏.....5
任.....5
伤.....5
仰.....6
自.....6
血.....6
凶.....6
后.....6
行.....6
全.....6
杀.....6
肌.....6
多.....6

〔、〕

冲.....6
交.....6
产.....6
羊.....7
井.....7
灯.....7
汗.....8
污.....8
汛.....8
安.....8

〔7〕

孖.....8
异.....8
阳.....8
收.....8
阴.....8
妇.....8
红.....8

七 画

〔一〕

弄.....8
形.....8
走.....8
赤.....8
块.....8
芽.....8
花.....8
劳.....8
更.....8
豆.....8
束.....8
来.....8
报.....8
连.....8
求.....8

〔1〕

早.....8
时.....8
呕.....8
喂.....8
吴.....8

〔J〕

利.....8
体.....8
身.....8
免.....9
余.....9
坐.....9
含.....9
肝.....9
肛.....9
肚.....9
肠.....9
角.....9
龟.....9
卵.....9
饮.....9

〔、〕

冻.....9
冷.....9
怀.....9
间.....9
闷.....9
沥.....9
沉.....9
沈.....9
初.....9
诊.....9
谷.....9

〔7〕

尿.....9
忌.....9

坠.....9
阻.....9
妊.....9
妒.....10
鸡.....10
纯.....10
纳.....10
纹.....10

八 画

〔一〕

环.....10
武.....10
青.....10
表.....10
幸.....10
茄.....10
枋.....10
枕.....10
板.....10
枪.....10
卧.....10
刺.....10
郁.....10
奇.....10
抱.....10
择.....10
拗.....10
转.....10

〔1〕

非.....10
齿.....10
虎.....10
易.....10
肾.....10
果.....10
呷.....10
鸣.....10

败.....10

〔丿〕

垂.....10

物.....10

季.....10

侧.....10

侏.....10

迫.....10

金.....10

钊.....10

命.....10

觅.....10

受.....10

乳.....10

肤.....11

肿.....11

胀.....11

肺.....11

肥.....11

周.....11

昏.....11

鱼.....11

免.....11

狐.....11

〔丶〕

变.....11

夜.....11

底.....11

卒.....11

疝.....11

放.....11

怯.....11

性.....11

单.....11

泄.....11

泡.....11

注.....11

泻.....11

沸.....11

治.....11

定.....11

实.....11

试.....11

〔冫〕

居.....11

降.....11

妬.....11

始.....11

承.....11

孤.....11

绊.....11

经.....11

九 画

〔一〕

珍.....12

毒.....12

拭.....12

指.....12

按.....12

项.....12

带.....12

草.....12

茶.....12

荫.....12

垢.....12

胡.....12

枯.....12

咸.....12

〔丨〕

韭.....12

背.....12

战.....12

哑.....12

胃.....12

蚂.....13

品.....13

咽.....13

响.....13

咳.....13

骨.....13

〔丿〕

看.....13

选.....13

种.....13

钟.....13

秋.....13

重.....13

便.....13

信.....13

钩.....13

食.....13

蚀.....13

盆.....13

胚.....13

胆.....13

胞.....13

脉.....13

胎.....13

独.....14

急.....14

〔丶〕

疫.....14

疮.....14

养.....14

差.....14

姜.....14

类.....14

前.....14

首.....14

逆.....14

临.....14

烂.....14

炸.....14

洞.....14

洗.....14

室.....14

宣.....14

官.....14

客.....14

语.....14

误.....14

神.....14

〔冫〕

退.....14

昼.....14

眉.....14

怒.....14

癸.....14

贯.....14

孩.....14

结.....14

绝.....14

绞.....14

骈.....14

十 画

〔一〕

唇.....14

顽.....14

盐.....14

恶.....14

隔.....14

夏.....14

真.....14

原.....14

逐.....14

捏.....14

损.....14

换.....14
热.....15
顿.....15

〔1〕

紧.....15
哮.....15
哺.....15
吮.....15

〔1〕

缺.....15
积.....15
透.....15
倒.....15
候.....15
臭.....15
躯.....15
息.....15
鬼.....15
钻.....15
脊.....15
脓.....15
脆.....15
脏.....15
脐.....15
脑.....15
脂.....15
皱.....15

〔、〕

高.....15
疖.....15
病.....15
疥.....15
疹.....15
疔.....15
癰.....15
疮.....15

烦.....15
消.....15
涎.....16
流.....16
涕.....16
浴.....16
浪.....16
浸.....16
被.....16
调.....16

〔7〕

陷.....16
通.....16
难.....16
验.....16
缘.....16
继.....16

十 一 画

〔一〕

琉.....16
麸.....16
黄.....16
著.....16
梦.....16
雪.....16
盛.....16
捧.....16
掩.....16
控.....16
推.....16

〔1〕

虚.....16
烦.....16
悬.....16
野.....16
眼.....16

蛇.....16
蛊.....16
晚.....16
崩.....16
婴.....16

〔1〕

停.....16
偏.....16
假.....16
盘.....16
遇.....16
脚.....16
脱.....16

〔、〕

麻.....16
旋.....17
盗.....17
盖.....17
惊.....17
惜.....17
断.....17
清.....17
淋.....17
混.....17
剪.....17
烧.....17
宿.....17

〔7〕

蛋.....17
隐.....17
颈.....17

十 二 画

斑.....17
蒯.....17
葡.....17

落.....17
朝.....17
厥.....17
裂.....17
颊.....17

〔1〕

悲.....17
断.....17
紫.....17
暑.....17
噬.....17
遗.....17
蛲.....17
蛔.....17
蛤.....17
跌.....17
喘.....17
喉.....17
黑.....17

〔1〕

鹅.....17
健.....17
铺.....17
锁.....17
筋.....17
脾.....17
猴.....18

〔、〕

痘.....18
痞.....18
疥.....18
痢.....18
痢.....18
痧.....18
痛.....18
童.....18

慣.....18
 焯.....18
 涇.....18
 滯.....18
 溫.....18
 濕.....18
 滑.....18
 潰.....18
 寒.....18
 割.....18

〔7〕

疏.....18
 登.....18

十三画

〔一〕

鼓.....18
 藍.....18
 蓐.....18
 蒸.....18
 禁.....18
 感.....18
 碍.....18
 摘.....18
 輸.....18

〔1〕

虜.....18
 蒙.....18
 睛.....18
 睡.....18
 暖.....18
 歇.....18
 暗.....18
 嗜.....18
 噬.....18
 蛾.....18

〔J〕

稚.....18
 催.....18
 鼠.....18
 錯.....18
 膝.....18
 腰.....18
 腹.....18
 触.....19
 解.....19

〔、〕

瘡.....19
 癢.....19
 痞.....19
 痰.....19
 新.....19
 桴.....19
 數.....19
 溢.....19

〔7〕

嫉.....19
 嫁.....19
 纏.....19

十四画

〔一〕

磁.....19
 嗽.....19
 雌.....19

〔J〕

穩.....19
 鼻.....19
 魃.....19
 膀.....19

〔、〕

裏.....19
 腐.....19
 痕.....19
 瘟.....19
 瘦.....19
 慢.....19
 滿.....19
 漱.....19
 精.....19
 滴.....19
 漏.....19
 痞.....19

〔7〕

嬰.....19
 縮.....19

十五画

〔一〕

聃.....19
 橫.....19
 醉.....19
 醋.....19
 飄.....19
 碗.....19
 震.....19
 霉.....19
 撮.....19
 撞.....19

〔1〕

暴.....19
 影.....19
 顯.....19
 踏.....19

〔、〕

痼.....19
 瘡.....19
 爆.....19
 潮.....19

十六画

〔一〕

燕.....19
 顛.....19

〔1〕

蝸.....20
 噤.....20
 踰.....20
 踵.....20
 蹉.....20
 噫.....20

〔J〕

軌.....20
 鰓.....20

〔、〕

楓.....20
 壅.....20
 凝.....20
 辨.....20
 激.....20

〔7〕

避.....20

十七画

〔一〕

戴.....20

〔1〕

螳.....20
 螺.....20

〔、〕
 糜……………20
 瘡……………20
 糟……………20
 糠……………20
 燥……………20
 豁……………20

十八画

〔一〕
 釐……………20

〔丨〕
 蟠……………20
 鹭……………20

〔丿〕
 翻……………20
 〔、〕
 癩……………20
 癖……………20

十九画

〔丨〕
 巖……………20

〔丿〕
 醴……………20
 駒……………20

〔、〕
 鏊……………20
 二十画
 〔丿〕
 鱗……………20

〔、〕
 灌……………20
 瀼……………20
 瘕……………20

二十一画

〔一〕
 露……………20

囊……………20

二十二画

〔一〕
 皇……………20
 囊……………20
 習……………20

〔、〕
 孿……………20

二十四画

〔丿〕
 髭……………20

目 录

一 画

〔一〕

- 一月经再行…… 1
一指定三关…… 1

二 画

〔一〕

- 二便色白…… 1
二便秘结…… 1
十二病绝产…… 1
十二经绝产…… 1
十二癥…… 1
十月胎形…… 1
十三指形…… 2
七日风…… 2
七害…… 2
丁奚…… 2
丁奚病…… 2
丁奚疳…… 2

〔J〕

- 入痘接种法…… 2
人病…… 2
八月章…… 2
八片锦…… 3
八利…… 3
八段锦…… 3
八痢…… 3
八蒸十变…… 3
八痼…… 3
入月…… 3
九窍出血…… 3
九痛…… 3
九道出血…… 3
九漏…… 3

- 儿门…… 3
儿风…… 3
儿衣…… 3
儿衣不出…… 3
儿枕…… 3
儿枕不安…… 3
儿枕块…… 3
儿枕痛…… 3
儿晕…… 4
儿痉…… 4
儿脐出血…… 4
儿捧母心…… 4
儿寐不宁…… 4
儿啼…… 4
儿嗜灯花…… 4
儿发干枯…… 4
儿发不生…… 4
儿发成穗…… 4
儿发疏薄…… 4

三 画

〔一〕

- 三虫…… 4
三关…… 4
三固…… 4
三消…… 4
三秽液毒…… 4
三焦惊…… 5
三痛…… 5
三痼…… 5
干血癆…… 5
干涩难产…… 5
干疳…… 5
干浆…… 5
下关…… 5

- 下乳…… 5
下胎毒法…… 5
下部冰冷不孕…… 5
下消…… 5
下瘡…… 5
大小便白…… 5
大小肠交…… 5
大小蒸…… 5
大产…… 5
大肠水…… 5
大肠泻…… 6
大肠惊…… 6
大便下血…… 6
大便恶臭…… 6
大惊卒恐…… 6
寸白虫…… 6

〔I〕

- 上皮疹…… 6
上关…… 6
上草…… 6
上腭痛…… 6
口下黄肥疮…… 6
口吻疮…… 6
口角疮…… 6
口软…… 6
口齿疳…… 6
口疮…… 7
口喎斜僻…… 7
口疳…… 7
口噤…… 7
口糜…… 7

〔J〕

- 久赤白痢…… 7

- 久泻肠滑…… 7
久病发惊…… 7
久暗…… 7
久惯小产…… 7
久腹胀…… 7
久痢…… 8
久痢脱肛…… 8
久痢腹痛…… 8

〔、〕

- 广嗣…… 8

〔7〕

- 弓反外形…… 8
弓反里形…… 8
女人腹中十
二疾…… 8
女子赤白沥…… 8
女子赤淫…… 8
女子胞…… 8
女子梦交…… 8
女子暗闭…… 8
女子暗闭经…… 8
女阴溃疡…… 8
小儿大蛆…… 8
小儿久痢羸瘦…… 9
小儿中风不随…… 9
小儿风泻…… 9
小儿风疾癰疹…… 9
小儿风痢…… 9
小儿心痛…… 9
小儿心腹痛…… 9
小儿白泻…… 9
小儿发痧…… 9
小儿半身不遂…… 9
小儿头痛…… 9

小儿舌膜·····10	小儿浮肿·····14	小产·····19	子悬·····21
小儿多涎·····10	小儿涎喘·····14	小肠风·····19	子淋·····22
小儿吐血·····10	小儿诸虫·····14	小肠水·····19	子朝·····22
小儿闭证·····10	小儿诸热·····14	小肠气痛·····19	子痛·····22
小儿阳厥·····10	小儿诸淋·····15	小肠泻·····19	子啼·····22
小儿阴疮·····10	小儿聋哑·····15	小肠惊·····19	子痢·····22
小儿阴厥·····10	小儿虚热·····15	习惯性流产·····19	子嗽·····22
小儿阴癰·····10	小儿偏风·····15	子门·····19	子痞·····22
小儿好睡·····10	小儿脚痲·····15	子气·····19	子满·····22
小儿医·····10	小儿脱肛·····15	子户·····19	子痼·····22
小儿呕吐·····10	小儿麻痺后	子户肿胀·····19	子躁·····23
小儿吼病·····10	遗症·····15	子户旁生肿块·····19	子翻胃症·····23
小儿身热吐泻·····10	小儿雀目·····16	子水不利·····19	马牙·····23
小儿身热痿黄·····10	小儿厥证·····16	子水气·····19	马牙风·····23
小儿肛痒·····11	小儿暑病·····16	子处·····19	马脾风·····23
小儿肿病·····11	小儿遗尿·····16	子死产门难产·····19	马脾风似痼·····23
小儿肿满·····11	小儿喘急·····16	子死腹中·····20	马痹·····23
小儿昏迷·····11	小儿腋气·····16	子舌·····20	
小儿卒利·····11	小儿痢疾·····17	子舌胀·····20	四 画
小儿泄泻·····11	小儿寒厥·····17	子衣·····20	〔一〕
小儿面疮·····11	小儿腹胀·····17	子呛·····20	开闭法·····23
小儿指纹·····12	小儿腹痛·····17	子肠不收·····20	天马疮·····23
小儿啰·····12	小儿痰热发黄·····17	子鸣·····20	天吊惊风·····23
小儿咳嗽·····12	小儿痿证·····17	子肿·····20	天吊风·····23
小儿秋痢·····12	小儿痰鸣·····17	子疳·····20	天行发斑疮·····23
小儿食癥·····12	小儿痰泻·····18	子冒·····20	天行痘·····23
小儿脉法·····12	小儿痰实·····18	子宫·····20	天花·····23
小儿唇紧·····12	小儿溺血·····18	子宫不收·····20	天钩·····23
小儿热泻·····12	小儿瘦·····18	子宫外妊娠·····20	天钩似痼·····24
小儿热厥·····12	小儿发黄·····18	子宫肌瘤·····20	天钩惊风·····24
小儿紧唇·····13	小儿瘰癧·····18	子宫脱出·····21	天泡疮·····24
小儿哮喘·····13	小儿瘰气·····18	子宫颈炎·····21	天疮·····24
小儿积证·····13	小儿羸瘦·····18	子宫脱垂·····21	天柱骨倒·····24
小儿脓血痢·····13	小儿胸喘·····18	子眩·····21	天癸·····24
小儿脑髓风·····13	小儿囊肿·····18	子晕·····21	天癸水至·····24
小儿变蒸·····13	小三关·····18	子脏·····21	天哮·····24
小儿痘病·····13	小户·····18	子脏冷无子·····21	天哮呛·····24
小儿瘰气·····13	小户嫁·····19	子病·····21	天痘·····24
小儿消渴·····13	小户嫁痛·····19	子烦·····21	无子·····24

无辜疳·····24	不能食·····27		月水不利·····32
无嗣·····24	不寐多困·····27		月水不绝·····32
木舌·····24	不嗜食·····27		月水不通·····32
木舌胀·····25	牙儿鼻塞·····27		月水不调·····33
木肾·····25	牙疳·····27		月水不断·····33
五不女·····25			月水汁·····33
五伤·····25	〔1〕		月水色黄·····33
五反恶候·····25	日午发搐·····27		月水来腹痛·····33
五水灸法·····25	日角月角·····27		月水滞涩·····33
五色带下·····25	日晚发搐·····27		月运·····33
五色痢·····25	中人·····28		月信·····33
五冷恶候·····25	中风不随·····28		月信不行·····33
五迟·····25	中风失音·····28		月行·····33
五软·····25	中关·····28		月闭·····33
五肿恶候·····26	中毒气吐下·····28		月汛·····33
五盲恶候·····26	中毒性肺炎·····28		月事·····33
五紧恶候·····26	中毒性痢疾·····28		月事不来·····33
五脏热·····26	中药流产·····28		月事不通·····33
五脏疳·····26	中药避孕·····28		月事沉滞·····33
五脏病·····26	中恶·····29		月使·····33
五脏痼·····26	中恶似痛·····29		月使不来·····33
五陷·····26	中客·····29		月使不调·····33
五陷恶候·····26	中客忤·····29		月经·····33
五疳·····26	中期引产·····29		月经不匀·····33
五痉·····26	中暑·····29		月经不行·····33
五般聾耳候·····26	中脾积·····29		月经不通·····33
五崩·····26	中魃·····29		月经不调·····33
五硬·····26	中寒泻·····29		月经水·····33
五喘恶候·····26	内风·····29		月经过少·····33
五痼·····26	内伤饮食痉·····29		月经过多·····33
五缩恶候·····26	内吹·····29		月经先期·····34
太阳·····26	内吹乳·····29		月经后期·····34
太阴·····26	内钩·····29		月经来如胆水·····34
历瘕疳疔·····27	内钩似痛·····29		月经或前或后·····34
不子·····27	内疳·····30		月经前期·····34
不月·····27	内热头痛·····30		月经病·····34
不月水·····27	见苗·····30		月经涩少·····34
不孕·····27	见点·····30		月经落后·····34
不思食·····27			月经滞涩·····34
		〔J〕	
		手足软·····30	
		手足抽掣·····30	
		手足皴裂·····30	
		手拳·····30	
		手筋色·····30	
		气血虚弱痛经·····30	
		气闭·····30	
		气关·····30	
		气池·····30	
		气郁血崩·····30	
		气肿·····30	
		气乳·····31	
		气疝·····31	
		气逆难产·····31	
		气胎·····31	
		气结难产·····31	
		气疳·····31	
		气积·····31	
		气虚月经过多·····31	
		气虚经行先期·····31	
		气虚崩漏·····31	
		气虚脱肛·····31	
		气虚滑胎·····32	
		气淋·····32	
		气痛·····32	
		气陷血崩·····32	
		气滞经行后期·····32	
		气滞经闭·····32	
		气滞痛经·····32	
		气瘕·····32	
		长虫·····32	
		长针形·····32	
		长珠形·····32	
		反关痘·····32	
		月不通·····32	
		月水·····32	
		月水不来·····32	

月经愆期·····34	风湿痉·····36	心惊·····39	双身·····41
月蚀疮·····34	风寒头痛·····36	心疝·····39	双乳蛾·····41
月食疮·····34	风寒咳嗽·····36	心腹痛啼·····39	双胎·····41
月脉·····34	风寒喘急·····36	心噤·····39	双躯·····41
月客·····34	风禁·····36	心躁夜啼·····39	双鹅·····41
月候·····34	风搐·····37	斗睛·····39	双蛾·····41
月候不调·····34	风喉·····37	斗鸡眼·····39	
月候过多·····34	风痰壅盛·····37	火邪经闭·····39	五 画
月候血·····34	风癰·····37	火闭·····39	〔一〕
月浣·····34	风瘫·····37	火泻·····39	玉门·····41
月假·····34	风瘙·····37	火带疮·····40	玉门不闭·····41
月期华水·····34	风齲·····37	火热喘急·····40	玉衍·····42
月漏·····34	风噤·····37	火眼·····40	玉衡·····42
月潮·····34	乌痧惊风·····37	火喘·····40	正产·····42
月露·····34	丹疹·····37	火禁·····40	甘草法·····42
风门·····34	丹痧·····37	火嗽·····40	功能性子宫
风气肿·····35	分诞·····37		出血·····42
风火眼·····35	分娩·····37	〔二〕	节疳·····42
风水肿·····35	分解·····37	巴豆贴脐法·····40	本脏自病痉·····42
风邪伤肺·····35		引痰法·····40	去蛇形·····42
风闭·····35	〔、〕	少小客忤·····40	左歪·····42
风关·····35	文台·····37	少食而肥·····40	右藉·····42
风池·····35	六甲·····37	少食易饱·····40	石人·····42
风毒痢·····35	六阳虚汗·····37	水中金·····40	石女·····42
风疮·····35	六涎·····37	水气肿满·····40	石困·····42
风热·····35	心气实·····38	水分·····40	石淋·····42
风热犯肺·····35	心气虚·····38	水衣·····40	石蛾·····42
风热眼·····35	心风·····38	水字形·····40	石瘦·····42
风热惊啼·····35	心水·····38	水谷利·····40	龙门·····42
风疳·····35	心阳虚·····38	水谷泻·····40	
风疹·····35	心实·····38	水苗法·····41	〔1〕
风疔·····36	心热·····38	水沫疮·····41	目连割·····42
风痉·····36	心热多惊·····38	水泻·····41	目直·····43
风涎·····36	心热烦啼·····38	水毒·····41	目睛瞬动·····43
风惊食三疳·····36	心热惊啼·····38	水痘·····41	目瞿·····43
风痼·····36	心疳·····38	水禁·····41	四六风·····43
风痧·····36	心病·····38	水靨·····41	四时感冒·····43
风湿肿·····36	心虚经闭·····39	双生·····41	四肢拘挛·····43
风湿痰·····36	心常有余·····39	双产·····41	出形紫黑·····43

出瘡发热……………43	外疳……………46	耳沁……………48	吐蛔痧……………51
〔J〕	孕……………46	耳疮……………48	虫吐……………51
生下吐……………43	孕妇尿出……………46	耳脓……………48	虫积……………51
生后不啼……………43	孕珠……………46	耳痛……………48	虫积经闭……………51
生胎……………43	孕痛……………46	耳溃……………48	虫病似痛……………51
失信……………43	孕悲……………46	百日儿症……………48	虫蛔癆……………51
失合症……………43	〔、〕	百日内嗽……………48	虫痛……………51
失血心痛……………44	讨盐生……………46	百日咳……………48	吊茄子……………51
失胎……………44	立迟……………46	百日疮……………49	回乳……………51
乍热……………44	闪跌血崩……………46	百啐内嗽……………49	回浆……………51
代甲……………44	半生……………47	有子……………49	〔J〕
代指……………44	半产……………47	有身……………49	年未老经水断……………51
白带……………44	半产下血不止……………47	有妊……………49	年老血崩……………51
白带腹痛……………44	半产胞衣不下……………47	有娠……………49	年老经水复行……………52
白虎候……………44	半产恶露不下……………47	灰陷……………49	先天红铅……………52
白虎证似痢……………44	半产腹痛……………47	达生……………49	先兆子病……………52
白面痧……………44	半阴阳……………47	死舌……………49	先兆流产……………52
白脓疳靛……………44	头不生发……………47	死胎……………49	廷孔毒……………52
白脓疳痢……………44	头汗……………47	死胎不下……………49	舌上疮……………52
白脓痢……………44	头软……………47	死产……………49	舌肿……………52
白疳……………44	〔7〕	夹口疮……………49	舌卷……………52
白疹……………44	奶疳……………47	夹冷痛……………49	舌卷卵缩……………52
白陷……………44	奶疹子……………47	夹热痛……………50	舌卷囊缩……………52
白菌……………44	奶麻……………47	夹热腹痛……………50	舌卷囊缩……………52
白崩……………45	奶麻子……………47	夹疹痢……………50	舌衄……………52
白麻……………45	奶癖……………47	夹惊吐……………50	舌笋……………53
白疹……………45	奶癖……………47	过食生冷经闭……………50	舌黄鹅口……………53
白喉……………45	发迟……………47	过期经行……………50	舌舒……………53
白喉忌表……………45	发泉……………47	过期流产……………50	舌殿风……………53
白痢……………45	发惊潮搐……………47	邪干心痛啼……………50	休息痢……………53
白痞……………45	六 画	〔1〕	休惜痢……………53
白缠喉……………45	〔一〕	壮热……………50	伍耳……………53
白漏……………46	老妇血崩……………48	早晨发搐……………50	伏暑吐泻……………53
外阴炎……………46	老妇行经……………48	吐舌……………50	任主胞胎……………53
外阴白斑……………46	老鼠胎……………48	吐泻互作……………50	任娠……………53
外阴搔痒……………46	地丁肿……………48	吐泻生风……………50	伤风……………53
外伤滑胎……………46		吐乳泻青……………50	伤风发疹……………53
外肾肿硬……………46		吐乳泻黄……………51	伤风吐……………53
			伤风吐泻……………53

伤风自利·····53	血风疮·····56	血痢·····59	交经·····62
伤风后发搐·····54	血母块·····57	血滞不孕·····59	交骨不开·····62
伤风嗽·····54	血信·····57	血滞经闭·····59	交骨不开难产·····62
伤风嗽吐·····54	血闭·····57	血寒月经过少·····59	交结出血·····63
伤产·····54	血块痛·····57	血寒经行后期·····60	交接出血·····63
伤冷乳·····54	血沙淋·····57	血寒经迟·····60	交感出血·····63
伤乳·····54	血枕痛·····57	血瘀不孕·····60	产下肉线·····63
伤乳吐·····54	血经·····57	血瘀月经过少·····60	产子·····63
伤乳食·····54	血枯经闭·····57	血瘀经行后期·····60	产子痢·····63
伤乳食泻·····54	血咳·····57	血瘀经闭·····60	产门·····63
伤食·····54	血脉·····57	血瘀崩漏·····60	产门不合·····63
伤食发丹·····54	血胎·····57	血瘀痛经·····60	产门不闭·····63
伤食发热·····54	血热崩漏·····57	血溢·····60	产门颊·····63
伤食吐·····54	血热月经过多·····57	血嗽·····61	产风眼·····63
伤食吐泻·····55	血热滑胎·····57	血膈·····61	产户不敛·····63
伤食后发搐·····55	血热经早·····57	血瘦·····61	产后儿枕腹痛·····63
伤食泻·····55	血热经行先期·····57	血漏·····61	产后三冲·····63
伤食腹胀·····55	血热经迟·····57	凶开不合·····61	产后三审·····63
伤饱·····55	血脏·····58	凶风伤寒·····61	产后三急·····63
伤胎·····55	血海败·····58	凶肿·····61	产后三病·····63
伤热乳·····55	血泪·····58	凶陷·····61	产后三脱·····64
伤积·····55	血陷·····58	凶填·····61	产后三禁·····64
伤堕·····55	血脐·····58	凶填陷·····61	产后下利·····64
伤娠·····55	血热·····58	后蹬·····61	产后下物如钵·····64
伤暑·····55	血疸·····58	行迟·····61	产后大便下血·····64
伤寒发惊·····55	血虚不孕·····58	行经·····62	产后大便难·····64
伤寒夹惊·····55	血虚月经过少·····58	行经目痛·····62	产后大便秘涩·····64
伤寒谷黍·····56	血虚发热·····58	行经气痛·····62	产后口渴·····64
伤寒挟实·····56	血虚经乱·····58	全不产·····62	产后口鼻黑鼻衄·····64
伤寒兼惊·····56	血虚经行后期·····58	杀血心痛·····62	产后口噤·····64
伤寒暴嗽·····56	血虚难产·····58	肌肉软·····62	产后小便不利·····64
伤湿泻·····56	血虚滑胎·····59	多食易饥·····62	产后小便不通·····65
仰顶生·····56	血眼·····59		产后小便数·····65
自汗·····56	血崩·····59	〔、〕	产后子宫不收·····65
血亏经闭·····56	血崩不止·····59	冲为血海·····62	产后子宫脱出·····65
血山崩·····56	血崩心痛·····59	交肠·····62	产后不语·····65
血少不孕·····56	血崩昏暗·····59	交肠病·····62	产后中风·····65
血分·····56	血崩腹痛·····59	交径·····62	产后中柔风·····65
血风劳·····56	血淋·····59	交乳·····62	产后中暑·····65

产后内极七病…66	产后交肠病…69	产后类中风…73	产后痢疾…77
产后风冷虚劳…66	产后产户痛…70	产后类伤寒二	产后寒热…77
产后风虚冷劳…66	产后妄言妄见…70	阳症…73	产后禁药…77
产后风痿…66	产后汗出…70	产后类疟…74	产后腰痛…77
产后心风…66	产后汗血…70	产后恶血入心…74	产后腹中块痛…77
产后心包络痛…66	产后汗雨不止…70	产后恶血入肝…74	产后腹胀…77
产后心痛…66	产后阴下脱…70	产后恶血入肺…74	产后腹胀呕吐…77
产后水谷利…66	产后阴户不闭…70	产后恶血入脾…74	产后腹痛…77
产后水肿…66	产后阴痛…70	产后恶血冲心…74	产后瘀血流注…77
产后玉门不敛…66	产后呕吐…70	产后恶血循经…74	产后痹证…77
产后玉户不敛…66	产后呕逆不食…70	产后恶露不下…74	产后溺血…78
产后目闭…67	产后吞酸…71	产后恶露腹痛…74	产后溺淋…78
产后目病…67	产后余血奔心…71	产后病瘕…74	产后瘕疝…78
产后目痛…67	产后肝萎…71	产后疽症…74	产后暗…78
产后目瞑…67	产后狂言谵语…71	产后浮肿…75	产后漏牛膜片…78
产后四不活…67	产后狂越…71	产后流注…75	产后漏黄水…78
产后四字真言…67	产后言语含糊…71	产后痉风…75	产后瘫痪…78
产后四肢虚肿…67	产后完谷不化…71	产后痉病…75	产后霍乱…78
产后乍见鬼神…67	产后尿血…71	产后虚烦…75	产后膨胀…78
产后乍寒乍热…67	产后青肿…71	产后虚渴…75	产妇…78
产后头痛…68	产后郁冒…71	产后遗尿…75	产枕痛…78
产后发热…68	产后拘挛…71	产后遗粪…75	产乳…78
产后发瘥…68	产后败血成痈…72	产后蛊肿…75	孕育三难…78
产后发斑…68	产后胁痛…72	产后脚气…75	产泄…78
产后耳聋…68	产后乳汁自出…72	产后脚痛…75	产科…78
产后肉线…68	产后岔怒…72	产后脱肛…75	产前十忌…78
产后舌出…68	产后狐惑…72	产后麻臂…76	产室…78
产后舌黑…68	产后疟…72	产后盗汗…76	产难…78
产后伤风…68	产后疝瘕厥痛…72	产后惊风…76	产婆…78
产后伤食…68	产后怔忡…72	产后惊悸…76	产颓…78
产后伤寒…69	产后单潮…72	产后淋…76	产痿…78
产后自汗…69	产后泄泻…72	产后遍身疼痛…76	产褥感染…79
产后血气痛…69	产后宜戒…73	产后厥…76	产癩…79
产后血奔…69	产后孤阳绝阴…73	产后厥逆…76	羊水…79
产后血晕…69	产后面黑…73	产后喉中气	羊水过多症…79
产后血崩…69	产后咽痛…73	急喘…76	羊舌…79
产后血淋…69	产后咽喉作	产后癆…76	羊胡疮…79
产后血痕…69	蝉声…73	产后痘…76	并月…79
产后危证…69	产后咳嗽…73	产后痞满…76	灯火疗法…79

汗证……………79	阴肿……………81	妇人淋带……………85	赤眼……………88
汗粟……………79	阴肿成疮……………81	妇人矢志经闭……………85	赤崩……………88
污……………79	阴肿疝气……………82	妇人石淋……………85	赤痢……………88
汛期……………79	阴毒……………82	妇人白浊……………85	赤游丹……………88
安胎……………79	阴茧……………82	妇人白淫……………85	赤游丹毒……………88
	阴挺……………82	红汗……………85	赤游肿……………88
〔7〕	阴挺下脱……………82	红脉……………85	赤鼻……………88
孖生……………79	阴挺出下脱……………82	红脉不通……………85	赤膈伤寒……………88
异痘……………79	阴疮……………82	红铅……………85	块痛……………88
阳水肿……………79	阴突……………82	红眼伤寒……………85	芽儿……………88
阳闭……………80	阴烂……………82	红漏……………85	花风……………88
阳毒……………80	阴热……………82	红潮……………85	花心风……………88
阳虚发热……………80	阴疳……………82	红臀……………85	花癩……………88
阳崩……………80	阴疽……………82		劳伤月经过多……………88
阳痼……………80	阴菌……………82	七 画	更年期综合症……………88
阳痧……………80	阴虚发热……………82	〔一〕	豆豉法……………88
收生……………80	阴崩……………82	弄舌……………86	束胎……………89
收靥……………80	阴蚀……………82	弄产……………86	来蛇形……………89
阴门……………80	阴蚀疮……………83	弄胎……………86	报标……………89
阴门不闭……………80	阴脱……………83	弄痛……………86	连珠痲串……………89
阴门痒……………80	阴痔……………83	形肥过期经行……………86	求子……………89
阴户内发热	阴痒……………83	形肥经少……………86	求嗣……………89
如烙……………80	阴宽……………83	形肥痰滞经闭……………86	
阴户风肿……………80	阴痼……………83	形瘦过期经行……………86	〔1〕
阴户肿痛……………80	阴痧……………83	形瘦血热经闭……………86	旱苗法……………89
阴户痛……………80	阴寒……………83	形瘦血瘀经闭……………86	时行顿咳……………89
阴户湿肿……………80	阴痛……………83	形瘦经少……………86	时疫痢……………89
阴中生疮……………80	阴寒白喉……………83	走马牙疳……………86	呕乳……………89
阴中生核……………81	阴缩……………84	走马疳……………87	吮乳……………89
阴中生息肉……………81	阴缩入腹……………84	赤白泔……………87	吴萸熨……………89
阴中痛……………81	阴癰……………84	赤白带下……………87	
阴中湿烂……………81	阴囊……………84	赤白痢……………87	〔J〕
阴水肿……………81	妇人三十六疾……………84	赤白滞下……………87	利后虚羸……………89
阴闭……………81	妇人下赤白沃……………84	赤白漏下……………87	利如膏血……………89
阴汗……………81	妇人水分……………84	赤虫……………87	体如水晶……………89
阴阳二痼……………81	妇人血分……………84	赤利……………87	体禀纯阳……………89
阴吹……………81	妇人血膈……………84	赤带……………87	身有赤处……………89
阴冷……………81	妇人鸡爪风……………84	赤疳……………87	身重暗哑……………90
阴茄……………81	妇人疵痲……………84	赤疹……………88	身瘦不孕……………90

兔缺……………90	龟胸……………92	初生无皮……………94	妊娠小便淋痛…97
余热……………90	卵缩……………92	初生不尿……………94	妊娠小腹痛…97
坐生……………90	饮痢……………92	初生不乳……………94	妊娠子烦……………97
坐产……………90		初生不啼……………95	妊娠不语……………97
坐草……………90	〔、〕	初生目闭……………95	妊娠中风……………97
坐桶……………90	冻生……………92	初生吐乳……………95	妊娠中恶……………97
坐婆……………90	冻产……………92	初生两肾缩……………95	妊娠中暑……………97
坐蓐……………90	冻烂疮……………93	初生乳核……………95	妊娠中湿……………97
坐碍……………90	冷利……………93	初生拭口……………95	妊娠风痉……………97
坐臀生……………90	冷毒疳痢……………93	初生便血……………95	妊娠心痛……………97
含腮……………90	冷热利……………93	初生脚气……………95	妊娠心腹胀满…97
含腮疮……………90	冷热疳……………93	初孕大热……………95	妊娠心腹痛…98
肝气郁结不孕…90	冷热泻……………93	初关……………95	妊娠少阳证…98
肝水……………90	冷积……………93	初潮……………95	妊娠目病……………98
肝阴不足……………90	冷疳……………93	诊脐……………95	妊娠失音……………98
肝肾亏损痛经…90	冷涎……………93	谷瘕……………95	妊娠白带……………98
肝肾阴虚经漏…90	冷痰……………93		妊娠耳鸣……………98
肝郁经行先后	咳嗽……………93	〔7〕	妊娠吐血……………98
无定期……………91	怀子……………93	尿门无孔……………96	妊娠伤食……………98
肝郁经行先期…91	怀孕……………93	尿白……………96	妊娠多怒坠胎…98
肝经湿热带下…91	怀身……………93	尿来……………96	妊娠阳明证…98
肝热恶阻……………91	怀胎……………93	尿床……………96	妊娠阴肿……………98
肝病……………91	怀躯……………93	忌奶……………96	妊娠呕吐……………98
肝疳……………91	怀娠……………93	坠伤……………96	妊娠护胎法…99
肝虚雀目……………91	间经……………93	坠胎……………96	妊娠谵语……………99
肝虚雀目内障…91	闷气生……………93	坠娠……………96	妊娠尿血……………99
肝惊……………91	闷肠生……………93	阻病……………96	妊娠环跳穴痛…99
肝常有余……………91	闷脐生……………93	妊子……………96	妊娠乳肿……………99
肛门内合……………92	闷痧……………94	妊娠……………96	妊娠乳痛……………99
肛肿……………92	闷瘡……………94	妊娠大小便	妊娠肿胀……………99
肚皮青黑……………92	沥胞生……………94	不通……………96	妊娠胁痛……………99
肚带……………92	沥浆生……………94	妊娠大便秘	妊娠疰……………99
肠覃……………92	沥浆产……………94	不通……………96	妊娠泄泻……………99
肠痈……………92	沉听……………94	妊娠下痢……………96	妊娠卒心痛…99
肠痛……………92	沈唇……………94	妊娠口干……………96	妊娠经来……………99
角……………92	初生儿阴道	妊娠口舌生疮…96	妊娠毒药伤胎…99
角花……………92	出血……………94	妊娠口渴……………96	妊娠药忌……100
角花头……………92	初生下吐……………94	妊娠小便不利…96	妊娠咽痛……100
龟背……………92	初生口噤……………94	妊娠小便不通…96	妊娠咽喉痛…100

妊娠咳血…… 100	纯阳之体…… 103	〔I〕	鸣胎…… 108
妊娠咳嗽…… 100	纳气法…… 103		败血冲心…… 108
妊娠脉…… 100	纹…… 103	非搐…… 105	败血冲胃…… 108
妊娠胎萎燥…… 100	纹色…… 103	齿不生…… 105	败血冲肺…… 108
妊娠疫喉…… 100		齿迟…… 105	
妊娠眩晕…… 100	八 画	齿根血出…… 105	〔J〕
妊娠积聚…… 100	〔一〕	齿噩…… 105	垂头生…… 108
妊娠衄血…… 100	环珠形…… 103	齿齲…… 105	垂痛…… 109
妊娠脐下冷痛 100	武台…… 103	齿齲注…… 105	物触…… 109
妊娠疹…… 100	青记…… 103	齿齲…… 105	季经…… 109
妊娠瘰…… 100	青盲…… 103	虎口三关…… 105	侧水…… 109
妊娠烦渴…… 100	青带…… 104	虎口三关脉纹 106	侧棱…… 109
妊娠流涎…… 101	青崩…… 104	虎口纹…… 106	侏儒…… 109
妊娠眼昏…… 101	青瘦…… 104	虎口纹十三形 106	迫咳…… 109
妊娠唾血…… 101	表热…… 104	虎口脉色…… 106	金铅…… 109
妊娠惊悸…… 101	幸帽儿…… 104	易虚易实…… 106	锡饼…… 109
妊娠暑泻…… 101	茄子疾…… 104	易寒易热…… 106	命关…… 109
妊娠遗尿…… 101	茄病…… 104	肾水…… 106	命蒂…… 109
妊娠期…… 101	枵后…… 104	肾怯失音…… 106	觅盐生…… 109
妊娠喘…… 101	枵后生…… 104	肾泻…… 106	受肚泻…… 109
妊娠痘…… 101	枕陷…… 104	肾热…… 106	乳下婴儿…… 109
妊娠痼症…… 101	板牙…… 104	肾痞…… 106	乳子伤寒…… 109
妊娠遍身痠懒 101	板齿…… 104	肾病…… 107	乳无汁…… 109
妊娠遍身瘙痒 101	枪形…… 104	肾消…… 107	乳不消…… 109
妊娠腰背痛… 102	卧产…… 104	肾常虚…… 107	乳少…… 109
妊娠腰痛…… 102	卧胎…… 104	肾惊…… 107	乳中…… 109
妊娠腹内冷痛 102	卧蓐…… 104	肾痼…… 107	乳汁不行…… 110
妊娠腹痛…… 102	刺痧法…… 104	肾虚不孕…… 107	乳汁不通…… 110
妊娠数堕胎… 102	郁气崩漏…… 104	肾虚月经过少 107	乳汁自涌…… 110
妊娠瘕疝…… 102	郁结血崩…… 104	肾虚经闭…… 107	乳汁溢…… 110
妊娠瘫痪…… 102	奇胎…… 105	肾虚经乱…… 108	乳医…… 110
妊娠霍乱…… 102	抱儿癆…… 105	肾虚带下…… 108	乳利如血…… 110
妒头疮…… 102	抱鼻…… 105	肾虚崩漏…… 108	乳利如膏…… 110
妒乳…… 102	择食…… 105	肾虚滑胎…… 108	乳卸…… 110
鸡盲…… 102	拗哭…… 105	肾虚经行先后	乳泣…… 110
鸡咳…… 102	转乳…… 105	无定期…… 108	乳妬…… 110
鸡冠疮…… 102	转胞…… 105	肾虚经行后期 108	乳食不消…… 110
鸡胸…… 103	转胎…… 105	果菜积…… 108	乳食作痛啼… 110
纯血痢…… 103	转脐…… 105	叩嗽…… 108	乳食积滞…… 110

乳脉不行…… 110	肥人白带多痰 114	泻痢痧…… 116	经水不定…… 118
乳胎…… 110	肥胖不孕…… 114	沸子…… 116	经水不通…… 118
乳哺…… 110	肥疮…… 114	治崩三法…… 116	经水不调…… 118
乳积…… 111	肥热疳…… 114	定痛法…… 116	经水先后无
乳痈癖…… 111	肥疳…… 114	实女…… 116	定期…… 118
乳难…… 111	周身脱皮…… 114	实证自汗…… 116	经水先期…… 118
乳菌…… 111	昏睡露睛…… 114	实胀…… 116	经水后期…… 118
乳悬…… 111	鱼骨形…… 114	实热…… 116	经水全白…… 118
乳鹅…… 111	兔身…… 114	实热呕吐…… 117	经水否涩…… 118
乳滞…… 111	兔乳…… 114	试月…… 117	经水或多或少 118
乳蒸…… 111	兔蓐…… 114	试水…… 117	经水忽来忽断 119
乳蛾…… 111	狐气疔…… 114	试水症…… 117	经水绝…… 119
乳嗽…… 111	狐臭…… 114	试胎…… 117	经水涩少…… 119
乳缩症…… 111	狐瘦…… 114	试痛…… 117	经水断绝…… 119
乳膨…… 111			经水黑灰…… 119
乳癖…… 111	〔、〕	〔丁〕	经水愆期…… 119
乳癖…… 112	变蒸…… 114	居经…… 117	经乍来乍少… 119
肤证…… 112	夜间发搐…… 114	降诞…… 117	经乍来乍多… 119
肿胀…… 112	夜热…… 115	妬乳…… 117	经汁血…… 119
胀后产…… 112	夜惊…… 115	始胚…… 117	经早…… 119
胀满…… 112	夜啼…… 115	始胎…… 117	经血…… 119
肺风痰喘…… 112	夜啼四证…… 115	始膏…… 117	经血不定…… 119
肺水…… 112	夜啼痧…… 115	承浆疮…… 118	经血不断…… 119
肺炎喘嗽…… 112	底耳…… 115	孤浆…… 118	经血妄行…… 119
肺热…… 112	卒失音…… 115	绊舌…… 118	经血暴下…… 119
肺热咳嗽…… 112	卒然无声…… 115	经不调…… 118	经血暴下兼
肺疳…… 112	疝证…… 115	经气不调…… 118	带下…… 119
肺脏怯…… 113	放点…… 115	经从上逆…… 118	经色…… 119
肺病…… 113	放痧法…… 115	经从口鼻出… 118	经后吐衄…… 119
肺虚发热…… 113	怯肺…… 115	经月不利…… 118	经后腹痛…… 119
肺虚自汗…… 113	性急多怒经闭 115	经水一月再行 118	经行不止…… 119
肺虚作喘…… 113	单双肉蛾…… 116	经水久不行	经行发热…… 119
肺虚损…… 113	单蛾…… 116	发肿…… 118	经行吐血…… 120
肺常不足…… 113	单乳蛾…… 116	经水无常…… 118	经行先后无
肺惊…… 113	泄阳…… 116	经水不止…… 118	定期…… 120
肺痼…… 113	泄泻黄水…… 116	经水不止发	经行先期…… 120
肺寒壅嗽…… 113	泄痢发搐…… 116	肿满…… 118	经行后期…… 120
肺噤…… 113	泡水…… 116	经水不利下… 118	经行身痛…… 120
肺燥久咳…… 113	注夏…… 116	经水不行…… 118	经行或前或后 120

经行泄泻…… 120	经来如牛膜片 122	经前便血…… 125	带下青候…… 127
经行便血…… 120	经来如屋漏水 123	经前脐下痛… 125	带下黄候…… 127
经行衄血…… 120	经来如黄泥水 123	经前泄水…… 125	带下黑候…… 127
经行腹痛…… 120	经来如铜绿水 123	经前期紧张综 合征…… 125	草迷…… 127
经多发肿…… 120	经来如鱼脑髓 123	经前腹痛…… 125	草蓐…… 127
经闭…… 120	经来如猪肝水 123	经前腹痛吐血 125	茶黄…… 127
经闭不行…… 121	经来呕吐…… 123	经逆赤肿…… 125	荫胎…… 128
经闭不利…… 121	经来饮食后 即吐…… 123	经绝…… 125	垢胎…… 128
经闭出痘…… 121	经来狂言谵语 123	经候…… 125	胡臭…… 128
经闭发热…… 121	经来胁气痛… 123	经候不止…… 125	枯胎…… 128
经闭浮肿…… 121	经来胁痛…… 123	经候不匀…… 125	咸哮…… 128
经闭黄疸…… 121	经来泄泻…… 123	经候不行…… 125	
经闭腹大如鼓 121	经来咳血…… 123	经候不调…… 126	〔1〕
经如虾蟆子… 121	经来绿色…… 123	经崩…… 126	韭汁法…… 128
经来下肉胞… 121	经来浮肿…… 123	经崩出痘…… 126	背包生…… 128
经来下血胞… 121	经来臭如腐肉 123	经断…… 126	背脊…… 128
经来小便出 白虫…… 121	经来黄色…… 124	经断复来…… 126	战汗…… 128
经来小便痛… 121	经来断续…… 124	经断前后诸症 126	战胎…… 128
经来小便痛如 刀割…… 121	经来黑色…… 124	经淡如水…… 126	哑胎…… 128
经来小腹结块 121	经来惯呕吐… 124	经期…… 126	哑惊…… 128
经来小腹痛如 刀刺…… 122	经来遍身疼痛 124	经量…… 126	胃中实热…… 128
经来小腹痛 有块…… 122	经来腰腹痛… 124	经漏…… 126	胃气实热…… 128
经来未尽腹痛 122	经来潮热不食 124		胃气虚热…… 128
经来不止…… 122	经来潮热气痛 124	九 画	胃火呕吐…… 128
经来白色…… 122	经坚如石…… 124	〔一〕	胃水…… 128
经来发狂…… 122	经乱…… 124	珍珠积…… 127	胃有积滞…… 128
经来发热…… 122	经乱不孕…… 124	毒涎…… 127	胃怯汗…… 128
经来出白虫… 122	经迟…… 124	拭口法…… 127	胃泻…… 129
经来成块…… 122	经事…… 124	拭秽法…… 127	胃实热…… 129
经来成块如葱 白色…… 122	经质…… 124	指三关…… 127	胃热呕吐…… 129
经来吐蛔虫… 122	经信…… 124	按季…… 127	胃热胎疸…… 129
经来吊阴痛… 122	经脉…… 124	项软…… 127	胃热恶阻…… 129
经来色淡…… 122	经脉不止…… 124	带…… 127	胃弱恶阻…… 129
经来色紫…… 122	经脉不行…… 125	带下…… 127	胃虚汗…… 129
	经脉不利…… 125	带下三十六疾 127	胃虚热…… 129
	经脉不通…… 125	带下五色…… 127	胃惊…… 129
	经脉不调…… 125	带下无子…… 127	胃喘…… 129
	经前吐衄…… 125	带下赤候…… 127	胃寒恶阻…… 129
			胃禁…… 129

蚂蚁丹…………… 129	食积咳嗽…………… 132	胎中病…………… 134	胎脉…………… 137
品产…………… 129	食积盗汗…………… 132	胎气…………… 134	胎急…………… 137
品胎…………… 129	食积寒热…………… 132	胎气上逆…………… 134	胎养…………… 137
咽白喉…………… 129	食痞…………… 132	胎气攻心…………… 134	胎逆…………… 137
响惊…………… 129	食痼…………… 132	胎气喘息…………… 134	胎前…………… 137
咳喘…………… 129	食痛…………… 132	胎气蕴热…………… 134	胎前十字真言 137
咳嗽发搐…………… 130	食滞…………… 132	胎风…………… 135	胎前手足麻木 137
骨热…………… 130	食癖…………… 132	胎水…………… 135	胎前气急不 得卧…………… 137
骨热疳癆…………… 130	蚀疮…………… 132	胎水不利…………… 135	胎前节养六条 137
骨痞…………… 130	盆肠生…………… 132	胎水肿满…………… 135	胎前白带…………… 137
骨蒸肌瘦…………… 130	盆腔炎…………… 132	胎甲…………… 135	胎前用药三禁 137
骨蒸夜热不孕 130	胚…………… 133	胎生青记…………… 135	胎前用头风痛… 137
骨蒸孩劳…………… 130	胆水…………… 133	胎记…………… 135	胎前头痛…………… 137
骨蒸热…………… 130	胆惊…………… 133	胎动下血…………… 135	胎前动红…………… 137
骨缩病…………… 130	胞不正…………… 133	胎动不安…………… 135	胎前阴门肿… 137
	胞衣…………… 133	胎死不下…………… 135	胎前赤白痢… 138
	胞衣不出…………… 133	胎死腹中…………… 135	胎前赤带…………… 138
	胞衣不下…………… 133	胎自堕…………… 135	胎前吞酸…………… 138
	胞衣先破难产 133	胎衣…………… 135	胎前乳肿…………… 138
	胞转…………… 133	胎衣不下…………… 135	胎前昏迷…………… 138
	胞系…………… 133	胎衣不出…………… 135	胎前怔忡…………… 138
	胞系了戾…………… 133	胎赤…………… 135	胎前食泻…………… 138
	胞冷无子…………… 133	胎赤风眼…………… 136	胎前恍惚…………… 138
	胞阻…………… 133	胎赤眼…………… 136	胎前损身…………… 138
	胞胀不下…………… 133	胎呆…………… 136	胎前诸症…………… 138
	胞肥难产…………… 133	胎间水气…………… 136	胎前脚气…………… 138
	胞络…………… 133	胎证…………… 136	胎前脚肿…………… 138
	胞脉…………… 133	胎妒…………… 136	胎前脚痛…………… 138
	胞官…………… 134	胎肿…………… 136	胎前焦渴…………… 139
	胞脏…………… 134	胎肥…………… 136	胎前寒泻…………… 139
	胞浆…………… 134	胎疰…………… 136	胎前漏红…………… 139
	胞寒不孕…………… 134	胎疳…………… 136	胎前霍乱…………… 139
	胞满…………… 134	胎怯…………… 136	胎热…………… 139
	脉…………… 134	胎实不安…………… 136	胎热不安…………… 139
	胎…………… 134	胎毒…………… 136	胎热伏心啼… 139
	胎上逼心…………… 134	胎毒疮疥…………… 136	胎哭…………… 139
	胎元…………… 134	胎毒疮疡…………… 137	胎倦…………… 139
	胎不长…………… 134	胎毒瘰癧…………… 137	胎疽…………… 139
	胎不长养…………… 134	胎垢…………… 137	

[1]

胎病…………… 139	疫咳…………… 142	室女红脉不通 144	绝胎…………… 147
胎病风痰………… 139	疫痢…………… 142	室女实热经闭 144	绝嗣…………… 147
胎病作热………… 139	疫痧…………… 142	室女经闭………… 145	绞脐…………… 147
胎病结热………… 140	疫喉…………… 142	室女带下………… 145	骈产…………… 147
胎病脏寒………… 140	疫喉宜表………… 142	室女经闭成劳 145	骈胎…………… 147
胎病惊热………… 140	疮痂…………… 142	室女经闭劳嗽 145	
胎病潮热………… 140	疮疹热…………… 142	室女经闭胀痛 145	十 画
胎疾…………… 140	养胎…………… 143	室女经闭浮肿 145	〔一〕
胎兼癥瘕………… 140	养子十法………… 143	室女经闭骨蒸 145	唇口蠕动………… 147
胎浆…………… 140	差经…………… 143	室女经闭腹痛 145	唇疡…………… 147
胎弱…………… 140	姜片虫病………… 143	室女虚热经闭 145	唇疹…………… 147
胎教…………… 140	类胎痛…………… 143	宣露…………… 145	唇疮…………… 147
胎黄…………… 140	类搐…………… 143	官冷不孕………… 145	唇腭…………… 147
胎虚不安………… 140	前阴漫肿………… 143	官颈糜烂………… 145	顽涎…………… 147
胎麻…………… 140	前晓…………… 143	客热…………… 145	盐哮…………… 147
胎惊夜啼………… 140	首铅…………… 143	客忤…………… 146	恶子…………… 148
胎落…………… 140	逆生…………… 143	客忤似痢………… 146	恶字…………… 148
胎喘…………… 140	逆产…………… 143	客忤夜啼………… 146	恶阻…………… 148
胎痢…………… 140	逆经…………… 143	客忤痉…………… 146	恶食…………… 148
胎痛…………… 141	临月…………… 144	语迟…………… 146	恶疮…………… 148
胎寒…………… 141	临产…………… 144	误搐…………… 146	恶露…………… 148
胎寒不安………… 141	临产七候………… 144	神不安啼………… 146	恶露不止………… 148
胎寒胃冷啼… 141	临产五要………… 144	神奇外治法… 146	恶露不尽………… 148
胎渴…………… 141	临产六字真言 144	神珠将反………… 146	恶露不绝………… 148
胎蒸…………… 141	临产血晕………… 144		鬲痂…………… 148
胎瘦…………… 141	临产时五忌… 144		鬲痰风厥头痛 148
胎瘤…………… 141	临产晕绝………… 144	〔二〕	夏日沸烂疮… 148
胎嗽…………… 141	临草…………… 144	退妊…………… 146	夏月破腹………… 148
胎痕…………… 141	临盆…………… 144	昼热…………… 146	夏令麻疹………… 148
胎漏…………… 141	临摩…………… 144	眉炼…………… 146	夏痿…………… 149
胎漏黄水………… 141	烂衣疮…………… 144	怒后崩漏………… 146	真产…………… 149
独肾…………… 141	烂喉痹痧………… 144	癸…………… 147	真搐…………… 149
急疳…………… 142	烂喉痧…………… 144	癸水…………… 147	原生…………… 149
急惊风…………… 142	炸腮…………… 144	贯脓…………… 147	逐日经来………… 149
急惊风类证… 142	洞痢…………… 144	孩儿攻心………… 147	逐月养胎………… 149
	洞泄注下………… 144	结舌…………… 147	捏破涎涡儿… 149
〔三〕	洗三…………… 144	绝子…………… 147	捏脊…………… 149
疫疔疮疮………… 142	室女…………… 144	绝生…………… 147	损娠…………… 149
疫毒痢…………… 142	室女月水不通 144	绝孕…………… 147	换睡…………… 149
		绝产…………… 147	

热入血室……	149	积风冷嗽……	152	脐石症………	155	疳积……………	158
热吐……………	149	积吐……………	152	脐肠……………	155	疳积吐…………	158
热产……………	150	积泻……………	152	脐带……………	155	疳积酿泻………	158
热乳……………	150	积热……………	152	脐带法…………	155	疳病……………	158
热夜啼…………	150	积痢……………	152	脐疮……………	155	疳疾……………	158
热毒疮疥………	150	积痛……………	152	脐突……………	155	疳疾目矇………	158
热毒疮疡………	150	积滞……………	153	脐粪……………	155	疳热流注………	158
热毒瘰癧………	150	积滞吐…………	153	脐寒泻………	155	疳涩眼……………	158
热疮……………	150	积嗽……………	153	脐湿……………	155	疳黄……………	158
热疳……………	150	积精……………	153	脑长头大………	155	疳眼……………	158
热痲……………	150	透关射指形…	153	脑后顶门………	156	疳癆……………	158
热痘……………	150	透关射甲形…	153	脑顶风……………	156	疳痢……………	158
热烦……………	150	倒开花…………	153	脑砂……………	156	疳湿……………	159
热烦啼…………	150	倒生……………	153	脑热……………	156	疳湿疮……………	159
热淋……………	150	倒产……………	153	脑热注目………	156	疳渴……………	159
热涎……………	151	倒经……………	153	脑疳……………	156	疳嗽……………	159
热痢……………	151	倒敛……………	153	脑崩……………	156	疳瘦……………	159
热痢……………	151	倒靨……………	153	脑漏……………	156	疳蠱……………	159
热痧……………	151	候胎……………	153	脂塞不孕………	156	疳癖……………	159
热渴……………	151	臭息……………	153	脂瘦……………	156	病儿……………	159
热痰……………	151	躯……………	153	皱脚……………	156	病后暗……………	159
热嗽……………	151	息胞……………	153			病阻……………	159
热痰嗽…………	151	息胎……………	153	[、]		病鬼……………	159
顿泻……………	151	鬼泣……………	153	高喘……………	156	病涎……………	159
顿咳……………	151	鬼胎……………	153	疳……………	156	病膈……………	159
		钻牙疳………	154	疳气入阴………	156	病瘕……………	159
[I]		脊疳……………	154	疳气耳聋………	156	疳腮……………	159
紧唇……………	151	脓耳……………	154	疳水……………	157	疹后失音………	160
紧唇疮…………	151	脆脚……………	154	疳虫……………	157	疹后肺癰………	160
哮喘……………	151	脏头风………	154	疳后天柱倒…	157	疹后肺痿………	160
哺乳疳…………	151	脏寒泻………	154	疳利……………	157	疔夏……………	160
哺露……………	152	脏腑惊证………	154	疳肚……………	157	疔瘟……………	160
哺露疳…………	152	脐……………	154	疳证……………	157	痄子……………	160
虻……………	152	脐中水………	154	疳胀……………	157	痄疮……………	160
虻厥……………	152	脐中生疮………	154	疳肿胀………	157	痉病似天钩…	160
		脐中冷…………	155	疳泻……………	157	烦热……………	160
[J]		脐中流血………	155	疳蚀……………	157	消上……………	160
缺乳……………	152	脐风……………	155	疳疮……………	158	消中……………	160
缺唇……………	152	脐风三证………	155	疳蚀疮………	158	消肌……………	160

消肾…………… 160	黄连法…………… 163	眼疳…………… 166	盘肠气痛……… 168
消乳…………… 161	黄肿…………… 163	眼睫连割……… 166	盘肠生…………… 169
消浊…………… 161	黄带…………… 163	蛇丝惊…………… 166	盘肠似内钩… 169
涎嗽…………… 161	黄胖病…………… 164	蛇舌…………… 166	盘肠产…………… 169
流行性乙型	黄病…………… 164	蛇身…………… 166	盘肠痛…………… 169
脑炎…………… 161	黄崩…………… 164	蛇串疮…………… 166	盘肠献花……… 169
流红…………… 161	黄瘦…………… 164	蛇胎…………… 166	週经…………… 169
流珠形…………… 161	著噤…………… 164	蛇缠虎带……… 166	脚手先下难产 169
流涎…………… 161	梦生…………… 164	蛇痕…………… 167	脚拳…………… 169
涕液不收……… 161	梦与鬼交……… 164	蛊胀…………… 167	脚踏莲花生… 169
浴儿法…………… 161	雪口…………… 164	蛊毒痢…………… 167	脱壳…………… 169
浪脐生…………… 162	盛胎…………… 164	蛊痢…………… 167	脱荣…………… 169
浸淫疮…………… 162	捧心生…………… 164	晚期妊娠中	脱囊…………… 169
被魃…………… 162	掩脐法…………… 164	毒症…………… 167	
被膜儿…………… 162	控脑沙…………… 164	晚嫁难产……… 167	〔、〕
调产…………… 162	推肠生…………… 164	崩…………… 167	麻风疮…………… 169
调经…………… 162		崩中…………… 167	麻后牙疳……… 169
〔7〕	〔1〕	崩中五色俱下 167	麻后有痰……… 170
陷伏…………… 162	虚中积…………… 164	崩中漏下……… 167	麻后喉风……… 170
陷经…………… 162	虚风…………… 164	崩中漏下五色 167	麻证…………… 170
通乳…………… 162	虚里动气……… 165	崩砂…………… 167	麻证口渴……… 170
通脉法…………… 162	虚坠…………… 165	崩漏…………… 167	麻证衄血……… 170
通睛…………… 162	虚胀…………… 165	崩漏下血夹水 168	麻证燥痒……… 170
难产…………… 162	虚热经行先期 165	婴儿…………… 168	麻毒入营……… 170
难产七因……… 162	虚热痉…………… 165	婴儿不睡……… 168	麻毒内攻……… 170
难乳…………… 162	虚积痢…………… 165	婴儿哭迟……… 168	麻毒陷肺……… 170
验齿…………… 163	虚涎…………… 165	婴幼儿疮疡……… 168	麻疹…………… 170
验胎…………… 163	虚弱血崩……… 165	婴孩寒热……… 168	麻疹夹斑……… 171
缘虫病…………… 163	虚痘…………… 165		麻疹作痢……… 171
继病…………… 163	虚寒白喉……… 165	〔J〕	麻疹逆证……… 171
十一画	虚寒血崩……… 165	停经…………… 168	麻疹泄泻……… 171
〔一〕	虚寒腹痛……… 165	停食…………… 168	麻疹顺证……… 171
琉璃胎…………… 163	虚羸痢…………… 166	偏风口噤……… 168	麻疹险证……… 172
熬蒸法…………… 163	颅胀…………… 166	偏产…………… 168	麻疹烦渴……… 172
黄水疮…………… 163	悬痛…………… 166	偏坠…………… 168	麻疹紫黑……… 172
黄水粘疮……… 163	野合…………… 166	偏经…………… 168	麻疹喘急……… 172
黄耳伤寒……… 163	野鸡痢…………… 166	假胎…………… 168	麻疹喉痛……… 172
	眼赤痛…………… 166	假搐…………… 168	麻疹谵妄……… 172
	眼胎赤…………… 166	盘肠气钩啼… 168	麻痺…………… 172

旋耳疮····· 172	惊癖····· 176		黑疖····· 181
旋螺风····· 172	昏塞····· 176		黑陷····· 181
盗汗····· 172	断子····· 176	〔I〕	黑崩····· 181
盖痘疹····· 173	断产····· 176	悲哭····· 178	黑靥····· 181
惊丹····· 173	断乳····· 176	断齿····· 178	
惊风····· 173	断胎····· 176	紫舌胀····· 178	〔J〕
惊风八候····· 173	断脐····· 176	紫河车····· 178	鹅口····· 181
惊风内钩啼····· 173	断绪····· 176	紫陷····· 178	鹅口疮····· 181
惊风四证····· 173	断续····· 176	暑月水泻····· 178	鹅口疳····· 181
惊风先兆····· 174	清里法····· 176	暑风····· 178	鹅口白疮····· 181
惊风结核····· 174	淋瀝····· 176	暑风慢惊····· 178	健子····· 181
惊风热····· 174	混元生····· 177	暑令吐泻····· 178	铺摩····· 182
惊风烦渴····· 174	混元母····· 177	暑产····· 178	锁口····· 182
惊风预治法····· 174	混沌衣····· 177	暑泻····· 178	锁子症····· 182
惊风腹痛····· 174	剪口疮····· 177	暑热证····· 179	锁肚····· 182
惊风痰····· 174	烧浆····· 177	暑疮····· 179	锁肚痛····· 182
惊风痰热痧····· 174	宿乳····· 177	暑厥····· 179	锁肠疳····· 182
惊水····· 174	宿食不消····· 177	暑痢····· 179	锁项····· 182
惊生····· 174		暑博血崩····· 179	锁膈····· 182
惊吐····· 174	〔T〕	噬唾····· 179	筋疳····· 182
惊后瞳斜····· 174	蛋托法····· 177	噬煎····· 179	脾风····· 182
惊产····· 174	隐病····· 177	遗毒····· 179	脾风多涎····· 182
惊狂····· 175	隐疹····· 177	遗尿····· 179	脾不统血····· 182
惊泻····· 175	隐痞····· 177	蛲虫病····· 180	脾中积····· 182
惊胎····· 175	颈细····· 177	蛲疳····· 180	脾气虚····· 182
惊退而暗····· 175		蛔虫贯膈····· 180	脾水····· 182
惊热····· 175	十二画	蛔虫病····· 180	脾冷多涎····· 183
惊积····· 175	〔一〕	蛔虫痧····· 180	脾毒痢····· 183
惊疳····· 175	斑疮入眼····· 177	蛔疳····· 180	脾消····· 183
惊悸····· 175	蕈病····· 177	蛤蟆瘟····· 180	脾病····· 183
惊啼····· 175	葡萄疫····· 177	跌仆伤胎····· 180	脾疳····· 183
惊啼壮热····· 175	落草····· 178	喘胀····· 180	脾疳积····· 183
惊痢····· 175	落胎····· 178	喘疾····· 180	脾热····· 183
惊痢····· 175	朝信····· 178	喉白喉····· 181	脾热多涎····· 183
惊搐····· 176	厥痛····· 178	喉点疳····· 181	脾热身黄····· 183
惊搐五证····· 176	裂浆····· 178	喉痹····· 181	脾惊····· 183
惊膈吐····· 176	颊赤····· 178	喉暗····· 181	脾虚久嗽····· 183
惊膈嗽····· 176	颊脂垫····· 178	黑带····· 181	脾虚发黄····· 183
惊瘫····· 176		黑疮倒靥····· 181	脾虚多涎····· 183

脾虚自汗…… 183	痼渴…… 187	寒乳…… 190	碍产…… 193
脾虚呕吐…… 184	痢后风…… 187	寒胀…… 190	碍肩生…… 193
脾虚泻…… 184	痢证…… 187	寒夜啼…… 190	搐…… 193
脾虚经闭…… 184	痧子…… 187	寒疝…… 190	输卵管积水… 193
脾虚经行先后 无定期…… 184	痧筋…… 187	寒积吐…… 190	
脾虚带下…… 184	痧癆…… 187	寒痉…… 190	〔I〕
脾虚湿困…… 184	痧痘口疳…… 187	寒淋…… 190	虜寄疮…… 193
脾常不足…… 184	痛经…… 187	寒痧…… 190	蒙头…… 193
脾病…… 184	痛胎…… 187	寒湿泻…… 190	睛动…… 193
猴疳…… 184	童子怯…… 187	寒湿凝滞痛经 190	睡中惊动…… 193
猴疳疮…… 184	童子癆…… 188	寒湿凝滞经闭 191	暖病…… 193
	童损…… 188	寒痢…… 191	暖痰法…… 194
	童癆…… 188	寒禁…… 191	歌…… 194
〔、〕	惯堕胎…… 188	寒痰…… 191	歌经…… 194
痘中呛逆…… 184	焮法…… 188	寒嗽…… 191	暗风…… 194
痘不起胀…… 184	焮胎寒…… 188	割脂…… 191	暗产…… 194
痘不灌浆…… 184	焮脐风…… 188		暗经…… 194
痘出不快…… 185	湮尻疮…… 188	〔7〕	暗痢…… 194
痘夹疹…… 185	滞颐…… 188	疏表法…… 191	嗜异…… 194
痘后浮肿…… 185	滞利…… 188	登痘疮…… 191	噬乳…… 194
痘色淡白…… 185	温壮…… 188		蛾子…… 194
痘衣法…… 185	温麻…… 188	十三画	
痘呛…… 185	温热痉…… 188	〔一〕	〔J〕
痘应出不出… 185	湿水肿…… 188	鼓…… 191	稚阳稚阴…… 194
痘疔…… 185	湿痉…… 188	鼓舌…… 191	催生…… 194
痘疮…… 185	湿泻…… 188	鼓花…… 191	催肠生…… 194
疮疮见形…… 185	湿毒带下…… 189	鼓花头…… 191	催乳…… 194
痘疮发热…… 185	湿热泻…… 189	鼓槌风…… 191	鼠痿…… 194
痘疮夹斑…… 186	湿热痢…… 189	蓝注…… 192	错经…… 195
痘疮夹痧…… 186	湿热感寒疝… 189	摩风…… 192	错喉…… 195
痘疮身痒…… 186	湿痰…… 189	摩劳…… 192	错经妄行…… 195
痘疮起胀…… 186	湿疹…… 189	摩疮…… 192	错经吐衄血崩 195
痘疮难靨…… 186	湿痰不孕…… 189	蒸乳…… 192	膝…… 195
痘疮脱痂…… 186	湿蟹…… 189	蒸笼头…… 192	腰背反张…… 195
痘痂…… 186	滑胎…… 189	禁疮…… 192	腹啼…… 195
痘疹闷乱…… 186	溃槽…… 189	感冒夹食…… 192	腹痛啼…… 195
痘浆法…… 186	寒入血室…… 189	感冒夹热…… 192	腹中有癖…… 195
痞结…… 186	寒邪伤肺…… 190	感冒夹惊…… 192	腹哭钟鸣…… 195
痞热…… 187	寒吐…… 190	感染性休克… 192	腹痛夜啼…… 195

触经伤寒…… 195
 触经感冒…… 195
 解颅…… 195
 解颅法…… 195
 解颅眼白多…… 196

〔、〕

痞子…… 196
 痞后便脓…… 196
 痞…… 196
 痞子…… 196
 痞瘤…… 196
 痰母…… 196
 痰闭…… 196
 痰迷…… 196
 痰胎…… 196
 痰痢…… 196
 痰嗽…… 196
 痰火扰心…… 196
 痰闭惊厥…… 196
 痰实壅闷…… 196
 痰迷心窍…… 197
 痰积血崩…… 197
 痰涎喘嗽…… 197
 痰滞恶阻…… 197
 痰湿不孕…… 197
 痰湿带下…… 197
 痰饮食不消…… 197
 痰阻经行后期…… 197
 痰湿月经过少…… 197
 新生浴儿…… 197
 新生儿败血症…… 197
 疔疮…… 197
 数失子…… 197
 数堕胎…… 197
 数月行经…… 198
 溢乳…… 198

〔7〕

嫉妬不孕…… 198
 嫁痛…… 198
 缠耳…… 198
 缠腰火丹…… 198

十四画

〔一〕

磁锋砭法…… 198

〔1〕

嗽吐…… 198
 嗽吐脓痰…… 198
 嗽声不出…… 198
 嗽唾脓痰…… 198
 雌雄人…… 198

〔J〕

稳婆…… 198
 鼻干无涕…… 198
 鼻风…… 199
 鼻多涕…… 199
 鼻息肉…… 199
 鼻衄…… 199
 鼻疳…… 199
 鼻煽…… 199
 鼻渊…… 199
 鼻塞…… 199
 鼻鼾…… 199
 鼻鼾塞…… 199
 魇气…… 199
 魇乳…… 199
 魇病…… 199
 膀胱气痛…… 200
 膀胱水…… 200

〔、〕

裹脐法…… 200

腐根…… 200
 痕泄…… 200
 瘟毒发瘡…… 200
 瘦人经水来少…… 200
 瘦冷疳…… 200
 慢肝风…… 200
 慢肝惊风…… 200
 慢惊风…… 200
 慢惊夹痰…… 200
 慢惊自汗…… 200
 慢脾风…… 200
 满月…… 201
 漱经…… 201
 精积…… 201
 滴虫性阴道炎…… 201
 漏…… 201
 漏下…… 201
 漏下不止…… 201
 漏下白候…… 201
 漏五色俱下…… 201
 漏下赤白…… 201
 漏下赤候…… 201
 漏下青候…… 201
 漏下黄候…… 201
 漏下黑候…… 201
 漏带…… 201
 漏胞…… 201
 漏胎…… 201
 漏疳…… 201
 痞生…… 202

〔7〕

娶舌…… 202
 缩儿胎…… 202
 缩胎…… 202

十五画

〔一〕

聾耳…… 202

横生…… 202
 横产…… 202
 醉乳…… 202
 醋哮…… 202
 飘麻…… 202
 豌豆疮…… 202
 震耳…… 202
 霉菌性阴道炎…… 202
 撮口…… 202
 撮风…… 203
 撞红…… 203

〔1〕

暴冷嗽…… 203
 暴注…… 203
 暴泻…… 203
 暴崩…… 203
 暴惊…… 203
 暴喘…… 203
 暴痢…… 203
 影疹…… 203
 颧颊热肿…… 203
 踏盐生…… 203

〔、〕

痼疾…… 203
 瘙疹…… 203
 爆疮…… 203
 爆浆疮…… 204
 潮水…… 204

十六画

〔一〕

燕口…… 204
 燕口疮…… 204
 燕窝疮…… 204
 颠倒…… 204

[1]	
蝻齿……………	204
噤口痢……………	204
噤风……………	204
踹地生……………	204
踹经……………	204
踹经……………	204
踹理症……………	204
踹踹……………	204
噫奶……………	204
[J]	
毓蛆……………	204
嚶啼……………	204
[一]	
襞褓……………	205
壅乳……………	205
凝产……………	205
辨胎孕男女法	205
激经……………	205
[7]	
避年……………	205
避经……………	205
十七画	
[一]	
戴白生……………	205

[1]	
螳螂子……………	205
螺……………	205
[、]	
糜疳……………	205
瘡……………	205
糟指……………	205
糟蒸法……………	205
糠疮……………	206
燥疮……………	206
燥痕……………	206
豁泄……………	206
十八画	
[一]	
萱草……………	206
[1]	
蟠肠生……………	206
鹭鸶咳……………	206
[J]	
翻花……………	206
翻肛……………	206
翻皮疮……………	206
[、]	
癰疽……………	206

癰葫芦……………	206
癰……………	206
癰气……………	206
癰热……………	207
癰疾……………	207
十九画	
[1]	
巖疾……………	207
[J]	
齙舌……………	207
胸癰……………	207
胸胎……………	207
[、]	
鑿痕……………	207
二十画	
[J]	
鱗体……………	208
[、]	
灌脓……………	208
灌浆……………	208
灌浆板黄……………	208
灌浆逆证……………	208
灌浆顺证……………	208
灌浆险证……………	208

潰痢……………	208
瘰癧……………	208
瘰癧痛……………	208
二十一画	
[一]	
露丹……………	209
露珠……………	209
[1]	
囊痢……………	209
二十二画	
[一]	
醫……………	209
醫疮……………	209
醫鼻……………	209
囊耳……………	209
囊脱……………	209
囊缩……………	209
留舌……………	209
[、]	
雙生……………	209
二十四画	
[J]	
鰓鼻……………	210

一

画

〔一〕

一月经再行 病证名。指一月经来二、三次而言。多因气虚、血热所致。《叶氏女科证治》：“性躁多气伤肝，而动冲任之脉，宜服九味四物汤（四物汤加人参、柴胡、黄芩、黄连、甘草），兼服滋阴丸（知母、黄柏）。如误服辛热药物致经再行，宜用九味四物汤，更服三补丸（黄芩、黄连、黄柏）”。

一指定三关 用一指切诊小儿寸口的、

寸、关、尺三关脉息的方法。出《医宗金鉴》卷五十。三岁以下小儿，寸口部位甚小，不能以三指切诊，医生左手握住小儿手，用右手拇指按儿掌后桡骨茎突脉上，分寸、关、尺三部以定息数；对四岁以上小儿，则以桡骨茎突中线为关，以一指指向关前后滚动，寻找三部；至七八岁时，则可以挪动拇指切诊三部。由于这种切脉法是以一指进行，以定寸口三关脉息，故名。

二

画

〔一〕

二便色白 病证名。见《张氏医通·婴儿门》。又名大小便白。小儿便如米泔，或溺停少顷，变成泔浊者，为脾胃湿热；若大便泔白色，或如鱼冻，或呈红黄黑色者，为湿热积滞所致。治宜理脾消滞，去湿热，节饮食。用胃苓汤加减。日久气虚，伴有神疲，少气者，用肥儿丸，或六君子汤，腹痛加木香。

二便秘结 指大便干燥和小便赤涩的病证。见《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》。病因由于小儿乳食停滞，郁而生火，火热上熏心肺，心与小肠相表里，心火移于小肠，故小便赤涩不畅；肺与大肠相表里，肺热移于大肠，故大便秘结不行。临床多见面赤唇焦，舌干口渴。热积者，二便秘结，伴有少腹满急，治宜清热利水，用八正散；食积者，大便不通畅，而腹胀作痛，治宜清热攻下，用神芎丸（《医宗金鉴》：大黄、滑石、薄荷、川芎、黄芩、黄连、牵牛）。

十二病绝产 指导致绝产的十二种病

症。《千金要方》卷四：“一曰白带，二曰赤带，三曰经水不利，四曰阴胎，五曰子藏坚，六曰藏癖，七曰阴阳患痛，八曰内强，九曰腹寒，十曰藏闭，十一曰五藏痠痛，十二曰梦与鬼交。”宜服龙骨散（龙骨三两，黄柏、半夏、灶中黄土、桂心、干姜各二两，石苇、滑石各一两，乌贼骨、代赭石各四两，白僵蚕五枚）。古人认为妇人患此十二病，则影响生育。

十二经绝产 即十二病绝产。详该条。

十二瘕 即带下三十六疾中的十二瘕。《诸病源候论》卷三十八：“十二瘕者，是所下之物，一者如膏，二者如青血，三者如紫汁，四者如赤皮，五者如脓痂，六者如豆汁，七者如葵羹，八者如凝血，九者如清血、血似水，十者如米汁，十一者如月浣，十二者经度不应期也”。

十月胎形 指胎儿在母体内的发育成长过程。北齐·徐之才《逐月养胎方》：“妊娠一月始胚，二月始膏，三月始胞，四月形体成，五月能动，六月筋骨立，七月毛发生，八月

脏腑具，九月谷气入胃，十月诸神备，日满即产矣”。后世医家对一、二、三月的胎形又有不同的描述，如：《诸病源候论》：“一月始形，二月始膏，三月始胎”；《女科要旨》：“一月为胚，二月为胚，三月为胎”；清·何荣《胎产金鍼》：“一月如露珠，二月如桃花，三月分男女”。以上均是前人对十月胎形的认识。

十三指形 小儿指诊法。小儿指纹的十三种形状。出《证治准绳·幼科》。又名虎口纹十三形。即第一，流珠形，只一点红色见于风关，主饮食所伤，内热欲吐或肠鸣自利。第二，环珠形，其点差大，主脾虚停食，胸膈胀满，烦渴发热。第三，长珠形，其点圆长，主脾伤，饮食停滞，肚腹作痛，寒热不食。第四，来蛇形，是长散出气关，一头大，一头尖，主脾胃湿热，中脘不利，干呕不食。第五，去蛇形，是大头向气关，主脾虚食积，吐泻烦渴。第六，弓反里形，主感冒寒邪。第七，弓反外形，主痰热。第八，枪形直上，主风热。第九，鱼骨形，纹分支歧，主惊痰发热。第十，水字形，三脉并行，主惊风、食积。第十一，长针形，过命关一、二粒米许，主心肝热极生风。第十二，透关射指形，命脉向里，主惊风，痰热聚于胸膈。第十三，透关射甲形，命脉向外，主惊风，肝木克脾土之败证（《四诊抉微》引《全幼心鉴》）。

七日风 病名。脐风的俗称。详该条。

七害 出《诸病源候论》卷三十八。即带下三十六疾中之七害。一指七种病因，二指七种病症。《诸病源候论》：“一者害食，二者害气，三者害冷，四者害劳，五者害房，六者害妊，七者害睡”。《千金要方》卷四：“一曰穷孔痛不利，二曰中寒热痛，三曰小腹急坚痛，四曰藏不仁，五曰子门不端引背痛，六曰月浣乍多乍少，七曰害吐”。

丁奚 病名。①小儿黄瘦腹大的证候。《诸病源候论》卷四十七：“小儿丁奚病者，由乳食过度，而脾胃尚弱，不能消磨故也。哺食不消，则水谷之精减损，无以营其气血，致肌肉消瘠，其病腹大颈小，黄瘦是也。”②

凡小儿因吐泻久不差，或病退不能行，膝大胫小，名曰丁奚；七岁以下名鼓槌风。此由风冷伤肾所致（《普济方》）。③小儿腹大，如有青筋见，即曰疳胀。如无青筋见，乃名丁奚是因过饱伤食得之（《证治准绳·幼科》）。④指丁奚疳。详该条。

丁奚病 出《诸病源候论》卷四十七。详见丁奚条。

丁奚疳 病证名。《诸病源候论》卷四十七名为小儿丁奚病。指小儿疳疾，骨瘦如柴，其形似“丁”之证。属于脾胃虚损，气血衰惫，以致出现面色苍白，低烧潮热，四肢细小，项长骨露，尻臀无肉，腹胀脐突，以及食多吐逆、泄泻无度等。病因病理均同于哺露疳，皆系脾疳重症。治宜补脾养胃，并改进饮食。

〔一〕

人痘接种法 是取天花患者痘痂制浆接种于健康儿童，使之产生免疫力，以预防天花的方法。是我国人民对人类的一项重大贡献。相传公元十世纪的北宋时期已应用引痘法以预防天花。到公元十六、十七世纪，人痘接种在国内已较普遍并成为专业。其方法分为四种：即痘浆法、旱苗法、水苗法、痘衣法（见各条）。前三者都是接种于鼻孔，其痘苗又叫做鼻苗。痘衣法是穿用天花患者患病时所穿的衣服。人痘接种法的创造，是人类免疫学的先驱，这种技术在公元十七世纪开始，先后传播到俄国、日本、阿拉伯等许多亚、欧、非洲国家。公元1717年传到英国。直到公元1796年英国人发明的牛痘接种法后，才逐步代替。

人癆（ō 啊） 病名。出《汉书·五行志》。癆，病貌。人癆指生殖器两性畸形。

八月章 出《万氏妇人科》卷一。是指孕妇滋养太过，体质肥盛，胎儿过大，孕至七、八个月，腹大令孕妇坐卧不安，为防其难产，宜予服瘦胎之药。方用瘦胎丸（枳壳、白术、当归、甘草），蜜小丸，口服。

八片锦 即八段锦。详该条。

八利 出《小儿卫生总微论方》。即八痢。见该条。

八段锦 ①小儿指诊法。指小儿指纹的纹形改变及其延伸方向各种类型的合称。又名八片锦。清·林之翰《四诊抉微》分：鱼刺形，主惊风、痰热；悬针形，主伤风、泄泻、积热；水字形，主食积、咳嗽、惊疳；乙字形，主肝病惊风；虫纹形，主肝虫、大肠秽积；环形，主疳积吐逆；乱纹，主虫；珠形，主死。现较少用，有待研究。②传统体育疗法的一种。

八痢 又称八利。指八种不同类型的痢疾。①《小儿卫生总微论方》痢作利。以水谷利、冷利、热利、滞利、积利、疳利、蛊利、休惜利为八利。②《普济方》以冷痢、热痢、疳痢、惊痢、冷热不调痢、休息痢、溃痢、蛊毒痢为八痢。

八蒸十变 出《外台秘要》卷第三十五。详大小蒸条。

八瘕 《诸病源候论》卷三十八：“八瘕者，皆胞胎生产，月经往来，血脉精气不调之所生也”。即黄瘕、青瘕、燥瘕、血瘕、脂瘕、狐瘕、蛇瘕、鳖瘕。详各条。

入月 ①见《外台秘要》卷三十三。指临近产期。②月经的别称。《妆楼记》：“红潮，谓桃花癸水也。又名入月。”

九窍出血 见《张氏医通》卷十四。即九道出血。详该条。

九痛 即带下三十六疾中之九痛，是指妇人九种病症。《诸病源候论》卷三十八：“一者阴中痛伤，二者阴中淋痛，三者小便即痛，四者寒冷痛，五者月水来腹痛，六者气满并痛，七者汁出阴中如虫啮痛，八者胁下皮痛，九者腰痛”。

九道出血 病证名。见《证治准绳·幼科》。又名九窍出血。即眼、鼻、耳、口及二阴出血。小儿九道出血，多因乳母喜吃辛辣之物，流于乳络，儿饮之后，停滞不散，郁蒸于

内，或因护养过暖，积温成热，热极则涌泄，亦有气虚而邪热乘袭，则血不得循流络脉，浮出诸经，也生失血之证。《张氏医通·诸血门》：“是证非中毒，即跌扑受伤。中毒者，用生羊血法，受伤者，观其人不发热，尚能饮食者，频灌童便。无故发生九窍出血者，肝肾疲极，五脏内崩也。”五脏内崩可见于急性白血病等。因热而出血者，宜清血止血，用十灰散合犀角地黄汤；因虚而出血者，宜补气以摄血，用大剂独参汤加龙骨、牡蛎之类，以防气随血脱。

九漏 病证名。出《证治准绳·幼科》。即小儿瘰癧。详该条。

儿门 即产门，指阴道外口。

儿风 病名。即子痫。《坤元是宝》：“有孕眩暈，或冷麻，甚至昏倒仆地者为子痫，亦名儿风”。详子痫条。

儿衣 见《外台秘要》卷三十三。即胞衣。详该条。

儿衣不出 病名。见《外台秘要》卷三十三。即胞衣不下。详该条。

儿枕 ①指妊娠晚期，胞中余血成块有如儿枕，故名。《经效产宝》：“十月足日，食有余，遂成血块，呼为儿枕。”②病名。见《医学入门》。即儿枕痛。详该条。

儿枕不安 病名。指产后血瘀型腹痛。《郑氏女科家传秘方》：“恶露不行，脐腹作痛，俗名儿枕不安。”详儿枕痛条。

儿枕块 病名。《女科撮要》：“产后小腹作痛，俗名儿枕块”。详儿枕痛条。

儿枕痛 病名。见《古今医鉴》卷十二。包括儿枕。又名儿枕不安、块痛、产枕痛、血枕痛、血块痛、血母块、产后儿枕腹痛、产后腹中块痛等。多因产后败血未尽，或风寒乘虚侵袭胞脉，血被寒凝，瘀血内停所致。恶露未尽者，症见小腹硬痛拒按，或可摸到硬块，兼见恶露不下或不畅，治宜活血祛瘀，方用《傅青主女科》散结定痛汤、失笑散等；血被寒凝者，症见小腹冷痛，得热痛减，兼

见面色青白，四肢不温，恶露涩滞不下，治宜温经散寒祛瘀，方用生化汤加減。

儿晕 病名。即子痼。高淑濂《胎产方案》：“妊娠口噤，项强手足挛搐，言语蹇涩，痰涎壅盛，不省人事，名曰子痼，即胎风，又名儿晕、儿痉”。详子痼条。

儿痉 病名。见高淑濂《胎产方案》。即子痼。详该条。

儿脐血出 病证名。出《本草纲目》。又名血脐。指断脐后，脐部有血渗出，经久不止。可因患儿脐带粗大，干缩后，所缚的结松脱而出血；或因胎热内盛，迫血妄行而致。大多在出血后第一星期，脐带脱落的前后发现。如出血无其他症状者，重新结扎脐带；胎热内盛者，宜凉血止血，用十灰散。

儿捧母心 病名。见清·叶其綦《妇科切要》。即捧心生。详该条。

儿寐不寤 小儿偶尔出现思睡不醒，可因乳母酒醉乳儿，致儿亦醉思睡不醒，其脉和平，与惊睡之脉洪大而强不同，不能误作惊风治疗。宜用甘草、葛花、砂仁、贯众煎服，解酒即醒（《儒门事亲》）。

儿啼 出《医学入门》。即子啼。详该条。

儿嗜灯花 出《本草纲目》。见拗哭。详该条。

儿发干枯 病证名。指小儿头发干枯而不光泽者。《太平圣惠方》第四十一卷：“足少阴之经血，外养于发，血气盛则光泽，若虚则血不能养发，故无光泽。”多见于小儿慢性消耗性疾病，亦有因气血不足而致者。发乃血之余，气血不荣于发，故发干枯。治同儿发不生，详该条。

儿发不生 病证名。多因气血不荣于发所致。《普济方》卷三百六十三：“气血损少，不能荣于发，故令发不生也。”亦有因疮而秃落者，均宜地黄丸内服。

儿发成穗 病证名。小儿发枯色萎而又胶结成穗状，为疳疾证候之一。《育婴秘诀》：“大病后，其发成穗，或稀少者，乃津液不足，疳癆之外候也。”

儿发疏薄 小儿头发稀疏。《普济方》卷三百六十三：“夫足少阴为肾之经，其荣在发。小儿禀性少阴，血气不足，则发疏薄。”宜内服地黄丸。

三

画

〔一〕

三虫 出《诸病源候论》卷五十。小儿三种常见的肠寄生虫病，即长虫、赤虫、蛲虫。见蛔虫病、蛲虫病、姜片虫病条。

三关 ①小儿指诊部位。小儿指纹显现的食指掌侧三个部位，又名虎口三关。即风关、气关和命关。详小儿指纹条。②脉诊部位。指寸口切脉的三部。《医宗金鉴》：“三关者，寸关尺也。”③推拿穴位名。出陈氏《小儿按摩经》。位于前臂桡侧缘（《幼科铁镜》位于前臂伸侧）。常用推法，自腕推至肘，为推上三关；自肘推至腕，为推下三关。寒证、

虚证用之，能培元气，发汗行气。治发热恶寒，无汗，四肢冷弱，赤白痢下，因寒而引起的头痛，腹痛等症。

三固 出《诸病源候论》卷三十八。即三痼。详该条。

三消 病证名。①见《幼科铁镜》。为儿科消上、消肌、消浊的合称。详小儿消渴条。②内科消渴病的上消、中消、下消的合称。

三秽液毒 古痘疮的病因学名称。出宋·陈文中《痘疹方论》，即①五脏六腑秽液之毒，发为水泡疮；②皮膜筋肉秽液之毒，发为浓水泡疮；③气血骨髓秽液之毒，发为脓血水泡疮，三毒既出，则发为疹痘疮。

三焦惊 脏腑惊证之一。详该条。

三痢 病证名。见《幼幼集成》。即风痢、惊痢、食痢。各详该条。

三瘤 即带下三十六疾中三瘤。又名三固。古人认为属妇人三种顽固疾病。《千金要方》卷四：“何谓三瘤？一曰羸瘦不生肌肤，二曰绝产乳，三曰经水闭塞”。

干血癆 病名。见《血证论》卷五。早在《金匱要略·血痹虚劳病脉证并治》中就有关于干血的记载，症状及治疗与本病一致。病因五劳所伤，虚火久蒸，干血内结，瘀滞不通，久则瘀血不去，新血难生，津血不能外荣。症见经闭不行，身体羸瘦，不思饮食，骨蒸潮热、肌肤甲错、面目黯黑等。治宜活血行瘀，清其积热，方用大黄蟅虫丸；继宜养血和血，方用当归补血汤、四物汤等。

干涩难产 病名。又名胎干难产。清·周登庸《续广达生篇》：“产时用力太早，水衣先破，被风所吹，产户肿胀，干涩狭小者，用熏洗法，从容俟之，无不立下矣。熏洗法：紫苏不拘量，多点好，煎重汤熏洗阴户。随用麻油和蜂蜜涂之。”

干痞 病证名。痞疾的一种证候。见《太平圣惠方》第八十七卷。由于小儿乳食不调，心、脾积热，津液虚损所致。症见羸瘦，皮肤干枯，两目干燥凹下，或畏光，夜热不安，啼哭无泪，腹部胀满，口干唇燥，或颈项倒斜。治宜健脾益气，清热养阴，用参苓白朮散加减。

干浆 出清·翟良《痘科类编释意》。为痘疮收靨发热的证候。详收靨条。

下关 ①诊察小儿指纹的部位。见《奇效良方》。即命关。详该条。②经穴名。出《灵枢·本输》。属足阳明胃经。位于面部，耳屏前约一横指，颧骨弓与下颌切迹所形成的凹陷处。

下乳 出《千金要方》卷二。即对产妇乳汁不下或乳汁缺乏通下乳汁。详催乳条。

下胎毒法 古代新生儿调护方法之一。

小儿初生拭净口中恶血后，用药物内服，以去腹中恶物、脐粪，解胎中蕴积热毒。《千金要方》有甘草法等；李东垣用淡豆豉一味煎汤，与三、五口，其毒自下，又能助胃气。

《证治准绳·幼科》分甘草法、黄连法、韭汁法、朱蜜法、牛黄法、汞粉法、猪乳法、脐带法。《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》分甘草法、黄连法、朱蜜法、豆豉法。参见拭口法。

下部冰冷不孕 病证名。出《傅青主女科》。不孕症型之一。即胞寒不孕。详该条。

下消 ①见《丹溪心法·消渴》。儿科三消之一，即消浊。详该条。②内科消渴病之一，即肾消。

下痿 (fān 翻) 见清·崔秉铤《妇科宗主》。即阴挺。详该子宫脱垂条。

大小便白 见《明医杂著》。即二便色白。详该条。

大小肠交 病名。指产后阴道直肠漏。《妇人良方大全》卷二十三：“产妇小便(指阴道)出粪，名大小肠交。”

大小蒸 古说小儿变蒸可以时日计算，分小变蒸和大变蒸两个阶段。《外台秘要》卷三十五：“小儿生三十二日一变，六十四日再变兼蒸；九十六日三变，百二十八日四变又蒸；百六十日五变，百九十六日六变又蒸；二百二十四日七变，二百五十六日八变又蒸；二百八十八日九变，三百二十日十变又蒸；此小变蒸毕也。后六十四日又蒸，蒸后六十四日又一大蒸，蒸后一百二十八日又一大蒸，此大小蒸都毕也。”以上即八蒸十变，历时576天。参变蒸条。

大产 即足月分娩。《儒门事亲》卷五：“夫妇人大产。十月满足降诞者是也。”

大肠水 病证名。浮肿的一种类型。因大肠有病而引起的水肿。由大肠转化失常，气机紊乱，水湿内停，聚散无常所致。临床特征为浮肿，乍虚乍实(水肿时消时肿，时而便溏，时而便秘)。治宜化湿利水，用胃苓汤。

大肠泻 病证名。大肠受病而引起的泄泻。《幼科发挥》：腹泄“自大肠来者，则变化尽而成尿，但不结聚，而所下皆酸臭也。”寒湿偏盛者，多兼泄泻清稀，肠鸣腹痛，治宜温化寒湿，用平胃散加肉豆蔻；湿热偏盛者，则泄下灼肛，小便短赤，宜清热利湿，用葛根芩连汤加银花、木通之类。

大肠惊 脏腑惊证之一。出金·陈文中《小儿病源方论》。详脏腑惊证条。

大便下血 病证名。《证治准绳·幼科》：“大便下血者，是大肠热结，损伤所为也。脏气既伤，风邪自入，或蓄热，或积冷，或湿毒积于脾胃，或疳食伤于脏腑，因兹冷热交击，疳湿互作，致动血气，停留于内，凝滞无归，渗入肠中，故大便下血也。”《张氏医通》：“小儿多因胎中受热，……或儿自食甘肥积热，或六淫外侵而成。粪前见血者，清胃散加槐米，粪后见血者，清胃散加犀角、连翘。”热者，宜清血，用犀角地黄汤；病后元气下陷者，宜补气摄血，用补中益气汤。

大便恶臭 病证名。小儿宿滞，内有伏热而致大便恶臭。临床多伴体热多睡。见于消化不良症。治宜用龙胆汤去伏热，用保和丸去宿滞。

大惊卒恐 见《景岳全书·小儿则》。小儿突然遭受惊吓而发生抽搐。因小儿气血未充，神气脆弱，卒遇大惊恐吓，每易损及心、胆之气，恐则气下或气乱，使气血失调而致病。症见面赤，大便青，多烦，多哭，睡卧惊惕易醒，振动不宁。治宜安神定志，用秘旨安神丸（人参、半夏、酸枣仁、茯神、当归、橘红、赤芍、五味子、甘草）。

寸白虫 出《诸病源候论》卷五十。即绦虫。见绦虫病条。

〔1〕

上皮疹 即马牙。详该条。

上关 ①诊察小儿指纹的部位。见《奇效良方》。即风关。详该条。②经穴名。出

《灵枢·本枢》。属足少阳胆经。位于面部，颧弓上缘微上方，距耳廓前缘的1寸凹陷处。

上草 见《卫生家宝产科备要》卷一。即临产。详该条。

上腭痛 病证名。见《证治准绳·杂病》。

①发于上腭的喉痛。《医宗金鉴·订正仲景全书》：“上腭痛若葡萄形，少阴三焦积热成，舌难伸缩鼻红涕，口难开合寒热增”。若壮热神昏谵语者，为邪毒内陷之候。治宜解毒、泻热、消肿，可选用黄连消毒饮、五味消毒饮、仙方活命饮等加减，或待脓熟时以刀针刺破排脓。②即悬痈。详该条。

口下黄肥疮 病证名。指小儿流涎，口下肥烂而有黄汁渗出者。《诸病源候论》卷五十：“小儿有涎唾多者，其汁流溢浸渍于颐，生疮黄汁出，浸淫肥烂挟热者，疮汁则多也。”治宜外搽碧玉散。

口吻疮 病证名。又名肥疮、燕口、口角疮。常因脾胃湿热上攻口唇，或先天遗毒所致。《诸病源候论》卷三十：“足太阴为脾之经，其气通于口；足阳明为胃之经，手阳明为大肠之经，此二经脉并挟于口，其府藏虚，为风邪湿热所乘，气发于脉，与津液相搏，则生疮，恒湿烂有汁，世谓之肥疮，亦名燕口。”小儿多患之。症见口角生疮，色白糜烂，疼痛微肿，湿烂有汁。治宜清热、除湿、解毒。可选用清胃散、三黄凉膈散等加减。

口角疮 见《幼幼集成》。即口吻疮。详该条。

口软 病证名。口唇为脾所主。多由小儿乳食不足，脾胃气虚所致。症见唇色淡白，咀嚼无力，时流清涎。治以补脾为主。宜扶元散。

口齿疳 病证名。出《太平圣惠方》第八十七卷。疳疾毒热攻胃反映于口齿的证候。多由阳明湿热火毒熏蒸所致。《小儿药证直诀》：“初发之时，小儿口臭，上干胃

口，气息臭郁，渐进损筋，龈肉生疮，或肿或烂；又进热逼入脉，常出血，其热注久，齿龈腐坏，槽宽齿脱”。治宜清热泻火，解毒养阴。可选用养阴清肺汤、清胃散、黄连解毒汤等加减。

口疮 病证名。出《诸病源候论》卷五十。指口腔粘膜出现淡黄色或灰白色大小不等的溃疡，为小儿较常见的口腔疾病。由于脾胃素蕴积热，热甚化火；或素体阴虚及患热性病后伤阴，邪毒乘虚侵入口腔所致。治法：脾胃积热者，宜清中泻火，用凉膈散；阴虚火炎者，宜滋阴降火，用知柏地黄汤或加肉桂以引火归原。外治用赴筵散（见口糜条）搽之，或吹口散（《证治准绳》黄连、青黛、孩儿茶、冰片）吹于疮面。

口喎斜僻 证名。小儿中风口喎斜僻，是风邪入于颌之脉络所致，见于面神经麻痹。治宜疏风舒筋，用防风散内服；外用蓖麻子、椿根皮、栝蒌瓢研末，以大麦面作饼，上掺药末，左患贴右，右患贴左（《太平圣惠方》）。针刺地仓透颊车。

口疳 出《外科启玄》卷八。即糜疳。详该条。

口噤 证名。指初生儿口噤不开，不能吮乳。《千金要方》卷六：“口噤赤者心噤，白者肺噤。”《证治准绳·幼科》：“婴儿初生下，口噤不乳，口舌上疮，如黍粟大，噤多啼，名曰噤。”参见心噤、肺噤各条。

口糜 病证名。指小儿口腔糜烂。出元·朱震亨《平治荟萃》。多由阳明湿火薰蒸而发。常见于小儿。《保婴易知录》：“满口糜烂，色红作痛，甚则腮舌俱肿，联及咽喉，不能饮食。”治宜清热解毒，用赴筵散（《证治准绳》：薄荷、黄柏、青黛），或用清胃散加减。继则健脾益胃，用参苓白术散加减。还可用银花、甘草、薄荷、连翘煎汤漱口。并外吹冰硼散。外用中白煨红60克，孩儿茶30克、黄柏、薄荷、青黛各

18克，冰片1.5克。共为极细末，少量掺口疳上（《外科正宗》）。

〔 〕

久赤白痢 病证名。指日久不愈的赤白痢。《诸病源候论》卷十七：“久赤白痢者，是冷热乘于血，与津液相杂而下，甚者肠虚不复，故赤白连滞，久不瘥也。”治宜益气固肠，用乌梅丸，或调中益气丸加黄连、枳壳。

久泻肠滑 病证名。①指小儿泄泻，迁延不愈不能禁约的证候。出元·朱震亨《幼科全书》。多由久泻不止，或误用攻下，致脾胃阳虚，完气下陷，不能固涩所致。症见泄泻不禁，完谷不化，面饒神疲，四肢不温，口淡食少等。治宜升提中气，用四君子汤加升麻、防风、乌梅。针灸：取足三里、内庭、天枢等穴。②指慢性腹泻，直肠粘膜脱出者。《证治准绳》：“小儿泄利甚青黄，久患时多转滑肠，下部脱肛频冷咽，朝朝焦瘦渐羸尪。”治宜益气固肠，升提敛气，用补中益气汤、诃子散。

久病发惊 病证名。见《医林改错》。长期患病，气虚血亏而成惊搐。其症身热起伏，面颊潮红，形瘦肉脱，似搐非搐，有时昏迷少气。治宜健脾益气，养血镇惊，用可保立苏汤（方见小儿昏迷条）加减。

久暗（yīn 音） 病证名。指久病而致的失音。其证因久病逐渐而来，多因肺燥津伤，或肺肾阴虚，咽喉失于滋润而成。肺燥宜清润，用清燥救肺汤；阴虚宜滋阴，用百合固金汤。参见肾怯失音条。

久惯小产 见《妇科易知》。即滑胎。详该条。

久腹胀 病证名。指腹胀久而不愈者。《诸病源候论》卷十六：“久腹胀者，此由风冷邪气在腹内不散，与脏腑相搏，脾虚故胀，其胀不已，连滞停积，时瘥时发，则成久胀也。”其症多伴有腹胀，按之柔软，形

体消瘦，面色淡白等。治宜健脾利气，用六君子汤加厚朴、香附。

久痢 病名。痢疾日久不愈的病证。多因痢久致脾胃虚弱而成。《诸病源候论》卷四十七：“凡水谷痢久，肠胃虚易为冷热，得冷则变白脓，得热则变赤血，若冷热相加，则赤白相杂，利久则变肿满。”治法详久赤白痢条。

久痢脱肛 病证名。《医学纲目》：“凡小儿所患泻痢，皆因暑湿风热，乘脾胃虚而得”。因“脾气虚，肺无所养，故大肠之气虚脱而下陷也，用补中益气，或四君子为主”。若脱出绯红或作痛者，为血虚有热，宜补中益气汤合四物汤加牡丹皮；若微红而作痛者，为气虚有热，宜佐四君子汤加牡丹皮。外可用五倍子煎汤，加朴硝熏洗。

久痢腹痛 病证名。久痢不止，腹痛不除的证候。因久痢而脾胃虚弱，冷气在内，与脏气相搏，正邪交争，故令腹痛不除。治宜温养脾胃，用肉豆蔻散（《证治准绳》：肉豆蔻、青橘皮、黄牛角、当归、地榆、厚朴、黄连、干姜）。

〔、〕

广嗣 嗣，指后代、子孙。广嗣即多子女。

〔7〕

弓反外形 小儿指诊法十三指形之一。详十三指形条。

弓反里形 小儿指诊法十三指形之一。详十三指形条。

女人腹中十二疾 指妇女腹中十二种病症。《千金要方》卷四：“一曰经水不时，二曰经来如清水，三曰经水不通，四曰不周时，五曰生不乳，六曰绝无子，七曰阴阳减少，八曰腹苦痛如刺，九曰阴中寒，十曰子门相引痛，十一曰经来冻如葵汁状，十二曰腰急痛”。

女子赤白沥 病证名。出《甲乙经》。指妇女从阴道流出赤白相兼的粘液。详赤白带下条。

女子赤淫 病证名。出《甲乙经》。指妇女从阴道流出胶样的赤色粘液。参见赤带条。

女子胞 出《素问·五脏别论》。即胞宫。详该条。

女子梦交 病名。出《金匱要略·血痹虚劳病脉证并治》。亦名梦与鬼交。指妇人睡则梦中交合的一种病症。因摄养失宜，气血衰微；或为七情所伤，心血亏损，神明失养所致。症见睡则梦中交合，头痛、头晕、精神恍惚，甚则喜怒无常，妄言妄见等。治宜养心安神。方用柏子养心丸、桂枝龙骨牡蛎汤等。

女子暗闭 见吴梅庵《秘传内府经验女科》。即室女经闭。详该条。

女子暗闭经 病证名。指未婚女子的经闭。王之翰《妇科胎产百问》：“十四五岁月水初潮，将出血海，少女不自知觉，此时或以冷水洗手足，或洗衣物，血冷则凝，不能出血海，致面色青黄，遍身浮肿，人多作水肿医治不愈，宜用通经丸（三棱、莪术、苏木、赤芍、川芎、当归、山甲珠、刘寄奴、芫花），通其血脉，其肿自消”。

女阴溃疡 病名。外阴部由细菌、病毒或其他原因感染而发生大小不等的溃疡面。多发生于小阴唇内外两侧，有烧灼痛和奇痒，溃疡面有较多的脓样分泌物。局部可外用溃疡粉（生肌粉、樟丹、冰片）、珍珠散（养殖珍珠5克，青黛5克，雄黄5克，黄柏15克，儿茶10克，冰片0.25克，共为极细面）香油调膏外敷。参见阴蚀条。

小儿大衄 指小儿眼、鼻、耳、口七窍出血。《普济方》卷三百八十九：“血虚受热，散漫失度，出于七窍者，为大衄。”《疡医大全》：“耳目口鼻窍中一齐出血，药不及煎，死在旦夕顷，用冷水当面喷几

口，急分开头发，用粗纸数层，蘸醋令透，搭在囟门，血即止。次以当归两煎汤，磨沉香、降香各五钱，加童便服之，血自归经”。属血热妄行者，宜凉血止血，用犀角地黄汤加地榆，蒲黄、紫珠草；属气不摄血，或气随血脱者，宜补气摄血，用独参汤加龙骨、牡蛎。

小儿久痢羸瘦 病证名。小儿久痢不止而致身体羸瘦的证候。《太平圣惠方》第九十三卷：“夫小儿久痢羸瘦者，由因乳食不节，脏腑风挟痞气，肠胃冷热不调，变为下痢，经久不差，则脾胃虚弱，谷气减少，气血不荣，故肌体羸瘦也。”治宜以益气消食，用参苓白术散加减。

小儿中风不随 病证名。小儿感受风邪，四肢缓纵，不能随意运动。《太平圣惠方》第八十三卷：“小儿中风不随者，因风邪中于肢节，客于筋脉。若风挟寒气者，即拘急挛痛；若挟于热者，则缓纵不随。”宜分辨寒热，以疏风通络为治。

小儿风泻 病证名。指慢惊风后出现的泄泻。《证治准绳·幼科》：“慢惊大病后有之，其粪稀黄褪色，或夹不消化乳食同下，此因脾虚所致。”治宜补益脾气，用参苓白术散。

小儿风疾癰疹 病证名。小儿皮肤作痒，遍身疙瘩的病证。即荨麻疹。《小儿卫生总微论方》：“小儿风疾癰疹者，因小儿肌肤嫩，血气微弱，或因暖衣而腠理疏开，或天暄而汗津润出，忽为风邪所干，搏于血气，藏流于皮肤之间，不能消散。”参见隐疹条。

小儿风痢 病证名。见《医学纲目》。风毒内袭小儿脾胃而致的痢疾。其特点是便下黄褐色，与疳泻颇相类似，但风痢粪便不臭为异。治宜去脾胃风毒，用泻黄散，送下香连丸。

小儿心痛 病证名。出《小儿卫生总微论方》。指上腹胃脘部的疼痛。吮乳口气冷

者，为冷心痛，治宜温经利气为主，参见小儿心腹痛条；吮乳口气热者，为热痛，用金铃子散。亦可针刺内关、灸膻中。

小儿心腹痛 病证名。《小儿卫生总微论方》谓其病因是：“由脏腑虚而寒冷之气所干，邪气与脏气相搏，上下冲击，上则为心痛，下则为腹痛，上下俱作，心、腹皆痛。”心痛指上腹胃脘部的疼痛。突然发生兼有肢冷，脉迟，唇淡者属寒，治以温经利气散寒为主，用当归四逆汤加减；腹痛，参见小儿腹痛条。心腹俱痛、辨证治之。针刺取太冲、公孙、足三里等穴。

小儿白泻 病证名。出《中藏经》。指小儿泄泻，大便稀薄而色白者。多由脾胃气虚，运化失常，水湿下注所致。其症可伴有腹胀、腹痛、唇淡等。治宜健脾利气，用白术丸（《中藏经》：白术、当归、白芍、木香，等分为末，炼蜜丸如绿豆大）。

小儿发痧 病证名。见《寿世保元》卷八。小儿寒邪外来，气血内郁，引起发痧。其症似寒非寒，似热非热，四肢懈怠，饮食不思，容颜惨楚。如腹痛而手足冷者为阴痧；腹痛而手足温者为阳痧。治宜开通腠理，宣畅气血。用热水蘸搭臂膊，以苧麻频频刮之，候红色出为度。甚者宜以针刺十指背近爪处一分许（先将患儿两手自臂捋下，俟血聚指头方刺）。参见闷痧、寒痧、热痧条。

小儿半身不遂 病证名。指小儿肢体一侧运动障碍或完全丧失。《医林改错》：“小儿半身不遂，自周岁至童年皆有，突然患此者少，多半由伤寒、瘟疫痘疹、吐泻等病后元气渐亏，面色青白，渐渐手足不动，甚则手足筋挛，周身如泥塑。”针灸：上肢，取肩髃、曲池、列缺、少商、合谷、手三里。下肢，取解溪、风市、阳陵泉、足三里、环跳，邪盛者用泄法，邪退正虚，或无外邪者用补法。参见小儿麻痹后遗症条。

小儿头痛 病证名。小儿头痛，虚证较

少。《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》分头痛为风寒头痛与内热头痛两类。外感风寒，必先疏散，邪去就可痛除；里热熏蒸，必须清解，热去火降，病自可愈。参风寒头痛、内热头痛条。

小儿舌膜 病证名。出《本草纲目》。《疡医大全》谓其症为“初生小儿舌上白膜裹住”。多因胎中感受热毒，蕴于脾胃，熏蒸于舌所致。临床还有舌下有膜如石榴子，妨碍吮乳，啼声不出者。治宜先将此膜刮去，外以白矾少许擦之。内服三黄汤（《银海精微》：黄连、黄芩、大黄）加银花、牛蒡子，以清热解毒。

小儿多涎 病证名。出《太平圣惠方》第八十九卷。多为脾热上蒸或脾胃虚寒，升降失常，运化无力所致。脾热上蒸的涎多粘稠而臭；脾胃虚寒的涎多清稀，并有纳少便溏等。前者宜清脾泻热，用泻黄散；后者宜温中健脾，用理中汤加减。参流涎条。

小儿吐血 病证名。吐血多因素体阳热偏盛，乳食不当，郁而化热，热乘于血，血热妄行，随气上逆而成。《幼幼集成》：“胃中积热，火逼其血而妄行，故从口吐出，宜清其胃火。”用犀角地黄汤合四生散。如突然吐血，面色苍白者，为气不摄血，宜固气止血，用独参汤。

小儿闭证 病证名。小儿昏迷，属于闭证。因病势急骤凶猛，正气不能支持，邪毒痰热内陷心包，阻塞内闭所致，故称。详小儿昏迷条。

小儿阳厥 即小儿热厥。详小儿厥证、小儿热厥条。

小儿阴疮 病证名。指小儿阴囊生疮。多为湿热之邪下注阴器所致。表现为阴囊疼痛流水，并且日久不瘥。治宜清热燥湿，如二妙散加味，外用川椒、荆芥、槐枝、柳枝、蛇床子煎汤洗后，用朴硝末掺之。

小儿阴厥 即小儿寒厥。详小儿厥证、小儿寒厥条。

小儿阴瘤 小儿睾丸肿大的病证。多因风湿、热毒下注所致。《太平圣惠方》卷第九十二：“夫小儿阴瘤者，是阴核结肿大也。”治以清热化湿，兼以解毒为主。用导赤散加草薢、苦楝子、延胡索。

小儿好睡 证名。见《明医杂著》。小儿脾胃嫩弱，消化机能不强。喂养不当，容易导致消化失常，湿阻中焦，升降不利，或乳食停滞而成此证。治宜健脾化湿为主，用六君子汤。有乳食滞的，兼以消食导滞，如山楂、神曲、麦芽之类；若因心脾气虚而有痰者，宜用六君子汤加当归、白芍、枣仁，豁痰养心。

小儿医 古代对儿科医生的称谓。《史记·扁鹊仓公列传》：“扁鹊名闻天下……，来入咸阳，闻秦人爱小儿，即为小儿医。”

小儿呕吐 病证名。本症多由乳食过多，停滞中脘，损伤胃气，不能运化所致。《圣济总录》：“小儿呕吐者，脾胃不和也。或因啼呼未定而遽饮乳；或因乳食中伤冷，令儿饮之，皆致呕吐。”此外，还有因感触惊异，蛔虫内扰和痰饮壅盛而成者。临床分寒吐、热吐、伤食吐、伤乳吐、积吐、虫吐、惊吐等。各详该条。

小儿吼病 病名。即小儿哮喘。详该条。

小儿身热吐泻 病证名。见《儒门事亲》。本症多因外感六淫，内伤乳食所致。常伴有腹满不进饮食、嗜睡、烦躁、口热等。治以清热解毒为主，用葛根黄连黄芩汤加减。

小儿身热痿黄 病证名。指小儿夏令发热，软弱而发黄的证候。《卫生宝鉴》：“小儿身体蒸热，胸膈烦满，皮肤如溃橘之黄，眼中白睛亦黄，筋骨痿弱不能行立。此由夏季之热加以湿令而蒸搏于经络，入于骨髓，使脏气不平，故脾逆乘心，湿热相合而成此疾也。”心火实则身体蒸热，胸膈烦闷，脾湿胜则发黄；肝肾受邪，则筋骨痿弱。而治痿独取阳明，故治宜清泻阳明为法，用泻黄

散加茵陈蒿、苡米、木瓜之类。

小儿肛痒 病证名。指小儿肛门瘙痒。多因嗜食甘肥，大肠湿热积滞，日久生虫蚀于肛门所致。瘙痒以夜间尤甚并有啼哭不眠等症。见于蛲虫病等。治宜清热燥湿杀虫止痒。用四味肥儿丸加蚕砂、鹤虱、白藓皮之类。亦可用苦楝皮、使君子、生槟榔煎剂，雷丸，百部及蛲虫膏（《实用儿科学》方内含龙胆紫及百部）或栓剂等。

小儿肿病 见《小儿卫生总微论方》。即小儿浮肿。详该条。

小儿肿满 病证名。①水气流溢于皮肤而致的水肿。《诸病源候论》卷四十八：

“小儿肿满，由将养不调，肾脾二脏俱虚也。肾主水，其气下通于阴；脾主土候肌肉而克水，肾气不能传其水液，脾虚不能克制于水，故水气流溢于肌肤，故令肿满”。

②水病下为跗肿腹大，上为喘呼，不得卧者。《幼幼集成》卷四：“夫肿满之证，悉由脾胃之虚也。脾土喜燥而恶湿，因中气虚弱，脾虚无火，故水湿得以乘之，而脾愈不运，则乳食凝而不化，停积于中，而肿满作焉。”治肿当分上下，凡肿自上而起者，多因于风，其治在肺，宜发散用参苏饮合五皮饮；肿自下而起者，由于肾虚水泛，或因脾气受湿，宜渗利之，宜五苓散加防己、槟榔。

小儿昏迷 病证名。指小儿突然或逐渐对周围环境意识完全消失，对外界的刺激不起反应的证候。是由于热与痰内闭所致。其病变部位在心包。热闭大多由温热病邪内传心包，或由吸受夏令暑邪，“暑气通于心”，最易内闭。痰闭系痰迷心窍，其挟湿者多表现为痰浊内闭的证候；挟火者，多表现为痰火薰蒸的证候。热闭，宜清热开窍，用牛黄清心丸，或安宫牛黄丸；烦躁明显加服紫雪丹，并可针刺少商、中冲、间使、大椎。痰闭者，宜芳香开窍，用苏合香丸，高热加至宝丹，并可针刺合谷、内关、尺泽、丰隆。内闭外脱，应开闭固脱并进。开闭参照痰闭的

治法，固脱用参附汤加龙骨、牡蛎，双方兼治。若脱症已固，元气大虚，用可保立苏汤（《医林改错》：黄芪、党参、甘草、白芍、当归、白术、山萸肉、枣仁、枸杞、破故纸、核桃肉）内服。

小儿卒利 病名：又名暴泻、暴注。指小儿急骤的泄利。《诸病源候论》：“小儿卒利者，由肠胃虚，暴为冷热之气所伤，而为卒利。热则色黄赤，冷则色青白，若冷热相交，则变为赤白滞利也”。治热利用香连丸；治冷利，用理中汤；治冷热相兼利，用豆蔻香连丸。

小儿泄泻 病证名。本症多因脾胃被水湿所侵，或过伤乳食，或外感风寒暑湿邪气，导致脾运化失常而致；也有因体质虚弱，突受惊恐，影响气机升降失调；或因多食瓜果生冷，过服寒凉之药，以致耗损元气，脏腑虚寒，有因病久脾虚，脾阳不运等，均可引起腹泻。临床证候分类甚繁。①元·朱震亨《幼科全书》谓其证有五，即寒湿、热湿、风湿、湿伤元气下陷、食积。②《婴童百问》分冷泻、热泻、伤食泄、惊泄。③《古今医统》谓“泄泻乃脾胃专病，凡饮食、寒、热三者不调，此为内因，必致泄泻。又经谓所论春伤风，夏飧泄，夏伤暑，秋伤湿，皆为外因，亦致泄泻。”④《证治准绳·幼科》：“论泄之原，有冷泻、热泻、伤食泻、水泻、积泻、惊泄、风泄、脏寒泻、疳积酿泻。”⑤《幼科发挥》：“泄泻有三，寒、热、积也。”又谓：“《难经》五泄之论甚详，予论大肠泻、小肠泄、大瘕泄，则易明。予论脾泻、肾泻，则难分晓也。”⑥《幼幼集成》：“泄泻有五，寒、热、虚、实、食积也。”⑦《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》分伤乳食泻、中寒泄、火泻、惊泻、脐寒泻、脾虚泻、飧泻、水泄。辨证应抓住病因，分清寒热虚实论治。

小儿面疮 病证名。指小儿面部生疮，有脓或黄水渗出者。《小儿卫生总微论方》：

“小儿面上忽遇有经络虚隙，为风、湿、寒、热所乘，搏于气血则生其疮。或如火烧，或出脓，或出黄水，日久不能愈瘥。”类似浅脓疱病。治宜内服疏风化湿、清热解毒之剂，如五味消毒饮加减，外用三黄散加青黛、撒布局部。

小儿指纹 小儿指诊法。出唐·王超《水镜图诀》。又名虎口纹、虎口三关脉纹。主要观察三岁以下小儿食指掌侧靠拇指一侧的浅表静脉，以第一节为风关，第二节为气关，第三节为命关。纹在风关是邪浅病轻，纹透气关是邪较深，纹达命关则病尤重。若指纹延伸至指端为“透关射甲”，则病更重。正常指纹红黄相兼，隐现于风关之内。纹紫为热，淡红为虚，青色为风，主痛。青兼紫黑是血络瘀闭。指纹的变化虽可反映病变的轻重、浅深，但只能作为辨证的参考。

小儿嘔 病证名。嘔，呃逆。《诸病源候论》卷二十一：“胃受邪气则呕，脾受邪气，脾胀气逆，遇冷折之，气不通则嘔也。”小儿嘔多因于食滞胃脘而致。《医林绳墨》谓因于食而致者，脾胃不能健运，食阻气而不行，宜以温中消导为治。用二陈汤加厚朴、山楂、砂仁、木香。

小儿咳嗽 病名。小儿腠理不密，容易感冒，表邪侵入，首先犯肺，因而在冬、春气候多变的季节。最易引起咳嗽。另小儿如消化不良，以致脾为湿困，容易生痰，痰湿内蕴，则肺气失宣，亦致咳嗽。至于体质素弱，久咳伤津，导致虚火上炎而使津气亏虚，肾不纳气，则肺气更虚而咳嗽加剧。因此小儿咳嗽，可分为外感内伤两类。外感咳嗽：如寒咳、热咳、伤寒暴嗽，肺寒咳嗽，肺热咳嗽，痰热嗽，秋燥咳嗽；内伤咳嗽：如食积咳嗽，呷嗽，涎嗽，痰血嗽，肺燥久咳，脾虚久嗽，肾虚久嗽等。

小儿秋痢 病证名。出《本草纲目》。小儿脾胃嫩弱，内为乳食所伤，秋风飒动，凉燥之邪伤及元气，以致食积热毒，蕴积而

成。症见里急后重，腹痛便脓。宜用香连丸、黄连香薷饮加减。痢久，白多，便溏者，宜益黄散。

小儿食癥 病证名。出《太平圣惠方》第八十八卷。由于小儿脾胃娇嫩，饮食生冷粘滞食物，困阻脾胃，不能消化，因而胶滞其间与血气相搏而成。症见乳食减少，腹内结块不散，日渐长大，坚固不移，并有胁下刺痛，恶心呕逆等。体弱者，以健脾为主，佐以疏导，如参苓白术散；体实者，以疏导散结为主，佐以消痰，如取癖丸。

小儿脉法 小儿切诊之一。小儿手腕较短，寸、关、尺三部不分，多用“一指定三关法”切诊。《脉经》：“小儿脉快疾，一息七八至曰平，不及曰损，太过曰至。”一般年龄越小，脉搏越快。二、三岁小儿，若按成人正常呼吸定息，其脉来五、六次为常脉，超过六次为数脉，不足五次为迟脉。关于小儿脉象的分类。《内经》以大、小、缓、急等四脉为准。《小儿药证直诀》有浮、沉、缓、急、弦、细、促、乱等八脉的记载。《幼幼集成》取浮、沉、迟、数四脉，而以有力无力定虚实。目前，对年龄较小的乳幼儿，不采用诊脉，一般到二、三岁以后才采用。小儿脉象主病以浮、沉、迟、数、虚、实、弦、滑八脉为较常用。

小儿唇紧 出《本草纲目》。即小儿紧唇。详该条。

小儿热泻 病证名。小儿热迫大肠而致的腹泻。小儿为纯阳之体，感受暑热，邪热入里，下迫大肠而成腹泻。《婴童百问》：“小儿热泻者，大便黄而赤，或有沫。”并伴有阵阵肠鸣腹痛，烦躁啼哭，肛门灼热，小便短赤。治宜苦寒泻热。用葛根芩连汤加减。

小儿热厥 病证名。小儿厥证之一。又名小儿阳厥。系由邪热过盛，阳气内郁，不能透达四肢而见手足厥冷，出现热极似寒或真热假寒之象。《张氏医通》：“阴气衰于

下,则为热厥”。《血证论》:“……伏火之厥,则厥后微露热形,口不和,便不溏,小便不清,心中疼热,烦躁不宁,恶明喜暗,渴欲得饮,吐衄随厥而发,皆现真热假寒之象。”“所谓热深厥亦深,热微厥亦微”(《医学心悟》)。临床所见热厥的症状,为四肢厥冷而胸腹灼热,舌干,苔黄燥或焦黑起刺,伴恶热,口渴,烦躁不得眠,小便赤涩或便秘,甚至神昏谵语等。治疗:

“先宜治其伏火,使火得发,转厥为热,次乃更清其热”(《血证论》)。故除用白虎汤、四逆散,大、小承气汤以清、下外;伴见闭证者宜开窍,可选用安宫牛黄丸、紫雪丹、至宝丹等;伴见脱证者宜结合益气固脱,用生脉散加减。

小儿紧唇 病证名。出《本草纲目》。又名小儿唇紧、紧唇、紧唇疮、沈唇。指唇疮所致的口唇紧急,难于开合的症状。《诸病源候论》卷三十:“脾胃有热,气发于唇,则唇生疮,而重被风邪,寒湿之气搏于疮,则微肿湿烂,或冷或热,乍瘥乍发,积月累年,谓之紧唇”。参见唇疮条。

小儿哮喘 病名。又名小儿吼病。哮和喘是两种不同的症状。《罗氏会约医镜》:“喘者气急声高,张口抬肩,摇身撷肚,惟呼出一息为快,此肺经邪气实也。……哮者,其症似喘,但不如喘出气之多,而有呀、呬之音。呬者口开,呀者口闭,俱有声音,甚至隔壁亦闻,似痰结喉间,与气相击,故出入有声,此为痰火郁于内,风寒束于外。”哮喘一年四季都可发生,尤以寒冷季节及气候急剧变化时发病较多。其病机与肺、脾、肾有关,薛铠《保婴撮要》认为:“多因脾肺气虚腠理不密,外邪所乘”,使肺失宣降所致。由于肺气根于肾,如哮喘延久,肾气虚衰,并可出现肾不纳气或上实下虚的情况。故有“急则治肺,缓则治肾”的治则。哮喘发作期,以平喘降逆宣肺化痰为主,用定喘汤,五虎汤。痰多者,配合涤痰汤加减以豁

痰。缓解期则宜调理脾肾如异功散加黄芪、紫苑,或六味地黄汤加胡桃,补骨脂。

小儿积证 病证名。小儿食物滞久成积。又名伤积。《幼科金针》:“小儿积证,多因哺乳失调,过食生冷油腻硬物,脾土受伤,停于中脘,或为风寒所感,或夜卧失盖,以致积气停留,面黄腹胀,往来潮热,口渴神倦,多睡少食,肚热脚冷,大便酸臭,小便短涩者,伤积也。然有乳积,食积,气积,惊积,须分别之。”参积滞条。

小儿脓血痢 病证名。出《太平圣惠方》第九十三卷。痢疾脓血相杂,为湿热毒气内侵所致,因毒气化热,热迫血行,渗出大肠,与肠间津液相搏,积热蕴结,血化为脓,故利下脓血相杂,里急后重。治宜清肠和血,用芍药汤或香连丸加水杨梅、海蚌含珠等。

小儿脑髓风 病证名。见《普济方》卷三百六十七。小儿囟门未合,为风邪所侵,袭于脑髓,其症囟颅开解,皮肉筋脉急胀,骨缝青筋起,面少血色,呕吐痰涎,久则成慢惊风搐。治宜疏风豁痰之剂。

小儿变蒸 即变蒸。详该条。

小儿痙病 病证名。指小儿四肢痙挛的病证。清·吴鞠通《解儿难》分痙病为九大纲。即寒痙、风温痙、温热痙、暑痙、湿痙、燥痙、内伤饮食痙、客忤痙,本脏自病痙。分详各条。

小儿疝气 病证名。脐肋两旁弦起疼痛名疝气。由饮食不调,生冷过度,与血气相搏,结聚所成。治宜理气消痰之剂。

小儿消渴 病证名。又名痼渴、三消。为津液枯燥,虚热内盛的病证。临床以口渴、饮多、食多、尿多而消瘦为特征。《幼科铁镜》:“三消之症,实热者少,虚热者多,不足之症……始而心肺消渴,或脾胃消中,或肾水消浊。传染日久,则肠胃合消,五脏干燥、精神疲怠,以致消瘦四肢。”临床分消上、消肌、消浊三证。详见各条。

小儿浮肿 病证名。又名小儿肿病。是指体内水液潴留，泛滥皮肤，引起头面目窵、四肢腹部以及全身浮肿的病证。《儒门事亲》：“小儿通身浮肿，是水气肿也。”临床多见于急慢性肾炎，肾病综合症。《小儿卫生总微论方》：“小儿肿病有二：一者气肿，因脾胃虚而气攻腹，腹胀误行转药下之，致虚气上附于肺，行于四肢面目而作肿也。……二者水肿，因上焦烦渴，饮水无度，脾胃虚而不能约制其水，肾反乘脾，土随水行，上附于肺，肺主皮肤，脾主四肢，故水流走于四肢皮肤而作肿也。”可见浮肿的病变，主要在于肺、脾、肾三脏功能失调，从而导致气化失宣，水液潴留，因以为肿。《证治准绳》指出肿病的机制是“肾为本而肺为标，皆至阴以积水。其为病也，肾者胃之关键，关键不利，机不转枢，水乃不行，渗于脉络皮肤而为浮肿。”因此浮肿有其标在肺，其制在脾，其本在肾的说法。治则：《金匱要略》载“腰以下肿当利小便；腰以上肿，当发汗。”临床常用的有发汗，利小便以及健脾益气、温肾化浊等法。亦可分为心水、肝水、脾水、肺水、肾水、胃水、胆水、小肠水、大肠水、膀胱水，辨证施治。详各条。

小儿涎喘 病证名。指小儿涎盛而喘急。为痰涎上壅于肺所致。其症以肺脾气虚，腠理不密，外邪所乘，正气虚而邪气盛者为多。《东医宝鉴》：“顽涎者，脾肺所出也，涎则流溢于咽喉，如水鸡之声，喘嗽烦闷，宜抱龙丸……”。发作时以豁痰为主，用二陈汤加苏子等品；未发作时以理脾为主，用六君子汤加减。

小儿诸虫 病证名。小儿肠寄生虫病，以蛔虫、蛲虫、姜片虫、绦虫、钩虫为多见，尤以蛔虫、蛲虫病发病更为普遍。这些肠道寄生虫病，轻者影响小儿生长发育，重者可危及生命。因小儿接触污染的环境机会多，虫卵通过食物或蚊虫接触皮肤而侵入儿体。小儿脏腑柔弱，易为诸虫寄居生长，影响脾

胃的正常运化功能。《小儿药证直诀》虫痛：

“面皤白，心腹痛，口中沫及清水出，发痛有时”。并伴有食欲不振或嗜异，大便不调或稀或干。日久则脾胃俱虚，影响水谷摄取，四肢百骸无以营养，故见气促，神疲，浮肿、心悸等气血不足的病象。脾虚则肝旺，可见烦躁易怒，睡中咬牙等。一般以驱虫为主；如久病脾胃已伤，驱虫后及时健脾以恢复脾胃功能。如脾虚气血生化之源不足，导致气血虚弱者，当以益气养血，待病情好后，再予驱虫。必要时驱虫与补益药同时并进。参绦虫病、钩虫病、蛔虫病等条。

小儿诸热 病证名。指小儿因各种原因引起的发热。小儿脏腑娇嫩，阳常有余，阴常不足。不论外感六淫，内伤脏腑，都能引起发热，并且感邪之后，最易化热，热甚则伤阴，阴损及阳。所以，小儿发热表、里、寒、热、虚、实的变化，较成人更为迅速。由于引起发热的病因病理及症状的不同，故其辨证分类有：①《小儿药证直诀》分潮热、壮热、风热、温壮。②《幼科全书》分伤风发热、伤寒发热、伤暑发热、伤食发热、痘疹发热、变蒸发热、潮热、惊热、夜热、客热、癖热、血热。③《幼科发挥》分肝、心、脾、肺、肾热及虚热、实热。④《证治准绳·幼科》：“夫热有潮热、惊热、夜热、余热、食热、疳热、壮热、烦热、积热、风热、虚热、客热、癖热、寒热、血热、疮疹热十六者，大同而小异”，还有表热、里热、表里俱热、半表半里热、骨蒸热等⑤《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》分发热为表热、里热、虚热、实热；《幼幼集成》卷三：表里虚实四热为纲，其下以杂证，伤风发热、伤寒发热、脾胃虚热、伤热发热、伤暑发热、心热、表里俱热、疳热、壮热、烦热、积热、虚热、客热、心经血热为目。这些分类，虽各有特点，但繁复不全，临床上多结合病因、脏腑见证，以阴阳表里虚实分之，庶可概括。

小儿诸淋 病证名。指小儿肾与膀胱有热而致小便淋沥的证候。《诸病源候论》卷四十九：“小儿诸淋者，肾与膀胱热也。膀胱与肾为表里，俱主水，水入小肠，下于胞，行于阴，为小便也。肾气下通于阴，阴，水液之通路，膀胱津液之府，膀胱热，津液内溢，而流于泽，水道不通，水不上不下，停积于胞，肾气不通于阴，肾热其气则涩，故令水道不利，小便淋沥，故谓为淋。其状小便出少起数，小腹急痛引脐是也。”临床分石淋、气淋、血淋、热淋、寒淋五种，详各条。一般治疗以清热通淋为主，用海金沙散、木通散之类。

小儿聋哑 病证名。本证分先天性和后天性两类，其中多数是由于在幼小时候因病丧失听觉，无从学习语言而成聋哑。先天性者，幼小即两耳失聪，不能语言。《诸病源候论》卷二十九：“发惊痫后，六七岁不能语言。”《丹溪心法》：“耳聋皆属于热。”说明聋哑系由热病或发惊后，经络气机阻滞，致窍闭不通，不能闻声所致。经脉循行到耳部的主要有手太阳，手少阳和足少阳三经。《灵枢·经脉篇》：“手太阳小肠经……所生病者耳聋……，又，手少阳三焦经是动则病耳聋。”《素问·热论》：“少阳立胆，其脉循胁，络于耳，故胸胁痛而耳聋。”《素问·厥论篇》：“少阳之厥则暴聋。”治以通经利气为主。针灸取听会、听宫、耳门、翳风、瘰脉、百会、中渚。眩晕，配风池；语蹇，配哑门，廉泉；鼻塞，配迎香，合谷。一般以尚有残余听觉者，治疗效果较佳。

小儿虚热 病证名。出元·朱震亨《幼科全书》。多由汗下太过，津血枯涸，或大病之后，元气受伤所致。其由津血焦枯所致者，症见温热或潮热，或渴或不渴；由元气亏虚所致者，则表现为困倦少力，面色青白，四肢软弱，手足厥冷。津血焦枯者，宜益气生津，调营和卫，用竹叶石膏汤合当归

补血汤；元气不足者，宜甘温除热，用调元生脉散（人参、炙黄芪、麦冬、五味、炙甘草）。

小儿偏风 病证名。又名偏风口噤。指小儿半身不遂，口眼歪斜的证候。《证治准绳·幼科》：“若足阳明胃经气虚，风邪所乘，其筋脉偏急者，属外因；若足厥阴肝经风热乘脾，筋脉偏急者，属内因。若脾肺虚弱，腠理不密，外邪所乘……或吐泻后内亡津液，不能养脾，致口眼歪邪，或半身不遂诸证，皆属肝血不足，肝火生风，宜滋肾水养肝血，壮脾土。”因脾胃气虚而风内动者，宜培土以熄风，用异功散加钩藤、桑枝；肝火血燥者，宜柔润以熄风，用六味地黄丸；脾肺虚而外邪所乘者，用钩藤饮；津液不足者，宜益胃以生津，用白术散加减。

小儿脚瘰（zhú逐） 病证名。瘰即冻疮。《太平圣惠方》第九十一卷：“夫小儿脚瘰者，是小儿肉嫩，外风冷中于足掌中涌泉穴也。是儿脚上皮肉间，气血与风邪相感，使肉硬气血不通，阳气不达，致使然也。”

小儿脱肛 病证名。为肛管直肠甚至部分结肠移位下降外脱的病象。《诸病源候论》卷五十：“小儿患肛门脱出，多因利久肠虚冷，兼用飧气，故肛门脱出。”小儿气血未充，或因久泄久痢等，以致中气下陷，不能摄纳而致脱肛。治宜内服益气升提之剂，如补中益气汤。针灸可取百会、足三里、长强、承山等穴。

小儿麻痹后遗症 病证名。属痿证、痿躄的范围。多由风湿热之邪内窜经络所致，不同于一般温邪袭肺或暑湿壅阻肠胃。《素问·生气通天论》：“湿热不攘，大筋软短，小筋弛张，软短为拘，弛张为痿。”临床表现早期类似感冒，如发热、呕吐、腹泻等。发生麻痹前期多有面赤，咽红，出汗，全身肌肉疼痛拘急，四肢颤震等。治宜通利湿热，祛风通络。若病毒内窜，可出现嗜

睡,昏迷,抽搐,项强或喘促,吞咽困难等症,治宜熄风镇静,或定喘降逆。本病进入麻痹期,瘫痪可发于身体各部,常见于四肢,尤以下肢为多见,治宜疏风通络,调和气血,可用独活寄生汤加减。如面部瘫痪,可用牵正散加减。或针刺颊车、地仓、合谷。若此期未能恢复,日久引致肌肉萎缩,关节变形等,即为小儿麻痹后遗症。治宜补益肝肾,温通络脉。可用虎潜丸、活络丹或金刚丸等。并积极配合针灸、按摩治疗,上肢瘫痪取肩髃、肩髃、曲池、大椎;下肢瘫痪取足三里、解溪、环跳、风市、阳陵泉;腹肌瘫痪,取中脘、梁门、气海;颈肌瘫痪,取天柱、天鼎、天容。

小儿雀目 病证名。见明·张三锡《医学准绳六要》。又名肝虚雀目、鸡盲。《诸病源候论》卷四十八:“人有昼而睛明,至黄昏便不见物,谓之雀目。”清·黄庭镜《目经大成》:“此证世呼鸡盲,一名雀目……,至晚不见,晓则复明。”小儿雀目多“因疳得之”(《世医得效方》),以肝虚为主要病机,故又有“肝虚雀目内障”之称,与成人阳虚的高风雀目内障不同。前者只能视直下之物,且多痒多涩,预后多良好;后者只能视上方之物,两旁看不清楚,日久失治,容易变成青盲。小儿雀目宜补肝养血,用石决明、苍术为末,以猪肝披开,入药末在内扎定,砂锅煮熟以气熏目,待冷,食肝饮汁(《龙木论》方)。参阅肝疳条。

小儿厥证 病证名。指小儿真元虚,手足厥冷的证候。临床有寒厥和热厥之分。《杂病源流犀烛》卷九:“夫寒厥者,即阴厥,宜急补阳(宜理中汤,或附、桂、干姜、吴萸,俱可酌用);热厥者,即阳厥,宜急泄热(宜芩、连、山栀、石膏、知母、童便,甚者可用硝、黄下之)。详小儿寒厥、小儿热厥条。

小儿暑病 小儿夏季感受暑邪而引起的病证。见《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》。

暑为阳邪,故感暑而病者,可见高热口渴等;暑邪有升散的性质,所以侵人则使腠理开而多汗。汗出太多,则气亦随之消耗,气耗轻者,使人少气,倦怠;重者使人卒然昏倒。暑多挟湿,除暑热见症外,还有困倦、食欲不振、呕吐、便溏、脉濡,苔腻等症状。前人治暑,“暑病首用辛凉,继用甘寒,终用甘酸敛津,不必用下”的经验,对于临床有一定指导意义。常见的暑病包括有中暑、伤暑、暑痉和暑厥。分详各条。

小儿遗尿 病证名。儿科常见病。小儿不自觉地排尿者为遗尿。睡里自出者,谓之尿床。常见于学龄儿童。若婴幼儿时期,由于发育尚未健全,排尿的正常习惯还未养成,或因白天嬉戏过度,精神激动,夜间偶有尿床者,则不属病态。《诸病源候论》:

“遗尿者,此由膀胱有冷,不能约于水故也。”膀胱为津液之府,有贮藏排泄小便的功能,又与肾互为表里。若肾气不足,影响膀胱的正常功能,不能制约水道则致遗尿。治法:膀胱冷者以温经固脬为主,用缩泉丸、固脬丸;肾气不足者,以益气补肾为主,用《金匱》肾气丸。体针取关元、足三里、三阴交,阴陵泉;耳针:刺膀胱、交感及脑点。参尿来条。

小儿喘急 证名。指小儿呼吸迫促。喘与气急有轻重的区别。《证治准绳》:“喘则欲言不能,溢于胸膈;气急,但息短,心神迷闷耳。”凡喘急声音粗大,气急而促者,为实证;多因风寒外束,腠理壅遏,肺失宣降,气逆而喘,治详风寒喘急条。凡喘急呼吸浅而弱,精神萎靡,面色晄白者,为虚证;多由胎气不足,脾肺气虚所致。治宜益气健脾,用六君子汤加干姜、五味。

小儿腋气 病证名。又名狐臭、胡臭。为湿热内郁或遗传所致。《小儿卫生总微论方》:“小儿腋气者,血气不荣,腋下孔,一如毛孔而稍大,臭秽之气,从其中出……。亦有父母遗传相传者,又有乳养之

人而有染著者。”其症腋下汗腺有特殊臭气，其他如乳晕、脐部、外阴、肛周亦可发生。大部分患儿同时伴有油耳症状。治用密陀僧研末加冰片外涂；或用龙眼核十二枚和胡椒五十四枚研末外扑。

小儿痢疾 痢疾多见于夏秋季，以腹痛，里急后重以及含有粘液，脓血便为其主要特征的肠道传染病。夏秋之间，暑湿盛行，热郁湿蒸，因热贪凉，过吞生冷，以致饮食停滞，内伤肠胃，因而生湿化热，挟积阻于大肠曲选之间，故腹痛与后重并见；同时由于外邪与湿滞阻于肠中，大肠传导功能失常，气血凝滞，湿郁热蒸，损伤肠道脂膜血络而致下利脓血。湿盛于热，而邪在气分者，则痢下多以白色粘脓为主；如热盛于湿，而邪在血分者，则痢下多见红色粘腻。如病初起，邪在卫分者，常有发热、恶寒等表证；如热毒深重，可以迅速传入营血，内窜心肝两经，突见高热，昏迷、惊厥等危重症状。属湿重于热者，宜清肠化湿，用芍药汤；属热重于湿者，宜清肠解毒，用白头翁汤；邪窜心肝者，则宜配合清心镇静之剂，于上述方药中加神犀丹，或紫雪丹。久痢脾肾阳虚者，宜温补脾肾，用桂附理中汤加味。针刺可取上巨虚、天枢、足三里、内庭。

小儿寒厥 病证名。小儿厥证之一。又名小儿阴厥。系由阳气衰于下，阴寒过盛，以致阳虚则阴凑之而见手足厥冷的证候。《寿世保元》：“阴厥者，始得之，身冷脉沉，四肢厥逆，足踡卧，唇口青，或自利不渴，小便色白，宜四逆理中汤之类。仍速灸关元百壮，鼻尖有汗为度”。

小儿腹胀 病证名。小儿腹部胀满。《诸病源候论》卷四十七：“小儿脏腑嫩弱，有风冷邪气客之，搏于脏气，则令腹胀。若脾虚，冷移于胃，食则不消。”（明·陈治《幼幼近编》：）“小儿腹胀，有虚有实。小便不利，闷乱喘急者，此邪气之实也……。小便自利，不喘，面目四肢浮肿者，

此正气之虚也。”治法参见虚胀、实胀条。

小儿腹痛 病证名。出《小儿药证直诀》。凡婴儿出生后，无故啼哭不止，或夜间啼哭，多是腹痛。临床分寒实腹痛、积热腹痛、伤湿腹痛、积痛、虫痛、锁肚痛、盘肠钓痛、癥瘕痛、虚寒腹痛等。

小儿瘀热发黄 病证名。小儿瘀热在里而发生的黄疸。《圣济总录》第一百七十四：“小儿瘀热在胃，或湿热相搏，熏在肌肉，其证目黄，身或疼痛，肌肉如橘色。或得之伤寒，或得之邪气，或得之风温。皆脾胃气虚，邪热与谷气相搏所为也”。治宜清热利湿，凉血解毒，用地黄汤（《证治准绳》：茵陈、生地、川芎、赤芍、当归、花粉、茯苓、泽泻、甘草）加減。

小儿痿证 病证名。指小儿四肢软弱，无力以运动的病证。清·何梦瑶《医编》：

“痿者手足软弱，纵缓不收也，盖热而兼湿使然”。《儒门事亲》：“痿之为状，两足痿弱，不能行用。由肾水不能胜心火，心火上烁肺金，肺金受火制，六叶皆焦，皮毛虚弱，急而薄著，则生痿躄。”故本病主要起于阳明湿热内蕴，肺受热乘而气液枯槁，脾受湿淫致流溢筋脉，因肺朝百脉，肺热叶焦，则百脉弛缓而成痿。脾主肌肉，阳明主一身的宗筋。如脾胃湿热不攘，则为大筋短，小筋弛长，短为拘，弛长为痿的见症。其症初起发热，或不发热而见四肢或左或右，或上或下，逐渐无力，麻木痿弱，不能举动，肌肉日见消瘦。病重者则见疾患部位运动功能全部丧失。肺热津伤者，宜清热生津，养肺益胃，用清燥救肺汤加減；湿热阻滞者，宜清热利湿，舒筋活络，用二妙散加味（《中医临证学基础》：苍术、黄柏、当归、牛膝、龟板、防己、草薢）；肾亏者宜益肾清热，用虎潜丸。针灸：上肢取合谷、曲池、肩髃；下肢取足三里、承山、阳陵泉、环跳。

小儿痰鸣 病证名。指小儿痰嗽而喉中

有痰鸣声响者。清·余梦塘《保赤存真》：

“小儿病易动痰。风盛者，咳嗽必紧，痰不易出；火盛者，痰滑而稠；脾虚者，痰稀而白，或睡中觉有痰响，醒则不觉有痰，此虚痰往来也。”治宜利气化痰。用六君子汤加减。

小儿痰泻 病证名。见清·文叔来《慈幼便览》。多由脾虚不振，运化失常，水湿不化，聚而生痰，痰湿下注，并走肠间而成。泻无定时，质稠而粘，并有神疲乏力等。治宜健脾化痰，用神术散加茯苓、半夏。

小儿痰实 病证名。指小儿饮乳不下，口吐涎沫。《太平圣惠方》卷一百七十七：“小儿乳食不下，吐涎沫而微壮热者，痰实也。”治宜利气化痰。用赤茯苓散（赤茯苓、陈桔皮、川朴硝、旋覆花、甘草）。

小儿溺血 病证名。即小儿小便出血。多由胎热结于下焦，损伤阴络，血热妄行，下渗膀胱所致。《证治准绳·幼科》：“溺血者，盖心主血，血与小肠相合，血之流行，周遍经络，循环脏腑，若热聚膀胱，血渗入脬，故小便血出也。”又“热盛积于小肠，甚则尿血。”其症尿中带血，顺利而下，无疼痛感觉。治宜清血止血，用小蓟饮子，或四物汤加牛膝、白茅根。虚热，用六味地黄丸。

小儿癰 病证名。由血瘀阻滞经络而成。症见寒热如疟，胸膈郁闷，腹中积块，或聚或散，痛亦时上时下，能食而肌肉不生。治宜和血散结之剂。

小儿髮黄 病证名。指小儿头发色黄的病证。《诸病源候论》卷四十八：“足少阴为肾之经，其血气华于发，若血气不足，则不能润悦于发，故髮黄也。”治宜滋肾养血，用二至丸合四物汤加制何首乌、菟丝子煎服。

小儿瘰癧 病证名。即淋巴结肿大，肿大者为瘰，肿大者为癧，合称瘰癧，又名九漏。《诸病源候论》卷五十：“小儿身生热

疮，必生瘰癧。其状如结核，在皮肉间三两个相连累也。是风热搏于气血，愀结所生也。”亦有由肝气郁结，痰湿凝聚，或素有体虚，肺肾虚损，虚火内动，痰火凝结所致者。颈两侧为肝、胆经脉所循行，痰湿阻滞肝脉，凝结成核，日久痰湿化热内燔，溃烂成脓，或染毒愀发红、肿、痛、灼，肉腐成脓，破溃而成疮。若病程迁延，此愈彼起，阴毒流窜，皮下穿空，发为鼠瘻。治以清热解毒疏风活血为主，方用消瘰丸，解毒济生汤加减，脓肿形成，切开引流。

小儿瘰气 病证名。见《太平圣惠方》第八十九卷。多因气结或水土因素而引起。症见颈部肿物弥漫性肿大，边缘不清，皮色如常，按之柔软。见于地方性甲状腺肿大。治以理气软坚，健脾除湿为主。用四海舒郁汤、海藻玉壶汤加减。针刺取天突、人迎、足三里、合谷。

小儿羸(lēi 雷)瘦 病证名。小儿脾胃脆弱，易虚易实，如果喂养不当，或患泻痢等症，损伤脾胃功能，使之食欲不佳，甚至不能饮食，影响气血生化，肌肤得不到营养，则可渐至体羸而消瘦。临床有挟冷、挟热的区别。《诸病源候论》：“挟热者，即温壮身热，肌肉微黄；其挟冷者，即时时下利，唇口青葩。”治疗一般以补益脾胃为主。挟热者，用七味白术散；挟冷者，用益黄散。冷热既除，则用参苓白术散调之。

小儿胸(hōu 侯)喘 出《普济方》卷三百八十九。小儿胸喘而痰邪壅盛者。多因痰邪内伏，复感风寒之邪，壅滞于肺所致。症见胸满气促，痰多食少。无表寒者，宜豁痰降气，用枳实汤；兼表寒者宜解表化饮，用小青龙汤。

小儿囊肿 见《本草纲目》。即脱囊。详该条。

小三关 推拿部位名。详指三关条。

小户 见《卫生宝鉴》。指女子外阴小及阴道较狭窄。

小户嫁 见《医宗金鉴·妇科心法要诀》。即小户嫁痛。详该条。

小户嫁痛 病名。出《千金要方》卷三。亦名小户嫁。指妇女阴户小，性交时疼痛。《女科经纶》卷八：“妇人小户嫁痛连日，方用甘草、生姜、白芍、桂心、酒煮温服。又方疗嫁痛：一味牛膝或一味大黄，酒煮服。又乌贼鱼骨烧末，酒吞之。外用青盐炒热，布裹熨之”。

小产 病名。见《卫生家宝产科备要》。亦名半生、半产、失胎、伤娠、革产、损娠。指妇人怀孕三月以上，由于气血虚弱，肾虚，血热，毒药伤胎，或外伤等损伤冲任，不能摄血养胎，以致未足月而产者。

小肠风 病名。指顽固性阴疮。周慎斋《秘传女科》：“阴户生疮，诸药不效，名小肠风”。可用木通、藁本、枳壳、贯众、白芷、甘松、芥穗、薄荷，等分切细，水煎，临用加皮硝三钱，日洗三、五次。

小肠水 病证名。出《证治准绳·幼科》。小儿浮肿的一种类型。因小肠有病引起的水肿。由于小肠热郁，水湿内停，湿热相搏，注入下焦所致。临床症状为浮肿，小腹急满。治宜清热利湿，用导赤散加减。

小肠气痛 病证名。脐下两侧绞痛的疝气。《幼科铁镜》：“婴儿小肠膀胱气痛，在脐下气海两边，筋肿到肾囊边，痛不可抵。”治用川楝子、橘核、小茴香、荔枝核俱焙炒为末，白酒调服，甚者宜手术治疗。

小肠泻 病证名。小肠受病而引起的泄泻。《幼科发挥》：“泻自小肠来者，亦水谷注下而不分，则成糟粕而非完谷，且小肠为受气之府，水谷到此，已变化而未尽变化也。”治宜泌别水谷，用五苓散，使水谷分利，则泻自止。

小肠惊 脏腑惊证之一。详该条。

习惯性流产 病名。即滑胎。详该条。

子门 出《灵枢·水胀》。指子宫外口。

子气 病名。见《妇人良方大全》引《产乳集》。亦名子水气。指孕后三、四个月，自膝至足肿，小便清长者。多因抑郁气滞，有碍气机升降；或脾肾阳虚，脾不健运，湿气内停，流注于下，以致足肿，渐至腿膝，甚至足出黄水。气滞者，宜理气行滞除湿，用天仙藤散加苍术；湿盛者，宜温阳健脾燥湿，用赤苓汤（厚朴、陈皮、苍术、炙草、赤苓、桑皮、姜）；若湿伤于肺而喘闷者，宜天仙藤散加葶苈子；足出黄水者，宜健脾行水，用全生白术散。

子户 出《脉经》。即女阴。

子户肿胀 病名。出徐润之《最新三字达生续编》。即妇女前阴肿胀。参见阴户肿痛条。

子户旁生肿块 病证名。陆成一《女界须知》：“湿痰下流，子户旁生肿块，针破出白脓，即消无瘢，又但肿而不痛，知无热毒，用煅白螺蛳壳、南星、半夏、柴胡、甘草、曲糊为丸服”。

子水不利 病证名。明·赵贞观《绛雪丹书》：“妊娠胸腹胀满，或遍身浮肿，小便艰涩，名曰子水不利”。参见妊娠肿胀条。

子水气 病名。明·赵贞观《绛雪丹书》：“凡胎成三月后，两足渐肿至腿膝，行步难甚以致喘闷，饮食不美，状似水气，至于脚指出黄水，名曰子水气”即子气。详该条。

子处 出《灵枢·五色》。即子宫。《类经》卷五《色藏部位脉病易难》注：“子处子宫也”。

子死产门难产 病名。《傅青主女科》：“妇人有生产三、四日，儿已到产门，交骨不开，儿不得下。子死而母未亡者，服开骨之药不验，当有死亡之危。……治但救其母，而不必顾其子矣。然死子在产门，塞其下口，有致母死之患。宜用推送之法。补水以生水，补气以生血，使气血两旺，死子可

出而存母命也。倘徒用降子之剂以坠之，则死子未必下，而母气先脱矣，非救援之善者也。山亲见此等之症。常用救母丹活人颇多。故志之（方药：人参一两、当归二两、川芎一两、益母草一两、赤石脂一钱、芥穗三钱炒黑）。”

子死腹中 出《诸病源候论》卷四十三。又称胎死腹中、死胎。多因跌仆闪挫，气血逆乱；或母患热病，热毒伏于冲任；或误服毒药，药毒伤胞；或母体素虚，冲任气血虚少；或胎儿脐带缠颈气绝致死等，致胎儿死于母腹内。当急下死胎。参见死胎不下条。

子舌 出《景岳全书·杂证谟》。即重舌。详该条。

子舌胀 出《儒门事亲》。即重舌。详该条。

子衣 出《隋书·外国传》。即胞衣。详该条。

子吮 见《大生要旨》卷二。即子嗽。详该条。

子肠不收 病名。清·何梦瑶《妇科辑要》：“子宫脱出又名子肠不收”。详子宫脱垂条。

子啼 见清·柯炯《保产机要》。即子啼。详该条。

子肿 病名。见《医学入门》。俗称琉璃胎。指孕至五、六个月，胎体渐长，由于脾肾阳虚，运化输布失职，以致水湿泛滥，流于四末。症见两足浮肿，遍及下肢，渐至周身，头面俱肿，小便短少。脾虚者，兼见倦怠无力，脘腹胀闷，治宜健脾行水，方用全生白术散；肾虚者，兼见腰膝痠软，手足不温，治宜温阳化气行水，方用五苓散；若兼胸闷胁胀，上方可加陈皮。

子疰 见《盘珠集胎产证治》。即妊娠疰。详该条。

子冒 病名。《诸病源候论》卷四十二：“……亦名子痼，亦名子冒也”。即

子痼。详该条。

子宫 出《神农本草经》紫石英条。即胞宫。详该条。

子宫不收 见《世医得效方》卷十五。即子宫脱垂。详该条。

子宫外妊娠 病名。简称宫外孕。指子宫腔以外部位的妊娠。以输卵管妊娠为多见。临床表现有停经，早孕反应，发作性小腹部剧痛，阴道出血，腹腔内出血，贫血，休克等症状。多属瘀血内停，气机阻滞的实证。按病变的情况，采用中西医结合辨证治疗。一般分为三型：①休克型：腹痛剧烈，面色苍白，头出冷汗，四肢厥逆，血压下降，脉象沉细而弱。症属正虚邪实，治以回阳救逆，佐以扶正，活血化瘀之法，用参附汤加丹参、赤芍、乳香、没药，并配合输血补液治疗。②不稳定型：腹痛反复发作，病情不稳定，胚胎未死，常伴有不同程度的贫血，属瘀血内停少腹之实证，宜活血化瘀止痛，用《医学衷中参西录》活络效灵丹加减。若兼寒证表现有形寒肢冷者加桂、附之类，以温经回阳；兼热证表现有发热腹痛拒按者，加金银花、连翘、蒲公英，以清热解毒；兼腹实证者表现有大便秘结，腹胀鼓肠加大黄、枳实、芒硝；胀甚者加川楝子、木香、元胡。③包块型：胚胎已死，病情稳定，盆腔形成血肿。症属瘀血内结，治宜活血化瘀，方用活络效灵丹加三棱、莪术、穿山甲等。如休克不能纠正，或疑似间质部妊娠，胚胎继续存活，或并发肠梗阻者，应行开腹手术治疗。

子宫肌瘤 病名。由子宫平滑肌、结缔组织、腺体组成的实质性良性肿瘤。可发生在子宫肌间、粘膜下或浆膜下，大小不等，单发或多发。根据肿瘤的大小、生长部位不同，临床常伴有月经过多，痛经，带下，腹部肿块，不孕，贫血等症状。此病属带下，崩漏，癥瘕，石瘕范畴。临床多用行气破血，软坚消积之法，攻补兼施，辨证治疗。如用

《金匱要略》桂枝茯苓丸加減。

子宮脫出 病名。見《葉天士女科診治秘方》。即子宮脫垂。詳該條。

子宮頸炎 病名。是子宮頸的急性或慢性炎症病變。急性炎症表現宮頸局部充血、水腫、上皮脫落、坏死，甚至形成潰瘍，帶下量多呈膿樣。慢性宮頸炎包括宮頸糜爛、息肉、肥大和潴留囊腫等，帶下量亦多，有時呈膿性或血性，常伴有腰酸腹痛，下腹墜痛等症狀。急、慢性炎症均屬帶下病範疇，可根據帶下的色、質、氣味、症狀等辨證治療。宮頸局部上藥可用胆矾散（制法：取新鮮豬膽，以酒精消毒外囊，再取明矾100克煅燒，去其結晶水研碎與新鮮胆汁100毫升，調成糊狀，置60℃烘乾研碎過篩，防止污染）外敷，3～7天為一療程。

子宮脫垂 病名。又名子宮脫出、陰脫、陰癰、癰疾、子宮不收、子腸不收。俗稱吊茄子、癰葫蘆。與陰挺、陰痔等病相似。指婦女子宮下墜，甚至脫出陰道口外。多由氣虛下陷，帶脈失約，沖任虛損，或多產、難產、產時用力過度，產後過早參加重體力勞動等，損傷胞絡及腎氣，而使胞宮失於维系所致。症見子宮位置下垂，或脫出陰道口外，甚者連同阴道壁或膀胱直腸一并膨出。氣虛者兼見少氣懶言，面色晄白，小腹空墜等症，宜補氣升陽，用補中益氣湯；腎虛者兼見頭暈耳鳴，腰痠腿軟等症，宜補腎益氣，用大補元煎加鹿角膠、升麻、枳殼。若子宮脫垂因摩擦損傷或邪毒感染，而局部有紅腫潰爛，黃水淋漓，陰門腫痛，小便赤數等症，宜清熱利濕，用龍胆瀉肝湯，外用薰洗方：苦參、蛇床子、黃柏、烏梅，五倍子水煎，先薰後洗。針灸可刺維胞、子宮、三陰交等穴。

子眩 病名。亦名妊娠眩暈。鄭玉峰《萬金方》：“妊婦頭眩躁悶，不能舉動，心震不安，名曰子眩”。多屬肝腎陰虛，肝陽偏亢，上扰清竅所致。症見頭痛眩暈，耳

鳴眼花，心煩急躁。宜養陰清熱，平肝潛陽。用一貫煎，或天麻鉤藤湯，或杞菊地黃丸等。

子暈 病名。見《葉氏女科証治》卷二。指妊娠眩暈。平素血虛，孕後血聚養胎，孕至七、八個月陰血愈虛，不能上榮清竅，以致虛火上炎，鼓動其痰，或因氣虛而致眩暈。重者忽然昏倒不省人事，少頃即醒，又若常人。宜養陰清熱，佐以祛痰，用葛根四物湯（熟地、當歸、川芎、白芍、葛根、秦艽、防風、丹皮、細辛）加竹瀝；若氣虛者，宜補氣安胎，佐以祛痰，用人參麥冬散（人參、麥冬、茯苓、黃芩、知母、生地、炙草、竹茹）；血虛者，宜補血安胎，佐以祛痰，用胎元飲加黃芩。

子脏 出《金匱要略·婦人妊娠病脈証并治》。即胞宮。詳該條。

子脏冷无子 出《諸病源候論》卷三十九。不孕症型之一。即胞寒不孕。詳該條。

子病 病名。《婦人良方大全》卷十二：“妊娠惡阻病，產寶謂之子病”。即惡阻。詳該條。

子煩 病名。見王肯堂《胤產全書》。亦名妊娠子煩。婦女懷孕後因血聚養胎，陰血不足，或素有痰飲，復因郁怒忧思，致使火熱乘心，神志不寧，出現心驚胆怯，煩悶不安的病症。陰虛者，兼見五心煩熱，口干，宜清熱養陰、除煩，用人參麥冬散（《婦科心得》：人參、麥冬、竹茹、茯苓、黃芩、知母、生地、炙草）；痰火者，兼見頭暈腕悶，惡心嘔吐，多痰，宜清熱滌痰，用竹瀝湯（《婦科心得》：竹瀝、麥冬、黃芩、茯苓、防風）加減；肝郁者，兼見兩脇脹痛，宜疏肝解郁、除煩，用逍遙散加減。

子愚 病名。出《婦人良方大全》卷十二。亦名胎氣上逆、胎上逼心。指孕後胎氣上逼，出現胸膈脹滿。多因平素腎陰不足，肝失所養，孕後陰虧于下，氣浮于上，沖逆心胸，以致胸膈脹滿，甚者脇痛。若胎氣上逆迫肺者，兼見喘促；腎陰不足，心火亢盛者，

兼见烦躁不安等。治宜理气安胎。用紫苏饮（《妇人良方大全》：当归、川芎、大腹皮、人参、甘草、橘红、白芍、紫苏）。喘加桑白皮，烦躁不安加黄芩。

子淋 病名。出《诸病源候论》卷四十二。亦称妊娠小便淋痛。指妊娠期小便淋漓疼痛。孕妇因阴虚、实热、湿热、气虚等原因，致使膀胱气化不行，出现小便频数，点滴而下，淋漓疼痛的病症。阴虚者，为阴亏肾水不足，脬为火灼，津液涩少，故小便淋痛，兼见两颧渐红，心烦不宁，治宜清热滋阴通淋，用知柏地黄丸；实热者，为心移热于小肠，传入膀胱，灼伤津液，兼见口苦、口渴、口舌生疮，治宜清热泻火通淋，用导赤散；湿热者，为湿热下注，蕴结膀胱，气化不利，兼见肢体倦怠，小便涩痛，治宜清热利湿通淋，用五淋散；气虚者，因中气素虚，胎长膀胱受迫，气虚不能约制其水，兼见小便不能约制，溺后痛甚，治宜益气止淋，用益气止淋汤（《女科正宗》：人参、黄芪、白术、茯苓、麦冬、益智仁、升麻、甘草）。

子朝 病名。清·单南山《胎产证治录》：“孕妇胎气上攻，心腹胀满作痛，名曰子朝，宜服顺气安胎饮”。参见子悬条。

子痛 病名。见清·周登庸《续广达生篇》。①指妊娠腹痛。②指妊娠妇女胃脘痛。徐灵胎《女科指要》：“妊娠心痛而风痰冷饮交结于胃之上口，名曰子痛”。

子啼 见王肯堂《胤产全书》。亦名子鸣、儿啼、腹啼、鸣胎、胎哭、腹哭钟鸣、钟鸣。指孕妇因气虚，或胎热不安，以致腹中发声如钟鸣者。

子痢 病证名。《叶氏女科证治》卷二：“妊娠下痢名曰子痢”。

子嗽 病名。出《妇人良方大全》卷十一。亦名子呛、妊娠咳嗽。多因孕后血聚养胎，阴虚火动，或痰饮上逆，外感风寒等，致肺气失宣，气机不畅，发为咳嗽。阴虚火动者，兼见潮热颧红，短气乏力，宜滋阴清

热，用麦味地黄丸加减；痰饮上逆者，咳嗽痰多，胸闷心烦，宜理气化痰，用二陈汤加减；外感风寒者，兼见鼻塞流涕，发热恶寒，宜解表宣肺，用杏苏散。

子瘖（yin 音） 病名。见王肯堂《胎产证治》。亦名身重瘖哑、哑胎、妊娠不语。指妊娠期间出现声音嘶哑，或不能发声的一种病症。《素问·奇病论》：“人有重身，九月而瘖”。因孕至八、九个月，胎儿长大，阻绝胞中之络脉，胞脉受阻，肾阴不能上荣舌本，以致逐渐或突然不能发声。一般不需治疗，待十月子生，胞脉复通，可自然恢复。亦可滋肾益阴，用六味地黄丸加沙参、麦冬以生其津，津足则荣舌本，自能发声。慎勿宣窍开发。

子满 病名。出《诸病源候论》卷四十一。即妊娠肿胀兼有喘满的病症。多因平素脾肾阳虚，内有水气湿邪，孕至六、七个月胎体渐长，腹大异常，影响气机升降，运化输布失常以致水湿停聚，而出现遍身浮肿，腹胀喘满。宜温阳健脾，理气行水。用五苓散加葶苈子，或鲤鱼汤（白术、茯苓、当归、赤芍、橘红、姜、用鲤鱼汤煎）。《叶氏女科证治》：“妊娠五、六月间，腹大异常，胸膈胀满，小水不通，遍身浮肿，名曰子满。此胞中蓄水也，若不早治，生子手足必然软短，形体残疾，或水下即死，宜鲤鱼汤”。参见胎水肿满条。

子癇 病名。出《诸病源候论》卷四十二。亦名妊娠瘕、妊娠风瘕、风瘕、妊娠痫症、儿晕、儿风、儿瘕、子冒、胎风。指妊娠期间突然仆倒，昏不识人，四肢抽搐，少时自醒，醒后复发的病症。多因平素肝肾阴虚，孕后阴血益虚，阴虚则阳亢，导致肝风内扰，虚火上炎，引动心火，风火相煽所致。治宜平肝潜阳，滋阴清热。方用羚羊角散，或天麻钩藤汤。若痰涎壅盛，喉中痰鸣，目吊口噤者，治宜清热涤痰，上方加竹沥、胆南星；若抽搐不止，昏不识人者，配合针灸急

救，抽搐不止，针曲池、承山、太冲；昏不识人，针人中、内关、百会、风池、涌泉；牙关紧闭，针下关、颊车。

子燥 病名。徐大椿《女科旨要》：“肝肾阴亏，相火炎上，不时均令心烦，且亦令人作躁谓之子燥”。即孕悲。参见该条。

子翻胃症 病证名。清·周登庸《续广达生篇》卷二：“妊娠呕吐不已，数月不思饮食，精神如常，非恶阻，名子翻胃症”。

马牙 病证名。出《万病回春·初生》。又名上皮疹。即初生儿牙龈上呈散在的淡黄色若米粒大小的圆形结节，内含脂肪渣，往往因妨碍吮乳而引起啼哭。清·程永培《咽喉经验秘传》：“马牙系初生小儿胎内已受热毒，见风即生，但看牙根上有白色如脆骨者是。此症初发出胎即打喷嚏，含乳在口或吞，或吐，或吞而不吐……大约百日外不患此病”。可以针刺出血，并吹清凉解毒之清咽利喉散或冰硼散。

马牙风 出明·万全《育婴家秘》。即脐风。详该条。

马脾风 病名。出明·楼英《医学纲目》。又名风喉、暴喘。为小儿“暴喘而胀满”

(《证治准绳》)的危重证候。多由“胸膈积热，心火凌肺，痰热壅盛”(《幼幼集成》)所致。症见胸高气壅，肺胀喘满，两肋抬动，鼻翼扇动，大小便秘，神气闷乱。因寒邪客闭肺经，郁而化热，肺气不通者，治宜宣肺清热，先用五虎汤；继以利下痰涎，用一捻金。

马脾风似痛 病证名。急惊风类证之一，小儿肺胀似痛。表现上气喘急，鼻翼扇动，两肋闷乱，喘喝声嘎，痰涎壅塞者，即为此证。其状险恶，宜急攻下，用牛黄散(《幼科发挥》)。

马痹 病证名。指咽喉肿痛，水浆难下的证候。《诸病源候论》卷四十八：“马痹与喉痹相似，亦是风热毒气，客于咽颌颊之间。与气血相搏，结聚肿痛，其状从颌肿连颊下，应喉内肿痛塞，水浆不下，甚者脓溃，毒若攻心，则心烦懊闷致死。”见于急性扁桃体炎，扁桃体周围脓肿，咽后脓肿。治以清热解毒为主。详见喉痹条。如热毒入于营血者，宜清营汤加减。脓肿已形成，宜行切开排脓术。

四 画

〔一〕

开闭法 神奇外治法之一。用生菖蒲、生艾叶、生姜、生葱各一握，共入石臼内捣如泥，以麻油好醋同煎四味，炙热布包之，从头项背胸四肢，乘热往下熨之。治小儿风痰闭塞，昏沉不醒。

天马疮 病名。明·周慎斋《秘传女科》：“阴户生疮名天马疮”。详阴蚀条。

天吊惊风 出《本草纲目》。即天钓。详该条。

天吊风 出《医学正传》。即慢惊风。

详该条。

天行发斑疮 出《肘后备急方》。即痘疮。详该条。

天行痘 即痘疮。详该条。

天花 见清·袁句《天花精言》。即痘疮。详该条。

天钓 病证名。出明·万全《育婴家秘》。惊风的一种证型。又名天吊惊风、天钓惊风。临床以高热惊厥，头目仰视为特征。多由外感风热，或乳哺失宜，以致邪热痰涎，蕴积上焦，心膈壅滞，不得宣通而成。明·陈治《幼幼近编》：“天钓属心肺积热

所致。其证涎潮搐搦，项强痰鸣，双眸翻上，爪甲色青。”治宜先用礞石滚痰丸，去其积热与痰；再服钩藤饮（《证治准绳》：钩藤、天麻、木香、犀角、全蝎、甘草）清心以止搐搦。

天钩似痢 病证名。急惊风类症之一。见《幼科发挥》。天钩表现有壮热，惊悸，眼上视，手足抽掣，或啼或哭，喜怒不常，甚或爪甲发青等症状。由风热炽盛，窜扰经络所致。治宜和解风热。用羚角钩藤散或小儿回春丹。针刺丰隆、曲池、颊车、间使。

天钩惊风 出《本草纲目》。即天钩。详该条。

天泡疮 病证名。出《证治准绳·幼科》。小儿易患，分两种类型。①发于夏秋之间，起病急骤，互相传染。由暑湿之邪侵入肺经，郁于皮肤而成。初起为潦浆水泡，界限清楚，皮薄光泽，顶白根红，破流滋水，蔓延迅速。即脓泡疮。治宜清热解毒，利湿化浊。用五味消毒饮加六一散、土茯苓；暑热偏盛者，用三黄解毒汤，外用青黛散。②不分四季发病，病程缓慢，无传染性。因心火脾湿蕴郁而成。生大小不等的水泡，泡壁松薄，根部红赤，易于擦破滋水，伴有长期发热，胸闷，胃呆等全身症状，病久有潮热骨蒸，舌光绛无苔，脉细数等伤阴现象。即天疱疮。治宜清热除湿。内服清脾除湿饮（《医宗金鉴》：赤茯苓、炒白术、炒苍术、黄芩、生地黄、麦门冬、栀子、泽泄、甘草、连翘、茵陈蒿、炒枳壳、玄明粉、竹叶、竹心）。阴伤者，宜养阴益胃，服益胃汤。外用十大功劳、蒲公英煎水洗净患处；再用碧玉散，冷开水调敷患部。

天疮 出元·朱震亨《幼科全书》。即痘疮。详该条。

天柱骨倒 病证名。见《杂病源流犀烛·颈项病源流》。指小儿颈项软弱无力，头向下垂不能抬起的证候。天柱骨即颈椎。项为督脉及足太阳经脉所过。天柱骨倒，见

于胎禀不足，或病后阴虚及督脉空虚的病者。治宜滋阴益髓，用六味地黄丸、补天大造丸之类。

天癸 ①促进人体生长、发育和生殖机能，维持妇女月经和胎孕所必需的物质。它来源于男女之肾精，受后天水谷精微的滋养而逐渐充盛。《素问·上古天真论》：“女子二七而天癸至，任脉通太冲脉盛，月事以时下，故有子。……七七任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也”。

②元阴的别称（《类经》注）。③月经的代名词。如“天癸过期”（《妇人良方大全》是指月经后期）。现已不用。

天癸水至 即月经初潮的别名。《寿世保元》卷七：“室女十四岁，经脉初动，名曰天癸水至”。

天哮 出明·秦景明《幼科金针》。即百日咳。详该条。

天哮呛 即百日咳。详该条。

天痘 即痘疮。详该条。

无子 出《脉经》。指不孕症。参见不孕条。

无辜疳 病证名。指疳病头颈生核的证候。《圣济总录》卷一百七十二：“由小儿嗜肥甘过多，虫因甘动，或饮食不调所致。”其症头颈生核，形如弹丸，按之转动不痛，内有一种米粉样物质（如颈淋巴结核）；其毒侵及脏腑而成疳疾。治宜先挑破其核，挤出粉样物，方用柴胡饮（《医宗金鉴》柴胡、赤芍、黄连、半夏、桔梗、夏枯草、龙胆草、浙贝母、黄芩、甘草）清热，后用集圣丸（方见肝疳条）消疳。

无嗣 出《辨证录·受妊门》。指无子女。参见不孕条。

木舌 病证名。又名舌黄鹅口、死舌。舌体肿大，板硬如木。元·朱震亨《平治会萃》：“木舌者，舌肿硬不和软也。”见于新生儿舌炎。《婴童百问》：“舌者心之候，脾之脉络于舌也。脏腑壅滞，心脾积热，热

气上冲，故令舌肿，渐渐胀大，塞满口中，是为木舌。”《赤水玄珠》卷三：“舌肿硬而不柔和，挺然胀满或出口者为木舌。”

《医学纲目》：“木舌者，舌肿粗大，渐渐肿硬满口，不急治，即塞杀人也。”《焦氏喉科枕秘》：“木舌皆由心火盛，舌如木硬紫多疼，壮热憎寒言蹇涩……。”同时伴有转运不灵，妨碍吮乳，啼哭不安。治宜泻火解毒。用凉膈散加减。热毒深重，舌肿硬痛，不能言语者，宜清心凉血解毒。用黄连解毒汤、犀角地黄汤等加减。并可于舌刺去恶血，冲服紫雪丹，外吹冰硼散，或用芒硝、百草霜、滑石，酒调敷舌上。临床上常见新生儿脱水时，其舌亦强硬似木，并略向上卷，塞满口中，则为干缩性肿大，经哺乳后，往往不药而愈。

木舌胀 病证名。小儿舌上偶生疮肿，症见舌体粗大、木闷而硬。《儒门事亲》：“热结于舌中，舌为之肿，名曰木舌肿。木者，强而不柔和也。”见于感染性疾病而伴有神经损害者。参见木舌条。

木肾 睾丸肿而不痛证候。《育婴秘决》：“卵肿不痛者，此湿也，又名木肾。”治宜软坚利气。用橘核丸。

五不女 指女子先天性生理缺陷而无生育能力。《广嗣纪要·择配篇》：“五种不宜：一曰螺，阴户外纹如螺蛳样、旋入内；二曰文，阴户小如筋头大，只可通，难交合，名曰石女；三曰鼓花头，绷急似无孔；四曰角花头，尖削似角；五曰脉，或经脉未及十四而先来，或十五六岁而始至，或不调，或全无”。五不女即螺、纹、鼓、角、脉。详各条。

五伤 指妇女伤于胞宫而引起的五种病症。即带下三十六疾中之五伤。《诸病源候论》卷三十八：“五伤者，一者穷孔痛，二者中寒热痛，三者小腹急牢痛，四者藏不仁，五者子门不正引背痛”。

五反恶候 病证名。见《普济方》卷三百五十八。即眼反、唇反、舌反、项反、脚反。

为五脏精气将脱的危险。

五水灸法 五脏水肿的灸疗方法。《素问病机气宜保命集·肿胀论》：“青（肝）水灸肝井（大敦）；赤（心）水灸心荣（少府）；黄（脾）水灸脾俞（太白）；白（肺）水灸肺经（经渠）；黑（肾）水灸肾合（阴谷）。”

五色带下 病证名。见《千金要方》卷四。亦名带五色俱下、带下五色。指从阴道流出杂色秽浊的液体。多因湿热蕴结下焦，积瘀成毒，损伤冲任带脉所致。症见五色秽浊之液从阴道流出，或有恶臭气味，绵绵不断。治疗见湿毒带下条。临床见此病证，应注意生殖器官有无恶性病变。

五色痢 病证名。指痢疾五色杂下，病情危笃的证候。《医学纲目》：“有五色痢者，乃因五脏蕴热，日久不散，故有是证。”因五脏受热，熏腐脏腑，营卫不调，五谷不化，故痢下之物呈青、黄、白、黑五色，腹中刺痛，神气昏沉等。见于中毒性痢疾。宜中西医结合抢救。中药以清热解毒，芳香开窍为主，如白头翁汤加减，配合紫雪丹之类。

五冷恶候 病证名。见《普济方》卷三百五十八。即手冷、足冷、气冷、面冷。为初生儿全身阳气衰竭的危险。

五迟 病证名。小儿发育迟缓的总称。《医宗金鉴·幼科心法要诀》：“小儿五迟之证，多因父母气血虚弱，先天有亏，致儿生下筋骨软弱，行步艰难，齿不速长，坐不能稳，要皆肾气不足之故。”分立迟、行迟、发迟、齿迟与语迟。详见各条。

五软 病证名。①指头软、项软、手软、脚软、肌肉软。见《婴童百问》。多系禀受不足，气血不充，故骨脉不强，筋肉痿弱。明·薛铠《保婴撮要》：“原其要，总归于胃。盖胃为水谷之海，为五脏之本，六腑之大原也。治法必先以脾胃为主，俱用补中益气汤，以滋化源。头项手足三软，兼服地黄丸。”详头软、项软、手足软、肌肉软各条。②即胎

怯。出《古今医统》。详该条。

五肿恶候 见《普济方》卷三百五十八。肿病表现的五种危险症候。即五心肿、人中肿、舌头肿、膝胫肿、阴茎肿。

五盲恶候 病证名。见《普济方》卷三百五十八。指因病而突然失明的严重证候。包括“疮豆盲、惊风盲、久渴盲、久痢盲、久泻盲”。为邪毒偏盛，肝肾精衰的危象。

五紧恶候 病证名。见《普济方》卷三百五十八。小儿惊风的重证。即咽喉紧、口唇紧、眼梢紧、手脚紧、阴囊紧，为经脉邪实，经气将竭的危象。

五脏热 病证名。见《证治准绳·幼科》。小儿五脏偏热而引起热证的合称。分心热、肝热、脾热、肺热、肾热。详见各条。

五脏疳 即五疳。详该条。

五脏病 出《小儿药证直诀》。五脏的病理变化及临床证候，包括心病、肝病、脾病、肺病、肾病。详各条。

五脏痼 出《小儿药证直诀》。即五痼，详该条。

五陷 出《古今医鉴》。疮痘之毒，由内向外透出的为顺，已出复入的为陷。痘出不能成浆的，谓之倒陷。五陷，指痘疮已出，由于调治失宜，以致毒气内陷，其浆不成的五种严重证候。临床分紫陷、黑陷、白陷、灰陷和血陷。详各条。

五陷恶候 见《普济方》卷三百五十八。指儿科五种险恶证候。即囟门陷、太阳陷、眼轮陷、胸下陷、肩胛陷；为小儿精髓不足的危象。

五疳 五种疳证的合称。①又名五脏疳。《小儿药证直诀》：“疳证有五，谓五脏所受，故得其名。”五疳，即心疳、肝疳、脾疳、肺疳、肾疳。详各条。②《诸病源候论》卷十八：“五疳，一是白疳，令人皮肤枯燥，面失颜色；二是赤疳，内食人五脏，令人头发焦枯；三是蛲疳，食人脊膂，游行五脏，体重浮肿；四是疳蠹，食人下部，疼

痒腰脊挛急；五是黑疳，食人五脏，多下黑血，数日即死。”详各条。

五痉 指风、寒、暑、湿、燥所引起的痉证。《解儿难》征保按：“张仲景《金匱》脊强者，五痉之总名，其症卒口噤，背反张而痠痲。”

五般聾耳候 病证名。出《婴童百问》。即聾耳，脓耳，缠耳，底耳和囊耳。均由风水入耳，内有积热上壅而成。若不早治，久则成聋。详各条。

五崩 病名。指崩下的血有五种不同的颜色。《脉经》：“白崩者形如涕，赤崩者形如绛津，黄崩者形如烂瓜，青崩者形如蓝色，黑崩者形如衄血也”。详各条。

五硬 病证名。①《古今医统》指“头硬不能俯视，气壅胸膈，手足心冷如冰而硬，名曰五硬”。多因禀赋不足，真阳大虚所致。急用六君子汤加炮姜、肉桂、柴胡、升麻以复其真气。②《幼科铁镜》指肝受风邪，头颈手足强直的病证。③《幼幼集成》指手硬、脚硬、腰硬、肉硬、颈硬。

五喘恶候 见《普济方》卷三百五十八。即疮痘喘、惊风喘，虚肿喘、吐泻喘、下痢喘。为邪胜正衰，元气将脱的危象。

五痼 出《小儿药证直诀》。小儿痼证的五种证型。又名五脏痼。即肝病、心病、脾病、肺病、肾病。详各条。

五缩恶候 病证名。见《普济方》卷三百五十八。即手缩、脚缩、舌缩、唇缩、阴缩，属小儿危重证候。

太阳 ①小儿面部望诊的部位。即文台稍上靠内侧处。《奇效良方》：“左太阳并口角红脉现，变蒸候，主烦躁啼叫，头肚上温温壮热，……”。参见文台、武台条。②经外奇穴名。位于眉梢与外眼角连线中点，向后约1寸凹陷处。

太阴 小儿面部望诊的部位。即文台外侧稍上之处。《奇效良方》：“太阴上红脉现，伤寒之候，主壮热鼻塞。”参见文台、武

台条。

历癆痞症 古病名。出《颅凶经》卷上。又名锁肠痞。指小儿疟疾发作无时，口噤，咬牙作声的证候。

不予 出《医宗金鉴·妇科心法要诀》。即不孕。详该条。

不月 出《素问·阴阳别论》。指经闭，或指月经不按月来潮。参见经闭条。

不月水 出《脉经》。即经闭。详该条。

不孕 病名。出《素问·骨空论》。又名无子、全不产、绝产、断绪。女子婚后，夫妇同居三年以上未避孕而不怀孕者，称为原发性不孕；曾孕育过，并未采取避孕措施，又间隔三年以上未再次怀孕者，称为继发性不孕。在女子方面，有因先天性生理缺陷者，如五不女；有因后天病理变化者，常见肝郁、血虚、痰湿、肾虚、胞寒、血瘀等引起冲任失调，难以摄精受孕。在男子方面，“更当察其男子之形气虚实何如。有肾虚精弱，不能融育成胎者；有禀赋微弱，气血虚损者；有嗜欲无度，阴精衰惫者。各当求其源而治之”（《妇人良方大全》）。治疗详见肝气郁结不孕、血虚不孕、痰湿不孕、肾虚不孕、胞寒不孕、血瘀不孕等条。

不思食 病证名。又名不嗜食。即食欲不振。《赤水玄珠》：“由脾胃馁弱，或病后而脾胃之气未复，或痰客中焦，以故不思食，非心下痞满而恶食也。”临床分虚、实两证。偏实者，多因乳食停滞，治宜消食化滞，用平胃散加减；偏虚者，多因体质虚弱，治宜健脾益胃，用异功散加山楂、麦芽。

不能食 证名。《证治汇补》：“不能食，有虚有实，实则心下痞满口苦，宜消导。虚则倦怠面色痿黄，必心下软和，宜异功散加砂仁；有虚痰者，六君子汤。”热病后期，胃液受伤不能食而烦渴者，宜清胃养液，用竹叶石膏汤加减。

不寐多困 病证名。指失眠而困倦。《幼科铁镜》：“婴儿不睡有二：一心虚，二胆虚。

睡中不闻人声，忽醒而不寐者，此心血不足。宜人参安神丸（麦冬、人参、当归、黄连、枣仁、生地、茯神）。有睡中稍闻人声响动，即惊而不寐者，此胆虚之极。宜用参竹汤（麦冬、人参、竹叶、甘草、半夏、小麦、粳米、陈皮、生姜）。亦有因胃热而卧不安者，宜清胃，用竹叶石膏汤。”

不嗜食 见《赤水玄珠》。即不思食。详该条。

牙儿鼻塞 病证名。小儿肺气通于鼻，气为阳。若气受风寒，停滞鼻间，则成鼻塞。治法：用通关膏敷囟，消风散煎服（《证治准绳》）。

牙疳 疳疾毒热攻胃所致的证候。见《儒门事亲》。由于其病情的变化，亦极迅速，所以又有走马疳、走马牙疳之称，为疳蚀之极。因齿乃骨之余，龈属胃之络。一旦毒火攻于胃和肾经，上发龈、口，所以牙龈赤烂肿痛，重者龈坏齿脱。《小儿药证直诀》描述肾疳五证，为“初作口气，名曰臭息；次第齿黑，名曰崩砂；盛则龈烂，名曰溃槽，又盛血出，名曰宣露；重者齿自脱落，名曰腐根。”临床可见于急性溃疡性口炎，坏死性龈、口炎。治以清泄毒火为主，内服凉膈散加减；外用锡类散，时时敷涂。参阅走马牙疳条。

〔1〕

日午发搐 病证名。出《小儿药证直诀》。因日午潮热引起抽搐，由心火亢旺所致者。临床特点为每逢巳、午、未时发搐，心神惊悸，目上视，白睛赤色，牙关紧，口内流涎，手足动摇。当补肝治心，治心用导赤散，凉惊丸；补肝，用地黄丸。

日角月角 小儿面部望诊的部位。见《奇效良方》。即风池直上发际处。左为日角，右为月角。参见太阳条。

日晚发搐 病证名。出《小儿药证直诀》。因日晚潮热引起抽搐，由肺热所致者。

临床特点为每逢申、酉、戌时不甚搐而喘，目微斜视，身体似热，睡露睛，手足冷，大便为淡黄色水液。治宜补脾、治心、治肝。补脾，用益黄散；治肝，用泻青丸；治心，用导赤散。

中人 出《诸病源候论》卷四十六。即客忤，详该条。

中风不随 病证名。小儿感受风邪而致的四肢运动障碍。《太平圣惠方》第八十三卷：“夫小儿中风不随者，因风邪中于肢节，客于筋脉。若风挟寒气者，即拘急挛痛；若挟于热，则缓纵不随也。”见于急性感染性多发性神经炎。治宜疏风清热。用小续命汤加减。

中风失音 病证名。即伤风卒然失音。《太平圣惠方》第八十三卷：“若有暴风寒气，客于喉厌之间，喉厌得寒，则不能发声。”治法见卒失音条。

中关 诊察小儿指纹的部位。见《奇效良方》。即气关。详该条。

中毒气吐下 病名。出《诸病源候论》卷四十七。指小儿因肠胃脆弱，用药失当，不胜药势，造成吐泻不止，烦躁顿乏的证候。《小儿卫生总微论方》：“小儿脾胃怯弱，脏腑嫩软，气血未壮，因服药不胜其味之毒，致烦躁闷乱，或口舌麻木……甚至吐利，有致衄血者。”小儿形气未全，易虚易实，用药时要注意“中病即止”，已经达到治疗目的时，即宜及时停药，以免发生中毒。

中毒性肺炎 小儿肺炎中较为严重的一种类型。临床表现起病急骤，来势凶猛，高热，嗜睡，昏迷，惊厥，循环及呼吸衰竭等。其病机为气分热炽，灼肺伤津，进而热入营血，扰及心神。若正不胜邪，则现阳气衰竭等症。气分热炽者，宜平喘、解毒，宣肺化痰，用麻杏石甘汤加鱼腥草、银花、竺黄、竹沥；热入营血者，宜清营解毒，平喘化痰，用清营汤加减。合并心力衰竭，用参附汤，益气固脱；合并中毒性脑病，宜加用羚羊钩藤汤或神犀丹。

中毒性痢疾 是一种具有强烈的传染性疾病。临床以发病急骤，高热，昏迷，抽搐，开始多无脓血便为其特征。多发于夏秋两季，常见2~7岁小儿。由于疫毒之邪从口而入，湿热蕴伏肠胃所致。可出现邪毒旺盛的闭证，同时又可伴随正气虚衰的脱症。凡突起寒战高热，烦躁谵妄，反复惊厥，神志昏迷，大便腥臭，伴有脓血或无大便者，为实热内闭；如突现面色苍白或青灰，四肢发凉者，为内闭外脱。实热内闭者，宜清热解毒，用黄连解毒汤；内闭外脱者，宜扶正固脱，镇痉开窍，先服参附汤，调服安宫牛黄丸，以固脱镇痉，继用四逆汤。病情好转时，再清热制痢，如白头翁汤等。

中药流产 指妊娠三个月以内，因身体情况不宜继续怀孕，或适应计划生育的要求，经内服中药或外用中药等方法达到流产的目的。文献记载有关材料较多，可供参考。如：①汪嘉谟《胎产辑萃》：“妊娠羸瘦或挟疾病，脏腑虚损，气血枯竭，既不能养胎，致胎动而不牢固，终不能安者则可下之，免害妊妇，方用牛膝汤（牛膝、川芎、朴硝、蒲黄、当归、桂心）。②钱峻《秘录奇方》：“用土膝根洗净用五寸长者数根，将蒂紧紮住，根头上搽麝香少许，放入阴中，一日即下，要札好，不然冲心致死。”③根心堂主人《坤道指南》退妊方：五味子、三棱、文术、归尾、萆薢各等分，人参少许。④根心堂主人《坤道指南》打胎方：“归尾、红花、丹皮、附子、大黄、桃仁、官桂、莪术各五钱，白醋糊为丸，每服三钱，黄昏一付，半夜一付，五更一付，或一付即下，不必再服”。⑤高井岐《杜氏女科辑要》：“瞿麦六两，通草、桂心各三两，牛膝、榆白皮各四两，细切，用水九升，煮取三升，去渣，分三服即下。一方无榆白皮，有天花粉四两，大能坠胎。”

中药避孕 指内服中药或外用中药达到避孕的目的。若达到终生不孕称为绝育。亦名断产、断子、绝胎。历代文献均有记载，效

果尚待考证。《本草纲目》：“马槟榔核仁，欲断产者常嚼二枚，久则子宫寒冷不孕。”又“故蚕纸烧末酒下，终身不孕。”《医林集要》以零陵香为末，酒服二钱，云能绝育一年。千金断产方：四物汤一剂，芸苔子（即油菜子）一撮，红花，水一钟半，煎八分，经后空心服，则不受胎。“断产灸法：灸脐下二寸三分阴动脉中三壮。”此外如万年青、酸枣树根皮、鹿含草、柿蒂、水银、防风、马蔺子等，用作断产，亦有文献记载。

中恶 出《诸病源候论》卷二十二。小儿体质娇嫩，气血未充，秽恶之气骤然遇之即闭塞清窍，堵滞胸中者为中恶。其症先无他病，卒然心腹刺痛，闷乱欲死。治宜开窍除邪，以通其闭。可针刺人中，外用皂角末吹鼻，内服苏合香丸。

中恶似痾 病证名。急惊风类证之一，小儿危恶症候之一。中恶毒之气，病自外至。其证眩仆，四肢厥冷，两手握拳，不能喘息。治宜先用霹雳散吹鼻中取嚏，促醒，继用苏合香丸。中恶毒之物，病自内生，其症心腹刺痛，腹皮青黑，闷乱欲死。宜急攻之，用雄黄解毒丸（《幼科发挥》）。

中客 出《诸病源候论》卷四十六。即客忤。详该条。

中客忤 出《诸病源候论》卷四十六。即客忤。详该条。

中期引产 指妊娠13~24周，因身体欠佳，不适于继续怀孕，或适应计划生育的要求，须中止妊娠而行引产者。亦名打胎。可参见中药流产条。目前有用天花粉提纯注射液或芫花酊针剂，做羊膜腔内注射法，行中期引产，有效率达98%以上。天花粉有一定的副作用，同时注意过敏反应，要选好适应症。

中暑 病证名。暑病之一。为感受暑热之邪所致的急证。临床表现一般为壮热有汗，并因暑热之邪上熏，可见头痛口渴，烦躁不安的症状，甚至出现神倦疲乏，两足发冷，恶寒等。如果暑兼湿重，则可见胸满懒

食，停饮呕水的现象。治宜益气清暑。用人参白虎汤加苍术。

中脾积 见《证治准绳·幼科》。即脾中积。详该条。

中魃 出《太平圣惠方》卷八十八。即继病。详该条。

中寒泻 病证名。出《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》。指中焦脾胃虚寒而致的腹泻。症见面色淡白，四肢厥冷，饮食懒进，时腹疼痛，大便清澈清冷，小便清长色白。治宜温中止泻。用理中汤。

内风 出《临证指南》卷一。即虚风。详该条。

内伤饮食痧 病证名。小儿痧病之一。出清·吴鞠通《解儿难》。小儿食伤脾胃之阳，呕吐、腹泻引起津液枯竭，经脉失养而致发痧，亦有脾肾阳虚而致者。治以调理脾胃为主，用参苓白术散之属；脾肾阳虚者，用理中汤加丁香、肉桂、肉果、诃子之类。

内吹 病名。出《疮疡全书》。即妊娠乳肿。清·何荣《胎产金针》：“凡孕妇胎前两乳硬肿疼痛，寒热并发者，此名内吹”。参见妊娠乳肿条。

内吹乳 病名。出《疮疡全书》。指妊娠六、七个月，胎气旺盛，肝气郁结，胃热壅滞，致使肝胃二经，经络瘀阻，乳房结肿疼痛，谓之内吹乳。若色红者，多属热，宜柴胡清肝散，不红者，为气郁，宜逍遥散。参见妊娠乳肿条。

内钩 病证名。出《幼科发挥》。惊风的一种证型。临床以内脏抽掣，腹痛多啼为特征。多由内伤寒冷所致。因寒则拘急，内脏掣痛。明·陈治《幼幼近编》：“内钩属脾胃虚寒，寒主收引，故伛偻拳曲，腹痛多啼，唇黑囊肿也。”治宜温中定痛，用理中汤加木香、吴茱萸、肉桂。

内钩似痾 病证名。急惊风类证之一。小儿内钩，表现腹痛多啼，唇黑囊肿，伛偻反张，眼内有红筋斑白者，即为此证。为寒

气壅结所致。治宜温经散寒，用木香丸(《幼科发挥》)。

内疳 病证名。疳疾的一种证型。出《小儿药证直诀》。指疳病时间长，病位在心、腹、胃、肠的症候。《证治准绳》：“小儿乳食，心腹虚胀，眼目涩痒，体热皮枯，肠胃不和，痢下五色，渐渐羸瘦，虫蚀肛肠，日月弥深，痢转不止。”由脏腑虚冷所致，治宜厚肠丸(李东垣方：陈皮、半夏、苍术、人参、麦芽、枳壳、神曲末、青皮、厚朴)。

内热头痛 病证名。见《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》。胃中郁热而引起的头痛。因小儿脾胃脆嫩，过食肥甘厚腻食物，引起脾胃消化功能失调，积滞化热，热极生火，火性上炎，循足阳明经上行而致。症见鼻干目痛，上至头额，下至齿颊，痛无定时。治宜疏风清热。用菊花茶调散。

见苗 出《痘疹心传必效良方》。即痘疮见形。详该条。

见点 痘疮始出的迹象。出《证治准绳·幼科》。即痘疮见形。详该条。

〔 1 〕

手足软 五软之一。四肢为脾所主。小儿胎禀不足，乳食失调，以致肝肾脾胃虚弱，故四肢无力，手软不能握持，足软不能站立。治以补益为主。先用补肾地黄丸滋补肝肾，继用扶元散调补脾胃。

手足抽掣 病证名。出《太平圣惠方》第八十五卷。婴儿手足抽掣，多因妊母被风邪所袭；儿出生后，邪留脏腑，不得宣通，复感风邪，因而发病。其症多伴有壮热呕吐，睡时多惊，心神不安，身体强直，眼目反张。治宜祛风解痉。用羚羊钩藤汤。

手足皲裂 病名。手足冻破。《太平圣惠方》第九十一卷：“夫小儿肌肤软弱，冬时解脱，触冒风寒，手足肌肉破，故谓之皲裂也。”可用皲裂欲脱方(川椒、芎藭、白芷、防风、干姜)捣碎，水煎取汁，温涂患部。

手拳 病证名。即手指挛缩不展。《太平圣惠方》第八十九卷：“夫小儿手拳者，由在胎之时，其母脏腑气虚，为风冷所乘，儿生之后，肝气不足，致筋脉挛缩，不能伸展，故令手拳不展。”治宜养肝柔筋，和血祛风之剂。

手筋色 出元·朱震亨《幼科全书》。即纹色。详该条。

气血虚弱痛经 病证名。属痛经证型之一。由于体质素虚，气血不足，经行之后气血更虚，以致冲任胞脉失养。症见经后小腹绵绵作痛，喜温喜按，经血量少，色淡质稀。治宜补气养血，扶脾止痛。方用内补当归建中汤，或用民间方：红糖、生姜等量，蒸后口服，每次一食匙。

气闭 病名。《竹林寺女科秘方》：“妇人胎前小便不通，此症乃因气弱，名为气闭。宜用海金砂丸治之”。

气关 ①小儿指纹见于食指第二节为气关。出元·朱震亨《幼科全书》。又名中关。详小儿指纹条。②推拿部位名。指三关之一。位于食指中段指节的腹面。用揉法可行气通窍。参见指三关条。

气池 小儿头面部望诊部位。见《奇效良方》。眼平视，瞳孔直下1寸处，相当眶下孔之部。气池红，主伤风传变在脏，三焦有热之证。

气郁血崩 病证名。属血崩症型之一。多因暴怒伤肝，气乱血动，血失所藏，冲任失调，发为血崩。症见突然阴道下血量多，色紫红有块，烦躁易怒，胸胁不舒。治宜止血以治其标，方用固冲汤；待血量减少后，再以疏肝解郁，方用逍遥散加炒香附、青皮。或用醋炒香附为细面，每次口服10克，米饮送下。

气肿 ①肿病的一种类型。详小儿浮肿条。②指先肿而后喘。《幼科铁镜》：“由脾胃虚弱，脾主肌肉，肺主皮毛。土弱不能生金，虚气上攻乎肺，行于面目，遍身浮肿也”。治宜调脾行气为主，用五子五皮汤(苏

子、山楂子、葶苈子、萝卜子、桑皮、桔皮、大腹皮、茯苓皮、生姜皮），亦可用茯苓导水汤。

气乳 乳母忧思气结哺儿，令儿致病。因思则伤脾，儿饮其乳，则病吐泻腹胀，面黄而啼（《证治准绳》）。

气疝 病证名。小儿疝气。内则脐腹绞痛，外则卵丸肿大。《幼幼集成》卷四：

“小儿性急，多叫哭而得之者，此气动于内，谓之气疝。”治宜行气开郁，用柴苓汤、木香内消丸（木香、三棱、猪苓、泽泻、川楝、广皮、香附、青皮）。

气逆难产 病名。见《傅青主女科》。指因气逆造成的儿不能下生。多因产妇临蓐心怀恐惧，恐则神怯，气机不利，气逆不行小儿转动无力所致。症见临蓐数日，儿头尚未到产门不能下生。治宜利气安神，调畅气机。除安慰产妇之心，使其不可忧虑焦烦外，方用舒气散（人参、当归、川芎、白芍、紫苏梗、牛膝、陈皮、柴胡、葱白）。

气胎 病名。指假孕症型之一。《续名医类案》卷二十四：“因当经著气伤肝，久郁冲于血海，似怀胎而无形，此名气胎”。多因平素肝旺易怒，肝气郁结，气血运行不畅，冲任胞脉阻滞所致。症见经闭腹大，状如怀孕。治宜疏肝理气行血。方用逍遥散加木香、香附、川芎等。

气结难产 病名。指气结不行，反而逆上所造成的难产。清·周登庸《续广达生篇》：“数日胎不下，服催生药不效，似交骨不开，实气结不行。儿未到产门，虽数日不下，万不可用开骨药，又切忌催生药。多因坐草太早，儿未转头，原难骤生，产母见儿不下，心必忧恐，恐则神怯，怯则气下不升，则下焦闭塞，气乃逆上。气即逆则上焦胀满，气阻于上，下而难行，苟不利气而催生，则气愈逆，而胎愈闭，故但利气用舒气汤（人参、当归、紫苏、牛膝各三钱，川芎、白芍各五钱，柴胡八分，陈皮一钱，葱白七

寸）胎自下矣”。

气痞 出《小儿药证直诀》。即肺痞。见该条。

气积 病证名。积痛之一。肝脾之气积滞不和而致的腹痛。小儿肝常有余，脾常不足，乳食伤脾，肝气横逆，则气积于胁肋而隐隐作痛，并伴有腹胀暖气等。治宜疏肝去积。用四逆散加鸡内金、青皮、厚朴之类。

气虚月经过多 病证名。属月经过多证型之一。多因素体虚弱，忧思伤脾，中气不足，冲任失固，血失约制所致。症见经行血量过多，或行经时间延长，色淡，质稀，面色㿔白，精神疲倦，气短懒言，或心悸，小腹空坠等。治宜补气摄血，健脾固冲。方用补中益气汤、举元煎、归脾汤等。

气虚经行先期 病证名。属经行先期证型之一。多因素体虚弱，忧思伤脾，或饮食不节等。以致中气不足，冲任失固，经血妄行，症见经期提前，血量较多，色淡红，质清稀，面色㿔白，精神疲倦，气短懒言，不思饮食，或心悸，小腹空坠等。治宜补气摄血，健脾固冲。方用补中益气汤，举元煎等。

气虚崩漏 病证名。多因素体虚弱，忧思不解，或饮食失节等损伤脾胃，以致气虚冲任不固，血失统摄。症见阴道出血量多，或淋漓不止，色淡质稀，疲倦气短懒言，不思饮食等。治宜补气固摄。方用举元煎，或补中益气汤。血多加阿胶、艾叶炭、乌贼骨；若流血不止，两目昏暗或眩晕跌仆，脉细弱者，用固本止崩汤（《傅青主女科》）。

气虚脱肛 病证名。小儿肛门脱出，有的在大便时肛门下脱，便后又慢慢收合，但也有病延日久，肛门滑脱不收，不能自然收缩者。主要是由于泻痢日久，中气虚弱，肠薄脂消，使肛门滑脱不收。每多伴见面色青黄，唇色淡白指头发冷等。治以温中健脾为主，先服补中益气汤，以升提下陷之气；再用真人养脏汤，以温补固涩。外用温开水洗

净，再用涩肠散（《医宗金鉴》：诃子、赤石脂、龙骨、陈茶叶）掺肠头上，药棉揉入。

气虚滑胎 病证名。滑胎证型之一。孕妇有滑胎病史，孕后脾胃虚弱，中气不足，冲任不固，胎失摄养以致腰痠，腹胀，胎动下坠，或阴道下血，气短无力等。宜益气安胎，以防滑坠。用举元煎。若腰痠腹痛坠甚者，加杜仲、桑寄生；阴道下血者，加阿胶、艾炭。

气淋 病证名。诸淋之一。又名气癃。为尿有余沥结涩不通的症候。《诸病源候论》卷四十九：“气淋者，肾虚膀胱受肺之热气。”《圣济总录》：“肾虚则不能制小便，膀胱挟热则水道涩。肾虚膀胱热，则胞内气胀，小腹坚满，而生淋涩之病也。其候出少喜数，尿有余沥是也。”治宜清热利气，用沉香散（《金匱翼》：沉香、石苇、滑石、当归、桔皮、白芍、冬葵子、甘草、王不留行）加减。

气痛 病证名。指因气郁而致的心腹痛。多因怒而食，或伤风冷之气，或因体虚脏寒而气逆作痛。治宜理气解郁。用四磨汤。

气陷血崩 病证名。属血崩症型之一。多因素体虚弱，饮食不节，或劳伤形体，以致脾虚气陷，血随下脱，冲任失固，发为血崩。症见出血色淡，质稀，困倦乏力，怠惰嗜卧，动则气短血下更多。治宜补气升阳为主，方用举元煎，或补中益气汤等，重用人参、黄芪，再加乌贼骨、棕榈炭、煅牡蛎等，以固涩止血。若见汗出肢冷，昏不知人，脉微欲绝者，为气陷血脱之危候，急煎独参汤，或加附子，以回阳救逆，但均须频服。

气滞经行后期 病证名。属经行后期证型之一。多因郁怒伤肝，气机不畅，冲任胞脉血行受阻，以致经血不能按时下达胞宫。症见经期错后，血量较少，涩滞不畅，小腹及乳房胀痛拒按。治宜行气开郁。方用加味乌药汤、七制香附丸等。

气滞经闭 病证名。属经闭症型之一。多因郁怒伤肝，肝气郁滞，气滞则血涩，瘀阻冲任胞脉，经血不得下达胞宫而致经闭。症见经闭不通，精神郁闷，烦躁易怒，胸胁小腹胀闷不舒。治宜行气开郁调经。方用乌药散、七制香附丸等。

气滞痛经 病证名。属痛经证型之一。多因情志抑郁，气机不畅，气滞则涩血，冲任血行郁阻，不通则痛。每在经前或经行时，下腹部胀甚于痛，或兼胸乳胀闷不舒，经行涩滞不畅。治宜行气开郁止痛。方用加味乌药汤、七制香附丸、金铃子散、延胡索散等。

气癃 出《诸病源候论》卷四十九。即气淋。详该条。

长虫 出《诸病源候论》卷五十。即蛔虫。详蛔虫病条。

长针形 小儿指诊法十三指形之一。详十三指形条。

长珠形 小儿指诊法十三指形之一。详十三指形条。

反关痘 病证名。指气分毒邪，相夹交争，肌肤闭塞，以致毒气内攻的痘疮。明·秦景明《幼科金针》论反关痘谓：“其症狂言谵语，烦躁不宁，手足抽掣，目割，腹胀，隐隐不振，昏睡不醒，或见斑点即没。”治宜宣毒透表。若大小便及口、鼻出血，则属危症。

月不通 见《证治要诀》。即经闭。详该条。

月水 出《脉经》。即月经。详该条。

月水不来 出《脉经》。即经闭。详该条。

月水不利 出《诸病源候论》卷三十七。一指经闭，二指经行不畅。

月水不绝 出《圣济总录》卷一百五十一。指经漏。详该条。

月水不通 出《诸病源候论》卷三十七。即经闭。详该条。

月水不调 出《诸病源候论》卷三十七。即月经不调。详该条。

月水不断 出《诸病源候论》卷三十七。即经漏。详该条。

月水汁 见《本草集要》。即月经之血。

月水色黄 见《竹林寺女科秘方》。即经来黄色。详该条。

月水来腹痛 出《诸病源候论》卷三十七。即经来腹痛。详该条。

月水滞涩 见《太平圣惠方》卷七十二。即月经过少。详该条。

月运 见清·吕种玉《言鲚》。即月经。详该条。

月信 见清·崔乘铤《妇科宗主》。即月经。详该条。

月信不行 见《世医得效方》卷十五。即经闭。详该条。

月行 出《医说》引《锁碎录》。一指月经，二指经期。

月闭 出《神农本草经》水蛭条。即经闭。详该条。

月汛 出《赤水玄珠》。指月经。详该条。

月事 出《素问·上古天真论》。即月经。详该条。

月事不来 病名。《素问·评热病论》：“月事不来者，胞脉闭也”。即经闭。详该条。

月事不通 见《圣济总录》卷一百五十一。指经闭。详该条。

月事沉滞 病名。指月经数月不行。《儒门事亲》卷五：“夫妇人月事沉滞，数月不行，肌肉不减，《内经》曰：此名为瘕为沉也。沉者，月事沉滞不行也，急宜服桃仁承气汤加当归，大作剂料服，不过三服立愈。后用四物汤补之，更可用宣明方槟榔丸（槟榔、木香、牵牛、陈皮）”。

月使 出《脉经》。指月经。详该条。

月使不来 出《脉经》。指经闭。详该条。

月使不调 出《脉经》。指月经不调。详该条。

月经 名词。出《脉经》。亦名月水、月水汁、月信、月行、月汛、月使、月运、月事、月经水、月脉、月客、月浣、月候、月候血、月期华水、月漏、月潮、月露、红脉、红漏、红潮、血经、血信、血脉、经水、经月、经汁血、经血、经事、经脉、经信、经候、信水、癸、癸水、朝信、潮水、水中金等。是指胞宫周期性出血的生理现象。女子一般在十四岁左右月经即开始来潮，到五十岁左右，月经即自行断绝，中间除妊娠及哺乳期外通常一月来潮一次，每次持续约为3~7天。因其每月均按期而来，故称。

月经不匀 见《圣济总录》卷一百五十一。即月经不调。详该条。

月经不行 见《圣济总录》卷一百五十一。即经闭。详该条。

月经不通 见《圣济总录》卷一百五十一。即经闭。详该条。

月经不调 病名。见《千金要方》卷四。亦名月水不调、月使不调、月经不匀、月候不调、失信、经水无常、经水不定、经水不调、经不调、经气不调、经血不定、经脉不调、经候不匀、经候不调等。泛指月经的周期、血量、血色和经质的异常。常见的有经行先期、经行后期、经行先后无定期及月经过多、月经过少等。详各条。

月经水 见《本草蒙筌》。指月经之血。

月经过少 病名。亦名月经涩少、月经滞涩、经水否涩、经水涩少、经乍来乍少等。指月经周期虽准，但血量少于正常，或经行时间过短，量亦过少，甚至点滴一、二日即净。有血虚月经过少、血寒月经过少、血瘀月经过少、肾虚月经过少或痰湿月经过少等。详各条。

月经过多 病名。见《圣济总录》卷第

一百五十一。亦名月候过多、经乍来乍多。指月经周期虽准,但血量超过正常,或经行时间延长,超过七、八天以上,量亦增多。多因气虚不摄,血热内扰,劳伤冲任等所致。详气虚月经过多、血热月经过多、劳伤月经过多各条。

月经先期 见《竹林女科证治》。即经行先期。详该条。

月经后期 见静光禅师考定《女科秘要》卷三。即经行后期。详该条。

月经来如胆水 病证名。指经期阴道流出黄绿色的液体。清·何应豫《女科备考》:

“月经来如胆水,五心作热,腰痛并小腹痛,面色萎黄,不思饮食,乃气血虚弱。先用黄芩散(黄芩、川芎、当归、甘草、知母、花粉)退其热,后用调经丸(三棱、莪术、当归、白芍、生地、熟地、延胡索、茯苓、川芎、大茴、小茴、乌药、砂仁、香附)补血以顺气”。

月经或前或后 见静光禅师考定《女科秘要》卷三。即经行先后无定期。详该条。

月经前期 见静光禅师考定《女科秘要》卷三。即经行先期。详该条。

月经病 泛指月经方面各种病症的总称,包括经期、经量、经色和经质等的异常,或经期及其前后出现各种明显症状。经期异常的,常见有经行先期,经行后期,经行先后无定期。经量异常的如月经过多、月经过少、月经时多时少。经色异常的如经来色淡,经来色紫,经来如黄泥水等。经质异常的如经来成块,经来如牛膜片等。经期及其前后则有痛经、崩漏、经闭、逆经、经行便血、经行身痛、经行发热、经行泄泻、经来浮肿、经断前后诸症,年未老经水断,年老经水复行,经断复来等。详有关各条。

月经涩少 见清·叶其纂《女科指掌·调经门》。指月经过少。详该条。

月经落后 见清·叶其纂《女科指掌·调经门》。即经行后期。详该条。

月经滞涩 病证名。是指经行涩滞不爽。《圣济总录》卷第一百五十一:“治妇人月经滞涩,调顺荣气,姜黄散方(姜黄半两,丁香半两,当归炒一两,芍药一分,右四味,捣罗为散,每服二钱匕,温酒调下,日二)”。参见经行后期、月经过少条。

月经愆期 病名。见《类证普济本事方》。①指经行先后无定期。《医宗金鉴·妇科心法要诀》:“经来前后为愆期”。②指错过日期的意思,故或认为是指经行后期。

月蚀疮 即旋耳疮。详该条。

月食疮 病证名。①《诸病源候论》卷五十二:“小儿耳鼻口间生疮,此谓之月食疮。”②耳疮亦称月食疮。参耳疮条。

月脉 见《普济方》卷三百三十二。即月经。详该条。

月客 见《神仙服食经》。即月经。详该条。

月候 出《圣济总录》卷一百五十一。即月经。详该条。

月候不调 见《圣济总录》卷一百五十一。即月经不调。详该条。

月候过多 见《圣济总录》卷一百五十一。即月经过多。详该条。

月候血 见《太平圣惠方》卷一百五十一。即月经之血。

月浣 出《千金要方》卷四。即月经。详该条。

月假 出宋·齐仲甫《女科百问》。即月经。详该条。

月期华水 见佛教经《四分律》。指月经。详该条。

月漏 即月经。详该条。

月潮 见《古今医统》。即月经。详该条。

月露 见《证类本草》。即月经。详该条。

风门 小儿面部望诊的部位。即耳屏间

切迹相平处，相当于听会的部位。《厘正按摩要术》：“风门在耳前，少阳经所主，色黑则为寒为疔，色青则为燥为风。”

风气肿 病证名。出《诸病源候论》卷四十八。指小儿肿满，因皮肤受风，风搏于气而致虚肿如吹者。参见小儿肿满条。

风火眼 病名。又名火眼、赤眼、风热眼。《厘正按摩要术》：“小儿两目红肿，由肝经有热内蕴，风邪外袭，是为风火眼。”见于急性卡他性结膜炎。治宜疏风泄热，用导赤散（《证治准绳》：羌活、防风、赤芍、大黄、甘草）加減煎服。用夏枯草、蒲公英煎水熏洗，滴10%千里光点眼液。

风水肿 病证名。指风邪引起，以上身为重的水肿。《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》：“上身肿者，头面，肩臂至腰皆肿也。病因外感风邪，法宜发汗则愈。”见于小儿肾炎、肾病等。用越婢加苍术汤，或麻黄连翘赤小豆汤。

风邪伤肺 出《证治准绳·幼科》。指冬春之季，风邪侵犯肺而致的喘嗽。症见恶寒，或微热，咳嗽气急。治宜疏风宣肺。用止嗽散加減。

风闭 病名。①清·刘甫斋《妇科三字经》：“产时血去太多，经络空虚，风邪乘虚而入，忽然口噤昏倒，角弓反张，此名风闭”。治详产后痉风条。②闷痞之一。麻疹在出疹的时候，复感风邪，汗孔闭塞。症见洒淅恶寒，毛窍竖起，鼻塞气粗，喘闷不宁，甚至角弓反张，手足拘挛，眼白足冷，大便清利。治宜疏风透疹。用宣毒发表汤加羚羊角，锉为末，煎水兑汤药服。

风关 ①小儿指纹见于食指第一节为风关。出元·朱震亨《幼科全书》。又名上关、初关。详小儿指纹条。②经外穴名。见《针法灸道记》。位于食指掌面，掌指关节横纹中点稍外处。③推拿部位名。指三关之一。位于食指近端指节的腹面。参见指三关条。

风池 ①小儿面部望诊的部位。见《奇

效良方》。即眼平视，瞳孔直上，当眉毛上缘处，即鱼腰穴的稍上方。风池色红，主上中焦风热，抽搐，痰涎。②经穴名。出《灵枢·热病》。属足少阳经。位于项后枕骨下两侧凹陷处，平风府穴，适当斜方肌和胸锁乳突肌之间陷中。

风毒痢 病证名。出《医学纲目》。为风毒内袭于肠而致的急性痢疾。其症下痢，形如青草汁，或痢下物如鸡肝片。治宜疏风解毒。用白翁汤加減。

风疮 出《片玉心书》。即胎毒疮疥。见该条。

风热 病证名。小儿风热证候。①乳子中风热，表现为喘鸣肩息（出《素问·通评虚实论》）。②风邪外感，表现为身热而口中气热（出《小儿药证直诀》卷上）。③“风邪伤于皮毛，入于脏腑，则令恶风壮热，胸膈烦闷，目涩多渴，故曰风热也。”（《太平圣惠方》）。治疗以疏风清热为主，用桑菊饮、银翘散加減。

风热犯肺 病证名。由外感风热之邪，或因风寒郁而化热，以致肺气宣降失常而成。症见咳嗽声急，痰黄稠粘，咯出不易，口气热，呛乳，鼻流浊涕，咽喉肿痛，或咳出脓血痰，舌尖红。治宜清宣肺热。用桑菊饮，或麻杏石甘汤加減。

风热眼 见《幼幼集成》。即风火眼。见该条。

风热惊啼 病证名。出《太平圣惠方》第八十二卷。由风热内乘于心，以致心脏生热，精神不定，睡卧不安，因致惊啼。治以清心宁神为主，如牛黄清心丸；热重者，用导赤散加黄连、山栀之类。

风疳 出《婴童百问》。即肝疳。见该条。

风疹 病证名。出《千金要方》卷五。是一种较轻的出疹性传染病。多见于五岁以下的婴幼儿，流行于冬春季节。疹点细小淡红，出浸较快，退后无落屑及疹痕，因其症

状如痧子，故又名风痧。主要由于外感风热时邪，郁于肌表，发于皮肤所致。治宜清热解毒，用银翘散或加味消毒饮。

风疰 病名。《经效产宝》卷中：“产后中风，腰背强直，时时反张，名风疰”。此病不宜当真中风治，可用华佗愈风散（荆芥穗一味，焙干研末，每服三钱，童便调，以鼻饲投药）。

风痉 病名。①指产后中风，又名在蓐中风。见《千金要方》。详产后中风条。②指子痫。见《济阴纲目》。详子痫条。

风涎 六涎之一。指因风气蒸动痰涎，填塞胸中，以致闷倒无知者。治宜顺其风气，使胸中之痰涎随气而下，则痰涎自顺。

风惊食三痼 小儿痼疾的三种证候，简称三痼。《千金要方》：“小儿之痼有三，风痼、惊痼、食痼也”。其发病原理，《婴童百问》：“发病者，小儿之恶病也。幼小血脉不敛，骨气不聚，为风邪所伤，惊怪所触，乳哺失节，停滞经络而得之”。明·丁凤《医方集宜》：“盖痼虽有五，而致病之由有三，曰惊、曰风、曰食。若震骇恐怖，打坠积惊，叫啼恍惚，是为惊痼。若汗出脱衣，风邪袭入，积热生痰，屈指如计数者，是为风痼。食时受惊，停滞乳食，结为惊癖，是为食痼。”详风痼、惊痼、食痼各条。

风痼 病名。出《脉经》。①痼发瘥后，不能语者，是风痼。《诸病源候论》卷四十五：“风痼因儿衣厚汗出，以儿乘风取凉太过，为风所伤得之，其初发之状，屈指如数，然后发瘥是也。心之声为言，开窍于口，其痼发虽止，风冷之气犹滞，心之络脉，使心气不和，其声不发，故不能言也。”②外感风邪而引起的抽搐。《证治准绳·幼科》：“风痼，因将养失度，气血不和，或厚衣汗出，腠理开舒，风邪因入之，其病在肝，肝主风。验其证：目青、面红、发搐。”

风痧 即风疹。详该条。

风湿肿 病证名。指风湿合邪而引起的

通身水肿。《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》：

“通身肿者，头面手足皆肿也。得病之由，内停湿饮，外感风邪，风湿相搏，水道不利，外攻肌肤而为肿也。”肿势严重的，用疏凿饮子以消水；症状轻的，用茯苓导水汤以和解；喘不能卧的，宜泻肺逐水，用苏葶丸。

风湿痰 病证名。出《医学纲目》。风湿郁结经络，津液输布失常，凝滞为痰，则见四肢痿痹，屈伸不便，如果眼皮及眼下有烟灰样黑色者，则为痰之确证，宜从痰湿施治。

风温痉 病证名。小儿痉病之一。感受风温之邪所致的痉证。《解儿难》：“风温咳嗽致痉者，用桑菊饮。”如伴有神昏谵语者，兼用芳香开窍，如安宫牛黄丸，紫雪丹之类。

风寒头痛 病证名。见《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》。感受风寒之邪引起的头痛。头为诸阳之会，太阳主一身之表，故风寒之邪入侵后，先犯太阳。症见恶寒发热，以及巅顶额角部位不时作痛。治宜疏散发汗，用清空膏。

风寒咳嗽 病证名。见《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》。感受风寒，肺先受邪，使气上逆而致的咳嗽。多伴有咳嗽喷嚏，流涕鼻塞，声重频唾痰涎。先以参苏饮疏解表邪，再以金沸草散清其痰嗽。若寒邪壅蔽，又当以华盖散加减，以散寒宁嗽。

风寒喘急 指风寒病邪，内郁于肺而致的喘急。《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》：“肺主皮毛，一受风寒，内闭肺气，则气逆不降，呼吸气急，故作喘也。”发热无汗者，宜以华盖散，汗而散之；若肺气本虚，外复为风寒所伤者，宜以参苏饮，补而散之。

风禁 出《痘疹经验良方》。禁疮之一。痘疮初发热时，不避风，则风入肌表，以致痘不能发，或肌肤麻木，不知痛痒，或

不麻木而干燥，或毛直而干焦，或皮痒而欲搔，甚则烦躁谵语，由风热相搏所致。治以疏风解毒，用消风散；甚者加紫草、丹参、生地以活血清营。

风搐 出元·朱震亨《幼科全书》。即脐风。详该条。

风喉 出《证治准绳·幼科》。即马脾风。详该条。

风痰壅盛 病证名。出《证治准绳·幼科》。多因婴幼儿脾气素亏，肝气过旺，肝木克脾土，气机失调，风痰内动以致肺失肃降，因而咳嗽。其症咳嗽之极时，顿呕吐，乳食与痰俱出尽，方少定。治宜健脾降气，豁痰利气。可用涤痰汤加减。

风痲 出元·滑伯仁《麻证新书》。即隐疹。详该条。

风痲 病名。江天览《妇女病自疗法》：“一名产痲，系冲任血虚，心脾失养，故宗筋弛，不能束骨而利机关四肢萎弱无力。治宜活血祛风，若以降火滋阴，破气破血为治，则荣卫俱伤，终身莫挽。”方用《沈氏尊生书》血风汤。

风瘙 出《千金要方》卷二十二。即隐疹。详该条。

风齲 病证名。指牙龈肿痛而齿缝出血。《诸病源候论》卷二十九：“足阳明，足太阳之脉，并入于齿，风气入其经脉，与血气相搏，齿即肿痛，脓汁出，谓之风齲。”治宜消风镇痛，用赴筵散（《太平惠民和剂局方》：良姜、草乌、荆芥、细辛）搽擦患齿。即齿齲。参该条。

风噤 见《婴童百问》。即脐风。详该条。

乌痧惊风 病证名。惊风的一种证型。见《本草纲目》。多由风寒湿热之邪，阻滞经络，血行不畅所致。临床特点为遍身发乌，闷乱欲脱。急用黄土入醋炒热，布包乘热从头颈向躯干四肢熨之，出现黑块，取最显著者，用针刺破，挤出乌血，以使闷乱缓

解。

丹痧 出明·秦景明《幼科金针》。即丹痧。详该条。

丹痧 病证名。又名丹疹、烂喉痧、烂喉痹痧、疫痧、疫喉、喉痧。类于猩红热。因其咽喉红肿糜烂，疹色鲜红如丹，故名。丹痧属于疫疹，多流行于冬春季节，以二至十岁为多见。由疫疠之邪从口鼻而入肺胃，初期邪在卫分，继之病邪由表入里，里热炽盛，表现为气血两燔。咽喉为肺胃之通路，热毒上攻，故咽喉红肿腐烂。少数患儿由于正虚邪盛或延误治疗，可出现谵妄、昏迷、惊厥等邪陷心包的危候。初起邪尚在表，恶寒无汗者，宜辛温发散，用荆防败毒散；邪犯肺卫者，宜清热解毒，用银翘散加减；气血两燔者，宜双清气血，用清瘟败毒饮；邪陷心包者，宜清心开窍，解毒熄风，用清营汤合神犀丹或紫雪丹之类。

分诞 出《王叔和脉诀》。即分娩。详该条。

分娩 出《妇人良方大全》卷十七。娩，古作免、𦍋。又名分诞、分解、免身、免乳。指妊娠二十八周以上的胎儿，娩出母体的过程。

分解 即分娩。详该条。

〔 〕

文台 小儿头面部望诊的部位。即眉梢外侧端凹陷处稍上方。《奇效良方》：“文台上红脉现，伤寒三日候，主内热头疼”。

六甲 出《隋书·经籍志》。指胎孕。

六阳虚汗 出《小儿药证直诀》。手足三阳经脉，都会于头，如禀赋不足，阳虚不固，其汗上至头，下至项大出不止，为亡阳的征候。治宜回阳敛汗，用大剂固真汤、参附汤、芪附汤及回阳救急汤之类。

六涎 出宋·史堪《史载之方》。指风涎、热涎、冷涎、病涎、虚涎和毒涎六种。详各条。

心气实 病证名。出《小儿药证直诀》。又名心实。指邪热壅遏于心的证候。小儿纯阳，感邪后易于化热而壅遏于心而成心气实之证，表现为惊悸、昏谵等症状；同时儿之初生，知觉未开，见闻易动，故又神怯而易生惊。心恶热，与风相搏则发搐，故肝生风，得心热则风火相煽，而壮热、惊搐、昏迷交作。因而在病理上有小儿“心常有余”（明·万全《育婴家秘》）的说法。①“左手关前寸口阴实者，心实也，若心下有水气”（《脉经》）。②“夫心实则生热，热则阳气盛，阳盛则卫气不行，荣气不通，遂令热毒稽留，心神烦乱，面赤身热，口舌生疮，咽燥头疼，喜笑恐惊，手心热满，汗出衄血，其脉洪实相搏者，是其候也”（《太平圣惠方》）。③“心实即实火实热五证：谵语，属心家邪热；舌破，属心火；烦躁，属心家邪热，及心火内炎；自笑，属心家有热邪；发狂，属心家有邪热甚”（《本草经疏》）。

心气虚 证名。心气虚弱所致的证候。小儿多由胎元不足，或病后体虚而成。《小儿药证直诀》谓“心主惊……，虚则卧而悸动不安。”临床表现心悸气短，动则加重，自汗，舌质淡红，苔白，脉细数无力，或兼面㿔白，倦怠乏力等。治宜补心气，安心神。用四君子汤加黄芪以助气；加酸枣仁、远志、柏子仁、五味子等，以养心安神。参见心阳虚条。

心风 证名。指痰迷心窍所致的一类精神病症。《证治要诀》：“心风者，精神恍惚，喜怒不常，语言时或错乱，有癫之意，不如癫之甚，亦痰气所为也。”以豁痰开窍为治。

心水 病证名。出《证治准绳·幼科》。浮肿的一种类型。因心有病而引起的水肿。由心阳不振，水气上泛而成。临床特征为浮肿，短气不得卧。治宜温阳利水，用苓桂术甘汤。

心阳虚 除具有心气虚的证候外，还有面色苍白，形寒肢冷，心区憋闷，舌尖凉感。治宜益气温阳，用养心汤加减。严重者出现心阳虚脱时，可兼见大汗淋漓，四肢厥冷，口唇青紫，呼吸微弱，甚则神昏，脉微欲绝。治宜回阳救急，用大剂参附汤或人参四逆汤灌服。参见心气虚条。

心实 出《脉经》。即心气实。详该条。

心热 病证名。五脏热之一。①“视其睡，口中气温，或合面睡，及上窜咬牙，皆心热也。导赤散主之”（《小儿药证直诀》）。②“心热者，额上先赤，心烦心痛，掌中热而口岁，或壮热饮水，已午时益甚，宜泻心汤、导赤散、安神丸。”（《证治准绳·幼科》）。③即血热。

心热多惊 病证名。小儿蕴积邪热，脏腑壅滞，气血不和，心神烦乱。症见梦中狂语，烦闷多惊。治宜清热镇惊。用赤茯苓散（《太平圣惠方》）。

心热烦啼 病证名。见明·万全《育婴家秘》。为小儿心热内盛而致的啼哭。《幼幼集成》：“心热烦啼者，面红色赤，或舌苔白涩，无灯则啼稍息，见灯则啼愈甚。治宜清心除烦，用导赤散加麦冬、灯心；甚者加黄连、龙胆草。

心热惊啼 病证名。出《普济方》卷三百六十一。指心经有热而引起的惊啼。其症伴有舌尖红，啼哭不止。宜清热宁神。用柏子仁散（《普济方》：柏子仁一两）。

心疳 五疳之一。又名惊疳。是因小儿恣食肥甘，积滞生热，热传心经所致。症见患儿面红，眼白中有红丝，高热，有汗，时时惊烦，咬牙弄舌，口燥渴饮，口舌生疮，胸膈烦闷，睡喜伏卧，食欲不振，肌肉消瘦。热重者宜清心泻火，用泻心导赤散（《医宗金鉴》：黄连、木通、生地、甘草）；病久心气不足者，宜理脾补心，用四君子汤加当归、茯神。

心病 病证名。出《诸病源候论》第十

五卷。心主血脉，主神志，开窍于舌。因此在病理条件下，心病症状均反映在神志思维的异常和血脉运行的障碍以及舌体疾患等方面，如神昏，谵语，惊痫，心悸，舌疮等。心与小肠相表里，心经实火，可下移小肠，临床出现小便短赤，尿道灼热，疼痛或尿血等症。参心常有余、痰火扰心、心风、心气实、心气虚等条。

心虚经闭 病证名。《叶氏女科证治》：“妇人以血为主，血旺则经调，故治妇女之病，当以经血为先。而血之所主在心，盖心主血，肝藏血，脾统血，是心为气血之主，而脾为气血之本也。若忧虑伤心，心气虚耗，不能生血，脾乃心之子，脾失所养，则不嗜饮食，绝生化之源矣。且心虚无以制肺，金来克木，而肝脏亏损，则血不藏，以致经血干枯，不营经络，斯有血枯经闭之证。宜服补心汤（熟地、当归、川芎、茯苓、陈皮、半夏、桔梗、枳壳、前胡、甘草、干葛、苏叶、木香、人参、生姜、大枣引）。”

心常有余 小儿生理、病理特点之一。心为火脏，位于胸中，开窍于舌，其华在面，主身之血脉，为人体血液运行的动力所在，又主神志。由于小儿初生，知觉未开，见闻易动。故在生理上表现为神怯，易喜易怒易惊，变态不常。心的气血充盈，在正常情况下，则为神志清晰，思考敏捷，精神充沛；否则，常可导致心神的病变。实则叫哭发热，饮水而搐；虚则困卧，悸动不安。心热火盛则津液干而病渴，神志乱而卧不安。心恶热与风相搏则发搐，尤其小儿外感诸病，最易从阳化热，入心入肝，所以临床上往往壮热不退，因热生痰，因痰生风，肝风得心热而搐作，往往抽掣不已，甚至劫液伤津，逆传内陷生变。而且心属火，旺于夏，火性炎上，往往舌破生疮，诸痛疮疡，皆属于心。小儿固多瘤丹斑疹，蛇缠虎带，虫疥燥疮，动辄神昏愤乱，斑疹变黑。所以明·万全总结为“心常有余”、“心热为火同肝论”。

心惊 脏腑惊证之一。出金·陈文中《小儿病源方论》。详脏腑惊证条。

心痢 五痢之一。多由血虚邪热阻滞心经而发。其症面赤目瞪，吐舌弄舌，心烦气短等。血虚者用养心汤；实热用导赤散加黄连；虚热用妙香散。

心腹痛啼 小儿突然因心腹疼痛而啼。出《普济方》卷三百六十一。小儿气血不足，肠胃挟冷，再感风寒之邪，邪气分争，攻冲上下，而致心腹刺痛作啼。甚者可表现为面易五色，状似惊痫。治疗：轻者宜补中健脾，用六神散；重者宜温中开窍，用苏合香丸。

心噤 病证名。出《千金要方》卷五。指初生儿口噤，嘴唇发赤而紫者。参口噤条。

心躁夜啼 出《三因极一病证方论》。即热夜啼。详该条。

斗睛 又名通睛。详该条。

斗鸡眼 又名通睛。详该条。

火邪经闭 病证名。见清·秦之桢《女科切要》。指由于内热火炽，血被热灼导致经闭。如肺被火刑，气壅热闭，以致经闭者，兼见喘嗽肩痛，治宜清金利气，方用清肺饮合地骨皮饮；心经火旺者，兼见夜多烦躁，治宜清心火，养心血，方用三和汤、导赤各半汤；虚者用清心莲子饮，补心丹；肝经火旺者，兼见胁肋刺痛，小腹火热上冲，治宜清血室之火，方用芩连四物汤合小柴胡汤；脾经血燥者，兼见大便干结，治宜滋阴清脾，方用《证治准绳》当归饮、梔连戊己汤。肾阴不足，火伏下焦而经血不通者，治宜滋阴壮水养血，方用知柏四物汤。

火闭 闷瘡之一。系火毒内攻，疹难透发的证候。其症疹点见而急隐，面红目赤，肌肤焦热，舌燥唇裂，大便或闭或泻，甚至气喘狂叫，神昏错乱，扬手掷足。治宜泄火透疹，用三黄石膏汤，或凉膈散。参小儿昏迷条。

火泻 病证名。出《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》。多因脏腑素有积热或夏季伤暑受热，蕴结于内，下注大肠而致腹泻。泻时势急，量多如水倾注，色黄或夹泡沫，肛门灼热，伴腹痛身热面红，小便赤少。治宜清热为主，兼以利尿。清热用玉露饮；利尿用四苓汤。

火带疮 即蛇缠虎带。详该条。

火热喘急 证名。出《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》卷五十三。又名火喘。指火热之邪，郁于肺胃，使肺气郁滞不宣，痰浊挟热，阻塞气道所致的喘息。症见喘急而口干舌燥，面赤唇红。因于肺热者，宜清肺泄热，用凉膈散；因于胃热便结者，宜清热通便，用凉膈白虎汤。

火眼 见《疡医大全》卷十一。即风火眼。详该条。

火喘 即火热喘急。详该条。

火禁 出《痘疹经验良方》。禁疮之一。指痘疹初发之际，病人身发寒热，误以火熏其衣被，或至病人于温热环境之中，使皮肤干燥，以致痘毒发泄不出，多见于兼有气虚，因气虚不能鼓其毒，以致毒停皮肤之间，隐隐不能发出肌表，因而出痘时，毒陷皮内，痘点隐于皮下，觉有红点，无头无脚，或于四肢、头面部，见一、二点痘粒，皮内隐隐之痘，终不能块者，称为火禁。宜用疏风解肌之药，如水杨梅、荆芥之类，煎水温浴，并用升麻葛根汤内服，以升发透痘。

火嗽 出《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》。即肺热咳嗽。详该条。

〔七〕

巴豆贴脐法 水肿的外治法。用巴豆、水银粉、硫黄，共研匀成饼，先用新棉一片，包药布脐上，外用纱布缚约一时许，自然泻下恶水，待下三、五次，去药。食粥调补止泻。适用于湿盛，水肿腰以下为重，男

儿阴囊皆肿，兼有腹痛者（《医宗金鉴》）。

引痰法 神奇外治法之一。用生白矾一两研末，用醋溶化，入面粉取其胶粘，和作小饼，贴两足心，纱布包之一宿，治小儿痰嗽，上气喘急，喉中有拽锯之声者。

少小客忤 出《千金要方》卷五。即客忤，详该条。

少食而肥 指食纳虽少而体肥胖的病态。《脾胃论》：“脾胃俱旺，则能食而肥；脾胃俱虚，则不能食而瘦，或少食而肥，虽肥而四肢不举，盖脾实而邪气盛也。”

少食易饱 脾胃受纳不佳的病症。《幼科发挥》：“儿有少食而易饱者，此胃之不受，脾之不能消也。宜益胃之阳，养脾之阴。”用异功散合小建中汤加减。

水中金 出《本草原始》。月经的别名。详月经条。

水气肿满 证名。指水肿气急喘满的症候。《普济方》卷三百八十六：“夫小儿水气肿满者，由将养不调，脾肾两脏俱虚故也。……肾虚不能传其水液，脾虚不能克制于水，故水气流溢于皮肤，故令肿也。”先宜理脾利水，用茯苓导水汤；继宜温肾化水，用金匱肾气丸。

水分 ①病名。《金匱要略·水气病脉证并治》：“先病水，后经水断，名曰水分”。指先身肿而后月经闭止的疾病。亦名妇人水分。详该条。②经穴名。属经脉。位于腹正中线上，脐上1寸处。

水衣 出谢文详《救产全书》。即胞衣。详该条。

水字形 小儿指诊法十三指形之一。详十三指形条。

水谷利 出《太平圣惠方》第九十三卷。即水谷泻。详该条。

水谷泻 病证名。见《证治准绳·幼科》。又名水谷利。指小儿食物不化，与水液杂下的腹泻。多因脾胃素虚，饮食不慎，以致食物不消化而成。《小儿药证直诀》：

“食不消，脾胃冷，故不能消化，当补脾，益黄散主之。”若其症伴有四肢不温，面白神疲等，治当温中健脾，用理中汤加陈皮、神曲、山楂；肠滑不禁者，用四神丸。

水痘法 人痘接种法之一。取痘痂20~30粒，研为细末，和净水或人乳三、五滴，调匀，用新棉摊薄片，裹所调痘苗在内，捏成枣核样，以线拴之，塞入鼻孔内，12小时后取出。通常至七日发热见痘，为种痘成功。此法为我国古代人痘接种法中效果最好的一种。

水沫疮 病证名。腿间疱疹，因冷水沫后而加重者。《扁鹊心书》：“小儿腿胫间有疮，若以冷水洗之，寒气浸淫，遂成大片，甚至不能步履”为水沫疮。可用葱、椒、姜煎水洗后，再以百花散掺之。

水泻 病证名。见《儒门事亲》。指脾虚湿盛而致泻水样便的证候。脾失健运则湿盛，下注大肠则成水泻。症见面皖神疲，身重懒言，食少纳呆，泻水样便，小便短少。治宜健脾渗湿，用胃苓汤加减。

水毒 病证名。见《小儿卫生总微论方》。凡患疮疡，水入疮中，局部疼痛，水肿，甚或全身发肿的称为水毒。

水痘 病名。见明·蔡维藩《痘疹方论》。是疱疹病毒所致的急性传染病。全年均可发病，以冬、春两季较多。临床以发热，皮肤及粘膜分批出现斑疹、丘疹和疱疹为特征。病机为外感时邪风毒，内蕴湿热，扰于卫分而发。清·马之骥《痘科纂要》描述患儿症见“面赤唇红，眼光如水，咳嗽喷嚏，唾涕稠粘，身热二三不出，明净如水

泡，易出易痂，与痘疮大不相同。”风热夹湿者，宜疏风清热，兼以渗湿，用银翘散加滑石；热毒炽盛者，宜清热解毒，用五味消毒饮加减。发热期间，注意休息，并注意皮肤清洁，勿使抓破皮肤；若已抓破，可用青黛散外扑，助其消炎收敛。

水禁 出《痘疹经验良方》。禁疮之一。痘疮将出，毒气方炽，误食生冷，以致毒停皮肉之间，隐隐有红点，或于头面、两胁、手足之际，发有水泡。如冷气在内，则腹痛腹胀；冷气在外，则发热恶寒，称为水禁。治以温经散寒为主，如肉桂、丁香、升麻、茯苓、大腹皮之类。冷食伤及脾胃者，须防泄泻，再加山楂。

水靨 指痘疮结靨而有脓水溢出者。明·聂尚恒《痘疹慈航》：“痘靨时，有外溃而脓水淋漓者，谓之水靨”。

双生 出南北朝《公羊传》。又名孪生、孖生、双产、骈产、螯孳、孖子。指一胎生二婴。

双产 即双生。详该条。

双身 即妊娠。详该条。

双乳蛾 病证名。见《疮疡全书》。简称双蛾、双鹅。指乳蛾发于喉核双侧者。详乳蛾、双蛾条。

双胎 出《脉经》。亦名双躯、骈胎。指妇人一次怀二胎。

双躯 出《脉经》。即双胎。详该条。

双鹅 即双乳蛾。详该条。

双蛾 病证名。即双乳蛾。《景岳全书·杂证谟》谓喉蛾“盖肿于咽之两旁者，为双蛾”。详乳蛾条。

五 画

〔一〕

玉门 出《脉经》。一指未婚女子的阴

道外口。二泛指阴道外口。

玉门不闭 病证名。见《经效产宝》卷中。即产门不闭。详该条。

玉衡 出《千金要方》卷五。即玉衡。详该条。

玉衡 又名玉衡。婴儿娩出后清洁口腔的一种方法。《千金要方》卷五：“小儿初生，先以棉裹指，拭儿口中舌上青泥恶血，此为之玉衡。”

正产 又名真产。即正常产。杨子建《十产论》：“妇人怀胎十月，忽腰腹作阵疼痛，相次胎气顿陷，至于脐腹痛极，乃至腰间痛重，谷道挺进，继之紫破血出，胎儿遂生，名曰正产”。

甘草法 古代下胎毒法之一。婴儿初生，防止恶汁吸入，清洁口腔，用甘草浓煎去滓，以消毒纱布缠指蘸药拭口，或分数次滴灌口中，经常服用，其毒自解，一年四季无论寒暑，体虚体实皆可用之。

功能性子宫出血 病名。指性腺功能失调而引起的生殖系统无明显器质性病变的子宫出血病。属崩漏范畴。临床可根据月经周期变化，按卵泡期、排卵期、黄体期的不同阶段，结合临床症状辨证治疗。如黄体功能不足者，多伴有脾肾阳虚症状，重在补肾健脾固冲。对淋漓不断，日久不止，子宫内膜剥脱不全，再生缓慢者，可用化瘀生新等法治疗。参见崩漏、月经不调各条。

节瘤 病证名。指疳疾患耳内生疮，肌肉消瘦，骨节皆露的证候。多由肾经虚热所引起。

本脏自病瘥 病证名。小儿瘥病之一，又名虚热瘥。即肝血亏虚而致的瘥证。清·吴鞠通《解儿难》：“肝主血，肝以血为自养，血足则柔，血虚则强，故曰本脏自病。”临床见于温热病后期，因汗多亡血而致。如急性中毒性脑病。治当育阴柔肝，六味地黄丸，复脉汤，三甲复脉汤，大小定风珠皆可选用。

去蛇形 小儿指诊法十三指形之一。详十三指形条。

左歪 偏产的一种。员从云《产科一得》：“临产儿头偏抵左旁也”。相当于左枕

横位。参见偏产条。

右藉 偏产的一种。员从云《产科一得》：“临产儿头偏抵右畔”。相当于右枕横位。参见偏产条。

石人 郑栎庵《女科万全方传灯》：“室女从不通经者，石人也”。参见石女条。

石女 ①出明·万全《广嗣纪要·择配篇》。指阴道狭窄，影响性交与生育。详五不女条。②见《女科万全方传灯》。指女子一生无月经。又名石困、石人、实女。

石困 《竹林寺产科》：“一生经闭，名曰石困”。详石女条。

石淋 病证名。诸淋之一。为小便时茎中疼痛不堪，尿中有物如沙石的淋症。由于湿热下注与膀胱污浊相结，热郁久蓄所致。治宜清热通淋，用八正散加冬葵子、金钱草、石苇等。

石蛾 病证名。见清·吴·张氏《喉科秘旨》卷上。指乳蛾之见于小儿，蛾体较小而无全身症状者。多由气血凝滞所致。症见咽部一侧或两侧喉核发肿成蛾，蛾体较小而硬实，疲劳或吃辛辣煎炒时略有肿痛，饮食不利，经休息或改变饮食后，肿痛能自减退，但不能使硬块消失。如果蛾体过大，妨碍呼吸，应考虑手术摘除。

石瘕 病名。《灵枢·水胀》：“石瘕生于胞中，寒气客于子门，子门闭塞，气不得通，恶血当泻不泻，衄以留止，日以益大，状如怀子，月事不以时下，皆生于女子，可导而下”。多因经期产后胞宫空虚，寒气乘虚侵入，以致血为寒凝，日久结聚成块，逐渐增大。治宜温经行气、活血逐瘀。方用琥珀散或桂枝茯苓丸加减。此症近似子宫口粘连、宫腔积血的病症，可结合手术治疗。

龙门 出《脉经》。指已婚妇女而未经产的阴道外口。

〔1〕

目连割 病证名。眼睑频繁的刮动。又名眼睫连割。《小儿药证直诀》：“凡病或新

或久,皆引肝风,风动而上于目,目属肝,风入于目,上下左右如风吹,不轻不重,儿不能任,故目连割也。”治宜清肝祛风,用柴胡清肝散。如目割面青,食少体倦,为肝气乘脾,宜平肝健脾,用五味异功散加白芍、柴胡、生姜,实者去参,加赤芍、羌活、蝎梢。

目直 证名。指定睛直视。多因风热袭络,肝风内动所致。《小儿药证直诀》:“热入于目,牵其筋脉,两皆俱紧,不能转视,故目直也。”因热者,治宜清肝泻热,用泻青丸;风邪袭络者,宜熄风之剂,如钩藤、桑枝、全蝎之类。

目睛瞬动 见《证治准绳·幼科》。即睛动。见该条。

目矇(giōng 琼) 病证名。出《素问·诊要经终论》。即两目矇矇直视,作徬徨惊顾之状。儿在胎中,孕母骤受大惊卒恐,以致儿袭其气,生后出现目矇,宜按胎惊治之。《儒门事亲》治一儿目矇,目赤多泪,令服瓜蒂散加郁金,上涌下泄,排出涎沫而愈。

四六风 脐风的俗称。详该条。

四时感冒 病证名。见《婴童百问》。为婴幼儿感受四时不正之气而引起的一种外感性疾病。一年四季均有,尤以冬春为多。由于婴幼儿对冷暖调节失宜,加以肌肤嫩弱,腠理空疏,卫外机能不固,故特容易发生。主要为外感时邪病毒,由口鼻而入于肺。肺为娇脏,性喜清肃,外合皮毛,开窍于鼻,邪自口鼻、皮毛而入,肺卫受邪。证见发热,恶寒、鼻塞流涕、喷嚏、咳嗽等。若邪不外达,内闭于肺,可出现气急,鼻煽,导致肺炎喘嗽。小儿脾常不足,肝常有余,感冒以后,每易兼挟乳滞和因高热而易致惊厥。寒重者,宜辛温解表,用葱豉汤、杏苏散加减;热重者,宜辛凉解表,用银翘散、桑菊饮加减。针灸可取合谷、曲池、足三里、内庭等穴。参见伤风、感冒夹食、感冒挟热、感冒挟惊条。

四肢拘挛 证名。感受风邪而致的四肢拘挛症状。《太平圣惠方》:“夫小儿肌肉嫩

弱,易于伤风。风冷中于肌肤,入于经络,搏于筋脉,筋脉得冷则急,故四肢拘挛也。”治宜温经疏风之剂。

出形紫黑 痘疹见形的重证。出元·朱震亨《幼科全书》。痘疮已出见形,当其起发的时候,应视其痘的根窝,以辨别其轻重。如形充肥色红活者,为气血和畅,毒气发越的吉兆。若见形扁而塌,色枯而黑者,此内外毒气壅遏,营气不能流畅所致。其症兼有喘急,躁烦,大便秘结等。治宜解毒活血,用七物升麻丸(《证治准绳》:升麻、犀角、黄芩、朴硝、梔子仁、大黄、淡豉)。若痘点转红活,用紫草饮(紫草、芍药、麻黄、当归、甘草)。如痘点反见于黑者,多属危症。

出瘡发热 指出疹发热。为正气鼓毒外透的病机。清·郑卞年《瘡略》:“出瘡发热,愈壮愈妙,热壮斯能尽透。但须知此热,乃从胃腑中郁蒸而出,断不可误谓表邪,以大开其毛窍。”麻疹在疹出之前,需要发热,因发热可以鼓其邪毒外出。待麻疹全透之后,则其热势不宜过高,过高则伤津耗液,阻碍皮疹的收没。特别是素体阳旺,或夏令出麻,尤应注意。

〔J〕

生下吐 出《小儿药证直诀》。指婴儿出生时咽下秽液,内扰于胃,生后当天或次日多次呕吐。将秽液污染的胃内容物吐净后,可自行缓解。

生后不啼 出《大生要旨》。指婴儿生后不哭。详闷气生条。

生胎 出《本草纲目》丹参条。指在腹中正在成长的胎儿。

失信 病证名。指月经不调。清·潘蔚《女科要略》:“若经血之来,前后多少,有无不一,谓之不调,不调则为失信矣。”

失合症 病证名。见《褚氏遗书·精血篇》。多因妇女由于性欲未遂,久则影响情志所致。症见乍寒乍热,喘嗽,白淫,甚或经闭成癆。治宜舒肝理脾,开郁降火。方用

丹梔逍遥散加减。

失血心痛 见《张氏医通》卷十。即杀血心痛。详该条。

失胎 出《脉经》。即小产。详该条。

乍热 指一阵阵发热。元·滑伯仁《麻症全书》：“乍热有二，一则热数日热止，过数日又作者；一则一日之间，有早发热而午凉，午发热而夜止者。此二者，皆谓之乍热也。”

代甲 出《诸病源候论》卷三十。即代指。详该条。

代指 病证名。出《诸病源候论》卷三十。又名代甲、槽指。指甲两旁及指甲根部化脓性疾病。《太平圣惠方》：“夫小儿代指者，其指先肿，焮焮热痛，其色不黯，然后方始爪甲结脓，剧者，爪甲脱也。……夫爪筋之余也，由筋骨热盛，气涩不通，故结肿生脓而指甲脱也。”治疗以针刺出血后，外敷三黄散，或以天仙子、芙蓉叶、野菊花敷。如脓肿侵至甲下，指甲已经松动或有嵌甲者，均应拔除指甲。

白带 病名。见《千金要方》卷四。亦名带下白候。妇女从阴道经常流出白色粘液，绵绵如带，称为白带。一般在经期前后或妊娠期中，白带量可能略多，属正常生理现象。若量过多有味，并伴有腰腹痠痛等，则属病态。多因脾虚肝郁，湿热之邪下注，带脉失约，任脉不固所致。因于脾虚者，白带量多，兼见神疲，面黄，肢冷，便溏等症。治宜健脾除湿。方用完带汤。因于肝郁者，白带时多时少，兼见精神不畅，头眩，胸闷乳胀等症，治宜疏肝解郁，方用加减逍遥散；湿热下注者，带下有腥臭气味，兼有阴痒，头晕倦怠等症，治宜清热利湿，方用龙胆泻肝汤。此外虚寒、虚热、痰湿等均可引起白带增多。

白带腹痛 病证名。见《竹林女科证治》。多因脾肾阳虚以致白带日久不止，量多，质清稀，脐腹冷痛。治宜温阳止带。方用九气丸（艾叶、牡蛎、龙骨、干姜、当归、吴茱萸、白芍、山药、白石脂）。

白虎候 出《诸病源候论》卷四十八。即白虎证似痼。详该条。

白虎证似痼 病证名。急惊风类证之一。出明·万全《幼科发挥》。《诸病源候论》卷四十八作白虎候。并载“其状身微热，有时啼唤，有时小冷，屈指如数，似风痼，但手足不痲痲耳。”明·万全谓为客忤之轻证。

白面痧 病证名。指麻疹出现皮疹时，而面色苍白者。临床见于伴有高热、大汗或泄泻及体弱的病儿。由中气亏虚，脾阳不运所致。其症以疹点突然隐退或疹透不全，面色苍白，唇及肢端青紫，四肢冰冷为特征。治宜补中益气汤以益气升阳，加紫草、红花以活血通络。见于麻疹并发肺炎而兼感染性休克者。参白麻条。

白脓疮靨 出《颅凶经》。即白脓痢。详该条。

白脓疮痢 病证名。出《颅凶经》。指痢病伴有腹痛，痢下白色，或青蓝色粘液的症状。治法见冷毒痢条。

白脓痢 病证名。见《证治准绳·幼科》。又名白脓疮靨。指小儿肠寒，下利似白脓的痢疾。多见于素体阳虚的小儿。因阳虚者易为寒湿所袭，寒湿内阻，蕴蓄于肠，气机失利，故见此证。治宜温中利气。用胃苓汤。

白痞 出《诸病源候论》卷十八。五痞之一。详五痞条。

白疹 病证名。①出元·滑伯仁《麻证新书》。指麻疹粒头高耸，色红淡润而肤白者。

《临证指南》卷六：“赤疹遇清凉而消，白疹得温暖而解。”参白麻条。②出《温病条辨》。即白痞。风湿郁于经络毛窍，表现为身热、身痛，汗多自利，胸腹白疹，系湿停热郁的证候。宜以辛凉解肌表之热，辛淡渗在里之湿为治。

白陷 五陷之一。《痘疹精详》：“痘出稠密，其色淡白，根无红晕而顶陷者，白陷也。”为气血两虚所致，宜大补气血，用人参养营汤或当归补血汤加味。

白菌 见清·郑若溪《喉白阐微》。即

白喉。详该条。

白崩 病名。出《脉经》。指崩下血内有大量白色液体，质稀如水或如粘胶等。多因忧思过度，劳伤心脾，或因虚冷劳积伤于胞脉所致。劳伤心脾者，兼见心悸气短，失眠，饮食少进。治宜养心安神，健脾。方用平补镇心丹，用人参或龙眼肉汤送服；或用豆花散空腹服；或用《世医得效方》方：棕榈炭、丝瓜络各等分，细末米饮调服。虚冷劳积者，症见虚乏倦怠，形寒畏冷，小腹寒凉，治宜温经补虚，方用金锁正元丹。

白麻 病证名。麻疹的一种证型。又名白疹。《麻证新书》：“麻疹之粒头高耸，色红淡润而肤白者，此肺胃之火原轻。”见于麻疹轻证。如兼面色㿔白，神疲，肢冷，则为正气虚弱，不能载毒外出。治宜益气透疹。用人参败毒散加减。

白疹 病证名。出《千金要方》卷五。指隐疹皮疹色白者。详见隐疹条。

白喉 病名。见《时疫白喉捷要》。又名白缠喉、白菌。系一种急性传染病。流行于秋末冬初，以学龄前儿童发病率最高。《重楼玉钥》：“喉间起白如腐一症，其害甚速，……患此者甚多，惟小儿尤甚，且多传染。”发病多因时行疫疠之毒，从口鼻而入；或肺胃素虚，复感风热，热毒结于咽喉所致。症见咽喉疼痛，吞咽尤甚，继之一侧或两侧喉核处出现白点，白点迅速蔓延，成为乳白色或灰白色边界清楚有光泽之白膜，其白膜迅速蔓延至悬雍垂及喉关内外，白膜不易剥脱，若用力剥除，则易出血，并迅速为新的白膜所覆盖。白膜坚韧不易捣碎。并兼有头痛，身疼，微热，或寒热交作，疲乏，胸闷烦躁，口臭鼻塞。若白膜蔓延至喉关内或会厌下，则呼吸困难，鼻煽唇青，心悸怔忡等。白喉的病理多属阴虚肺燥，宜养阴清肺为主，方用养阴清肺汤。有表证者当先解表；如初起阳热偏盛，症见咽喉痛闭，饮水作呛，目红声嘶，口出臭气者，用神仙活命

汤；若痰火阻塞，喉声如锯，宜清肺降痰，用猴枣散（《中医儿科》：猴枣、川贝母、天竺黄、沉香、朱砂、仙半夏）加土牛膝根、葶苈子、大黄、礞石、竹沥之类。针刺取合谷、少商、天突、足三里、内庭。临床发现病人，应隔离、消毒、报告疫情。

白喉忌表 白喉治法注意事项之一。清·耐修子《白喉治法忌表抉微》认为“（白喉毒邪）一经表散，仅能纷窜于经络之中，而不能透出于皮肤之外，愈入愈深，有入无出”，因而提出养阴清肺的治法。其实忌表仅适用于肺燥无表证者。《白喉条辨》：“白喉为太阴肺经伏燥，苟无时邪感触，自不宜无故表散，……若确属挟有时感表证者，则解表自难容缓。”在临床上白喉初起挟温热者，辛凉解表，可用薄荷、荷叶、连翘、银花之类；挟风寒者，辛温发散，如麻黄、紫苏等皆可酌用，绝不可拘泥于忌表。参见白喉条。

白痢 病证名。《幼科全书》：“凡白痢者，湿热伤在气分，从大肠中而来也。”症见便下白色粘脓，腹胀乍热，里急后重。治宜散寒化湿。用藿香正气散，或平胃合香连丸。如渴而小便不利，利仍不止，则为脾气虚弱，不能制湿，泛滥皮肤而成水肿，治宜健脾利水，用五苓散加减。

白痞 病证名。出《温热经纬》。又名白疹。系一种细小水泡状呈水晶色而莹亮的疹子。多见于颈项与胸腹部，头面四肢却很少见。由湿热之邪留恋气分，稽留难解，郁蒸肌肤酝酿而成。所以白痞多见于湿温及温热挟湿之证，每随热与汗而出。未出之前，由于湿郁热蒸，往往胸闷无奈；既出之后，因邪有外达之机，则胸闷可舒。凡白痞晶莹饱满，颗粒分清，为津气俱足，正能胜邪，邪得外达。反之，若色白如枯骨，空壳无液，则为津气俱竭，正不胜邪的表现。治以透热化湿，宣畅气机为主，若津气俱竭者，则急宜养阴益气。

白缠喉 见《重楼玉钥》。即白喉。详该条。

白漏 病名。出《千金要方》卷四。指经血漏下挟有白色液体，淋漓不断者为白漏。多因脾肺气虚所致。《诸病源候论》卷三十八：“劳伤血气，冲任之脉皆起于胞内，为经脉之海，手太阳、少阴二经，主下为月水，伤损经血，冲任之气虚，故血非时而下，淋漓不断而成漏下，五脏皆禀血气，肺脏之色白，漏下白者，是肺脏之虚损，故漏下而挟白色也”。治宜补益脾肺。方用补中益气丸、人参养荣汤，或用马蹄圆（白马蹄、禹余粮，各四两，龙骨三两，乌贼骨、白僵蚕、赤石脂各二两，共为细末，蜜小丸，每服二、三钱，空心黄酒送下）。

外阴炎 病名。外阴部炎症，局部皮肤红、肿、热、痛，甚至溃疡，起脓泡，分泌物增多。若慢性炎症可使皮肤增厚或有皲裂。多因肝经湿热下注所致。属带下、阴痒、阴疮范畴。宜清肝泻火利湿。用龙胆泻肝汤加减。外用熏洗药方：苦参、川椒、蛇床子、黄柏、枯矾、百部。

外阴白斑 病名。是指外阴局部或弥漫性皮肤干燥，肥厚变白，角化并失去弹性，甚至萎缩破溃，伴有奇痒及疼痛，白带多等症状。临床病理检查有非典型细胞增生者称为外阴白斑。一般多属为外阴白色病损。根据临床证候，属阴痒及带下病范畴。可外用熏洗方：蛇床子、鸡血藤、白鲜皮、土槿皮、野菊花、仙灵脾各50克，泽泻、艾叶、苦参各25克，花椒20克，冰片1.5克煎汤熏洗。白斑洗方：生川乌200克，生草乌200克，蛇床子150克，苦参150克，艾叶50克，用八斤水煎至四斤，再加白矾150克，卤水一斤二两，再煎至二斤，局部外用。

外阴搔痒 即阴痒。详该条。

外伤滑胎 病证名。指孕妇由外伤造成的滑胎。怀孕后跌扑闪挫，或过劳及房室不节，直接损伤冲任，致使胎动，又有滑坠之势。症见腰痠腹痛，胎动不安，或阴道少量流血。当扶气养血安胎，预防滑坠，方用八

珍汤加减。

外肾肿硬 病证名。又名阴肿。指阴囊肿硬。多因小儿坐卧湿地，湿浊风邪与气血相搏而成。《婴童百问》：“小儿外肾肿大，茎物通明，牡蛎粉研极细，鸡子清调敷为佳。”参见脱囊、阴肿、疝气条。

外疳 病证名。出《小儿药证直诀》。指疳疾外现于五官的证型。疳病新起的症状，外现于目、鼻、口齿等部位。《证治准绳》：“鼻下赤烂自揉，鼻头上有疮，渐绕耳生疮。今分走马疳，口齿疳，鼻疳，眼疳等。”

孕 出《素问·骨空论》。即妊娠。详该条。

孕妇尿出 病证名。见杨志一《生育问题》。即妊娠遗尿。详该条。

孕珠 出《五十朋赋》。指怀孕之始。

孕痛 病名。见《校注妇人良方》卷十五。指孕妇腹内生痛。宜用千金牡丹皮散，或神效括萎散。用药时除防止坠胎外，应按内痛治疗。

孕悲 病证名。清·永思堂主人《胎产合璧》：“孕妇脏躁，无故悲泣，名曰孕悲”。参见脏躁条。

〔、〕

讨盐生 旧病名。《女科辑要》卷五：“儿手先出者，名曰讨盐生”。相传产时儿手先下，产婆以盐半分涂儿手心，儿手即缩回，故名讨盐生。相当于横产。此法现已废用。参见横产条。

立迟 五迟之一。小儿周岁以后，不能自己站立的病证。肝主筋，肾主骨，小儿肝肾不足，或哺养失宜，影响筋骨的发育，以致膝盖骨软弱，足胫无力，不能自立。治宜滋补肝肾。用六味地黄丸加枸杞、鹿角胶、当归、白芍之类。

闪跌血崩 病证名。见《傅青主女科》。多因登高跌坠，或闪挫受伤，损及冲任，恶血下流，以致突然阴道出血量多，色鲜红或

黑黯有块，腹部按之疼痛。治宜行血祛瘀。方用逐瘀止血汤，或用七厘散、益母膏等。

半生 出《脉经》。即小产。详该条。

半产 出《金匱要略·妇人妊娠病脉证并治》。即小产。详该条。

半产下血不止 病证名。多因堕胎复损胞脉或瘀血残留所致。治宜调补胃气为主。如脾虚者兼见食少纳呆，脘腹饱闷，方用四君子汤加当归、熟地；胃气下陷者，兼见痞满，小腹下坠，方用补中益气汤；因瘀血残留所致者，兼见下血色暗有块，临床应注意有否胎盘残留，如属残留，可按胞衣不下处理或结合手术治疗。参见崩漏、恶露不绝条。

半产胞衣不下 病证名。半产即小产。指由于小产造成的胞衣不下。参见胞衣不下条。

半产恶露不下 病证名。半产即小产。指由于小产造成的恶露不下。参见产后恶露不下条。

半产腹痛 病证名。半产即小产。指由于小产造成的腹痛。参见产后腹痛条。

半阴阳 见杨志一《生育问题》。指生殖器发育畸形。即雌雄人。详该条。

头不生发 病证名。见《普济方》卷三百六十三。发乃血之余，小儿头不生发，或因病后秃落，皆因伤其气血，气血损少，不能荣于发，故令发不生。治宜补益气血之剂，如八珍汤加巨胜子之类。

头汗 病证名。①小儿体质虚弱，头部汗出，《小儿药证直诀》：“上至头，下至项，不过胸，为太阳虚汗。”②阳明热郁发黄的先兆。《伤寒论》：“阳明病发热汗出，此为热越，不能发黄也。但头汗出，而身无汗，剂颈而还，小便不利，渴引水浆者，此为瘀热在里，身必发黄，茵陈蒿汤主之。”③汗出只在头部，以阳明热证和湿热证多见，因热郁于内，不得四散，循经上越，内热退则汗自止。肺热亦多头汗，用桑叶、桑枝清之。

④小儿睡时惯常头汗，无其他症状，不属病

象，俗呼蒸笼头（《中医临证备要》）。⑤六阳虚汗。详该条。

头软 五软之一。头为诸阳之会。小儿先天胎禀不足，肾之阳虚髓弱，后天营养不良，脾之清阳不升，故头软不能抬举。治宜温肾补脾，益气升阳。用补中益气汤兼服补肾地黄丸。

〔七〕

奶痞 出《婴童百问》。即脾痞。详该条。

奶疹子 病名。婴幼儿发疹性疾病。《证治准绳·幼科》：“小儿有出一、二次者，出轻而日数少者，名奶疹子。”如风疹、幼儿急疹等。

奶麻 病名。又名胎麻、奶麻子。《麻证新书》：“奶麻者，小儿初生未满月时，遍身红点，斑驳如珠，皆由儿在母胎中，受有热毒所致。故生下散见于皮肤，不可认作时行麻疹。”奶麻与幼儿急疹相似，治宜清热疏风解毒，用银翘散加减。

奶麻子 出《痘疹精详》。即奶麻。详该条。

奶癖 病证名。①出《儒门事亲》。即乳痈癖。详该条。②《证治准绳·幼科》：“壅乳成奶癖。”参见壅乳条。③即乳癖。详该条。

奶癣 病证名。见《外科正宗》卷十一。又名乳癖。多为胎中血热或感受风邪所致。表现为头顶或眉端痒起白屑，甚至皮肤起粟，搔痒无度，黄水浸淫，遍及全身。治宜清热凉血，祛风止痒。用四物汤或消风散加减，外用黄柏末干渗或香油调涂。

发迟 五迟之一。小儿初生无发，日久不长，长亦稀疏萎黄的病证。发乃血之余，小儿所禀于先天的血气不足，不能上荣于发，故头发不生。治以补血为主。宜胡麻丸。

发泉 见《医说》。指指缝中因搔痒，成疮，血溅出不止者。

发惊潮搐 病证名。出《儒门事亲》。

指小儿三、五岁或至十余岁,突然发生惊怖,目瞪喘急,涎如拽锯,不省人事,抽搐如潮发

作。其症轻则为惊吊,重则为痫病。似即原发性癫痫。

六 画

〔一〕

老妇血崩 见《傅青主女科》。即年老血崩。详该条。

老妇行经 指妇女年过五十岁后,仍然行经者。如身体无病为气血盛实有余。若经来较频,或一月二、三次,血量反见增多者,属于病态。多因气虚,肝肾不足,冲任虚损,血失统摄所致。治宜补气养血、大补肝肾。方用安老汤。并应注意癌变的可能。

老鼠胎 病证名。缪慎斋《妇女卫生医药常识》:“更有初孕时一、二月中,经水仍来,来而色淡不多者,名曰垢胎,俗云老鼠胎”。即激经。参见激经条。

地丁肿 病证名。地丁(即悬雍垂)红肿肿痛。为心火上炎,血热为患所致。病之初起,地丁微红,逐渐肿大,继而色鲜红,肿甚而热痛,啼叫不安,妨碍吮乳、吞咽和呼吸,并有窒息的危险。治宜泻火解毒,用犀角、连翘、黄连、大青叶、竹叶、莲子心、灯心煎汤,频频服之。

耳沁 病证名。出明·秦景明《幼科金针》。指小儿耳内肿痛之症。多由内有风热,复有水入耳所致。症见寒热交作,大哭不已,睡中惊啼,察其耳窍,焮红而肿。治宜清泄肝热。用梔子清肝汤(《医宗金鉴》:山梔、川芎、柴胡、当归、白芍、丹皮、甘草、石膏、牛蒡子、黄芩、黄连)。

耳疮 病证名。指小儿耳周生疮湿烂。《诸病源候论》卷五十:“生于小儿两耳,时瘥时发,亦有脓汁,此是风湿搏于气血所生。世亦呼之为月食疮也”。参见旋耳疮条。

耳聩 见《医贯》。即聾耳。详该条。

耳痛 耳部感受毒邪而致肿痛的化脓性病证。多由肝胃毒火上炎所致。痛生于耳,红肿疼痛。《证治准绳》:“若寒热间作,内外红肿疼痛日增者为耳痛”。治宜解毒泻火,消肿止痛。用仙方活命饮、五味消毒饮等加減。

耳溃 病证名。耳中溃烂有少量脓液。《幼科金针》:“小儿肾经气热,其气上冲耳中,水湿停留,搏于气血而成。发无寒热,不哭不知者,为耳溃,久而不治,恐成耳聋。先以棉球取出其脓,宜红绵龙骨散吹入。”

百日儿疳 病名。出《本草纲目》。百日内婴儿患疳。清·叶天士《幼科要略》谓“疳因暑发居多”,“幼稚之疳,都因脾胃受病,然气怯神弱,初病惊痫、厥逆为多。”临床上婴儿疳疾急性发作无定型。可无寒战症状,或仅见四肢厥逆,面白唇紫,到发热时才被发觉。有的发热也不显著,或仅有躯干灼热,四肢反觉冰冷,出汗很多。有的呕吐,泄泻,脾脏肿大,腹部拒按。初起以清热截疳为主,可用青蒿、常山加入适当方中。

百日内嗽 出《幼科发挥》。即百晬内嗽。详该条。

百日咳 病名。又名顿咳,时行顿咳,天哮,疫咳,迫咳,俗称天哮呛、鹭鸶咳、鸡咳。是一种流传冬春季的传染病,以五岁以下的小儿为多见。《医学正传》:“咳嗽俗名呛,连咳则头倾胸曲,甚则手足痉挛,痰从口出,涕泣相随……小儿患此,谓之时行顿咳。”主要是由于时行疫毒犯肺,肺气不宣,气郁化热,酿液成痰,阻于气

道，气机上逆而成。临床以阵发性、痉挛性咳嗽和痉咳后有特殊的吸气性回声为特征。邪热恋肺，损伤肺络，则可引起咳血或衄血。初起邪袭肺胃，宜宣肺散邪，用止嗽散，射干麻黄汤、三拗汤化裁；中期邪热恋肺，宜清热宣肺，用麻杏石甘汤、五虎汤、泻白散加减；日久肺胃阴伤，咳血者，宜清燥润肺，用清燥救肺汤、阿胶散；肺脾气虚，宜健脾和中，养肺止咳，用人参五味子汤（《幼幼集成》：人参、麦冬、五味子、茯苓、白术、生姜、大枣、甘草）。鹭鸶涎丸、鸡苦胆等也可选用。

百日疮 病名。①见《医宗金鉴·痘疹心法要诀》。即小儿出生后百日内出现的痘疹。详痘疹条。②见清·谈金章《诚书痘疹》。即痘疮。详痘疮条。

百晬（zuì 醉）内嗽 病名。出《幼科发挥》。又名百日内嗽、乳嗽、胎嗽。指婴儿出生百日内出现的气憋、痰嗽。主要是由于外感风寒、湿热之邪，郁于肺卫，聚液成痰，痰热阻肺，肺失肃降，气机逆乱所致。临床以发病急，变化快，由肺累及心肝，虚实互见，发热、气粗痰盛、呕吐、烦躁、呛奶，呼吸迫促等为特征。类似支气管炎、毛细支气管炎。一般轻证以清热宣肺，豁痰为治，用麻杏石甘汤合泻白散加银花、连翘；重症者喘憋加重，口围发绀，宜解毒，平喘，化痰，用射干麻黄汤加减；高热惊厥，用羚角钩藤汤、紫雪丹；心阳不振，宜参附汤、人参四逆汤化裁为治。必要时可用中西医两法结合治疗。

有子 即妊娠。《素问·阴阳别论》：“阴搏阳别，谓之有子”。

有身 出《诗经·大雅》。即妊娠。妇人以身中复有一身，故名。

有妊 即妊娠。详该条。

有娠 即妊娠。《脉经》：“三部脉沉浮正等，按之无绝者，有娠也”。

灰陷 五陷之一。指痘出稠密，其色如

灰，根脚无红晕而顶陷者，为气血大虚所致。治法详白陷条。

达生 见函斋居士《达生篇》。达，小羊。羊子易生而无留难，故古人以顺利分娩谓达生。

死舌 病证名。即木舌。《焦氏喉科枕秘》：“死舌名木舌，坚硬不能舒。”参木舌条。

死胎 即胎死腹中。详该条。

死胎不下 病证名。又名胎死不下。指胎儿死于母腹后，日久不能自行产出者。可发生于妊娠期和临产时。多因妊妇气血虚弱，胞宫无力娩出胎儿；或胞宫瘀血阻滞，不能送胎外出所致。气血虚弱者，症见腹部不继续增大，仅微有缩小，阴道流出淡红色血水；或口有恶臭，精神疲倦，面色黄白，纳呆等。治宜补气益血，佐以下胎方，用疗儿散。瘀血阻滞者，症见胎动停止，阴道流紫黑色血液，口气恶臭或临产胎死腹中，腰腹胀急，胸满喘闷，面色青暗，治宜行血祛瘀，方用脱花煎。另外可根据产妇之虚实，病势之缓急，采用佛手散缓下，平胃散加芒硝峻下，或据王肯堂寒者热以行之，热者凉以行之，燥者滑以润之，危急者毒以下之的原则，斟酌治法。

死产 病名。戴武承《女科指南集》：“死产者，临产时胎死腹中也。”参见胎死腹中条。

夹口疮 病证名。见《疡医大全》。即剪口疮。详该条。

夹冷痛 病证名。见《幼幼集成》。多因脾气虚寒，伤于冷食所致。其症面色或青或白，冷甚者，面色暗淡，唇口爪甲皆青，为脾气虚寒之极。治宜温脾散寒。轻证用当归散（当归、肉桂、人参、炙甘草、木香）；重证用烧脾散（炮姜、厚朴、砂仁、神曲、麦芽、广皮、炙甘草、草薢仁、高良姜）。亦可取中脘、天枢、关元、足三里针刺加艾灸。

夹热痛 见《幼幼集成》。即挟热腹痛。详该条。

夹热腹痛 病证名。见《幼幼集成》。又名挟热痛。小儿热邪内积、气机不畅而致的腹痛。症见腹痛伴有面赤唇红，壮热烦躁、手足心热、多发于夜。治宜清热理气。用四顺清凉饮（白芍、当归、大黄、甘草）加青皮、枳壳，亦可针刺行间、太冲、合谷等穴。

夹疹痢 出《医宗金鉴·痘疹心法要诀》。即麻疹作痢。详该条。

夹惊吐 见《证治准绳·幼科》。即惊吐。见该条。

过食生冷经闭 病证名。《竹林女科证治》：“妇人行经时及产后，过食生冷之物而血闭发热，以血见水即滞故也。初起一、二月生寒发热，五心烦躁，口苦舌干，面色青黄，犹易医治。先用逍遥散退其寒热，后用紫金丸（三棱、莪术、良姜、枳壳、乌药、砂仁、槟榔、陈皮、红豆蔻、香附、苍术，共细末，糊小丸，每服二钱），渐纳谷气，脾胃一旺，自然经血流通……”。

过期经行 见《竹林女科证治》。即经行后期。详该条。

过期流产 病名。指怀孕后，胚胎死亡已超过一、二个月，仍稽留在子宫腔内，子宫增大与原妊娠月份不符，有时伴有阴道流血或有褐色分泌物，尿妊娠试验为阴性者。即死胎不下。多因气血虚弱或气滞血瘀。气虚不能使其胎娩出；气滞，气机不畅，影响死胎下行。治宜活血行滞祛瘀，引胎下行。方用《景岳全书》脱花煎加減，或用平胃散加芒硝。

邪干心痛暗 病证名。指小儿因寒邪干心作痛而啼。《普济方》卷三百六十一：“小儿禀受虚怯，厥气上逆，痞而不散，故发心痛而啼也。”治以散寒开窍为主。用苏合香丸。

〔一〕

壮热 病证名。出《诸病源候论》卷四十五。一向热而不止为壮热。《证治准绳·幼科》：“壮热者，一向不止，由气血壅实，五脏发热，蒸熨于内，则眠卧不安，精神恍惚；熏发于外，则表里俱热，烦躁喘粗，甚则发惊痫也。”壮热可见于各种急性感染性疾病。此外，亦有乳食不化，郁而为热，蒸发于外，以致壮热，口干，烦渴者。

早晨发搐 病证名。出《小儿药证直诀》。因早晨潮热引起抽搐。由肝旺所致者，临床特点为每逢寅、卯时身体壮热，目上视，手足动摇，口内生热涎，颈项拘急。当补肾治肝。补肾，用地黄丸；治肝，用泻青丸。

吐舌 病证名。见明·薛铠《保婴撮要》。又名舌舒。指患儿舌头不断地伸出口外，伸出较长而缩回较慢或久而不收者。与随露随收之弄舌，有所区别。舌乃心之苗，心经有热，引起舌头干涩而紧，故时时吐出，以图舒缓。临床上不仅有吐舌的表现，而且还有面红烦渴，小便赤涩等心热症状。治以清心泻热为主。用泻心导赤汤。

吐泻互作 病证名。《幼科发挥》：“吐出上焦，泻出下焦，乃肠胃之病也。脾在中焦，管摄乎上下之间，吐泻互作者，乃脾之病也。”夏秋吐泻，饮水身热者，多属脾胃湿热，治以健脾化湿为主，宜胃苓汤加減；秋冬吐泻，面皓白，足胫冷者，多属寒湿困脾，治以温中健脾为主。宜理中汤、益黄散。

吐泻生风 病证名。指长期呕吐、腹泄不止，引起脾虚而致的慢惊风。《幼科发挥》：“久泻不止，津液消耗，脾胃倒败，下之谷亡，必成慢惊，所谓脾虚则吐泻生风是也。”临床可见于中毒性消化不良的酸中毒病者。治以益胃养津为主。用参苓白术散加減。

吐乳泻膏 病证名。出《小儿药证直诀》。

指婴儿吐乳而兼腹泻，且排泄物呈青色的证候。多因患儿感受寒邪，伤及脾胃，肝气逆乱，上扰于胃则吐乳，下扰于肠则泻青。治宜补脾平肝。用异功散加肉桂、白芍。

吐乳泻黄 病证名。出《小儿药证直诀》。指婴儿吐乳而兼腹泻，且排泄物呈黄色而臭的证候。因伤热乳引起胃肠积热所致。治宜清肠和胃。用黄芩汤加减。

吐蛔痧 病证名。即蛔虫病儿感染痧毒而致吐蛔之证。小儿素患蛔虫病，因痧毒入胃，胃必热胀，热胀之极，蛔不能存，因而上涌，乘吐而出。此与伤寒吐蛔，伏阴在内者不同。宜用消毒三棱针刺臍弯、臂弯痧筋上，流出紫黑毒血；另用香附、陈皮、木香、砂仁、莱菔子、山楂、槟榔之属煎汤，稍冷饮之，以散痧消胀而降逆（《痧胀玉衡》）。

虫吐 病证名。因肠道蛔虫上扰于胃而致的呕吐。多因胃经火逆或者寒迫，以致虫动不安扰胃上逆。呕吐大多为清稀涎沫，兼伴有腹部时痛时止等。如因胃热而起者，则面色口唇红赤；如因胃寒而起者，则面色大多青白。热则清胃安蛔，用温胆汤加黄连、乌梅；寒则温胃安蛔，用理中汤去甘草，加乌梅、川椒。蛔安吐止，再服使君子、苦楝等以驱虫。

虫积 病证名。积痛之一。常见于四岁以上的小儿。多因食物不洁，损伤胃气，以致胃气虚寒，虫动作痛。临床表现以心腹疼痛发作有时，口吐清水涎沫，啼哭不安，目无精光，面色变易不常为特征。治宜安虫止痛。用乌梅煎水，磨槟榔，取汁喂服。

虫积经闭 病证名。见顾膺陀《妇科集》。指因虫积而致经闭者。由于虫积于内，耗血伤阴，以致无血下达而成经闭之症。治宜驱虫为主，继以补血养血。用《妇科集》雄砂丸、万应丸。

虫竅似痼 病证名。急惊风类证之一。指蛔虫扰及胆胃而致剑突下剧痛，伴有口噤

或哭叫的证候。《幼科发挥》：“虫病乃虬虫攻其心痛也。发则目直视，口噤不言，或大叫哭，口中流沫涎水，面色或青或白，手足强直，宜急攻之。”一般可服化虫丸。

虫蛔癆 病证名。出明·缪存济《识病捷法》。指肠寄生虫病（如蛔虫、钩虫等），久而不愈，肌肉消瘦，嗜异，腹部胀大而青筋贯于小腹者。治以理虚驱虫，攻补兼施为主，如理中安蛔汤加减。

虫病 病证名。因寄生虫（如囊虫等）引起的痛证。《本草纲目》：“胃寒，虫上诸证，危恶与痢相似，用白芨黄，干漆烧存性等分为末，米饮调服。”

吊茄子 即子宫脱垂之俗名。详子宫脱垂条。

回乳 见《本草纲目》卷四。因产妇血气旺盛，乳房作胀，又无儿食乳而须回乳者，以炒麦芽100克水煎频服。参见断乳条。

回浆 见清·翟良《痘科类编释意》。为收靥时发热的证候。详收靥条。

〔 〕

年未老经水断 病证名。见《傅青主女科》。指年未届绝经期而月经断绝。多因素体虚弱，营养不良，或早婚、产多、乳众等，耗伤精血，肾气、天癸虚衰，或忧思劳伤心脾，阴血暗耗，以致脏腑、冲任血亏失养，无血下达。肾虚者，症见面色晦黯，头晕耳鸣，腰膝痠软等，治宜补肾益精，养阴调经，方用左归饮、当归地黄饮、六味地黄丸等；血亏者，症见面色萎黄，皮肤不润，饮食日少，精神虚惫等，治宜补血养阴，扶脾宁心，方用益经汤、十全大补汤、归脾丸等。

年老血崩 病证名。见《傅青主女科》。亦名老妇血崩，俗名血海败。指年老经断前后而患血崩之症。多因肾气、天癸已将衰竭，身体虚弱，如因肝脾损伤，血失藏摄，或房室不慎而动命门之火，气郁而动肝火，迫血妄行，冲任胞宫失于约制，而发为血

崩。治宜先用加味当归补血汤（当归、黄芪、汉三七、桑叶），后补益肝肾健脾，方用安老汤，或用白术、熟地、山药、麦门冬、五味子以补精血。同时应作妇科检查，防止癌变可能。

年老经水复行 病证名。见《傅青主女科》。指妇人年五十外或六、七十岁，本已绝经而忽然又再行经者。多因肝脾损伤，血失藏摄，或精伤而动命门之火，气郁而肝火妄动，两火交并迫血妄行所致。证见下血色紫有块。治宜补益肝肾健脾。方用安老汤加贯众炭末冲服。同时应作妇科检查，防止癌变可能。

先天红铅 见《本草纲目》。①指女子第一次来的月经。②中药名。古代有以初潮之月经，干燥后取其粉末而入药。

先兆子痫 病名。妊娠24周后，出现水肿，高血压，蛋白尿，并兼有头痛，眩晕，呕吐，眼花，上腹不适，视力障碍或血压收缩压在160毫米汞柱以上者称为先兆子痫。多因平素肾阴虚，妊娠后肾阴更虚，肝阳上亢，或阴损及阳，脾肾阳虚，或肝郁化热等所致。肝阳上亢而见头晕目眩，血压升高者，宜滋肾益阴，平肝潜阳，用钩藤汤（《证治准绳》：杜仲、牛膝、菊花、黄芩、桑寄生、白芍、天麻、钩藤、蝉退）；若阴损及阳，脾肾阳虚而发生水肿者，宜健脾利湿消肿，用茯苓导水汤；若肝郁化热兼见口苦咽干目眩者，宜清热平肝潜阳，用羚羊钩藤汤。参见妊娠眩晕条。

先兆流产 病名。指妊娠期伴有腰腹部疼痛下坠，阴道少量流血，宫口未开，尿妊娠试验阳性者为先兆流产。治疗见胎动不安、胎动下血条。

廷孔毒 病证名。谢观《中国医学大辞典》：“因肝火郁结，或交合损伤，而致子宫肿痛溃烂。宜用海浮散油调灌入，仰卧良久，再换玉红膏调海浮散以绵润透塞入”。按廷孔一般指尿道外口而言，本病类似宫颈

糜烂。

舌上疮 病证名。舌上生疮，溃烂。《诸病源候论》卷五十：“心候于舌，若心脏有热，则舌上生疮也。”治宜清心解毒。用导赤散加银花、连翘、穿心莲内服；外用锡类散撒布疮面。

舌肿 病证名。指舌体肿大，见于舌炎。《诸病源候论》卷五十：“心候舌，脾之络脉出舌下，心脾俱热，气发于口，故舌肿也。”治以清心脾之热为主。用导赤散加黄连、梔子。

舌卷 病证名。出《素问》脉要精微论、缪刺论等篇。指舌本卷曲而难伸。少阴之脉系舌本，连舌下，故舌卷以心肾二经之病居多。参见舌卷卵缩条。

舌卷卵缩 病证名。又名舌卷囊缩。指上则舌卷曲不伸，下则阴囊收缩不下。《灵枢·经脉篇》：“足厥阴气绝则筋绝，厥阴者肝脉也，肝者筋之合也，筋者，聚于阴器，而脉络于舌本也，故脉弗荣则筋急，筋急则引舌与卵，故唇青舌卷卵缩则筋先死。”《素问·奇病论》：“少阴之脉，贯肾系舌本”。故舌卷卵缩，为心、肝、肾三经受病所致，同时，标志着病情危重。辨证有寒热之分。因阳明热盛，邪传厥阴所致者，宜急下存阴，用大承气汤；因寒邪直中少阴、厥阴所致者，宜温经回阳，用四逆汤等。参舌卷囊缩条。

舌卷囊缩 病证名。即舌卷卵缩。《赤水玄珠》卷三：“肝脉亦络舌本，故伤寒邪热传至厥阴经则舌卷囊缩”。详舌卷卵缩条。

舌衄 病证名。即舌上出血。《诸病源候论》卷二十七：“心主血脉而候于舌，若心脏有热，则舌上出血如涌泉。”元·王东野《王氏集验方》谓“肝家热壅”为“舌衄病源”。心热者，治宜凉血止血，用犀角地黄汤、十灰散加减；肝肾阴虚，虚火上炎，治宜滋阴凉血，用知柏地黄汤加减。外治可用五倍子熬浓汁，纱布浸湿紧塞口中，或用蒲

黄散(元·僧继洪《澹寮集验方》:乌贼鱼骨、蒲黄研末)或槐花末、血余炭末涂舌上。

舌笋 病证名。见《串雅内编》。小儿舌上起白泡一粒,名舌笋,因妨碍吮乳,故令啼哭不止。宜以鲜生地取汁,涂患处。

舌黄鹅口 出《证治准绳·幼科》。即木舌。见该条。

舌舒 出明·薛铠《保婴撮要》。即吐舌。见该条。

舌殿风 病证名。出明·周慎斋《幼科指南》。为初生儿舌上发黄泡出水,乃胎毒所致。治用大螺丝炒研,拌入雄黄、灯心灰涂之。

休息痢 病名。又名休惜痢。《小儿卫生总微论方》:“谓下血黑暗中有白物,如肠中之脂或如烂鱼肠之状,亦名休息者,谓患即无休息而至死也。此肠胃溃疡,患者更休爱惜,故以名之。”临床表现为久痢不止,时发时瘥,治疗不当,以致毒邪留连肠道,损伤气血而成。治宜利气和血。用和中丸,忌收涩之剂。

休惜痢 出《小儿卫生总微论方》。即休息痢。见该条。

伍耳 病证名。出《证治准绳·杂病》。即耳中痞臭。多由湿热相搏,上冲于耳而成。治宜清热燥湿,用交感丹(《证治准绳》:香附子、茯神、黄连、桂心、甘菊花)。参见脓耳条。

伏暑吐泻 病证名。见《小儿卫生总微论》。古人认为夏季大热,感受暑邪,伏于肠胃,而不即时发病,待秋气候凉爽,感受外邪,引动伏暑,乱于肠胃,清浊相干,则成吐泻。其症突然呕吐,腹泻,小便不利,泻下物色黄或赤等。治宜清暑解毒,调和肠胃为主。

任主胞胎 出《素问·上古天真论》王冰注。指任脉主女子的胞宫与胎孕。《类经·任冲督脉为病》:“任脉者,女子得之以养任也”。女子十四五岁左右,任脉气通,

冲脉血盛,则月经正常,婚后即能孕育。反之,任脉不足,则经、带、胎孕亦因之出现病变。

任娠 出《诸病源候论》卷四十一。即妊娠。详该条。

伤风 病证名。为感受风邪而引起的外感急性病。风邪外袭皮毛,肺气不能宣达,致使肺气不利。症见发热怕冷,头痛有汗,不时喷嚏,鼻塞流涕,咳嗽声重等。治以解表祛邪为主。如表邪重者,宜疏风散邪,用杏苏散;若咳嗽声重,肺气不畅者,宜疏利肺气,用止嗽散。

伤风发痉 病证名。因伤风而发痉者。风邪郁于太阳经络,不得疏泄,阻于经络而致痉。症见发热、头痛而身不痛,有汗,或鼻鸣,干呕,四肢搐搦,目上视,手足牵动有力,脉来浮缓。治宜祛风和营卫,用桂枝汤;如兼有伤食腹痛,宜天保采薇汤(清·庄一夔《惊风辨证必读书·治验录》)。

伤风吐 病证名。感受风冷而致吐者。多因小儿调护失宜,风冷袭之,搏于血气,气不得顺,故逆上呕吐。《保幼大全》载其症为“吐逆身热,鼻青呵欠顿闷,口中气热,夜间发躁”等。治宜调气止吐,发散风冷。用藿香正气散。

伤风吐泻 病证名。感受风寒而引起的吐泻。《小儿卫生总微论方》:“伤风吐泻,身温,乍凉乍热,呵欠烦闷,多睡,口中气粗。”治宜驱散风寒,调和脾胃。用藿香正气散加减。《小儿药证直诀》分:①伤风吐泻身热。症见身热多睡,能乳食,呵欠烦闷,口中气热,饮水不止,吐痰,大便黄水。治宜生津散邪。用七味白术散加味。②伤风吐泻身凉。症见吐泻,身凉,昏睡露睛,吐沫,泻青白色,不渴等。治宜健脾益气,温经回阳。用益黄散,或理中汤加减。

伤风自利 病证名。出《小儿药证直诀》。指外感风邪后出现泄利。多因脾胃嫩弱,感受风邪,肺气上逆,脾失运化所致。

其症以怕冷鼻塞，咳嗽气促而泄泻为特征。治宜疏散外风，调理脾气。用人参败毒散。

伤风后发搐 病证名。伤风后引起的抽搐。《小儿药证直诀》：“伤风后得之，口中气出热，呵欠顿闷，手足动摇。”多由患儿素禀胎元不足，外感风寒，邪扰经络而引起。治宜发散风寒，舒经活络。

伤风嗽 病证名。出《小儿药证直诀》。感受风邪袭于肺卫而致的咳嗽。清·叶天士《幼科要略》：“若果暴凉外束，身热痰嗽，只宜葱豉汤，或苏梗、前胡、杏仁、枳、桔之属，仅一、二剂即可。”

伤风嗽吐 病证名。指小儿伤风咳嗽而吐痰涎的证候。多由风邪入于肺胃，入里化热，灼液成痰，痰结胸中，以致肺气不宣而成。《幼科金针》：“伤风嗽吐者，寒气滞于胸中，肺气不顺，连嗽不止而吐也。”常伴有发热、恶寒等全身症状。热重口渴者，宜清宣和胃，用桑菊饮合泻白散加减；恶寒，口中气冷者，宜温散降逆，用止嗽散加减。

伤产 病名。①杨子建《十产论》：“伤产者，言怀胎未足月，有所伤动，以致忽然脐腹疼痛，或服催药过早，或产母用力太早，逼儿错路，不能正生”。②汪嘉謨《胎产辑萃》指过月而产。

伤冷乳 病证名。指冷乳伤胃而致的吐泻。《幼科发挥》：“伤冷乳者，所出清冷，面晄白者是也。”临床多伴有四肢冷，口不渴等。治以温中化滞为主。宜益黄散，煨生姜煎汤调服。

伤乳 出《丹溪心法》。即乳积。详该条。

伤乳吐 病证名。又名嗌乳。乳哺儿常见病。《证治准绳·幼科》：“伤乳吐，才乳哺后即吐，或少停而吐，此因乳饮无度，脾气弱不能运化，故有此证。”治宜节制乳食，并服健脾消乳之剂。如消乳丸（《婴童百问》：陈皮、甘草、砂仁、神曲、香附、

麦芽）之类。

伤乳食 病证名。指乳食停滞而致的吐泻。《幼科发挥》：“伤乳食，物出作馊酸气者是也。”临床多伴有腹痛，面色黄滞，发热，不喜饮食。治以化乳消食为主。宜胃苓丸，煨生姜煎汤研碎调服。

伤乳食泻 病证名。见《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》。即乳食不节而致的腹泻。因乳食不节，损伤脾胃，运化失常，腹胀肠鸣，疼痛啼叫，口渴尿赤，粪腥臭且夹乳瓣或未消化的食物。治宜和中消滞。用保和丸。

伤食 食物不能消化的一种证型，《丹溪心法》：“伤食必恶食”。与停食有所不同。《金匱翼》：“伤食者，饮食自倍，肠胃乃伤，病在不及消化。停食，不论食之多少，或当食而怒，或当食而病，在气结而不能化也。治伤食，宜偏重于食，或吐或下或消；若停食则偏重在气，惟理气而兼之以消，吐下之法不可用也。”治之宜用健脾消导，甘温辛香之剂，如平胃散之类。参见积滞条。

伤食发丹 病证名。见《证治准绳·幼科》。小儿伤食而发的丹毒。因其脾胃之气未充，乳食过度，不能运化，蕴积化热，达于肌表，复感风热邪毒，故成此症。症见发热口渴，烦躁多啼，身多红晕，皮肤灼热，不思饮食，食积甚者，可见腹大气急等。治宜清热解毒，消食导滞。清热解毒用清瘟败毒饮；消食导滞用保和丸。

伤食发热 病证名。见元·朱震亨《幼科全书》。小儿食积不化引起的发热。其热先见于腹部，以后手足俱热，而以腹背较甚，暖气吐腐，大便酸臭，腹痛多啼，肌瘦腹胀，或肠鸣泄泻，痛随泻减，不思饮食，面色晦暗，眼胞浮肿。治宜先去其积。可选用保和丸、至宝锭之类。

伤食吐 病证名。因饮食不节而引起的呕吐。《古今医统》：“凡小儿乳哺不宜过

饱，若满则溢，故令呕吐”。小儿饮食失宜，最易导致胃气受伤，胃气伤则呕吐。表现为频吐酸馊粘液，或吐黄水，或吐清涎，腹胀，暖气，厌食等。见于消化不良，急性胃炎等。治宜理胃和中，消导食滞。用保和丸加减，配合针刺足三里及推三关退六腑等法。

伤食吐泻 病证名。指小儿伤食所致的吐泻。多因脾胃嫩脆，乳食失节，壅塞脾胃而引起。《小儿卫生总微论方》：“吐泻乳食不化，其吐及粪皆有酸臭气者，此伤食吐泻也。”治宜消食导滞。用胃苓汤加减。

伤食后发搐 病证名。因伤食后引起的抽搐。小儿乳食停滞，蓄积胃肠，湿郁则生热，热极生风，发为抽搐。《小儿药证直诀》：“伤食后得之，身体温，多睡多睡，或吐不思食而发搐。”病机为脾虚肝旺。明·陈治《幼幼近编》：“若因饮食停滞，痰涎壅满，而见此证(发搐)者，乃脾土弱不能生金，金虚不能平木，故邪旺动也，宜健脾消食，其证自愈，不可用凉惊等药。”治疗先消食，用保和丸；后止搐，用琥珀抱龙丸。参急惊风条。

伤食泻 病证名。饮食不节，损伤脾胃，脾失健运而致的腹泻。症见吞酸噯腐，腹胀胀满，痛则欲泻，泻后痛减，或泻下便臭如败卵。《婴童百问》：“凡伤食泄不可即止，宜节饮食。”治宜消食导滞，用保和丸。

伤食腹胀 病证名。食物停滞而致的腹胀。多由脾胃功能失常，消化障碍所致。《幼科发挥》：“有食饱伤胃而胀，法宜消导之，不可攻下也；有脾虚不能消食，食饱则胀者，此宜补脾，以助其传化可也。”消导用保和丸加枳壳、厚朴；补脾用香砂六君子汤。

伤饱 病证名。小儿乳食不当，损伤脾气所致的病证。《诸病源候论》卷四十七：“小儿食不可过饱，饱则伤脾，脾伤不能磨消于食，令小儿四肢沉重，身体苦热，面黄

腹大是也。”治以健脾消食，兼以除热为主，如保和丸加减。参食积条。

伤胎 病名。出《金匱要略·妇人妊娠病脉证并治》。指临产前，羊水未破而先有阴道流血者。《张氏医通》：“临月胞水不破，血先下者，此是伤胎，非产也”。

伤热乳 指热乳伤胃而致的吐泻。《幼科发挥》：“伤热乳者，物出热，面赤唇燥者是也”。临床多伴有四肢温，口渴等。治以清利和胃为主，宜六一散，煨生姜煎汤调服。

伤积 出《幼科金针》。即小儿积证。见该条。

伤堕 病名。出《诸病源候论》卷四十一。指孕后因气虚、血虚、肾虚或外伤等因素引起的腰腹痛坠，甚至阴道不时下血，以致流产。

伤娠 出《三国志·方技传》。即小产。详该条。

伤暑 病证名。暑病之一。因感受暑热而致，或因起居不慎，夏热贪凉，遭受凉风的病。多是内蕴暑热之邪，外为风冷所束，属于表里俱病的证候。症见发热无汗，口渴饮水，面红，胸脘不畅，干呕恶心，腹痛如绞，嗜眠，疲乏等。治宜内清暑热，外散表寒。用香薷饮加减。若体弱困倦者，当补正祛邪，用六合汤（《医宗金鉴》：人参、香薷、半夏、甘草、砂仁、木瓜、赤茯苓、藿香、杏仁、扁豆、厚朴、姜、枣）。

伤寒发惊 病证名。指寒邪阻于太阳经络而致惊者。症见发热、恶寒，头、身骨节痛，无汗，手足牵动，目上视，搐搦有力，脉来浮紧。治宜疏散寒邪，用麻黄汤，或五积散（见清·庄一夔《惊风辨症必读书》）。

伤寒夹惊 病证名。小儿因惊又感寒邪，或因伤寒郁久化热，热极风生而邪乘于心，发为搐搦者。其症多兼壮热，头痛，鼻塞流涕，畏寒拘急。治宜解表清热。用羌活汤（《张氏医通》：羌活、防风、荆芥、紫苏、川芎、赤芍、枳壳、山楂、木通、甘草、

葱白、生姜)。

伤寒谷黍 病证名。即感受风寒病邪而引起的发斑证。出清·马之骥《疹科纂要》。又名红眼伤寒。临床以皮肤发斑有色点而无颗粒为特征。有阳毒和阴毒之不同，详阴毒、阳毒条。

伤寒挟实 病证名。感受寒邪，蕴积成实而成壮热证候。《诸病源候论》卷四十五：“伤寒，是寒气客于皮肤，搏于气血，腠理闭塞，气不宣泄，蕴积生热，故头痛，体痛而壮热，其人本脏气实者则气与实气相搏，而成壮热，谓之挟实。实者有两种：有冷有热，其热实粪黄而臭；其冷实食不消，粪白而酸气”。治热实宜清泄，如大小承气汤加减；治冷实宜消导化食，如保和丸加加减。

伤寒兼惊 病证名。小儿感受寒邪而兼发惊的病证。《诸病源候论》卷四十五：“伤寒是寒邪客于皮肤，搏于气血，使腠理闭塞，气不宣泄，蕴集生热，故头痛，体痛而壮热也。其兼惊者，是热乘心，心主血脉，小儿气血软弱，心神易动，为热所乘，故发惊，惊不止，则变惊痫也。”可见于小儿感染性疾病而致的高热惊厥。参急惊风条。

伤寒暴嗽 病证名。出《千金要方》卷五。指小儿感受寒邪，突然咳嗽者。症见咳嗽，气逆，喉有痰鸣，无汗，鼻塞清涕，为寒邪束肺，气机不利所致。治宜散寒宣肺。用金沸草散。参寒嗽条。

伤湿泻 病证名。小儿秋季感受湿邪而引起水泻。《幼科发挥》：“秋月得之，伤湿泻也。其证体重，所下溏粪，谓之濡泻，宜渗湿补脾、利小便，胃苓汤主之。或升麻除湿汤（升麻、柴胡、防风、神曲、泽泻、猪苓、苍术、陈皮、甘草、麦蘖）。”

仰顶生 病证名。即产儿额先露。清·周纪常《女科辑要》：“名仰顶生者，谓额角已露，顶却向后”。

自汗 病证名。汗证的一种类型。不活动而自然出汗的证候。《幼科发挥》：“自

汗者，昼夜出不止，此气血俱热，荣卫虚也。”

《证治准绳·幼科》：“自汗者，汗不待表发而自出也。”自汗临床有虚实的区别。如因表虚而卫阳不固的，每见发热恶寒，汗出如注；如因胃中有热，热蒸而汗出的，表现为发热不恶寒，汗出如蒸，肌肤灼热。表虚者，宜补气固表，用玉屏风散；阳虚者，宜温阳止汗，用桂枝加附子汤；胃中有热者，宜辛凉清热，如白虎汤；胃热便闭者，宜苦寒泄热，如调胃承气汤。参见盗汗条。

血亏经闭 病证名。见《医宗金鉴·妇科心法要诀》。多因久病失血，或早婚房事过度，生育过多，乳众等耗伤精血，以致阴虚血亏，先见经期错后，量少，逐渐无血下达，冲任胞宫空虚，终成经闭。症见不思饮食，皮肤干燥，形体消瘦，动作日虚。因失血过多者，兼见面色，皮肤萎黄不泽，治宜补血养血，方用人参养荣汤；因房事损伤者，兼见头晕耳鸣，腰膝痠软等，治宜滋阴补肾，方用六味地黄汤；因乳众者，治宜大补气血，方用十全大补汤等。

血山崩 病名。指血崩。《中藏经》卷七：“治血山崩甚者，以凌霄花焙干为末，酒下三钱”。

血少不孕 病证名。出清·叶其綦《女科指掌·种子门》。不孕症型之一。即血虚不孕。详该条。

血分 病名。《金匱要略·水气病脉证并治》：“经水前断，后病水，名曰血分”。是指月经闭，然后身肿的疾病。亦名妇人血分，详该条。

血风劳 出《世医得效方》卷十五。详见干血癆条。

血风疮 病证名。见《医宗金鉴·外科》。多由肝脾两经，湿热外受，风邪袭于皮肤，郁于肺经所致。症见遍身生疮，形如粟米，抓破时有津脂水液渗出，并伴有烦躁、口渴等。治宜养血解毒，兼祛风邪。用四物汤加银花、连翘、钩藤、防风之类。外用黄连膏

(《医宗金鉴》：黄连、归尾、生地、黄柏、姜黄)，涂于患部。

血母块 病名。清·汪嘉謨《胎产辑萃》：“产后恶露不尽，血结刺痛，名曰血母块”。详儿枕痛条。

血信 见《产宝》。即月经。详该条。

血闭 出《神农本草经》禹余粮条。即经闭。详该条。

血块痛 病名。王肯堂《胤产全书》：“产后儿枕块痛俗名血块痛，宜服三圣散(当归一两，延胡索、桂心各三钱为末，每服三钱，童便或热酒调下)”。详儿枕痛条。

血沙淋 病名。见《女科经纶》卷一。指妇人月经来时，交合阴阳，伤于血络，而致经漏淋漓不止，俗名血沙淋。治宜调和血气，使脏腑和平，经血可止。参见经漏条。

血枕痛 见《皇汉医学·产科发蒙》。即儿枕痛。详该条。

血经 出《妇人良方大全》卷一。即月经。详该条。

血枯经闭 病证名。见《丹溪心法》。指血枯而致之经闭。多因素患失血，或早婚，产多，乳众等耗伤阴血，日久乃致血枯，冲任空虚，无血下达胞宫而致经闭。因失血者，症见饮食减少，面色㿠白无华，日渐虚弱消瘦，治宜补血养血，方用人参养荣汤；早婚而伤精者，兼见两颧发赤，午后潮热或骨蒸等虚损症候，治宜滋阴补血，方用六味地黄汤等；因产乳多而伤阴血者，治宜气血双补，方用十全大补汤等。

血咳 见《叶天士女科证治秘方》。即经来咳血。详该条。

血脉 见《卫生易简》。妇科有时指月经而言。

血胎 病名。假孕症型之一。谢观《中国医学大辞典》：“此症因经行者或举重物或犯房事，致经事不卒，瘀滞子宫，经闭腹大，状如怀孕，法当下其瘀血，则腹胀自消”。方用血府逐瘀汤。

血热崩漏 病证名。多因素体阳盛，过嗜辛辣，或感受热邪，或五志化火，热郁于内，损伤冲任，迫血妄行；或忿怒伤肝，肝经火炽，血失所藏等，以致经血妄动。症见突然阴道大量出血，或淋漓日久不止，血色深红，稠粘，面赤口渴，烦躁不寐，头晕等。治宜清热凉血、止血。方用清热固经汤。如兼气虚者，加沙参、黄芪；口渴，加麦冬、花粉；若见胸胁胀痛，心烦易怒，时欲叹息，脉弦者，为肝经火炽，治宜平肝清热止血，方用丹栀逍遥散去生姜，加炒蒲黄、血余炭、益母草、香附炭之类。

血热月经过多 病证名。多因素体阳盛内热，热扰血溢，或过嗜辛辣，热伏冲任，迫血妄行所致。症见经血量过多，或经行持续时间延长，血色深红或紫，稠粘或有臭秽气味。面红身热，口干作渴，时作烦躁。治宜清热凉血。方用清经汤加阿胶，或用先期汤。若见两颧发赤，午后手足心热，脉细数者，为阴虚血热所致，治宜滋阴清热，方用两地汤。

血热滑胎 滑胎证型之一。孕妇素体阳盛，有滑胎病史，怀孕后因热伏冲任，迫血妄行，损伤胎元。症见小腹作痛，心烦不宁，口渴喜凉饮，甚则阴道流血，以致胎动欲坠。宜清热凉血，安胎，用保阴煎(生地黄、熟地黄、芍药、山药、续断、黄芩、黄柏、甘草)。

血热经早 见《景岳全书·妇人规》。即血热经行先期。详该条。

血热经行先期 病证名。亦名血热经早。包括虚热、实热两种。实热者，多因素体内热，过嗜辛辣食物，或感受热邪，以致热扰冲任，迫血妄行。症见经期提前七、八天以上，血量较多，色紫红，稠粘，心烦口渴，喜凉饮，大便秘，小便黄等。治宜清热凉血。方用芩连四物汤之类。虚热者，详虚热经行先期条。

血热经迟 病证名。由于血热而致经水

过期而来。《景岳全书·妇人规》：“血热者，经期当早，此营血流利及未甚亏者多有之。其有阴火内烁血本热而亦每过期者，此水亏血少燥涩而然。治宜清火滋阴，以加味四物汤、加减一阴煎、滋阴八味丸之类主之”。

·**血脏** 见《太平惠民和剂局方》。即胞宫。详该条。

血海败 病证名。江天览《妇人病自疗法》：“年老妇人血崩，俗名血海败”。即年老血崩。详该条。

血泪 见《活幼心书》。指双泪流血。清·吴溶堂《保婴易知录》谓其发病“乃胎热胎火所致”。目为肝窍，血乃心液，火灼心肝，迫血上溢，故成此证。治宜凉肝泻心之剂。

血陷 五陷之一。《痘疹精详》：“血陷之证，与紫陷相似，须要详辨。血陷透顶通红，不带紫色。紫陷属血热必气粗，身热，口渴，烦躁，治宜凉血为主；血陷属气虚，气弱不能统血，故血僭居气位，痘也红而陷也，见症必气缓身凉，不烦不渴，治以补气为主，断不可投凉血之剂。”

血脐 即儿脐出血。详该条。

血热 病证名。小儿发热的一种证型。元·朱震亨《幼科全书》：“血热者，每日以午间发热，遇夜则凉，此心热也。轻则导赤散，重则四顺饮治之。”

血痘 病证名。出《奇效良方》。指婴儿血分热毒而引起的黄肿。小儿胎热者，初生下肌肤红白，二月已后，遍身黄肿，眼闭不开，作呻吟声。此因胎内有热，或因妊母服热药，热毒遗于胎儿所致。治宜内服清热解毒之剂，外用黄柏煎水浴之。

血虚不孕 病证名。出清·叶其綦《女科指掌·种子门》。不孕症型之一。又名血少不孕。由素体脾胃虚弱，或久病失血伤阴，致阴血不足，冲任空虚，不能养精成孕；兼见身体瘦弱，面色萎黄，疲倦乏力等症。宜补血养阴滋肾。方用养精种玉汤（熟地、当归、白芍、山萸肉）加味。

血虚月经过少 病证名。属月经过少证型之一。多因素体虚弱，久病失血伤阴，或脾胃损伤，生化之源不足，冲任血虚所致。症见月经量少，或点滴一、二天便净，色淡红、质稀。面色萎黄，头晕心悸，小腹空痛等。治宜补血益气健脾。方用人参滋血汤（《产宝百问》：人参、山药、茯苓、当归、熟地、白芍、川芎）、人参养荣汤等。

血虚发热 病证名。小儿血虚引起的发热。其症午后热甚，烦躁不安，两颐淡红，面唇淡白，毛发枯黄，形瘦神疲，大便艰涩难出，脉来大而无力。治宜补血以退热。用四物汤，热甚另加生地（《幼科铁镜》）。

血虚经乱 病证名。见《景岳全书·妇人规》。由于血虚而致经行或先或后，或先后无定期，血色淡红，量涩少等。因肝脾血虚者，兼见抑郁不乐，胸乳胀闷不舒，食少腹胀，便溏等，治宜补血为主，方用四物汤，寒加肉桂，热加黄芩；肝脾肾三阴虚损者，兼见经后腹痛绵绵，喜暖喜按，食少便溏，腰膝痠软等，治宜补血养阴，方用小营煎、五福饮等；忧思伤及心脾者，兼见饮食日少，心悸气短，失眠健忘等，治宜补益心脾，方用归脾汤、七福饮等。

血虚经行后期 病证名。属经行后期症型之一。多因素患失血，或大病、久病，或产乳过多，耗伤阴血，以致血海空虚，冲任不足，胞宫不得按时满溢，导致月经过期而来。症见经期错后在七、八天以上，血量较少、色淡，面色萎黄，皮肤不润，眼花心悸，小腹空痛喜按，身体瘦弱等。治宜补血养营益气。方用人参养荣汤、当归补血汤、人参滋血汤等。

血虚难产 病证名。《傅青主女科》下卷：“妊娠有腹痛数日，不能生产，人皆曰气虚力弱，不能送子出产门。谁知是血虚胶滞，胞中无血，儿难转身乎。夫胎之成，成于肾脏之精；而胎之养，养于五脏六腑之血。故血旺则子易生，血衰则子难产。所以

临产之前，宜用补血之药，补血而血不能遂生，必更兼补气以生之。然不可纯补其气也，恐阳过于旺，则血仍不足。偏胜之害，必有升而无降，亦难产之渐也，防微杜渐，其惟气血兼补乎，使气血并旺，则气能推送，而血足以济之，是汪洋之中自不难转身也，又何有胶滞之患乎。方用送子丹（生黄芪一两，当归一两，麦冬一两，熟地五钱，川芎三钱）”。杨志一《妇科经验良方》：“血虚则子宫濡润不足，不能滑利故难产，宜大补气血，儿易转动，自然降生”。

血虚滑胎 滑胎证型之一。孕妇平素血虚，有滑胎病史，怀孕后阴血益虚，胎失滋养。症见神疲无力，面色淡黄，或有浮肿，腰痠腹痛，甚则阴道流血，以致胎动欲坠。宜补血益气，以防滑坠。方用胎元饮（人参、当归、杜仲、芍药、熟地、白术、陈皮、炙甘草），下血者加阿胶、艾炭。

血眼 病证名。①指血浸眼中。初生艰难，血浸眦眦，遂溅渗其睛，以致神瞳不见，名血眼。②指血脉贯瞳。《保婴易知录》：“儿百日内乳嗽不愈，以致血脉贯瞳，而眶紫黑，或白珠红赤如血，亦名血眼”。

血崩 病名。见《妇人良方大全》卷一。亦名崩中、血山崩、血崩不止、暴崩。指不在经期而突然阴道大量出血者。多因劳伤过度，气虚不能摄制经血，或暴怒伤肝，肝不藏血，以致经血妄行。临床上须防晕厥虚脱。在急则治其标的原则下，劳伤气虚者，治宜补气固摄止血，方用举元煎加乌贼骨、棕榈炭、煅牡蛎等，或用固冲汤。因暴怒伤肝者，治宜舒肝解郁，佐以止血，方用平肝开郁止血汤，待血减少或血止时，再予辨证治本。其他如血热、血瘀、跌仆损伤等，均可引起冲任不固而致血崩。

血崩不止 病名。指患血崩症日久不止者。《世医得效方》卷十五：“梅饮子治血崩不止，盐梅七个烧灰为末，空心米饮服。又方陈槐花一两，百草霜半两，为末，烧红

秤锤淬酒下”。或用安冲汤、固冲汤等。参见血崩条。

血崩心痛 病证名。见周怡观《秘珍济阴》。属杀血心痛范畴。详该条。

血崩昏暗 病证名。见《傅青主女科》。多因血崩失血过多，心肝失养所致。症见两目昏暗，卒倒不省人事。治宜补血止血。方用固本止崩汤。若崩血不止，汗出肢冷，脉微欲绝者，为气随血脱危重症候，治宜回阳救逆，急与参附汤以救逆。

血崩腹痛 病证名。指因患血崩而兼腹痛。血瘀者，腹痛拒按，血块下后则痛减，治宜行瘀止痛，方用四乌汤加莪术，或用失笑散；血虚者，腹痛喜热喜按，治宜养血止血，方用胶艾四物汤。

血淋 病证名。诸淋之一。是尿血俱下，茎中疼痛的淋症。由于心经有热移于小肠，热甚搏血，失其常道，渗于胞中所致。治宜清热止血，用小蓟饮子。

血痢 出《太平圣惠方》卷九十三。即纯血痢。详该条。

血滞不孕 病证名。不孕症型之一。《叶氏女科证治》：“妇人血虚经滞，蓄积不行，小腹疼痛，久不成胎，宜五物煎（当归、熟地、白芍、川芎、肉桂）”。

血滞经闭 病证名。见《妇人良方大全》卷一。多因情志不畅，气郁血滞，或经期涉水感寒，寒搏于血，血行涩滞，冲任阻闭，经血不能下达胞宫所致。症见经闭不行，面色紫黯，下腹疼痛拒按，或痛引胸胁。治宜开郁行滞，活血通经。方用通瘀煎加桃仁、丹参、泽兰、牛膝。因寒者，多兼形寒肢冷，小腹凉痛喜得温热，治宜温经活血行瘀。方用琥珀散。

血寒月经过少 病证名。属月经过少症型之一。多因素体阳虚，阴寒内生，化气生血功能不足，冲任血少所致。症见经期血量过少，色淡或黯，质稀，形寒畏冷，小腹冷痛，喜得温热等。治宜温经养血。方用大营

煎(《景岳全书》:当归、熟地、枸杞、炙甘草、杜仲、牛膝、肉桂)加炮姜,甚者加附子。

血寒经行后期 经行后期证型之一。亦名血寒经迟。多因经产之时,感受寒凉,寒邪乘虚侵入胞宫,血为寒滞,运行失常所致。症见经期错后,量少,色黯有块,小腹绞痛,得热痛减,面色青白,形寒畏冷。治宜温经行滞。方用温经汤(《金匱要略》:当归、川芎、白芍、炙甘草、人参、肉桂、吴茱萸、丹皮、阿胶、半夏、麦门冬、生姜)。若见经血量少,色淡质稀,小腹隐痛,喜热喜按,面色㿔白,头晕气短,腰痠乏力等,则为冲任虚寒,血行无力所致,宜温经养血,方用大营煎。

血寒经迟 见《景岳全书·妇人规》。即血寒经行后期。详该条。

血瘀不孕 病证名。病因情志内伤气血运行不畅,或感受寒邪,血被寒凝,以致瘀血停滞,内阻冲任胞脉不能摄精受孕。症见经期错后,经行涩滞不畅,血块较多,腹痛拒按等。气滞血瘀者,兼见胸胁胀满,烦躁易怒,乳房胀痛,治宜行气理血,方用《医林改错》血府逐瘀汤;寒邪客于胞中者,兼见手足不温,小腹凉痛,治宜温经散寒,方用《医林改错》少腹逐瘀汤。

血瘀月经过少 月经过少证型之一。多因寒凝气滞,瘀血内停,冲任血行不畅所致。因寒凝者,症见经行量少,色黯有块,小腹凉而痛甚于胀,拒按,喜得温热,血块排出后则痛稍减,治宜温经活血行瘀,方用少腹逐瘀汤,或用过期饮;因气滞者,症见经血量少,色紫有块,小腹胀甚于痛,排气较舒,治宜行气活血,方用膈下逐瘀汤,七制香附丸等。

血瘀经行后期 经行后期证型之一。多因气滞、寒凝,以致血瘀内阻冲任,经血不能按时下达胞宫所致。气滞血瘀者,症见经期错后,经量涩少,血色紫黯,血块较多,

小腹胀痛,治宜行气活血化瘀,方用过期饮;寒凝血瘀者,症见小腹冷痛,拒按,血块去后则舒,治宜温经活血化瘀,方用少腹逐瘀汤。

血瘀经闭 病证名。多因气滞、寒阻,经脉血行涩滞,瘀阻冲任胞脉,积久而成经闭。症见经闭不行,小腹疼痛拒按。治宜活血祛瘀,通经。方用膈下逐瘀汤。偏于气滞者,重用乌药、延胡索、枳壳、香附;兼寒者,加肉桂、炮姜。或用血府逐瘀汤等方加减。

血瘀崩漏 病证名。属崩漏证型之一。多因经期、产后、余血未尽,或挟外感,内伤,以致瘀血停滞于内,冲任失调,瘀血不去,新血难安,血不归经发为崩漏。症见阴道突然出血,量多不止,或血量虽少而淋漓不断;色紫黯有块,小腹疼痛拒按,血块排出后疼痛减轻。治宜活血行瘀。方用佛手散合失笑散,或用逐瘀止崩汤(《安徽中医验方选集》:当归、川芎、三七、没药、五灵脂、丹皮炭、炒丹参、炒艾叶、阿胶、乌贼骨、龙骨、牡蛎)。

血瘀痛经 病证名。多因经期产后,余血未尽,继受寒凉,或情志内伤等,致使宿血停滞,凝结成瘀,内阻冲任胞脉,碍血下行,血滞胞中。症见经前或经行之时,小腹刺痛拒按,经血量少、有块,血块下后痛减。治宜活血祛瘀。方用膈下逐瘀汤、琥珀散(三棱、莪术、丹皮、肉桂、延胡索、乌药、刘寄奴、当归、赤芍、熟地黄)。

血溢 即出血。指离经之血,溢于体外者。《小儿卫生总微论方》:“小儿诸血溢者,由热乘于血气也。血得热则流溢,随气而上。自鼻出者为衄衄。从口出者多则为吐血;少则为唾血。若流溢渗入大肠而下者,则为便血。渗于小肠而下者,为溺血。又有血从耳目牙缝龈舌诸窍等出者,是血随经络虚处著溢,自皮孔中出也。”血溢原因很

多,其病机不外乎络伤血溢和气不摄血两类。由于脏腑络脉损伤的部位和程度不同,因此出血的情况和机转亦不一。《灵枢·百病始生》:“阳络伤则血外溢,血外溢则衄血;阴络伤则血内溢,血内溢则后血。”气为血之帅,故血脱可导致气衰,气衰不能摄血也可引起出血,两者有密切关系。如果出血不止,或大量出血,即有导致虚脱的危险。络伤血溢,宜以止血为主,因热的宜清热止血;因寒的宜温经止血;因血瘀的宜消瘀止血;因气不摄血的,宜固气摄血。参见小儿大衄、小儿吐血、九道出血、大便下血、小儿溺血、鼻衄、舌衄条。

血嗽 见《竹林女科证治》。即经来咳血。详该条。

血膈 见《景岳全节·妇人规》。即妇人血膈。详该条。

血瘕 病名。出《诸病源候论》卷三十八。属八瘕之一。多因经行未尽,饮食失节,损伤肠胃,以致余血与食气搏结,留于经络,瘀滞于少腹。症见小腹内有积气,坚牢如石,少腹急痛,阴中若有冷风,或背脊作痛,腰痛不可俯仰。治宜调瘀散瘕。方用干姜、乌贼骨、桃仁、捣散酒服(《济阴纲目》)。

血漏 见《圣济总录》卷一百五十一。即经漏。详该条。

凶开不合 出《小儿药证直诀》。即解颅。详该条。

凶风伤寒 病证名。出《普济方》卷三百六十三。指婴幼儿凶门未合,感受风寒而引起的鼻塞。治以葱白捣碎取汁,涂于凶门;或用艾茸炒热,布包敷于凶门,气通即愈。参见鼻风条。

凶肿 病证名。指凶门肿起。《小儿卫生总微论方》:“小儿有凶肿者,由脾胃不和,冷热不调,或怒啼饮乳,或喘急咳嗽,致阴阳气逆,上冲而凶肿也。热则肿而软,冷则肿而硬。”因热而肿者,宜清热解毒,

以青黛冷水调敷于局部,兼服大连翘饮,或五福化毒丹;因冷而肿者,宜温化阳气,用肾气丸,兼服益黄散。

凶陷 病证名。指凶门下陷的证候。小儿在六个月内,前凶门微陷,不作病理状态。如在慢惊、久泻之后,凶门显著下陷,甚至如坑的,则为凶陷。《诸病源候论》卷四十八:“脏腑气血虚弱,不能上充脑髓,故凶陷也。”或因胎禀不足,或因泻痢,或小便频数,加之病久伤阴,或过服寒凉损伤脾胃之阳,故令凶门下陷,并见面色萎黄,神疲气短,食少便溏,四肢不温,脉沉缓无力,指纹淡滞等。如枕部同时下陷的,尤为严重。治宜培元补肾,用固真汤(《医宗金鉴》:人参、白术、肉桂、茯苓、山药、黄耆、甘草、附子、姜、枣);中气下陷者,用补中益气汤。

凶填 病证名。指凶门突出,隆起如堆的证候。多见于发热和惊厥的患儿,亦有由寒凝气滞而致者。《诸病源候论》卷四十八:“小儿凶填,由乳食不时,饥饱不节,或热或寒,乘于脾胃,致脏腑不调,其气上冲所为也。”因热上冲者,宜疏风清热解毒,用大连翘饮;因于寒凝者,宜温中散寒,用理中汤加减。

凶填陷 病证名。凶填、凶陷的合称。《普济方》卷三百六十三:“凶肿为热,以黄柏膏涂足心涌泉穴;陷则为冷,以半夏涂手心妙。”详凶填、凶陷条。

后蹬 病证名。清·员从云《产科一得》:“后蹬,临产时儿头偏抵谷道。名虽有多云,皆偏产也。此因子方投奔出路,母错用力逼迫”。相当于枕后位。参见偏产条。

行迟 五迟之一。出《小儿药证直诀》。《证治准绳·幼科》:“凡儿生至周岁三百六十日,膝骨成,乃能行。”小儿周岁以后甚至二、三岁还不能步行者为行迟。肝主筋,肾主骨,小儿肝肾不足,或哺养失宜,脾胃虚弱,元气不充,影响筋骨的发育,故

迟迟不能行动。肝肾虚弱者，宜滋补肝肾，用六味地黄丸加鹿胶、牛膝之类；元气不足者，宜补益元气，用调元散。

行经 一指经来。二指月经。

行经目痛 病证名。见《医宗金鉴·眼科心法要诀》。指经行之际，出现眼目涩痛，头痛眩晕。多因经行去血过多，肝经虚损，以致眼目涩痛，肿涩难开，或生翳于黑睛上等。治宜补血养肝。方用当归补血汤（《医宗金鉴》：薄荷、羌活、茺蔚子、柴胡、蒺藜、菊花、防风、甘草、生地黄、当归、白芍、川芎），或用杞菊地黄丸等。

行经气痛 病证名。静光禅师考定《女科秘要》卷三：“经来一半，余血未尽，腹中作痛，变作潮热，或无热，当用红花当归散（当归、红花、牛膝、苏木、川芎、枳壳、赤芍、三棱、莪术），破其余血，则痛止人安”。参见痛经条。

全不产 病证名。出《千金要方》卷二。即原发性不孕症。详不孕条。

杀血心痛 病证名。见《妇人良方大全》卷一。亦名血崩心痛、失血心痛。指妇女因血崩而出现心痛的病症。多因出血过多，心脾失养，或血瘀凝滞所致。症见血崩心痛较甚，血色浅淡如水，小腹喜按，治宜收敛止血，用乌贼骨炒为细末，醋汤调服，再以补中益气汤升举之。若血崩色紫有块，心痛拒按者，为血瘀凝滞不散，治宜行瘀止痛，先用失笑散，后用十全大补汤以补之。

肌肉软 五软之一。肌肉为脾所主，小儿乳食不足，脾胃气虚，故肌肉虚软，皮肤松弛，形体瘦弱，智力迟钝。治以补脾为主。宜扶元散。

多食易饥 病证名。《幼科发挥》：“儿有多食而易饥者，此脾胃之邪热甚也。”治宜泻脾胃之火。用三黄枳实丸。

〔、〕

冲为血海 出《素问·上古天真论》王冰注。冲脉是十二经脉气血汇聚的要冲，故

称血海。《灵枢·海论》：“冲脉者，为十二经之海”。又《类经·人之四海》张景岳注：

“血海者，言容纳诸经之灌注，精血于此而蓄藏也。冲脉者，经脉之海也，主渗灌谿谷”。

交肠 病证名。见《世医得效方》。又名交肠病。即大小便易位而出。清·董西园《医级》：“……肠穿膀胱破，而后尿溺得以易位而出也。”

交肠病 出《本草纲目》。即交肠。见该条。

交胫 病证名。出《千金要方》卷五。即行胫相交。小儿生下，一脚或两脚不能直伸，至步行时，两脚相交，举足则外出，下地则内入，为先天性胫骨畸形。

交乳 出《证治准绳·幼科》。即继病。详该条。

交经 病名。《郑氏女科家传秘方》：“产后小便撒黑，谓之交经。用提气补血治之”。

交骨不开 见《妇人良方大全》卷十六。①交骨即耻骨。古人认为未产前两骨相合，临产时两骨稍离。若此骨不开，儿难降生。多因元气虚弱，胎前失于调养，以致气血不能运达所致。②指骶骨关节部。在分娩时，这一关节可被动地作一定的活动，使骨盆下口张大。若这一关节活动有障碍，可影响分娩。治疗可用凤林寺《女科秘宝》佛手开骨散（龟板一具炙酥，当归50克，川芎50克，党参100克）。参交骨不开难产条。

交骨不开难产 病证名。指由于交骨不开造成的难产。《傅青主女科》：“交骨之能开能合者，气血主之也。血旺而气衰，则儿虽向下而儿门不开。气旺而血衰，则儿门可开而儿难向下，是气所以开交骨，血所以转儿身也。欲生产之顺利，非大补气血不可。然交骨之闭甚易，而交骨之开甚难。临产交骨不开者，多由于产前贪欲，泄精太甚，精泄则气血失生化之本而大亏矣；气血亏则无以运润于儿门，而交骨粘滞不开矣。”

故欲交骨之开,必须于补气补血之中,而加开骨之品,两相合治,自无不开之患,不必催生,而儿自迅下,母子俱无恙矣。方用降子汤:当归一两,人参五钱,川芎五钱,红花一钱,川牛膝三钱,柞木枝一两”。

交结出血 见《女科备要》。即交接出血。详该条。

交接出血 病名。见《妇人良方大全》卷八。亦名交结出血、交感出血。指性交出血。多因肝火妄动不能藏血,脾虚不能摄血,或交媾损伤所致。治宜调补肝脾。方用补中益气汤或归脾汤加伏龙肝。应检查局部有无损伤及病变,可用中西医结合治疗。

交感出血 出《傅青主女科》。即交接出血。详该条。

产下肉线 旧病名。又名产后肉线出。《叶天士女科诊治秘方》卷三:“产下肉线,临产用力太过,以致腠膜有伤,产妇垂出肉线一条,长三、四尺,牵引心腹,痛不可忍,以手微动,则痛欲绝。宜用生姜三斤,连皮捣烂,入麻油二斤,拌匀炒熟,以油干为度。先以熟绢五尺,摺作数层,令妇人轻轻盛起肉线,使之屈曲盘旋,纳入产户,再以绢袋盛姜,就近薰之,冷则再换,……肉线切不可断,断则不治矣”。

产子 出《诸病源候论》卷四十三。即分娩。详该条。

产子痢 病名。①《诸病源候论》卷四十三指产后患痢。多因产后虚损,下地过早,伤于风冷,风冷乘虚入于大肠,肠虚则泻所致。②施雯《盘珠集胎产证治》指产后恶露不行,败血渗入大肠,积滞而成泄痢者。详产后下利条。

产门 见《妇人良方大全》卷十六。又名儿门。指已婚妇女的阴道外口。

产门不合 即产门不闭。详该条。

产门不闭 病名。出《妇人良方大全》卷二十三。又名玉门不闭、阴门不闭、产门不合。指产后阴道外口不能闭合。多因胎前失

于调养,产后气血大虚,不能收摄,或产时伤及产门破损所致。气血大虚者,兼见少气懒言,面色苍白,自汗等,治宜大补气血。方用十全大补汤。产时所伤者,兼见阴户破溃,焮痛不闭,治宜清热解毒,凉血,方用逍遥散加荆芥、丹皮、双花、连翘水煎服,并用浓煎甘草汤洗之。

产门颓 病名。又名产癰、产颓。包括产后子宫不收。静光轮应禅师考定《女科秘要》:“产物形如帕下垂,俗名呼作产门颓”。指产时用力,气虚下陷,产后子宫脱下。严重时致阴道壁下垂及小便淋沥等。治宜补中益气。方用补中益气汤。同时可针刺子宫、维胞、百会等穴。

产风眼 病名。指产后目眩红烂。宜用复盆子叶嫩汁渍眼,外以纱布蒙之。

产户不敛 见《医钞类编》。即产后玉户不敛。详该条。

产后儿枕腹痛 见《妇人良方大全》卷二十。即儿枕痛。详该条。

产后三冲 见《张氏医通》卷十一。指产后恶露当下不下,逆而上冲引起的三种危重证候。即败血冲心、败血冲肺、败血冲胃。详各条。

产后三审 是古代对产后疾病的诊断经验。《张氏医通》卷十一:“凡诊新产妇,先审少腹痛与不痛,以征恶露之有无。次审大便通与不通,以征津液之盛衰。再审乳汁行与不行及乎饮食多少,以征胃气之充馁。必先审此三者,以脉参证,以证合脉,脉证相符,虽异寻常,治之必愈。脉证相反,纵无危候,必多变端”。

产后三急 指产后呕吐、盗汗、泻泄三症。《张氏医通》卷十一:“产后诸病,惟呕吐、盗汗、泄泻为急,三者并见必危”。详产后呕吐、产后盗汗、产后泄泻条。

产后三病 《金匱要略·妇人产后病脉证并治》:“新产妇人有三病,一者病痉,二者病郁冒,三者大便难”。因新产血虚多

汗出，易中风邪，血虚不能濡养筋脉，风邪易于化燥伤津，故令病痉；亡血汗多腠理不密，寒邪乘虚侵袭，正气内虚不能驱邪外达，反逆而上冲，故令郁冒；亡血伤津，肠胃失濡，故大便难。详产后病痉、产后郁冒、产后大便难各条。

产后三脱 指气脱、血脱、神脱。明·赵贞观《绛血丹书》：“产后患崩者，谓之血脱；气短似喘者，谓之气脱；妄言妄见者，谓之神脱”。也有认为产后气随血脱，出现的唇白，眼闭，口开，手撒，厥冷，六脉微细欲绝者，谓之气脱。

产后三禁 指产后禁止用药发汗、攻下、利小便。《景岳全书》卷三十九：“产后三禁，……谓不可汗，不可下，不可利小便”。因发汗太过亡阳伤气；攻下太过亡阴伤血；利小便太过会损伤津液。此系古人总结产后病治法应注意事项，临床上并不绝对禁用，当灵活掌握。

产后下利 病名。出《金匱要略·妇人产后病脉证并治》。包括产后痢疾。多因产后饮食伤及脾胃，饮食停积于内；产后气血虚少更兼热邪伤阴，或恶露不下，败血渗入大肠所致。伤于饮食者，症见下利兼腹胀痛，里急窘迫等。治宜导滞攻下。方用小承气汤。产后气血虚少更兼热邪伤阴，症见下利脓血，发热腹痛，里急后重，兼见身体困倦，虚烦不眠，唇干口渴等，治宜养血清利湿热，白头翁汤加甘草阿胶汤；若恶露不下，亦称产后痢，症见便痢鲜血，腹中刺痛，无里急后重，方用枳实、荆芥，水煎服。

产后下物如衄 病名。见清·陈笏庵《胎产秘书》。即产后阴下脱。详该条及子宫脱垂条。

产后大便下血 病证名。因产后失血伤阴，阴虚生热，热伤肠络所致。治宜养血清热。方用四物汤加味（四物汤加阿胶、地榆、血余、乌贼骨）。

产后大便难 病证名。出《金匱要略·

产后病脉证并治》。多因产后失血，伤津，阴液不能润肠所致。不宜轻用下法，徒伤元气。治宜润肠通便。方用润肠丸（当归、川芎、白术、熟地、麻仁、苏子、人参、甘草、郁李仁，蜜糖引）或用麻仁丸。待血旺津回，大便自通。

产后大便秘涩 病证名。见《卫生家宝产科备要》卷四、《妇人良方大全》：“产后大便秘涩，因肠胃虚弱，津液不足也，若腹闷胀，宜服《洁古家珍》麻仁丸润之。若用苦寒药通则危矣”。

产后口渴 病证名。见竹林寺轮应禅师《女科秘旨》。多因产后失血，多汗耗伤津液或阴虚火旺，火燥液涸所致。症见咽干口渴。治宜生津止渴。方用生脉散加花粉、石斛、知母。若因火燥液涸，消渴饮水不止，治宜滋阴降火，生津止渴，方用止渴四物汤（四物汤加知母、黄柏、茯苓、黄芪）。

产后口鼻黑鼻衄 病证名。产后重症之一。出《妇人良方大全》卷二十一。因产时气虚血散，营卫运行失常，胃绝肺败所致。症见口鼻有黑气环绕，鼻衄。急用二味参苏饮加附子，水煎服。并中西医结合治疗。

产后口噤 病证名。《妇人良方大全》卷二十一：“产后口噤，由血气虚，而风邪乘于手三阳经也。盖手三阳之筋，循结于颌，得风冷则筋急，故致口噤”。治以大补气血为先，虽有他症以末治之。如恶寒发热，乃属气血虚甚之极，方用十全大补汤加减；若不应，可用参附汤。

产后小便不利 病证名。见《千金翼方》卷七。多因平素虚弱，产后劳伤气血，脾肺气虚，通调不利；素体肾虚，复因产后损伤肾气，肾阳虚衰，气化失职；情志不畅，肝气郁结，气机受阻，清浊升降壅滞，膀胱不利所致。脾肺气虚者，兼见精神萎靡，言语无力等，治宜补气润肺，佐以行水，方用补气通脾饮（黄芪、麦冬、通草）；肾虚者，兼见腰膝酸痛，健忘，面色晦暗

等,治宜温阳化气行水,方用肾气丸;气机阻滞者,兼见精神抑郁,两胁胀痛,烦闷不安,治宜理气行滞,佐以利尿,方用木通散(木通、滑石、葵子、槟榔、枳壳、甘草),另用盐于脐中填平,葱白捣一指厚,安盐上,以艾柱放葱上,灸之觉暖气入腹内,难忍为止,小便即通。手指按压利尿穴(神阙、曲骨之正中),也效。

产后小便不通 病证名。指产后尿闭,小腹胀急疼痛,甚则坐卧不安。多因素体虚弱,产时劳力伤气,或失血过多,气随血耗,脾肺气虚,不能通调水道,下输膀胱;或素禀元气不足,复因分娩损伤肾气,以致肾阳不足,不能化气行水;或产后情志不畅,或悲怒伤肝,肝气郁结,气机阻滞,清浊升降失调,膀胱不利所致。气虚者兼见小腹胀急,精神萎靡,言语无力,舌质淡,治宜补气润肺,佐以行水,方用补气通脬饮(《女科辑要》:黄芪、麦冬、通草)。肾虚者兼见小腹胀满而痛,腰部痠胀,坐卧不安,面色晦暗等,治宜温肾化气行水,方用肾气丸;气滞者,兼见小腹胀痛,精神抑郁,甚则两胁胀痛,治宜理气行滞,佐以利尿,方用木通散(《妇科玉尺》:木通、滑石、葵子、槟榔、枳壳、甘草)。

产后小便数 病证名。出《诸病源候论》卷四十四。多因产后肾气虚弱,虚热移于膀胱;气虚不能约制;或冷气入于膀胱,膀胱失于约制等所致。虚热移于膀胱者,热甚则小便涩痛,方用六味地黄汤;气虚不能约制者,小便频数而色白,方用补中益气汤合桑螵蛸散;冷气入于膀胱者,小便频数而短,方用桂附八味丸。若因助产不慎,胞损而小便淋漓者,可结合手术治疗。

产后子宫不收 见明·赵贞观《绛血丹书》。即产后阴下脱。详该条及子宫脱垂条。

产后子宫脱出 即产后阴下脱。详该条及子宫脱垂条。

产后不语 病证名。出《经效产宝·续

编》。多因产后败血不去,停积于心;产后气血两脱,心气虚不能上通于舌,或痰热乘心,心气闭塞所致。败血停心者,症见面色紫黑,心闷,治宜活血开郁,方用芎归汤合七珍散(人参、石菖蒲、生地黄、川芎、细辛、防风、辰砂);心气虚者,兼见心悸气短,自汗等,治宜补益气血,以人参煎汤服;痰热乘心者,兼见喉间有痰声,面热胸高等,治宜清痰热,兼以和胃,方用二陈汤加胆星、钩藤等。古人有采用急刺眉心的方法,认为血出即语。因肾脉挟舌本,脾脉连舌本,大肠经散舌下,当这些脏腑有病,亦能出现产后不语。

产后中风 病名。出《金匱要略·产后病脉证并治》。多因产后气血骤虚,腠理不密,外邪乘虚侵袭所致。若感受风邪,连续十多日不解,头微痛,恶寒时时有热,心下闷,干呕,汗出。治宜调和营卫,桂枝汤主之。若症见发热面赤,喘而头痛,竹叶汤主之;若感受风寒,寒搏筋脉,症见筋脉挛急,牙关紧闭,不省人事,身如角弓,不宜当真中风治,华佗愈风散(荆芥穗焙干,研末,每服三钱,童便调,鼻饲下之)主之。参见破伤风条。

产后中柔风 病名。《诸病源候论》卷四十三:“柔风者四肢不收,或缓或急,不得俯仰也。由阴阳俱虚,风邪乘之,风入于阳则表缓,四肢不收也,入于阴则里急,不得俯仰也。产则血气皆损,故阴阳俱虚,未得平复,而风邪乘之故也”。治宜气血双补,佐以祛风。方用八珍汤加羌活、桂枝。

产后中暑 病名。见《石室秘录》。多发生于产后1~3天内。因产后气血未复,盛夏炎热,暑邪乘虚侵袭肌体,阴气卒绝,阳气暴壅,经络不通而致高热,神志不清等症。若热中于里,兼见心烦口渴,大汗面赤,脉洪大,治宜生津止渴,方用《伤寒论》人参白虎汤。若脏热内炽,热甚伤津,烦渴,大便不通,甚至发斑,宜涤除胃热,

方用玉泉散（生石膏，粉甘草）；若热毒入营，燔灼脏阴，症见谵语，四肢抽搐，神志不清，面色苍白，脉细弱，治宜清热养阴，方用清营汤及生脉散加减。针刺十宣放血等法。若证状初起，出现头晕，恶心，胸闷心慌，口渴汗多，为预防中暑，可用清暑益气法，方用清暑益气汤（苍术、黄芪、升麻、人参、白术、神曲、泽泻、黄柏、当归、青皮、麦门冬、干葛、甘草、五味子）。

产后内极七病 《诸病源候论》卷四十四：“产后血气伤竭为内极七病，即旧方所云七害也。一者害食，二者害气，三者害冷，四者害劳，五者害房，六者害任（任同妊），七者害眼。皆产时伤动血气，其后虚极未平复，犯此七条而生诸病”。

产后风冷虚劳 病证名。又名产后风虚冷劳。《诸病源候论》卷四十三：“产则血气劳伤，脏腑虚弱，而风冷客之，风冷搏于血气，血气不能自温于肌肤，使人虚乏疲顿，致羸损不平复，谓之风冷虚劳。若久不瘥，风冷乘虚而入腹，搏于血则否涩，入肠则下利不能养或食不消，入子脏，则胞脏冷，亦使无子也”。

产后风虚冷劳 病名。《妇人良方大全》卷二十一：“产后气血劳伤，脏腑虚弱，若风冷乘之，血气愈虚，形气羸损，风冷入脏，令人无子，谓之风虚冷劳也”。参产后风冷虚劳条。

产后风痙 病证名。亦称产痙。多由冲任血虚，心脾失养，故宗筋弛，不能束骨而利机关，令人手足痿弱，怔忡目眩，宜用血风汤，或以大红野蔷薇花子一两，酒煎服。初起一般可愈，如日久两手不能提举，以蔷薇花四两，当归二两，红花一两，浸酒五斤，每日随量饮之。若以降火滋阴，破气破血为治，则荣卫愈伤，终身废弃。

产后心风 病名。清·施雯《盘珠集胎产证治》：“心虚而受风邪，遂成惊悸，名曰心风，其证目睛不转，其脉动而弱，宜大

补气血，其作风治，速之危矣”。

产后心包络痛 病证名。出《妇人良方大全》卷二十。因素有宿寒，产后太虚，寒搏于血，血凝不行，上冲心之络脉所致。症见心胸闷痛，甚至胸痛彻背。治宜散寒以温通。方用大岩蜜汤。参见产后心痛条。

产后心痛 出《诸病源候论》卷四十三。包括产后心包络痛、产后真心痛。多因素有宿寒，产后体虚，寒搏于血，血凝不行，上冲心之络脉；或气血大虚，寒搏于血，血与寒凝，伤及心经所致。血与寒凝，伤于心之络脉者，亦称心包络痛。症见心胸闷痛，甚至胸痛彻背。治宜温通散寒。方用大岩蜜汤。伤于心之正经者，亦称真心痛，症见指甲青黑，手足冷而过节，旦发夕死，夕发旦死，方用大岩蜜汤合失笑散。因胃位于心窝部，故古人有称产后胃脘痛为产后心痛。

产后水谷利 见《傅青主女科·产后编》。即产后完谷不化。详该条。

产后水肿 病证名。见明·赵贞观《绛血丹书》。因素体脾肾虚弱，产后脾肾之阳益虚，水湿不得敷布，溢于肌肤四肢所致。症见手足浮肿，皮肤光亮色润。治宜大补气血为主，佐以利水。方用八珍汤加苍术、茯苓。若壅满加陈皮、半夏、香附；虚者倍用人参、木通；有热加黄芩、麦冬。参见产后浮肿条。

产后玉门不敛 见清·沈明宗《医征女科》。即产后玉户不敛。详该条。

产后玉户不敛 病证名。又名产后玉门不敛、产户不敛、产后阴户不闭、阴门不闭。《万氏妇人科》：“女子初产，身体纤柔，胞户窄小，子出不快，乃至折裂，浸淫溃烂，日久不敛。宜内服十全大补汤，外用敷药：白芨、白龙骨、诃子、烂蜂壳（全蜂房）、黄柏（炒），各等分为细末，先用野紫苏叶煎洗拭干。干后以药搽之”。相当于产时会阴裂伤。可结合会阴修补及局部换药等

方法处理。

产后目闭 病证名。指产后闭目不语。由痰气郁滞，或瘀血壅滞经络关窍不通所致。痰气郁滞者，孤风散治之（胡氏方：生石矾末，每服一钱，热水调下）；瘀血壅滞经络者，《类证普济本事方》琥珀散主之。清·叶其纂《女科指掌》：“武叔卿曰：痰气郁滞，闭目不语者，孤风散。纂谓肝开窍于目，又五脏六腑皆上注于目，曾治伤寒热病，凡见目瞑目闭者，俱是血分受病，或衄血蓄血，热入血室，触经感冒等症，则知产后目闭，不独痰气一条，亦有瘀血壅滞经络关窍不通者，因制琥珀散用之验”。

产后目病 指妇人产后由于气血虚弱，邪气内乘所引起的眼部各种疾患的总称。《张氏医通》卷八：“产则百脉皆动，邪易以乘，肝部发生之气甚弱，而胆失滋养，精汁不盛，则目中膏液，皆失化源。所以目病者，多皆内不足所致”。

产后目痛 病证名。清·单南山《胎产证治录》。因产后出血过多所致。症见眼痛不能视，羞明隐涩，眼睑无力，眉及太阳酸痛等。治宜补血养营。方用当归养荣汤、当归补血汤。有热者加黄芩；脾胃不和，恶食不饮食者加生姜。

产后目瞑 病证名。《诸病源候论》卷四十四：“目不痛不肿，但视物不明，谓之目瞑。肝藏血，候应于目，产则血虚，肝气不足，故目瞑也”。《金梦石产家要诀》：“经云，目者属肝，肝和则知黑白。又云，脱阴者，目盲血不荣也。又云，目得血而能视，肝藏血，开窍于目，产则血虚肝气不足，故目瞑。四物汤，六味地黄汤”。

产后四不活 是古时对产后四种危重症的描述。宋·陈选《妇科秘兰》：“一者身体强直，有如反张，小腹胀痛，口噤不开，亦名摩风，乃产后为风邪所中，华佗愈风散灌之最妙（方见产后中风条），不得大发其汗。二者产后气急，喉中如猫声，此因败血

冲心，入喉中，危证也。三者产后中风，初病眼腰强，筋急，角弓牙关紧急，母产后七日未满劳动，百日之中伤于房事所致，难治。四者产后面色黑及遍身黑靨者，因败血入于皮肤，百无一生也”。

产后四字真言 古人总结产后调养的四件注意事项。出清·袁于江《生生宝录》。一曰静，二曰淡（咸伤肾后而绝产，酸伤肝行步艰难，煎炒厚味伤脾），三曰乐（乐则血气易和），四曰坐（使血不上攻）。

产后四肢虚肿 病证名。《经效产宝·续编》：“产后四肢虚肿者如何？答曰：产后败血乘虚停积于五脏，循经流入四肢，留淫入深，回还不得，腐坏如水，故令四肢面目浮肿。医者不辨，作气治之，凡水气多用导水药极虚之。夫产后既虚，又以药虚之，是重虚也。但服调经散（没药、琥珀、桂心、芍药、当归、麝、细辛）。血行肿消，则病自愈。

产后乍见鬼神 旧病名。出《经效产宝》。指产后出现幻视幻觉的病证。多因产后血去太多，神无所归，或败血停积，上攻于心所致。若血去太多，兼见心神恍惚，睡卧不安。治宜补血养心宁神。方用茯神散（茯神、柏子仁、远志、人参、当归、生地、炙草、桂心、辰砂）。若败血上攻于心，兼见心下胀闷，烦躁昏乱，治宜活血祛瘀，方用芎归泻心汤（当归、川芎、延胡索、蒲黄、牡丹皮、桂心）调五灵脂另研末食后服。参见产后妄行妄见条。

产后乍寒乍热 病证名。见《千金要方》卷三。由产后气血虚损，阴阳不和或败血留滞，经脉阻闭，营卫不调所致。《经效产宝》：“阴阳不和，败血不散，皆作乍寒乍热……，二者何以别之？答曰：时有刺痛者败血也，但寒热无他症者，阴阳不和也。”气血虚损者，治宜补益气血，调和阴阳，方用增减四物汤（当归、芍药、川芎、人参、干姜、甘草）加柴胡。败血留滞者，

治宜活血通经，方用夺命丹或生化汤加柴胡。

产后头痛 病证名。见《妇人良方大全》卷二十二。多因产后失血过多，不能上荣于脑，或恶露停留胞宫（厥阴之位，其脉贯顶），循经上冲于脑所致。失血过多者，兼见面色苍白，小腹隐痛。治宜补血益气。方用八珍汤加蔓荆子。瘀血上攻者，兼见小腹刺痛，拒按等，治宜活血化瘀，方用黑龙丹（《证治准绳》：当归、五灵脂、川芎、良姜、熟地黄）。

产后发热 病证名。见《医学纲目》。指分娩后，因各种原因引起的发热。常见的有外感、血虚、血瘀、食滞、感染邪毒等。外感多因气血骤虚，卫外不固，外邪乘虚袭入，症见恶寒发热，头痛，肢体疼痛，无汗或咳嗽流涕，治宜养血祛风为主，方用荆防四物汤（四物汤加荆芥、防风）。属血虚者，因产时失血，阴不敛阳，虚热内生，症见微热，头晕，心悸或腹痛绵绵，治宜补气血，调营卫，方用八珍汤；若症见午后热甚，两颧发赤，口渴喜冷，便秘尿黄，治宜滋阴清热、养血，方用一阴煎。属血瘀者，瘀血留滞经络，营卫不调，寒热时作，恶露不下或甚少，色紫暗有块，或有臭味，小腹胀痛，拒按，治宜养血逐瘀、解热，方用生化汤加味；属食滞者多因恣食肥甘，停积不化，症见胸膈饱闷，噎腐吞酸纳呆或脘腹胀痛，治宜消食导滞，方用异功散；属感染邪毒者，因产后气血虚弱，邪毒直中胞宫，正邪交争，症见高热，口渴，汗出，腹痛拒按，甚则神昏谵语，皮肤出斑疹，治宜清热解毒、活血化瘀，方用清热解毒汤（辽宁医学院主编《妇产科学》：银花、连翘、蒲公英、紫花地丁、丹皮、花粉、地骨皮、大青叶、益母草、赤芍、蒲黄）；若神昏谵语，可用安宫牛黄丸，紫雪丹等。

产后发痉 痉同痙。见《薛氏医案》。即产后痉病。详该条。

产后发斑 病证名。属产后危证之一。

因产后败血流入脏腑，肌肤四肢热结流注，转还不得所致。《女科备要》（作者佚名）：

“产后面黄色干，口中流血，遍身色点生斑如何？答曰：产后败血入五脏六腑，皆满流入肌肤，败血出入，流走四肢，热结流注，转还不得，故有此症……。”治当清热散结、消斑逐瘀为主。

产后耳聋 病证名。《诸病源候论》卷四十四：“肾气通耳，而妇人以肾系胞，因产血气伤损，则肾气虚，其经为风邪所乘，故令耳聋也”。治宜补益肾气为主。方用金匱肾气丸。

产后肉线 见徐润之《最新达生篇》。即产下肉线。详该条。

产后舌出 病证名。见戴武承《女和指南集》。舌尖属心，舌根属肾，舌两边属肝胆，一舌原通三经之气。产后元神虚惫，少阴厥阴大败，经脉失养，以致舌出不收。治宜于舌上外涂朱砂末，内服保元汤。

产后舌黑 病证名。出《肖山竹林寺妇科》。多因肾水涸竭，肺津焦燥，产后血气已损，肾阴肺津耗竭所致。症见舌黑如尘，心闷发烧，口燥，耳焦唇青。治宜滋养阴液。用增液汤加知母、鲜石斛等。也有主张用春泽汤（猪苓、泽泻、茯苓、白术、炒黄柏）治疗，服后舌有津可治，无津病危。

产后伤风 病证名。指产后气血两虚，风邪外乘而言。症见鼻塞声重，流清涕，自汗，恶风等。若恶露未尽，而小腹痛者宜行血理气，用《金匱》旋复花汤；若恶露已尽，小腹痛，但头痛身热，足冷自汗，咳嗽者，治宜和营卫，黄芪建中汤加减；头重者，治宜解表除湿，方用香苏散加减；若风寒并伤，遍体痛无汗，宜败毒散。虚甚者不可发散，宜逍遥散去术加桂枝。

产后伤食 病证名。见《傅青主女科》。指产后饮食不节，损伤脾胃，症见脘腹满闷，噎腐吞酸，大便酸臭。治宜清补兼施。

方用生化汤加消导药。伤面食加神曲、麦芽；伤肉食加山楂、砂仁；伤生冷加吴茱萸、肉桂；虚者加人参、白术或用保和丸；停滞冷物，日久脾胃虚极，影响消化吸收者，用炒神曲热熨胃脘部。

产后伤寒 病证名。《诸病源候论》卷四十四：“触冒寒气而为病，谓之伤寒。产妇血气俱虚，日月未满，而起早劳动，为寒所伤，则啬啬恶寒，翕翕微热，数日乃歇，重者头及骨节皆痛，七、八日乃瘥也”。因产后气血大虚，卫外不固，寒邪乘虚侵袭肌表所致。症见产后恶寒发热，头痛，无汗或有汗。治宜补虚为主，佐以祛邪。有汗用桂枝四物汤，无汗用麻黄四物汤。

产后自汗 证名。产妇在饮食时或睡眠中汗出较多，一般2~3天之后可逐渐减少以致恢复，属正常生理现象。若汗出过多或持续时间长，则属病态。多因体质素弱，复因产时气血耗伤，以致肺气更虚，卫阳不固，腠理疏泄，气阴两虚所致。症见产后汗出较多，不能自止，时或恶风微热，面色晄白，气短懒言，语声低怯，头晕，心悸，倦怠乏力。治宜补气固表止汗。方用玉屏风散加大枣、生姜。

产后血气痛 病证名。指产后余血未尽，瘀阻所致的腹痛身热等症状。《肖山竹林寺妇科》：“产后血气痛，此乃瘀血未尽，腹中作痛，遍身发热，宜除去瘀血，而热自退。法用当归红花散（红花、当归、牛膝、三棱、莪术、川芎、紫苑、苏木、枳壳）。

产后血奔 见江天览《妇女病自疗法》卷一。即产后余血奔心。详该条。

产后血晕 病名。出《经效产宝》。多因产后气血暴虚，虚阳上冒清窍，或恶露不下，内有停瘀，上攻心胸所致。若属虚证，症见分娩后忽然头晕，昏厥，不知人事，治宜温养气血，活血祛瘀，方用清魂散或黑神散；若兼见肢冷，自汗，恶寒，少气面白，

宜回阳救脱，方用参附汤；若瘀血内停，兼见恶露量少，涩滞不下，治宜行血化瘀，方用琥珀散或佛手散；若兼见产后血晕，闷乱，神昏口噤，当开其噤，以药灌之。药用牡丹皮、大黄、芒硝、冬瓜子、桃仁等。如属用脑过度而晕厥者，可用针刺人中等法治疗。

产后血崩 病名。见《卫生家宝产科备要》卷四。多因产时损伤冲任胞脉，产后经脉未复，劳役损伤；胞衣不下，冲任胞脉受阻或产褥期房事过早所致。症见阴中突然大量流血或暴崩不止。治法参见血崩、胞衣不下条。

产后血淋 病名。《经效产宝》：“有因产损血气，血气虚则挟热，热搏于血，血即流渗于胞中，故血随小便出”。治宜清热利小便。用瞿麦、黄芩、冬葵子、通草、大枣、车前子。

产后血瘕 病名。《经效产宝》：“产后瘀血，与气相搏，名曰瘕。谓其痛而无定处，此因夙有风冷而成，轻则否涩，重则不通”。《校注妇人良方大全》卷二十：“前症（指产后血瘕）乃寒邪乘客，气血壅结，此因气病而血病也。常补养胃气，调和月经，宽缓静养为善。《难经》云：任脉之病，男子为七疝，女子为瘕聚。”用当归、桂心、芍药、血竭、蒲黄、延胡索为末，每服二钱，空心酒调下。

产后危证 宋·薛轩《坤元是保》：“产后危证有四：呕吐、盗汗、泻痢、喘息是也。并见者死，仅见者危。”

产后交肠病 病名。又名差经。郑玉峰《济阴要旨》：“产后交肠病，又谓之差经，大小便易位而出。干粪结燥不行，方用润肠汤（麻黄、大黄、生地、熟地、升麻、当归尾、桃仁、红花、甘草）治之。如大便溏薄，而从小便出者，宜五苓散、调气散（木香、香附、人参、陈皮、藿香、甘草、厚朴加阿胶末，沸汤调服”。本病相当于产伤造成的

阴道直肠痿等。现多采用手术修补。也可结合中西药治疗。

产后产户痛 见《王节斋公胎产》。即产后阴痛。详该条。

产后妄言妄见 病证名。见朱丹溪《胎产秘书》。多因产后血出过多，心失所养，神无所归，或产后恶血不去，瘀血攻心所致。症见神志恍惚，或妄言妄见。气血虚弱者，兼见少气懒言，面色无华，自汗等，治宜补气血，方用滋荣益气复神汤（龙眼肉、川芎、当归、人参、黄芪、白术、枣仁、柏子仁、茯神、益智、陈皮、麦冬、五味子、莲心）；瘀血上攻者，兼见恶露涩滞不下等，治宜养血活血宁神，方用安神生化汤（川芎、当归、干姜、甘草、桃仁、茯神、人参、益智、柏子仁、陈皮，枣水煎服）。

产后汗出 病证名。清·王实颖《新产证治》：“产后汗出不止。由劳伤脾，惊伤心，怒伤肝，患此三者，不宜即加敛汗之药，但令神安则汗自止。且血块作痛，芪术末可遽加。凡产毕，先服生化汤两帖，以消块，继服调卫止汗汤（黄芪、麻黄根、当归、桂枝、炙草、枣）。若倦甚而潏潏然汗出，形色俱脱，乃亡阳汗脱也。难拘常法，从权以参芪调卫（人参、炙芪、麻黄根、当归、桂枝、防风）救急。待产母稍有精神，又减参芪以除块痛。若汗多而阴竭阳微，以致筋脉拘急，项强口噤，牙禁发搐，类伤寒痉症者，慎勿作伤寒治，宜加味生化汤，随证加减。汗虽有自汗盗汗之分，治当兼理血分药品，并宜加味生化汤。余方俱非产后盗汗所宜。若服参芪大剂，汗多不止，及头面汗出不止，腰足青色者不治。”若汗出不止，真阳已衰，卫外之阳不固，方内宜加附子、枣仁、炒野术、牡蛎粉等。

产后汗血 病证名。出《诸病源候论》卷四十三。因产后阴气大虚，血气伤动所致。症见产后汗出如血。治宜大补血分。方用圣愈汤加阿胶，或用单方刺猬皮散（刺猬

皮烧灰每服二、三钱，米饮调下，或用肉煮食者更佳）。

产后汗雨不止 病证名。出清·徐大椿《女科指要》。多因产后心肾气虚，身体大虚，不能统摄津液所致。证见汗出如雨。治宜养心益肾。方用人参枣仁汤（人参、枣仁、五味子、茯神、归身、草灰、萸肉、乌梅）加牡蛎散治之。

产后阴下脱 出《诸病源候论》卷四十四。包括产后子宫脱出、产后子宫不收。产后下物如钵。多因宿有虚冷，产时用力过度，其气下冲所致。症见子宫脱出或伴有阴道壁下垂等。治法参见子宫脱垂条。

产后阴户不闭 即产后玉户不敛。详该条。

产后阴痛 又名产后产户痛。指产后阴部疼痛。多因产时损伤，感染邪毒，或起居不慎，产门感受风寒所致。治宜活血疏风，祛风定痛汤（生地、当归、茯苓、川芎、荆芥、防风、肉桂、大枣）主之。若产时损伤，兼见浸淫溃烂，日久不敛，治法参见产后玉户不敛条。

产后呕吐 病证名。见清·周纪常《女科辑要》。多因产后恶露去少，败血散于脾胃；或产后血去过多，而气独盛，以致气逆所致。败血散于脾胃者，脾受之则不能运化精微，兼见腹胀；胃受之则不能受纳水谷，而出现呕吐。同时伴有恶露下行，滞而不爽。治宜活血祛瘀、降逆和胃。方用抵圣汤（人参、半夏、赤芍药、泽兰叶、橘皮，入姜汁数匙）。若以寻常止呕药治之，更伤动正气，病难治愈。气盛以致气逆者，症见腹胀呕吐，兼见气短乏力，面色不华，产后下血量较多，治宜益气和胃，降逆止呕，方用《和济局方》人参养胃汤。

产后呕逆不食 病证名。出《妇人良方大全》卷二十一。多因产后劳伤脏腑，寒邪乘于脾胃，气逆呕吐，瘀血上冲，胃失和降，或痰浊中阻，胃气上逆所致。寒邪乘于

脾胃者，治宜温中散寒，方用温胃丁香散（当归、白术、炮姜、丁香、人参、陈皮、炙甘草、前胡、藿香）；瘀血上冲者，治宜活血祛瘀，降逆止呕，方用生化汤加生姜、半夏；痰浊中阻者，治宜除湿祛痰，降逆止呕，方用平陈汤。

产后吞酸 病证名。庄复严《妇科百辨》：“妇人产后吞酸者何？曰此胃中积痰滞火所致。宜七气合二陈汤”。

产后余血奔心 病名。出《经效产宝》。又名产后血奔。因产后虚火上炎，恶露未尽，随火逆上以致余血奔心所致。症见心中异常烦闷，口渴不已。治宜通瘀降火。方用三合汤合芎归汤。若见心中虚热烦闷，气欲绝，方用大枣、茯苓、生姜、甘草、竹沥、人参、粳米、麦门冬；若见烦闷，腹痛，方用生地、川芎、枳壳、芍药。

产后肝萎 古病名。清·曾懿《妇科良方》：“产后小儿生下失血过多，遂遗下一物，如脂膜状，乃气血素亏，产前劳伤，肝之脂膜，随血崩堕，名曰肝萎。治宜大补气血，略加升提之品”。类似胎膜残留。

产后狂言谵语 出《妇人良方大全》卷十八。多因产后失血，心血不足，心神失养，败血扰心；或外感风寒，恶露不行；或产伤气血，心气大虚所致。症见言语颠倒，眼见异物，狂乱胡言。产后失血，心血不足，则宜芎归合华佗愈风汤；败血扰心则宜用芎归汤；外感风寒，恶露不行，治宜芎归汤加荆芥、藁本、炮姜等；因产伤气血，心气大虚宜芎归汤兼服补心丸（炙黄芪、枣仁、远志、茯苓、生地、人参、菖蒲，大枣和丸，朱砂为衣）。

产后狂越戴 病名。见戴武承《女科指南集》。狂者，狂乱而无一定；越者，乖越礼法，而失常度。指产后精神病。多因产后败血冲心，或素有痰郁，产后失血，心火旺盛，火动痰凝心窍所致。若败血冲心，心无所主，症见喜笑，妄行不休，甚则弃衣而

走，登高而呼，踰垣上屋，骂詈产不避亲疏。治宜活血祛瘀。方用涤痰散（桃仁、灵脂、蒲黄、木通、青皮、归尾、牛膝、延胡索，水煎冲朱砂一钱）；若火动痰凝心窍，兼见气粗腕闷，两颊通红，作渴引饮，治宜泻火涤痰，方用紫金丹（乌犀尖、大黄、胆星、杏仁、瓜蒌、元明粉、海浮石、鲜首乌）。

产后言语含糊 病证名。见周丹枕《胎产指南》。因产失血太多，心血虚弱，故舌萎卷缩。治宜滋阴养心。方用生脉散合四物汤。

产后完谷不化 病名。俗名产后水谷利。素体脾胃虚弱，复因产后劳倦伤脾，转输失职所致。症见泄泻完谷不化。治宜温阳健脾祛瘀。方用生化汤加益智仁、砂仁、豆蔻、木香、柴胡、升麻、陈皮、党参。

产后尿血 病证名。出《诸病源候论》卷四十四。又名产后溺血。多因产后血气虚而热乘之，血得热则流散，渗入膀胱，故血随小便出。治宜发灰、滑石，地黄汁调下。若小腹痛者，属败血流入膀胱，宜用小蓟汤主之（归尾、小蓟根、红花、赤芍、元胡索、牛膝、琥珀、甘草梢，兼热者加黄芩、麦冬）。

产后青肿 病证名。指身体某部皮肤出现的青肿。陆成一《女界须知》：“妇人经验方云，此血水积也。干漆，大麦芽等分为末，新瓦罐铺漆一层，麦芽一层，层层令满，泥封煨赤，取出研末，热酒调服二钱”。

产后郁冒 病名。①出《金匱要略·妇人产后病脉证并治》。郁指郁结而气不舒，冒指昏朦而神不清。因产后失血过多，汗出腠理不密，寒邪乘虚侵袭所致。由于正气内虚，不能驱邪外达，反逆而上冲。症见头眩目昏，郁闷不舒。《金匱要略》：“产妇郁冒，其脉微弱，呕不能食，大便反坚，但头汗出，……小柴胡汤主之”。②见《证治准绳·女科》。指血晕。详产后血晕条。

产后拘挛 病名。多因产后气血骤虚，风寒乘虚侵袭，入于经络；或因产耗伤气

血，肝血不足，筋失所养而致。症见四肢筋脉拘挛；若风寒侵袭，兼见恶寒发热，有汗或无汗等。治宜养血祛风。方用荆防四物汤（四物汤加荆芥、防风）。若肝血不足，兼见头昏目眩，耳鸣不愿视人，两目干涩等，治宜养血柔肝，方用四物汤加钩藤、木瓜。

产后败血成痼 徐润之《最新三字达生续编》：“产后……败血留内，结成痼疽，只宜生化汤加连翘、双花、甘草、节乳香、没药治之，切不可用寒凉败毒之药，恐溃后腐烂，必难医治。”

产后胁痛 出清·寄湘渔父《达生保赤编》。多因气血瘀滞，或因产后失血过多，肝脉失养所致。古人认为病在左者多属血，病在右者多属气。属血瘀者痛过于胀，治宜活血祛瘀止痛，方用生化汤去炮姜加延胡；属气滞者，胀过于痛，治宜理气止痛，方用四君子汤加柴胡、青皮；若因去血过多而痛者，宜八珍汤加肉桂。

产后乳汁自出 病证名。出《经效产宝》。多因产后脾胃气虚，摄纳无权，因而乳汁随化随出；或肝火亢盛，疏泄太过，以致乳汁自溢。气虚者，乳房不胀，乳汁清稀，兼见气短乏力等，治宜补气养血，佐以固摄，方用十全大补汤加减；肝热者，乳胀，乳汁较浓，兼见烦躁易怒，口苦咽干等，治宜平肝清热，方用柴胡清肝散（《证治准绳》：柴胡、黄芩、当归、生地、牡丹皮、黄连、山梔、川芎、升麻、甘草）。或用丹梔逍遥散。

产后忿怒 病证名。见清·王实颖《广嗣五种备要》。多因产后失血，肝血不足或情志不遂所致。症见胸膈不舒，多怒等。治宜生化汤去桃仁加木香末二分。若轻产重气，偏用香附、乌药、枳壳之类，则元气反损，满闷益增。

产后狐惑 病名。见清·陈笏庵《胎产秘书》。前后二阴溃疡称之为狐；口腔、咽部溃疡称之为惑。狐惑即指前后二阴和口腔、

咽部溃疡的病证。王实颖《广嗣五种备要》：

“产后狐惑症乃外感伤寒，邪传入里，寒变为热，里又不清，则湿热结为阴毒，流注大肠，清阳不升，浊阴不降，湿热久郁而生虫，渐蚀肛门，万难救一。盖产后气血两亏，又兼外感，所谓两感症也，忌用柴、梔、芩、连、知、柏、丹皮凉泄药物，遏郁寒邪，引贼入室。宜十全大补，或补中益气加减治之。人参断不可少。可加文蛤一、二钱，大胡麻三、四钱”。

产后疟 病名。《诸病源候论》卷四十四：“夫疟者，由夏伤于暑，客在皮肤，至秋因劳动血气，腠理虚而风邪乘之，动前暑热，正气相击，阴阳交争，阳盛则热，阴盛则寒，阴阳更盛，故发寒热。阴阳相离，则寒热俱歇。若邪动气至，交争复发，故疟休作有时。”热多者，方用草果饮子（半夏、赤茯苓、甘草、草果、川芎、陈皮、白芷、青皮、良姜、紫苏、干葛）；寒多者，方用生熟饮子（肉豆蔻、草果、厚朴、半夏、陈皮、甘草、大枣、生姜）。

产后疝瘕厥痛 病名。郑连山《女科临床效方》下卷：“产后动怒，气血皆逆，面冷，肢冷，痛呕不卧，口鼻气寒，必自下冲上，此属疝瘕厥痛。川楝、吴萸、桂枝、云苓、薤白头、雄鼠矢”。

产后怔忡 病名。产后血去过多，心气不足则心中惕惕然跳动不安，谓之怔忡。如产后血块未净，恶露流行不畅，治宜祛瘀生新，方用生化汤；如无瘀血残留，宜调和脾胃，补气养血，方用人参养荣汤。

产后单潮 病名。凤林寺《女科秘宝》：“产后单潮，此症当审虚实，如血尽发热乃是虚热，当服八珍汤；若食炒鸡姜椒热物，此虚中有热，加枳壳、黄连；若恶血未尽发热，宜服红花当归散”。指产后出现的单纯发热而无其他兼证。参产后发热条。

产后泄泻 病证名。又名产泄。《丹溪心法》：“产后泄泻，此余血渗入大肠为

泄，洞泄不禁，下青白黑色，用荆芥大者四、五穗，于盏内烧灰，不得犯油火，入麝香研汤调下。此药虽微，能治大病，方名的奇散”。《张氏医通》卷十一：“产后泄泻。其因有五。一者因胎前泄利未止，产后尤甚；一者因临产过伤饮食，产后滑脱；一者因新产骤食肥腥，不能克运；一者因新产烦渴恣饮，水谷混乱；一者因新产失护，脐腹脏腑受冷。其致泻之由虽异，一皆中气虚寒，传化失职之患，并宜理中汤为主。食加枳实、山楂；水加桂心、茯苓。虚加桂附倍参；寒加桂附倍姜；久泻肾虚加桂心、熟附；痰结不行加炮楂、归身。若见完谷不化，色白如糜，此脾胃大虚，元气虚脱之候，十有九死。惟猛进温补之剂，庶可挽回。即有烦躁、发热、面赤，脉来数大，皆虚火上炎之故，当并进桂、附、人参、甘、姜、苓、术之类，伏龙肝煮汤代水煎服，仍得收功。若小便混浊如泔，或大便中有白沫，如肠垢者，乃元气下陷之故，并宜补中益气加桂苓、炮姜升举之。或臭水不止加藜艾、香附、吴茱萸”。

产后宜戒 见清·倪东谟《产宝家传》。古时认为：一戒怒气，二戒勉强起居，三戒七日内沐浴梳头，四戒早食厚味荤腥。

产后孤阳绝阴 病名。产后喘息危证之一。又名产后喉中气急喘。《产育宝庆集》上卷：“产后喉中气急喘者何？答曰：荣者血也，卫者气也，荣行脉中，卫行脉外，相随上下，谓之荣卫。因产所下过多，荣血暴竭，卫气无主，独聚于肺中，故令喘也。此名孤阳绝阴，为难治；恶露不快，败血停凝，上薰于肺，亦令喘急，如此但服夺命丹（附子、丹皮、干漆、大黄），血出，喘息自定。”

后面黑 病证名。江天览《妇女病自疗法》：“产后恶血入腹，以致面色黑暗，发现面部突然变黑，呼吸急促欲死，治宜散瘀补气。苏木一两，水三盅，煎至一盅，调

人参细末五钱服”。

产后咽痛 病证名。风林寺《女科秘宝》：“此症因寒伤肺经，有痰涎攻上，致咽中作痛。宜服甘桔汤：甘草三钱，桔梗一两”。

产后咽喉作蝉声 病证名。产后危证之一。出孟葑《仁寿镜》。因产后败血冲遏于心，入于肺，气与血并，喉声如蝉鸣。治宜乳香一钱，煎汤入陈酒三分服之。

产后咳嗽 病证名。出《诸病源候论》卷四十四。多因产后气虚，风寒袭肺，恶露上攻，肺经受邪或阴虚血热，上烁肺络所致。风寒袭肺者，症见发热恶寒，鼻塞声重，鼻流清涕，治宜散寒止咳，方用参苏饮；恶露上攻者，兼见胸膈满闷，治宜破瘀止咳，方用二母散（知母、贝母、人参、茯苓、桃仁、杏仁）；阴虚火盛，上烁肺金者，症见咽干，干咳少痰，伴午后潮热，治宜养阴清热，方用麦味地黄丸加减。

产后类中风 病名。见《傅青主女科》。产后由于气血暴虚，百骸少血濡养，出现忽然口噤牙紧，项强，手足筋脉抽搐，类似中风症候，不可以真中风治疗。治宜养血和络，先服加参生化汤，后服滋荣活络汤（羌活、川芎、当归、熟地、人参、黄芪、茯神、天麻、炙草、陈皮）。《张氏医通》卷十一：“产后类中风症，大多血虚，非真中也。或挟风，或挟痰，或挟气，证虽不一，治法莫要于行血。芎归汤加荆芥穗，淋黑豆酒煎服。亦治角弓反张，手足痠痲。脉来虚浮者，血晕四肢强直，芎归汤加童便，或用荆芥穗微焙为末，豆淋酒调下二钱，或童便服之，口噤则扶齿灌之，齿噤则灌入鼻中即苏。手足瘫痪，败血入经络也，用五积散。又有形盛气虚，产后痿废不起者，但服补气药中兼行气为主，朝用香砂六君子，暮用越鞠丸，久服自效”。

产后类伤寒二阳症 指产后出现类似伤寒太阳、少阳二阳经的症候。由气血两虚，

阴阳不和所致，与外感的病症不同。赵贞观《绛血丹书》：“产后七日内外，有发热头痛恶寒，勿专作太阳证治之以麻黄汤；发热头痛胁痛，勿专做少阳证治之以柴胡汤。皆由产后气血两虚，阴阳不和而然也。且产妇脱血之后，而重发其汗，则虚虚之祸，不可胜言。仲景云：亡血之家不可发汗。丹溪云：产后不可发表，虽明知产后真伤寒，亦当于生化汤中入芎、姜散之可也”。

产后类症 病证名。见《傅青主女科》。指产后出现寒热往来，每日应期而发，似疟而非疟，故名。多因产后气血双虚，阴阳失调，或瘀血停留，荣卫不和所致。气血双虚，若有汗，每日午后而发者，治宜滋荣养气扶正汤（人参、炙黄芪、白术、川芎、熟地、麦冬、麻黄根、当归、陈皮、炙草、枣）；若头痛无汗者，治宜加减养胃汤（当归、苍术、茯苓、人参、半夏、川芎、陈皮、藿香、炙甘草、鲜姜）；瘀血停留者，治宜活血化瘀，生化汤加柴胡、鳖甲。前人经验：产后类症不宜用草果、常山等截疟药治疗。

产后恶血入心 病证名。又名产后恶血冲心。指产后由于正气亏损，虚火上炎，以致恶血冲心。出现烦闷欲绝，神识昏迷的症候。宜用七珍散（人参、生地、川芎、防风、菖蒲、细辛、飞朱砂）补之”。

产后恶血入肝 病证名。指产后恶血入于肝经，出现手足痠痲，筋挛抽搐的症候。吴梅菴《秘传内府经验女科》：“肝主筋，产后或加郁怒，致败血入于肝，手足痠痲，筋挛抽搐，有似中风状者是。丹皮散主之（丹皮、防风）”。

产后恶血入肺 病证名。指产后由于瘀血入于肺经，出现咳逆气急，口鼻黑气的症状。吴梅菴《秘传内府经验女科》：“若瘀血入于肺，咳逆气急，口鼻黑色，或鼻中血出乃属危候，宜二味参苏饮加附子”。

产后恶血入脾 病证名。指产后由于瘀

血入于脾经，出现嘔恶不食的症候。吴梅菴《秘传内府经验女科》：“产后食伤而呕，血亦随气上逆，入于脾胃，故嘔恶不食，宜服抵圣汤治之（人参、半夏、陈皮、泽兰、赤芍、炙草、生姜）”。

产后恶血冲心 病证名。见《太平圣惠方》卷八十，即产后恶血入心。详该条。

产后恶血循经 病证名。由产后恶血循经流注所致。症见产妇筋骨疼痛，转身不得；或指爪黑晕起，舌根青色。治宜行气活血。郑玉峰《万宝方》认为此病可用当归、川芎、乳香、没药、桃仁、乌药、红花、香附、甘草、延胡索加水、酒煎热服；服后稍减，宜倍加干姜。如不效，则属难治。

产后恶露不下 病证名。见《太平圣惠方》第卷八十。多因产后外感受寒凉或内伤生冷，寒邪乘虚侵袭胞脉，瘀阻冲任。或因气血虚弱，产后益虚无血可下所致。寒袭胞脉者，兼有小腹胀满，刺痛无时，治宜散寒活血化瘀，生化汤加减；中气虚弱者，兼见小腹乍痛乍止，或绵绵作痛，治宜补益气血，方用八珍汤加炮姜、肉桂。

产后恶露腹痛 见《妇人良方大全》卷二十。即儿枕痛。详该条。

产后病痉 病名。出《金匱要略·妇人产后病脉证并治》。指产后突然颈项强直，四肢抽搐，甚至口噤不开，角弓反张。多因产后阴血大亏，筋失所养，复为风邪所袭，引动肝风或产后汗出过多，亡血伤津，虚极生风，拘急而痉。复感风邪者，症见口噤不开，背强而直，身反折，须臾又发，气息如绝。宜急用小续命汤鼻饲；虚极生风者，症见唇青气冷，汗自出，目瞑神昏，若以风治则大误，治宜育阴熄风，方用大定风珠。古人也有采用济危上丹以治本病者。

产后疸症 病名。见高淑濂《胎产方案》。多因产后气血更虚，风寒湿邪乘虚入胆，郁而化热，蕴蒸胆汁，泛溢肌肤，皮肤色黄，甚者目黄，尿黄如茶汁者，治宜加减

阴疽汤(人参、柴胡、白芍、甘草、干姜、半夏、党参)。阳亏者加桂附;阴虚者加当归、熟地;微热加丹皮。古人有认为茵陈等清热利胆药不适宜用于产后黄疸者。因其病因、病理不同于湿热黄疸。

产后浮肿 证名。包括产后四肢虚肿,产后水肿。气、血、水三者均可导致浮肿。若素多抑郁,气机失畅,产后气血不和,有碍气机升降,可致气滞肿胀。症见肢体浮肿,皮色不变,压痕随手而起,兼见胸闷胁胀,饮食减少。治宜理气、行滞、除湿。方用天仙藤散(天仙藤、香附、陈皮、甘草、乌药、生姜、木瓜、紫苏)加茯苓、大腹皮;产后脾肾俱虚,水湿溢于四肢者,即产后水肿,见产后水肿条。产后败血未尽,流入经络,出现四肢浮肿者,即产后四肢虚肿。见产后四肢虚肿条。也有认为产后四肢虚肿即为产后浮肿。

产后流注 病名。亦名产后瘀血流注。指产后败血不去,循经流入腰背关节等处所引起的一种疾病。症见腰、臂、足关节之处,或漫肿或结块,久则肿起作痛,肢体倦怠。急宜用葱熨法以治外肿,内服参归生化汤(川芎、当归、炙草、人参、黄芪、肉桂、马兜香)以消血滞。未成者消,已成者溃。葱熨法:用葱一握,炙热捣烂作饼敷患处,用厚布二、三层,以熨斗火熨之。

产后痉风 病名。见《经效产宝·续编》。多因产后血虚,腠理不密,多汗复遇风邪相搏所致。症见口噤,背强如痫状,身反折,气息如绝,频繁发作。急宜灌服小续命汤。

产后痙病 亦名产后痉。《证治准绳·女科》:“陈临川云:凡产后口噤,腰背强直,角弓反张,皆名曰痙”。因其发病原因不同,有产后痙风、产后病痙、产后惊风、癖风等。详各条。

产后虚烦 出《诸病源候论》卷四十三。多因产后气血亏损,虚火上扰所致。症

见烦热少气,疲倦胸膈满闷,甚者虚烦不得眠。治宜清热除烦。用淡竹叶汤加人参。兼有躁动者,用当归补血汤加味。

产后虚渴 病证名。《诸病源候论》卷四十三:“夫产水血俱下,脏腑血燥,津液不足,宿挟虚热者,燥竭则甚,故令渴”。症见口渴,干渴。治宜生津止渴。用加减竹叶汤(人参、麦冬、生地、花粉、炙草、粳米、淡竹叶)。

产后遗尿 出《诸病源候论》卷四十四。多因产后肾虚不固,开合失职;气血虚弱,气不能约束或产伤膀胱所致。症见尿遗下不禁。肾虚不固者,兼见头晕耳鸣,腰膝酸软,治宜益肾固摄,方用肾气丸合桑螵蛸散;气血虚弱者,兼见倦怠乏力等,治宜益气补中,方用补中益气汤合桑螵蛸散。若产伤膀胱,可结合手术修补。

产后遗粪 出《外台秘要》卷三十四。多因平素脾肾虚寒,产后益虚,中气虚弱,肾失开合,故产后不自觉遗粪。治宜温补脾肾。方用金匱肾气丸合四神丸。

产后蛊肿 病证名。指产后四肢不浮肿而腹大青筋显露的病症。《竹林寺女科秘方》:“产后蛊肿,四肢不浮,肚大青筋。如大便硬,用醉公丸通泄,后进理脾顺气丸;如大便滑泄,宜用木香调胃散”。

产后脚气 病名。《妇人良方大全》卷二十一:“产后脚气。因元气内虚,六淫外侵所致。其状发热瞢闷,搐掣惊悸,心烦呕吐气上。用小续命汤治之”。

产后脚痛 病证名。《竹林寺女科秘方》:“产后双脚痛不可忍者,乃下血虚也。下元清冷,寒邪入骨。治宜乌药顺气散加减(乌药、姜蚕、桔梗、枳壳、天麻、白芷、干姜、川芎、石南藤、陈皮、乳香、麻黄、甘草、桑寄生、葱头,加姜三片)。

产后脱肛 出《王节斋公胎产》。多因平素气血两虚,复加产后劳伤,中气益虚所致。治宜大补气血。方用《傅青主产后编》

加参生化汤合补中益气汤。

产后麻瞢 病名。见《张氏医通》卷十一。指产后肢体发麻，兼有眩晕病症。多因失血过多，气血不能充养周身。或因产后经脉空虚，痰饮瘀阻经络所致。失血过多者，症见手足麻木，或小腹痛，治宜补血益气，方用十全大补汤；痰饮瘀阻者，症见遍体麻木，昏晕，肢体沉重，甚者昏闷不识人，治宜健脾益气，开窍涤痰，方用六君子汤、稀涎散加减。

产后盗汗 病证名。见《傅青主女科》。因产时气血暴虚，血虚阴亏所致。症见睡中汗出，醒来即止。产后盗汗与内科杂病盗汗的治法有所不同。一般盗汗患者用当归六黄汤；而产后盗汗却应当调补气血，兼以敛汗，方用止汗散（《傅青主女科》：人参、当归、熟地、麻黄根、黄连、浮小麦、大枣）。

产后惊风 病名。清·汪喆《产科心法》：“产妇汗多发痉，俗谓产后惊风，实非风也，乃肝血空虚，不能荣筋，以致手足抽搐，有似中风之状，更有口噤咬牙，角弓反张，此气血大虚之恶候”。治法参见产后病痉条。

产后惊悸 病证名。见清·汪喆《产科心法》。因产后血虚，心气不足，神无所归，症见惕然而惊，心中怯，如人将捕之状，甚则目不转睛，口不能言。治宜补心宁神。方用养心汤（黄芪、茯神、川芎、当归、麦冬、远志、柏子仁、人参、五味子）。

产后淋 出《诸病源候论》卷四十四。指产后小便频数，涩痛的病症。多因产后阴血骤亏，虚热内生，或产后邪热客于胞中，致使热迫膀胱。症见小便频数，涩痛不已。治宜清热利湿。方用茅根汤（白茅根、瞿麦、茯苓、冬葵子、桃胶、人参、滑石、甘草、紫贝、鱼首石），或用瞿麦、黄芩、冬葵子、通草、大枣。

产后遍身疼痛 出《经效产宝》。多因产后气血亏损，运行无力，致血留滞于经络，肌肉之间；恶露过少，瘀血停留，败血入于

关节之中，或产后血脉空虚，风寒袭之，流注筋脉所致。气血运行不畅者，兼见骨节不利，筋脉拘急，治宜养血活血为主，方用十全大补汤加减；败血入于关节者，以手按之，局部疼痛益甚，兼见恶露甚少，血色紫黑，治宜活血化瘀，方用四物汤加秦艽、桃仁、没药、红花；风寒外袭者，症见遇冷则痛甚，得热则痛减，兼见头痛，发热，恶寒，肢体疼痛，治宜养血祛风，方用趁痛散（当归、肉桂、白术、黄芪、独活、牛膝、生姜、炙甘草、薤白、寄生）。

产后厥 病名。又名产后厥逆。明·赵贞观《绛血丹书》：“凡产用力过多，劳倦伤脾，孤脏不能注于四旁，故足冷而厥气上行。经曰：阳气衰于下则为寒厥是也。宜用加参生化汤，连进二剂，则血旺，而神复厥自止矣”。

产后厥逆 见清·王实颖《广嗣五种各要》。即产后厥。详该条。

产后喉中气急喘 出《经效产宝·续编》。即产后孤阳绝阴。详该条。

产后癆 病名。《妇科玉尺》：“或血气既亏，为风冷所搏，则不能温于肌肤，使人虚羸憔悴，饮食不消；又或风邪两感于肺，肺受微寒，喘嗽口干头昏，百节痛；又或风邪侵于营卫，流于脏腑，寒热如疟，盗汗，背膊烦闷，四肢沉重，名曰癆劳。俗总谓之产后癆”。详癆劳条。

产后痘 病名。痘，包括天花和水痘。指产后适逢出痘。治宜大补荣卫为主，方用大补汤（黄芪、熟地、川芎、白芍、官桂、茯苓、人参、当归）。若痘出多者，则加连翘、大力子等；大便泻者，则加肉豆蔻、炮姜等。余按常例治。现天花已基本消灭，此病少见。

产后痞满 病证名。素有胃气虚弱，产后饮食不节，重伤脾胃，胃失和降所致。症见胃脘部痞满不舒。治宜健脾益气，消食行滞。方用导功散。

产后痢疾 病名。见《医学入门》。属产后下利范畴。参见产后下利条。

产后寒热 ①包括产后发热、产后乍寒乍热。详各条。②《张氏医通》卷十一：

“产后因气血虚弱，脾胃亏损而发寒热，皆不足证。经云：阳虚则恶寒，阴虚则内热。若兼大便不通，尤属气血枯槁。切禁发表降火，……下血过多。寒热而下小腹不痛者，此营卫亏损，阴阳不和，属虚，增损四物汤。若恶露未净，伤滞胞络，寒热而小腹痛者，属实，轻则四乌汤，重则醋煎散。产后卧不如法，败血流入经络，骨节间寒热，腰股肿胀，痛不可拊，《局方》调经散。有食消食，头痛骨疼寒热者，外感风寒也，参苏饮、增损柴胡汤、柴胡四物汤选用。或兼泻及吐者，五积散。胸膈饱闷，前后心痛寒热者，伤气于食也，指迷七气汤。虚人，《局方》七气合沉香降气散。如饱满寒热兼腹痛腰疼者，四乌汤”。

产后禁药 泛指产后禁用的药物。清·倪东溟《产宝家传》：“产后气不顺，禁服枳实、厚朴耗气等药；产后伤食禁服大黄、三棱、莪术；产后身热禁服芩、连、梔、柏；七日内禁服地黄、芍药；戒有血块服牛膝、蓬术、苏木；戒大便不通禁服大黄、芒硝；戒服济坤丹大损气血；戒产前服瘦胎药大损气血。”此系古人经验，可供参考。

产后腰痛 出《诸病源候论》卷四十三。多因产时劳伤肾气，腰无所主，败血阻滞带脉，真气内虚，外邪乘之；或产后起居不慎，闪挫腰部，伤及肾经带脉所致。产伤肾气者，症见腰部隐痛，耳鸣，治宜壮腰补肾为主，方用六味地黄丸加杜仲、续断；败血流入肾经及闪挫腰部，症见局部胀痛如刺，时作时止，手不可近，治宜活血祛瘀，方用《局方》复元通气散；感受外邪者，兼见外感表证，治宜养血祛风，方用养荣壮肾汤（当归、防风、独活、肉桂、杜仲、川芎、续断、桑寄生）。

产后腹中块痛 见陆清洁《医药顾问大全·妇人科》。即儿枕痛。详该条。

产后腹胀 出沈明宗《医征女科附翼金匱》。多因败血阻滞，冲气上攻于脾胃，运化受损；或伤于饮食，损伤脾胃所致。若因败血阻滞者，症见不恶食，或呕多血腥气味，治宜调养气血，佐以消导，方用抵圣汤（半夏、陈皮、赤芍、泽兰、人参、甘草）；若因于伤食者，症见恶食或呕多食臭，治宜健脾消胀，方用平胃散加味（苍术、厚朴、陈皮、香附、人参、麦芽、神曲、甘草、干姜）。

产后腹胀呕吐 病证名。见《妇人良方大全》。卷二十一。多因产后败血攻于脾胃，胃气上逆所致。证见腹胀，满闷，呕吐，兼见恶露量少等。治宜活血祛瘀，健脾和胃。方用抵圣汤（赤芍、半夏、泽兰叶、人参、陈皮、甘草）或生化汤加味。

产后腹痛 出《金匱要略·产后病脉证并治》。指产后小腹部疼痛。多因血虚胞脉失养，或血瘀、寒凝等瘀阻胞脉所致。其中瘀血阻滞胞脉而致腹痛者，又名儿枕痛。若气血虚者，症见小腹隐隐作痛，喜热喜按，头昏目眩，体倦畏冷，甚则心悸气短，治宜补血益气，方用肠宁汤；若属血瘀者，症见小腹硬痛，舌质多紫暗，或小腹部可摸到硬块，兼见恶露不下或不畅，治宜活血祛瘀，方用散结定痛汤；若感受风寒者，症见面色青白，四肢不温，小腹冷痛拒按，得热稍减，治宜温经散寒，方用生化汤加减。也有认为产后腹痛包括大腹和小腹部疼痛。大腹痛多伤食所致。

产后瘀血流注 出单养贤《胎产全书》。即产后流注。详该条。

产后痹证 病证名。因产后气血大虚，腠理不固，风寒湿邪乘虚袭入肌肤、经络、关节所致。以痛痹、行痹较为多见。治宜扶正为主，佐以祛邪。方用荆防四物汤随证加减。产后痹证，正气甚虚，切不可用过辛燥

之药。

产后溺血 即产后尿血。详该条。

产后溺淋 病证名。徐大椿《女科指要》：“产后冲任虚热，膀胱气不施化，故小便涩痛，滴沥难出谓之溺淋”。相当于五淋中的热淋。

产后痙痙 病证名。见《妇人良方大全》卷十九。痙，即筋脉拘急；痙，即筋脉弛张。指产后血虚，阴血不足，筋失濡养所引起以抽搐为主的病证。不宜当作风治，宜大补气血，方用人参养荣汤加味。

产后喑 病名。见《妇人良方大全》卷二十一。包括产后不语。指产后音哑，不能说话。或产后各种原因引起的声音嘶哑。参见产后不语条。

产后漏牛膜片 证名。凤林寺《女科秘宝》：“产后血来不止，漏下片牛膜者，人皆疑惧，而不能治。然症虽凶而可治，服阿胶汤（阿胶、地榆、当归、白芍、熟地、茯苓）”。本证类似胎膜或胎盘部分残留，可结合手术处理。

产后漏黄水 病证名。肖山《竹林寺女科秘方》：“产后一月，漏黄水不止，此乃血虚之故，宜服补血汤（当归、肉苁蓉、附子、川芎、白芍、茯苓、甘草）。

产后痙痙 病证名。见高淑濂《胎产方案》。因产时去血过多，经脉空虚以致半身不遂，手足麻木不仁，拘挛不知痛痒。治宜补气养血。方用黄芪桂枝五物汤、补阳还五汤。切勿误认为风症，妄用祛风散血燥烈等药。

产后霍乱 病名。出《妇人良方大全》卷二十一。多因产后脏腑虚损，饮食不消，复感风冷，阴阳升降不顺所致。症见上吐下泻，甚者四肢厥冷。治宜调和肠胃，化瘀散寒。生化六和汤治之（川芎、当归、黑姜、炙草、陈皮、茯苓、砂仁、藿香、姜），厥冷加附子。

产后膨胀 证名。见《傅青主女科》。

清·王实颖《广嗣五种备要》：“胎前素弱，产后又亏，胃难纳谷，脾不健运。或因伤食而停滞，或因血虚而便闭，误进消耗等药，胃气益损，满闷益增，气不升降，滋热助积，郁积之久，遂成膨胀。治当审其误用何物，如误用耗气药，宜益气汤（人参、白术、当归、川芎、白芍、茯苓、陈皮、厚朴、苏梗、炙草、腹皮、木香、磨萝卜子、木通）。误用消导药，宜健脾汤（人参、白术、当归、茯苓、白芍、神曲、川芎、陈皮、炙草、砂仁、腹皮）。误用攻下药，宜养生化滞汤（川芎、当归、人参、白芍、茯苓、白术、桃仁、腹皮、肉苁蓉）。

产妇 见《诸病源候论》卷四十三。指在产褥期的妇女。

产枕痛 见《皇汉医学·产科发蒙》。即儿枕痛。详该条。

产乳 ①《千金要方》指分娩。②病名。指临产时忽然晕绝。

产育三难 指三种难产。即横生、足位产、臀位产。李小有《胎产护生篇》：“产育三难，有先露手而曰横生，有先露足而曰逆生，有先露臀而曰坐生”。

产泄 即产后泄泻。详该条。

产科 治疗妇人怀孕诸疾之专科。

产前十忌 出清·李小有《胎产获生篇》。第一最忌共夫寝，二忌大醉，三忌大怒，四忌不可食诸物，五忌洗浴，六忌久坐，七忌负重登高，八忌药饵，九忌师巫，十忌针灸。

产室 见《卫生家宝产科备要》。为妇人分娩所准备的房屋。

产难 出《诸病源候论》卷四十三。即难产。详该条。

产婆 见《卫生家宝产科备要》。又称稳婆。古代对接生员的称呼。

产颓 病名。指产后子宫下坠。参见子宫脱垂条。

产瘕 即产后风痙。详该条。

产褥感染 病名。产后重症之一。指在产前、产时或产后细菌侵入生殖器官引起全身或局部的炎症反应。症见高热，恶寒，战慄，恶露多或有臭味成脓样等，多属产后发热，恶露不绝，热入血室等范畴。症状轻者宜清热解毒，逐瘀生新，用生化汤加减。若症见汗多烦渴，加天花粉、芦根、石斛、梔子，以生津止渴除烦；若少腹疼痛加剧，正气未衰，可用大黄牡丹皮汤加败酱草；若高热寒战烦躁，皮下出血，谵语者，是邪入血分，宜清热解毒，养阴凉血，用清营汤加紫花地丁、丹皮、蒲公英、穿心莲等。必要时采用中西医结合治疗。

产瘤 瘤同颓。即产门颓。详该条。

羊水 羊膜腔内的液体，即养胎之水。足月妊娠时，羊水量约为600~1200毫升。若羊水量超过2000毫升，称为羊水过多症。详该条。

羊水过多症 病名，指妊娠羊水量超过2000毫升者，临床表现腹部迅速增大，有明显压迫症状，呼吸困难，不能平卧，常兼有手足面目浮肿等症。属胞中蓄水之症，即胎水肿满。多由体质素弱，脾阳不振，不能输布精微，反聚为水湿，胎气挟湿，湿浊与水谷之气相并，水与血相搏，血化为水，水湿停于胞中则腹大异常，若儿未成形胎多损坏，致手足软短，或形体残疾，渍于肌腠则头面四肢浮肿，浸于肺则喘息气逆不安。治疗：病初起，宜健脾理气行水，用束胎饮（白术、黄芩、苏叶、枳壳、大腹皮、砂仁、炙甘草、生姜片），或用《医宗金鉴》茯苓导水汤。若有胎儿畸型，当引产终止妊娠。

羊舌 病证名。见陆乐山《养生镜》。舌体歪斜的证候。多为风邪伤及心肺所致。其症舌斜左边，眼亦斜左边；舌斜右，眼亦斜右。宜针刺金津、玉液、肩井、肺俞、少商、中冲等穴。

羊胡疮 出《外科正宗》。即燕窝疮。见该条。

并月 见《医宗金鉴·妇科心法要诀》。指妇女身体无病每两月行一次月经者。

灯火疗法 即烙法。详该条。

汗证 病证名。以汗出为特征的病证。《景岳全书》：“汗证有阴阳，阳汗者热汗也，阴汗者冷汗也。人但知热能致汗，而不知寒亦致汗。所谓寒者，非曰外寒，正以阳气内虚，则寒生于中而阴中无阳；阴中无阳，则阴无所主而汗随气泄。”总之，汗为心液，来源于脾胃水谷之气。《古今医统》：“汗出于心，热之所致。汗出于脾，湿气上腾。汗泄于肤，卫气不固。所以清心，则液荣于内而为血。和胃，液周流而不腾。实腠理，则卫气充而液不泄。知斯三者，治汗毕矣。”参见自汗、盗汗、战汗条。

汗粟 病证名。指寒邪束表，误用寒凉，以致寒郁化热。其症“形如芝麻，细细白泡，似乎痞疮，痒痛全无，惟胸腹脘内居多”（明·秦景明《幼科金针》）。治宜清热透发，用加减柴胡汤（柴胡、黄芩、连翘、牛蒡子、桔梗、山梔、葛根、荆芥、木通、甘草）。

污 见《说文》。指月经。

汛期 见《赤水玄珠》。指经期。

安胎 出《经效产宝》。指对胎动不安，或有滑胎史的孕妇进行预防流产的治疗。治则有二：因母病以致胎动者，应治母病，其胎自安；若胎气不固以致母病者，安胎母自愈。治法参见胎动不安、滑胎条。

〔7〕

孖生 即双生。详该条。

异痘 病证名。出清·翟良《痘科类编释意》。指痘疮发于特殊部位，如蒙头、抱鼻、锁口、锁项等。详各条。

阳水肿 病证名。肿满之一。属热实，多由患儿体质尚实，湿热内郁，水道阻塞，水气泛滥，外攻肌表而成。《幼幼集成》：“阳水

肿，身热，大便秘，小便赤涩，烦躁口渴，以五皮汤作煎送沆瀣丹微下之。”但必须量儿大小，根据病情的轻重，适当取用，不能过于峻攻，以免耗伤正气。

阳闭 证名。见《证治准绳·幼科》。指因阳热而致的小便不通。膀胱主藏津液，借气化才能排出。如果热邪壅结膀胱，使气化功能受阻，水道不通，故使小便不通。其症除小便不通外，可兼有一派热象，如发热，面红，烦躁多啼，指纹紫滞。治宜清热、解毒、利尿。初起用导赤散；若热邪壅结过甚，出现腹胀、喘急的宜八正散。

阳毒 病证名。伤寒谷黍之一。清·马之骥《疹科纂要》：“阳毒脉浮数洪大，内外结热极深，面赤狂乱，舌卷焦黑，鼻若烟煤，四肢烦躁，狂言谵语，如见鬼神，下利频多不安，发点斑烂，名为阳毒。”为热毒郁于营血所致。临床可见于猩红热、斑疹伤寒以及流行性脑脊髓膜炎菌血症型等。治宜清热解毒。用清瘟败毒饮加紫草、紫花地丁等。

阳虚发热 病证名。阳气亏虚而引起的发热。明·王纶《明医杂著》：“内伤发热，是阳气自伤，不能升达，降下阴分而为内热，乃阳虚也。故其脉大而无力，属肺脾。”宜甘温除热。

阳崩 病名。热邪内扰，热伤冲任，导致崩下赤色，并见小腹疼痛，古称阳崩。宋·齐仲甫《女科百问》四十二问：“受热而赤者，谓之阳崩”。宜用胶艾汤。

阳痼 病证名。腑热的痼证。多因急惊风后，热痰未尽，积久而热痰涌盛，蒙蔽心神，肝经亦被阻滞发为痼证。其症发时身热有汗，仰卧面红，牙关紧闭，或啼叫不止，口吐痰涎。治宜清热化痰、泻肝，用龙胆汤、泻青丸；痰涎盛者，四制抱龙丸。

阳痧 病证名。出《寿世保元》。指小儿发痧，腹痛而手足温者，详小儿发痧条。

收生 即接产。

收靨 痘至收靨，为毒尽将愈的证候。清·翟良《痘科类编释意》：“痘至九日、十日之间，脓浆满而色苍蜡者，必发热熏蒸，此回浆之候也，俗名谓之烧浆，又谓之干浆。盖真阳运化，其水自消烁而收靨矣。若及时回浆，当靨而不靨，其人身凉而手足冷，脉来沉迟者，此元气不足，虚寒证也。”须大补气血而助之收结，用八珍汤；如当靨不靨，其人壮热，烦渴，脉来洪数，为热毒熏蒸而不靨，宜清凉退热，则痘自收靨。

阴门 见《石室秘录》。指妇女的阴道外口。

阴门不闭 见《张氏医通》卷十。即产门不闭。详该条。

阴门痒 见吴梅菴《秘传内府经验女科》。即阴部搔痒。详阴痒条。

阴户内发热如烙 病证名。朱振声《妇女病续集》：“当有经水，阴户内发燥而干，由肝火偏炽，下吸肾液，肝肾之阴两亏也，用生地、女贞、阿胶并以生芝麻油涂阴户内；发热而潮湿者，肝火旺而挟湿也，用黄连、黄柏、川楝子，并以川楝子煎洗”。

阴户风肿 病证名。属阴肿证候。陆成一《女界须知》：“肝脉络于阴器，肝旺生风，复由外风引动，则阴户发肿，可用桑叶、菊花、荆芥、防风煎汤熏洗”。

阴户肿痛 病证名。见《医学入门》。多因郁怒伤肝，肝气犯脾，湿热下注所致。症见阴户肿胀作痛，或小便涩滞，下腹部不舒，甚则伴有寒热等。治宜清热利湿。方用龙胆泻肝汤加减。外用蛇床子、地肤子、黄柏、防风、苦参煎汤熏洗。

阴户痛 见《卫生宝鉴》卷十八。即阴痛。详该条。

阴户湿肿 病证名。见陆成一《女界须知》。属于阴肿症候。因脾湿下注所致。多见于体肥之人。症现阴户肿胀，甚则肢体倦怠，小便淋漓等。治疗参见阴肿。

阴中生疮 出《金匱要略·妇人杂病脉

证并治》。即阴蚀。详该条。

阴中生核 病证名。谢观《中国医学大辞典》：“妇人阴中生核，肿大不消，此亦阴挺之类，用蚌蛤肉塞阴中，日换数次，早服补中益气汤，晚服龙胆泻肝汤，连服数日即消；消后再用四物汤加柴胡、山梔、龙胆草调理”。

阴中生息肉 病证名。《诸病源候论》卷四十：“此由胞络虚损，冷热不调，风邪客之，邪气乘于阴，搏于血气，变而生息肉也，其状如鼠乳”。《肘后备急方》卷五治阴中息肉突出，用醋浸乌头三日后，以此浸液外洗息肉。

阴中痛 出《肘后备急方》卷五。即阴痛。详该条。

阴中湿烂 病名。见清·施雯《盘珠集胎产证治》。多因七情郁火，湿热下注所致。阴中或肿或痛或痒。治疗参见阴蚀条。

阴水肿 病证名。肿满之一。属寒属虚，主要由于患儿脾肾虚弱，脾虚不能制水，肾虚不能化水，以致水邪停留，外泛作肿，内停作胀。《幼幼集成》：“阴水肿，身不热，口不渴，身冷怯寒，二便自调。”脾虚宜健脾利水，用茯苓导水汤；肾虚宜温肾化水，用《金匱》肾气丸。

阴闭 证名。见《证治准绳·幼科》。指因寒湿乘虚入里，而致小便不通。因先天禀赋不足，元气衰微，气化不宣，水道不能通调，而致小便不通。症见神疲、声低、面唇色淡、舌润、指纹淡红。治宜培补元气，温化利水。用五苓散合独参汤。

阴汗 病症名。指阴部多汗的证候。缪慎斋《妇女卫生医药常识》：“阴户外部，不分寒暑常有冷汗浆浆，甚则有作痒者，此湿热下陷，可用密陀僧、蛇床子各等分研末擦之”。

阴阳二痢 出《证治准绳·杂病》。即阴痢和阳痢。各详该条。

阴吹 病名。出《金匱要略·妇人杂病

脉证并治》。指阴中时时排气如矢气之状。多因谷气实，胃气下泄；或气血虚、中气下陷所致。谷气实者，兼见大便秘结不通，排出声音响亮，连续不绝，治宜润燥导下，方用膏发煎（猪膏、乱发）；中气下陷者，兼见气短懒言，倦怠乏力等，治宜补中益气，方用十全大补汤加升麻、柴胡。

阴冷 病证名。又名阴寒。《诸病源候论》卷四十：“胞络劳伤，子脏虚损，风冷客之，冷乘于阴，故令冷也”。症见阴部寒冷，甚至小腹冷痛，多影响生育。治宜补肾壮阳。方用金匱肾气丸。《妇人良方大全》：“妇人阴冷，因劳伤子脏，风冷客之，用五加皮、干姜、丹参、蛇床子、熟地黄、杜仲各三两，钟乳粉四两，天门冬一两，地骨皮二两，酒十五升，渍二宿，每服一盞，空心食前饮之”。

阴茄 病名。《妇科易知》：“阴户出物如茄，亦阴挺之类也”。详阴挺条。

阴肿 ①妇科病证名。包括阴户风肿、阴户湿肿、阴户肿痛。《诸病源候论》卷四十：“阴肿者，是虚损受风邪所为，胞经虚而有风邪客之，风气乘于阴，与血气相搏，令气血否涩腠理壅闭，不得泄越，故令阴肿也”。病因风邪客入阴部，腠理壅滞，或肝气犯脾，湿热下注所致。症见阴户肿痛。风邪客于阴部者，兼见阴户肿痛，奇痒，治宜疏风消肿，用艾叶、防风、大戟等煎熬薰洗，更以枳壳、陈皮二味为末，炒热敷之，其肿自消；湿热下注者，兼见肿胀痒痛，带多色黄，治宜清热利湿，方用草薢渗湿汤，或龙胆泻肝汤。②指外肾肿硬。详该条。

阴肿成疮 病证名。阴茎包皮感染湿热毒邪，以致局部掀赤肿痛成疮。《诸病源候论》卷四十：“阴肿，下焦热，热气冲阴，阴头忽肿合，不得小便，乃至生疮。”此症暑天较多，婴幼儿包皮内积垢未除者，每易致之。治宜清热利尿，用导赤散，或四苓散加灯芯；外以蝉蜕煎汤洗，或硼砂研细、水

调敷。

阴肿疝气 病证名。出《婴童百问》。即小儿阴囊肿痛。多属肝肾气虚，及坐卧寒湿之地，冷气凝滞，或啼叫怒，闭击于下，结聚不散而成；亦有因肝经湿热下注阴器所致者。寒气凝滞的表现为阴囊清冷；湿热下注的表现为红肿胀甚。前者治宜理气散寒，兼以利尿，用五苓散；后者治宜清热利湿，用龙胆泻肝汤。

阴毒 病证名。伤寒谷黍之一。清·马之骥《疹科纂要》：“阴毒脉沉细疾实，眼痛，唇口青黑，咽喉不利，身体沉重，背强不能转，四肢厥冷，毒气攻心，小腹急痛，干呕，身发斑点，名为阴毒。”为湿毒郁滞血络所致。可见于流行性脑脊髓膜炎、慢性败血症型。治宜解毒散瘀。用升麻鳖甲汤加減。

阴茧 病名。见谢观《中国医学大辞典》。因肝火湿热太甚下注，或新婚伤损，或交合不洁染毒而成。症见阴户一侧或两侧结肿，形如蚕茧。治宜清肝泻热解毒。方用逍遥散加減，或用甘草水薰洗。

阴挺 病名。妇科常见病之一。指妇人阴中有物突出。包括子宫脱垂、阴道壁膨出、阴痔、阴脱等。又名阴突、阴茄、阴挺下脱、茄病、下瘤、鸡冠疮等。《诸病源候论》卷四十：“胞络伤损，子脏虚冷，气下冲则令阴挺出，谓之下脱。亦有因产而用力偃气，而阴下脱者”。临床以气虚下陷或肾气不足较为多见。气虚者，气短乏力，小腹空坠，宜补气升提，用补中益气汤加減，重用方内升麻、炙黄芪；肾虚者，腰膝痠软，宜补肾益气，用大补元煎加鹿角胶、升麻、枳壳。若脱出后摩擦损伤感染者，局部肿痛，黄水淋漓，小便赤涩，宜清热利湿，用龙胆泻肝汤加減。外治用乌梅、蛇床子等煎水薰洗。参见子宫脱垂条。

阴挺下脱 出《妇人良方大全》卷八。即阴挺。详该条。

阴挺出下脱 出《诸病源候论》卷四十。

即阴挺。详该条。

阴疮 病名。出《肘后备急方》卷五。指阴中生疮。又有阴蠹、阴疳等名。即阴蚀。详该条。

阴突 出清·施雯《盘珠集胎产证治》。即阴挺。详该条。

阴烂 病证名。见王世雄《潜斋医学丛书简效方》。指外阴溃烂。用煅牡蛎、飞滑石、煅蚌蛤、人中白、煅龙骨、冰片，共研末局部上药。参见阴蚀条。

阴热 病名。出《医钞类编》。指妇人阴部灼热的一种病症。可用泽兰叶煎汤熏洗。

阴疳 即阴疮。详该条。

阴疽 病名。高淑濂《胎产方案》：“产后黄疸名曰阴疽”。治法见产后疸症条。

阴菌 病名。出《景岳全书·妇人规》。阴部下脱之物如蘑菇状，称为阴菌。即阴挺。详该条。

阴虚发热 病证名。阴血自伤或肾水亏虚而引起的发热。《格致余论》：“夫阳在外为阴之卫，阴在内为阳之守。精神外驰，嗜欲无节，阴气耗散，阳无所附，遂致浮散于肌表之间而恶热也。”治宜甘润之剂，滋水以制火。

阴崩 病名。妇女阴中崩下为白色，古称之为阴崩。宋·齐仲甫《女科百问》四十二问：“受冷而白者，谓之阴崩”。多因感寒所致。宜用固经丸（炒艾叶、鹿角霜、伏龙肝、干姜，各等分，细末，鹿角胶溶合药面为小丸，每服三钱，食后淡盐汤下）。

阴蚀 病名。出《神农本草经》石硫黄条。亦名阴中生疮、阴疮、阴蠹、蠹、阴蚀疮等。病因情志郁火，损伤肝脾，湿热下注，郁蒸生虫，虫蚀阴中所致。症见阴部溃烂，形成溃疡，脓血淋漓，或痛或痒，肿胀坠痛，多伴有赤白带下等。治宜清热利湿杀虫。方用草薢渗湿汤（《疡科心得集》：草薢、薏苡仁、黄柏、赤茯苓、丹皮、泽泻、滑石、通草），并用外治法：漏痒汤（《疡医大全》：

苦参、狼牙、蛇床子、当归尾、威灵仙、鹤虱),煎汤熏洗。珍珠散(辽宁中医学院主编《妇产科学》:珍珠、雄黄、青黛、冰片、黄柏、儿茶),局部上用。

阴蚀疮 出《肘后备急方》卷五。即阴蚀。详该条。

阴脱 病名。出《千金要方》卷六。①即阴挺。相当于子宫脱垂。《医学正传》卷七:“产后阴脱,谓阴户中宫脱下也”。②指妇人因分娩损伤胞络,或举动房劳。而致阴户开而不闭,甚则肿痛,小便淋漓。治宜补益气血。方用十全大补汤加五味子。小便淋漓者,方用丹梔逍遥散加车前子。外用蛇床子、五倍子煎汤熏洗。

阴痔 病名。见《证治准绳·杂病》。《坤宁集》:“凡九窍有肉突出,皆名为痔。妇人阴中突肉,名阴痔”。相当于子宫脱垂、子宫粘膜下肌瘤等。有因肝郁或湿热者,阴户流黄水,宜解郁清热利湿,用龙胆泻肝汤或丹梔逍遥散;有因脾虚者,阴户流白水,宜健脾益气,用补中益气汤或归脾汤。局部可用乌头七个,煨纯性,浓醋熬熏洗。详见子宫脱垂条。

阴痒 病名。出《肘后备急方》卷五。又名阴门痒。多因肝郁化热,脾虚聚湿,湿热蕴结,流注于下;或因外阴不洁,久坐湿地,病虫乘虚侵袭;也有因阴虚血燥而致者。症见外阴部或阴道内搔痒,甚则奇痒难忍,坐立不安。湿热者,多伴有带下量多、色黄等,治宜清热利湿,方用草薢渗湿汤(见阴蚀条),或用龙胆泻肝汤;阴虚血燥者,治宜养血祛风,方用当归饮(当归、白芍、川芎、生地、白蒺藜、防风、荆芥穗、何首乌、黄芪、甘草)。局部可用蛇床子、川椒、枯矾、苦参、百部、生艾叶、杏仁,水煎熏洗。《妇人良方大全》主张内服龙胆泻肝丸、逍遥散,外以桃仁研膏和雄黄末,或鸡肝纳阴中,以杀其虫。或针刺阴廉、曲骨、三阴交。

阴宽 病名。见王士雄《潜斋医学丛书

简效方》。《千金要方》中有治阴宽大令窄小方的记载。可能指阴道松弛、阴道壁膨出的病症。王士雄主张“肥皂荚子浸去黑皮,用其白肉,加白芨、五倍子、蛇床子、石榴皮、甘松、山奈、龙骨煎浓汤,日日熏洗;宽而冷者,加石硫磺煎”。

阴癰 病证名。脏寒的病证,多因慢惊风之后,痰入心包而起。其症发时手足厥冷,偃卧拘急,面色青白,口吐涎沫,声音低微。治宜健脾宁心。用醒脾汤。

阴痧 病证名。出《寿世保元》。指小儿发痧,腹痛而手足冷者。详小儿发痧条。

阴寒 病名。指阴中寒冷。《金匱要略·妇人杂病脉证并治》:“妇人阴寒,温阴中坐药,蛇床子散主之”。详阴冷条。

阴痛 病名。出《诸病源候论》卷四十。又名阴中痛、阴户痛。包括小户嫁痛、嫁痛。多因郁热损伤肝脾,脾虚聚湿,湿热下注;或中气下陷;或风邪客于下焦,与气血相搏,肝肾经络为之壅闭。症见阴痛,甚则痛极难忍。湿热下注者,兼见肿胀疼痛,带多色黄,治宜和肝理脾,清热除湿,方用丹梔逍遥散加味,外以四物汤料合乳香捣饼纳阴中;中气下陷者,兼见阴户坠痛,气短懒言,治宜补益中气,方用补中益气汤;风邪壅滞者,兼见肿胀痛甚,治宜祛风散瘀,方用菖蒲散(《寿世保元》:石菖蒲、当归、秦艽、吴茱萸)水煎空心服,外用艾叶、防风、大戟水煎熏洗。

阴寒白喉 白喉症型之一。见《全国名医验案类编》卷九。指素禀阳虚,传染阴毒而发的白喉。其症喉间初见白点,继则白块满喉,饭粒可进,惟饮水及咽津则痛甚,身微热,四肢厥逆,脉缓无神,舌苔灰白而滑,宜以破阴助阳为治,用四逆汤加味,或坎宫回生丹(血竭、梅片、生附片、牙皂、郁金、真雄精、麝香、细辛、飞月石)、良官除害丹(真珍珠、地虱婆、真琥珀、真玛瑙、手指甲、麝香、真珊瑚、蚯蚓、大梅片、辰砂、蚕茧、

马勃)吹入白处,含噙片时,使毒气随风涎吐出。参见虚寒白喉条。

阴缩 病证名。出《灵枢》邪气脏腑病形等篇。指前阴内缩。《张氏医通》:“阴缩,谓前阴受寒入腹内也。”包括男婴阴茎、阴囊内缩及女婴阴唇内缩。因寒入厥阴所致者,宜温散厥阴寒邪,可选用当归四逆汤、四逆汤加人参、肉桂。挟食者,用枳实理中汤加熟附子;发热面赤戴阳者,稍加黄连。大吐大泻之后,元气虚陷,阴缩而四肢逆冷,面黑气促,冷汗自出,甚则人事不省者,宜大剂回阳固脱,用回阳返本汤(《伤寒六书》:四逆汤加人参、麦冬、五味子、陈皮、腊茶)加龙骨、牡蛎;并用艾炷灸关元、气海。参舌卷卵缩条。

阴缩入腹 病证名。见《验方新编》卷五。初生儿六七日后,阴囊收缩入腹,啼哭不止者,多系感受寒邪所致。治宜温经散寒。用硫磺、吴茱萸各五钱,为细末,研大蒜调涂脐下,再以蛇床子,微炒布包熨脐部。

阴癰 病名。《医宗金鉴·外科心法要诀》:“子宫脱出名为阴癰”。即子宫脱垂。详该条。

阴蝕 见陆清洁《妇人科》。即阴蚀。详该条。

妇人三十六疾 出《千金要方》卷四。即带下三十六疾。详该条。

妇人下赤白沃 病证名。见《医学纲目》卷三十四。即赤白带下。《诸病源候论》卷三十九:“带下之病,曰沃与血相兼带而下也”。《甲乙经》:“妇人下赤白沃后,阴中干痛,恶合阴阳,少腹膜坚,小便闭,曲骨主之”。治疗参见赤白带下条。

妇人水分 病名。出《圣济总录》卷一百五十三。亦名水分。指先有肢体浮肿而后病经闭者。因脾虚不能制水,水饮内停,膀胱行水化气功能减弱,以致水气分散经血,水泛流溢于皮肤,先见肢体浮肿而后出现经闭,治宜健脾清水为主,水去则肿自消,月

经亦自通。方用茯苓导水汤。《圣济总录》:“水分者,以水气上下溢于皮肤,分散四末,发为跗肿。盖肾者胃之关,关闭不利,故聚水而从其类也。此病与血分治有先后耳”。

妇人血分 病证名。见《圣济总录》卷一百五十三。指先有经闭而后发生肢体肿胀者。病因寒湿伤于冲任,血壅经隧,气机不行,以致经脉不行,经血分而为水,流入四肢。症见先经闭而后出现水肿,治宜调经为主,其肿自消。方用调经散(当归、肉桂、没药、琥珀、赤芍、细辛、麝香),加红花、丹皮、牛膝。《圣济总录》:“论曰血分者,经水流通之际,寒湿伤其冲任为之中止,气壅不行,播在皮肤,邪气相搏,经血分而为水,发为跗肿,故曰血分。”

妇人血膈 病证名。见《妇人良方大全》卷七。简称血膈。指血气阻隔中焦而致之经闭。多因长期忧思郁怒,肝伤气郁血滞,瘀血内结,胃脘阻隔,胃失和降所致。症见胸膈疼痛如锥刺,食入而复吐出,甚则水饮难下。上则呕吐如赤豆汁或紫血;下则经闭,大便干黑,坚如羊粪等。治疗初起宜舒肝解郁。方用启膈散(沙参、丹参、茯苓、贝母、郁金、砂仁、荷蒂、米糠)。日久血结,宜活血祛瘀。方用通幽汤去升麻(生地、熟地、桃仁、红花、当归、甘草,另加郁金);并用五汁安中饮(韭菜汁、牛乳、生姜汁、梨汁、藕汁)以润之。

妇人鸡爪风 病名。《古今医鉴》卷十二:“妇人鸡爪风,因月家得此,不时举发,手足挛束如鸡爪状,疼痛难伸。于左右膝眼两旁各有一小窝共四穴,俗谓之鬼眼,各灸三壮即愈”。多因产后血亏,筋失所养,复感风寒所致。无汗者,治宜养血祛风,调和营卫,四物汤加柴胡、木瓜、桂枝、钩藤;有汗者,养血益气,调和营卫,方用八珍汤加桂枝、黄芪、阿胶。

妇人疝瘕 病名。指两侧腹股沟及阴部肿痛的一种病症。《妇人良方大全》卷二十

四：“一名便痛，一名便毒，俗称痞子。妇人疝症，或肝经湿热下注，或郁怒伤损脾肝，其外症或两拗小腹肿痛，或玉门焮肿作痛，或寒热往来，憎寒壮热，其内症或小便涩滞，或腹内急痛，或小腹痞闷，或上攻两胁，或喘热重坠。若两拗小腹肿痛，肝经湿热壅滞也，用龙胆泻肝汤；玉门肿胀，肝火血虚也，用加味逍遥散”。

妇人淋带 病证名。见《景岳全书·妇人规》。指妇人患淋症同时夹有带下。多因房劳过度，心火妄动，脾肾俱虚，湿热下注所致。症见排尿刺痛不利，尿色多黄，淋漓不宣，小腹或胀，腰痛，并见带下量多，连绵不断等。治宜清热利湿为主，方用八正散之类。

妇女失志经闭 病证名。指由于所愿不遂而致之经闭。《叶氏女科证治》：“妇女情欲不遂，沉思积郁，心脾气结，致伤冲任之源，而肾气日消，轻则或早或迟，重则渐成枯闭。宜服秘元煎（远志、山药、芡实、炒枣仁、白术、茯苓、炙甘草、人参、五味子、金樱子）”。

妇女石淋 病证名。多因经水未绝，肝经血虚，肝气郁久化火，凝滞浊液，渐结成粒。《诸病源候论》卷四十：“淋而出石，谓之石淋。肾主水，水结则化为石，故肾客沙石。肾为热所乘则成淋，肾虚则不能制石，故淋而出石，细者如麻如豆，大者亦有结如皂荚核状者，发则燥痛闷绝，石出乃歇”。治宜开郁火，补阴血兼以导气。方用牛膝膏加郁金、山梔、生地黄、琥珀之类，切不可用利水诸剂，参见石淋条。

妇女白浊 病证名。见《妇人良方大全》卷一。妇女从阴道中流出一种秽浊如脓的粘液。多因膀胱积湿化热所致。初起觉排尿时尿道涩痛，小便不利，或如米泔样。治宜清

热渗湿。方用清心莲子饮加草薢。或用威喜丸。

妇女白淫 病证名。出《妇人良方大全》卷一。妇女从阴道内时时流出有白色粘液，形如胶样的秽物。多因房劳伤肾，心肾不交，肾主水开窍在阴，胞冷肾损故下流淫浊，而小便通利无碍。治宜补肾固涩。方用金锁正元丹、固精丸、锁金丸（补骨脂、青盐、茯苓、五味子）等。

红汗 病证名。指伤寒而鼻出血者。《活幼口议》：“小儿伤寒后，……忽然鼻中出血，五七岁以上至大人亦有此证，为红汗。”《杂病源流犀烛·诸血源流》：“汗出而色红染衣，亦谓之红汗。”治宜茅根汤。

红脉 指月经。宋·齐仲甫《女科百问》十三问：“经脉来时，俗称为红脉”。

红脉不通 见《世医得效方》卷十五。即经闭。详该条。

红铅 指初潮月经的别名。明·万全《广嗣纪要》：“月事初下，谓之红铅”。

红眼伤寒 出清·马之骥《疹科纂要》。即伤寒谷黍。详该条。

红漏 出董炳《避水集验要方》。①指月经。②指经漏。

红潮 即月经。详该条。

红臀 病证名。又名湮尻疮。即尿布皮炎。为新生儿多见的皮肤炎症。小儿皮肤娇嫩，尿布潮湿浸渍过久，湿毒乘虚侵入，发于臀部肌表，而为焮红、粗烂；重则有丘疹、疱疹甚至脓疱形成。初起内服药以清热解毒为主，用银花甘草汤；外宜六一散扑于患部，如疮破渗液，可以青黛散外敷。如新生儿，手足、颐下、颊、肢窝、腿丫内，湿热之气，蕴积湮烂成疮者，用伏龙肝研细外敷。

七 画

〔一〕

弄舌 病证名。出《小儿药证直诀》。又名蛇丝惊。即患儿舌头频频外伸，随露随收，并上下、左右掉弄如蛇舌者，与久露不收的吐舌有别。在温热病过程中往往见之。明·方贤《奇效良方》：“夫弄舌者，脾脏微热，今舌络微紧，时时舒舌。”舌乃心之苗，脾络系舌本，弄舌多由心脾积热所致。心热偏重者，多见面赤心烦，渴喜冷饮，甚者扰动欲惊；脾热偏重者，多见面黄腹胀，大便黄稠而臭甚。治宜清脾泻热，用泻黄散。一般不宜过用寒凉，否则损脾耗液，最易变成疳证。

弄产 病名。指妊娠后期，胎忽乱动，而脉象并无即将分娩的征象。清·周登庸《续广达生篇》卷三：“怀孕六、七个月或八、九个月，偶略曲身，胎忽乱动。二、三日间或痛或止，或有水下，惟腰不甚痛，脉未离经。名曰弄产”。

弄胎 见《妇人良方大全》卷十七。亦称弄痛、试胎。①指临产假阵痛。李长科《胎产护生篇》：“凡临月忽然腹痛，或一日，二日，三、五日。胎水已来，腹痛不止者，此名弄胎，非当产也”。②指妊娠后期，胎忽乱动，而脉象并无分娩的症状。《大生要旨》：“受孕六、七个月或八、九个月，胎忽然乱动，两三日间或痛或止，或有水下，但腰不甚痛，是胎未离经，名曰弄胎。又曰试胎”。

弄痛 指妊娠临月，腹痛不甚，或时痛时止，或腹痛而腰不痛等，均非正产之候。①《卫生家宝产科备要》卷三：“大凡生产自有时候，痛不甚者，名曰弄痛”。②《叶天士女科诊治秘方》：“妊娠临月腹痛，或作或止，名曰弄痛，非正产之候，或腹虽痛，

但腰不甚痛，非正产之候”。参见弄胎条。

形肥过期经行 病证名。见《叶氏女科证治》。指身体肥盛而经期错后者。多因肥人脾虚血少，兼痰湿阻滞。症见经行错后，量少色淡或有腹胀、浮肿等症。治宜健脾除湿，化痰导滞。方用苍附导痰丸、六君子汤等。

形肥经少 病证名。见《叶氏女科证治》。多因体质肥胖，脾虚气衰，水谷精微不能运化为血，反化为水湿痰涎所致。症见身体益胖，月经逐渐量少，色淡质稀，或夹带下等。治宜健脾除湿。方用二陈汤加当归、川芎。

形肥痰滞经闭 病证名。见《叶氏女科证治》。指肥盛妇女由于躯脂迫塞，痰涎壅盛，以致血滞经闭。治宜行气导痰。方用苍附导痰丸或开郁二陈汤（苍术、香附、川芎、青皮、枳壳、木香、槟榔、生姜）等。

形瘦过期经行 病证名。《叶氏女科证治》：“形瘦素无他症，而过期经行者，此气血不足也，宜服十全大补汤。如食少而脾胃素弱，过期经行者，此气衰血少也，宜服异功散合芎归汤，兼服地黄丸”。

形瘦血热经闭 病证名。《叶氏女科证治》：“形瘦血虚生热，而月水不通，此冲任内伤也。宜服人参四物汤（人参、当归、川芎、生地、白芍、知母、麦门冬、炙甘草、生姜、大枣）兼地黄丸”。

形瘦血瘀经闭 病证名。《叶氏女科证治》：“形瘦多热多郁，血少气虚，宜服芩连四物汤，合开郁二陈汤”。

形瘦经少 病证名。《叶氏女科证治》：“形瘦经少，此气血弱也。宜服加味四物汤（四物汤加人参、香附、甘草、生姜、大枣）”。

走马牙疳 病证名。见《外科启玄》。简称走马疳。指患牙疳而发病迅速，势如走

马者。多因胎毒、大病后、时行疫疔或疹痘余毒未清，复感外邪，积毒上攻齿龈所致。《景岳全书·杂证谟》：“走马牙疳，牙床腐烂，齿牙脱落，谓之走马者，言其急也，此盖热毒蕴蓄而然”。多见于小儿，初起齿龈边缘或颊部结硬，红肿疼痛，继之腐烂，色灰白，随即变为黑色，流出紫黑血水，气味臭恶，此时因其气味臭秽，故亦有称之为臭息者。局部微痛而痒，若溃烂渐深，则见鼻及鼻翼两旁或腮和口唇周围出现青褐色，甚则唇腐腮破，齿落腮穿，鼻梁塌陷。《焦氏喉科枕秘》：“此症食炙燔醇酒肥甘，以致阳明胃经火动而生湿热，故发。牙龈作烂，顷刻腐黑沿开，其患迅速，故名走马。甚者牙龈脱落，根柯污黑，不数日，以致穿腮破唇，沿及满口，走入喉中。”治宜解毒，清热，祛腐。可选用芦荟消疳饮加减。脾虚者，兼服人参茯苓粥（人参、茯苓共为细末，同捣为末熬成粥），先以盐汤漱口，后食粥，或以绿豆煎汤常服。参牙疳条。

走马疳 走马牙疳的简称。《外科正宗》卷十一：“走马牙疳，言其患迅速，不可迟治也。乃痧痘余毒所中，又有杂病热甚而成者。初起牙龈作烂，随即黑腐作臭，甚者牙龈脱落，龈傍黑朽，不数日间，以致穿腮破唇”。详见走马牙疳条。

赤白沥 见《甲乙经》。即赤白带下。详该条。

赤白带下 病证名。出《千金要方》卷四。亦名赤白沥、赤白漏下、妇人下赤白沃等。指阴道流出似血非血、红色夹有白色粘液，连绵不断者，称为赤白带下。多因肝郁化热，脾虚聚湿，湿热下注，伤及冲任，夹杂胞络之血所致。治宜疏肝健脾，清热利湿。方用清肝止淋汤（方见赤带条），或用加减逍遥散（白芍、柴胡、茯苓、甘草、陈皮、茵陈、梔子）。

赤白痢 病证名。指痢下赤白粘脓。《诸病源候论》卷十七：“然其痢赤白者，是热乘于血，血渗肠内则赤也；冷气入肠，搏于

肠间，津液凝则白也”。元·朱震亨《幼科全书》：“凡痢不论赤白，皆属湿热”。小儿多因乳食不洁，脾胃不和，湿热交蒸，气血并病而成。赤痢者，湿热伤在血分，病变主要在小肠；白痢者，湿热伤在气分，病变主要在大肠。治法总以清肠利湿为主。可选用芍药汤、香连导滞丸、枳实导滞丸，可以随宜选用。针刺：赤痢取天枢、小肠俞、膈俞、内庭；白痢取大肠俞、下脘、支沟。

赤白滞下 病证名。赤白粘脓相杂同下的痢疾。《诸病源候论》卷四十七：“小儿体本挟热，忽为寒所折，气血不调，大肠虚弱者，则冷热俱乘之，热搏血渗肠间，其利则赤，冷搏肠津液凝，其利则白，冷热相交，血滞相杂，肠虚者泄，故为赤白滞下也”。治宜清热导滞，用香连丸加减。针刺取大肠俞、小肠俞、足三里、内庭。参见赤白痢条。

赤白漏下 见《圣济总录》卷第一百五十一。指赤白带下。详该条。

赤虫 三虫之一。出《诸病源候论》卷五十。即姜片虫。见姜片虫病条。

赤利 病证名。指小儿下利而赤多者。《诸病源候论》卷四十七：“小儿有挟客热，客热入于经络，而血得热则流散，渗入大肠，肠虚则泄，故为赤利也”。其症下利带有赤色粘脓，或下纯血，并伴有烦渴、脉数等。治以清热凉血为主。用白头翁汤、黄芩汤加地榆、蒲黄。

赤带 病证名。见《千金要方》卷四。亦名带下赤候。指从阴道流出淡红似血非血的粘液，淋漓连绵不断，称为赤带。多因忧思积伤心脾，肝郁火炽，灼伤冲任带脉所致。治宜扶脾气、清肝火。方用清肝止淋汤（《傅青主女科》：白芍、当归、生地、阿胶、丹皮、黄柏、牛膝、香附、红枣、小黑豆），或用清白散（《医宗金鉴·妇科心法要诀》：当归、黄柏、炒白芍、椿根皮、生地、川芎、贝母、炮姜、甘草），加地榆、荆芥、黄芩，以清热止带。

赤疳 出《诸病源候论》卷十八。五疳

之一。详五疳条。

赤疹 病证名。出《临证指南》卷六。麻疹皮疹色红焮艳者，为赤疹。参白疹、麻疹紫黑条。

赤眼 出《颅凶经》卷下，即风火眼。详该条。

赤崩 病名。出《脉经》。指崩下之血为纯绛红色。治疗参见血崩条。

赤痢 出《诸病源候论》卷十七。即纯血痢。详该条。

赤游丹 病证名。出《疮疡全书》。又名赤游丹毒、赤游肿。为皮肤感染毒邪所引起。其症皮肤色赤如丹，形如云片，游走不定，故名。多见于初生儿，婴幼儿亦常感染。一般发于四肢，由腹背流于四肢者为轻；由四肢流于腹背者为重。邪毒内扰，出现神昏、抽搐，胸满气促者，多属危候。治宜清火、凉血、解毒，用犀角解毒饮；外用大青叶煎水和如意金黄散调敷患部。

赤游丹毒 出《婴童百问》。即赤游丹。详该条。

赤游肿 出《颅凶经》卷上。即赤游丹。详该条。

赤鼻 病证名。小儿鼻色赤，乃脾胃实热，治宜清脾泻热；用泻黄散。如只微赤，则为脾胃虚热；宜异功散加升麻、柴胡治之（《证治准绳》）。参见鼷鼻条。

赤膈伤寒 病证名。见《医宗说约》卷之四。风温时毒陷入胸膈，以致胸膈赤肿、热痛，因其由暴寒搏动而发，故名。症见发热，胸痛，痰嗽气急。若咯浊唾腥臭者，为温毒内陷伤肺，酿成脓胸。初起属实证者，宜表里双解，用荆防败毒散加减；若热壅血瘀，郁结成脓，则宜排脓解毒，用桔梗汤（《济生方》：桑白皮、桔梗、贝母、当归、栝蒌仁、黄芪、枳壳、甘草、防己、百合、苡仁、五味子、地骨皮、知母、杏仁、葶苈）加减。

块痛 病名。倪校维《产宝》：“产后腹有血块作痛，名曰块痛。生化汤治之”。详

儿枕痛条。

芽儿 婴儿初生的称谓。见明·万全《育婴家秘》。形容婴儿初生“如草木之芽，受气初生，其气方盛”，生机蓬勃，欣欣向荣。

花风 病名。见谢观《中国医学大辞典》。即花癰。详该条。

花心风 病名。见谢观《中国医学大辞典》。即花癰。详该条。

花癰 病名。见清·周登庸《续广达生篇》。亦名花风、花心风。指妇人相火过旺，欲火妄炽，肝风易动的病症。症见情欲激动，性欲亢进，见男子则以为情人，甚则出现夜间四肢抽搐，牙关拘紧等。治宜泻肝火，平肝风。方用丹栀逍遥散加炙香附，或用知柏地黄汤、龙胆泻肝汤。

劳伤月经过多 病证名。月经过多证型之一。多因经期不慎，过度劳伤，冲任受损所致。症见月经过多，并持续时间较长，血色暗，面色萎黄，体倦乏力，或有腰腹酸坠等。治宜固冲止血。方用安冲汤、云南白药等。

更年期综合症 病名。亦名更年期症候群。是指经断前后，卵巢功能逐渐衰退出现垂体功能暂时性亢进，促性腺激素、促甲状腺激素、促肾上腺皮质激素等分泌增多，引起内分泌系统功能失调，新陈代谢障碍，心血管系统功能紊乱，植物神经系统失调等所表现的错综复杂的症候。临床主要表现为月经不调，颜面烘热，汗多怕冷，情绪易激动，烦躁不安，心悸失眠，记忆力减退，皮肤麻木或有蚁行感，眩晕耳鸣，水肿等症，属经断前后诸症。多因七七之年，肾气渐衰，冲任亏损，精血不足，出现肾阴虚或肾阳虚症候。肾阴虚者，宜滋阴补肾，用六味地黄汤加减；肾阳虚者，以右归饮加减；阴虚肝旺者，以滋阴降火，用知柏地黄汤；心悸者，用甘麦大枣汤治之。参见经断前后诸症条。

豆豉法 古代下胎毒法之一。取淡豆豉煎为浓汁，频频喂服，适宜于胎禀怯弱，体质不强，而有胎毒内蕴的婴儿。

束胎 见《女科指掌》。指紧束胎儿，令子易生。《胎产护生篇》：“治妊妇七、八个月，恐胎气展大难产，用此扶助母气，紧束儿胎”。《女科指掌》：“束胎者，谓约束其胎，而不能纵横，使易产也，古方束胎丸（白术、云苓、黄芩、陈皮）主之”。宜入月前一个月服至临产。

来蛇形 小儿指诊法十三指形之一。详十三指形条。

报标 麻疹早期征候。出《麻科活人全书》。详麻疹条。

连珠疔串 病证名。见清·梁希曾《病科全书》。瘰病的一种证型。其症颈项颌下、耳之前后，结核垒块，连珠疔串，不痛，或破微痛皮赤，溃烂久不收口。结核坚实不痛者，应舒筋养血，解郁化坚，用四逆散加昆布、海藻、玄参之类；结核微痛皮赤，软化有波动者，宜托里透脓，用透脓散；结核已溃，脓液稀薄者，应补气养血，用人参养荣丸。

求子 出《千金要方》卷二。亦名求嗣。指不孕妇女要求生育。

求嗣 出《妇人良方大全》卷九。即求子。详该条。

〔1〕

旱苗法 人痘接种法之一。取天花患者痘痂研极细末，置曲颈银管之一端，对准鼻孔吹入，以达种痘预防天花的目的。一般至七日而发热，为种痘已成。此法以其简便而多用，但因苗入刺激鼻粘膜，鼻涕增多，往往冲去痘苗而无效，后多不用。

时行顿咳 出《医学正传》。即百日咳。详该条。

时疫痢 见《丹溪心法》。即疫痢，详该条。

呕乳 病证名。亦称溢乳。小婴儿呕乳，无其他症状，往往是由于小儿贲门松弛，乳母哺乳方法不当，以致有时在哺乳后有少量乳汁倒流出口腔而出现呕乳。《幼科发挥》：

“初生小儿，胃小而脆，容乳不多，为乳母者，量饥而与之，勿令其太饱可也。”这种呕乳，只要改进哺乳方法或随年龄增长就会消失。

哕（xiàn 现）乳 病证名。又名转乳，噫奶。为哺乳期婴儿常见的病证。①“哕者，乃儿因吮乳汁过多，胃满而上溢出也。”《小儿卫生总微论方》②“哕乳者，小儿无故乳常流出，口角唇边常见，如瓶之漏，而水渗出也，即哺露。”（《幼科发挥》）③“凡吐乳直出而不停留者，谓之哕乳。”（《证治准绳》）。为胃气上逆所致。治宜和胃降逆。用二陈汤去甘草，加藿香、木瓜，或以炒麦芽、橘红、丁香，水煎服。

吴茱萸 阴寒胸腹疼痛，四肢厥冷的外治方法。用吴茱萸，酒拌湿，纱布袋包蒸极热，互熨胸、腹部及两足心，候气透其痛即止（余梦塘《保赤存真》卷五）。

〔J〕

利后虚羸 病证名。下利而致体虚消瘦的证候。《诸病源候论》卷四十七“肠胃虚弱，受风冷则下利，利断之后，脾胃尚虚，谷气犹少，不能营气血，故虚羸也”。多见于婴儿素体脾胃虚弱，营养不良，气血亏虚者。症见下痢黄白粘脓，里急后重，日夜频频，肢体消瘦。治宜益气健脾。用参苓白术散。

利如膏血 病证名。指痢疾排出呈脂膏血性的大便。《诸病源候论》卷十七：“此是赤利肠虚极，肠间脂与血俱下，故谓利如膏血也。”为湿热之邪郁结肠间，损伤阴络所致。治宜滋阴养血。用驻车丸。

体如水晶 据文献记载新生儿胸腹透明畸形。清·吴溶堂《保婴易知录》：“初生小儿，胸腹忽然如水晶色，脏腑皆见。”

体禀纯阳 小儿体质的特点。详纯阳之体条。

身有赤处 病证名。即小儿皮肉呈现赤色。《诸病源候论》卷四十九“小儿因汗，为风邪所伤，与气血相搏，热气蒸发于外，

其肉色赤，而壮热也。”据临床所见，患儿身上初起有赤点，渐至额上口旁及其它部位，赤如胭脂，皮即皴削。治宜疏风清热，凉血解毒。用消风散加茜草、紫草。

身重痞哑 出《儒门事亲》卷五。即子痞。详该条。

身瘦不孕 不孕症型之一。出《傅青主女科》。因瘦弱之人，性躁多火，精血不足，阴虚火旺，冲任胞宫失于濡润，精不得养，而致不孕。治宜滋阴补肾，养血调经。方用养精种玉汤。

兔缺 又名缺唇。《诸病源候论》卷三十：“人有生而唇缺似兔唇，故谓之兔缺。”为先天性畸形，治宜手术修复。

余热 病证名。见元·朱震亨《幼科全书》。小儿热病经汗下后，表里之热俱退，而复发热者，谓之余热。乃阴阳气血俱虚所致。治宜滋补退热。血虚热甚者，用当归补血汤加味；气虚而恶寒发热者，用补中益气汤；阴虚而热者，用四物汤加地骨皮；阳虚而热者，用四君子汤加黄芪。

坐生 指臀位产。李小有《胎产护生篇》：“产育三难，……有先露臀而曰坐生”。详坐臀生条。

坐产 古代助产方法。杨子建《十产论》：“坐产者，言儿之欲生，当从高处牢系手巾一条，令产母以手攀之，轻轻屈坐，令儿生下。不可坐，抵儿生路”。现已不用。

坐草 出《经效产宝》。临产的别名。因古代产妇临产时，有的是坐在草蓐上分娩，故名。

坐桶 即分娩。张蕃芝《生生要旨》：“妇人生产，往往坐盆而生，俗呼坐桶”。因古代妇女临产时，有的是坐在桶或盆上分娩，故名。

坐婆 出《世医得效方》卷四。古代对接生员的称呼。

坐蓐 见《张氏医通》卷十。即临产。详该条。

坐碍 见顾允若《妇科辑要》。指脐带

绕颈造成的难产。详碍产条。

坐臀生 亦名坐生。《张氏医通》卷十：“儿臀先露，谓之坐臀生”。

含腮 病证名。见清·吴浴堂《保婴易知录》。小儿初生时，腮内生如米豆大一小疱，次日渐大，如有所含，故名含腮。若不早治，则可蚀破腮颊。宜先以盐汤洗净患处，然后用二金散（鸡内金、郁金等分）吹之。

含腮疮 病证名。出清·邹五峰《外科真诠》。①即疔腮。详该条。②《外科启玄》：

“大人小孩疔食透腮颊，初生时如米豆大一小疮，次则渐大，蚀破腮颊，故名含腮疮。”

肝气郁结不孕 不孕症型之一。见陆成一《女界须知》。因肝气郁结，疏泄失常，气血不和，冲任胞脉失于资助，不能摄精成孕，多伴有情志抑郁，胸胁不舒，乳房胀痛，月经失调等症。治宜疏肝解郁，养血调经。方用开郁种玉汤（《傅青主女科》：白术、炒白芍、茯苓、丹皮、香附、花粉）。

肝水 病证名。浮肿的一种类型。因肝有病而引起的水肿。由肝气郁结致脾不健运，故引起肝脾不调，水湿内停而成。临床特点为浮肿，胁痛，脉弦等。治宜疏肝利湿。用逍遥散合四苓散。

肝阴不足 证名。由热灼阴伤，肝脉失养所致。见于急性热病后期。症见头晕，眼干，视物不清，手足心热或麻木等。见于维生素A缺乏症，传染性后脑炎及中毒性脑病所致之目盲，视神经萎缩等。治宜滋阴养肝。用杞菊地黄丸，或石斛夜光丸加减。

肝肾亏损痛经 痛经证型之一。见《中医妇科学讲义》。多因素体虚弱，早婚，分娩过多，损伤肝肾，精亏血少，经行之后，冲任胞脉失养所致。症见经后小腹绵绵作痛，喜按，头晕耳鸣，腰膝酸软等。治宜调补肝肾。方用调肝汤，或六味地黄汤加人参、麦门冬、黄芪。

肝肾阴虚经漏 经漏证型之一。由于先天不足，早婚，房室不节，分娩过多等原

因,耗伤精血,以致肝肾阴虚,阴虚生热,热伤冲任,迫血妄行。症见阴道出血时多时少,淋漓不断,血色鲜红,头晕耳鸣,腰膝痠软,两颧发红,手足心热,甚或午后潮热等。治宜滋补肝肾,清热固冲。方用清海丸,或用两地汤加海螵蛸、煅牡蛎。

肝郁经行先后无定期 见《中医妇科学讲义》。经行先后无定期证型之一。多因恚怒伤肝,肝郁气乱,气乱则血亦乱,冲任胞宫蓄溢失常。症见经期先后不定,经量或多或少,色紫稠粘,抑郁不乐,时欲叹息,胸乳胀闷不舒,或小腹胀痛等。治宜舒肝解郁。方用逍遥散、柴胡舒肝汤等。

肝郁经行先期 经行先期证型之一。出《妇人良方大全》卷一。多因情志抑郁,恚怒伤肝,肝郁化热迫血妄行,冲任失守所致。症见经期提前,经量时多时少,色红或紫,或稠粘有块,乳房及小腹胀痛不舒,烦躁易怒等。治宜疏肝解郁,清热。方用丹栀逍遥散。

肝经湿热带下 带下证型之一。多因肝郁久而化热,犯脾聚湿,湿热互结,流注下焦,损伤冲任带脉所致。症见带下淋漓不断,色黄或赤白相兼,粘稠味臭,胸乳胀闷不舒,精神抑郁易怒,头晕目眩,口苦咽干,尿色黄等。治宜泻肝清热,利湿。方用龙胆泻肝汤,或用白头翁25克、黄柏15克、苦参20克,水煎服,日二次。

肝热恶阻 证名。多因素性急躁,孕后血聚养胎,阴血益虚,肝火犯胃。症见呕吐苦水,或食入即吐,眩晕口苦等。宜清肝和胃,降逆止呕,用加味温胆汤(陈皮、半夏、茯苓、甘草、枳实、竹茹、黄芩、黄连、麦冬、芦根、姜、枣)。

肝病 病名。出《诸病源候论》卷十五。肝为刚脏,体阴而用阳,主储藏血液,调节血量。肝受邪则其气不得疏泄,郁而化火,火动则阳失潜藏,阳亢则风自内生,风火相煽,上升巅顶或横窜脉络,以致血不归藏,随气火而并走于上。临床常见壮热,惊

搐,昏迷,甚至角弓反张等。若肾阴亏虚,精不化血,肝失濡养,亦可成肝阴不足的虚证。肝与胆相表里,其发病常互相影响,如肝胆湿热等证,常是肝胆同病。

肝疳 五疳之一。出《颅凶经》卷上。又名筋疳、风疳。《证治准绳》引杨氏云:“肝疳者由乳食不调,肝脏受热所致也。”主要症状为面目、爪甲发青,眼涩不能睁开,昏暗雀盲成为疳眼(详疳眼条),同时伴有肚大筋青,体瘦,大便色青等。治疗宜清肝泄热,用泻青丸加减,次用集圣丸(《幼科发挥》:黄连、干蟾、青皮、莪术、使君子、砂仁、芦荟、夜明砂、五灵脂、当归、川芎、木香)以清热除疳,健脾消积。

肝虚雀目 见《世医得效方》。即小儿雀目。详该条。

肝虚雀目内障 见《秘传眼科龙木论》。即小儿雀目。详该条。

肝惊 出金·陈文中《小儿病源方论》。脏腑惊证之一,详脏腑惊证条。

肝常有余 小儿生理、病理特点之一。肝为风木之脏,其性刚而不柔,旺於春,春乃少阳之气,可使万物生发和成长。明·万全根据自然界的这种春生夏长的规律,认为阳气自然有余。小儿犹如草木之芽,受气初生,其气方盛,亦少阳之气方长而已。说明小儿生长发育迅速,在生理上正是肝常有余的体现。同时在病理上他还认为“五脏之中肝有余”。因为肝属木,木生风,肝有风则目连翳,或直视大叫,筋急项强,搐搦牵引,尤其小儿禀纯阳,感受病邪,每易嚣张,邪正交争则剧,最易出现壮热惊搐之证。如同一痢疾,成人则较缓和,小儿每多发病急暴,高烧抽搐;同一发烧,有的仅是一般发热,便致抽搐痉挛;有的本是伤风病证,由于风为阳邪,化热最速,小儿既不堪时邪之稽留,又难耐高烧之燔灼,以致一时热甚风生,陡然出现惊搐不已,抽掣神昏之象;有的本是积滞病证,运化转输不利,一时阴阳平衡失

调，卒然出现神志昏乱，惊掣抽搐之象；尤其小儿神气怯弱，邪易深入，内陷心包则惊悸神昏，肝风内动，则抽搐癇疾，肝风心火，交相煽动，易致火热炽盛，真阴内亏，柔不济刚，筋脉失养，故惊搐神迷不已，甚则角弓反张。以上均为肝常有余现象，所以在治疗上有“肝则有泻无补”的论点。

肛门内合 病证名。见《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》。小儿生后，造成肛门内合的原因有二：一是由于热毒壅盛，结于肛门，无复滋润，以致肛门特别狭窄，称“锁肛”。二是由于生理缺陷，出生就肛门被膜遮闭，无隙可通，称“无谷道”。属于热毒壅盛者，宜泻热解毒之剂，如大黄、槟榔、玄明粉之类；属于脂膜遮闭肛门者，必须立即采取手术治疗。参见闷脐生条。

肛肿 病证名。见《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》。又名翻肛。即肛门红肿翻出。多因小儿积热太盛，下移大肠，流注肛门，或因大便困难，便时努力攻胀，致使肛门红肿翻出。治宜清热通便。用调胃承气汤加蒲公英、紫花地丁。外用荆芥、生葱煎水洗净后，再以蟠龙散（干地，焙，一两，风化硝二钱）涂敷局部。

肚皮青黑 病证名。腹部皮肤忽现青黑的证候。《保婴易知录》：“小儿百晬内，忽然肚皮青黑，乃气血失养，风寒乘之，危恶之候也。百晬外亦有此证。”

肚带 出杨子建《十产论》。即脐带。详该条。

肠覃 病名。出《灵枢·水胀》。指下腹部有块状物，而月经又能按时来潮的病证。多因气阻血瘀，癖结所致。《灵枢·水胀》：“肠覃者，寒气客于肠外，与卫气相搏，气不得荣，因有所系，癖而内著，恶气乃起，瘕肉乃生。其始生也，大如鸡卵，稍以益大，至其成，如怀子之状，久则离岁，按之则坚，推之则移，月事以时下，此其候也”。治宜攻坚散寒，行气活血。方用桂枝

茯苓丸（桂枝、茯苓、桃仁、丹皮、赤芍），或香棱丸（《济生方》：公丁香、木香、三棱、莪术、青皮、川楝子、小茴香、枳壳、朱砂为丸）。

肠痈 病证名。痈证发作全身僵硬者。《千金要方》：“肠痈之为病，不动摇，灸两承山，又灸足心，两手劳官。”

肠痛 出《幼科发挥》。即盘肠气痛。见该条。

角 五不女之一。又名角花、角花头。生殖器官发育畸型的一种。多指阴蒂过长。杨志一《生育问题》：“阴核过大，性欲一动，亦能自举，状如阴中有角，故以角症名之”。

角花 五不女之一。即角。详该条。

角花头 出《广嗣纪要·择配篇》。五不女之一。即角。详该条。

龟背 病证名。即脊骨弯曲突起，如龟之背。《小儿药证直诀》：“儿生下客风入脊，逐于髓，即成龟背。”或由胎禀不足，调养失宜，脾肾两虚，脊骨柔弱所致。症见脊柱弯曲畸形，高突隆起，步行伛偻，形体羸瘦。可见于佝偻病、脊椎结核。治宜培补脾肾为主，用补天大造丸。

龟胸 出《小儿药证直诀》。即鸡胸。详该条。

卵缩 病证名。出《灵枢·经脉》。又名囊缩。指阴囊、睾丸上缩。卵缩舌卷并见为病情危笃。

饮痈 病证名。伴有食欲异常的癇痈为饮痈。《奇效良方》谓“其症吃食不知饱，忽然连三、五日不甚思食，手足搐动，多自梦寐中，太饱亦便发作。”治用断痈丸（方见寒痈条）。

〔、〕

冻生 见清·陈笏庵《胎产秘书》。即冻产。详该条。

冻产 病名。指因天寒，影响产妇，儿

不能速生。杨子建《十产论》：“冻产者，言天气寒冷，产妇血气迟滞，儿不能速生，故衣裳宜厚，产室宜暖，背心宜温和，庶儿易生”。

冻烂疮 病证名。出《诸病源候论》卷五十。小儿肌肤柔脆，抵抗力弱，冬月寒气侵袭，易致局部皮肤皲裂，久而生疮，或痒或痛，焮赤红肿，破出脓汁。多见于两耳或手足间。以外治为主，可用蜀椒和盐入酒煎之，乘热蘸涂患处；或用附子、干姜研末，猪脂调涂。

冷利 八利之一。小儿脾胃嫩弱，寒湿内侵或伤生冷，以致脾胃虚寒，运化失常。症见利下白色粘液，手足冰冷，渴喜饮热等。治宜温运脾阳。用附子理中汤等方加减。

冷毒痢 病证名。出《颅凶经》。指小儿痢疾伴有腹胀，腹痛，里急后重，痢下脓血的症候。治宜温中止痢之剂。

冷热利 病证名。冷热之邪相杂损伤胃肠而致的腹泻，又名冷热泻。《诸病源候论》卷四十七：“小儿先因饮食，有冷气在肠胃之间，而复为热气所伤，而肠胃宿虚，故受于热，冷热相交，而走下利，乍黄乍白，或水或谷，是为冷热利也。”治宜和胃止泻。用胃苓汤加减。

冷热疳 病证名。疳疾的一种证型。①疳疾发病的新久和寒热虚实错综复杂的证候。《证治准绳·幼科》：“疳之新者为热疳，面黄脸赤，骨热盗汗，鼻干口臭，唇焦烦渴，心躁惊悸，情意不乐；若疳之久者为冷疳，目肿腹胀，便利不定，泻粪肥腻或似油珠，烦渴黄疸。热疳病多在外，冷疳病多在内，又有冷热二证交互，非新非久，不内外因者。治冷疳木香丸（木香、青黛、槟榔、肉豆蔻、麝香、续随子、虾蟆）；治热疳胡黄连丸（胡黄连、黄连、朱砂）。”②《证治准绳》引《庄氏家传小儿二十四候·第一候》：“泻脓血，日渐瘦，是冷热疳。”

冷热泻 见《小儿卫生总微论方》。即冷热利。详该条。

冷积 病证名。积痛之一。脾胃虚冷，感受寒邪积滞于中而致的腹痛。症见形寒，面色

皤白，腹痛不思饮食，四肢厥冷，小便清长，大便秘结，舌淡，苔白润，脉沉迟。治宜温通镇痛，散寒去积。用温脾汤加减。

冷疳 病证名。疳疾内脏虚冷的一种证型。又名瘦冷疳。《证治准绳·幼科》：“冷疳病多在内，利色无常，其沫清白，肢体软弱，目肿面黧。又一证：躁渴卧地，似有热状，惟饮食不进，滑泄无度，亦冷疳也。”治疗先用木香丸（方见冷热疳条），继用温补脾肾之剂，如九味地黄丸（方见肾疳条）。

冷涎 六涎之一。多由“脾气不运，复因肝气所乘，伏而不动，停水滞谷”（《史载之方》）而成。其症可因怒而诱发。症见心前溃乱不快，闷倒不省人事，四肢渐次发冷等。治宜温化痰涎。用青州白丸子。

冷痰 出《诸病源候论》卷二十。即寒痰。详该条。

冷嗽 即寒嗽。详该条。

怀子 出《素问·腹中论》。即妊娠。详该条。

怀孕 即妊娠。详该条。

怀身 出《金匱要略·妇人妊娠病脉证并治》。即妊娠。详该条。

怀胎 见《脉经》。即妊娠。详该条。

怀躯 出《脉经》。即妊娠。详该条。

怀娠 出《金匱要略·妇人妊娠病脉证并治》。即妊娠。详该条。

间经 见《玉峰郑氏女科秘传·经候》：“经血平时常二、三、四月一行，饮食如常，动作不衰，腹中不痛，面色不改，名间经”。

闷气生 出王伯龙《养儿宝》。又名闷肠生、梦生、闷脐生、生后不啼。包括寤生、草迷。指婴儿生下闷绝不啼，相当于新生儿窒息。

闷肠生 出《大生要旨》。即婴儿生下后不啼哭。详闷气生条。

闷脐生 ①出元·朱震亨《幼科全书》。即初生不啼。详该条。②初生儿肛门有膜闭塞的畸形。清·鲍相璈《验方新编》卷五：“有闷脐生者，儿粪门有一膜，闭住其气，

故不能出声”。宜手术治疗。

闷痧 病证名。小儿发痧的一种证型。见陆乐山《养生镜》。症见怠倦喜睡，四肢乏力，饥饿不知，不思饮食，重则眼渐昏暗，人事不知。宜急刺曲池、委中、间使、手、足三里、大椎，并刮背脊两旁高肉。

闷瘡 (cū 醋) 指麻疹闭表，疹难透出的证候。清·张畹谿《麻疹阐注》：“闷瘡之症，有热五六日而不出者；有一出而即隐者；有头面微出而身上俱无者；有身上微影而头面胸背俱无者；有形迹在内而外不见形者；有皮肤隐隐紫赤者；有红紫遍身紫黑成块者。”临床分风闭、火闭、食闭、痰闭四证。详各条。

沥胞生 即沥浆生。清·亟斋居士《胎产问答》：“沥浆生，又名沥胞生”。详沥浆生条。

沥浆生 又名沥胞生、沥浆产。相当于早期破水。《胎产心法》：“有沥浆生，其浆流一、二日不产，俟流浆渐少方生。倘浆来过多，恐胞干难产”。若浆血已涸，元气困惫，急用人参、当归煎服以助血气，不能单纯用催生耗气之药。

沥浆产 见清·寄湘渔父《达生保赤编》。即沥浆生。详该条。

沉听 病证名。出《小儿卫生总微论方》。指耳聋之轻症。轻小之声音不辨，重大之声音可闻。多由风邪乘入少阳之经，邪结耳内，与正相搏，气停壅滞，阻于耳窍而成。治宜祛风通窍。用通鸣散（《证治准绳》：菖蒲、远志、柴胡、麦门冬、防风、细辛、甜葶苈、磁石、杏仁）加减。针灸可取听宫、听会、内关、神门等穴。耳针取肾、神门。

沈唇 出《小儿卫生总微论方》。即小儿紧唇。详该条。

初生儿阴道出血 婴儿出生数日后阴道出血，血量不多，仅足点染尿布，类似成人月经，而无其他症状者，一般不须治疗，数日即愈。

初生下吐 病证名。出《小儿药证直

决》。指初生小儿腹泻与呕吐并见。多由哺乳过早、过量，或感寒热之邪，扰及胃肠所致。治宜抑制乳食。轻证，减少乳量，代以米汤、糖、盐水等；病情好转后，逐渐增加乳量。重证，应禁食，给予静脉输液等治疗。

初生口噤 出《全幼心鉴》。即脐风。详该条。

初生无皮 病证名。见《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》。小儿生下无皮，除由早产发育未全所致者外，在旧时多由父母素患梅毒遗传而来。临床表现多为上半身或下半身赤烂，甚至色带紫黑，尤以鼻沟、肛门、阴囊等处更为明显。由于早产的多遍身红嫩光亮，面色发白，四肢不温。属胎元不足者，治宜调补气血，用当归饮（《医宗金鉴》：何首乌、白藓皮、白蒺藜、甘草、当归、生地黄、白芍药、人参、黄耆、川芎），外用糯米粉扑之。梅毒遗传者，宜清解胎毒，用换肌消毒饮（《医宗金鉴》：当归、生地黄、白芍、川芎、皂刺、土茯苓、金银花、连翘、甘草、白芷、苦参、白藓皮、防风、灯心），外敷清凉膏（石灰、香油）、鹅黄散（黄柏、石膏、猪苦胆）。

初生不尿 病证名。出《证治准绳·幼科》。婴儿出生后，一般在36小时内初次排尿，每天四、五次，渐至十余次，一周岁以后，才逐渐减少。如果出生两天后，仍无小便，除由于缺乏肾或尿道畸形所致者外，大多由胎热蕴结膀胱，或胎禀不足，膀胱气化不行所致。热蕴膀胱者，宜清热利水，用导赤散或八正散加减；胎禀不足者，宜益气利水，用春泽汤。

初生不乳 病证名。见《证治准绳·幼科》。婴儿出生12小时后，不能吮乳。原因颇多，由于元气不充，脾胃虚寒或秽热郁积者为常见。其症息弱声低，无力吮乳者，宜培补元气，先进独参汤，继进四君子汤；面白肢冷，曲背啼哭而不吮乳者，宜以温中健脾为治，如理中汤加减。烦啼声粗，腹膨便秘而不吮乳者，宜清热逐秽，用小承气汤加黄连。

初生不啼 病证名。出《全幼心鉴》。又名寤生、梦生、闷脐生、草迷、婴儿哭迟。均属新生儿窒息。多由难产，或寒气内迫，导致小儿气闭，不能啼哭，甚至气绝而闷死。其症轻者，唇口青紫，呼吸微弱；重者，颜面苍白，手足发冷，呼吸极微。治法：气闭不通者，尽快清除口鼻内的羊水，再将儿倒置，用手轻轻拍打儿背，便可回苏而发出啼声。如因寒闭不啼，可用棉絮包裹，暂不断脐，以艾条或纸捻蘸油点火，在脐带上往来熏之，待暖气入腹，寒气一散，自能啼哭，然后再断脐。若因气绝而不能啼者，为其重症。除用上法外，还需配合人工呼吸等急救措施。

初生目闭 病证名。见《本草纲目》。小儿初生目闭不开，多系胎有伏热，热蒸于脾所致。《幼幼集成》：“小儿初生目闭，此胎热也”。眼胞属脾，脾之脉络为热所壅，故眼胞赤肿，不能睁开。热重者并有面红唇燥。治宜清热泻脾，用生地黄汤（《医宗金鉴》：生地黄、赤芍药、川芎、当归、天花粉、甘草），或用石斛、白芍、甘草，煎汤喂之；外用药棉浸凉开水洗之，其目自开。

初生吐乳 见《本草纲目》。小儿初生偶然作吐，吐量不多，一般不属病态。如果呕吐不止，或者进乳即吐，可由初生拭口不净，秽液内拭（参见生下吐条）；或胎前寒热偏盛，或产时外伤等原因所形成。应结合起病缓急，呕吐与哺乳的关系，根据证情，综合分析。辨别寒热虚实，随证施治。

初生两肾缩 病证名。指男婴初生时双侧睾丸上缩。如因受寒所致。可用硫黄、吴茱萸、大蒜同研，涂于腹部，再以蛇床子煎汤淋洗熏之（《普济方》）。

初生乳核 新生儿乳房胀大及泌乳的现象。为禀自母体冲任二脉之气上溢所致。男女婴儿均可出现，是一种生理现象。切忌挤压，以防感染。任其自然，一至二星期即可消失，但亦有延长至三月之久才消失者。

初生拭口 又名拭口法、拭秽法。古人

认为小儿初生，必须先以绢裹指，拭净口中秽液，“若不急拭，啼声一发，即入腹成百病”（《千金要方》）。历代医著均有类似的记载。在临床上婴儿开始呼吸前，应清除口咽内的粘液，亦可倒提婴儿片刻，让粘液、秽血自由流出。如鼻内有分泌物引起呼吸困难，可用消毒棉签轻轻拭去，使之通畅。

初生便血 病证名。小儿初生七日内，大小便有出血者，一般多为胎气热盛所致。《诸病源候论》卷四十九：“心主血脉，心脏有热，热乘于血，血性得热，流散妄行，不依常度，其流渗于大小肠者，故大小便血也。”治宜清热止血。用地黄汤加减。

初生脚气 病证名。小儿新生即见全身水肿，尿量减少，体温低下，吮乳无力，反复呕吐，肢体柔软，终日睡眠，啼声低弱，或生后尚啼，次日起即不啼，此一系列症状，必与母亲脚气同时出现。一般只须改变乳食，如换以牛奶、蛋黄、豆粉、代乳粉或健康妇的乳汁等，即可不吐，尿量渐增，水肿随于数日内退尽，余症也全消失。如历时较久，出现冲心、抽搐等症，预后多不良。

初孕大热 病证名。《女科秘宝》：“初孕自发大热，服凉药更甚，此胎之虚热也，服四物汤再加人参、附子”。

初关 见《片玉心书》。即风关。详该条。

初潮 亦名天癸水至、首经、天癸水等。指女子的第一次来月经。

诊脐 观察脐部的诊断方法。《台州原文》：“脐通五脏，真神往来之门也，故曰神阙”。凡脐以深大而坚固，左右上下推之不动，轮廓约束者，为真神安全。按之有力为真气充足；按之无力为脏气虚衰。外观应注意有无脐肿、脐湿、脐疮等病象。

谷瘕 病证名。出《诸病源候论》卷四十七。多由小儿哺食过度，脾气受伤，不能消磨食物，以致停滞不化，而成腹大颈细，全身黄瘦的病候。参见丁奚疳条。

〔一〕

尿门无孔 由于先天性畸形，尿门无孔，以致婴儿出生后小便不通，宜采用外科手术治疗。

尿白 病证名。出《婴童百问》。指小儿小便初下色黄赤，落地良久凝如白膏者（《幼幼集成》）。多因乳食伤脾，脾不散精，湿热内蕴，清浊相干，下注膀胱所致；亦有因肺脾气虚而产生的。脾伤湿蕴者，治宜健脾分利，用胃苓丸；肺脾气虚者，用补中益气汤。

尿来 病证名。指小儿夜间小便不禁而遗尿者。《古今医统》：“小儿遗尿者，此膀胱有冷、不能约于水，故遗尿也，又有尿来者，亦由膀胱冷。夜属阴，小便不禁，胞里自出，谓之尿来也。”治法参小儿遗尿条。

尿床 病证名。出《诸病源候论》卷十四。夜睡时不自觉地尿床。参小儿遗尿条。

忌奶 见顾膺陀《妇科集》。忌奶者，即孕妇之乳，小儿饮之，易致吐泻等症。

坠伤 出《脉经》。即小产。详该条。

坠胎 病证名。出《诸病源候论》卷四十二。指妇人怀孕三月以内，由于肾虚、血虚、气虚、血热、郁怒或外伤，药物中毒等因，伤及冲任，或冲任不固，胎元失养，以致妊娠中断，胎儿未成形而坠下。《医宗金鉴·妇科心法要诀》：“五月成形名小产，未成形象坠胎言”。

坠孪 即小产。详该条。

阻病 出《妇人良方大全》卷十二。即恶阻。详该条。

妊子 即妊娠。《素问·平人氣象论》：“妇人手少阴脉动甚者，妊子也”。详妊娠条。

妊娠 出《金匱要略·妇人妊娠病脉证并证》。亦名六甲、有子、有身、有妊、有娠、任娠、双身、妊子、怀子、怀孕、怀身、怀胎、怀娠、怀躯、孕、重身、躯。指妇女受孕。

妊娠大小便不通 病证名。出《诸病源

候论》卷四十二。孕妇血聚养胎，脏腑气实，血燥生热，热积于大小肠，以致大小便不通。治宜清热、润燥、利水。方用梔子汤（梔子、石膏、黄芩、泽泻、柴胡、车前子、葳蕤、竹叶）。

妊娠大便秘不通 病证名。出《诸病源候论》卷四十二。孕后血聚养胎，阴血不足，津液竭燥，肠胃否涩，蕴积结于肠间，以致大便秘结。治宜养血润下。方用四物汤倍用生地加黑芝麻、松子仁、柏子仁等。

妊娠下痢 病证名。出《诸病源候论》卷四十二。亦名子痢、胎前赤白痢。病因孕后内伤饮食生冷，或外受暑湿热毒之邪，以致里急后重，腹痛，下痢赤白，日夜无度，若阳气下陷则胎易坠。由饮食所伤者，初起腹痛，里急后重者，宜香连化滞丸；若受暑湿热邪，宜当归芍药汤。

妊娠口干 病证名。见《女科指要》。指孕后脾肾两虚，清阳下陷，以致津液不能上承，口干不渴。治宜健脾生津。方用七味白术散。

妊娠口舌生疮 病证名。病因孕后血聚养胎，血热心火上炎所致。治宜清热、泻火。方用东垣凉膈散（方见妊娠咽喉痛条）。

妊娠口渴 见《闺中宝录》。即妊娠烦渴。详该条。

妊娠小便不利 病证名。出《诸病源候论》卷四十二。病因孕后小肠积热，热结膀胱，气化受阻；或脾肺气虚，通调运输失职，不能下输膀胱，以致小便不利。小肠积热者，症见口渴、心烦、尿赤，宜清热利水，方用八正散加减；脾肺气虚者，多有心悸、气短、神疲、乏力等症，宜补益脾肺，方用补中益气汤加减。

妊娠小便不通 病证名。出《诸病源候论》卷四十二。亦名转胞、转脬、胞转。指以脐下急痛为主症的小便不通。多因强忍小便（忍尿疾走、忍尿入房、饱食忍尿等），或寒热所迫，或惊恐暴怒，水气上逆，气迫

膀胱,使膀胱屈戾不舒所致。治宜滑利疏导。方用蒲黄散(《圣济总录》:蒲黄、滑石),或滑石散(《世医得效方》:寒水石、滑石、葵子、乱发灰、车前子、木通);年老体弱者,当宜补肾,用六味丸;惊忧暴怒,小便卒暴不通者,宜葱白汤(《世医得效方》:陈皮、葵子、葱白);若孕妇胎满压迫膀胱所致者,宜用肾气丸,或令孕妇平卧床榻,脚端抬高,使胎不压胞,小便自通;若因孕妇中气虚弱,胎元下坠所致,宜补中益气汤。

妊娠小便淋痛 即子淋。详该条。

妊娠小腹痛 病证名。即妊娠腹痛。《诸病源候论》卷四十二:“妊娠小腹痛者,由胞络宿有冷,而妊娠血不通,冷血相搏,故痛也”。详妊娠腹痛条。

妊娠子烦 出《诸病源候论》卷四十二。即子烦。详该条。

妊娠不语 出《妇人良方大全》卷十五。即子瘖。详该条。

妊娠中风 病名。出《诸病源候论》卷四十二。多因孕后血虚,经络、脏腑失荣,中于风邪所致。中于经络者,症见肌肤不仁,手足麻木,口眼歪斜,甚则半身不遂;中于脏腑者,症见卒然昏倒,痰涎壅盛,不省人事。惟孕妇患此症不可以按中风常法治疗。应以补虚安胎,佐以祛风为主。方用增损八物汤(《证治准绳》:人参、黄芪、白术、甘草、当归、川芎、牛蒡子、赤芍、防风、荆芥穗、连翘、桔梗、葛根)。若口眼歪斜,手足顽痹者,宜养血祛风,佐以安胎,用防己散(《证治准绳》:防己、羌活、防风、麻黄、松木节、羚羊角、桂心、荆芥穗、薏苡仁、桑寄生、炙甘草);若卒然昏倒,痰涎壅滞者,治宜搜风、开窍、祛痰,方用防风散(《证治准绳》:防风、葛根、桑寄生、羚羊角、细辛、当归、菊花、防己、秦艽、桂心、茯神、甘草)加竹沥;若中风不语,肢体强直,不省人事者,治宜祛风开窍,方用生犀角散(《证治准绳》:生犀角屑、

麻黄、秦艽、甘草、防风、赤箭、羌活、当归、人参、葛根、赤芍、石膏)。

妊娠中恶 病名。出《诸病源候论》卷四十二。指孕妇中邪恶之气,症见忽然心腹刺痛,闷绝欲死。治宜扶正祛邪安胎。方用当归散(《证治准绳》:当归、丁香、川芎、青橘皮、吴茱萸),或用金银藤煎汤饮服。

妊娠中暑 病名。见边继孝校刊《竹林女科证治》。妊娠中暑热之邪。症见发热口渴,自汗闷乱,昏愤倦怠,胎动不安。治宜清暑安胎。方用香薷饮,大渴多饮加麦冬、黄芩、花粉、五味子、梔子。

妊娠中湿 病名。见《万氏女科》。病因孕后冒雨,或感受雾露之邪,久坐湿地,及汗出冷浴,以致湿伤于肌腠。症见发热,骨节烦痛,身重头重鼻塞等。治宜祛湿安胎。方用黄芩白术汤(黄芩、白术、苏叶、生姜)。

妊娠风痉 见《妇人良方大全》卷十四。即子痫。详该条。

妊娠心痛 病名。出《诸病源候论》卷四十一。病因风邪痰饮交结,痹阻胸阳,所引起的心前疼痛,重者胸痛彻背,喘不得卧,轻者时痛时止,若痛不止,气乘胞络则令胎动。因风邪乘于心包而痛者,宜驱邪止痛,用四磨汤加元胡、香附、草果;因寒痰停饮而痛者,用二陈汤加山楂、青皮、木香、乌药;宿有冷痛外感寒邪而痛者,用吴茱萸汤加砂仁主之。一说妊娠心痛,非心痛也,乃胎气上升,壅塞胃口作痛,治宜顺气安胎,方用手拈散。

妊娠心腹胀满 病证名。见《太平圣惠方》卷七十五。多因脾胃素虚,孕后感寒,或内伤饮食,以致胃气壅滞,浊邪内阻,升降失调。症见心腹胀满,脘闷不思食。感寒者,兼见食后胀甚、喜按、喜热。治宜温中散寒,方用香砂六君子汤;伤食者,兼见食后胀痛,噎腐吞酸,治宜消食化滞,方用保和丸。

妊娠心腹痛 病证名。出《诸病源候论》卷四十一。妊娠心腹俱痛，多由冷积或新触风寒，邪正相击，而并于气，随气上下，上冲于心则心痛，下攻于腹则腹痛，上下俱作则心腹俱痛。若不早治，则冲击胞络必致胎动。素有冷痛者，发病急，痛如刀刺。方用川芎散（川芎、当归、人参、吴茱萸、厚朴、茯苓、桔梗、芍药、枳壳、甘草）。冲击胞络腹痛者，宜当归芍药汤（当归、芍药、白术、茯苓、泽泻、川芎）。

妊娠少阳证 病证名。病因孕后邪中半表半里。症见胸胁满痛，寒热往来，脉弦。治宜和解安胎。方用四物汤加柴胡、黄芩，或黄龙汤（即小柴汤去半夏）主之。

妊娠目病 病名。见《张氏医通》卷八。多属热症。因孕后胎热有火所致。如气分有热者，症见旋螺突起，瞳人散大，治宜清火，泻气分之热，方用天门冬饮；血分有热者，症见瘀血凝翳，治宜清火，泻血分之热，方用保胎清火汤；心脾壅热者，症见目赤烦闷，治宜清火，泻心脾壅热，方用简易知母汤（知母、麦冬、茯苓、黄芩、黄芪、甘草、桑皮、竹沥）；外感风邪者，症见眼花头昏，治宜清火，驱风邪，方用芎苏散；胎气受伤邪热上攻者，症见眼昏生花，治宜清火泻热，方用消风散。

妊娠失音 病证名。妊娠期间出现声音嘶哑，或不能出声，称为妊娠失音。参见子瘖条。

妊娠白带 病证名。见《叶氏女科证治》卷二。亦称胎前白带。在正常情况下，孕后白带较平时可稍为增加。如超出正常现象，则为病态。多因孕后脾虚运化失职，或胞虚寒冷，寒湿凝滞，伤及冲带二脉，以致白带量多。治宜健脾固摄。方用闭白丸（龙骨、牡蛎、赤石脂、乌贼骨），胞寒者，加艾叶、炮姜。

妊娠耳鸣 病证名。见《叶氏女科证治》卷二。多因肾虚，或肝胆火盛所致。孕

后足少阴肾经不足，肾虚髓海不足则耳鸣，兼有头晕、目眩、腰痠。治宜滋阴补肾，方用猪肾丸（猪肾子一对，青盐少许，蜜丸酒下）。因肝胆火盛鸣于午前者，多为实证，兼见头痛目眩，口苦咽干，治宜清肝胆之火，方用小柴胡汤加黄连、梔子；鸣于午后者，多属血虚，兼见心烦不宁，夜寐不安。治宜平肝补血，方用四物汤加白术、茯苓。

妊娠吐血 病证名。出《诸病源候论》卷四十一。多因胃中积热；或肝郁化热，热伤胃络，气逆于上，血随而溢，则出现吐血。若吐血不止，易致堕胎。因胃中积热者，脘腹胀闷疼痛，吐血色红或紫暗，挟有食物残渣，大便色黑。治宜清胃热，止血。方用加味清胃散（当归、生地、升麻、丹皮、黄连、犀角、连翘、甘草）。肝火犯胃者，兼见口苦胁痛，心烦善怒，治宜平肝清热，止血，方用丹梔逍遥散加止血药。

妊娠伤食 病证名。见王肯堂《胤产全书》。孕妇脾胃虚弱，饮食不节，伤及脾胃，而致食水停滞。症见脘腹胀满，或呕吐泄泻。因饮食停滞而胀满者，治宜消食导滞健脾，方用保和丸，恶心呕吐加枳壳、砂仁；伤食腹满泄泻者，治宜消食健脾止泻，方用六君子汤，伤于肉食加山楂，伤于面食加麦芽，冷物所伤加砂仁、木香。

妊娠多怒坠胎 病证名。见《傅青主女科》。由于孕后性急多怒，肝火妄动，下扰冲任，气迫血乱，胎元受损欲坠。症见腰痠腹胀，胁痛，甚者阴道流血。治宜平肝、泻火、安胎。方用逍遥散加黄芩、桑寄生。

妊娠阳明证 病证名。孕后热病邪在阳明。症见口渴便秘，谵语气促，腹中满痛，脉沉数有力。治宜泻热安胎，方用四物汤加大黄。

妊娠阴肿 见《叶氏女科证治》卷二。即胎前阴门肿。详该条。

妊娠呕吐 出《金匱要略·妇人妊娠病脉证并治》。即恶阻。详该条。

妊娠护胎法 指妇人在孕期的注意事项。如妊娠药忌、胎前节养六条、胎前用药三禁、胎前十字真言、换睡等。均属护胎法范畴。参见各条。

妊娠谵语 病证名。《张氏医通》卷十：

“妊娠谵语，为藏府热极之候，急宜童便时时灌之。不应，用生地黄黄连散清其血中之火，庶胎得安，脉实者，加酒大黄下之，下迟则伤胎也”。

妊娠尿血 病证名。出《诸病源候论》卷四十一。指孕妇尿中带血。多因孕后肾虚；或心经火盛，移热于小肠，热扰血分，渗入膀胱所致。肾虚者，兼见小便频数，血色淡红，腰膝痠软，头晕倦怠。治宜补肾固摄，方用六味地黄汤加阿胶、杜仲、血余炭；心经火盛者，兼见小便热赤，血色鲜红，心烦口渴，口舌生疮，治宜清热泻火，方用小蓟饮子。

妊娠环跳穴痛 病证名。清·阎纯玺《增补胎产心法》上卷：“妊娠环跳穴痛，属肾虚，宜六味地黄汤，加杜、续或千金保孕丸”。

妊娠乳肿 病名。见《叶氏女科证治》卷二。亦名内吹、胎前乳肿、内吹乳。怀孕六、七个月，因肝气不舒，气滞血瘀，经络不通，乳管阻塞，以致乳房胀硬疼痛，寒热并发。宜舒肝、理气、清热，用清肝解郁汤（《证治准绳》：人参、茯苓、熟地、芍药、贝母、川芎、山梔、白术、当归、柴胡、丹皮、陈皮、甘草），并结合外治法。

妊娠乳痛 病名。出《诸病源候论》卷四十。乳头属肝，乳房属胃，由于妊娠乳肿失于治疗，或复伤气怒，令肝胃积热，血涩不通，气结不散，以致结聚成痈。治宜托里解毒，兼顾胎元，方用托里解毒汤（人参、黄芪、当归、芍药、白术、茯苓、陈皮、连翘、白芷、金银花、甘草），并结合外治法。

妊娠肿胀 病证名。指妊娠以后发生的肢体肿胀。根据肿胀部位和症状的不同，有

子肿、子气、子满、皱脚、脆脚、胎水肿满等名称。详各条。

妊娠胁痛 病证名。见清·阎纯玺《增补胎产心法》。多因痰浊瘀阻，或恼怒伤肝，气郁不舒所致。痰浊瘀阻者，痰涎壅盛，胸胁疼痛，治宜祛痰理气，方用二陈汤加减；恼怒伤肝者，烦闷易怒，两胁疼痛，治宜舒肝解郁，方用逍遥散加减。

妊娠疟 病名。出《诸病源候论》卷四十二。亦称子疟、胎疟。多因脾胃虚弱，饮食停滞，夏伤于暑，感染疟邪所致。治宜和解驱邪，健脾安胎。用七宝散。若脾胃虚弱，饮食停滞者，宜六君子汤加藿香、桔梗、苍术；停食而又感寒邪者，宜驱邪散；伤暑而饮食少者，宜藿香正气散。

妊娠泄泻 病证名。出《妇人良方大全》卷十五。孕妇脾肾素虚，外受风寒暑湿之邪，内伤饮食生冷；或肾阳不能上蒸脾土，脾失健运；及肝气乘脾而致腹痛泄泻。伤于风寒者，泄泻清稀，腹痛肠鸣。治宜散寒化浊，方用藿香正气散；伤暑者，泄泻烦渴，小便赤澀，治宜清热利湿，方用葛根芩连汤；停食不化而泻者，吞酸胀饱，腹痛肠鸣，治宜消食、导滞、健脾，方用保和丸；脾肾阳虚者，饮食少思，五更作泻，治宜温补脾肾之阳，方用四神丸；肝气乘脾者，胸胁痞闷。治宜抑肝扶脾，方用痛泻要方。

妊娠卒心痛 病证名。《经效产宝》：“治妊娠卒心痛，气欲绝。川芎、当归、茯苓、厚朴”。参见妊娠心痛条。

妊娠经来 即激经。《证治准绳·女科》：“大抵妊娠经来不多，而饮食精神如故，六脉和缓滑大无病者，血盛有余也，儿大能饮自不来矣”。

妊娠毒药伤胎 见《证治准绳·女科》。指孕妇误服毒药，损伤胎元。症见腰痛腹坠，胎动不安。宜解毒安胎。用甘草、黑豆、淡竹叶浓煎频服。并根据所服毒药，进行抢救。安胎参见胎动不安条。

妊娠药忌 指妊娠期禁用或须慎用的一些药物。这些药物可能引起流产,或损胎元,一般不得使用,故称。大致有以下几类:

1)植物药类:①毒草类:乌头、附子、天雄、侧子、野葛、羊躑躅、南星、半夏、大戟、芫花、常山。②破血药类:牛膝、桃仁、牡丹皮、茜根、干漆、瞿麦、茵茹、三棱、鬼箭羽、通草、红花、苏木。③吐下滑利药类:藜芦、巴豆、牵牛、皂荚、葵子、薏苡仁。④辛温辛热药类:厚朴、肉桂、干姜。2)动物药类:①毒虫类:水蛭、芫青、斑蝥、地胆、蜘蛛、蜈蚣、蜈蚣、蛇蜕、虻虫。②其他动物药类:猬皮、牛黄、麝香、龟板、鳖甲。3)矿物药类:代赭石、水银、锡粉、硃砂、砒石、芒硝、硫黄、雄黄。其中有些是剧毒药,如砒石、巴豆、斑蝥等都绝对禁用;有些经过炮炙,可以使用,如生半夏用姜汁制成的姜半夏,为妊娠恶阻常用药之一。故上述这些药是否完全禁忌,尚须进一步研究。

妊娠咽痛 病证名。见《叶氏女科证治》卷二。多因孕妇胃中积热,或有痰涎所致。宜清胃化痰。方用升麻桔梗汤(升麻、桔梗、甘草、元参、防风),或东垣凉膈散(方见妊娠咽喉痛条)。

妊娠咽喉痛 病证名。出《胎产新法》。病因阴虚火盛,胎气上攻,感受时邪,热灼肺胃,发为喉痛。宜降火驱邪。方用东垣凉膈散(薄荷、黄芩、黄连、栀子、连翘、桔梗、甘草)。

妊娠咳血 病证名。多因孕妇肺阴素虚,或感风热之邪,以及情志内伤,肝火上犯于肺,损伤肺络所致。阴虚者,兼见潮热盗汗,咳嗽胸痛,宜养阴清肺止血,用百合固金汤加藕节、焦山栀;风热者,兼见喉痒咳嗽,口干鼻燥,痰中带血,宜疏风清热,养阴止血,用桑杏汤加黄芩、黄连、栀子、藕节;肝火犯肺者,兼见烦躁易怒,胸胁疼痛,痰中带血,宜平肝清热止血,用丹栀逍遥散加藕节、桑皮、仙鹤草。

妊娠咳嗽 出《诸病源候论》卷四十二。即子嗽。详该条。

妊娠脉 亦称胎脉。根据孕后生理变化的特点,其脉象常见滑而冲和,滑数搏指有力,或尺脉滑数,寸脉微小等脉象。如《素问·阴阳别论》:“阴搏阳别,谓之有子”;《素问·平人氣象论》“妇人手少阴脉动甚者,妊子也”;《素问·腹中论》:“身有病而无邪脉”;《濒湖脉学》:“滑利冲和,妊娠脉可决”;《医宗金鉴·四诊心法要诀》:“滑疾而散,胎必三月,按之不散,五月可别”等。均属妊娠之脉。

妊娠胎萎燥 出《圣济总录》卷一百五十五。即胎不长。详该条。

妊娠疫喉 病证名。病因孕后感受疫疠之邪。症见发热喉痛,呼吸困难。急宜养阴清热解毒。方用养阴清肺汤,外用锡类散。误治则热深血耗,痉厥风生,母子俱危。参见白喉条。

妊娠眩晕 见顾允若《妇科辑要》。即子眩。详该条。

妊娠积聚 即胎兼症瘕。详该条。

妊娠衄血 病证名。见《证治准绳·女科》。多因孕后嗜食辛辣,积热不散,上蒸于肺,灼伤肺络,血随上逆,发为鼻衄。若衄血不止,热伤胞络,有坠胎之虞。宜养阴清热,止血安胎。用丹皮汤(《竹林寺女科秘方》:丹皮、黄芩、白芍)。

妊娠脐下冷痛 病证名。清·阎纯玺《增补胎产心法》卷上:“妊娠脐下冷痛,腹胀虚疼,小便频数,大便虚滑,皆食生冷所致,小建中加炮姜、木香,不应更加茴香、良姜”。

妊娠疹 病证名。指妊娠期患麻疹。其症初起发热,易动胎。治疗除注意安胎外,余症均按麻疹辨证治疗。

妊娠瘕 出《诸病源候论》卷四十二。即子痼。详该条。

妊娠烦渴 病证名。见《普济方》卷三

百四十。亦称妊娠口渴、胎前焦渴。多因孕妇脏腑气虚，荣卫不和，阴阳失调，热乘于心脾，津液枯少，故令烦躁，口干作渴。若胃经实热者，宜泻热生津止渴，方用竹叶石膏汤；若胃经虚热者，宜滋阴清热止渴，方用竹叶黄芪汤；若心经火动者，宜清热泻火，用竹茹、麦冬、甘草煎汤代茶饮。

妊娠流涎 病证名。涎是口液，伏于脾而溢于胃，由于孕后胞宫内实，冲脉气盛，胎气上逆，致使脾胃不和，则往往液自口流出。宜理脾降逆，调和脾胃。方用香砂六君子汤，或二陈汤。

妊娠眼昏 病证名。指妊娠临月，忽然两目失明。由孕后阴虚，伏热在内，肝经热毒上攻于目所致。症状急骤，卒然视物不见，并头痛项肿，不能转颈等。宜清热熄风。急以天门冬饮子（天冬、知母、菴蔚子、五味子、防风、茯苓、川羌、人参）治之。

妊娠唾血 病证名。指鲜血与唾沫混杂而出。多由阴虚火旺，虚火上扰舌及齿龈之络所致。治宜养阴清热为主。方用滋阴降火汤（白芍、当归、熟地、白术、天冬、麦冬、生地、陈皮、知母、黄柏、炙甘草、姜、枣）加減。

妊娠惊悸 病证名。指孕后心悸易惊，恐惧不安的病症。多因孕后心血不足，或阴虚火旺，或心阳不振等引起。症见心神不宁，心悸善惊，坐卧不安。若心血不足者，兼见面色不华，头晕目眩，宜补血养心，方用归脾汤，阴虚火旺者，兼见心悸不宁，心烦少寐，宜滋阴清火，方用补心丹；心阳不振者，兼见面白少气，形寒肢冷。宜振奋心阳，方用桂枝甘草龙骨牡蛎汤。

妊娠暑泻 病证名。见明·赵献可《邯郸遗稿》。多因孕后内伤生冷之湿，外受暑热之邪，湿热损及肠胃，症见泄泻如水，烦渴尿赤，自汗面垢等。由于耗伤津液，则易伤胎。治宜清暑去湿，并需注意安胎。方用藿香正气散。

妊娠遗尿 病证名。见《妇人良方大全》卷十五。亦名孕妇尿出。因孕后血虚，脬中有热；或脾肺气虚，下逼于脬；及肝肾阴虚，热扰膀胱所致。血虚脬中有热者，兼见心烦尿赤，宜养血清热，用丹栀逍遥散，或白薇散（白薇、白芍）；若脾肺气虚者，兼见少腹坠胀，宜补益脾肺，用补中益气汤加益智仁、桑螵蛸；若肝肾阴虚者，兼见神疲头晕，腰膝痠软，宜滋补肝肾，用六味地黄丸。

妊娠期 指妇人自怀孕起，至分娩前的全过程，称为妊娠期。

妊娠喘 病证名。见清·汪家谟《胎产辑萃》。亦名胎喘。病因脾肺素虚，孕后水气逆行，上乘于肺；或感受风寒，肺气失宣；或火动胎元，气逆作喘；及胎死不下，奔迫上冲等所致。症见痰喘气急，夜卧不安。脾肺素虚者，兼见四肢无力，卒然气喘不足以息，宜补益脾肺，用生脉散；感受风寒者，兼见发热恶寒，宜疏风散寒，用参苏饮；火动气逆者，兼见烦躁发热，用黄芩、香附为末，水调服；胎死不下者，兼见面赤舌青，喘不得卧，用催生汤（苍术、枳壳、桔梗、陈皮、芍药、白芷、川芎、当归、肉桂、半夏、甘草、麻黄、厚朴、木香、杏仁、茯苓、生姜）。

妊娠痘 病证名。指妊娠期出天花和水痘。天花我国已基本消灭。妊期在治则上只以清热安胎为主，不可触动其胎。余症均按天花，水痘辨证治疗。

妊娠痼症 即子痼。详该条。

妊娠遍身痠懒 病证名。《叶氏女科证治》卷二：“妊娠遍身痠懒，面色青黄，不思饮食，精神困倦，形容枯槁，此血少无以养胎也，宜四物汤”。

妊娠遍身瘙痒 病证名。见《叶氏女科证治》卷二。孕妇遍身瘙痒，多系皮中有风。宜用樟脑调酒，或用川椒、艾叶、透骨草、防风、荆芥擦洗之。

妊娠腰背痛 病证名。出《经效产宝》。因孕后肾气虚弱，又因湿伤于肾，以致相引腰背串痛。若痛不止者，易致坠胎。治宜补肾、祛湿、安胎。方用青娥丸。

妊娠腰痛 病证名。出《诸病源候论》卷四十一。多因妊娠而肾虚所致；或跌仆闪挫，损伤肾气；或风冷所乘，瘀血阻滞经络。甚者可致胎坠。肾虚者，兼见腰痠无力，劳动则甚，宜温补肾阳，方用青娥丸；闪挫伤肾者，腰痛下坠，转侧不利，宜养血止痛，补肾安胎，方用八珍汤加续断、寄生、杜仲；风冷所乘者，兼见腰部冷痛，遇寒则甚，宜驱风散寒，方用四物汤加寄生、防风。

妊娠腹内冷痛 病证名。《经效产宝》：“疗妊娠腹内冷痛，忽胎动。薤白、当归”，水煎服。

妊娠腹痛 病证名。出《金匱要略·妇人妊娠病脉证并治》。亦名胞阻、妊娠小腹痛、子痛。指孕妇发生小腹部疼痛的病症。多因虚寒、血虚、气郁胞脉气血运行失畅，或血虚胞脉失养所致。虚寒者，小腹冷痛，得热痛减，宜温经散寒，用艾附暖宫丸；血虚者，兼见头痛目眩，小腹绵绵作痛，喜按，宜养血止痛安胎，用胶艾汤；气郁者，兼见脘腹胀满，烦躁易怒，宜舒肝解郁，用逍遥散。

妊娠数堕胎 病证名。出《诸病源候论》卷四十一。指妇人屡孕屡堕，故名。参见滑胎条。

妊娠痠痲 病证名。见《妇人良方大全》卷十四。痠为筋脉急而缩，痲为筋脉缓而伸。一缩一伸，手足相引，搐搦不已，发为痠痲。多因孕后血聚养胎，肝肾不足，风火相炽，筋失濡养所致。宜平肝养血。用钩藤汤。热盛者，加山梔、黄芩；兼有风痰上涌者，加竹沥、南星、半夏；气血亏损者，宜八珍汤加钩藤、山梔；风邪急搐者，加全蝎、僵蚕。

妊娠痿痹 病证名。见《叶氏女科证治》卷二。指孕后血聚养胎，阴血不足，或因气怒痰阻气血，而致手足不举，体用不遂的病症。《叶氏女科证治》：“妊娠手足不能举动，乃痰闭气血也，宜乌药顺气汤（乌药、僵蚕、川芎、白芷、陈皮、枳壳、干姜、甘草、麻黄、姜、葱）”。阴血不足者，方用八珍汤。

妊娠霍乱 病证名。出《诸病源候论》卷四十二。亦名胎前霍乱。多因孕期贪凉饮冷，饮食不洁，感受秽浊之邪，以致卒然发作，腹中绞痛，上吐下泻等。《叶氏女科证治》：“妊娠霍乱，或邪在上胃脘，则当心痛而吐多；邪在下胃脘，则当脐痛而利多；邪在中胃脘，则腹中痛而吐利俱多。吐多伤气，利多伤血，邪击胎元，母命易殒，气血伤而无以养胎，子命易倾，此急证也，宜香苏散（香附、紫苏、陈皮、甘草、姜、葱白），转筋加木瓜，胎动加白术，吐泻频作先服六合汤（扁豆、人参、木香、半夏、茯苓、砂仁、杏仁、陈皮、藿香、甘草、姜、枣），次服丹溪安胎饮（人参、川芎、黄芩、白术、当归、熟地、紫苏、陈皮、甘草、砂仁、姜、枣）”。

妒头疮 病证名。指头生小疮，浸淫瘙痒，黄膏出不生痂，连年不愈者。用苦参汤浸纱布塌疮上。

妒乳 即螳螂子。详该条。

鸡盲 出《证治准绳·杂病》。即小儿雀目。详该条。

鸡咳 病名。即百日咳。《温病条辨》：“凡小儿连咳数十声，不能回转，半日方回，如鸡声者”。初起风热偏重，宜疏风清解，用桑菊饮；咳久津伤，宜滋润清肺，用杏仁煎（《太平圣惠方》：杏仁、蜜、贝母、紫菀、甘草）。详百日咳条。

鸡冠疮 病证名。见清·崔乘铎《妇科宗主》。指阴挺脱出红肿溃破者。外用《妇科宗主》方：飞矾、铜绿、五味、雄黄、桃仁、

共研细末炼蜜为丸，重五钱，以方内雄黄为衣，每周一丸纳阴中。

鸡胸 病证名。出明·秦景明《幼科金针》。又名龟胸。即胸廓畸形突出，状如鸡胸或胸如龟背。多由于先后天均不足，脾肾亏损，骨质柔弱所致。其症多伴有体瘦神疲，息短无力，可见于成骨发育不全及佝偻病。治以培补脾肾为主，用补天大造丸。由于先天禀赋不足、后天调养失宜、脾肾亏损，兼有痰热壅肺，以致“肺热胀满、攻于胸膈”（《小儿药证直诀》），长期气机不畅而成者，则宜利气祛痰及清热散结之剂。

纯血痢 病证名。出《医学纲目》。又名血痢、赤痢。为热毒内迫于血，肠络损伤，血从下泄所致。治宜凉血止痢。用茜根汤。

纯阳之体 为小儿生理特点之一，纯阳，含有小儿生长发育旺盛的意义，《颅凶经》：“三岁以内，呼为纯阳”。《小儿药证直诀》提出“小儿纯阳，无烦益火”。徐灵胎《医学源流论》亦谓：“小儿纯阳之体，最宜清凉”。认为小儿体禀纯阳，所患热病最多，在治疗上不宜使用温阳药物。而后《温病条辨·解儿难》则说：“古称小儿纯阳……非盛阳之谓，小儿稚阳未充、稚阴未长

也”，罗整齐《蚌溪论选》更明确指出：

“小儿年幼，阴气未充，故曰纯阳，原非阳气之有余也，特稚阳耳。稚阳之阳，其阳几何？”因此，对纯阳之体有两种学说。其中“小儿纯阳之体，最宜清凉”的论点，给后世的影响较大。

纳气法 神奇外治法之一。用吴茱萸五分，胡椒七粒，五倍子一钱，研细末，酒和作饼，封肚脐以带扎之。治小儿虚脱，上气喘急，真气浮散，不得归元者。

纹 五不女之一。纹同文。指阴道狭窄，影响性交与生育。又名石女。明·万全《广嗣纪要·择配篇》：“阴户小如筋头大，只可通，难交合”。

纹色 指小儿虎口脉纹的颜色。见《四诊抉微》卷三。又名手筋色、虎口脉色。元·朱震亨《幼科全书》：“紫热红伤寒，青惊白是疳，黑时因中恶，黄即困脾端”。脉纹的颜色一般能反映病情的寒热虚实。纹色红赤，多属火；淡红者为虚寒；纹见深红紫黯，为热极邪郁，或为血瘀内阻；纹色青紫，多见于肝热生风，或伤食痰阻，亦主惊，主痛，主抽搐，多实证；指纹色淡，多见体质虚弱，气血不足的虚证。参见小儿指纹条。

八 画

〔一〕

环珠形 小儿指诊法十三指形之一。详十三指形条。

武台 小儿头面部望诊的部位。即耳前锐发下，平耳壳根前方，相当和髻之处。明·方贤《奇效良方》：“太阳脉红至太阳，内外有热，又连文台，热极不解；至武台，渐生变证。”

青记 即胎生青记。详该条。

青盲 病证名。指眼外观无异常而逐渐失明者。《诸病源候论》卷四十八：“目是五脏之精华，肝之外候也。肝气通于目，为停饮水渍，脏气不宣和，精华不明审，故不赤痛，亦无障翳，而不见物，故名青盲也。”亦有由儿在胎中，孕母感受风邪，致儿生后，瞳人无损而视物昏蒙，或夜卧多惊，呕吐黄汁，是为青盲外障。宜以滋补肝肾，益精养血，开窍明目为治。用菊花散（《太平圣惠方》：甘菊花、牯牛胆、寒水石、雌鸡

肝)、杞菊地黄丸、驻景丸等。并配合针睛明、光明等穴。

青带 病证名。见《傅青主女科》。亦名带下青候。多因经产之后胞脉正虚，湿浊秽邪乘虚侵袭，或肝经湿热下注，伤及任脉所致。症见阴道流出青绿色粘腻，气味臭秽的液体，连绵不断。治宜调肝清热利湿。方用加减逍遥散（茯苓、白芍、柴胡、甘草、茵陈、陈皮、焦栀子）。参见肝经湿热带下、湿毒带下条。

青崩 病名。出《脉经》。指崩下之血为青色者，临床极少见。治疗参见血崩条。

青瘤 病名。出《诸病源候论》卷三十八。属八瘤之一。病因新产后，浣洗太早所致。聚在左右胁下，藏于背脊，上至肩胛、腰下急痛，腹中气冲，面色黄，四肢肿，二便难，喜唾涎，不可多食，其后月水为之不通，或不复禁，状如崩中。方用戎盐、皂荚、细辛，纳阴中。

表热 病证名。外感风寒或风热引起的发热。《证治准绳·幼科》谓表热的特点为“热而二便调和”。其症喜人怀抱，身缩，恶风寒，不欲露出头面，面带惨容，不渴，清便自调，吮乳口不热，或鼻塞流涕，或喷嚏、浑身拘急。治宜辛温解表，用十神汤。如吮乳口热，口渴而鼻流浊涕者，治宜辛凉解表，用银翘散。一般见于感染性疾病初期，表示病变较浅，病情尚轻。

幸帽儿 出清·阎诚斋《临产须知评正》：“在子宫口开全后不破水，卒致胎儿包被囊膜而出者，是曰被膜儿，又曰幸帽儿。”

茄子疾 病名。出《证治准绳·女科》。属阴挺范畴。指阴中突出一物如茄子，俗名茄子疾。参见阴挺条。

茄病 病证名。属阴挺范畴。清·周胎观《秘珍济阴》：“妇人阴门坠出，或红或白，状如茄子，名曰茄病。红属湿热，宜白薇散（白薇、川芎、当归、熟地、白芍、苍术、泽兰、丹皮、凌霄花）；白属气虚，宜

服四物吴茱萸汤（吴茱萸、当归、人参、白术、熟地、川芎、陈皮、白芍、沉香、肉桂、甘草、白茄根引）。或三茱丸（吴茱萸、家茱萸、山茱萸各一两，米糊为丸）。

柎（zhàng）后 见许廷哲《保产要旨》。即胀后产。详该条。

柎后生 见濯之《胎产须知》。即胀后产。详该条。

枕陷 病证名。出《幼科发挥》。即枕骨内陷，可由儿卧日久所致；如兼头骨四破，高下成缝，则为肾元衰败之重症。

板牙 ①病证名。为隐约见于新生儿牙龈粘膜下的白色斑块，可妨碍吮乳而引起啼哭。治法见马牙条。②指门齿。又名板齿，即口前之切齿。儿生八月板齿始生。一说指白齿。

板齿 即门牙。详板牙条。

枪形 小儿指诊法十三指形之一。详十三指形条。

卧产 见《诸病源候论》卷四十三。指产妇临产时，背平着席，体不倦曲，使儿易产，所采取的体位，称卧产。

卧胎 病名。即胎不长。《济阴要略》：“按荫胎者，由于妊母体质素怯，胎失其养，荫而不长，一名卧胎”。参见胎不长条。

卧蓐 见《卫生家宝产科备要》。即临产。详该条。

刺痧法 即放痧法。详该条。

郁气崩漏 病证名。见《竹林女科证治》。多因情志抑郁，心气不足，郁久化火，以致血热，经水不以时下，或适来适断，或暴下不止。治宜大补气血，养胃健脾，结合镇坠心火之剂。方用开郁四物汤（四物汤加香附、白术、黄芪、蒲黄、地榆、人参、升麻）。

郁结血崩 病证名。见《傅青主女科》。因郁怒伤肝，肝气郁结，甚而血不能藏，其症除血崩外，兼见口舌干渴，呕吐吞酸等症。治以开郁平肝。方用平肝开郁止血汤

(白芍、柴胡、白术、丹皮、生地、当归、黑芥穗、三七根、甘草)。

奇胎 见朱振声《妇女病续集》。多指胎儿畸型。

抱儿癆 病证名。见《血证论》。妇人有胎，复得咳嗽，发热骨蒸，或吐血，或梦交，名为抱儿癆。多因孕妇平素阴虚，孕后血聚养胎，耗其气血，阴血不能上承、肺阴亏损，出现咳嗽，甚则五心烦热，胎动不安。如久嗽不愈，可成癆嗽。治宜保养肺金为主。方用清燥救肺汤（人参、甘草、黑芝麻、石膏、阿胶、杏仁、麦冬、杷叶、桑叶）或紫苑散主之。若痰凝气阻，咳逆不休者，用豁痰丸；若肺胀咳嗽不得卧者，用葶苈大枣泻肺汤。

抱鼻 异痘之一。痘疮初见于面部，独鼻梁左右密集，其他部较少的症状，此热毒上聚于肺，多属险症。治宜内服黄连解毒汤。

择食 病证名。恶阻症候之一。指妊娠早期，发生的嗜食辛辣，嗜酸，厌油等称为择食。无其他不适，可以任她所喜食物选择，过期自安。参见恶阻条。

拗哭 ①指幼儿数日内啼哭不止（《儒门事亲》）。②小儿夜啼，见灯即止者，此由点灯习惯，为拗哭（明·万全《育婴家秘》）。又名儿嗜灯花。③小儿初生，性多执拗，凡有亲狎之人，玩弄之物，一时不见，其心不悦而哭，谓之拗哭（《幼幼集成》）。

转乳 即吮乳。详该条。

转胞 出《金匱要略·妇人杂病脉证并治》。即妊娠小便不通。详该条。

转胎 ①即试痛。《保产万全金》：“试痛即转胎”。②纠正异常胎位，使之转为正常。

转脬 见《证治汇补》。脬同胞。即妊娠小便不通。详该条。

〔1〕

非搐 病证名。出《幼幼集成·惊风辟

妄》。指小儿急慢惊风。详搐条。

齿不生 出《诸病源候论》卷四十八。即齿迟。见该条。

齿迟 五迟之一。出《小儿药证直诀》。又名齿不生。小儿乳齿约在六至十个月内出现，如已届生齿之期还未生齿者为齿迟。《世医得效方》：“齿不生者，由齿者骨之所络，髓之所养，禀气不足，则髓不能充于骨，故齿久不生。”肾主骨生髓，齿为骨之余，小儿先天肾气不足，髓不能充，故齿生较迟，生亦不固。治宜益肾充髓，用肾气丸加补骨脂、胡桃之类。

齿根血出 指牙龈出血。《诸病源候论》卷四十八：“手阳明、足太阳（应作阳明）之脉，并入于齿。小儿风气，入其经脉，与血气相搏，血气虚热，即齿根血出。”临床有虚实之分，虚热宜滋阴降火，用知柏地黄汤；实热宜清热降火，用玉女煎。

齿蠹 出《诸病源候论》卷二十九。即齿龋。详该条。

齿龋 病证名。出《素问·缪刺论》等篇。又名齿龋注、龋齿、风龋、齿蠹、齿蠹。 “龋，朽也，虫齧之齿缺朽也”（《释名》）。多由口腔不洁，致齿牙腐蚀蛀空，或湿热薰蒸手足阳明二经，龈肿腐臭，齿牙蛀蚀宣露，疼痛时作时止。《证治准绳》：“有齿龋者，亦以阳明入风热之邪，搏齿龈气血，腐化为脓出臭汁，谓之齿龋。”治宜内服清热止痛之剂。可选用黄连温胆汤、清胃散等加减。《诸病源候论》卷二十九：“食毕当漱口数过，不尔，使人病龋齿。”常以银花、连翘、薄荷、甘草煎汤漱口。亦可用针灸。《素问·缪刺论》：“齿龋，刺手阳明”。

齿龋注 出《诸病源候论》卷二十九。即齿龋。详该条。

齿蠹 见清·《沈氏尊生书》卷二十三。即齿龋。详该条。

虎口三关 见《四诊抉微》。指小儿指纹显现于食指掌侧的三个部位。即第一指节

为风关，寅位；第二指节气关、卯位；第三指节命关，辰位。参见小儿指纹条。

虎口三关脉纹 出《证治准绳·幼科》。即小儿指纹。详该条。

虎口纹 出《奇效良方》。指食指掌侧靠拇指一侧的脉纹。详小儿指纹条。

虎口纹十三形 见《四诊抉微》卷三。即十三指形。详该条。

虎口脉色 见《奇效良方》。即纹色。详该条。

易虚易实 小儿病理特点之一。小儿在生理上既阳气兴旺生机蓬勃，发育迅速；又稚阳稚阴，脏腑娇嫩，形气未充。所以感邪以后，邪气容易蕴积泛滥，病势嚣张，出现实证热证。如急惊风证，往往发病急暴，迅即壮热，抽搐，邪热盛实，肝风心火，交相煽动，实证热证较为明显；但邪毒既盛，正气易伤，如正不胜邪，或正气内溃，亦可迅即转为面色苍白，四肢清冷，脉细无力等虚证寒证。又如：呕吐腹泻证，当水谷邪气壅滞肠胃初期，往往出现高烧，胸腹闷满，呕吐酸腐，泄泻臭秽，小便黄赤量少，唇口干渴，舌苔黄腻而浊，脉数滑有力，纹色紫滞等实证热证；若吐泻不止，脾胃之阴耗损，中气虚弱，阴津阳气同时衰竭，又可急剧出现神昏肢厥，脉微欲绝等虚证寒证现象。如不及时回阳救逆以固其脱，则必变生仓卒。一经阳回正复，邪正相争又剧，往往实证热证又现，这种邪正消长，虚实寒热转化，在儿科临床上非常多见。以前医家如钱乙、王肯堂、万全等人，均指出小儿易虚易实、易寒易热，不可偏补偏消，药品药量均宜权衡适当，中病即止，不可过量，免伤正气。参见易寒易热条。

易寒易热 小儿病理特点之一。小儿肺娇胃弱，最易从口鼻感受病邪而患时行热病。故清·叶天士《幼科要略》提出“六气之邪，皆从火化；饮食停留，郁蒸化热；惊恐内迫，五志动极皆阳”之说，以论证小

儿“所患热病最多”。由于小儿具有“稚阴未长”的生理特点，因而病理上容易出现阴伤阳亢的证候；但是，小儿又具有“稚阳未充”的生理特点，身体的调节，适应机能也较脆弱。故易亢奋，也易衰竭，临床表现就有易寒易热的变化。参见易虚易实条。

肾水 病证名。浮肿的一种类型。因肾有病而引起的水肿。由肾阳不足，气不化水所致。临床特征为浮肿，腰痛足冷。治宜温肾利水。用真武汤。

肾怯失音 病证名。又名病后瘖。大病之后，突然嘶哑。《小儿药证直诀》：“病吐泻及大病后，虽有声而不能言，又能咽药，此非失音，为肾怯不能上接于阳故也，当补肾，地黄丸主之。”

肾泻 病名。见《幼科发挥》。指小儿先天禀赋不足，或久病后，命门之火方虚而致的腹泻。命门之火不足，既不能助脾胃腐熟水谷，又不能约束二便。症见便泻清冷，五更及黎明泻甚，治宜温肾健脾。用四神丸。

肾热 病证名。五脏热之一。肾热者，颧下先赤，目无精光而畏明。两足热甚，脊骨重，热甚不能起于床，夜间益甚。治宜滋肾育阴，用六味地黄汤。若虚热见于大病之后，或温热，或潮热，或渴或不渴，大小便如常者，宜骨皮散加减。

肾疳 五疳之一。又名骨疳、急疳。多系先天不足，禀赋虚弱，患有解颅、鹤膝、五迟等病；复因嗜食甘肥，不知节制，以致脏腑伏热，津液耗伤，日久肾阴枯涸而成。《小儿卫生总微论方》载肾疳“其候上热下冷，寒热时作，齿断生疮，耳焦脑热；手足逆冷，吐逆滑泄；下部生疮，脱肛不收，夜啼饶哭，渐成困重，甚则高骨乃败”。治宜先用集圣丸（方见肝疳条），消疳解毒；继进九味地黄丸（《证治准绳》：熟地黄、赤茯苓、山茱萸肉、川楝子、当归、川芎、牡丹皮、山药、使君子肉）。滋阴养肾，兼以疳疳。如体质极端虚弱，宜大补气血，用人参

养荣丸。

肾病 病名。出《诸病源候论》卷十五。肾藏精，主水，为先天之本。小儿肾病，可由先天肾气不足，或后天为他脏病变所累及，出现两脏同病。例如：①肺肾两虚，表现为咳嗽反复发作，体弱消瘦，动则气短，多汗，怕冷，舌质淡，少苔。治以补肾纳气，如六味地黄丸加紫河车、故脂之类。②脾肾阳虚，身疲乏力，肢冷，便溏，食欲减退，浮肿或腹水，面色㿠白，舌质淡，苔少或无苔，脉沉无力。治以温补脾肾，常用八味地黄丸和四神丸加减。③心肾不交，特点为心肾阴虚，故凡能引起心的阴血虚损或肾的阴精亏虚的一切病因，均可进一步导致心肾两脏的阴虚，而成心肾不交之证。表现为虚烦失眠，心悸，头晕，腰膝酸软，潮热盗汗等。治宜交通心肾，可用天王补心丹、六味地黄汤、黄连阿胶汤加减。④肝肾阴虚，症见头晕目眩，耳鸣，腰膝酸软，咽干，颧红，盗汗，五心烦热等。治宜滋补肝肾，可用杞菊地黄丸或一贯煎加减。参见肾常虚条。

肾消 见《医学纲目》。即消浊。详该条。

肾常虚 小儿生理特点之一。肾属水，乃天一真精之所生，人之有肾，有树木之有根，而肾又为元气聚会之处，一水不胜二火（君火、相火），所以，阳常有余，阴常不足，肾常虚，筋骨难成乳必癯。肾主骨，肾虚则骨髓不满，面㿠白，目中白睛多，其颅即解；尻骨不成，则不能坐；髌骨不成，则不能行，多有五软之证；齿乃骨之余，骨不余则齿生迟；肾之液为血，发乃血之余，肾虚则发稀不黑。因此，有些小儿出生后出现五迟、五软、解颅、兔唇、先天性痴呆等，生长发育受到了一定的限制，甚至成为畸形，皆由先天肾气不足所致。此外，肾主闭藏，开窍于二阴，职司二便，若肾阳不足，下元虚寒，则闭藏失职，不能制约小便，就会出现

遗尿；若肾气虚弱，火不生土，亦可形成五更肾泻；再如哮喘，久发便可由肺及肾，而出现肤冷多汗，动则喘气，肾虚不能纳气的现象。所以，明·万全总结为“肾常虚”。在治疗上提出“有补无泻”的主张。

肾惊 脏腑惊证之一。出金·陈文中《小儿病源方论》。详脏腑惊证条。

肾癰 五癰之一。由肾虚木少水涵，筋失所养而发。其症面黑目张，吐涎沫，形体强直等。因肾虚宜补，用地黄丸、紫河车丸之类。

肾虚不孕 病名。出清·叶其秦《女科指掌·种子门》。不孕证型之一。多因禀赋素弱，肾气不足，或久病房劳，损伤肾气而致精亏血少，肾气虚衰，冲任胞脉失养，难以摄精成孕；兼见精神疲倦、头晕耳鸣、腰膝腿软，月经不调等症。治宜补肾调经，调补冲任。若偏于肾阳不足，则兼见形寒肢冷、小腹寒凉。治宜温补肾阳。方用桂附八味丸或毓麟珠（白术、人参、甘草、茯苓、当归、熟地、川芎、白芍、兔丝子、杜仲、鹿角霜、川椒）加补骨脂、巴戟天、肉桂、附子等。若偏于肾阴虚，则兼见颧红唇赤，潮热盗汗等症，治宜滋阴补肾，方用六味地黄汤。

肾虚月经过少 病证名。月经过少证型之一。多因先天不足，早婚，分娩次数多，乳儿众多，或房室不节，损伤肾气，精亏血少，冲任胞脉之血不足所致。症见月经量少，色黯红，质稀，头晕耳鸣，腰膝痠软。宜补肾养血。用当归地黄饮（《景岳全书》：当归、熟地、山药、山茱萸、杜仲、炙甘草、牛膝）加黄芪。

肾虚经闭 病证名。经闭证型之一。多因先天不足，早婚，分娩次数多，或房室不节等，损伤肾气，导致冲任不足，胞脉血虚而致经闭。症见头晕耳鸣，腰膝痠软，小便频数等。宜补肾养血。方用固阴煎加鹿角胶、补骨脂、肉苁蓉。

肾虚经乱 见《景岳全书·妇人规》。即肾虚经行先后无定期。详该条。

肾虚带下 病证名。多因早婚，分娩过多，损伤肾气，以致肾阳不足，寒湿下注伤及任带二脉。症见带下量多，淋漓不断，清稀如水，面色晦暗，腰痛如折，小腹觉凉，大便稀薄，尿液清长。治宜温阳补肾。方用内补丸。如日久不止，势有滑脱现象者，于前方加乌贼骨、煅龙骨、煅牡蛎、芡实、金樱子以加强固涩止带；若年老体衰，带下如注者，可酌加人参、升麻，以补气升提固摄。

肾虚崩漏 病证名。见《竹林女科证治》。指由肾虚不能约制胞络，以致冲任不固，而成崩漏下血不止，兼见腰膝痠软，疲倦乏力等。宜补肾固冲。方用固冲汤加鹿角胶。

肾虚滑胎 病证名。滑胎证型之一。指由于肾虚，胎失所系所引起。过去曾有滑胎病史。症见孕后腰痠痛，小腹下坠，或阴道流血，头晕耳鸣，两膝痠软等。宜补肾安胎。用寿胎丸（菟丝子、桑寄生、续断、阿胶）。若流血较多加艾炭、杜仲炭以止血。

肾虚经行先后无定期 病证名。亦名肾虚经乱。经行先后无定期证型之一。多因早婚，房室不节，孕育过多等耗伤精血，以致肾气不固，闭藏失职，冲任失调，胞宫蓄溢因之失常。症见经期先后不定，经血量少，色淡质稀，面色晦暗，头晕耳鸣，腰膝痠软，夜尿较多，大便不实等，是为肾阳虚证。治宜温阳补肾。方用固阴煎（《景岳全书》：熟地、山药、山茱萸、人参、五味子、兔丝子、远志、炙甘草）加肉桂、附子、补骨脂。或用定经汤（《傅青主女科》：兔丝子、白芍、当归、熟地黄、山药、茯苓、柴胡、荆芥穗）。

肾虚经行后期 经行后期证型之一。多因先天不足，早婚，分娩次数多，或房室不节，损伤肾气，精亏血少，冲任不足，胞宫不能按时满溢所致。症见经期错后，血量较

少，头晕耳鸣，腰膝痠软等。宜补肾养阴。用固阴煎（《景岳全书》：熟地、山药、山茱萸、人参、五味子、兔丝子、远志、炙甘草）加肉桂。或用六味地黄丸等。

果菜积 病证名。出《世医得效方》。即多食果菜而成积。症见时时下利，腹中结块等。治宜和胃消积，如平胃散加丁香、麝香为末，热盐汤调服。

呬嗽 证名。即呬呬有声，喉有痰鸣的咳嗽。《诸病源候论》卷十四：“呬嗽者，犹是咳嗽也。其胸膈痰饮多者，嗽则气动于痰，上搏咽喉之间，痰气相击，随嗽动息，呬呬有声，谓之呬嗽。”治宜消痰破气。选用二陈汤、三子养亲汤之类。

鸣胎 出《医学正传》。即子啼。详该条。

败血冲心 产后三冲之一。见《卫生家宝产科备要》。指分娩后由于恶露，瘀血不下，或下而不畅所致。临床以神志错乱，颠狂等为主要特征。《张氏医通》卷十一：“败血上冲有三，或歌午谈笑，或怒骂坐卧，甚者踰墙上屋，口咬拳打，山腔野调，号佛名神，此败血冲心。多死。……花蕊石散最捷，琥珀黑龙丹亦效。如虽闷乱，不致颠狂者，失笑散加郁金”。

败血冲胃 产后三冲之一。《张氏医通》卷十一：“败血上冲有三，……若闷绝呕恶。腹满胀痛者曰冲胃，……用平胃加姜桂，往往获效。不应，送来复丹。呕逆，腹胀，血化为水者，金匱下瘀血汤”。

败血冲肺 产后三冲之一。见《张氏医通》卷十一。指恶露当下不下，逆而上冲于肺的病证。常见胸闷烦躁，面赤气急，呕逆，鼻衄等症。方用二味参苏饮（人参、苏木），甚者加芒硝。属产后危重病。

〔1〕

垂头生 病名。清·周纪常《女科辑要》卷二：“名垂头生者，儿头已到产门，

头之后骨，偏柱母谷道，儿不能下”。相当于枕后位分娩。参见偏产条。

垂痈 即悬痈。详该条。

物触 指小儿心神受到拂逆而致的精神神经症状。《古今医统》：“小儿随其心性，不可触逆；凡有所爱之物，不可强直取之。心神所好，若不遂欲，心气解散，神逐物近，不食不言，神昏如醉，四肢垂解，状如中恶者，称为物触。”

季经 见单南山《胎产证治录》。即居经。详该条。

侧水 指妇女妊娠期间阴道所流出白而稠的液体。清·崔秉铎《妇科宗主》：“妇人有孕，或因气怒，或取重物，偶来白色水，稠者，非胞破之水，名曰侧水”。

侧棱 即横产。清·员从云《产科一得》：“手先出者，名曰侧棱”。

侏儒 病证名。出《礼记·王制》。身材异常矮小人之称。患儿自三、四岁开始，生长发育显著缓慢，身高一直低于同龄同性小儿之平均身高百分之三十以上，年龄越大，矮小越明显，但智力发育多属正常。仅个别有智力过高或稍低者。通常由于内分泌障碍所致。

迫咳 病名。即百日咳。《千金要方》卷五：“小儿冷风入肺，上气气逆面青，喘迫咳嗽”。详百日咳条。

金铅 药名。见《本草原始》。妇女初潮的月经名金铅，旧时用以入药，现已不用。

锡饼 病证名。出元·朱震亨《幼科全书》。指痘疮不依次起长，而一齐起发，遍身白色如锡饼形，头面浮肿的症状，属危症。但病人能食，大便坚，小便清利又无其他兼症者，宜清补解毒，用助脾快斑汤（《幼科全书》：黄芪、人参、甘草、防风、桂皮）。

命关 ①小儿指纹见于食指第三节为命关。出元·朱震亨《幼科全书》。又名下关。详见小儿指纹条。②经外穴名。见《扁

鹊心书》。位于胁下，以中脘穴至乳中穴连线为底边，向外侧作一等边三角形，其顶角是穴。③推拿穴位名。参见指三关条。

命蒂 出《本草纲目》。即脐带。详该条。

觅盐生 见朱振声《妇女病》。即手先下的横产。参横产条。

受肚泻 病证名。见《幼科折衷》。指小儿饱食后腹泻的症候。由脾胃虚弱，运化不及所致。其症饮食饱满则泻，泻尽乃止，如此反复。治宜补脾益胃。用益黄散送下保和丸。

乳下婴儿 出《诸病源候论》卷四十五。指六岁以下的小儿。

乳子伤寒 病证名。出《幼幼集成》。指婴幼儿感受寒邪而引起的急性发热性疾病。初起寒邪在表，恶寒，身热，无汗，沉迷；如表寒化热，则必热势增高，心烦，口渴；如便秘，小便黄涩者，则为热邪传里之候。初起表寒，治宜辛温解表，用葱豉汤（《类证活人书》：葱白、豆豉、麻黄、葛根）；表寒化热者，治宜辛凉清解，用银翘散加减；表里俱热者，治宜表里双解，可用防风通圣散。

乳无汁 病名。指产后无乳。《诸病源候论》卷四十四：“妇人手太阳少阴之脉，下为月水，上为乳汁、妊娠之人，月水不通，初以养胎，即产则水血俱下，津液暴竭，经血不足者。故无乳汁也”。治疗见缺乳条。

乳不消 出《诸病源候论》卷四十六。即乳积。详该条。

乳少 见清·许廷哲《保产要旨》。即缺乳。详该条。

乳中 出《金匱要略·妇人产后病脉证并治》。①乳，脉经作产字解释。《辑义》：“乳中盖在草蓐之谓”。亦即产后。②泛指哺乳期。③经穴名。属足阳明胃经。位于乳头中央。

乳汁不行 病名。又名乳汁不通、乳脉不行。《三因极一病证方论》：“产妇有二种乳汁不行，有气血盛而壅闭不行者，有血少气弱涩而不行者，虚常补之，盛当疏之，盛者当用通草、漏芦、土瓜根辈，虚者当用炼成钟乳粉、猪蹄、鲫鱼之属”。参见缺乳条。

乳汁不通 见《肖山竹林寺妇科》。即乳汁不行。详该条。

乳汁自涌 病名。出《医宗金鉴·妇科心法要诀》。由于气血大虚。宜十全大补汤倍人参、黄芪。

乳汁溢 指产后乳汁分泌过多而泛溢。《诸病源候论》卷四十四：“其产虽血水俱下，其经血盛者，则津液有余，故乳汁多而溢出也”。参见乳汁自涌条。

乳医 出《汉书》。①指接生员。俗称稳婆。古亦称看产。②指产科医生。

乳利如血 病证名。《颅囟经》：“初生小儿一月内，乳利如血，是母胸有滞热所作也。”治宜清除滞热，用荷叶蒂、黄连煎服。

乳利如膏 病症名。《颅囟经》：“初生小儿，一月内，乳利如膏，是母寒气伤胃所致也。”新生儿消化力弱，哺乳失宜，复感寒邪，最易导致乳汁不消而成此症。故《古今医统》论抚养婴儿，要注意哺乳之法，有“忍三分饥，吃七分饱”的说法。

乳卸 病名。见晟叔来《增订达生篇》。指乳头拖下过长的病证。多因肝经风热发泄所致。用小柴胡汤主之，外用羌活、防风、白敛烧烟薰之，仍以蓖麻子四十九粒、麝香一分同研烂，涂顶心，俟乳收上，急急洗去。

乳泣 病名。出宋·陈选《妇科秘兰》。亦名乳胎、鬼泣。《妇科秘兰》：“妊娠乳自流出者，谓之乳泣”。因孕妇气血虚弱不能统摄，乳汁自出，出多则血不足以养胎，以致影响胎儿发育。治宜补气养血。方用八珍汤。

乳妬 病名。见刘斋甫《妇科三字经》。指两乳胀硬痛疼，憎寒发热的病症。即妬乳。详该条。

乳食不消 见《小儿药证直诀》。即食积。详该条。

乳食作痛啼 病证名。指小儿因乳食所伤而致腹痛啼哭。《普济方》卷三百六十一：“因儿饮乳，乳壅不散，伤动脾胃，脾胃气弱，不能消化，滞乳停留，与正气交击，故成阵作痛而啼也。”治宜消乳导滞。用保和丸加木香、厚朴。或以熟艾烘热，布包，熨熨腹脐。

乳食积滞 病证名。指婴幼儿伤乳、伤食而致的胃肠病。多因脾胃虚寒，乳食不化，久而成积所致。单纯饮乳积滞者，参见乳积条。乳食俱伤积滞者，称宿食不消。《诸病源候论》卷四十七：“小儿宿食不消者，脾胃冷故也，小儿乳哺饮食，取冷过度，冷气积于脾胃，脾胃则冷，胃为水谷之海，脾气磨而消之，胃气调和，则乳哺消化。若伤于冷，则宿食不消。”参见食积条。

乳脉不行 病名。《儒门事亲》：“因啼哭悲怒郁结，气溢闭塞，以致乳脉不行”。详见乳汁不行条。

乳胎 病名。见《郑氏女科真传·胎前杂症》。指妊娠期乳自出。即乳泣。详该条。

乳哺 指喂养小儿的方法。乳，人乳；哺，喂养。婴儿初生一周，消化能力较弱，母乳是婴儿最适宜的天然营养品。《千金要方》：“凡乳儿不欲太饱，饱则呕吐”。婴儿逐渐长成，乳量逐渐增多，使婴儿胃口逐渐适合于食物，但乳哺不可太过。《古今医统》：“忍三分饥，吃七分饱”。一般“小儿四五个月，只与乳吃”（《寿世保元》）。

“半年以后宜煎陈米粥，取粥面时时与之，十月以后渐与稠粥稀饭，以助中气，自然易养少病”（《小儿药证直诀》）。8~12月为

是断乳适当的时期。人乳喂养太久的婴儿，尤其是不增加辅食的，可致食欲异常或消失，导致元气虚弱，易于感染疾病。经期内往往乳汁减少，且可引起婴儿泄泻、吐乳等症。但经期后喂哺的婴儿若能增长如常，不妨继续哺乳。如母亲患重病或怀孕，必须立即停止哺乳。

乳积 病证名。见《幼科金针》。又名伤乳、乳不消、乳滞。婴儿哺乳失宜，停滞不化而得。症见呕吐泄泻，吐出物与泄下物均有未消化的乳瓣，且有馊臭气，伴有面色青黄、发热，口渴，多睡，口疮，身渐黄瘦等。治宜开胃消导，先服消乳丸；常服健脾散（党参、茯苓、厚朴、苍术、橘皮、甘草、草果、姜、枣）。

乳痈癖 病证名。出《儒门事亲》。又名奶癖。多由乳食太过，郁于肠胃，积热熏蒸而成。症见身瘦肌热，面黄腹大，或吐泻腹有青筋，两胁结硬如碗。宜以导滞清热为治。

乳难 病名。①出《神农本草经》。指分娩困难。即难产。《神农本草经》的滑石、贝母、泽泻等条主治乳难，应为产难或难产解。②指乳汁分泌不足或乳汁不下之意。

乳菌 病证名。指婴儿口中有肉肿起，高如菌状的病象。多由胎中火旺或胃有热毒所致。肿势严重者，妨碍吮乳而引起啼哭。治宜清热解毒，如凉膈散、清胃散，皆可选用。外以薄荷、甘草煎汤洗拭口腔。肿重者可用消毒三棱针刺破菌头，如有出血，以消毒纱布拭净，再以冰硼散涂之。

乳悬 病名。《医学入门》：“乳悬，乃产后瘀血上攻，忽两乳伸长，细小如肠，直过小腹，痛不可忍，名曰乳悬，危证也”。治疗参《医宗金鉴·妇科心法要诀》：“宜浓煎芎归汤，不时饮之，以其余药熏鼻，则瘀散乳即上升。如不上者，更以蓖麻仁捣，贴顶心，收即去之”。

乳鹅 即乳蛾。详该条。

乳滞 即乳积。详该条。

乳蒸 病名。见《郑氏女科家传秘方》。指乳房胀痛发热者。即蒸乳。详该条。

乳蛾 病证名。见《幼科金针》。又名蛾子、乳鹅、单双肉蛾。主要是由于肺胃蕴热，复感风邪，风热相搏，循经上乘于咽喉所致。发于咽喉两侧之喉核，或左或右，或两侧均见，有红肿疼痛。发于一侧者名单蛾，发于两侧者名双蛾，以其形如蛾腹而得名。其症喉核一侧或两侧红肿疼痛，其表面可见黄白色之脓性分泌物，口臭便秘，舌苔厚腻，汤水难咽，身发寒热，发病急骤者曰急乳蛾，相当于急性扁桃体炎。若蛾如乳头，不甚疼痛，感寒易发，病难速愈者，曰石蛾，相当于慢性扁桃体炎。属肺胃热壅者，宜疏风清热，消肿解毒，用清咽利膈汤加减；属痰浊肝火者，宜清热涤痰，用指迷茯苓丸加减；属阴虚火旺者，宜滋阴降火，用知柏地黄汤加减。《幼科金针》：“治乳蛾，儿小者，用针微刺出血，吹冰硼散，服清咽利膈汤。”此外，板蓝根、土牛膝根、七叶一枝花均可选用。

乳嗽 出《婴童百问》。即百晬内嗽。详该条。

乳缩症 病名。见晟叔来《增订达生篇》。指乳头收缩内陷者。由肝经受寒，气敛不舒所致。症见乳头收缩肉里。治宜温经暖肝。方用暖肝煎（黄芪、当归、白芷、防风、木通、干姜、肉桂）。

乳膨 病名。见《张氏医通》卷十一。因无子饮乳，蒸乳而发寒热作痛者，俗名乳膨。可用炒麦芽一两，水煎频饮。乳退，胀热自除。

乳癖 病证名。癖疾之一。见《太平圣惠方》第八十八卷。又名奶癖。指哺乳期婴儿，因伤乳食所致的癖疾。病机主要在于肝脾。因乳积损伤脾胃，肝气横逆，气血瘀阻，遂成癖疾。临床表现为身瘦肌热，面黄腹大，腹壁青筋怒张，胁下痞块结硬。用调理肝脾，消乳化积之剂，如消癖丸。但过于攻下克伐之药，不宜滥用，以免损伤正气。

乳癖 见《幼科金针》。即奶癖。见该条。

肤证 出元·滑伯仁《麻证新书》。麻疹的别称。详该条。

肿胀 证名。水溢肌肤为肿，气滞于中为胀。《景岳全书》：“肿胀之病，原有内外之分。盖中满者谓之胀，而肌肤之胀者，亦谓之胀。若以肿言，则单言肌表，此其所以辨也。”治肿宜化气利水，用五皮饮、五苓散等化裁；治胀宜行气消导，用排气散（《沈氏尊生书》：乌药、香附、陈皮、沉香、木香、厚朴、枳壳、泽泻）加减。

胀后产 相当于枕后位。阎纯玺《增补绘图胎产心法》：“胀后产。乃儿头后骨偏柱产母谷道。不得下者”。参见偏产条。

胀满 病证名。多由脾胃损伤，致气壅滞而成。清·潘揖《医灯续焰》：“胀谓胀于外，满谓满于中，排脏腑而廓胸胁，急皮肤而露筋脉，脐凸腰圆，鼓之如鼓，胸腹之疾也。间亦有胀及于头面四肢者，与水肿大同小异，而此则无水也。”

肺风痰喘 证名。出明·秦景明《幼科金针》。指小儿感冒风寒，入于肺经，以致痰气阻塞于肺而致喘疾。“身热在表为肺风，气促不息为痰喘”。临床表现为喉间齁齁，咳嗽不得舒畅，喘急不止，面青潮热，啼哭惊乱。可见于支气管肺炎、毛细支气管炎。一般治以清宣肺热，平喘化痰法，常用麻杏石甘汤加减。重证容易出现正不胜邪，阳气衰竭的证候，宜中西医配合施治。阳气衰竭者，宜回阳固脱，用参附汤或四逆汤加人参，煎水急服或鼻饲。

肺水 病证名。浮肿的一种类型。因肺有病而引起的水肿。肺气不宣，不能通调水道，下输膀胱，以致水溢肌肤而成水肿。临床特征为浮肿，大便鸭溏。治宜宣肺利水，用麻黄杏仁薏苡甘草汤。或麻黄连翘赤小豆汤，越婢汤等加减。

肺炎喘嗽 证名。出《麻疹活人全书》。

系小儿常见病。一年四季都可发生，尤以冬、春季节为多见，好发于婴幼儿时期。临床以热、咳嗽、呼吸急促为特点。在麻疹、感冒或其他疾病的过程中，由于先后天不足，如佝偻病，营养不良，亦易并发和继发。以寒温失常，外感风寒，风温之邪为主要发病因素，而以风温之邪为多见。风寒仅见于初期，寒邪化热，故温热占其主要地位。肺为娇脏，性喜清肃，主呼吸。寒温之邪从口鼻而入，郁于肺经，轻则为咳，重则为喘。如因温邪化火，寒邪化热，炼液为痰，痰阻气逆，从而导致呼吸困难，产生气促。或因邪郁肺闭，气失宣通，气阻则血滞，故在气急鼻煽的同时，可伴见颜面、口唇、肢端等青紫发绀。心主血脉，肝为藏血之脏，在重证病例中，由于气闭血滞而发生心阳虚衰，肝脏肿大等危象。如因热毒炽盛，内陷营分、血分者，可见昏迷、抽搐等。若体虚邪恋，可使肺部病变迁延难愈。初期寒邪犯肺，宜辛温宣肺，用三拗汤；属温热者，则宜辛凉，用麻杏石甘汤；痰喘者，宜定喘涤痰，用定喘汤；毒热偏重，宜清热解毒，用三黄石膏汤。正虚邪盛，导致心阳虚脱者，宜回阳固脱，用参附汤。青紫郁血明显，肝脏肿大者，酌加丹参、桃仁、红花，以活血通络，化瘀生新。

肺热 病证名。五脏热之一。①有嗽而咯脓痰者，乃肺热，食后服甘桔汤（《小儿药证直诀》）。②肺热，……咳嗽寒热，壮热饮水，凉膈散主之。③肺热者，右颊先赤，日西热甚。轻则用泻白散，重则用凉膈散及地骨皮散（《证治准绳》）。

肺热咳嗽 证名。见《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》。又名火嗽。肺受热邪而引起的咳嗽。表现为咳嗽频繁，吐黄色稠痰，面红咽干，指纹紫色。治宜清宣肺热。用泻白散加减。

肺疳 五疳之一。又名气疳、疳鬻。由于乳食不调，壅热积滞，传伤肺经所致。

《小儿药证直诀》：“肺疳，气喘，口鼻生疮。”肺属金，色白，主皮毛，所以除上述症状外，还有面白咳嗽，毛发枯焦，肌肤干燥，鸡皮疙瘩，恶寒发热，常流清涕等。治宜疏散风邪，用止嗽散；继则清热润肺，用阿胶散；日久气虚，则宜益气之剂，如参苓白术散加减。

肺脏怯 证名。又名怯肺、肺虚损。指久病后肺气虚损证候。《小儿药证直诀》：“脾肺病久，则虚而唇白，脾者肺之母也，母子皆虚，不能相营，故名曰怯肺。主唇白，白而泽者吉；白如枯骨者死”。其症可伴有气怯，神疲，便秘，舌淡等。治宜健脾益肺。用阿胶散、参苓白术散加减。

肺病 病名。出《诸病源候论》卷十五。肺主气，病机主要是肺气出入升降的失常。肺为娇脏，不耐寒热，又为呼吸之孔道，故六淫、疫疠之邪，从上受者，首先犯肺。又肺气贯百脉而通他脏，他脏有病，也常累及于肺。所以有小儿“肺常不足”（《育婴家秘》）之说。但肺受风热、痰浊之侵扰，亦可出现气机壅闭的邪实证候。故肺病以咳嗽、喘、哮、痰鸣、失音等为主症。常见有肺热、肺风痰喘、肺脏怯、肺虚发热、肺虚作喘等。分详各条，参肺常不足条。

肺虚发热 病证名。出《小儿卫生总微论方》。肺经气阴两虚而引起的发热。多由久病、热病后期，余热恋肺，以致肺经气阴两伤，津液被耗。其症夜热晓凉，多涎善睡，消瘦，干咳无痰，或痰少而粘，甚或声音嘶哑。治宜益肺养阴，保元汤、养阴清肺汤、清燥救肺汤、麦门冬汤等，均可化裁选用。

肺虚自汗 证名。出《证治准绳·幼科》。肺经虚气上壅而引起的自汗。症见咳嗽连声，痰少，面色㿠白，自汗。治以补肺益气为主，用补肺散；或调补其脾脏之气，以益肺气，用参苓白术散。

肺虚作喘 证名。出《医宗金鉴·幼科

杂病心法要诀》。肺经津气不足而致的喘急。小儿虚喘的发生，多由元气不足，或因病后体虚，或因久咳不止，以致肺气虚弱，不能肃降所致。症见喘而呼吸短促，痰声低微，面色㿠白，额上有汗，神疲，脉弱。治宜补虚清肺，用黄芪汤。肺虚津液不足者，宜滋肺生津，用阿胶散。

肺虚损 出《小儿药证直诀》。即肺脏怯。详该条。

肺常不足 小儿生理、病理特点之一。由于小儿形体柔嫩，卫外机能未固，对外界的适应能力较差。感邪以后常先犯肺，所以明·万全认为，“天地之寒热伤人也，感则肺先受之”，并创“肺常不足”之说（《育婴家秘》）。故邪气不论从口鼻而入，或由皮毛侵袭，间接或直接地均足以影响肺的正常功能，出现感冒咳嗽、哮喘、肺炎等呼吸道疾患。或易感时行疫气出现麻疹、水痘、猩红热等传染性疾病。而且其他脏腑病气，也常波及于肺，肺为清虚之体，既易受邪，又不耐寒热，因此，在病理上就形成了肺为娇脏，难调而易伤。一些慢性咳嗽、哮喘疾患，往往久而不愈。

肺惊 脏腑惊证之一。出金·陈文中《小儿病源方论》。详脏腑惊证条。

肺瘤 五疳之一。由肺气虚，或阴虚火旺而发。其症面如枯骨，目白反视，惊跳反折，摇头吐沫等。气虚者用五味异功散；阴火上冲于肺者，用地黄丸。

肺寒壅嗽 证名。出《证治准绳·幼科》。小儿肺气虚弱，忽感寒邪而引起的咳嗽。症见咳嗽微喘有痰，痰多清稀，面色淡白，流清涕。治宜温肺散寒。用百部丸（《证治准绳》：百部、麻黄、杏仁、甘草）。

肺噤 病证名。出《千金要方》卷五。指初生口噤嘴唇苍白者，参口噤条。

肺燥久咳 证名。肺经津液干枯而引起的咳嗽。多系久病热郁，耗伤津液，肺经枯燥所致。因肺为清虚之脏，主肃降，肺失津

液滋濡，则肃降失职而致气机逆乱，因而咳嗽，低热，痰少而带血丝，或鼻出血，间或气促，舌红苔少。治宜清润降火。用清燥救肺汤加减。

肥人白带多痰 病证名。《叶氏女科证治》卷一：“肥人气虚生痰，多下白带。宜服柴术六君汤（六君加苍术、柴胡、升麻、生姜），兼苍附导痰丸（苍术、香附、枳壳、陈皮、茯苓、甘草、胆南星，右为末，姜汁和神曲为丸，柴术六君汤送下五十丸）”。

肥胖不孕 病名。出《傅青主女科·种子篇》。不孕症型之一。妇人体质肥盛，恣食厚味，痰湿内生，流注冲任胞脉，或因体脂过盛，壅塞胞脉和胞宫而致不孕。多伴有心跳气短，白带量多等症。治宜健脾燥湿化痰。方用启宫丸或苍术导痰丸。

肥疮 出《诸病源候论》卷三十。即口吻疮。详该条。

肥热疳 见《证治准绳·幼科》。即热疳。详该条。

肥疳 出《小儿药证直诀》。即脾疳。见该条。

周身脱皮 见《验方新编》卷五。即脱壳。详该条。

昏睡露睛 病证名。指病人昏睡，眼睑半开半合。余梦塘《保赤存真》卷四：“脾胃虚极，眼皮不能紧合，故睡而半开半合。宜大温补为主。吐泻病多见此证。”宜用参附汤之类。

鱼骨形 小儿指诊法十三指形之一。详十三指形条。

兔身 出《证治准绳·女科》。即分婉。详该条。

兔乳 出《证治准绳·女科》。即分婉。详该条。

兔唇 出《卫生家宝产科备要》。即临产。详该条。

狐气疝 病证名。疝证之一。见《证治准绳·幼科》。又名偏坠。因小儿啼哭，吸气

不止，内动肝气，肝脉络于阴器，肝气结聚不散，以致阴核一侧肿大，时上时下。治宜理气和肝。用金铃子散加当归、木香、蝎尾。

狐臭 见小儿腋气条。

狐癰 病名。出《诸病源候论》卷三十八。属八癰之一。症因经行时，悲哀惊恐过度，或远行而遇暴风疾雨所致。症见少腹瘀滞，胸胁腰背相引痛，阴中肿，小便难，不能受精，四肢不举，嗜食欲呕，喜睡多思如有孕状。治当以破瘀、化滞、调经为大法。

〔、〕

变蒸 病证名。又名小儿变蒸。指婴儿在生长过程中，或有身热、脉乱、汗出等症。此说始于西晋·王叔和《脉经》。隋唐医家，日相传演，其说益繁。《诸病源候论》卷四十五：“变蒸者，以长气血也。”《千金要方》卷五：“凡小儿自生三十二日一变，再变为一蒸。凡十变为五小蒸，又三大蒸，和五百七十六日，大小蒸都毕，乃成人。”并谓“小儿所以变蒸者，是荣其血脉，改其五脏。”《外台秘要》：“其变蒸之候，令身热，脉乱，汗出，目睛不明，微似欲惊。”《小儿卫生总微论方》：“每经一次之后，则儿骨脉气血稍强，精神性情特异。”张景岳对此持有异议。他在《景岳全书·小儿则》指出：“凡属违和，则不因外感，必以内伤，初未闻有无因而病者，岂真变蒸之谓耶。”清·陈飞霞《幼幼集成》著论支持这一观点。大部分医家，均认为变蒸发热是一种病理状态，并不是小儿生长发育的自然现象。

夜间发搐 病证名。出《小儿药证直诀》。因潮热而引起的抽搐，由脾虚心热所致者。临床特点为每逢亥、子、丑时不甚抽搐，而卧不稳，身体温壮，目睛紧斜视，喉中有痰，大便呈银褐色，乳食不消，多睡，不纳津液。当补脾治心。补脾，用益黄散；治心，用导赤散、凉惊丸。

夜热 病证名。出元·朱震亨《幼科全书》。小儿夜间发热，多由乳食不节，六淫外伤，引起肺脾肾功能不足，营卫阴阳失调，故夜间发热。一般为低热，或伴有心烦，以及睡眠不安等。治法：停食的宜消积清热，用保和丸；肺有风热，伴有气促的，宜清肺疏风，用桑菊饮；脾虚肝旺发热腹胀的，宜健脾利气，用异功散；肾虚的宜滋阴退热，用六味地黄汤加减。

夜惊 病证名。小儿在夜间入睡后，突然惊醒，瞪目起坐，躁动不安，面露恐怖，有时喊叫，一般持续10余分钟，可隔数日或数十日发作一次，治宜安神镇惊。用琥珀抱龙丸。结合针刺内关、大椎等穴。

夜啼 病证名。出《诸病源候论》卷四十七。婴儿初生在未满月时，日间安静，夜间时有啼哭不安，持续不停，至天明又转安静。《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》：

“小儿初生夜啼，其因有二：一曰脾寒，一曰心热……”。如见夜啼面色青白，手腹俱冷，不欲吮乳，曲腰不伸者为脾寒；如面赤唇红，身腹俱热，小便不利，烦躁多啼者为心热。脾寒宜温，兼以活血行气，用钩藤饮；心热宜清，兼以安神除烦，用导赤散加减。参夜啼四证条。

夜啼四证 指小儿夜啼四种不同的症候。①指寒、热、重舌口疮、客忤（《三因极一病证方论》）。②指惊啼、热烦啼、腹痛啼、神不安啼（《片玉心书》）。③指热夜啼、寒疝夜啼、触邪夜啼、心烦夜啼（明·秦景明《幼科金针》）。④指脏寒啼、心热啼、神不安啼、拗哭（《幼幼集成》）。

夜啼痧 病证名。小儿夜间啼哭，不得安静的痧胀。如视其腿弯、肘弯有青筋的，可用消毒三棱针于青筋上刺之，放出紫黑毒血；如其胸胀作痛的，用刷子蘸香油刮之，痧起，其啼可止（《痧胀玉衡》）。

底耳 病证名。五般聤耳之一。耳内腥臭，多由澡浴水入耳中，水湿停留，搏于气

血，酝酿成热所致。治法见伍耳条。

卒失音 病证名。突然声音嘶哑。《诸病源候论》卷四十八：“喉咙者，气之道路；喉厌者，音之门户。有暴寒气，客于喉厌，喉厌得寒，即不能发声，故卒然失音也。”治宜温散寒邪。用金沸草散之类。

卒然无声 病证名。《灵枢·忧悲无言》：“会厌者，音声之户也。”“人卒然无声者，寒气客于厌，则厌不能发，发不能下，至其开阖不致，故无音。”即卒失音。见该条。

疝证 病证名。《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》：小儿疝证，“多因先天不足，本脏虚弱，复因外感风邪，内食生冷，寒邪凝滞而成者有之。或因湿热郁于中，复被寒邪束于外，邪气乘虚并于血队，流入厥阴，厥阴属肝，其性急速，故牵引睾丸，少腹绞痛也。”由于病因不同，临床证候也有寒热虚实、属气属血的区别。如偏于热的，则每见阴囊松弛坠下；若偏于寒的，则每多疼痛；病在血分的，往往病在一处不移；属气分的，多时收时下，动而不定；属于湿热的，则见睾丸肿而下坠，伴有重坠的感觉；若属于虚肿下坠的，则无重坠感觉。由于病因、症状比较复杂，必须根据具体病情，审察寒热虚实，才能因证施治。

放点 见《救偏琐言·放点证治准》。即痘疮见形。详该条。

放痧法 又名刺痧法。主治实热痧毒深入血肉中，有青筋、紫筋现于肘弯、腿弯者。用消毒三棱针于曲池、委中直刺或斜刺，放出紫黑血，使痧毒有所泄，然后根据痧症用药。若未现痧筋者，可用手蘸水拍之即现。余如手足十指尖或指背两旁近甲处，以及百会、太阳、印堂、舌下两旁、喉中两旁、双乳，均为放痧部位，可视病情轻重，酌量采用（《痧胀玉衡》）。

怯肺 出《小儿药证直诀》。即肺脏怯。详该条。

性急多怒经闭 病证名。见《竹林女科

证治》。由于性急多怒，因郁而气血俱热，以致热灼伤津，阴血枯竭而患经闭不行。治宜清热解郁。方用四物汤加黄芩、黄连、柴胡、香附。

单双肉蛾 病证名。出《证治准绳·儿科》。乳蛾发于一侧者为单肉蛾；发于两侧者为双肉蛾。见乳蛾条。

单蛾 病证名。见《儒门事亲》。《景岳全书》卷二十八：喉蛾“肿于一边者为单蛾，此其形必圆突如珠”。详乳蛾条。

单乳蛾 病证名。见《疮疡全书》。为乳蛾之发于一侧者。简称单蛾。详乳蛾、单蛾条。

泄阳 病名。宋·薛轩《坤元是保》：“孕后阴户出水不止者，是名泄阳”。用单方人参、茯苓、白术、陈皮等量煎汤，再与鲤鱼二斤煮汤，各半碗合服。

泄泻黄水 病证名。指泄泻黄色粪水的病证。多由感受风湿之邪，内搏肠道而致。元·朱丹溪《幼科全书》：“泄泻不住成黄水者，或渴或不渴，此风湿也，其证多得于夏，以五苓散加防风，苍术、羌活治之。”

泄痢发搐 病证名。指腹泄、痢疾而见抽搐症状者。《幼科发挥》：“泄痢发搐，如先吐泻，或痢疾久不止，以致脾胃虚弱者，此慢惊风也，难治。如先发搐，后发泄痢者，此因发搐之时，多用利惊下痰之药，或多用寒凉之药，伤其胃气，泄痢不止，宜补涩之。”临床可见于中毒性痢疾迁延难愈者。用异功散加木香、砂仁、肉豆蔻、诃子肉、山药以调脾健胃。

泡水 见《叶天士女科诊治秘方》。即羊水。

注夏 病证名。见《丹溪心法》。又作疰夏。因其发病每于夏令，故名。为小儿脾胃虚弱，又遇长夏润溽之气，感受湿热而致。《证治准绳·儿科》：“肢体怠惰不收，两脚痿弱，嗜卧发热，精神不足，饮食少思，口中无味，呼吸短乏气促，目中视物

眵眵，小便赤数，大便不调。”治以健脾化湿为主，用补中益气汤去升麻、柴胡，加炒黄柏，或用参苓白术散加减。胃热者，宜清胃生津，用竹叶石膏汤加减。病情轻者，可不须服药，待秋季自可全愈。

泻蛔痧 病证名。即蛔虫病儿感染痧毒而致泻蛔之证。小儿素患蛔虫病，因痧毒入胃，胃必热胀，热胀之极，蛔不能存，下入大肠，由大便排出。治以放痧为主，用消毒三棱针刺臂弯、腿弯痧筋，放出紫黑毒血（《痧胀玉衡》）。

沸子 出《诸病源候论》卷三十五。即痈疮。详该条。

治崩三法 指治疗血崩常用的三个基本治则。《丹溪心法附余》：“经血暴下，久而不止，谓之崩中。治法初用止血，以塞其流；中用清热凉血，以澄其源；末用补血，以复其旧。若止塞其流，不澄其源，则滔天之势不能遏；若止澄其源，而不复旧，则孤阳之浮无以止，不可不审也”。

定痛法 神奇外治法之一。用食盐一碗，锅内炒极热，布包之，向胸腹从上熨下，盖盐走血分，故能软坚，治小儿胸中饱闷。

实女 指少女月经从未来潮而无明显病状者。明·赵献可《邯郸遗稿》：“凡室女从幼经水未至，面色如故、饮食如常，名曰实女”。

实证自汗 病证名。出《证治准绳·儿科》。外因感冒风邪发热，以致浸浸汗出的证候。临床可伴有间常昏睡的症状。当救表解肌，用百解散；或间投五苓散。

实胀 病证名。食积引起的腹胀。《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》：“小儿饮食过度，则胃中积滞，以致腹胀，大便不利，身体潮热，心烦口渴，形气壮实，此实胀也。”治宜健脾消积，或攻下积滞。胀轻用加减平胃散；胀重用小承气汤。

实热 病证名。出《奇效良方》。小儿

实热，多由六淫外感与饮食内伤积滞化热而成。症见日晡潮热，汗出似蒸，烦躁啼叫，口渴引饮，腹胀便结，小便赤涩，两腮绯红，气粗，脉实。治宜清热导滞。用沆瀣丸。

实热呕吐 病证名。胃中实热郁积而致的呕吐。《古今医统》：“胃中郁热，饮食积滞而呕者，则恶食恶寒，烦闷膈满，或渴喜凉，闻食则吐，服药亦吐，脉洪大而数，此皆实热者也。”胃中郁热者，用大黄甘草汤（《金匱》：大黄、甘草），以泄热降浊；食积者，用二陈汤加神曲、麦芽、黄连、保和丸之类，以消食导滞。

试月 ①指妊娠后期，忽然脐腹疼痛，而又不能分娩的症候。《景岳全书》卷三十九：“有一月前或半月前忽然腹痛如欲产而不产者，名曰试月，亦非产也”。②即试水，详该条。③即类胎痛。详该条。④指伤产。详该条。

试水 指妊娠末期或临产，胎水早破者，或胎水破而未生者。见《妇人良方大全》卷十七。亦称试月，包括试水症。①周登庸《续广达生篇》：“胎未足月，先破水衣，而腰不痛，名曰试水，又名试月，非正产也”。②刘斋甫《妇科三字经》：“试痛或破水者，名试水，可与八珍汤加杜仲，故脂，以安其胎”。③《高淑濂胎产方案》：“浆水点滴微来，名曰试水。此时儿方转身切莫仓皇，并禁稳婆将手入探腹上揣摩。直至腰痛如折，眼中火出，水破淋漓，儿逼产门，方可坐草，用力送之，小孩自来”。④《张氏医通》卷十：“胞水破，儿未下，谓之试水”。

试水症 属妊娠早期破水。清·周胎观《秘珍济阴》：“胎未满月，先破水，腰不痛，名试水症。非产也。宜服八珍汤加杜仲、故纸、坤草数贴，俟月足，自易生”。参见试水条。

试胎 指妊娠中期或晚期出现胎忽乱动，腹痛等症状。但脉象无分娩症候者。①

《女科经略》卷五：“有一月前。忽然腹痛。如欲便生。名曰试胎。非当产也”。②唐桐园《大生要旨》二卷：“受胎六、七个月或八、九个月，胎忽乱动。二、三日间或痛或止，或有水下，但腰不甚痛，是脉未离经，名曰弄胎，又曰试胎”。

试痛 指假阵痛或妊娠晚期由于某种原因所致腹痛而无分娩症者。①张仲远《产孕集》：“孕至八九月，或妊母有火，起居不时，令孕不安，因而作痛，所谓试痛也”。②刘斋甫《妇科三字经》：“孕妇临产，必先有试痛，试痛有一次者，有二、三次者。俟过七日，而后一试。凡腹痛而腰不痛，或腰痛而腹不痛者皆为试痛，非真产也”。

〔7〕

居经 出《脉经》。亦名季经，按季，披季。指妇女身体无病，而月经每三个月一行者，是属正常生理范围。

降诞 见《叶天士女科诊治秘方》。即分娩。详该条。

妬乳 病名。出《肘后备急方》卷五。又名乳妬。指两乳胀硬疼痛或乳头生疮的病证。因产后无儿吮乳或产妇壮盛乳多，儿小未能饮尽、乳汁积蓄，与气血相搏，而致乳房胀硬掣痛，手不得近；或乳头生细小之疮，或痛或痒，搔之则黄水浸淫。治宜清热解毒。方用连翘散（《医宗金鉴》防风、升麻、元参、白芍、白敛、射干、芒硝、大黄、甘草、杏仁）。如有破溃者，外敷鹿角散（鹿角、甘草为末，鸡子黄调，热敷患处）。

始胚 妇女怀胎一月之称。北齐·徐之才《逐月养胎方》：“妊娠一月名始胚。”

始胎 指开始呈现人的形态的胚胎。《诸病源候论》卷四十一：“妊娠三月始胎，当此之时，血不流，形像始化”。

始膏 古代对妊娠二月胚胎之称。北齐·徐之才《逐月养胎方》：“妊娠二月名始膏”。

承浆疮 病证名。又名疳蚀疮。指承浆部位成片赤烂。清·吴溶堂《保婴易知录》：“生于唇下，或小儿赤烂，用甌盖上炊流汁涂之，重者以青蛤散涂之。”

孤浆 亦名胞浆、胎浆。《脉经》：“妇人怀胎六、七月暴下余水，其胎必依而堕。此非时，孤浆预下，气血皆虚故也”。即羊水。

绊舌 见《幼幼集成》。即结舌。见该条。

经不调 见《景岳全书·妇人规》。即月经不调。详该条。

经气不调 见《圣济总录》卷一百五十一。即月经不调。详该条。

经从上逆 病证名。指经期血从上逆，以致口鼻出血。曾鼎《妇科指归》：“经来时，忽从口鼻出者，因多食椒姜热极，火升血逆而上。治宜清热凉血。方用犀角地黄汤”。参见逆经条。

经从口鼻出 病证名。指经期从口鼻中出血。《竹林女科证治》：“经不往下行而从口鼻中出，名曰逆经，此由过食椒姜多热之物，热伤其血，血乱上行。宜服犀角地黄汤”。参见逆经条。

经月不利 出《脉经》。指月经不调。详该条。

经水一月再行 见顾膺沅《妇科集·调经门》。即指经行先期。详该条。

经水久不行发肿 见明·岳甫嘉《妙一斋医学正印·女科》。即经闭浮肿。详该条。

经水无常 见单南山《胎产证治录》。即月经不调。详该条。

经水不止 病名。见明·岳甫嘉《妙一斋医学正印·种子篇》。亦名经行不止。多因血热损伤胞络，或劳损冲任，气虚不能摄血等所致。症见经来不止，淋漓无时。治宜凉血补血。方用四物汤加白术、黄芩、阿胶、茯苓、栀子、地榆、荆芥、香附、甘草；气虚

加人参、黄芪，或用举元煎。

经水不止发肿满 病证名。见明·岳甫嘉《妙一斋医学正印·种子篇》。亦名经多发肿。多因脾经血虚，水湿渗入血分所致。症见月经持续不止，兼发肿满。治宜补血健脾利水。方用四物汤加茯苓、白术、砂仁、大腹皮、木香、陈皮、厚朴、猪苓、木通、甘草。

经水不利下 病名。指由瘀血而导致经闭不行。《金匱要略·妇人杂病脉证并治》：“妇人经水不利下，抵当汤主之”。参见经闭条。

经水不行 见《寿世保元》卷七。即经闭。详该条。

经水不定 见《圣济总录》卷一百五十一。即月经不调。详该条。

经水不通 出《脉经》。即经闭。详该条。

经水不调 见《圣济总录》卷一百五十一。即月经不调。详该条。

经水先后无定期 见《傅青主女科》。即经行先后无定期。详该条。

经水先期 见《傅青主女科》。即经行先期。详该条。

经水后期 见《傅青主女科》。即经行后期。详该条。

经水全白 见清·王之翰《妇科胎产百病》。即经来白色。详该条。

经水否涩 病名。见《圣济总录》卷一百五十三。指因经水蓄聚，或产后恶露不尽，皆本冲任气虚，风冷所乘，气不能宣而成血瘀。瘀血不去，结痼成积，则令人面黄肌瘦，烦渴憎寒，腰腹重痛，经水否涩不通。治宜通经活血化瘀。方用桃仁汤（桃仁、大黄、肉桂、当归、甘草、蟅虫、水蛭），水煎加芒硝冲服。

经水或多或少 病名。见《竹林寺女科秘方》。多因肝郁脾虚，久而阴虚生热，冲任失调所致。症见经来血量或多、或少不定，

兼见面色萎黄，头目眩晕，饮食不思，五心烦热等。治宜先用清凉散（黄芩、知母、当归、丹皮、茯苓、白芍），退去烦热，后用调经四物汤（四物汤加香附、砂仁、丹皮、黄芩、生姜）。

经水忽来忽断 见《傅青主女科》。即经来断续。详该条。

经水绝 见《脉经》。即经水断绝。详该条。

经水涩少 见《丹溪心法》。即月经过少。详该条。

经水断绝 亦名经断、经绝。①指妇女到五十岁左右，由于肾气已衰，天癸衰竭，冲任胞脉俱虚，以致月经断绝，是生理现象，不作病论。②指病理性月经停止，即经闭。出《金匱要略·妇人杂病脉证并治》：“妇人病，因虚、积冷、结气，为诸经水断绝”。

经水黑灰 病证名。见风林寺《女科秘宝》。经水黑灰者，因体质虚弱，血气衰微，以致面青嗜卧，五心烦热，口苦舌干，头晕目昏，小腹作痛，即将调经丸（四物汤加三棱、莪术、良姜、大茴、小茴、槟榔、枳壳、延胡索、乌药）作汤剂服之。

经水愆期 见《女科指掌·调经门》。即经行先后无定期。详该条。

经乍来乍少 病名。指月经忽来而月经量甚少。秦景明《女科医宗大成》：“此因阴气乘阳，内寒血涩，以致经血乍来乍少。而在月后者，治用八物汤（四物汤加人参、白术、黄芪、红花、陈皮、甘草、丹皮）”。

经乍来乍多 病名。指经血忽来而月经量甚多。秦景明《女科医宗大成》：“此因阳气乘阴，血热流散，以致经血乍来乍多。而在月前者，治用三黄汤（熟地、黄芩、黄芪、茯苓、当归、蒲黄、人参、甘草）”。

经汁血 出《神农本草经》。即月经。详该条。

经早 见《景岳全书·妇人规》。即经

行先期。详该条。

经血 见《圣济总录》卷一百五十一。指月经之血。

经血不定 见《圣济总录》卷一百五十一。即月经不调。详该条。

经血不断 见《圣济总录》卷一百五十一。即经漏。详该条。

经血妄行 病证名。一指经血不按期循经而行。二指逆经。陈稚泉《妇科心得》：“女子经血妄行或吐血，或唾血，或口内血腥，用四物凉膈散加生韭自然汁服之”。

经血暴下 见《圣济总录》卷一百五十一。即血崩。详该条。

经血暴下兼带下 病证名。指患血崩而兼带下。《圣济总录》卷一百五十三：“妇人脏腑久冷，素有赤白带下，复因冲任气虚，不能约制经血，以致暴下，二者兼作，故谓经血暴下兼带下也”。治宜补气摄血止带。方用地榆汤（《圣济总录》：地榆、当归、阿胶、黄芪、艾叶、龙骨）。

经色 指月经血的颜色。正常经血一般为黯红色，开始色较浅，以后逐渐加深，最后又转为淡红色而净。如有病理变化，经色也会相应的改变，以作临床辨证的参考。如色淡多气虚、血虚；紫红、深红多血热；紫黯多血瘀；黑黯多寒凝；鲜红多虚热，红夹黄色多湿热，色杂夹带多为湿毒等。

经后吐衄 病证名。见《医宗金鉴·妇科心法要诀》。多因肺胃虚热不尽，以致血不归经，症见经后从口鼻中出血，量少，色鲜红。治以清虚热为主。方用麦门冬汤加生地、沙参、牛膝。

经后腹痛 病证名。见《证治准绳·女科》。指经行之后，小腹隐隐作痛，喜按。多属气血虚弱，肝肾亏损所致。参见气血虚弱痛经、肝肾亏损痛经条。

经行不止 见《竹林寺女科秘方》。即经水不止。详该条。

经行发热 病证名。见《医宗金鉴·妇

科心法要诀》。亦名经来发热，包括经行潮热。多因经期感受外邪，表被邪束，邪正交争，营卫失调，或血热经期外泛；阴虚生热等所致。感受外邪者，症见发热、恶寒、无汗，治宜发散表寒，方用四物汤加麻黄；感受风邪者，症见发热恶风自汗。治宜调和营卫，方用四物汤加桂枝；若无表邪而血热者，症见但发热而不恶寒，肌肉灼热，治宜清热凉血，方用地骨皮饮加胡黄连；阴虚生热者，症见午后潮热，盗汗或手足心发烧，治宜养阴清热，方用六神汤。

经行吐血 病名。见《红线女博识摘腴》。多因积热损伤胃络，经行之时，胃经之气随冲气上逆，血随气上所致。症见经行时出现周期性吐血，血色黯红，或经血量少等。治宜清胃热，引血下行。用三黄四物汤，或犀角地黄汤等方。

经行先后无定期 病名。亦名经行或前或后、经乱，经水先后无定期、经水无常、经血不定等。指月经来潮或提前，或错后，经期表现常不规律。多因肝郁、肾虚所致。详肝郁经行先后无定期、肾虚经行先后无定期各条。

经行先期 病名。亦名月经先期、一月经再行、经水先期、经早等。指月经来潮比正常周期提前一周以上，甚或一月两至者。多因血热、虚热、气虚、肝郁等所致。

经行后期 病名。亦名月经落后、经水后期、经迟、过期经行等。指月经来潮比正常周期推迟一周以上。多因血虚、血寒、肾虚、气滞和血瘀等所致。当分别用益血、温经、补肾、行气、祛瘀等法治疗。

经行身痛 病证名。见《医宗金鉴·妇科心法要诀》。多因风寒表邪郁阻经络，营卫失调，或因失血过多，筋脉失养所致。症见经行时或经行前后，身体疼痛发热恶寒。若身痛而胀，无汗者为表实，宜发散表邪，用麻黄四物汤；若发热恶寒，身痛不胀而有汗者，为表虚，宜调和营卫，用桂枝四物

汤；若无寒热表症而身痛者，为血脉壅滞，阻塞不通所致，宜疏通经脉，用四物汤加羌活、桂枝，以使血脉通利，疼痛自止。若在经行之后，或因失血过多而身痛者，为血虚不能荣养筋脉，宜补血荣筋，用黄芪建中汤，补益血脉。

经行或前或后 见陈稚泉《妇科心得》。即经行先后无定期。详该条。

经行泄泻 病证名。亦名经来泄泻。多因脾肾阳虚，当经行之时，胃肠之气血受阻，影响水谷精微的运化及传导失职所致。脾虚者，症见经期大便泄泻，精神疲倦，食减，或见浮肿、腹胀等，治宜健脾渗湿，方用参苓白术散；肾阳虚者，症见大便溏薄，五更泄泻，腰膝痠软，小便清长，治宜温肾扶阳，方用健固汤（《傅青主女科》：人参、白术、茯苓、薏苡米，巴戟）水煎送服四神丸。

经行便血 即差经。详该条。

经行衄血 病证名。见《医宗金鉴·妇科心法要诀》。多因肝郁化火犯肺，或阴虚肺热，以致肺络损伤，经期血随火动上逆。症见经行衄血。肝火犯肺者，兼见急躁易怒，口苦咽干或咳，治宜平肝泻热，方用丹栀逍遥散加郁金；阴虚者，兼有午后潮热，治宜养阴清热，方用犀角地黄汤，或麦门冬汤去人参、半夏，加生地、玄参、知母、茅根。

经行腹痛 病名。见《妇人良方大全》卷一。是指经行时出现下腹部及腰部疼痛，经净后即缓解痛止。详痛经条。

经多发肿 病证名。见《女科备要》。即经水不止，身发肿满。详该条。

经闭 病名。出《妇人良方大全》卷一。亦名不月、月闭、不月水、月水不来、月经不通、血闭、月事不来、月事不通、月不通、月使不来、月水不通、月经不行、经水不行、经水不通、经闭不利、经脉不行、经脉不通、经候不行、歇、歇经等。包括女子暗闭，女子暗闭经。指女子年龄超过十八

周岁以上，仍不见月经来潮，或曾来过月经，但又连续闭止三个月以上，除妊娠、哺乳期等生理性闭经外，均称之为经闭。多由血亏、肾虚、气滞、血滞、寒湿凝滞等原因所导致。参有关各条。

经闭不行 见《张氏医通》卷十。即经闭。详该条。

经闭不利 出《脉经》。即经闭。详该条。

经闭出痘 病证名。指妇女经闭而发痘疮之症。如因心脾先病而经闭不通，积垢郁阻于冲任胞宫，以致痘疮火毒当出不出者。初起发热时，宜用桃仁承气汤，以清除宿垢，继用四物汤合匀气散加红花、木通以调之。若心脾虚损，冲任胞宫空虚，无血可行，而适逢出痘者，治用归脾汤以调其心脾，里气和则邪自外出。

经闭发热 病证名。清·《妇科秘方》：“此症因行经时及产后食冷水果等物所致。盖血见水则凝滞，初起每日生寒作热，五心烦热，脾土不胜，若半年不治，变作骨蒸，子午发热潮热，肌肉消瘦泄泻不止，须用逍遥散、紫金汤治之”。

经闭浮肿 病证名。亦名经水久不行发肿，月水久不行发肿。指经闭之后而发生肢体肿胀者。《叶氏女科证治》：“经闭不行，致有败血停积五脏，流入四肢作浮肿者，不可误认水气，宜调其经，经调则肿消矣，然服煎药，必须服十余剂，庶无愆期之患至，服丸散更宜久服，可免复肿之忧，宜服调经汤（当归、生地、益母草、川芎、白芍、香附、茯苓、丹皮、甘草、生姜、大枣），金匱丸（四制香附、没药、当归、茯苓、白薇、白术、阿胶、白芍、人参、砂仁、生地、续断、山药）”。

经闭黄疸 病证名。丁甘仁《女科医案》：“室女经闭肝失疏泄，宿瘀内阻，水谷之湿逗留，太阴、阳明、厥阴三经为病，始而少腹作痛，继则脘胀纳少，目黄，

溲赤，肌肤亦黄，大便色黑，现为黄疸。久则恐成血臌，急宜健脾逐湿，祛瘀通经。方用苍术、大腹皮、苏木、陈皮、厚朴、桃仁、延胡索、赤茯苓、茵陈、红花、泽泻，青鳞丸吞服”。

经闭腹大如鼓 病证名。指经闭后腹部增大如鼓，形似怀孕。其病因较多。《竹林女科证治》：“月经二三月不行，腹大如鼓，人以为有孕。一日崩下，其血内有物如虾蟆子，昏迷不知，体弱形瘦者不治，若体盛者，急投十全大补汤”。此证描述，相当于葡萄胎，可结合手术处理。

经如虾蟆子 病证名。亦名经来下肉胞、经来下血胞。《妇科易知》：“经水过期，其人腹大如鼓，月经来时血中夹物如虾蟆子，并见昏迷不知人事者。宜气血双补法。方用十全大补汤”。相当于葡萄胎，可中西医结合治疗。参经闭腹大如鼓条。

经来下肉胞 病证名。亦名经来下血胞。《叶氏女科证治》：“经来不止，忽下肉胞三五个，状如鸡子大，软如絮，用刀剖开，内如石榴子，昏迷不省人事。宜服用十全大补汤”。

经来下血胞 见《竹林寺女科秘方考》。即经来下肉胞。详该条。

经来小便出白虫 见《竹林寺女科秘方考》。即经来出白虫。详该条。

经来小便痛 病证名。《叶氏女科证治》：“经来小便痛如刀割，此乃血门不通，用八珍散不效，急服牛膝汤（牛膝、麝香、乳香）”。

经来小便痛如刀割 病证名。风林寺《女科秘宝》：“经来小便痛如刀割，此血淋也。先用牛膝汤（牛膝、麝香、乳香）一剂，后用海金砂丸（海金砂、猪苓、泽泻、白术、车前子、木通、草薢，为末，米糊小丸，空心下百丸”。

经来小腹结块 病证名。《竹林寺妇科秘方考》：“经来小腹结成一块，如皂角一条

横过，痛不可忍，不思饮食，面色青黄，急用延胡散（延胡索、发灰）”。

经来小腹痛如刀刺 病证名。吴悔菴《秘传内府经验女科》：“经行时，由热邪乘于小肠，闭而不通，以致小腹痛如刀刺。宜服八正散，或用牛膝散（牛膝、麝香、乳香）”。参见血瘀痛经条。

经来小腹痛有块 病证名。曾鼎《妇科指归》：“经来小腹有块，痛不可忍，不思饮食，面色青黄。宜服元胡散（延胡索、制香附、百草霜，重者再加血余炭，共为细末，用益母膏和匀，砂糖为丸）”。参见血瘀痛经条。

经来未尽腹痛 病证名。《叶氏女科证治》：“经来一半余血未尽，腹中作痛，或发热或不热，乃气血俱实也。宜服红花当归汤（红花、当归、牛膝、苏木、枳壳、三棱、莪术、赤芍、芫花），破其余血，而热自止”。参见气滞痛经、血瘀痛经、寒湿凝滞痛经条。

经来不止 病名。见《竹林女科证治》。指经血来潮过期不止。治疗参见月经过多、经漏条。

经来白色 病证名。亦名经水全白。《竹林女科证治》：“经血来时而色白者，兼见五心烦热，小便作痛，面色青黄，乃气血俱虚之症。宜用乌鸡丸”。

经来发狂 见顾膺陀《妇科集·调经类》。即经来狂言谵语。详该条。

经来发热 见顾膺陀《妇科集·调经类》。即经行发热。详该条。

经来出白虫 病证名。《竹林寺妇科秘方考》：“经水内有白虫如鸡肠，满腹疼痛。宜推虫从大便出。先用追虫丸（续随子、槟榔、牵牛子、大戟、甘遂、芫花、当门子），后用建中丸（黄芪、肉桂、甘草、白芍）”。

经来成块 病证名。见《竹林女科证治》。多因气滞血瘀或血寒凝泣，以致月经来时多含血块。血瘀者，症见小腹痛不可忍

而拒按，宜化瘀调经，用延胡索20克，蒲黄15克，五灵脂15克，共为细面，每服10克，酒调服；若寒凝者，症见经来成块，色黑黯无光，小腹胀痛，口唇麻木，宜温经散寒，用内补当归丸（《证治准绳》：当归、阿胶、白芷、续断、干姜、川芎、炙甘草、熟地、附子、白芍、肉桂、吴茱萸、白术、蒲黄）。

经来成块如葱白色 病证名。《叶氏女科证治》：“经来成块如葱白色，或如死猪血黑色，头昏目暗，口唇麻木，此虚冷也，药忌寒凉，急服内补当归丸（方见经来成块条）”。

经来吐蛔虫 病证名。见《叶氏女科证治》。指妇女于月经期间呕吐蛔虫。王伯龙《养儿宝》：“经来寒热，四肢厥冷，大汗不止，呕吐蛔虫。宜用乌梅丸、当归四逆汤”。

经来吊阴痛 病证名。见《竹林女科证治》。月经来时，自觉有两条筋从阴部中吊起至两乳，疼痛难忍，身上发热。方用川楝汤（川楝子、大茴香、小茴香、猪苓、泽泻、白术、乌药、槟榔、乳香、延胡索、木香、麻黄、生姜）。临床少见。

经来色淡 病证名。见《竹林女科证治》。多因气血俱虚，脾肾阳虚，运化功能减弱所致。《女科经纶》引朱丹溪语：“色淡者，虚而有水混之也”。治宜补气血以调经。用八珍汤加黄芪、香附、生姜，兼常服六味地黄丸。虚甚者加干姜、附子。

经来色紫 病证名。见《竹林女科证治》。多因情志失调，肝郁化火，郁火伤气，气热灼血，以致月经色紫，稠粘，症属实热。治宜清热调经。方用四物连附汤（四物汤加黄连、香附）。

经来如牛膜片 病证名。《叶氏女科证治》：“经来不止，兼下物如牛膜片，昏迷倒地，乃血气结聚，变成此症。症虽惊人，却无大事，宜服朱雄丸（朱砂、雄黄、白茯

苓)”。

经来如屋漏水 病证名。《竹林女科证治》：“经来如屋漏水，头昏目眩，小腹作痛，更兼白带，咽中臭如鱼腥，恶心吐逆，此血虚有热也。先用理经四物汤（四物汤加白术、柴胡、香附、延胡索、三棱、黄芩），次用内补当归丸”。

经来如黄泥水 病证名。又名经来黄色、月水色黄。《竹林寺妇科秘方考》：“经来如黄泥水，全无血色，乃大虚大寒，不可用凉药，宜乌鸡丸，服半月，非但病愈，兼能怀孕，再用加味四物汤（四物汤加乌药、延胡索、小茴香、生姜、黑枣），以暖其经、和其血”。

经来如铜绿水 病证名。又名经来绿色。《叶氏女科证治》：“经来全无红色，乃大虚大冷也。忌用凉药，宜用乌鸡丸”。

经来如鱼脑髓 病证名。《叶氏女科证治》：“经来如鱼脑髓，双脚疼痛，不能举动，乃下元虚冷更兼风邪所致。当行气行血。宜服苏风止痛汤（天麻、僵蚕、紫金皮、乌药、牛膝、独活、川芎、当归、乳香、南藤、补骨脂、生姜、葱白），酒煎空心服”。

经来如猪肝水 病证名。《叶氏女科证治》：“经来如猪肝水，五心烦热，腰腹疼痛，面黄肌瘦，不思饮食，此气血皆虚也。先用黄芩汤（黄芩、当归、川芎、知母、苍术、花粉、白芍）退其烦热，后用调经丸（生地、熟地、当归、白芍、三棱、莪术、延胡索、茯苓、川芎、砂仁、乌药、香附、大茴、小茴、共为末，粳米糊丸，每服二钱）调其气血”。

经来呕吐 病证名。见《竹林女科证治》。亦名经来惯呕吐。多因饮后水聚不化，或胃弱食伤停滞所致。如伤于水饮者，呕吐多为食物夹水，治宜温中化饮，方用丁香散（公丁香、炮姜、白术）；如食伤停滞者，兼见胃痛，宜消食导滞，方用香砂六君

子汤。

经来饮食后即吐 病证名。《竹林女科证治》：“此因痰在胸脘，阻隔米谷，不能下胃，急服乌梅丸化其痰涎，后服九仙夺命丹（豆豉、木香、陈皮、山楂、草果、枳壳、茯苓、厚朴、苍术）”。

经来狂言谵语 病证名。见《竹林女科证治》。又名经来发狂。多因月经来时偶触烦怒，肝气逆乱，血随气逆，上攻于心。症见神志紊乱，妄有所见，狂言谵语，甚至不知人事。治宜舒肝宁心。方用麝香散（麝香、朱砂、甘草、木香、人参、茯神、桔梗、柴胡、远志）加减。或用茯神丸（茯神、茯苓、远志、砂仁、朱砂）。

经来胁气痛 《叶氏女科证治》。即经来胁痛。详该条。

经来胁痛 病证名。见《竹林女科证治》。又名经来胁气痛。多因肝郁气滞所致。症见月经来时，胁内作痛，经血色暗。治宜行气止痛。方用四物元胡汤（四物汤加延胡索、沉香）。

经来泄泻 见《竹林女科证治》。即经行泄泻。详该条。

经来咳血 病证名。《竹林寺女科秘方》：“伤于生冷又触于热毒，以致经来咳血，痰气急满，五心烦热。宜先用五虎汤（陈皮、甘草、桑皮、桔梗、苏子、石膏、知母、枳壳），次用紫苑汤（阿胶、桑皮、紫苑、五味子、杏仁、冬花、桔梗、苏子、贝母、陈皮、枳实）”。

经来绿色 即经来如铜绿水。详该条。

经来浮肿 病证名。见《竹林女科证治》。多因脾虚水湿不化，泛滥肌肤而致。宜调理脾胃，行气利水。用木香调胃汤（木香、陈皮、车前子、甘草、三棱、莪术、红豆蔻、大腹皮、砂仁、苍术、木通、草薢、山楂、姜皮）。

经来臭如腐肉 病证名。《竹林女科证治》：“此乃血弱，更伤热物。譬如沟渠水

干,天气无雨,久则臭也。身衰旧血少,新血不生,则臭如夏月腐肉。宜服龙骨丸(龙骨、海螵蛸、生地、当归、川芎、白芍、黄芩、茯苓、牡蛎),兼服通瘀散(当归、三棱、莪术、赤芍、丹皮、白术、香附、猪苓、陈皮、木通、生姜)”。

经来黄色 见《妇科易知》。即经来如黄泥水。详该条。

经来断续 病证名。见顾膺陀《妇科学集·调经类》。亦名经水忽来忽断。多因经行之际,血室正开,适为风寒侵袭,肝气为之壅闭不舒,阻碍经血下行,腠理经络亦皆不宜。症见经来忽断,断而又来,或每日经来几滴则止,五日、十日又来几滴,一月常见三四次,面色青黄,腹中时痛,寒热往来等。宜补益肝血,疏郁散风。用加味四物汤(四物汤加丹皮、延胡索、甘草、柴胡、白术)。

经来黑色 病证名。指月经来时,色如黑灰或如黑豆汁样。《竹林寺女科秘方》:“此属虚弱血衰之症。如见面色青,嗜睡,或卧不安,五心烦热,口舌干,头目眩晕,小腹作痛者,宜服调经丸。若沉黑色败,由于虚寒者,宜补中益气汤、理中汤、归脾汤等温之”。

经来惯呕吐 见王之翰《妇科胎产百病》。即经来呕吐。详该条。

经来遍身疼痛 病证名。《叶氏女科证治》:“经来二三日,遍身疼痛,此寒邪入骨,或发热或不发热,俱宜解表,服乌药顺气汤(乌药、僵蚕、川芎、白芷、陈皮、枳壳、干姜、甘草、麻黄、姜、葱,水煎温服)”。参见经行身痛条。

经来腰腹痛 病证名。《竹林女科证治》:“经来腰腹痛而气滞血实者,宜服桃仁汤(当归、赤芍、生地、香附、丹皮、红花、延胡索、桃仁),形瘦有火加黄芩、黄连;形肥多痰加枳壳、苍术、半夏。亦有肝肾阴虚腰腹痛者,宜养肝肾,用六味地黄汤

加杜仲、续断、寄生、白芍”。

经来潮热不食 病证名。见《竹林女科证治》。指经来胃气不开,潮热旬日不思饮食。多因气血素虚所致。宜以开胃为主,用保和丸、逍遥丸。继以大补气血佐以滋阴,用十全大补汤酌加山茱萸、山药、丹皮、麦门冬、五味子。

经来潮热气痛 病证名。《叶氏女科证治》:“经来一半,遍身潮热,头痛,口渴,小腹作痛。此因伤食生冷,故血滞不行,内有余血,忌服补剂,宜服莪术汤(莪术、三棱、红花、苏木、牛膝)”。

经坚如石 病证名。见谢观《中国医学大辞典》。指月经来时,所下之物坚硬如石者。多因血积或受寒,日久结集所致。治宜和血归经。方用和血通经汤(当归、三棱、莪术、木香、熟地、肉桂、红花、贯众、苏木、血竭)。

经乱 见《景岳全书·妇人规》。即经行先后无定期。详该条。

经乱不孕 病证名。不孕症型之一。《叶氏女科证治》:“妇人经水不调,气血乖和,不能受孕”。治宜调经,参见月经不调条。

经迟 见《景岳全书·妇人规》。即经行后期。详该条。

经事 见《医学纲目》卷三十四。即月经。详该条。

经质 指月经的性状。正常月经,一般不稀、不稠、不凝结,无血块,无特殊气味。根据经质的病理改变,可作为临床辨证的参考。例如经质清稀为气血虚,经质稠粘多属血热等。

经信 出《妇人良方大全》卷一。即月经。详该条。

经脉 ①指月经。见《脉经》。②指气血循行的经脉见《灵枢·经脉》。

经脉不止 见《圣济总录》卷一百五十一。即经漏。详该条。

经脉不行 见《圣济总录》卷一百五十一。即经闭。详该条。

经脉不利 出《脉经》。一指月经不调。二指经闭。

经脉不通 见《寿世保元》卷七。即经闭。详该条。

经脉不调 见《圣济总录》卷一百五十。即月经不调。详该条。

经前吐衄 病证名。指在行经期前，出现周期性口鼻出血的病症。详逆经条。

经前便血 病证名。见《简明中医妇科学》。指每月行经前一、二日，大便下血。多因素嗜辛辣燥血之物，热郁肠中，大肠与胞宫并域而居，当经行之前，胞中气血俱盛，引动肠中郁热，因而迫血下行所致。症见经前大便下血，色深红，面赤唇干，咽燥口苦，渴喜冷饮，头晕心烦，经行量少，色紫红稠粘等。宜清热凉血止血。方用约营煎（生地、芍药、甘草、续断、地榆、槐花、炒芥穗、乌梅、黄芩），大便燥结甚者，去乌梅，加麻仁、郁李仁；热甚者，去乌梅，加栀子、黄连。

经前脐下痛 病证名。指经前三、五日，脐下作痛势如刀刺，或寒热交作，经血下如黑豆汁样。多因寒湿凝滞所致。宜温经化湿。方用温脐化湿汤（白术、茯苓、山药、巴戟、扁豆、白果、建莲子）。参见寒湿凝滞痛经条。

经前洩水 病证名。见《傅青主女科》。指每在经前则先洩水三四日，然后方行经者。多因脾虚不固，运化失职，水湿停聚，以致经水将动欲流注于血海，而水湿乘之，故先洩水而后行经。治宜补气健脾除湿。方用健固汤（人参、茯苓、白术、薏苡仁、巴戟）、参苓白术散等。

经前期紧张综合症 病名。指经行前一周左右，出现有烦躁易怒，倦怠嗜睡，或失眠，头晕头痛，偏头痛，乳房胀痛，喉痛声嘶，胸闷，腰腹酸胀浮肿，腹泻，关节痛，

荨麻疹，皮肤搔痒等症，随月经周期发作，月经走后骤然减轻或消失，故称。多由肝肾失调影响冲任，若肝气郁滞，症见经前乳房胀痛，头晕头痛或偏头痛胃纳不佳等，宜疏肝解郁，用丹栀逍遥散加减，配合针刺合谷、三阴交、太冲。若肾阴不足症见腰膝酸软，口干颧红，盗汗等，宜滋阴补肾，用六味地黄汤。参见经前浮肿、经行头痛、经前腹泻、经前乳房胀等各条。

经前腹痛 病证名。指经行之前，出现下腹部疼痛，经行后即愈。多因气滞、血瘀、寒湿凝滞等所致。《叶天士女科诊治秘方》：“经水将来，而脐腹绞痛，此血涩不行，以作痛也。宜服通经汤（四物汤加川楝子、小茴香、槟榔、延胡索、木香。水煎，食前服）”。参见气滞痛经、血瘀痛经各条。

经前腹痛吐血 病证名。见《傅青主女科》。指经水未行之前一二日，出现腹痛吐血。乃肝气不顺上逆所致，因血随气为行止，气安则血安，气动则血动。治宜顺气平肝兼行纳气之法。用顺经汤（当归、熟地、白芍、丹皮、茯苓、沙参、黑芥穗）。

经逆赤肿 病证名。指经闭上逆，两目赤肿。《张氏医通》卷八：“女人逆经，血灌瞳神，满眼赤涩者，乃血热经闭，过期不行，则血逆行于上。如有胥肉，切不可钩割，只用四物加行气破血通经药，经行则血翳自退，势甚，必加酒大黄下夺其势，去火所以存阴”。

经绝 即经水断绝。详该条。

经候 见《产宝百问》。即月经。详该条。

经候不止 见《圣济总录》卷一百五十一。即经漏。详该条。

经候不匀 见《圣济总录》卷一百五十。即月经不调。详该条。

经候不行 出《妇人良方大全》卷一。即经闭。详该条。

经候不调 见《圣济总录》卷一百五十一。即月经不调。详该条。

经崩 病名。亦名经血暴下。指经期来潮阴道大流血。徐润之《最新三字达生续编》：“经血忽然大下不止，名曰经崩”。参见血崩条。

经崩出痘 病证名。指患经崩气血俱虚，而又继续发生痘疮。此时正不胜邪，宜用十全大补汤治之。若见痘色灰白平塌难发难胀者，则加熟附子一、二片，使里气充足，毒无停滞，服后饮食增进，痘形起胀者为顺，否则为逆。

经断 出《金匱要略·妇人妊娠病脉证并治》。指经水断绝。详该条。

经断复来 病名。见《医宗金鉴·妇科心法要诀》。又名倒经，俗称倒开花。指妇女月经已断一年以上，而又见经血者。如无明显症状，是属营血有余。若有病态反应，乃多因血热下迫，内扰冲任所致。宜清热为主，用芩心丸，或益阴煎（生地、知母、黄柏、龟板、砂仁、炙甘草）；若经血过多，热随血去，以致冲任虚损不能固摄者，用十全大补汤、八珍汤以调补气血。若因怒气伤肝，肝不藏血，用逍遥散以疏肝理血。若因忧思伤脾，血失统摄者，用归脾汤，健脾以引血归经。肝脾俱伤则在以上两方斟酌加减。本病应注意癌变。

经断前后诸症 病证名。指妇女更年期月经将断未断之时，出现一些综合性的病症。多因肾气衰弱，冲任虚损，精血不足，以致脏腑经络失于濡养和温煦，临床症状参见更年期综合症条。如见头昏目眩，心烦易怒，情志失常，手足心发热，月经量多，或经漏淋漓不断，耳鸣心悸，或潮热汗出，颧红口干等症，为真阴亏损，阳失潜藏，宜滋阴潜阳，用六味地黄汤加龙骨、牡蛎、龟板、白芍、沙苑蒺藜、石决明之类；若见失眠怔忡或情志失常者，为心肾不交，宜滋肾宁

心安神，用补心丹；若见畏寒喜暖，腰脊痛，腿软腹冷者，为肾阳不足，冲任督带失于温煦，宜温阳补肾，用右归丸加人参、破故纸、仙茅、淫羊藿等；若见神志烦乱，善悲欲哭，呵欠频作者，为阴血亏耗，不能濡养五脏，火动内扰之脏躁症，宜甘润滋补，调养心脾，用甘麦大枣汤，酌加枣仁、茯神，以安神，竹茹除烦，陈皮理气，或加生地、麦冬以滋心肾之阴，白芍敛肝和脾，黑芝麻以养肝肾而润大肠等，均可随症酌用。

经淡如水 病证名。指月经色淡，质稀如水。由气血俱虚所致。治宜补气养血。方用黄芪、人参、甘草、肉桂、当归、川芎、香附。或用四物汤加人参、黄芪、香附；腹痛加阿胶、艾叶、延胡索；虚甚者，加生姜、附子。

经期 ①指月经的周期。一般以二十八天左右为一个月经的周期。但由于个人的体质、年龄、气候、地区和生活条件的不同，月经周期也会有所差异。所以在二十一天和三十五天之间的，也属正常范围。②指月经的持续时间。一般为三至七天。如持续时间延长，或过短，则属病态。

经量 指经期排出的血量。一般总量约为50~100毫升左右。由于个人的体质、年龄、气候、地区和生活条件等不同，经量有时略有增减，均属正常的生理范畴。如有病理变化，血量过多或过少，均属病态。参见月经过多，月经过少条。

经漏 病名。见《兰室秘藏》。又名月漏、血漏、经血不断、漏下、漏下不止、月水不绝、月水不断、经脉不止、经候不止等。指阴道出血淋漓不断，或经期血来而持续日久不止，血量较少或略增多。病因多为气虚、血热、阴虚、气郁、血瘀等，致使气血失调，冲任不固而为经漏。辨证治疗，参见崩漏条。

九 画

〔一〕

珍珠积 病名。古时记载妇科奇病。清·周胎观《秘珍济阴》：“妇人奇病名曰珍珠积。因血气凝滞，经水数月不行，如孕子状，但腹痛时，用手按之有小团，或至年余不产，形体消瘦，宜服琥珀汤（琥珀、生地、生泽兰），煎水酒对服，即产下血珠、水珠全愈”。

毒涎 六涎之一。见于疫病之后，由肝心脾肺受其疫毒之气，以致毒涎相积而成。症见便秘尿涩，面色黯赤，浑身发热，昏昏如醉，狂言妄语，不知人事。宜用疏泄之药，取其毒气，荡下其涎。

拭口法 出《千金要方》卷五。即初生拭口。详该条。

拭秽法 出《世医得效方》。即初生拭口。详该条。

指三关 ①即三关。详见上关、中关、下关及风关、气关、命关条。②推拿部位名。又名小三关。即食指三节指骨的腹面，近端指节为风关，中段指节为气关，远端指节为命关。《小儿推拿广意》：“指上三关，推之通血气发汗”。

按季 见上海中医文献研究馆《调经专辑》。即居经。详该条。

项软 五软之一。明·薛铠《保婴撮要》：“项软者，乃天柱骨弱，肾主骨，足少阴太阳经虚也。”参见天柱骨倒条。

带 ①指妇女从阴道内流出的粘性分泌物。②指带下病。《妇人良方大全》卷一：“人有带脉，横于腰间，如束带之状，病生于此，故名带”。参见带下条。

带下 出《素问·骨空论》。①泛指妇科疾病。②指妇女阴道流出一种粘性液体，

连绵不断，其形如带，称为带下。参见黄带、赤带、青带、黑带等各条。

带下三十六疾 指妇人三十六种疾病。《诸病源候论》卷三十八：“三十六疾者，是十二藏、九痛、七害、五伤、三固谓之三十六疾也”详见各条。

带下五色 病证名。见《圣济总录》卷一百五十一。一指带下五色俱出。二指带下有五种颜色。

带下无子 病证名。不孕症型之一。由于带下病影响受孕的。《诸病源候论》卷三十九：“带下无子者，由劳伤于经血、经血受风邪则成带下，带下之病，曰沃与血相兼，带而下也。病在子藏，胞内受邪，故令无子也”。可根据带下病辨证治疗。

带下赤候 出《诸病源候论》卷三十七。即赤带。详该条。

带下青候 出《诸病源候论》卷三十七。即青带。详该条。

带下黄候 出《诸病源候论》卷三十七。即黄带。详该条。

带下黑候 出《诸病源候论》卷三十七。即黑带。详该条。

草迷 见《医宗金鉴·儿科心法要诀》。

①指婴儿生下后不啼。即初生不啼。详该条。②指产妇将胎儿娩出后出现的昏迷不知人事。

草蓐 见《卫生家宝产科备要》。即临产。详分娩条。

茶黄 病证名。指小儿遍身黄肿而嗜茶叶等异物的病证。《幼科铁镜》：“茶黄者，小儿胃腑积有湿热，嗜食茶叶，或嗜生米，瓦砾黄土所致，遍身皆黄而肿。”治宜清胃化湿。用平胃散加茵陈蒿、梔子。一说用青矾炒黄豆，随意食之有效。

茵胎 病名。《济阴要略》：“按茵胎者，由于妊母体质素怯，胎失其养，茵而不长”。即胎不长。详该条。

垢胎 激经。《本草纲目·论月水》：“有受胎之后，月月行经而产子者，是谓盛胎，俗名垢胎”。即激经。详该条。

胡臭 见小儿腋气条。

枯胎 见《胎产心法》上卷。即胎不长。详该条。

咸哮喘 出《本草纲目》。即哮喘。详该条。

[1]

韭汁法 古代下胎毒法之一。小儿初生时以韭根捣汁煮开灌之；或用甘草煎水，浸韭子汁，涂儿唇上。

背包生 指产儿脐带绕颈。《张氏医通》卷十：“儿出胞转身时，偶然脐肠盘于项上，牵系不能即下者，俗名背包生。亦宜推入。轻轻拨去。然后用力”。详碍产条。

背脊(xū 俞) 新生儿脊椎管没有完全闭合的一种先天性畸形。清·吴溶堂《保婴易知录》：“小儿初生背上有孔脊一二个，其内有膜完护脏腑者，得生；如无膜露见脏腑者，即死无救。”与脊柱裂相类似。

战汗 病证名。汗证的一种类型。先见战栗而后汗出的证候。多因邪胜正馁，邪伏不去，一旦正气来复，邪正相搏，所致。战汗是邪正相争，为疾病的转折点。《景岳全书·伤寒典》：“正胜邪则战而汗解。”故汗出热退，身凉脉静，为邪去正安；汗后身凉脉躁，为正不胜邪。

战胎 见曾鼎《妇科指归》。指孕妇临近分娩时转胎引起的腹痛。

哑胎 病名。明·赵献可《邯郸遗稿》：“胎前忽然不语者，谓之哑胎”。参见子痞条。

哑惊 病证名。惊风之一。清·许宣治《许氏幼科七种》小儿惊风发搐“壮热痰

涌，抽掣无声者，俗名哑惊。”用羚羊钩藤、琥珀抱龙丸。

胃中实热 病证名。小儿实热之一。《诸病源候论》卷四十六：“小儿气血俱盛者，则脏腑皆实，故胃中生热，其状大便则黄，四肢温壮，翕然体热也。”治宜清胃泻热。用泻黄散。

胃气实热 又名胃实热。①指小儿胃气充盛，感受热邪，邪与气相搏，充斥阳明，则成实热。症见发热而饮水作渴，喜冷饮食。治宜清泻胃热，用泻黄散。②吐泻昏睡不露睛者，胃实热（《小儿药证直诀》）。③小儿气血旺盛，发热引饮，大便黄坚，小便赤少，四肢、身体翕翕发热，此为胃实热，治宜下之。”（《小儿卫生总微论方》），用调胃承气汤。

胃气虚热 病证名。又名胃虚热。①胃气虚弱而引起的发热。《小儿药证直诀》：“发热而不欲饮水者，胃气虚热也。用白术散”。若见于热病后期，兼有口干、舌燥者，宜养胃生津，用竹叶石膏汤加减。②“吐泻昏睡，露睛者，胃虚热”（《小儿药证直诀》）。治宜健脾益胃，用参苓白术散。

胃火呕吐 病证名。胃火亢盛而致的呕吐。明·张三锡《医学六要》：“脉经数或洪滑，口干，面赤，喜冷恶热，烦躁引饮而吐者，属火。宜清胃降火。”用竹叶石膏汤加芦根、竹茹。

胃水 病证名。小儿浮肿的一种类型。因胃有病而引起的水肿。由胃失和降，不能游溢精气，上输于脾，因而导致脾不散精津，水津内阻而成。临床特征为浮肿，小便闭涩。治宜健胃利水。用胃苓汤。

胃有积滞 乳食停滞于胃而致的证候。表现为胃胀腹满，嗳气反酸，食差，舌苔厚腻。治宜消食导滞。用保和丸。参见积滞条。

胃怯汗 出《证治准绳·杂病》。即胃

虚汗。详该条。

胃泻 病证名。脾胃虚寒不能腐熟水谷而引起的泄泻。《幼科发挥》：“(泻)自胃来者，水谷注下而不分，所下者皆完谷也。”治宜温胃散寒为主。用理中丸加减。

胃实热 出《小儿药证直诀》。即胃气实热。详该条。

胃热呕吐 见《幼幼集成》。即热吐。见该条。

胃热胎疸 病证名。出《小儿药证直诀》。指小儿生下百日或半岁内，因胃热突然出现发黄。由阳明胃热，湿邪留滞，湿热郁蒸而发。症见身黄壮热，腹胀口渴，大便秘小便赤涩。治宜清利湿热，用茵陈蒿汤合五苓散。热重者可用黄连解毒汤加减。

胃热恶阻 恶阻证型之一。平素胃热，孕后冲脉气盛，胃气不降所致。症见呕吐心烦，颜面潮红，口渴喜凉饮，便秘。宜清胃热，降逆止呕。用苏叶黄连汤（紫苏叶、黄连）加半夏、竹茹、陈皮，或加味温胆汤。

胃弱恶阻 恶阻证型之一。多因脾胃素弱，孕后冲脉气盛，致使胃失和降。症见脘闷腹胀，呕吐不食，或食入即吐。宜健脾和胃，调气止呕。方用六君子汤加枇杷叶、藿香、旋复花、砂仁、枳壳。

胃虚汗 病证名。出《小儿药证直诀》。又名胃怯汗。指胃气虚弱而引起的自汗。其特点为汗出上至头，下至脐，面色㿔白，四肢倦怠。治宜益胃敛汗。用益黄散加减。

胃虚热 出《小儿药证直诀》。即胃气虚热。详该条。

胃惊 脏腑惊证之一。出金·陈文中《小儿病源方论》。详脏腑惊证条。

胃喘 病证名。胃气上逆而作的喘证。清·何梦瑶《医碥》：“胃喘一证，谓胃络不和，气逆作喘。然后以致逆者，非火则食与痰耳。”因于火者，喘而烦渴，宜清胃降火，用泻白散合白虎汤，便秘加大黄；因于痰者，喘则便有痰声，宜降气化痰，用二陈

汤加杏仁、瓜蒌仁、苏子、前胡。

胃寒恶阻 恶阻证型之一。平素脾胃虚寒，孕后胞门闭塞，脏气内阻，寒饮逆上。症见呕吐清水，倦怠畏寒，喜热饮。宜温胃止呕。用干姜人参半夏丸。

胃禁 出《痘疹经验良方》。禁疮之一。痘疮之毒火内灼于胃，使痘毒不能宣发于肌表，脾胃受灼。其痘现于口唇之间，或三、四点相连；或者诸痘未成浆锭，此痘已先黄熟，兼见面色潮红，气粗热甚，口臭异常。治以清胃解毒为主，如清胃散加减。

蚂蚁丹 病证名。小儿丹毒的一种。明·秦景明《幼科金针》：“小儿三焦风热，乘于肌表，风动火生，风火相搏，自发寒热，遍身如丹，似痧非痧，斑如雪片，上有风粟，发之多痒，烦渴焦躁者，蚂蚁丹也，以化斑解毒汤主之。”

品产 即一次生三婴。

品胎 见《医宗金鉴·妇科心法要诀》。即一孕三胎。

咽白喉 病证名。白喉假膜位于咽部者，初起常在一侧扁桃体，继而迅速扩展到咽峡部和悬雍垂。常兼有发热，神疲乏力，食欲减退，全身不适和轻度咽痛等症。治法详白喉条。亦可用抗白喉合剂。

响惊 病证名。惊风之一。清·许宣治《许氏幼科七种》谓小惊风发搐“发热目窜，忽然抽掣啼叫者，俗名响惊。”治宜清痰热，平肝风。用《怡堂散记》方：连翘、赤芍药、炒山栀、天麻、钩藤勾、桔红、半夏、代赭石、茯苓、甘草。

咳喘 病证名。指咳嗽不畅伴有呼吸急促困难的证候。由于肺气虚弱，内有顽痰宿饮，一旦外邪侵袭引起痰邪交阻，肺失宣降所致。证有寒热之分。咳喘寒证治以辛温散邪，化痰平喘为主，可选用华盖散、小青龙汤；咳喘热证，治以辛凉开肺，平喘化痰为主，可选用五虎汤，或定喘汤加减。脾是生痰之源，肺为贮痰之器，如果脾失健运聚湿

成痰，湿痰上泛，阻碍呼吸，因而形成咳嗽，治宜健脾豁痰，用六君子汤，异功散加减。肺主出气，肾主纳气，肾不纳气，往往咳嗽痰泛，动则喘甚，治宜补肾纳气，用都气丸加减。

咳嗽发搐 证名。指咳嗽兼见抽搐症状者。《幼幼发挥》：“咳嗽发搐，视其病之新久，如初咳嗽时，痰盛气促，连声不止，而不能治，发搐者，宜葶苈丸，苏叶煎汤下，利去其痰，咳止搐亦止矣……如发搐后变嗽者，此风邪入肺也，宜人参荆芥散”。若风温咳嗽，发热而搐者，宜用桑菊饮加蝉蜕、僵蚕，宣肺熄风；若病久津伤，咳嗽气急而搐者，宜清燥救肺汤加竹沥、竹茹，钩藤之类，以柔润熄风。

骨热 病证名。骨蒸的前驱症状。《普济方》卷三百八十四：“阳气偏盛，水不足，脏腑积热，熏灼肌体，盛则消烁骨髓，是为骨热之病，久不已，变成骨蒸。”症见低热长期不退，或潮热，或发热不规则，烦渴，盗汗等。治宜清热养阴，用胡黄连散。

骨热疳癆 病证名。出《颅囟经》。指小儿疳疾日久，肌肉消瘦，两脚纤细，无力行走，而伴有潮热的证候。乃疳热伤阴，骨髓被灼所致。治宜清热消疳。用青蒿鳖甲汤。

骨疳 出《小儿药证直诀》。即肾疳。见该条。

骨蒸肌瘦 病证名。见《普济方》卷三百八十四。小儿骨热，肌肉消瘦。为病后余热化火熏灼肌体，消灼骨髓所致。治详骨热、骨蒸热条。

骨蒸夜热不孕 病证名。出《傅青主女科》。不孕症型之一。病因肾阴不足，阴虚火旺，热伏冲任胞宫而致不能摄精受孕，伴有骨蒸夜热盗汗，颧红唇赤，腰痠腿软等症。治宜滋补肾阴，清其骨热。方用拯阴理癆汤（人参、五味子、麦冬、当归、白芍、生地、丹皮、薏苡仁、莲子、橘红、炙甘草），

或清骨滋肾汤（地骨皮、丹皮、沙参、麦冬、人参、五味子、白术、石斛）。

骨蒸孩劳 见清·叶天士《幼科要略》。即疳癆。详该条。

骨蒸热 病证名。见《证治准绳·幼科》。小儿乳食失宜，积滞不化，迁延失治，蕴积成热，或大病之后，余毒未清，消耗阴液，阴液耗伤，虚火亢盛，骨受其灼，则为骨蒸。症见身体消瘦，潮热遇晚而发，盗汗心烦，或腹内有癥块，有时微痛。治以滋阴清热为主，用青蒿鳖甲汤。腹内有癥块者，宜以消瘀化癥，理脾导滞为治。

骨缩病 病证名。指骨筋缩短的证候。《扁鹊心书》：“由于肾气虚惫。肾主骨，肾水既涸，则诸骨皆枯，渐至缩短。”治宜养阴滋肾，填精益髓。用补肾地黄丸加紫河车。

〔 〕

看产人 出《诸病源候论》卷四十三。古代对接生员的称呼。

选饭 见宋若昂《胎产珍庆集》。即恶阻。详该条。

种子 见明·万全《妇人秘科·种子章》。又名种玉。指受孕。

种玉 出《广嗣纪要》。即种子。详该条。

钟鸣 出清·施雯《盘珠集胎产证治》。即子啼。详该条。

秋日泄痢 病证名。出《济生拔粹·田氏保婴集》。秋初之际，湿热伤及脾胃，致运化失常，发生泻泄；湿热下注，蕴积肠道，腹痛即泄，或里急后重，便脓血者，则成痢疾。如症见泄泻灼肛气秽，粪色黄褐，心烦口渴，小便短赤者，为湿热郁滞，治宜清热利湿，用葛根芩连汤加银花、木通，以分消湿热；如痢下赤白粘液，便带脓血者，用香连丸以调气清热。泄痢久而不愈者，治法参见久泻滑肠、久痢条。

重下痢 病证名。指以里急后重为突出的痢疾。《诸病源候论》卷十七“重下利者，此是赤白滞下利，而挟热多者，热结肛门，利不时下而久堰气，谓之重下利也”。治宜清热活血。用芍药汤加减。

重舌 病证名。出《灵枢·终始》。又名子舌、子舌胀、齙舌。《诸病源候论》卷四十八：“心脾有热，热气随脉冲于舌本，血脉胀起变生，如舌之状。在于舌本之下，谓之重舌。”即舌系带两旁的舌下腺肥大，俨如双重舌头，但较正常短小。小儿初生六七日后可以见到，一般不属病态。如果局部红肿，妨碍吮乳，或痛而啼哭，甚至溃烂，多属心脾积热上熏所致。局部红肿者，宜用消毒针，刺破放血，外用蒲黄末敷，或用黄柏，黄连液点之；局部溃烂者，用锡类散外吹。内服清心泻脾之剂，如清胃散、黄连解毒汤、犀角地黄汤等。

重身 出《素问·奇病论》。即妊娠。详该条。

重龈 病证名。见《千金要方》卷五。小儿初生牙龈红肿，状如两龈重叠。多由于口腔不洁，感染秽毒，加以素体肠胃有热，故循经上熏牙龈所致。症见牙龈红肿，经常啼哭，不能吮乳，面赤唇红，口涎外流，舌苔黄干，指纹紫滞。治宜清热解毒。内服清胃散，外用消毒三棱针将患处刺破，排出恶液，用生理盐水洗净后，外搽冰硼散以解毒防腐。

重舌 病证名。出《千金要方》卷五。指小儿上颌肿起如痛，舌难伸缩，口开难合，不能吮乳，甚至阻塞喉部，不能啼哭等。多因口中不洁或胎中受热，热蓄于胃，熏发于口腔所致。可用三棱针将其刺破，拭去汁液或恶血；再用淡盐汤拭口，外用三黄散清热解毒，内服清胃散以清胃泻热。

便毒 病名。①指肛门前后生疮。见《医学纲目》卷十九。②指两侧腹股沟及阴部肿痛的病症。见《妇人良方大全》卷二十

四。本病又名疝疮。参见妇人疝疮条。

便痢 出《妇人良方大全》卷二十四。详妇人疝疮条。

信门 前囟的别称。出《奇效良方》。婴幼儿气血虚弱者，则囟门虚软而不实。

信水 见《血证论》。即月经。详该条。

信期 见《叶氏女科证治》卷一。指经期。

钩虫病 病证名。又名黄胖病、黄胖、黄肿、食劳疸黄。由小儿赤脚或坐地，皮肤触及钩虫丝状蚴后，进入体中引起。成虫寄生在小肠内吸血，以面黄浮肿，全身无力等气血虚弱脾虚湿困为主证。治疗以驱虫为主，配合调理脾胃。驱虫可选用贯众，榧子，苦楝根皮，土荆芥，槟榔等；调理脾胃用香砂六君子汤加减；气血虚弱者，用十全大补丸。并可用《串雅内编》加味绿矾丸。

食闭 闷痞之一。系饮食不节，食积内停，以致疹难透出的证候。其症面色微黄，四肢倦怠，吞酸噎腐，身热口燥，胸膈痞闷，甚至肚腹坚实，昏睡气急，大便不通。治宜消食透疹，用宣毒发表汤去甘草，加山楂、麦芽以消其食；莱菔子、大黄以通其闭。

食劳疸黄 出《世医得效方》。即钩虫病。详该条。

食积 病证名。出《平治会萃》。食物停滞不能消化的证候。又名宿食不消、乳食不调。小儿脾胃嫩弱，乳食失调，致伤脾胃，食积滞于内，六淫病邪侵于外而致。症见腹胀，腹痛，呕吐，腹泻，食欲减退等。治宜消食导滞，调理脾胃为主；肝气盛者，宜平肝。消食可选用平胃散，保和丸之类；如食积既去而热不退，或作呕吐，食少者，用异功散；胁胀少食，善怒便膏，用六君子汤加升麻，柴胡。食少体倦便黄，用补中益气汤；手足冷加炮姜，木香；体瘦潮热口干，大便不调，用肥儿丸。参积滞条。

食积吐 病证名。出元·朱震亨《幼科

全书》。指因食积阻滞肠胃而引起的呕吐。主要症状为腹痛，呕吐，大便不通及肛门不排气等。针刺足三里，内庭；并配合中药利气导滞之剂。

食积成块 病证名。指食积凝结肠胃，腹部触及块状物者。明·周礼《医圣阶梯》：“食积凝结成块，留滞肠胃者，虽泄泻而不能出。”症见腹痛拒按，口臭，口舌干燥。治宜通腑去积，用大承气汤加减。

食积咳嗽 病证名。又名积嗽。《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》：“积嗽者，因小儿食积生痰，热气熏蒸肺气，气促痰壅，频频咳嗽”。热重痰稠，面赤心烦者，治宜泄热利痰，用葶苈丸（《小儿药证直诀》：甜葶苈、黑牵牛、汉防己、杏仁）；兼见便溏者，治宜消导豁痰，用曲麦二陈汤；兼见便秘者，治宜攻下痰实，用苏葶滚痰丸。

食积盗汗 病证名。因食积而引起的盗汗。多由虚热内盛，逼汗外出而成。《幼幼集成》谓小儿“睡中遍身有汗，觉来久不干者，此食积盗汗，脾冷所致。”治宜健脾敛汗。亦有食积郁久，化热伤阴而盗汗者，治宜健脾消积，养阴止汗之剂。

食积寒热 指食积而兼寒热的证候。《证治准绳·幼科》：“小儿食积者，因脾胃虚寒，乳食不化，久而成积。其证至夜发热，天明复凉，腹痛膨胀，呕吐吞酸，脚冷肚热，喜睡神昏，大便酸臭是也。有前证而兼寒热者，名曰食积寒热。若食在胃之上口者吐之，胃之下口者消之，腹痛痞胀，按之益痛者下之，下后仍痛，按之则止者补之，夹食伤寒者先散之，用参苏饮。热甚便秘者先利之，用大柴胡汤。如无外感，但只伤食不至于甚，保和丸调之。”

食疳 出《婴童百问》。即脾疳。见该条。

食痼 病证名。饮食伤脾而引起的病证。《太平圣惠方》第八十五卷：“小儿食痼者，由脏腑壅滞，内有积热，因其哺乳过度，停

滞中脘，脾胃不能运化，一时痰热上壅，内乱神明，外闭经络，则成食痼。”《证治准绳·幼科》：“食痼，其病在脾，脾纳食，验其证，噎吐馊气即发搐，此病或大便酸臭。”治以通降治搐为主。用礞石滚痰丸。

食痛 病证名。见《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》。指饮食不当，积滞不化所致的腹痛。小儿脏腑娇嫩，脾胃功能不强。若乳食不节，饱食过度，摄入不易消化的食物，以致损伤脾胃，乳食壅滞，酿成湿热，热结肠胃而脏气不通，故作腹痛。症见腹部胀满疼痛，按之痛甚，不思饮食，暖气酸臭。先宜疏导积滞，用小承气汤；若大便通利后，宜消食理气，用保和丸。

食滞 病证名。小儿乳食不知节制，致使脾胃不能运化，滞留肠胃，即成食滞。症见暖气作饱，呕吐酸馊残渣，食欲减退，腹满而热或拒按作痛，大便闭结，矢气甚臭，伴有低热口渴等。《张氏医通》：“食滞心下，初起不可骤用苦寒，必兼辛散。二陈、平胃消之；或加枳实、白术、青皮、陈皮山楂、麴蘖之类，以食得寒则凝，得热则腐也”。参见积滞条。

食癖 病证名。癖疾之一。见《普济方》卷三百九十一。指食滞不化，积聚成癖，潜匿于右胁间者。其癖按之若无物，有时而痛，如觉有物，外症寒热如疟，多惊叫。宜以消食化癖为治。参见乳癖条。

蚀疮 病名。赵贞观《绛雪丹书》：“凡妇人阴户中生虫生疮，名曰蚀疮”。详阴蚀条。

盆肠生 即盘肠生。详该条。

盆腔炎 病名。系指子宫、输卵管、卵巢、子宫旁组织及盆腔腹膜等部位炎症的总称。以输卵管炎较为多见。根据发病过程及临床表现有急、慢性之分。主要症状有发热，恶寒，少腹疼痛，带下多，月经不调等。这些证候分别归属于带下、痛经、月经不调、不孕症、癥瘕、产后发热、热入血室等范围。急

性期以发热、恶寒为主，兼有小腹疼痛，带下，苔黄脉数等症，宜清热利湿，化瘀解毒，用大黄牡丹皮汤加减；若属热入血室，寒热往来，心烦喜呕等症，宜和解少阳，用小柴胡汤加减。慢性炎症以带下为主症者，如湿从寒化，可用完带汤加减。湿从热化，用龙胆泻肝汤加减。以痛经或瘀血为主症者，当以活血止痛，化瘀散结，用桂枝茯苓丸加减；亦可用千年健、追地风、川断、归尾、防风、乳香、没药、红花、血竭、透骨草、五加皮作腹部熨药法（上药为粗末，装纱布袋内蒸三十分钟，乘热敷下腹部，一日一次），或用红藤汤（红藤、败酱草、桃仁、赤芍、蒲公英）作煎剂保留灌肠。其他结合临床症状辨证治疗。

胚 指妊娠之始称。《千金翼方》卷十一：“凡儿在胎，一月胚，二月胎，……”。

胆水 病证名。小儿浮肿一种类型。因胆有病而引起的水肿。由胆气郁结，水湿内停，化而为热，湿热相蒸而成。临床特征为浮肿，口苦咽干。治宜利胆消肿。用小柴胡汤合五皮饮。

胆惊 脏腑惊证之一。出《小儿病源方论》。详脏腑惊证条。

胞不正 病证名。见金梦石《产家要诀》。指孕妇因气滞，或临产惊恐，影响胞胎转运，致胎位不正。宜舒气导滞。用紫苏饮（当归、川芎、白芍、紫苏梗叶、陈皮、大腹皮、甘草），虚加人参。并可灸至阴穴。

胞衣 又名胎衣、混元母、混元衣、混沌衣、紫河车、水衣、子衣、儿衣。即胎盘和胎膜的总称。

胞衣不出 见《诸病源候论》卷四十三。即胞衣不下。详该条。

胞衣不下 病证名。出《经效产宝》。又名胞衣不出、息胞、息胎、胎衣不出、胎衣不下、儿衣不出、胞胀不下。指胎儿娩出后，胎盘迟迟不下。多因分娩后元气大虚，无力继续排出，败血流入胞中，作胀不下，

或感邪而气血凝滞所致。气虚者治宜大补气血，方用人参养营汤；若气血凝滞或作胀不下者，治宜养血逐瘀，方用生化汤合益母膏。同时可结合针灸合谷、三阴交等穴或手术处理。

胞衣先破难产 病证名。指胞衣早破，引起的胎涩难产。《临产须知》：“胞衣先破，其故有二：一因母弱气血虚，胞衣薄，儿身转动，随触而破。一因儿身未转，坐草早，用力狠，以致胞破久，血水干，产路涩，儿难下。急用加味芎归汤加熟蜜一两，助气而兼润滑，自当顺下，甚者用加味八珍汤（八珍汤加丹参，益母草）。”

胞转 出《诸病源候论》卷四十。即妊娠小便不通。详该条。

胞系 ①见《诸病源候论》卷四十三。指脐带。②指膀胱。

胞系了戾 病证名。出《金匱要略·妇人杂病脉证并治》。指妊娠末期，胎气压迫膀胱，以致小便不通。

胞冷无子 见《妇科玉尺》卷一。即胞寒不孕。详该条。

胞阻 出《金匱要略·妇人妊娠病脉证并治》。即妊娠腹痛。详该条。

胞胀不下 病证名。黄兴德《胎产集要》：“胞胀不下，因败血流入胞中，即胀大”。治法参见胞衣不下条。

胞肥难产 病证名。指由于胎体过大，以致难产。《济生方》：“胞肥难产者何？身居富贵，口厌甘肥，聚乐不常，食物无度，既饱便卧致令胞胎肥厚，根蒂坚固，行动气急……致于临产，必是难生。入月可服无忧散（当归、川芎、白芍、木香、甘草、枳壳、乳香、血余）则易生矣”。

胞络 出《素问·奇病论》。是分布在胞宫上的络脉，也有称胞脉。

胞脉 指分布在胞宫上的经脉。出《素问·评热病论》。其中包括冲、任二脉联属胞宫的部分，以维系并营养胞宫完成月经生

理及孕育功能。

胞宫 见《圣济总录》卷一百五十一。亦名子宫、子脏、子处、女子胞、胞脏、血脏。是妇女排出月经和孕育胎儿的器官，属奇恒之府。位于带脉之下，小腹之中，前有膀胱，后有直肠，下口连接阴道，在脏腑与天癸、冲、任、督、带共同作用之下，完成其生理功能。

胞脏 出《诸病源候论》卷四十二。即胞宫。详该条。

胞浆 见王之翰《妇科胎产百病》。即孤浆。详该条。

胞寒不孕 病证名。又名宫冷不孕、胞冷无子、子脏冷无子、下部冰冷不孕。病因肾阳不足，寒自内生，胞宫失于温煦；或经期调摄不慎，风寒客于胞中，以致胞宫寒冷，难以摄精而致不孕。多伴有小腹寒冷，形寒肢冷，经行后期等症。因肾阳不足者，兼见腰痠腿软，小便清长，治宜温阳补肾，方用桂附八味丸或温胞饮（白术、巴戟肉、人参、山药、芡实、杜仲、兔丝子、附子、肉桂、补骨脂）；因风寒内客者，兼见小腹胀痛拒按，治宜温经助阳，煖宫祛寒，方用艾附煖宫丸。

胞漏 出《脉经》。即胎漏。详该条。

脉 ①见明·万全《广嗣纪要·择配篇》。五不女之一。指月经不调，或全无月经，以致终身不孕者。②脉象的简称。《素问·脉要精微论》：“脉者，血之府也”。

胎 通常指已孕育成形至出生前的胎儿。《文中子·九守》：“四月而胎。”

胎上逼心 见《女科辑要》。即子悬。详该条。

胎元 ①胎的别称。②指母体中培育胎儿生长发育的元气。如胎元不足，可致早产、小产等症。③指胎盘。《证治准绳·胎元散方》：“用胎元一具，焙干为末，加麝香小许，治痘疮气血俱虚不起发。”

胎不长 出《妇人良方大全》卷十三。

又名胎不长养、荫胎、卧胎。多因漏红伤胎，漏红虽止，但胎儿发育受阻；或孕妇素体虚弱，或有宿疾，脾胃不和，气血不足，胎失滋养，以致孕至五、六个月，腹形明显小于妊娠月份。宜补益气血。用八珍汤，十全大补汤。若脾胃虚弱者，用六君子汤、补中益气汤。本病应与胎死不下鉴别。

胎不长养 出《张氏医通》卷十。即胎不长。详该条。

胎中病 即胎疾。详该条。

胎气 ①指妊娠期间，养胎之气，通称为胎气，是胎儿在母体内所受的精气（《千金要方》）。②《妇人良方大全》卷十五：“治妊娠面目浮虚，四肢肿如水气，名曰胎气”。③宋·薛轩《坤元是宝》：“胎前痢疾，产后即止者，名曰胎气”。④明·赵献可《邯郸遗稿》：“妊娠腹痛者，名痛胎，俗名胎气”。

⑤**胎气上逆** 病证名。因肾阴虚损，肝气偏盛，胎气上逆，上冲心胸。症见烦躁不安，甚则胁痛，喘急。参见于悬条。

胎气攻心 病证名。见《叶氏女科证治》。亦名孩儿攻心。病因孕后过食辛辣，热毒之物，热积胎中，以致胎儿不安，手足乱动，上冲于心。症见母多烦躁痛苦，两胁疼痛。宜清胃热，佐以安胎。用调中和气散（大黄、石膏、槟榔、枳壳、黄芩、知母、黄连、黄柏、柴胡）。

胎气喘息 病证名。见《叶氏女科证治》。病因孕后过食生冷，兼有风寒客于肺胃，以致肺气失宣，气机不畅。症见痰喘气急，夜卧不安。宜散寒宣肺，平喘安胎。用紫苏安胎饮（紫苏、枳实、大腹皮、桔梗、贝母、知母、当归、桑白皮、甘草、五味子、石膏）。参见妊娠喘条。

胎气蕴热 病证名。出《普济方》卷三百六十一。指婴儿烦热，食即呕吐，眠不安席，神情躁扰，闻声即惊的证候。古人认为是由于儿在胎中，孕母多忧怒郁闷之情，又因胎

气燥热，儿生艰难，母生惊悸，以致乳汁不和，令儿吮之而作。宜以调气解蕴为治。

胎风 病证名。婴儿禀赋不足，感受风寒而引起的抽掣。《圣济总录》卷一百七十二：“子在胞胎，禀受不足，肝心经虚。其及始生，乳养无法，触冒外风，或因断脐，疮痂未敛，风邪一入，则令脏腑虚弱，经络不通，蕴结为热，盖风善行而数变，入营卫气血间，则令儿壮热吐吮，精神不宁，睡卧惊悸，手足抽掣，故名胎风。”治宜熄风镇痉。用羚角钩藤汤加减。一说小儿初生，身皮如汤泼火伤者，为胎风（《保婴撮要》）。

胎水 ①指羊水，即养胎之水。②指胎水肿满。《三因极一病证方论》：“妊娠亦有身肿满，心腹急胀者，名曰胎水”。

胎水不利 病证名。单南山《胎产指南》：“孕妇胸腹满胀便秘，遍身浮肿，名曰胎水不利，宜服鲤鱼汤”。参见胎水肿满条。

胎水肿满 病名。出《妇人良方大全》卷十五。亦名胎水、胎间水气。指妇女妊娠五、六个月后，因脾气虚弱，运化失常，胞中蓄水，泛滥周身，以致遍身肿满，腹大异常，胸膈满闷，甚则喘不得卧的病证。相当于羊水过多症。宜健脾行水。用茯苓导水汤。腹大异常者，用千金鲤鱼汤（鲤鱼、白术、生姜、芍药、当归、茯苓）。此症宜早治，因胎水过多，胎儿可能发生手足短，形体残疾等畸型，或子死腹中。

胎甲 宋时称妊娠为胎甲。

胎生青记 婴儿出生时，往往在骶骨部、臀部、四肢或头部，出现大小不等、形态不规则的青色斑块，俗名青记，或胎记。可于儿童期渐渐消失于无形，但亦有终身遗留者，不需治疗。

胎记 即胎生青记。详该条。

胎动下血 病证名。见王伯龙《养儿宝》。指孕妇有腹痛，胎动感，兼见阴道出

血。初起症状较轻，后逐渐加重，如流血量多，可致流产。参见胎动不安、胎漏、先兆流产等条。

胎动不安 病证名。出《诸病源候论》卷四十一。指妊娠期不时胎动下坠，腰痠腹痛，或兼见阴道少量流血。多由气虚、血虚、肾虚、血热、外伤等因，致使冲任不固，不能摄血养胎所致。气虚者，兼见精神萎靡，少气懒言。宜补气安胎。用举元煎（人参、黄芪、炙甘草、升麻、白术）加阿胶；血虚者，兼见面色淡黄、神疲乏力。宜补血安胎，用胎元饮（人参、当归、杜仲、芍药、熟地、白术、陈皮、炙甘草）；肾虚者，兼见头晕耳鸣，两腿痠软，尿频，宜固肾安胎，用寿胎丸（菟丝子、桑寄生、续断、阿胶）；血热者，兼见口干咽燥，心烦不安，宜清热凉血安胎，用保阴煎（生地、熟地、芍药、山药、续断、黄芩、甘草）；外伤者，于外伤后突然胎动下坠，腰痠小腹胀痛，宜补气养血安胎，用胶艾四物汤加减。

胎死不下 即死胎不下。详该条。

胎死腹中 见《千金要方》卷二。即子死腹中。详该条。

胎自堕 病证名。见《丹溪心法》。多因孕妇气血虚损，胎失滋养；或血热燔灼，胎有所伤；或肾虚胎失所系，冲任不固，不能摄血养胎，以致其胎自堕。参见先兆流产、胎动不安条。

胎衣 见《妇人良方大全》卷十七。即胞衣。详该条。

胎衣不下 见《卫生家宝产科备要》。即胞衣不下。详该条。

胎衣不出 见《经效产宝》。即胞衣不下。详该条。

胎赤 见《证治准绳·幼科》。初生儿头面肢体皮肤发赤，多因胎中感受热毒所致。治宜清热和血用清热解毒汤。如小儿出生之初，由于皮肤娇嫩，骤与外界接触，出现鲜红色斑者，数天后可自行消退，不必药

治。

胎赤风眼 病证名。出《本草纲目》。指新生儿感受风热毒邪，引起白睛充血发红的症状。治详眼胎赤条。

胎赤眼 出《太平圣惠方》卷八十九。即眼胎赤。见该条。

胎呆 指胎儿在母体无力挣动，非胎真死。《保产万全经》：“胎呆乃无力挣动，非真死也。盖小儿端坐腹中，临盆时头转向下，脚转向上，以便奔生，若遇腰曲，则腹中窄狭，门路遮闭，而关津为之阻碍矣，及再寻门路，又为腰曲相阻，因而力乏，不能动挣，有似胎呆者，皆因曲腰之为害也，只补产母元气，安心进食，仰卧养神，胎气渐复，自然运动而生”。

胎间水气 出《诸病源候论》卷四十一。即胎水肿满。详该条。

胎证 出明·薛铠《保婴撮要》。即胎热、胎寒、胎黄、胎肥的总称。详各条。

胎妒 古魇病的病因学名称。《幼幼集成》：“孕在胎中，因儿饮乳，……而致儿病，故谓之胎妒。”其义与魇乳同。参继病条。

胎肿 郑玉峰《济阴要旨》：“女人胎肿，乃有孕而手足或头面，通身浮肿是也”。参见子肿、子满、胎水肿满条。

胎肥 病证名。出《小儿药证直诀》。小儿生下遍身肌厚，肉色通红，满月以后，渐渐消瘦，白睛粉红色，五心热，大便难，时时吐涎。多由在胎时，母食甘肥，湿热太过，深入胞中，以致形质虚肥。治宜清泄湿热。用大连翘饮加减。

胎疰 出明·赵献可《邯郸遗稿》。即妊娠疰。详该条。

胎疝 病名。①指先天禀赋不足，使儿生下，即少腹下部结硬疼痛（见《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》）。宜以行气止痛为治，用五磨饮子、金铃子散之类。②指即睾丸肿大，久而不愈者。

胎怯 病证名。出《小儿药证直诀》。又名胎瘦、胎弱。①为小儿胎禀不足，气血虚弱的泛称。症见生后皮肤脆薄，毛发不生，形寒肢冷，面无血色，肌肉消瘦，筋骨不利，腰膝痿软等。治宜补益气血，滋养肝肾。用十全大补汤、六味地黄汤之类。②指五软证（《古今医统》）。

胎实不安 病证名。指因邪气盛实所致的胎动不安。《叶氏女科证治》卷二：“胎实而不安者，惟其素本不虚，而或多郁滞者有之，治宜开之导之，若呕吐不止者，参橘汤（人参、陈皮、麦冬、白术、厚朴、茯苓、炙甘草、淡竹叶、姜），停痰加枳壳、半夏；食滞胀满者，小和中饮（陈皮、茯苓、厚朴、山楂、扁豆、甘草、姜）；呕吐加半夏，胀加砂仁；肝气滞逆胀满者，解肝煎（陈皮、半夏、厚朴、茯苓、苏叶、白芍、砂仁、姜）；怒动肝火者，化肝煎（青皮、陈皮、白芍、丹皮、栀子、泽泻、贝母）；脾肺气滞上攻作痛者，紫苏饮（大腹皮、川芎、白芍、陈皮、苏叶、当归、人参、甘草、姜、葱白）；气滞兼痰者，四七汤（半夏、茯苓、苏叶、厚朴、姜）；气滞兼火者，枳壳汤（枳壳、黄芩、白术）气滞加陈皮、茯苓。

胎毒 ①婴儿在胎妊期间受自母体毒火，因而出生后发生疮疹诸病的病因。胎毒的由来，指其父母恣食肥甘，或多郁怒，或纵淫欲，或患恶疾（如梅毒），其毒火蕴藏于精血之中。明·万全《片玉心书》：“男女交媾，精血凝结，毒亦附焉，此胎毒之原也。”《幼幼集成》：“凡胎毒之发，如虫疥流丹，湿疮痈疖结核，重舌木舌，鹅口口疮，与夫胎热、胎寒、胎搐、胎黄是也。”②指遗毒。见《外科启玄》。即先天性梅毒。

胎毒疮疥 病证名。出《证治准绳·幼科》。又名风疮。古人认为因胎毒而生疮疥，系胎热外达而生，其症初如干癣，后则脓水淋漓，或结靨成片，治法参见胎毒疮疡条。

胎毒疮疡 病证名。见《证治准绳·幼科》。指小儿疮疡之由胎毒形成者。古人认为系因孕母恣食辛、热、煎、炒，或七情内火妄动，热毒传于胎中，致儿生后发为疮疡肿毒。治宜清热解毒。用五味消毒饮，仙人活命饮之类。

胎毒瘰癧 病证名。见《证治准绳·幼科》。指小儿瘰癧之由胎毒引起者。妊母素多恼怒，或气郁化火，或肝脾血虚有热，致儿稟受肝胆二经之热，生下后，于肝胆二经循行部位的耳前颈项间生核累累如珠。如发寒热者，先用小柴胡汤加当归，芍药以解之；继用丹栀逍遥散合消瘰丸。

胎垢 见清·鲍相璈《验方新编》卷五。即鳞体。见该条。

胎脉 见《坤元是保》。即妊娠脉。详该条。

胎急 病名。古人对胎前发生神志方面急症的称呼。郑玉峰《郑氏女科真传》：“妊娠怔忡惊悸多睡，腹满连脐急疼，坐卧不安，胎气既成，安养五脏则可。或为喧呼心惊悸乱，皆因气厥，致令胎惊而有此症，兼筋骨伤痛，四肢不安，宜服大圣散（木香、茯苓、川芎、麦冬、黄芪、甘草、当归、姜）安胎保孕”。

胎养 见明·万全《婴儿家秘》。即养胎。详该条。

胎逆 病名。出明·岳甫嘉《妙一斋医学正印·种子篇》。①指胎气上逆。②指孕后火动胎元而喘。

胎前 指受孕后至分娩前的整个怀孕时期。

胎前十字真言 出清·袁于江《生生宝录》。古人对孕妇提出应注意的事项。即一节“嗜欲”，二节“劳逸”，三慎“起居”，四节“饮食”，五节“见闻”。称为胎前十字真言。

胎前手足麻木 病证名。明·赵献可《邯郸遗稿》：“胎前手足麻木，此属血少，宜养血安胎，以八珍汤为主”。

胎前气急不得卧 病证名。《女科秘

要》卷二：“此乃过食生冷，兼有风寒中胃肺经，因而生痰气急”。宜紫苏安胎散（紫苏、枳实、桔梗、大腹皮、贝母、知母、当归、五味子、甘草、石膏、桑白皮）。

胎前节养六条 出清·唐桐园《大生要旨》。指妊娠期应注意的六个方面。一除恼怒，二禁房劳，三戒生冷，四慎寒温，五服药饵，六宜静养。

胎前白带 见《女科秘要》卷二。即妊娠白带。详该条。

胎前用药三禁 古人对胎前用药提出的禁忌。指不可过于发汗、攻下、利小便，将此列为三禁，以免损伤胃气及胎元。因过汗亡阳伤气，过下亡阴伤血，过利小便损伤津液。临症时应根据病情灵活掌握。

胎前头风痛 病证名。指妊娠后头痛时痛时止，常突然触发。多因痰涎风火郁遏经络，气血壅滞所致。《肖山竹林女科秘方》：

“妇人胎前头风痛，不可服药，恐伤其胎，宜用雄黄散（细辛、藁本、川芎、麝香、雄黄、川乌）吹入鼻内少许，其痛可止”。

胎前头痛 病证名。见《女科秘要》卷二。多因孕后阳气虚衰，感受风邪；或因血聚养胎，阴虚阳亢，及血虚等因而致头痛。感受风邪者，兼见发热，头痛连及项背，宜疏风止痛，用川芎茶调散；阴虚阳亢者，兼见头胀而热，烦躁易怒，甚则耳鸣，宜平肝潜阳，方用天麻钩藤饮；若无外感风邪，或阴虚阳亢而常苦头痛者，为血虚，其症多心烦不宁，面色不华，午后痛甚，治宜养血熄风止痛，用四物汤加蔓荆子、菊花、甘草。

胎前动红 病证名。指胎动不安，阴道流血。《女科秘要》卷二：“此因失跌动伤，恶血破来，如水流不止，急用胶艾汤，以止其血；再服安胎散（阿胶、人参、茯苓、当归、生地、川芎、甘草、小茴、八角茴）以护其胎。然此症孕妇形盛，而在三、五日内可治，若弱而久者难治”。

胎前阴门肿 病证名。见《女科秘要》

卷二。亦名妊娠阴肿。此症多发生在妊娠后半期，多因脾肾阳虚，温化健运失职，水湿下注，而致外阴浮肿。宜温阳健脾。用安胎顺血散（诃子，水煎温服）；外用地肤子、艾叶、防风、透骨草、荆芥、川椒、黄瓜皮，熏洗。参见子肿条。

胎前赤白痢 见明·赵献可《邯鄲遗稿》。即妊娠下痢。详该条。

胎前赤带 病证名。见《竹林女科秘方》。因素体阳盛，孕后过食辛辣，积热于内，以致带脉失约，任脉不固，发为带下色赤。宜清热凉血安胎。用侧柏叶、黄芩为丸，或用侧柏汤（侧柏叶、白术、丹皮、蒲黄、黄芩）。

胎前吞酸 病证名。见明·赵献可《邯鄲遗稿》。吞酸多因脾虚肝旺，伤于饮食，不得传化。有寒热之分：寒者，由脾胃不和，饮食太过，胃脘填塞，脾气不运而致，宜温养脾胃，用六君子汤加吴萸；热者，由于肝气郁滞，化热犯胃所致，宜泻肝清热，用左金丸。

胎前乳肿 见静光禅师考定《女科秘要》卷二。即妊娠乳肿。详该条。

胎前昏迷 病证名。此症多因素体虚弱，孕后血聚养胎，血不能上荣头目，以致头晕眼花，或忽然倒地。宜补益气血。用八珍汤、人参养荣汤；或结合针灸治疗。《女科秘要》卷二：“胎前昏迷，忽然倒地，乃血去养胎，母无精神，承儿不住，故眼花头晕”。

胎前怔忡 病证名。见《女科秘要》卷二。亦名胎前恍惚。病因平素气血虚弱，孕后愈虚，心血不足，心神失养，则常发生心神恍惚，惊悸怔忡，遍身烦热等。宜补益气血，养神安神为主。若惊悸不安，夜卧不宁者，宜大圣散（川芎、黄芪、当归、木香、人参、甘草、茯苓、麦冬）；若血少神虚，心神不宁者，宜养荣汤（枣仁、远志、黄芪、柏子仁、当归、茯神、白芍、紫石英、

木香、甘草）；若心气虚，而神不安者，宜定志丸（人参、远志、蒲黄、茯苓）；若火盛者，宜安神丸（黄连、生地、当归、炙草、辰砂）。

胎前食泻 病证名。见明·赵献可《邯鄲遗稿》。指妊娠伤食作泻。多因孕后饮食不节，伤于脾胃，以致腹满嗳气，泻下酸臭。宜健脾消食导滞。用养胃汤加山楂、神曲、麦芽，或用保和丸。

胎前恍惚 见王之翰《女科胎产百病》。即胎前怔忡。详该条。

胎前损身 病症名。出凤林寺《女科秘宝》。指胎伤腹痛漏血，应按胎动不安治疗。如见面赤，口唇焦，指甲色黑者，为胎已死，可用兰石散下之（滑石粉适量，蜜半盅，麻油半盅，开水调服）。

胎前诸症 出《医宗金鉴·妇科心法要诀》。指妊娠后出现各种疾病的总称。如恶阻、胞阻、子肿、子气、子满、跛脚、脆脚、子嗽、子烦、子悬、子疝、子淋、转胞、胎漏、胎动不安、小产、堕胎、惯堕胎、子瘕、孕悲、子死腹中、胎不长等。其它如兼患伤寒、伤食、疟疾、痢疾、霍乱、感冒、中恶、中暑、泄泻、妊娠疹、妊娠痘等。虽均为妊娠诸病，应随证治疗，兼注意护胎。

胎前脚气 病证名。清·吴梅菴《秘传内府经验女科》：“妊娠下元虚怯，寒气所淫，因寒从足起，故两脚胫肿痛，名曰脚气。宜鸡鸣散（苏叶、木瓜、广皮、吴萸、生姜、桔梗、槟榔）治之”。

胎前脚肿 病证名。见清·曾鼎《妇科指归》。孕后气血虚弱，下元不足，湿气渗于下，症见两足微肿不痛。宜顺气养血汤（党参、陈皮、当归、首乌、川芎、炒白芍、桑皮、乌药、阿胶、炙草）。

胎前脚痛 病证名。《女科秘要》卷二：“此下元气血虚弱，又兼风邪，宜行气行血，服乌药顺气散（麻黄、陈皮、乌药、僵蚕、川芎、枳壳、甘草、白芷、桔梗、干

姜)”。

胎前焦渴 见《竹林寺女科秘传》。即妊娠烦渴。详该条。

胎前寒泻 病证名。见明·赵献可《邯郸遗稿》。多因孕后脾肾阳虚，或外受风寒；或内伤饮食生冷，损伤脾肾，以致肾阳不能上蒸脾土，运化失职所致。脾肾阳虚者，症见脐下作痛，肠鸣即泻，腹胀畏寒肢冷。宜温阳健脾止泻，用四神丸，或理中汤；外感风寒者，症见泄泻清稀，腹痛肠鸣，或肢体酸痛，宜祛风散寒止痛，用胃苓汤；饮食生冷所伤者，症见腹痛泻下酸臭，腹胀痞满，宜消食导滞止泻，用保和丸，或养胃汤加山楂、神曲、麦芽。

胎前漏红 病证名。①指激经。《女科秘要》卷二：“有孕红来如行经，应期每月一至，此是漏也”。②泛指妊娠期间阴道流血，称为胎前漏红。参见胎动不安、胎前动红条。

胎前霍乱 出明·赵献可《邯郸遗稿》。即妊娠霍乱。详该条。

胎热 病证名。①出《小儿药证直诀》。指小儿在母胎时感热所致的症候。前人认为多由孕母恣食辛热炙燥之物，或患热病失于清解，使儿受之，生后目闭面赤，眼胞浮肿，烦啼不已，溺赤粪稠。治宜清热解毒。用大连翘饮或清胃散。②指临产两目失明。《叶氏女科证治》卷二：“妊娠将临月，两目失明，不见灯火，头痛眩晕，腮颌肿不能转侧，此肝经热毒上攻，由过食炙燥火酒辛辣等物，名曰胎热”。宜天冬饮（天冬、知母、茯苓、羌活、人参、防风、五味子、茺蔚子）。

胎热不安 病证名。见《叶氏女科证治》卷二。指孕妇因热而致胎动不安。多因素体阳盛，嗜食辛辣，感受热邪；或肝郁化热，复加孕后血聚养胎，阴虚阳盛，热扰冲任，出现或热、或烦、或渴、或燥、或漏血尿赤，以致胎动不安。宜养阴清热安胎。用

保阴煎。若小便赤热，或怒火动血者，加梔子；潮热加地骨皮；肺热多汗加麦门冬、枣仁；血热甚加黄连。

胎热伏心啼 病证名。出《普济方》卷三百六十一。指婴儿惊啼，面赤唇红的证候。由于妊母恣食辛酸，多味炙燥热气熏蒸，传入胎中，以致胎受其气，伏于心经，出生后因风邪暴伤而诱发。治宜清热宁心，用导赤散加黄连、蝉蜕。

胎哭 见瞻甫《慈航普渡》。即子啼。详该条。

胎倦 病名。见《郑氏女科秘传万金方》。指孕后倦怠，疲乏无力。多因孕后气血两亏，又因血聚养胎，母血益虚，以致四肢无力，遍身酸懒，羸瘦倦怠，不思饮食，精神短少，形容憔悴。宜补气养血。用八珍汤。

胎疸 病证名。指新生儿出现的黄疸。又名胎黄。《诸病源候论》卷四十六：“小儿在胎，其母气有热，熏蒸于胎至生下小儿，体皆黄，谓之胎疸也。”《幼科铁镜》：“胎黄，由妊母感受湿热，传于胞胎，故儿新生，面目通身皆黄如金色，壮热便秘，溺赤。”治宜清热化湿，用茵陈蒿汤加味。亦有少数小儿，先天元气不足，脾气虚弱，寒湿不化，面色暗黄无泽，肢冷便溏。治宜温脾化湿，用理中汤加茵陈蒿。

胎病 又名巅疾。即癫痫。《素问·奇病论》：“人生而有病巅疾者，病名曰何？……病名为胎病此得之在母腹中时，其病有所大惊，气上而不下，精气并居，故令子发为巅疾也。”

胎病风痰 病证名。出《普济方》卷三百五十九。指小儿晕卧，动则作呕，吐泡沫粘液，言语不利，或发癫痫等症。由于儿在胎中，孕母恣食油腻煎炒，影响脾肺功能，产生风痰所致。宜用清热凉膈、消风化痰之剂。

胎病作热 病证名。出《普济方》卷三

百五十九。指婴儿眼多眵泪，二便不利，或利而有血水，甚至手常拳紧，脚常搐缩，眼常斜视，身常掣跳的证候。治宜大连翘饮子以解散诸热；继予消风散以祛风解痉。

胎病结热 病证名。出《普济方》卷三百五十九。指婴儿里热内结，大便不通，冲心腹胀，甚至脐突的证候。治宜通腑泻结之剂，如三黄丸（《小儿药证直诀》：黄连、大黄、黄芩）。

胎病脏寒 病证名。出《普济方》卷三百五十九。指初生婴儿生后腹壁青脉暴露，时膨时减，按之虚软。呃呃作声，日夜不禁的证候。古人认为是由于儿在胎中，妊母恣食生冷过度，有时肠鸣，腹泻，儿受其气，因引起内脏虚寒而成。治宜温中散寒。用香砂六君子汤加减。

胎病惊热 病证名。出《普济方》卷三百五十九。指婴儿惊热内蓄，精神不爽，面色虚白，初则温温有热，其后颊赤多惊，物动则恐，声响即悸的证候。

胎病潮热 病证名。出《普济方》卷三百五十九。儿在胎中，孕母曾患疟疾，或为邪热所伤，儿受其气，生后出现潮热，热来之前，身体寒战，牙关紧急。治宜调其阴阳，阴阳自和，其热自退。

胎疾 又名胎证、胎中病。指婴儿满月以内有病者（元·朱震亨《幼科全书》）。也指小儿周岁以内有病者（《幼科发挥》）。多由胎禀不足，或儿母妊娠时调摄失宜以及胎毒等引起。文献所载胎寒、胎热、胎肥、胎弱、解颅、五软等，均属胎疾范围。

胎兼癥瘕 病证名。见《医宗金鉴·妇科心法要诀》。亦称妊娠积聚。指妇人素有癥瘕旧疾，现又怀胎，称为胎兼癥瘕。治宜软坚化癥，调和气血。宜用桂枝茯苓丸。

胎浆 即羊水。戴武承《女科指南集》：“养胎之水谓之胎浆”。

胎弱 出《小儿药证直诀》。即胎怯。详该条。

胎教 古人对孕期提出的有关摄养、起居等注意事项。以达到保证孕妇身体健康，预防胎儿发育不良，及防止坠胎、小产、难产等目的。如胎前节养六条：①除烦恼；②禁房劳；③戒生冷；④慎寒温；⑤服药饵；⑥宜静养。有关胎教的学说，古人还认为胎儿在母体中能够受孕妇的情绪和言行所感化，所以孕妇的言动必须谨守礼仪，心情保持恬静舒畅，给胎儿以良好的影响。《大戴礼记·保傅》：“古者胎教，王后腹之七月，而就宴室。”

胎黄 见《幼科全书》。即胎疸。详该条。

胎虚不安 病证名。见《叶氏女科证治》卷二。指孕妇素体虚弱，孕后气血不足，而致胎虚不安。宜补脾益气，养血安胎。以胎元饮为主。若心气虚者，症见烦躁，心悸失眠，用归脾汤；若肝肾阴虚者，症见急躁易怒，头痛眩晕耳鸣，腰膝疲软，宜调补肝肾，用左归饮，或固阴煎；若脾肾阳虚，症见腹胀，肠鸣泄泻，倦怠畏寒，带下清稀，肢冷，宜温阳健脾，养血安胎，用秘元煎，或菟丝煎；若气血俱虚者，宜补气养血，用八珍汤，或十全大补汤。

胎麻 出明·汪机《痘治理辨》。即奶麻。详该条。

胎惊夜啼 病证名。出《医学入门》。即夜啼之由于胎惊所致者。其症每于睡梦中惊醒，猝然肢体一弹而尖嚎作啼。夹寒则多见于下半夜，曲腰伏卧，眼目上视，手足抽掣；夹热多见于上半夜，仰身汗出，面赤身热。夹寒者益黄散；夹热者，凉惊丸。

胎落 病名。即小产。《经效产宝》：“妊娠伤寒，骨节疼痛，壮热，不急治，则胎落”。

胎喘 见明·赵献可《邯郸遗稿》。即妊娠喘。详该条。

胎痫 病证名。胎中受惊引起的一种痫证。元·曾世荣《活动心书》：“胎痫者，因未产前，腹中被惊……或母为七情所伤，致

伤胎气，儿生百日内是也。其症频频作搐，身热面青手足抽掣，牙关紧闭，腰直身僵，睛斜目闭，多啼不乳。宜先服断痢丸（方见寒痢条），后以六味地黄汤以滋其化源。”

胎痛 病证名。指妊娠腹痛。《资生集》引薛立斋：“妊娠腹中不时作痛，或小腹重坠，名胎痛，用内补丸”。

胎寒 病证名。①指小儿在母胎时感寒所致的症候。《诸病源候论》卷四十七：“小儿在胎时，其母将养，取冷过度，冷气入胞，伤儿肠胃，故儿生之后，冷气犹在胃肠之间。其状儿肠胃冷不能消乳哺，或腹胀，或时谷利（乳食不化样粪便），令儿颜色素肥，时啼者，是胎寒故也。”治疗以温中祛寒为主。用理中汤。②《叶氏女科证治》卷二：“妊娠不守禁忌，纵恣口腹，过食生冷瓜果，及当风取凉，以致胎冷不安，胸腹胀痛，肠中虚鸣，四肢拘急，泄泻欲绝，名曰胎寒。宜安胎和气饮（诃子、白术、陈皮、良姜、木香、白芍、炙草、陈米、姜）”。

胎寒不安 病证名。见《叶氏女科证治》卷二。指孕妇阳气素虚，阳虚内寒影响胎元，症见吞酸吐酸，或呕恶、胀满、泄泻，以致胎寒不安。宜温阳散寒，佐以安胎。用理阴煎（熟地、当归、炙草、干姜）为主。若脾肾两虚，或呕，或胀加茯苓；若泄泻不止去当归，加山药、扁豆、补骨脂；腰腹痛加杜仲、枸杞；腹胀滞痛加陈皮、砂仁；夹外感加柴胡。

胎寒胃冷啼 病证名。出《普济方》卷三百六十一。指婴儿面白唇青，时时啼叫的证候。由于母妊娠之时，寒温失理，取凉饮冷，冷气停滞，触入胞中，致婴儿出生之后，冷伏脾胃所致。治宜温中止痛。用理中汤。

胎渴 病名。见金梦石《产家要诀》。指妇女在炎夏怀孕，口渴欲饮之证。宜四物汤加黄芩、木通、陈皮。

胎蒸 病名。《女科秘旨》卷四：“面

肿色赤，口苦咽干，日晡寒热，日渐羸瘦，胎气不见升动，用银柴胡、胡黄连各一钱，煎服”。

胎瘦 出《幼科全书》。即胎怯。详该条。

胎瘤 病证名。出《外科正宗》。小儿初生，头上或胸乳间生瘤，漫肿不痛。由于胎中蕴热，更兼瘀血凝滞而成。须俟脓成熟透，方可用针刺破，放出脓汁，其肿即消。内服五福化毒丹（清·吴溶堂《保婴易知录》）。

胎嗽 出《幼科发挥》。即百晬内嗽。详该条。

胎癭 出《太平圣惠方》卷七十一。即脂癭。详该条。

胎漏 病证名。见《素问病机气宜保命集》。亦名漏胎、胞漏、漏胞、漱经。《医学入门》：“不痛而下血者为胎漏”。孕后因气血虚弱、肾虚、血热等以致冲任不固，不能摄血养胎。症见阴道不时下血，量少或按月来血点滴，并无腰痠腹痛及小腹下坠等。气虚者，兼见精神萎靡，少气懒言，宜补气安胎，用举元煎加阿胶；血虚者，兼见面色淡黄，神疲乏力，宜补血安胎，用胎元饮；肾虚者，兼见头晕耳鸣，尿频，宜固肾安胎，用寿胎丸；血热者，兼见口干咽燥，心烦不宁，宜清热凉血安胎，用保阴煎。

胎漏黄水 病证名。见《女科经纶》卷三。指妊娠后忽下黄汁如胶，或如豆汁，名为胎漏黄水。多因肝脾湿热，或风热，或因郁怒，脾胃气虚下陷所致。胎动不安者，宜黄芪、糯米，水煎服；肝脾湿热者，宜升阳除湿汤；肝脾风热者，宜加味逍遥散；肝脾郁结者，宜加味归脾汤；脾胃气虚者，宜七味白术散；脾虚下陷者，宜补中益气汤。

独肾 见《小儿卫生总微论方》。指单侧辜丸。小儿生下时，一侧辜丸未降入阴囊，为单侧隐辜。绝大多数可在周岁以内自然下降；如至两岁以上仍未下降，则下降的

机会很少。一般不影响日后的生育功能。

急疳 出《婴童百问》。即肾疳。见该条。

急惊风 病证名。惊风的一种证型。急惊风形成的因素很多，有因偶然受外界的各种强烈刺激引起；有因心肝火盛，外感风寒郁闭，不得宣泄所形成；也有由于饮食不节，脾胃停痰，郁而化热，以致痰热相蒸，窍道不通，发为抽搐。临床以发病急骤，且具有惊、风、痰、热四证为特征。明·丁凤《医方集宜》描述其典型症状及其形成机制为“急惊之症，其发猛恶，忽然牙关紧急，壮热涎潮，窞视反张，抽掣摇头，口中热气，颊赤唇红，纹青脉数，小便涩黄，盖因内有积热，外受风寒，心受热而积惊，肝生风而发搐，以致痰涎壅塞，口噤无知……”。故心肝蓄热，脾肺停痰，风热壅闭，窍道不通为本证的主要病机。急惊发作，须急用重掐手法，掐人中、印堂、合谷、涌泉，亦可针刺人中、合谷、内关。牙关紧闭加承浆、下关或中冲，以三棱针速刺出血。同时用嚏惊散（生半夏、皂角），吹鼻取嚏，并用开关散（蜈蚣、僵蚕、南星、麝香、皂角）调以姜汁，或乌梅擦牙开关。随即灌服苏合香丸或至宝丹，以助开窍醒神。再按惊、风、痰、热四证，以镇痉熄风，涤痰泄火为治，急则治标。但在痰火稍降，就应调其气血，否则每因过用寒凉，易成慢惊等证。临床上当抽搐缓解，则应用琥珀抱龙丸治之，以清热镇惊，并益气和中。若脾虚生痰者，则用清心涤痰汤（《医宗金鉴》：竹茹、橘皮、半夏、茯苓、枳实、甘草、麦冬、枣仁、人参、菖蒲、南星、黄连）。

急惊风类证 见《幼科发挥》。与急惊风相类似的证候。包括有天钩似痼，痉病似天钩，内钩似痼，盘肠似内钩，客忤似痼，中恶似痼，白虎证似痼，虫病似痼，马脾风似痼。详各条。

〔、〕

疫癘胞疮 出《诸病源候论》卷十。即痘疮。详该条。

疫毒痢 出《医学纲目》。即疫痢。详该条。

疫咳 即百日咳。详该条。

疫痢 病名。见宋·史堪《史载之指南方》。又名疫毒痢、时疫痢。小儿夏秋感受时行疫毒之气，侵犯肠胃所致的一种传染性较强、病情较重的痢疾。临床表现为发病急剧，壮热头痛，遍身疼痛，痢下脓血粘液，便次频繁；甚或昏迷抽搐。类似中毒性痢疾。治宜清肠解毒，凉血制痢。用葛根芩连汤加减。昏迷谵妄者，配清心开窍之剂，如安宫牛黄丸、紫雪丹、至宝丹之类；阳脱肢厥者，须回阳救逆，如参附汤之类。

疫痧 见清·曹心怡《喉痧正的》。即丹痧。详该条。

疫喉 见清·曹心怡《喉痧正的》。即丹痧。详该条。

疫喉宜表 疫喉痧治法之一。清·曹心怡《喉痧正的》：“温病之邪，郁之深而发之暴，不能自出于表，以至上窜咽喉，苟非洞开毛窍，何以泄其毒而杀其势；”又“此证重在发汗，使痧邪外达，则不致酿成危证；体虚者，尤宜急进……即使自有汗者，仍须汗之，一汗不畅则再汗。”临床上宜表，但仅用于疫喉痧毒未透的初期阶段。若痧已露者，则宜随其病机，辨证施治，不宜误用发表之药。详丹痧条。

疮痂 见清·翟良《痘科类编释意》。即痘痂。详该条。

疹疹热 病证名。见《小儿卫生总微论方》。由发疹性疾患而引起的发热。其症以面燥腮赤，目胞亦赤，呵欠烦闷，乍寒乍热，咳嗽喷嚏，手足指冷，耳鼻尖冷为其特征。宜分麻疹、飘疹、风疹、斑疹、天泡疮等辨证论治。

养胎 又名妊娠养胎、胎养。即妊娠期要注意饮食起居，以护养胎儿的方法。《诸病源候论》卷四十一：“妊娠之人，有宿挟痼疹，因而有娠，或有娠之时，节适乖理，致生疾病，并令脏腑衰损，气血虚羸，令胎不长，故须服药去其疾病，益其气血，以扶养胎也”。《格致余论》：“儿之在胎与母同体，得热则俱热，得寒则俱寒，病则俱病，安则俱安，母之饮食起居，尤当慎密。”慎密，即“节饮食，适寒暑，戒嗔怒，寡嗜欲。”（《幼幼集成》）以预防疾病，适当注意营养，如《千金要方》提到的“逐月养胎法”，避免某些对胎儿不利的食物和药物，并从事一定的轻体力劳动，这对胎儿的分娩有一定好处。如儿“在母腹中，其母作劳，气血动用，形得充实，……多易生产。”（《儒门事亲》）。宋·陈文中《小儿病源方论》卷一：“豪富之家，居于奥室，怀妊妇女，饥则辛酸咸辣，无不所食，饱则恣意坐卧，不劳力，不运动，所以腹中之日胎受软弱，儿生之后……少有坚实者也。”此外妊母饮食起居不慎，足以影响胎儿，还可造成初生小儿发生胎寒、胎热、胎毒等疾患，故有养胎之说。

养子十法 护养小儿的十种方法。《古今医统》载：一要背暖；二要肚暖；三要足暖；四要头凉；五要心胸凉；六者精神未全，勿见非常之物。七者，不温脾胃，致成吐泻慢惊。八者，儿哭未定，勿使饮乳，致儿吐奶粪青。九者，勿得轻服轻粉、朱砂。十者，小儿腠理不密，频洗不慎，湿热之气蒸郁不散，变生赤游丹毒。故小儿洗浴时要适可而止，注意防护。

差经 病证名。见《竹林女科证治》。亦名错经，蹉经、蹉缠、蹉理症、蹉经。多因素嗜辛辣热物，积热郁久，内扰冲任，迫血妄行所致。症见月经来时从大小便俱出。治宜解热毒、调气血。方用分利五苓汤（猪苓、泽泻、白术、赤芍、阿胶、当归、川芎）。

亦有认为差经为产后交肠病。详该条。

姜片虫病 病证名。我国地方病的一种，因其虫形似姜片，故名。虫色赤如生肉，故又叫赤虫。在东南沿海各省和华中某些地区都有流行，长江以北很少。本病可引起腹痛，腹泻，浮肿，贫血等症状，甚至引起小儿生长发育，但预后一般良好，姜片虫驱除以后，患者迅速恢复。若反复感染又不治疗，可导致重度营养不良，有造成全身衰竭的危险。本病因食生菱角、荸荠等吞入姜片虫的囊蚴所引起。成虫寄生肠道上部，上犯胃气，下扰肠道，导致胃失和降，脾失健运等症。治疗用槟榔煎水，早上空腹，不须另服泻药，连用2~3天。病情严重，气血亏虚者，则宜补脾胃，先服参苓白术散；待全身症状改善后，再予驱虫。

类胎痛 见《玉峰郑氏女科秘传》。指孕妇未及分娩期（怀胎八、九个月时），忽感腹痛，如欲产之状；约三、四日后，腹痛止，安静如常，名曰类胎痛。参见试胎条。

类搐 病证名。出《幼幼集成》。指伤暑疟痢等，迁延时日，抑遏邪气而致搐者。详搐条。

前阴漫肿 病证名。见徐大椿《女科指要》。多因脾虚不能运化水湿，肝郁化热，湿热蕴结流注于厥阴，以致前阴漫肿、疼痛。因脾虚者，兼见倦怠乏力，食少便溏，治宜健脾利湿，方用四苓汤；因肝经湿热者，兼见心烦易怒，口苦胁痛，带多色黄，治宜舒肝解郁，清热利湿，方用丹栀逍遥散加减。

前产 属儿头先露的异常分娩之一。清·员从云《产科一得》：“临产儿头偏抵阴前也”。参见偏产条。

首铅 出《本草原始》。指初潮月经。

逆生 出《千金要方》卷二。即倒产。详该条。

逆产 出《诸病源候论》卷四十三。即倒产。详该条。

逆经 病名。见《医宗金鉴·妇科心法

要诀》。亦名经从上逆、经从口鼻出、经行吐衄、倒经等。是指经期中或行经的前后，出现周期性的口鼻出血。多因肝经郁火炽盛，经期冲脉气盛血动，血随气火上逆；或阴虚肺热，热伤肺络所致。在经前或经期者，多属内热壅盛，迫血上行之实热症。治宜泻热凉血。方用三黄四物汤、顺经汤等。经后者，虽属血虚，但仍为阴虚余热内扰之虚热症，治宜养阴清热，方用犀角地黄汤、麦门冬汤之类。

临月 出《外台秘要》卷三十三。即临产。详该条。

临产 出《诸病源候论》卷四十三。又名临蓐、临盆、临月、临草、卧蓐、坐蓐、坐草、草蓐、上草、免蓐。指临近生产，进入分娩期。

临产七候 见寄湘渔父《达生保赤编》。分娩过程的七种症候。即脐腹急痛，腰酸重坠，眼中出火，谷道挺进，室户肿满，手指筋脉跳动，胞浆或血大来。

临产五要 见清·员从云《产科一得》。指临产时的五种注意事项。即一要审时，二要饮食，三要戒喧，四要设法助其力量，五要安顿胞衣。

临产六字真言 出亟斋居士《达生篇》。即“睡，忍痛，慢临盆”。古人以此六字概述临产时应注意事项。

临产血晕 病证名。见《叶氏女科证治》卷三。指临产时由于去血太多，以致昏不知人，故名。急以回阳救脱，方用独参汤。

临产时五忌 见濯之《胎产须知》。古时临产时的注意事项。一忌用力太早，二忌曲身坐卧，三忌惊忧，四忌不饮食，五忌锁闭（门窗紧闭）。

临产晕绝 病证名。绝同厥。指产妇临产时出现昏不识人，四肢厥冷的症候。清·许廷哲《保产要旨》：“临产儿未生下，忽然晕绝者，此因痛极气闷也。急用生半夏面，米糊为小丸豆大，纳鼻中即醒”。

临草 见《卫生家宝产科备要》。即临产。详该条。

临盆 见薛立斋·《女科撮要》。即临产。详该条。

临蓐 见《张氏医通》卷十。即临产。详该条。

烂衣疮 病证名。见《医宗金鉴·痘疹心法要诀》。即小儿出生一月内出现瘙痒。详该条。

烂喉痧 见清·金德鉴《烂喉痧痧辑要》。即丹痧。详该条。

烂喉痧 见清·曹心怡《喉痧正的》。即丹痧。详该条。

炸腮 出《普济方》卷三百八十四。即痄腮。详该条。

洞痢 病名。出《圣济总录》卷一百七十九。指小儿泄痢昼夜不止者。多由寒湿之邪，内迫肠道所致。

洞泄注下 病证名。见《证治准绳·幼科》。是小儿下利不止的证候。小儿脾胃虚弱，至长夏阴盛之时，饮食居住不慎，或复感风冷，则成此证。治宜醒脾化湿。用厚朴散（张涣方：厚朴、诃梨勒、白术、干姜、肉豆蔻）加减。

洗三 见陈治道《保产万全书》。儿生三日后，古人用艾叶加少量防风水煎洗浴儿体，以预防各种皮肤病。《产孕集》卷下：“儿生三日，浴之，俗谓之洗三”。

室女 指未婚女子。宋·齐仲甫《女科百问》第十三问：“室女者，乃未出闺门之女也”。

室女月水不通 出《妇人良方大全》卷一。即室女经闭。详该条。

室女红脉不通 见《世医得效方》卷十五。即室女经闭。详该条。

室女实热经闭 病证名。见《竹林女科证治》。指未婚女子素体阳盛，热灼耗阴而致经闭，常兼见发热，唇干，咽燥，喜冷恶热，脉实有力等症。治宜养血泻热调经。方

用四物凉膈散（四物汤加黄芩、黄连、桔梗、薄荷、甘草、竹叶、连翘）。

室女经闭 病证名。出《妇人良方大全》卷一。亦名室女月水不通。指未婚女子的经闭而言。多因情志不遂，心怀抑郁，气血凝结所致。体弱者，用泽兰叶汤，兼服柏子仁丸；体壮者，可用大黄廑虫丸。

室女带下 病证名。见《济阴纲目》卷三。指未婚女子由于经血初潮，阴中炎热，当风感寒，或用凉水洗下体，或初见经血来而惊恐致成带下。亦有属冲任虚寒而致白带量多者。

室女经闭成劳 病证名。见《妇人良方大全》卷一。未婚女子，由于忧思积虑，损伤心脾气血，以致经闭不通，常可出现诸虚劳损症状。如心伤则血逆竭，故神色败，经水先闭；脾虚则食少；肺阴失养而致咳嗽；随之肾肝失养，则见多怒而毛发焦枯，筋骨萎弱等。若五脏传遍则为危象。治当益阴血，制虚火，切忌用凉药行血之药。宜先用柏子仁丸、泽兰叶汤等，并当随其兼证不同而相应处理。

室女经闭劳嗽 病证名。见《竹林女科证治》。指未婚女子，因忧思劳伤心脾，心脾虚损则肺阴失养，阴虚生热，灼伤肺阴所致。症见经闭后饮食减少，日渐消瘦，久咳不止，四肢干痿，发热或潮热盗汗等。治宜滋阴清热，养血调经。方用四物汤加丹皮、陈皮、白术、香附、黄芩、甘草，兼服四神丸（橘红、延胡索、当归、郁金），或用劫劳散等。

室女经闭胀痛 病证名。见《竹林女科证治》。指未婚女子由于气滞血瘀而致经闭，腹胀作痛者。治宜行气活血化瘀。方用膈下逐瘀汤、少腹逐瘀汤等。

室女经闭浮肿 病证名。见《肖山竹林寺女科》。指未婚女子经闭兼有浮肿的病证。多因外邪客于胞脉，血壅经隧，经脉不利，血化为水，流溢四肢，导致经闭及遍身

浮肿，面色青黄。治宜通经为主，经通则肿自消。方用通经丸。

室女经闭骨蒸 病证名。见《竹林女科证治》。未婚女子多由肝肾阴虚，气血暗耗，阴虚热灼所致。症见经闭进而出现骨蒸，五心烦热，消瘦疲倦，颧赤等。治宜滋阴清热，补养气血。方用人参柴胡汤（人参、茯苓、白芍、干地黄、知母、麦冬、柴胡、甘草），有汗加牡蛎，热甚加黄连。

室女经闭腹痛 病证名。见《竹林女科证治》。指未婚女子由于瘀血阻滞，以致经闭后小腹坚硬有块，攻刺疼痛。治宜活血行瘀。方用通经散（刘寄奴、当归、穿山甲、赤芍、红花、延胡索、莪术、乌药、丹皮、牛膝、三棱、肉桂、朱砂）。

室女虚热经闭 病证名。见《竹林女科证治》。未婚女子由于阴虚血弱，火盛水亏而致经闭。症见经闭不行，羸瘦，潮热。治宜养阴益血。方用柏子仁丸，兼用泽兰汤。

宣露 肾疳五证之一。出《小儿药证直诀》。详牙疳条。

宫冷不孕 见《济阴纲目》。即胞寒不孕。详该条。

宫颈糜烂 病名。指宫颈鳞状上皮脱落露出皮下组织呈鲜红色，或由颈管柱状上皮向外生长覆盖，代替了原来的鳞状上皮的炎症反应。临床表现白带量多，成黄色或血性可按带下症辨证治疗。多采用宫颈局部上药，如地榆丸（生地榆100克，生槐花100克，明矾50克，龙骨25克，研成细末，放入胶囊）每天一次每次2丸，局部外用，四次为一疗程，五重软膏（五倍子，重楼）胆矾散（方见子宫颈炎条）等，以及宫颈局部针刺等法。

客热 病证名。小儿发热，进退不定，如客之往来，故名。元·朱丹溪《幼科全书》：“客热者，邪妨于心也；心若受邪，则热形于额，故先起于头面，次而身热，恍惚

多惊，闻声则恐，良由真气虚而邪气胜也。邪气既胜，则真气与之交争，发热无时，进退不定，如客之往来也。”

客忤 病名。出《诸病源候论》卷四十六。又名中客忤、中客、中人、少小客忤。由于小儿神气未定，如骤见生人，突闻异声，突见异物，而引起惊吓啼哭，甚或面色变异，兼之风痰相搏，影响脾胃，以致运化受纳失调，引起呕泻、腹痛、反侧痠痲，状似惊痫，宜用安魂丸（《丹台玉案》：炒枣仁、茯苓、远志、当归、胆星、灯心）加减；痰热盛者，可用豁痰清热之剂，如温胆汤加钩藤、桑枝之类。

客忤似痫 病证名。急惊风类证之一。小儿客忤，口吐青、黄、白沫，水谷夹杂，面色变异，喘息腹痛，反侧痠痲，状如惊痫，眼不上窜，为客忤似痫，治宜镇惊安神（《幼科发挥》）。

客忤夜啼 病证名。出《三因极一病证方论》。指小儿夜啼由客忤所致者。其症患儿于忽受外界刺激之后，面色变易不定，气郁如怒，睡中惊惕作啼，口吐青白沫，反侧痠痲，状如惊痫，但眼不上窜。治法见客忤条。

客忤痉 病证名。小儿痉病之一。小儿神怯气弱，受惊吓所致的痉证。症见发热，或有汗，或无汗，面时青时赤，梦中呓语，手足蠕动。宜复脉汤去参、桂、姜、麦，加丹参、丹皮、犀角，补心之体，以配心之用（清·吴鞠通《解儿难》）。

语迟 五迟之一。出《小儿药证直诀》。小儿二、三岁一般能说简单的语言，到四、五岁还不能说话者为语迟。言为心之声，肾脉系舌本，小儿先天肾虚，心气不和，为形成本病的主要原因。但也有由后天脾胃亏损，津气不能上荣所致者。肾气不足者，用六味地黄汤加菖蒲、远志之类；心气不足者，用养心汤；脾胃虚弱者，用补中益气汤。

误搐 病证名。出《幼幼集成》。指伤

寒其邪抑遏而致壮热搐搦的证候，详搐条。

神不安啼 病证名。见《片玉心书》。多由胎热，引起心神不安，入睡时热扰于心，故睡中突然自哭，并有心烦，易惊等。治宜清心安神。用安神丸。

神奇外治法 小儿病的外治方法。出《幼幼集成》。包括疏表法、清里法、解烦法、开闭法、引痰法、暖痰法、纳气法、通脉法和定痛法。分详各条。

神珠将反 病证名。见《证治准绳·杂病》。眼珠深度牵斜的症状。“神珠将反者，谓目珠不正，虽欲转而不能转，乃风热攻脑，筋络牵急，吊偏神珠，是以不能运转”（《张氏医通》），指目珠倾斜于某侧而转动失灵者。类似麻痹性斜眼。治宜疏风清热之剂。

〔七〕

退妊 见根心堂主人《坤道指南》。即打胎。《坤道指南》·退妊方：五味子、三棱、莪术、归尾、葶苈各等分，人参少许，为末水调服。

昼热 病证名。见《证治准绳·幼科》引《全婴方》。小儿每日早饭后于巳午时间发热，至夜则凉，乃血热所致。古人认为因巳午为心火用事之时，心主血，血热充盈，行致巳午阳盛之时，故发热。此与夜热昼凉之血液不足，阴不潜阳所致之发热，截然相反。治宜清热凉血。用犀角地黄汤。

眉炼 病证名。出《卫生宝鉴》。指眉间生疮。由小儿胎热上蒸而生。症见眉间生疮如疮，流脂成片，瘙痒不已。外用五倍子、生白矾研细，麻油调敷。并可内服清热解毒、消风止痒之剂。

怒后崩漏 病证名。见《竹林女科证治》。妇人因大怒之后，经血暴下或淋漓不止。乃暴怒伤肝，肝不藏血，以致经血妄行而成崩漏。治宜平肝养血。方用养血汤（当

归、白芍、白术、茯苓、香附、青皮、柴胡、甘草)。

癸 天癸的简称。详该条。

癸水 见《古今医统》。指月经。

贯脓 出《古今医鉴》。指痘疮贯脓，又名灌浆，灌脓。凡痘疮七、八、九日渐贯脓，脓水之盈亏，视气血之盛衰而定。气血充盈者，易脓易痂；气血不足者，毒不成浆，气不胜者，则毒内陷，出现五陷等现象。《医宗金鉴·痘疹心法要诀》分灌浆顺证、灌浆逆证、灌浆险证。详各条。

孩儿攻心 出静光禅师考定《女科秘要》卷二。即胎气攻心。详该条。

结舌 病证名。又名绊舌。由于舌尖下的膜(即舌系带)短缩，舌尖受其牵绊，以致舌头转动伸缩不灵，妨碍吮乳。年龄稍大，则见发育困难，吐词不清。处理方法：可用小毒的钝头小剪刀，将舌下系带剪开，在剪口外搽枯矾水，以收敛止血。

绝子 出《千金要方》卷二。指断绝生育，即绝育。

绝生 出《脉经》。即绝产。详该条。

绝孕 出《神农本草经》。即绝育。

绝产 出《脉经》。又名绝生、断产。

①指妇女因病而终身不孕。②用药物、手术等方法达到终身不孕的目的。

绝胎 见清·根心堂主人《坤道指南》。即绝育。

绝嗣 出《千金要方》卷二。指婚后不孕，不生子女。

绞脐 病证名。即产儿脐带绕颈。清·员从云《产科一得》：“绞脐，门户既正，儿顶已露，而不得产，乃由儿转身时，儿项为脐带所缠绊也”。详碍产条。

骈(pián 梗)产 骈，并列或一对。骈产即双生。详该条。

骈胎 出《褚氏遗书》。即双胞胎。

十 画

〔一〕

唇口蠕动 病证名。见《证治准绳·幼科》。小儿唇口蠕动。唇为脾之华，脾虚则唇口蠕动。治宜补脾健胃。用七味白术散。

唇疡 出许慎《说文解字》。即唇疮。详该条。

唇疹 病证名。出《灵枢·经脉》。疹，唇疡也(《说文解字》)。详唇疮条。

唇疮 病证名。又名唇疹、唇疡。①《诸病源候论》卷三十：“脾胃有热气发于唇，则唇生疮”，可流黄水，或痒或痛。治宜清解脾胃郁热。内服泻黄散加减，外以黄柏、野蔷薇根等分为末，水调敷唇部，或熬汁浓缩成膏涂搽。②由伤寒狐惑，小儿疳蠹所致唇部起疮。《沈氏尊生书》卷二十三：“伤

寒狐惑，虫蚀其脏，则上唇生疮，虫蚀其肛，则下唇生疮，是脏腑之病，未尚不应诸口也”。又《片玉心书》：“儿疳蠹，昏睡烦躁，鼻烂汁臭，齿断生疮，下利黑血，虫食下部为狐，下唇有疮；虫食其脏为惑，上唇有疮”。可用锡类散外涂。

唇腭(tiǎn 忝) 病证名。出《小儿卫生总微论方》。指唇肿粗厚。

顽涎 病证名。指引起喘嗽痰鸣的涎液。《东医宝鉴》：“顽涎者，脾肺所出也。涎则流溢于咽喉，如水鸡之声，喘嗽烦闷。”治宜豁痰降逆。用涤痰汤、三子养亲汤加减。

盐哮喘 见明·秦景明《幼科金针》。即哮喘。详该条。

恶子 见《产宝百问》。即恶阻。详该

条。

恶字 出《诸病源候论》卷四十一。即恶阻。详该条。

恶阻 病名。出《诸病源候论》卷四十一。亦名子病、阻病、病儿、病阻、病隔、选饭、恶子、恶字、恶食、妊娠呕吐等。是指妊娠早期出现的恶心、呕吐、择食或食入即吐，甚则呕吐苦水，或血性物者称为恶阻。有胃弱恶阻、胃热恶阻、胃寒恶阻、痰滞恶阻、肝热恶阻等。详各条。

恶食 病证名。①指见食物而有厌恶感，不能进食者。《证治汇补》：“恶食非止一端，有胸中痰滞者，宜导痰以助脾。有伤食恶者，宜消化以助脾。有病久胃虚者，宜参术以健脾。”一般可用保和丸加减。

②即恶阻。详该条。

恶疮 病证名。指小儿疮疡，脓血腐败，久而不愈者。《小儿卫生总微论方》：“小儿有缘身生诸恶疮者，由脏腑有热，冲发于外。外被风湿所干，内外相乘，搏于气血，随其经络虚处，停滞留结而生，或大或小，或痒或痛，破烂成疮，或脓或血，或腐或败，挟毒所作者，久而不差，皆曰恶疮。”

恶露 出《肘后备急方》。①指产妇在分娩后，胞宫内遗留的余血和浊液。一般于产后二至三周内恶露应完全排尽。如果超过这段时间，仍然持续淋漓不断，排出或多或少均属病态。参见恶露不下、恶露不绝条。

②指养胎之血。见戴武承《女科指南集》。

恶露不止 出《肘后备急方》。即恶露不绝。详该条。

恶露不尽 见《诸病源候论》卷四十三。即恶露不绝。详该条。

恶露不绝 病名。见《妇人良方大全》卷二十。又名恶露不止、恶露不尽。一般产后恶露持续二至三周应完全排尽。如超过这段时间，仍然持续淋漓不断则属病态，称之为恶露不绝。多因产后气虚下陷，冲任不固；余血未尽或感寒凉，败血瘀阻冲任，新血不

安；或因营阴耗损，虚热内生，热扰冲任，迫血妄行所致。气虚者证见恶露色淡，质清稀，量多，兼见面色苍白，懒言，小腹空坠。治宜补气摄血，方用举元煎加减；余血未尽者，恶露量少，淋漓涩滞不爽，色紫暗有块，伴有小腹疼痛，治宜化瘀止血，方用当归益母汤加减（当归、川芎、益母草、炮姜、延胡索、红花）；血热者，恶露量多，色红，质稠粘，有臭味等，面色潮红，治宜养阴清热，止血，方用保阴煎加减（白芍、续断、旱莲草、阿胶、黄芩、生地、乌贼骨、黄柏）。

鬲膈 病证名。风痰阻于胸膈而引起的病证。《千金要方》卷五：“鬲膈之为病，目反，四肢不举。”治宜利胸膈风痰。或用灸法，先灸风府，次灸百会、人中、承浆。

鬲痰风厥头痛 病证名。出《肘后备急方》。风痰相结而引起的顽固性头痛。《诸病源候论》卷二十：“鬲痰者，谓痰水结聚于胸膈之上，又犯大寒，使阳气不行，令痰水结聚不散，而阴气上逆，上与风痰相结，上冲于头，即令头痛，或数岁不已，久连脑痛，故云鬲痰风厥头痛。”治宜熄风豁痰。用半夏麻白术汤加减。

夏日沸烂疮 出《诸病源候论》卷三十五。即痈疮。见该条。

夏月破腹 病证名。《医说》引《医余》：“夏月破腹：一曰伤暑；二曰伤冷物、食瓜果、饮水之类；三曰夏季心火旺，心经热则小水不利，行大肠，谓之水谷不分。伤暑而泄者，心躁头痛作渴，宜服香薷饮……伤冷物而泻者，腹痛水泄，谷食不化，宜服暖药，如附子及理中丸……水谷不分者，宜服大顺散，五苓散。”

夏令麻疹 夏暑季节出现的麻疹，与冬春时节发病者不尽相同。夏季炎热，腠理松，汗易出，肺气通畅而咳嗽轻，且麻毒易于透达而疹密。初期宜辛凉轻剂，用银翘散加减；热重者用辛凉重剂，如白虎汤加蝉

蛻、浮萍；疹后阴伤者，用增液汤，或鲜生地、鲜沙参、鲜石斛等品，以滋阴养液。

夏痿 病证名。小儿夏末时，感受暑湿之邪，湿热下注，郁于经脉，以致下肢痿而无力，步履维艰；久病由实转虚者，则肌肉萎缩。可见于小儿麻痹后遗症。治宜清热利湿，通经活络。用二妙散加牛膝，苡米、汉防己、丝瓜络。虚证用虎潜丸加减。

真产 见清·刘斋甫《妇科三字经》。即正产。详该条。

真搐 病证名。①指惊风得之于母腹，生下百日内，因有所犯，引动其疾，发为抽搐者（《小儿卫生总微论方》）。②抽搐时牙关紧闭，口吐痰涎者为“真搐”（《东医宝鉴》）。③抽搐虽定，而神气昏闷者。（清·许宜治《许氏幼科七种》）。参搐条。

原生 出清·巫斋居士《达生篇》。指胎产而言。因其为生人之始，故名原生。

逐日经来 病证名。《竹林寺妇科秘方考》：“逐日经来有几点便住，或五日或十日，又来几点，一月之间常来三、四次，面色青黄，先用胶艾汤（川芎、艾叶、熟地、红枣、阿胶珠），后用紫金丸（三棱、莪术、良姜、乌药、枳壳、槟榔、砂仁、红豆蔻、陈皮）”。

逐月养胎 出徐之才《逐月养胎方》。是古人按脏腑、经络理论对胚胎发育的认识。如妊娠一月始胚，由足厥阴肝经主养；妊娠二月始膏，由足少阳胆经主养；妊娠三月始胎，由手厥阴心包经主养；妊娠四月由手少阳三焦经主养；妊娠五月由足太阴脾经主养；妊娠六月由足阳明胃经主养；妊娠七月由手太阴肺经主养；妊娠八月由手阳明大肠经主养；妊娠九月由足少阴肾经主养；妊娠十月五脏六腑，关节以及神气等都已齐备，俟时而生。并以此作为逐月调养胎元，治疗用药及针灸宜忌的参考。这些均属古人经验，尚待进一步研究。

捏破涎涌儿 出《普济方》卷三百六十二。即脾冷涎多。详该条。

捏脊 治疗疳积方法。也可用于治疗遗尿、失眠及其他小儿消化系统疾病。手法：首先使患儿裸露背部，平卧，术者立于左侧背后，两手半握拳，两手食指抵于脊背上，用中指第二节与拇指挟起皮肉，自下向上两手交替，不间断地边推、边捶、边卷，自长强穴开始，沿着督脉向上，至大椎穴为止算作一遍，每次捏3~6遍。为了加强刺激，可在从第四遍起加用提的手法。即在捏拿的同时，间断地稍用力向上提拉，使发出“刮刮”的声音。最后，用两拇指在肾俞加按并向外侧分抹，共三次。在治疗过程中亦可辨证用药内服或外用化痞膏贴脐。忌食螃蟹、蚕豆、醋以及不易消化的食物。对患有急性热病，有出血倾向，严重心脏病及背部皮肤有感染或浮肿者禁用。

损娠 出《外台秘要》卷三十三。即小产。详该条。

换睡 出徐润之《最新达生篇》。指怀孕六个月之后，孕妇睡时不要长时间固定一侧，须左右转换，便于胎儿左舒右展，肢体活动。为妊娠摄养中的一项注意事项。

热入血室 病名。出《伤寒论·辨太阳病脉证并治》。指妇女在经期或产后感受外邪，邪热乘虚侵入血室，与血互相搏结所出现的病症。《金匱要略·妇人杂病脉证并治》：“妇人中风，七八日续来寒热，发作有时，经水适断，此为热入血室，其血必结，故使如疟状，发作有时，小柴胡汤主之”。

“妇人伤寒发热，经水适来，昼日明了，暮则谵语，如见鬼状者，此为热入血室。治之无犯胃气及上二焦，必自愈”。“妇人中风，发热恶寒，经水适来，得七八日，热除脉迟，身凉和，胸胁满如结胸状，谵语者，此为热入血室也。当刺期门，随其实而取之”。“阳明病，下血谵语者，此为热入血室，但头汗出，当刺期门，随其实而泻之，濈然汗出者愈”。

热吐 病证名。又名胃热呕吐。小儿因胃热而致的呕吐。元·朱震亨《幼科全书》：

“热吐食化，不恶食。”多因乳食停积化而为热；或夏秋暑热侵袭于胃以致胃气上逆所致。《幼幼集成》卷三：“小儿胃热呕吐，外证面赤烦躁，身热作渴，手足心热者，热吐也。黄连一钱姜汁炒熟，石膏一钱，共为细末，每服一钱，白汤调下。吐止，止后服。”乳食停滞者用保和丸，暑热伤胃者用香薷饮加竹茹、芦根。

热产 病证名。又名暑产。杨子建《十产论》：“热产者，言盛暑之月，产妇当温凉得宜。热甚，产母则头疼，面赤昏晕。若产室人众，热气蒸逼，亦致前患，名曰血晕。若夏月风凉阴雨，亦当谨避。”

热乳 出《千金翼方》卷十一。古人认为乳母热甚哺儿，令儿致病。因热伤肺胃，儿饮其乳，肺胃之气上逆，则面黄不食，甚或呕吐气急。

热夜啼 病证名。见《证治准绳·幼科》。又称心躁夜啼。多因胎热、惊热、风热等内犯于心所致。其症面红身热，小便赤涩，入夜即烦躁不安，仰目啼哭而多泪，见灯火则烦啼更甚。治宜清热宁心。用导赤散加黄连。

热毒疮疥 病证名。出《证治准绳·幼科》。湿热毒邪郁于皮肤而致的疮疥。其症以手指缝最为多见，亦常见于肘窝腋下、小腹、腹股沟、臀腿等处，甚则遍及全身。呈针尖大小的丘疹和皮泡，痒甚，故体表常见抓痕和结痂。如搔破皮肤引起继发性感染，则可成疮化脓。治用蛇床子、苍耳子、地肤子煎水外洗。

热毒疮疡 病证名。出《证治准绳·幼科》。为热毒蕴积而引起疮疡。临床表现以局部出现焮红、作痛、发肿、发痛。热毒炽盛，累及脏腑则可出现里热的证候，如烦热、便秘等。治宜清热解毒，如仙方活命饮、五味消毒饮之类。

热毒瘰癧 病证名。出《证治准绳·幼科》。指因风热毒邪入于手足少阳经而引起

的瘰癧。其症多伴发于热毒疮疡的患儿。如头、面和颈部疮疡，则颈部出现瘰癧。轻者略有疼痛，可以自愈。重者局部红、肿、痛、热，并有显著触痛及发热、恶寒等全身症状。如能及时治疗，瘰癧亦可消退，但常遗留下小的硬结。若瘰癧化脓，则最后穿破而出脓汁。治法以清热解毒为主，可选用五味消毒饮、仙方活命饮等煎剂内服，局部可用芙蓉花叶或野菊花捣烂敷于患处。如已破溃，则用三黄散或生肌散敷之。

热疮 出《太平圣惠方》第九十一卷。即痂疮。详该条。

热疳 病证名。出《颅凶经》。又名肥热疳。疳疾湿热侵入肌肤的一种证型。《证治准绳·幼科》：“热疳病多在外，鼻下赤烂，头疮湿痒，五心烦热，掀衣气粗，渴饮冷水，烦躁卧地，肚热脚冷，潮热往来，皆热疳也。”先用胡黄连丸（《颅凶经》：胡黄连、蟾酥），继用清热消疳之剂，如柴胡清肝散。

热痱 病证名。出《太平圣惠方》第九十卷。即痱子簇集成瓣，颜色鲜红者。详痱疮条。

热痧 病证名。热邪炽盛引起的痧病。清·吴鞠通《解儿难》：“风温、风热、风暑、燥火致痧者，热痧也。”见于小儿高热引起的惊厥。治宜清热熄风，用羚角钩藤汤。如壮热、大汗而烦渴、脉洪大者，宜清热保津，兼以熄风，用白虎汤加全蝎、蜈蚣。

热烦 病证名。小儿表里俱热的证候之一。《诸病源候论》卷四十六：“小儿脏腑实，气血盛者，表里俱热，则苦烦躁不安，皮骨壮热也。”治宜清解表里。用防风通圣散。

热烦啼 病证名。小儿心经伏热烦躁而啼。多系热扰心阴所致。《片玉心书》谓“其哭无泪，见灯则喜而止。”治宜清心养阴。用导赤散加麦冬、梔子。

热淋 病证名。诸淋之一。因湿热下注

膀胱，气化不利所致。症见小便不利，淋漓涩痛有热感，或有少腹胀满，引脐作痛，大便闭结等。治宜清热利水。用导赤汤加金钱草。

热涎 六涎之一。指劳伤精气，髓海空虚，虚热内生，灼液而成的痰涎。《史载之方》：“脏腑骨槽，虚热转盛，其涎所积，隔在中焦，因其肾脏之虚寒，邪气与热涎相交，发为疼痛。”

热痢 病证名。八痢之一。小儿感受热邪，热迫大肠而致的痢疾。症见纯下赤血，手足发热，渴喜冷饮。治宜清热止利。用黄连解毒汤之类。

热病 病证名。小儿内有积热所致的痢证。《太平圣惠方》第八十五卷：“夫小儿热痢者，由气血不和，内有积热之所致也。”其症口眼相牵，手足抽掣，腰背强直，口中吐沫，鼻里作声，颈项反张，壮热啼哭。治宜退热除痢。用羚羊钩藤汤。

热痧 病证名。小儿发痧的一种证型。见陆乐山《养生镜》。症见面赤眼红，发热狂躁，大渴饮水。宜拍患儿手臂弯、腿弯处，使紫筋显露后刺出血；刮胸前、背部。并刺中冲、少商、委中、阳交、期门。继用绿豆、银花煎服。

热渴 病证名。因实热而口渴。《诸病源候论》卷四十六：“小儿气血盛者，则脏腑生热，热则脏燥，故令渴。”治宜清热保津。用白虎汤。

热痰 病证名。出《诸病源候论》卷二十。指热邪熏灼津液而成痰者。《温热经纬》引何西池云：“辨痰之法，古人以黄稠者为热，稀白者为寒，此特言其大概，而不可泥也。以外感言之，伤风咳嗽，痰随嗽出，频数而多，色皆稀白。误作寒治，多致困顿。盖火盛壅遏，频咳频出，停留不久，故未致于黄稠耳。迨火衰气平，咳嗽渐息，痰之出者，半日一口，反黄而稠，缘火不上壅，痰得久留，受其煎炼使然耳。故黄稠之痰，火

气尚缓而微；稀白之痰，火气反急而盛也。此皆当用辛凉解散，而不宜于温热者。推之内伤亦然，孰谓稀白之痰，必属于寒哉。”临床上热痰多伴有热象，如唇焦，心烦等。治宜清热化痰。用清气化痰汤之类。

热嗽 病证名。积热引起的咳嗽。《外台秘要》卷九：“热嗽者，年少力壮，体气充满，将息伤热，积热所成，故致热嗽。”热则清之，用竹叶石膏汤。

热痰嗽 病证名。指夏月发热咳嗽而痰稠者。《素问病机气宜保命集》：“夏月嗽而发热者，谓之痰热嗽。”治宜清热化痰。用泻白散加石膏。

顿泻 病证名。由脾胃湿盛而致者。明·唐椿《原病集》：“日间无事，将脯腹胀，一夜肠鸣，不得宽泰，次早洞泄，此名顿泻，是脾虚湿盛也。以胃苓汤加缩砂仁主之。”

顿咳 病名。见《医学正传》。即百日咳。《本草纲目拾遗·鸩鹑》：“顿咳从少腹下，逆上而咳逆，嗽数十声，少住又作，甚或呛甚作呕，牵掣两胁，涕泪皆出，连月不愈……”。并载有鸩鹑涎方（鸩鹑涎、白糖）治疗。详百日咳条。

〔 1 〕

紧唇 出《诸病源候论》卷三十。即小儿紧唇。详该条。

紧唇疮 出《普济方》卷三百六十五。即小儿紧唇。详该条。

哮拔 病证名。小儿哮喘的一种证型。见明·秦景明《幼科金针》。又名咸哮、盐哮、醋哮。前人认为肺乃轻清之脏，恶咸酸热毒，故咸酸之物，食之太过，影响于肺，可成哮拔。其证气促时发时止，参小儿哮喘条。

哺乳疳 病证名。由哺乳失宜而成的疳疾。小儿长期缺乏营养，或乳食伤脾，均能导致脾胃积热，灼损津液而形成本病。症见

形体消瘦，毛发痿黄易脱，面色黄黯，腹部胀大，时有潮热，皮肤松弛，囟门低凹，头骨不合等症。治宜健脾利气，用养脾消积丸（《幼科发挥》：人参、白术、茯苓、甘草、陈皮、木香、青皮、砂仁、使君子、枳实、黄连、神曲）。

哺露 病证名。①指小儿胃弱，无时吐出的证候。《幼科发挥》：“有胃弱者，不能受乳而变化之，无时吐出，所吐不多，此名哺露，如瓶之漏，不能容受也。”当补其脾胃，助其变化，可用六君子汤加减。②即吮乳的一种证型。

哺露疳 病证名。指小儿哺露而变生的疳证。《诸病源候论》卷四十七载其病因为：“小儿乳哺不调，伤于脾胃，脾胃衰弱，不能饮食，血气减损，不荣肌肉”所致。症见骨瘦如柴，呕逆，吐虫，心烦，口渴，傍晚蒸热等。宜先用集圣丸（方见肝疳条）消积杀虫；如迁延日久，肚大青筋者，则宜人参丸（《太平圣惠方》：人参、麦冬、半夏、黄芪、大黄、白茯苓、柴胡、黄芩、诃黎勒、甘草、鳖甲、川芎），以攻补兼施。参哺露条。

蚘（huí 回） 出《伤寒论·辨厥阴病脉证并治》。即蛔虫。详蛔虫病条。

蚘厥 病证名。出《伤寒论·辨厥阴病脉证并治》。指小儿因蚘而致的人事不省，握拳直足，四肢逆冷的证候。此为饮食不洁，虫卵进入腹中，日久发育成蚘，蚘逆上攻，而致成厥。治宜安蚘回厥，先用乌梅丸，继用追虫散驱虫，参苓白术散以调理善后。参蛔虫病条。

〔J〕

缺乳 病名。见《济阴纲目》卷十三。多因产后气血亏虚、乳汁化源不足，或肝郁气滞、气血运行不畅、乳汁壅滞不行所致。气血亏虚者乳房无胀痛感，唇色淡，面白，食少体倦。宜补气养血，佐以通乳。方用

《傅青主女科》通乳丹（党参、黄芪、当归、桔梗、通草、麦门冬、猪蹄）。肝郁气滞者乳房胀满而痛，甚则身热，胸闷不舒，宜疏肝解郁通乳，用《清太医院配方》下乳涌泉汤（当归、川芎、山甲珠、王不留行、白芍、桔梗、甘草、通草、漏芦、青皮柴胡）。

缺唇 即兔唇。详该条。

积风冷嗽 出《千金要方》卷五。风邪郁积于肺，复感寒邪而致的咳嗽。参见寒嗽条。

积吐 病证名。指宿食积滞不消而引起的呕吐。《证治准绳·幼科》：“积吐，眼胞浮，面微黄，足冷肚热，昼轻夜重，儿大者脉沉缓，此宿冷滞脾，故吐黄酸水；或有清痰，脉实而滑，为食积所伤，吐酸馊气；或宿食并出，儿小者，吮乳不化是也。”治以导滞降逆为主，用平陈汤加减。

积泻 病证名。小儿乳食积滞脾胃而致的泄泻。多因小儿脾气虚弱，不能运化以致积滞而成。《幼科发挥》：“积泻者面黄，所下酸臭食也。”其症频频泻下，泄出黄白粪水清便，量不多，完谷不化且酸臭，腹胀面黄，食欲少。治宜调理脾胃，兼以芳香导滞消积，用保和丸加藿香、白蔻壳。

积热 病证名。见元·朱震亨《幼科全书》。小儿表里遍身俱热，日久不止，颊赤口干，大小便涩，谓之积热。乃内因乳食肥甘；外因重被厚棉，炉火侵迫所致。此内外蕴积之热，先以三黄丸下之，后以凉惊丸调之。

积痢 病证名。八痢之一。饮食滞积而致的痢疾。小儿脾常不足，若乳食内停，则脾不能运化而滞积，久而成痢。症见痢下色黄，或如鱼膏，腹部胀痛，恶食。治宜导滞、消食，宜保和丸。

积痛 病证名。见《证治准绳·幼科》。因积而引起的腹痛。其疼痛的特点是腹中隐痛。有冷积、气积、食积和虫积之分。冷积、气积、食积之痛，每每停聚而不散；虫痛则

乍作乍止，来去无定，又有呕吐清沫，以此为辨。治疗原则宜先去积，后调脾胃。详各条。

积滞 病证名。指小儿宿食不消，停积而滞的疾患。明·丁凤《医方集宜》：“积滞之病，面色萎黄，腹胀浮肿，多睡食少，大便滞涩，小水如油，或吐泻酸臭，皆积之证也。”多由乳食哺养不节，过食生冷、甘肥、坚燥之物，脾胃不能消化，停滞胃肠。外为风寒所伤，滞而成积。积久不化，则可出现长期低热不退；发热时间不规则，或朝热暮退，或夜重日轻，面黄消瘦；日久失治，则成虚羸。治疗：宜消积导滞以治标，补脾理气以治本。治标，积滞轻用保和丸加减，积滞重而大便秘结不通者，用小承气汤攻下宿食；治本用异功散化裁。针灸可取足三里、关元、内庭等穴。按摩：分阴阳，推三关，退六腑，推补脾土，掐四横纹等。

积滞吐 病证名。食物久停，积滞于胃而致的呕吐。《普济方》卷三百九十四：“小儿积滞吐，胸膛闷结，中脘痞闷，气不舒畅，闻秽呕逆即吐”。治宜和胃降逆。用二陈汤、枳术丸加减。

积嗽 见《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》。即食积咳嗽。详该条。

积精 病名。指月经期间，因房事所致腹部痞满肿块一类病症。《女科经纶》：“陈藏器曰：‘一犯月水行房，精血相射，入于任脉，留于胞中，以致小腹结满，病如伏梁，水溺频涩，是名积精’。治当消积化痞，行瘀通淋。”

透关射指形 小儿指诊法十三指形之一。详十三指形条。

透关射甲形 小儿指诊法十三指形之一。详十三指形条。

倒开花 即经断复来。详该条。

倒生 指足位分娩。《张氏医通》卷十：“用力太早。儿不能自顺。只一直下，先露其足。谓之倒生”。详倒产条。

倒产 又名脚踏莲花生、踏盐生、踹地

生、倒生、颠倒、逆生、逆产。属臀足位分娩。

倒经 病证名。指经血上逆。单南山《胎产证治录》：“有行经期只吐血、衄血或眼耳出血者，是谓倒经”。详逆经条。

倒敛 病证名。出《痘疹经验良方》。痘疹出后，其毒当敛不敛，复入于里者，谓之倒敛，多见于元气素弱，又不食，常自利以致气馁，不能托毒外出者。治以益气托毒为宜，如异功散加黄芪、当归。

倒靥 病证名。痘疮不能结痂，谓之倒靥。《证治准绳·幼科》：“痘疮遍身溃烂，不结痂者，倒靥也”。清·翟良《痘科类编释意》：“倒靥之证，痘疮初见一、二日细小，四、五日渐大顶平，至六、七日即脚渐润，顶愈平陷，其色全白，形如豆壳者，倒靥也。有脓清不满，已成痂者，只是嫩皮，未成痂者，俱溃烂不休，亦是倒靥也。宜用人参归耆汤，去桂加芍药、连翘、白芷、香附主之。”痘浆未充忽然收靥，或豆浆虽充而齐结痂干紫的为气虚血热。治宜清热补气，用犀角地黄汤加紫草、黄芪。

候胎 产科诊法。见《妇人良方大全》卷十一。即验胎。详该条。

臭息 肾疳五证之一。出《小儿药证直诀》。详牙疳条。

躯 ①妊娠。《脉经》：“妇人经自断而有躯”。②身体。《荀子·劝学》：“曷足以美七尺之躯哉！”

息胞 《诸病源候论》卷四十三：“有产儿下。若胞衣不落者。世谓之息胞”。详胞衣不下条。

息胎 胞衣不下的一种病理情况。宋·薛轩《坤元是保》：“恶血流入胞中，胞为血胀而不下，谓之息胎”。详胞衣不下条。

鬼泣 病名。见清·周纪常《女科辑要》。指妊娠期乳自出。即乳泣。详该条。

鬼胎 旧病名。出《诸病源候论》卷四十二。①属癥瘕一类病证。因妇人素体虚

弱，七情郁结，气血凝滞不散，冲任经脉壅滞不行所致。《傅青主女科》：“腹似怀妊，终年不产，甚则二、三年不生者，此鬼胎也。其人必面色黄瘦，肌肤消削，腹大如斗”。治宜调补正气为主，继以攻积之药。方用荡鬼汤（《傅青主女科》：人参、当归、大黄、雷丸、川牛膝、红花、丹皮、枳壳、厚朴、桃仁）或雄黄丸（《证治准绳》：雄黄、鬼臼、莽草、丹砂、巴豆、獾肝、蜥蜴、蜈蚣）。②指假孕而言。包括气胎、血胎、痰胎等。详见各条。③相当于葡萄胎。《肖山竹林寺女科、鬼胎》：“月经不来，二、三月或七、八月，腹大如孕，一日血崩下血泡，内有物如虾蟆子，昏迷不省人事”。治宜气血双补，方用十全大补汤，或中西医结合治疗。

钻牙疳 病证名。见《医宗金鉴·外科心法要诀》。又名钻齿疳。多由肝胃二经热毒炽盛所致。清·沈善谦《喉科心法》卷上：

“生于牙根，不分上下，初起齿痛，牙根肉内，忽透一骨，似牙尖锐，疼痛异常，由肝胃积热而成，小儿多生之”。治宜先将长出似牙之骨刺拔掉，外敷冰硼散，再进清肝泻火之剂。可选用龙胆泻肝汤、芦荟消疳饮（芦荟、胡南莲、石膏、羚羊角、栀子、牛蒡子、银柴胡、桔梗、大黄、玄参、薄荷叶、甘草）加减煎服。

脊疳 病证名。疳疾侵蚀于脊骨的证候。见《婴童百问》。古人认为疳疾日久，湿浊蕴热不解，疳虫内生，侵蚀脊骨所致。症见羸瘦异常，脊骨节节显露，以手扣骨，空如鼓鸣，并有发热烦渴，下利不止，十指生疮，喜咬指甲等。治宜杀虫消疳。用芦荟丸（《证治准绳》：芦荟、青黛、朱砂、麝香、熊胆、胡黄连、贯众、地龙、黄连、蝉蜕、雷丸、虾蟆）。

脓耳 病证名。五般聤耳之一。耳中有粉红色脓液溢出。《丹溪心法》：“热气乘虚，随脉入耳，聚热不散，脓汁出，谓之脓

耳”。由湿热火毒，郁结肝胆而致者，耳中肿痛，口苦心烦，治宜清泄肝火，用泻青丸、龙胆泻肝汤；因风热蕴结成毒而致者，发热，口渴，治宜清热解毒，用银翘散、五味消毒饮加减。外用龙骨、五倍子、乳香、枯矾、血余炭，等分为末，捻净吹之（《临证指南》）。

脆脚 指妊娠期下肢浮肿之症。见《医宗金鉴·妇科心法要诀》。平素脾阳不振，随胎体渐长，有碍脾阳敷布，以致水湿下注。症见脚部浮肿，皮薄光亮，压痕不起，无其它不适，经休息后不能恢复者，治宜健脾渗湿。方用全生白术散。

脏头风 病证名。指肛门奇痒出虫，及局部红肿的证候。为湿热积滞，虫蚀于肛所致。外用苦参、地肤子、百部煎水温浸。参阅小儿肛痒条。

脏寒泻 出《证治准绳·幼科》。即脐寒泻。详该条。

脏腑惊证 惊风手足搐搦所属脏腑的证候。《小儿病源方论》：“肝惊，眼赤粪青；胆惊，面青下白；心惊，面脸红赤；小肠惊，夜啼至晓；脾惊，五心热干呕；胃惊，腹胀不食；肺惊，气喘吃水；大肠惊，喉中痰作声；肾惊，梦中咬牙；三焦（惊），睡中惊哭。”

脐 《诸病源候论》卷四十三：“胞系连儿脐，胞不出则不得以时断脐”。即脐带。详该条。

脐中水 病证名。指初生儿脐带未脱时，脐带被水浸湿所致的病证。《千金要方》卷五：“若脐中水及冷，则令儿腹绞痛，天紖（音义同纠。天纠，形容小儿屈曲绞痛不堪之状）啼呼，面目青黑，此是中水之过。”为寒湿之邪，结于腹部所致。治宜温经散寒，宣通阳气为主。灸中脘、下脘、气海、关元。或用吴茱萸研粗末，盐水炒热，熨于腹部。

脐中生疮 出《千金要方》卷五。即脐

疮。详该条。

脐中冷 病证名。出《千金要方》卷五。指初生儿脐带未脱时，脐部受到冷邪侵袭所致的病证。详脐中水条。

脐中流血 病证名。指脐中出血。若其血不多，夹水流出者，乃大小肠火旺，以致肾经干燥无水滋润所致。须以治肾为主，方用两止汤或障脐汤（《辨证录》：大黄、当归、生地、地榆）。

脐风 病名。出《千金要方》卷五。又名风噤、风搐、噤风、马牙风、初生口噤、四六风、七日风。即新生儿破伤风。系由断脐不洁，感染外邪所致。一般在4~7天内发病，发病后以全身各部发生强直性痉挛，牙关紧闭，面呈苦笑状为其特征。属于危重疾病，病死率高。新中国成立后，妇女儿童得到保护。由于积极推广新法接生，已控制了新生儿破伤风的发生。本病以通经开闭，镇痉熄风为治。选用方剂有撮风散（《证治准绳》：蜈蚣、全蝎尾、钩藤、麝香、僵蚕、水飞朱砂，用竹沥水送服）等。

脐风三证 指脐风的三种危重证候。《幼科发挥》：“一曰撮口，二曰噤风，三曰锁肚。虽曰不同，皆脐风也。”

脐石症 病证名。见清·洪金鼎《一盘珠》卷之八。指小儿脐部四周肿硬疼痛。

脐肠 见《张氏医通》卷十。即脐带。详该条。

脐带 见《妇人良方大全》卷十六。又名脐、肚带、脐肠、命蒂。即连结胎儿和胎盘的管状物。长约50厘米。具有供给胎儿血液和营养物质代谢，保持胎儿在宫腔内的一定活动等作用。

脐带法 古代下胎毒法之一。用本儿落下脐带，瓦上焙燥为末，入辰砂、黄连、甘草末各五分，和匀蜜拌，分作三五次涂乳母乳上，候儿吞之。必须一日夜吞尽，次日恶毒皆从大便而出（《证治准绳》）。

脐疮 病证名。出《诸病源候论》卷五

十。又称脐中生疮。脐疮是在脐湿的基础上，皮肤破损，再感毒邪，壅于脐部，郁而不散，出现脐部红肿，轻者局限于脐部，重者可向周围蔓延，甚则糜烂，脓水外溢，同时可见发热，烦躁，唇红口干。治疗以清热解毒为主，佐以疏风止痒。轻者用青黛散或金黄散干扑脐部即可；重症则须内外兼治，内服如五味消毒饮。

脐突 病证名。即新生儿脐部膨出。《证治准绳·幼科》：“因新生洗浴，系脐不紧，秽水浸入于内，产后旬日外，脐忽光浮如吹，捻动微响，间或惊悸作啼。”由于脐部发育不全，或啼哭过多，剧烈咳嗽等，造成腹腔内压力大于腹壁抗力，以致肠管从脐环突出至皮下而形成突出。绝大多数可以自愈。但年龄在二岁以上，脐环直径过大者，则应考虑手术切除疝囊，并修补其腹壁的缺损。

脐粪 见《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》。指婴儿出生后，第一次所排的粪便。一般初生儿于一日内均可排出粪便，呈青绿色，如过时而不解者，多为胎热所致。

脐寒泻 病证名。见《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》。又名脏寒泻。因婴儿断脐失护，风冷乘入，传于脏腑而引起。症见粪色清白，腹痛肠鸣。先用和气饮（苍术、紫苏、防风、赤苓、豆豉、藿香、陈皮、厚朴、炙甘草、生姜），温散寒邪；再用调中汤（人参、茯苓、藿香、白术、炙甘草、木香、香附、宿砂仁、煨姜水煎服），温补脾胃。

脐湿 病证名。出《颅囟经》。指新生儿脐带脱落后，脐孔湿润不干，甚或有水溢出，或脐孔周围稍见红肿。由于断脐后护理不当，为水湿所浸，如洗浴未给揩干，或因尿布过分潮湿，久浸脐部而成。治宜外用收敛固涩药物，如枯矾、煅龙骨、煅牡蛎、滑石粉等，干扑脐部。

脑长头大 病证名。指大头畸形。《太

平圣惠方》第八十二卷：“小儿脑长头大，囟开不合，臂胫小，不能胜头。”常伴有智力发育不全，视力和听力障碍，约有半数病儿发生惊厥。治以固肾为主，用地黄丸内服；用南星、白藜为末，醋调，摊布上，烘热贴敷囟门，以纱布包扎。亦可用烫药方（半夏、芎藭、细辛、桂心、川乌头）研末，煮热，温熨囟门。

脑后顶门 后囟之别称。出《奇效良方》。婴幼儿元气充实者则脑后顶门坚实而矫健。

脑顶风 病证名。出《颅囟经》。指小孩无故摇头的病态。系由肝风内动所致。临床可伴有惊搐、咬牙、弄舌等。须依据具体病情，辨证施治。

脑砂 病证名。出《医学入门》。即控脑沙。详鼻渊、控脑沙条。

脑热 病证名。《太平圣惠方》第八十四卷：“夫小儿肺脏壅滞有热，上攻于脑，则令脑热也。”脑热则引起鼻干，口渴，心烦，不寐等。宜以清热养液为治。

脑热注目 病证名。出《小儿卫生总微论方》。指小儿风热入脑而脸涩常闭不开者。宜用明目饮（方见慢肝风条）。

脑疮 病证名。出《颅囟经》。为头部生疮的一种疳疾。多由小儿平素感受风热，失于发散，加以乳食不调，中气内虚，风热乘虚上犯头部所致。症见头上生疮疡，头热，毛发焦枯如穗，甚至脱落光秃，鼻干，心烦，疲倦，困睡，目睛无神，腮肿囟凸，身热汗出不解等。治宜用龙胆泻肝汤，清热败毒；继用肥儿丸，健脾消疳。

脑崩 见《外科大成》卷三。即鼻渊。详该条。

脑漏 见《外科正宗》卷四。即鼻渊。详该条。

脂塞不孕 病名。出清·叶其蓁《女科指掌》。因体脂过盛，闭塞胞脉，影响胞宫摄精而致不孕。参见肥胖不孕条。

脂癭 病名。出《诸病源候论》卷三十八。亦名胎癭。属八癭之一。病因经期或产后未三十日身体未复而行房事，以致损伤胞络，精与血相搏，则生脂癭之聚。症状在脂膜之间，难以触寻。症见腰背如刺，少腹走注串痛，肢体困倦，骨肉消瘦懈怠，大小便下血，时甚时止等。方用皂荚、白矾、五味子、川椒、细辛、干姜，研末纳阴中。

皱脚 病证名。见《三因极一病证方论》。妊娠晚期，胎体渐长，气机失畅所致。症见脚部浮肿，皮肤色苍粗厚，无其它不适，休息后即消失者，一般产后可自愈。若孕后气血虚弱，下元不足，湿气下注而不痛者，宜顺气养血汤（曾鼎《妇科指归》：当归、白芍、党参、川芎、陈皮、炙草、木香、乌药、阿胶、首乌、桑皮）。

〔、〕

高喘 证名。指突然发热而呼吸迫促的证候。《素问病机气宜保命集·热论》：“暴热上喘者，病在心肺，谓之高喘。”治宜宣肺平喘，用麻杏甘石汤。

疳 病证名。为疳证、疳疾、疳病的简称。是一种由脾胃运化失常所引起的慢性营养不良障碍性病证。多见于5岁以内的儿童。主要由于喂养不当，饮食失调，损伤脾胃，以及六淫疫毒，诸虫感染，热病久病之后而致脾胃虚弱。病因虽多，而病变的关键在于脾胃。《小儿药证直诀》：“疳皆脾胃病，亡津液之所作也。”因脾为生化之源，后天之本；胃主受纳水谷，脾主运化精微，生化气血，滋养百骸，若长期脾胃失调，运化不健，水谷停滞，久则精液耗伤，精血不生，气血俱虚，则可引起形体及五脏的病变。临床上以面黄肌瘦，毛发稀黄，食欲反常，肚腹膨胀，大便失调等为主症。病久则影响生长发育，或因病久正气伤残，导致其他并发症。如由于脾不统血或血热妄行，可见皮肤紫癜；若脾虚水湿泛滥，可形成肢体浮肿；

若正气大亏，阴阳两伤，则可出现阴竭阳脱的危象。本证多见于营养不良或慢性消化不良和小儿结核病后期及其他慢性传染病的损害。由于其病因复杂，症状表现不一，故历代医家对疳的分类，亦较繁杂，有从病因病机命名者，如热疳、冷疳、冷热疳、哺乳疳、蛔疳、甘疳、五脏疳、脑疳、脊疳、节疳、鼻疳、疳眼、牙疳。有从症状命名者，如内疳、外疳、疳嗽、疳癆、丁奚疳、哺露疳、干疳、疳积吐、疳泻、疳黄、疳水、疳痢、疳肚、疳肿胀、钻牙疳等（详见各条）。一般治疗以清热消积，驱虫除疳为主，病因清除之后，则着重于调理脾胃。还可配合捏脊、针刺四缝、割治等。

疳气入阴 病证名。出《证治准绳·幼科》。指疳气下注入阴，致使阴囊水肿呈黄亮色者。多由疳疾脾胃虚弱，以致水湿下注所致。临床可伴有局部肿痛，小便不利，或瘙痒等。治宜化气利湿，用五苓散；外用蛇床子煎水淋洗。

疳气耳聋 病证名。出《本草纲目》。为疳气攻肾出现的耳聋而兼有阴肿的证候。肾开窍于耳，疳气攻肾则肾气虚即不能上充于耳，影响听力减退，甚则耳聋，兼有阴部肿大，属邪实正虚之象。治宜先祛其疳气，用牵牛研末煨猪腰子服；继服六味地黄丸。

疳水 病证名。指疳疾全身浮肿的证候。出《普济方》卷三百七十九。多由疳积日久，脾胃受伤，以致运化失常，水液泛滥，溢于肌肤。症见全身虚肿，皮色㿖白而有光亮，小便量少等。治以健脾利水为主，用茯苓导水汤，或五苓散合五皮饮加减。肿消后，再进养脾肥儿丸（《幼科发挥》：人参、白术、甘草、陈皮、枳实、木香、茯苓、砂仁、山药、莲肉、麦芽、神曲、山楂、青皮）。

疳虫 见《太平圣惠方》第八十七卷。古人认为小儿五疳之疾，皆由乳哺不调，寒温失节而使腹内生虫所致。若久而不愈，则肌体黄瘦，下利不止。治宜服驱虫之

药，虫去则疳气渐退。

疳后天柱倒 病证名。出《证治准绳·幼科》。指小儿久患疳疾，颈椎骨软弱，以致头不能抬起的症状，为精气大亏之候。

疳利 病证名。八利之一。即疳痢。详该条。

疳肚 病证名。出《普济方》卷三百七十九。指小儿腹大而有青筋者。多因食物过饱，阻滞中焦，伤及脾胃，以致气机失运，经脉瘀阻而致腹壁青筋暴露。治宜先消除积滞，舒畅气机，用三棱散（《证治准绳》：三棱、人参、香附、青皮、益智仁、陈皮、枳壳、神曲、谷芽、半夏、莪术、大黄、紫苏、甘草）；继而健脾理气，用消食丸（方见疳积条）。

疳证 见《婴童百问》。即疳。详该条。

疳胀 病证名。见《证治准绳·幼科》。指小儿腹大而有青筋者。见丁奚条。

疳肿胀 病证名。疳疾兼见浮肿腹胀的证候。《婴童百问》：“疳肿胀者，虚中有积，其毒气交并，故令肚腹肿胀。由是脾复受湿，故令头面脚手虚浮是也。”如肺气不宣，脾失健运，则可伴有胸膈饱闷不舒，咳嗽气喘等。治以健脾化气宣肺利水，用御院匀气散（《医宗金鉴》：桑白皮、桔梗、赤茯苓、甘草、藿香、陈皮、木通、生姜皮、灯心草）。如肾气不足，头面、四肢浮肿，宜化气利水，用五苓散合五皮饮加减。

疳泻 病证名。指因疳而泄泻的证候。《婴童百问》：“疳泻者，毛焦唇白，额上青纹，肚胀肠鸣，泄下糟粕是也。”疳、泻并存，治疳必须治泻，亦即按照疳证的虚实轻重，用扶脾和胃的方法，如参苓白术散，随证加减，标本兼治。

疳蚀 病证名。出《千金要方》卷五。即疳疾遍身生疮的证候。由于小儿患有疳疾，忽被风寒所搏，气血凝滞，皮肤不得疏泄而引起。治宜健脾逐风寒，内服人参败毒散，继服肥儿丸；外用蚕茧、明矾（火煨）、密陀僧、白芷研末蜜调敷。

疳疮 病名。《济阴纲目》卷七：“因月后便行房，致成湛浊（湛浊为经事断续不了了也），伏流阴道，疳疮遂生，搔痒无时。生用胡椒葱白作汤、一日两三度淋洗，却服后药：黄芪、菟丝子、沙苑蒺藜、黑牵牛、赤石脂、龙骨，右为末，炼蜜丸，桐子大，每服二十丸”。

疳蚀疮 见《证治准绳·幼科》，即承浆疮。详该条。

疳积 病证名。疳疾而有积滞的证候。出《小儿药证直诀》。古人认为“无积不成疳，”“积是疳之母”。积的成因，多由嗜食生冷、甘肥、粘腻、积滞中脘，脾胃不能消化而致。临床表现为腹胀，腹痛，呕吐，泄泻，所出之物有酸腐气味，久则形体消瘦，精神萎靡，肚大筋青等。治以消积除疳为主。先用平胃散、消食丸（《证治准绳》：砂仁、陈皮、三棱、神曲、麦芽、香附）；继用四味肥儿丸。

疳积吐 病证名。疳积日久而引起食入即吐的证候。凡食积而引起的疳症，久则胃热伤津，津枯胃燥，以致不能容纳水谷。其症除有疳疾症状外，兼有食入即吐，潮热不退。治宜养阴，健胃，用参苓白术散加石斛、谷芽、胡黄连、鲜竹茹之类。

疳积酸泻 出《证治准绳·幼科》。即疳泻。详该条。

疳病 见《明医指掌》卷十。即疳。详疳条。

疳疾 出《颅凶经》。即疳。详疳条。

疳疾目矇 证名。疳疾引起双目昏矇，视物模糊的证候。属疳热上犯于目而致。治法详见疳眼条。或用二百花草膏（《串雅内编》：羊胆汁、蜂蜜，蒸丸）。

疳热流注 病证名。指小儿身患疳疾，潮热生疮，发歇无已的证候。治宜清热消疳，用猪肚黄连丸（《证治准绳》：猪肚，解黄连）。

疳涩眼 出《儒门事亲》。即疳眼。详

该条。

疳黄 病证名。疳疾兼有发黄的症候。由疳疾而致中焦湿热郁蒸，脾失运化所引起；亦有疳疾日久而致血虚黄肿者。症见身黄浮肿，状似黄疸，但目不黄，并兼有疲倦少神，时吐黄水，毛发皆直，嗜异等。治以健脾除疳为主，先服茵陈五苓散；继用香砂六君子汤，以理虚和胃。

疳眼 病证名。出《龙木论》。又名疳涩眼。《儒门事亲》：“凡小儿疳涩眼，数日不开，皆风热所致。”《证治准绳》：“肝者眼之候，上膈伏热，痰涎壅滞，以致肝风入眼，赤肿翳生，眵泪烂眶，痛痒揉擦，昏暗雀盲，甚至经月合眼”，则为疳眼。宜服杀疳散（《龙木论》：防风、龙脑、牡蛎、白芷、细辛、五味子）以疏风散热；如角膜软化，二目畏光羞明，生白翳，由肝阴不足，虚火上炎者，用杞菊地黄丸，或石斛夜光丸，以养肝清肝。并宜早期及时处理，以防角膜炎溃疡、失明，必要时配用西药，参疳疳条。

疳癆 病证名。出《颅凶经》。属肺疳重证。明·万全《育婴秘诀》：“儿童十六岁以下，其病为疳；十六岁以上，其病为癆。疳、癆皆气血虚惫，乃脾胃受病之所致。”《证治准绳》：“热发往来，形体枯槁，面无神采，无血色，名曰疳癆。”古代所称的癆，又名骨蒸孩劳或童子癆，多与结核病相似。今对新生儿普遍接种卡介苗，婴幼儿结核病已较少见。本症即疳热而骨蒸，兼诸咳嗽盗汗等。治宜消疳除热，用月华丸（《医学心悟》：天冬、麦冬、生地、熟地、山药、百部、沙参、贝母、茯苓、阿胶、三七、獭肝、菊花、桑叶）、鳖甲散（《证治准绳》：黄芪、白芍、生熟地黄、鳖甲、地骨皮、当归、人参）加减。

疳痢 病证名。出《颅凶经》。指疳疾合并痢疾。多因饮食不洁，寒温失调所致。临床表现除具有疳的症状外，并有腹痛，里

急后重，下痢脓血等。治以理气和血，消疳制痢为主，用香连丸；久不止者，用木香丸（《证治准绳》：黄连、木香、厚朴、夜明砂、诃子肉）。并参照小儿痢疾治法，根据患儿身体强弱，病情轻重，急则治标，缓则治本，因人制宜。

疳湿 病证名。出《千金要方》卷五。又名疳蠃、湿蠃、疳湿疮。古人认为疳湿是由于久利脾胃虚弱，肠胃之间，虫动侵蚀五脏，使人心中烦懊，其虫上蚀则口鼻齿龈生疮，下蚀则肛门烂痒。用《千金》姜蜜汤（生姜汁、白蜜、黄连），送服化蠃丸（《证治准绳》：茺萸、芦荟、青黛、川芎、白芷、胡黄连、黄连、虾蟆灰）。

疳湿疮 出《千金要方》卷五。即疳湿。详该条。

疳渴 病证名。指疳疾而兼口渴喜饮的证候。出《小儿药证直诀》。多由小儿嗜食肥甘，积滞生热，灼耗脾胃津液而成。症见口渴，多饮而渴不止，并兼有心神烦热不安等。积热者，用小儿疳渴方（《证治准绳》：人参、干葛、黄芩、柴胡、甘草）；送下集圣丸（方见肝疳系），以清热消疳。津液不足者，用清热甘露饮（《医宗金鉴》：生地、黄、麦冬、石斛、知母、枇杷叶、石膏、甘草、茵陈蒿、黄芩），或生脉散、《金匱》麦门冬汤加减，以益气生津。

疳嗽 病证名。见《证治准绳·幼科》。因疳疾而引起的咳嗽，多为疳热损伤肺气所致。临床表现除具有疳的症状外，多伴咳嗽咯痰，胸闷气急，消瘦，盗汗，五心烦热等。治宜利肺除疳，豁痰止咳，用泻白散加减。参肺疳条。

疳瘦 病证名。出《小儿药证直诀》。指疳疾肌肉消瘦，形骸骨立。多由乳食停滞，积而化热，脾胃受伤，运化失职，以致食物精微不能充养肌肤所致。临床表现多伴有面色萎黄，皮肤干燥，腹凹如舟等。治宜消食和气，用异功散，或橘连丸（橘皮、黄

连）和人参粉同服。

疳蠃 ①出《诸病源候论》卷十八。即疳湿。五疳之一。详五疳、疳湿条。②即肺疳。（《婴童百问》）。

疳癖 病证名。出《普济方》卷三百七十九。指小儿因疳而致的癖疾，疳、癖并存之证。癖块潜匿于右肋下，其状如梳，触之隐痛。兼见肌肉不生，渐成羸瘦，或作潮热，肚腹渐大。治宜消疳化癖。

病儿 ①病名。即恶阻。《证治要诀》：“胎前恶阻，俗谓之病儿”。②儿童患病之称。

病后瘡 即肾怯失瘡。详该条。

病阻 出《千金要方》卷三。即恶阻。详该条。

病鬼 见《证治要诀》。即恶阻。详该条。

病涎 六涎之一。指寒邪热毒损伤脏腑，其气结涩凝滞而成。因涎与滞气相交，多发为疼痛。

病膈 见《寓意草》。即恶阻。详该条。

病瘕 病证名。简称瘕。指小儿两侧睾丸肿大。《诸病源候论》卷五十：“瘕者，阴核气结肿大也。小儿患此者，多因啼哭气不止，动于阴气，阴气而击，结聚不散所成也。”治宜利气软坚，用橘核丸。参见小儿阴癰条。

炸腮 病证名。小儿常见的急性传染病。见明·秦景明《幼科金针》。又名炸腮、含腮疮、蛤蟆瘟。临床以发病急，耳下腮部肿胀疼痛为其特征，或伴有恶寒发热，轻度全身不适及咀嚼不便等症。一年四季都可发生，以冬春两季为多见。主要是由于风温病毒从口鼻而入，壅阻少阳经络，郁而不散，结于腮颊所致。两颊腮部属少阳，邪入少阳，络脉壅滞，气血流通受阻，表现于两耳下腮颊部漫肿，坚硬作痛；少阳与厥阴相表里，足厥阴之脉绕阴器，若受邪较重

及较大患儿，可并发睾丸红肿疼痛。如温毒内窜心肝，可见壮热、头痛、嗜睡、呕吐，惊厥，昏迷等（并发脑膜脑炎）。治以疏风、清热，解毒为主，可选用银翘散、普济消毒饮、五味消毒饮等。睾丸肿痛可加金铃子、橘核、荔枝核。昏迷、惊厥者，用羚羊钩藤汤。外治可用青黛散、如意金黄散麻油调敷患处。

疹后失音 病证名。出《治疹全书》。又名痘疮。麻疹没后失音，为热毒闭塞肺窍所致。治以清热解毒为主，用儿茶散（《医宗金鉴》：硼砂、孩儿茶）。

疹后肺癰 病证名。麻疹后并发肺癰。《治疹全书》：“疹后久嗽，痛引胸胁，或吐脓血，或吐如米粥样，此肺内生毒也，名肺癰。”治宜泄热豁痰，解毒排脓。用宁肺桔梗汤（《治疹全书》方：桔梗、贝母、枳壳、杏仁、瓜蒌根、生黄耆、防风、桑白皮、苡仁、知母、地骨皮、甘草、葶苈子、五味子）。

疹后肺痿 病证名。麻疹后并发肺痿。清·赵月航鉴定（撰人不详）《治疹全书》：“疹后久咳不止，时吐白沫如米糊者，为肺痿。”系火热伤肺，津液受损所致。先用加味二冬汤（《治疹全书》：生地、熟地、天冬、麦冬、甘草、桔梗、贝母、苡仁、瓜蒌仁、沙参、紫菀、甘草、款冬花）；后用门冬清肺汤（《证治准绳》：天冬、麦冬、知母、贝母、桔梗、款冬花、甘草、牛蒡子、杏仁、马兜铃、桑白皮、地骨皮）。

痘夏 即注夏。详该条。

痘疮 出《治疹全书》。即疹后失音。详该条。

痂子 出《太平圣惠方》第九十一卷。即痂疮。见该条。

痂疮 病证名。出《太平圣惠方》卷第九十一。又名沸子、夏日沸烂疮、热疮。夏季气候炎热，小儿多生痂疮，即痂子。《小儿卫生总微论方》：“此由盛热汗津出，而腠

理开，被风热毒气干于气血所生。其状细碎，累累如粟芥之类，色赤而痒。多生额、头、胸、背之上，甚至遍身。”如身热、痂子簇集成瓣、颜色鲜红，搔痒较甚者，为热痂。治宜清暑散热，如新加香薷饮，或生啖西瓜等，并用冰水磨檀香外涂。

痘病似天钩 病证名。急惊风类型之一。小儿痘病表现有项背强直，腰身反张，摇头掣颈，噤口不语，发热腹痛，整日不醒，病与天钩不同。多由风寒外邪壅闭经络所致。风重汗出者，用桂枝汤加葛根；寒重无汗者，用葛根汤。参小儿痘病条。

烦热 病证名。发热而烦躁的证候。《诸病源候论》卷四十六：“小儿脏腑实，血气盛者，表里俱热，则苦烦躁不安，皮肤壮热也。”治宜清宣胃热。用竹叶石膏汤加减。

消上 病证名。小儿消渴之一。《幼科铁镜》：“消渴，心火动而消上，上消乎心，移热于肺，渴饮茶水，饮之又渴，名曰消上。”治以滋阴养液为主，宜莲花饮（甘草、知母、莲花须、黄连、瓜蒌仁、五味子、人参、干葛、白茯苓、生地、竹叶）；次以润燥养心，宜生津四物汤（当归、川芎、白芍、生地、知母、麦冬、黄连、乌梅、花粉、薄荷、石莲肉、黄柏、炙甘草）。

消中 病证名。《素问·脉要精微论》：“瘠成为消中。”即消肌。详该条。

消肌 病证名。为小儿消渴之一。即消中。宋·黎民寿《简易方》：“若热蓄于中，脾虚受之，伏阳蒸内，消谷善饥，食欲倍常，不生肌肉，好饮冷水，小便频数，色白如泔，味甜如蜜，名曰消中，又曰脾消，属于中焦，病在水谷之海也。”《幼科铁镜》：“消肌、脾火动而消中，中消于脾，移热于胃，喜多食，食无足时，小便色黄，名曰中消”。治宜养胃存津。用白虎加人参汤加减。

消肾 即消浊。详该条。

消乳 指哺乳期间中断乳汁分泌的方法。王实颖《广嗣五种备要·保胎方论》：

“产母不令子饮乳，有乳而欲消者，用麦芽五钱，炒为末，四物汤调服即消。或用神曲二钱，炒为末，酒吞日服一次”。参见断乳条。

消浊 病证名。小儿消渴证之一。又名肾消。《幼科铁镜》：“消浊，火动消肾，移热于膀胱。”《幼幼集成》：“乃上消之传变，肺胃之热久不清，乃至动而消肾，移热于膀胱，小便浑浊，色如膏脂，名曰下消。”治宜滋阴清热。用加味地黄汤，或四物汤加莲子、知母、芡实、麦冬。

涎嗽 证名。出《儒门事亲》。指咳嗽而有痰涎溢出者。多由风热炽盛，灼液酿成痰涎，上逆而嗽；亦有素体阳虚，肺复受寒，以致痰涎上泛，射肺而嗽。风热炽盛者，治以清热豁痰为主，用温胆汤加竹黄，竹沥，僵蚕之类；阳虚受寒者，以温中散寒为主，用六君子汤加干姜，白附子之类。

流行性乙型脑炎 病名。是一种比较严重的急性传染病。发生于夏秋之际。属于暑温、暑风、暑痉、暑厥范围。暑热之邪由口鼻而入，先在阳明气分。临床以发病急，病情变化大，高热，头痛，呕吐，嗜睡惊厥，昏迷等为主症。在恢复期和后遗症阶段，又可有余热稽留和各种轻重不等的神经精神症状。由于本病的发病季节，正值“暑气下迫，湿气上腾”即暑湿行令的时期，因此，暑邪为本病的主要原因。暑为阳邪，易于化火动风，所以高热可引起抽搐、昏迷；即所谓热极生风，风动生痰，痰盛生惊。而热、痰、风三者的病机转归又是互为因果，互有联系，尤其在重型病例中，病情来势凶猛，常因高热、昏迷、抽搐的持续，而出现呼吸、循环衰竭。其主要转归是热、痰、风相互充斥，风火相煽，痰闭清窍，从而由闭及脱，而产生呼吸不整，面色灰滞、苍白，四肢不

温，腹胀，脉息微细而促等内闭外脱的危象。在重症病例中，热、痰、风三症往往互为存在，在早期，多属实证、闭证；在后期，若因病邪久留，脏腑、经络、气血的功能受到严重的耗损，余邪留在经络，或津液耗损，则以虚为主，或虚中夹实，往往留有各种轻重不同的后遗症。治以清暑解毒为主。初起在表，用新加香薷饮；暑热偏重，用白虎汤加减。同时，因暑必挟湿，所以需配合芳香化湿之剂，如甘露消毒丹；暑风盛者，用羚角钩藤汤；暑湿挟痰，用温胆汤加减；严重病例，高热者，配紫雪丹；昏迷者，配安宫牛黄丸；惊厥者，配至宝丹。恢复期发热，多为余邪未尽，可用清络饮。呼吸衰竭，可取膻中、中府、肺俞等，用10%人参注射液，作穴位注射。危重病例可采取中西医结合治疗。

流红 病证名。指胎漏下血。陈无咎《女科难题》：“怀胎而月经忽来者，名曰流红”。

流珠形 小儿指诊法十三指形之一。详十三指形条。

流涎 证名。口角流涎，难以控制。《张氏医通》：“夫脾主涎，脾虚则不能收摄，多兼流涎”。参见脾风多涎、脾热多涎、脾冷涎多、脾虚多涎各条。

涕液不收 病证名。小儿鼻常流涕不收。《圣济总录》卷一百八十：“风冷伤于肺经，或冷中囟户，皆因小儿涕液不收。盖肺气通于鼻，脑液下通于鼻故也。”治宜解表散寒。用菊花散（《证治准绳》：甘菊花、防风、前胡、细辛、桂心、甘草）。

浴儿法 出《千金要方》卷五。洗浴婴儿，是为初生婴儿去除污秽，清洁皮肤，具有防止皮肤病和疮疖的作用。洗浴的水，前人用桃、槐、桑、梅、柳五枝煎成，临浴时，要选择在无风的地方，洗浴的时间要适可而止，注意脐带的干燥，不可久坐水中恣意洗浴，以免冬天受凉，夏天受热。如洗浴

水中加少许猪胆汁，不仅可以除污去秽，而且能够滋润皮肤，更能起清热解毒，预防疮疡。经常洗浴小儿，不仅可去除污秽，清洁皮肤，且有加强血液循环，促进新陈代谢的作用。

浪脐生 《张氏医通》卷十：“儿出胞时，头必转向产门，自然正产。若无力转运，脚踏胞衣，脐肠先出，谓浪脐生。急令稳婆清理推入，稍俟气平，乘势就其脚下，不可推转久延。久则脐肠复下，复难收拾矣”。类似于臀足位分娩，脐带脱出。

漫淫疮 病证名。指风湿疮疹，漫延全身者。《诸病源候论》卷五十：“小儿五脏有热，薰发皮肤，外为风湿所折，湿热相搏身体，其症初出甚小，后有脓汁浸淫渐大，故谓之浸淫疮也。”即湿疹。治宜祛风清热，渗湿、收敛、止痒。可用白鲜皮、儿茶、乌梅、五倍子、苦楝皮、紫草茸、黄柏、苦参、枯矾，煎汁内服、外洗。

被噤 (gì奇) 出《诸病源候论》卷四十七。即继病。详该条。

被膜儿 出阎诚斋《临产须知评正》。即混元生。详该条。

调产 调，调节、料理之意。指产时料理产妇应注意的事项。《傅青主女科》：“调产者，产母临月，择稳婆，办器用，备参药。产时不可多人喧闹，二人扶身，或凭物站。心烦，用滚水调白蜜一匙，独活汤更妙，或肌服糜粥少许，勿令饥渴。有生息未顺者，只说有双胎，或胎衣不下，勿令产母惊恐”。

调经 指妇科治疗月经病的一种法则。见《妇人良方大全》卷一。如先病而后经不调者，当先治病，病愈则经自调；若因经不调而后生病者，必先调经，经调则病自愈。

〔7〕

陷伏 见《奇效良方》。即黑靥。详该条。

陷经 指经血下陷、漏血不止的病证。《金匱要略·妇人杂病脉证并治》：“妇人陷经，漏下黑不解，胶姜汤主之”。参见崩漏条。

通乳 指通下乳汁，适用于产后乳汁不通或缺乳者。详见催乳条。

通脉法 神奇外治法之一。凡小儿手足突然厥冷，邪闭经络者，用生姜煨热，捣汁半小杯，略入麻油调匀，以指蘸姜油，摩儿手足，往下搓挪揉挾，以通其经络，候其热回，以纸拭去，如以小儿指纹滞涩，推之不动，急以此法推豁，不论阴阳虚实，均可用之。

通睛 病证名。出元·危亦林《世医得效方》。又名斗鸡眼、斗睛。多见于小儿。由惊风后遗，或受猛烈震荡所致。一眼或双眼黑珠相对呆定于眦侧，瞻东反西，顾左反右，若振掉头脑，则睛方转。治宜化痰通络为主；结合针刺睛明、攒竹、丝竹空、合谷等穴。

难产 见《诸病源候论》卷四十三。又名产难。指胎儿娩出发生困难，为各种异常产的总称。多因气滞、气虚、血滞等原因所致。杨子建《十产论》中伤产、催产、冻产、横产、倒产等均属难产范围。

难产七因 出《赞育编》。指造成难产的七种原因。即：一因安逸，二因奉养，三因淫欲，四因忧疑，五因娇怯，六因仓皇，七因虚乏。

难乳 病名。出《诸病源候论》卷四十七。指小儿不能吮乳。《小儿卫生总微论方》：“小儿难乳有二：一者儿初生，客风邪热中脐，流入心脾之经，即令舌厚唇燥而急，口不能乘乳，故乳而不能啜饮也。二者儿初生时，拭掠口中秽血不及，咽而入腹，则令儿心腹痞满，短气促急，故口不能吮乳。”治宜清热除秽，用五福化毒丹（《明医指掌》：玄参、桔梗、甘草、牙硝、青黛、人参、茯苓、黄连）。

验齿 指验齿与龈以辨病。叶天士云：“齿为肾之余，龈为胃之络。小儿病看舌后，亦须验齿。“热邪耗肾液者，齿色必黄，黄如酱瓣宜救肾。热邪耗胃液者，齿色必紫，紫如干漆，宜安胃。齿光燥如石者，胃热；枯骨色者，肾液枯；若上半截润者，是水不上承，当心火上炎”（《厘正按摩要术》）。

验胎 产科诊法。亦名候胎。是古代服中药检验是否怀孕的方法。《妇人良方大全》卷十一：“妇人经脉不行，已经三月，欲验有胎，川芎生为末，空心浓煎艾汤调下二钱，腹内微动，则有胎也”。

绿虫病 病证名。由生食猪、牛、鱼肉引起。绿虫长盈丈，节片构成，寄生在小肠内，绿虫尾端节片常脱落后随大便排出，长

寸许，故又叫寸白虫。《太平圣惠方》：“其虫发动，则伤人脏腑，饮食不成肌肤。”轻者无自觉症状，较重者全腹疼痛，食欲异常等；并可出现脾失运化，肝失疏泄等。治宜驱虫，可用槟榔、芜荑、苦楝根皮、鹤虱、雷丸、石榴皮、南瓜子、贯众等；调理脾胃，可用异功散加麦芽、枳实。

继病 病证名。出《证治准绳·幼科》又名交乳、魛病、被魛、中魛。由“魛乳”或乳食停滞而致的营养不良性疾病。《古今医统》：“怀孕乳儿，致令黄瘦，腹大脚软，名曰魛病。”《小儿卫生总微论方》：“其候精神不爽，身体痿痹，骨软发落。”治用消乳丸消乳积，有热者用龙胆汤清热；继以参苓白术散补之，令儿断乳则愈。

十 一 画

〔一〕

琉璃胎 病证名。即子肿。《女科玉尺》：“妊娠五、六月以来，浮肿如水气者，名曰子肿，俗呼琉璃胎”。

麸蒸法 中湿脚肿的外治方法。即用小麦麸、花椒、生葱、盐、酒、醋拌润，放锅内炒热，将患脚熏蒸其上，盖以衣被，多蒸汗出为度，勿见风（余梦塘《保赤存真》）。

黄水疮 病证名。又名黄水粘疮。临床特点为薄脓疮，结痂，传染性较强，发生于面部和手足等处，多发于儿童，常在夏秋季流行，相当于脓疱病。《外科正宗》：“黄水疮，于头面耳项忽生黄疮，流脂水，顷刻沿开，多生痛痒。”由感受风湿、热毒而成。治以清热解毒，兼以疏风为主。用九味解毒散内服。外用黄柏、连翘、蒲公英煎水洗患部。

黄水粘疮 出《证治准绳·幼科》。即黄水疮。见该条。

黄耳伤寒 病证名。风毒入耳而引起的发热化脓性疾患。清·张石顽《伤寒绪论》：

“风温时毒，先犯少阳，续感暴寒而发，乃太少两阳合病，状类伤寒，以其两耳发黄”。初起常有发热，头痛，耳痛，耳聋；婴儿表现烦躁不安，数日后鼓膜穿破，则耳道有脓溢出，类似化脓性中耳炎。治宜疏风清热，可选用荆防败毒散、银翘散及五味消毒饮之类。

黄连法 古代下胎毒法之一。取黄连捣碎，用水浸泡出汁，时时滴儿口中，婴儿初生，体内蕴有胎热，或值夏季气候炎热之时宜用之。有清热解毒的作用。

黄肿 出《丹溪心法》。即钩虫病。详该条。

黄带 病证名。见《傅青主女科》。亦名带下黄候。指阴道内流出淡黄色、稠粘的液体，甚则色浓如茶汁，或有臭秽气味。多因体内湿邪过盛，湿郁化热，伤及任、带二脉所致。治宜清热利湿解毒。方用易黄汤。

黄胖病 见《医学正传》。即钩虫病。详该条。

黄病 指黄疸。《诸病源候论》卷四十六：“黄病者，是热入脾胃，热气蕴积与谷气相搏，蒸发于外，故皮肤悉黄，眼亦黄，……又有百日半岁小儿，非关伤寒温病，而身微黄者，亦是胃热”。然小儿有素体阳虚者，亦可出现《伤寒论》所载“身目为黄……寒湿在里不解”的病机。故黄病辨证有阳黄与阴黄的区别。阳黄，是胆胃湿热相蒸，上不得越，下不得泄，熏蒸郁遏，溢于肺脾，以致肌肤身目俱黄。其症黄如橘子，色泽鲜明，口渴引饮，大便干结，小便黄涩。治以清热、利湿。选用茵陈蒿汤、栀子柏皮汤、大黄硝石汤、犀角散（《千金要方》：茵陈、犀角、山栀、黄连、升麻）等方加减。阴黄，是湿从寒化，脾阳失于运化，胆液为湿所阻，致浸润肌肉，散溢皮肤而成。其症黄如烟熏，肤色晦暗，怕冷，不发热，口中气冷，神疲嗜卧，便溏。治宜温脾，化湿。用茵陈理中汤加减（《中医临证学基础》：茵陈、白术、苍术、干姜、炙甘草、茯苓、薏苡仁）。

黄崩 病证名。出《脉经》。指妇女血崩所下的液体色黄者。治宜健脾除湿。方用补中益气汤加苍术、黄柏、乌贼骨。参见崩漏条。

黄瘕 病名。出《诸病源候论》卷三十八。属八瘕之一。多因经水行时，感受风邪所致。症见左胁下有气，牢结不可抑，腰背相引而痛，小腹常急，下引阴中如刺，不得小便，或溺黄赤，时发寒热。方用皂荚、川椒，细辛，研末纳阴中。

著嗽 即嗽风。详该条。

梦生 病证名。即初生不啼。《济阴纲目·保婴经验方》：“初生不能发声，谓之梦生”。详闷气生条。

梦与鬼交 出《妇人良方大全》卷六。即女子梦交。详该条。

雪口 病证名。即鹅口疮。清·程永培《咽喉经验秘传》：“雪口一名鹅口，初生月内小儿，满口生舌上，白雪如鹅口样，故名。”详鹅口疮条。

盛胎 见《本草纲目·论月水》。即激经。详该条。

捧心生 旧病名。亦名儿捧母心。见清·陈莲舫《女科秘决大全》。相当于臂位分娩，儿两臂上举。属难产的一种。古人从现象观察，误以为儿捧母心以致难产，故名。

掩脐法 通利二便的方法。用连须生葱、生姜、淡豆豉、食盐，同捣烂，作一饼，铤子烘热，掩肚脐，以帛扎定，良久气通，二便自利。用于中下二焦积热，大小便秘（《幼幼集成》）。

控脑沙 病证名。见《景岳全书·杂证谟》。又名脑砂。多因鼻渊久而不愈所致。其症“鼻中淋漓腥臭血水，头眩虚晕而痛”（《医宗金鉴·外科心法要诀》）。或鼻中流臭黄水（《幼幼集成》）。参见鼻渊条。

推肠生 指分娩时，产妇直肠脱出。见宋·陈选《妇科秘兰》。即盘肠生。详该条。

[1]

虚中积 病证名。指脾胃虚弱而挟有积滞。由脾胃素虚，加之乳食不节而形成。《证治准绳·幼科》：“其候浑身微热，不思饮食，昏昧神缓，抱着一似睡未觉，肚热足冷者，多因吐泻大病及攻击之后而得此候。”治宜补益消积。用参苓白术散加消导之药。

虚风 病证名。①即慢脾风。出《婴童百问》。②指血虚、阴虚内生的风证，亦称内风。多见于大汗、大吐、大泄、失血，或久病伤阴者。症见眩晕震颤，或手足蠕动，昏仆等。《临证指南》华岫云注云：“今叶氏发明内风，乃身中阳气之变动，肝为风脏，因精血衰耗，水不涵木，木少滋荣，故

肝阳偏亢，内风时起。治以滋液熄风，濡养营络，补阴潜阳。”宜用大小定风珠、复脉汤、阿胶鸡子黄汤（方见慢惊风条）等加减为治。

虚里动气 虚里相当于心尖搏动的部位。古人认为“虚里与寸口相应”，故诊虚里的动气与寸口切脉同义。王孟英认为“小儿脉候难凭，惟揣虚里穴，确有可据”。《柳州医话》：“凡治小儿不论诸证，宜先揣虚里穴，若跳动甚者不可攻伐，以其先天不足也”。虚里动气的不及与太过，可以辨别病机的变化。如其动微而不见，为不及，属宗气内虚；若动而应衣，为太过，属宗气外泄。按之应手动而不紧，缓而不急者，为宗气积于膻中的正常现象。《诊病奇核》：“虚里动气有三候，浅按便得，深按却不得者，气虚之候。轻按洪大，重按虚细者，血虚之候。有形而动者，积聚之候”。

虚坠 病证名。指痢疾病人大便后肛门坠重的症状。《医宗金鉴·杂病心法要诀》：“粪出更坠，为粪后坠，非滞也，故曰虚坠。”有气虚者，为大肠气降而不能升，治以升气举陷为主。有血虚者，所谓“虚坐努责”即是其特点，治以补血为主。

虚胀 病证名。出《小儿药证直诀》。指因脾虚所致的腹胀。《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》：“凡小儿久病脾虚，或吐泻暴伤脾气，健运失常，所以饮食不化，食少腹部胀满。现症精神倦怠，面黄肌瘦，此虚胀也。”治宜健脾为先，兼以导滞用六君子汤加木香、厚朴。

虚热经行先期 病证名。经行先期证型之一。见《医宗金鉴·妇科心法要诀》。病因阴血不足，虚热内扰冲任所致。症见经期提前，经量较少，血色鲜红，质稠粘，兼有颧红，手足心热等。治宜养阴清热。方用地骨皮饮或两地汤。

虚热痉 出清·吴鞠通《解儿难》。即本脏自病痉，详该条。

虚积痢 病证名。出《普济方》卷三百九十六。脾胃虚弱而致积滞的痢疾。小儿脾胃嫩弱，过食肥甘，成为积滞，积滞过久，即成此证。其症腹痛喜按而软，里急后重，日夜无度。治宜健脾益胃，用大安丸合香连丸。

虚涎 六涎之一。由虚热上蒸，其涎并上。其症“初发作时，先觉清涎满口，渐闻心前有一物，上触咽喉中急促，闷倒不觉”（《史载之方》）。治宜灸气海，补暖脾胃。

虚弱血崩 病证名。指因气血虚弱，冲任失固，导致血崩。治法：崩中不止，所下血块色紫者，用《妇人良方大全》小蓟汤；崩血无度虚损羸瘦者，宜《千金要方》鹿茸散。

虚痘 病证名。痘出不红润，色灰白，痘顶陷凹的症状。此气血两虚所致。治宜保元汤加肉桂之类（明·徐春甫《痘疹泄秘》）。

虚寒白喉 白喉证型之一。见清·余二田《喉症指南》。由秉质素弱，兼感寒邪所致的白喉。其症初起无恶寒发热，饮食如常，惟唇白面青，精神疲倦，喉内起白皮或白块，随时增加。治以温经散寒为主。用附桂理中汤。参见阴寒白喉条。

虚寒血崩 病证名。由于心气不足，或劳役、饮食不节，或过服寒凉之药所致。症见血崩不止，脐下如水浸凉，恶寒不已，所下白带白滑，或如屋漏水，时有鲜血而不多。本病较为少见。治法：丁香研细末，黄酒食前送服；或用丁香百粒，酒煎服亦可。又阿胶25克，熟艾5克，干姜5克，水煎冲阿胶服之。或以益智仁炒，研细末，淡盐汤调服。

虚寒腹痛 病证名。小儿素体阳虚或病后体弱，脾胃虚寒，中阳不振，寒湿停滞，气机不畅而致腹痛。症见腹部隐隐作痛，绵绵不止，喜按喜热，得食则舒缓，面色㿔白，形寒肢冷，纳呆便溏。治宜温养脾胃，

甘缓止痛。用小建中汤加黄芪。

虚羸痢 病名。出施雯《盘珠集胎产证治》。古人对产后患痢，同时身体羸弱者，谓之虚羸痢。参见产后下利条。

颅胀 病证名。指头皮光滑，额角胀大的病态。清·程杏轩《医述·幼科集要》：“颅胀，与囟填不同，……头皮光急，额角胀大，乃肝肾虚热上冲”。治宜育阴之剂以镇之，用地黄汤加减。

悬痈 病证名。出《诸病源候论》卷三十。又名垂痈、上腭痈。《脉因证治》：“有悬痈生在上腭”。为五脏六腑有伏热，上冲于咽喉，热气乘于悬雍所致。其症多见上腭肿起疼痛，色红，饮食吞咽均感不适，或身发寒热，口渴，舌苔黄，脉数等。治宜泻火解毒，消肿止痛。可选五味消毒饮、黄连消毒饮、仙方活命饮等加减。参见上腭痈条。

野合 古人指绝经后再孕者。宋·薛轩《坤元是保》：“女子二七而阴道通，七七而阴道绝，绝而后育，是名野合，野合之子率多不寿”。

野鸡痢 病证名。①指大便下血。《幼科金针》：“粪前粪后，点滴而下，无腹痛后重者是也。”因湿热内蕴，或风热外受，积于肠道，损伤阴络，血热妄行，下溢肛门所致。治宜清热凉血，用槐花散。②指诸色痢。《幼科发挥》：“痢下赤白青黑者，名野鸡痢。”

眼赤痛 病证名。双眼赤而肿痛。《太平圣惠方》第三十二卷：“夫肝气通于目，脏内有热，与胸膈痰饮相搏，熏渍于肝，热气冲发于目，故令眼赤痛。”治宜清热泻肝之剂，如小防风汤（《证治准绳》：大黄、栀子、甘草、赤芍、当归、防风、羌活）。

眼胎赤 病证名。又名胎赤眼。即初生儿眼睑及结合膜充血、糜烂。《太平圣惠方》：“夫小儿眼胎赤者，是初生洗目不净，令秽汁浸于眦中，使脸赤烂，至久不差，故云胎赤也。”见于新生儿急性包涵体

性结膜炎。治宜清热解毒，内服清凉膏（《证治准绳》：大黄、黄连、黄柏、葛根、细辛、薄荷）；外用洗眼黄柏汤（《太平圣惠方》：黄柏、秦皮、蕤仁、枣，煎水，适寒温洗之）。

眼疳 病证名。出《太平圣惠方》第八十七卷。疳热挟肝火上攻于眼的证候。其症初起双目痒涩赤烂，继则红肿热痛，不时流泪，畏光羞明，渐渐白睛生翳，遮满全眼，并有口渴善食而消瘦，发焦，下泄，腹胀，鼻干等。治宜疏肝泻热，用泻肝汤，继用《医宗金鉴》清热退翳汤。或用草决明晒干，生鸡肝（猪肝亦可）一具加酒，饭上蒸服（《本草纲目》）。

眼睫连割 出明·薛铠《保婴撮要》。即目连割。见该条。

蛇丝惊 见《幼幼集成》。即弄舌。详该条。

蛇舌 病证名。见陆乐山《养生镜》。指舌头似蛇舌的伸缩不停。为心经受风热邪毒所致。其症可伴有呕酸水、吐顽痰等。宜用汤匙蘸香油刮肩井；针刺舌尖、中冲出血。并内服疏风清热，解毒活血之剂。

蛇身 出《诸病源候论》卷二十七。即鳞体。见该条。

蛇串疮 见《医宗金鉴·外科心法要诀》。即蛇缠虎带。详该条。

蛇胎 见《验方新编》。即鳞体。详该条。

蛇缠虎带 病证名。出明·万全《育婴家秘》。又名缠腰火丹、火带疮、蛇串疮。系由湿热火毒，蕴蓄经络而发。《外科大成》载其症“初生于腰，紫赤如疹，或起水疱，痛如火燎”。虽多发于腰及胸胁等处，但亦可发生于其他部位。发病前，局部常有疼痛，同时伴有微热和全身不适等症状。2~3天后，局部皮肤出现不规则的小红斑，随即在小红斑上发生水疱，密集成群。发生在躯干或四肢时，常依次排列成带状。

即带状疱疹。治宜清热解毒，泄火去湿。用龙胆泻肝汤加减，外用黄连膏涂查。并可配针刺合谷、曲池、血海、太冲等穴及耳针治疗。

蛇瘕 病名。出《诸病源候论》卷三十八。属八瘕之一。多因经水适止，若远行道路，饮污秽之水，食不洁之食，留络不去而致。症在脐上下，或左右胁，其形长大，上犯心肝，令人不敢喘气，腰背痛，难以动作，少腹热，膀胱引阴挛急，小便黄赤，两股胫间时痛。方用川大黄、黄芩、芒硝、甘草、乌贼骨、皂荚，研面每服五钱。

壘胀 病证名。①壘即胀，指腹部膨隆。《证治准绳·杂病》：“许学士云：脐腹四肢悉肿者为水。但腹胀，四肢不甚肿，为壘。壘即胀也，然胀亦有头面手足尽肿者，大抵先头足肿后腹大者，水也；先腹大而后四肢肿者，胀也。”②“肚上青筋，腹满滑泄，名为壘胀”（《小儿卫生总微论方》）。

壘毒痢 病证名。痢疾的一种类型。出《圣济总录》卷一百七十八。又名壘痢。由于患者正气内亏，感染毒痢之气，邪与气血相搏，入于肠胃，毒气蕴积，值大肠虚者，则便痢血，其特点为排出物如鸡鸭肝片。由于毒气盛热，侵入脏腑，状如中壘，故称。

壘痢 壘毒痢之简称。详该条。

晚期妊娠中毒症 病名。是孕产妇所特有的病症，多发生在妊娠24周以后，临床以高血压、水肿、蛋白尿为主要症状；严重时出现头痛眼花、抽搐或昏迷。表现以高血压为主症者，近于妊娠眩晕，先兆子痫。表现以水肿为主证者，多属于子肿范围。表现以抽搐或昏迷为主证者，属子痫。可根据临床症状辨证论治。

晚嫁难产 病名。清·汪嘉谟《胎产辑萃》：“三十后适人者，谓之晚嫁。盖少嫁则筋骨软，故产门易开；晚嫁则筋骨坚强，所以难产”。临月可服苧麻根饮（苧根、人参、陈皮、生地、炙草、乌梅肉，水煎服）。

崩 病证名。指经血妄行，即妇女的血

崩病。由于阳盛阴虚，迫血妄行而成。《素问·阴阳别论》：“阴虚阳搏，谓之崩”。参见血崩条。

崩中 病证名。指阴道忽然大量出血。《诸病源候论》卷三十八：“崩中者，腑脏伤损，冲脉任脉血气俱虚故也。冲任之脉，为经脉之海，血气之行，外循经络，内荣腑脏，若无伤则腑脏平和而气调，适经下以时，若劳动过度，致腑脏俱伤，而冲任之气虚，不能约制其经血，故忽然暴下，谓之崩中”。参见血崩条。

崩中五色俱下 病证名。指崩下之血杂有五色。《诸病源候论》卷三十八：“五脏皆禀血气，五脏之色，随脏不同，伤损之人五脏皆虚者，故五色随崩俱下”。

崩中漏下 病证名。即指崩漏。《诸病源候论》卷三十八：“崩中之状，是伤损冲任之脉。冲任之脉皆起于胞内，为经脉之海，劳伤过度，冲任气虚，不能约制经血，故忽然崩下，谓之崩中。崩而内有瘀血，故时崩时止，淋漓不断，名曰崩中漏下”。

崩中漏下五色 病证名。出《诸病源候论》卷三十八。即经血崩下而夹瘀血在内，以致淋漓不断，谓之崩中漏下。多因劳伤过度，冲任气虚不能统制经血，故忽然崩下，或漏下淋漓不止。其夹有五色者，古人认为乃随各脏之虚而出现有赤、白、青、黄、黑等的不同颜色。

崩砂 肾疳五证之一。出《小儿药证直诀》。详牙疳条。

崩漏 病证名。见《济生方》。亦名崩中漏下。崩，指不在经期突然阴道大量出血，来势急骤，出血如注；漏是出血量少，淋漓不止，或经期血来，量少而持续日久不止者，前人以其出血淋漓不断，如器之漏，故名。在发病过程中，两者常易互相转化，如崩血渐少，可能致漏，漏势发展又可转变为崩，因此，临床有时不易截然分开，故多以崩漏并称。本病多发生于青春期及更年期

妇女。多因血热，气虚，肝肾阴虚，血瘀，气郁等，以致冲任不固所致。治崩要以止血为先，以防晕绝虚脱，待血少或血止后，可审因论治，亦即急则治标，缓则治本的原则。参见血崩、漏下等条。

崩漏下血夹水 病证名。见《医宗金鉴·妇科心法要诀》。病因饮食不节，或劳伤形体，损伤脾胃不能摄血归源；或素有心气不足，复因饮酒劳倦，致令心火乘脾所致。症见崩漏下血夹有水湿，或每日水泻一二次，气短，怠惰嗜卧，疲倦乏力。如形体不甚虚弱者，治宜先胜其湿。方用调经升阳除湿汤；如元气已虚弱者。治以补中胜湿法，用补中益气汤（重用补中益气汤）。

婴儿 即新生儿。马王堆汉墓帛书载有“婴儿索痉。”《古今医鉴》：“初生者曰婴儿，三岁者曰小儿，十岁者曰童子。”

婴儿不睡 出《幼科铁镜》。详不寐多困条。

婴儿哭迟 出《证治准绳·幼科》。即初生不啼。详该条。

婴幼儿疮疡 婴幼儿疮疡发病。《外科精要》谓“凡小儿属纯阳，其痈疽之疾也，多因心气热而患之。”《婴童百问》谓痈疽肿毒，皆由气血凝滞而有热毒之气乘之，结聚而成。因婴幼儿脏腑娇嫩，气血未充，肌肉不坚，筋骨尚脆，故凡患疮疡者，一般宜清热解毒，内疏内托，缓和之剂内服，或消肿拔毒之品外敷，峻猛之剂切忌滥用。

婴孩寒热 出《本草纲目》。指婴孩恶寒与发热同时或先后出现，及寒热往来而言。一般外感初期均有恶寒现象，继即发热。有发热与恶寒并见，有热重寒轻，有热轻寒重，均为表证。外感不论伤寒、温病，有一分恶寒即有一分表证。有表证治应解表。表寒用辛温解表，如麻黄汤、荆防败毒散；表热用辛凉解表，如银翘散、桑菊饮。寒热往来属少阳经证，常伴口苦，咽干，目眩，胸胁苦满等症，用小柴胡汤和解，不可

妄用汗、吐、下。

〔〕

停经 即经血停止。多指经闭，或指月经净后。

停食 病证名。见《金匱翼》。由于气机不畅，以致食物停滞而形成的脘闷，暖气等症状。治宜理气为主，兼以消导。参见伤食、积滞条。

偏风口噤 见《证治准绳·幼科》。即小儿偏风，详该条。

偏产 见杨子建《十产论》。指在分娩过程中，由于产妇用力不当或其他原因，使儿头偏左或偏右，不能即产。相当于儿头先露的异常分娩。有仰顶生、垂头生、左歪、右藉、胀后产、前跻等名称。详各条。

偏坠 见《证治准绳·幼科》。即狐气疝。见该条。

偏经 见庄复严《妇科百辨》。即经行便血。详差经条。

假胎 见《续名医类案》卷二十四。即假孕，指经闭腹大而无胎息可验的病证。包括气胎、血胎、痰胎。详见各条。

假搐 病证名。①指外感寒邪，客于肌表，小儿体弱不胜其邪，发为抽搐者（《小儿卫生总微方论》）。②病虽见搐抽者，目上视，但牙关不紧闭，口无痰涎者，为“假搐”（《东医宝鉴》）。③“发热抽掣，少时掣定，神气清爽，能吮乳者，名假搐”（清·许宣治《许氏幼科七种》）。参搐条。

盘肠气钩啼 病证名。指小儿啼叫之由盘肠气钩所致者。《普济方》卷三百六十一：“盘肠气发先腰曲，无泪叫啼眼干哭，口开脚冷上唇乌，额上汗流珠碌碌”。治宜行气止痛。用木香散。

盘肠气痛 病证名。出《婴童百问》。又名盘肠痛、肠痛。多由小儿脾气不足，感受寒邪风冷，搏于肠间所致。症见腹痛曲腰，叫哭不已，不乳，面色青白，两眉蹙

锁，大便泻青，额上汗出等。治以温运脾阳，行气止痛。用金铃子散或沉香降气汤之类。

盘肠生 见《张氏医通》卷十。又名推肠生、蟠肠生、盘肠献花、盘肠产、盆肠生、催肠生。过去一般认为产母平日气虚，临产时努挣，浑身气血下注，以致肠随儿下，儿下后肠仍不收。相当于临产时产妇直肠脱出。宋·陈选《妇科秘兰》：“临产时肚肠先出，然后产子，产子之后，其肠不收，甚是苦楚，以蓖麻子十四粒去壳研如膏，贴产母头顶，肠收即忙拭去，又名推肠生。”

盘肠似内钩 病证名。急惊风类证之一。即小儿盘肠气痛，表现有干啼，额上汗出者。多因小儿肠胃脆弱，突为寒气所搏而成。治宜利气散寒。用金铃子散加减（《幼科发挥》）。

盘肠产 见《张氏医通》卷十。即盘肠生。详该条。

盘肠痛 见《幼科发挥》。即盘肠气痛。见该条。

盘肠献花 即盘肠生。《杜氏女科辑要》：“临产子肠先出，产后肠不收，名曰盘肠献花”。详盘肠生条。

遇经 指月经一年来一次。夏福康《女科知要》：“有一年一行谓之遇经，此皆生理上之特异，非关病也”。参见避年条。

脚手先下难产 病证名。《傅青主女科》：“妊妇生产之际，有脚先下而儿不得下者，有手先下而儿不得下者。人以为横生倒产，至危之症也，谁知是气血两虚之故乎。……产母之气血足，则胎必顺；产母之气血亏，则胎必逆。顺则易生，逆则难产。气血既亏，母身必弱。子在胞中，亦必弱。胎弱无力，欲转头向下而不能，此胎之所以有脚手先下者也……。急用转天汤（人参、当归、川芎、川牛膝、升麻、附子），以救顺之。

脚拳 病证名。即脚趾挛缩不展。《太

平圣惠方》第八十九卷：“夫小儿脚拳，由在胎之时，其母脏腑内有冷积，为风邪所乘，儿生之后，肾气不足，气血未营，故令脚指拳缩不展。”治宜益肾、和血、祛风、舒筋之剂。

脚踏莲花生 见亟斋居士《保生篇》。即倒产。详该条。

脱壳 病证名。周身脱皮。指小儿生下，血弱不润肌肤，加之外触风邪所致。《验方新编》：“此证因生时触风，满身皮屑脱下，一层又一层，名曰脱壳。”治宜养血祛风，用四物汤加荆芥、防风、蝉蜕、薄荷之类。

脱荣 病证名。见徐润之《最新三字达生续编》。指妊娠坠胎后，阴血暴下不止，出现面黄，唇白，虚极欲脱，谓之脱荣。治宜补气回阳，方用独参汤或参附汤。

脱囊 病证名。出元·朱震亨《平治会萃》。又名小儿囊脱。系湿热之毒，注入下焦所致。症见阴囊肿大，坠下不收。严重时阴囊皮肤溃烂，阴核有欲坠之势。治宜清热解毒，兼以化湿。用黄连、黄芩、连翘、当归尾、木通、甘草煎汤内服。局部肿大时，用紫苏叶为末，水调敷之，兼有局部溃烂时，用黄连、青黛末扑之，或以香油调涂。

〔、〕

麻风疮 病证名。出清·朱丹山《麻疹集成》。指小儿麻疹收没之后，遍身生疮，痒甚，心烦等。多由麻疹余毒未清，复感风邪所致。治宜疏风解毒。用消风散或大连翘饮加減。

麻后牙疳 病证名。麻疹后期，牙龈腐烂，以营养状态较差的婴儿为最多见。元·滑伯仁《麻证新书》：“此乃胃中伏毒，上窜阳明部分，宜用犀角地黄汤加火麻仁、滑石，以泄大肠之火，使下移毒势，上清胃火”。外用锡类散或硼砂、冰片、硝石、敷之，或栗树根煨存性调搽。

麻后有痰 麻疹后期而吐痰者。《麻疹全书》：“吐痰之证有二：有吐出而白者；有吐出而成块者，皆肺胃之火欠清而作也，俱宜清肺消痰降火为急，以杏仁清肺汤去甘草、桔梗，加黄芩，……但清痰切勿用半夏、南星等燥药，惟宜用天花粉、贝母、陈皮之类。”

麻后喉风 病证名。麻疹后期，突然喉肿，呼吸困难之证候。大都是麻疹后，余毒未尽，肺胃积热，夹毒火上炎所致。症见高热，呼吸困难，吸气时胸骨上窝、肋间隙深陷，上腹内缩，咽喉充血并水肿，面青，唇紫，不能进食。治宜清热通闭，用麻杏甘石汤合银翘马勃散（《温病条辨》：银花、连翘、马勃、射干、牛蒡子）。并结合针刺少商、商阳、天突、尺泽、合谷、曲池。

麻证 出元·滑伯仁《麻证新书》。即麻疹。详该条。

麻证口渴 病证名。麻疹发热而口渴。元·滑伯仁《麻证新书》：“麻证原是火邪，心火内亢，肺焦胃枯，津液干涸，发热之时，未有不渴，不可以冷水与饮，只宜绿豆、或芝麻、或陈炒米煎汤饮之。”如麻疹初起即口渴、热重者，多挟温热，治宜凉透，用银翘散加天花粉；如疹出始烦渴者，为胃热，宜凉透清胃，兼以保津，用白虎加人参汤加竹叶、银花、连翘之类；如收没期而口渴不止，为胃枯津涸，宜予甘淡养阴之剂，如增液汤等。

麻证衄血 病证名。麻疹口鼻出血。元·滑伯仁《麻证新书》：“夫麻证衄血。因肺胃中热毒，迫而上升，初潮得之，原是顺候，乃逆邪外移，衄血即是宣毒之意，不必遽止，倘失血太过，恐至亡阳。经云：‘夺血者亡汗’，用犀角地黄汤加茅根，泻火、润肺、凉血为主。”如麻疹已出而衄血者，须防血虚内陷，宜清营汤加贝母、麦冬以降火清肺。

麻证燥痒 病证名。麻疹后期全身燥

痒。元·滑伯仁《麻证新书》：“麻证燥痒，乃是风邪外袭，皮肤燥烈之故。其证多在将收、收后时，因而得此燥痒，即用紫背浮萍加胆矾熏洗”。内服滋润活血熄风之剂，如生地黄、白芍、菊花、蝉蜕、紫草等。

麻毒入营 病证名。在麻疹的病变过程中，由于再感热毒之邪，入于营分，内陷心包所致。症见疹色紫黯，稠密成片，高热烦渴，谵妄神昏，抽搐、撮空，舌质红绛起刺；毒入血分，则口鼻及二便出血，见于麻疹并发其他严重感染。治宜清营凉血，止痉开窍。用化斑汤合犀角地黄汤，或清瘟败毒饮；并用紫雪丹、安宫牛黄丸或神犀丹等吞服。

麻毒内攻 病证名。指麻毒不能透发外出的逆证。《古今医鉴》：“麻疹既出，一日而又没者，乃为风寒所冲，麻毒内攻。”清·张霞溪《麻疹阐注》：“麻疹见形三日之后，当渐次收没，不疾不徐，始为无病。若一二日疹即收没，此为太速，因调摄不谨，或风寒所袭，或为邪秽所触，以致毒气反内攻。轻则烦躁谵妄，重则神昏闷乱。急宜内服荆防解毒汤。”外用胡荽酒擦全身，藉以促疹透出。重者配合内服安宫牛黄丸，以苏神志。

麻毒陷肺 病证名。指在麻疹病变过程中，麻毒深重，再感时邪，以致麻毒内攻，陷入于肺。《医宗金鉴·痘疹心法要诀》：“麻疹发脾肺，故多咳嗽”。症见疹出不透，高热，咳嗽不畅，痰声呼呼，气急鼻煽，甚至面唇青紫。见于麻疹并发肺炎。初期，为风邪所郁者，用升麻葛根汤加前胡、桔梗、苏叶、杏仁；已出而咳者，肺为火灼，宜宣肺透邪，辛凉解毒，用麻杏甘石汤加银花、连翘、鱼腥草等。痰多加葶苈子、桑白皮；痰中带血加白茅花、藕节炭；咳嗽不爽加桔梗、紫菀。

麻疹 病证名。又名瘡、麻证、瘡子、痧子、肤证、糠疮、籽疮。元·滑伯仁《麻证新书》

定为麻疹。是一种由麻疹病毒引起的发疹性传染病。多见于婴幼儿，以体表皮疹状如麻粒故名。四季均可发病，但以冬春季最易流行。新中国建立以来，由于对麻疹采取了各种有效的防治措施，发病率已经显著降低。病因为麻疹病毒，由口鼻而入。《麻疹拾遗》指出：“多为天行厉气传染。”也有认为与胎毒有关。主要病位在肺、脾二经。《小儿药证直诀》：“初起候，面燥腮赤，目胞亦赤，呵欠顿闷，乍凉乍热，咳嗽喷嚏，手足稍冷，夜卧惊悸，多睡……。”《麻科活人全书》：“认麻须看两耳根下，颈项连耳之间，以及脊背以下至腰间，必有三、五红点，此即麻之报标……。”又：《麻证新书》：“舌上白珠累累如粟，甚则上腭、牙龈，满口遍生。”这是发疹期具有特殊意义的征象。在发病过程中，如体质壮实，护理恰当，毒能透发，勿药可愈。由于气候、环境以及小儿体质的强弱等各种不同因素的影响，在临床上所表现的症状也有所不同。根据病情轻重的表现，一般分为顺证、逆证及险证，顺证经过良好，逆证较严重，险证多属危急。麻疹一般分为疹前期，出疹期及疹退期三个阶段。从发到收没，有一定过程。因此它是由内而外，由里及表，所以，在治疗上，以宣透清解为主，初期尤为重要；中期疹向外透，治应解毒，仍宜顺势宣透，使其完全出齐；末期，当养阴，清解托毒，使其逐渐收没。对于不同的变证，应具体分析，分别论治。

麻疹夹斑 病证名。麻毒炽盛，内陷营血而夹瘀斑的证候。清·马之骥《疹科纂要》：“麻疹不出，忽发红点者，名为夹斑。”由肺、胃同时受麻毒热蒸所致。症见恶寒，壮热，喷嚏流涕，腮红眼赤，咳嗽气急，继则全身既可见碍手的颗粒麻疹，复见成片、平坦不碍手之红斑。治宜清营解毒，透疹化斑为主。如清瘟败毒饮。

麻疹作痢 又名夹疹痢。因热毒未解，

移于大肠所致。清·朱梦芬《麻疹集成》：

“麻疹作痢，毒在肠胃，在初热未出时见之，宜疏托为君，佐以行滞；若因食积加以消食行滞；正没、没后见之，宜解毒，凉血，行气。”如临床表现有腹痛下痢，或赤、或白，与赤白相兼者，不可轻用收涩之剂，宜清热导滞汤，（《医宗金鉴》：山楂、厚朴、生甘草、枳壳、槟榔、当归、白芍、黄芩、连翘、牛蒡子、青皮、黄连）。

麻疹逆证 麻疹透发艰难，病毒内陷者，多属逆证。一般年龄较小、体质较弱的小儿，在出疹时，又遇气候不良，往往疹毒内闭，不能外透；如疹出不透，或一出即收，或发热无汗，或疹色不正，稀疏淡白，或紫暗成片，以致正虚邪实，遂成逆证。清·马之骥《疹科纂要》：凡麻疹“身体极热，隐伏不出，或带紫黑不明，或不突起，与肌肉一平，或一、二日就没，喘嗽利下者，逆。”又“麻未出时，发热，面先青黑，乃毒气攻心者，逆。”应透邪扶正，辨证施治，并加强护理，以促其疹毒外透，由逆转顺。

麻疹泄泻 病证名。麻疹腹泄，多由胃肺热毒，下移于肠所致。《古今医鉴》：“麻疹泄泻，须分新久寒热：新泄热泄者，宜服四苓散，加木通；寒泄者，十中无一；如有伤食伤冷，不得已以理中汤，一服而止”。麻疹泄泻，乃火邪内迫，纯是热证，莫作寒论。一般皮疹初出未出而泄泻者，宜升透制泄，用升麻葛根汤合四苓散。疹已出而泄泻，宜黄连解毒汤合四苓散；疹没后而泄泻，宜黄连解毒汤加导赤散。

麻疹顺证 麻疹红润，五液俱全，多为顺证。清·郑卜年《瘡略》：“出瘡发热，时有微汗滋润，并汗、泪、鼻涕、唾、溺，此谓五液俱全，出时色红润，部位齐而透，此顺证也。”一般发育正常，身体健康的小儿，在出疹时，先由头颈、胸背逐渐遍及全身四肢，渐透渐多，疹色红润。自初潮、透疹，直至收没，经过良好，无合并症，通为顺

证。但顺和逆是能相互转化的，顺证要加强护理，慎风寒，节饮食，避免逆转。

麻疹险证 通常指麻疹患者邪盛正衰、麻毒内陷而出现的各种险恶证情。小儿易虚易实、易寒易热。如麻疹透发不顺，可能转趋。主要病变在肺，对肺的危害最大；如邪毒陷肺，肺气闭郁，则出现肺炎喘嗽。清·马之骥《疹科纂要》：“麻未出时，发热喘促者，险。”“身体极热，欲出不出，隐伏皮内，不发透快者，险。”咽喉为肺之门户，如肺热上冲，毒热蕴于咽喉，则会出现喉痹失音；如肺热移于大肠，泻下黄赤焦臭，可发生泄泻或肠炎；如热传心肝，则可见神昏、惊厥。如邪毒深入营血，则皮疹挟斑，而见吐血，衄血。若年龄幼小，体质虚弱，正虚不能抗邪外出，可能出现心阳不振，正不胜邪的内闭外脱的危象。这些都属险证，宜加紧治疗，精心护理。

麻疹烦渴 病证名。《医宗金鉴·痘疹心法要诀》：“凡出麻烦渴者，乃热毒壅盛也。”热扰于心则烦；热灼于胃则渴。麻疹尚未透出时，而见烦渴者，宜透疹生津，用升麻葛根汤加花粉、麦门冬；疹已出者，宜清热保津，用白虎汤；疹没后烦渴者，宜清余热，益胃津，用竹叶石膏汤。

麻疹紫黑 病证名。麻疹热极则颜色紫黑。元·滑伯仁《麻证新书》：“麻遇紫色，内热极也。”内热上迫于肺，则伴有呼吸迫促，口唇、指甲青紫、发绀。治法参见麻毒陷肺条。如热毒深入营者，则伴有皮肤发斑，吐血，衄血，治宜清营凉血，用清营汤加减。”明·徐春甫《痘疹泄秘》：“热盛吐衄，粪黑秘结者，用犀角地黄汤加大黄下之”。

麻疹喘急 病证名。指麻毒攻肺，呼吸急促之证。《医宗金鉴·痘疹心法要诀》：“初出未透，无汗喘急者，此表实拂郁其毒也，宜用麻杏石甘汤发之。疹已出，胸满喘急，此毒气内攻，肺金受克，宜用清气化毒

饮（前胡、桔梗、瓜蒌仁、连翘、桑皮、杏仁、黄芩、黄连、玄参、生甘草、麦冬）清之。”参麻毒陷肺条。

麻疹喉痛 病证名。麻毒热盛，上攻咽喉的证候。多由表邪郁遏，麻毒不能舒发，或“疹后余毒不散，结于咽喉”（《治疹全书》）所致。其症轻者咽喉肿痛，重者汤水难下。疹初喉痛，宜清热解毒，用银翘散加减；里热炽盛或疹已发出而痛者，用清咽消毒饮。

麻疹谵妄 病证名。指麻疹出现谵妄症状。《医宗金鉴·痘疹心法要诀》：“谵妄一证，乃毒太盛，热昏心神而然也。”治宜清火解毒。疹未出而谵妄者，用三黄石膏汤；疹已出而谵妄者，用黄连解毒汤。

麻痲（guāi 乖）病证名。出清·郁谢《麻科合璧》。指麻疹愈后肌肤发痒，出现似疮非疮，似疥非疥的一种疾患。系风湿热毒郁于肌肤所致。宜用开理肌表，疏风利湿，兼以活血为治。

旋耳疮 病证名。见《医宗金鉴·外科心法要诀》。又名月蚀疮，多见于小儿。由胆、脾二经湿热上蒸，或耳道流脓延及外耳所致。清·吴溶堂《保婴易知录》：“生于耳后缝间，延及耳摺上下，如刀割之状。”治宜黄连粉撒敷患处。久则滋水淋漓，湿烂作痒，搔破则出血水，甚者耳后摺缝裂开，缠绵难愈。即耳后间隙性湿疹。治宜清热除湿，内服龙胆泻肝汤，外用黄连、枯矾各等分研末敷之。

旋螺风 病证名。见《普济方》卷三百八十五。即小儿龟头赤肿而痛。多由风热湿毒郁结所致。治宜内服通心饮（木通、连翘、瞿麦、栀子仁、黄芩、甘草），外用土牛膝、泽兰煎水洗。

盗汗 病证名。指睡中汗出，醒后即收。《诸病源候论》卷四十七：“小儿阴阳之气嫩弱，腠理易开，若将养过温，因睡卧阴阳气交，津液发泄，而汗自出也。”由于阴

气虚衰,睡时卫气乘虚陷入,血气不能固表,故腠理开而汗出,醒则卫阳之气复归于表,故其汗得止。盗汗虽多属虚象,但有两种证候,一为心虚而阴气不敛,每见睡中多惊,可用酸枣仁汤,以养血滋阴,宁心安神;一为心热火盛,伤于阴分,多伴有发热多烦等。可用当归六黄汤,以滋阴泄火。《景岳全书》认为“自汗亦有阴虚,盗汗亦多阳虚,……然则阴阳有异,何以辨之?曰:但察其有火无火,则或阴或阳自可见矣。盖火盛而汗出者,以火灼阴,阴虚可知也;无火而汗出者,以表气不固,阳虚可知也。”

盖痘疹 病证名。痘疮方愈,而疹子随发的证候。因痘后余毒未尽,更恣意饮食,外感风寒而引起,其症遍身出疹,先如粟米,渐成云片状。治宜疏风清热,用加味消毒饮(《医宗金鉴》:荆芥、防风、牛蒡、升麻、甘草、赤芍、山楂、连翘)。

惊丹 病证名。①因惊而引起的发丹。《活动心书》:“婴儿生后,百日之内,半岁以上,忽然眼泡红晕微起,面带青黯色,向夜烦啼,或面如胭脂,此伏热在内,亦有面不红者。始因居胎之时,母受重惊,惊邪伤胎,递相传袭;降生之后,复受热毒,或再有惊,有惊则热,热气内蕴,形之于外;初发之时,散生满面,状如水痘,脚微红而不壮,出没休息无定,次到颈项,赤如朱砂,名为惊丹。②因搐而引起的发丹,《幼科发挥》:“先发搐后发丹,此名惊丹,可治,此胎毒自内而外也,宜用大连翘饮主之。”

惊风 病名。儿科常见疾病之一。即惊厥。以搐、搦、掣、颤、反、引、窜、视等八个主要证候为其特征。多见于5岁以下的幼儿,7岁以上的则逐渐减少,年龄越小。发病率越高。病情变化极快,多危及生命。唐以前将本病归入痫证中,《小儿药证直诀》才定惊风之名。古人将发病暴急,出现壮热、烦渴等热证者,称为急惊风。惊乃强直和痉挛的表现,故古代有的医家把惊风

与痉作为通用名词。如《寓意草》、吴鞠通《解儿难》、《幼幼集成》都认为惊风即是痉病。风乃言其病因,《内经》所谓“诸暴强直,皆属于风”。凡因风而引起的各种抽搐症状,皆可名之为惊风。近代习惯上将痉厥出现于成人的称痉病,出现于幼儿的称惊风。治疗原则,急惊以疏风解毒,开窍豁痰,平肝镇痉为主;慢惊以回阳救急,逐寒荡惊,温中健脾为主。详惊风四证,惊风八候,急惊风、慢惊风、慢脾风条。

惊风八候 惊风的八种证候。《古今医鉴》:“夫小儿有热,热盛生痰,痰盛生惊,惊盛发搐,搐盛则牙关紧急而八候生焉。搐、搦、掣、颤、反、引、窜、视是也。搐者两手伸缩,搦者十指开合,掣者势如相扑,颤者头偏不正,反者身仰向后,引者臂若开弓,窜者目直视怒,视者露睛不活,是谓八候也。”八候,无论急惊、慢惊都可出现,但不一定同时并见,发作时的急慢强弱,也不尽相同。

惊风内钓啼 病证名。指小儿因惊风内钓而啼。《普济方》卷三百六十一:“夫惊风内钓啼者,阴阳两证:阴者起于吐呃之后,胃气虚弱,精神昏愤,啞哑不宁,或不乳,项硬反张,手足痿痹,内钓啼叫也;阳者起于身体发热,惊悸大哭,精神伤动,恍惚不定,或睡或不睡,涎鸣气粗,手足潮搐,惊钓啼叫也。”治以镇惊熄风为主。阴者用沉香散,阳者用乳香丸。

惊风四证 急惊风的四种症候,出《古今医鉴》。即惊、风、痰、热。惊,指昏聩惊叫,恐惧不安;风,指牙关紧闭,口角牵引,窜视搐搦,项背反张;痰,指痰涎壅盛,满口痰沫,或痰鸣如锯;热,指高热谵妄,唇颊焮红,二便秘涩,烦渴饮冷。其形成的病理,与肝、脾、心、肺有关。《东医宝鉴》:“其肝主风,其脾主痰,其肺作热,其心发惊。四证相临,重者先发”。惊宜凉心镇惊,用牛黄清心丸;风宜熄风镇痉,用至宝丹;痰

宜涤痰攻下，用利痰丸（《幼科全书》：牛胆南星、枳壳、陈皮、大黄、牵牛）；热宜清热泻火，用凉膈散。同时可针刺合谷、曲池、昆仑、承山、十宣等穴。但惊、风、热、痰四证，多相互并见，不能截然分开，因而应根据具体病情，辨证施治。

惊风先兆 小儿惊厥发生的前期症状。《幼科释谜》：“凡乳儿欲发惊风者，先神志不定，恍惚惧人，斜眼上视，左顾右盼，伸手握拳，闷郁努气，情态不如寻常，皆惊风先兆”。

惊风结核 病证名。见《证治准绳·幼科》。即小儿既患结核而兼慢惊风的证候。由于结核日久，积而为热，血燥风动；其症筋挛结核如贯珠，生颈项两侧，两臂反张。治宜滋肾养肝，软坚润燥。用夏枯草、玄参、生牡蛎、丹参、百部、玉竹、银柴胡、鳖甲、地骨皮之类。

惊风热 病证名。指发热而惊厥。《证治准绳·幼科》：“惊风热，发搐惊痫，脉数，烦躁，颠叫恍惚。”见于小儿急性感染性发热疾病，治法详急惊风条。

惊风烦渴 病证名。惊风后伤津引起的烦躁、口渴症状。多因小儿惊风，伤及津液，津亏则虚热内生，烦渴喜饮。治宜益气养阴。用麦门冬汤加减。

惊风预防法 凡急、慢惊风的发生，必先有其前驱症，先以药物预防可免发生惊搐。如小儿急性热症，高热，腮红面赤，两目似怒，直视不转，此将发惊风之候，宜服当归龙荟丸，泄肝胆经火，则可不致成为急惊风。如小儿吐泻不止，见其手、足冷，睡时露睛，口鼻出冷者，此慢惊风欲成之候，急用参苓白术散补脾，琥珀抱龙丸去枳壳、枳实，可预防慢惊风发生（《幼科发挥》）。

惊风腹痛 病证名。惊风兼见腹痛，多由积食伤胃，郁热生痰，复感外风而引起。治宜驱风导痰。用四磨汤加蝉蜕、钩藤。

惊风痰 病证名。出《医学纲目》。指

惊风而挟有痰者，临床特征为在惊厥发作的同时，眼黑而气短促。多因肺为火热所灼，痰气郁结，风木鸱张，所谓“金囚木旺”所致。宜以熄风豁痰为治。如羚角钩藤汤加减。

惊风痰热痧 病证名。小儿发热面赤，手足抽搐，两目上视，痰喘不已。诊其六脉俱伏，反无热象。治以疏风而热不除，豁痰而痰不消，定惊而惊益甚者，属痧胀。视其腿弯、肘弯有痧筋，用消毒三棱针刺之，紫黑毒血流出自愈（《痧胀玉衡》）。

惊水 病证名。即惊风后引起的水肿。《普济方》卷三百八十六：“惊水者，前后重叠受惊，致令心火燥盛，饮水过多，停积于脾，其候四肢肿，身上热，若其脉大者生，小者死。”治宜健脾利水。用五苓散合五皮饮。

惊生 指受惊而影响产妇分娩。见《医宗金鉴·妇科心法要诀》。又名惊产。产房内人语声嘈杂，使产妇心情不安，容易受惊，而致心气虚怯，精神疲困，不能顺产。应使闲人出去，屋里只留医护人员，使房内安静，产妇情绪自然稳定，胎儿多能顺产。

惊吐 病证名。又名夹惊吐、惊膈吐。《小儿卫生总微论方》：“吐逆早晚发热，睡卧不安者，此惊吐也。心热则生惊，故睡卧不安，而神不宁也。心神不宁，则气血逆乱而吐也。”临床表现多伴有呕吐清水稀涎，面色青白，精神倦怠，发热不高，时而烦躁不安，手足缓缓抽搐，睡时露睛，脉迟细，舌质淡，苔白腻等。先用全蝎观音散（《证治准绳》：全蝎、黄芪、人参、木香、白茯苓、甘草、石莲肉、扁豆、白芷、羌活、防风、天麻）镇惊去热；再用橘皮竹茹汤加减，和胃止吐。

惊后瞳斜 病证名。为小儿惊风后，瞳人不正，斜于左右。属惊风后，肝经失养所致。治宜养血益肝，用人参、阿胶煎水温服（《仁斋直指方》）。

惊产 见《叶天士女科诊治秘方》。即

惊生。详该条。

惊狂 病证名。心肝风火亢盛，扰及神明的证候。明·万密斋《痘疹心法》：“惊者，口眼歪邪，手足搐搦，随发随止；狂者，手足扰乱，言语乖越，发而不止。惊者心主火而恶热，肝主风而善动。”心肝二经，风火相煽，内扰神明，外窜经络，故作惊狂。

惊泻 病证名。指小儿脾胃虚弱，外受惊恐所引起的泄泻。临床特点为惊搐与泄泻并见。《证治准绳·幼科》：“惊泄，粪青如苔，稠若胶粘。”宜以镇心抑肝，和脾胃，消乳食为治。可用四君子汤、异功散之类，勿用峻攻之药。

惊胎 病证名。《诸病源候论》卷四十二：“惊胎者，见怀妊月将满，或将产，其胎神识已具，外有劳伤损动，而胎在内损动也。”

惊退而瘡 病证名。指惊风后出现的失音。多由津液受伤，肺肾阴虚所致。治法详久喑。

惊热 病证名。出《普济方》卷三百八十四。小儿骤受惊忤，惊则气散神浮，引起发热。症见遍身发热，夜间尤甚。外无表症，内无宿滞，但见额上及眉宇间赤色，印堂青色，烦吵不宁，易从睡梦中惊醒。治宜清热镇惊，用抱龙丸；虚而有热者，用补心丹（清·许宣治《小儿诸热辨》）。

惊积 病证名。小儿受惊后，复为乳食痰热所伤而成的积证。《活幼心书》：“小儿所患之证，皆因乳哺不节，……但有时泄下青水如生草汁，是受惊而后有积，烦闷歌唧，常似生嗔，名为惊积。”《丹溪心法》：

“小儿食积，痰热，伤乳为病，大概肝与脾病多，肝只是有余，脾只是不足。”受惊是肝先受病，肝盛脾虚则下泄青绿。治以健脾平肝为主，可选用异功散、大安丸、枳术丸加柴胡、白芍、鸡内金之类。针灸可取足三里、大敦、行间、关元、天枢等穴。

惊疳 见《婴童百问》。即心疳。见该

条。

惊悸 病证名。指小儿睡眠不安，心悸不能自持的症状。《太平圣惠方》卷三百七十二：“夫小儿惊悸者，由心脏壅热，为风邪所乘，邪搏于心，则令多惊不安；惊不已则悸动不安”。临床上惊和悸有所区别。《幼科金鑑》：“惊者恐怖之谓；悸者惕跳之谓，或睡与不睡之间，偶而闪跳，谓之悸也。乃先天心血不足之故。”宜以清心养血、安神定志为治。酸枣仁丸（《证治准绳》：茯神、酸枣仁、远志、柏子仁、防风、枳壳、生地黄、青竹茹）加減。

惊啼 病证名。出《颅囟经》①系小儿受到惊恐而引起的啼哭。《景岳全书·小儿则》：“盖小儿肝气未充，胆气最怯，凡耳闻骤声，目视骤色，虽非大惊卒恐，亦能怖其神魂，醒时受怖，寝则惊惕，或振动不宁，或忽而惊叫，皆神怯不安之证。”治以安神养气为主，如独参汤、秘旨安神丸之类。②指小儿睡里忽啼而惊觉者。《普济方》谓有阴阳二证及半阴半阳证。阴证，身凉，大便呈青绿色，时复惊啼；阳证，则身热，精神不定，睡中惊啼；又有身凉大便赤黄而啼者，有身热大便青白而啼者，则属半阴半阳之证。

惊啼壮热 病证名。见《太平圣惠方》卷八十二。指小儿壮热惊厥而啼，为热邪炽盛上窜于心，灼伤阴液而成。临床常兼有面黄颊赤，神志恍惚不宁。治宜清热安神。用钩藤散。

惊痢 病证名。八痢之一。小儿因受惊气机逆乱，湿注肠道而成痢者。多由外感惊恐，肝气逆乱，阻滞气机，湿浊内行，下注肠道所致。症见腹痛，便下青色粘脓，心烦不食。治宜温肝燥湿。用左金丸。

惊痼 病证名。①小儿痼证之因惊而发者。《诸病源候论》卷四十五：“惊痼者，起于惊怖大啼，精神伤动，气脉不定，因惊而发作成痼也。”②发搐轻证和重证的

混称。《小儿卫生总微论方》：“小儿惊痫者……轻者，但身热面赤，睡眠不安，惊惕上窜，不发搐者，此名惊也；重者上视身强，手足拳，发搐者，此名痫也。”④惊怖与外邪所入引起的发搐。《证治准绳·幼科》：“惊痫，因血气盛实，脏腑生热，或惊怖大啼，精神伤动，外邪所入为之，其病在心，心主惊，验其症，忽然叫声发搐。”

惊搐 病证名。指神识不安而四肢搐搦的证候。清·王伯伟《天花八陈》：“惊搐者，骇然而厥，目赤，牙紧，口喎，四肢搐搦也。盖因热极生风，风撼肝木，木来侮土，土受邪而归心，心神不安，故发惊搐也。”热病惊搐，属热极生风，肝风内动者，治以清肝熄风为主，一般用羚角钩藤汤；实热者，用泻青丸或龙胆泻肝汤。

惊搐五证 惊搐五种证候的鉴别。身热力大者为急惊；身冷力小者为慢惊；仆地无声，醒时吐沫者为痾；头目仰视者为天吊；角弓反张者为痉（《东医宝鉴》）。

惊膈吐 出《证治准绳·幼科》。即惊吐。见该条。

惊膈嗽 病证名。多因肝经余热，上灼于肺所致。《证治准绳·幼科》：“小儿患惊风，惊止而嗽作，谓之惊膈嗽。”症见咳嗽痰稠，苔黄滑。治宜豁痰利肺，兼以平肝。用二陈汤加钩藤、桑皮。

惊癰 病证名。小儿患惊风后，风毒流入经络、骨节所致的证候。《证治准绳·幼科》：“小儿心惊不常，及遍身肿痛，或手、足不随，此为惊癰之候也。”治宜疏风透毒为主。若迁延失治，则膝胫骨之间流结顽核，或膝大而肿，肉消骨露，成为鹤膝。

惊癰 病证名。指小儿因惊而成的癰疾，惊、癰并存之证。其癰系由惊气与痰涎相搏所致。盘旋胁间，或在左，或在右，常作惊啼。治宜涤痰化癰。用礞石滚痰丸。

昏塞 病证名。即神识模糊的症状。《诸病源候论》卷四十八：“人有禀性阴

阳不和而心神昏塞者，亦有因病而精采闇钝，皆由阴阳之气不足，致神识不分明。”

断子 古时的绝育方法。《张氏医通》卷十：“断子法用酒麴一升，无灰酒五升，煮至二升半，滤去滓，分三服，经候至前一日，晚进一服，次早五更一服，天明二服，月经即行，终身无妊矣”。

断产 出《千金要方》卷四。指断绝生育。即绝育。

断乳 见徐润之《最新三字达生续编》卷五。又名回乳、消乳。指用药物中断乳汁的分泌。常用炒麦芽80~100克水煎频服。又《胎产辑萃》断乳方：归尾、赤芍、红花酒洗、牛膝酒洗，水煎临卧服”。

断胎 见清·汪嘉谟《胎产辑萃》。即打胎。

断脐 出《千金要方》卷五。婴儿初生断脐，必须严密谨慎，如果处理不当，可以引起病毒走窜，酿成各种不同病证。如内侵脏腑，可以发生脐风；外袭肌肤，则可产生脐湿、脐疮、脐出血等病证。

断绪 病证名。又称断续。《千金要方》卷二：“妇人立身已来全不产、及断绪久不产三十年者”。即不孕。详该条。

断续 出《千金要方》卷二。即断绪。详该条。

清里法 神奇外治法之一。以鸡蛋一枚，去黄取清，以碗盛之，入麻油，再加雄黄细末一钱搅匀，复以妇人乱发一团，蘸染蛋清，于小儿胸口拍之。寒天以火烘暖，不可冷用。自胸口拍至脐轮止，须拍半时之久。仍以头发敷于胸口，以布扎之，约40分钟，取下不用。用于小儿发热二、三日，邪已入里，或乳食停滞，内或郁热，五心烦热，睡卧不宁，口渴多啼，胸满气促，面赤唇焦，大小便闭等症。

淋閼 病名。见《证治准绳·女科》。閼同闭、秘。指小便淋涩难下，包括产后诸淋。

混元生 又名被膜儿、幸帽儿。指胎胞未破，小儿随胞一起娩出。周纪常《女科辑要》五卷：“儿不出胞，连胞生下者，名曰混元生；生后将胞衣掐破，儿既（即）出矣”。

混元母 即胞衣。详该条。

混沌衣 即胞衣。详该条。

剪口疮 病证名。《疡医大全》卷十四：“剪口疮又名夹口疮，脾热者多患此。亦有父母遗毒小儿口角色白生疮，久而不愈。”治宜清热解毒。可选用清胃散、凉膈散等加减。参见口吻疮条。

烧浆 病证名。出清·翟良《痘科类编释意》。痘疮收靥时发热的证候。详收靥条。

宿乳 指间隔哺乳时间较长，存积于乳腺前部的奶汁。乳母哺儿前应将宿乳挤出，并用手揉按乳房，使乳汁流畅，并用温水把乳头洗净，然后哺乳。《千金要方》：“夏不去热乳，令儿吐逆；冬不去寒乳，令儿咳嗽”。

宿食不消 见《诸病源候论》卷四十七。即食积。详该条。

〔一〕

蛋托法 小儿阴寒腹痛的外治方法。余梦塘《保赤存真》卷五：“凡阴寒腹痛，用鸡子煮熟去壳，放脐眼内，一时一换，四五换，阴气收入蛋内，即愈矣”。

隐病 见杨志一《妇科经验良方》。指女阴各种疾患的总称。包括阴痒、阴挺、阴疮、阴冷、阴吹等。

隐疹 病证名。搔痒性皮疹。出《素问·四时刺逆从论》。又名风瘙、痞瘤。《诸病源候论》卷四十九：“风入腠理，与气血相搏，结聚起相连成隐疹。”或由对某些物质过敏所致。皮肤出现大小不等的风团，小如麻粒，大如豆瓣；甚则成块成片，剧痒时隐时现。如疹色红赤，灼热，舌红，脉数者，属风热；疹色白者名白疹。恶风，舌苔白薄，指纹浮淡者，属风寒。风热者，疏风清热，用消风散；风寒者，疏风散寒，用荆防败毒散。可针刺血海、三阴交、曲池、足三里。耳针刺内分泌区。

隐瘡 病证名。又名风癰。指麻疹未收，皮肤搔痒者。清·郑卜年《瘡略》：“瘡出未收，复感风寒邪气，风邪外袭皮肤而入肺，肺中毒气，合而复于两胁，背胸腰腿之间，名为风隐。”治宜疏风解毒。用荆防败毒散，或加味消毒饮（《医宗金鉴》：荆芥、防风、牛蒡子、升麻、甘草、连翘、山查、赤芍）。

颈细 病证名。指小儿颈细，头倾而无力的证候。多由先天精气不足，营养失调所致。明·万全《幼科发挥》：“颈者头之茎也，颈细则不能任元（元即头）”。宜配合填精益髓之剂治疗。

十二画

〔一〕

斑疮入眼 病证名。指睑缘生疮，累及角膜。《世医得效方》：“眼胞患斑疮，热气冲透睛中，疼痛泪出，翳如银片，肿涩难开，宜服柴胡散。”

菰（zǔ 阻）病 见《经效产宝》。即

恶阻。详该条。

葡萄疫 病证名。遍身出现大小青紫斑点的证候。明·秦景明《幼科金针》：“小儿稍有寒热，忽生青紫斑点，大小不一，但有点而无头，色紫若葡萄，发于头面者点小，身上者点大，此表症相干，直中胃腑，邪毒传攻，必致牙宣。”治宜清热凉血。用犀角

地黄汤。

落草 见《外台秘要》卷三十三。指婴儿娩出。

落胎 见《郑氏女科家传秘方》。即打胎。

朝信 见《外台秘要》卷三十三。即月经。详该条。

厥痛 病证名。指妊娠心痛。永思堂主人《胎产合璧》：“孕妇心痛，乃风邪痰饮交结，或肝气不畅，若伤于络则乍作乍安，名曰厥痛。若胎动下血，乃伤触子脏也，用安胎散（白术、当归、黄芩、甘草）或火龙散（川楝、茴香、艾叶），手拈散（元胡、草果、灵脂、乳香、没药），轻者砂仁一味，煎汤服，气调自安”。

裂浆 指产期未到而破水，以致难产者。毛希蒙《大生全书》：“产期未到，恶露先下，以致水干难生，俗名裂浆”。

颊赤 证名。小儿两颊发红。元·杜思敬《济生拔粹·田氏保婴录》论本证“由心脏邪热上攻也，宜服导赤散。”

颊脂垫 即螳螂子。见该条。

〔十一〕

悲哭 见《儒门事亲》。小儿啼哭，弥日不休，而面容惨淡，声气哽塞，双目泫然者。《证治准绳·幼科》：“悲哭者，肺之声，泪者，肝之液。”因儿情志有所挫伤，或乳母怒火遗热于肝，肝火犯肺，故令悲哭而声泪俱下。

龄(jiè 戒)齿 病证名。出《金匱要略·痉湿喝病脉证》。又名戛齿。即上下齿磨切有声。除成人在热病过程中偶见之外，一般以小儿在睡眠中出现者为多，醒后则可咬乳。此由胃热所致，以芦根泡汤饮之可解，小儿因患蛔虫病而致咬牙者，按蛔虫病治疗；如见于惊搐者，宜以平肝风风为治。

紫舌胀 病证名。出《小儿卫生总微论

方》。小儿舌上偶生疮肿，呈紫色者，名紫舌胀。临床可见于由感染而引起的毒血症、脓毒血症或化脓性疾病发热期。为热毒深入营血所致。

紫河车 出《本草纲目》。①即胞衣。详该条。②中药名。取胞衣制干入药。

紫陷 五陷之一。清·周冠《痘疹精详》：“痘出稠密，晕红紫而顶陷下者，紫陷也。”由血热炽盛所致。其症必气粗，身热，口渴，烦躁不安。治宜凉血解毒，用犀角地黄汤加减。

暑月水泻 病证名。见《验方新编》卷五。婴幼儿夏暑季节，腹泻，排出物如水样。多因感受暑湿之邪，浸渍肠胃所致。其症多兼小便赤涩或小便不通。治宜清暑利湿，用四苓散加木瓜、木通、车前子。

暑风 见《温病条辨》。即暑痉，详该条。

暑风慢惊 病证名。为小儿夏季泄泻，转为慢惊风的证候。因小儿脾胃稚弱，感受暑风病邪，以致吐泻并作，重伤脾胃。故额热，肢冷，四肢抽搐，转为慢惊。治宜健脾清暑。用四君子汤加黄连、香薷、扁豆之类。

暑令吐泻 病证名。出《证治准绳·幼科》。小儿暑令季节，上吐下泻，多由乳食不洁，损伤肠胃；也有由外感暑湿或寒湿之邪，阻滞中焦，胃失和降，脾失运化，清浊相混而成。因乳食所伤而致者，宜消食异滞，调和胃肠，用保和丸；因暑湿者，宜清热利湿，用葛根芩连汤加减；因寒湿者，宜燥湿散寒，用藿香正气散加减。

暑产 见汪朴斋《产科心法》下集。即热产。详该条。

暑泻 病名。见《丹溪心法》。感受暑邪而致的腹泻。《小儿卫生总微论方》：“泻于暑热时多患者，谓时热及饮食冷故也。不伤于热，必伤于冷。若伤热伏暑而泻者，则心脏烦热，必小便不利，清浊不分。泻色赤

黄，宜利小便，解暑热。若小便快而泻者，冷泻也，色必青白，谷不化，宜温脾胃止泻。”伤热伏暑，多兼湿热。偏湿者泻下如水，呕恶，苔腻，治宜化湿解暑，可用五味香薷饮；偏热者，必兼烦渴尿赤，自汗面垢，苔黄腻。治宜清暑化湿，用黄连香薷饮，香连丸、六一散等；冷泻可用缩脾饮加减。

暑热证 病证名。婴幼儿时期特有的疾病。出《三时伏气外感篇》。多见于三岁以下的小儿，临床以长期发热不退，口渴多饮，多尿，少汗等为主要症状。因其发病都在夏季，又无一般常见暑温病的发病规律，病程中无其他合并症发生，至秋凉后，发热及其他症状随之消退，故又名小儿夏季热。主要是由患儿平素体质较弱，不能适应外界酷热的气候环境，从而冒受暑气，熏蒸肺胃之经所致。肺受暑气，失其正常生理，故见发热，汗闭；暑气在内，耗伤胃之津液，所以口渴而喜多饮；暑必伤气，气虚下陷，不能化水为津液，遂致水液下趋，而为小便清长而多；汗与尿液，同属于阴，异物而同源，故汗闭则尿液多，尿多则津液伤，津伤则必多饮以解渴，此为暑渴症汗闭，发热，多饮，多尿的一般病机。治以清暑益气，养阴生津为主，用人参白虎汤，或王氏清暑清气汤；久病阴虚者，用六味地黄汤合生脉散。

暑痉 病证名。小儿痉病之一。又名暑风。为感受暑温之邪，以致抽搐，发痉急骤，甚至角弓反张的症候。见于流行性乙型脑炎。清·吴鞠通《解儿难》：“夏日小儿身热头痛、项强无汗，此暑兼风寒者也，宜新加香薷饮；有汗则用银翘散；重加桑叶；身重汗少，则用苍术白虎汤；脉扪面赤多言，喘喝欲脱者，即用生脉散；神志不清者，即用清营汤加钩藤、丹皮、羚羊角；神昏者，兼用紫雪丹、牛黄丸等；病势轻微者，用清络饮之类。”

暑厥 病名。小儿暑病之一。见《医学

入门》。为感受暑邪而致的突然昏迷。多因小儿平素体质较差，元气虚弱，感受暑热之邪，热迫营血，逆传心包；或由于暑邪挟湿，湿浊生痰，痰浊上冲，蒙蔽心窍，以致出现突然昏迷，不省人事。《三时伏气外感篇》：“夏令若受热，昏迷若惊，此为暑厥，即热气闭塞孔窍所致。其邪入络，与中络同法，牛黄丸，至宝丹，芳香利窍，可效。神苏以后，用清凉血分，如连翘心、细生地、鲜生地、二冬之类。”湿重舌苔白腻，宜芳香化浊，用甘露消毒丹，送服苏合香丸。急救可针刺人中、十宣等穴；或蒜肉塞鼻，或来复丹，蒜水灌之。

暑痼 病证名。即小儿暑温出现的惊厥。《温病条辨》：“小儿暑温，身热，卒然痉厥，名曰暑痼。”因暑热之邪。袭及心肝，心肝受灼，热极生风所致。治以清心涤暑，平肝熄风为主。用清营汤加减，可配入紫雪丹。

暑搏血崩 病证名。多因暑邪客于冲任胞宫，血难停留而致突然经血崩下。症见血色深红，质稀，量多如注，面赤或垢，身热口渴喜凉饮。治宜清热祛暑，凉血止血。方用单苓心丸，或益元散加百草霜。

嘔噤 (zī yǎ 兹牙) 小儿烦躁的表现。《婴童百问》：“嘔噤者，心经有风邪，精神恍惚，心躁生风，热多不安，烦久则惊，风多不定，躁久而搐。”治宜清热镇惊，用七物黄连汤；风热重者，用至宝丹。

嘔煎 小儿烦躁的表现。《婴童百问》：“嘔煎者，心经有热，精神恍惚，内烦不安，心烦则渴，自然生惊。”治宜清心退热，通利小便。热重者用黄连解毒汤，轻者用导赤散。

遗毒 见《外科启玄》。指先天性梅毒。参胎毒条。

遗尿 症名。《医学心悟》：“遗尿有二证：一因脾胃虚弱，仓廪不固，肠滑而遗者。一因火性急速，逼迫而遗者。”脾虚者，

宜温中固摄，用理中汤；火盛者，宜清火厚肠，用芍药甘草汤加黄连。

蛲虫病 病证名。蛲虫，三虫之一。出《诸病源候论》卷五十。《太平圣惠方》卷第九十二：“夫小儿蛲虫者，此是九虫内之一虫也。形甚细小，如今之蛔虫状，亦因脏腑虚弱而致发。”其虫寄生于肠下，晚间爬出肛门产卵，而致肛门奇痒。病久长期抓痒而致肛门周围炎症、湿疹，并有面色萎黄，易怒，嗜食指甲等。治以杀虫止痒为主。内服可用苦楝根皮、百部、榧子煎剂；外治可用菹菜煎汤每晚洗肛，或用大蒜打烂成泥状，加菜油涂拭肛门周围。肛门湿疹，可用青黛散调黄连油膏外敷。

蛲瘡 出《诸病源候论》卷十八。五瘡之一。详五瘡条。

蛔虫贯膈 病证名。出清·余梦塘《保赤存真》卷四。系脾胃虚寒，蛔虫上扰的证候。症见右上腹部阵发绞痛，痛时患儿哭闹，屈体弯腰，出冷汗，面色苍白，常伴呕吐，可吐出蛔虫和胆汁。阵痛之间仍留微痛。剑突下稍右疼痛拒按，脉弦或沉紧。类似胆道蛔虫症。宜用乌梅丸。参蛔虫病条。

蛔虫病 病证名。蛔虫又名虵、长虫、虵虫。状如蚯蚓，寄生在小肠内。静止时无自觉症状。在初期或有发热、咳嗽。肠蛔虫病时，可有食欲不振，恶心呕吐，胃部不适，流涎，腹痛，易激怒，梦惊，夜间磨牙，鼻痒，偶有惊厥等症。蛔虫具有一种钻入各种孔道的特性，当肠内发生某些对蛔虫生活不良的条件时，其活动的能力增加，扰动时腹痛阵发，如虫多可引起肠梗阻，窜入胆道，可引起胆道蛔虫症。治疗以驱蛔虫为主。宜用乌梅丸。胆道蛔虫症，治宜先安后驱，肠梗阻则应配合通利腑气，当蛔虫驱去以后，再予健脾。驱虫用使君子、苦楝根皮等；健脾用异功散加减。

蛔虫痧 病证名。即蛔虫病儿感染痧毒而致蛔结之证。小儿素患蛔虫病，因痧毒内

犯，致蛔死而与肠中糟粕相结，引起腹中大痛，大便不通。宜用三棱针刺腿弯、臂弯痧筋上，流出紫黑毒血；另用大黄芒硝煎汤稍冷服之，下其死蛔与宿粪，其痛自止（《痧胀玉衡》）。

蛔疳 病证名。由蛔虫而引起的疳疾。出《太平圣惠方》卷第八十七。小儿脏腑虚弱，如饮食不洁，蛔虫感染，或喜食肥甘、香饵，损及脾胃，则湿浊不化，易生虫疾。症见腹中攻痛，时缓时止，呕吐清涎，腹胀，面色青黄，唇色淡白，目乏光彩，治宜驱虫暖胃。先用化虫丸，继服使君子丸（《小儿药证直诀》：使君子、厚朴、甘草、诃子肉、青黛、陈皮）。

蛤蟆瘟 即炸腮。详该条。

跌仆伤胎 病证名。孕妇由于跌仆闪挫，气血逆乱，损伤胎元，以致胎动不安。症见腰腹痛坠，或阴道流血。治宜调补气血、安胎。方用胶艾汤或八珍汤。参见先兆流产、胎动不安条。

喘胀 病证名。喘，指喘嗽；胀，指腹部及肌肤肿胀。喘与胀在病理机制上常互为因果，其关键在于肺、脾机能的异常。《证治准绳·幼科》：“凡喘嗽之证，若小便不利，则必生胀，胀则必生喘。要分标本先后，先喘而后胀者主于肺，先胀而后喘者主于脾。”肺主肃降，外合皮毛，有通调水道，下输膀胱的作用。假如肺气失于肃降而反上逆，则水道失调，必使小便渐短，以致水溢皮肤而为胀，此则喘为本而胀为标，治以肃肺降逆为主，兼以实脾利水。脾主运化又主肌肉，若脾的运化失常，则水湿妄行，浸渍肌肉而为胀，水既泛溢，上侵及肺，气不肃降必成喘嗽，此则胀为本而喘为标，治疗以实脾利水为主，兼以肃肺降逆。

喘疾 病证名。指呼吸急促，伴有咳嗽的证候。一般多因肺气虚弱，内有顽痰宿饮，一旦外感寒热之邪，以致内与痰饮交阻，肺失宣降，则成喘疾。《证治准绳》：“小儿

喘急，重于咳嗽，然有虚实冷热之分。”治实热，宜辛凉开肺，用定喘汤；治虚冷，寒邪束肺者，宜辛温畅肺，用射干麻黄汤；久病气虚，宜益气降逆，用六君子汤加苏子、白芥子。

喉白喉 病证名。白喉假膜位于喉、气管、支气管者，大多由咽白喉向下蔓延而来。表现为喉梗阻症状，开始声音嘶哑，咳声如吠，甚至失音，继则出现呼吸困难，烦躁不安；严重时口唇紫绀，三凹征；甚至昏迷、窒息，兼有发热。多为痰热阻肺。治宜宣肺豁痰，清热解毒。用麻杏石甘汤加土牛膝根、银花、连翘等。烦躁气闭者，治宜逐痰通闭，清肺解毒，用雄黄解毒丸。必要时行气管切开术。

喉点疳 病证名。出《育婴秘诀》。属走马牙疳之一。为疳毒蚀于喉头环状软骨部位，发生溃烂的症候。治法详牙疳条。

喉痹 病证名。出《灵枢·经脉》。即咽喉肿痛。是风毒之气，客于咽喉之间，与血气相搏而成。《圣济总录》：“喉痹之病，喉中肿塞痹痛，水饮不下，呼吸有妨，寒热往来，得之风热客于脾肺，熏发咽喉。小儿纯阳，尤多是疾”。见于急性咽喉炎。治宜疏风泄热，清咽解毒。用银翘马勃散，普济消毒饮之类。外用冰硼散吹喉；针刺：取合谷、少商、风池等。

喉疳 不能言语的病证。《证治准绳·杂病》：“为风冷所客，使气道不通，故声不得发而喉无音也。”

黑带 病证名。见《傅青主女科》。亦名带下黑候。指妇女从阴道经常流出黑豆水色稠粘或稀、或腥臭的液体，也有在赤白带下中杂有黑色的，连绵不断。多因热盛熏蒸，伤及任脉带脉，肾水亏虚所致。治宜泻火清热，方用利火汤。参见肝经湿热带下、肾虚带下条。

黑疮倒靥 出《类证活人书》。即黑靥。详该条。

黑疳 出《诸病源候论》卷十八。五疳之一。详五疳条。

黑陷 五陷之一。出元·朱震亨《幼科全书》。其特点为痘疮晕脚干枯，中有黑脐。为毒火内盛，营血干枯所致。治宜凉血解毒，泄火清营。用清瘟败毒饮。

黑崩 病证名。出《脉经》。指崩下大量之血，色黯如败坏凝聚的黑血。治疗参见血崩、崩漏条。

黑靥 病证名。见《奇效良方》。又名倒靥、黑疮倒靥、陷伏。痘疮收靥时，外感寒邪，腠理复闭，身痛四肢微厥，痘转青紫或呈黑色者为黑靥。出痘时感受风寒或毒气弥盛，心热与外热壅郁，蒸腾不消，毒复入里；或食少腹泄，脏腑阳气亏虚，无阳以应，或秽气冲触，均可形成黑靥。宜审因施治。

〔J〕

鹅口 出《诸病源候论》卷五十。即鹅口疮。详该条。

鹅口疮 病证名。又名鹅口、雪口、鹅口疳、鹅口白疮。《诸病源候论》卷五十：“小儿口里所起白屑，乃至舌上成疮，如鹅口里，世谓之鹅口。”为多见于新生儿、婴儿泄泻及营养不良或麻疹等病后期的口腔疾患之一。脾经邪热，或久热伤及胃阴，均可导致本证。《外科正宗》：“鹅口疮，皆心脾二经胎热上攻，致满口皆生白斑雪片，甚则咽间叠叠肿起，致难乳哺，多生啼叫。”脾经郁热的宜清泄，用清胃散；胃阴不足的宜滋润，用益胃汤。一般外用吹口散（方见口疮条）或冰硼散、锡类散涂拭患处。或常用银花、连翘、薄荷、甘草煎汤漱口。

鹅口疳 出明·秦景明《幼科金针》。即鹅口疮。见该条。

鹅口白疮 出《本草纲目》。即鹅口疮。详该条。

健子 秦晋之间称双生为健子。详双生

条。

铺蓐 指胎儿娩出。顾允若《妇科辑要》：“胞水已破，儿即堕地，谓之铺蓐”。

锁口 异痘之一。即痘疮发于口唇周围的症状。嘴角有痘疮一颗，较其他痘疮为大，板硬无盘的名单锁口痘；嘴两边各有一颗大痘，名双锁口。此外，嘴上下四旁痘疮连串环绕，亦名锁口，属痘毒拥于脾经所致。治宜先用针挑破初出的大痘，内服泻黄散。

锁子症 病证名。多由胎毒未清，痰热上冲所致。《喉舌备要》：“此症小儿百日内以及二、三岁皆有发者，发时满口白膜黄膜，涎盛面黄，牙内有白点”。治宜清余毒，泻痰热。可选用导赤散合温胆汤等加减。

锁肚 病证名。①指初生儿大便不通。婴儿出生后二、三日不大便，除生理畸形外，大多由于胎热壅结，或胎禀不足，大肠传送无力所致。胎热者宜清肠，用一捻金；胎禀不足者宜益气，先用独参汤，继以蜜煎导法。②脐风三证之一。《幼科发挥》：“锁肚证，脐突青肿，肚腹胀大，青筋浮露，大便涩不通者，不治。”③肛门内合的一种证型。

锁肚痛 病证名。见《证治准绳·幼科》。指儿生下一个月后，忽然乳不下咽，肚硬如石，腹壁色红如朱，撮口而哭，手足口气俱冷的病证。古人认为是因断肠，结扎不紧，为风邪所乘而成。治以祛风散寒为主。用乌梅散（《证治准绳》：乌梅、延胡索、甘草、乳香、没药、钩藤）。

锁肠疳 出《颅凶经》。即历瘡疳症。详该条。

锁项 异痘之一。即痘疮攒集于颈项部的症状。属痘毒攻肺；若不急治，则毒攻咽喉，必发为喉头肿痛，音哑，声呛，汤药难下，变为险证。

锁膈 病证名。见《婴童百问》。慢惊风口生疮，不能乳食者为锁膈。小儿患慢惊风后，吐泻不止，因津液消烁，致脾虚肝

旺，口内生疮。治宜平肝补脾，予服独参汤，或四君子汤；并以南星末敷足心。

筋疳 出《小儿药证直诀》。即肝疳。见该条。

脾风 病证名。①慢脾风之简称。详该条。②“发搐后变疟者，此脾风之证也”（《幼科发挥》）。

脾风多涎 病证名。出《太平圣惠方》卷八十九。指小儿因脾经有风而致多涎的症状。由于风邪上逆，导致脾胃气机不和，以致涎液上壅，乳汁不下，甚则昏昏多睡。治宜调和脾胃，疏风豁痰。用防风散（防风、羚羊角、人参、枳壳、甘草、半夏）。

脾不统血 脾气虚弱，运化失常而致血不循经的证候。《血证论》：“脾统血，血之运行上下，全赖乎脾，脾阳虚则不能统血。”主要表现为诸失血证，如皮下出血、便血、溺血，同时伴有面色淡白少华，神疲，气少，脉虚弱，指纹淡，舌质淡等。治宜补脾摄血。用归脾汤加减。

脾中积 病证名。见《证治准绳·幼科》。又名中脾积。食硬物或冷物伤脾而成的积滞。症见面黄，或带虚浮，脐上微痛，肚皮热，饮食减少，脐上及腹中痛，所食不化，头微热。治宜消积健脾。先用取癖丸，后用匀气散、醒脾散调理。

脾气虚 脾气虚弱的一类病证。多由素体虚弱，乳食不节，内伤脾气而成。临床以困怠、消瘦为主。明·万全《育婴家秘》：“脾主肉，脾虚则瘦、大肉折；脾主味，脾虚则不喜食；脾热则食不作肌肤……。”症见病儿体质虚弱，精神不振，不活泼，面色萎黄，食纳差，大便溏，为气虚不运，治以健脾和胃，用参苓白术散加减。如兼虚热，则能食而瘦，便燥唇干，治宜益胃存津，用竹叶石膏汤、益胃汤加减。

脾水 病证名。小儿浮肿的一种类型，因脾有病而引起的水肿。由脾阳虚不能运化水湿，水渗肌肉而为肿。临床特征为浮肿，

四肢苦重。治宜健脾制水，用防己茯苓汤。

脾冷多涎 病证名。又名捏破涎涡儿。《普济方》卷三百六十二：脾之液为涎，脾气冷不能收制其津液，故流出渍于颐上。”治宜温中健脾。用益黄散、理中丸。

脾毒痢 病证名。出《婴童百问》。感受暑热之毒而致的痢疾。夏暑之时，饮食不洁，生冷不禁，暑热之毒犯及胃肠，而成下痢。其症发热烦渴，腹痛，里急后重，痢下频作。治宜清暑解毒。如白头翁汤加人苋，或香连丸、黄连香薷饮，或黄连素穴位注射。

脾消 出宋·黎民寿《简易方》。即消肌。详该条。

脾病 病名。出《诸病源候论》卷十五。脾主统摄血液，运化营养及水湿，主肌肉四肢。故水肿、呕吐、泄泻、黄疸、呃逆、鼓胀以及出血性疾病多与脾的病变有关。胃主受纳及腐熟水谷，脾与胃通过经络联系构成表里关系，共同完成运输营养、消化、吸收等任务。脾病的常见证候有脾气虚、脾虚湿困、脾不统血、中气下陷和胃中有热、胃有积滞等。参见脾常不足条。

脾疳 五疳之一。又名肥疳、食疳、奶疳。是疳疾中的最基本证候。由脾经蕴郁湿热所致。《古今医鉴》：“疳在脾，则面黄身热，腹胀肚大，好吃泥土，水谷不消，泄下酸臭，困睡，减食，消瘦，”有时吐泻，夹有蛔虫等。治以攻积杀虫为主，用集圣丸（方见肝疳条）；积去以后，应调理脾胃，用参苓白术散。

脾疳积 病证名。出《证治准绳·幼科》。指两胁间有块如石，按之则痛的证候。多由病者营卫俱虚，外感风寒，内伤乳食，停滞既久，以致肝脾气滞血瘀而成。其症可伴有面黄肌瘦，肚硬而胀，肝脾肿大，触痛明显等。治宜利气活血，疏肝理脾。用鳖甲、茅根、当归、赤芍药、五灵脂、蒲黄、茜草、柴胡、地龙、鸡内金、青皮、枳

壳为丸服。

脾热 病证名。五脏热之一。脾热者，鼻上先赤，目中黄。怠惰嗜卧，身热饮水，遇夜益甚。宜泻黄散，茵陈五苓散（《证治准绳》）。

脾热多涎 病证名。指脾经风热上壅而多涎者。《太平圣惠方》卷八十九：“夫小儿多涎者，风热壅结，在于脾脏，积聚成涎也。”治宜清脾泄热。用泻黄散。

脾热身黄 病证名。小儿黄疸，因脾胃积热而致者。《太平圣惠方》卷八十四：“夫小儿黄疸者，是热入于脾胃，热气蕴积，与谷气相搏，蒸发于外，故皮肤悉黄，眼赤黄也。”治宜清热解毒。用茵陈丸或三黄散。

脾惊 脏腑惊证之一。出《小儿病源方论》。详脏腑惊证条。

脾虚久嗽 证名。脾气虚弱而引起的咳嗽。《证治准绳·幼科》：“脾虚亦能作嗽”。小儿脾常不足，易为乳食所伤；脾伤则运化失职，而使湿化成痰，痰湿交阻，肺气失宣则咳嗽。其症多伴有久嗽，痰多，食纳不佳，腹胀，便溏，面黄肌瘦等。治宜健脾利气，止咳化痰。用六君子汤加減。

脾虚发黄 病证名。脾气虚弱导致湿热郁滞而致的黄疸。《幼幼集成》：“盖脾土强者，足以捍御湿热，必不生黄，惟其脾虚不运，所以湿热乘之。”黄重者利湿清热，用茵陈五苓散；黄稍退，即速健脾。若面目俱黄而带虚浮，宜补脾健胃，用六君子汤加減。

脾虚多涎 病证名。指脾气虚弱而多涎者。《证治准绳·幼科》：“小儿多涎，由脾气不足，不能四布津液而成。”症见神疲，面色萎黄，涎多清稀。治宜补益脾气。用补中益气汤。

脾虚自汗 病证名。出《证治准绳·幼科》。脾胃为水谷之海，是卫气资生的根源。脾胃气虚，卫气不足以固摄于外，故自

汗出。症见自汗多出额上，沾粘人手。治宜速救胃气，如四君子汤加浮小麦。

脾虚呕吐 病证名。指脾虚湿盛而致的呕吐。明·张三锡《医学六要》：“久病或服克伐药，吐涎不止，脉大无力，属脾虚不能摄涎而涎泛上”。治宜理脾和胃。用六君子汤加减。

脾虚泻 病证名。见《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》。指小儿脾胃虚弱的慢性腹泻。因小儿脾胃嫩弱，乳食所伤，脾阳不足，不能温化水谷，水谷滞留，而成泄泻。症见食后作泻，腹胀便溏，水谷不化，面黄形瘦，神疲倦怠。治宜健脾益胃。用参苓白术散。

脾虚经闭 病证名。见《竹林女科证治》。因脾胃损伤，饮食益减，生化之源不足，无血下达冲任胞宫而致经闭，常兼见食欲不振，痞满，大便不实等症。治宜补脾胃，养气血。方用补中益气汤、参苓白术散等。

脾虚经行先后无定期 病证名。因脾虚气血生化之源不足，气虚血少，统摄无力以致冲任失调，故见经期先后不定，经血色淡，或混有粘液，肢体倦怠，食少便溏等。治宜健脾益气。方用补中益气汤等。

脾虚带下 病证名。由于脾失健运，聚湿下注，伤及任、带二脉而致带下量多，色白或淡黄，无臭，如涕如唾，连绵不断，并见面色淡黄，精神疲倦，不思饮食，腰痠腹坠，或下肢浮肿，大便溏泻等。治宜健脾益气，升阳除湿。方用完带汤，或用白扁豆20克，向日葵籽25克，水煎服。

脾虚湿困 指脾虚导致内湿阻滞的病机。脾气既虚，湿邪困甚的证候。多由受凉饮冷，寒湿停滞中焦，或因地处湿洼，导致湿困于脾而致。明·薛铠《保婴撮要》：“脾主湿，自病则泄泻多睡，体重昏倦。”临床以胃脘满闷，食欲减退，恶心，泄泻，身体倦怠，苔白厚腻等症。治以健脾化湿为主。用胃苓汤加减。

脾常不足 小儿生理病理特点之一。由于小儿脾气未充，消化力弱，而生长发育又非常迅速，对水谷营养的需求较大，往往影响消化功能。如一旦饮食失调，喂养方法不当，过食过量，或突然改变饮食，超过脾胃的耐受能力；或气候变化感受外邪，就会出现运化不健，不能升清降浊，以化生精微，发生积滞，呕吐，泄泻等病证。如果迁延失治，而出现营养障碍，全身消瘦等状态，甚而可致严重后果。

脾病 五疳之一。由乳食伤脾，脾失健运而发。其症面色萎黄，目直，腹满，四肢不收等。一般用五味异功散；若面青泻利，饮食少思，用六君子汤加木香、柴胡。

猴痘 见《保婴易知录》。即猴疳疮。详该条。

猴痘疮 病证名。又名猴痘。新生儿臀部发红，重者蔓延全身，甚则皮肤发红，随即大片皮肤脱落。《保婴易知录》：“猴痘者，状如圆癣色红，从臀而起，渐及遍身，四周皮脱，中露赤肉，若猴之状，乃胎中毒邪，蓄于肾脏所发。”内服药以清热解毒为主，可用五味消毒饮加减，外用青黛散扑于患部，助其消炎收敛。

〔、〕

痘中呛逆 出《证治准绳·幼科》。即痘呛。详该条。

痘不起胀 病证名。出《古今医鉴》。痘疮发病后，一般历时四天，当渐起胀，先出者先起，后出者后起，至五、六日毒气尽出，至七、八日则进入贯脓。若见形三、四日，起胀如豆形，根窝红活肥满，光泽明净者，预后良好。若不起胀，灰白陷顶者，为气血不足；紫红不起胀者，则为火盛血热。前者治宜补托，后者治宜清血。

痘不灌浆 痘疮由小小血泡，起胀渐大，变成水泡形，逐渐转成脓泡的症状为灌浆。灌浆时，根、窠要红润，脓浆要饱满，

色如黄蜡，二便正常，饮食不减者为佳兆。痘不灌浆，明·徐春甫《痘疹泄秘》谓有二因：“一则气血不足；一则热毒太盛，烧涸津液。”宜分别治之。

痘出不快 病证名。出《古今医鉴》。痘疮初出见点，色淡红，稀疏不匀，此属毒伏于里。气弱不能全部托出，故欲出而不畅透。治宜补气托毒。用十宣散（《证治准绳》：黄芪、人参、当归、厚朴、桔梗、川芎、防风、甘草、白芷）。

痘夹疹 出明·徐春甫《痘疹泄秘》。即痘疮夹痧。详该条。

痘后浮肿 病证名。出《医宗金鉴·痘疹心法要诀》。痘疮脱痂后，因表虚不固，见风太早，风邪乘虚而入，引起面目、遍身浮肿。治宜微汗解表。用五皮饮。

痘色淡白 病证名。出清·翟良《痘科类编释意》。痘疮灌浆，其色淡白，疱疹颗粒形而尖圆，根无晕红者。多由营血太亏，元气不足所致。治以大补气血，托毒外出为主。宜用人参、当归、鹿茸之类。

痘衣法 人痘接种法之一。取天花患儿贴身内衣，给健康未出痘的小儿穿着二、三天，以达种痘之目的。一般在着衣九至十一天时始发热，为种痘已成，此法成功率低。若成功者，发热、出痘证候较缓，不致发生危险。

痘呛 病证名。又名痘中呛逆。指痘疮饮水入咽而气逆喷出之症。为痘毒犯胃，津气受伤，气机上逆而成。《证治准绳·幼科》：“痘中呛逆最凶危，沉香浓汁杏仁推。还把蜂糖多加水，按经煎透滤渣随，欲服晨时加好乳，汤中温热渐调之。”

痘应出不出 病证名。出元·朱震亨《幼科全书》。痘疮初起发热三、四日后，应见点而不见点，此因外感风寒，阻于肌表，毒气不能外发所致。其症常伴有头痛，四肢拘急，恶风寒等。治宜解表透毒。用参苏饮，败毒散加减。

痘疔 病证名。出明·徐春甫《痘疹泄秘》。长于痘疮内的疔，其色紫黑，疔形坚实，随痘而出，多先见疔而后见痘形，生长较快。为热毒积于肌肉间，随痘而出所致。

痘疮 病名。为急性发疹性传染病。又名天痘、天行痘、天疮、天花、天行发斑疮、疫疔疮、豌豆疮、登痘疮、百日疮、虏寄疮。由于发病有强烈的传染性，故名天行。因先见点，起胀，灌浆，如花发蕾；七日后收靥，脱痂，如花之萎谢，故又名天花。或以其疮形似痘，故又名痘疮。《时后备急方》：“比发有病，天行发斑疮，头面及身须臾周匝，状如火疮，皆载白浆，随抉随生，不及治疗，剧者数日必死，疔得瘥后，疮瘢紫黯，弥岁方无。”初起与伤寒相类似，有形寒，身热，呕吐，惊悸，口鼻气粗，耳尻不热，遍身疼痛，耳后有红筋等先驱症，在整个病程中其特点可分为发热，见形，起胀、灌浆、收靥、脱痂六个阶段。在各个阶段中，因毒邪的深浅，体质的强弱不同，可出现较多的变证。解放后，本病已经消灭。

痘疮见形 又名见点、放点、见苗。为痘疮将现的迹象。小儿出痘，一般发热三日后见点，热势较缓，皮肤上即见淡红色的痘疹，光泽稀落深藏于皮肤内，摸之有坚实感。《医宗金鉴》分顺、逆、险三证。①发热三日见点，热减身和，不渴不烦，颗粒稀疏。其痘先自头面渐至周身而出，色红润，顶尖圆者为顺证。②发热一日或半日即见点，一齐涌出，点不分明，平塌不起，出而复隐，痘色紫黑，干枯不润者为逆证。③痘已见形，身仍发热，痘稠密，粘连不分，痘色虽红而滞暗，或痘虽稀疏而色浅淡，隐于皮肤不透出而精神倦怠者为险证。

痘疮发热 病证名。出明·万全《家传痘疹心法》。痘疮须发热鼓其毒气，才能外透。凡痘疹初起发热，时起时退，或发热不盛者，乃热浅则毒轻，其痘必稀；若发热太盛，烦躁，昏睡，其痘必重。一般痘疮发

热，有外感的症状。治宜发表透疹。用升麻葛根汤；挟有食滞的，应加消导药。

痘疮夹斑 病证名。即与痘相夹而出的红斑。因痘疮毒火郁遏，伤及阴血，血与热相搏，迫血游溢于皮肤之间，故痘与斑相夹而出。症见皮肤上起红斑，片片如云头突起的片状。治宜疏风攻毒。用荆防败毒散，或黄连解毒汤。

痘疮夹痧 病证名。又名痘夹疹。痘疮夹有痧子的证候。《医宗金鉴·幼科》：“痧亦疹类，但形如粟米，尖圆白硬，内含清水为异。此亦热毒所发，往往夹痘而出，宜于疏散，以荆防败毒散主之。”

痘疮身痒 病证名。元·朱震亨《幼科全书》：“凡痘初出之时，遍身作痒，抓捏不宁，此系邪火停于肌肤皮肉之间，不能即出，故作痒也。”须按病情分别施治，如痘方出作痒，此邪气欲出，因腠理严密，热毒往来游溢其间，外不得泄，故时时作痒，治宜升发，用升麻葛根汤；在灌浆时痘色淡白，平塌，便溏，厌食，浆清作痒，属气血亏虚，宜补气益血，用十全大补汤；至于将靨作痒，此为脓成毒化，荣卫和畅的现象，不必服药。

痘疮起胀 痘疮见点后已个个隆起，尖圆坚实，形如黄豆、豌豆，属痘疮的正形，称为起胀。清·翟良《痘科类编释意》：“起胀者，痘勃勃欲长，有起发之势，颗粒尖圆而胀大也。”一般痘出齐之后，先出者先起，后出者后起，颗粒尖圆光泽，根脚红锭肥胖。饮食、二便如常，神清气爽而无他症者，不必用药，但节饮食，避风寒，防秽气，妥善护理，即可使痘疮自然恢复。

痘疮难靨 病证名。即痘疮干浆应收靨而不收靨的症候。痘疮自见点、起胀、灌浆十至十三天左右，应收靨结痂。到时而不收靨，是毒气太重，内外热蒸所致。若失于治疗，则热毒入心，可变为险证。治宜清热败毒，用犀角散（《证治准绳》：犀角、黄芩、

黄耆、升麻、栀子仁、汉防己、川朴硝、牛黄）。

痘疮脱痂 痘疮收靨为结痂期。痂干自然脱落，脱痂后，有残留的紫色瘢痕，经久方退。元·朱震亨《幼科全书》：“其疮落痂之后，根痂平正，红活者吉；若瘀血或凸起，或凹陷，其色或白或黑，此凶吉未可知也。”设若痂皮不落，兼有昏睡者，为脾胃气虚之故。

痘痂 又名疮痂。指痘疮浆回后所结的痂皮。清·翟良《痘科类编释意》：“痘至脓足浆回结靨之时，其疮蜡色或葡萄色，浆回结痂厚硬而色黑，随结随落，亦如起胀灌浆收靨之三、四次，相挨而落痂，其痂微红，鲜明光莹，无赤黑，无凸凹者，上吉也。”痘痂红痒，为血虚有热，治宜补血清热，用四物汤加牡丹皮、紫草；痂皮干燥，深入肌肉、不易脱落，宜用麻油或蜂蜜润之，不要强行剥离，以免成瘢；痘痂不落，昏昏喜睡者，为邪气已退，正气未复，脾胃虚弱，宜以调补脾胃为治；痘痂落后，其痂白，以手拭之，则稍红，为气虚，宜多服保元汤，必至痂红而后止；痂落后，虚烦不眠，宜用竹叶石膏汤。

痘疹闷乱 病证名。痘疹神识不清的一种表现。《痘疹心法》：“谵妄、狂扰而烦躁者，谓之闷乱。”一般为湿热、痰浊或瘀血阻塞心包，扰及神志所致。治以清热化湿，豁痰消瘀为宜。烦热闷乱，宜清心解毒，用导赤散加银花、连翘、山栀、黄连之类；湿蔽清窍，宜芳香化浊，用菖蒲郁金汤；痰浊阻窍，宜豁痰开窍，宜温胆汤加菖蒲、郁金；瘀血阻络，宜消瘀活络，宜通窍活血汤。

痘浆法 人痘接种法之一。取天花患儿的新鲜痘浆，以棉花蘸塞入被接种对象的鼻孔，以此引起发痘，达到预防接种的目的。因本法须直接刺破儿痘，病家多不愿接受，故在古代亦较少用。

痞结 病证名。出《婴童百问》。指小

儿脘部痞满结痛，多因热邪蕴于胸膈，与胃脘留饮相搏，致脏腑不得宣通，营卫运行不畅所致。临床表现为心下脘腹满而坚，按之啼哭，乳食减少，身热，大便不通等，治宜疏利大便，破结散气为主。

痞热 病证名。小儿食积成痞而致发热者。《幼科指南》：“痞热者，由饮食不清，伏结于内，致成痞块，以生内热，熏灼于外。”宜以消积清热为治。

痞(xīāo)渴 见宋·黎民寿《简易方》。即消渴。详小儿消渴条。

痢后风 病证名。指痢后两膝肿痛，足曲筋缩的证候。《幼科金针》：“久痢将瘥，忽然双膝酸痛，肿大无力，足曲筋缩，立则掣痛，类于鹤膝而非也。因痢后营卫大虚，气不能充胃，血不能营筋。”治宜补益气血。用十全大补汤。

痫证 病名。是一种发作时常有意识障碍，肌肉痉挛，感觉和行动异常的病证。多因小儿形气未充，神志未定，如被惊恐，或风邪外感，或痰热、食积所伤而引起；亦有由于妊母受惊，得之于先天者。《诸病源候论》卷四十五：“痫者小儿病也，十岁以上为癫，十岁以下为痫。”症见突然昏倒，不省人事，抽搐牵引面目，口吐白沫，喉头痰鸣，惊掣啼叫，发作后在短时间内，苏醒如常。有一日一发，或数十日，数月发作一次者，本病按其病因病理及症状分型的不同，分五痫、阴阳二痫、风惊食三痫、暴痫、肠痫、胎痫、饮痫、痰痫、寒痫、热痫、虫痫等。详见各条。

痧子 见元·滑伯仁《麻证新书》。麻疹的别称。详该条。

痧筋 指发痧时腿弯、肘弯上下怒张的静脉，呈深青、紫色或深红色。系痧症显现于体表的一种标志。《痧胀玉衡》：“痧筋有现有微现，有乍隐乍现，有伏而不现。痧筋之现者。毒入血分者多；乍隐乍现者，毒入气分者多；伏而不现者，毒结于血分者多。”

治法：痧筋明显的，用刺痧法；乍隐乍现的，须俟其显现后再放血。其他如痧毒结聚不散，结于血分者，散其瘀；结于食者，消其食；结于痰积者，消其痰积。散结之后，痧筋必显，用三棱针刺痧筋使出血，以排泄痧毒。

痧癆 病证名。出明·秦景明《幼科金针》。为麻疹后久咳不止，肌肉消瘦的病证。多由病儿胎禀不足，麻毒深重，热久伤津所致。多见于麻疹之后，热留不退，发枯毛竖，肉消骨立，渐渐羸瘦。如病情迁延不愈，则见睡时露睛，口鼻气冷，手足厥逆等阳虚证候。治疗先用清热活血之剂，如柴胡四物汤，热退后再进生津养液，如养胃汤；阳虚者宜温中回阳，如参附汤之类。

痧痘口疳 病证名。指麻疹、痘疮之后，口腔溃烂的证候。见清·程永培《咽喉经验秘传》。清·吴·张氏《喉科秘旨》卷上：“痘余痧后口生疳，烂在牙龈痘毒传，若是见痧生满口，须从心胃二经参”。治宜清泻心胃二经之火。可选用清胃散、银翘散、导赤散等加减。

痛经 病名。亦名经前腹痛、经行腹痛、月水来腹痛、经后腹痛等。指每在月经期，或行经前后，出现小腹及腰部疼痛，甚则剧痛难忍者，称为痛经。临床常见有气滞、血瘀、寒湿凝滞、气血虚弱、肝肾亏损痛经等，详气滞痛经、血瘀痛经等各条。

痛胎 病证名。明·赵献可《邯鄲遗稿》：“妊娠腹痛者，名痛胎”。《叶氏女科证治》：“妊娠初受妊时，即常患腹痛者，此由热之故，名曰痛胎。一时不能速愈，宜服梔芩汤（山梔、黄芩、当归、玄参、枳壳、苏梗、陈皮、白芍、杜仲）数剂”。

童子怯 病证名。崔秉铤《妇科宗主》：“闺女十五、六岁，月经行一、二次或从来未行，而经闭者，人渐渐黄瘦，内骨蒸热，咳嗽或腹内有块时疼，名曰童子怯”。治疗

参见室女经闭条。

童子癆 疳癆的俗称。详疳癆条。

童损 病证名。见缪慎斋《妇女卫生医药常识》。指室女经闭后，出现形瘦肉削，食少神疲，或见咳嗽潮热等症，称为童损，俗名童子癆。参见室女经闭条。

童癆 病证名。吴道源《女科切要》：“室女经水既通，而至期复又不来者，面黄肌瘦，内热，是童癆”。参见室女经闭条。

惯堕胎 见黄体端《女科秘方》。即滑胎。详该条。

焮法 又名灯火疗法。《厘正按摩要术》：“取灯芯，截三四寸长，微蘸麻油，烘干燃着，右手平持灯芯，以尾下垂，按穴焮之。一近皮肤即提起，熳熳有声，须手法灵捷，勿致灼伤肌肉。”临床常用的有焮胎寒，焮脐风等。详各条。

焮胎寒 灯火治疗新生儿胎寒证的方法。《厘正按摩要术》：“小儿生一、二日内，面青唇白，不乳不啼，肢冷拳缩或腹痛啼哭不已。皆胎寒也，用灯火于囟门、眉心、脐心各一焮，脐旁四围六焮，左右足跟两旁各一焮，共十五焮，声音不出者，肺俞二焮，左右少商穴各一焮”。

焮脐风 灯火治疗脐风的方法。出《厘正按摩要术》。脐风初发，即用灯火于囟门、眉心、人中、承浆、两手大指少商等处、各一焮，脐旁四围六焮，脐带未落，于带口一焮，如既落，则于落处一焮，共十三焮。可收熄风镇痉之效。

涇尻疮 见《保婴易知录》。即红臀。见该条。

滞颐 病证名。出《诸病源候论》卷四十八。指小儿口内流涎，浸渍两颐。脾之液为涎，脾开窍于口，小儿脾气虚弱，固摄失职或脾胃蕴郁湿热，上蒸于口而致。脾气虚弱者，口角流涎清稀，面白唇淡，治宜温补脾气，用益黄散或温脾丹；脾胃湿热者，口角流出稠涎，口渴烦躁，治宜清热利湿，用清脾散之类。

滞利 八利之一。实指痢疾。《小儿卫生总微论方》：“……滞利，谓便下脓血相杂也”。治疗参见小儿痢疾条。

温壮 病证名。小儿胃肠实热的症状。出《诸病源候论》卷四十五。①指温温然，热而不甚者。《证治准绳·幼科》：“温壮与壮热相类而有小异，一向热而不止是壮热也。”②《圣济总录》卷一百六十七：“体热多睡名曰温壮。其证大便黄而恶臭者，有伏热也，利下乃愈；若便自下而有醋臭者，有宿食也，当微利损谷乃愈。”温壮多由内有伏热，及挟宿食，以致胃不调和，气机壅涩而成。

温麻 病名。指麻疹温热偏重者。出元·滑伯仁《麻证新书》。麻疹原系一种外感天行、内蕴热毒的疾病，由于病情偏于温热，症见烦渴，壮热；甚或神昏，谵语。疹前期将出未出时，治宜辛凉透发，用银翘散加减；已出疹点红肿甚大者，宜清解透毒，用清营汤加减。

温热痉 病证名。小儿痉病之一。小儿感受温热病邪，侵袭经络，壮热，发痉者。治宜辛凉镇痉。用白虎汤加全蝎，蜈蚣之类。参风温痉条。

湿水肿 病证名。指湿邪引起的以下身为重的水肿。《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》：“下身肿者，腰脐两足皆肿也。病因脾经湿热所成。”宜急用利水化湿之剂，外敷贴脐法，内服沉香琥珀丸。

湿痉 病证名。小儿痉病之一。感受湿热病邪而致的痉证。湿热病邪。侵袭经络，以致身热不扬，抽搐，或四肢痉挛，角弓反张。治宜清热化湿为主，如甘露消毒丹。清·吴鞠通《解儿难》：“湿为浊邪，最善弥漫三焦，上蔽清窍，内蒙膻中。”故湿痉多伴有神志模糊，谵语等。见于急性中毒性脑病等。治宜清热化湿，用菖蒲郁金汤，偏热者煎送至宝丹；如秽浊甚者，用苏合香丸。

湿泻 病证名。因受湿邪而引起的腹

泻。脾喜燥恶湿，湿甚则脾为湿困，水谷不能正常运化。《幼科发挥》：“如泄时水谷混下，小便少而大便多者，此湿泻也。有溏泻无度者，此久湿也。并宜五苓散主之。”如症见肠鸣，身重胸闷，乳食少纳，嗜睡懒语者，则为脾气下陷，湿邪内盛所致。治宜升阳除湿之剂。

湿毒带下 病证名。多因经期、产后、胞脉正虚，湿毒秽浊之邪，乘虚内侵直伤胞脉，损伤冲任之气血，以致带脉失约，任脉不固所致。症见带下量多，色如米泔或黄绿如脓，五色杂下，气味臭秽，阴部痒痛，或有发热，腹痛，小便短赤等。治宜清热解毒，除湿止带。方用止带方，酌加金银花、连翘、莖菜等。

湿热泻 病证名。指湿热所致的腹泻。由湿热内侵，蕴结肠胃所致。元·朱震亨《幼科全书》：“如泄泻黄稠，腹痛作热，面红口渴，此热湿也，其症多得于夏，以五苓散加滑石、甘草、木通治之。”如兼腹痛舌苔黄厚者，用香连导滞丸。

湿热痢 病证名。指夏秋季节，感受湿热，蕴蓄肠胃，湿热下注，而致的痢疾。《幼科全书》：“凡痢不论赤白，皆属湿热，……赤白冷热皆有，但热证腹痛，湿证不痛耳。”症见下痢频作，赤白相杂，状如鱼脑，粘稠臭秽，里急后重，肛门灼热，小便赤热，舌苔黄腻，脉象滑数。治宜清肠泄热，化浊利湿。用葛根芩连汤或香连丸加滑石、苍术之类。

湿热感寒疝 病证名。疝证之一。出《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》。小儿贪食不节，则势必影响中焦消化功能，因而积久生湿，湿郁生热，以致湿热之气下注，流入阴囊，复被风湿之邪外侵，则成本证。发作时阴囊红肿松弛，常常刺痛，一般可用乌头栀子汤（《医宗金鉴》：乌头、栀子，入姜汁煎服）。

湿痰 病证名。见金·张子和《治法杂

论》。指水湿聚结而成痰者。由于小儿饮食不节，或过食油腻不易消化的食物，使脾胃损伤，不能运化而成。症见痰多稀滑，容易咯出，食欲减退，胸脘饱闷，精神疲乏，面色发黄。治宜燥湿化痰。用二陈汤加枳壳、桔梗之类。

湿疹 病名。为风湿热三种邪气侵袭皮肤所致。主症为局部皮肤发痒、皮疹多呈对称性发生，呈多形性，如发红，水肿，丘疹，水疱，糜烂，渗出胶粘状液体，无一定的发病部位，但多发生于面部和四肢；女性的乳房和外阴，男性的阴囊等处，均可发生，发病部位大小不一。婴儿湿疹多对称地发生于面部，呈弥漫性发红，糜烂，渗液并结痂，而且反复发作，亦可泛发于全身，一般2~3岁可以自愈。治宜祛风、清热、渗湿、收敛、止痒，用湿疹汤（白鲜皮、儿茶、乌梅、五倍子、苦楝皮、紫草茸、黄柏、苦参、枯矾）煎汤内服、外洗，并用黄连20克，寒水石20克，冰片20克，蓖麻油20克，凡士林40克调配成膏，外搽。

湿痰不孕 病证名。出清·叶其臻《女科指掌·种子门》。不孕症型之一。即痰湿不孕。详该条。

湿蠱 出《诸病源候论》卷十八。即疳湿。详该条。

滑胎 出《经效产宝》。①病名。亦名数堕胎。指连续发生三次以上的自然流产者。即习惯性流产。多因气虚、肾虚、血热、外伤等以致屡孕屡坠。治疗参见气虚滑胎、肾虚滑胎等各条。②治法。指用药使胎滑易产。《经效产宝》用诃子丸（诃子、槟榔、川芎、吴茱萸）自妊娠七、八个月服至分娩前，或用束胎丸（白术、枳壳）自妊娠八月服至临产。

痰槽 肾疳五证之一。出《小儿药证直诀》。详牙疳条。

寒入血室 病证名。见陆清洁《医药顾问大全·妇人科》。多因经期血室正开，偶

感寒邪，寒气乘虚陷入冲脉所致。症见月经骤停，腹痛难忍，两胁亦痛，背寒，尿液清长，不思食等。治宜温阳行血调经。方用桃仁桂枝汤（桃仁、桂枝、生姜、炙甘草、赤芍、大枣、菟蔚子、泽兰）。如失于治疗，则寒气益盛，腹痛愈剧，其痛如绞如切，不能睡卧，面目俱青，四肢厥冷，或冷汗如雨，脉微欲绝，病势危笃者，宜回阳救逆，急投参附汤，或独参汤之类。

寒邪伤肺 出《证治准绳·幼科》。指冬春之季寒邪侵犯肺卫而致的喘嗽。症见恶寒无汗，咳嗽气急。治宜发散寒邪，宣肺利气。用荆防败毒散或华盖散。

寒吐 病证名。即小儿因胃中虚冷而致的呕吐。元·朱震亨《幼科全书》：“寒吐食不化，不恶食。”小儿脾胃嫩弱，寒气易伤，或母体受寒而吮其乳，以致吐时少而吐出物多，吐出物为青涎夹奶，四肢不温。治宜温中化食。用香砂六君子汤加减。

寒乳 乳母因寒哺乳，令儿致病。因母形寒饮冷，乳气虚寒，儿饮其寒乳，导致脾胃虚寒，运化失司，故其症腹泻奶片不化，或便青而啼（《证治准绳》）。

寒胀 证名。见《东垣试效方》。肠胀气因寒邪侵入而致者，其症腹胀，胸中痞满，脉来沉细。治宜温散寒邪。用平胃散加豆蔻、大腹皮。

寒夜啼 病证名。见《证治准绳·幼科》。又称腹痛夜啼。系由内脏虚寒所致。症见面色青白，四肢不温，曲腰而啼，眼中无泪，得灯火则啼稍息。治宜温中祛寒。用理中汤。

寒疝 病证名。疝证之一。指因寒邪引起的疝气。《诸病源候论》卷十二：“寒疝者，阴气积于内，则卫气不行，卫气不行，则寒气盛也。”小儿过食生冷或坐卧潮湿地方，阴寒之邪入侵，滞留于体内而成。临床表现有恶寒不欲食，手足发冷，绕脐痛，遇寒即发，阴囊清冷，或睾丸作痛，同时牵引

少腹等。治宜温经散寒，行气止痛。用导气汤加减。

寒积吐 病证名。指寒邪积滞胃中而致的呕吐。多因乳幼儿沐浴受凉，风寒由肌表入胃，寒邪积滞不化，气逆而吐所致。明·邓景仪《医经会解》：“寒积吐，清浊混出，不作腥臭，吐汁久澄，清浮浊底。”临床可伴有面唇苍白，形寒、肢冷等，治以温中消积为主，用理中汤加藿香、丁香之类。

寒痉 病证名。小儿痉证之一。外感寒邪而致的痉证。清·吴鞠通《解儿难》：“风寒、风湿致痉者，寒痉也。风寒咳嗽致痉者，用杏苏散。”见于乳幼儿各种感染，如上呼吸道炎、肺炎等引起的惊厥。

寒淋 病证名。小儿诸淋之一。因风寒之邪入侵膀胱，致下焦受冷，失去正常的气化功能而成。症见小便闭塞，胀痛难忍，并牵引少腹作痛，或小便淋漓不畅。治宜温阳散寒，止痛利水。用五苓散加肉桂、小茴香。

寒痧 病证名。小儿发痧的一种证型。见陆乐山《养生镜》。多由臭气入于肺胃之经，感受寒邪而发。症见身发潮热，指尖微冷，怕寒喜热。宜刮臂臑、尺泽；针曲池、少商、委中。并用藿香、紫苏、橘红、青木香煎服。

寒湿泻 病证名。指寒湿内侵，困遏脾阳，运化失司所致的腹泻。元·朱震亨《幼科全书》：“泄泻清白，或乳食不化，腹痛四肢冷，面眇白，不作渴者，此寒湿也。”治宜温中利湿。用五苓散送服理中丸。

寒湿凝滞痛经 病证名。多因久居阴湿之地，或经期涉水感寒，寒湿之邪伤及冲任胞宫，血被寒滞，经血下行受阻所致。症见经血色黯有块，血行涩滞不畅，下腹部冷痛或绞痛，得热痛减。治宜温经祛湿，活血止痛。方用当归四逆汤、少腹逐瘀汤，或用益母草、干姜、胡椒，水煎服。虚寒者，症见经血色淡，质稀，小腹隐痛喜温热，治宜温

经补虚，方用小营煎，当归建中汤等。

寒湿凝滞经闭 病证名。多因久居阴湿之地，或经期涉水感寒，寒湿之邪与血搏结，冲任胞脉阻闭所致。症见经闭不行，小腹冷痛，形寒肢冷，白带量多。偏寒者，多见带下清稀如水，治宜温经散寒，活血通经，方用温经汤；偏湿者，多兼腹胀，便溏，或下肢浮肿，治宜燥湿化浊，方用丹溪治湿痰方（苍术、白术、半夏、茯苓、香附、滑石、当归、川芎）。

寒痢 病证名。感寒即发的痢证。小儿内伤脾胃，外感风寒，结于胸膈之间，遇风寒即发。其症突然仆倒，不省人事，发出尖叫声，口涌痰涎。治宜断痢丸（《证治准绳》：皂角、白矾、蝎梢、僵蚕、雄黄、朱砂，白附子、麝香、乌蛇、南星、蜈蚣）。并宜灸膻中、内关、劳宫、涌泉。

寒禁 出《痘疮经验良方》。禁疮之一。痘疮初发热时，误经冷水浴洗，或衣被单薄，感寒邪，以致痘不宜露，手足麻木，不知痛痒，四肢冷痛，不能举动，其麻木冷痛之处，不出痘子，惟于委曲，避风之处，或头面发际上痘出如瘾疹者，称为寒禁。治宜升麻、丁香、肉桂、川芎温经散寒。

寒痰 病证名。出元·王珪《泰定养生主论》。又名冷痰。小儿素体阳虚，“冲冒风凉不节之气。”阴寒偏盛，津液失于运化而成寒痰。症见畏寒，足冷，或全身浮肿，

咳嗽吐痰，痰色白而清稀，舌苔白润。治宜温化寒痰。用苓桂术甘汤。

寒嗽 病证名。又名冷嗽。指冬月感受寒邪而致的咳嗽。《素问病机气宜保命集》：“冬月嗽而发寒热，谓之寒嗽。”症见咳嗽，喷嚏，流涕，鼻塞，身重，咳吐痰涎，身热恶寒。治宜温经散寒。用小青龙汤加杏仁。

割脂 治疗疳疾方法之一。割治部位为鱼腹穴，即在手掌大鱼际侧边缘线上，相当于食指间引一垂直线向下，另在拇指掌指关节处向掌心引一横线，与垂直线交叉点。手术操作：局部消毒后，用平口手术刀在鱼腹穴垂直纵向戳下，创口阔0.4厘米，深度0.4厘米左右，然后挤出皮下脂肪如赤豆大，并剪去之，再用红汞消毒药棉覆盖其上，用纱布条包扎。

〔7〕

疏表法 神奇外治法之一。以葱捣烂取汁，加麻油少许和匀，指蘸葱油摩运小儿的五心、头面、项背诸处，依次摩擦数十下，摩擦完毕后，以厚衣包裹，略取微汗，但不可令其大汗。此法用于小儿发热，风寒外感，乳食所伤，以及发疹等。能使腠理疏通，邪气外出，而又不伤其正气。

登痘疮 出《诸病源候论》卷十。即痘疮。详该条。

十 三 画

〔一〕

鼓 五不女之一。又名鼓花头、鼓花。处女膜坚韧如鼓皮，以致不能性交；且使经血停蓄于内，成为瘀块，谓之鼓症。可采用手术治疗。

鼓舌 病证名。出《小儿卫生总微论

方》。指小儿舌上生疮肿大，其形肿大如吹泡者，为邪热风毒上壅所致。

鼓花 五不女之一。即鼓。详该条。

鼓花头 五不女之一。《广嗣纪要·择配篇》：“鼓花头绷急似无孔”。即鼓。详该条。

鼓槌风 病证名。出《普济方》卷三百

九十三。指七岁以下小儿患丁奚膝大胫细的症状。详丁奚条。

蓝注 指皮肉出现蓝色紫斑的一种症状。《诸病源候论》卷四十九“小儿为风冷，乘其血脉，血得冷则结聚成核，其皮肉色如蓝，乃经久不歇，世谓之蓝注。”与紫癜相类似。

蓐风 见《千金要方》卷三。李师圣《产育宝庆集》：“产后为风邪所中，角弓反张，口噤不开，名曰蓐风，用药不得大发其汗。并忌转泻吐利，用华佗愈风散（荆芥穗一味）最妙。”治疗参见破伤风条。

蓐劳 病名。又名产后癆。《经效产宝》：“产后虚弱，喘乏作寒热状如疟，名为蓐劳”。因产后气血耗伤，调理失宜，感受风寒，或忧劳思虑等所致。症见虚羸喘乏，寒热如疟，头痛自汗，肢体倦怠，咳嗽气逆，胸中痞，腹绞痛或刺痛。宜扶养正气为主。用六君子汤加当归。饮食渐进，正气恢复，其病自愈。

蓐疮 病证名。出《小儿卫生总微论方》。儿自初生至七日内外，因胎毒攻发，身生疮者，名曰蓐疮。此症见于头面腿臂等处，并逐渐蔓延，引起患儿啼哭不乳。治宜用黄连粉、青黛香油调涂。

蒸乳 病名。出《张氏医通》卷十一。又名乳膨、乳蒸。多因产妇气血旺盛，乳汁壅滞不通，或产后无子饮乳所致。两乳肿硬疼痛，恶寒发热。治宜理气通络。用香附、瓜蒌、通草、橘叶共煎服，其药渣煎洗，待乳通则热自除。如无婴儿吃乳，用炒麦芽100克，水煎，频饮或熏洗，乳退热亦退。

蒸笼头 病证名。指小儿睡时惯常头部出汗，无其他症状者。详头汗条。

禁疮 病证名。出《痘疹经验良方》。指痘疹初出，或一、二点，见于隐僻关节、四肢之间。古人认为此疮一出，则其痘疮不得宣发成浆，故称禁疮。分胃禁、火禁、水禁、风禁、寒禁。详各条。

感冒夹食 病证名。见《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》。指感冒夹有食积。症见发热，恶寒，头疼身痛等感冒症状外，常伴有脘闷暖气，口臭，呕吐酸馊及未消化之食物，腹胀，甚或腹痛，便秘，脉滑，指纹沉滞。表里俱实，发热而二便不通者，宜表里双解，清热通便，用防风通圣散；寒重而兼呕吐者，宜疏化和中，用藿香正气散。表邪既解，积滞已通之后，应以调理脾胃为主，可用平胃散加减。

感冒夹热 病证名。见《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》。小儿体质娇柔，消化力薄弱，如饮食失宜，最易生痰生热，所以在病理方面每有脏腑蕴热的特点。假如一旦遭到风寒外邪的侵袭，则外邪与内热相搏，而致郁蒸化火，成为本证。临床表现多为面红，唇焦，口鼻干燥，初起时有恶寒的现象。随即发热，口渴喜冷，并见心神烦躁，谵妄，二便闭结不通等热象。因本证外有表邪，兼有里热，治当疏表与清里并用，宜防风通圣散；如服药后，汗出便通，症状减轻，而仍显热象者，可用凉膈散加减。

感冒夹惊 病证名。见《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》。小儿神气怯弱，遭受外感以后，又被外界异声异物所惊吓，或者由于邪热的刺激，则可引起神志不宁，成为本证。症见身热烦躁，面色青赤，睡卧不安，且有胆战心惊的现象。初起宜以清热散邪为主，用疏解散（《医宗金鉴》：羌活、苏叶、防风、枳壳、桔梗、前胡、赤芍、杏仁、僵蚕、甘草、黄连）；继服凉惊丸（《小儿药证直诀》：龙胆草、防风、青黛、钩藤、黄连、牛黄、麝香、龙脑、用金银花汤下）。

感染性休克 病名。系由感染所引起的急性循环不全。主要表现是微循环的血流障碍，为儿科常见的危重急症之一。早期休克，四肢微温不冷，血压稍低或正常，呼吸气促或有轻度不规则，属气郁不得定畅者，用四逆散，如面色苍白，口唇发绀，脉细无

力者，为气阴欲脱，宜益气复脉，用独参汤或生脉散。重度休克，四肢厥冷，体温或血压不升，面色灰白，唇指青紫，大汗出，舌紫黯，脉微欲绝者，为阳气暴脱，宜回阳固脱，用四逆汤、参附汤、独参汤之类。

碍产 病名。指分娩时，因脐带绕颈，绊肩而引起的难产。又名碍肩生、绞脐、背包生、坐碍、凝产。杨子建《十产论》：“碍产者，言儿身已顺，门路已正，儿头已露，因儿转身，脐带绊其肩，以致不能生。令产母仰卧，稳婆轻推儿向上，以中指按儿肩，脱脐带仍令儿身正顺，产母努力，儿即生”。属脐带绕颈，脐带绊肩之类。

碍肩生 病名。周纪常《女科辑要》卷五：“儿已露顶。因脐带攀肩，而不能下者，名碍肩生”。相当于脐带绊肩。参见碍产条。

搐 ①惊风八候之一。详该条。②即惊风。《幼幼集成》以急惊、慢惊、慢脾三证，易为误搐、类搐、非搐。误搐：“盖小儿伤寒最多，由医者治不如法，抑遏其邪，莫能外解，因而壮热不退，遂变为痉，则有搐搦反张之候，与《内经》诸痉项强，诸风掉眩，诸寒收引之例相符。归于误搐之下。”类搐：“盖伤暑疟痢，丹毒霍乱，客忤中恶，其证显然，辨识既明，一药可愈，何致作搐，由医者延迁时日，抑遏邪气，无所发泄，亦有变为搐者，所以谓之类搐。遵《内经》诸热瞤瘈，皆属于火之例，归于类搐条下。”非搐：“盖小儿吐泻病后，脾败胃绝，昏睡露睛，虚痰往来之证，幼科以为慢脾风，更以大惊卒恐，神魂离散之证，为急惊风，不知此之征，死生呼吸，犹敢以惊风称之耶。因体景岳非风之意，竟以非搐名之。”

输卵管积水 病名。指输卵管炎后，伞端粘连闭锁，管壁渗出浆液性液体，或由输卵管积脓，但脓液被吸收后形成输卵管积水，瘕似瘕瘕、肠覃。治以活血化瘀，理气行水。可用当归、赤芍、牛膝、防己、川芎、元胡、桃仁、肉桂、木通、香附、甘草煎服。

腹部外敷甘遂、麝香面（见《中医杂志》1965年6期）。

〔1〕

腐疮 见谈金章《诚书痘疮》。即痘疮。详该条。

蒙头 异痘之一。指痘出蒙头满面。属痘疮火毒共积于头部所致。治宜疏解，用松肌通圣散（《医宗金鉴》：荆芥、羌活、牛蒡、防风、紫草、红花、青皮、当归、赤芍、紫花地丁、蜂房、山楂、木通）。

睛动 病证名。目睛眴动。又名目睛眴动。清·余梦塘《保赤存真》卷四：“目为肝窍，肝藏血，血不足则肝火内生，故睛动。”治宜四物汤以益其血，加柴胡、山梔以清其肝，使阴血内荣则虚风自熄。若因肝经血燥而致者，用六味地黄丸，以滋其化源；若愈后惊悸不寐，或睡中咬牙，目睛眴动者，乃血虚不能荣于目所致，宜归脾汤加茯苓、五味以补益其血。此证兼属肝脾，为慢惊之渐，应当注意。

睡中惊动 病证名。指小儿睡觉时，突然出现惊恐躁动的证候。明·薛铠《保婴撮要》：“小儿睡中惊动者，由心肾不足所致。盖心主血与神，肝藏血与魂，肺主气与魄，肾主惊与恐。小儿脏腑脆弱，易为惊恐，恐则气下，惊则心无所依，神无所归。且夫人之神气，寤则行于目，寐则栖于肾，今心肾既虚，则不能宁摄精神，故睡中惊动也。治宜清心安神，用茯苓补心汤（茯苓、桂心、甘草、紫石英、人参、麦门冬、大枣）加酸枣仁、茯神、五味。……食郁生痰，惊动不安者，用四君子以健脾，神曲、半夏以化痰，山梔、芍药以清热。”

暖病 病证名。见清·许宣治《小儿诸热辨》。小儿纯阳之体，稍寒无妨，过暖则病。如果衣被过厚，室温过高，或睡时覆盖过严，气不得泄，均可导致身热面赤，心烦多啼，谓之暖病。既非外感，亦非内伤，宜

即去其过厚的衣被，调节室温，使之寒温适宜，并酌服轻清凉解之剂，其证自愈。

暖痰法 神奇外治法之一。用生附子一枚，生姜一两，同捣烂炒热，布包熨背心及胸前，将姜附捻成一饼，贴于胃口。治小儿胸有寒痰，不时昏倒者。

歇 见郑栎庵《女科经验方传灯》。又称歇经。指未婚女子，月经初潮后，复又经闭，诊其面色不黄，饮食如常，身又无热者，名曰歇。不属病态。

歇经 简称歇。吴道源《女科切要》：“有室女经水既通，而至期复又不来者，必须视其有症无症，验其似疾非疾，若面色不改，饮食如常，身无内热，名曰歇经”。

暗风 见《小儿卫生总微论方》。即暗痢。详该条。

暗产 病证名。指胚胎初结未足一月而流产者。因此时胚胎尚未成形，人多不知有胎。古人认为多由郁怒不舒，房室不节所致（见《景岳全书》卷三十九）。李梴《达生撮要》：“种子须防暗产，初交之后，最宜将息。弗复交接，以扰其子宫，盗泄母阴，夺养胎之气。盖浮火一动，则摇撼肾脉，胞门亦由之而不闭，胎始堕矣。”

暗经 见《医宗金鉴·妇科心法要诀》。指妇女终身不见月经，而同样仍能孕育者。

暗痢 病证名。见《小儿卫生总微论方》。又名暗风。遇阴暗地即发生的痢证。小儿气血怯嫩，而肝热较旺，易挟痰涎上犯心神，阴暗之地，小儿常至惊恐，故容易发作。其证特点，每至阴暗地即僵卧，气乱不省人事，手足动弹战掉，抽搦，喉中痰响，吐痰沫，或作吼声叫，发作时间，长则一日或半日，短则一、二小时，发作过后即能起声，一如常人。

嗜异 病证名。指病人喜食异物。《寿世保元》：“小儿爱吃泥土，乃脾虚胃热所致，面色青黄，或是虫动。”临床上脾疳、虫积的患儿多有嗜异的症状。

噬乳 见《幼幼集成》卷三。即伤乳吐。

见该条。

蛾子 见清·刘序鹄《增删喉科心法》。即乳蛾。详该条。

〔〕

稚阳稚阴 小儿生理特点之一。阳是指体内各种功能的活动，阴是指体内精血津液等具有物质性的东西；稚阳稚阴是指小儿在功能活动和物质基础上均未臻完善。《小儿药证直诀》：小儿“五脏六腑，成而未全，……全而未壮”。闫季忠在该书序言中指出小儿“骨气未成，形声未正，悲啼喜笑，变态不常”。说明小儿机体柔嫩，气血未充，经脉未盛，神气怯弱，内藏精气未足，卫外功能未固的生理特点。清·吴鞠通《解儿难》中则总结为“小儿稚阳未充，稚阴未长”。认为幼儿赖阳以生，依阴以长，然而阴既未足，阳未充盛，所以在治疗方面则以维护阴气为要，但还要善于护阳。

催生 指服药以助产母之正气，令儿速生之法。杨子建《十产论》：“催生者，言欲产时，儿头至产门，方服药催之。或经日久产，母困倦难生，宜服药以助其血气，令儿速生”。

催肠生 即盘肠生。详该条

催乳 包括通乳、下乳。指治疗产后缺乳的方法。由于气血虚弱而致缺乳，症现乳汁全无，或有而不多，乳房无胀痛感，面白唇淡，食少便溏，治宜补血益气，佐以通乳，方用通乳丹加减（方见缺乳条）；由于肝郁气滞而致缺乳，症现乳房胀满而痛甚，或身热，精神抑郁，治宜疏肝解郁，佐以通乳，方用下乳涌泉散加减（方见缺乳条）。

鼠瘻 指瘰癧溃烂成脓，皮下穿空的病证。见于颈腋部淋巴结结核。《灵枢·寒热》：“鼠瘻之本，皆在于脏，其末上出于颈腋之间”。其所以名为鼠瘻，清·莫枚士《研经言》指出：“鼠性善窜，……瘻之称鼠，亦取窜通经络为义”。参见小儿瘰癧

条。

错经 病证名。见《竹林寺女科秘方考》。一指经血上逆，从口鼻而出。二指经血从大小便出。参见差经、产后交肠病。

错喉 病证名。①食谷即吐。由贲门受伤所致。（《证治准绳》）。②乳食误呛入喉，随即引起的吐逆。

错经妄行 病证名。岳甫嘉《妙一斋医学正印·种子篇》：“错经妄行于口鼻者，是火载血上行，气之乱也”。详逆经条。

错经吐衄血崩 病证名。见何梦瑶《妇科精要》。指血为热迫，导致经血上壅为吐衄，下为血崩之症。如去血过多，则热随血去，以补为主；若去血少而热尚未减者，仍当清之。甚者三黄四物汤，轻者宜犀角地黄汤加减。

腓（mei媒） 指妇女始怀胎。《圣济总录》卷一百五十四：“妊娠之初，月水乍聚，一月为腓”。《说文》：“妇始孕，腓兆也”。

腰背反张 病证名。腰背高度强直，使身躯仰曲反张如弓状，故名。清·余梦塘《保赤存真·幼科》：“足太阳脉夹脊抵腰中，且主周身之气，外邪感之，经络拘急，所以背反张。又肝主筋，肝风盛及肝血虚者，多见此症。”参小儿痉病、惊风条。

腹啼 出《张氏医通》卷十。即子啼。详该条。

腹痛啼 指小儿因腹痛而啼。出《片玉心书》。小儿腹痛以食积、虫扰所致者居多，亦有因脏冷腹痛而啼者，则表现面唇皓白无光，喜热；由瘀血腹痛而啼者，则为面青、肢冷，腹部有块。脏冷者宜温中散寒，用理中丸；瘀血者宜活血祛瘀，用丹参饮；因食积者，治以消食为主，因虫扰的，治以驱虫为主。

腹中有癖 病证名。指乳食停滞，腹中出现癖块者。《小儿药证直诀》：“小儿病癖，由乳食不消，伏在腹中，乍凉乍热，饮

水或喘嗽，与潮热相类，不早治，必成疳。”治宜消乳导滞。便秘者，用保和丸加大黄，便通者，用大安丸加鸡内金。

腹哭钟鸣 见《济阴纲目》。即子啼。详该条。

腹痛夜啼 出《三因极一病证方论》。即寒夜啼。详该条。

触经伤寒 病证名。见《竹林女科证治》。指经期忽然作渴误食生冷，遍身潮热，痰气急满，恶寒，四肢厥冷一证。治宜辛温解表。方用五积散之类，或酌情用厚朴、陈皮、茯苓、白芷、枳壳、川芎、半夏、香附、苍术、柴胡、干姜、青皮、肉桂、紫苏梗、地骨皮等。

触经感冒 病证名。见明·岳甫嘉《妙一斋医学正印·种子篇》。多因经期感寒所致。症见经行时周身疼痛，手足麻痹，寒热，头痛目眩等。治宜辛温解表为主。方用五积散之类。

解颅 病证名。又名囟开不合。指小儿到一定的年龄，囟应合而不合，头缝开解，囟门较正常儿为大的病态。一般矢状缝及其他头骨缝大都在6个月时骨化。前囟的斜径，在初生时约2.5厘米，到12~18个月时闭合。后囟在初生时或闭或微开，最晚于2~4个月时闭合。延迟闭合，多由胎禀不足，先天肾气亏虚，不能充养脑髓而致。《诸病源候论》卷四十八：“肾主骨髓，而脑为髓海，肾气不盛，则髓海不足，不能结成，故头颅开解也”。囟门晚闭见于脑积水、佝偻病、呆小病等。治以培元、滋肾、充髓为主，宜内服调元散（《证治准绳》：人参、白术、茯苓、熟地、茯神、黄耆、山药、炙甘草、当归、白芍、川芎、石菖蒲、姜、枣），外用封囟散（柏子仁、天南星、防风研末）猪胆汁调，摊纱布上，敷于囟门。

解颅法 神奇外治法之一。用水粉一两，以蛋清调匀，略稀，涂患儿胃口及两手掌心，复以酿酒小曲十数枚，研烂，热酒和

作二饼，贴两足心，纱布扎之。用于小儿实热之证。

解颅眼白多 病证名。小儿解颅黑睛少，白睛多，伴有头大，颅缝开解，凶大筋青等症者。见于脑积水。《小儿药证直诀》：“儿本虚怯，由胎气不成，则神不足，目中白睛多，其颅即解，面色晄白，此皆难养，……又肾气不足，则下窜”。治宜补肾，地黄丸主之。参见解颅条。

〔、〕

瘡子 见元·滑伯仁《麻证新书》。麻疹的别称。详该条。

瘡后便脓 病证名。麻疹后便下脓血。清·郑卞年《瘡略》：“瘡后泄泻，而便脓血者，由邪热内陷，大忌止涩。最宜升发升提，虽元气不复，脾胃虚弱，不得轻用参耆，解其热，凉其肠，而病症自愈。”用葛根黄连黄芩汤之类。

癩 (gè 戈) 病证名。指(趾)节腕间搔痒性皮肤病。《诸病源候论》卷五十：“癩者，风湿搏于气血所成。多着手足节腕间，币币然搔之痒痛，浸淫生长，世谓之癩”。

瘡子 出《妇人良方大全》卷二十四。即妇人疔疮。详该条。

瘡瘡 出《证治准绳·疡医》。即隐疹。详该条。

痰母 病理名。见《证治准绳·幼科》。指小儿乳食停滞，或为暑湿所侵，化热灼液成痰，因循日久，结为顽块者，称为痰母。是胸膈的病因。详胸膈条。

痰闭 ①闷痞之一。见于痰饮素盛的病儿，麻毒与痰饮相搏，内迫于肺，以致肺气不宣，疹难透发。症见气急发喘，满口痰涎，咯痰不出，喉间有声。治宜宣肺涤痰，用二陈汤加葶苈、瓜蒌仁、莱菔子、白芥子、枳壳、连翘、桔梗之类。②指惊风、癫痫发作，风痰壅盛而致上闭清窍，症见昏迷，手足搐搦，目窜口喎等证。治宜豁痰开窍，用牛黄

丸、紫金锭之类；并重掐或强刺人中、合谷等穴，以开闭醒神。③痰闭惊厥，④详该条。小儿昏迷的一种证型。详小儿昏迷条。

痰迷 病证名。《厘正按摩要术》：“小儿痰壅气塞，呀呷作声，甚至痰漫窍闭，如痴如迷；甚至痰塞喉间，吐之不出，咽之不入，在小儿为尤多。”治宜豁痰开窍，用涤痰汤加减。

痰胎 病证名。假孕症型之一。由平素火盛多痰，适值经行胞净，痰浊乘虚入子宫，与血相结，以致经闭腹大，状如怀孕。法当下其痰，则腹胀自消。方用苍附导痰丸或二陈汤合芎归汤。

痰痼 病证名。见《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》。痼证痰多者为痰痼。多由小儿素有热痰内伏，复受惊恐而引起。症见仆地昏倒，惊掣啼叫，痰涎塞满喉间，口吐痰沫。治宜祛痰清热。先用一捻金，后服滚痰丸。

痰嗽 病证名。见《小儿卫生总微论方》。指咳嗽痰多，因痰作嗽者。由于小儿乳食失宜，脾胃不和，停滞不化，留结成痰，随气上扰于肺，因而咳嗽、痰多。治宜理脾化痰。如二陈汤加减。

痰火扰心 证名。心在病主惊，小儿受到惊恐刺激，气结湿生，化为痰火，阻遏心窍。症见哭闹不休，打人骂人，哭笑无常，神志有时清楚或不清楚，舌红，苔白，脉滑数。治宜清火化痰。用黄连温胆汤加味。

痰闭惊厥 病证名。见《串雅内编》。指风痰阻闭经络而引起的惊厥。多因患儿痰湿偏盛，蕴于肺胃，复为外邪所犯，或饮食所伤，邪从热化，热郁生风，风痰上扰，窜及清窍，则牙关紧闭，双目上窜，扰及经隧，则四肢抽搐。体实者，宜镇风豁痰为治，如止痉散(全蝎、蜈蚣)；体虚者，则宜调理脾胃以降痰，宣畅气机以镇静，如六君子汤加僵蚕之类。参痰闭条。

痰实壅闷 病证名。出《太平圣惠方》卷八十四。指小儿痰实停于胸膈，胸闷气逆，时复呕吐，不欲饮食。治疗参小儿痰实

条。

痰迷心窍 病证名。见《本草纲目》。小儿多因乳食不节，停滞中焦，致使气结湿生，化为痰浊，阻遏心窍所致。症见神志错乱，神呆目滞；严重者可出现昏倒于地，不省人事，喉中痰鸣，漉漉有声，纹沉色淡，舌苔白腻。治宜涤痰开窍，导痰汤、涤痰汤、苏合香丸、小儿回春丹，均可选用。

痰积血崩 病证名。多因痰涎郁于胞中，清气不升，经脉壅遏而致血崩。症见腹满或脐腹疼痛，下血量多成块，血出则快，血止则闷，或脐上动悸。治宜行痰降逆。方用《素问病机气宜保命集》半夏丸，或用旋复花汤等。

痰涎喘嗽 指痰涎壅盛之喘息咳嗽。《证治准绳·幼科》：“肺气不调，咳嗽喘满，痰涎壅塞，心下坚满。”治宜半夏丸。

痰滞恶阻 病证名。恶阻症型之一。平素脾胃虚弱，运化失常，聚湿成痰，孕后经血壅闭，冲脉之气上逆，痰饮随逆气上冲所致。症见恶心，呕吐痰涎，胸满不食等。治宜豁痰降逆。方用小半夏加茯苓汤。

痰湿不孕 病证名。不孕症型之一。包括湿痰不孕。指妇人体质肥盛，恣食厚味，痰湿内生，影响冲任胞脉，难以摄精成孕。多伴有带下量多，月经不调等症。治宜健脾燥湿化痰。方用启宫丸半夏、苍术、香附、神曲、茯苓、陈皮、川芎）。

痰湿带下 病证名。因素体肥盛，脾虚水湿不运，以致湿浊停注，损伤任、带二脉，故见白带量多，稠粘味腥，胸闷腹胀，或有恶心、痰嗽，或大便稀薄等。治宜健脾除湿化痰。方用苍附导痰丸或六君子汤加苍术、柴胡、升麻。

痰饮食不消 病证名。痰饮内停而引起的食物不能消化。《诸病源候论》卷二十：“此由痰水结聚，在胸府膀胱之间，久而不散，流行于脾胃，脾恶湿，得水则胀，胀则不能消食也。或令腹里虚满，或水谷不消化，

或时呕逆，皆其候也。”治宜化痰消食。用平胃、二陈汤之类加减。

痰阻经行后期 病证名。病因形体肥盛，湿痰壅阻，躯脂逼迫冲任，以致经血不得及时下达，故而经行错后，血色淡，质稠粘，带下连绵，心悸头眩。治宜健脾除湿，化滞导痰。方用六君子汤加苍术、香附、南星。

痰湿月经过少 病证名。多因素体肥胖，躯脂过盛，或嗜食厚味，痰湿内生，躯脂湿痰壅阻经隧，以致冲任血行涩滞。症见月经过少，色淡质稀，或兼见白带量多，面色晄白，头晕心悸，下肢轻度浮肿等。治宜健脾燥湿化痰。方用苍附导痰丸，或用二陈汤合芎归汤。

新生浴儿 见《奇效良方》。古人认为小儿初生须用五根汤（桃、柳、楝、枚、槐）加白芷，苦参煎汤浴之，若遇气候炎热，则以软绢蘸汤揩拭周身，可以清洁皮肤，预防疾病。

新生儿败血症 新生儿时期邪毒入血引起的病症。由于新生儿脏腑娇嫩，形气未充，中枢神经系统调节能力差，对疾病的抵抗力薄弱，产生抗体的机能不完善，皮肤粘膜柔嫩，容易破坏而致细菌邪毒入侵，入侵后也不易局限和消灭，因而发生感染，即易产生“正不胜邪，邪毒入血”现象。细菌邪毒扩散进入血液循环，引起了全身性的化脓性感染。甚则由于正气衰弱而出现“邪毒内陷，侵袭脏腑”危候。如皮肤的化脓性病灶、呼吸道及肠道感染，出生时吸入污染羊水，或在胎内因母亲患败血症等都可引起。治以清热解毒，泻火凉血为主，可用清瘟败毒饮，神昏加紫雪丹，黄疸加茵陈蒿、满天星。如正气衰弱，邪毒内陷，除清热解毒之外，尚须加重扶正之品，如人参、黄芪之类。

痒疮 见元·滑伯仁《麻证新书》。麻疹的别称。详该条。

数失子 出《诸病源候论》卷三十九。即滑胎。详该条。

数堕胎 见《诸病源候论》卷四十一。

即滑胎。详该条。

数月行经 病证名。见《叶氏女科证治》。指月经周期为三个月以上且不规则者。患者形盛多痰，宜服六君子汤加苍术、香附，兼服苍附导痰丸。若形瘦，脾胃虚弱，气血两亏，数月而经始行者，宜服十全大补汤；肾虚者，治宜健脾益肾，方用助仙丹（茯苓、白术、白芍、陈皮、山药、兔丝子、杜仲、甘草）。

溢乳 证名。指婴儿饮乳过多而溢出的症状。亦称呕乳。详该条。

〔7〕

嫉妒不孕 病证名。不孕症型之一。包括肝气郁结不孕。《傅青主女科·种子篇》：“妇人怀有素恶，……其郁而不能成胎

者，以肝木不舒，必下克脾土而致塞，脾土之气塞，则腰脐之气必不利，腰脐之气不利，必不能通任脉而达带脉，则带脉之气亦塞矣。带脉之气即塞，则胞胎之门必闭，精即到门，亦不得其门而入矣。方用开郁种玉汤。”

嫁痛 出《千金要方》卷三。凡女子新婚初次性交而阴户疼痛，名曰嫁痛。

缠耳 病证名。五般聾耳之一。耳中有白色脓液溢出，多由湿热痰浊上壅耳道所致。治宜解毒排脓，清热降火。用龙胆泻肝汤、柴胡清肝汤，或清白散（《证治准绳》：桑皮、寒水石、地骨皮、甘草、贝母、天花粉、黄芩、天门冬）。

缠腰火丹 见《外科大成》。即蛇缠虎带。详该条。

十四画

〔一〕

磁锋砭法 小儿丹毒的刺血疗法。《幼幼集成》：“用上清磁器，轻轻敲破，取其锋锐者一枚，将筋头劈破，横夹磁针，露锋于外，将线扎紧。以磁锋正对丹毒之处，另以筋一条，于磁锋筋上轻轻敲之，其血自出”。

〔1〕

嗽吐 见《幼幼集成》。指小儿咳嗽未定而进乳食所致的呕吐。症见在乳食过程中或乳食后不久出现咳嗽呕吐，吐出痰涎和少量未消化的乳食。治宜化痰止嗽。用枳橘二陈汤。

嗽吐脓痰 出明·薛铠《保婴撮要》。即嗽唾脓痰。详该条。

嗽声不出 出《太平圣惠方》第八十三卷。指小儿咳嗽，声不出者。多由邪热侵肺，津液受伤所致。治宜甘润生津，兼以利

肺。用杏仁煎或紫菀散。

嗽唾脓痰 证名。又名嗽吐脓痰。小儿咳嗽而咯脓痰的病证。多为感受风热邪毒，熏灼于肺，痰热内蕴，热壅血瘀，蕴酿成脓所致。可用桔梗汤，或苇茎汤加鱼腥草、红藤、银花。

雌雄人 ①指女子阴蒂过大。杨志一《生育问题》：“女子阴核过大，性欲一至亦能自举，状如阴中有角，故以角症名之，又名半阴阳，俗称雌雄人”。详见角条。

②泛指两性畸形者。

〔1〕

稳婆 见《妇人良方大全》卷十七。古代对接生员的称呼。

鼻干无涕 病证名。出《太平圣惠方》第三十七卷。肺气通于鼻主于涕，若肺脏有热，则津液干燥，所以鼻干无涕。如口干烦躁，夜卧不安者，宜木通散（木通、麦门冬、升麻、知母、犀角、甘草、杏仁、梔子仁）。

鼻风 病证名。指新生儿鼻塞而不能吮乳者。明·秦景明《幼科金针》：“小儿生下三朝五日，忽然鼻塞弗乳，不能开口呼吸，此乃保母鼻风吹入小儿囟门，宜清风散（防风、荆芥、羌活、蝉蜕、川芎、藿香、陈皮、甘草、桔梗、僵蚕）治之。”

鼻多涕 病证名。鼻塞不通，而多涕液。《圣济总录》卷一百八十：“肺开窍于鼻，肺气不和，风冷乘之，使气道遏而不通，则风冷与气上昇，蒸而为液，其液复界于下，故令鼻多涕。”治法见涕液不收条。

鼻息肉 病证名。鼻腔一侧或双侧发生息肉，以致鼻塞不闻香臭，说话常带鼻音，鼻涕增多，头痛。治以鹅不食草或细辛用棉裹塞鼻，以通鼻气；根治可手术摘除。

鼻衄 即鼻中出血。《诸病源候论》卷二十九：“脏腑有热，热乘血气，血性得热即流溢妄行，发于鼻者，为鼻衄。”小儿鼻衄，多因肺热与胃热上壅或熏蒸所致。因肺热上壅而致衄者，称肺壅鼻衄。其症兼有鼻燥，呛咳，痰少等，治以宣清肺热为主，用桑菊饮，或桑杏汤等加减。因胃热致衄者，症见鼻燥，烦渴引饮，口臭等，治宜清胃止血，用白虎汤加生地、牛膝；重者用犀角地黄汤加茅根。

鼻疳 疳疾的一种证型。出《太平圣惠方》卷八十七。主要是由于疳疾热毒上攻于肺，或疳虫蚀鼻所致。因鼻为肺窍，所以发疳时，大多鼻塞，赤痒疼痛，浸淫溃烂，下连唇际，并伴有咳嗽，呼吸急促，毛发焦枯，肌肤消瘦等。肺热喘咳者，用枇杷叶散（《证治准绳》：枇杷叶、百部、山梔、槟榔），以利肺泄热；疳虫蚀鼻者，用集圣丸（方见肝疳条），以消疳杀虫。外用吹鼻蝉壳散（《太平圣惠方》：蝉蜕、青黛、蛇蜕、滑石、麝香），涂于鼻部。

鼻煽 病证名。鼻翼开合煽动，为肺气闭塞及肺绝的症状。林慎菴云：“鼻煽有虚实新久之分，不可概言肺绝。若初病即鼻煽，多有邪热风火，壅塞肺气使然；若久病

鼻煽喘汗为肺绝”（《厘正按摩要术》）。

鼻渊 病名。又名脑漏、脑崩。指鼻中常流浊涕，为内因胆经之热，移于脑髓，外因风寒凝郁火邪而成。《素问·气厥论》：“胆移热于脑，则辛頞鼻渊。”亦有因肺热痰蕴，移热于脑，而成肺咳而鼻渊者。症见浊涕下流不止，鼻塞不闻香臭，头额眉棱骨昏闷胀痛，类似鼻副窦炎。治宜清热开窍。用辛夷散、苍耳子散（《景岳全书》：苍耳子、辛夷、薄荷、白芷、葱白、细茶叶）、藿香丸（《医宗金鉴》：藿香、雄猪胆汁）加野菊花、蒲公英、紫花地丁等。针灸：肺热，取迎香、合谷、列缺；胆热，取阳陵泉、绝骨、行间。均用泻法。

鼻塞 病证名。突然鼻塞不通，开口呼吸。多由风冷所袭而成。《诸病源候论》：“风冷邪气入于脑，停滞鼻间，即气不宣和，结聚不通，故鼻塞也。”可用葱头、生姜共捣烂摊纸上，加温，贴于囟门，其鼻自通。

鼻欬（jiu 九） 病证名。即鼻流清涕而不臭。为风寒伤于皮毛，腠理郁闭所致。治宜辛温疏散。如血与涕俱出者，称衄衄，宜以和营降火为治。参见鼻渊条。

鼻鼈（wèng 瓮）塞 病证名。鼻塞不通。《圣济总录》卷一百八十：“小儿鼻鼈塞者，肺气不利也，肺主气，诸阳之气，上荣于面，其气不和，风冷乘虚，客于脑，与气停滞，搏于津液，鼻道壅遏，故为鼻鼈塞。”用黄连丸口服，细辛膏涂鼻内。

鼈（qi 奇）气 古病名。指鼈病兼有发热，大便黄而恶臭者。治法见大便恶臭条。

鼈乳 病证名。出《证治准绳·幼科》。《幼幼集成》：“儿将周岁，母复有娠，儿饮其乳，谓之鼈乳。”因为“母既妊娠，精华下荫，冲任之脉，不能上行，气则壅而为热，血则郁而为毒。”儿饮这种乳汁，所以易患鼈病。详继病条。

鼈病 出《千金要方》卷五。马王堆汉墓帛书简称鼈即继病。详该条。

膀胱气痛 病证名。见《幼科铁镜》。指脐周绞痛的疝气。详小肠气痛条。

膀胱水 病证名。小儿浮肿的一种类型。因膀胱有病而引起的水肿。由膀胱气化不利，水液潴留而成。临床特征为浮肿，腹急（小腹胀急）。治宜化气利水，用五苓散。

〔、〕

裹脐法 出《千金要方》卷五。新生儿断脐后用绷带裹扎脐部的方法。

腐根 肾疳五证之一。出《小儿药证直诀》。详牙疳条。

痼泄 病证名。宿食积滞不化而致的泄利。《幼科发挥》：“因于积者，脓血交杂，肠鸣腹痛，所下腥臭，谓之痼泄。”治宜消积导滞，用平胃散合香连丸加山楂、神曲。

瘟毒发瘡 病证名。指因感瘟毒而发疹的病证。清·郑卞年《瘡略》：“小儿感冒风邪，蓄于肌肉之间，至阳气发动，而行于皮肤之外。一年之中，屡有不正之气感之。出于两腋之下，盖两腋之下者，气之道路也。瘟毒随气之道路而出，谓之瘟毒发瘡。”治宜清瘟败毒饮。

瘦人经水来少 病证名。见《竹林女科证治》。指身体瘦弱而月经量少。多属气血俱虚。治宜气血双补。方用四物汤加人参汤。参见月经过少条。

瘦冷疳 见《证治准绳·幼科》。即冷疳。详该条。

慢肝风 病证名。又名婴儿目涩。《幼幼新书》：“月内目闭不开，或肿羞明，或出血者，名慢肝风。”多因感染污浊风热病邪所引起，内服明目饮（《证治准绳》：山梔仁、香附，夏枯草），外用黄连蒸人乳点眼。

慢肝惊风 病证名。出《本草纲目》。慢惊风的一种证型。症见抽搐，兼目如橘黄而上视，不乳食，气虚欲脱等。多因泄泻过久，

损伤脾胃，土虚木亢所致。

慢惊风 病证名。又名天吊风。惊风的一种证型。大多出现于大病、久病之后，但也有因小儿体弱，一病就成慢惊者。临床以发病缓慢，无热，抽搐时发时止，缓而无力为其特点。《证治准绳·幼科》：“慢惊之候，或吐或泻，涎鸣微喘，眼开神缓，睡则露睛，惊跳搐搦，乍发乍静，或身热，或身冷，或四肢热，或口鼻冷气，面色淡白淡青，眉唇间或青黯，其脉沉迟散缓。盖由急惊过用寒凉，或转太骤，传变成之。”治以培补元气，温运脾胃为主。可用逐寒荡惊汤（《福幼新编》：胡椒、炮姜、肉桂、丁香、灶心土）或六君子汤加全蝎、木香、白附子、南星。如脾虚肝旺，惊搐频作，宜健脾平肝，用缓肝理脾汤（即异功散加桂枝、白芍、扁豆、山药）。但也有久病伤阴，虚风内动者，宜滋阴镇静，用阿胶鸡子黄汤（《通俗伤寒论》：阿胶、白芍、石决明、双勾藤，生地、炙甘草、茯神、鸡子黄、络石藤，牡蛎）。

慢惊夹痰 病证名。慢惊风夹有热痰者。由于病久脾损阴消，以致虚火亢盛，烦渴喜饮；水谷停蓄，痰浊易生，形成痰热相兼，虚中夹实的半阴半阳症候。其症午后身热，口渴烦饮，胸脘胀闷，呼吸气促，泛吐痰涎，心烦不寐，时发抽搐。治法：《明医杂著》以二陈为主，脾虚有热痰，加白术、芩、连；风痰稠结，加南星、贝母、枳实；胃虚生痰，加白术、麦芽、竹沥。

慢惊自汗 病证名。出《证治准绳·幼科》。慢惊风，阳气大亏，自汗不止，遍身冰冷，面色苍白。治宜回阳救急。用固真汤，或参附汤加龙骨，牡蛎、黄耆、五味、干姜。

慢脾风 病证名。慢惊风的一种类型。见《证治准绳·幼科》。又名脾风、虚风。多因吐泄既久，脾虚气弱，肝失濡养所致。症见闭目摇头，面唇发青发黯，额上汗出，四肢厥冷，手足微搐，气弱神微，昏睡不语，

舌短声哑，呕吐清水，指纹隐约。属无阳纯阴的虚寒败象。患儿往往衰脱而死，预后大多不良。治宜补脾益胃，温中回阳为主。用参附汤、回阳救急汤之类。

满月 出《外台秘要》卷三十三。通常指分娩后一个月。也有的认为一月为小满月，两个月为大满月。张仲远《产孕集》：“产后一月俗谓之满月，二月谓之大满月”。使产妇在此期间可以得到休息和恢复体力。

漏经 病证名。张蕃芝《生生要旨》：“妊娠阴阳失和，胎气不安，以致腹中作痛，时有漏下，俗名漏胎，又名漏经。宜胶艾汤主之”。详胎漏条。

精积 病证名。指经期性交所致闭经癥瘕症候。清·舒驰远《女科要诀》：“乃因经信当行，血海未净，而强交媾，精与污浊互结而积于胞中。以致阻塞经闭不通，状类有孕，而症不同，……精积之症，闷乱不安，饮食不下，胞无胎息可验，法主攻坚破积”。

滴虫性阴道炎 病名。是由阴道毛滴虫所引起的阴道炎。临床表现有白带量多，呈灰黄色，有泡沫及腥臭气味，尿频尿痛，外阴搔痒，阴道粘膜充血，有散在红点。当按带下、阴痒辨证治疗。局部用药：①苦参、龙胆草水煎去渣冲洗。②苦楝根皮浓煎剂冲洗。③蛇床子、枯矾、百部、黄柏、薄荷水煎洗或坐浴。④仙鹤草茎200%浓缩温煎液，涂纱布放阴道内，日一次，7天为一疗程。

漏 病名。见陈稚泉《妇科心得》卷二。指妇女阴道流血淋漓不断。详见漏下条。

漏下 病证名。《诸病源候论》卷三十八：“漏下者，由劳伤血气，冲任之脉虚损故也。冲脉任脉为十二经脉之海，皆起于胞内，而手太阳小肠之经也，手少阴心之经也，此二经主上为乳汁，下为月水，妇人经脉调适，则月下以时；若劳伤者，以冲任之气虚损，不能制其脉经，故血非时而下，淋漓不断，谓之漏下也”。治疗参见气虚崩漏条。

漏下不止 出《金匱要略·妇人妊娠病

脉证并治》。即指经漏。详该条。

漏下白候 出《诸病源候论》卷三十八。指经漏下血夹有白色液体。参见崩漏条。

漏五色俱下 病证名。出《诸病源候论》卷三十八。即经漏所下之血杂见五色，多属五脏虚损所致。参见经漏条。

漏下赤白 病证名。出《脉经》。亦名赤白漏下。指阴道漏下之血污，赤白相杂，淋漓不断。参见经漏条。

漏下赤候 病证名。出《诸病源候论》卷三十八。指漏下之血色赤，淋漓不断。参见经漏条。

漏下青候 病证名。出《诸病源候论》卷三十八。指漏下经血夹有青色液体。参见经漏条。

漏下黄候 病证名。出《诸病源候论》卷三十八。指经血漏下夹有黄色之液体。参见经漏条。

漏下黑候 病证名。出《诸病源候论》卷三十八。指经漏下血夹有黑色之液体。参见经漏条。

漏带 病证名。①先下血而后带下淋漓不断。《证治要诀》：“有带疾愈后一二月或再发，半年一发，先血而后下带，来不可遏，停蓄未几，又复倾泻，此名漏带，最难治者也”。②指带下如同经血漏下之势（《竹林女科》）。

漏胞 病证名。即胎漏。《诸病源候论》卷四十一：“漏胞者，谓妊娠数月而经水时下，此由冲脉任脉虚，不能约制太阳、少阴之经血故也”。详胎漏条。

漏胎 病名。即胎漏。清·曾鼎《妇科指归》卷二：“孕妇或按月下血数滴，名漏胎。”详胎漏条。

漏疳 病证名。出《普济方》卷三百八十二。为牙龈红肿，化脓焮痛，绵绵不断，久而不愈，或时发时愈的证候。治宜清热解毒。先服银翘马勃散（《温病条辨》：银花、连翘、马勃、牛子、射干），继服甘露饮。

外用锡类散涂患处。

寤生 出《左传·隐出》。①产妇在睡眠时，小儿娩出，醒后方知。②指婴儿娩出之际，立即能睁眼视物者。③即逆生。详该条。④指婴儿生下，闷绝不啼（自诚斋《临床须知评正》）。

〔七〕

嬰（shà 煞）舌 病证名。见《幼幼集成》。小儿舌忽肿大，塞满口中的病证。

与木舌的肿而硬，重舌之肿于下者有所区别。乃心火上攻所致。如不急治，则妨碍呼吸而窒息致死。可用蒲黄末或皂矾煅红研细擦舌。

缩儿胎 亦名缩胎，是古人对孕妇体质肥胖，或过食肥甘，于妊娠后期，恐胎儿过大，造成难产，故用早期服药的方法，使孕妇足月易产为缩儿胎。

缩胎 出《医学纲目》卷三十五。即缩儿胎。详该条。

十五画

〔一〕

聾耳 病证名。五般聾耳之一。又名耳脓。耳中有黄色脓液溢出。《诸病源候论》卷四十八：“小儿肾脏盛，而有热者，热气上冲于耳，津液壅结，即生脓汁；亦有因沐浴水入耳内，而不倾沥令尽，水湿停积，搏于血气，蕴结成热，亦令脓汁出，皆谓之聾耳。”治宜清热解毒，用清黄散（《证治准绳》：防风、滑石、炙草、藿香、黄连、梔子）；脓尽，用龙黄散（《婴童百问》：枯矾、龙骨、黄丹、麝香）掺入耳内。

横生 病证名。出《千金要方》卷二。《张氏医通》卷十：“儿未生先露手臂谓之横生”。详横产条。

横产 病证名。出《诸病源候论》卷四十三。又名横生、觅盐生、讨盐生、侧棱。指产时儿手先下。

醉乳 乳母酒醉后哺儿，令儿致病。因酒性燥烈，儿饮其乳，故病恍惚多惊（《证治准绳》）。

醋啤 病证名。见明·秦景明《幼科金鍼》。即啤拔。详该条。

飄麻 病名。是一种较轻的出疹性传染病。多见于五岁以下的乳幼儿，流行于冬春

季节。《验方新编》：“感风热而麻者，俗谓飘麻。”因其疹点细小淡红，形如麻粒，飘于皮肤之上，出没较快，故名。由于风热时邪，首先侵犯肺卫，故其症临床可伴有发热，咳嗽，流涕等。因病毒较轻，一般只伤及肺卫，邪从外泄，所以疹点透发后，即热退而解。治宜疏风解毒，用银翘散加减。

豌豆疮 出明，万全《家传痘疮心法》。即痘疮。详该条。

震耳 病证名。又名囊耳。《证治准绳·杂病》：“震耳，耳内虚鸣，常出青脓。”多由肝胆湿热所致。耳中有青色脓液溢出，或兼见肝胆湿热症状，如口苦，舌苔黄厚等。治宜清热除湿，用龙胆泻肝汤加减。如大便秘结，宜清肝泄热，用泻青丸。

霉菌性阴道炎 病名。由白色念珠菌引起的阴道炎。临床表现外阴奇痒，甚至溃烂疼痛，白带量多呈凝乳样，阴道壁有白色伪膜覆盖，擦掉后可见粘膜发红等症。治疗以阴道局部冲洗上药为主，如用细叶香薷蒸馏液，或一枝黄花（《中草药通讯》1957年6期）治疗。参见带下、阴痒各条。

撮口 病证名。脐风三证之一。又名撮风。以口唇收缩，撮如鱼口为主症。系母体脏腑有热，令胎儿心脾受灼，生后又为风邪

所袭而然。一般妨碍吮乳，舌强唇青，面色赤黄，口涎痰满，气息喘促，啼声不出，甚至腹现青筋，二便秘结，身热多惊，手足抽搐。《幼科发挥》：“撮口证儿多啼，口频撮者，此脐腹痛也，可用雄黄解毒丸。”气喘痰盛的，宜豁痰通窍，用辰砂僵蚕散；腹痛便秘的，宜通便开结，用紫霜丸；身热多惊的，宜清热镇惊，用龙胆汤；手足抽搐的，宜熄风镇痉，用撮风散。

撮风 又名撮口。详该条。

撞红 见《妇科易知》。指男女性交时，妇女月经适至，俗称撞红。

〔1〕

暴冷嗽 病证名。出《千金要方》卷五。冬令气候严寒，骤然感受寒冷以致肺寒而引起的咳嗽。参见寒嗽条。

暴注 出《证治准绳·幼科》。即小儿卒利，详该条。

暴泻 见《证治准绳·幼科》。即小儿卒利。详该条。

暴崩 病证名。出《妇人良方大全》卷一。指非经期而突然阴道出血，量多如注者。多因暴怒伤肝，血失所藏；或气虚气陷，失于统摄；或跌仆损伤冲任，以致经血失于约制所致。治宜止血为主，以防晕厥虚脱。方用十灰散，兼服独参汤。待血渐减少，或血止后，当审因论治，因暴怒伤肝者，用逍遥散加香附炭、青皮；气虚气陷者，用举元煎；跌仆损伤者，以八珍汤加三七末，或用云南白药。参见血崩条。

暴惊 病证名。小儿突然发惊、啼哭，形气欲脱者，多由小儿气怯，猝见生人，异物，或闻大声巨响，以致精神闷乱，气逆痰聚而致。治以镇惊安神为主，如秘旨安神丸。

暴喘 出《中藏经》。即马脾风。详该条。

暴痢 病证名。小儿平日无其他疾病，

骤然而得之痢证。《千金要方》卷五：“小儿暴痢者，身躯正直如死人，及腹中雷鸣。灸太仓，及脐中上下两旁各一寸，凡六处。”

影疹 指麻疹疹出不透，隐隐于皮肤之内者。清·马之骥《疹科纂要》：“麻疹正出之时，时有时无，欲出不出，如物影之摇动，谓之影疹”。治以透疹为主，宜升麻葛根汤、化斑汤，其影疹不日即出。如小便不通而热甚者，宜四苓汤加梔子、木通。若不急治，则皮肤闭塞，毒气壅滞，或形成一片白，一片红，一片紫，喘满，腹胀，腹痛等变症。

颧颊热肿 病证名。腮及颊部充血，发红而肿痛者。多因风热毒邪壅滞阳明、少阳经脉，以致气血郁遏而成。治宜疏风清热，解毒消肿为主。内服普济消毒饮，外用赤小豆末和蜜涂之。

踏盐生 即足位分娩。旧时传说产妇分娩时如儿足先下，以盐半分涂儿足心，则其足自收，故名。此说不确，现已废用。详倒产条。

〔、〕

瘰(Hui 会)疾 病证名。出《世医得效方》卷十五。《叶天士女科证治秘方》：“子宫脱出，痛不可忍，名曰瘰疾”。详见子宫脱垂条。

瘰疹 病名。见《医宗金鉴·痘疹心法要诀》。凡小儿在未出痘疹之前感受风邪，以致遍身红点，如粟米之状者为瘰疹。治宜疏散风邪。用银翘散加蝉蜕。

爆疮 病证名。出《诸病源候论》卷五十。又名爆浆疮。《小儿卫生总微论方》：“小儿生爆浆疮者，由风热毒气客于皮肤，生爆浆而溃成疮。搏于气血而所作也。始生如火烧汤烫，作泡而起，寻即皮破，爆浆出以成疮，亦甚疼痛，渐引相续而生，有至遍身溃烂。”治疗以清热、疏风、解毒为主，外用赤小豆或莹肌散煎水淋洗，再用三黄散末

疹疮上。

燥浆疮 出《小儿卫生总微论方》。即燥疮。见该条。

潮水 月经的别称。明·赵献可《邯郸

遗稿》：“妇女经事谓之月水，又谓之潮水。日月者，一月一至也；曰潮者，取其信也”。详月经条。

十六画

〔一〕

燕口 出《诸病源候论》卷三十。即口吻疮。详该条。

燕口疮 病证名。指口角生疮而湿烂。见《疡医大全》卷十四。多由脾胃有热上攻口唇所致。症见口角生疮，疼痛微肿，湿烂有汁。治宜清热，除湿，解毒。可选用清胃散、凉膈散等加减。参见口吻疮条。

燕窝疮 病证名。又名羊胡疮。为脾胃湿热，复感风邪而发。症见下颏生疮，破流黄水，浸淫成片。清·吴溶堂《保婴易知录》：“初生小者如粟，大者如豆，色红热痒微痛，治以碧玉散搽之。”内服消风散，升麻消毒饮，以祛风胜湿，清热凉血。并用黄柏末、红枣肉烧灰存性，研细末，香油调敷患处。

颠倒 指足位分娩。清·员从云《产科一得》：“婴儿足先出者，名曰颠倒”。详倒产条。

〔1〕

龋齿 出《灵枢·论疾诊尺》。即齿龋。详该条。

噤口痢 病证名。见元·朱震亨《幼科全书》。《幼科发挥》：“痢久不能食，或有食入即吐者名噤口痢。”因小儿脾胃薄弱，感受疫疠或久痢脾胃重伤，以致胃气上逆，而成噤口。因疫毒而致者，宜清热解毒，用黄连温胆汤；久痢脾胃损伤者，宜补脾健胃，用参苓白术散加葛蒲、梗米。

噤风 脐风三证之一。又名著噤。以牙关紧闭，口闭不开为主症。《幼科发挥》：“噤风证，牙关紧急，不能吮乳，啼声不出发搐者不治。”参见脐风条。

蹇地生 见清·周纪常《女科辑要》卷五。即倒产。详该条。

蹇经 见吴梅菴《秘传内府经验女科》。即差经。详该条。

蹇经 见王伯龙《养儿宝》。即差经。详该条。

蹇理症 见清·曾鼎《妇科指归》。指差经。详该条。

蹇蹇 见何应豫《女科备考》。即差经。详该条。

噤奶 见《小儿卫生总微论》。即吮乳。见该条。

〔J〕

鼽(jiu 九)衄 病证名。出《灵枢·经脉》、《素问·金匱真言论》。王冰注：“衄谓鼻中出血。”鼽衄，为鼻流清涕与鼻中出血同时并见的证候。参见鼻鼽条。

𧈧(yǎ 演)啼 𧈧，曲身向前之意。小儿腹痛，曲身而啼，谓之𧈧啼。《诸病源候论》卷四十七：“小儿在胎时，其母将养伤于风冷，邪气入胞，伤儿脏腑，故儿生之后，邪犹在心腹内，邪气与正气相搏，则腹痛，故儿𧈧张蹇气而啼。”治宜温脏止痛，用四磨汤加减。

〔、〕

襁褓 指包裹婴儿用的布幅。《证治准绳·幼科》：初生小儿“必须人襁褓。”《寿世保元》卷八：“初生三五日，宜绑缚令卧，勿竖头抱出，免致惊痫。”这可能与小儿初生常保持胚胎中姿势，四肢屈肌较紧张，故“宜绑缚令卧”，使其肢体舒展；又因脊柱软弱，头项不能自支，所以“勿竖头抱出”；且神志发育不成熟，易为大的声音或猛烈的震动等引起惊痫之状，所以要着意襁褓，以加强保护。

壅乳 指乳母气机壅滞时，以乳哺儿，损儿脾胃，而生诸疾。《证治准绳·幼科》引《灵秘》和《宝鉴》云：“壅乳成痰涎，涎壅生惊。”“壅乳成妳癖。又吐逆生痰”。

凝产 见明·岳甫嘉《妙一斋医学正印种子编》。即碍产。详该条。

辨胎孕男女法 是对怀孕妇女，以脉象、腹形及两乳房而进行辨别男女胎的方法。如左手太阳浮大为男，右手太阴沉细为女；左脉疾为男，右脉疾为女。左乳房有核胀痛为男，右乳房胀痛为女；腹部上小下大如箕为女，腹高如釜为男等。均为古人的经验，有待研究。

激经 出《脉经》。亦名垢胎、盛胎、妊娠经来、胎前漏红，老鼠胎。指孕后仍按月行经，并无其他症状，又无损于胎儿，俟胎儿渐长，其经自停，谓之激经。

〔7〕

避年 出《脉经》。亦名避经、周经。指月经周期一年来潮一次者，不属于病症。与经闭不同，但临床较为少见。

避经 见顾允若《妇科辑要》。即避年。详该条。

十七画

〔一〕

戴白生 指儿生下时，头上戴有膜一片，粘腻如胶者。

〔1〕

螳螂子 病证名。出明·秦景明《幼科金鍼》。又名妒乳、颊脂垫。小儿生后一月左右，口腔内两侧近牙龈处，出现肿硬隆起的脂肪垫，剖视之颇似螳螂子，故名。小儿患此，吮乳困难，甚至啼哭不能出声，日久则面呈黄色，尤以鼻准部为最显著。一般只要暂停吮乳6~8小时，将乳汁挤出，用滴管或小匙喂之，即可自愈。如硬块消退较慢，可用冰硼散涂之，日2~3次，切忌割治。

螺 五不女之一。明·万全《广嗣纪要·择配篇》：“阴户外纹如螺蛳样，旋入

内”。属生殖器畸形，影响性交与生育。

〔、〕

糜瘡 口腔及牙床糜烂的证候。又名口疳。多由疳疾及痘疮患儿，口腔不洁，或于夏令暑湿偏盛之际，胃火与湿热之气上攻，侵蚀于口而成。症见口中溃烂，常发生于舌、颊、唇内侧及上腭等处，有时扩展到唇外，口角、齿龈及咽喉。治宜清热解毒，内服五味消毒饮加玄参、桔梗、青黛；外用锡类散涂于疮面。

瘡 (fān 番) 病名。《女科入门》：“阴挺，时医名之曰瘡”。详见子宫脱垂条。

槽指 出《千金要方》卷三十。即代指。详该条。

槽蕪法 急性腿膝疼痛的外治方法。余

梦塘《保赤存真》卷五：“凡腿膝患风寒湿气，可于夏伏天用糟坊内酒糟，下锅烧热，将布包两包，在患处热炙，冷即更换，寒湿气出尽，即愈。”

糠疹 出元·滑伯仁《麻证新书》。麻疹的别称。详该条。

燥痉 病证名。小儿痉病之一。燥气炽盛，消灼津液而致痉证。多由于热邪炽盛，津液干枯，化燥动风，经脉失养而成。其症高热，痉挛，四肢抽搐，口燥咽干，大便干燥，皮肤不润。治宜辛凉甘润，如白虎汤合增液汤之类。

燥瘰 病名。出《诸病源候论》卷三十八。属八瘰之一。多因暑月行经时，劳役患

怒所致。症如半杯下覆，游移腹中不定，痛连两胁，上下引心而烦，不得太息，两足痿软枯瘦，久立则痛，遗尿失精，便难盗汗，妨碍饮食，时欲呕吐。治宜舒肝理气，活血化痰。方用川大黄、干姜、黄连、鸡内金、桂心、蜜虫、厚朴、郁李仁，共为细末，每服三钱。

豁泄 古病名。指食不知饱，肌瘦、腹大而多泄的证候。《诸病源候论》卷四十七：

“小儿有嗜食，食已仍不知饱足，又不生肌肉，但其腹大，其大便数而多泄，亦呼为豁泄，此肠胃不守故也。”治宜健脾益气。用参苓白术散。

十 八 画

〔一〕

藟草 南北朝时称双生为藟草。详双生条。

〔1〕

蟠肠生 病名。清·周登庸《续广达生编》卷三：“问蟠肠生是何缘故，是用力过度耳，产母平日气虚，临产用力努挣，浑身气血下注，以致肠随儿下。一次如此，下次又复如此，若能等到瓜熟蒂落，焉有此怪异”。即盘肠生。详该条。

鹭鸶咳 百日咳的俗称。详百日咳条。

〔1〕

翻花 病名。①杨志一《妇科经验良方》：“阴户忽然有物挺出，如阴茎然；或阴户翻出不能转动者，名曰翻花。治宜补中益气汤加减。”②《卫生鸿宝》卷五：“产后玉门燥热，遂成翻花。泽兰叶四两，煎汤熏洗二、三次即收，或加枯矾。又阴中生笋，长半寸，用川连半斤，煎水半锅，入盐一撮，盆盛，乘温坐盆内”。

翻肛 见《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》。即肛肿。详该条。

翻皮疮 病证名。见《保婴易知录》。指眼皮外翻，如以舌舐唇之状。治以熟石膏、栀子仁、生甘草、防风（酒拌微炒）、豨莶草（酒蒸晒干），研末，煎汤口服或外用洗疮。

〔、〕

癰（tuí 颓）疔 病证名。①疔证之一。见《幼科发挥》。指小儿阴囊肿大疼痛。肿而不痛的名癰；痛而不肿的名疔；既肿且痛的，名癰疔。多因啼哭不止，使阴气不得流行，加上风寒入侵，导致气结不散而得。宜以理气散寒为治。用橘核丸。②《医宗金鉴·妇科心法要诀》：“阴挺下脱即癰疔，突物如蛇或如菌”。详子宫脱垂条。

癰葫芦 见《医宗金鉴·外科心法要诀》。即子宫脱垂的俗名。详见子宫脱垂条。

癰 出《小儿药证直诀》。即癰疾。详该条。

癰气 病证名。癰疾之一。指两胁坚

满,时时疼痛的病证。由于小儿调养不当,三焦痞塞,肠胃不得宣畅,致使水饮停聚不散,更加寒气相搏,结聚而成。其症可伴有饮食不下,面色萎黄,逐渐消瘦,手足烦热等。宜以分消水饮为治,用中满分消丸。

癖热 病证名。见元·朱震亨《幼科全书》。由乳食不消,伏结于内,致成癖块而引起的发热。症见癖块结于胁下,按之则痛,发热不规则,或伴有腹胀、呕吐。见于肝炎。治宜疏肝和胃。用四逆散合温胆汤加鳖甲,或配合服疏肝理脾丸。

癖疾 病证名。见《古今医鉴》。小儿脾胃柔脆,脏腑娇嫩,调护不当,乳食失

调,势必伤及脾胃,使脾胃不能消化水谷,水谷不化,则容易停滞而生湿生痰,使邪积胸中,气血流行不畅,脏腑机能衰退,以致气滞血涩,体内排出的浊液外溢,复感寒气,凝聚不散,留结成块,结于胁下,则成癖疾。临床表现胁下有一结块,开始比较柔软,渐渐增大而变硬,如继续发展,扩大到肚脐以下,则病根已深。本病同时还伴有潮热,头出虚汗,腹部膨大,青筋暴露,甚至毛发焦枯,肌肉消瘦,口渴喜饮,面色青黄等;若病延日久,则气血衰耗,往往导致虚脱。临床有乳癖、食癖、癖气之分。详各条。

十 九 画

〔1〕

巅疾 ①即胎病。详该条。②巅,指巅顶。巅疾,即头部的疾病,一般指头痛。《张氏医通》:“六腑清阳之气,五脏精华之血,皆朝会于高巅。”故不论是外感六淫,内伤脏腑,均能引起巅疾。

〔1〕

噤(chèn 插)舌 见清·程永培《咽喉经验秘传》。即重舌。详该条。

麴𩚑(hōuxiā 候 虾) 出《普济方》卷三百八十七。即麴𩚑。详该条。

𩚑𩚑(hē 呵) 又名麴𩚑。指小儿因有痰母而引起的气促喘急,喉间若拽锯声者。小儿脾肺脆弱,乳食停滞,或“暑湿所侵,未经发散,邪传心肺,变而为热,有热生

风,有风生痰,痰实不化,因循日久,结为顽块,元如豆粒,遂成痰母”(《证治准绳》)。一旦调护失宜,或节令变迁,则痰母发动而风随之,风痰潮紧,气促而喘。见于小儿支气管哮喘。体实者宜去风降痰;久病体虚者,则宜益气化痰之剂。

〔、〕

鳖瘕 古病名。出《诸病源候论》卷三十八。属八瘕之一。病因经水将净,入水浣浴,感受水中秽邪所致。症见形大如杯,腹中窜走,或若有若无,腰背引痛,不可以息,经闭不通,面目黄黑,声微气少。有此病者,令人绝子。治宜温经活血散瘀。方用大黄、干姜、侧子、附子、人参、蜜虫、桂心、细辛、白术。

二十画

〔1〕

鳞体 病证名。又名胎垢、蛇身、蛇胎。《小儿卫生总微论方》：“鳞体者，谓皮肤之上，如蛇皮鳞甲之状，故又名蛇体，此由气血否（痞）涩，不能通润于皮肤……。”类似鱼鳞病。治宜养血活血，如四物汤加味。亦可用僵蚕、蛇蜕煎水外洗，或用杏仁30克、猪油60克、捣泥外搽。

〔、〕

灌脓 出《证治准绳·痘疮》。即贯脓。详该条。

灌浆 出明·徐春甫《痘疹泄秘》。即贯脓。详该条。

灌浆板黄 病证名。指痘疹灌浆不起，痘形板腻死塞，干腊而不明黄的证候。见《证治准绳·幼科》。是由毒气盛凝结气血所致。治宜行血解毒，用清毒活血汤（《医宗金鉴》：紫草、当归、木通、生地黄、芍药、连翘、牛蒡子、山楂、桔梗、黄连、黄芩、人参、黄芪）。

灌浆逆证 痘疮灌浆之时，其色紫黑或灰白，而浆不行者，为毒内蕴，锢滞气血，或虚弱不能载毒外出的逆候。此外，痘疮浆未成而腐烂，行浆时痒塌，空壳无浆；或稠密不分颗粒，而复干枯无浆者，均属逆证。宜分清元气盛衰，毒邪之强弱，辨证施治。

灌浆顺证 痘疮灌浆一般自第七天开

始。先起胀者，先灌浆，由红转白，白变成浆，渐渐肥满而光泽；至第九日浆苍，其色苍如黄腊，而显结痂之形，神识清楚，食纳渐增者为顺证，宜加强护理，以防逆转。参见贯脓条。

灌浆险证 痘疮当灌浆之时，浆清不脓，及不按期而浆行者，为气血虚；痘粒软薄，痘皮不坚实者，属气虚；痘根赤艳，为热在血分；水泡夹杂于痘中，为脾虚多湿。这些都为险证，宜辨其寒热虚实以施治，妥善护理，以期化险为夷。

癰痢 八痢之一。即囊痢，详该条。

癥瘕 病名。见《金匱要略·疟病脉证并治》。指腹腔内痞块。一般以隐见腹内，按之形证可验，坚硬不移，痛有定处者为癥；聚散无常，推之游移不定，痛无定处者为瘕。《圣济总录》等书多认为与积聚相类，而以癥瘕发生于下焦为多。常由情志抑郁，饮食内伤，导致肝脾受损，脏腑失和，日久正气不足，气滞血瘀，痞块固定不动者为癥；虽有结块可推移者称为瘕瘕（《诸病源候论》）。

癥瘕痛 病证名。由癥瘕积聚而引起的腹部疼痛。小儿多由营卫俱虚，内则伤于乳食，血积则为癥，气聚则为瘕，停滞积久，故作腹痛。症见肚硬而胀，痛则身冷如冰，按之则痛甚，或有面黄肌瘦，腹有青筋，昼凉夜热，蒸潮无时，乳食减少，大便溏泻等（《证治准绳》）。

二 十 一 画

〔一〕

露丹 病证名。为小儿满面发红的疱疹性疾患。《幼幼集成》：“小儿生后，百日内外，半岁以上，忽然眼胞红肿，面青黯色，夜间烦啼，脸如胭脂，此因热伏在内，发之于外，初则满面如水痘，脚微红而不壮，出没无定，次至颈项，赤如丹砂，名曰露丹。”治宜疏散伏热，用三解散（人参、防风、天麻、郁金、白附、大黄、黄

芩、僵蚕、全蝎、枳壳、薄荷、赤芍、甘草、灯芯）加减。

露珠 见《医学入门》。怀孕一月，胎元初成，形如露珠，故名。

〔1〕

囊（nǎng）痢 病名。八痢之一。又名襁痢。为突然暴冷而致的痢疾。其特征为小腹胀痛，赤白痢下等。治宜散寒止痢。用芍药汤加减。

二 十 二 画

〔一〕

匿（nì 匿） 病名。出《妇人良方大全》卷二十三。即阴疮。详见阴蚀条。

匿疮 病名。指阴户生疮。《王节斋公胎产》：“妇人阴户生疮，名曰匿疮”。详见阴蚀条。

鼻 病证名。风邪外袭皮毛，影响肺气不利。鼻是肺气所通，客邪乘之，与血气相搏成疮，发于鼻下两边，色赤而痒。治宜疏风泄热之剂，如消风散加减。

囊耳 病证名。五般聾耳之一。《疡医大全》：“耳内虚鸣，常出青脓。”即震耳。详该条。

囊脱 见《外科证治全书》。即脱囊。详该条。

囊缩 出《素问·热论》。即卵缩。详该条。

齧（niè 聂）舌 病证名。啮者，咬也。系指自咬其舌。《灵枢·口问》：“少阴气至则啮舌，少阳气至则啮颊，阳明气至则啮唇矣”。《黄帝内经灵枢集注》：“齿者，肾气之所生也，少阴之脉挟舌本，少阴之脉循于颊，阳明之脉，挟口环唇下，如肾藏之生气，厥逆走上，与中焦所生之脉气，相贯而至，则舌在齿之内，而反向外矣，唇在齿之外，而反向内矣，颊在齿之旁，而反向中矣。”故自咬其舌。《证治汇补》卷四：“心脾之虚，恒通于舌，阳明之经，直入齿缝，故邪入心脾，则舌自挺；邪入阳明，则口自噤，一挺一噤，故令嚼舌。治宜清其风火，则舌自愈。”

〔、〕

孿生 即双生。详该条。

二 十 四 画

〔1〕

𪔐（wèng 瓮）鼻 病证名。指鼻塞有脓而不闻香臭者。《诸病源候论》卷二十九：

“风冷客于头脑，即其气不和，令气停滞，搏于津液，脓涕结聚，即鼻不闻香臭，谓之𪔐。”

汉语拼音索引

(每字后页码, 系正文页数)

A		病… 159	唇… 147	dīng	丁… 2
ài	碍… 193	bǔ	哺… 151	dìng	定… 116
ān	安… 79	bù	不… 27	dòng	冻… 92
àn	按… 127	C			洞… 144
	暗… 194	cǎo	草… 127	dòu	斗… 39
B		cè	侧… 109		豆… 88
bā	八… 2	chā	搔… 207		痘… 184
	巴… 40	(又读 shā)		dú	独… 141
bái	白… 44	chá	茶… 127		毒… 127
bǎi	百… 48	chà	差… 143	dù	肚… 92
bài	败… 108	chán	缠… 198		妒… 102
bān	斑… 177	chǎn	产… 63		妬… 117
bǎn	板… 104	cháng	长… 32	duàn	断… 176
bàn	半… 47		肠… 92	dùn	顿… 151
	绊… 118	cháo	朝… 178	duō	多… 62
bāo	胞… 133		潮… 204	D	
bào	报… 89	chén	沉… 94	dá	达… 49
	抱… 105	chéng	枅… 104	dà	大… 5
	暴… 203		承… 118	dài	代… 44
bēi	悲… 178	chǐ	齿… 105		带… 127
bèi	背… 128	chì	赤… 87		戴… 205
	被… 162	chōng	冲… 62	dān	丹… 37
běn	本… 42	chóng	虫… 51		单… 116
bēng	崩… 167		重… 131	dǎn	胆… 133
bí	鼻… 198	chòu	臭… 153	dàn	蛋… 177
bì	避… 205	chū	出… 43	dào	倒… 153
biàn	变… 114		初… 94		盗… 172
	便… 131	chù	触… 195	dēng	灯… 79
	辨… 205		搐… 193		登… 191
biāo	爆… 203	chuài	踹… 204	dī	滴… 201
biǎo	表… 104	chuǎn	喘… 180	dǐ	底… 115
biē	鳖… 207	chuāng	疮… 142	dì	地… 48
bīng	并… 79	chuí	垂… 108	diān	颠… 204
		chún	纯… 103		巅… 207
				diào	吊… 51
				diē	跌… 180

E

é	蛾… 194
	鹅… 181
è	恶… 148
ér	儿… 3
ěr	耳… 48
èr	二… 1

F

fā	发… 47
fà	发… 47
fān	翻… 206
fán	烦… 160
fǎn	反… 32
fàng	放… 115
fēi	非… 105
féi	肥… 114
fèi	肺… 112
	沸… 116

fēn	痹… 160	guǐ	鬼… 153	huǒ	火… 39	qīng	睛… 193
fēng	分… 37	guǒ	癸… 147	J		qīng	精… 201
fū	风… 34	guò	果… 108	jī	肌… 62	jǐng	颈… 177
	肤… 112		裹… 200		鸡… 102	jīng	痉… 160
	麸… 163	guò	过… 50		积… 152	jiǔ	九… 3
	桴… 197				激… 205		久… 7
fú	伏… 53	H			急… 142	jū	韭… 128
fǔ	腐… 200	há	蛤… 180	jí	嫉… 198	jué	居… 117
fù	妇… 84	hái	孩… 147	jǐ	脊… 154		绝… 147
	腹… 195	hán	含… 90	jì	忌… 96		厥… 178
		hàn	寒… 190		季… 109	K	
G			汗… 79		继… 163	kāi	开… 23
gài	盖… 173		旱… 89		魅… 199	kān	看… 130
gān	干… 5	hēi	黑… 181	jiā	夹… 49	kāng	糠… 206
	甘… 42	héng	横… 202	jiá	颊… 178	ké	咳… 129
	瘡… 156	hóng	红… 85	jiǎ	假… 168	kè	客… 145
	肝… 90	hōu	駒… 207		瘦… 200	kòng	控… 164
gǎn	感… 192	hóu	喉… 181	jià	嫁… 198	kǒu	口… 6
gāng	肛… 92		猴… 184	jiǎn	剪… 177	kū	枯… 128
gāo	高… 156	hòu	后… 61	jiàn	见… 30	kuài	块… 88
gē	割… 191		候… 153		间… 93	kuì	溃… 189
	癰… 196	hú	狐… 114	jiāng	姜… 143	L	
gé	鬲… 148		胡… 128	jiàng	降… 117	lái	来… 89
gēng	更… 88	hǔ	虎… 105	jiāo	交… 62	lán	蓝… 192
gōng	弓… 8	huā	花… 88	jiǎo	角… 92	làn	烂… 144
	功… 42	huái	滑… 189		绞… 147	làng	浪… 162
	宫… 145	huán	怀… 93		脚… 169	láo	劳… 88
gōu	钩… 131	huàn	环… 103	jié	节… 42	lǎo	老… 48
gòu	垢… 128	huáng	换… 149		结… 147	lèi	类… 143
gū	孤… 118	huī	黄… 163	jiě	解… 195	lěng	冷… 93
gǔ	谷… 95	huí	灰… 49	jīn	金… 109	lí	螫… 206
	骨… 130		蛔… 180		筋… 182	lì	立… 46
	蛊… 167		蚘… 152		禁… 192		历… 27
	鼓… 191	huì	虺… 203	jǐn	紧… 151		沥… 94
guān	贯… 147	hūn	昏… 114		噤… 204		利… 89
	惯… 188		悞… 176	jīng	经… 118		痢… 187
	灌… 208	hùn	混… 177		惊… 173	lián	连… 89
guǎng	广… 8	huō	豁… 206				
guī	龟… 92						

liàn 链... 181
liè 裂... 178
lín 临... 144
鳞... 208
lìn 淋... 176
liú 流... 161
琉... 163
liù 六... 37
lóng 龙... 42
lòu 漏... 201
lú 颅... 166
lǔ 虏... 193
lù 鹭... 206
露... 209
luán 孪... 209
luǎn 卵... 92
luó 螺... 205
luò 落... 178

m
má 麻... 169
mǎ 马... 23
蚂... 129
mài 脉... 134
mǎn 满... 201
màn 慢... 200
méi 眉... 146
腺... 195
霉... 202
mèn 闷... 93
mēng 蒙... 193
mèng 梦... 164
mí 糜... 205
mì 觅... 109
miǎn 免... 114
míng 鸣... 108
mìng 命... 109
mù 木... 24
目... 42

N

nà 纳... 103
nǎi 奶... 47
nán 难... 162
náng 囊... 209
nǎng 囊... 209
náo 蛸... 180
nǎo 脑... 155
nèi 内... 29
nì 逆... 143
蛊... 209
nián 年... 51
niào 尿... 96
niē 捏... 149
niè 齧... 209
níng 凝... 205
niù 拗... 105
nóng 脓... 154
nòng 弄... 86
nù 怒... 146
nǚ 女... 8
nuan 暖... 193

O
ǒu 呕... 89

P
pān 潘... 205
pán 盘... 168
蟠... 206
pào 泡... 116
páng 膀... 200
pēi 胚... 133
痞... 196
pén 盆... 132
pěng 捧... 164
pí 脾... 182
pǐ 痞... 186
癖... 207

piān 偏... 168
pián 骈... 147
piāo 飘... 202
pǐn 品... 129
pò 迫... 109
pú 葡... 177
pù 铺... 182

Q

qī 七... 2
qí 奇... 105
脐... 154
qì 气... 30
qián 前... 143
qiāng 枪... 104
qiǎng 襁... 205
qié 茄... 104
qiè 怯... 115
qīng 青... 103
清... 176
qiū 秋... 130
qiú 求... 89
軌... 204
qū 躯... 153
qǔ 龋... 204
qù 去... 42
quán 全... 62
quē 缺... 152

R
ráng 攘... 208
rè 热... 149
rén 人... 2
rèn 任... 53
妊... 96
rì 日... 27
rǔ 乳... 109
rù 入... 3
蓐... 192

S

sāi 颞... 203
sān 三... 4
sào 瘙... 203
shā 杀... 62
痧... 187
shà 霎... 202
shǎn 闪... 46
shàn 疝... 115
shāng 伤... 53
shàng 上... 6
shāo 烧... 177
shǎo 少... 40
shào 少... 40
shé 舌... 52
蛇... 166
shēn 身... 89
shén 神... 146
shěn 沈... 94
shèn 肾... 106
shēng 生... 43
shèng 盛... 164
shī 失... 43
湿... 188
shí 十... 1
石... 42
时... 89
实... 116
食... 131
蚀... 132
shǐ 始... 117
shì 试... 117
拭... 127
室... 144
嗜... 194
shōu 收... 80
shǒu 手... 30
首... 143

shòu 受… 109
瘦… 200
shū 输… 193
疏… 191
shǔ 暑… 178
鼠… 194
shù 束… 89
数… 197
漱… 201
shuāng 双… 41
shuǐ 水… 40
shuì 睡… 193
shuò 数… 198
sǐ 死… 49
sì 四… 43
sòu 嗽… 198
sù 宿… 177
suī 尿… 96
sǔn 损… 149
suō 缩… 202
suǒ 锁… 182

T

tà 踏… 203
tāi 胎… 134
tài 太… 26
tán 痰… 196
táng 螳… 205
tāo 绦… 163
tǎo 讨… 46
tǐ 体… 89
tī 涕… 161
tiān 天… 23
tiáo 调… 162
tíng 廷… 52
停… 168
脖… 202
tōng 通… 162
tóng 童… 187

tòng 痛… 187
tóu 头… 47
tòu 透… 153
tǔ 吐… 50
tù 吐… 50
兔… 90
tuī 推… 164
tuí 瘫… 206
tuì 退… 146
tuō 脱… 169

W

wài 外… 46
wǎn 碗… 202
wán 顽… 147
wǎn 晚… 167
wèi 胃… 128
wēn 温… 188
瘟… 200
wén 文… 37
纹… 103
wěn 稳… 198
wèng 鼈… 210
wò 卧… 104
wū 乌… 37
污… 79
wú 无… 24
吴… 89
wǔ 五… 25
伍… 53
武… 103
wù 物… 109
误… 146
恶… 147
寤… 202

X

xī 息… 153
锡… 109

xí 习… 19
xǐ 洗… 144
xiā 呷… 108
xià 下… 5
夏… 148
xiān 先… 52
xián 咸… 128
涎… 161
痛… 187
xiàn 现… 89
陷… 162
xiǎng 响… 129
xiàng 项… 127
xiāo 哮… 151
消… 160
瘡… 187
xiǎo 小… 8
xiē 歇… 194
xié 邪… 50
xiè 泄… 116
泻… 116
xīn 心… 38
新… 197
xìn 凶… 61
信… 131
xíng 行… 61
形… 86
xìng 幸… 104
性… 115
xiū 休… 53
xū 虚… 164
xuān 宣… 145
xuán 悬… 166
xuǎn 选… 130
xuàn 旋… 172
xuě 雪… 164
xuè 血… 56
xùn 汛… 79

Y

yá 牙… 27
芽… 88
yǎ 哑… 128
yān 咽… 129
yán 盐… 147
yǎn 掩… 164
眼… 166
鼹… 204
yàn 验… 163
燕… 204
yáng 羊… 79
阳… 79
yǎng 仰… 56
养… 143
yāo 腰… 195
yě 野… 166
yè 夜… 114
yī 一… 1
噫… 204
yí 遗… 179
yì 异… 79
易… 106
疫… 142
噬… 194
溢… 198
yīn 阴… 80
湮… 138
荫… 128
yín 斲… 178
yǐn 引… 40
饮… 92
隐… 177
yīng 婴… 168
影… 203
yōng 壅… 205
yòu 右… 42
yǒu 有… 49

yú	余… 90		炸… 144		稚… 194	zhuǎn	转… 105
	鱼… 114		炸… 159	zhōng	中… 28	zhuàng	壮… 50
yǔ	语… 146	zhàn	战… 128		钟… 130		撞… 203
yù	玉… 41	zhàng	胀… 112	zhǒng	肿… 112	zhuì	坠… 96
	郁… 104	zhēn	珍… 127		种… 130	zī	籽… 79
	浴… 161		真… 149		踵… 204		磁… 179
yuán	原… 149	zhěn	诊… 95	zhòng	中… 28	zǐ	子… 19
yuè	月… 32		疹… 160		重… 131		紫… 178
yùn	孕… 46		枕… 104	zhōu	周… 114	zì	自… 56
		zhèn	震… 202		週… 169	zǒu	走… 86
	Z	zhēng	蒸… 192	zhòu	昼… 146	zū	菰… 177
zàng	脏… 154		藏… 208		皱… 156	zǔ	阻… 96
zāo	糟… 205	zhèng	正… 42	zhū	侏… 109	zuān	钻… 154
zǎo	早… 50	zhī	脂… 156	zhù	逐… 149	zuì	醉… 202
zào	燥… 206	zhǐ	指… 127	zhù	注… 116	zuǒ	左… 42
zé	择… 105	zhì	治… 116		疰… 160	zuò	坐… 90
zhà	乍… 44		滞… 188		著… 164		

[General Information]

书名=中医大辞典 妇科儿科分册（试用本）

作者=

页数=215

SS号=0

出版日期=