中国中药资源丛书

# 中国中药资源志要

中国药材公司 编著

科学出版社

1994

00356301

（京）新登字 092 号

## 内 容 简 介

本书是《中国中药资源丛书》之一。根据全国中药资源普查的资料和有关文献，收载了我国药用资源 12 694 种，其中药用植物 383 科 2 313 属 11 020 种，药用动物 414 科 879 属 1 590 种，药用矿物 84 种。记述每个资源种的生境、分布、药用部位、中药名、性味、功能、用途等内容。

本书是我国中药资源较为全面的基本资料，可供中药生产、经营、科研、教学和资源保护等部门的人员使用。

中国中药资源丛书

中国中药资源志要

中国药材公司 编著

责任编辑 曾美玉 曾建飞

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码：100717

中国科学院印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

1994 年 7 月第 一 版 开本：787×1092 1/16

1994 年 7 月第一次印刷 印张：131 插页：2

印数：1—3 500 字数：3 066 000

ISBN 7-03-003138-5/R·153

定价：199.00 元

發揮
實現

書贈中國中藥資源叢書

中藥資源優
中藥事業騰
飛勢

盧嘉錫　一九九二年冬月

# 《中国中药资源丛书》编辑委员会


**顾　　问**

阎　颖　　盛树仁　　王　磊　　高　修　　陈耀邦
胡熙明　　刘广运　　李振声　　刘积斌　　刘永纲
石广生　　邵宗明　　朱　杰　　史立德

**主　　编**

张洪魁

**副 主 编**

秦双发　　李　军　　陈文定　　张惠源

**编　　委**（以姓氏笔画为序）

丁贵桢　　丁禄起　　丁景耀　　于连江　　王　非
王文采　　王冶钢　　王克勤　　王秀芳　　王国栋
王济生　　王晓云　　王荷生　　王绵之　　王维昌
王惠芳　　王德澍　　王耀祖　　牛心礼　　毛发和
方　生　　尹祥山　　冉小峰　　冉懋雄　　丛　众
轧仲锐　　宁绍智　　冯浩镒　　史续哉　　许太宁
许锦柏　　那世瑞　　吕兰薰　　朱有昌　　朱海玉
孙传奇　　刘录元　　刘彦斌　　向　涛　　杨卫东
杨文轩　　杨拾宁　　杨锦文　　陈　介　　陈文定
陈克宁　　陈信泗　　陈锡坤　　陈德贵　　李　波
李开写　　李允良　　李　军　　李应中　　李承志
李咨伯　　李洁英　　李映焕　　李家实　　张友余
张训诚　　张安玲　　张志英　　张国庆　　张炳灿
张秋国　　张洪魁　　张超良　　张清浦　　张惠源
何历明　　何庆惠　　杜永祥　　吴正刚　　吴成信
吴国钧　　吴承荫　　吴征镒　　吴政旭　　吴耀闾
汪津生　　闵祥呈　　肖培根　　沈惠民　　邹寒雁
余敬睦　　余椿生　　周　莹　　周太炎　　周自臣

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 郑本灼 | 郑孝武 | 金永昌 | 金德升 | 范良茂 |
| 岳俊三 | 林　绮 | 赵承春 | 赵润怀 | 姚　宁 |
| 姚蕴英 | 姜世强 | 禹华年 | 贺　喜 | 唐士惠 |
| 徐　南 | 徐国钧 | 徐祥浩 | 徐锡岑 | 秦双发 |
| 秦临喜 | 袁文成 | 袁志仁 | 袁昌齐 | 郭庆丰 |
| 郭成池 | 郭志雨 | 郭荣麟 | 郭隆华 | 高连元 |
| 高博明 | 高耀亭 | 高麟溢 | 贾志辉 | 栗福民 |
| 黄成龙 | 黄学文 | 黄继仁 | 龚安琪 | 寇宪宗 |
| 梁维纲 | 常瑞英 | 韩希森 | 谢宗万 | 蒋　玲 |
| 曾美玉 | 舒树森 | 韩　涌 | 焦跃庭 | 楼之岑 |
| 雷布云 | 路志正 | 蔡巨乐 | 颜于宏 | 颜正华 |
| 潘成全 | 戴伦凯 | 魏宗玉 | 瞿德庆 | |

# 《中国中药资源志要》编辑委员会


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主　　编 | 张惠源 | 张志英 | | | |
| 副 主 编 | 岳俊三 | 郭荣麟 | | | |
| 编写人员 | 张志英 | 岳俊三 | 郭荣麟 | 王克勤 | |
| | 张惠源 | 孙传奇 | 来复根 | 王惠芳 | |
| | 颜孟尤 | 梁固城 | 初　敏 | 张　群 | |
| 审　　定 | 吴征镒 | 周太炎 | 王文采 | 陈　介 | |

# 序


我国是世界上天然药物资源最丰富的国家之一，在传统药物资源的研究和开发利用方面有着悠久的历史和非常丰富的经验，成为中华民族灿烂文化的重要组成部分。

我国的天然药物资源种类繁多、分布广泛，这是中医药事业长期发展的物质基础和优势所在。但是，长期以来存在着一些不可忽视的严重问题：一方面有许多天然的药物资源没有得到充分的开发利用，另一方面却出现了一些常用药材资源的急剧减少，严重影响了市场的供应。因此，客观地认识和正确评价我国的中药资源现状，总结开发利用的历史经验，不仅是解决当前某些常用中药供不应求矛盾的迫切需要，而且从保障全国人民的医疗卫生保健的需要来看，也需要研究制定出合理开发、护育管理、科学研究与发展生产的长远发展战略。

根据 1982 年国务院第 45 次常务会议决定，从 1983 年开始进行的全国中药资源普查，是中华人民共和国成立以来规模最大的一次，国家和地方各级政府以及医药等有关部门投入了大量的人力和财力。通过这次普查，取得了大量的第一手资料。科学地总结、整理这些宝贵资料，既是普查成果推广应用的需要，也是服务于中医中药事业和我国现代化建设的需要。中国药材公司(全国中药资源普查办公室)组织有关方面的专家、教授和技术人员，在整理普查资料的基础上，编写(绘)的这套中国中药资源丛书，极大地丰富了中药学宝库，是对发展我国中药事业作出的重大贡献。

这套丛书以该次普查取得的第一手资料为主，并参考吸收了历次普查成果和有关方面的最新资料，通过深入细致地研究整理，使大量的实践经验上升为系统的理论，首次全面、科学地反映了我国的中药资源现状，并对中药资源合理开发利用和护育管理的长远发展目标、方向、途径和措施等进行了比较深入的研究，其内容广泛、科学实用，堪称是当代中药资源方面的权威性论著。

这套丛书包括《中国中药资源》、《中国中药资源志要》、《中国常用中药材》、《中国中药区划》、《中国药材资源地图集》、《中国民间单验方》等 6 本书。在总体内容安排上，既是一个有密切联系的有机整体，又有其突出的特点；既有全面的概要介绍，又有深入的论述；既反映了客观实际，又有理论上的分析和提高；既着眼于当前，又考虑了长远发展；在编写形式上，图文并茂，形式多样，资料翔实查考方便。这套丛书是一套科学价值、实用意义极为珍贵的药材学文献，既可作为领导决策的依据，也是从事中药生产、经营、科研、教学、资源保护等工作必需的常用参考书。读了这套丛书，一定会使您受益匪浅。谨此为序。



中国科学院

1992 年 12 月

# 《中国中药资源丛书》前言

我国幅员辽阔，地形复杂，气候多样，孕育着丰富的药用资源。几千年来，我国劳动人民在开发利用这些资源的长期实践中，积累了许多极为宝贵的经验，形成了完整的中医中药学理论体系。中医中药已成为我国人民防病治病、康复保健的可靠保证，为各族人民的生存繁衍做出了巨大贡献。为了查清我国中药资源，进一步合理开发利用这些资源，1982年国务院第45次常务会议决定对全国中药资源进行普查，制定长远开发规划。为此，由国家经济委员会组织国家医药管理局、卫生部、农牧渔业部、林业部、对外经济贸易部、中国科学院、国家统计局等组成全国中药资源普查领导小组，在中国药材公司设立全国中药资源普查领导小组办公室，具体领导这项工作。从1983年开始，在全国开展了大规模的中药资源普查。全国各省(市、自治区)、地(市)、县共有4万人参加，历时5年。普查人员爬山涉水，历尽艰辛，收集了大量的第一手资料，采集了近200万份标本、药材样品及10多万个民间单、验方。在此基础上，由中国药材公司组织各省、市、自治区药材部门，以及农业、卫生、林业、科研、测绘等有关单位人员，利用5年时间，整理、编写(绘)出这套大型丛书。

这套丛书包括《中国中药资源》、《中国中药资源志要》、《中国中药区划》、《中国常用中药材》、《中国药材地图集》和《中国民间单验方》。《中国中药资源》从总揽全局的角度，概要介绍了我国中药资源的种类、来源、分布、蕴藏量和产量，开发利用的历史和现状，资源保护管理和发展战略研究等；《中国中药资源志要》收载了我国现已查明的1.2万多种药用植物、动物、矿物的分布和用途等；《中国中药区划》以我国自然条件和社会经济技术条件与中药生产的特点为依据，在研究总结中药资源分布的基本规律、区域优势和发展潜力的基础上，将我国划分为九大类型区，并提出了各区中药资源保护、开发的方向、途径和措施；《中国常用中药材》系统地介绍了137种常用中药材的来源、分布、形态和生态特点、资源现状、开发利用、商品产销情况等；《中国药材地图集》首次以地图形式，反映了全国和各省、市、自治区的主要药材的地理分布，全国126种常用药材的数量分布；《中国民间单验方》选编出2万多个民间单、验方，反映了我国劳动人民丰富的用药经验，为开发中药资源开辟了新的领域。

《中国中药资源丛书》全面反映了我国中药资源现状，总结了开发利用的历史经验，提出了中药资源开发的战略，是一套系统的中药资源专著。全书对中药生产、经营、科研、教学、资源保护及各级有关领导进行决策等，都具有一定的实用、参考价值。

这套丛书的编（绘），得到了国家有关部门和各省、自治区、直辖市医药管理局(总公司)、药材(医药)公司及有关方面专家、教授的大力支持，在此表示衷心的谢意。由于编者水平所限，书中难免有不妥之处，敬请广大读者批评指正。

《中国中药资源丛书》编辑委员会

1993年10月

# 编 写 说 明

1. 本书是在全国中药资源普查的基础上，参考各省(市、区)提供的中药资源名录及国内外有关文献和部分科研成果编著而成的。

2. 本书收载了全国药用植物、动物、矿物等中药资源及部分从国外引种栽培或饲养的药用资源共计 12 694 种，其中药用植物 383 科 2 313 属 11 020 种(含种下等级 1 208 个)；药用动物 414 科 879 属 1 590 种；药用矿物 84 种。

3. 本书收载的种类，按各自的分类系统排列，属及属以下以学名的拉丁字母为序。药用植物中藻类、菌类、地衣、苔藓类采用国内常用分类系统；蕨类植物采用秦仁昌(1978)分类系统；裸子植物采用郑万钧(1978)分类系统；被子植物采用恩格勒(1964)分类系统；药用动物采用约翰逊(1977)分类系统排列。药用矿物按化合物属性归类。

4. 每个资源种均记述了中名、地方名、拉丁学名、生态环境、分布、药用部位、中药名、性味、功能、用途、附注等项内容。

5. 中名一般(属名除外)选用《中国植物志》、《中国动物志》，以及地方植物志、动物志等文献的名称，用黑体字排印。地方名每种不超过 5 个，选择使用范围广、形象和较为科学的名称，并加注出处。中药名选用我国历代医药学专著中记载且普遍使用的名称。拉丁学名选用合法的名称，用正体字排印；组合基名及主要异名用斜体字排印。

6. 生态环境项，简要记述分布区的海拔高度、地形地貌、生长环境、伴生植物、寄主、土壤等。

7. 分布项，广布种的分布范围列至大区，如东北、西南等；分布狭窄的列至省、县，也可指至具体地名；常用中药材列出主产地。

8. 药用部位项，多部位入药者，主要药用部位在前，其余按根、茎、叶、花、果实、种子的顺序排列。

9. 性味功能项，凡《中华人民共和国药典》1990 年版收载的种类，均以药典记载为准，其余种类参考《中药大辞典》、国内有关中草药书籍，予以记述。无性味功能者只列出用途。书中的病名，以中医传统病证名称为主，部分采用了有关西医病名。

10. 附注项，包括功效相同或相似种；国家重点保护种类；代用品及混淆品种；新资源、新分布及其他必要说明等内容。

11. 为便于使用，书后附有中名索引和拉丁学名索引。

# 目　　录


序

《中国中药资源丛书》前言

编写说明

## 药　用　植　物

**藻类植物 Algae** …… 3

1.颤藻科 Oscillatoriaceae …… 3
2.念珠藻科 Nostocaceae …… 3
3.鞭枝藻科 Mastigocladaceae …… 4
4.胶须藻科 Rivulariaceae …… 4
5.衣藻科 Chlamydomonadaceae …… 4
6.小球藻科 Chlorellaceae …… 4
7.栅藻科 Scenedesmaceae …… 5
8.丝藻科 Ulotrichaceae …… 5
9.礁膜科 Monostromaceae …… 5
10.石莼科 Ulvaceae …… 5
11.刚毛藻科 Cladophoraceae …… 6
12.松藻科 Codiaceae …… 7
13.蕨藻科 Caulerpaceae …… 7
14.双星藻科 Zygnemataceae …… 7
15.轮藻科 Characeae …… 8
16.狭果藻科（海蕴科）Spermatochnaceae …… 8
17.铁钉菜科 Ishigeaceae …… 8
18.管藻科 Scytosiphonaceae …… 9
19.绳藻科 Chordaceae …… 9
20.海带科 Laminariaceae …… 9
21.巨藻科 Lessoniaceae …… 10
22.翅藻科 Alariaceae …… 10
23.墨角藻科 Fucaceae …… 10
24.马尾藻科 Sargassaceae …… 11
25.钙板金藻科(球石藻科) Coccolithaceae …… 11
26.脆杆藻科 Fragilariaceae …… 12
27.菱形藻科 Nitzschiaceae …… 12
28.膝沟藻科 Gonyaulaceae …… 12
29.红毛菜科 Bangiaceae …… 12
30.柏桉藻科 Bonnemaisoniaceae …… 13
31.石花菜科 Gelidiaceae …… 13
32.凝花菜科 Gelidiellaceae …… 14
33.内枝藻科 Endocladiaceae …… 14
34.隐丝藻科 Cryptonemiaceae …… 15
35.珊瑚藻科 Corallinaceae …… 15
36.杉藻科 Gigartinaceae …… 15
37.肉叶藻科 Phyllophoraceae …… 16
38.红翎菜科 Solieriaceae …… 16
39.江蓠科 Gracilariaceae …… 17
40.仙菜科 Ceramiaceae …… 17
41.红叶藻科 Delesseriaceae …… 18
42.松节藻科 Rhodomelaceae …… 18

**菌类植物 Fungi** …… 19

1.假丝菌科 Reticulariaceae …… 19
2.霜霉科 Peronosporaceae …… 19
3.曲霉科 Eurotiaceae …… 19
4.麦角菌科 Clavicipitaceae …… 20
5.肉座菌科 Nypocreaceae …… 21
6.炭角菌科 Xylariaceae …… 22
7.核盘菌科 Sclerotiniaceae …… 22
8.羊肚菌科 Morchellaceae …… 23
9.地菇科 Terfeziaceae …… 23
10.黑粉菌科 Ustilaginaceae …… 23
11.菰黑粉菌科 Yeniaceae …… 24
12.木耳科 Auriculariaceae …… 24
13.银耳科 Tremellaceae …… 25
14.革菌科 Thelephoraceae …… 25
15.珊瑚菌科 Clavariaceae …… 26
16.鸡油菌科 Cantharellaceae …… 26
17.干朽菌科 Meruliaceae …… 26
18.齿菌科 Hydnaceae …… 27

19.牛排菌科 Fistulinaceae ……27
20.多孔菌科 Polyporaceae ……28
21.口蘑科 Tricholomataceae ……36
22.鹅膏科(毒伞科) Amanitaceae ……40
23.光柄菇科 Pluteaceae ……41
24.蘑菇科(伞菌科) Agaricaceae……41
25.粪伞科 Bolbitiaceae ……42
26.桩菇科 Paxillaceae ……42
27.铆钉菇科 Gomphidiaceae ……43
28.牛肝菌科 Boletaceae ……43
29.松塔牛肝菌科 Strobilomycetaceae…
……44
30.红菇科 Russulaceae ……44
31.鬼笔科 Phallaceae ……47
32.腹菌科 Hymenogastraceae……48
33.灰菇包科 Secotiaceae ……48
34.轴灰包科 Podaxaceae ……48
35.柄灰包科 Tulostomataceae ……48
36.马勃科 Lycoperdaceae ……49
37.地星科 Geastraceae ……51
38.硬皮马勃科 Sclerodermataceae ……52
39.鸟巢菌科 Nidulariaceae……52
40.暗色孢科 Dematiaceae ……53
41.丛梗孢科 Moniliaceae ……53
**地衣植物 Lichenes ……54**
1.皮果衣科 Dermatocarpaceae……54
2.牛皮叶科 Stictaceae ……54
3.石蕊科 Cladoniaceae……55
4.珊瑚枝科 Stereocaulaceae……56
5.石耳科 Umbilicariaceae ……56
6.鸡皮衣科 Pertusariaceae ……57
7.梅衣科 Parmeliaceae……57
8.松萝科 Usneaceae ……58
9.地茶科 Thamnoliaceae ……59
**苔藓植物 Bryophyta ……60**
藓纲 Musci……60
1.泥炭藓科 Sphagnaceae ……60
2.牛毛藓科 Ditrichaceae ……61
3.曲尾藓科 Dicranaceae ……61
4.丛藓科 Pottiaceae ……61
5.葫芦藓科 Funariaceae ……62
6.壶藓科 Splachnaceae……62
7.真藓科 Bryaceae ……62
8.提灯藓科 Mniaceae ……63
9.珠藓科 Bartramiaceae …… ……63
10.万年藓科 Climaciaceae ……64
11.白齿藓科 Leucodontaceae ……64
12.蔓藓科 Meteriaceae……64
13.羽藓科 Thuidiaceae ……65
14.柳叶藓科 Amblystegiaceae……65
15.绢藓科 Entodontaceae……66
16.灰藓科 Hypnaceae ……66
17.金发藓科 Polytrichaceae ……67
苔纲 Hepalicae ……67
18.耳叶苔科 Frullaniaceae……67
19.瘤冠苔科 Grimaldiaceae ……68
20.蛇苔科 Conocephalaceae ……68
21.地钱科 Marchantiaceae ……68
**蕨类植物门 Pteridophyta ……69**
1.石杉科 Huperziaceae ……69
2.石松科 Lycopodiaceae ……71
3.卷柏科 Selaginellaceae……73
4.木贼科 Equisetaceae……76
5.松叶蕨科 Psilotaceae ……78
6.七指蕨科 Helminthostachyaceae……
……78
7.阴地蕨科 Botrychiaceae ……78
8.瓶尔小草科 Ophioglossaceae ……79
9.观音座莲科 Angiopteridaceae ……80
10.紫萁科 Osmundaceae ……82
11.瘤足蕨科 Plagiogyriaceae ……83
12.里白科 Gleicheniaceae ……84
13.莎草蕨科 Schizaeaceae ……85
14.海金沙科 Lygodiaceae……85
15.膜蕨科 Hymenophyllaceae ……86
16.蚌壳蕨科 Dicksoniaceae ……87
17.桫椤科 Cyatheaceae ……87
18.稀子蕨科 Monachosoraceae……88
19.碗蕨科 Dennstaedtiaceae…… ·88
20.鳞始蕨科 Lindsaeaceae ……89
21.姬蕨科 Hypolepidaceae ……90
22.蕨科 Pteridiaceae ……90
23.凤尾蕨科 Pteridaceae ……90
24.中国蕨科 Sinopteridaceae ……93
25.铁线蕨科 Adiantaceae……96
26.水蕨科 Parkeriaceae ……98

27.裸子蕨科 Hemionitidaceae…… 98
28.车前蕨科 Antrophyaceae…… 99
29.书带蕨科 Vittariaceae…… 100
30.蹄盖蕨科 Athyriaceae…… 100
31.肿足蕨科 Hypodematiaceae …… 103
32.金星蕨科 Thelypteridaceae …… 104
33.铁角蕨科 Aspleniaceae …… 107
34.球子蕨科 Onocleaceae …… 110
35.岩蕨科 Woodsiaceae …… 111
36.乌毛蕨科 Blechnaceae …… 111
37.鳞毛蕨科 Dryopteridaceae …… 113
38.三叉蕨科 Aspidiaceae…… 121
39.实蕨科 Bolbitidaceae …… 122
40.舌蕨科 Elaphoglossaceae …… 123
41.肾蕨科 Nephrolepidaceae …… 123
42.骨碎补科 Davalliaceae …… 123
43.双扇蕨科 Dipteridaceae…… 125
44.水龙骨科 Polypodiaceae…… 125
45.槲蕨科 Drynariaceae …… 138
46.剑蕨科 Loxogrammaceae …… 139
47.蘋科 Marsileaceae …… 139
48.槐叶蘋科 Salviniaceae …… 140
49.满江红科 Azollaceae …… 140

**裸子植物 Gymnospermae…… 141**

1.苏铁科 Cycadaceae …… 141
2.银杏科 Ginkgoaceae…… 141
3.松科 Pinaceae …… 142
4.杉科 Taxodiaceae …… 148
5.柏科 Cupressaceae…… 149
6.罗汉松科 Podocarpaceae …… 153
7.三尖杉科 Cephalotaxaceae …… 154
8.红豆杉科 Taxaceae …… 155
9.麻黄科 Ephedraceae …… 156
10.买麻藤科 Gnetaceae …… 157

**被子植物 Angiospermae …… 158**

**双子叶植物 Dicotyledoneae …… 158**

1.木麻黄科 Casuarinaceae …… 158
2.杨梅科 Myricaceae …… 158
3.胡桃科 Juglandaceae …… 159
4.杨柳科 Salicaceae …… 162
5.桦木科 Betulaceae…… 166
6.壳斗科 Fagaceae …… 171
7.马尾树科 Rhoipteleaceae …… 178
8.榆科 Ulmaceae …… 178
9.杜仲科 Eucommiaceae …… 183
10.桑科 Moraceae…… 183
11.荨麻科 Urticaceae …… 192
12.山龙眼科 Proteaceae …… 207
13.铁青树科 Olacaceae…… 208
14.山柚子科 Opiliaceae …… 209
15.檀香科 Santalaceae…… 209
16.桑寄生科 Loranthaceae …… 211
17.蛇菰科 Balanophoraceae…… 217
18.蓼科 Polygonaceae …… 218
19.商陆科 Phytolaccaceae …… 234
20.紫茉莉科 Nyctaginaceae…… 235
21.粟米草科 Molluginaceae …… 235
22.番杏科 Aizoaceae …… 236
23.马齿苋科 Portulacaceae …… 236
24.落葵科 Basellaceae …… 237
25.石竹科 Caryophyllaceae …… 237
26.藜科 Chenopodiaceae …… 251
27.苋科 Amaranthaceae …… 257
28.仙人掌科 Cactaceae…… 262
29.木兰科 Magnoliaceae …… 264
30.番荔枝科 Annonaceae…… 270
31.肉豆蔻科 Myristicaceae …… 274
32.五味子科 Schisandraceae …… 275
33.八角科 Illiciaceae …… 279
34.蜡梅科 Calycanthaceae …… 281
35.樟科 Lauraceae …… 282
36.莲叶桐科 Hernandiaceae …… 299
37.领春木科 Eupteleaceae …… 300
38.连香树科 Cercidiphyllaceae …… 300
39.毛茛科 Ranunculaceae…… 301
40.小檗科 Berberidaceae…… 354
41.大血藤科 Sargentodoxaceae …… 371
42.木通科 Lardizabalaceae…… 371
43.防己科 Menispermaceae…… 374
44.睡莲科 Nymphaeaceae …… 385
45.金鱼藻科 Ceratophyllaceae …… 387
46.三白草科 Saururaceae…… 387
47.胡椒科 Piperaceae …… 388
48.金粟兰科 Chloranthaceae …… 391
49.马兜铃科 Aristolochiaceae…… 393
50.五桠果科 Dilleniaceae …… 401

51.芍药科 Paeoniaceae…… 402
52.猕猴桃科 Actinidiaceae …… 404
53.金莲木科 Ochnaceae …… 410
54.龙脑香科 Dipterocarpaceae…… 410
55.山茶科(茶科) Theaceae …… 410
56.藤黄科(山竹子科) Cuttiferae … 419
57.猪笼草科 Nepenthaceae …… 424
58.茅膏菜科 Droseraceae …… 425
59.罂粟科 Papaveraceae …… 426
60.白花菜科 Capparidaceae…… 444
61.十字花科 Cruciferae …… 446
62.悬铃木科 Platanaceae…… 458
63.金缕梅科 Hamamelidaceae …… 459
64.景天科 Crassulaceae …… 462
65.虎耳草科 Saxifragaceae…… 472
66.海桐花科 Pittosporaceae …… 492
67.蔷薇科 Rosaceae …… 495
68.牛栓藤科 Connaraceae …… 543
69.豆科 Leguminosae …… 544
70.酢浆草科 Oxalidaceae…… 609
71.牻牛儿苗科 Geraniaceae…… 611
72.旱金莲科 Tropaeolaceae…… 615
73.蒺藜科 Zygophyllaceae …… 615
74.亚麻科 Linaceae …… 617
75.古柯科 Erythroxylaceae …… 618
76.大戟科 Euphorbiaceae…… 618
77.虎皮楠科 Daphniphyllaceae …… 641
78.芸香科 Rutaceae …… 642
79.苦木科 Simaroubaceae …… 656
80.橄榄科 Burseraceae…… 657
81.楝科 Meliaceae …… 659
82.远志科 Polygalaceae …… 662
83.乌桕科 Coriariaceae …… 666
84.漆树科 Anacardiaceae…… 666
85.槭树科 Aceraceae …… 672
86.伯乐树科 Bretschneideraceae…… 675
87.无患子科 Sapindaceae…… 676
88.七叶树科 Hippocastanaceae …… 679
89.清风藤科 Sabiaceae…… …… 680
90.凤仙花科 Balsaminaceae …… 683
91.冬青科 Aquifoliaceae …… 687
92.卫矛科 Celastraceae …… 691
93.省沽油科 Staphyleaceae …… 703
94.翅子藤科 Hippocrateaceae…… 704
95.黄杨科 Buxaceae …… … 704
96.茶茱萸科 Icacinaceae …… 707
97.鼠李科 Rhamnaceae…… 709
98.葡萄科 Vitaceae …… … 719
99.火筒树科 Leeaceae …… 732
100.杜英科 Elaeocarpaceae…… 732
101.椴树科 Tiliaceae …… …… 733
102.锦葵科 Malvaceae…… 737
103.木棉科 Bombacaceae…… 746
104.梧桐科 Sterculiaceae …… …… 747
105.毒鼠子科 Dichapetalaceae …… 752
106.瑞香科 Thymelaeaceae…… 752
107.胡颓子科 Elaeagnaceae…… 758
108.大风子科 Flacourtiaceae … …… 762
109.堇菜科 Violaceae …… 765
110.旌节花科 Stachyuraceae …… 771
111.西番莲科 Passifloraceae …… 772
112.红木科 Bixaceae …… 774
113.柽柳科 Tamaricaceae …… 774
114.沟繁缕科 Elatinaceae …… 777
115.番木瓜科 Caricaceae …… 777
116.秋海棠科 Begoniaceae …… 778
117.葫芦科 Cucurbitaceae …… 781
118.千屈菜科 Lythraceae…… 798
119.菱科 Trapaceae …… 800
120.桃金娘科 Myrtaceae …… 801
121.海桑科 Sonneratiaceae …… 806
122.石榴科 Punicaceae…… 806
123.玉蕊科 Lecythidaceae …… 807
124.野牡丹科 Melastomataceae …… 807
125.红树科 Rhizophoraceae…… 815
126.使君子科 Combretaceae …… 816
127.柳叶菜科 Onagraceae …… 818
128.小二仙草科 Haloragidaceae … 823
129.杉叶藻科 Hippuridaceae …… 824
130.锁阳科 Cynomoriaceae…… 824
131.八角枫科 Alangiaceae …… 824
132.蓝果树科 Nyssaceae…… 825
133.珙桐科 Davidiaceae …… 826
134.山茱萸科 Cornaceae …… 826
135.五加科 Araliaceae…… 832
136.伞形科 Umbelliferae …… 847

137.岩梅科 Diapensiaceae ····· 880
138.山柳科 Clethraceae ····· 881
139.鹿蹄草科 Pyrolaceae····· 881
140.杜鹃花科 Ericaceae ····· 883
141.紫金牛科 Ardisiaceae ····· 899
142.报春花科 Primulaceae ····· 909
143.白花丹科 Plumbaginaceae ····· 923
144.山榄科 Sapotaceae····· 925
145.柿科 Ebenaceae ····· 926
146.安息香科 Styracaceae ····· 928
147.山矾科 Symplocaceae ····· 930
148.木犀科 Oleaceae ····· 933
149.马钱科 Loganiaceae ····· 944
150.龙胆科 Gentianaceae····· 946
151.睡菜科 Menyanthaceae····· 958
152.夹竹桃科 Apocynaceae····· 958
153.萝藦科 Asclepiadaceae····· 973
154.茜草科 Rubiaceae ····· 990
155.花葱科 Polemoniaceae ·····1023
156.旋花科 Convolvulaceae·····1023
157.紫草科 Boraginaceae·····1031
158.马鞭草科 Verbenaceae ·····1040
159.水马齿科 Callitrichaceae·····1055
160.唇形科 Labiatae·····1056
161.茄科 Solanaceae·····1116
162.醉鱼草科 Buddlejaceae·····1129
163.玄参科 Scrophulariaceae ·····1131
164.紫葳科 Bignoniaceae·····1160
165.爵床科 Acanthaceae ·····1164
166.胡麻科 Pedaliaceae ·····1176
167.苦苣苔科 Gesneriaceae·····1177
168.列当科 Orobanchaceae ·····1194
169.狸藻科 Lentibulariaceae ·····1196
170.苦槛蓝科 Myoporaceae·····1197
171.透骨草科 Phrymataceae ·····1197
172.车前科 Plantaginaceae·····1197
173.忍冬科 Caprifoliaceae·····1198
174.败酱科 Valerianaceae ·····1215
175.川续断科 Dipsacaceae ·····1219
176.桔梗科 Campanulaceae·····1222
177.草海桐科 Goodeniaceae ·····1237
178.花柱草科 Stylidiaceae ·····1238
179.菊科 Compositae ·····1238
**单子叶植物 Monocotyledoneae·····1357**
180.泽泻科 Alismataceae·····1357
181.花蔺科 Butomaceae ·····1359
182.水鳖科 Hydrocharitaceae·····1360
183.水麦冬科 Juncaginaceae ·····1361
184.眼子菜科 Potamogetonaceae·····1361
185.百合科 Liliaceae ·····1363
186.百部科 Stemonaceae·····1402
187.龙舌兰科 Agavaceae·····1403
188.石蒜科 Amaryllidaceae·····1406
189.仙茅科 Hypoxidaceae ·····1409
190.箭根薯科 Taccaceae ·····1410
191.薯蓣科 Dioscoreaceae ·····1411
192.雨久花科 Pontederiaceae·····1416
193.鸢尾科 Iridaceae ·····1417
194.水玉簪科 Burmanniaceae·····1423
195.田葱科 Philydraceae·····1423
196.灯心草科 Juncaceae ·····1424
197.凤梨科 Bromeliaceae ·····1426
198.鸭跖草科 Commelinaceae ·····1427
199.黄眼草科 Xyridaceae ·····1432
200.谷精草科 Eriocaulaceae ·····1432
201.禾本科 Gramineae·····1433
202.棕榈科 Palmae ·····1460
203.天南星科 Araceae ·····1465
204.浮萍科 Lemnaceae·····1482
205.露兜树科 Pandanaceae·····1483
206.黑三棱科 Sparganiaceae ·····1484
207.香蒲科 Typhaceae·····1484
208.莎草科 Cyperaceae ·····1486
209.芭蕉科 Musaceae ·····1499
210.姜科 Zingiberaceae ·····1501
211.美人蕉科 Cannaceae·····1515
212.竹芋科 Marantaceae·····1516
213.兰科 Orchidaceae ·····1517

## 药　用　动　物

**无脊椎动物 Invertebrates ·····1565**
原生动物门 Protozoa ·····1565

纤毛纲 Ciliata ……1565
1.草履虫科 Parameciidae ……1565
海绵动物门 Spongia ……1565
寻常海绵纲 Demospongiae ……1565
2.筒骨海绵科 Haploscleridae……1565
腔肠动物门 Coeleterata ……1566
水螅纲 Hydrozoa ……1566
3.水螅科 Hydridae ……1566
4.僧帽水母科 Physalidae ……1566
钵水母纲 Scyphozoa ……1566
5.洋须水母科 Ulmaridae……1566
6.霞水母科 Cyaneidae……1566
7.根口水母科 Rhizostomatidae ……1567
珊瑚纲 Anthozoa ……1567
8.海葵科 Actiniidae……1567
9.银冠海葵科 Diadumenidae ……1567
10.滨珊瑚科 Poritidae……1568
11.枇杷海葵科 Oculinidae ……1568
12.角珊瑚科 Antipathidae ……1568
13.矶花科 Melitodidae ……1569
14.柳珊瑚科 Gorgonidae……1569
15.海鳃科 Pennatulidae ……1569
软体动物门 Mollusca ……1570
双神经纲 Amphineura ……1570
16.隐板石鳖科 Cryptoplacidae ……1570
17.锉石鳖科 Ischnochitonidae ……1570
腹足纲 Gastropoda ……1570
18.鲍科 Haliotidae ……1570
19.帽贝科 Patellidae ……1571
20.马蹄螺科 Trochidae ……1571
21.蝾螺科 Turbinidae……1571
22.环口螺科 Cyclophoridae ……1572
23.田螺科 Viviparidae ……1572
24.滨螺科 Littorinidae ……1573
25.锥螺科 Turritellidae ……1573
26.汇螺科 Potamididae ……1574
27.宝贝科 Cypraeidae ……1574
28.骨螺科 Muricidae ……1575
29.蛾螺科 Buccinidae ……1576
30.盔螺科 Galeodidae ……1576
31.榧螺科 Olividae ……1576
32.涡螺科 Volutidae……1577
33.阿地螺科 Atyidae ……1577
34.海兔科 Aplysiidae ……1577
35.侧鳃海牛科 Pleurobranchidae …1577
36.石磺海牛科 Homoiodoridiidae …1578
37.椎实螺科 Lymnaeidae……1578
38.石磺科 Oncidiidae ……1578
39.玛瑙螺科 Achatinidae ……1578
40.坚齿螺科 Camaenidae……1579
41.嗜粘液蛞蝓科 Phiolomycidae …1579
42.蛞蝓科 Limacidae ……1579
43.巴蜗牛科 Bradybaenidae ……1580
瓣鳃纲 Lamellibranchia ……1580
44.蚶科 Arcidae ……1580
45.贻贝科 Mytilidae ……1580
46.钳蛤科 Vulsellidae ……1581
47.珍珠贝科 Pteriidae ……1582
48.江珧科 Pinnidae ……1582
49.扇贝科 Pectinidae ……1582
50.海菊蛤科 Spondylidae ……1583
51.海月蛤科 Placunidae ……1583
52.牡蛎科 Ostreidae……1583
53.珍珠蚌科 Margaritanidae ……1584
54.蚌科 Unionidae ……1584
55.蚬科 Corbiculidae ……1586
56.砗磲科 Tridacnidae ……1586
57.帘蛤科 Veneridae ……1586
58.蛤蜊科 Mactridae ……1587
59.紫云蛤科 Psammobiidae ……1588
60.斧蛤科 Donacidae ……1588
61.樱蛤科 Tellinidae ……1588
62.竹蛏科 Solenidae……1588
63.海螂科 Myidae……1589
头足纲 Cephalopoda ……1589
64.柔鱼科 Ommastrephidae……1589
65.枪乌贼科 Loliginidae……1590
66.乌贼科 Sepiidae ……1590
67.蛸(章鱼)科 Octopodidae ……1591
星虫动物门 Sipuncula ……1591
星虫纲 Sipunculida ……1591
68.星虫科 Sipunculidae ……1591
环节动物门 Annelida ……1592
多毛纲 Polychaeta……1592

69.沙蚕科 Nereidae ……1592
70.矶沙蚕科 Eunicidae……1592
71.吻沙蚕科 Glyceridae ……1592
72.沙蠋科 Arenicolidae ……1593
寡毛纲 Oligochaeta ……1593
73.钜蚓科 Megascolecidae ……1593
74.正蚓科 Lumbricidae ……1594
蛭纲 Hirudinea ……1594
75.医蛭科 Hirudidae ……1594
76.山蛭科 Haemadipsidae ……1595
节肢动物门 Arthropoda ……1595
肢口纲 Merostomata……1595
77.鲎科 Tachypleidae ……1595
蛛形纲 Arachnoidea ……1595
78.钳蝎科 Buthidae ……1595
79.蝰蛞科 Ctenizidae ……1596
80.壁钱科 Urocteidae ……1596
81.圆蛛科 Araneidae ……1596
82.黄金蛛科 Argiopidae ……1597
83.漏斗网蛛科 Agelenidae ……1597
84.跳蛛科 Salticidae ……1597
甲壳纲 Crustacea ……1598
85.铠茗荷科 Scalpellidae ……1598
86.茗荷科 Lepadidae ……1598
87.藤壶科 Balanidae ……1598
88.笠藤壶科 Tetraclitidae ……1598
89.缩头水虱科 Cymothoidae ……1599
90.珊瑚水虱科 Corallanidae ……1599
91.团水虱科 Sphaeromidae……1599
92.栉水虱科 Asellidae……1599
93.平甲虫科(卷地鳖科) Armadillidae ……1600
94.鼠妇科 Porcellionidae ……1600
95.潮虫科 Oniscidae ……1600
96.海蟑螂(海岸水虱)科 Ligiidae …1601
97.对虾科 Penaeidae ……1601
98.长臂虾科 Palaemonidae……1602
99.龙虾科 Palinuridae……1602
100.河虾科 Astacidae ……1603
101.鲶蛞虾科 Upogebiidae ……1603
102.虾蛄科 Squillidae ……1603
103.寄居蟹科 Paguridae ……1603
104.馒头蟹科 Calappidae ……1604
105.蜘蛛蟹科 Majidae……1604
106.菱蟹科 Parthenopidae ……1604
107.梭子蟹科 Portunidae ……1605
108.溪蟹科 Potamonidae……1605
109.华溪蟹科 Sinopotamidae ……1606
110.方蟹科 Grapsidae ……1606
唇足纲 Chilopoda ……1607
111.蜈蚣科 Scolopendridae……1607
112.蚰蜒科 Scutigeridae ……1607
倍足纲 Diplopoda ……1607
113.球马陆科 Glomeridae ……1607
114.圆马陆科 Paradoxosomatidae …1608
115.蟠马陆科 Sphaerotheriidae ……1608
116.山蛩科 Spirobolidae……1608
昆虫纲 Insecta ……1609
117.衣鱼科 Lepismatidae ……1609
118.蜓科 Aeschnidae ……1609
119.蜻科 Libellulidae ……1609
120.蜚蠊科 Blattidae ……1610
121.姬蠊科 Phyllodromiidae ……1610
122.鳖蠊科 Corydiidae ……1611
123.螳螂科 Mantidae ……1611
124.鼻白蚁科 Rhinotermitidae ……1612
125.白蚁科 Termitidae ……1612
126.螽斯科 Tettigoniidae ……1612
127.沙螽科 Stenopelmatidae ……1613
128.蝗科 Acrididae ……1613
129.蟋蟀科 Gryllidae ……1614
130.蝼蛄科 Gryllotalpidae……1615
131.蝉科 Cicadidae ……1615
132.蜡蝉科 Fulgoridae ……1616
133.绵蚜科 Pemphigidae ……1617
134.蚧科 Coccidae ……1617
135.胶蚧科 Lacciferidae……1618
136.蝽科 Pentatomidae ……1618
137.黾蝽科 Gerridae ……1619
138.步甲科 Carabidae……1619
139.龙虱科 Dytiscidae……1619
140.豉甲科 Gyrinidae……1620
141.隐翅虫科 Staphilinidae ……1620
142.萤科 Lampyridae ……1620

143.叩甲(叩头虫)科 Elateridae……1620
144.吉丁虫科 Buprestidae ……1621
145.芫菁科 Meloidae ……1621
146.粉甕科 Lyctidae……1622
147.金龟子科 Scarabaeidae……1623
148.犀金龟科 Dynastidae ……1623
149.鳃金龟科 Melolonthidae ……1623
150.粪金龟科 Geotrupidae ……1624
151.丽金龟科 Rutelidae ……1624
152.花金龟科 Cetoniidae ……1624
153.拟步甲科 Tenebrionidae……1625
154.沟胫天牛科 Lamiidae ……1625
155.天牛科 Cerambycidae ……1626
156.象甲(象虫)科 Curculionidae …1626
157.蚁蛉科 Myrmeleontidae ……1626
158.石蛾科 Phryganeidae ……1627
159.蝙蝠蛾科 Hepialidae ……1627
160.蓑蛾科 Psychidae ……1627
161.刺蛾科 Cochlidiidae……1628
162.草螟科 Crambidae……1628
163.野螟科 Pyraustidea ……1628
164.天蚕蛾科 Saturniidae ……1628
165.家蚕蛾科 Bombycidae ……1629
166.灯蛾科 Arctiidae ……1629
167.夜蛾科 Noctuidae ……1630
168.弄蝶科 Hesperiidae ……1630
169.粉蝶科 Pieridae……1630
170.凤蝶科 Papilionidae……1630
171.绢蝶科 Parnassiidae……1631
172.虻科 Tabanidae……1631
173.食蚜蝇科 Syrphidae ……1632
174.丽蝇科 Calliphoridae ……1632
175.蝇科 Muscidae ……1632
176.蚁科 Formicidae ……1632
177.土蜂科 Scoliidae ……1633
178.蜾蠃科 Eumenidae ……1633
179.异腹胡蜂科 Polybiidae……1633
180.马蜂科 Polistidae……1633
181.胡蜂科 Vespidae ……1634
182.木蜂科 Xylocopidae ……1635
183.蜜蜂科 Apidae ……1635
苔藓动物门 Bryozoa ……1636
裸唇纲 Gymnolaemata ……1636
184.胞孔苔虫科 Celleporidae……1636
棘皮动物门 Echinodermata ……1636
海参纲 Holothurioidea……1636
185.刺参科 Stichopodidae ……1636
186.海参科 Holothuriidae ……1636
海星纲 Asteroidea……1637
187.槭海星科 Astropectinidae ……1637
188.角海星科 Goniasteridae ……1638
189.太阳海星科 Solasteridae ……1638
190.棘海星科 Echinasteridae ……1638
191.海燕科 Asterinidae ……1638
192.海盘车科 Asteriidae……1639
蛇尾纲 Ophiuroidea ……1639
193.阳遂足科 Amphiuridae ……1639
海胆纲 Echinoidea ……1639
194.长海胆科 Echinometridae ……1639
195.毒棘海胆科 Toxopneustidae …1640
196.刻肋海胆科 Temnopleuridae …1640
197.球海胆科 Strongylocentrotidae ……1640
198.蛛网海胆科 Arachnoididae……1641
原索动物门 Protochordata ……1641
尾索动物纲 Urochordata ……1641
199.玻璃海鞘科 Cionidae ……1641
头索动物纲 Cephalochordata …1641
200.文昌鱼科 Branchiostomidae …1641
**脊椎动物 Vertebrates ……1643**
脊椎动物门 Vertebrata……1643
圆口纲 Cyclostomata……1643
201.七鳃鳗科 Petromyzonidae ……1643
软骨鱼纲 Chondrichthyes……1643
202.六鳃鲨科 Hexanchidae……1643
203.虎鲨科 Heterodontidae……1644
204.锥齿鲨科 Carchariidae……1644
205.姥鲨科 Cetorhinidae……1644
206.须鲨科 Orectolobidae ……1644
207.鲸鲨科 Rhincodontidae ……1645
208.猫鲨科 Scyliorhinidae ……1645
209.皱唇鲨科 Triakidae ……1645
210.真鲨科 Carcharhinidae……1646
211.双髻鲨科 Sphyrnidae ……1646
212.角鲨科 Squalidae ……1647

213.扁鲨科 Squatinidae ……1642
214.锯鲨科 Pristiophoridae …… 1647
215.锯鳐科 Pristidae ……1648
216.梨头鳐科 Rhinobatidae……1648
217.鳐科 Rajidae ……1648
218.虹科 Dasyatidae……1648
219.燕虹科 Gymnuridae ……1649
220.鲼科 Myliobatidae……1649
221.蝠鲼科 Mobulidae……1650
222.银鲛科 Chimaeridae……1650
硬骨鱼纲 Osteichthyes ……1650
223.鲟科 Acipenseridae ……1650
224.匙吻鲟科 Polyodontidae ……1651
225.鲱科 Clupeidae ……1651
226.鳀科 Engraulidae ……1652
227.鲑科 Salmonidae ……1653
228.香鱼科 Plecoglossidae ……1654
229.银鱼科 Salangidae ……1654
230.狗母鱼科 Synodidae ……1654
231.龙头鱼科 Harpodontidae ……1655
232.鳗鲡科 Anguillidae ……1655
233.康吉鳗科 Congridae……1656
234.海鳗科 Muraenesocidae……1656
235.海鳝科 Muraenidae ……1656
236.蠕鳗科 Echelidae ……1657
237.蛇鳗科 Ophichthyidae ……1657
238.鲤科 Cyprinidae ……1658
239.鳅科 Cobitidae ……1667
240.平鳍鳅科 Homalopteridae ……1668
241.鲇科 Siluridae ……1668
242.胡鲇科 Clariidae ……1668
243.鮡鲇科 Plotosidae……1668
244.鲿科 Bagridae ……1669
245.钝头鮠科 Amblycipitidae……1670
246.鮡科 Sisoridae ……1670
247.海鲇科 Ariidae ……1670
248.颌针鱼科 Belonidae ……1670
249.鱵科 Hemiramphidae ……1671
250.飞鱼科 Exocoetidae ……1671
251.鳕科 Gadidae ……1672
252.烟管鱼科 Fistulariidae……1672
253.玻甲鱼科 Centriscidae ……1672
254.海龙科 Syngnathidae ……1673
255.鲹科 Sphyraenidae……1674
256.鲻科 Mugilidae……1674
257.马鲛科 Polynemidae……1674
258.合鳃鱼科 Synbranchidae ……1675
259.鮨科 Serranidae……1675
260.大眼鲷科 Priacanthidae ……1676
261.乳香鱼科 Lactariidae ……1676
262.方头鱼科 Branchiostegidae……1676
263.鲹科 Carangidae ……1677
264.乌鲳科 Formionidae……1677
265.石首鱼科 Sciaenidae……1677
266.鰕科 Leiognathidae ……1679
267.鲷科 Sparidae ……1679
268.石鲈科 Pomadasyidae ……1680
269.金钱鱼科 Scatophagidae ……1680
270.隆头鱼科 Labridae…… ……1680
271.鼹科 Uranoscopidae ……1681
272.绵鳚科 Zoarcidae ……1681
273.蓝子鱼科 Siganidae ……1681
274.带鱼科 Trichiuridae……1682
275.鲭科 Scombridae ……1682
276.鲅科 Cybiidae …… ……1682
277.金枪鱼科 Thunnidae……1682
278.鲳科 Stromateidae ……1683
279.塘鳢科 Eleotridae……1683
280.鰕虎鱼科 Gobiidae ……1684
281.弹涂鱼科 Periophthalmidae …1684
282.鳗鰕虎鱼科 Taenioididae ……1685
283.斗鱼科 Belontiidae ……1685
284.乌鳢科 Ophiocephalidae ……1686
285.鲃科 Echeneidae ……1686
286.鲉科 Scorpaenidae……1687
287.毒鲉科 Synanceiidae……1687
288.鲂鲉科 Triglidae ……1688
289.六线鱼科 Hexagrammidae ……1688
290.鲬科 Platycephalidae ……1688
291.杜父鱼科 Cottidae ……1689
292.牙鲆科 Paralichthyidae ……1689
293.鲽科 Pleuronectidae ……1690
294.鳎科 Soleidae……1690
295.舌鳎科 Cynoglossidae ……1690
296.三刺鲀科 Triacanthidae ……1691

297.革鲀科 Aluteridae……1691
298.鲀科 Tetraodontidae……1691
299.刺鲀科 Diodontidae……1692
300.翻车鲀科 Molidae……1693
301.海蛾鱼科 Pegasidae……1693
302.鲛鳚科 Lophiidae……1693
303.蝙蝠鱼科 Ogcocephalidae……1693
两栖纲 Amphibia……1694
304.小鲵科 Hynobiidae……1694
305.隐鳃鲵科 Cryptobranchidae……1694
306.蝾螈科 Salamandridae……1695
307.盘舌蟾科 Discoglossidae……1695
308.蟾蜍科 Bufonidae……1696
309.雨蛙科 Hylidae……1696
310.蛙科 Ranidae……1697
311.树蛙科 Rhacophoridae……1698
312.姬蛙科 Microhylidae……1698
爬行纲 Reptilia……1699
313.平胸龟科 Platysternidae……1699
314.龟科 Emydidae……1699
315.陆龟科 Testudinidae……1700
316.海龟科 Cheloniidae……1701
317.棱皮龟科 Dermochelyidae……1702
318.鳖科 Trionychidae……1702
319.鬣蜥科 Agamidae……1703
320.壁虎科 Gekkonidae……1704
321.石龙子科 Scincidae……1705
322.蜥蜴科 Lacertidae……1705
323.蛇蜥科 Anguidae……1706
324.蟒科 Boidae……1706
325.游蛇科 Colubridae……1706
326.眼镜蛇科 Elapidae……1709
327.海蛇科 Hydrophiidae……1710
328.蝰科 Viperidae……1711
329.鼍(钝吻鳄)科 Crocodidae……1712
鸟纲 Aves……1712
330.鸊鹈科 Podicipedidae……1712
331.鹈鹕科 Pelecanidae……1713
332.鸬鹚科 Phalacrocoracidae……1713
333.鹭科 Ardeidae……1713
334.鹳科 Ciconiidae……1715
335.鸭科 Anatidae……1716
336.鹰科 Accipitridae……1719
337.松鸡科 Tetraonidae……1721
338.雉科 Phasianidae……1722
339.三趾鹑科 Turnicidae……1726
340.鹤科 Gruidae……1726
341.秧鸡科 Rallidae……1727
342.鸨科 Otidae……1728
343.鹬科 Scolopacidae……1728
344.鸥科 Laridae……1729
345.沙鸡科 Pteroclididae……1729
346.鸠鸽科 Columbidae……1729
347.鹦鹉科 Psittacidae……1730
348.杜鹃科 Cuculidae……1731
349.鸱鸮科 Strigidae……1731
350.夜鹰科 Caprimulgidae……1732
351.雨燕科 Apodidae……1733
352.翠鸟科 Alcedinidae……1733
353.戴胜科 Upupidae……1724
354.啄木鸟科 Picidae……1734
355.百灵科 Alaudidae……1735
356.燕科 Hirundinidae……1735
357.鹡鸰科 Motacillidae……1736
358.黄鹂科 Oriolidae……1736
359.椋鸟科 Sturnidae……1737
360.鸦科 Corvidae……1737
361.河乌科 Cinclidae……1739
362.鹪鹩科 Troglodytidae……1740
363.鹟科 Muscicapidae……1740
364.山雀科 Paridae……1742
365.鸸科 Sittidae……1743
366.攀雀科 Remizidae……1743
367.绣眼鸟科 Zosteropidae……1743
368.文鸟科 Ploceidae……1744
369.雀科 Fringillidae……1744
哺乳纲 Mammalia……1745
370.猬科 Erinaceidae……1745
371.鼹鼠科 Talpidae……1746
372.蝙蝠科 Vespertilionidae……1746
373.狐蝠科 Pteropidae……1747
374.鞘尾蝠科 Emballonuridae……1748
375.菊头蝠科 Rhinolophidae……1748
376.蹄蝠科 Hipposideridae……1748
377.懒猴科 Lorisidae……1749
378.猴科 Cercopithesidae……1749

379.叶猴科 Colobidae ……1749
380.长臂猿科 Hylobatidae ……1750
381.穿山甲科 Manidae ……1750
382.鼠兔科 Ochotonidae……1751
383.兔科 Leporidae ……1751
384.松鼠科 Sciuridae ……1752
385.鼯鼠科 Petauristidae ……1754
386.河狸科 Castoridae ……1755
387.豪猪科 Hystricidae ……1755
388.竹鼠科 Rhizomyidae ……1755
389.仓鼠科 Cricetidae ……1756
390.鼠科 Muridae……1756
391.露脊鲸科 Balaenidae……1757
392.灰鲸科 Eschrichtiidae ……1757
393.须鲸科 Balaenopteridae ……1757
394.抹香鲸科 Physeteridae……1758
395.淡水豚科 Platanistidae ……1758
396.海豚科 Delphinidae ……1758
397.鼠海豚科 Phocoenidae ……1759
398.领航鲸科 Globicephalidae ……1759
399.犬科 Canidae……1759
400.熊科 Ursidae……1761
401.鼬科 Mustelidae ……1762
402.灵猫科 Viverridae ……1764
403.猫科 Felidae……1765
404.海狮科 Otariidae ……1767
405.海豹科 Phocidae ……1767
406.儒艮科 Dugongidae ……1767
407.象科 Elephantidae……1768
408.马科 Equidae ……1768
409.犀科 Rhinocerotidae……1769
410.猪科 Suidae ……1769
411.骆驼科 Camélidae……1770
412.鹿科 Cervidae ……1771
413.麝科 Moschidae……1773
414.牛科 Bovidae ……1773

## 药　用　矿　物

**1. 铁化合物类**……1781
黄铁矿 Pyritum……1781
磁铁矿 Magnetitum ……1781
褐铁矿 Limonitum ……1781
赤铁矿 Hematitum ……1781
铁 Ferrum ……1781
水绿矾 Melanteritum ……1782
纤铁矾 Fibroferritum ……1782
**2. 铜化合物类**……1782
蓝铜矿 Azuritum ……1782
氯铜矿 Atacamitum ……1782
斑铜矿 Bornitum ……1782
铜 Cuprum……1783
孔雀石 Malachitum ……1783
胆矾 Chalcanthitum ……1783
**3. 镁化合物类**……1783
透闪石 Tremolitum ……1783
阳起石 Actinolitum ……1783
滑石 Talum ……1783
滑石片岩 Talc schist ……1784
角闪石石棉 Asbestos hornblendum ……1784
软玉 Nephritum ……1784
**4. 钙化合物类**……1784
石膏 Gypsum……1784
硬石膏 Anhydritum ……1784
透石膏 Selenitum ……1784
纤维石膏 Gypsum fibrosum ……1785
钙芒硝 Glauberitum ……1785
方解石 Calcitum ……1785
白垩 Creta ……1785
石灰岩 Limestonum ……1785
钟乳石 Stalactitum ……1785
浮石 Pumex ……1786
萤石 Fluoritum……1786
黄土钙质结核 Calcareous loess nodule……1786
蛇纹石大理岩 Ophicalcitum ……1786
**5. 钾化合物类**……1786
硝石 Nitrum……1786

明矾石 Alunitum ……1786
**6. 钠化合物类**……1787
硼砂 Borax……1787
石盐 Halitum ……1787
食盐 Sal communis ……1787
盐水 Salinus ……1787
盐卤 Bittenn ……1787
芒硝 Mirabilitum ……1788
**7. 汞化合物类**……1788
汞 Hydrargyrum ……1788
辰砂 Cinnabaris……1788
**8. 砷化合物类**……1788
雄黄 Realgar ……1788
雌黄 Auripigmentum ……1789
砷华 Arsenolitum ……1789
毒砂 Arsenopyritum ……1789
**9. 硅化合物类**……1789
石英 Quartz ……1789
白云母 Muscovitum ……1789
蛭石 Vermiculitum ……1790
水云母 Hydromica ……1790
高岭石 Kaolinitum ……1790
多水高岭石 Halloysitum ……1790
玉髓 Chalcedony ……1790
水黑云母片岩 Hydrobiotite schist ……1790
蛭石片岩 Vermiculite schist ……1790
黑云母片岩 Biotite schist ……1790
绿泥石化云母碳酸盐片岩 Chloritified mica carbonacite ……1791
蒙脱石 Montmorillonitum ……1791
井底泥 Shaft bottom clay ……1791
地浆 Earth mud ……1791
漂白土 Fullers earth……1791
灶心土 Terra flava usta ……1791
**10. 有色金属化合物类** ……1791
自然金 Aurum Natura……1791
自然银 Argentum Natura ……1791
菱锌矿 Smithsonitum ……1792
水锌矿 Hydrozincitum……1792
锡石 Cassiteritum ……1792
软锰矿 Pyrolusitum ……1792
方铅矿 Galenitum……1792
**11. 古动物化石类** ……1792
古脊椎动物化石 Fossil paleovertebrales ……1792
古腕足类动物化石 Fossil paleobrachiopod ……1793
古节肢动物化石 Fossil paleoarthropod ……1793
古石鳖科动物化石 Fossil paleotrionychidae ……1793
**12. 其他矿物类** ……1793
自然硫 Sulphur……1793
硇砂 Sal-Ammoniac……1793
松科植物树脂化石 Fossil pinaceae resim ……1794
石油 Petraleum……1794
麦饭石 Maifanitum ……1794
矿泉水 Aquae minerale ……1794

中名索引……1795
拉丁学名索引……1880

# 药 用 植 物

# 藻类植物 Algae

## 1. 颤藻科 Oscillatoriaceae

### 鞘丝藻属 Lyngbya Ag.

**巨大鞘丝藻**

**Lyngbya majuscula** Harv.

生于沿海岩石上。分布于海南等沿海岛屿。

藻体(鞘丝藻): 抗菌,抗真菌,抗病毒。

### 束毛藻属 Trichodesmium Ehrh.

**红海束毛藻**

**Trichodesmium erythraeum** Ehrh.

生于沿海岩石上。分布于海南沿海岛屿。

藻体(束毛藻): 抗菌。

## 2. 念珠藻科 Nostocaceae

### 念珠藻属 Nostoc Vauch.

**地木耳** 念珠藻(通称),地皮菜(江苏)

**Nostoc commune** Vauch.

生于潮湿草地或林缘阴湿土表。全国各地均有分布。

藻体(葛仙米): 甘、淡,寒。清热明目,益气,收敛。用于目赤红肿,夜盲,久痢脱肛,烧、烫伤。

**发菜** 发状念珠藻

**Nostoc flagelliforme** Born. et Flah.

生于干旱草原地带。分布于宁夏。

发状藻体(发菜): 祛痰止咳,理气,利尿。用于高血压症,妇女血虚。

附 注: 为名贵的食用藻类。

**沼泽念珠藻**

**Nostoc paludosum** Külz.

生于雨后林内湿地和水底。分布于安徽。

藻体：清热明目，益气，收敛。

## 3. 鞭枝藻科　Mastigocladaceae

### 海雹菜属　Brachytrichia Zanard.

**海雹菜**

**Brachytrichia quoyi** (C. Ag.) Born. et Flah.——*Nostoc quoyi* C. Ag.

生于沿海沙地石块上。分布于全国沿海地区。

藻体(海雹菜)：咸，寒。利水，解毒。用于水肿。

## 4. 胶须藻科　Rivulariaceae

### 眉藻属　Calothrix C. Ag.

**苔垢菜**

**Calothrix crustacea** Thuret

生于浅海岩石上。分布于浙江、福建、台湾、海南。

藻体(苔垢菜)：利尿，解毒。

## 5. 衣藻科　Chlamydomonadaceae

### 衣藻属　Chlamydomonas Ehrh.

**球衣藻**

**Chlamydomonas globosa** Snow.

生于有机质丰富的小水体中和潮湿土表上。分布于安徽淮北及大别山地区。

藻体：清热，益气，收敛。

## 6. 小球藻科　Chlorellaceae

### 小球藻属　Chlorella Beij.

**蛋白核小球藻**

**Chlorella pyrenoidosa** Chick.

生于淡水沟、洼、池塘浅水中。分布于长江流域以南各地。

藻体(小球藻)：清热解毒。

**小球藻**

**Chlorella vulgaris** Beij.

生于沟、洼、池塘等静水中。分布于全国各地。
藻体(小球藻)：用于肾虚，肝炎，水肿，贫血，泄泻。

## 7. 栅藻科 Scenedesmaceae

### 栅藻属 Scenedesmus Mey.

**斜生栅藻**
**Scenedesmus obliqnus** (Turp.) Kütz.
生于湖泊、池塘、沟渠等各种水体中。分布于全国各地。
藻体(栅藻)：清热解毒。

## 8. 丝藻科 Ulotrichaceae

### 丝藻属 Ulothrix Kütz.

**软丝藻**
**Ulothrix flacca** (Dillwyn) Thuret——*Conferva flacca* Dillwyn
生于中潮带石块、贝壳上。分布于辽宁、山东沿海岛屿。
藻体(软丝藻)：咸，寒。软坚散结，清热利尿。用于水肿，咳嗽痰结。

## 9. 礁膜科 Monostromaceae

### 礁膜属 Monostroma Thuret

**礁膜**
**Monostroma nitidum** Wittr.
生于低潮线岩石上。分布于山东、浙江、福建、台湾、广东、海南、广西。
藻体(石菜)：咸，寒。清热化痰，软坚散结，利水，解毒。用于咽喉痛，咳嗽痰结，水肿。

附　注：功用相同的有**袋礁膜 M. angicava** Kjellm. 及**小礁膜 M. zestericola** Tilden。

## 10. 石莼科 Ulvaceae

### 浒苔属 Enteromorpha (Kink) Ag.

**条浒苔**
**Enteromorpha clathrata** (Roth) Grev.

生于中潮带和内湾泥底中。分布于上海、浙江、福建、台湾、广东沿海海域。

藻体(苔菜)：咸，微寒。清热解毒，软坚散结。用于甲沟炎，颈淋巴结肿大，衄血。

**浒苔**

**Enteromorpha prolifera** (Müell) J. Ag.

生于中潮带的石沼中。分布于南北各沿海地区，常见于山东、江苏、浙江、福建沿海。

藻体(苔菜)：咸，寒。清热解毒，软坚散结。

附　注：常混淆应用，功效基本相同的有**扁浒苔 E. compressa** (L.) Grev.，全国沿海习见；**曲浒苔 E. flexuosa** (Wulf.) J. Ag.，分布于广东沿海；**肠浒苔 E. intestinalis** (L.) Grev.，分布于全国南北沿海；**缘管浒苔 E. linza** (L.) J. Ag.，全国沿海习见；**管浒苔 E. tubulosa** Kütz.，全国沿海习见。

## 石莼属　Ulva L.

**蛎菜**　猪母菜(福建)

**Ulva conglobata** Kjellm.

生于中潮带和高潮带的小石沼边缘或具有细沙的岩石上。长江口以南至南海诸岛屿沿岸较多。

藻体(蛎皮菜)：咸，寒。清热解毒，利水，降压。用于甲状腺肿，中暑，高血压症，水肿。

**裂片石莼**

**Ulva fasiata** Diels

生于风浪较小的大于潮线附近的岩石上或低潮带石沼中。分布于广东沿海。

藻体(大腹消)：甘、咸，寒。功效见石莼。民间泡茶饮，作清凉剂。

**石莼**

**Ulva lactuca** L.

生于海湾内的岩石上或石沼中。辽宁、河北、山东、江苏沿海较少，长江口以南包括台湾沿岸较多。

藻体(白昆布)：甘，平。清热祛痰，软坚散结，利水，解毒。用于咽喉痛，水肿，疮疖。

**孔石莼**　海白菜(山东)，海条(浙江)，纸菜(广东)

**Ulva pertusa** Kjellm.

生于中、低潮带及大于潮线附近的岩石上或石沼中。分布于辽宁、河北、山东、江苏。

藻体(海菠菜)：甘，平。软坚散结，利水，降血压。用于瘿瘤，高血压症，水肿。

# 11. 刚毛藻科　Cladophoraceae

## 刚毛藻属　Cladophora Kütz.

**绉刚毛藻**

**Cladophora crispata** (Roxb.) Kütz.

生于浅水湖泊、池塘中，为高 pH 值的指示植物。分布于华东。

藻体：用于心腹疼痛。

**团集刚毛藻**

**Cladophora glomerata** (L.) Kütz.

生于溪流、水沟、湖泊、水塘的石头上，或成团沉于水底。分布于华东、中南、西南。

藻体(刚毛藻)：消炎，解毒。

## 12. 松藻科 Codiaceae

### 松藻属 Codium Stackh.

**刺松藻** 鼠尾巴(辽宁)，软软菜(福建)

**Codium fragile** (Sur.) Horiot——*Acanthocodium fragile* Sur.

生于中、低潮带岩石上或石沼中。分布于全国沿海及台湾，长江口以南较少。

藻体(水松)：甘、咸，寒。清热解毒，利尿，驱虫。用于水肿、小便不利。广东民间常以煮水作清凉饮料。

附 注：功效相同的有**长松藻 C. cylindricum** Holm.，分布于福建、广东等沿海。

## 13. 蕨藻科 Caulerpaceae

### 蕨藻属 Caulerpa Lamx.

**总状蕨藻**

**Caulerpa racemosa** (Forssk.) Web. v. Bos.

生于中、低潮带的岩石上及石沼中。分布于台湾、广东、海南、广西海域。

藻体：麻醉。

附 注：本属**盾状蕨藻 C. racemosa** var. **peltata** Lam. 提取物，对小鼠艾氏腹水瘤有抑制作用。

## 14. 双星藻科(水绵科) Zygnemataceae

### 水绵属 Spirogyra Link

**光洁水绵**

**Spirogyra nitida** (Dillw.) Link

生于池塘、湖泊、溪沟静水处或水稻田中。全国各地均有分布。

藻丝体(水绵)：用于丹毒，漆疮，烧、烫伤。

附 注：功效相同的有**普通水绵 S. communis** (Hass.) Kütz,；**扭曲水绵 S. intirta** Jao；**长形水绵 S. longata** (Vauch.) Kütz.及**异形水绵 S. varians** Kütz. 等。

## 15. 轮藻科 Characeae

### 轮藻属 Chara Vaill. ex L.

**脆轮藻** 鱼草(山西)

**Chara fragilis** Desv.

生于含有钙质和硅质的淡水中,在有粘泥和流动缓慢的塘,沟中生长繁茂。全国大部分地区有分布。

藻体: 祛痰,平喘,止咳。用于咳嗽痰喘,胸闷。

### 丽藻属 Nitella Ag.

**膨胀丽藻** 水茴香(贵州)

**Nitella expansa** T. F. Allen

生于水边或池沼中。分布于陕西、贵州。

藻体: 辛,平。清热,止咳,疏风,利湿。用于暑热感冒,咳嗽,烧、烫伤。

## 16. 狭果藻科(海蕴科) Spermatochnaceae

### 海蕴属 Nemacystus Derb. et Sol.

**海蕴** 滑溜菜(通称)

**Nemacystus decipiens** (Sur.) Kuck. ——*Mesogloea decipiens* Sur.

生于大干潮线,缠绕在其他藻体上。分布于辽宁、山东、台湾、广东、海南、广西海域。

藻体(海蕴): 咸,寒。软坚散结,祛痰。用于瘿瘤结气,咽喉痛,咳嗽痰喘。

## 17. 铁钉菜科 Ishigeaceae

### 铁钉菜属 Ishige Yendo

**叶状铁钉菜** 铁钉菜(福建),剪刀菜(广东)

**Ishige foliacea** Okam

生于波浪较小的低潮带的岩石上或石沼中。分布于浙江、福建、台湾、广东、海南、广西海域。

藻体(铁钉菜): 咸,寒。清热解毒,祛痰,软坚散结,驱虫。用于瘿瘤, 瘰疬,咽喉痛。

**铁钉菜**

**Ishige okamurae** Yendo

生于中、高潮带波浪冲击的岩礁上。分布于浙江、福建、台湾、广东、海南、广西海域。

藻体(铁钉菜)：咸，寒。软坚散结，消热，化痰。用于瘰疬，瘿瘤，咽喉痛。

## 18. 萱藻科 Scytosiphonaceae

### 鹅肠菜属 Endarachne J. Ag.

**鹅肠菜** 脚皮菜(福建)，野海带(广东)

**Endarachne binghamiae** J. Ag.

生于风浪不太大处中、低潮带的岩石上。盛产浙江嵊泗列岛至广东硇洲岛间的沿岸及台湾。为东海和南海的习见藻类。

藻体(鹅肠菜)：咸，寒。软坚散结，清热，祛痰。用于瘰疬，干咳肺痨。

### 萱藻属 Scytosiphon C. Ag.

**萱藻** 黄海菜(江苏)，海麻线(辽宁)，捞子筋(山东)

**Scytosiphon lomentarius** (Lyngb.) J. Ag.——*Chorda lomentaria* Lyngb.

生于中潮带的岩石上和石沼中，高潮带的岩礁与低潮带的石沼中也有生长。全国南北广大沿海海域均有分布。

藻体(海麻线)：咸，寒。清热解毒，软坚散结，祛痰。用于瘿瘤，瘰疬，干咳肺痨，咽喉痛。

## 19. 绳藻科 Chordaceae

### 绳藻属 Chorda Stackh.

**绳藻** 海嘎子(辽宁)，麻绳(山东)

**Chorda filum** (L.) Lamx.——*Fucus filium* L.

生于中潮带的岩石上。分布辽宁、河北、山东、江苏海域。

藻体(绳藻)：软坚散结，利尿，降压，祛痰。

## 20. 海带科 Laminariaceae

### 海带属 Laminaria Lamx.

**海带** 江白菜、海菜(通称)

**Laminaria japonica** Aresch.

生于低潮线下2—3米深的岩石上。自然分布于辽宁、河北、山东沿海。现人工养殖已扩展到广东沿海。产量居世界首位。

叶状体(昆布): 咸,寒。软坚散结,消痰,利水。用于瘿瘤,瘰疬,子痈,痰饮水肿。
附　注:《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 21. 巨藻科　Lessoniaceae

### 巨藻属　Macrocystis C. Ag.

**巨藻**
**Macrocystis pyrifera** (L.) Ag.
山东青岛已引进养殖。
藻体(巨藻): 用于提取褐藻胶原料,供医药等工业用。

## 22. 翅藻科　Alariaceae

### 昆布属　Ecklonia Hornem.

**昆布**　　面其菜(浙江),木履草(福建)
**Ecklonia kurome** Okam.
生于潮线附近的岩礁上。分布于辽宁、浙江、福建、台湾海域。
藻体(昆布): 咸,寒。镇咳平喘,软坚散结,祛痰。用于瘿瘤,瘰疬,咳嗽痰喘,肺痨,老年性白内障。

### 裙带菜属　Undaria Sur.

**裙带菜**　　海芥菜(浙江)
**Undaria pinnatifida** (Harv.) Sur——*Alaria pinnatifida* Harv.
生于海湾低潮线以下深 1—4 米处的岩礁上。分布于辽宁、河北、山东、江苏、浙江、福建沿海。
藻体(裙带菜): 化痰,软坚散结,利尿通淋。用于瘿瘤,瘰疬,肝脾肿大,水肿。

## 23. 墨角藻科(鹿角菜科)　Fucaceae

### 鹿角菜属　Pelvetia Decne.

**鹿角菜**　　鹿角棒(辽宁),鹿角尖(山东)
**Pelvetia siliquosa** Tseng et C. F. Chang
生于低潮线的岩石上。分布于辽宁、山东沿海。
藻体(鹿角菜): 咸,寒。软坚散结,清热,祛痰。用于瘰疬,瘿瘤,咳嗽痰喘,肺痨。

## 24. 马尾藻科 Sargassaceae

### 马尾藻属 Sargassum (Turn.) C. Ag.

**羊栖菜** 鹿角尖(辽宁、山东),海大麦(浙江)

**Sargassum fusiforme** (Harv.) Setch.

生于低潮带和大干潮线下的岩礁上,常为波浪冲击处。全国南北沿海岛屿均有分布。

藻体(海藻): 苦、咸, 寒。软坚散结,消痰,利水。用于瘿瘤, 瘰疬, 子痈, 痰饮水肿。

附 注:《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**铜藻** 海柳麦(浙江),草茜(福建),油菜(广东)

**Sargassum horneri** (Turn.) C. Ag.——*Fucus horneri* Turn.

生于低潮带深沼中或大干潮线下深至 4 米处的岩石上。分布于辽宁、山东、浙江、福建、广东沿海海域。

藻体(海藻): 咸,寒。软坚散结,消痰,利尿。用于瘰疬,瘿瘤,心绞痛。

附 注: 为提制褐藻胶的原料。

**海蒿子** 大蒿子(辽宁),海根菜(山东),海草(江苏)

**Sargassum pallidum** (Turn.) C. Ag.——*Fucus pallidum* Turn.

生于低潮线下海水冲击处的岩石上。分布于辽宁、山东、江苏沿海。

藻体(海藻): 苦、咸,寒。软坚散结,消痰,利水。用于瘿瘤,瘰疬,痰饮水肿、子痈。

附 注: ①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②功效相似的有**无肋马尾藻 S. enerve** C. Ag., 产南北沿海;**半叶马尾藻 S. hemiphyllum** (Turn.) C. Ag., 分布于东海至南海沿海;**亨氏马尾藻 S. henslowianum** C. Ag., 分布于福建至广东沿海;**海黍子 S. kjellmanianum** Yendo, 分布于辽宁至山东沿海; **匍枝马尾藻 S. polycystum** C. Ag., 分布于广东、海南、广西沿海岛屿; **裂叶马尾藻 S. siliquastrum** (Turn.) C. Ag., 分布于辽宁至广东沿海岛屿;**鼠尾藻 S. thunbergii** (Mert.) O. Kuntze, 北起辽东半岛,南至雷州半岛均有分布,为沿海习见种; **三角藻 S. tortile** C. Ag., 产辽宁、河北等省沿海;**瓦氏马尾藻 S. vachellianum** Grev., 分布于福建至广东沿海。以上种类均为提制褐藻胶的原料。

## 25. 钙板金藻科(球石藻科) Coccolithaceae

### 钙板金藻属 Coccolithus Schwarz

**赫氏球石藻**

**Coccolithus huxleyi** (Lohm.) Kamptner

广布于辽东半岛至山东半岛海域。

藻体(板金藻): 抗菌。

## 26. 脆杆藻科　Fragilariaceae

### 楔形藻属　Licmophora Ag.

**短纹楔形藻**

**Licmophora abbreviata** Ag.

附　注：功效基本相同的有**日本星杆藻 Asterionella japonica Cl.**

以上二种，全国各海域广泛分布。

藻体：抗菌。

## 27. 菱形藻科　Nitzschiaceae

### 菱形藻属　Nizschia Hass.

**长菱形藻**

**Nitzschia longissima** (Bréb.) Ralfs

分布于南海海域诸岛屿。

藻体：抗菌。

## 28. 膝沟藻科　Gonyaulaceae

### 膝沟藻属　Gonyaulax Diesing

**膝沟藻**

**Gonyaulax catenella** Whedon et Kofoid

分布于南海海域诸岛屿。

藻体：含甲藻毒素，对中枢和外周神经系统有强烈的抑制作用，其活性要比局麻药普鲁卡因、可卡因高 10 万倍以上。

## 29. 红毛菜科　Bangiaceae

### 紫菜属　Porphyra C. Ag.

**绉紫菜**

**Porphyra crispata** Kjellm.

生于高潮带的岩礁上。分布于福建至广东海域。

叶状体(紫菜)：甘、咸，寒。清热利尿，软坚散结，消痰。用于瘰瘤结气，淋证，水肿。

**长紫菜**　　柳条菜(福建)

**Porphyra dentata** Kjellm.

生于高潮带向北、东和东北，秋、冬季节海浪比较大的岩礁上。浙江嵊泗列岛以南到珠江口附近岛屿均有分布。

叶状体(紫菜)：甘、咸，寒。清热，化痰，利尿。用于瘿瘤，咽喉痛，水肿。

**坛紫菜**

**Porphyra haitanensis** T. J. Chang et B. F. Zheng

生于朝北、东或东北方向风浪大的高潮带岩石上。分布于浙江、福建、台湾，广东沿海。是南方养殖的主要种类。

叶状体(紫菜)：甘、咸，寒。清热，化痰，补肾，利水。用于咳嗽痰喘，瘿瘤，高血压症。

**圆紫菜**　　春菜(福建)

**Porphyra suborbiculata** Kjellm.

生于中潮带上部的岩礁上。分布于江苏、浙江和我国南海海域沿岸，北方产量少，南方较多。

叶状体(紫菜)：甘、咸，寒。软坚散结，化痰，补肾，利水。用于咳嗽痰喘、咽喉痛，瘿瘤、高血压病。

附　注：功效相似的有**边紫菜 P. marginata** Tseng et T. J. Chang，分布于辽东半岛和山东半岛；**甘紫菜 P. tenera** T. J. Chang，分布于辽宁、江苏沿海岛屿；**条斑紫菜 P. yezoensis** Ueda，分布于辽宁、山东、江苏、浙江、福建沿海岛屿，为北方养殖的主要藻类。

## 30. 柏桉藻科　Bonnemaisoniaceae

### 海门冬属　Asparagopsis Mont.

**海门冬**

**Asparagopsis taxiformis** (Delile) Collins et Herv.

生于中、高潮带的岩礁上。分布于台湾、广东、海南、广西沿海岛屿。

藻体(海菜)：辛，咸。抗菌，消炎。用于瘿瘤。

## 31. 石花菜科　Gelidiaceae

### 石花菜属　Gelidium Lamx.

**石花菜**　　鸡毛菜(辽宁、山东)，凤尾(江苏)，红丝(福建)

**Gelidium amansii** Lamour.

生于大干潮线附近约 5—15 米深的海底岩礁上。分布于山东、福建、台湾、广东沿海。以山东半岛海域产量较大。

藻体(石花菜)：驱蛔虫，缓泻，清热解毒。用于泄泻，肾盂肾炎。

附　注：主要为制备琼脂的原料之一，作为细菌培养基，制剂上用作混悬剂。

**小石花菜**　石花菜(福建)

**Gelidium diviricatum** Martens

生于中潮带的岩石和其他贝壳上，常形成很大的群落。为全国沿海习见的种类。

藻体(小石花菜)：清热，泻火，利水，解毒。用于慢性便秘。

附　注：功效基本相同并为制备琼脂原料的有**细毛石花菜 G. crinale** (Turn.) Lamx.，分布于南北沿海；**中肋石花菜 G. japonicum** (Harv.) Okam.，分布于福建、台湾沿海；大**石花菜 G. pacificum** Okam.，分布于浙江、福建海域；**伏美石花菜 G. pulchellum** Kütz. 等。

### 鸡毛菜属　Pterocladia J. Ag.

**鸡毛菜**　冻菜渣渣(山东)

**Pterocladia tenuis** Okam.

生于大干潮线附近的岩礁上和中、低潮带的石沼中或石块上。分布于全国各沿海岛屿。

藻体(鸡毛菜)：清热，泻火，软坚散结，化痰。用于干咳痰结，咽喉痛。

## 32. 凝花菜科 Gelidiellaceae

### 凝花菜属　Gelidiella Feldm.

**凝花菜**

**Gelidiella acerosa** (Forssk.) Feldm. et Hamel

生于中、低潮带下的岩礁上。分布于海南海域。

藻体(拟花菜)：甘、咸，寒。清热解毒。

附　注：为制备琼胶的原料之一。

## 33. 内枝藻科(海萝科)　Endocladiaceae

### 海萝属　Gloiopeltis J. Ag.

**海萝**　毛毛菜(山东)，胶菜(福建)，红菜(广东)

**Gloiopeltis furcata** (Post. et Rupr.) J. Ag.

生于中、高潮带下的岩礁上，常丛生成群落。北起辽东半岛，南至雷州半岛以及台湾的基隆均有分布

藻体(海萝)：咸，寒。清热，化痰，软坚散结，祛湿。用于劳热，痰结，痞块，痔疮，关节酸痛，风湿痛。

附　注：功效相似的有**鹿角海萝 G. tenax** (Turn.) J. Ag.，分布于浙江、福建、广东等沿海。均为制备琼胶的原料。

## 34. 隐丝藻科 Cryptonemiaceae

### 蜈蚣藻属 Grateloupia C. Ag.

**蜈蚣藻** 海赤菜(福建),冬家烂(广东)

**Grateloupia filicina** (Wulf.) C. Ag.——*Fucus filicinus* Wulf.

生于潮间带的石沼中或泥砂滩碎砂石上。全国各海域及沿海均有分布。

藻体(蜈蚣藻): 淡,凉。清热解毒,驱虫。用于泄泻,咽喉痛,蛔虫病。

**舌状蜈蚣藻** 佛祖菜(广东)

**Grateloupia livida** (Harv.) Yamada——*Nemastoma livida* Harv.

生于大干潮线附近的岩礁上或低潮带石沼中。分布于辽宁、浙江、广东沿海地区。广东沿海为主产区。

藻体(面菜): 咸,寒。清热解毒,驱虫。用于咽喉痛,泄泻,蛔虫病。

### 海柏属 Polyopes J. Ag.

**海柏**

**Polyopes polyideoides** Okam.

生于中、高潮带下的岩礁上。分布于东南沿海。

藻体(海柏): 甘、咸,寒。清热,泻火。用于泄泻,胃痛,高血压症。

附 注: 为制备琼脂的辅助原料。

## 35. 珊瑚藻科 Corallinaceae

### 珊瑚藻属 Corallina L.

**珊瑚藻**

**Corallina officinalis** L.

生于中、高潮带下的岩礁石上。分布于山东、浙江沿海。

藻体(珊瑚藻): 驱蛔虫。

## 36. 杉藻科 Gigartinaceae

### 角叉菜属 Chondrus Stackh.

**角叉菜** 鹿角菜(台湾)

**Chondrus ocellatus** Holm.

生于大干潮线下的岩礁上。分布于山东、浙江、福建、台湾、广东、海南沿海。

藻体(角叉菜)：甘、咸、寒。清热解毒，和胃，通便。
附　注：为制备角叉菜胶的原料，并可作轻缓泻剂。

### 杉藻属　Gigartina Stackh.

**小杉藻**　　茶米菜(台湾)
**Gigartina intermedia** Sur.
生于中、低潮带的岩石上或石沼中。分布于浙江、福建、台湾、海南沿海。
藻体(小杉藻)：清热，和胃，通便。用于胃痛。
附　注：为制备角叉菜胶的原料。

## 37. 育叶藻科　Phyllophoraceae

### 叉枝藻属　Gymnogongrus Martius

**扇形叉枝藻**　　扁枝子(山东)
**Gymnogongrus flabelliformis** Harv.
生于大干潮线间海底岩石上。全国沿海海域习见。
藻体(叉枝藻)：作为轻泻剂。为制备琼脂的辅助原料。

## 38. 红翎菜科　Solieriaceae

### 麒麟菜属　Eucheuma J. Ag.

**琼枝**　　海菜、石衣菜(广东)
**Eucheuma gelatinae** (Fsper) J. Ag.——*Fucus gelatinus* Esper
生于大干潮线附近及其以下1—2米深处的碎珊瑚上，少数生于低潮带阴暗的石缝中。分布于台湾、海南沿海岛屿。
藻体(琼枝)：甘、咸，寒。清热，润肺，除湿，化痰。用于痰结，瘿瘤，咳嗽痰喘，泄泻，痔疮。

**麒麟菜**　　鸡脚菜(台湾)
**Eucheuma muricatum** (Gmel.) Web. v. Bos.——*Fucus muricatus* Gmel.
生于大干潮线下1—2米深处的碎珊瑚上。分布于台湾、海南等沿海岛屿。
藻体(鸡脚菜)：清热，化痰，软坚散结。用于痰结，痞积，瘿瘤，瘰疬，痔疮。
附　注：①功效相同的有**珍珠麒麟菜 E. okamurai** Yamada，分布于台湾、海南等沿海岛屿。②**食用麒麟菜 E. edule** Kütz.，为制备麒麟菜胶的原料。

### 鸡冠菜属　Meristotheca J. Ag.

**鸡冠菜**

**Meristotheca papulosa** (Mont.) J. Ag.

生于大干潮线下的岩礁上。分布于台湾、海南海域。

藻体(鸡冠菜)：咸，平。软坚散结，化痰。

## 39. 江蓠科 Gracilariaceae

### 江蓠属 Gracilaria Grev.

**江蓠** 龙须菜(辽宁)，竹筒菜(福建)，海菜、线菜(广东)

**Gracilaria verrucosa** (Huds.) Papenf.——*Fucus verrucosa* Huds.

生于肥沃、平静的内海湾中，从高潮带至潮下带均有生长。分布于全国各沿海海域。

藻体(龙须菜)：甘，寒。软坚散结，化痰，清热利尿。用于瘿瘤热结，内热，小便淋痛。并为制备琼脂的原料。

附 注：功效相同的有**节江蓠 G. articulata** C. F. Chang et B. M. Xia；**芋根江蓠 G. blodgettii** Harv.，分布于福建、广东沿海；**脆江蓠 G. bursa-pastoris** (Gmel.) Silva，分布于福建、广东等沿海；**凤尾菜 G. eucheumoides** Harv.，产海南及西沙群岛；**粗江蓠 G. gigas** Harv.，产广东沿海；**缢江蓠 G. salicornia** (C. Ag.) Dawson，产海南沿海；**扁江蓠 G. textorii** (Sur.) De-Toni，分布于辽宁、河北、山东、江苏沿海海域。

## 40. 仙菜科 Ceramiaceae

### 凝菜属 Campylaephora J. Ag.

**钩凝菜** 钩仙菜(山东)

**Campylaephora hypnacoides** J. Ag.

生于沿海岛屿岩石上。分布于辽宁、河北、山东沿海海域。

藻体：软坚散结，化痰，利尿。

附 注：为制备琼脂的辅助原料。

### 仙菜属 Ceramium Roth

**二叉仙菜** 糕菜(辽宁)，红蒿子(山东)

**Ceramium kondoi** Yendo

生于沿海岩石上。分布于辽宁、山东沿海海域。

藻体(糕菜)：化痰，软坚散结，利尿。为制备琼脂的辅助原料。

附 注：功效相同的有**波登仙菜 C. boydenii** Gepp。另外本科的**篮子藻 Spyridia filamentosa** (Wulf.) Harv.，分布于全国北方沿海海域，具A型血的凝集素。

## 41. 红叶藻科 Delesseriaceae

### 鹧鸪菜属 Caloglossa J. Ag.

**鹧鸪菜** 岩头菜(浙江),鲁地菜(福建),乌菜(广东)

**Caloglossa leprieurii** (Mont.) J. Ag.

生于暖温地区河口附近的中、高潮带的岩礁石上、防坡堤以及红树皮的阴面。分布于长江口以南的沿海海域。

藻体(鹧鸪菜): 咸,平。有小毒。驱蛔虫,消食。用于蛔虫病、蛔虫性肠梗阻、消化不良、咳嗽痰喘。

## 42. 松节藻科 Rhodomelaceae

### 软骨藻属 Chondria Ag.

**树枝软骨藻**

**Chondria armata** (Kütz.) Okam.——*Lophura armata* Kütz.

生于低潮带岩石上。分布于山东、台湾、海南沿海。

藻体(软骨藻): 咸,寒。驱除蛲虫、蛔虫。

附 注: ①本种含软骨藻酸(domoic acid),是中枢神经兴奋性的氨基酸,具有较强的驱虫作用。②功效相同的有**粗茎软骨藻 C. crassicaulis** Harv., 分布于全国各沿海海域。

### 海人草属 Digenea C. Ag.

**海人草**

**Digenea simplex** (Wulf.) C. Ag.——*Conferva simplex* Wulf.

生于大干潮线下 2—7 米深处的珊瑚碎块上。分布于福建、台湾和南海海域。

藻体(海人草): 咸,平。有小毒。驱除蛔虫、鞭虫、绦虫。

### 凹顶藻属 Laurencia Lamx.

**钝形凹顶藻**

**Laurencia obtusa** (Hudson) Lamx.

全国各沿海海域均有分布。

藻体(凹顶藻): 咸,寒。有抗真菌作用,亦用作防腐剂。

附 注: 本种具有血细胞凝集素,对 B 型血特异活性更显著。

# 菌类植物 Fungi

## 1. 假丝菌科 Reticulariaceae（粉瘤菌科 Lycogalaceae）

### 粉瘤菌属 Lycogala Mich. ex Adans.

**粉瘤菌**

**Lycogala epidendrum** (L.) Fries——*Lycoperdon epidendrum* L.

春至秋季生于阔叶林内的腐木上。分布于华北、西北、华东及吉林、广西、海南、四川、云南。

子实体(粉瘤菌)：消炎止痛。多用于外敷药。

## 2. 霜霉科 Peronosporaceae

### 指梗霜霉属 Sclerospora Schröt.

**禾生指梗霉** 粟白发菌(真菌鉴定手册)

**Sclerospora graminicola** (Sacc.) Schmidt.

秋季生于粟穗上，也寄生于玉米及狗尾草属植株上。分布于东北、华北、西北及江苏、台湾、河南、湖北、四川。

病菌穗(糠谷老)：清热利湿，利尿消肿。用于体虚浮肿、痢疾、淋证、小便湿痛。

## 3. 曲霉科 Eurotiaceae

### 红曲霉属 Monascus van. Tiegh.

**红曲**

**Monascus purpureus** Went.

在自然界多存在于乳制品中，也可以用糯米作培养基进行人工培养。成为红曲。分布于长江流域以南各省及河北。

菌丝体及孢子(红菌)：甘，温。活血止痛，健脾燥湿，消食和胃。用于瘀血腹痛，产后恶露不净，食积胀饱，痢疾，跌打损伤。

## 4. 麦角菌科 Clavicipitaceae

### 麦角菌属 Claviceps Tul.

**麦角**

**Claviceps purpurea** (Fr.) Tul.——*C. microcephala* (Wall.) Tul.

麦角的寄主范围很广，已知的有 35 属，70 余种；主要是**小麦属 Triticum** L.，**大麦属 Hordeum** L.，**黑麦属 Secale** L.，**燕麦属 Avena** L.，**雀麦属 Bromus** L.，**早熟禾属 Poa** L.，**披碱草属 Elymus** L. 等。分布于东北、华北、西北及山东、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、四川。

菌核(麦角)：甘、辛，平。有毒。用于子宫出血，产后出血不止，偏头痛。

### 虫草属 Cordyceps (Fr.) Link

**大蝉草** 蝉花、虫花(四川)

**Cordyceps cicadae** Sching

生于竹林或树林中鳞翅目的幼虫体上。分布于江苏、安徽、上海、浙江、福建、四川、云南。

菌核及子座(大蝉草)：甘，寒。镇惊，熄风。用于小儿惊痫，夜啼，心悸。

**亚香棒虫草**

**Cordyceps hawkesii** Gray

生于林中落叶层下的鳞翅目幼虫体上。分布于安徽、湖南、广东、广西。

菌核及子座(亚香棒虫草)：甘、微辛，温。止血，化痰，明目，补肺，益肾。

附 注：民间用作滋补强壮药。

**凉山虫草**

**Cordyceps liangshanensis** Zang, Hu et Liu

生于高山林中落叶层下埋于土中鳞翅目的幼虫体上。分布于四川、云南昭通地区。菌核及子座：甘，温。补肺，益肾。

**蛹虫草** 北冬虫夏草(吉林)

**Cordyceps militaris** (L.) Link

春至秋季生于半埋在土中的鳞翅目昆虫蛹上。分布于东北及河北、陕西、安徽、福建、广西、云南。

菌核及子座：甘，平。止血，化痰，益肺，补肾，补精髓。用于肺痨，贫血虚弱，肾虚腰痛。

**大团囊虫草**

**Cordyceps ophioglossoides** (Ehrh. ex Fr.) Link

生于竹林或栎树林下疏松土壤中**大团囊菌 Elaphomyces** sp. 的子实体上。分布于江苏、广西、四川、云南。

# 历代中医书籍大全分享

你好，我是逢原，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com
二、加我 **QQ/微信：2049346637**
三、关注微信公众平台——**逢原中医**，经常有中医文章更新。
四、关注我的**空间**：**http://user.qzone.qq.com/2049346637**

不管哪种方式，看到你的信息我会第一时间回复，尽全力帮您！

加微信可以扫描以下二维码加我！

私人微信号：2049346637

公众平台：逢原中医

子座：微涩，温。活血调经。用于血崩，月经不调。

**冬虫夏草**　冬虫草(甘肃)，虫草(通称)

**Cordyceps sinensis** (Berk.) Sacc.----*Sphaeria sinensis* Berk.

生于鳞翅目的幼虫体上。常见于4 000米以上的高山排水良好的高寒草地。分布于西南及山西、甘肃、青海，湖北。

菌核及子座(虫草)：甘，平。补肺益肾，止血，化痰。用于久咳虚喘，劳嗽咯血，阳痿遗精，腰膝酸痛。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**蝉花**　胡蝉(云南)，蝉蛹草(中国的真菌)

**Cordyceps sobolifera** (Hill.) Berk. et Br.——*Clavaria sobolifera* Hill.

生于蝉蛹或山蝉的幼虫体上。分布于江苏、浙江、福建、广东、广西、四川、贵州、云南。

菌核及子座(蝉花)：甘，寒。解痉，退翳，透疹，散风热。用于小儿惊风，目赤红痛，麻疹不透。

附　注：功效相同的有**珊瑚虫草 C. martialis** Speg.，分布于浙江、福建。

### 绿核菌属　Ustilaginoidea Bref.

**稻绿核菌**

**Ustilaginoidea virens** (Cooke) Tak.

寄生于水稻、玉米等植物果穗上。全国各地均有分布。

菌核及分生孢子(粳谷奴)：微咸，平。杀菌，消炎，利咽。用于乳蛾，白喉。

## 5. 肉座菌科　Hypocreaceae

### 肉球菌属　Engleromyces P. Henn.

**竹生肉球菌**

**Engleromyces goetzii** P. Henn.

生于海拔2 000—3 500米的高山针叶林和针阔叶混交林下的多种竹竿上。分布于四川、云南、西藏。

子座(竹菌)：苦，寒。清热解毒，抗菌消炎。用于疖腮，乳蛾，咽喉痛，胃炎，胃溃疡，水肿，疔肿痈毒。

### 亚肉座菌属　Hypocrella Sacc.

**竹小肉座菌**　竹砂仁、竹花(云南)

**Hypocrella bambusae** (Berk. et Br.) Sacc.

围生于**箭竹属 Sinarundinaria** Nakai 植物竿的节间或近节处。分布于云南。

子座（竹花）：辛、涩，平。祛风除湿，止痒，解毒。用于胃病，风湿关节痛，外阴白斑。

### 肉座壳属 Podostroma Karst.

**滇肉棒**

**Podostroma yunnanensis** M. Zang

生于混交林中地上。分布于云南。

子实体(滇肉棒)：甘，温。止血。用于外伤出血。

### 竹黄属 Shiraia P. Henn.

**竹黄**

**Shiraia bambusicola** P. Henn.

生于箭竹属及毛竹属的枝、竿上，多生在将衰败或已衰败的竹林中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、四川、贵州、云南。

子座及孢子(竹黄)：淡，温。祛风利湿，舒筋活络，止咳，止痛，散瘀活血，通经。用于中风，小儿惊风，胃痛，顿咳，牙痛，咳嗽痰喘，关节痛。

## 6. 炭角菌科 Xylariaceae

### 炭角菌属 Xylaria Hill ex Grev.

**柄炭角菌**

**Xylaria nigripes** (Kl.) Sacc.

生于地上，往往由白蚁废弃的巢穴内的菌核长出。分布于江苏、浙江、江西、福建、河南、广东、四川、云南。

菌核(地炭棍)：除湿，镇惊，催乳，止血，补肾，利尿。也用于烧、烫伤。

## 7. 核盘菌科 Sclerotiniaceae

### 核盘菌属 Sclerotinia Fuck.

**核盘菌**

**Sclerotinia sclerotiorum** (Lib.) de Bary

生于蔬菜园地上。分布于江苏、福建、广西、四川。

菌核(核盘菌)：利用本菌发酵培养制得多糖体(葡聚糖)，对小鼠肉瘤 180 有抑制作用。

## 8. 羊肚菌科 Morchellaceae

### 羊肚菌属 Morchella Dill. ex Pers.

**羊肚菌** 羊肚蘑(山西)

**Morchella esculenta** (L.) Pers.

生于阔叶林地上及林缘空旷处，4—5 月为盛产期。分布于西北及吉林、河北、山西、江苏、四川、云南。

子实体(羊肚菌)：甘，平。化痰理气，益肠胃。用于消化不良、痰多气短。

附 注：功效基本相同的有**顶羊肚菌 M. angusticeps** Peck.，分布于内蒙古、青海、四川、云南、西藏；**尖顶羊肚菌 M. conica** Pers.，分布于河北、山西、甘肃、江苏、湖南、云南、西藏；**粗柄羊肚菌 M. crassipes** (Vent.) Pers.，分布于黑龙江、山西、陕西、新疆、四川；**小羊肚菌 M. deliciosa** Fr.，分布于山西、陕西、宁夏、新疆、四川。

## 9. 地菇科 Terfeziaceae

### 地菇属 Terfezia Tul.

**瘤孢地菇**

**Terfezia leonis** (Tul.) Tul.

生于松树林下的土中，半外露于地上。分布于河北、山西。

子囊体(瘤孢地菇)：抗耳部肿瘤，肛门肿瘤，鼻息肉，湿疣。

## 10. 黑粉菌科 Ustilaginaceae

### 轴黑粉菌属 Sphacelotheca de Bary

**高粱黑粉菌**

**Sphacelotheca sorghi** (Link) Clint.

寄生于高粱穗上。分布于东北、华北及甘肃、山东、江苏、安徽、河南、湖北。

孢子堆(高粱乌米)：甘，平。调经止血。用于月经不调，血崩，便血。

### 黑粉菌属 Ustilago (Pers.) Rouss.

**粟黑粉菌**

**Ustilago crameri** koern

寄生于粟、狗尾草等植物的果穗上。分布于东北、华北、西北、西南及山东、江苏、台湾、河南、湖南、广西。

冬孢子粉(粟奴)：淡、微苦，温。除烦闷，利小肠，消食。用于肠胃不适，消化不良，胸中烦闷。

**玉米黑粉菌**　灰包谷(贵州)

**Ustilago maydis** (DC.) Corda——*U. zeae* (Schw.) Ung.

寄生于玉米植株的任何部位，为玉米的主要病害之一。分布于全国各地。

孢子堆(玉米黑粉菌)：甘，寒。利肝脏，益肠胃，消食，通便，解毒。用于消化不良，肾虚，小儿疳积。

**麦散黑粉菌**　鬼麦(江苏)，小麦奴(本草纲目)

**Ustilago nuda** (Jens.) Rostr.——*U. segetum* var. *nuda* Jens.

寄生于大麦和小麦的穗上。分布于全国各地。

孢子堆(麦奴)：淡，温。发汗，止痛。用于烧、烫伤，头痛，无汗，烦闷，口噤。

## 11. 菰黑粉菌科　Yeniaceae

### 菰黑粉菌属　Yenia Liou

**菰黑粉菌**　茭草黑粉(贵州)

**Yenia esculenta** (P. Henn.) Liou——*Ustilago esculenta* P. Henn.

寄生于湖、塘、池、沼中菰 **Zizania latifolia** (Griseb.) Turcz. 的幼茎中，使幼茎膨大成纺锤形。分布于华东、中南、西南及河北。

菌瘿(菰黑粉菌)：甘，冷滑。除目赤，祛热，解酒毒，利二便。用于风热目赤，二便不畅。

## 12. 木耳科　Auriculariaceae

### 木耳属　Auricularia Bull. ex Méraf.

**木耳**　黑木耳(通称)，细木耳(贵州)

**Auricularia auricula** (L. ex Hook.) Underw.——*Tremella auricula* L. ex Hook.

生于夏、秋季雨后山林及庭园中的栎、榆、杨、柳、桑、槐、栗、枣等阔叶树种的朽木上，培植或野生。分布于东北、西北、华东、中南、西南及河北、北京、天津、山西。

子实体(木耳)：甘，平。益气强身，活血，止血，止痛。用于血崩，淋证，痢疾，跌打损伤，肠风痔血。

**毛木耳**　粗木耳(贵州)

**Auricularia polytricha** (Mont.) Sacc.——*Hirneola polytricha* Mont.

生于夏、秋季雨后山林及庭园中的桑、槐、杨、柳等阔叶树干或朽木上，培植或野生。除西北及黑龙江、辽宁、江苏不产外，大多数省区均有分布。

子实体(木耳)：甘，平。功效见木耳。

附　注：①功效相同的有**皱木耳 A. delicata** (Fr.) P. Henn.，分布于福建、台湾、广东、广西、贵州、云南。②**毡盖木耳 A. mesenterica** (Disks.) Pers.，分布于黑龙江、吉林、河北、山西、宁夏、河南、广东、广西、云南。子实体提取物对小鼠肉瘤 180 及艾氏癌均有较好的抑制作用。

## 13. 银耳科　Tremellaceae

### 银耳属　Tremella Dill. et Fr.

**金耳**　　黄木耳(西藏)

**Tremella mesenterica** Fries.

生于栎树及其他阔叶树的朽木上。培植或野生。分布于山西、江西、福建、四川、云南、西藏。

子实体(金耳)：甘，温。益肺化痰，平喘止咳，降压。用于肺痨，虚劳咳嗽，感冒，痰多，气喘，高血压症。

**橙耳**

**Tremella cinnabarina** (Mont.) Pat.

生于夏、秋季的阔叶树的朽木上。分布于福建、广东、海南、云南。

子实体：用于嗌气不饥，久泻。并可食用。

**银耳**　　白木耳(通称)

**Tremella fuciformis** Berk.

生于夏、秋季栎、杨等数十种阔叶树的朽木上，多为培植。分布于华东、中南、西南及山西、陕西、台湾。

子实体(银耳)：甘，平。润肺生津，清热养阴，补气活血，强身，补脑。用于肺热咳嗽，肺燥干咳，久咳喉痹，咳痰带血，肺痈，肺癌，便血，大便秘结。

附　注：**胶勺 Phlogiotis helvilloides** DC. ex Fr. 与虎掌菌 **Tremellodon gelatinosum** Fr. 对小鼠肉瘤 180 及艾氏癌均有抑制作用，前者为 100%，后者为 90%。

## 14. 革菌科　Thelephoraceae

### 革菌属　Thelephora Ehrh. ex Fr.

**莲座革菌**

**Thelephora vialis** Schw.

生于针、阔叶林中地上。分布于陕西、青海、江苏、安徽、浙江、江西、福建、广东、四川、云南。

子实体(莲座革菌)：淡，平。舒筋活络，追风散寒。用于风湿关节痛。

附　注：**串球盘革菌 Aleurodiscus amorphus** (Pers.) Rabenh.，对小鼠肉瘤及艾氏癌有较强的抑制作用。**硬笋革菌 Lloydella subpileata** (Berk. et Curt.) Höhn

et Litsch.，分布于河北、甘肃、浙江，菌丝体发酵液对小白鼠肉瘤 180 有拮抗作用。**绣球菌 Sparassis crispa** (Wulf.) Fr.，有抗真菌作用。**粗毛硬革菌 Stereum hirsutum** (Willd.) Fr.，分布于东北、西北、西南及河北、山西、江苏、安徽、浙江、福建、湖南、广东、广西，其子实体，亦有抗菌作用。

## 15. 珊瑚菌科 Clavariaceae

### 羽珊菌属 Pterula Fr.

**钻顶羽珊菌** 树头发(云南)

**Pterula umbrinella** Bres.

生于林地树干或枯枝上。分布于贵州、云南。

菌丝体(树头发)：苦、涩，寒。润肺止咳，续筋接骨。用于肺痨，骨折，跌打损伤。

附 注：**董紫珊瑚菌 Clavaria zollingeri** Lévl.，分布于福建。该菌的发酵液有抗结核菌的作用。**尖枝瑚菌 Ramaria apiculata** (Fr.) Donk.、**葡萄状枝瑚菌 R. botrytis** (Pers.) Ricken、**黄枝瑚菌 R. flava** (Schaeff ex Fr.) Quél. 和**美丽枝瑚菌 R. formosa** (Per. ex Fr.) Quél.，对小鼠肉瘤 180 及艾氏癌均有抑制作用。

## 16. 鸡油菌科 Cantharellaceae

### 鸡油菌属 Cantharellus Adans ex Fr.

**鸡油菌** 杏菌、鸡蛋黄菌(陕西)

**Cantharellus cibarius** Fr.

生于秋季雨后混林交林内地上。分布于吉林、河北、陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、福建、湖南、广东、广西、四川、云南、西藏。

子实体(鸡油菌)：甘，寒。清目，利肺，益肠胃。用于视力失常，夜盲，呼吸及消化道感染。

**小鸡油菌**

**Cantharellus minor** Peck

生于秋季雨后混交林中地上。分布于福建、湖南、广东、四川、贵州。

子实体(鸡油菌)：甘，寒。益肠胃，明目，利肺。用于视力失常，夜盲，泄泻。

附 注：**管形鸡油菌 C. tubaeformis** Fr.，分布于福建、云南，子实体有抗菌或抑菌作用。

## 17. 干朽菌科 Meruliaceae

### 射脉菌属 Phlebia Fr.

**射脉菌** 榆蘑(辽宁)

**Phlebia radiata** Fr.

生于榆树等阔叶树种的朽木上。分布于黑龙江、辽宁、广西、云南、西藏。

子实体(射脉菌)：辽宁开原县民间称榆蘑，用于痢疾。

附　注：**伏果圆灶菌 Gyrophana lacrymans** (Wulf.) Pat.、**金色干朽菌 Merulius aureus** Fr. 及**胶质干朽菌 M. tremellosus** Schrad. ex Fr.，均含有抗癌物质，对小鼠肉瘤 180 及艾氏癌均有较强的抑制作用。

## 18. 齿菌科　Hydnaceae

### 猴头菌属　Hericium Pers. ex Gray

**珊瑚状猴头菌**

**Hericium coralloides** (Scop. ex Fr.) Pers. ex Gray——*Hydnum coralloides* Scop. ex Fr.

生于阔叶类树种的朽木或活立木上。分布于新疆、四川、云南、西藏。

子实体(玉髯)：甘，平。助消化，利五脏，滋补，抗癌。

**猴头菌**　猴头(通称)

**Hericium erinaceus** (Bull. ex Fr.) Pers.——*Hydnum erinaceus* Bull. ex Fr.

生于胡桃及栎类等朽木上。分布于华北及黑龙江、吉林、甘肃、浙江、河南、广西、四川、云南、西藏。

子实体(猴头)：甘，平。利五脏，助消化，滋补，抗癌。

附　注：本种对皮肤癌有一定的抑制作用。为著名的美味食用菌。

### 肉齿菌属　Sarcodon Quél.

**褐盖肉齿菌**

**Sarcodon fuligineo-albus** (Fr.) Quél.——*Hydnum fuligineo-album* Fr.

生于针、阔叶混交林内地上。分布于云南。

子实体(褐盖肉齿菌)：甘，平。消炎，杀菌，抗癌。用于乳蛾，疖腮，胃癌，肝癌。

**翘鳞肉齿菌**

**Sarcodon imbricatus** (L. ex Fr.) Karst.——*Hydnum imbricatum* L. ex Fr.

生于针、阔叶混交林内地上。分布于甘肃、新疆、四川、云南、西藏。

子实体：消炎，抗癌，并可食用。

## 19. 牛排菌科　Fistulinaceae

### 牛排菌属　Fistulina Bull. ex Fr.

**肝色牛排菌**

**Fistulina hepatica** (Schaeff.) Fr.

生于阔叶树的朽木上。分布于福建、河南、广西、四川、云南。

子实体(牛舌菌)：此菌含明胶膘、木糖及阿拉伯糖等，对小鼠肉瘤 180 及艾氏癌均有抑制作用。也作食用。

## 20. 多孔菌科 Polyporaceae

### 乌芝属 Amauroderma (Pat.) Murr.

**皱盖乌芝**

**Amauroderma rude** (Berk.) Pat.

生于混交林中地上及附着木层的朽木上。分布于福建、广东、云南。

子实体(假灵芝)：淡，平。消积，化痰，消炎。用于肾炎水肿，消化不良。

附　注：功效相同的有**黑漆乌芝 A. roderma** (Berk) Pat.，分布于云南。

### 烟管菌属 Bjerkandera Karst.

**烟色烟管菌**

**Bjerkandera fumosa** (Pers. ex Fr.) Karst.

生于阔叶树的倒木上。分布于东北及河北、陕西、青海、江苏、福建、湖南、广西、四川、贵州、云南。

子实体(亚黑管菌)：微涩，平。辽宁丹东地区用于治疗子宫癌。

### 刺孢多孔菌属 Bondarzewia Sing.

**圆苞地花**

**Bondarzewia montana** (Quél.) Sing.——*Spongiporus montana* Quél.; *Polyporus montanus* (Quél.) Ferry

生于冷杉等林中地上。分布于福建、四川、云南、西藏。

子实体(塔蒜)：微苦。可食。福建三明地区用于解野菇中毒。

### 革盖菌属 Coriolus Quél.

**毛革盖菌**

**Coriolus hirsutus** (Wulf. ex Fr.) Quél.——*Polyporus hirsutus* (Wulf.) Fr.

生于阔叶树枯干上，引起木材白腐。全国均有分布。

子实体(蝶毛菌)：祛风除湿，清肺止咳，祛腐生肌。

**单色革盖菌**　齿毛芝(河北)

**Coriolus unicolor** (Bull. ex Fr.) Pat.——*Polystictus unicolor* (Bull. ex Fr.)

Lloyd

生于榆、杨、栎、桦、梓、胡桃、杜鹃等阔叶树的朽木和树干上。全国均有分布。

子实体(云芝): 微苦、涩,平。抗肿瘤。用于多种肿瘤。

**彩绒革盖菌**(云芝)

**Coriolus versicolor** (L. ex Fr.) Quél.——*Polystictus versicolor* (L.) Fr.

生于阔叶树的腐木上,偶见于针叶树的朽干上。全国均有分布。

子实体(云芝): 微甘,寒。清热消炎,除湿化痰。用于咳嗽痰喘、肿瘤。

附　注: **二型革盖菌 C. biformis** (Kl. ex Fr.) Pat., 分布于华北及黑龙江、江苏、浙江、云南; **鲑贝革盖菌 C. consors** (Berk.) Imaz., 分布于长江以南大部分地区及陕西、甘肃; **绒拟革盖菌 Coriolopsis occidentalis** (Kl.) Murr.、**大孔集毛菌 Coltricia schweinitzii** (Fr.) Cunn., 分布于福建、广东、云南。均有广泛的抗癌与抗肿瘤作用。

## 隐孔菌属　Cryptoporus (Peck) Hubb.

**隐孔菌**　　树疙瘩(云南)

**Cryptoporus volvatus** (Peck) Schear.——*Polyporus volvatus* Peck

生于针叶及阔叶树的树干上。分布于黑龙江、河北、福建、湖北、广东、海南、广西、四川、云南。

子实体(松橄榄): 微苦,平。止咳平喘。用于咳嗽痰喘。

附　注: **粉迷孔菌 Daedalea biennis** (Bull.) Fr.、**三色拟迷孔菌 Daedaleopsis tricolor** (Fr.) Bond. et Sing. 及**棱孔菌 Favolus alveolaris** (Bosc ex Fr.) Quél., 均对小鼠肉瘤 180 有抑制作用。

## 层孔菌属　Fomes (Fr.) Gill.

**硬壳层孔菌**

**Fomes hornodermus** Mont.

生于栎类树的枯干上。分布于湖南、广东、广西、贵州、云南。

子实体(梓菌): 镇惊,祛风,止血,止痒。

## 拟层孔菌属　Fomitopsis Karst.

**药用拟层孔菌**　　阿里红(新疆)

**Fomitopsis officinalis** (Vill. ex Fr.) Bond. et Sing.——*Fomes officinalis* (Vill. ex Fr.) Faull.

生于针叶及落叶阔叶类植物的树干上。分布于华北及黑龙江、吉林、新疆、四川、云南、西藏。

子实体(苦白蹄): 甘、苦,温。温肺化痰,祛风除湿,降气平喘,消肿利尿。用于咳嗽痰喘,胃痛,石淋,咽喉痛,牙周炎,毒蛇咬伤。

**榆拟层孔菌**

**Fomitopsis ulmaria** (Sow. ex Fr.) Bond. et Sing.——*Fomes ulmarius* (Fr.) Gill.

生于榆类植物及其他落叶树干基部。分布于台湾、河南、湖南。

子实体(榆层孔菌)：补骨髓，固精脉。

附　注：**多年拟层孔菌 F. annosa** (Fr.) Karst.、**红颊拟层孔菌 F. cytisina** (Berk.) Bond. et Sing.、**松生拟层孔菌 F. pinicola** (Sw. ex Fr.) Karst. 及**红拟层孔菌 F. rosea** (Alb. et Schw. ex Fr.) Karst.，均含有抗癌物质，对小鼠肉瘤 180 有一定的抑制作用。

## 褐孔菌属　Fuscoporia Murr.

**斑褐孔菌**

**Fuscoporia punctata** (Fr.) Cunn.

生于栎、槭类阔叶树的树皮和腐木上。分布于吉林、河北、陕西、江苏、浙江、广西、云南。

子实体(斑褐孔菌)：民间用以治疗冠心病。

## 灵芝属　Ganoderma Karst.

**树舌**　　扁芝(江苏)，扁蕈(四川)

**Ganoderma applanatum** (Pers. ex Wall.) Pat.——*Fomes applanatum* (Pers. ex Wall.) Gill.

生于夏、秋季雨后潮湿环境中的多种阔叶树干上，导致腐朽，有时也生在针叶树的树干上和竹竿的基部。全国各地均有分布。

子实体(老母菌)：苦，平。清热，消积，化痰，止血，止痛。主用于食道癌。

**灵芝**　　赤芝(通称)，木灵芝(贵州)

**Ganoderma lucidum** (Leyss. ex Fr.) Karst.——*Polyporus lucidus* Lryss. ex Fr.

生于夏、秋季阔叶林内的朽桩旁。分布于华东、西南及河北、山西、台湾、河南、广东、海南、广西、贵州。其他省区亦有培植。

子实体(灵芝)：苦、涩，温。滋补，健脑，益胃，消炎，利水。用于胃痛，肾虚，咳嗽痰喘，肝炎，毒菌中毒。

**紫芝**　　灵芝草(江西)，灵芝菇(广东)

**Ganoderma sinense** Zhao, Xu et Zhang.——*G. japonicum* sensu Teng

生于阔叶树腐木及朽木桩上，有时也生在竹类的枯死部分。分布于河北、山东、浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、贵州。

子实体(黑芝)：微苦，温。滋补强壮，健脑，益胃，消炎，利尿。用于肾虚，失眠，胃痛，消化不良，乳痈，对口疮，毒菌中毒。

**密纹薄芝**

**Ganoderma tenue** Zhao, Xu et Zhang

生于木上。中国科学院植物研究所培养的子实体。

子实体：镇静。对改善急、慢性肝炎病人的肝功能及缓解症状有一定效果。

**热带灵芝**

**Ganoderma tropicum** (Jungh.) Bres.

生于大叶合欢、相思树等豆科植物的树桩和枯根上。分布于浙江、福建、江西、广东、海南、广西、贵州、云南。

子实体。民间用以治疗冠心病。

附　注：**狭长苞灵芝 G. boniense** Pat. 及**铁杉灵芝 G. tsugae** Murr.，分布于黑龙江、吉林、甘肃、西藏，对小鼠肉瘤 180 及小鼠腺癌均有抑制作用。

## 粘褶菌属　Gloeophyllum Karst.

**褐粘褶菌**

**Gloeophyllum subferrugineum** (Berk.) Bond. et Sing.——*Lenzites subferruginea* Berk.

生于松、杉等的腐木上。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖南、海南、广西、四川、云南、西藏。

子实体：除风祛湿，顺气。

附　注：**簇边粘褶菌 G. saepiarium** (Wulf. ex Fr.) Karst. 及**密粘褶菌 G. trabeum** (Pers. ex Fr.) Murr. 的菌液，对小鼠肉瘤 180 有抑制作用。

## 蜂窝菌属　Hexagonia Poll. ex Fr.

**毛蜂窝菌**　龙眼梳(福建)

**Hexagonia apiaria** (Pers.) Fr.——*H. koenigii* Berk.

生于龙眼、荔枝等树的树干上。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、四川、云南。

子实体(龙眼梳)：微苦、涩，温。宣肠，健胃，止酸。用于胃气痛、消化不良。

附　注：**黄褶孔菌 Hirschioporus** flavus (Kl.) Teng 及**褐紫褶孔菌 H. fusco-violaceus** (Schrad. ex Fr.) Donk，对小鼠肉瘤 180 有抑制作用。

## 纤孔菌属　Inonotus Karst. em. Imaz.

**薄皮纤孔菌**

**Inonotus cuticularis** (Bull. ex Fr.) Karst.——*Boletus cuticularis* Bull.; *Polyporus cuticularis* (Bull.) Fr.

生于桦树及其他阔叶树的腐木上。分布于黑龙江、吉林、江苏、浙江、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、四川、云南、西藏。

子实体(合树裂)：益神，顺气，祛风，止血。

附　注：**东方纤孔菌 I. orientalis** (Lloyd) Teng、**松鼠状纤孔菌 I. sciurinus** Imaz.、**烟草色纤孔菌 I. tabacinus** (Mont.) Karst.，其子实体水提液，对小鼠肉瘤 180 均有抑制作用。

## 革裥菌属　Lenzites Fr. em. Donk.

**桦革裥菌**

**Lenzites betulina** (L.) Fr.——*Agaricus betulinus* L.

生于阔叶树腐木上，桦树上尤甚，针叶树上偶有生长。分布于东北、华北、华东、中南、西南及陕西、甘肃、青海。

子实体(桦革裥菌)：淡，温。驱风散寒，舒筋活络。用于手足麻木，腰腿痛。

## 木层孔菌属　Phellinus Quél.

**贝状木层孔菌**

**Phellinus conchatus** (Pers. ex Fr.) Quél.

生于柳、李、漆等阔叶树的腐木上。分布于华东、中南、西南及河北、陕西、甘肃。

子实体(鸡爪菌)：活血，消积，解毒。

**密集木层孔菌**

**Phellinus densus** (Lloyd) Teng——*Fomes densus* Lloyd

生于楝树及榆类等植物的腐木上。分布于湖北、湖南、四川。

子实体(苦楝菌)：杀虫，解热。用于疳积，血吸虫病。

**淡黄木层孔菌**

**Phellinus gilvus** (Schw.) Pat.

生于阔叶及针叶树的腐木上。分布于西南及黑龙江、吉林、河北、山西、陕西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖北、湖南、海南、广西。

子实体：健胃，补脾，祛湿。

**针层孔菌**　　桑黄

**Phellinus igniarius** (L. ex Fr.) Quél.——*Boletus igniarius* L.

生于杨、柳、桦、栎、榉、杜鹃等阔叶树的树干上。分布于东北、华北、西北及台湾、河南、广东、四川、云南、西藏。

子实体(桑黄)：微苦，寒。止血，活血，和胃，止泻。用于脾虚泄泻，症瘕积聚，瘰疬，带下病，妇人劳伤，血淋，脱肛。

**簇毛木层孔菌**

**Phellinus torulosus** (Pers.) Bourd. et Galz.——*Fomes torulosus* (Pers.) Lloyd

生于栎类植物的树干基部。分布于黑龙江、吉林、河北、山西、浙江、江西、台湾、湖南、广东、广西、云南。

子实体(剑皮树菌)：理气，解毒。

附　注：**哈尔蒂木层孔菌 P. hartigi** (Allesch. et Schnabl) Imaz.、**橡胶针层孔菌 P. lamensis** (Murr.) Teng、**裂蹄木层孔菌 P. linteus** (Berk. et Curt.) Teng、**松木层孔菌 P. pini** (Thore ex Fr.) Ames、**白木层孔菌 P. setulosus** (Lloyd) Imaz. 等，对小鼠肉瘤 180 及艾氏癌均有抑制作用。

## 滴孔菌属　Piptoporus Karst.

**桦滴孔菌**

**Piptoporus betulinus** (Bull. ex Fr.) Karst.——*Boletus betulinus* Bull.; *Polyporus betulinus* Bull. ex Fr.

生于桦树的树干上。分布于黑龙江、吉林、内蒙古、陕西、甘肃、河南、四川、云南、西藏。

子实体：对化脓小球菌有抵抗作用。

## 多孔菌属　Polyporus (Mich.) Fr. et Fr.

**雅致多孔菌**　杂蘑(山西)

**Polyporus elegans** (Bull.) Fr.——*Boletus elegans* Bull.

生于阔叶树种的腐木及枯枝上，偶见针叶树的枯枝上。分布于黑龙江、吉林、山西、陕西、甘肃、青海、新疆、安徽、浙江、江西、福建、湖南、广东、广西、四川、云南、西藏。

子实体(杂蘑)：微咸，温。舒筋活络，追风散寒。用于筋络不适，腰腿疼痛，四肢麻木。

**雷丸**　木连子(广西)，竹苓(本草纲目)

**Polyporus mylittae** Cooke et Mass. ——*Ophalia lapidescens* Schroet.

生于竹林下的竹根上或老竹根下，有时也生在棕榈及桐树等的朽树根部。分布于陕西、甘肃、安徽、浙江、福建、河南、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

子实体(雷丸)：苦，寒；有小毒。除热，消积，杀虫。用于小儿疳积，虫积腹痛，皮肤瘙痒，癥瘕疼痛。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**猪苓**　野猪食(辽宁)，粉猪苓(上海)，野猪粪(浙江)，猪屎苓(四川)

**Polyporus umbellatus** (Pers.) Fr.——*Grifola umbellata* (Pers. ex Fr.) Pilát

生于阔叶及针叶林下树根旁和腐木桩旁地上。分布于东北及河北、北京、山西、陕西、甘肃、河南、湖北、四川、贵州、云南。

菌核(猪苓)：甘、淡，平。利水，渗湿。用于水肿、小便淋痛、泄泻、淋浊、带下病。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②**白多孔菌 P. albicans**(Imaz.) Teng、**贝叶多孔菌 P. frondosus** (Dicks.) Fr. 及**巨多孔菌 P. giganteus** (Pers.) Fr. 等，对小鼠艾氏癌均有抑制作用。

## 卧孔菌属　Poria Pers. ex Gray

**茯苓**　松茯苓(贵州)

**Poria cocos** (Schw.) Wolf.

生于松树类的树根上，多为人工培植。分布于华东及辽宁、天津、山西、陕西、山东、江苏、河南、湖北、广西、四川、贵州、云南。

菌核(茯苓)：甘、淡，平。健脾宁心，利水渗湿。用于水肿尿少，痰饮眩悸，脾虚食少，便溏泄泻，心神不安，惊悸失眠。

附注：①《中华人民共国和药典》1990年版收载。② 树皮生卧孔菌 **P. corticola** (Fr.) Caoke，对小鼠肉瘤180及小白鼠腺癌755有抵抗作用。**黄白卧孔菌 P. subacida** (Peck.) Sacc. 对小鼠白血病 L-1210 有抑制作用。

## 褐层孔菌属 Pyropolyporus Murr.

**钢青褐层孔菌**

**Pyropolyporus adamantinus** (Berk.) Teng——*Fomes adamantinus* (Berk.) Cke.

生于栎类、油茶等阔叶树的树干基部或木桩上。分布于江苏、福建、湖南、广东、广西、贵州。

子实体：用于胃痛。

**木蹄层孔菌** 木蹄(陕西)

**Pyropolyporus fomentarius** (L. ex Fr.) Teng——*Boletus fomentarius* L.; *Fomes fomentarius* (Fr.) Fr.

生于栎类、桦、杨、柳、赤杨、椴、榆、水曲柳、李、梨、苹果等树干上。分布于东北、华北、西南及陕西、甘肃、新疆、河南、广西。

子实体(木蹄)：微苦，平。消积，化瘀，抗癌。用于食道癌，胃癌，子宫癌，小儿食积。

**裂褐层孔菌** 裂蹄

**Pyropolyporus rimosus** (Berk.) Teng——*Polyporus rimosus* Berk.; *Phellinus rimosus* (Berk.) Pilát

生于阔叶树的树干上。分布于山西、江西、福建、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州。

子实体(裂蹄)：微苦，平。化症，止血，和胃，止泻。用于症瘕积聚，崩漏，带下病，脾虚泄泻，疳积，瘰疬。

附 注：**平伏褐层孔菌 P. megregori** (Bres.) Teng 对小鼠肉瘤180及艾氏癌有抑制作用

## 栓菌属 Trametes Fr.

**朱红栓菌** 朱砂菌、胭脂栓菌(河北、广西)

**Trametes cinnabarina** (Jacq.) Fr.——*Polyporus cinnabarina* Jacq.

生于栎、桦、椴、槭等阔叶树的腐木上，偶尔生于松木上。分布于华北、西北、西南及黑龙江、吉林、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖南、广东、广西。

子实体(朱砂菌)：微辛、涩，温。除湿，消炎，清热解毒，止血。用于咳嗽痰喘，风湿关

节痛，外伤出血。

**血红栓菌**

**Trametes cinnabarina** (Jacq.) Fr. var. **sanguinea** (L. ex Fr.) Pilát——*Polystictus sanguineus* Fr.

生于腐木和枕木上，有时生在松、杉木上。分布于华东、中南、西南及河北。

子实体(枫菌)：祛风除湿，行气，止血，止痒。用于咳嗽痰喘，风湿关节痛，止血。

**皱褶栓菌**

**Trametes corrugata** (Pers.) Bres.——*Polyporus corrugatus* Pers.

生于阔叶树干上。分布于西南及浙江、福建、湖南、广东、海南、广西。

子实体(樟菌)：镇惊，祛风，止血，活血，止痒。

**东方栓菌**

**Trametes orientalis** (Yasuda) Imaz.——*Polystictus orientalis* Yasuda; *Polyporus vittatus* Berk.

生于阔叶树的腐木或枕木上。分布于江西、台湾、湖北、湖南、广东、广西、贵州、云南。

子实体(白鹤菌)：祛风除湿，消炎。用于肺痨，咳嗽痰喘。

**紫椴栓菌**

**Trametes palisoti** (Fr.) Imaz.——*Lenzites palisoti* Fr.

生于腐木上。分布于西南及河北、江苏、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西。

子实体(皂角菌)：驱风，止痒。

## 干酪菌属　Tyromyces Karst.

**硫色干酪菌**　硫磺多孔菌

**Tyromyces sulphureus** (Bull. ex Fr.) Donk——*Polyporus sulphureus* Fr.; *Laetiporus sulphureus* (Bull. ex Fr.) Bond. et Sing.

生于栎、桦、槭、李、冷杉、落叶松等的树干及木桩上。分布于华北、西南及黑龙江、吉林、陕西、甘肃、新疆、江苏、安徽、浙江、江西、福建、河南、广东、广西。

子实体(硫磺菌)：甘，温。抵抗疾病，调节机体，增进健康。

附　注：**毛盖干酪菌 T. pubescens** (Schum. ex Fr.) Imaz. 子实体提取物对小鼠肉瘤 180 有抑制作用。

## 黄褐孔菌属　Xanthochrous Pat.

**粗毛黄褐孔菌**

**Xanthochrous hispidus** (Bull. ex Fr.) Pat.——*Polyporus hispidus* Bull. ex Fr.

生于栎、榆、桑、杨、槐、枣、合欢等阔叶树的树干上。分布于黑龙江、吉林、河北、陕西、宁夏、新疆、西藏。

子实体(槐蘑)：祛风，止血，败毒止痛。用于五痔脱肛，肠、痔下血。

附　注：本种子实体提取物，对小鼠肉瘤 180 及艾氏癌抑制率分别为 80%，70%。

**团核黄褐孔菌**

**Xanthochrous rheades** (Pers.) Pat.

生于槐、杨、桑、柽柳等树干上。分布于黑龙江、河北、内蒙古、陕西、宁夏、新疆。

子实体(槐蘑)：清热解毒，祛风，止血，败毒止痛。用于脱肛，肠、痔下血。

## 21. 口蘑科　Tricholomataceae

### 假蜜环菌属　Armillariella (Karst.) Karst.

**假蜜环菌**　　榛蘑(吉林)

**Armillariella mellea** (Vahl. ex Fr.) Karst.——*Agaricus melleus* Vahl. ex Fr.

生于夏、秋季雨后的针、阔叶树的树干基部、根部或倒木上，丛生。常导致树木的根腐病，并使腐木发光。是栽培天麻不可缺的生物因子。分布于东北、西北、西南及河北、天津、山西、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖南、广西。

子实体(蜜环菌)：甘，寒。强筋健骨，祛风活络，清目，利肺，益肠胃。用于腰腿疼痛，佝偻病，眼炎，夜盲，咳嗽及消化道感染。

**发光假蜜环菌**　　假蜜环菌(江苏)

**Armillariella tabescens** (Scop. ex Fr.) Sing.——*Clitocybe tabescens* (Scop. ex Fr.) Bres.

生于阔叶树的树桩上及树干基部，丛生。为食用菌之一。分布于西南及河北、江苏、安徽、浙江、福建、河南。

菌丝体(亮菌)：甘，平。消炎解毒。用于慢性肝炎，胆囊炎，肠痈，中耳炎。

附　注：对小鼠肉瘤 180、艾氏癌有抑制作用。

### 冬菇属　Flammulina Karst.

**冬菇**　　构菌(山西)

**Flammulina velutipes** (Curt. ex Fr.) Sing.——*Agaricus velutipes* Curt.; *Collybia velutipes* (Curt. ex Fr.) Quél.

生于早春、晚秋至初冬季节的阔叶树腐木桩上或根部丛生。分布于华北、西北及黑龙江、吉林、江苏、浙江、福建、河南、广西、四川、云南。

子实体(冬菇)：微苦、稍咸，寒。利肝脏，益肠胃，抗癌。用于肝炎，慢性胃炎。

附　注：本科有**芳香杯伞 Clitocybe fragrans** (Sow. ex Fr.) Quél.、**漏斗形杯伞 C. infundibuliformis** (Schaeff. ex Fr.) Quél.、**肉色杯伞 C. geotropa** (Bull. ex Fr.) Quél.、**紫晶蜡蘑 Laccaria amethystea** (Bull. ex Fr.) Murr.、**漆蜡蘑 L. laccata** (Scop. ex Fr.) Brek. et Br.、**柄条蜡蘑 L. proxina** (Boud.) Pat.、**月光菌 Lampteromyces japonicus** (Kawan.) Sing. 等，对小鼠肉瘤 180、艾氏癌均有抑制作用。

## 香菇属 Lentinus Fr.

**香菇** 香蕈(山西)

**Lentinus edodes** (Berk.) Sing.

生于春、秋、冬季阔叶林中的倒木上。为传统的食用菌，现多人工栽培。分布于西南及陕西、安徽、浙江、福建、台湾、江西、湖北、广东。

子实体(香菇)：甘，平。化痰，理气，助食。用于佝偻病，乳蛾，麻疹不透，高血压症，贫血，小便失禁，毒菌中毒。

**洁丽香菇**

**Lentinus lepideus** Fr.——*Agaricus lepideus* Fr.

生于夏、秋季针叶树的腐木上，近丛生。分布于黑龙江、吉林、河北、山西、陕西、江苏、安徽、福建、台湾、江西、云南、西藏。

子实体(豹皮菇)：甘，平。调节机体，增进健康，抵抗疾病。对人体机能有调节作用。

附注：本属种类对小鼠肉瘤 180、艾氏癌均有抑制作用。

## 杯柄菇属 Lepiota (Pers. ex Fr.) Gray

**紫丁香菇**(裸口蘑) 紫晶蘑(福建)

**Lepiota nuda** (Bull. ex Fr.) Cooke——*Tricholoma nudum* Quél.

群生于秋季林内地上。分布于黑龙江、青海、新疆、福建。

子实体(紫晶蘑)：甘，平。有维持机体正常糖代谢之功效，又可预防脚气病。

附 注：本种为食用菌，对小鼠肉瘤 180、艾氏癌有抑制作用；**夜鹭杯柄菇 L. luscina** (Fr.) Sing.，亦为食用菌，对小鼠腺癌 755 有抑制作用。

**高环柄菇**

**Lepiota procera** (Scop. ex Fr.) Gray

夏、秋季生在林中地上和草地上。分布于西南及吉林、江苏、安徽、浙江、福建、河南、湖南、海南。

子实体：此菌含有18种氨基酸，经常食用能助消化，增进健康。

## 白桩菇属 Leucopaxillus Bours.

**大白桩菇** 青腿子(内蒙古)

**Leucopaxillus giganteus** (Sow. ex Fr.) Sing.——*Clitocybe gigantea* (Sow. ex Fr.) Quél.

夏、秋季群生或单生于草原上，形成蘑菇圈，在地下的菌核为黄褐色。分布于黑龙江、辽宁、河北、内蒙古、青海、新疆。

子实体(雷蘑)：甘，平。宣肺益气，清热解表，抗癌。用于透发麻疹。

附 注：**白桩菇 L. candidus** (Bers.) Sing.，分布于黑龙江，山西、青海，对革兰氏

阳性、阴性菌有抑制作用。**墨染离褶伞 Lyophyllum semitale** (Fr.) Kuhner，对小鼠肉瘤 180、艾氏癌有抑制作用。

## 小皮伞属 Marasmius Fr.

**安络小皮伞** 鬼毛针(湖南)

**Marasmius androsaceus** (L. ex Fr.) Fries.

此菌常见的主要是菌索阶段，多在 5—10 月份生长，子实体较少见，生于深山密林、阴湿处的枯枝、枯干上。分布于吉林、湖南、云南。

菌索(鬼毛针)：微苦，温。止痛，活络。用于跌打损伤，骨折，坐骨神经痛，偏头痛，麻风性神经痛，风湿关节痛。

附 注：功效类同的有**马毛小皮伞 M. equicrinis** Muell.。本科**枝杆微皮伞 Marasmiellus ramealis** (Ball. ex Fr.) Sing. 对细菌分枝杆菌有抵抗作用。

**硬柄小皮伞** 硬柄皮伞(山西)

**Marasmius oreades** (Bilt. ex Fr.) Fr.——*Agaricus oreades* Bolt.

夏、秋季在草地上群生并形成蘑菇圈，也见于林地上。分布于河北、山西、青海、四川、云南、西藏。

子实体(杂蘑)：微咸，温。用于腰腿疼痛，手足麻木。

## 扇菇属 Panellus Karst.

**止血扇菇**

**Panellus stypticus** (Bull. ex Fr.) Karst.——*Panus stypticus* Fr.

生于阔叶树的腐木上，有时会发光。分布于华北西南及黑龙江、吉林、陕西、甘肃、青海、福建、湖南、广西。

子实体(鳞皮扇菇)：辛、温。有毒。止血。用于外伤出血。

## 革耳属 Panus Fr.

**贝壳状革耳**(紫革耳) 光革耳(陕西)

**Panus conchatus** (Bull. ex Fr.) Fr.——*Agaricus conchatus* Bull. ex Fr.; *P. torulosus* (Pers.) Fr.

夏、秋季生于阔叶树的腐木上。为食用菌之一。分布于陕西、甘肃、河南、云南、西藏。

子实体(蘑菇)：苦，温。舒筋活络，追风散寒。用于手足麻木，腰腿疼痛。

**野生革耳**

**Panus rudis** Fr.

夏、秋季生于桦、柳、杨、栎类等的腐木上。分布于华东、西南及黑龙江、吉林、河北、甘肃、河南、湖南、广东、广西。

子实体(革耳)：云南民间用于治疗疔肿疮毒。

附　注：幼菌可食。对小鼠肉瘤 180、艾氏癌有抑制作用。

## 侧耳属　Pleurotus (Fr.) Quél.

**金顶侧耳**　　榆蘑(吉林)

**Pleurotus citrinopileatus** Sing.

生于阔叶树的腐木上。分布于西南及吉林、河北、福建、台湾、广东。

子实体(金顶蘑)：甘，温。滋补强壮。用于虚弱，阳痿，痢疾。

**阿魏侧耳**

**Pleurotus ferulae** Lanzi

5 月份生于阿魏根部。分布于新疆。

子实体(阿魏蘑菇)：消积，杀虫。用于胃病。

**糙皮侧耳**(侧耳)　　北风菌(山西)

**Pleurotus ostreatus** (Jacq. ex Fr.) Quél.——*Agaricus ostreatus* Jacq. ex Fr.

冬、春季在阔叶树的腐木上丛生。分布于东北、华北及陕西、新疆、江苏、台湾、河南、四川、西藏。

子实体(杂蘑)：甘，温。追风散寒，舒筋活络。用于手足麻木，筋络不适，腰腿疼痛。

附　注：为食用菌之一，现多培植。

**榆干侧耳**　　榆蘑(青海)

**Pleurotus ulmarius** (Bull. ex Fr.) Quél.

生于榆树等阔叶树的腐木上。分布于吉林、青海。

子实体(大榆蘑)：甘，温。滋补强壮，止痢。用于虚弱，阳痿，痢疾。

附　注：**白黄侧耳 P. cornucopiae** (Paul. ex Pers.) Roll.、**灰白侧耳 P. spodolencus** Fr.，对小鼠肉瘤 180、艾氏癌均有抑制作用。

## 裂褶菌属　Schizophyllum Fr.

**裂褶菌**

**Schizophyllum commune** Fr.——*S. alneum* Schrot.

春至秋季生于阔叶及针叶树的枯枝和腐木上。分布于东北、华东、西南及河北、北京、天津、山西、陕西、甘肃、河南、湖南、广东、广西。

子实体(树花)：甘，平。滋补，强身。作滋补剂。

## 蚁巢伞属　Termitomyces Heim

**鸡枞菌**　　白蚁菰(福建)，蚁夺(贵州)，蚁纵(云南)

**Termitomyces albuminosus** (Berk.) Heim——*Collybia albuminosa* (Berk.) Petch

生于山地、田野、草坡、林边地上，单生或群生，其假根与地下白蚁窝相连。为全国著

名食用菌之一。分布于西南及江苏、福建、台湾、广东、广西。

子实体(鸡坳)：甘，寒。益胃，清神。用于消化不良，提神，痔疮。菌核：补肾，镇静。

### 口蘑属　Tricholoma (Fr.) Quél.

**口蘑**　虎皮香蕈

**Tricholoma gambosum** (Fr.) Gill.

夏、秋季生在草原上形成蘑菇圈，地下的菌核黄褐色。为全国著名的食用菇。分布于黑龙江、河北、内蒙古。

子实体(口蘑)：甘，平。散血，解表。用于小儿透发麻疹。

**松口蘑**

**Tricholoma matsutake** (Ito et Imai) Sing.——*Armillaria matsutake* Ito et Imai

秋季生于松林或针、阔混交林中地上，形成蘑菇圈。为优良食用菌。分布于东北及安徽、台湾、四川、贵州、西藏。

子实体(松蘑)：淡，温。化痰，理气，强身，止痛，益肠胃。

**蒙古口蘑**　白蘑

**Tricholoma mongolicum** Imai

夏、秋季生于草原上形成蘑菇圈。此种为我国北方草原盛产口蘑的最佳品。分布于东北、河北、内蒙古。

子实体(口蘑)：甘，平。益气，解表，宣肠，散血热。用于透发麻疹、烦燥不安。

附　注：**苦口蘑 T. acerbum** (Bull. ex Fr.) Quél.、**白棕口蘑 T. albobrunneum** (Pers. ex Fr.) Quél.、**白口蘑 T. album** (Scharff. ex Fr.) Quél.、**黄褐口蘑 T. fulvum** (DC. ex Fr.) Rea、**毒绳口蘑** T. **muscarium** Kawam.、**粗壮口蘑 T. robustum** (Alb. et Schw. ex Fr.) Ricken、**褐黑口蘑 T. ustale** (Fr.) Quél.、**红鳞口蘑 T. vaccinum** (pers. ex Fr.) Quél.、**条纹口蘑 T. virgatum** (Fr.) Gill. 及**宽褶菇 Tricholomopsis platyphylla** (Pers. ex Fr.) Sing.，对小鼠肉瘤 180、艾氏癌均有抑制作用。

## 22. 鹅膏科(毒伞科)　Amanitaceae

### 鹅膏属(毒伞属)　Amanita Pres.

**片鳞鹅膏**　白托柄菇

**Amanita agglutinata** (Berk. ex Curt.) Sing.——*Agaricus agglutinatus* Berk. et Curt.; *Amanitopsis volvata* Sacc.

夏、秋季生于阔叶林中地上，单生。分布于吉林、河北、江苏、安徽、四川、云南。

子实体(蘑菇)：苦，温。有毒。舒筋活络，追风散寒。

附　注：**橙盖鹅膏 A. caesaria** (Scop. ex Fr.) Pers. ex Schw.、**蛤蟆菌 A. mu**

**scaria** (L ex Fr.) Pers. ex Gray 有毒，对小鼠肉瘤 180 有抑制作用。**毒伞 A. phalloides** (Vaill. ex Fr.) Secr.，有免疫活性，也可作农药毒杀红蜘蛛等害虫。

## 23. 光柄菇科 Pluteaceae

### 小包脚菇属 Volvariella Speg.

**草菇**

**Volvariella volvacea** (Bull. ex Fr.) Sing.——*Agaricus volvaceus* Bull.

春至秋季生于稻草等草堆上，也有栽培。分布于河北、江苏、福建、台湾、湖南、广东、广西、四川。

子实体(草菇)：甘，寒。消暑祛热，抗癌。用于高血压症，齿龈出血，皮疹，坏血病，肿瘤。

## 24. 蘑菇科(伞菌科) Agaricaceae

### 蘑菇属 Agaricus L. ex Fr.

**野蘑菇** 杂蘑(山西)

**Agaricus arvensis** Schaeff. ex Fr.

夏、秋季单生于草地或草原上。分布于黑龙江、河北、青海、新疆、河南、云南。

子实体(杂蘑)：甘，温。追风散寒，舒筋活络。用于腰腿痛，手足麻木。

附 注：为山西五台县制作舒筋散的原料之一。

**双孢蘑菇** 洋蘑菇

**Agaricusbis porus** (Lange) Sing.

为广泛培育的食用菌。全国各地均有栽培。

子实体(蘑菇)：甘，平。降压，安神，消食。用于消化不良，高血压症，肾虚。

**四孢蘑菇** 原野蘑菇(山西)

**Agaricus campestris** L. ex Fr.

春至秋季单生或群生于旷野、草地、路边、牧场及堆肥场等处。分布于华北、西北、西南及黑龙江、吉林、江苏、台湾、湖南。

子实体(蘑菇)：甘、寒。化痰，理气，益肠胃。用于脚气病，食欲不振，消化不良，乏力。

附 注：**双环菇 A. placomyces** Peck 及**紫红蘑菇 A. subrutilescens** (Peck) Hotson et Stuntz 对小鼠肉瘤 180、艾氏癌均有抑制作用。

### 鬼伞属 Coprinus Pers. ex Gray

**墨汁鬼伞**

**Coprinus atramentarius** (Bull.)Fr.——*Agaricus atramentarius* Bull.

春至秋季雨后生于田野、道旁、林中草地上。分布于东北、西南及河北、山西、甘肃、青海、新疆、江苏、台湾。

子实体(鬼盖)：甘，寒。化痰理气，益肠胃，消肿解毒。用于消化不良，无名肿毒。

**毛头鬼伞**

**Coprinus comatus** (Muell. ex Fr.) Gray——*Agaricus comatus* Muell.

夏、秋季雨后群生或单生在林中草地、路旁、田野、庭园或有机肥料堆存处。分布于东北及河北、山西、甘肃、青海、江苏、云南、西藏。

子实体(鸡腿蘑)：甘、滑，平。提神，益胃，消食，化痔。

附　注：对小鼠肉瘤 180、艾氏癌抑制率分别为 100% 和 90%。

**粪鬼伞**

**Coprinus sterguilinus** Quél.

春末及夏、秋雨后散生至群生于粪堆上。分布于河北、山西、江苏、台湾、广西、云南。

子实体(堆肥鬼伞)：甘，寒。祛痰理气，消肿，解毒，益肠胃。用于疔毒痈疖，消化不良。

附　注：**费赖斯鬼伞 C. friesii** Quél.、**晶体鬼伞 C. micaces** (Bull.) Fr.、**褶纹鬼伞 C. plicatilis** (Curt. et Fr.) Fr. 及**辐毛鬼伞 C. radians** (Desm.) Fr. 对小鼠肉瘤 180、艾氏癌均有抑制作用。

## 25. 粪伞科　Bolbitiaceae

### 田头菇属　Agrocybe Fayod

**柱状田头菇**

**Agrocybe cylindracea** (Fr.)Maire——*Pholiota cylindracea* (Fr.) Gill.

春至秋季丛生或单生于油茶、柳树等枯木部分。人工栽培，为食用菌。分布于福建、台湾、云南。

子实体(茶新菇)：有健脾，渗湿，止泻，利尿。

附　注：**硬田头菇 A. dura** (Bolt. ex Fr.)Sing.，分布于四川，对革兰氏阳、阴性菌及真菌有抵抗作用；**沼生田头菇 A. paludosa** (Lange) Kühn. et Romagn.、**田头菇 A. praecox** (Pers. ex Fr.) Fayod、**簇生沿丝伞 Naematoloma fasciculare** (Huds. ex Fr.) karst.、**亚砖红沿丝伞 N. sublateritium** (Fr.) Karst.，对小鼠肉瘤 180、艾氏癌均有抑制作用。

## 26. 桩菇科　Paxillaceae

### 桩菇属　Paxillus Fr.

**卷边桩菇**　卷平菌(山西)

**Paxillus involutus** (Batsch) Fr.——*Agaricus involutus* Batsch

春末到秋季散生或群生于林中或林缘草地上。为食用菌之一。分布于东北及河北、山西、安徽、广东、四川、云南、西藏。

子实体(台蘑)：微咸，温。追风散寒，舒筋活络。

附注：为山西五台县制作舒筋散原料之一。

## 27. 铆钉菇科 Gomphidiaceae

### 铆钉菇属 Gomphidius Fr.

**铆钉菇**

**Gomphidius viscidus** (L.) Fr.

生于松树下的地上，单生或群生。分布于东北及河北、云南。

子实体(肉蘑)：用于神经性皮炎。

## 28. 牛肝菌科 Boletaceae

### 小牛肝菌属 Boletinus Kalchbr.

**小牛肝菌**

**Boletinus cavipes** (Opat.) Kalchbr.

夏、秋季雨后群生或丛生于林中地上。分布于黑龙江、吉林、山西。

子实体(杂蘑)：微咸，温。舒筋活络，追风散寒。用于手足麻木，腰腿疼痛。

### 牛肝菌属 Boletus Dill. ex Fr.

**美味牛肝菌** 山鸟茸(陕西)

**Boletus edulis** Bull. ex Fr.

夏、秋季单生或散生于针阔混交林中地上。分布于西南及黑龙江、吉林、台湾、陕西、河南。

子实体(大脚菇)：淡，温。健脾消积，补虚，止带。

**小美牛肝菌** 见手青(云南)

**Boletinus speciosus** Frost.

夏、秋季丛生或散生于林中地上。分布于江苏、广东、云南。

子实体(见手青)：微甘，平。用于腹胀，消化不良。

附 注：**红柄牛肝菌 B. erythropus** Pers. ex Fr.、**细点牛肝菌 B. pulverulentus** Opat.，**桃红牛肝菌 B. regius** Krombh.、**血红牛肝菌 B. rubllus** Krombh.、**魔牛肝菌 B. satanas** Len.、**紫褐牛肝菌 B. violaceofuscus** Chiu 及**褐圆孔牛肝菌 Gyroporus castaneus** (Bull. ex Fr.) Quél. 等对小鼠肉瘤 180、艾氏癌均有抑制作用。

## 粉末牛肝菌属　Pulveroboletus Murr.

**黄粉末牛肝菌**

**Pulveroboletus ravenelii** (Berk. et Curt.) Murr.

夏、秋季单生于混交林中地上。分布于陕西、江苏、安徽、福建、河南、广东、海南、广西、四川、云南。

子实体(黄蘑菇)：微咸，温。祛风除湿，消炎止痛。用于风湿关节痛，外伤出血。

## 乳牛肝菌属　Suillus Michx ex Gray

**点柄乳牛肝菌**　栗壳牛肝菌(山西)

**Suillus granulatus** (L. ex Fr.) O. Kuntze——*Boletus granulatus* Fr.

夏、秋季散生或群生于针叶林或混交林中地上。分布于东北及河北、山西、山东、江苏、安徽、浙江、台湾、河南、湖北、湖南、广西、贵州、云南、西藏。

子实体(栗壳牛肝菌)：甘，温。用于大骨节病。

**厚环乳牛肝菌**

**Suillus grevillei** (Klotzsch.) Sing.

夏、秋季单生或群生于针叶林中地上。分布于东北及山西、陕西。

子实体(台蘑)：甘，温。舒筋活络，追风散寒。

**褐环乳牛肝菌**　土包牛肝菌(山西)

**Suillus luteus** (L. ex Fr.) Gray——*Boletus luteus* L. ex Fr.

夏、秋季单生或群生于黑松林或混交林中地上。分布于东北、西南及河北、山西、山东、江苏、湖南。

子实体(松蘑)：甘，温。用于大骨节病。

附　注：**铜绿乳牛肝菌 S. aeruginascens** (Secr.) Snell、**粘盖牛肝菌 S. bovinus** (L. ex Fr.) O. Kuntze 对小鼠肉瘤 180、艾氏癌有抑制作用。

# 29. 松塔牛肝菌科　Strobilomycetaceae

**绒柄松塔牛肝菌**

**Strobilomyces floccopus** Karst.

对小鼠艾氏腹水瘤、大鼠吉田肉癌均有抑制作用。

# 30. 红菇科　Russulaceae

## 乳菇属　Lactarius DC. ex Gray

**劣味乳菇**

**Lactarius insulsus** Fr.

夏、秋季单生或群生于阔叶林中地上。分布于河北、山西、江苏、安徽、河南、四川、云南。

子实体(铜钱菌)：苦，温。有毒。祛风散寒，舒筋活络。用于腰腿痛、手足麻木。

附　注：为山西太原制做舒筋丸的主要原料之一。

**沥青色乳菇**

**Lactarius picinus** Fr.

生于林中地上。分布于山西、陕西、安徽。

子实体(黑乳菇)：甘，温。用于腰腿疼痛、筋骨不适、四肢抽搐、手足麻木。

附　注：为制舒筋丸主要原料之一。

**辣乳菇**　　白乳菇

**Lactarius piperatus** (L. ex Fr.) Gray——*Agaricus piperatus* L. ex Fr.

夏、秋季雨后散生于阔叶林中地上。分布于华北、西南及黑龙江、吉林、陕西、江苏、安徽、浙江、福建、台湾、湖南、广西。

子实体(白乳菇)：辣，温。舒筋活络，祛风散寒。用于腰腿痛、四肢抽搐、手足麻木。

附　注：为山西制做舒筋丸的主要原料之一。

**绒白乳菇**

**Lactarius vellereus** (Fr.) Fr.——*Agaricus vellerius* Fr.

夏、秋季雨后散生于阔叶林中地上。分布于西南及吉林、山西、安徽、福建、江西、河南。

子实体(石灰菌)：苦，温。有毒。用于手足麻木、四肢抽搐、筋骨疼痛。为舒筋丸主要原料之一。

附　注：**香乳菇 L. camphoratus** (Bull.) Fr.、**红汁乳菇 L. hatsudake** Tanake、**稀褶乳菇 L. hygrophoroides** Berk. et Curt.、**亚绒盖乳菇 L. subvellereus** Peck、**香亚环乳菇 L. subzonzrius** Hongo 及**多汁乳菇 L. volemus** Fr.，含有抗癌物质，对小鼠肉瘤 180、艾氏癌均有抑制作用。

## 红菇属　Russula (Pers. ex Fr.) Gray

**革质红菇**

**Russula alutacea** (Pers.) Fr.

夏、秋季雨后散生于针阔叶混交林及阔叶林中地上。分布于黑龙江、河北、陕西、甘肃、江苏、安徽、福建、河南。

子实体(大红菇)：甘，平。祛风散寒，舒筋活络。是舒筋丸主要原料之一。

**密褶红菇**　　小黑菇(江苏)

**Russula densifolia** (Secr.) Gill.

夏、秋季雨后群生于阔叶林及针叶林中地上。分布于河北、山西、江苏、安徽、福建、江西、湖南、广西、四川、贵州。

子实体(灰炭菌)：微咸、涩，温。用于筋骨疼痛，四肢麻木，抽搐。

附　注：福建民间用于痢疾。为舒筋丸原料之一。

**臭红菇**　　鱼鳃菇(山西)

**Russula foetens** (Pers.) Fr.——*Agaricus foetens* Pers.

春末至秋初群生于松林及杂树林中地上。分布于黑龙江、吉林、河北、山西、江苏、安徽、浙江、福建、河南、湖南、海南、广西、四川、云南、西藏。

子实体(腥红菇)：臭，温。有毒。舒筋活络，祛风散寒。

附　注：是山西太原舒筋丸的原料之一。

**全缘红菇**

**Russula integra** (L.) Fr.——*Agaricus integra* L.

夏、秋季生于林中地上。分布于西南及吉林、河北、山西、陕西、新疆、江苏、福建。

子实体(变色红菇)：微咸，平。舒筋活络，祛风散寒。

附　注：本种为舒筋丸主要原料之一。

**黑红菇**　　大黑菇，黑蘑菇(江苏)

**Russula nigricans** (Bull.) Fr.

夏、秋季雨后单生或群生于阔叶林中地上。分布于吉林、江苏、安徽、福建、江西、广东、广西、四川、云南。

子实体(猪仔菇)：微咸，温。用于手足麻木、四肢抽搐，筋骨酸痛。

附　注：福建民间用于痢疾。

**葡酒红菇**

**Russula vinosa** Lindbl.

夏、秋季群生于阔叶林中地上。分布于福建。

子实体(正红菇)：民间用于产后贫血病。

**变绿红菇**　　青头菌(江苏)

**Russula virescens** (Schaeff.) Fr.——*Agaricus virescens* Schaeff.

夏、秋季雨后单生或散生于针阔混交林和阔叶林中地上。分布于西南及江苏、福建、河南、广西。

子实体(青头菌)：甘、淡、微酸，寒。清热，明目，舒筋活络，泻肝火。用于眼目不明，内热、妇女气郁。

附　注：**烟色红菇 R. adusta** (Pers.) Fr. **金红菇 R. aurata** (With.) Fr.、**疣状红菇 R. crustosa** Perk.、**蓝黄红菇 R. cyanoxanthus** (Schaeff.) Fr.、**美味红菇 R. delica** Fr.、**毒红菇 R. emetica** (Schaeff. ex Fr.) Pers. ex Gray、**拟臭黄菇 R. lauroxerasi** Melz.、**鳞盖红菇 R. lepida** Fr.、**淡紫红菇 R. lilacea** Quél.、**假大白菇 R. pseudodelica** Lange、**变黑红菇 R. rubescens** Beardslee、**血红菇 R. sanguinea** (Bull.) Fr.、**点柄黄红菇 R. senecia** Imai.、**茶褐黄菇 R. sororia** Fr.、**菱红菇 R. vesca** Fr. 及**黄孢红菇 R. xerampelina** (Schaeff. ex Secr.) Fr. 等种类含有抗癌物质，对小鼠肉瘤 180、艾氏癌均有抑制作用。

## 31. 鬼笔科 Phallaceae

### 竹荪属 Dictyophora Desv.

**短裙竹荪**

**Dictyophora duplicata** (Bosc) Fisch.

夏、秋季单生或群生于地上。分布于黑龙江、河北、江苏、浙江、四川、贵州。

子实体(短裙竹荪)：贵州民间用于痢疾。

**竹荪**

**Dictyophora indusiata** (Vent. ex Pers.) Fisch.

夏、秋季单生或群生于竹林林中或庭园林下地上。分布于河北、江苏、安徽、台湾、广东、广西、云南、贵州。

子实体(竹荪)：用于痢疾。

附　注：本种的煮沸液调拌于菜肴内，可用于防腐。

**杂色竹荪**

**Dictyophora multicolor** Berk. et Br.

单生或群生于阔叶林或竹林等地上。分布于西南及山西、江苏、安徽、福建、湖南、广东。

子实体(黄裙竹荪)：有毒。多作外涂药，用于脚气病。

附　注：**五棱散尾鬼笔 Lysurus mokusin** (L. ex Pers.) Fr.，分布于河北、江苏、浙江、广西、云南。有抗癌效果，对小鼠肉瘤 180、艾氏癌有抑制作用。

### 鬼笔属 Phallus Mich. ex Pers.

**白鬼笔**

**Phallus impudicus** L. ex Pers.

夏、秋季雨后单生或群生于林中地上。分布于山西、山东、安徽、广东、海南、四川、云南、西藏。

子实体(鬼笔)：甘、淡，温。活血，止痛。用于风湿骨痛。

附　注：本种亦作食品短期防腐剂。

**深红鬼笔**

**Phallus rubicundus** (Bosc) Fr.——*Ithyphallus rugulosus* Fisch.

夏、秋季单生或群生于竹林、针阔叶林中地上、田野及草丛中。分布于华北及辽宁、陕西、甘肃、江苏、浙江、福建、台湾、河南、湖南、广东、广西、四川、云南。

子实体(红鬼笔)：有毒。消肿，散毒，生肌。用于疮疽。

### 柄笼头菌属 Simblum Kl.

**田头格柄笼头菌**

**Simblum clathroides** Kawam. **var. gracile** Liou et Hwang
生于田间、草地上。分布于江苏、河南、四川。
子实体(黄柄笼头菌): 河南民间用于食道癌,胃痛。

## 32. 腹菌科 Hymenogastraceae

### 须腹菌属 Rhizopogon Fr.

**黑根须腹菌**
**Rhizopogon piceus** Berk. et Curt.
生于针阔叶混交林中地上。分布于山西、福建。
子实体(黑络丸菌): 淡,平。用于外伤出血。

## 33. 灰菇包科 Secotiaceae

### 灰菇包属 Secotium G. Kuntze

**伞菌状灰菇包**
**Secotium agaricoides** (Czern.) Hollós
多在秋季单生或散生于砂地、草原或山坡草地。分布于河北、内蒙古、新疆。
子实体(马勃): 辛,平。清肺,利咽,消肿,止血。用于咽喉痛,冻疮,外伤出血。

## 34. 轴灰包科 Podaxaceae

### 轴灰包属 Podaxis Desv.

**轴灰包**
**Podaxis pistillaris** (L. ex Pers.) Fr.
生于砂地上,早期地下生,后外露。分布于广东、海南。
子实体(柄马勃): 辛,平。消肿,止血,解毒。用于乳蛾,咽喉痛,外伤出血。

## 35. 柄灰包科 Tulostomataceae

### 钉灰包属 Battarraea Pers.

**鬼笔状钉灰包** 灰钉(四川)
**Battarraea phalloides** (Dicks.) Pers.
秋季生于地上。分布于四川。
孢子体(灰钉): 辛,平。清肺,利咽,消肿,止血。用于感冒咳嗽,咽喉痛,音哑, 外伤

出血。

**毛柄钉灰包**

**Battarraea stevenii** (Libosch.) Fr.

秋季生于碱滩草地上。分布于内蒙古、新疆。

孢子体(粗灰钉)：辛，平。止血，解毒，消肿。用于食道与胃出血，外伤出血，咽喉痛，乳蛾。

### 歧裂灰包属　Phellorinia Berk.

**歧裂灰包**　灰风梨(青海)

**Phellorinia inquinans** Berk.

秋季生于砂土或粘土草地和空旷草原上。分布于青海、新疆。

孢子体(灰风梨)：辛，平。消炎，止血。用于外伤出血，冻疮。

### 柄灰包属　Tulostoma Pers.

**小顶柄灰包**　白灰锤

**Tulostoma jourdanii** Pat.

单生或散生于云杉林中地上或草原上。分布于山西、内蒙古、甘肃、青海、新疆。

孢子体(灰锤)：辛，平。消肿，解毒，止血。用于感冒咳嗽，音哑，咽喉痛，乳蛾，外伤出血。

附　注：**褐柄灰包 T. bonianum** Pat.、**柄灰包 T.brumale** Pres.、**小孢柄灰包 T. finkii** Lloyd 及**裂顶柄灰包 T. laceratum** (Ehrenb.) Fr.，均有止血作用。

## 36. 马勃科　Lycoperdaceae

### 灰球菌属　Bovista Pers.

**铅色灰球菌**

**Bovista plumbea** Pers.

秋季生于旷野草地或草原。分布于河北、内蒙古、甘肃、青海、新疆、云南。

子实体(马勃)：辛，平。消肿，止血，解毒。用于外伤出血，衄血，胃出血，乳蛾，咽喉痛。

### 静灰球菌属　Bovistella Morg.

**长根静灰球菌**

**Bovistella radicata** (Dur. et Mont.) Pat.

夏、秋季生于林中地上或旷野草地。分布于吉林、甘肃、江苏、四川、云南。

子实体(马勃)：淡，平。清肺利喉，止血，消肿。用于肺热咳嗽，咽喉痛，衄血，外伤出

血。

**中国静灰球菌**　　马勃(甘肃)

**Bovistella sinensis** Lloyd

夏、秋季雨后生于草地上。分布于吉林、河北、山西、陕西、甘肃、山东、江苏、广东、贵州、云南、西藏。

子实体(马勃)：微咸，平。清热，利喉，消肿，解毒，止血。用于胃与消化道出血，乳蛾，外伤出血。

## 秃马勃属　Calvatia Fr.

**浮雕秃马勃**　　龟裂马勃(甘肃)

**Calvatia caelata** (Bull. ex DC.) Morg.——*Lycoperdon caelatum* Bull.

秋季生于地上及山坡草丛中。分布于河北、内蒙古、陕西、甘肃、新疆。

子实体(龟裂马勃)：辛，平。清热，利喉，止血，消肿。用于咽喉痛，疔腮，吐血，衄血，刀伤出血，无名肿毒。

**白秃马勃**

**Calvatia candida** (Rostk.) Hollós——*Langermannia candida* Rostk.

生于林中地上。分布于辽宁、河北、陕西、新疆、江苏、贵州、西藏。

子实体(马勃)：辛、平。止血，解热，利咽。

**头状秃马勃**

**Calvatia craniiformis** (Schw.) Fr.

夏、秋季单生或散生于林中地上。分布于黑龙江、吉林、河北、陕西、江苏、安徽、江西、福建、台湾、湖南、海南、广西、四川、云南。

子实体(马勃)：消炎，生肌，消肿，止痛。

**大秃马勃**　　巨马勃(山西)

**Calvatia gigantea** (Batsch ex Pers.) Lloyd——*Lycoperdon giganteum* Batsch ex Pers.

夏、秋季单生或散生于旷野草地或草原上。分布于华北及辽宁、甘肃、宁夏、青海、新疆、江苏、福建、云南。

子实体(马勃)：辛，平。清肺利咽，止血。用于风热郁肺，咽喉痛，咳嗽，音哑，衄血，创伤出血。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**紫色秃马勃**　　马屁包(青海)，灰菇(安徽)

**Calvatia lilacina** (Mont. et Berk.) Lloyd

秋季雨后生于旷野草地或林中地上。分布于东北、华北及青海、新疆、江苏、安徽、福建、台湾、湖北、广东、广西、四川、云南。

子实体(马勃)：辛，平。清肺利咽，止血。用于风热郁肺，咽喉痛，咳嗽，音哑，衄血，创伤出血。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

### 毛球马勃属 Lasiosphaera Reich.

**脱皮马勃** 药包(河北)

**Lasiosphaera fenzlii** Reich.

夏、秋季雨后生于地上或林中空旷地。分布于黑龙江、河北、内蒙古、陕西、甘肃、新疆、江苏、安徽、湖北、湖南、贵州。

子实体(马勃): 辛,平。清肺利咽,止血。用于风热郁肺,咽喉痛,咳嗽,音哑, 衄血, 创伤出血。

附 注:《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

### 马勃属 Lycoperdon Pers.

**网纹马勃**

**Lycoperdon perlatum** Pers.

夏、秋季雨后群生于林中空旷地,有时生在腐木上。分布于东北、西北、华东、西南及河北、山西、河南、湖南、海南、广西。

子实体(马勃): 辛,平。清肺,利咽,消肿,止血。用于咽喉痛,外伤出血。

**小马勃** 小药包(辽宁),马勃(江西)

**Lycoperdon pusillum** Batsch ex Pers.

夏、秋季雨后生于草地上。分布于华北及辽宁、陕西、青海、江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、四川、云南。

子实体(马勃): 辛,平。清热解毒,消肿,止血。用于乳蛾,咽喉痛, 外伤出血,衄血。

附 注: **梨形马勃 L. pyriforme** Schaeff. ex Pers. 有抗癌活性,对小鼠肉瘤 180 及艾氏癌有抑制作用。

### 树丝马勃属 Mycenastrum Desv.

**树皮丝马勃** 栓皮马勃

**Mycenastrum corium** (Guers.) Desv.

秋季生于草原上,幼嫩时可食。分布于河北、内蒙古、青海、新疆。

子实体(马勃): 辛,平。清热、利咽,消肿,止血,解毒。用于咽喉痛,乳蛾、胃出血,外伤出血。

## 37. 地星科 Geastraceae

### 地星属 Geastrum Pers.

**量湿地星** 山蟹(贵州)

**Geastrum hygrometricum** Pers.——*Astraeus hygrometricum* (Pers.) Morg.

夏、秋季散生于林中砂质土上。分布于东北、华东、西南及河北、陕西、甘肃、河南。

孢体(地星)：辛，平。清肺，消炎，解热、止血。用于咳嗽痰喘，外伤出血，衄血，冻疮。

**尖顶地星**　土星菌(吉林)

**Geastrum triplex** (Jungh.) Fisch.——*Geaster triplex* Jungh.

夏、秋季雨后群生于林中地上。分布于黑龙江、吉林、河北、山西、甘肃、宁夏、青海、新疆、四川、云南、西藏。

孢体(地星)：辛，平。止血，消肿，解毒。用于消化道出血，外伤出血，感冒咳嗽。

## 38. 硬皮马勃科　Sclerodermataceae

### 豆马勃属　Pisolithus Alb. et Schw.

**采色豆马勃**　豆包(安徽)

**Pisolithus tinctorius** (Pers.) Coker. et Couch——*P. arenarius* Alb. et Schw.

夏、秋季雨后单生或群生于松树林中、砂砾地或草地上。分布于中南及江苏、安徽、浙江、江西、福建、四川、云南。

子实体(豆包菌)：辛，平。消肿，止血。用于消化道出血，外伤出血，冻疮。

### 硬皮马勃属　Scleroderma Pers.

**大孢硬皮马勃**　硬皮马勃(江苏)

**Scleroderma bovista** Fr.

夏、秋季生于林中地上或草中，多与树木形成菌根。分布于西南及吉林、河北、陕西、甘肃、山东、江苏、浙江、河南、湖北、湖南。

孢体(硬皮马勃)：辛，平。消肿，止血。用于外伤出血，消化道出血。

**光硬皮马勃**

**Scleroderma cepa** Pers.

夏、秋季生于林中地上。分布于西南及江苏、浙江、河南、湖北、湖南。

孢体(硬皮马勃)：辛，平。止血，消肿，解毒。用于乳蛾，外伤出血，痔疮出血，

## 39. 鸟巢菌科　Nidulariaceae

### 黑蛋巢菌属　Cyathus Hall. ex Pers.

**粪生黑蛋巢菌**

**Cyathus stercoreus** (Schw.) de Toni

群生于粪土、堆肥、垃圾或田野。分布于华北、西南及黑龙江、陕西、江苏、安徽、江西、福建、河南、湖南、广西。

子实体(鸟巢菌)：健胃，止痛。用于胃痛、消化不良。

**多根硬皮马勃**　　星裂硬皮马勃(福建)

**Scleroderma polyrhizum** Pers.

夏、秋季单生或群生于林间空旷地、草丛或石隙处。分布于西南及江苏、浙江、福建、台湾、河南、湖南、广东、广西。

孢体(硬皮马勃)：辛，平。消肿，止血。用于外伤出血。

**隆纹黑蛋巢菌**

**Cyathus striatus** Willd. ex Pers.

夏、秋季群生于落叶林的朽木或腐殖质较多的地上。分布于黑龙江、河北、山西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖南、广东、广西、四川、云南、西藏。

子实体(鸟巢菌)：微苦，温。用于消化不良，胃痛。

## 40. 暗色孢科　Dematiaceae

### 尾孢霉属　Cercospora Fres.

**稻尾孢**

**Cercospora oryzae** Miyake

生于水稻叶上。分布于辽宁、吉林、河北、台湾、湖南、广西、四川、云南。

孢子(稻尾孢)：有抵抗腹水癌细胞作用。

## 41. 丛梗孢科　Moniliaceae

### 白僵菌属　Beauveria Vuill.

**白僵菌**　　白僵蚕(通称)，僵虫(河北、山西)

**Beauveria bassiana** (Bals.) Vuill.

为常见的昆虫寄生菌，寄生于190多种昆虫的幼虫、蛹及成虫体上。分布于东北及河北、陕西、青海、江苏、安徽、江西、福建、四川、云南、西藏。

僵蚕干燥体(白僵蚕菌)：辛、咸，平。祛风镇惊，消炎化痰。用于惊风，痉挛抽搐，头痛，咽喉痛，乳蛾，皮肤瘙痒，丹毒。

### 瘤孢属　Sepedonium Link et Fr.

**黄瘤孢**

**Sepedonium chrysospermum** (Bull.) Fr.

生于牛肝菌等上面。分布于河北、江苏、安徽、福建。

孢子(黄瘤孢)：微苦，温。用于外伤出血。

# 地衣植物 Lichenes

## 1. 皮果衣科 Dermatocarpaceae

### 皮果衣属 Dermatocarpon Th. Fr.

**皮果衣**

**Dermatocarpon miniatum** (L.) Mann.——*Lichen miniatus* L.

生于河岸、溪沟旁的岩石上，常见于低山较湿润的环境。分布于东北及河北、内蒙古、陕西、甘肃、云南、西藏。

地衣体(黑石耳)：健胃，消食，祛风湿。用于消化不良、高血压症。

## 2. 牛皮叶科 Stictaceae

### 肺衣属 Lobaria Schreb.

**光肺衣**

**Lobaria kurokawae** Yoshim.

生于岩面苔藓层上、地上、树干和树基部。分布于陕西、甘肃、安徽、浙江、江西、台湾、四川、云南、西藏。

地衣体(老龙皮)：消食健胃，消炎止痛，利水。用于消化不良、水肿。

附 注：功效相同的有**裂芽肺衣 L. isidiosa** (Mull.-Arg.) Vain，分布于黑龙江、河北、陕西、福建、台湾、湖南、云南；**平滑南肺衣 L. meridionalis** Vain var. **subplana** (Asah.) Yoshim，分布于陕西、甘肃、浙江、安徽、台湾。

**肺衣**

**Lobaria pulmonaria** (L.) Hoffm.

生于树干上或岩面苔藓层上。分布于东北及甘肃、台湾、广西、云南。

地衣体(老龙皮)：淡，微苦，平。祛风止痒，健脾利水，消炎。用于消化不良，小儿疳积，蛔虫病，腹胀，水肿，烧、烫伤，皮肤瘙痒，无名肿毒。

**网肺衣**

**Lobaria retigera** Trev.

生于树干上及岩面苔藓层上。分布于东北及陕西、甘肃、青海、安徽、浙江、江西、福建、台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

地衣体(老龙皮)：淡、微苦，平。健脾利湿，祛风止痒。用于消化不良，小儿疳积，肾炎水肿，皮肤瘙痒，烧、烫伤，疮疡肿毒。

### 牛皮叶属　Sticta Schreb.

**牛皮叶**

**Sticta miyoshiana** Müll.-Arg.

生于潮湿地上或岩石上。分布于山西、四川。

地衣体(老龙皮)：健脾利湿。

## 3. 石蕊科　Cladoniaceae

### 石蕊属　Cladonia Hill.

**筛石蕊**

**Cladonia aggregata** (Sw.) Ach.——*Lichen aggregatus* Sw.

生于地上、草丛中，常与苔藓混生。分布于西南及黑龙江、吉林、陕西、江苏、上海、安徽、浙江、江西、福建、台湾。

地衣体(筛石蕊)：用于制取抗生素的原料。

附　注：**粉杆红石蕊 C. bacillaris** (Ach.) Nyl.，**红头石蕊 C. floerkeana** (Fr.) Flk.，**瘦柄红石蕊 C. macilenta** Hoffm.，**软石蕊 C. mitis** Sandst.，**粉杯红石蕊 C. pleurota** (Flk.) Schaer. 其地衣体均可为制取抗生素原料。

**黑穗石蕊**

**Cladonia amaurocraea** (Flk.) Schaer.——*Capitularia amaurocraea* Flk.

生于地上、腐木上以及岩石苔藓层上，常见于阴湿的林中和高山苔原带。分布于黑龙江、吉林、河北、内蒙古、陕西、云南、西藏。

地衣体(黑穗石蕊)：祛风、镇痛。

**松石蕊**

**Cladonia fallax** Abbayes

生于树干基部。分布于陕西、四川。

地衣体(金刷把)：苦，平。镇静，止痛，收敛。用于癫痫，癫狂，头目眩晕，肾虚，跌打损伤，烧、烫伤。

**细石蕊**　　太白针(陕西)

**Cladonia gracilis** (L.) Willd.

生于地上或岩面苔藓层上。分布于东北及内蒙古、陕西、四川、云南。

地衣体(太白鹿角)：苦，凉。清热明目，消肿解毒，利尿通淋，凉血止血。用于目赤红肿，黄水疮，衄血，吐血，小便涩痛。

**石蕊**　　太白树(陕西)，刀伤药(贵州)

**Cladonia rangiferina** (L.) Web.——*Lichen rangiferinus* L.

生于森林中腐殖质土或沙质土上。分布于东北及内蒙古、陕西、台湾、湖北、云南、西藏。

地衣枝状体(石蕊)：苦，凉。祛风，镇痛，凉血止血。用于偏头痛，风湿痛，烦热心闷，咳血，淋证，外伤出血。

**雀石蕊**

**Cladonia stellaria** (Opiz) Pouzar et Vezda——*Cenomyce stellaris* Opiz

生于高寒山地草丛中、地上或针叶林中。分布于东北及内蒙古、陕西、甘肃、新疆、四川、云南。

地衣枝状体(太白花)：淡，平。平肝，健胃，调经，止血。用于眩晕、偏头痛，五脏虚劳，月经不调，带下病，衄血，高血压症。

**多层石蕊**　地喇叭(贵州)，树疙瘩(苗语)

**Cladonia verticillata** Hoffm.

生于路旁阴湿岩石上。分布于内蒙古、贵州、云南。

地衣体(小喇叭)：咸、微涩，平。止血，清热。用于外伤出血，咳血，烧、烫伤。

## 4. 珊瑚枝科　Stereocaulaceae

### 珊瑚枝属　Stereocaulon Schreb.

**裸珊瑚枝**

**Stereocaulon exutum** Nyl.

生于裸露的岩石上。分布于吉林、陕西、福建、湖北、四川、云南。

地衣体(石寄生)：凉血，降压，止血。用于吐血，衄血，高血压症。

**东方珊瑚枝**　石寄生、东方衣(陕西)

**Stereocaulon paschale** (L.) Hoffm.

生于高山岩石上。分布于东北及陕西、湖北、云南。

地衣体(石寄生)：苦、涩，凉。凉血，止血。用于衄血，吐血，高血压症。

## 5. 石耳科　Umbilicariaceae

### 石耳属　Umbilicaria Hoffm.

**石耳**　石壁花、石木耳(陕西)，岩茹(江西)，地木耳(贵州)

**Umbilicaria esculenta** (Miyoshi) Minks——*Gyrophora esculenta* Miyoshi

生于山地光裸的岩石上，尤喜生在硅质岩石上。分布于东北及陕西、安徽、浙江、江西、湖南、贵州、西藏。

地衣体(石耳)：甘，平。清热止血，利尿，解毒。用于淋证，带下病，痢疾，外伤出血，烧、烫伤，毒蛇咬伤。

**红腹石耳**　黄底石耳(陕西)

**Umbilicaria hypococcinea** (Jatta) Llano——*Gyrophora hypococcinea* Jatta

生于高山裸露的岩石上。分布于山西、陕西、西藏。

地衣体(红石耳)：淡、微苦，平。健胃消食，理气止痛。用于小儿疳积，痞块，虫积，消化不良，痢疾，带下病。

## 6. 鸡皮衣科 Pertusariaceae

### 鸡皮叶属 Pertusaria DC.

**包被鸡皮衣**

**Pertusaria velata** (Turn.) Nyl.

生于岩石上。分布于陕西、江西、台湾、云南，广布于温带地区。

地衣体(石霜)：收敛，止血，止痛。

## 7. 梅衣科 Parmeliaceae

### 冰岛衣属 Cetraria Ach.

**冰岛衣**

**Cetraria ialandica** (L.) Ach.——*Lichen islandicus* L.

生于高山草丛、地上，常与其它地衣和苔藓混生。分布于东北及陕西、甘肃、新疆、四川、云南、西藏。

地衣体(太白树)：调肠胃，助消化。

附 注：①本种为制取抗生素的原料。②**黄卷岛衣 C. cucullata** (Bell.) Ach.，**雪岛衣 C. nivalis** (L.) Ach.，**黄花岛衣 C. pinastri** (Scop.) Röhl.，**桧岛衣 C. juniperina** (L.) Ach.，均为制取抗生素的原料。

### 金丝属 Lethariella Krog.

**金丝刷**

**Lethariella cladonioides** (Nyl.) Krog.——*Chlorea cladonioides* Nyl.

生于高山针叶树的树干或树枝上以及腐木上。分布于陕西、甘肃、四川、云南、西藏。

地衣体(金丝刷)：镇静安神，消炎止痛。

**金丝带**

**Lethariella zahlbruckneri** (DR.) Krog.——*Usnea zahlbruckneri* DR.

生于高山针叶树的树干或树枝及枯木上。分布于陕西、四川。

地衣体(金腰带)：祛风除湿。用于劳伤，腰腿疼痛。

### 梅衣属 Parmelia Ach.

**皱梅衣**

**Parmelia caperata** Ach.

生于树干上及岩石表面苔藓层上。分布于东北及河北、内蒙古、陕西、浙江、江西、云南、西藏。

地衣体(地花)：清热，止渴，泻火。

**石梅衣**　　石花(宁夏)

**Parmelia saxatilis** (L.) Ach.——*Lichen saxatilis* L.

生于树干上及岩层表面上层。分布于东北及内蒙古、陕西、甘肃、宁夏、浙江、台湾、湖南、云南、西藏。

地衣体(石花)：甘，平。养血，明目，补肾，利尿，清热解毒。用于黄疸、小便涩痛、崩漏、小儿口疮、白癜风、皮肤瘙痒。

**梅衣**

**Parmelia tinctoria** Despr.

生于树干及岩层表面。分布于辽宁、河北、陕西、山东、浙江、安徽、福建、台湾、河南、广西、贵州、云南、西藏。

地衣体(白石花)：甘，凉。凉血，止血，解毒。用于无名肿毒，外伤出血。

附　注：本属大部分种类均可作为制取抗生素的原料，如**粉斑梅衣 P. borreri** (Sm.) Turn.、**粉黄袋梅衣 P. hypotrypella** Asal.，**裂缘梅衣 P. pseudolivetorum** Asal. **暗腹梅衣 P. tinctina** Mah. 及**绵腹衣属 Anzia** Stizenb. 的**仙人掌绵腹衣 A. opuntiella** Müll. 和**瘤绵腹衣 A. ornata** (A. Z.) Asal. 等。

## 8. 松萝科 Usneaceae

### 树发属　Alectoria Ach.

**亚洲树发**　　头发七，黑丝草(陕西)

**Alectoria asiatica** DR.

生于针叶树的树干或树枝上。分布于东北及陕西、甘肃、台湾、云南。

地衣丝状体(头发七)：淡，平。清热祛风，滋阴补肾，利尿通淋，消肿。用于肾虚羸瘦，遗精盗汗，热淋，头痛头晕，目疾，黄水疮，外伤出血。

附　注：功效相同的有**双色树发 A. bicolor** (Ehrh.) Nyl.，**树发 A. jubata** (L.) Ach.，**沟树发 A. sulcata** Nyl. 等。沟树发含有抗癌活性物质。

**绿树发**

**Alectoria virens** Tayl.

生于树干树枝或枯木上。分布于陕西、浙江、安徽、江西、台湾、云南。

地衣的丝状体(金丝带)：甘、苦，平。镇静安神，除风祛湿，止血止痛，调经活血，健脾胃。用于外伤出血，腰腿痛，眩晕，半身不遂，月经不调，阴挺，带下病。

### 松萝属　Usnea Wigg.

**环裂松萝**　　树挂(黑龙江、辽宁)，云雾草(浙江)，老君须(江西)，天棚矿(四川)，海

风藤(贵州)

**Usnea diffracta Vain.**

生于针、阔叶林中的树干及树枝上。分布于东北、华东、西南及山西、内蒙古、陕西、甘肃、台湾、湖南。

地衣丝状体(松萝)：甘，平。清热，化痰，止血，解毒。用于肺痨，咳嗽痰喘，外伤出血，创伤感染，中耳炎，疮疖，瘰疬，乳痈，烧、烫伤，阴道滴虫。

**长松萝**　山挂面(四川)

**Usnea longissima** Ach.

生于阴湿的针、阔叶林中树干与树枝上。除低海拔省市外，分布几遍全国。

地衣丝状体(天蓬草)：甘，平。清热止痛，止血生肌，驱蛔虫。用于外伤出血，跌打损伤，无名肿毒，风湿关节痛。

附　注：①功效相同的有**粗皮松萝 U. montis-fuji** Mot.，分布于东北及陕西、甘肃、湖北，四川。②松萝属所有种类及**树花属 Ramalina** Ach. 的**粉树花 R. farinacea** (L.) Ach.，**裂树花 R. minuscula** Nyl.，**肉刺树花 R. roesleri** (Hochst.) Nyl. 及**中国树花 R. sinensis** Jatta 等，均作为制取抗生素的原料。

# 不完全地衣类　Lichenes Imperfecti

## 9. 地茶科　Thamnoliaceae

### 地茶属　Thamnolia Ach.

**雪地茶**

**Thamnolia subuliformis** (Ehrh.) W. Culb.——*Lichen subuliformis* Ehrh.

生于高寒山地的地上或草丛中。分布于东北、西北、西南及内蒙古、台湾、湖南。

地衣体(雪茶)：微苦，凉。清热，解渴，醒脑，安神。

**地茶**

**Thamnolia vermicularis** (Sw.) Ach.——*Lichen vermicularis* Sw.

生于高寒山地的地上或草丛中。分布于东北、西南及内蒙古、陕西、新疆、安徽、湖北。

地衣体(太白茶)：淡、微苦，凉。清热，安神。用于肾虚，阴虚潮热，心中烦热，高血压症。

# 苔藓植物　Bryophyta

## 藓　　纲　Musci

### 1. 泥炭藓科　Sphagnaceae

泥炭藓属　Sphagnum Ehrh.

**尖叶泥炭藓**

**Sphagnum acutidolium** Ehrh.

多生于冷湿沼泽地。分布于东北、华北及贵州、云南。

植物体：清热，解毒，明目，消肿。用于目赤肿痛，角膜白斑。

**白齿泥炭藓**

**Sphagnum girgensohnii** Russ.

生于林地沼泽处或冷杉林地上。分布于东北、西南及台湾。

植物体：清热，明目，止血，止痒。

附　注：国内外多用其消毒后代脱脂棉。

**中位泥炭藓**

**Sphagnum magellanicum** Brid.

生于湿地或沼泽地。分布于东北林区。

植物体(泥炭藓)：清热，明目，止血，止痒。

附　注：消毒后用以代脱脂棉。

**泥炭藓**

**Sphagnum palustre** L.

生于沼泽地。全国各地均有分布。

植物体(泥炭藓)：淡、甘，凉。清热，明目，止痒，止血。

附　注：消毒后代脱脂棉用。

**粗叶泥炭藓**

**Sphagnum squarrosum** Crom.

生于沼泽或积水的林地。分布于东北及内蒙古、四川、云南西北部。

植物体：清热，明目，止痒，止血。

附　注：因吸水力强，消毒后用以代脱脂棉。

**细叶泥炭藓**　　满天星(陕西)

**Sphagnum teres** (Schimp.) Aongstr.——*S. squarrosum* Crom. var. *teres* Schimp.

生于沼泽或积水的林地。分布于东北及内蒙古、陕西、云南、西藏。

植物体(满天星)：淡、微苦，平。清热，明目，消肿。用于角膜白斑，目赤肿痛。

## 2. 牛毛藓科 Ditrichaceae

### 牛毛藓属 Ditrichum Hamp.

**黄牛毛藓**

**Ditrichum pallidum** (Hedw.) Hamp.——*Trichostomum pallidum* Hedw.

生于空旷的林地和土坡。分布于东北、华北、西南。

植物体：淡，凉。镇惊。民间用于小儿惊风。

## 3. 曲尾藓科 Dicranaceae

### 曲柄藓属 Campylopus Brid.

**梨蒴曲柄藓**

**Campylopus fragilis** (Brid.) B. S. G. var. **pyriformis** (Schultz.) Agstr.

生于林地断桩倒木之上，为小形腐木藓类。分布于东北及陕西、四川、云南。

植物体：辛，温。用于跌打损伤，老年虚咳，风湿麻木。

### 曲尾藓属 Dicranum Hedw.

**多蒴曲尾藓**

**Dicranum majus** Turn.

生于针叶和针阔混交林的腐木上。全国山区林地均有分布。

植物体：止咳，清热，解毒。

### 山毛藓属 Oreas Brid.

**山毛藓** 牛毛七(陕西)

**Oreas martiana** (Hopp. et Hornsch.) Brid.——*Weisia martiana* Hopp. et Hornsch.

生于高山地区，密集丛生成厚垫状。分布于东北、西南及陕西。

植物体(牛毛七)：甘、淡，凉。祛风除湿，清热养阴，止血，安神，镇痛。用于风湿麻木，阴虚潮热，肾虚，癫痫，外伤出血。

## 4. 丛藓科 Pottiaceae

### 小石藓属 Weissia Hedw.

**小石藓** 垣衣(浙江)

**Weissia controversa** Hedw.

生于较空旷的地上和附有薄土的岩石上。分布于东北、西南及陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、福建、湖北。

植物体：淡，平。清热解毒。用于鼻塞流涕，鼻窦炎。

## 5. 葫芦藓科 Funariaceae

### 葫芦藓属 Funaria Hedw.

**葫芦藓**

**Funaria hygrometrica** Hedw.

生于平原、田圃、村舍周围和火烧后的林地。全国各地均有分布。

植物体(葫芦藓)：辛、涩，平。祛风除湿，舒筋活血，镇痛，止血。用于肺热吐血，跌打损伤，湿气脚病。

## 6. 壶藓科 Splachnaceae

### 并齿藓属 Tetraplodon B. S. G.

**并齿藓**

**Tetraplodon mnioides** (Hedw.) B. S. G.——*Splachum mnioides* Hedw.

生于鸟粪土和小动物腐败尸体上，寒冷林地及沼泽地。分布于辽宁、吉林、内蒙古、陕西、四川、云南，西藏。

植物体：淡，平。镇静安神。用于中风，痫症，心悸。

## 7. 真藓科 Bryaceae

### 真藓属(小真藓属) Bryum Dill

**真藓**(银叶真藓)

**Bryum argenteum** Hedw.

生于田边、房宅周围、低山土坡、薄土岩面和火烧后的林地。全国各地均有分布。

植物体：涩，凉。清热解毒。用于痢疾，鼻窦炎。

### 大叶藓属 Rhodobryum (Schimp.) Hamp.

**暖地大叶藓** 太阳针(四川)，岩谷伞(贵州)，回心草(云南)

**Rhodobryum giganteum** (Schwaegr.) Par.——*Mnium giganteum* Schwaegr.

生于溪边碎石间和潮湿林地。分布于长江流域以南及陕西、甘肃。

植物体(回心草)：辛、微苦，凉。养心安神，清肝明目。用于惊心病，高血压症，肾虚，目赤，刀伤。

**大叶藓**　铁脚一把伞、回心草(云南)

**Rhodobryum roseum** (Hedw.) Limpr.——*Mnium roseum* Hedw.

生于森林中阴湿土地、石上、树根或腐木上，在南方生长在较高的山地，为北温带山地常见藓类。全国各地均有分布。

植物体(铁脚一把伞)：淡、微苦，平。镇静安神，壮阳。用于肾虚，阳痿，心悸；治外伤出血有显效。

## 8. 提灯藓科　Mniaceae

### 匐灯藓属　Plagiomnium T. Kop.

**尖叶匐灯藓**(尖叶提灯藓)

**Plagiomnium cuspidatum** (Hedw ) T. Kop.——*Mnium cuspidatum* Hedw.

生于山区、原野、溪边、阴湿土坡或树干基部成片生长。全国各地均有分布。

植物体(水木草)：淡，凉。清热，止血。用于衄血、崩漏。

附　注：功效相同的有**湿地匐灯藓 P. acutum** (Lindb.) T. Kop.，分布于全国各地。

## 9. 珠藓科　Bartramiaceae

### 泽藓属　Philonotis Brid.

**泽藓**　阴阳草(陕西)

**Philonotis fontana** (Hedw.) Brid.——*Mnium fontanum* Hedw.

生于海拔 800—3 200 米间的林下岩面薄土上和沼泽地带。分布于东北、华北、西北、西南。

植物体：清热解毒。用于烧、烫伤，乳蛾，咽喉痛，疮疖痈肿。

### 平珠藓属　Plagiopus Brid.

**寒地平珠藓**(平珠藓)

**Plagiopus oederi** (Brid.) Limpr.——*Bartramia oederi* Brid.

生于海拔 2 900—3 300 米高山地区的林下石灰岩岩面薄土上，为北半球寒冷及高山地区的藓类之一，常呈大片垫状群落。分布于东北及陕西(东、西太白山)、新疆(天山)、云南、西藏。

植物体(太阳针)：淡，平。镇静定惊。用于痫症，中风不语，心悸。

## 10. 万年藓科 Climaciaceae

### 万年藓属 Climacium Web. et Mohr

**万年藓**

**Climacium dendroides** (Hedw.) Web. et Mohr——*Leskea dendroides* Hedw.

生于湿润林地或荫蔽的湿草原及山地针叶林地。分布于大兴安岭、秦岭、四川西部，贵州及云南西北部。

植物体(万年藓)：祛风除湿。用于风湿劳伤，筋骨疼痛。

## 11. 白齿藓科 Leucodontaceae

### 白齿藓属 Leucodon Schwaegr.

**偏叶白齿藓**

**Leucodon secundus** (Harv.) Mitt.——*Sclerodontium secundum* Harv.

生于林荫湿石上或树干附生。分布于全国各地的山区。

植物体：淡，凉。散瘀消肿，止血，止痛。

## 12. 蔓藓科 Meteriaceae

### 毛扭藓属 Aerobrydium Fleisch.

**毛扭藓**

**Aerobrydium filamentosum** (Hook.) Fleisch.

生于树干或石上。分布于陕西、福建、台湾、四川、云南、西藏。

植物体：淡，凉。清热解毒。用于烧、烫伤。

### 悬藓属 Barbella Fleisch.

**多疣悬藓**

**Barbella pendula** (Sull.) Fleisch.——*Meteorium pendulum* Sull.

生于溪边或林内湿度较大的常绿阔叶树枝梢，多年生长后，附主由于树皮终年潮湿，引起真菌滋生，对茶树危害很大。分布长江流域以南各省区。

植物体：清热解毒。用于疖肿疮毒。

## 13. 羽藓科 Thuidiaceae

### 小羽藓属 Haplocladium (C. Müell.) C. Müell.

**细叶小羽藓**

**Haplocladium microphyllum** (Hedw.) Broth.——*Hypnum microphyllum* Hedw.

生于林下腐木上。分布于东北及陕西、江苏、安徽、台湾、西藏。

植物体：苦、辛，凉。清热解毒。用于各种炎症，其疗效与青霉素相似。

### 羽藓属 Thuidium B. S. G.

**大羽藓**(羽藓)

**Thuidium cymbifolium** (Doz. et Molk.) Doz. et Molk.——*Hypnum cymbifolium* Doz. et Molk.

生于海拔500—3 300米的林地、路边的树基、湿土面或岩面薄土上。全国各地均有分布。

植物体：淡，凉。祛腐生肌，清热解毒。

## 14. 柳叶藓科 Amblystegiaceae

### 柳叶藓属 Amblystegium B. S. G.

**柳叶藓**

**Amblystegium serpens** (L. ex Hedw.) B. S. G. ——*Hypnum serpens* L. ex Hedw.

生于海拔1 400—2 700米的林下湿润的土面、腐木或树干基部及岩面上。分布于东北、西北及云南、西藏。

植物体：止血。用于外伤出血。

### 牛角藓属 Cratoneuron (Sull.) Spruc.

**牛角藓**(短叶牛角藓)

**Cratoneuron filicinum** (Hedw.) Spruc.——*Hypnum filicinum* Hedw.

生于海拔800—2 500米的水湿土壤上或石灰质的沼泽地。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、青海、河南、云南、西藏。

植物体(牛角藓)：淡、微涩，平。宁心安神。用于心悸，肾虚。

### 薄网藓属　Leptodictyum (Schimp.) Warnst.

**薄网藓**

**Leptodictyum riparium** (L. ex Hedw.) Warnst.——*Hypnum riparium* L. ex Hedw.

生于湿草地或静水池塘中飘浮，往往成群落生长，有时或与水绵混生，高寒地区也有。全国各地普遍分布。

植物体：清热利湿。

## 15. 绢藓科　Entodontaceae

### 绢藓属　Entodon C. Müell.

**密叶绢藓**(扁枝绢藓)　　石苔(云南)

**Entodon compressus** (Hedw.) C. Müell.——*Leskea compressa* Hedw.

多附生于高山地区的树干基部或石灰岩薄土层。分布于东北、华北、西北、中南、西南。

植物体：苦、涩、平。利尿。多用于水肿病。

## 16. 灰藓科　Hypnaceae

### 灰藓属　Hypnum Hedw.

**大灰藓**

**Hypnum plumaeforme** Wils.

生于低山或马尾松林地和土坡草地上，喜酸性砂质土，在湿度高或石灰岩地区，则生于树干向北面的基部。全国各地均有分布。

植物体：甘，凉。清热凉血。用于咯血，吐血，衄血，血崩。

### 鳞叶藓属　Taxiphyllum Fleisch.

**鳞叶藓**(长叶鳞叶藓)

**Taxiphyllum taxirameum** (Mitt.) Fleisch.——*Stereodon taxirameus* Mitt.

生于低山林地湿土、岩面薄土上及树干基部，常成大片群落。分布于长江流域及西南。

植物体(鳞叶藓)：淡，凉。消炎，止血。用于外伤出血。

## 17. 金发藓科 Polytrichaceae

### 仙鹤藓属 Atrichum P. Beauv.

**波叶仙鹤藓**

**Atrichum undulatum** (Hedw.) P. Beauv.

生于山地阴湿林边或路旁土坡上，群集成丛生长。全国各地普遍分布。

植物体：抗菌。

### 小金发藓属 Pogonatum P. Beauv.

**东亚小金发藓** 红孩儿、止血药(贵州)

**Pogonatum inflexum** (Lindb.) Lac.

生于50--1 300米的林边或路旁土坡上。全国各地均有分布。

植物体(小金发藓)：辛，温。镇静，安神，止血。用于失眠，癫狂，跌打损伤，吐血。

**小口小金发藓**(大蒴小金发藓)

**Pogonatum microstomum** (Schwaegr.) Brid.

生于低地向阳山坡草丛中和砂石上。分布于西南及台湾。

植物体：辛、凉。消肿散瘀，排石止痛。用于胆囊结石。

### 金发藓属 Polytrichum Hedw.

**金发藓**(大金发藓) 千年松(江西)，矮松树(四川)，眼丹药(贵州)

**Polytrichum commune** L. ex Hedw.

生于山野阴湿土坡、森林沼泽、酸性土壤上。全国各地均有分布。

植物体(土马棕)：苦，凉。收敛止血，清热解毒，补虚，通便。用于刀伤出血，衄血，吐血，便血，血崩，肺痨，痈毒。

**桧叶金发藓**

**Polytrichum juniperinum** Willd. ex Hedw.

生于高山较干燥的红松、云杉和落叶松林下。分布于东北、西南及内蒙古、新疆。

植物体：消炎，抗菌，抗癌。

# 苔 纲 Hepalicae

## 18. 耳叶苔科 Frullaniaceae

### 耳叶苔属 Frullania Raddi

**串珠耳叶苔** 地蓬草(陕西)

**Frullania tamarisci** (L.) Dum. subsp. **monilata** (Reinw., Bl. et Nees)

Kamim.——*Jungermannia moniliata* Reinw., Bl. et Nees

生于山地林内树干和阴坡岩石上，成片生长。分布于长江流域以南各省区。

植物体：淡、微苦，凉。补肾，清心明目。用于目赤肿痛。

## 19. 瘤冠苔科 Grimaldiaceae

### 石地钱属 Reboulia Raddi

**石地钱**

**Reboulia hemisphaerica** (L.) Raddi——*Marchantia hemisphaeria* **L.**

生于较干燥的土坡、石壁和石缝土上。全国各地均有分布。

植物体(石地钱)：清热止血，消肿解毒。用于外伤出血，跌打肿痛。

## 20. 蛇苔科 Conocephalaceae

### 蛇苔属 Conocephalum Weber

**蛇苔** 七星丹(江西)，地皮斑(贵州)

**Conocephalum conicum** (L.) Dum.——*Marchantia conica* **L.**

生于溪边、林下阴湿土上或碎石上。全国各地均有分布。

植物体(蛇地钱)：甘、辛，寒。清热解毒，消肿止痛。用于毒蛇咬伤，发背痈疽，烧、烫伤、骨折，疔疮。

附 注：功效相同的有**小蛇苔 C. supradecompositum** (Lindb.) Steph.，分布于辽宁、陕西、台湾、西藏。

## 21. 地钱科 Marchantiaceae

### 毛地钱属 Dumortiera Nees

**毛地钱**

**Dumortiera hirsuta** (Sw.) Reinw., Bl. et Nees

生于阴暗潮湿的土坡和石壁上。分布于秦岭以南各省区。

植物体：清热解毒，拔毒，生肌。

### 地钱属 Marchantia L.

**地钱** 脓痂草(陕西)，地梭罗(贵州)

**Marchantia polymorpha** L.

生于阴湿的土坡和岩石上，西南地区路边及住宅附近常见。全国各地普遍分布。

植物体(地梭罗)：淡，凉。清热，生肌，拔毒。用于刀伤，骨折、毒蛇咬伤，疮痈肿毒，烧、烫伤。

# 蕨类植物门 (Pteridophyta)

## 1. 石杉科 Huperziaceae

### 石杉属 Huperzia Bernh.

**中华石杉** 龙胡子、旱灵草(云南)

**Huperzia chinensis** (Christ) Ching——*Lycopodium chinensis* Christ

生于林中树上或阴石上。分布于东北、华北、西北、西南。

全草：苦、涩，平。祛风除湿，清热，消肿止痛。用于关节酸痛、跌打损伤、腰缠火丹、癍疹。

**皱边石杉** 虱子草、矮杉树(四川)

**Huperzia crispata** (Ching) Ching——*Lycopodium crispatum* Ching

生于林中树干或石上。分布于广西、四川南部、贵州、云南北部。

全草：化瘀，止血，固肾涩精，益气。

**峨眉石杉** 铁扫把、鸡爪莲(四川)

**Huperzia emeiensis** (Ching et H. S. Hung) Ching et H. S. Hung——*Lycopodium emeiense* Ching et H. S. Hung

生于林下石上。分布于湖北、四川。

全草：用于跌打损伤，刀伤出血，肝炎，痔疮。

**东北石杉**

**Huperzia miyoshiana** (Makino) Ching——*Lycopodium miyoshianum* Makino

生于林下。分布于黑龙江伊春、牡丹江、长白山。

孢子：功效见**石松 Lycopodium japonicum** Thunb.

**小杉兰** 小接骨草(陕西)，石杉(中国药用孢子植物)

**Huperzia selago** (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.——*Lycopodium selago* L.

生于海拔 1 200—2 200 米的针叶林及针阔混交林下。分布于吉林、陕西、新疆、四川、云南、西藏。

全草(小接骨草)：微苦，平。祛风除湿，续筋止血，消肿止痛。用于风湿疼痛、跌打损伤、外伤出血、癍疹、蛇咬伤。

**千层塔** 救命王(福建)，虱婆药(湖南)，塔宝草(广西)，虱子草(四川)，蛇足石杉(云南植物研究)

**Huperzia serrata** (Thunb.) Trev.——*Lycopodium serratum* Thunb.

生于海拔 200—2 200 米的密林下或沟谷石上。分布于东北、华东、中南、西南。

全草(千层塔)：苦、涩，凉。有毒。散瘀消肿，止血生肌，麻醉镇痛，消肿，杀虱。用于

瘀血肿痛，跌打损伤，坐骨神经痛、神经性头痛，烧、烫伤；灭虱及臭虫等。

附　注：本种所含部分生物碱，经药理实验证明有肌肉松弛作用。

**虱婆草**

**Huperzia serrata** (Thunb.) Trev. f. **intermedia** (Nakai) Ching——*Lycopodium serratum* Thunb. f. *intermedia* Nakai

生境与分布同千层塔。

全草：舒筋活络，消肿止痛。用于跌打损伤、咳嗽痰喘；外用于疥疮及杀虱。

**九层塔**

**Huperzia serrata** (Thunb.) Trev. f. **longipetiolata** (Spring) Ching

生于林下阴石上。分布于广西。

全草：民间用于肺痨。

## 马尾杉属　Phlegmariurus (Herter) Holub.

**龙骨马尾杉**　　裤带藤(广东)，大伸筋草(广西)，龙骨石松(海南植物志)

**Phlegmariurus carinatus** (Desv.) Ching——*Lycopodium carinatum* Desv.

生于林中地上。分布于台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

全草：祛风除湿，通经活络，消肿止痛。用于关节疼痛，四肢无力，跌打损伤，无名肿毒。

**金丝条马尾杉**　　马尾千金草(广西、云南)

**Phlegmariurus fargesii** (Herter) Ching——*Lycopodium fargesii* Herter

生于林中树干或地上。分布于台湾、广西、贵州、四川。

全草：淡，平。有毒。祛风除湿，舒筋活络。用于风湿骨痛、肌肉痉挛，跌打损伤。

**华南马尾杉**　　栎树千金、石根子(广西)，麂子草(四川)

**Phlegmariurus fordii** (Baker) Ching——*Lycopodium fordii* Baker

生于阴湿林中的树干或岩石上。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、贵州、云南。

全草：苦，凉。消肿止痛，祛风止血，清热解毒。用于关节痛、跌打损伤、四肢麻木，淋证，蛇咬伤。

**有柄马尾杉**　　八股绳(云南)

**Phlegmariurus hamiltonii** (Spreng.) Löve et Löve var. **petiolatus** (Clarke) Ching

生于林中石上或树干上。分布于四川、云南。

全草：通经活络，渗湿利水。用于腰痛，跌打损伤，水肿。

**闽浙马尾杉**　　青丝龙、阳痿草(湖南)

**Phlegmariurus mingchegense** Ching

生于林下树干或岩石上。分布于安徽南部、浙江、江西、福建、湖南。

全草：苦，寒。清热消肿，止痛，止泻，杀虱。用于高热咳嗽、泄泻、头痛、无名肿毒；杀头虱。

**马尾杉**　牛尾草、六角卓(广西),树灵芝、龙胡子(云南)

**Phlegmariurus phlegmaria** (L.) Holub——*Lycopodium phlegmarium* L.

生于密林树干或岩石上。分布于台湾、广东、广西、云南南部。

全草：苦、淡,凉。有小毒。清热消肿,祛风除湿,消肿止痛。用于风湿疼痛、关节痛、跌打损伤、咽喉痛、水肿、癣疹。

**美丽马尾杉**　美丽石松(云南),万年松(中国高等植物图鉴)

**Phlegmariurus pulcherrimus** (Wall.) Löve et Löve——*Lycopodium pulcherrimum* Wall.

生于林下湿石积土上。分布于安徽、浙江、江西、台湾、广西、云南南部、西藏东南部。

全草：辛,温。清热解毒，活络散瘀，解表透疹。用于跌打损伤、透发麻疹，无名肿毒。

**展开马尾杉**　马尾干金草(广西)

**Phlegmariurus squarrosus** (Forst.) Löve et Löve——*Lycopodium squarrosum* Forst.

生于林中树干或岩石上。分布于广西、西藏。

全草：用于风湿腰痛,坐骨神经痛。

## 2. 石松科　Lycopodiaceae

### 扁枝石松属 Diphasiastrum Holub

**高山扁枝石松**

**Diphasiastrum alpinum** (L.) Holub——*Lycopodium alpinum* L.

生于海拔 2 000—2 200 米的亚高山草原、苔原地，常成小群落。分布于东北、华北。

全草：淡,平。活血,镇痛。用于关节痛、跌打损伤。

**扁枝石松**　小伸筋(湖南),舒筋草(四川),伸筋草(贵州),猴子尾巴(云南)

**Diphasiastrum complanatum** (L.) Holub——*Lycopodium complanatum* L.

生于海拔 800—2 800 米的疏林下和阳性山坡草地。分布于中南、西南及福建、台湾。

全草：辛,温。舒筋活血,祛风散寒,通经,消炎。用于风湿骨痛，月经不调，跌打损伤,烧、烫伤。

**地刷子**　伸筋草、扁心草(辽宁),地刷子石松(长白山植物药志)

**Diphasiastrum complanatum** (L.) Holub var. **anceps** (Wall.) Aschers.——*D. anceps* (Wall.) Ching

生于海拔 600—1 950 米的阳坡针叶林、针阔混交林下。分布于东北、华北。

全草：辛、微甘,温。祛风活络,散寒止咳,通经。用于风湿关节痛、月经不调、跌打损伤。孢子：用作强壮剂或外科吸湿剂。

**矮小石松**

**Diphasiastrum veitchii** (Christ) Holub——*Lycopodium veitchii* Christ

生于疏林向阳山坡草地。分布于台湾、湖北,四川、云南。

全草：祛风除湿，通经活络，消炎镇痛。用于腰腿痛、关节痛，跌打损伤，刀伤，烧、烫伤。

## 藤石松属　Lycopodiastrum Holub

**藤石松**　木麻黄(广东)，吊壁伸筋草(广西)，猫藤(浙江药用植物志)，千金藤(四川中药志)

**Lycopodiastrum casuarinoides** (Spring) Holub——*Lycopodium casuarinoides* Spring

生于海拔300—1 200米的山坡灌丛或林缘灌丛中。分布于西南及浙江南部、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西。

全草：微甘、温。祛风活血，消肿镇痛。用于风湿关节痛，腰腿痛，跌打损伤，疮疡肿毒，烧、烫伤。

## 石松属　Lycopodium L.

**单穗石松**　伸筋草(四川)，多穗石松(中国高等植物图鉴)，杉叠石松(长白山植物药志)

**Lycopodium annotinum L.**

生于针叶林或针阔混交林下。分布于东北及内蒙古、陕西、甘肃、台湾、湖北、四川、贵州。

全草及孢子(石松子)：苦、辛，平。祛风除湿，舒筋活络，解热镇痛。用于关节疼痛，跌打损伤，风湿麻痹。

**石松**　筋骨草(陕西)，蜈蚣藤(浙江)，九龙草(江西)，曲干草(广东)，过山龙(滇南本草)

**Lycopodium japonicum** Thunb.

生于海拔300—2 300米的山坡灌丛或疏林下酸性土壤中。分布于中南、西南及吉林、内蒙古、陕西、新疆、江苏、浙江、江西、福建。

全草(伸筋草)：甘，温。祛风活络，镇痛消肿，调经。用于风寒湿痹、四肢麻木、跌打损伤、月经不调、外伤出血、缠腰火丹。孢子：用于小儿湿疹。

**玉柏石松**　狗尾舒筋草(四川)，树状石松(中药通报)，千年柏(本草纲目)

**Lycopodium obscurum** L.

生于海拔800—1 700米的林下或与苔藓混生。分布于东北、华北、西南及甘肃、江西、湖北、湖南。

全草(玉柏)：微辛，温。祛风除湿，舒筋活络，散寒。用于风湿痹痛，肢体麻木，腰腿痛，跌打损伤，小儿麻痹后遗症、痈肿疮毒。

附　注：东北地区作伸筋草入药。

## 灯笼草属　Palhinhaea Franco et Vasc.

**灯笼草**　铺地蜈蚣(通称)，鹿角草(福建)，伸筋草(广西、云南)，舒筋草(四川)，筋

骨草(植物名实图考)

**Palhinhaea cernua** (L.) Franco et Vasc.——*Lycopodium cernuum* L.

生于海拔150—1 100米的山坡灌丛、沟谷路旁湿润酸性土上。分布于长江流域以南及台湾。

全草(铺地蜈蚣)：甘、微涩，平。舒筋活络，消肿解毒，收敛止血。用于风湿骨痛、四肢麻木、跌打损伤、小儿麻痹后遗症、小儿疳积，吐血，血崩，瘰疬，痈肿疮毒。

## 3. 卷柏科 Selaginellaceae

### 卷柏属 Selaginella Beauv.

**二形卷柏** 绿地柏(贵州)

**Selaginella biformis** A. Br.

生于林下阴湿溪边岩石上或栽培于庭园中。分布于福建、广东沿海、海南、贵州。

全草：用于烧、烫伤。

**大叶卷柏** 贵州卷柏(贵州)

**Selaginella bodineiri** Hieron. ex Christ

生于林缘溪沟边阴湿地。分布于贵州。

全草：清热利湿，舒筋活络，抗癌。用于风热咳嗽、水肿、跌打损伤，癌肿。

**布朗卷柏** 毛枝卷柏(浙江)，拨云丹、岩白草(四川)

**Selaginella braunii** Baker

生于林下阴湿处或岩石边。分布于浙江、湖北、四川。

全草：辛、微甘，平。清热，解毒，消肿，止咳。用于黄疸，烧、烫伤，肺痨咳嗽。

**装饰卷柏** 毛鹿卷柏(四川)，缘毛卷柏(秦岭植物志)

**Selaginella compta** Hand.-Mazz.

生于山坡林缘阴湿处或岩石边。分布于西南及陕西南部。

全草：微苦，凉。清热利湿，通经活络。用于胆囊炎，黄疸，痢疾，泄泻，肺痛，风湿关节痛，烧、烫伤。

**蔓出卷柏** 小过江龙(云南)

**Selaginella davidii** Franch.

生于海拔100—2 400米的林下石灰岩上或溪边。分布于中南、西南及河北、山西、山东、福建。

小过江龙(全草)：苦、涩、温。清热解毒，舒筋活络。用于筋骨疼痛，风湿关节痛，肝炎。

**薄叶卷柏** 山柏枝(广西)

**Selaginella delicatula** (Desv.) Alston——*Lycopodium delicatula* Desv.

生于海拔300—1 500米的林下或路边。分布于华东、西南及湖北、湖南、广东、海南、广西。

全草(薄叶卷柏)：辛，平。清热解毒，驱风退热，活血调经。用于小儿惊风，麻疹，跌

打损伤，月经不调，烧、烫伤。

**深绿卷柏**　岩扁柏(浙江)，石上柏(广西)，岩青(四川)，梭罗草(贵州)

**Selaginella doederleinii** Hieron.

生于海拔 400—2 300 米的林下湿地或溪沟边。分布于浙江、福建、台湾、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草(大叶菜)：甘，凉。消炎解毒，驱风消肿，止血生肌。用于风湿疼痛，风热咳喘，肝炎，乳蛾，痈肿溃疡，烧、烫伤。

**疏松卷柏**

**Selaginella effusa** Alston

生于山谷旁阴湿处的石岩上。分布于湖南、广东、广西、贵州。

全草：微苦，平。消炎解毒。用于肝炎，痢疾，痈肿。

**异穗卷柏**

**Selsginella heteristachys** Baker

生于林下阴湿地。分布于安徽、浙江、江西、福建、台湾、广东、广西、云南。

全草：微涩，凉。清热解毒，止血。用于蛇咬伤，外伤出血。

**兖州卷柏**　千年柏(江西)，金不换(福建)，柏叶草(湖南)，鹿茸草(广东)，卷筋草(贵州)

**Selaginella involvens** (Sw.) Spring——*Lycopodium involvens* Sw.

生于海拔 200—3 500 米的疏林下岩石边。分布于西南及陕西、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西。

全草(兖州卷柏)：淡、苦，寒。清热凉血，利水消肿，清肝利胆，化痰定喘，止血。用于急性黄疸，肝硬化腹水，咳嗽痰喘，风热咳喘，崩漏，瘰疬，疮痈，烧、烫伤，狂犬咬伤，外伤出血。

**地柏**　地柏(四川)，蜂药(贵州)

**Selaginella kraussiana** A. Br.

生于阴湿处及岩石边。分布于西南。

全草：淡、凉。消肿，镇咳，祛痰，止喘。用于肺热咳嗽，鼻塞流涕，疮毒，烧、烫伤，蜂螫。

**细叶卷柏**　地柏枝(江西、四川、云南)，金花草(四川)，四叶草(贵州)

**Selaginella labordei** Hieron.

生于林缘溪边阴湿处。分布于陕西、安徽、江西、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

全草：苦、涩，凉。清热解毒，利湿消炎，止血，调经。用于小儿惊风，小儿疳积，肝炎，胆囊炎，痢疾，肺痨咳血，月经不调，外伤出血。

**江南卷柏**　岩柏草(浙江)，石金花(江西)，烂皮蛇(广东、广西)、油面风(广西)，金花草(四川)

**Selaginella moellendorffii** Hieron.

生于海拔 350—2 300 米的林下或溪边。分布于长江流域以南及陕西、台湾。

全草(地柏枝)：辛、微甘，凉。清热解毒，利尿通淋，活血消肿，止血退热。用于急性黄疸，肝硬化腹水，淋证，跌打损伤，咯血，便血，刀伤出血，疮毒，烧、烫伤，毒蛇咬伤。

**单孢卷柏**　　小蛇尾(四川)

**Selaginella monospora** Spring

生于海拔800米上下的山坡岩石上。分布于广东、广西、四川、云南西北部、西藏。

全草：清热解毒。民间用于蛇咬伤。

**伏地卷柏**　　接筋藤(广西)，补地云(四川)，宽叶卷柏(中国药用孢子植物)

**Selaginella nipponica** Franch. et Sav.

生于海拔700—2 600米的山坡阔叶落叶林下或溪边湿地或岩石上。分布于华东、西南及陕西、河南、湖北、湖南。

全草(伏地卷柏)：淡，平。清热解毒，润肺止咳，舒筋活血，止血生肌。用于痰喘咳嗽，淋证，吐血，痔疮出血，外伤出血，扭伤，烧、烫伤。

**黑顶卷柏**　　百叶草(广西)

**Selaginella picta** A. Br. ex Baker

生于山地密林下阴湿处。分布于海南、广西、云南。

全草：淡、涩，辛。凉血止血，消炎止痛，舒筋活络。用于咳血，吐血，胃痛，痢疾，跌打损伤、外伤出血。

**垫状卷柏**　　回生草(广西)，还魂草(四川)，长生不死草(云南)，莪区森得尔英(藏语)

**Selaginella pulvinata** (Hook. et Grev.) Maxim.——*Lycopodium pulvinatum* Hook. et Grev.

生于海拔2 600—4 200米的山坡岩石上。分布于西南及广西。

全草(卷柏)：辛、涩，平。通经散血，止血生肌，活血祛瘀，消炎退热。用于闭经，子宫出血，胃肠出血，尿血，外伤出血，跌打损伤，骨折，小儿高热惊风。

**疏叶卷柏**　　小爬岩草、地虱子(四川)

**Selaginella remotifolia** Spring

生于海拔2 600米以下的林下石灰岩上或石洞内。分布于江西、福建、四川。

全草：淡，平。清热解毒，消炎止血，祛湿利尿。用于疮毒，狂犬咬伤，烧、烫伤。

**海南卷柏**　　滑石风(广西)

**Selaginella rolandi-principis** Alston

生于热带森林下，平卧在潮湿阴暗的岩石上。分布于海南、广西。

全草：清肝明目，凉血止血。用于肝炎，口腔破溃，各种出血。

**圆枝卷柏**　　地柏树(四川)，金鸡尾(贵州)

**Selaginella sanguinolenta** (L.) Spring——*Lycopodium sanguinolentum* L.

生于海拔1 200—3 600米的干旱石上。分布于东北、华北、西北、西南。

全草：舒筋活血，止痢。用于外伤出血，舒筋活络，痢疾。

**中华卷柏**　　地网子(山东)，地柏枝(河南)

**Selaginella sinensis** (Desv.) Spring——*Lycopodium sinense* Desv.

生于山坡林缘岩石上。分布于东北、华北、华东及陕西、河南。

全草：淡、微苦，凉。清热，利湿，止血。用于肝炎，胆囊炎，下肢湿疹，外伤出血，烧、烫伤。

**旱生卷柏**　　干蕨鸡(贵州)

**Selaginella stauntonina** Spring

生于干山坡岩石上。分布于东北、华北及山东、贵州。

全草：活血散瘀，凉血止血。用于便血，尿血，子宫出血，瘀血肿痛，跌打损伤。

**卷柏**　　老虎爪(河北)，铁拳头(江苏、浙江)，见水活(湖南)，九死还魂草(广东)，回阳草(滇南本草)

**Selaginella tamariscina** (Beauv.) Spring——*Stachygynandrum tamariscinum* Beauv.

生于海拔200—1 000米的干旱岩石上或石缝中。分布于全国各地。

全草(卷柏)：辛、涩，平。破血止血，祛痰，通经。用于吐血，便血，尿血，外伤出血，月经过多，胃肠出血，闭经，癥瘕，咳喘，癫痫昏厥，跌打损伤，烧、烫伤。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**粗叶卷柏**　　肺筋草、石上柏(广西)

**Selaginella trachyphylla** A. Br.

生于林下湿地或溪边。分布于广东、广西、贵州。

全草：淡，凉。收敛止血，清热止咳。用于咳嗽，痢疾，烧、烫伤，白疱疮，便血，刀伤出血，疥癣，蛇咬伤。

**翠云草**　　百脚草(浙江)，细风藤(广西)，拦路枝(四川)，剑柏(云南)

**Selaginella uncinata** (Desv.) Spring——*Lycopodium uncinatum* Desv.

生于海拔40—1 000米的林下湿石上或石洞内。分布于华东、中南、西南。

全草(翠云草)：淡、苦，寒。清热解毒，利湿通络，化痰止咳，止血。用于黄疸，痢疾，高热惊厥，胆囊炎，水肿，泄泻，吐血，便血，风湿关节痛，乳痈、烧、烫伤。

## 4. 木贼科　Equisetaceae

### 问荆属　Equisetum L.

**问荆**　　笔头草(河北)，接骨草(陕西)，锁眉草(江西)，黄蚂草(四川)

**Equisetum arvense** L.

生于海拔100—2 300米的田边沟旁。分布于东北、华北及新疆、山东、江苏、湖北、四川，贵州，西藏。

地上部分(问荆)：苦、涩，凉。清热利尿，止血，平肝明目，止咳平喘。用于鼻衄，肠出血，咯血，痔出血，月经过多，淋证，骨折，咳喘，目赤肿痛。

**散生问荆**　　小笔筒草(广西)，马浮草(四川)，散生木贼(中国高等植物图鉴)，密枝问荆(中国药用孢子植物)

**Equisetum diffusum** D. Don

生于林缘路边湿地。分布于西南及甘肃、湖南、广西。

全草(问荆)：苦、甘，平。清热利尿，解表散寒，明目退翳，接骨。用于小儿疳积，感冒发热，石淋，疝气，月经过多，衄血、目翳，跌打骨折，关节痛。

**犬问荆**　洗碗草(福建),骨接草(贵州),库鞠杂江(藏语),沼泽问荆(中国药用孢子植物)

**Equisetum palustre** L.

生于海拔 2 300 米以下的水田、沟边和阴湿地。分布同问荆。

地上部分(骨接草): 甘、苦、平。清热利尿,舒筋活血,明目,止血。用于淋证,风湿关节痛,跌打损伤,目翳,吐血,衄血。

**草问荆**

**Equisetum pratense** Ehrh.

生于海拔 2 000 米以下的林内、灌丛杂草地或林缘沟边。分布于东北、华北、西北及四川。

全草: 利尿,驱虫。用于动脉粥样硬化。

**林问荆**

**Equisetum sylvaticum** L.

生于森林草地、灌丛杂草中或林下湿地或沟边。分布于东北及内蒙古。

全草: 止血,收敛,镇痛。用于尿血,淋证,痛风、风湿痛、癫痫、滑胎。

## 木贼属　Hippochaete Milde

**笔管草**　驳骨草(广东),笔头草(广西),木贼草(四川),笔筒草(中国药用孢子植物)

**Hippochaete debilis** (Roxb.) Ching——*Equisetum debile* Roxb.

生于河边或溪沟边。分布于西南及江西、福建、湖北、湖南、广东、海南、广西。

地上部分(土木贼): 甘、苦,凉。清热明目,利尿通淋,退翳。用于感冒、目翳、尿血、便血、石淋、痢疾、水肿。

**木贼**　节骨草(东北),笔头草(河北),擦草(山西),节节草(植物名实图考)

**Hippochaete hiemale** (L.) Borher——*Equisetum hiemale* L.

生于海拔 600—3 000 米的山坡湿地或疏林下。分布于东北、华北、西北、西南及河南、湖北、湖南。

地上部分(木贼): 甘、苦,平。散风热,退目翳。用于风热目赤、迎风流泪、目生云翳。

附　注:《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**节节草**　麻蒿(山东),锉刀草(浙江),虾蟆竹(广东),笔杆草(贵州)

**Hippochaete ramosissima** (Desf.) Böerner——*Equisetum ramosissimum* Desf.

生于海拔 100—2 800 米的潮湿路旁、砂地、荒原或溪沟边。全国各地普遍分布。

地上部分(笔筒草): 甘、苦,平。清热明目,祛风除湿,止咳平喘,利尿,退翳。用于目赤肿痛、感冒咳喘、水肿、淋证、肝炎、跌打骨折。

## 5. 松叶蕨科 Psilotaceae

### 松叶蕨属 Psilotum Sw.

**松叶蕨** 岩扫帚(浙江),石寄生(福建),羊须(广西),石刷把(四川)

**Psilotum nudum** (L.) Griseb.——*Lycopodium nudum* L.

生于海拔200—2 000米的岩石或树干上。分布于江苏、安徽、浙江、福建、台湾、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草(石刷把): 甘、辛,温。祛风除湿,消炎解毒,利水止血。用于跌打损伤、风湿麻木、肺痨、水肿、痢疾、蛇咬伤。

## 6. 七指蕨科 Helminthostachyaceae

### 七指蕨属 Helminthostachys Kaulfuss

**七指蕨** 假七叶一枝花、蜈蚣草(广东)

**Helminthostachys zeylanica** (L.) Hook.——*Osmunda zeylanica* L.

生于雨林下阴湿地。分布于台湾、广东、海南、广西、云南。

全草(人地蜈蚣): 苦、甘,凉。清热化痰,散瘀镇痛,化瘀消积,解毒。用于劳伤咳嗽、跌打瘀积、乳蛾、风湿骨痛、毒蛇咬伤。根状茎: 用作滋补剂。

## 7. 阴地蕨科 Botrychiaceae

### 阴地蕨属 Botrychium Sw.

**薄叶阴地蕨** 一朵云(四川、贵州),西南小阴地蕨(中国药用孢子植物)

**Botrychium daucifolium** Wall.

生于林中溪沟边。分布于西南及广东、广西。

全草: 甘、辛,平。补虚润肺,化痰止咳,清热解毒。用于肺热咳嗽,气虚血虚, 疟腮, 乳痈,跌打损伤,毒蛇、狂犬咬伤。

**华东阴地蕨** 满天云(广西),红细补药(贵州),日本小阴地蕨(中国药用孢子植物)

**Botrychium japonicum** (Prantl) Underw.——*B. daucifolium* Wall. var. *japonicum* Prantl

生于林下或林缘草丛中。分布于江苏、浙江、江西、福建、台湾、广东、广西。

全草: 甘、苦,微寒。清热解毒,镇惊, 平肝润肺, 消肿散瘀。用于小儿高热抽搐,肺炎,咳喘痰血,痈疮疖肿。

**绒毛阴地蕨** 独立金鸡(四川),独蕨茸、金扇子(云南)

***Botrychium lanuginosum*** Wall

生于海拔1 800—2 600米的山地常绿杂木林下。分布于台湾、湖南、广西西北部、四

川、贵州南部、云南。

全草：微苦、辛，凉。清热解毒，止咳平喘，滋补润肺。用于虚痨咳嗽、肺痨、顿咳、疳螫、蛇咬伤、疮毒。

**扇羽阴地蕨**　高山独脚蕨(四川)，扇羽小阴地蕨(中国药用孢子植物)

**Botrychium lunaria** (L.) Sw.——*Osmunda lunaria* L.

生于海拔1 000米以上的草原、草甸或林下。分布于东北、华北及陕西、新疆、台湾、河南、四川、云南、西藏。

全草：辛，凉。清热解毒，平喘止咳。用于喘咳、痢疾、乳痈、毒蛇咬伤，创伤出血。

**药用阴地蕨**　蕨萁细辛(四川)

**Botrychium officinale**. Ching

生于林下或草地。分布于四川东南部。

全草：苦，凉。清热，止咳，消肿。用于肺热咳嗽、疮毒、瘰疬。

**劲直阴地蕨**　抓地虎(全国中草药汇编)

**Botrychium strictum** Underw.

生于海拔1 000米上下的林下湿地。分布于吉林、湖北、四川。

全草：甘，寒。清热解毒。用于毒蛇咬伤。

**阴地蕨**　蛇不见(浙江、福建)，春不见(湖北)，破天云(湖南)，蛇背生(四川)，鸡爪莲(广西)

**Botrychium ternatum** (Thunb.) Sw.——*Osmunda ternata* Thunb.

生于海拔1 000米以下的灌丛阴处。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广西、四川、贵州。

全草(阴地蕨)：甘、淡，微寒。清热解毒，平肝散结，润肺止咳。用于小儿惊风，疳积，肺热咳嗽，顿咳，瘰疬，痈肿疮毒、毒蛇咬伤。

**蕨萁**　一朵云(陕西)，大脚独蒿(四川峨眉)，蕨箕(植物名实图考)

**Botrychium virginianum** (L.) Sw.——*Osmunda virginiana* L.

生于少寒地区的山谷或灌丛下。分布于山西、陕西、浙江、湖北、四川、云南。

全草：苦、涩，凉。清热解毒，润肺止咳，平肝明目。用于肺痈，目赤，劳伤，跌打损伤，瘰疬，小儿惊风，目翳，蛇咬伤。

**云南阴地蕨**

**Botrychium yunnanense** Ching

生于海拔1 000—3 000米的杂木林下。分布于广东、广西、云南。

全草：甘、辛，凉。清热解毒，止咳平喘。用于毒蛇与狂犬咬伤、乳痈、痄腮、肺痨、咳嗽痰喘。

## 8. 瓶尔小草科　Ophioglossaceae

### 瓶尔小草属　Ophioglossum L.

**尖头瓶尔小草**　一支箭(四川)，蛇吐须(贵州)，一矛一盾(云南)

**Ophioglossum pedunculosum** Desv.

生于低海拔的灌丛中，偶有庭园栽培。分布于安徽、江西、福建、台湾、广东、四川、贵州、云南。

全草(一支箭)：甘、苦，凉。清热解毒，活血散瘀，祛风除湿，消肿止痛。用于蛇、犬咬伤，跌打损伤，骨折，疥疮，体虚咳嗽，小儿风热咳喘，小儿惊风，疳积。

**钝头瓶尔小草**　单匹枪(陕西)，一根箭(四川、陕西)

**Ophioglossum petiolatum** Hook.

生于海拔高达3 000米的开阔山坡灌丛下。分布于陕西、四川、贵州、云南。

全草：苦、甘，寒。清热消炎，消肿解毒。用于毒蛇咬伤、乳痈、疮肿、无名肿毒。

**心脏叶瓶尔小草**　蛇咬子(湖北)，心叶一支箭(广西)，一支箭(云南)

**Ophioglossum reticulatum** L.

生于密林下。分布于江西、福建、台湾、湖北、广西、四川、贵州、云南。

全草(一支箭)：微苦，平。清热解毒，消肿止痛。用于蛇咬伤、痈疖疮毒。

**狭叶瓶尔小草**　温泉瓶尔小草(长白山植物药志)

**Ophioglossum thermale** Kom.

生于山地草坡上或温泉附近。分布于东北及河北、陕西、江苏、江西、四川、云南。

全草：甘、辛，凉。有小毒。清热解毒，消肿止痛。用于跌打损伤、乳痈、肿毒、蛇咬伤。

**瓶尔小草**　独叶一枝枪(浙江)，单枪一支箭(江西)，拨云草(广东、广西)，盘龙箭(四川)

**Ophioglossum vulgatum** L.

生于海拔高达3 000米的林下或草地。分布于长江流域以南及陕西南部、台湾。

全草(一支箭)：微甘、酸，凉。清热解毒，消肿止痛，活血散瘀。用于疮疖肿毒，蛇、虫咬伤，肺热咳嗽，黄疸，目赤，咳嗽痰喘，跌打损失。

## 9. 观音座莲科　Angiopteridaceae

### 观音座莲属　Angiopteris Hoffm.

**褐色观音座莲**　马蹄付子(广西)

**Angiopteris badia** Ching

生于林下湿地。分布于广西，云南。

根状茎：补气温中。

**福建观音座莲**　山羊蹄(浙江)，马蹄树(湖南)，马蹄蕨(广东)，大马蹄(贵州)，观音座莲(植物名实图考)

**Angiopteris fokiensis** Hieron.

生于林下沟谷或溪边。分布于浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、贵州。

根状茎(马蹄蕨)：淡、微甘，凉。清热解毒，疏风散瘀，凉血止血，安神。用于跌打损伤、风湿痹痛、风热咳嗽、疟腮、崩漏、蛇咬伤、外伤出血。

**河口观音座莲**　　河口座蕨蕨(中国药用孢子植物)

**Angiopteris hokouensis** Ching

生于海拔 280 米的林下溪沟边。分布于云南河口、西双版纳。

根状茎：微苦、涩，凉。清热解毒，止咳，散结。用于疟腮、痈疖、瘰疬、骨折、蛇咬伤。

附　注：云南特有药用植物。

**广西观音座莲**　　广西莲座蕨(中国药用孢子植物)

**Angiopteris kwangsiensis** Ching

生于海拔 400 米的深谷密林下。分布于广西。

根状茎：微苦，凉。清热，散结，消肿。用于瘰疬、疟腮、痈疖、骨折，蛇咬伤。

附　注：广西特有药用植物。

**宽边观音座莲**　　滇南莲座蕨

**Angiopteris late-marginata** Ching

生于平坝低山沟谷雨林下溪边灌丛中。分布于云南。

根状茎：用于泄泻，痢疾，月经不调。

附　注：云南特有药用植物。

**大观音座莲**　　马蹄根(云南)，故季马(傣语)

**Angiopteris magna** Ching

生于密林下沟边。分布于云南。

根状茎：苦、涩，寒。清热利湿，止血，止痛，止痢。用于泄泻，痢疾，水肿，咳血，血崩，跌打损伤。

附　注：云南特有药用植物。

**刺柄观音座莲**

**Angiopteris muralis** Ching

生于山谷密林下。分布于广东。

根状茎：淡、涩，凉。清热散结，止咳，止泻，消肿。用于风热咳嗽，瘰疬，疟腮，泄泻，痢疾，骨折，蛇咬伤，痈疖。

**定心散观音座莲**　　定心散(浙江)

**Angiopteris officinalis** Ching

生于林下湿地。分布于浙江南部。

根状茎(定心散)：微苦，凉。安神，通络，清热止咳，消肿。用于肾虚，精神分裂症，冠心病，风热咳嗽，疟腮，痈肿，蛇咬伤。

附　注：浙江特有药用植物。

**峨眉观音座莲**　　峨眉半边莲(四川)

**Angiopteris omeiensis** Ching

生于林下沟谷中。分布于四川。

根状茎：苦、淡，凉。祛风除湿，消炎解毒，止咳，止血。用于风湿骨痛，肺热咳嗽，哮喘，小便淋痛，痢疾，痈肿，蛇咬伤。

附　注：四川特有药用植物。

**有柄观音座莲**

**Angiopteris petiolulata** Ching

生于林下阴湿沟谷中。分布于四川。

根状茎：消炎解毒，止咳，止血。用于肺热咳嗽，咳嗽痰喘，小便淋痛，痢疾，蛇咬伤，痈肿。

附　注：四川特有药用植物。

**强壮观音座莲**

**Angiopteris robusta** Ching

生于海拔 250 米的溪沟湿地。分布于广西、贵州。

根状茎：苦，凉。清热消炎，散结消肿。用于水肿，瘰疬，疖腮，骨折，痈肿，蛇咬伤。

**中华观音座莲**

**Angiopteris sinica** Ching

生于林中沟溪边湿地。分布于四川。

根状茎：祛风除湿，消炎解毒，止咳。用于肺热咳嗽，哮喘，风湿骨痛，痢疾，痈肿，蛇咬伤。

**云南观音座莲**

**Angiopteris yunnanensis** Hieron.

生于海拔 1 100 米的林下溪沟旁。分布于云南东南部。

根状茎：苦，凉。清热消炎，止血消肿。用于肺咯血，疖腮，骨折，痈肿，蛇咬伤。

附　注：云南特有药用植物。

### 原始观音座莲属　Archangiopteris Christ et Gies.

**亨利原始观音座莲**　小散血(湖南)

**Archangiopteris henryi** Christ

生于海拔 100—300 米的山地林下。分布于湖南、贵州、云南。

全株：苦，寒。清热利尿，止泻。用于痢疾，心烦火盛，小便淋痛。

## 10. 紫萁科　Osmundaceae

### 紫萁属　Osmunda L.

**桂皮紫萁**　分株紫萁(中国高等植物图鉴)，牛毛广东(长白山植物药志)

**Osmunda asiatica** (Fernald) Ohwi——*O. cinnamomea* L. var. *asiatica* Fernald

生于沼泽地或潮湿山谷。分布于黑龙江、吉林、四川、云南。

根状茎：苦、涩，微寒。清热，解毒，止血，镇痛，利尿，杀虫。用于痢疾，麻疹，衄血，便血，外伤出血，崩漏，绦虫病，钩虫病，蛲虫病。

**绒紫萁**

**Osmunda claytomiana** L. var. **pilosa** (Wall.) Ching——*O. pilosa* Wall.

生于海拔 3 400 米以下的山地林缘、路边草地。分布于东北、西南及台湾。

根状茎：四川民间用于筋骨疼痛。

**南方紫萁**　贯众(江西)

**Osmunda cinnamomea** L. var. **fokiense** Copel.

生于山谷林下。分布于安徽、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、四川东南部、贵州。

根状茎：苦，寒。清热，解毒，止血，杀虫。用于感冒，疟腮，衄血，钩虫病，蛲虫病。

**紫萁**　大贯众(山东、江苏)，狼萁(浙江)，避瘟贯众(四川)，高脚贯众(贵州)，黑龙骨(云南)

**Osmunda japonica** Thunb.

生于林下溪边的酸性土上。分布于华北、华东、中南、西南及陕西、甘肃。

根状茎(紫萁贯众)：苦、涩，寒。清热解毒，利湿散瘀，止血，杀虫。用于疟腮，痘疹，风湿痛、跌打损伤，衄血，便血，血崩，肠道寄生虫。

**宽叶紫萁**　爪哇蕨(广州植物志)

**Osmunda javanica** Bl.

生于林下溪沟边。分布于广东、广西、云南东南部。

根状茎：苦，寒。清热解毒，止血，杀虫。用于漆疮，疟腮，痈肿疔毒，肠道寄生虫。

**华南紫萁**　鲁萁(广东)，大凤尾蕨(广西)，马肋巴(四川)

**Osmunda vachellii** Hook.

生于山地、草丛或林缘溪沟边。分布于福建、广东、广西、贵州、云南。

根状茎：苦、涩，平。消炎解毒，舒筋活络，止血，杀虫。用于感冒，尿血，淋证，外伤出血，疟腮，痈疔，烧、烫伤，肠道寄生虫。

## 11. 瘤足蕨科　Plagiogyriaceae

### 瘤足蕨属　Plagiogyria Mett.

**镰叶瘤足蕨**　斗鸡草(四川)

**Plagiogyria distinctissima** Ching

生于海拔100—1 800米的林下溪沟边。分布于西南及江苏、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西。

全草：辛，温。清热散寒，解表。用于感冒，皮肤瘙痒，麻疹。

**华东瘤足蕨**

**Plagiogyria japonica** Nakai

生于海拔高达1 450米的林下沟谷中。分布于华东及湖南、广东、广西、四川、贵州。

根状茎：微苦，凉。清热解毒，消肿止痛。用于时行感冒，扭伤。

**两广瘤足蕨**

**Plagiogyria liankwangensis** Ching

生于林下溪边。分布于广东、广西。

根状茎：清热解毒。用于时行感冒。

**耳形瘤足蕨**　小牛肋巴(四川)

**Plagiogyria stenoptera** (Hance) Diels——*Blechnum stenopterum* Hance
生于海拔高达 3 000 米的林下酸性土上。分布于西南及台湾、湖南、广西。
根状茎：民间用于感冒头痛。

## 12. 里白科 Gleicheniaceae

### 芒萁属 Dicranopteris Bernh.

**大芒萁**
**Dicranopteris ampla** Ching et Chiu
生于海拔 600—1 400 米的疏林下或灌丛中。分布于海南、广西、云南、西藏。
嫩苗：微甘，平。解毒，止血。用于蜈蚣咬伤，衄血，外伤出血。
**铁芒萁** 路萁子柴(湖南)，鲁萁草(广西)，小蕨萁杆(四川)
**Dicranopteris linearis** (Burm.) Underw.——*Polypodium lineare* Burm.
生于林下或山坡酸性土上。分布于湖南、广东、广西、四川、云南、西藏。
全草：微甘，平。清热解毒，散瘀消肿，止血。用于痔疮、血崩，衄血，跌打损伤，风湿瘙痒，烧、烫伤，狂犬及蛇咬伤。
**芒萁**
**Dicranopteris linearis** (Burm.) Underw. var. **dichotoma** (Thunb.) Holtt——*Polypodium dichotomum* Thunb.
生于红壤丘陵荒坡或马尾松林下。分布于华东、中南、西南。
全草：微甘、淡，平。清热解毒，化瘀止血，止咳，利尿。用于肺热咳嗽，衄血，崩漏小，便涩痛，淋证，跌打损伤，烧、烫伤，外伤出血，狂犬及蛇虫咬伤。

### 里白属 Diplopterygium (Diels) Nakai

**里白** 大蕨萁(四川)
**Diplopterygium glaucum** (Thunb. ex Houtt.) Nakai——*Polypodium glaucum* Thunb. ex Houtt.; *Hicriopteris glauca* (Thunb.) Ching
生于海拔高达 1 500 米的林下或沟边。分布于华东、西南及湖北、广东、广西。
根状茎及髓部：微苦、涩，凉。行气，止血，接骨。用于胃痛，衄血，接骨。
**中华里白**
**Diplopterygium chinensis** (Ros.) Devol——*Hicriopteris chinensis* (Ros.) Ching
生于海拔 400—1 200 米的疏林下或溪边。分布于福建广东、广西、四川、贵州。
全草：接骨。
**光里白**
**Diplopterygium levissima** (Christ) Nakai——*Gleichenia laevissima* Christ; *Hicriopteris laevissima* (Christ) Ching

生于海拔500—2 500米的山坡谷地或林缘稍阴处。分布于长江流域以南各省区。
根状茎：苦，凉。行气止血。用于胃痛，鼻衄；亦用于接骨。

## 13. 莎草蕨科 Schizaeaceae

### 莎草蕨属 Schizaea Smith

**莎草蕨**
**Schizaea digitata** (L.) Sw.
生于海拔约200米的低丘陵疏林下或干瘠砂壤土上。分布于广东、海南。
全草：微苦，凉。清热解毒，退热。用于乳蛾，感冒发热。

## 14. 海金沙科 Lygodiaceae

### 海金沙属 Lygodium Sw.

**海南海金沙** 转转藤(贵州)
**Lygodium conforme** C. Chr.
生于林中或溪边灌木丛中。分布于海南、广西、贵州、云南。
全草：淡，凉。清热利尿。用于小便淋痛，淋证，石淋，尿血，痢疾，并能拔除弹片。
**曲轴海金沙** 坐转藤(福建)，长叶海金沙(广州)，驳筋藤(广西)，海金沙(云南)
**Lygodium flexuosum** (L.) Sw.——*Ophioglossum flexuosum* L.
生于疏林或灌丛中。分布于福建、广东、海南、广西、贵州、云南。
全草(牛抄藤)：甘、微苦，寒。舒筋活络，清热利尿，止血消肿。用于风湿麻木，淋证，石淋，水肿，痢疾，跌打损伤，外伤出血，疮疡肿毒。
**海金沙** 藤吊丝(福建)，海银沙(湖北)，硬筋藤(湖南)，铁丝草(广西)，软筋藤(贵州)
**Lygodium japonicum** (Thunb.) Sw.——*Ophioglossum japonicum* Thunb.
生于海拔1 000米以下的山地路旁或灌丛中。分布于长江流域以南各省区，北达陕西、江苏北部及河南南部。
孢子、茎藤(海金沙、金沙藤)：甘、咸，寒。清热利湿，通淋止痛。用于热淋，砂淋，石淋，血淋，膏淋，尿道涩痛。
附 注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。
**狭叶海金沙**
**Lygodium microstachyum** Desv.
生于海拔200米以下的灌丛、溪边及沟谷中。分布于浙江、福建、台湾、广东、海南、广西、云南。
全草及孢子：微苦，凉。利尿消炎。用于淋证，石淋，烧、烫伤。
**小叶海金沙** 扫把藤(广西)，左转藤(贵州)

**Lygodium scandens** (L.) Sw.——*Ophioglossum scandens* L.

生于海拔200米以下阳光充足的路旁、灌丛或水沟边。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

全草及孢子：甘，寒。利水渗湿，舒筋活络，通淋，止血。用于水肿，肝炎，淋证，痢疾，便血，风湿麻木，外伤出血。

## 15. 膜蕨科 Hymenophyllaceae

### 膜蕨属 Hymenophyllum Smith

**华东膜蕨**

**Hymenophyllum barbatum** (v. d. B.) Baker——*Leptocionium barbatum* v. d. B.

生于海拔1 000米以下的林下阴湿岩石上。分布于华东及湖南、广东、广西。

全草：用于外伤出血。

附　注：**顶果膜蕨 H. khasyanum** Hook. et Baker，分布于广西、四川、贵州、云南，全草止血。

### 蕗蕨属 Mecodium Presl.

**蕗蕨**　马尾草(广西)

**Mecodium badium** (Hook. et Grev.) Cop.——*Trichomanes badium* Hook. et Grev.

生于海拔400—1 600米的林下阴湿岩石上。分布于西南及江西、福建、台湾、湖北、广东、海南、广西。

全草：淡、涩，凉。消炎生肌。用于烧、烫伤，痈疖，外伤出血。

**长柄蕗蕨**

**Mecodium osmundoides** (v. d. B.) Ching——*Hymenophyllum osmundoides* v. d. B.

生于海拔800—1 100米的林下溪谷岩石上。分布于福建、广东、广西、贵州、云南、西藏。

全草：苦，凉。生肌消炎。用于烧、烫伤，痈疖，外伤出血。

### 瓶蕨属 Trichomanes L.

**瓶蕨**　青蛇斑、石上挡(四川)

**Trichomanes auriculata** Bl.——*Vandenboschia auriculata* (Bl.) Cop.

生于海拔2 700米以下的溪谷林中树干或岩石上。分布于西南及浙江、江西、福建、台湾、广东、海南、广西。

全草：微苦，平。止血生肌。用于外伤出血。

**城口瓶蕨**　滚山龙(四川)，滚龙草(中国药用孢子植物)

**Trichomanes fargesii** Christ——*Vandenboschia fargesii* (Christ) Ching

生于阴湿林边或灌丛中。分布于四川、贵州。

全草：淡，平。解热清凉。用于吐血，便血，淋浊。

**漏斗瓶蕨**　热水莲(四川峨眉山)

**Trichomanes naseana** Christ——*Vandenboschia naseana* (Christ) Ching

生于山地阴湿岩壁上。分布于西南及台湾、广东、广西。

全草：淡、涩，平。健脾和胃，止血生肌。用于消化不良，外伤出血。

**华东瓶蕨**　地枝莲(四川)

**Trichomanes orientalis** C. Chr.——*Vandenboschia orientalis* (C. Chr.) Ching

生于林下溪谷岩石上。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖南，广西、贵州、云南。

全草：微涩，凉。清热解毒，健脾消食，止血生肌。用于肺热咳嗽，消化不良，外伤出血，疮疖肿毒。

## 16. 蚌壳蕨科　Dicksoniaceae

### 金毛狗属　Cibotium Kaulf.

**金毛狗**　金毛狮子(浙江)，毛犬(湖北)，黄狗头(广东)，金狗毛(广西)，金毛狗脊(本草备要)

**Cibotium barometz** (L.) J. Smith——*Polypodium barometz* L.

生于山麓沟边及林下阴处酸性土壤上。分布于西南及浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西。

根状茎(狗脊)：苦、甘，温。补肝肾，强腰脊，祛风湿。用于腰脊酸软，下肢无力，风湿痹痛。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 17. 桫椤科　Cyatheaceae

### 桫椤属　Alsophila R. Br.

**桫椤**　山蜈蚣(广东)，龙骨风(广西)

**Alsophila spinulosa** (Wall. ex Hook.) Tryon——*Cyathea spinulosa* Wall. ex Hook.

生于海拔 100—800 米的林下溪边或林缘湿地。分布于西南及福建、台湾、广东、广西。

根状茎：苦、涩，平。驱风除湿，强筋骨，活血散瘀，清热解毒，驱虫。用于肾虚腰痛，跌打损伤，风湿骨痛，咳嗽痰喘，崩漏，蛔虫病，蛲虫病

### 黑桫椤属　Gymnosphaera Bl.

**大黑桫椤**　　黑狗头(广西),大桫椤(海南植物志)

**Gymnosphaera gigantea** (Wall. ex Hook.) J. Smith——*Alsophila gigantea* Wall.; *Cyathea gigantea* (Wall.) Holtt.

生于密林下阴湿处。分布于广东、广西、云南。

全株：涩,平。祛风壮筋。用于风湿关节痛,跌打损伤。

## 18. 稀子蕨科　Monachosoraceae

### 稀子蕨属　Monachosorum Kunze

**尾叶稀子蕨**

**Monachosorum flagellare** (Maxim.) Hayata——*Polypodium flagellare* Maxim.

生于海拔 800—1 500 米的密林下。分布于江西、贵州。

全草：微苦,平。用于痛风。

**稀子蕨**　　观音莲(广西)

**Monachosorum henryi** Christ

生于海拔 500—1 600 米的密林下沟谷中。分布于台湾、广东、广西、贵州、云南。

全草：用于风湿骨痛。

## 19. 碗蕨科　Dennstaedtiaceae

### 碗蕨属　Dennstaedtia Bernh.

**碗蕨**

**Dennstaedtia scabra** (Wall.) Moore——*Dicksonia scabra* Wall. ex Hook.

生于海拔 1 000—2 400 米的林下或溪边。分布于西南及浙江、江西、台湾、湖南,广西。

全草：辛,凉。清热解表。用于感冒头痛。

### 鳞盖蕨属　Microlepia Presl

**华南鳞盖蕨**　　凤尾千金草(广西)

**Microlepia hancei** Prantl.

生于林下溪边湿地。分布于福建、台湾、广东、海南、广西。

全草：微苦,寒。祛湿热。用于风湿骨痛,感冒,黄疸。

**边缘鳞盖蕨**　　黑鸡婆(四川)

**Microlepia marginata** (Houtt.) C. Chr.——*Polypodium marginatum* Houtt.

生于海拔300—1 500米的灌丛中或溪边。分布于西南及江苏、浙江、江西、福建、台湾、广东、广西。

全草：清热解毒。用于痈疮疖肿。

**粗毛鳞盖蕨**

**Microlepia strigosa** (Thunb.) Presl——*Trichomanes strigosa* Thunb.

生于海拔1 700米以下的林下石灰岩上。分布于东南沿海及四川、云南。

全草：微苦，寒。祛湿热。用于时行感冒，肝炎。

## 20. 鳞始蕨科　Lindsaeaceae

### 鳞始蕨属　Lindsaea Dry.

**异叶鳞始蕨**　　异叶林蕨(海南植物志)

**Lindsaea heterophylla** Dry.——*Schizoloma heterophyllum* (Dry.) J. Smith

生于海拔100—600米的林下溪边。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、云南。

全草：利水，活血，止痛。

**卵叶鳞始蕨**　　金花草(广西)

**Lindsaea intertextum** (Ching) Ching——*Schizoloma intertextum* Ching

生于海拔130—230米的灌丛中。分布于广东、广西、云南。

全草：淡、涩，凉。止血，止痛，止痢。用于痢疾，跌打损伤，外伤出血。

**鳞始蕨**　　土黄连(四川)，陵齿蕨(中国植物志)，刀叶林蕨(海南植物志)

**Lindsaea odorata** Roxb.

生于海拔2 000米以下的林下阴湿处或沟边。分布于西南及福建、台湾、湖南、广东、海南、广西。

全草：淡，凉。利尿，止血。用于尿闭，吐血。

**团叶鳞始蕨**　　月影草(广东)，黑脚蕨(广西)，团叶陵齿蕨(中国植物志)

**Lindsaea orbiculata** (Lam.) Mett.

生于海拔500—1 100米的溪边林下或石上。分布于西南及福建、台湾、广东、广西。

全草：苦，凉。抗菌消炎，收敛止血，镇痛。用于枪弹伤，痢疾，疮疖。

### 乌蕨属　Stenoloma Fée

**乌韭**　　花叶凤尾草(浙江)，万能解毒草(江西)，金花草(广东)，野黄连(四川峨眉)，乌蕨(中国植物志)

**Stenoloma chusana** (L.) Ching——*Adiantum chusana* L.

生于海拔200—1 900米的林下或路边。分布于华东、中南、西南及陕西。

叶(乌韭)：微苦，寒。清热解毒。用于砷中毒，沙门氏菌所致食物中毒，野菰、木薯中

毒，泄泻，痢疾。

## 21. 姬蕨科 Hypolepidaceae

### 姬蕨属 Hypolepis Bernh.

**姬蕨** 冷水蕨(广西)

**Hypolepis punctata** (Thunb.) Mett.——*Polypodium punctatum* Thunb.

生于海拔500—2 300米的林下溪边或湿草地。分布于西南及安徽、浙江、江西、福建、台湾、广东、广西。

全草：苦、辛，凉。清热解毒，收敛止血。用于烧、烫伤，外伤出血。

## 22. 蕨科 Pteridiaceae

### 蕨属 Pteridium Scop.

**蕨** 蕨菜(通称)，拳头菜(山东)，米蕨(四川)，如意菜(长白山植物药志)，乌糯葛萁(浙江药用植物志)

**Pteridium aquilinum** (L.) Kuhn var. **latiusculum** (Desv.) Underw. ex Heller——*Pteris latiuscula* Desv.

生于海拔100—1 200米的林缘及荒坡。全国均有分布，主产长江流域以北地区。

嫩苗、根状茎(蕨、蕨根)：甘，寒。清热解毒，驱风利湿，降气化痰，利水安神。用于感冒发热，痢疾，黄疸，高血压症，风湿腰痛，带下病，脱肛。

**蕨菜** 龙爪菜、锯菜(云南)

**Pteridium excelsum** (Bl.) Ching

生于山坡草丛及路边。分布于云南。

根状茎(蕨根)：清热解毒。用于烧、烫伤，疮毒。

附 注：蕨菜有致癌物质，不宜多食。

**毛轴蕨**

**Pteridium revolutum** (Bl.) Nakai——*Pteris revolutum* Bl.

生于海拔570—3 000米的阳坡或疏林下。分布于西南及陕西、甘肃、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西。

根状茎：涩，凉。祛风除湿，解热利尿，驱虫。用于风湿关节痛，淋证，脱肛，疮毒，蛔虫病。

## 23. 凤尾蕨科 Pteridaceae

### 凤尾蕨属 Pteris L.

**猪鬃凤尾蕨** 细凤尾草(四川)，还阳草(植物名实图考)，猪鬃凤尾草(中国蕨类植

物图谱）

**Pteris actiniopteroides** Christ

生于海拔 600—2 000 米的石灰岩缝或旧墙上。分布于西南及陕西南部、湖北、广西。

全草：苦，寒。清热解毒，消痰，清胃。用于咳喘痰喘，胃炎，烧、烫伤，刀伤，犬咬伤。

**狭眼凤尾蕨**

**Pteris biaurita** L.

生于山地溪沟边。分布于台湾、广东、海南、广西、云南。

全草：苦，寒。止血，收敛，止痢。用于痢疾，泄泻，外伤出血。

**条纹凤尾蕨**

**Pteris cadieri** Christ

生于溪边林下。分布于江西、福建、台湾、广东、广西、云南。

全草：清热解毒。用于痢疾。

**大叶井口边草**　　八字龙(四川)，凤尾接骨草(云南)，大叶凤尾草(台湾植物志)

**Pteris cretica** L.

生于林下溪边。分布于台湾、四川、云南。

全草：甘、淡，平。清热解毒，除湿，止血，止痢。用于黄疸，泄泻，淋证，乳蛾，乳痈，崩漏，带下病，风湿疼痛，外伤出血。

**粗糙凤尾蕨**　　井口边草(云南)

**Pteris cretica** L. var. **laeta** (Wall.) C. Chr. et Tard-Blot——*P. laeta* Wall.

生于林下溪沟边。分布于西南及江西。

全草：辛、苦、涩，凉。消炎解毒，利水止痢，活络。用于痢疾，泄泻，肝炎，咽喉痛，小便淋痛，肾炎水肿，风湿痛，跌打肿痛，痈疮疖肿。

**指状凤尾蕨**

**Pteris dactylina** Hook.

生于林下溪沟边岩石缝中。分布于西南。

全草(金鸡尾)：淡、涩，平。清热利湿，定惊解毒。用于痢疾，泄泻，疟腮，瘰疬，小儿惊风，狂犬咬伤，带下病，水肿。

**岩凤尾蕨**　　楚箭草(湖南)，鸡爪风(四川峨眉)

**Pteris deltodon** Baker

生于海拔 1 500 米以下的石灰岩上。分布于西南及湖南、广东、广西。

全草：甘，平。清热解毒，消炎止泻。用于泄泻，痢疾，久咳不止，淋证。

**刺齿凤尾蕨**　　半边双(广西)

**Pteris dispar** Kunze

生于海拔 150—950 米的山地疏林下或山坡路旁石缝中。分布于华东及湖南、广西、四川、贵州。

全草(刺齿凤尾蕨)：苦、涩，凉。清热解毒，止血，散瘀生肌。用于泄泻，痢疾，疟腮，风湿痛，疮毒，跌打损伤，蛇咬伤。

附　注：广西民间以根作止血剂，效果近似云南白药。

**疏羽半边旗**　　大半边旗(广西)，半边旗(四川)

**Pteris dissitifolia** Baker

生于林下或岩石缝中。分布于广西、四川、云南。

全草：微苦，凉。生肌，止血，止痢。用于外伤出血，痢疾。

**剑叶凤尾蕨**　三叉草(广州)，井边茜(海南)，鸡脚草(广西)，小凤尾草(贵州)

**Pteris ensiformis** Burm.

生于海拔150—1 000米的林下溪边或潮湿酸性土上。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全草(凤冠草)：淡、涩，凉。清热利湿，凉血止痢。用于痢疾，疟疾，黄疸，淋证，血崩，带下病，乳蛾，疖肿，湿疹，跌打损伤。

**溪边凤尾蕨**

**Pteris excelsa** Gaud.

生于海拔600—2 700米的溪边疏林下或灌丛中。分布于西南及甘肃、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西。

全草：清热解毒。用于淋证，烧、烫伤，狂犬咬伤。

**金钗凤尾蕨**　南方凤尾蕨(广东)，冷蕨草(广西)

**Pteris fauriei** Hieron.

生于海拔300—800米的山坡林下路旁或溪沟石缝中。分布于安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西。

叶：淡，凉。收敛，止血。用于烧、烫伤，外伤出血。

**狭叶凤尾蕨**　猪毛草(四川峨眉)，旋鸡尾草(贵州)

**Pteris henryi** Christ

生于海拔600—2 000米的石灰岩缝或旧墙上。分布于陕西、甘肃、湖北、广西、四川、贵州、云南。

全草：苦、涩，凉。清淡解毒，利尿，生肌。用于烧、烫伤，刀伤，狂犬咬伤，淋证，带下病。

**全缘凤尾蕨**　巴墙草(江西)，蒲山剑(广西)

**Pteris insignis** Mett. ex Kuhn

生于山谷林下或溪边阴湿岩壁或石缝中。分布于江西、福建、湖南、广东、广西、贵州、云南。

全草：微苦，凉。清热解毒，消炎散瘀。用于黄疸，痢疾，风湿痛，瘰疬，咽喉痛，跌打损伤，尿血，外伤出血。

**长叶凤尾草**　大仙鸡尾(广东)

**Pteris longifolia** L.

生于林下岩石缝或旧墙上。分布于广东、广西。

全草：淡，凉。清热，止痢。用于痢疾，淋证。

**井栏边草**　凤凰尾(江苏)，乌鸡脚(浙江)，五指草(贵州)，五叶灵芝(云南)

**Pteris multifida** Poir.

生于海拔850米以下的阴湿的墙缝、井边、路旁或石灰岩上。分布于华东、中南及山西、四川、贵州、云南。

全草(凤尾草)：微苦，凉。清淡解毒，消炎止血。用于痢疾，黄疸，泄泻，乳痈，带下病，崩漏；外用烧、烫伤，外伤出血。

**凤尾蕨**　红尾草(广西)，金鸡凤尾(四川)，杂玛冬罗玛切瓦(藏语)

**Pteris nervosa** Thunb.——*P. cretica* L. var. *nervosa* (Thunb.) Ching et S. K. Wu

生于海拔400—3 200米的林下或石灰岩缝中。除江苏、浙江外，广布于长江流域以南各省区，北到陕西南部，西达西藏东部。

全草：甘、淡，凉。清热利湿，活血止痛。用于跌打损伤，瘀血腹痛，黄疸，乳蛾，痢疾，淋证，水肿，烧、烫伤，犬、蛇咬伤。

**栗柄凤尾蕨**　五爪鸡草(广西)

**Pteris plumbea** Christ

生于林中或林缘路旁。分布于浙江、江西、福建、广东、广西、贵州。

全草：消肿止血，止痢。用于跌打损伤，痢疾，外伤出血。

**半边旗**　凤尾巴草(浙江)，单片锯(广东)，甘草蕨(广州)，半边蕨(广西)

**Pteris semipinnata** L.

生于海拔900米以下的林下、路旁阴湿地及石上。分布于西南及安徽、浙江、江西、福建、台湾、广东、海南、广西。

全草(半边旗)：苦、辛，凉。止血，生肌，消肿，止痛。用于吐血，外伤出血，发背，疔疮，跌打损伤，目赤肿痛。

**蜈蚣草**　蜈蚣连(广西)，上天梯(四川)，小蜈蚣草(云南)，蜈蚣蕨(海南植物志)

**Pteris vittata** L.

生于海拔2 000米以下的路旁、桥边石缝中或石灰岩山地上。分布于长江以南各省区，北达甘肃、陕西、河南南部。

全草及根状茎(蜈蚣草)：淡、苦，温。有小毒。祛风除湿，清热解毒。用于时行感冒，痢疾，风湿疼痛，跌打损伤，虫、蛇咬伤，疥疮。

**西南凤尾蕨**　老泻风(广西)

**Pteris wallichiana** Agardh.

生于海拔800—2 400米的林下沟谷溪边。分布于西南及台湾、广东、广西。

全草：微苦、涩，凉。清热止血。用于痢疾，惊风，外伤出血。

## 24. 中国蕨科　Sinopteridaceae

### 粉背蕨属　Aleuritopteris Fée

**银粉背蕨**　还阳草(青海)，明珑珀草(浙江)，印花草(广西)，通经草(四川)，花叶猪棕草(云南)

**Aleuritopteris argentea** (Gmel.) Fée——*Pteris argentea* Gmel.

生于海拔3 000米以下的石灰岩缝中或山坡岩石上。分布于全国各地。

全草：淡、微涩，温。补虚止咳，调经活血，消肿解毒，止血。用于月经不调，肝炎，肺

痨咳嗽，吐血，跌打损伤。

**无银粉背蕨**

**Aleuritopteris argentea** (Gmel.) Fée var. **obscura** (Christ) Ching——*Cheilanthes argenes* O. Kuntze var. *obscura* Christ

生于海拔 1 800 米以下的石灰质岩缝中。分布于东北、华北、西北、华东、中南及四川。

全草：活血散瘀，消肿解毒。用于经闭目赤，痈肿疔毒。

**华北粉背蕨**

**Aleuritopteris kuhnii** (Milde) Ching——*Cheilanthes kuhnii* Milde

生于海拔 3 400 米以下的疏林下石岩上。分布于东北、华北及陕西南部、甘肃东南部、山东、河南、四川、云南。

全草及根状茎：苦，寒。润肺止咳，消炎止血。用于咳血，外伤出血。

**粉背蕨**　岩飞蛾(湖南)，卷叶凤尾(广东)，水郎鸡(四川、贵州)，黑猪棕草(云南)

**Aleuritopteris pseudofarinosa** Ching et S. K. Wu

生于海拔 600—3 000 米的干燥石灰岩上或墙基。分布于西南及江西、福建、湖南、广东、广西。

全草：淡、微涩，温。止咳化痰，健脾补虚，舒筋活络，利湿止痛。用于咳嗽痰喘，痢疾，腹痛，消化不良，带下病，瘰疬，跌打损伤，蛇咬伤。

**毛叶粉背蕨**　小一把抓(云南)

**Aleuritopteris squanosa** (Hope et C. H. Wright) Ching

生于林下石岩上。分布于云南。

全草：健脾胃，补中益气。用于感冒，小儿疳积及虚弱。

**绒毛粉背蕨**　小凤尾草(云南)

**Aleuritopteris subvillosa** (Hook.) Ching

生于海拔 2 800 米以下的杂木林中石上。分布于四川、云南、西藏。

全草：辛、微苦、涩，凉。清热解毒，活血止痛，消炎利水。用于肝炎，咽喉炎，痢疾，泄泻，淋证，瘰疬，风湿痛，跌打肿痛。

## 碎米蕨属　Cheilosoria Trev.

**毛轴碎米蕨**　凤尾路鸡(湖南)，斑鸠尾(广西)

**Cheilosoria chusana** (Hook.) Ching et Shing——*Cheilanthes chusana* Hook.

生于海拔 300—900 米的山谷林下或溪边石上。分布于华东、中南、西南及陕西。

全草：微苦，寒。清热解毒，止血散瘀，利尿。用于肝炎，痢疾，泄泻，月经不调，咽喉痛，跌打，蛇伤，外伤出血。

**碎米蕨**

**Cheilosoria mysuriensis** (Wall.) Ching et Shing——*Cheilanthes mysuriensis* wall.

生于林下溪边或村旁墙基。分布于福建、台湾、广东、海南、广西。

全草：微苦、涩，凉。清热解毒，收敛止血。用于蛇咬伤，痢疾，咽喉痛，各种出血。

**薄叶碎米蕨**　山竺根(广西)

**Cheilosoria tenuifolia** (Burm.) Trev.——*Trichomanes tenuifolia* Burm.

生于海拔50—1 600米的平原溪边、田边或山地林下石上。分布于福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、云南。

全草：苦，凉。活血散瘀。用于跌打损伤，痢疾。

## 黑心蕨属　Doryopteris J. Smith

**黑心蕨**　同色黑心蕨(海南植物志)

**Doryopteris concolor** (Langsd. et Fisch.) Kuhn——*Pteris concolor* Langsd. et Fisch.

生于海拔230—800米的林下溪边或田边。分布于台湾、广东、广西。

全草：涩，凉。清热，利尿，止血。用于淋证，外伤出血。

## 隐囊蕨属　Notholaena R. Br.

**中华隐囊蕨**　山莲(广西)

**Notholaena chinensis** Baker

生于荒坡溪沟边或石上。分布于广西。

全草：用于痢疾。

## 金粉蕨属　Onychium Kaulf.

**黑足金粉蕨**　铁足草(云南)

**Onychium contigum** (Wall.) Hope——*Cheilanthes contigua* Wall.

生于海拔3 200米以下的路边、沟旁、山谷及疏林下。分布于甘肃、四川、云南、西藏。

全草及根状茎：微苦，凉。解毒，利水，止血。用于农药及木薯中毒，水肿，外伤出血。

**野雉尾**　孔雀尾(福建)，霍乱草(广西)，地柏枝(四川)，串鱼草(云南)，海风丝(植物名实图考)

**Onychium japonicum** (Thunb.) O. Kuntze——*Trichomanes japonicum* Thunb.

生于海拔1 900米以下的林下沟边或灌丛阴处。分布于长江流域以南各省区，北到河北西部、河南南部及秦岭南坡。

叶(小野鸡尾)：苦，凉。清热解毒，止血，利湿。用于跌打损伤，烧、烫伤，泄泻，黄疸，痢疾，咳血，狂犬咬伤，食物、农药、药物中毒。根状茎：清热，凉血，止血。用于外感风热，咽喉痛，吐血，便血，尿血。

**栗柄金粉蕨**　人头发(云南)

**Onychium lucidum** (D. Don) Spring——*Leptostegia lucida* D. Don

生于海拔 2 030 米以下的路边林下或灌丛中。分布于西南及陕西、甘肃、福建、台湾、湖北。

全草：苦、涩，凉。清热解毒，祛风除湿，消炎。用于感冒，胃痛，风湿痛，跌打肿痛，外伤出血，木薯、砷等中毒。

**蚀盖金粉蕨**　狭叶金粉蕨、金花草(云南)

**Onychium tenuifrons** Ching

生于海拔 800—2 100 米的较干旱的山脚或谷地酸性土灌丛中。分布于四川、贵州、云南。

全草：清热解毒，消炎。用于感冒，跌打肿痛，木薯中毒。

### 旱蕨属　Pellaea Link

**西南旱蕨**

**Pellaea smithii** C. Chr.

生于海拔 1 200—2 540 米的干旱河谷灌丛下岩缝中。分布于四川、贵州、云南。

根状茎：除湿，清热利尿。

## 25. 铁线蕨科　Adiantaceae

### 铁线蕨属　Adiantum L.

**毛足铁线蕨**　猪鬃草(四川)

**Adiantum bonatianum** Brause

生于海拔 3 400 米以下的溪边石上。分布于四川、云南。

全草：微苦，平。清热解毒，利尿，止痢。用于痢疾，淋证，淋浊，乳痈。

**团羽铁线蕨**　猪毛针(四川)，猪鬃七(贵州)

**Adiantum capillus-junonis** Rupr.

生于海拔 350—2 500 米的潮湿石灰质岩脚或墙缝中。分布于西南及河北、甘肃、山东、台湾、湖南、广东、广西。

全草：微苦，凉。清热解毒，补肾止咳。用于痢疾，咳嗽，淋证，乳痈，瘰疬，疮痈，毒蛇咬伤，烧、烫伤。

**铁线蕨**　铁骨狼萁(山东)，乌脚芒(福建)，黑草(广西)。

**Adiantum capillus-veneris** L.

生于海拔 2 800 米以下的溪边岩缝或村舍旁墙基。分布于华东、中南、西南及山西、陕西、甘肃。

全草(猪鬃草)：淡、苦，凉。清热解毒，利湿消肿，利尿通淋。用于痢疾，瘰疬，肺热咳嗽，肝炎，淋证，毒蛇咬伤，跌打损伤。

**鞭叶铁线蕨**　两头根(广西)，岩虱子(贵州)，旱猪鬃草(云南)

**Adiantum caudatum** L.

生于海拔 1 200 米以下的林下或山谷或干燥岩石缝。分布于浙江、江西、福建、台湾、广东、广西、贵州、云南。

全草(鞭叶铁线蕨)：苦、甘，平。清热解毒，利水消肿，凉血止咳。用于痢疾，乳痈，淋证，小便涩痛，尿血，蛇咬伤，外伤出血，烧、烫伤。

**白背铁线蕨**　碎叶猪鬃草(云南)

**Adiantum davidii** Franch.

生于海拔 1 100—3 400 米的溪边岩石上。分布于河北、山西、陕西、甘肃、四川、云南。

全草：苦、涩，凉。清热利湿，消炎止痛，止痢，通乳。用于淋证，小便涩痛，肺热咳嗽，风火牙痛，痢疾，子痈。

**普通铁线蕨**　小猪鬃七(四川)

**Adiantum edgeworthii** Hook.

生于海拔 700—2 500 米的林下湿地或岩石上。分布于辽宁东部、河北、陕西、甘肃、山东、台湾、四川、云南。

全草：用于赤白淋浊，外伤出血。

**肾盖铁线蕨**

**Adiantum erythochlamys** Diels

生于林下湿地或岩石上。分布于陕西、甘肃、四川。

全草：利水通淋。用于瘰疬溃疡，淋证。

**长盖铁线蕨**

**Adiantum fimbriatum** Christ

生于林下石上。分布于山西、陕西、甘肃、四川、云南、西藏。

全草：苦、涩、凉。利尿，通经，祛痰。用于淋证，月经不调，咳嗽痰喘。

**扇叶铁线蕨**　铁脚狼箕(浙江)，铁爪篱(江西)，鸡爪莲(湖南)，乌脚鸡(广西)，过坛龙(植物名实图考)

**Adiantum flabellulatum** L.

生于海拔 100—1 200 米阳光充足的山坡酸性红土上。分布于西南及浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西。

全草(过坛龙)：淡、涩，凉。清热利湿，祛痰消肿，止血散结，止咳平喘。用于痢疾，泄泻，传染性肝炎，肺热咳嗽，小儿高热抽搐，淋证，石淋，吐血，便血，瘰疬，跌打损伤，蛇伤，烧、烫伤，疮毒。

**单盖铁线蕨**　生肌草(江西)，岩浮萍(四川)，石长生(神农本草经)

**Adiantum monochlamys** Eaton

生于林下潮湿石上。分布于长江流域以南各省区。

根状茎、叶：咸，微寒。有小毒。清热解毒，消炎，化痰。用于肺热咳嗽，肺痨吐血，痈肿疔毒，痢疾，淋浊，疥癣。

**灰背铁线蕨**　铁扇子(四川)

**Adiantum myriosorum** Baker

生于林下阴湿石灰岩石上。分布于西南及甘肃、湖北、湖南。

全草(铁扇子)：淡、苦，平。清热通淋，消炎，活血散瘀。用于跌打损伤，小便癃闭，烧、烫伤，冻疮。

**掌叶铁线蕨**　铜丝草(陕西)，乌脚枪(江西)，热惹琼互(藏语)

**Adiantum pedatum L.**

生于海拔350—3 300米的山地林下沟旁。分布于东北、华北、西南及陕西、甘肃。

全草(铁丝七)：苦、微涩，平。除湿利水，调经止痛，消炎解毒。用于淋证，水肿，风湿骨痛，月经不调，肺热咳嗽，崩漏，瘰疬，痈肿，烧、烫伤，毒蛇咬伤。

**半月形铁线蕨**　骨螃他(广西)，黑龙丝(云南)

**Adiantum philippense L.**

生于林下阴湿处或溪边。分布于台湾、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草：淡、微辛，平。活血散瘀，利尿，止咳。用于乳痈，小便涩痛，淋证，发热咳嗽，产后瘀血，血崩。

**荷叶铁线蕨**　荷叶金钱(四川)

**Adiantum reniforme L. var. sinense Y. X. Lin**

生于低山丘陵岩壁及石隙中。分布于四川万县地区。

全草：淡、微苦，平。清热解毒，利水通淋。用于黄疸，淋证，石淋，中耳炎。

## 26. 水蕨科 Parkeriaceae

### 水蕨属　Ceratopteris Brongn.

**水蕨**　水柏(浙江)，水扁柏、水柏枝(广西)

**Ceratopteris thalictroides** (L.) Brongn.——*Acrostichum thalictroides* **L.**

生于池塘、水田或水沟中。分布于江苏、安徽、浙江、福建、台湾、湖北、广东、海南、广西、四川、云南。

全草(水蕨)：甘、淡，凉。活血解毒，清热利尿，止血止痛。用于胎毒，痢疾，跌打损伤，淋浊，外伤出血。

## 27. 裸子蕨科　Hemionitidaceae

### 凤丫蕨属　Coniogramme Fée

**尖齿凤丫蕨**　马肋巴、过山龙(四川)

**Coniogramme affinis** (Wall.) Hieron.——*Grammitis affinis* Wall.

生于海拔3 500米以下的混交林下阴湿处或沟边。分布于陕西、甘肃、河南、四川、云南、西藏。

根状茎：清热解毒，凉血，强筋壮骨，用于肩疼，狂犬咬伤。

**普通凤丫蕨**　马力胯(四川)

**Coniogramme intermedia** Hieron.

生于海拔 250—2 500 米的湿润林下。分布于西南及陕西、甘肃、台湾、湖北、湖南、广东、广西。

根状茎(秤杆七)：甘、涩，温。祛风除湿，理气止痛。用于风湿关节痛，腰痛，跌打损伤，痢疾，带下病，淋浊，疮毒。

**凤丫蕨**　散血莲(湖南)，羊角草(广西)，眉风草(贵州)

**Coniogramme japonica** (Thunb.) Diels——*Hemionitis japonica* Thunb.

生于海拔 1 800 米以下的湿润林下和山谷阴湿处。分布于长江流域以南各省区。

根状茎及全草：苦，凉。祛风除湿，清热解毒，活血止痛。用于风湿骨痛，跌打损伤，经闭，瘀血腹痛，目赤肿痛，乳痈，肿毒初起。

附　注：孕妇慎用。

## 金毛裸蕨属　Gymnopteris Bernh.

**耳叶金毛裸蕨**　白带药(四川)

**Gymnopteris bipinnata** Christ var. **auriculata** (Franch.) Ching——*Gymnogramma vestita* Hook. var. *auriculata* Franch.

生于林下石上或岩壁。分布于河北、山西、陕西、甘肃、山东、河南、湖北、四川、云南、西藏。

根状茎及全草：苦，寒。解毒，止痒。用于风毒，疮痒，带下病，腹痛，眩晕。

**金毛裸蕨**　猫耳朵草(云南)

**Gymnopteris vestita** (Wall.) Underw.——*Grammitis vestata* Wall.

生于海拔 800—3 000 米的岩壁或林下石上。分布于台湾、四川、云南、西藏。

根状茎及全草：微苦、辛，凉。消炎退热。用于伤寒高热，关节痛。全草：用于胃痛。

# 28. 车前蕨科　Antrophyaceae

## 车前蕨属　Antrophyum Kauld.

**台湾车前蕨**　水知母(广西)

**Antrophyum formosanum** Hieron.

生于海拔 600—1 600 米的溪边石上。分布于台湾、广东、广西、贵州、云南。

全草：用于咳嗽。

**长柄车前蕨**　金线标(四川峨眉)

**Antrophyum obovatum** Baker

生于 1 500—2 300 米的树干或石上。分布于西南及台湾、广东、广西。

全草：苦、凉。清热解毒，活血散瘀，消炎利湿。用于乳蛾，乳痈，关节痛。

## 29. 书带蕨科 Vittariaceae

### 书带蕨属 Vittaria J. Smith

**细柄书带蕨** 回阳生(广西)

**Vittaria filipes** Christ

生于海拔 200—3 200 米的树干或林下岩石上。分布于西南及浙江、江西、福建、湖南、广东、广西。

全草：微涩，平。活血止痛。用于跌打损伤，筋骨痛，手足麻木。

**书带蕨** 木莲金(浙江天目山)，晒不死(广西)

**Vittaria flexuosa** Fée

生于海拔 500—2 300 米的树干或密林下岩石上。分布于西南及江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西。

全草(书带蕨)：苦、涩，凉。清热息风，舒筋活络。用于小儿惊风，疳积，妇女干血痨，目翳，瘫痪，跌打损伤。

**平肋书带蕨** 树韭菜(贵州)

**Vittaria fudzinoi** Makino

生于海拔 1 300—2 800 米的林下岩石或树干上。分布于西南及浙江、江西、福建、湖北、广西。

全草：微苦，微温。理气活血，止痛。用于胃痛，筋骨痛，劳伤，小儿惊风，疳积。

**小叶书带蕨**

**Vittaria modesta** Hand.-Mazz.

生于林下岩石上或树干上。分布于安徽、福建、湖南、广东、广西。

全草：苦、涩，平。舒筋活络。用于骨折，跌打损伤。

## 30. 蹄盖蕨科 Athyriaceae

### 短肠蕨属 Allantodia R. Br.

**中华短肠蕨**

**Allantodia chinensis** (Baker) Ching——*Asplenium chinense* Baker

生于海拔 300—550 米的林下沟边或石缝中。分布于江苏、浙江、江西、福建、广西、四川、贵州。

根状茎：微苦、涩，凉。清热除湿。用于黄疸，时行感冒。

**毛柄短肠蕨**

**Allantodia dilatata** (Bl.) Ching——*Diplazium dilatata* Bl.

生于海拔 300—900 米的林下潮湿溪边及石缝中。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、贵州。

根状茎：微苦，凉。有小毒。清热解毒，除湿，驱虫。用于肝炎，时行感冒，痈肿，肠道寄生虫。

## 假蹄盖蕨属　Athyriopsis Ching

**假蹄盖蕨**

**Athyriopsis japonica** (Thunb.) Ching——*Asplenium japonica* (Thunb.) Bedd.

生于海拔 1 500 米以下的山谷林下或村旁路边湿地。分布于长江流域各省及福建、台湾、广西、云南。

全草：微苦、涩，凉。清热消肿。用于肿毒，乳痈，目赤肿痛。

## 蹄盖蕨属　Athyrium Roth

**短叶蹄盖蕨**　东北蹄盖蕨(中国高等植物图鉴)

**Athyrium brevifrons** Nakai

生于海拔 200—1 200 米的混交林下。分布于东北、华北及四川。

根状茎：微苦、涩，凉。驱虫，止血。用于蛔虫病，外伤出血。

**翅轴蹄盖蕨**　细股黄连(四川)

**Athyrium delavayi** Christ

生于海拔 600—1 800 米林下。分布于西南及广西。

全草：淡，苦。清热解毒，消肿止痛。用于烧、烫伤。

**长江蹄盖蕨**　山柏(江西)

**Athyrium iseanum** Ros.——*A. göringianum* (O. Kuntze) Moore

生于海拔 2 000 米以下的林下湿地或石上。分布于西南及江苏、浙江、江西、福建、湖南、广东、广西。

全草：苦，凉。解毒，止血。用于疮毒，衄血，痢疾，外伤出血。

**多齿蹄盖蕨**　猴腿蹄盖蕨(东北)

**Athyrium multidentatum** (Doell.) Ching

生于海拔 1 200 米以下的混交林下。分布于东北及河北、内蒙古、甘肃、山东。

根状茎：微苦，凉。清热解毒，杀虫。用于虫积腹痛，时行感冒，麻疹。

**华东蹄盖蕨**　牛心贯众(山东)

**Athyrium nipponicum** (Mett.) Hance——*Asplenium nipponicum* Mett.

生于海拔 2 500 米以下的平原和丘陵湿地。分布于华北、华东、西南及辽宁、河南、湖北、湖南。

根状茎：清热解毒，消肿止血。用于痈毒疖肿，痢疾，衄血，蛔虫病。

**华北蹄盖蕨**　马牙贯众(山东)

**Athyrium pachyphlebium** C. Chr.

生于林下湿地及丘陵。分布于华北及辽宁、山东。

根状茎：用于痈毒疖肿，痢疾，蛔虫病。

附　注：山东泰安地区作贯众入药。

**中华蹄盖蕨**

**Athyrium sinense** Rupr.

生于海拔 750—2 800 米的林下。分布于东北、华北、西北及山东。

根状茎：微苦，凉。清热解毒，杀虫。用于时行感冒，乙型脑炎，钩虫病，蛔虫病。

**软刺蹄盖蕨**

**Athyrium strigillosum** Moore

生于林下溪沟旁草丛中。分布于广东、广西、贵州、云南。

全草及嫩叶：微苦，凉。清热解毒，止血收敛。用于痢疾，外伤出血，下肢疖肿。

**禾秆蹄盖蕨**

**Athyrium yokoscens** (Franch. et Sav.) Christ——*Asplenium yokoscens* Franch. et Sav.

生于海拔 100—800 米的林缘石缝中。分布于吉林、辽宁、山东、江苏、安徽、江西。

根状茎：微苦，凉。驱虫，止血，解毒。用于蛔虫病，外伤出血。

## 双盖蕨属　Diplazium Sw.

**双盖蕨**　　梳篦叶(广西)，金鸡尾(植物名实图考)

**Diplazium donianum** (Mett.) Trad.-Blot——*Asplenium donianum* Mett.

生于海拔 400—1 600 米的山地林下或溪边石上。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、云南。

全草：微苦，寒。清热利湿，凉血解毒。用于黄疸，妇女痛经及腰痛，外伤出血，蛇咬伤。

**锡兰双盖蕨**　　裂叶双盖蕨(福建植物志)

**Diplazium zeylanicum** (Hook.) Moore——*Asplenium zeylanicum* Hook.

生于海拔 1 400 米以下的林下或溪边石上。分布于江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、四川。

全草：微苦，凉。清热凉血，利尿通淋。用于肺痨咯血，乳痈，淋证。

## 介蕨属　Dryoathyrium Ching

**介蕨**　　贯众(贵州)

**Dryoathyrium boryanum** (Walld.) Ching——*Asplenium boryanum* Willd.

生于海拔 300—2 800 米的林下溪沟或石缝中。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、贵州、云南、西藏。

根状茎：用于钩虫病。

**华中介蕨**

**Dryoathyrium okuboanum** (Makino) Ching——*Athyrium okuboanum* Makino

生于海拔 500—1 800 米的密林下沟中。分布于中南及江苏、安徽、浙江、福建、四川、

云南。

全草：淡、涩，凉。清热消肿。用于疮疖肿毒。

### 蛾眉蕨属　Lunathyrium Koidz.

**蛾眉蕨**　贯众(宁夏)

**Lunathyrium acrostichoides** (Sw.) Ching——*Asplenium acrostichoides* Sw.

生于海拔1 400—2 500米的林下山谷或灌丛中。分布于东北、华北、西北、西南。

根状茎：苦、涩，微寒。清热解毒，止血，杀虫。用于痢疾，便血，血崩，蛔虫病，蛲虫病，并用于预防时行感冒。

附　注：东北及宁夏等地将本品作贯众入药。

### 假双盖蕨属　Triblemma Ching

**假双盖蕨**　青根(福建)，叶下青(湖南)，斩蛇剑(广西)，蛇莲(四川)，单叶双盖蕨(中国高等植物图鉴)

**Triblemma lancea** (Thunb.) Ching——*Asplenium lanceum* Thunb.

生于海拔1 600米以下的溪旁及林下酸性土或石上。分布于长江以南及台湾。

全草：苦、涩，寒。利尿通淋，消炎解毒，排石健脾，止血镇痛。用于淋证，石淋，感冒高热，小儿疳积，肺痨咳血，跌打损伤，疮疖，烧、烫伤，蛇咬伤，骨鲠喉，并拔竹、木刺入肉。

## 31. 肿足蕨科　Hypodematiaceae

### 肿足蕨属　Hypodematium Kunze

**肿足蕨**　活血草(河南)，小金狗(广西)，石猪鬃(四川)，黄鼠狼(贵州)

**Hypodematium crenatum** (Forsk.) Kühn.——*Polypodium crenatum* Forsk.

生于海拔1 800米以下的干旱石灰岩缝或砖墙上。分布于长江流域以南各省区及河南。

根状茎及全草：苦、涩，凉。清热解毒，祛风利湿，止血生肌。用于乳痈，疮疖，淋浊，痢疾，风湿关节痛，外伤出血。

**山东肿足蕨**

**Hypodematium sinense** Iwatsuki

生于石灰岩石缝中。分布于陕西、山东、江苏、江西、河南、湖南。

全草：用于恶心，呕吐，头晕，胃神经官能症，美尼尔氏综合征。

附　注：治疗美尼尔氏综合征，有效率为95%。

# 32. 金星蕨科 Thelypteridaceae

## 星毛蕨属 Ampelopteris Kunze

**星毛蕨**

**Ampelopteris prolifera** (Retz.) Copel——*Helmionitis prolifera* Retz.

生于海拔1 000米以下的阳光充足的溪边河滩湿地。分布于西南及福建、台湾、广东、海南、广西。

全草：微酸，凉。清热，止痢。用于胃炎，痢疾。

## 毛蕨属 Cyclosorus Link

**渐尖毛蕨** 小水火蕨(广西)，黑舒筋(四川)，尖羽毛蕨(海南植物志)

**Cyclosorus acuminatus** (Houtt.) Nakai ex H. Ito——*Polypodium acuminatum* Houtt.

生于海拔1 200米以下的田边、路旁或林下山谷中。分布于长江流域以南各省区及山西、陕西、甘肃、台湾。

全草(渐尖毛蕨)：消炎解毒，健脾，镇惊。用于消化不良，烧、烫伤，狂犬咬伤。

**干旱毛蕨** 凤尾草(广西)，密腺小毛蕨(台湾植物志)

**Cyclosorus aridus** (D. Don) Tagawa——*Aspidium aridum* D. Don

生于海拔100—1 800米的疏林下或河边草地、田边。分布于西南及安徽、浙江、福建、台湾、广东、海南、广西。

全草：苦，凉。清热解毒，止痢。用于乳蛾，痢疾，狂犬咬伤，枪弹伤。

**齿牙毛蕨** 篦子舒筋草(四川)

**Cyclosorus dentatus** (Forsk.) Ching——*Polypodium dentatum* Forsk.

生于山谷湿地或沟边石缝中。分布于西南及江西、福建、台湾、广东、海南、广西。

根状茎(篦子舒筋草)：微苦，平。舒筋活络，散瘀。用于风湿筋骨痛，手足麻木，瘰疬，痞块，痢疾，跌打损伤。

**华南毛蕨** 金星草(广州)，大风寒(四川)，密毛小毛蕨(台湾植物志)

**Cyclosorus parasiticus** (L.) Farwell——*Polypodium parasiticum* L.

生于海拔100—800米的林下、林缘或溪边湿地。分布于西南及福建、台湾、湖南、广东、广西。

全草：辛，平。祛风除湿，清热，止痢。用于风湿筋骨痛，感冒，痢疾。

## 圣蕨属 Dictyocline Moore

**圣蕨** 铁甲草(四川)

**Dictyocline griffithii** Moore

生于海拔 200—1 400 米的林下溪边湿地。分布于西南及台湾、广西。

根状茎：用于虚痨内伤，小儿惊风。

**羽裂圣蕨**

**Dictyocline wilfordii** (Hook.) J. Smith——*Hemionitis wilfordii* Hook.

生于海拔 100—300 米的林下或溪谷边。分布于西南及浙江、福建、台湾、广东、广西。

根状茎：用于小儿惊风，虚痨内伤。

## 针毛蕨属 Macrothelypteris (H. Ito) Ching

**针毛蕨** 金鸡尾巴草(浙江)

**Macrothelypteris oligophlebia** (Baker) Ching

生于海拔 1 000 米以下的山坡林下阴湿处。分布于中南及江苏、安徽、浙江、江西、福建、贵州、云南。

根状茎：苦，寒。清热解毒，止血，消肿，杀虫。用于烧、烫伤，外伤出血，疖肿，蛔虫病。

**雅致针毛蕨**

**Macrothelypteris oligophlebia** (Baker) Ching var. **elegans** (Koidz.) Ching——*Dryopteris elegans* Koidz.

生于林下溪沟边阴湿处。分布于长江流域中、下游以南及陕西、甘肃。

根状茎：用于疖肿，烧、烫伤，外伤出血，蛔虫病。

## 金鳞蕨属 Parathelypteris (H. Ito) Ching

**金星蕨** 毛毛蛇(四川)

**Parathelypteris glanduligera** (Kunze) Ching——*Aspidium glanduligera* Kunze

生于海拔 1 500 米以下的山坡疏林下、路边或溪边。分布于长江流域以南及台湾。

叶：苦，寒。清热，止血，止痢。用于烧、烫伤，吐血，痢疾。

**中日金星蕨** 篦子草(四川)

**Parathelypteris nipponica** (Franch. et Sav.) Ching——*Aspidium nipponica* Franch. et Sav.

生于海拔 400—2 500 米的山坡疏林下或路边。分布于长江流域以南及陕西、甘肃、河南。

叶：苦，寒。消炎止血。用于外伤出血。

## 卵果蕨属 Phegopteris Fée

**延羽卵果蕨** 猪棕草(四川)

**Phegopteris decursive-pinnata** (van Hall.) Fée——*Polypodium decursive-*

*pinnata* van Hall

生于海拔 1 800 米以下的平原、丘陵、河沟两岸或林缘路边。分布于长江流域以南及陕西。

根状茎：利湿消肿，收敛解毒。用于水湿胀满，疖毒溃烂久不收口。

## 新月蕨属 Pronephrium Presl

**红色新月蕨**

**Pronephrium lakhimpurense** (Ros.) Holtt. ——*Dryopteris lakhimpurensis* Ros.

生于海拔 400—1 000 米的疏林下或溪边湿地。分布于西南及福建、广东、广西。

根状茎：清热消炎，止血。用于跌打损伤，疮疡肿毒，外伤出血。

**多羽新月蕨** 散血莲、铁蕨鸡(贵州)

**Pronephrium nudatum** (Roxb.) Holtt.

生于海拔 1 200 米以下的山地林下阴湿处。分布于广西、贵州、云南、西藏。

根状茎：苦、涩，寒。通经活络，理气，利湿。用于月经不调，胃气痛，痢疾。

**披针新月蕨** 地苏木(四川)，铁板金(贵州)

**Pronephrium penangianum** (Hook.) Holtt. ——*Polypodium penangianum* Hook.

生于海拔 200—3 600 米的林下沟溪边阴湿处。分布于中南、西南及甘肃、江西。

根状茎、叶：苦、涩，凉。活血散瘀，利湿。用于风湿麻痹，痢疾，跌打腰痛。叶：用于血凝气滞。

**单叶新月蕨** 草鞋青(广西)

**Pronephrium simplex** (Hook.) Holtt.——*Meniscium simplex* Hook.

生于海拔 1 500 米以下的林下溪边。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、云南。

全草：甘、微涩，凉。清热解毒，利咽消肿。用于乳蛾，疮疡肿毒，蛇咬伤。

**三羽新月蕨** 蛇退步、三枝标(广东)，上树栖(广西)

**Pronephrium triphyllum** (Sw.) Holtt.——*Meniscium triphyllum* Sw.

生于路旁或林下溪沟边。分布于福建、台湾、广东、广西、云南。

全草(蛇退步)：苦、辛，平。消炎散瘀，止痒，解毒。用于痈疮疖肿，跌打损伤，湿疹，皮炎，毒蛇咬伤。

## 假毛蕨属 Pseudocyclosorus Ching

**镰片假毛蕨** 凤尾草(广西)，镰形假毛蕨(中国高等植物图鉴)

**Pseudocyclosorus falcilobus** (Hook.) Ching——*Lastrea falciloba* Hook.

生于海拔 300—1 100 米的溪谷边或路旁湿地。分布于西南及福建、广东、海南、广西。

叶：苦，凉。清热解毒，抗菌消炎。用于痢疾，烧、烫伤。根状茎：用于杀虫。

### 溪边蕨属　Stegnogramma Bl.

**贡众叶溪边蕨**　乳鸡藤(四川)

**Stegnogramma cyrtomioides** (C. Chr.) Ching——*Dryopteris stegnogramma* (Bl.) C.Chr. var. *cyrtomioides* C. Chr.

生于海拔 1 500 米以下的林下溪沟边。分布于四川、贵州、云南。

根状茎：用于内伤，眩晕。

## 33. 铁角蕨科　Aspleniaceae

### 铁角蕨属　Asplenium L.

**线裂铁角蕨**　芒头铁角蕨(广西)

**Asplenium coenobiale** Hance

生于林下溪沟旁石岩上。分布于广西。

全草：用于风湿痹痛，小儿麻痹，月经不调。

**剑叶铁角蕨**　石浮(广西)

**Asplenium ensiforme** Wall. ex Hook. et Grev.

生于海拔 800—2 400 米的密林下树干或石上。分布于西南及台湾、广西。

全草：用于胃脘痛。

**云南铁角蕨**　凤尾猪鬃草(云南)

**Asplenium exiguum** Bedd. var. **yunnanense** (Franch.) Ching——*A. yunnanense* Franch.

生于海拔 2 300 米以下的山沟、箐沟边潮湿处岩石上。分布于西南及青海南部。

全草：苦，寒。清热，利尿，通乳，接骨。用于感冒高热，子痈，小便涩痛，淋证，乳汁不通，乳蛾，痢疾，麻疹，疮毒，跌打骨折，外伤出血。

**镰叶铁角蕨**　骨把(广西)

**Asplenium falcatum** Lam.

生于林下溪边岩石上。分布于广东、海南、广西、贵州。

全草：清热消炎，利尿。用于黄疸，高热，淋证，淋浊，烧、烫伤。

**厚叶铁角蕨**　旋鸡尾(广西)

**Asplenium griffithianum** Hook.

生于海拔 800—2 400 米的山谷密林树干或岩石上。分布于西南及福建、台湾、湖南、广东、海南、广西。

根状茎：苦，凉。清热解毒，利尿通淋，消炎。用于黄疸，高热，烧、烫伤。

**虎尾铁角蕨**　伤寒草(浙江)，洞里仙(江西)

**Asplenium incisum** Thunb.

生于海拔 1 600 米以下的林下湿岩石上或田埂边。分布于华东、中南及辽宁、河北、陕

西、四川。

全草(地柏叶)：苦、甘，凉。清热解毒，平肝镇惊，祛湿止痛。用于小儿惊风，肝炎，肺热咳嗽，胃痛，小便淋痛，毒蛇咬伤。

**宝兴铁角蕨**　　木坪铁角蕨

**Asplenium moupinense** Franch.

生于山谷林下岩石上。分布于四川、云南。

全草：清热解毒。用于痢疾，蜈蚣咬伤。

**倒挂铁角蕨**

**Asplenium normale** D. Don

生于海拔 600—2 500 米的密林下或溪边石上。分布于华东、西南及广东、海南、广西。

全草：苦，平。清热解毒，活血散瘀，镇痛止血。用于肝炎，痢疾，外伤出血，蜈蚣咬伤。

**北京铁角蕨**　　小凤尾草(陕西)，臁疮药(四川)

**Asplenium pekinense** Hance

生于海拔 380—4 200 米的石岩上。分布于华北、西北、华东及河南、湖北、湖南、四川。

全草(小凤尾草)：甘、辛，温。止咳化痰，利膈，止泻，止血。用于感冒咳嗽，肺痨，腹泻，痢疾，臁疮，外伤出血。

**胎生铁角蕨**

**Asplenium planicaule** Wall.

生于海拔 800—1 100 米的山地密林下树干或湿石上。分布于长江流域以南(江苏除外)，西北到甘肃。

全草：淡、涩，凉。舒筋活血。用于腰痛。

**西南铁角蕨**　　大猪鬃草(云南)

**Asplenium praemosum** Sw.

生于山地林下树干或岩石上。分布于西南。

全草：甘、苦，平。清热利尿，消炎。用于痢疾，泄泻，咽喉痛，淋巴腺炎，小便涩痛，淋证，腱鞘炎。

**长生铁角蕨**　　仙人架桥(湖南)，倒生根(广西)，两面快(四川)，盘龙莲(贵州)，定根草(云南)

**Asplenium prolongatum** Hook.

生于海拔 350—2 000 米的常绿阔叶林下树干、沟边或岩石上。分布于长江流域以南各省区。

全草(倒生莲)：辛、苦，平。清热解毒，消炎止血，止咳化痰。用于咳嗽多痰，肺痨吐血，痢疾，淋证，肝炎，小便涩痛，乳痈，咽喉痛，崩漏，衄血，跌打骨折，烧、烫伤，外伤出血，蛇、犬咬伤。

**大羽铁角蕨**　　野鸡尾(广西)

**Asplenium pseudolaseritiifolium** Ching

生于林下溪沟或石上。分布于广东、海南、广西。

全草：淡，平。驱风除湿，强腰膝。用于风湿关节痛，腰腿痛。

**岭南铁角蕨**

**Asplenium sampsonii** Hance

生于林下溪边或岩石上。分布于广东、广西、贵州。

全草：苦，凉。清热化痰，止咳止血。用于痢疾，感冒，咳嗽，小儿疳积，外伤出血，蜈蚣咬伤。

**华中铁角蕨**　退血草(湖南)，见血生(广东)，矮金花草(广西)，风水草(四川)

**Asplenium sarelii** Hook.

生于溪边或岩石缝中。分布于陕西、江苏、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广西、四川、贵州。

全草(孔雀尾)：苦，寒。消炎解毒，止血生肌，利湿。用于黄疸，时行感冒，咳嗽，肠胃出血、乳蛾，白喉，痄腮，疔疮，刀伤出血，烧、烫伤。

**石生铁角蕨**　鸡心草(广西)，野黄连(四川)

**Asplenium saxicola** Ros.

生于溪边沟旁或岩石上。分布于广东、广西、贵州、云南。

全草：淡、涩，平。清热润肺，消炎利湿。用于肺痨，小便涩痛，跌打损伤，疮痈。

**铁角蕨**　石蜈蚣(浙江)，蜈蚣赶蛇(江西)，石壁莲(广西)，石上蜈蚣(贵州)

**Asplenium trichomanes** L.

生于海拔 400—4 000 米的林下山谷岩石上。分布于长江流域以南各省区，北至山西、陕西、甘肃、新疆、河南。

全草(铁脚凤尾草)：淡、苦，平。清热解毒，收敛止血，补肾调经，散瘀利湿。用于小儿高热惊风，阴虚盗汗，痢疾，月经不调，带下病，淋浊，胃溃疡，烧、烫伤，疮疖肿毒，外伤出血。

**三翅铁角蕨**

**Asplenium tripteropus** Nakai

生于海拔 800—3 000 米的山坡路旁石上。分布于长江流域以南，北至陕西。

全草：微苦，平。舒筋活络。用于腰痛，跌打损伤。

**变异铁角蕨**　铁扫把(湖南)，铁郎鸡(贵州)

**Asplenium varians** Wall. ex Hook. et Grev.

生于海拔 600—4 600 米的林中树干或岩石上。分布于西南及山西、陕西，湖南。

全草(九倒生)：微涩，凉。清热止血，散瘀消肿。用于刀伤，骨折，小儿疳积及惊风，烧、烫伤，疮疡溃烂。

**狭翅铁角蕨**　人头发(广西)

**Asplenium wrightii** Eaton ex Hook.

生于海拔 230—1 100 米的林下溪边岩石上。分布于福建、台湾、广东、广西、四川、贵州。

根状茎：用于疮疡肿毒。

## 过山蕨属 Camptosorus Link

**过山蕨** 还阳草(辽宁),小石韦(山东),马蹬草(河南)

**Camptosorus sibiricus** Rupr.

生于海拔 200—2 000 米的阴湿岩石壁上。分布于东北、华北及陕西、山东、江苏北部。

全草(马蹬草): 淡,平。止血消炎,活血散瘀。用于脱疽,神经性皮炎,脑血管栓塞引起的偏瘫症,子宫出血,外伤出血,下肢溃疡。

## 巢蕨属 Neottopteris J. Smith

**狭基巢蕨** 真武剑(广西)

**Neottopteris antrophyoides** (Christ) Ching——*Asplenium antrophyoides* Christ

生于海拔 300—1 100 米的石灰岩壁及山地雨林中树干上。分布于广东、广西、贵州、云南。

全草: 微苦,凉。清热解毒,利尿通淋,活络消肿。用于水肿,淋证,小儿惊风,风湿痛,疮疖痈肿,跌打损伤,蛇咬伤。

**麻栗坡巢蕨** 石韦(广西)

**Neottopteris marlipoense** Ching

生于雨林中树干或岩石上。分布于广西、云南。

全草: 利水、通淋。用于淋浊,淋证。

**巢蕨** 山苏花(广西),老鹰七(贵州),铁蚂蝗(云南)

**Neottopteris nidus** (L.) J. Smith——*Asplenium nidus* L.

生于雨林中树干或石岩上。长江以南庭园中常有栽培。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

全草: 苦,温。活血散瘀,强筋骨。用于跌打损伤,骨节疼痛,阳痿。

## 水鳖蕨属 Sinephropteris Mickel

**水鳖蕨**

**Sinephropteris delavayi** (Franch.) Mickel

生于海拔 800—1 750 米的林下阴湿石岩上或岩洞脚下。分布于西南及甘肃、广西。

全草: 淡,平。收敛,止痢。用于痢疾。

# 34. 球子蕨科 Onocleaceae

## 荚果蕨属 Matteuccia Todoro

**东方荚果蕨** 乌来巴、大叶蕨(四川)

**Matteuccia orientalis** (Hook.) Trev.——*Struthiopteris orientalis* Hook.

生于海拔 700—2 600 米的林缘或灌丛中。分布于西南及陕西、甘肃、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广西。

根状茎：苦，凉。祛风，止血。用于风湿骨痛，创伤出血。

**荚果蕨**　黄瓜香(吉林)，野鸡膀子(北京、河北)

**Matteuccia struthiopteris** (L.) Todoro——*Osmunda struthiopteris* L.

生于海拔 900—3 200 米的林下或山谷路旁阴湿地。分布于东北、华北、西北及河南、湖北、四川、西藏。

根状茎：苦，微寒。清热解毒，止血，杀虫。用于湿热肿痛，疔腮，虫积腹痛，崩漏，便血，蛲虫病。

## 35. 岩蕨科　Woodsiaceae

### 岩蕨属　Woodsia R. Br.

**膀胱岩蕨**　东北岩蕨

**Woodsia manchuriensis** Hook.

生于海拔 700—2 300 米的阴湿岩石缝中。分布于东北及山东、安徽、浙江、江西、云南。

全草：利尿，消肿，通淋。用于淋浊，小便不利，跌打损伤。

**耳羽岩蕨**　蜈蚣旗(浙江)

**Woodsia polystichoides** Eaton.

生于海拔 200—2 700 米的沟边阴湿岩石处。分布于吉林、辽宁、河北、山西、陕西、甘肃、山东、浙江、江西、台湾、河南、湖北。

根状茎：用于伤筋；东北民间作清热解毒剂。

## 36. 乌毛蕨科　Blechnaceae

### 乌毛蕨属　Blechnum L.

**乌毛蕨**　贯众(通称)，红骨草(广西)

**Blechnum orientale** L.

生于海拔 1 300 米以下的山坡林下溪边、路旁草丛中。分布于西南及浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西。

根状茎(乌毛蕨贯众)：微苦，凉。清热解毒，杀虫，止血。用于时行感冒，乙型脑炎，疔腮，斑疹伤寒，肠道寄生虫，衄血，吐血，血崩。叶：用于疮疖痈肿。

### 苏铁蕨属　Brainea J. Smith

**苏铁蕨**

**Brainea insignis** (Hook.) J. Smith——*Boweringia insignis* Hook.

生于海拔 200—1 800 米较干旱的荒坡或路旁。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

根状茎(苏铁蕨贯众)：微涩，凉。清热解毒，活血散瘀，收敛止血，杀虫。用于烧、烫伤，外伤出血，感冒，蛔虫病。

附　注：福建、广东、广西等部分地区作贯众入药。

## 崇澍蕨属　Chieniopteris Ching

**崇澍蕨**　羽裂狗脊蕨(中国高等植物图鉴)

**Chieniopteris harlandii** (Hook.) Ching——*Woodwardia harlandii* Hook.

生于海拔 400—1 200 米的林下或沟谷。分布于福建、台湾、广东、海南、广西。

根状茎：祛风除湿。用于关节痛。

## 荚囊蕨属　Struthiopteris Scop.

**荚囊蕨**　铁角蕨、锯草(四川)，天鹅抱蛋(贵州)

**Struthiopteris eburnea** (Christ) Ching——*Blechnum eburneum* Christ

生于海拔 500—1 800 米的林缘干旱石灰岩壁上。分布于台湾、湖北、广西、四川、贵州。

全草：甘、涩，凉。清热解毒，散瘀消肿。用于淋证，跌打损伤，疔疮痈肿。

## 狗脊蕨属　Woodwardia Smith

**狗脊蕨**　贯众(通称)，虾公草(湖南)，猫儿兜(广西)，大贯众(四川)

**Woodwardia japonica** (L. f.) Smith——*Blechnum japonicum* L.

生于疏林下或溪边路旁，为酸性土的指示植物。分布于长江流域以南及台湾。

根状茎(狗脊蕨贯众)：苦，凉。清热解毒，散瘀，杀虫。用于虫积腹痛，湿热便血，血崩，痢疾，疔疮痈肿。

**东方狗脊蕨**　老龙骨(湖南)，牛肋巴贯众(四川)

**Woodwardia orientalis** Sw.

生于海拔 700—2 600 米的林缘路旁或溪边。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西。

根状茎：甘，微温。祛风除湿，壮腰膝。用于风寒湿痹，腰腿痛，痢疾，烧、烫伤，蛇咬伤。

附　注：福建、湖南部分地区作贯众入药。

**胎生狗脊蕨**　多子东方狗脊(湖南药物志)

**Woodwardia prolifera** Hook. et Arn.——*W. orientalis* Sw. var. *prolifera* (Hook. et Arn.) Ching

生于海拔 600 米以下的沟边、路旁。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、四川。

根状茎：苦，寒。强腰膝，补肝肾，除风湿。用于风寒湿痹，肾虚腰痛，腹中邪热。

**单芽狗脊蕨**　　真虾公草(湖南)，冷卷子疙瘩(四川)

**Woodwardia unigemmata** (Makino) Nakai——*W. radicans* (L.) Smith var. *unigemmata* Makino

生于海拔 600—3 000 米的林下或灌丛中。分布于中南、西南及陕西、甘肃、浙江、江西、福建、台湾。

根状茎(狗脊蕨贯众)：苦，凉。清热解毒，散瘀，杀虫。用于虫积腹痛，感冒，便血，血崩，痈疮肿毒。

## 37. 鳞毛蕨科　Dryopteridaceae

### 复叶耳蕨属　Arachniodes Bl.

**美丽复叶耳蕨**

**Arachniodes amoena** (Ching) Ching——*Rumohra amoena* Ching

生于海拔 700—1 400 米的林下或路旁阴湿处。分布于江西、福建、湖南、广东、广西、贵州。

全草：用于关节痛。

**芒刺复叶耳蕨**

**Arachniodes aristata** (Forst.) Tindale——*Polypodium aristatum* Forst.

生于山谷石岩上。分布于山西、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东及沿海岛屿、广西、云南。

根状茎：微苦，凉。清热解毒。用于痢疾。

**刺头复叶耳蕨**

**Arachniodes exilis** (Hance) Ching——*Aspidium exile* Hance

生于林下沟边或路旁。分布于长江流域以南及河南。

根状茎：微苦、涩，凉。清热，消炎，止痢。用于烧、烫伤，痢疾。

**斜方复叶耳蕨**　　大叶鸭脚莲(浙江)，线鸡尾(四川)

**Arachniodes rhomboidea** (Wall. ex Mett.) Ching——*Aspidium rhomboideum* Wall. ex Mett.

生于海拔 1 200 米以下的林下或溪边石缝中。分布于西南及江苏、安徽、浙江、福建、台湾、广东及沿海岛屿。

根状茎：微苦，温。祛风散寒。用于关节痛。

**长尾复叶耳蕨**　　小叶金鸡尾巴草(浙江天目山)

**Arachniodes simplicior** (Makino) Ohwi——*Aspidium aristatum* var. *simplicior* Makino

生于海拔 400—1 800 米的林下或灌丛中。分布于西南及江苏、安徽、浙江、江西、福

建、湖北、湖南、广东、广西。

根状茎：微涩，平。清热解毒。用于内热腹痛。

**美观复叶耳蕨**　冷蕨茸(四川)，华丽汝蕨(植物分类学报)

**Arachniodes speciosa** (Don) Ching——*Aspidium speciosum* Don

生于林下或溪边。分布于西南及海南。

根状茎：涩，凉。清热解毒，祛风止痒，散瘀活血。用于热泻，风疹，跌打瘀肿。

## 贯众属　Cyrtomium Presl

**镰羽贯众**　小羽贯众(广西)

**Cyrtomium balansae** (Christ) C. Chr.——*Polystichum balansae* Christ

生于海拔200—1 600米的林下或溪边。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

根状茎：苦，寒。清热解毒，杀虫。用于时行感冒，肠道寄生虫。

附　注：功效相同的有**缺齿镰羽贯众 C. balansae** (Christ) C. Chr. f. **edentatum** Ching，分布于广西。

**刺齿贯众**　大叶兰芝(四川)，牛尾贯众(贵州)

**Cyrtomium caryotideum** (Wall.) Presl——*Aspidium caryotideum* Wall.

生于海拔400—2 900米的林下山谷阴湿处。分布于西南及陕西、甘肃、江西、台湾、湖北、广东。

根状茎：苦，微寒。有小毒。清热解毒，活血散瘀，利水。用于瘰疬，疔毒疖肿，感冒，崩漏，跌打损伤，水肿。

附　注：云南部分地区作贯众入药。

**全缘贯众**　贯众(广东)

**Cyrtomium falcatum** (L. f.) Presl——*Polypodium falcatum* L. f.

生于沿海山石及岛屿疏林下。分布于辽宁、河北、山东、江苏、浙江、福建、台湾、广东、海南、广西。

根状茎：苦、涩，寒。清热解毒，驱虫，止血。用于外伤出血，肠道寄生虫病。

附　注：大连、山东、浙江、福建沿海地区作贯众入药。

**贯众**　小唇头鸡(陕西)，大叶狼衣(浙江)，黑狗脊(福州)，神箭根(广州)，铁狼鸡(贵州)

**Cyrtomium fortunei** J. Smith

生于海拔400—2 300米的山地林下路旁或溪沟边。分布于华东、中南、西南及河北、山西、陕西、甘肃、台湾。

根状茎：苦，微寒。清热平肝，止血，消炎，解毒，杀虫。用于感冒，热病斑疹，粉秽中毒，疟疾，痢疾，肝炎，血崩，带下病，乳痈，瘰疬，跌打损伤。

附　注：华东某些地区作贯众入药，惟用量较少。

**多羽贯众**

**Cyrtomium fortunei** J. Smith f. **polypterum** (Diels) Ching——*Polystichum*

*falcatum* (L. f.) Presl var. *polypterum* Diels

生于山地林下或沟溪边。分布于陕西、甘肃、河南、湖北、湖南、四川、贵州。

根状茎：苦，微寒。清热解毒，凉血，降压。用于头晕，头痛，高血压症。

**大羽贯众**　石吊儿、岩边七(四川)

**Cyrtomium macrophyllum** (Makino) Tagawa——*Aspidium falcatum* (L. f.) Presl var. *macrophyllum* Makino

生于海拔1 000—3 500米的林下水沟边、路旁或阴湿石缝中。分布于江西、湖北、湖南、四川、贵州。

根状茎：清热解毒，活血，止血，杀虫。用于崩漏，带下病，烧、烫伤，跌打损伤，蛔虫病。

**大叶贯众**　猪仔、野头鸡(四川)

**Cyrtomium macrophyllum** (Makino) Tagawa f. **muticum** (Christ) Ching et Shing——*C. muticum* Christ

生于海拔2 000米以下的山谷溪沟石旁或路边阴湿处。分布于西南及陕西、甘肃、湖北、湖南。

根状茎：苦，凉。清热解毒，止血。用于预防时行感冒，乙型脑炎，崩漏。

**厚叶贯众**　谷发(壮族语)

**Cyrtomium pachyphyllum** (Ros.) C. Chr ——*Polystichum pachyphyllum* Ros.

生于山谷林下溪沟边阴湿处。分布于广西、贵州、云南。

根状茎：用于预防时行感冒，蛔虫病，小儿高热。

**线羽贯众**　凤尾莲(四川)

**Cyrtomium urophyllum** Ching

生于林下溪沟旁。分布于湖南、广西、四川。

根状茎：清热解毒，散热。

**阔羽贯众**　冷蕨子草(四川)

**Cyrtomium yamamotoi** Tagawa

生于山地林下阴湿处。分布于甘肃、安徽、浙江、江西、湖北、广西、四川。

根状茎：清热解毒，驱虫，止血。

## 鳞毛蕨属　Dryopteris Adans.

**阔叶鳞毛蕨**　大鳞毛蕨(东北草本植物志)

**Dryopteris austriaca** (Jacq.) Waynar ex Schinz et Thell——*Polypodium austriaca* Jacq.

生于次生林、针阔混交林下阴湿处。分布于东北、华北。

根状茎：用于蛔虫病。

**多鳞鳞毛蕨**　贯众(云南)，芒齿贯众(中药鉴别手册)

**Dryopteris barbigera** (Moore) O. Kuntze——*Lastrea barbigera* Moore

生于海拔3 600—4 700米的阔叶林下阴湿草地。分布于青海、台湾、四川、云南、西

藏。

根状茎：驱虫。

附　注：云南丽江地区作贯众入药。

**两色鳞毛蕨**

**Dryopteris bissetiana** (Baker) C. Chr.——*Nephrodium bissetianum* Baker

生于山谷林下或沟边。分布于长江流域各省及陕西、甘肃。

根状茎：清热解毒。用于预防时行感冒。

**阔鳞鳞毛蕨**　毛贯众(湖南)，细叶土凤尾(广西)，东南鳞毛蕨(浙江药用植物志)

**Dryopteris championii** (Benth.) C. Chr. ex Ching——*Aspidium championii* Benth.

生于海拔300—1 500米的疏林下或灌丛中。分布于中南及江苏、安徽、浙江、江西、福建、四川、贵州。

根状茎：苦，寒。清热解毒，止咳平喘。用于感冒，气喘，便血，痛经，钩虫病，烧、烫伤。

**金冠鳞毛蕨**

**Dryopteris chrysocoma** (Christ) C. Chr.

生于海拔2 700—3 200米的山坡林下或灌丛中。分布于云南、西藏。

根状茎：清热解毒，散瘀，止血。用于金疮，产后血气胀痛，带下病，衄血，痢疾。

附　注：云南丽江地区作贯众入药。

**绵马鳞毛蕨**　野鸡膀子、东绵马(东北)

**Dryopteris crassirhizoma** Nakai

生于海拔300—1 200米的林下。分布于东北及河北。

根状茎(绵马贯众)：苦，微寒。有小毒。清热解毒，驱虫，止血。用于预防时行感冒，虫积腹痛，崩漏。

**暗鳞鳞毛蕨**

**Dryopteris cycadina** (Franch. et Sav.) C. Chr.——*Aspidium cycadium* Franch. et Sav.

生于海拔500—2 500米的常绿阔叶林下。分布于华东、中南、西南及陕西。

根状茎：苦，寒。驱虫，止血。用于蛔虫病，崩漏。

附　注：云南屏边、贡山等地作贯众入药。

**欧洲鳞毛蕨**

**Dryopteris filix-mas** (L.) Schott——*Polypodium filix-mas* L.

生于林下湿地。分布于新疆北部山区。

根状茎(欧绵马)：苦，微寒。有小毒。清热解毒，驱虫，止血。用于防治时行感冒，虫积腹痛，崩漏。

**黑足鳞毛蕨**

**Dryopteris fuscipes** C. Chr.

生于疏林下或灌丛中。分布于长江流域以南。

根状茎：收敛消炎。用于疮毒溃烂久不收口。

**黄山鳞毛蕨**　　小叶凤凰尾巴草(浙江)

**Dryopteris hwangshanensis** Ching

生于阔叶林下沟边湿地。分布于安徽、浙江。

根状茎：苦，平。清热明目。用于疮疡溃烂，目赤肿痛。

**齿头鳞毛蕨**　　青溪鳞毛蕨(中国药用孢子植物)

**Dryopteris laborder** (Christ) C. Chr.——*Aspidium labordei* Christ

生于海拔600—1 900米的山坡林下。分布于江西、台湾、湖南、广东、广西、贵州、云南。

根状茎：苦，凉。清热利湿，通经活血。用于泄泻，痢疾，痛经，外伤出血。

**狭顶鳞毛蕨**　　半边草(广西)，毛头黄(四川)，熊蕨(国药的药理学)

**Dryopteris lacera** (Thunb.) O. Kuntze——*Polypodium lacera* Thunb.

生于林下或灌丛中。分布于陕西、山东、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、广西、四川、云南。

根状茎：清热活血，杀虫。用于跌打损伤，痢疾，绦虫病。

**美丽鳞毛蕨**　　马牙贯众(山东)，华北鳞毛蕨(秦岭植物志)

**Dryopteris laeta** (Kom.) C. Chr.——*Nephrodium laetum* Kom.

生于海拔1 000—2 800米的沟谷灌丛中。分布于吉林、辽宁、河北、陕西、甘肃、山东、河南、四川。

根状茎：苦、涩，平。除风湿，强筋骨，降血压，清热解毒。用于腰背酸痛，头晕，高血压症。

附　注：山东泰安地区作贯众入药。

**疏羽鳞毛蕨**

**Dryopteris laeta** (Kom.) C. Chr. var. **giraldii** (Christ) Ching——*D. filix-mas* (L.) Schott var. *giraldii* Christ

生于海拔2 800米以下的林下。分布于陕西南五台山、太白山。

根状茎：除风湿，强腰膝，降压。用于脊柱疼痛，头晕，高血压症。

**厚叶鳞毛蕨**　　喀西鳞毛蕨(云南)，等宽鳞毛蕨(中药鉴别手册)

**Dryopteris lepidopoda** Hayata

生于海拔2 300—2 500米的山地阔叶林下。分布于台湾、四川西部、云南西北部、西藏。

根状茎：清热解毒，杀虫。用于绦虫病。

附　注：云南腾冲、丽江地区作贯众入药。

**大叶鳞毛蕨**　　湿地贯众(云南)

**Dryopteris marginata** (Wall.) Christ

生于山地林下或疏灌丛中。分布于云南。

根状茎：清热解毒，散瘀，止血。用于斑疹，金疮，带下病，产后流血，衄血，痢疾。

**半岛鳞毛蕨**　　辽东鳞毛蕨(东北草本植物志)

**Dryopteris peninsulae** Kitag.

生于林下阴湿地。分布于辽宁、陕西、山东、江西、河南、湖北。

根状茎：苦、涩，微寒。清热解毒，止血，杀虫。用于产后出血，血崩，吐血，衄血，便血，赤痢，绦虫病、蛔虫病。

附　注：本品在山东作贯众入药。在云南地区作贯众使用的有**大羽鳞毛蕨 D. paleacea** (Sw.) C. Chr.；**纤维鳞毛蕨 D. sinofibrillosa** Ching，分布于台湾、云南、西藏。

**同形鳞毛蕨**

**Dryopteris uniformis** Makino

生于林下阴湿地或石上。分布于江苏、上海、安徽、浙江、江西。

根状茎：苦，寒。止血，杀虫。用于崩漏，吐血，绦虫病、蛔虫病。

**变异鳞毛蕨**　　小狗脊子(四川)

**Dryopteris varia** (L.) O. Kuntze——*Polypodium varia* L.

生于山地林下溪边及石缝中。分布于华东及河北、湖北、湖南、广西、四川、贵州。

根状茎：微涩，凉。清热，止痛。用于内热腹痛。

附　注：湖南部分地区作贯众入药。

## 黔蕨属　Phanerophlebiopsis Ching

**粗齿黔蕨**　　点星蕨(广西)

**Phanerophlebiopsis blinii** (Lévl.) Ching——*Aspidium blinii* **Lévl.**

生于林下溪沟边湿地。分布于湖南、广西，贵州。

根状茎：用于腰痛，瘰疬。

## 耳蕨属　Polystichum Roth

**刺叶耳蕨**　　凤尾贯众(昆明)

**Polystichum acanthophyllum** (Franch.) Christ

生于海拔 2 300—2 800 米的山坡石上。分布于四川、云南、西藏。

全草：辛、微苦，平。止血，解毒。用于便血，衄血，崩漏。

**尖齿耳蕨**　　岩山鸡(四川)，胃痛药(贵州)

**Polystichum acutidens** Christ

生于海拔 400—2 500 米的山谷林下湿地。分布于西南及台湾、湖北、湖南、广西。

根状茎：用于胃痛。全草：用于头昏，周身疼痛。

**角状耳蕨**　　牛毛七、石黄连(四川)

**Polystichum alcicorne** (Baker) Diels

生于海拔 1 500 米以下的溪边阴石岩或树干上。分布于四川、贵州。

全草：消肿解毒，散瘀止血。用于外伤出血。

**布朗耳蕨**　　耳蕨贯众(山西)，睬甲哈乌(藏语)

**Polystichum braunii** (Spenn.) Fée——*Aspidium braunii* Spenn.

生于高寒山区林下湿地。分布于东北、华北、西北及四川。

根状茎、全草(耳蕨贯众)：涩，寒。止血，杀虫，清热解毒。用于衄血，轻粉中毒，头疮白秃，痄腮，蛲虫病。 全草：用于斑疹。

附　注：山西部分地区作贯众入药。

**鞭叶耳蕨**

**Polystichum craspedosorum** (Maxim.) Diels——*Aspidium craspedosorum* Maxim

生于林下钙质岩石上。分布于东北、华北、西北及山东、浙江、湖北、湖南、四川、贵州。

全草：清热解毒。

**对生耳蕨**　　小牛肋巴(四川)，灰贯众(湖南药物志)

**Polystichum deltodon** (Baker) Diels——*Aspidium deltodon* Baker

生于海拔 750—1 800 米的山地林下石灰岩壁或缝中。分布于西南及安徽、台湾、湖北、湖南、广东、广西。

全草：酸、涩，微寒。活血止痛，消肿，利尿。用于跌打损伤，感冒，外伤出血，蛇咬伤。

**小三叶耳蕨**　　蛇舌草(广西)

**Polystichum hancockii** (Hance) Diels——*Ptilopteris hancockii* Hance

生于林下溪沟边。分布于福建、台湾、广东、广西。

全草：微苦，凉。清热解毒。用于外伤，毒蛇咬伤。

**丽江耳蕨**　　小叶昏头鸡(四川)

**Polystichum lichiangense** (C.H. Wight) Ching

生于海拔 4 000 米以下的山坡灌丛草地。分布于四川、云南、西藏。

根状茎：微涩，平。清热解毒，凉血止血，杀虫，止痒。用于外伤出血，便血，蛔虫病。

**矛状耳蕨**　　耳蕨(新疆中草药)

**Polystichum lonchitis** (L.) Roth

生于山地林下沟谷湿地。分布于新疆北部山区。

根状茎：苦，微寒。清热解毒，驱虫，止血。用于防治时行感冒，虫积腹痛，崩漏。

附　注：产地作贯众入药。

**黑鳞耳蕨**　　大叶山鸡尾巴草(浙江)

**Polystichum makinoi** Tagawa

生于海拔 900—1 200 米的林下湿地。分布于西南及山西、陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南。

叶、根状茎(黑鳞大耳蕨)：用于下肢疖肿，刀伤出血。 根状茎：清热解毒，消炎，止痢。用于痢疾。

**宝兴耳蕨**　　热那儿(四川)，穆坪高山耳蕨(西藏植物志)

**Polystichum moupinense** (Franch.) Bedd.

生于高山林下湿地。分布于陕西、甘肃、四川、云南。

全草：用于胃病，食物中毒。

**革叶耳蕨**　　凤凰尾巴草(浙江)

**Polystichum neolobatum** Nakai

生于海拔 1 400—2 200 米的林下或疏灌丛下岩石上。分布于陕西、安徽、浙江、江西、台湾、湖北、四川、云南。

根状茎：用于内热腹痛。

**峨眉耳蕨**　　万年青、草苓子(四川)，树林株(中国药用植物志)

**Polystichum omeiense** C. Chr.

生于海拔 800—1 500 米的林中树干或湿岩石上。分布于四川、贵州、云南。

全草：苦，平。清热利尿。用于胃热，鼻肿，小便涩痛，大肠火结。

**棕鳞耳蕨**

**Polystichum polyblepharum** (Röm.) Presl——*Aspidium polyblepharum* Röm

生于林下溪沟旁。分布于江苏、安徽、浙江、江西、湖北、四川。

根状茎：微涩，凉。清热解毒。用于痢疾，泄泻，乳痈，下肢疖肿。

**多鳞耳蕨**

**Polystichum setiferum** (Forsk.) Moore ex Woynar

生于山地林下、溪沟边的酸性土上。分布于西南及江西、湖北、广东。

根状茎：清热解毒。用于时行感冒，痢疾，麻疹。

**线鳞耳蕨**

**Polystichum setosum** (Wall.) Schott.——*Asplenium setosum* Wall.

生于海拔 700—2 300 米的林下湿地或沟边。分布于西南及湖南、广西。

根状茎：清热解毒。用于泄泻，痢疾，乳痈。

**陕西耳蕨**　　小贯众(陕西)，水贯众(青海)

**Polystichum shensiense** Christ

生于海拔 2 600—3 200 米的较干旱的岩石上。分布于陕西、青海。

根状茎：苦、涩，微寒。有小毒。清热解毒，杀虫，止血。用于防治时行感冒，脑膜炎，蛲虫病，吐血，衄血，崩漏。

附　注：产地多作贯众入药。

**中华耳蕨**　　牛肋巴(四川)

**Polystichum sinense** Christ——*P. prescotianum* (Wall.) Moore var. *sinense* Christ

生于高山林下湿地或沟边。分布于陕西、四川。

全草：散寒。用于周身疼痛。

**密鳞耳蕨**　　敦木朴热惹(西藏)，多鳞耳蕨(中国高等植物图鉴)

**Polystichum squarrosum** (D. Don) Fée——*Aspidium squarosum* D. Don

生于海拔 2 000—2 400 米的河谷杂木林下、林下岩石上。分布于西南及陕西、甘肃、浙江、河南、湖北。

根状茎：苦，凉。有小毒。清热解毒，杀虫，止血。用于时行感冒，赤痢，麻疹，肠道寄生虫，吐血，便血，崩漏。

附　注：《西藏常用中草药》载作贯众入药。

**三叉耳蕨**

**Polystichum tripteron** (Kunze) Presl——*Aspidium tripteron* Kunze

生于海拔 400—2 300 米的林下溪沟旁。分布于东北、华北、华东、中南、西南及陕西、甘肃。

根状茎：清热解毒，利尿通淋。用于内热腹痛，痢疾，淋浊。

**对马耳蕨**　　毛脚鸡(四川)，马祖耳蕨(中国蕨类植物图谱)

**Polystichum tsus-simense** (Hook.) J. Smith——*Aspidium tsus simense* Hook.

生于海拔 400—3 000 米的林下岩石上或灌丛中。分布于中南、西南及陕西、甘肃、安徽、浙江、福建、台湾。

根状茎：清热解毒。用于目赤肿痛，痢疾，痈疮肿毒。

## 38. 三叉蕨科　Aspidiaceae

### 肋毛蕨属　Ctenitis C. Chr.

**膜边肋毛蕨**　　贯众(云南)

**Ctenitis clarker** (Baker) Ching——*Nephrodium clarker* Baker

生于海拔 2 800 米以下的混交林、针叶林下湿地或岩石上。分布于西南及台湾、广西。

根状茎：杀虫，解毒。用于绦虫病。

**虹鳞肋毛蕨**　　小金毛狗脊(四川)

**Ctenitis rhodolepis** (Clarke) Ching——*Nephrodium rhodolepis* Clarke

生于海拔 500—3 600 米的林下湿石缝中。分布于西南及福建、台湾、湖北、广西。

根状茎：用于风湿骨痛。

### 沙皮蕨属　Hemigramma Christ

**下延沙皮蕨**　　五指蕨(广西)，沙皮蕨(中国蕨类植物图谱)

**Hemigramma decurrens** (Hook.) Cop.——*Gymnopteris decurrens* Hook.

生于海拔 500 米以下的山谷密林下。分布于福建、台湾、海南、广西、云南。

根状茎：清热解毒。用于痢疾。

### 牙蕨属　Pteridrys C. Chr. et Ching

**毛轴牙蕨**

**Pteridrys australis** Ching

生于海拔 290—400 米的沟边杂木林下。分布于广东、云南。

全草：清热止血。用于痢疾，衄血，便血，淋浊。

### 地耳蕨属　Quercifilix Cop.

**地耳蕨**　　干肚药(广西)，散血草(贵州)

**Quercifilix zeylanica** (Houtt.) Cop.——*Ophioglossum zeylanicum* Houtt.

生于海拔100—800米的林下湿地或溪边石上。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

全草：清热止血。用于痢疾，便血，淋浊，衄血。 叶：用于小儿便稀。

### 三叉蕨属 Tectaria Cavan

**下延三叉蕨** 独角莲、一匹莲(四川)

**Tectaria decurrens** (Presl) Cop.——*Aspidium decurrens* Presl

生于海拔500米以下的山谷林下溪边湿地。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、四川、云南。

全草：清热解毒。用于疔疮痈毒。

**掌状三叉蕨** 鸟足状三叉蕨(广西)

**Tectaria subpedata** (Harr.) Ching

生于林下或石缝中。分布于广西。

全草：清热解毒。用于感冒发热。

**三叉蕨** 鸡爪蕨(广西)，昏鸡头(四川)

**Tectaria subtriphylla** (Hook. et Arn.) Cop.——*Polypodium subtriphyllum* Hook. et Arn.

生于林下或溪沟石上。分布于西南及福建、台湾、广东、广西。

叶：涩，平。祛风除湿，止血，解毒。用于风湿骨痛，痢疾，刀伤出血，蛇咬伤。

## 39. 实蕨科 Bolbitidaceae

### 实蕨属 Bolbitis Schott

**长叶实蕨** 三叉剑(广西)，三步跳(四川)，鸭公尾(四川、贵州)

**Bolbitis heteroclita** (Presl) Ching——*Acrostichum heteroclitum* Presl

生于海拔200—1 400米的溪边石上或林下湿地。分布于西南及福建、台湾、广东、海南、广西。

全草：淡，凉。清热解毒，止咳，止血，收敛。用于咳嗽，吐血，痢疾，烧、烫伤，跌打损伤，蛇咬伤。

**华南实蕨** 凤尾蕨(广西)，海南实蕨(海南植物志)

**Bolbitis subcordata** (Cop.) Ching——*Compium subcordatum* Cop.

生于林下溪边石上。分布于浙江、福建、台湾、江西、广东、海南、广西。

全草：微涩，凉。清热解毒，凉血，止血。用于痢疾，吐血，毒蛇咬伤。

## 40. 舌蕨科 Elaphoglossaceae

### 舌蕨属 Elaphoglossum Schott

**华南舌蕨** 小儿群(图经本草)

**Elaphoglossum yoshinagae** (Yatabe) Makino——*Acrostichum yoshinagae* Yatabe

生于海拔520—900米的林下湿岩石上。分布于江西、福建、台湾、广东、广西、贵州。

根状茎：苦，凉。利尿。用于淋浊。

附 注：功效相同的有**披针叶舌蕨 E. lancifolium** Ching，分布于广西。

## 41. 肾蕨科 Nephrolepidaceae

### 肾蕨属 Nephrolepis Schott

**肾蕨** 狗枫走(福建)，蕨薯(广西)，麻雀蛋(四川)，冰果草(贵州)，蛇蛋参(云南)

**Nephrolepis auriculata** (L.) Trimen——*Polypodium auriculatum* L

生于海拔600米以下的溪边、林下石缝中或树干上，现各地庭园多有栽培作观赏用。分布于西南及浙江、福建、台湾、湖南、广东、广西。

全草(肾蕨)：苦、辛，平。清热利湿，消肿解毒。用于黄疸，淋浊，骨鲠喉，痢疾，乳痈，外伤出血，毒蛇咬伤。块茎：甘、涩，平。清热利湿，止血。用于感冒发热，淋巴结炎，咳嗽吐血，泄泻，崩漏，带下病，乳痈，痢疾，血淋，子痈。

**毛叶肾蕨**

**Nephrolepis hirsutula** (Forst) Presl——*Polypodium hirsutulum* Forst

生于林缘、谷地及村旁路边。分布于福建、台湾、广东、海南、广西。

全草：淡，凉。消积，化痰。用于小儿消化不良。

## 42. 骨碎补科 Davalliaceae

### 小膜盖蕨属 Araiostegia Cop.

**美小膜盖蕨** 蜈蚣草(云南)

**Araiostegia pulchra** (Don) Cop.——*Davallia pulchra* D. Don

附生于海拔2 300—3 300米的山地林下沟边石上或树干上。分布于四川、云南、西藏。

根状茎：用于蛔虫病。

**云南小膜盖蕨** 蕨叶一枝蒿、小冷蕨叶(广西)

**Araiostegia yunnanensis** (Christ) Cop.——*Davallia yunnanensis* Christ

生于海拔1 000—3 000米的山地混交林下的岩石上。分布于广西、贵州、云南。

全草：淡，平。清热解毒，消炎。用于跌打损伤，烧、烫伤，刀伤，痢疾，食物中毒。

## 骨碎补属　Davallia Smith

**大叶骨碎补**　木石鸡(广东)，小骨碎补(广西)

**Davallia divaricata** Bl.

生于低山沟谷的岩石或树干上。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、云南。

根状茎：微苦，温。散瘀止痛，强筋壮骨，益肾固精。用于跌打损伤，风湿骨痛，肾虚腰痛。

**骨碎补**　毛姜、骨碎补(山东)，海州骨碎补(中国蕨类植物图谱)

**Davallia mariesii** Moore ex Baker

生于海拔200—700米的阴石上。分布于辽宁、山东、江苏、台湾。

根状茎：苦，温。坚骨，补肾，祛风除湿，活血止痛。用于肾虚腰痛，筋骨酸痛，关节痛，跌打损伤。

**中国骨碎补**　石岩鸡、山知母(广西)

**Davallia sinensis** (Christ) Ching——*D. solida* (Forst) Sw. var. *sinensis* Christ

生于岩石或树干上。分布于广西、云南东南部。

根状茎：苦，温。壮筋骨，强腰膝。用于跌打损伤，筋骨疼痛。

## 阴石蕨属　Humata Cav.

**半圆盖阴石蕨**　白龙鸡(广西)，白毛蕨(云南)

**Humata platylepis** (Baker) Ching——*Davallia platylepis* Baker

生于海拔1 400—1 500米的林中树干上。分布于广西、贵州、云南。

根状茎：苦、涩，凉。祛风解痉，除湿利水，续筋接骨。用于破伤风，肾炎水肿，风湿骨痛，跌打损伤，骨折。

**阴石蕨**　红毛蛇(广西)，小蕨鸡(四川)，一把针(贵州)

**Humata repens** (L. f.) Diels ——*Adiantum repens* L. f.

生于海拔500—1 900米的林下溪边树干或岩石上。分布于福建、台湾、广东、广西、四川、贵州、云南。

根状茎：甘、淡，平。清热利湿，散瘀活血，续筋接骨。用于风湿痹痛，腰肌劳损，便血，淋证，跌打损伤，痈疮肿毒。为治牙痛的特效药。

**圆盖阴石蕨**　白毛石蚕(浙江)，石伸筋(江西)，老鼠尾(福建)，白毛蛇(广东、广西、云南)，补筋藤(广西)

**Humata tyermanni** Moore

附生于海拔200—1 760米的树干或阴石上。分布于西南及江苏、安徽、浙江、江西、福建、广东、广西。

根状茎(草石蚕)：淡、微苦，凉。清热解毒，祛风除湿。用于湿热黄疸，风湿痹痛，腰肌劳损，跌打损伤，肺痈，咳嗽，牙龈肿痛，毒蛇咬伤。

### 大膜盖蕨属　Leucostegia Presl

**大膜盖蕨**

**Leucostegia immersa** (Wall.) Presl——*Davallia immersa* Wall.

生于海拔 1 800—2 800 米的混交林下或灌丛中。分布于台湾、广东、广西、云南、西藏。

根状茎：微苦，温。活血散瘀。用于腰痛，跌打损伤。

## 43. 双扇蕨科 Dipteridaceae

### 双扇蕨属　Dipteris Reinw.

**中华双扇蕨**　　半边藕、铁凉伞(广西)

**Dipteris chinensis** Christ

生于海拔 800—2 100 米的灌木丛中。分布于广西、贵州、云南、西藏。

根状茎：消炎，镇痛。用于水肿，小便涩痛，腰痛，浮肿。

## 44. 水龙骨科 Polypodiaceae

### 节肢蕨属　Arthromeris J. Smith

**节肢蕨**　　岩脚箕、搜山虎(四川)

**Arthromeris lehmanni** (Mett.) Ching——*Polypodium lehmanni* Mett.

生于海拔 500—2 900 米的林下岩石或树干上。分布于西南及江西、台湾、湖北、广东。

全草：活血散瘀，解毒。用于狂犬咬伤。

**龙头节肢蕨**　　倒省莲(广西)，搜山虎(贵州)

**Arthromeris lungtauensis** Ching——*Polypodium lungtauensis* Ching

生于海拔 500—1 800 米的林下岩缝或树干上。分布于江西、福建、湖北、广东、广西贵州。

根状茎：苦、涩，平。清热利尿，止痛。用于淋证，骨折。

**多羽节肢蕨**　　过山龙(四川)，地蜈蚣、凤尾搜山虎(昆明)

**Arthromeris mairei** (Brause) Ching——*Polypodium mairei* Brause

生于海拔 2 600 米以下的林下湿地及石缝中。分布于西南。

根状茎：苦、涩，寒。有小毒。祛风活络，消积，通便，降火。用于风湿筋骨痛，坐骨神经痛、食积腹胀、胃痛，便秘，目赤，牙痛。

### 线蕨属　Colysis Presl

**琼越线蕨**

**Colysis bonii** Ching

生于密林下溪边的潮湿岩石上。分布于广东、海南、广西。

全草：微苦、涩、凉。活血散瘀，清热利尿。用于跌打损伤，淋证。

**掌叶线蕨**　一包针、石壁莲(广西)

**Colysis digitata** (Baker) Ching——*Gymnogramme digitata* Baker

生于海拔 110—1 700 米的林下或山谷溪边湿地或岩石上。分布于海南、广西、云南。

叶：微苦、涩，凉。活血散瘀，解毒，止痛。用于跌打损伤，关节痛，蛇咬伤。

**线蕨**　羊七莲(广西)

**Colysis elliptica** (Thunb.) Ching——*Polypodium elliptica* Thunb.

生于海拔 100—800 米的山坡林下或溪边。分布于华东、中南、西南。

叶：微苦，凉。清热利尿，散瘀消肿。用于淋证，跌打损伤。全株：用于肺痨。

**断线蕨**　石韦(广西)

**Colysis hemionitidea** (Wall.) Presl——*Polypodium hemionitideum* Wall.

生于海拔 500—1 300 米的混交林下或溪边岩石上。分布于西南及福建、台湾、广东、广西。

叶：淡、涩，凉。清热利尿，解毒。用于斑疹，淋证，膀胱湿热，毒蛇咬伤。

**胃叶线蕨**　三枝枪(广西)

**Colysis hemitoma** (Hance) Ching

生于海拔 300—600 米的林下湿地或岩石上。分布于江西、福建、广东、广西。

全草：用于外伤感染。

**矩圆线蕨**　水剑草(福建)，边那坡草(广西)，应卜扇(四川)，篦梳剑(泉州本草)

**Colysis henryi** (Baker) Ching——*Gymnogramme henryi* Baker

生于海拔 600—2 000 米的林下阴湿岩壁上。分布于江苏、浙江、福建、湖北、广西、四川、贵州、云南。

全草：甘，微寒。清热利尿，止血，通淋，接骨。用于肺痨，咳血，尿血，淋浊，急性关节痛，骨折。

**绿叶线蕨**　爬山虎、小一包针(广西)

**Colysis léveillei** (Christ) Ching

生于溪边岩石上。分布于江西、湖南、广东、广西、贵州。

全草：微涩，凉。清热利湿，通淋。用于风湿骨痛，跌打损伤，淋证，淋浊。

**狭绿叶线蕨**

**Colysis lèveillei** (Christ) Ching f. **angusta** (C. Chr.) Ching

生于林下溪边石上。分布于广西。

全草：用于淋证，淋浊，风湿骨痛，跌打损伤。

**长梗线蕨**

**Colysis longipedunculata** Ching et Y.X. Ling

生于林下阴湿地或岩石上。分布于广西。

全草：用于烧、烫伤。

**龙州线蕨**

**Colysis morsei** Ching

生于林下阴湿岩石上。分布于广西。

全草：用于胃脘痛，风湿骨痛。

**宽羽线蕨**　一包金、骨碎补(广西)

**Colysis pothifolia** (Don) Presl——*Hemionitis pothifolia* Don

生于林下湿地或岩石上。分布于福建、台湾、广东、广西、贵州、云南。

全草：淡、微涩，温。补虚损，强筋骨。用于跌打损伤。

**褐叶线蕨**　小肺经草、连天草(湖南药物志)

**Colysis wrightii** (Hook.) Ching——*Gymnogramme wrightii* Hook.

生于林下溪边岩石上。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西。

全草：甘，平。行气化瘀，祛痰镇咳。用于妇女虚弱咳嗽，带下病。

## 抱树莲属　Drymoglossum Presl

**异叶抱树莲**　金鱼藤(云南)，铁指甲(中国药用孢子植物)

**Drymoglossum heterophyllum** (C. Chr.) Ching

生于林下湿石或树干上。分布于贵州、云南。

全草：甘、淡，微温。消肿镇痛，接骨，止血。用于跌打损伤，外伤出血，骨折，中耳炎。

**抱树莲**　抱石莲、瓜子菜(广州)，巧根藤(岭南采药录)

**Drymoglossum piloselloides** (L.) Presl——*Pteris piloselloides* L.

生于树干上。分布于广东、广西 云南。

全草(抱树莲)：甘、淡，微凉。清热利湿，消炎解毒。用于风湿骨痛，瘰疬，痄腮，跌打损伤，疥疮，秃疮。

## 丝带蕨属　Drymotaenium Makino

**丝带蕨**　木莲金(浙江)

**Drymotaenium miyoshianum** (Makino) Makino——*Taenitis miyoshiana* Makino

生于树上。分布于西南及安徽、浙江、台湾、湖北。

全草：用于小儿惊风。

## 伏石蕨属　Lemmaphyllum Presl

**肉质伏石蕨**　棚梗(广西)，豆瓣绿衔、石串莲(云南)

**Lemmaphyllum carnosum** Presl

生于树干或石上。分布于西南及广西。

全草：苦、辛，凉。活血散瘀，润肺止咳，清热解毒。用于小儿惊风，肺热咳嗽，风湿

痛，骨折，中耳炎，毒蛇咬伤。

**伏石蕨**　山豆片草(福建)，石瓜子(湖南)，铺地洋桃(广西)，痞子药(贵州)，杜仲寄生(云南)

**Lemmaphyllum microphyllum** Presl——*Drymoglossum microphyllum* (Presl) C. Chr.

附生于海拔500—1 500米的树干或石上。分布于西南及江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西。

全草(螺厣草)：甘、微苦，寒。清热解毒，凉血止血，润肺止咳。用于肺热咳嗽，肺脓疡，肺痨咳血，黄疸，跌打损伤，衄血，尿血，便血，血崩，乳痈，痞块，痢疾。

**倒卵叶伏石蕨**　两广伏石蕨(海南)，上石田螺(广西)

**Lammaphyllum microphyllum** Presl var. **obovatum** (Harr.) C. Chr.

生于树干或石上。分布于福建、台湾、广东、海南、广西。

全草：广西瑶族用于梅毒病。

## 骨牌蕨属　Lepidogrammitis Ching

**披针骨牌蕨**　万年青(广西)

**Lepidogrammitis diversa** (Ros.) Ching——*Polypodium diversum* Ros.

生于林下岩石上。分布于长江流域中下游各省及福建、台湾、广西、贵州。

全草：微苦、涩，平。清热利湿，止血止痛。用于肺热咳嗽，风湿关节痛，小儿高热，跌打损伤，外伤出血。

**抱石莲**　石豆(陕西)，金丝鱼鳖草(浙江)，风不动(福建)，石钱草(广西)，石瓜子(贵州)

**Lepidogrammitis drymoglossoides** (Baker) Ching——*Polypodium drymoglossoides* Baker

生于海拔200—1 400米的林下树干或岩石上。分布于华东、中南、西南及陕西。

全草：清热解毒，除湿化瘀。用于咽喉痛，肺热咳血，风湿关节痛，淋巴结炎，胆囊炎，石淋，跌打损伤，疔毒痈肿。

**中间骨牌蕨**　金星蕨(四川)

**Lepidogrammitis intermedia** Ching

生于阴湿树干或石上。分布于陕西、甘肃、湖北、四川、贵州。

全草：补脾益气。用于鼻痛。

**骨牌蕨**　上树咳、瓜核草(广西)

**Lepidogrammitis rostrata** (Bedd.) Ching——*Pleopeltis rostrata* Bedd

生于海拔240—2 400米的树干或石上。分布于广东、广西、贵州、云南、西藏。

全草：甘、微苦，平。清热利尿，除烦清热。用于淋沥癃闭，热咳，心烦，淋证，感冒，疮肿。

## 瓦韦属 Lepisorus (J. Smith) Ching

**狭叶瓦韦**

**Lepisorus angustus** Ching

生于树干、岩缝或屋脊上。分布于安徽、浙江。

全草：苦，凉。利尿，通经，消肿止痛。用于淋证，月经不调，跌打损伤。

**黄瓦韦**　石茶(宁夏)，旋鸡尾(四川)，大石韦(贵州)

**Lepisorus asterolepis** (Baker) Ching——*Polypodium asterolepis* Baker

生于树干或岩面上。分布于西南及陕西、宁夏、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、广西。

全草：苦，凉。消炎解毒，止血。用于发热咳嗽，大便秘结，淋证，水肿，疔毒痈肿，外伤出血。

**两色瓦韦**　骗鸡尾(贵州)

**Lepisorus bicolor** (Takeda) Ching——*Polypodium excavatum* var. *bicolor* Takeda

生于海拔 1 000—3 000 米的高山石上或树干上。分布于西南及甘肃、湖北、四川。

全草：微苦，平。利尿通淋，清热利湿。用于风湿痛，淋证，泄泻，咽喉痛，麻疹，烧、烫伤。

**网眼瓦韦**　瓦韦(青海)，金星草(图经本草)

**Lepisorus clathratus** (Clarke) Ching——*Polypodium clathratum* Clarke

生于海拔 1 400—3 500 米的岩石上或树干上。分布于华北及陕西、甘肃、青海、新疆、四川、云南。

全草：甘，凉。清热解毒，利尿通淋，消肿止血。用于淋证，石淋，尿血，赤、白痢疾，咳嗽吐血，疔毒痈肿。

**扭瓦韦**　金钗、一皮草(四川)，卷叶瓦韦(西藏)

**Lepisorus contortus** (Christ) Ching——*Polypodium contortum* Christ

生于海拔 1 400—3 600 米的树干或岩石面上。分布于陕西、湖北、四川、云南、西藏。

全草：微苦，寒。清热解毒，消炎止痛。用于跌打损伤，烧、烫伤。

**离山瓦韦**　石小豆(陕西)，点子草(四川)

**Lepisorus eilophyllus** (Diels) Ching——*Polypodium eilophyllus* Diels

生于高山林下岩面上或树干上。分布于陕西、甘肃、湖北、四川、云南。

全草：淡、微涩，平。祛风利湿，通淋，止血，消积。用于风湿痛，劳伤腰痛，淋证，崩漏，带下病，衄血，小儿消化不良。

**庐山瓦韦**　七星草、骨牌草(江西)

**Lepisorus lewisii** (Baker) Ching——*Polypodium lewisii* Baker

生于海拔 500—1 200 米的山坡林下岩石面上。分布于安徽、浙江、江西、广东、广西。

全草：苦，平。清热利湿，消肿止痛。用于感冒咳嗽，泄泻，淋证，跌打损伤。

**大瓦韦**　金星草(宁夏)，观音旗、大冷蕨蕨叶(广西)，金星凤尾草(滇南本草)

**Lepisorus macrosphaerus** (Baker) Ching——*Polypodium macrosphaerum* Baker

生于海拔 800—2 300 米的树干或岩石上。分布于西南及甘肃、宁夏、浙江、江西、湖南、广西、云南。

全草：苦，凉。清热解毒，除湿利尿。用于小便涩痛，痈毒疔肿，便秘，血崩，淋证，月经不调。

**粤瓦韦**　小金刀、骨牌伸筋(湖南)，独叶一枝生、剑丹(广东)

**Lepisorus obscure-venulosus** (Hayata) Ching——*Polypodium obscure-venulosum* Hayata

生于海拔 800—1 200 米的林下或溪边岩石上。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、贵州。

全草：苦，凉。清热解毒，止血，通淋。用于咽喉痛，水肿，泄泻，吐血，小儿惊风，淋证，蛇咬伤，烧、烫伤。

**多鳞瓦韦**　两面刀(湖南)，石韦(广西)

**Lepisorus oligolepidus** (Baker) Ching——*Polypodium oligolrpidum* Baker

生于海拔 2 300 米以下的山坡阴处或岩石上。分布于西南及陕西、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西。

全草：苦、涩，平。清热解毒，健脾利湿，止咳，止血。用于肺痨，头痛，腹痛，淋证，小儿疳积，外伤出血。

**长瓦韦**　扎柏(青海)

**Lepisorus pseudonudus** Ching

生于海拔 3 400 米以下的阔叶落叶林下石缝或树干上。分布于青海、四川、云南、西藏。

全草：甘、微苦，微寒。清热利湿，消肿止血。用于肺热咳嗽，痢疾，淋浊，尿血，内伤吐血，外伤出血，金疮。

**棕鳞瓦韦**　四瓦韦(云南)

**Lepisorus scolopendrinus** (Ham ex Don) Mehra et Bir——*L. excavatus* Bory. var. *scolopendrius* (Don) Ching

生于海拔 2 000—2 800 米的针叶林或阔叶林下的树干或岩石上。分布于云南、西藏。

全草：用于泄泻。

**瓦韦**　七星草(江苏)，小叶骨牌草(浙江)，小舌头草(湖南)，千只眼(四川)，小肺筋(贵州)

**Lepisorus thunbergianus** (Kaulf.) Ching——*Pleopeltis thunbergiana* Kaulf.

生于海拔 250—1 200 米的林下溪边石上或树干上。分布于华东及湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全草(瓦韦)：淡，寒。清热解毒，利尿，止血。用于淋浊，痢疾，咳嗽吐血，牙疳，小儿惊风，跌打损伤，蛇咬伤。

**拟瓦韦**　阔叶瓦韦

**Lepisorus tosaensis** (Makino) H. Ito

生于海拔高达 1 700 米的树干或瓦缝中。分布于华东(除山东、江苏)、西南及广东、

海南、广西。

全草：利尿，通淋。用于淋浊，小便淋痛。

**乌苏里瓦韦**　青叶红(湖南)，射鸡尾、铁包针(贵州)

**Lepisorus ussuriensis** (Regel et Maack) Ching——*Pleopeltis ussuriensis* Regel et Maack

生于海拔800米以下的树干或岩石上。分布于东北、华北、西北及山东、河南、湖南、四川、贵州。

全草：苦，平。祛风，利尿，止咳，活血。用于风湿骨痛，小便淋痛，咳嗽，惊风，月经不调，跌打损伤。

## 星蕨属　Microsorium Link

**攀援星蕨**　一枝旗(广西)，灯火草(四川)

**Microsorium buergerianum** (Miq.) Ching——*Polypodium buergerianum* Miq.

生于海拔500—900米的林中树干或岩石上。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

全草：微苦、涩，凉。清热利湿。用于淋证，黄疸，筋骨痛。

**羽裂星蕨**　海草(广西)，观音莲(四川峨眉)

**Microsorium dilatatum** (Bedd.) Sledge——*Pleoprlis dilatatum* Bedd.

生于海拔600—2 000米的林下溪边阴湿岩石或树干上。分布于西南及福建、台湾、广东、海南、广西。

全草：清热利湿，活血散瘀，止血。用于关节疼痛，跌打损伤，外伤出血，疝气。

**江南星蕨**　龙舌草(福建)，膀草(广东)，七星剑(广西)，鸡公尾(四川)，膳鸡尾(贵州)

**Microsorium fortunei** (Moore) Ching——*Drynaria fortunei* Moore

生于海拔200—1 800米的林下溪边树干或岩石上。分布于华东、中南、西南及陕西。

全草及根状茎：微苦，凉。清热解毒，祛风利湿，活血，止血。用于风湿关节痛，热淋，带下病，吐血，衄血，痔疮出血，肺痈，瘰疬，跌打损伤，疔毒痈肿，蛇咬伤。

**滇星蕨**　藤碎补(广西)，上树草(四川)，千里马、赶山鞭(贵州)

**Microsorium hymenodes** (Kunze) Ching——*Polypodium hymenodes* Kunze

生于树干或岩石上。分布于西南及湖南、广西。

根状茎：微苦，凉。清热止咳。活血散瘀，消肿。用于肺热咳嗽，淋浊，跌打损伤。

**膜叶星蕨**　大叶包针(广西)，光石韦(四川)，断骨粘(云南)，大风草(植物名实图考)

**Microsoriun membranaceum** (Don) Ching——*Polypodium membranaceum* Don

生于海拔2 000米以下的阴湿岩石上。分布于西南及台湾、广东、海南、广西。

全草：苦，寒。清热利尿，散瘀消肿，止血，接骨。用于小便涩痛，淋证，跌打损伤，外伤出血，疔毒痈肿。

**星蕨**　尖凤尾(广东)，野苦荬(广西)，二郎剑(四川)

**Microsorium punctatum** (L.) Cop.——*Acrostichum punctatum* L.

生于海拔500--1 100米的树干或墙缝中。分布于台湾、广东、海南、广西、四川、贵州。

全草：苦，凉。清热利尿。用于淋证，痢疾，跌打损伤。

**广叶星蕨**　鸡蹼、珍珠草(广西)

**Microsorium steerei** (Harr.) Ching——*Polypodium steerei* Harr.

生于林下湿石或树干上。分布于台湾、广西、贵州。

全草：清热利尿，消肿止痛。用于小便涩痛，淋浊，风湿骨痛，小儿疳积，跌打损伤。也可用于脾脏肿大。

## 扇蕨属　Neocheiropteris Christ

**扇蕨**　金沙箭(四川)，搜山虎(贵州)，鸭脚板(云南)，半把伞(植物名实图考)

**Neocheiropteris palmatopedata** (Baker) Christ——*Polypodium palmatopedatum* Baker

生于海拔1 500—2 700米的密林下岩石上。分布于四川、贵州、云南。

全草：辛、酸，寒。散瘀利湿，利湿消积。用于胃腹胀满，风湿脚气，卵巢囊肿，便秘，咽喉痛。根状茎：消胀有特效。用于食积。

## 盾蕨属　Neolepisorus Ching

**羽裂盾蕨**　铁包金(广西)，观音针(四川)，细药、过江龙(贵州)

**Neolepisorus deltoidea** (Baker) Ching——*Polypodium deltoideum* Baker

生于林下石缝或溪边湿地。分布于广西、四川、贵州。

全草：苦，凉。清热利湿，止血止痛。用于跌打损伤，外伤出血，尿血，风湿痛，狂犬咬伤。

**盾蕨**　青卷莲(湖南)，岩豆草(广西)，旋鸡尾(四川)，青竹标(贵州)，水石韦(植物名实图考)

**Neolepisorus ovatus** (Bedd.) Ching——*Pleopeltis ovata* Bedd.

生于海拔600—2 100米的林下或溪边石上。分布于华东、中南、西南及甘肃。

全草：苦，凉。清热利湿，散瘀活血，止血。用于劳伤吐血，血淋，跌打损伤，烧、烫伤，疔毒痈肿。

## 瘤蕨属　Phymatodes Presl

**光亮瘤蕨**　爬山虎(广西)，石生姜(四川)，爬岩蛇(贵州)，绿爬山虎(云南)

**Phymatodes cuspidata** (D. Don) Alston——*Polypodium cuspidatum* D. Don

生于海拔250—1 500米的林下石灰岩上。分布于广东、广西、贵州、云南、西藏。

根状茎：涩，温。有小毒。活血止痛，消肿，接骨。用于风湿骨痛，腰肌劳损，丹毒，小

儿疳积，肝炎，跌打损伤。

## 假瘤蕨属　Phymatopsis J. Smith

**交连假瘤蕨**

**Phymatopsis conjuncta** Ching

生于海拔2 000米以下的岩石上。分布于陕西、安徽、福建、河南、四川、云南。

根状茎：用于消化不良。

**紫柄假瘤蕨**　　女金芦、地蜈蚣(云南)

**Phymatopsis crenato-pinnata** (Clarke) Ching——*Polypodium crenato-pinnatum* Clarke

生于林下石上、树上或阴湿荒坡。分布于西南。

全草(女金芦)：微苦，凉。清热解毒，舒筋活络，止血，消积。用于咽喉痛，瘰疬，小儿惊风，风湿骨痛，淋证，吐血，跌打损伤，毒蛇咬伤，狂犬咬伤。

**黑鳞假瘤蕨**　　石岩浆(云南)

**Phymatopsis ebenipes** (Hook.) J. Smith

生于林下树干或岩石上。分布于四川、云南、西藏。

根状茎：清热解毒。用于狂犬咬伤。

**波缘假瘤蕨**

**Phymatopsis engleri** (Luerss.) H. Ito——*Polypodium engleri* Luerss.

生于林下岩石上。分布于福建、台湾。

全草：清热镇咳，驱风镇惊，活血散瘀，清热解毒。用于感冒，咳嗽，小儿惊风，跌打损伤。

**刺齿假瘤蕨**　　鸭掌金星、搜山虎(云南)

**Phymatopsis glaucopsis** (Franch.) Ching

生于林中树干或岩石上。分布于云南。

根状茎：用于泄泻。

**金星草**　　石韦(广西)，金钏草(本草图经)

**Phymatopsis griffithiana** (Hook.) J. Smith——*Polypodium griffithianum* Hook.; *Phymatodes griffithiana* (Hook.) Ching

生于海拔1 300—3 200米的林中树干或岩石上。分布于西南及安徽、广西。

全草：微酸、苦，寒。清热止咳，凉血解毒。用于肺热咳嗽，瘰疬，风湿骨痛，暴赤火眼，肠风，小便不利，痈肿疔毒。

**鹅掌金星草**　　三叉剑(湖北)，盐桃草(湖南)，三滴血(广西)，笔架草(四川)

**Phymatopsis hastata** (Thunb.) Kitag. ex H. Ito——*Polypodium hastatum* Thunb.; *Phymatodes hastata* (Thunb.) Ching

生于海拔200—2 300米的林下阴湿地或岩石上。分布于长江流域以南各省区及陕西、甘肃、台湾、河南。

全草(鹅掌金星草)：微苦，凉。清热利尿，凉血解毒。用于小儿惊风，痢疾，淋证，乳

蛾，疳积，痈肿疔毒，蛇咬伤。

**中间假瘤蕨**　中间假茀蕨(植物分类学报)

**Phymatopsis intermedia** (Ching) Cbing——*Phymatodes intermedia* Ching

生于林中树干或湿石上。分布于贵州、云南。

根状茎：用于泄泻。

**陕西假瘤蕨**　鸡翅膀尖(云南)

**Phymatopsis shensiensis** (Christ) Ching——*Polypodium shensiensis* Christ

生于海拔1 300--3 400米的岩石上或树干上。分布于山西、陕西、河南、四川、云南。

全草：苦，凉。通淋，消肿。用于淋浊，水肿。

**三出假瘤蕨**　小过山龙、三角风(四川)，七星草(云南)

**Phymatopsis trisecta** (Baker) Ching——*Polypodium trisectum* Baker

生于树干或岩石上。分布于四川、云南。

全草：苦，寒。清热利湿，凉血解毒。用于水肿，咽喉痛，暑热、湿热带下病，疔毒疖肿。

**维氏假瘤蕨**　乌鸡骗、花狼鸡(贵州)，日本假茀蕨(植物分类学报)

**Phymatopsis veitchii** (Baker) H. Ito——*Polypodium veitchii* Baker; *Phymatodes veitchii* (Baker) Ching

生于林中石上或树干上。分布于安徽、台湾、河南、湖北、四川、贵州。

根状茎：辛、涩，温。调气，除湿。用于风湿痛，脚气，小儿冷气腹痛。

## 宽带蕨属　Platygyria Ching et S. K. Wu

**宽带蕨**　戟叶石韦、渣贝箏瓦(西藏)，戟叶瓦韦(中国药用孢子植物)

**Platygyria waltonii** (Ching) Ching et S. K. Wu——*Neochiropteris waltonii* Ching; *Lepisorus waltonii* (Ching) Ching

生于海拔3 500—4 600米的河谷石缝中及阴湿岩石上。分布于西藏。

全草：苦、甘，平。清热止咳，利尿通淋。用于肺热咳嗽，咳嗽痰喘，淋证，石淋，水肿，咯血，咽喉痛。

附　注：为我国特有属。

## 拟水龙骨属　Polypodiastrum Ching

**川拟水龙骨**　牛尾巴(四川)

**Polypodiastrum dielsianum** (C. Chr.) Ching——*Polypodium dielsianum* C. Chr.

生于海拔1 100—2 300米的林下岩壁上。分布于台湾、四川、贵州。

根状茎：用于解表，散寒。

## 水龙骨属 Polypodiodes Ching

**友水龙骨** 猴子蕨(广西),土碎补、细牛肋巴(四川), 阿里山水龙骨(台湾植物志)

**Polypodiodes amoena** (Wall. et Mett.) Ching——*Polypodium amoena* Wall. ex Mett.

生于海拔400—2 950米的树干或岩石上。分布于西南及安徽、江西、台湾、湖北、广东、海南、广西。

根状茎: 微苦,凉。舒筋活络,消肿止痛。用于风湿关节痛,齿痛,跌打损伤。

**水龙骨** 拐金枣(陕西),青石莲(浙江),青龙骨(江西),蜈蚣蕨(广西), 青豆梗(贵州)

**Polypodiodes nipponica** (Mett.) Ching——*Polypodium nipponicum* Mett.

生于海拔200—2 300米的林下溪沟旁树干或岩壁上。分布于华东、中南、西南及陕西、甘肃。

根状茎(拐金枣): 苦,凉。祛风除湿,清热,活络。用于痢疾,淋浊,风湿痹痛, 腰痛, 关节痛,目赤红肿,跌打损伤。

**中华水龙骨** 鸡爪七(四川)

**Polypodiodes pseudoamoenum** (Ching) Ching——*Polypodium pseudoamoenum* Ching

生于林下树干或岩石上。分布于河北、陕西、甘肃、宁夏、安徽、河南、湖北、四川。

根状茎: 苦、涩,平。行气活血,散瘀消肿。用于劳伤,跌打损伤,腰腿痛, 半身不遂, 烧、烫伤,外伤出血。

## 多足蕨属 Polypodium L.

**东北多足蕨** 小水龙骨(东北草本植物志),东北水龙骨(中国高等植物图鉴)

**Polypodium virginianum** L.

生于林下岩石上或石缝中。分布于东北及河北。

全草: 甘、苦,凉。祛风除湿,清热解毒,止咳,镇痛。用于风湿关节痛,牙痛, 小儿高热,咳嗽痰喘,淋证,跌打损伤,痈肿疔毒。

**多足蕨** 水龙骨(新疆),欧亚水龙骨(中国高等植物图鉴)

**Polypodium vulgare** L.

生于海拔高达1 700米的山石缝中。分布于新疆北部。

根状茎: 甘,平。清热解毒,平肝明目。用于淋证,泄泻, 小儿高热, 目赤红痛,关节痛,牙痛,瘾疹,痈肿疔毒。

## 石韦属 Pyrrosia Mirbel

**贴生石韦** 上树咳(广西),抱树石韦(台湾植物志)

**Pyrrosia adnascens** (Sw.) Ching——*Polypodium adnascens* Sw.

生于海拔100—1 300米的林缘岩石上或附生于树干上。分布于福建、台湾、广东、广西、云南。

叶：清热利湿，散瘀解毒。用于痄腮，瘰疬，小儿感冒高热，咽喉痛，牙痛，跌打损伤，蛇咬伤。

**相异石韦**　破血丹、小蛇头草(湖南)，反食草(广西)，小石韦(贵州)，相似石韦（福建植物志）

**Pyrrosia assimilis** (Baker) Ching——*Polypodium assimile* Baker

生于海拔270—1 200米的林下石上或树干上。分布于西南及浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西。

叶：苦、涩，凉。清热，镇惊，利尿，止血。用于癫痫，小儿惊风，淋证，外伤出血，肺热咳嗽。

附　注：功效相同的有**浅裂相异石韦 P. assimilis** (Baker) Ching f. **lobata** (Wu) Ching 及**波氏石韦 P. bonii** (Christ) Ching。分布同相异石韦。

**光石韦**　大鱼刀(湖南)，石韦、大肺痨草(广西)，牛皮凤尾草、梭标草(四川)

**Pyrrosia calvata** (Baker) Ching——*Polypodium clavatum* Baker

生于海拔400—1 750米的林下石上或树干上，成丛生长。分布于中南、西南及陕西、甘肃、福建。

叶(光石韦)：苦、微辛，微寒。清热除湿，利尿止血。用于感冒咳嗽，小便不利，石淋，吐血，外伤出血。

**华北石韦**　石柳子(河北)，小石韦(甘肃、宁夏)，马耳朵(四川)

**Pyrrosia davidii** (Baker) Ching——*Niphobolus davidii* Baker

生于海拔320—1 800米的岩石上。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、山东、湖北、四川。

叶(华北石韦)：甘、苦，微寒。清热利尿，通淋。用于肺热咳嗽，淋证。

**毡毛石韦**　大金刀、瓦韦、牛耳朵(四川)，大叶石韦(西藏)

**Pyrrosia drakeana** (Franch.) Ching——*Polypodium drakeanum* Franch.

生于海拔2 000米以下的林下石上或树干上。分布于西南及陕西、河南、湖北。

叶：甘，平。清热利尿，通淋。用于淋证，石淋。

附　注：陕西、四川作石韦入药。

**西南石韦**　扁担草、生扯拢(四川)，石革庶、石皮(云南)

**Pyrrosia gralla** (Gies.) Ching

生于海拔2 000米以下的林下石上或树干上。分布于湖北、四川、云南。

叶(西南石韦)：微苦，凉。清热利尿，止血。用于淋证，外伤出血。

**阔叶石韦**

**Pyrrosia inaequalis**(Christ) Ching

生于树干或石上。分布于四川、贵州、云南。

叶：微苦，平。收敛止血，利尿通淋。用于淋证，水肿，外伤出血。

**石韦**　石剑(福建)，会全草(广州)，岩山莲(广西)，石耳朵(四川)，小叶下红(贵州)

**Pyrrosia lingua** (Thunb.) Farw.——*Acrostichum linguum* Thunb.

生于海拔300—1 300米的林下树干上或溪边石上。分布于华东、中南、西南。

叶(石韦)：甘、苦，微寒。利尿通淋，清热止血。用于热淋，血淋，石淋，小便淋痛，吐血，衄血，尿血，崩漏，肺热咳嗽。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**矩圆石韦**　金瓢石韦(四川)

**Pyrrosia martinii** (Christ) Ching——*Niphobolus martinii* Christ

生于林下树干或石上。分布于湖北、四川、贵州。

叶：微苦，凉。清热止血，利尿。用于咳嗽痰喘，淋证，石淋，尿血。

**柔软石韦**　多形石韦(台湾)，黄毛石韦(海南)，小经刀草(广西)，牛舌条(贵州)，飞刀剑(云南)

**Pyrrosia mollis** (Kunze) Ching——*Niphobolus mollis* Kunze

生于海拔200—2 300米的阴石上或树干上。分布于西南及海南、广西。

叶(柔软石韦)：寒、微寒。清热，利尿通淋，止血。用于水肿，石淋，小便涩痛，外伤出血。

附　注：亦用于鸡眼、寻常疣。

**有柄石韦**　石茶(东北)，石韦(湖北)，打不死、猫耳朵(四川)，小石韦(贵州)

**Pyrrosia petiolosa** (Christ) Ching——*Polypodium petiolosum* Chris

生于海拔250—2 200米的裸露干旱岩石上。分布于西南及吉林、辽宁、河北、北京、天津、陕西、山东、江苏、安徽、河南、湖北。

叶(石韦)：功效见石韦。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**庐山石韦**　大叶石韦(浙江)，金石韦(江西)，叶下红(广西、贵州)，金腰带(四川)，血公鸡(贵州)

**Pyrrosia sheareri**(Baker) Ching——*Polypodium sheareri* Baker

生于海拔500—2 300米的林下石上或树干上。分布于中南、西南及安徽、浙江、江西、福建、台湾。

叶(石韦)：功效见石韦。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**相似石韦**　灰背石韦(广西药用植物名录)

**Pyrrosia similis** Ching

生于林下石上及树干上。分布于广西。

叶：清热利尿，通淋。用于小便淋痛，淋证，水肿，肺热咳嗽，虫、蛇咬伤。

**越南石韦**　毛石韦、舌鹅草(广西)，宽尾石韦(云南)

**Pyrrosia tonkinensis** (Gies.) Ching——*Niphobolus tonkinensis* Gies.

生于林下石上或树干上。分布于广东、广西、贵州、云南。

叶：微苦，凉。清热利尿。用于肺热咳嗽，淋证，小便淋痛。

附　注：广西有的地方作石韦入药。

### 石蕨属　Saxiglossum Ching

**石蕨**　石豇豆(陕西),鸭舌韦(浙江),卧龙草(湖南),回阴生(广西),止血草(四川)

**Saxiglossum angustissimum** (Gies.) Ching——*Niphobolus angustissimus* Gies.

生于海拔 600—1 000 米的林下石壁上。分布于中南及陕西、甘肃、安徽、浙江、江西、福建、台湾、四川、贵州。

全草：淡，凉。活血调经，镇惊。用于月经不调，小儿惊风，疝气，跌打损伤。

## 45. 槲蕨科　Drynariaceae

### 槲蕨属　Drynaria J. Smith

**中华槲蕨**　骨碎补(通称),石良姜(山西),石蜈蚣(贵州),白江热热(藏语),秦岭槲蕨(秦岭植物志)

**Drynaria baronii** (Christ) Diels——*Polypodium baronii* Christ

生于海拔 1350—2 800 米的石上或坡地。分布于西南及山西、陕西、甘肃、宁夏、青海。

根状茎(骨碎补)：苦,温。补肾强骨,续筋止痛。用于肾虚腰痛，耳鸣耳聋，牙齿松动,跌扑闪挫,筋骨折伤。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**团叶槲蕨**　骨碎补、肉碎补(广西)

**Drynaria bonii** Christ

生于密林下的树干或岩石上。分布于广东、广西、贵州、云南。

根状茎：微苦,温。补虚损,强筋骨,行血,止血。用于肾虚耳鸣,骨折,跌打损伤。

**川滇槲蕨**　骨碎补(通称),爬岩姜(四川),云南槲蕨(四川、云南)

**Drynaria delavayi** Christ

生于林下石上或树干上。分布于甘肃南部、四川、云南、西藏。

根状茎(骨碎补)：苦,温。补肾强骨,续筋止痛。用于肾虚腰痛，耳鸣耳聋，牙齿松动,跌扑闪挫,筋骨折伤;外治斑秃,白癜风。

**槲蕨**　猴姜(浙江),爬岩姜(湖北、贵州),毛姜(湖北),碎补、绿爬山虎(四川)

**Drynaria fortunei** (Kunze) J. Smith——*Polypodium fortunei* Kunze

生于海拔 270—1 800 米的树干或石上。分布于中南、西南及浙江、江西、福建、台湾。

根状茎(骨碎补)：苦,温。补肾强骨,续筋止痛。用于肾虚腰痛，耳鸣耳聋，牙齿松动,跌扑闪挫,筋骨折伤。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**光叶槲蕨**　老鹰翅膀(云南),石莲姜槲蕨(中国高等植物图鉴)

**Drynaria propinqua** (Wall.) J. Smith——*Polypodium propinquum* Wall.

生于海拔 500—1 800 米的树干或岩石上。分布于西南及广西。

根状茎：功效见槲蕨。

附　注：四川民医多用于跌打损伤，风湿麻木，筋骨疼痛。

**栎叶槲蕨**

**Drynaria quercifolia** (L.) J. Smith——*Polypodium quercifolium* L.

生于林中树干或岩石上。分布于海南。

根状茎：微苦，温。补肾，续骨，活血止血。用于跌打损伤，外伤出血，风湿关节痛。

### 崖姜蕨属　Pseudodrynaria C. Chr.

**崖姜蕨**　　大骨碎补、崖姜(广东)，马骝姜、玉麒麟(广西)

**Pseudodrynaria coronans** (Wall.) Ching——*Polypodium coronans* Wall.

生于海拔 100—1 900 米的雨林或季雨林中岩石或树干上。分布于西南及福建、台湾、广东、广西。

根状茎：微苦、涩，温。祛风湿，强壮筋骨，舒筋活络。用于跌打损伤，骨折，风湿关节痛。

## 46. 剑蕨科　Loxogrammaceae

### 剑蕨属　Loxogramme (Bl.) Presl

**中华剑蕨**　　石虎(云南)

**Loxogramme chinensis** Ching

生于树干或阴湿岩石上。分布于西南及福建、广东、广西。

根状茎：苦、涩，微寒。清热解毒，活血，利尿。用于淋症，狂犬咬伤。

**柳叶剑蕨**　　肺痨草(广西)

**Loxogramme salicifolia** (Makino) Makino——*Gymnogramme salicifolia* Makino

生于海拔 200—1 200 米的树干或岩石上。分布于中南、西南及陕西、甘肃、安徽、江西、福建、台湾。

全草：用于肺痨咳嗽。

## 47. 蘋科　Marsileaceae

### 蘋属　Marsilea L.

**蘋**　　田字草(通称)，水头草(上海)，四瓣莲船(浙江)，水浮钱(福建)，烂毛钱(四川)

**Marsilea quadrifolia** L.

生于水田或沟塘中。全国大部分地区均有分布。

全草(蘋)：甘，寒。清热解毒，消肿利湿，止血，安神。用于风热目赤，肾虚，湿热水

肿，淋巴结炎，水肿，疟疾，吐血，热淋；外用于热疖疮毒，毒蛇咬伤。

## 48. 槐叶蘋科 Salviniaceae

### 槐叶蘋属 Salvinia Adans

**槐叶蘋** 槐瓢(上海)，蜈蚣漂(浙江)，马蘋(福建)，草鞋蘋(广东)，包田麻(贵州)
**Salvinia nutans**(L.) All.——*Marsilea nutans* L.
生于水田、沟塘和静水溪河中。分布于东北、华北、中南、西南。
全草(蜈蚣蘋)：苦，平。清热解毒，消肿止痛。用于瘀血积痛，痈肿疔毒，烧、烫伤。

## 49. 满江红科 Azollaceae

### 满江红属 Azolla Lam.

**满江红** 绿蘋(山东、江苏)，紫藻(浙江)，漂(江西)，紫背浮蘋(广西)，紫蘋(贵州)
**Azolla imbricata** (Roxb.) Nakai——*Salvinia imbricata* Roxb
生于水田或池塘中，有时与蓝藻共生。分布于华东、中南、西南。
全草(满江红)：辛，寒。祛风除湿，发汗透疹。用于风湿疼痛，麻疹不透，胸腹痞块，带下病，烧、烫伤。

# 裸子植物　Gymnospermae

## 1. 苏铁科　Cycadaceae

### 苏铁属　Cycas L.

**苏铁**　铁树(通称),凤尾草(广西),凤尾蕉(植物名实图考),凤尾松(中国种子植物科属辞典),避火蕉(中国树木分类学)

**Cycas revoluta** Thunb.

分布于福建、台湾、广东。除东北地区外,全国均有栽培。

根(苏铁根): 甘、淡,平。祛风活络,补肾止血。用于肺痨咯血,肾虚,牙痛,腰痛,带下病,风湿关节痛,跌打损伤。 叶(苏铁叶): 甘、酸,微温。收敛止血,理气活血。用于肝胃气痛,经闭,胃炎,胃溃疡,吐血,跌打,刀伤。花(苏铁花): 甘,微温。有小毒。理气止痛,益肾固精,活血祛瘀。用于胃痛,遗精,带下病,痛经,吐血,跌打损伤。 种子(苏铁子):有小毒。平肝,降血压。用于高血压症。

附　注: 功效相同的有**篦齿苏铁 C. pectinata** Griff., 分布于云南西南部。

**华南苏铁**　刺叶苏铁(中国树木分类学),龙尾苏铁(海南植物志)

**Cycas rumphii** Miq.

华南各省均有栽培。

根: 用于无名肿毒。

**云南苏铁**　孔雀抱蛋、凤尾蕉、象尾菜(云南), 凤凰蛋(植物名实图考), 泰国苏铁(全国中草药汇编)

**Cycas siamensis** Miq.

常生于热带、亚热带季雨林中。分布于云南西南部。广东、广西有栽培。

根: 用于黄疸。 茎、叶: 用于慢性肝炎, 黄疸, 难产, 癌症。 叶: 用于高血压症。种子: 用于泄泻,痢疾,消化不良,呃逆,咳嗽痰喘。

附　注: 国家二级保护植物。

## 2. 银杏科　Ginkgoaceae

### 银杏属　Ginkgo L.

**银杏**　白果树(通称),鸭脚树(北京),公孙树(汝南圃史),鸭脚子(本草纲目)

**Ginkgo biloba** L.

浙江天目山一带有野生。北自沈阳、南达广州、东起华东、西南至贵州、云南均有栽

塔。

种子(白果)：甘、苦、涩，平。有毒。敛肺气，定喘咳，止带浊，缩小便。用于哮喘，痰咳，淋证，尿频。叶(银杏叶)：苦、甘，平。益气敛肺，化湿止泻。用于胸闷心痛，心悸怔忡，带下病，咳嗽痰喘，泻痢。根或根皮：甘，平。益气补虚。用于带下病，遗精。树皮：外用于牛皮癣。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。国家二级保护植物。

## 3. 松科　Pinaceae

### 冷杉属　Abies Mill.

**苍山冷杉**　冷杉(云南)，大理冷杉(安徽)，高山枞(中国裸子植物志)

**Abies delavayi** Franch.

生于海拔 2 500—4 000 米的高山。分布于云南西北部、西藏东南部。安徽黄山、江西庐山有栽培。

种子：辛，温。理气散寒。用于胃脘气痛，胸腹冷痛，疝气。

**冷杉**　塔杉(四川)

**Abies fabri** (Mast.) Craib——*Keteleeria fabri* Mast.

生于海拔 2 700 米以上高山，喜生于气候温凉、湿润、土质肥沃的环境，常与针叶林、阔叶林混交。分布于四川。

果实(冷杉果)：理气散寒。

附　注：四川特有药用植物。

**巴山冷杉**　鄂西冷杉、太白冷杉(中国树木分类学)，川枞、华枞(中国裸子植物志)，洮河冷杉(经济植物手册)

**Abies fargesii** Franch.——*A. suichuenensis* (Franch.) Rehd. et Wils.

生于海拔 1 500—3 700 米的高山。分布于陕西南部、甘肃南部、河南西部、湖北西部、四川东北部。

果实(朴松实)：涩、微辛，平。平肝熄风，调经活血，止血，安神定志。用于高血压症，头痛，头晕，心神不安，月经不调，崩漏带下。

附　注：功效相同的有**秦岭冷杉 A. chensiensis** Van Tiegh.，分布于陕西、甘肃、湖北。

**岷江冷杉**　柔毛冷杉(中国树木分类学)，柔毛枞(中国裸子植物志)

**Abies faxoniana** Rehd. et Wils.

生于海拔 2 700—3 900 米的高山，喜生于气候冷湿、排水良好的酸性棕色灰化土及山地草甸森林中。分布于甘肃南部、四川西部。

果实(冷杉果)：祛风除湿，止血。

**杉松**　沙松、白松、东北杉木(吉林)，辽东冷杉(中国树木分类学)，针枞(中国裸子植物志)

**Abies holophylla** Maxim.

生于海拔 500—1 200 米气候寒冷、土层肥厚、阴蔽、湿润山地。分布于东北。

枝、叶：民间外用于风湿。

**臭冷杉**　臭松、白松、臭枞(东北)，冷杉(河北)，白枞(中国裸子植物志)

**Abies nephrolepis** (Trautv.) Maxim.——*A. sibirica* Ledeb. var. *nephrolepis* Trautv.

生于海拔 1 000—2 000 米的阴湿环境和肥沃山坡，常与针、阔叶林混交。分布于东北及河北。

树皮、枝叶：民间外用于腰腿痛。

**新疆冷杉**　西伯利亚冷杉(中国树木分类学)

**Abies sibirica** Ledeb.

生于海拔 1 900—2 350 米气候凉润地带，常与针叶林组成混交林。分布于新疆阿尔泰山。

树脂(松香)：舒筋活血。　果实(松塔)：祛痰，止咳，平喘。

## 雪松属　Cedrus Trew

**雪松**　香柏(北京)

**Cedrus deodara** (Roxb.) G. Don——*Pinus deodara* Roxb.

生于海拔 1 300—3 300 米气候温和凉润、土层深厚、排水良好的山地。原产阿富汗至尼泊尔一带。全国各地均有栽培

树干、枝叶(雪松)：祛风活络，消肿生肌，活血止血。

## 油杉属　Keteleeria Carr.

**江南油杉**　浙江油杉(中国树木学)

**Keteleeria cyclolepis** Flous

生于海拔 300—1 500 米的中、低山缓坡。分布于浙江西南部、江西西南部、湖南南部、广东北部、广西、贵州、云南东南部。

树皮：透疹，消肿，接骨。

**铁坚油杉**　铁坚杉(湖北)

**Keteleeria davidiana** (Bertr.) Beissn.——*Pseudotsuga davidiana* Bertr.

生于海拔 600—1 500 米的砂岩、页岩、石灰岩山地。分布于陕西南部、甘肃东南部、湖北西部、湖南西北部、四川北部、贵州西北部。

种子：驱虫，消积，抗癌。

**云南油杉**　杉松苞、杉老树(云南)，杉松、云南杉松(中国树木学)

**Keteleeria evelyniana** Mast.

生于海拔 700—2 650 米的松林中或组成小片纯林。分布于四川西南部、贵州西部、云南。

根皮：涩，平。消肿止痛，活血祛瘀，解毒生肌。用于跌打损伤，骨折，疮痈，漆疮。

**油杉**　松梧、杜松(福建),海罗松(广东)

**Keteleeria fortunei** (Murr.) Carr.

生于海拔 400—1 200 米的阴坡、林缘。分布于浙江南部、福建、广东、广西。

根皮：淡,平。叶：微酸,平。消肿解毒。用于深部脓肿,痈疽疮肿。

附　注：国家二级保护植物。

## 落叶松属　Larix Mill.

**落叶松**　意气松(东北),兴安落叶松、大果兴安落叶松(东北木本植物图志),达乌里落叶松(植物分类学报)

**Larix gmelinii** (Rupr.) Rupr.——*Abies gmelinii* Rupr.; *L. dahurica* Turcz.

生于海拔 300—1 200 米温暖湿润、排水良好的缓坡丘陵。分布于东北及河北、内蒙古。

树皮：用于痢疾,脱肛,气滞、腹胀。

**红杉**　落叶松(中国裸子植物志)

**Larix potaninii** Batal.

生于海拔 2 500 米以上气候寒凉的高山。分布于甘肃南部、四川西部、云南。

树干内皮：微辛,温。止痢,升阳,理气,除胀。用于痢疾,脱肛,气滞腹胀。干皮、根皮：杀虫治癣。

**新疆落叶松**　西伯利亚落叶松(中国树木分类学),俄国落叶松(中国裸子植物志)

**Larix sibirica** Ledeb.

生于海拔 100—3 500 米的潮湿阳坡。分布于新疆阿尔泰山、天山。

树脂：舒筋活血,破瘀。果实：止咳,祛痰,平喘。

## 云杉属　Picea Dietr.

**青海云杉**

**Picea crassifolia** Kom.

生于海拔 1 600—3 800 米的山谷、阴坡。分布于内蒙古大青山、甘肃、宁夏、青海。

果实：辛、苦,温。止咳祛痰,理气止痛。

**长白鱼鳞云杉**　长白鱼鳞松(中国树木学)

**Picea jezoensis** Carr. var. **komarovii** (Vass.) Cheng et L. K. Fu——*P. komarovii* Vass.

生于海拔 600—1 800 米山地，常与针叶树、阔叶树混交成林。分布于吉林东部及南部。

树皮、枝叶：用于咳嗽痰喘。

**红皮云杉**　红皮臭、虎尾松、高丽云杉、针松(东北),沙树(中国树木分类学)

**Picea koraiensis** Nakai

生于海拔 400—1 800 米气候温凉湿润、排水良好、土层肥厚的山麓缓坡。分布于东北

及内蒙古。

树皮、枝叶：用于风湿痛。

**川西云杉**　西康云杉(中国树木分类学)，水平杉(中国裸子植物志)

**Picea likianggensis** (Franch.) E. Pritz. var. **balfouriana** (Rehd. et Wils.) Hillier ex Slavin——*P. balfouriana* Rehd. et Wils.

生于海拔300—4 100米气候寒冷的棕色森林土地带。分布于青海南部、四川西部、西藏东部。

果实：止咳，平喘，止痛。

**白杆**　白儿松、罗汉松(河北)，红杆云杉(东北植物志)，利儿松(经济植物手册)

**Picea meyeri** Rehd. et Wils.

生于海拔1 600—2 700米的森林中。分布于华北及辽宁。河南有栽培。

节(松节)：苦，温。祛风除湿，活络止痛。根、树皮(松根、松树皮)：苦，温。收敛，生肌，止痛。用于风湿骨痛，跌打肿痛，外伤出血。叶(松针)：苦、涩，温。祛风活血，明目安神，解毒止痒。用于风湿关节痛，跌打肿痛，感冒，夜盲，高血压症。花粉(松花粉)：甘，温。祛风益气，收敛止血。用于眩晕，胃痛，痢疾，疮毒湿烂，创伤出血。树脂(松香)：甘、苦，温。燥湿祛风，生肌止痛。用于痈疽，疔毒，痔瘘。

附　注：功效相同的有**青杆 P. wilsonii** Mast.，分布于华北及陕西、甘肃、青海东部、四川西部。

**紫果云杉**　红松(青海)，紫果杉(中国裸子植物志)

**Picea purpurea** Mast.

生于海拔2 600—3 800米的山地，常与针叶树组成混交林。分布于甘肃南部、青海东南部、四川西北部。

果实：温，苦。祛痰，止咳，平喘。

**雪岭杉**　雪岭云杉(新疆)

**Picea schrenkiana** Fisch. et Mey.

生于海拔1 200—3 500米的湿润阴坡、峡谷中。分布于新疆天山地区。为新疆天山地区的主要森林树种。

节、叶(松节、松叶)：祛风除湿，止痛。

附　注：功效相同的有**天山云杉 P. schrenkiana** Fisch. et Mey. var. **tianshanica** (Rupr.) Cheng et S. H. Fu，分布于新疆天山西部。

## 松属　Pinus L.

**白皮松**　白果松(北京、浙江)，蟠龙松(河北)，虎皮松(山东)，白骨松、三针松(河南)

**Pinus bungeana** Zucc. ex Endl.

生于海拔500—1 800米的山地。分布于山西、陕西南部、甘肃南部、湖北西部、四川北部。辽宁、北京、山东、江苏、浙江、湖南有栽培。

果实(白松塔、松塔：)：苦，温。镇咳，祛痰，平喘。用于咳嗽痰喘。

**高山松**　西康油松(云南、中国树木分类学),西康赤松(中国裸子植物志)

**Pinus densata** Mast.

生于海拔 2 600—3 500 米的高山阳坡或河流两岸。分布于青海南部、四川西部、云南西部、西藏东部。

花粉(松花粉): 收敛,止血。外用于诸疮糜烂,创伤出血。 叶(松针): 苦、涩,温。祛风通络,活血消肿,止痛,安神。用于风湿痛,牙痛,跌打损伤,高血压症,肾虚, 水肿。 松节: 用于风湿关节痛,骨折。

**海南五针松**　油松(河南),葵花松(贵州),海南松,粤松(中国树木分类学),海南五须松(植物分类学报)

**Pinus fenzeliana** Hand.-Mazz.

生于海拔 1 000—1 600 米的高山林中或散生于山脊岩石间。分布于海南、广西。

根皮: 祛风通络,活血消肿。

**乔松**

**Pinus griffithii** McClell

生于海拔 1 600—3 300 米的高山地带。分布于云南西北部、西藏南部及东南部。

树脂提取的挥发油(松节油): 祛风,燥湿,舒筋通络。

**巴山松**　短叶马尾松(植物分类学报)

**Pinus henryi** Mast.

生于海拔 1 200—2 000 米的山地。分布于陕西南部、湖北西部、四川东北部。

树脂蒸馏提取的挥发油(松节油): 外用于肌肉酸痛,关节痛。

**思茅松**

**Pinus kesiya** Royle et Gord. var. **langbianensis** (A. Chev.) Gaussen——*P. langbianensis* A. Chev.

生于海拔 700—1 200 米的针叶、阔叶混交林中。分布云南南部。

嫩果: 用于跌打损伤,风湿关节痛。

**红松**　海松、红果松(东北),朝鲜松(中国裸子植物志)

**Pinus koraiensis** Sieb. et Zucc.

生于海拔 150—1 800 米气候温寒湿润、土壤肥沃、排水良好的山地。分布于东北。

节(松节): 祛风除湿,舒筋活络,止痛。 树皮(松树皮): 祛风湿, 祛瘀, 敛疮。 叶(松针): 祛风活血,燥湿止痒。 种子(海松子、松子): 甘,温。滋补强壮, 润肺滑肠, 熄风镇痉。用于风痹,燥咳,吐血,便秘。

**华南五针松**　广东松(经济植物手册)

**Pinus kwangtungensis** Chun ex Tsiang

生于海拔 700—1 600 米的山地。分布于湖南南部、广东、海南、广西、贵州。

树脂: 用于肌肉酸痛,关节痛。

附　注: ①国家二级保护植物。②功效相同的有**南亚松 P. latteri** Mason, 分布于广东、海南、广西。

**马尾松**　青松、山松、枞松(广东、广西),铁甲松、厚皮松(四川)

**Pinus massoniana** Lamb.

生于海拔 1 100—1 500 米地带的石砾土、沙质土或岩石缝中。分布于西南及河北、陕西南部、河南西南部、广东及长江中下游各省。

根(松根): 苦，温。祛风，燥湿，舒筋，通络。用于风湿骨痛，风痹，跌打损伤，外伤出血，痔疮。 节(油松节): 苦，温。祛风除湿，活络止痛。用于风湿关节痛，腰腿痛，骨痛，跌打肿痛。 叶(松针): 苦、涩，温。祛风活血，安神，解毒止痒。用于感冒，风湿关节痛，跌打肿痛，高血压症；外用于冻疮，湿疹，脐癣。 树皮(松树皮): 苦、涩，温。收敛止血。用于筋骨损伤；外用于疮疡初起，头癣，臁疹烦痒，金疮出血。 果实(松果): 苦，温。用于风痹，肠燥便难，痔疮。 种子(松子仁): 甘，温。润肺，滑肠。用于肺燥咳嗽，慢性便秘。 花粉(松花粉): 燥湿，收敛，止血。用于金疮出血，皮肤湿疹。

附 注: ①功效相似的有**华山松 P. armandi** Franch.，分布于西南及陕西、甘肃、河南、湖北。新疆、安徽有引种栽培；**赤松 P. densiflora** Sieb. et Zucc.，分布于东北及山东东部、江苏北部；**油松 P. tabulaeformis** Carr.，分布于华北及吉林、辽宁、陕西、甘肃、青海、宁夏、河南、湖北、四川；**黄山松 P. taiwanensis** Hayata，分布于安徽、浙江、福建、台湾、江西、河南、湖北、湖南；**樟子松 P. Sylvestiris** L. var. **mongolica** Litv.，分布于黑龙江大兴安岭、内蒙古。①《中华人民共和国药典》1990 年版收载马尾松及油松。

**偃松** 爬地松(吉林)，爬松、矮松、千叠松(东北)

**Pinus pumila** (Pall.) Regel.——*P. cembra* L. var. *pumila* Pall.

生于海拔 1 000—1 800 米以上的较阴湿山坡、山顶、林下或岩石缝隙中。分布于东北。

枝、叶: 用于咳嗽痰喘。 种子: 润肺止咳。 花粉: 祛风益气，燥湿止血。

**新疆五针松** 西伯利亚红松(植物分类学报)

**Pinus sibirica** (Loud.) Mayr——*P. cembra* L. var. *sibirica* Loud.

生于海拔 1 600—2 350 米气候冷湿的山地。分布新疆阿尔泰山西北部。

松节(松节): 苦，温。祛风湿，止痛。用于风湿关节痛，痉挛，牙痛。 叶(松针): 苦，温。祛风活血，明目安神。用于体虚浮肿，腰酸无力，脱发，夜盲。 花粉(松花粉): 甘，平。润肺，止血。用于肺痨，外伤出血。 果实(松果)、树脂(松脂): 甘、苦，温。生肌，杀虫，止咳。用于疖肿，咳嗽痰喘。

**黑松** 日本黑松(中国树木分类学)

**Pinus thunbergii** Parl.

大连、山东沿海地区和蒙山山区及上海、南京、福建、台湾、河南、武汉、四川等地均有栽培。

叶(松针): 苦、涩，温。祛风止痛，活血消肿，明目。用于时行感冒，风湿关节痛，跌打肿痛，夜盲；外用于冻疮。 花粉(松花粉): 甘，温。收敛，止血。用于胃痛，咳血，黄水疮，外伤出血。

**云南松** 青松、长毛松(云南)

**Pinus yunnanensis** Franch.

生于山坡。分布于西南及广西南部。

节(松节): 祛风除湿，活络止痛。用于腰腿痛，大骨节痛，跌打肿痛。 叶(松针): 祛风活血，解毒止痒。 树梢(松梢): 解毒。用于木薯、钩吻等中毒。 花粉(松花粉): 收

敛，止血。用于胃肠溃疡，咳血，外伤出血。 树脂(油树脂)：用于肌肉酸痛，关节痛。

附 注：叶、枝功效相同的有：**细叶云南松 P. yunnanensis** Franch. var. **tenuifolia** Cheng et Law，分布于广西红水河流域、贵州南部。

### 金钱松属 Pseudolarix Gord.

**金钱松** 金松(上海、浙江)，水树(浙江)

**Pseudolarix amabilis** (Nelson) Rehd.——*Larix amabilis* Nelson; *Pseudolarix kaempferi* (Lindl.) Gord.

生于海拔100—1 500米温暖多雨、土层深厚、排水良好的山坡、林缘或林中。分布于华东及河南、湖北、湖南。

根皮(土荆皮)：辛，温。有毒。杀虫，止痒；外用于手足癣，神经性皮炎，湿疹，头部疥癣。

附 注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

### 铁杉属 Tsuga Carr.

**铁杉** 仙柏、铁林刺、刺柏(四川)，栂、展栂(中国裸子植物志)

**Tsuga chinensis** (Franch.) Pritz.——*Abies chinensis* Franch.

生于海拔1 200—3 200米的山地。分布于陕西南部、甘肃南部、河南西部、湖北西部、四川、贵州西北部。

根、叶：祛风除湿。

**长苞铁杉** 贵州杉(中国树木分类学)，铁油杉(经济植物手册)

**Tsuga longibracteata** Cheng

生于海拔300—2 000米温暖湿润的红、黄壤上，常与阔叶林混交。分布于福建南部、湖南南部、广东北部、广西北部。

根皮：接骨。

附 注：国家三级保护植物。

## 4. 杉科 Taxodiaceae

### 柳杉属 Cryptomeria D. Don

**柳杉** 中国柳杉(湖南)，孔雀松(四川、江西)，湿沙天树(福建)，华杉(浙江)，长叶孔雀树(中国裸子植物志)

**Cryptomeria fortunei** Hooibrenk ex Otto et Dietr.

生于海拔1 100米以下地带。分布于浙江、福建、江西。中南及江苏、安徽、四川、贵州有栽培。

树皮(柳杉皮)：苦，寒。解毒，杀虫。外用于癣疮，痈疽。

附　注：功效相同的有**日本柳杉 C. japonica** (L. f.) D. Don，山东、上海、江苏、浙江、江西、湖北、湖南、广西有栽培。

### 杉木属　Cunninghamia R. Br.

**杉木**　　沙木、沙树(西南)，正杉、正木(浙江)，木头树、刺杉(江西、安徽)，杉(经济植物手册)

**Cunninghamia lanceolata** (Lamb.) Hook.——*Pinus lanceolata* Lamb.

生于海拔700—2 500米的山区。分布于长江流域、秦岭以南各省区。浙江、福建、广东、广西有栽培。

根皮(杉木根)：辛，温。用于淋症，疝气，痧秽，腹痛，关节痛，跌打损伤，疥癣。　树皮(杉皮)：祛风止痛，燥湿，止血。用于水肿，脚气，金疮，漆疮，烫伤。　枝干结节(杉木节)：用于脚气，痞块，骨节疼痛，带下病，跌扑血瘀。　心材、枝叶(杉木、杉叶)：辛，微温。辟秽，止痛，散湿毒，降逆气。用于漆疮，风湿毒疮，脚气，心腹胀痛；外用于跌打损伤。　种子：散瘀消肿。用于疝气，乳痛。　木材沥出的油脂(杉木油)：用于尿闭。

### 水松属　Glyptostrobus Endl.

**水松**　　泪杉、卧子松(江西)，孔雀松(云南)，水松柏(广西)

**Glyptostrobus pensilis** (Staunt.) Koch——*Thuja pensilis* Staunt.

生于海拔1 000米以下地区。分布于广东、福建中部、江西东部、广西、四川东南部、云南东南部。

树皮：解表止痒，收敛止痛。用于烫伤，皮肤水泡疮。枝、叶：苦，寒。祛风除湿。用于周身骨节痛。果实：苦，平。化气止痛。用于心胃气痛，疝气疼痛，风湿关节痛，皮炎。

附　注：我国特有属。国家二级保护植物。

### 水杉属　Metasequoia Miki ex Hu et Cheng

**水杉**

**Metasequoia glyptostroboides** Hu et Cheng

我国特产稀有珍贵树种，分布于湖北利川、四川石柱、湖南龙山。全国各地均有栽培。

叶、果实：清热解毒，消炎止痛。用于痈疮肿毒，癣疮。

附　注：国家一级保护植物。

## 5. 柏科　Cupressaceae

### 柏木属　Cupressus L.

**干香柏**　　扁柏、滇柏、冲天柏(云南)，干柏杉(中国树木分类学)

**Cupressus duclouxiana** Hickel

生于海拔 1 400—3 300 米的干燥坡地、山地。分布于四川西南部、云南中部及西北部。

叶：凉血，止血。用于跌打损伤。 种子：养血安神。

**柏木** 香扁柏、垂丝柏、黄柏(四川)，扫帚柏(湖南)

**Cupressus funebris** Endl.

生于海拔 1 100—2 000 米的山地。分布于浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。各地庭园广泛栽培。

根、树干(柏木)：清热利湿，止血生肌。 叶(柏树叶)：苦、辛，温。生肌止血。用于外伤出血，吐血，痢疾，痔疮，烫伤。 果实(柏树果实)：苦、涩，平。祛风解表，和中止血。用于感冒，头痛，发热烦躁，吐血。 树脂(柏树脂)：解风热，燥湿，镇痛。用于风热头痛，带下病；外用于外伤出血。

## 福建柏属 Fokienia Henry et Thoms

**福建柏** 建柏(福建)，滇柏(中国树木分类学)，广柏(中国裸子植物志)

**Fokienia hodginsii** (Dunn) Henry et Thomas——*Cupressus hodginsii* Dunn

生于海拔 800—1 800 米的中、高山混交林内或林缘。分布于浙江南部、福建、江西西部、湖南南部、广东北部、广西、四川、贵州、云南中部及东南部。

心材：用于脘腹疼痛，噎膈，气逆，呕吐。

附 注：国家二级保护植物。

## 刺柏属 Juniperus L.

**欧洲刺柏** 璎珞柏(中国树木分类学)，欧桧(经济植物手册)

**Juniperus communis** L.

原产欧洲、中亚、北非、北美。华北至长江流域引种栽培。

果实：止胃痛，祛痰，利尿。树脂油：外用于风湿关节痛，皮炎，风湿痛。

**刺柏** 刺杨柏(青海)，山刺柏(江苏、江西、湖北、贵州、云南)，刺松(安徽、江西、四川)，山杉(福建)

**Juniperus formosana** Hayata

生于海拔 3 400 米以下的山地、丘陵地。分布于华东、西南及陕西南部、甘肃东部、青海东北部、湖北、湖南南部。长江流域各城市多有栽培。

根、枝、叶：苦，寒。清热解毒，退热透疹，杀虫。用于低热不退，皮肤癣症，麻疹。

**杜松** 刚桧、柽桧(黑龙江)，崩松(东北)，棒松(吉林、河北、山西)，乌热格·素图-阿日查(蒙语)

**Juniperus rigida** Sieb. et Zucc.

在东北地区一般生于海拔 500 米以下的向阳砂质山坡或岩缝间；华北地区多生于海拔 1 400—2 200 米地带。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏。

果实(杜松实)：辛，温。发汗，利尿，祛风除湿，镇痛。用于小便淋痛，水肿，风湿关节痛。

**西伯利亚刺柏**　高山桧(吉林)，矮桧(中国裸子植物志)，西伯利亚杜松(中国东北裸子植物研究资料)

**Juniperus sibirica** Burgsd.

生于海拔1 500—4 200米地带的向阳山坡疏林或林缘。分布东北及内蒙古、新疆、西藏。

树脂(松香、松节油)、松香：祛风燥湿，排脓拔毒，生肌止痛。松节油：用作皮肤刺激药。

果实：祛风，镇痛，利尿。

## 侧柏属　Platycaldus Spach

**侧柏**　崖柏(吉林)，扁柏(吉林、浙江、安徽、江西、湖南)，香柏(河北、江西)，扁桧(江苏)

**Platycladus orientalis** (L.) Franco——*Thuja orientalis* L.

生于海拔250—3 300米的石灰岩山地、阳坡、石缝或平原。河北、陕西渭河流域、云南澜沧江流域山谷有野生。全国各地多有栽培。

根皮(柏根白皮)：苦，平。收敛止痛；外用于烫伤。枝节(侧柏枝)：用于霍乱转筋，齿龈肿痛。叶(侧柏叶)：苦、涩，寒。凉血止血，祛风消肿，清肺止咳。用于吐血，衄血，尿血，痢疾，肠风，崩漏，风湿痹痛。种仁(柏子仁)：甘，平。养心安神，润肠通便。用于惊悸失眠，遗精，便秘。树脂(柏树脂)：甘，平。解毒，消炎，止痛。用于疥癣，癞疮，黄水疮，丹毒。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

## 圆柏属　Sabina Mill.

**圆柏**　桧柏(吉林、北京、山西、浙江)，桧(吉林、河北、福建、云南)，红心柏(北京、浙江)，中国圆柏(新疆)，刺柏(江西、湖北)

**Sabina chinensis** (L.) Ant.——*Juniperus chinensis* L.

生于海拔1 000—3 900米的山坡丛林中。分布于华北、西北、华东、中南、西南。吉林、新疆、西藏有栽培。

树皮、枝叶(桧叶)：苦、辛，温。有小毒。祛风散寒，活血消肿，解毒，利尿。用于风寒感冒，风湿关节痛，小便淋痛，癣疹。

**密枝圆柏**　深山柏、密条柏(中国树木分类学)，细枝桧(经济植物手册)

**Sabina convallium** (Rehd. et Wils.) Cheng et W. T. Wang——*Juniperus convallium* Rehd. et Wils.

生于海拔2 500—3 700米地带的阳坡或半阴坡。分布于四川西部、西藏东部。

枝叶、种子：祛风湿，清热解毒。

**兴安圆柏**　兴安桧、蟠龙桧(吉林、东北木本植物图志)

**Sabina davurica** (Pall.) Ant.——*Juniperus davarica* Pall.

生于大兴安岭海拔400—1 400米向阳山坡或林缘岩石缝中。分布黑龙江、内蒙古北部。

果实：镇痛利尿。

**香柏**　小果香柏(中国树木分类学)，小果香桧(中国裸子植物志)

**Sabina pingii** (Cheng ex Tetté) Cheng et W. T. Wang var. **wilsonii** (Rehd.) Cheng et L. K. Fu——*Juniperus squmata* Buch.-Ham. var. *wilsonii* Rehd. et Wils.

生于海拔2 600—4 900米的高山地带灌丛中。分布陕西、甘肃南部、湖北西北部、四川、云南北部、西藏。

枝叶：用于理气。

**祁连圆柏**　祁连山圆柏(青海、中国树木学)，陇东圆柏、蒙古圆柏(中国树木分类学)，柴达木桧(经济植物手册)，柴达木圆柏(中国树木学)

**Sabina przewalskii** Kom.

生于海拔2 600—4 000米的湿润肥沃坡地。分布于甘肃中部及南部、青海东部及北部、四川西北部。

带叶嫩枝：苦、涩，寒。止血、镇咳。用于咯血，吐血，尿血，便血，鼻衄，崩漏，咳嗽。

**新疆方枝柏**　阿尔泰圆柏(新疆)，阿尔泰方枝柏(中国高等植物图鉴)，冷桧(中国裸子植物志)

**Sabina pseudosabina** (Fisch. et Mey.) Cheng et W. T. Wang——*Juniperus pseudosabina* Fisch. et Mey.

生于海拔1 900—3 300米的山地。分布新疆阿尔泰山、天山、昆仑山。

叶：用于吐血，衄血，尿血，崩漏，风湿痹痛，烫伤。果实：用于眼疾。

**垂枝柏**　曲枝柏(云南、中国树木分类学)，曲桧(中国裸子植物志)，弯枝桧(经济植物手册)

**Sabina recurva** (Buch.-Ham.) Ant.——*Juniperus recurva* Buch.-Ham.

生于海拔2 700—3 900米的针、阔叶林中。分布于西藏南部。云南有栽培。

叶：凉血止血，生发乌发，清肺止咳，祛风消肿。用于吐血，衄血，尿血，崩漏，风湿痹痛。种仁：养心安神，润肠通便。用于惊悸失眠，遗精，便秘。

**方枝柏**　方香柏(四川)，方枝桧(经济植物手册)

**Sabina saltuaria** (Rehd. et Wils.) Cheng et W. T. Wang——*Juniperus saltuaria* Rehd. et Wils.

生于海拔2 400—4 300米的山地。分布于甘肃南部、四川西部、云南西北部、西藏东部。

枝叶、果实：清热祛风，除湿，止血。

**高山柏**　山柏、香柏(四川)，浪柏(西藏)，鳞桧(中国裸子植物志)，大香桧(中国树木分类学)

**Sabina squamata** (Buch.-Ham.) Ant.——*Juniperus squamata* **Buch.-Ham.**; *S. squamata* (Buch.-Ham.) Ant. **var.** *fargesii* **Cheng f. et L. K. Fu**

生于海拔 1 600—4 000 米高山地带的灌木丛和针、阔叶林内。分布于西南及陕西南部、甘肃南部、安徽南部、福建、台湾、湖北西部。

根(峨沉香)、枝、叶：苦、涩，寒。清热解毒，透疹利尿，健胃止痢。用于痈肿，小便淋痛，痢疾，水肿，炭疽。

**大果圆柏**　西藏圆柏(青海)，西康圆柏(中国树木分类学)，藏桧、西康桧(经济植物手册)，甘川圆柏(中国树木学)

**Sabina tibetica** Kom.

生于海拔 2 800—4 600 米的山地。分布于甘肃南部、青海南部、四川西部、西藏南部及东部。

带叶嫩枝：苦、涩，寒。祛风除湿，止咳，止血。

**叉子圆柏**　新疆圆柏、天山圆柏(新疆、中国树木学)，沙地柏(甘肃、青海，中国树木学)，臭柏(内蒙古、青海)，爬柏(甘肃)

**Sabina vulgaris** Ant.

生于海拔 1 100—2 800 米的干旱多石山坡或沙丘。分布于西北及内蒙古。

枝、叶、果实：苦，平。驱风镇静，活血止痛。用于风湿关节痛，小便淋痛，迎风流泪，头痛，视物不清。

### 崖柏属　Thuja L.

**朝鲜崖柏**　长白侧柏(东北木本植物图志)，朝鲜柏(东北裸子植物研究资料)

**Thuja koraiesis** Nakai

生于海拔 700—1 400 米的山谷、山坡、路旁、林缘。分布于吉林东部。

枝、叶：凉血，止血，生发乌发。　节：用于风痹。　种仁：养心安神，润肠通便。

附　注：国家三级保护植物。

## 6. 罗汉松科　Podocarpaceae

### 罗汉松属　Podocarpus L'Her. ex Pers.

**罗汉松**　土杉(台湾、云南)，土松(福建)，大叶罗汉松(江西)，罗汉杉(中山传信录)

**Podocarpus macrophyllus** (Thunb.) D. Don——*Taxus macrophylla* Thunb.

分布于中南及陕西、江苏、安徽、浙江、福建、江西、四川、贵州、云南，多为庭园栽培。

根皮：甘，微温。活血，止痛，杀虫；外用跌打损伤，疥癣。　叶：淡，平。止血。用于咳血，吐血。　种子、花托：：甘，平。益气补中，补肾，益肺。用于心胃疼痛，血虚面色萎黄。

附　注：功效相同的有**短叶罗汉松 P. macrophyllus** (Thunb.) D. Don var. **maki** Endl.，陕西、江苏、浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南有栽培；**大理罗汉松 P. forrestii** Craib et W. W. Smith，分布于云南大理苍山。

**竹柏**　椰树(浙江)，铁甲树(江西、海南)，罗汉柴(福建)，黄杂树(江西)，猪肝树(广

西)

**Podocarpus nagi** (Thunb.) Zoll. et Mor. ex Zoll.——*Myrica nagi* Thunb.

生于海拔1 600米以下的常绿阔叶林中。分布于浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、四川。

叶：淡，平。止血，接骨，消肿。用于骨折，外伤出血，风湿痹痛。

**百日青**　桃柏松(上海)，竹叶松(广东、广西)，大叶竹柏松、竹柏松(海南)，紫柏(云南)

**Podocarpus neriifolius** D. Don

生于海拔540—1 300米山地的阔叶林中。分布于浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根：用于水肿。 根皮：用于癣疥，痢疾。 枝、叶：用于骨质增生，关节肿痛。

**肉托竹柏**　大叶竹柏(云南、中国树木分类学)，大叶罗汉松(中国裸子植物志)

Podocarpus wallichiana Presl

生于海拔540米左右的山区。分布于云南西双版纳。

根、枝叶：用于关节红肿，水肿。

## 7. 三尖杉科 Cephalotaxaceae

### 三尖杉属 Cephalotaxus Sieb. et Zucc. ex Endl.

**三尖杉**　山榧树(浙江)，三尖松(湖北)，藏杉(四川)，岩杉木(广西)，臭杉(云南)

**Cephalotaxus fortunei** Hook. f.

生于海拔1 000—3 000米的杂木林中，针、阔叶混交林及林缘、溪边。分布于华东、中南及陕西、四川、贵州、云南。

根皮：用于石淋。 枝、叶：苦、涩，寒。抗癌。用于肿瘤。种子：甘、涩，平。润肺，消积，杀虫。用于咳嗽，食积，蛔虫、钩虫病。

附　注：①近年研究证明，本种所含三尖杉总碱对淋巴肉瘤、肺癌等有较好疗效，对胃癌、上颌窦癌、食管癌等有一定效果。②功效相同的有**高山三尖杉 P. fortunei** Hook. f var. **alpina** Li，分布于甘肃南部、四川西部、云南西北部；**绿背三尖杉 P. fortunei** Hook. f. var. **concolor** Franch.，分布于江西、四川西部、贵州。

**贡山三尖杉**

**Cephalotaxus lanceolata** K. M. Feng

生于海拔1 900米左右的阔叶林中。分布于云南贡山独龙江上游沿岸。

根、枝叶、种子：抗癌。用于癌症。

附　注：云南特有药用植物。

**粗榧**　野榧、木榧(浙江)，土香榧(湖北)，水松(广西)，中国粗榧(中国树木分类学)

**Cephalotaxus sinensis** (Rehd. et Wils.) Li——*C. drupacea* Sieb. et Zucc. var. *sinensis* Rehd. et Wils.

生于海拔800—2 500米的山地针、阔叶混交林中、砂岩、石灰岩山地。分布于中南及

陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、福建、江西、四川、贵州、云南。

根皮、枝、叶：苦、涩，寒。祛风湿，抗癌。用于淋巴癌，白血病。 种子：甘、涩，平。润肺止咳，驱虫，消积。用于食积，咳嗽，蛔虫病，钩虫病，咳嗽。

附　注：功效相同的有**宽叶粗榧 C. sinensis** (Rehd. et Wils.) Li var. **latifolia** Cheng et L. K. Fu，分布于湖北、广东、广西、四川、贵州；**海南粗榧 C. hainanensis** Li，分布于广东西部、海南、广西容县、云南东南、西藏东南部；**西双版纳粗榧 C. mannii** Hook. f.，分布于云南西双版纳；**篦子三尖杉 C. oliveri** Mast.，分布于江西东部、湖北、湖南、广东北部、四川西部及南部、贵州、云南东南部。

## 8. 红豆杉科　Taxaceae

### 穗花杉属　Amentotaxus Pilger.

**穗花杉**　　华西穗花杉(南京)，水杉树(湖南)

**Amentaxus argotaenia** (Hance) Polger.——*Podocarpus argotaenia* Hance

生于海拔 300—1 000 米的中、低山阴湿沟谷、溪流沿岸、杂木林中。分布于西南及陕西、甘肃南部、江西西北部、湖北西部、湖南、广东、广西、四川、西藏东南部。

根、树皮：止痛，生肌。用于跌打损伤，骨折。 种子(榧子)：用于消积，驱虫。

附　注：国家三级保护植物。

### 红豆杉属　Taxus L.

**红豆杉**　　红豆树、观音杉(湖北)，卷柏、血柏、扁柏(四川)

**Taxus chinensis** (Pilger) Rehd.——*T. baccta* L. subsp. *cuspidata* Sieb. et Zucc. var. *chinensis* Pilger

生于海拔 800—2 000 米的山地杂木林中。分布于陕西南部、甘肃南部、河南、湖北西部、湖南、四川、贵州、云南东北部及东南部。

叶：用于疥癣。 种子(血榧)：消积，驱虫。用于小儿疳积，蛔虫病。

**南方红豆杉**　　海罗松、红叶水杉(江西)，红榧(湖北)，杉公子(四川)，美丽红豆杉(云南)

**Taxus chinensis** (Pilger) Rehd. var. **mairei** (Lemée et Lévl.) Cheng et L. K. Fu——*Tsuga mairei* Lemée et Lévl.; *T. mairei* (Lemée et Lévl.) S. Y. Hu ex Liu

生于海拔 700—2 500 米的阴湿山沟、溪边、山坡杂木林中。分布于中南及陕西南部、江西、福建、四川、贵州、云南东北部。

种子(血榧)：苦、甘，寒。消积食，驱蛔虫。 叶：用于咽喉痛。

**东北红豆杉**　　赤柏松、紫柏松(东北)，紫杉(中国树木分类学)

**Taxus cuspidata** Sieb. et Zucc.

生于海拔 500—1 000 米山地、河岸、谷地、缓坡或林中。分布于吉林东部。

枝、叶：利尿，通经。用于肾炎浮肿，小便涩痛，消渴。

**云南红豆杉**　土榧子(云南),西南红豆杉(中国树木分类学)

**Taxus yunnanensis** Cheng et L. K. Fu

生于海拔 2 000—3 400 米的高山地带。分布于四川西南部、云南西部及西北部、西藏东南部。

枝、叶：清热解毒,凉血,驱虫,消食。种子：散寒,止痛,杀虫。

## 榧树属　Torreya Arn.

**榧树**　药榧(安徽),圆榧、芝麻榧(浙江),野杉(浙江、江西),香榧(中国裸子植物志)

**Torreya grandis** Fort. ex Lindl.

生于海拔 1 400 米以下的林缘、溪边或路旁。分布于江苏南部、安徽南部、浙江、福建北部、江西北部、湖南西南部、贵州东北部。

种子(榧子)：甘、涩,平。驱虫,消积,润燥。用于虫积腹痛,食积痞闷,便秘,痔疮,蛔虫病。根皮：用于风湿肿痛。花：苦。去水气,驱蛔虫。

附　注：功效基本相同的有**巴山榧子 T. fargesii** Franch.，分布于陕西南部、湖北西部、四川;**日本榧树 T. nucifera** (L.) Sieb. et Zucc.，原产日本。青岛、南京、上海、杭州引种栽培；**云南榧树 T. yunnanensis** Cheng et L. K. Fu，分布于云南西北部。

**长叶榧树**　浙榧(中国裸子植物志)

**Torreya jackii** Chun

生于林缘、坡地、陡壁、石缝中。分布于浙江、福建。

枝叶(长叶榧)：用于降压,抗肿瘤。

附　注：国家二级保护植物。

# 9. 麻黄科　Ephedraceae

## 麻黄属　Ephedra Tourn ex L.

**中麻黄**

**Epbedra intermedia** Schrenk ex Ney.

生于海拔 2 000 米以下的干旱荒漠、沙滩、坡地或草地上。分布于西北及辽宁、河北、山西、山东。

茎(麻黄)：辛、微苦,温。发汗散寒,宣肺平喘,利水消肿。用于风寒感冒,胸闷喘咳,水肿,痰喘咳嗽,哮喘。根(麻黄根)：甘,平。止汗。用于盗汗。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载本种及草麻黄,木贼麻黄。②功效相同的有**草麻黄 E. sinica** Stapf，分布于东北、华北及陕西、甘肃、新疆、河南；**木贼麻黄 E. equisetina** Bunge，分布于华北及陕西、甘肃、青海、新疆;**膜果麻黄 E. przewalskii** Stapf，分布于内蒙古、甘肃、青海、宁夏、新疆；**喀什膜果麻黄 E. przewalskii** Stapf var. **kaschgarica** (Fedtscb. et Bobr.) C. Y. Cheng，分布于新疆喀什;**西藏中麻黄 E. inter-**

**media** Schrenk ex Mey. var. **tibetica** Stapf, 分布于新疆南部、西藏东部至西部；**西藏麻黄 E. saxatilis** Royle, 分布于西藏南部；**丽江麻黄 E. likiangensis** Florin, 分布于西南；**匍枝丽江麻黄 E. likiangensis** Florin f. **mairei** (Florin) C. Y. Cheng, 分布于四川西南部、云南西北部、西藏东南部；**山岭麻黄 E. gerardiana** Wall., 分布于西藏；**垫状山岭麻黄 E. gerardiana** Wall. var. **congesta** C. Y. Cheng, 分布于四川西南部、云南西北部、西藏；**单子麻黄 E. monosperma** Gmel. ex Mey., 分布于华北及黑龙江、甘肃、青海、宁夏、新疆、四川、西藏；**矮麻黄 E. minuta** Florin, 分布于青海南部、四川西北部、云南德钦；**雌雄麻黄 E. fedtschenkoae** Pauls., 分布于新疆。

**细子麻黄**

**Ephedra regeliam** Florin

生于海拔700—2 500米的低山冲积戈壁或多沙砾石地区。分布于新疆南部。

果实(麻黄果)：用于消化，胃痛。

## 10. 买麻藤科 Gnetaceae

### 买麻藤属 Gnetum L.

**细柄买麻藤**

**Gnetum gracilipes** C. Y. Cheng

生于林中，缠绕于树上。分布于广西十万大山。

根、茎：用于跌打损伤。

附 注：广西特有药用植物。

**买麻藤** 倪藤(通称)，山花生(福建)，博节藤、山米藤(广东)，老熊果(云南)

**Gnetum montanum** Markgr.

生于海拔1 600—2 200米的阔叶林缘或疏林中。分布于广东、海南、广西、云南南部。

根、茎、叶(买麻藤)：苦，温。祛风除湿，活血散瘀，行气健胃，接骨。用于风湿关节痛，腰痛，咽喉痛，咳嗽，胃脾虚弱，跌打损伤，骨折。

附 注：功效相同的有**大子买麻藤 G. montanum** Markgr. f. **megalacarpum** Markgr.；**小叶买麻藤 G. parvifolium** (Warb.) C. Y. Cheng ex Chun, 分布于福建、江西、湖南、广东、广西。

**垂子买麻藤** 藤子果(云南)

**Gnetum pendulum** C. Y. Cheng

生于海拔1 200—1 800米的山坡、峡谷林中。分布于云南南部。

茎、叶、果实：祛风湿，生肌，止血。用于刀枪伤，跌打损伤，风湿骨痛。

附 注：功效相同的有**短柄垂子买麻藤 G. pendulum** C. Y. Cheng f. **intermedium** C. Y. Cheng, 分布于广西西南部、贵州东南部、云南南部、西藏东南部；**无柄垂子买麻藤 G. pendum** C. Y. Cheng f. **subsessile** C Y. Cheng, 分布于云南西部；**海南买麻藤 G. hainanense** C. Y. Cheng, 分布于广东、海南、广西。

# 被子植物 Angiospermae

## 双子叶植物 Dicotyledoneae

### 1. 木麻黄科 Casuarinaceae

#### 木麻黄属 Casuarina Adans.

**木麻黄** 驳骨树、短枝木麻黄(广州),马尾树(中国种子植物分类学),驳骨松(中国高等植物图鉴)

**Casuarina equisetifolia** Forst.

原产澳大利亚和太平洋岛屿。全国东南沿海地区均有栽培。

树皮、叶(驳骨松): 祛风除湿,发汗,利尿。

### 2. 杨梅科 Myricaceae

#### 杨梅属 Myrica L.

**青杨梅** 火梅(广西),青梅(贵州)

**Myrica adenophora** Hance

生于山谷或林中。分布于广东、广西、贵州。

果实(青杨梅): 祛痰,解酒,止吐。

**毛杨梅** 火树杨梅、野杨梅(云南)

**Myrica esculenta** Buch. -Ham.

生于海拔 280—2 500 米的稀疏杂木林内或干燥山坡上。分布于广东西部、广西、四川中部以西、贵州西部及南部、云南。

根皮、树皮、果实: 涩,平。消炎,收敛,止泻,止血,止痛。用于痢疾,泄泻,崩漏,胃痛。

附 注: 云南药品标准(1974)收载。

**云南杨梅** 酸杨梅(贵州),杨梅(云南)

**Myrica nana** Cheval.

生于海拔 1 500—3 500 米的山坡、林缘及灌丛中。分布于四川、贵州、云南。

根皮、茎皮: 涩,凉。果实: 酸,凉。用于痢疾,泄泻,消化不良,崩漏,直肠出血,脱肛。

附 注: 功效相似的有**茂盛矮杨梅 M. nana** Cheval. var. **luxuriana** Cheval.,

分布于云南。

**杨梅**　酸梅(湖北),树梅(湖南),珠红(福建、贵州)

**Myrica rubra** (Lour.) Sieb.et Zucc.——*Morella rubra* Lour.

生于海拔125—1 500米的山谷林中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

果实(杨梅):酸、甘,平。生津止渴,和胃消食。用于烦渴,胃痛,食欲不振。根:辛、苦,温。理气止血,化瘀。用于胃痛,膈食呕吐,疝气,吐血,跌打损伤。树皮:苦,温。理气散瘀,止痛,利湿。用于跌打损伤,胃痛,牙痛,外伤出血。

## 3. 胡桃科　Juglandaceae

### 喙核桃属　Annamocarpa A. Chev.

**喙核桃**

**Annamocarpa sinensis** (Dode)Leroy——*Carya sinensis* Dode; *Rhamphocarpa integrifoliolata* Kuang

生于河流两岸的山坡林中。分布于湖南、广西、贵州南部、云南东南部。我国台湾有栽培。

枝、叶:杀虫,止痒。果实:滋润。

附　注:国家二级保护植物。

### 山核桃属　Carya Nutt.

**山核桃**　小核桃(浙江)

**Carya cathayensis** Sarg.

生于海拔400—1 200米的山麓疏林中或腐殖质丰富的山谷。分布于安徽、浙江、江西、河南、贵州、云南。主产浙江。

种仁:滋润补养。根皮:用于脚癣。　外果皮:用于皮肤癣症。

**美国山核桃**

**Carya illinoinensis** (Wangenh.)K. Koch——*Juglans illinoinensis* Wangenh.

原产北美洲。河北、山东、江苏、浙江、江西、福建、湖南、四川有栽培。

种仁:滋养强壮,润肺通便。

### 青钱柳属　Cyclocarya Iljin

**青钱柳**　青钱李(江西),一串钱(湖北),山麻柳(四川),甜茶树(贵州)

**Cyclocarya paliurus** (Batal.) Iljin——*Pterocarya paliurus* Batal.

生于海拔500--2 500米的山地湿润森林中。分布于河北、陕西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南东南部。

树皮、叶：清热消肿，止痛。用于顽癣。

**附　注**：我国特有属。

## 黄杞属　Engelhardtia Leschen. ex Bl.

**毛叶黄杞**

**Engelhardtia colebrookiana** Lindl. ex Wall.

生于海拔 800—1 400 (—2 000)米的山腰或山谷疏林中。分布于海南、广西、贵州、云南。

根、茎皮：涩，凉。收敛，止血。用于痢疾，泄泻，脱肛，外伤出血。

**少叶黄杞**

**Engelhardtia fenzelii** Merr.

生于山地疏林中。分布于浙江、福建、广东北部、广西。

树皮：理气化湿。

**黄杞**　黄桷(福建)，黄榛(湖北)，黄古木、土厚朴(广西)

**Engelhardtia roxburghiana** Wall.——*E. chrysolepis* Hance

生于海拔 200—1 500 米的林中。分布于福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

树皮：微苦、辛，平。理气化湿，导滞。用于脾胃湿滞，湿热泄泻。叶：微苦，凉。有毒。清热，止痛。用于疝气腹痛，感冒发热。

## 胡桃属　Juglans L.

**野核桃**　串桃(江西)，巴核桃(湖北)，山核桃(四川)

**Juglans cathayensis** Dode

生于海拔 800—2 000(—2 800) 米的杂木林中。分布于山西、陕西、甘肃、山东、江西、河南、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。部分地区有栽培。

种仁(野核桃仁)：甘，温。补养气血，润燥化痰，益命门，利三焦，温肺润肠。用于虚寒咳嗽，下肢酸痛。根皮、果皮：杀虫止痒。

**华东野核桃**　野核桃(浙江)

**Juglans cathayensis** Dode var. **formosana** (Hayata) A. M. Lu et R. H. Chang——*J. formosana* Hayata

生于山谷或山坡林中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾。

种仁：甘、涩，微温。补养气血，润燥化痰，温肺润肠。

**胡桃楸**　山核桃(东北、河北)，核桃楸(河北)，马核果(北京)

**Juglans mandshurica** Maxim.

生于土质肥厚、湿润、排水良好的沟谷两旁或山坡阔叶林中。分布于东北、华北及陕西、甘肃、山东、河南。

树皮(楸皮)：苦、辛，平。清热解毒。用于痢疾，胃痛。青果或果皮(核桃楸果)：辛，

平。有毒。止痛。用于胃痛，腹痛。种仁：甘，温。敛肺定喘，温肾润肠。用于体质虚弱，肺弱咳嗽，肾虚腰痛，便秘遗精，石淋，乳汁缺少。

附　注：①其干皮及枝皮在华北、西北和华东等地常混作秦皮用。②国家三级保护植物。

**胡桃**　　核桃(通称)，嘎丢豆浆桑(苗语)，胡西根-楚莫(蒙语)

**Juglans regia** L.

生于海拔 400—1 800 米的山坡及丘陵地带。野生种仅见于新疆巩留、霍城。平原及丘陵地区常见栽培。栽培于华北、西北、华东、中南、西南。主产于河北、山西、山东。

种仁(核桃仁)：甘，温。温补肺肾，润肠通便。用于肾虚耳鸣、咳嗽气喘，阳痿，腰痛，中耳炎，便秘。根(胡桃根)：杀虫，攻毒。　嫩枝：甘，温。用于瘰疬。　叶：苦、涩，平。有毒。解毒消肿。用于食道癌，象皮腿，带下病，疥癣。　外果皮(青龙衣)：苦、涩，平。有毒。消肿止痒。用于胃痛，胃炎疼痛，咳嗽痰喘；外用于头癣，牛皮癣，疮疡肿毒。　内果皮(胡桃壳)：用于血崩，乳痈。　种隔(分心木)：苦、涩，平。　固肾涩精。用于肾虚遗精，滑精，遗尿。种仁油：用于绦虫病。

附　注：①国家二级保护植物。②《中华人民共和国药典》1990 年版及山西中药材标准收载。③本种诸栽培品种亦药用。

## 化香树属　Platycarya Sieb. et Zucc.

**圆果化香树**

**Platycarya longipes** Wu

生于海拔 800—1 300 米的山坡向阳地或疏林中。分布于湖南、广东、广西、贵州。

叶：顺气，祛风，化痰，消肿，解毒，燥湿，杀虫。用于癞头疮，无名肿毒。果实：顺气，祛风，消肿，止痛。用于痈肿，疥癣。

**化香树**　　花椒果(江苏)，化皮树(江西)，山柳(湖北)

**Platycarya strobilacea** Sieb. et Zucc.

生于海拔 600—1 300 米，有时达 2 000 米的向阳山坡及杂木林中。分布于华东、中南及陕西、甘肃、四川、贵州、云南。

叶：苦，寒。有毒。杀虫，解毒，止痒。用于疮毒，阴囊湿疹，顽癣。果实：辛，温。顺气，祛风，消肿，止痛，燥湿，杀虫。

## 枫杨属　Pterocarya Kunth.

**湖北枫杨**　　枫杨(湖北)，山麻柳(贵州)

**Pterocarya hupehensis** Skan

生于海拔 1 200 米处的山坡、林中或沟边。分布于湖北、四川、贵州。

根皮、茎皮、叶：辛，大热。有毒。杀虫止痒，利尿消肿。用于血吸虫病，癫痫，疮癣。

**华西枫杨**　　棘柳(陕西)

**Pterocarya insignis** Rehd. et Wils.

生于海拔 1 100—2 500 米的山坡及山谷杂木林中。分布于陕西、甘肃、浙江、湖北、四川、云南。

树皮、叶：苦、辛，温。杀虫。

**枫杨**　　蜈蚣柳(安徽)，水柳树、麻柳树(陕西、湖北)，鬼柳(河南、湖南、贵州)，枫柳(唐本草)

**Pterocarya stenoptera** C. DC.

生于海拔 1 500 米以下的沿溪涧的河滩、阴湿山坡地林中。分布于华东、中南及辽宁、陕西、甘肃、四川、贵州、云南。东北和华北均有栽培。

树皮(枫柳皮)：辛，大热。有毒。用于龋齿痛，疥癣，烧烫伤。根或根皮(麻柳树根)：苦，热。有毒。用于疥癣，牙痛，风湿筋骨痛。叶(麻柳叶)：苦，温。有毒。用于咳嗽痰喘，关节痛，痈疽疖肿，皮肤湿疹，吸血虫病。果实(麻柳果)：散寒，止咳。

**东京枫杨**　　越南枫杨(中国植物志)

**Pterocarya tonkinensis** (Franch.) Dode——*P. stenoptera* C. DC. var. *tonkinensis* Franch.

生于海拔 50—1 000 米的疏林中。分布于云南东南部。

树皮：祛风，杀虫。用于龋齿痛，积年痛风；外用于疥癣，皮肤病。

## 4. 杨柳科　Salicaceae

### 钻天柳属　Chosenia Nakai

**钻天柳**　　顺河柳、上天柳(吉林)

**Chosenia arbutifolia** (Pall.) A. Skv.——*Salix arbutifolia* Pall.

生于海拔 300—950 米的沿河石砾地。分布于东北及内蒙古。

叶：清热平喘，止咳化痰。

附　注：国家三级保护植物。

### 杨属　Populus L.

**响叶杨**　　白杨树(河北、青海、贵州)，绵杨(陕西)，山白杨(江苏、江西)，圆叶白杨(江苏)，腺柄杨(云南)

**Populus adenopoda** Maxim.

生于海拔 300—2 500 米的向阳山坡灌丛中。分布于华北、西北、华东、西南及河南、湖北、湖南。

根、树皮、叶(响叶杨)：祛风通络，散瘀活血，止痛。用于风湿关节痛，四肢不遂，损伤肿痛。

**银白杨**

**Polulus alba** L.

生于海拔 1 000—1 700 米的山坡。东北、华北、西北、河南、湖北、西藏有栽培。新疆

有野生。

叶(白背杨)：祛痰止咳，消炎平喘。用于咳嗽痰喘。

**新疆杨**

**Populus alba** L. var. **pyramidalis** Bunge——*P. bolleana* Lauche

生于草原绿洲。北方各省区多栽培，以新疆最普遍。

树皮、枝：用于风湿麻木。　花：用于泄泻。

**加拿大杨**　加杨(北方通称)

**Populus canadensis** Moench

除广东、云南、西藏外，全国各省区均有栽培。

树皮：祛风除湿，凉血解毒。叶：用于咳嗽痰喘。　花：用于肠炎。

**青杨**

**Populus cathayana** Rehd.

生于海拔1 500—2 600米的沟谷、河岸和山麓阴坡。分布于华北、西北及辽宁、四川、西藏。

根皮、树皮、枝叶：祛风，散瘀。

**山杨**　白杨(吉林)，大叶杨(天津、湖北)，山白杨(青海)，火杨(河南)，响杨(中国高等植物图鉴)

**Populus davidiana** Dode

生于海拔650—2 000米的林中、向阳山坡及山沟中。分布于东北、华北、西北及河南、湖北、湖南。

根皮、树皮(白杨皮)、枝(白杨枝)、叶(白杨叶)：苦、辛，平。清热解毒，祛风，止咳，行瘀凉血，驱虫。　用于高血压病，肺热咳嗽，蛔虫病，小便淋漓；外用于秃疮疥癣。　树枝：用于腹痛，疮疡。　叶：用于龋齿。

附　注：功效相同的有**小青杨 P. pseudo-simonii** Kitag.，分布于东北、西北；**香杨 P. koreana** Rehd.，分布于东北。

**滇南山杨**　白杨树(云南)

**Populus duclouxiana** Dode var. **bonati** (Levl.) C. Wang et Tung——*P. bonati* Levl.

生于海拔2 100—3 500米的密林中或山坡疏林下。分布于云南昆明、大理。

树皮、枝叶：清热解毒，利水，杀虫。

**胡杨**　胡桐(中国高等植物图鉴)

**Populus euphratica** Oliv.——*P. diversifolia* Schrenk.

生于荒漠、半荒漠地带河岸、水边。分布于西北。

根：驱虫。叶(胡杨叶)：平肝。用于高血压症。花：止血。树脂(胡桐泪)：苦、咸，寒。清热化痰，软坚，止痛。用于咽喉肿痛，牙痛，瘰疬，胃痛；外用于中耳炎，痔疮。

附　注：国家三级保护植物。

**大叶杨**

**Populus lasiocarpa** Oliv.

生于海拔1 200—2 500米的山坡杂木林中。分布于陕西、湖北、四川、贵州、云南。

根皮：止咳，驱虫

**钻天杨**　美国白杨(中国树木分类学)，笔杨(中国高等植物图鉴)

**Populus nigra** L. var. **italica** (Muenck.) Koehne——*P. italica* Muench.

长江、黄河流域各地多栽培。

树皮：苦，寒。凉血解毒，祛风除湿。用于风湿痛疼，脚气肿，高血压症，烧、烫伤，肝炎，痢疾，感冒；外用于秃疮。

**毛白杨**　大叶杨(江苏、河南)，响杨(中国高等植物图鉴)

**Populus tomentosa** Carr.

生于低海拔1 500米以下的山区及平原，多为栽培。分布于华北、西北、华东及辽宁南部。

树皮(毛白杨)、花序(杨狗花)：苦、甘，寒。清热利湿，祛痰，止痢。用于痢疾，淋浊，带下病，肺热咳嗽，肝炎，蛔虫病。

**云南白杨**　滇杨(中国树木分类学)

**Populus yunnanensis** Dode

生于海拔1 000米以上的山地、沟边、河边。分布于四川、贵州、云南。

根：清热解毒，杀虫。

## 柳属　Salix L.

**白柳**　苏盖提(维吾尔语)

**Salix alba** L

生于海拔高达3 100米处，多沿河生长。分布于新疆。青海、甘肃、西藏有栽培。

根、枝、叶、芽：苦，寒。清热，祛风，除湿。用于乳蛾，咽喉痛，盆腔炎，水肿，疮疖，黄疸，关节痛初起。

**垂柳**　柳树(通称)，线柳(黑龙江)，垂杨柳(吉林)，仙柳(青海)，水杨柳(江西、广西)

**Salix babylonica** L.

全国各地均广栽培。

根(柳根)：苦，寒。利水通淋，泻火除湿。用于风湿拘挛，筋骨疼痛，湿下带下，牙龈肿痛。　枝、叶(柳枝、柳叶)：苦，寒。消肿散结，利水，解毒透疹。用于小便淋痛，黄疸，风湿痹痛，恶疮。　花序(柳花)：苦，寒。散瘀止血。用于吐血。果实：凉。止血，祛湿，溃痛。　茎皮：苦，寒。祛风利湿，消肿止痛。用于黄水疮。

附　注：功效相同者有**旱柳 S. matsudana** Koidz.，分布于东北、西北、华中及江苏、安徽、四川；**细柱柳 S. gracilistyla** Miq.，分布于东北。

**中华柳**　山柳(湖北)

**Salix cathayana** Diels

生于海拔1 500—3 300米的山坡上。分布于河北、陕西、河南、湖北、四川、云南。

枝叶(中华柳)：用于感冒发热。

**沙柳**　乌柳(陕西、西藏植物名录)，筐柳(甘肃、中国树木分类学)

**Salix cheilophila** Schneid.

生于海拔750—3 000米的山坡、河谷、溪边、湿地。分布于华北及陕西、甘肃、青海、四川、云南、西藏东部。

树皮、枝、叶(河柳)：辛、甘，温。祛风解表，清热消肿。用于麻疹初起，斑疹不透，皮肤瘙痒，慢性风湿。

**巫山柳**　川鄂柳(中国高等植物图鉴)

**Salix fargesii** Burk.

生于海拔1 400—1 600米的山坡林中。分布于陕西、甘肃、湖北、四川。

根、叶：祛风除湿

**山杨柳**　山黑柳(贵州)，黑杨柳(云南)

**Salix guebrianthiana** Schneid.——*S. tetradenia* Hand. -Mazz.

生于海拔1 700—2 200米的山坡杂木林中。分布于贵州、云南。

树皮：清热解毒。用于痈疮肿毒。

**小叶柳**　山杨柳、红腊梅(中国高等植物图鉴)，翻白柳(秦岭植物志)

**Salix hypoleuca** Seem.

生于海拔1 400—2 700米的林缘、山坡灌丛中。分布于山西、陕西、甘肃、湖北、四川、贵州。

根、叶：辛、涩，温。祛风除湿，活血化瘀，用于风湿痹痛，疔疮，劳伤，蛇头疔。

**蒙古柳**　筐柳(中国植物志)

**Salix linearistipularis** (Franch.) Hao——*S. purpurea* L. var. *stipularis* Franch.; *S. mongolica* (Franch.) Siuz.

生于平原低湿地、河边、沙丘、草原。分布于东北及河北、内蒙古。

树皮、枝：消肿，收敛。

**龙爪柳**

**Salix matsudana** Koidz. f. **tortuosa** (Vilm.) Rehd.——*S. matsudana* Koidz. var. *tortuosa* Vilm.

各地多栽培作庭园绿化树种。

枝、叶(龙爪柳)：祛风，利尿，清热，止痛。

**小穗柳**　少柳(新疆)

**Salix microstachya** Turcz.

生于沙漠地区低地、河流沿岸、固定沙丘。分布于辽宁、内蒙古、甘肃、青海、宁夏、新疆。

根皮(乌柳根)：苦、凉。清热消肿，祛风，顺气。用于黄疸，牙痛，急性腰扭伤。

**五蕊柳**

**Salix pentandra** L.

生于海拔600—1 200米的山坡路旁、河边、水甸、草甸中。分布于华北及黑龙江、吉林。

根：祛风除湿。　枝、叶：清热解毒，散瘀消肿。　花序：止泻。

**红皮柳**　水杨(湖北)，簸箕柳(中国高等植物图鉴)

**Salix sinopurpurea** C. Wang et Tung

生于海拔1 000米以下的山地河边、草地、灌丛、湿润砂地。分布于陕西、甘肃、湖北、四川、贵州、云南。

根：用于乳痈。　皮：用于金疮诸痛。　枝叶：清热解毒。

**天山柳**

**Salix tianschanica** Regel

生于海拔1 700—2 700米的山地河岸边、林缘、灌丛中。分布于新疆北部山区。

根、枝、叶：清热解毒，祛风除湿。果实：清热，凉血，祛瘀，止痛。

**秋华柳**　　银叶柳(贵州)

**Salix variegata** Franch.

生于河滩沙石处或水旁。分布于西南及陕西、甘肃、湖北。

枝皮：祛风除湿，活血化瘀。

**皂柳**

**Salix wallichiana** Anderss.

生于海拔1 150—3 300米的坡地、林缘、岸边。分布于西南及河北、山西、陕西、河南、湖北、湖南。

根(皂柳根)：辛、酸，凉。祛风，解热，除湿。用于风湿关节痛，头风痛。

**威氏柳**　　紫柳(贵州、中国树木分类学)

**Salix wilsonii** Seem.

生于海拔1 000—1 300米的平原、低山区的水边、堤岸、山沟、河边。分布于江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、贵州。

根皮：祛风除湿，活血化瘀。

## 5. 桦木科　Betulaceae

### 桤属　Alnus Mill.

**桤木**　　牛屎树(陕西)，水青冈(贵州)

**Alnus cremastogyne** Burk.

生于海拔500—3 000米的山坡或岸边林中。分布于陕西南部、甘肃东南部、四川、贵州北部、云南。部分地区有栽培。

树皮、嫩枝、叶：涩，平。有小毒。平肝，清火，利气。用于鼻衄，崩漏，风火赤眼。

**川滇桤木**

**Alnus ferdinandi-coburgii** Schneid.

生于海拔1 500—3 000米的山坡、岸边林中或潮湿地。分布于四川西南部、贵州西部、云南。

树皮、叶：解毒，清热，利湿。

**日本桤木**　　水冬瓜、赤杨(通称)

**Alnus japonica** (Thunb.) Steud.——*Betula japonica* Thunb.

生于山坡林中、河边、路旁。分布于吉林、辽宁、河北、山东、河南。

树皮、嫩枝、叶：苦、涩，凉。清热降火。用于鼻衄不止，外伤出血。

**毛桤木**　　罗拐木(贵州)

**Alnus lanata** Duthie ex Bean

生于海拔1 600—2 300米的林中。分布于四川西部、贵州、云南。

树皮、嫩叶：涩，平。有小毒。解毒，清热，利湿。用于毒蛇咬伤，泄泻，麻风。

**东北桤木**　　水冬果、水冬瓜(东北)

**Alnus mandshurica** (Call.) Hand.-Mazz.——*A. fruticosa* Rupr. var. *mandshurica* Call. ex Schneid.

生于海拔100—1 700米的林缘、河岸或山坡林中。分布于东北及内蒙古。

树皮、果实：清热解毒，收敛。

**尼泊尔桤木**　　旱冬瓜(四川、贵州)

**Alnus nepalensis** D. Don

生于海拔700—3 600米的山坡林中、河岸阶地及村落中。分布于西南及广西。

树皮：苦、涩，平。止泻，消炎，接骨。用于泄泻，痢疾，鼻衄，骨折，跌打损伤。

**辽东桤木**　　色赤杨、水冬瓜树(东北)

**Alnus sibirica** Fisch.——*A. tinctoria* Sarg.

生于山溪及阔叶林或针阔叶混交林中。分布于东北及内蒙古，亦有栽培。

树皮：苦、涩。祛痰，镇咳，平喘。用于老年咳嗽痰喘。

**江南桤木**　　水冬瓜(安徽)，木瓜树(湖北)

**Alnus trabeculosa** Hand.-Mazz.

生于海拔200—1 000米的山谷或河谷林中、岸边或村落附近。分布于中南及江苏、安徽、浙江、江西、福建、贵州。

树皮、茎枝：利尿通淋。用于泄泻。叶：清热利湿，解毒止痒，止血。

## 桦木属　Betula L.

**红桦**　　红皮桦(河北、青海)

**Betula albo-sinensis** Burk.

生于海拔1 000—3 400米的山坡杂木林中及阴坡、半阴坡湿润地。分布于河北、陕西、甘肃、青海、河南、湖北、四川、云南。

树皮、芽：清热利湿，解毒。用于胃病。

**西桦**　　西南桦木(中国树木分类学)

**Betula alnoides** Buch.-Ham. ex D. Don

生于海拔700—2 100米的山坡杂木林中。分布于浙江、广东、海南、广西、贵州、云南。

叶：解毒，敛口。用于疖毒，已出脓久不收口。

附　注：**滇自桦 B. alnoides** Buch.-Ham. ex D. Don var. **pyrifolia** Franch.，分布于云南。树皮：甘、辛，温。除风化湿，温中散寒。用于感冒，胃肠炎，风湿痹痛。

**长穗桦**

**Betula cylindrostachya** Lindl.

生于海拔 1 725—2 800 米山谷杂木林中。分布于云南西北部、西藏。

树皮：温中散寒，祛风化湿。用于感冒，脘腹痛，风湿骨痛。

**华南桦**

**Betula austro-sinensis** Chun ex P. C. Li

生于海拔 1 000—1 800 米的山坡杂木林中。分布于湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

树皮、芽：解热。

**黑桦**　　棘皮桦(河北习见树木图说)

**Betula dahurica** Pall.

生于海拔 400—1 300 的米干燥、土层深厚的阳坡、山顶石岩上、潮湿阳坡、针叶林或杂木林下。分布于东北及华北。

芽：用于胃病。

**岳桦**

**Betula ermanii** Cham.

生于海拔 1 400—1 700 米的山坡林下。分布于东北及内蒙古东部。

树皮、芽：清热解毒，化痰，利湿。用于疮疡。

**香桦**

**Betula insignis** Franch.

生于海拔 1 400—1 800 米的山坡林中。分布于湖北、湖南、四川、贵州。

根：用于狂犬咬伤，泄泻。

**亮叶桦**　　桦树皮(四川)，狗啃木(贵州)，光皮桦(中国树木分类学)

**Betula luminifera** H. Winkl.

生于海拔 500—2 500 米的阳坡杂木林中。分布于陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根：甘、微辛，凉。清热利尿。用于小便淋痛，水肿。　皮：苦，微温。除湿，消食，解毒。用于食积停滞，乳痈红肿。　叶：甘、辛，凉。清热解毒，利尿。用于疖毒，水肿。

**小叶桦**

**Betula microphylla** Bunge

生于海拔 1 200—1 600 米的岸边或山沟间杂木林中。分布于阿尔泰山及新疆哈密。

树皮：清热解毒。用于泻痢，喘咳。

**垂枝桦**　　刻因托斯(维吾尔语)

**Betula pendula** Roth

生于海拔 500—2 000 米的河滩、山谷、山脚湿润地带向阳的石山坡。亦有栽培。分布于新疆北部至阿尔泰山区。

树皮(白桦皮)：苦，平。清热解毒，止咳。用于痢疾，咳嗽气喘，乳痈。

**白桦**　　粉桦(东北)，桦皮树(河北)

**Betula platyphylla** Suk. ——*B. platyphylla* Suk. var. *mandshurica* (Regel)

Hara

生于海拔400—4 100米的山坡或林中。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、青海、河南、四川、西藏东南部。许多地区有栽培。

树皮(桦木皮)：苦，寒。清热利湿，祛痰止咳，解毒消肿。用于风热咳喘，痢疾，泄泻，黄疸，水肿，咳嗽，乳痈，疖肿，痒疹，烧、烫伤。　液汁(桦树液)：止咳。用于痰喘咳嗽。叶：利尿。

**圆叶桦**

**Betula rotundifolia** Spach

生于海拔2 300米处的高山地区，常成密丛。分布于阿尔泰山。

树皮：清热，利尿，利胆，止咳。

**天山桦**

**Betula tianschanica** Rupr.

生于海拔1 300—2 500米的河岸阶地、沟谷、阴山坡或砾石坡。分布于天山。亦有栽培。

树皮：功效同圆叶桦。

**糙皮桦**

**Betula utilis** D. Don

生于海拔1 700—3 100米的山坡林中。分布于河北、山西、陕西、甘肃、青海、河南、湖北、广西、四川西部、云南、西藏。

树皮：清热利湿，驱虫。

## 鹅耳枥属　Carpinus L.

**千金榆**　半拉子(东北、陕西)，金丝榆、穗子榆(河南)，千筋榆(湖北)

**Carpinus cordata** Bl.

生于海拔500—2 500米较湿润、肥沃的阴山坡或山谷杂木林中。分布于东北、华北及陕西、甘肃、河南、湖北。

果穗：甘、淡，平。健胃消食。用于消化不良。　根皮：淡，平。用于劳倦疲乏，跌打损伤，痈肿，淋证。

**华千金榆**　小果千斤榆(浙江)，大叶马料(江西草药手册)

**Carpinus cordata** Bl. var. **chinensis** Franch.

生于海拔500—2 500米的阴山坡或山谷杂木林中。分布于华东及陕西、湖北、湖南、四川、贵州。

根皮：淡，平。用于劳倦疲乏，跌打损伤，痈疮肿毒，淋证。　果穗：健胃消食。

**川黔千金榆**

**Carpinus fangiana** Hu

生于海拔700—2 100米的山坡林中。分布于广西西北部、四川、贵州、云南东南部。

根皮：清热解毒。

**川陕鹅耳枥**

**Carpinus fargesiana** H. Winkl.

生于海拔 1 000—2 000 米的山地林中。分布于陕西、安徽、湖北、四川东部和北部。

根、茎皮：解毒，祛瘀。

**云南鹅耳枥**

**Carpinus monbeigiana** Hand.-Mazz.

生于海拔 1 700—2 800 米的林中。分布于四川、云南西北部和中部。

根皮：用于跌打损伤。

**云贵鹅耳枥**　　毛鹅耳枥(中国树木分类学)

**Carpinus pubescens** Burk.

生于海拔 800—1 200 米的石灰岩山林中。分布于陕西太白山、四川南川、贵州、云南东南部。

树皮：用于痢疾。

**鹅耳枥**　　穗子榆(河南)

**Carpinus turczaninowii** Hance

生于海拔 500—2 000 米的山坡或山谷林中。分布于辽宁南部、河北、山西、陕西、甘肃、山东、河南。

树皮、叶：用于跌打损伤。

## 榛属　Corylus L.

**华榛**　　山白果(湖北)

**Corylus chinensis** Franch.

生于海拔 2 000—2 500 米湿润的山坡林中。分布于陕西、河南、湖北、湖南、四川西南部、云南。

种仁：调中，开胃，明目。

附　注：国家三级保护植物。

**藏刺榛**

**Corylus ferox** Wall. var. **thibetica** (Batal.) Franch.——*C. thibetica* Batal

生于海拔 1 500—3 000 米的山坡林中。分布于陕西、甘肃、湖北西部、四川东部和北部、贵州。

果实：滋补强壮。　种仁：用于痢疾，咳喘。

**毛榛**　　毛榛子、火榛子(东北)

**Corylus mandshurica** Maxim.

生于海拔 400—1 500 米的山坡灌丛中或林下。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、山东、四川东部和北部。

雄花穗：收敛，消肿。果仁：益气，开胃，明目。

**榛**　　榛子(通称)，榛柴棵子(东北)，平榛(河北)

**Corylus heterophylla** Fisch. ex Bess.

生于海拔 200—1 000 米的山地阴坡灌丛中。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、

山东、安徽、湖北、贵州。

种仁(榛子)：甘，平。调中，开胃，明目。用于食欲不振，视物昏花。雄花穗：消肿，止痛。

**川榛**　　木里仙(浙江)，山板栗(四川)

**Corylus heterophylla** Fisch. ex Bess. var. **szechuenensis** Franch.

生于海拔700—2 500米的山地林间。分布于陕西、甘肃中部和东南部、宁夏、山东、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北、四川、贵州。

种仁：功效同榛。

**滇榛**

**Corylus yunnanensis** A. Camus

生于海拔2 000—2 700米的山坡灌丛中。分布于湖北、四川西部和西南部、贵州西部、云南中部、西部和西北部。

果实：健脾开胃，润肺。

### 虎榛属　Ostryopsis Decne.

**虎榛子**　　棱榆(河南)

**Ostryopsis davidiana** Decne.

生于海拔800—2 400米的山坡或林中。分布于华北及辽宁、陕西、甘肃、青海、四川。

果实：清热利湿。

附　注：我国特有属。

**滇虎榛**　　叶上花(云南)，大叶虎榛子(中国树木分类学)

**Ostryopsis nobilis** Balf. f. et Smith

生于海拔1 500—3 000米的杂木林中。分布于四川西南部、云南西北部。

茎皮：接骨，止血。

## 6. 壳斗科　Fagaceae

### 栗属　Castanea Mill.

**板栗**　　毛栗子(江苏、湖北)，大栗(浙江)，栗果(滇南本草)

**Castanea mollissima** Bl.

生于海拔500—2 500米的山坡或山沟中。分布于辽宁、河北、山西、陕西、甘肃、山东、江苏、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖北、湖南、广东、四川、贵州、云南。多为栽培。

种仁(栗子)：甘，温。养胃健脾，补肾强筋，活血止血。用于反胃，泄泻，腰腿软弱，吐血，衄血，便血。　根(栗树根)：甘、淡，平。用于疝气。　树白皮：用于丹毒，口疮，漆疮。　叶(栗叶)：用于喉疮火毒，顿咳。花(栗花)：微苦、涩，微温。用于泻痢，便血，瘰疬。　总苞(栗毛球)：用于丹毒，瘰疬，顿咳。　外果皮(栗壳)：甘、涩，平。用于反胃，鼻衄，便血。内果皮(栗茧)：甘、涩，平。用于瘰疬，骨鲠，皮肤干燥。

**锥栗**　珍珠栗(贵州)

**Castanea henryi** (Skan) Rehd. et Wils.——*Castanopsis henryi* Skan

生于海拔600—2 000米的山林中。分布于陕西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

叶、壳斗：苦、涩，平。用于湿热，泄泻。　种子：甘，平。用于肾虚，痿弱，消瘦。

**茅栗**　毛栗(通称)，尖栗(湖南)，野栗子(四川)，金栗(江西草药手册)

**Castanea seguinii** Dode

生于海拔700—1 700米的山地。分布于河北、山西、陕西、江苏、上海、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

种仁(茅栗仁)：用于失眠。根、树皮或总苞：外用于丹毒，疮毒。花序：用于口疮。果实：消食化气。

## 锥属　Castanopsis Spach

**瓦山栲**

**Castanopsis ceratacantha** Rehd. et Wils.

生于海拔700—1 500米的密林中。分布于西南及湖北、广西。

叶、种子：健脾补肾，祛湿热。用于气血不通，炎症。

**锥**　锥栗(广西药用植物名录)，栲栗(常用中草药彩色图谱)

**Castanopsis chinensis** Hance

生于海拔200—1 500米的山坡及山谷林中。分布于湖南、广东、广西，贵州西南部、云南东南部。

叶、壳斗：苦、涩，平。健胃补肾，除湿热。用于湿热，腹泻。种子：甘，平。健脾补肾。用于肾虚，痿弱，消瘦。

**高山锥**　丝栗(贵州)，高山栲树(拉汉英种子植物名称)

**Castanopsis delavayi** Franch.

生于海拔500—2 800米的山坡林中。分布于广西西南部、四川、贵州、云南。

根、茎皮：辛、涩、微苦，平。收敛，止泻，解毒。用于泄泻。　果实：用于心悸，耳鸣，腰痛。

**甜槠**

**Castanopsis eyrei** (Champ. ex Benth.) Tytch.——*Quercus eyrei* Champ.

生于海拔200—1 300米的混交林内。分布于安徽、浙江、湖北、湖南、广东、四川、贵州。

根皮：止泻。　种仁：健胃燥湿。

**栲**　丝栗树(四川)，栲树(云南植物志)

**Castanopsis fargesii** Franch.

生于海拔500—1 800米的山坡林中。分布于安徽、福建、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

总苞：清热，消肿止痛。

**黄楣栲**　印度栲、印度锥栗(云南),印度锥(树木学)

**Castanopsis indica** (Roxb.) A. DC.——*Castanea indica* Roxb.; *Quercus indica* Drake

生于海拔 600—1 100(—1 400) 米的沟谷疏林中。分布于福建、台湾、广东、广西、云南南部、西藏东南部。

果实：用于痢疾。

**元江锥**　毛果栲(云南植物志)

**Castanopsis orthacantha** Franch.

生于海拔 1 800—2 200 米的山坡林中。分布于四川西南部、贵州西部、云南。

果实：养胃健脾，补肾强筋。

**扁刺锥**　峨眉栲(四川)，扁刺栲(云南植物志)

**Castanopsis platycantha** Rehd. et Wils.

生于海拔 1 000—2 400 米的山坡阔叶混交林中。分布于广东、广西、四川、贵州中部以西、云南东南部。

叶、种子：健胃，补肾，除湿热。

**苦槠**　血槠(本草纲目)，槠子(本草拾遗)

**Castanopsis sclerophylla** (Lindl.) Schott.——*Quercus sclerophylla* Lindl.

生于海拔 100—1 000 米的向阳干旱处。分布于江苏、上海、安徽、福建、河南、湖北、湖南、广东、广西。

种仁(槠子)：苦、涩。止泻痢，除恶血，止渴。树皮及叶(槠子皮叶)：止血。

**钩锥**　大叶锥栗、猴栗(贵州)，青叶槠(江西草药手册)，钩栗(浙江天目山药用植物志)

**Castanopsis tibetana** Hance

生于海拔 400—900 米的湿润山地林中。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、四川、贵州、云南。

果实(钩栗)：用于痢疾。

## 青冈属　Cyclobalanopsis Oerst.

**黄青冈**　黄栎、黄椆、黄毛青冈(云南植物志)，黄栗树(云南中草药)

**Cyclobalanopsis delavayi** (Franch.) Schott.——*Quercus delavayi* Franch.

生于海拔 1 200—2 500 米的山地林中。分布于广西、四川、贵州、云南。

树皮(黄栎)：微苦、涩，微温。平喘。用于哮喘。

**毛叶青冈**　埋哥当牧(傣语)，平脉椆(云南植物志)

**Cyclobalanopsis kerrii** (Craib) Hu ——*Quercus kerii* Craib

生于海拔 250—300 米的丘陵地带疏林中。分布于广东、海南、广西、云南。

树皮、壳斗(埋博树)：苦、涩，温。涩肠止泻，解毒，截疟。用于疟疾。

**小叶青冈**　青椆(云南植物志)

**Cyclobalanopsis myrsinaefolia** (Bl.) Oerst.——*Quercus myrsinaefolia* Bl.

生于海拔 1 000 米以上的山地。分布于西南及陕西、江苏、安徽、福建、台湾、河南、广东、广西。

种仁：苦、涩，平、凉。止泻痢，除恶血，止渴。皮、叶：止血。

**滇青冈**　　滇椆(云南植物志)

**Cyclobalanopsis glaucoides** Schott.——*Quercus schottkyana* Rehd. et Wils.

生于海拔 1 500—2 600 米的中山陡坡或石灰岩地区及山地林中。分布于四川西南部、贵州西南部、云南。

果仁：消乳肿。

## 水青冈属　Fagus A. L. Juss.

**米心水青冈**　　凤梨子(湖北)，米心树(中国经济植物志)

**Fagus engleriana** Seem.

生于海拔 1 200—2 500 米的山坡、沟边。分布于陕西南部、安徽黄山、河南、湖北、四川、贵州、云南东北部。

根、茎皮：收敛止泻，解毒消炎。

**水青冈**　　长柄山毛榉(四川)

**Fagus longipetiolata** Seem.

生于海拔 1 000—2 500 米阴湿的山坡。分布于陕西南部、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南东部。

壳斗：健胃，消食，理气。

## 柯属　Lithocarpus Bl.

**金毛柯**

**Lithocarpus chrysocomus** Chun et Tsiang

生于海拔 900—1 200 米的山地林缘湿润的厚土层中。分布于湖南南部、广东北部、广西东北部、贵州。

根皮：用于泻痢，烧、烫伤。

**白皮柯**　　甜茶(四川)，野槟榔(昆明民间常用草药)，滇石栎(云南植物志)

**Lithocarpus dealbatus** (Hook. f. et Thoms.) Rehd.——*Quercus dealbatus* Hook. f. et Thoms.

生于海拔 1 300—3 500 米的山坡温暖湿润的密林中。分布于四川西南部、贵州西南部、云南东南部。

花序(野槟榔)：微苦、涩，温。顺气消食，健胃，杀虫。用于食积腹胀，虫积不化。

**厚斗柯**　　贵州石栎(中国树木分类学)

**Lithocarpus elizabethae** (Tutch.) Rehd.——*Quercus elizabethae* Tutch

生于海拔 900—1 100 米的潮湿山谷、山坡密林或疏林中。分布于广东、广西、贵州南部、云南东南部。

树皮：用于泻痢及烧、烫伤。

**柯**　石头树(湖北)、木奴树(临海异物志)，榧(拉汉英种子植物名称)

**Lithocarpus glaber** (Thunb.) Nakai——*Quercus glaber* Thunb.

生于海拔800米以下的山坡林下。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

树皮韧皮部(柯树皮)：辛，平。有小毒。用于大腹水病。

**绵柯**　菠萝树(湖北)，青皮刚、大青冈(四川)，绵槠(中国树木分类学)

**Lithocarpus henryi** (Seem.) Rehd. et Wils.

生于海拔1 000米处的山地林中。分布于湖北西部、湖南西北部、四川东部、贵州东北部。

果实：祛风除湿。

**圆锥柯**　圆锥榧(拉汉英种子植物名称)

**Lithocarpus paniculatus** Hand. -Mazz.

生于海拔1 000米以下的山坡林中。分布于湖北西南部、湖南、广东北部、四川南部。

总苞：清热，消肿，止泻。

**多穗柯**　甜茶(浙江)，多穗石栎(云南植物志)

**Lithocarpus polystachyus** (Wall.) Rehd.——*Quercus polystachyus* Wall.

生于海拔400—1 400米的山地林中、山谷沟边。分布于浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

叶(多穗石柯叶)：甘、苦，平。清热利湿。用于高血压症，湿热下痢，皮肤瘙痒，痈疽恶疮。　根：甘、涩，平。补肾益阴。用于虚损病。　果实：滋阴补肾，清热止泻。

**箭杆柯**　雅州石栎(中国树木分类学)

**Lithocarpus viridis** Rehd. et Wils.

生于海拔1 000—1 800米的山地林中。分布于四川、云南。

叶、花：祛风除湿，顺气消食。

## 栎属　Quercus L.

**麻栎**　青杠转(四川)，橡栎(图经本草)，柞斗(唐本草)

**Quercus acutissima** Carr.

生于海拔900—2 200米的山地、丘陵地带。分布于中南及吉林、辽宁、河北、陕西、甘肃、山东、江苏、上海、安徽、浙江、四川、贵州、云南。

果实(橡实)：苦、涩，微温。涩肠固脱。用于泻痢脱肛，痔血。　根皮或树皮(橡木皮)：苦，平。用于泻痢，瘰疬，恶疮。壳斗(橡实壳)：涩，温。收敛，止血。用于泻痢脱肛，肠风下血，崩中带下。

**槲栎**　橡碗树(湖北)，大叶枥柴(贵州)

**Quercus aliena** Bl.

生于海拔800—1 500米的向阳山地上。分布于华中、西南及辽宁、河北、山西、陕西、甘肃。

根、树皮、壳斗：收敛，止痢。用于痢疾。叶：用于恶疮。

**櫟子栎**　　青冈子(湖北)

**Quercus baronii** Skan

生于海拔1 200米处的山坡。分布于山西、陕西、甘肃、河南以南及湖北、湖南、四川。

根皮：用于牙痛，黄疸。叶：用于肿毒，难产。

**小叶栎**

**Quercus chenii** Nakai

生于海拔500米以下的丘陵地带。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、四川。

枝、壳斗：收敛，止泻。

**小枝青冈**

**Quercus ciliaris** Huang et Y. T. Chang

生于海拔500—2 500米的山坡灌丛中。分布于安徽、浙江、江西、湖北、湖南、四川。

根或树皮：用于腰痛。

**柞栎**　　波罗栎、金鸡树、大叶栎(本草纲目)

**Quercus dentata** Thunb.

生于海拔300—1 500米向阳、干旱的山坡。分布于东北、华北、华东、西南及陕西、甘肃、河南、湖北、湖南。

种子(槲实仁)：苦、涩，平。涩肠止痢。用于小儿佝偻病。树皮(槲皮)：苦。用于恶疮，瘰疬，痢疾，肠风下血。叶(槲叶)：甘、苦，平。用于吐血，衄血，血痢，血痔，淋证。

**白栎**　　白栗(湖南)，青杠(四川)，白反栎(贵州)，小白栎(云南)

**Quercus fabri** Hance

生于海拔1 600米以下的山地或低海拔丘陵地带。分布于长江中下游及湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

带虫瘿总苞(白栎斛)：健胃消积，理气，清火，明目。用于疝气，疳积，目赤肿痛。

**川滇山栎**　　锥连栎(云南植物志)

**Quercus franchetii** Skan

生于海拔1 200—2 600米的山地或松林中。分布于四川西南部、云南。

茎内皮(椎连栎)：微苦、涩，微温。止咳，定喘。用于感冒。

**川西栎**

**Quercus gilliana** Rehd. et Wils.

生于海拔2 400—3 100米的山坡林中。分布于陕西南部、甘肃南部、四川西部、贵州、云南西北部。

全株：用于痢疾。

**槲栎**　　橡子树(四川)

**Quercus glandulifera** Bl.

生于海拔1 000米左右的山地。分布于辽宁、陕西、山东、河南、湖北神农架、四川、贵州。

果实：养胃健脾。

**短柄枹栎**　　柴树、青冈柳(湖北)

**Quercus glandulifera** Bl. var. **brevipetiolata** Nakai

生于海拔600—1 500米的山坡林中。分布于陕西、甘肃、山东、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北、湖南、四川、贵州。

果实：功效同枹栎。

**大叶栎**

**Quercus griffithii** Hook. f. et Thoms.

生于海拔1 300—2 800米的山地林中。分布于贵州西南部、云南。

树皮、叶、果实：收敛，消肿。

**辽东栎**　　青杠(东北)，杠木(宁夏中草药手册)

**Quercus liaotungensis** Koiz.

生于海拔600—2 000米山坡林中。分布于东北、西北及黄河流域各地。

果实：苦，微温。健脾止泻，收敛止血。用于脾虚泄泻，痔疮出血，脱肛。　根皮和树皮(辽东栎皮)：苦，平。收敛，止泻。用于久痢，泄泻，恶疮，痈肿。　总苞(辽东栎壳斗)：收敛，止血，止泻。用于便血，崩漏，带下病，泻痢，疮肿。

**蒙古栎**　　柞树(东北)，青栎(贵州)，柞树皮(吉林中草药)，岛输尔巴姆那木(朝鲜语)

**Quercus mongolica** Fisch.

生于海拔200—2 000米的向阳山坡。分布于东北、华北、西北及山东。

树皮(柞树皮)、根皮：苦、涩，平。利湿，清热，解毒。用于咳嗽，泄泻，痢疾，黄疸，痔疮。　叶(柞树叶)：用于痢疾，小儿消化不良，痈肿，痔疮。　果实：苦、涩，微温。健脾止泻，收敛止血，涩肠固脱，解毒消肿。用于脾虚泄泻，痔疮出血，脱肛，乳痈。

**欧洲白栎**　　夏橡(新疆)

**Quercus robur** L.

原产欧洲。新疆北部有栽培。

果实：收敛，涩肠，止痢，平喘。

**高山栎**

**Quercus semicarpifolia** Smith

生于海拔2 300—3 200米的山地混交林中。分布于四川西部、贵州、西藏东南部。

叶的煎膏(青杠膏)：苦、涩，平。清热解毒。用于寒热夹杂，泻痢，哮喘。种子亦入药，功效同叶。

**刺叶栎**　　铁匠树、铁橡树(湖北)，刺叶高山栎(拉汉英种子植物名称)

**Quercus spinosa** David

生于海拔1 000—2 500米的山坡林中。分布于陕西、甘肃、湖北、四川、云南。

叶：用于肝炎。

**黄山槲栎**　　黄山栎(拉汉英种子植物名称)

**Quercus stewardii** Rehd.

生于海拔1 200—1 800米的山地和丘陵林中。分布于安徽、浙江、江西、湖北、贵州。

根皮、树皮：收敛，止泻。果实：健脾止泻，收敛止血。

**栓皮栎**　　花栎木(陕西),青杠碗(湖北、四川、贵州草药),软木栎(云南植物志)

**Quercus variabilis** Bl.——*Q. chinensis* Bunge

生于海拔600—1 500米的向阳山坡。分布于辽宁、河北、北京、山西、陕西、甘肃、山东、江苏、浙江、安徽、河南、湖北、广西、四川、贵州、云南。

壳斗或果实：苦、涩,平。健胃,收敛,止血痢,止咳,涩肠。用于痔疮,恶疮,痈肿,咳嗽,水泻,头癣。

## 7. 马尾树科　Rhoipteleaceae

### 马尾树属　Rhoiptelea Diels et Hand.-Mazz.

**马尾树**　　漆榆(贵州)

**Rhoiptelea chiliantha** Diels et Hand.-Hazz.

生于海拔900—1 100米的杂木林中。分布于广西南部、贵州南部、云南东南部。

树皮：收敛止血。用于泄泻。

## 8. 榆科　Ulmaceae

### 糙叶树属　Aphananthe Planch.

**糙叶树**　　粗叶树(贵州)

**Aphananthe aspera** (Bl.) Planch.——*Homoceltis asper* Bl.

生于海拔900米以下的山坡、村旁及河边。分布于华东及山西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根皮、树皮：舒筋活络,止痛。用于腰部损伤酸痛。

### 朴属　Celtis L.

**紫弹树**　　黄果朴,牛筋树(浙江、江西),粗壳榔(湖北),沙糖果(贵州)

**Celtis biondii** Pamp.

生于海拔1 000米以下的山坡疏林中。分布于中南及陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、四川、贵州、云南。

根皮、茎枝、叶：甘,寒。清热解毒,祛痰,利小便。用于小儿脑积水,腰骨酸痛,乳痈;外用于疮毒,溃烂。

**黑弹朴**　　黑弹树(浙江、江西、广西),棒棒树(湖南、贵州)

**Celtis bungeana** Bl.

生于海拔1 500米以下的山坡或平原。分布于华北、华东、西南及辽宁、陕西、甘肃、宁夏、河南、湖北、湖南、广西。

树干、树皮或枝条(棒棒木)：辛、微苦,凉。祛痰,止咳,平喘。用于咳嗽痰喘。

**珊瑚朴**　沙棠子(贵州)

**Celtis julianae** Schneid.

生于山坡、路旁。分布于中南及陕西、江苏南部、安徽、上海、浙江、江西、福建、四川、贵州、云南。

茎、叶：由于咳喘。

**大叶朴**　山灰枣、石榆子(山东)，大叶白麻(河南)

**Celtis koraiensis** Nakai

生于海拔1 500米以下山地阔叶林中。分布于辽宁、河北、山西、陕西、甘肃、山东、江苏北部、安徽、河南。

根、茎、叶：止咳，平喘。用于咳喘，疮痈。

**滇朴**　四蕊朴(云南)

**Celtis tetrandra** Roxb.

生于海拔700—2 700米的山地沟谷、林缘及灌丛中。分布于广西、四川、云南、西藏。

根皮：用于腰痛，漆疮。

**朴树**　崖枣树(宁夏)，沙朴(浙江、广西)

**Celtis tetrandra** Roxb. subsp. **sinensis** (Pers.) Y. C. Tang——*C. sinensis* Pers.; *C. labilis* Schneid.

生于海拔500—1 000米的山坡、山沟、平原。分布于华东、中南及山西、陕西、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

树皮(朴树皮)：调经。用于月经不调，瘾疹，肺痈。叶(朴树叶)：用于漆疮。

## 刺榆属　Hemiptelea Planch.

**刺榆**　刺榔(浙江)，柘榆、梗榆(尔雅)

**Hemiptelea davidii** (Hance) Planch.——*Planera davidii* Hance

生于海拔1 200米以下的山麓石砾沟谷地带。分布于东北、华北及陕西、甘肃、山东、江苏、安徽、浙江、江西、湖北。

根皮、树皮：淡、涩，平。解毒消肿。用于疮痈肿毒。叶：用于痈肿，水肿；外用于毒蛇咬伤，痈疮肿毒。

## 青檀属　Pteroceltis Maxim.

**青檀**　檀树(湖南)，翼朴(广西、贵州)

**Pteroceltis tatarinowii** Maxim.

生于石灰岩山地、花岗岩山地及河滩溪旁。分布于华北、中南及陕西、甘肃、江苏南部、四川、贵州、西藏。

茎、叶：祛风，止血，止痛。

附　注：①我国特有属。②国家三级保护植物。

## 山黄麻属　Trema Lour.

**狭叶山黄麻**　　麻脚树(中国经济植物志)

**Trema angustifolia** (Planch.) Bl.—— *Sponia angustifolia* Planch.

生于山地、丘陵。分布于广东、广西、云南。

根、叶：清凉止血，止痛。皮：舒筋活络，止痛。

**光叶山黄麻**　　尖尾斧头树(广东)，山海麻(广西)

**Trema cannabina** Lour.——*T. virgata* Bl.

生于低山草地或山坡林中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

根皮：甘、微酸，平。健脾利水，化瘀生新。用于泄泻，骨折。

**山油麻**　　榔木(浙江)，山水麻(湖北)，山脚麻(中国高等植物图鉴)

**Trema cannabina** Lour. var. **dielsiana** (Hand.-Mazz.) C. J. Chen——*T. dielsiana* Hand.-Mazz.

生于海拔800米以下向阳山坡或灌丛中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

根、嫩叶：清热解毒，止痛，止血。用于疮毒，风湿麻木，风湿关节痛，外伤出血。

**羽叶山黄麻**　　麻榔树(四川)，麻柳树(中国经济植物志)

**Trema laevigata** Hand.-Mazz.

生于山坡。分布于湖北西部、四川、贵州西南部、云南。

皮、叶：清热泻火。用于风湿关节痛。

**山黄麻**　　麻桐树(贵州)，九层麻(云南)

**Trema orientalis** (L.) Bl.——*Celtis orientalis* L.

生于阴湿沟谷、林中或空旷山坡。分布于西南及福建、台湾、湖南、广东、广西。

根、叶：涩，平。散瘀，消肿，止血。用于跌打损伤，外伤出血。

## 榆属　Ulmus L.

**毛枝榆**　　红榔木(文山中草药)

**Ulmus androssowii** Litw. var. **virgata** (Planch.) Grudz.——*U. virgita* Wall. ex Planch.; *U. pumila* L. var. *pilosa* Rehd.

生于海拔1 200—1 800米的山坡及山谷阔叶林中。分布于四川、云南、西藏。

树皮：苦、涩，平。接骨，消肿，止血。用于外伤出血，跌打损伤。

**兴山榆**

**Ulmus bergmanniana** Schneid.

生于海拔500—1 300米的山坡林中。分布于陕西、甘肃、江西、湖北、湖南、四川、云南。

树皮：用于胃病。　叶：用于水肿。

**西蜀榆**　一点红、叶上珠(湖北)

**Ulmus bergmanniana** Schneid. var. **lasiophylla** Schneid.——*U. lasiophylla* (Schneid.) Cheng

生于海拔 1 300 米以下的山坡林中。分布于湖北、四川、云南，西藏。

叶上虫瘿：用于毒蛇咬伤。

**多脉榆**　栗叶榆(江苏植物志)

**Ulmus castaneifolia** Hemsl.——*U. multinervis* Cheng

生于海拔 900—1 450 米的山坡灌丛中及山谷路旁。分布于江苏、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

树皮：清热解毒，利尿消肿，祛痰。

**杭州榆**

**Ulmus changii** Cheng

生于海拔 600 米以下的山麓、路旁或沟边。分布于江苏南部、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广西、四川、贵州。

果实：祛痰，利尿，杀虫。

**圆冠榆**

**Ulmus densa** Litw.

原产前苏联。新疆南部有栽培。

果实：用于体虚，带下病。

**黑榆**

**Ulmus davidiana** Planch.

生于石灰岩山地或谷地。分布于辽宁、河北、山西、陕西、河南。

枝、叶：利水消肿，清热，驱虫。

**春榆**

**Ulmus davidiana** Planch. var. **japonica** (Rehd.) Nakai ——*U. japonica* Sarg. f. *suberosa* Kitag.; *U. propinqua* Koidz.

生于海拔 230—2 000 米的山坡或山谷灌丛及混交林中。分布于东北及河北、山西、陕西、甘肃、宁夏、青海、山东、浙江、湖北、河南。

根、树皮：用于骨瘤。

附　注：　功效相同的有**旱榆 U. glaucescens** Franch.，分布于华北及陕西、甘肃、宁夏、山东、河南；**毛果旱榆 U. glaucescens** Franch. var. **lasiocarpa** Rehd.，分布于河北、陕西、宁夏、青海。

**裂叶榆**　青榆、大叶榆(东北)

**Ulmus laciniata** (Trautv.) Mayr.——*U. montana* var. *laciniata* Trautv.

生于湿润山谷、平地或林中。分布于东北及河北、山西、陕西、河南。

果实：民间用于杀虫。

**欧洲白榆**

**Ulmus laevis** Pall.

原产欧洲。东北、华北、西北及山东有栽培。

枝、叶：用于烧伤感染，骨折，音哑。

**大果榆**　山榆(东北、江苏)，毛榆(河南)，黄榆(中国经济植物志)

**Ulmus macrocarpa** Hance

生于海拔500—1 300米的山坡或山沟灌丛中。分布于东北、华北、西北及江苏北部、安徽、河南、湖北、四川。

果实(芜荑)：苦、辛，温。杀虫，消积。用于虫积腹痛，小儿疳泻，冷痢，疥癣，恶疮。

**榔榆**　小叶榆(通称)，豹皮榆(江西)，排钱树(湖北)，牛筋树(湖南)

**Ulmus parvifolia** Jacq.

生于海拔1 100米以下的低山区河畔。分布于华东、中南及辽宁、河北、北京、天津、陕西，四川、贵州、云南。

树皮或根皮(榔榆皮)：甘，寒。利水，通淋，消痈。用于小儿解颅。茎叶(榔榆茎叶)：苦，平。用于疮肿，腰背酸痛，牙痛。

**榆**　家榆、白榆(通称)、榆钱树(救荒本草)

**Ulmus pumila** L.

生于山坡、路旁。分布于东北、华北、西北。长江流域以南多系栽培。

树皮或根皮韧皮部(榆白皮)：甘，平。利水，通淋，消肿。用于小便不通，淋浊，水肿，痈疽发背，丹毒，疥癣。叶(榆叶)：利小便，用于石淋。花(榆花)：用于小儿癫痫，小便不利。果实或种子(榆荚仁)：甘、酸，寒。清湿热，杀虫。用于带下病，小儿疳热羸瘦。

**越南榆**　大树皮(云南中草药选)

**Ulmus tonkinensis** Gagnep.

生于海拔300—1 300米的山坡、山谷及石灰岩山地阔叶林中。分布于海南、广西、云南。

树干内皮：涩，平。收敛，止血。用于胃肠出血，尿血，各种外伤出血。

## 榉属　Zelkova Spach

**榉树**　大叶榉(通称)，硬壳榔(湖北)

**Zelkova schneideriana** Hand.-Mazz.

生于海拔较低的山坡。分布于中南及甘肃、江苏、上海、安徽、浙江、江西、贵州。

树皮(榉树皮)：苦，大寒。清热，利水。用于时行头痛，热毒下痢，水肿。叶(榉树叶：苦，寒。用于火烂疮，疔疮。

**大果榉**　小叶榉(通称)，叶下珠(陕西)

**Zelkova sinica** Schneid.

生于山坡疏林中。分布于山西、陕西、甘肃、江苏、浙江、河南、四川、贵州。

树皮：涩，平。生肌止血。用于烧、烫伤。

## 9. 杜仲科 Eucommiaceae

### 杜仲属 Eucommia Oliv.

**杜仲** 丝棉木(湖南),玉丝皮(四川),银丝杜仲、树杜仲(云南)

**Eucommia ulmoides** Oliv.

生于较温暖地区。分布于长江中游各省,现各地多有栽培。

树皮(杜仲): 甘、微辛,温。补肝肾,强筋骨,安胎,降压。用于高血压症,腰膝酸痛,肾虚尿频,胎动不安。叶: 功效同树皮。

附 注:《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 10. 桑科 Moraceae

### 见血封喉属 Antiaris Leschen.

**见血封喉** 箭毒木、加毒(广东、广西)

**Antiaris toxicaria** (Pers.) Leschen.——*Ambora toxicaria* Pers.

生于海拔 1 000 米以下的山地常绿阔叶林中。分布于华南及云南南部。

皮、汁: 有剧毒。强心,麻醉,催吐。

附 注: 国家三级保护植物。

### 桂木属 Artocarpus Forst.

**菠萝蜜** 木菠萝(种子植物名称),树婆罗(广州植物志),天婆罗(中国树木分类学),牛肚子果(中国高等植物图鉴)

**Artocarpus heterophyllus** Lam.

产于热带地区。台湾、广东、广西、云南东南部有栽培。

果实(菠萝蜜): 甘、微酸,平。生津,止渴,助消化。 叶(菠萝蜜叶): 用于溃疡病。树脂(菠萝蜜树液): 淡、涩。散结消肿,止痛。用于疮疖肿痛,瘰疬,湿疹。 种仁(菠萝蜜核中仁): 甘、微酸,平。益气,通乳。用于产后乳少和乳汁不通,脾胃虚弱。

**白桂木** 胭脂木(江西),将军木(广东)

**Artocarpus hypargyraea** Hance

生于山坡常绿阔叶林中。分布于江西、福建、湖南、广东、广西、云南。

根: 祛风除湿,活血消肿。 果实: 酸,平。生津止渴,止血,开胃化痰。用于热渴,咳血,吐血,衄血,咽喉痛,食欲不振。

附 注: 国家三级保护植物。

**桂木** 狗果(岭南采药录)

**Artocarpus lingnanensis** Merr.

产于热带地区。广东、广西有栽培。

果实(桂木干)：酸，平。生津止血，敛气，开胃化痰。

**红枫荷**　二色菠萝蜜(广西)

**Artocarpus styracifolius** Pierre

生于常绿阔叶林中。分布于广东、广西。

根：甘，温。祛风除湿，舒筋活血。用于风湿关节痛，腰肌劳损，半身不遂，跌打损伤，扭挫伤。

## 构属　Broussonetia L'Hérit.

**藤构**　藤葡蟠、尖叶楮皮(浙江)，构桑(湖北)、谷皮藤(全国中草药汇编)

**Broussonetia kaempferi** Sieb. et Zucc.

生于海拔250—1 550米的山坡、溪谷、山脚下疏林内或林缘。分布于中南及陕西、安徽、浙江、江西、福建、台湾、四川、贵州。

全株：清热，止咳，利尿。用于砂淋、石淋，肺热咳嗽。

**小构树**　野构树、野构桃(陕西)、构皮麻(贵州民间方药集)

**Broussonetia kazinoki** Sieb. et Zucc.

生于海拔600—1 700米的山坡灌丛或次生杂木林中。分布于陕西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根皮、嫩枝叶、树汁(谷皮树)：甘、淡，平。根皮：祛风，活血，利尿。用于风湿痹痛，跌打损伤，虚肿。　嫩枝叶、树汁：解毒，杀虫。外用于神经性皮炎，顽癣。

**构树**　楮桃(江苏)，谷皮树(湖南)，沙皮树(广西)，大骨皮(贵州)

**Broussonetia papyrifera** (L.) Vent.——*Morus papyrifera* L.

生于海拔1 400米以下的山坡、路旁、沟边或林中。分布于华北、西北、华东、中南、西南及辽宁。

果实(楮实子)：甘，寒。补肾，清肝明目，利尿。用于腰膝酸软，虚劳骨蒸，头晕目昏，目生翳膜，水肿胀满。　根：微涩，平。清热利湿，活血祛瘀。用于咳嗽吐血，水肿，血崩，跌打损伤。　白皮(楮树白皮)：甘，平。行水，止血。用于气短咳嗽，肠风血痢。　叶：甘，凉。凉血，利水。用于衄血，外伤出血，水肿，痢疾。　皮间白汁：用于水肿，癣疾。树枝：用于风疹，目赤肿痛，小便不利。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

## 大麻属　Cannabis L.

**大麻**　线麻(东北)，野麻(江苏)，黄麻(本草纲目)

**Cannabis sativa** L

原产亚洲西部。全国各地均有栽培，或逸为野生。主产东北及江苏、浙江、四川、云南。

成熟果实(火麻仁)：甘，平。润燥滑肠，通便。用于血虚，津亏肠燥便秘。　根：用

于崩中带下。　叶：驱蛔虫。花：通经。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 柘属　Cudrania Tréc.

**构棘**　千层皮(浙江)，黄龙脱壳(江西)，蓑芝(中国高等植物图鉴、中国种子植物科属词典)，黄蛇(广东中药)

**Cudrania cochinchinensis** (Lour.) Kudo et Masam. ——*Vanieria cochinchinensis* Lour.; *Maclura cochinchinensis* (Lour.) Corner

生于海拔 500 米左右的山坡路旁。分布于浙江、安徽、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根(穿破石)：微苦，凉。祛风利湿，活血通经。由于风湿关节痛，劳伤咳血，跌打损伤。　棘刺：苦，温。用于血癜，痰痞。果实：微甘，温。用于疝气。

**柘麻**

**Cudrania fruticosa** Wight

生于低山沟谷或林缘灌丛中。分布于云南。

根：清热活血，舒筋活络。

**柘树**　柘骨针(江苏)，鸡头桑(浙江)，黄桑(广西)，山荔枝(四川)

**Cudrania tricuapidata** (Carr.) Bur. ——*Maclura tricuspidata* Carr.

生于海拔 1 000 米以下的山坡灌丛、路旁、沟边、宅旁。分布于长江流域以南及北京、陕西、甘肃、河北南部。

根(穿破石)、棘刺功效同构棘。　木材：甘，温。用于崩中，疟疾。　根或树干内皮(柘木白皮)：苦，平。补肾固精，凉血，舒筋。用于腰痛，遗精，咯血，跌打损伤。　茎叶：微甘，凉。用于疮疖，湿疹。　果实：苦，平。清热凉血，舒筋活络。用于跌打损伤。

## 水蛇麻属　Fatoua Gaud.

**水蛇麻**　地桑(湖北)，桑草(贵州)

**Fatoua villosa** (Thunb.) Nakai ——*Urtica villosa* Thunb.; *F. pilosa* Gaud.

生于海拔 200—1 000 米的山坡路旁、草丛中或园圃中。分布于河北、江苏、浙江、福建、台湾、湖北、贵州。

叶：用于风热感冒，头痛，咳嗽。　全株：用于刀伤，无名肿毒。

## 榕属　Ficus L.

**石榕树**　水榕(广西)，水牛乳树(贵州)

**Ficus abelii** Miq.

生于溪旁。分布于江苏、江西、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

叶：消肿止痛，祛腐生新。用于乳痈，刀伤。

**高山榕**　　鸡榕(广西),大叶榕(贵州)

**Ficus altissima** Bl.

生于山地林中。分布于福建、广东、广西、贵州、云南。

根、枝条：清热解毒,活血止痛。

**垂叶榕**　　细叶榕(贵州)

**Ficus benjamina** L.

生于海拔300—1 000米的石灰岩山地或平原旷野较湿的杂木林中。分布于广东、广西、贵州、云南。

气根、树皮、叶芽、果实：清热解毒,祛风,凉血,滋阴润肺,发表透疹,催乳。用于风湿麻木,鼻出血。

**无花果**　　密果(江苏、江西),牛奶仔(福建),实花果(湖北),天生子(滇南本草)

**Ficus carica** L.

原产地中海及西南亚。全国各地均有栽培。

果实(无花果)：甘,平。健胃清肠,消肿解毒。用于泄泻,痢疾,便秘，痔疮,咽喉痛,痈肿,癌肿。　根、叶：淡、涩,平。散瘀消肿,止泻。用于泄泻;外用于痈肿。

附　注：新疆、江苏、四川地方标准收载。

**小叶榕**

**Ficus concinna** Miq. ——*F. parvifolia* Miq.

生于海拔900—1 500米的路旁、溪边或林缘。分布于福建、广西、云南。

根、叶、果实：微苦,平。祛风除湿。用于风湿关节痛,胃痛,阴挺,跌打损伤。

**黄毛榕**

**Ficus fulva** Reinw.

生于溪边、山谷林中。分布于福建、广东、广西、贵州、云南。

根皮：甘,平。健脾益气,活血祛风。用于气血虚弱，阴挺,脱肛,水肿,风湿痹痛,便溏泄泻。

**天仙果**　　牛奶浆(浙江民间常用草药),牛奶柴(闽东本草)

**Ficus beecheyana** Hook. et Arn. ——*F. erecta* Thunb. var. *beecheyana* (Hook. et Arn.) King

生于山坡林下、溪边。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

根(天仙果)：辛,温。祛风除湿,健脾益气,活血。用于劳倦乏力,食少,月经不调,脾虚,带下病。　茎叶：甘、淡,温。补中益气,健脾化湿,强筋壮骨,活血解毒。用于风湿关节痛,中气虚弱,气血衰微,跌打损伤。　果实：用于痔疮。

**小果榕**　　母猪精(贵州),铁牛入石(福建中草药)

**Ficus gasparriniana** Miq. var. **viridescens** (Lévl et Vant.) Corner—— *F. comata* Hand.-Mazz.

生于山坡林下阴湿处、溪边灌丛中。分布于浙江、福建、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根：甘、微辛,温。祛风行气,健脾利湿。用于风湿关节痛,消化不良,带下病,溃疡久

不收口。

**台湾榕**

**Ficus formosana** Maxim. ——*F. taiwanensis* Maxim.

生于溪边灌木丛中。分布于浙江、福建、江西、台湾、湖南、广东、广西、贵州。

全株：甘、微涩，平。柔肝和脾，清热利湿。用于急、慢性肝炎，腰脊扭伤，水肿，小便淋痛。

**水同木**

**Ficus harlandi** Benth.

生于山地林中。分布于台湾、广东、广西、贵州、云南。

根皮、叶：补气，润肺，活血，利尿。用于五劳七伤，跌打，小便淋痛，湿热泄泻。

**异叶榕**　斑鸠树(陕西)，山枇杷(湖北、湖南)

**Ficus heteromorpha** Hemsl.

生于海拔700—1500米的山坡林下、路旁、灌丛、山谷、沟边。分布于中南及陕西、甘肃东南部、安徽、浙江、江西、福建、台湾、四川、贵州、云南。

果实(奶浆果)：甘、酸，温。下乳补血。用于脾胃虚弱，缺乳。　根：用于牙痛，久痢。

**尖叶榕**　山枇杷(广西)

**Ficus henryi** Warb.

生于海拔500—700米的山坡杂木林灌丛中。分布于湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南东部。

果实：清热利湿，解毒消肿。用于痔疮。

**粗叶榕**　入山虎(贵州)

**Ficus hirta** Vahl——*F. simplicissima* Lour. var. *hirta* (Vahl) Migo

生于旷地、山谷、水旁或山坡林中。分布于浙江、江西、福建、湖南、广东、广西、贵州、云南。

根(五指毛桃)：甘、微苦，平。祛风湿，壮筋骨，祛瘀消肿。用于风湿痿痹，劳伤，浮肿，跌打损伤，带下病，乳少。

**对叶榕**　牛奶子(广州植物志)

**Ficus hispida** L. f.

生于溪边疏林或灌丛中、池塘边及河边。分布于广东、广西、贵州、云南。

根、叶、皮：甘，凉。疏风解热，消积化痰，行气散瘀。用于感冒发热，咳嗽，消化不良，痢疾，跌打损伤。果实：酸，寒。用于腋疮。

**裂叶榕**　树地瓜(四川常用中草药)

**Ficus laceratifolia** Lévl. et Vant.——*F. gasperiana* Miq. var. *laceratifolia* (Lévl. et Vant.) Corner

生于海拔600—1300米的山地林中阴处或水边。分布于陕西南部、四川、贵州、云南。

根：涩、微咸，平。清热解毒。用于痢疾，淋证，瘰疬，痔疮。　果序托：甘，平。下乳。用于乳汁不足。

**榕树**　　小叶榕、细叶榕(浙江、广东、广西)

**Ficus microcarpa** L. f.

生于村边或山坡林中。分布于安徽、浙江南部、江西、福建、台湾、广东、广西、贵州、云南。

气根(榕须)：苦、涩，平。祛风清热，活血解毒。用于感冒，顿咳，麻疹不透，乳蛾，跌打损伤。　叶(榕树叶)：淡，凉。清热利湿，活血散瘀。用于咳嗽，痢疾，泄泻。　树皮(榕树皮)：用于泄泻，疥癣，痔疮。　果实(榕树果)：用于臁疮。　树胶汁(榕树胶汁)：用于目翳，目赤，瘰疬，牛皮癣。

附　注：壮族仅用气根和叶治病。

**琴叶榕**　　香人乳(浙江)，奶汁树(江西)，小无花果(贵州)

**Ficus pandurata** Hance

生于山地灌丛中或疏林中。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根或叶：甘、辛，温。行气活血，舒筋活络，调经。用于腰背酸痛，跌打损伤，乳痈，痛经，疟疾。

**条叶榕**　　竹叶榕(安徽)，狭叶榕(浙江)

**Ficus pandurata** Hance var. **angustifolia** Cheng——*F. stenophylla* Hemsl.

生于山坡林下阴湿处、山谷溪边灌丛、田野沟边石缝内。分布于浙江、江西、湖南、广东、广西、云南。

根：祛风利湿，清热解毒。

**全叶榕**　　小叶牛奶仔(福建)

**Ficus pandurata** Hance var. **holophylla** Migo

生于山坡疏林中、溪谷灌丛中。分布于浙江、江西、福建、湖南、广东、广西。

根或叶：甘、微辛，温。舒筋通络，活血调经，解毒消肿。用于劳倦乏力，带下病，风湿关节痛。

**薜荔**　　凉粉树(江西、湖南、贵州)，馒头郎(广州植物志)，爬墙果(四川中药志)，鬼馒头(本草纲目)

**Ficus pumila** L.

生于海拔250—1 200米的山地，常攀于树上，岩石上或墙垣上，沟边湿地亦有。分布于华东、中南及四川、贵州、云南。

花序托(薜荔果)：甘，平。补肾固精，活血，催乳。用于遗精，乳汁不下，肠风下血，淋浊。　不育幼枝(络石藤)：苦，平。祛风通络，活血止痛。用于风湿痛，腰腿痛，跌打损伤，痈肿疮毒。　根：苦，平。祛风除湿，舒筋通络。用于头痛眩晕，风湿关节痛，产后风。　茎叶：酸，平。祛风利湿，活血解毒。用于风湿痹痛，泻痢，淋证。

附　注：①江苏地方标准收载(木馒头)。②壮族药用花托、藤、叶。

**梨果榕**　　水棉木(广西)，瘦柄榕(贵州)

**Ficus pyriformis** Hook. et Arn.

生于山谷沟边。分布于湖南南部、广东、广西、四川、贵州、云南。

茎：涩，凉。清热利尿，止痛。用于水肿，小便淋痛，胃痛。

**菩提树**　印度菩提树皮(中国药用植物图鉴),思维树(酉阳杂俎)

**Ficus religiosa** L.

原产印度。广东、广西、云南南部有栽培。

树皮汁：收敛。用于牙痛。花、种子：发汗解热,镇静。

**珍珠莲**　岩枇杷(湖北),吊攀子(湖南),冰粉子(四川),石彭子(江西中药)

**Ficus sarmentosa** Buch.-Ham. ex J.E. Smith. var. **henryi** (King) Corner——*F. foveolata* Wall. var. *henryi* King

生于海拔 750 米以下的山谷密林或灌丛中。分布于中南及陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、四川、贵州、云南。

根或藤茎：甘、涩,平。祛风除湿,消肿解毒,杀虫。用于风湿关节痛,乳痈,疮疖、癣。花托：用于睾丸偏坠,内痔,便血。

**爬藤榕**　小木莲、石金藤(浙江),爬岩香(湖北)

**Ficus sarmentosa** Buch.-Ham. ex J.E.Smith. var. **impressa** (Champ.) Corner——*F. impressa* Champ. ex Benth.; *F. martinii* Lévl. et Vant.

生于海拔 600—1 400 米的沟边岩石上或林中。分布于中南及陕西南部、江苏、安徽、浙江、四川、贵州、云南。

根状茎：辛、甘,温。祛风湿,舒气血,消肿止痛。用于风湿关节痛，神经痛，跌打损伤,消化不良,气血亏虚。

**尾尖爬藤榕**　爬岩枫(湖北)

**Ficus sarmentosa** Buch.-Ham. ex J.E.Smith. var. **lacrymens** (Lèvl.) Corner——*F.lacrymens* Lévl.

生于海拔 500—1 400 米的山谷,攀援于岩石上。分布于江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

根、藤、种子：清热解毒,祛风通络,舒筋活血。

**斜叶榕**

**Ficus tinctoria** Forst. f. var. **gibbosa** (Bl.) Corner——*F. gibbosa* Bl.

生于山谷湿润森林中。分布于福建、台湾、广东、广西、四川、贵州、云南。

树皮：苦,寒。清热,解痉。用于感冒,高热抽搐,泻痢。　根皮：用于腹痛。　嫩尖叶：用于皮癣。　果实：用于溃疡。

附　注：该植物为紫胶虫寄主。

**地瓜**　地枇杷(湖北),复坡虎(广西)、铺地蜈蚣(四川中药志),地石榴花(云南中草药)

**Ficus tikoua** Bur.

生于海拔 1 200 米以下山坡灌丛阴处、草坡及岩石缝中。分布于西南及陕西南部、甘肃东南部、湖北、湖南、广西。

根：苦,寒。清热利湿。用于泄泻,黄疸,瘰疬,痔疮,遗精。　茎叶：清热利湿,活血解毒。用于风热咳嗽,痢疾,水肿,经闭,带下病。　花：用于遗精，滑精。　果实：清热散寒,祛风除湿。用于咽喉痛。

**变叶榕**　常绿天仙果(江西、贵州)

**Ficus variolosa** Lindl.

生于丘陵、平原及山地疏林中。分布于江苏、浙江、江西、福建、湖南、广东、广西、贵州、云南。

根：甘、微辛，温。补肝肾，强筋骨，祛风湿。用于肾亏腰痛，风湿痹痛，月经不调，带下病，跌打损伤，乳汁不下。

**笔管榕**　漆娘舅(福建)

**Ficus virens** Ait.——*F. wightiana* Wall. ex Benth.

生于山坡林中或河岸。分布于浙江、福建、广东、广西、四川、贵州、云南。

根或叶：甘、微苦，平。清热解毒。用于漆疮，鹅儿疮，乳痈。

**黄葛树**　大叶榕(广西)，黄桷树(四川)，雀树(贵州)

**Ficus virens** Ait.var. **sublanceolata** (Miq.) Corner

生于山地疏林、溪边。分布于广东、广西、四川、贵州、云南。

根：微辛，凉。祛风除湿，清热解毒。　叶：涩，平。消肿止痛。用于风湿骨痛，感冒，乳蛾，目赤；外用于跌打损伤。

## 葎草属　Humulus L.

**啤酒花**　蛇麻草(浙江)，啤瓦古丽(维吾尔语)，忽布(中国高等植物图鉴)

**Humulus lupulus** L.

产于欧洲。新疆北部有野生分布。东北、华北、西北及山东等地有栽培。

未成熟绿色果穗(啤酒花)：苦，微凉。健胃消食，安神，利尿。用于消化不良，腹胀，浮肿，小便淋痛，肺痨，失眠。

**华忽布花**　野酒花(陕西中草药)

**Humulus lupulus** L. var. **cordifolia** (Miq.) Maxim.——*H. cordifolia* Miq.

生于海拔1 000—2 000米的山坡、山谷林缘或灌丛中水分充足处。分布于河北、山西、陕西北部、甘肃东部、浙江、广东、四川、贵州。

花：苦，平。健胃消食，镇静利尿，抗痨。用于消化不良，不思饮食，癆病，失眠，痨病。

**葎草**　拉拉藤(东北、江苏)，葛麻藤(陕西)，五爪龙(福建)，老虎藤(安徽)，锯锯藤(四川、贵州)

**Humulus scandens** (Lour.) Merr.——*Antidesma scandens* Lour.; *H. japonicus* Sieb. et Zucc.

生于海拔1 500米以下的山坡、道旁荒地及宅旁。分布于东北、华北、华东、中南、西南及陕西、甘肃。

全草(葎草)：甘、苦，寒。清热解毒，利尿消肿。用于淋证，小便淋痛，疟疾，泄泻，痔疮，风热咳喘。　根：用于石淋，疝气，瘰疬。

附　注：江苏、贵州地方标准收载。

## 牛筋藤属　Malaisia Blanco

**牛筋藤**

**Malaisia scandens** (Lour.)Planch.——*Caturus scandens* Lour.

生于山坡、旷野，攀援于岩石上或树上。分布于台湾、广东、广西。

根：祛风除湿。用于风湿痹痛，泄泻。

## 桑属　Morus L.

**桑**　　家桑(日华子本草)，桑薪(四川中药志)，白桑皮(山西中药志)

**Morus alba** L.

生于海拔 1 000 米以下的山坡疏林或渠岸、路旁及住宅周围。全国各地均有分布。主产安徽、河南、浙江、江苏、湖南。

根皮(桑白皮)：甘，寒。泻肺平喘，利水消肿。用于肺热咳嗽，水肿胀满尿少，面目肌肤浮肿。　嫩枝(桑枝)：微苦，平。祛风湿，利关节。用于肩臂关节酸痛麻木。　叶（桑叶)：甘、苦，寒。疏风清热，清肝明目。用于风热感冒，肺热燥咳，头晕头痛，目赤昏花。

果穗(桑椹)：甘、酸，寒。补血滋阴，生津润燥。用于眩晕耳鸣，心悸失眠，须发早白，津伤口渴。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②功效相似的有**鞑靼桑 M. alba** L. var. **tatarica** (Pall.) Ser.，分布于新疆；**蒙桑 M. mongolica** Schneid.，分布于东北、华北及陕西、山东、江苏、河南、湖北、湖南、四川、云南。

**鸡桑**　　野桑(浙江、江西)，裂叶水桑(湖北)，剪刀桑(湖南)，心叶桑(广西药用植物名录)

**Morus australis** Poir.

生于海拔 1 500 米以下的山坡、林缘或河边。分布于东北、华东、中南及河北、陕西、甘肃、新疆、四川、贵州、云南。

根皮、叶(鸡桑)：甘、辛，寒。清热解表。用于感冒咳嗽。

附　注：四川地方标准收载。

**华桑**　　构桑、岩桑(湖北)

**Morus cathayana** Hemsl.

生于海拔 500—1 800 米向阳的山坡、沟旁。分布于长江及黄河流域各地。

根皮、叶(华桑)：功效同鸡桑。

附　注：①四川地方标准收载。②湖北以此作桑白皮、桑枝、桑叶、桑椹用。

**黑桑**

**Morus nigra** L.

栽培于新疆乌鲁格、英吉沙、和田及喀什。

根皮：泻肺利水，止咳平喘。

### 假鹊肾树属　Pseudostreblus Bur.

**假鹊肾树**

**Pseudostreblus indica** Bur.

生于密林或灌丛中。分布于广东、广西、贵州、云南南部。

树皮：祛瘀止血，镇痛。用于消化道出血，胃痛，外伤出血，跌打损伤，风湿痛。

### 鹊肾树属　Streblus Lour.

**鹊肾树**

**Streblus asper** Lour.

生于疏林或灌丛中。分布于广东、广西、云南。

根：解蛇毒。用于创伤。　树皮：解热。用于痢疾，泄泻。

## 11. 荨麻科　Urticaceae

### 苎麻属　Boehmeria Jacq.

**叶序苎麻**　团水麻(湖北)

**Boehmeria clidemioides** Miq. var. **diffusa** (Wedd.) Hand.-Mazz.——*B. diffusa* Wedd.

生于海拔1 800米以下的山坡路旁草丛中或沟边。分布于陕西南部、甘肃、安徽南部、浙江、江西、福建、湖北西部、湖南、广东北部、广西、四川、贵州、云南。

根和根状茎：祛风解毒，止痒消肿，止血安胎。　全草：祛风除湿。用于水肿。

**密球苎麻**

**Boehmeria densiglomerata** W.T.Wang

生于海拔230—800米的山谷灌丛中。分布于江西南部、福建南部、湖南西部、广西北部、四川西部和南部、贵州。

全草：用于跌打损伤。

**细野麻**　水苎麻(湖北)、麦麸草(四川、陕西中草药)，小赤麻(中国高等植物图鉴)

**Boehmeria gracilis** C.H.Wright

生于海拔1 700米以下的山坡杂草丛中、林阴下岩壁旁及沟边。分布于吉林、辽宁、河北、山西、陕西、山东、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖北、湖南、四川、贵州。

全草：涩、微苦，平。清热解毒，除风止痒，利湿。用于皮肤发痒，湿毒。

**大叶苎麻**　方麻(浙江)，蒙自苎麻(广西)，火麻(四川)，山麻(中国种子植物分类学)，水禾麻(贵州民间药物)

**Boehmeria longispica** Steud.——*B. grandifolia* Wedd.; *B. japonica* Miq.

生于海拔500—1 100米的山坡、路旁或沟边。分布于中南及陕西、江苏、安徽、浙江、

江西、福建、台湾、山东、四川、贵州。

根或全草：淡，温。祛风除湿，接骨，解表寒。

**长叶苎麻**　水麻(贵州)

**Boehmeria pendulifera** Wedd. ex Long——*B. macrophylla* D. Don

生于海拔500—2 000米的山坡、溪边。分布于西南及广西西部。

根：用于骨折，感冒，风湿关节痛。　茎尖：用于头风痛，发烧。

**苎麻**　天青地白(陕西)，野麻(江西)，白麻(湖北、湖南、广西)

**Boehmeria nivea** (L.) Gaud.——*Urtica nivea* L.

生于低山及丘陵地带原野、路旁或沟边。分布于江苏、浙江、江西、湖北、广东、广西、四川、贵州、云南。秦岭以南广泛栽培。主产浙江、山东、陕西。

根(苎麻根)：甘，寒。清热解毒，止血散瘀。用于热病大渴，血淋，带下病，痈肿，丹毒。　皮(苎麻皮)：甘，寒。清烦热，利小便，散瘀，止血。用于瘀热，心烦，小便淋痛，血淋。　叶(苎麻叶)：甘，寒。止血凉血，散瘀。用于咯血，吐血，尿血，乳痈，创伤出血。花(苎麻花)：清心，利肠胃，散瘀。用于麻疹。

**伏毛苎麻**

**Boehmeria nivea** (L.) Gaud. var. **nipononivea** (Koidz.) W.T. Wang——*B. nipononivea* Koidz.

安徽、浙江、江西、台湾、广东、广西有栽培。

根：用于骨刺鲠喉。

附　注：**微绿苎麻 B. nivea** (L.) Gaud. var. **viridula** Yamamoto，分布于台湾、广西、云南，根：清热，解毒，散瘀。

**悬铃叶苎麻**　山麻(浙江)，水苎麻(江西)，透骨风(湖北)，白穗麻(湖南)

**Boehmeria tricuspis** (Hance) Makino——*B. platyphylla* D. Don var. *tricuspis* Hance; *B. platanifolia* Franch. et Sav.

生于海拔200—1 600米的林下沟旁。分布于华东、中南及山西、陕西、甘肃、四川、贵州、云南。

叶：解表，生肌。用于头风及发烧。　根：用于关节痛。　全株或根(水苎麻)：淡，温。解表，生肌。用于头痛发热，跌打损伤，痔疮。

**水苎麻**

**Boehmeria macrophylla** Hornem.——*B. platyphylla* D. Don

生于海拔1 800—3 000米的山地林下或沟边。分布于广东、广西、贵州、云南、西藏。

全株：用于风湿关节痛。

**灰绿水苎麻**

**Boehmeria macrophylla** Hornem. var. **canescens** (Wedd.) Long.——*B. canescens* Wedd.; *B. platyphylla* D. Don var. *canescens* (Wedd.)Wedd.

生于海拔840—1 000米的山地林下或沟边。分布于广西西部、云南南部。

全株：用于骨髓炎。

**糙叶水苎麻**

**Boehmeria macrophylla** Hornem. var. **scabrella** (Roxb.)Long —— Urtica

scabrella Roxb.; *B. platyphylla* D. Don var. *scabrella* (Roxb.) Wedd.

生于海拔 200—1 300 米的林下或沟边。分布于广东、广西、贵州、云南、西藏东南部。

根：用于疟疾。　全草：用于风湿痛，疮毒。

**柬埔寨芒麻**　八楞麻(贵州)，牙呼光(傣语)，大接骨(云南中草药选)

**Boehmeria siamensis** Craib

生于海拔 400—1 900 米的山地阴坡灌丛或疏林中。分布于广西南部及西部、贵州西南部、云南南部。

根或全草：淡，平。清热解毒，祛风除湿。用于肠痈，经闭，泄泻，风湿痛，癥疹，皮肤瘙痒，湿疹，痘疮。

附　注：**阴地芒麻 B. umbrosa** (Hand.-Mazz.) W.T.Wang——*B. clidemoides* Miq. var. *umbrosa* Hand.-Mazz.，分布于四川西部、云南北部，全草：清热解毒。

**赤麻**　红苧麻(湖北)

**Boehmeria silvestrii** (Pamp.) W.T.Wang——*B. platanifolia* Franch. et Sav. var. *silvestrii* Pamp.; *B. tricuspis* auct. non (Hance) Makino

生于海拔 700—1 400(—2 600) 米的沟边草地或林下。分布于吉林、辽宁南部、河北、陕西、甘肃、山东东部、河南西部、湖北西部、四川。

全草：用于跌打损伤。

**小赤麻**　小红活麻(湖南)

**Boehmeria spicata** (Thunb.) Thunb.——*Urtica spicata* Thunb.

生于丘陵或低山草坡、岩石上或沟边。分布于山东东部、江苏、浙江、江西、河南西部、湖北西部、四川。

根：用于跌打损伤，痔疮。

**密毛芒麻**　毛叶水苧麻(四川)

**Boehmeria tomentosa** Wedd.——*B. platyphylla* D. Don var. *tomentosa* (Wedd.) Wedd.

生于海拔 1 500—2 400 米的山坡及宅旁。分布于广西西部、四川西南部、云南西部和南部。

全草：祛风止痛。

## 微柱麻属　Chamabainia Wight

**微柱麻**　红四楞麻(湖北)，止血草(贵州)

**Chamabainia cuspidata** Wight

生于海拔 1 000—2 400 米的山地林下或沟边。分布于西南及福建、江西西部、台湾、湖北西部、湖南。

全草：行气止痛，止血生肌，利湿。用于刀伤，痢疾。

## 水麻属　Debregeasia Gaud.

**水麻**　水马麻(陕西),水麻柳(贵州),柳梅(植物学大辞典),冬里麻(峨眉药用植物)

**Debregeasia orientalis** C.J. Chen

生于海拔1 400米以下的山坡灌丛中或路旁、沟边较阴湿处。分布于西南及陕西、甘肃南部、台湾、湖北、湖南、广西。

茎、皮、叶: 辛、微苦,平。清热利湿,止血解毒。用于小儿急惊风,风湿关节痛,咳血,痈疖肿毒。

**长叶水麻**

**Debregeasia longifolia** (Burm.f.) Wedd.——*Urtica longifolia* Burm. f.

生于海拔1 400米以下的林阴下、沟边潮湿地。分布于西南及湖北西部、广西。

根、叶: 清热利湿,活血。用于牙痛。

**鳞片水麻**

**Debregeasia squamata** King

生于丘陵或低山溪边或山坡灌丛中。分布于广东、广西、贵州南部、云南东南部。

全株: 止血。用于跌打损伤,刀伤出血。

## 火麻树属　Dendrocnide Miq.

**咬人狗火麻树**

**Dendrocnide meyeniana** (Walp.) Chew

生于山地林中。分布于我国台湾中部和南部。

全草: 用于瘰疬,痈肿,发背。

附　注: **粗毛火麻树 D. meyeniana** (Walp.) Chew f. **subglabra** (Hayata) Chew, 分布于台湾,根、叶用于瘰疬。

**圆齿火麻树**　全缘叶火麻树(中国高等植物图鉴)

**Dendrocnide sinuata** (Bl.) Chew——*Urtica sinuata* Bl.

生于河谷两岸混交林中。分布于海南、广西、云南西南部、西藏。

全株: 用于跌打骨折。

**火麻树**

**Dendrocnide urentissima** (Gagnep.) Chew——*Laportea urentissima* Gagnep.

生于石山混交林中。分布于广西西南部、云南南部至东南部。

树皮: 有毒。驱蛔虫。用于蛔虫病。

## 楼梯草属　Elatostema Forst.

**短齿楼梯草**　上天梯(湖北)

**Elatostema brachydontum** (Hand.-Mazz.) W. T. Wang——*E. ficoides* Wedd. var. *brachyodonium* Hand.-Mazz.

生于海拔 600—1 200 米的林下阴地岩缝中。分布于湖北西部、湖南西北部、广西西北部、四川东部、贵州。

全草：祛风除湿，清热解毒。

附　注：功效相同的有**骤尖楼梯草 E. sessile** Forst. var. **cuspidatum** (Wight) Wedd.，分布于西南及江西西部、湖北、广西北部。

**锐齿楼梯草**

**Elatostema herbaceifolium** Hayata

生于海拔 450—1 400 米的山谷溪边石上及山洞中或林中。分布于甘肃南部、江西、福建、台湾、湖北西部、湖南、广东北部、广西西部、四川、贵州、云南东南部。

全草：消炎，拔毒，接骨。

附　注：功效相同的有**宜昌楼梯草 E. ichangense** H. Schröter，分布于湖北西部、湖南西部、广西北部、四川南部和东部、贵州。

**楼梯草**　冷饭团(湖北)，细水麻叶(湖南药物志)

**Elatostema involucratum** Franch. et Sav.——*E. umbellatum* (Sieb. et Zucc.) Bl var. *majus* Maxim.

生于海拔 200—2 000 米的山谷沟边石上、林中或灌丛中。分布于华东及陕西南部、甘肃、河南西南部、湖北西部、湖南、四川、云南东北部。

全草(赤车使者)：微苦，平。清热利湿，活血消肿。用于痢疾，风湿痛，黄疸，水肿，无名肿毒，骨折。　根(赤车使者根)：辛、苦，温。用于寒风冷气。

附　注：功效相同的有**狭叶楼梯草 E. lineolatum** Wight var. **majus** Wedd.，分布于福建、台湾、广东、广西、云南南部、西藏东南部。

**多序楼梯草**

**Elatostema macintyrei** Dunn

生于山谷沟边或林下潮湿处。分布于西南及湖南南部、广东、广西。

全草：清热凉肝，润肺止咳。

**异叶楼梯草**

**Elatostema monandrum** (D. Don.) Hara——*Procris monandra* D.Don; *E. surculosum* Wight

生于海拔 2 000—3 000 米的山地林中、沟边、石上，有时附生于树干上。分布于西南。

根状茎：清热利湿，消肿解毒。用于风湿痛，痢疾，跌打损伤，无名肿毒。

**瘤茎楼梯草**

**Elatostema myrtillus** (Lévl.) Hand.-Mazz.——*Pellionia myrtillus* Lévl.

生于山谷、林下及沟边。分布于湖北、湖南西北部、广西西部、四川东南部、贵州南部、云南东南部。

全草：用于眼热红肿，风湿痛，跌打损伤。

**长圆楼梯草**

**Elatostema oblongifolium** Fu——*E. bodinieri* (Lévl.) Hand.-Mazz.

生于海拔 350—1 500 米的山地林下或沟边阴湿地。分布于湖北西部、湖南西北部、四川、贵州。

全草：清热解毒。

附　注：功效相同的有**宽叶楼梯草 E. platyphyllum** Wedd.，分布于四川南部、云南西部、西藏东南部。

**钝叶楼梯草**

**Elatostema obtusum** Wedd.

生于海拔 700—3 000 米的山地林下、沟边或石上，常与苔藓同生。分布于陕西南部、甘肃南部、湖北西部、四川、云南、西藏东南部。

全草：清热解毒，祛瘀止痛。

**小叶楼梯草**

**Elatostema parvum** (Bl.) Miq. ——*Procris parva* Bl.; *E. stracheyanum* wedd.

生于海拔 1 000—2 800 米的山地林下石上或沟边。分布于台湾、广东、广西、四川西部、贵州、云南。

全草：清热利湿，活血消肿。

**裂序楼梯草**

**Elatostema schizocephallum** W.T. Wang

生于山地沟边、林下。分布于湖南、广西。

全草：化痰止咳。用于伤风感冒。

**庐山楼梯草**　白龙骨(甘肃)，软骨飞扬(江西)，鸡血七(湖北)，雪里开花(湖南)，接骨草(浙江天目山药用植物志)

**Elatostema stewardii** Merr.

生于海拔 700—1 400 米的山谷溪边或林下。分布于陕西南部、江苏、安徽南部、浙江、江西、湖北、四川东部。

根：用于骨折。　茎叶：用于咳嗽。　全草：淡，温。活血祛瘀，消肿解毒，止咳。用于挫伤，扭伤，骨折，疖腮，肺痨，发热咳嗽。

**托叶楼梯草**　托叶冷水花(湖北)

**Elatostema stipulosum** Hand.-Mazz.

生于海拔 600—2 000 米的山地林下或草坡阴处。分布于江西西部、湖北西南部、湖南、广西西部、四川西部、贵州、云南东南部。

全草：清热解毒，接骨。用于骨髓炎。

**条叶楼梯草**

**Elatostema sublineare** W. T. Wang

生于山地林下沟边。分布于湖北西南部、湖南、广西北部、贵州。

全草：用于跌打骨折。

**毛果楼梯草**

**Elatostema trichocaroum** Hand.-Mazz.

生于山地林下、沟边。分布于湖北西部、湖南西北部、四川、贵州。

全草：清热解毒，祛瘀止痛。

## 蝎子草属　Girardinia Gaud.

**浙江蛇麻**

**Girardinia chingiana** Chien

生于林下或沟边阴处。分布于浙江、江西。

根：用于跌打损伤，痔疮。

**棱果蝎子草**

**Girardiana cuspidata** wedd. subsp. **grammata** C.J. Chen

生于山地林下。分布于西南及广西。

全草：祛风除湿，镇痛。

**大蝎子草**　　大荨麻(江西)，火麻(湖北)，大钱麻、梗麻(滇南本草)

**Girardiana diversifolia** (Link) Friis ——*Urtica diversifolia* Link; *G. palmata* (Forst.) Gaud

生于山坡林阴下。分布于陕西、甘肃、江西、台湾、湖北、四川、贵州、云南。

全草：苦、辛，凉。有毒。祛痰，利湿，解毒。用于伤风咳嗽，胸闷痰多，肤痒，疮毒。

## 糯米团属　Gonostegia Turcz.

**糯米团**　　米麸子(甘肃)，山笋草(浙江)，贯菜子(湖南)，猪粥菜(广西)

**Gonostegia hirta** (Bl.) Miq.——*Urtica hirta* Bl.; *Memorialis hirta* (Bl.) Wedd.

生于海拔 1 200 米以下的山坡、路旁或沟边，常成片生长。分布于西南及陕西、江西、福建、河南南部、湖北、广东、广西。

全草(糯米团)：淡、微苦，凉。清热解毒，健脾止血。用于消化不良，食积胃痛，带下病。

附　注：四川地方标准收载。

**狭叶糯米团**

**Gonostegia pentandra** (Roxb.) Miq. var. **hypericifolia** (Bl.) Masamune

生于溪谷林下阴湿处。分布于台湾、广东、广西、云南。

根：用于外伤出血。

## 艾麻属　Laportea Gaud.

**珠芽艾麻**　　鳖麻子(东北)，零余子荨麻(中国高等植物图鉴)，野绿麻(浙江中医杂志)

**Laportea bulbifera** (Si eb. et Zucc.) Wedd. ——*Urtica bulbifera* Sieb. et Zucc.; *L. sinensis* C.H. Wright

生于山地林下或沟边、村旁。分布于东北、中南、西南及山西、陕西南部、甘肃南部、江苏、安徽。

块根：辛，温。祛风除湿，调经。用于风湿关节痛，皮肤瘙痒，月经不调。　全草：用于疳积。

**艾麻**　　才活麻(湖北)，山芋麻(中国高等植物图鉴)，红线麻(陕西草药)

**Laportea macrostachya** (Maxim.) Ohwi ——*Sceptrocnide macrostachya* Maxim.

生于海拔 1 700 米以下的林下草丛中及沟边。分布于西南及河北、山西、陕西南部、甘肃、安徽、浙江、江西、河南、湖北、湖南。

根：辛、苦，寒。有小毒。祛风除湿，通经活络，解毒消肿。用于腰腿疼痛，麻木不仁，风痹水肿，瘰疬。

**广西艾麻**

**Laportea violacea** Gagnep.

生于林下及沟边。分布于广西。

根：用于胃痛。　全草：用于风湿，痞气。

附　注：广西特有药用植物。

## 假楼梯草属　Lecanthus Wedd.

**假楼梯草**　　簕管草(广西)

**Lecanthus peduncularis** (Royle) Wedd. ——*Procris Peduncularis* Royle

生于山谷林下或沟边阴处。分布于西南及湖南西部、广西。

全草：清热解毒，祛瘀止痛。

## 水丝麻属　Maoutia Wedd.

水丝麻　　普爷树(广西)

**Maoutia puya** (Wall.) Wedd. ——*Urtica puya* Wall.

生于丘陵或低山草坡及灌丛中。分布于广西西部、四川西南部、贵州、云南。

根：用于手足麻木。　皮：用于呕吐。

## 花点草属　Nanocnide Bl.

**花点草**　　油点草(广西)，幼油草(湖北、浙江天目山药用植物志)

**Nanocnide japonica** Bl.

生于山地林下湿地、沟谷阴湿岩缝间。分布于山西、陕西、江苏、上海、安徽、浙江、江西、台湾、湖北、广西、四川、贵州。

全草(花点草)：酸，温。化痰止咳，止血。用于咳嗽，咯血。

**毛花点草**　　红细草(浙江)，连钱草(湖南)，透骨消(广西药用植物名录)，雪药(四川

常用中草药)

**Nanocnide lobata** Wedd. ——*N. pilosa* Migo

生于山野阴湿地草丛或石缝中。分布于华东及陕西、湖北、湖南、广西、四川、贵州。

**全草**：苦、辛，凉。清热解毒，活血祛瘀。用于烧、烫伤，跌打损伤，肺痨咳嗽，疮毒。

## 紫麻属 Oreocnide Miq.

**紫麻** 水苎麻(湖北)，野麻(湖南、贵州)，水麻叶(四川中药志)

**Oreocnide frutescens** (Thunb.) Miq. ——*Urtica frutescens* Thunb.; *Villebrunea frutescens* (Thunb.) Bl.

生于海拔 200—1 000 米的山谷林下或沟边。分布于中南、西南及陕西、安徽南部、浙江、江西、福建、台湾。

全株：甘，平。行气活血。用于跌打损伤，牙痛。 叶：透发麻疹，止血。 果实：用于咽喉痛。

**广西紫麻** 广西花点草(广西)

**Oreocnide kwangsiensis** Hand.-Mazz.

生于山地。分布于广西。

根：用于骨折，疮毒挤癣。

附 注：①广西特有药用植物。②**倒卵叶紫麻 O. obovata** (C. H. Wright) Merr.，分布于中南及云南，根：用于接骨。

## 墙草属 Parietaria L.

**墙草**

**Parietaria micrantha** Ledeb.

生于海拔 2 400 米以下的冷杉林下草丛中、阴湿多石处或草地上。分布于东北、华北及陕西、甘肃、福建、台湾、湖北、四川西部、云南北部。

根、叶：淡，平。拔脓消肿。用于脚底深部脓肿，痈疽，疔疖，多发性脓肿。

## 赤车属 Pellionia Gaud.

**短叶赤车**

**Pellionia brevifolia** Benth.

生于阴湿林下、溪边及沟旁。分布于中南及福建。

全草：用于跌打损伤。

**异被赤车**

**Pellionia heteroloba** Wedd.

生于山地林下及沟边。分布于广东、广西、云南。

全草：用于消化不良，烧、烫伤。

**小赤车**　　山椒草(浙江天目山药用植物志)

**Pellionia minima** Makino

生于阴湿林下、溪边及沟旁。分布于安徽、浙江、江西、福建、广东。

全草：辛、苦，温。祛瘀，消肿，解毒，止痛。用于关节扭伤，脚鸡眼。

**赤车使者**　　岩下青(江西)，风湿草(湖北)，半边山(贵州)

**Pellionia radicans** (Sieb. et Zucc.) Wedd.——*Procris radicans* Sieb. et Zucc.

生于海拔600—2 500米的山谷沟边或林下阴湿草丛下，常成片繁生。分布于安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

全草：辛、甘，温。祛瘀消肿，解毒止痛。用于挫伤血肿，毒蛇咬伤，牙痛，疖子。

**吐烟花**

**Pellionia repens** (Lour.) Merr. ——*Polychroa repens* Lour.

生于阴湿林下或沟、溪旁。分布于海南、云南南部。

全草：甘、微涩，凉。清热利湿。用于急、慢性肝炎，肾虚；外用于过敏性皮炎，下肢溃疡及疖肿。

**蔓赤车**　　接骨草(浙江)，水田草(湖北)，半边山(贵州)

**Pellionia scabra** Benth.

生于海拔1 500米以下的山谷沟边或林下潮湿地。分布于华东及湖北、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草：甘、淡，凉。清热解毒，活血散瘀。用于眼热红肿，疖腮，扭挫伤，牙痛，缠腰火丹，经闭，毒蛇咬伤。

**长柄赤车**

**Pellionia tsoongii** Merr.

生于山坡或山谷林中。分布于广东、海南、广西、云南南部。

全草：用于疔疮肿毒。

**绿赤车**

**Pellionia viridis** C. H. Wright

生于海拔650—1 900米的山地沟边或林中。分布于湖北西部、四川、云南东北部。

全草：用于筋骨酸痛。

## 冷水花属　Pilea Lindl.

**圆瓣冷水花**　　湖北冷水花(湖北植物志)

**Pilea angulata** (Bl.) Bl.——*Urtica angulata* Bl.; *P. stipulosa* (Miq.) Miq.

生于海拔400—1 200米的山地、山谷阴湿处。分布于陕西、湖北、广西、四川、贵州、云南。

全草：清热解毒，祛风湿，安胎。

附　注：**长柄冷水花 P. angulata** Bl. subsp. **petiolaris** (Sieb. et Zucc.) C. J. Chen，分布于华东、中南、西南，全草：祛风活血。

**短角冷水花**

**Pilea aquarum** Dunn subsp. **brevicornuta** (Hayata) C.J. Chen——*P. brevicornuta* Hayata

生于山地阴湿地。分布于福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南。

全草：消炎止痛。

**基心叶冷水花**

**Pilea basicordata** W. T. Wang ex C. J. Chen

生于山地沟旁阴湿处。分布于广西。

全草：清热解毒，散瘀消肿。用于烧、烫伤，跌打肿痛，骨折，疮疖。

附　注：广西特有药用植物。

**花叶冷水花**

**Pilea cardierei** Gagnep. et Guill.

庭园及温室广为栽培。

全草：淡，凉。清热解毒，利尿。用于疮疖肿毒。

**波缘冷水花**　岩鸡心草(湖北)，石苋菜(湖南)

**Pilea cavaleriei** Lévl.

生于海拔 300—1 300 米的山坡、山谷林下阴湿石灰岩石上或湿草地上。分布于中南及浙江、江西、福建、四川、贵州、云南。

全草：甘、淡，凉。清热解毒，润肺止咳，消肿。用于跌打损伤，烫火伤，肺痨，哮喘，疖肿。

附　注：功效相同的有**石油菜 P. cavaleriei** Lévl. subsp. **valida** C.J. Chen，分布于湖南、广西。

**点乳冷水花**

**Pilea glaberrima** (Bl.) Bl.——*Urtica glaberima* Bl.

生于山地林下阴湿处。分布于西南及广东、广西。

全草：用于跌打损伤。

**山冷水花**　苔水花(湖北、湖南)，红水草(四川)

**Pilea japonica** (Maxim.) Hand. -Mazz. ——*Achudemia japonica* Maxim.

生于海拔 1 600 米以下的山坡林下、山谷阴湿草丛中或石上。分布于吉林、辽宁、河北、陕西、安徽、浙江、江西、台湾、河南、湖北、广西、四川、贵州。

全草：甘，凉。清热解毒，渗湿利尿，调经。用于乳蛾，小便淋痛，宫颈糜烂，带下病。

**隆脉冷水花**　鼠舌草(四川)

**Pilea lomatogramma** Hand. -Mazz.

生于海拔 1 000—1 600 米的林下阴湿处。分布于江西、福建、湖北、湖南、广东、四川、云南。

全草：用于烧、烫伤，凉寒腹痛。

**长茎冷水花**

**Pilea longicaulis** Hand. -Mazz.

生于山地林下阴湿处。分布于广西、贵州。

全草：消肿散瘀。用于跌打损伤，烧、烫伤。

**大叶冷水花**　大水边麻(湖南),到老嫩(贵州)

**Pilea martinii** (Lévl.) Hand. -Mazz. ——*Boehmeria martinii* Lévl.

生于海拔800—1 600米的山地阴处或沟边。分布于西南及陕西南部、湖北、湖南。

全草：清热解毒,消肿止痛,利尿。用于扭伤,接骨。

附　注：功效相同的有**长序冷水花 P. melastomoides** (Poir.) Wedd., 分布于西南及台湾、广东、广西。

**小叶冷水花**　透明草(广西)

**Pilea microphylla** (L.) Liebm. ——*Parietaria microphylla* L.

生于林下阴湿裸岩上及溪谷两旁碎石上。原产南美。在我国为归化种,分布于浙江、福建、台湾、广东、广西、云南。

全草：淡、涩,凉。清热解毒。用于痈疮肿毒,无名肿毒;外用于烧、烫伤。

**念珠冷水花**

**Pilea monilifera** Hand. -Mazz.

生于溪谷林下阴湿处。分布于江西南部、湖北、湖南西北部、广西、四川、贵州、云南。

全草：清热解毒,利湿。

**冷水花**　水麻(江西),紫色冷草(湖南),水麻叶(贵州民间药物)

**Pilea notata** C.H. Wright

生于海拔350—1 400米的阴湿地岩缝中。分布于华东、中南及陕西南部、四川、贵州。

全草：淡,凉。清热利湿,破瘀消肿。用于湿热黄疸,肺痨,跌打损伤,外伤感染。

**盾叶冷水花**

**Pilea peltata** Hance

生于沟边石上阴处。分布于湖南、广东、广西、贵州、云南东南部。

全草：用于跌打骨折,刀伤出血。

**镜面草**　跌打散、翠屏草(云南)

**Pilea peperomioides** Diels

生于溪谷林下阴湿处。分布于四川西南部、贵州西部、云南中部至西部。

全草：消炎解毒。用于丹毒,接骨。

**矮冷水花**　苦水花(浙江),荸艾冷水花(广西),坐镇草(贵州)

**Pilea peploides** (Gaud.) Hook.et Arn. ——*Dubruelia peploides* Gaud.

生于低海拔山地、路旁、沟边。分布于华东、中南及吉林、辽宁、河北、内蒙古。

全草：辛,凉。清热解毒,祛瘀止痛。用于跌打损伤,骨折,痈疖肿毒。

附　注：功效相同的有**齿叶矮冷水花 P. peploides** (Gaud.) Hook. et Arn. var. **major** Wedd., 分布于华东及广东、广西、贵州。

**西南冷水花**　过金桥(湖北),石稔草、石头花(广西药用植物名录)

**Pilea plataniflora** C.H. Wright

生于海拔200—1 250米的山坡潮湿地、林下岩石或阴坡岩壁上。分布于陕西、台湾、湖北西部、广西、四川、贵州、云南。

全草(石筋草)：辛、酸,温。舒筋活络,消肿止痛,解毒。用于风寒湿痹,筋骨疼痛,手

足麻木，肾炎水肿。

**透茎冷水花**　亮杆芹(辽宁)，野麻(江西)，水麻叶(四川)

**Pilea pumila** (L.) A. Gray ——*Urtica pumila* L.; *P. mongolica* Wedd.

生于海拔1 300米以下的山坡、山谷及水边阴湿地。全国除黑龙江、新疆、青海、台湾、西藏外均有分布。

全草：甘，寒。清热利尿，消肿解毒，安胎。用于消渴，孕妇胎动，先兆流产，水肿，小便淋痛，阴挺，带下病。　叶：止血。

附　注：功效相同的有**阴地冷水花 P. pumila** (L.)A. Gray var. **hamaoi**(Mak.) C.J. Chen，分布于黑龙江、吉林、河北。

**怒江冷水花**

**Pilea salwinensis** (Hand. -Mazz.) C.J. Chen ——*P.symmeria* Wedd. var. *salwinensis* Hand. -Mazz.

生于山谷林下或沟边湿地。分布于云南西北部。

全草(九节风)：微苦、涩，温。散瘀，止痛，软坚，活血。外用于跌打损伤，骨癌，骨折。

**圆果冷水花**

**Pilea rotundinucula** Hayata

生于溪谷林下阴湿地。分布于我国台湾中部和北部。

叶：用于头痛。

**厚叶冷水花**

**Pilea sinocrassifolia** C. J. Chen ——*P. crassifolia* Hance

生于林下及沟谷湿地。分布于广东南部、广西。

全草：清热解毒。

**粗齿冷水花**　水麻(湖北)，阿伯香(苗语)，扇花冷水花(广西药用植物名录)

**Pilea sinofasiata** C. J. Chen ——*P. fasiata* Franch.

生于海拔800—1 500米的林下、沟边岩缝或草丛中。分布于中南及陕西、安徽、浙江、江西、四川、贵州、云南。

全草(紫绿草)：辛，平。清热解毒，祛风止痛，理气止血。用于胃气痛，乳蛾，鹅口疮，消化不良，风湿骨痛。

**三角叶冷水花**　散血丹(江西)，铁丝草(湖北)，玻璃草(贵州)

**Pilea swinglei** Merr.

生于山谷沟边或石上阴湿处。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖北、广东、四川、贵州。

全草：淡、微甘，凉。清热解毒，消肿，外用于毒蛇(竹叶青)咬伤。

**大果冷水花**

**Pilea symmeria** Wedd.

生于海拔800—2 400米的山谷林下或沟边阴湿处。分布于我国西藏。

全草：散瘀，止痛，活血。

**海南冷水花**

**Pilea tsiangiana** Metc.

生于溪谷林下阴湿处。分布于海南。

全草：拔毒消肿。

**疣果冷水花**

**Pilea verrucosa** Hand.-Mazz.

生于溪谷阴湿处。分布于湖北、湖南、广西、四川、贵州。

全草：用于疮疖痈肿。

## 雾水葛属 Pouzolzia Gaud

**雅致雾水葛**

**Pouzolzia elegans** Wedd.

生于山坡草地或灌丛中。分布于台湾、四川西南部、贵州南部、云南西北部。

茎皮：用于痈肿疮毒，蛇咬伤。

**红雾水葛** 燃麻桐(四川)，青白麻叶(中国高等植物图鉴)

**Pouzolzia sanguinea** (Bl.) Merr. ——*Urtica sanguinea* Bl.; *P. ovalis* Miq.; *P. viminea*(Wall.) Wedd.

生于干燥山坡、草地、灌丛中或林边。分布于西南及江西、广东、广西。

根(大粘药)：辛、涩，热。祛风除湿，舒筋活络，消肿散毒。用于风湿筋骨痛，乳痈，疮疖红肿，骨折。

**雾水葛** 山三茄(浙江)，石茹(福建草药)，生肉药(广西药用植物名录)

**Pouzolzia zeylanica** (L.) Benn. ——*Parietaria zeylanica* L.

生于海拔300—1 300米的草地、田边、丘陵或低山灌丛及疏林中。分布于中南及安徽、浙江、江西、福建、四川、云南。

全草(雾水葛)：甘，凉。清热利湿，去腐生肌，消肿散毒。用于疮、疽，乳痈，风火牙痛。

附 注：**多枝雾水葛 P. zeylanica** (L.) Benn. var. **microphylla** (Wedd.) W. T. Wang，分布于福建、台湾、广东、广西，全草：用于肺痨，蜂窝炎，接骨。

## 藤麻属 Procris Comm. ex Juss.

**藤麻**

**Procris wightiana** Wall. ex Wedd.

生于山地林下、石上或沟边阴湿处。分布于台湾、广东、广西、贵州西南部、云南、西藏东南部。

全草(藤麻)：微苦，凉。清热解毒，散瘀消肿。外用于无名肿毒，烧、烫伤。 茎、叶：清热解毒，退翳明目。用于角膜云翳，眼热红肿。 鲜叶：外用于水、火烫伤。

## 荨麻属　Urtica L.

**狭叶荨麻**　　螫麻子、哈拉海(东北)，蝎子草(钦定热河志)

**Urtica angustifolia** Fisch. ex Hornem.

生于山地林边或沟边。分布于东北、华北及新疆、山东。

全草：苦、辛，温。有小毒。祛风定惊，消积，通便，解毒。用于风湿关节痛，产后抽风，小儿惊风，小儿麻痹后遗症，高血压症，消化不良。

**麻叶荨麻**　　恰克卡克欧提(维吾尔语)，燃麻(中国高等植物图鉴)

**Urtica cannabina** L.

生于海拔2 600米以下的干燥山坡或沙丘坡上。分布于东北、华北、西北及四川。

全草：苦、辛，温。有小毒。祛风除湿，解痉，活血。用于高血压症，风湿关节痛，小儿惊风，癔疹，毒蛇咬伤。

**异株荨麻**

**Urtica dioica** L.

生于林下阴湿地。分布于西北及云南西北部、西藏。

茎、叶：用于中风不语，咳嗽痰多，小儿惊风。

**荨麻**　　白蛇麻(浙江)，火麻草(湖北)，活麻草(湖南)，裂叶荨麻(中国高等植物图鉴)

**Urtica fissa** Pritz.

生于海拔1 200米以下的山坡路旁草丛中或沟边。分布于陕西南部、甘肃南部、浙江、福建、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南中部。

全草(白活麻)：甘、淡，凉。有小毒。祛风除湿。用于风湿骨痛，小儿吐乳，皮肤湿疹。

**高原荨麻**

**Urtica hyperborea** Jacq. et Wedd.

生于山地林下、草甸及河沟旁。分布于青海、新疆、四川西部、西藏。

全草：祛风除湿，解痉，活血，解虫毒。

**宽叶荨麻**　　螫麻子，哈拉海(东北)

**Urtica laetevirens** Maxim.

生于海拔1 000米以下的山谷、林缘或沟溪湿地。分布于东北、华北、西北及河南、湖北、四川、云南北部、西藏东部。

全草：苦、辛，温。有小毒。祛风定惊，消积通便。用于风湿关节痛，小儿惊风，大便不通，小儿麻痹后遗症，高血压症，消化不良；外用于癔疹，蛇咬伤。

附　注：**齿叶荨麻 U. laetevirens** Maxim. subsp. **dentata** (Hand. -Mazz.) C. J. Chen，分布于西北及湖北、湖南、四川、贵州、云南，全草：祛风除湿，利水消肿。

**粗根荨麻**　　老虎麻(贵州)

**Urtica macrorrhiza** Hand. -Mazz.

生于山地、沟边草丛及宅旁。分布于云南西北部。

全草(青活麻)：苦、辛，温。祛风除湿，解痉，解毒。用于风湿关节痛，高血压症，小儿惊风。

**滇藏荨麻**　云南荨麻(中国高等植物图鉴)

**Urtica mairei** Lévl.

生于山地草丛或沟边。分布于四川西南部、云南、西藏东部。

全草：苦、辛，温。祛风除湿，活血止痛，止痒。用于风湿麻木，关节痛，劳伤疼痛，疝痛，水肿，皮肤瘙痒，小儿惊风吐乳，妇女产后体虚。

**咬人荨麻**　荨麻(中国高等植物图鉴)

**Urtica thunbergiana** Sieb. et Zucc.

生于海拔1 000—1 200米的山谷沟边及林下岩缝处。分布于台湾。

叶：用于蛇咬伤，风疹。

**西藏荨麻**

**Urtica tibetica** W. T. Wang

生于海拔3 500—4 300米的山坡及田野。分布于我国西藏。

地上部分：祛风湿，解痉，活血。

**三角叶荨麻**

**Urtica triangularis** Hand. -Mazz.

生于山地阴湿处。分布于青海南部、四川西部、云南西北部、西藏东部。

全草：苦、辛，温。祛风湿，解痉，解毒。用于风湿关节痛，小儿惊风，高血压症。

## 12. 山龙眼科　Proteaceae

### 银桦属　Grevillea R. Br.

**银桦**　凤尾七(广西)，银橡树(海南)

**Grevillea rotusta** A. Cunn.

原产澳大利亚。全国南部和西南部有栽培。

叶、花：清热利气，活血止痛。用于跌打损伤。

### 山龙眼属　Helicia Lour.

**小果山龙眼**　红叶树、羊屎果(广东)

**Helicia cochinchinensis** Lour.

生于海拔20—1 300米的山地湿润常绿阔叶林中。分布于长江流域以南各地。

根、叶：苦，凉。行气活血，祛瘀止痛。用于跌打损伤，肿痛，外伤出血。　种子：外用于烧、烫伤。

**倒卵叶山龙眼**　山枇杷(广西)

**Helicia obovatifolia** Merr. et Chun

生于海拔300—1 000米的山地常绿阔叶林中。分布于海南、广西。

叶：止咳化痰。

**常绿山龙眼**　　豆腐渣果(云南)

**Helicia nilagirica** Bedd.

生于海拔1 000—2 000米的山地和山谷常绿阔叶林中。分布于云南西南部和南部。

根、叶：涩，凉。收敛，解毒。用于泄泻，食物中毒。

附　注：功效相同的有**潞西山龙眼 H. tsaii** W. T. Wang，分布云南西南部。

**网脉山龙眼**

**Helicia reticulata** W. T. Wang

生于海拔700—1 500米的山地林中。分布于江西、福建、湖南、广东、广西、贵州、云南。

枝、叶：外用于跌打损伤。

## 假山龙眼属　Heliciopsis Sleum.

**调羹树**

**Heliciopsis lobata** (Merr.) Sleum. ——*Helicia lobata* Merr.

生于山地丛林中。分布于海南、广西。

根皮、叶：淡、涩、凉。有小毒。清热解毒。外用于疔腮。

**疔腮树**　　鹅掌枫(广西)

**Heliciopsis terminalis** (Kurz) Sleum.——*Helicia terminalis* **Kurz**

生于山地林中。分布于广东、广西、云南。

叶：用于疔腮；外用于皮炎。

# 13. 铁青树科　Olacaceae

## 赤苍藤属　Erythropalum Bl.

**赤苍藤**　　龙香藤(广西)，牛耳藤(海南)

**Erythropalum scandens** Bl.

生于海拔600—1 700米的湿润林下或路旁。分布于广东、海南、广西、贵州南部、云南。

全株(腥藤)：微苦，平。清热利尿。用于肝炎，泄泻，淋证，水肿，小便淋痛。

## 香芙木属　Schoepfia Schteber

**管花青皮木**

**Schoepfia chinensis** Gardn. et Champ.

生于山谷密林中。分布于广东西南部、广西南部、贵州。

根、树皮、叶(**华青皮木**)：甘、淡，凉。清热利湿，消肿止痛。用于急性黄疸，风湿痹

痛，跌打损伤，骨折。

**香芙木**

**Schoepfia fragrans** Wall.

生于海拔 850—2 100 米的密林、疏林或灌丛中。分布于云南南部和西南部、西藏东南部。

根：用于骨折。

**青皮木**　　幌幌木(广西)

**Schoepfia jasminodora** Sieb. et Zucc.

生于海拔 500—1 500 米的疏林中。分布于陕西南部、甘肃东南部、江苏、安徽、浙江、湖北、广西、四川、贵州、云南。

全株(脆骨风)：甘、淡，平。散瘀，消肿止痛。用于风湿关节痛，跌打肿痛。

## 14. 山柚子科　Opiliaceae

### 山柑属　Casjera Gmel.

**山柑藤**　　捞饺藤(广西)

**Casjera rheedii** Gmel.

生于山地林中及灌丛中。分布于广东、广西。

茎：用于小儿惊风。

## 15. 檀香科　Santalaceae

### 米面翁属　Buckleya Torr.

**米面翁**　　九层皮(浙江)，籽米驼(湖北)

**Buckleya lanceolata** (Sieb. et Zucc.) Miq. ——*Quadriala lanceolata* Sieb. et Zucc.; *B. henryi* Diels

生于海拔 700—1 800 米的山坡林下或路旁灌丛中。分布于山西、陕西、甘肃、安徽、浙江、河南、湖北、四川。

根：微苦，凉。清热解毒，止痛驳骨。用于痈疽，疮痒，刺痛，无名肿毒。

### 寄生藤属　Dendrotrophe Miq.

**寄生藤**　　藤香(广西)

**Dendrotrophe frutescens** (Champ.) Danser ——*Henslowia frutescens* Champ. ex Benth.

生于海拔 100—300 米的山地灌丛中，寄生于其他植物根上。分布于福建、广东、广西、云南。

全株(寄生藤)：微甘、苦、涩，平。疏风解热，除湿。用于时行感冒，跌打损伤。

## 沙针属　Osyris L.

**沙针**　　土檀香(广西)，豆瓣香(四川)

**Osyris wightiana** Wall.

生于海拔 600—2 700 米的林下、河岸或灌丛中。分布于广西、四川、云南、西藏。

根、叶(千檀香)：辛、微苦，凉。消炎，解毒，安胎，止血，接骨。用于咳嗽，胃痛，胎动不安，外伤出血，骨折，疮，疖，痈。

## 檀梨属　Pyrularia Michx.

**檀梨**

**Pyrularia edulis** (Wall.)A. DC. ——*Sphaerocarya edulis* Wall.

生于海拔 1 200—2 700 米的常绿阔叶林中。分布于福建、湖北、广东、广西、四川、云南、西藏。

茎皮：用于跌打损伤。　种子：用于烧、烫伤。

## 檀香属　Santalum L.

**檀香**　　白檀(通称)，檀香树(广东)

**Santalum album** L.

原产太平洋岛屿。广东、广西、云南有栽培。

心材(檀香)：辛，温。理气，和胃，止痛。用于胸腹疼痛，气逆，呕吐，胸痹闷痛。檀油：用于尿道消毒剂。　心材中树脂(檀香泥)：用于胃气滞痛，肝郁不舒。

**附　注**：《中华人民共和国药典》1990 年版附录收载。

## 百蕊草属　Thesium L.

**百蕊草**　　细须草(浙江)，黄花蛇舌草(湖南)，地石榴(四川、贵州)

**Thesium chinensis** Turcz.

生于海拔 500—2 700 米的沙地边缘或草地上，寄生于其他植物根上。分布于东北、华北、华东及陕西、甘肃、青海、河南、湖北、广东、广西、贵州、云南。

全草(百蕊草)：辛、苦，平。清热解毒，解暑。用于风热咳喘，肺脓疡，乳蛾，乳痈。

**长梗百蕊草**

**Thesium chinensis** Turcz. var. **longipedunculata** Chu

生于干山坡、灌丛。分布于东北。

全草：清风散热，解痉。

**短梗百蕊草**　　藏南百蕊草(西藏)

**Thesium emodi** Hendrv.

生于海拔 2 900—3 300 米的向阳山坡、草地或河滩石砾地。分布于我国西藏。

全草：清热解毒，消肿。

**喜马拉雅百蕊草**　　九仙草(昆明民间常用草药)，西域百蕊草(新华本草纲要)

**Thesium himalense** Royle

生于山地疏林下。分布于四川、云南西北部。

全草(绿珊瑚)：甘、微苦，凉。清热解痉，利湿消疳。用于小儿风热咳喘，咳嗽痰喘，肝炎，小儿疳积，腓肠肌痉挛，风湿骨痛，血小板减少性紫癜。

附　注：功效相同的有**长花百蕊草 T. longiflorum** Hand. -Mazz.，分布于四川、云南、西藏。

**长叶百蕊草**　　珍珠草(贵州、云南)

**Thesium longifolium** Turcz.

生于林缘、草地。分布于东北及河北、内蒙古、甘肃、宁夏、青海、四川、云南。

全草：杀虫，止痒，止痢，祛风清热，解痉。用于感冒，中暑，小儿风热咳喘，咳嗽，惊风。

**急折百蕊草**　　狗牙草(四川)，九龙草(贵州)，九仙草(云南昆明)

**Thesium refractum** Mey.

生于多沙石地。分布于东北、华北、西南及陕西、青海、新疆。

全草(绿珊瑚)：甘、微苦，凉。清热解痉，利湿消疳。用于感冒，咳嗽，小儿惊风，风湿骨痛，小儿疳积。

## 16. 桑寄生科　Loranthaceae

### 五蕊寄生属　Dendrophthoe Mart.

**五蕊寄生**　　槲树寄生(广西)

**Dendrophthoe pentandra** (L.) Miq. ——*Loranthus pentandrus* L.

生于低海拔平原至 1 600 米的山地常绿阔叶林中，寄生于乌榄、油桐、杧果等植物上。分布于广东、广西、云南。

全株：用于痢疾，腰痛，虚劳。

### 离瓣寄生属　Helixanthera Lour.

**离瓣寄生**　　五瓣桑寄生(海南植物志)

**Helixanthera parasitica** Lour. ——*Loranthus pentapetalus* Roxb.

生于低海拔平原至 1 500 米的山地常绿阔叶林中，寄生于锥属、榕属及油桐、苦栋等植物上。分布于福建、广东、广西、贵州、云南、西藏东南部。

茎叶：用于痢疾，腰痛，虚劳，肺痨，咳嗽。

**油茶离瓣寄生**

**Helixanthera sampsoni** (Hance) Danser ——*Loranthus sampsoni* Hance

生于海拔 50—500 米的山地常绿阔叶林中或疏林中，寄生于樟科、大戟科及油茶等植物上。分布于福建、广东、广西、云南南部。

全株：用于风热咳喘，风湿痛。　叶：外用于鹤膝风。

## 栗寄生属　Korthalsella Van Tiegh.

**栗寄生**

**Korthalsella japonica** (Thunb.) Engl. ——*Viscum japonicum* Thunb.; *V. opuntia* Thunb.; *K. opuntia* (Thunb.) Merr.

常寄生于樟科、山茶科及栎树、冬青等木本植物上。分布于西南及浙江、福建、台湾、湖北、广东、广西。

茎枝(栗寄生)：祛风除湿，养血安神。用于胃病，跌打损伤。

## 桑寄生属　Loranthus L.

**槲桑树寄生**　　总序桑寄生(湖北)，杂木寄生(广西植物名录)

**Loranthus delavayi** Van Tiegh.

生于海拔 550—3 000 米的山地阔叶林中，常寄生于壳斗科植物上。分布于西南及浙江、福建、台湾、陕西、湖北、广东、广西。

全株：功效见北桑寄生。

**北桑寄生**　　杏寄生(山西)，宜枝(陕西)

**Loranthus tanakae** Franch. et Sav.

生于海拔 950—2 000 米的山地阔叶林中，寄生于栎树和榆树上。分布于华北及陕西、甘肃、新疆、山东、四川北部。

枝叶：补肝肾，强筋骨，祛风湿，安胎。

## 鞘花属　Macrosolen(Bl.) Reichb.

**双花鞘花**　　八角寄生(广西)

**Macrosolen bibracteolatus** (Hance) Danser ——*Loranthus bibracteolatus* Hance

生于海拔 300—2 000 米的常绿阔叶林中，寄生于樟属、山茶属、灰木属等植物上。分布于广东、广西、贵州东南部、云南西南部和南部。

全株：用于风湿痛，痰咳。

**鞘花**　　杉寄生(广东、广西)，枫木鞘花(海南植物志)，八角鞘花寄生(新华本草纲要)

**Macrosolen cochinchinensis** (Lour.) Van Tiegh. ——*Loranthus cochinchinensis* Lour.

生于海拔 20—1 600 米的平原或山地常绿阔叶林中，寄生于油桐、杉木、油茶等乔木上。分布于福建、广东、广西、四川、贵州、云南。

茎、叶：祛风除湿，清热止咳，补肝肾。用于痉症，痢疾，咳血，风湿筋骨痛。

## 梨果寄生属 Scurrula L.

**卵叶梨果寄生** 水东哥寄生(广西)，卵叶寄生(新华本草纲要)

**Scurrula chingii** (Cheng) H. S. Kiu ——*Loranthus chingii* Cheng

生于海拔 90—1 100 米的山地常绿阔叶林中，寄生于油茶、木油桐、木菠萝等树上。分布于广西、云南南部和东南部。

全株：用于风湿痛，痢疾，小儿睾丸炎。

**锈毛梨果寄生** 滇南寄生(中国高等植物图鉴)，桑上寄生(中药志)

**Scurrula ferruginea** (Jack) Danser——*Loranthus ferruginea* Jack

生于海拔 1 500—2 150 米的山坡灌丛，寄生于茶科、桑科等多种植物上。分布于云南西南部和南部。

枝叶：强壮，安胎。用于腰膝痛，神经痛，高血压症，血管硬化性四肢麻木。

**红花寄生** 桑寄生(本草纲目)

**Scurrula parasitica** L.——*Loranthus parasitica* (L.) Merr.

生于海拔 20—1 000 米的沿海平原或山地常绿阔叶林中，常寄生于柚、桔、黄皮等果树或茶科、大戟科、蔷薇科等植物上。分布于江西南部、福建、台湾、广东、广西、四川、贵州、云南。

全株：补肝肾，祛风湿，强筋骨，养血，安胎，降血压。用于风湿痹痛，腰酸软，下肢麻木，胎动不安。

附 注：功效相同的有**小红花寄生 S. parasitica L. var. graciliflora** (Wall. ex DC.) H. S. Kiu，分布于广西、贵州西南部、四川、云南，寄生于桃、柿、石榴等植物上。

**梨果寄生** 马桑寄生(新华本草纲要)

**Scurrula philippensis** (Cham. et Schlecht.) G. Don——*Loranthus philippensis* Cham. et Schlecht.

生于海拔 1 200—2 900 米的山地阔叶林中，常寄生于楸树、油桐、桑树或壳斗科植物上。分布于广西西北部、贵州西南部、云南。

全株：有大毒。用于偏头痛，风湿关节痛，跌打损伤。

## 钝果寄生属 Taxillus Van Tiegh.

**栗毛钝果寄生** 栗毛寄生(云南植物志)

**Taxillus balansae** (Lecomte) Danser——*Loranthus balansae* Lecomte

生于海拔 400—1 200 米的山地常绿阔叶林中，寄生于枫树、石栗、荷树、马尾树或木兰科、壳斗科等植物上。分布于广西西南部和南部、云南东南部。

全株：用于泄泻；外用于跌打损伤，骨折。

**松柏钝果寄生**　　油杉寄生(广西)，松寄生(中国高等植物图鉴)

**Taxillus caloreas** (Diels) Danser——*Loranthus caloreas* Diels

生于海拔900—2 000米的山地针叶林或针阔混交林中，寄生于松属、油杉属、云杉属、雪松属等树上。分布于西南及福建、台湾、湖北、广东、广西。

全株：用于风湿关节痛，哮喘，肺痨，胃痛。

**广寄生**　　寄生茶(广西)，松树桑寄生(海南植物志)

**Taxillus chinensis** (DC.) Danser——*Loranthus chinensis* DC.

生于海拔20—400米的平原或低山常绿阔叶林中，常寄生于桑树、桃树、李树、龙眼、荔枝、杨桃、油茶、油桐、橡胶树、榕树等多种植物上。分布于福建南部、广东、广西。

带叶茎枝(桑寄生)：苦、甘，平。补肝肾，强筋骨，祛风湿，安胎。用于风湿痹痛，腰膝酸软，筋骨无力，崩漏经多，妊娠漏血，胎动不安，高血压症。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**柳叶钝果寄生**　　柳寄生(四川)，火把树寄生(云南)，花椒寄生(新华本草纲要)

**Taxillus delavayi** (Van Tiegh.) Danser——*Phyllodesmis delavayi* Van Tiegh.; *Loranthus delavayi* (Van Tiegh.) Engl.

生于海拔1 800—3 500米的高原或山地阔叶林或针叶、阔叶混交林中，寄生于花楸、山楂、樱桃、梨树、桃树、马桑或柳属、桦属、栎属等植物上。分布于西南及广西。

全株：舒筋活络。用于胎动，风湿腰痛。

**锈毛钝果寄生**　　连江寄生(广西、贵州)，李寄生(新华本草纲要)

**Taxillus levinei** (Merr.) H. S. Kiu——*Loranthus levinei* Merr.

生于海拔600—1 600米的山地或山谷常绿阔叶林中，常寄生于油茶、樟树、板栗或壳斗科植物上。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、云南东南部。

全株：用于风湿腰腿痛，肺痨，咳嗽痰喘。

**木兰寄生**　　枫木寄生(广西)，粤桑寄生(海南植物志)

**Taxillus limprichtii** (Grüning) H. S. Kiu——*Loranthus limprichtii* Grüning

生于海拔240—1 300米的山地阔叶林中，寄生于乐东木兰、金叶含笑，枫香、槭木、油桐、樟树、栗、梧桐等植物上。分布于江西南部、福建、台湾、湖南、广东、广西、四川东部、贵州南部、云南东南部。

全株：祛风除湿，补肝强筋，安胎下乳。　茎叶：用于痔疮，全身酸痛，骨折。

**显脉木兰寄生**　　赤柯寄生(台湾)，螃蟹脚(广东、四川、云南)

**Taxillus limprechtii** (Grüning) H. S. Kiu var. **liquidambaricoides** (Hayata) H. S. Kiu——*Viscum liquidambaricolum* Hayata

生于海拔200—750米的山地阔叶林中或常绿阔叶林中，寄生于枫香、油桐、柿或壳斗科等植物上。分布于西南及陕西西南部、甘肃、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西。

全株：辛，温。祛风，活血，除湿，止咳，化痰。用于风湿关节痛，腰肌劳损，瘫痪，痢疾，带下病。

**毛叶钝果寄生**　　寄生泡(陕西、四川)，借母怀胎(湖南)，柿寄生(中药志)

**Taxillus nigrans** (Hance) Danser——*Loranthus nigrans* Hance

生于海拔300—1 300米的山地、丘陵或河谷盆地阔叶林中，寄生于樟树、桑、油茶或栎属、柳属植物上。分布于陕西、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

全株(寄生)：祛风除湿，安胎下乳，止咳化痰，安神镇痛。

附　注：四川地方标准收载。

**桑寄生**　板栗寄生(湖北)，四川桑寄生(湖北植物志)，桑上寄生(本草纲目)

**Taxillus sutchuenensis** (Lecomte) Danser——*Loranthus sutchuenensis* Lect.

生于海拔500—1 900米的山地阔叶林中，寄生于桑、梨、李、梅、油茶、漆树、核桃或栎属、桦属、榛属等植物上。分布于山西、陕西、甘肃、浙江、江西、福建、台湾、广西、海南、四川、贵州、云南。

全株(川寄生)：消肿止痛，祛风湿，安胎。用于疮疖，风湿筋骨痛，胎动不安。

附　注：①四川地方标准收载。②功效相同的有**灰毛桑寄生** **T. sutchuenensis** (Lecomte) Danser var. **duclouxii** (Lecomte) H. S. Kiu，分布于湖北、湖南、四川、贵州、云南。

**滇藏钝果寄生**　梨寄生(云南)，牛筋刺寄生(新华本草纲要)

**Taxillus thibetensis** (Lecomte) Danser——*Loranthus thibetensis* Lecomte

生于海拔1 700—2 700米的山地阔叶林中，常寄生于梨、柿、板栗、李或栎属等植物上。分布于四川西南部、云南、西藏东南部。

全株：解毒止咳，消炎。用于小儿中蛊毒，腹内坚痛，面目青黄，淋露不尽，咳嗽，小便淋痛。

## 大苞寄生属　Tolypanthus (Bl.) Reichb.

**黔桂大苞寄生**　榔榆寄生(新华本草纲要)

**Tolypanthus esquirolii** (Lévl.) Lauener——*Loranthus esquirolii* Lévl.

生于海拔1 100—1 200米的山地或山谷阔叶林中，寄生于枇杷、油桐或山茶属植物上。分布于广西、贵州。

全株：清热，补肝肾，祛风湿，止咳。

**大苞寄生**

**Tolypanthus maclurei** (Merr.) Danser——*Loranthus maclurei* Merr.

生于海拔150—900米的山地、山谷或溪畔常绿阔叶林中，寄生于油茶，槲木、柿、紫薇或杜鹃属、杜英属、冬青属等植物上。分布于江西西部和南部、福建西南部、湖南、广东、广西、贵州南部和东部。

全株：用于风湿痛。

## 槲寄生属　Viscum L.

**卵叶槲寄生**　阔叶槲寄生(云南植物志)，白果槲寄生(新华本草纲要)

**Viscum album** L. var. **meridianum** Danser

生于海拔 1 300—2 400 米的山地阔叶林中，寄生于樱桃、花楸、胡桃、云南鹅耳枥等植物上。分布于云南、西藏。

全株：强壮，消肿，催乳。

**扁枝槲寄生**　　榕树寄生(广西)，麻栎寄生(云南)

**Viscum articulatum** Burm. f.

生于海拔 50—1 200 米的沿海平原或山地南亚热带季雨林中，常寄生于桑寄生科、壳斗科、大戟科、樟科、檀香科等植物上。分布于广东、广西、云南。

全株：微苦，平。祛风利湿，舒筋活血，止血。用于风湿关节痛，腰肢酸痛，风湿骨痛，劳伤咳嗽，痢疾，产后血气痛，鼻衄，小便淋痛。

附　注：四川地方标准收载。

**槲寄生**　　冬青(东北)，冬青条、倒吊草(河北)，寄生柴(湖南)，北寄生(中药志)

**Viscum coloratum**. (Kom.) Nakai——*V. album* L. subsp. *coloratum* Kom.

生于海拔 500—1 400 米的阔叶林中，寄生于榆、杨、柳、桦、栎、梨、苹果、枫杨或椴属植物上。除新疆、广东、广西、云南、西藏外，全国各地均有分布。上产河北、辽宁、吉林。

茎叶(槲寄生)：甘、苦，平。祛风湿，补肝肾，强筋骨，安胎。用于风湿痹痛，腰膝酸软，胎动不安。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**柿寄生**　　棱枝槲寄生(海南)，梨寄生(广西)，桑寄生(西藏常用中草药)

**Viscum diospyrosicolum** Hayata

生于海拔 20—1 000 米的平原或山地常绿阔叶林中，寄生于柿、梨、樟、油桐或壳斗科等植物上。分布于中南、西南及陕西、甘肃、浙江、江西、福建、台湾。

全株：苦，平。祛风舒筋，止咳，清热，消炎。用于肺痨，吐血，风湿痛，胃痛，乳疮，小儿咳嗽。

**五脉槲寄生**

**Viscum monoicum** Roxb. ex DC.

生于海拔 700—1 360 米的山地疏林或常绿阔叶林中，寄生于垂叶榕、石榴、桂花或吴茱萸属植物上。分布于广西西部、云南南部和东南部。

全株：用于关节痛。

**柄果槲寄生**　　三桠乌树上寄生(广东)，寄生茶(广西)

**Viscum multinerve** (Hayata) Hayata——*V. orientale* Willd. var. *multinerve* Hayata

生于海拔 200—1 200 米的山地常绿阔叶林中，寄生于锥栗属、柯属或樟属植物上。分布于江西、福建、台湾、广东、广西、贵州西南部、云南南部和东南部。

全株：微苦，平。祛风除湿。用于跌打，骨折，腰腿痛。

**绿茎槲寄生**

**Viscum nudum** Danser

生于海拔 2 150—3 800 米的山地阔叶林中，寄生于杨属、柳属、榛属或化香树、桦、梨、桃等植物上。分布于四川、贵州西北部、云南。

全株：祛风湿，安胎，降压。

**瘤果槲寄生**　　柚寄生(广西)

**Viscum ovalifolium** DC.

生于海拔 10—1 100 米的沿海红树林中或平原、盆地、山地亚热带季雨林中，寄生于柚、黄皮、柿、无患子、柞木、板栗、海桑、海莲等植物上。分布于广东、广西、云南南部。

全株：祛风，止咳，化痰，清热解毒。用于风湿脚肿，咳嗽，麻疹，痢疾，疳积。

## 17. 蛇菰科　Balanophoraceae

### 蛇菰属　Balanophora Forst. et Forst. f.

**隐轴蛇菰**　　密都(拉祜语)

**Balanophora crytocaudex** S. Y. Chang et Tam

生于海拔 1 900 米的山坡林中。分布于云南。

全株：用于神经官能症，阳痿，慢性肝炎，外伤出血，消化道出血，月经过多，咳嗽痰喘，阴茎感染。

**粗穗蛇菰**

**Balanophora dioica** R. Br. ex Royle

生于海拔 1 150—2 510 米的山地密林中。分布于湖南、云南、西藏。

全草：用于毒蛔，刀伤。

**红冬蛇菰**　　蛇菰(云南)

**Balanophora harlandii** Hook. f.

生于海拔 600—2 100 米的阴蔽林中较湿润的腐殖质土壤处。分布于广东、广西、云南。

全草：壮阳补肾，止血生肌。用于神经官能症。

**宜昌蛇菰**　　土菌子(四川)

**Balanophora henryi** Hemsl.

生于海拔 600—1 700 米湿润的杂木林中。分布于陕西、湖北、广东、广西、四川、贵州。

全草：用于吐血，鼻衄，外伤出血。

附　注：拉祜族药"密都"。

**印度蛇菰**

**Balanophora indica** (Arn.) Griff.——*Langodorffia indica* Arn.

生于海拔 900—1 500 米的常绿阔叶林中。分布于海南、广西东南部、云南。

全株：民间用作补药。

**苞鞘蛇菰**　　葛花(四川)，寄生黄(贵州)，鹿仙草(云南)

**Balanophora involucrata** Hook. f.

生于海拔 2 300—3 600 米的云杉、铁杉和栎林中。分布于西南及湖南。

全草：苦、涩，温。壮阳补肾，健脾理气，止血。用于阳痿，神经官能症，慢性肝炎，胃

痛，消化道出血，月经过多。

**日本蛇菰**　土心肝(浙江)，鸡心七(湖北)，红血莲(四川)

**Balanophora japonica** Makino

生于海拔 1 500 米左右的林下，寄生于木本植物根上。分布于甘肃、浙江、江西、福建、河南、海南、广西、四川、贵州、云南。

全草：苦、涩，寒。清热解毒，凉血止血。用于咳嗽吐血，血崩，痔疮肿痛，指疔。

**疏花蛇菰**　石上莲(广东)，通天蜡烛(广西)，密都(拉祜语)

**Balanophora laxiflora** Hemsl.

生于海拔 660—1 700 米的山坡密林中。分布于福建、湖北西部、广东、广西、四川、云南。

全草：苦，凉。清热凉血。用于痔疮，虚劳出血，腰痛。

**多蕊蛇菰**　木菌子(海南)，土苁蓉(广西)

**Balanophora polyandra** Griff.

生于海拔 1 000—2 500 米的山坡密林下。分布于湖北、广东、广西、四川、云南、西藏。

全草：滋阴补肾，止痛。用于阳痿，淋证。

**穗花蛇菰**　地荔枝(广西)

**Balanophora spicata** Hayata

生于海拔 700—1 300 米的山谷阔叶林中。分布于江西、台湾、湖南、广东、广西、四川、云南。

全株：行气止痛。用于腰痛，痔疮，肝炎。

**杯茎蛇菰**

**Balanophora subcupularis** Tam

生于海拔 650—1 450 米的山坡密林中。分布于江西、福建、湖南、广东、广西、云南。

全草：苦、涩，凉。清热凉血，消肿解毒。

## 18. 蓼科　Polygonaceae

### 金线草属　Antenoron Raf.

**金线草**　人字草(浙江)，化血归(湖北)，血经草(湖南)

**Antenoron filiforme** (Thunb.) Roberty et Vautier——*Polygonum filiforme* Thunb.; *Tovara virginiana* (L.) Raf. var. *filiformis* (Thunb.) Steward

生于海拔 500—1 200 米的山坡林阴下、山坡草丛中或沟溪旁。分布于中南及山西、陕西、山东、江苏、浙江、江西、福建、台湾、四川、贵州、云南。

块根或全草(金线草)：辛，凉。凉血止血，祛瘀止痛。用于风湿骨痛，胃痛，咳血，吐血，产后血瘀腹痛，跌打损伤。

附　注：功效相同的有**短毛金线草 A. neofoliforme** (Nakai) Hara——*Polygonum neofiliforme* Nakai，分布于华东及山西、陕西、甘肃、河南、湖北、湖南、广东、四川、贵州、云南。

## 沙拐枣属 Calligonum L.

**白皮沙拐枣**

**Calligonum leucocladum** (Schrenk) Bunge

生于沙漠地区。分布于新疆北部。

全草：收敛止泻。

**沙拐枣**

**Calligonum mongolicum** Turcz.

生于沙丘及沙地。分布于内蒙古、甘肃、宁夏、新疆。

根及带果全枝(沙拐枣)：苦、涩，微温。用于小便混浊，皮肤皲裂。

## 荞麦属 Fagopyrum Mill.

**金荞麦** 荞麦当归(湖北)，荞麦三七(浙江民间常用草药)

**Fagopyrum dibotrys** (D. Don) Hara——*F. cymosum* (Trev.) Meissn. *Polygonum cymosum* Trev.

生于海拔600—1 000米的沟岸、路旁。分布于中南、西南及陕西、甘肃、江苏、浙江、江西、福建。

根及根状茎(金荞麦)：微辛、涩，凉。清热解毒，活血散瘀，祛风除湿。用于咽喉痛，痈疮，瘰疬，肝炎，肺痈，头风，胃痛、痢疾，带下病。

**荞麦** 花麦(湖南)，荞子(贵州)

**Fagopyrum esculentum** Moench——*Polygonum fagopyrum* L.

全国各地普遍种植，有时逸生于路旁荒地上。

茎叶：酸，寒。降压，止血。用于噎食，痈肿。 种子：甘，凉。降气宽肠，导滞，消肿毒。用于肠胃积滞，泄泻，痈疽发背，烧、烫伤。

**细梗荞麦**

**Fagopyrum gracilipes** (Hemsl.) Dammer——*Polygonum gracilipes* Hemsl.

生于海拔300—2 000米的山坡、路旁、林下、河滩地或农田地边。分布于陕西、甘肃、湖北、四川、云南。

全草：清热解毒，活血散瘀，健脾利湿。 种子：开胃，宽肠。

**苦荞麦** 荞叶七(陕西草药)，苦荞头(贵州民间方药集)

**Fagopyrum tataricum** (L.) Gaertn.——*Polygonum tataricum* L.

生于海拔700—2 000米的山地、沟谷、河滩地，栽培或半野生。分布于东北、西北、西南。

块根及根状茎：甘、苦，平。健胃顺气，除湿止痛。用于胃痛，消化不良，痢疾，劳伤，腰腿痛。

## 竹节蓼属 Muelhenbeckia Meissn.

**竹节蓼** 飞天蜈蚣(广西),百足草(广州植物志)

**Muelhenbeckia platycladum** (F. Muell. ex Hook.) Meissn. ——*Coccoloba platyclada* F. Muell. ex Hook.; *Homalocladium platycladum* (F. Muell. ex Hook.) L. H. Bailey

原产南太平洋所罗门群岛。全国南北各地庭园、温室均有栽培。

茎、叶: 甘、淡,平。行血祛瘀,生新止痒,消肿止痛。用于痈疮肿痛,跌打损伤,毒蛇及蜈蚣咬伤。

## 山蓼属 Oxyria Hill

**肾叶山蓼** 酸浆草(陕西中草药)

**Oxyria digyna** (L.) Hill——*Rumex digynus* L.

生于海拔 2 000—3 600 米的高山草地、山坡或山谷。分布于吉林、陕西、甘肃、青海、四川、云南、西藏。

全草: 酸,凉。清热利湿。用于肝气不舒,肝炎,坏血病。

## 蓼属 Polygonum L.

**头状蓼** 尼泊尔蓼(中国高等植物图鉴),猫儿眼睛(四川常用中草药)

**Polygonum alatum** Buch. -Ham. ex D. Don——*P. nepalense* Meissn.; *Persicaria alata* (Buch -Ham. ex D. Don) Nakai

生于海拔 800—2 700 米的山坡、沟谷湿地、路旁或农田地边。分布于全国各地。

全草: 苦,寒。清热解毒,收敛固肠。用于咽喉痛,目赤,牙龈肿痛,赤痢,关节痛,胃痛。

**狐尾蓼**

**Polygonum alopecuroides** Turcz. ex Besser

生于河边草甸。分布于吉林、内蒙古。

根状茎: 清热解毒,凉血止血。内蒙古部分地区作草河车入药。

**两栖蓼** 小黄药(贵州草药)

**Polygonum amphibium** L.——*Persicaria amphibia* (L.) S. F. Gray

生于低海拔湖泊、河流浅水中及水边湿地。分布于东北、华北及陕西、宁夏、山东、江苏北部、安徽、河南、湖北、四川、贵州、云南。

全草(两栖蓼): 苦,平。清热利湿。用于痢疾;外用于疔疮。

附 注: ① 山东昌维地区用于肥大性脊椎炎。② 相同功效与分布的有**千型两栖蓼** **P. amphibium** L. var. **terrestre** Leyss.

**抱茎蓼**

**Polygonum amplexicaule** D. Don——*Bistorta amplexicaule* (D. Don) Greene

生于海拔 1 000 米以上的高山林缘草丛及山谷沟边。分布于湖北、四川、云南。

根状茎：顺气解痉，散瘀止血，止痛生肌，抗菌消炎。

**中华抱茎蓼**　血三七(湖北)，红孩儿(四川)

**Polygonum amplexicaule** D. Don var. **sinense** Forb. et Hemsl.

生于海拔 1 300—1 500 米的阴湿山沟或草丛中。分布于陕西、湖北、四川、云南。

根状茎(鸡血七)：微苦、涩，平。有小毒。清热解毒，收敛止泻，活血止痛。用于痢疾，泄泻，跌打损伤，外伤出血。

附　注：本种不宜与鸡冠花、钩藤同用。

**毛叶耳蓼**

**Polygonum attenuatum** V. Petrov ex Kom.

生于山地草丛中。分布于吉林。

根状茎：清热解毒，凉血，消肿，定惊。

**木藤蓼**

**Polygonum aubertii** L. Henry——*Fallopia aubertii* (L. Henry) Holub

生于海拔 500—2 000 米的山坡，山沟向阳的灌丛中，或栽培。分布于西南及内蒙古、陕西、甘肃、宁夏。

块根(酱头)：苦、涩，凉。清热解毒，调经止血。用于痢疾，消化不良，胃痛，月经不调。

**萹蓄**　牛筋草(陕西)，太阳草(浙江)，斑鸠台(安徽)，地蓼(中药志)

**Polygonum aviculare** L.

生于田野、荒地或水边湿地。全国各地普遍分布。

地上部分(萹蓄)：苦，凉。利尿通淋，杀虫，止痒。用于膀胱热淋，小便短赤，淋沥涩痛，皮肤湿疹，阴痒症，带下病。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。② 功效类似的有**紧穗萹蓄 P. aviculare L.** var. **rigidum** (Skv.) H. C. Fu，分布宁夏贺兰山；**多茎萹蓄 P. aviculare** L. var. **vegetum** Ledeb.，分布于江苏、安徽、浙江、河南、四川、贵州。

**毛蓼**　四季青(植物名实图考)

**Polygonum barbatum** L.

生于海拔 1 000 米以下的路旁、沟边及林阴下。分布于江苏、安徽、浙江、福建、台湾、湖北、广东、广西、四川、贵州、云南。

根：辛，温。收敛。　全草：拔毒生肌，通淋。　种子：催吐，止泻。

**细毛刺蓼**　小毛蓼(种子植物名称)，蓼子草(四川中药志)

**Polygonum barbatum** L. var. **gracile** (Danser) Steward——*P. barbatum* L. subsp. *gracile* Danser

生于海拔 500—1 000 米的山地沟边、路旁。分布于江苏、上海、广西、四川、贵州。

全草及根：微辛，温。散寒，活血。用于麻疹，大病后虚寒，腹痛，跌损后受寒，阴寒及陈寒。

**拳参**　紫参(河北、湖南、贵州)，倒根草(新疆)，虾参(山东)，马峰七(广西)

**Polygonum bistorta** L.——*Bistorta vulgaris* Hill ex H. Gross

生于山坡草甸或林间草甸。分布于华北、西北及吉林、山东、江苏、安徽、浙江、河南、湖北、四川、贵州。主产河北、山西、山东、河南。

根状茎(拳参)：苦、涩，凉。清热解毒，消肿，止血。用于赤痢，热泻，肺热咳嗽，瘰疬，口舌生疮，吐血，衄血，痔疮出血，毒蛇咬伤。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**柳叶刺蓼**

**Polygonum bungeanum** Turcz.

生于田边、路旁湿地。分布于华北及黑龙江、辽宁、山东。

根：清热解毒，利尿。

**丛枝蓼**　太阳草(四川)，钻之莲(贵州)

**Polygonum čaespitosum** Bl.——*Persicaria caespitosa*(Bl.) Nakai

生于海拔700—2 000米的山坡林阴下、路旁、沟边。分布于中南及陕西、甘肃、江苏、上海、江西、福建、四川、贵州、云南。

全草：清热解毒，凉血止血。用于腹痛泄泻，痢疾。

**钟花蓼**

**Polygonum campanulatum** Hook. f.

生于海拔1 200米左右的山坡灌丛中。分布于四川、贵州、云南。

全草(猪蓼草)：活血散瘀，消肿。用于无名肿毒，阴疽，瘰疬，带下病。

**头花蓼**　岩荞麦(湖北)，水绣球(贵州)，石莽草(广西中药志)

**Polygonum capitatum** Buch.-Ham. ex D. Don——*Persicaria capitata*(Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross

生于海拔250—500米的山坡路旁或岩缝中。分布于江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草(红酸杆)：酸，寒。解毒散瘀，利尿通淋。用于痢疾，石淋，水肿，风湿痛，跌打损伤，疮疡湿疹。

**火炭母**　赤地利(浙江)，白饭草(广东)，老鼠蔗(广西)，暑药(四川中药志)

**Polygonum chinense** L.——*Persicaria chinensis* (L.) H. Gross

生于海拔1 200—2 200米的山坡路旁、沟溪边或宅院旁。分布于西南及安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西。

全草(火炭母草)：微酸，凉。清热解毒，利湿消滞。用于泄泻，痢疾，黄疸，风热咽痛，虚热头昏，带下病，痈肿湿疮。　根：酸、甘，平。益气行血。用于气虚头昏，耳鸣耳聋，跌打损伤。

附　注：功效相似的有**卵叶火炭母 P. chinense** L. f. **ovalifolium** Meissn，分布于贵州、云南。

**粗毛火炭母**　小红人(云南思茅中草药选)

**Polygonum chinense** L. var. **hispidum** Hook. f.

生于山谷湿地、路旁。分布于贵州、云南。

块根：酸，平。通络活血，止血解毒。用于痢疾，泄泻，月经不调，血崩，产后流血过

多。

**毛脉蓼**　朱砂七(陕西),朱砂莲(湖北)

**Polygonum cilinerve** (Nakai) Ohwi——*Pleuropterus ciliinervis* Nakai; *P. multiflorum* Thunb. var. *cillinerve* (Nakai) Steward

生于海拔 800—1 800 米的山坡密林、沟边、路旁及乱石缝中。分布于东北及陕西、甘肃、宁夏、河南、湖北、四川、贵州。

块根: 苦、微涩,凉。有小毒。清热解毒,止痛,止血,调经。用于乳蛾,吐泻,溃疡病,痢疾。

**卷茎蓼**　荞麦蔓(贵州)

**Polygonum convolvulus** L.——*P. dumetorum* L.

生于海拔 600—1 600 米的山坡草地或农田中。分布于东北、华北及陕西、甘肃、新疆、山东、江苏北部、河南、贵州。

全草: 清热解毒,消肿。　根: 健胃,止咳,镇痛,解毒。用于肺痨咳血,顿咳,胃气痛。

**革叶蓼**　伴蛇莲(广西药用植物名录)

**Polygonum coriaceum** Sam.

生于路旁潮湿地或水沟边。分布于广西、云南、西藏。

根状茎: 苦,寒。有小毒。清热解毒。用于痢疾,口腔破溃,牙龈炎,痈肿,痔疮,烧伤。

**虎杖**　活血丹(江苏),酸筒杆(湖南),大叶蛇总管(广西),窝巩料(苗语)

**Polygonum cuspidatum** Sieb. et Zucc.——*Pleuroterus cuspidatus* (Sieb. et Zicc.) H. Gross

生于海拔 2 500 米以下的山坡草地、林下沟边或路旁。分布于华东、中南及辽宁、陕西、甘肃、四川、贵州、云南。部分地区有栽培。

根及根状茎(虎杖): 微苦,凉。祛风利湿,散瘀定痛,止咳化痰。用于关节痹痛,湿热黄疸,经闭,咳嗽痰多,跌打损伤。　叶: 微酸,凉。祛风,凉血,解毒。

附　注:《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**牛皮消蓼**　毛血藤(贵州植物志)

**Polygonum cynanchoides** Hemsl.

生于海拔 750—1 200 米的河岸或山沟中。分布于陕西、甘肃、湖北、四川、贵州、云南。

根: 辛、涩,凉。敛肺止咳,镇痉止痛。用于肺痨咳血,顿咳,胃气痛,劳伤咳嗽,风湿关节痛。

**血苋**

**Polygonum denticulatum** Huang

生于山坡向阳灌丛中,缠绕于其他植物上。分布于贵州。

块根: 清热解毒,和血散瘀,收敛止血,平喘。用于痢疾,产后腹痛,跌打红肿。

**齿翅蓼**

**Polygonum denta-alatum** F. Schmidt ex Maxim.

生于海拔500—2 000米的山坡灌丛、河岸或荒地。分布于黑龙江、辽宁、河北、陕西、甘肃、河南。

全草：用于目赤。

**稀花蓼**　红降龙草(湖北)

**Polygonum dissitiflorum** Hemsl.——*Persicaria dissitiflorum*(Hemsl.)H. Gross

生于海拔750—1 500米的林下阴湿地或河岸。分布于东北、华北、华东、中南及陕西、甘肃。

全草：解毒，利尿。用于蛇咬伤，小便淋痛。

**叉分蓼**　酸不溜(东北)，酸姜(东北、中国沙漠地区药用植物)

**Polygonum divaricatum** L.——*Persicaria divaricata* (L.) H. Gross

生于山坡草地。分布于华北及吉林、辽宁、青海、山东、湖北、四川、西藏。

根：酸、甘，温。祛寒，温肾。用于寒疝，阴囊出汗。

**红蓼蓼**

**Polygonum emodi** Meissn.——*Bistorta emodi* (Meissn.) V. Petrov

生于山坡草地。分布于四川、云南。

全草：淡，微温。舒筋活血。用于跌打损伤，风湿痛。

**中轴蓼**

**Polygonum excurrens** Steward——*Persicaria excurrens* (Steward) Koidz.

生于海拔1 000米以下的山坡草丛中或山谷。分布于东北、华北及安徽、江西、湖北。

全草：止痛，杀虫。

**辣蓼**　辣马蓼(江西)，蓼子草(四川)

**Polygonum flaccidum** Meissn.——*P. hydropiper* L. var. *flaccidum* (Meissn.) Steward; *Persicaria flaccida*(Meissn.) H. Gross ex Loes.

生于近水旁湿润地。分布于东北及江西、福建、广东、四川、贵州。

全草(辣蓼)：辛，温。有小毒。祛风利湿，消滞，散瘀，止痛，杀虫。用于痢疾，泄泻，崩漏，乳蛾，风湿关节痛，跌打肿痛。

**翼蓼**

**Polygonum giraldii** Dammer

生于海拔600—1 800米的山坡路旁、沟岸或灌中。分布于河北、山西、陕西、甘肃、河南、湖北、四川、贵州。

块根(红药子)：酸、苦，凉。清热解毒，止血止痛。用于腹泻，痢疾，腰腿痛，便血，崩漏；外用于烧、烫伤，疮疖，狂犬咬伤。

**长梗蓼**

**Polygonum griffithi** Hook. f.

生于海拔3 300—4 400米的山坡草地或石缝中。分布于我国西藏错那、察隅。

根状茎：清热解毒。

**异叶蓼**

**Polygonum heterophyllum** Lindm.

生于路旁。分布于东北。

全草：清热，利尿，杀虫。

**水蓼**　辣人草(浙江)，痛骨消(广西)，药蓼(四川)，胡辣蓼(东北药用植物图志)

**Polygonum hydropiper** L. ——*Persicaria hydropiper* (L.) Spach

生于海拔1 500米以下的山坡路旁草丛中或沟边湿地。全国普遍分布。

全草(辣蓼)：辛，温。有小毒。祛风利湿，消滞，散瘀，止痛，杀虫。用于痢疾，泄泻，食滞，疳积，湿疹，顽癣，风湿痛，跌打损伤。

附　注：功效类似的有**狭叶水蓼 P. hydropiper** L. var. **angustifolia** (A. Brown) Kitag.；**散枝水蓼 P. hydropiper** L. var. **diffusa** Kitag.，均分布于黑龙江。

**毛水蓼**

**Polygonum hydropiper** L. var. **hispidum** (Hook. f.) Steward

生于水边湿地。分布于福建、贵州。

全草：苦、微辛，凉。用于痢疾，泄泻，中暑腹痛。

**蚕茧草**　蓼草(浙江)，水蓼(湖北)，红蓼子(贵州)

**Polygonum japonicum** Meissn. ——*Persicaria japonica* (Meissn.) H. Gross ex Nakai

生于低山、平原的路旁草丛中或沟边湿地。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、河南、湖北、广东、广西、四川、贵州。

全草(蚕茧草)：辛，温。散瘀活血，止痢。用于腰膝酸痛，麻疹，痢疾。

**愉悦蓼**

**Polygonum jucundum** Meissn.——*Persicaria jucunda* (Meissn.) Migo

生于海拔200—700米的山坡草丛中、山谷路旁及沟边潮湿地。分布于长江流域及东南沿海地区。

全草：用于泄泻。

附　注：功效相同的有**小蓼 Polygonum minus** Huds.——*Persicaria minor*(Huds.) Opiz，分布于东北、华北、华东、中南、西南。

**酸模叶蓼**　蓼吊子(东北)，旱田蓼(四川)，大马蓼(常用中草药彩色图谱)

**Polygonum lapathifolium** L.——*Persicaria lapathifolia* (L.) S.F. Gray

生于海拔1 900米以下的山坡路旁或沟溪边。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、山东、江苏、安徽、浙江、河南、湖北、广东、广西、四川、贵州。

全草(辣蓼)：辛、苦，凉。清热解毒，利湿止痒。用于痢疾，泄泻；外用于湿疹，瘰疬。

**绵毛酸模叶蓼**　红辣蓼(湖北)，辣蓼草(江苏植物药志)，柳叶蓼(贵州植物志)

**Polygonum lapathifolium** L. var. **salicifolium** Sibth.

生于低山区水沟、近水草地或低洼湿地。分布于全国各地。

全草：祛风利湿，清热解毒，止血，消滞。

**黄斑酸模叶蓼**　蓼子草(四川)

**Polygonum lapathifolium** L. var. **xanthophyllum** Kung

生于海拔500—1 500米的山坡草地上。分布于陕西、甘肃、宁夏、湖北、四川。

全草：清热利尿。

**石生蓼**

**Polygonum lapidosum** Kitag.

生于山坡或干草地。分布于东北及河北。

根状茎：苦，微寒。有小毒。清热解毒，凉血止血。

附　注：东北用作拳参入药。

**长鬃蓼**　　辣蓼(湖北)，水红花(四川)

**Polygonum longisetum** De Bruyn——*Persicaria longiseta* (De Bruyn) Kitag.

生于山沟泉水边或潮湿地。分布于全国各地。

全草：活血祛瘀，消肿止痛。

附　注：某些地区作辣蓼用。

**大花蓼**　　大长花蓼(贵州植物志)

**Polygonum macranthum** Meissn.——*P. japonicum* Meissn. var. *conspicuum* Nakai; *Persicaria conspicua* (Nakai) Nakai

生于海拔700米以下的山坡路旁、草丛中及田边湿地。分布于山西、陕西、江苏、安徽、浙江、台湾、湖北、四川、贵州、云南。

全草：用于风湿关节痛，跌打损伤，痢疾，泄泻。

**圆穗蓼**　　蝎子七(陕西)，然波(藏语)

**Polygonum macrophyllum** D. Don——*Bistorta macrophylla* (D. Don) Sojak; *P. sphaerostachyum* Meissn.

生于山地。分布于西南及陕西、甘肃、青海、湖北。

根状茎：苦、涩，凉。收敛，止血，活血，止泻。用于痢疾，吐血，衄血，血崩，带下病，跌打损伤。

**耳叶蓼**　　北重楼(辽宁)

**Polygonum mandshuriense** V. Petrov

生于山坡或湿草地。分布于东北及河北。

根状茎：苦，凉。有小毒。清热解毒，凉血止血。

附　注：辽宁地方标准收载。

**小头蓼**

**Polygonum microcephalum** D. Don

生于海拔1 500—1 800米的林阴下或路边草丛中。分布于西南及河南、湖北、湖南。

全草：消炎，止血。

**绵毛蓼**

**Polygonum molle** D. Don——*Ampelygonum molle*(D. Don) Roberty et Vautier; *Aconogonon molle* (D. Don) Hara

生于水边及路旁湿地。分布于广西。

全草：用于疮疡肿毒。

**刺茎蓼**

**Polygonum muricatum** Meissn.——*P. strigosum* R. Br. var. *muricatum* (Meissn.) Steward

生于低海拔山坡路旁草丛中及田边湿地。分布于长江中下游以南地区。

全草：用于皮肤瘙痒，痢疾。

**何首乌**　金首乌(浙江)，野苕(湖北)，窝朴翁(苗语)，马肝石(本草纲目)

**Polygonum multiflorum** Thunb.——*Pleuropterus multiflorus* (Thunb.) Turcz ex Nakai; *Reynoutria multiflora* (Thunb.) Moldenke; *Tiniaria multiflora* (Thunb.) Hu; *Fallopia multiflora* (Thunb.) Haraldson

生于海拔500—2 200米的山坡路旁、山谷水边或灌丛中。分布于河北、山西、陕西、甘肃、新疆、山东、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北、广东、广西、四川、贵州、云南。主产河南、湖北、四川。

块根(何首乌)：苦、甘、涩，温。解毒，消痈，润肠通便。用于瘰疬疮痈，风疹瘙痒，燥肠便秘，高血脂症。　藤茎(首乌藤)：甘，平。养血安神，祛风通络。用于失眠多梦，血虚身痛，风湿痹痛；外用于皮肤瘙痒。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**节蓼**　曲辣蓼(湖北)

**Polygonum nodosum** Pers.——*Persicaria nodosa* (Pers.) Opiz

生于海拔600—1 400米的山沟水边或路旁湿地。分布于东北、华北、西北、西南。

带根全草：解毒杀虫，散瘀开窍。用于疮肿，热毒。

附　注：地上部分有作红草用。

**倒根蓼**

**Polygonum ochotense** V. Petr ov ex Kom.

生于高山冻原。分布于吉林长白山高山地带。

根状茎：凉血，解毒。

附　注：吉林作草河车用。

**红蓼**　家蓼(新疆)，酒药草(浙江)，八字蓼(福建)，东方蓼(中国药用植物志)

**Polygonum orientale** L.——*Persicaria orientalis* (L.) Spach

生于低山、丘陵及平原地区的山坡、沟边、路旁、草地、湿地，常成片繁生，或栽培。全国普遍分布。主产江苏、辽宁。

果实(水红花子)：咸，凉。散血消癥，消积止痛。用于癥瘕痞块，瘿瘤肿痛，食积不消，胃脘胀痛。　全草(荭草)：辛，凉。有小毒。祛风利湿，活血止痛。用于风湿关节痛，疟疾，疝气，脚气。

附注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**太平洋蓼**

**Polygonum pacificum** V. Petrov ex Kom.——*Bistorta pacifica* Kom.

生于高山草丛、林下及湿草甸子。分布于黑龙江。

根状茎：清热解毒，凉血止血，收敛。用于赤痢，吐血，烧、烫伤，外伤出血。

**草血竭**　虾子七(湖北)，紫花根(云南)，一口血(四川中药志)

**Polygonum paleaceum** Wall.——*Bistorta chinensis* H. Gross

生于海拔2 000米左右的高山草原。分布于青海、湖北、四川、贵州、云南。

根状茎(草血竭)：苦、涩，微温。活血散瘀，止痛，止血。用于胃痛，食积，月经不调，浮肿，跌打损伤。

**杠板归**　水马铃(上海),拦路虎(福建),大蜢腿(广西),蛇倒退(四川)

**Polygonum perfoliatum** L.—— *Persicaria perfoliata* (L.) H. Gross; *Ampelygonum perfoliatum* (L.) Roberty et Vautier; *Truellum perfoliatum* (L.) Sojak

生于海拔 1 700 米以下的山谷灌丛中或沟边。全国普遍分布。

全草(杠板归): 酸,凉。清热解毒,利尿消肿。用于水肿,黄疸,泄泻,疟疾,顿咳,湿疹,疥癣。

**逆阿落**

**Polygonum peregrinatoris** Pauls. ——*Aconogonon peregrinatoris* (Pauls.) Hara

生于海拔 3 800—4 900 米的山坡草地及河滩地。分布于我国西藏。

根: 辛,温。涩肠止痢。用于痢疾,泄泻。

附　注: 藏药。

**桃叶蓼**　山辣蓼(湖北)

**Polygonum persicaria** L.—— *Persicaria vulgaris* Wedd. et Moq.

生于海拔 1 000 米以下的沟岸或路旁湿地。分布于吉林、河北、陕西、甘肃、新疆、山东、江西、福建、河南、湖北、四川、贵州、西藏。

全草: 辛,温。发汗除湿,消食止泻。用于痢疾,泄泻,蛇咬伤。

**松林蓼**

**Polygonum pinetorum** Hemsl.—— *Persicaria pinetorum* H. Gross

生于海拔 2 000—2 500 米的针阔叶混交林下或阴湿山沟、路旁。分布于陕西、甘肃、湖北、四川。

全草: 清热解毒,利湿,祛风化痰。

**腋花蓼**　米子蓼(广西),习见蓼(贵州植物志)

**Polygonum plebeium** R. Br.

生于低山丘陵及平原地区的山坡路旁。分布于中南、西南及河北、陕西、江苏、安徽、江西、福建、台湾。

全草: 利水通淋,化浊杀虫。用于恶疮疥癣,淋浊,蛔虫病。

**多穗蓼**　姿姿萨曾(藏语)

**Polygonum polystachyum** Wall. ex Meissn.—— *Aconogonon polystachyum* (Wall. ex Meissn.) M. Kral; *Persicaria polystachya* (Wall. ex Meissn.) H. Gross

生于荒山坡。分布于四川、西藏。

全草: 辛,凉。祛风除湿,清热解毒,杀虫止痢。用于痢疾,泄泻,小儿消化不良,跌打损伤,风湿肿痛。

附　注: 藏药。我国西藏作辣蓼用。

**九牯牛**

**Polygonum rude** Meissn.—— *Persicaria rudia* (Meissn.) H. Gross; *Aconogonon molle* (D. Don) Hara var. *rude* (Meissn.) Hara; *Polygonum molle* D. Don var. *rude* (Meissn.) A. J. Li

生于水沟边。分布于贵州。

全草：辛、微甘，温。通经，镇痛。用于劳伤，月经不调，筋骨疼痛。

**赤胫散**　飞蛾七(湖北)，蛇头蓼(广西)，血当归(云南)，苦荼头草(中国药用植物图鉴)

**Polygonum runcinatum** Buch.-Ham.—— *Persicaria runcinata* (Buch.-Ham.) H. Gross

生于海拔1 000—2 500米的山坡草丛或沟边阴湿地。分布于台湾、河南、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

全草(赤胫散)：酸、苦，凉。清热解毒，活血消肿。用于痢疾，胃痛，带下病，经闭。

附　注：功效相似的有**伞房花赤胫散 P. runcinatum** Buch.-Ham. var. **corymbosum** Huang，分布于贵州。

**华赤胫散**　散血丹(湖北)，花蓼子草(四川)

**Polygonum runcinatum** Buch.-Ham. var. **sinense** Hemsl.

生于海拔1 300—2 600米的林荫下、路旁草丛中或沟边。分布于陕西、甘肃、河南、湖北、湖南、广西、四川、云南。

根及全草：苦、涩，寒。消肿解毒，活血舒筋。用于劳伤咳嗽，月经不调，风湿骨痛，跌打损伤。

**大箭叶蓼**　蛇子草(广西)，蛇倒退(湖北)

**Polygonum sagittifolium** Lévl. et Vant

生于海拔800—1 500米的山地路旁及沟边潮湿地。分布于陕西、湖北、湖南、四川、贵州。

全草：清热解毒。用于痢疾，疔毒，皮肤瘙痒，蛇咬伤。

**刺蓼**　猫儿刺(浙江)

**Polygonum senticosum** (Meissn.) Franch. et Sav.—— *Persicaria senticosa* (Meissn.) Nakai ex H. Gross

生于海拔1 000米以下的山坡路旁草丛中或林阴下及沟边岩缝中。分布于华东、中南及吉林、辽宁、河北、北京、贵州。

全草(疙因)：酸、微辛，平。解毒消肿，利湿止痒。用于蛇头疮，顽固性痈疖，跌伤，湿疹痒痛，内、外痔。

**西伯利亚蓼**　剪刀股(四川)

**Polygonum sibiricum** Laxm.—— *Persicaria sibirica* (Laxm.) H. Gross; *Aconogonon sibiricum* (Laxm.) Hara

生于海拔1 600米以下的盐化草甸，盐湿低地或砾质含盐碱土壤。分布于黑龙江、辽宁、河北、北京、内蒙古、甘肃、宁夏、青海、山东、江苏北部、河南、四川、云南、西藏。

根：用于水肿。　全草：清热解毒，祛风除湿。

**箭叶蓼**　锯锯草(湖北)，走游草(四川)，雀翘(名医别录)

**Polygonum sieboldii** Meissn.—— *Persicaria sieboldii* (Meissn.) Ohki

生于海拔1 800米以下的山坡及沟边潮湿草丛中。分布于东北及河北、山东、江苏、安徽、福建、湖北、湖南、四川、贵州。

全草：酸，涩，平。祛风除湿，清热解毒。用于风湿关节痛，毒蛇咬伤。

**支柱蓼**　血三七(浙江),算盘七(湖北),扭子七(四川),红三七(陕西中草药)

**Polygonum suffultum** Maxim. —— *Bistorta suffulta* (Maxim.) Greene ex H. Gross

生于海拔1 200—2 000米的林荫下,阴湿草丛中、沟溪边及田间路旁。分布于西南及河北、山西、陕西、甘肃、宁夏、青海、安徽、浙江、江西、河南、湖北、湖南。

根状茎:苦、涩,凉。收敛止血,止痛生肌。用于跌打损伤,劳伤吐血,便血,月经不调。

附　注:功效相似的有**细穗支柱蓼 P. suffultum** Maxim. var. **pergracile** (Hemsl.) Sam.,分布于陕西、甘肃、湖北、四川、云南。

**太白蓼**

**Polygonum taipaishanense** Kung

生于海拔2 800—3 200米的高山草坡。分布于陕西太白山。

根状茎:苦、涩,凉。清热解毒,散瘀止血。

附　注:陕西特有药用植物。

**戟叶蓼**　鹿蹄草(江苏),水蝴蝶(湖北),水麻蓼(植物名实图考)

**Polygonum thunbergii** Sieb. et Zucc.—— *Persicaria thunbergii* (Sieb. et Zucc.) H. Gross

生于海拔1 850米以下的沟谷,林下或湿草地。分布于东北及河北、陕西、山东、江苏、安徽、浙江、福建、台湾、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

根状茎或全草:酸、微辛,平。清热解毒,凉血止血,祛风镇痛,止咳。用于痄症,蛇咬伤,痢疾。

**蓼蓝**　大青叶(东北、华北),青板水辣蓼(浙江),蓝靛(本草纲目),蓝蓼(东北草本植物志)

**Polygonum tinctorium** Ait.—— *Persicaria tinctoria* (Ait.) Spach

原产中国。现南北各地常见栽培或半野生。主产河北、山西。

叶(蓼大青叶):苦,寒。清热解毒,凉血消斑。用于温病发热,发斑发疹,肺热喘咳,喉痹,疙瘩,丹毒,痈肿。　加工品(青黛):咸,寒。清热解毒,凉血,定惊。用于温病发斑,血热吐衄,胸痛咳血,口疮,小儿惊痫。

附　注:《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**粘毛蓼**

**Polygonum viscosum** Buch.-Ham. ex D. Don——*Persicaria viscosa* (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross ex Nakai

生于低海拔路旁湿地、水边。分布于中南及吉林、辽宁、陕西、江苏、浙江、江西、福建、台湾、四川、贵州、云南。

根状茎:清热解毒,凉血止血。

**珠芽蓼**　红三七(宁夏),猴儿七(湖北),野高粱(四川)

**Polygonum viviparum** L.——*Bistorta vivipara* (L.) S. F. Gray

生于海拔1 200—3 000米的高山草原阴湿地或沟溪边。分布于华北、西南及吉林、陕西、甘肃、青海、新疆、河南。

根状茎:苦、涩,凉。清热解毒,散瘀止血。用于乳蛾,咽喉痛,痢疾,泄泻,带下病,便

血。

## 大黄属　Rheum L.

**阿尔泰大黄**

**Rheum altaicum** A. Los.

生于山区岩缝及砾石地。分布于新疆。

根及根状茎：泻实热，通大便，破积行瘀，消肿。

附　注：相同功效与分布的有**密序大黄 R. compactum** L.。

**沙七**　　白小黄(云南)

**Rheum delavayi** Franch.

生于山地。分布于云南。

根：苦，凉。清热解毒，止血生肌。用于肺热咳嗽，咽喉痛，大便下血，外伤出血，骨折，跌打扭伤，风湿痹痛。

**藏边大黄**　　白牛尾七(全国中草药汇编)

**Rheum emodi** Wall.

生于海拔 3 200—4 300 米的山坡灌丛、乱石滩及岩壁上。分布于云南、西藏。西北有栽培。

根：苦、甘，寒。清热解毒，止血生肌。用于肺热咳嗽，咽喉痛，便血，痈疮肿毒，外伤出血。

**牛尾七**　　红马蹄鸟(四川)，雪三七(云南中草药)

**Rheum forrestii** Diels

生于海拔 3 000 米左右的岩石土上。分布于四川、云南。

根：苦，凉。舒筋活血，止血，清热。用于咽喉痛，疼腮，大便秘结，跌打损伤，外伤出血。

**波叶大黄**　　华北大黄(通称)，唐大黄(中国药用植物志)

**Rheum franzenbachii** Münt.

生于山坡草地。分布于华北及吉林、辽宁、新疆、湖北。部分地区有种植。

根状茎：苦，寒。泻热，通便，破积，行瘀。用于热结便秘，湿热黄疸，痈肿疔毒，跌打瘀痛，口疮糜烂，烧、烫伤。

附　注：功效相似的有**矮大黄 R. nanum** Siewers，分布于内蒙古、甘肃、新疆。

**高山大黄**　　塔黄(西藏)

**Rheum nobile** Hook. f. et Thoms.

生于海拔 4 500—5 200 米的高山山坡草地。分布于我国西藏。

根状茎：苦，寒。泻实热，破积滞，行瘀血。用于实热便秘，谵语发狂，食积痞滞，痢疾，腹痛后重，湿热发黄，水肿，目赤，头痛，经闭。

**大黄**　　南大黄、西大黄(通称)，川军(中药材手册)，峻(藏语)

**Rheum officinale** Baill.

生于海拔 1 300—1 600 米的山地、田埂及山坡。分布于西南及陕西、甘肃、青海、河

南、湖北。主产甘肃、青海。

根及根状茎(大黄)：苦，寒。泻热通便，凉血解毒，逐瘀通经。用于实热便秘，积滞腹痛，泻痢不爽，湿热黄疸，血热吐衄，目赤，咽喉痛，瘀血经闭，跌打损伤。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②功效类似的有**西藏大黄 R. tibeticum** Maxim. ex Hook. f.，分布于青海；**天山大黄 R. wittrocki** Lundstr.，分布于新疆北部及南部。

**掌叶大黄**　北大黄(通称)，金大黄(湖北)

**Rheum palmatum** L.

生于山地林缘或草坡。分布于陕西、甘肃、青海、湖北、四川、西藏。大部地区有栽种。

根及根状茎(大黄)：功效同大黄。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**小大黄**

**Rheum pumilum** Maxim.

生于高山阴坡、半阴坡及草甸。分布于青海。

根：苦，寒。泻肠胃积滞，泻实热，下瘀血，消痈肿。用于食积停滞，脘腹胀痛，实热内蕴，大便秘结。

**唐古特大黄**　鸡爪大黄(通称)

**Rheum tanguticum** Maxim. et Balf.

生于山地灌丛下或林缘较湿地。分布于甘肃、青海、湖北、四川、西藏。陕西有栽培。

根及根状茎(大黄)功效同大黄。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②功效类似的有**六盘山鸡爪大黄 R. tanguticum** Maxim. et Balf var. **liupanshanense** C. Y. Cheng et T. C. Kao，分布于宁夏。

## 酸模属　Rumex L.

**酸模**　酸浆(东北)，山菠菜(湖北)，牛耳大黄(湖南、四川、贵州)

**Rumex acetosa** L.

生于低海拔至 3 100 米的高山潮湿山沟、林缘或草地。分布于华北、西北及吉林、辽宁、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

根或全草(酸模)：酸、苦，寒。凉血，解毒，通便，杀虫。用于热痢，小便淋痛，吐血，恶疮，疥癣。

**水生酸模**

**Rumex aquaticus** L.

生于海拔 2 400 米以下的山谷水沟旁。分布于东北、华北、西北及湖北。

根：用于消化不良，急性肝炎，湿疹，顽癣。

**中亚酸模**

**Rumex chalepensis** Mill.

生于田野、河湖岸湿地及路旁荒坡草地。分布于东北及河北、陕西、山东、江苏、江西、河南、湖北。

根(牛西西): 苦、酸，寒。凉血止血，清热解毒，杀虫。用于崩漏，吐血，咯血，鼻衄，胃出血，便血，紫癜，便秘，水肿。

**皱叶酸模**　牛舌头(宁夏)，羊蹄根(吉林中草药)，四季菜根(四川中药志)

**Rumex crispus** L.

生于田边路旁湿地或水边。分布于东北及河北、内蒙古、陕西、宁夏、青海、江苏、安徽、浙江、福建、台湾、河南、湖北、广西、四川、贵州、云南。

根及全草: 苦、酸，寒。清热，凉血，通便，杀虫，化痰止咳。用于急性肝炎，咳嗽痰喘，吐血，血崩，大便秘结，痢疾，疥癣。

附　注: 功效类似的有**单瘤皱叶酸模 R. crispus** L. var. **unicallosus** Potern.，分布于宁夏。

**齿果酸模**　牛耳大黄(四川)，牛舌草(江苏药材志)

**Rumex dentatus** L.

生于海拔 400—1 200 米的水边湿地。分布于河北、山西、陕西、甘肃、青海、江苏、安徽、浙江、河南、湖北、四川、贵州、云南。

根及全草: 类似皱叶酸模。　叶: 用于乳房红肿。

**毛脉酸模**

**Rumex gmelini** Turcz.

生于水边或湿草地。分布于东北及河北、内蒙古。

根: 止血，泻下。

**川滇土大黄**

**Rumex hastatus** D. Don

生于山坡草地。分布于四川、云南。

全草: 酸、涩、微辛，温。发汗解表，润肺止咳。用于感冒，咳嗽，水肿，痰喘。

**羊蹄**　羊舌头(浙江)，牛利菜(广西)，牛舌大黄(植物名实图考)

**Rumex japonicus** Houtt.

生于山野、路旁湿地。分布于华东、中南及贵州。

根(羊蹄): 苦、酸，寒。有小毒。凉血止血，通大便，解毒，杀虫。用于大便秘结，淋浊，黄疸，吐血，肠风，秃疮。　叶(羊蹄叶): 甘，寒。用于肠风下血，大便秘结，小儿疳积。果实: 苦、涩，平。用于赤白杂痢。

附　注: 功效(根)相同的有**尼泊尔酸模 R. nepalensis** Spreng.，分布于西南及陕西、甘肃、青海、江西、河南、湖北。

**长刺酸模**　牛屎草(湖北)，血大黄(四川)，皱叶羊蹄(广西中草药)

**Rumex maritimus** L.

生于路旁及沟边湿地。分布于东北、华北、长江流域及福建、广西、贵州。

全草: 微甘、微苦，凉。清热凉血，解毒杀虫。用于肺痨咳血，痈疮肿痛，秃疮疥癣，皮肤瘙痒，跌打肿痛，痔疮出血。

**钝叶酸模**　血三七、化血莲(江苏)

**Rumex obtusifolius** L.—— *R. madaio* Makino

生于山坡路边湿地及疏林下。分布于长江流域。

根(土大黄)：苦，寒。清热通便，杀虫止痒，止血，祛疾。用于肺痈，咯血，肝炎，便秘；外用于跌打损伤，烧、烫伤。

**巴天酸模**　　土大黄(陕西中草药)，牛西西(江西中草药学)

**Rumex patientia** L.

生于路旁、村边湿地及水沟边。分布于黑龙江、辽宁、河北、山西、陕西、甘肃、青海、江苏南部、湖北、贵州。

**根**：苦、酸，寒。有小毒。凉血止血，清热解毒，通便杀虫。用于痢疾，泄泻，肝炎，跌打损伤，大便秘结，痈疮疥癣。

**附　注**：功效相同的有**洋铁酸模 R. patientia** L. var. **callosus** Fr. Schmidt，分布于东北。

**窄叶酸模**

**Rumex stenophyllus** Ledeb.

生于湿草地或盐渍化土壤。分布于东北、华北及新疆。

根：苦、酸，寒。凉血止血，清热解毒，杀虫。用于崩漏，胃出血，便血，紫癜，水肿。

**附　注**：功效相同的有**乌苏里酸模 R. stenophyllus** Ledeb. var. **ussuriensis** (A. Los.) Kitag.，分布于黑龙江。

## 19. 商陆科　Phytolaccaceae

### 商陆属　Phytolacca L.

**商陆**　　白母鸡(江苏)，山萝卜(贵州)

**Phytolacca acinosa** Roxb.

生于海拔 1 700 米以下的山沟或林下、林缘、路旁湿地。全国普遍分布。主产河南、湖南。

根(商陆)：苦，寒。有毒。逐水消肿，通利二便，解毒散结。用于水肿胀满，二便不通；外用于痈肿疮毒。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**美洲商陆**　　花商陆(湖北)，美商陆(杭州植物志)，垂序商陆(贵州植物志)

**Phytolacca americana** L.

原产北美洲。长江流域以南有栽培，亦有逸为野生，北方少有栽培。

根(商陆)：功效同商陆。　种子：利尿。　叶：解热。并用于脚气病。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。② 功效相同的有**多雄商陆 P. polyandra** Batal.，分布于四川。

## 20. 紫茉莉科 Nyctaginaceae

### 黄细心属 Boerhavia L.

**黄细心**

**Boerhavia diffusa** L.

生于较干燥的路旁草丛中。分布于台湾、广东、广西、四川、贵州、云南。

根(老来青)：苦、辛，温。活血散瘀，强筋骨，调经，消疳。用于筋骨痛，腰腿痛，月经不调，带下病，脾肾虚浮肿，小儿疳积。

### 叶子花属 Bougainvillea Comm. ex Juss.

**光叶子花** 三角花(华北)，九重葛(广州植物志)

**Bougainvillea glabra** Choisy

原产巴西。全国各地有栽培。

花：苦、涩，温。调和气血。用于带下病，月经不调。

### 紫茉莉属 Mirabilis L.

**东亚紫茉莉** 喜马拉雅紫茉莉(西藏常用中草药)，八朱(藏语)

**Mirabilis himalaica** (Edgew.) Heim.——*Oxybaphus himaleicus* Edgew.

生于海拔700—1 800米的山坡、路旁及石壁上。分布于陕西、甘肃、四川、云南、西藏。

根：辛、甘，温。补益脾肾，利水。用于肾炎水肿，淋证。

**紫茉莉** 胭脂花(通称)，夜娇娇(浙江)，粉子头(四川)

**Mirabilis jalapa** L.

原产拉丁美洲。全国各地有栽培，有时野生或半野生。

根(紫茉莉根)：甘、苦，平。利尿泻热，活血散瘀。用于淋浊，带下病，肺痨咳嗽，关节痛。 叶：甘，平。用于痈疖，疥癣，创伤。 胚乳：可去面上黡痣粉刺。

附 注：新疆地方标准收载。

## 21. 粟米草科 Molluginaceae

### 粟米草属 Mollugo L.

**星毛粟米草**

**Mollugo lotoides** (L.) O. Kuntze—— *Glinus lotoides* L.

生于湿润空旷的沙地上。分布于台湾、海南、贵州。

全草：清热解毒，利湿。用于腹痛泄泻，感冒咳嗽，皮肤风疹；外用于目赤红痛，疮疖肿毒。

**簇花粟米草**

**Mollugo oppositifolia** L.

生于山坡。分布于广东。

全草：淡，平。清热解毒，利湿。

**粟米草**　四月飞(陕西)，珠儿草(浙江)，鱼籽草(湖北)，地杉树(四川)

**Mollugo pentaphylla** L.

生于海拔300—1 100米的山坡、路旁及田边。分布于华东、中南及陕西、四川、贵州。

全草：淡、微涩，平。清热解毒。用于腹痛泄泻，皮肤热疹，目赤。

## 22. 番杏科　Aizoaceae

### 番杏属　Tetragonia L.

**番杏**　白红菜(福建)

**Tetragonia tetragonioides** (Pall.) O. Kuntze——*Desmovia tetragonoides* Pall.; *T. expansa* Murr.

江苏、浙江、福建、台湾，广东、云南栽培或野生于海滩。

全草：甘、微辛，平。清热解毒，祛风消肿。用于泄泻，败血症，疔疮红肿，风热目赤，胃癌，食道癌，宫颈癌。

## 23. 马齿苋科　Portulacaceae

### 马齿苋属　Portulaca L.

**大花马齿苋**　太阳花(通称)，佛甲草(广西)，半支莲(江西民间草药)

**Portulaca grandiflora** Hook.

原产巴西。全国各地广泛栽培。

地上全草：苦，寒。清热解毒。用于咽喉痛，烫伤，跌打损伤，湿疮。

**马齿苋**　蚂蚁菜、蚂蚱菜(通称)，马踏菜(山东)，瓜子菜(广西)

**Portulaca oleracea** L.

生于海拔1 300米以下的山地、路旁、田间、地边。全国各地普遍分布。

地上部分(马齿苋)：酸，寒。清热解毒，凉血止血。用于热痢脓血，热淋，带下病，痈肿恶疮，丹毒。　种子：明目，利大小肠。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**毛马齿苋**　还魂草(广西)

**Portulaca pilosa** L.

生于田边、路旁及荒地。分布于广西。

全草：用于刀伤，烧、烫伤。

**小马齿苋**　四裂马齿苋(广西)

**Portulaca quadrifida** L.

生于山地。分布于广西、云南。

全草：微酸、微苦，平。止痢杀菌。用于痢疾，泄泻，湿热性黄疸，内痔出血，乳汁不足，小儿疳积，黄水疮；外用于目赤肿痛。

### 土人参属　Talinum Adans.

**土人参**　飞来参(广东)，瓦坑头(广西)，瓦参(云南)

**Talinum paniculatum** (Jacq.) Gaertn.——*Portulaca paniculata* Jacq.

原产美洲热带。黄河流域以南多有栽培，或逸为野生。

根及叶(土人参)：甘，平。健脾润肺，止咳，调经。用于脾虚劳倦，泄泻，肺痨咳嗽盗汗自汗，月经不调，带下病。

## 24. 落葵科　Basellaceae

### 落葵薯属　Anredera Juss.

**落葵薯**　土三七(四川)，藤三七(云南)

**Anredera cordifolia** (Tenore) Van Steen——*Boussingaultia gracilis* Miers var. *pseudobaselloides* Bailey

原产美洲热带。全国各地均有栽培。

藤及珠芽：微苦，温。滋补强壮，祛风除湿，活血祛瘀，消肿止痛。用于腰膝痹痛，病后体虚，跌打损伤，骨折。

### 落葵属　Basella L.

**落葵**　胭脂菜(浙江)，阳菜(湖北)，西洋菜(四川)，木耳菜(云南)

**Basella alba** L.——*B. rubra* L.

原产亚洲热带地区。长江流域以南各地均有栽培。

根：用于风湿关节痛。　茎叶：甘、酸，寒。清热，滑肠，凉血，解毒。用于大便秘结，小便短涩，便血，疔疮。　花汁：清血解毒。用于乳头破裂，水痘。

## 25. 石竹科　Caryophyllaceae

### 麦仙翁属　Agristemma L.

**麦仙翁**　麦毒草(通称)

**Agristemma githago L.**

生于半干旱草原地带、麦田或草地。原产欧洲。分布于东北及内蒙古东部、新疆。

全草：用于顿咳，崩漏。

## 蚤缀属　Arenaria L.

**髯毛蚤缀**　　鸡肠子(四川)

**Arenaria barbata** Franch.

生于山坡草地及林下。分布于四川、云南、西藏。

根：清热凉血。

**硬尖叶蚤缀**

**Arenaria forrestii** Diels

生于河滩、乱石滩及草甸。分布于青海、四川、云南、西藏。

全草：清热，利肺。

**老牛筋**　　追风箭(湖北)，灯芯草蚤缀(中国高等植物图鉴)

**Arenaria juncea** Bieb.

生于海拔2 000米以下的丘陵草地、山地岩壁上。分布于东北、华北及新疆、江苏北部、山东、河南、湖北。

根(山银柴胡)：甘、苦，凉。清热凉血。用于虚劳骨蒸，阴虚久疟，小儿疳积羸瘦。

**小无心菜**　　矮茎鹅不食草(东北草本植物志)

**Arenaria juncea** Bieb. var. **abbreviata** Kitag.

生于草原性干山坡。分布于黑龙江大兴安岭。

根及全草：清热凉血。

附　注：辽宁彰武等地称"银柴胡"。

**甘肃蚤缀**

**Arenaria kansuensis** Maxim.

生于海拔4 000米左右的石灰岩山地草原或石隙间。分布于甘肃、青海、四川西部、西藏。

全草(雪灵芝)：甘，寒。滋阴养血，益肾壮骨。用于肺燥咳嗽，咳血，血虚风痹，筋骨疼痛，肾虚眩晕。

**卵瓣雪灵芝**

**Arenaria kansuensis** Maxim. var. **ovatipetala** Y. W. Tsui et L. H. Chou

生于高山草甸。分布于青海。

全草：苦，寒。退烧，止咳，降血压，滋补。

**尖瓣雪灵芝**

**Arenaria kansuensis** Maxim. var. **oxypetala** Y. W. Tsui et L. H. Chou

生于高海拔石缝中。分布于青海。

全草：清热解毒，利胆退黄。

**万年松**

**Arenaria lapanshanensis** Y. W. Tsui

生于高山草甸、高山砾石带。分布于青海。

全草：淡，寒。清热利湿。

**苔藓状蚤缀**

**Arenaria musciformis** Wall.

生于干旱山坡。分布于青海南部、四川西部、云南西北部、西藏。

全草：清热解毒。

**四齿蚤缀**

**Arenaria quadridentata** (Maxim.) F. N. Williams——*Lepyrodiclis quadridentata* Maxim.

生于海拔 3 000—3 800 米的山坡草地阴处。分布于陕西南部、甘肃南部、四川北部。

全草：清热凉血，消肿。

**青藏雪灵芝**

**Arenaria roborowskii** Maxim.

生于山坡、山顶草甸。分布于青海、西藏。

全草：清热，润肺止咳，降血压。

**蚤缀**　雀儿蛋(陕西)，地胡椒(湖北)，铃铃草(湖南)，小无心菜(植物名实图考)

**Arenaria serpyllifolia** L.

生于海拔 300—1 600 米的河边湿润冲积土麦田中或石质山坡、路旁荒地。全国普遍分布。

全草：辛，平。清热明目，解毒。用于目赤，咳嗽，齿龈肿痛。

## 短瓣石竹属　Brachystemma D. Don

**短瓣花**　土牛七、抽筋草(广西)

**Brachystemma calycinum** D. Don

生于山间灌丛、田间、路旁。分布于广西、四川、贵州、云南。

带根全草(白牛膝)：甘，平。清热解毒，舒筋活络。用于白喉，风湿痹痛，跌打损伤，月经不调，病后虚弱。

## 卷耳属　Cerastium L.

**卷耳**

**Cerastium arvense** L.

生于海拔 2 000 米以上的高山林缘草地。分布于东北、华北及陕西、甘肃、青海、新疆、四川、西藏。

全草：滋补肝肾。

**簇生卷耳**　卷耳草(四川)

**Cerastium caespitosum** Gilib.

生于海拔 1 200—2 300 米的林缘疏松沙质壤土上。分布于东北、华北、西北及长江流域。

全草：苦，凉。清热解毒，消肿止痛。用于感冒，乳痈初起，疔疽肿痛。

附　注：功效相似的有**丛生腺毛卷耳 C. caespitosum** Gilib. var. **glandulosum** Wirtgen，分布于东北、西北。

**六齿卷耳**

**Cerastium cerastoides** (L.) Britt.——*Stellaria cerastoides* L.

生于海拔 1 000 米左右的山谷水边草地。分布于吉林、辽宁、内蒙古、新疆、西藏。

全草：清热解毒，消肿止痛。

**缘毛卷耳**　　高山卷耳(四川)

**Cerastium furcatum** Cham. et Schlecht.

生于高山地带林缘及草甸。分布于华北及吉林、陕西、四川、云南。

全草：解毒清肿。

**球序卷耳**　　高脚鼠耳草(浙江天目山药用植物志)

**Cerastium glomeratum** Thuill.——*C. viscosum* L.

生于海拔 1 200 米以下的林下、路旁草地。分布于西南及江苏、浙江、江西、福建、台湾、河南、湖北、湖南。

全草(婆婆指甲草)：淡，凉。清热解表，降压，解毒。用于感冒发烧，高血压症；外用于乳痛。

**毛蕊卷耳**

**Cerastium pauciflorum** Stev. ex Ser. var. **oxalidiflorum** (Makino)Ohwi——*C. oxalidiflorum* Makino

生于海拔 2 900 米以下的林中、林缘、山区路旁湿润地及河边。分布于东北及四川。

全草：清热利湿。

**鄂西卷耳**

**Cerastium wilsonii** Takeda

生于海拔 1 000—1 600 米的山坡、林缘及路旁湿沙土上。分布于湖北、四川东部。

叶：用于火疮。

## 狗筋蔓属　Cucubalus L.

**狗筋蔓**　　舒筋草(湖北)，九股牛(四川)，大种鹅肠菜(贵州)，小被单草(云南中草药)

**Cucubalus baccifer** L.

生于海拔 900—2 800 米的山坡灌丛、林缘或沟边草地。全国普遍分布。

根(狗筋蔓)：甘、淡，温。接骨生肌，散瘀止痛，祛风除湿，利尿消肿。用于骨折，跌打损伤，风湿关节痛，小儿疳积，肾炎水肿，小便淋痛，肺痨。　根毛：用于缩阴症。

**日本狗筋蔓**　　和筋草(湖南药物志)

**Cucubarus baccifer** L. var. **japonicus** Miq.

生于山沟溪旁、林缘、山坡灌丛及林下。全国普遍分布。

根：淡，平。利大小肠。用于呕吐，小便癃闭，跌打损伤。

## 石竹属　Dianthus L.

**须苞石竹**　金蝴蝶(四川)

**Dianthus barbatus** L.

原产中国东北部和原苏联。分布于吉林、江西、湖南、四川、云南。

全草：活血调经，通络，利尿通淋。

**石竹**　石竹子、石柱花(通称)，青水红(广西)，洛阳花(本草纲目)

**Dianthus chinensis** L.——*D. amurensis* Jacq.

生于海拔1 000米以下的山坡草丛中及路旁。全国普遍分布。主产河北、河南、辽宁、江苏、湖北。

地上部分(瞿麦)：苦，寒。利尿通淋，破血通经。用于热淋，血淋、石淋，小便淋痛不利，月经过多。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。② 功效相似的有**高山石竹 D. chinensis** L. var. **morii** (Nakai) Y. C. Chu，分布吉林长白山。

**麝香石竹**

**Dianthus caryophyllus** L.

原产欧洲至印度。全国各地均有栽培。

地上部分：清热利尿，破血，通便。

**长萼石竹**

**Dianthus longicalyx** Miq.

生于荒山草丛中。分布于辽宁、吉林、河北、山西、陕西、山东、江苏、浙江、台湾、湖北、湖南、广东、云南。

全草：苦，寒。清热利尿，破血通经。用于小便淋痛，尿血，经闭。

**瞿麦**　稠子花(甘肃)，竹节草(山东)，山高粱(浙江)

**Dianthus superbus** L.

生于海拔2 800米以下的山坡草地或路旁。分布于东北、华北、西北、华东及四川、贵州。

地上部分(瞿麦)：功效同石竹。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。② 功效相似的有**长筒瞿麦 D. superbus** L. var. **longicalycinus** (Maxim.) Williams，分布于东北、华北、西北、华东及湖南、海南、四川、贵州；**高山瞿麦 D. superbus** L. var. **speciosus** Reichb.，分布于吉林。**兴安石竹 D. versicolor** Fisch. ex Link；**蒙古石竹 D. versicolor** Fisch. ex Link var. **subulifolius** (Kitag.) Y. C. Chu，均分布于东北。

## 荷莲豆草属　Drymaria Willd.

**荷莲豆草**　　水荷兰(广西)，青蛇仔(海南)，青钱草(四川)

**Drymaria cordata** (L.) Willd.

生于山谷溪流边及杂木林缘。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全草：微酸，凉。清热解毒，利尿通便，活血消肿，退翳。用于急性肝炎，胃痛，疟疾，腹水，便秘，风湿脚气。

## 丝石竹属　Gypsophylla L.

**石头花**　　石栏菜(陕西)，百布根(宁夏)

**Gypsophylla acutifolia** Fisch.

生于石质山坡。分布于河北、内蒙古、陕西、甘肃、宁夏、青海。

根：淡、凉。活血散瘀，消肿止痛，化腐生肌。用于跌打损伤，骨折，外伤。

**光梗丝石竹**

**Gypsophylla acutifolia** Fisch. var. **gmelini** Regel

生于半阳坡及较干旱的红土荒地。分布于青海。

根及全草：清热凉血，止咳化痰。

**草原石头花**

**Gypsophylla davurica** Turcz. ex Fenzl

生于草原、丘陵、固定沙丘及石砾质山坡。分布于东北及内蒙古。

根(山银柴胡)：清热凉血。

附　注：功效相似的有**狭叶草原丝石竹 G. davurica** Turcz. ex Fenzl **var. angustifolia** Fenzl，分布于内蒙古。

**尖叶丝石竹**

**Gypsophylla licentiana** Hand.-Mazz.

生于石质山坡。分布于河北、内蒙古、陕西、甘肃、宁夏。

全草：止咳化痰。

**长蕊石头花**　　霞草(全国中草药汇编)，欧石头花(东北植物检索表)

**Gypsophylla oldhamiana** Miq.

生于海拔 600—2 000 米的石质山坡干燥处或河滩乱石间。分布于东北、华北、西北及山东、江苏北部、河南、湖北。

根(山银柴胡)：甘、苦，凉。活血散瘀，消肿止痛，化腐生肌。用于跌打损伤，骨折，外伤，小儿疳积。

**大叶石头花**　　石头花(吉林)

**Gypsophylla pacifica** Kom.

生于石砾质于山坡及林缘草地。分布于东北。

根：甘、苦，凉。镇咳，祛痰，强心，利尿。

**圆锥石头花**

**Gypsophylla paniculata** L.

生于沙质干山坡。分布于阿尔泰地区，全国其他省区亦见栽培

根：甘，凉。凉血，清虚热。用于肺痨潮热。

## 薄蒴草属　Lepyrodiclis Fenzl

**薄蒴草**

**Lepyrodiclis holosteoides** (C. A. Mey.) Fenzl ex Fisch. et C. A. Mey.——*Gouffeia holosteoides* C. A. Mey.

生于海拔 1 200—3 500 米的山坡草地、荒芜农地或林缘。分布于内蒙古、陕西、甘肃、青海、新疆、四川、西藏。

全草：甘，寒。活血散瘀，利肺，托疮。

附　注：藏医用于肺热咳嗽，痈肿。

## 剪秋罗属　Lychnis L.

**浅裂剪秋罗**

**Lychnis cognata** Maxim.

生于草甸子、林下、林缘灌丛及阴湿山坡。分布于东北。

根、全草：用于头痛。花：用于头疮。

附　注：功效相同的有**丝瓣剪秋罗 L. wilfordii** (Regel) Maxim.，分布于东北。

**剪夏罗**　阔叶鲤鱼胆(浙江)，金钱花(四川)，山茶田(贵州)

**Lychnis coronata** Thunb.

生于山坡疏林内或山谷林缘草丛中较阴湿处。分布于江苏、浙江、江西、福建、湖北、四川、贵州。

根及全草：甘，寒。解热，消炎，镇痛，止泻。用于感冒，关节痛，泄泻；外用于缠腰火丹。

**大花剪秋罗**

**Lychnis fulgens** Fisch.

生于海拔 400—2 000 米的林下草地、林缘、草甸。分布于东北，华北。

根及全草：用于小儿疳积。

**腺毛剪秋罗**

**Lychnis glandulosa** Maxim.

生于山顶岩缝及干山坡。分布于青海。

全草：辛、苦，平。清热凉血，健脾利尿，通乳。

**剪秋罗**　地黄连(甘肃)，见肿消(湖北)，散血沙(四川常用中草药)

**Lychnis senno** Sieb. et Zucc.

生于海拔 2 000 米以下的山坡林下或草丛中。分布于长江流域，北达秦岭北坡，野生或栽培。

根及全草：甘，寒。清热，止痛，止泻。用于感冒，风湿关节痛，泄泻。

## 鹅肠菜属 Malachium Fries

**鹅肠菜** 牡筋丹、鸡卵菜(陕西)，白头娘草(浙江)，鹅儿肠(湖南、四川、贵州)

**Malachium aquaticum** (L.) Fries——*Cerastium aquaticum* L.

生于海拔 200 -2 700 米的河流两旁冲积地上或灌丛林荫下及稻田边。分布于东北、华北、华东及陕西、广东、广西、四川、贵州。

全草(鹅肠草)：酸，平。清热凉血，消肿止痛，消积通乳。用于小儿疳积，牙痛，痢疾，痔疮肿痛，乳痈，乳汁不通。

## 白鼓钉属 Polycarpaea Lam.

**白鼓钉** 声色草(广东)

**Polycarpaea corymbosa** (L.) Lam.——*Achyranthes corymbosa* L.

生于沿海空旷沙滩及山坡草地。分布于江西、福建、湖北、广东、广西、云南。

全草：淡，凉。清热解毒，除湿利尿。用于痢疾，泄泻，实症腹水，消化不良。

## 多荚草属 Polycarpon Loefl. ex L.

**多荚草**

**Polycarpon indicum** (Retz.) Merr.

生于海拔 1 500 米左右的地边或农田中。分布于广东、贵州、云南。

全草：清热解毒。

## 金铁锁属 Psammosilene W. C. Wu et C. Y. Wu

**金铁锁** 独定子(四川、云南)

**Psammosilene tunicoides** W. C. Wu et C. Y. Wu

生于海拔 3 000 米左右的山坡草地或林缘沙地。分布于云南西北部和东北部。

根(金铁锁)：辛，温。有毒。祛风活血，散瘀止痛。用于风湿痹痛，骨痛，创伤出血，跌打损伤。

附 注：①为云南白药原料。②我国特有属。③国家二级保护植物。

## 孩儿参属 Pseudostellaria Pax

**蔓假繁缕**

**Pseudostellaria davidii** (Franch.) Pax ex Pax et Hoffm.——*Kraschenikovia davidii* Franch.

生于海拔 3 200 米以下的山地、林下富含腐殖质的土壤中。分布于东北、华北、西北、西南。

全草：清热解毒。

附　注：功效相同的有**狭叶孩儿参 P. sylvatica** (Maxim.) Pax ex Pax et Hoffm.——*Kraschenikovia sylvatica* Maxim.，分布于东北、华北、西北、西南。

**孩儿参**　小孩参(通称)，太子参(江苏、浙江)，异叶假繁缕(东北植物检索表)，童参(上海常用中草药)

**Pseudostellaria heterophylla** (Miq.) Pax——*Kraschenikovia heterophylla* Miq.

生于海拔 800—2 700 米的山谷或山坡林下。分布于东北、华北、华东及陕西。主产江苏、山东、安徽。

块根(太子参)：甘、微苦，平。益气健脾，生津润肺。用于脾虚体倦，食欲不振，病后虚弱，气阴不足，自汗口渴，肺燥干咳。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。② 功效相似的有**矮小孩儿参 P. maximowicziana** (Franch. et Sav.) Pax，分布于东北、西北、西南及河南。

## 漆姑草属　Sagina L.

**漆姑草**　地兰(浙江)，踏地草(广西)，针包草(四川)

**Sagina japonica** (Swartz) Ohwi——*Spergula japonica* Swartz

生于海拔 600—2 000 米的河流两旁低湿沙质地或山坡荒芜农田。分布于东北、华北及长江和黄河流域。

全草(漆姑草)：苦，凉。散结消肿，解毒止痒。用于白血病，漆疮，痈肿，瘰疬，龋齿病。

附　注：功效相似的有**珍珠草 S. japonica** (Swartz) Ohwi var. **parviflora** (Burtt-Davy) C. Y. Wu，分布于云南。

## 肥皂草属　Saponaria L.

**肥皂草**

**Saponaria officinalis** L.

原产欧洲。新疆有野生分布，北方多有栽培。

根：祛痰，利尿，祛风除湿，抗菌，杀虫。用于咳嗽，皮肤病。

## 蝇子草属　Silene L.

**女娄菜**　小猪耳朵(宁夏)，大叶金石榴(浙江)，野罂粟(云南)

**Silene aprica** Turcz. ex Fisch. et Mey.——*Melandrium apricum* (Turcz.) Rohrb.

生于海拔300—2 250米的山坡草地或山谷湿地。分布于全国南北各地。

全草：辛、苦，平。健脾利水，活血调经。用于乳汁少，体虚浮肿，小儿疳积，月经不调。

**高雪轮**

**Silene armeria** L.

原产欧洲。全国各城市公园和庭院有栽培。

全草：清热解毒。

**麦瓶草**　米瓦罐(通称)，梅花瓶(陕西)，灯笼草(江苏)，香炉草(四川)

**Silene conoidea** L.

生于海拔1 000米以下的田埂、路旁荒地。分布于华北，西北及长江流域。

全草(麦瓶草)：苦，凉。清热凉血，止血调经。用于鼻衄，吐血，尿血，肺痈，月经不调。

附　注：个别地区将其种子误作天仙子用，应注意鉴别。

**洱源土柽柳**　淳三七、桔梗(云南)

**Silene delavayi** Franch.——*Melandrium delavayi* (Franch.) Hand.-Mazz.；*Lychnis delavayi* (Franch.) Diels

生于海拔1 500米以下的山坡草地。分布于云南。

根：清热止痛。用于感冒，跌打损伤。

**粗壮女娄菜**　硬叶女娄菜(浙江天目山药用植物志)，臾巴(藏语)

**Silene firma** Sieb. et Zucc.——*Melandrium firmum* (Sieb. et Zucc.) Rohrb.

生于海拔500—1 700米的山坡草地、林缘、灌丛间及河边。分布于东北、华北及长江流域。

种子：活血通经，消肿止痛。　全草：甘、淡、凉。清热解毒，除湿利尿，催乳调经。

附　注：①功效类似的有**疏毛女娄菜 S. firma** Sieb. et Zucc. f. **pubescens** Makino，分布于东北、华北及湖北。②朝鲜以其种子作王不留行用。

**蝇子草**　白接骨丹(陕西)，银柴胡(甘肃)，脱力草(江苏药材志)，苍蝇花(中药志)

**Silene fortunei** Vis.

生于海拔400—1 800米的山坡草地或山谷草地。分布于长江流域、黄河中下游以南及福建、台湾。

全草(蝇子草)：辛，凉。清热利湿，补虚活血。用于小便淋痛，带下病，痢疾，泄泻；外用于蝮蛇咬伤，扭伤，关节肌肉酸痛。

**隐瓣蝇子草**

**Silene gonosperma** (Rupr.) Bocquet——*Physalychnis gonospermum* Rupr.

生于阳坡、半阳坡。分布于青海、新疆、西藏。

全草、花、果实：健脾，利尿，通乳，调经，补血。

**长梗细蝇子草**

**Silene gracilicaulis** C. L. Tang var. **longipedicellata** C. L. Tang

生于海拔2 500—2 800米的山坡草地。分布于陕西、甘肃、青海、四川、西藏。

根(九头草): 苦,平。破血,清热,利尿。

**大花蝇子草**

**Silene grandiflora** Franch.——*Melandrium grandiflorum* (Franch.) Y. W. Tsui

生于山地。分布于四川、云南。

全草: 清热,止痛,通淋。

**喜马拉雅蝇子草**

**Silene himalayensis** (Rohrb.) Majumder——*Melandrium apetalum* (L.) Fenzl var. *himalayense* Rohrb.

生于阳坡、草甸草原。分布于河北、山西、陕西、甘肃、青海、湖北、四川、云南、西藏。

全草、花、果实: 健脾、利尿,通乳,调经,补血。

**湖北蝇子草** 龙须草(湖北)

**Silene hupehensis** C. L. Tang

生于海拔1 200—2 700米的草坡或林间岩石上。分布于陕西、河南、湖北、四川。

全草: 用于跌打损伤,周身疼痛。

**山蚂蚱** 银柴胡(内蒙古、河北、山东),旱麦瓶草(中药志)

**Silene jenissensis** Willd.

生于石质山坡、石缝、林缘及草地。分布于东北、华北、西北及山东。

根(山银柴胡): 甘、苦,凉。清热凉血。用于虚劳骨蒸,阴虚久疟,小儿疳热,羸瘦。

附 注: 功效相似的有**长白旱麦瓶草 S. jenissensis** Willd. var. **oliganthella** (Nakai et Kitag.) Y. C. Chu; **兴安麦瓶草 S. jenissensis** Willd. var. **viscifera** Y. C. Chu, 分布于黑龙江、吉林; **小花旱麦瓶草 S. jenissensis** Willd. f. **parviflora** (Turcz.) Schischk., 分布于东北; **丝叶旱麦瓶草 S. jenissensis** Willd. f. **sentifolia** (Turcz.) Schischk., 分布于黑龙江、甘肃。

**洱源蝇子草**

**Silene lankongensis** Franch.——*Melandrium lankongense* (Franch.) Hand.-Mazz.

生于海拔1 700—3 200米的山坡草地。分布于西南。

根(滇白前): 清热解毒。

**匍生蝇子草**

**Silene repens** Patr.

生于河岸、山坡草地、草甸、沙丘。分布于东北、华北、西北及西藏。

全草: 止血,活血,调经。

附 注: 功效相似的有**宽叶匍茎蝇子草 S. repens** Patr. var. **latifolia** Turcz.,分布于青海。

**准噶尔蝇子草** 叟巴(藏语)

**Silene songarica** (Fisch., Mey. et Avé-Lall.) Bocquet——*Melandrium brachypetalum* (Horn.) Fenzl

生于山坡草地。分布于新疆东北部。

全草：淡，凉。清热解毒，凉血降压，除湿。用于黄疸，咽喉痛，耳鸣。

**四川粘萼女娄菜**

**Silene szechuanense** Williams——*Melandrium viscidulum* (Franch.) Williams var. *szechuanense* (Williams) Hand.-Mazz.

生于山坡草地。分布于四川、贵州、云南。

根(瓦草)：苦、辛，凉。清肺止咳，止血，利尿。用于咳嗽痰多，热淋，风湿骨痛，疮疖肿痛。

**石生蝇子草**　米洋参(湖北)，瓦草(四川)

**Silene tatarinowii** Regel——*Melandrium tatarinowii* (Regel) Y. W. Tsui

生于海拔1 200—2 950米的山坡林下或山谷路旁。分布于华北及陕西、甘肃、青海、河南、湖北、四川。

全草：清热，通淋，止痛。

**细蝇子草**

**Silene tenuis** Willd.

生于海拔2 200—2 800米的山坡、草丛中。分布于青海、四川、云南、西藏。

根：苦，平。清热利尿，通经。用于小便不利，淋漓涩痛，尿血，经闭。

**粘萼蝇子草**　白前、金柴胡(云南)

**Silene viscidula** Franch.——*Melandrium viscidula* Williams

生于山野坡地草丛中。分布于西南。

根(青骨藤)：苦、辛，凉。有小毒。镇痛，止血，清热，利尿。用于跌打损伤，刀伤，吐泻。

**白玉草**

**Silene vulgaris** (Moench.) Garcke var. **commutata** (Gusson) Coode et Cullen ——*S. venosa* (Gilib) Aschers.

生于草甸、山谷灌丛、荒地。分布于黑龙江、内蒙古、新疆、西藏。

全草：用于丹毒，瘀伤疼痛，月经不调。

## 牛漆姑草属 Spergularia (Pers.) J. et C. Presl.

**拟漆姑**

**Spergularia salina** J. et C. Presl.

生于田野或碱滩地。分布于东北、华北及西南。

全草：清热解毒，祛风除湿。

## 繁缕属 Stellaria L.

**雀舌草**　雪里开花(浙江)，寒草(福建)，天蓬草(植物名实图考)

**Stellaria alsine** Grimm.

生于海拔200—1 900米的溪畔及农田附近的湿地上。分布于华北、华东、西南及陕西、甘肃、青海、广东、广西。

全草：辛，平。祛风散寒，续筋接骨，活血止痛，解毒。用于伤风感冒，风湿骨痛，疮痈肿毒，跌打损伤，骨折。

**安徽繁缕**

**Stellaria anhweiensis** Migo

生于山坡、山麓、路边及田埂。分布于安徽、浙江。

全草：酸，平。清热解毒，活血止痛。

**二柱繁缕**

**Stellaria bistylata** W. Z. Di et Y. Ren

生于山坡、荒漠地带。分布于宁夏贺兰山。

根：类似银柴胡。

附　注：①宁夏作银柴胡用，自产自销。②宁夏特有药用植物。

**中国繁缕**　　华繁缕(浙江)，蛇舌草(湖北)

**Stellaria chinensis** Regel

生于海拔500—2 500米的灌丛下及冷杉林下。分布于华东及河北、山西、陕西、甘肃、河南、湖北、湖南、四川、贵州。

全草：清热解毒，消肿。用于乳痈，跌打损伤；外用于扭伤，瘀肿。

**叉歧繁缕**

**Stellaria dichotoma** L.

生于多石质向阳干山坡、山坡石缝间或沙丘上。分布于东北、华北、西北及四川。

根及全草：甘，凉。清热凉血。用于骨蒸发热，久疟发热，盗汗。

**银柴胡**　　牛肚根(陕西)，白根子(甘肃)，山马蹄菜根(山东)

**Stellaria dichotoma** L. var. **lanceolata** Bunge——*S. gypsophiloides* Fenzl

生于向阳多石质山坡、山坡石缝间、固定沙丘及草原上。分布于华北及黑龙江、辽宁、陕西、甘肃、宁夏。主产陕西、甘肃、宁夏、内蒙古。

根(银柴胡)：甘，凉。清虚热，除疳热。用于阴虚发热，骨蒸劳热，小儿疳积。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**翻白繁缕**

**Stellaria discolor** Turcz.

生于湿草甸、山地溪流旁、山坡草丛及山麓石砾地。分布于东北及河北、内蒙古、陕西、四川。

全草：提脓拔毒。

**禾叶繁缕**

**Stellaria graminea** L.

生于海拔1 000米以上的山坡草地或林下石隙中。分布于内蒙古、山西、陕西、甘肃、青海、湖北、四川、云南、西藏。

全草：甘、酸，凉。清热解毒，化痰，止痛，催乳。

**湖北繁缕**　　续筋草(湖北)

**Stellaria henryi** Williams

生于山坡路旁石缝中。分布于湖北。

种子：止咳，利水，顺气。　全草：用于四肢关节痛。

**繁缕**　小鸡草(浙江)，五爪龙(湖南)，狗蚤菜(广西)

**Stellaria media** (L.) Cyr.——*Alsine media* L.

生于田间路旁、溪旁草地。全国普遍分布。

全草(繁缕)：甘、酸，凉。清热解毒，祛瘀止痛，催乳。用于泄泻，痢疾，肝炎，肠痈，产后瘀血腹痛，牙痛，乳痈，跌打损伤。

**鹅肠繁缕**　赛繁缕(中国高等植物图鉴)，鸡肚肠草(浙江民间常用草药)

**Stellaria neglecta** Weihe

生于海拔 900—1 200 米的田间、路旁、溪边草地。全国普遍分布。

全草：酸，平。解毒祛瘀，清热利尿，下乳。用于痔疮肿痛，肠痈，热淋。

**峨眉繁缕**

**Stellaria omeiensis** C. Y. Wu et Y. W. Tsui

生于海拔 1 000 米以上的山地阴处草丛中。分布于湖北、四川。

全草：清热解毒。

**沼泽繁缕**

**Stellaria palustris** Ehrh.——*S. glauca* With.

生于河边草地、山坡林下。分布于黑龙江、辽宁、河北、山西、陕西、甘肃、山东、河南、湖北。

全草：淡、涩，平。消肿解毒，止痛。

**石生繁缕**　白筋骨草(四川)，抽筋草(云南)

**Stellaria saxatilis** Buch.-Ham.

生于海拔 600—1 600 米的山沟乱石滩或石隙中。分布于西南及河北、山西、陕西、甘肃、浙江、台湾、河南。

全草：辛，凉。有小毒。活血止痛，利湿。用于黄疸，浮肿，带下病，跌打损伤，风湿关节痛；外用于骨折，疮疖。

**伞花繁缕**

**Stellaria umbellata** Turcz.

生于山坡草地。分布于陕西、甘肃、青海、新疆、四川。

全草：甘、酸，凉。清热解毒，化瘀止痛。

**武冈繁缕**

**Stellaria wushanensis** Williams var. **trientaloides** Hand.-Mazz.

生于海拔 1 200—1 600 米的山谷岩缝潮湿地上。分布于浙江、湖北、湖南、广西、四川。

全草：用于小儿疳积。

**云南繁缕**　千针万线草(滇南本草)

**Stellaria yunnanensis** Franch.

生于海拔 2 600—3 250 米的丛林旁或林缘岩石间。分布于云南。

根：甘，平。健脾益肾，养肝。用于体虚贫血，精神不振，头晕心慌，耳鸣眼花，潮热，遗精，月经不调，带下淋沥，小儿疳积。

### 王不留行属　Vaccaria V. Wolf

**王不留行**　麦篮子(陕西、河南)，豆篮子(甘肃)

**Vaccaria segetalis** (Neck.) Garcke——*Saponaria segetalis* Neck.

生于山地、路旁、农田、田埂及丘陵地带。分布于华北、华东及陕西、青海、新疆、四川、云南。其他地区多为栽培或逸出野生。主产河北、山东、辽宁。

种子(王不留行)：苦，平。活血通经，下乳，消肿。用于乳汁不下，闭经，痛经，乳痈肿痛。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 26. 藜科 Chenopodiaceae

### 沙蓬属　Agriophyllum Bieb.

**沙蓬**　沙米、灯索(宁夏)，东廧子(本草纲目拾遗)，曲星赫勒(蒙语)

**Agriophyllum pungens** (Vahl) Link ex A. Diedr.——*Corispermum pungens* Vahl; *A. squarrosum* (L.) Moq.; *A. arenarium* Bieb.

生于沙丘或流动沙丘背风坡。分布于东北、华北、西北及河南、西藏。

种子(东廧子)：甘，平。利肠，消食，清热消风，益气。用于饮食积滞，噎膈反胃，感冒发烧。

### 假木贼属　Anabasis L.

**无叶假木贼**

**Anabasis aphylla L.**

生于山前砾石洪积扇、戈壁、沙丘间，偶见于干旱山坡。分布于甘肃西部、新疆。

嫩枝：杀虫。

附　注：① 所含毒藜碱可增强呼吸。② 功效相同的有**短叶假木贼 A. brevifolia** C. A. Mey.，分布于内蒙古西部、甘肃西部、宁夏、新疆；**展枝假木贼 A. truncata** (Schrenk) Bunge，分布于新疆。

### 滨藜属　Atriplex L.

**中亚滨藜**　马灰条(宁夏)

**Atriplex centralasiatica** Iljin

生于戈壁、荒地、海滨及盐土荒漠，有时侵入田间。分布于华北、西北及吉林、辽宁、山东、西藏。

带苞果实(软蒺藜)：清肝明目，祛风活血，消肿。用于头痛，头晕，目赤多泪，咳喘，高血压症，皮肤瘙痒，风疹。

**野滨藜**　　粉藜(全国中草药汇编)，三齿粉藜(东北草本植物志)，希日古恩-绍日乃(蒙语)

**Atriplex fera** (L.) Bunge——*Spinacia fera* L.

生于湖边、河滩、渠沿、路边等含盐碱地上。分布于华北及黑龙江、吉林、陕西、甘肃、青海、新疆。

全草：甘、酸，平。利水涩肠。用于泄泻。

**榆钱菠菜**　　洋菠菜(通称)

**Atriplex hortensis** L.

原产欧洲。全国北方多见栽种。

茎叶(洋菠菜)：用于缺铁性贫血。

**海滨藜**

**Atriplex maximowicziana** Makino

生于海滩沙地。分布于东南沿海各地。

全草：淡，凉。利湿消肿。

**西伯利亚滨藜**　　碱灰菜(内蒙古)，西伯日-绍日乃(蒙语)，软蒺藜(山东中草药手册)

**Atriplex sibirica** L.

生于盐碱荒漠、湖边、渠沿、河岸及固定沙丘上。分布于东北、华北、西北及山东。

果实(软蒺藜)：苦、咸，平。清肝明目，祛风活血，消肿。用于头痛，皮肤瘙痒，肿毒，乳汁不通。

## 轴藜属　Axyris L.

**轴藜**

**Axyris amaranthoides** L.

生于沙漠地区山坡、草地、河边、荒地及路旁。分布于东北、华北、西北。

果实：清肝明目，祛风消肿。

**平卧轴藜**

**Axyris prostrata** L.

生于沙漠地区山麓及山前平原。分布于内蒙古、青海、新疆、西藏。

全草：淡，寒。祛风止痒。

## 甜菜属　Beta L.

**甜菜**　　糖萝卜(通称)，菜菜(名医别录)，菜菜根(本草纲目)

**Bets vulgaris** L.

全国各地普遍种植，尤以东北及内蒙古较多。

根(甜菜根)：甘，平。通经脉，下气，开胸膈。用于经脉不通，气滞胸闷。

**厚皮菜**　海白菜(陕西)，莙荙菜(本草纲目)，牛皮菜(滇南本草)，构菜(广州植物志)

**Beta vulgaris** L. var. **cicla** L.

全国长江流域以南广为种植。北方亦有少量栽培。

茎叶(莙荙菜)：甘，凉。清热凉血，行瘀止血。用于麻疹透发不快，热毒下痢，经闭，淋浊，痈肿，骨折。　种子(莙荙子)：用于小儿发热，痔疮下血。

## 雾冰藜属　Bassia All.

**雾冰藜**　水蓬蒿(宁夏)，乌斯特-哈姆哈格(蒙语)，五星蒿(中国沙漠地区药用植物)

**Bassia dasyphylla** (Fisch. et Mey.) O. kuntze——*Kochia dasyphylla* Fisch. et Mey.

生于戈壁、盐碱地、沙丘、草原、河滩、阶地及洪积扇上。分布于东北、华北、西北及山东、西藏。

全草：甘、淡，凉。清热燥湿。用于去头皮屑。

## 樟味藜属　Camphorosma L.

**樟味藜**

**Camphorosma monspeliaca** L.

生于荒地、沙丘及旱山坡。分布于天山。

全草：利尿，发汗。

附　注：功效相同的有**同齿樟味藜 C. monspeliaca** L. subsp. **lessingii** (Litv.) Allen，分布于阿尔泰山。

## 驼绒藜属　Ceratoides (Tourn.) Gagnebin

**驼绒藜**

**Ceratoides latens** (J.F. Gmel.) Reveal et Holmgren——*Krascheninikovia latens* J.F. Gmel.; *Eurotia ceratoides* (L.) C.A. Mey.

生于戈壁、荒漠、旱山坡及草原。分布于内蒙古、甘肃、青海、新疆、西藏。

根、花：淡，凉。止咳化痰，解热。

## 藜属　Chenopodium L.

**尖头叶藜**　绿珠藜(东北草本植物志)

**Chenopodium acuminatum** Willd.

生于荒地、河岸及田边。分布于东北、华北、西北及山东、浙江、河南。

全草：用于风寒头痛，四肢胀痛。

**藜**　灰藜、灰菜(救荒本草)，灰蓼(本草纲目)，飞扬草(广州植物志)，灰苋菜(四川中药志)

**Chenopodium album** L.

生于路旁、荒地及田间。全国各地普遍分布。

幼嫩全草：甘，平。有小毒。清热利湿，透疹止痒，杀虫。用于痢疾，泄泻，湿疮痒疹，毒虫咬伤。　茎：涂疣赘黑痣，蚀恶肉。

附　注：①华东及山东、湖北、湖南、贵州以其果实作地肤子(灰菜子)。② 功效相似的有**灰绿藜 C. glaucum** L.，分布于除江西、福建、台湾、广东、广西、贵州以外的地区。

**土荆芥**　红泽兰(福建)，臭草(福建、贵州)，虎骨香(湖南)，杀虫芥(广东)，钩虫草(广西)

**Chenopodium ambrosioides** L.

生于路边、村旁及河岸。分布于华东、中南及四川、贵州。主产广东、广西、福建、贵州。

全草(土荆芥)：辛、苦，温。有毒。杀虫，祛风，通经。用于风湿痹痛，钩虫病，蛔虫病，痛经，经闭，蛇虫咬伤。

**刺藜**　灯笼草(宁夏)，刺穗藜(中国北部植物图志)，红小扫帚苗(长白山植物药志)

**Chenopodium aristatum** L.——*Teloxys aristata* Moq.

生于农田或山坡、荒地。分布于东北、华北、西北及山东、江苏、河南、四川。

全草：淡，平。祛风止痒。外用于过敏性皮炎，癣疹。

**香藜**

**Chenopodium botrys** L.——*Ambrina botrys* Moq.

生于山谷、河岸阶地、宅旁及路边。分布于我国西藏。

全草：用于皮肤湿疹，肠道虫症。

**菊叶香藜**　臭灰菜(宁夏)，总状花藜(中国北部植物图志)

**Chenopodium foetidum** Schrad.

生于海拔 400—1 400 米的林缘草地、沟岸、河沿、宅旁及农田。分布于华北及辽宁、陕西、甘肃、青海、河南、四川、云南、西藏。

全草：祛风止痒，清热利湿，杀虫。

**细穗藜**　小叶野灰菜(湖北)

**Chenopodium gracilispicum** Kung

生于山坡草地、林缘及河边。分布于陕西、甘肃、山东、江苏、浙江、江西、河南、湖北、湖南、广东、四川。

全草：外用于皮肤过敏。

**杂配藜**　大叶灰菜(黑龙江)，大叶藜(东北、宁夏)

**Chenopodium hybridum** L.

生于林缘、山坡灌丛间及沟沿处。分布于东北、华北、西北及浙江、河南、四川、云南、西藏。

全草(血见愁)：甘，平。活血，通经，止血。用于月经不调，崩漏，咯血，衄血，尿血，疮痈肿毒。

**红叶藜**

**Chenopodium rubrum** L.

生于路旁、田边及轻度盐碱地。分布于黑龙江、内蒙古、甘肃、宁夏、新疆。

地上部分：外用于创伤。

**小藜**　粉子菜(湖北)，灰灰菜(四川)，灰藋(雷公炮炙论)

**Chenopodium serotinum** L.

生于农田、荒地、道旁及垃圾堆。除西藏外，全国各地普遍分布。

全草：甘、苦，凉。祛湿，清热解毒。用于疮疡肿毒，疥癣瘙痒。

**市藜**

**Chenopodium urbicum** L.

生于戈壁及田边。分布于新疆、四川。

全草：清热，利湿，杀虫。

## 虫实属　Corispermum L.

**兴安虫实**

**Corispermum chinganicum** Iljin

生于湖边沙丘、半固定沙丘及草原。分布于东北及河北、内蒙古、甘肃、宁夏。

全草：降血压。用于高血压症。

附　注：功效相同的有**蝇虫实 C. declinatum** Steph. ex Steven，分布于华北、西北及河南；**软毛虫实 C. puberulum** Iljin，分布于东北、华北及陕西、湖北；**细苞虫实 C. stenolepis** Kitag.，分布于辽宁西部、内蒙古伊克昭盟。

## 盐生草属　Halogeton C.A. Mey.

**盐生草**

**Halogeton glomeratus** (Bieb.) C.A. Mey.——*Anabasis glomerata* Bieb.

生于山脚及戈壁滩。分布于甘肃、青海、新疆、西藏。

地上部分：发汗解表，止咳平喘，祛湿。

## 地肤属　Kochia Roth.

**木地肤**

**Kochia prostrata** (L.) Schrad.——*Salsola prostrata* L.; *K. suffruticulosa* Less.

生于山坡、沙地及荒漠。分布于华北、西北及黑龙江、辽宁、西藏。

全草：解热。

**地肤**　野扫帚(东北),独独草(宁夏),铁扫把子(四川)

**Kochia scoparia** (L.) Schrad.——*Chenopodium scoparia* L.

生于田边、路旁及荒地。全国各地普遍分布。主产河北、山西、山东、河南。

果实(地肤子):辛、苦,寒。清热利湿,祛风止痒。用于小便涩痛,阴痒症,带下病,风疹,湿疹,皮肤瘙痒。　嫩茎叶:苦,寒。清热解毒,利尿通淋。用于痢疾,泄泻,热淋,雀盲。

附　注:①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②功效相似的有**碱地肤 K. scoparia** (L.) Schrad. var. **sieversiana** (Pall.) Ulbr. ex Aschers. et Graebn.,分布东北、华北、西北;**扫帚菜 K. scoparia** (L.) Schrad. f. **trichophila**(Hort. ex Tribune) Sching et Thell.

## 小蓬属　Nanophyton Less.

**小蓬**

**Nanophyton erinaceum** (Pall.) Bunge——*Polycnemum erinaceum* Pall.

生于戈壁、石质山坡及干燥的钙质土地区。分布于新疆。

全草:清热解毒。用于淋证,梅毒。

## 盐角草属　Salicornia L.

**盐角草**　海蒿、胖蒿子(江苏),海蓬子(种子植物名录)

**Salicornia europaea** L.

生于盐碱地、盐湖旁及海边。分布于华北、西北及辽宁、山东、江苏。

全草:止血,利尿。

附　注:可作为制取碳酸钠原料。

## 猪毛菜属　Salsola L.

**蒿叶猪毛菜**

**Salsola abrotanoides** Bunge

生于河滩、山间盆地及沙砾质土壤上。分布于内蒙古、甘肃、青海、新疆。

全草:淡,凉。平肝。用于高血压症。

**木本猪毛菜**

**Salsola arbuscula** Pall.

生于山麓及砾质荒漠。分布于内蒙古、甘肃西部、青海、新疆。

地上部分:平肝,镇静。

附　注:全株含类似罂粟碱的三种生物碱。

**猪毛菜**　扎蓬棵(东北、河北),牛尾巴(江苏),猪毛缨(河南)

**Salsola collina** Pall.

生于村边、路旁及荒芜地。分布于东北、华北、西北、西南及山东、江苏、河南。

全草：甘、淡，凉。平肝。用于肝阳，头痛。

**刺沙蓬**　风滚草(吉林)，大翅猪毛菜(东北药用植物图志)，刺蓬(中国植物志)

**Salsola ruthenica** Iljin

生于河谷沙地、砾质戈壁及海边。分布于东北、华北、西北及山东、江苏、西藏。

全草：苦，凉。平肝。用于高血压症。

### 菠菜属　Spinacia L.

**菠菜**　菠薐(嘉祐本草)，鹦鹉菜(现代实用中药)，波斯菜(本草纲目)，菠薐菜(植物名实图考)

**Spinacia oleracea** L.

原产伊朗。全国各地普遍种植。

带根全草：甘，凉。滋阴平肝，止咳，润肠。用于头痛，目眩，风火赤眼，消渴，便秘。　果实：微辛、甜，微温。祛风明目，开通关窍，利胃肠。

### 碱蓬属　Suaeda Forsk.

**碱蓬**　盐蒿子、碱蒿子(通称)

**Suaeda glauca** (Bunge) Bunge——*Schoberia glauca* Bunge

生于海滨、荒地、渠岸及田边盐碱地。分布于华北、西北及黑龙江、辽宁、山东、江苏、安徽、河南。

全草：微咸，凉。清热，消积。

## 27. 苋科　Amaranthaceae

### 牛膝属　Achyranthes L.

**土牛膝**　破布粘(福建)，鸡骨黄(湖北)，倒钩草、倒梗草(广州)，南蛇牙草(海南)

**Achyranthes aspera** L.

生于海拔800—2 300米的山坡疏林或村落附近空旷地。分布于江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草(土牛膝)：微苦，凉。清热解毒，利水，活血。用于感冒发热，痄腮，白喉，痢疾，疟疾，咽喉痛，脚气，淋证，水肿，跌打损伤，风湿关节痛。　根和根状茎：苦、酸，平。清热解毒，活血散瘀，祛湿利尿。用于淋证，尿血，经闭，白喉。

**钝叶土牛膝**　倒刺草(广西)

**Achyranthes aspera** L. var. indica L.

生于山坡林下、田埂、路边、河旁。分布于台湾、广东、广西、云南。

全草：用于咽喉痛，疟疾。

**牛膝**　透骨草(江苏),白牛膝(浙江),牛克膝(贵州),山牛膝(海南植物志),牛磕膝(中国植物志)

**Achyranthes bidentata** Bl.

生于海拔200—1 750米的山坡林下。除东北外,全国普遍分布。主产河南。

根(牛膝): 苦、酸,平。补肝肾,强筋骨,逐瘀通经,引血下行。用于腰膝酸痛,筋骨无力,经闭癥瘕,肝阳眩晕。茎叶: 用于寒湿痿痹,腰膝疼痛,久疟,淋证。

附　注:《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**少毛牛膝**

**Achyranthes bidentata** Bl. var. **japonica** Miq.

生于林下阴处。分布于安徽、浙江、江西、湖南。

根: 微苦,凉。清热解毒,利尿。

**柳叶牛膝**　拐牛膝(湖北),红牛七(广西)

**Achyranthes longifolia** (Makino) Makino——*A. bidentata* Bl. var. *longifolia* Makino

生于海拔 1 000 米以下的山坡。分布于陕西、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根: 苦、酸,平。活血散瘀,祛湿利尿,清热解毒。用于淋证,尿血,风湿关节痛。

附　注: 功效相同的有**红柳叶牛膝 A. longifolia** (Makino) Makino f. rubra Ho,分布于江西、湖北、四川(多为栽培)。

## 白花苋属　Aerva Forsk.

**白花苋**　白牛膝(贵州),绢毛苋(贵州植物志、中国高等植物图鉴)

**Aerva sanguinolenta** (L.) Bl.——*Achyranthes sanguinolenta* L.

生于海拔 1 100—2 300 米的山坡灌丛。分布于海南、广西、四川、贵州、云南。

根或花: 微辛,平。生用破血,利湿;炒用补肝肾,强筋骨。用于痢疾,跌打损伤,月经不调,血崩,咳嗽。

## 莲子草属　Alternanthera Forsk.

**锦绣苋**　五色草(通称),红节节草、红莲子草(福建),红草(广东)

**Alternanthera bettzickiana** (Regel) Nichols. ——*Telanthera bettzickiana* Regel

原产巴西。全国各大城市有栽培。

全株: 清热解毒,凉血止血,消积逐瘀。

**喜旱莲子草**　水花生(北京、江苏、浙江、贵州),蟛蜞菊(湖北、四川),空心苋(福建中草药)

**Alternanthera philoxeroides** (Mart.) Griseb. ——*Cucholzia philoxeroides* Mart.

原产巴西。北京、陕西、江苏、浙江、江西、福建、湖北、湖南有引种，后逸为野生，常见于池沼、水沟内。

根：苦，寒。　茎叶：微甘，寒。清热凉血，利尿，解毒。用于麻疹，乙型脑炎，肺痨咳血，淋浊，缠腰火丹，疔疖，蛇咬伤。

**莲子草**　满天量(浙江)，耐惊花(江西)，虾钳草(湖北、广东)，节节花(广州、海南)，水金钤(四川中药志)

**Alternanthera sessilis** (L.) DC. ——*Illecebrum sessile* L.

生于村落附近的草坡、水沟、田边、沼泽或海边湿地。分布于华东、中南及四川、贵州、云南。

全草：苦，凉。散瘀消毒，清火退热。用于咳嗽吐血，痢疾，肠风下血，淋证，痈疽肿毒，湿疹。

## 苋属　Amaranthus L.

**尾穗苋**　红苋菜(通称)，西洋谷(湖北)，老枪谷(龙沙纪略、海南植物志)

**Amaranthus caudatus** L.

原产热带。全国南北各地均有栽种。

根(老枪谷)：甘、淡，平。滋补强壮。用于头昏，四肢无力，小儿疳积。

**绿穗苋**　西风谷(浙江)

**Amaranthus hybridus** L.

生于田埂及沟边湿地。分布于陕西、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北、湖南、四川，贵州。

全草：苦、辛，凉。清热解毒，利湿止痒。

**繁穗苋**　西番谷、西方谷(东北)，老来红(内蒙古)，天粟米(湖北)，天雪米(四川)

**Amaranthus paniculatus** L.

生于海拔 2 500 米以下地带。各地栽培或野生。

种子：苦，平。消肿，止痛。用于跌打损伤，骨折肿痛，恶疮肿毒。

**凹头苋**　刺苋菜(湖北)，野苋菜(滇南本草)，野苋(植物名实图考)

**Amaranthus lividus** L.——*A. ascendes* Loisel.

生于 1 600 米以下的田野、村庄附近的杂草地上。分布于除内蒙古、宁夏、青海和西藏以外各省区。

全草：甘，凉。用于痢疾，目赤，乳痈，痔疮。　种子：祛寒热，利小便，明目。

**反枝苋**　西番谷(宁夏)，西风谷(贵州)

**Amaranthus retroflexus** L.

原产北美热带。生于田园、农地、村庄附近的草地。分布于东北、华北、西北及江苏、河南、湖北、贵州。

全草：用于泄泻，痢疾，痔疮肿痛出血。

附　注：青葙子伪品之一。

**刺苋**　酸酸苋(浙江)，刺刺草(福建)、野勒苋、勒苋菜(广东)，笋苋菜(岭南采药录)

**Amaranthus spinosus L.**

生于海拔300—800米的旷地或园圃。分布于中南及陕西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、四川、贵州、云南。

全草：甘、淡，寒。清热利湿，凉血止血，解毒消肿。用于痢疾，便血，浮肿，带下病，胆结石，瘰疬，痔疮，咽喉痛，蛇咬伤。

**苋**　苋菜(通称)，老来变(东北)，青香苋(江西)，雁来红(救荒本草)，老少年(盛京通志)，三色苋(华北经济植物志要)

**Amaranthus tricolor** L.——*A. mangostanus* L.; *A. gangeticus* L.

原产印度。全国各地有栽培，有时逸为野生。

全草(**苋菜**)：甘，寒。凉血解毒，止痢。用于痢疾，吐血，血崩，目翳。种子：甘，寒。清肝明目。用于角膜云翳，目赤肿痛。

**皱果苋**　绿苋(中国北部植物图志)，野苋、细苋、白苋(海南植物志)

**Amaranthus viridis** L.

原产非洲热带。生于田野及村庄附近。分布于东北、华北、华东及陕西、广东、海南、广西、贵州、云南。

根及全草：甘、淡，凉。清热利湿。用于痢疾，泄泻，乳痈，痔疮肿痛。

## 青葙属　Celosia L.

**青葙**　野鸡冠花(华东、四川)，狗尾巴子(四川中药志)，野鸡冠(本草纲目)

**Celosia argentea** L.

生于海拔1 100米以下平原、丘陵、山坡及田边。全国普遍分布，野生或栽培。

种子(**青葙子**)：苦，凉。清肝，明目，退翳。用于肝热目赤，眼生翳膜，视物昏花，肝火眩晕。　花序：苦，凉。清肝凉血，明目退翳。用于吐血，头风，目赤，血淋，月经不调，带下病。　茎叶：苦、凉。清热燥湿，杀虫，止血。用于风瘙身痒，疮疥，痔疮，刀伤出血。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**鸡冠花**　鸡脚枪(福建)，比瓦格(苗语)

**Celosia cristata** L. ——*C. argentea* L. var. *cristata* (L.) O. Kuntze

全国各地普遍栽培。

花序(**鸡冠花**)：甘、涩，凉。收涩止血，止带，止痢。用于吐血，崩漏，便血，痔血，带下病，久痢不止。　种子：甘，凉。凉血止血。用于肠风便血，痢疾，淋浊。　茎叶：用于痔疮，痢疾。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

## 浆果苋属　Cladostachys D. Don

**浆果苋**　野苋菜藤(云南)，地灵苋(海南植物志)

**Cladostachys frutescens** D. Don

生于海拔100—2 200米的山坡林下或灌丛中。分布于西南及台湾、广东、海南、广西。

全株：淡，平。祛风利湿。用于风湿关节痛，泄泻，痢疾。

## 杯苋属　Cyathula Bl.

**头花杯苋**　　白牛膝(云南)，麻牛膝(四川中药志)

**Cyathula capitata** Moq.

生于海拔 1 700—2 300 米的山坡杂木林下。分布于西南。

根(麻牛膝)：祛风除湿，祛瘀通经，强筋壮骨。

**川牛膝**　　毛牛膝(湖北)

**Cyathula officinalis** Kuan

生于海拔 1 500 米以上地区，野生或栽培。分布于四川、贵川、云南。主产四川。

根(川牛膝)：甘、微苦，平。逐瘀通经，通利关节，利尿通淋。用于经闭癥瘕，胞衣不下，关节痹痛，尿血血淋，跌打损伤。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**杯苋**　　蛇见怕(海南植物志)

**Cyathula prostrata** (L.) Bl.——*Achyranthes prostrata* L.

生于山坡灌丛或河边。分布于台湾、广东、海南、广西、云南。

全草：苦、甘，平。消积除疾，消肿止痛。用于小儿疳积，癥瘕，肺痨，蛇咬伤，跌打损伤，疮疡肿毒。　根：清热解毒。用于痢疾。

**绒毛杯苋**　　藏牛膝(贵州)

**Cyathula tomentosa** (Roth) Moq.——*Achyranthes tomentosa* Roth

生于海拔 1 800—2 300 米的林下。西南地区有栽培。

根：生用破血行瘀；炙用补肾，强腰膝。

## 千日红属　Gomphrena L.

**银花苋**　　鸡冠千日红(南京中山植物园栽培植物名录)

**Gomphrena celosioides** Mart

原产美洲热带。生于路旁草地。分布于台湾、广东、海南及西沙群岛。

全草(地锦花)：甘、淡，凉。清热利湿，凉血止血。用于痢疾。

**千日红**　　千年红(江苏)，长生花(上海)，蜻蜓红(福建)，百日红(广州)

**Gomphrena globosa** L.

原产美洲热带。全国各地有栽培。

花序(千日红)：甘，平。止咳平喘，平肝明目。用于头风，目痛，气喘咳嗽，痢疾，顿咳，小儿惊风，瘰疬，疮疡。

## 血苋属　Iresine P. Br.

**血苋**　　红苋菜(广东)，红叶苋(经济植物手册)，红洋苋(上海植物名录)

**Iresine herbstii** Hook. f. ex Lindl.

原产巴西。我国江苏、上海、广东、海南、广西、云南等地有栽培。

全草：微苦，凉。清热止咳，调经止血。用于吐血，衄血，创伤出血，痢疾，痛经。

## 28. 仙人掌科 Cactaceae

### 猬状仙人球属 Echinopsis Zucc.

**仙人球** 刺球、雪球(福建民间草药)，天鹅蛋、仙人拳、薄荷包掌(全国中草药汇编)

**Echinopsis multiplex** Zucc.

全国各地温室均有栽培。

全株：甘，平。清肺止咳，消肿解毒。用于肺热咳嗽，痔疮；外用于蛇、虫咬伤，烧、烫伤。

### 昙花属 Epiphyllum Haw.

**昙花** 琼花、风花、叶下莲、金钩莲(福建)

**Epiphyllum oxypetalum** (DC.) Haw.——*Cereus oxypetalus* DC.

原产美洲热带。全国各地公园常在温室栽培。

茎：酸、咸，凉。清热解毒。用于咽喉痛，疥疖。 花(昙花)：淡，平。清肺，止咳，化痰。用于肺痨，咳嗽，咯血，高血压症，崩漏。

### 量天尺属 Hylocereus (Berger) Britt. et Rose

**量天尺** 三角火旺、七星剑花(广东)，霸王鞭(花)(海南、广西)，剑花(广东中药)

**Hylocereus undatus** (Haw.) Britt.et Rose——*Cereus undatus* Haw.; *C. fricostatus* Gossel.

广东、海南、广西有栽培或逸生，北方温室有栽培。

茎(量天尺)：甘、淡，凉。舒筋活络，解毒。外用于骨折，痄腮，疮肿。 花(剑花)：甘、淡，微凉。清热润肺，止咳。用于肺痨，咳嗽，瘰疬。

### 银毛球属 Mammillaria Haw.

**长突仙人掌**

**Mammillaria longimamma** DC.

南方有栽培。

全株：止血，止痛。用于内伤出血，腹痛。

**光刺乳突球**

**Mammillaria longimamma** DC. var. **sphaerica** (A. Dietr.) K. Brang

南方有栽培。

果实：止咳。用于咳嗽。

**绒仙人球**

**Mammillaria rhodantha** Link

分布于广西。南方或温室有栽培。

茎：甘、滑，凉。散积消滞。

## 令箭荷花属　Nopalxochia Britt. et Rose

**令箭荷花**

**Nopalxochia ackermannii** Kunth

全国各地温室有栽培。

全株：用于精神病。

## 仙人鞭属　Nyctocereus Britt. et Rose

**仙人鞭**　仙人条(贵州)

**Nyctocereus serpentinus** (Lag.) Britt. et Rose——*Cereus serpentinum* Lag.

全国各地温室有栽培。

茎(仙人鞭)：辛、苦、涩，凉。理气消痞，清热解毒。用于疟腮，泄泻，乳痈，蛇咬伤。

## 仙人掌属　Opuntia Mill.

**猪耳掌**　棵林歪(广西壮语)

**Opuntia brasiliensis** (Willd.) Haw.

广西有分布。南方或温室有栽培。

茎：消痞。用于腹内癥块。

**仙人掌**　观音掌(广西)，神仙掌(本草求原)，老鸦舌(南安府志)

**Opuntia dillenii** (Ker-Gawl.) Haw.——*Cactus dillenii* Ker-Gawl.

生于树边石上、海滨沙滩，常有栽培。原产巴西至阿根廷。北方温室有栽培；南方逸为野生。

全株(仙人掌)：苦，寒。行气活血，清热解毒，消肿止痛，健胃镇咳。用于胃痛，急性痢疾，咳嗽；外用于疟腮，痈疖肿毒，蛇咬伤，烧、烫伤。花(仙人掌花)：用于吐血。果实(仙人掌子)：甘，平。补脾健胃，益脚力，除久泻。肉质茎中的浆汁凝结物(玉芙蓉)：淡，寒。用于怔忡，便血，痔血，咽喉痛，疔肿。

附　注：功效相似的有**普通仙人掌 O. vulgaris** Mill.；**梨果仙人掌 O. ficus-in dica** Mill.

**仙巴掌**　仙人掌、玉英(云南)

**Opuntia monacantha** (Willd.) Haw.——*Cactus monacantha* Willd.

生于河谷或大片自然生长。分布于四川、贵州、云南。

茎(仙巴掌)：苦，凉。清热解毒，消肿散结。用于痄腮，乳痈，疖疮痈肿，毒蛇咬伤，水、火烫伤。茎汁液凝结物(玉芙蓉)：甘，寒。用于便血，疔肿。

## 蟹爪兰属　Zygocactus Schum.

**蟹爪兰**　　锦上添花(广西)，蟹足霸王鞭(植物学大辞典)

**Zygocactus truncatus** (Haw.) Schum.——*Epiphyllum truncatum* Haw.

全国各地温室有栽培。

全株：清热解毒，消肿。外用于疮疡肿毒，疔疖，痄腮。

# 29. 木兰科　Magnoliaceae

## 鹅掌楸属　Liriodendron L.

**鹅掌楸**　　马褂木(江苏、江西)，野厚朴(浙江)，马褂树(广西)，双飘树(贵州)，遮阳树(云南)

**Liriodendron chinense** (Hemsl.) Sarg.——*L. tulipifera* L. var. *chinense* Hemsl.

生于山谷常绿或落叶阔叶林中及阳坡水沟边。庭园有栽培。分布于长江流域以南各省区。

根、树皮(凹朴皮)：辛，温。祛风除湿，止咳。用于风寒咳嗽，风湿关节痛。　叶：外用于头疮。

附　注：国家二级保护植物。

**北美鹅掌楸**

**Liriodendron tulipifera** L.

原产北美。南京、青岛、昆明、庐山等地庭园栽培。

树皮：辛，温。除湿，止咳。用于风寒咳嗽，气急、四肢浮肿。

附　注：本种的木部乙醇提取物对多种细菌及真菌均有抑制作用。

## 木兰属　Magnolia L.

**天目木兰**　　木兰(浙江)

**Magnolia amoena** Cheng

生于海拔700—1 000米的树林中。分布于浙江天目山、江西。

花蕾(天目木兰)：苦，寒。利尿消肿，润肺止咳。用于肺热咳嗽，痰中带血，痈疮肿毒。

附　注：功效相同的有**黄山木兰 M. cylindrica** Wils. 分布于安徽、浙江、河南。

**凹叶厚朴**　　厚朴(浙江、江西)，温朴(浙江)，庐山厚朴(中国高等植物图鉴)

**Magnolia biloba** (Rehd. et Wils.) Cheng——*M. officinalis* Rehd. et Wils. var. *biloba* Rehd. et Wils.

喜生于温凉、湿润、酸性的肥沃沙壤土中。分布于安徽、浙江、江西、福建、广东、广西。陕西、甘肃、江苏、河南、湖北、湖南、贵州有栽培。

树皮、根皮(厚朴)：苦、辛，温。温中理气，消积散满。用于胸腹胀满，气逆喘咳，呕吐泻痢。　花(厚朴花)：微苦，温。宽中理气。用于感冒咳嗽，胸闷不适。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载为厚朴及厚朴花基源之一。

**望春花**　辛夷(河南)，法氏辛夷(中药志)，望春玉兰(中国高等植物图鉴)

**Magnolia biondii** Pamp.——*M. fargesii* (Finet et Gagnep.) Cheng

生于山坡路旁或杂木林中。分布于陕西、甘肃、河南、湖北、四川。青岛有栽培。

花蕾(辛夷)：辛，温。散上焦风热。用于头痛，鼻塞流浊涕。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载，为辛夷基源之一。

**滇藏玉兰**　二叶子厚朴(云南)，辛夷、木笔花、大琼(西藏)

**Magnolia camphelii** Hook. f. et Thoms.——*M. mollicomata* W. W. Smith

生于海拔2 300—3 300米的山坡林中或阔叶林下。分布于四川西南部、云南西北部、西藏东南部。

花蕾：辛、苦，温。祛风通窍，温中下气，燥湿化痰。用于感冒头痛，鼻塞流浊涕，三叉神经痛。　树皮：功效同厚朴。

附　注：我国西藏地区以本种花蕾作"辛夷"用。

**桂南木莲**　大叶花、假厚朴(广西)，仁昌木莲(广东植物志)

**Magnolia chingii** Dandy

生于山地林中。分布于广东北部及西部、广西西北和西南及中部、贵州东南部。

叶、花、果实：消肿止痛。

**夜合花**　夜合(福建)，合欢花(广东、广西)，夜香木兰(广州植物志)

**Magnolia coco** (Lour.) DC.——*Liriodendron coco* Lour.; *M. pumila* Andr.

喜生于气候温湿地区。福建、台湾、广东、广西、贵州、云南有栽培。

花(夜合花)：苦，微温。理气止痛。用于肝郁气痛，带下病，咳嗽气喘，失眠，四肢浮肿，跌打损伤。

**山玉兰**　土厚朴、野厚朴、野玉兰、波罗花(云南)

**Magnolia delavayi** Franch.

生于山坡及杂木林中。分布于四川、贵州、云南。

树皮、花：苦、辛，温。温中理气，止痛，健脾。用于消化不良，脘痛，呕吐，腹胀，腹痛。花：用于鼻炎，鼻窦炎，咳嗽。

**玉兰**　白玉兰、辛夷(通称)，望春花(陕西、安徽、湖北)，姜朴(陕西)，迎春花(浙江)，玉堂春(广州)

**Magnolia denudata** Desr.——*M. heptapeta* (Buchoz.) Dandy

全国各地均有栽培。

花蕾(辛夷)：辛，温。通窍，祛风散寒。用于急、慢性鼻窦炎，过敏性鼻炎，头痛。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。为辛夷基源之一。② 花的煎液

对皮肤癣菌及常见致病菌有较强的抗菌作用。

**荷花玉兰**　广玉兰、洋玉兰(通称)

**Magnolia grandiflora** L.

原产北美东南部。长江流域以南各省区均有栽培。

花：辛，温。祛风散寒，止痛。用于外感风寒，鼻塞头痛。　树皮：燥湿，行气止痛。用于湿阻，气滞胃痛。

**思茅玉兰**　大叶木兰(云南)，傻东化(傣语)

**Magnolia henryi** Dunn

生于海拔540—1 500米的低山沟谷雨林或栽培。分布于云南思茅、西双版纳。

树皮、花：温中理气。

附　注：云南特有药用植物。

**日本辛夷**

**Magnolia kobus** DC.

原产日本及朝鲜南部。青岛、杭州有栽培。

花蕾：祛风散寒。

**辛夷**　望春花、木笔花、木兰花(西北)，紫玉兰(江苏、河南)，杜春花(江苏)

**Magnolia liliflora** Desr.——*M. quinquepeta* (Buchoz.) Dan

分布于甘肃东南部、湖北、四川。现各地庭园多有栽培。

花蕾(辛夷)：辛，温。祛风散寒，通窍。用于鼻塞，头痛，齿痛。　树皮(木兰皮、厚朴)：功效同厚朴。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。② 功效相同的有**罗田玉兰 M. pilocarpa** Z. Z. Zhao et Z. W. Xie，分布于湖北罗田；**白花湖北木兰 M. sprengeri** Pamp. var. **elongata** (Rehd. et Wils.) Stapf，分布于湖北。

**日本厚朴**

**Magnolia obovata** Thunb.

东北及青岛有栽培。

花：温中下气，燥温化痰。　果实：温中利气，消食。

**厚朴**　川朴，紫油厚朴(通称)，厚朴实(本草纲目)，厚朴子、赤朴(名医别录)

**Magnolia officinalis** Rehd. et Wils.

喜生于温暖、湿润、土壤肥沃的坡地。多栽培。分布于中南及河北、陕西、甘肃、安徽、浙江、江西、福建、四川、贵州、云南。

树皮、根皮(厚朴)：辛，温。温中下气，化湿行滞。用于胸腹胀痛，食积气滞，泄泻，痢疾，气逆喘咳。　花(厚朴花)：甘、微苦，温。宽中理气，开郁化湿。用于胸脘胀闷。　果实(厚朴实)：用于感冒咳嗽，胸闷。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②厚朴煎剂对金黄色葡萄球菌、肺炎双球菌、痢疾杆菌等有较强抗菌作用。其所含的厚朴箭毒碱能使运动神经末梢麻痹、有解痉和松弛肌肉的作用；厚朴酚有抗溃疡作用。③ 功效相同的有**华木兰 M. sinensis** (Rehd. et Wils.) Stapf，分布于四川。

**长叶木兰**　水铁罗木(海南)，含笑花木(广西)

**Magnolia paenetalauma** Dandy——*M. tenuicarpella* Chang

生于山坑、山坡、丘陵的常绿阔叶林中。分布于广东、海南、广西、贵州南部。

树皮：消积。用于胃脘胀痛。　叶、果实：用于风湿疼痛，咳嗽。

**大叶厚朴**　云朴、贡山厚朴、腾冲厚朴、贡山木兰(云南)，滇缅厚朴(中国高等植物图鉴)

**Magnolia rostrata** W. W. Smith

生于温暖的山野坡地。分布于云南西北部及西部、西藏东南部。

树皮：辛，微苦，温。功效同厚朴。

附　注：本种为云南西部习用商品厚朴。

**凹叶木兰**　姜朴、辛皮、乌皮(四川)，二月花、苞谷树、花树子(云南)

**Magnolia sargentiana** Rehd. et Wils.——*M. emarginata* Cheng

生于林中。分布于四川中部和南部、云南北部。

树皮(姜朴)：辛，温。功效同厚朴。

附　注：《四川省中药材标准》1977 年版收载。

**天女木兰**　木兰(浙江)，天女花(中国高等植物图鉴)

**Magnolia sieboldii** K. Koch

喜生于阳坡和湿润山谷中。分布于辽宁、山东、安徽、浙江、江西、广西。

花蕾：苦，寒。消肿解毒，润肺止咳。用于痈毒，肺热咳嗽，痰中带血。

**湖北木兰**　迎春树(湖北)，辛夷、应春花、二月花(四川)，武当玉兰(中国高等植物图鉴)

**Magnolia sprengeri** Pamp.——*M. denudata* Rehd. et Wils. var. *purpurascens* (Maxim.) Rehd. et Wils.; *M. denudata* Rehd. et Wils. var. *elongata* Rehd. et Wils.

生于山坡或杂木林中。分布于陕西南部、甘肃、河南西南部、湖北西部、湖南西北部、四川东部。

树皮：辛，温。功效同厚朴。　花蕾(辛夷)：用于风寒头痛，鼻塞，鼻渊，浊涕。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载，为辛夷基源之一。②本种在四川作姜朴药用已有数十年历史。《四川省中药材标准》1977 年版收载。

**川滇木兰**　西昌厚朴、枝子皮(四川)，鸡蛋花(云南)

**Magnolia wilsonii** (Finet et Gagnep.) Rehd.——*M. parviflora* Sieb. et Zucc. var. *wilsonii* Finet et Gagnep.; *M. nicholsoniana* Rehd. et Wils.

生于海拔 3 500 米以下的山地杂木林缘。分布于四川、云南。

树皮(姜朴)、枝皮(枝子皮)：功效同厚朴。

附　注：《四川省中药材标准》1977 年版收载。

**龙女花**　小玉兰(云南)

**Magnolia wilsonii** (Finet et Gagnep.) Rehd. f. **taliensis** (W. W. Smith) Rehd.——*M. taliensis* W. W. Smith

生于海拔 2 400—2 900 米的山地。分布于云南大理、宾川、昆明、会泽。

根皮：燥湿健脾。

## 木莲属　Manglietia Bl.

**盐津木莲**　古蔺厚朴(四川),川滇木莲(中国树木志)

**Manglietia duclouxii** Finet et Gagnep.

生于山坡阔叶林中。分布于四川南部、贵州、云南东北部及东南部。

树皮：四川南部地区作厚朴入药,功效同厚朴。

**木莲**　山厚朴(广西)

**Manglietia fordiana** (Hemsl.) Oliv.

多生于酸性土壤的常绿阔叶林中。分布于安徽、江西、福建、河南(栽培)、湖南南部、广东、广西、云南东南部。

树皮、果实(木莲)：用于便秘,干咳。　叶：祛痰。用于咳嗽。

**红花木莲**　西昌厚朴、枝子皮(四川),小叶子厚朴、木莲花(云南)

**Manglietia insignes** (Wall.) Bl.

生于海拔1 300—3 300米的山坡林中。分布于湖南东部、广西南部、贵州南部、云南南部、西藏东南部。

树皮、枝皮：苦、涩、微苦,温。云南及四川部分地区代厚朴用。

**巴东木莲**

**Manglietia patungensis** Hu

生于海拔1 200米左右的山谷密林中。分布于湖北利川、兴山、神农架。

花：用于高血压症。

附　注：湖北特有药用植物。

**四川木莲**　柴厚朴、厚朴花(四川)

**Maglietia szechuanica** Hu

生于山坡林中。分布于四川南部、云南北部。

树皮、花：苦、辛,温。温中和胃,理气止吐。

附　注：四川少数地区用树皮代厚朴用。

**狭叶木莲**　木莲果、土厚朴(浙江),乳源木莲(浙江药用植物志),木莲(浙江天目山药用植物志)

**Manglietia yuyuanensis** Law

生于山谷沟边及阴坡常绿阔叶林中。分布于浙江、江西、湖南、广东。

根、树皮：辛,凉。通便,止咳。用于实火便秘,老年干咳。　果实(木莲果)：淡,平。疏肝理气,润肺止咳。用于肝胃气痛,脘胁胀满,便秘及老年干咳。

## 含笑属　Michelia L.

**白兰**　黄槐兰(四川),缅桂花、白缅花、白玉兰(云南)

**Michelia alba** DC.

江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、河南、广东、海南、广西、四川、云南均有栽培。

叶：苦、辛，微温。芳香化湿，止咳化痰，利尿。用于小便淋痛，老年咳嗽气喘。叶蒸馏液（玉兰液）：镇咳平喘。花（白兰花）：辛，苦，平。行气通窍，芳香化湿。用于气滞腹胀，带下病，鼻塞。根：用于小便淋痛，痈肿。

**黄兰** 黄缅桂、黄缅花、大黄桂（云南），卖仲哈（傣语）

**Michelia champaca** L.

喜生于温暖地区。分布于云南南部及西南部。长江流域以南各省区有栽培。

根（黄缅桂）、果实（黄缅桂果）：苦，凉。祛风除湿，清利咽喉。用于风湿骨痛，骨刺卡喉。果实：用于胃痛及消化不良。

附 注：① 印度民间用树皮或根皮治疗腹部肿瘤。② 所含的黄心树宁碱对葡萄球菌、枯草杆菌、沙门菌属等有显著抑制作用。

**景烈含笑** 乐昌含笑、南子香（广西）

**Michelia chapensis** Dandy——*M. tsoi* Dandy

生于海拔500—1 500米的沙质壤土山地常绿阔叶林中。分布于江西南部、湖南南部，广东北部及西北部、广西东北及东南部。

树皮：解毒散热。

**紫花含笑** 粗柄含笑（湖北）

**Michelia crassipes** Law

生于海拔300—700米的山谷密林中。分布于湖南、广东北部。

枝、叶：活血散瘀，清热利湿。

**含笑花** 含笑（通称），茶莲木（广西）

**Michelia figo** (Lour.) Spreng.——*Liriodendron figo* Lour.

生于向阳山坡杂木林中。分布于华南。长江流域各地亦有栽培。

花：功效同白兰花，并用于月经不调。叶：用于跌打损伤。

**金叶含笑**

**Michelia foveolata** Merr. ex Dandy

生于海拔500—1 800米的阴湿山谷混交林中。分布于江西、湖南南部、广东、广西南部、贵州东南部、云南东南部。

树皮：解毒散热。

**香子含笑** 麻罕（傣语），八角香兰（云南省药品标准）

**Michelia hedyosperma** Law

生于阔叶林下或沟谷雨林中。分布于广东、云南。

种子：辛，温。健脾，消胀，止痛。用于腹胀，胃痛，消化不良，胸膈痞满。

**醉香含笑**

**Michelia macclurei** Dandy

生于海拔1 000米以下的山林中。分布于广东中部及东南部、海南、广西。

树皮、叶：用于跌打损伤，疮痈肿毒。

**深山含笑**

**Michelia maudiae** Dunn

生于山地阔叶林中。分布于浙江、福建、湖南南部、广东北部、广西、贵州东部。

花：辛，温。散风寒，通鼻窍，行气止痛。 根、花：清热解毒，行气化浊，止咳。

**云南含笑** 皮袋香、山辛夷、山枝子、羊皮袋(云南)

**Michelia yunnanensis** Franch.

生于酸性红壤地带的灌丛中或杉、松、云南松林下。分布于云南。

花(山辛夷)：微苦、涩，凉。清热解毒。用于咽喉痛，鼻塞流涕，目赤。

## 合果含笑属 Paramichelia Hu

**假含笑** 山白兰、山桃树(云南)，卖张哄木(傣语)，盘和盘柱(哈尼语)

**Paramichelia bailonii** (Pierre) Hu——*Magnolia bailonii* Pierre

生于海拔700—1 500米的山林中。分布于云南南部。

根、树皮：用于风湿疼痛。

# 30. 番荔枝科 Annonaceae

## 番荔枝属 Annona L.

**圆滑番荔枝** 牛心果(广东)

**Annona glabra** L.

原产美洲热带。我国浙江、台湾、广东、广西、云南有栽培。

叶：用于咳嗽痰喘。 果实：健脾胃。

**牛心番荔枝** 牛心果(云南)

**Annona reticulata** L.

原产美洲热带，现亚洲热带地区均有栽培。福建、台湾、广东、广西、云南有栽培。

树皮：涩、平。收敛。 果实：苦，寒。驱虫，止痢，健脾胃。 叶：用于咳嗽痰喘。种子及叶：杀虫。

**番荔枝** 林檎(广东)，洋波罗、蚂蚁果、唛螺陀(广西)

**Annona squamosa** L.

原产美洲热带。浙江、福建、台湾，广东、广西、云南有栽培。

根：苦，寒。清热解毒，解郁，止血。用于痢疾，精神抑郁。 叶：苦、涩，凉。收敛，解毒。用于小儿脱肛，恶疮肿毒。 果实、种子：用于疮毒，杀虫。

## 鹰爪花属 Artabotrys R. Br.

**鹰爪花** 鹰爪兰(通称)，五爪兰(福建)，鹰爪(中国植物学杂志)

**Artabotrys hexapetalus** (L. f.) Bhandari——*Annona hexapetalus* L. f.

少数野生，多见于栽培。分布于浙江、江西、福建、台湾、广东、广西、云南。

根：苦，寒。杀虫。用于疟疾。 果实：微苦、涩，凉。清热解毒。用于瘰疬。

**香港鹰爪花** 野鹰爪藤、钩枝藤、铁钩藤(广西)，香港鹰爪(海南植物志)

**Artabotrys nongkongensis** Hance

生于海拔300—1500米的山地密林下或山谷阴湿处。分布于湖南、广东、广西、贵州、云南。

全株：用于风湿骨痛。 总花梗：用于狂犬咬伤。

## 依兰属 Cananga (DC.) Hook. f. et Thoms.

**依兰** 香水树(台湾)，锅裸剎版那(傣语)，加拿楷(中国植物学杂志)，依兰香(热带植物研究)

**Cananga odorata** (Lamk.) Hook f. et Thoms.——*Uvaria odorata* Lamk.

原产缅甸、印度尼西亚、菲律宾及马来西亚。福建、台湾、广东、广西、四川、云南有栽培。

花所提制的高级芳香油除作重要的化工原料外，并用于头痛，目赤痛风。

## 假鹰爪属 Desmos Lour.

**假鹰爪** 鸡爪风(广东、广西)，狗牙花、酒饼叶、酒饼藤(海南)，五爪龙(广西)

**Desmos chinensis** Lour.

生于丘陵山坡、林缘灌丛中、荒野、山谷及低海拔旷地。分布于广东、广西、贵州、云南。

全株、根：微辛，温。有小毒。祛风利湿，健脾理气，祛瘀止痛。用于风湿关节痛，产后风痛及腹痛，痛经，胃痛，泄泻，跌打损伤。

**毛叶假鹰爪** 灯笼木、都蝶(广西)，火神(云南)，云南山指甲(植物分类学报)

**Desmos dumosus** (Roxb.) Saff.——*Unona dumosa* Roxb.

生于海拔500—1700米的山地疏林中或山坡灌木林下。分布于广西、贵州、云南。

根：用于风湿骨痛，疟疾。 叶：用于疟疾，水肿，风疹，骨鲠刺喉，疥癣。

**大叶假鹰爪** 鸡爪风(广西)

**Desmos grandifolius** (Finet et Gagnep.) C. Y. Wu ex P. T. Li——*Unona desmos* Dunn var. *grandifolia* Finet et Gagnep.

生于海拔130—250米的山地密林中或山谷灌丛下。分布于广西西林和百色、云南河口。

全株：用于产后风痛。

## 瓜馥木属 Fissitigma Griff.

**排骨灵** 满山香(云南)，多苞瓜馥木(植物分类学报)

**Fissistigma bracteolatum** Chatt.

生于海拔1000—1800米的山地或山谷路旁潮湿林中。分布于云南南部及西部。

根皮：辛、涩，温。舒筋活血，止血。用于跌打损伤，骨折，外伤出血。

**独山瓜馥木**

**Fissistigma cavaleriei** (Lévl.) Rehd.——*Uvaria cavaleriei* Lévl.

生于山地密林中。分布于广西、贵州、云南。

根：活血，除湿。用于风湿痛，劳伤。

**阔叶瓜馥木**　香藤(广西)

**Fissistigma chloroneurum** (Hand. -Mazz.) Tsiang——*Melodorum chloroneurum* Hand. -Mazz.

生于海拔100—650米的丘陵山地疏林潮湿地。分布于广西、云南。

根状茎：活血，除湿。根：用于风湿痛，劳伤。叶：用于跌打损伤。

**白叶瓜馥木**　大祥酒饼藤(广东)，火索藤、牛耳枫(广西)

**Fissistygma glaucescens** (Hance) Merr.——*Melodorum glaucescens* Hance

生于山地林中。分布于福建、台湾、广东、广西。

根(乌骨藤)：辛、涩，温。祛风除湿，通经活血，止血。用于风湿骨痛，跌打损伤，月经不调，骨折，外伤出血。

**瓜馥木**　狐狸桃(江西)，藤龙眼(台湾)，山龙眼藤(广东)，钻山风、降香藤(广西)

**Fissistygma oldhamii**(Hemsl.) Merr.——*Melodorum* oldhamii Hemsl.

生于低海拔灌木丛中或山谷水旁。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、云南。

根(瓜馥木)：微辛，温。祛风活血，镇痛。用于腰腿痛，关节痛，跌打损伤。

**长柄瓜馥木**　酒饼果(广西)

**Fissistygma oldhamii** (Hemsl.) Merr var. **longistipitalum** Tsiang

生于山谷林中或水旁密林阴处。分布于海南、广西东南部。

根：用于风湿骨痛。

**多花瓜馥木**　酒饼子公(广东)，黑风藤、雷公根(广西)，黑皮跌打、大力丸(云南)，埋罕(傣语)

**Fissistygma polyanthum** (Hook. f. et Thoms.) Merr.——*Melodorum polyanthum* Hook. f. et Thoms.

生于山坡阔叶林中。分布于广东、广西、贵州、云南、西藏。

根、藤(黑风藤)：甘，温。祛风湿，通经络，活血调经。用于风湿关节痛，跌打损伤，小儿麻痹后遗症。叶：用于哮喘，疮疥。

**香港瓜馥木**　打鼓藤、山龙眼藤(广东)，大酒饼子、除骨风、角洛子藤(广西)

**Fissistygma uonicum** (Dunn) Merr.——*Melodorum uonicum* Dunn

生于丘陵山地林中。分布于福建、湖南、广东、广西。

茎：祛风活络，消肿止痛。

## 哥纳香属　Goniothalamus (Bl.) Hook. f. et Thoms.

**四方骨**　山芭蕉(广西)，田方骨(中国植物志)

**Goniothalamus donnaiensis** Finet et Gagnep.

生于海拔300—800米的山地密林中。分布于广西南部、云南南部。

茎：用于跌打损伤，骨折。

## 野独活属 Miliusa Lesch. ex DC.

**野独活** 木吊灯、铁皮青(广西)，算盘子密榴木(广西植物名录)，细梗密榴木(中国植物志)

**Miliusa chunii** W. T. Wang

生于山地密林中或山谷灌丛下。分布于广东、广西、云南。

根：用于胃脘疼痛，肾虚腰痛。

**中华野独活** 山黄皮、野黄皮(广西)，中华密榴木(植物分类学报)

**Miliusa sinensis** Finet et Gagnep.

生于海拔500—1 000米的山地密林中或山谷灌丛下。分布于广东、广西、贵州、云南。

根：用于肾虚腰痛。

## 暗罗属 Polyalthia Bl.

**陵水暗罗** 黑根皮、落坎薯(广东)

**Polyalthia nemoralis** A. DC.

生于低海拔至中海拔的山地林中阴湿处。分布于广东南部至海南。

根：甘，平。补脾健胃，益肾固精。用于胃脘痛胀，食欲不振，四肢无力，遗精。

**斜脉暗罗** 厚皮林(广东)，九层皮、九重皮(广西)

**Polyalthia plagioneura** Diels

生于海拔500—1 000米的山地密林中或疏林下。分布于广东、广西。

茎皮：用于腹痛，蛇咬伤。

**暗罗** 山观音、鸡爪树、老人皮、眉尾木(海南)

**Polyalthia suberosa** (Roxb.) Thw.——*Uvaria suberosa* Roxb.

生于低海拔山地疏林中。分布于广东南部、广西南部。

根：止痛，散结气。

## 紫玉盘属 Uvaria L.

**刺果紫玉盘** 山香蕉、毛荔枝藤(海南)，细叶酒饼木(广西)

**Uvaria calamistrata** Hance

生于低海拔至中海拔的山地林下、山谷水沟旁或灌丛中。分布于广东、海南、广西。

茎皮：收敛。

**山椒子** 川血乌、红肉梨(海南)，水香桃、酒饼树(广西)，葡萄木(中国植物学杂志)

**Uvaria grandiflora** Roxb.——*U. purpurea* Bl.

生于低海拔灌丛中或丘陵山地疏林下。分布于广东南部、海南、广西。

根：用于咽喉痛。

**紫玉盘**　蕉藤、山芭豆、牛刀树(广东)，小十八风藤、石龙叶(广西)

**Uvaria microcarpa** Champ. ex Benth.——*U. macrophylla* Roxb. var. *microcarpa*(Champ. ex Benth.) Finet et Gagnep.

生于低海拔地灌丛中或丘陵山地疏林下。分布于台湾、广东、广西。

根、叶(酒饼婆)：苦、甘，温。健胃行气，祛风止痛。　根：用于风湿痛，跌打损伤，腰腿痛。　叶：止痛消肿。

附　注：兽医用于牛腹胀，有健胃及促进反刍之功效。

**扣匹**　乌藤、东京紫玉盘(海南)

**Uvaria tonkinensis** Finet et Gagnep.

生于海拔200—600米的丘陵山地林中或灌丛下。分布于海南、广西龙津、云南南部。

根、茎：用于乳糜尿。

## 31. 肉豆蔻科　Myristicaceae

### 风吹楠属　Horsfieldia Willd.

**风吹楠**　荷斯菲木(广东)，光叶血树、霍而飞(广西)，埋尖嬷(傣语)，枯牛(佤语)，丝迷罗(拉祜语)

**Horsfieldia glabra** (Bl.) Warb.——*Myristica glabra* Bl.

生于海拔140—1 200米的平坝疏林、山坡及沟谷密林中。分布于广西西南部、海南、云南。

树皮：补血。

**海南风吹楠**　海南霍而飞(广东)，水枇杷(海南)，咪按(黎语)，海南荷斯菲木(海南植物志)，假玉果(中国高等植物图鉴)

**Horsfieldia hainanensis** Merr.

生于海拔400—450米的山谷及丘陵阴湿密林中。分布于海南、广西南部。

树皮、叶：补血，也用于小儿疳积。

### 肉豆蔻属　Myristica Gronov.

**肉豆蔻**　玉果、肉果(广西)

**Myristica fragrans** Houtt.

原产马鲁古群岛，热带地区广泛栽培。台湾、广东、云南引种栽培。

果实、种子(肉豆蔻)：行气止痛，温脾健胃，祛风湿。用于虚泻冷痢，脘腹冷痛，呕吐；外用于风湿痛；并作寄生虫驱除剂。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版附录收载。

# 32. 五味子科 Schisandraceae

## 南五味子属 Kadsura Juss.

**狭叶南五味子** 大红袍、小血藤(云南)

**Kadsura angustifolia** A. C. Smith

生于海拔 1 280—2 250 米的山谷林中。分布于云南。

全株：用于风湿痛，骨折，跌打损伤，外伤出血。

**黑老虎** 鲗鳅钻(福建)，钻地风(江西、广东)，酒饭团(广东、广西)，过山龙藤(海南)，臭饭团(海南植物志)，冷饭团(中国高等植物图鉴)

**Kadsura coccinea** (Lem.) A. C. Smith——*Cosbaea coccinea* Lem.

生于山地疏林中或林缘。分布于江西、福建、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

藤(饭团藤)、根(黑老虎根)：微苦，温。行气止痛，散瘀消肿，祛风除湿。用于胃脘痛胀，风湿关节痛，痛经。 果实：用于肺虚久咳，阳痿，带下病。

附 注：本种的根在广东为妇科常用药。

**异味南五味子** 血藤(湖北)，过山龙藤、海风藤(广东)，风藤(广西)，通血香(云南)，异形叶南五味子(海南植物志)

**Kadsura heteroclita** (Roxb.) Craib——*Uvaria heteroclita* Roxb.

生于山谷林中。分布于湖北、湖南、广东南部、海南、广西、贵州、云南。

根、藤(地血香)、果实(地血香果)：苦、辛，温。祛风除湿，活血化瘀，行气止痛。用于风湿疼痛，胃脘痛胀，痛经，跌打损伤。 果实：辛，微温。补肾宁心，止咳祛痰。用于肾虚腰痛，失眠健忘，咳嗽。

附 注：广东、广西用茎藤代海风藤。云南用茎藤熬膏，作鸡血藤膏用。

**云南鸡血藤** 葡果、散血藤(云南)，顺宁鸡血藤(新华本草纲要)

**Kadsura interior** A. C. Smith

生于海拔 1 200—2 500 米的山地林中。分布于云南西部及西南部。

藤：生血活血，调经，壮筋骨。用于气血虚弱，月经不调，胞宫寒冷，带下病，遗精。

附 注：①《云南省药品标准》1974 年版收载。② 著名中药"云南鸡血藤膏"是用本种茎、叶汁煎制而成。

**南五味子** 大活血(浙江)，紫金藤、钻骨风(江西、福建、广东、广西)，大(小)血藤(湖北、贵州、云南)，南蛇风(四川)，红木香(新华本草纲要)

**Kadsura longipedunculata** Finet et Gagnep.——*K. peltigera* Rehd. et Wils.

生于杂木林或灌丛中。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根皮(紫金皮、内风消)、根(红木香)、茎(大活血)：辛、苦，温。祛风通络，消肿止痛。用于吐泻，风湿关节痛，跌打损伤，经闭腹痛。 果实(五味子)：功效同五味子。 叶：消肿镇痛，祛腐生新。

**冷饭团** 饭团藤(海南)，入地麝香、细风藤(广西)，吹风散(华南、云南)，五香血藤

（贵州）

**Kadsura oblongifolia** Merr.

生于山坡疏林中及沟边湿润处。分布于广东东南部、广西、贵州、云南东南部。

根、茎藤(吹风散)：行气止痛，活血消肿。用于风湿痛，骨折，痛经，胃痛。

**白叶大血藤**　　大风藤(四川)，多子南五味子(中国高等植物图鉴)

**Kadsura polysperma** Yang

生于山坡林中。分布于四川。

根、茎：通经活血，强壮筋骨，祛风除湿。

附　注：四川特有药用植物。

## 五味子属　Schisandra Michx.

**腋生五味子**

**Schisandra axillaris** Hook. f. et Thoms.

生于山坡疏林灌丛中。分布于贵州。

根：用于跌打损伤。

**二色五味子**　　香苏子、二色内风消(浙江天目山药用植物志)

**Schisandra bicolor** Cheng

常攀附于杂木林中的裸岩上或山坡灌丛中。分布于安徽、浙江。

果实：酸，温。功效同五味子。　根、藤、果实：理气活络，健脾。用于劳力过度，四肢酸麻，胃纳不佳，胸闷。

附　注：浙江以本种作北五味子药用。

**五味子**　　北五味子(通称)，血藤、乌(五)梅子(东北)，山花椒(陕西、甘肃、宁夏、青海)

**Schisandra chinensis** (Turcz.) Baill.——*Kadsura chinensis* Turcz.; *S. japonica* Hance

生于山地杂木林中。分布于东北、华北及甘肃、宁夏、安徽、江西、河南、湖北、湖南、四川、贵州。

果实(五味子)：酸、甘，温。固涩收敛，益气生津，补肾宁心。用于久咳虚喘，遗尿，尿频，遗精，久泻，盗汗，伤津口渴，气短脉虚，内热消渴，心悸失眠，肝炎。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②本种乙醇提取物对四氯化碳、硫代乙酰胺、乙炔雌二醇环戊醚等所引起的血清转氨酶升高现象有降低作用。商品名“五仁醇”已用于肝炎病患。③ 功效相同的有**兴山五味子 S. incarnata** Stapf，分布于湖北。

**灰色五味子**　　花血藤、饭巴团、冷饭团(湖北)

**Schisandra glaucescens** Diels

生于山地密林中。分布于湖北。

茎藤：用于劳伤，虚弱，瘰瘤。　果实：酸、涩，凉。清肺热。

附　注：湖北作五味子用。

**大花五味子**

**Schisandra grandiflora** (Wall.) Hook. f. et Thoms.——*Kadsura grandiflora* Wall.

生于海拔2 000—3 000米的山坡常绿阔叶林中或灌丛下。分布于贵州、西藏。

根、果实：理气镇痛，润肺止咳，滋肾固精。

**峨眉五味子**　毛香藤(湖北)，紫金血藤(四川)，黄皮血藤(四川、贵州)，气藤(贵州)，翼梗五味子、棱枝五味子(中国高等植物图鉴)

**Schisandra henryi** C. B. Clarke——*S. hypoglauca* Lévl.

生于疏林中或沟旁。分布于安徽、湖北、广西、四川、贵州。

果实：功效同五味子。 茎藤(血藤)：酸、涩、微麻、苦，温。理气止痛，舒筋活络，通经。用于风湿麻木，脱疽，跌打损伤，月经不调。

附　注：果实商品称西五味子或川五味子。

**白背铁箍散**

**Schisandra henryi** C. B. Clarke var. **marginalis** A. C. Smith

生于海拔1 450米左右的山地林中。分布于云南威信。

茎藤：通经活血，强筋壮骨。

**白五味子**　小血藤、铁骨散、吊吊果、香石藤(云南)，滇翅梗五味子(西藏植物名录)

**Schisandra henryi** C. B. Clarke var. **yunnanensis** A. C. Smith

生于山坡丛林或常绿阔叶林中。分布于贵州、云南、西藏。

根、茎：辛，温。舒筋活血，止痛生肌。用于风湿疼痛，跌打损伤。 果实：酸、甘，温。补肾，敛肺，涩精，止汗。用于食欲不振，肾虚腰痛，盗汗，自汗，咳嗽。

**披针叶五味子**　小血藤、小钻地风、香石藤、小密细藤、满山香(云南)

**Schisandra lancifolia** (Rehd. et Wils.) A. C. Smith——*S. sphenanthera* Rehd. et Wils. var. *lancifolia* Rehd. et Wils.

生于山间疏林或灌丛中。分布于湖北、四川、云南。

全株：微苦、涩，温。祛瘀消肿，止血接骨。用于跌打损伤，骨折，外伤出血。果实：酸、涩，温。用于肾虚。

附　注：①茎藤及种子的乙醇提取物对四氯化碳引起的小鼠肝损伤，有降低血清转氨酶的作用，尤以种子的作用明显。②本种果实在湖北亦作五味子用。

**小花五味子**　接筋藤、大伸筋、血木通、过山龙(云南)

**Schisandra micrantha** A. C. Smith

生于海拔1 200—2 900米的山间疏林或灌丛中。分布于贵州、云南。

全株、根：辛，温。舒筋活络，理气止痛。用于风湿腰痛，胃痛，月经不调，跌打损伤。根、果实：用于肾虚，胃痛。

**滇藏五味子**　小血藤(云南)

**Schisandra neglecta** A. C. Smith

生于海拔1 300—3 000米的山坡灌丛或杂木林中。分布于四川、云南、西藏。

果实：云南西北部地区作五味子入药，功效同五味子。 茎藤：舒筋活血，止痛生肌。

附　注：种子、茎藤的乙醇提取物，对四氯化碳引起的小鼠肝损伤，有降低血清转氨酶作用。

**复瓣黄龙藤**

**Schisandra plena** A. C. Smith

生于海拔600—1 500米的山坡密林中。分布于云南。

全株：清热解毒，消肿止痛。

**五香藤**　五香血藤(贵州)，蛇毒药、拔毒散、铁骨散(云南)，合蕊五味子(中国树木志)

**Schisandra propinqua** (Wall.) Baill. var. **intermedia** A. C. Smith

生于向阳石缝或山坡灌丛中。分布于湖北、四川、贵州、云南。

根、茎藤：甘、辛、平。舒筋活血，止痛消肿。用于风湿麻木，跌打损伤，月经不调，疮毒，毒蛇咬伤。叶：淡，平。外用于外伤出血。果实：用于肾虚。

附　注：本种果实即云南中药五味子。其根在湖北曾伪充巴戟天，应注意鉴别。

**铁箍散**　天青地红(陕西)，香巴戟、钻石风(四川)，五香血藤(贵州、云南)，爬岩香(云南)，小血藤(中药大辞典)

**Schisandra propinqua** (Wall.) Baill. var. **sinensis** Oliv.

生于海拔400—1 500米的山坡、山沟、山地林下及灌丛中。分布于陕西、甘肃、湖北、四川、贵州、云南。

根、茎藤(小血藤)：辛、酸，温。活血调经，散瘀消肿，行气止痛。用于风湿麻木，筋骨痛，跌打损伤，劳伤吐血，经闭，痈肿。

附　注：功效相同的有**毛芽厚朴 Magnolia officinalis** Rehd. et Wils. **var. pubescens** C. Y. Deng，贵州有栽培。

**毛叶五味子**　五味子、北五味子(湖北、四川)，西五味子(四川)

**Schisandra pubescens** Hemsl. et Wils.

生于山坡灌丛、路旁阴湿处或岩石缝中。分布于湖北、贵州、四川。

果实：功效同五味子。

**红花五味子**　滇五味、五味子、香血藤、过山龙(云南)

**Schisandra rubriflora** (Franch.) Rehd. et Wils.——*S. chinensis* (Turcz.) Baill. var. *rubriflora* Franch.

生于山坡杂木林下或河谷针阔叶混交林中。分布于湖北、四川、云南、西藏。

果实(滇五味)：功效同五味子。　茎藤：祛风除湿，活血。用于风湿关节痛。

附　注：① 本种的种子乙醇提取物对四氯化碳中毒小鼠的血清转氨酶有降低作用。②湖北以本种果实作五味子用。

**满山香**　过山龙、山包谷(云南)

**Schisandra sphaerandra** Stapf

生于海拔2 400—3 600米的山地。分布于云南。

根、藤、果实：敛肺，止汗，涩精。

**球蕊五味子**　山包谷、圆药五味子(云南)，五味子、山花椒(西藏)，达智(藏语)，滇藏五味子(西藏植物名录)

**Schisandra sphaerandra** Stapf f. **pallida** A. C. Smith

生于海拔高达2 400—3 250米的山坡灌丛中或杂木林下。分布于云南西部及西北部、

西藏掃木。

果实(五味子)：酸，温。滋阴涩精，敛肺止咳，止泻，止汗。用于遗精，早泄，自汗，盗汗，泄泻，肾虚。叶：用于疔疮。

附　注：种子的乙醇提取物对四氯化碳引起的小鼠肝损伤，有降低血清转氨酶的作用。

**华中五味子**　　红铃子(浙江、江西)，大血藤(湖北、四川)，活血藤(湖南)，五香血藤(贵州)，山包谷(云南)

**Schisandra sphenanthera** Rehd. et Wils.

生于较湿润的阔叶林或灌丛中。分布于山西、陕西、甘肃、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

果实：功效见五味子。　茎藤、根(血藤)：辛、酸，温。养血消瘀，理气化湿。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②果实商品通称南五味子，甘肃作五味子；四川称西五味子或川五味子。③国家三级保护野生药材。

**绿叶五味子**　　风沙藤(广东)

**Schisandra viridis** A. C. Smith——*S. elongata* Baill. var. *longissima* Dunn

生于山坡疏林缘或灌丛中。分布于安徽、浙江、福建、广东、广西。

果实：辛、微涩，温。敛肺止汗，涩精止泻，补肾生津。

**马耳山五味子**

**Schisandra wilsoniana** A. C. Smith

生于海拔 2 600 米左右的山地。分布于云南大理、鹤庆马耳山、邓川、丽江。

茎藤：通经活血，强筋骨。

## 33. 八角科　Illiciaceae

### 八角属　Illicium L.

**短柱八角**　　山八角(广西)

**Illicium brevistylum** A. C. Smith

生于林下阴湿处。分布于湖南、广东、广西、云南。

树皮：有毒。外用于风湿骨痛，跌打损伤。

**地枫皮**　　钻地枫、追地枫、地枫、野八角(广西)

**Illicium difengpi** K. I. B. et K. I. M.

生于石灰岩山石缝中。分布于广西南部及西南部。

树皮(地枫皮)：辛、涩，温。有小毒。除湿驱虫，行气止痛。用于风湿疼痛，腰肌劳损。

附　注：本种为广西特有药用植物，但在商品中尚发现有**大八角 I. majus** Hook. f. et Thoms. 和**假地枫皮 I. jiadifengpi** B. N. Chang 的树皮，这两种均有毒，不能作地枫皮入药。

**野八角**　　石莽草、、樟木钻(广西)

**Illicium dunnianum** Tutcher

生于常绿阔叶林中。分布于福建、湖南、广东、广西、贵州。

根：苦、辛，温。有毒。散瘀消肿，祛风湿，止痛。外用于跌打损伤，挫伤骨折，风湿疼痛。

**川八角**

**Illicium fargesii** Finet et Gagnep.

生于常绿阔叶林中。分布于四川、贵州梵净山。

果实、叶：行气止痛，止呕。

**红茴香**　八角(湖北、贵州)，野八角、桂花钻(广西)，红毒茴(四川)，土八角(四川中药志)

**Illicium henryi** Diels

生于溪间密林中或阔叶林下。分布于陕西南部、江苏、安徽、浙江、江西、福建、河南、大别山、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

根，根皮：辛，温。有毒。祛风除湿，活血止痛。用于跌打损伤，风寒湿痺，胸腹痛。

附　注：功效相同的有**多蕊红茴香 I. henryi** Diels var. **multistamineum** A. C. Smith，分布于湖北、四川。

**山木蟹**　老根山木蟹(浙江、江西)，大茴、铁苦散(浙江)，野八角、红毒茴(江西)，莽草(中国高等植物图鉴)

**Illicium lanceolatum** A. C. Smith

多生于阴湿的树林中。分布于长江中、下游各省区。

根、根皮(红茴香根)：辛，温。有大毒。祛风除湿，散瘀止痛。用于风湿关节痛，腰腿痛。　叶：用于外伤出血。

附　注：种子剧毒，切勿误作"八角"食用。

**小花八角**　山八角、野八角、假八角、救树主(广东)

**Illicium micranthum** Dunn

生于山地溪谷旁。分布于广东、四川峨眉山、云南南部。

全株：辛、微苦，温。有毒。祛瘀止痛，温中散寒。用于跌打肿痛，风湿痺痛，无名肿毒，蛇咬伤。

**少药八角**

**Illicium oligandrum** Merr. et Chun

生于近山顶的密林中。分布于广东、海南、广西。

树皮：外用于跌打损伤，风湿痛。

**短梗八角**　毒八角、樟木钻(广西)，厚叶八角(中国高等植物图鉴)

**Illicium pachyphyllum** A. C. Smith

生于山地密林中。分布于贵州、广西。

根、树皮：消肿止痛。用于风湿痛，跌打损伤。　叶：用于毒蛇咬伤，水肿。

附　注：有毒。

**东毒茴**　断肠草(贵州)

**Illicium religiosum** Sieb. et Zucc.

生于山地林中。分布于贵州。

叶、果实：杀虫，生肌，祛风。外用于疥疮，久溃疮疡。

**云南八角**　土大香(四川、四川中药志)，断肠草(贵州)，山八角(云南)，野八角(云南、中国高等植物图鉴)，土八角(四川中药志、中药大辞典)

**Illicium simonsii** Maxim.——*I. yunnanense* (Franch.) Franch. ex Finet et Gagnep.

生于山间林中。分布于江西、台湾、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

叶、果实：辛，热。有剧毒。杀虫，生肌。叶：外用于久溃疮疡；果实：外用于疥疮。

附　注：①本种有大毒，《中药大辞典》及《四川中药志》记载无毒，有误。②功效相同的有**大花八角 I. macr anthum** A. C. Smith，分布于云南。

**厚皮香八角**　黔八角(贵州)

**Illicium ternstroemioides** A. C. Smith

生于山地疏林阴湿处。分布于贵州、广东、海南、云南。

果实：辛、微苦，温。温中理气，健胃止吐。

**八角**　八角茴香、大茴香(通称)，大料(北方通称)，五香八角(南方通称)

**Illicium verum** Hook. f.

多生于温暖湿润的山谷中。分布于福建、台湾、广东、广西、贵州、云南。

果实(八角茴香)：辛，温。温中理气，健胃止呕。用于呕吐，腹胀，腹痛，疝气；外用于毒蛇及蜈蚣咬伤。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②本种在我国广泛用作食品调味料。其乙醚提取物有较强的抗菌作用。果实及叶均可提取芳香油。

## 34. 蜡梅科　Calycanthaceae

### 夏蜡梅属　Calycanthus L.

**夏蜡梅**　黄梅花、牡丹木、蜡木(浙江)，夏梅(林业科学)

**Calycanthus chinensis** Cheng et S. Y. Chang——*Sinocalycanthus chinensis* (Cheng et S. Y. Chang) Cheng et S. Y. Chang

生于海拔 600—1 000 米的山地沟边林荫下。分布于浙江天台、昌化。

根、花(夏蜡梅)：微苦、辛，温。健胃止痛。用于胃痛。

附　注：浙江特有药用植物。

### 蜡梅属　Chimonanthus Lindl.

**山蜡梅**　秋蜡梅(江西)，香风茶(安徽)，臭蜡梅(贵州)，野蜡梅(云南)，亮叶蜡梅(经济植物手册)

**Chimonanthus nitens** Oliv.

生于山地疏林中或石灰岩石地。分布于陕西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广西、贵州、云南。

叶(山蜡梅叶)：微苦、辛、凉。清热解毒，祛风解表。用于中暑，咳嗽痰喘，胸闷，蚊、蚁叮咬，预防感冒。 花：辛，温。疏风散寒，芳香化湿，辟秽。用于风寒感冒，咳嗽痰喘，食欲不振。 根：用于跌打损伤，风湿，寒性胃痛，感冒头疼，疖疮肿毒。

附 注：①叶用量过大可出现恶心或上腹不适等反应，停药后即可消失。② 我国特有属。

**蜡梅** 蜡花、金黄茶(浙江)，荷花蜡梅(江西)，大叶蜡梅(广西)，雪里花(贵州)

**Chimonanthus praecox** (L.)——*Calycanthus praecox* L.

生于山地林中或庭园栽培。分布于华东、中南及河北、陕西、四川、贵州、云南。

花蕾(蜡梅花)：辛，凉。开胃散郁，解暑生津，止咳。用于气郁胸闷，暑热头晕，呕吐，麻疹，顿咳，烫、火伤。 根、叶：理气止痛，散寒解毒。用于跌打损伤，腰疼，风湿麻木，风寒感冒，刀伤出血，疖疮痈毒。

附 注：本种的一些栽培品种的花、根、叶亦供药用，功效同蜡梅。

**柳叶蜡梅** 香风茶(安徽)

**Chimonanthus salicifolius** S. Y. Hu

生于山地林中。分布于安徽休宁和歙县，江西修水和广丰。浙江有栽培。

**叶**：用于感冒，咳嗽。

## 35. 樟科 Lauraceae

### 黄肉楠属 Actinodaphne Nees

**红果黄肉楠** 小楠木(四川)，红果楠(贵州)

**Actinodaphne cupularis** (Hemsl,) Gamble——*Litsea cupularis* Hemsl.

生于海拔 360—1 300 米的山坡密林、溪旁及灌丛中。分布于湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

根、叶(红果楠)：辛，凉。解毒，消炎。用于疮疡，痔疮，烧、烫伤，脚癣。

**柳叶黄肉楠** 山桂花(四川)

**Actinodaphne lecomtei** Allen

生于海拔 650—1 800 米的山地、路旁、溪旁及杂木林中。分布于广东、四川、贵州。

根(柳叶黄肉楠)：用于风湿骨痛，跌打损伤。

**峨嵋黄肉楠** 山桂花(四川)

**Actinodaphne omeiensis** (Liou) Allen——*A. reticulata* Meissn. var. *omeiensis* Liou

生于海拔 500—1 700 米的山谷、路旁灌丛及杂木林中。分布于四川、贵州东北部。

根皮：用于风湿骨痛，跌打损伤。

**倒卵叶黄肉楠** 假箬衣叶、七叶一把伞(云南)，莫苏(哈尼语)，把漂(瑶语)，恰嘎兴(门巴语)

**Actinodaphne obovata** (Nees) Bl.——*Litsea obovata* Ness

生于海拔 1 000—2 700 米的山谷溪旁或湿润的混交林中。分布于云南南部至东南部、

西藏东南部。

树皮(七叶一把伞)：辛，温。舒筋活络，接骨。外用于骨折。

**毛黄肉楠**　毛樟、香胶(广东)，茶胶树、刨花(海南)，刨花木、山枇杷、胶木(广西)

**Actinodaphne pilosa** (Lour.) Merr.——*Laurus pilosa* Lour.

生于海拔500米以下的旷野丛林或混交林中。分布于广东、海南、广西。

茎皮、叶(香胶木)：辛，凉。祛风，散瘀，消肿，解毒，止咳。用于跌打，疮疖，腰腿痛。叶：止咳。

## 琼楠属　Beilschmiedia Nees

**短序琼楠**

**Beilschmieda brevipaniculata** Allen

生于山坡密林或疏林中，分布于广东、广西。

叶：活血，消肿。用于跌打损伤。

**琼楠**　荔枝公(海南)，番鬼楹(广西)

**Beilschmieda intermedia** Allen

散生于海拔400—1 300米的山谷、山腰缓坡，水边或溪旁。分布于广东、广西。

叶：活血，消肿。用于跌打损伤。　果实：用于痈疮肿毒。

## 无根藤属　Cassytha L.

**无根藤**　无头草、无爷藤(广东、海南)，无娘藤(广西)，罗网藤、无头藤(云南)

**Cassytha filiformis** L.

生于海拔980—1 600米的山坡灌丛或疏林中。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、贵州、云南。

全草(无爷藤)：甘、微苦，平。有小毒。清热利湿，凉血止血。用于感冒发热，肝炎，疟疾，咯血，尿血，水肿，石淋，湿疹、疖肿。

## 樟属　Cinnamomum Trew.

**毛桂**　土肉桂(江西)，假桂皮(广西、云南)，山桂皮、香桂子(广西)，山桂枝(四川)，柴桂(贵州)

**Cinnamomum appelianum** Schewe

生于海拔350—1 400米的山坡或谷地的灌丛及疏林中。分布于江西、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全株：散血。用于风湿。　树皮：理气止痛。用于受寒胃脘痛，泄泻，腰膝痛，跌打肿痛。

**华南桂**　大叶樟、野桂皮、肉桂、大叶辣樟树(江西)

**Cinnamomum austro-sinense** H. T. Chang

生于海拔630—700米的山坡或溪边常绿阔叶林中或灌丛下。分布于浙江、江西、福建、广东、广西。

树皮(土桂皮)：作桂皮收购入药，功效同桂皮。用于风湿骨痛，疥癣。果实：用于虚寒胃痛。

**钝叶桂**　大叶山桂、山桂楠(广东)，假桂皮、青樟木(云南)、钝叶樟（海南植物志)，海宗关龙(傣语)

**Cinnamomum bejolghota** (Buch.-Ham.) Sweet——*Laurus bejolghota* Buch.-Ham.; *C. obtusifolium* (Roxb.) Nees

生于海拔600—1 780米的山坡、沟谷、疏林或密林中。分布于广东南部、云南南部。

茎皮(土肉桂)：甘、辛，温。温中散寒，理气止痛，止血，接骨。用于胃寒痛，风湿痛，腰肌劳损，阳痿，闭经；外用于外伤出血，骨折，蛇咬伤。

**猴樟**　猴挟木(湖南)，楠木、香樟(四川)，香樟、大胡椒树(贵州)，香树(云南)

**Cinnamomum bodinieri** Lévl. ——*C. hupehanum* Gamble

生于海拔700—1 480米的路边、沟旁、疏林或灌丛中。分布于湖北、湖南西部、四川东部、贵州、云南东北及东南部。

根、果皮(猴樟)：微辛，温。祛风，镇痛，行气，温中。用于风寒感冒，风湿麻木，劳伤痛、泄泻，烧、烫伤。

**阴香**　山肉桂、香桂(广东)，小桂皮(广西)，阿尼茶(云南)，桂秧(海南苗语)，中美谷(壮语)

**Cinnamomum burmannii** (C. G. et Th. Nees) Bl.——*Laurus Burmannii* C. G. et Th. Nees

生于海拔100—1 400 (2 100)米的疏林、密林、灌丛、路旁或溪边。分布于福建、广东、广西、云南。

树皮(阴香皮)：辛，温。温中，散寒，祛风湿。用于泄泻，胃痛，疖肿疮毒，跌打扭伤，风湿关节痛。

**狭叶阴香**　三股筋、大舒筋活血(云南)

**Cinnamomum burmannii** (C. G. et Th. Nees) Bl. f. **heyneanum** (Nees) H. W. Li——*C. heyneanum* Nees; *C. burmannii* (C. G. et Th. Nees) Bl. *var. abgustifolium* (Hemsl.) Allen

生于海拔120—450米的河边、山坡灌丛中。分布于湖北西部、广西、四川东部、贵州西南部、云南东南部。

根(阴香根)、叶(阴香叶)：舒筋活络，散寒止痛。用于风湿痛，跌打，骨折。

**樟**　香樟、樟木、油樟(南方通称)，乌樟(台湾、四川)，臭樟(台湾)，瑶人柴(广西)

**Cinnamomum camphora** (L.) Presl. ——*Laurus camphora* L.

生于山坡或沟谷中，南方省区多有栽培。分布于全国南部及西南各省区。

木材(樟木)：辛，温。祛风湿，行血气，利关节。用于跌打损伤，痛风，心腹胀痛，脚气，疥癣。全株提制的结晶(樟脑)：辛，热。通窍，杀虫，止痛，辟秽。用于心腹胀痛，跌打损伤，疮疡疥癣。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**肉桂**　桂枝、桂皮、玉桂(广东)，筒桂(广西)，棵非亚(壮语)

**Cinnamomum cassia** Presl.

原产中国。现福建、台湾、广东、广西、云南广为栽培，尤以广西栽培为多。

树皮(肉桂)：甘，辛，大热。暖脾胃，除积冷，通血脉。用于腰膝冷痛，阳痿，宫冷·腹痛泄泻，经闭症瘕，阴疽。枝(桂枝)：辛、甘，温。发汗，通经脉，助阳化气。用于风寒感冒，脘腹冷痛，经闭，关节痹痛，水肿。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**云南樟**　香樟(四川、云南)，白樟(四川)，臭樟、樟木(云南)，香叶樟(西藏)

**Cinnamomum glanduliferum** (Wall.) Nees——*Laurus glandulifera* Wall.

生于海拔 1 500—3 000 米的山地阔叶林中。分布于四川南部及西南部、贵州南部、云南中部至北部、西藏东南部。、

枝、叶：苦、辛，温。祛风利湿，行气止痛。用于风湿骨痛，跌打损伤，感冒，胃痛，泄泻。

**大叶桂**　假桂皮(云南)

**Cinnamomum iners** Reinw. ex Bl.

生于海拔 140—1 000 米的山谷路旁、疏密林中。分布于广西南部、云南南部、西藏东南部。

茎皮、根皮：用于关节疼痛，牙痛及胃、腹痛；外用于外伤出血，骨折。

**天竺桂**　竺香、大叶天竺桂(浙江)，土桂、山玉桂(福建)，山肉桂(台湾)

**Cinnamomum japonicum** Sieb.——*C. pedunculatum* Nees; *C. chekiangense* Nakai

生于海拔 300—1 000 米的低山地或近海的常绿阔叶林中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾。

根、树皮(桂皮)、枝叶：辛，温。祛寒镇痛，行气健胃。用于风湿痛，腹痛及创伤出血。叶及树皮提制的芳香油作杀菌剂。

**野黄桂**　桂皮树(江西、湖南)，三条筋树(湖北、四川)

**Cinnamomum jensenianum** Hand.-Mazz.

生于海拔 500—1 500 米的山坡常绿阔叶林下或竹林中。分布于江西、福建、湖北、湖南西部、广东、四川。

树皮：用于跌打损伤，筋骨痛，风湿痛。

**红叶辣汁树**　红辣槁树(广东)

**Cinnamomum kwangtungense** Merr.

生于山地阴坡。分布于广东中部、贵州东南部。

茎皮：祛风，健胃，止痛，活血。

**川桂**　桂皮树、关桂、樟桂(四川)，川桂皮(中国高等植物图鉴)，银叶桂(中国植物志)

**Cinnamomum mairei** Lévl. ——*C. argenteum* Gamble

生于海拔 1 300—1 800 米的山地阔叶林中。分布于四川西部、云南东北部。

树皮：辛、甘，温。祛风散寒，行气止痛。用于风寒感冒，胃腹冷痛，痛经，风湿关

节痛、跌打损伤，骨折。

**米槁**　　大果樟(广西)，麻告(云南壮语)

**Cinnamomum migao** H. W. Li

生于海拔500米左右的山地林中。分布于广西西部、云南东南部。

果实：用于腹痛。

**土肉桂**

**Cinnamomum osmophloeum** Kanehira

生于海拔400—1 500米的常绿阔叶林中。分布于我国台湾台北、台中、南投、高雄。

茎皮(土肉桂)：用于腹痛，风湿痛，创伤出血。

**少花桂**　　土桂皮(广西)，岩桂、三股筋、臭乌桂(四川)，臭樟(贵州)

**Cinnamomum pauciflorum** Nees

生于海拔400—2 200米的山地或山谷疏、密林中。分布于湖北、湖南西部、广东、广西、四川东部、贵州，云南东北部。

树皮：开胃，健脾，散热。用于肠胃病，腹痛。

附　注：四川常作官桂皮用。

**黄樟**　　油樟、大叶樟(江西)，樟木、黄樟(海南)，樟脑树、冰片树(云南)，梅崇、中亥(傣语)，都苏(苗语)

**Cinnamomum porrectum** (Roxb.) Kosterm.——*Laurus porrectum* Roxb.; *C. parthenoxylum* (Jack) Nees

生于海拔1 500米以下的常绿阔叶林或灌丛中。分布于江西、福建、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南。

根、枝、叶：辛、微苦，温。祛风利湿，行气止痛，消食化滞。用于风湿骨痛，泄泻，感冒，跌打损伤。

**银木**　　香樟(陕西)，土沉香(四川)

**Cinnamomum septentrionale** Hand.-Mazz.

生于海拔600—1 000米的山谷或山坡上。分布于陕西南部、甘肃南部、四川西部。

树皮、叶：辛，温。祛风湿，行气血，利关节。

**香桂**　　香桂皮(浙江)，香槁树(江西)，土肉桂(江西、福建)，山肉桂(湖南)，假桂皮(云南)，细叶香桂(中国高等植物图鉴)

**Cinnamomum subavenium** Miq.——*C. chingii* Metc.; *C. randaiense* Hayata

生于海拔400—2 500米的山坡、常绿阔叶林中。分布于西南及安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、广东、广西。

树皮、枝叶、果实(香桂)：辛，温。温胃散寒，宽中下气。用于胸腹胀痛，胃寒气痛，寒结肿毒，痛经，风湿关节痛；外用于跌打损伤，骨折。

**柴桂**　　桂皮、肉桂、辣皮树、三股筋(云南)

**Cinnamomum tamala** (Buch.-Ham.) Th. G. Fr. Nees——*Laurus tamala* Buch.-Ham.

生于海拔1 180—1 930米的山坡或谷地常绿阔叶林中及水边。分布于云南西部，西藏察隅、吉隆、聂拉木。

树皮(三条筋、柴桂)：甘、辛，温。止血，通经活络，接骨。用于消化道及外伤出血，跌打损伤，骨折。

**假桂皮树**　东京樟、美高量(广西)

**Cinnamomum tonkinense** (Lec.) A. Chev.——*C. albiflorum* Nees var. *tonkinensis* Lec.

生于海拔 1 000—1 800 米的常绿阔叶林中潮湿处。分布于广西西南部、云南东南部。

茎皮、嫩枝：用于肾虚腰痛，感冒，骨痛。

**川桂**　官桂(陕西)，三条筋(陕西、湖北)，山肉桂(湖南)，臭樟木(四川)

**Cinnamomum wilsonii** Gamble

生于海拔 300—2 400 米的山谷、山坡向阳处、沟边、疏林或密林中。分布于陕西、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川。

树皮、枝(川桂皮、桂皮)：甘、辛，温。温中散寒，通经活络。

附　注：湖北将本种茎皮作肉桂用，嫩枝作桂枝用。

**锡兰肉桂**

**Cinnamomum zeylanicum** Bl.

原产斯里兰卡。台湾及广东有栽培。

树皮：驱风健胃。

## 月桂属　Laurus L.

**月桂**

**Laurus nobilis** L.

原产地中海地区。江苏、浙江、福建、台湾及云南有栽培。

叶、果实(月桂)：提制的芳香油为杀菌剂。

## 山胡椒属　Lindera Thunb.

**乌药**　铜钱树(浙江、江西)，天台乌药、斑皮柴(浙江)，土木香、细叶樟(江西)，白叶子树(广东)

**Lindera aggregata** (Sims) Kosterm.——*Laurus aggregata* Sims; *Lindera strychnifolia* (Sieb. et Zucc.) F. Vill.

生于海拔 200—1 000 米的向阳坡地、山谷及疏林灌丛中。分布于安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西。

根、树皮(乌药)：辛，温。温中散寒，理气止痛。用于心胃气痛，泄泻，痛经，风湿痛，跌打伤痛。

附　注：① 湖北部分地区有将本种嫩枝误作桂枝用。　② 《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**小叶乌药**　小辣子、立槁辣子、细叶乌药(广东)，小叶钓樟(海南植物志)

**Lindera aggregata** (Sims) Kosterm. var. **playfairii** (Hemsl.) H. P. Tsui——

*Litsea playfairii* Hemsl.

生于山谷或疏林灌丛中。分布于广东、广西。

根：消肿止痛，理气散寒。用于胃脘疼痛，跌打，尿频，疝气。

**狭叶山胡椒**　小鸡条(江苏)，鸡婆子(江西)，见风消(植物名实图考)

**Lindera angustifolia** Cheng

生于山坡灌丛或疏林中。分布于陕西、山东、江苏、安徽、江西、福建、河南、湖北、广东、广西。

全株(狭叶山胡椒)：辛、微涩，温。祛风利湿，舒筋活络，解毒消肿。用于感冒、头痛，食积气滞，泄泻，风湿麻木，跌打损伤。

**香面叶**　朴香果、毛叶三条筋、香油果(云南)

**Lindera caudata** Benth.——*Daphnium caudatum* Nees

生于海拔700—2 300米的灌丛、疏林、路边及林缘。分布于广西西部、云南南部。

根、茎皮、叶(毛叶三条筋)：辛、微甘，温。止血生肌，理气止痛。用于跌打损伤，外伤出血，胸痛。

**鼎湖山胡椒**　千打锤、耙齿钩(广东、广西)，白胶木(广东)，乌药(广西)，陈氏钓樟(海南植物志)

**Lindera chunii** Merr.

生于山坡林中。分布于广东、广西。

根(千打锤、台乌球)：祛风除湿，止痛健胃。用于风湿骨痛，跌打损伤。茎：用于跌打损伤。

附　注：广东地区用根代乌药浸制"台乌酒"，用于祛风除湿。

**香叶树**　疔疮树(浙江)，香叶子(浙江、湖北)，千金树(江西)，大番叶(福建)，野木姜子(贵州)

**Lindera communis** Hemsl.

生于干燥砂质土壤或混生于常绿阔叶林中。分布于陕西、甘肃、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

叶，茎皮(香叶树)、种子油(香果脂)：微苦，温。散瘀消肿，止血止痛，解毒。用于跌打损伤，骨折，外伤出血，疮疖痈肿。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②种子油作栓剂基质。

**红果山胡椒**　红果钓樟(中国高等植物图鉴)，詹糖香(本草纲目)

**Lindera erythrocarpa** Makino——*L. umbellata* Bl.

生于海拔1 000米以下的山坡、山谷、溪边、林下。分布于华东及陕西、广东、广西、四川。

枝、叶：用于无名肿毒。　根皮：收敛止血。外用于疥疮。

**绒毛钓樟**　山玉桂(湖北)

**Lindera floribunda** (Allen) H. P. Tsui——*L. gambleana* Allen var. *floribunda* Allen

生于海拔370—1 300米的山坡、河旁混交林或杂木林中。分布于陕西、甘肃、湖北、湖南、广东、四川、贵州。

根皮、树皮：用于泄泻，关节痛；外用于跌打损伤，外伤出血。

**蜂房叶山胡椒**

**Lindera foveolata** H. W. Li

生于海拔 1 400—2 100 米的山坡常绿阔叶林中。分布于四川、云南东南部。

果实：消食理气，逐水。

**香叶子**　　香叶山胡椒(云南)

**Lindera fragrans** Oliv.

生于海拔 700—2 030 米的沟边及山坡灌丛中。分布于陕西、湖北、广西、四川、贵州、云南。

树皮(香叶子)：温经通脉，行气散结。 枝、叶：顺气。用于胃脘痛，食积气滞。

**绿叶甘橿**　　系系筷子(浙江)，山姜子、山乌药(湖北)

**Lindera fruticosa** Hemsl.——*Litsea fruticosa* (Hemsl.) Gamble

生于海拔 2 300 米以下的山坡、路旁、林下及林缘。分布于西南及陕西、安徽、浙江、江西、河南、湖北、湖南。

果实：用于胃寒痛，胸腹胀满，肋下气痛。

**山胡椒**　　假死柴(陕西)，香叶子(安徽)，野胡椒(河南、湖南)，牛筋树(河南)，雷公子(四川)

**Lindera glauca** (Sieb. et Zucc.) Bl.——*Benzion glauca* Sieb. et Zucc.

生于海拔 900 米左右的山坡、杂木林下、林缘及路旁。分布于华东、中南及山西、陕西、甘肃、四川。

全株(山胡椒)：辛，温。祛风活络，消肿解毒，止血，止痛。用于风湿麻木，筋骨痛，跌打损伤，寒气胃痛，风寒头痛，水肿。 叶：外用于疔疮肿毒，毒蛇咬伤，外伤出血。

**更里山胡椒**　　小香樟、山胡椒(云南)

**Lindera kariensis** W. W. Smith

生于海拔 2 700—3 700 米的山地林中。分布于云南、丽江、大理、怒江、迪庆。

根、果实：辛，温。根：祛风湿，散瘀血，通脉络。 果实：用于中风不语，心腹冷痛。叶：淡，平。祛风，解表，散瘀。

附　注：功效相同的有**无毛更里山胡椒 L. kariensis** W. W. Smith f. **glabrescens** H. W. Li.，分布于云南。

**黑壳楠**　　楠木(陕西、湖北、四川)，鸡屎楠、枇杷楠(湖北)，八角香、花兰(四川)

**Lindera megaphylla** Hemsl.

生于海拔 1 600—2 000 米的山坡谷地湿润常绿阔叶林下或灌丛中。分布于陕西、甘肃、江西、福建、湖北、广东、广西、四川、贵州、云南。

根、枝、树皮(黑壳楠)：辛、微苦，温。驱风除湿，消肿止痛。用于风湿麻木疼痛，咽喉肿痛。

附　注：功效相同的有**毛黑壳楠 L. megaphylla** Hemsl. f. **touyunensis** (Levl.) Rehd.。

**网叶山胡椒**　　山香果、化楠木、连杆果(云南)

**Lindera metcalfiana** Allen var. **dictyophylla (Allen)** H. P. Tsui——*L. di-*

*ctyophylla* Allen

生于海拔 550—2 000 米的山坡、沟边疏林、灌丛或林缘。分布于福建、广西、云南。

果实：用于腰膝冷寒，血吸虫病。

**三桠乌药**　三钻风(陕西、甘肃)，山姜(山东)，绿绿柴(浙江)，甘姜(河南)，大山胡椒(四川)

**Lindera obtusiloba** Bl.——*L. cercidifolia* Hemsl.

生于低海拔至高海拔地区的山谷、密林灌丛中。分布于辽宁、陕西、甘肃、山东、江苏、安徽、江西、福建、河南，湖北、湖南、四川、西藏。

树皮(三钻风)：辛，温。活血舒筋，散瘀消肿。用于跌打损伤，瘀血肿痛，疮毒。

**滇藏钓樟**

**Lindera obtusiloba** Bl. var. **heterophylla** (Meissn.) H. P. Tsui——*L. heterophylla* Meissn.

生于海拔 2 300—3 300 米的山坡林下。分布于云南澜沧江流域、西藏。

树皮：活血祛瘀。

**香粉叶**　香叶树、山叶树(湖南)，假桂皮、尖叶樟(广西)

**Lindera pulcherima** (Wall.) Benth. var. **attenuata** Allen

生于海拔 650—1 590 米的山坡，溪边。分布于湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

茎皮、根、叶：消食止痛，祛风除湿，止血生肌。用于腹痛，下肢疼痛及麻木，刀斧砍伤。

**川钓樟**　白背叶(陕西)，关桂、三条筋(四川)，山香桂、皮桂(云南)

**Lindera pulcherima** (Wall.) Benth. var. **hemsleyana** (Diels) H.P. Tsui——*L. strychnifolia* (Sieb. et Zucc.) F.-Vill. var. *hemsleyana* Diels

生于海拔 2 700 米以下的山坡、灌丛中或林缘。分布于西南及陕西、湖北、湖南、广西。

根、叶：辛，温。止血生肌，宽中顺气，消食止痛，排石。

**山橿**　生姜树(安徽)，钓樟(浙江、江西)，甘橿、大叶钓樟(浙江)、木姜子、铁脚樟(江西)

**Lindera reflexa** Hemsl.

生于海拔 1 000 米以下的山谷、山坡林下或灌丛中。分布于中南及江苏、安徽、浙江、江西、贵州、云南。

根(山橿根)：辛，温。止血，消肿，杀虫，行气止痛。用于胃痛，疥癣，癞疹，刀伤出血。

**四川山胡椒**

**Lindera setchuenensis** Gamble

生于海拔 1 500 米以下的山坡路旁及疏林中。分布于四川、贵州。

根(石桢楠根)：外敷疮毒。

**菱叶钓樟**　铁桂皮(四川)，山香桂(云南)，川滇三股筋香(中国高等植物图鉴)

**Lindera supracostata** Lec.

生于海拔 2 400—2 800 米的山谷及山坡密林中。分布于湖北鹤峰、利川、神农架，四

川西南、贵州西部、云南中部及西北部。

根皮、茎叶：用于胸腹胀满，肋下冷气痛。

**三股筋香**　　臭油果(云南药用植物名录)

**Lindera thomsonii** Allen

生于海拔1 100—3 000米的山地疏林中。分布于广西、贵州西部、云南西部。

果实、果油：用于蚊虫叮咬。

**假桂钓樟**　　假桂(云南)

**Lindera tonkinensis** Lec.

生于海拔130—2 200米的灌木丛中或杂木林下。分布于海南、广西南部、云南东南部。

根、树皮、种子：健脾和胃，止痛。　树皮：消肿，杀虫。

**无梗假桂钓樟**　　乔哈哄(傣语)

**Lindera tonkinensis** Lec. var. **subsessilis** H. W. Li

生于海拔高达2 300米以下的山地。分布于广西北部、云南中南部。

根、树皮：消肿，杀虫。用于脚气，水肿、疥癣。

## 木姜子属　Litsea Lam.

**天目木姜子**

**Litsea auriculata** Chien et Cheng

生于海拔500—1 000米的混交林中。分布于浙江天目山和天台山、安徽大别山。

果实、根皮(天目木姜子)：用于绦虫(寸白虫)病。叶：外敷筋骨损伤。

**高山木姜子**

**Litsea chunii** Cheng

生于海拔1 500—3 400米的山坡、溪旁及混交林中。分布于四川西部、云南西北部。

果实：辛，温。祛风散寒，理气止痛。

附　注：功效相同的有**丽江木姜子 L. chunii** Cheng var. **likiangensis** Yang et P. H. Huang，分布于云南。

**毛豹皮樟**　　老鹰茶(四川)

**Litsea coreana** Lévl. var. **lanuginosa** (Migo) Yang et P. H. Huang——*Iozoste hirtipes* Migo var. *lanuginosa* Migo

生于海拔300—2 300米的山谷杂木林中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东北部、广西、四川、贵州、云南。

叶(老鹰茶)：用于泄泻，痢疾。根、树皮：用于水肿。

**豹皮樟**　　扬子黄肉樟(中国高等植物图鉴)

**Litsea coreana** Lévl. var. **sinensis** (Allen) Yang et P. H. Huang——*Actinodaphne lancifolia* (Sieb. et Zucc.) Meissn. var. *sinensis* Allen

生于海拔900米以下的山地杂木林中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖北。

根：用于水肿，胃痛。

**山鸡椒**　毕澄茄、澄茄子(江苏、浙江、四川、云南)，山苍树(江西、湖南、广东、广西、四川、云南)，豆豉姜(广东)，臭油果树(云南)，芙辣伤(侗语)，肥壮(壮语)

**Litsea cubeba** (Lour.) Pers.——*Laurus cubeba* Lour.

生于海拔500—3 200米的向阳山地、灌丛、疏林或林缘路旁。分布于西南及陕西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南。

果实(毕澄茄)、根(豆豉姜)：辛、微苦，温。祛风散寒，理气止痛。　根：用于风湿骨痛，四肢麻木，感冒头痛，胃痛。　叶：外用于痈肿疮疖，乳痛，蛇、虫咬伤。　果实：用于食积气滞，胃痛，感冒头痛，血吸虫病。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**毛山鸡椒**

**Litsea cubeba** (Lour.) Pers. var. **formosana** (Nakai) Yang et P. H. Huang.——*Apecula formosana* Nakai

生于山地、灌丛、疏林或路旁。分布于江西、福建、台湾、湖南、广东北部。

根、果实：健胃消食、暖脾肾。

**黄丹木姜子**　野枇杷木、打色眼树(广东)，毛丹、毛丹公(海南)，黄壳兰(广西)

**Litsea elongata** (Wall. ex Nees) Benth. et Hook. f.——*Daphnidium elongata* Nees

生于海拔500—2 000米的山坡路旁、溪旁及杂木林下。分布于西南及江苏、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西。

根：祛风除湿。

**清香木姜子**　毛梅桑(云南沙族语)

**Litsea euosma** W. W. Smith

生于海拔高达2 450米的山地阔叶林中湿润处。分布于西南及江西、湖南、广东北部、广西。

果实(木姜子)：祛痰止痛，顺气止呕。用于瘿症。

**潺槁木姜子**　油槁树、青野槁(广东)，大疳根(广西药用植物名录)，楠木根(南宁市药物志)，潺槁树(全国中草药汇编)

**Litsea glutinosa** (Lour.) C. B. Rob.——*Sebifera glutinosa* Lour.

生于海拔500—1 900米的山地林缘、疏林、灌丛中或溪边。分布于福建、广东、广西、云南南部。

根、茎皮(残槁骚)、叶：甘、苦、涩，凉。消肿解毒，清湿热，止痛，止血。　叶、茎皮：外用于疮疖痈肿，疼腿，乳蛾，跌打损伤，外伤出血。　根：用于跌打损伤，泄泻，糖尿病。

**白野槁树**　野胶树(海南)，圆尾槁、厚叶樟、青柳槁木(广东)

**Litsea glutinosa** (Lour.) C. B. Rob. var. **brideliifolia** (Hayata) Merr.——*L. brideliifolia* Hayata

生于海拔500—1 350米的疏林或灌丛中。分布于广东、广西。

根：祛风消肿。用于跌打损伤。

**宜昌木姜子**　老姜子、狗酱子树(湖北)

**Litsea ichangensis** Gamble

生于海拔 300—2 200 米的山坡灌丛中或密林中。分布于湖北西部及西南部、湖南西部、四川东部及东北部。

果实：用于胸腹胀满，食积气滞；外用于疮毒肿痛。

**毛叶木姜子**　香桂子、野木姜子、毕澄茄(湖北)，猴香子(四川)，大木姜(云南)

**Litsea mollis** Hemsl.——*L. mollifolia* Chun

生于海拔 600—2 800 米的山坡灌丛中或阔叶林下。分布于西南及湖北、湖南、广东、广西。

根、果实：用于胃寒腹痛，食滞饱胀，疝气，风湿骨痛。

附　注：湖北民间用本种果实作毕澄茄药用。

**假柿木姜子**　假柿树，山菠萝树、母猪橐(广东)，纳橐(海南)，毛腊树、接口木(云南)

**Litsea monopetala** (Roxb.) Pess.——*Tetranthera monopetala* Roxb.

生于海拔可达 1 500 米的向阳山坡灌丛中。分布于广东、海南、广西、贵州西南部、云南南部。

叶：民间外用于关节脱臼。

**四川木姜子**

**Litsea moupinensis** Lec. var. **szechuanica** (Allen) Yang et P. H. Huang——*L. szechuanica* Allen

生于海拔 500—2 100 米的山谷溪旁及疏林中。分布于四川。

果实：温中散寒，理气止痛。

**附　注**：四川民间用本种果实代毕澄茄用。

**木姜子**　辣姜子(陕西)，木香子、兰香树、猴香子(四川)，香桂子(云南)

**Litsea pungens** Hemsl.

生于海拔 800—3 400 米的山地阳坡杂木林中、林缘或溪旁。分布于中南、西南及山西、陕西、甘肃、浙江南部。

果实(木姜子)、叶：苦、辛，温。祛风行气，健脾燥湿，消食，解毒。用于胃寒腹痛，食积气滞，中暑吐泻；外用于疮疡肿毒。

**杨叶木姜子**　老鸦皮(四川、云南)

**Litsea populifolia** (Hemsl.) Gamble——*Lindera populifolia* Hemsl.

生于海拔 750—2 600 米的山地阳坡、河谷沿岸、阳坡灌丛或干瘠土层的次生林中，有时组成纯林。分布于四川、云南东北部、西藏东部。

果实(澄茄子、樟树果)：用于胃寒腹痛，食滞饱胀。

**圆叶豺皮樟**

**Litsea rotundifolia** (Nees) Hemsl.

生于低海拔山地的灌丛中或疏林下。分布于广东、广西。

根：用于风湿骨痛。

**豺皮樟**　白叶仔、假面果、硬钉树、啫喳木(广东)，圆叶木姜子(台湾植物志)

**Litsea rotundifolia** Hemsl. **var. obiongifolia** (Nees) Allen——*Actinodaphne*

*chinensis* Nees var. *oblongifolia* Nees

生于海拔 800 米以下的丘陵地灌丛中、疏林下或山地路旁。分布于浙江平阳、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西。

根(豺皮樟根): 辛,温。祛风除湿,行气止痛,活血通经。用于风湿关节痛,跌打损伤,痛经,胃痛,泄泻,水肿。

**红叶木姜子** 野气辣子、大山胡椒(四川),木姜树、山茴香、辣姜子(云南)

**Litsea rubescens** Lec.——*L. rubescens* Lec. f. *nanchuanensis* Yang

生于海拔 700—3 800 米的山谷常绿阔叶林中、空旷处或林缘。分布于西南及陕西南部、湖北、湖南。

果实(樟树果)、根: 辛,微温。祛风散寒,消食化滞。用于胃寒腹痛,食滞腹胀,风湿骨痛,跌打损伤,感冒头疼。

**绢毛木姜子**

**Litsea sericea** (Nees) Hook. f.——*Tetranthera sericea* Nees

生于海拔 400—3 400 米的山坡路旁、灌丛中或针阔叶混交林下。分布于四川西部、云南西北部、西藏东南部。

果实: 祛痰,利尿,健胃,驱风,防腐。

**钝叶木姜子** 木香子(四川)

**Litsea veitchiana** Gamble

生于海拔 400—3 800 米的山坡路旁或灌丛中。分布于湖北、四川、贵州、云南西北部。

果实: 健胃温肾,行气散结。用于胸腹胀痛,食积气滞。

**轮叶木姜子** 樟木姜、王指姜、铁打王(广东),大王托、五叉虎(广西植物名录)

**Litsea verticillata** Hance

生于海拔 1 300 米以下的山谷、溪旁、灌丛或杂木林中。分布于广东、广西、云南南部。

根(跌打老)、树皮、叶: 辛,温。祛风通络,活血消肿,止痛。用于风湿关节痛,四肢麻痹,腰腿痛,跌打肿痛,痛经。

## 润楠属 Machilus Nees

**宜昌润楠** 竹叶楠(湖北)

**Machilus ichangensis** Rehd. et Wils.

生于海拔 560—1 400 米的山坡及山谷疏林内。分布于陕西南部、甘肃西部、湖北、四川。

树皮: 舒经络,止呕吐。

**薄叶润楠** 大叶楠(浙江),荷树(湖南),华东楠(植物分类学报)

**Machilus leptophylla** Hand.-Mazz.

生于海拔 450—1 200 米的阴坡谷地混交林中。分布于江苏、浙江、福建、湖南、广东、广西、贵州。

根(大叶楠根)：消肿解毒。用于跌打，疮疖，痢疾。

**小果润楠**　　毛楠(四川)，大树药(云南)

**Machilus microcarpa** Hemsl.

生于山地阔叶混交林中。分布于湖北、四川、贵州。

果实：止咳，消胀。

**刨花润楠**　　粘柴(福建)，刨花，刨花楠(广东)

**Machilus pauhoi** Kanehira——*Persea pauhoi* (Kanehira) Kosterm.

生于土壤湿润肥沃的山坡灌丛或山谷疏林中。分布于浙江、江西、福建、湖南、广东、广西。

茎(刨花润楠)：甘，微辛，凉。清热润燥。用于烫、火伤，大便秘结。

**柳叶润楠**

**Machilus salicina** Hance

生于低海拔地区的溪畔河边。分布于广东、广西、贵州南部、云南南部。

叶：消肿解毒。

**红楠**　　山樟树(湖南)

**Machilus thunbergii** Sieb. et Zucc.

生于海拔800米以下的山地阔叶混交林中。分布于华东及湖南、广东、广西。

根皮(红楠皮)、茎皮：舒筋活血，消肿止痛。用于扭挫伤，脚肿，吐泻不止。

**绒毛润楠**　　猴高铁(全国中草药汇编)

**Machilus velutina** Champ. ex Benth.

生于湿润的山谷溪旁及杂木林中。分布于浙江、江西、福建、广东、广西。

根、叶(野枇杷)：苦，凉。化痰止咳，消肿止痛，收敛止血。用于咳嗽痰喘；外用于烧、烫伤，痈肿，外伤出血，骨折。

**滇润楠**　　铁香樟，白香樟(四川)，云南楠木、滇桢楠(云南)

**Machilus yunnanensis** Lec.——*M. yunnanensis* Lec. var. *diclouxii* Lec.; *M. bracteata* (Lec.) Kosterm.

生于海拔1 500—2 000米的山地常绿阔叶林中。分布于四川西部、云南中部、西部至西北部。

叶(冻青叶)：苦、涩，凉。消肿解毒。用于疮毒，疔腮，烧、烫伤，跌打骨折，风湿痛。

## 新樟属　Neocinnamomum Liou

**滇新樟**　　三股筋，羊角香(云南)，梅根(傣语)，茶蚬、加修(壮语)，白桂(全国中草药汇编)

**Neocinnamomum caudatum** (Nees) Merr.——*Cinnamomum caudatum* Nees; *N. yunnanense* Liou; *N. poilanei* Liou

生于500—1 800米的山谷、路旁、溪边、疏林或密林中。分布于广西西南部、云南中部至南部。

树皮、叶：涩、辛，平。祛风除湿，祛瘀活血，散寒止痛。用于风湿关节痛，跌打肿痛，

骨折、痛经，风寒感冒，麻疹，寒性胃痛。

**川鄂新樟**　鸡筋树(湖北)，三条筋(四川)

**Neocinnamomum fargesii** (Lec.) Kosterm.——*Cinnamomum fargesii* Lec.

生于海拔600—1 300米的山坡沟边、灌丛及林缘。分布于湖北西部、四川东部。

根皮、果实：用于骨痛，风湿痛，跌打损伤，出血。

**新樟**　香桂子、香叶子(四川)，野香叶树、梅花香(云南)，少花新樟(中国高等植物图鉴)

**Neocinnamomum delavayi** (Lec.) Liou——*Cinnamomum delavayi* Lec.; *N. parvifolium* (Lec.) Liou; *N. delavayi* (Lec.) Liou var. *pauciflorum* Yang

生于海拔1 100—2 300米的灌丛、林缘、疏林、密林中、河谷两岸、沟边及排水良好的石灰岩上。分布于湖北西部、四川东部。

叶(三股筋)：祛风湿、舒筋络，止血。用于风湿痹痛，跌打损伤；外用于出血。

**海南新樟**　木大刀王(海南)，美共(侗语)

**Neocinnamomum lecomtei** Liou——*N. hainanianum* Allen

生于海拔400—500米的密林中或山谷水边。分布于海南、广西南部、贵州西南部、云南东南部。

全株(木大刀王)：辛，温。有小毒。舒筋活络，活血散瘀，祛风除湿，行气止痛。用于风湿骨痛，跌打损伤，腰肌劳损，小儿麻痹，乙脑后遗症。

**沧江新樟**　楠木香，三股筋(云南)

**Neocinnamomum mekongense** (Hand.-Mazz.) Kosterm.——*Cinnamomum delavayi* Lec. var. *mekongense* Hand.-Mazz.

生于海拔1 600—2 300米的灌丛中。分布于云南西部至西北部、西藏察隅。

全株：辛，温。祛风湿，舒筋络，止血，调经，止痛。用于风湿痹痛，跌打损伤，刀伤出血，月经不调。

## 新木姜子属　Neolitsea Merr.

**新木姜子**　新木姜(中国高等植物图鉴)

**Neolitsea aurata** (Hayata) Koidz.——*Litsea aurata* Hayata

生于海拔500—1 700米的山坡、林缘或杂木林中。分布于江苏、江西、福建、台湾，湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根、树皮(新木檀子)：理气止痛，消肿。用于胃脘胀痛，水肿。

**浙江新木姜子**　假桂花、红皮树、香桂(浙江)

**Neolitsea aurata** (Hayata) Koidz. var. **chekiangensis** (Nakai) Yang et P. H. Huang——*N. chekiangensis* Nakai

生于海拔500—1 300米的山坡杂木林中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建。

树皮：用于胃脘胀痛。　根：用于水肿。

**粉叶新木姜子**

**Neolitsea aurata** (Hayata) Koidz. var. **glauca** Yang

生于海拔 800—850 米的山坡阔叶林中。分布于四川。

果皮：温中散寒，理气止痛。

附　注：四川特有药用植物。

**云和新木姜子**　　油桂(湖北)

**Neolitsea aurata** (Hayata) Koidz. var. **paraciculata** (Nakai) Yang et P. H. Huang——*N. paraciculata* Nakai

生于海拔 500—1 900 米的山地杂木林中。分布于浙江、江西、湖南、广东北部、广西。

根：用于胃脘胀痛，水肿。

**锈叶木姜子**　　辣汁树、大叶樟、石楠(广东)，白背樟(广西)

**Neolitsea cambodiana** Lec.——*N. ferruginea* Merr.

生于海拔 1 000 米以下的山地混交林中。分布于江西、福建、湖南、广东、广西。

叶：外用于疮疖肿毒。

**鸭公树**　　青胶木(广东)，中叶樟(广西)，大香籽(云南)

**Neolitsea chuii** Merr.

生于海拔 500—1 400 米的山谷或丘陵地的疏林中。分布于江西、福建、湖南、广东、广西、云南南部。

种子：用于胃脘胀痛，水肿。

**簇叶新木姜子**　　香桂子树(陕西)，台乌、乌药(湖北)，丛叶楠(中国树木分类学)，密叶新木姜子(中国高等植物图鉴)

**Neolitsea confertifolia** (Hemsl.) Merr.——*Litsea confertifolia* Hemsl.

生于海拔 460—2 000 米的山地、水旁，灌丛及山谷密林中。分布于中南及陕西东南部、江西、四川、贵州。

全株(香楠树)：用于关节痛。

**大叶新木姜子**　　鹅掌风(湖南)，土玉桂、厚壳树(广东)，假玉桂(广西)，大叶新木姜(中国高等植物图鉴)

**Neolitsea levinei** Merr.——*N. chinensis* (Gamble) Chun

生于海拔 300—1 300 米的山地路旁、水边及山谷密林中。分布于江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根：用于带下病，跌打损伤，痈肿疮毒。　果实：祛风散寒。用于胃寒痛。

**南亚新木姜子**　　南亚新木姜(中国高等植物图鉴)

**Neolitsea zeylanica** (Nees) Merr.——*Litsea zeylanica* Nees

生于海拔 750—1 000 米的山林或灌丛中。分布于广西南部。

根：祛风止痛。用于风湿痛。

## 鳄梨属　Persea Mill.

**鳄梨**　　油梨、樟梨(通称)

**Persea americana** Mill.

原产美洲热带。福建、福州和漳州、台湾、广东广州和汕头、海南海口、广西南宁、四川西昌有少量栽培。

果实(油梨)：用于消渴。

## 楠属　Phoebe Ness.

**山楠**

**Phoebe chinensis** Chun

生于海拔1 400—1 600米的山坡及山谷常绿阔叶林中，亦有栽培。分布于陕西、甘肃、湖北、四川、贵州、云南、西藏。

根：用于吐泻，水肿。

**竹叶楠**　小樟木

**Phoebe faberi** (Hemsl.) Chun——*Machilus faberi* Hemsl.

生于海拔800—2 200米以下的山地阔叶林中。分布于陕西、湖北西部、四川、贵州、云南中部至北部。

心材：辛，温，芳香。散寒止痛，温胃止呕。

**湘楠**　湖南楠(秦岭植物志)

**Phoebe hunanensis** Hand.-Mazz.

生于沟谷或水边。分布于陕西、甘肃、江苏、江西西南部、湖北、湖南中部、东南部及西部、贵州东部。

根、叶：用于小儿疳积，风湿痛。

**紫楠**　野枇杷、山枇杷(浙江)，黄心楠(广西)，金丝楠、紫金楠（中国高等植物图鉴）

**Phoebe sheareri** (Hemsl.) Gamble——*Machilus sheareri* Hemsl.

多生于海拔1 000米以下的山地阔叶林中。分布于长江流域及其以南地区。

叶、根(紫楠)：辛，温。叶：温中理气。用于腹胀，脚气水肿。根：祛瘀消肿。用于跌打损伤。

**峨眉紫楠**　桢楠树(四川)

**Phoebe sheareri** (Hemsl.) Gamble var. **omeiensis** (Yang) N. Chao——*P. neurantha* (Hemsl.) Gamble var. *omeiensis* Yang

生于低海拔地区的阔叶林中。分布于四川(西部较常见)、贵州西北部。

根：用于跌打损伤。

**楠木**　桢楠(四川)

**Phoebe zhennan** S. Lee et F. N. Wei——*Persea nanmu* Oliv. P. P. excl. specim Yunnan.

野生或栽培，野生者多见于海拔1 500米以下的阔叶林中。分布于湖北西部、四川、贵州西北部。

木、茎皮(楠木)：辛，温。利水，止吐泻。用于吐泻不止，胃脘胀痛。

### 檫木属　Sasafras Trew.

**檫木**　　青檫(安徽)，檫树(浙江)，天鹅枫(江西)，枫荷桂(广东)，半风樟(广西)，鹅脚板(云南)

**Sasafras tsumu** (Hemsl.) Hemsl. ——*Lindera tzumu* Hemsl.

常生于海拔150—1 900米的山地疏林或密林中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全株(檫树)：甘、淡，微温。活血散瘀，驱风除湿。用于风湿痛，腰肌劳损，扭挫伤，胃痛。

## 36. 莲叶桐科　Hernandiaceae

### 莲叶桐属　Hernandia L.

**莲叶桐**

**Hernandia sonora** L.——*H. ovigera* L.

常生于海滩。分布于我国台湾南部。

植株：用于抗癌，神经系统及心血管疾病。

### 青藤属　Illigera Bl.

**宽药青藤**　　保龙甩、保龙师(傣名)

**Illigera celebica** Miq.

生于海拔160—1 300米的低、中山疏林或密林中。分布于广东、广西、云南。

根、茎藤：驱风除湿，止痛。用于风湿骨痛。

**心叶青藤**　　牛尾参、翼果藤(四川)，黄鳝藤、大风藤、毛叶血藤(云南)

**Illigera cardata** Dunn

生于海拔600—1 900 米的山坡密林灌丛中。分布于广西、四川、贵州、云南。

根、茎：驱风除湿，散瘀止痛。用于跌打损伤。

**多毛青藤**　　葛根(云南)

**Illigera cordata** Dunn var. **mollissima** (W. W. Smith) Kubitzke ——*I. mollissima* W. W. Smith

生于海拔1 100米左右的山谷密林或灌丛中。分布于云南西北部。

根：有毒。用于泄泻。云南民间用作牲畜滋补药。

附　注：云南特有药用植物。

**大花青藤**　　红豆七、通气跌打、风车藤、青藤(云南)

**Illigera grandiflora** W. W. Smith et J. F. Jeffr.

生于海拔1 300—3 200米的山地树林中。分布于贵州南部、云南南部及西南部。

根、藤：辛，凉。消肿解热，散瘀接骨；外用于跌打损伤，骨折。

**蒙自青藤**

**Illigera henryi** W. W. Smith

生于海拔 1 100—1 600 米的山地密林中。分布于广西、云南东南部。

根、茎：用于风湿痛。

**小花青藤**　翅果藤(福建)，黑九牛、细叶青(广西)

**Illigera parviflora** Dunn

生于海拔 500—1 400 米的山地密林中。分布于福建、广东、广西、贵州、云南。

根、茎：用于风湿痛，小儿麻痹后遗症。

**红花青藤**　毛青藤、三姐藤(广西)

**Illigera rhodantha** Hance

生于海拔 100—2 100 米的山谷密林或疏林灌丛中。分布于广东、广西、云南。

根、茎：甘、辛，温。消肿止痛，祛风散瘀。用于风湿痛，跌打损伤，小儿麻痹后遗症，小儿疳积，毒蛇咬伤。

**锈毛青藤**　三叶稠藤(广西)

**Illigera rhodantha** Hance var. **dunniana** (Lévl.) Kubitzki——*I. dunniana* Lévl

生于海拔 120—1 000 米的山坡、谷地密林或灌丛中。分布于广东、广西，贵州、云南。

根、茎：用于风湿痛。

## 37. 领春木科　Eupteleaceae

### 领春木属　Euptelea Sieb. et Zucc.

**领春木**　黄花树(湖北)，扇耳树(四川)

**Euplelea pleiospermum** Hook. f. et Thoms.

生于海拔 900—3 600 米的溪边杂木林中。分布于西南及河北、山西、陕西、甘肃、浙江、江西、河南、湖北、湖南。

树皮、花：清热，泻火，消痈，接骨。

附　注：国家二级保护植物。

## 38. 连香树科　Cercidiphyllaceae

### 连香树属　Cercidiphyllum Sieb. et Zucc.

**连香树**　芭蕉香清(浙江)，圆椤(四川)

**Cercidiphyllum japonicum** Sieb. et Zucc.

生于海拔 1 200—2 500 米的山坡或山谷中。分布于山西南部、陕西南部、甘肃南部、安徽西部和南部、浙江、江西、河南西南部、湖北、四川、贵州。

果实：用于小儿惊风，抽搐肢冷。

附　注：国家二级保护植物。

## 39. 毛茛科　Ranunculaceae

### 乌头属　Aconitum L.

**两色乌头**

**Aconitum alboviolaceum** Kom.

生于林缘、溪边。分布于东北及河北北部。

根：祛风止痛。

**拟黄花乌头**

**Aconitum anthoroideum** DC.

生于海拔 1 400—1 950 米的林下及山地草甸。分布于新疆北部。

块根：散风寒，除湿止痛。

附　注：功效相同的有**空茎乌头 A. apetalum**(Huth) B. Fedtsch.，分布于新疆。

**滇南乌头**　　小黑牛、铜皮(云南)

**Aconitum austroyunnanense** W. T. Wang

生于海拔 1 700—2 500 米的山地灌丛中。分布于云南南部和西部。

块根：用于风寒湿痹，中风瘫痪，跌打损伤。

附　注：云南地方标准收载。

**细叶黄乌头**　　扁特、扁毒(唐本草)

**Aconitum barbatum** Pers.

生于海拔 450—900 米的林下及山地草甸。分布于黑龙江、内蒙古。

块根、全草：止痛消肿，祛风散寒，通经活络。

附　注：蒙医用于祛风湿，镇痛。

**西伯利亚乌头**　　黑尾大艽(河北)，黑秦艽(内蒙古)，朝天恒(陕西)，牛扁(本草经)

**Aconitum barbatum** Pers. var **hispidum** DC.——A. *sibiricum* Poir.

生于海拔 420—2 200 米的林缘、山地草甸。分布于华北及黑龙江、吉林，陕西，甘肃、宁夏、新疆、河南西部。

根：祛风止痛。

**牛扁**　　曲芍(河北)，扁桃叶根(山西)

**Aconitum barbatum** Pers. var. **puberulum** Ledeb.——*A. ochranthum* C. A. Mey.

生于海拔 400—2 700 米的山地林中或林边草地。分布于华北及青海、新疆。

根(牛扁)：苦，温。有毒。祛风止痛，止咳平喘，化痰。用于咳嗽痰喘，腰腿痛，关节肿痛；外用于疥癣，瘰疬，并杀虱。

**短柄乌头**　雪上一枝蒿(云南)

**Aconitum brachypodum** Diels

生于海拔 2 800—3 700 米的山地草坡或多石砾坡地。分布于四川西南部、云南西北

部。

块根(雪上一枝蒿)：苦、辛，温。有大毒。祛风除湿，消炎止痛。用于跌打损伤，风湿骨痛，牙痛，疮疡肿毒，毒蛇咬伤。

附　注：①国家三级保护植物。②功效相同的有**曲毛短柄乌头 A. brachypodum** Diels var. **crispulum** W. T. Wang，分布于四川西部、云南；**展毛短柄乌头 A. brachypodum** Diels var. **laxiflorum** Fletch. et Lauener，分布于四川西南部、云南北部。

**弯喙乌头**

**Aconitum campylorrhynchum** Hand.-Mazz.

生于海拔 3 200—4 000 米的山地草丛中。分布于四川西部、甘肃南部。

块根：消炎抗毒，镇痛。

**乌头**　鹅儿花、铁花(四川)

**Aconitum carmichaeli** Debx.

生于海拔 700—2 100 米的山沟或山坡。栽培于中南及辽宁南部、陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、四川、贵州、云南。主产四川、陕西。

母根(川乌)：辛、苦，热。有大毒。祛风除湿，温经止痛。用于风寒湿痹，关节痛，心腹冷痛，寒疝作痛，麻醉止痛。子根(附子)：辛、甘，大热。有毒。回阳救逆，补火助阳，逐风寒湿邪。用于亡阳虚脱，肢冷脉微，阳痿，宫冷，心腹冷痛，虚寒吐泻，阴寒水肿，阳虚外感，寒湿痹痛。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**黄山乌头**

**Aconitum carmichaeli** Debx. var. **hwangshanicum** W. T. Wang et Hsiao

生于海拔 1000 米左右的山地草坡、灌丛中及各地林缘。分布于安徽南部、浙江西部、江西东北部。

块根：辛、苦，热。有毒。祛风湿，散寒，止痛。

**大麻叶乌头**　羊角七(湖北)

**Aconitum cannabifolium** Franch. ex Finet et Gagnep.

生于海拔 1 280—1 950 米的山地林中或沟边。分布于陕西南部、湖北西部、四川东北部。

根：有毒。用于五劳七伤。

**黔川乌头**　水八角莲(贵州)

**Aconitum cavaleriei** Lèvl. et Vant.

生于山坡草地、林下。分布于四川西部、贵州。

块根：用于胃病。

**察瓦龙乌头**

**Aconitum changianum** W. T. Wang

生于海拔 3 500 米左右的高山草地。分布于云南、西藏。

根(铁罗汉)：辛，温。有大毒。风祛除湿，活血通络，止痛。用于局部麻醉，风湿麻木，腰腿痛，关节扭伤。

**展花乌头**

**Aconitum chasmanthum** Stapf

生于海拔 4 600 米左右的山地。分布于我国西藏中南部。

块根：镇痛，祛风。用于风湿痛。

**祁连山乌头**　　铁棒锤(甘肃)

**Aconitum chilienshanicum** W. T. Wang

生于海拔 3 400—3 900 米的草地林缘。分布于甘肃西北部，青海东北部。

根：用于跌打损伤。

**苍山乌头**　　七星草乌(云南)

**Aconitum contortum** Finet et Gagnep.

生于海拔 3 400 米左右的灌丛或林缘。分布于云南西部。

块根：祛风湿，祛寒，止痛。用于跌打损伤。

**黄花乌头**　　山喇叭花(东北)，白附子(名医别录、东北)

**Aconitum coreanum** (Lèvl.) Rap.——*A. delevayi* Franch. var. *coreanum* Lèvl

生于海拔 200—900 米的山坡、草地或灌丛中。分布于东北及河北北部。主产东北。

块根(关白附)：辛、甘，大温。有毒。祛风痰，逐寒湿。用于腰膝关节冷痛，头痛，冻疮。

**粗茎乌头**　　紫乌头(云南)

**Aconitum crassicaule** W. T. Wang

生于海拔 2 800—3 000 米的山地草坡。分布于云南贡山一带。

块根：民间用于风湿寒痛。

附　注：云南特有药用植物。

**粗花乌头**

**Aconitum crassiflorum** Hand. -Mazz.

生于海拔 3 200—4 200 米的山地林中或林缘草地。分布于四川西南部、云南西北部。

根：用于胃气痛，跌打损伤。

**马耳山乌头**

**Aconitum delavayi** Franch.

生于海拔 3 700—3 800 米的荒山、草地。分布于四川、云南马耳山。

块根：活血散瘀，消肿。

**无距宾川乌头**

**Aconitum duclouxii** Lèvl. var. **ecalcaratum** Fletch. et Lauener

生于海拔 4 000 米的山地草坡。分布于云南剑川一带。

块根：有大毒。镇痛，祛风湿。用于跌打损伤。

**敦化乌头**

**Aconitum dunhuaense** S. H Li

生于林缘、草地。分布于吉林敦化。

块根：镇痛。

附　注：吉林特有药用植物。

**藏南藤乌头**

**Aconitum elwesii** Stapf

生于海拔 2 300—3 200 米的山地林中或灌丛中。分布于我国西藏南部。

块根：搜风，祛风湿。

附　注：我国西藏特有药用植物。

**紫乌头**　　藤乌(贵州)，堵喇(云南)

**Aconitum episcopale** Lévl. ——*A. vilmorinianum* Kom.var. *altifida* W. T. Wang

生于海拔 2 400—2 900 米的山地灌丛中。分布于四川西南部、贵州西部、云南东北部和西北部。

块根：祛风散寒，除湿止痛。民间也用于解乌头中毒。

**紫花高乌头**

**Aconitum excelsum** Reichb.

生于林缘或高山草地。分布于黑龙江西部、辽宁西部、内蒙古东南部。

块根：活血祛瘀，驱风除湿，止痛消肿。

全草：用于感冒。

**赣皖乌头**　　牛虱鞭(浙江)

**Aconitum finetianum** Hand. -Mazz.

生于海拔 1 000 米以上的山坡林下杂草丛中。分布于安徽南部、浙江西部、江西、福建。

块根：辛、苦，大热。有毒。祛风湿，散寒，止痛。

**伏毛铁棒锤**　　一枝蒿(宁夏)

**Aconitum flavum** Hand. -Mazz.

生于海拔 2 000—3 700 米的高山草地。分布于甘肃、宁夏、青海、四川西部、西藏。

块根(铁棒锤)：苦、辛，温。有大毒。祛风止痛，散瘀止血，消肿拔毒。用于风湿关节痛，牙痛，痛经，瘰疬，疮疡肿毒。

附　注：① 内蒙古用全草治内伤吐血。② 功效相似的有 **阴山乌头 A. flavum** Hand. -Mazz. var. **galeatum** W. T. Wang，分布于内蒙古南部。

**丽江乌头**　　黄草乌(云南丽江)

**Aconitum forrestii** Stapf

生于海拔 3 100 米左右的山地草坡或林缘。分布于四川木里、云南丽江。

块根：增体力，解毒。用于风湿痛。

**膝瓣乌头**　　大草乌(云南)

**Aconitum geniculatum** Fletch. et Lauener

生于海拔 3 200 米左右的灌丛、林缘。分布于云南北部。

块根(膝瓣乌头)：辛，温。有大毒。祛风湿，镇痛。

**露蕊乌头**　　泽兰(青海)，罗贴巴(藏语)

**Aconitnm gymnandrum** Maxim

生于海拔 3 200—4 300 米的高山草地，灌丛或青稞田中。分布于甘肃、青海、四川西部、西藏。

根：辛，温。有大毒。驱风镇痛。用于关节痛。　叶：杀虫。用于疥癣，并杀灭蝇。花：用于淋风。

**瓜叶乌头**　　鱼夫子(湖南)，血乌(中药材品种论述)

**Aconitum hemsleyanum** Pritz.

生于海拔800—2 200米的山地林中或灌丛中。分布于陕西南部、江苏、安徽西部、浙江西北部、江西北部、河南西南部、湖北、湖南北部、四川。

块根：辛，温。有大毒。用于跌打损伤，关节痛；外用于无名肿毒，疥疮。

附　注：四川地方标准收载，作草乌用。

**掌距瓜叶乌头**

**Aconitum hemsleyanum** Pritz. var. **circinatum** W. T. Wang

生于灌丛中。分布于四川、贵州、云南西至西北部。

块根：祛风胜湿，活血行瘀。

**川鄂乌头**

**Aconitum henryi** Pritz.

生于海拔1 000—2 000米的山地林下草丛中。分布于湖北西部、四川东部。

块根：祛风胜湿，活血行瘀。用于跌打损伤，风湿痛。

附　注：功效相同的有 **展毛川鄂乌头 A. henryi** Pritz. var. **villosum** W. T. Wang，分布于山西南部、陕西东南部、浙江西部、河南西部、湖北、湖南北部、四川东北部。

**东北乌头**　　靰鞡花、蓝靰鞡花(东北)

**Aconitum jaluense** Kom. var. **glabrescens** Nakai——*A. manshuricum* Nakai

生于山坡杂木林中、草甸、林缘及灌丛中。分布于东北。

块根：辛、苦，热。有大毒。功效类似草乌。

**多根乌头**

**Aconitum karakolicum** Rap.

生于海拔1 200—2 000米的山地草坡。分布于新疆西部。

块根：止痛。用于神经痛，牙痛，关节痛。

**吉林乌头**

**Aconitum kirinense** Nakai

生于山地草坡。分布于东北。

全草：祛风止痛。用于胃脘疼痛。

**毛果吉林乌头**

**Aconitum kirinense** Nakai var. **australe** W. T. Wang

生于海拔780—2 000米的山地林中、山坡草丛或路边岩石上。分布于山西南部、陕西东南部、河南南部、湖北西部。

根：祛风除湿，活血止痛。

**工布乌头**　　蓬阿那博(藏语)

**Aconitum kongboense** Lauener

生于海拔3 000—4 300米的高山草地、灌丛中或栎林中。分布于四川西部、西藏。

块根：有毒。清热止痛。用于炭疽病；外用于跌打损伤，毒虫咬伤。

附　注：功效相似的有**类乌齐乌头 A. leiwuqiense** W. T. Wang，分布于我国西藏类乌齐；**展喙乌头** A. novoluridum Munz，分布于我国西藏林芝、米林。

**北乌头**　　兰靴鞘花(东北)，断肠草(新疆)

**Aconitum kusnezoffii** Reichb.

生于海拔 1 000—2 400 米阔叶林中、林缘或山坡。分布于东北、华北及青海、山东。主产辽宁。

块根(草乌)：辛、苦，热。有大毒。祛风除湿，温经止痛。用于风寒湿痹，关节痛，心腹冷痛，寒疝作痛，麻醉止痛。叶(草乌叶)：辛、涩，平。有小毒。清热，止痛。用于热病发热，泄泻腹痛，头痛，牙痛。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。② 草乌叶为蒙药。③ 功效类似的有**带岭乌头 A. biribidshanicum** Worosch.，分布于黑龙江；**毛叶乌头 A. carmichaeli** Debx. var. **pubescens** W. T. Wang et Hsiao，分布于甘肃南部；**展毛乌头 A. carmichaeli** Debx. var. **truppelianum** (Ulbr.) W. T. Wang et Hsiao，分布于辽宁南部、山东、江苏、浙江；**大渡乌头 A. franchetii** Finet et Gagnep.，分布于四川西部；**细叶乌头 A. macrorrhynchum** Turcz.，分布于黑龙江、吉林、内蒙古；**高山乌头 A. monanthum** Nakai，分布于吉林东部；**圆锥乌头 A. paniculigerum** Nakai，分布于吉林东部、辽宁东南部；**疏毛圆锥乌头 A. paniculigerum** Nakai var. **wulingense** (Nakai) W. T. Wang，分布于河北、内蒙古。

**白喉乌头**　　麻布七(四川)

**Aconitum leucostomum** Worosch.

生于海拔 1 400—2 300 米的山坡草地。分布于内蒙古西部、甘肃西北部、新疆。

块根：除湿镇痛。

**河北白喉乌头**

**Aconitum leucostomum** Worosch. var. **hopeiense** W. T. Wang

生于海拔 900—1 500 米的山沟林下。分布于河北北部、内蒙古南部。

块根：用于感冒。

**凉山乌头**　　雪乌(四川)

**Aconitum liangshanicum** W. T. Wang

生于山坡草地。分布于四川西南部。

块根：止痛，祛风湿。

附　注：四川特有药用植物。

**贡嘎乌头**

**Aconitum liljestrandii** Hand.-Mazz.

生于海拔 3 400 米左右的山沟、坡地。分布于四川康定至大金。

块根：活血，散瘀，消肿。

附　注：四川特有药用植物。

**长齿乌头**

**Aconitum lonchodontum** Hand.-Mazz.

生于海拔 2 700 米左右的山坡草地。分布于湖北西部(神农架)。

块根：有毒。散寒止痛，祛风湿。

附　注：湖北特有药用植物。

**江孜乌头**　　雪上一枝蒿(西藏)

**Aconitum ludlowii** Exell

生于海拔 4 200—4 800 米的高山草地或田边。分布于我国西藏江孜一带。

块根：同雪上一枝蒿。

**山地乌头**

**Aconitum monticola** Steinb.

生于海拔 2 300 米的山地河谷及洪积堆。分布于新疆。

块根：止痛消肿，祛风散寒，通经活络。

**保山乌头**

**Aconitum nagarum** Stapf

生于山地草坡。分布于云南西部。

块根(保山附片)：有毒。类似附片。

附　注：本品为加工品。

**小白撑**　　黄蜡一枝蒿(云南)

**Aconitum nagarum** Stapf var. **heterotrichum** Fletch. et Lauener ——*A. bullatifolium* Lévl

生于海拔 1 500 米以上的山坡草地。分布于云南西北部至东北部。

块根(小白撑)：用于腰肌劳损，风湿关节痛。

附　注：国家三级保护植物。

**宣威乌头**　　宣威一枝蒿(云南宣威)

**Aconitum nagarum** Stapf var. **lasiandrum** W T. Wang ——*A. subrosulatum* Hand -Mazz

生于山地草坡。分布于云南宣威一带。

块根：用于肿瘤痛。

附　注：为成药"雪治宁"原料。

**船盔乌头**　　滂嘎儿(藏语)

**Aconitum naviculare** (Brühl.) Stapf ——*A. ferox* Wall. var. *naviculare* Brühl

生于海拔 3 200—5 000 米的高山草地、灌丛中或河滩上。分布于我国西藏东部及东南部。

带根全草：苦，寒。有毒。解热，利湿。用于各种传染病引起的热症(如肝炎、流感、天花、麻疹等)，泄泻。

**林地乌头**

**Aconitum nemorum** M. Pop.

生于海拔 2 000—3 000 米的山间谷地及林下。分布于新疆。

块根：止痛消肿，祛风散寒，通经活络。

**德钦乌头**

**Aconitum ouvrardianum** Hand -Mazz.

生于海拔 3 000—4 000 米的山地草坡。分布于云南西北部、西藏东南部。

块根：当地用作箭毒。

**铁棒锤**　　铁牛七(陕西)，雪上一枝蒿(甘肃、四川)

**Aconitum pendulum** Busch ——*A szechenyianum* Gay.

生于海拔 1 400—4 900 米的高山草甸、多石砾山坡及灌丛草地。分布于陕西、甘肃、青海、河南西部、湖北西部、四川西部，云南北部、西藏。

块根(铁棒锤)：苦、辛，温。有大毒。祛风镇痛，散瘀止血，消肿拔毒。用于风湿关节痛，腰腿痛，跌打损伤，疮疡肿毒。

附　注：① 四川地方标准收载。② 功效类似的有**多裂乌头 A. polyschistum** Hand -Mazz.，分布于四川西部和西北部。

**雷波乌头**

**Aconitum pseudohuiliense** Chang

生于海拔 3 700 米的山坡草丛中。分布于四川雷波。

块根：祛风散寒，除湿止痛。

附　注：四川特有药用植物。

**拟玉龙乌头**　　黑心解(云南)

**Aconitum pseudostapfianum** W. T. Wang

生于海拔 2 800—3 000 米的草坡。分布于云南丽江一带。

块根：解乌头毒。

附　注：云南特有药用植物。

**美丽乌头**

**Aconitum pulchellum** Hand. -Mazz.

生于海拔 3 500—4 500 米的高山草地或灌丛中。分布于四川西南部、云南西北部、西藏东南部。

块根：辛、苦，温。有剧毒。活血散瘀，活络止痛。用于腰肌劳损，软组织挫伤，关节扭伤，风湿关节痛，肋间神经痛。

**岩乌头**　　若乌(湖北、四川)，一支蒿(贵州)

**Aconitum racemulosum** Franch.

生于海拔 1 600—2 300 米的山坡、草丛。分布于湖北西部、四川东南部、贵州、云南东北部。

块根：用于跌打损伤；外用于疮肿。

**巨苞岩乌头**

**Aconitum racemulosum** Franch. var. **grandibracteolatum** W. T. Wang

生于海拔 2 300—2 800 米的灌丛中。分布于四川峨眉山。

块根：祛风胜湿，活血行瘀。

附　注：四川特有药用植物。

**直序乌头**　　棚压玛博(藏语)

**Aconitum richardsonianum** Lauener

生于海拔 3 000—4 600 米的高山草地、高山松林中或桦木林中。分布于我国西藏林

芝、米林、拉萨。

块根：用于风湿关节痛，炭疽病。

附　注：功效相同的有**伏毛直序乌头 A. richardsonianum** Lauener **var. pseudosessiliflorum** (Lauener) W. T. Wang，分布于我国西藏拉萨。

**圆叶乌头**　阿克伯伯(维吾尔语)

**Aconitum rotundifolium** Kar. et Kir.

生于海拔3 100米的高山草地及林下。分布于新疆。

块根：外用镇痛，除腐生肌。　全草：解热。民间用于牙痛。

**花葶乌头**　活血莲(陕西、湖南)，一口血(湖北)，土莎莲(四川)

**Aconitum scaposum** Franch.

生于海拔1 100—2 000米的山沟或林下阴湿处。分布于陕西南部、江西东部、河南西南部、湖北西部、四川、贵州北部。

根：辛、苦，温。有小毒。行气止痛，活血调经。用于咳喘，劳伤，跌打损伤，月经不调，骨折肿毒；外用于无名肿毒。

**等叶花葶乌头**　碎骨还阳(湖北)

**Aconitum scaposum** Franch. var. **hupehanum** Rap. ——*A. jucundum* Diels

生于海拔1 700—2 100米的山坡林下阴湿处。分布于陕西和甘肃南部、江西北部、湖北、湖南北部、四川、云南北部。

根及块根：用于关节及肋骨疼痛，胃痛。

**聚叶花葶乌头**　血三七(湖北)，独儿七、笋尖七(中国高等植物图鉴)

**Aconitum scaposum** Franch. var. **vaginatum** (Pritz.) Rap. ——*A. vaginatum* Pritz.

生于海拔1 800—2 000米的山沟阴湿处或山坡林下腐殖土上。分布于陕西、甘肃南部、湖北西部、湖南北部、四川、贵州、云南东北部。

块根：辛、苦、温。有小毒。祛风散寒，除湿止痛，活血调经。用于五劳七伤，风湿痛，月经不调，跌打损伤。

**宽叶堇乌头**　藤乌头(中国高等植物图鉴)

**Aconitum sczukinii** Turcz.

生于海拔850—1 900米的杂木林中或林边，缠绕于其他植物上。分布于东北。

块根：祛风止痛，除湿，麻醉。

**缩梗乌头**　铁棒七(四川)

**Aconitum sessiliflorum** (Finet et Gagnep.) Hand.-Mazz. ——*A. napellus* L. var. *sessiliflorum* Finet et Gagnep.

生于海拔3 500—4 100米的山地草坡。分布于四川西部。

块根：四川部分地区作雪上一枝蒿用。

**高乌头**　通天袋(陕西)，穿心莲(四川)

**Aconitum sinomontanum** Nakai

生于海拔1 500—3 300米的山谷溪旁或山坡林下。分布于河北、山西、陕西、甘肃、青海、河南、湖北、四川、贵州。

根：辛、苦，温。有毒。祛风除湿，理气止痛，活血散瘀。用于风湿腰腿痛，胃痛，心悸，跌打损伤，瘰疬，疮疖。

**狭盔离乌头**　　野草乌(广西)

**Aconitum sinomontanum** Nakai var. **angustius** W. T. Wang

生于海拔 1 750—3 500 米的山地草坡及灌丛中。分布于安徽南部、江西北部、湖南、广西北部。

根：用于风湿骨痛，跌扑损伤，痈疮肿毒。

**陕西乌头**

**Aconitum shensiense** W. T. Wang

生于海拔 1 640 米处的山坡草地。分布于陕西南部。

块根：祛风止痛，散瘀消肿。

附　注：陕西特有药用植物。

**准噶尔乌头**　　草乌(新疆)

**Aconitum soongaricum** Stapf

生于海拔 1 200—1 700 米的山地草坡或河边草地。分布于新疆。

块根：镇痛，散风寒，除湿。

**华北乌头**

**Aconitum soongaricum** Stapf var. **angustius** W. T. Wang

生于海拔 1 500—3 000 米的山坡草地。分布于华北。

根：搜风胜湿，散瘀止痛。

**低矮华北乌头**

**Aconitum soongaricum** Stapf var. **jeholense** (Nakai et Kitag.) W. T. Wang——*A. jeholense* Nakai et Kitag.

生于山地草坡。分布于河北、山西。

块根：有大毒。祛风湿。用于痹痛。

**亚东乌头**

**Aconitum spicatum** Stapf

生于海拔 4 000 米左右的高山灌丛中。分布于我国西藏亚东。

块根：用于风湿关节痛。

**玉龙乌头**

**Aconitum stapfianum** Hand. -Mazz.

生于海拔 2 800—3 400 米的山地草坡。分布于云南西北部。

块根：祛风湿，镇痛。

附　注：功效相同的有**显柱乌头 A. stylosum** Stapf，分布于云南西北部。

**松潘乌头**　　羊角七、金牛七(陕西)，火焰子(甘肃)

**Aconitum sungpanense** Hand. -Mazz.

生于海拔 1 200—3 000 米的山坡灌丛中或林下。分布于山西南部，陕西中部至南部，甘肃南部、青海东部、河南西部、四川北部。

块根：辛、苦，温。有大毒。祛风止痛，散瘀消肿。用于跌打损伤，风湿关节痛。

附　注：功效相似的有**太白乌头 A. taipaicum** Hand.-Mazz.，分布于河南西部、陕西南部。

**甘青乌头**　　辣辣草(四川)

**Aconitum tanguticum** (Maxim.) Stapf——*A. rotundifolium* Kar. et Kir. var. *tanguticum* Maxim.

生于海拔 3 300—4 800 米的山坡草地及林缘。分布于陕西南部、甘肃、青海、四川西部、云南西北部、西藏东部。

块根：苦、辛，温。温中散寒，祛风止痛，散瘀止血。全草：用于发热，肺炎。

附　注：功效相同的有**毛果甘青乌头 A. tanguticum** (Maxim.) Stapf var. **trichocarpum** Hand.-Mazz.，分布于甘肃、青海、四川、云南西北部。

**康定乌头**

**Aconitum tatsienense** Finet et Gagnep.

生于海拔 2 700—3 700 米的高山灌丛中。分布于四川西部。

块根：驱风散寒，镇痛。

附　注：四川特有药用植物。

**直缘乌头**　　小黑牛(云南)

**Aconitum transsectum** Diels

生于海拔 2 800—3 400 米的山坡草丛。分布于云南西北部。

块根：用于风湿痛。

附　注：云南特有药用植物。

**草地乌头**

**Aconitum umbrosum** (Korsh.) Kom. ——*A. lycoctonum* L. subsp. *genuinum* Korsh. f. *umbrosum* Korsh.

生于山地杂木林或落叶松林下潮湿处。分布于东北及河北北部。

根或全草：用于祛风散寒，除湿止痛。

**黄草乌**　　滇草乌(贵州)，大草乌、昆明堵喇(云南)

**Aconitum vilmorinianum** Kom.

生于山地草坡。分布于四川、贵州西部、云南东部和中部。

块根：苦、辛，温。有剧毒。祛风散寒，除湿止痛。用于跌打损伤，风湿痛，手足厥冷。

**展毛黄草乌**

**Aconitum vilmorinianum** Kom. var. **patentipilum** W. T. Wang

生于海拔 2 300—3 000 米的高山草丛中。分布于四川会东、云南北部。

块根：祛风镇痛。

**白毛乌头**

**Aconitum villosum** Reichb

生于山地河谷林下及林缘草地。分布于吉林东部。

块根：止痛消肿，祛风散寒，通经活络。

**蔓乌头**

**Aconitum volubile** Pall. ex Koelle

生于山地、草坡、林中及灌丛中。分布于东北及内蒙古。

块根：麻，温。有剧毒。镇痛镇静。用于神经痛，风湿痛。

## 类叶升麻属　Actaea L.

**类叶升麻**　米升麻(湖北)，绿豆升麻(贵州)

**Actaea asiatica** Hara

生于海拔350—3 000米的山地阔叶林下。分布于东北、华北、西北、西南及河南、湖北。

根状茎或全草(类叶升麻)：辛、微苦，凉。祛风止咳，清热解毒。用于感冒头痛，顿咳；外用于犬咬伤。

附　注：功效相似的有**红果类叶升麻 A. erythrocarpa** Fisch.，分布于东北。

## 侧金盏花属　Adonis L.

**夏侧金盏花**

**Adonis aestivalis** L.

生于山坡草地。分布于新疆西部。

全草：强心，利尿。

**小侧金盏花**

**Adonis aestivalis** L. var. **parviflora** M. Bieb.

生于山坡草地。分布于新疆西部、西藏西南部。

全草：强心，镇静，利尿。

**侧金盏花**　冰凉花、冰里花、冰溜花(东北)，福寿草(现代实用中药)

**Adonis amurensis** Regel et Radde

生于山坡草地或林下。分布于东北。

全草：苦，平。有小毒。强心，利尿。用于心悸，水肿，癫痫。

**短柱侧金盏花**　水黄连(四川)

**Adonis brevistyla** Franch.——*A. davidii* Franch.

生于海拔1 900—3 500米的山地草坡、沟边、林缘或林中。分布于山西南部、陕西南部、甘肃中南部、四川西部和东南部、云南西北部、西藏南部和东部。

全草：用于黄疸，咳嗽；哮喘，热毒。

**金黄侧金盏花**

**Adonis chrysocyatha** Hook. f. et Thoms.

生于海拔2 200—2 600米的高山草坡。分布于新疆西部。

全草：强心，利尿。用于心悸，充血性心力衰竭。

**蓝侧金盏花**　豆月老(甘肃)，贾子豆罗(藏语)

**Adonis coerulea** Maxim.

生于海拔2 300—5 000米的高山草坡。分布于甘肃、青海、四川西北部、西藏东北部。

全草：辛、苦，温。燥湿杀虫。外用于疮疥，牛皮癣，皮肤病。

**辽吉侧金盏花**

**Adonis pseudoamurensis** W. T. Wang

生于山坡阳处。分布于吉林、辽宁东南部。

全草：强心，利尿。

附　注：功效相同的有**天山侧金盏花 A. tianschanica** (Adolf) Lipsch.，分布于新疆西北部。

**蜀侧金盏花**　　毛黄连(陕西、四川)

**Adonis sutchuenensis** Franch.

生于海拔 1 100—3 300 米的山地林中、灌丛中或草坡上。分布于陕西南部、四川西北部和东北部。

全草：苦，凉。有小毒。清热燥湿，健胃，镇静，强心。用于痈肿疮毒，目赤肿痛，呕吐，泻痢，心悸不眠，癫痫。

## 银莲花属　Anemone L.

**阿尔泰银莲花**　　鸡爪莲(陕西)，九节离(河南)，穿骨七(贵州)

**Anemone altaica** Fisch. ex C. A. Mey.

生于海拔 1 000—2 000 米的山地谷中林下、灌丛中或沟边。分布于山西南部、陕西南部、甘肃、河南西部、湖北西北部。主产陕西、河南、山西。

根状茎(九节菖蒲)：辛，微温。开窍，祛痰，驱风化湿，健胃，解毒。用于神昏谵语，癫痫痰饮，风湿痹痛，疮疡肿毒。

**黑水银莲花**

**Anemone amurensis** (Korsch.) Kom. ——*A. nemorosa* L. subsp. *amurensis* Korsch.

生于山地林下或灌丛下。分布于东北。

全草：发汗，增强肝、肾功能。

**毛果银莲花**

**Anemone baicalensis** Turcz.

生于海拔 500—3 100 米的山地林下、灌丛中或阴坡湿地。分布于东北及陕西南部、甘肃南部、四川西部。

叶：解毒，杀虫。

**卵叶银莲花**　　卵叶双瓶梅(贵州)

**Anemone begoniifolia** Lévl. et Vant.

生于海拔 650—1 000 米的山谷密林中或阴湿的沟边草地、岩石上。分布于广西西部、四川南部、贵州、云南东部。

根：消肿接骨，止血生肌。用于风湿关节痛；外用于疮毒。

**银莲花**

**Anemone cathayensis** Kitag.

生于海拔 1 000—2 600 米的山坡草地、山谷沟边或多石砾坡地。分布于河北、山西。

全草：用于风湿骨痛，跌打损伤。

**山东银莲花**

**Anemone chosenicola** Ohwi var. **schantungensis** (Hand.-Mazz.) Tamura——A. *schantungensis* Hand.-Mazz.

生于海拔600—1 100米的山地草丛中。分布于山东东部。

根：止血除湿，清热解毒。

**西南银莲花**　铜钱草(湖北)，铜骨七(四川)，钻骨风(贵州)

**Anemone davidii** Franch.

生于海拔950—3 500米的山地沟谷杂木林中、竹林中或沟边阴处。分布于西南及湖北西部、湖南西北部。

根状茎：微苦，温。活血止痛，祛瘀消肿，补肾。用于跌打损伤，风湿痛，劳伤，阳痿，腰痛。

**滇川银莲花**

**Anemone delavayi** Franch.

生于海拔2 400—3 000米的山地林下或林缘阴湿处。分布于四川西南部、云南西北部。

根状茎：活血散瘀，补肾。

**展毛银莲花**

**Anemone demissa** Hook. f. et Thoms.

生于海拔3 200—4 600米的山地草坡或疏林中。分布于甘肃西南部、青海东南部和南部、四川西部、云南北部和西北部、西藏东部和南部。

根状茎：用于疟疾，恶疮。叶及果实：祛风除湿。

**云南银莲花**

**Anemone demissa** Hook. f. et Thoms. var. **yunnanensis** Franch.

生于海拔3 200—4 000米的山地草坡或林下。分布于四川西南部、云南北部和西北部。

全草：祛风止痛。

**二歧银莲花**　土黄芩(吉林)

**Anemone dichotoma** L.

生于丘陵或山坡湿草地及林中。分布于东北及内蒙古。

根状茎：苦，凉。舒筋活血，清热解毒。用于跌打损伤，痢疾，风湿关节痛；外用于疮痈。

**鹅掌草**　蜈蚣三七(浙江)，菜乌头(湖北)，林荫银莲花(中国高等植物图鉴)

**Anemone flaccida** Fr. Schmidt

生于海拔1 100—3 000米的山地谷中草地或林下。分布于陕西、甘肃、江苏、浙江、江西、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

根状茎：辛、微苦，温。祛风湿，壮筋骨。用于跌打损伤，风湿痛。

附　注：功效相似的有**展毛鹅掌草 A. flaccida** Fr. Schmidt **var. hirtella** W. T. Wang，分布于湖北。

**鹤峰银莲花**

**Anemone flaccida** Fr. Schmidt **var. hofengensis** Wuzhi

生于海拔 1 200--1 400 米的沟边阴湿处。分布于湖北西南部、湖南西北部。

根状茎：用于小儿消化不良；外用于扭伤，风湿痛。

**拟卵叶银莲花**

**Anemone howellii** J. F. Jerr. et W. W. Smith——*A. begoniifolioides* W. T. Wang

生于海拔 1 200—2 300 米的山谷沟边阴湿处或疏林中。分布于广西西部、贵州西南部、云南西部和东南部。

全草：外用于皮肤病。

**打破碗花花**　野棉花(陕西、湖北、湖南、四川)，翦王草(贵州)

**Anemone hupehensis** Lem

生于海拔 400—1 800 米的低山丘陵草坡或沟边。分布于陕西、浙江、江西、湖北、湖南、广东北部、广西、四川、贵州。

根及全草(打破碗花花)：苦，凉。有毒。清热利湿，理气杀虫。用于顽癣，痈肿疮疖，消化不良，水泻，蛔积，疟疾，痢疾。

附　注：部分地区混称白头翁，或误作漏芦用。

**水棉花**　白背湖北银莲花(云南种子植物名录)

**Anemone hupehensis** Lem. f. **alba** W. T. Wang

生于海拔 1 200—3 500 米的山地草坡或沟边。分布于台湾、四川、贵州、云南。

根状茎、叶：清热除湿，活血祛瘀。用于痢疾，淋证，难产，风湿关节痛，食积，胃痛。

**秋牡丹**　土牡丹(浙江)

**Anemone hupehensis** Lem. var. **japonica** (Thunb.) Bowles et Stearn——*A. japonica* (Thunb.) Sieb. et Zucc.

江苏、安徽、浙江、江西、福建、广东、云南普遍栽培，有时逸为野生。

根(秋牡丹)：用于感冒，蛔虫病，股癣，体癣。

**叠裂银莲花**

**Anemone imbricata** Maxim.

生于海拔 3 200—5 300 米的高山草坡或灌丛中。分布于甘肃、青海、四川西部、西藏东部。

茎、叶、花：消炎。用于烧伤。

**凉山银莲花**

**Anemone liangshanica** W. T. Wang

生于海拔 2 800—3 600 米的高山草地。分布于四川雷波。

根：清热解毒，散结消肿。

附　注：四川特有药用植物。

**钝齿银莲花**

**Anemone obtusiloba** D. Don

生于海拔 2 900—4 000 米的高山草地或铁杉林下。分布于甘肃、四川、西藏。

全草：补血，散寒，消积。

**疏齿银莲花**　毛叶千紫花(陕西)

**Anemone obtusiloba** D. Don subsp. **ovalifolia** Brühl——*A. ovalifolia* (Brühl) Hand -Mazz.; *A. geum* Lévl.

生于海拔1 900—5 000米的高山草地或灌丛林缘。分布于河北、山西、陕西、甘肃、宁夏、青海、四川西部、云南北部、西藏。

叶、花、果实：用于病后体温低，淋证，关节积液，黄水疮，咳嗽痰喘。　全草：止血。

**多被银莲花**　竹节香附(辽宁)，老鼠屎(山东)

**Anemone raddeana** Regel

生于海拔800米以下的山地林中或草地阴湿处。分布于东北及山东东部。

根状茎(两头尖)：辛，热。有毒。祛风湿，消痈肿。用于风湿腰腿痛，关节痛，风寒感冒，咳嗽多痰，骨节痛。

附　注：辽宁地方标准收载。

**反萼银莲花**

**Anemone reflexa** Steph.

生于山地谷中灌丛下。分布于吉林长白山、陕西太白山、河南西部。

根状茎：功效同阿尔泰银莲花。

**草玉梅**　水乌头(湖北)，鬼打青(四川)，虎掌草(滇南本草)，来个(藏语)

**Anemone rivularis** Buch.-Ham. ex DC.

生于海拔850—4 900米的山地草坡，小溪边或湖边。分布于西南及甘肃、青海、湖北、广西。

根、全草：苦、辛，平。有毒。清热解毒，活血舒筋。用于咽喉痛，瘰疬，疟腮，风湿痛，胃痛，跌打损伤，疟疾，慢性肝炎，肝硬化。

**小花草玉梅**　山辣椒(陕西)，破牛膝(宁夏中草药手册)

**Anemone rivularis** Buch.-Ham. ex DC var. **flore-minore** Maxim.——*A. rivularis* Buch.-Ham. ex DC. var. *burbulata* Turcz. ex Fedts.

生于海拔900—3 000米的山地林缘或草坡上。分布于华北、西北及湖北、四川。

根、全草：苦、辛，平。有毒。消食，截疟，消炎散肿，皮肤引赤。用于肝炎，筋骨痛，淋证，水肿；外用于外伤瘀肿日久不散。

**大花银莲花**

**Anemone silvestris** L.

生于海拔580—3 400米的山谷草坡或桦树林缘、草原或多石砾山坡。分布于河北、内蒙古、新疆。

全草：消积，祛湿，排脓。

附　注：蒙药。

**大火草**　大头翁(陕西)，白头翁(甘肃)

**Anemone tomentosa** (Maxim.) Péi——*A. vitifolia* Buch.-Ham. var. *tomentosa* (Maxim.) Finet et Gagnep.

生于海拔700—3 400米的山地草坡或路边。分布于河北、山西、陕西、甘肃、青海、河

南西部、湖北西部、四川。

根(大火草)：苦，温。有小毒。化痰，散瘀，消食。用于痢疾，疟疾，劳伤咳嗽，跌打损伤，小儿疳积，顽癣。

**条叶银莲花**　布尔青(藏语)

**Anemone trullifolia** Hook. f. et Thoms. var. **linearis** (Brühl) Hand.-Mazz.——*A. obtusiloba* D. Don subsp *trulifolia* (Hook.f. et Thoms ) Brühl var. *linearis* Brühl

生于海拔 3 500—5 000 米的高山草地或灌丛中。分布于甘肃西部、青海、四川西部、云南西北部、西藏东部和南部。

全草：用于背部及脊椎骨痛。

**野棉花**　清水胆(湖南)，满天星(云南)

**Anemone vitifolia** Buch.-Ham.

生于海拔 1 200—2 700 米的山地草坡、沟边或疏林中。分布于西南。

根(野棉花)：苦、辛。有毒。止咳止血，理气杀虫，祛风湿，接骨。用于跌打损伤，风湿骨节痛，痢疾，泄泻，蛔虫病，黄疸，咳嗽气喘，内、外伤出血。

## 耧斗菜属　Aquilegia L.

**暗紫耧斗菜**

**Aquilegia atrovinosa** M. Pop. ex Gamajun.

生于山地林下。分布于新疆。

全草：清热凉血，调经止血。

附　注：功效相同的有**西伯利亚耧斗菜 A. sibirica** Lam.，分布于新疆。

**无距耧斗菜**　野前胡(湖北、贵州)，官前胡(四川)

**Aquilegia ecalcarata** Maxim.

生于海拔 1 200—3 000 米的山坡林缘、冷杉林下湿地或河岸沙地。分布于陕西南部、甘肃、青海、河南西部、湖北西北部、四川，贵州北部、西藏东部。

根：甘，平。生肌拔毒，清热解毒。用于烂疮，黄水疮，久不收口，溃疡。

**细距耧斗菜**

**Aquilegia ecalcarata** Maxim f **semicalcarata** (Schipcz.) Hand.-Mazz.——*Semiaquilegia ecalcarata* (Maxim.) Schipcz. f. *semicalcarata* Schipcz.

生于高山林缘。分布于甘肃、四川。

全草：清热解毒，散瘀止血。

**秦岭耧斗菜**　铁扁担、灯笼草(陕西)

**Aquilegia incurvata** Hsiao

生于海拔 800—2 800 米的沟边草地或山坡草地。分布于陕西南部、甘肃南部、四川东北部。

根：辛、微苦，平。有小毒。祛瘀生新，镇痛祛风。用于瘀血，跌打损伤。

**白山耧斗菜**

**Aquilegia japonica** Nakai et Hara

生于高山带山坡草地。分布于吉林东部。

全草：止血。用于妇女病。

**尖萼耧斗菜**　　血见愁(东北)

**Aquilegia oxysepala** Trautv. et Mey.

生于山地杂木林缘及草地。分布于东北。

全草：调经，活血。　流浸膏：用于月经不调。

附　注：功效相同的有**黄花尖萼耧斗菜 A. oxysepala** Trautv et Mey. f. **pallidiflora** (Nakai) Kitag.，分布于吉林、辽宁。

**甘肃耧斗菜**　　石蛋七(湖北)，乌全胡(四川)

**Aquilegia oxysepala** Trautv. et Mey. var. **kansuensis** Brühl

生于海拔 1 300—2 700 米的山地草丛中或林下。分布于陕西南部、甘肃、宁夏南部、青海东部、湖北西部、四川、云南西北部。

根：活血。用于劳伤。　全草：用于感冒。

**小花耧斗菜**

**Aquilegia parviflora** Ledeb.

生于山坡草地。分布于黑龙江、内蒙古北部。

全草：苦、微甘，平。活血通经。用于月经不调，经期腹痛。

**耧斗菜**　　绿花耧斗菜(陕西、贵州)

**Aquilegia viridiflora** Pall.

生于山地路旁、河边及潮湿地。分布于东北、华北及陕西、甘肃、青海、山东。

全草：微苦、辛，凉。清热解毒，调经止血。用于月经不调，崩漏，咽喉痛，咳嗽，痢疾，腹痛。　种子及花：用于烧伤。

**华北耧斗菜**　　亮亮草(湖北)

**Aquilegia yabeana** Kitag.

生于海拔 800—2 200 米的山地灌丛下。分布于辽宁、河北、山西、陕西、山东、河南。

全草：用于月经不调，产后瘀血过多，痛经，瘰疬，疮疖，泄泻，蛇咬伤。

## 星果草属　Asteropyrum Drumm. et Hutch.

**裂叶星果草**　　鸭脚黄连(广西)，水八角(贵州)

**Asteropyrum cavaleriei** (Lévl. et Vant.) Drumm. et Hutch. ——*Isopyrum cavaleriei* Lévl. et Vant.

生于海拔 1 050—2 400 米的山地林下或沟边阴湿处。分布于湖北西南部、湖南西部、广西北部、四川、贵州、云南东南部。

根及根状茎：苦，寒。清热解毒，除湿利水。用于热病，腹痛，痢疾。

附　注：我国特有属。

**星果草**　　五角莲(湖北)

**Asteropyrum peltatum** (Franch.) Drumm. et Hutch. ——*Isopyrum peltatum*

Franch.

生于海拔1 200—3 000米的山地林下阴湿处。分布于湖北西部、四川。

**根状茎**：清热利胆，除湿，泻火解毒。

## 铁破锣属　Beesia Balf. f. et W. W. Smith

**单叶升麻**　土黄连(甘肃)，贝茜花(四川)，花椒七(贵州)，滇豆根(云南)

**Beesia calthaefolia** (Maxim.) Ulbr.——*Cimicifuga calthaefolia* Maxim.

生于山地林下阴处。分布于陕西、甘肃、河南、湖北、湖南西部、广西北部、四川、贵州、云南西北部。

根状茎、全草：辛、苦，温。驱风散塞，除湿止痛。用于风寒感冒，风湿关节痛，跌打损伤；外用于毒蛇咬伤。

## 鸡爪草属　Calathodes Hook. f. et Thoms.

**鸡爪草**　虎脚板(湖北)

**Calathodes oxycarpa** Sprague

生于海拔2 400—3 200米的山地林下或草坡阴湿处。分布于湖北西部、四川、云南西部。

全草：甘、辛，温。散寒表汗。用于风湿麻木，鸡爪风，瘰疬，风寒感冒。

**多果鸡爪草**　铁血子(湖北)

**Calathodes polycarpa** Ohwi

生于海拔1 800—2 000米的山地林下或山谷沟边。分布于台湾、湖北西南部、贵州、云南东北部。

全草：接骨。用于风湿麻木，骨折。

## 美花草属　Callianthemum C. A. Mey.

**厚叶美花草**

**Callianthemum alatavicum** Freyn

生于海拔2 650—3 600米的山坡草地、溪水岸边。分布于新疆中部。

全草：清热解毒。

**太白美花草**

**Callithanthemum taipaicum** W. T. Wang

生于海拔3 450—3 600米的山坡、山梁草丛中。分布于陕西秦岭。

全草(重叶莲)：苦、微辛，凉。清热解毒，消炎。用于小儿肺炎。

**附　注**：秦岭特有药用植物。

## 驴蹄草属　Caltha L.

**驴蹄草**　　马蹄叶(四川中药志)

**Caltha palustris** L.

生于山谷溪旁、草甸或林下。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、青海、河南、湖北、四川、贵州、云南西北部。

全草：辛，微温。散风除寒。用于头目昏眩，周身痛；外用于烫伤，皮肤病。

**空茎驴蹄草**

**Caltha palustris** L. var. **barthei** Hance——*C. fistulosa* Schipcz.

生于荒山草地。分布于四川西部、云南西北部。

全草：祛风散寒。

**膜叶驴蹄草**

**Caltha palustris** L. var. **membranacea** Turcz.

生于山沟水边、杂木林、草丛等潮湿处。分布于东北。

全草、根：用于发痧，扭伤，跌伤。

附　注：功效相似的有**白花驴蹄草 C. nathans** Pall.，分布于黑龙江、内蒙古东北部。

**三角叶驴蹄草**

**Caltha palustris** L. var. **sibirica** Regel

生于湿草甸、河岸、山谷溪流边及浅水中。分布于东北、华北、西北。

全草：清热消炎，止咳。用于热病，瘰疬，痛经；外用于烧伤，化脓性创伤，皮肤病。

**花葶驴蹄草**　　陆畜(藏语)

**Caltha scaposa** Hook. f. et Thoms.

生于海拔 2 800—4 100 米的湿草甸或山谷沟边。分布于甘肃、青海、四川西部、云南西北部、西藏。

全草：辛、微温。有小毒。祛风散寒。用于筋骨痛，刀伤，头晕目眩。

## 升麻属　Cimicifuga L.

**金龟草**　　小升麻(河北)，独叶八角草(安徽)，金丝三七(浙江)

**Cimicifuga acerina** (Sieb. et Zucc.) Tanaka——*Pityrispermum acerinum* Sieb. et Zucc.

生于海拔 1 150—2 600 米的山坡林下。分布于河北西南部、山西南部、陕西南部、甘肃南部、安徽、浙江、江西、河南、湖北、湖南、广东北部、四川、贵州。

根状茎(金龟草)：辛、微苦，温。有小毒。升阳发汗，理气，散瘀活血。用于跌打损伤，风湿痛，咽喉痛，无名肿毒，疖毒，降血压。

附　注：①四川作升麻用，称"南川升麻"。②功效相同的有**紫花金龟草 C. acerina** (Sieb. et Zucc.) Tanaka f. **purpurea** Hsiao，分布于陕西。

**兴安升麻**　　升麻、窟窿牙(东北)

**Cimicifuga dahurica** (Turcz.) Maxim. ——*Actinospora dahurica* Turcz.

生于海拔300—1 200米的山地林中或林缘。分布于东北、华北。主产东北。

根状茎(升麻)：辛、微甘，凉。发表透疹，清热解毒，升举阳气。用于风热头痛，齿痛，口疮，咽喉痛，麻疹不透，阳毒发斑，脱肛，阴挺。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**升麻**　　西升麻(通称)，黑升麻(陕西)，绿升麻(湖北、云南)

**Cimicifuga foetida** L.

生于海拔1 200—3 000米的山地林缘或草坡。分布于陕西、甘肃、宁夏、青海、河南、湖北、四川、贵州、云南。主产陕西。

根状茎(升麻)：功效同兴安升麻。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**大三叶升麻**　　苦龙菜(吉林、辽宁)，地龙芽(盛京通志)

**Cimicifuga heracleifolia** Kom.

生于林下、山坡草丛。分布于东北。

根状茎(升麻)：功效同兴安升麻。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**南川升麻**

**Cimicifuga nanchuanensis** Hsiao

生于海拔1 130米左右的山地草坡。分布于四川南部。

根状茎(绿豆升麻)：清热解毒，发表透疹。

附　注：四川特有药用植物。

**单穗升麻**　　野升麻(浙江天目山药用植物志)

**Cimicifuga simplex** Wormsk.

生于海拔1 100米以下的山坡草地或灌丛中。分布于东北及河北、内蒙古、陕西、甘肃、宁夏、湖北、四川。

根状茎(单穗升麻)：甘、辛、微苦，凉。散风解毒，升阳发表。用于伤风咳嗽。

## 星叶草属　Circaester Maxim.

**星叶草**

**Circaester agrestis** Maxim.

生于海拔2 300—3 000米的山坡林下或崖下湿地。分布于陕西南部、甘肃南部、青海、新疆、四川、云南、西藏。

全草：辛，温。止痛，利痰。

附　注：国家二级保护植物。

## 铁线莲属　Clematis L.

**芹叶铁线莲**　　透骨草(河北)，驴断肠(北京)，叶芝尕保(藏语)

**Clematis aethusaefolia** Turcz.

生于海拔600—3 000米的山坡及水沟边。分布于华北及陕西、甘肃、宁夏、青海。

全草(铁线透骨草)：辛，温。祛风利湿，解毒止痛。用于筋骨拘挛，风湿痛，脚肿，无名肿毒。

附　注：功效相同的有**宽芹叶铁线莲 C. aethusifolia** Turcz. var. **latisecta** Maxim.，分布于华北及黑龙江。

**甘川铁线莲**

**Clematis akebioides** (Maxim.) Hort. ex Veitch——*C. orientalis* L. var. *akebioides* Maxim.

生于海拔1 930—3 600米的高原草地、灌丛中或河边。分布于甘肃南部、青海东部、四川西部、西藏东部。

藤茎：清热，消炎，通经。　全草：用于消化不良。

**女萎**　　百根草(福建)，方藤(安徽)，银匙藤(浙江)

**Clematis apiifolia** DC.

生于海拔150—1 000米的山坡林缘。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建。

茎、叶：辛，温。消食，利尿，通经，活络。用于霍乱下痢，筋骨痛。　鲜根：外敷患处可治风火牙痛。

**钝齿铁线莲**　　山木通(江西、湖北、广西)，大木通(云南)

**Clematis apiifolia** DC. var. **obtusidentata** Rehd. et Wils.——*C. obtusidentata* (Rehd.et Wils.) Hj. Eicher

生于海拔400—2 300米的山坡林中或沟边。分布于陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、广东北部、广西北部、四川、贵州、云南。

茎：淡、苦，凉。清热利水，活血通乳。用于湿热癃闭，水肿，淋证，妇女血气不和，少乳，经闭。

**粗齿铁线莲**　　山木通(宁夏)，线木通(浙江)

**Clematis argentilucida** (Lévl. et Vant.) W. T. Wang——*C. vitalba* L. var. *argentilucida* Lévl. et Vant.; *C. grata* Wall. var. *grandidentata* Rehd. et Wils

生于海拔450—3 200米的山坡或山沟灌丛中。分布于河北西南部、山西、陕西、甘肃、宁夏、安徽、浙江、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

根：行气活血，祛风湿，止痛。用于风湿骨痛，跌打损伤。　茎：通关理气，利水通经。用于瘀血疼痛。　叶：用于梅毒，虫疮久烂。

**小木通**

**Clematis armandii** Franch.——*C. armandii* Franch. var. *biondiana* (Pavol.) Rehd.

生于海拔100—2 400米的山坡、山谷、路边、灌丛中、林缘或水沟旁。分布于西南及陕西、甘肃、江西、浙江、福建、湖北、湖南、广东、广西。主产四川。

茎(川木通)：淡、苦，寒。清热利尿，通经下乳。用于水肿，淋证，小便淋痛，关节痹痛，闭经乳少。　叶：消肿毒，止痹痛。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**短尾铁线莲**　　石通(陕西),铜脚灵仙(湖北),小木通(四川)

**Clematis brevicaudata** DC.

生于海拔460—3 200米的山地灌丛或疏林中。分布于东北、华北、西南及陕西、甘肃、宁夏、青海、河南西部、四川西部。

茎:苦,凉。除湿热,通血脉,利小便。用于五淋,淋证,腹中胀满。

**毛木通**

**Clematis buchananiana** DC.

生于海拔2 900—3 800米的山地沟边、林下或灌丛中。分布于四川西南部、云南、西藏南部。

全株:消炎,利尿,止痛。

**威灵仙**　　白线草(安徽),铁丝威灵仙(湖南),青龙须(广西)

**Clematis chinensis** Osbeck

生于海拔80—1 500米的山坡、山谷灌丛或沟边、路旁草丛中。分布于中南及陕西、江苏、安徽、浙江、江西、湖南、福建、广西、广东、台湾、四川、贵州、云南。主产江苏、安徽、浙江。

根及根状茎(威灵仙):辛、咸,温。祛风除湿,通络止痛。用于风湿痹痛,筋脉拘挛,屈伸不利,骨哽咽喉。

附　注:《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**毛叶威灵仙**　　铁扫帚(湖北)

**Clematis chinensis** Osbeck f. **vestita** Rehd.

生于海拔900米以下的山坡、路旁草丛中。分布于陕西、江苏、安徽、浙江、湖北。

根及根状茎:祛风湿,通经络,消痰涎,散癖积。

**两广铁线莲**　　康壳藤(广西)

**Clematis chingii** W. T. Wang

生于海拔700—1 700米的山坡灌丛中。分布于广东、广西、贵州西南部、云南南部。

根、花:用于风湿骨痛,咳嗽。

**金毛铁线莲**　　野木通(贵州)

**Clematis chrysocoma** Franch.

生于海拔1 000—3 200米的山坡、山谷灌丛中、林下、林缘或沟谷。分布于四川南部和西部、贵州西部、云南中部及北部。

根或茎(风藤草):甘、淡,平。利水消肿,通经活血。用于肾炎水肿,小便淋痛,跌打损伤,骨痛,经闭。

**平坝铁线莲**

**Clematis clarkeana** Lèvl. et Vant.

生于海拔2 400—2 900米的山坡林缘。分布于贵州中部。

根:苦,平。清热利尿,解毒。用于咽喉痛,脚气,水肿。

**合柄铁线莲**

**Clematis connata** DC.

生于海拔2 000—3 400米的江边、山沟边、云杉林下及杂木林中,攀于树冠上。分布

于西南。

根：用于哮喘。

**大花铁线莲**　小脚威灵仙(湖北)

**Clematis courtoisii** Hand.-Mazz.

生于海拔2 000—5 000米的山坡、溪边及路旁杂木林中、灌丛中，攀援于树上。分布于江苏南部、安徽南部、浙江北部、河南南部、湖北南部和东部。

根：解毒，利尿，祛瘀。　全草：用于毒蛇咬伤。

**厚叶铁线莲**

**Clematis crassifolia** Benth.

生于海拔300—1 100米的山地、山谷、平地、溪边、路旁密林或疏林中。分布于福建、台湾、湖南南部、广东、广西。

根及根状茎：用于风湿骨痛，小儿惊风，咽喉肿痛。

**粗柄铁线莲**

**Clematis crassipes** Chun et How

生于海拔700米左右的干燥山坡，攀于灌丛中。分布于广东、海南、广西南部。

全草：用于风湿骨痛，腰膝冷痛。

附　注：功效相同的有**毛序粗柄铁线莲 C. crassipes** Chun et How var. **pubipes** W. T. Wang，分布于广西。

**滑叶藤**　小叶五香血藤(云南)

**Clematis fasciculiflora** Franch.

生于海拔1 000—2 700米的山坡灌丛、草丛中或林缘。分布于广西西部、四川西部、云南。

根、皮、叶：辛，温。行气消炎，祛瘀生新，祛风除湿。用于气滞腹胀，风湿筋骨痛，跌打损伤；外用于骨折、疮疖，乳痈红肿，刀伤出血。

**丝铁线莲**　棉藤、喉痧根(广西)

**Clematis filamentosa** Dunn

生于海拔500—1 600米的溪边、山谷密林、灌丛中、近水旁或较潮湿地。分布于广东、海南、广西、云南东部。

全草：甘、微凉。镇静，镇痛，降压。用于头痛，目赤肿痛，高血压症，四肢麻木，失眠。

**山木通**　过山照(浙江)，冲倒山(江西)，蓑衣藤(湖南)，硬骨灵仙(广西)

**Clematis finetiana** Lèvl. et Vant.

生于海拔100—1 200米的山坡疏林、溪边、路旁灌丛或山谷石缝中。分布于中南及江苏、安徽、浙江、江西、福建、四川、贵州、云南。

根(山木通)：祛风利湿，活血解毒。用于风湿关节痛，吐泻，疟疾，乳痈，牙痛。　茎：通窍，利水。　叶：用于关节痛。　花：用于乳蛾，咽喉痛。

**铁线莲**　铜威灵仙(浙江)，龙须草(广西)

**Clematis florida** Thunb.

生于低山区丘陵灌丛中、山谷、路旁及小溪边。分布于江西、湖南、广东、广西。

根或全草：辛，温。利尿通经，活血止痛。用于小便淋痛，腹胀，癃闭；外用于关节肿痛，虫蚊咬伤。

**褐毛铁线莲**

**Clematis fusca** Turcz.

生于海拔500—1 000米的山坡、林缘、林中或草坡上。分布于东北及河北北部、山东东部。

全草：活血祛瘀，消肿止痛。

附　注：功效相同的有**紫花铁线莲 C. fusca** Turcz. var. **violacea** Maxim.，分布于东北。

**扬子铁线莲**　　小肥猪藤(湖北)

**Clematis ganpiniana** (Lévl. et Vant.) Tamura——*C. vitalba* L. var. *ganpiniana* Lévl. et Vant.; *C. brevicaudata* DC. var. *lissocarpa* Rehd. et Wils.

生于海拔400—3 300米的山坡、溪沟边灌丛中或杂木林中。分布于陕西南部、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、广东北部、广西北部、四川、贵州、云南。

茎：用于四肢麻木，风湿关节痛，小便淋痛。

**毛叶扬子铁线莲**

**Clematis ganpiniana** (Lévl. et Vant.) Tamura var. **subsericea** (Rehd. et Wils.) C. T. Ting——*C. brevicaudata* DC. var. *subsericea* Rehd. et Wils.

生于海拔1 200—1 300米的山地阳坡。分布于四川、贵州、云南西北部。

茎叶：除湿热，利尿。

**毛果扬子铁线莲**

**Clematis ganpiniana** (Lévl. et Vant.) Tamura var. **tenuisepala** (Maxim.) C. T. Ting——*C. brevicaudata* DC. var. *tenuisepala* Maxim.

生于海拔250—900米的山坡、林下、沟边或路旁灌丛中。分布于山西、陕西、甘肃、山东、江苏、浙江、河南、湖北、广西。

根、茎：用于小便淋痛，胃痛，水肿。

**粉绿铁线莲**　　狗肠草(宁夏)，苘苘草(中国沙漠地区药用植物)

**Clematis glauca** Willd.

生于海拔1 000—2 600米的山坡、路旁灌丛中。分布于西北及内蒙古、山西。

全草：辛，温。祛风湿，止痒。用于关节痛；外用疮疖，瘙痒症。

**小蓑衣藤**　　大车藤(贵州)，小花木通(云南种子植物名录)

**Clematis gouriana** Roxb. ex DC.

生于海拔50—1 800米的山坡、山谷灌丛中或沟边、路旁。分布于湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

藤茎：行气活血，祛风湿，止痛。用于跌打损伤，瘀滞疼痛，风湿筋骨痛，利水。

**金佛铁线莲**

**Clematis gratopsis** W. T. Wang

生于海拔150—1 700米的山坡、山谷或沟边、路旁草丛中。分布于陕西南部、甘肃东南部、湖北西部、四川。

根：行气活血，祛风湿，止痛。

**毛萼铁线莲**

**Clematis hancockiana** Maxim.

生于海拔100—300米的低山坡或灌丛中。分布于江苏西南部、安徽、浙江东北部、河南南部。

根状茎：解毒，利尿。

**单叶铁线莲**　雪里开(浙江、江西)，野灵仙(广西)

**Clematis henryi** Oliv.

生于海拔200—2 400米的溪边、山谷、阴坡湿地，林下及灌丛中，缠绕于树上。分布于中南及江苏、安徽、浙江、台湾、四川、贵州、云南。

根、叶：辛、苦，平。行气活血，抗菌消炎。用于胃痛，腹痛，跌打损伤，驱蛔，小儿高烧；外用于疖腮。

**大叶铁线莲**　草本女萎(山东、浙江)、草牡丹(江苏、浙江)，大样十月泡(湖南)

**Clematis heracleifolia** DC.

生于海拔300—2 000米的山坡沟谷、林缘及路旁灌丛中。分布于吉林、辽宁、河北、陕西、山东、江苏、安徽、浙江、河南、湖北、湖南西北部。

全株(牡丹藤)：辛，平。祛风除湿，解毒消肿。用于风湿关节痛，结核性溃疡；外用于疮疖肿毒，痔瘘。

**棉团铁线莲**　山辣椒秧、威灵仙(东北)，山棉花(内蒙古)

**Clematis hexapetala** Pall.

生于干山坡或山坡草地及固定沙丘。分布于东北、华北及陕西、甘肃东部、宁夏、山东。

根及根状茎(威灵仙)：功效同威灵仙。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**长冬草**　小叶光萼铁线莲(江苏)

**Clematis hexapetala** Pall. var. **tchefouensis** (Debeaux) S. Y. Hu——*C. angustifolia* Jacq. var. *tchefouensis* Debeaux

生于山坡草地。分布于江苏北部、山东。

根：辛、微苦，温。除湿，通络止痛。用于关节不利，筋骨疼痛，鱼骨哽喉。

**吴兴铁线莲**　金剪刀(浙江)

**Clematis huchouensis** Tamura

生于湖边、路旁、草坡及田埂上。分布于江苏东南部、浙江东北部、江西北部、湖南北部。

根及全草：辛、咸、微苦，温。抗癌，祛风湿，解毒消肿。用于风湿关节痛，深部脓肿，脑瘤。

**黄花铁线莲**　叶芝赛保(藏语)

**Clematis intricata** Bunge

生于海拔2 600米以下的山坡、路旁或灌丛中。分布于华北及吉林、辽宁、陕西、甘肃、宁夏、青海。

全草及叶：辛，温。祛风除湿，解毒止痛。用于风湿关节痛，痒疹，疥癣。

附　注：河北、北京、天津作透骨草入药，称“铁线透骨草”。

**细木通**　　小木通（云南）

**Clematis kerriana** Drumm. et Craib

生于山坡草地。分布于云南西部和南部。

根：利尿，通经，祛风寒。用于疟疾，麻风病。

**太行铁线莲**

**Clematis kirilowii** Maxim.

生于海拔200—1 750米的山坡草地、丛林中或路旁。分布于河北、北京，山西、山东、江苏、安徽、河南。

根、叶：祛风湿，利尿，消肿解毒。

附　注：功效相同的有**狭裂太行铁线莲 C. kirilowii** Maxim. var. **chanetii** (Lévl.) Hand.-Mazz.，分布于河北、山西、山东、河南。

**巴山铁线莲**　　老虎须（湖北）

**Clematis kirilowii** Maxim. var. **pashanensis** M. C. Chang

生于海拔200—1 400米的山坡，路旁灌丛中或河沟边。分布于陕西南部、湖北西部、四川东部。

根及根状茎：用于四肢麻木，跌打损伤，鱼骨哽喉。

**朝鲜铁线莲**

**Clematis koreana** Kom.

生于海拔1 000—1 900米的红松林及针阔叶混交林内或灌丛中。分布于吉林东部、辽宁东部。

根：祛风湿，通经络。

**披针叶铁线莲**

**Clematis lancifolia** Bur. et Franch.

生于海拔1 500—1 900米的山坡林下或草丛中。分布于四川西部和西南部、云南北部。

根：清热解毒，杀菌。

**毛蕊铁线莲**　　木通（广西），川木通（四川）

**Clematis lasiandra** Maxim.

生于海拔500—2 800米的沟边、山坡荒地及灌丛中。分布于陕西、甘肃、安徽、浙江、江西、湖南、广东。

全草：淡，平。舒筋活血，祛湿止痛，解毒。用于筋骨疼痛，四肢麻木，腹胀，无名肿毒。

**锈毛铁线莲**　　金盏藤（广西）

**Clematis leschenaultiana** DC.

生于海拔500—1 200米的山坡灌丛中。分布于福建、台湾、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全株：用于风湿骨痛，毒蛇咬伤，目赤肿痛，小便淋痛。　叶：用于疮毒，角膜炎。

附　注：① 四川部分地区作木通用。② 功效相同的有**细齿金盏藤 C. leschenaultiana** DC. var. **denticulata** Merr.，分布于广西。

**菱叶铁线莲**

**Clematis loureiriana** DC. ——*C. loureriana* DC. var. *subpeltata* (Wall.) Hand-Mazz.

生于海拔500—2 300米的山坡、林中或沟边。分布于广东、广西、贵州南部、云南南部。

全草(金丝木通)：苦、辛，微温。舒筋活络，消炎利尿。用于风湿骨痛，水肿。

附　注：广东作木通代用品，称"紫木通"。

**盾叶铁线莲**

**Clematis loureiriana** DC. var. **peltata** W. T. Wang

生于海拔900—1 600米的山谷、江边或混交林中。分布于云南南部。

全株：用于风湿骨痛，淋证。

**长瓣铁线莲**　　大瓣铁线莲(宁夏)，叶芝邪保(藏语)

**Clematis macropetala** Ledeb.

生于海拔2 000—2 600米的荒山坡、草坡岩石缝中及林下。分布于河北、山西、陕西、甘肃、宁夏、青海。

茎：利尿通淋。全草：消食健胃，散结。

附　注：功效相同的有**白花长瓣铁线莲 C. macropetala** Ledeb. var. **albiflora** (Maxim.) Hand.-Mazz.，分布于山西、宁夏。

**毛柱铁线莲**　　过山龙(湖南)

**Clematis meyeniana** Walp.

生于海拔250—1 850米的山坡疏林、路旁灌丛中或山谷、溪边。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖南南部、广东、广西、四川、贵州、云南。

根：祛风除湿，通经止痛。藤叶：活络止痛，破血通经。用于风寒感冒，胃痛，风湿麻木，经闭。

附　注：福建、湖南、广西作威灵仙用。

**沙叶铁线莲**

**Clematis meyeniana** Walp. var. **granulata** Finet et Gagnep.

生于海拔60—1 300米丘陵、山地、山谷、路旁、沟边林缘或灌丛中。分布于广东、海南、广西、云南河口。

全株(软骨过山龙)：苦、辛，寒。清热利尿，通经活络。用于风湿骨痛，咽喉痛，水肿，骨哽喉。

**绣球藤**　　淮木通(秦岭)，花叶木通(湖北)，亦蒙哦薄(藏语)

**Clematis montana** Buch.-Ham. ex DC.

生于海拔1 200—4 000米的山坡、山谷灌丛中、林缘或沟边。分布于西南及陕西南部、甘肃南部、宁夏、青海、安徽、江西、福建、台湾、河南西南部、湖北、湖南、广西北部。主产四川、贵州。

藤茎(川木通)：功效同小木通。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②功效相同的有**大花绣球藤** C. **montana** Buch. -Ham. ex DC. var. **grandiflora** Hook.，分布于西南及陕西、甘肃、河南、湖北、湖南。

**晚花绣球藤**

**Clematis montana** Buch. -Ham. ex DC. var. **wilsonii** Sprague

生于海拔 2 400—3 600 米的山坡灌丛中或林缘。分布于四川西部、云南。

藤茎：清热利尿，消炎。

**秦岭铁线莲**

**Clematis obscura** Maxim.

生于海拔 400—2 600 米的山地丘陵灌丛中或山坡、山谷阴湿处。分布于山西南部、陕西、甘肃南部、河南西部、湖北、四川。

全株：祛风湿，活血通经。用于痛风。

**东方铁线莲**

**Clematis orientalis** L.

生于海拔 1 000—2 000 米的沟边、路旁或湿地。分布于新疆中部和西北部。

茎(新疆木通)：清热利水，通经活络。

附　注：新疆地方标准收载。

**宽柄铁线莲**　　小威灵仙(湖北)

**Clematis otophora** Franch. ex Finet et Gagnep.

生于海拔 1 200—2 000 米的山沟林缘或灌丛中。分布于湖北西部、四川东部。

藤茎：通经利尿，镇痛。

**裂叶威灵仙**

**Clematis parviloba** Gardn. et Champ

生于海拔 500—3 200 米的山坡、山谷灌丛中、林缘、路旁或沟边。分布于浙江、江西、台湾、广东、广西、四川、贵州、云南。

根：用于风湿骨痛。

**转子莲**

**Clematis patens** Morr. et Decne.

生于海拔 200—1 000 米的山坡杂草丛中或灌丛中。分布于辽宁东部、山东东部。

根：祛瘀，利尿，解毒。

**钝萼铁线莲**　　白血藤(湖南)

**Clematis peterae** Hand. -Mazz. ——*C. gouriana* Roxb. var. *finetii* Rehd et Wils.

生于海拔 340—3 400 米的山坡、沟边杂木林中。分布于河北西南部、山西、陕西、甘肃、河南、湖北、四川、贵州、云南。

藤茎：苦，寒。清热利湿，活血止痛，健胃消食，清肝明目。

**毛果铁线莲**

**Clematis peterae** Hand. -Mazz. var. **trichocarpa** W. T. Wang

生于海拔 600—2 400 米的山坡、山谷，溪边灌丛中或山脚路旁。分布于陕西、甘肃、

江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北、湖南、四川。

藤茎：祛风利湿，活血解毒。

**须蕊铁线莲**

**Clematis pogonandra** Maxim.

生于海拔 2 200—3 400 米的山坡林缘或灌丛中。分布于陕西西部、甘肃南部、湖北西部、四川。

藤茎：清热，消炎，通经。用于风湿关节痛，跌打损伤。

**美花铁线莲**

**Clematis potaninii** Maxim.

生于海拔 1 400—3 000 米的山坡，山谷林下或林缘。分布于陕西南部、甘肃南部、四川、云南、西藏东部。

藤茎：祛风湿，清肺热，止痢，消食。

**华中铁线莲**

**Clematis pseudootophora** M. Y. Fang

生于海拔 1 280—1 800 米的阳坡沟边、林下或灌丛中。分布于浙江北部、江西西部、湖北西南部、湖南中部、贵州北部。

藤茎：用于风湿关节痛，跌打损伤。

**西南铁线莲**

**Clematis pseudopogonandra** Finet et Gagnep.

生于海拔 2 700—4 300 米的溪边、山沟、疏林中或灌丛中。分布于四川西部、云南西北部、西藏东南部。

藤茎(西藏花木通)：苦，寒。清热利尿。用于水肿，小便涩痛，淋证，口舌生疮，久痢脱肛，乳汁不足。

**五叶铁线莲**　　柳叶见血飞(贵州)

**Clematis quinquefoliolata** Hutch.

生于海拔 1 000—1 800 米的山坡、路边灌丛中或水沟边。分布于湖北西部、湖南、四川、贵州、云南嵩明。

藤茎：祛风利湿，活血解毒，温中理气，散瘀止痛。用于偏头痛，神经痛，面神经麻痹，鱼骨哽喉，跌打损伤。

**毛茛铁线莲**　　铁线牡丹(贵州)

**Clematis ranunculoides** Franch.

生于海拔 500—3 000 米的山坡、沟边、林下或灌丛中。分布于广西西北部、四川西南部、贵州西南部、云南西北部。

根、全草(绣球藤)：淡、微辛，平。清热解毒，祛瘀活络，利尿。用于疖痈，尿闭，乳痈，跌打损伤。

**思茅铁线莲**

**Clematis ranunculoides** Franch. var. **pterantha** (Dunn) M. Y. Fang

生于山地疏林中或林缘。分布于云南南部。

根：舒筋活络，利尿止痛，祛风湿。

**长花铁线莲**

**Clematis rehderiana** Craib

生于海拔 2 000—4 200 米的阳坡、沟边或林缘灌丛中。分布于四川西部、云南西北部、西藏东部。

茎：通经络，利水。用于跌打损伤。

**曲柄铁线莲**　　小叶木通(湖北)

**Clematis repens** Finet et Gagnep.

生于海拔 1 300—2 500 米的江边、路旁疏林中或潮湿林下。分布于广东北部、广西北部、四川中部、贵州东部。

全株：凉血、降火，解毒。用于风湿骨痛，痛风。

**莓叶铁线莲**　　红叶铁线莲(全国中草药汇编)

**Clematis rubifolia** Wright

生于海拔 800—2 000 米的山谷、坡地或林缘，攀于树上。分布于广西西部、云南东南部。

根或全草：苦、涩、凉。除湿利尿，清血解毒。用于风湿关节痛，跌打损伤，小便涩痛，淋证，便血，口腔溃疡，胎盘不下。

**西伯利亚铁线莲**　　青格力克(维吾尔语)

**Clematis sibirica** (L.) Mill. ——*Atragene sibirica* L.

生于海拔 1 200—2 000 米的林缘、路旁或云杉林下。分布于黑龙江、吉林、内蒙古、新疆北部。

茎、枝：清心火，泄湿热，通血脉。

**准噶尔铁线莲**

**Clematis songarica** Bunge

生于海拔 450—2 500 米的山麓前冲积扇、石砾冲积堆、河谷、湿草地或荒山坡。分布于新疆。

茎：清热利水，通经活络。

附　注：功效相同的有**蕨叶铁线莲 C. songarica** Bunge var. **asplenifolia** (Schrenk) Trauiv.，分布于新疆西部。

**甘青铁线莲**　　亦蒙(藏语)

**Clematis tangutica** (Maxim.) Korsh. ——*C. orientalis* L. var. *tangutica* Maxim.

生于海拔 1 370—4 900 米的高原草地或灌丛中。分布于陕西、甘肃、青海、新疆、四川西部、西藏。

藤茎：消炎，清热，通经。用于消化不良，痞块食积，腹泻。

**圆锥铁线莲**　　铜灵仙(陕西)

**Clematis terniflora**DC. ——*C. paniculata* Thunb.; *C. maximowicziana* Franch. et Sav.

生于海拔 400 米以下的山地、丘陵林缘或路旁草丛中。分布于陕西东南部、江苏、安徽、浙江、江西、河南南部、湖北、湖南。

根：苦，平。有毒。凉血，降火，消肿，解毒，通经络，利关节。

**辣蓼铁线莲**　　辣铁线莲(通称)

**Clematis terniflora** DC. var. **mandshuica** (Rupr.) Ohwi ——*C. mandshurica* Rupr.

生于山坡灌丛中、杂木林中或林缘。分布于东北及内蒙古、山西。

根及根状茎(威灵仙：功效同威灵仙。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**杯柄铁线莲**　　大木通(四川)

**Clematis trullifera** (Franch.) Finet et Gagnep. ——*C. buchananiana* DC. var. *trullifera* Franch.

生于海拔 2 000—2 800 米的沟边、路旁灌丛中或铁杉林下。分布于四川西南部、贵州西部、云南北部。

藤茎：消炎，清热，通经。

**柱果铁线莲**　　岩木通(陕西)，白灵仙(湖北)

**Clematis uncinata** Champ.

生于海拔 200—2 000 米的山地、山谷、溪边灌丛中、林缘。分布于陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根、叶：辛，温。利尿，祛瘀，驱风除湿，舒筋活络，镇痛。

**皱叶铁线莲**

**Clematis uncinata** Champ. var. **coriacea** Pamp.

生于海拔 550—2 000 米的山坡、山谷林下、河边、沟旁灌丛中或草丛中。分布于陕西、甘肃、湖北、湖南、四川。

藤茎：消炎，清热，通经。用于跌打损伤；外用于乳蛾，肝炎，牙痛。

**尾叶铁线莲**

**Clematis urophylla** Franch.

生于海拔 400—2 000 米的林缘、路旁或灌丛中。分布于湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

藤茎：祛风利湿，活血解毒。

**小齿铁线莲**

**Clematis urophylla** Franch. var. **obtusiuscula** Schneid.

生于海拔2000米左右的山坡林下及灌丛中。分布于四川西南部。

藤茎：消炎，清热，通经。

**云南铁线莲**

**Clematis yunnanensis** Franch.

生于海拔 2 000—3 000 米的山谷、江边及山坡林缘灌丛中，攀于树上。分布于四川西部、云南西北部。

茎：清热利湿，利尿通淋。用于小便短赤。

## 飞燕草属　Consolida (DC.) Opiz

**飞燕草**

**Consolida ajacis** (L.) Schur. ——*Delphinium ajacis* L.

原产欧洲南部和亚洲西南部。全国许多地区有栽培。

根：用于腹痛。　种子：用于喘息，水肿；外用于跌打损伤，疥癣。

## 黄连属　Coptis Salisb.

**黄连**　　鸡爪莲(四川)

**Coptis chinensis** Franch.

生于海拔 500—2 000 米的山地林中阴湿处。现多栽培。分布于陕西南部、湖北、湖南、四川、贵州。主产四川、湖北。

根状茎(黄连)：苦，寒。清热燥湿，泻火解毒。用于湿热痞满，呕吐，泻痢，黄疸，高热神昏，心火亢盛，心烦不寐，血热吐衄。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②商品习称　“味连”。③国家三级保护植物。

**短萼黄连**　　土黄连(安徽、浙江、福建、广东、广西)

**Coptis chinensis** Franch. var. **brevisepala** W. T. Wang et Hsiao

生于海拔 700—1 200 米的溪谷林下或坡地林下阴湿处。分布于安徽、浙江、江西、福建、广东、广西。

根状茎：苦，寒。清热燥湿，泻火解毒。

附　注：国家三级保护植物。

**三角叶黄连**　　峨眉连(四川)

**Coptis deltoidea** C. Y. Cheng et Hsiao

中国南部许多地区有栽培，野生种仅见于四川。主产四川洪雅、峨眉。

根状茎(黄连)：功效同黄连。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②商品习称“雅连”。

**峨眉野连**　　凤尾连(四川)

**Coptis omeiensis** (Chen) C. Y. Cheng ——*C. chinensis* Franch. var. *omeiensis* Chen

生于阴湿丛林中及岩壁上。分布于四川西部。

根状茎：功效见黄连。

附　注：①国家二级保护植物。②四川特有药用植物。

**五裂黄连**

**Coptis quinquesecta** W. T. Wang

生于阴湿林中。分布于云南东南部。

根状茎：功效同黄连。

附　注：云南特有药用植物。

**云南黄连**

**Coptis teeta** Wall. ——*C. teetoides* C. Y. Cheng

生于高山寒湿林阴下。分布于贵州、云南西北部、西藏东南部。主产云南。

根状茎(黄连)：功效同黄连。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②商品习称"云连"。③国家二级保护植物。

## 翠雀属　Delphinium L.

**白蓝翠雀花**　　下冈哇(藏语)

**Delphinium albocoeroleum** Maxim.

生于海拔 3 600—3 900 米的山坡草地或圆柏林下。分布于甘肃西部、青海东部、四川西北部、西藏东北部。

全草：用于泄泻。

**贺兰山翠雀花**

**Delphinium albocoeruleum** Maxim. var. **przewalskii** (Huth) W. T. Wang ——*D. przewalskii* Huth

生于林下、山坡、草甸。分布于宁夏贺兰山。

全草：有毒。杀虫灭虱。

**还亮草**　　鱼灯苏(浙江、四川)，牛疔草(广西)，峨山草乌(贵州)

**Delphinium anthriscifolium** Hance

生于海拔 100—1 100 米的阳处荒坡、山谷河沟、路旁。分布于中南及山西南部、江苏、安徽、浙江、江西、福建、四川、贵州、广东。

全草(还亮草)：辛，温。有毒。祛风除湿，止痛活络。用于风湿痛，半身不遂，食积胀满，咳嗽；外用于痈疮癣疥。

**卵瓣还亮草**　　岩黄连(湖北)

**Delphinium anthriscifolium** Hance var. **calleryi** (Franch.) Finet et Gagnep. ——*D. calleryi* Franch.

生于海拔 30—1 300 米的丘陵、山地林缘、灌丛或草坡阴湿处。分布于陕西南部、江苏、浙江、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

全草：用于便秘，痈疮肿毒，跌打损伤。

**大花还亮草**

**Delphinium anthriscifolium** Hance var. **majus** Pamp.

生于海拔 100—1 100 米的阳处荒坡、山谷河沟或石缝中。分布于湖北、湖南北部、四川、贵州。

全草：用于痢疾，泄泻；外用止血。

**三出翠雀花**

**Delphinium biternatum** Huth

生于山谷、草地。分布于新疆。

全草：祛风湿，止痛，镇惊。

**川黔翠雀花**　　铁脚草乌(四川)

**Delphinium bonvalotii** Franch.

生于海拔 2 100—2 600 米的阴湿山地林下。分布于四川西部、贵州。

根：辛，温。有毒。祛风除湿，止痛活络。用于半身不遂，风湿筋骨痛；外用于痈疮，癣癞。

**毛梗川黔翠雀花**　　水乌头(贵州)

**Delphinium bonvalotii** Franch. var. **eriostylum** (Lévl.) W. T. Wang—— *D. eriostylum* Lévl.

生于海拔 400—1 200 米的溪边草地。分布于贵州。

根：消肿毒。用于无名肿毒。

**囊距翠雀花**　　雀沟勃(藏语)

**Delphinium brunonianum** Royle

生于海拔 4 500—6 000 米高原草地。分布于我国西藏中部和东部。

全草：苦、涩，寒。凉血解毒，祛风止痒。用于各种传染病；外用于疥癣，皮疹，皮肤瘙痒，蛇咬伤。

**蓝翠雀花**　　雀冈(藏语)

**Delphinium caeruleum** Jacq. ex Camb

生于海拔 2 100—4 000 米的山地草坡或多石砾处。分布于甘肃西南部、青海、四川西北部、西藏。

根：散寒，通经络。　花：利水，止泻。用于白痢；外用于化脓性疮疡。

**单花翠雀花**　　得木萨(藏语)

**Delphinium candelabrum** Ostenf. var. **monanthum** (Hand.-Mazz.) W. T. Wang ——*D. monanthum* Hand.-Mazz.

生于海拔 4 170—5 000 米的多石砾山坡。分布于甘肃西南部、青海东南部和东部、四川西北部、西藏东北部。

全草：苦，温。温中止泻。用于胃肠冷痛，泄泻。

**尾裂翠雀花**

**Delphinium caudatolobum** W. T. Wang

生于海拔 4 600 米高山草地。分布于四川甘孜。

全草：用于胃痛。

附　注：四川特有药用植物。

**角鳞翠雀花**　　贝角翠雀(贵州)

**Delphinium ceratophorum** Franch.

生于海拔 2 800—3 600 米的山坡岩石缝中。分布于云南西北部。

根：辛，热。有毒。镇痛。用于跌打损伤。

**烟台翠雀花**　　山鸦雀、苦连(山东)

**Delphinium chefoense** Franch.

生于林下杂草丛中。分布于山东东部。

根：清热解毒。全草：止痛，泻火，驱虫。

附　注：山东特有药用植物。

**谷地翠雀花**

**Delphinium davidii** Franch.

生于海拔 1 100—1 400 米的阴湿林下。分布于四川西部。

根：辛，温。有毒。祛风除湿，镇痛。用于中风半身不遂，风湿筋骨痛。

**滇川翠雀花**　　小草乌、细草乌(云南中草药)

**Delphinium delavayi** Franch.

生于海拔 2 650—3 650 米的山坡、荒地或疏林中。分布于四川西南部、云南西北部。

根：辛、苦，温。有毒。驱风除湿，散寒止痛，通络散瘀。用于风湿关节痛，胃痛，跌打损伤。

**须花翠雀花**　　白升麻(贵州)

**Delphinium delavayi** Franch. var. **pogonanthum** (Hand.-Mazz.) W. T. Wang—— *D pogonanthum* Hand.-Mazz

生于海拔 2 600 米左右的灌丛中。分布于四川西南部、贵州西部、云南北部。

根：清热解毒，升阳。用于风热头痛，水泻。

**密花翠雀花**　　文阿玛保(藏语)

**Delphinium densiflorum** Duthie ex Huth

生于高上草甸、高山碎石隙。分布于青海。

全草：甘，温。解毒。解乌头毒。

**绢毛高翠雀花**

**Delphinium elatum** L. var. **sericeum** W. T. Wang

生于高山及亚高山草甸。分布于新疆北部。

全草：祛风湿，止痛，镇惊。

**短距翠雀花**

**Delphinium forrestii** Diels

生于海拔 3 800—4 000 米的林缘或陡坡多石砾处。分布于四川西南部、云南西北部。

根：通经络，止痛。

**秦岭翠雀花**

**Delphinium giraldii** Diels

生于海拔 960—2 000 米的山地林缘。分布于山西南部、陕西、宁夏南部、甘肃东南部、河南西南部、湖北西北部。

根(云雾七)：辛，温。活血止痛。用于头痛，腰背痛，腹痛，劳伤。

**翠雀**　　鸡爪莲、土黄连(吉林)，鹦哥花(甘肃)，瓣根草(安徽)，玉珠色洼(藏语)

**Delphinium grandiflorum** L.

生于山坡草地。分布于东北、华北、西北及河南西北部、四川西部、云南西北部。

根：苦，寒。有毒。泻火止痛，杀虫。含漱用于风热牙痛。全草：外用于疥癣。种子：用于哮喘。

附　注：功效相似的有**腺毛翠雀花 D. grandiflorum** L. **var. glandulosum** W.

T. Wang，分布于河北西北部、山西南部、陕西、甘肃、宁夏、青海、安徽、河南；**光果翠雀花 D. grandiflorum** L. var. **leiocarpum** W. T. Wang，分布于陕西、甘肃、宁夏。

**拉萨翠雀花**

**Delphinium gyalanum** Marq. et Shaw

生于海拔3 000—4 500米的高山草地、灌丛边、田边或岩屑堆山坡。分布于我国西藏南部和东南部。

根：祛风除湿。

附　注：我国西藏特有药用植物。

**腺毛茎翠雀花**　　白花升麻(湖北)

**Delphinium hirticaule** Franch. var. **mollipes** W. T. Wang

生于山坡路旁草丛中。分布于湖北。

根：用于全身风湿麻木。

附　注：湖北特有药用植物。

**河南翠雀**

**Delphinium honanense** W. T. Wang

生于海拔1 000米左右的山坡草地。分布于陕西东南部和南部、河南西南部、湖北西部。

根：清热活血，止痛。用于头痛，腰背痛，腹痛，劳伤。

**展毛翠雀**　　稀吐(四川)，下冈哇(藏语)

**Delphinium kamaonense** Huth var. **glabrescens** (W. T. Wang) W. T. Wang—— *D. pseudograndiflorum* W. T. Wang var. *glabrescens* W. T. Wang

生于海拔4 000米以上的高山草甸、河边。分布于甘肃西南部、青海、四川西北部、西藏东部。

全草：苦，凉。消肠炎，止腹泻，退烧，祛风湿。　根：镇痛。用于风湿痛。

**宽苞翠雀花**

**Delphinium maackianum** Regel

生于林间、路旁、灌丛中。分布于东北。根：用于月经痛。

**囊谦翠雀花**　　萨贡巴(藏语)

**Delphinium nangchienense** W. T. Wang

生于海拔4 200米左右的林缘、高山草甸。分布于青海南部。

全草：清热镇痛。

**峨眉翠雀花**　　铁脚草乌、峨山草乌(四川)

**Delphinium omeiense** W. T. Wang

生于海拔3 000—3 300米的山地草坡或林下。分布于四川西部。

根(峨山草乌)：祛风除湿，镇痛。

附　注：四川特有药用植物。

**黑水翠雀花**

**Delphinium potaninii** Huth

生于灌丛中。分布于甘肃南部、四川西北部和北部。

全草：辛，温。有毒。镇痛，祛风除湿。

**宽萼翠雀花**

**Delphinium pseudopulcherrimum** W. T. Wang

生于海拔 4 600—5 100 米的山坡草地。分布于我国西藏拉萨。

根：止痛。用于跌打损伤，时行感冒。

**大通翠雀花**

**Delphinium pylzowii** Maxim.

生于河边、高山碎石旁及灌丛中。分布于甘肃西部、青海东部。

全草、花：散寒止痛，温脾胃。用于泄泻，肝病。

附　注：功效相似的有**三果大通翠雀花 D. pylzowii** Maxim. **var. trigynum W.** T. Wang，分布甘肃西南部、青海南部、四川西北部、西藏东部。

**细须翠雀花**

**Delphinium siwanense** Franch. var. **leptopogon** (Hand.-Mazz.) W T. Wang —— *D. leptopogon* Hand.-Mazz.

生于海拔 2 800—3 200 米的山坡草地或灌丛中。分布于内蒙古南部、山西、陕西、甘肃、宁夏南部。

全草：杀虫。

**川甘翠雀花**　　恰冈哇(藏语)

**Delphinium souliei** Franch.

生于高山草甸、高山碎石带。分布于甘肃西南部、青海、四川西北部。

地上部分：清热利湿，止泻止痢。

**唐古拉翠雀花**

**Delphinium tangkulaense** W. T. Wang

生于高山草丛。分布于青海西南部、西藏东北部。

根：用于小儿惊风，风湿关节痛。

**康定翠雀花**　　鸡爪乌(四川)

**Delphinium tatsienense** Franch.

生于海拔 2 300—3 200 米的山地草坡或向阳石缝中。分布于四川西部、云南北部。

根：辛、微苦，大热。有毒。温中止痛，祛风毒。用于小儿肚寒痛，劳伤痛。

**天山翠雀花**

**Delphinium tianshanicum** W. T. Wang

生于山地、灌丛、草甸。分布于新疆。

全草：祛风湿，止痛，镇惊。

**毛翠雀花**　　白狼毒(四川)

**Delphinium trichophorum** Franch.

生于海拔 2 000—2 500 米的高山灌丛、草甸。分布于甘肃西南部、青海东部、四川西部、西藏东部。

根：祛风湿。　叶：用于感冒。　全草：杀虫。

附　注：藏药。

**三小叶翠雀花**　　活血珠(湖北)

**Delphinium trifoliolatum** Finet et Gagnep.

生于海拔 1 580—1 600 米的山地林下或林缘草地。分布于湖北西部、四川东南部。

根：用于周身疼痛，跌打损伤。

**云南翠雀花**　　倒提壶(贵州)，鸡脚草乌(云南)

**Delphinium yunnanense** Franch.

生于海拔 1 600—2 400 米的山坡草地、灌丛中。分布于四川西南部、贵州西部、云南。

根：辛、苦，温。有毒。驱风除湿，散寒止痛，通络散瘀。用于风湿关节痛，胃寒痛，跌打损伤。

## 人字果属　Dichocarpum W. T. Wang et Hsiao

**小花人字果**

**Dichocarpum adiantifolium** (Hook. f. et Thoms.) W. T. Wang et Hsiao——*Dichocarpum franchetii* (Finet et Gagnep.) W. T. Wang et Hsiao; *Isopyrum franchetii* Finet et Gagnep.

生于海拔 1 300—3 200 米的山地林中或沟边阴湿处。分布于湖南、台湾、广西北部、四川、贵州、云南。

根：清热解毒。　全草：用于消化不良，目赤肿痛。

**耳状人字果**　　母猪草、山黄连(四川)

**Dichocarpum auriculatum** (Franch.) W. T. Wang et Hsiao —— *Isopyrum auriculatum* Franch.

生于海拔 750—1 600 米的山坡林下。分布于湖北、四川、贵州、云南东北部。

全草：止咳化痰，消炎。用于咳嗽痰喘，虚肿；外用于瘰疬。

**基叶人字果**　　地五加(四川)

**Dichocarpum basilare** W. T. Wang et Hsiao

生于山坡林下。分布于四川南部。

全草：用于风湿，水肿。

附　注：四川特有药用植物。

**蕨叶人字果**　　土黄连(浙江)，野黄连(广东)

**Dichocarpum dalzielii** (Drumm. et Hutch.) W. T. Wang et Hsiao——*Isopyrum dalzielii* Drumm et Hutch.

生于海拔 750—1 600 米的山地密林下、沟边较阴湿处。分布于浙江、江西、福建西部、广东、广西、四川、贵州。

根状茎(岩节连)：辛、微苦，寒。消肿解毒。用于劳伤腰痛；外用于红肿疮毒。

**纵肋人字果**　　野黄瓜(贵州)

**Dichocarpum fargesii** (Franch.) W. T. Wang et Hsiao——*Isopyrum fargesii* Franch.

生于海拔 1 300—1 600 米的山谷阴湿处。分布于陕西南部、甘肃东南部、河南西南部、湖北西部、四川东部、贵州北部。

全草：微甘，平。健脾益胃，清热明目。用于消化不良，目赤。

**人字果**

**Dichocarpum sutchuense** (Franch.) W T. Wang et Hsiao——*Isopyrum sutchuense* Franch.

生于海拔 1 800 米左右的背阴山坡、山谷竹林下草丛中。分布于浙江、湖北、四川、云南。

根状茎：清热解毒，消肿。

**三小叶人字果**　　羊不吃、三脚蝉(四川)

**Dichocarpum trifoliolatum** W. T. Wang et Hsiao

生于山地林下。分布于四川南部。

全草：驱风，益智补神。

附　注：四川特有药用植物。

## 水葫芦苗属　Halerpestes Greene

**水葫芦苗**　　九百棒(四川)，曲露帕拉(藏语)

**Halerpestes sarmentosa** (Adans.) Kom.——*Ranunculus sarmentosa* Adans.; *H. cymbalaria* auct. non (Pursh) Green

生于盐碱性沼泽地或湖边。分布于东北、华北、西北及山东、四川西北部、西藏。

全草：甘、淡，寒。利水消肿，祛风除湿。用于关节痛，水肿。

**长叶碱毛茛**

**Halerpestes ruthenica** (Jacq.) Ovcz.——*Ranunculus ruthenicus* Jacq.

生于盐碱沼泽地或草地。分布于东北、华北、西北。

全草、种子：辛，温。解毒，温中止痛。

**三裂碱毛茛**

**Halerpestes tricuspis** (Maxim ) Hand.-Mazz.——*Ranunculus tricuspis* Maxim.

生于海拔 3 000—5 000 米的盐碱性湿草地。分布于陕西、甘肃、青海、新疆、四川西北部、西藏。

全草：辛，温。解毒，利水祛湿。

## 铁筷子属　Helleborus L.

**铁筷子**　　小山桃儿七(陕西)

**Helleborus tibetanus** Franch.

生于海拔 1 100—3 700 米山地疏林中或灌丛中。分布于山西南部、陕西南部、甘肃南部、宁夏、湖北西北部、四川西北部。

根及根状茎：苦，寒。活血散瘀，消肿止痛，清热解毒。用于跌打损伤，疮疖肿毒，小

便涩痛，淋证。

## 獐耳细辛属　Hepatica Mill.

**川鄂獐耳细辛**　三角海棠(四川)，峨眉獐耳细辛(中国高等植物图鉴)

**Hepatica henryi** (Oliv.) Steward——*Anemone henryi* Oliv.; *H. yamatutai* Nakai

生于海拔 1 300—2 500 米的山地林下或阴湿草坡。分布于湖北西部、四川。

全草：清热止血。用于跌打损伤，劳伤，筋骨酸痛。

**獐耳细辛**　幼肺三七(浙江)

**Hepatica nobilis** Schreb. var. **asiatica** (Nakai) Hara——*H. asiatica* Nakai

生于山地杂木林内或草坡石下阴湿处。分布于吉林、辽宁东南部、安徽、浙江、河南、湖北。

根状茎：用于跌打损伤，筋骨酸痛。

## 扁果草属　Isopyrum L.

**东北扁果草**

**Isopyrum manshuricum** Kom.

生于海拔 800 米左右的山地针阔叶混交林下潮湿处。分布于黑龙江东部、吉林。

块根：散结消肿，解毒。

## 独叶草属　Kingdonia Balf. f. et W. W. Smith

**独叶草**

**Kingdonia uniflora** Balf. f. et W. W. Smith

生于海拔 2 750—3 900 米的山地冷杉林下或杜鹃灌丛下。分布于陕西太白山、甘肃南部、四川西部、云南西北部。

全草：活络，健胃，祛风。

附　注：①我国特有属。②国家二级保护植物。

## 蓝堇草属　Leptopyrum Reichb.

**蓝堇草**

**Leptopyrum fumarioides** (L.) Reichb.——*Isopyrum fumarioides* L.

生于田边干燥草地。分布于东北、华北及陕西、甘肃、新疆。

全草：用于心血管、胃肠道疾病及伤寒。

## 锡兰莲属　Naravelia DC.

**两广锡兰莲**

**Naravelia pilulifera** Hance

生于海拔300米左右的山坡、溪边疏林中，攀于树上。分布于广东、海南、广西南部。

全株：行气止痛。用于风湿骨痛，小便淋痛。

## 黑种草属　Nigella L.

**腺毛黑种草**　　斯亚旦(维吾尔语)，色拉那博(藏语)，景郎(傣语)

**Nigella glandulifera** Freyn et Sint.

新疆、云南、西藏等地有栽培。

种子(黑种草子)、幼苗：甘、辛，温。通经活血，通乳，利尿。用于耳鸣健忘，经闭乳少，热淋，石淋，白癜疯，疮疥。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②**黑香种草 N. sativa** L. 的种子，《中华人民共和国药典》1990年版附录收载。

**黑种草**

**Nigella damascena** L.

原产欧洲南部。新疆有栽培。

种子：散寒通经，活血健脑。

## 鸦跖花属　Oxygraphis Bunge

**鸦跖花**　　赛尔赛保(藏语)

**Oxygraphis glacialis** (Fisch.) Bunge——*Ficaria glacialis* Fisch.

生于海拔3 600—5 100米的高山草甸或高山灌丛中。分布于陕西南部、甘肃、青海、新疆、四川西部、云南西北部、西藏。

全草：辛，温。祛风散寒，开窍通络。

## 拟耧斗菜属　Paraquilegia Drumm. et Hutch.

**乳突拟耧斗菜**

**Paraquilegia anemonoides** (Engl. ex Willd.)Ulbr.——*Aquilegia anemonoides* Willd

生于海拔4 300—4 700米的山地石缝中。分布于甘肃西北部、宁夏、青海西北部、西藏。天山也有分布。

全草：祛风湿，止痛。

**拟耧斗菜**　　尤木丢尽(藏语)

**Paraquilegia microphylla** (Royle) J. R. Drumm. et Hutch.——*Isopyrum microphyllum* Royle

生于海拔 3 700—5 200 米的陡崖岩石上。分布于甘肃西南部、青海、新疆西部、四川西部、云南西北部、西藏。

地上部分：苦、涩，寒。活血散瘀，止痛，止血。用于刀枪伤，接骨。　根、种子：用于乳痈，恶疮痈疽。

## 白头翁属　Pulsatilla Mill.

**蒙古白头翁**

**Pulsatilla ambigua** Turcz. ex pritz.

生于高山草地。分布于黑龙江、内蒙古、甘肃北部、青海北部、新疆。

根：苦，寒。鲜品有毒。清热凉血，解毒。用于痢疾。

**钟萼白头翁**　白头翁(新疆)

**Pulsatilla campanella** Fisch. ex Regel et Tiling

生于海拔 1 900—2 600 米的山地草坡。分布于新疆西部。

根状茎：用于痢疾，瘰疬。

**朝鲜白头翁**　毛姑朵花(东北)

**Pulsatilla cernua** (Thunb.) Bercht. et Opiz ——*Anemone cernua* Thunb.; *P. koreana* Nakai ex Mori

生于山地草坡、林缘。分布于吉林、辽宁。

根：收敛，消炎，止痢。用于痢疾、经闭。

**白头翁**　羊胡子花(陕西)，老公花(山东)，老冠花(江苏)，补芒尕哇(藏语)

**Pulsatilla chinensis** (Bunge) Regel——*Anemone chinensis* Bunge

生于海拔 200—3 200 米的平原、山坡草丛中、林缘或干旱多石的坡地。分布于东北、华北、西北、华东及河南、湖北、四川西部。主产内蒙古、辽宁、河北。

根(白头翁)：苦，寒。清热解毒，凉血止痢。用于热毒血痢，阴痒症，带下病，阿米巴痢疾。　茎叶：暖腰膝，强心。　花：用于疟疾寒热。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**兴安白头翁**　毛姑朵花(东北)

**Pulsatilla dahurica** (Fisch.) Spreng. ——*Anemone dahurica* Fisch. ex DC.

生于山地草坡、林间空地、灌丛、石砾地。分布于黑龙江、吉林东部。

根：用于痢疾。

**肾叶白头翁**

**Pulsatilla patens** (L.) Mill. ——*Anemone patens* L.

生于海拔 1 100 米左右的山地、林间。分布于新疆北部。

根：清热解毒，凉血止痛。

附　注：功效相似的有**掌叶白头翁 P. patens** (L.) Mill. var. **multifida**(Pritz.) S. H. Li et Y. H. Huang，分布于黑龙江、内蒙古北部、新疆北部。

**黄花白头翁**

**Pulsatilla sukaczevii** Juz.

生于丘陵多砂砾山坡。分布于黑龙江、内蒙古。

根：清热凉血，解毒。

**细叶白头翁**　　白头翁(内蒙古)

**Pulsatilla turczaninovii** Krylov et Serg.

生于草原、山地草坡或林缘。分布于辽宁西部、河北北部、内蒙古、宁夏贺兰山。

根：清热凉血，解毒。　全草：用于风湿关节痛。

## 毛茛属　Ranunculus L.

**阿尔泰毛茛**

**Ranunculus altaicus** Laxm.

生于海拔 2 400—2 650 米的高山湿草地或沼泽地。分布于新疆。

全草：清热解毒，消肿止痛。

**披针毛茛**

**Ranunculus amurensis** Kom.

生于沼泽化草甸湿地中。分布于黑龙江、内蒙古。

根：辛，微寒。有小毒。解毒消肿，截疟杀虫，发散风热。用于疮肿痒疹，筋骨疼痛。

**田野毛茛**

**Ranunculus arvensis** L.

生于路边砂石地。湖北有逸生。

全草：用于恶疮。

**鸟足毛茛**

**Ranunculus brotherusii** Freyn

生于海拔 2 600—3 500 米的高山草地。分布于青海、新疆。

全草、花：温中祛寒，通经活络。

**禺毛茛**　　水芹菜(广西)，自扣草(四川、贵州)，黄花虎掌草(云南)

**Ranunculus cantoniensis** DC.

生于海拔 500—2 500 米的平原、丘陵田边、沟边水湿地。分布于华东及湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草(禺毛茛)：辛，凉。有毒。解毒，消炎。用于黄疸，目翳；外用于跌打损伤。

**茴茴蒜**　　绒毛犬脚迹(浙江)，野大蒜(江苏)，辣辣草(四川)

**Ranunculus chinensis** Bunge

生于海拔 700—2 500 米的平原、丘陵、溪边、田旁水湿草地。全国各地普遍分布。

全草(茴茴蒜)：淡、微苦，温。有毒。清热解毒，杀虫截疟。用于肝炎，哮喘。

附　注：四川民间煮蛋吃，用于肺热咳嗽。

**西南毛茛**　　卵叶毛茛(贵州)

**Ranunculus ficarüfolius** Lévl. et Vant.

生于海拔 1 000—3 200 米的林缘湿地或水沟旁。分布于湖北西部、四川西南部、贵州、云南北部。

茎叶：利湿消肿，止痛杀虫。

**砾地毛茛**

**Ranunculus glareosus** Hand.-Mazz.

生于海拔 3 600—5 000 米的高山流石滩的岩坡砾石间。分布于青海南部、四川西部、云南西北部、西藏东部。

全草：外用于风湿痛。

**毛茛**　　五虎草(甘肃)，毛田菜(湖南)，鸭脚板(广西)，辣子草(四川)

**Ranunculus japonicus** Thunb.

生于海拔 200—2 500 米的田沟旁、林缘路边及湿草地上。全国除西藏外，均有分布。

根、全草(毛茛)：辛，温。有毒。退黄，定喘，截疟，镇痛。(外敷)用于黄疸，哮喘，风湿关节痛，牙痛，跌打损伤。

附　注：功效相同的有**兴安毛茛 R. japonicus** Thunb. var. **smirnovii** (Ovcz.) L. Liou，分布于黑龙江、内蒙古。

**棉毛茛**　　结察(藏语)

**Ranunculus membranaceus** Royle

生于海拔 4 000—5 000 米的流石滩坡地及砾石草甸中。分布于青海、四川西北部、西藏。

全草、种子：辛，温。温中祛寒，健胃消食，利水。

**刺果毛茛**　　野元宵(湖北)

**Ranunculus muricatus** L.

生于田野道旁杂草丛中。分布于江苏、浙江、湖北、广西。

全草：用于疮疖，坠胎。

**云生毛茛**

**Ranunculus nephelogenes** Edgew.——*R. longicaulis* C. A. Mey. var. *nephelogense* (Edgew.) L.

生于海拔 3 000—5 000 米的高山草甸、河滩、湖边及沼泽草地。分布于甘肃、青海、四川、云南、西藏。

全草：辛，温。温中祛寒，解毒，利尿。

**肉根毛茛**

**Ranunculus polii** Franch.

生于田野潮湿草地。分布于江苏、浙江、江西、湖北、湖南。

全草：清暑解热，疏风止痒。

**匍枝毛茛**

**Ranunculus repens** L.

生于沟边草地、水边湿草甸子。分布于东北、华北及新疆、云南西北部。

全草：利湿，消肿，止痛，截疟，杀虫。

**石龙芮**　　鸡脚爬草(陕西、浙江)，胡椒草(福建)，黄瓜草(广西)

**Ranunculus sceleratus** L.

生于河边、沟边及平原湿地。全国各地普遍分布。

全草(石龙芮): 苦、辛，寒。补阴润燥，祛风逐湿，利关节。外敷穴位消瘰疬，截疟，祛风湿。

**扬子毛茛**　　尿疱果子(江苏)，起泡草(湖北)，鹅脚板(四川)

**Ranunculus sieboldii** Miq.

生于海拔 300—2 500 米的山坡林缘及平原湿地。分布于陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南东北部。

全草: 苦，热。有毒。截疟，拔毒，消肿。外用于肿毒，疮毒，腹水，浮肿。

**高原毛茛**　　辣子草(四川)，结察(藏语)

**Ranunculus tanguticus** (Maxim.) Ovcz.——*R. affinis* L. var. *tanguticus* Maxim.

生于海拔 3 000—4 500 米山坡或沟边沼泽草地。分布于西南及河北、山西、陕西、甘肃、青海。

全草: 淡，温。消炎退肿，平喘，截疟。用于感冒，瘰疬；外用于牛皮癣。

**猫爪草**　　金花草(广西)，小毛茛(贵州)

**Ranunculus ternatus** Thunb.

生于平原湿草地或田边荒地。分布于江苏、安徽、浙江、江西、台湾、河南、湖北、广西、贵州。

块根(猫爪草): 辛、苦，平。有毒。消肿，散结。用于瘰疬未溃，咳嗽痰浓。

附　注: 《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 天葵属　Semiaquilegia Makino

**天葵**　　麦无踪(湖南)，小乌头(江西)

**Semiaquilegia adoxoides** (DC.) Makino——*Isopyrum adoxioides* DC.

生于海拔 600 米以上的山坡路边草丛中及乱石滩。分布于陕西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广西、四川、贵州。

块根(天葵子、老鼠屎): 甘、苦，寒。有小毒。清热解毒，散结消肿。用于瘰疬，痈肿疔疮，跌打损伤，毒蛇咬伤。地上部分: 清热解毒，利尿排石。

附　注: ①块根，《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②功效相同的有**大天葵** **S. adoxioides** (DC.) Makino var. **grandis** D. Q. Wang，分布于安徽南部；直根天葵 **S. dauciformis** D. Q. Wang，分布于安徽大别山区。

## 黄三七属　Souliea Franch.

**黄三七**　　太白黄连(陕西)

**Souliea vaginata** (Maxim.) Franch.——*Isopyrum vaginatum* Maxim.

生于海拔 2 200—3 600 米的牛皮桦、冷杉及落叶松林下或沟谷。分布于陕西南部、甘

肃南部、青海东部、四川西部、云南西北部、西藏东南部。

根状茎：苦，凉。泻火燥湿，抗菌消炎，健胃。用于目赤，口腔破溃，痢疾，泄泻，金疮。

## 唐松草属　Thalictrum L.

**尖叶唐松草**　石笋还阳(湖北)

**Thalictrum acutifolium** (Hand.-Mazz.) Boivin——*T. clavatum* DC. var. *auctifolium* Hand.-Mazz.

生于山谷或村边、溪旁阴湿地草丛中。分布于安徽南部、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川东南部、贵州。

根、全草：苦，寒。消肿解毒，明目，止泻，凉血。用于全身黄肿，眼睛发黄。

**高山唐松草**

**Thalictrum alpinum** L.

生于海拔 2 500—5 200 米的山坡草地或沼泽草地。分布于青海、新疆、西藏。

根及根状茎：清热燥湿，杀菌止痢。

附　注：新疆作马尾黄连用。

**直梗高山唐松草**　小青草(四川)，复叶披麻草(云南)

**Thalictrum alpinum** L. var. **elatum** Ulbr.

生于海拔 2 300—5 400 米的山坡草地、高山沼泽地或高山草甸。分布于河北西部、山西、陕西南部、甘肃南部、青海南部和东部、宁夏、四川西部、云南北部、西藏东部。

根：苦，寒。清热燥湿，凉血解毒。用于胸闷呕吐。　全草：苦，寒。清热解毒，清肝消积。用于小儿疳积，小儿惊风。

**唐松草**　草黄连(山东)，高山野花草(浙江)

**Thalictrum aquilegifolium** L. var. **sibiricum** Regel et Tiling—— *T. aquilegifolium* L.

生于林缘、林间草地及河岸灌丛中。分布于东北、华北及山东、浙江西北部。

全草：苦，寒。清热解毒。　根：用于痈肿疮疖，黄疸，泄泻。

**狭序唐松草**　水黄连(贵州)

**Thalictrum atriplex** Finet et Gagnep.

生于海拔 2 300—3 600 米的山坡草地或林缘。分布于四川西部、云南西北部、西藏东部。

全草：苦，寒。清热燥湿，解毒。　根：用于病毒性肝炎，痈肿疮疖。

**贝加尔唐松草**　马尾黄连(四川)

**Thalictrum baicalense** Turcz.

生于海拔 800—1 400 米的山谷山坡林下、林缘及山坡草地。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、青海、河南西部、西藏东南部。

根及根状茎：苦，寒。清热燥湿，解毒。用于痢疾，目赤。

**星毛唐松草**　淡色马尾连(四川)

**Thalictrum cirrhosum** Lévl.

生于高山草丛中。分布于四川、贵州、云南。

根及根状茎：清热解毒，止痢。

附　注：四川地方标准收载。

**高原唐松草**　　草黄连(云南)

**Thalictrum cultratum** Wall.

生于海拔1 700—4 000米的山地草坡、灌丛中、沟边草地或林中。分布于甘肃南部、四川西部、云南西北部、西藏南部。

根及根状茎(马尾连)：苦，寒。清热燥湿，泻火解毒。用于痢疾，泄泻，病毒性肝炎，感冒，麻疹，痈肿疮疖，目赤。

附　注：根含小檗碱，有代黄连用。

**偏翅唐松草**

**Thalictrum delavayi** Franch.

生于海拔2 200—3 000米的灌丛、林下及林缘草地。分布于四川西部、云南北部、西藏东部。

根及根状茎：用于风火牙痛，眼痛。

附　注：四川西昌及云南作马尾黄连。

**大叶唐松草**　　蓝蓬草(浙江)

**Thalictrum faberi** Ulbr.

生于湿润山谷沟溪旁、路边草丛、林缘及疏林下阴湿处。分布于江苏、安徽、浙江、江西、河南南部、湖南。

根及根状茎(大叶马尾连)：苦，寒。清热解毒，利湿。用于目赤。

附　注：根含唐松草新碱，具有抗癌作用。

**西南唐松草**

**Thalictrum fargesii** Franch. ex Finet et Gagnep.

生于海拔600—2 400米的山地林中、草地、陡崖旁及沟边。分布于陕西南部、湖北西部、四川、贵州北部。

全草：苦，寒。清热解毒，泻火燥湿。用于牙痛，皮炎，湿疹。

**滇川唐松草**　　千里马(云南)

**Thalictrum finetii** Boivin

生于海拔3 100—4 000米的山地草坡或林中。分布于四川西部、云南西北部、西藏东南部。

根：苦，寒。清热解毒，泻火燥湿。

附　注：根含小檗碱，有代黄连用者。

**香毛唐松草**　　腺毛唐松草(陕西)，鹅整(藏语)

**Thalictrum foetidum** L.

生于海拔1 100—3 900米的山地草坡或林下。分布于华北及陕西、甘肃、青海、新疆、四川、西藏。

根：用于目赤，病毒性肝炎，痈肿疮疖。

**多叶唐松草**

**Thalictrum foliolosum** DC.

生于海拔 1 500—3 500 米的山地草坡、林中或灌丛中。分布于四川西南部、云南、西藏南部。

根及根状茎：苦，寒。清热燥湿。用于肝炎，痢疾，目赤，小儿热疳，痘疹难透。

**华东唐松草**

**Thalictrum fortunei** S. Moore

生于海拔 700—1 200 米较湿润的溪谷及山坡疏林下、林缘草丛中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建。

根、全草：苦、寒。清湿热，消肿解毒，杀虫。用于疔疮，疱疖。

**金丝马尾连**　　多腺唐松草(四川)

**Thalictrum glandulosissimum** (Finet et Gagnep.) W. T. Wang et S. T. Wang——*T. foetidum* L. var. *glandulosissimum* Finet et Gagnep.

生于海拔 2 500 米左右的山坡草地。分布于四川、云南大理、宾川。

根及根状茎：苦，寒。清热燥湿。用于热盛心烦，痢疾，泄泻，目赤，咽喉痛，痈肿疮疖。

附　注：①四川地方标准收载。②功效相同的有**昭通唐松草 T. glandulosissimum** (Finet et Gagnep.) W. T. Wang var. **chaotungense** W. T. Wang et S. H. Wang，分布于云南昭通。

**河南唐松草**

**Thalictrum honanenae** W. T. Wang et S.H. Wang

生于山谷溪流旁或疏林中。分布于河南。

根、全草：清热解毒，利湿。用于痈疖，肿毒。

**盾叶唐松草**　　水香草(湖南、广西)，倒地掐(四川)

**Thalictrum ichangense** Lecoy. ex Oliv.

生于海拔 800—1 200 米的山谷沟边或山坡林中。分布于中南及辽宁、陕西南部、浙江、四川、贵州、云南。

全草(岩扫把)：苦，寒。散寒，除风湿，祛目雾，消浮肿。　根：苦，寒。祛风清热，解毒。用于小儿抽风，小儿鹅口疮。

**紫蕊叶唐松草**

**Thalictrum isopyroides** C. A. Mey.

生于低山、林缘。分布于新疆西部。

根及根状茎：清热燥湿，杀菌止痢。

**爪哇唐松草**　　鬼见退(湖北)，羊不食(四川)

**Thalictrum javanicum** Bl.

生于山地林下或沟边阴湿地。分布于西南及甘肃南部、浙江西部、江西、福建、台湾、湖北西部、广东北部、四川、贵州、云南西北部。

根：解热。用于跌打损伤。　全草：用于关节痛。

**长喙唐松草**　　马尾连(甘肃)，满天星(湖北)

**Thalictrum macrorhynchum** Franch.

生于海拔850—2 900米的山地林中或山谷灌丛中。分布于河北、山西、陕西、甘肃、河南西部、湖北、四川东北部。

带根全草：用于伤风感冒。

**长柱唐松草**

**Thalictrum megalostigma** (Boivin) W. T. Wang —*T. baicalense* Turcz. var. *megalostigma* Boivin

生于海拔2 500米左右的山坡草地。分布于甘肃南部、四川西部。

根：苦，寒。清热燥湿。

附　注：四川若尔盖作马尾连用。

**小果唐松草**　　铁线还阳(湖北)，飞蛾七(四川)

**Thalictrum microgynum** Lecoy. ex Oliv

生于海拔700--2 800米的山地林下、草坡或岩石边较阴湿处。分布于陕西南部、湖北西北部、湖南西北部、四川、云南西北部。

根：退热解表。用于跌打损伤。　全草：用于全身黄肿，眼睛发黄，祛寒。

**亚欧唐松草**

**Thalictrum minus** L.

生于山坡路旁、林缘草地及石缝中。分布于山西、甘肃、青海、新疆、湖北、四川西部。

根：清热凉血，理气消肿。用于痢疾，泄泻。

**东亚唐松草**　　烟锅草(陕西)，金鸡脚下黄(贵州)

**Thalictrum minus** L. var. *hypoleucum* (Sieb. et Zucc.)*Miq.*——*T. hypoleucum* Sieb. et Zucc.; *T. thunbergii* DC.

生于丘陵或山地林缘、山谷沟边。分布于东北、华北及陕西、甘肃、山东、江苏、安徽、河南、湖北、广东、四川、贵州。

根：用于牙痛，急性皮炎，湿疹。

**峨眉唐松草**　　倒水连(四川)

**Thalictrum omeiense** W. T. Wang et S. H. Wang

生于海拔720—2 400米的山地沟边或岩石边潮湿处。分布于四川峨眉、洪雅。

根：苦、涩，寒。清热解毒，祛风除湿。用于湿热发黄，腹痛泻痢，疟疾寒热。

附　注：四川特有药用植物。

**瓣蕊唐松草**　　马尾黄连(内蒙古、宁夏)

**Thalictrum petaloideum** L.

生于山地草坡、高山阴湿处、灌丛及林缘草地。分布于东北、华北、西北及山东、安徽、河南西部、湖北、四川西北部。

根：苦，寒。健胃消食，清肝明目，清热解毒。用于黄疸，泄泻，痢疾，渗出性皮炎。

**长柄唐松草**　　拟散花唐松草(中国高等植物图鉴)

**Thalictrum przewalskii** Maxim.

生于海拔1 300—3 000米的山坡或山沟林中。分布于华北及陕西、甘肃、青海东部、河南西部、湖北西北部、四川西部、西藏东部。

根：祛风。　花、果实：用于肝炎，肝肿大。

**多枝唐松草**　　水黄连(广西)

**Thalictrum ramosum** Boivin

生于海拔540—950米的林中或灌丛中。分布于湖南西部、广西西北部、四川、贵州。

全草：用于目赤，热痢，黄疸。

**美丽唐松草**　　鹅整(藏语)

**Thalictrum reniforme** Wall.

生于海拔2 650—3 800米的山谷草地、林缘或灌丛中。分布于我国西藏南部和东南部。

根：用于炭疽病。

**网脉唐松草**　　草黄连(云南)

**Thalictrum reticulatum** Franch.

生于海拔2 200—2 500米的山地草坡或疏林中。分布于四川西部、云南西北部。

根：用于感冒，咳嗽。

**粗壮唐松草**

**Thalictrum robustum** Maxim.

生于海拔940—2 100米的山地林中、沟边或较阴湿草丛中。分布于陕西南部、甘肃、河南西部、湖北西北部、四川西北部和东部。

根：用于痢疾，泄泻。

**芸香叶唐松草**

**Thalictrum rutifolium** Hook. f. et Thoms.

生于山坡、灌丛、草地或林下。分布于甘肃、青海、四川西部、西藏。

全草：清热泻火，燥湿解毒。

**箭头唐松草**

**Thalictrum simplex** L.

生于河漫滩。分布于新疆塔城。

根及根状茎：清热燥湿，杀菌止痢。

**短梗箭头唐松草**　　硬水黄连(陕西、四川)

**Thalictrum simplex** L. var. **brevipes** Hara

生于平原、低山草地或沟边。分布于华北及吉林、辽宁、陕西、甘肃、宁夏、青海、湖北西部、四川。

全草：苦，寒。清湿热，解毒。用于黄疸，泻痢。　花、果实：用于肝炎，肝肿大。

**粽柱唐松草**

**Thalictrum smithii** Boivin

生于海拔2 300—3 000米的山地林缘、草坡或田边。分布于四川西部、西藏东部和东南部。

全草：用于头晕，腹痛，下痢。

**石砾唐松草**　　札阿中(藏语)

**Thalictrum squamiferum** Lecoy.

生于海拔3 600—5 000米的山地多石砾山坡、河岸石砾砂地或林缘。分布于青海南

部、四川西部、云南西北部、西藏东南部。

全草：清热解表。用于发烧。

**展枝唐松草**

**Thalictrum squarrosum** Steph. ex Willd.

生于海拔2 000米以下的平原草地、干燥草坡或田边。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、新疆。

全草：苦，平。清热解毒，健胃制酸，发汗。

**毛发唐松草**　　珍珠莲(云南)

**Thalictrum trichopus** Franch.

生于海拔2 000—2 500米的山地灌丛中。分布于四川西南部、云南西部。

根：用于小儿高热，惊风，风热咳嗽。

**深山唐松草**

**Thalictrum tuberiferum** Maxim.

生于针叶林或针阔叶混交林下。分布于东北。

根：清热，消炎。

**弯柱唐松草**　　米升麻(湖北)

**Thalictrum uncinulatum** Franch.

生于海拔1 500—2 600米的山地草坡或林缘。分布于陕西南部、甘肃南部、湖北西部、四川、贵州西部。

全草：用于麻疹初起。

**帚枝唐松草**　　阴阳和(云南)

**Thalictrum virgatum** Hook. f. et Thoms.

生于海拔2 300—2 700米的山地林下岩石上。分布于四川西南部、云南北部和西部、西藏南部。

根：用于胃病。

**粘唐松草**

**Thalictrum viscosum** C. Y. Wu

生于河谷。分布于云南丽江北部。

根：功效同金丝马尾连。

附　注：云南特有药用植物。

## 金莲花属　Trollius L.

**阿尔泰金莲花**

**Trollius altaicus** C. A. Mey.

生于高山草地。分布于新疆。

全草、花：苦，寒。清热解毒，止血止咳，降血压。

**宽瓣金莲花**

**Trollius asiaticus** L.

生于山坡草地。分布于黑龙江、新疆。

全草、花：用于眼疾，夜盲，黄疸。

**川陕金莲花**　骆驼七(陕西)

**Trollius buddae** Schipcz.

生于海拔1 780—2 400米的山坡草地。分布于陕西南部、甘肃西部、四川西北部。

根：活血，破血。

**金莲花**

**Trollius chinensis** Bunge

生于山地草坡或疏林下。分布于华北及吉林、辽宁、河南西北部。

花(旱地莲)：苦，寒。清热解毒。用于乳蛾，急性中耳炎，疔疮。

**准噶尔金莲花**

**Trollius dschungaricus** Regel

生于山坡草地、林缘。分布于新疆北部。

全草、花：清热解毒，止血止咳，降血压。

**矮金莲花**　五金草(陕西)，梅多赛尔庆(藏语)

**Trollius farreri** Stapf

生于海拔2 800—4 000米的山坡或草地。分布于陕西南部、甘肃南部、青海、四川西部、云南西北部、西藏东北部。

全草：苦，微寒。清热解毒。用于伤风感冒。

**长白金莲花**

**Trollius japonicus** Miq.

生于高山草地。分布于吉林东部。

花：清热解毒，明目。

**短瓣金莲花**

**Trollius ledebourii** Reichb.

生于林间草地、湿地、草甸、沼泽地。分布于黑龙江、吉林、内蒙古东北部。

**花：**抑菌消炎。

附　注：功效相同的有**长瓣金莲花 T. macropetalus** (Franch.) Schmidt，分布于东北。

**小金莲花**

**Trollius pumilus** D. Don

生于海拔3 800—5 000米的河滩、草地、高山草地、沼泽中。分布于青海、西藏南部。

全草、花：清热解毒，利肺，祛风湿。

**青藏金莲花**

**Trollius pumilus** D. Don var. **tanguticus** Brühl

生于海拔4 000米左右的河滩上、河边草地。分布于青海南部、四川西北部、西藏东北部。

花：苦，凉。清热解毒。

**毛茛状金莲花**

**Trollius ranunculoides** Hemsl.

生于海拔 2 900—4 100 米的高山、亚高山草甸及沼泽草甸灌丛中。分布于甘肃南部、青海南部和东部、四川西部、云南西北部、西藏东部。

全草：甘、辛，温。散寒解表。用于风湿痛，瘰疬。 花：排脓生肌，解毒。用于化脓性创伤。

## 尾囊草属 Urophysa Ulbr.

**尾囊草** 岩蝴蝶(贵州)

**Urophysa henryi** (Oliv.) Ulbr.——*Isopyrum henryi* Oliv.

生于低山干燥岩石边。分布于湖北西部、湖南北部、四川东部、贵州。

根：用于跌打损伤，消肿，疟疾，吐泻。

附 注：我国特有属。

# 40. 小檗科 Berberidaceae

## 小檗属 Berberis L.

**尖叶小檗** 三颗针(湖北)

**Berberis acuminata** Franch.

生于山地沟边密林中。分布于湖北、云南。

根：清热，利湿、散瘀。

**锥花小檗** 三颗针(通称)，猫儿刺、黄檗刺(甘肃)，老鼠刺、刺黄芩(四川)，刺黑珠(中国高等植物图鉴)

**Berberis aggragata** Schneid.

生于海拔 1 000—3 000 米的山地灌丛中。分布于陕西南部、甘肃南部、湖北、贵州。

根、茎皮：清热解毒，利湿，散瘀。

附 注：民间代黄檗用。

**拟刺红珠** 三颗针(通称)

**Berberis ambrozyana** Schneid.

生于海拔 3 000—4 000 米的山坡、田埂及路旁。分布于青海、四川。

根：清热解毒。用于痢疾。

**美丽小檗** 三颗针(通称)

**Berberis amoena** Dunn

生于海拔 1 600—2 500 米的石山灌丛中。分布于四川北部、云南西北部。

根：清热解毒，泻火。

**黄芦木** 刀口药、黄连(黑龙江)，狗奶子(东北)，刺黄檗(山西、陕西)，希拉-毛都(蒙语)，大叶小檗(长白山植物药志)

**Berberis amurensis** Rupr.

生于海拔1 000—2 800米的山地林缘、沟边或灌丛中，部分地区庭园有栽培。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、山东、江苏、河南、四川、贵州。

根：苦，寒。清热燥湿，泻火解毒。用于泄泻，痢疾，咳嗽，口疮，湿疹疮疖，丹毒，烫火伤，目赤。叶：酊剂作妇科止血药。

附　注：本种为提取黄连素的原料。东北地区及陕西用本种代黄檗和黄连用。

**安徽小檗**　　刺黄柏(湖北)

**Berberis anhweiensis** Ahrendt

生于山地灌丛中或疏林下。分布于安徽、浙江、湖北。

根：苦，寒。清热燥湿，利尿，杀虫。用于黄疸，小儿疳积，目疾，热痢下血，淋浊带下，疮疡热毒，毒蛇咬伤。

**深黄小檗**　　三颗针、刺黄连、鸡脚刺(贵州)

**Berberis atrocarpa** Schneid.

生于山地灌丛中或疏林下。分布于四川、贵州西北部。

根：苦，寒。清热利湿，散瘀止痛，凉血。用于黄疸，痢疾，目赤，跌打损伤；外用于刀伤。

**硬齿小檗**　　刺黄连、土黄柏(湖北)

**Berberis bergmanniae** Schneid.

生于山地半阴处灌丛中。分布于湖北。

根：清热，利湿，散瘀。

**短柄小檗**　　三颗针(陕西)，小黄檗、刺黄连(陕西、甘肃、宁夏)，酸梨刺(甘肃)

**Berberis brachypoda** Maxim.

生于海拔1 300米左右的山坡灌丛中、山沟或林下。分布于山西、陕西、甘肃南部、宁夏、青海、河南、湖北西部、四川北部、西藏。

根、茎皮：苦，寒。清热燥湿，泻火解毒。用于痢疾，咽喉痛，口疮，湿疹，疖肿。

**单花小檗**

**Berberis candidula** Schneid.

生于山地路边。分布于湖北、四川。

根：清热泻火，化湿，散瘀。

**鄂尔多斯小檗**　　三颗针、黄柏(宁夏)

**Berberis caroli** Schneid.

生于河滩、山坡灌丛中。分布于内蒙古、甘肃、宁夏。

根皮、茎皮：清热，解毒，燥湿，泻火，明目，健胃。

**贵州小檗**　　鸡脚刺、三颗针、刺黄连(贵州)

**Berberis cavaleriei** Lévl.

生于山地灌丛中。分布于贵州梵净山、江口。

根：苦，寒。清热解毒，止泻。用于痢疾，泄泻，目赤。

**皖赣小檗**　　安徽小檗(拉汉英种子植物名称)

**Berberis chingii** Cheng

生于山地灌丛中。分布于安徽、江西、贵州。

根(鸡脚刺)：清热解毒，止泻。用于痢疾，泄泻，目赤，跌打损伤，烧、烫伤。

**黄球小檗**

**Berberis chrysosphaera** Mulligan

生于花岗岩峭壁上。分布于我国西藏察隅。

根皮：为提取黄连素的原料。

**秦岭小檗**　老鼠刺、刺黄檗(陕西)，黄刺(甘肃)，黄檗(青海)

**Berberis circumserrata** (Schneid.) Schneid.——*B. diaphana* Maxim. var. *circumserrata* Schneid.

生于海拔2 600—3 000米的灌丛中、山坡或山脊、林隙或伐林地阻坡地。分布于陕西南部、甘肃、青海东部、河南、湖北、四川。

根、茎内皮：解毒，清热泻火。用于痢疾。

附　注：陕西太白山地区以本种茎皮代黄檗入药。

**直穗小檗**　山黄檗、刺黄檗、黄檗(陕西、河南)，三颗针、吉尔尔(青海)，密穗小檗(秦岭植物志)

**Berberis dasystachya** Maxim.

生于海拔1 700—2 500米的山坡灌丛中或山谷溪旁。分布于河北、内蒙古、陕西、甘肃南部、宁夏、青海东部、河南伏牛山、湖北西部，四川阿坝。

根皮(黄刺皮)、茎内皮：苦，寒。清热燥湿，泻火解毒。用于泄泻，痢疾，黄疸，带下病，关节痛。

**鲜黄小檗**　三颗针(陕西、青海)，黄刺(陕西)，黄檗(青海)，黄花刺(中国树木分类学)

**Berberis diaphanuas** Maxim.

生于海拔2 500—4 000米的高山灌丛中或干燥砂砾地。分布于陕西太白山、甘肃、宁夏、青海、四川、云南、西藏昌都地区。

根：苦，寒。清热解毒，消肿止痛。

**细脉小檗**

**Berberis dictyoneura** Schneid.

生于海拔1 400—3 000米的山坡灌丛中、山地沟谷或河滩上。分布于陕西、甘肃南部、宁夏、四川西部。

根皮：清热解毒。外用于目赤。

**刺红珠**　三颗针(贵州)，吉儿巴(西藏)

**Berberis dictyophylla** Franch.

生于海拔2 500—4 000米的山坡灌丛中。分布于西南。

根、根皮：苦，寒。清热解毒，止痢。用于口疮，咽喉痛，目赤，泄泻，痢疾，刀伤。

**首阳小檗**　黄皮针刺(山西、陕西)，黄檗刺、黄檗(陕西)

**Berberis dielsiana** Fedde

生于海拔600—2 300米的山坡或山谷灌丛中。分布于山西、陕西、甘肃南部、宁夏、河南、四川。

根皮：苦，寒。清热降火，解毒。

附　注：陕北地区常代黄檗用。

**长穗小檗**　　黄檗(陕西)

**Berberis dolichobotrys** Fedde

生于山坡灌丛中。分布于陕西、河南灵宝和卢氏、四川城口。

树皮：清热燥湿，泻火解毒。用于痢疾，带下病，关节痛，口疮。

**置疑小檗**　　黄檗(青海)，吉尔雍(四川)

**Berberis dubia** Schneid.

生于海拔 1800—4 000 米的阳坡或山坡灌丛中。分布于内蒙古东部至西部，甘肃南部、宁夏、青海东部、四川西部、西藏昌都地区。

根皮、茎皮：苦，寒。清热解毒。用于目赤，咽喉痛，泄泻，痢疾，痈疽肿毒。

附　注：青海民间用本品代黄檗用；我国西藏昌都地区用以提取小檗碱。

**昆明小檗**　　鸡脚黄连、鸡脚刺、土黄连(云南)

**Berberis ferdinandi-coburgii** Schneid.

生于海拔 1 300—2 300 米的山坡灌丛中。分布于四川、云南。

根：清热解毒。用于泄泻，痢疾，咽喉痛，目赤，牙龈痛，疮痈，淋证，烧、烫伤。

附　注：产地以本种根代黄连用。

**大黄檗**　　三颗针(通称)

**Berberis franciscі-ferdinandi** Schneid.

生于海拔 1 300—3 000 米的山坡灌丛中。分布于甘肃南部、四川西北部、西藏东北部。

根：清热解毒。为提取小檗碱的原料植物。

**崂峪小檗**　　小叶黄檗(陕西)

**Berberis gilgiana** Fedde

生于海拔 800—2 100 米的山坡或山地两岸。分布于陕西秦岭南北坡、河南。

根皮：清热降火，解毒。

**毛脉小檗**

**Berberis giraldii** Hesse

生于海拔 1 200—1 700 米的山坡林下、路边或林缘。分布于陕西太白山、甘肃天水、四川万源。

根：清热解毒，降火。

**波密小檗**

**Berberis gyalaica** Ahrendt

生于海拔 2 000—3 100 米的灌丛中或林下。分布于我国西藏波密、林芝、米林。

根、根皮：为提取小檗碱的原料。

**拉萨小檗**　　三颗针、吉儿把加勃(西藏)

**Berberis hemsleyana** Ahrendt

生于海拔 3 600—4 400 米的灌丛中或草坡。分布于我国西藏。

根、根皮：用于痢疾，眼疾。

**巴东小檗**　　三颗针、黄檗(陕西)、川鄂小檗(秦岭植物志)

**Berberis henryana** Schneid.

生于海拔500—2 400米的林下或山坡灌丛中。分布于陕西、河南伏牛山区、湖北西部、四川。

根皮：清热解毒。用于痢疾，泄泻；外用于目赤。果实(追风子)：用于小儿惊风。

**黑果小檗**　刺黄檗、热则克(新疆)，卡拉卡特(哈萨克语)

**Berberis heteropoda** Schrenk.

生于海拔2 000米以上的山地及沿河两岸。分布于新疆乌鲁木齐。

根、根皮(黑果小檗)：清热解毒，泻火。　果实：用于高血压症。

**毛梗小檗**

**Berberis hobsonii** Ahrendt

生于海拔3 400—4 300米的高山栎林下或灌丛中。分布于我国西藏南部。

根：清热降火。

**叙永小檗**

**Berberis hsuyunensis** Hsiao et Sung

分布于四川的叙永、泸州。

根：清热解毒，泻火。用于热毒疮肿。

**阴湿小檗**

**Berberis humido-umbrosa** Ahrendt

生于海拔3 300—4 000米的阴湿处。分布于我国西藏东南部。

根：清热降火。

**藏黑果小檗**

**Berberis ignorata** Schneid.

生于海拔2 700—3 800米的高山栎或针阔叶混交林下及灌丛中。分布于我国西藏。

根皮：用于目赤。

**伊宁小檗**　刺黄连(新疆)

**Berberis iliensis** Popov

生于海拔3 000米左右的山坡灌丛中及谷地。分布于天山山脉。

根：清热燥湿，泻火解毒，止泻，止痢。

**川滇小檗**　吉儿把(西藏)

**Berberis jamesiana** Forrest et W. W. Smith

生于海拔2 600—4 000米的山地、田野路边向阳处或山间林缘及林中。分布于四川西部、云南北部、西藏东南部及昌都地区。

根：苦，寒。用于目赤，口疮，咽喉痛，泄泻，痢疾。

**腰果小檗**　吉儿把兴哦薄(西藏)，西藏小檗(植物分类学报)

**Berberis johannis** Ahrendt

生于海拔3 020—3 250米的高山松林，冷杉林下或灌丛中。分布于我国西藏东部及南部。

根：用于目赤，皮肤病，冻伤。

**豪猪刺**　三颗针(陕西、四川)，石妹刺(云南)

**Berberis julianae** Schneid.

生于海拔 1 000—1 500 米的山坡杂木林中。分布于陕西南部、甘肃、安徽、江西、福建、河南、湖北西部、湖南、广西、四川东部、贵州、云南。江苏有栽培。

根、茎皮(土黄连): 苦,寒。清热解毒,杀虫,止泻。用于痢疾,泄泻,风火眼痛,疮疡脓肿;外用于跌打损伤。

附　注: ①本种为提取小檗碱的原料。② 与本种功效相同的有**长叶豪猪刺** B. julianae Schneid var. **oblongifolia** Ahrendt.

**甘肃小檗**　　黄檗(甘肃)

**Berberis kansuensis** Schneid.

生于海拔 3 000 米以下的山坡灌丛中。分布于陕西、甘肃、宁夏、青海。

根皮、茎皮: 苦,寒。用于泄泻,痢疾,肝炎,胆囊炎,目赤。

附　注: 宁夏部分地区以本种作黄檗用,自产自销。

**台湾小檗**　　土黄芩(台湾)

**Berberis kawakamii** Hayata

生于海拔 2 500—3 500 米的山地草丛中。分布于我国台湾。

根: 清热泻火。

附　注: 我国台湾民间代黄芩用。

**长柱小檗**　　黄檗、土黄檗(浙江)

**Berberis lempergiana** Ahrendt

生于海拔 1 200 米左右的山坡林缘、溪谷灌丛中。分布于安徽南部、浙江。

根: 苦,寒。清热解毒。用于吐泻、目赤,口疮,咽喉痛,痢疾,丹毒,无名肿毒,湿疹,烧、烫伤,劳伤吐血,跌打损伤。

附　注: 浙江民间用根皮及茎内皮代黄檗用。

**大花小檗**

**Berberis ludlowii** Ahrendt

生于海拔 3 500—4 000 米的高山多石山地。分布于云南西北部、西藏东南部。

根: 清热降火,解毒。

**毛叶小檗**

**Berberis mitifolia** Stapf

生于海拔 1 000—3 000 米的山溪两岸及山坡灌丛中。分布于陕西南部、甘肃东南部、湖北西部。

根: 清热降火,化湿,散瘀。

**阿里小檗**

**Berberis morrisonensis** Hayata

分布于我国台湾。

根皮: 清热解毒。当地民间作黄芩用。

**显脉小檗**　　三颗针、黄檗刺(陕西)

**Berberis oritrepha** Schneid.

生于海拔 1 900—3 000 米的山坡路旁或灌丛中。分布于陕西华山、太白山。

根：清热解毒。为提取小檗碱的原料。

附　注：陕西特有药用植物。

**屏山小檗**　　大刺黄连、三颗针(四川)

**Berberis pingshanensis** Sung et Hsiao

生于海拔800米左右的山地路旁。分布于四川屏山地区。

根：清火。民间作黄连代用品。

**细叶小檗**　　狗奶子、红狗奶子(东北)，北常山(辽宁)，刺淄淄(河北)，刺黄柏(陕西)，针雀(中国高等植物图鉴)

**Berberis poiretii** Schneid.

生于海拔1 000米以下的山坡路旁或溪边。分布于东北、华北及陕西、宁夏、新疆、山东、河南。

根、根皮(三颗针)：苦，寒。清热解毒，健胃。用于吐泻，消化不良，痢疾，咳嗽，胆囊炎，目赤，口疮，无名肿毒，湿疹，烧、烫伤，高血压症。

附　注：本种为中国北部地区提取黄连素最主要的原料。

**刺黄花**

**Berberis polyantha** Hemsl

生于海拔2 300--3 600米的路旁阳坡地及河谷沿岸。分布于四川西部、西藏昌都和江达。

根：清热燥湿，解毒。用于痢疾，泄泻，目赤。

**粉叶小檗**　　黄连刺、鸡脚刺、三颗针(云南)，大黄连(植物名实图考)

**Berberis pruinosa** Franch.

生于海拔1 600—3 000米的山野路旁灌丛中。分布于广西北部、贵州、云南中南部至西北部、西藏南部及东南部。

根(宽叶鸡脚黄连)：苦，寒。清热解毒，用于痢疾，咽喉痛，疔腮，乳痈，疮疖，黄疸，并可预防感冒。果实：消食理气。用于食积腹胀。

附　注：①本种为云南西北部提取黄连素的主要原料之一。②对菌痢，泄泻，目赤，中耳炎，感冒，滴虫性阴道炎等确具疗效。

**柔毛小檗**　　三颗针(湖北)

**Berberis pubescens** Pamp.

生于山地灌丛中。分布于陕西眉县、湖北北部。

根：清火解毒，利湿，散瘀。

**延安小檗**

**Berberis purdomii** Schneid.

生于山坡或山谷灌丛中。分布于山西、陕西延安和米脂、甘肃。

根：苦，寒。清热燥湿，泻火解毒。

**网脉小檗**

**Berberis reticulata** Byhouwer

生于海拔1 350—2 800米的山坡岩石上或山脊灌丛中。分布于陕西光头山及太白

根：清热解毒。用于泄泻，痢疾。

附　注：陕西特有药用植物。

**血红小檗**

**Berberis sanguinea** Franch.

生于海拔 3 000 米左右的山地路旁或山坡向阳处。分布于四川西部及北部。

根：为提取黄连素的原料植物之一。

**刺黑珠**　　桑骨风、狼把针(湖北)，黑石珠、三颗针(四川)，刺黄连(贵州)

**Berberis sargentiana** Schneid.

生于海拔 1 000—2 000 米的山坡灌丛中或山沟路旁林下。分布于福建、湖北西部、四川东南部、贵州。

根：清热解毒，散瘀。用于痢疾，泄泻，疮痈肿毒，跌打损伤。

附　注：本种为提取黄连素的原料植物之一。

**陕西小檗**

**Berberis shensiana** Afrendt

生于山坡灌丛中或林下。分布于陕西、河南灵宝。

根、茎皮：清热解毒。

**刺叶小檗**　　三颗针(东北)

**Berberis sibirica** Pall.

生于沟谷、干旱阳坡碎石坡下、草原灌丛中。分布于东北及内蒙古、青海玛沁、新疆。

根、根皮：苦，寒。清热燥湿。用于痢疾，泄泻。

**华西小檗**　　黄包刺棵子(湖北)，三颗针、大山黄刺(四川)

**Berberis silva-taroucana** Schneid.

生于海拔 2 000—3 500 米的山坡林下阴湿地。分布于甘肃、湖北、四川西北部至南部、贵州、云南。

根：苦，寒。清热燥湿，止痢止泻。民间代黄连用。

**假豪猪刺**　　刺黄檗(陕西)，刺黄连(陕西、湖北)，铜针刺、土黄柏(甘肃)，排骨筋(湖北)，拟蠓猪刺(秦岭植物志)

**Berberis soulieana** Schneid.——*B. stenophylla* Hance

生于海拔 600—3 000 米的山沟河旁或浅山坡。分布于陕西、甘肃东南部、湖北西部、四川东部及北部。

根皮、茎皮(三颗针)：苦，寒。清热泻火。用于咽喉痛，目赤，乳痈，泄泻，痢疾，胆囊炎，急性肝炎。

附　注：① 本种在产地是提取黄连素的主要原料之一。②《中华人民共和国药典》1985 年版附录收载。

**独龙小檗**

**Berberis tarenensis** Ahrendt

生于海拔 2 030—2 600 米处林下或灌丛中。分布于云南西北部，西藏察隅、波密、[illegible]麦、墨脱、林芝。

根：为提取黄连素的原料植物。

北京中医药大学 图书

**日本小檗**

**Berberis thunbergi** DC.

原产日本。全国部分地区庭园栽培。

全株：清热燥湿，泻火解毒。

**蓝果小檗**　三颗针(湖南、四川)

**Berberis veitchii** Schneid. ——*B. gagnephinii* Schneid. var *lanceifolia* Ahrendt

生于海拔2 000—4 000米的高山灌丛中或山坡水沟边。分布于湖北西部、湖南、四川、贵州、云南北部。

根：清热解毒，燥湿，泻火，利尿。为提取黄连素原料植物。

**匙叶小檗**　黄刺(甘肃)，三颗针、黄檗(新疆)

**Berberis vernae** Schneid. ——*B. caroli* Schneid. var. *hoanghensis* Schneid.

生于河谷滩地、戈壁滩或山坡灌丛中。分布于内蒙古、陕西、甘肃、青海、新疆。

根(三颗针)：清热解毒。用于痢疾。

**疣枝小檗**

**Berberis verruculosa** Hemsl. et Wils.

生于海拔2 000—4 000米的高山地带山坡林下或山谷岩石上。分布于甘肃、四川。

根：民间用于清热祛火。

**变绿小檗**

**Berberis virescens** Hook. f. et Thoms.

生于海拔3 600—4 100米的高山灌丛中。分布于我国西藏东南部。

根：用于目赤。

**庐山小檗**　黄疸树(江苏、浙江)，土黄檗、黄刺柏(浙江、江西)，土黄连(江西、广西)，树黄连(福建、广东、广西)

**Berberis virgetorum** Schneid

生于海拔1 500米以下的山地灌丛中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、贵州。

根、茎(黄疸树)：苦，寒。清热解毒，利湿，健胃。用于吐泻，口疮，目赤，肝炎，胆囊炎，痢疾，淋浊带下，湿疹，丹毒，无名肿毒，烧、烫伤。

附　注：本种在中南及华东地区是提取黄连素最主要的原料植物。

**普通小檗**　刺檗(甘肃)，欧洲小檗(拉英汉种子植物名称)

**Berberis vulgaris** L.

生于灌丛、阳坡、河谷。分布于甘肃。

茎皮：清热燥湿，泻火解毒。

**金花小檗**　猫儿刺(湖北)，小叶三颗针、刺黄芩、土黄连(四川)，小黄连刺，小鸡脚黄刺(云南)

**Berberis wilsonae** Hemsl. et Wils.

生于海拔1 500—3 500米山坡灌丛中或山间路旁。分布于湖北、四川西北部、贵州、云南。

根(三颗针)：苦，寒。清热解毒，止痢。用于咽喉痛，乳蛾，目赤，痢疾，痈肿疮毒，劳伤吐血。亦为提取黄连素的原料植物。

**黄枝小檗**

**Berberis xanthoclada** Schneid.

生于山坡灌丛中。分布于贵州梵净山、江口。

根：清热燥湿，泻火解毒。

**黄皮小檗**

**Berberis xanthophloea** Ahrendt

生于海拔 2 800—3 500 米的山坡林下、林缘、灌丛中、河谷阶地及沟边。分布于我国西藏东南部。

根：清热解毒。用于目赤。

## 红毛七属　Caulophyllum Michx.

**红毛七**　藏严仙(东北)，背阳草(湖南)，红毛三七(四川)，细毛细辛(贵州)，竹参七(云南)，威岩仙(拉汉英种子植物名称)，类叶牡丹(中国高等植物图鉴)

**Caulophyllum robustum** Maxim. ——*Leontice robustum* (Maxim.) Diels

生于海拔 950—3 000 米的山地密林中。分布于东北、华北、西南及陕西、甘肃、宁夏、安徽、浙江、河南、湖北、湖南。

根、根状茎(红毛七)：苦、辛，温。有小毒。祛风通络，活血调经，清热解毒。用于风湿筋骨痛，跌打损伤，乳蛾，月经不调，痛经。

附　注：本种提取物对实验动物有明显降压作用。所含塔斯平碱对结核杆菌有显著的抑制作用；并证明有很好抗炎作用。

## 山荷叶属　Diphylleia Michx.

**山荷叶**

**Diphylleia grayi** Fr. Schmidt

生于山坡阴湿处或山地林下。分布于东北。

根、根状茎：甘、微辛，温。有毒。破瘀，通淋，止痛。用于筋骨痛，跌打损伤。

附　注：所含的鬼臼毒素有抑制肿瘤的作用。

**南方山荷叶**　窝儿七、窝儿参、一把伞(陕西、甘肃)，江边一碗水、金边七(湖北)

**Diphylleia sinensis** Li

生于海拔 3 500 米以下的背阴、湿润的混交林中或山谷沟边。分布于陕西、甘肃、宁夏、河南、湖北、四川、云南。

根、根状茎：苦、辛，凉。有毒。祛风除湿，破瘀散结，解毒，活血止痛。用于风湿关节痛，骨蒸痨热，跌打损伤，月经不调，疮肿痈疖，毒蛇咬伤。

附　注：本种为目前用于提取鬼臼毒素的原料植物。

## 八角莲属　Dysosma R.E. woods.

**云南八角莲**　八角莲、多花八角莲(云南)

**Dysosma aurantiocaulis** (Hand. -Mazz.) Hu——*Podophyllum aurantiocaule* Hand.-Mazz.

生于海拔2 400—3 300米的山坡、山谷、杂木林下阴湿处。分布于贵州安顺、遵义，云南漾濞、盐津、维西、茨开。

根状茎：甘、辛，凉。有小毒。清热解毒，活血散瘀。用于毒蛇咬伤，痈肿疮疖，瘰疬，腹痛，痄腮，跌打损伤，乳腺癌。

**白八角莲**

**Dysosma chengii** (Chien) Chen——*Podophyllum chengii* Chien

生于山坡林下。分布于贵州。

根状茎：滋阴补肾，清肺润燥，拔毒消肿。用于体虚头晕，阳痿，劳伤筋骨痛，胃痛，骨折，无名肿毒。

**小八角莲**　单叶一枝花、荷叶莲、药中王(湖南)，铁骨散(贵州)，憋糯亮(壮语)

**Dysosma difformis** (Hemsl. et Wils.) T. H. Wang ex Ying——*Podophyllum difforme* Hemsl. et Wils.; *P. triangula* Hand. -Mazz.

生于阴湿山谷及山地密林下。分布于湖北、湖南、广西、四川、贵州。

根、根状茎：甘、微辛，凉。有小毒。清热解毒，散结祛瘀。用于风热咳喘，目赤，咽喉痛，痄腮，乳蛾，瘰疬，胃、腹疼痛，痈肿疮疖，缠腰火丹，毒蛇咬伤，跌打损伤。

**毛八角莲**

**Dysosma hispida** (Hao) Chun——*Podophyllum hispidum* Hao

生于深谷溪边。分布于广东博罗。

根：散结祛瘀。

**乌云伞**　八角莲(湖北)

**Dysosma lichuanensis** Z. Cheng

生于沟谷林阴下。分布于湖北恩施和咸丰、四川。

根、根状茎：清热解毒，排脓生肌。用于蛇虫咬伤，跌打损伤。

**贵州八角莲**　白八角莲、叶子花(贵州)

**Dysosma majorensis** (Gagnep.) Ying——*Podophyllum majorense* Gagnep.

生于山谷、山坡杂木林下阴湿处。分布于湖北西部、广西、四川、贵州。

根状茎：甘、微苦，平。滋阴补肾，清肺润燥，拔毒消肿，止痛。用于劳伤筋骨痛，体虚，胃痛。

**六角莲**　独脚莲、八角金盘(浙江)，八角莲(贵州)，鬼臼(神农本草经)

**Dysosma pleiantha** (Hance) Woods.——*Podophyllum pleianthum* Hance

生于山谷、山坡杂木林下阴湿处。分布于安徽、浙江、江西、福建、台湾、河南、湖北、广东、广西、四川。

根状茎(八角莲)：苦、辛，平。有小毒。清热解毒，祛瘀消肿，化痰散结。用于痈肿疔

疮，瘰疬，咽喉痛，跌打伤痛，毒蛇咬伤。

附　注：本种为目前提取抗癌有效成分鬼臼毒素的原料植物之一。

**川八角莲**　八角金盘、金盘银盘、独脚莲(四川)，山荷花、五朵云(云南)

**Dysosma veitchii** (Hemsl. et Wils.) Fu ex Ying——*Podophyllum veitchii* Hemsl. et Wils.

生于山地密林下阴湿处。分布于湖北、四川、贵州、云南。

全草、根状茎(八角莲)：苦，温。有毒。追风散毒，止痛，杀虫。用于腰痛，劳伤吐血，疔毒恶疮，疥癣。

**八角莲**　八角乌(通称)，一碗水、窝儿七(陕西)，独角莲(江西、广东)，独叶一枝花(广东、广西)，八角盘(贵州)

**Dysosma versipellis** (Hance) M. Cheng ——*Podophllum versipelle* Hance

生于阴湿山谷阔叶林下、竹林及溪谷阴湿草丛中。分布于中南及陕西、安徽、浙江、江西、福建、四川、贵州、云南。

根状茎(鬼臼)：苦、辛，温。有毒。舒筋活血，散瘀消肿，排脓生肌，除湿止痛。用于跌打损伤，劳伤，咳嗽，腰腿痛，胃痛，瘰疬，小儿惊风，胆囊炎，毒蛇咬伤。

附　注：本种为提取鬼臼毒素(抗癌有效成分)的原料植物之一。

## 淫羊藿属　Epimedium L.

**粗毛淫羊藿**　淫羊藿(四川、云南)，三枝九叶草、小定药(云南)

**Epimedium acuminatum** Franch. ——*E. komarovi* Lévl

生于海拔1 400　2 400米的山沟阴湿处或山坡丛林下。分布于湖北西部、广西，四川、贵川、云南。

全草(尖叶淫羊藿)：辛，温。补肾壮阳，祛风除湿。用于肾虚阳痿，遗精，风湿痛，四肢麻木，肾虚。

附　注：本种在贵州、广西、四川、云南地区作淫羊藿收购和使用。

**淫羊藿**　野黄连、鬼见愁、含阴草(陕西)，短角淫羊藿(秦岭植物志)

**Epimedium brevicornum** Maxim. ——*E. ratundatum* Hao

生于海拔2 300米以下的山地灌丛中阴湿处。分布于西北及山西、河南、四川。

全草(淫羊藿)：辛，温。补肾壮阳，强筋骨，祛风湿。用于腰膝软弱，阳痿，风湿关节痛，四肢麻木。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。　②功效相同的有**巫汶淫羊藿** **E. platypetalum** K. Mey.，分布于陕西南部、四川。

**川滇淫羊藿**　淫羊藿(湖北、云南、滇南本草)，三哑草(湖北)，兴阳草(滇南本草)。

**Epimedium davidi** Franch. ——*E. membranaceum* K. Mey.

生于海拔2 400米以下的阴湿山坡及灌丛下。分布于湖北西部、四川、贵州、云南中部、东北部及西北部。

全草：补肾壮阳，祛风除湿。　根状茎：用于劳伤，风湿痛。

附　注：本种在四川、湖北地区作羊淫藿收购。

**川西淫羊藿**　淫羊藿(四川),羊藿(四川中药志)

**Epimedium elongatum** Kom.

生于阴湿山坡及灌丛下。分布于四川西北部、贵州东南部。

全草：辛、甘,微温。补肾壮阳,祛风除湿。用于肾虚,阳痿早泄,筋骨挛急,风湿痹痛。

**川鄂淫羊藿**

**Epimedium fargesii** Franch.

生于山地针阔叶混交林中。分布于湖北、四川。

全草：补肾壮阳,祛风除湿。

**湖南淫羊藿**　淫羊藿(湖南),阴阳合(广西)

**Epimedium hunanense** (Hand. -Mazz.) Hand. -Mazz. ——*E. davidi* Franch. var. *hunanense* Hand. -Mazz.

生于山谷或阴坡草丛中。分布于河南、湖北、湖南、广西、贵州。

全草：辛,温。补肾壮阳,强筋壮骨。用于精少不育,肾虚腰痛,手足麻木。

附　注：本种在湖南、贵州作淫羊藿收购。

**朝鲜淫羊藿**　羊藿刺、三枝九叶草、淫羊藿(东北),仙灵脾(唐本草)

**Epimedium koreanum** Nakai

生于阔叶林下阴湿处及灌丛中。分布于吉林、辽宁。

全草(淫羊藿)：辛、甘,温。补肝肾,益精,祛风湿。用于阳痿,遗精,早泄,风湿痹痛,四肢麻木,月经不调,肾虚喘咳,胸痛。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**黔岭淫羊藿**　淫羊藿(湖北、贵州)

**Epimedium leptorrhizum** Stearn

生于林下阴湿处及灌丛中。分布于湖北、贵州。

叶：补肝肾,祛风湿。根状茎：苦。清火,祛风。用于风湿痛,劳伤,眩晕。

附　注：本种在贵州、四川部分地区作淫羊藿收购。

**柔毛淫羊藿**　淫羊藿(陕西)

**Epimedium pubescens** Maxim.

生于山沟阴湿处或山坡林下。分布于陕西、甘肃、安徽、河南、湖北、四川、贵州。

全草(淫羊藿)：补肾壮阳,祛风除湿。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**三枝九叶草**　淫羊藿(通称),铁箭头(浙江),阴阳合(江西、福建),乏力草(福建),三叉骨(湖南),箭叶淫羊藿(浙江药用植物志)

**Epimedium sagittatum**(Sieb. et Zucc.) Maxim. ——*Aceranthus sagittatus* Sieb. et Zucc.

生于山坡林下灌丛中或山沟、竹林下及路旁石缝中。分布于陕西、甘肃、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东北部、广西、四川、贵州、云南。

全草(淫羊藿)：辛,温。祛风除湿,补肾壮阳。用于阳痿,劳倦乏力,风湿痛,跌打损伤,小儿麻痹后遗症,劳伤咳嗽,高血压症。

附　注：①药理实验证明有镇咳,祛痰,降压,抗炎作用。②《中华人民共和国药典》

1990 年版收载。

**单叶淫羊藿**

**Epimedium simplicifolium** T. S. Ying

生于灌木林下。分布于贵州务川、正安。

根、叶：补肾壮阳，祛风除湿。

附　注：贵州特有药用植物。

**四川淫羊藿**　　淫羊藿(四川)

**Epimedium sutchuenense** Franch.

生于山坡林下或路旁。分布于湖北、四川。

全草：补肾益肝，祛风除湿。用于阳痿，风湿痛。

附　注：本种在四川部分地区作淫羊藿收购。

**巫山淫羊藿**

**Epimedium wushanense** T. S. Ying

生于山坡路旁。分布于陕西、四川、贵州。

全草：补肾壮阳，祛风止咳。

附　注：①本种在四川巫山、陕西、贵州作淫羊藿收购。②《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 鲜黄连属　Jeffersonia Barton

**鲜黄连**　　毛黄连(吉林)，细辛幌子、毛黄连(辽宁)

**Jeffersonia dubia** (Maxim.) Benth. et Hook. f.——*Plagiorhegma dubia* Maxim.

生于山坡灌丛中、杂木林及针阔叶混交林下。分布于东北。

根状茎(鲜黄连)：苦，寒。清热解毒，健胃止泻。用于口舌生疮，乳蛾，头晕，目赤，泄泻，痢疾，衄血，湿热痹痛。

附　注：①本种在吉林朝鲜族代黄连用。②国外临床用根治风湿症，梅毒，泄泻，并用于眼科疾患的洗眼消炎剂。

## 牡丹草属　Leontice L.

**牡丹草**　　荒漠牡丹草(中国沙漠植物志)

**Leontice incterta** Pall.

生于荒漠地区。分布于新疆阜康，呼图壁、玛纳斯。

根状茎：用于心悸。

**江南牡丹草**　　玉龙擒珠(浙江)

**Leontice kiangnanensis** P. L. Chiu

生于山坡林下阴湿草丛中。分布于浙江西部。

根、根状茎：止痛。民间用于跌打损伤。

## 十大功劳属　Mahonia L.

**阔叶十大功劳**　刺黄芩(陕西)，土黄柏(江西、福建)，刺黄连(四川)，土黄连(贵州)，醒斗喊(傣语)，肥汪恋(壮语)

**Mahonia bealei** (Fort.) Carr.——*Berberis bealei* Fort.

生于山坡、山谷林下、林缘或庭园栽培。分布于华东、中南及北京、陕西、甘肃、四川、贵州。

根(茨黄连)、茎(功劳木)：苦、寒。清热解毒，除湿消肿。用于目赤，痈疽疔毒、衄血。叶：用于骨蒸潮热，头晕耳鸣，目赤。

附　注：本种尚可作兽药，用于牛肺病，咳嗽；配制土农药，可杀孑孓、粘虫、稻苞虫等。

**巴东十大功劳**　十大功劳(湖北)

**Mahonia bodinieri** Gagnep.

生于山坡林中。分布于湖北巴东、利川。

根：清热解毒，活血消肿。

附　注：湖北特有药用植物。

**芦茎十大功劳**

**Mahonia calamicaulis** Spague et Fisch.

生于海拔 2 500 米左右的山坡林下。分布于我国西藏南部及东南部。

叶：苦，寒。止咳化痰，清热解毒，泻火燥湿。用于咳嗽，虚劳发热，腰酸腿软，头昏耳鸣，痢疾，目赤肿痛，痈肿疮毒。

附　注：我国西藏特有药用植物。

**鄂西十大功劳**　刺黄连(鄂西)

**Mahonia decipiens** Schneid.

生于山坡林中。分布于湖北西部。

根：清热解毒，燥湿。果实：清火。

附　注：湖北特有药用植物。

**宽苞十大功劳**　刺黄芩(四川)

**Mahonia eurybracteata** Takeda

生于山坡林中。分布于四川。

根、清肺热，泻火。

**大叶刺黄柏**　刺黄连、刺黄芩、老鼠刺(贵州)

**Mahonia fargesii** Takeda

生于山坡林中。分布于湖北、贵州。

根、全草：苦，寒。清热解毒。用于泄泻，痢疾，风热感冒，目赤，头晕耳鸣，黄疸，湿疹。

**黄十大功劳**　刺黄柏、大黄连、细叶十大功劳(云南)

**Mahonia flavida** Schneid.

生于海拔1 000—2 810米的山坡林中。分布于贵州、云南。

全株：苦，寒。清热解毒，止泻，滋阴。用于黄疸，感冒，泄泻，痢疾，高血压症，跌打损伤。

**广东十大功劳**　山黄连(广东)

**Mahonia fordii** Schneid.

生于山坡林中。分布于广东。

根、茎：清火解毒。用于痢疾，泄泻。

**十大功劳**　山黄连(江西)，西风竹(江西、福建)，竹叶黄连、木黄连(广东)，醒斗喊(傣语)，肥恋(壮语)

**Mahonia fortunei** (Lindl.) Fedde

生于山坡林下或灌丛中，庭园多有栽培。分布于中南及北京、内蒙古、安徽、江苏、浙江、江西、福建、四川、贵州。

全株(功劳木)：微苦，寒。清热解毒，止痢。用于痢疾，泄泻，黄疸，关节痛，目赤，湿疹疮毒，烧、烫伤。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**甘平十大功劳**　刺黄柏(四川)，湖北十大功劳(中国高等植物图鉴)

**Mahonia ganpinensis** (Lévl.) Fedde——*Berberis ganpinensis* Lévl.; *M. confusa* Sprague

生于山地灌丛中。分布于湖北西部、四川、贵州。

根：苦，寒。清热解毒，止泻。用于痢疾，目赤肿痛，痈肿疮毒。

**细梗十大功劳**　刺黄柏(湖北、中国高等植物图鉴)

**Mahonia gracilipes** (Oliv.) Fedde

生于山地丛林中。分布于湖北、湖南、四川、贵州。

枝内皮：苦，寒。清热解毒，健胃止泻，杀虫。用于痢疾，吐泻，肺痨；外用于烧、烫伤，湿疹，黄水疮。　果实：清火。

**刺黄连**　刺黄柏(湖北)

**Mahonia gracilipes** (Oliv.) Fedde var. **epruinosa** Ying

生于山地岩石缝中。分布于湖北。

根：用于黄疸，痈疽疮毒。

附　注：湖北特有药用植物。

**蒙自十大功劳**　土黄连

**Mahonia hancokiana** Takeda

生于海拔1 000—2 850米的山坡丛林中。分布于云南红河州。

全株：苦、凉。清热解毒，化痰止咳，止泻。用于肺痨咳嗽，咳血，泄泻，痢疾，目赤。

附　注：本种在产地尚作提取黄连素的原料。

**华南十大功劳**　黄刺柏(福建)，土黄柏(福建、广东)，土黄连(广东)

**Mahonia japonica** (Thunb.) DC.——*Ilex japonica* Thunb.

生于山地灌丛中。分布于浙江、江西、福建、台湾、广东、湖北、四川、贵州。

根(茨黄连)、茎：苦，寒。清热泻火，消肿解毒。用于泄泻，黄疸，肺痨，潮热，目赤，带下病，风湿关节痛，痈疽臁疮。

**滇刺黄连**　　鸭脚黄连、大黄连、刺黄柏(云南)

**Mahonia mairei** Takeda

生于海拔1 900—2 300米的山地背阴处。分布于广西那坡，贵州，云南楚雄州、昆明、西盟。

全株：苦，凉。清热补虚，止咳化痰。用于骨蒸潮热，头晕耳鸣，感冒咳嗽，牙龈肿痛，口疮，胃脘痛胀，胆囊炎，烧、烫伤。

**尼泊尔十大功劳**

**Mahonia napaulensis** DC.

生于海拔1 750—2 700米的林下或山脚。分布于云南、西藏。

根、茎：清热解毒。用于痢疾。

**无刺十大功劳**　　木黄连、土黄连(华南)

**Mahonia shenii** Chen

生于山坡林下或灌丛中。分布于江西、广东、广西。

根：清热解毒。用于吐泻，痢疾，肝炎，感冒，咳嗽，小便淋痛，烧、烫伤。

**长阳十大功劳**　　刺黄柏、刺黄芩、老鼠刺(湖北)

**Mahonia sheridaniana** Schneid.

生于山坡林中。分布于湖北长阳。

根、茎：苦，寒。清热泻火，止泻，明目。用于痢疾，感冒，目赤肿痛，黄疸，湿疹，疮痈，烧、烫伤。

附　注：湖北特有药用植物。

**半复瓦十大功劳**　　小功劳(广西)

**Mahonia subimbricata** Chun et F. Chun

生于山地灌丛中。分布于广西乐业、那坡、靖西。

根、茎：用于痢疾，肝炎，肺热咳嗽，肺痨，目赤，烧、烫伤。

附　注：广西特有药用植物。

## 南天竹属　Nandina Thunb.

**南天竹**　　山黄芩(湖南、广东)，万寿竹(广西)，山黄连(四川)，岩黄连(贵州)

**Nandina domestica** Thunb.

生于山坡灌丛中或山谷旁，各地庭园多有栽培。分布于华东、中南及内蒙古、陕西、四川、贵州。

根(南天竹根)、茎(南天竹梗)、叶：苦，寒。清热解毒，活血凉血，祛风止痛。用于目赤，消化不良，吐泻，小便淋痛，感冒发烧，风湿痛，跌打损伤。果实(南天竹子)：止咳平喘。用于咳嗽气喘。

## 桃儿七属　Sinopodophyllum Ying

**桃儿七**　　铜筷子(陕西)，鸡素苔(陕西、甘肃)，蒿果(甘肃)，鹅木塞(藏名)，小叶莲

(中国民族药志)

**Sinopodophyllum hexandrum** (Royle) Ying ——*Podophyllum hexandrum* Royle; *S. emodii* (Wall.) Ying; *P. emodii* Wall. ex Royle

生于海拔 2 700—4 300 米高山草丛中、林下或灌丛中。分布于西南及陕西、甘肃、宁夏、青海、湖北。

根、根状茎：苦，寒。有毒。利气活血，止痛，止咳，祛风除湿。用于风湿痹痛，咳喘，跌打损伤，月经不调。果实：甘，平。有小毒。活血通经，止咳平喘，健脾理气。用于劳伤咳喘，腰痛，月经不调，胎盘不下，带下病，宫颈癌。

附　注：本种所含鬼臼毒素为抗癌有效成分，亦为提取该类成分的原料植物。

## 41. 大血藤科　Sargentodoxaceae

### 大血藤属　Sargentodoxa Rehd. et Wils.

**大血藤**　大活血、血藤(陕西)，红菊花心、红藤(浙江)，槟榔钻(广西)，阿格牧(苗语)，血木通(中药志)

**Sargentodoxa cuneata** (Oliv.) Rehd. ex Wils.——*Holboellia cuneata* Oliv.

生于山坡疏林或溪边，亦有栽培。分布于陕西、江苏南部、安徽、浙江、江西、河南、湖北、湖南、广西、四川、云南东南部。

茎藤(大血藤、红藤)：苦，平。活血通络，祛风除湿，强筋壮骨，败毒，杀虫。用于风湿痹痛，跌打损伤，肠痛，痢疾，经闭腹痛，肠道寄生虫病。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 42. 木通科　Lardizabalaceae

### 木通属　Akebia Decne.

**木通**　八月炸、八月瓜、野香蕉(江苏)，冷饭包(浙江)，野毛蛋(安徽)，腊瓜(湖南)

**Akebia quinata** (Thunb.) Decne.——*Rajania quinata* Thunb.

生于山坡、疏林或园圃，常缠绕于其他植株上。广布于北起陕西，南至广东、广西，东至东南沿海各省，西达四川。

果实(预知子)：甘，寒。舒肝理气，活血止痛，除烦，利尿。用于肝、胃气痛，消化不良，腰、胁痛、疝气，痛经，痢疾。　茎藤(木通)、根(木通根)：苦，寒。清热利尿，通经活络，镇痛，排脓，通乳。用于小便淋痛，风湿关节痛，月经不调，乳汁不通。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②《新华本草纲要》考证，预知子的原植物应为**三叶木通 A. trifoliata** (Thunb.) Koidz.

**三叶木通**　预知子(开宝本草)，八月札(饮片新参)

**Akebia trifoliata** (Thunb.) Koidz.——*Clematis trifoliata* Thunb.

生于海拔 500—2 000 米的山坡林缘或灌丛下。分布于河北、山西、陕西、甘肃、山东

及长江流域各省。

果实(预知子)、茎藤(木通)及根：功效同木通。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**白木通**　青木香、青防己(云南)，三叶木通、八月瓜藤(中国高等植物图鉴)

**Akebia trifoliata** (Thunb.) Koidz. var. **australis** (Diels) Rehd.——*A. lobata* Decne. var. *australis* Diels

生于荒野山坡、溪边、山谷疏林或灌丛半阴湿处。广布于长江流域各省，北至山西、陕西，河南，西南至云南。

果实(预知子)、茎藤(木通)及根：功效同木通。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

## 猫儿子属　Decaisnea Hook. f. et Thoms.

**猫儿子**　猫屎瓜(陕西)，矮杞树(四川)，都哥杆(贵州)，猫屎包、鸡肠子(云南)

**Decaisnea fargesii** Franch.

生于阴山坡或山沟杂木林下。分布于西南及陕西南部。安徽、浙江、江西、湖北、湖南，广西。

根(猫儿屎)、果实：甘，凉。清肺止咳，润燥，祛风除湿。用于肺痨咳嗽，风湿关节痛。果实浓煎剂：用于皮肤皲裂及肛裂。

## 鹰爪枫属　Holboellia Wall.

**鹰爪枫**　八月札(浙江)，牛千斤、八月瓜(云南)

**Holboellia coriacea** Diels

生于海拔500—1 200米的山坡杂木林中或路旁石崖上。分布于陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、广西、四川、贵州。

根：微苦，寒。祛风活血。用于风湿筋骨痛。　茎藤：作木通用。　果实：作预知子用。

**紫花牛姆瓜**　五月藤、五月腊、腊藤(湖北)，野人瓜、八月瓜(果)、八月札、木通(四川、云南)，五月瓜藤(中国高等植物图鉴)

**Holboellia fargesii** Réaub.

生于海拔700—1 200米的杂木林中。分布于西南及陕西南部、福建、湖北、广东。

果实、茎藤：利湿，通乳，解毒。用于胃痛，风湿痛，跌打损伤。

附　注：本种在四川作八月札、木通入药。

**牛姆瓜**

**Holboellia grandiflora** Réaub.

多生于杂木林中。分布于陕西、湖北、四川、贵州。

茎藤、果实：功效同木通。

**五风藤**　牛腰子果、大木通、八月瓜、八月札(云南)

**Holboellia latifolia** Wall.

生于山地杂木林下或灌丛中。分布于西南。

茎藤、果实(五风藤果)：苦，凉。利湿，通乳，解毒，止痛。用于小便淋痛，脚气浮肿，乳汁不通，胃痛，风湿痛，跌打损伤。

附　注：功效相同的有**狭叶牛姆瓜 H. angustifolia** Wall.，分布于四川西昌。

## 串果藤属　Sinofranchetia Hemsl.

**串果藤**

**Sinofranchetia chinensis** (Franch.) Hemsl.——*Parvatia chinensis* Franch.

生于山谷及山坡阔叶林中。分布于陕西南部、甘肃东南部、湖北西部、湖南西部、四川及云南东北部。

茎藤：祛风除湿，舒筋活血。

附　注：①我国特有属。②陕西以本种作木通用。

## 野木瓜属　Stauntonia DC.

**短药野木瓜**　　罗卜藤、蒙姑芦(广西)

**Stauntonia brachyanthera** Hand.-Mazz.

生于山地杂木林中、山坡路旁潮湿处及溪边。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、广东、广西、四川、贵州。

茎藤、叶、果实：甘，温。舒筋活络，解毒，利尿，调经止痛。用于风湿关节痛，跌打损伤，小便淋痛，月经不调。

**西南野木瓜**　　九叶木通(广西)，六月瓜(贵州)

**Stauntonia cavalerieana** Gagnep.

生于山地灌丛、林缘及山谷。分布于广西、贵州。

根：舒筋活络，调气补虚，止痛，止痢。用于风湿痛，劳伤咳嗽，肾虚腰痛，痢疾。

果实：用于小便淋痛。

**野木瓜**　　拿绳(浙江)，假荔枝、七叶莲(江西、广东)，牛藤(广西)，五叶木通(四川)，五爪野金龙(植物名实图考)

**Stauntonia chinensis** DC.

生于山谷杂木林缘或溪旁灌丛中。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根(野木瓜)、茎、叶：甘，温。舒筋活络，散瘀止痛，利尿消肿，调经。用于风湿痛，跌打损伤，痈肿，水肿，小便淋痛，月经不调。

附　注：①本种有较强的镇痛作用，能抑制肠道平滑肌运动，缓解由乙酰胆碱所引起的平滑肌痉挛性收缩。②功效相同的有**白背叶木瓜；S. glauca** Merr. et Mete. **斑叶野木瓜 S. maculata** Merr. 及**倒卵叶野木瓜 S. obovata** Hemsl.

**牛藤**　　野木瓜(广西)

**Stauntonia hexaphylla** (Thunb.) Decne.——*Rajania hexaphylla* Thunb.

生于山坡灌丛中或林缘。分布于广东、广西。

茎藤、根：微苦，寒。强心，利尿，镇静，止痛。用于各种疼痛。　果实、核仁：用于蛔虫病。

**木通七叶莲**　五指那藤、七叶莲、牛藤、那藤(广西)

**Stauntonia hexaphylla** (Thunb.) Decne. f. **intermedia** Wu

生于杂木林及灌丛中。分布于湖南、广东、广西。

茎(七姐妹藤)、叶：祛瘀止痛，利水消肿。用于跌打损伤，风湿痛，各种神经痛，水肿，小便淋痛。

**尾叶野木瓜**　尾叶那藤(中国高等植物图鉴)

**Stauntonia hexaphylla** (Thunb.) Decne. f. **urophylla** Hand.-Mazz.

生于山坡或疏林中。分布于浙江、江西、福建、湖南、广东、广西。

茎、叶：用于风湿痛，跌打损伤，水肿。

## 43. 防己科　Menispermaceae

### 崖藤属　Albertisia Becc.

**崖藤**　崖爬藤(中国种子植物科属词典)

**Albertisia laurifolia** Yamam.——*A. perryana* H. L. Li

常生于密林中。分布于海南中部及南部、广西南部、云南。

根：用于感冒发热，痧症，小便短小、黄赤。

### 古山龙属　Arcangelisia Becc.

**古山龙**　黄连藤、黄藤、黄胆槐(广东)，黄丁课(黎族语)，向更梅(瑶族语)，钩影(壮语)

**Arcangelisia gusanlung** H. S. Lo

生于山谷及山地林中。分布于海南西部及南部。

根(古山龙)：苦，寒。有小毒。清热解毒，利湿，泻火，止痛，杀虫。用于疟疾，肺痨，胃脘痛胀，乳蛾，痢疾，泄泻，高血压症，神经性头痛，疖肿；外用于湿疹，皮炎，瘙痒症，目赤。

附　注：①《新华本草纲要》中本种用 **A. loureiri** (Pierre) Diels 一名，著者认为，**A. gusanlung** H. S. Lo 主要特点是内果皮被锈色皱卷长毛，而其余与 **A. loureiri** 无异，因此仍保留原学名。②本种对金黄色葡萄球菌，溶血性链球菌有抑制作用。

### 球果藤属　Aspidocarpa Hook. f. et Thoms.

**球果藤**　盾核藤(西双版纳植物名录)

**Aspidocarpa uvifera** Hook f. et Thoms

生于山林灌丛中或林缘。分布于贵州、云南。

根：苦，寒。理气活血，通淋利湿。用于风湿痛，劳伤，水肿。

## 锡生藤属　Cissampelos L.

**锡生藤**　呀呼噜、亚红隆(傣语)

**Cissampelos pareira** L. var. **hirsuta** (Buch.-Ham. ex DC.) Forman——*C. hirsuta* Buch.-Ham. ex DC.; *C. nepalensis* Rholes

生于河边草地、沙滩、荒地、山坡常绿阔叶林中或灌丛中。分布于广西、贵州、云南、西藏。

全株(亚乎奴)：淡、微麻，温。麻醉止痛，止血生肌。用于跌打损伤，挤压伤，创伤出血，风湿腰疼。民间尚用于心脏病。其所含生物碱作肌肉松弛剂原料。

附　注：①锡生藤新碱在组织培养中对人鼻、咽喉癌细胞有抑制作用。②《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 木防己属　Cocculus DC.

**衡州乌药**　木防己、托食茶、十八症(广西)，土巴戟(四川)，樟叶木防己(海南植物志)

**Cocculus laurifolius** DC.

生于低、中海拔山地林缘或疏林下。分布于西南及江西、福建、台湾、湖南、广东、广西。

根(衡州乌药)、全株：苦，凉。散瘀消肿，祛风止痛，消食止泻。用于风湿腰腿痛，跌打肿痛，泄泻，腹痛，头痛，疝气。

**木防己**　土木香(江苏、江西)，白木香(浙江、江西)，黑皮青木香(江西)，钻骨龙(江西、广东)，小青藤(湖南)，百解薯(云南)

**Cocculus orbiculatus** (L.) DC.——*Menispermum orbiculatum* L.; *C. trilobus* (Thunb.) DC.

生于疏林下、灌丛中或山坡路边林缘。分布于华东及河北、山西、陕西、甘肃、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根状茎(黑皮青木香)：苦、辛，寒。祛风止痛，行水消肿。用于风湿痛，神经痛，咽喉痛，水肿，痈肿疮毒，毒蛇咬伤。

**毛木防己**　穿心龙(湖南)，防己、追风散、金锁匙(云南)

**Cocculus orbiculatum** (L.) DC. var. **mollis** (Wall. ex Hook. f. et Thoms.) Hara——*C. mollis* Wall. ex Hook. f. et Thoms.; *C. leuissimus* Gagnep.; *C. mokiangensis* Lien

生于山坡林缘灌丛中。分布于湖南、广西、贵州、云南。

全株：用于风湿痛，产后风寒，胸膈胀满，水肿，痈疮肿毒。

## 轮环藤属 Cyclea Arnott ex Wight

**毛叶轮环藤** 银不换、散血丹、大叶金锁匙(广东),九条牛、猪肠换(海南),银锁匙(广西),

**Cyclea barbata** Miers——*Cissampelos barbata* Wall.

缠绕于林中、林缘或村边灌木上。分布于广东、海南、广西。

根(银不换): 苦,寒。有小毒。清热解毒,利湿通淋,散瘀止痛。用于感冒风热,咽喉痛,痢疾,腹痛,砂淋,牙痛,跌打损伤。

附 注: 功效相同的有**密花轮环藤 C. glacillima** Diels, 分布于台湾、海南、广西。

**粉叶轮环藤** 乌皮龙、黑皮蛇(江西),金锁匙、百解藤(广东),金线风、凉粉藤(广西)

**Cyclea hypoglauca** (Schauer) Diels——*Cissampelos hypoglauca* Schauer

生于疏林或灌丛中。分布于江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南。

根(金锁匙、凉粉藤)、茎: 苦,寒。清热解毒,祛风镇痛。用于风寒感冒,咽喉痛,风火牙痛,咳嗽,泄泻,痢疾,小便淋痛,风湿关节痛,疮痈肿毒,毒蛇咬伤。

**海岛轮环藤**

**Cyclea insularis** (Makino) Hatusima——*Cissampelos insularis* Makino

生于山坡林中。分布于我国台湾。

根: 用于风湿痛。

**福建轮环藤**

**Cyclea migoana** Yamam.

生于山林中。分布于福建。

本种所含各种成分具有明显松弛肌肉的作用。

**铁藤** 银不换(海南),棵叶黑(广西),须龙藤、百解藤(云南), 离瓣轮环藤(植物分类学报)

**Cyclea polypetala** Dunn——*C. hainanensis* Merr.

生于中海拔至高海拔的森林中, 常攀附于乔木上。分布于海南东南部、南部和西南部,广西南部,云南东南部至西南部。

根、叶: 苦,寒。清热解毒,利尿,止痛。用于咽喉痛,乳蛾,白喉,牙痛,胃痛, 小便淋痛,痈疮肿毒,毒蛇咬伤。

**轮环藤** 金蚂蝗(湖北),铁石鞭(广西), 青藤细辛、青藤(贵州), 滚天龙(贵州、云南),山豆根(云南)

**Cyclea racemosa** Oliv.

常缠绕于林中或山地路边的乔木或灌木上。分布于陕西、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

根(小青藤香): 苦,寒,有小毒。清热解毒,理气止痛,用于脘、腹疼痛,吐泻, 风湿痛毒蛇咬伤。

**四川轮环藤** 光叶金锁匙(广东、云南),金线风、良藤(云南)

**Cyclea sutchuenensis** Gagnep.

常生于山地沟谷灌丛或林缘，缠绕于树上。分布于湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根、茎藤：苦，寒。有小毒。清热解毒，利水通淋，散瘀止痛。用于风热感冒，小儿惊风，破伤风，咽喉痛，牙痛，腹痛，小便淋痛，痢疾，跌打损伤。

**越南轮环藤**　槟榔花(广西)，小花轮环藤(广西药用植物名录)，南轮环藤（中国高等植物图鉴）

**Cyclea tonkinensis** Gagnep.

生于海拔1 000—1 500米的林中或灌丛中。分布于广西、云南。

根、茎藤：苦，寒。清热解毒，止痛。用于咽喉痛，胃痛，腹痛，风湿痛，月经不调。

## 、称钩风属　Diploclisia Miers

**称钩风**　清风藤、杜藤(浙江)，过山龙(湖南)，花防己(广西)，湘防己、华防己(中药大辞典)

**Diploclisia affinis** (Oliv.) Diels——*Cocculus affinis* Oliv.; *D.chinensis* Merr.

生于林缘或灌丛中。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、贵州、云南。

根、茎：苦，平。祛风除湿，活血祛瘀，利尿。用于风湿关节痛，跌打损伤，小便淋痛。

附　注：浙江、湖北等省以本种作青风藤使用；广西作防己使用。

**苍白称钩风**　蛇总管、土防己(广东)，茎花防己、粉绿称钩风(广西)

**Diploclisia glaucescens** (Bl.) Diels——*Cocculus glaucescens* Bl.

生于低山次生疏林或林缘灌丛中。分布于江西、福建、广东、海南、广西、云南。

茎藤、叶：微苦，寒。清热解毒，祛风除湿。用于风湿痛，小便淋痛，胆囊炎，咽喉痛，痢疾，毒蛇咬伤。

## 天仙藤属　Fibraurea Lour.

**天仙藤**　黄连藤、藤黄连(广东、广西)，土黄连、山大黄(广西)，大黄藤(广西、云南)，黄藤(本草纲目)

**Fibraurea recisa** Pierre

生于山谷密林中。分布于广东、广西、云南。

根、茎(黄藤)：苦，寒。有小毒。清热解毒，利尿。用于咽喉痛，乳蛾，目赤，痢疾，肺痨，疖肿，感冒，烧、烫伤，刀伤。茎、叶：用于腰痛。

## 夜花藤属　Hypserpa Miers

**夜花藤**　夜香藤、青藤(广东)，细红藤(广东、广西)，吼喃浪、豁啷朗、嘿啦姆朗(傣语)

**Hypserpa nitida** Miers

生于林缘灌丛中。分布于福建、广东、海南、广西、云南。

全株(夜花藤)：苦，凉。凉血止血，利尿。用于咳血，吐血，便血，外伤出血。

## 肾子藤属　Limaciopsis Engl.

**肾子藤**　疟疾草(云南)

**Limaciopsis valida** (Diels) H.S. Lo ——*Pachygone valida* Diels

生于海拔 400—1 800 米的密林及林缘或石灰岩灌丛中。分布于广西、贵州、云南。

根、茎：苦，寒。祛风除湿，活血镇痛。用于风湿痛，手足麻木，腰肌劳损。

## 蝙蝠葛属　Menispermum L.

**蝙蝠葛**　野豆根、黄条香(东北、河北、内蒙古)，山地瓜秧(东北)，山豆秧根(内蒙古)，狗骨头(陕西)，金葛子(山东)

**Menispermum dauricum** DC.

生于山地灌丛中或攀援于岩石上。分布于东北、华北、华东及陕西、甘肃、宁夏、四川。

根(北豆根)、茎(蝙蝠藤)：苦，寒。有小毒。清热解毒，祛风止痛。用于咽喉痛，泄泻，痢疾，风湿痹痛，痔疮肿痛，蛇虫咬伤。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②本种提取的总碱制成的成药北豆根片”，用于咽喉肿痛，乳蛾，咳嗽痰喘。

## 粉绿藤属　Pachygone Miers

**粉绿藤**　广西粉绿藤(广西)，华粉绿藤(植物分类学报)

**Pachygone sinica** Diels

生于山坡林下或灌丛中。分布于广东、广西、贵州南部。

根、茎：苦，寒。祛风除湿，止痛。用于风湿痛。

## 莲蕊藤属　Parabaena Miers

**连蕊藤**

**Parabaena sagittata** (wall.) Miers ——*Cissampelos sagittata* Buch. -Ham. ex Wall.

生于杂木林中。分布于广西、贵州、云南、西藏墨脱。

叶：通便。用于便秘。

## 细圆藤属　Pericampylus Miers

**细圆藤**　蛤仔藤(广东)，铁线藤、青藤(广西)、广藤、土藤(广东、广西、云南)，黑风散(云南)

**Pericampylus glaucus** (Lam.) Merr. ——*Menispermum glaucum* Lam.

生于林中或灌丛中。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

藤：苦，凉。祛风镇静，解毒，止咳。用于小儿惊风，破伤风。根：止咳，利咽喉。用于咽喉痛，肺痨，毒蛇咬伤，疮疖。叶：用于无名肿毒，骨折。

附　注：①本种的细茎藤在四川等地作藤椅、藤器的主要原料。②《新华本草纲要》收载有**台湾细圆藤 P. formosanum** Diels；**峨眉细圆藤 P. omeiensis** Lien，但《广东植物志》等载我国仅产细圆藤 1 种。

## 密花藤属　Pycnarrhena Miers ex Hook. f. et Thoms.

**硬骨藤**

**Pycnarrhena poilanei** (Gagnep.) Forman ——*Pridania poilanei* Gagnep.

生于海拔 500 米左右的林中。分布于海南崖县、云南东南部及南部。

根：消肿止痛。

## 青藤属(防己属)　Sinomenium Diels

**青藤**　青风藤(江苏、浙江)，海枫藤(浙江)，汉防己(河南)，大风藤(湖北、贵州)，黑防己(云南)，风藤(中国高等植物图鉴)

**Sinomenium acutum** (Thunb.) Rehd. et Wils. ——*Menispermum acutum* Thunb.

生于山坡路旁、山地林缘或沟边灌丛中，常攀附于树上或石山上。分布于华东、中南及陕西、四川、贵州、云南。

根、茎藤(青风藤)：苦、辛，寒。祛风除湿，止痛，利水，理气消食。用于风湿关节痛，劳损，神经痛，水肿，泄泻，腹痛及毒蛇咬伤。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②本种有镇静，降压和镇咳作用。

**毛青藤**　汉防己(本草纲目)

**Sinomenium acutum** (Thunb.) Rehd. et Wils. var. **cinereum** (Diels) Rehd. et Wils.——*Cocculus divarsifolius* Miq. var. *cinereus* Diels

生于山坡灌丛中或山谷林阴下或沟边。分布于陕西、甘肃、江苏、安徽、湖北、广东、贵州。

茎藤(青风藤)：功效同青藤。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 千金藤属　Stephania Lour.

**白线薯**　山乌龟、波摸硬、保憋(傣语)，短蕊千金藤(全国中草药汇编)，短芯千金藤

(中药大辞典)

**Stephania brachyandra** Diels

生于沟谷、雨林下近水旁。分布于贵州、云南东南部。

块根：苦，寒。有小毒。清热解毒，利湿，止痛。用于胃、腹痛，泄泻，风湿关节痛，疟疾；外用于湿疹，痈疮肿毒。

**金线吊乌龟**　地苦胆(陕西)，金线吊蛤蟆(浙江)，铁秤砣(江西)，白药(广东)，山乌龟(广西)，白药子(图经本草、新华本草纲要)，头花千金藤(植物分类学报)

**Stephania cepharantha** Hayata ex Yamam. ——*S. tetrandra* S. Moore var. *glabra* Maxim.; *S. disciflora* Hand. -Mazz.

生于村边、旷野、山地灌丛中或草丛中。分布于华东及陕西、湖南、广东、广西、四川、贵州。

块根(白药子)：苦，寒。清热解毒，止痛，散瘀消肿。用于胃痛，肝炎，肠痈，痢疾，跌打损伤，毒蛇咬伤；外用于疔肿；神经性皮炎，疖肿。

**景东千金藤**　山乌龟(云南)

**Stephania chingtungensis** H. S. Lo

生于海拔1 200—2 500米的阔叶林下、岩石上或河谷地带。分布于云南西南部及南部。

块根：镇静，理气，止痛。

附　注：云南特有药用植物。

**一文钱**　青藤、藤子内消(广西)，金(铜)钱暗消、铜钱根、小黑藤(云南)

**Stephania delavayi** Diels.——*S. gracciliflora* Yamam.

生于山地常绿阔叶林中。分布于广西、四川南部、贵州西南部、云南。

根(地不容)：苦，寒。理气止痛，祛风除湿。用于胃脘痛，食滞气胀，风湿痛及腰漆痛。

**荷苞地不容**　寒地山乌龟(云南)

**Stephania dicentrinifera** H.S. Lo et M. Yang

生于海拔1 000—1 460(—2500)米的林下多石砾地。分布于云南开远、泸西、宜良、弥勒、蒙自。

块根：镇静。为提取左旋荷苞牡丹碱和生产颅通定原料植物。

附　注：云南特有药用植物。

**血散薯**　山乌龟(通称)，独角乌桕(广东、广西)，一滴血、金不换(广东)，一点血(广西)

**Stephania dielsiana** C.Y. Wu

生于林中、林缘或溪边多石砾处。分布于湖南、广东、广西、贵州南部。

块根：苦，寒。散瘀止痛，解毒。用于胃痛，吐泻，神经痛，牙痛，咽喉痛，跌打损伤，毒蛇咬伤，痈疮肿毒。

附　注：经《新华本草纲要》著者考证，《全国中草药汇编》所载的圆叶千金藤系本种；《中药大辞典》所载的金不换实为本种与海南产的 **S. hainanensis** H.S. Lo et Tsoong 及 **S. succifera** H.S. Lo et Tsoong 的混合物。

**雅丽千金藤**　　雅致千金藤(全国中草药汇编)

**Stephania elegans** Hook. f. et Thoms.

生于山地。分布于云南西南部。

根：苦、辛，寒。祛风活血，消肿解毒。用于风湿关节痛，痈疮肿毒。

**地不容**　　地乌龟、乌龟抢蛋、山乌龟、金丝荷叶、白地胆(云南)，抹汉(傣语)

**Stephania epigaea** H.S. Lo

生于山地常绿阔叶林中。分布于四川、贵州、云南。

块根：苦，寒。有小毒。清热解毒，截疟，镇静，止痛。用于疟疾，胃痛，腹痛，风湿关节痛，痈疽肿毒。

附　注：①本品需炮制后使用，孕妇及体弱者忌服。②本种以往常误用为**一文钱**，其区别在于本种具有大型扁球状块根，而一文钱不具肥大的块根。

**江南地不容**　　伏牵牛(广西)

**Stephania excentrica** H.S. Lo

生于山地阴湿处或林下。分布于江西、福建、湖北、湖南、广西、四川、贵州。

根：苦，寒。理气止痛。用于胃痛，腹胀，腹痛，风湿痹痛，蛇咬伤。

**光千金藤**

**Stephania forsteri** (DC.) A. Gray ——*Cocculus forsteri* DC.

生于林下或路旁。分布于广西、云南。

根：消肿止痛，排脓。

**光叶地不容**　　察隅八勒噶(藏语)

**Stephania glabra** (Roxb.) Miers ——*Cissam pelos glabra* Roxb.

生于林下、路旁。分布于我国西藏。

块根：辛、苦，寒。祛风行水，消肿解毒。

**海南地不容**　　金不换(海南)

**Stephania hainanensis** H.S. Lo et Y. Tsoong

生于林荫石上。分布于海南琼中、白沙、儋县。

块根：苦，寒。消肿解毒，健胃止痛。用于胃痛，吐泻，痢疾，咽喉痛，跌打损伤。

附　注：海南特有药用植物。

**铜锣七**　　乌龟七(湖北)，乌龟梢、乌龟条(四川)，草质千斤藤(植物分类学报)

**Stephania herbacea** Gagnep.

生于山坡路旁、林下或岩石缝隙中。分布于江西、湖北、湖南、广西、四川、贵州。

根：苦，寒。清热解毒，止痛消肿。用于胃痛泛酸，腰痛，劳伤；外用于跌打损伤，口疮，烧、烫伤，蛇咬伤。

**桐叶千金藤**　　牛金藤(四川)，毛千金藤(西藏植物名录)，毛背千金藤(植物分类学报)

**Stephania hernandifolia**(Willd.) Walp.——*Cissampelos hernandifolia* Willd.

生于林缘灌丛中。分布于西南及广西。

根(桐叶千金藤)：苦，凉。清热解毒，通经活络，祛风除湿。用于痈疮肿毒，咽喉痛，口疮，疖腮，痢疾，中暑，风湿关节痛。根、叶：杀虫，止痛。用于风湿痹痛。

**千金藤**　金丝荷叶、天青药(浙江)，小青藤、土广木香(江西)，山乌龟(湖南)，爆竹消(湖南药物志)

**Stephania japonica** (Thunb.) Miers

生于山坡、溪旁或路边。分布于华东(山东栽培)及河南、湖北、湖南、四川、贵州。

根(千金藤)、茎：苦，寒。清热解毒，利水消肿，祛风止痛。用于咽喉痛，牙痛，胃痛，小便淋痛，尿急尿痛，水肿脚气，痄疾，痢疾，风湿关节痛，疮疖痈肿。

**桂南地不容**　山乌龟(广西)

**Stephania kuinanensis** H. S. Lo et M. Yang

生于山脚土壤肥沃地或林下石灰岩石缝中。分布于广西龙州。

块根：功效同广西地不容。

附　注：广西特有药用植物。

**广西地不容**　山乌龟(广西、云南)，金不换(广西)

**Stephania kwangsiensis** H.S. Lo

多生于石灰岩石山上。分布于广西、云南。

块根：苦，凉。止痛，镇静，清热解毒。用于胃痛，感冒头痛，咽喉痛，痢疾，疮痈肿毒，外伤疼痛。

附　注：①本种的块根是提取1-四氢掌叶防己碱的主要原料之一。②功效相同的有**大叶地不容 S. dolichopoda** Diels，分布于广西，云南。

**粪箕笃**　黎壁叶(福建、广东)，膏药草(福建)，粪箕藤、七厘(广东)，飞天雷公、铁线藤(广西)

**Stephania longa** Lour.

生于村边、旷野、山地灌丛中。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、贵州、云南东南部。

全株(粪箕笃)：微苦、涩，平。清热解毒，利尿消肿，祛风止痛，用于咽喉痛，尿急尿痛，泄泻，痢疾，中耳炎，风湿疼痛，腰腿痛，毒蛇咬伤，痈疮肿毒。

附　注：孕妇忌服。

**马山地不容**　山乌龟(广西)

**Stephania mashanica** H. S. Lo et B. N. Chang

生于石缝中。分布于广西。

块根：功效同广西地不容。

附　注：①广西特有药用植物。②块根含左旋荷苞牡丹碱。

**小花地不容**　山乌龟(广西)

**Stephania micrantha** H S. Lo et H. M. Yang

生于石灰岩山上。分布于广西龙州。

块根：功效同广西地不容。

附　注：①本种是提取1-四掌叶防己碱的重原料植物之一。②广西特有药用植物。

**台湾千金藤**

**Stephania sasakii** Hayata ex Yamam

分布于我国台湾。

根、茎：镇痛，催吐，抗结核菌。

附　注：我国台湾特有药用植物。

**汝兰**　金钱吊乌龟、地乌龟(四川)，吊金龟、山乌龟(贵州)，金不换、华千金藤(中药大辞典)

**Stephania sinica** Diels

生于山坡灌丛中、竹林下或沟边。分布于安徽、湖北、贵州、四川、云南。

块根(金不换)：苦、辛，凉。清热解毒，祛风除湿。用于痈疖疮毒，蛇咬伤，痢疾，中暑，风湿关节痛。

**高原千金藤**　西南千金藤(植物分类学报)

**Stephania subpeltata** H. S. Lo

生于山坡路旁潮湿地及林下石山。分布于西南及广西。

全株：消肿止痛。用于痈肿疮毒。

**小叶地不容**　金不换(海南)

**Stephania succifera** H. S. Lo et Y. Tsoong

生于山谷林荫石上。分布于海南琼中、崖县。

块根：苦，寒。镇静止痛，清热解毒。用于内、外伤痛，疟疾，痢疾，吐泻，胃痛，牙痛，口疮，咽喉痛；外用于蛇咬伤，疮毒，跌打损伤。

附　注：海南特有药用植物。

**四川千金藤**　小山豆根、山豆根(四川)

**Stephania sutchuenensis** H. S. Lo

生于山坡草地或灌丛中。分布于四川。

根：苦，寒。清热解毒，止痛，杀虫。用于牙痛，咽喉痛，喘咳，腹痛下痢，痔疮，蛲虫病，蛇、虫咬伤。

附　注：四川特有药用植物。

**粉防己**　汉防己、石蟾蜍(通称)，金丝吊鳖(浙江)，金线吊蛤蟆(江西)，山乌龟(广西、福建)，长根金不换(海南)

**Stephania tetrandra** S. Moore

生于村边、旷野、林缘及灌丛中。分布于安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西、贵州。

块根(防己、粉防己)：苦、辛，寒。利水消肿，祛风止痛。用于小便淋痛，水肿脚气，疮毒，湿疹，高血压症，风湿痹痛。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**黄叶地不容**　山乌龟、金不换(广西)

**Stephania viridiflavens** H. S. Lo et H M. Yang

生于石灰岩上。分布于广西、贵州、云南。

块根：功效同广西地不容。

附　注：本种的块根是目前生产左 1-四氢掌叶防己碱的主要原料之一。

**云南地不容**　地不容、山乌龟、一滴血、红藤(云南)

**Stephania yunnanensis** H. S. Lo

生于石灰岩石山上。分布于云南蒙自、个旧。

块根：苦，寒。有小毒。清热解毒，截疟，镇痛。用于痈疮肿毒，咽喉痛，疟疾，胃痛。

附　注：①云南特有药用植物。②《思茅中草药》将本种误定为 **S. brachyandra** Diels

## 大叶藤属　Tinomiscium Miers ex Hook. f. et Thoms.

**广西大叶藤**

**Tinomiscium phytocrenoides** Kurz.

生于山地灌丛中。分布于广西及云南东南部。

叶：用于刀伤出血。　根状茎：广西民间作黄藤用。

**大叶藤**　　黄藤、藤黄连、土黄连(广西)，黄藤子、假黄藤(云南)

**Tinimiscium tonkinense** Gagnep

生于沟谷雨林中或山地灌丛中。分布于广西、贵州、云南。

根、茎藤：苦，寒。活血通络，散瘀止痛，壮筋骨。用于风湿痹痛，小儿麻痹后遗症，咽喉痛，乳蛾，目赤，黄疸，跌打损伤；外用于骨折。　叶：用于刀伤，跌打损伤。

## 青牛胆属　Tinospora Miers

**纤梗青牛胆**　　山慈菇(江西、湖南、广东、广西、贵州)，破石珠(湖南、广东)，金牛胆、地苦胆(湖南、广西)，九牛胆(广东、广西)、圆角金果榄(广东药用植物手册)

**Tinospora capillipes** Gagnep.

生于山谷溪边疏林下或石隙中。分布于江西、湖南、广东、广西、四川、贵州。

块根(金果榄)：苦，寒。清热解毒，利咽，止痛。用于咽喉痛，痈疽疔毒，泄泻，痢疾，乳蛾，肺炎，痰喘，风热咳嗽。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**波叶青牛胆**　　发冷藤、金鸡纳藤(广西)，千里找根、隔夜找娘(云南)，赛克麻套、括裸(傣语)

**Tinospora crispa** (L.) Miers——*Menispermum crispum* L.; *T. gibbericaulis* Hand.-Mazz.; *T. mastersii* Diels

生于低山疏林灌丛中。分布于广西、云南。

茎藤：苦，凉。清热解毒，通经活血，驱虫。用于骨折，刀、挫伤，毒蛇咬伤，痈疖肿毒，蚂蝗入鼻，痢疾，疟疾，腹胀。

**青牛胆**　　九龙胆(陕西)，青鱼胆(湖北)，金牛胆、破石珠(湖南)，山茨菇(湖南、广东、广西、四川、贵州)，地苦胆(广东、广西、四川)

**Tinospora sagittata** (Oliv.) Gagnep.——*Limacia sagittata* Oliv.

生于山地疏林或灌丛中。分布于陕西、甘肃、安徽、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

块根(金果榄)：功效同金果榄。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载，为金果榄基源之一。

**云南青牛胆**　　金果榄(广西)，苦地胆(云南)

**Tinospora sagittata** (Oliv.) Gagnep. var. **yunnanensis** (S. Y. Hu) H. S. Lo——*T. yunnanensis* S. Y. Hu

生于灌丛下石隙间。分布于广西那坡、云南东南部。

茎：用于风湿疼痛，腰肌劳损，跌打损伤。块根：苦，寒。清热解毒。用于咽喉痛，乳蛾，热咳失音，痢疾，跌打损伤，毒蛇咬伤。

**中华青牛胆**　　伸筋藤(广东、广西)，舒筋藤、软筋藤(广东)，无地生根、打不死(广西)，宽筋藤(云南)

**Tinospora sinensis** (Lour.) Merr.——*Campylus sinensis* Lour.

生于村落附近林下或灌丛中，亦有栽培。分布于广东、海南、广西、云南、西藏墨脱。

茎藤(宽筋藤)：苦，寒。舒筋活络，祛风除湿。用于风湿关节痛，腰肌劳损，慢性腰腿痛，感冒周身酸痛，扭伤，筋脉拘挛。

**发冷藤**

**Tinospora thorelii** Gagnep.

广西栽培。

藤：用于疟疾。　茎、叶：退热。

## 44. 睡莲科　Nymphaeaceae

### 莼菜属　Brasenia Schreb.

**莼菜**　　莼(名医别录)

**Brasenia schreberi** J. F. Gmel.

生于池塘湖沼。分布于江苏、浙江、江西、湖北、湖南、四川、云南。

茎叶(莼菜)：甘，寒。清热解毒，止呕。用于高血压症，泻痢，胃痛，呕吐，痈疽疔疖。

### 芡实属　Euryale Salisb.

芡实　　鸡头米(东北、河北、山东)，鸡头果(江苏)，刺莲藕(江西、广西)，假莲藕(广西)，刺莲蓬实(药材学)

**Euryale ferox** Salisb. ex DC.

生于池沼湖塘中。分布于全国南北各地。主产山东、湖北、湖南、江苏。

种仁(芡实)：甘、涩，平。益肾固精，补脾止泻，祛湿止带。用于梦遗、滑精，遗尿、尿频，脾虚久泻，白浊，带下病。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 莲属 Nelumbo Adans.

**莲** 荷花(通称),荷(诗经),莲花(日华子本草)

**Nelumbo nucifera** Gaertn.

生于池塘及浅水湖泊中。全国普遍分布。主产湖南、湖北、福建、江苏。

根茎节(藕节): 甘、涩,平。止血,散瘀。 叶基部(荷叶蒂): 苦, 平。清暑祛湿, 止血,安胎。 叶(荷叶): 苦、涩,平。解暑清热, 升发清阳, 散瘀止血。 花蕾(莲花): 苦, 甘,凉。清热,散瘀止血。 花托(莲房): 苦、涩, 温。化瘀止血。 雄蕊(莲须): 甘、涩、平。固肾涩精。 种子(莲子): 甘、涩,平。补脾止泻,益肾涩精,养心安神。 幼叶及胚根(莲子心): 苦,寒。清心安神,交通心肾,涩精止血。

附 注:《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 萍蓬草属 Nuphar J. E. Smith

**贵州萍蓬草** 龙骨莲(贵州民间药物)

**Nuphar bornetii** Lévl. et Vant.

生于溪流及水沟中。分布于江西、贵州。

根状茎: 甘、微苦,凉。滋补清热。用于劳伤虚损。

**萍蓬草** 金莲花(浙江),叶骨(湖北),冷骨风(广西)

**Nuphar pumilum** (Hoffm.) DC.——*Nymphaea pumila* (Timm) Hoffm.; *N. lutea* L. var. *pumilum* Timm

生于湖沼中。分布于中南及黑龙江、吉林、河北、新疆、江苏、浙江、江西、福建、贵州。

根状茎(萍蓬草): 甘、涩,平。清虚热,止汗,止咳,止血,祛瘀调经。用于劳热,骨蒸,盗汗,肺痨咳嗽,月经不调,刀伤。 种子: 滋补强壮,健胃,调经。

## 睡莲属 Nymphaea L.

**睡莲** 蓬蓬草、蓬蓬花(东北),水莲花(广西),子午莲(本草纲目拾遗)

**Nymphaea tetragona** Georgi

生于池塘及水沼中。全国各地普遍栽培。

根状茎: 消暑,强壮,收敛。用于肾炎。花: 用于小儿惊风。

附 注: 功效相同的有**大花睡莲 N. tetragona** Georgi **var. crassifolia** (Hand.-Mazz.) Y. C. Chu,分布于黑龙江。

**雪白睡莲** 水莲草(新疆)

**Nymphaea candida** C. Presl

生于河湖池塘中。分布于新疆。

根状茎及花: 强壮,收敛。

附 注: 民族药。

## 45. 金鱼藻科 Ceratophyllaceae

### 金鱼藻属 Ceratophyllum L.

**金鱼藻** 扎毛(宁夏),虾须草(湖北),细草、软草(四川),藻(植物名实图考)

**Ceratophyllum demersum** L.

生于池塘、河沟。全国各地普遍分布。

全草:淡,凉。止血。用于吐血,咳嗽。

附 注 功效相似的有**东北金鱼藻 C. manshuricum** (Miki) Kitag. 分布于东北及内蒙古、宁夏。

**五刺金鱼藻**

**Ceratophyllum oryzetorum** Kom.

生于河沟、池沼中。分布于黑龙江、辽宁、宁夏、台湾、湖北、广西。

全草:用于疟腮。

## 46. 三白草科 Saururaceae

### 裸蒴属 Gymnotheca Decne.

**裸蒴** 水百步还魂草、土细草(广西),鱼腥草(湖南)

**Gymnotheca chinensis** Decne.

生于低海拔的林下潮湿处、阴湿草地或水沟边。分布于湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

全草(白侧耳根)辛,温。清热利湿,消肿利尿,止带。用于肺虚久咳,劳伤咳嗽,小便淋痛,水肿,带下病,外用于跌打损伤。

**白苞裸蒴** 白侧耳根(四川),水折耳(贵州),白折耳、圆叶蕺菜(贵州、云南)

**Gymnotheca involucrata** Pei

生于海拔 2 000 米左右的山坡阴湿处、阴湿草地、水沟旁。分布于四川、贵州、云南。

全草:辛,温。清热利湿,活血化瘀,止带。用于跌打损伤,肺痨咳嗽,白浊,带下病,腹胀水肿。

### 蕺菜属 Houttuynia Thunb.

**蕺菜** 鱼腥草(通称),鱼鳞草、臭草(江西、江苏),折耳根(湖北、四川、贵州、云南),壁虱菜(云南)

**Houttuynia cordata** Thunb.

生于海拔 100—2 000 米的阴湿山坡、草地、水边、田埂、林下。分布于长江流域以南各省区及陕西、山东、河南、西藏。

全草(鱼腥草)辛,凉。清热解毒,消痈排脓,利尿通淋。用于肺痈,肺热咳嗽, 小便淋痛,水肿;外用于痈肿疮毒,毒蛇咬伤。

附　注: ①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。② 民间用鲜草加豆腐食用治风火赤眼、咽喉肿痛、小便红赤。

### 三白草属　Saururus L.

**三白草**　　塘边藕(江苏、湖北、广东、云南), 过塘藕(福建、江西、广东、广西、贵州), 白面姑(南京、四川、贵州、云南),水九节连(江西), 百节藕(江苏、湖北),白舌骨(贵州、云南)

**Saururus chinensis** (Lour.) Baill.——*Spathium chinensis* Lour.

生于低湿水沟旁、塘边、草丛、田埂边, 分布于长江流域以南各省区及河北、甘肃、河南、云南。

根、茎(百节藕)、全草(三白草): 辛、甘,寒。清热利尿,消肿解毒。用于小便淋痛,石淋、水肿,带下病;外用于疮痈,皮肤湿疹,毒蛇咬伤。

附　注:《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 47. 胡椒科　Piperaceae

### 草胡椒属　Peperomia Ruiz et Pavon

**硬毛草胡椒**　　指甲草(广西)

**Peperomia cavaleriei** C. DC.

攀援于树上或石上。分布于广西、贵州、云南。

全草: 用于皮肤湿疹。

**石蝉草**　　石瓜子、火伤叶(广西),散血丹、大伤草、红豆瓣(云南)

**Peperomia dindygulensis** Miq.

生于海拔 700—1 000 米的低山沟谷林中或潮湿岩石上。分布于福建、台湾、广东、广西、贵州、云南。

全草(石蝉草): 辛,凉。消肿止痛,散瘀止血,抗癌。用于肺热咳嗽,跌打损伤, 痈疮肿毒,癌症疼痛。

**蒙自草胡椒**　　散血丹、狗骨头(云南)

**Peperomia heyneana** Miq.

生于海拔 1 600 米左右的沟谷林中或岩石上。分布于广西西部、云南。

全草: 甘,凉。散瘀止血,消肿止痛,清热解毒。用于胃出血, 鼻衄,痈肿,疮疖,跌打损伤,肺热咳嗽。

**草胡椒**　　透明草(云南)

**Peperomia pellucida** (L.) Kunth——*Piper pellucidum* L.

生于阴湿沟谷林中、溪边石上。分布于福建、广东、海南、广西、云南。

全草：散瘀止痛。用于烧、烫伤，跌打损伤。

**豆瓣绿**　岩筋草、石瓜子(陕西)，豆瓣菜(广西)，如意草(云南)，豆瓣鹿衔草(云南、植物名实图考)

**Peperomia tetraphylla** (Forst. f.) Hook. et Arn.——*Piper tetraphylla* Forst. f.

生于1 300—2 700米的背阴山坡、林下、湿地或岩石上。分布于西南及陕西、甘肃、福建、广东、广西。

全草(豆瓣绿)：淡，寒。祛风除湿，舒筋活络，清热解毒，润肺止咳。用于劳伤咳嗽，哮喘，风湿痹痛，跌打损伤，小儿疳积。

## 胡椒属　Piper L.

**小叶爬岩香**

**Piper arboricola** C. DC.

生于海拔100—2 500米的疏林、山谷密林中、山坡石壁上。分布于东南及西南各省区，东起我国台湾，西至西藏。

全草：祛风除湿，止痛，祛痰，健胃。

**蒌叶**　蒟酱、槟榔蒌(广西)，芦子、大芦子(云南)，娄子(中国高等植物图鉴)

**Piper betle** L.

生于海拔1 600—2 000米的山地林缘、河边、溪边阴湿处。栽培于台湾、广东、广西、贵州、云南。

茎、叶、果实：辛、微甘，温。温中行气，祛风散寒，消肿止痛，化痰止痒。用于风寒咳嗽，胃寒痛，消化不良，腹胀，疮疖，湿疹。

**海南蒟**　山胡椒(海南)，上树胡椒(广西)，海南胡椒(贵州)

**Piper hainanense** Hemsl.

生于林下，常攀援于树上或石上。分布于广东南部、海南、广西、云南。

全草：辛，温。祛风除湿，健胃镇痛。用于风湿骨痛，腰膝无力，扭挫伤，胃脘冷痛，消化不良，腹胀。

附　注：功效相同的有**假蒟 P. sarmentosum** Roxb.，分布于福建、广东、广西、贵州、云南、西藏墨脱；**毛胡椒 P. puberulilimbum** C. DC. 分布于云南南部至西南部。

**山蒟**　石南藤(江西、湖北、湖南、广西)，海风藤(浙江、福建、江西、湖南、四川)，香藤(江西)，小风藤(广东)，花叶定心草(广西)。

**Piper hancei** Maxim.

生于密林或疏林中，攀缘于阔叶林中的树干或灌木上。分布于浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、贵州、云南。

全草(海风藤、石南藤、山蒟藤)：辛，温。祛风湿，强腰膝，止咳，止痛。用于风湿痹痛，扭挫伤，风寒感冒，咳嗽，跌打损伤。

附　注：功效相同的有**光轴苧叶蒟 P. boehmeriaefolium** (Miq.) C. DC. var. **tonkinense** C. DC.，分布于广东、广西、贵州、云南；**变叶胡椒 P. mutabile** C. DC.，分

布于广东、广西、贵州。

**海风藤**　大风藤(台湾),细叶青风藤(海南),细叶青蒌藤(广西),石楠藤(贵州),风藤(台湾、中药志)

**Piper kadsura** (Choisy) Ohwi——*Ipomoea kadsura* Choisy; *P. futokadsura* Sieb.

生于密林或疏林中,攀援于其他物体上。分布于福建、台湾、广东、广西、贵州、云南。

茎藤(海风藤): 辛、苦,微温。祛风湿,通经络,止痹痛。用于风湿痹痛,筋脉拘挛,屈伸不利。

附　注:《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**大叶蒟**　野胡椒、山胡椒(海南),小肠风(广西)

**Piper laetispicum** C. DC.

生于林中,常攀缘于树上或石上。分布于广东、海南、广西。

全草: 辛,温。活血,消肿。用于跌打损伤。

附　注: 功效相同的有**复毛胡椒 P. bonii** C. DC. 分布于广西西部、云南东南部;**华南胡椒 P. austrosinense** Y. C. Tseng, 分布于广东。

**荜拔**　鼠尾(云南、中药志)

**Piper longum** L.

生于海拔 1 400—1 800 米的竹林或灌丛阴湿处。分布于云南。福建、广东、广西有栽培。

果实(荜拔)辛,热。温中散寒,祛风,止痛。用于胃寒呕吐,心腹冷痛,泄泻。

附　注: ①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②功效相同的有**裸果胡椒 P. undibaccatum** Y. C. Tseng, 分布于云南。

**短蒟**　钮子跌打、细芦子藤(云南)

**Piper mullesua** D. Don

生于海拔 800 米以上的沟谷、林下、溪边。布分于海南、四川、云南、西藏南部。

全草: 辛、热。温中散寒,舒筋活络,散瘀消肿,止血止痛。用于风湿腰腿痛, 四肢麻木,跌打损伤。

附　注: 功效相同的有**毛山蒟 P. martinii** C. DC. 分布于广东、广西、贵州、云南。

**胡椒**　坡洼热(四川)

**Piper nigrum** L.

福建、台湾、广东、海南、广西、云南有栽培。

果实(黑胡椒、白胡椒): 辛,热。温中散寒,理气止痛。用于胃腹冷痛,腹胀, 食欲不振,吐呕泄泻。

附　注: ①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②功效相同的有**荜叶蒟 P. boehmeriaefolium** (Miq.) C. DC., 分布于云南。

**毛蒟**　小毛蒟、金钱蒌(广西),石南藤(湖南),大节芦子(云南), 绒毛胡椒(中药大辞典)

**Piper puberulum** (Benth.) Maxim.——*Chavica puberula* Benth.

生于海拔1 600—2 000米密林、疏林处的潮湿地，常攀缘树上或石上。分布于浙江、福建、湖南、广东、广西、贵州、云南。

全草(毛蒌、毛蒟)：辛，温。祛风活血，行气止痛。用于跌打损伤，脘腹疼痛，腰腿痛，关节痛。

**岩参**

**Piper puthicatulum** C. DC.

生于低山雨林中，附生于岩石上。分布于云南。

茎藤：辛、麻，温。健胃行气，消炎镇痛。用于胃脘胀痛，泄泻，痢疾。

## 48. 金粟兰科 Chloranthaceae

### 金粟兰属 Chloranthus Swartz

**狭叶金粟兰** 四叶细辛、小四块瓦(湖北)

**Chloranthus angustifolius** Oliv.

生于海拔650—1 200米的山坡、林下或岩石下阴湿处。分布于湖北、四川。

全草：祛风湿，通经。

**丝穗金粟兰** 水晶花(江苏、江西)，四对草(福建)，银线草(江西)，四块瓦(江苏、湖南、广西)

**Chloranthus fortunei** (A. Gray) Solms——*Tricercandra fortunei* A. Gray

生于低山林下或山坡阴湿草丛中。分布于华东及湖北、湖南、广东、广西、四川。

全草(银线草、水晶花)：辛，温。有小毒。活血化瘀，解毒。用于风湿关节痛，痢疾，泄泻，胃痛，跌打损伤，经闭；外用于癣，湿疹，皮肤瘙痒。

**宽叶金粟兰** 四块瓦(通称)，四大天王(江西、湖南)，大叶及己(广东)，四叶细辛(广西)

**Chloranthus henryi** Hemsl.

生于山坡林下阴湿处。分布于中南及陕西、甘肃、安徽、浙江、福建、江西、四川、贵州、云南。

全草(四块瓦)辛，温。祛风除湿，活血化瘀，消肿解毒。用于风寒湿痹，月经不调，跌打损伤，风寒咳嗽，痈疮肿毒。

**全缘金粟兰** 四块瓦(广西、贵州、云南)，土细辛、四味细辛(云南)

**Chloranthus holostegius** (Hand.-Mazz.) Pei et Shan——*C. fortunei* (A. Gray) Solms-Laub. var. *holostegius* Hand.-Mazz.

生于中、低山常绿杂木林下阴湿处。分布于广西、贵州、云南。

全草：苦、辛，温。有毒。活血散瘀，舒筋活络，止痛。用于跌打损伤，骨折，风湿关节痛。

附 注：功效相同的有**鱼子兰 C. elatior** Link，分布于广西、云南、贵州。

**毛脉金粟兰**

**Chloranthus holostegium** (Hand.-Mazz.) Pei et Shan var. **trichoneurus** K. F. Wu

生于海拔600—1 700米的林下，湿地及沟边。分布于贵州、云南。

全草：消肿解毒，镇痛。

**银线草**　四大天王(黑龙江、湖南)，灯笼花(吉林)，四块瓦(吉林、河北、湖南)，分叶芹、假细辛(中国高等植物图鉴)

**Chloranthus japonicus** Sieb.

生于山坡林下阴湿处、沟边草丛中。分布于东北、华北及陕西、甘肃、山东、江苏、湖北、湖南。

全草：苦、辛，温。活血行瘀，散寒祛风，解毒。用于风寒咳嗽，风湿痛，经闭；外用于跌打损伤，瘀血肿痛，毒蛇咬伤。

**多穗金粟兰**　四大天王(江西)，四叶细辛(贵州)，四眼牛夕(湖北)，四块瓦(河南)

**Chloranthus multistachys** Pei

生于海拔1 000—1 500米的山坡、林下、山谷湿地。分布于中南及陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、福建、江西、四川、贵州、云南。

全草：苦、辛，微温。有小毒。活血散瘀，祛风解毒。用于跌打损伤，腰腿痛，感冒，带下病，疖肿，皮肤瘙痒。

**东南金粟兰**

**Chloranthus oldhami** Solms.

生于山坡密林阴湿处。分布于福建、广东。

全草(四叶金)：苦，平。活血祛瘀，解毒消肿。用于经闭，瘀血肿痛，风湿痛，跌打损伤，毒蛇咬伤。

**及己**　四大金刚(江苏)，四块瓦(江苏、江西、湖北、广东、广西)，四叶对(江西、河南、湖南)，四大天王(江西)

**Chloranthus serratus** (Thunb.) Roem. et Schult.——*Nigrina serratus* Thunb.

生于林下阴湿处。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川。

全草：(及己)：苦，平。有毒。活血散瘀，祛风消肿，解毒。用于跌打损伤，痈疮肿毒，风湿痛。

**金粟兰**　珠兰(通称)，鱼子兰(云南)，珍珠兰(岭南杂记)

**Chloranthus spicatus** (Thunb.) Makino——*Nigrina spicatus* Thunb.

生于低山河谷、林下、溪边或潮湿沼泽地，多为栽培。分布于全国南部各省区。河南有栽培。

全草(珠兰、金粟兰)：甘、辛，温。祛风湿，接筋骨。用于风湿关节痛，跌打损伤，刀伤出血；外用于疔疮。

## 雪香兰属　Hedyosmum Swartz

**雪香兰**　吹风散(广西)

**Hedyosmum orientale** Merr. et Chun

生于山坡谷地的阴湿密林下。分布于广东、海南、广西南部。

全草：用于风湿痛。

### 草珊瑚属　Sarcandra Gardn.

**草珊瑚**　九节风、九节茶(江西、湖南、广西、中国高等植物图鉴)，接骨莲(江西、中国高等植物图鉴)，山鸡茶(广西)

**Sarcandra glabra** (Thunb.) Nakai——*Bladhia glabra* Thunb.

生于中、低山常绿阔叶林下阴湿处。分布于安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、四川。

全草(肿节风)：苦、辛，平。有小毒。清热解毒，通经接骨。用于感冒，流行性乙型脑炎，肺热咳嗽，痢疾，肠痈，疮疡肿毒，风湿关节痛，跌打损伤。

**海南草珊瑚**　山泽兰(广西)，山牛耳清(中国高等植物图鉴)

**Sarcandra hainanensis** (Pei) Swamy et Bailey——*Chloranthus hainanensis* Pei

生于海拔830—1 600米的山坡、沟谷林下湿润处。分布于广东、广西、云南。

全草：消肿止痛，通利关节。用于骨折。

## 49. 马兜铃科　Aristolochiaceae

### 马兜铃属　Aristolochia L.

**川南马兜铃**

**Aristilochia austroszechuanica** Chien et Y. Cheng

生于山谷疏林中。分布于四川、贵州。

根状茎：用于骨痨。

**管兰香**　萝卜防己(云南)

**Aristolochia cathcartii** Hook. f.

生于山沟阔叶林中。分布于云南思茅、普洱。

根：苦，寒。清热解毒，理气止痛，舒筋活络。用于胃痛，吐泻，风湿痛，跌打肿痛。

**长叶马兜铃**　三筒管(广西)，绊藤香(四川)，青藤(贵州)

**Aristolochia championii** Merr. et Chun

生于海拔500—900米的山谷密林中或较稀疏干燥林下。分布于台湾、广东、广西、四川、贵州、云南。

块根：苦，寒。清热解毒。用于泄泻，痢疾，疟腮。

附　注：壮族用药。

**苞叶马兜铃**　十八钻(广西)

**Aristolochia chlamydophylla** C. Y. Wu ex S. M. Hwang

生于海拔1 000—1 300米的山坡林下。分布于广西、云南。

根：用于吐泻，肝炎，肾炎水肿，肝硬化腹水；外用于湿疹。

**扁茎马兜铃**　竹叶藤香(四川江津)

**Aristolochia compressocaulis** Z. L. Yang

生于海拔 1 200—1 700 米的山坡林下。分布于四川江津、南川、古蔺。

根及茎：行气止痛。用于脘腹痛。

**北马兜铃**　后老婆罐(东北)，万丈龙(内蒙古)，铁扁担(陕西)，土青木香(唐本草)

**Aristolochia contorta** Bunge

生于海拔 500—1 200 米的山坡灌丛、沟谷两旁及林缘。分布于东北、华北及陕西、甘肃、山东、江苏、安徽、河南、湖北、湖南。

果实(马兜铃)：苦，微寒。清肺降气，止咳平喘，清肠消痔。用于肺热咳嗽，痰中带血，肠热痔血，痔疮肿痛。地上部分(天仙藤)：苦，温。行气活血，利水消肿。用于脘腹刺痛，关节痹痛，妊娠水肿。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。**马兜铃 A. debilis** Sieb. et Zucc. 亦作正品用，详见专条。②伪混品种有百合科荞麦叶大百合 *Cardiocrinum cathayanum* (Wils.) Stearn、心叶大百合 *C. giganteum* (Wall.) Makino；葫芦科纤花雪胆 *Hemsleya graciliflora* (Merr.) Cogn. 和土贝母 *Bolbostemma paniculatum* (Maxim.) Franquet 等。

**葫芦叶马兜铃**

**Aristolochia cucurbitoides** C. F. Liang

生于海拔 800—2 400 米的疏林中。分布于广西、贵州、云南。

根：用于痈疮肿毒。

**马兜铃**　三白银药(福建)，定海根(湖南)，蛇参果(四川、贵州)

**Aristolochia debilis** Sieb. et Zucc.

生于海拔 200—1 500 米的山谷、沟边、路旁阴湿处及山坡灌丛中。分布于黄河流域以南及山东、河南。主产浙江、江苏、湖北、江西、河南。

根(青木香)：辛、苦，寒。利胆止痛，解毒，消食。用于眩晕头痛，胸腹胀满，痈肿疔疮，蛇虫咬伤。地上部分(天仙藤)、果实(马兜铃)：功效同北马兜铃。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**广防己**　防己(广西)，防己马兜铃(中国高等植物图鉴)

**Aristolochia fangchi** Y. C. Wu

生于海拔 500—1 000 米的山坡密林或灌丛中。分布于广东、广西、四川、贵州、云南。

根(广防己)：苦、辛，寒。祛风止痛，清热利水。用于风湿热痹痛，下肢水肿，小便淋痛。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**通城虎**　血藤(广东)，大散血(广西)，血藤暗消(云南)，天然草(瑶语)，奇巧(壮语)

**Aristolochia fordiana** Hemsl.

生于山谷林下灌丛中和山地石隙中。分布于浙江、江西、福建、广东、广西。

根、全草：苦、辛，温。有小毒。祛风止痛，消肿解毒，开窍。用于胃痛，风湿痛，跌打损伤，小儿惊风，毒蛇咬伤。

**海南马兜铃**　假青黄藤(广西)

**Aristolochia hainanensis** Merr.

生于海拔 800—1 200 米的山谷林中。分布于海南、广西。

根：祛风，利湿，清热。 叶：民间外用于眼痛。

**南粤马兜铃** 侯氏马兜铃(海南植物志)，汪喉和、雅布伦(黎语)

**Aristolochia howii** Merr. et Chun

生于海拔200—600米阳光充足、土壤干燥的疏林中。分布于海南。

块根：清热解毒。用于高热，肺热咳喘，咽喉痛。

附 注：海南特有药用植物。

**凹脉马兜铃** 穿石藤(广西)

**Aristolochia impressinervis** C. F. Liang

生于海拔360米的石灰岩地区林下或灌丛中。分布于广西。

全株：祛风活络，止血，止痛。用于胃痛，风湿痛，跌打肿痛，泄泻，小儿麻痹后遗症。

附 注。广西特有药用植物。

**金山马兜铃**

**Aristolochia jinshanensis** Z. L. Yang et S. X. Tan

生于海拔700米的山坡灌丛中。分布于四川金佛山。

根状茎及茎(通城虎)：祛风镇痛，解毒。

附 注：四川特有药用植物。

**大叶马兜铃** 香里藤(福建)，金獅藤(广东)，南木香(云南)

**Aristolochia kaempferi** Willd.——*A. shimadai* Hayata; *A. mollis* Dunn

生于山坡灌丛中。分布于甘肃、江苏、浙江、江西、福建、台湾、广东、广西、贵州、云南。

根：苦，寒。清热解毒，活血，健脾利湿。用于消化不良，止咳。

**异叶马兜铃** 青木香、天仙藤(陕西)，防己(甘肃)，小南木香(四川)

**Aristolochia kaemoferi** Willd. f. **heterophylla** (Hemsl.) S. M. Hwang——*A. heterophylla* Hemsl.

生于疏林中或林缘山坡灌丛中。分布于河北、陕西、甘肃、湖北西部、湖南、四川、贵州。

根(汉中防己)：苦、辛，寒。利水消肿，祛风止痛。用于水肿，小便淋痛，脚气湿肿，风湿关节痛。

附 注：其茎藤在陕西作天仙藤用。

**川西马兜铃** 山豆根(四川)

**Aristolochia kaempferi** Willd f. **thibetica** (Franch.) S. M. Hwang——*A. thibetica* Franch.

生于山坡灌丛中。分布于四川、云南中部以北地区。

根(小寒药)：苦、微辛，温。散瘀止痛，消食健胃，顺气，通乳。用于脘腹冷痛。

**广西马兜铃** 南蛇藤(福建)，圆叶马兜铃(广西)，九管、棵广木香(广西壮语)

**Aristolochia kwangsiensis** Chun et How ex C. F. Liang

生于海拔600—1 600米的山谷林中。分布于浙江、福建、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

块根(管南香)：苦，寒。有小毒。清热止痛。用于咽喉痛，胃痛，腹痛，疮疥，刀伤。

**凉山马兜铃** 地檀香(四川米易)

**Aristolochia liangshanensis** Z. L. Yang

生于海拔 2 200—2 500 米的山坡乱石林中。分布于四川盐源、米易、会理。

根：理气止痛。用于腹痛。

附　注：四川特有药用植物。

**弄岗马兜铃**　　弄岗通城虎(广西)

**Aristolochia longgongensis** C. F. Liang

生于海拔 100—200 米的石灰岩山坡。分布于广西龙州。

全株：用于小儿高热，胃脘痛，跌打损伤。

附　注：广西特有药用植物

**木通马兜铃**　　木通、关木通(东北)，淮通(湖北、四川)

**Aristolochia mandshuriensis** Kom.

生于海拔 100—2 200 米的阴湿阔叶和针叶混交林中。分布于东北及山西、陕西、甘肃、河南。主产东北。

藤茎(关木通)：苦，寒。清心火，利小便，通经下乳。用于口舌生疮，心烦尿赤，水肿，热淋涩痛，带下病，经闭乳少，湿热痹痛。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**寻骨风**　　白毛藤(山东)，猫耳草(河南)，绵毛马兜铃(江苏南部种子植物手册)

**Aristolochia mollissima** Hance

生于海拔 100—850 米的山坡、草丛、沟边及路旁。分布于山西、陕西、山东、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北、湖南、四川、贵州。主产江苏、河南、江西。

带根全草(寻骨风)：苦，平。祛风通络，活血止痛。用于风湿关节痛，腹痛，疟疾，痈肿。

附　注：新近用于癌症。

**宝兴马兜铃**　　大条青木香(湖北)，理防己(云南)，关木通(西藏)，木香马兜铃(中国高等植物图鉴)

**Aristolochia moupinensis** Franch.

生于海拔 2 000—3 200 米的林中、沟边、灌丛中。分布于浙江、江西、福建、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

藤茎(淮木通)：苦，寒。除烦退热，清热利湿，行水下乳，排脓止痛。用于热淋涩痛，水肿，阴痒症，风湿关节痛。根：同汉中防己。

附　注：四川地区标准收载。

**偏花马兜铃**　　汉防己(云南)

**Aristolochia obliqua** S. M. Hwang

生于海拔 2 200—2 600 米的山坡阔叶林下阴湿处。分布于云南贡山、剑川。

块根：用于消化不良，胃脘气胀。

**卵叶马兜铃**　　大寒药(四川)，木防己(贵州植物志)

**Aristolochia ovatifolia** S. M. Hwang

生于海拔 1 000—2 500 米的灌丛中或疏林下。分布于四川、贵州、云南。

根：止痛，解毒。

**革叶马兜铃**

**Aristolochia scytophylla** S. M. Hwang et D. L. Chen

生于海拔 600 米的石灰岩地区灌丛中。分布于广西、贵州。

块根：用于小儿发热抽搐，咽喉痛，湿热泄泻。

**耳叶马兜铃**　黑面防己(广东)，卵叶雷公藤(海南)，假大薯(广西)，卵叶马兜铃(中国高等植物图鉴)

**Aristolochia tagala** Champ.

生于海拔 60—2 000 米的阔叶林中。分布于台湾、广东、海南、广西、云南。

根：苦、辛，寒。祛风除湿，行气利水。用于小便淋痛，水肿，风湿关节痛。

**海边马兜铃**　石蟾蜍(广东)

**Aristolochia thwaitesii** Hook. f.

生于山地灌丛中，竹林中或山坡石隙上。分布于广东珠海。香港有分布。

块根：清热解毒。民间用于咽喉痛。

**粉质马兜铃**　蝴蝶暗消(云南)，朱砂莲(贵州植物志)，细尖马兜铃(新华本草纲要)

**Aristolochia transsecta** (Chatt.) C. Y. Wu ex S. M. Hwang——*Isotrema transsecta* Chatt.

生于林中或草丛中。分布于四川、贵州、云南。

根：苦、涩，温。行气健胃，祛风止痛。用于消化不良，胃痛，腹胀，风湿关节痛。

**块茎马兜铃**　躲蛇生(四川)，毒蛇药(云南)，万丈龙(广西瑶语)，背蛇生(新华本草纲要)

**Aristolochia tuberosa** C. F. Liang et S. M. Hwang——*A. cinnabarina* C. Y. Cheng et J. L. Wu

生于海拔 150—1 600 米的石灰岩山上或山沟旁灌丛中。分布于湖北、广西、四川、贵州、云南。

块茎：苦、辛，寒。清热解毒，利湿止痛。用于痢疾，泄泻，胸痛，胃痛，咽喉痛，毒蛇咬伤。

附　注：云南彝族亦药用。

**管花马兜铃**　金丝丸(浙江)，红白药(广东)，一点血(广西)，独一味(四川)

**Aristolochia tubiflora** Dunn

生于海拔 100—1 700 米的林下阴湿处。分布于中南及浙江、江西、福建、四川、贵州。

根：苦、辛，寒。清热解毒，止痛。用于胃痛，毒蛇咬伤。　全株：用于跌打损伤。

**变色马兜铃**　过石珠(广东)，银袋(广西)，青香藤(云南)

**Aristolochia versicolor** S. M. Hwang

生于海拔 500—1 500 米的山坡灌丛、山谷石砾间或林缘较阴湿处。分布于广东、广西、云南。

块根：苦，寒。清热解毒。用于泄泻，痢疾，疟腮。

**香港马兜铃**　山总管(贵州)，银袋(中国高等植物图鉴)

**Aristolochia westlandii** Hemsl.

生于海拔 300—800 米的山谷林中。分布于广东、贵州、云南。

块根：苦，寒。清热解毒，理气止痛。用于泄泻，乳痈，过敏性皮炎。

**云南马兜铃**　藤七(贵州)，追风散(云南)

**Aristolochia yunnanensis** Franch.

生于海拔2 000米的林中。分布于贵州、云南、西藏。

根：温中理气，止痛消食，舒筋活络。用于脘腹胀痛，风湿痛。

## 细辛属　Asarum L.

**短尾细辛**　接气草(四川)，圆叶细辛(植物分类学报)

**Asarum caudigerellum** C. Y. Cheng et C. S. Yang

生于海拔1 600—2 100米的林下阴湿地或水边岩石上。分布于湖北西部、四川、贵州、云南东北部。

全草(茗叶细辛)：辛、苦，温。散寒镇痛，止咳祛痰。用于外感风寒头痛，齿痛，目痛，咳逆上气，风湿痛，肢节拘挛。

**尾花细辛**　白细辛(浙江)，花乌金草(湖北)，四两淋(湖南)，香菇草(广东)，土细辛(中国高等植物图鉴)

**Asarum caudigerum** Hance

生于海拔350—1 660米的林下、溪边及路旁阴湿处。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根、全草(土细辛)：辛、微苦，温。有小毒。温经散寒，化痰止咳，散瘀消肿，止痛。用于风寒咳嗽，哮喘，风湿痹痛，毒蛇咬伤，跌打肿痛。

附　注：功效相同的有**花叶尾花细辛 A. caudigerum** Hance var. **cardiohyllum** (Franch.) C. Y. Cheng et C. S. Yang 分布于湖北、四川、贵州、云南；**窄叶尾花细辛 A. caudigerum** Hance f. **leotophyllum** (Hayata) C. Y. Cheng et C. S. Yang，分布于贵州。

**双叶细辛**　乌金草(湖北)，草马蹄香(贵州)

**Asarum caulescens** Maxim.

生于海拔1 200—1 700米的林下腐殖土中。分布于陕西、甘肃、浙江、湖北、四川、贵州。

全草：辛，微温。散风寒，镇痛，止咳。用于风寒感冒，头痛咳嗽，劳伤身痛。　根及根状茎：用于痧气痛，心腹痛，周身疼痛。

**川北细辛**　中国细辛(湖北植物志)

**Asarum chinense** Franch.

生于海拔1 300—1 500米的林下或山谷阴湿地。分布于湖北西部、四川东北部。

全草：行气止痛，散血。

附　注：功效相同的有**绿背白脉细辛 A. chinense** Franch. f. **fargesii** (Franch.) D. Y. Cheng et C. S. Yang，分布于四川。

**铜钱细辛**　胡椒七(湖北)，毛细辛(四川)

**Asarum debile** Franch.

生于海拔 1 300—2 300 米的林下石缝或溪边湿地上。分布于陕西、安徽、湖北、四川。

全草：辛，微温。祛湿，顺气，散寒，止痛。用于感冒风寒，风湿痹痛。

**川滇细辛**　牛蹄细辛(四川峨眉)

**Asarum delavayi** Franch.

生于海拔 800—1 600 米的林下阴湿岩坡上。分布于四川，云南东北部。

全草：祛风散寒，止痛。　根：调气止痛。用于劳伤痛，腹痛。

附　注：功效相同的有**峨眉牛蹄细辛 A. delavayi** Franch. var. **omeiense** C. Y. Cheng et C. S. Yang，分布于四川。

**皱花细辛**　盆花细辛(四川)

**Asarum erispulatum** C. Y. Cheng et C. S. Yang

生于山坡路边林下阴湿地。分布于四川南川。

全草：祛风散寒，止痛。

附　注：四川特有药用植物。

**杜衡**　双龙麻消(江西)，马细辛(湖北)，马辛(江苏药材志)

**Asarum forbesii** Maxim.

生于海拔 800 米以下的林下沟边阴湿地。分布于江苏、安徽、浙江、江西、河南南部、湖北、湖南、四川东部。

全草(杜衡)：辛，温。有小毒，止痛，利水，祛痰镇咳。用于牙痛，咽喉痛，胃痛，咳嗽多痰，喘息，蛇伤，跌打损伤。

**福建细辛**　土里开花、薯叶细辛(江西、安徽)，马脚蹄(福建)

**Asarum fukienense** C. Y. Cheng et C. S. Yang

生于海拔 300—1 000 米的山谷林下阴湿处。分布于安徽、浙江、江西、福建。

全草：辛，温。散风，祛寒，开窍，止痛。

**地花细辛**　大块瓦(广西)，铺地细辛(贵州植物志)，矮细辛(植物分类学报)

**Asarum geophilum** Hemsl.

生于海拔 250—700 米的密林下或山谷湿地。分布于广东、广西、贵州南部。

根：辛，温。疏散风寒，宣肺止咳。用于感冒风寒，鼻塞流涕，咳嗽，哮喘，风湿痹痛，毒蛇咬伤。

**辽细辛**　烟袋锅花(辽宁)

**Asarum heterotropoides** Fr. Schmidt var. **mandshuricum**(Maxim.) Kitag.——*A. sieboldii* Miq. var. *mandshuricum* Maxim.

生于山坡林下、山沟土壤肥沃阴湿地上。分布于东北及山西、陕西、山东、河南。部分地区有栽培。主产东北。

全草(细辛)：辛，温。有小毒。祛风散寒，通窍止痛，温肺化饮。用于风寒感冒，头痛，牙痛，鼻寒鼻渊，风湿痹痛，痰饮喘咳。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②本品不宜与藜芦同用。③功效类似的有**细辛 A. sieboldii** Miq.，分布于西北及江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北、湖南、四川、贵州，主产陕西；**汉城细辛 A. sieboldii** Miq. f. **seoulense** (Nakai) C. Y. Cheng et C. S. Yang，分布于吉林、辽宁。

**单叶细辛**　　乌金七(湖北),水细辛(四川),土癞蜘蛛香(贵州)

**Asarum himalaicum** Hook. f. et Thomas. ex Klotzsch.

生于海拔 1 300—3 100 米的溪边林下阴湿地。分布于西南及陕西、甘肃、湖北西部。

全草(单叶细辛): 祛风散寒,利水,开窍。

附　注: 四川地方标准收载。

**小叶马蹄香**　　独叶细辛(湖北),土细辛(江西)

**Asarum ichangense** C. Y. Cheng et C. S. Yang

生于海拔 330—1 400 米的林下草丛或溪旁阴湿地。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西。

全草: 祛风散寒,止痛。

**金耳环**　　一块瓦(广西),丘尽(广西侗语),扁化(广西瑶语)

**Asarum insigne** Diels——*A. longipedunculatum* O. C. Schmidt

生于海拔 450—700 米的林下阴湿地或土石山坡上。分布于江西、广东、广西。

全草: 辛,温。祛风散寒,平喘止咳,行气止痛,解毒消肿。用于风寒咳嗽,哮喘,脘腹寒痛,龋齿痛,毒蛇咬伤,跌打损伤。

**长茎金耳环**　　金耳环(广西)

**Asarum longerhizomatosum** C. F. Liang et C. S. Yang

生于海拔 200 米的林间空地、岩边阴湿地。分布于广西。

全草: 辛,温。有毒。祛风散寒,解毒止痛。用于小儿抽搐, 风寒感冒,咳嗽,心胃气痛,跌打损伤。

附　注: 广西特有药用植物。

**祁阳细辛**　　南细辛(江西),山慈菇(广东)

**Asarum magnificum** Tsiang ex C. Y. Cheng

生于海拔 300—700 米的林下阴湿处。分布于陕西南部、浙江、江西、湖北、湖南、广东北部。

全草: 祛风止痛,温经散寒。

**大叶马蹄香**　　马蹄细辛(湖北),花脸细辛(四川中药志)

**Asarum maximum** Hemsl.

生于海拔 600—800 米的林下腐殖土中。分布于湖北、四川东部。

根、根状茎、全草: 辛,温。有小毒。祛风散寒, 止痛, 活血解毒。用于风寒头痛,牙痛,喘咳,中暑腹痛,痢疾,吐泻,风湿关节痛。

**长毛细辛**　　乌金草(湖北),牛毛细辛(四川),白三百棒(贵州)

**Asarum pulchellum** Hemsl.

生于海拔 700—1 700 米的林下腐殖土中。分布于安徽、江西、湖北、四川、贵州、云南东北部。

全草、根: 辛,温。理气止痛。用于胃痛,劳伤。

**山慈菇**　　岩慈菇(中国高等植物图鉴)

**Asarum sagittarioides** C. F. Liang

生于海拔 960—1 200 米的山坡林下或溪边阴湿地。分布于广东、广西。

全草(土金耳环): 辛,温。祛风散寒,解毒止痛。用于跌打损伤,蛇咬伤,牙痛,感冒。

**青城细辛**　　花脸王(四川),花脸细辛(中国高等植物图鉴)

**Asarum splendens** (Maekawa) C. Y. Chen et C. S. Yang——*Heterotropa splendens* Maekawa

生于海拔850—1 300米的陡坡草丛或竹林下阴湿地。分布于湖北、四川、贵州、云南东北部。

全草: 发表散寒,镇咳祛痰,止痛。用于劳伤。

**五岭细辛**

**Asarum wulingense** C. F. Liang

生于海拔1 100米左左的林下阴湿地。分布于江西、湖南、广东、广西、贵州。

全草: 辛,温。发表散寒,温肺止咳,祛风止痛。根: 用于蛇伤。

## 马蹄香属　Saruma Oliv.

**马蹄香**　　冷水丹(陕西),高脚细辛(四川),狗肉香(贵州)

**Saruma henryi** Oliv.

生于海拔1 000—1 600米的山谷林下阴湿地。分布于陕西、甘肃、江西、河南、湖北、四川、贵州、云南。

根、根状茎: 辛、苦,温。有小毒。温中散寒,理气镇痛。用于胃寒痛,心前区痛,关节痛。叶: 用于疮疡。

附　注: 我国特有属。

# 50. 五桠果科　Dilleniaceae

## 五桠果属　Dillenia L.

**五桠果**　　西湿阿地(傣尼语)

**Dillenia indica** L.

生于海拔150—900米的山谷溪旁,雨林中。分布于广西、云南。南方其他地区有引种栽培。

根、树皮、果实(五桠果): 酸、涩,平。收敛解毒。用于疟疾。

**小花五桠果**　　牛彭、大叶山枇杷、五室第伦桃(海南植物志)

**Dillenia pentagyna** Roxb.——*D. hainanensis* Merr.

生于中海拔的疏林中及草地上。分布于海南、云南。

果实: 止咳。用于咳嗽。

**大花五桠果**　　大花第伦桃、山牛彭(海南植物志)

**Dillenia turbinata** Finet et Gagnep.

生于低海拔的常绿雨林中。分布于海南、广西、云南。

叶：润肺止咳，利尿。用于肺痨，咳嗽，水肿，小便淋痛。

### 锡叶藤属　Tetracera L.

**锡叶藤**　　涩叶藤(海南)，水车藤、涩沙藤(广西)

**Tetracera asiatica** (Lour.) Hoogl.——*Segnieria asiatica* Lour.

生于灌丛或疏林中。分布于广东、海南、广西。

根、茎、叶(锡叶藤)：酸、涩，平。收敛止泻，消肿止痛。用于泄泻，便血，肝脾肿大，阴挺、带下病，风湿关节痛。

附　注：功效相同的有**毛果锡叶藤 T. scandens** (L.) Merr.——*Tragia scandens* L.，分布于云南。

## 51. 芍药科　Paeoniaceae

### 芍药属　Paeonia L.

**阿尔泰芍药**　　窄叶芍药(拉汉英种子植物名称)

**Paeonia anomala** L.

生于林下及灌丛下。分布于陕西、甘肃、新疆。

根：活血祛瘀，解毒消肿。

**块根芍药**　　赤芍(新疆)

**Paeonia anomala** L. var. **intermedia** (C. A. Mey. ex Ledeb.) O. et B. Fedtsch.——*P. intermedia* C. A. Mey. ex Ledeb.

生于山地林下。分布于新疆西北部。

块根：产地作赤芍代用品。

**滇牡丹**　　赤丹皮(云南)，野牡丹(中国植物志)，滇藏牡丹(新华本草纲要)

**Paeonia delavayi** Franch.

生于海拔 3 700 米以下的山坡上。分布于四川西南部、云南西北部、西藏东南部。

根皮：清热凉血。用于吐血，尿血，血痢，痛经。

附　注：去掉根皮的根加工后，云南作白芍用，质量较差。

**黄牡丹**　　西昌丹皮(通称)，丹皮(四川、西藏)

**Paeonia delavayi** Franch. var. **lutea** (Delav. ex Franch.) Finet et Gagnep.——*P. lutea* Delav. ex Franch.

生于海拔 2 500—3 500 米的山坡路旁。分布于四川木里、云南、西藏。

根皮(西昌丹皮)：清热解毒，止痛。用于吐血，尿血，痛经。

附　注：①四川地方标准收载。②国家二级保护植物。

**芍药**

**Paeonia lactiflora** Pall.

东北、华北及陕西、西藏多为野生，华东、西南有大量栽培。白芍主产浙江、四川、安

徽；赤芍主产河北、辽宁、吉林、黑龙江。

栽培的根(白芍)：辛、酸，凉。平肝止痛，养血调经，敛阴止汗。用于头痛眩晕，胁痛，腹痛，四肢挛痛，月经不调，自汗，盗汗。野生根(赤芍)：苦，凉。清热凉血，散瘀止痛。用于温毒发斑，吐血，衄血，目赤，跌打损伤，痈肿疮疡。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**毛果芍药**

**Paeonia lactiflora** Pall. var. **trichocarpa** (Bunge) Stern——*P. trichocarpa* Bunge

生于山麓湿地、林下。分布于东北、华北及湖北、四川、贵州。野生或栽培。

根：养血柔肝，缓中止痛。用于血虚肝旺头晕、头痛，痢疾，月经不调，崩漏，带下病，肠痈，腹痛，手足拘挛疼痛。

**美丽芍药**　狗头芍药(陕西)

**Paeonia mairei** Lévl.

生于海拔 1 000—2 020 米的山坡林下阴湿处。分布于陕西南部、甘肃南部、四川中南部、云南东北部、贵州西部。

根：行瘀活血，止痛。

**草芍药**　山芍药、野芍药(通称)

**Paeonia obovata** Maxim.

生于海拔 1 900 米以下山坡或山谷林下。分布于东北、华北及陕西、甘肃、新疆、山东、安徽、浙江、江西、河南、湖北、四川、贵州、云南。

根(赤芍)：酸、苦，凉。活血散瘀，清肝，止痛。用于瘀血腹痛，经闭，痛经，胸胁疼痛。

附　注：①北方地区大多以此作赤芍用，其中以内蒙古多伦产者为佳。②功效相似的有**毛叶草赤芍 P. obovata** Maxim. var. **willmottiae** (Stapf) Stern，分布山西、陕西、甘肃南部、湖北、四川、贵州。

**新疆芍药**

**Paeonia sinjiangensis** K. Y. Pan

生于山地针叶林下或林间灌丛中。分布于新疆阿拉善。

块根：活血化瘀，解毒消肿。

附　注：①新疆地方标准收载。②特有药用植物。

**牡丹**

**Paeonia suffruticosa** Andr.——*P. moutan* Sims

全国除秦岭部分地区有野生外，其他地区均为栽培。主产安徽、四川、甘肃、陕西、湖北、湖南、山东、贵州。安徽铜陵产的"凤丹皮"质量最佳。

根皮(牡丹皮)：苦、辛，凉。清热凉血，活血散瘀。用于温毒发斑，吐血衄血，夜热早凉，骨蒸无汗，经闭，痛经，痈肿疮毒，跌扑伤痛。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**紫斑牡丹**

**Paeonia suffruticosa** Andr. var. **papaveracea** (Andr.) Kerner——*P. papa-*

*veracea* Andr.

生于海拔 1 100—2 800 米的山坡灌丛中。分布于陕西、甘肃、河南、四川。

根皮：清热解毒，止痛。

附　注：①陕西作丹皮用，称"西丹皮"。②功效相同的有**矮牡丹 P. suffruticosa** Andr var. **spontannea** Rehd.，分布陕西北部、山西、甘肃、四川。③紫斑牡丹、矮牡丹均为国家三级保护植物。

**四川牡丹**

**Paeonia szechuanica** Fang

生于海拔 2 600—3 100 米的山坡、河旁草地或灌丛中。分布于四川西北部。

根皮：清热解毒，止痛。

附　注：①国家二级保护植物。②四川地方标准收载；特有药用植物。

**川赤芍**　　赤芍(甘肃、青海、四川)，条赤芍(四川)

**Paeonia veitchii** Lynch

生于海拔 1 950—3 700 米草坡或林下阴湿处。分布于山西南部、陕西、甘肃、青海东部、四川西部、西藏。

根(赤芍)：功效同草芍药。

附　注：③《中华人民共和国药典》1990 年版收载；西南地区常以此作赤芍用。②功效相似的有**毛果川赤芍 P. veitchii** Lynch var. **leiocarpa** W. T. Wang；**单花赤芍 P. veitchii** Lynch var. **uniflora** K. Y. Pan；**毛脉川赤芍 P. veitchii** Lynch var. **woodwardii** Stern，均分布于四川。

## 52. 猕猴桃科　Actinidiaceae

### 猕猴桃属　Actinidia Lindl.

**软枣猕猴桃**　　猕猴梨(通称)，软枣子(东北)，藤梨、阳桃、毛梨子(全国中草药汇编)

**Actinidia arguta** (Sieb. et Zucc.) Planch.——*Trochostigma arguta* Sieb. et Zucc.

生于海拔 1 000—2 000 米的杂木林间或灌丛中。分布于东北及河北、北京、山西、陕西、甘肃、宁夏、浙江、江西、湖北、广西、云南。

根、叶(猕猴梨)：淡、微涩，寒。清热，健胃，利湿。用于风湿关节痛，跌打损伤，丝虫病，肝炎，痢疾，擦疡，痈疖肿毒，癌症。　果实(软枣子)：甘。止渴，解烦热，下石淋。用于消化不良，食欲不振、呕吐、烧、烫伤。

附　注：功效相同的有**心叶猕猴桃 A. arguta** (Sieb. et Zucc.) Planch. var. **cordifolia** (Miq.) Bean，分布于吉林、辽宁、山东、安徽、浙江；**陕西猕猴桃 A. arguta** (Sieb. et Zucc.) Planch. var. **giraldii** (Diels) Vorosh.，分布于河北、陕西、河南、湖北；**凸脉猕猴桃 A. arguta** (Sieb. et Zucc.) Planch. var. **nervosa** C. F. Liang，分布于安徽、浙江、河南、四川、云南。

**紫果猕猴果**　　羊奶奶(全国中草药汇编)

**Actinidia arguta** (Sieb. et Zucc.) Planch. var. **purpurea** (Rehd.) C. F. Liang——*A. purpurea* Rehd.

生于海拔700—1 500米的山谷杂木林中或林缘。分布于陕西、福建、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

根、茎皮、果实(小羊桃)：酸、涩，平。清热解毒，利湿，补虚益损。用于吐血，慢性肝炎，月经不调，风湿关节痛。

**异色猕猴桃** 鸡考果(广西)

**Actinidia callosa** Lindl. var. **discolor** C. F. Liang

生于海拔350—1 300米的山谷林缘、山坡路旁及灌丛中。分布于安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

茎、叶、果实：利尿通淋，祛风除湿，止痢。用于石淋，痢疾，风湿痹痛。

**京梨猕猴桃** 水梨儿藤(四川)

**Actinidia callosa** Lindl. var. **henryi** Maxim.

生于海拔1 000米以下的山间杂木林内或林缘。分布于中南、西南及陕西、甘肃、安徽、浙江、福建。

根皮(水梨藤)：涩，凉。清热，消肿。用于全身肿胀，背痈红肿，肠痈腹痛。

**毛叶硬齿猕猴桃** 秤砣梨(安徽)

**Actinidia callosa** Lindl. var. **strigillosa** C. F. Liang

生于海拔750—1 300米的山谷林中或林缘。分布于安徽、福建、湖南、广西、贵州。

果实：用于肿瘤。

**奶果猕猴桃** 小果冬藤(广西)

**Actinidia carnosifolia** C. Y. Wu var. **glaucescens** C. F. Liang

生于海拔900—1 400米的山谷、溪边、林缘或路旁。分布于广东、广西、贵州、云南。

根：外用于瘰疬。

**中华猕猴桃** 羊桃、鬼桃(陕西)

**Actinidia chinensis** Planch.

生于山坡、林缘或灌丛中。分布于中南及陕西、江苏、安徽、浙江、江西、福建。

果实(猕猴桃)：酸、甘，寒。解热，通淋，止渴。用于消化不良，食欲不振，呕吐，烧、烫伤。根皮(羊桃根皮)：酸、微甘，凉。有小毒。清热解毒，活血消肿。用于风湿关节痛，跌打损伤，丝虫病，肝炎，痢疾，瘰疬，痈肿，癌症。

附 注：功效相同的有**美味猕猴桃 A. deliciosa** (A. Chev.) C. F. Liang et A. R. Ferrguson，分布于西南及陕西、甘肃、河南、湖北、湖南、广西；**黄毛猕猴桃 A. fulvicoma** Hance，分布于江西、福建、湖南、广东；**黑蕊猕猴桃 A. melananda** Franch.，分布于陕西、甘肃、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南；**清风藤猕猴桃 A. sabiaefolia** Dunn，分布于安徽、江西、福建、湖南。

**柱果猕猴桃**

**Actinidia cylindrica** C. F. Liang

生于山谷、水边、溪旁及林下、灌丛中。分布于广西、贵州。

根皮、叶、果实：清热生津，消肿解毒。

附　注：功效相似的有**网脉猕猴桃** **A. cylindrica** C. F. Liang **var. reticulata** C. F. Liang，分布于广西、贵州。

**毛花猕猴桃**　　白藤梨(通称)，毛花杨桃(中国高等植物图鉴)，山蒲桃、毛冬瓜(全国中草药汇编)

**Actinidia eriantha** Benth.

生于海拔150—1 700米的岩石林缘、溪边、山坡路旁或疏林灌丛中。分布于浙江、江西、福建、湖南、广东、广西、贵州。

根、根皮、叶(毛冬瓜)：微辛，凉。抗癌，消肿解毒。根：用于胃癌，乳腺癌，食管癌，腹股沟淋巴结炎，疮疖，皮炎。根皮：用于跌打损伤。叶：外用于乳痈。

**绵毛猕猴桃**

**Actinidia fulvicoma** Hance var. **lanata** (Hemsl.) C. F. Liang——*A. lanata* Hemsl.

生于山地疏林或灌丛中。分布于福建、湖南、广东、广西、贵州、云南。

根、茎：甘，凉。清热解毒，化湿祛瘀。用于乳痈，消化不良，骨折，瘰疬。果实：用于石淋。

**糙毛猕猴桃**

**Actinidia fulvicoma** Hance var. **lanata** (Hemsl.) C. F. Liang f. **hirsuta** (Finet et Gagnep.) C. F. Liang——*A. fulvicoma* Hance var. *hirsuta* Finet et Gagnep.

生于海拔1 300—1 500米的阴湿常绿林及灌丛中。分布于广西、贵州、云南。

根：消积，消疮。用于小儿疳积；外用于疮疥。

**长叶猕猴桃**

**Actinidia hemsleyana** Dunn

生于山地、路旁或林内。分布于浙江、江西、福建。

果实：甘、酸，凉。清热解毒，除湿。

**蒙自猕猴桃**　　多齿猕猴桃、藤沙梨(广西)

**Actinidia henryi** Dunn

生于海拔180—1 930米的山坡林中或路边。分布于广西、云南。

茎：外用于口疮。

**华南猕猴桃**　　猴子果(广西)

**Actinidia glaucophylla** F. Chun

生于海拔250—1 400米的林中、灌丛或路旁。分布于湖南、广东、广西、贵州。

根、茎、果实或全株：生津清热，消肿解毒。根：用于胃脘痛。茎：外用于骨折，外伤出血。根、果实：用于痢疾。全株：用于消渴。

**耳叶猕猴桃**　　歪叶猕猴桃(中国果树分类学)

**Actinidia glaucophylla** F. Chun var. **asymmetrica** (F. Chun) C. F. Liang——*A. asymmetrica* F. Chun

生于山谷、林中或路旁。分布于广东、广西。

茎：祛风除湿，接骨。用于风湿痹痛；外用于骨折。

**狗枣猕猴桃**　　深山木天蓼(江苏)

**Actinidia kolomikta** (Rupr. et Maxim.) Maxim.——*Prunus? kolomikta* Rupr et Maxim.

生于山坡混交林或水边灌丛中，海拔可达3 600米。分布于东北及河北、陕西、江苏、江西、湖北、四川、云南。

果实(狗枣子)：酸、甘，平。滋补强壮。用于坏血病。

**小叶猕猴桃**

**Actinidia lanceolata** Dunn

生于山坡、山谷混交林内或林缘、山脚水沟、灌丛中。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖南、广东。

根：甘、微酸、涩，凉。行血，补精。用于筋骨酸痛，精血不足。

**阔叶猕猴桃**　　多果猕猴桃(海南植物志)

**Actinidia latifolia** (Gardn. et Champ.) Merr.——*Heptaca? latifolia* Gardn. et Champ.

生于海拔150—2 200米的山坡灌丛中或林缘。分布于安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

茎、叶(红蓇蛇)：淡、涩，平。清热解毒，除湿，消肿止痛。用于咽喉痛，泄泻；外用于痈疮痛。

**两广猕猴桃**　　鱼网藤(广西)

**Actinidia liangguangensis** C. F. Liang

生于海拔250—1 000米的山地、山谷灌丛或疏林中。分布于广东、广西。

根或全株：利尿，清热，舒筋活络。用于小便淋痛；外用于跌打损伤，疮疡肿毒。

**大籽猕猴桃**

**Actinidia macrosperma** C. F. Liang

生于低山坡、山麓竹林内及林缘、水沟边、路旁旷地上。分布于江苏、安徽、浙江、江西、湖北、广东。

在浙江作毛人参药用，其作用比对萼猕猴桃佳。

附　注：功效相同的有**梅叶猕猴桃 A. macrosperma** C. F. Liang var. **mumoides** C. F. Liang，分布于江苏、安徽、浙江、江西。

**褐粉猕猴桃**

**Actinidia melanandra** Franch. var. **subconcolor** C. F. Liang

生于山坡林中、路边。分布于浙江、贵州。

根、果实：生津清热，消肿解毒。

**美丽猕猴桃**　　红毛藤、红网藤(广西)

**Actinidia melliana** Hand.-Mazz.

生于海拔200—1 250米的山地树丛中。分布于江西、湖南、广东、海南、广西。

根：止血，消炎，祛风除湿，解毒，接骨。用于崩漏，脱疽，风湿痹痛；外用于皮肤过敏，枪伤，毒虫咬伤，骨折。

**葛枣猕猴桃**　　葛枣子(辽宁)

**Actinidia polygama** (Sieb. et Zucc.) Maxim.——*Trochostigma polygama* Sieb

et Zucc.

生于海拔500~1 900米的林缘及山麓、河岸等处的灌丛中。分布于东北及山西、陕西、甘肃、山东、浙江、河南、湖北、湖南、四川、云南。

根(木天蓼根): 用于风虫牙痛,腰痛。 枝、叶(木天蓼): 辛,温。理气止痛。用于麻风,食积,腰痛,疝痛。 带虫瘿的果实(木天蓼子): 苦、辛,微热。用于中风,口面㖞斜,疝气。

**红茎猕猴桃**

**Actinidia rubricaulis** Dunn.

生于山沟林中。分布于湖北、湖南、广西、四川、贵州。

根、茎: 祛风活络,消肿止痛,行气散瘀。

**革叶猕猴桃**

**Actinidia rubricaulis** Dunn var. **coriacea** (Finet et Gagnep.) C. F. Liang——*A. callosa* Lindl. var. *coriacea* Finet et Gagnep.

生于海拔700—1 500米的山谷、林中或沟边。分布于安徽、江西、湖北、湖南、广东、四川、贵州、云南。

根(秤砣梨根): 苦、涩,温。行气活血。用于跌打损伤,腰背疼痛,内伤吐血。 果实(秤砣梨): 酸、涩,温。抗肿瘤。用于肿瘤。

**花楸猕猴桃**

**Actinidia sorbifolia** C. F. Liang

生于海拔1 300—1 600米的山地丛林中。分布于贵州。

根: 清热利水,散瘀止血。

**安息香猕猴桃**

**Actinidia styracifolia** C. F. Liang

生于山林中。分布于福建、湖南、贵州。

根、果实: 清热解毒,消肿。

**四萼猕猴桃** 小洋桃藤、大气藤(陕西)

**Actinidia tetramera** Maxim.

生于山坡林中或灌丛中。分布于陕西、甘肃、河南、湖北、四川。

根: 甘、淡,平。清热利湿。用于慢性肝炎,痰疾,带下病。

**毛蕊猕猴桃**

**Actinidia trichogyna** Franch.

生于海拔1 000—1 800米的山地林中。分布于江西、湖北、四川、贵州。

根、果实: 清热解毒,补虚益损。

**对萼猕猴桃** 猫气藤、沙梨藤、糯米饭藤(全国中草药汇编)

**Actinidia valvata** Dunn

生于海拔200—800米的溪边、山谷丛林中。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南。

根(猫人参): 苦、涩,凉。清热解毒。用于痈疖脓肿,带下病,麻风病。

**显脉猕猴桃**

**Actinidia venosa** Rehd.

生于海拔1 200—2 400米的山地林中。分布于西南。

根：解毒，活血，祛瘀。用于跌打损伤。

**葡萄叶猕猴桃**

**Actinidia vitifolia** C. Y. Wu

生于山地疏林或灌丛中。分布于四川、云南。

根：行气止痛。用于跌打损伤。

## 藤山柳属 Clematoclethra Maxim.

**猕猴桃藤山柳** 杨叶藤山柳(中国植物志)

**Clematoclethra scandens** (Franch.) Maxim. subsp. **actinidioides** (Maxim.) Y. C. Tang et Q. Y. Xiang——*C. actinidioides* Maxim.; *C. actinidioides* Maxim. var. *populifolia* C. F. Liang et Y. C. Chen

生于山坡林缘或沟旁。分布于陕西、甘肃、宁夏、河南、四川、贵州、云南。

根：酸，凉。清热解毒，活血化瘀，消肿止痛。用于吐血，带下病，经闭，慢性肝炎，风湿关节痛，疝气。

附　注：我国特有属。

## 水东哥属 Saurauia Willd.

**尼泊尔水东哥** 蜜心果、粘心果(云南)

**Saurauia napaulensis** DC.

生于山坡疏林或箐沟、河边阴湿处。分布于广西、四川、贵州、云南。

根及果实(鼻涕果)：苦，凉。有毒。散瘀消肿，止血。用于骨折，跌打损伤，创伤出血，疮疖。

附注：有毒，宜慎用。

**山地水东哥** 牛嚎管树(广西)，密心果、少牢木(云南)

**Saurauia napaulensis** DC. var. **montana** C. F. Liang

生于沟边或密林中。分布于广西、贵州、云南。

根(牛嚎管根)：甘、淡，平。有毒。接骨排脓。用于骨折，疮疡。树皮(牛嚎管树)：甘、涩，平。止血生肌，散瘀消肿。用于骨折，跌打损伤，外伤出血，慢性骨髓炎，小便淋痛。

附　注：有毒，宜慎用。

**聚锥水东哥** 碧利木、水枇杷、勒苗、个毛(广西)，羊桃山枇杷(贵州)

**Saurauia thyrsiflora** C. F. Liang

生于山谷、溪边、沟旁、路边及林下。分布于广西、贵州、云南。

根：用于小儿麻疹。茎皮：用于痢疾。叶：用于烧、烫伤。

**水东哥** 白饭果、白饭木(广西)

**Saurauia tristyla** DC.

生于丘陵、低山山谷或山坡林中。分布于福建、广东、海南、广西、云南。

根、叶(水东哥)：微苦，凉。清热解毒，止咳，止痛。用于风热咳嗽，风火牙痛，无名肿毒、目翳。根皮：用于遗精。

## 53. 金莲木科 Ochnaceae

### 合柱金莲木属 Sinia Diels

**合柱金莲木** 辛木(广西)

**Sinia rhodoleuca** Diels

生于密林中。分布于广东西北部、广西西北部及中部。

全株：用于疥疮。

## 54. 龙脑香科 Dipterocarpaceae

### 龙脑香属 Dipterocarpus Gaertn. f.

**油树** 羯布罗香(云南)，陀螺状龙脑香(拉汉英种子植物名称)

**Dipterocarpus turbinatus** Gaertn. f.

生于海拔500米的热带雨林中。云南盈江、景洪、勐腊有栽培。

叶：止血。外用于过敏性皮炎，疥疮，刀伤出血。

## 55. 山茶科(茶科) Theaceae

### 黄瑞木属(杨桐属) Adinandra Jack.

**川黄瑞木**

**Adinandra bockiana** Pritz. ex Diels

生于海拔300—1 400米的山地、沟边、林地。分布于广西、四川、贵州。

叶(瑶人茶)：止血，清热解毒。用于外伤出血，烧、烫伤。

**尖叶川黄瑞木**

**Adinandra bockiana** Pritz. ex Diels var. **acutifolia** (Hand.-Mazz.) Kobuski—*A. acutifolia* Hand.-Mazz.

生于海拔300—1 400米的山地、沟边、林地。分布于江西、福建、湖南、广东、广西、贵州。

全株：祛风解表，散寒理气。用于风寒感冒，头痛，胃痛。

**大萼黄瑞木** 大萼红淡(福建)

**Adinandra glischroloma** Hand.-Mazz. var. **macrosepala** (Metc.) Kobuski——

*A macrosepala* Metc.

生于山坡林下。分布于浙江、江西、福建、湖南、广东、广西。

根、叶：活血祛瘀，止痛，止泻。

**海南黄瑞木**

**Adinandra hainanensis** Hayata

生于海拔200—1 800米的向阳山坡林地。分布于广东、海南、广西。

茎、叶：止咳，通窍。用于口疮，鼻咽癌。

**毛药黄瑞木**

**Adinandra millettii** (Hook. et Arn.) Benth.——*Cleyera millettii* Hook. et Arn.

生于海拔90—1 250米的山地林下、水边。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖南、广东、广西。

根、嫩叶(黄瑞木)：甘、微苦，凉。凉血止血，消肿解毒。根：用于鼻衄，子痫，疟腮；外用于疖肿，毒蛇咬伤，毒蜂螫伤。

**亮叶黄瑞木**

**Adinandra nitida** Merr. ex Li

生于山谷林中。分布于广东、广西、贵州。

叶：用于肝炎。

## 红楣属(茶梨属) Anneslea Wall.

**红楣** 胖婆茶(广西)，茶梨(贵州)，香叶树(云南)，猪头果(中国高等植物图鉴)

**Anneslea fragrans** Wall.

生于荒山坡上。分布于江西、福建、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根、树皮、叶(红香树)：微苦、涩，凉。消食健胃，舒肝退热。用于消化不良，泄泻，肝炎，湿疹，吐泻，骨折。

## 山茶属(茶属) Camellia L.

**长尾毛蕊茶** 尾叶山茶(拉汉英种子植物名称)

**Camellia caudata** Wall.

生于山谷林下及灌丛中。分布于浙江、福建、台湾、广东、海南、广西、四川、云南。

茎、叶、花：活血止血，祛腐生新。

**浙江红山茶** 红花油茶(中国高等植物图鉴)

**Camellia chekiang-oleosa** Hu

生于海拔500—1 300米的山坡、山谷灌丛中、疏林边及溪涧旁。分布于浙江、江西、福建、湖南。

叶：止痢。用于泻痢。 花：用于外伤出血。

**金花茶**

**Camellia chrysantha** (Hu) Tuyama——*Theopsis chrysantha* Hu

生于林下及灌木丛中。分布于广西、云南。

叶(金花茶)：清热生津，止痢。用于痢疾。

附　注：①国家一级保护植物。②广西特有药用植物。③**防城金花茶 C. chrysantha** (Hu) Tuyama var. **phaeopabisperma** Chang，分布于广西防城。　老叶：用于痢疾；外用于烂疮。　花：用于便血。

**贵州连蕊茶**　　阿根衣(贵州)

**Camellia costei** Lévl.——*Camelliapsis costei* (Lévl.) V. Krecz.

生于山坡、山谷、林中。分布于江西、湖北、湖南、广东、广西、贵州、云南。

全株(阿根衣)：苦，温。健脾消食，滋补强壮。用于虚弱消瘦。

**尖连蕊茶**　　尖叶山茶、阿连衣(贵州)

**Camellia cuspidata** Wight

生于海拔 500—1 700 米的山沟、林下。分布于陕西、安徽、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、贵州、云南。

根、花：甘，温。健脾消食，补虚。用于脾虚食少，病后虚弱，吐血。

**毛花连蕊茶**　　连蕊茶(中国高等植物图鉴)

**Camellia fraterna** Hance

生于海拔 150—500 米的山坡、山谷疏林中及溪谷两旁林缘、山麓水沟边。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建。

根、叶、花(连蕊茶)：苦，凉。消肿，活血，清热解毒。用于痈肿溃烂，跌打损伤。

**秃房茶**　　那梅些(广西)

**Camellia gymnogyna** H. T. Chang

生于山谷密林下。分布于广东、广西、四川、贵州、云南。

种子：用于疟腮。

**山茶**　　红茶花(分类草药性)

**Camellia japonica** L.

山东、浙江、四川有野生。各地多有栽培。

根(山茶根)：苦，平。消肿止痛。用于跌打损伤。　花(山茶花)：甘、苦、辛，寒。凉血，止血，散瘀，消肿。用于吐血，衄血，血崩，肠风，血痢，血淋，跌打损伤，烧、烫伤。

**落瓣油茶**　　落瓣短柱茶(中国高等植物图鉴)

**Camellia kissi** Wall.

生于海拔 600—2 100 米的常绿林下、灌丛中及河边。分布于广东、海南、广西、四川、云南。

种子：行气，疏滞。用于气滞腹痛。

**长柄山茶**　　山茶花(广西)

**Camellia longipedicellata** (Hu) H. T. Chang

生于疏林中。分布于广西。

叶、花：止痢。用于痢疾。

**油茶**　　茶麸、茶油巴(广东)，油茶籽(中国经济植物志)，椮树(本草纲目拾遗)，枯饼

（药性考）

**Camellia oleifera** Abel.

长江流域以南各省区及陕西南部普遍栽培。

根皮（油茶根皮）：苦，平。有小毒。散瘀活血，接骨消肿。用于骨折，扭挫伤，腹痛，皮肤瘙痒，烧、烫伤。 花（茶子木花）：苦，寒。微毒。凉血止血。用于胃肠出血，咳血，鼻衄，肠风下血，崩漏；外用于烧、烫伤。 种子（茶子心）：苦，平。有毒。行气疏滞。用于气滞腹痛，泄泻，皮肤瘙痒，烧、烫伤。 种子脂肪油（茶油）：甘，平。清热化湿，杀虫解毒。用于痧气腹痛，急性蛔虫阻塞性肠梗阻，疥癣，烧、烫伤。 种子经榨油后的残渣（茶子饼）：辛、苦、涩。有小毒。收湿杀虫。

附　注：功效相同的有**小果短柱茶 C. confusa** Craib——*C. oleifera* Abel var. *confusa* (Craib) Sealy，分布于广西、云南。

**细萼茶**　　白毛茶（广西）

**Camellia parvisepala** H. T. Chang

生于山谷密林中。分布于广西、云南。

叶：利尿。

**西南红山茶**　　匹他山茶（贵州），野山茶（云南种子植物名录）

**Camellia pitardii** Coh. Stuart

生于海拔1 000—2 800米的山沟、水旁、疏林下。分布于湖南、广西、四川、贵州、云南。

根、叶、花（西南山茶）：淡，平。止痢，止血，调经。用于痢疾，月经不调，鼻衄，吐血，肠风下血，关节痛，脱肛。

附　注：功效相同的有**滇野山茶 C. pitardii** Coh. Stuart f. **cavalerieana** (Lévl.) Sealy，分布于云南；**云南野山茶 C. pitardii** Coh. Stuart var. **yunnanica** Sealy，分布于四川、贵州、云南。

**滇山茶**　　野茶花、红花油茶（云南），南山茶（中国高等植物图鉴）

**Camellia reticulata** Lindl.

生于海拔1 500—2 800米的山坡疏林中。分布于云南西部。

叶、花、果实：凉血止血，调经。用于鼻衄，崩漏，月经不调。

附　注：①功效相同的有**单瓣辛滇山茶 C. reticulata** Lindl. f. **simplex** Sealy，分布于云南。②国家二级保护植物。

**怒江红山茶**　　狗爪爪、野茶花（云南），怒江山茶（云南种子植物名录）

**Camellia saluenensis** Stapf ex Bean.

生于山坡疏林中。分布于云南。

叶、嫩芽：清热利尿。

附　注：功效相同的有**小怒江红山茶 C. saluenensis** Stapf ex Bean. f. **minor** Sealy，分布于云南。

**茶**　　叶（本草便读），腊茶（圣济总录），茶芽（本草别说），细茶（万氏家抄方）

**Camellia sinensis** (L.) O. Kuntze——*Thea sinensis* L.

长江流域及以南各地均有种植。

芽、叶（茶叶）：甘、苦，凉。清头目，除烦渴，消食，利尿，解毒。用于头痛，目昏，嗜睡，

心烦口渴，食积痰滞，疟疾，痢疾。 根(茶树根)：苦，平。用于心脏病，口疮，牛皮癣。 果实(茶子)：苦，寒。有毒。用于痰喘，咳嗽。

**普洱茶** 野茶树(通称)，普雨茶(物理小识)

**Camellia sinensis** (L.) O. Kuntze var. **assamica** (Mast.) Kitamura——*Thea assamica* Mast.

生于杂木林下。分布于福建(南靖)、广东、海南、广西(扶绥、昭平)、贵州(盘县、榕江)、云南。

叶(普洱茶)：苦、涩，寒。消肉食，逐风痰，，泄热解毒，生津止渴。用于痞气腹痛，霍乱，痢疾。

附 注：国家二级保护植物。

**大叶茶** 苦丁、过罗、抱罗(南越笔记)

**Camellia sinensis** (L.) O. Kuntze f. **macrophylla** (Sieb.) Kitamura——*Thea sinensis* L. var. *macrophylla* Sieb.

生于山坡林下。分布于四川、云南。

叶(皋芦)：苦、涩，平。清热除烦，利咽止痛，通淋。用于头痛烦热，咽喉痛，淋证。

**毛枝连蕊茶**

**Camellia trichoclada** (Rehd.) Chien——*Thea trichoclada* Rehd.

生于低山坡、丘陵、疏林下或林缘灌丛中。分布于浙江、福建。

花蕾(毛枝连蕊茶)：苦，温。解毒。

**三花连蕊茶**

**Camellia triantha** H. T. Chang

生于山坡或疏林下。分布于广西。

叶：祛腐生新。

**威宁短柱茶**

**Camellia weiningensis** Y. K. Li

生于灌丛中。分布于贵州威宁。

果实：清热解毒。

## 红淡比属(肖柃属) Cleyera Thunb.

**红淡比** 杨桐(中国高等植物图鉴)

**Cleyera japonica** Thunb

生于海拔2 000—3 200米的山坡林中。除湖北、四川外，广布于长江流域以南及台湾、海南。

花：凉血，止血，消肿。

## 柃木属(柃属) Eurya Thunb.

**尖萼毛柃** 苦白腊、尖叶柃木(贵州)

**Eurya acutisepala** Hu et L. K. Ling

生于灌丛林下。分布于江西、福建、湖南、广东、广西、贵州。

叶、果实：祛风除湿，活血祛瘀。用于风湿痛，跌打损伤。

**翅柃**　　柃木(湖南)

**Eurya alata** Kobuski

生于海拔380—1 500米的山谷、沟边、林下。分布于陕西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东。

根皮：理气活血，消瘀止痛。

**金叶柃**

**Eurya aurea** (Lévl.) Hu et L. K. Ling——*Rapanea aurea* Lévl.

生于山坡、山谷林下或灌丛中。分布于湖北、广西、四川、贵州、云南。

根、叶(金叶柃)：涩，平。清热解毒，消肿止痛。用于无名肿毒，脓疱疮。

**耳叶柃**　　三早木(广西)

**Eurya auriformis** H. T. Chang

生于山坡。分布于广东、广西。

叶(耳叶柃)：生肌。

**短柱柃**

**Eurya brevistyla** Kobuski

生于海拔850—2 600米的阴湿山坡常绿灌丛中。分布于陕西、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

叶：用于烧、烫伤。

**米碎花**　　梅养东(侗名)

**Eurya chinensis** R. Br.

生于海拔300—800米的荒山草地、林旁、河边、灌丛中。分布于江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、云南。

全株(米碎花)：淡、微苦、甘，凉。除湿敛疮，清热解毒。用于脓疮。

**长毛柃**　　乌婆树、鱼骨刺(广西)

**Eurya ciliata** Merr.——*Eurya patentipila* Chun

生于山坡灌丛林下。分布于广东、广西。

叶：用于烧、烫伤，疮疡肿毒，跌打损伤。

**秃小耳柃**

**Eurya disticha** Chun

生于海拔670—1 200米的山林中。分布于福建、广东。

根、叶：祛风止痒。

**二列叶柃**

**Eurya distchophylla** Hemsl.

生于海拔480—1 500米的山谷、林下、水边。分布于江西、福建、湖南、广东、广西。

全株(山禾串)：甘、微涩，凉。清热解毒，止痛。用于乳蛾，咽喉痛，口疮，咳嗽，烧、烫伤。

**岗柃**

**Eurya groffii** Merr.

生于海拔500—2 000米的山坡、林地、水边。分布于西南及福建、广东、海南、广西。

根、叶(岗柃)：微苦，平。消肿止痛，镇咳祛痰。用于肺痨，咳嗽，跌打损伤。

**丽江柃**

**Eurya handel-mazzettii** H. T. Chang

生于山地、草坡、灌丛中。分布于西南。

叶：用于烧、烫伤。

**微毛柃**

**Eurya hebeclados** L. K. Ling

生于山谷、溪边、草丛中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

枝、叶(微毛柃)：辛、苦，平。截疟，消肿，止血，解毒。用于风湿关节痛，疟疾；外用于出血，无名肿毒。

附　注：功效相同的有**细齿叶柃 E. nitida** Korth.，分布于陕西、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州；**凹脉柃 E. impressinervis** Kobski，分布于华南及湖南、贵州、云南。

**柃木**　　细叶菜(江西)，硐龙络(苗语)，吹木叶(湖南药物志)，粗齿柃(植物分类学报)

**Eurya japonica** Thunb.

生于山坡阴湿处。分布于上海、浙江、江西、台湾、湖南。

枝、叶(柃木)：苦、涩，平。祛风除湿，消肿止血。用于风湿关节痛，臌胀，外伤出血，发热口干。

**贵州毛柃**

**Eurya kweichowensis** Hu et L. K. Ling

生于海拔600—1 000米的林中。分布于湖北、广西、四川、贵州、云南。

枝、叶：清热解毒，消肿止血，祛风除湿。

**细枝柃**　　黑水柃木(广西)，短尾叶柃、罗葵氏柃(海南植物志)

**Eurya loquaiana** Dunn

生于海拔40—770米的山谷、林下。分布于安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南，广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

茎、叶：消肿止痛。用于风湿痛，跌打损伤。

**黑柃**

**Eurya macartneyi** Champ.

生于海拔160—1 000米的山地林中。分布于江西、福建、湖南、广东、海南、广西。

茎、叶：清热解毒。

**格药柃**　　刺柃、硬壳紫(云南)

**Eurya muricata** Dunn

生于山谷疏林中或竹林内。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、四

川、贵州、云南。

茎、叶、果实：祛风除湿，消肿止血。

**钝叶柃**

**Eurya obtusifolia** H. T. Chang

生于低山林中。分布于陕西、浙江、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

果实(野茶子)：苦、涩，凉。止渴，利尿，醒脑。用于暑热口渴，小便淋痛，泻痢，头昏目眩。

**窄基红褐柃**

**Eurya rubiginosa** H. T. Chang var. **attenuata** H. T. Chang

生于山坡、山谷混交林下或林缘、山脚丘陵地及水边灌丛中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖南、广东、广西。

叶、果实：苦、涩，平。祛风除湿，消肿止血。

**窄叶柃**

**Eurya stenophylla** Merr.

生于山谷、山坡灌丛中。分布于湖北、广东、广西、四川、贵州。

根、枝、叶：清热，补虚。

**四角柃**

**Eurya tetragonoclada** Merr. et Chun

生于山坡、山谷林中。分布于江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、云南。

根：消肿止痛。用于跌打损伤。

**单耳柃**

**Eurya weissiae** Chun

生于山林中。分布于浙江、江西、福建、湖南、广东、广西、贵州。

茎、叶：清热解毒，消肿。

## 大头茶属 Gordonia Ellis

**大头茶** 香港大头茶(拉汉英种子植物名称)

**Gordonia axillaris** (Roxb. ex Ker.) Dietr.——*Camellia axillaris* Roxb. ex Ker.; *Polyspora axillaris* (Roxb.) Sweet

生于海拔500—3 000米的山谷、溪边、林地。分布于台湾、广东、海南、广西、四川、云南。

芽、叶、花(三白花)：清热解毒。

## 木荷属 Schima Reinw. ex Bl.

**银木荷**

**Schima argentea** Pritz.

生于海拔900—3 000米的山坡、林地。分布于西南及江西、湖南、广东、广西。

根皮、树皮：有毒。驱虫。用于蛔虫病、绦虫病。

**木荷**　木艾树(常用中草药单方验方选编)，何树(中国高等植物图鉴)，柯树、果槁(海南植物志)

**Schima superba** Gardn. et Champ.

生于山坡、山谷常绿林地。分布于江苏、浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、贵州。

根皮(木荷皮)：辛，温。有毒。利水消肿，催吐；外用于痈疮肿毒。

**西南木荷**　峨眉木荷(拉汉英种子植物名称)

**Schima wallichii** Choisy

生于海拔800—1 800米的山谷、林地。分布于江西、湖南、广西、四川、贵州、云南。

茎皮、叶(毛木树)：涩，凉。有小毒。收敛止泻，杀虫。用于外伤出血，虫、蛇咬伤。

## 紫茎属(旃檀属)　Stewartia L.

**长柱紫茎**

**Stewartia rostrata** Spongb.

生于山坡混交林下、溪谷两旁灌丛中。分布于浙江、江西。

根、果实：用于暑热腹痛。

**紫茎**　帽兰(四川中药志)

**Stewartia sinensis** Rehd. et Wils.

生于山地阔叶林中或沟谷林中。分布于安徽、浙江、福建、江西、河南、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

根皮、茎皮、果实(紫茎皮)：苦、辛，凉。舒筋活络，解暑。用于跌打损伤，风湿麻木。

附　注：国家三级保护植物。

## 厚皮香属　Ternstroemia Mutis ex L. f.

**厚皮香**

**Ternstroemia gymnanthera** (Wight et Arn.) Sprague——*Cleyera gymnanthera* Wight et Arn.

生于高海拔的山坡林地。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

叶、花、果实(厚皮香)：苦，凉。(花、果实)有小毒。清热解毒，消痈肿。用于痈疮肿毒，乳痈，消化不良。花：可止癣痒。

**尖萼厚皮香**　木铁老虎(广西)

**Ternstroemia luteoflora** Hu et L. K. Ling

生于山谷、林地。分布于江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、贵州、云南。

根、叶：清热解毒，舒筋活络，消肿止痛，止泻。

# 56. 藤黄科(山竹子科) Cuttiferae

## 红厚壳属 Calophyllum L.

**红厚壳** 琼崖、海棠树、胡桐(台湾、广东),海棠果(海南)

**Calophyllum inophyllum** L.

生于海滨、丘陵、山地疏林中,也有栽培。分布于台湾、广东,海南、广西。

根、叶(红厚壳): 微苦,平。祛瘀止痛。用于风湿痛,跌打损伤,痛经。 叶: 用于外伤出血。 树皮、果实(配方): 用于鼻衄,鼻塞,耳聋。 种子油: 用于皮肤病。

**薄叶红厚壳** 跌打将军(广东),薄叶胡杨(海南植物志),梳篦木、独角风(广西上思壮语),横经席(新华本草纲要)

**Calophyllum membranaceum** Gardn. et Champ.

多生于山地的密林或疏林中。分布于台湾、广东、海南、广西。

根、叶(横经席): 微苦,平。祛瘀止痛,补肾强腰。用于风湿骨痛,跌打损伤,骨折,肾虚腰痛,月经不调,黄疸。 叶: 用于外伤出血。

## 黄牛木属 Cratoxylum Bl.

**黄牛木** 黄牛茶、雀笼木(广东),九芽木、满天红(广西),茶咯桌(广西壮语)

**Cratoxylum cochinchinense** (Lour.) Bl.——*Hypericum cochinchinense* Lour.; *C. ligustrinum* (Spach) Bl.

生于阳坡次生杂林或灌丛中。分布于广东、广西、云南。

根、茎皮、嫩叶(黄牛茶): 淡、微苦,凉。止血消肿,清热解暑,化湿消滞。用于泄泻,黄疸,咳嗽,音哑,感冒发热。 嫩叶: 代茶饮预防感冒,痢疾。

**红芽木** 苦丁茶(通称),土茶(广西),酸浆树、黄浆树(云南), 毛叶黄牛木(广西植物名录)

**Cratoxylum formosum** (Jacq.)Dyer subsp. **pruniflorum**(Kurz)Gogelein.——*Tridesmis pryniflora* Kurz

生于山地疏林中。分布于广西、云南。

嫩叶(苦丁茶): 甘、淡、微苦,凉。化湿消滞。用于泄泻,痢疾,疮疖。

## 山竹子属(藤黄属) Garcinia L.

**云树** 黄芽果、倒接果、酸果(云南),给哈蒿(云南傣语), 云南山竹子(中国高等植物图鉴)

**Garcinia cowa** Roxb.

生于季雨林中。分布于广西、云南。

茎、叶、汁(黄心果): 苦、涩,凉。有小毒。清热,解毒,驱虫。用于湿疹,口疮,牙龈肿痛,痈疮溃烂,烧、烫伤,蚂蝗入鼻(鲜叶汁滴入鼻中)。 果实: 用于铁砂入肉不出。

**藤黄**　海藤、玉黄、月黄(通称)

**Garcinia hanburyi** Hook. f.

原产柬埔寨及马来西亚。广东、广西有引种。

树脂(藤黄)：酸、涩，凉。有毒。杀虫解毒，强壮收敛。用于龋齿。

附　注：现多为兽用药。

**木竹子**　山桔子(广西)，白树仔(广西)，花皮果、酸木果(云南)，多花山竹子(海南植物志)，旦罗旦(瑶语)

**Garcinia multiflora** Champ.

生于海拔 400—1 200 米的密林或疏林中。分布于江西、福建、台湾、广东、海南、广西、云南。

树内皮(山竹子)：苦、涩，凉。有小毒。清热解毒，止痛，收敛生肌。用于胃脘痛胀，小儿消化不良，湿疹，口疮，牙龈肿痛，臁疮，烧、烫伤。果实：酸，凉。有小毒。生津解暑，解酒毒，止泻。用于吐逆不食，脱肛。

附　注：功效相同的有**单花山竹子 G. oligantha** Merr.，分布于海南。

**岭南山竹子**　岭南倒稔子、赤过、麦芽仔、鸠酸山竹、粘牙仔(广东)，黄芽果(海南)，蒙龙果(广西)

**Garcinia oblongifolia** Champ.

生于海拔 200—400 米的湿润肥沃山地。分布于广东、海南、广西。

树内皮：苦、涩，凉。有小毒。清热解毒，止痛，收敛生肌。用于带下病，烧、烫伤，跌打损伤。叶、果实：用于食滞腹胀。

**金丝李**　碎棉(广西瑶语)，美芦敦(广西壮语)

**Garcinia paucinervis** Chun et How

生于山地丛林中。分布于广西、云南。

根：用于胃脘痛。枝叶(金丝李)：甘、微涩，平。有小毒。清热解毒，消肿。用于疮痈肿毒。树皮：外用于烧、烫伤。

附　注：国家二级保护植物。

**长叶山竹子**　越南藤黄(中国植物志)

**Garcinia schefferi** Pien

生于山地丛林中。分布于广西。

树皮(长叶山竹子)：微苦、涩，平。消肿，散热毒。用于烧、烫伤。

**大叶藤黄**　歪脖子果、大叶山竹子、胶树、人面果(云南)，勿茂(广西壮语)

**Garcinia xanthochymus** Hook. f. ex T. Anders. ——*G. tinctoria* (DC.) W. F. Wight

生于海拔 100—1 080 米的山谷密林中。分布于广西、云南。

茎、叶液汁(歪脖子果)：苦、酸、凉。驱虫。用于蚂蝗人鼻。

## 金丝桃属　Hypericum L.

**狭叶金丝桃**　黄木(广西)

**Hypericum acmosepalum** N. Robson

生于山坡、林缘、草丛中。分布于广西、四川、贵州、云南。

根：用于肝炎。

**湖南连翘**　旱莲草(通称)，金丝蝴蝶(山西、四川)，大对丝草(陕西)，黄花刘寄奴(湖南)，黄海棠(四川、中国高等植物图鉴)

**Hypericum ascyron** L.

生于山坡、林下或草丛中。除青海、新疆外，全国各地均有分布。

全草(红旱莲)：微苦，寒。凉血止血，泻火解毒。用于吐血，咯血，衄血，崩漏，外伤出血，肝火头痛，黄疸，疮疖。

附　注：功效相同的有**衡山金丝桃 H. hengshanensis** W. T. Wang，分布于江西、湖南衡山。

**赶山鞭**　女儿茶(江苏)，地耳草(湖北)，咯讥喊(佬语)

**Hypericum attenuatum** Choisy

生于海拔 700—2 000 米的山坡、草丛中。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、新疆、山东、安徽、江苏、河南、湖北。

全草(赶山鞭)：苦，平。止血，镇痛，通乳。用于吐血，咯血，崩漏，创伤出血，风湿关节痛，神经痛，跌打损伤，乳痈，疔疮肿毒，多汗，又可作清凉解渴剂。

**无柄金丝桃**　黄香棵(云南)，南芒种花(云南种子植物名录)

**Hypericum augustini** N. Robson

生于山地、沟边、路旁潮湿处。分布于云南、西藏。

全草：清热解毒，渗湿利水。

**黄花香**

**Hypericum beanii** N. Robson ——*H. patulum* Thunb. var. *henryi* veitch. ex Bean

生于草坡。分布于四川、贵州、云南。

根、芽、嫩叶、叶(黄花香)：苦，寒。清肝利湿，解毒散瘀。用于肝炎。

**美丽金丝桃**　土连翘(西藏)，甲橡旺利(藏语)，栽秧花(中国植物志)

**Hypericum bellum** Li

生于海拔 2 100—3 300 米的山坡草地，林缘、林下及灌丛中。分布于四川、云南、西藏。

全草、果实(西藏土连翘)：苦，寒。清热解毒，祛风除湿，凉血止血，杀虫止痒。用于肝炎，感冒，痢疾，口疮，皮炎，蛔虫病，黄水疮，水肿。

**挺茎金丝桃**　对对草(四川)

**Hypericum elodeoides** Choisy

生于海拔 500—1 750 米的山坡、草地、林缘、路旁。分布于西南及江西、福建、湖北、湖南、广东。

全草(对对草)：苦，平。活血调经。用于月经不调。

**尖叶金丝桃**　小连翘(新疆)

**Hypericum elongatum** Ledeb.

生于平原草地。分布于新疆北部。

全草：辛，凉。清热解毒，消肿散瘀。

**小连翘**　草黄 麝香草(江苏)，小元宝草、万层塔(浙江)，小对月草(四川)

**Hypericum erectum** Thunb.

生于山坡路旁。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、四川、云南。

全草(小对叶草)：苦，平。止血、消肿，解毒。用于吐血，咯血、衄血、便血，外伤出血，风湿关节痛，神经痛，疔疮肿毒，跌打扭伤、肿毒，月经不调。

附　注：功效相同的有**毛金丝桃 H. hirsutum** L.；**糙枝金丝桃 H. scabrum** L.，分布于新疆北部。

**扬子小连翘**　鼻噩药(贵州)，西南遍地金(云南种子植物名录)

**Hypericum faberi** R. Keller

生于海拔 800—1 800 米的山坡草地、灌丛中或沟边。分布于陕西、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

全草(扬子小连翘)：苦，凉。凉血止血，消肿止痛。用于风热感冒，风湿痛，跌打损伤，鼻噩，内出血。

**多蕊金丝桃**　过路黄、苦连翘、金丝桃(云南)，金丝海棠(新华本草纲要)

**Hypericum hookerianum** Wight et Arn.

生于海拔 2 500—3 400 米的山坡、山谷林缘或灌丛中。分布于云南、西藏。

枝、叶(金丝海棠)：苦，平。清热利湿。用于小便淋痛，黄水疮，疝气。

**地耳草**　对月草(江苏)，七寸金(江西、福建)，肝炎草(广东)，金掌草(四川)，蛇细草(云南)

**Hypericum japonicum** Thunb.

生于山坡草地、林下、灌丛或空旷处。分布于秦岭以南、长江流域及其以南各省区。

全株(田基黄)：辛、苦，平。清热利湿，散瘀消肿，止痛。用于肝炎，肠痈，痈疖，目赤，口疮，蛇虫咬伤，烧、烫伤。

**贵州金丝桃**　水香柴、上天梯(贵州)

**Hypericum kouytchouensis** Lévl.

生于山坡灌丛或路旁。分布于贵州、云南。

根、种子(水香柴)：辛、甘，寒。清热利湿，消积，活血，镇痛。用于经闭，痞块，黄疸，月经不调，痢疾。

**长柱金丝桃**

**Hypericum longistylum** Oliv.

生于山坡林下、灌丛或草地。分布于陕西、甘肃、安徽、河南、湖北、四川。

果实：清热解毒，散瘀消肿。

**少花金丝桃**　花生草、观音草、双筋草 (四川)，长瓣金丝桃(中国高等植物图鉴补编)

**Hypericum monanthemum** Hook. f. et Thoms.

生于海拔 3 200—3 600 米的山坡或沟边草丛中。分布于四川、云南、西藏。

全株(单花金丝桃)：微苦，平。破瘀活血。用于月经不调，痛经。

**金丝桃**　金线莲(陕西),照月莲,五心花(湖南),夜来花树(四川),妈机干(广西罗城仫佬语)

**Hypericum monogynum** L.——*H. chinensis* L.

生于海拔900—1 500米的山坡草地或路旁,庭院多栽培。分布于华东、中南、西南及河北、陕西。

根(金丝桃):甘,温。祛风湿,止咳嗽,清热解毒。用于风湿腰痛,肝炎,疖肿,毒蛇咬伤。　果实(金丝桃果实):用于肺痨,顿咳。

**金丝梅**

**Hypericum patulum** Thunb.——*Norysca patula* (Thunb.) J. O. Voigt

生于海拔可达2 700米的山坡、草地、林下、灌丛中。分布于华东(除山东)及陕西、甘肃、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

根:舒筋活血,催乳,利尿。

**贯叶金丝桃**　山汗淋草(江苏),大对叶草、大对取(湖北),小癀(贵州),贵州连翘(中国药用植物志),千层楼(新华本草纲要)

**Hypericum perforatum** L.

生于海拔1 000—2 500米的山坡林下或草地。分布于河北、陕西、甘肃、青海、新疆、山东、江苏、安徽、江西、河南、湖北、湖南、四川、贵州。

全草或带根全草(贯叶连翘):苦、涩,平。止血消肿,清热解毒,收敛,利湿。用于风湿骨痛,口鼻生疮,肿毒,咯血,吐血,肠风下血,烧、烫伤,外伤出血,无名肿毒,头晕目赤,小便淋痛,月经不调。

**有柄金丝桃**　涩疙瘩(云南),短柄遍地金(云南种子植物名录)

**Hypericum petiolulatum** Hook. f. et Thoms.

生于向阳山坡。分布于云南、西藏。

果实:苦,寒。清热解毒,祛风除湿。

附　注:功效相同的有**云南金丝桃**(滇遍地金) **H. petiolulatum** Hook. f. et Thoms. subsp. **yunnanense** (Franch.) N. Robson——*H. yunnanense* Franch.,分布于四川、云南。

**突脉金丝桃**　大花金丝桃、大叶刘寄奴(陕西),老君茶(新华本草纲要)

**Hypericum przewalskii** Maxim.

生于海拔500—2 500米的山坡草丛或林下。分布于陕西、甘肃、宁夏、青海、河南、湖北、四川。

全草(大对经草):苦、辛,平。活血调经,止血止痛,利水消肿,祛风除湿。用于月经不调,跌打损伤,骨折出血,小便淋痛,毒蛇咬伤。

**元宝草**　对月草、对经草(通称),穿心草、空心草(江苏),叶枹枝(福建、广西),帆船草(广西、云南),仰星埃(苗语),马误(佬语),上莲下柳(壮语)

**Hypericum sampsonii** Hance

生于海拔500—1 500米的山坡草地或路旁阴湿处。分布于长江流域以南及陕西、甘肃、台湾。

全草(元宝草):苦、辛,凉。调经通络,活血止血,解毒。用于月经不调,跌打损伤,风

湿腰痛，吐血，咯血，痈肿，毒蛇咬伤。

**密脉小连翘**

**Hypericum seniawinii** Maxim.

生于海拔800—1 500米的山坡草地、林缘或疏林中。分布于江西、福建、湖南、广西、四川、贵州。

全草：微苦，平。收敛止血，镇痛。

**匙萼金丝桃**　细连翘、蜂子王(湖南)，大叶黄(广西)，山黄花、黄花香(云南)，云南连翘(植物名实图考)，金丝梅(中国高等植物图鉴)

**Hypericum uralum** Buch.-Ham. ex D. Don

生于海拔600—1 800米的山坡林下或灌丛中。分布于华东、西南及陕西、甘肃、湖北、湖南、广西。

全株(芒种花)：苦、辛，寒。清热解毒，利尿，行瘀。用于肝炎，感冒，痢疾，淋证，疝气，筋骨痛，牙痛，鼻衄，黄水疮，跌打损伤。

**遍地金**　锅巴草、金星草、鹅掌菜(云南)

**Hypericum wightianum** Wall. ex Wight et Arn.——*H. bodinieri* Lévl. et Vant.; *H. delavayi* R. Keller

生于田边或路旁草丛中。分布于西南。

全株(遍地金)：苦、涩，寒。收敛，止泻，清热解毒。用于小儿发热，消化不良，久痢，久泻，毒蛇咬伤。

**川鄂金丝桃**　鸡蛋黄花(湖北)

**Hypericum wilsonii** N. Robson

生于山坡灌丛中。分布于湖北、四川。

果实：用于目赤。

### 铁力木属　Mesua L.

**铁力木**　铁栗木、铁棱(广西)，埋波朗、埋朗木过、埋甘莫喀(云南傣语)

**Mesua ferrea** L.

生于海拔450—1 300米的低丘斜坡地或山坡林中。分布于广西、云南。

树皮(铁力木)：苦，凉。收敛止咳，发汗。用于咳嗽，感冒，痰喘，痔血，烧、烫伤。叶：解毒。用于痢疾，毒蛇咬伤。花：止痢。用于痢疾，毒蛇咬伤。未成熟的果实：芳香，发汗。

## 57. 猪笼草科　Nepenthaceae

### 猪笼草属　Nepenthes L.

**猪笼草**　猴子埕(海南)

**Nepenthes mirabilis** (Lour.) Druce——*Phyllamphora mirabilis* Lour.

生于海拔50—400米的沼地、路边、山腰及山顶灌丛、草地或林下。分布于广东西北部及南部，广西玉林、北流、陆川。

全草(猪笼草)：甘、淡，凉。清热止咳，利尿，降压。

## 58. 茅膏菜科 Droseraceae

### 茅膏菜属 Drosera L.

**锦地罗** 落地金钱、丝线串铜钱(云南)，一朵芙蓉花(岭南采药录)

**Drosera burmannii** Vahl

生于海拔50—1 520米的平地、山坡、山谷、疏林或路旁水湿地。分布于福建、台湾、广东、广西、云南。

全草(锦地罗)：微苦，凉。清热利湿，凉血，化痰止咳，止痢。用于泄泻，痢疾，咽喉痛，肺热咳嗽，咯血，衄血，小儿疳积。

**长叶茅膏菜** 捕蝇草、满露草(海南)

**Drosera indica** L.——*D. makinoi* Masamune

生于海拔600米以下的湿旷地或水田边。分布于福建、台湾、广东、广西及沿海岛屿。

全草：外用于跌打损伤，中耳炎，癣疹。

**光萼茅膏菜**

**Drosera peltata** Smith var. **glabrata** Y. Z. Ruan

生于海拔50—1 600米的山坡、草丛、湿草地或溪边。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西。

全草(茅膏菜)：甘，温。有小毒。祛风通络，活血止痛。

附 注：江苏民间用球茎作镇痛药，效果良好。

**苍蝇网** 山君子、珍珠草(云南)，茅膏菜(中国高等植物图鉴)

**Drosera peltata** Smith var. **lunata** (Buch.-Ham.) C. B. Clarke——*D. lunata* Buch.-Ham. ex DC.

生于山坡草地或林缘。分布于长江流域及珠江流域各省区，西藏南部亦有分布。

全草、球茎：用于小儿泄泻脱水，惊风，疳积，肾虚，难产，跌打损伤。

**茅膏菜** 地下明珠(苗族、侗族语)

**Drosera peltata** Smith var. **multisepala** Y. Z. Ruan

生于1 200—3 650米的松林、疏林下、草丛、田边或水旁。分布于四川西南部、贵州西部、云南及西藏南部。

全草、球茎(茅膏菜)：用于跌打损伤，外伤出血。

附 注：过量服食有毒。

**匙叶茅膏菜**

**Drosera spathulata** Labill.

生于山坡湿地和岩石间的灌丛或草丛中。分布于福建中部至西部及台湾。

全草(地毡草)：清热利湿，凉血解毒，化痰消积。

**圆叶茅膏菜**

**Drosera rotundifolia** L.

生于海拔900—1 000米的山坡湿地或湿草丛中。分布于吉林、黑龙江。

全草：甘，平。镇咳祛痰，止痢，祛风通络，活血止痛，解痉。

## 59. 罂粟科 Papaveraceae

### 荷包藤属 Adlumia Raf.

**荷包藤** 合瓣花(东北)

**Adlumia asiatica** Ohwi——*A. cirrhosa* (non. Raf.) **Kom.**

生于林缘、荒地。分布于东北。

全草：苦，寒。镇痛。用于各种疼痛。

### 蓟罂粟属 Argemone L.

**蓟罂粟**

**Argemone mexicana** L.

原产墨西哥等地。栽培或逸生。分布于新疆、福建、台湾、广东、海南、四川、云南。

全草：苦，凉。消肿利胆，祛痰，止泻。用于黄疸，水肿。根：用于慢性皮肤病。种子：催吐，祛痰，消炎，止痛。

### 白屈菜属 Chelidonium L.

**白屈菜** 土黄连(东北、山西、甘肃、山东、河南)，假黄连 (东北)，断肠草(东北、北京)，牛金花(山西)，雄黄草(陕西)

**Chelidonium majus** L.

生于山坡或山谷林缘草地。分布于东北、华北、西北及山东、江苏、安徽、江西、河南、湖北、四川。

全草(白屈菜)：苦，凉。有毒。止咳平喘，镇痛。用于咳喘痰嗽，顿咳，泻痢，脘腹痛；外用于毒蛇咬伤，疥癣，疣，稻田皮炎。根：破瘀消肿，止血，止痛。

附 注：白屈菜有抗癌作用，有用本种治疗直肠癌者。

### 紫堇属 Corydalis Vent.

**川东紫堇** 地丁、苦地丁(湖北)

**Corydalis acuminata** Franch.

生于海拔1 700—1 800米的草地。分布于湖北西部、四川东部。

全草：清热解毒，活血消肿。

**美紫堇**

**Corydalis adrienii** Prain

生于海拔 3 200—4 500 米的高山草坡。分布于四川西南部、云南西北部、西藏东北部。

全草：苦，寒。清热解毒。

**灰绿黄堇**　黄草花(甘肃、青海)，八夏蓄(西藏藏语)，师则色巴(云南德钦藏语)

**Corydalis adunca** Maxim.

生于海拔 1 060—2 700 米的干燥山坡或山坡灌丛中。分布于内蒙古、甘肃、宁夏、青海、四川西北部、西藏东部。

全草(嘎的)：苦，凉。清热解毒，活血消肿，止血，退热。

附　注：本种为藏药。

**东北延胡索**　元胡、延胡索(东北)，土元胡、玄胡(江苏)

**Corydalis ambigua** Cham. et Schltd.——*C. ambigua* Cham. et Schltd. var. *amurensis* Maxim.; *C. ambigua* Cham. et Schltd. f. *rotundiloba* (Maxim.) Kitag.

生于落叶阔叶林、疏林及沟谷斜坡湿润处。分布于东北及北京、山西、宁夏、江苏。

块茎(山延胡索)：苦、微辛，温。活血散瘀，行气止痛。用于气滞心腹作痛，产后瘀血作痛，痛经，癥瘕，跌打损伤，疝痛。

附　注：功效相同的有**线叶东北延胡索 C. ambigua** Cham. et Schltd. f. **tinearioba** (Sieb. et Zucc.) Kitag.; **齿裂东北延胡索 C. ambigua** Cham. et Schltd. f. **dentata** Y. H. Chou 及**多裂东北延胡索** *C. ambigua* Cham et Schltd. f. **multifida** Y. H. Chou, 均分布于东北。

**小距紫堇**

**Corydalis appendiculata** Hand.-Mazz.

生于海拔 2 700—4 100 米的林下或草坡。分布于四川东南部、云南西北部。

根：苦，寒。止血，散瘀，麻醉。用于月经不调，外伤出血，瘀血疼痛。

**台湾黄堇**　黄连(山东)，鸡屎草、臭草(浙江)，合艺(壮语)

**Corydalis balansae** Prain——*C. tashiroi* Maxim.; *C. formosana* Hayata

生于海拔 200—400 米的山谷或沟边湿地。分布于华东及湖北、湖南、广东、广西。

带根全草：苦，凉。清热解毒。用于跌打损伤，痈疮肿毒；外用止痛。

**地丁草**　苦地丁(通称)，紫花地丁(辽宁、内蒙古、河北、山东、湖南)，苦丁、小鸡菜(山东)

**Corydalis bungeana** Turcz.

生于田边路旁，或栽培。分布于华北及辽宁、陕西、甘肃、宁夏、山东、河南、湖南、贵州。

全草(苦地丁)：苦、辛，寒。清热解毒，活血消肿。用于疔疮痈疽，化脓性炎症，瘰疬，感冒，咳嗽，目赤，肝炎，水肿，肠痈，泄泻。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版附录收载。②本种为藏药“格周丝哇”的原植物之一。

**东紫堇**

**Corydalis buschii** Nanki

生于林缘，荒地。分布于东北。

全草、块茎：苦，温。镇痛，解痉。用于头痛，痛经，胃痛。

**无冠克什米尔紫堇**　　雀子都(藏语)

**Corydalis cashmeriana** Royle var. **ecristata** Prain

生于海拔 4 500—4 700 米的阴坡灌丛中或山顶石缝中。分布于我国西藏吉隆、错那。

全草：苦，寒。止血。用于刀伤出血及其他出血症。

**碎米蕨叶黄堇**　　地白子(四川)

**Corydalis cheilanthifolia** Hemsl.

生于海拔 1 000 米左右的阴湿山坡。分布于甘肃、湖北西部、四川。

全草：滋补。

**金球黄堇**　　东丝儿(藏语)

**Corydalis chrysosphaera** Marq. et Airy-Shaw

生于海拔 3 000—4 800 米的河漫滩地。分布于我国西藏嘉黎、索县、类乌齐。

全草(区敦奥嘎)：苦，寒。解热止痛，利水消肿。用于湿热水肿，胃脘痛，痢疾，腰腿痛，疮痈肿毒。

附　注：本种为藏医用药，为我国西藏特有药用植物。

**卡拉黄堇**　　寸冬欢蒿(藏语)

**Corydalis clarkei** Prain

生于高山草坡。分布于我国西藏。

全草：苦，寒。清热解毒。用于湿热水肿、疮毒痈肿。

附　注：本种为藏药"区敦奥嘎"的原植物之一。

**斑花黄堇**　　广布黄堇(中草药)，寸冬欧蒿(藏语)

**Corydalis conspersa** Maxim.

生于海拔 3 500—5 700 米的多石河岸或高山石砾地。分布于青海、四川、西藏。

带根全草(玉周丝哇)：苦、涩，寒。有毒。清热解毒，止痛，杀虫。用于水肿，伤寒，感冒发热；外用于牛皮癣，顽癣，疮毒，毒蛇咬伤。

附　注：本种为藏药。

**皱波黄堇**　　隆恩(藏语)

**Corydalis crispa** Prain

生于海拔 3 100—4 800 米的山坡草地灌丛中。分布于我国西藏。

全草(隆恩)：苦，寒。清热解毒，消肿镇痛，止血。用于四肢疼痛，水肿，痈疮肿毒，出血。

附　注：本种为藏药。

**曲花紫堇**

**Corydalis curviflora** Maxim.

生于海拔 2 450—3 700 米的山坡草地、云杉林下或高山草甸。分布于山西南部、陕西、甘肃、青海、四川西部、云南西北部。

全草(恰布孜孜巧)：苦，寒。活血散瘀，清热解毒，止血，止痛。用于月经不调，血滞痛经，衄血，湿热黄疸。

附　注：①本种为藏药。②功效相同的有**乌紫堇 C. curviflora** Maxim. var. smithii Fedde。

**弯花紫堇**　　雀博之之、雀子却(藏语)

**Corydalis curviflora** Maxim. var. **rosthornii** Fedde

生于海拔3 600—5 100米的山坡草地或灌木林下。分布于青海南部、四川西部、云南西北部、西藏。

全草：苦，凉。活血散瘀，止血，止痛。用于血滞痛经，月经不调。

附　注：本变种是藏药"恰布孜孜巧"的原植物之一。

**迭裂黄堇**　　东日色尔瓦(藏语)

**Corydalis dasyptera** Maxim.

生于海拔3 700—4 800米的高山草地、岩隙中或疏林下。分布于甘肃南部、青海、四川西北部、西藏。

带根全草(格周丝哇)：苦、涩，寒。有毒。止血敛疮，消肿解毒，舒肝利胆。用于外伤出血，疮疡痈疽，高烧，黄疸。

附　注：本种为藏药。

**细花迭裂黄堇**　　寸冬欧萧、隆恩(藏语)

**Corydalis dasyptera** Maxim. var. **tenuiflora** C. Y. Wu et T. Y. Shu

生于高山草坡。分布于我国西藏。

全草：苦，寒。清热解毒，消肿止痛，舒肝利胆。用于四肢疼痛，高热，黄疸。

附　注：本变种是藏药"格周丝哇"的原植物之一。

**南黄紫堇**　　啄木冠草(湖北)，土黄芩、黄断肠草、老龙草(四川)

**Corydalis davidii** Franch.

生于海拔2 000—2 800米的草坡林下或沟边草丛中。分布于湖北、四川、贵州、云南。

根状茎：苦，凉。祛瘀消肿。用于跌打损伤，骨折，无名肿毒，痈肿。

附　注：本种是藏药"当日丝哇"的原植物之一。

**夏天无**　　落水珠(江西)，伏生紫堇(中国高等植物图鉴)

**Corydalis decumbens** (Thunb.) Pers.——*Fumaria decumbens* Thunb.; *C. amabilis* Migo

生于丘陵或低山坡草地。分布于华东及河南、湖北、湖南。

块茎(夏天无)：苦、微辛，温。舒筋活络，活血止痛，降压镇痉。用于中风偏瘫，小儿麻痹后遗症，跌打损伤，腰肌劳损，腰腿痛、高血压症，视力模糊(假近视)。

附　注：本品酒浸剂和生物总碱对血管平滑肌有扩张作用；对肠平滑肌有解痉作用。目前已制成"夏天无片"、"夏天无滴眼剂"等制剂用于临床。

**丽江紫堇**　　马尾黄连(云南)

**Corydalis delavayi** Franch.

生于海拔3 000米左右的山地草坡。分布于云南西北部。

全草(热衮巴)：苦，寒。清热解毒，镇静，镇痛。用于肝炎；外用于疮痈肿疖，毒蛇咬伤。

附　注：本种为藏医用药。

**齿苞黄堇**　　隆恩(藏语)

**Corydalis denticulato-bracteata** Fedde

生于海拔3 800—5 044米的多石山坡、河滩或草甸。分布于我国西藏。

全草：苦，寒。清热解毒，镇痛，消肿。用于四肢疼痛，水肿。

附　注：本品为藏药"隆恩"的主要来源。

**密穗黄堇**

**Corydalis densispica** C. Y. Wu

生于海拔3 700—4 100米的高山栎林或灌丛下。分布于四川西南部、云南西北部、西藏的察隅和八宿。

全草(贾大丝哇)：苦、涩，寒。有毒。解毒，杀虫。用于高热；外用于顽癣，牛皮癣，疮毒，毒蛇咬伤。

附　注：本种为藏药。

**紫堇**　断肠草(陕西、四川、贵州)，蝎子草、麦草黄(陕西)，闷头花(陕西、四川)

**Corydalis edulis** Maxim.

生于丘陵下、沟边、山地路旁或多石处。分布于华东及河北、山西、陕西、甘肃、河南、湖北、湖南、四川、贵州。

根或全草(紫堇)：苦、涩，凉。有毒。消炎解毒，清热解暑。用于腹痛，中暑头痛，肺痨咯血；外用于疮疡肿毒，毒蛇咬伤，化脓性中耳炎，刀伤。根：用于脱肛。

附　注：本种25%煎剂对金黄色葡萄球菌有明显的抑制作用，对大肠杆菌、绿脓杆菌次之。

**籽纹紫堇**

**Corydalis esquirolii** Lévl.

生于海拔500—1 300米的石灰岩常绿林内沟边。分布于广西西北部、贵州南部。

全草(高山羊不吃)：有小毒。清热，止痛。

**流苏瓣缘黄堇**　流苏黄堇(中草药)

**Corydalis fimbripetala** Ludlow

生于海拔4 400—4 900米的高山草甸或灌木林缘。分布于我国西藏当雄、林周、拉萨。

全草(当日丝哇)：苦，寒。清热止痛。用于感冒，伤寒，胃脘痛；外用于疮疖肿痛。

**巨紫堇**

**Corydalis gigantea** Trautr. et Merr.

生于林缘或石砾地。分布于黑龙江、吉林。

全草：苦，寒。镇痛镇静，清热解毒。用于各种疼痛。

**灰叶延胡索**　新疆元胡(新疆)

**Corydalis glaucescens** Regel

生于海拔1 300—1 700米的山坡灌丛中或荒漠。分布于新疆巩留、伊宁。

块茎：苦，温。行气止痛，活血散瘀。用于痛经，胃痛，神经痛，双胁痛，腰痛，疝痛。

**纤细黄堇**　小黄断肠草(四川中药志)

**Corydalis gracilima** C. X.Wu——*C. gracilis* Franch. non Ledeb.

生于海拔2 700—4 500米的林下、林缘灌丛中或沟边。分布于四川、云南、西藏。

全草：苦、涩，寒。有毒。清热解毒，利尿，杀虫，止痢，止血。用于小儿惊风，湿热黄疸，肺痨咳血，暑热泻痢，肿毒，目赤；外用于毒蛇咬伤，疮痈，疥癣。

**钩距黄堇**　都拉色布、都力色布(藏语)

**Corydalis hamata** Franch.

生于海拔 4 200 米以下的湿草地、路旁或溪边。分布于四川西部、云南西北部及西藏左贡。

全草(都拉丝哇)：苦，凉。清热，止痛。用于高热，胃痛。

附　注：本种为藏药。

**三叶紫堇**　半荷包紫堇(云南种子植物名录)

**Corydalis hemidicentra** Hand.-Mazz.

生于海拔 4 300—4 700 米的高山乱石坡。分布于云南西北部。

花：凉。退热，利胆。

附　注：云南特有药用植物。

**亨氏黄堇**　日棍、来棍日贵(藏语)

**Corydalis hendersonii** Hemsl.

生于海拔 5 200 米以下的河滩沙砾地或流石坡。分布于青海、新疆、西藏。

全草：苦，寒。清热解毒，降压。用于湿热泄泻；外用于疮疖痈肿，毒蛇咬伤。

附　注：本种为藏药"热衮巴"的原植物之一。

**宽果紫堇**

**Corydalis heterocarpa** Sieb. et Zucc.——*C. platycarpa* Makino; *C. wilfordii* Regel

生于山坡草地。分布于山东、安徽、浙江、福建。

全草：苦、涩，寒。有毒。消肿，收敛，止痒。用于疮毒，缠腰火丹，顽癣。

**蜜北紫堇**　断肠草(四川)

**Corydalis impatiens** (Pall.) Fisch.

生于山地疏林或草坡。分布于黑龙江、内蒙古，甘肃、青海、四川、西藏。

全草(桑格丝哇)：苦，寒。清热解毒，镇痛。用于痈肿疮毒，毒蛇咬伤，疥癣，刀伤。

附　注：本种为藏药。

**刻叶紫堇**　紫花鱼灯草、烫伤草(浙江)，羊不吃(四川)

**Corydalis incisa** (Thunb.) Pers.——*Fumaria incisa* Thunb.

生于丘陵山坡、路边、沟旁或潮湿处。分布于河北、山西、陕西、甘肃、宁夏、安徽、江苏、上海、浙江、江西、福建、台湾、河南、湖北、湖南、四川。

根及全草(紫花鱼灯草)：苦、涩，寒。有毒。解毒杀虫。用于疮毒，疥癣，毒蛇咬伤，脱肛。

**帕里紫堇**

**Corydalis kingii** Prain

生于海拔 3 300—4 800 米的高山草地。分布于我国西藏。

全草(介巴铜达)：苦，寒。止血收敛。用于刀伤，枪伤出血。

附　注：本种为藏药。

**狭距紫堇**

**Corydalis kokiana** Hand.-Mazz.

生于海拔 3 100—4 700 米的草地或灌丛中。分布于四川西部、云南西北部、西藏东北部。

全草：甘，寒。解暑，退热。

**对叶元胡**

**Corydalis ledebouriana** Kar. et Kir.

生于草甸、草原、砾石地及阴坡。分布于新疆。

块茎：苦，温。活血散瘀，行气镇痛。用于胃痛，神经痛，腰痛，胁痛，痛经，疝痛。

**条裂紫堇**　　申打色尔娃(藏语)，铜棒锤(新华本草纲要)

**Corydalis linearioides** Maxim.

生于海拔 2 800—4 100 米的山坡草地或灌丛中。分布于陕西西部、甘肃东南部、青海东部、四川西北部、西藏东北部。

全草、块根(铜棒锤)：苦、微辛，平。有毒。消肿止痛，祛风除湿，活血散瘀。用于风湿痛，劳伤，跌打损伤，皮肤瘙痒。

附　注：本种为藏药"申打丝哇"的原植物。

**细叶黄堇**　　寸冬欧蕾(藏语)

**Corydalis meifolia** Wall.

生于海拔 4 600 米的砾石堆上。分布于我国西藏聂拉木。

全草：苦，寒。消肿。用于水肿。

附　注：我国西藏特有药用植物。

**暗绿紫堇**　　麦强日尔瓦、银周色尔瓦(藏语)

**Corydalis melanochlora** Maxim.

生于海拔 3 850—4 500 米的山坡或山谷多石砾地。分布于甘肃西南部、青海东部，四川西北部。

全草：苦，寒。镇静，利胆，清热。用于时行感冒发烧。所含生物碱可用于心血管疾患，败血症；外用于创伤感染。

**扁柄黄堇**　　东丝勒、东丝儿、至马朵共(藏语)，黄花紫堇(西藏常用中草药)

**Corydalis mucronifera** Maxim.——*C. boweri* Hemsl.

生于海拔 4 200—5 300 米的高山砂砾地或流石滩。分布于甘肃、青海、西藏。

全草：苦，寒。解热止痛。用于胃脘痛，痢疾，腰腿痛；外用于疮痈肿疖，毒蛇咬伤。

附　注：本种为藏药"热衮巴"的原植物之一。

**细花紫堇**　　介巴铜达(藏语)

**Corydalis napuligera** C. Y. Wu

生于海拔 3 800 米的冷杉林下。分布于我国西藏波密。

全草：苦，寒。止血，收敛。用于刀、枪伤，疮肿痈疖。

附　注：我国西藏特有药用植物。

**黄紫堇**

**Corydalis ochotensis** Turcz.

生于海拔 1 200 米左右的林下。分布于东北。

全草：苦，凉。清热解毒，止痢，止血。用于痈肿疮毒，痢疾，肺痨咯血。

附　注：功效相似的有**小黄紫堇 C. ochotensis** Turcz. var. **raddeana** (Regel.) Nakai，分布于东北、华北及山东、浙江。

**蛇果黄堇**　　断肠草(四川、云南)，帕夏嘎、抓桑(藏语)

**Corydalis ophiocarpa** Hook. f. et Thoms.

生于海拔 1 100—2 800 米的山沟草地。分布于西南及河北、山西、陕西、甘肃、宁夏、青海、安徽、江西、台湾、河南、湖北。

全草(巴夏嘎)：苦、辛，凉。有毒。祛风除湿，镇痛，活血。用于肺痨咳嗽，流感发烧，肝炎，痢疾；外用于疮疖痈肿，皮肤瘙痒，跌打损伤。

附　注：本种为藏药。

**粗梗黄堇**　　马尾黄连、土黄连(云南)，日紧巴(云南德钦)

**Corydalis pachypoda** (Franch.) Hand.-Mazz.——*C. tibetica* Hook. f. var. *pachypoda* Franch.

生于海拔 2 300—4 600 米的岩石缝中或砂石坡地。分布于四川西部、云南西北部、西藏错那。

根：苦，凉。清热解毒。用于疮痈肿疖。

**黄堇**　　千人耳子(山东)，鸡粪草(浙江)，水黄连(河南)

**Corydalis pallida** (Thunb.) Pers.——*Fumaria pallida* Thunb.

生于山坡、沟边、河滩、路旁及湿地。分布于吉林、辽宁、河北、山西、山东、江苏、上海、安徽、浙江、福建、河南、湖北、贵州。

全草(菊花黄连)：苦、涩，寒。有毒。清热解毒、消肿，杀虫。用于热毒痈肿，化脓性中耳炎，顽癣，目赤，腹痛，痢疾，痔疮。

**球果黄堇**　　胡黄堇(东北)，珠果黄紫堇(长白山植物药志)

**Corydalis pallida** (Thunb.) Pers. var. **speciosa** (Maxim.) Kom.——*C. speciosa* Maxim.

生于向阳山坡及干燥多石砾地。分布于东北。

全草：苦、涩，寒。清热解毒，消肿散结。用于无名肿毒，痈疮热疖，角膜充血。

**远志黄堇**　　介巴铜达(西藏)

**Corydalis polygalina** Hook. f. et Thoms.

生于海拔 4 200—4 800 米的山坡。分布于我国西藏加查。

全草：苦，寒。止血，收敛。用于刀、枪伤，疮疖。

附　注：本种为藏药。

**多叶紫堇**　　日紧巴都拉(藏语)

**Corydalis polyphyllas** Hand.-Mazz.

生于海拔 3 700—4 200 米的阴湿坡地。分布于云南西北部、西藏东南部。

根：苦，凉。清热，解毒。用于痈疖疮肿。

附　注：本种为藏医用药。

**断肠草**

**Corydalis pterygopetala** Hand.-Mazz.

生于海拔 2 300—4 100 米的山坡草地。分布于贵州、云南、西藏察隅。

全草：清热解毒。用于疔疮。

**小花黄堇**　野水芹、虾子草(安徽)，黄花鱼灯草(浙江)，水黄连(河南)，鱼子草（湖南)，断肠草(四川)

**Corydalis racemosa** (Thunb.) Pers.——*Fumaria racemosa* Thunb.

生于墙边、多石处及山地沟边湿草地。分布于华东、中南及河北、山西、陕西、甘肃、四川、贵州、云南。

全草(黄堇)：苦、涩，寒。有毒。清热解毒，杀虫。用于暑热泻痢，痢疾，湿热黄疸，肺痨咳血，小儿惊风，目赤，疮毒痈肿，流火，毒蛇咬伤。

**齿瓣延胡索**　东北元胡、蓝雀花、蓝花菜、元胡、延胡索(东北)

**Corydalis remota** Fisch. et Maxim.

生于杂木疏林下、林缘灌丛中及山坡湿润地。分布于东北及河北、内蒙古、宁夏、山东。

块茎：苦，温。行气止痛，镇静，止血，活血散瘀。用于胃、腹疼痛，痛经，关节痛，外伤肿痛及泻痢。

附　注：东北及河北有下列变型的块茎均可作延胡索使用：**蓼叶延胡索 C. remota** Fisch. et Maxim. f. **fumariaefolia** Maxim.；**海岛延胡索 C. remota** Fisch. et Maxim. f. **haitaoensis** (Y. H. Chou et C. Q. Xu) C. Y. Wu；**线叶齿瓣延胡索 C. remota** Fisch. et Maxim. f. **lineariloba** Maxim. 及**栉裂齿瓣延胡索 C. remota** Fisch. et Maxim. f. **pectinata** Kom.

**全叶延胡索**　土延胡、苏延胡(中药大辞典)，土元胡(江苏、山东)

**Corydalis repens** Mandl. et Mühldorf.——*C. humosa* Migo

生于林缘湿润地。分布于东北及河北、山西、陕西华山、安徽、河南、湖北、四川。

块茎：苦，温。行气止痛，活血散瘀。用于脘腹痛，并作延胡索使用。

**扇苞黄堇**

**Corydalis rheinbabenia** Fedde

生于海拔 3 500—4 300 米的山坡或灌丛下。分布于甘肃西南部、四川西北部、西藏东部。

根状茎：苦，凉。活血镇痛，行气消肿。用于各种疼痛。

**石生黄连**　黄连(湖北、云南)，菊花黄连、鸡爪连(广西)，岩黄连(湖北、广西、四川、贵州)，岩连(四川、云南)

**Corydalis saxicola** Bunting

生于岩石缝隙中。分布于西南及甘肃、湖北、广西。

根及全草(岩黄连)：苦，寒。镇痛，利湿，清热，止血。用于口舌糜烂，目赤，急性腹痛，肝炎，痢疾，痔疮出血，晚期癌症痛。

附　注：其总生物碱具有显著的抗菌，消炎，抗癌和止痛作用，为治疗肝炎的新药。广西南宁地区民间草医广泛用于各种晚期癌症。

**岩黄堇**　岩川芎(湖北)

**Corydalis saxicola** Bunting var. **pasuiflora** C. Y. Wu et T. Y. Shu

生于林下或沟边阴湿处。分布于湖北利川、来凤。

根：用于胃痛，腰痛。

**粗毛黄堇**　　多勒什、勒巴(藏名)

**Corydalis scaberula** Maxim.

生于海拔5 100米以下的高山砾石坡。分布于甘肃、青海、四川、西藏。

全草：苦，寒。清热解毒。用于时行感冒，发烧。

附　注：本种为藏药"贾大丝哇"的原植物之一。

**长花延胡索**　　新疆元胡(新疆)

**Corydalis schanginii** (Pall.) B. Fedtsch.——*Fumaria schanginii* Pall.; *C. longiflora* (Wall.) Pers.

生于海拔1 200米左右的荒漠、沙地至前山旱坡。分布于新疆乌鲁木齐、塔城、伊宁、阿勒泰。

块茎：苦，温。活血散瘀，行气止痛。用于痛经，胃痛，神经痛，疝痛，腰痛，两胁疼痛。

**尖距紫堇**　　红花鸡距草(广东)、苦心胆(广西)，鹿耳草（四川），三月烂、飞菜(贵州)，护心胆(新华本草纲要)

**Corydalis sheareris** S. Moore——*C. suaveolens* Hance

生于海拔高达1 600米的林边阴处或沟边。分布于安徽、江苏、浙江、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

带根全草：苦、微辛，寒。有小毒。消肿止痛，清热解毒，活血祛瘀。用于湿热胃痛，腹痛，目赤肿痛，泄泻，积年劳伤，跌打损伤，偏瘫，痈肿疮毒，蛇虫咬伤。

**北紫堇**

**Corydalis sibirica** (L. f.) Pers.——*Fumaria sibirica* L. f.

生于山地林下、溪旁湿地。分布于黑龙江、辽宁、内蒙古。

全草：苦，寒。清热解毒。用于坏血病；外用于毒蛇咬伤，疮疖痈肿。

附　注：本种为藏药"热衮巴"的原植物之一。

**匙苞黄堇**　　东丝儿(藏语)

**Corydalis spathulata** Prain ex Craib

生于海拔4 700米左右的冰川河谷地。分布于我国西藏江孜。

全草(当日丝哇)：苦，寒。清热解毒，止痛。用于胃痛，腰腿痛，痛经，痢疾；外用于疮疖肿痛。

附　注：本种为藏药。

**球果紫堇**　　胡黄堇(吉林)

**Corydalis speciosa** Maxim.

生于向阳山坡、干燥石砾地。分布于吉林、辽宁。

全草：行气止痛，活血散瘀。

**草黄堇**　　草黄花紫堇(中草药)

**Corydalis straminea** Maxim.

生于海拔2 700—4 000米的山地柳树林下或多石处。分布于甘肃西南部、青海东北

拉，西藏索县。

全草(玉周丝哇)：苦，寒。清热解毒，消肿止痛，利水。用于感冒发烧，伤寒，水肿；外用于痈肿疮毒。

附　注：本种为藏药。

**直茎黄堇**

**Corydalis stricta** Steph.

生于海拔3 600—4 100米的山坡或岸边多石地。分布于青海、新疆、西藏。

全草(巴夏嘎、直立紫堇)：苦，寒。清热解毒，活血散瘀，除湿止痛。用于高血压症，肝炎，胆囊炎，时行感冒，跌打损伤，痈肿疮毒。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②亦为藏医用药。

**金钩如意草**　　水金钩如意、大理紫堇草、苦地丁(云南)，五味草(滇南本草)

**Corydalis taliensis** Franch.——*C. stenantha* Franch.

生于海拔高达2 900米的旷野疏林，阴湿岩隙、路边草地及荒地。分布于四川、贵州、云南。

全草(木琼丝哇)：苦，寒。祛风除湿，清热，止痛，明目。用于风湿痛，肺热咳嗽，肝炎，泄泻，痢疾，牙痛，目赤。

附　注：本种为藏药。

**无冠金钩如意草**　　五味草(云南)

**Corydalis taliensis** Franch. var. **ecristata** Hand.-Mazz.

生于海拔1 800—3 500米的山地疏林下。分布于云南。

全草：苦。祛风通络，消散风热。用于肺痨咳嗽发热，筋骨痛，痰火。

**大叶紫堇**　　闷头花(湖北)，山臭草、断肠草(四川)

**Corydalis tenulifolia** Franch.

生于海拔1 000—2 800米的常绿阔叶林或混交林下及溪边。分布于甘肃、湖北、四川、贵州、云南。

全草：苦，寒。清热解毒，镇痛。用于腰痛，胃痛，臀疮。

**岩黄连**

**Corydalis thalictrifolia** Franch.

生于岩石蔽阴处。分布于贵州。

根(岩黄连)：清热解毒，止痛，止血，利湿。用于目赤，目翳，痔疮出血，痢疾，腹痛。

**锥花黄堇**　　札桑(藏语)

**Corydalis thyrsiflora** Parin

生于海拔4 500—5 000米的平坝或石砾地。分布于我国西藏中部和西南部。

全草(扎桑丝哇)：苦，凉。活血散瘀，镇痛，消肿，降压。用于胃痛，高血压症，跌打损伤，痈肿疖肿，刀、枪伤，瘫痪。

附　注：本种为藏药。

**千岩堇**　　土黄芩、岩黄连(湖北)，三尖刀(四川)，毛黄堇(中药大辞典)，千岩矸（南川常用中草药手册）

**Corydalis tomentella** Franch.

生于悬岩陡壁少水处。分布于四川、贵州。

全草：苦，凉。祛瘀止痛，凉血，止血。用于跌打损伤，关节痛，咳血，劳伤吐血。

**糙果紫堇**　甲多网巴(藏语)

**Corydalis trachycarpa** Maxim.

生于海拔3 300—4 200米的高山草地或多石砾处。分布于甘肃、青海、四川、云南的德钦和中甸、西藏。

全草：苦，寒。用于时行感冒发热，伤寒，胃痛；外用于疮疖肿毒。

附　注：本种为藏药"当日丝哇"原植物之一。

**三裂紫堇**

**Corydalis trifoliata** Franch.——*C. quadriflora* Hand.-Mazz.; *C. trifoliolata* Franch.

生于海拔4 200米左右的山坡石砾地。分布于云南西北部、西藏察隅。

全草(贾大丝哇)：苦，寒。清热解毒。用于感冒发烧，伤寒。

附　注：为藏医常用药。

**察隅紫堇**　吓戈(藏语)

**Corydalis tsayulensis** C. Y. Wu et H. Chuang

生于海拔3 700—4 100米的草丛中或林缘。分布于我国西藏东部。

全草：苦，寒。清热解毒，止血。

**川鄂黄堇**　岩黄连、土黄连(湖北)，金花草(四川)

**Corydalis wilsonii** N. E. Br.

生于海拔高达3 000米的山地林缘草丛潮湿处或沟边。分布于四川、湖北。

全草：利湿，止痛，止血，清热解毒，杀虫。

**岩莲**　岩黄连(云南)

**Corydalis wumungensis** C. Y. Wu

生于海拔1 900—2 400米的潮湿岩石上或河谷岸边。分布于云南武定。

全草：苦，凉。有毒。清热解毒，散瘀，祛风除湿。用于跌打损伤，风湿痛。

**延胡索**　元胡(通称)

**Corydalis yanhusuo** W. T. Wang——*C. turtschaninovii* Bess. f. *yanhusuo* Y. H. Chou et C. C. Hsu

多为栽培，主产于浙江。河北、山西、陕西、山东、江苏、上海、安徽、河南、湖北、湖南、四川、贵州亦有引种栽培。

块茎(延胡索、元胡)：微辛，温。行气止痛，活血散瘀。用于气滞血瘀，周身疼痛，痛经，经闭，癥瘕，产后瘀血阻滞，疝痛，跌打损伤(孕妇忌服)。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**黄水金钩如意**　滇黄堇(云南种子植物名录)

**Corydalis yunnanensis** Franch.

生于海拔3 000米左右的阴蔽山谷中。分布于云南西北部。

全草：苦，寒。祛风除湿，镇痛，明目退翳。用于风湿痛，目翳。

附　注：云南特有药用植物。

## 紫金龙属　Dactylicapnos Wall.

**紫金龙**　豌豆七、豌豆跌打、穿山七、串枝莲(云南)，藤铃儿草(中国高等植物图鉴)

**Dactylicapnos scandens** (D. Don) Hutch.——*Diclytra scandens* D. Don

生于阴湿水沟边、低洼草地、竹林、杂木林下及山地灌丛中。分布于广西西部、贵州、云南西北部、西藏樟木。

根(紫金龙)：苦、辛，凉。有毒。镇痛，解痉，止血，活血，降压。用于神经性头痛，胃病，牙痛，外伤肿痛，内伤出血，跌打损伤，骨折，高血压症。

**大藤紫金龙**　独定子、岩莲(云南)，大藤铃儿草(中国高等植物图鉴)

**Dactylicapno torulosa** (Hook. f. et Thoms.) Hutch.——*Diclytra torulosa* Hook. f. et Thoms.

生于海拔高达 3 000 米的山坡灌丛中或石上。分布于四川、贵州西部、云南。

全草：清热解毒，镇痛，降压，止血。用于跌打损伤，外伤出血，高血压症，带下病，血崩。

## 荷包牡丹属　Dicentra Benth.

**大花荷包牡丹**　丁三七(云南)，滥肠草、大牡丹(四川)

**Dicentra macrantha** Oliv.

生于海拔 1 500—2 600 米的山地林下。分布于湖北、四川、贵州、云南东北部。

全草：苦、温。镇痛，活血行气。用于头痛，腹痛。

**荷包牡丹**　荷包花(湖北、青海)

**Dicentra spectabilis** (L.) Lam.——*Fumaria spectabilis* L.

东北、西北及河北、北京、天津、内蒙古、山东、四川、云南均有栽培。

全草：苦，温。镇痛，解痉。用于胃痛。根(荷包牡丹根)：辛，温。消肿散血，调经。用于疮毒，月经不调。

## 秃疮花属　Dicranostigma Hook. f. et Thoms.

**秃疮花**　秃子花、勒马回(陕西)，负儿草(四川)

**Dicranostigma leptopodum** (Maxim.) Fedde——*Glaucium leptopodum* Maxim.

生于丘陵草坡、路边或墙上。分布于河北、山西、陕西、甘肃、青海、河南、四川、云南、西藏。

全草(秃疮花)：苦，寒。清热解毒，消肿止痛，杀虫。用于牙痛，乳蛾，咽喉痛，瘰疬；外用于秃疮，疥癣及痈肿疮毒。

附　注：本种所含的右旋异紫堇定，对小鼠有较明显的镇痛及镇静作用。

## 血水草属　Eomecon Hance

**血水草**　水黄连(江西)，黄芋芽(江西、湖北、贵州)，见肿消(湖北)，捆仙绳（四川）

**Eomecon chionantha** Hance

生于海拔 700—2 200 米的林下蔽阴处。分布于中南及陕西、浙江、江西、福建、四川、贵州。

根状茎：苦，寒。有毒。清热解毒，行气止痛。用于目赤，劳伤，胃癌，痈肿疔毒，跌打损伤，毒蛇咬伤，疥癣，湿疹。

## 花菱草属　Eschscholzia Cham.

**花菱草**　金英花(新疆)

**Eschscholzia californica** Cham.

原产美国加利福尼亚洲。全国各地庭园有栽培。

花、果实：镇痛，清热。

## 海罂粟属　Glaucium Mill.

**天山海罂粟**　野罂粟(新疆)

**Glaucium elegans** Fisch. et Mey.

生于荒漠或低山石坡。分布于新疆乌鲁木齐、玛纳斯。阿尔泰山、天山也有分布。

果实：镇痛，止咳。

**海罂粟**　野罂粟(新疆)

**Glaucium fimbrilligerum** Kar. et Kir.

生于海拔 2 000 米左右的砾石荒漠、干旱低山坡及草地。分布于新疆乌鲁木齐、石河子、伊宁、温泉、新二台。

果实：镇痛，止咳。

附　注：功效相同的有**新疆海罂粟 G. squamigerum** Kar. et Kir.，分布于新疆。

## 荷青花属　Hylomecon Maxim.

**荷青花**　鸡蛋黄菜(东北)，刀豆三七(东北、浙江)，大叶老鼠七(陕西)，补血草、小菜子七(鄂西草药名录)

**Hylomecon japonica** (Thunb.) Prantl et Kündig——*Chelidonium japonicum* Thunb.; *H. vernalis* Maxim.

生于山地林下、林缘或沟边。分布于东北及山西、陕西、安徽、浙江、河南、湖北、湖南、四川、贵州。

全草：苦，平。祛风通络，散瘀消肿，止血镇痛。用于风湿关节痛，跌打损伤，劳伤，四

肢乏力，胃脘痛，腹痛，痢疾。

**多裂荷青花**　一枝花、菜子七(湖北)

**Hylomecon japonica** (Thunb.) Prantl et Kündig var. **dissecta** (Franch. et Sav.) Fedde——*Stylophorum japonicum* Miq. var. *dissecta* Franch. et Sav.

生于海拔 1 800 米以下的山坡林下、沟边。分布于陕西、湖北、四川。

根状茎：用于毒蛇咬伤，小儿湿疹，高烧，咳嗽。

**锐裂荷青花**　一口血、菜子七(湖北)

**Hylomecon japonica** (Thunb.) Prantl et Kündig var. *subincisa* Fedde

生于海拔 2 000 米以下的山坡林下潮湿地。分布于陕西、湖北、四川涪陵。

根状茎：祛风除湿，散瘀消肿，止痛，止血。用于高烧，吐泻，胃脘痛，腹痛，痢疾，咳嗽痰喘，顿咳。

## 角茴香属　Hypecoum L.

**角茴香**　咽喉草、雪里青、黄花草(河南)

**Hypecoum chinense** Franch.

生于干燥山坡、砾质碎石地或草地。分布于华北及陕西、甘肃、新疆、河南西北部。

全草：苦，寒。清热，消炎，止痛，镇咳。用于咽喉痛，目赤。

**直立角茴香**　山黄连(西南)，野茴香(中国沙漠地区药用植物)

**Hypecoum erectum** L.

生于海拔高达 4 500 米的砾石荒漠、沙地、池边草地及公路旁。分布于东北、华北、西北及西藏。

全草：苦、辛，凉。泻火，清热解毒，镇咳。用于目赤，咽喉痛，伤风感冒。

**细果角茴香**　山黄连(西南)，巴尔巴达、哇日哇达(藏语)

**Hypecoum leptocarpum** Hook. f. et Thoms.

生于海拔 4 800 米的山坡草地、林缘、田园地边，也见于沙滩。分布于华北、西北及四川西部、云南西北部、西藏。

全草：苦，寒。清热解毒，镇痛，凉血。用于咽喉痛，目赤，伤风感冒，头痛，关节痛，胆囊炎，食物中毒。

**小花角茴香**　角茴香(新疆)

**Hypecoum parviflorum** Kar. et Kir.

生于平原荒漠及前山石坡。分布于新疆。

全草：泻火，清热，镇咳。

## 博落回属　Macleaya R. Br.

**博落回**　号筒树(安徽、江西、福建、湖北、湖南、广西、贵州)，喇叭筒(浙江)，哈哈筒(安徽)，波罗筒(福建)，三钱三(广西)

**Macleaya cordata** (Willd.) R. Br.——*Bocconia cordata* Willd.

生于向阳山坡、路边、草地。分布于河北及长江流域以南各省区。

全株(博落回)：苦，温。大毒。消肿，镇痛解毒，杀虫。外用于疔毒脓肿，跌打损伤，中耳炎，阴痒症，烧、烫伤，顽癣。

附　注：本种有大毒，因口服或肌注中毒死亡者，主要因引起急性心原性脑缺血综合症所致，务慎用！另可作农药，防治孑孓、蝇蛆等。

**小果博落回**　黄浆苔、吹火筒、泡桐杆(陕西)，野狐杆(甘肃)

**Macleaya microcarpa** (Maxim.) Fedde——*Bocconia microcarpa* Maxim.

生于海拔2 000米以下的山地、河边、沟岸、路旁。分布于陕西、甘肃、江苏北部、河南西北部、湖北北部、四川、贵州。

全株：苦，寒。有毒。杀虫，祛风，解毒，散瘀消肿。用于风湿关节痛，跌打损伤，痈疖肿毒，蜂螫，下肢溃疡，阴痒症，烧、烫伤。

附　注：本种可作农药，用于防治小麦杆锈病，杀孑孓及蝇蛆等。

## 绿绒蒿属　Meconopsis Vig.

**椭果绿绒蒿**　断肠草、蒿枝七、裂叶蒿、银乌(四川)，黄花绿绒蒿（中国高等植物图鉴）

**Meconopsis chelidonifollia** Bur. et Franch.

生于海拔1 850—2 650米的疏林下或溪边较阴处。分布于四川西部、云南东北部。

根：淡，温。有小毒。补气，活血行气，止血。用于各种出血症。

**蓝花绿绒蒿**

**Meconopsis henrici** Bur. et Franch.

生于海拔3 200—4 500米的高山草地。分布于甘肃西南部、四川西南部。

全草：苦、涩，微温。镇痛，调经，活血散瘀。用于月经不调，痛经，跌打损伤。

**多刺绿绒蒿**　毛瓣草(四川)，乌巴拉色尔布(藏语)，刺尔思(藏药标准)

**Meconopsis horridula** Hook. f. et Thoms.

生于海拔高达5 400米的草坡、草丛、高山碎石带、石砾缝中。分布于甘肃西部、青海、四川、云南西北部、西藏。

全株(多裂绿绒蒿)：苦，寒。有小毒。活血化瘀，镇痛，燥湿，利咽。用于跌打损伤。

**总状绿绒蒿**　刺参、鸡脚参、雪参(云南)，才完(藏语)

**Meconopsis horridula** Hook. f. et Thoms. var. **racemosa** (Maxim.) Prain——*M. racemosa* Maxim.

生于海拔高达5 500米的草坡、石坡、林下。分布于甘肃、青海、四川、云南、西藏。

全草：苦、淡，寒。活血、止痛。用于外伤痛，各种剧烈性刺痛。　根：补虚，止痢，定喘。　花：苦，寒。清热解毒，用于肺热咳嗽，肝炎。

**绿绒蒿**　黄牡丹(青海)，黄芙蓉(云南)，阿拍色鲁、吾白恩布(藏语)，全缘叶绿绒蒿(西藏植物名录)

**Meconopsis integrifolia** (Maxim.) Franch.——*Cathacartia integrifolia* Maxim.

生于海拔高达5 100米的灌丛、草坡、草甸。分布于甘肃南部、青海东北部、四川西部

及西北部、云南西北部、西藏东部及东北部。

全草(绿绒蒿)：苦、酸涩，寒。有毒。清热利湿，镇咳平喘。用于湿热黄疸，肺热咳喘，头痛，吐泻，湿热水肿，痛经，带下病，伤口久不愈合。　花：退热，催吐。

附　注：功效相似的有**尼泊尔绿绒蒿 M. nepaulensis** DC.，分布于四川西南部、云南西北部、西藏南部。

**全缘叶绿绒蒿**

**Meconopsis integrifolia** (Maxim.) Franch. var. **uniflora** C. Y. Wu et H. Chuang

生于海拔 4 350—4 450 米的山坡草地。分布于云南中甸哈巴雪山。

全草：清热，止咳。

**长叶绿绒蒿**

**Meconopsis lancifolia** (Franch.) Franch.——*Cathacartia lancifolia* Franch.

生于海拔 3 300—4 800 米的高山草地或林下。分布于甘肃、四川西部、云南西北部、西藏东南部。

全草：苦，凉。清热利尿。

**柱果绿绒蒿**　　黄鸦片草(湖北)

**Meconopsis oliveviana** Franch. et Prain

生于海拔 1 700—2 400 米的山坡、林下或灌丛中。分布于陕西、湖北西部、四川东部。

全草：清热解毒，镇静，定喘。

**锥花绿绒蒿**

**Meconopsis paniculata** (D. Don) Prain——*Papaver paniculata* D. Don

生于海拔 3 000—4 350 米的林中草地、路边、水沟边。分布于青海、四川西南部、西藏。

全草：酸、涩，寒。清热解毒。用于肝炎，肺热咳喘，头疼，皮肤病。

**红花绿绒蒿**　　阿拍儿麻鲁(藏语)

**Meconopsis punicea** Maxim.

生于海拔 2 800—4 300 米的山坡草地、高山草甸、阴坡疏林下。分布于甘肃南部、青海东南部、四川西北部、西藏东北部。

全草(红花绿绒蒿)：苦，平。清热凉血，利咽，镇咳，止痛，止泻。用于外感发热，头痛，目赤，衄血。

**五脉绿绒蒿**　　毛叶兔耳风、毛果七(陕西)，吾白恩布(藏语)

**Meconopsis quintuplinervia** Regel

生于海拔高达 4 600 米的高山草地或阴坡灌丛中。分布于陕西中部、甘肃南部、青海东北部、湖北西部、四川西北部、西藏东北部。

全草(毛叶兔耳风)：微甘、辛，寒。清热解毒，镇痉息风，定喘。用于肺热咳喘，肺痨，胆囊炎，小儿惊风，胃痛。

**毛瓣绿绒蒿**

**Meconopsis torquqta** Prain

生于海拔 3 450—3 800 米的山坡上。分布于我国西藏米林。

全草：甘、涩，寒。有小毒。清热泄肺，除湿利水。用于肺热咳喘，湿热水肿，肝炎。

附　注：我国西藏特有药用植物。

## 罂粟属　Papaver L.

**桔黄罂粟**　野罂粟(新疆)

**Papaver croceum** Ledeb.

生于亚高山和高山带林缘和石坡。分布于阿尔泰山及天山各地。

果实：镇痛，止咳，定喘，止泻。

附　注：功效相同的有**阿尔泰黄罂粟 P. pseudocanescens** M. Pop.；**天山罂粟 P. tianschanicum** M. Pop.；**黑环罂粟** P. pavoninum Schrenk 及**小罂粟 P. tenellum** A. Tolm.，均分布于新疆。

**野罂粟**　山大烟、山罂粟、山米壳(东北)，来汗古丽(维吾尔语)

**Papaver nudicaule** L.

生于海拔高达 2 690 米的干燥山坡、多石砾地或栽培。分布于东北及内蒙古、山西、宁夏、青海、新疆、湖北。

全草：酸、微苦、涩，凉。有毒。镇痛，止咳，定喘，止泻。用于神经性头痛，偏头痛，咳喘，泻痢，便血，痛经。

**华罂粟**　山大烟(陕西)，山罂粟、藏金莲(云南植物志)

**Papaver nudicaule** L. subsp. **rularo-aurantiacum** (DC.) Fedde var. **chinense** (Regel) Fedde

生于海拔 1 800—3 100 米的山坡、高山草地或沟边草地。分布于河北、北京、山西、陕西、甘肃、青海、宁夏、四川。云南有栽培。

全草及未成熟果实：酸、涩、微苦，凉。有毒。止痢，镇痛，止咳，定喘。用于头痛，腹痛，泄泻，痢疾，痛经，久咳。

**黑水罂粟**　野大烟花、山大烟(黑龙江)

**Papaver nudicaule** L. subsp. **amurense** N. Busch

生于山野干燥地。分布于东北、华北、华中。

果实：酸、苦，凉。有毒。止咳，镇痛，止泻。用于久咳喘息，头痛，痛经，泄泻，痢疾。

**白山罂粟**　山罂粟(东北)，山大烟(吉林)

**Papaver pseudo-radicatum** Kitag.

生于山坡、沟边、草地。分布于东北。

全草、果壳：止泻，镇痛，敛肺。民间用作镇痛药。

**虞美人**　丽春花(图经本草)

**Papaver rhoeas** L.

全国大部分地区庭园栽培。

全草(虞美人)、花、果实：苦、涩，凉。镇痛，镇咳，止泻。用于咳嗽，痢疾，腹痛。

**罂粟**　米囊花、罂子壳(开宝本草)

**Papaver somniferum** L.

东北、西南等省区有法定栽培作药用者。

果实：涩。有毒。止痛，镇静，镇咳，止泻。用于久咳，久泻，久痢。心腹痛，筋骨痛，便血，脱肛，尿频，遗精，带下病。　果壳(罂粟壳)：酸、涩，凉。止咳敛肺，止痛，涩肠。用于久咳，久泻，心腹痛，筋骨痛。　种子(罂粟子)：甘，寒。止痢，润燥。

### 裂叶罂粟属　Roemeria Medik.

**裂叶罂粟**　野罂粟(新疆)，红勒米花(新疆植物检索表)

**Roemeria refracta** (Stev.) DC.——*Glaucium refractum* Stev. ex **DC.**

生于荒漠或绿洲地带。分布于新疆乌鲁木齐、塔城、伊宁。

全草：止咳，平喘。

### 人血草属　Stylophorum Nutt.

**人血草**　人血七(陕西、甘肃)、大金盘、大人血七(陕西)，豆叶七(湖北)

**Stylophorum lasiocarpum** (Oliv.)Feede——*Chelidonium lasiocarpum* Oliv.

生于高山林下。分布于陕西、甘肃、湖北、四川。

全草：苦、涩，平。活血调经，行气散瘀，止血止痛。用于跌打损伤，劳伤，外伤出血，月经不调，疮痈肿疖。

## 60. 白花菜科　Capparidaceae

### 山柑属　Capparis L.

**独行千里**　单兵救主、黑皮蛇、黑钩榕(广东)，尖叶槌果藤(广东植物志)

**Capparis acutifolia** Sweet

生于低海拔的旷野、山坡路旁、石上或灌丛、林中。分布于江西、福建、台湾、湖南、广东。

根、叶：苦、涩，温。有小毒。破血散瘀，消肿止痛，舒筋活络。用于跌打肿痛，风湿痛，咽喉痛，腹痛，胃痛，牙痛，经闭。

**广州山柑**　山柑子(广州)，老虎须(广西)，广州槌果藤(广东植物志)

**Capparis cantoniensis** Lour.——*C. bodinieri* Lévl.

生于山沟、水边、密林或平地疏林中。分布于福建、广东、广西、四川西南部、贵州、云南。

全株(猫胡子花)：辛、苦，寒。舒筋活络，清热解毒。用于风湿痛，跌打损伤，乳蛾，牙痛，痔疮。　根：用于慢性肝炎。　叶、花：用于毒蛇咬伤。　种子：用于咽喉痛，胃脘痛。

**野槟榔**　山水槟榔(广西、云南)

**Capparis chingiana** B. S. Sun

生于石山灌丛或林中。分布于广西西部至西北部、云南东南部。

果实、种子：有毒。驱虫。

**马槟榔**　紫槟榔、太根子(云南)，爬姆朽(傣语)，水槟榔(中国高等植物图鉴)

**Capparis masaikai** Lévl.

生于疏林中。分布于广西西部及西北部、贵州南部、云南东南部。

种仁(水槟榔)：苦、甘，寒。清热解毒，催产。用于咽喉痛，热病口渴，疟疾，肿毒恶疮，淋巴肉瘤，难产。

**雷公桔**　老虎木(广东)，一扫光(广西)，纤枝槌果藤(广东植物志)

**Capparis membranifolia** Kurz.

常见于中海拔山地疏林中或山坡路旁、旷野。分布于广东、广西、贵州、云南。

根：微酸、涩，温。有毒。消肿止痛，强筋壮骨。用于瘀气，疟疾，胃痛，跌打肿痛，风湿痛；外用于体癣，湿疹。　叶、果实：用于毒蛇咬伤。

**毛蕊山柑**　毛叶山柑(广西药用植物名录)，桃叶槌果藤(广东植物志)

**Capparis pubiflora** DC.——*C. cerasifolia* A. Gray

生于低、中海拔的疏林中。分布于广东南部、海南、广西。

根：民间用于淋巴肉瘤。

**刺山柑**　波里克果(维吾尔语)，槌果藤(新疆中草药手册)

**Capparis spinosa** L.

生于干旱低山坡沙砾地。分布于新疆、西藏。

根皮、叶、果实(老鼠爪)：辛、苦，温。祛风，散寒，除湿。用于风湿关节痛。

**无柄山柑**

**Capparis subsessilis** B. S. Sun

生于山地疏林中。分布于广西西南部。

叶：用于毒蛇咬伤。

附　注：广西特有药用植物。

**小绿刺**　尾叶槌果藤(广东)，尾叶山柑(广西)

**Capparis urophylla** F. Chun

生于低、中海拔山地路旁及河边灌丛中。分布于广东、广西、云南。

叶：微辛，甘。解毒消肿。用于毒蛇咬伤。

**屈鸡头**　圆头鸡、屈头鸡(广东)，保亭槌果藤(广东植物志)

**Capparis versicolor** Griff.——*C. koi* Merr. et Chun

生于中海拔山地林中或疏林向阳处。分布于广东、广西。

根、叶、果实：微苦、涩，甘。有小毒。化痰止咳，散瘀止痛。用于哮喘，跌打肿痛，痈肿疮疖。

## 白花菜属　Cleome (L.) DC.

**白花菜**　羊角菜(湖北、云南)，臭腊菜(湖北)，息花菜(云南)

**Cleome gynandra** L.——*Gynandropsis gynandra* (L.) Briq.

生于低海拔地区的村边、路旁、荒地、田野。广布于北京以南的大部分地区。

全草(白花菜)：苦、辛，温。祛风散寒，活血止痛，解毒消肿。用于风湿关节痛，跌打损伤，痔疮，带下病，疟疾，痢疾。　种子(白花菜子)：苦，辛。微毒。散风祛湿，活血止痛。外用于痔疮，风湿痹痛，疟疾。

**醉蝶花**　紫龙须(广东)

**Cleome spinosa** L.

原产南美。全国各大城市庭园均有栽培。

全草：辛、涩，平。有小毒。祛风散寒，杀虫止痒。　果实：民间试用于肝癌。

**黄花草**　臭点菜(浙江)，黄花菜、臭矢菜(广东)，羊角草(广西)

**Cleome viscosa** L.

生于荒地、路边、田野。分布于安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、云南。

全草：苦、辛，凉。有毒。散瘀消肿，祛腐生肌。用于皮肤溃烂，痈肿疮毒，跌打损伤，腰肌劳损。种子：用于劳伤，小儿疳积。

附　注：湖北有将本种根误作板兰根用，系伪品。

## 鱼木属　Crateva L.

**大籽鱼木**　四方灯盏(广东)

**Crateva trifoliata** (Roxb.) Sun var. **macrosperma** Hwang

生于山谷疏林潮湿处。分布于广东、广西。

叶：健胃。　果实：有毒。用于跌打损伤。

**树头菜**

**Crateva unilocularis** Buch. -Ham.

生于湿润地区。分布于广东、广西、云南。

根(树头菜根)、叶(鹅脚木叶)：苦，凉。健胃，清热解毒，舒筋活络。用于肝炎，痢疾，泄泻，风湿关节痛，疟腮，胃痛。

# 61. 十字花科　Cruciferae

## 南芥属　Arabis L.

**贺兰山南芥**　阿拉善南芥(内蒙古植物志)

**Arabis alaschanica** Maxim.

生于海拔 2 700—4 200 米的山坡石灰岩上。分布于内蒙古、甘肃、宁夏，四川。

全草：解毒退烧。用于食物中毒。

**鞭甸南芥**

**Arabis flagellosa** Miq.

生于海拔 100—200 米的阴湿林下沟边或石缝中。分布于江苏、安徽、浙江。

全草：清热解毒。

**圆锥南芥**

**Arabis paniculata** Franch.

生于海拔 2 500—2 900 米的山坡林下荒地。分布于贵州、云南。

种子：解热。

**垂果南芥**　野白菜(内蒙古)，大蒜芥(新疆)，扁担蒿(四川)，文珠目-赫其(蒙语)

**Arabis pendula** L.

生于海拔 1 500—3 600 米的高山灌丛下、河边草丛及荒漠地区。分布于东北、华北、西北、西南。

果实：辛，平。清热解毒，消肿。用于疮毒，阴痒症。　种子：退热。

附　注：功效相同的有**粉绿垂果南芥 A. pendula** L. var. **hypoglauca** Franch.，分布于内蒙古、陕西。

## 辣根属　Armoracia Gaertn., B. Mey. et Scherb.

**辣根**　马萝卜(经济植物手册)

**Armoracia rusticana** (Lam.) Gaertn., B. Mey. et Scherb.——*Cochlearia rusticana* Lam.

原产欧洲。东北及河北、北京、江苏药圃及庭园中引种栽培。

根：辛，芳香。利尿，兴奋。外用引赤发泡，也作食用辛香料。

## 芸苔属　Brassica L.

**芥蓝**　芥蓝菜(通称)

**Brassica alboglabra** Bailey

生于向阳、排水良好、肥沃而疏松的土地。原产我国南部，为广东、海南、广西普遍种植的蔬菜之一，福建、广东、广西等地亦有栽培。

根：辛，平。解毒，清咽，平喘。用于咽喉痛，气喘，风热感冒。　茎、叶：散积化痰。　叶、种子：消食积，解面毒。

**油菜**　芸苔(唐本草)

**Brassica campestris** L.——*B. campestris* L. var. *oleifera* DC.

全国各省、市、区均有种植。

种子(芸苔子)辛，温。行血散瘀，消肿散结。用于丹毒，产后瘀血腹痛，恶露不净，痢疾，便秘，疮肿。　茎、叶：辛，凉。散血消肿。劳伤出血，痈肿疮毒。

**甘蓝**　玉头(内蒙古)，芥蓝头(广东)

**Brassica caulorapa** Pasq.——*B. oleracea* L. var. *caulorapa* DC.

全国南北各地普遍种植。

球茎、叶：甘、辛、微苦，凉。利水消肿。用于热毒风肿，脾虚火盛，淋浊，便血。　叶、种子：用于食积，恶疮。

**青菜**　小白菜、江门白菜(广州)

**Brassica chinensis** L.——*B. napus* L. var. *chinensis* (L.) O. E. Schulz

全国各地普遍种植。

叶、种子：甘，凉。清热除烦，消食祛痰，解酒。用于肺热痰咳，小便淋痛。　种子：消痰积，清肺热。

**苦芥**　青菜(四川)，苦菜(云南)，帆怕干(傣语)

**Brassica integrifolia** (West) O. E. Schulz——*Sinapis integrifolia* West

栽培于台湾、湖南、广东、海南、广西、四川、云南。

种子：苦，大寒。用于高热抽搐，痉挛，妄语，神经痛，乳痈，溃疡，皮疹。

**芥菜**　霜不老(福建)，冲菜(湖南)

**Brassica juncea** (L.) Czern. et Coss.——*Sinapis juncea* L.

全国各地普遍种植。

种子(黄芥子)：辛，温。利气化痰，温中散寒，通络止痛，消肿解毒。用于寒痰喘咳，胸胁胀痛，痰滞经络，关节麻木，痛经，痰湿流注，阴疽肿毒。

附　注：①**银丝芥 B. juncea** (L.) Czern. et Coss. var. **multisecta** Bailey 全国各地有种植，云南作芥子药用。②芥菜为《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**大头菜**　布留克(东北)，洋大头(江苏)

**Brassica napobrassica** Mill.

东北、华北、华东及西北部分地区均有种植。

种子：甘，凉。泻湿热，消食下气，止咳，止渴。用于热毒肿痛，肝虚目暗，乳痈，便秘，黄疸。

**塌棵菜**　塌地白菜(内蒙古)，乌塌菜、瓢儿菜(江苏)，蹋菜(食物本草)

**Brassica narinosa** Bailey

长江下游地区多有种植。

茎、叶：甘，平。滑肠，疏肝，利五脏。

**卷心菜**　包菜(江苏、广西)，莲花白(陕西、四川，云南)

**Brassica oleracea** L. var. **capitata** L.

全国各地普遍种植作蔬菜食用。

叶：甘，平。益肾，利五脏，止痛。用于溃疡病痛。

**白菜**　大白菜(通称)，黄芽菜(江苏)，卷心白(四川)

**Brassica pekinensis** Rupr.

全国各地均有种植。

叶：甘、平。消食下气，利肠胃，利尿。用于食积，淋证；外用于疖腮，漆毒。

**芜菁**　地蔓菁(内蒙古)，扁萝卜(云南、西藏)，蔓-金(蒙语)，蔓青(唐本草)

**Brassica rapa** L.

东北及河北、山东等地有栽培。

根、叶：苦，凉。利五脏，益气，消食，止咳。用于心腹冷痛，热毒肿痛，乳痈。花、种子：苦、辛，平。明目，清热利湿，利尿。用于青盲，目暗，黄疸，痢疾，小便淋痛，头痛。

## 荠属 Capsella Medik.

**荠** 荠菜(通称),香荠菜(安徽),上巳菜(福建),菱角菜(广东),地米菜(贵州),护生草(本草纲目)

**Capsella bursa-pastoris** (L.) Medik.——*Thlaspi bursa-pastoris* L.

生于山坡,田园及路旁,野生或栽培。全国各地普通分布。

全草(荠菜花): 甘,凉。凉血止血,清热利尿,明目,降压,解毒。用于痢疾,高血压症,乳糜尿,水肿及各种出血。 种子: 用于目痛青盲,翳障。

## 碎米荠属 Cardamine L.

**弯曲碎米荠** 野荠菜(浙江),萝目草(福建),小叶地豇豆(云南)

**Cardamine flexuosa** With.

生于田埂、河边、山谷等阴湿处。分布几遍全国,尤以长江流域以南各地为常见。

全草(弯曲碎米荠、白带草): 甘、淡,平。清热利湿,养心安神,收敛,止带。用于痢疾,淋证,小便涩痛,心悸,失眠,带下病。

**碎米荠** 白带草(江苏),雀儿菜(湖南)

**Cardamine hirsuta** L.

生于海拔 2 400 米以下的山坡、路旁荒地及草丛中。分布于华东、中南、西南及辽宁、河北、陕西,甘肃。

全草(白带草): 甘,平。清热解毒,祛风除湿。用于痢疾,泄泻,腹胀,带下病,乳糜尿,外伤出血。

**弹裂碎米荠**

**Cardamine impatiens** L.

生于海拔 150—3 500 米的路旁、山坡、沟谷、水边或湿地。分布于西南及吉林、辽宁、山西、陕西、甘肃、新疆、山东、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北、广西。

全草: 淡,平。清热利湿,利尿解毒。用于淋浊,带下病,痢疾,胃痛,疔毒。

**白花碎米荠** 山芥菜(东北),菜子七(湖北),角蒿(湖南)

**Cardamine leucantha** (Tausch) O. E. Schulz——*Dentaria leucantha* Tausch

生于海拔 200—2 000 米的山坡、路边、杂木林下及山谷沟边湿地。分布于东北及河北、山西、陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北、四川。

根状茎(菜子七): 甘,凉。清热解毒,化痰止咳。用于咳嗽痰喘,顿咳,月经不调。

**水田碎米荠** 奥存-照古其(蒙语),阿英久(苗语)

**Cardamine lyrata** Bunge

生于水田边、溪沟旁浅水处。分布于东北及河北、内蒙古、江苏、安徽、江西、河南、湖南、广西。

全草(水田碎米荠): 甘、微辛,平。清热,凉血,明目,调经。用于痢疾,吐血,目翳,目赤,月经不调。

**大叶碎米荠**　　石格菜、普贤菜(四川)

**Cardamine macrophylla** Willd.

生于海拔 1 600—4 200 米的山坡灌丛下沟边、石隙、高山草坡水湿处。分布于华北、西南及陕西、甘肃、青海、湖北。

全草：甘，平。消肿补虚。用于虚劳内伤，头晕乏力，崩漏，带下病。

**草甸碎米荠**　　诺古音-照古其(蒙语)

**Cardamine pratensis** L.

生于湿草原、河边、溪旁和林缘湿地。分布于黑龙江、内蒙古、西藏西部。

全草：清热解毒。用于坏血病。

**裸茎碎米荠**　　落叶梅(陕西)

**Cardamine scaposa** Franch.——*C. denudata* O. E. Schulz

生于山坡灌丛中及林下湿地。分布于河北、山西、陕西。

全草：清热解毒。用于疔疮痈肿。

**紫花碎米荠**　　石荠菜(四川)

**Cardamine tangutorum** O. E. Schulz.

生于海拔 2 100—4 000 米的高山山谷、草地或林下湿地。分布于河北、山西、陕西、甘肃、青海、四川、云南、西藏东部。

全草：清热利湿，平肝，利尿。用于黄水疮，外伤出血。花：用于筋骨痛。

**小三叶碎米荠**

**Cardamine trifoliolata** Hook. f. et Thoms.

生于海拔 2 000 米以下的山坡林下、山沟水边草地。分布于湖北、湖南、四川、云南、西藏。

全草：用于风湿痛。

**华中碎米荠**　　半边菜(湖北)，普贤菜(四川峨眉)

**Cardamine urbaniana** O. E. Schulz.

生于海拔 980—3 500 米的山谷湿地及山坡林下。分布于陕西南部、甘肃南部、浙江、江西、湖北、湖南、四川中南部。

根状茎、全草：微苦、辛，平。止咳化痰，活血，止泻。用于咳嗽痰喘，顿咳，小儿泄泻，跌打损伤。　全草：用于崩漏，带下病。

## 桂竹香属　Cheiranthus L.

**桂竹香**

**Cheiranthus** cheiri L.

原产欧洲南部。全国各地庭园栽培供观赏。

花(桂竹香)：泻下，通经。

**红紫桂竹香**

**Cheiranthus roseus** Maxim.

生于海拔 3 400—3 700 米的高山石堆处。分布于甘肃、青海、四川西北部、西藏东北

部。

全草：清热解毒。

## 岩芥属　Cochlearia L.

**岩芥**

**Cochlearia officinalis** L.

原产欧洲西北部。全国有引种栽培。

全草：用于抗坏血病，消化不良，牙痛，口腔破溃。

## 播娘蒿属　Descurainia Webb. et Berth.

**播娘蒿**　麦里蒿(山东)，眉毛蒿(江苏)，乔棍坦(维吾尔语)，格扯(藏语)

**Descurainia sophia** (L.) Schur.——*Sisymbrium sophia* L.

生于麦田、荒地、路旁。除广东、海南、广西外，全国各地普通分布。

种子(葶苈子)：辛、苦，大寒。泻肺平喘，行水消肿，逐痰止咳。用于喘咳痰多，胸胁胀满，胸腹水肿，小便淋痛。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。习称"南葶苈"。

## 异蕊芥属　Dimorphostemon Kitag.

**腺毛异蕊芥**

**Dimorphostemon glandulosus** (Kar. et Kir.) V. Golubk.——*Arabis glandulosus* Kar. et Kir.

生于海拔1 900—5 100米的高山草甸、山坡草地、河边沙地、山沟灌丛及石缝处。分布于甘肃、宁夏、青海、新疆、四川、云南、西藏。

全草：青海民间用于食物中毒。

## 花旗杆属　Dontostemon Andrz. ex DC.

**花旗杆**　苦葶苈、米蒿(山东)

**Dontostemon dentatus** (Bunge) Ledeb.——*Andreoskia dentata* Bunge

生于海拔200—1 900米的石砾质山地、山坡、林缘路旁。分布于东北及河北、山西、陕西、山东、江苏、安徽、河南。

全草及种子：利尿。

## 葶苈属　Draba L.

**毛葶苈**

**Draba eriopoda** Turcz.

生于海拔 1 900—4 300 米的山坡、林下河谷及牧场。分布于西北及山西、四川、西藏。

种子：清热利尿，祛痰定喘。

**苞序葶苈**　穴乌萝卜(四川)，线果葶苈(秦岭植物志)

**Draba ladyginii** Pohle

生于海拔 2 100—4 200 米的向阳路边及潮湿地。分布于华北、西北及湖北、四川、西藏。

全草：清热，祛痰平喘，解食物毒。

**喜山葶苈**　希五拉普(藏语)，毛萼葶苈(青藏高原药物图鉴)

**Draba oreades** Schrenk

生于海拔 3 000—5 300 米的高山草甸、石砾及岩石缝中。分布于内蒙古、陕西、甘肃、青海、新疆、四川、云南、西藏。

全草：辛，平。消积，解肉食中毒。

附　注：**葶苈 D. nemorosa** L. 为历史资料的延伸引用，实际不作葶苈子入药。

## 芝麻菜属　Eruca Mill.

**芝麻菜**　臭菜(东北)，臭芥(内蒙古)，麻吉-诺高(蒙语)

**Eruca sativa** Mill.

生于海拔 1 400—3 100 米的向阳坡地、路边、麦田、水渠边。野生或栽培。分布于华北及黑龙江、辽宁、陕西、甘肃、青海、新疆、江苏、四川、云南。

种子(金堂葶苈)：辛、苦，大寒。破坚利水，定喘化痰。用于喘急咳逆，肺痈，痰饮，浮肿。

附　注：本种的种子在四川作葶苈子入药。

## 糖芥属　Erysimum L.

**糖芥**　乌兰-高恩淘格(蒙语)

**Erysimum bungei** (Kitag.) Kitag.——*E. amurense* Kitag. subsp. *bungei* Kitag.

生于田边荒地及山坡。分布于东北、华北及陕西、江苏、四川。

全草：强心利尿，健脾和胃，消积。用于心悸，浮肿，消化不良。　种子：清热，镇咳，强心。

**小花糖芥**　打水水花(内蒙古)，苦葶苈(山东)

**Erysimum cheiranthoides** L.

生于海拔 500—2 000 米的山坡、山谷、路边及荒野。分布于华北及吉林、辽宁、陕西、甘肃、宁夏、新疆、山东、江苏、安徽、河南、湖北、湖南、四川、云南。

全草及种子(桂竹糖芥)：酸、苦，平。有小毒。强心利尿。用于心力衰竭。

附　注：可作毒毛旋花子苷的代用品。

**灰毛糖芥**　冈托巴(藏语)

**Erysimum diffusum** Ehth.

生于山坡草地。分布于新疆、西藏。

全草及种子：甘、涩，寒。清热镇咳，强心，解肉食中毒。用于虚痨发热，肺痨咳嗽，久病心力不足。

**宽线叶蒙古糖芥**　　阿尔泰音-高恩淘格(蒙语)，阿尔泰糖芥(内蒙古植物志)

**Erysimum flavum** (Georgi) Bobrov——*Hesperis flava* Georgi; *E. altaicum* C. A. Mey.

生于山坡草地。分布于黑龙江、内蒙古、新疆、西藏。

全草：用于心脏病。

附　注：为藏医用药。

## 薄果芥属　Hymenolobus Nutt.

**薄果芥**　　心草(新疆)

**Hymenolobus procumbens** (L.) Nutt.——*Lepidium procumbens* L.

生于低海拔荒漠。分布于新疆。

全草：用于肝炎，胸痹，高血压症，神经性头痛。

## 菘蓝属　Isatis L.

**菘蓝**　　蓝靛(通称)，大靛(江苏)，菘青(药学通报)

**Isatis indigotica** Fort.

原产我国。各地均有栽培。

叶(大青叶)：苦，寒。清热解毒，凉血消斑。用于温邪入营，高热神昏，发斑发疹，热痢，疙腮，喉痹，丹毒，痈肿。　根(板蓝根)：苦，寒。清热解毒，凉血利咽。用于温毒发斑，舌绛紫暗，疙腮，喉痹，烂喉丹痧，大头瘟疫，丹毒，痈肿。　叶、茎叶经加工制得的干燥物(青黛)：咸，寒。清热解毒，凉血，定惊。用于温毒发斑，血热吐衄，胸痛咳血，口疮，疙腮，喉痹，小儿惊痫。

附注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。② 功效基本相同的有**小果菘蓝 I. minima** Bunge，分布于新疆。

**长圆果菘蓝**

**Isatis oblongata** DC.

生于山坡草地。分布于辽宁、内蒙古、甘肃、新疆。

根、叶：清热解毒。用于伤寒，口疮，乳蛾，衄血，痢疾。

## 独行菜属　Lepidium L.

**独行菜**　　芝麻眼草(天津)，茶戳巴(藏语)

**Lepidium apetalum** willd.

生于海拔 2 000 米以下的山坡、山沟、路旁及村舍附近。分布于东北、华北、西北、西南及江苏、安徽、浙江。

种子(葶苈子): 辛、苦,大寒。泻肺平喘,行水消肿。用于喘咳痰多,胸胁胀满,不得平卧,胸腹水肿,小便淋痛。

附　注:《中华人民共和国药典》1990 年版收载。习称"北葶苈子"。

**宽叶独行菜**　大辣根、止痢草、羊辣辣(陕西、甘肃、宁夏、青海),希克崔克(蒙语)

**Lepidium latifolium** L.

生于海拔 1 800—4 250 米的山坡、村旁、田边及盐化草甸等处。分布于东北、华北、西北及河南、西藏。

全草: 微苦、涩,凉。清热燥湿。用于痢疾,泄泻。

附　注: 本种及**光果宽叶独行菜 L. latifolium** L. **var. affine** C. A. Mey. 的种子,在陕西、甘肃及青海部分地区作"葶苈子"入药。

**抱茎独行菜**　窄叶独行菜(东北植物检索表)

**Lepidium perfoliatum** L.

生于路旁、荒地、荒漠及干燥沙滩。分布于辽宁、甘肃、新疆、江苏太仓。

全草: 利尿,抗坏血病。

**柱毛独行菜**　柱腺独行菜(东北植物检索表),积鸡菜(江苏植物名录)

**Lepidium ruderale** L.

生于沙质土壤或草地。分布于东北、西北及山东、江苏、河南、湖北。

种子: 止咳平喘,行气利水。

**家独行菜**　台尔台孜(维吾尔语)

**Lepidium sativum** L.

栽培或逸为野生。分布于黑龙江、吉林、新疆、山东、西藏。

全草(台尔台孜): 利尿,抗坏血病。用于疟疾。种子: 用于咳嗽,泄泻,疥癣。

附　注: 为新疆民族药。

**北美独行菜**　辣菜(山东),大叶香荠(浙江、江西),土荆芥穗(福建)

**Lepidium virginicum** L.

原产美洲。生于田野、荒地及路旁。分布于华东及河南、湖北、广东、广西。

全草: 甘,平。驱虫,消积。用于虫积腹胀。种子: 用于水肿,痰喘咳嗽,小便淋痛。

## 涩荠属　Malcolmia R. Br.

**涩荠**　千果草(青海),大麦荠菜(江苏),蒺兀萝卜(藏语)

**Marcolmia africana** (L.) R. Br.——*Hesperis africana* L.

生于海拔 100—2 800 米的田野、荒地、山坡路边。分布于华北、西北及江苏、安徽、河南、四川、西藏。

种子(紫花荠): 苦、辛,大寒。祛痰定喘,泻肺行水。用于咳逆痰多,脾虚肿满,胸腹积水,胸胁胀满,肺痈。

## 豆瓣菜属　Nasturtium R. Br.

**豆瓣菜**　水生菜(河北),西洋菜(上海、广州),无心菜(植物名实图考)

**Nasturtium officinale** R. Br.——*Sisymbrium nasturtium-aquaticum* L.; *Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek

生于海拔800—3 700米的水田中、水沟边、山涧、沼泽地，栽培或野生。分布于西南及黑龙江、河北、山西、陕西、山东、江苏、上海、安徽、河南、广东、海南、广西。

全草(西洋菜)：甘、淡，凉。清热解毒，凉血，止痛。用于肺热咳嗽，小便淋痛，皮肤瘙痒，疔毒痈肿。

附　注：①广东、广西等地区栽培供蔬食，称"西洋菜"，久负盛名。②本种熬食，有通经、流产和避孕作用。

## 单花荠属 Pegaeophyton Hayek et Hand. -Mazz.

**无茎荠**　高山无茎芥(甘肃中草药)

**Pegaeophyton scapiflorum** (Hook. f. et Thoms.) Marq. et Airy-Shaw——*Cochlearia scapiflorum* Hook. f. et Thoms.

生于海拔3 500—5 400米的高山草地、山坡湿地、林缘流水滩地。分布于青海、四川西南部、云南西北部、西藏。

全草(高山辣根菜)：苦、辛，寒。清热解毒，消肿止痛。用于肺热咳嗽，急性热病，肺咯血，刀伤出血，食物中毒。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版附录收载。

## 沙芥属　Pugionium Gaertn.

**沙芥**　沙萝卜(内蒙古)，额乐孙萝邦(蒙语)，沙芥菜(中国沙漠地区药用植物)

**Pugionium cornutum** (L.) Gaertn.——*Bunias cornuta* L.

生于草原地带的沙地或半固定沙丘地。分布于辽宁、内蒙古、陕西、宁夏。

全草(沙芥)：辛，温。行气止痛，消食解毒。用于消化不良，胃肠胀气，胸腹胀满，食物中毒。根：辛，凉。清热止咳。用于咳嗽。

附　注：为蒙医用药。

**斧翅沙芥**　乌日格-额乐孙萝邦(蒙语)

**Pugionium dolabratum** Maxim.

生于荒漠及半沙漠的沙地。分布于内蒙古、陕西、甘肃、宁夏。

根：辛，凉。清热止咳。用于咳嗽。

## 萝卜属　Raphanus L.

**萝卜**　菜头(福建)，地灯笼(湖南)，萝白(广州)，莱菔(唐本草)

**Raphanus sativus** L.

全国各地普遍栽培。

种子(莱菔子)：辛、甘，平。消食除胀，降气化痰。用于饮食停滞，脘腹胀痛，大便秘结，积滞泻痢，痰壅喘咳。　叶(莱菔英)：辛、苦，平。消食，理气，化痰。　根（地骷髅)：消食积，利尿消肿。用于胃脘疼痛。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②功效相同的有**长羽叶萝卜 R. sativus** L. var. **longipinnatum** Bailey，全国各地栽培。

**蓝花子**　　滨莱菔(台湾植物志)，茹菜、满园花(广西)，冬菜子(云南)

**Raphanus sativus** L. var. **raphanistroides** (Makino) Makino

栽培或逸为野生。分布于浙江、台湾、湖南，广西、四川、云南。

种子：宽中下气，消食，解毒。

## 蔊菜属　Rorippa Scop.

**细子蔊菜**　　沙地菜(湖北)

**Rorippa cantoniensis** (Lour.) Ohwi——*Ricotia cantoniensis* Lour.

生于海拔80—1 800米的田边路旁、山沟、河边湿地。分布于华东、中南及辽宁、河北、陕西、四川、云南。

全草：清热解毒，镇咳。

**无瓣蔊菜**

**Rorippa dubia**(Pers.)Hara——*Sisymbrium dubium* Pers.; *Nasturtium montanum* Wall.; *Rorippa montana* (Wall.) Small

生于海拔100—3 700米的山坡路旁、山谷湿地、田园及房舍阴湿地。分布于中南、西南及陕西、甘肃、江苏、上海、安徽、浙江、江西、福建。

全草(江剪刀草)：辛，平。止咳化痰，平喘，散瘀消肿，清热解毒。用于咽喉痛，感冒发热，经闭，风湿关节痛。

**风花菜**　　银条菜(植物名实图考)

**Rorippa globosa** (Turcz.) Hayck——*Nasturtium globosum* Turcz.

生于海拔90—2 500米的路旁、河岸、沟边湿地或草丛中。分布于东北、华北、中南及山东、江苏、安徽、浙江、江西、云南。

全草(风花菜)：补肾，凉血。用于乳痈。

**蔊菜**　　水辣辣(甘肃)，野油菜(浙江、江西、福建)，青蓝菜(广东)，天菜子(四川)

**Rorippa indica** (L.) Hiern——*Sisymbrium indicum* L.; *Nasturtium indicum* (L.) DC.

生于海拔30—1 450米的园圃、河边、房舍墙脚及山坡路旁湿地。分布于华东、中南及陕西、甘肃、四川、云南。

全草(蔊菜)：辛，凉。清热解毒，止咳化痰，止痛，通经活血。用于感冒发热，咳嗽，咽喉痛，麻疹透发不畅，风湿关节痛，经闭。

附　注：江苏收购的“江剪刀草”，此种是其中之一。

**沼生蔊菜**　水萝卜(陕西),水前草(云南),叶香(藏语)

**Rorippa islandica** (Oed.) Borb.——*Sisymbrium islandica* Oed.; *R. palustris* (Leyss.) Bess.

生于田边、路旁、溪岸、山坡及湿草场。分布于东北、华北、西北及山东、江苏、安徽、河南、湖南、贵州、云南、西藏。

全草：辛，凉。清热解毒，利水消肿，活血通经。用于咽喉痛，风热感冒，肝炎，肺热咳喘，小便淋痛，关节痛，痘疹，痈肿，烧、烫伤。

## 欧白芥属　Sinapis L.

**欧白芥**　白辣菜子(安徽),阿克克却(维吾尔语),辣菜子(中药志), 蜀芥 (本草纲目)

**Sinapis alba** L.——*Brassica alba* (L.) Boiss.

原产欧洲。辽宁、北京、山西、新疆、山东、江苏、安徽、四川有栽培。

种子(白芥子)：辛，温。温肺豁痰，利气散结，通络止痛。用于寒痰喘咳，胸胁胀痛，关节麻木，痰湿流注，阴疽肿毒。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 大蒜芥属　Sisymbrium L.

**垂果大蒜芥**　冈妥巴(藏语),垂果蒜芥(中草药通讯)

**Sisymbrium heteromallum** C. A. Mey.

生于海拔 900—3 500 米的森林草原、草甸及沟谷溪边。分布于东北、华北、西北及四川、云南。

全草、种子：甘、辛，平。清热解毒，镇咳化痰，强心。用于虚劳咳嗽，顿咳，久病心力不足，肉食中毒。全草：用于瘰疬，肉瘤。

## 丛菔属　Solms-Laubachia Muschl.

**长果丛菔**　索裸格鲁(藏语)

**Solms-Laubachia dolichocarpa** Y. C. Lan et T. Y. Cheo

生于海拔 4 300 米以下的高山岩石间。分布于四川若尔盖地区。

全草：用于肺痨。

附　注：四川特有药用植物。

**宽果丛菔**　梭罗加博(藏语)

**Solms-Laubachia eurycarpa** (Maxim.) Botsch.——*Parrya eurycarpa* Maxim.

生于海拔 4 000 米以下的高山悬岩上。分布于青海、西藏。

全草及根：苦、辛，寒。清热止咳。用于肺热咳嗽。

**线叶丛菔**　鸡掌七(云南)

**Solms-Laubachia linearifolia** (W. W. Smith) O. E. Schulz.——*Parrya linearifolia* W. W. Smith

生于海拔 3 600—4 300 米的高山石灰岩缝中。分布于云南曲靖、大理、丽江地区。

全草：止血，续筋接骨，益气补血。用于外伤出血，骨折，病后体虚，贫血。

**总状丛蓼**　扫罗慕布(藏语)

**Solms-Laubachia platycarpa** (Hook. f. et Thoms.) Botsch.——*Parrya platycarpa* Hook. f. et Thoms.

生于海拔 4 300—5 700 米的山坡砂砾地、山顶岩石边。分布于我国西藏。

全草：苦、辛，凉。清热，镇咳，止血。用于肺热咳嗽，痰中带血。

**丛蓼**　索鲁卡鲁(藏语)

**Solms-Laubachia pulcherrima** Muschl.——*S.-L. pulcherrima* Muschl. **f.** *atrichophylla* Hand.-Mazz.

生于海拔 2 800—4 300 米的河边、山坡草地及石灰岩石缝中。分布于四川、云南、西藏。

全草：辛，凉。有小毒。清热解毒，发散风热。用于肺热咳嗽，感冒发热，肝火耳鸣，头晕目眩。

## 荠蒿属　Thlaspi L.

**荠蒿**　洋辣罐(辽宁)，苦稽(甘肃)，犁头菜(陕西)，臭虫草(江苏)，则尕娃-哲噶(藏语)

**Thlaspi arvense** L.

生于山地、路旁、沟边、村舍附近或田间。分布几遍全国。

全草(苏败酱)：甘，平。和中益气，利气，消肿，清热解毒，利肝明目。用于小儿消化不良，水肿，肝炎，肺痈，关节痛，痈肿疖毒。　种子：辛，凉。清热解毒，明目，利尿。用于目赤红肿，风湿关节痛，脘腹痛。

# 62. 悬铃木科　Platanaceae

## 悬铃木属　Platanus L.

**悬铃木**　法国梧桐(江苏、安徽)

**Platanus acerifolia** (Ait.) Willd.

全国各地多栽培作行道树或庭园绿化树种。

叶：滋补，退热，发汗。果实：解表，发汗，止血。用于血小板减少性紫癜，出血。

附　注：功效相同的有**三球悬铃木 P. orientalis** L.；**一球悬铃木 P. occidentalis** L.。

# 63. 金缕梅科 Hamamelidaceae

## 蕈树属 Altingia Noronha

**蕈树** 阿丁枫(广东),假荔枝(广西),半边风(云南)

**Altingia chinensis** (Champ.) Oliv. ex Hance——*Liquidambar chinensis* Champ.

生于常绿林中。分布于浙江、江西、福建、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南东南部。

根: 用于风湿痹痛,跌打损伤,瘫痪。木材所提取的蕈香油供药用及香料用。

**云南蕈树** 青皮树、苦梨树、白皮树(云南)

**Altingia yunnanensis** Rehd. et Wils.

生于山地常绿阔叶林中。分布于贵州、云南东南部。

根: 祛风除湿。

## 蜡瓣花属 Corylopsis Sieb. et Zucc.

**鄂西蜡瓣花** 小扇木(湖北)

**Corylopsis henryi** Hemsl.

生于山坡林中。分布于湖北西部、四川东部。

根皮、果实: 用于月经不调,内伤出血。

**峨眉蜡瓣花** 朴扇木(湖北),大果蜡瓣花(海南植物志)

**Corylopsis multiflora** Hance——*C. wilsonii* Hemsl.

生于常绿阔叶林下。分布于福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、贵州、云南。

根皮: 用于恶寒发热,呕逆,心悸,烦乱昏迷,白喉,内伤出血。

**蜡瓣花** 连核梅、连合子(浙江),华蜡瓣花(中国高等植物图鉴)

**Corylopsis sinensis** Hemsl.

生于山地岭脊灌丛中、沟谷、路旁或林缘。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖南、广东、广西、四川、贵州。

根、叶(蜡瓣花): 苦,凉。清热镇静,止呕逆。用于恶寒发热,呕逆,心悸,烦乱昏迷。

**四川蜡瓣花**

**Corylopsis willmottiae** Rehd. et Wils.

生于山地林中。分布于四川西部及西南部、贵州。

果皮: 止血。根: 清热,除烦,止呕。

## 蚊母树属 Distylium Sieb. et Zucc.

**小叶蚊母树** 石头棵子(贵州)

**Distylium buxifolium** (Hance) Merr.——*Myrsine buxifolia* Hance; *D. stricatum* Hemsl.

生于溪旁或河边。分布于福建、湖北、广东、广西、四川、贵州。

果实：民间用于癥瘕痞块。

**窄叶蚊母树**　　大叶浆木(广西)

**Distylium dunnianum** Lévl.

生于山地林中。分布于广西、贵州、云南东部。

根：清热。

**杨梅叶蚊母树**

**Distylium myricoides** Hemsl.

生于向阳山坡林中及沟谷林缘。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖南、广东、广西、四川、贵州东部。

根：辛、苦，平。通络，消肿。用于跌打损伤，手足浮肿。

**蚊母树**

**Distylium racemosum** Sieb. et Zucc.

生于山地溪旁杂木林中。分布于浙江、上海、福建、台湾、海南。

根、树皮：辛、微苦，微温。活血祛瘀，抗肿瘤。

## 马蹄荷属　Exbucklandia R. W. Br.

**马蹄荷**　　马蹄樟、马蹄木(广西)，合掌木、巴巴叶(云南)

**Exbucklandia populnea** (R. Br.) R. W. Br.——*Bucklandia populnea* R. Br.; *Symingtonia populnea* (R. Br.) Steenis

生于常绿阔叶林中。分布于广西、贵州、云南及西藏。

茎：酸、涩，湿。有小毒。舒筋活血，通络止痛。用于风湿关节痛，腰腿痛。根：外用于疮疡肿毒。

## 牛鼻栓属　Fortunearia Rehd. et Wils.

**牛鼻栓**　　木里仙、连合子(浙江)

**Fortunearia sinensis** Rehd. et Wils.

生于山地杂木林中或灌丛中。分布于陕西、江苏、上海、安徽、浙江、江西、河南、湖北，四川。

根、枝叶：苦、涩，平。益气，止血，生肌。用于劳伤乏力，刀伤出血。果实：益气血。

附　注：我国特有属。

## 金缕梅属　Hamamelis L.

**金缕梅**

**Hamamelis mollis** Oliv.

生于中海拔的次生林或灌丛中。分布于安徽、浙江、江西、湖北、湖南、广西、四川。

根(金缕梅): 用于劳伤乏力,热毒疮疡。

## 枫香树属 Liquidambar L.

**枫香树** 枫树(通称),九空子、六六通(江苏)

**Liquidambar formosana** Hance

生于湿润肥沃的山坡杂木林中。分布于秦岭及淮河以南各省区,北起河南、山东,东至台湾,西至四川、云南及西藏,南至广东。

果序(路路通): 苦、涩,平。行气宽中,活血通络,利水, 通经。用于关节痛, 水肿胀满,乳少,经闭。树脂(枫香脂、白云香): 辛、微苦,平。活血止痛,凉血解毒, 生肌。用于跌打损伤,痈疽肿痛,吐血,衄血,外伤出血。根: 用于痈疽,疔疮,风湿关节痛。

附 注:《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**苏合香**

**Liquidambar orientalis** Mill.

喜生于向阳的土壤上。我国南部有少量栽培。

树脂(苏合香): 甘、辛,温。通窍,开郁,祛痰。用于中风痰厥,惊痫。

附 注:《中华人民共和国药典》1990 年版附录收载。

**胶皮枫香树**

**Liquidambar styraciflua** L.

原产北美和中美洲。云南勐腊有栽培。

树脂: 解毒,生肌,止痛,止血。

## 檵木属 Loropetalum R. Br.

**檵木** 白清明花(福建),满山白(湖北),土墙花(湖南)

**Loropetalum chinense** (R. Br.) Oliv.——*Hamamelis chinensis* R. Br.

生于向阳的丘陵及山地。分布于全国中部、南部及西南各地。

花(檵花): 微甘、涩,平。清暑解热,止咳,止血。用于咳嗽,咯血,衄血,血痢, 血崩, 遗精,泄泻。叶(檵木叶): 涩、苦,凉。收敛止血,清热解毒。用于创伤出血,烧、烫伤, 扭伤,吐血,泄泻。根(檵木根): 苦、涩,微温。用于咳血,跌打损伤,吐血,经闭, 腹痛泄泻, 关节酸痛。

附 注: ①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。② 功效相同的有**红花檵木 L. chinense** Oliv. var. **rubrum** Yieh, 分布于湖北、湖南。

## 红花荷属 Rhodoleia Champ. ex Hook. f.

**红花荷**

**Rhodoleia championii** Hook. f.

生于山地密林中。分布于广东中部及西部、广西。

叶：治刀伤出血。

**小花红花荷**　小花红苞木(中国高等植物图鉴)

**Rhodoleia parvipetala** Tong

生于海拔500—1 700米的山地常绿林中。分布于广西西部、贵州东南部、云南东部。

叶：止血。

## 半枫荷属　Semiliquidambar H.T. Chang

**半枫荷**

**Semiliquidambar cathayensis** H. T. Chang——*S. coriacea* H. T. Chang

生于山地灌丛中。分布于江西南部、广东、海南、广西北部、贵州南部。

根：辛，微温。祛风除湿，舒筋活血。用于风湿痹痛，跌打损伤，腰腿痛，痢疾；外用于刀伤出血。

附　注：①功效相同的有**小叶半枫荷 S. cathayensis** H.T. Chang var. **parvifolia** (Chun) H. T. Chang，分布于广东北部及广西北部。②我国特有属。

## 水丝梨属　Sycopsis Oliv.

**水丝梨**

**Sycopsis sinensis** Oliv.

生于山地常绿林及灌丛中。分布于陕西、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西。

树脂：祛风通窍。

# 64. 景天科　Crassulaceae

## 落地生根属　Bryophyllum Salisb.

**落地生根**　枪刀叶(福建)，打不死、叶生根(广东)，火炼丹，接骨草(云南)

**Bryophyllum pinnatum** (L. f.) Oken——*Crassula pinnata* L. f.

各地栽培供观赏，亦有逸生于岩石上或村旁。分布于福建、台湾、广东、广西、贵州、云南。

全草(落地生根)：微酸、涩，凉。消肿，活血止痛，拔毒生肌。外用于痈肿疮毒，乳痈，丹毒，中耳炎，疖肿，外伤出血，跌打损伤，骨折，烧、烫伤。

## 景天属　Hylotelephium H. Ohba

**狭穗景天**　狭穗景天(通称)

**Hylotelephium angustum** (Maxim.) H. Ohba——*Sedum angustum* Maxim.

生于海拔 1 850—3 500 米的山坡或沟边灌丛、疏林及石上。分布于山西、陕西、甘肃、青海东部、湖北西部、四川、云南。

全草(狭穗八宝): 涩,寒。清热,利肺,顺气。

**八宝** 活血三七(安徽、云南),脚趾草(安徽),豆瓣还阳(湖北),胡豆七(四川),大打不死(云南),景天、对叶景天(长白山植物药志)

**Hylotelephium erythrostictum** (Miq.) H. Ohba——*Sedum erythrostictum* Miq.

生于海拔 450—1 800 米的山坡草地或沟边。分布于东北及河北、山西、陕西、山东、江苏、安徽、浙江、河南、湖北、四川、贵州、云南。

全草(景天): 苦,平。清热解毒,散瘀消肿,止血。用于咽喉痛,吐血,癥瘕;外用于疔疮肿毒,缠腰火丹,脚癣,毒蛇咬伤,烧、烫伤。

**紫花八宝** 打不死(广西),猫舌草、活血丹(浙江天目山药用植物志)

**Hylotelephium mingjinianum** (S.H. Fu) H. Ohba——*Sedum mingjinianum* S. H. Fu

生于海拔700米左右的山涧溪边阴湿处。分布于安徽、浙江、河南、湖北、湖南、广西。

全草(石蝴蝶): 苦,凉。活血生肌,止血,解毒。用于挫伤,吐血,小儿惊风,胸胁痛,毒蛇咬伤,烧、烫伤。

**白八宝** 白景天(拉汉英种子植物名称)

**Hylotelephium pallescens** (Freyn) H. Ohba——*Sedum pallescens* Freyn

生于河边石砾滩及林下草地。分布于东北、华北。

全草: 清热解毒,镇静止痛。

**紫八宝** 紫景天(拉汉英种子植物名称)

**Hylotelephium purpureum** (L.) S. H. Fu——*Sedum telephium* L. var. *purpureum* L.; *S. purpureum* (L.) Schult.

生于海拔 420—1 550 米的山坡草原或林下阴湿山沟边。分布于东北及内蒙古、北京、新疆。

全草(紫景天): 止血,清热解毒,镇痛。用于痈疽疮肿,瘰疬,感冒,风湿痛。

**长药八宝** 石头菜(东北植物检索表),长药景天(拉汉英种子植物名称)

**Hylotelephium spectabile** (Bor.) H. Ohba——*Sedum spectabile* Bor.

生于低山多石干山坡及山顶岩石上。分布于东北及河北、北京、陕西、山东、河南、安徽。

全草: 清热解毒,消肿排脓。

**轮叶八宝** 轮叶景天(通称),一代宗(陕西),楼台还阳、还魂草(安徽),岩三七,胡豆七(湖北)

**Hylotelephium verticillatum** (L.) H. Ohba——*Sedum verticillatum* L.

生于海拔 300—2 900 米的山坡草丛中或沟边阴湿处。分布于吉林、辽宁、河北、北京、山西、陕西、甘肃、宁夏、山东、江苏、安徽、浙江、河南、湖北、贵州、四川。

全草(还魂草): 苦、涩,平。解毒消肿,止痛,止血。用于痈肿疔毒,蛇、虫咬伤,创伤出血。

## 伽蓝菜属　Kalanchoe Adans.

**伽蓝菜**　　鸡爪三七(广东),土三七、鸡脚三七(云南)

**Kalanchoe laciniata** (L.) DC.——*Cotyledon laciniata* L.

多为盆栽观赏植物或野生于石山岩壁上。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、云南。

全草(伽蓝菜): 甘、微苦,凉。清热消肿,散瘀止痛。用于疮疡肿毒,湿疹,毒蛇咬伤,烧、烫伤,外伤出血。

**匙叶伽蓝菜**　白背子草(云南)

**Kalanchoe spathulata** DC.——*Cotyledon spathulata* (DC.) Poir.

生于林下岩石上或溪旁石上。分布于福建、台湾、广东、广西、云南南部、西藏。

全草: 用于目赤肿痛,烧、烫伤。

**洋吊钟**　　肉吊钟、落地生根(广东)

**Kalanchoe verticillata** Elliet

原产非洲马达加斯加。广东广州、佛山、肇庆庭园有栽培。

茎、叶: 酸,凉。清热解毒。用于烧、烫伤,外伤出血,疮疖肿痛。

## 瓦松属　Orostachys Fisch.

**狼爪瓦松**　　辽瓦松、乾滴落(东北)

**Orostachys cartilagineus** A. Bor.

生于低山坡、石质山坡或沙丘。分布于东北及内蒙古、山东。

全草: 酸,平。有毒。止血,止痢,敛疮。用于泻痢,便血,痔疮出血,崩漏,痈肿疮毒。

**塔花瓦松**

**Orostachys chanetii** (Lévl) Berger——*Sedum* chanetii Lévl.

生于海拔 400—1 700 米的山坡岩石上或瓦屋缝中。分布于河北、甘肃、山东、四川。

全草: 止血,活血,敛疮。

**晚红瓦松**　　瓦花、瓦花草(江苏)

**Orostachys erubescens** (Maxim.) Ohwi——*Umbilicus erubescens* Maxim.

生于低山石上或溪沟旁。分布于江苏、上海、安徽、浙江。

全草: 酸,平。清热解毒,止血敛疮。

**瓦松**　　石扣子(陕西),吊吊草(宁夏),瓦花(江苏),瓦莲花(四川),斯琴-额布斯(蒙语)

**Orostachys** fimbriatus (Turcz.) Berger——*Cotyledon fimbriata* Turcz.

生于海拔高达 3 500 米的山坡石上或旧屋瓦缝中。分布于华北及黑龙江、辽宁、陕西、甘肃、宁夏、青海、山东、江苏、上海、安徽、浙江、福建、河南、湖北、四川。

全草: 酸,平。活血、止血,收敛,利湿,消肿。用于便血,吐血; 外用于疮口久不愈合。

**钝叶瓦松**　矛回日-斯琴-额布斯(蒙语)

**Orostachys malacophyllus** (Pall.) Fisch.——*Cotyledon malacophylla* Pall.

生于海拔 1 200—1 800 米的岩石缝中或草地。分布于东北及河北、内蒙古。

全草：止血，止痢，敛疮。

**黄花瓦松**

**Orostachys spinosus** (L.) C. A. Mey.——*Cotyledon spinosa* L.; *Sedum spinosum* (L.) Thunb.

生于海拔 600—2 900 米的干山坡石缝中。分布于东北及内蒙古、甘肃、宁夏、新疆、西藏。

全草：活血止痛，利湿消肿，敛疮。

**小苞瓦松**

**Orostachys thyrsiflorus** Fisch.——*Sedum ppinosum* (L.) Thunb. var. *thyrsiflorus* (Fisch.) Fröd.

生于海拔 1 000—2 100 米的山坡干草原或石质山坡、戈壁沙土丘。分布于甘肃、新疆、西藏。

全草：止血止痢，敛疮。

## 合景天属　Pseudosedum Berger

**白花合景天**　白花假景天(拉汉英种子植物名称)

**Pseudosedum affine** (Schrenk) Berger——*Umbilicus affine* Schrenk; *Sedum albertii* Regel

生于海拔 230—1 600 米的山沟阴坡及山坡石地和沙滩砾石砂土中。分布于新疆塔城、霍城、温泉、博乐。

全草：止血破瘀，镇静，降压。

## 红景天属　Rhodiola L.

**喜冷红景天**　苏罗玛保(藏语)

**Rhodiola algida** (Ledeb.) Fisch. et Mey. var. **jenisense** (Maxim.) S. H. Fu

生于海拔 3 900—4 200 米的高山草甸及灌丛边缘。分布于青海黄南、海北及海西。

根、花：涩，寒。退烧，利肺，止血。用于肺热咳嗽，泄泻，神经麻痹症。

附　注：本种为藏药。

**唐古红景天**

**Rhodiola algida** (Lédeb.) Fisch. et May. var. **tangutica** (Maxim.) S. H. Fu——*Sedum algidum* Lédeb. var. *tanguticum* Maxim.

生于海拔 2 000—4 700 米的高山石缝、潮湿草地或近水边。分布于甘肃、宁夏、青海、四川。

根、茎、花(红景天)：涩，寒。退烧，利肺。用于肺热咳喘，神经麻痹症。

附　注：为藏医常用药。

**西川红景天**

**Rhodiola alsia** (Fröd.) S. H. Fu——*Sedum alsium* Fröd.

生于海拔 3 400—4 800 米的山坡石缝、林缘、灌丛及碎石中。分布于青海玛沁、四川西部。

花、根：涩，寒。清热，利肺，活血，止血。

**小丛红景天**　　凤尾草(陕西)，香景天(甘肃)，凤尾七(宁夏、四川)、凤凰草(宁夏)

**Rhodiola dumulosa** (Franch.) S. H. Fu——*Sedum dumulosum* Franch.; *S. wulingense* (Nakai) Kitag.

生于海拔 1 600—3 900 米的山坡及山脊石缝中。分布于华北及吉林、陕西、甘肃、宁夏、湖北、四川西北部。

全草(凤尾七)：甘、涩、微苦，温。补肾，明目，养心安神，调经活血。

**大花红景天**　　(宽瓣红景天)

**Rhodiola euryphylla** (Fröd.) S. H. Fu——*S. euryphyllum* Fröd.; *R. crenulata* (Hook. f. et Thoms.) H. Ohba

生于海拔 2 800—5 600 米的山坡草地、灌丛、石缝中。分布于青海、四川西部、云南西北部、西藏。

花、根：甘、涩，寒。清热退烧，利肺。

**长鞭红景天**

**Rhodiola fastigiata** (Hook. f. et Thoms.) S. H. Fu——*Sedum fastigiatum* Hook. f. et Thoms.

生于海拔 2 500—5 400 米的山坡石上及高山碎石带。分布于青海、四川、云南、西藏。

全草：祛痰，消肿。用于跌打损伤。

**长鳞红景天**

**Rhodiola gelida** Schrenk——*Sedum gelidum* (Schrenk) Kar. et Kir.

生于海拔 2 870—4 180 米的山坡草地、阳坡石缝或岩石上。分布于天山。

根：清热润肺。

**豌豆七**　　还阳参、接骨丹(陕西)，岩活阳(湖北)，接骨七(四川)，血三七、玉蝴蝶(云南)

**Rhodiola henryi** (Diels) S. H. Fu——*Sedum henryi* Diels; *S. yunnanense* Franch. var. *henryi* (Diels) Hamet.

生于海拔 1 000—3 300 米的山坡沟边、山地林下岩石上或石隙中。分布于陕西、甘肃、河南、湖北、四川、贵州。

带根全草(白三七)：苦、涩，平。理气，活血，接骨止痛，解毒消肿，止泻。用于痢疾，泄泻，跌打损伤，风湿痛，疮痈。

**异齿红景天**

**Rhodiola heterodonta** (Hook. f. et Thoms.) A. Bor.——*Sedum heterodontum* Hook. f. et Thoms.

生于海拔 2 800—4 700 米的山坡沟边、高山石质坡地及石缝中。分布于新疆、西藏。

根：清热解毒，祛风湿，止血。

**狭叶红景天**　石菜兰、九莲花(陕西)，涩疙瘩(甘肃)，狮子七(云南)

**Rhodiola kirilowii** (Regel) Regel.——*Sedum kirilowii* Regel; *R. longicaulis* (Praeg.) S. H. Fu

生于海拔 2 000—5 600 米的山地多湿草地或山坡岩石缝中。分布于河北、北京、山西、陕西、甘肃、青海、新疆、四川、云南、西藏。

根及根状茎(红景天)：涩，温。止血，止痛，破坚，消积，止泻。用于跌打损伤，腰痛，吐血，崩漏，月经不调，痢疾。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版附录收载。

**四裂红景天**

**Rhodiola quadrifida** (Pall.) Fisch. et Mey.——*Sedum quadrifidum* Pall.; *R. coccinea* (Royle) A. Bor.

生于海拔 2 900—5 100 米的高山石缝中或沟边。分布于甘肃、青海、新疆、四川、西藏。

根、花：涩，寒。清热退烧，利肺。

**库页红景天**　红景天、高山红景天(长白山植物药志)

**Rhodiola sachalinensis** A. Bor.——*Sedum sachalinense* (A. Bor.) Vorosh

生于海拔 1 600—2 500 米的山坡林下、碎石山坡及高山冻原。分布于黑龙江尚志、宁安、海林、吉林抚松、安图。

全草：滋补强壮，降压，安神。

**圣地红景天**　全瓣红景天(拉汉英种子植物名称)

**Rhodiola sacra** (Prain ex Hamet) S. H. Fu——*Sedum linearifolium* Royle var. *sacrum* (Prain ex Hamet) Hamet

生于海拔 2 700—4 600 米的山坡石缝、农田边石隙或草地。分布于云南西北部、西藏。

根状茎、全草(扫罗玛尔布)：活血，止血，清肺止咳，解毒，消肿。

**糙红景天**　雪松(云南)，糙红景天(拉汉种子植物名称)

**Rhodiola scabrida**(Franch.) S. H. Fu——*Sedum scabridum* Franch.

生于海拔 3 200—4 760 米的山坡崖石缝中。分布于四川西部、云南西北部。

茎：补气血。

**粗茎红景天**

**Rhodiola wallichiana** (Hook.) S. H. Fu——*Sedum wallichianum* Hook.

生于海拔 2 600—3 800 米的山坡林下石上。分布于云南西北部、西藏东南部。

根：用于跌打损伤，风湿腰痛，吐血，血崩，痢疾。

**大株粗茎红景天**　大株红景天(植物分类学报)

**Rhodiola wallichiana** (Hook.) S. H. Fu var. **cholaensis** (Praeg.) S. H. Fu——*Sedum crassipes* Wall. ex Hook. f. et Thoms. var. *cholaense* Praeg.

生于高山坡及山脊石缝中。分布于青海、云南西北部。

根及根状茎(尕都尔)：清热，退烧，活血散瘀，止血，止痛，止泻。用于肺炎，吐血，泄泻，血崩，跌打损伤，风湿腰痛。

附　注：为藏医常用药。

**云南红景天**　豌豆七、白三七(湖北)，胡豆七(四川)，三台观音，铁角莲(云南)

**Rhodiola yunnanensis** (Franch.) S. H. Fu——*Sedum yunnanense* Franch.

生于海拔 2 000—4 000 米的山坡林下及山坡湿地草丛中。分布于西南及湖北西部。

带根全草(还魂草)：苦、涩，凉。清热解毒，散瘀止血，消肿。用于疮痈，跌打损伤，泄泻。

附　注：**倒披针叶红景天 R. yunnanensis** (Franch.) S. H. Fu var. **oblanceolata** (Fröd.) S. H. Fu，全草用于风湿骨痛，乳痈。

## 费菜属　Sedum L.

**费菜**　景天三七(通称)，田三七(广西)，大三七(四川)，大马菜、土三七(江苏)

**Sedum aizoon** L.——*S. pseudo-aizoon* Debeaux

生于岩石、山谷、山坡或山沟。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、青海、山东、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北、四川、贵州。

全草(景天三七)：甘、微酸，平。散瘀止血，安神镇痛。用于吐血，衄血，牙龈出血，便血，崩漏；外用于跌打损伤，外伤出血，烧、烫伤。

**乳毛费菜**

**Sedum aizoon** L. var. **scabrum** Maxim.

生于海拔 3 600 米以下的石山坡草地、山地岩石上或灌丛中。分布于河北、内蒙古、陕西、甘肃、宁夏、青海。

带根全草：酸，平。活血止血，宁心，利湿，消肿解毒。

**东南佛甲草**　石上老鼠耳、石上瓜子菜(广东)，石板菜(改订植物名汇)

**Sedum alfredii** Hance——*S. formosanum* N. E. Br

生于海拔 500—3 000 米的山坡阴湿石缝中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

全草：清热凉血，消肿拔毒。用于口疮，肝炎，毒蛇咬伤，烫伤。

**苞叶景天**　一朵云(陕西)，水生还阳草、亮杆草(湖北)，灯笼草(四川)

**Sedum amplibracteatum** K. T. Fu——*S. bracteatum* Diels

生于海拔 1 100—2 800 米的山地林下阴湿处或沟边。分布于陕西、甘肃、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

全草：散寒理气，接骨，解毒。用于烧、烫伤，蛇咬伤，跌打损伤。

**珠芽景天**　马屎花(江苏、安徽)，水三七(湖北)

**Sedum bulbiferum** Makino——*S. alfredii* Hance var. *bulbiferum* (Makino) Fröd.

生于海拔 1 000 米以下的低山平地树阴下或路边草丛、田野及园圃阴湿处。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖北、湖南、四川、广西。

全草(小箭草): 辛、涩,温。散寒,理气,止痛,消肿,止血,截疟。用于食积腹痛,风湿瘫痪,外用于痈肿疮毒。

**隐匿景天**　隐匿山景天(拉汉英种子植物名称)

**Sedum celatum** Fröd.——*S. wuianum* Hao

生于海拔 2 900—4 000 米的干山坡或山坡岩石上。分布于甘肃南部夏河、卓尼、临夏,青海东部泽库、兴海、同仁。

全草: 杀虫,蚀疣。

**大叶火焰草**　龙鳞草、毛舌辣草(广西)

**Sedum drymarioides** Hance——*S. drymarioides* Hance var. *genuinum* Hamet

生于海拔 940 米以下低山阴湿岩石上。分布于中南及安徽、浙江、福建、台湾、江西。

全草(光板猫叶草): 苦,平。清热凉血,消肿解毒。用于吐血,咳血。

**细叶景天**　半边莲、小鹅儿肠(陕西),灯台草、崖松(湖北)

**Sedum elatinoides** Franch.——*S. silvestrii* Pamp.

生于海拔 400—3 400 米的山坡石缝中。分布于山西、陕西、甘肃文县、河南、湖北、四川、贵州、云南西北部。

全草(崖松): 酸、涩,寒。清热解毒,止痢。用于痢疾,瘰疬,小儿丹毒,蛇咬伤。

**凹叶佛甲草**　马牙半枝莲(江苏),豆瓣菜(安徽),山马齿苋(湖北),打不死,水辣椒(广西),六月雪(四川),九月寒(云南)

**Sedum emarginatum** Migo——*S. makinoi* Maxim. var. *emarginatum* (Migo) S. H. Fu

生于海拔 400—1 800 米的阴湿山坡岩石上。分布于陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

全草(马牙半枝莲): 微酸,凉。清热解毒,止血,止痛,利湿。用于痢疾,疮毒,瘰疬,肝炎,跌打损伤,吐血,衄血,崩漏,带下病;外用于痈疮疔毒,缠腰火丹。

附　注: 功效相同的有**圆叶佛甲草 S. makinoi** Maxim.,分布于安徽、浙江、贵州。

**小山飘风**　豆瓣还阳(湖北)

**Sedum filipes** Hemsl.

生于海拔 400—2 000 米的山坡林下或山沟阴湿处。分布于陕西、江苏、浙江、河南、湖北、四川、云南。

全草(小山飘风): 清热凉血。用于痢疾。

**杂交景天**　杂种景天(经济植物手册)

**Sedum hybridum** L.

生于海拔 1 400—2 500 米的山坡石缝中或旱山坡上。分布于新疆霍城至阜康、北至福海。

全草: 清热解毒,祛风湿,止血。

**日本景天**　指甲草(湖北)

**Sedum japonicum** Sieb. ex Miq.——*S. chrysastrum* Hance

生于海拔 1 000 米以下的山坡阴湿处及山地石缝中。分布于安徽、浙江、江西、福建、

台湾、湖北、湖南、广东、贵州。

全草：消肿止血，祛湿热，抗癌。

**堪察加景天**　金不换(北京植物志)

**Sedum kamtschaticum** Fisch.——*S. aizoon* L. subsp. *kamtschaticum* (Fisch.) Fröd.

生于海拔600—1 800米的多石山坡及高山流石带。分布于华北及吉林、青海湟源。

带根全草：甘、微酸，平。清热利肺，活血止血，镇静止痛。用于吐血，衄血，牙龈出血，便血，崩漏；外用于跌打损伤，外伤出血，烧、烫伤。

**白果佛甲草**　黄花岩松(云南)

**Sedum leucocarpum** Franch.

生于海拔1 800—2 800米的石旁。分布于四川西南部、云南西北部。

全草：辛，平。清热解毒。用于中耳炎，肝炎，烧、烫伤。

**佛甲草**　狗牙菜(陕西)，晒不死(宁夏)，鼠牙半枝莲、地蜈蚣(江苏)，午时花(安徽)，麻雀舌(广西)，豆瓣草(四川)

**Sedum lineare** Thunb.——*S. obtuso-lineare* Hayata

生于低山岩石上或沟边湿地，各地亦有栽培。分布于华东中南及陕西、甘肃、宁夏、四川、贵州、云南。

全草：甘、微酸，凉。清热解毒，消肿排脓，止痛，退黄。用于咽喉痛，肝炎、痈肿疮毒，毒蛇咬伤，缠腰火丹，烧、烫伤。

**山飘风**　半边莲(陕西)，岩豆瓣菜、豆瓣七(湖北)

**Sedum major** (Hemsl.) Migo——*S. filipes* Hemsl. var. *major* Hemsl.

生于海拔1 000—4 300米的山坡林下或山谷路边岩石上。分布于西南及陕西、河南、湖北。

全草(半边莲)：酸、涩，寒。清热解毒。用于外伤肿痛，跌打损伤，疔疮，衄血。

**吉林费菜**　岩景天、狗景天(吉林)

**Sedum middendorfianum** Maxim.——*S. middendorffianum* Maxim. var. *diffusum* Praeg.

生于海拔300—940米的山地林下岩石上。分布于吉林、辽宁。

带根全草(吉林景天)：散瘀止血，安神镇痛，生津止咳，祛风清热。

**多茎景天**　石花、石根、岩如意，九头狮子草(云南)

**Sedum multicaule** Wall. ex Lindl.——*S. mekongense* Praeg.

生于海拔1 300—3 500米的山坡林下石上。分布于西南及陕西、甘肃。

全草(佛甲草)：甘、微辛，凉。清热解毒，止血，祛风湿，降压。用于咽喉痛，乳蛾、口疮，目翳，高血压症，风热头痛，风湿关节痛；外用于湿疹，疮毒。

**齿叶费菜**　六月还阳(湖北)，打不死(四川)，天簪七(贵州植物志)

**Sedum odontophyllum** Fröd.

生于海拔300—1 200米的山坡阴湿石上。分布于湖北、四川、贵州。

全草：酸，凉。活血散瘀，止血，消肿，止痛。用于跌打损伤，骨折扭伤，肝炎，劳伤咳嗽，衄血；外用于痈肿疮毒。

**薛状景天**　　柳叶景天(东北植物检索表),薛状佛甲草(拉汉英种子植物名称)

**Sedum polytrichoides** Hemsl.

生于海拔 1 000 米左右的山坡石上或栽培。分布于东北及陕西、山东、安徽、浙江、江西、河南、贵州。

根：清热解毒,止血。用于咯血。

**高原山景天**

**Sedum przewalskii** Maxim.

生于海拔 2 400—5 400 米的高山坡干草地或岩石上。分布于甘肃、青海、四川、云南、西藏。

带根全草：清热利肺,活血止血。

**阔叶景天**

**Sedum roborowskii** Maxim.

生于海拔 2 200—4 500 米的山坡林下阴蔽处或岩石上。分布于甘肃中部及西南部、宁夏中部、青海南部及东部、西藏南部。

全草：活血,止血,敛疮。

**南川景天**

**Sedum rostornianum** Diels

生于海拔 1 500 米以下的山坡草丛中。分布于湖北鹤峰、竹山，四川南川、巫山至城口。

全草：用于咽喉痛,溃疡,痢疾,便血。

**垂盆草**　　鼠牙半枝莲(河北),肝炎草(山东),狗牙半枝莲(江苏),土三七(广东),瓜子莲(广西)

**Sedum sarmentosum** Bunge——*S. sarmentosum* Bunge f. *major* Diels

生于海拔 500—1 600 米的山坡向阳处或石上,亦有栽培。分布于华东及吉林、辽宁、河北、山西、陕西、甘肃、河南、湖北、湖南、四川、贵州。

全草：甘、微酸、凉。清热解毒,消肿排脓,退黄。用于咽喉痛,口疮,黄疸,痢疾;外用于烧、烫伤,痈疮疔毒,缠腰火丹,蛇咬伤。

**火焰草**　　石豆瓣、毛狗(湖北),火焰山景天(拉汉英种子植物名称)

**Sedum stellariaefolium** Franch.——*S. drymarioides* Hance var. *stellariaefolium* (Franch.) Hamet

生于海拔 400—3 400 米的山坡、山谷或石缝中。分布于辽宁、河北、山西、陕西、甘肃、山东、浙江、福建、台湾、河南、湖北、湖南西部、四川、贵州、云南。

全草(光板猫叶草)：苦,平。清热凉血,消肿解毒。用于风湿关节痛,黄疸,疟疾，肺痨,水肿。

**四芒苞景天**　　石上开花(安徽)

**Sedum tetractinum** Fröd.

生于海拔 700—1 000 米的溪边石上近水处。分布于安徽、浙江、江西、广东、贵州。

全草：淡,平。清热凉血,补虚。用于妇女虚弱不育,痔疮出血。

**汶川景天**

**Sedum wenchuanense** S. H. Fu

生于海拔 1 350 米左右的山坡林下或灌丛中。分布于四川汶川、阿坝。

全草：清热，凉血，止血。

附　注：四川特有药用植物。

## 石莲属　Sinocrassula Berger

**石莲**　梅花狗牙瓣、景天还阳(湖北)，石山莲、土三七(广西)，岩松(云南)

**Sinocrassula indica** (Decne.) Berger——*Crassula indica* Decne.

生于海拔 400—3 300 米的山坡岩石上或草丛中。分布于西南及陕西、甘肃、湖北、湖南、广西。

全草(石莲)：酸，平。有毒。清热，活血散瘀，祛伤止痛。用于头晕，头痛，肝炎，乳痈，月经不调，中耳炎，跌打损伤，痢疾，咽喉痛，崩漏，便血；外用于疮疡久不收口，烧、烫伤。

**绿花石莲**　石灯台(陕西)

**Sinocrassula indica** (Decne.) Berger var. **viridiflora** K. T. Fu

生于海拔 500—1 200 米的河岸及山坡岩石上。分布于陕西南部、四川。

全草(石灯台)：苦、酸，凉。清热解毒。

**云南石莲**　把岩香(云南)

**Sinocrassula yunnanensis** (Franch.) Berger——*Crassura yunnanensis* Franch.

生于海拔 2 500 米左右的山地岩石上。分布于云南迪庆州、大理。

根：苦、辛，温。有小毒。活血通络，止痛，祛痰。

附　注：云南特有药用植物。

# 65. 虎耳草科　Saxifragaceae

## 落新妇属　Astilbe Buch.-Ham.

**华南落新妇**　水升麻、水红柳(广西)，马尾参、山花七(贵州)，水高粱(云南)

**Astilbe austrosinensis** Hand.-Mazz.

生于山地灌丛及阴湿沟边草丛中。分布于长江流域以南各省区。

根状茎(红升麻)：辛、苦，温。散瘀止痛，祛风除湿。用于跌打损伤，腰腿痛，骨折，风湿骨痛，胃痛，毒蛇咬伤。全草：清热，止咳。用于风热感冒，头痛，全身酸痛。

附　注：湖北部分地区将本种的根状茎充升麻用，系伪品。

**落新妇**　金毛七(陕西)，红三七(江西)，金毛三七、红升麻(湖南)，水三七、水升麻(广西)，金尾蟾(贵州)

**Astilbe chinensis** (Maxim.) Franch. et Sav. ——*Hoteia chinensis* Maxim.

生于山谷溪边、林缘及路边草丛中。全国大部分地区均有分布。

根状茎(落新妇根)：苦、涩，温。祛风除湿，强筋壮骨，活血祛瘀，止痛，镇咳。用于筋

骨痛，头痛，跌打损伤，毒蛇咬伤，咳嗽，小儿惊风，术后痛，胃痛，泄泻。

附　注：① 湖北部分地区将本种的根状茎充升麻用。② 功效相同的有**朝鲜落新妇 A. koreana** Nakai，分布于吉林、辽宁。

**北红升麻**　　三七(云南)

**Astilba davidii** (Franch.) Henry——*A. chinensis* (Maxim.) Franch. et Sav. var. *davidii* Franch.

生于海拔 1 400 米左右的溪边。分布于云南。

全草：祛风，清热。

附　注：云南特有药用植物。

**大叶落新妇**　　红升麻(湖北)，野红稗、大澹疙瘩(贵州)，毛头寒药(云南)

**Astilbe grandis** Stapf ex Wils.

生于山地林下阴湿处及路旁草丛中。分布于山东、安徽、浙江、江西、河南、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

根状茎：散瘀止痛，祛痰止咳。用于筋骨酸痛，跌打损伤，胃痛，咳嗽，久泻，麻疹，崩漏，带下病。

附　注：湖北部分地区用本种的根状茎充升麻用。

**多花落新妇**　　金毛七(陕西、湖北)，铁杆升麻(陕西)

**Astilbe myriantha** Diels

生于海拔 1 100—3 500 米的山坡林下、林缘、灌丛及山谷沟边。分布于陕西、甘肃、河南、湖北、四川、西藏。

根状茎(金毛七)：辛、微涩，平。祛风，发表，镇痛。用于伤风感冒，头痛。

**溪畔落新妇**　　野高粱、红升麻(云南)

**Astilbe rivularis** Buch.-Ham.

生于海拔 1 700—2 500 米的山谷水边或潮湿地。分布于云南、西藏樟木。

全草(野高粱)：涩，温。活血散瘀，祛风除湿，行气止痛。用于跌打损伤，风湿痛，胃痛，黄水疮。

**红花升麻**

**Astilbe rubra** Hook. f. et Thoms. ex Hook.

生于海拔 2 400—3 000 米的山坡、溪边及针阔叶混交林下。分布于云南。

根：舒筋活络。

**西南落新妇**

**Astilbe thunbergii** Miq.

生于山坡林下。分布于西南。

根：用于跌打损伤，阳痿。

## 大叶子属　Astilboides Engl.

**大叶子**　　山荷叶、大脖梗子、佛爷伞(东北)

**Astilboides tabularis** (Hemsl.) Engl.——*Saxifraga tabularis* Hemsl.

生于山地林下或山谷沟边。分布于吉林、辽宁。

全株：收涩，固肠止泻。用于泄泻。

## 岩白菜属　Bergenia Moench

**厚叶岩白菜**

**Bergenia crassifolia** (L.) Fritsch

生于高山草地、阴湿石缝和山坡。分布于新疆。阿尔泰山区也有分布。

根状茎：用于痢疾，泄泻。全草：滋补，壮阳，敛肺。

**岩白菜**　石蚕、岩菖蒲(贵州)，岩壁菜、雪头开花、石山菖蒲(云南)

**Bergenia purpurascens** (Hook. f. et Thoms.) Engl.——*Saxifraga purpurascens* Hook. f. et Thoms.

生于海拔2 000--4 500米的林下阴湿处、亚高山草甸和石隙。分布于四川西南部、贵州、云南北部、西藏。

全草(岩白菜)、根状茎：辛、甘，平。润肺止咳，清热解毒，止血，止泻，调经。用于肺痨咳嗽，咯血，衄血，便血，崩漏，带下病，泄泻，痢疾，劳伤；外用于黄水疮。

**秦岭岩白菜**　盘龙七(陕西)

**Bergenia scopulosa** T. P. Wang

生于海拔2 500—2 800米的峭壁石崖缝隙中。分布于陕西中部。

根状茎：涩、微苦，平。补脾健胃，收敛固肠，除湿利水，活血。用于吐泻，痢疾，崩漏，带下病，黄水疮。

## 草绣球属　Cardiandra Sieb. et Zucc.

**草绣球**　牡丹三七(浙江、江西)，紫阳花(江西)，岩绣球(湖北)，人心药（中国高等植物图鉴）

**Cardiandra moellendorffii** (Hance) Li——*Hydrangea moellendorffii* Hance; *C. alternifolia* Sieb. et Zucc. var. *moellendorffii* Engl.; *C. sinensis* Hemsl.

生于林下水沟旁土质肥沃而阴湿的砂壤土中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、河南、湖南、广西、贵州。

根状茎(草绣球)：苦，微温。活血祛瘀。用于跌打损伤，痔疮出血。

## 金腰属　Chrysosplenium L.

**金腰**　金腰子(长白山植物药志)

**Chrysosplenium alternifolium** L.

生于山脚、路边及阴湿地。分布于东北。

全草：用于小便淋痛，阴挺，咳嗽，黄疸，出血。

**互叶金腰**

**Chrysosplenium alternifolium** L. var. **sibiricum** Seringe ex DC.

生于山坡湿地或石崖阴蔽处。分布于东北及河北、山西、青海。

全草：苦，寒。泻湿热，退黄疸。用于黄疸，小便淋痛，阴挺，出血。

**长梗金腰**

**Chrysosplenium axillare** Maxim.

生于高山石崖阴湿处。分布于陕西、甘肃、新疆、四川。

全草：清热解表，祛痰止咳。

**绣毛金腰**

**Chrysosplenium davidianum** Decne. ex Maxim.

生于海拔 1 800—3 600 米的山地针叶林、针阔混交林中或沟边。分布于四川西部、贵州、云南西北部。

全草：清热解毒。

**肾萼金腰**

**Chrysosplenium delavayi** Franch.

生于山地溪边或石缝中。分布于台湾、湖南、广西北部、四川、贵州、云南。

全草：清热解毒，生肌。用于小儿惊风，痈疮肿毒，烧、烫伤，民间尚用于癌肿。

**肾叶金腰**

**Chrysosplenium griffithii** Hook. f. et Thoms.

生于海拔 2 500—4 100 米的山地石崖阴处。分布于陕西、甘肃、青海、新疆、四川、云南、西藏。

全草：苦，寒。清热，泻下，利胆。

**蛛叶金腰**　　野包耳菜(湖北)

**Chrysosplenium henryi** Franch.

生于山地林中、阴湿沟边或岩石上。分布于湖北西部、湖南西部、四川、贵州东北部、云南东北部。

全草：微苦，凉。清热解毒，消肿，祛风。用于风热感冒，小儿惊风，疔疮肿毒。

**日本金腰**

**Chrysosplenium japonicum** (Maxim.) Makino——*Chrysosplenium japonicum* Maxim.

生于山坡林下。分布于吉林。

全草：清热解毒，祛风解表，用于疔疮。

**绵毛金腰**　　红地棉(湖北)

**Chrysosplenium lanuginosum** Hook. f.

生于海拔 2 000—3 800 米的山地树林中或竹林下。分布于湖北、四川、云南、西藏。

全草：用于劳伤，跌打损伤，退黄疸。

**大叶金腰**　　虎皮草(陕西)，马耳朵草、龙舌草(浙江)，肺心草(湖北)，大虎耳草(贵州)

**Chrysosplenium macrophyllum** Oliv.

生于阴湿山地林下、溪边、山谷溪涧旁石隙中及岩石上。分布于陕西南部、安徽南部、

浙江西北部、江西、福建、河南、湖北、湖南、广东北部、四川、贵州、云南。

全草(虎皮草): 苦,涩,寒。清热解毒,平肝,收敛生肌。用于小儿惊风,臁疮,烧、烫伤。

**滇黔金腰** 明镜草(云南)

**Chrysosplenium nepalense** D. Don var. **cavaleriei** (Lévl. et Vant.) Hara —— *C. cavaleriei* Lévl. et Vant.

生于海拔 1 900—2 300 米的潮湿林下。分布于贵州、云南。

全草: 苦,寒。清热泻火,解毒。

**裸茎金腰** 亚吉玛(藏名)

**Chrysosplenium nudicaule** Bunge

生于高山带河边阴湿处或碎石带。分布于甘肃、青海、新疆、云南、西藏。

全草: 苦,寒。泻湿热,退黄疸。用于黄疸,吐黄水。

**异叶金腰**

**Chrysosplenium pseudofauriei** Lévl.

生于山地溪边或林中。分布于东北及河北、河南、贵州。

全草: 解表发汗。用于喘咳。

**矮小猫眼草**

**Chrysosplenium pumium** Franch.

生于山地林下。分布于贵州、云南。

全草: 清热解毒,抗癌。

**中华金腰** 华金腰子(陕西),金腰子(宁夏),金钱苦叶草、猫眼草(浙江)

**Chrysosplenium sinicum** Maxim.

生于海拔 750—3 350 米的河边湿地或山地树林中。分布于吉林、山西西部、陕西、甘肃、宁夏、青海、浙江西北部、河南、湖北西部、四川西北部。

全草(华金腰子): 苦,寒。清热解毒,退黄,排石。用于黄疸,砂淋,石淋,小便短赤疼痛,疔疮。

**单花金腰**

**Chrysosplenium uniflorum** Maxim.

生于海拔 2 400—4 100 米的山地冷杉林或刺柏林下阴湿处。分布于陕西、甘肃、青海、四川、云南、西藏。

全草: 苦,平。行气化痰。止咳定喘。

## 赤壁草属 Decumaria L.

**赤壁草**

**Decumaria sinensis** Oliv.

生于湿润的石壁或沟边林下。分布于陕西南部、河南西部、湖北、四川、贵州北部。

叶: 消肿,止血。全草: 祛风湿,强筋骨。

## 银梅草属　Deinanthe Maxim.

**叉叶蓝**　　银梅草、四块瓦(湖北)

**Deinanthe caerulea** Stapf

生于山谷沟边、林下或阴湿坡地。分布于湖北神农架。

根状茎：活血散瘀，止痛。

附　注：湖北特有药用植物。

## 溲疏属　Deutzia Thunb.

**异色溲疏**

**Deutzia discolor** Hemsl.

生于海拔 1 300—3 300 米的山地林缘。分布于陕西、河南、湖北、四川、贵州、云南。

根、叶：退热解毒，活血止血，催吐，利尿。

**无毛溲疏**　　崂山溲疏(山东)

**Deutzia glabrata** Kom.

生于山地林缘或林中。分布于东北及山东东部、河南。

全株：清热利尿，下气。

**黄山溲疏**

**Deitzia glauca** Cheng

生于海拔 600—1 200 米的山地。分布于安徽、浙江。

根、叶：苦，寒。清热解毒，利尿，截疟，接骨。

**大花溲疏**

**Deutzia grandiflora** Bunge

生于丘陵或低山山坡灌丛中。分布于华北及辽东、陕西、甘肃、山东、河南、湖北、四川。

果实：清热利尿，下气。

**粉背溲疏**

**Deutzia hypoglauca** Rehd.

生于山地林缘或林中。分布于东北及陕西、甘肃、山东、湖南、湖北、四川、云南。

枝、叶：清热利尿，除烦。

**多花溲疏**

**Deutzia micrantha** Engl.

生于山地林下。分布于山西、陕西、河南。

叶、根：退热，利尿。

**宁波溲疏**　　空心副常山、细叶空心柴(浙江)，观音竹(湖北)

**Deutzia ningpoensis** Rehd.

生于山坡林缘、杂木林中或空旷山坡及岩石旁。分布于安徽、浙江、江西、福建。

根及叶：辛，寒。清热解毒，截疟，利尿，接骨。用于感冒发热，小便淋痛，疟疾，骨折，疥疮。

**小花溲疏**

**Deutzia parviflora** Bunge

生于山地林边或林下灌丛中。分布于东北及河北。

茎皮：用于感冒，咳嗽。

附　注：功效相同的有**东北溲疏 D. amurensis** (Regel) Airy-Shaw，分布于东北。

**溲疏**　　野茉莉(湖北)

**Deutzia scabra** Thunb.

生于山地沟边、山脚及山坡灌丛中。分布于华东及河南、湖北、贵州。

全株(溲疏)：辛，寒。有毒。用于胃痛，遗尿，疟疾，疥疮，关节痛，骨折。民间用作退热剂。

**川溲疏**　　鹅毛通(湖南)

**Deutzia setchuenensis** Franch.

生于山地灌丛中。分布于江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

枝、叶：化食，利尿，除胃热，活血镇痛。

根：补肝肾，止遗尿。

## 黄常山属　Dichroa Lour.

**大明山常山**

**Dichroa damingshanensis** Y. C. Wu

生于山坡或疏林中。分布于广西。

根、叶：用于风湿痹痛。

附　注：广西特有药用植物。

**常山**　　鸡骨常山、南常山(江西、贵州)，甜茶(福建)，摆子药(贵州)，黄常山(福建药物志)

**Dichroa febrifuga** Lour.

生于林下，路旁或溪边。分布于长江流域以南各省区及陕西南部、甘肃南部，河南。

根(常山)：辛、苦，寒。有小毒。截疟，解热，催吐，祛痰。用于疟疾，痰饮停积，感冒。

附　注：①体虚者及孕妇慎用。②《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**罗蒙常山**　　人骨风(广西)

**Dichroa yaoshanensis** Y. C. Wu

生于林下阴湿处。分布于湖南东南部、广东北部、广西东部。

根：用于风湿骨痛，产后风。

## 绣球属　Hydrangea L.

**伞形绣球**　　土常山(浙江、福建),甜茶(浙江),窄瓣绣球(拉汉英种子植物名称)

**Hydrangea angustipetala** Hayata——*H. umbellata* Rehd.

生于山坡疏林、路旁草丛及溪流两岸。分布于安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西。

根(土常山)、叶(甜茶):辛、酸,凉。有小毒。解毒,祛痰,截疟。用于疟疾,胸腹胀满,瘰疬,肝炎;外用于癣癞。叶:用于消渴,高血压症。

**冠盖绣球**

**Hydrangea anomala** D. Don

生于山谷、溪边或林下。分布于西南及陕西、甘肃、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广西。

叶:清热,抗疟。用于疟疾,胸腹胀满;外用于皮肤疥癣。根:辛、酸,凉。小毒。祛痰,截疟,解毒,活血散瘀。

**马桑绣球**

**Hydrangea aspera** D. Don

生于阔叶林下。分布于中南、西南。

根:消食积,清热解毒;外用于癣疥。

**中国绣球**　　脱皮龙(广西),粉团花(贵州)

**Hydrangea chinensis** Maxim.

生于溪边或林下。分布于华东及湖南、广东、广西、贵州、云南。

根:利尿,抗疟,祛瘀止痛,活血生新。用于跌打损伤,骨折。全株:用于肺痨。

根、叶:用于麻疹。

**西南绣球**

**Hydrangea davidii** Franch.

生于山坡灌丛下。分布于广西、四川、贵州、云南。

根、叶(马边绣球):用于疟疾。茎髓:用于麻疹,小便淋痛。

**白背绣球**　　光皮树(湖北)

**Hydrangea hypoglauca** Rehd.

生于海拔1 200—2 500米的山坡、沟谷灌丛中。分布于湖北西部。

根:除风痰,截疟。

附　注:湖北特有药用植物。

**临桂绣球**

**Hydrangea linkweiensis** Chun

生于山坡林下。分布于广西、贵州。

根:止咳,抗疟,接骨。

**长柄绣球**

**Hydrangea longipes** Franch.

生于阴湿沟谷及路旁。分布于陕西、甘肃、河南、湖北、湖南、四川、贵州。

根、叶：清热解毒，除湿退黄。

**大枝绣球**　鸡骨头(陕西)，土常山、脱皮常山(湖北)

**Hydrangea longipes** Franch. var. **rosthornii** (Diels) W. T. Wang ——*H. rosthornii* Diels

生于湿润的山谷溪流岸边、路旁草地或林下。分布于陕西、甘肃、河南、湖北、广西、四川、贵州、云南。

根、叶、花：苦、涩，温。清热解毒，除湿退黄，止痛，凉血止血，截疟。用于疟疾，心热惊悸。

附　注：叶功效相同的有**柳叶绣球 H. stenophylla** Merr. et Chun。

**绣球花**　雪球花、七变球(福建)

**Hydrangea macrophylla** (Thunb.) Ser. ex DC. f. **hortensia** Wils. ——*Viburnum macrophylla* Thunb.

全国各地林园及庭院常有栽培。

根(八仙花根)、叶、花：苦、微辛，寒。有小毒。清热，截疟，杀虫。花、叶：用于疟疾，心悸烦燥。根：用于喉痹胸闷，阴囊湿疹。叶：用于头晕。

**圆锥绣球**　粉团花(湖北)，土常山(云南)

**Hydrangea paniculata** Sieb.

生于山谷溪边、湿地及林缘灌丛中。分布于安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、贵州、云南。

花：祛湿，破血。全株：清热，抗疟。根：截疟退热，消积和中。用于咽喉痛，疟疾，食积不化，胸腹胀满，骨折。

**粗壮绣球**

**Hydrangea robusta** Hook. f. et Thoms.

生于林下或灌丛中。分布于西南及台湾、河南、湖北、湖南。

叶：清热抗疟。

**腊莲绣球**　土常山(陕西)，狗骨常山(湖北)，鸡跨裤(贵州)

**Hydrangea strigosa** Rehd. ——*H. aspera* D. Don subsp. *strigosa* (Rehd.) McClintock

生于低山溪边及林缘。分布于陕西、甘肃、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根(土常山)：辛、酸，凉。有小毒。消食积，涤痰结，解热毒，截疟退热。用于瘰疬，疟疾，疥癣。

附　注：① 湖北部分地区将本品的根充常山用。② 功效相同的有**阔叶腊莲绣球 H. strigosa** Rehd. var. **macrophylla** Rehd.，分布于湖北。

**柔毛绣球**　踏地消、土常山(湖北)

**Hydrangea villosa** Rehd.

生于山坡路旁疏林中。分布于陕西、浙江、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

全株：用于外伤出血，疝气，乳痈，烧、烫伤，风湿痛，带下病。根：抗疟。

**挂苦绣球**　六娥戏珠(陕西)

**Hydrangea xanthoneura** Diels

生于山地灌丛中或荒地上。分布于陕西、甘肃、宁夏、河南、湖北、四川、贵州、云南。

根：辛，温。活血祛瘀，续筋接骨。外用于骨折。枝：外用于刀、斧伤。花、叶、根：用于疟疾。

## 鼠刺属　Itea L.

**秀丽鼠刺**

**Itea amoena** Chun

生于林下或林缘。分布于广西。

根、叶：外用于风湿痛。

附　注：广西特有药用植物。

**鼠刺**　鸡嘴果、硬翻桃(广西)

**Itea chinensis** Hook. et Arn.

生于山坡林下或灌丛中。分布于广东、广西、云南。

根、叶：苦，温。活血消肿，止痛。用于风湿痛，跌打肿痛。根、花：滋补强壮。

**矩叶鼠刺**　鸡骨柴、银牙莲、牛皮桐(浙江)，糯米树、青皮柴(福建)

**Itea chinensis** Hook. et Arn. var. **oblonga** (Hand.-Mazz.) Wu ——*I. oblonga* Hand. -Mazz.

生于山坡杂木林中、溪边、山坡裸岩旁或林缘路边。分布于安徽南部至四川以南各省区。

根、叶、花：苦，温。滋补强壮，止咳，消肿，接骨。根：用于体虚，劳伤乏力，咳嗽，咽喉痛，跌打损伤，骨折，带下病，产后关节痛，腰痛。叶：用于外伤出血。花：用于咽喉痛。

附　注：根、花功效相同的有**云南鼠刺 I. yunnanensis** Franch.，分布于广西、四川、贵州、云南。

**厚叶鼠刺**

**Itea cariacea** Wu

生于山坡杂木林中。分布于湖南、广东、广西。

叶：用于刀伤出血。

**腺鼠刺**　牛母树、炸莲木(广西)

**Itea glutinosa** Hand. -Mazz.

生于林下或山坡向阳处。分布于福建、湖南、广西、四川、贵州。

根、花：续筋接骨，强壮滋补，润肺止咳。叶：用于毒蛇咬伤。

**月月青**　猫儿刺(湖北)，牛尾巴菜(贵州)

**Itea ilicifolia** Oliv.

生于山坡林下、沟边或山坡岩石缝中。分布于湖北、四川、贵州、云南。

根：甘，平。清热止咳，滋补肝肾。用于劳虚咳嗽，咽喉干痛，目赤。根、花：用于跌

打损伤，扭伤，外伤出血。

**毛鼠刺**

**Itea indochinensis** Merr.

生于疏林中或林缘及溪旁。分布于广西、云南。

茎：用于风湿痛，跌打损伤。

**大叶鼠刺**

**Itea macrophylla** Wall.

生于林下或溪边。分布于广西、贵州、云南。

根：滋补。 花：用于咳嗽，喉干。

**毛脉鼠刺** 小熊胆、益母树(广西)

**Itea pubinervia** H. T. Chang

生于路旁阴处及疏林中。分布于广东、广西、云南。

叶：消肿，止血。用于刀伤出血，骨折。

## 黄山梅属 Kirengeshoma Yatabe

**黄山梅** 铃钟三七、乌株子、少女花(浙江)

**Kirengeshoma palmata** Yatabe

生于山疏林下、阴湿岩上或灌丛中。分布于安徽黄山、浙江天目山。

根状茎：舒筋活血，滋补强壮。用于疲劳过度，全身酸痛麻木。

## 槭叶草属 Mukdenia Koidz.

**槭叶草** 腊八菜、爬山虎、山碰子根(吉林)

**Mukdenia rossii** (Oliv.) Koidz. ——*Aceriphyllum rossii* Engl.

生于近水边的山谷石崖上。分布于吉林、辽宁。

全草：用于心脏病，心悸，失眠。

## 独根草属 Oresitrophe Bunge

**独根草**

**Oresitrophe rupifraga** Bunge

生于山谷崖石缝中。分布于辽宁、河北、山西。

全草：清热利湿。用于小儿肠炎，泄泻。

## 梅花草属 Parnassia L.

**二叶梅花草**

**Parnassia bifolia** Nekras

生于中山带林缘及林中空地、山谷溪边。分布于天山。

全草：清热润肺，止痛。

附　注：功效相同的有**单叶梅花草 P. laxmannii** Pall. ex Schutt.；**绿梅花草 P. trinervis** Drude var. **viridiflora** (Batal.) Hand. -Mazz.，均分布于新疆。

**鸡心草**　　水莲花(云南)

**Parnassia crassifolia** Franch.

生于海拔 1 400—2 700 米的林下或沟边阴湿处。分布于四川、云南。

根：淡，平。消食健胃，理气止痛。　全草：清热利肺，消肿止痛。

**半边蝶**

**Parnassia davidii** Franch.

生于林下阴湿处。分布于广西。

全草：利水通淋。

**突隔梅花草**　　肺心草、苍耳七(陕西)，金耳吊环、肾形草(湖北)，芒药苍耳七(秦岭植物志)

**Parnassia delavayi** Franch.——*P. delavayi* Franch. var. *brevistyla* Briq.

生于海拔高达 3 200 米的山坡或水沟旁湿润处。分布于西南及陕西、甘肃、河南、湖北、湖南。

全草(肺心草)：甘，寒。清热，润肺，消肿，止痛。用于肺痨，风热咳嗽，疟腮，咽喉痛，带下病，痈肿疮毒，跌打损伤。

**贡山梅花草**

**Parnassia farreri** W. E. Evans

生于海拔 3 000—3 400 米的山地。分布于云南贡山。

全草：明目，补肾。用于无名肿毒，背痛。　花：退翳。

**白耳菜**　　苍耳七、金钱灯塔草(浙江、江西)，白侧耳(湖北)，海里茶(湖南)，白须草(浙江药用植物志)

**Parnassia foliosa** Hook. f. et Thoms.

生于山坡林下、林缘阴湿地或山谷溪沟。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖南、广西、四川、云南。

全草：淡，温。解热利尿，清肺镇咳，止血，利湿，止泻。用于久咳咯血，痢疾，疔疮，带下病，便血。

**黄瓣梅花草**

**Parnassia lutea** Batal.

生于海拔高达 3 700 米的河边、阴坡林下或灌丛中。分布于甘肃、青海、西藏。

全草：清热解毒，止咳化痰。

**凹瓣梅花草**　　小苍耳七(云南)

**Parnassia mysorensis** Heyne

生于高山阴处草坡。分布于西南。

全草：淡，平。清肺止咳，解暑，止血。用于肺虚咳嗽，咳血。

**细叉梅花草**　　铁棍子(四川)

**Parnassia oreophila** Hance

生于林下湿处或山坡杂草丛中。分布于河北、山西、陕西、甘肃、青海、四川。

全草：清热利湿，止咳。

**梅花草**

**Parnassia palustris** L.

生于林下潮湿处、水沟边或湿草地。分布于东北、华北及陕西、甘肃、青海。

全草(梅花草)：苦，凉。消肿解毒，清热凉血，化痰止咳。用于黄疸，脱疽，痢疾，咽喉痛，顿咳，咳嗽痰多，疮痈肿毒。

**三脉梅花草**

**Parnassia trinervis** Drude

生于海拔高达4 700米的高山山坡阴湿处、山坡草地及草甸。分布于陕西、甘肃、青海、四川、云南、西藏。

全草：苦，凉。清热解毒，止咳化痰。

**鸡眼梅花草**　鸡肫草、荞麦叶(陕西)，肥猪草、地核桃(湖北)，白折耳根(贵州)，苍耳七(云南)

**Parnassia wightiana** Wall.

生于山谷、溪旁及林下阴湿处。分布于西南及陕西、甘肃、福建、湖北、广东。

全草(鸡肫草)：淡，平。清肺止咳，补虚益气，利湿，排石，解毒。用于咳嗽，咯血，砂淋，胆石症，痈疮肿毒，湿疹，跌打损伤，带下病。

## 扯根菜属 Penthorum L.

**扯根菜**　水泽兰(陕西)，水杨柳(湖北)，水苋菜、红柳信(湖南)

**Penthorum chinense** Pursh

生于山沟路旁潮湿处或溪边湿地。全国南北各地普遍分布。

全草：甘，微温。通经活血，散瘀消肿，利水，止血。用于水肿，胃脘疼痛，崩漏，带下病，跌打肿痛。

## 山梅花属 Philadelphus L.

**滇南山梅花**　山梅花、毛叶木通(云南)

**Philadelphus henryi** Kochne

生于海拔1 500—3 300米的山野疏林下。分布于云南。

茎、叶：甘、淡，平。清热利湿。用于小便淋痛，黄疸。

附　注：云南特有药用植物。

**山梅花**　兴隆茶(甘肃)，鸡骨头(湖北)

**Philadelphus incanus** Kochne

生于海拔1 000—1 700米的山地灌丛中。分布于陕西、甘肃、青海、山东、河南、湖北、四川。

根皮：用于挫伤，腰胁痛，胃痛，头痛。

**太平花**　银盘盘花(宁夏)

**Philadelphus pekinensis** Rupr.

生于山坡或溪边灌丛中，常栽培。分布于辽宁、河北、山西、宁夏、江苏、山东、四川。

根：解热镇痛，截疟。用于疟疾，胃痛，腰痛，挫伤。

**绢毛山梅花**　土常山(浙江)，鸡骨头(湖北)，小吉通(湖南)

**Philadelphus sericanthus** Kochne

生于山坡灌丛、林缘、溪谷两旁。分布于上海、安徽、浙江、江西、河南、湖北、湖南、四川东部、贵州、云南东北部。

根皮：苦，平。活血镇痛，截疟。用于疟疾，挫伤，腰胁痛，胃痛，头痛。

**薄叶山梅花**

**Philadelphus tenuifolius** Rupr.

生于山地杂木林中。分布于东北及内蒙古。

根、果实：补虚强壮，利尿。　根：用于痔疮。

## 冠盖藤属　Pileostegia Hook. f. et Thoms.

**星毛冠盖藤**

**Pileostegia tomentella** Hand. -Mazz.

生于林下或溪旁。分布于福建、湖南、广东、广西。

全株及花：活血散瘀。

**冠盖藤**　青棉花藤(浙江、湖北)，红棉花藤、猴头藤(浙江)，大青叶(湖北)，青棉花(贵州)

**Pileostegia viburnoides** Hook. f. et Thoms.

生于山坡岩石边、杂木林中及阴湿山谷。分布于长江流域以南各省区及台湾。

根、藤、叶、花：苦，温。补肾，接骨，活血散瘀，消肿解毒。用于肾虚腰痛，风湿关节痛，跌打损伤，骨折，流注，疮疡不收口。

## 茶藨子属　Ribes L.

**尖叶茶藨**　山麻子(湖北)

**Ribes acuminatum** Wall.

生于山坡林下或河谷。分布于陕西、湖北、四川。

果实：清热，生津止渴。

**大刺茶藨**

**Ribes alpestre** Wall. ex Decne.

生于林下、林缘、灌丛中或沟谷路旁。分布于陕西、甘肃、青海、湖北、四川、云南、西藏。

果实(刺李)：清热，止痛。用于萎缩性胃炎。茎皮、果实：舒筋活血，祛风湿。

**高茶藨**

**Ribes altissimum** Turcz.

生于山地针叶林下。分布于新疆。

根皮：舒筋活血。 果实：滋补强壮。

附 注：功效相同的有**红花茶藨 R. atropurpureum** C. A. Mey.；**臭茶藨 R. graveolens** Bunge 及**小叶茶藨 R. heterotrichum** C. A. Mey.，均分布于新疆。

**刺梨**

**Ribes burejense** Fr. Schmidt——*Grossularia burejensis*(Fr. Schmidt) Berg.

生于山地针叶林下或溪旁。分布于东北及河北、山西、陕西、青海。

茎枝、果实：清热燥湿，利水，调经。用于风湿痛。

**革叶茶藨** 岩石榴(湖北)

**Ribes davidi** Franch.

生于山坡灌丛中。分布于四川、云南。

根：苦、涩，微温。活血祛瘀，舒筋理气。用于风湿腰痛，跌打损伤，经闭腰痛，月经不调，产后腹疼，痢疾。

**华茶藨** 三升米(浙江)

**Ribes fasciculatum** Sieb. et Zucc. var. **chinense** Maxim.

生于山坡疏林、溪谷两旁及山岩旁。分布于辽宁旅顺、陕西、山东、江苏、浙江、河南、湖北。

根：用于妇女虚热乏力，月经不调，痛经。 果实：清热解毒。用于瘾疹，痈肿，痢疾。

**冰川茶藨** 奶浆子(湖北)

**Ribes glaciale** Wall.

生于海拔 1 300—3 800 米的山地沟边、林下或灌丛中。分布于山西、陕西、甘肃、青海、湖北、四川、云南、西藏。

叶：用于烧、烫伤，漆疮，胃痛。 茎皮、果实：清热燥湿，健胃。

**睫毛茶藨** 钻石风(湖北)，岩马桑(贵州)

**Ribes henryi** Franch.

生于山坡林下或灌丛中。分布于湖北、四川、贵州。

根：甘，凉。舒筋活络，祛瘀止血。用于风湿痛，劳伤，吐血。

**糖茶藨** 酸吊吊(宁夏)

**Ribes himalense** Royle——*R. emodes* Rehd.

生于海拔 3 800 米以下的山坡、林下、林缘灌丛及山谷。分布于华北、西南及陕西、宁夏、青海、河南、湖北。

茎枝(糖茶藨)、果实：甘、涩，平。解毒，清热。用于肝炎。

附 注：功效相同的有**美丽茶藨 R. pulchellum** Turcz.，分布于华北及甘肃、新疆；**楔叶茶藨 R. diacanthum** Pall.，分布于内蒙古。

**东北茶藨** 灯笼果(陕西)，山麻子(中国高等植物图鉴)

**Ribes mandshuricum** (Maxim.) Kom.——*R. multiflorum* Kitag. r. *mandshuricum* Maxim.

生于山坡杂木林或针阔叶混交林下。分布于东北及河北、山西、陕西、甘肃、河南。

果实：辛，温。解表。用于感冒。

**刺果茶藨**

**Ribes maximowiczii** Batal.

生于山坡灌丛中。分布于甘肃南部、湖北、四川北部。

根：祛风除湿。用于风湿关节痛。

**五裂茶藨**

**Ribes meyeri** Maxim.

生于河谷灌丛中。分布于甘肃、青海，新疆、四川。

茎皮、果实：泻湿热，退黄。用于黄疸。

**宝兴茶藨**

**Ribes monpinense** Franch.

分布于林下、山间灌丛中。分布于甘肃、青海、湖北、四川、贵州、云南。

茎皮、果实：清热燥湿。 根：祛风除湿，活血调经。

附 注：功效相同的有**狭果茶藨 R. stenocarpum** Maxim.，分布于陕西、甘肃、青海、四川。

**细枝茶藨** 三升米(湖北)

**Ribes tenue** Jancz.

生于山坡林下或林边草地。分布于陕西、甘肃、宁夏、安徽、河南、湖北、四川。

根：用于月经不调，痛经，四肢无力，烧、烫伤。

## 鬼灯檠属 Rodgersia A. Gray

**鬼灯檠** 称杆七(陕西)，红药子(陕西、宁夏)，厚朴七、老蛇莲(湖北)，老蛇盘(河北)

**Rodgersia aesculifolia** Batal.

生于海拔 1 200—3 200 米的林下灌丛中或山谷石崖上。分布于山西、陕西、甘肃、宁夏、河南西部、湖北西部、四川、云南西北部、西藏。

根状茎(索骨丹根)：涩、微甘，平。清热解毒，止血生肌，止痛消瘿。用于吐血，衄血，崩漏，肠风下血，痢疾，月经不调，外伤出血，外痔，瘿瘤，咽喉痛，疮痈，毒蛇咬伤。

**羽叶鬼灯檠** 岩陀、九叶岩陀(云南)

**Rodgersia pinnata** Franch.

生于高山林中阴湿处。分布于四川西南部、贵州、云南。

根状茎(岩陀)：辛，温。通经活血，祛风除湿，调经止痛，止痢。用于风湿痹痛，骨折，跌打损伤，消化不良，甲状腺机能亢进，泄泻，痢疾，月经不调。

**西南鬼灯檠** 岩陀(四川)，野黄姜、毛青杠(贵州)，岩陀陀(云南)

**Rodgersia sambucifolia** Hemsl.

生于海拔 1 800—3 000 米的山地阴湿处及山坡灌丛草地。分布于四川西南部、贵州西部、云南北部。

根、根状茎(岩陀)：苦、涩，凉。清热凉血，调经，止痛。用于肺热咳喘，痢疾，痛经，月经过多，风湿关节痛，跌打损伤；外用于外伤出血，阴囊湿疹。

## 虎耳草属　Saxifraga L.

**黑虎耳草**

**Saxifraga atrata** Engl.

生于亚高山及高山草甸、碎石带、灌丛下。分布于甘肃、青海。

花：清肺退烧。

**喜马拉雅虎耳草**

**Saxifraga brunonis** Wall. ex Ser.——*S. brunoniana* Wall. ex Sterub.

生于海拔 3 100—4 000 米的冷杉林下、草地或石隙中。分布于云南大理、西藏东南部至南部。

全草：甘，温。利痰。用于肺痨，脓胸。

附　注：功效相同的有**朗县虎耳草 S. nangxianensis** J. T. Pan，分布于我国西藏拉萨、错那、加查、朗县。

**零余虎耳草**　　点头虎耳草(拉汉英种子植物名称)

**Saxifraga cernua** L..

生于岩石阴湿处。分布于河北、内蒙古、陕西、甘肃、青海、新疆、四川、云南、西藏。

全草：清热解毒，排脓。

**聚叶虎耳草**

**Saxifraga confertifolia** Engl. et Irmsch.

生于高山草地、石缝中。分布于陕西南部、甘肃、四川西部。

全草：清热解毒。

**异叶虎耳草**

**Saxifraga diversifolia** Wall.

生于海拔高达 4 200 米的山地林缘或高山草甸。分布于四川西南部、云南西北部、西藏南部。

全草：甘，凉。清热凉血，祛风镇静。用于风湿痛，惊风。

附　注：功效相同的有**扁叶虎耳草 S. flabellifolia** Franch.，分布于湖北、四川东部、贵州。

**优越虎耳草**

**Saxifraga egegia** Engl.

生于海拔高达 4 300 米以下的林下、灌丛或高山草甸。分布于西南及甘肃南部、青海东部及南部。

花：：微苦，寒。清热降火，凉血解毒，祛风止咳。

**小伞虎耳草**

**Saxifraga gemmuligera** Engl.

生于高山草甸。分布于青海东部、四川西北部。

全草：清热解毒。

**道孚虎耳草**

**Saxifraga lumpuensis** Engl.

生于山坡草地。分布于甘肃南部、四川西部、贵州。

全草：清热解毒，消肿。

**东北虎耳草**

**Saxifraga manchuriensis** (Engl.) Kom.——*S. punctata* var. *manchuriensis* Engl.

生于山地林间草地及石质山坡。分布于吉林、辽宁。

全草：用于疔疮肿毒。

附　注：功效相同的有**条裂虎耳草 S. laciniata** Nakai et Takeda，分布于吉林、辽宁；**斑点虎耳草 S. punctata** L.，分布于黑龙江、吉林。

**黑心虎耳草**　　大柱头虎耳草(云南)

**Saxifraga melanocentra** Franch.

生于海拔 3 000—5 400 米的高山灌丛中、高山草甸及碎石隙中。分布于陕西、甘肃、青海、四川西部及云南西北部。

全草：补血，散瘀，清热，利胆，退烧。用于眼病，肺热咳喘。

**云南虎耳草**　　蒙自虎耳草、马莲花(贵州)

**Saxifraga mengtzeana** Engl. et Irmsch.

生于海拔 1 100—1 500 米的山地阴处岩石上。分布于四川、贵州、云南。

全草：微苦、辛，凉。有小毒。清热解毒，凉血止血。用于中耳炎，乳痈，无名肿毒，皮肤溃疡及过敏，外伤出血，高热，麻疹，咳嗽，月经不调，产后腹痛。

附　注：功效相同的有**多叶虎耳草 S. pallida** Wall. f. **foliosa** Engl. et Irmsch.，分布于贵州、云南、西藏。

**山地虎耳草**

**Saxifraga montana** H. Smith.

生于海拔 3 000—5 300 米的灌丛、高山草甸及石隙。分布于陕西南部、甘肃南部、青海东部、四川西部、云南西北部、西藏南部。

全草：清热解毒，镇痛。用于头痛。

**卵心叶虎耳草**

**Saxifraga ovatocardata** Hand.-Mazz.

生于岩石边阴湿处。分布于广西、四川西部、云南西北部。

全草：清热解毒，利湿。

**青藏虎耳草**

**Saxifraga przewalskii** Engl.

生于海拔 4 200 米以下的山坡、高山草甸及碎石地。分布于甘肃、青海、四川、西藏。

全草：苦、辛，寒。清肝胆热，补脾健胃。用于肝炎，风热感冒，消化不良，胆囊炎。

**狭瓣虎耳草**

**Saxifraga pseudohirculus** Engl.

生于海拔高达 4 900 米的疏林下、灌丛中及高山草甸。分布于甘肃南部、青海南部、四川西部、西藏东北部。

全草：清热解毒。

**红毛虎耳草**

**Saxifraga rufescens** Balf. f.

生于海拔 2 100—4 000 米的山地林下或阴处石上。分布于四川西部、贵州、云南。

全草：清热祛风，镇痛。

**石生虎耳草**

**Saxifraga rupicola** Franch.

生于石山上。分布于贵州、云南。

全草：清热，祛风，镇痛。用于中耳炎，癍疹，腹痛，小儿惊风。

**北京虎耳草**

**Saxifraga sibirica** L. var. **pekinensis**(Maxim.) Engl. et Irmsch.

生于山坡林下阴湿处。分布于陕西、甘肃、青海、山东、湖北西部、四川东部。

全草：清热解毒，凉血，祛风湿，消肿止痛，生肌。

**繁缕虎耳草**

**Saxifraga stellariifolia** Franch.

生于高山草地或林缘。分布于四川西部。

全草：清热解毒，祛风止咳。

附　注：四川特有药用植物。

**虎耳草**　老虎草(江苏)，金丝荷叶、耳朵红(浙江)，金丝叶(江西)，耳聋草、猪耳草(福建)

**Saxifraga stolonifera** Meerb.——*S. sarmentosa* L.

生于阴湿处、溪旁树荫下或阴湿岩石缝中，亦有栽培。分布于华东、中南、西南及陕西、甘肃。

全草(虎耳草)：微苦，寒。有小毒。清热凉血，消肿解毒。用于中耳炎，小儿惊风，肺痈，咳嗽，咳血，风火牙痛，瘰疬，冻疮，湿疹、皮肤瘙痒，痈肿疔毒，蜂蝎螫伤。

附　注：孕妇慎用。

**斑瓣虎耳草**

**Saxifraga takedana** Nakai

生于高山石缝中。分布于青海。

全草：淡，温。除湿利尿，活血祛瘀。用于咳嗽，咯血，黄疸，骨折筋伤，带下病，疮疖。

**甘青虎耳草**

**Saxifraga tangutica** Engl.

生于高山草地或溪边。分布于甘肃、青海、四川西部、西藏南部。

全草(迭达)：苦、寒。清热解毒，解表发汗，补脾。用于肝炎，胆囊炎，感冒。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版附录收载。

**爪虎耳草**　赛滴(甘肃)

**Saxifraga unguiculata** Engl.

生于山地路边、高山碎石带及草甸。分布于河北、山西、甘肃。

全草：清热解毒。

## 钻地风属　Schizophragma Sieb. et Zucc.

**白背钻地风**

**Schizophragma hypoglauca** Rehd.

生于山地潮湿处。分布于安徽、四川峨眉山、云南。

茎藤(散血藤)：苦，凉。祛风湿，解热毒。用于筋骨痛，疮毒红肿。

**钻地风**　　桐叶藤(浙江)，利筋藤(四川)

**Schizophragma integrifolia** Oliv.——*S. hydrangeoides* Sieb. et Zucc var. *integrifolium* Franch.

生于山坡疏林中、林缘、山坡路旁及岩石旁。分布于安徽、浙江、江西、福建、台湾、河南、湖北、广东、广西、四川、贵州、云南。

根(钻地风)、茎藤：淡，凉。祛风活血，舒筋通络。用于风湿痹痛，四肢关节痛，丝虫病。

**小齿钻地风**

**Schizophragma integrifolia** Oliv. f. **denticulata** (Rehd.) Chun

生于山地密林中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、广东、四川。

根(齿缘钻地风)：祛风除湿，解热毒。用于筋骨痛，疮毒红肿。

**粉绿钻地风**

**Schizophragma integrifolia** Oliv. var. **glaucescens** Rehd.——*S. glaucescens* (Rehd.) Chun

生于山地林中。分布于安徽、浙江、江西、湖北、湖南、广东北部、四川、贵州。

根皮：淡、凉。祛风，活血，止痛。用于风湿脚气，四肢关节酸痛。

## 峨屏草属　Tanakea Franch. et Sav.

**峨屏草**　　峨眉岩下雪(四川)

**Taankea omeiensis** Nakai

生于山地林中。分布于四川西部。

全草：清热消痈，息风定惊。

附　注：四川特有药用植物。

## 黄水枝属　Tiarella L.

**黄水枝**　　高脚铜告碑、防风七(浙江)，紫背金钱(广西药用植物名录)

**Tiarella polyphylla** D. Don

生于山地林中或沟边。分布于长江中下游各省区，南达广东、广西北部、台湾，西南至

云南、西藏。

全草：辛、苦，凉。清热解毒，消肿止痛，活血祛瘀。用于肝炎，耳聋，咳嗽气喘，痈肿疮毒，跌打损伤。

## 66. 海桐花科 Pittosporaceae

### 海桐花属 Pittosporum Banks ex Soland .

**大叶海桐** 山枝仁(四川)，山枝茶(贵州)

**Pittosporum adaphniphylloides** Hu et Wang

生于山谷沟边或林中。分布于四川、贵州。

根皮、种子：退热，通经，活血，敛汗。

**聚花海桐** 山辣椒、山霸王(广西)

**Pittosporum balansae** DC.—— *P. conferium* Merr. et Chun

生于疏林中。分布于广东、海南、广西。

根、叶：用于瘰疬，肿瘤，蛇咬伤，跌打肿痛。

**窄叶聚花海桐** 邹叶海桐花(海南)，雅辽类(广西)

**Pittosporum balansae** DC. var. **angustifolium** Gagnep.——*P. baileyanum* Gowda

生于山地常绿林中。分布于广东西部、海南、广西。

根：用于骨折。

**短萼海桐** 木辣椒(广西)，山桂花(广西、云南)，万里香、万年青、鸡骨头(云南)

**Pittosporum brevicalyx** (Oliv.) Gagnep.——*P. pauciflorum* Hook. et Arn. var. *brevicalyx* Oliv.

生于疏林中。分布于江西、湖北、湖南、广东、广西、贵州、云南、西藏。

全株、茎皮：祛风，消肿解毒，止痛。用于腰痛，小儿惊风。 果实：消肿解毒。用于毒蛇咬伤，疮疖肿毒，跌打损伤。

**皱叶海桐** 岩花树、山枝条(湖北)

**Pittosporum crispulum** Gagnep.

生于林下或林缘。分布于湖北、四川、贵州、云南。

根：祛风活络，散瘀止痛。 叶：解毒，止血。 种子：用于水肿。

**密脉海桐**

**Pittosporum densinervatum** H. T. Chang et Yan

生于砂坡、林间或沟边。分布于湖南、贵州。

全株：退热，通经活络，敛汗。

**光叶海桐** 野连翘、鸭脚板树(湖北)，大皮子药(湖南)，大天王(广西)，一朵云、见血飞(广东)

**Pittosporum glabratum** Lindl.

生于山地常绿林及次生疏林中。分布于湖北、湖南、广东、广西、贵州。

根(山栀根)、茎：散瘀消肿，祛风止痛。用于风湿关节痛，腰背疼痛，跌打损伤，产后风瘫，刀伤，蛇咬伤，疮疖肿毒。　叶(一朵云叶)：用于过敏性皮炎，外伤出血。

**狭叶海桐**　山栀子(陕西)，黄枝子、金刚口摆(湖北)，黑皮子(湖南)，斩蛇剑、狭叶崖子花(广东)，金刚摆(贵州)

**Pittosporum glabratum** Lindl. var. **neriifolium** Rehd. et Wils. ——*P. cavaleriei* Lévl.

生于山地疏林及灌丛中。分布于长江流域以南各省区及陕西。

全株：苦，寒。清热除湿，祛风活络，消肿解毒，活血止痛。用于风湿关节痛，产后风瘫，跌打骨折，胃痛，湿热黄疸，疮疡肿毒，毒蛇咬伤，外伤出血。

**异叶海桐**　野桂花、椿根白皮、红杉树(云南)

**Pittosporum heterophyllum** Franch.

生于田埂、山坡或灌丛中。分布于西南及甘肃。

根、茎皮(野桂花皮)：苦，凉。清热解毒，祛风除湿，止血。用于肺热咳嗽，风湿痛，崩漏，刀伤，烧、烫伤，跌打骨折。

**海金子**　山栀茶(湖北)，满山香(广西)，朗楼肥(侗族语)，豆威(苗族语)，崖花海桐(中国高等植物图鉴)

**Pittosporum illicioides** Makino——*P. kobuskianum* Gowda

生于山坡林下。分布于长江流域以南各省区。

根(山栀茶)：苦、辛，温。安神，活血消肿，解毒止痛。用于肾虚，体虚遗精，高血压症，胃脘痛，风湿痛，扭伤，水肿，蛇咬伤，皮肤搔痒。　叶：解毒活血。用于蛇咬伤，疮疖，外伤出血。　种子：苦，寒。涩肠，固精。用于久泻，带下病，滑精。

附　注：功效相同的有**狭叶海金子 P. ilicioides** Makino var. **stenophyllum** P. L. Chin，分布于浙江、湖北、湖南。

**羊脆木**　杨翠木、羊耳朵树(云南)

**Pittosporum kerri** Craib

生于海拔 1 200—2 300 米的山地林中。分布于云南景谷、西盟。

根、树皮：清热解毒，祛风解表。用于感冒，发烧，顿咳，疟疾。

附　注：云南特有药用植物。

**广西海桐**　山辣蓼、木辣蓼(广西)

**Pittosporum kwangsiense** H. T. Chang et Yan

生于林下或灌丛中。分布于广西、云南。

茎皮、叶：用于黄疸，风湿痹痛，小儿惊风。

**薄萼海桐**

**Pittosporum leptosepalum** Gowda

生于山地常绿林中。分布于广东北部、广西。

根皮：祛风湿。　叶：止血。

**滇藏海桐**

**Pittosporum napaulense** (DC.) Rehd. et Wils.——*Senacia napaulensis* DC.

生于海拔 400—2 000 米的灌丛中。分布于云南、西藏。

根：用于疮痈肿毒。

**峨眉海桐**

**Pittosporum omeiense** H. T. Chang et Yan

生于山地灌丛中。分布于湖北、四川、贵州。

根、叶、果实：用于咳嗽，肾虚。

**卵果海桐**

**Pittosporum ovoideum** Gowda

生于山地灌丛中。分布于广西、贵州。

叶：止血。

**小果海桐**　　崖子花(湖北)，五月上树风(广西)

**Pittosporum parvicapsulare** H. T. Chang et Yan

生于山坡杂木林中或溪边林下。分布于浙江、湖北、湖南、广西。

根、叶、种子：消肿解毒，利湿，活血。用于痈疽疮毒，蛇咬伤，皮肤湿疹，瘙痒，关节痛，跌打损伤。

**少花海桐**　　满山香(广西)

**Pittosporum pauciflorum** Hook. et Arn.

生于山地常绿林中。分布于江西、广东、广西。

全株：用于跌打损伤，风湿痹痛，胃脘痛，毒蛇咬伤。

**台琼海桐**　　台湾海桐花(海南植物志)

**Pittosporum pentandrum** (Blanco) Merr. var. **hainanense** (Gagnep.) Li——*P. formosanum* Hayata var. *hainanense* Gagnep.; *P. formosanum* Hayata

生于平地疏林中，靠近海岸地区较常见。分布于台湾、广东、广西、海南。

根：用于跌打损伤。

**全秃海桐**　　土连翘、鸭脚板树(湖北)

**Pittosporum perglabratum** H. T. Chang et Yan

生于山坡林下。分布于湖北、贵州。

果皮：用于风热感冒。　根皮：强腰补肾，益气安神。

**缝线海桐**　　吊灯笼(广西)

**Pittosporum perryanum** Gowda

生于山地常绿林中或石崖上。分布于广东、海南、广西、贵州、云南。

果实：用于黄疸。　全株：用于泄泻，胃脘痛。

**柄果海桐**　　山枝条(湖北)，寡鸡蛋树(云南)

**Pittosporum podocarpum** Gagnep.

生于山地林中。分布于陕西、甘肃、湖北、四川、贵州、云南。

根：甘、苦、辛，凉。补肾益肺，祛风湿，活血通络。用于虚劳咳喘，遗精早泄，失眠，头晕，高血压症，风湿关节痛，小儿瘫痪。

叶：解毒，止血。种子：甘，涩，平。清热，生津止渴。用于虚热心烦，口渴咽痛，泻痢后重，倦怠乏力。

**线叶柄果海桐**　　崖子花(湖北)

**Pittosporum podocarpum** Gagnep. var. **angustatum** Gowda

生于山地密林下或灌丛中。分布于陕西、甘肃、湖北、四川、贵州、云南。

根皮、叶、果实：镇静，退热，补虚，定喘。用于哮喘，肾虚，遗精，疳腮。

**秀丽海桐**

**Pittosporum pulchrum** Gagnep.

生于山谷、山坡林中或石岩上。分布于广西。

全株：用于跌打骨折。

**厚圆果海桐**　铁棒锤(湖北)

**Pittosporum rehderianum** Gowda

生于海拔700—1 100米的山地、山林灌丛中。分布于陕西南部、甘肃东南部、湖北西部、四川西部及西北部。

果实：用于跌打损伤。

**崖花海桐**　大皮子药(湖南)

**Pittosporum sahnianum** Gowda

生于低山或丘陵区。分布于安徽、湖南。

全株：祛风除湿，活血止痛。　根：祛风活络，散结止痛。用于风湿关节痛，腰腿痛，骨折，胃痛，高血压症，遗精。

**海桐**

**Pittosporum tobira** (Thunb.) Ait.

长江流域以南各地普遍栽培。为园林绿化习见树种。

叶(海桐花)：外用于疥疮。　根：祛风活络，散瘀止痛。　果实：用于疝痛。

**四子海桐**　山茶辣(广西)

**Pittosporum tonkinense** Gagnep.——*P. tetraspermum* sense Gowda

生于海拔1 000—1 800米的石灰岩上。分布于广西、贵州、云南。

全株：用于风湿痹痛，胁痛。

**棱果海桐**　瘦鱼蓼、鸡骨头，公栀子(贵州)

**Pittosporum trigonocarpum** Lévl.

生于低山或丘陵灌丛中及林缘。分布于湖南、四川、贵州南部。

全株：祛风除湿，活血止痛，生津止渴。

**崖花子**　山枝子、七里香(陕西)，岩子花(湖北)，山茶辣(广西)，菱叶海桐（中国高等植物图鉴）

**Pittosporum truncatum** Pritz.

生于山谷林下，分布于陕西、甘肃、湖北、广西、四川、贵州、云南。

全株：散瘀止痛，祛风活络。用于胁痛，风湿骨痛。

## 67. 蔷薇科　Rosaceae

### 龙芽草属　Agrimonia L.

**托叶龙芽草**　朝鲜龙芽草(东北草本植物志)

**Agrimonia coreana** Nakai

生于海拔500—800米的林缘及山坡灌丛旁。分布于吉林、辽宁、山东、浙江。

根状茎及全草：收敛，止血，止泻，驱虫。用于吐血，咳血，便血，绦虫病。

**大花龙芽草**

**Agrimonia eupatoria** L. subsp. **asiatica** (Juzep.) Skalicky ——*A. asiatica* Juzep.

生于海拔500—1 300米的山脚下或水边。分布于新疆。

全草：收敛，止血，止泻，消炎。用于咳血，呕血，尿血，便血。

**小花龙芽草**

**Agrimonia nipponica** Koidz. var. **occidentalis** Skalicky

生于海拔200—1 500米的路旁、村旁、旷野。分布于安徽、浙江、江西、广东、广西、贵州东南部。

全草：用于咳血，吐血，崩漏下血，血痢，感冒发热。

**龙芽草**　地仙草(黑龙江)，路边黄(陕西)，瓜香草(救荒本草)，仙鹤草(中国药学大辞典)

**Agrimonia pilosa** Ledeb.

生于海拔100—3 800米的溪边、路旁、草地、灌丛、林缘及疏林下。全国普遍分布。

地上部分(仙鹤草)：涩、辛，平。收敛止血，截疟，止痢，解毒。用于吐血，咳血，尿血，便血，劳伤。芽(鹤草芽)：苦、涩，平。驱虫。用于绦虫病。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。② 功效相似的有**黄龙尾 A. pilosa** Ledeb. var. **nepalensis** (D. Don) Nakai，分布于西南及河北、山西、陕西、甘肃、山东、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北、广东、广西。

## 羽衣草属　Alchemilla L.

**羽衣草**　日本羽衣草(新疆)，斗蓬草(种子植物名称)

**Alchemilla japonica** Nakai et Hara

生于海拔2 800—3 500米的高山湿润草地。分布于内蒙古、陕西、甘肃、青海、新疆、四川。

全草：止血收敛，消炎，止痛。

## 唐棣属　Amelanchier Medik.

**东亚唐棣**

**Amelanchier asiatica** (Sieb. et Zucc.) Endl.——*Aronia asiatica*, Sieb. et Zucc.

生于海拔1 000—2 000米的山坡、溪旁、混交林中。分布于安徽黄山、浙江天目山、江西西北部。

树皮：苦，平。有小毒。益肾，散瘀，止痛。用于肾虚，带下病，跌打瘀痛。

## 桃属　Amygdalus L.

**扁桃**

**Amygdalus communis** L.——*Prunus communis* Fritsch.; *P. amygdalus* Batsch

生于海拔600—1 300米的浅山地带，亦有栽培。分布于陕西、甘肃、青海、新疆、山东。

种子(巴旦杏仁)：甘，平。润肺，止咳，化痰，下气。用于虚劳咳嗽，心腹逆闷。

**新疆桃**　　大宛桃(通称)

**Amygdalus ferganensis** (Kost. et Reib.) Yu et Lu—— *Prunus ferganensis* Kost. et Reib.

新疆有栽培。

种子：润肺止咳，祛痰平喘。

**山桃**　　野桃(四川)，山毛桃(河南)

**Amygdalus davidiana** (Carr.) C. de Vos ex Henry—— *Persica davidiana* Carr.; *Prunus davidiana* (Carr.) Franch.

生于石灰岩山地。分布于黄河流域各地及四川、云南。吉林、辽宁、江苏有栽培。

种子(桃仁)：苦、甘，平。祛瘀活血，润肠通便。用于经闭，痛经，症瘕痞块，跌打损伤，肠燥便秘。

附　注：桃仁《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**光核桃**

**Amygdalus mira** (Koehne) Yu et Lu——*Prunus mira* Koehne

生于海拔2 600—4 000米的山坡、田边及路旁。分布于四川、云南、西藏。

叶：用于湿疹、痔疮。　花：泻下通便，利水消肿。　幼果：敛汗，止血。　种子：破血行瘀，润燥通便。

**蒙古扁桃**

**Amygdalus mongolica** (Maxim.) Ricker——*Prunus mongolica* Maxim.

生于海拔1 100—2 400米的干旱山坡、岩石缝中或河滩地。分布于内蒙古、甘肃、宁夏。

性味功效与郁李相似。

**长梗扁桃**　　柄扁桃(内蒙古)

**Amygdalus pedunculata** Pall.—— *Prunus pedunculata* (Pall.) Maxim.

生于石质山坡、开旷地及林缘。分布于内蒙古、陕西、宁夏。

种子：润肠，利水。

**桃**　　毛桃(安徽)，白桃(浙江)

**Amygdalus persica** L.—— *Prunus persica* (L.) Batsch

全国各地均有栽培。

种子(桃仁)：苦、甘，平。活血祛痰，润肠通便。用于经闭，痛经，症瘕痞块，跌打损伤，肠燥便秘。　幼果(毳桃干)：苦，微温。止汗。用于自汗，盗汗。　花：微苦，平。滑肠

逐水，消肿。 叶：苦，平。散结，消肿，解毒。 树胶：和胃止渴。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**蟠桃**

**Amygdalus vulgaris** Mill. var. **compressa** Loud.——*Prunus persica* (L.) Batsch var. *compressa* (Loud.) Bean

全国各地均有栽培，江苏、浙江为最多。

种子：润肺止咳，祛痰平喘。

**榆叶梅**　榆梅(江苏)

**Amygdalus triloba** (Lindl.) Ricker——*Prunus triloba* Lindl.

生于海拔 2 100 米以下的山坡疏林内。分布于东北、华北及山东、江苏、安徽、浙江。

种子：润燥，滑肠，下气，利水。

## 杏属　Armeniaca Mill.

**杏**　杏树(救荒本草)，杏花(花镜)

**Armeniaca vulgaris** Lam.——*Prunus armeniaca* L.

全国各地均有栽培。

种子(苦杏仁)：苦，微温。有小毒。降气止咳平喘，润肠通便。用于咳嗽气喘，胸满痰多，血虚津枯，肠燥便秘。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**山杏**　野杏(通称)

**Armeniaca vulgaris** Lam. var. **ansu** (Maxim.) Yu et Lu——*Prunus armeniaca* L. var. *ansu* Maxim.

生于海拔 1 500--2 200 米的山坡、沟谷。分布于华北及陕西、甘肃、山东、江苏、安徽、河南。

种子(苦杏仁)：苦，微温，有小毒。平喘止咳，润肠通便。用于咳嗽气喘，胸满痰多，血虚津枯，肠燥便秘。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**毛叶杏**

**Armeniaca holosericea** (Batal.) Kost.——*Prunus armeniaca* Lam. var. *holosericea* Batal.

生于海拔 3 100—3 300 米的山坡、路旁、河边及村边。分布于四川、西藏。

种子：止咳，平喘，润肠。

**东北杏**　辽杏(中国树木分类学)

**Armeniaca mandshurica** (Maxim.) Sknortz.——*Prunus armenica* L. var. *mandshurica* Maxim.; *P. mandshurica* (Maxim.) Koehne

生于向阳山坡、林缘及灌丛中。分布于东北。亦有栽培。

种子(苦杏仁)：苦，微温。有小毒。降气止咳平喘，润肠通便。用于咳嗽多痰，胸满

痰多，血虚津枯，肠燥便秘。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**梅**　　梅树(浙江)

**Armeniaca mume** Sieb.——*Prunus mume* (Sieb.) Sieb. et Zucc.

长江流域以南各地均有栽培。

花蕾(梅花)：微酸、涩，平。开郁和中，化痰，解毒。用于郁闷心烦，肝胃气痛，梅核气，瘰疬疮毒。果实(乌梅)：酸、涩，平。敛肺，涩肠，生津，安蛔。用于肺虚久咳，虚热消渴，蛔厥呕吐腹痛，胆道蛔虫症。

附　注：梅花及乌梅均为《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**西伯利亚杏**　　山杏(东北木本植物图志)

**Armeniaca sibirica** (L.) Lam.——*Prunus sibiricus* L.

生于海拔 200—1 500 米的荒山丘陵、草原及灌丛中。分布于华北及黑龙江、辽宁。

种子(苦杏仁)：苦、微温。有小毒。降气止咳平喘，润肠通便。用于咳嗽气喘，胸满痰多，血虚津枯，肠燥便秘。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 假升麻属　Aruncus (L.) Schaeff

**假升麻**　　棣棠升麻(东北植物检索表)

**Aruncus sylvester** Kostel.

生于海拔 1 800—3 500 米的山沟、山坡杂木林下。分布于东北及陕西、甘肃、安徽、浙江、江西、河南、湖南、广西、四川、云南、西藏。

根(升麻草)：用于跌打损伤，劳伤，筋骨痛。

## 樱桃属　Cerasus Mill.

**欧洲甜樱桃**　　欧洲樱桃(经济植物手册)

**Cerasus avium** (L.) Moench——*Prunus avium* L.

原产欧洲及亚洲西部。东北、华北有栽培。

果实：生津，开胃，利尿。

**高盆樱**　　云南欧李(中国高等植物图鉴)

**Cerasus cerasoides** (D. Don) Sok.——*Prunus cerasoides* D. Don

生于海拔 1 300—2 200 米的山坡、疏林内或灌丛中。分布于云南、西藏。

种仁：润燥滑肠，下气利水。用于便秘，瘀血肿痛，跌打损伤，风痹，经闭。

**毛叶欧李**　　显脉欧李(华北经济植物志要)

**Cerasus dictyoneura** (Diels) Yu——*Prunus dictyoneura* Diels

生于海拔 400—1 600 米的山坡、旷野、草地及灌丛中。分布于河北、山西、陕西、甘肃、宁夏、河南。

种子：苦、甘，平。润燥清肠，下气，利水。用于大便秘结，水肿，尿少。

**麦李**

**Cerasus glandulosa** (Thunb.) Lois.——*Prunus glandulosa* Thunb.

生于海拔 2 300 米以下的山区、沟边或灌丛中。各地庭院常见栽培。分布于陕西、山东、江苏、安徽、浙江、福建、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

种子：辛、苦、甘，平。润燥滑肠，下气，利水。用于津枯肠燥，食积气滞，腹胀便秘，水肿，脚气，小便淋痛。

**欧李**

**Cerasus humilis** (Bunge) Sok.——*Prunus humilis* Bunge

生于海拔 100—1 800 米的山地阳坡、沙地及灌丛中。分布于东北及河北、内蒙古、山东、河南。

种子(郁李仁)：辛、苦、甘，平。润燥滑肠，下气，利水。用于津枯肠燥，食积气滞，腹胀便秘，水肿，脚气，小便淋痛。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**郁李**　　雀梅(群芳谱)，寿李(花镜)

**Cerasus japonica** (Thunb.) Lois.——*Prunus japonica* Thunb.

生于向阳山地，山麓路旁、林缘或灌丛中。分布于东北、华北、华东。

种子(郁李仁)：辛、苦、甘，平。润燥滑肠，下气，利水。用于津枯肠燥，食积气滞，腹胀便秘，水肿，脚气，小便淋痛。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**长梗郁李**

**Cerasus japonica** (Thunb.) Lois. var. **nakai** (Levl.) Yu et Li——*Prunus nakai* Levl.

生于向阳山坡。分布于东北。

种子：润燥滑肠。

**黑樱桃**　　深山樱(植物学大辞典)

**Cerasus maximowiczii** (Rupr.) Kom.——*Prunus maximowiczii* Rupr.

生于山坡、林间、林缘及灌丛中。分布于东北。

果实：收敛止汗。

**樱桃**　　樱珠(江苏)，樱球(浙江)

**Cerasus pseudocerasus** (Lindl.) G. Don——*Prunus pseudocerasus* Lindl.

辽宁、河北、陕西、甘肃、山东、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北、湖南、四川均有栽培。

果核(樱桃核)：辛，热。发表，透疹。用于麻疹不透。　叶：平喘，杀虫。用于慢性咳嗽痰喘，阴道滴虫。　果实：甘，温。益气，祛风湿。

**山樱**

**Cerasus serrulata** (Lindl.) G. Don——*Prunus serrulata* Lindl.

生于海拔 400—800 米的山坡及林中。分布于黑龙江、辽宁、河北、山西、陕西、山东、浙江。

种子：解毒，利尿，透疹。

**四川樱**　　盘脉野樱桃(宁夏)

**Cerasus szechuanica** (Batal.) Yu et Li——*Prunus szechuanica* Batal.

生于海拔 1 500—2 600 米的山区、林中及林缘。分布于陕西、河南、湖北、四川。

根、果实、种子：清热，益肾，调经活血。

**天山樱桃**

**Cerasus tianschanica** Pojark.——*Prunus tianschanica* (Pojark.) Yu et Li

生于海拔 700—1 600 米的山坡、草地及林中。分布于新疆。

种子：润肠，解毒，透疹。

**毛樱桃**

**Cerasus tomentosa** (Thunb.) Wall.——*Prunus tomentosa* Thunb.

生于海拔 100—3 200 米的林中、林缘、草地及灌丛中，亦有栽培。分布于东北、华北、西南及陕西、甘肃、宁夏、青海、山东、江苏、河南、湖北。

种子(郁李仁)：辛，平。润燥滑肠，下气，利水。用于津枯肠燥，食积气滞，腹胀便秘，水肿，脚气，小便淋痛不利。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 木瓜属　Chaenomeles Lindl.

**木瓜**　　榠楂、木李(浙江)，海棠(广东)，木李(诗经)

**Chaenomeles sinensis** (Thoin) Koehne——*Cydonia sinensis* Thoin

陕西、山东、江苏、安徽、浙江、湖北、广东、广西均有栽培。

果实(光皮木瓜)：酸、涩，温。和脾敛肺，平肝舒筋，清暑消毒，祛风湿。用于吐泻腹痛，风湿关节痛，腰膝酸痛。

**皱皮木瓜**　　贴梗海棠(通称)，贴梗木瓜(中国高等植物图鉴)

**Chaenomeles speciosa** (Sweet) Nakai——*Cydonia speciosa* Sweet; *Cydonia lagenaria* Loisel.; *Chaenomeles legenaris* (Loisel.) Koidz.

陕西、甘肃、浙江、广东、四川、贵州、云南均有栽培。

果实(木瓜)：酸，温。平肝舒筋，和胃化湿。用于腓肠肌痉挛，吐泻腹痛，风湿关节痛，腰膝酸痛。

附　注①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②功效相同的有**毛叶木瓜 Chaenomeles cathayensis** (Hemsl.) Schneid.——*Cydonia cathayensis* Hemsl.，分布于陕西、甘肃、江西、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

**西藏木瓜**

**Chaenomeles thibetica** Yü

生于海拔 2 600—2 760 米的山坡、林下、涧谷、灌丛中。分布于四川西部、西藏南部和东部。

果实：舒筋，化温，和胃。

## 地蔷薇属　Chamaerhodos Bunge

**地蔷薇**　　直立地蔷薇(河北),追风蒿(内蒙古)

**Chamaerhodos erecta** (L.) Bunge——*Sibbalsia erecta* L.

生于海拔 2 500 米上下的山坡、丘陵或干旱河滩。分布于华北、西北及河南。

全草(地蔷薇):苦、微辛,温。祛风除湿。用于黄疸,风湿关节痛。

## 无尾果属　Coluria R. Br.

**无尾果**

**Coluria longifolia** Maxim.

生于海拔 2 700—4 100 米的高山草原。分布于甘肃、青海、四川、云南、西藏。

全草:苦,凉。止血,止痛,清热解毒,平肝熄风。用于高血压症,肝炎。

## 沼委陵菜属　Comarum L.

**沼委陵菜**

**Comarum palustre** L.

生于沼泽及泥炭沼泽。分布于东北及河北、内蒙古。

全草:止血,止泻。

## 栒子属　Cotoneaster (B. Ehrh.) Medik.

**灰栒子**

**Cotoneaster acutifolius** Turcz.

生于海拔 1 400—3 700 米的山坡、山麓、山沟及丛林中。分布华北及陕西、甘肃、青海、河南、湖北、西藏。

枝叶、果实(灰栒子):苦、涩,平。凉血止血。用于鼻衄,牙龈出血,月经过多。

**川康栒子**　　四川栒子(中国高等植物图鉴)

**Cotoneaster ambiguus** Rehd. et Wils.

生于海拔 1 800—2 900 米的山地、半阳坡及稀疏林中。分布于陕西、甘肃、四川、贵州、云南。

叶、果实:清热解毒,消肿止痛。

**泡叶栒子**

**Cotoneaster bullatus** Boiss.

生于海拔 2 000—3 200 米的坡地疏林中、河岸旁或山沟边。分布于湖北、四川、云南、西藏。

根、叶:清热解毒,止痛。

**厚叶栒子**

**Cotoneaster coriaceus** Franch.

生于海拔 1 800—2 700 米的沟边草坡或丛林中。分布于四川、贵州、云南。

根(野苦梨根): 苦,凉。消肿,解毒。用于红肿恶疮。

**西南栒子**

**Cotoneaster franchetii** Boiss.

生于海拔 2 000—2 900 米的多石向阳地灌丛中。分布于四川、贵州、云南。

根(马蝗果): 苦、涩,凉。清热解毒,消肿止痛。用于疔腮,瘰疬,瘾疹。

**粉叶栒子**

**Cotoneaster glaucophyllus** Franch.

生于海拔 1 200—2 800 米的山坡杂木林中。分布于广西、四川、贵州、云南。

根、茎: 用于消化不良,食滞。胃脘胀满。

**细弱栒子**　　细枝栒子(四川),细弱灰栒子(华北经济植物志要)

**Cotoneaster gracilis** Reng. et Wils.

生于海拔 1 000—3 000 米的山坡、河滩地及灌丛中。分布于陕西、甘肃、湖北、四川。

叶、果实: 止血,接骨。

**蒙自栒子**　　华西栒子(经济植物手册)

**Cotoneaster harrovianus** Wils.

生于海拔1 600—2 100米的山地。分布于云南。

根: 苦,凉。消肿解毒。用于红肿恶疮。

**平枝栒子**　　栒刺子(四川),矮红子(贵州)

**Cotoneaster horizontalis** Decne.

生于海拔 2 000—3 500 米的灌丛中或岩石坡上。分布于陕西、甘肃、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

根(水莲沙根)、全草(水莲沙): 酸、涩,凉。清热化湿,止血止痛。用于泄泻,腹痛,吐血,痛经,带下病。

**小叶平枝栒子**　　小叶栒刺木(中国树木分类学)

**Cotoneaster horizonatalis** Decne var. **perpusillus** Schneid.

生于海拔 1 500—2 400 米的山岩上或山坡多石地带。分布于陕西、湖北、四川、贵州、云南。

根(地红子根): 酸、涩,凉。清热除湿。用于泄泻,痢疾,吐血。

**全缘栒子**　　全缘栒子木(东北木本植物图志)

**Cotoneaster integerrimus** Medic.

生于海拔 2 500 米上下的石质山坡、沙地或林缘灌丛中。分布于东北及内蒙古、河北、新疆。

枝叶、果实: 祛风湿,止血,消炎。

**黑果栒子**　　黑果灰栒子(华北经济植物志要)

**Cotoneaster melanocarpus** Lodd.

生于海拔 700—2 600 米的山坡、疏林间或灌丛中。分布于黑龙江、吉林、河北、内蒙古、甘肃、新疆。

枝叶、果实：祛风湿，止血，消炎。用于风湿痹痛，刀伤出血。

**小叶栒子**　黑牛筋、刀口药(云南)

**Cotoneaster microphyllus** Wall. ex Lindl.

生于海拔 2 500—4 100 米的多石山坡地、灌丛中。分布于四川、云南、西藏。

叶(耐冬果)：甜、微酸、涩，温。有毒。止血，生肌。用于刀伤出血。

**宝兴栒子**　木坪栒子(经济植物手册)

**Cotoneaster moupinensis** Franch.

生于海拔 1 700—3 200 米的疏林缘或松林下。分布于陕西、甘肃、四川、贵州、云南。

全株：用于风湿关节痛。

**水栒子**　灰栒子、香李(河南)，多花栒子(经济植物手册)

**Cotoneaster multiflorus** Bunge

生于海拔 1 200—3 500 米的沟谷、山坡杂木林中。分布于华北、西北及黑龙江、辽宁、河南、四川、云南、西藏。

枝叶：用于烫伤，烧伤。

**柳叶栒子**　山米麻、木帚子(四川)

**Cotoneaster salicifolius** Franch.

生于海拔 1 800—3 000 米的山地或沟边杂木林中，分布于湖北、湖南、四川、贵州、云南。

全株(翻白柴)：苦，凉。除风热，祛风湿，止血利尿。用于干咳失音，湿热发黄，肠风下血，小便短少。

**西北栒子**　土兰条(河南)

**Cotoneaster zabelii** Schneid.

生于海拔 800—2 500 米的石灰岩山地、山坡阴地、沟谷边或灌丛中。分布于河北、山西、陕西、甘肃、宁夏、山东、河南、湖北、湖南。

枝叶、果实：止血，凉血。

## 山楂属　Crataegus L.

**阿尔泰山楂**

**Crataegus altaica** (Loud.) Lange——*C. purpurea* Bosc. ex DC. var. *altaica* Loud.

生于海拔 450—1 900 米的山坡、林下或河沟旁。分布于新疆。

果实：健胃消食，止痢止泻，降血压。

**野山楂**　小叶山楂、牧虎梨(河南)，红果子(贵州)，猴楂(江西)

**Crataegus cuneata** Sieb. et Zucc.

生于海拔 250—2 000 米的山谷、多石湿地或山地灌丛中。分布于中南及江苏、安徽、浙江、福建，贵州、云南。

果实(山楂)：酸、甘，微温。消食健胃，行气散瘀。用于肉食积滞，脘腹痞满，血瘀，产

后腹痛，恶露不净。

**光叶山楂**

**Crataegus dahurica** Koehne ex Schneid.

生于海拔 500—1 000 米的河岸林间草地或沙丘坡上。分布于黑龙江、内蒙古。

果实：健胃消食。

**湖北山楂**　猴楂子(浙江)，大山枣(江西)

**Crataegus hupehensis** Sarg.

生于海拔 500—2 000 米的山坡灌丛中。分布于山西、陕西、江苏、浙江、江西、河南、湖北、湖南、四川。

果实：酸、甘，微温。破气散瘀，消积，化痰。用于痢疾，产后瘀痛，绦虫病，高血压症，肉食积滞，肝脾肿大，血脂偏高。

**甘肃山楂**　面旦子(陕西)

**Crataegus kansuensis** Wils

生于海拔 1 000—3 000 米的杂木林中、山坡阴处及山沟旁。分布于河北、山西、陕西、甘肃、四川、贵州。

果实：消食化滞，散瘀止血。用于消化不良。

**毛山楂**

**Crataegus maximowiczii** Schneid.

生于海拔 200—1 000 米的杂木林中或林缘、河岸边及路边。分布于东北及内蒙古。

果实：消积，降压，开胃。用于肉食积滞，高血压症，脾胃虚弱。

**滇西山楂**

**Crataegus oresbia** W. W. Smith

生于海拔 2 500—3 300 米的山坡灌丛中。分布于云南。

果实：消食健胃。用于肉积，痰饮，痞满，泄泻，小儿乳食停滞。

**山楂**　山里红(东北植物检索表)

**Crataegus pinnatifida** Bunge

生于海拔 100—1 500 米的山坡林边或灌丛中。分布于东北、华北及陕西、山东、江苏、河南。

果实(山楂)：酸、甘，微温。消食健胃，行气散瘀。用于肉食积滞，脘腹痞满，血瘀，产后腹痛，恶露不尽。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。② 功效相似的有**桔红山楂 C. aurantia** Pojark.，分布于河北、山西、陕西、甘肃；**无毛山里红 C. pinnatifida** Bunge var. **pilosa** Schneid.，分布于东北。

**山里红**　红果、棠棣(河北)，大山楂(江苏)

**Crataegus pinnatifida** Bunge var. **major** N. E. Br.

生于山坡灌丛中。分布于河北、江苏。亦有栽培。

果实(山楂)：酸、甘，微温。消食健胃，行气散瘀。用于肉食积滞，脘腹痞满，血瘀，产后腹痛，恶露不净。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**辽宁山楂**

**Crataegus sanguinea** Pall.

生于海拔 900—2 100 米的山坡或河沟旁杂木林中。分布于东北及河北、内蒙古、新疆。

果实：健胃消食。

**云南山楂**　　大果山楂、酸冷果(广西)，山林果(云南)

**Crataegus scabrifolia** (Franch.) Rehd.——*Pyrus scabrifolia* Franch.

生于海拔 1 500—3 000 米的松林边灌丛中或溪岸杂木林中。分布于广西、四川、贵州、云南。

果实：消食化积，散瘀。

附　注：四川省药材标准规定作山楂药用。

**准噶尔山楂**

**Crataegus songorica** Koch

生于海拔 500—2 000 米的河谷或峡谷灌丛中。分布于新疆。

果实：健胃消食，止痢止泻，降血压。

**华中山楂**

**Crataegus wilsonii** Sarg.

生于海拔 1 000—2 500 米的山坡阴处密林中。分布于陕西、甘肃、浙江、河南、湖北、四川、云南。

果实：酸、甘，微温。破气散瘀，消积，化痰。用于肉食积滞，脘腹痞满，血瘀，产后腹痛，恶露不净。

## 榅桲属　Cydonia Mill.

**榅桲**

**Cydonia oblonga** Mill.

陕西、新疆、江西、福建、贵州、云南均有栽培。

果实(榅桲)：酸、甘，微温。下气，消食，收敛。用于呕吐酸水，食积胸闷。　树皮(榅桲皮)：(捣末敷疮)用于黄水疮。

附　注：功效相似的有**梨形榅桲 C. oblonga** Mill. var. **pyriformis** Rehd.，陕西、新疆有栽培。

**苹果形榅桲**

**Cydonia oblonga** Mill. var. **maliformis** Schneid.

陕西、新疆、江西、福建、贵州、云南均有栽培。

果实：舒筋活络，祛湿解暑，消食。

## 木瓜属　Docynia Decne.

**云南木瓜**

**Docynia delavayi** (Franch.) Schneid.——*Pirus delavayi* Franch.

生于海拔 1 000—3 000 米的山谷、溪旁、灌丛中或路旁杂木林中。分布于四川、贵州、云南。

茎叶(栘桉): 酸、涩,凉。消炎,收敛,接骨。用于烧伤,骨折。　果实(栘桉果): 酸,凉。舒筋活血,消食健胃,驱虫。用于风湿关节痛,蛔虫病,疳积。

**栘桉**　红叶栘桉(经济植物志)

**Docynia indica** (Wall.) Decne.——*Pyrus indica* Wall.

生于海拔 2 000—3 000 米的山坡、溪边及丛林中。分布于四川西南部、云南东北部。

果实: 消食健胃,收敛杀菌。用于烫伤,湿疹,腹泻。

## 蛇莓属　Duchesnea J. E. Smith

**蛇莓**　蛇杨梅、三叶蛇扭(浙江)

**Duchesnea indica** (Andr.) Focke——*Fragaria indica* Andr.

生于海拔 1 800 米以下的山坡、河岸、草地及潮湿处。分布于华北、西北、华东、中南、西南及辽宁。

全草(蛇莓): 微酸、涩,寒。有小毒。清热解毒。用于白喉,痢疾,目赤,烫伤。

**皱果蛇莓**

**Duchesnea chrysantha** (Zoll. et Mor.) Miq.——*Fragaria chrysantha* Zoll. et Mor.

生于草地上。分布于陕西、福建、台湾、广东、广西、四川、云南。

茎叶: 用于毒蛇咬伤,烫伤,疔疮。

## 枇杷属　Eriobotrya Lindl.

**大花枇杷**　山枇杷(江西、湖北、广西)

**Eriobotrya cavaleriei** (Lévl.) Rehd.——*Hiptage cavaleriei* Lévl.

生于海拔 500—2 000 米的山坡、河边的杂木林中。分布于江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

果实: 用于热病。

**台湾枇杷**　山枇杷、野枇杷(江西)

**Eriobotrya deflexa** (Hemsl.) Nakai——*Photinia deflexa* Hemsl.

生于海拔 1 000—1 800 米的山坡及山谷阔叶杂木林中。分布于江西、台湾、广东、广西。

果实: 清热。用于发热。

**枇杷**　卢桔(通称)

**Eriobotrya japonica** (Thunb.) Lindl.——*Mespilus japonica* Thunb.

陕西、甘肃、江苏、上海、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南均有栽培。湖北、四川有野生。

叶(枇杷叶): 苦,微寒。清肺止咳,降逆止呕。用于咳嗽痰喘,多痰,呕吐。 果实: 用于发热。

附 注: ①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。 ② 功效相似的有**怒江枇杷 E. salwinensis** Hand.-Mazz., 分布于云南西北部,也有栽培。

## 白鹃梅属 Exochorda Lindl.

**白鹃梅** 茧子花(江苏、浙江),九活头(安徽),金瓜果(浙江)

**Exochorda racemosa** (Lindl.) Rehd.——*Amelanchier racemosa* Lindl.; *Exochorda grandiflora* Lindl.

生于海拔 250—500 米的山坡阴地、山麓灌丛中或草坡上,也生于裸岩附近。分布于江苏、浙江、江西、河南。

根皮、树皮: 用于腰骨酸痛。

## 蚊子草属 Filipendula Adans.

**细叶蚊子草**

**Filipendula angustiloba** (Turcz.) Maxim.——*Spiraea angustiloba* Turcz.

生于海拔 600—1 300 米的草甸、河边、林区湿地。分布于黑龙江、内蒙古。

花: 止血。用于各种出血。

**棣白蚊子草**

**Filipedula intermedia** (Glehn) Juzep. ——*Spiraea digitata* Willd. var. *intermedia* Glehn

生于山岗灌丛、草甸及河岸边。分布于黑龙江、吉林。

根、全草: 用于风湿关节痛,刀伤出血,驱蚊。 叶: 发汗。用于发热,冻伤,烧伤。

**蚊子草** 合叶子(拉汉种子植物名称)

**Filipendula palmata** (Pall.) Maxim.——*Spiraea palmata* Pall.

生于海拔 200—2 000 米的林缘、山坡草地、河岸边及草甸等湿地。分布于东北、华北。

根、全草: 用于风湿关节痛,各种出血,驱蚊。 叶: 发汗。用于热病,冻伤,烧伤。

附 注: 功效相似的有**槭叶蚊子草 F. purpurea** Maxim., 分布于东北。

**光叶蚊子草** 绿叶蚊子草(吉林)

**Filipendula palmata** (Pall.) Maxim. var. **glabra** Ledeb. ex Kom.——*F. nuda* Grub.

生于海拔 400—2 300 米的沟边、林缘、河边、草甸等湿地。分布于东北及华北。

根、全草: 用于风湿痹痛,刀伤出血,驱蚊。 叶: 发汗。用于热病,冻疮,烧伤。

**旋果蚊子草** 榆叶蚊子草(新疆)

**Filipendula ulmaria** (L.) Maxim.——*Spiraea ulmaria* L.

生于海拔 1 200—2 400 米的山谷阴处、沼泽、林缘及水边。分布于新疆。

根、花: 止血消炎,发汗解毒。

## 草莓属 Fragaria L.

**草莓** 凤梨草莓(通称)

**Fragaria ananassa** Duch.——*F. grandiflora* Ehrh.

原产南美。全国均有栽培。

果实: 清凉止渴,健胃消食。

**西南草莓**

**Fragaria moupinensis** (Franch.) Gard.——*Potentilla moupinensis* Franch.

生于海拔 1 400—4 000 米的林下、草地、山坡。分布于陕西、甘肃、四川、云南、西藏。

全草: 祛风止咳,清热解毒。

**黄花草莓** 白草莓(四川),锈毛草莓(秦岭植物志)

**Fragaria nilgerrensis** Schlecht. ex Gay

生于海拔 700--3 000 米的山坡草地及沟边林下。分布于陕西、台湾、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

全草(白草莓): 甘、苦,寒。清热解毒,祛风止咳。用于风热咳嗽,顿咳,口腔破溃,痢疾,尿血,疮疖。

**粉叶黄花草莓** 白蔗(云南)

**Fragaria nilgerrensis** Schlecht. ex Gay var. **mairei** (Lévl.) Hand.-Mazz.——*F. mairei* Lévl.

生于海拔 800—2 700 米的山坡草地、沟谷、灌丛及林缘。分布于陕西、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

全草: 消炎解毒,续筋接骨。

**东方草莓**

**Fragaria orientalis** Lozinsk.

生于海拔 600—4 000 米的山坡草地或林下。分布于东北、华北及陕西、甘肃、青海、山东、湖北、四川。

果实: 止渴生津,祛痰。

**野草莓** 欧洲草莓(经济植物手册)

**Fragaria vesca** L.

生于潮湿山坡、草地、灌丛中或林下。分布于吉林、陕西、甘肃、新疆、四川、贵州、云南。

果实: 清热解毒,补肺利咽。

## 路边青属 Geum L.

**路边青** 水杨梅(通称),兰布政(云南)

**Geum aleppicum** Jacq.

生于海拔 200—3 500 米的山坡草地、沟边、地迾、河滩、林间隙地及林缘。分布于东

北、西南及内蒙古、山西、陕西、甘肃、新疆、山东、河南、湖北。

根、全草(五气朝阳草)：甘、辛，平。祛风除湿，活血消肿。用于腰腿痹痛，痢疾，带下病，跌打损伤，痈疽疮疡，咽喉痛，瘰疬。

**柔毛水杨梅**　　黄梅球、水球花(浙江)，追风七(陕西)

**Geum japonicum** Thunb. var. **chinense** F. Bolle

生于海拔200—2 300米的山坡草地、田边、河边、灌丛及疏林下。分布于华东、中南及陕西、甘肃、新疆、四川、贵州、云南。

全草、根(柔毛水杨梅)：辛、甘，平。降压，镇痉，止痛，消肿解毒。用于小儿惊风，高血压症，跌打损伤，风湿痹痛，疮疖肿毒。

**紫萼路边青**　　垂花水杨梅(新疆)

**Geum rivale** L.

生于海拔1 200—2 300米的林缘、水边、山坡及草地。分布于新疆。

全草：清热解毒，祛湿消肿。

## 棣棠花属　Kerria DC.

**棣棠花**　　鸡蛋黄花、土黄条(陕西)

**Kerria japonica** (L.) DC.——*Rubus japonicus* L.

生于海拔200—3 000米的山坡林缘、水沟边、疏林灌丛及岩间灌丛中。分布于华东及陕西、甘肃、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

枝叶、花(棣棠花)：微苦、涩，平。止咳化痰，健脾，驱风，清热解毒。用于肺热咳嗽，消化不良，风湿痹痛，痈疽肿毒，癞疹，湿疹。

附　注：功效相似的有**重瓣棣棠花 K. japonica** (L.) DC. f. **pleniflora** (Witte) Rehd.，分布于安徽、湖南、四川、云南。

## 桂樱属　Laurocerasus Tourn. ex Duh.

**腺叶桂樱**

**Laurocerasus phaeosticta** (Hance) Schneid.——*Pygeum phaeosticta* Hance

生于海拔300—2 000米的疏杂木林内、丘陵和山地密林中。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、贵州、云南。

种子：用于闭经，疮疡肿毒，大便燥结。

**刺叶桂樱**　　槚木(通称)，甜珠(浙江)

**Laurocerasus spinulosa** (Sieb. et Zucc.) Schneid.——*Prunus spinulosa* Sieb. et Zucc.

生于海拔200—1 400米的山坡及溪谷混交林内或疏林缘。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

种子：用于痢疾。

## 苹果属 Malus Mill.

**花红** 沙果(河北),文林郎果(本草纲目)

**Malus asiatica** Nakai

生于海拔 50—2 800 米的山坡阳处、平原砂地。分布于华北及辽宁、陕西、甘肃、山东、河南、湖北、四川、贵州、云南。

果实: 酸、甘,平。止渴,化滞,涩精。用于消渴,泄泻,遗精。

**山荆子** 山定子(河北),林荆子(经济植物学)

**Malus baccata** (L.) Borkh.——*Pyrus baccata* L.

生于海拔 50—1 500 米的山坡杂木林及山谷阴处灌丛中。分布于东北、华北及陕西、甘肃、山东。

果实: 用于吐泻,细菌感染。

附 注: 功效相似的有**毛山荆子 M. mandshurica** (Maxim.) Kom., 分布于山西、内蒙古、陕西、甘肃。

**台湾林檎** 台湾海棠(广州植物志)

**Malus doumeri** (Boiss.) Chev.——*Pirus doumeri* Boiss.; *M. formosana* (Kaw. et Koidz.) Kaw. et Koidz.

生于海拔 1 000—2 000 米的林中。分布于台湾。

果实: 甘、酸、涩,微温。理气健脾,消食导滞。用于消化不良。

**垂丝海棠**

**Malus halliana** Koehne

生于海拔 50—1 200 米的山坡丛林中或山溪边。也有栽培。分布于陕西、江苏、安徽、浙江、云南。

花(垂丝海棠): 淡、苦,平。调经活血。用于红崩。

**湖北海棠** 小石枣(甘肃),野花红(浙江),花红茶(湖北),茶海棠(中国植物图谱)

**Malus hupehensis** (Pamp.) Rehd.——*Pirus hupehensis* Pamp.

生于海拔 50—2 900 米的山坡或山谷丛林中。分布于华东及陕西、甘肃、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

根、果实: 活血,健胃。用于食滞,筋骨扭伤。

**尖嘴林檎**

**Malus melliana** (Hand.-Mazz.) Rehd.——*Pirus melliana* Hand.-Mazz.

生于海拔 700—2 400 米的山地混交林中或山谷沟边。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖南、广东、广西、云南。

根: 苦、涩,平。解毒,收敛。用于吐泻,痢疾。

**西府海棠** 子母海棠(河北),海红(本草纲目)

**Malus micromalus** Makino

生于海拔 100—2 400 米的平原或山地。分布于辽宁、河北、山西、陕西、甘肃、山东、云南。亦有栽培。

果实：酸、甘，平。用于泄痢。

**楸子**　　海棠果(河北)

**Malus prunifolia** (Willd.) Borkh.——*Pyrus prunifolia* Willd.

生于海拔50—1 300米的山坡、平地或山谷梯田边。分布于华北及辽宁、陕西、甘肃、山东、河南。

果实：甘、酸，平。清凉止渴，补血。

**苹果**　　柰(西京杂记)

**Malus pumila** Mill.

原产欧洲和亚洲西部。辽宁、河北、山西、陕西、甘肃、山东、四川、云南、西藏均有栽培。

果实：甘，凉。生津润肺，除烦，解暑，开胃，醒酒。

**丽江山荆子**　　李仁(云南)，喜马拉雅山荆子(中国树木分类学)

**Malus rockii** Rehd.

生于海拔2 400—3 800米的山谷杂木林中。分布于四川西南部、云南西北部、西藏东南部。

种仁：活血祛瘀。用于跌打损伤。

**海棠花**

**Malus spectabilis** (Ait.) Borkh.——*Pyrus spectabilis* Ait.

生于海拔50—2 000米的平原或山地。分布于河北、陕西、山东、江苏、浙江、云南。华北、华东各地常有栽培。

果实：理气健脾，消食导滞。

**滇池海棠**　　云南海棠(经济植物手册)

**Malus yunnanensis** (Franch.) Schneid.——*Pyrus yunnanensis* Frunch.

生于海拔1 600—3 800米间的山坡杂木林中或山谷沟边。分布于四川、云南。

果实：健胃消积，行瘀定痛。

## 绣线梅属　Neillia D. Don

**毛叶绣线梅**

**Neillia ribesioides** Rehd.

生于海拔1 000—2 500米的山地丛林中。分布于陕西、甘肃、湖北、四川、云南。

根：酸、苦，温。利水除湿，清热止血。用于水肿，咳血。

**中华绣线梅**

**Neillia sinensis** Oliv.

生于海拔1 000—2 500米的山坡杂木林或河岸边及河岸灌丛中。分布于中南及陕西、甘肃、四川、贵州、云南。

根(钓杆柴)：苦、酸、甘，凉。利水除湿，清热止血。用于水肿，咳血。

**绣线梅**　　复序南梨(经济植物手册)

**Neillia thyrsiflora** D. Don

生于海拔 1 000—3 000 米的山地丛林中。分布于云南西北部。

花：用于肺痨。

## 小石积属 Osteomeles Lindl.

**华西小石积** 沙糖果、黑果、糊砂石(云南)

**Osteomeles schwerinae** Schneid.

生于海拔 1 500—3 600 米的山坡灌丛中或田边路旁向阳干燥处。分布于陕西南部、甘肃东南部、四川、贵州、云南。

根及叶(黑果)：微涩，平。清热解毒，收敛止泻，祛风除湿。用于痢疾，泄泻，疟腮，肠风下血，水肿，关节痛，阴挺，宫寒不孕，外伤出血。

## 稠李属 Padus Mill.

**短柄稠梨**

**Padus brachypoda** (Batal.) Schneid.——*Prunus brachypoda* Batal.

生于海拔 1 000—3 100 米的的山坡、山沟及林中。分布于陕西、甘肃、河南、湖北、四川、云南。

根、叶及果实：用于筋骨扭伤。

**稠李** 臭李子(东北)，臭耳子(甘肃)，稠梨(中国树木分类学)

**Padus racemosa** (Lam.) Gilib.——*Prunus racemosa* Lam.; *Prunus padus* L.

生于海拔 200—2 500 米的山坡、谷地、林中及灌丛中。分布于东北、华北及陕西、甘肃、新疆、山东、河南。

叶：镇咳祛痰。

**北亚稠李**

**Padus racemosa** (Lam.) Gilib. var. **asiatica** (Kom.) Yu et Ku——*Padus asiatica* Kom.

生于海拔 500—2 800 米的山坡、沟边、杂木林内及灌丛中。分布于东北、华北及陕西、甘肃、新疆。

果实：酸，平。补脾胃，止泄泻。用于泄泻，痢疾。

## 石楠属 Photinia Lindl.

**中华石楠** 假思桃(广东)，牛筋木(广西)

**Photinia beauverdiana** Schneid.

生于海拔 1 000—1 700 米的山坡或山谷林下。分布于中南及陕西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、四川、贵州、云南。

根：辛、苦，平。有小毒。祛风止痛，补肾强筋。

**厚叶石楠** 玉枇杷(贵州)

**Photinia crassifolia** Lévl.

生于海拔 500—1 700 米的向阳山坡丛林中。分布于广西、贵州、云南。

花、果实：用于久咳不止。

**椤木石楠**　椤木(浙江)，凿树(广东)，山官木(广西)，水红树花(四川)

**Photinia davidsoniae** Rehd.

生于海拔 600—1 000 米的灌丛中。分布于陕西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖南、湖北、广东、广西、四川、云南。

根及叶：清热解毒。用于痈肿疮疖。

**光叶石楠**　扇骨木(江苏)，石斑木(广东)，山官木(广西)，红檬子(四川)

**Photinia glabra** (Thunb.) Maxim.——*Crataegus glabra* Thunb.

生于海拔 500—800 米的山坡杂木林中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根：辛、苦，平。有小毒。祛风止痛，补肾强筋。

**广西石楠**

**Photinia kwangsiensis** Li

生长于海拔 3 000 米上下的河边混交林中。分布于广西。

叶：用于风湿关节痛。

**小叶石楠**　牛李子(湖南)，山红子(贵州)，牛筋木(四川)

**Photinia parvifolia** (Pritz.) Schneid.——*Pourthiaea parvifolia* Pritz.

生于海拔 1 000 米以下的低山丘陵灌丛中。分布于中南及江苏、安徽、浙江、江西、台湾、四川、贵州。

根(小叶石楠)：苦、涩，凉。行血活血，止痛。用于黄疸，乳痈，牙痛。

**绒毛石楠**

**Photinia schneideriana** Rehd.

生于海拔 1 000—1 500 米的山坡疏林中。分布于浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、四川。

根皮：用于内热。

**石楠**　将军柴(浙江)

**Photinia serrulata** Lindl.

生于山坡杂木林中及溪谷边林缘、山麓旷野。分布于中南及陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、四川、贵州、云南。

叶(石楠叶)：辛、苦，平。有小毒。祛风止痛，补肾强筋。用于肾虚脚软，风痹，腰背酸痛。

**毛叶石楠**　鸡丁子、吉铃子(山东)，细毛扇骨木(江苏)

**Photinia villosa** (Thunb.) DC.——*Crataegus villosa* Thunb.

生于海拔 800—1 200 米山坡灌丛中。分布于华东及甘肃、河南、湖北、湖南、广东、贵州、云南。

根：苦，平。除湿，止痢。用于呕吐，泄泻，痢疾。

**无毛毛叶石楠**　庐山石楠(中国树木分类学)

**Photinia villosa** (Thunb.) DC. var. **sinica** Rehd. et Wils.

生于海拔 1 000—1 500 米的山坡疏林中。分布于陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

根、果实：用于劳伤疲乏。

## 委陵菜属 Potentilla L.

**星毛委陵菜** 无茎委陵菜(新疆)

**Potentilla acaulis** L.

生于海拔 580—3 000 米的山坡草地、砂原草滩、黄土坡、多砾石瘠薄山坡。分布于华北及黑龙江、陕西、甘肃、青海、新疆。

全草：清热解毒，止血止痢。

**蕨麻** 鹅绒委陵菜、莲花菜(河北)，人参果、延寿草(秦岭植物志)

**Potentilla anserina** L.

生于海拔 500—1 400 米的河岸、路边、山坡草地及草甸。分布于东北、华北、西北及四川、云南、西藏。

块根(蕨麻)：甘，平。健脾益胃，生津止渴。用于贫血，营养不良。

**白萼委陵菜** 白叶委陵菜(东北草本植物志)

**Potentilla betonicifolia** Poir.——*P. leucophylla* Pall.

生于海拔 700—1 600 米的山坡草地及岩石缝间。分布于东北及河北、内蒙古。

全草：苦、辛，微温。消肿利水。用于各种水肿。

**二裂叶委陵菜** 痔疮草(陕北)

**Potentilla bifurca** L.

生于海拔 800—3 600 米的地边、道旁、沙滩、山坡、草地、黄土坡上、半干旱荒漠草原及疏林下。分布于华北、西北及黑龙江、四川。

全草：甘、微辛，凉。止血，止痢。用于崩漏，产后出血。

**长叶二裂委陵菜** 光叉叶委陵菜(吉林)，高二裂委陵菜(内蒙古植物志)

**Potentilla bifurca** L. var. **major** Ledeb.

生于海拔 400—3 200 米的耕地道旁、河滩沙地及山坡草地。分布于华北及黑龙江、吉林、陕西、甘肃、新疆。

全草：止血，止痢。

**委陵菜** 一白草、生血丹、扑地虎(陕西)

**Potentilla chinensis** Ser.

生于海拔 400—3 200 米的山坡草地、沟谷、林缘、灌丛或疏林下。分布于东北、华北、中南、西南及陕西、甘肃、山东、江苏、安徽、浙江、江西、台湾。

全草(委陵菜)：苦，寒。清热解毒，凉血止痛。用于赤痢腹痛，久痢不止，痔疮出血，痈肿疮毒。

附 注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。② 功效相似的有**皱叶委陵菜 P. ancistrifolia** Bunge，分布于东北及河北、山西、陕西、甘肃、河南、湖北、四川；**薄叶委**

**陵菜 P. ancistrifolia** Bunge var. **dickinsii** (Franch. et Sav.) Koidz.，分布于辽宁、河北、山西、陕西、甘肃、安徽、河南；**轮叶委陵菜 P. verticillaris** Steph. ex Willd.，分布于黑龙江、吉林、河北、内蒙古。

**黄花委陵菜**　亚洲委陵菜(新疆)

**Potentilla chrysantha** Trev.——*Potentilla asiatica* (Wolf.) Juzep

生于海拔 1 000—2 200 米的林缘、草地、河谷及水渠边。分布于新疆。

全草：清热解毒，收敛止血。

**大萼委陵菜**　大头委陵菜(东北草本植物志)

**Potentilla conferta** Bunge

生于耕地边、山坡草地、沟谷、草甸及灌丛中。分布于华北及黑龙江、陕西、甘肃、新疆、四川、云南、西藏。

根：苦、酸，凉。清热，凉血，止血。用于崩漏，鼻衄。

**狼牙委陵菜**

**Potentilla cryptotaeniae** Maxim.

生于海拔 1 000—2 000 米的河谷、草甸、草原及林缘。分布于东北及陕西、甘肃、四川。

根：抗菌消炎，止血，驱虫。　全草：解毒。

**翻白草**　鸡腿根、天藕(陕西)，叶下白、鸡爪参(湖南)

**Potentilla discolor** Bunge

生于海拔 100—1 850 米的荒地、山谷、沟边、山坡草地、草甸及疏林下。分布于华北、华东及黑龙江、辽宁、陕西、河南、湖北、湖南、广东、四川。

全草(翻白草)：甘、微苦，凉。清热解毒，消肿，止血，凉血。用于痢疾，疟疾，肺痈，咳血，吐血，崩漏，痈肿，疮癣，瘰疬。

**细枝委陵菜**　鸡儿头苗、蔓委陵菜(东北植物检索表)

**Potentilla flagellaris** Willd. ex Schlecht.

生于海拔 300—2 100 米的阴湿草地、水溪边及疏林下。分布于东北及河北、山西、甘肃、山东。

全草：清热解毒。

**莓叶委陵菜**　雉子筵(江苏、浙江)

**Potentilla fragarioides** L.

生于海拔 350—2 400 米的地边、沟边、草地、灌丛及疏林下。分布于东北、华北及陕西、甘肃、山东、江苏、安徽、浙江、福建、河南、湖南、广西、四川、云南。

全草(雉子筵)：甘，温。补益中气。用于妇女产后出血，肺出血，疝气。

**三叶委陵菜**　三叶蛇子草(浙江)，三张叶(陕西)

**Potentilla freyniana** Bornm.

生于海拔 300—2 100 米的山坡草地、溪边及疏林下阴湿处。分布于东北及河北、陕西、甘肃、山东、浙江、江西、福建、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

根：苦，微寒。清热解毒，敛疮止血。用于骨髓炎，外伤出血，毒蛇咬伤。　全草：清热解毒，散瘀止血。用于骨痨，口腔破溃，瘰疬，跌打损伤，外伤出血。

附　注：功效相似的有**中华三叶委陵菜 P. freyniana** Bornm. var. **sinica** Migo，分布于江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南。

**金露梅**　　药王茶、棍儿茶(东北)，金老梅、金蜡梅(东北木本植物图志)

**Potentilla fruticosa** L.——*Dasiphora fruticosa* (L.) Pydb.

生于海拔 1 000—4 000 米的山坡草地、砾石坡、灌丛及林缘。分布于东北、华北及陕西、甘肃、新疆、四川、云南、西藏。

叶(药王茶)：甘，平。清暑热，益脑，清心，调经，健胃。用于暑热眩晕，两目不清，胃气不和，食滞，月经不调。

**西南委陵菜**　　地槟榔、管仲(云南)

**Potentilla fulgens** Wall. ex Hook.

生于海拔 1 100—3 600 米的山坡草地、灌丛、林缘及林中。分布于湖北、广西、四川、贵州、云南。

全草(管仲)：苦、涩，寒。凉血止血，清热消炎，收敛止泻。用于赤白痢疾，吐泻，胃痛，肺痨，咯血，鼻衄，便血，血崩，外伤出血，疔疮。

**银露梅**　　白花棍儿茶(东北)，银老梅(东北木本植物图志)

**Potentilla glabra** Lodd.——*Dasiphora davurica* (Nestl.) Kom. et Klob.-Alis.

生于海拔 1 400—4 200 米的山坡草地、河谷岩石缝中、灌丛及林中。分布于华北及陕西、甘肃、青海、安徽、湖北、四川、云南。

全草(银老梅)：甘，温。理气散寒，镇痛固牙，利尿消水。用于牙痛，固齿。

**腺粒委陵菜**

**Potentilla granulosa** Yü et Li

生于海拔 3 400—4 200 米的高山草地。分布于四川、西藏。

全草：用于血管硬化症。

附　注：藏民药用较多。

**长柔毛委陵菜**　　翻白叶、小管仲、小天青(四川)

**Potentilla griffithii** Hook. f. var. **velutina** Card.

生于海拔 3 000—4 000 米的山坡草地及林缘。分布于四川、云南、西藏。

根(翻白叶)：涩、微苦，平。清热消炎，止痛。用于食积胃痛，痢疾。

**蛇含委陵菜**　　蛇含、五爪龙(浙江)，五皮风、五皮草(云南)

**Potentilla kleiniana** Wight et Arn.

生于海拔 400—3 000 米的田边、水旁、草甸及山坡草地。分布于华东、中南、西南及辽宁、陕西。

全草(蛇含)：苦，微寒。清热解毒，消肿止痛，截疟。用于伤风感冒，高热惊风，疟疾，角膜溃疡，急性咽喉痛，乳蛾，口腔破溃，乳痈。

**银叶委陵菜**　　锦线镖(四川)

**Potentilla leuconota** D. Don

生于海拔 1 300—4 600 米的山坡草地及林下。分布于甘肃、台湾、湖北、四川、贵州。

根(涩草)：涩、甘，凉。用于风热声哑，湿痰风邪，腹痛下痢，带下病。

**脱毛银叶委陵菜**　　短叶白斑人参果(云南)

**Potentilla leuconota** D. Don var. **brachyphyllaria** Card.

生于海拔 3 600—4 200 米的溪边、高山草地及峭壁上。分布于四川、云南。

根：用于腰痛。

**腺毛委陵菜**

**Potentilla longifolia** Willd. ex Schlecht.——*P. viscosa* Donn ex Lehm.

生于海拔 300—3 200 米的山坡草地、高山灌丛、林缘及疏林下。分布于华北及黑龙江、吉林、甘肃、青海、新疆、山东、四川、西藏。

根、全草：收敛止血，解毒。

**多茎委陵菜**　　猫爪子(陕西)

**Potentilla multicaulis** Bunge

生于海拔 200—3 800 米的耕地边、沟谷阴处、向阳砾石山坡、草地及疏林下。分布于华北、西北及辽宁、河南、四川。

全草：用于阿米巴痢疾。

**多裂委陵菜**　　白马肉(甘肃)

**Potentilla multifida** L.

生于海拔 1 200—4 300 米的山坡草地、沟谷及林缘。分布于东北及河北、内蒙古、陕西、甘肃、青海、新疆、四川、云南、西藏。

全草：甘、微苦，寒。清热解毒。用于阿米巴痢疾，肝炎，蛲虫病，崩漏；外伤出血。

**显脉翻白草**　　三叶翻白草(新疆)

**Potentilla nervosa** Juzep

生于海拔 1 900—2 500 米的草地或林缘。分布于新疆。

全草：清热解毒，降压，止血。用于细菌感染，高血压症，外伤出血。

**雪白委陵菜**

**Potentilla nivea** L

生于海拔 2 500—3 200 米的高山灌丛边缘、山坡草地及沼泽边缘。分布于华北及吉林、新疆。

根：清热利湿，止痛，补虚。

**小叶金露梅**

**Potentilla parvifolia** Fisch.——*Dasiphora parvifolia* (Fisch ) Juzep.

生于海拔 900—5 000 米的干燥山坡、岩石缝中、林缘及林中。分布于黑龙江、内蒙古、甘肃、青海、四川、西藏。

叶及花(小叶金老梅)：甘，寒。利尿消水，收敛止泻。用于脚气，痒疹，乳痈。

**总梗委陵菜**　　大理人参果、白地榆(云南)

**Potentilla peduncularis** D. Don

生于海拔 3 000—4 400 米的高山草地、砾石坡及林下。分布于云南、西藏。

根：苦、酸，凉。清热利湿，消肿。用于风热声哑，腹痛，下痢，浮肿，带下病。

附　注：功效相同的有**疏叶委陵菜 P. peduncularis** D. Don var. **elongata** Yu et Li，分布于云南。

**匍匐委陵菜**

**Potentilla reptans L.**

生于海拔 500—600 米的田边潮湿处。分布于新疆。

块根：甘，平。生津止渴，滋阴，补虚。用于虚痨，带下病，虚咳；外用于疮疖。

**绢毛匍匐委陵菜**　　结根草莓(植物学大辞典)

**Potentilla reptans** L. var. **sericophylla** Franch.——*Fragaria filipendula* Hemsl.

生于海拔 300—3 500 米的山坡草地、渠旁、溪边灌丛中及林缘。分布于华北及陕西、甘肃、山东、江苏、浙江、河南、四川、云南。

块根(金金棒)：甘。生津止渴，补阳，除虚热。用于虚劳白带，虚喘。　全草(结根草莓)：淡，平。止血排脓。用于肺瘀血，崩漏。

**钉柱委陵菜**

**Potentilla saundersiana** Royle

生于海拔 2 600—5 150 米的山坡草地、多石山顶及高山灌丛、草甸。分布于西北及山西、四川、云南、西藏。

全草：清热解毒，凉血。

**朝天委陵菜**　　鸡毛菜(东北)，铺地委陵菜(秦岭植物志)

**Potentilla supina** L.——*P. paradoxa* Nutt. ex Torr. et Gray

生于海拔 100—2 000 米的田边、荒地、河岸沙地、草甸及山坡湿地。分布于东北、华北、西南及陕西、甘肃、宁夏、新疆、山东、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北、湖南、广东。

全草：止血，固精，收敛，滋补。

**菊叶委陵菜**　　蒿叶委陵菜(东北草本植物志)

**Potentilla tanacetifolia** Willd. ex Schlecht

生于海拔 400—2 600 米的山坡草地、低洼地、砂地、草原、丛林缘及黄土高原。分布于东北、华北及陕西、甘肃、山东。

全草：清热解毒，消炎止血。

**簇生委陵菜**　　泥沼人参果(云南)

**Potentilla turfosa** Hand.-Mazz.

生于海拔 2 600—3 600 米的山坡草地或竹林边缘。分布于云南。

全草：涩，凉。利湿解毒，镇痛。用于腹痛，腰痛。

**曲枝委陵菜**　　匐枝委陵菜(东北草本植物志)

**Potentilla yokusaiana** Makino

生于山坡灌丛间及山地林缘。分布于辽宁。

全草：用于痢疾，腹泻。

## 扁核木属　Prinsepia Royle

**东北扁核木**　　扁担胡子(吉林)

**Prinsepia sinensis** (Oliv.) Kom.——*Plagiospermum sinensis* Oliv.

生于疏林下、林缘、溪旁及灌丛中。分布于东北。

种子：清肝明目。

**扁核木**　　蕤仁(通称)

**Prinsepia uniflora** Batal.

生于向阳低山坡或山下稀疏灌丛中，亦有栽培。分布于内蒙古、山西、陕西、甘肃、河南、四川。

种仁(蕤仁)：甘，微寒。养肝明目，疏风散热。用于目赤肿痛，睑缘赤烂，目暗羞明。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。　②功效相同的有**齿叶扁核木 P. uniflora** Batal. var. **serrata** Rhed.，为《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**总花扁核木**　　青刺尖(云南)

**Prinsepia utilis** Royle

生于海拔1 400—3 100米的山坡、溪旁或灌丛中。分布于四川、贵州、云南。

根、叶：苦、辛，凉。清热解毒，活血消肿。根：虚咳，久咳。　茎叶：用于痈疽毒疮，蛇咬伤，风火牙痛，骨折，枪伤。　果实：苦、辛，温。消食健胃。用于目翳多泪，消化不良，食积。

## 李属　Prunus L.

**樱桃李**

**Prunu scerasifera** Ehrh.

生于海拔800—2 000米的山坡乔灌木林中、多石砾的坡地及峡谷水边。分布于新疆。山东有栽培。

种子：镇咳，活血，止痢，润肠。

**洋李**　　欧洲李(中国果树栽培学)

**Prunus domestica** L.

原产欧洲和亚洲。河北、甘肃、新疆、山东等地栽培。

种子：活血散瘀，利水生津。

**李**　　李子树(救荒本草)

**Prunus salicina** Lindl.

生于溪边疏林内或山坡杂木林中。分布于东北南部、华北、华东、中南。全国各地均有栽培。

根皮：大寒。利湿解毒。　叶：甘、酸，平。清热解毒。　种子：苦，平。活血祛瘀，滑肠利水。　果实：甘、酸，平。清肝涤热，生津利水。

**杏李**

**Prunus simonii** Carr.

华北及江苏有栽培。

根、叶(鸡血李)：苦，平。活血，调经。用于跌打损伤，经闭，吐血。

**黑刺李**　　乌荆子(新疆)

**Prunus spinosa** L.

生于海拔800—1 200米的森林草原地带、林中旷地、林缘及河谷两岸。分布于新疆。

种子：解热生津，止痢。

## 火棘属　Pyracantha Roem.

**全缘火棘**　　木瓜刺(四川),救军粮(贵州)

**Pyracantha atalanthioides** (Hance) Stapf——*Sportella atalanthioides* Hance

生于海拔500—1 700米的山坡或谷地灌丛疏林中。分布于陕西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

果实：清热,凉血,活血,镇痛。

**火棘**　　火把果(云南)

**Pyracantha fortuneana** (Maxim.) Li——*Photinia fortuneana* Maxim.

生于海拔500—2 800米的山地、丘陵地阳坡灌丛草地及河沟路旁，亦有栽培。分布于西南及陕西、江苏、浙江、福建、河南、湖北、湖南、广西。

根(红子根)：酸、涩,平。清热凉血。用于虚劳骨蒸,闭经，跌打损伤。　叶(救军粮叶)：甘、酸,平。清热解毒。用于疮疡肿毒。　果实(赤阳子)：甘、酸,平。消积止痢,活血,止血。用于消化不良,痢疾,崩漏,带下病,产后腹痛。

## 梨属　Pyrus L.

**杜梨**　　灰梨(山西),海棠梨(江西)

**Pyrus betulaefolia** Bunge

生于海拔50—1 800米的平原或山坡阳处。分布于辽宁、河北、山西、陕西、甘肃、山东、江苏、安徽、江西、河南、湖北。

枝叶：用于霍乱,吐泻,转筋腹痛,反胃吐食。　树皮：用于皮肤溃疡。　果实：酸、甘、涩,寒。消食止痢。用于泄泻,痢疾。

**白梨**　　白挂梨、罐梨(河北)

**Pyrus bretschneideri** Rehd.

生于海拔100—2 000米的干旱寒冷地区的山坡阳处。分布于河北、山西、陕西、甘肃、青海、山东。亦有栽培。

果实熬成的膏(雪梨膏)：甘,平。止咳平喘,养阴清肺。用于肺燥咳嗽，吐血,咯血,心火烦躁,口渴喉干。

**豆梨**　　野梨(浙江),梨丁子(江西),糖梨、杜梨(贵州)

**Pyrus calleryana** Decne.

生于海拔80—1 800米的温暖山坡、平原或山谷杂木林中。分布于华东、中南。

根皮(鹿梨根皮)：甘、淡,平。止咳。　果皮：甘、涩,凉。清热,生津,收敛。

附　注：功效相似的有**柳叶豆梨 P. calleryana** Decne. var. **lanceolata** Rehd.,分布于安徽、浙江。

**洋梨**

**Pyrus communis** L. var. **sativa** (DC.) DC ——*P. sativa* DC.

全国各地普遍栽培。

果实：祛痰止咳，健胃消食，润肺止痢。

附　注：功效相同的有**河北梨 P. hopeiensis** Yü，分布于河北、山东。

**川梨**　　棠梨刺(云南)

**Pyrus pashia** Buch.-Ham. ex D. Don

生于海拔650—3 000米的山谷斜坡、丛林中。分布于四川、贵州、云南。

果实(山里红)：酸、甘，温。消食积，化瘀滞。用于肉食积滞，消化不良，泄泻，痛经，产后瘀血作痛，高血压症。　种子：生津、润燥，清热，化痰，消瘀。

**大花川梨**

**Pyrus pashia** Buch.-Ham. ex D. Don var. **grandiflora** Card.

生于海拔650—3 000米的山谷斜坡、丛林中。分布于贵州、云南。

茎内皮：止泻，止痢。用于痢疾，泄泻。

**无毛川梨**

**Pyrus pashia** Buch.-Ham. ex D. Don var. **kumaoni** Stapf

生于海拔1 400—1 600米的山谷斜坡、丛林中。分布于云南。

茎内皮：止泻，止痛，解毒。用于痢疾下泻，腹痛。

附　注：功效相似的有**钝叶川梨 P. pashia** Buch.-Ham. ex D. Don var. **obtusata** Card.，分布于四川、云南。

**褐梨**　　棠杜梨(北京)

**Pyrus phaeocarpa** Rehd.

生于海拔100—1 200米的山坡或黄土丘陵地杂木林中。分布于河北、山西、陕西、甘肃、山东。

果实：止咳平喘。

**沙梨**　　麻安梨(贵州)

**Pyrus pyrifolia** (Burm. f.) Nakai——*Ficus pyrifolia* Burm. f.

江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南均有栽培。

果实：甘、涩，凉。清暑解渴，生津润燥。用于热病津伤，烦渴，痰热惊狂，噎嗝，便秘。

**麻梨**　　黄皮梨(四川)

**Pyrus serrulata** Rehd

生于海拔100—1 500米的灌丛中或林缘。分布于浙江、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川。

果实：生津，润燥，清热，化痰。

**新疆梨**

**Pyrus sinkiangensis** Yü

陕西、甘肃、青海、新疆有栽培(亦有野生)。

果实：健胃消食，润肺止痢。

**秋子梨**　　花盖梨、山梨(东北)，沙果梨、酸梨(河北)

**Pyrus ussuriensis** Maxim.

东北、华北、西北均有栽培。

果实：祛痰止咳。用于肺热，咳嗽，痰多。　叶：利水。用于水肿，小便不利。

## 石斑木属　Raphiolepis Lindl.

**石斑木**　　铁里木(浙江)

**Raphiolepis indica** (L.) Lindl.——*Crataegus indica* L.

生于海拔150—1 600米的山坡疏林下、裸岩旁或溪边灌丛中。分布于安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、贵州、云南。

根(春花木)：微苦、涩，寒。活血，止痛，消肿解毒。用于溃疡红肿，跌打损伤，冻伤。

**细叶石斑木**

**Raphiolepis lanceolata** Hu

生于海拔450—1 500米的山坡疏林下或开阔山谷灌丛中。分布于海南、广西。

根：用于半身不遂。

## 鸡麻属　Rhodotypos Sieb. et Zucc.

**鸡麻**　　双珠母(浙江)

**Rhodotypos scandens** (Thunb.) Makino——*Corchorus scandens* Thunb.

生于海拔100—800米的山坡疏林中及山谷林下阴湿处。分布于辽宁、陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、河南、湖北。

根、果实(鸡麻)：用于血虚肾亏。

## 蔷薇属　Rosa L.

**刺蔷薇**　　细刺蔷薇(新疆)

**Rosa acicularis** Lindl.

生于海拔450—1 820米的山坡阳处、灌丛中或桦木林下及路旁。分布于东北、华北及陕西、甘肃、新疆。

根：用于关节痛。

**腺齿蔷薇**　　落萼蔷薇(新疆)

**Rosa albertii** Regel

生于海拔1 200—2 000米的山坡、云杉落叶松林下或林缘处。分布于甘肃、青海、新疆。

根：活血化瘀，祛风除湿，解毒收敛。

**木香花**　　七里香(四川)，木香(群芳谱)

**Rosa banksiae** Aiton

生于海拔500—1 300米的溪、路旁或山坡灌丛中。分布于四川、云南。全国各地均有栽培。

根皮：涩，平。收敛止痛，止血。用于久痢，便血，小儿腹泻，疮疖，外伤出血。

附　注：功效相似的有**黄花木香 R. banksiae** Ait. f. **lutea** (Lindl.) Rehd.、分

布于江苏、安徽。

**单瓣白木香**　七里香(陕西)

**Rosa banksiae** Ait. var. **normalis** Regel

生于海拔500—1 500米的沟谷中。分布于陕西、甘肃、河南、湖北、四川、贵州、云南。

根、叶(香花刺)：涩，温。活血，调经，消肿，散瘀。用于月经不调，外伤红肿。

**弯刺蔷薇**

**Rosa beggeriana** Schrenk

生于海拔880—2 000米的山坡、山谷、河边及路旁。分布于甘肃、新疆。

果实：强壮，止泻，利尿。

**美蔷薇**　油瓶子(河北)

**Rosa bella** Rehd. et Wils.

生于海拔1 700米以下的灌丛中、山脚下或河沟旁处。分布于华北及吉林、河南。

花蕾：理气，活血。

**硕苞蔷薇**　糖钵(浙江)

**Rosa bracteata** Wendl.

生于海拔100—300米的溪边、路旁及灌丛中。分布于江苏、浙江、江西、福建、台湾、湖南、贵州、云南。

根(苞蔷薇根)：甘，温。补脾益肾，收敛涩精，祛风活血，消肿解毒。用于盗汗，久泻，脱肛，遗精，带下病。　叶：微苦，凉。收敛解毒。　花：甘，平。润肺止咳。用于肺痨，咳嗽。　果实：甘，平。祛风，调经。用于痢疾，脚气病。

**百叶蔷薇**　洋蔷薇(中国树木分类学)

**Rosa centifolia** L.

原产高加索。全国各地均有栽培。

根、叶：止痛收敛。

**月季花**　月月红(浙江)，月月花(四川)

**Rosa chinensis** Jacq.

全国各地普遍栽培。

花蕾(月季花)：甘，温。活血调经。用于月经不调，痛经。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。② 功效相似的有**紫月季花 R. chinensis** Jacq. var.**semperflora** (Curtis) Koehne，全国各地栽培。

**小果蔷薇**　山木香(浙江)，倒钩簕(广东)，红荆藤(四川)

**Rosa cymosa** Tratt. ——*R. microcarpa* Lindl.

生于海拔250—1 300米的山坡溪谷疏林、林缘灌丛中、山麓旷野、沟边、路旁。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根(小金樱根)、果实(小金樱子)：苦、辛、涩，温。消肿止痛，祛风除湿，止血解毒，补脾固涩。用于风湿关节病，跌打损伤，阴挺，脱肛。　花(白残花)：苦、涩，寒。清热化湿，顺气和胃。　叶：苦，平。解毒消肿。外用于痈疮肿毒，烧、烫伤。

**刺玫蔷薇**　刺玫果、红根(东北)，山刺玫(中国高等植物图鉴)

**Rosa davurica** Pall.

生于海拔 230—2 500 米的山坡阳处或杂木林缘、丘陵草地。分布于东北、华北。

花(刺玫花): 甘,微苦,温。止血活血,健胃理气,调经,止咳祛痰,止痢止血。用于月经过多,吐血,血崩,肋间作痛,痛经。　果实(刺玫果): 酸,温。助消化。用于小儿食积,消化不良,食欲不振。　根: 苦、涩,平。止咳化痰,止痢止血。用于慢性咳嗽,血崩,泄泻,痢疾,跌打损伤。

**光叶山刺玫**

**Rosa davurica** Pall. var. **glabra** Liou

生于山坡阳处或灌丛中及杂木林缘。分布于东北。

根: 用于慢性咳嗽痰喘,吐泻,菌痢,崩漏,跌打损伤。　花: 用于吐血,血崩,月经不调。　果实: 用于消化不良,食欲不振,小儿积食。

**腺果蔷薇**

**Rosa fedtschenkoana** Regel

生于海拔 2 400—2 700 米的灌丛中、山坡上或河谷水沟边。分布于新疆。

果实: 强壮止泻。

**细梗蔷薇**

**Rosa graciliflora** Rehd. et Wils.

生于海拔 3 300—4 500 米的山坡、云杉林下或林缘灌丛中。分布于四川、云南、西藏。

果实(刺栗子): 甘、酸、微涩,平。收涩,消肿。用于痢疾,痔疮。

**卵果蔷薇**　野牯牛刺(陕西),牛黄树刺(湖北),巴东蔷薇(秦岭植物志)

**Rosa helenae** Rehd. et Wils.

生于海拔 1 000—1 600 米的山坡、沟边或灌丛中。分布于陕西、甘肃、湖北、四川、贵州、云南。

果实: 涩,凉。润肺,止咳。用于咳嗽,咽喉痛。

**软条七蔷薇**　秀蔷薇(浙江),湖北蔷薇(湖北植物志)

**Rosa henryi** Boulenger

生于海拔 1 700—2 000 米的山谷、林缘、田边或灌丛中。分布于中南及陕西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、四川、贵州、云南。

根、果实: 辛、苦、涩,温。消肿止痛,祛风除湿,止血解毒,补脾固涩。用于月经过多,带下病,阴挺,遗尿,老年尿频,慢性腹泻,跌打损伤,风湿痹痛,口腔破溃,疮疖肿痛,咳嗽痰喘。

**黄蔷薇**　大马茄子、红眼刺(陕西)

**Rosa hugonis** Hemsl.

生于海拔 600—2 300 米的山坡向阳处、林缘灌丛中。分布于山西、陕西、甘肃、青海、四川。

根、叶: 止痛收敛。

**腺叶蔷薇**　南疆蔷薇(新疆)

**Rosa kokanica** Regel ex Juzep.

生于海拔 1 500—2 500 米的山坡及林缘。分布于新疆。

果实: 活血化瘀,祛风除湿,解毒收敛。

**金樱子**　糖罐头(浙江),油饼果子(安徽),糖樱箩(广东),和尚头(四川)

**Rosa laevigata Michx.**

生于海拔200—1 600米的向阳山野、田边、溪畔灌丛中。分布于陕西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

果实(金樱子):甘、涩,平。固精缩尿,涩肠止泻。用于遗精滑精,遗尿尿频,崩漏,带下症,久泻久痢。　根:甘、淡、涩,平。活血止血,收敛解毒。　叶:苦,平。解毒消肿。

附　注:《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**疏花蔷薇**

**Rosa laxa** Retz.

生于海拔500—1 500米的灌丛中、干沟边或河谷旁。分布于新疆。

果实:强壮止泻,利尿。

**长尖叶蔷薇**　倒挂刺(云南)

**Rosa longicuspis** Bertol.

生于海拔600—2 100米的丛林中。分布于四川、贵州、云南。

叶上虫瘿:用于风湿痹痛,咳嗽痰喘,阴挺,疝气。　果实:用于痢疾,尿频,淋证。

**大叶蔷薇**

**Rosa macrophylla** Lindl.

生于海拔3 000—3 700米的山坡灌丛、河谷两旁及山麓沟边。分布于云南西北部、西藏。

果实:活血,散瘀,利尿,补肾,止咳。

附　注:藏医作金樱子入药。

**毛叶蔷薇**　昭通山石榴(云南)

**Rosa mairei** Lévl.

生于海拔2 300—4 180米的山坡阳处或沟边杂木林中。分布于西南。

根及果实:甘、酸、涩,平。消食健胃,止痢。用于积食腹胀,肠鸣腹泻。

**野蔷薇**　蔷薇(浙江)

**Rosa multiflora** Thunb.

生于向阳山坡、溪边、路旁或灌丛中。分布于山东、江苏、浙江、河南。

根、果实(营实):苦、涩,凉。活血,通络,收敛。用于关节痛,面神经瘫痪,高血压症,偏瘫,跌伤。　花(蔷薇花):苦、涩,寒。清暑热,化湿浊,顺气和胃。用于暑热胸闷,口渴,呕吐,不思饮食,口疮口糜。

附　注:功效相同的有**粉团蔷薇 R. multiflora** Thunb. var. **cathayensis** Rehd. et Wils.;**七姐妹 R. multiflora** Thunb. var. **carnea** Thory.、分布同野蔷薇。

**香水月季**　芳香月季(中国高等植物图鉴)

**Rosa odorata** (Andr.) Sweet——*R. indica* Andr. var. *odorata* Andr.

江苏、浙江、四川、云南均有栽培。

根、叶:调和气血,止痢,止咳,定喘,消炎,杀菌。　花:活血调经,消肿止痛。

**打破碗**

**Rosa odorata** (Andr.) Sweet var. **gigantea** (Crép) Rehd et Wils ——*R. gi-*

*gantea* Crep.

生于向阳山坡、溪边、路旁。分布于云南。

根：用于不孕，疝气，痢疾，咳嗽痰喘，泄泻，疮毒。　果实：用于遗精，遗尿，带下病，脾虚，泄泻。

**峨眉蔷薇**　　刺石榴、山石榴(陕西)

**Rosa omeiensis** Rolfe

生于海拔750—4 000米的山坡、山脚下或灌丛中。分布于陕西、甘肃、宁夏、青海、湖北、四川、云南、西藏。

根、果实(刺石榴)：苦、涩，平。止血，止痢。用于吐血，衄血，崩漏，带下病，赤白痢疾。

**扁刺峨眉蔷薇**

**Rosa omeiensis** Rolfe f. **pteracantha** Rehd. et Wlis.

生于沟谷及林缘。分布于西南及甘肃、宁夏、青海。

果实：止血，止痢。用于吐血，衄血，痢疾。

**宽刺蔷薇**

**Rosa platyacantha** Schrenk

生于海拔1 100—1 800米的林缘、林下、灌丛中较干旱山坡、荒地或水旁潮湿处。分布于新疆。

果实：强壮止泻。

**缫丝花**　　刺梨(贵州)

**Rosa roxburghii** Tratt.

生于海拔500—2 500米的向阳山坡、沟谷、路旁、灌丛中，亦有栽培。分布于西南及陕西、甘肃、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南。

果实：酸、涩，平。解暑，消食。用于中暑，食滞，痢疾。　根：酸、涩，平。消食健胃，收敛止泻。用于食积腹胀，痢疾，泄泻，自汗盗汗，遗精，带下病，月经过多，痔疮出血。

**玫瑰**

**Rosa rugosa** Thunb.

全国各地普遍栽培。

花蕾(玫瑰花)：甘、微苦，温。行气解郁，和血，止痛。用于肝胃气痛，食少呕恶，月经不调，跌打伤痛。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**绢毛蔷薇**　　山刺梨(四川)

**Rosa sericea** Lindl.

生于海拔2 000—3 800米的山顶、山谷斜坡或向阳燥地。分布于西南。

根、果实(山刺梨)：甘、酸、涩，平。消食，健胃，止泻。用于积食腹胀，肠鸣腹泻。

**腺叶绢毛蔷薇**

**Rosa sericea** Lindl. f. **glandulosa** Yu et Ku

生于海拔2 550—4 200米的山坡、路旁及灌丛中。分布于西藏。

根、果实：消食健脾，止痢。　花：降气，清胆，活血调经。

**钝叶蔷薇**

**Rosa sertata Rolfe**

生于海拔1 390—2 200米的山坡路旁、沟边或疏林中。分布于山西、陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北、四川、云南。

根：用于月经不调，痛风，无名肿毒。

**川滇蔷薇**

**Rosa soulieana** Crep.

生于海拔2 500—3 000米的山坡、沟边或灌丛中。分布于四川、云南、西藏。

果实：固肾涩精。用于滑精，遗尿，尿频。

**密刺蔷薇**

**Rosa spinosissima** L.

生于海拔1 100—2 300米的山地、草坡或林间灌丛中及河滩河岸边。分布于新疆。

果实：活血舒筋，祛湿利尿。

**扁刺蔷薇**　油瓶子、野刺玫(陕西)

**Rosa sweginzowii** Koehne

生于海拔2 300—3 850米的山坡路旁或灌丛中。分布于陕西、甘肃、青海、湖北、四川、云南、西藏。

果实：用于祛风湿，活气血。

**光叶蔷薇**

**Rosa wichuraiana** Crep.

生于海拔150—500米的山坡灌丛中，亦有栽培。分布于山东、浙江、福建、台湾、广东、广西。

叶：活血消肿。

**黄刺玫**　黄刺莓(中国高等植物图鉴)

**Rosa xanthina** Lindl.

东北、华北等地均有栽培。

果实。活血舒筋，祛湿利尿。

**单瓣黄刺玫**

**Rosa xanthina** Lindl. f. **normalis** Rehd. et Wils.

生于向阳山坡或灌丛中。分布于东北、华北及陕西、甘肃。

花：理气解郁，和血散瘀。

## 悬钩子属　Rubus L.

**腺毛莓**

**Rubus adenophorus** Rolfe

生于阴山坡林缘灌丛中或溪谷林下岩旁。分布于浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、贵州。

根、叶：甘、涩，温。理气，利湿，止痛，止血。用于痨肺疼痛，吐血，痢疾，疝气。

**粗叶悬钩子**

**Rubus alceaefolius** Poir.

生于海拔500—2 000米的向阳山坡、山谷杂木林中或沼泽灌丛中及路旁岩石间。分布于江苏、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、贵州、云南。

根、叶：甘、淡，平。活血祛瘀，清热止血。用于急、慢性肝炎，肝脾肿大，乳痈，外伤出血，口腔破溃。

**刺莓悬钩子**

**Rubus alexeterius** Focke

生于海拔3 700米以下的山谷溪旁、荒山坡或松林下开阔处。分布于四川、云南西北部、西藏南部。

根：用于肠风下血，红白痢，筋骨痛，月经不调，盗汗，倒经，小儿顿咳，黄疸，水肿，挫伤，黄疸。

**秀丽莓**　美丽悬钩子(华北经济植物志要)

**Rubus amabilis** Focks

生于海拔1 000—3 700米的山麓、沟边或山谷丛林中。分布于山西、陕西、甘肃、青海、河南、湖北、四川。

根：清热解毒，活血止痛。

**周毛悬钩子**　全毛悬钩子(浙江)

**Rubus amphidasys** Focke ex Diels

生于海拔400—1 600米的阴山坡裸岩旁、溪谷林下、林缘、山麓树丛或竹林下。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

全草(全毛悬钩子)：苦，平。活血调经，止痛。用于妇女产后受风，月经不调，四肢酸麻。

**北悬钩子**

**Rubus arcticus** L.

生于海拔1 200米左右的山坡、林下及沟旁。分布于东北。

果实：补肝肾，明目。

**粉枝莓**　二花悬钩子(秦岭植物志)

**Rubus biflorus** Buch.-Ham. ex Smith

生于海拔1 960—3 300米的山谷河边或山地杂木林中。分布于陕西、甘肃、四川、云南、西藏。

果实：益肾补肝，明目，兴阳。用于滑精，遗尿，带下病，泄泻，阳痿。

**寒莓**　冬扎公(浙江)，水漂沙、寒刺泡(江西)

**Rubus buergeri** Miq.

生于山坡、山麓林下或灌丛中，也见于溪谷两旁灌丛中或竹林内。分布于江苏、安徽、浙江、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

根(寒莓根)：甘、淡、酸，寒。活血凉血，清热解毒，和胃止痛。用于胃痛吐酸，黄疸，泄泻，带下病，痔疮。　全草、叶(寒莓叶)：酸，平。补阴益精，强壮补身。用于肺痨咳血，黄水疮。

**掌叶覆盆子**　华东复盆子(浙江)

**Rubus chingii** Hu

生于低海拔至中海拔地区的山坡路边阳处或灌丛中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、广西。

果实(复盆子)：甘、酸，温。益肾，固精，缩尿。用于肾虚遗尿，小便频数，阳痿早泄，遗精滑精。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**毛萼莓**　毛萼悬钩子、紫萼悬钩子(秦岭植物志)

**Rubus chroosepalus** Focke

生于海拔 300—2 000 米的山坡灌丛中或林缘。分布于陕西、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根：清热，解毒，止泻。

**蛇泡藤**　鸡足刺、猫枚筋(海南)，越南悬钩子(中药大辞典)

**Rubus cochinchinensis** Tratt.

生于灌丛中。分布于广东、海南、广西、云南。

根、叶(五叶泡)：苦、辛，温。驱风，除湿，行气。用于腰腿痛，四肢痹痛，风湿骨痛。

**华中悬钩子**

**Rubus cockburnianus** Hemsl.

生于海拔 900—3 800 米的向阳山坡灌丛中或沟谷杂木林内。分布于陕西、河南、四川、云南、西藏。

果实：益肾补肝，明目，兴阳。

**山莓**　大麦泡(陕西)，刺葫芦(福建)，三月泡(湖南)，撒秧泡(贵州)

**Rubus corchorifolius** L. f.

生于海拔 200—2 200 米的向阳山坡、溪谷的林缘灌丛中、山麓沟边及路旁。全国除东北及甘肃、青海、新疆、西藏外，普遍分布。

果实(悬钩子)：酸，平。醒酒，止渴，祛痰，解毒。用于痛风，丹毒，遗精。　根：苦、涩，平。凉血止血，活血调经，收敛解毒，用于吐血，痔血，血崩，带下病，泄泻，遗精，腰痛，疟疾。

**插田泡**　复盆子(浙江)，高丽悬钩了(华北经济植物志要)

**Rubus coreanus** Miq.

生于海拔 100—1 700 米的山坡、山谷疏林下或林缘灌丛中、山麓沟边及路旁。分布于陕西、甘肃、新疆、江苏、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖北、湖南、四川、贵州。

根(倒生根)：酸、咸，平。行气活血，补肾固精，助阳明目，缩小便。用于劳伤吐血，衄血，月经不调，跌打损伤。

附　注：功效相同的有**毛叶插田泡 R. coreanua** Miq. var. **tomentosus** Card.，分布于陕西、甘肃、安徽、河南、湖北、湖南，四川、贵州、云南。

**牛叠肚**　托盘、马林果(东北)，蓬藟(植物名实图考)

**Rubus crataegifolius** Bunge

生于海拔 300—2 500 米的向阳山坡灌丛中或林缘。分布于东北及河北、山西、山东、

河南。

根：清热解毒，调经活血。

**三叶悬钩子**　　绊脚刺、小黄泡刺(四川)

**Rubus delavayi** Franch.

生于海拔 2 000—3 000 米的山坡杂木林下。分布于四川、云南。

全株(倒钩刺)：甘，微酸，平。清热解毒，除湿止痢，驱蛔虫。用于乳蛾，目赤红肿，痢疾，疥疮，风湿关节痛，蛔虫病，痄腮，乳痈，无名肿毒。

**白簕**

**Rubus doyonensis** Hand. -Mazz.

生于海拔 2 400—3 200 米的沟谷边杂木林中。分布于云南。

全株：微苦、涩，寒。解毒。

**椭圆悬钩子**　　切头悬钩子(四川)

**Rubus ellipticus** Smith

生于海拔 1 000—2 500 米的干旱山坡、山谷或疏林中。分布于四川、云南、西藏。

根(黄藨根)：咸、酸，平。祛风除湿，清热解毒。用于吐血，瘰疬。　叶(黄藨叶)：咸、酸，平。杀虫止痒。用于皮肤病。

**栽秧泡**　　黄泡(云南)

**Rubus ellipticus** Smith var. **obcordatus** (Franch.) Focke —— *R. ellipticus* Smith f. *oboordatus* Franch.

生于海拔 300—2 000 米的山坡、路旁及灌丛中。分布于广西、四川、贵州、云南。

根：苦、涩，平。通络，消肿，清热，止泻。用于筋骨痛，痿软麻木，乳蛾，肿毒，黄疸，菌痢。　叶(黄锁梅叶)：用于湿疹。　果实(黄泡果)：酸，平。补肾涩精。用于肾虚，多尿，遗精，早泄。

**桉叶悬钩子**　　六月泡(贵州)

**Rubus eucalyptus** Focke

生于海拔 1 000—2 500 米的杂木林、灌丛中或荒草地。分布于陕西、甘肃、湖北、四川、贵州。

叶：消炎生肌。

**大红泡**

**Rubus eustephanus** Focke ex Diels

生长于海拔 500—2 310 米的山麓潮湿地、山坡密林或河沟灌丛中。分布于陕西、浙江、湖北、湖南、四川、贵州。

根、叶：消肿，止痛，收敛。

**黔桂悬钩子**

**Rubus feddei** Lévl. et Vant.

生于低海拔的山坡疏林下灌丛中或山坡路旁。分布于广西、贵州、云南。

根、叶：止血。

**凉山悬钩子**　　匍伏悬钩子(四川)

**Rubus fockeanus** Kurz ——*R. loropetalus* Franch.

生于海拔2 000—4 000米的山坡草地或林下。分布于湖北、四川、云南、西藏。

全株：清热，解毒，消炎。

**戟叶悬钩子**　　红棉藤(四川)

**Rubus hastifolius** Lévl. et Vant. ——*R. rufolanatus* H. T. Chang

生于海拔600—1 500米的山坡阴湿处及沟谷疏林内或溪涧两旁的灌丛中。分布于江西、湖南、广东、贵州、云南。

枝叶(红棉藤)：清热，凉血，止血，止痛。用于多种内出血及外出血。

附　注：广东用其叶制成"止血灵注射液"。

**蓬藥**　　泼盘、饭消扭(浙江)

**Rubus hirsutus** Thunb.

生于海拔1 000米以下的低山坡、谷地、山麓、旷野路边、沟边及村庄周围园地。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、河南、广东。

根、叶(刺菠)：酸，平。清热解毒，活血止痛。用于伤暑吐泻，风火头痛，感冒，黄疸。

**宜昌悬钩子**　　牛尾泡、红五泡(四川)

**Rubus ichangensis** Hemsl. et O. Kuntze

生于海拔2 500米以下的山坡、山谷疏密林中或灌丛中。分布于陕西、甘肃、安徽、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根、叶(牛尾泡)：酸、涩，平。清热解毒，收敛止血。用于吐血，痔疮出血，黄水疮，湿热疮毒。

**复盆子**　　绒毛悬钩子(华北经济植物志要)

**Rubus idaeus** L.

生于海拔500—2 000米的山地杂木林缘、灌丛或荒野。分布于吉林、辽宁、河北、山西、新疆。

茎(珍珠杆)、果实：固精补肾，明目。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版附录收载。

**华北复盆子**

**Rubus idaeus** L. var. **borealisinensis** Yü et Lu

生于海拔1 250—2 500米的山谷阴处、山坡林中或密林下、白桦林缘或草甸中。分布于华北。

果实：补肾，明目。

**拟复盆子**

**Rubus idaeopsis** Focke

生于海拔1 000—2 600米的山坡灌丛或山谷溪边。分布于西南及陕西、甘肃、江西、福建、河南、广西。

果实：补肾固精。

**白叶莓**　　刺泡(陕西)，早谷藨、天青白扭(浙江)，白叶悬钩子(秦岭植物志)

**Rubus innominatus** S. Moore

生于海拔400—2 500米的山坡路旁、山谷溪边、林下灌丛中。分布于中南及陕西、甘肃、安徽、浙江、江西、福建、四川、贵州、云南。

根(早谷蕉)：用于小儿风寒咳喘。

**无腺白叶莓**

**Rubus innominatus** S. Moore var. **kuntzeanus** (Hemsl.) Bailey ——*R. kuntzeanus* Hemsl.

生于海拔800—2 000米的山坡路旁或灌丛中。分布于中南及陕西、甘肃、安徽、浙江、江西、福建、四川、贵州、云南。

根(早谷蕉)：平喘止咳。用于小儿风寒咳逆，气喘。

**灰毛泡**　地王泡藤(江西)

**Rubus irenaeus** Focke

生于海拔500—1 300米的山坡杂木林下或树荫下腐殖质较多的地方。分布于江苏、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

根、叶(地五泡藤)：咸，平。理气止痛，散毒生肌。用于气痞腹痛，口角生疮。

**高粱泡**　冬牛(浙江)，冬菠(福建)

**Rubus lambertianus** Ser.

生于山坡疏林、林缘灌丛或路旁和岩石旁。分布于中南及江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾。

根：酸、涩，微温。疏风解表，活血调经，补肾固精。用于感冒，产后腹痛，出血，产褥热，痛经，带下病，阴挺，遗精，痔疮。

**腺毛高粱泡**　腺叶蓬藟(云南)

**Rubus lambertianus** Ser. var. **glandulosus** Card.

生于海拔1 200—2 100米的山谷疏林或灌丛中潮湿地。分布于湖北、四川、贵州、云南。

根：用于高血压症，吐血，咳嗽。

**白花悬钩子**

**Rubus leucanthus** Hance

生于低海拔至中海拔的疏林中或旷野。分布于福建、河南、广东、广西、贵州、云南。

根：用于泄泻，赤痢。

**紫叶悬钩子**　老林茶(湖北)，羊尿泡(四川)

**Rubus malifolius** Focke

生于海拔400—2 200米的山坡或山沟杂木林中或灌丛阴蔽处。分布于湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根、叶：消肿，止痛，收敛。

**喜阴悬钩子**　莓子(甘肃)

**Rubus mesogaeus** Focke

生于海拔900—2 700米的山坡、山谷林下潮湿处或沟边冲积台地。分布于西南及陕西、甘肃、台湾、河南、湖北。

根：祛风，除湿。

**大乌泡**

**Rubus multibracteatus** Lévl. et Vant. ——*R. mallodes* Focke

生于海拔 2 000—2 500 米的山坡、沟谷阴处灌丛中或林缘及路边。分布于广东、广西、贵州、云南。

根(大乌泡): 微涩,凉。清热利湿,凉血,止血。用于痢疾,泄泻,风湿痹痛,咳血,妇女倒经,骨折。

**红泡刺藤**　　钩撕刺(甘肃),薅秧泡、白枝泡(贵州)

**Rubus niveus** Thunb. ——*R. foliolosus* D. Don

生于海拔 500—2 800 米的山坡灌丛、疏林或山谷河滩及溪流旁。分布于西南及陕西、甘肃、广西。

根、叶(硬枝黑锁梅): 涩、微苦,平。收敛,止血,止咳,消炎。用于脱肛,泄泻,顿咳,月经不调。

**太平莓**　　老虎扭(浙江)

**Rubus pacificus** Hance

生于海拔 300—1 000 米的山坡疏林、林缘灌丛中及山谷、溪边林阴下、裸岩旁或路边草坡上。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖南。

全草(太平莓): 用于产后腹痛,发热。

**乌泡子**　　乌泡(四川),乌蔗子(中国树木分类学)

**Rubus parkeri** Hance

生于海拔 1 000 米以下的山地疏密林中阴湿处或溪旁及山谷岩石上。分布于陕西、江苏、湖北、四川、贵州、云南。

根(小乌泡根): 咸,凉。行血调经。用于劳伤,吐血,月经不调,经闭,血崩。

**茅莓**　　红梅梢(浙江),草杨梅子(湖北)

**Rubus parvifolius** L.

生于海拔 400—2 600 米的山坡林缘、山麓灌丛中,也见于旷野沟边、路旁、田野等处。分布于东北、华东、中南及河北、山西、甘肃、四川、贵州。

根(茅莓根): 苦,凉。清热解毒,祛风利湿,活血止血,利尿通淋。用于感冒高热,咽喉痛,风湿痹痛,肝炎,泄泻,水肿,小便淋痛。　全草(薅田薰): 甘、酸,平。散瘀,止痛,解毒,杀虫。用于吐血,跌打刀伤,产后瘀滞腹痛,痢疾,痔疮,疥疮,瘰疬。

**盾叶莓**

**Rubus peltatus** Maxim.

生于海拔 300—1 500 米的山坡、山脚、山沟林下、林缘阴湿处。分布于安徽、浙江、江西、湖北、四川、贵州。

果实: 涩,凉。消炎利尿,清热排石。

**多腺悬钩子**

**Rubus phoenicolasius** Maxim.

生于林下、路旁或山沟谷底。分布于山西、陕西、甘肃、青海、山东、河南、湖北、湖南,四川、贵州。

根、叶: 辛,温。解毒,补肾,活血止痛,祛风除湿。用于风湿骨痛,跌打损伤。

**红毛悬钩子**　　黄刺泡(贵州)

**Rubus pinfaensis** Lévl. et Vant.

生于海拔500—2 200米的山坡灌丛、杂木林中或林缘及山谷或水沟边。分布于台湾、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

根、叶(老虎泡)：酸、咸，平。祛风，除湿，散瘀，补肾。用于风湿关节痛，刀伤，吐血，月经不调，黄水疮，肾虚阳痿，尿血。

**梨叶悬钩子**

**Rubus pirifolius** Smith

生于山地较阴蔽处。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根：淡、涩，凉。凉血，清肺热。用于肺热咳嗽，胸闷，咳血。

**针刺悬钩子**　　倒扎龙、倒毒散(通称)

**Rubus pungens** Camb.

生于海拔2 200—3 300米的山坡林下、林缘或河边。分布于陕西、甘肃、四川、云南、西藏。

根(倒扎龙)：辛、微苦，凉。清热解毒，活血止痛。用于腰痛，带下病，瘰疬，黄水疮。

**锈毛莓**　　蛇包箭、大叶蛇箭(广东)，山烟筒子(广西)

**Rubus reflexus** Ker.

生于海拔300—1 000米的阴山坡林下、林缘灌丛中、溪谷竹林下、山麓沟边及岩旁。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西。

根：祛风湿，强筋骨。　叶：止血，消炎。

附　注：功效相似的有**浅裂锈毛莓 R. reflexus** Ker. var. **hui** (Diels) Metc.，分布同锈毛莓。

**深裂锈毛莓**　　七爪风(广东)

**Rubus reflexus** Ker. var. **lanceolobus** Metc.

生于低海拔的山谷或水沟边疏林中。分布于福建、湖南、广东、广西。

根：苦、涩、酸，平。祛风湿，强筋骨。用于风湿痛，痢疾，风火牙痛，带下病。

**空心泡**　　蔷薇莓(浙江)

**Rubus rosaefolius** Smith

生于海拔2 000米以下的山坡、谷地灌丛中及溪涧两旁。分布于安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、四川、贵州。

根(倒触伞)：辛、微苦，凉。清热解毒，活血止痛，止带、止汗，止咳，止痢。用于倒经，咳嗽痰喘，盗汗，脱肛，红白痢，小儿顿咳。

**库页悬钩子**　　白背悬钩子(吉林)

**Rubus sachalinensis** Lévl.

生于海拔1 000—2 500米的山坡潮湿地密林下、稀疏杂木林中、林缘、林间草地或干沟石缝、谷底石堆中。分布于黑龙江，吉林、河北、内蒙古、甘肃、青海、新疆。

根、全草：解毒，止血，止带，祛痰、消炎。用于吐血，衄血，痢疾。

**石生悬钩子**　　天山悬钩子(东北植物检索表)

**Rubus saxatilis** L.

生于海拔3 000米以下的石砾地、灌丛或针、阔叶混交林下。分布于东北、华北及新疆。

果实：甘、酸，温。补肾固精，助阳明目，缩小便。用于遗精。　全株：苦、微酸，平。补肝健胃，祛风止痛。用于肝炎，食欲不振，风湿关节痛。

**川莓**　糖泡刺、黄水泡、倒生根(贵州)

**Rubus setchuenensis** Bur. et Franch

生于海拔500—3 000米的山坡、路旁、林缘或灌丛中。分布于湖北、湖南、广西、四川，贵州、云西。

根(大乌泡根)、叶：酸、咸，平。祛风除湿，活血止血。用于劳伤吐血，咳血，月经不调，痢疾，瘰疬，骨折。

**美饰悬钩子**　小叶复盆子(云南)

**Rubus subornatus** Focke

生于海拔2 700—4 000米的岩石坡地灌丛中及沟谷杂木林中。分布于四川西部、云南西北部、西藏东南部。

果实：补肾。

**红腺悬钩子**　牛奶莓(浙江)，马泡、红刺苔(贵州)

**Rubus sumatranus** Miq.

生于海拔2 000米以下的山坡稀疏林下、草丛中及溪谷边岩旁。分布于西南及安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西。

根：用于产后寒热，腹痛，食欲不振。

**木莓**

**Rubus swinhoei** Hance

生于海拔300—1 500米的山坡、溪谷的林缘灌丛中、山麓沟边及路旁。分布于陕西、江苏、安徽、浙江、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

根、叶：苦、涩，平。凉血止血，活血调经，收敛解毒。用于牙痛，疮漏，疔肿疮肿，月经不调。

**灰白毛莓**　灰莓(安徽)，乌龙摆尾、倒水莲、蛇乌苞(湖南)

**Rubus tephrodes** Hance

生于海拔1 500米以下的山坡、路旁及灌丛中。分布于安徽、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、贵州。

根(乌龙摆尾)：酸、涩。收敛，凉血，活血，止血。用于闭经，产后感冒，腰腿痛，筋骨酸痛，麻木。　果实(蓬藟)：甘、酸，温。补肝肾，缩小便。

附　注：功效相似的有**无腺灰白毛莓 R. tephrodes** Hance var. **ampliflorus** (Levl. et Vant.) Hand.-Mazz.，分布于江苏、浙江、江西、湖南、广东、广西、贵州。

**三花悬钩子**

**Rubus trianthus** Focke

生于海拔500—2 800米山坡、溪谷的林缘灌丛中、山麓沟边及路旁。分布于江苏、安徽、浙江、福建、台湾、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

根、叶：苦、涩，平。凉血止血，活血调经，收敛解毒。

**黄果悬钩子**　泡儿刺(陕西)，黄莓子、地莓子、莓子刺(甘肃)

**Rubus xanthocarpus** Bur. et Franch.

生于海拔 600—3 200 米的山沟石砾滩地及土层较厚处。分布于陕西、甘肃、安徽、四川。

根(地莓子): 酸,凉。消炎止痛,杀虫,止血。用于湿热泻痢,鼻衄不止,黄水疮,疥癣。

## 地榆属 Sanguisorba L.

**高山地榆**

**Sanguisorba alpina** *Bunge*

生于海拔 1 200—2 700 米的山坡、沟谷水边、沼地及林缘。分布于甘肃、宁夏、新疆。

根: 止血止泻,收敛消炎。

**矮地榆** 虫莲(通称)

**Sanguisorba filiformis** (Hook. f.) Hand. -Mazz.——*Poterium filiformis* Hook. f.

生于海拔 1 200—4 000 米的沼泽、湿润草地。分布于四川、云南、西藏。

根(虫莲): 辛,温。补血调经,止血,止痛。用于月经不调,不孕症。

**地榆** 山红枣(浙江)

**Sanguisorba officinalis** L.

生于海拔 30—3 000 米的草原、草甸、山坡草地、灌丛中及疏林下。分布于东北、华北、西北、西南及山东、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、广西。

根(地榆): 苦、酸、涩,凉。凉血止血,解毒敛疮。用于便血,痔血,血痢,崩漏,水火烫伤,痈肿疮毒。

附 注:《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**长叶地榆**

**Sanguisorba officinalis** L. var. **longifolia** (Bertl) Yü et C.L. Li——*S. longifolia* Bertl

生于海拔 100—3 000 米的山坡草地、溪边、灌丛中、湿草地及疏林中。分布于中南及黑龙江、辽宁、河北、山西、甘肃、山东、江苏、安徽、浙江、江西、台湾、贵州、云南。

性味功效同地榆。

附 注:《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**长穗地榆**

**Sanguisorba officinalis** L. var. **longifila** (Kitag.) Yü et Li ——*S. grandifolia* (Maxim.) Makino

生于海拔 100—1 300 米的沟边及草原湿地。分布于黑龙江、辽宁、内蒙古。

根: 凉血止血,收敛止泻。

**大白花地榆**

**Sanguisorba sitchensis** C. A. Mey.

生于海拔 1 400—2 300 米的山地、山谷、湿地、疏林下及林缘。分布于吉林、辽宁。

嫩茎、叶: 收敛止血。

**细叶地榆**　　狭叶地榆(河北)

**Sanguisorba tenuifolia** Fisch. ex Link.

生于海拔300—1 500米的山坡草地、草甸及林缘。分布于东北及内蒙古。

根：凉血，止血。

附　注：功效与分布相同的有**小白花地榆 S. tenuifolia** Fisch. et Link **var. alba** Trautv. et Mey.。

## 山莓草属　Sibbaldia L.

**山莓草**

**Sibbaldia procumbens** L. var. **aphanopetala** (Hand. -Mazz.) Yü et Li——*S. aphanopetala* Hand. -Mazz.

生于海拔2 500—4 000米的山坡草地、岩石缝及林下。分布于陕西、甘肃、青海、四川、云南、西藏。

全草：止咳，调经，祛瘀消肿。

## 珍珠梅属　Sorbaria (Ser.) A. Br. ex Aschers

**高丛珍珠梅**

**Sorbaria arborea** Schneid.

生于海拔2 500—3 500米的山坡林缘、山溪沟边。分布于西南及陕西、甘肃、新疆、江西、湖北。

茎皮(珍珠梅)：活血祛瘀，消肿止痛。用于骨折，跌打损伤。

**华北珍珠梅**　　珍珠梅(中国高等植物图鉴)

**Sorbaria kirilowii (Regel) Maxim.** ——*Spiraea kirilowii* Regel

生于海拔200—1 300米的山坡阳处或杂木林中。分布于华北及陕西、甘肃、青海、山东、河南。

根、叶、果实：清热凉血，祛痰，消肿。止痛。

**珍珠梅**　　山高粱条子、高楷子、八本条(东北)

**Sorbaria sorbifolia** (L.) A. Br.

生于海拔250—1 500米的山坡疏林中。分布于东北及内蒙古。亦有栽培。

茎皮：苦，寒。活血祛瘀，消肿止痛。

## 花楸属　Sorbus L.

**水榆花楸**　　水榆(浙江)

**Sorbus alnifolia** (Sieb. et Zucc.) K. Koch ——*Crataegus alnifolia* Sieb. et Zucc.; *Micromeles alnifolia* (Sieb. et Zucc.) Koehne

生于海拔500—2 300米的山坡、山沟或山顶混交林或灌丛中。分布于东北及河北、

陕西、甘肃、山东、安徽、浙江、江西、河南、湖北、四川。

果实(水榆果)：用于体虚劳倦。

**黄山花楸**

**Sorbus amabilis**.Cheng ex Yü

生于海拔900—2 000米的杂木林中。分布于安徽、浙江。

果实：用于体虚劳倦。

**北京花楸**　　黄果臭山槐(河北)

**Sorbus discolor** (Maxim.) Maxim. ——*Pyrus discolor* Maxim.

生于海拔1 500—2 500米的山地阳坡阔叶混交林中。分布于华北及甘肃、山东、河南。

树皮、果实：祛痰镇咳，健脾利水。

**石灰花楸**　　石灰树(江西)，毛枸子(河南)，翻白树(四川)

**Sorbus folgneri** (Schneid.) Rehd. ——*Micromeles folgneri* Schneid.

生于海拔800—2 000米的山坡杂木林中。分布于中南及陕西、甘肃、安徽、江西、四川、贵州、云南。

果实：用于体虚劳倦。

**球穗花楸**

**Sorbus glomerulata** Koehne

生于海拔1 900—2 700米的杂木林中。分布于湖北、四川、云南。

根、果实：健脾，镇咳，祛痰。

**湖北花楸**　　雪压花(中国树木分类学)

**Sorbus hupehensis** Schneid.

生于海拔1 500—3 500米的高山阴坡或山沟密林中。分布于陕西、甘肃、青海、山东、安徽、江西、湖北、四川、贵州。

树皮：用于咳嗽痰喘。

**大果花楸**　　沙糖果(贵州)

**Sorbus megalocarpa** Rehd.

生于海拔1 400—2 050米的山谷、沟边或岩石坡地。分布于湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

根、果实：健脾，镇咳，祛痰。

**花楸树**　　马加木(东北)，红果臭山槐、绒毛树(河北)

**Sorbus pohuashanensis** (Hance) Hedl. ——*Pyrus pohuashanensis* Hance

生于海拔900—2 500米的山坡或山谷杂木林中。分布于东北、华北及甘肃、山东。

果实、茎(花楸)：甘、苦，寒。镇咳祛痰，健脾利水。用于肺痨，水肿，哮喘咳嗽，吐泻，胃痛，维生素A、C缺乏症。

**西康花楸**

**Sorbus prattii** Koehne ——*S. unguiculata* Koehne

生于海拔2 100—3 700米的高山杂木林中。分布于四川、云南、西藏。

根皮(独椒)：辛，温。散风寒，除湿邪。用于牙寒肿痛，肾寒阴缩。

**红毛花楸**

**Sorbus rufopilosa** Schneid.

生于海拔 2 700—4 000 米的山地杂木林中或沟谷旁。分布于西南。

根、树皮、果实：镇咳，祛痰，健脾利水。

**太白花楸**

**Sorbus tapashana** Schneid.

生于海拔 1 900—3 500 米的云杉、冷杉及杜鹃林中。分布于陕西、甘肃、新疆。

果实：清肺热，止渴，补脾生津。

**天山花楸**

**Sorbus tianschanica** Rupr.

生于海拔 2 000—3 200 米的高山溪谷或云杉林缘。分布于甘肃、青海、新疆。

嫩枝、树皮、果实(天山花楸)：甘、苦，平。清肺热，止渴，补脾生津。用于肺痨，哮喘咳嗽，吐泻，胃痛，维生素 A、C 缺乏症。

**黄脉花楸**

**Sorbus xanthoneura** Rehd.

生于海拔 800—2 600 米的疏密杂木林中。分布于陕西、甘肃、湖北、四川、贵州。

根、树皮、果实：镇咳，祛痰，健胃利水。

## 马蹄黄属 Spenceria Trimen

**马蹄黄** 黄地榆、白地榆(云南)

**Spenceria ramalans** Trimen

生于海拔 3 000—5 000 米的高山草原石灰岩山坡。分布于四川、云南、西藏。

根：苦、涩，温。解毒消炎，收敛止血。用于久泻久痢。

附 注：我国特有属。

## 绣线菊属 Spiraea L.

**绣球绣线菊** 绣球(江苏)，珍珠梅(四川)

**Spiraea blumei** G. Don

生于海拔 500—2 000 米的向阳山坡、杂木林中或路旁。分布于华北、华东及辽宁、陕西、甘肃、河南、湖北、广东、广西。

根(麻叶绣球)：辛，微温。调气止痛，散瘀，利湿。用于瘀血，腹胀满，带下病，跌打内伤，疮毒。

**麻叶绣线菊** 石棒子(河南)，麻叶绣球(汝南圃史)

**Spiraea cantoniensis** Lour.

河北、陕西、山东、江苏、浙江、江西、福建、河南、广东、广西、四川均有栽培。

根、叶、果实：清热，凉血，祛瘀，消肿止痛。用于跌打损伤、疥癣。

**中华绣线菊** 铁黑汉条(浙江、湖北)

**Spiraea chinensis** Maxim.

生于海拔500—2 040米的山坡灌丛中、山谷溪边、田野路旁。分布于中南及河北、内蒙古、陕西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、四川、贵州、云南。

根：用于咽喉痛。

**曲萼绣线菊**

**Spiraea flexuosa** Fisch. ex Cambess.

生于海拔600—2 200米的针、阔叶混合林下或林缘、河岸及沙丘岩石坡地。分布于东北及内蒙古、山西、陕西、新疆。

花：生津止渴，利水。

**华北绣线菊**

**Spiraea fritschiana** Schneid.

生于海拔100—1 000米的岩石坡地、山谷丛林间。分布于陕西、山东、江苏、浙江、河南。

根、果实：清热止咳。用于发热，咳嗽。

**金丝桃叶绣线菊**

**Spiraea hypericifolia** L.

生于海拔600—2 200米的干旱地区向阳坡地或灌丛中。分布于黑龙江、内蒙古、山西、陕西、甘肃、新疆。

花：生津止渴，利水。

**粉花绣球菊**　蚂蟥梢(陕西)，火烧尖(贵州)

**Spiraea japonica** L. f.

原产日本、朝鲜。全国各地常见栽培。

根：止咳，明目，镇痛。　叶：清热止咳。　果实：用于痢疾。

**狭叶绣线菊**

**Spiraea japonica** L. f. var. **acuminata** Franch.

生于海拔900—4 000米的山坡旷地、疏密杂木林中、山谷或河沟旁。分布于陕西、甘肃、安徽、浙江、江西、河南、湖南、广西、四川、贵州、云南。

全草(吹火筒)：微苦，平。解毒生肌，通经，通便，利尿。用于经闭，月经不调，便结腹胀，小便淋痛。

**光叶绣线菊**　大绣线菊(浙江)

**Spiraea japonica** L. f. var. **fortunei** (Planch.) Rehd. ——*S. fortunei* Planch.

生于海拔700—3 000米的山坡林缘灌丛中、田野或杂木林下。分布于陕西、山东、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、四川、贵州、云南。

根、叶、果实：苦，凉。清热，利湿，驱风，止咳。

**无毛粉花绣线菊**

**Spiraea japonica** L. f. var. **glabra** (Regel) Koidz. ——*S. callosa* Thunb. var. *glabra* Regel

生于海拔1 600—1 900米的山坡旷地、杂木林下、林缘、山谷或溪沟旁。分布于安徽、浙江、四川、云南。

全草：微苦，平。解毒生肌，通经，通便，利尿。

**欧亚绣线菊**　石棒子(河南)

**Spiraea media** Schmidt

生于海拔750—1600米的多石山坡、山坡草原或疏密杂木林中。分布于东北及内蒙古、新疆。

根、叶、种子：祛风湿，健脾驱虫。用于吐泻，蛔虫病，风湿关节痛，带下病。

**疏毛绣线菊**

**Spiraea miyabei** Koidz. var. **pilosula** Rehd.

生于海拔1000—1600米的山地林缘。分布于湖北、四川、云南。

根：清热，利尿。用于感冒。　全草：用于经闭，便结，腹胀，小便淋痛。　花：用于胃病。

**细叶绣线菊**

**Spiraea miyabai** Koidz. var. **tenuifolia** Rehd.

生于荒坡地。分布于四川。

茎髓：清热，利尿。

**蒙古绣线菊**

**Spiraea mongolica** Maxim.

生于海拔1600—3600米的山坡灌丛中或山顶及山谷多石砾地。分布于华北及陕西、甘肃、青海、河南、四川、西藏。

花：生津止渴，利水。

**细枝绣线菊**

**Spiraea myrtilloides** Rehd.

生于海拔1500—3100米的山坡、山谷或杂木林缘。分布于甘肃、湖北、四川、云南。

根：消肿解毒，祛腐生新。

**李叶绣线菊**　笑靥花(花镜)

**Spiraea prunifolia** Sieb. et Zucc.

陕西、山东、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、四川、贵州均有栽培。

根(笑靥花)：用于咽喉痛。

附　注：功效相同的有**单瓣李叶绣线菊 S. runifolia** Sieb. et Zucc. **var. simplic-iflora** Nakai，分布于江苏、浙江、江西、福建、湖北、湖南。

**土庄绣线菊**　土庄花、石蒡子、小叶石棒子(河南)

**Spiraea pubescens** Turcz.

生于海拔200—2500米的干燥岩石坡地、向阳或半阴处的杂木林中。分布于东北、华北及陕西、甘肃、山东、安徽、河南、湖北。

茎髓：用于水肿。

**绣线菊**　空心柳、马尿溲(东北)，珍珠梅(植物名实图考)

**Spiraea salicifolia** L.

生于海拔200—900米的河流沿岸、湿草地、空旷地和山沟中。分布于东北及河北、内蒙古。

花、全草(空心柳)：苦，平。通经活血，通便利水。用于关节痛，周身酸痛，咳嗽多痰，刀伤，闭经。

**绢毛绣线菊**

**Spiraea sericea** Turcz.

生于海拔500—1 100米的向阳山坡、杂木林及林缘草地。分布于东北及内蒙古、山西、陕西、河南、四川。

茎、叶：用于湿疹。

**珍珠绣线菊**　雪柳(山东)，珍珠花(花镜)

**Spiraea thunbergii** Sieb. ex Bl.

生于山坡及溪谷两旁或山麓郊野路边灌丛中。分布于华东。辽宁、陕西有栽培。

根：用于咽喉痛。

**三裂绣线菊**　石棒子、石朋子(河北)，三桠绣球(山东)

**Spiraea trilobata** L.

生于海拔450—2 400米的多岩石向阳坡地或灌丛中。分布于东北、华北及陕西、甘肃、山东、安徽、河南。

叶、果实：活血祛瘀，消肿止痛。

### 小米空木属　Stephanandra Sieb. et Zucc.

**华空木**　野珠兰、凤尾米筛花(浙江)

**Stephanandra chinensis** Hance

生于向阳山坡林缘、溪边、路边灌木杂草丛中。分布于江苏、安徽、浙江、福建、河南、湖北、湖南、广东、四川。

根：用于咽喉痛。

附　注：功效相同的有**小米空木 S. indisa** (Thunb.) Zebel，分布于辽宁、山东、台湾。

### 太行花属　Taihangia Yü et Li

**太行花**

**Taihangia rupestris** Yü et Li

生于海拔1 100—1 200米的土坡、石岩上及山谷中。分布于河南修武、林县。

全草：用于癣症。

附　注：我国特有属；国家二级保护植物。

## 68. 牛栓藤科　Connaraceae

### 栗豆藤属　Agelaea Soland ex planch.

**栗豆藤**

**Agelaea trinervis** (Llanos) Merr. ——*Castanola trinervis* Llanos

生于山谷疏林或林缘，常攀援于树上。分布于海南。

根及茎皮：用于风湿关节痛，胃痛。

## 牛栓藤属　Connarus L.

**牛栓藤**

**Connarus paniculatus** Roxb.

生于山坡疏林或密林中。分布于广西、云南。

茎叶：用于感冒。

## 红叶藤属　Rourea Aubl.

**红叶藤**　　牛栓藤、荔枝藤(广西)

**Rourea microphylla** (Hook. et Arn.) Planch. ——*Connarus microphyllus* Hook. et Arn.; *R minor* (Gaertn.) Leenh. subsp. *microphylla* (Hook. et Arn.) J. Vidal

生于丘陵山地的山坡疏林或灌丛中。分布于福建、广东、广西、云南。

根及叶：甘、涩，微温。止血止痛，活血通经。用于经闭，跌打损伤，各种出血。

# 69. 豆科　Leguminosae

## 相思子属　Abrus Adans.

**广东相思子**　　鸡骨草、地香根(广东)

**Abrus fruticulosus** Wall. ex Wight et Arn. ——*A. cantoniensis* Hance

生于山坡草丛中或灌丛中。分布于广东、广西。

全草(鸡骨草)：甘，凉。清热利湿，活血祛瘀。用于传染性肝炎，肝硬化腹水，风湿痛、疮疖。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**毛相思子**　　蜻蜓藤、油甘草(海南)，毛鸡骨草(广西植物名录)

**Abrus mollis** Hance

生于疏林内或灌丛中。分布于福建、广东、海南、广西。

全草：消炎解毒，清热利湿。用于乳疮及小儿疳积。

**相思子**　　相思藤(广东)，红豆、美人豆(海南)

**Abrus precatorius** L.

生于低山、丘陵、平原及海边草丛中。分布于台湾、广东、广西、云南。

种子(相思子)：辛、苦，平。有毒。催吐，驱虫，拔毒消肿。用于疥癣，痈疮。　根(相思子根)、茎叶(相思藤)：生津，润肺，清热，利尿。用于咽喉痛，肝炎，咳嗽痰喘。

附　注：全株有毒。中毒可引起呕吐，剧泻，虚脱，重者可致命。

## 金合欢属　Acacia Mill.

**儿茶**　　孩儿茶、百药煎(本草纲目)

**Acacia catechu** (L. f.) Willd. ——*Mimosa catechu* L. f.

浙江、广东、海南、广西有栽培。云南有野生。

心材水煎汁液浓缩制成的干浸膏(儿茶)：苦、涩，微寒。清热，生津，化痰，敛疮，生血。用于水泻，肠粘膜炎，口腔破溃，湿疹，咳嗽，刀伤出血。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②功效相同的有无刺儿茶 **A. catechu** (L. f.) Willd. var. **wallichiana** (DC.) P. H. Huang，分布于云南；**金合欢 A. farnesiana** (L.) Willd.，分布于浙江、福建、台湾、广东、广西、四川、云南。

**台湾相思**　　相思树、香丝树、番子树(福建)

**Acacia confusa** Merr.

福建、台湾、广东、广西、云南有栽培。

枝、叶：祛腐生肌。外洗治烂疮。

附　注：种子有毒。误食可引起腹痛，头痛，恶心。

**阔叶金合欢**　　老虎刺(云南)

**Acacia delavayi** Franch.

生于海拔1 000—2 200米的山地沟谷疏林中，分布于广西、贵州、云南。

根、嫩枝：消炎，健胃。

**钝叶金合欢**　　臭菜藤、臭香椿(云南)

**Acacia magaladena** Desv.

生于林中、沟谷及溪水旁。分布于台湾、云南。

茎叶：避孕，截疟。

**羽叶金合欢**　　蛇藤、龙骨刺(浙江)，蛇藤(中国主要植物图说——豆科)

**Acacia pennata** (L.) Willd. ——*Mimosa pennata* L.

生于山坡疏林中或水旁。分布于浙江、福建、湖南、广东、海南、广西、云南。

根、茎：苦、辛、微甘，温。祛风湿，强筋骨，活血止痛。用于风湿痹痛，劳伤，跌打损伤。

**藤金合欢**　　金合欢(中国主要植物图说——豆科)

**Acacia sinuata** (Lour.) Merr. ——*Mimosa sinuata* Lour.; *M. concina* Willd.; *A. concinna* (Willd.) DC.

生于山谷林下湿润处。分布于江西、湖南、广东、广西、贵州、云南。

全株：甘、淡，凉。清热解毒，散血消肿。用于痈肿疮毒。

**云南金合欢**　　滇金合欢(云南)

**Acacia yunnanensis** Franch.

生于海拔1 700—3 000米的山地灌丛中。分布于四川、云南。

茎：用于疮毒。

## 海红豆属　Adenanthera L.

**海红豆**　　孔雀豆(广东)，红金豆(广西)

**Adenanthera pavonina** L. var. **microsperma** (Teijsm. et Binnend.) Nielsen ——*A. microsperma* Teijsm. et Binnend.

生于林中或无荫蔽的山溪沟边及山坡，亦有栽培。分布于福建、广东、广西、云南、西藏。

种子(海红豆)：凉。有小毒。用于黑皮黯黯，花癣，头面游风。

## 合萌属　Aeschynomene L.

**田皂角**　　合萌(浙江)，水皂角(四川中药志)

**Aeschynomene indica** L.

生于塘边、溪边或田埂边。全国各地普遍分布。

茎去皮(梗通草)：甘、淡，寒。清湿热，利尿，下乳。用于水肿，小便淋痛，乳汁不下。

全草：苦、涩，凉。清热解毒，平肝明目，利尿。

## 缅茄属　Afzelia Smith

**木果缅茄**　　两茄(高濂珍异药品)

**Afzelia xylocarpa** (Kurz) Craib ——*Pahudia xylocarpa* Kurz

广东、海南、广西、云南有栽培或野生。

种子：消肿解毒。用于牙痛，眼疾。

## 合欢属　Albizia Durazz

**楹树**　　华楹(海南)，牛尾木(广西)

**Albizia chinensis** (Osbeck) Merr. ——*Mimosa chinensis* Osbeck

多生于林中、谷地、河边。分布于福建、湖南、广东、海南、广西、云南。西藏有栽培。

树皮：淡、涩。固湍止泻，收敛生肌。用于泄泻，疮疡溃烂，外伤出血。

**天香藤**　　刺藤(海南、广西)

**Albizia corniculata** (Lour.) Druce ——*Mimosa corniculata* Lour.

生于水边或潮湿地。分布于福建、广东、海南、广西。

木质部：行气止痛。

**南洋楹**

**Albizia falcataria** (L.) Fosberg ——*Adenanthera falcataria* L.; *Albizia falcata* (L.) Baker

福建、广东、广西有栽培。

树皮：淡、涩。固濇止泻，收敛生机。用于吐泻，疮疡溃烂久不收口，外伤出血。

**合欢**　夜合槐(山东)，夜关门(浙江)，夜合花(江西)，合昏(唐本草)

**Albizia julibrissin** Durazz.

生于低山坡疏林、林缘、山脚溪边及郊野旷地。全国各地均有栽培。

树皮(合欢皮)：甘，平。解郁安神，活血消肿。用于心神不安，忧郁失眠，肺痈疮肿，跌扑伤痛。　花(合欢花)：甘，平。解郁安神。用于心神不安，忧郁失眠。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**山合欢**　刀头黄(山东)，山槐(江苏)，白夜合(江西)

**Albizia kalkora** (Roxb.) Prain ——*Mimosa kalkora* Roxb.

生于山坡疏林、林缘、山脚树丛中。分布于河北、山西、陕西、甘肃以南各地。

根、树皮、花：涩，凉。舒筋活血，止痛。

**阔荚合欢**

**Albizia lebbeck** (L.) Benth. ——*Momosa lebbeck* L.

原产热带非洲。福建、台湾、广东、海南、广西有栽培。

树皮：消肿，止痛。

附　注：果实、种子有毒。

**毛叶合欢**　大毛毛花、羊毛花、夜合(云南种子植物名录)

**Albizia mollis** (Wall.) Boiv. ——*Acacia mollis* Wall.

生于海拔 1 000—2 500 米的山坡草地上。分布于西南。

树皮：安神，活血，消肿。

**香合欢**　香须树(广东)，黑心木(海南)

**Albizia odoratissima** (L. f.) Benth. ——*Mimosa odoratissima* L. f.

生于海拔 500—1 700 米的沟谷疏林中。分布于广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根：用于风湿关节痛，跌打损伤，创伤出血，疮癣。

## 骆驼刺属　Alhagi Gagnebin

**骆驼刺**

**Alhagi pseudoalhagi** Desv.

生于干旱田野及戈壁滩。分布于内蒙古、甘肃、新疆。

分泌液凝结而成的糖粒(刺蜜)：甘、酸，平。滋补强壮，泻肠止痛。用于骨蒸烦渴，血痢，泄泻，腹痛，头痛。

## 链荚豆属　Alysicarpus Neck ex Desv.

**链荚豆**

**Alysicarpus vaginalis** (L.) DC. ——*Hedysarum vaginale* L.

生于旷野草坡上。分布于福建、台湾，广东、海南、广西、云南。

全草：甘、苦，平。活血通络，清热化湿，驳骨消肿。 用于跌打损伤，半身不遂，股骨酸痛，肝炎，蛇咬伤，骨折，外伤出血，疮疡溃烂久不收口。

## 沙冬青属 Ammopiptanthus Cheng f.

**沙冬青** 蒙古黄花木(内蒙古)

**Ammopiptanthus mongolicus** (Maxim.) Cheng f. ——*Piptanthus mongolicus* Maxim

生于荒漠。分布于内蒙古、甘肃、宁夏、新疆。

茎叶(沙冬青)：有毒。祛风湿，活血，散瘀。用于风湿痛，冻疮。

附 注：国家三级保护植物；我国特有属。

**新疆沙冬青** 小沙冬青(中国高等植物图鉴)

**Ammopiptanthus nanus** (M. Pop.) Cheng f.——*Piptanthus nanus* **M. Pop.**

生于多砾河床上。分布于新疆乌恰。

枝叶：祛风湿，活血散瘀。

附 注：国家二级保护植物。

## 紫穗槐属 Amorpha L.

**紫穗槐** 苕条(吉林)，椒条、棉槐(东北)

Amorpha fruticosa L.

原产北美。全国各地均有栽培。

花：清热，凉血，止血。

## 两型豆属 Amphicarpaea Ell.

**三籽两型豆** 野毛扁豆(通称)

**Amphicarpaea trisperma** Baker ex Jacks. ——*A. edgeworthii* Benth. var. *trisperma* (Baker ex Jacks.) Ohwi

生于低山坡阔叶林缘和郊野溪畔路旁。分布于东北及河北、山西、陕西、山东、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖南、四川、贵州。

种子：用于带下病。

## 土圞儿属 Apios Moench.

**肉色土圞儿** 鸭嘴花(经济植物志)

**Apios carnea** (Wall.) Benth ex Baker

生于沟边杂木林中或溪边、路旁。分布于西南及广西。

块根：清热，活血，明目。

**土圞儿** 地栗子(通称)，九子羊(浙江)

**Apios fortunei** Maxim.

生于向阳山坡疏林缘、灌草丛中、沟边及路旁。 分布于江苏、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

块根(土圞儿): 甘，平。消肿解毒，祛痰止咳。用于感冒咳嗽，顿咳，咽喉痛，疝气，痈肿，瘰疬。

## 落花生属 Arachis L.

**落花生** 花生、长生果(通称)

**Arachis hypogaea** L.

全国各地普遍栽培。

叶: 安神。种子(花生仁): 甘、辛，平。补脾润肺，止血。用于燥咳，反胃，脚气，乳妇奶少。 种皮(花生衣): 止血。用于血小板缺乏症。

## 紫云英属 Astragalus L.

**直立黄芪**

**Astragalus adsurgens** Pall.

生于山坡草地、沟边、沙质地或草原上。 分布于东北、华北及陕西、甘肃、河南、江苏、四川、云南、西藏。

种子: 补肝肾，固精，明目。

**阿勒泰黄芪**

**Astragalus alatavicus** Kar.

生于山谷、林间或林缘。分布于新疆。

根: 补气补血，强心利尿，安胎降压。

**长小苞黄芪** 雪山芪(云南)，滇西北黄芪(中国主要植物图说——豆科)

**Astragalus balfourianus** Simpson

生于海拔 2 650—4 000 米的牧场、林下、林缘或草坡上。分布于四川、云南。

根: 甘，温。补气健脾，消食，固表，壮阳益骨。用于体虚，贫血，产后虚弱，阴挺，脱肛，自汗。

**地八角** 八角花、地皂角、黄鳝草(云南)

**Astragalus bhotanensis** Baker

生于山坡、路旁及草丛中。分布于陕西、甘肃、四川、贵州、云南。

全草(地八角)、根: 苦、涩，凉。清热，解毒，利尿，消肿。 用于乳蛾，浮肿，牙痛，口鼻出血，瘾疹。

**华黄芪**

**Astragalus chinensis** L.

生于盐碱地、砂质地、砾石砂地及山坡上。分布于东北及河北、内蒙古、山东、河南。

种子: 补肝肾，固精，明目。

**金翼黄芪**

**Astragalus chrysopterus** Bunge

生于海拔 2 000—3 100 米的丛林、山沟中。分布于山西、陕西、甘肃、四川。

根：补气固表，托毒生肌，利尿。

附　注：四川省药品标准收载作黄芪入药。

**扁茎黄芪**

**Astragalus complanatus** R. Br. ex Bunge

生于海拔 500—1 600 米的路边潮湿地、阳坡或灌丛中。分布于东北、西北及河南。

种子(沙苑子)：甘，温。温补肝肾，固精，缩尿，明目。用于肾虚腰痛，遗精早泄，带下病，小便余沥，眩晕目昏。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**达呼里黄芪**　　野豆角花、鸦食花(中国高等植物图鉴)

**Astragalus dahuricus** (Pall.) DC. ——*Phaca dahurica* Pall.

生于砂质山坡、草丛中及河滩地。分布于东北、华北及陕西。

种子：补肾益肝，固精明目。

**梭果黄芪**

**Astragalus ernestii** Comber

生于山坡、草地及灌丛中。分布于四川、西藏。

根：补气固表，托毒生肌，利尿。

附　注：四川省药品标准收载作黄芪入药。

**多花黄芪**

**Astragalus floridus** Benth. ex Bunge

生于海拔 3 300—4 300 米的山坡草地及灌木林下。分布于青海、四川、新疆。

根：补气升阳，益气固表，托毒生肌，利水退肿。

**马河山黄芪**

**Astragalus mahoschanicus** Hand. -Mazz.

生于海拔 1 800—4 500 米的沟谷、草地及灌丛中。分布于新疆、四川。

根：补气补血，强心利尿，安胎降压。

**草木樨状黄芪**　　扫雪苗、山胡麻(中国高等植物图鉴)

**Astragalus melilotoides** Pall.

生于山坡沟旁或河床沙地及草坡。分布于华北及陕西、甘肃、山东、河南。

全草(苦豆根)：苦，凉。祛风湿。用于风湿关节痛，四肢麻木。种子：补肾益肝，固精明目。

**膜荚黄芪**　　东北黄芪(通称)

**Astragalus membranaceus** (Fisch.) Bunge ——*Phaca membranaceus* Fisch.

生于山坡阳处、草丛和灌丛中。分布于东北、华北及甘肃、江苏、浙江、四川、西藏。广西有栽培。

根(黄芪)：甘，温。补气固表，利尿托毒，排脓，敛疮收肌。用于气虚乏力，食少便溏，中气下陷，久泻脱肛，便血崩漏，表虚自汗，气虚水肿，痈疽难溃，久溃不敛，血虚痿黄，内热

消渴，慢性肾炎蛋白尿。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。 ② 功效相似的有**细茎黄芪 A. miniatus** Bunge，分布于东北北部；**蒙古黄芪 A. mongholicus** Bunge，分布于华北及吉林。江苏有栽培。蒙古黄芪为《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**单体蕊黄芪**

**Astragalus monadelphus** Bunge

生于海拔 2 500—3 400 米的山坡、灌丛及林下草丛中。 分布于陕西、甘肃、青海、四川、西藏。

根：甘，温。补气固表，托毒生肌，利尿，功效同黄芪。

**多枝黄芪**

**Astragalus polycladus** Bur. et Franch.

生于海拔 2 000—4 000 米的山路、草坡上。分布于甘肃、青海、四川。

全草：用于肝硬化，腹水。

**糙叶黄芪**　　粗糙紫云英、掐不齐(中国高等植物图鉴)

**Astragalus scaberrimus** Bunge

生于山坡阳处、路旁、滩地及地边。分布于东北、华北及陕西、甘肃、山东、河南。

种子：补肾益肝，固精明目。

**无毛黄芪**

**Astragalus severzovii** Bunge

生于山谷、草地。分布于新疆。

根：补气补血，强心利尿，安胎降压。

**紫云英**　　红花草子(浙江)，米布袋(救荒本草)

**Astragalus sinicus** L.

生于山坡溪畔、林缘、道旁、田边、沟边及农舍前后，野生或栽培。分布于华北、西北、华东、西南。

全草(红花菜)、种子：甘、微辛，寒。清热解毒，利尿消肿。用于风痰咳嗽，咽喉痛，目赤红痛，疔疮，缠腰火丹，外伤出血。

**青海黄芪**

**Astragalus tanguticus** Batal.

生于海拔 3 000—4 000 米的山坡草地、河边灌丛旁。分布于青海、四川、西藏。

根：补气升阳，益气固表，托毒生肌，利水退肿。

**塘谷耳黄芪**　　连七(四川)

**Astragalus tongolensis** Ulbr.

生于海拔 3 700 米以下的草坡上。分布于甘肃、四川。

根：补气固表，托毒生肌，利尿。

附　注：四川省药品标准作黄芪药用。

**云南黄芪**

**Astragalus yunnanensis** Franch.

生于海拔 3 000—4 300 米的山坡草地、灌丛下或山顶碎石处。 分布于甘肃、云南、西

藏。

根：强壮补气，排脓生肌，利尿止汗。

## 虫豆属　Atylosia Wight et Arn.

**虫豆**

**Atylosia mollis** (Willd.) Benth. ——*Glycine mollis* Willd.

生于疏林中及山坡上。分布于海南、广西、云南、西藏。

全株：解毒。用于疮疥。

**蔓草虫豆**

**Atylosia scarabaeoides** (L.) Benth. ——*Dolichos scarabaeoides* L.

生于灌丛中或旷野草地。分布于福建、台湾、广东、海南、云南。

全草：甘、微苦，温。解暑利尿，止血生肌。用于伤风感冒，风湿水肿；外用于创伤出血。

## 羊蹄甲属　Bauhinia L.

**金叶羊蹄甲**　　红绒毛羊蹄甲(广西)，黄麻藤(四川)

**Bauhinia aurea** Lévl.

生于灌丛或杂木林中。分布于广西、四川、贵州、云南。

茎：用于胃脘痛，肾虚腰痛，便频，风湿关节痛。

**马鞍叶羊蹄甲**　　蝴蝶风(广西)，夜关门(云南)

**Bauhinia brachycarpa** Wall. ex Benth. ——B. *faberi* Oliv.

生于海拔 300—3 400 米的灌丛及沟旁。分布于陕西、甘肃、湖北、广西、四川、贵州、云南。

全株(大飞扬)：苦、涩，平。清热润肺，敛阴安神，除湿，杀虫。用于顿咳，心悸失眠，盗汗遗精，瘰疬，湿疹，疥癣。

**龙须藤**　　双木蟹(浙江)，蝶藤(福建)，乌郎藤(广东)

**Bauhinia championi** (Benth.) Benth. ——*Phanera championii* Benth.

生于山坡林缘、灌丛中或溪边及裸岩缝中。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西、贵州。

根：甘、辛，微温。祛风湿，行气血。用于跌打损伤，风湿骨痛，心胃气痛。藤：苦、辛，平。用于风湿骨痛，跌打接骨，胃痛。叶：退翳。种子：理气止痛，活血散瘀。用于跌打损伤，肝、胃痛。

**粉叶羊蹄甲**　　羊蹄甲、马蹄藤(江西)，拟粉叶羊蹄甲(中国主要植物图说——豆科)

**Bauhinia glauca** (Wall. ex Benth.) Benth. ——*Phanera glauca* Wall. ex Benth.; *B. paraglauca* Tang et Wang

生于海拔 320—2 000 米的山坡石缝、山脊、灌丛及草地上。分布于陕西、甘肃、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根(双肾藤): 苦,平。清热利湿,消肿止痛。用于痢疾,子痈,阴囊湿疹。

附　注: 功效相同的有**深裂叶羊蹄甲 B. corymbosa** Roxb. ex DC., 分布于江西、广东、海南、广西。

**多脉羊蹄甲**

**Bauhinia glauca** (Wall. ex Benth.) Benth. subsp. **pernervosa** (L. Chen) T. Chen——*B. pernervosa* L. Chen

生于海拔 1 100—1 900 米的山野路旁及山沟丛林中。分布于云南。

根(大夜关门根): 辛、甘、酸、微苦,温。止血,镇咳,补肾气。用于血崩,咳嗽,遗精,滑精。叶(大夜关门): 辛、甘、酸、微苦,温。补肾气,提神。用于脱肛,阴挺。

**密花羊蹄甲**　薄叶羊蹄甲(中国主要植物图说——豆科)

**Bauhinia glauca** (Wall. ex Benth.) Benth. subsp. **tenuiflora** (Watt. ex C. B. Clarke) K. et S. S. Larsen——*B. tenuiflora* Watt. ex C. B. Clarke

生于海拔 900—1 500 米的山坡、山沟密林中或灌丛中。分布于广西、云南。

根、叶: 补肾,提神,止血,镇咳。

**羊蹄甲**　紫羊蹄甲(中国主要植物图说——豆科),玲甲花(植物名实图考)

**Bauhinia purpurea** L.

生于山野路旁及山沟丛林中。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、云南。

树皮: 用于烫伤,脓疮。　嫩叶: 用于咳嗽。

附　注: 根皮有剧毒。

**囊托羊蹄甲**

**Bauhinia touranensis** Gagnep.——*B. genuflexa* Craib

生于山坡或灌丛中。分布于广西、云南。

茎: 用于风湿痹痛,疮疖。

**洋紫荆**　马蹄豆(广东)

**Bauhinia variegata** L.

原产于热带丛林中。福建、台湾、广东、海南、广西、云南均有栽培。

花(老白花): 苦、涩,平。消炎解毒。用于肝炎,咳嗽痰喘,风热咳嗽。

**白花洋紫荆**

**Bauhinia variegata** L. var. **candida** (Roxb.) Voigh ——*B. candida* Roxb.; *B. variegata* L. var. *alboflava* de Wit

福建、广东、海南、广西、云南均有栽培或野生。

根: 强壮,驱虫。用于蛔虫病,消化不良。

**云南羊蹄甲**

**Bauhinia yunnanensis** Franch.

生于海拔 400—2 000 米的山地灌丛或悬岩石上。分布于四川、贵州、云南。

根: 清热解毒。

## 藤槐属 Bowringia Champ. ex Benth.

**藤槐** 鸡公合藤(海南),赤竹子(广东)

**Bowringia callicarpa** Champ. ex Benth.

生于山谷,常攀附于树上。分布于福建、广东、海南、广西。

根、叶: 清热凉血。

## 云实属 Caesalpinia L.

**刺果苏木** 杧果钉(广东),大托叶云实(中国高等植物图鉴)

**Caesalpinia bonduc** (L.) Roxb.——*Guilandia bonduc* L.

生于山沟、路旁或草地上。分布于台湾、广东、海南、广西。

叶、种子: 止泻,祛风湿。

**华南云实** 假老虎簕(海南植物志)

**Caesalpinia crista** L.——*C. nuga* Ait.; *C. szechuenensis* Craib

生于路旁及海边沙地。分布于福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

叶(刺果苏木): 苦,凉。祛瘀止痛,清热解毒。用于急、慢性胃痛,痈疮疖肿。 种子: 行气祛瘀,消肿止痛,泻火解毒。

**大见血飞** 麻药(云南)

**Caesalpinia cucullata** Roxb. —— *Mezoneurum cucullatum* (Roxb.) Wight et Arn.

生于溪边或灌丛中。分布于云南。

藤茎: 活血止痛。

**云实** 铁场豆(福建),倒钩刺(四川),老虎刺尖、爬墙刺(云南),粘刺(本草纲目)

**Caesalpinia decapetala** (Roth) Alston —— *Reichardia decapetala* Roth; *C. sepiaria* Roxb

生于低山坡石灰岩旁或溪边灌丛中。分布于华北、西北、华东、中南、西南。

种子(云实子): 辛,凉。有小毒。止痢,驱虫,镇咳,祛痰。用于咳嗽痰喘,风热头痛,黄水疮。 叶(四时青): 用于小儿口疮,跌打损伤,产后恶露不尽。

**毛云实**

**Caesalpinia decapetala** (Roth) Alston var. **pubescens** (Tang et Wang) P. H Huang

生于平川、丘陵、低山坡的路旁或溪边。分布于陕西、甘肃、江西、湖南、贵州、云南。

根(倒挂牛): 涩,热。有小毒。解表发汗,筋骨疼痛,跌打损伤。用于伤风感冒头痛,筋骨酸痛麻木,陈伤。 茎皮: 用于酒鼾鼻。

**肉荚云实**

**Caesalpinia digyna** Rottler

生于丘陵、山谷或溪边。分布于海南、云南。

根：用于瘰疬。

**大叶云实**

**Caesalpinia magnifoliolata** Metc.

生于海拔500—900米的水边丛林中。分布于广东、广西、贵州、云南。

根及果枝：甘、辛，温。舒筋活络，补虚。用于跌打损伤，虚弱瘦瘦。

**小叶云实**　　假南蛇簕

**Caesalpinia millettii** Hook. et Arn.

生于丘陵、山溪边或岩石缝中。分布于江西、湖南、广东、广西。

根：用于胃病，消化不良。

**喙荚云实**　　南蛇簕(广东)，石莲子、阎王刺(四川)

**Caesalpinia minax** Hance

生于海拔200—1 500米的山地疏林内、溪边及灌丛中。分布于福建(栽培)，广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

种子(苦石莲)：苦，寒。散瘀，止痛，清热，祛湿。用于哕逆，痢疾，淋浊，尿血，跌打损伤。根(南蛇簕根)：苦，寒。清热，解毒，散瘀。用于外感发热，痧症，风湿关节痛，疮肿，跌打损伤。苗(南蛇簕苗)：苦，寒。泻热，祛瘀解毒。用于风热感冒，湿热痧气，跌打损伤，瘰疬，疮疡肿毒。

**金凤花**　　洋金凤(广州)，红紫(海南)

**Caesalpinia pulcherrima** (L.) Sw.——*Poinciana pulcherrima* L.

台湾、广东、海南、广西、四川、云南均有栽培。

根、茎皮：解表，发汗。

**苏木**　　棕木(中国高等植物图鉴)

**Caesalpinia sappan** L.

福建、台湾、广东、海南、广西、四川、贵州、云南均有栽培。

心材(苏木)：甘、咸，平。行血祛瘀，消肿止痛。用于胸腹疼痛，经闭，产后瘀血胀痛，外伤肿痛。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**春云实**　　乌爪簕藤、南蛇簕(广东)

**Caesalpinia vernalis** Champ.

生于山沟湿沙土上。分布于浙江、福建、广东。

种子：辛，温。有小毒。止痢，驱虫，镇咳，祛痰。

## 木豆属　Cajanus D C.

**木豆**

**Cajanus cajan** (L.) Millsp.——*Cytisus cajan* L.; *Cajanus flavus* DC.

浙江、福建、台湾、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南均有栽培。

种子(木豆)：甘、微酸，温。清热解毒，利水消肿，补中益气，止血止痢。用于水肿，血

淋，痔血，痈疽肿毒，痢疾，脚气。　叶：平、淡。有小毒。解痘毒，消肿。　用于小儿水痘、痈肿。

## 朱缨花属　Calliandra Benth.

**朱缨花**

**Calliandra haematocephala** Hassk.

原产南美洲。福建、广东、云南均有栽培。

树皮：利尿，驱虫。

## 杭子梢属　Campylotropis Bunge

**毛三棱枝杭子梢**　三棱梢(云南)

**Campylotropis bonatiana** (Pamp.) Schindl. ——*Lespedeza bonatiana* Pamp.

生于荒坡。分布于云南。

全草：辛、微甘、涩，平。发汗解表，清热利湿。用于跌打损伤，皮肤病，感冒，肾炎。

**西南杭子梢**

**Campylotropis delavayi** (Franch.) Schindl.——*Lespedeza delavayi* Franch

生于荒坡。分布于四川、贵州、云南。

根(豆角柴)：辛、微苦，凉。清热解毒。用于感冒发热。

**滇南杭子梢**

**Campylotropis harmsii** Schindl.

生于海拔1 500—2 700米的草坡或灌丛中。分布于贵州、云南。

根：甘、平。祛瘀止痛，清热利湿。用于跌打损伤，刀伤，痢疾。

**毛杭子梢**

**Campylotrpis hirtella** (Franch.) Schindl.——*Lespedeza hirtella* Franch.

生于山溪边、水田中、草坡、林地或山坡灌丛中。分布于四川、云南。

根(锈钉子)：涩、微苦，微温。活血，调经，理气，止痛。用于经闭，月经不调，痛经，胃痛。

**杭子梢**

**Campylotropis macrocarpa** (Bunge) Rehd.——*Lespdeza macrocarpa* Bunge

生于山坡、山沟、草坡、林缘及疏林下。分布于华北、华东及辽宁、四川。

根(壮筋草)：微苦、微辛，温。祛风散寒，舒筋活血。用于肢体麻木、半身不遂、感冒、水肿。

**绒毛杭子梢**

**Campylotropis pinetorum**(Kurz)Schindl. subsp. **velutina** (Dunn) Ohashi——*Lespedeza velutina* Dunn

生于海拔700—1 800米的山谷、旷野或山坡灌丛中。分布于贵州、云南。

根(三匹叶)：苦、涩，平。通经活血，舒筋络，收敛，止痛。用于泄泻，赤白痢，慢性肝炎，腹痛，风湿关节痛，痛经。

**多花杭子梢**　小雀花(云南)

**Campylotropis polyantha** (Franch.) Schindl. ——*Lespedeza eriocarpa* DC. var. *polyantha* Franch.

生于山坡灌丛中。分布于西南及甘肃南部。

根：祛痰，止痛，清热，利湿。

**三棱枝杭子梢**　马尿藤(云南)，黄花马尿藤(中药大辞典)

**Campylotropis trigonoclada** (Franch.) Schindl. ——*Lespedeza trigonoclada* Franch.

生于海拔500—2 800米的山坡林下或草丛中。分布于四川、贵州、云南。

根(爬山豆根)：涩、微甘，平。解热止血。用于泄泻，肠风下血，水肿，风湿关节痛，跌打损伤。

**滇杭子梢**

**Campylotropis yunnanensis** (Franch.) Schindl. ——*Lespedeza yunnanensis* Franch.

生于海拔1 900—2 800米的山坡草地灌丛中。分布于湖南、四川、云南。

根：活血，调经，止气，消气。

## 刀豆属　Canavalia DC.

**刀豆**

**Canavalia gladiata** (Jacq.) DC. ——*Dolichos gladiatus* Jacq.

原产美洲热带。长江流域以南各地普遍栽培。

种子：甘，温。温中，下气，止呃。用于虚寒，呃逆，呕吐。　豆荚(刀豆壳)：淡，平。益肾，温中，除湿。用于腰痛，呃逆，久痢，痹痛。

附　注：功效相同的有**洋刀豆 C. ensiformis** (L.) DC.，全国各地普遍栽培。

## 锦鸡儿属　Caragana Fabr.

**刺叶锦鸡儿**

**Caragana acanthophylla** Kom.

生于砾石山坡河岸或灌丛中。分布于新疆。

根：活血祛风，利尿，消肿。

**树锦鸡儿**　锦鸡儿(河北)

**Caragana arborescens** (Amm.) Lam. ——*Aspalathus arborescens* Amm.

生于灌丛、林中及砾石沙地。分布于东北、华北及陕西、甘肃、新疆。

全草(柠条)：甘、微辛，平。滋养，通乳，利尿，祛风湿。用于月经不调，宫颈癌，乳腺癌，脚气，带下病，乳汁不通，麻木浮肿。

**短叶锦鸡儿**

**Caragana brevifolia** Kom.

生于海拔 2 000—3 000 米的河岸、山谷、山坡杂木林中。分布于甘肃、宁夏、青海、四川、西藏。

根：辛、苦，寒。清热消肿，生肌止痛。用于痈疮，肿痛。

**新疆锦鸡儿**　　库车锦鸡儿(新疆)

**Caragana camilli-schneideri** Kom.

生于山坡、谷地及灌丛中。分布于新疆。

根：祛风，平肝，止咳。

附　注：功效相同的有**粗毛锦鸡儿 C. dasyphylla** Pojark.；**黄刺条 C. frutex** (L.) K. Koch，均分布于新疆；**柠条锦鸡儿 C. korshinskii** Kom.，分布于内蒙古、甘肃、宁夏、新疆。

**云南锦鸡儿**

**Caragana franchetiana** Kom.

生于海拔 3 300—4 000 米的山坡灌丛中、林下或林缘。分布于四川、云南、西藏。

根(阳雀花根)：甘、微苦，平。祛风活血，止痛，利尿，补气益肾。用于风湿关节痛，跌打损伤，乳汁不足，浮肿，痛经。　花(阳雀花)：甘、微苦，平。补气益肾。用于头晕头痛，耳鸣眼花，肺痨咳嗽，小儿疳积。

**中间锦鸡儿**

**Caragana intermedia** Kuang et H. C. Fu

生于半荒漠地带的沙质地。分布于内蒙古、陕西、宁夏。

全草(柠条)：甘，温。活血止血，滋阴养血。用于月经不调，宫颈癌，乳腺癌。

**鬼箭锦鸡儿**　　鬼见愁(内蒙古)，浪麻(青海)

**Caragana jubata** (Pall.) Poir.——*Robinia jubata* Pall.

生于山坡灌丛中。分布于华北、西北及四川、云南。

根皮及茎叶：甘，平。接筋续断，祛风除湿，活血通络，消肿止痛。用于跌打损伤，风湿筋骨痛，月经不调，乳房发炎。

**白皮锦鸡儿**

**Caragana leucophloea** Pojark.

生于干旱山坡、山谷、山前平原及戈壁滩。分布于内蒙古、甘肃、新疆。

花：祛风，平肝，止咳。

附　注：功效相同的有**阿拉套锦鸡儿；C. laeta** Kom.；**多叶锦鸡儿 C. pleiphylla** (Regel) Pojark.；**昆仑锦鸡儿 C. polourensis** Franch.，均分布于新疆。

**白刺锦鸡儿**

**Caragana leucospina** Kom.

生于河岸及干旱石坡。分布于新疆境内的天山。

根：活血利尿，止痛强壮。

**繁花锦鸡儿**　　矮锦鸡儿(西藏)

**Caragana maximowicziana** Kom.

生于海拔 3 500—4 600 米的山坡、路边及灌丛中。分布于甘肃、青海、四川、云南、西藏。

红色心材：破血，化瘀，降压。

**小叶锦鸡儿**　　黑柠条、牛筋条(宁夏)，猴獠倒(中国高等植物图鉴)

**Caragana microphylla** Lam.

生于山坡草地、灌丛及干燥处。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、山东、江苏。

全草(柠条)、果实(柠鸡儿果)：苦，寒。清热解毒，滋阴养血。用于咽喉痛，月经不调，宫颈癌，乳腺癌。

**粉刺锦鸡儿**

**Caragana pruinosa** Kom.

生于干旱石坡。分布于新疆天山。

根：活血祛风，利尿消肿。

附　注：功效相同的有**线叶锦鸡儿 C. pygmaea** (L.) DC.，分布于新疆；**猫耳锦鸡儿 C. roborowskyi** Kom.，分布于内蒙古、甘肃、宁夏、青海、新疆。

**阿拉善锦鸡儿**

**Caragana przewalskii** Pojark.

生于荒漠及沙丘。分布于甘肃、新疆。

根：解毒，消炎。

**红花锦鸡儿**　　黄枝条、金雀儿(中国高等植物图鉴)

**Caragana rosea** Turcz. ex Maxim.

生于山坡、河谷及灌丛中，亦有栽培。分布于东北、华北及陕西、甘肃、山东、江苏、安徽、浙江、河南、四川。

根：甘、微辛，平。健脾强胃，活血催乳，利尿通经。用于虚损劳热，阴虚喘咳，带下病。

**锦鸡儿**　　土黄芪(浙江)

**Caragana sinica** (Buchoz) Rehd. ——*Robinia sinica* Buchoz

生于山坡林下和林缘路边，亦有栽培。分布于河北、陕西、江苏、浙江、江西、福建、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

根(金雀根)：甘、微辛，平。理气活血，祛风利湿。用于关节痛，劳伤无力，盗汗，虚肿。花(金雀花)：甘，温。活血祛风，止咳化痰。用于头晕耳鸣，肺虚久咳，风湿痹痛，小儿疳积。

**狭叶锦鸡儿**　　皮溜刺、母猪刺(内蒙古)

**Caragana stenophylla** Pojark.

生于干旱低山坡、沙地及黄土丘陵。分布于内蒙古、山西、陕西、甘肃、宁夏、新疆。

花：祛风，平肝，止咳。

附　注：功效相似的有**多刺锦鸡儿 C. spinosa** DC.；**中亚锦鸡儿 C. tragacanthoides** (Pall.) Poir.，均分布于新疆。

**青甘锦鸡儿**

**Caragana tangutica** Maxim.

生于海拔 2 300—3 700 米的山坡灌丛中或阳坡林中。分布于甘肃、青海、四川。

根：解毒，消炎。

**毛刺锦鸡儿**　　川青锦鸡儿(中国高等植物图鉴)

**Caragana tibetica** Kom.

生于黄土山坡、沙地、山前平原。分布于内蒙古、甘肃、宁夏、青海、四川、西藏。

根：用于关节痛。　花：用于头晕。

**吐鲁番锦鸡儿**　　伊犁金鸡儿(中国主要植物图说——豆科)

**Caragana turfanensis** (Krassn.) Krassn. ——*C. frutescens* K. Koch var. *turfanensis* Krassn.

生于河滩及山坡砾石地。分布于新疆。

根：活血，利尿，止痛，强壮。

## 决明属　Cassia L.

**神黄豆**　　越南决明(通称)，排钱豆(云南思茅)

**Cassia agnes** (de Wit) Brenan ——*C. javanica* L. var. *agnes* de Wit; *C. javanica* L. var. *indo-chinensis* Gagnep.

分布于广东、广西、云南，或栽培。

种子(雄黄豆)：苦，凉。清热解毒，理气润肠。　用于胃痛，疟疾，感冒，麻疹，水痘，便秘。

**翅荚决明**　　对叶豆(云南)

**Cassia alata** L.

原产美洲热带。广东、海南、云南均有栽培。

叶：辛，温。杀虫止痒。用于皮肤病，疮疡肿毒，便秘。　种子：用于蛔虫病。

附　注：种子可作咖啡的代用品。

**腊肠树**　　牛角树(广东)，阿勃勒(本草拾遗)

**Cassia fistula** L.

台湾、福建、广东、海南、广西、云南有栽培。

果实(婆罗门皂荚)：苦，大寒。主心膈间热风，骨蒸寒热，杀虫。　用于胃脘痛，便秘，胃酸过多，食欲不振。

**光叶决明**

**Cassia floribunda** Cav.

生于平坝路边灌丛中。原产美洲热带地区。广东、海南、广西、云南有栽培。

根、叶、果实：清热通便，明目。　用于感冒，角膜云翳，慢性结膜炎，胃痛，便秘，牙痛，咽喉痛。

**毛荚决明**

**Cassia hirsuta** L.

原产美洲热带。广东、云南栽培或逸生。

全草：解毒止痛。用于痈疽，肿毒，疮疖。

**短叶决明**

**Cassia leschenaultiana** DC. ——*C. mimosoides* L. var. *wallichiana* (DC.)

Baker

生于山坡草地、路旁或灌丛中。分布于华东、西南及广东、海南、广西。

种子：甘，平。清热利湿，散瘀化积。

**含羞草决明**　山扁豆(江西)

**Cassia mimosoides** L.

生于山地、田野、路旁及水沟旁。原产美洲热带。分布于长江流域以南各省区。

全草：甘、微苦，平。清热解毒，利尿，通便。用于水肿，口渴，咳嗽痰多，习惯性便秘，毒蛇咬伤。　根：用于痢疾。

**豆茶决明**

**Cassia nomame** (Sieb.) Kitag. ——*Sooja nomame* Sieb.

生于山坡、路边、山谷溪边及林下草丛中。分布于东北、华北、华东及湖北、湖南、四川、云南。

全草(水皂角)：甘、微苦，平。清热利尿，润肠通便。用于目花，夜盲，偏头痛，水肿，脚气，黄疸，便秘。

**望江南**　羊角豆(浙江)，野扁豆(广东)，山绿豆(海南)

**Cassia occidentalis** L.

生于山坡道旁林缘和灌丛中，亦有栽培。分布于华东及广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

种子(望江南)：甘、苦，平。有小毒。清肝明目，健胃润肠。用于毒蛇咬伤，高血压，头痛，目赤，口烂，便秘。　茎、叶：解毒，止痛。　根：利尿。

**铁刀木**　黑心树、挨刀树(云南)，埋甩嘿(傣语)

**Cassia siamea** Lam.

福建、广东、广西有栽培。云南有野生。

叶及果实：用于痞满腹胀，头晕，脚转筋。

**茳芒决明**　望江南(通称)，槐叶决明(安徽)

**Cassia sophera** L.

生于山坡路旁，亦有栽培。原产亚洲热带。分布于长江流域以南各地。

根：苦，寒。强壮利尿，健胃，消炎，止痛。用于痢疾，胃痛，肝脓疡，咽喉痛，淋巴腺炎。　种子：平。清热，解毒。

**黄槐**　粉叶决明、黄槐决明(中国主要植物图说——豆科)

**Cassia surattensis** Burm. f. ——*C. suffruticosa* Koen. ex Roth

福建、台湾、广东、广西有栽培。

叶：清凉解毒，润肺。

**小决明**

**Cassia tora** L.

生于山坡、河边、山脚郊野荒地、路旁草丛中，亦有栽培。分布于长江流域以南各地。河北有栽培。

种子(决明子)：甘、苦、咸，微寒。清热明目，润肠通便。用于目赤涩痛，羞明多泪，头痛眩晕，目暗不明，大便秘结。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 紫荆属　Cercis L.

**紫荆**　　满条红(中国高等植物图鉴)

**Cercis chinensis** Bunge

生于低海拔的山坡溪畔、疏林或灌丛中，亦有栽培。分布于黄河流域以南各地。

树皮(紫荆皮)：苦，平。活血通经，消肿解毒。用于风寒湿痹，经闭，血气痛，喉痹，淋证，痈肿，癣疥，跌打损伤，蛇虫咬伤。　木部(紫荆木)：苦，平。活血，通淋。用于痛经，瘀血腹痛，淋证。　花(紫荆花)：清热凉血，祛风解毒。用于风湿筋骨痛，鼻中疳疮。　果实(紫荆果)：用于咳嗽，孕妇心痛。

**黄山紫荆**　　浙皖紫荆(浙江)

**Cercis chingii** Chun

生于山坡溪畔、疏林或灌丛中。分布于安徽、浙江、广东。

枝、树皮：活血，消肿，止痛。

附　注：功效相同的有**垂丝紫荆 C. racemosa** Oliv.，分布于江西、湖北、四川、贵州、云南。

**广西紫荆**　　**岭南紫荆**(江西、广西)

**Cercis chuniana** Metc.

生于海拔 800—1 300 米的山坡草地及灌丛中。分布于江西、福建、湖南、广东、广西、贵州。

树皮(紫荆皮)：苦，平。活血通经，消肿解毒。用于风寒湿痹，经闭，血气痛，喉痹，淋证，痈肿，癣疥，跌打损伤，蛇虫咬伤。

**湖北紫荆**

**Cercis glabra** Pamp. ——*C. yunnanensis* Hu et Cheng

生于石灰岩山地。分布于中南及陕西、安徽、浙江、四川、贵州、云南。

心材及树皮：破血，解毒。用于痈疽，肿毒，疮疖，产后血气痛。

## 蝙蝠草属　Christia Moench.

**铺地蝙蝠草**　　罗藦草(通称)

**Christia obcordata** (Poir.) Bahn. f. ——*Hedysarum obcordata* Poir.; *Lourea obcordata* (Poir.) Desv.

生于山野草坪上。分布于福建、广东、广西。

全株(半边钱)：苦、辛，寒。利水通淋，散瘀，解毒。用于小便淋痛，淋证，水肿，吐血，咳血，跌打损伤，疮疡，疥癣，蛇虫咬伤。

**蝙蝠草**　　蝴蝶草、飞锡草(中国高等植物图鉴)

**Christia vespertilionis** (L. f.) Bahn. f. ——*Hedysarum vespertilionis* L. f.; *Lourea vespertilionis* (L. f.) Desv.

生于山坡草地或灌丛中。分布于广东、广西。

全草(双飞蝴蝶): 甘、微辛,平。舒筋活血,调经法瘀。用于痛经,跌打损伤,风湿骨痛,毒蛇咬伤,痈疮。

## 鹰嘴豆属 Cicer L.

**鹰嘴豆** 香豆子(中国高等植物图鉴)

**Cicer arietinum** L.

河北、山西、陕西、甘肃、青海均有栽培。

种子(回回豆): 甘。用于肝炎,脚气。

## 香槐属 Cladrastis Raf.

**翅荚香槐**

**Cladrastis platycarpa** (Maxim.) Makino ——*Sophora platycarpa* Maxim.

生于海拔 600 米以下的山坡杂木疏林中或林缘。分布于江苏、浙江、湖南、广东、广西、贵州。

根: 用于关节痛。

**小花香槐** 香槐(中国主要植物图说——豆科,中国高等植物图鉴)

**Cladrastis sinensis** Hemsl.

生于海拔 700—2 500 米的山地。分布于陕西、湖北、四川、贵州、云南。

根: 消肿,止痛。

**香槐** 香近豆(浙江),山荆(河南)

**Cladrastis wilsonii** Takeda

生于海拔 1 000 米左右的山坡杂木疏林中或林缘。分布于陕西;安徽、浙江、江西、湖北、四川、云南。

根及果实(香槐): 用于关节痛,肠道寄生虫。

## 蝶豆属 Clitoria L.

**三叶蝴蝶花豆** 顺气药、大山豆(云南)

**Clitoria mariana** L.

生于山坡或林中。分布于云南。

根、叶、花: 甘,温。补肾,止血,舒筋,活络。用于感冒,肾虚头晕,带下病,水肿,肠出血,风湿关节痛。

## 舞草属 Codariocalyx Hassk.

**圆叶舞草** 无风独摇草(云南)

**Codariocalyx gyroides** (Roxb. ex Link.) Hassk.——*Hedysarum gyroides* Roxb. ex Link; *Desmodium gyroides* (Roxb. ex Link) DC.

生于海拔1 000—1 500米的阔叶林下或林缘灌丛中。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

根、叶及花：祛邪风，舒筋活血。

**舞草**

**Codariocalyx motorius** (Houtt.) Ohashi ——*Hedysarum motorium* Houtt.: *Desmonium gyrans* (L. f.) DC.

生于丘陵草地。分布于福建、台湾、江西、广东、广西、四川、贵州、云南。

全株(接骨草)：微涩，平。安神，镇静，祛瘀生新，活血消肿。用于肾虚，胎动不安，跌打肿痛，骨折，小儿疳积，风湿腰痛。

## 巴豆藤属 Craspedolobium Harms

**巴豆藤** 铁血藤(云南)

**Craspedolobium schochii** Harms

生于海拔950—1 850米的疏林中或林缘。分布于广西、四川、贵州、云南。

根(铁藤根)：涩、微苦，温。祛瘀活血，调经，除风湿。用于内脏出血，风湿痹痛，跌打损伤。

## 猪屎豆属 Crotalaria L.

**翅托叶野百合**

**Crotalaria alata** Buch.-Ham.

生于旷野草地上或林下较阴处。分布于广东、广西、云南。

全草：用于小儿疳积，肾虚，阳痿，骨折。

**响铃豆** 响铃草、摆子药(云南)

**Crotalaria albida** Heyne ex Roth

生于荒地路旁、山坡草丛、灌丛中或岩石上。分布于华东、中南、西南。

全草：苦、辛，凉。清热，解毒，利尿，截疟。用于久咳痰喘，小便涩痛，痈疽疔疮。

**大猪屎豆** 山豆根、野靛叶(云南)

**Crotalaria assamica** Benth.

生于海拔380—2 400米的山坡灌丛中、潮湿河岸边。分布于安徽、台湾、广东、广西、贵州、云南。

茎叶(自消容)、根：淡，微凉。清热解毒，凉血降压，利水。用于咳嗽吐血，肿胀，牙痛，小儿头疮，白血病，恶性肿瘤。叶：用于跌打，石淋。

**大苞叶猪屎豆**

**Crotalaria bracteata** Roxb.

生于海拔500—900米的山坡灌丛及路旁荒草地上。分布于台湾、云南。

根：消炎杀菌，解毒。

**长萼野百合**　长萼猪屎豆(中国主要植物图说——豆科)

**Crotalaria calycina** Schrank

生于旷野草地上。分布于福建、台湾、广东、广西、云南。

全株：用于小儿疳积。

**黄雀儿**　思茅猪屎豆(云南)

**Crotalaria cytisoides** Roxb. ex DC. ——*C. szemoensis* Gagnep.; *Priotropis cytisoides* (Roxb. ex DC.) Wight et Arn.

生于路边、田边及水沟边。分布于云南。

根(小扁豆)：甘、微涩，微温。消炎解毒，利喉止痛。用于急性吐泻，咽喉痛，乳蛾。

**假地蓝**　荷猪草、黄花野百合(中国主要植物图说——豆科)

**Crotalaria ferruginea** Grah. ex Benth.

生于山坡、路旁及灌木草丛中。分布于长江流域以南各地。

全草(响铃草)：甘，微苦，平。益气补肾，消肿解毒。用于久咳痰血，耳鸣，耳聋，梦遗，水肿，小便涩痛，石淋，乳蛾，瘰疬，疔毒，恶疮。

**菽麻**　太阳麻(云南)，赖麻，赫麻(中国高等植物图鉴)

**Crotalaria juncea** L.

全国南方各地广为栽培。

根：解毒，止痛，麻醉。

**线叶猪屎豆**

**Crotalaria linifolia** L.f. ——*A. linifolia* L.f. var. *stenophylla* (Vogel) C. Y. Yang

生于路旁、田边及空旷地方。分布于中南、西南。

根：辛、微苦，平。清热解毒，补中益气。用于腹痛，毒疮，耳鸣，肾亏，遗精，腰痛，妇女干血痨，疮毒。

**假苜蓿**

**Crotalaria medicaginea** Lam.

生于路旁及荒坡。分布于中南、西南。

全草：清热，化湿，利尿。

**猪屎豆**　水蓼竹(福建)，猪屎青、野黄豆、大眼蓝(中国主要植物图说——豆科)

**Crotalaria pallida** Ait. ——*C. mucronata* Desv.

福建、台湾、湖南、广东、广西、云南均有栽培。

种子：明目，固精，补肝肾。用于肾虚，眼目昏花。

**野百合**　农吉利(浙江、山东)

**Crotalaria sessiliflora** L.

生于向阳山坡疏林缘或矮草丛中及裸岩旁。分布于长江流域以南各地。

全草(野百合)：甘，平。清热解毒，利湿。用于痢疾，疮疖，小儿疳积，恶性肿瘤。

**四棱猪屎豆**

**Crotalaria tetragona** Andr.

生于山野草坡。分布于贵州、云南。

根及全草(化金丹): 辛、涩,温。化滞,止痛。用于腹痛。

## 棋子豆属 Cylindrokelupha Kosterm.

**大叶合欢**

**Cylindrokelupha turgida** (Merr.) T.L. Wu——*Pithecellobium turgida* Merr.; *Albizia turgida* (Merr.) Merr.

生于山地、水旁及林中谷地。分布于广东、广西。

根: 用于腹痛。

## 黄檀属 Dalbergia L. f.

**南岭黄檀** 水相思(广东)

**Dalbergia balansae** Prain

生于海拔 900 米以下的低山丘陵、河谷、溪边疏林内及灌丛中。分布于浙江、江西、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根: 行气,止痛,破积。

**两粤黄檀** 两粤檀(海南植物志)

**Dalbergia benthamii** Prain

生于丘陵山地疏林中。分布于广东、海南、广西。

茎: 活血通经。

**海南檀** 花梨公、牛筋树(海南)

**Dalbergia hainanensis** Merr. et Chun

生于密林中。分布于海南。

心材: 辛,温。止血,止痛。用于胃气痛,刀伤出血。

**藤黄檀** 丁香藤、香藤刺(浙江),大香藤、油香藤(广西)

**Dalbergia hancei** Benth.

生于海拔 1 400 米以下的山坡灌丛中、溪边岩石旁、林缘及路边。分布于安徽、浙江、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

根: 辛,温。强筋骨,宽筋,活络。 茎(红香藤): 行气,止痛,破积。用于心胃气痛,久伤积痛,气喘,衄血。 树脂: 止血。用于腹痛,心气痛。

**黄檀** 檀树(江苏、浙江),硬檀树、担杆树(福建)

**Dalbergia hupeana** Hance

生于山坡灌丛中、林内、林缘、溪旁、山脚沟边。分布于华东、中南及四川、贵州。

根皮(檀根): 苦、微辛,平。有小毒。清热解毒,止血消肿。

**香港黄檀** 油香藤(广东)

**Dalbergia millettii** Benth.

生于山坡路边、水沟或灌丛中。分布于浙江、福建、湖南、广东、广西、四川、贵州。

叶: 清热解毒。

**含羞草叶黄檀**　象鼻藤(植物名实图考)

**Dalbergia mimosoides** Franch.

生于海拔800—2 200米的山沟林下或灌丛中。分布于西南及浙江、江西、福建、湖北、湖南、广西。

叶(麦刺藤叶): 消炎,解毒。用于疔疮,痈疽,毒蛇咬伤,蜂窝组织炎。

**降香黄檀**　降香檀(海南植物志)

**Dalbergia odorifera** T. Chen

生于山坡疏林中、林缘或村旁旷地上,亦有栽培。分布于福建、广东、海南、广西。

心材(降香): 辛,温。行气活血,止痛,止血。用于脘腹疼痛,肝郁肋痛,胸痹刺痛,跌打损伤,外伤出血。

**斜叶黄檀**　斜叶榕、罗望子黄檀(海南植物志)

**Dalbergia pinnata** (Lour.) Prain——*Derris pinnata* Lour.

生于密林中。分布于海南、云南。

全株: 消肿止痛。用于风湿痛,跌打损伤,扭挫伤。

**多裂黄檀**

**Dalbergia rimosa** Roxb.

生于海拔1 300—1 700米的山谷疏林中或溪边。分布于广东、广西、云南。

根、叶: 用于头痛,黄水疮。

**印度黄檀**

**Dalbergia sisso** Roxb.

原产伊朗、印度、巴基斯坦。浙江、广东、海南、云南有栽培。

心材: 苦。行气止痛,活血止血。

**滇黔黄檀**

**Dalbergia yunnanensis** Franch.

生于海拔1 200—2 000米的山坡、路旁及灌丛中、林内或河沟边干燥向阳处。分布于广西、四川、贵州、云南。

根(秧青): 淡、辛,温。理气发表。用于感冒头痛,食积饱胀腹痛。

## 假木豆属　Dendrolobiun (Wight et Arn.) Benth.

**假木豆**　野马蝗、假绿豆(广西)

**Dendrolobium triangulare** (Retz.) Schindl.——*Hedysarum triangulare* Retz.

生于山坡路旁及灌丛中。分布于台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

根: 清热,强筋骨。用于咽喉痛,泄泻,跌打损伤,吐血。

## 鱼藤属　Derris Lour.

**毛鱼藤**

**Derris elliptica** (Wall.) Benth.——*Pongamia elliptica* Wall.

广东、海南、广西、云南均有栽培。

根：用于癣疥湿疹。

**毛果鱼藤**

**Derris eriocarpa** How

生于深山密林中。分布于广西、云南。

根：补血，润肠。用于发烧胸闷，咳嗽，咽喉痛。　藤(藤子甘草)：甘、苦，平。　利尿除湿，镇咳化痰。用于小便涩痛，咳嗽，水肿。

**锈毛鱼藤**　　荔枝藤、老荆藤(广东)

**Derris ferruginea** Benth.

生于灌丛中或疏林内。分布于广东、海南、广西、云南。

根：用于疥癣。

**中南鱼藤**

**Derris fordii** Oliv.

生于山坡、疏林或溪边灌丛中。分布于浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根、枝叶：辛，温。有毒。散瘀，止痛，杀虫。用于疮毒。

**亮叶中南鱼藤**　　老凉藤(广西)，亮叶揭阳鱼藤(广西植物名录)

**Derris fordii** Oliv. var. **lucida** How

生于石灰岩山地。分布于广东、广西、贵州、云南。

果实：凉血，补血。

**肇庆鱼藤**

**Derris hancei** Hemsl.

生于灌丛中或疏林中。分布于广东、广西。

根：用于骨折，跌打损伤。

**边荚鱼藤**　　老荆藤(广东)，纤毛鸭鱼藤(中国主要植物图说——豆科)

**Derris marginata** (Roxb.) Benth.——*Dalbergia marginata* Roxb.

生于山谷或林缘。分布于福建、广东、广西、云南。

根：用于疥癣。

**鱼藤**　　毒鱼藤(中国高等植物图鉴)

**Derris trifoliata** Lour.

生于河岸、沼池、沿海路边。分布于浙江、福建、台湾、广东、海南、广西。

根及枝叶：辛，温。有毒。散瘀，止痛，杀虫。用于跌打损伤，癣症。

## 山蚂蝗属　Desmodium Desv.

**小槐花**　　粘身草(浙江)，拿身草(广东)

**Desmodium caudatum** (Thunb.) DC.——*Hedysarum caudatum* Thunb.

生于向阳山坡路边疏林下、林缘、山脚灌丛中、旷野及路旁。分布于华东、中南、西南。

全草(青酒缸)：微苦，平。祛风利湿，解毒，利尿。　用于吐泻，泄泻，疟腮，咳嗽吐血，

疮疖。

**圆锥山蚂蝗**　　黄皮条、棉筋(云南)

**Desmodium elegans** DC.——*Desmodium esquirolii* Lévl.

生于海拔1 000—2 600米的山地灌丛中。分布于四川、云南。

根：祛风湿，止咳，消炎。

**宽卵叶山蚂蝗**　　假山绿豆(中国高等植物图鉴)

**Deamodium fallax** Schindl.

生于山坡草地、林下及林缘、灌丛中。分布于安徽、浙江、福建、台湾、湖北、广东、贵州。

全草：祛风活血，止痢，清汗发表。

附　注：功效相同的有**东北山蚂蝗** **D. fallax** Schindl. var. **mandshuricum** (Maxim.) Nakai，分布于东北。

**大叶山蚂蝗**　　大叶山绿豆(海南植物志)，恒河山绿豆(广州植物志)

**Desmodium gangeticum** (L.) DC.——*Hedysarum gangeticum* L.

生于荒地草丛中。分布于台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

茎叶(红母鸡草)：甘、微辛，平。止血，止痛，消瘀散肿。用于跌打损伤，阴挺，脱肛，腹痛，牛皮癣，神经性皮炎。

**假地豆**　　野花生(浙江、广西)，稗豆(海南)，假花生(广西)

**Desmodium heterocarpum** (L.) DC.——*Hedysarum heterocarpum* L.

生于山脚路边、水沟旁灌丛中或林下。分布于江苏、浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全草(狗尾花)：苦、甘，寒。清热解毒，消肿止痛。用于流行性乙型脑炎，疟腮，跌打损伤，咳嗽，小儿疳积。

**伏毛假地豆**

**Desmodium heterocarpon** (L.) DC. var. **strigosum** Van Meeuwen

生于山坡草地上。分布于广东、海南、广西。

全草：止痛，止血，生肌。用于砂淋，胃出血。　根：用于感冒发热，头痛。

**异叶山绿豆**　　田胡蜘蛛(海南)，铁线草、假地豆(广西)

**Desmodium heterophyllum** (Willd.) DC.——*Hedysarum heterophyllum* Willd.

生于河边、田边或坡坎上。分布于台湾、广东、海南、广西、云南。

全草：淡，凉。清热解毒，利水通淋，散瘀消肿。用于小儿石淋，疳积，消化不良，跌打瘀肿；外用于外伤出血，疮疡肿毒及毒蛇咬伤。

**大叶拿身草**　　羊带归(广西)，疏花山绿豆(广州植物志)

**Desmodium laxiflorum** DC.

生于山坡草地或林缘。分布于台湾、广东、广西、四川、云南。

全草：清热，平肝，利湿。

**小叶三点金草**　　红夜关门(广西)，辫子草(云南)，小叶山绿豆(海南植物志)

**Desmodium microphyllum** (Thunb.) DC.——*Hedysarum microphyllum* Thunb.

生于山脚路边、低山坡疏林下、林缘、田边或草丛中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福

延、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全草(碎米柴)：甘，平。清热，利湿，解毒。用于泌尿道结石，慢性吐泻，慢性咳嗽痰喘，小儿疳积，痈疽发背，痔疮，漆疮。根(辫子草根)：甘，平。清热利湿，止血，通络。用于黄疸，痢疾，小便淋痛，风湿痛，咯血，崩漏，带下病，痔疮，跌打损伤。

**饿蚂蝗** 红掌草(四川)

**Desmodium multiflorum** DC.

生于低山山坡、草地、山沟边、山脚丘陵地草丛中。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全株(饿蚂蝗)：苦，凉。补虚，活血，止痛。用于胃痛，小儿疳积，妇女干血痨。

**矩叶山蚂蝗** 断节果(云南)

**Desmodium oblongum** Wall. ex Benth.

生于海拔1 400—1 600米的山地。分布于云南。

全株：解表散寒，祛风解毒。

**波叶山蚂蝗** 牛巴嘴(江苏)，瓦子草(云南)，菱叶山绿豆(广西植物名录)

**Desmodium sequax** Wall.——*D. sinuatum* (Miq.) Bl.

生于山坡林下草地。分布于台湾、河南、湖北、广东、广西、四川、贵州、云南。

根：苦、涩，平。润肺止咳，驱虫。用于肺痨咳嗽，盗汗，咳嗽痰喘，蛔虫病。果实：微苦，涩，温。止血。用于内伤出血。全草：用于目赤肿痛。

**广金钱草** 金钱草、落地金钱(中国高等植物图鉴)

**Desmodium styracifolium** (Osbeck) Merr.——*Hedysarum styracifolium* Osbeck

生于山坡草地或灌丛中。分布于福建、湖南、广东、海南、广西、四川、云南。

地上部分(广金钱草)：甘、淡，凉。清热除湿，利尿通淋。用于热淋，砂淋，石淋，小便涩痛，水肿尿少，黄疸，尿赤。

附 注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**三点金草**

**Desmodium triflorum** (L.) DC.——*Hedysarum triflorum* L.

生于荒地草丛、灌丛下或河边沙土上。分布于台湾、广东、海南、广西、云南。

全草：苦、微辛，温。行气止痛，温经散寒，解毒。用于中暑腹痛，疝气痛，月经不调，痛经，产后关节痛，狂犬病。

**绒毛山蚂蝗** 绒毛山绿豆(海南植物志)

**Desmodium velutinum** (Willd.) DC.——*Hedysarum velutinum* Willd.

生于山地草坡及灌丛中。分布于台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

全株：用于黄疸。

## 代儿茶属 Dichrostachys Wight et Arn.

**代儿茶** 柏勒树、白凿簕(中国树木志)

**Dichrostachys cinerea** (L.) Wight et Arn.——*Mimosa cinerea* L.

原产非洲及印度。广东有栽培。

枝：止血，止泻，止痛。用于胃痛，胃出血。

附　注：心材浸膏可代儿茶，外用敛疮拔脓，生肌，镇痛；内服止血，止泻。　根：在原产地用于肠道寄生虫，蛇、蝎咬伤。

## 扁豆属　Dolichos L.

**扁豆**

**Dolichos lablab** L.

全国各地均有栽培。

种子(白扁豆)：甘，微温。健脾化湿，清暑。　用于脾胃虚弱，暑湿内蕴，呕吐泄泻，消渴，带下病。　种皮(扁豆衣)：甘，平。　清暑化湿，健脾止泻。用于脾虚便溏，暑湿呕泻。花(扁豆花)：甘，平。理气宽胸，和胃止泻。用于胸闷气滞，不思饮食，呕恶，泄泻。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**大麻药**

**Dolichos tenuicaulis** (Baker) Craib——*Phaseolus sublobatus* Roxb. var. *tenuicaulis* Grah.

生于旷野灌丛中。分布于云南、广东。

根或叶(大麻药)：辛，温。有毒。镇痛，消肿，止血。用于风湿痛，跌打损伤，骨折，外伤出血，吐血，衄血，便血。

## 山黑豆属　Dumasia DC.

**心叶山黑豆**　　心叶小黑豆(云南)

**Dumasia cordifolia** Benth. ex Baker

生于海拔 2 000 米上下的向阳山坡、灌丛中或草地。分布于云南。

根：止咳化痰。用于咳嗽痰多。

**雀舌豆**

**Dumasia forrestii** Diels

生于山沟潮湿地带。分布于江西、云南。

荚果：苦、涩，平。舒筋活络，止痛。用于坐骨神经痛，筋骨疼痛。

**柔毛山黑豆**

**Dumasia villosa** DC.

生于路旁、河边及空旷地。分布于江西、湖北、四川、贵州、云南。

荚果：清热解毒，通经消食。

## 野扁豆属　Dunbaria Wight et Arn.

**长柄野扁豆**　　山绿豆(广东)

**Dunbaria podocarpa** Kurz

生于河边、灌丛或攀援于树上。分布于福建、江西、广东、海南、广西。

全株：解痛，肿痛。用于咽喉痛。

**圆叶野扁豆**

**Dunbaria rotundifolia** (Lour.) Merr.——*Indigofera rotundifolia* Lour.

生于山坡灌丛中。分布于江苏、广东、广西、四川、贵州、云南。

根：淡，凉。清热解毒，消肿，止血生肌。用于肺热咳嗽，大肠湿热，疮疡痈疮。

**毛野扁豆**

**Dunbaria villosa** (Thunb.) Makino——*Glycine villosa* Thunb.

生于山坡疏林、林缘路边草丛中、山脚溪边、路旁。分布于江苏、安徽、浙江、江西、湖南、广东、广西。

种子(野扁豆)：淡，凉。活血，行气，止痛。用于胸膈胀满，胃痛，月经不调，痛经，带下病，刀伤。

## 榼藤子属 Entada Adans.

**榼藤子** 牛肠麻、牛眼睛(海南)

**Entada phaseoloides** (L.) Merr.——*Lens phaseoloides* L.; *E. scandens* (L.) Benth.; *Mimosa scandens* L.

生于低山丘陵及次生林中。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、云南、西藏。

根、藤茎：微苦、涩，平。活血祛风，壮腰固肾。用于风湿关节痛，四肢麻木，跌打损伤，骨折。茎皮：催吐、泄泻。种仁(榼藤子仁)：微苦、涩，平。利湿消肿。用于黄疸，脚气，水肿。

附 注：种子(榼藤子仁)《中华人民共和国药典》1990 年版附录收载。

## 象耳豆属 Enterolobium Mart.

**青皮象耳豆** 密茂象耳豆(云南)

**Enterolobium contortisiliquum** (Vell.) Morong——*Mimosa contortisiliquum* Vell.

原产南美。广东、海南、云南有栽培。

果荚：祛风痰，除湿毒，杀虫。用于头风头痛，咳嗽痰喘，肠风便血，痈肿便毒，下痢，疮癣疥癞。

**象耳豆**

**Enterolobium cyclocarpum** (Jacq.) Griseb.——*Mimosa cyclocarpa* Jacq.

原产南美。浙江、江西、福建、广东、海南、广西、云南均有栽培。

果荚：祛风痰，除湿毒，杀虫。用于头风头痛，咳嗽痰喘，疮癣疥癞。

## 雀梗珠属　Eriosema (DC.) G. Don.

**猪仔笠**　山葛、毛瓣花(江西)

**Eriosema chinense** Vog.

生于向阳山坡、草地及干旱山顶。分布于江西、广东、广西、云南、贵州。

块根(猪仔笠)：甘，平。清肺化痰，滋阴，消肿。用于肺热咳嗽，烦渴，赤白痢疾。

**绵三七**　鸡心矮陀陀、球块茎毛瓣花(中国主要植物图说——豆科)

**Eriosema himalaicum** Ohashi

生于山坡草丛中、石缝中或林下。分布于四川、云南、西藏。

块根(绵三七)：甘、苦，平。健胃，止痛，解毒。用于胃痛，泄泻，痢疾，小儿疳积，子痈，疝气，跌打损伤，疮毒。

## 刺桐属　Erythrina L.

**刺木通**　鹦哥花、红嘴绿鹦哥(云南)

**Erythrina arborescens** Roxb.

生于路边及沟旁。分布于西南及湖北。

根、叶、果实(乔木刺桐)：苦、辛，平。清热驱风，健脾利湿。用于头痛，痢疾。种子：祛风除湿，驱虫。

**龙牙花**

**Erythrina corallodendron** L.

山东、江苏、浙江、福建、台湾、广东、广西、云南均有栽培。

树皮：作麻醉剂和止痛镇静剂。

**硬核刺桐**　翅果刺桐(云南)

**Erythrina lithosperum** Bl. ex Miq.

生于沟谷密林中。分布于云南。

树皮：祛风除湿。

**刺桐**　象牙红、海桐树、鸡桐木(广东)，鸡公树(海南)

**Erythrina orientalis** (L.) Merr.——*E. corallodendron* L. var. *orientalis* L.; *E. variegata* L. var. *orientalis* (L.) Merr.

台湾、广东、海南、广西、四川、贵州均有栽培。

树皮(海桐皮)：苦、辛，平。祛风湿，通径络，杀虫。用于风湿痹痛，痢疾，牙痛，疥癣。

## 山豆根属　Euchresta Benn.

**三小叶山豆根**

**Euchresta trifoliolata** Merr.

生于沟边石壁或山地林中。分布于江西、湖北、湖南、广东、广西。

种子：消炎解毒，镇痛止泻。

**管萼山豆根**　胡豆蓬(四川)，鸦片七(湖南)

**Euchresta tubulosa** Dunn

生于海拔300—1 200米的山地及密林中。分布于湖北、湖南、四川。

全株：清火祛热。用于咽喉痛，牙痛。

## 千斤拔属　Flemingia Roxb.

**锈毛千斤藤**　黄胆树、假里豆(海南)

**Flemingia ferruginea** Wall. ex Benth.

生于海拔1 700米以下的旷野山坡。分布于海南、广西、云南。

根：用于黄疸，强筋骨。

**水边千斤拔**

**Flemingia fluminalis** C. B. Clarke ex Prain

生于沟边潮湿处及江边沙滩上。分布于四川、云南。

根及茎叶(岩豆)：微苦、辛，温。行血，除湿。用于风湿关节痛，带下病，肠痛。

**千斤拔**　牛得巡(海南)，大叶千斤拔(中国主要植物图说——豆科)

**Flemingia macrophylla** (Willd.) Merr.——*Crotalaria macrophylla* Willd.

生于海拔2 400米以下的旷野和灌丛中。分布于安徽、江西、福建、台湾、广东、广西、四川、贵州、云南。

根(大叶千斤拔)：辛、微苦，寒。清热利湿，健脾补虚，解毒。用于红、白痢。

**葵性千斤拔**　单守根、牛达敦(海南)，马石头(广西)

**Flemingia philippinensis** Merr. et Rolfe

生于山坡草地。分布于江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南。

根：甘、辛，温。祛风利湿，消瘀解毒，强筋骨。用于风湿痹痛，水肿，跌打损伤，痈肿，乳蛾。

**球穗千斤拔**　球穗花千斤拔(中国主要植物图说——豆科)

**Flemingia strobilifera** (L.) Ait ——*Hedysarum strobiliferum* L.

生于空旷草坡上。分布于台湾、广东、海南、广西、云南。

根、全草：苦、甘，凉。止咳祛痰，清热除湿，补虚强骨。

## 千花豆属　Fordia Hemsl.

**千花豆**　虾须豆(广东)，五郎伞(广西)

**Fordia cauliflora** Hemsl.

生于山坡及荒地。分布于广东、广西、云南。

根及叶(虾须豆)：甘、微辛，平。散瘀消肿，止咳，化痰，润肺。用于跌打损伤，疮毒，风湿骨痛，瘀积疼痛，肺痨咳嗽。

## 乳豆属　Galactia P. Br.

**乳豆**

**Galactia elliptifoliola** Merr.

生于路边灌丛中。分布于广东、海南、广西、云南。

全草：用于跌打损伤，骨折。

## 皂荚属　Gleditsia L.

**华南皂荚**

**Gleditsia fera** (Lour.) Merr.——*Mimosa fera* Lour.

生于海拔1 900—2 100米的灌丛中，亦有栽培。分布于江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西。

嫩茎枝：辛，温。有微毒。搜风拔毒，消肿排脓。用于肿痛，疮毒，疬风，癣疮，胎衣不下。　果实：辛，温。有微毒。开窍，通便，润肠，镇咳。

附　注：功效相似的有**小果皂荚 G. australis** Hemsl.，分布于广东、海南、广西。

**日本皂荚**　　山皂荚(浙江)

**Gleditsia japonica** Miq.——*G. melanacantha* Tang et Wang

生于山脚、郊野林缘及村庄附近旷地。分布于吉林、辽宁、河北。

棘刺：辛，温。消肿排脓，下乳，杀虫除癣。用于瘰疬，乳痈，痈肿不溃。　果实：辛，温。有小毒。祛痰通窍，消肿。用于中风，癫痫，痰涎涌盛，痰多咳喘。

**云南皂荚**　　滇南皂角树(植物名实图考)

**Gleditsia japonica** Miq. var. **delavayi** (Franch.) L. C. Li ——*G. delavayi* Franch.

生于海拔1 000—2 000米的山坡、溪边、阔叶林中。分布于贵州、云南。

种子：祛痰，利尿。

**皂荚**　　皂荚树(浙江)，刀皂(湖南)，皂角(河南、四川)，牍皂(四川)

**Gleditsia sinensis** Lam.——*G. officinalis* Hemsl.

生于山坡疏林、村旁、路边、溪河两岸向阴处。分布于黄河流域以南各地。

刺(皂角刺)：辛、咸，温。搜风，化痰，托毒。用于痈肿，疮毒，胞衣不下，疮癣。　荚果(大皂角)：辛，温。有小毒。开窍，祛痰，解毒。用于中风口噤，喘咳痰壅，癫痫，痈疮肿毒。　不育荚果(猪牙皂)：辛，温。有小毒。开窍，消痰，搜风，杀虫。用于中风口噤，风痫，痰喘，疥癣肿毒。　种子(皂荚子)：辛，温。有小毒。搜风，祛痰，开窍。用于中风口噤，痰鸣喘咳，喉痹，疮癣肿毒。

附　注：皂角刺及猪牙皂为《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**三刺皂角**　　美国皂角(中国树木分类学)

**Gleditsia triacanthos** L.

原产美国。栽培作农田防护林或观赏树。上海市公园有栽培。

蘖刺：消肿杀虫。

## 大豆属　Glycine Willd.

**大豆**

**Glycine max** (L.) Merr. ——*Phaseolus max* L.

全国各地普遍栽培。

经发酵加工后的种子(淡豆豉)：苦、辛，凉。解表，除烦，宣发郁热。用于感冒，寒热头痛，烦燥胸闷，虚烦不眠。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**野大豆**

**Glycine soja** Sieb. et Zucc.

生于田边、水沟旁或田埂草丛中。分布于东北及河北、陕西、甘肃、山东、江苏、上海、安徽、湖南、湖北、四川。

种子(野料豆)：甘，凉。补益肝肾，祛风解毒。用于阴亏目昏，肾虚腰痛，盗汗，筋骨痛，产后风痉，小儿疳疾。藤(野大豆藤)：平，淡。健脾。用于盗汗，伤筋。

附　注：功效相同的有**狭叶野大豆 G. soja** Sieb. et Zucc. f. **lanceolata** (Skv.) P. Y. Fu et Y. A. Chen，分布同野大豆。

## 甘草属　Glycyrrhiza L.

**粗毛甘草**

**Glycyrrhiza aspera** Pall.

生于山谷河滩草甸。分布于新疆。

根、根状茎：祛痰止咳，清热解毒。

**光果甘草**

**Glycyrrhiza glabra** L.

生于荒漠、半荒漠或带盐碱草原、荒地。分布于甘肃、青海、新疆。

根及根状茎(甘草)：甘，平。补脾，益气，清热解毒，祛痰止喘，缓急止痛，调和诸药。用于脾胃虚弱，倦怠乏力，心悸气短，咳嗽多痰，脘腹、四肢痉挛急痛，痈肿疮毒，缓解药物毒性、烈性。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②功效相似的有**胀果甘草 G. inflata** Batal.，分布于甘肃、新疆；**圆果甘草 G. squamulosa** Franch.，分布于华北及宁夏、新疆、江苏、河南；**甘草 G. uralensis** Fisch.，分布于东北、华北、西北；**云南甘草 G. yunnanensis** Cheng f. et L. K. Tai，分布于云南。③胀果甘草与甘草均为《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**黄甘草**

**Glycyrrhiza korshiskyi** G. Hrig.

生于平原、渠旁、草地。分布于甘肃、新疆。

根及根状茎：祛痰止咳，清热解毒。

**刺果甘草**　马狼秆、马粮柴、胡苍耳(中国高等植物图鉴)

**Glycyrrhiza pallidiflora** Maxim.

生于海拔500—800米的路边、河边、堤岸草丛中。分布于东北及河北、内蒙古、陕西、山东、江苏。

果实(奶椎)：甘、辛，微温。催奶，用于乳汁缺少。　根：甘、辛，微温。杀虫。用于阴道滴虫病。

## 米口袋属　Gueldenstaedtia Fisch.

**光滑米口袋**

**Gueldenstaedtia maritima** Maxim.

生于山坡、田野及路旁。分布于辽宁、河北、山东。

全草(甜地丁)：解毒，消肿，镇痛。用于痈疽疔毒，恶疮瘰疬。

**狭叶米口袋**

**Gueldenstaedtia stenophylla** Bunge

生于山坡、田野及草地。分布于东北、华北及陕西、甘肃、江苏、江西、河南。

全草：清热解毒。用于痈疽疔毒，恶疮瘰疬。

**少花米口袋**　米布袋(中国高等植物图鉴)

**Gueldenstaedtia verna** (Georgi) Boriss.——*G. multiflora* Bunge

生于山坡草地、路边、田野。分布于东北及内蒙古。

全草(甜地丁)：苦、辛，寒。清热解毒。用于疔疮痈肿，肠痈。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

## 肥皂荚属　Gymnocladus Lam.

**肥皂荚**　肉皂角(湖北)

**Gymnocladus chinensis** Baill.

生于海拔300—1 500米的山坡杂木林中。分布于陕西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

果实(肥皂荚)：辛，温。祛风除湿，活血消肿。用于风湿痛，跌打损伤，疔疮肿毒。　种子(肥皂核)：甘，温。用于顽痰，下痢，疮癣。

## 岩黄芪属　Hedysarum L.

**山岩黄芪**

**Hedysarum alpinum** L.

生于山地林缘、河边草甸。分布于东北及内蒙古。

根：止汗，强壮。

**短翼岩黄芪**

**Hedysarum brachypterum** Bunge

生于砂质草原、草原带丘陵坡地。分布于河北、内蒙古。

全草：用于腹痛。

附　注：功效相似的有**山竹岩黄芪 H. fruticosum** Pall.，分布于东北、华北及陕西、宁夏；**踏郎 H. laeve** Maxim.，分布于内蒙古及陕西北部。

**川西岩黄芪**　　西康岩黄芪(中国主要植物图说——豆科)

**Hedysarum limprichtii** Ulbr.

生于海拔 2 500—3 000 米的山坡草丛中。分布于四川、云南、西藏。

根：用于脾胃虚弱，气虚下陷。

**红花岩黄芪**　　花柴、牛以消(陕西、甘肃)，豆花牛筋脖(中国高等植物图鉴)

**Hedysarum multijugum** Maxim.

生于沙漠戈壁、沙丘、草原、坡地及河谷。分布于西北及四川、西藏。

根及根状茎：强心，利尿，消肿。用于气虚气促，小便淋痛，浮肿。

附　注：功效相似的有**蒙古岩黄芪 H. mongolicum** Turcz.，分布于东北、华北。

**多序岩黄芪**

**Hedysarum polybotrys** Hand.-Mazz.

生于山坡草地及灌丛中。分布于甘肃、四川。

根及根状茎(红芪)：甘，温。补气固表，利尿托毒，排脓，敛疮生肌。用于气虚乏力，食少便溏，中气下陷，久泻脱肛，便血崩漏，表虚自汗，气虚水肿，痈疽难溃，血虚痿黄，内热消渴。

附　注：① 红芪为《中华人民共和国药典》1990 年版收载。② 功效相似的有**黄花岩黄芪 H. citrinum** Baker，分布于四川、云南、西藏；**滇岩黄芪 H. limitaneum** Hand.-Mazz. 分布于云南、西藏。

**花棒**　　桦秋、牛尾梢(甘肃)，花柴、花帽(宁夏)

**Hedysarum scoparium** Fisch. et Mey.

生于海拔 400—1 000 米的荒漠、半荒漠和干旱草原地带的沙地、戈壁或丘陵坡地。分布于西北及内蒙古。

根及根状茎：强心，利尿，消肿。用于气虚乏力，气喘自汗，浮肿。

**锡金岩黄芪**

**Hedysarum sikkimense** Benth. ex Baker

生于海拔 4 000—5 000 米的山坡及草丛中。分布于四川、云南、西藏。

根及根状茎：补气固表，托毒生肌，排脓消肿。

**准噶尔岩黄芪**

**Hedysarum songoricum** Bong.

生于山坡及沟边岩缝中。分布于新疆。

根及根状茎：强心，利尿，消肿。

**美丽岩黄芪**

**Hedysarum tuberosum** Fedtsch. var. **speciosum** Hand.-Mazz.

生于海拔 4 300—4 450 米的山坡灌丛或草丛中。分布于甘肃、四川、西藏。

全草：生肌，愈疮，利湿-镇痛，催吐。

**长白岩黄芪**

**Hedysarum ussuriense** Schischk. et Kom.

生于高山冻原、桦木林下及林缘。分布于东北。

根及根状茎：解热，止汗，强壮。

## 槐蓝属 Indigofera L.

**多花木蓝** 景栗子、马黄消(四川)

**Indigofera amblyantha** Craib

生于旷野、山坡、疏林中、林缘及灌丛中。分布于河北、山西、陕西、甘肃、江苏、浙江、河南、湖北、广东、广西、四川。

根及根状茎：苦、涩，寒。清热解毒，消肿止痛。

附 注：功效相似的还有**宁波木蓝 I. cooperi** Craib，分布于浙江、福建；**宜昌木蓝 I. decora** Lindl. var. **ichangensis** (Craib) Y Y Fang et C. E. Zheng，分布于浙江、江西、河南、湖北、湖南、广西、贵州；**华东木蓝 I. fortunei** Craib，分布于江苏、安徽、浙江、江西、湖北；**浙江槐蓝 I. parkesii** Craib，分布于安徽、浙江、江西、福建；**小蓝柴 I. potaninii** Craib，分布于山西、陕西、甘肃、河南、四川。

**深紫木蓝** 流产草(广西)

**Indigofera atropurpurea** Buch.-Ham.

生于路旁及灌丛中。分布于广东、广西、贵州、云南。

根：用于人工流产。 叶：蛇伤。

**铁扫帚** 山红蓝靛(广西)，野蓝枝子(中国高等植物图鉴)

**Indigofera bun eana** Steud.

生于山坡灌丛中或路旁、林缘。分布于河北、山西、陕西、甘肃、山东、安徽、浙江、湖北、四川、贵州。

全草(铁扫竹)：苦、涩，凉。用于创伤，肿毒，口疮，胸疮，吐血，水泻。

**苏木蓝**

**Indigofera carlesii** Craib

生于山坡林内或灌丛中。分布于陕西、江苏、安徽、江西、河南、湖北。

根：微苦，平。止咳，止血，敛汗。用于咳嗽，自汗，外伤出血。

**庭藤** 铜锣伞(广东)，泡颈亮(广西)，岩藤(中国高等植物图鉴)

**Indigofera decora** Lindl.

生于山坡阴处或路旁。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西。

根、全草(铜罗伞)：辛、微酸，平。通经络，散瘀积，消肿痛。用于跌打损伤，枳瘀，风湿关节痛。

**黔滇木蓝** 白口莲(广西)

**Indigofera esquirolii** Lévl.

生于灌丛中。分布于广西、贵州、云南。

枝、叶：用于肠道寄生虫病所致的腹痛腹胀。

**假大青蓝**

**Indigofera galegoides** DC

生于旷野及山谷中。分布于海南、广西、云南。

根：消肿止痛。

**草山木蓝**

**Indigofera hancockii** Craib

生于山坡荒地。分布于云南。

根(苍蝇草)：苦、微涩，凉。祛风，消炎，止痛。用于牙龈发炎，跌打疼痛，麻风。

**毛木蓝**

**Indigofera hirsuta** L.

生于旷野荒地上。分布于福建、台湾、湖南、广东、海南、广西。

枝叶：解毒消肿。用于疮疥。

**花槐蓝**　花木蓝(浙江)，苦扫根、扫帚花、山蓝(河北)

**Indigofera kirilowii** Maxim. ex Palibin

生于山坡灌丛中、疏林中、石缝中及溪边。分布于东北、华北及江苏、浙江、江西、湖北。

根：苦，寒。消炎镇痛，舒筋活络。用于疮毒，风湿关节痛。

**滨木蓝**

**Indigofera litoralis** Chun et T Chen

生于滨海沙地上或旷野草丛中。分布于广东、广西。

全草：用于乳痈，咽喉痛。

**蒙自木蓝**

**Indigofera mentzeana** Craib

生于山野疏林下。分布于云南。

根：苦，寒。消炎镇痛，舒筋活络。用于风热咳喘，风湿关节痛，瘫痪，疮疡。

**远志木蓝**　地萝卜、鸡心薯(广西)

**Indigofera neopolygaloides** Hu ex Wang et Tang

生于山坡草丛中。分布于贵州、云南。

全草：辛、微甘，平。活血止痛。用于劳伤。

**马棘**　野绿豆(浙江)，野蓝枝子、狼牙草(四川)，金雀花(贵州)

**Indigofera pseudotinctoria** Matsm.

生于低山坡林缘、山脚丘陵灌丛中、郊野溪边、沟边及路旁。分布于陕西、山东、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、广东、广西、贵州、云南。

根(一味药根)：苦、涩。活血祛瘀，解毒。用于咳喘，喉蛾，疔疮，瘰疬，痔疮，跌打损伤。　全草(一味药)：苦、涩，温。用于瘰疬，痔疮，食积，感寒咳嗽。

**茸毛槐蓝**　雪人参(贵州)，茸毛木蓝、血人参(中国高等植物图鉴)

**Indigofera stachyoides** Lindl.

生于山坡、灌丛中或林缘。分布于西南及湖北、广西。

根(雪人参): 涩、微苦,温。补虚,活血,固脱。用于崩漏,久痢,跌打损伤,溃疡久不收口。

**野青树** 假蓝靛(海南)

**Indigofera suffruticosa** Mill.

浙江、福建、台湾、广东、海南、广西、贵州、云南均有栽培。

全株(假蓝靛): 苦,寒。凉血解毒,消炎止痛。用于衄血,肤痒,斑疹。

**版纳木蓝**

**Indigofera teysmannii** Miq.

生于山地路旁。分布于广东、广西、贵州、云南。

根(大叶狼豆柴): 甘、苦,凉。软坚。用于痞块。 叶(大叶狼豆柴叶): 甘、苦,凉。解毒。用于乳痈。

**槐蓝** 靛、蓝靛(广东),木蓝(本草纲目)

**Indigofera tinctoria** L.

安徽、福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南有栽培。

根(大靛根): 苦。解虫毒。用于丹毒。 叶及茎(木蓝): 苦,平。清热解毒,祛瘀止血。用于乙型脑炎,疟腮,目赤红肿,疮肿,吐血。

**三叶木蓝** 地蓝、野蓝(广西)

**Indigofera trifoliata** L.

生于山坡草地。分布于湖北、湖南、广东、广西、云南。

根: 苦,寒。清热解毒。用于乳痈,咽喉痛。

## 鸡眼草属 Kummerowia Schindl.

**长萼鸡眼草** 鸡眼草(浙江)

**Kummerowia stipulacea** (Maxim.) Makino——*Lespedeza stipulacea* Maxim.

生于山坡、山脚下、路边、田边及林缘。分布于东北及河北、山西、陕西、甘肃、山东、江苏、安徽、浙江、江西、河南。

全草(莲子草): 甘,平。健脾利湿,解热止痢。

**鸡眼草** 掐不齐(山东、江苏),蚂蚁草(浙江)

**Kummerowia striata** (Thunb.) Schindl.——*Hedysarum striatum* Thunb.

生于山坡、路边、田边、林缘或林下。分布于东北及河北、江苏、浙江、福建、湖北、湖南、广东、四川、贵州、云南。

全草(鸡眼草): 甘、辛,平。清热解毒,健脾利湿。用于感冒发热,暑湿吐泻,疟疾,痢疾,传染性肝炎,热淋,白浊。

## 香豌豆属 Lathyrus L.

**大山黧豆** 苾芒香豌豆、山豇豆(通称)

**Lathyrus davidii** Hance

生于海拔1 800米以下的林缘草坡或疏林下。分布于东北、华北及陕西、甘肃、山东、安徽、河南。

全草：用于痛经，子宫内膜炎，也试用于避孕。

附　注：功效相同的有**牧地香豌豆 L. pratensis** L.，分布于陕西、甘肃、四川。

**三脉山黧豆**

**Lathyrus komarovii** Ohwi

生于林缘、林间草地或草甸。分布于东北。

全草：用于黄疸，尿少，外伤。

**欧香豌豆**　　沼生香豌豆(中国主要植物图说——豆科)

**Lathyrus palustris** L.

生于低山草甸、沟边、林缘、灌丛中或河边。分布于东北、华北、西北及江苏、浙江。

种子：活血破瘀。用于跌打损伤，肿痛。

附　注：功效与分布相同的有**山黧豆 P. palustris** L. subsp. **pilosus** (Cham.) Hulten。

**山黧豆**　　紫地丁(河北)，五脉叶香豌豆(中国主要植物图说——豆科)

**Lathyrus quinquenervius** (Miq.) Litv. ex Kom.——*Vicia quinquenervius* Miq.

生于沟坡、田边、草地、山坡及灌丛中。分布于东北、华北及陕西、青海、湖南、云南。

全草：苦、涩，温。祛风除湿，止痛。用于关节痛，头痛。

**玫红山黧豆**

**Lathyrus tuberosus** L.

生于海拔500—2 400米的山坡及河谷旁。分布于新疆。

种子：活血破瘀。用于跌打损伤，腰背酸痛，各种陈伤。

## 胡枝子属　Lespedeza Michx.

**胡枝子**　　帚条(东北)，圆叶胡枝子(安徽)

**Lespedeza bicolor** Turcz.

生于林缘或山坡灌丛中。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、山东、安徽、浙江、河南、湖北、湖南。

茎叶：甘，平。润肺清热，利尿通淋。用于伤风发热，头痛，淋浊。

**绿叶胡枝子**

**Lespedeza buergeri** Miq.

生于向阳山坡、路边及草丛中。分布于山西、陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、台湾、河南、湖北、湖南、四川。

根(血人参)：辛、微苦，温。解表，化痰，利湿，活血。用于伤风头痛，咳嗽，淋浊，妇女血瘀腹痛，血崩，痈疽，丹毒。　皮：用于四肢骨关节红肿。　叶：用于痈疽发背。

**中华胡枝子**

**Lespedeza chinensis** G. Don

生于向阳山坡疏林、林缘、路旁草丛、竹园及山脚草丛中。分布于江苏、浙江、安徽、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、四川。

全草(细叶马料梢)：清热止痢，祛风止痛，截疟。用于急性菌痢，关节痛，疟疾。

**截叶胡枝子**　老牛筋(黑龙江)，夜关门(陕西)，铁扫帚(浙江)

**Lespedeza cuneata** (Dum.-Cours.) G. Don——*L. sericea* Miq.

生于低山坡路边及空旷地杂草丛中。分布于东北、华北及陕西、甘肃、江苏、浙江、江西、湖南、广西、四川、贵州、云南。

全草(夜关门)：甘、苦、涩，凉。清热解毒，利湿消积。用于遗精，遗尿，白浊，带下病，哮喘，胃痛，劳伤，小儿疳积，泻痢，跌打损伤，视力减退，目赤红痛，乳痈。

**短梗胡枝子**　籽条(辽宁)，短序胡枝子(东北木本植物图志)

**Lespedeza cyrtobotrya** Miq.

生于山坡及林缘。分布于吉林、辽宁、河北、内蒙古、陕西、江西、福建、湖北、四川。

叶：用于水肿。

**大叶胡枝子**　活血丹(植物名实图考)

**Lespedeza davidii** Franch.

生于干旱向阳山坡、山谷林缘或灌丛中、路边及草丛中。分布于安徽、浙江、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

全草(和血丹)：甘，平。清热，止血，镇咳。用于疹瘙，咳嗽，外伤出血。

**达呼里胡枝子**　牤牛茶(河北)，豆豆苗(河南)

**Lespedeza dahurica** (Laxm.) Schindl.——*Trifolium dahuricum* Laxm.

生于山坡、草地及海滨沙滩。分布于东北、华北、西北及安徽、四川、云南。

全株(枝儿条)：辛，温。解表散寒。用于感冒，发烧，咳嗽。

**春花胡枝子**

**Lespedeza dunni** Schindl.

生于山地、溪谷边灌丛中。分布于福建、浙江。

全草：用于肠痈。

**多花胡枝子**　白毛蔴花(东北)

**Lespedeza floribunda** Bunge

生于干旱草坡或山坡丛林中。分布于华北及辽宁、陕西、甘肃、宁夏、青海、江苏、浙江、江西、湖北、湖南、广西、四川。

全草(铁鞭草)：涩，凉。消积，散瘀。用于疳积，疟疾。

**美丽胡枝子**　马拂帚(浙江)，红花羊牯爪(广东)

**Lespedeza formosa** (Vog.) Koehne——*Desmodium formosum* Vog.

生于空旷地杂草中或山坡疏林下。分布于陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、广东、广西、四川、云南。

根(草大戟)：苦，平。清肺热，祛风湿，散瘀血。用于肺痈，风湿痛，跌打损伤。　茎叶：苦，平。用于小便淋痛。　花：苦，平。清热凉血。用于肺热咳血，便血。

**阴山胡枝子**　白指甲花(中国主要植物图说——豆科)

**Lespedeza inschanica** (Maxim.) Schindl.——*L. juncea* Pers. var. *inschanica*

Maxim.

生于山坡草丛中。分布于东北、华北及陕西。

全草：活血，利水，止痛。

**铁马鞭**

**Lespedeza pilosa** (Thunb.) Sieb. et Zucc.——*Hedysarum pilosum* Thunb.

生于向阳低山坡的疏林、林缘草丛或石缝间及荒山草地。分布于甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、广东、四川。

全草：苦、辛，平。散结，通络，健胃，安神。用于体虚久热不退，痞症腹部胀痛，水肿，痈疽，指疔。

**绒毛胡枝子**　　山豆花(中国主要植物图说——豆科)

**Lespedeza tomentosa** (Thunb.) Sieb. ex Maxim.

生于干旱向阳山坡、路旁及草丛中。分布于东北、华北、中南及陕西、甘肃、贵州、云南。

根(小雪人参)：甘，平。清热，止血，镇咳，滋补。用于虚劳，虚肿。

**细梗胡枝子**

**Lespedeza virgata** (Thunb.) DC.——*Hedysarum virgata* Thunb.

生于干旱向阳山坡、路边及草丛中。分布于华北、华东及陕西、甘肃、湖北、湖南、广西、四川、贵州。

全草(掐不齐)：甘，平。清热，止血，截疟，镇咳。用于疟疾，中暑。

## 银合欢属　Leucaena Benth.

**银合欢**

**Leucaena leucocephala** (Lam.) de Wit——*Mimosa leucocephela* Lam.; *L. glauca* (Willd.) Benth.

福建、台湾、广东、海南、广西、贵州、云南均有栽培。

种子：用于消渴。

## 百脉根属　Lotus L.

**百脉根**　　牛角花、五叶草(通称)

**Lotus corniculatus** L.

生于山坡草地、田间湿润处。分布于陕西、甘肃、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

根(百脉根)：甘、苦，凉。下气，止渴，祛热。用于虚劳。　全草(地羊鹊)：淡、辛，平。清热，止咳，平喘，消痞满。用于感冒发热，咳嗽气喘，积聚，胃脘痞满疼痛，痔疮，下乳。

**细叶百脉银**

**Lotus tenuis** Kit.

生于草地及水边。分布于山西、陕西、甘肃、新疆。

全草(金花菜)：甘、微涩，平。清热止血。用于下血，痢疾。

## 仪花属 Lysidice Hance

**仪花**

**Lysidice rhodostegia** Hance

生于海拔130—700米的丘陵、山谷及平原。分布于广东、海南、广西、贵州、云南。

根(单刀根)：苦、辛，温。有小毒。散瘀，止痛，止血。用于跌打损伤，风湿骨痛，创伤出血。　叶：有小毒。用于外伤出血。

附　注：功效相同的有**短萼仪花 L. revicalyx** Z. Wei，分布于广东、海南、广西、贵州、云南。

## 马鞍树属 Maackia Rupr. et Maxim.

**怀槐**　　黄色木(吉林)

**Maackia amurensis** Rupr. et Maxim.

生于海拔1 000米以下的山地。分布于东北及河北、内蒙古、山东。

枝：用于风湿病。

附　注：功效相同的有**毛叶怀槐 M. amurensis** Rupr. et Maxim. var. **buergeri** (Maxim.) Schneid.，分布于东北。

**光叶马鞍树**　　铜身铁骨(浙江)

**Maackia tenuifolia** (Hemsl.) Hand.-Mazz.——*Euchresta tenuifolia* Hemsl

生于山坡疏林、林缘、干燥山谷林下及路边灌丛中。分布于江苏、安徽、浙江。

根：用于跌打损伤。

## 苜蓿属 Medicago L.

**距镰荚苜蓿**

**Medicago archiducis-nicolai** G. Sirjaev

生于海拔2 500—3 900米的山坡及草地上。分布于甘肃、青海、新疆、四川。

全草：微苦，凉。清热消炎，强心利尿。用于肺热咳嗽，创伤。

**野苜蓿**　　连花生(中国高等植物图鉴)

**Medicago falcata** L.

生于河边及路旁。分布于东北、华北、西北。

全草(野苜蓿)：甘、微苦，平。宽中下气，健脾补虚，利尿。用于胸腹胀满，消化不良，浮肿。

**南苜蓿**　　金花菜(安徽)，母齐头、草头、黄花草子(中国高等植物图鉴)

**Medicago hispida** Gaertn.

全国各地普遍栽培或野生。

根(苜蓿根)：苦、微涩，寒。清湿热，利尿，退黄疸。用于黄疸，石淋。　全草(苜蓿)：苦、微涩。清热利尿。用于石淋。

**天蓝苜蓿**　　黑荚苜蓿(浙江)，杂花苜蓿(中国高等植物图鉴)

**Medicago lupulina** L.

生于山脚郊野旷地、田边、路旁及田埂草丛中。分布于东北、华北、西北、中南、西南及浙江。

全草：甘、涩，凉。清热利湿，凉血解毒。用于黄疸，便血，痔疮出血，白血病，咳嗽，腰腿痛，风湿痹痛，腰肌劳损；外用于疮毒，毒虫、蛇咬伤。

**小苜蓿**

**Medicago minima** (L.) Bartalini——*M. pulymorpha* L. var. *minima* L.

生于荒地、草丛及沙地上。分布于山西、陕西、江苏、河南、湖北、四川。

根：清热，利湿，止咳。

**紫苜蓿**　　紫花苜蓿、蓿草、苜蓿(中国高等植物图鉴)

**Medicago sativa** L.

全国各地普遍栽培。

全草(苜蓿)：苦、微涩，平。健胃，清热利尿。用于腹泻，石淋，夜盲。

## 草木樨属　Melilotus Mill.

**白香草木樨**　　白甜车轴草、金花草、白草木樨(中国高等植物图鉴)

**Melilotus alba** Medic ex Desr.

东北及河北、陕西、甘肃、四川均有栽培。

全草(草木樨、辟汗草)：辛、苦，凉。清热解毒，化湿杀虫，截疟，止痢。用于暑热胸闷，疟疾，痢疾，淋证，皮肤疮疡。

**细齿草木樨**

**Melilotus dentata** (Waldst. et Kit.) Pers.——*Trifolicum dentatum* Waldst. et Kit.

生于山麓及沙滩。分布于河北、山西、陕西、山东。

全草：芳香化浊，截疟。

**印度草木樨**　　野苜蓿(中国高等植物图鉴)

**Melilotus indica** (L.) All.——*Trifolium indicum* L.

生于旷野、田埂及堤坝，亦有栽培。分布于河北、陕西、山东、江苏、福建、台湾、湖北、云南。

全草：甘，平。清热解毒，敛阴止汗。用于皮肤瘙痒，虚汗。

**黄香草木樨**　　野苜蓿(浙江)，墨里老鸦、金花草、黄甜车轴草(中国高等植物图鉴)

**Melilotus officinalis** (L.) Desr.——*Trifolium officinalis* L.

生于较潮湿的海滨、低山坡、郊野路旁及旷地，亦有栽培。东北、华北、西北有栽培。长江流域以南各地有野生。

地上部分(省头草)：辛，平。化湿，和中。用于暑湿胸闷，头痛头昏，恶心泛呕，舌腻

口臭。

**草木樨**　天竺杆(江苏),野苜蓿、品川蒌、菔蒌(中国高等植物图鉴)

**Melilotus suaveolens** Ledeb.

全国各地普遍栽培或逸为野生。

根(臭苜蓿根): 微苦,平。清热解毒。用于暑湿胸闷,瘰疬。　全草(辟汗草): 辛、苦,凉。清热,解毒,化湿,杀虫。用于暑湿胸闷,口臭,头胀,头痛,疟疾,痢疾。

## 崖豆藤属　Millettia Wight et Arn.

**滇桂岩豆藤**　大发汗(云南)

**Millettia bonatiana** Pamp.

生于海拔1 500米左右的山坡灌丛中或河边阴湿地。分布于广西、云南。

全株(白藤): 淡、辛,温。有毒。发汗,祛风,活血,止血。用于风寒感冒,关节痛,跌打损伤,经闭,外伤出血。

**绿花崖豆藤**　羊药头、老京藤(广东)

**Millettia championi** Benth.

生于海拔800米以下的山坡灌丛中。分布于福建、广东、广西。

根: 苦,凉。凉血散瘀,驱风消肿。用于跌打损伤,风湿关节痛,面神经麻痹。

**香花崖豆藤**　大巴豆(中国高等植物图鉴),山鸡血藤(广州植物志)

**Millettia dielsiana** Harms

生于海拔100—2 100米的山地疏林内、溪边、灌丛中,常攀附于岩石和树上。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根(岩豆根): 苦、微甘,温。活血补血,舒筋通络。用于风湿关节痛,腰痛,跌打损伤,创伤出血。

**异果崖豆藤**

**Millettia dielsiana** Harms var. **heterocarpa** (Chun et T. Chen) Z. Wei

生于山坡阴处及灌丛中。分布于江西、湖南、广东、广西、贵州。

根: 补血,行血。用于月经不调。

**广东崖豆藤**

**Millettia fordii** Dunn

生于海拔500米左右的灌丛中。分布于广东、广西。

根: 有毒。用于瘰疬,肺痨。

**窄序岩豆树**

**Millettia leptobotrya** Dunn

生于海拔500—1 400米的常绿阔叶林中。分布于云南。

根: 行气补血,舒筋活络。

**亮叶崖豆藤**　硬根藤(广东),血风藤(广西),亮叶鸡血藤(海南植物志)

**Millettia nitida** Benth.

生于海拔800米左右的山谷林缘或山野间。分布于江西、福建、台湾、广东、海南、广

西、贵州、云南。

根及藤茎：苦，温。用于痢疾，贫血，风湿关节痛。

**皱果鸡血藤**　大叶京老藤、豆藤(海南)，大种岩豆藤(中国主要植物图说——豆科)

**Millettia oosperma** Dunn

生于海拔3 300米以下的杂木林中。分布于湖南、广东、海南、广西、贵州、云南。

茎藤：用于补血。

**厚果崖豆藤**　毒鱼藤(广东)，苦蚕子(四川)，牛牯大力(贵州)

**Millettia pachycarpa** Benth.

生于海拔280—1 700米的山地林内、灌丛中或林缘。分布于西南及江西、福建、台湾、湖南、广东、广西。

叶(苦檀叶)：用于皮肤麻木，疥癣。　果实(苦檀子)：苦、辛，热。有毒。杀虫，攻毒，止痛。用于疥疮，癣，癞，痧气腹痛，小儿疳积。

**海南鸡血藤**　白药根(广东)，老藤、鱼藤(海南)，毛刀豆(云南)

**Millettia pachyloba** Drake——*Millettis lasiopetala* (Hayata) Merr.

生于海拔500—1 300米的山地、疏林内及灌丛中、溪沟边。分布于广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全株(毒鱼藤)：苦。有毒。杀虫止痒，逐湿痹，消炎止痛。

**疏叶崖豆藤**　美花鸡血藤、柜柳、老秧叶(云南)

**Millettia pulchra** (Colebr.) Kurz——*Tephrosia pulchra* Colebr.

生于海拔700—1 630米低山丘陵的常绿阔叶林中。分布于广东、海南、广西、云南。

茎藤：散瘀、消肿，止痛，宁神。

**中华崖豆藤**　狭叶岩豆树(云南)

**Millettia pulchra** (Colebr.) Kurz var. **chinensis** Dunn

生于海拔1 400米的沟谷林中。分布于湖南、广东、广西、云南。

叶：杀虫。

**鸡血藤**　网络崖豆藤、昆明鸡血藤(浙江)

**Millettia reticulata** Benth.

生于海拔1 000米以下的山坡、山谷溪边、山坡路边或灌丛中及山脚林缘、荒野。分布于江苏、安徽、浙江、福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州。

根(昆明鸡血藤根)：镇静。用于狂躁型精神分裂症。　藤(昆明鸡血藤)：苦，温。养血祛风，通经活络。用于腰膝酸痛麻木，遗精，月经不调，跌打损伤。

**美丽崖豆藤**　牛牯大力藤、老惊藤(广东)，牛大力藤(海南)

**Millettia speciosa** Champ.

生于海拔1 500米以下的山谷、路旁、疏林中或灌丛中。分布于福建、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南。

藤(山莲藕)：甘，寒。润肺滋肾，清热止咳。用于肺虚咳嗽，腰肌劳伤，溃疡，跌打损伤。　根(牛大力)：甘，寒。强筋活络，补虚润肺，清热止咳。用于腰肌劳损，风湿关节痛，肺痨，咳嗽，肝炎，遗精，带下病。

**喙果鸡血藤**

**Millettia tsui** Metc.

生于海拔 200—1 600 米的灌丛中。分布于湖南、广东、广西、贵州、云南。

藤茎：微苦、涩，平。补血，驱风湿，调经。用于风湿关节痛，月经不调。

**滇美花崖豆藤**　　老秧叶(云南)，山豆藤(云南植物名录)

**Millettia yunnanensis** Pamp.——*M. pulchra* Kurz. var. *yunnanensis* (Pamp.) Dunn

生于海拔 1 000—2 300 米的山地林中。分布于云南。

叶：杀虫。

## 含羞草属　Mimosa L.

**含羞草**　　知羞草(中国高等植物图鉴)

**Mimosa pudica** L.

原产美洲。全国各地普遍栽培，常作观赏用。

全草(含羞草)：甘、涩，凉。宁心安神，清热解毒。用于吐泻，失眠，小儿疳积，目赤肿痛，深部脓肿，带状泡疹。　根(含羞草根)：涩、微苦。有毒。止咳化痰，利湿通络，和胃，消积。用于咳嗽痰喘，风湿关节痛，小儿消化不良。

## 油麻藤属　Mucuna Adans.

**白花油麻藤**　　大兰布麻、血藤(广西)

**Mucuna birdwoodiana** Tutch.

生于林下。分布于浙江、福建、湖南、广东、广西、四川。

藤茎：通经络，强筋骨，补血。用于贫血，白血球减少症，腰腿痛。

附　注：种子有毒。

**褐毛黎豆**　　牛豆(海南)，黑血藤、黑肉风、牛藤(广西)

**Mucuna castanea** Merr.

生于林中。分布于海南、广西。

藤茎：涩，凉。舒筋活血。用于腰膝痛。

**绢毛油麻藤**　　毒毛麻雀豆(广东)

**Mucuna championi** Benth.

生于山谷林下。分布于广东、广西。

根：用于风湿关节痛，腰腿痛，吐泻，伤风感冒，无名肿毒。

**狗爪豆**　　白黎豆(浙江)

**Mucuna cochinchinensis** (Lour.)A. Cheval.——*Marcanthus cochinchinensis* Lour.

中南、西南及浙江有栽培。

种子(狗爪豆)：甘、微苦，温。有小毒。用于腰脊酸痛。

**长荚油麻藤**　　血藤(云南)，大果油麻藤(中药大辞典)

**Mucuna macrocarpa** Wall.

生于密林中。分布于云南。

藤茎(老鸦花藤)：涩，微温。舒筋活络，调经。用于风湿关节痛，小儿麻痹后遗症，月经不调。

**常春油麻藤**　　牛麻藤(湖北)，棉藤(浙江)，牛肋藤、肉藤(福建)

**Mucuna sempervirens** Hemsl.

生于林木繁茂遮阴强而潮湿的山谷岩旁、溪边及疏林中。分布于浙江、江西、福建、湖北、四川、贵州、云南。

根及茎藤：苦，温。活血补血，通经活络，祛风除湿。用于跌打损伤，风湿疼痛，麻木，痛经，经闭。

**鹅哥花藤**　　密绒毛油麻藤(中药大辞典)

**Mucuna wangii** Hu

生于山间疏林中。分布于云南。

茎藤(老鸦花藤)：涩，微温。舒筋活络，调经。用于风湿关节痛，小儿麻痹后遗症，月经不调。

## 红豆树属　Ormosia Jacks.

**肥荚红豆**　　小孔雀豆、青皮木、大红豆(广东)

**Ormosia fordiana** Oliv.

生于海拔1 000—2 200米以下的山谷、山坡、沟边疏林及灌丛中。分布于广东、海南、广西、云南。

树皮：苦，凉。消炎散毒。用于牙龈发炎，跌打损伤，肿痛，烧、烫伤。

**光叶红豆**　　广西红豆树(通称)，青同(海南)

**Ormosia glaberrima** C. Y. Wu

生于常绿阔叶林中。分布于广东、海南、广西、云南。

种子：用于痢疾。

**花榈木**　　花梨木、臭木、毛叶红豆树(浙江)

**Ormosia henryi** Prain

生于杂木林中或林缘、山谷地带及山脚疏林内。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根皮：微辛，温。有毒。活血消肿，祛风湿。用于跌打损伤，腰酸。

**红豆树**　　红宝树、宝树(江苏)，花梨木(浙江)，红豆柴(福建)

**Ormosia hosiei** Hemsl. et Wils.

生于海拔650米以下的低山地区、谷地、溪边阔叶林中。分布于陕西南部、江苏、安徽、福建、湖北、四川。

种子：苦，平。有小毒。散毒，理气，通经。用于疝气，腹痛，血滞，经闭。

**韧荚红豆**

**Ormosia indurata** L. Chen

生于常绿阔叶林中。分布于广东、广西。

种子：用于跌打损伤。

## 棘豆属 Oxytropis DC.

**刺叶柄棘豆**　　猫头刺(陕北)

**Oxytropis aciphylla** Ledeb.

生于固定沙丘、山坡或盐土上。分布于西北及河北、内蒙古。

全草：用于脓疮。

**长白棘豆**

**Oxytropis anertii** Nakai ex Kitag.

生于高山冻原带。分布于东北。

全草：用于痈疮肿毒。

**二色棘豆**

**Oxytropis bicolor** Bunge

生于干燥坡地、沙地、堤坝及路旁草丛中。分布于华北及陕西、甘肃、山东。

种子：解毒镇痛。

**轮叶棘豆**　　莪大夏(藏语)

**Oxytropis chiliophylla** Royle

生于海拔 4 400—5 200 米高山破碎石坡及干涸河滩。分布于西藏。

全草(莪大夏)：苦，凉。止血消肿，止泻镇痛。用于创伤出血，疮疖发炎，肠炎腹泻，疮痈肿痛。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版附录收载。

**蓝花棘豆**

**Oxytropis coerulea**(Pall.) DC.——*Astragalus coerulea* Pall.

生于山坡、路旁及田边。分布于华北。

根：强壮，补气。用于气虚不足，气喘自汗，头晕乏力。

**镰形棘豆**

**Oxytropis falcata** Bunge

生于山坡草地，沙土或河滩上。分布于甘肃、青海、新疆、四川。

全草(莪大夏)：苦，凉。止血消肿，止泻镇痛。用于创伤出血，疮疖发炎，泄泻，疮痈肿痛。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版附录收载。

**小花棘豆**　　醉马草(中国高等植物图鉴)

**Oxytropis glabra** DC.

生于山坡草地、河滩及盐土上。分布于华北、西北及西藏。

全草：麻醉，镇静，止痛。有毒。用于关节痛，牙痛，肾虚，皮肤瘙痒。

**山棘豆**　　海拉尔棘豆(内蒙古)

**Oxytropis hailarensis** Kitag.

生于固定沙丘、砂质草地、干燥的山坡、石砾地及草原。分布于东北及内蒙古。

全草：辛，寒。清热解毒，消肿，祛风湿；止血。用于疮疡肿毒，瘰疬，乳痈，感冒、湿疹。

附　注：功效相同的有**硬毛棘豆 O. hirta** Bunge，分布于华北及黑龙江、甘肃、山东；**宽苞棘豆 O. latibracteata** Jurtz.，分布于甘肃、青海、四川。

**甘肃棘豆**

**Oxytropis kansuensis** Bunge

生于山坡、河边或林下。分布于甘肃、青海、四川、云南。

种子：微辛，温。解疮毒，止血，利血。用于各种内出血。

**薄叶棘豆**

**Oxytropis leptophylla** (Pall.) DC.——*Astragalus leptophylla* **Pall.**

生于山坡向阳处。分布于华北。

根(棘豆根)：苦，凉。清热解毒。用于秃疮，瘰疬。

**黑萼棘豆**

**Oxytropis melanocalyx** Bunge

生于高山草地、山坡草丛中。分布于陕西、甘肃、青海、四川、云南、西藏。

全草：退热镇痛，催吐，利尿。用于溃疡，胃痉挛，水肿，创伤。

**狐尾藻棘豆**

**Oxytropis myriophylla** (Pall.) DC.——*Phaca myriophylla* Pall.

生于海拔 1 700 米处的山坡草地。分布于东北及河北、内蒙古、陕西。

全草(多叶棘豆、鸡翎草)：甘，寒。清热解毒，祛风除湿，止血。用于时行感冒，咽喉痛，痈疮中毒，创伤，瘀血肿胀，各种出血。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版附录收载。

**黄毛棘豆**

**Oxytropis ochrocephala** Bunge

生于海拔 2 000 米上下的向阳山坡灌丛中。分布于甘肃、青海、四川。

花：利水。

**砂珍棘豆**　　砂棘豆(中国高等植物图鉴)

**Oxytropis psammocharis** Hance

生于沙地河岸、沙滩山坡地。分布于华北及陕西北部、甘肃北部及西部、宁夏。

全草(砂棘豆)：淡，平。消食，健脾。用于小儿营养不良。

## 豆薯属　Pachyrhizus Rich. ex DC.

**豆薯**　　地瓜、凉薯(通称)

**Pachyrhizus erosus** (L.) Urban——*Dolichos erosus* L.

全国南部各地均有栽培。

块根(地瓜)：甘，平。清暑，生津，降压。用于热病口渴，中暑，高血压症。种子(地瓜子)：有毒。用于疥癣，痈肿；外用于头虱。

## 球花豆属　Parkia R. Br.

**球花豆**　白球花(云南)

**Parkia timoriana** (A. DC.) Merr.——*Inga timoriana* A. DC.; ***P. roxburghii*** G. Don

生于海拔 800—900 米的灌丛中或疏林内。分布于云南。台湾有栽培。

根：微苦、涩，凉。祛风除湿，消肿拔脓。用于风湿关节痛，疮疡疖肿。

## 扁轴木属　Parkinsonia L.

**扁轴木**　扁叶轴木(通称)

**Parkinsonia aculeata** L.

原产美洲热带。海南栽培作绿篱及观赏用。

树皮及叶：用于衰弱症。

## 蓝雀花属　Parochetus Buch.-Ham.

**蓝雀花**　紫雀花(云南种子植物名录)

**Parochetus communis** Buch. -Ham. ex D. Don

生于高山阴湿处。分布于贵州、云南。

全草(一颗血)：甘，温。补肾壮阳。用于肾虚，阳痿。

## 菜豆属　Phaseolus L.

**金甲豆**　棉豆(广州)

**Phaseolus lunatus** L.

原产美洲热带地区。河北、山东、江西、广东、海南、广西、云南均有引种栽培。

种子：补血，消肿。

**菜豆**　四季豆(通称)，芸扁豆、豆角(中国高等植物图鉴)

**Phaseolus vulgaris** L.

河北、山西、陕西、甘肃、江苏、浙江、湖北、四川、云南等地均有栽培。

种子(白饭豆)：甘、淡，平。滋养，利尿消肿。用于水肿，脚气。

## 排钱草属　Phyllodium Desv.

**毛排钱草**　连里尾树(海南)

**Phyllodium ,elegans** (Lour.) Desv.——*Hedysarum elegans* Lour.; *Desmodium elegans*(Lous.) Benth.

生于灌丛中、林缘或疏林内。分布于福建、广东、海南、广西、云南。

根、叶：清热利湿，活血祛瘀。用于感冒，痢疾，肝脾肿大，跌打瘀肿。

**长叶排钱草**

**Phyllodium longipes**(Craib) Schindl.——*Desmodium longipes* Craib

生于山坡或山谷。分布于广东、广西、云南。

根：用于胃脘痛，崩漏，跌打损伤，脱肛。　叶：用于目赤肿痛，风湿关节痛。

**排钱树**　排钱草(海南)，钱串子、燕子尾(广西)

**Phyllodium pulchellum** (L.) Desv.——*Hedysarum pulchellum* L.; *Desmodium pulchellum* (L.) Benth.

生于灌丛中、林缘或疏林内。分布于江西、福建、台湾、广东、广西、云南。

全草(排钱草)：淡、苦，平。疏风解表，活血散瘀。用于感冒，风湿痹痛，水肿，喉风，牙痛，跌打损伤。

## 黄花木属　Piptanthus Sweet

**黄花木**　圆荚树(陕西)

**Piptanthus concolor** Harrow ex Craib

生于海拔1 500—3 400米的草地、林下或林缘。分布于陕西、甘肃、四川、云南、西藏。

种子：甘、淡，凉。清肝明目，利水，润肠。用于风热头痛，目赤，高血压症，慢性便秘。

**云南黄花木**　三色黄花木(云南)

**Piptanthus concolor** Harrow ex Craib subsp. **yunnanensis** (Craib) Stapf

生于海拔3 000—3 500米的山坡、林缘及灌丛中。分布于云南。

果实及种子：清肝明目，利水滑肠。

附　注：功效与分布相同的有**藜自黄花木 P. forrestii** Craib。

**金链叶黄花木**　尼泊尔黄花木(云南)，披针叶黄花木(英拉汉植物名录)

**Piptanthus nepalensis** (Hook.) D. Don——*Baptisia nepalensis* Hook.; *Thermopsis laburnifolia* D. Don.; *P laburnifolius* (D. Don) Stapf

生于海拔4 000米以上的河岸、山坡、林缘及灌丛中。分布于云南、西藏。

果实及种子：清肝明目，利水润肠。

附　注：功效相同的有**绒毛叶黄花木 P. tomentosus** Franch.，分布于云南。

## 豌豆属　Pisum L.

**豌豆**　寒豆儿(通称)

**Pisum sativum** L.

全国各地普遍栽培。

种子(豌豆)：甘，平。和中下气，利小便，解疮霉。用于霍乱转筋，脚气，痈肿。

## 围涎树属　Pithecellobium Mart.

**围涎树**　　猴耳环(通称),角冷(福建)

**Pithecellobium clypearia** (Jack) Benth.——*Inga clypearia* Jack

生于海拔 1 000—1 800 米的溪边、林内或灌丛中。分布于浙江、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、四川、云南。

叶：微苦、微涩,凉。清热解毒,凉血,消炎。用于阴挺,疮疥,烧伤。

**牛蹄豆**

**Pithecellobium dulce** (Roxb.) Benth.——*Mimosa dulcis* Roxb.

原产中美洲。福建、台湾、广东、海南、广西、云南有栽培。

叶：消肿祛湿。

**亮叶围涎树**　　环钩树(四川),亮叶猴耳环(广州植物志)

**Pithecellobium lucidum** Benth.

生于海拔 180—2 100 米的密林或灌丛中及溪边。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全株(尿桶弓)：寒、凉。凉血,消炎生肌。用于风湿痛,跌打损伤,烫伤。

## 长柄山蚂蝗属　Podocarpium(Benth.) Yang et P. H. Huang

**羽叶长柄山蚂蝗**

**Podocarpium oldhami** (Oliv.) Yang et P. H. Huang——*Desmodium oldhami* Oliv.

生于山谷、沟边、林下、林缘及灌丛中。分布于东北及陕西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖北、湖南、四川。

全草：微苦,温。健脾化湿,祛风止痛,破瘀散肿。用于筋骨折断。

**长柄山蚂蝗**　　圆菱叶山蚂蝗(江苏),山豆子(浙江)

**Podocarpium podocarpum**(DC.) Yang et P. H. Huang——*Desmodium podocarpum* DC.

生于山坡草地或林下。分布于华北、华东、中南、西南。

根(圆菱叶山蚂蝗)：苦,温。发表散寒,止血,破瘀消肿,健脾化湿。用于感冒,咳嗽,脾胃虚弱。

**宽卵叶山蚂蝗**

**Podocarpium podocarpum** (DC.) Yang et P. H. Hang var. **fallax**(Schindl.) Yang et P. H. Huang——*Desmodium fallax* Schindl.

生于低山坡疏林下、林缘及山脚路旁草丛中。分布于华北、华东,中南、西南。

根及全草：微苦,温。健脾化湿,祛风止痛,破瘀消肿。

**尖叶长柄山蚂蝗**　　山蚂蝗(中国主要植物图说——豆科)

**Podocarpium podocarpum** (DC.) Yang et P. H. Huang var. **oxyphyllum**

(DC.) Yang et P. H. Huang——*Desmodium oxyphyllum* DC.

生于山坡草地、林缘及荒地。分布于华北、华东、中南、西南。

全草(山蚂蝗)：苦，平。祛风活络，解毒消肿。用于跌打损伤，风湿关节痛，腰痛，乳痈，毒蛇咬伤。

**四川长柄山蚂蝗**　四川山蚂蝗(中国主要植物图说——豆科)

**Podocarpium podocarpum** (DC.) Yang et P. H. Hang var. **szechuenense** (Craib) Yang et P. H. Huang——*Desmodium szechuenense* (Craib) Schindl.

生于海拔800—1 000米的灌丛中。分布于陕西、甘肃、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草(红土子)：清热止咳，健胃消食。用于感冒咳嗽，消化不良，疟疾。　根皮(红土子皮)：苦，凉。清热，解毒。用于咽喉痛，发热。

## 水黄皮属　Pongamia Vent.

**水黄皮**　野豆(广东)

**Pongamia pinnata** (L.) Merr.——*Cytisus pinnata* L.

生于水边潮汐处。分布于台湾、广东、海南、广西。

种子(水流豆)：寒。有毒。用于疥癣，脓疮，风湿关节痛。

## 补骨脂属　Psoralea L.

**补骨脂**　破故纸(通称)

**Psoralea corylifolia** L.

山西、陕西、安徽、江苏、河南、广东、四川、贵州、云南均有栽培。

果实(补骨脂)：辛、苦，温。温肾助阳，纳气，止泻。用于阳痿遗精，遗尿尿频，腰膝冷痛，肾虚作喘，五更泄泻，白癜风，斑秃。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

## 紫檀属　Pterocarpus Jacq.

**紫檀**　红木(江苏、浙江)

**Pterocarpus indicus** Willd.

生于山坡及疏林中，亦有栽培。分布于福建、台湾、广东、广西、云南。

心材(紫檀)：咸，平。消肿，止血，定痛。用于肿毒，金疮出血。

## 老虎刺属　Pterolobium R. Br. ex Wight et Arn.

**老虎刺**

**Pterolobium punctatum** Hemsl.——*Caesalpinia aestivalis* Chun et How

生于海拔300—2 000米的山坡疏林中及石灰岩山上。分布于江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

**枝叶**：用于疔疮。

## 葛属 Pueraria DC.

**葛藤** 野葛(通称)，葛条(华北)

**Pueraria lobata**(Willd.) Ohwi——*Dolichos lobatus* Wills.

生于山坡、低丘疏林、林缘、山脚沟边、路边及荒地草丛中。除新疆、西藏外，全国各地普遍分布。

根(葛根)：甘、辛，凉。解肌退热，生津，透疹，升阳止泻。用于温病发热，头痛，项背牵强，口渴泻痢，麻疹初起，早期突发性耳聋。 花(葛花)：甘，平。解酒，醒脾。用于伤酒烦渴，不思饮食，吐逆吐酸。

**附 注**：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②葛根含黄酮类成份，可用以治疗心血管系统疾病。③ 功效相同的有**甘葛藤 P. thomsonii** Benth.，中南及西南各地均有栽培，《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**越南葛藤**

**Pueraria montana** (Lour.) Merr.

生于海拔1 500—1 700米的山沟或林中。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、四川、云南。

根(苦葛根)：辛、苦，平。清热，透疹，生津止渴。用于麻疹不透，吐血，消渴，口腔破溃。 花(苦葛花)：用于痔疮，酒精中毒。

**云南葛藤** 苦葛藤(中国高等植物图鉴)

**Pueraria peduncularis** (Grah. ex Benth.) Benth.——*Neustanthus peduncularis* Grah ex Benth.; *P.yunnanensis* Franch.

生于旷野、山沟、树林中及岩石上。分布于云南。

根：升阳，解表。用于阳痿，感冒。

**三裂叶野葛**

**Pueraria phaseoloides** (Roxb.) Benth.——*Dolichos phaseoloides* Roxb.

生于山坡、低丘疏林、林缘、山脚沟边、荒地、路旁灌草丛中。分布于浙江、台湾、广东、海南、广西。

根、花：甘、辛，平。解肌退热，生津止渴，透发麻疹，解毒。

## 密子豆属 Pycnospora R. Br.

**密子豆**

**Pycnospora lutescens** (Poir.) Schindl.——*Hedysarum lutescens* Poir.

生于山边及屋边草地。分布于台湾、福建、广东、广西、云南。

全草(假地豆)：淡，凉。消肿解毒，清热利水。用于小便癃闭，白浊，砂淋，水肿。

## 鹿藿属　Rhynchosia Lour.

**鹿藿**　乌眼睛豆(浙江)

**Rhynchosia volubilis** Lour.

生于山坡、山脚路边草丛中，常缠绕在它物上。分布于陕西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西。

全草：苦，平。利尿消肿，解毒杀虫。用于头痛，腰疼腹痛，产褥热，瘰疬，痈肿，流注。

## 刺槐属　Robinia L.

**刺槐**　洋槐(通称)

**Robinia pseudoacacia** L.

除西藏外，全国各地均有栽培。

花(刺槐花)：止血。用于大肠下血，咯血，妇女红崩，吐血。

## 无忧花属　Saraca L.

**云南无忧花**　马树(云南)

**Saraca dives** Pierre.——*S. chinensis* Merr. et Chun

生于海拔200—1 000米的密林或疏林中。分布于广西、云南。广州有栽培。

树皮、叶：苦、涩，平。祛风活血，消肿止痛。用于风湿关节痛，跌打损伤，痛经，月经不调，产后腰腹痛。

## 田菁属　Sesbania Scop.

**田菁**　野豇豆(江苏)，咸青(浙江)

**Sesbania cannabina** (Retz.) Pers.——*Aeschynomene cannabina* Retz.

生于田间、路旁、海边或湿地。分布于江苏、安徽、浙江、福建、台湾、广东、海南、贵州。

根(向天蜈蚣)：甘、苦，平。清热利尿，凉血解毒。用于胸膜炎，关节扭伤，关节痛，带下病。　叶：用于尿血，毒蛇咬伤。

**大花田菁**　木田菁(广州植物志)

**Sesbania grandiflora** (L.) Pers.——*Aeschynomene grandiflora* L.

广东、海南、云南有栽培。

树皮：收敛。

## 宿苞豆属　Shuteria Wight et Arn.

**中国宿苞豆**　宿苞豆(中药大辞典)

**Shuteria involucrata** (Wall.) Wight et Arn.——*Shuteria sinensis* Hemsl.

生于向阳荒坡、山坡及灌丛中。分布于云南。

根(铜钱麻黄): 凉，苦。清热解毒，驱风止痛。用于时行感冒，感冒，咳嗽，咽喉痛，乳蛾。

**西南蔓苞豆**

**Shuteria involucrata** (Wall.) Wight et Arn. var. **glabrata** (Wight et Arn.) Ohoshi——*S. glabrata* Wight et Arn.; *S. vestita* (Grah.) Wight et Arn.

生于山谷、林中、草地及路旁。分布于海南、广西、云南。

根: 月经不调。

**毛蔓苞豆**　　蝴蝶草(中国高等植物图鉴)

**Shuteria involucrata**(Wall.) Wight et Arn. var. **villosa** (Pamp.) Ohoshi——*S. vestita* var. *villosa* Pamp.; *S. pampaniniana* Hand.-Mazz.

生于海拔500—700米的荒坡灌丛中。分布于广西、贵州、云南。

全草(铁马豆): 苦，凉。清肝泄热，除蒸宁咳。用于阴虚潮热，午后骨蒸，虚痨咳嗽，乳痈，疔腮。

## 坡油甘属　Smithia Ait.

**密节坡油甘**

**Smithia conferta** Smith

生于湿润处。分布于广东、广西。

全草: 用于肝炎，肺痨，肾虚，咳血，衄血，目赤肿痛，乳痈，烧、烫伤，跌打损伤。

**坡油甘**　　田基豆(广东)

**Smithia sensitiva** Ait.

生于田边、沟边或低湿处。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、四川、云南。

全草(田唇乌蝇翼): 清热，除蒸，消肿。用于咳嗽，钩端螺旋体病，疮毒，毒蛇咬伤。

## 槐属　Sophora L.

**苦豆子**　　胡兰-宝雅(蒙语)

**Sophora alopecuroides** L.

生于黄河台地及固定沙丘中。分布于华北及陕西、甘肃、宁夏、河南、西藏。

根(苦甘草): 苦，寒。清热解毒。用于痢疾，湿疹，牙痛，咳嗽。

**白刺花**　　苦刺(云南)

**Sophora davidii** (Franch.) Kom. ex Pavol.——*S. mooreroftiana* Benth. var. *davidii* Franch.

生于山坡路旁、灌丛或河边。分布于河北、山西、陕西、甘肃、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

根(白刺花): 苦，寒。清热解毒，利湿消肿，凉血止血。用于咽喉痛，肺热咳嗽，痢疾，小便淋痛，水肿，衄血，尿血，便血。　果实: 理气消积。用于消化不良，胃痛，腹痛。

**苦参**　牛人参(浙江),山豆根(江西),地槐(本草纲目)

**Sophora flavescens** Ait.

生于沙地或向阳山坡草丛中、丘地林缘及溪沟边。全国除西藏外,各地均有分布。

根(苦参):苦,寒。清热燥湿,杀虫,利尿。用于热痢,便血,黄疸尿闭,带下病,阴肿阴痒,湿疹,湿疮,皮肤瘙痒,疥癣麻风,滴虫性阴道炎。

附　注:《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**槐树**　细叶槐(江西),金药树(福建),豆槐(湖南)

**Sophora japonica** L.——*Styphnolobium japonicum*(L.) Schott

全国除西藏外,各地普遍栽培。

花蕾(槐米):苦,微寒。凉血止血,清肝泻火。用于便血,痔血,血痢,崩漏,吐血,衄血,肝热目赤,头痛眩晕。　花(槐花):性味功效与槐米相似。　荚果(槐角):苦,寒。清肠,止血。用于肠热便血,痔肿出血,肝热头痛,眩晕目赤。　根(槐根):用于痔疮,喉痹,蛔虫病。　枝(槐枝):苦,平。用于崩漏,带下病,心痛,目赤,痔疮,疥疮。　叶(槐叶):苦,平。用于惊痫,壮热,肠风,溲血,痔疮,疥癣,湿疹,疔肿。　根皮、树皮的内层皮(槐白皮):祛风除湿,消肿止痛。用于风邪,身体强直,肌肤不仁,热病口疮,牙疳,喉痹,肠风下血,疽,痔,烂疮,阴痒症,烫伤。　树胶(槐胶):苦,寒。用于破伤风。

附　注:①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②**龙爪槐 S. japonica** L. var. **pendula** Lour. 和 **五叶槐 S. japonica** L. f. **oligophylla** Franch., 均为栽培品种,功效同槐树。

**沙生槐树**

**Sophora moorcroftiana** (Benth.) Benth. ex Baker

生于海拔 3 000—4 200 米的山坡荒地及河滩地。分布于云南、西藏。

种子(沙生槐):苦,寒。消炎解毒。用于湿热黄疸,白喉。

**西南槐树**

**Sophora prazeri** Prain subsp. **mairei** (Pamp.) Yakovl.——*S. mairei* Pamp.

生于海拔 700—1 800 米的灌丛中或石坡上。分布于甘肃南部、江西、广西、四川、贵州、云南。

根(鸟豆根):苦、涩,凉。清热,凉血,止血,除湿。用于劳伤,水泻。

**越南槐**

**Sophora tonkinensis** Gagnep.——*S. subprostrata* Chun et T. Chen

生于海拔约 900 米的山坡疏林中。分布于广西、四川、贵州。

根及根状茎(山豆根):苦,寒。有毒。清热,解毒,消肿利咽。用于火毒蕴结,咽喉痛,齿龈肿痛。

附　注:《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**灰毛槐树**　灰毛槐角(云南),紫花苦参(云南种子植物名录)

**Sophora velutina** Lindl.

生于海拔 1 100—2 100 米的山坡、路旁。分布于四川、云南。

果实:苦,寒。清热,凉血,解毒,消炎。

**白花灰毛槐树**

**Sophora velutina** Lindl. var. **albescens**(Rehd. et Wils.) Tsoong
生于海拔 600—2 200 米的山坡灌丛中。分布于四川、贵州、云南。
根：用于咽喉痛，失眠。

## 密花豆属 Spatholobus Hassk.

**光叶密花豆** 大样荔枝藤(海南)
**Spatholobus harmandii** Gagnep.
生于溪边疏林下。分布于海南。
藤茎：补血强筋，通经活络。用于跌打损伤，陈伤，筋骨酸痛。
**红血藤** 华密花豆(广西)
**Spatholobus sinensis** Chun et T. Chen
生于密林中。分布于广东、海南、广西。
藤茎：补血，通经，活络。用于贫血，调经，筋骨酸痛。
**密花豆** 血藤(广东)
**Spatholobus suberectus** Dunn
生于海拔 650—2 100 米的林中、灌丛或山沟中。分布于福建、广东、云南。
藤茎(鸡血藤)：苦、甘，温。补血，活血，通络。用于月经不调，血虚萎黄，麻木瘫痪，风湿痹痛。
附 注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 苦马豆属 Swainsonia Salisb.

**苦马豆** 羊奶奶(陕西)
**Swainsonia salsula** Taub.
生长于盐碱滩及坡地。分布于华北及陕西、甘肃、河南。
全草、根、果实：微苦、平。有小毒。利尿，止血，消肿。用于湿疹，黄水疮，水肿，癥瘕痞块。

## 葫芦茶属 Tadehagi Ohashi

**葫芦茶** 咸虾茶(海南)，百劳活(广西)
**Tadehagi triquetrum** (L.) Ohashi——*Hedysarum triquetrum* L.; *Desmodium triquetrum* (L.) DC.
生于向阳山坡疏林下、路边及丘陵地带空旷地。分布于福建、广东、海南、广西、贵州、云南。
全株(葫芦茶)：微苦、涩，凉。清热解毒，消积利湿。用于肝炎，咳嗽痰喘，咽喉痛，痢疾，吐泻，感冒，小儿疳积，妊娠呕吐。
**蔓茎葫芦茶** 麻草(浙江)，一条根(广西)

**Tadehagi triquetrum**(L.)Ohashi subsp. **pseudotriquetrum**(DC.) Ohashi——*Desmodium pseudotriquetrum* DC.

生于向阳山坡疏林下、路边及丘陵地带空旷地。分布于浙江、台湾、广西、四川、云南。

全株：甘、微苦，凉。清热解毒，健脾利湿。用于肝炎，咳嗽痰喘，吐泻，痢疾，感冒。

## 酸豆属　Tamarindus L.

**酸豆**　罗晃子(广东)，酸梅(海南)，酸角(云南)

**Tamarindus indica** L.

原产非洲。福建、台湾、广东、海南、广西、四川、云南均有栽培。

果实(酸角)：甘、酸，凉。清暑热，化积滞。用于暑热食欲不振，妊娠呕吐，小儿疳积。

## 灰叶属　Tephrosia Pers.

**灰叶**

**Tephrosia purpurea** (L.) Pers.——*Cracca purpurea* L.

生于树旁、路边、荒野及河边草丛中。分布于福建、台湾、广东、海南、云南。

根：微苦，凉。清热消滞。用于胃胀气胀，消化不良，胃脘疼痛。　全草(灰叶)：微苦，凉。清热消滞。用于风热感冒，消化不良，湿疹，皮炎。

## 野决明属　Thermopsis R. Br.

**高山黄华**

**Thermopsis alpina** (Pall.) Ledeb.——*Sophora alpina* Pall.

生于山坡、山谷草地或林下及湖边砾石地上。分布于华北及陕西、新疆、西藏。

根、花、果实：苦，寒。有小毒。截疟，清热化痰，镇静。　根：用于疟疾，高血压症。花、果实：用于狂犬病。

**紫花黄华**

**Thermopsis barbata** Royle

生于山坡及草地上。分布于青海、四川、云南、西藏。

根及花、果实：苦，寒。有小毒。镇痛截疟，清热化痰。用于疟疾，咳嗽，感冒发热。

**小叶野决明**　野决明(浙江)

**Thermopsis chinensis** Benth.

生于田边、路旁、园地内及空旷地杂草丛中。分布于河北、陕西、江苏、浙江。

根及种子：用于目赤肿痛。

**披针叶黄华**　牧马豆(河北)

**Thermopsis lanceolata** R. Br.

生于河岸草地、沙丘、路旁及田边。分布于东北、华北及陕西、甘肃、青海、四川。

全草(牧马豆): 甘,微温。有毒。祛痰止咳。用于咳嗽痰喘。

**野决明**

**Thermopsis lupinoides** (L.) Link.——*Sopliora lupinoides* L.

生于山地及旷野。分布于东北。

种子: 有毒。解毒消肿,祛痰催吐。用于恶疮,疥癣。

## 高山豆属 Tibetia (All.) H. P. Tsui

**高山豆** 单叶米口袋(中国主要植物图说——豆科)

**Tibetia himalaica**(Baker) H. P. Tsui——*Gueldenstaedtia himalaica* Baker; *G. diversifolia* Maxim.

生于海拔2 000米以上的山地。分布于甘肃、青海、四川、云南。

全草: 苦、涩,寒。解毒消肿,利尿。用于水肿,痈肿疔毒,瘰疬。

## 车轴草属 Trifolium L.

**草莓车轴草**

**Trifolium fragiferum** L.

生于海滨及盐碱性土壤上。分布于东北、华北及新疆。

全草: 用于各种出血。

**杂种车轴草** 金花草、爱沙苜蓿、杂三叶(中国高等植物图鉴)

**Trifolium hybridum** L.

东北及华北有栽培。

种子: 用于各种肿瘤。

**绛车轴草** 猩红苜蓿、紫车轴草、绛三叶(中国高等植物图鉴)

**Trifolium incarnatum** L.

原产欧洲。我国西部有引种。

花序: 消炎利尿,祛痰。

**野火球** 也火秋、野火荻、野车轴草(中国高等植物图鉴)

**Trifolium lupinaster** L.

生于林缘、林下及路旁湿草地。分布于东北及河北、内蒙古。

全草: 镇痛,止咳。用于瘰疬,痔疮,皮癣。

**红车轴草** 红三叶、红荷兰翘摇、红菽草(中国高等植物图鉴)

**Trifolium pratense** L.

东北、华北及江苏、安徽、浙江、江西、湖北、云南均有栽培。

带花全草(红车轴草): 甘,平。止咳,平喘,镇痉。用于咳嗽,气喘,抽搐。

**白车轴草** 白三叶草(通称),白花苜蓿、金花草、菽草翘摇(中国高等植物图鉴)

**Trifolium repens** L.

原产欧洲。东北、华东、西南及河北、湖南均有栽培。

全草(三消草)：甘，平。清热，凉血，宁心。用于癫痫，痔疮出血。

## 葫卢巴属　Trigonella L.

**胡卢巴**　　苦豆、香草(中国高等植物图鉴)

**Trigonella foenum-graecum** L.

河北、甘肃、陕西、新疆均有栽培。

种子(胡卢巴)：苦，温。温肾，祛寒，止痛。用于肾脏虚冷，小腹冷痛，小肠疝气，寒湿脚气。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**花苜蓿**　　扁豆子、苜蓿草、野苜蓿(中国高等植物图鉴)

**Trigonella ruthenica** L.

生于山坡及草丛。分布于东北、华北及陕西、甘肃。

全草：苦，寒。退烧，消炎，止血。用于肺热咳嗽，赤痢。

## 兔尾草属　Uraria Desv.

**猫尾射**　　狗尾射(福建)，狐狸尾、猫尾草(广西)

**Uraria crinita** (L.) Desv.——*Hedysarum crinitum* L.

生于山坡、荒地、灌丛林缘或杂草中。分布于福建、广东、海南、广西、云南。

全草(虎尾轮)：甘、微苦，平。清热，解毒，止血，消痈。用于咳嗽，肺痈，吐血，咯血，尿血，脱肛，阴挺，肿毒。

**长穗猫尾草**

**Uraria crinita** (L.) Desv. var. **macrostachya** (Wall.) Benth.——*U. macrostachya* Wall.

生于旷野坡地。分布于福建、广东、海南、广西、云南。

全草(布狗尾)：淡，凉。止血，解热，杀虫。用于吐血，尿血，丝虫病，疟疾。

**兔尾草**

**Uraria lagopodioides**(L.) Desv.——*Hedysarum lagopodioides* L.

生于旷野或草丛中。分布于江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南。

全草：甘、淡，平。消肿，驱虫，清热解毒。用于疮毒，疳积，痔疮，毒蛇咬伤，瘰疬。

**美花兔尾木**　　美花兔尾草(中国主要植物图说〈豆科〉)

**Uraria picta** Desv.

生于旷野间或草丛中。分布于广西、四川、贵州、云南。

根：甘，平。除湿，散寒。用于感冒发热，肌肉酸痛。

## 算珠豆属　Urariopsis Schindl.

**短序算珠豆**

**Urariopsis brevissima** Yang et P. H. Huang

生于旷野草丛或路旁。分布于广西。

叶：解毒。用于恶疮肿痛。

**算珠豆**

**Urariopsis cordifolia** (Wall.) Schindl.——*Uraria cordifolia* **Wall.**

生于山坡、灌丛林缘或杂草中。分布于广西、云南。

叶：用于敷治毒疮。

## 蚕豆属　Vicia L.

**山野豌豆**　豆豆苗、芦豆苗(通称)

**Vicia amoena** *Fisch.*

生于山路旁杂草丛中。分布于东北、华北及陕西、甘肃、青海、山东、江苏、河南、四川、贵州、云南。

全草：甘、苦，平。祛风湿，活血，舒筋，止痛。用于风湿关节痛，闪挫伤，无名肿毒，阴囊湿疹。

**狭叶山野豌豆**

**Vicia amoema** Fisch. **var. oblongifolia** Bunge

生于山坡疏林下。分布于东北、华北、西北。

全草：祛风湿，活血，舒筋，止痛。用于风湿痹痛，筋骨酸痛。

**黑龙江野豌豆**

**Vicia amurensis** Oett.

生于林下、林缘、灌丛及草甸山坡。分布于东北、华北。

全草：散风祛湿，活血止痛。

**窄叶野豌豆**　大巢菜、野绿豆(中国高等植物图鉴)

**Vicia angustifolia** L.——*V. sativa* L. var. *angustifolia* (L.) H. T. Ho

生于杂草丛中。分布于东北、华北、西北、华东及福建、云南。

全草：用于乳峨，咽喉痛。

附　注：功效相同的有**三齿萼野豌豆** V. **bungei** Ohwi，分布于东北、华北及陕西、甘肃、山东、河南、四川。

**广布野豌豆**　草藤、细叶落豆秧、肥田草(中国高等植物图鉴)

**Vicia cracca** L.

生于田边、草坡、岩石上，亦有栽培。分布于东北、华北及陕西、甘肃、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖北、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草：辛，平。活血调经，止血，解毒。用于月经不调，血崩，便血，衄血。

**无萼野豌豆**

**Vicia edentata** Wang et Tang

生于阴湿处及杂草丛中。分布于山东、浙江。

全草：解毒，驱虫。

**蚕豆**　罗汉豆(浙江),南豆(中国高等植物图鉴)

**Vicia faba** L.

全国各地普遍栽种。

茎：止血,止泻。用于各种内出血,水泻,烫伤。　叶：微甘,温。用于肺痨咯血，消化道出血,外疮出血,臁疮。　花：甘,平。凉血,止血。用于咳血,鼻衄,血痢,带下病,高血压症。　豆荚：利尿渗湿。用于水肿,脚气,小便淋痛,天疱疮，黄水疮。　种子：甘,平。健脾,利湿。用于膈食,水肿。

**大野豌豆**　野豌豆、大巢菜(中国高等植物图鉴)

**Vicia gigantea** Bunge

生于山坡、岩坡及山顶上。分布于东北及河北、山西、陕西、甘肃、河南。

全草：散风祛湿,活血止痛。

附　注：功效相同的有**东方野豌豆 V. japonica** A. Gray，分布于东北、华北。

**小巢菜**　野豌豆(浙江),硬毛果野豌豆、雀野豆(中国高等植物图鉴)

**Vicia hirsuta** (L.) S. F. Gray——*Ervum hirsutum* L.

生于郊野路边、山脚下及郊野田畔。分布于陕西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

全草：辛,平。解表利湿，活血止血。用于黄疸，疟疾，鼻衄，带下病。　种子(漂摇豆)：凉。活血,明目。

**确山野豌豆**

**Vicia kioshanica** Baill.

生于海拔600—800米的山沟路旁、山坡及田沟。分布于陕西、山东、河南。

全草：利肝明目,活血平胃。

**多茎野豌豆**

**Vicia multicaulis** Ledeb.

生于山坡、草原、草甸及沙土地上。分布东北。

全草：辛,平。发汗除湿,活血止痛。用于风湿关节痛,筋骨拘挛,黄疸，带下病，鼻衄,热疟,阴囊湿疹。

**假香野豌豆**　大叶野豌豆(吉林),槐条花、大叶草藤、芦豆苗(中国高等植物图鉴)

**Vicia pseudo-orobus** Fisch. et C. A. Mey.

生于山坡草地、林间草地、林缘、灌丛及路旁。分布于东北及河北、山西、陕西、湖南、湖北、四川、云南。

全草：清热解毒。用于风湿,毒疮。

**北野豌豆**

**Vicia ramuliflora** (Maxim.) Ohwi——*Orobus ramuliflorus* Maxim.

生于林下、林缘、林间草地及草甸。分布于东北。

全草：散风祛湿,活血止痛。

附　注：功效与分布相同的有**贝加尔野豌豆 V. ramuliflora** (Maxim.) Ohwi f. **baicalensis** (Turcz.) P. Y. Fu et Y. A. Chen。

**野豌豆**　大巢菜(浙江)

**Vicia sativa** L.

生于郊野路边、山脚下或农垦地，亦有栽培作绿肥。分布于全国大部分地区。

全草(大巢菜)：辛，平。清热利湿，活血祛瘀。用于黄疸，浮肿，疟疾，鼻衄，心悸，梦遗，月经不调。

**新疆野豌豆**

**Vicia sikangensis** Kung

生于海拔1 500—2 000米的山谷及草坡。分布于新疆。

全草：散风祛湿，活血止痛。

**四籽野豌豆**　　乌喙豆(中国高等植物图鉴)

**Vicia tetrasperma** (L.) Schreb.——*Ervum tetraspernum* L.

生于郊野路边及山脚下。分布于陕西、江苏、安徽、浙江、江西、台湾、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

全草：辛，温。活血调经，止血，解毒。

**歪头菜**　　草豆、两叶豆苗(中国高等植物图鉴)

**Vicia unijuga** A. Br.

生于山坡草地、路旁及丘陵山地。分布于东北、华北及陕西、甘肃、青海、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

全草(三铃子)：甘，平。补虚调肝，理气止痛，清热利尿。用于劳伤，头晕。

附　注：功效相同的有**白花歪头菜 V. unijuga** A. Br. f. **albiflora** Kitag.，分布于辽宁、宁夏。

**短序歪头菜**

**Vicia unijuga** A. Br. var. **apoda** Maxim.

生于向阳山坡、草地、灌丛、林下或林缘。分布于东北、西北。

全草：清热，利尿，理气，降压，补虚。

**野豇豆**　　山豆(浙江)

**Vicia vexillata** (L.) A. Rich.——*Phaseolus vexillatus* L.

生于山坡林缘路边草丛中或山脚郊野草丛中。分布于陕西、江苏、浙江、江西、湖北、湖南、四川、云南。

根：甘、苦，微凉。补中益气，清热解毒。

附　注：曾发现本种的根伪制成红参兜售，应注意区别。

**云南野豇豆**　　云南山土瓜(云南种子植物名录)

**Vicia vexillata** (L.) A. Rich var. **yunnanensis** Franch.

生于山坡、路旁及草丛中。分布于云南。

根(山乌豆根)：苦，寒。清热解毒，消肿止痛，利咽。用于风火牙痛，咽喉痛，肺痨，腹胀，胃痛，便秘，疮毒，小儿麻疹余毒不尽、跌打关节痛。

## 豇豆属　Vigna Savi

**赤豆**　　杜赤豆(浙江)

**Vigna angularis** (Wight) Ohwi et Ohashi——*Phaseolus angularis* Wight

全国各地普遍栽种。

种子(赤小豆): 甘、酸,平。利水消肿,解毒排脓。用于水肿胀满,脚气浮肿, 黄疸尿赤,风湿热痹,痈肿疮毒,肠痈腹痛。

附　注:《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**山绿豆**　贼小豆(中国高等植物图鉴)

**Vigna minima** (Roxb.) Ohwi et Ohashi——*Phaseolus minimus* Roxb.

生于山坡草丛中、溪边及堤岸边。分布于华东、中南、西南及河北。

**种子**: 清湿热,利尿,消肿。

**绿豆**

**Vigna radiata** (L.) Wilczak——*Phaseolus radiatus* L.

全国各地普遍种植。

种子(绿豆): 甘,凉。清热解毒,消暑利水。用于暑热烦渴,水肿,泄泻,丹毒, 痈肿, 解热药毒。　种皮(绿豆衣): 甘,寒。清热解毒,消暑止渴,利尿消肿。用于暑热烦渴,肿胀,痈肿热毒,药物中毒。　叶: 苦,寒。用于吐泻,斑疹,疔疮, 疥癣。　发芽的种子(绿豆芽): 甘,寒。用于酒毒,热毒。　花: 解酒毒。

**赤小豆**　饭豆(通称)

**Vigna umbellata** (Thunb.) Ohwi et Ohashi——*Dolichos umbellatus* Thunb.; *Phaseolus calcaratus* Roxb.

我国南部各地普遍栽种。

种子(赤小豆): 性味功能与赤豆相同。

附　注:《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**豇豆**　角豆、[illegible](浙江)

**Vigna unguiculata** (L.) Walp.——*Dolichos unguiculata* L.; *V. sinensis* (L.) Savi. ex Hassk.

全国各地普遍栽种。

根: 甘,平。健脾益气,消食。用于食积,脾胃虚弱,淋浊,痔血,疔疮。　叶: 用于淋证。　豆荚: 镇痛,消肿。用于腰痛,乳痈。　种子: 甘,平。健脾补肾。用于脾胃虚弱,泄泻,吐逆,消渴,遗精,带下病,白浊,小便频数。

**眉豆**　饭豆(中国高等植物图鉴)

**Vigna unguiculata** (L.) Walp. var. **catjang** (Burm. f.) Bertoni——*Dolichos catjang* Burm. f.; *V. cylindrica* (L.) Skeels

全国各地普遍栽培。

种子(白豆): 甘、咸,平。调中益气,健脾益肾。

**豆角**　长豆角(中国主要植物图说——豆科)

**Vigna unguiculata** (L.) Walp. var. **sesquipedalis** (L.) Ohashi——*Dolichos sesquipedalis* L.

全国各地普遍栽种。

种子: 健胃,补气。

### 大荚藤属　Whitfordiodendron Elm.

**大荚藤**　猪腰豆(广西),冲天子(云南)

**Whitfordiodendron filipes** (Dunn) Dunn——*Adinobotrys filipes* Dunn

生于野草丛中。分布于广西、云南。

茎：用于贫血,月经不调,风湿关节痛,跌打损伤。

### 紫藤属　Wisteria Nutt.

**紫藤**　葛萝树(河北),绞藤(江西)

**Wisteria sinensis** (Sims) Sweet.——*Glycine sinensis* Sims.; *W. chinensis* DC.

生于向阳山坡疏林、林缘、空旷草地及溪谷两旁，亦有栽培。分布于华北及辽宁、陕西、甘肃、山东、江苏、安徽、浙江、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根：甘,温。用于痛风,关节痛。　种子：甘,微温。有小毒。杀虫,止痛，解毒。用于筋骨痛,食物中毒,腹痛,吐泻,蛲虫病。

**藤萝**

**Wisteria villosa** Rehd.

河北、山西、山东、江苏、河南、云南等地有栽培。

皮：解毒,止泻,驱虫。

### 丁癸草属　Zornia J. F. Gmel.

**丁癸草**　丁贵草、乌蝇翼草、人字草(通称)

**Zornia gibbosa** Spanoghe

生于干燥的旷野上。分布于浙江、江西、福建、广东、广西、四川、云南。

根：清热,解毒。用于痈疽,疔疮,脚气浮肿,瘰疬。　全草：甘,凉。清热，解毒，祛瘀。

## 70. 酢浆草科　Oxalidaceae

### 阳桃属　Averrhoa L.

**阳桃**　五棱果、羊桃(云南),三棱子、木踏子(广西中药志),五敛子(南方本草状)

**Averrhoa carambola** L.

栽培于福建、台湾、广东、海南、广西、云南。

根：用于头风,关节痛。　叶：涩,寒。利小便，散热毒。用于小便淋痛,血热瘙痒,痈肿,疥癣。　花：用于寒热往来;解鸦片毒。　果实：甘、酸,寒。清热,生津，利水,解毒。用于风热咳嗽,烦渴,口腔破溃,牙痛,石淋。

## 感应草属　Biophytum DC.

**感应草**　荷包草、扁粘草、安胎药(云南)

**Biophytum apodiscias** (Turcz.) Edgew. et Hook. f.

生于海拔 850—1 600 米的山地林下或山坡草丛中。分布于云南。

全草：甘、苦，平。消积利水，补肾，健脾，安神，安胎。用于小儿疳积，肾虚，失眠，脱肛，阴挺，黄水疮，缠腰火丹。

**分枝感应草**　骨筋草(云南)

**Biophytum esquirolii** Lévl.

生于疏林或灌丛中。分布于湖北、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南。

全草：甘、涩，微寒。有小毒。安神镇静，散瘀止痛，止血。用于肾虚，跌打损伤，咯血，外伤出血，缠腰火丹，湿疹，脚癣，脱肛，阴挺。

**感应草**　小姑娘草、吓虎草(云南)

**Biophytum sensitivum** (L.) DC.

生于海拔 130—620 米的杂木林缘及田埂草丛中。分布于台湾、湖北、广东、广西、贵州、云南。

全草：收敛，安神，安胎。用于肾虚，失眠，安胎，脱肛，阴挺；外敷黄水疮，缠腰火丹。

## 酢浆草属　Oxilis L.

**山酢浆草**　三块瓦、大酸溜溜(东北)，酸酢浆草(云南)

**Oxalis acetosella** L.

生于林下及灌丛下阴湿地。分布于东北及四川、云南、西藏。

全草：酸，微辛，平。活血化瘀，清热解毒。用于小便淋淋，带下病，痔痛，脱肛，烫伤，蛇蝎咬伤，跌打损伤，无名肿毒，疥癣。

**酢浆草**　酸酸草(浙江)，酸味草(广州)，酸角草、黄花酢浆草(云南)，鸠酸(唐本草)

**Oxalis corniculata** L.

生于低山坡路旁、旷地、田边、菜圃旁及院落墙脚湿处。全国各地均有分布。

全草(酢浆草)：酸，寒。清热利湿，止咳祛痰，解毒消肿。用于泄泻，痢疾，黄疸，淋症，带下病，癥疹，吐血，衄血，咽喉痛，疔疮，疥癣，痔疾，脱肛，跌打损伤，烧、烫伤。

附注：功效相同的有**大花酢浆草 O. bowiei** Lindl. 山东、江苏有栽培。

**铜锤草**　紫花酢浆草、红花酢浆草、大酸味草(浙江)，老鸦酸(云南)

**Oxalis corymbosa** DC.——*O. martiana* Zucc.

生于低山坡、山麓旷野阴湿处。全国各地均有分布。

全草(铜锤草)：酸，寒。散瘀消肿，清热解毒。用于跌打损伤，咽喉痛，水肿，淋浊，带下病，泄泻，痢疾，痈疮，烫伤。

**白花酢浆草**　山酢浆草(台湾)，飞天鹅(云南)，三块瓦(中国高等植物图鉴)

**Oxalis griffithii** Edgew. et Hook. f.

生于海拔 1 200—3 400 米的山坡林下。分布于陕西、甘肃、宁夏、浙江、江西、湖北、四川、云南、西藏。

全草(三块瓦): 淡、微辛,平。清热,利尿,解毒。用于目赤红痛,小儿哮喘,咳嗽痰喘。

**直酢浆草** 酸溜溜、酸黄瓜(辽宁),扭伤草(海南)

**Oxalis stricta** L.

生于山坡林下、山沟路旁、河谷及园田边。分布于东北、华东及河北、山西、河南、湖南。

全草: 苦,寒。有小毒。杀虫,止痛,散热,消肿,祛痰。用于淋证,丝虫病;外用于跌打损伤,肿毒,疥癣,烫伤。

## 71. 牻牛儿苗科 Geraniaceae

### 薰倒牛属 Biebersteinia Steph. ex Fisch.

**薰倒牛**

**Biebersteinia heterostemon** Maxim.

生于海拔 700—3 100 米的山坡、沟边、舍堰及田边。分布于甘肃、青海、新疆。

果实(狼尾巴蒿): 辛,凉。清热镇痉,祛风解毒。用于预防感冒,小儿高热惊厥,腹胀,腹痛。

附 注: 功效相似的有**西藏薰倒牛 B. odora** Staph. ex Fisch., 分布于西藏。

### 牻牛儿苗属 Erodium L'Herit.

**牻牛儿苗**

**Erodium stephanianum** Willd.

生于海拔 400—1 400 米的荒地上。分布于东北、华北、西北及西藏。

地上部分(老鹳草): 辛、苦,平。祛风湿,通经络,止泻痢。用于风湿痹痛,麻木拘挛,筋骨酸痛,泄泻,痢疾。

附 注: ①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。② 功效相似的有**长喙牻牛儿苗 E. hoefftianum** Mey., 分布于新疆;**西藏牻牛儿苗 E. tibetanum** Edgew., 分布于西藏。

### 老鹳草属 Geranium L.

**白花老鹳草**

**Geranium albiflorum** Ledeb.

生于谷地、溪边及田埂上。分布于新疆。

全草: 消炎止血,止痢,祛风活络。用于跌打损伤,风湿痹痛,麻木拘挛,筋骨酸痛,泄

泻，刀创出血。

附　注：功效相似的有**丘地老鹳草 G. collinum** Steph. ex Willd.，分布于新疆；**粗根老鹳草 G. dahuricum** DC.，分布于东北、华北及甘肃、新疆、四川；**蓝花老鹳草 G. pseudosibiricum** J. Mayer.，分布于新疆。

**野老鹳草**　　老鹳草、两支蜡烛一支香(浙江)

**Geranium carolinianum** L.

生于低山坡、旷野、山麓、田园及水沟边。分布于江苏、浙江、江西、河南、四川、云南。

地上部分(老鹳草)：苦、微辛，平。祛风利湿，舒筋活络，收敛止泻。用于风寒湿痹，跌打损伤，泄泻。

**叉枝老鹳草**

**Geranium divaricatum** Ehrh.

生于谷地、溪边及屋旁。分布于新疆。

全草：消炎止血，止痢，祛风，通经活络。用于跌扑扭伤，风湿关节痛，腰肌劳伤，痢疾泻下。

**北方老鹳草**

**Geranium erianthum** DC.

生于林下、林缘草地。分布于东北。

全草：祛风，活血，通络，清热。用于风寒湿痹，感冒发热。

**毛蕊老鹳草**

**Geranium eriostemon** Fisch.

生于海拔 800—2 500 米的灌丛或腐殖质土中。分布于东北、华北、西北及湖北、四川。

全草：疏风通络，强筋健骨。用于风寒湿痹，筋骨酸软。

**圆柱根老鹳草**

**Geranium farreri** Stapf——*G. stapfianum* Hand.-Mazz.

生于海拔 2 800—3 100 米的草原或草坡上。分布于陕西、甘肃、四川西南部、云南西北部。

根：消炎，止血，生肌。

**血见愁老鹳草**

**Geranium henryi** R. Kunth

生于海拔 1 200 米上下的林缘及灌丛中。分布于陕西南部、河南西南部、湖北、四川。

全草：清热解毒，驱风活血。用于咽喉痛，筋骨酸痛，四肢发麻。

**密毛老鹳草**　　刚毛紫地榆(云南种子植物名录)

**Geranium hispidissimum** (Franch.) R. Kunth——*Geranium strigosum* Franch. var. *hispidissimum* Franch.

生于海拔 2 300—3 000 米的山坡。分布于云南西北部。

根：消炎，止血。

**突节老鹳草**

**Geranium japonicum** Franch. et Sav.

生于灌丛、草甸、路旁。分布于东北。

全草：祛湿，强筋骨，活血。用于风寒湿痹，筋骨酸软，四肢麻木，陈伤。

附　注：功效相同的有**兴安老鹳草 G. maximowiczii** Regel et Maack，分布于黑龙江、吉林。

**萝卜根老鹳草**　　圆果隔山消(云南)

**Geranium napuligerum** Franch.

生于海拔 3 800—4 100 米的高山草地及林下。分布于四川、云南。

全草：清热解毒，驱风活血。用于胃痛，疝气，劳伤，痢疾。

**尼泊尔老鹳草**　　紫地榆(浙江)，老鹳草、五叶草(云南)

**Geranium nepalense** Sweet

生于山脚、丘地及郊野的草丛中。分布于西北、华东、中南、西南。

全草：苦、涩，平。清热利湿，祛风，止咳，止血，生肌，收敛。用于风寒湿痹，肌肉酸痛，跌扑伤痛，咳嗽气喘，泄泻。

**长白老鹳草**

**Geranium paishanense** Y. L. Chang

生于高山冻原地区。分布于吉林。

全草：祛湿，强骨，活血，止泻。用于风湿关节痛，四肢拘挛，痢疾下泻。

**草原老鹳草**

**Geranium pratense** L.

生于草原及林缘。分布于东北、华北、西北及四川。

全草：祛风湿，强筋骨，活血通络，清热止泻。用于风湿痹痛，四肢麻木，血瘀，痢疾。

**甘青老鹳草**

**Geranium pylzowianum** Ma xim.

生于海拔 2 000—3 600(—4 000)米的山地草原。分布于甘肃、青海、四川、云南、西藏。

全草：清热解毒，驱风活血。用于感冒发热，咽喉痛，风湿关节痛。

**疏毛老鹳草**　　直立老鹳(新疆)

**Geranium rectum** Trautv.

生于河谷草地、湿润山坡及溪边。分布于新疆。

全草：用于痢疾，风寒湿痹，四肢麻木。

**纤细老鹳草**　　汉荭鱼腥草(植物名实图考)

**Geranium robertianum** L.

生于海拔 1 000—3 100 米的林缘、山坡草地及灌丛中。分布于西南及台湾、湖北。

全草(猫脚印)：辛、酸，平。祛风除湿，解毒。用于寒湿痹症，扭挫伤，癣疹，阴挺，蛇、狗咬伤。

**鼠掌老鹳草**

**Geranium sibiricum** L.

生于低山、丘陵及草丛中。分布于东北、华北、西北及山东、河南、四川。

全草：祛风止泻，收敛。用于风湿关节痛，痢疾泻下，疮口不收。

附　注：功效相似的有**线裂老鹳草 G. soboliferum** Kom.，分布于黑龙江、吉林。

**中华老鹳草**　　观音倒座草(云南)

**Geranium sinense** R. Kunth

生于海拔 1 900—2 300 米的草坡、荒地及灌丛中。分布于四川、云南。

根：苦、涩，凉。收敛，止痢。用于痢疾，吐泻。

**紫地榆**　　隔山消、赤地榆(滇南本草)

**Geranium strictipes** R. Kunth

生于向阳山坡。分布于云南。

根(赤地榆)：苦、涩，凉。消炎，止血，涩肠。用于吐泻，痢疾，脘腹痛，鼻衄，便血，月经过多，产后流血，跌打损伤。

**串珠老鹳草**

**Geranium transversale** (Kar. et Kir.) Vved.

生于海拔 1 700 米左右的草坡或灌丛中。分布于新疆。

全草：疏风通络，活血强筋。用于风寒湿痹，筋骨酸软。

**青岛老鹳草**

**Geranium tsingtauense** Yabe

生于赤松林下、荒坡、山地阴坡草丛中。分布于山东东部。

叶及花：舒筋活络。

附　注：山东特有药用植物。

**伞花老鹳草**　　隔山消(云南)

**Geranium umbelliforme** Franch.

生于向阳山坡杂草丛中。分布于云南鹤庆。

根：收敛，止痛，止泻。

附　注：云南特有药用植物。

**老鹳草**　　鸭脚草(中国高等植物图鉴)

**Geranium wilfordii** Maxim.

生于海拔 100—500 米的山坡、林下及林缘草丛中。分布于东北及甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖南、四川。

全草(老鹳草)：辛、苦，平。祛风湿，通经络，止泻痢。用于风寒湿痹，跌打损伤，泄泻。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**灰背老鹳草**

**Geranium wlassowianum** Fisch. ex Link

生于河岸湿地、草甸及沼泽地。分布于东北、华北、西北及湖北、四川。

全草：祛风，活血，通络，清热。用于风寒湿痹，四肢拘挛，跌打损伤，泻痢。

## 天竺葵属　Pelargonium L'Herit.

**香叶天竺葵**　　摸摸香(云南)

**Pelargonium graveolens** L'Herit.

原产南非。全国各地均有栽培。

全草：辛，温。用于风湿痛，疝气。

**天竺葵**　　木海裳(云南)

**Pelargonium hortorum** Bailey

原产南非。全国各地温室普遍栽培。

花(石腊红)：苦、涩，凉。清热解毒。用于中耳炎。

**马蹄纹天竺葵**

**Pelargonium zonale** Ait.

原产非洲南部。全国各地均有栽培。

全草：祛风湿。用于阴囊湿疹，疥癣。

## 72. 旱金莲科　Tropaeolaceae

### 旱金莲属　Tropaeolum L.

**旱金莲**　　大红鸟(北京)，旱莲花、吐血丹(广西)

**Tropaeolum majus** L.

全国常见栽培。广西、云南、西藏有时逸为野生。

全草：辛、酸，凉。清热解毒，凉血止血。用于目赤红痛，痈疖肿痛，跌打损伤，咯血。

## 73. 蒺藜科 Zygophyllaceae

### 白刺属　Nitraria L.

**大白刺**　　齿叶白刺(内蒙古植物志)

**Nitraria roborowskii** Kom.

生于盐碱地带。分布于西北及内蒙古。

果实：甘、酸，温。健脾滋补，强壮，调经。用于身体瘦弱，气血两亏，脾胃不和，消化不良，月经不调，腰腹痛。

**小果白刺**　　白刺(通称)，酸胖(内蒙古、甘肃)，泡泡刺(华北)

**Nitraria sibirica** Pall.

生于盐碱地及海滩。分布于东北、华北、西北及山东。

种子：调经活血，消食健脾。　果实：甘、微咸，温。调经活血，消食健胃。用于身体虚弱，气血两亏，脾胃不和，消化不良，月经不调，腰酸腿痛。

**白刺**

**Nitraria tangutorum** Bobr.

生于盐渍化的沙丘及砂质土壤。分布于内蒙古、甘肃、宁夏、青海、新疆、西藏。

果实：甘、酸，温。健脾胃，助消化，安神，解表，下乳。用于脾胃虚弱，消化不良，肾

虚，感冒，乳汁不下。

## 骆驼蓬属　Peganum L.

**骆驼蓬**　臭菜、臭牡丹(陕西、甘肃)

**Peganum harmala** L.

生于干旱草地及盐碱化荒地。分布于西北和北部各地。

全草：辛、苦，凉。有毒。宣肺气，祛风湿，消肿毒。用于咳嗽气短，风湿痹痛，皮肤瘙痒，无名肿毒。　种子：用于咳嗽，小便淋痛，四肢麻木，关节酸痛。

附　注：①维吾尔族医生将全草用于癫痫，瘫痪，精神病。②近年来用本种提取物治疗癌症。

**多裂骆驼蓬**

**Peganum harmala** L. var. **multisecta** Maxim.

生于荒漠草原。分布于西北。

全草：有毒。宣肺止咳，祛风湿，解毒。用于咳嗽气喘，无名肿毒，风湿关节痛。　种子：有毒。止咳，解毒，止痢通经。　果壳：用于包虫。

**骆驼蒿**　骆驼蓬、骆驼蒿(内蒙古)，匍根骆驼蓬(宁夏)

**Peganum nigellastrum** Bunge

生于荒漠草原。分布于西北及内蒙古。

全草：祛风除湿，活血止痛，宣肺止咳。用于关节痛，月经不调，咳嗽痰喘，头痛。　种子：强筋骨，祛风湿。用于咳嗽气喘，癔病，瘫痪，筋骨酸痛。

## 蒺藜属　Tribulus L.

**蒺藜**　蒺藜狗子(辽宁、吉林、山西)，蒺藜骨子、野菱角、地菱儿、白蒺藜(江苏)

**Tribulus terrestris** L.

生于山坡路旁、田边、荒丘及沙地。全国各地均有分布。

果实(蒺藜)：苦、辛，温。平肝解郁，活血祛风，明目止痒。用于头痛眩晕，胸胁胀痛，乳闭乳痈，目赤翳障，风疹瘙痒。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。② 功效相似的有**大花蒺藜 T. cistoides** L.，分布于海南、云南。

## 霸王属　Zygophyllum L.

**豆叶霸王**　骆驼蹄瓣、蹄瓣根(甘肃)

**Zygophylla fabago** L.

生于干旱的沙地或多石砾地带。分布于甘肃、青海、新疆。

根：辛，凉。止咳化痰，止痛消炎。用于咳嗽痰喘，感冒，牙痛，顽固性头痛。

**骆驼蹄草**

**Zygophyllum oxianum** A. Boriss.

生于干旱草地及盐碱化荒地。分布于新疆。

全草：咸、辛，温。解痉镇痛。用于顽固性头痛。

**霸王**

**Zygophyllum xanthoxylum** (Bunge) Maxim.

生于干旱的沙地及多石砾的地方。分布于内蒙古、宁夏、甘肃、青海、新疆。

根：辛，温。行气散满。用于腹胀。

## 74. 亚麻科 Linaceae

### 亚麻属 Linum L.

**黑水亚麻**

**Linum amurense** Alet.

生于干燥砂质草甸或草原。分布于东北及内蒙古。

全草：清热解毒。用于疮痈肿毒。

**宿根亚麻** 豆麻(云南)

**Linum perenne** L.

生于山坡及草甸。分布于华北、西北、西南。

花及种子：通经利尿。用于子宫瘀血，经闭，身体虚弱。

**野亚麻** 山胡麻、丁竹草(辽宁)，疔毒草(吉林)，野胡麻(内蒙古)

**Linum stelleroides** Planch.

生于干燥山坡及草地上。分布于东北及内蒙古、甘肃、青海、江苏、河南。

种子：甘，平。养血润燥，祛风解毒。用于血虚便秘，皮肤瘙痒，癣疹，疮痈肿毒。

**亚麻** 亚麻子、亚麻仁(通称)，大胡麻、胡麻仁(湖北)

**Linum usitatissimum** L.

东北、华北及陕西、山东、河南、湖北、四川、云南均有栽培。

种子：甘，平。润燥通便，养血祛风。用于风热湿毒，肠燥便秘，皮肤瘙痒，疮疡湿疹，脱发。

附 注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

### 石海椒属 Reinwardtia Dumort.

**石海椒** 迎春柳、黄花香草(云南)

**Reinwardtia indica** Dumort.

生于海拔 1 000—2 700 米的路旁、山坡、岩边或沟旁。分布于湖北、广西、四川、贵州、云南。福建有栽培。

全草：甘，寒。清热凉血，利便，排脓。用于小便黄热。

### 青篱柴属　Tirpitzia H. Hall.

**米念芭**

**Tirpitzia ovoidea** Chun et How ex W. L. Sha

生于山路旁及石缝中。分布于广西。

茎、叶：甘，平。散瘀，舒筋活络。　根：用于黄疸，筋骨不舒，跌打损伤，骨折，风湿关节痛。　叶：用于肝区痛，肝癌病人食欲不振。

**青篱柴**　青皮柴(广西)，柄瓣木、白豆瓣菜(贵州)

**Tirpitzia sinensis** (Hemsl.) H. Hall.

生于山间疏林中。分布于广西、贵州、云南。

根及叶：甘，温。活血，止血，止痛。用于劳伤，刀伤出血，跌打损伤，疮疡。

## 75. 古柯科　Erythroxylaceae

### 古柯属　Erythroxylum P. Br.

**古柯**　高根(广西)

**Erythroxylum coca** Lam.

福建、台湾、广东、海南、广西、云南均有栽培。

叶：苦、涩，温。提神，强壮。用于局部麻醉，消除疲劳。

**东方古柯**　细叶接骨木、滇缅古柯、古柯(云南)，假古柯(广西)

**Erythroxylum kunthianum** (Wall.) Kurz——*Sethia kunthianum* Wall.

生于山脊的次生林中或山谷林缘。分布于浙江、江西、福建、广东、海南、广西、贵州、云南。

叶：微苦、涩，温。提神，麻醉。用于疲劳，咳嗽痰喘，骨折，疟疾。

## 76. 大戟科　Euphorbiaceae

### 铁苋菜属　Acalypha L.

**铁苋菜**　血见愁(安徽)，粪斗草(福建)，铁灯碗、筒筒草(四川)，六合草、半边珠(草木便方)

**Acalypha australis** L.

生于山坡、草地、路旁及农田中。分布于长江及黄河流域中下游，以及东北、华北。

全草：苦、涩，凉。清热解毒，消积，止痢，止血。用于痢疾，腹泻，咳嗽，吐血，便血，崩漏，疳积，腹胀，皮炎，湿疹，创伤出血。

**短穗铁苋菜**

**Acalypha brachystachys** Horn.

生于向阳山坡、山麓路旁、田旁、空旷地等处。分布于河北、陕西、甘肃、江苏、浙江、江西、湖北、广西、四川、云南。

全株：苦、涩，平。清热解毒，止血止泻。用于痢疾、肿毒。

**狗尾红**

**Acalypha hispida** Burm. f.

栽培于我国南部及城市温室中。

叶：用于溃疡病。花：用于泄泻。

**金边桑**　木本金线莲、金边莲(福建)

**Acalypha wilkesiana** Muell.-Arg.——*A. godseffiana* Mast. var. *marginata* Hort.; *A. wilkesiana* Muell.-Arg. var. *marginata* Hort.

南方各地有引种栽培。

叶：微苦，凉。清热，凉血，止血。用于紫癜，牙龈出血，再生障碍性贫血，咳嗽，血小板降低，暑热。

## 山麻杆属　Alchornea Sw.

**山麻杆**

**Alchornea davidii** Franch.

生于海拔100—800米的低山区及河谷两岸或栽培。分布于陕西、江苏、安徽、浙江、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

茎、皮、叶：淡，平。解毒，杀虫，止痛。用于狂犬咬伤，蛇咬伤，蛔虫病，腰痛。

**红背叶**　红罗裙(广州)，红背娘、红帽顶(广西中草药)，红背山麻杆(福建植物志)

**Alchornea trewioides** (Benth.) Muell.-Arg.——*Stipellaria trewioides* Benth.

生于海拔1 800米左右的路旁灌丛或林下。分布于东南部(台湾不产)及中部。

根、叶：甘，凉。清热利湿，散瘀止血。用于痢疾，小便涩痛，石淋，血崩，带下病，风疹，疥疮，脚癣，龋齿，外伤出血，腰腿痛。

**三稔藤**　苦茶、二两八树(海南)，山麻杆(广西)

**Alchornea rugosa** (Lour.) Muell.-Arg.——*Cladodes rugosa* Lour.

生于疏林中或旷野灌丛中。分布于南部及云南。

嫩枝叶：接骨生肌。用于跌打损伤，骨折，外伤不愈。

## 石栗属　Aleurites J. R. et G. Forst.

**石栗**　铁桐(广西)，铁果、水火树、烛果树(云南)

**Aleurites moluccana** (L.) Willd.——*Jatropha moluccana* L.

栽培于南部各省区及云南，也有野生。

叶、种子(烛果树)：甘、微苦，寒。有小毒。清热，通经止血。　叶：用于经闭，外伤出血。　种子：用于痈疮肿毒。

## 五月茶属　Antidesma L.

**西南五月茶**　二药五月茶、假南五月茶(云南种子植物名录)

**Antidesma acidum** Retz.

生于海拔140—1 500米的次生杂木林中。分布于四川、贵州、云南。

叶：收敛止泻，生津止渴，行气活血。

**五月茶**

**Antidesma bunius** (L.) Spreng.——*Stilago bunius* L.

生于疏林或密林中。分布于广东、海南、广西、云南。

根、叶：酸，温。收敛，止泻，生津止渴，行气活血。用于咳嗽口渴，跌打损伤，疮毒。

**黄毛五月茶**

**Antidesma fordii** Hemsl.

生于常绿阔叶林中。分布于福建、广东、海南、广西、云南。

叶：外用于痈疮肿毒。

**酸味子**　禾串果(广西)，酸叶子(海南植物志)，细五月茶(云南种子植物名录)

**Antidesma japonicum** Sieb. et Zucc.

生于海拔1 500—1 700米的杂木林中。分布于浙江、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、云南。

全株：祛风湿。　叶：用于胃脘痛，痈疮肿毒，吐血。

**方叶五月茶**　田边木(云南)

**Antidesma ghaesembilla** Gaerth.

生于山坡、旷野坡地或疏林中。分布于广东、海南、广西、云南。

茎：通经。用于月经不调。叶：用于小儿头疮。

**小叶五月茶**　小杨柳(云南)

**Antidesma venosum** E. Mey. ex Tul.

生于海拔160—1 200米的河旁砾石灌丛或草丛中。分布于华南及西南。

根、叶：收敛止泻，生津止渴，行气活血。根：用于小儿麻疹，水痘。

## 银柴属　Aporosa Bl.

**银柴**　大沙叶(海南)，厚皮稔(广西)

**Aporosa octondra** (Buch.-Ham. ex D. Don) A. R. Vickery——*Myrica octandra* Buch.-Ham. ex D. Don; *A. chinensis* (Champ.) Merr.; *A. dioica* (Roxb.) Muell.-Arg.

生于疏林或密林下。分布于广东、海南、广西、云南。

叶(大沙叶)：用于痈疮肿毒。

**毛银柴**　南罗米(傣语)，毛大沙叶(广西植物名录)

**Aporosa villosa** (Lindl.) Baill.——*Scepa villosa* Lindl.

散生于山坡、路旁、山谷或山坡阴湿的密林中。分布于广东、海南、广西、云南。

全株：用于麻风。

## 木奶果属　Baccaurea Lour.

**木奶果**　白皮(海南)，麦穗、火果、铁东木(广西)，蒜瓣果、树葡萄(云南)，枝花木奶果(海南植物志)

**Baccaurea ramiflora** Lour.

生于山谷或山坡林中。分布于海南、广西、云南。

果实(木奶果)：生津止渴，消积。用于津液亏损，口渴，食积。

## 斑籽属　Baliospermum Bl.

**散微籽**　抱冬电(傣语)

**Baliospermum effusum** Pax et Hoffm.

生于海拔520—1 600米的密林下或灌丛中。分布于云南。

根、皮、叶(微籽)：辛，温。解毒驱虫，散瘀消肿。用于跌打损伤，骨折，蛔虫病，黄疸。

**斑籽**　山微籽(云南)，括帮(傣语)

**Baliospermum montanum** (Willd.) Muell.-Arg.——*Jatropha montana* Willd.

生于河谷密林下或灌丛中。分布于云南。

种子(斑籽)：辛，温。有大毒。泻下祛积，逐水消肿。用于冷积凝滞，胸腹胀满急痛，血癥，痰癖，泻痢，水肿；外用于喉风，喉痹，恶疮疥癣。

## 重阳木属　Bischofia Bl.

**重阳木**　茄冬(福建)，埋法(傣语)

**Bischofia javanica** Bl.

生于林中空地或林中干燥处。分布于浙江、福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根、树皮、叶(秋枫)：微辛、涩，凉。行气活血，消肿解毒。　根及树皮：用于风湿骨痛。　叶：用于食道癌，胃癌，传染性肝炎，小儿疳积，风热咳喘，咽喉痛；外用于痈疽，疮疡。

附　注：功效相同的有**秋枫**(秋风) **B. polycarpa** (Lévl.) Airy-Shaw，分布于陕西、江苏、浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

## 黑面神属　Breynia J. R. et G. Forst

**黑面神**　铁甲将军、夜兰茶(广东)，鬼画符(广西)

**Breynia fruticosa** (L.) Hook. f.——*Andrachne fruticosa* L.

生于山坡荒野及潮湿灌丛中。分布于浙江、福建、广东、海南、广西、贵州、云南。

根、叶(黑面叶)：微苦，凉。有小毒。清热解毒，散瘀，止痛，止痒。　根：用于急性吐泻，咳嗽，砂淋，产后子宫收缩痛，风湿关节痛。　叶：外用于烧、烫伤，湿疹，过敏性皮炎，皮肤瘙痒，阴道炎。

**红子仔**　节节红花、小黑面叶(广西)

**Breynia hyposauropus** Croizat

生于山坡、疏林、灌丛中。分布于广西、贵州。

根：苦，寒。清热解毒，消肿止痛。用于感冒发热，咳嗽，泄泻，蛇咬伤，跌打肿痛。

**跳八丈**　牙万卖(傣语)，地石榴、小柿子(云南中草药)

**Breynia retusa** (Dennst.) Alston——*Phyllanthus retusa* Dennst.; *B. patens* (Roxb.) Benth

生于向阳山坡、路坎上及灌丛中。分布于广西、贵州、云南。

根、叶(小叶黑面叶)：苦、涩，凉。清热解毒，止血止痛。用于月经过多，崩漏，痛经，带下病，吐泻，痢疾，感冒发热，腹痛，咽喉痛，乳蛾；并预防流脑。

**喙果黑面神**　小面瓜(云南)

**Breynia rostrata** Merr.

生于山坡、路旁、灌丛、草丛中。分布于福建、广东、海南、广西、云南。

根、叶(小叶黑面神)：苦、涩，凉。清热解毒，止血止痛。用于感冒发热，乳蛾，咽喉痛，吐泻，痢疾，崩漏，带下病，痛经；外用于外伤出血，疮疖，湿疹，皮肤瘙痒，烧伤。

**小叶黑面神**　一叶一枝花(广西)

**Breynia vitis-idaea** (Burm. f.) C. E. C. Fisch.

生于山坡疏林下。分布于福建、台湾、广东、广西、贵州、云南。

根：用于哮喘，咽喉痛，风湿骨痛，跌打损伤，疮疖。

## 土密树属　Bridelia Willd.

**华南土密子**　虾公木(广西)

**Bridelia fordii** Hemsl.

生于山间灌丛中。分布于广东、广西、云南。

全株：用于骨折。

**禾串土密树**　禾串树(广东)

**Bridelia insulana** Hance

生于灌丛中。分布于福建、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根：用于骨折，跌打损伤。

**土密藤**　狗舌果(广西)，大串连果(云南)，

**Bridelia stipularia** (L.) Bl.——*Clutia stipularis* L.

生于海拔 150—1 500 米山坡林下、灌丛中。分布于台湾、广东、海南、广西、云南。

根：涩、微苦，凉。解毒，止泻。用于泄泻，脱肛。　果实：涩、微苦，凉。催吐，解草

乌、五楞金刚、曼陀罗、雪上一枝蒿中毒。

**土密树**　土知母、补脑根(贵州)

**Bridelia tomentosa** Bl.——*B. monoica* (Lour.) Merr.; *B. henryana* Jabl.

生于疏林下或灌丛中。分布于我国南部。

根皮、茎、叶：淡，微苦，平。安神，调经，清热解毒。根皮：用于肾虚，月经不调。茎、叶：用于狂犬咬伤。鲜叶：用于疔疮肿毒。

## 星毛戟属　Chrozophora Neck. ex A. Juss.

**星毛戟**

**Chrozophora sabulosa** Kar. et Kir.

生于荒漠地区、沙丘背风坡、丘间低地及河湖沿岸。分布于新疆古尔班通古特沙漠。

全草：缓泻。用于便秘。

## 枝实属　Cladogynos Zipp. ex Span

**越南枝实**

**Cladogynos orientalis** Zipp. var. **tonkinensis** Gagnep.

生于山坡或疏林中。分布于广西、云南。

根：用于风湿瘫疾。　枝叶：用于风湿骨痛，跌打损伤。

## 白桐树属　Claoxylon A. Juss.

**咸鱼头**　白桐树(海南)

**Claoxylon indicum** (Reinw. ex Bl.) Hassk.——*Erythrochilus indicum* Reinw. ex Bl.; *C. polot* (Burm. f.) Merr.

生于山坡、灌丛中或疏林下。分布于我国南部。

根、叶(丢了棒)：辛、微苦，平。有毒。祛风除湿，消肿止痛。用于风湿关节痛，腰腿痛，跌打损伤，产后风痛，水肿，外伤瘀痛。

## 棒柄花属　Cleidion Bl.

**棒柄花**　大树三台、三台花(云南)

**Cleidion brevipetiolatum** Pax et Hoffm.

生于山地林中。分布于广东、海南、广西、贵州、云南。

树皮(三台树)：苦，寒。消炎解表，利湿解毒，通便。用于感冒，急、慢性肝炎，疟疾，小便涩痛，脱肛，阴挺，月经过多，产后流血，疝气，便秘；外用于疮、疖。

## 闭花木属 Cleistanthus Hook. f. ex Planch.

**闭花木** 尾叶木(广西、云南)

**Cleistanthus sumatranus** (Miq.) Muell.-Arg.——*Leiopyxis sumatrana* Miq.

生于灌丛中。分布于海南、广西、云南。

叶：治疗矽肺，苯中毒。

附 注：功效相同的有崖县闭花木(北越闭花木) **C. tonkinensis** Jabl.，分布于海南、广西、云南。

## 巴豆属 Croton L.

**银叶巴豆** 叶下白(福建)

**Croton cascarilloides** Raeusch.

生于山坡石缝中。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、云南。

根：祛风，壮筋骨。用于风湿骨痛，瘰疬，咽喉痛。

**毛尾叶巴豆** 刹埂、哈其根(傣语)，大树跌打(云南)

**Croton caudatus** Geisel. var. **tomentosa** Hook. f.

生于海拔约580米的山坡灌丛中。分布于云南。

全株(毛叶巴豆树)：辛、微酸，热。镇惊祛风，退热止痛，舒筋活络。用于疟疾，高热，惊痫抽搐，风湿关节痛，四肢麻木。

**鸡骨香** 山豆根、木沉香(生草药性备要)，土沉香、驳骨消(岭南采药录)

**Croton crassifolius** Geisel.

生于山坡灌丛或旷野荒地上。分布于南部和西南部。

根(鸡骨香)：苦、辛，温。行气止痛，祛风消肿。用于胃痛，胃肠气胀，黄疸，贫血，疝气，风湿痹痛，跌打损伤。

**石山巴豆**

**Croton euryphyllus** W. W. Smith——*C. cavaleriei* Gagnep.

生于山坡灌丛中，分布于广西、四川、贵州、云南。

根：用于风湿骨痛，跌打损伤。

**光叶巴豆** 抱龙(傣语)

**Croton laevigatus** Vahl

生于密林、疏林、山顶、山谷、溪边及山坡灌丛中。分布于海南、云南。

根、叶：辛，温。芳香。活血散瘀，止痛。用于跌打损伤，骨折，疟疾，胃痛。

**毛果巴豆** 山辣蓼(广州植物志)

**Croton lachnocarpus** Benth.

生于山坡、溪边灌丛中。分布于华南及江西、湖南。

根、叶(小叶双眼龙)：辛、苦，温。有小毒。祛风除湿，散瘀消肿。用于蛇咬伤，皮肤瘙痒，风湿关节痛，风湿脚痛，产后风瘫，缠腰火丹，跌打损伤，脓肿，瘰疬。

**巴豆**　毒鱼子(福建)、双眼龙(海南)

**Croton tiglium L.**

生于山谷、林缘、溪边或密林中，多为栽培。分布于浙江、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

果实(巴豆)：辛，热。有大毒。泻寒积，通关窍，逐痰，行水，杀虫。用于冷积凝滞，胸腹胀满急痛，血瘕，痰癖，泻痢，水肿；外用于喉风，喉痹，恶疮疥癣。　巴豆的炮制加工品(巴豆霜)：辛，热。有大毒。峻下积滞，逐水消肿，豁痰利咽。　叶：用于疟疾，疮癣，跌打损伤，蛇咬伤。　根：辛，温。有大毒。温中散寒，祛风活络。用于痈疽，疔疮，跌打损伤，蛇伤、风湿痹痛，胃痛。　巴豆壳：消积滞，止泻痢、杀虫，败毒，破瘀痨痰咳。　巴豆油：辛，热。有毒。泻下，用于风痰，止血，开窍。

附　注：巴豆、巴豆霜均为《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**蓖麻叶巴豆**

**Croton urticifolius** Y. T. Chang et Q. T. Chen

生于山坡灌丛中。分布于贵州。

种子(巴豆)：辛，热。有毒。泻寒积，通关窍，逐痰，行水，杀虫。用于冷积凝滞，胸腹胀满，泻痢，水肿，血瘕；外用于喉风，喉痹，恶疮，疥癣。

附　注：贵州特有药用植物。

## 假奓包叶属　Discocleidion (Mull.-Arg.) Pax et Hoffm.

**假奓包叶**

**Discocleidion rufescens** (Franch.) Pax et Hoffm.——*Alchornea rufescens* Franch.

生于路旁及干燥乱石滩中。分布于陕西、甘肃、河南、湖北、湖南、四川、贵州。

根皮：清热解毒，泻水消积。用于水肿，食积，毒疮。

## 黄桐属　Endospermum Benth.

**黄桐**

**Endospermum chinense** Benth.

生于山坡丛林中，亦有栽培。分布于广东，海南、广西、云南。

树皮、叶(大树跌打)：辛，热。有大毒。祛瘀生新，消肿镇痛。舒筋活络。用于疟疾，骨折，跌打损伤，风寒湿痹，关节疼痛。

## 大戟属　Euphorbia L.

**火殃簕**　臭松、苔哥刺(福建)，龙骨刺(广西)，金刚纂(海南、云南)

**Euphorbia antiquorum** L.

原产印度。多种植作绿篱或盆景。分布于福建、广东、海南、广西。其他省区也有栽

培。

茎：苦，寒。有毒。消肿，通便，杀虫。用于膨胀，急性吐泻，肿毒，疥癣。　叶：苦，寒。有毒。清热化滞，解毒行瘀。用于热滞泄泻，痢秽吐泻，转筋，疔疮，跌打积瘀。　花蕊：解毒消肿。用于膨胀。　乳汁：苦，寒。有毒。泻下，逐水，止痒。

**刮金板**　　水杨柳(贵州)，大狼毒矮黄(云南)

**Euphorbia chrysocoma** Lévl. et Vant.

生于沟边、河岸及潮湿处。分布于广西、贵州、云南。

根皮、叶(水黄花)：苦，寒。有毒。清热解毒，逐水消肿。用于水肿，膨胀，疥疮，腹水喘急，无名肿毒。

附　注：粉背刮金板 **E. chrysocoma Lévl.** Vant. et Van t. var. **glaucophylla** Lévl. et Vant.，分布于云南。根：清热解毒。用于泻水。

**兰叶大戟**　　大狼毒(云南富民)

**Euphorbia cyanophylla** Lévl.

生于海拔 2 600—3 630 米的山地。分布于云南。

根：有毒。舒筋活络。用于乳汁不通，劳伤。

**月腺大戟**

**Euphorbia ebracteolata** Hayata

生于山坡、草地或林下。分布于陕西、山东、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北、四川。

根(狼毒)：辛，平。有毒。散结，杀虫。外用于瘰疬、皮癣，阴道滴虫。

**乳浆大戟**　　猫眼草(通称)，烂疤眼(福建)，查干-塔日努(蒙语)

**Euphorbia esula L.**——*E. lunulata* Bunge

生于沙漠、山坡草地或河岸向阳处。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、山东、江苏、浙江、福建、河南、湖北、湖南、广西、四川，贵州、云南。

全草(猫眼草)：苦，凉。有毒。利尿消肿，拔毒止痒。用于四肢浮肿，小便淋痛不利，疟疾；外用于瘰疬，疮癣瘙痒。

附　注：　功效相同的有**宽叶乳浆大戟 E. esula L. var. latifolia** Lebed.，分布于东北及宁夏。

**窄叶大戟**　　希乐木苏特-塔日努(蒙语)，松叶乳浆大戟(东北草本植物志)

**Euphorbia esula** L. var. **cyparissioides** Boiss ——*E. kaleniczenkii* Czern. ex Trautv.

生于固定沙地、覆沙硬梁地、砂质土壤。分布于辽宁、吉林、内蒙古、陕西、宁夏。

全草：苦，寒。有毒。拔毒消肿。用于疮疖，痈肿，瘰疬，乳蛾。

**泽漆**　　乳浆草(江苏)，五凤草(浙江)

**Euphorbia helioscopia** L.

生于山坡、草丛、路旁、沟边、田间杂草地。分布除新疆、西藏外，几遍全国。

全草(泽漆)：辛、苦、凉。有毒。逐水消肿，祛痰，散瘀，解毒，杀虫。用于水肿，痰饮喘咳，痢疾，癥瘕痞块；外用于瘰疬，癣疮。

**长圆叶大戟**　　震天雷、鸡爪狼(湖北)

**Euphorbia henryi Hemsl.**

生于海拔约700米的山坡疏林下或山谷沟边阴湿处或栽培。分布于江西、湖北。

全草：用于水肿，痢疾，瘰疬，神经性皮炎。

**草一品红**　叶上花(广西)，猩猩草(海南植物志，福建植物志)，叶象花(文山中草药)

**Euphorbia heterophylla** L.

原产南美秘鲁。全国各地及各大植物园均有栽培。贵州、云南逸为野生。

全草(一品红)：苦、涩，寒。有毒。调经，止血，止咳，接骨，消肿。用于月经过多，跌打损伤，骨折，咳嗽。

**马蹄大戟**　铁筷子、通大海(湖北)，牛奶浆草(湖北中草药)

**Euphorbia hippocrepica** Hemsl.——*E. erythraea* Hemsl.

生于田边、草地、郊野、山坡阴湿处。分布于安徽、湖北、湖南、云南。

二年以上老根(三朵云)：微苦、涩，寒。逐水消肿，活血通便。用于便秘，跌打损伤；外用于疮毒。

**飞扬草**　大奶浆草(贵州)，节节草、奶汁草(云南)

**Euphorbia hirta** L.

生于向阳山坡、山谷、路旁及灌丛下，多见于砂质土。分布于江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全草：微苦、微酸，凉。清热解毒，利湿止痒。用于消化不良，阴道滴虫，痢疾，泄泻，咳嗽，肾盂肾炎；外用于湿疹，皮炎，皮肤瘙痒。

**通奶草**　乳汁草(江苏苏州)，小飞扬(贵州)

**Euphorbia hypericifolia** L.——*E. indica* Lam.

生于路旁或海边沙地。分布于江西、江苏、福建、广东、海南、广西、湖南、贵州、云南。

全草：辛、微苦，平。清热解毒，散血止血，利水，通奶。用于水肿，乳汁不通，泄泻，痢疾，皮炎，湿疹，脓疱疮，烧、烫伤。

**地锦**　铺地红(陕西)，花被单(上海)，蜈蚣草(江西)，仙桃草(湖南)，地瓣草(贵州)，地锦草(嘉祐本草)

**Euphorbia humifusa** Willd.——*E. humifusa* Willd. var. *pilosa* Thell.

生于山坡荒地或农田中，平原地带较多见。全国除华南外，各地均有分布。

全草(地锦草)：苦、辛，平。清热解毒，活血，止血，利湿，通乳。用于痢疾，泄泻，咳血，吐血，便血，崩漏，外伤出血，湿热黄疸，乳汁不通，痈肿疔疮，跌打肿痛。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**震天雷**　九牛造、五朵云、翻天印(陕西)

**Euphorbia hylonoma** Hand. Mazz.

生于海拔800—2 800米的山坡、山沟、灌丛或草地上。分布于陕西、甘肃、河南、湖北、湖南、四川、贵州。

根(九牛造)：甘、苦，温。有毒。通便，利水，消积，破瘀，止痛。用于二便不通，积聚腹胀，胸膈不利，肝硬化，膨胀，泄泻，消化不良，劳伤，跌打损伤，瘀血作痛，无名肿毒。茎叶(九牛造叶)：止血，止痛，生肌。(晒干研粉)敷外伤；(鲜者)捣敷无名肿毒。

**约大戟**　南大戟、上莲下柳(广西)

**Euphorbia jolkini** Boiss.

生于山坡或林缘。分布于湖北、湖南、广东、广西。

全草：清热凉血。用于肺热咳嗽，劳伤咳血，跌打损伤。

**甘遂**　肿手花根(药材资料汇编)

**Euphorbia kansui** Liou ex S. B. Ho

多生于草坡、地埂、路旁。分布于山西、陕西、甘肃、宁夏、安徽、河南、湖南、四川、贵州。

块根(甘遂)：苦，寒。泻水逐饮。用于水肿胀满，留饮结胸，癫痫，噎膈，癥瘕积聚，二便不通。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②孕妇禁用，不宜与甘草同用。

**青海大戟**

**Euphorbia kozlovii** Prokh.

生于戈壁，平坦沙地及低山坡。分布于内蒙古、甘肃、青海。

根：微甘，寒。用于癣、疮。

**神仙对座草**　千金子、降龙草(陕西)，滩板救(湖南)，菩萨豆(日华子本草)，续随子(本草纲目)

**Euphorbia lathyris** L.

原产欧洲。全国各地均有栽培。

种子(千金子)：辛，温。有毒。逐水消肿，破瘀杀虫。用于水肿胀满，痰饮，宿滞，癥瘕，痃癖，瘀血，大小肠不利。　叶：用于白癜风，面虾，蝎螫。　茎中的白色乳汁：去黡赘。用于白癜风，蛇咬伤。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**林大戟**

**Euphorbia lucorum** Rupr.

生于林下、林缘、灌丛中、草甸子、高山草地或背阴山坡上。分布于东北。

根：清热解毒；外用于牛皮癣。

**黄土大戟**

**Euphorbia luticala** Hand.-Mazz.

生于山坡上。分布于云南。

根：用于止痛，止血，解毒。　全草：用于跌打损伤。

**斑地锦**　血筋草(浙江)

**Euphorbia maculata** L.

生于向阳路旁、田野荒地。华东及河北有逸生。

全草(斑地锦)：辛，平。止血，清湿热，通乳。用于黄疸，泄泻，疳积，血痢，尿血，血崩，外伤出血，乳汁不多，痈肿疮毒。

**银边翠**　高山积雪(通称)

**Euphorbia marginata** Pursh.

原产北美洲。全国各地公园及庭院常栽培。

全草：拔毒消肿。用于月经不调，无名肿毒，跌打损伤。

**小叶大戟**　小叶遍地金(福建)

**Euphorbia microphylla** Heyne

生于路旁半阳坡或阴坡。分布于福建、广东。

全草：用于泄泻，痢疾。

**铁海棠**　　狮子簕(广州)，海棠(广西)，万年刺、刺蓬花(贵州)

**Euphorbia milii** Ch. des Moulins

原产马达加斯加。全国各地公园及温室常有栽培。

根、茎、叶、乳汁：苦，凉。有毒。排脓，解毒，逐水。用于痈疮，肝炎，水肿。花：苦、涩，平。有小毒。止血。用于子宫出血。　根：用于鱼口，便毒，跌打。

**大狼毒**　　五虎下西山、搜山虎(云南)

**Euphorbia nematocypha** Hand.-Mazz.

生于高山石缝中或山坡草地。分布于广西、云南。

根(大狼毒)：辛、苦，温。有毒。泻下逐水。用于疥癣疮，外伤出血。

附　注：功效相同的有**毛大狼毒 E. nematocypha** Hand.-Mazz. var. **induta** Hand.-Mazz.，分布于云南。

**霸王鞭**

**Euphorbia neriifolia** L.

多种植或逸为野生。分布于广东、海南、广西、四川、贵州、云南。其他省区也有栽培。

鲜茎乳汁：微苦、涩，平。祛风，解毒。用于疮疡肿毒，皮癣，水肿。

**狼毒大戟**　　狼毒疙瘩(中国高等植物图鉴)

**Euphoebia pallasii** Turcz.——*E. fischeriana* Steud.

生于干旱草原、干燥丘陵草丛中。分布于东北、华北及河南。

根(狼毒)：辛，平。有大毒。破积杀虫，除湿止痒。用于水肿腹胀，痰、食、虫积，心腹痛，咳嗽，气喘，瘰疬，疥癣，痔漏。

附　注：功效相同的有**毛狼毒大戟 E. pallasii** Turcz. f. **pilosa** (Regel) Kitag.，分布于东北东部；**短柱狼毒大戟 E. palasii** Turcz. var. **przewaiskii** (Prokh) Y. C. Chu，分布于东北。

**大戟**　　京大戟(通称)，龙虎草(陕西)

**Euphorbia pekinensis** Rupr.

生于山坡、路旁、荒地草丛、林缘及疏林下。除新疆、西藏外，全国各地都有分布。

根(京大戟)：苦，寒。有毒。泻水逐饮。用于水肿，血吸虫病，肝硬化，结核性腹膜炎引起的腹水，胸腔积液，痰饮积聚；外用于疔疮疖肿。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。② 功效相同的有**东北大戟 E. mandshurica** Maxim.，分布于东北及内蒙古；**准噶尔大戟 E. soongarica** Boiss.，分布于甘肃、新疆；**光果大戟 E. soongarica** Boiss. subsp. **lamprocarpa** (Prokh) Prokh，分布于新疆伊犁。

**泽漆大戟**　　南欧大戟(福建植物志)

**Euphorbia peplus** L.

生于路旁及树阴下。分布于福建。

全草或乳汁(癣草)：苦，寒。有毒。杀虫，解毒。外用于癣疮。

**土瓜狼毒**　　大萝卜、一把香(昆明)

**Euphorbia prolifera** Buch.-Ham. ex D. Don

生于山坡草地。分布于云南。

根：微辛、甘，平。有大毒。清热，解毒，理气止痛，止血，消食，通便。用于跌打损伤，骨折，外伤出血，疮毒，疥癣，疮、癞，腹水，食积。

**铺地草**　乳草、奶疳草(福建)

**Euphorbia prostrata** Ait.

生于路旁及旷野。分布于华南、西南及福建。

全草：淡，凉。清热解毒，凉血，消肿。用于痢疾，吐泄；外用于口疮，乳痈，疔疖。

**一品红**

**Euphorbia pulcherrima** Willd. ex Klotzsch.

原产墨西哥一带。全国各地均有栽培。

全株(猩猩木)：苦、涩，凉。有小毒。调经止血，接骨，消肿。用于月经过多，跌打损伤，外伤出血，骨折。

**长角大戟**

**Euphorbia rothiana** Spreng.

生于海拔 1 500—3 000 米的山坡草地上。分布于贵州、云南。

根(贵州落地金钱)：苦，寒。有小毒，泻下祛痰。用于腹部胀痛，气窜胁间。

**丝果大戟**　　棉大戟、搜山虎(云南)

**Euphorbia sericocarpa** Hand.-Mazz.

生于海拔 1 450—4 300 米山坡草地或灌丛中。分布于云南。

根：止血，止痛，生肌。

**百步回阳**　　蚕豆七、金刚跌打(云南思茅)

**Euphorbia sessiliflora** Roxb.

生于山坡上。分布于云南。

全草：用于软组织扭伤，骨折，风湿，疮疖。

**钩腺大戟**　　无苞大戟(浙江)

**Euphorbia sieboldiana** Morr. et Decne.

生于山坡林下及草丛中。除新疆、西藏外，分布几遍全国。

根、根皮：辛，平。有毒。散结杀虫，利尿泻下。用于腹水。

**对叶大戟**

**Euphorbia sororia** Schrenk

新疆和田、喀什有栽培。

全草或种子：化积，行气，止痛。用于食积，腹部胀痛。

**高山大戟**　　棉大戟、西藏大戟(云南种子植物名录)

**Euphorbia stracheyi** Boiss.——*E. megistopoda* Diels

生于海拔 3 500—5 400 米的高山草甸。分布于青海、云南、西藏。

根：微甘，寒。止血，止痛，生肌。用于癣疾，黄水疮。

**千根草**　　痢疾草(广东)，乳汁草(岭南草药志)

**Euphorbia thymifolia** L.

生于荒野、草地或灌丛中，多见于山地冲积土或砂质土上。分布于江西、福建、广东、广西、云南。

全草(小飞杨草)：微酸、涩，凉。清热利湿，收敛止痒。用于痄疾，痢疾，泄泻，湿疹，乳痈，痔疮。

**绿玉树**　光棍树(通称)

**Euphorbia tirucalli** L.

原产非洲南部。全国南方城市、庭园常有栽培。

**全草**：辛，微酸，凉。有小毒。催乳，杀虫。用于缺乳，癣疾。

## 海漆属　Excoecaria L.

**草沉香**　刮筋板、刮金板(四川、贵州)

**Excoecaria** acerifolia F. Didrich.

生于海拔 2 000 米以下的山坡、河谷沿岸或坡地灌丛中。分布于湖北、湖南、四川、贵州、云南。

全株(刮金板)：苦、辛，微温。祛风散寒，健脾利湿，解毒。用于风寒咳嗽，疟疾，黄疸，消化不良，小儿疳积，风湿骨痛。

附　注：功效相同的有**硬尖刮筋板 E. aceriplia** F. Didrich. **var. cuspidata** Muell.-Arg.，分布于云南。

**海漆**

**Excoecaria agallocha.**

生于高潮线附近的泥滩上。分布于福建、台湾、广东、海南、广西。

树汁、木材：作泻剂。种子：用于腹泻。

附　注：树汁有毒，切不可误入眼睛、皮肤。

**红背桂花**　叶背红、金琐玉(云南)

**Excoecaria cochinchinensis** Lour.

生于山谷林下。分布于华南及云南。各地也有盆栽。

全株(红背桂)：辛、微苦，平。有小毒。通经活络，止痛。用于麻疹，疼腿，乳蛾，心、肾绞痛，腰肌劳损。

**绿背桂花**　鸡尾木、箭毒木(云南)

**Excoecaria cochinchinensis** Lour. **var. viridis** (Pax et Hoffm.) Merr.

生于山谷林下。分布于海南、云南。

叶：辛，温。有大毒。杀虫止痒。用于牛皮癣，慢性湿疹，神经性皮炎。

**鸡尾木**

**Excoecaria venenata** S. Lee et F. N. Wei

生于山地林下。分布于广西。

叶：外用于牛皮癣，湿疹。

## 算盘子属 Glochidion J. R. et G. Forst.

**四裂算盘子** 阿萨姆算盘子(广西)

**Glochidion assamicum** (Muell.-Arg.) Hook. f.——*Phyllanthus assamicum* Muell.-Arg.

生于灌丛中。分布于广西、云南。

叶：用于湿疹，痈疮肿毒。

**漆大姑** 毛果算盘子、生毛漆、痒树棵、毛七公(海南植物志、中国高等植物图鉴)

**Glochidion eriocarpum** Champ. ex Benth.

生于山坡、山谷向阳处灌丛中。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

根、叶：苦、涩，平。清热利湿，解毒止痒。根：用于泄泻，痢疾。叶：用于生漆过敏，水田皮炎，皮肤瘙痒，癣疹，湿疹，剥脱性皮炎。

**厚叶算盘子** 大叶水榕、大洋算盘、水泡木(全国中草药汇编)

**Glochidion hirsutum** (Roxb.) Voigt——*Bradleia hirsutum* Roxb.; G. *dasyphyllum* K. Koch

生于山谷边或山坡路旁。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、云南。

根、叶：涩、微甘，平。收敛固脱，祛风消肿。用于风湿骨痛，跌打肿痛，脱肛，阴挺，带下病，泄泻，肝炎。

**香港算盘子** 大叶面豆果、大红心、金龟树(台湾)

**Glochidion hongkongense** Muell.-Arg.

生于山谷、路旁、溪边湿润处。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、云南。

根皮：用于咳嗽，肝炎。树皮、叶：用于咳嗽，腰痛，鼻衄。

**大叶算盘子** 艾皎树(福建植物志)

**Glochidion lanceolarium** (Roxb.) Voigt——*Bridelia lanceolarium* Roxb

生于丘陵、山坡林缘湿润处。分布于福建、广东、广西、云南。

茎、叶：用于口疮，牙龈肿痛。

**菲岛算盘子** 甜叶算盘子(广西)

**Glochidion philippinense** (Cav.) Benth.——*Bridlia philippinense* Cav

生于山坡灌丛中。分布于台湾、广东、海南、广西。

叶：清热。用于咽喉痛。

**算盘子** 山金瓜、馒头果(福建)，金骨风(广东)，野南瓜(海南)

**Glochidion puberum** (L.) Hutch.——*Agyneia puberum* L.

生于海拔700—1 400米的山坡。分布于长江流域及陕西、福建、台湾、湖南、广东、广西。

果实(算盘子)：苦，凉。有小毒。清热利湿。用于感冒发热，咽喉痛，疟疾，吐泻，消化不良，痢疾，风湿关节痛，跌打损伤，带下病，痛经。 根(算盘子根)：苦，平。清热利湿，活血解毒。用于痢疾，疟疾，黄疸，白浊，劳伤咳嗽，风湿痹痛，崩漏，带下病，咽喉痛，牙痛，痈肿，瘰疬，跌打损伤。 叶(算盘子叶)：苦、涩，凉。有小毒。清热利湿，解毒消肿，

活血化瘀。用于感冒，咽喉痛，淋巴结炎，疟疾，痢疾，吐泻，食滞腹痛，黄疸，白浊，带下病，闭经，外用于蛇伤，疮疖肿痛，乳痈，跌打损伤。

附注：功效相同的有**湖北算盘子 G. wilsonii** Hutch.，分布于江西、福建、湖北、广西、贵州。

**茎红算盘子**　莫劳(斐济语)

**Glochidion ramiflorum** J. R. et G. Forst.

广州市有引种栽培。

鲜叶：抗生育，抗早孕，抗着床。用于计划生育。

**山柑算盘子**　山柑树(海南)

**Glochidion sphaerogynum** (Mueil.-Arg.) Kurz —— *Phyllanthus sphaerogynum* Muell.-Arg.; *G. fargifolium* Miq.

生于山坡灌丛中。分布于广东、海南、广西、云南、西藏。

枝，叶：苦、甘、涩，凉。清热解毒。用于感冒发热，暑热口渴，口疮，湿疹，疮疡溃烂。

**白背算盘子**

**Glochidion wrightii** Benth.

生于山坡灌丛中。分布于福建、湖南、广东、海南、广西、云南。

根，叶：用于痢疾，湿疹，小儿麻疹。

**锡柱算盘子**

**Glochidion zeylanicum** A. Juss.

生于山坡灌丛中。分布于广西。

根皮：用于咳嗽，肝炎。

## 水柳仔属　Homonoia Lour.

**水柳仔**　水椎木、水杨柳、细杨柳(海南植物志)

**Homonoia riparia** Lour.

生于山坡灌丛中。分布于台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

根：苦，寒。清热利胆，消炎解毒。用于急、慢性肝炎，黄疸，石淋。

## 麻疯树属　Jatropha L.

**麻疯树**　芙蓉树(海南)，羔桐、臭油桐、小桐子(广西)，亮桐、臭梧桐(云南)

**Jatropha curcas** L.

原产美洲热带。栽培或野生于村边、路旁。分布于广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

叶、树皮(麻疯树)：苦、涩，凉。有毒。散瘀消肿，止血，止痒。用于跌打肿痛，创伤出血，皮肤瘙痒，麻疯，癞痢头，慢性溃疡，关节挫伤，阴道滴虫，湿疹，脚癣。

**佛肚树**　独脚莲(通称)

**Jatropha podagrica** Hook.

原产美洲中部。全国南方各地均有栽培。

全株：苦、甘，寒。清热解毒，消肿止痛。用于毒蛇咬伤。

## 黑钩叶属　Leptopus Decne.

**雀儿舌头**　　黑钩叶(通称)

**Leptopus chinensis** (Bunge) Pojark.——*Andrachne chinensis* Bunge

生于岩崖及山坡阴处。分布于吉林、辽宁、河北、山西、陕西、山东、河南、湖北、湖南、广西、四川、云南。

嫩茎、叶：用于腹痛，虫积。

**尾叶黑钩叶**　　长叶雀舌(云南种子植物名录)

**Leptopus esquirolii** (Lévl.) Porjak.——*Andrachne esquirolii* Lévl.

生于山坡草丛中。分布于广西、云南。

叶：止血，固脱。用于阴挺。

## 血桐属　Macaranga Thou.

**中平树**　　灯笼树(海南)，赖麻(云南)

**Macaranga denticulata** (Bl.) Muell.-Arg.——*Mappa denticulata* Bl.

生于灌丛中。分布于广东、海南、广西、贵州、云南、西藏。

根：用于黄疸。　茎皮：清热消炎。

**草鞋叶**　　草鞋木、入骨风(广西)

**Macaranga henryi** (Pax et Hoffm.) Rehd.——*Mallotus henryi* Pax et Hoffm.

生于海拔1 000—1 800米的灌丛中。分布于广西、贵州、云南。

根：有毒。用于风湿骨痛，跌打损伤。

## 野桐属　Mallotus Lour.

**白背叶**　　野桐(广东)，药酒子树(云南)

**Mallotus apelta** (Lour.) Muell.-Arg.——*Ricinus apelta* Lour.

生于海拔125—1 000米的山坡灌丛中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖南、广东、广西、云南。

叶(白背叶)：寒。清热利湿，止痛，解毒，止血。用于蜂窝组织炎，外伤出血，湿疹。根(白背叶根)：微涩、微苦，平。清热，利湿，固脱，消肿。用于肝炎，胃痛，风湿关节痛，疝腮，带下病，产后风，目赤，目翳，跌打损伤。

**毛果桐**　　毛桐(通称)，大毛桐子(四川)，紫糠木、黄花叶(全国中草药汇编)

**Mallotus barbatus** (Wall.) Muell.-Arg.——*Rottlera barbatus* Wall.

生于山坡灌丛中。分布于湖北、广东、广西、四川、贵州、云南。

根(毛桐)：微苦、涩，平。清热利湿。用于泄泻，消化不良，水便淋痛，带下病，肺热吐

血。

**野梧桐**　白肉白匏子(台湾)

**Mallotus japonicus** (Thunb.) Muell.-Arg.——*Croton japonicum* Thunb.

生于密林中。分布于江苏、浙江、台湾、广西。

根、花、叶：微苦、涩，平。清热解毒，收敛止血。用于消化不良，溃疡，外伤出血，慢性肝炎，脾肿大，带下病，中耳炎。

**野桐**　臭樟木、大乌桑叶(全国中草药汇编)，狗尾巴树、黄栗树(中国油脂植物)

**Mallotus japonicus** (Thunb.) Muell.-Arg. var **floccosus** (Muell -Arg ) S M. Hwang——*M. nepalensis* Muell.-Arg.; *M. tenuifolius* Pax.

生于林缘、疏林或灌丛中。分布于西南及陕西、江苏、安徽、浙江、福建、湖北、湖南、广东、广西。

根、皮(山桐子)：辛，平。生新解毒。用于骨折，狂犬咬伤，骨痨。

**绒毛野桐**　黄白尼泊尔野桐(云南种子植物名录)

**Mallotus japonicus** (Thunb.) Muell. -Arg. var. **ochraceo-albidus** (Muell. -Arg.) S.M.Hwang——*M nepalensis* Muell.-Arg var. *ochraceo-albidus* Muell.-Arg.

生于山坡、林缘。分布于江西、广东、广西、四川、贵州、云南。

根：用于骨折。茎皮：用于狂犬咬伤。

**白背桐**　白帽顶(广西)，白楸(经济植物志)，力树(中国油脂植物)

**Mallotus paniculatus** (Lam.) Muell.-Arg.——*Croton paniculatus* Lam.

生于密林中。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、云南。

根、茎(白楸)：用于痢疾，阴挺，中耳炎。

**粗糠柴**　郭埋孜(傣语)

**Mallotus phippinensis** (Lam.) Muell.-Arg.——*Croton phippinensis* Lam.

生于海拔 800—1 000 米的山谷中。分布于陕西、甘肃、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根：微苦、微涩，凉。清热利湿。用于痢疾，咽喉痛。果实的腺毛及毛茸(吕宋楸毛)：淡，平。有毒。驱绦虫，通便。用于绦虫病，烂疮，跌打，大便秘结。

**倒挂藤**　杠香藤(陕西)，木贼枫藤(浙江)，万刺藤、犁头枫(中国高等植物图鉴)

**Mallotus repandus** (Willd.) Muell.-Arg. var. **chrysocarpus** (Pamp.) S. M. Hwang——*M. chrysocarpus* Pamp.

生于海拔 800—1 500 米的山坡、山谷中。分布于长江流域以南各地及陕西南部。

根、茎叶(山龙眼)：微辛，温。祛风活络，舒筋止痛。用于毒蛇咬伤，风湿痹痛，慢性溃疡。

**大叶石岩枫**

**Mallotus repandus** (Willd.) Muell.-Arg. var. **megaphyllus** Croiz.

生于海拔 950—1 500 米的山坡、岩石旁。分布于贵州、云南。

全株：驱风。用于肾炎，毒蛇咬伤，风湿痹痛，慢性溃疡。种子毛：驱虫。

## 木薯属　Manihot Mill.

**木薯**　　树薯攻伞(傣语)

**Manihot esculenta** Crantz

原产巴西。华南及云南广为栽培。

淀粉(木薯粉)：甘，寒。清热解毒，凉血。用于水肿。叶：用于疮癣，痈疮肿毒。

## 红雀珊瑚属　Pedilanthus Neck. ex Poit.

**红雀珊瑚**　　扭曲草、拖鞋花、青竹标、百足草、红雀掌(全国中草药汇编)

**Pedilanthus tithymaloides** (L.) Poit.——Euphorbia tithymaloides L.

原产美洲热带。全国南部及东南部有栽培。其他城市温室中有栽培。

全草(红雀珊瑚)：酸、微涩，寒。有小毒。清热解毒，散瘀消肿，止血生肌。用于跌打损伤，骨折，外伤出血，疖肿疮疡，目赤。

## 珠子木属　Phyllanthodendron Hemsl.

**珠子木**　　叶下花(广西)

**Phyllanthodendron anthopotamicum** (Hand.-Mazz.) Croiz.——*Phyllanthus anthopotamicum* Hand.-Mazz.

生于灌丛下。分布于广东、广西、贵州、云南。

全株(珠子木)：止痛。用于跌打损伤。

**枝翅珠子木**　　粉背珠子木(广西)

**Phyllanthodendron dunnianum** Lévl.——P. dunnianum Lévl. var. hypoglaucum Lévl.

生于山坡灌丛中。分布于广西、贵州。

根(枝翅珠子木)：止血，止痢。用于牙龈出血，痢疾，咽喉痛。

## 叶下珠属　Phyllanthus L.

**越南叶下珠**　　狗脚迹、乌蝇叶、苍蝇草(广西)

**Phyllanthus cochinchinensis** (Lour.) Spreng.

生于山坡灌丛中。分布于华南。

全株(树乌蝇羽)：甘、淡、微涩，凉。清热解毒，消肿止痛。用于腹泻下痢，五淋白浊，小儿积热，小儿烂头疮，皮肤湿毒，疥疮。

**余甘子**　　滇橄榄、望果(云南)

**Phyllanthus emblica** L.

生于疏林下或山坡向阳处。分布于江西、福建、台湾、广东、广西、四川、贵州、云南。

果实(余甘子)：甘、微涩，凉。清热利咽，润肺止咳。用于感冒发热，咽喉痛，咳嗽，口干烦渴，耳痛，维生素丙缺乏症。根 (油柑根)：辛，寒。有毒。消食，利水，化痰，杀虫。用于高血压症，胃痛，泄泻，瘰疬。 叶(油柑叶)：辛，平。祛湿利尿。用于水肿，皮肤湿疹。 树皮(油柑木皮)：甘、酸，寒。杀菌祛腐，止血。用于口疮，疔疮，痔疮，阴囊湿疹，外伤出血。树枝的虫瘿(油柑虫节)：用于胃痛，疝气，遗精，小儿疳积，牙痛。

附 注：①余甘子是常用藏药。②《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**青灰叶下珠**

**Phyllanthus glaucus** Wall. ex Muell.-Arg.

生于山坡疏林中或林缘。分布于西南及江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖南、广东、广西。

根：祛风湿、消积。用于风湿关节痛，小儿疳积。

**海南叶下珠**

**Phyllanthus hainanensis** Merr.

生于山林灌丛中。分布于湖南、广东、海南、广西。

全株：用于目赤肿痛，肝肿大。

**珠子草** 霸贝菜(海南)，月下株(云南)

**Phyllanthus niruri** L.

生于山坡、路旁或旷野草地。分布于我国南部各省区。

全草：止咳祛痰，消积。用于痰咳，小儿疳积，目赤。 根：用于黄疸。

**龙眼睛** 烂头砵(广州)，山兵豆(云南)，小果叶下珠(云南种子植物名录)

**Phyllanthus multiflorus** Willd.——*P. reticulatus* Poir.

生于山坡灌丛。分布于江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根(山兵豆)：涩，平。消炎，收敛，止泻。用于痢疾，泄泻，肠结核，肝炎，小儿疳积。

**无毛龙眼睛** 红鱼眼(广西)

**Phyllanthus reticulatus** Poir. var. **glaber** Mueil.-Arg.

生于丘陵、山坡、路旁、山沟附近。分布于福建、台湾、广东、广西、四川、贵州、云南。

全株：祛风活血，散瘀消肿。用于风湿骨痛，跌打损伤。

**叶下珠** 关门草(陕西)，十字珍珠草、夜合草(江西)，叶后珠(四川)，山皂角(贵州)，阴阳草、珍珠草(云南)

**Phyllanthus urinaria** L.

生于低山坡、河岸沙砾地。分布于华东、中南、西南及河北、山西、陕西。

全草或带根全草(珍珠草)：甘、苦，凉。平肝清热，利水解毒。用于泄泻，痢疾，传染性肝炎，水肿，小便淋痛，小儿疳积，赤眼目翳，口疮头疮，无名肿毒。

附 注：功效相同的有**西南叶下珠 P. tsarongensis** W. W. Smith，分布于四川、云南、西藏。

**密柑草** 夜关门(广西)

**Phyllanthus ussuriensis** Rupr. et Maxim. ——*P. matsumurae* Hayata

生于山坡或路旁。分布于东北、华北及湖北、湖南、广东、广西。新疆有栽培。

全草：苦，寒。有小毒。消食止泻，利胆。用于蛇咬伤，小儿疳积，感冒，目赤，暑热腹

泻，痢疾，夜盲症，小便淋痛，石淋，砂淋，肾炎水肿，黄疸，暑热腹泻，红、白痢疾，水肿。

**黄珠子草**　珍珠草、鱼骨草、日开夜闭(南宁)，地珍珠、假芋(广西)

**Phyllanthus virgatus** Forst. f.——*P. simplex* Retz.

生于海拔500—800米的山坡、路旁。分布于华东、中南、西南及河北、山西、陕西。

根或全草：甘、苦，平。补脾胃，消食退翳。用于淋证，骨哽喉。　全草用于疳积。根：用于乳房脓肿。

## 蓖麻属　Ricinus L.

**蓖麻**　天麻子果、红大麻子(云南)

**Ricinus communis** L.

原产非洲。全国各地都有种植，南方多为乔木，北方各地多为一年生草本。

种子(蓖麻子)：甘、辛，平。有毒。消肿拔毒，泻下通滞。用于痈疽肿毒，瘰疬、喉痹，疥癣癣疮，水肿腹满，大便燥结。　脂肪油(蓖麻油)：为刺激性泻药。用于大便燥结，疮疖，烧伤。　根：淡、微辛，平。祛风活血，止痛镇静。用于破伤风，癫痫，风湿痛，跌打瘀痛，瘰疬。　叶：甘、辛，平。有小毒。消肿拔毒，止痒。用于脚气，阴囊肿痛，咳嗽炎喘，鹅掌风，疮疖。

附　注：蓖麻子、蓖麻油为《中华人民共和国药典》1990年版收载。

## 乌桕属　Sapium R. Br.

**浆果乌桕**

**Sapium baccatum** Roxb.

生于海拔450—1 060米的沟、谷林中。分布于云南。

根皮、树皮、叶：杀虫，解毒消肿，逐水通便。

**济新乌桕**

**Sapium chihsinianum** S. Lee

生于山坡灌丛中。分布于广西。

根：解毒，止痒。用于毒蛇咬伤，湿疹，皮炎。

**山乌桕**　木子树(江西)，桕子(云南)

**Sapium discolor** (Champ. ex Benth.) Muell. -Arg. ——*Stillingia discolor* Champ. ex Benth.

生于山坡或山谷林中。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南。

叶、根皮、树皮：苦，寒。有小毒。泻下逐水，散瘀消肿。　根皮、树皮：用于肾炎水肿，肝硬化腹水，二便不通。叶：用于跌打肿痛。　毒蛇咬伤，过敏性皮炎，湿疹，缠腰火丹。

**白木乌桕**　野蓖麻、白乳木(陕西)

**Sapium japonicum** (Sieb. et Zucc.) Pax et Hoffm. ——*Stillingia japonica* Sieb. et Zucc.

生于山坡或林地。分布于陕西、山东、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

根、叶(白木乌桕)：微苦，寒。有小毒。散瘀消肿，利尿，通便。用于腰部劳损酸痛，二便不通。 种子：作缓泻剂。

**圆叶乌桕** 雁来红、红叶树(中国高等植物图鉴)

**Sapium rotundifolium** Hemsl.

生于山坡林下。分布于湖南、广东、广西、贵州、云南。

根皮、叶：解毒，利便。用于头风痛，痈疮肿毒，湿疹，毒蛇咬伤。

**乌桕** 木梓树、蜡烛树(福建)，木油树(全国中草药汇编)

**Sapium sebiferum** (L.) Roxb. ——*Croton sebiferum* L.

多生于旷野或疏林中。村庄附近多有栽培。分布于长江中、下游各省区、中南、西南及陕西、山东、台湾。

树皮、根皮(乌桕皮)：苦，微温。有小毒。泻下，逐水，驱虫，解毒。用于水肿，臌胀，癥瘕积聚，二便不通，湿疮疥癣，疔毒。 叶：苦，微温。有毒。拔毒消肿。用于痈肿疔疮，疮疥，脚癣，湿疹，蛇伤，阴道炎。 种子：甘，凉。有毒。杀虫，利水，通便。用于疥疮，湿疹，皮肤皲裂，水肿，便秘。

## 守宫木属 Sauropus Bl.

**方枝守宫木**

**Sauropus quadrangularis** (Willd.) Muell. -Arg. ——*Phyllanthus quadrangularis* Willd,

生于山林中。分布于广西及云南南部。

全草：用于毒蛇咬伤。

**龙脷叶**

**Sauropus spatulifolius** Baill. ——*S. changianus* S. Y. Hu

福建、广东、广西有栽培于苗圃、公园、村边或屋旁，或逸为野生于山谷、山坡湿润肥沃的丛林中。

叶(龙脷叶)：甘、淡，平。清热化痰，润肺通便。用于肺燥咳嗽，失音，咽喉痛，哮喘，咯血，大便秘结。 花(龙脷花)：用于咯血。

附 注：功效相同的有**守宫木** **S. androgynus** (L.) Merr.，广东、海南、四川、云南等地有栽培。

## 地杨桃属 Sebastiania Spreng.

**地杨桃** 坡荔枝(海南崖县)

**Sebastiania chamaelea** (L.) Muell.-Arg. ——*Tragia chamaelea* L.

生于灌丛中。分布于全国南部各省区。

全草：祛风除湿，舒筋活血，止痛。

## 叶底珠属　Securinega Comm. ex Juss.

**叶底珠**　一叶萩(通称),白饭条、山白条、老米饮、狗杏条(中国药用植物志)

**Securinega suffruticosa** (Pall.) Rehd.——*Pharnaceum suffruticosum* Pall.

生于海拔800—2 400米的山坡。分布于东北、华北、西北、华东、中南及四川、贵州。

嫩枝叶及根(叶底珠): 辛、苦,温。有毒。活血舒筋,健脾益肾。用于面神经麻痹,小儿麻痹后遗症,眩晕,耳聋,肾虚,嗜睡症,阳痿。

**白饭树**

**Securinega virosa** (Roxb. ex Will.) Baill. ——*Flueggea virosa* (Roxb. ex Will.) Baill.; *Phyllanthus virosus* Roxb. ex Will.

生于疏林中或山坡路旁。分布于福建、广东、海南、广西、贵州、云南。

全株(白饭树): 苦、微涩,凉。清热解毒,消肿止痛,止痒止血。用于湿疹,脓疱疮,过敏性皮炎,疮疖,烧、烫伤。

## 地构叶属　Speraskia Baill.

**广东地构叶**　蛋不老(陕西),六月雪、仁砂草(广西),地胡椒(四川)

**Speranskia cantonensis** (Hance) Pax et Hoffm.——*Argyrothamnea cantonensis* Hance

多生于河流两岸,山区少见。分布于陕西、甘肃、湖北、湖南、广东、广西、四川、云南。

全草(蛋不老): 苦,平。祛风湿,通经络,消坚块,补血活血,止痛。用于腹中痞块,瘰疬,风湿骨痛,虚痨咳嗽,疮毒肿瘤。

**地构叶**　透骨草(通称)

**Speranskia tuberculata** (Bunge) Baill.——*Croton tuberculata* Bunge

喜生于干燥砂质土壤上。分布于东北、华北、华东及陕西、甘肃、宁夏、河南、湖北、湖南。

全草(透骨草): 辛、苦,温。散风祛湿,解毒止痛,活血,舒筋。用于风湿关节痛;外用疮疡肿毒。

## 滑桃树属　Trewia L.

**滑桃树**　马屎子(中国高等植物图鉴),苦皮树(海南植物志)

**Trewia nudiflora** L.

生于林中、溪旁开阔处或村舍附近。分布于华南及云南。

种子: 含有美登新类抗癌成分。用于癌症。

## 三宝木属　Trigonostemon Bl.

**红花三宝木**

**Trigonostemon lutescens** Y. T. Chang et J. Y. Liang

生于疏林下。分布于广西。

根：用于风湿骨痛。

### 油桐属　Vernicia Lour.

**油桐**　桐油树子、高桐子、油桐果(福建)

**Vernicia fordii** (Hemsl.) Airy-Shaw ——*Aleurites fordii* Hemsl.

生于低山区、丘陵或平川的山坡、山麓及沟旁或栽培。分布于长江流域中、下游和西南及陕西。

种子：甘。大毒。吐风痰，消肿毒。用于风痰喉痹、瘰疬，疥癣，烫伤，脓疱疮，丹毒，食积腹胀，二便不通。根：辛，寒。有毒。消积驱虫，祛风利水，降气化痰。用于食积痞满，水肿、臌胀，哮喘，瘰疬，蛔虫病。叶：消肿，解毒，杀虫。用于痈肿，丹毒，臁疮，冻疮，疥癣，烧烫伤，痢疾。花：用于秃疮，热毒疮，天泡疮。

附　注：功效相同的有**山桐 V. montana** Lour.，分布于东南部至西南部。

## 77. 虎皮楠科　Daphniphyllaceae

### 虎皮楠属　Daphniphyllum Bl.

**狭叶虎皮楠**

**Daphniphyllum angustifolium** Hutch.

生于山林中。分布于陕西、湖北、湖南、四川。

叶：止咳，解毒，消肿。用于咳嗽，疔毒红肿。

**牛耳枫**　猪肚果、猪仔木、假鸦胆子(广西)，南岭虎皮楠(中国树木分类学)

**Daphniphyllum calycinum** Benth.

生于海拔250—700米的疏林或灌丛中。分布于福建、湖南、江西、广东、海南、广西、云南。

根、叶(牛耳枫)：辛、苦，凉。消热解毒，活血舒筋。用于感冒发热，乳蛾，风湿关节痛，跌打肿痛，骨折，毒蛇咬伤，疮疡肿毒。果实(牛耳枫子)：用于慢性痢疾。

**长柱虎皮楠**　大艳山红(湖北)，广西虎皮楠(中国树木分类学)

**Daphniphyllum longistylum** S. S. Chien

生于山坡林中。分布于浙江、湖北、广西、贵州。

叶：理气止痛。用于吐泻。

**交让木**　山黄树(江西、湖北)，豆腐头(广东)，五爪龙(广西)，水红朴(四川)

**Daphniphyllum macropodum** Miq.

生于海拔800—1 500米较湿润的阔叶林中。分布于安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

种子、叶(交让木)：苦，凉。消肿拔毒，杀虫。用于疮疖肿毒。

**虎皮楠**　南宁虎皮楠(中国树木分类学)

**Daphniphyllum oldhami** (Hemsl.) Rosenth.——*D. glaucescens* Bl. var. *oldhami* Hemsl.

生于海拔200—2 300米的阔叶林中。分布于长江流域以南地区。

根、叶(虎皮楠)：苦、涩，凉。清热解毒，活血散瘀。用于感冒发热，乳蛾，脾脏肿大，毒蛇咬伤，骨折。

**脉叶虎皮楠**　中叶羊屎(广东)，土杞果(海南)，峨眉虎皮楠(中国树木分类学)

**Daphniphyllum paxianum** Rosenth.

生于海拔300米的密林中。分布于广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根、叶(海南虎皮楠)：苦、涩，凉。清热解毒，活血散瘀。用于感冒发热，乳蛾，脾脏肿大，毒蛇咬伤，骨折。

## 78. 芸香科　Rutaceae

### 山油柑属　Acronychia J. R. et G. Forst.

**降真香**　山油柑(广东)

**Acronychia pedunculata** (L.) Miq.——*Jambolifera pedunculata* L.

生于常绿阔叶林或山坡疏林中。分布于广东、海南、广西、云南。

心材或根(沙塘木)：甘，平。行气活血，健脾止咳。用于感冒咳嗽，胃痛，疝气痛，食欲不振，消化不良，腹痛，刀伤出血，跌打肿痛。果实(山油柑)：甘，平。芳香，健胃，助消化，平喘。用于风湿痛，感冒咳嗽。

### 酒饼簕属　Atalantia Corr.

**酒饼簕**　东风桔(广东)

**Atalantia buxifolia** (Poir.) Oliv.——*Citrus buxifolia* Poir.; *Severnnia buxifolia* Tenore; *S. monophylla* Tanaka

生于丘陵山地阴坡灌丛中。分布于福建、台湾、广东、海南、广西。

根(东风桔根)：辛，温。祛瘀止痛，顺气化痰，接骨。用于外感风寒，咳嗽，胃痛，胃溃疡，风湿关节痛，跌打损伤，骨折，疟疾，时行感冒。

**大叶酒饼簕**　东风橘(云南)

**Atalantia kerrii** (Swingle) Huang

生于海拔500米左右的常绿阔叶林中。分布于云南。

根、叶：用于时行感冒，咳嗽，疟疾。

附　注：云南特有药用植物。

**广东酒饼簕**　无刺东风橘、无刺酒饼簕(广东)

**Atalantia kwangtungensis** Merr.

生于山地林下或灌丛中。分布于广东、广西。

根：微苦、辛，温。祛风，解表，化痰止咳，行气止痛。用于疟疾，感冒头痛，咳嗽，风湿痹痛，胃脘寒痛，牙痛。

## 石椒草属　Boenninghausenia Reichb.

**松风草**　臭节草、石椒草(通称)

**Boenninghausenia albiflora** (Hook.) Reichb.

生于海拔较高的阴山坡林下、山沟边及林缘阴湿处。分布于长江流域以南各省区。

全草：酸、苦，温。散瘀，止痛，截疟，杀虫。用于疟疾，感冒，咳嗽，跌打损伤，外伤出血，痈疽疮疡。

**石椒草**　白虎草、小狼毒、石交(云南)

**Boenninghausenia sessilicarpa** Lévl.

生于海拔 2 000—2 800 米的山野林地。分布于四川西南部、云南。

全草：苦、辛，凉。有小毒。清热解毒，活血止痛，祛风燥湿，理气镇痛。用于风寒感冒，肺热咳嗽，乳蛾，痢疾，脱疽。

## 柑桔属　Citrus L.

**酸橙**　皮头橙(浙江)

**Citrus aurantium** L.

长江流域以南各地均有栽培。

未成熟果实(枳壳)：苦、辛、酸，凉。理气宽中，行滞消胀。用于胸胁气滞，胃脘痛，食积不化，痰饮内停，脱肛，阴挺。幼果(枳实)：苦、辛、微酸，凉。破气消积，化痰散痞。用于积滞内停，痞满胀痛，泻痢后重，大便不通，痰滞气阻胸痹，胃脘胀痛，脱肛，阴挺。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②功效相似的有**朱栾 C. aurantium** L. var. **decumana** Bonar.，浙江温州有栽培。

**代代花**

**Citrus aurantium** L. var. **amara** Engl.

长江流域以南各地均有栽培。

未成熟果实(枳壳)、幼果(枳实)：性味功效同酸橙。花蕾(代代花)：甘、微苦，微温。理气宽胸，和胃止痛。用于气郁不舒，胸腹胀满。

**柚**　香抛(通称)

**Citrus grandis** (L.) Osbrck——*C. aurartium* L. var. *grandis* L.

长江以南各地均有栽培。

外层果皮(化橘红)：辛、苦，温。散寒，燥湿，利水，消痰。用于风寒咳嗽，喉痒痰多，食积伤酒，呕嗳痞闷。根：用于肺痨。叶：解毒消肿。用于头风痛，乳痈，乳蛾。种子：苦，平。用于疝气痛，子痈。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**化州柚**　化州桔红、毛桔红(广东)

**Citrus grandis** (L.) Osbesk "**tomentosa**"

湖南、广东、广西、四川均有栽培。

外层果皮(化橘红)：性味功效同柚。 花：行气，祛痰，镇痛。用于胃痛，胸膈胀痛。

附注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**宜昌橙**

**Citrus changensis** Swing.

陕西、甘肃、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南均有栽培。

果实：酸、甘，平。化痰止咳，生津健胃。用于咳嗽，顿咳，食欲不振，中暑烦渴。 **根**：苦、辛，温。行气，止痛。止咳平喘。用于胃痛，疝气痛，咳嗽。

**香橙** 广柑、橙子、黄果(云南)

**Citrus junos** Tanaka

长江流域以南各地均有栽培。

果实：辛、苦、酸，温。理气宽中，化痰，止痛。用于气滞腹胀痛，胃痛，咳嗽气喘，疝气痛。

**柠檬** 洋柠檬(通称)

**Citrus** limon (L.) Burm. f.——*C. medica* L. B. *limon* L.

西南各地均有栽培。

根：辛、苦，温。行气止痛，止咳平喘。用于胃痛，疝气痛，咳嗽。果实：酸、甘，平。化痰止咳，生津健胃。用于咳嗽，顿咳，食欲不振，维生素C缺乏症，中暑烦渴。

**橡檬** 宜母子(广东)，药果(云南)

**Citrus limonia** Osbeck

福建、台湾、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南均有栽培。

果实：甘、酸，平。祛痰止咳，行气，健胃，止痛，止吐。用于伤风感冒咳嗽，胃纳不佳，呕吐，风湿痹痛，跌打肿痛。

**枸橼** 香橼、香泡树、蜜罗柑(广东、云南)

**Citrus medica** L.

南方各地均有栽培。

果实：辛、苦、酸，温。舒肝理气，宽中化痰。用于胸闷胀满，胃痛，痰多咳嗽，食欲不振，肝郁气滞，消化不良，呕吐。

附 注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**佛手** 佛手柑(通称)

**Citrus medica** L. var. **sarcodactylis** (Noot.) Swingle——*Cstrus sarcodactylis* Noot

长江流域以南各地均有栽培。

果实(佛手)：辛、苦、酸，温。舒肝理气，和胃止痛。用于肝气郁结，胃气痛，胸闷咳嗽痰多，嗳气少食，消化不良，呕吐。 花(佛手花)：辛、微苦，温。理气，散瘀。用于肝胃气痛，月经不调。

附 注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**桔**

**Citrus reticulata** Blanco

长江流域以南各地均有栽培。

成熟的果皮(陈皮)：苦、辛，温。理气健脾，燥湿化痰。用于胸脘胀满，食少吐泻，咳嗽痰多。幼果(青皮)：苦、辛，温。疏肝理气，消积化滞。用于胸肋胀痛，疝气，乳核，乳痈，食积腹痛。成熟果皮的外层(橘红)：辛、苦，温。散寒，燥湿，利气，消痰。用于风寒咳嗽，喉痒痰多，食积伤酒，呕恶痞闷。种子(橘核)：苦，平。理气散结止痛。用于小肠疝气，子痈，乳痈肿痛。叶(橘叶)：苦，平。疏肝行气，消肿。维管束(橘络)：苦，平。通络化痰。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**橙**　甜橙(浙江)，广柑、橙子、黄果(广东)

**Citrus sinensis** (L.) Osbeck——*Citrus aurantium* L. var. *sinensis* L.

长江流域以南各地均有分布。

幼果(枳实)：性味功效同酸橙。

附　注：枳实为《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**香圆**

**Citrus wilsonii** Tanaka

长江中下游地区均有栽培。

果实(香橼)：性味功效同枸橼。

附　注：香橼为《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 黄皮属　Clausena Burm. f.

**齿叶黄皮**　野黄皮(广东)

**Clausena dentata** (Willd.) Roem ——*Amyris dentata* Willd.

生于石灰岩山坡灌丛或疏林中。分布于湖南、广东、广西、贵州、云南。

根(野黄皮)：苦、微辛，凉。疏风，理气，除湿活血。用于感冒高热，疟疾，胃痛，水肿，风湿关节痛。叶：用于麻疹，湿疹，骨折，脱臼，扭挫伤。

**齿叶黄皮**

**Clausena dunniana** Lévl.

生于灌丛中。分布于湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根：用于感冒高热，胃痛，水肿，疟疾。叶：用于麻疹，湿疹，骨折，扭挫伤，关节痛。

**小黄皮**

**Clausena emarginata** Huang

生于山坡灌丛中。分布于广西、云南。

根、叶、全株：苦、辛，微温。有毒。宣肺止咳，行气止痛，通经活络。用于感冒头痛，风寒咳嗽，偏头痛，胃痛，神经痛，牙痛，风湿关节痛，跌打损伤。

**假黄皮**　黑鸡蛋、鸡母黄、大果(广东)，臭假黄皮(云南种子植物名录)

**Clausena excavata** Burm. f.

生于丘陵坡地灌丛或疏林中。分布于福建、台湾、广东、广西、云南。

全株(山黄皮)：苦、辛，温。接骨，散瘀，祛风湿。用于胃脘冷痛，关节痛。叶：*疏风解表，散寒，截疟。用于风寒感冒，腹痛，疟疾，扭伤，毒蛇咬伤。

**黄皮**　黄弹子(广东)

**Clausena lansium** (Lour.) Skeels——*Quinaria lansium* Lour

中南及西南各地均有栽培。

根(黄皮根)：辛、微苦，温。消肿，止痛，利小便。用于黄疸，疟疾，预防时行感冒。树皮(黄皮树皮)：辛、苦，温。消风，祛痞积，散热积，通小便。叶(黄皮叶)：辛、苦，平。疏风解表，除痰行气。用于温病身热，咳嗽，哮喘，气胀腹痛，黄肿，疟疾，小便淋痛，热毒疥癞。果实(黄皮果)：甘、酸，温。消食，理气，化痰。用于食欲不振，胸膈满痛，痰饮咳喘。果皮及种子：辛、微苦，温。消肿，止痛，利小便。用于黄疸，疟疾，胃病，疝气，疮疖。

**鸡皮**　小麻木、白蜡子(云南)

**Clausena lenis** Drake

生于海拔840—1 900米丘陵灌丛或疏林中。分布于海南、云南南部。

叶：解表散热。用于感冒发热，咳嗽。

## 白鲜属　Dictamnus L.

**白鲜**　八股牛(东北)，白羶、白羊鲜(本草纲目)

**Dictamnus dasycarpus** Turcz.

生于向阳山坡草丛或灌丛中。分布于东北、华北、西北及江苏。

根皮(白鲜皮)：苦，寒。清热燥湿，祛风解毒。用于湿热疮毒，黄水淋漓，湿疹，疥癣疮癞，风湿热痹，黄疸尿赤。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

## 吴茱萸属　Evodia (*Euodia*) J. R. et G. Forst.

**华南吴萸**

**Evodia austrosinensis** Hand.-Mazz.

生于山地疏林中或村旁。分布于广东、广西、云南南部。

果实：温中散寒，行气止痛。用于胃痛，头痛。

**川西吴萸**

**Evodia baberi** Rehd. et Wlis.

生于灌丛中。分布于四川西部。

果实：温中，散寒，止痛。用于经行腹痛，脘腹胀痛，头痛，寒疝腹痛。

附　注：四川特有药用植物。

**石山吴萸**

**Evodia calcicola** Huang

生于山路旁或灌丛中。分布于广西西部及西南部、贵州西南部、云南东南部。

叶：用于疮疡肿毒。

**臭檀吴萸**　臭檀(河北)

**Evodia daniellii** (Benn.) Hemsl.——*Zanthoxylum daniellii* Benn.

生于溪边、杂木林下及阴湿地。分布于辽宁、河北、陕西、甘肃、山东、湖北。

果实：止痛，开郁。用于胃痛，头痛，心腹气痛。

**臭辣吴萸**　臭辣树(通称)，树油(浙江)

**Evodia fargesii** Dode

生于山坡、山脊、山谷溪边潮湿树丛中及山麓、旷野。分布于长江流域以南、五岭以北地区。

果实(臭辣树)：辛、苦，温。有小毒。温中散寒，下气止痛。用于胃痛，泄泻腹痛。

**蜜楝吴萸**　辣子树(四川)

**Evodia lenticellata** Huang

生于山地林中。分布于陕西南部、四川。

果实：温中散寒，理气止痛。用于胃痛，心腹痛，头痛。

**三叉苦**　三桠苦(广东)，小黄散、三叉叶(云南)

**Evodia lepta** (Spreng.) Merr.——*Ilex lepta* Spreng.

生于低山丘陵地、潭丛中或疏林下。分布于浙江、江西、福建、台湾、广东、广西、贵州、云南。

根及根皮(三叉虎根)：苦，寒。清热解毒，祛风除湿。用于肺热咳嗽，肺痈，风湿关节痛，创伤感染发热。叶(三丫苦叶)：苦，寒。清热解毒，祛风除湿。用于咽喉痛，疟疾，黄疸，风湿骨痛，湿疹，疮疡。

**楝叶吴茱萸**　檫树(海南、中国高等植物图鉴)

**Evodia meliaefolia** (Hance) Benth. ——*Metaboirya meliaefolia* Hance

生于山地林中。分布于福建、台湾、广东、广西、云南。

全株(树腰子)：辛，温。温中散寒，理气止痛。用于胃痛，头痛，心腹气痛。

**吴茱萸**　茶辣、豉油子(广东)，吴萸(广东、广西)，臭泡子(四川)，如意子(云南)

**Evodia rutaecarpa** (Juss.) Benth.——*Boymia rutaecarpa* Juss.

生于低山坡疏林下或林缘旷地、溪边及田野，也有栽培。分布于长江流域以南各地。

未成熟的果实(吴茱萸)：辛、苦，热。有小毒。散寒止痛，降逆止呃，助阳止泻。用于厥阴头痛，寒疝腹痛，寒湿脚气，经行腹痛，脘腹胀痛，呕吐吞酸，五更泄泻，口疮，高血压症。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**疏毛吴茱萸**

**Evodia rutaecarpa** (Juss.) Benth. var. bodinieri (Dode) Huang——*E. bodinieri* Dode

生于低山坡疏林下或林缘旷地、溪边及田野。分布于长江以南各地。

未成熟的果实(吴茱萸)：性味功效同吴茱萸。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。② 功效与分布相同的有**少果吴萸 E. rutaecarpa** (Juss.) Benth. f. **meionocarpa** (Hand.-Mazz.) Huang；**石虎 E. rutaecarpa** Benth. var. **officinalis** (Dode) Huang。

**牛纠吴萸**　　牛纠树(海南)，大漆王叶、斗麻、山吴萸(云南)

**Evodia trichotoma** (Lour.) Pierre——*Tetradium trichotoma* Lour.

生于溪涧或沿河两岸的丛林中。分布于广东、广西、贵州、云南。

果实(山吴萸果)：苦、辛，温。温中散寒，祛风止痛，舒肝理气。用于泄泻，小儿腹痛，肝胃气痛。　苦、辛，温。祛风除湿。用于小儿麻痹症，风湿关节痛，麻疹，湿疹，疮疡。

**毛牛纠吴萸**

**Evodia trichotoma** (Lour.) Pierre var. **pubescens** Huang

生于灌丛或林缘及路旁。分布于广西、四川、贵州、云南。

根：用于避孕。　叶：用于风湿痹痛。

## 金柑属　Fortunella Swingle

**山柑**　　金豆(浙江)

**Fortunella** hindsii (Champ. ex Benth.) Swingle——*Sclerostylis hindsii* Champ. ex Benth.

生于山坡混交林下、林缘、裸岩旁，亦有栽培。分布于江西、福建、湖南、广东、广西。

叶：辛，温。祛风，散瘀生新。用于感冒咳嗽，顿咳，跌打损伤。　根：辛、苦，温。醒脾行气。用于胃气不通、食积胀满，疝气。　果实：辛、酸、甘，温。宽中，化痰，下气。用于风寒咳嗽，寒哮。

金柑

**Fortunella japonica** (Thunb.) Swingle——Citrus japonica Thunb.

秦岭以南各地均有栽培。

果实：辛、甘，温。理气，解郁，化痰，醒酒。用于胸闷，伤酒，口渴，食滞胃呆。　叶：苦、辛，凉。疏肝解郁，理气散结。用于噎嗝，瘰疬。　根：辛、苦，温。健脾理气。用于胃气痛，疝气，产后气滞，腹痛。

**金桔**　　罗浮(通称)，金枣、牛奶桔(中国高等植物图鉴)

**Fortunella margarite** (Lour.) Swingle——*Citrus margarita* Lour.

南方各地均有栽培。

果实：甘，温。理气，解郁，化痰，醒酒。用于胸闷，伤酒，口渴，食滞胃呆。　根：苦、辛，温。行气，散结。用于胃痛吐食，瘰疬，疝气，产后腹痛，阴挺。　叶：苦、辛，凉。舒肝解郁，理气散结。用于噎嗝，瘰疬。　核：酸、辛，平。用于目疾，喉痹，瘰疬，子痈。

## 山小桔属　Glycosmis Correa

**山桔树**　　酒饼木、越南山小桔(云南)

**Glycosmis cochinchinensis** (Lour.) Pierre——*Toluifera cochinchinensis* Lour.

生于海拔500—800米的林缘灌丛中。分布于广东、广西、云南。

根、叶及果实：止咳行气。用于食积腹痛，跌打损伤，感冒咳嗽。

**山小桔**　　山油柑(广东)

**Glycosmis parviflora** (Sims) Little——*Limonic parviflora* Sims; *G citrifolia* (Willd.) Lindl.

生于低丘陵的灌丛或疏林中。分布于福建、台湾、广东、广西、贵州、云南。

根及叶(山小桔): 微辛、苦,平。祛风解表,化痰,消积,散瘀。用于感冒咳嗽,胃脘胀痛,消化不良,疝气痛,跌打瘀痛,风湿关节痛,毒蛇咬伤,冻疮。

附　注: 功效相同的有**五叶山小桔 G. arborea** (Roxb.) DC., 分布于云南。

## 小芸木属　Micromelum Bl.

**大管**　　山黄皮(广东、云南)

**Micromelum falcatum** (Lour.) Tanaka——*Aulasia falcatum* Lour.

生于海拔 500—1 200 米的沟谷林中。分布于广东、广西、云南。

根、根皮(白木): 微苦、辛,凉。散瘀行气, 止痛活血。用于胸痹,跌打扭伤, 毒蛇咬伤。

**小芸木**　　半边枫(广东),野黄皮、癞哈螟跌打(云南)

**Micromelum integerrimum** (Buch.-Ham.) Roem. ——*Bergera integerrimum* Buch.-Ham.

生于海拔 360—1 300 米的山地疏林及林缘中。分布于广西、贵州、云南、西藏。

根、树皮及叶(小芸木): 苦、辛,温。祛风湿,温中,散瘀。用于时行感冒, 疟疾, 跌打损伤,咳嗽,胃痛,风湿骨痛,骨折。

**毛小芸木**　　毛叶小芸木(云南)

**Micromelum integerrimum** (Buch.-Ham.) Roem. var. **mollissimum** Tanaka

生于海拔 150—1 500 米的山坡疏林中及林缘。分布于广西、云南。

根、树皮及叶: 祛风解表,散瘀止痛,止血。用于跌打损伤。

## 九里香属　Murraya Koenig ex L.

**豆叶九里香**　　山豆根叶九里香(云南)

**Murraya euchrestifolia** Hayata

生于山坡疏林中。分布于台湾、广西、贵州、云南。

叶: 用于疟疾,感冒。

**九里香**　　中华九里香(广东)

**Murraya exotica** L.

生于疏林或干燥山坡灌丛中,亦有栽培。分布于福建、台湾、广东、广西。

根、叶及花: 辛、苦,温。有小毒。行气散瘀,祛风除湿,消肿止痛。用于跌打伤痛,胃痛,局部麻醉。

**调料九里香**　　多小叶九里香(云南),麻绞叶(拉汉英种子植物名称)

**Murraya koenigii** (L.) Spreng——*Bergera koenigii* L.

生于海拔 120—1 600 米的低、中山阔叶林下或村寨附近。分布于广东、海南、云南南

部。

根及叶：祛风活络。用于风湿骨痛，跌打损伤。

**广西九里香**

**Murraya kwangsiensis** (Huang) Huang——*Cleusena kwangsiensis* Huang

生于山地疏林中。分布于广西。

根：用于咳嗽，胃脘痛。枝叶：用于感冒，跌打损伤，目翳。

附　注：广西特有药用植物。

**千里香**　　九里香(安徽、云南)，月桔(广东)

**Murraya paniculata** (L.) Jack.——*Chalcas paniculata* L.

生于较干旱的疏林中。分布于福建、台湾、湖南、广西、贵州、云南。

枝叶、根(九里香)：苦、辛，微温。行气，活血，祛风，除湿。用于风湿痹痛，腰痛，跌打损伤，子痈，湿疹，疥癣，胃痛，牙痛，破伤风，乙型脑炎，虫、蛇咬伤，局部麻醉。

**千支眼**

**Murraya tetramera** Huang

生于海拔1 400米左右的石灰岩山林下石缝中。分布于云南。

根及茎叶：辛、微苦，微温。祛风解表，行气止痛，活血散瘀。用于感冒发热，咳嗽，哮喘，风湿麻木，筋骨痛，跌打损伤，皮肤瘙痒，瘀血肿痛，毒蛇咬伤，疟疾，胃痛，水肿。

附　注：云南特有药用植物。

## 臭常山属　Orixa Thunb.

**日本常山**　　臭常山(浙江)

**Orixa japonica** Thunb.

生于山坡林下、溪沟边林下及林缘阴湿处。华东经其中部到四川均有分布。

根(臭山羊)：苦、辛，凉。有小毒。截疟，涌吐痰涎，舒筋活络。用于风热感冒，咳嗽，咽喉痛，牙痛，胃痛，风湿关节痛，痢疾，无名肿毒。

## 黄柏属　Phellodendron Rupr.

**黄柏**　　黄檗(通称)

**Phellodendron amurense** Rupr.

东北及河北有野生。浙江有栽培。

树皮(黄柏)：苦，寒。清热燥湿，泻火除蒸，解毒疗疮。用于湿热泻痢，黄疸，带下病，热淋，脚气，瘘蹩，骨蒸劳热，盗汗，遗精，疮疡肿毒，湿疹瘙痒。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②国家三级保护植物。

**黄皮树**　　檗木、灰皮树、小黄连树(广东)

**Phellodendron chinense** Schneid.

生于山沟边杂木林中，亦有栽培。分布于安徽、湖北、广东、四川、云南。

树皮(黄柏)：性味功效见黄柏。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②功效相同的有**秃叶黄皮树 P. chinense** Schneid. var. **glabriusculum** Schneid.，分布于秦岭以南地区。

**镰叶黄柏**

**Phellodendron chinense** Schneid var. **falcatum** Huang

生于海拔2100米以下的山沟边杂木林中。分布于云南。

树皮：苦，寒。清热燥湿，泻火解毒。用于热痢，泄泻，黄疸，便血，带下病，目赤肿痛，口疮，疮痈。

**云南黄柏**

**Phellodendron chinense** Schneid. var. **yunnanense** Huang

生于海拔1450米以下的山沟边杂木林中。分布于云南。

树皮：用于肝炎，肾炎，口疮，痢疾，无名肿毒。

## 枳属　Poncirus Raf.

**枸桔**　　枳(通称)，臭桔(本草纲目)

**Poncirus trifoliata** (L.) Raf.——*Citrus trifoliata* L.

生于旷野路边或山地上，常栽培作绿篱或柑桔砧木。分布于全国中部各地。

未成熟的果实(枸桔梨)：辛、苦，温。理气健胃，消肿止痛。用于肝胃气痛，疝气，食积痰滞，痞胀，跌打损伤，阴挺，乳痨。叶：用于反胃，呕吐。

附　注：我国特有属。

## 裸芸香属　Psilopeganum Hemsl.

**裸芸香**　　山麻黄(中药大辞典)

**Psilopeganum sinensis** Hemsl.

生于沙滩及丘陵。分布于湖北、四川、广西。

全草(山麻黄)：微辛，温。解表，健脾，行水，消积止呕。用于感冒咳喘，呕吐，水肿。

附　注：我国特有属。

## 芸香属　Ruta L.

**芸香**

**Ruta graveolens** L.

原产欧洲。全国南部各地均有栽培。

全草(臭草)：辛、苦，凉。清热解毒，散瘀止痛。用于感冒发热，牙痛，月经不调，小儿湿疹，疮疖肿毒，跌打损伤。

## 茵芋属　Skimmia Thunb.

**乔木茵芋**　　鸡肉果(广东，云南)

**Skimmia arborescens** Gamble

生于山谷林下。分布于西南及广东、广西。

茎叶：用于风湿痹痛。

**多脉茵芋**　　泡八角(云南)

**Skimmia multinervia** Huang

生于海拔2 000—3 000米的山沟边林下阴湿处及山坡林下灌丛中。分布于云南。

茎叶：用于风湿痹痛，四肢挛急，两足软弱。

**小茵芋**

**Skimmia multinervia** Huang var. **minor** Huang

生于山沟边林下阴湿处及山坡林下灌丛中。分布于云南。

茎叶：辛、苦，温。有毒。用于四肢挛急，两足软弱，风湿痹痛。

**茵芋**　　深红茵芋(浙江)，海南茵芋、黄山桂(广东)

**Skimmia reevesiana** Fort.

生于山沟边林下阴湿岩上及山坡林下灌丛中。分布于东南沿海至湖北、湖南、广西、贵州。

茎叶(茵芋)：苦，温。有毒。祛风胜湿。用于风湿痹痛，四肢挛急，两足软弱。

## 飞龙掌血属　Toddalia Juss.

**飞龙掌血**　　三百棒(浙江、湖北)

**Toddalia asiatica** (L.) Lam.——*Paullinia asiatica* L.

生于低山坡向阳灌丛中及沟谷疏林下或山麓坡地。分布于西南及陕西、湖北、湖南、浙江、福建、台湾、广东、广西。

根及根皮(飞龙掌血)：辛、微苦，温。散瘀止血，祛风除湿，消肿解毒，止痛。用于感冒风寒，胃气痛，风湿关节痛，胸胁痛，跌打损伤，腰腿痛，牙痛，痢疾，疟疾，疮疖肿毒，毒蛇咬伤，外伤出血。

## 花椒属　Zanthoxylum L.

**刺花椒**　　枸椒、见血飞、野花椒、岩椒(云南)

**Zanthoxylum acanthopodium** DC.

生于海拔1 500—2 000米的次生林或灌丛中。分布于云南、西藏。

根皮及茎叶：辛、麻，温。温中散寒，止痛，杀虫，避孕。用于避孕，劳伤腹痛，胃痛，风湿关节痛，虫积腹痛。

**毛刺花椒**　　刺花椒(广东)

**Zanthoxylum acanthopodium** DC. var. **timbor** Hook. f.——*Z. acanthopodium* DC. var. *villosum* Huang

生于山坡灌丛中。分布于西南及广西。

根(岩椒)：辛，温。温中散寒，止痛，杀虫，避孕。用于虫积腹痛，伤风感冒，避孕。

果实：温胃杀虫。用于心腹冷痛，冷痢，带下病。

**椿叶花椒**　　椇叶花椒(通称)

**Zanthoxylum ailanthoides** Sieb. et Wils.

生于山坡疏林、林缘、山麓旷地、溪流两旁或滨海涂地。长江流域以南各地均有分布。

树皮(浙桐皮)：甘、辛，平。祛风通络，活血散瘀。用于跌打损伤，风湿痹痛，蛇伤肿痛，外伤出血。　果实(食茱萸)：辛，温。有毒。燥湿，杀虫，止痛。用于心腹冷痛，寒饮，泄泻，冷痢，湿痹，带下病，齿痛。

附　注：功效相似的有**朵花椒 Z. molle** Rehd.，分布于安徽、浙江、江西、贵州。

**竹叶花椒**　　竹叶椒(通称)，贝椒子、山巴椒(广东)，入地紫牛、山椒(云南)

**Zanthoxylum armatum** DC. ——*Z. planispinum* Sieb. et Zucc.

生于海拔700米以下的山坡灌丛中或阔叶林下。全国各地均有分布。

果实(竹叶椒)：辛，温。温中止痛，杀虫止痒。用于脘腹冷痛，呕吐泄泻，虫积腹痛，蛔虫病，湿疹瘙痒。

附　注：功效相似的有**毛竹叶花椒 Z. armatum** DC. f. **ferrugineum** (Rehd. et Wils.) Huang，分布于长江流域以南各省区。

**岭南花椒**　　总管(江西)

**Zanthoxylum austrosinensis** Huang

生于山野灌丛及溪谷丛林中。分布于江西、湖南、广东、广西。

根皮及嫩叶：辛，温。有小毒。祛风解毒，散瘀消肿，行气止痛。用于感冒咳嗽，顿咳，心胃气痛，跌打损伤，风湿痹痛，骨折，龋齿痛，毒蛇咬伤。

**勒槎花椒**　　鹰不沾、鸟不宿(云南种子植物名录)

**Zanthoxylum avicennae** (Lam.) DC. ——*Fagara avicennae* Lam.

生于山坡、丘陵、山地的疏林或灌丛中。分布于福建、台湾、广东、广西、云南。

根(鹰不沾)：辛，温。祛风化湿，消肿通络。用于黄疸，早期肝硬化，水肿，感冒咳嗽，顿咳，肠痛，风湿痹痛，跌打损伤，心胃气痛，痢疾，痔疮肿痛。　叶：用于跌打损伤，腰肌劳损，乳痈，疖肿。　果实：用于胃痛，腹痛。

**花椒**

**Zanthoxylum bungeanum** Maxim.

生于路边、山坡灌丛中，亦有栽培。全国除东北外，各地均有分布。

果实(花椒)：辛，温。温中止痛，杀虫止痒。用于脘腹冷痛，呕吐泄泻，虫积腹痛，蛔虫病，湿疹瘙痒。　种子(椒目)：苦、辛，寒。行水消肿。用于胸腹胀满，小便淋痛。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。② 功效相似的有**毛叶花椒 Z. bungeanum** Maxim. var. **pubescens** Huang，分布于陕西、甘肃、四川、云南；青椒 **Z. schinifolium** Sieb. et Zucc.，分布于全国大部分省区。青椒果实为《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**石山花椒**　　岩椒(云南)

**Zanthoxylum calcicolum** Huang

生于海拔1 000—1 800米的疏林或灌丛中。分布于广西、贵州、云南。

全株：有小毒。用于脚气痛。

**异叶花椒**

**Zanthoxylum dimorphophyllum** Hemsl.

生于海拔300—1 600米的山坡林缘灌丛中。分布于陕西、湖南、广东、广西、四川、贵州。

枝叶(羊山刺)：用于脚气病，目翳。 果实：辛，温。有小毒。散寒温中，杀虫，燥湿。用于心胃气痛，冷痢，风寒湿痹。

**刺异叶花椒**

**Zanthoxylum dimorphophyllum** Hemsl. var. **spinifolium** Rehd. et Wils.

生于海拔300—1 600米的山坡林缘灌丛中。分布于陕西、湖北、湖南、四川、贵州。

根或根皮(见血飞)：涩、辛，平。祛风散寒，活血舒筋，镇痛。用于风寒咳嗽，风湿麻木，跌打损伤，外伤出血，大便秘结。

**拟蚬壳花椒** 拟山枇杷(广东)，假山枇杷(云南)

**Zanthoxylum dissitoides** Huang

生于山坡或山谷密林中。分布于广东、广西、云南。

根：用于牙痛，跌打损伤，疝气，月经过多。

**蚬壳花椒** 山枇杷(湖北、广东、云南)

**Zanthoxylum dissitum** Hemsl.

生于海拔350—600米的山谷林下及灌丛中。分布于陕西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

果实(大叶花椒)：辛、苦，温。祛风活络，散瘀止痛，解毒消肿。用于破伤风，风湿关节痛，胃痛，跌打扭伤，龋齿痛，毒蛇咬伤，霍乱。

**刺壳花椒** 刺壳椒(湖北)

**Zanthoxylum echinocarpum** Hemsl.

生于海拔350—600米的山谷林下及灌丛中。分布于湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根：祛风除湿，行气活血。用于风湿麻木，跌打损伤，外伤出血。

**岩椒** 贵州花椒(贵州)，狗椒(云南)，细柄花椒(云南种子植物名录)

**Zanthoxylum esquirolii** Lévl.

生于山沟灌丛中或林下。分布于四川、贵州、云南。

果实：温中散寒，止痛。用于脘腹冷痛，呕吐泄泻，虫积腹痛。

**滑叶花椒**

**Zanthoxylum laetum** Drake

生于林边或灌丛中。分布于广西、云南。

根：用于跌打损伤，扭挫伤，风湿痹痛。

附 注：功效相同的有**毛刺壳花椒 Z. echinocarpum** Hemsl. var. **tomentosum** Huang，分布于广西、贵州、云南。

**小花花椒** 见血飞(通称)

**Zanthoxylum micranthum** Hemsl.

生于疏林中或灌丛中。分布于西南及湖北、湖南。

根：止血。

**多叶花椒**　止血丹、蜈蚣刺、马椒(云南)

**Zanthoxylum multijugum** Franch.

生于岩石丛林中或石缝中。分布于云南。

根(多叶花椒)：辛，温。散寒，镇痛。用于风湿关节痛，脘腹冷痛，牙痛。茎(蜈蚣藤)：辛、苦，温。有小毒。祛风解毒。用于疮毒，梅毒。

附　注：云南特有药用植物。

**两面针**　光叶花椒(浙江)，山椒、入地金牛(广东)

**Zanthoxylum nitidum** (Roxb.) DC.——*Fagara nitidum* Roxb.

生于山坡灌丛中、路边及屋旁地边。分布于浙江、福建、台湾、广东、广西、云南。

根及枝叶(入地金牛)：用于风湿关节痛，跌打肿痛，腰肌劳损，牙痛，胃痛，咽喉痛，毒蛇咬伤。

附　注：功效相同的有**毛两面针 Z. nitidum** (Roxb.) DC. f. **fastuosum** Huang，分布于福建、广东、广西、云南。

**柄果花椒**

**Zanthoxylum podocarpum** Hemsl.

生于山坡、路旁的疏林或灌丛中，偶有栽培。分布于江西、湖南、广东。

果实：辛，温。有小毒。温中止痛，驱虫健胃。用于胃痛，腹痛，蛔虫病，湿疹，皮肤瘙痒，龋齿痛。种子：苦、辛，凉。利尿消肿。用于水肿，腹水。根：辛，温。祛风湿，止痛。用于胃寒腹痛，牙痛，风寒痹痛。

**大叶臭花椒**

**Zanthoxylum rhetsoides** Drake

生于疏林中。分布于福建、湖南、广东、广西、贵州、云南。

根及叶：辛、苦，微温。祛风除湿，消肿止痛。用于风湿痹痛，跌打损伤，骨折，疮疡，痈疖，湿疹。

**花椒簕**　尖叶花椒(浙江)

**Zanthoxylum scandens** Bl ——*Z. cuspidatum* Champ.

生于山坡林下、溪谷林缘及裸岩旁的灌丛中。分布于长江流域以南各地。

根及果实：辛、苦，温。活血散瘀，镇痛，消肿解毒，祛风行气。用于胃寒腹痛，牙痛，风寒痹痛，湿疹，龋齿疼痛。

**野花椒**

**Zanthoxylum simulans** Hance

生于低山坡疏林、灌丛、山麓旷野、路旁及溪流两岸。分布于黄河流域以南，五岭以北各省区。

根(野花椒根)：辛，温。祛风湿，止痛。用于劳损，胸腹酸痛，毒蛇咬伤。叶(野花椒叶)：辛，微温。祛风散寒，健胃驱虫，除湿止泻，活血通经。用于跌打损伤，风湿痛，瘀血作痛，经闭，咯血，吐血。果皮：辛，温。有小毒。温中止痛，驱虫健胃。用于胃寒腹痛，蛔虫病；外用于湿疹，皮肤瘙痒，龋齿痛。种子：苦、辛，凉。利尿消肿。用于水肿，腹水。

**狭叶花椒**

**Zanthoxylum stenophyllum** Hemsl.

生于海拔 1 400—1 750 米的山坡杂林中或路边。分布于陕西、甘肃、湖北、四川。

果实：温胃，杀虫。用于脘腹冷痛，蛔虫病。

**西藏花椒**　　叶尔玛(藏语)

**Zanthoxylum tibetanum** Huang

生于海拔 2 400—3 900 米的常绿灌丛中。分布于西藏东南部。

果实(野花椒)：辛，温。有小毒。温中散寒，燥湿，杀虫。用于胃腹冷痛，呕吐，寒湿泻痢。　种子(椒目)：辛，温。有小毒。行水。用于水肿胀满，蛔虫病。

附　注：西藏特有药用植物。

## 79. 苦木科　Simaroubaceae

### 樗树属　Ailanthus Desf.

**臭椿**　　樗树、白椿(通称)

**Ailanthus altissima** (Mill.) Swingle ——*Toxicodendron altissima* Mill.; *A. glaudulosa* Desf.

全国各地均有栽培。

根皮或干皮(椿皮)：苦、涩，寒。清热燥湿，收涩止带，止泻，止血。用于带下病，湿热泻痢，久泻久痢，便血，崩漏。　果实(凤眼草)：苦，寒。活血祛风，清热利湿。用于风湿痹痛，便血，淋浊，带下病，遗精。

附　注：①椿皮为《中华人民共和国药典》1990 年版收载。② 功效相同的有**大果樗树 A. altissima** (Mill.) Swingle var. **sutchuenensis** (Dode) Rehd. et Wils.，分布于安徽、浙江、湖北、四川、云南。

**岭南樗树**　　臭椿(通称)

**Ailanthus triphysa** (Dennst.) Alston ——*Adenanthera triphysa* Dennst.; *Ailanthus malabarica* DC.

生于山坡上。分布于广东、福建。

树皮：苦、涩，寒。清热燥湿，收敛固肠。用于湿热带下，梦遗，滑精，痢疾。

**刺樗**

**Ailanthus vilmoriniana** Dode

生于山坡上。分布于湖北、四川、云南、西藏。

树脂：用于头痛，手足皲裂。

### 鸦胆子属　Brucea J. F. Mill.

**鸦胆子**　　苦参子(通称)，羊屎兰(福建)，老鸦胆(广东)，鸦蛋子(植物名实图考)

**Brucea javanica** (L.) Merr. ——*Rhus javanica* L.

生于丘陵、山坡、田野、村边、路旁的疏林或灌丛中。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、云南。

果实(鸦胆子)：苦，寒。有小毒。清热解毒，截疟，止痢，腐蚀赘疣。用于痢疾，疟疾，赘疣，鸡眼。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**柔毛鸦胆子**

**Brucea mollis** Wall.

生于疏密林中及潮湿地。分布于广西、云南。

果实：用于痢疾，痔疮出血。

## 牛筋果属　Harrisonia R. Br.

**牛筋果**

**Harrisonia perforata** (Blanco) Merr. ——*Paliurus perforatus* Blanco

生于低海拔山坡、丘陵的疏林或灌丛中。分布于海南。

根：清热解毒。用于疟疾。　叶：苦，寒。清热解毒。用于眼疾。

## 苦木属　Picrasma Bl.

**苦树**　　苦木(通称)，苦檀(河南)，苦树皮(四川、贵州)

**Picrasma quassioides** (D. Don) Benn. ——*Simaba quassioides* D. Don

生于山坡、山谷及村边较潮湿处。分布于东北、华北、华东、中南及陕西、甘肃、四川。

根、茎：苦，寒。清热燥湿，解毒，杀虫。用于痢疾，吐泻，胆道感染，蛔虫病，疮疡、疥癣，湿疹，烧、烫伤。

# 80. 橄榄科　Burseraceae

## 乳香属　Boswellia Roxb. ex Colebr.

**乳香**　　卡氏乳香树(通称)

**Boswellia carterii** Birdw.

云南有引种栽培。

树脂(乳香)：辛、苦，温。调气活血，舒筋定痛。用于气血凝滞，心腹痛，痈疮肿毒，跌打损伤，痛经，产后瘀血刺痛。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 橄榄属　Canarium Stiskm.

**橄榄**　　青果(通称)，黄榄(云南)

**Canarium album** (Lour.) Raeusch. ——*Pimela alba* Lour.

福建、台湾、广东、广西、四川、云南均有栽培。

果实(青果)：甘、酸，平。清热，利咽，生津，解毒。用于咽喉痛，咳嗽 烦渴，鱼蟹中毒；根(白榄根)：淡，平。清咽，解毒，利关节。用于咽喉痛，脚气，筋骨痛。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**方榄**　　三角榄(广西)

**Canarium bengalense** Roxb. ——*C. austro-sinensis* Huang

生于海拔 400—1 300 米的杂木林中。广东、广西西南部、云南东南部均有栽培。

果实：酸、涩，平。清肺利咽，生津止渴，解毒。用于咽喉痛，咳嗽，烦渴，鱼蟹毒。

**小叶榄**

**Canarium parvum** Leenh.

生于海拔 120—700 米的山谷杂木林湿润处。分布于云南河口。

根及叶：用于手足麻木，胃痛，烫伤，风湿痹痛，腰腿痛。

**乌榄**　　黑榄(广东)，木威子(本草纲目拾遗)

**Canarium pimela** Leenh.

生于平原、丘陵及山地杂木林中。分布于福建、广东、广西、云南。

根(乌榄根)：酸、涩，平。止血，化痰，利水，消痈肿。用于内伤吐血，咳嗽，手足麻木，胃痛，烫伤，风湿痛，腰腿痛。叶(乌榄叶)：涩，温。止血。用于崩漏。果实(乌榄仁)：甘，淡。润肺，下气，补血，杀诸鱼毒。

**滇榄**　　漾短(傣语)

**Canarium strictum** Roxb.

生于低、中山沟谷雨林中。分布于云南南部。

根：舒筋活络，祛风止痛。果实：止血，化痰，利水。

附　注：云南特有药用植物。

**越榄**

**Canarium tonkinense** Engl.

生于海拔 170—180 米的沟谷雨林中，亦有栽培。分布于云南。

根：舒筋活络，祛风除湿。叶：清热解毒，消肿止痛。

## 白头树属　Garuga Roxb.

**光叶白头树**　　嘉榄(中国种子植物科属辞典)

**Garuga pierrei** Guill.

生于海拔 760—1 000 米的山谷或路边疏林中。分布于云南。

茎皮：清热解毒，化腐生肌。

**羽叶白头树**

**Garuga pinuata** Roxb

生于海拔 400—1 400 米的干燥山坡或疏林中。分布于广东、海南、广西、云南。

树皮：涩，凉。清热解毒，祛腐生肌。用于痈疮肿毒。

# 81. 楝科 Meliaceae

## 米仔兰属 Aglaia Lour.

**米仔兰** 碎米兰(安徽),山胡椒(广东),鱼子兰(广西),夜兰(本草纲目拾遗)

**Aglaia odorata** Lour.

生于湿润、肥沃的土壤中，亦有栽培。分布于安徽、福建、广东、海南、广西、四川、云南。

枝叶(米仔兰)：辛,温。活血散瘀,消肿止痛。用于跌打损伤,骨折，痈疮。花(米仔兰花)：甘、辛,平。行气解郁。用于气郁胸闷,食滞腹胀。

## 山楝属 Aphanamixis Bl.

**大叶山楝** 苦油木、罗浪果(广东),山楹(海南),红萝木(广西)

**Aphanamixis grandifolia** Bl.

生于低海拔的森林中或栽培。分布于广东、广西、云南。

树皮、叶：祛风消肿。用于风湿病。

**山楝** 铁罗、红罗、沙楹(中国高等植物图鉴)

**Aphanamixis polystachya** (Wall.) R.N. Parker——*Aglaia polystachya* Wall.

生于土深肥厚的平原或丘陵疏林中,亦有栽培。分布于广东、广西、云南。

树皮及叶：祛风消肿。

## 麻楝属 Chukrasia A. Juss.

**麻楝** 白椿(云南)

**Chukrasia tabularis** A. Juss.

生于低海拔的森林中。分布于广东、广西、云南、西藏。

树皮：退热,祛风止痒。用于感冒发热,皮肤瘙痒。

附 注：功效相同的有**毛麻楝 C. tabularis** A. Juss. var. **velutina** (Roth) Miq.,分布于广东、广西、贵州、云南。

## 浆果楝属 Cipadessa Bl.

**浆果楝** 老鸦树、老雅饭(云南)

**Cipadessa baccifera** (Roth) Miq. ——*Melia baccifera* Roth

生于河岸、路边灌丛中。分布于云南。

根及树皮：苦,凉。疏风解表,截疟。用于疟疾,感冒,泄泻,痢疾,皮肤瘙痒，外伤出血。

**灰毛浆果楝**　鱼胆木、大苦木(广西)，罗汉香、碎米肖(云南)

**Cipadessa cinerascens** (Pell.) Hand. -Mazz. ——*C. fruticosa* Bl. var. *cinerascens* Pell.; *C. baccifera* (Roth) Miq. var. *sinensis* Rehd. et Wils.

生于河岸、路边的灌丛中，分布于广西、四川、贵州、云南。

根及茎叶(假茶辣)：辛、苦，微温。清热解毒，行气通便，截疟。用于风湿痹痛，跌打损伤，痢疾，疟疾，感冒，大便秘结，小儿皮炎，癞疹，脓疱，蛇虫咬伤。

## 葱臭木属　Dysoxylum Bl.

**香港葱臭木**　早望(傣语)

**Dysoxylum hongkongense** (Tutch.) Merr. ——*Chisocheton hongkongensis* Tutch.

生于密林灌丛中。分布于广东、广西、云南。

全株：用于疟疾。

## 楝属　Melia L.

**楝**　苦楝(通称)，楝枣子(山东、江苏)

**Melia azedarach** L.

全国中部和南部各地均有栽培。

树皮及根皮(苦楝皮)：苦，寒。有毒。驱虫疗癣。用于蛔虫病，虫积腹痛，疥癣瘙痒。果实：苦，寒。有毒。舒肝行气止痛，驱虫。用于胸胁脘腹胀痛，疝痛，虫积腹痛。

附　注：为《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**川楝**　川楝树(通称)，金铃子(四川、贵州、云南)

**Melia toosendan** Sieb. et Zucc.

生于湿润肥沃的地方，多为栽培。分布于中南、西南。

树皮及根皮(苦楝皮)：性味功效同楝。果实(金铃子)：性味功效同楝。叶(楝叶)：苦，寒。有小毒。止痛，杀虫。

附　注：为《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 地黄连属　Munronia Wight

**小地黄连**　矮陀陀、小独根(云南)

**Munronia delavayi** Franch.

生于河谷急流岩石上。分布于广西、云南。

全株：甘、微苦，凉。清热解毒，消肿止痛。用于跌打骨折，风湿痹痛，咽喉痛，痈肿疔毒、瘫痪，气胀腹痛，恶性疟疾。

**海南地黄连**　七叶子(海南)

**Munronia hainanensis** How et T. Chen

生于山坡、路旁灌丛中。分布于海南。

全草：淡，平。清热解毒。用于风湿骨痛，跌打损伤。

附　注：海南特有药用植物。

**滇黔地黄连**　矮陀陀(通称)，白花矮陀陀、七匹散(云南)，雅害黑(傣语)

**Munronia henryi** Harms

生于海拔1 000米以上的山谷林下。分布于贵州、云南。

根(地黄连根)：用于气胀腹痛，恶性疟疾。　全株(地黄连)：苦，凉。有毒。清热解毒，行气活血。用于骨折，瘫痪，风湿痛，跌打损伤，胃痛。

**地黄连**　花叶矮陀陀(四川)

**Munronia sinica** Diels

生于灌丛及石缝中。分布于湖北、广西、四川、贵州。

全草：清热解毒，祛风除湿。用于风湿骨痛，跌打损伤。

**单叶地黄连**　石柑子、小白花草(贵州)，地柑子(云南植物志)

**Munronia unifoliolata** Oliv.

分布于海拔800—1 000米的沟边阴湿处。分布于湖北、湖南、四川、贵州、云南。

全株：清热燥湿，止血，杀虫。用于劳伤，咳嗽，胃痛，疮痛。　根：用于跌打损伤。

## 香椿属　Toona (Endl.) Roem.

**红椿**　红楝子(云南)，赤昨工(海南)

**Toona ciliata** Roem.

生于海拔560—1 550米的沟谷林中及河边、村旁。分布于安徽、福建、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根皮：苦，凉。除热燥湿，涩肠，止血，杀虫。用于久泻，久痢，肠风便血，崩漏，带下病，遗精，白浊，疳积，蛔虫病，疮癣。

附　注：国家三级保护植物。

**小果香椿**　紫椿、红椿树(云南)

**Toona microcarpa** (C. DC.) Harms ——*Cedrela microcarpa* C. DC.

生于山坡或山谷林中。分布于湖北、湖南、广东、广西、云南。

根皮：苦、甘、涩，温。燥湿，止血，杀虫。用于胃肠出血，血崩，风湿痛，痢疾，泄泻，皮肤瘙痒，痈疖。　嫩叶：用于痔疮。　果实：用于溃疡病。

**香椿**　红椿(内蒙古)，椿甜树(四川、湖北)，椿芽树(四川)，毛椿(云南)，椿(唐本草)

**Toona sinensis** (A. Juss.) Roem. ——*Cedrela sinensis* A. Juss.

生于向阳山坡杂木林中、山谷溪旁疏林缘，常栽培。除东北外，全国各地均有分布。

树皮及根皮的内层皮(椿白皮)：苦、涩，凉。除热，燥湿，涩肠，止血，杀虫。用于痢疾，泄泻，小便淋痛，便血，血崩，带下病，风湿腰腿痛。　叶(椿叶)：苦，平。消炎，解毒，杀虫。用于痔疮，痢疾。　果实(香椿子)：辛、苦，温。祛风，散寒，止痛。用于泄泻，痢疾，胃痛。

**红椿子**　　红楝子(中国高等植物图鉴)

**Toona sureni** (Bl.) Merr. ——*Swietenia surenii* Bl.

生于低海拔的丘陵山地疏林中。分布于广东、广西、四川、云南。

树皮：清热解毒，透疹。用于痢疾，泄泻，麻疹。

## 鹧鸪花属　Trichilia R. Br.

**老虎楝**　　假黄皮、小黄伞(云南)

**Trichilia connaroides** (Wight et Arn.) Bentv. ——*Zanthoxylum connaroides* Wight et Arn.; *Heynea trijuga* Roxb. et Smis

生于海拔 120—1 350 米的季雨林、雨林、常绿阔叶林中。分布于广西、贵州、云南。

根：苦，凉。有小毒。清热解毒，祛风湿，利咽喉。用于风湿腰腿痛，咽喉痛，乳蛾，感冒，胃痛。

附　注：功效相同的有**鹧鸪花 T. connaroides** (Wight et Arn.) Bentv. f. **glabra** Bentv.，分布于广西、贵州、云南。

**茸果鹧鸪花**　　白骨走马、绒果海木(广东、广西)

**Trichilia sinensis** Bentv. ——*Heynea velutina* How et T. Chen

生于低海拔山坡或近海边的灌丛中。分布于广东、广西。

根、叶及果实：苦，寒。有小毒。杀虫止痒，燥湿，止血。用于蛔虫，腹痛，臁疮，附骨疽，疮疥，湿疹，外伤出血。

## 杜楝属　Turraea L.

**杜楝**　　金银楝(拉汉英种子植物名称)

**Turraea pubescens** Hellen

生于低海拔山坡或近海的灌丛中。分布于广东、海南。

全株：解毒，收敛，止泻。用于痢疾，泄泻，咽喉痛，内、外伤出血。

# 82. 远志科　Polygalaceae

## 远志属　Polygala L.

**荷包山桂花**　　黄花远志(浙江)，树参、阳雀花(四川)，花岩陀、黄杨参(云南)

**Polygala arillata** Buch. -Ham. ——*Chamaebuxus arillata* Hassk.

生于山坡林下、溪谷林缘湿润的草丛中。分布于陕西、安徽、浙江、江西、福建、湖北、广东、四川、贵州、云南。

根或根皮(黄花远志)：甘，微温。润肺安神，补气活血，祛风湿。用于风湿痛，跌打损伤，肺痨，水肿，小儿惊风，肝炎，吐泻，顿咳，妇女腰痛，阴挺。

**小花远志**　　细牛草、七寸金(广东)，辰沙草(贵阳)，金牛草(中药志)

**Polygala arvensis** Willd. ——*P. telephioides* Willd.; *P. kinii* Courtois

生于山坡草地及路旁。分布于江苏、安徽、浙江、江西、台湾、广东、广西、云南。

全草(小金牛草)：甘、苦，平。祛痰止咳，活血散瘀，清热解毒。用于肺痨，咳血，尿血，便血，顿咳，肝炎，月经不调，跌打损伤，毒蛇咬伤，小儿麻痹后遗症。

**尾叶远志**　毛籽山桂花(云南)，乌棒子、野桂花(广西)

**Polygala caudata** Rehd. et Wils.

生于石山的灌丛中。分布于湖北、广东、广西、四川、贵州、云南。

根(水黄杨木)：苦，平。止咳，平喘，清热利湿，通淋。用于咳嗽，哮喘，黄疸，尿血。

**西南远志**　地花生、翻砖红、猪大肠(四川)，娘母良(傜语)

**Polygala crotalarioides** Buch.-Ham.

生于海拔1 600—2 300米的山坡草地或灌丛中。分布于西南。

根(地花生)：辛、甘，温。顺气化痰，活血止痛，补心安神。用于血虚，心悸，失眠多梦，咳嗽痰少，虚痨气弱，跌打劳伤。

**黄花倒水莲**　倒吊黄(福建)，黄金印(江西)，木本远志(湖南)

**Polygala fallax** Hemsl. ——*P. aureocauda* Dunn

生于山坡疏林下或沟谷丛林中。分布于江西、福建、湖南、广东、广西、云南。

全株(黄花倒水莲)：甘、微苦，平。补益气血，健脾利湿，活血调经。用于产后、病后体虚，腰膝酸痛，跌打损伤，黄疸，肾炎水肿，阴挺，带下病，崩漏，月经不调。

**叉枝远志**　肾果小扁豆(云南)

**Polygala furcata** Royle

生于路边草丛或山坡草地。分布于广西、贵州、云南。

全草：用于小儿疳积。

**华南远志**　疳积草、厚皮柑、银不换(广西)，金不换(中药大辞典)

**Polygala glomerata** Lour. ——*P. chinensis* L.

生于草地灌丛中。分布于福建、广东、广西、四川、云南。

全草(大金牛草)：甘，平。止咳，消积，活血，散瘀。用于咳嗽胸痛，咽喉痛，肺痨，顿咳，小儿疳积，黄疸，痢疾，小儿麻痹后遗症，目赤，痈疽疖肿，跌打损伤。

**香港远志**

**Polygala hongkongensis** Hemsl.

生于山地路旁、山谷草丛中。分布于江西、湖南、广东、四川。

全草：苦 微辛，温。活血，化痰，解毒。用于跌打损伤，咳嗽，附骨疽，失眠，毒蛇咬伤。

**狭叶香港远志**

**Polygala hongkongensis** Hemsl. var. **stenophylla** (Hayata) Migo

生于低山坡、山麓路旁、田野草丛中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、广东。

全草：苦、辛，温。益智安神，散瘀，化痰，退肿。用于失眠，跌打损伤，咳喘，附骨疽，痈肿，毒蛇咬伤。

**新疆远志**　远子(新疆)

**Polygala hybrida** DC.

生于湿润肥沃的草地上。分布于新疆。

全草：辛、温。祛痰利窍，益智安神，消肿止痛。用于心悸失眠，咳嗽痰喘，顿咳，痈肿。

附　注：新疆特有药用植物。

**瓜子金**　小叶地丁草(浙江)，歼疟草、散血丹(江西)，竹叶地丁、金牛草(贵州)

**Polygala japonica** Houtt.

生于低山坡、山麓路旁、田野草丛中。分布于东北、华北、华东、中南、西南及陕西。

全草或根(瓜子金)：辛，微温。活血散瘀，化痰止咳。用于咳嗽多痰，肺热咳喘，乳蛾，口疮，咽喉痛，吐血，便血，崩漏，乳痈，流脑，风湿关节痛，痢疾，失眠，健忘。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**曲江远志**　一包花、红花倒水莲(广西)

**Polygala koi** Merr.

生于海拔 700—1 300 米的密林岩石上、山谷、路旁及疏林下。分布于湖南、广东、广西。

全草：止咳化痰。用于咳嗽，小儿疳积，月经不调，咽喉痛。

**大叶金牛**

**Polygala latouchei** Franch.

生于海拔 700—1 300 米的林下岩石上或山坡草地。分布于江西、福建、广东、广西。

全草：用于咳嗽，咳血，小儿疳积，失眠，跌打损伤，毒蛇咬伤。

**蓼叶远志**　瓜子金、黄瓜仁草(云南)，辣味根(广西)，兹比比呀(哈尼语)

**Polygala persicariaefolia** DC.

生于林下岩石缝中或山坡草地。分布于广西、四川、贵州、云南。

全草：苦，寒。清热解毒，宽胸散结。用于咽喉痛，胸痛，咳嗽，跌打损伤，毒蛇咬伤。

**岩生远志**　岩生紫金牛(云南)

**Polygala saxicola** Dunn

生于海拔 1 200—2 100 米的林下阴湿岩石上或山脊干燥的岩石上。

分布于广西、云南。

根：滋补强壮，止咳。用于失眠，咳嗽，咳血。

**西伯利亚远志**　小叶远志(山东)，大远志、辰砂草(四川)，紫花地丁(云南)，卵叶远志(华北经济植物志要)

**Polygala sibirica** L.

生于山坡草地。全国各地均有分布。

根(远志)：辛、苦，温。安神益智，祛痰，消肿。用于失眠多梦，健忘惊悸，神志恍惚，咳痰不爽，疮疡肿毒，乳房肿痛。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**大冠远志**　小远志、兰花地丁草、小万年青(云南)，苦远志(滇南本草)

**Polygala sibirica** L. var. **megalopha** Franch.

生于向阳山坡或荒地、河畔草丛中。分布于云南。

全草(小丁香)：苦、微辛，寒。清热解毒，祛风止痛，生肌。用于疔疮痈肿，小儿咳喘，胃痛，痢疾，跌打损伤，胸肋痛。

**和合草**　对叶接骨草(贵州),合掌草、排钱金不换(云南)

**Polygala subopposita** S.K. Chen

生于海拔560—1 400米的山坡草地。分布于贵州、云南。

全草:苦、涩,平。清热解毒。用于感冒发热,咽喉痛,乳蛾,胃痛,疮疖红肿,外伤出血,骨折。

**小扁豆**　野豌豆草(云南),小远志(东北草本植物志)

**Polygala tatarinowii** Regel ——*P. triphylla* Royle

生于石山的灌丛中。分布于东北、华北、西南及河南、湖北、湖南。

全草:安神,止咳,清热,截疟,补虚弱。用于失眠,咳嗽发热,疟疾。

**远志**　线儿茶、小草根(山东),神砂草、红籽细辛(四川)

**Polygala tenuifolia** Willd.

生于山坡荒草丛中。分布于东北、华北、西北、中南及四川。

根(远志):苦、辛,温。安神益智,祛痰,消肿。用于失眠多梦,健忘惊悸,神志恍惚,咳痰不爽,疮疡肿毒,乳房肿痛。　全草(小草):苦,温。安神,化痰,消肿。用于惊悸健忘,咳嗽多痰,痈疮肿毒。

附　注:《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**密花远志**　胖树根、多花远志、岁氏远志、小鸡花(云南)

**Polygala tricornis** Gagnep.

生于海拔1 000—2 500米的林下或灌丛中。分布于云南东南部和南部。

根:用于跌打损伤,身体虚弱,肾虚。

**小叶密花远志**

**Polygala tricornis** Gagnep. var. **obcordata** C. Y. Wu et S. K. Chen

生于山坡林下及灌丛中。分布于广西、云南、西藏。

根:苦、辛,温。散风祛湿,舒筋活血。用于风湿痹痛,跌打损伤。

**长毛远志**　西南远志(广西),山桂花(四川),大毛籽黄山桂(云南)

**Polygala wattersii** Hance ——*P. mariesii* Hemsl.

生于石山的灌丛中。分布于江西、湖北、湖南、广东、四川、云南。

根(山桂花):甘、涩,温。活血解毒,滋补强壮,舒筋散血。用于跌打损伤,乳房肿痛。

## 齿果草属　Salomonia Lour.

**齿果草**　一碗泡(江西、云南)

**Salomonia cantoniensis** Lour.

生于旷野草地。分布于华东、中南、西南。

全草(吹云草):辛,平。解毒,消肿,散瘀,镇痛。用于肾炎水肿,风湿关节痛,血崩,痈疮肿毒,毒蛇咬伤,跌打损伤,骨折。

附　注:功效相同的有**无齿齿果草 S. cantoniensis** Lour. var. **edentula** (DC.) Gagnep.,分布于云南。

**椭圆齿果草**

**Salomonia oblongifolia** DC.

生于旷野草地。分布于江西、福建、台湾、广东、广西、贵州、云南。

全草：用于痈疮肿毒，毒蛇咬伤。

### 蝉翼藤属　Securidaca Mill.

**蝉翼藤**　　丢了棒、五味藤(广西)，蝉翼木(云南)

**Securidaca inappendiculata** Hassk.

生于密林中。分布于广东、广西、云南。

根(蝉翼藤)：辛、苦，寒。活血散瘀，消肿止痛，清热利尿。用于跌打损伤，风湿病，骨折，胃痛，产后恶露不净。

## 83. 马桑科　Coriariaceae

### 马桑属　Coriaria L.

**马桑**　　红娘子(陕西)，乌龙须(草木便方)

**Coriaria nepalensis** Wall. ——*C. sinica* Maxim.

生于海拔400—3 200米的山坡灌丛及沟边。分布于西南及陕西、甘肃、河南、湖北。

根(马桑根)：酸、涩、苦，凉。有剧毒。清热明目，生肌止痛，散瘀消肿。用于风湿痹痛，牙痛，瘰疬，跌打损伤，狂犬咬伤，烧、烫伤。树皮(马桑树皮)：收敛口疮。叶(马桑叶)：苦、辛，寒。剧毒。祛风除湿，镇痛杀虫。用于痈疽，肿毒，疥癣，黄水疮，烧、烫伤。

## 84. 漆树科　Anacardiaceae

### 腰果属　Anacardium L.

**腰果**　　槚如树、鸡腰果(云南)

**Anacardium occidentale L.**

原产美洲热带。适生于低海拔干热地区。福建、台湾、广东、海南、广西、云南引种栽培。

树皮(鸡腰果皮)：淡，平。有毒。截疟，杀虫。用于疟疾。　果壳(腰果壳)：用于癣疾。

### 南酸枣属　Choerospondias Burtt et Hill

**南酸枣**　　山枣(湖北、广东、广西、云南)，酸枣(湖北、广西、四川、贵州、云南)，五眼果(广东)，山桉果(广西)，货朗果、鼻涕果(云南)

**Choerospondias axillaris** (Roxb.) Burtt et Hill ——*Spondias axillaris* Roxb.

生于海拔300—2 000米的山坡、丘陵或沟谷疏林中。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

果实(广枣)：甘、酸，平。行气活血，养心安神。用于气滞血瘀，心区作痛，心跳气短，心神不安。　鲜果实、果核(南酸枣)：酸、涩，凉。消食滞，清热毒，解酒，收敛，杀虫。鲜果实：用于食滞腹痛。　果核：用于烧、烫伤，风毒初起或痒痛。　树皮(五眼果树皮)：酸、涩，凉。解毒收敛，止痛止血。用于烧、烫伤，外伤出血，牛皮癣。

附　注：①广枣为蒙医和藏医习用药材。②《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**毛脉南酸枣**

**Choerospondias axillaris** (Roxb.) Burtt et Hill var. **pubinervis** (Rehd. et Wils.) Burtt et Hill ——*Spondias axillaris* Roxb. var. *pubineruis* Rehd. et Wils.

生于山坡林中。分布于甘肃东南部、湖北、湖南、四川、贵州。

树皮：杀蛔虫。

## 黄栌属　Cotinus (Tourn.) Mill.

**红叶黄栌**

**Cotinus coggygria** Scop. var **cinerea** Engl.

生于海拔700—1 620米的向阳山坡林中。分布于河北、山西、陕西、甘肃、河南、湖北、四川。其他城市也有栽培。

根、木材(黄栌)：苦，凉。清热利湿，用于黄疸，麻疹不透，烦热。　枝、叶(黄栌枝叶)：苦，寒。清热利湿。用于黄疸，烫伤(皮肤未破)，丹毒，漆疮。

附　注：功效相同的有**粉背黄栌 C. coggygria** Scop. var. **glaucophylla** C. Y. Wu，分布于陕西、甘肃、宁夏、四川、云南；**毛黄栌 C. coggygria** Scop. var. **pubescens** Engl.，分布于山西、陕西、甘肃、山东、江苏、浙江、河南、湖北、四川。

## 九子母属　Dobinea Buch.-Ham. ex D. Don

**羊角天麻**　　九子不离母(拉汉英种子植物名称)

**Dobinea delavayi** (Baill.) Baill. ——*Podoon delavayi* Baill.

生于海拔1 100—2 300米的向阳草坡或灌丛中。分布于四川西南部、云南中部至西北部。

根状茎(大九股牛)：微苦，凉。清热解毒，止痛止咳。用于肺热咳嗽，痄腮，乳痈，疔疮肿毒。

## 人面子属　Dracontomelon Bl.

**人面子**　　人面树、银莲果(云南)

**Dracontomelon duperreanum** Pierre

生于海拔(90—)120—350米的山地林中。分布于广东、海南、广西、云南。

果实(人面果)：酸，凉。健脾消食，生津止渴。用于消化不良，食欲不振，热病口渴。叶：煎水外洗烂疮，褥疮。

附　注：功效相同(果实)的有**大果人面子 D. macrocarpum** H.L. Li，分布于云南。

## 厚皮树属　Lannea A. Rich.

**厚皮树**　　万年青树(广东)，晒木、牛角麻、龙泥漆、肢皮麻(全国中草药汇编)

**Lannea coromandelica** (Houtt.) Merr. ——*Dialicum coromandelica* Houtt.; *L. grandis* (Dennst.) Engl.

生于海拔 130—1 800 米的山坡、溪边或旷野林中。分布于广东、海南、广西、云南。

树皮(厚皮树皮)：淡、涩，凉。解毒。用于河豚鱼中毒、木薯中毒、地菠萝中毒。

## 杧果属　Mangifera L.

**杧果**　　密望、望果(本草纲目)，抹猛果、檬果(植物名实图考)，马蒙(傣语)

**Mangifera indica** L. ——*M. austro-yunnanensis* Hu

生于海拔 200—1 350 米的山坡、河谷或旷野的林中。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、云南。

果实(杧果)：甘、酸，凉。止咳，益胃，活血通经。用于咳嗽，晕船，呕吐，坏血病，经闭。　果核(杧果核)：酸、涩，平。行气，消滞。用于疝气，子痛，食滞。叶(杧果叶)：酸、甘，凉。清热止咳，健胃消滞。用于咳嗽，消化不良；外用于湿疹瘙痒。　树皮：用于暑热，腹股沟肿痛。

附　注：功效相同的有**长梗杧果 M. longipes** Griff.；**泰国杧果 M. siamesis** Warbg. ex Craib；**林生杧果 M. sylvatica** Roxb.

**扁桃**　　酸果(广西)，唛咖(壮语)

**Mangifera persiciformis** C.Y. Wu et T.L. Ming

生于海拔 290—600 米的山坡或栽培。分布于广西，贵州、云南。

叶：外用于湿疹。　果实、种子：用于咳嗽，食欲不振，疝气。

## 藤漆属　Pegia Colebr.

**藤漆**

**Pegia nitida** Colebr.

生于海拔(240—)500—1 750 米的沟谷林中。分布于广西、贵州、云南。

全株：通经，驱虫，镇咳。

**刺黄藤**　　肥力漆、追风藤、红根叶、退黄藤(广西)

**Pegia sarmentosa** (Lecte.) Hand.-Mazz. ——*Phlebochiton sarmentosa* Lecte.

喜生于石山灌丛或密林中。分布于广东、广西、贵州、云南。

茎、叶(大飞天蜈蚣)：酸，平。清热利湿，解毒消肿。用于毒蛇咬伤，黄疸，风湿痹痛；外用于疮疡溃烂，湿疹。

## 黄连木属　Pistacia L.

**黄连木**　药树、黄果树(陕西)，黄连头(江苏常熟)，鸡冠果、黄连树、黄连茶(淮南本草谱)

**Pistacia chinensis** Bunge

生于海拔 140—3 550 米的石山林中或山坡疏林中。分布于华北、西北及长江流域以南各省区。

叶芽(黄练芽)：苦、涩，寒。清热解毒，止渴。用于暑热口渴，霍乱，痢疾，咽喉痛。口舌糜烂，湿疮，漆疮初起。　树皮(黄连木皮)：苦，寒。有小毒。清热解毒。用于痢疾，皮肤瘙痒，疮痒。

**摩筏香**

**Pistacia terabinthus** L.

云南勐腊地区有栽培。

树脂：固齿，祛口臭。作乳香的代用品。

**阿月浑子**　皮斯塔(维吾尔语)

**Pistacia vera** L

新疆塔里木盆地有栽培(喀什)，其他省区沙地在引种试验。

果实(无名子)：辛、涩，温。温肾暖脾。用于肾虚腰冷，阳痿、脾虚冷痢。　树皮(无名木皮)：辛，大温。温肾祛湿，止痒。用于阳痿，阴囊湿疹。

**清香木**　清香树、香叶树、柴油木(云南)，对节皮、昆明乌木(植物名实图考)

**Pistacia weinmannifolia** J. Poiss. ex Franch.

生于海拔 580—2 700 米的石灰岩山林下或灌丛中。分布于西南及广西。

茎、叶(柴油木)：酸，平。清热利湿，解毒消肿。用于痢疾，泄泻，外伤出血，疮疡湿疹。

## 盐肤木属　Rhus (Tourn.) L. emend. Moench

**盐肤木**　木椿树(山东)，柘柴、猪枣椿(江苏)

**Rhus chinensis** Mill.

生于海拔 170—2 700 米的疏林、灌丛中。除东北、内蒙古、新疆外，分布遍及全国。

树叶上五倍子蚜的虫瘿(五倍子)：酸、涩，寒。敛肺降火，涩肠止泻，敛汗，止血，收湿敛疮。用于肺虚久咳，久痢久泻，咯血，衄血，便血，痔血，肾虚，遗精，遗尿，自汗，盗汗；外用于脱肛，阴挺，湿疮，鹅口疮，宫颈糜烂，疮疖肿毒，外伤出血。　果实(盐肤子)：酸、咸，凉。生津降火，润肺化痰，敛汗。用于喉痹，痰火咳嗽，酒毒黄疸，瘴疟，毒痢，体虚多汗，头风白屑，顽癣，痈毒溃烂。　根或根皮(盐肤子根)：酸、咸，凉。清热解毒，祛风湿，散瘀血。用于感冒发热，崩漏，咳嗽咯血，泄泻，黄疸，水肿，便血，痔疮出血，风湿痹痛；外用于跌打损伤，创伤出血，蛇咬伤、乳痈，癣、疮、湿疹。　叶(盐肤叶)：酸、咸，凉。化痰止咳，解毒。用

于痰嗽，便血，痢疾；外用于跌打损伤，蛇、犬咬伤，创伤出血，黄蜂螫伤，牛皮癣，湿疹，漆疮　根韧皮部(盐肤根白皮)：咸、涩，凉。祛风湿，散瘀血，清热解毒。用于咳嗽，风湿骨痛，水肿，黄疸，跌打损伤，肿毒疮疡，蛇咬伤。　树皮的韧皮部：用于血痢，肿毒，疮疡。花：用于鼻疳，痈肿溃烂。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②功效相同的有**川麸杨 R. wilsonii** Hemsl.，分布于四川、云南、西藏。

**滨盐肤木**　盐霜白(岭南采药录)

**Rhus chinensis** Mill. var. **roxburghii** (DC.) Rehd.——*R. semialata* Brandis var. *roxburghii* DC.

生于海拔280—2 800米的山坡沟谷疏林或灌丛中。分布于江西、台湾、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根、叶(滨盐肤木)：酸、咸，寒。清热解毒，散瘀止血。　根：用于感冒发热，咳嗽，咯血，泄泻，痢疾，痔疮出血。　根、叶：外用于跌打损伤，毒蛇咬伤，漆疮。

**青麸杨**

**Rhus potaninii** Maxim.

生于海拔800—2 500米的山坡疏林或灌丛中。分布于山西、陕西、甘肃、宁夏、河南、四川、云南。

树叶上五倍子蚜的虫瘿(五倍子)：功效见盐肤木。　根(青麸杨根)：辛，热。祛风解毒。用于小儿缩阴症，瘰疬。

附　注：五倍子为《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**红麸杨**

**Rhus punjabensis** Stewart var. **sinica** (Diels) Rehd. et Wils.——*R. sinica* Diels

生于海拔400—3 000米的石灰山灌丛或密林中。分布于西南及陕西、甘肃、湖北、湖南。

树叶上五倍子蚜的虫瘿(五倍子)：见盐肤木。　根(红麸杨根)：涩肠。用于痢疾，腹泻。

附　注：①五倍子为《中华人民共和国药典》1990年版收载。②功效相同的有**毛红麸杨 R. punjabensis** Stew. var. **pilosa** Engl.，分布于四川、云南、西藏。

**火炬树**

**Rhus typhina** L.

西北地区及北京、河北、山西引种栽培。

树皮、根皮：止血。用于外伤出血。

## 肉托果属　Semecarpus L. f.

**大叶肉托果**

**Semecarpus gigantifolia** Vidal

生于山坡林下。分布于台湾。

果实(槟如实)：甘，平。止渴，润肺，除烦，祛痰。用于肺热咳嗽。

附　注：台湾特有药用植物。

**网脉肉托果**　　缅漆(云南)

**Semecarpus reticulata** Lecomte

生于海拔540—1 350米的山坡、平地或山谷疏林中。分布于云南。

树脂：通经，驱虫，镇咳。

附　注：云南特有的药用植物。

## 槟榔青属　Spondias L.

**槟榔青**　　木个、外木个(西双版纳傣语)

**Spondias pinnata** (L. f.) Kurz——*Mangifera pinnata* L. f.

生于海拔(360—)460—1 200米的低山或沟谷林中。分布于海南、广西、云南。

茎皮：酸、涩，凉。用于心悸气促，子痈。

## 三叶漆属　Terminthia Bernh.

**三叶漆**

**Terminthia paniculata** (Wall. ex G. Don) C. Y. Wu et T. L. Ming——*Rhus paniculata* Wall.

生于海拔400—1 500米的稀树草地或灌丛中。分布于云南南部。

树皮、果实、(扁果)：酸、涩，凉。　树皮：苦、涩，凉。解毒，收敛，舒筋活络。用于风湿关节痛，乳蛾，消化不良。

## 漆属　Toxicodendron (Tourn.) Mill.

**尖叶漆**　　尖叶野漆(云南种子植物名录)

**Toxicodendron acuminatum** (DC) C. Y. Wu et T. L. Ming——*Rhus acuminatum* DC.

生于海拔(540—)1 800—2 600米的杂木林或阔叶林中。分布于云南、西藏。

根、叶、果实、树脂：清热解毒，散瘀消肿，止血。

**小漆树**　　漆树(云南)

**Toxicodendron delavayi** (Franch.) F. A. Barkl.——*Rhus delavayi* Franch.

生于海拔1 100—2 500米的向阳山坡林下或灌丛中。分布于四川、云南。

根、叶(小漆树)：苦、辛，温。祛风，除湿，消肿止痛。用于风湿痛。

附　注：① 小漆树的根、树皮、种子及树皮渗出物：功效同漆树。② 功效相同的有**狭叶小漆树 T. delavayi** (Franch.) F. A. Barkl. var. **angustifolium** C. Y. Wu，分布于四川、云南。

**大花漆**

**Toxicodendron grandiflorum** C. Y. Wu et T. L. Ming

生于海拔700—2 300米的草坡、灌丛和岩石上。分布于四川、云南。

根：发汗，祛风。

附　注：**长梗大花漆 T. grandiflorum** C. Y. Wu et T. L. Ming var. **longipes** (Franch.) C. Y. Wu et T. L. Ming，分布于四川、云南，根；清热解毒。

**野漆**　山漆树(安徽)，痒漆树(广西)

**Toxicodendron succedaneum** (L.) O. Kuntze——*Rhus succedaneum* L.

生于海拔(150—)300—1 500(—3 000)米的林中。分布于华北至长江以南各地。

根、叶、树皮、果实(野漆树)：苦、涩，平。有小毒。平喘解毒，散瘀消肿，止痛止血。用于哮喘，急、慢性肝炎，胃痛，跌打损伤；外用于骨折，创伤出血。

附　注：①功效相同的有**木蜡树 T. sylvestre** (Sieb et Zucc.) O. Kuntze，分布于长江流域以南各省区。② **毛漆树 T. trichocarpum** (Miq.) O. Kuntze，分布于安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南。

**漆**　大木漆、小木漆(湖北)，山漆(福建)

**Toxicodendron vernicifluum** (Stokes) F.A. Barkl.——*Rhus verniciflua* Stokes

生于海拔800—1 600米的山坡杂木林中或栽培。全国除黑龙江、吉林、内蒙古、新疆外，各地均有分布。

树脂加工后的干燥品(干漆)：辛，温。有毒。破瘀，消积杀虫。用于经闭，癥瘕，瘀血痛，虫积腹痛。 生漆：有毒。用于水蛊，虫积。 根(漆树根)：辛，温。有毒。用于跌打损伤。 心材(漆树木心)：辛，温。微有小毒。行气，镇痛。用于心胃气痛。 干皮或根皮(漆树皮)：辛，温。有小毒。接骨。用于骨折。 叶(漆叶)：辛，温。有小毒。用于紫云疯，外伤出血，疮疡溃烂。 种子(漆子)：有毒。用于便血，尿血。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

## 85. 槭树科　Aceraceae

### 槭属　Acer L.

**安徽槭**

**Acer anhweiense** Fang et Fang f.

生于海拔1 000—1 400米的山坡、沟谷阔叶林中。分布于安徽。

根、茎或枝：祛风止痛，清热解毒，降压明目。

附　注：安徽特有药用植物。

**三角槭**　三角枫(植物名实图考)

**Aeer buergerianum** Miq.

生于山坡、沟谷、山麓阔叶林中或石灰岩山地上。分布于山东、河南、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、广东、贵州。

根：用于风湿关节痛。 根皮、茎皮：清热解毒，消暑。

**梓叶槭**

**Acer catalpifolium** Rehd.

生于海拔400—1 000米的山地林中或林缘。分布于四川。

树皮：清热解毒，解暑。

附　注：国家三级保护植物。四川特有药用植物。

**青榨槭**　　青虾蟆(中国树木分类学)

**Acer davidii** Franch.

生于海拔500—1 500米的疏林中。分布于华北、华东、中南、西南。

根：用于风湿腰痛。　枝、叶：清热解毒，行气止痛。用于背疼，腹痛，风湿关节痛。花：用于目赤，小儿消化不良。

**秀丽槭**

**Acer elegantulum** Fang et P. L. Chin

生于干燥的山岩及山坡杂木林中或溪、谷旁林下。分布于安徽、浙江、江西。

根、根皮：祛风止痛。用于关节痛。

**罗浮槭**　　红蝴蝶(广西)，红翅槭(静生生物调查所汇报)

**Acer fabri** Hance

生于海拔500—1 800米的疏林中。分布于江西、湖北、湖南、广东、广西、四川。

果实(蝴蝶果)：微苦、涩，凉。清热，利咽喉。用于咽喉肿痛，肺痨。

**房县槭**

**Acer franchetii** Pax

生于海拔1 800—2 300米的密林中。分布于陕西、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

根、树皮、果实：祛风湿，活血，清热利咽。用于声音嘶哑，咽喉肿痛。

**茶条槭**　　茶条子、枫树(东北)

**Acer ginnala** Maxim.

生于海拔800米以下的山坡从林及山谷、沟、溪两岸。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、河南。

叶、芽：苦，寒。清热明目。用于肝热目赤，视物昏花。

**苦茶槭**　　青桑头、女儿红、桑条(江苏)，苦津茶、银桑叶(河南)

**Acer ginnala** Maxim. subsp. **theiferum** (Fang.) Fang——*A. theiferum* Fang

生于低海拔的山坡疏林中。分布于华东及河南南部、湖北、湖南。

幼芽(桑芽茶)：甘、微苦，凉。散风热，清头目。用于风热头痛。

附　注：江苏南部地区以"桑芽茶"作纺织女工饮料，可防汗渍污染织物。福建泉州用作清凉饮料。

**葛萝槭**

**Acer grosseri** Pax

生于山坡上部阔叶林中或沟谷旁。分布于河北、山西、陕西、甘肃、安徽、湖北、湖南。

枝、叶：清热解毒，降压明目，止痛。

附　注：　功效相同的有**长裂葛萝槭 A. grosseri** Pax var. **hersii** (Rehd.) Rehd.，分布于安徽、浙江、江西、河南、湖北、湖南。

**建始槭**　三叶槭(中国植物图谱)

**Acer henryi** Pax

生于海拔500—1 500米山坡疏林中。分布于山西、陕西、甘肃、江苏、浙江、安徽、河南、湖北、四川、贵州。

根：接骨，利关节，止痛。用于腰肌扭伤，风湿骨痛。

**桂林槭**　三角枫(广西)

**Acer kweilinense** Fang et Fang f.

生于海拔1 000—1 500米的疏林中。分布于广西、贵州。

果实：用于咽喉肿痛。

**光叶槭**　长叶槭树(中国树木分类学)

**Acer laevigatum** Wall.

生于山林中。分布于西南及陕西、湖北。

根、树皮：祛风除湿，活血。用于劳伤痛。　果实：清热利咽。

**疏花槭**　川康槭(中国树木分类学)

**Acer laxiflorum** Pax

生于海拔1 800—2 500米的山坡林中。分布于四川、贵州。

果实：清热解毒，行气止痛。

**色木槭**　地锦槭(中国高等植物图鉴)，水色树(中国树木分类学)，五角枫(华北经济植物志要)，五角槭(江苏南部种子植物手册)，奥存-巴图查干(蒙语)

**Acer mono** Maxim.

生于海拔800—2 500米的山坡和山谷林缘或丛林中。分布于东北、华北及陕西、甘肃至长江流域各省区。

枝叶(五龙皮)：辛，温。祛风除湿，活血逐瘀。用于风湿骨痛，骨折，跌打损伤。

附　注：功效相同的有**髭脉槭 A. barbinerve** Maxim.，分布于东北。

**大翅色木槭**

**Acer mono** Maxim. var. **macropterum** Fang

生于海拔2 100—2 700米的疏林中。分布于甘肃、湖北、四川、云南、西藏。

枝、叶：祛风除湿，活血化瘀。

**梣叶槭**　复叶槭(经济植物手册)，美国槭(华北经济植物志要)，白蜡槭(中国树木分类学)，糖槭(东北木本植物图志)，阿格其(蒙语)

**Acer negudo** L.

辽宁、河北、陕西、甘肃、新疆、山东、江苏、浙江、江西、河南、湖北有栽培。

果实：用于腹疾。

**飞蛾槭**　飞蛾树(中国树木分类学)

**Acer oblongum** Wall. ex DC.

生于海拔1 000—1 500米的常绿阔叶林中。分布于西南及陕西、甘肃、湖北。

根皮：祛风除湿。

**峨眉飞蛾槭**

**Acer oblongum** Wall. ex DC. var. **omeiense** Fang et Soong

生于海拔 1 200—1 700 米的林中。分布于四川。

根、树皮：祛风除湿，活血。

附　注：四川特有药用植物。

**五裂槭**

**Acer oliverianum** Pax

生于山坡湿润处。分布于甘肃、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

枝、叶：辛、苦，凉。清热解毒，理气止痛。用于腹痛，背疽，痈疮。

**鸡爪槭**　　鸡爪槭(江苏、江西、湖北)

**Acer palmatum** Thunb.

生于海拔 200—1 200 米的林缘或疏林中。分布于山东、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北、湖南、贵州。

枝叶(鸡爪槭)：辛、微苦，平。止痛，解毒。用于腹痛；外用于背疽，痈疮。

附　注：功效相同的有**小鸡爪槭 A. palmatum** Thunb. var. **thunbergii** Pax，分布于山东、江苏、浙江、江西、福建、湖南。

**中华槭**　　丫角树(中国树木分类学)

**Acer sinense** Pax

生于海拔 1 200—2 000 米的混交林中。分布于湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

根：接骨，利关节，止疼痛。用于风湿关节痛，骨折。

**天目槭**

**Acer sinopurpurascens** Cheng

生于海拔 700—1 000 米的混交林中。分布于浙江、江西。

根：接骨，利关节，止疼痛。用于扭伤。

**四蕊槭**　　红色槭(经济植物手册)，红色木(中国树木分类学)

**Acer tetramerum** Pax

生于海拔 1 400—3 300 米的山坡林中。分布于陕西、甘肃、河南、湖北、四川、西藏。

枝：散风热，清头目。用于头风热胀。

**元宝槭**　　五角枫(东北)，元宝树(河北)，平基槭(经济植物手册)，五脚树(中国树木分类学)，哈图-查干(蒙语)

**Acer truncatum** Bunge

生于海拔 400—1 000 米的山坡丛林中。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、山东、江苏、河南。

根皮：微温。祛风除湿。用于风湿腰背痛。

## 86. 伯乐树科(钟萼木科)　Bretschneideraceae

### 伯乐树属　Bretschneidera Hemsl.

**伯乐树**　　钟萼木(拉汉英种子植物名称)

**Bretschneidera sinensis** Hemsl.

生于低海拔至中海拔山地林中。分布于浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

树皮(伯乐树)：祛风活血。用于筋骨痛。

## 87. 无患子科 Sapindaceae

### 异木患属 Allophyllus L.

**波叶异木患** 三叶茶(广西)

**Allophyllus caudatus** Radlk.

生于林中或灌丛中。分布于广西、云南。

根：用于肝炎，肝硬化腹水，跌打损伤。 全株：祛风除湿，解毒，接骨。用于风湿痹痛，肾炎，水肿，肝炎，骨折。

**异木患** 大果小叶枫(海南)

**Allophyllus viridis** Radlk.

生于低海拔至中海拔的林下或灌丛中。分布于广东、海南。

根、茎、叶：甘，温。通利关节，散瘀活血。用于风湿痹痛，跌打损伤。 叶：用于感冒。

### 倒地铃属 Cardiospermum L.

**倒地铃** 包袱草、风船葛(广州)，鬼灯笼、三角泡(广西)，灯笼草(四川)

**Cardiospermum halicacabum** L.——*C. halicacabum* L. var. *microcarpum* (Kunth) Bl.

生于田野、灌丛、路旁和林缘，也有栽培。分布于东部、南部和西南部，北部少见。

全草：苦、微辛，凉。清热利水，凉血解毒。用于黄疸，淋病，疔疮，脓疱疮，疥疮，蛇咬伤。

### 茶条木属 Delavaya Franch.

**茶条木** 黑枪杆、滇木瓜、米香树(中国植物志)

**Delavaya toxocarpa** Franch.——*D. yunnanensis* Franch.

生于海拔500—2 000米的密林中。分布于广西、云南。

种子油：有毒。用于疥癣。

### 龙眼属 Dimocarpus Lour.

龙眼 圆眼、桂圆(通称)，羊眼果树(中国植物志)

**Dimocarpus longan** Lour.——*Euphoria longan* (Lour.) Steud.

东南部和西南部地区栽培很广，尤以福建最多，广东次之；华南及云南疏林中有呈野生或半野生状态生长。

假种皮(龙眼肉)：甘，温。补益心脾，养血安神。用于失眠健忘。心悸怔忡，慢性出血。月经过多，气血不足，虚劳羸弱。 根(龙眼根)：苦，涩。用于丝虫病，尿浊，带下病。树皮(龙眼树皮)：杀虫、解毒，消肿生肌。用于疳积，疔疮，子痈，疳眼；(烧灰存性)外用于外伤出血。 叶(龙眼叶)：微苦、涩，平。清热利湿，解毒杀虫。用于感冒，泄泻，小便短赤涩痛，痔疮，脚癣，阴囊湿疹，牙痛，睑弦赤烂。 花(龙眼花)：功效与根同，并用于各种淋证。 种子(龙眼核)：涩，平。止血定痛，理气散结，用于疝气，瘿瘤；外用于创伤出血，脚癣，烧、烫伤，疥癣。 果皮(龙眼壳)：甘，温。散邪祛风，聪耳明目。用于心虚头晕，痈疽久不收口，烫、烧伤。

附 注：①龙眼肉为《中华人民共和国药典》1990年版收载。

②国家三级保护植物。

## 赤才属 Erioglossum Bl.

**赤才** 灵树(通称)

**Erioglossum rubiginosum** (Roxb.) Bl.——*Sapindus rubiginosus* Roxb.

生于灌丛或疏林中。分布于广东、海南、广西。云南有栽培。

**根：** 民间作强壮剂。

## 车桑子属(坡柳属) Dodonaea Mill.

**车桑子** 铁扫把、白石楝、明子柴(福建)，坡柳(海南)，明油子(云南)

**Dodonaea viscosa** (L.) Jacq.——*Ptelea viscosa* L.

生于干旱山坡、旷地和海边沙地上。分布于东南部、南部和西南部。

根：消肿解毒。用于牙痛，风毒流注。 叶：淡，平。清热渗湿，消肿解毒。用于小便淋沥，癃闭，肩部漫肿，疮痒疔疖，会阴部肿毒，烫、烧伤。 全株：外用于疮毒，湿疹，瘾疹，皮疹。 花、果实：用于顿咳。

## 栾树属 Koelreuteria Laxm.

**复羽叶栾树** 泡花树(湖北)，花楸树(湖南)，灯笼树(贵州)，风吹果(云南)

**Koelreuteria bipinnata** Franch.

生于海拔400—2 500米的山地疏林中。分布于湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根、花(摇钱树)：微苦，平。 根：消肿止痛，活血，驱虫。用于蛔虫病，肿毒。 花：清肝明目，清热止咳。用于肝火上炎，风热咳嗽。

**全缘叶栾树** 黄山栾树(通称)，山膀光(南京)，圆扎拉、巴拉子(湖南)

**Koelreuteria bipinnata** Franch. var. **integrifoliola** (Merr.) T. Chen——*K. integrifoliola* Merr.

生于海拔 800 米以下的山坡、草地、阔叶林中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、云南。

功效同复羽叶栾树。

附　注：云南用树皮退热。

**栾树**　　五乌拉叶(甘肃)，石栾树(浙江)，黑叶树、木栏牙(河南)，木栾(梦溪笔谈)

**Koelreuterja paniculata** Laxm.

生于海拔 400—1 000 米的山坡杂木林、灌丛中，或栽培。分布于东北、华北、华东、西南及陕西、甘肃。

根皮：苦，寒。清肝明目。用于目痛泪出，目肿赤烂。

## 荔枝属　Litchi Sonn.

**荔枝**　　离枝(上林赋)，元红、丹荔(云南)

**Litchi chinensis Sonn.**——*Nephelium litchi* Camb.

全国东南部、南部、西南部均有栽培，尤以广东、福建南部栽培为多。福建、广东、广西云南有野生。

果实(荔枝)：甘、酸，温。生津止渴，补脾养血，理气止痛。用于烦渴，便血，血崩，脾虚泄泻，病后体虚，胃痛，呃逆；外用于瘰疬溃烂，疔疮肿毒，外伤出血。　种子(荔枝核)：甘、涩，温。散寒，理气，止痛。用于胃气冷痛，疝气痛。子痈，妇人腹中血气刺痛。　根(荔枝根)：微苦、涩，温。用于胃寒胀痛，疝气，遗精，喉痹。　叶(荔枝叶)：用于脚癣，耳后溃疡。　外果皮(荔枝壳)：用于痢疾，血崩，湿疹。

附　注：荔枝核为《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 韶子属　Nephelium L.

**韶子**　　山韶子(桂海虞衡志)，毛荔枝(植物名实图考)，毛召(陆川本草)

**Nephelium chryseum** Bl.

生于海拔 500—1 500 米的密林中。分布于广东、广西、云南；以北回归线为其分布区的北界。

果实(韶子)：酸、甘，温。解毒，散寒，止痢。用于口疮，痢疾，溃疡，心腹冷痛。

**红毛丹**

**Nephelium lappaceum** L.

台湾、广东、云南有栽培。

果皮：收敛。用于痢疾。

## 无患子属　Sapindus L.

**川滇无患子**　　油患子(四川)，打冷冷、菩提子(云南)，皮哨子(滇南本草)

**Sapindus delavayi** (Franch.) Radlk.——*Pancovia delavayi* Franch.

生于海拔 1 200—2 600 米的密林中，也常见栽培。分布于湖北、四川、贵州、云南。陕西、甘肃有栽培。

果皮、种子(皮哨子)：苦，凉。理气止痛，杀虫止痒。 果皮：用于疝气痛。 种子：用于疥癣，头虱。

**无患子** 油罗树、洗手果(通称)，黄目树、目浪树(台湾)，苦患子(海南)

**Sapindus mukorossi** Gaertn.

生于海拔 300—1 000 米的山坡灌丛中。分布于陕西及长江流域以南各省区，各地寺庙、庭园和村边常见栽培。

根：苦，凉。清热解毒，行气止痛。用于风热感冒，咳嗽哮喘，胃痛，尿浊，带下病，乳蛾。 树皮的韧皮：用于白喉，疥癣，疳疮。 嫩枝叶：用于顿咳；外用于蛇咬伤。 果肉：微苦，平。有小毒。清热化痰，行气消积。用于喉痹，心胃气痛，虫积、食积腹痛，毒蛇咬伤，无名肿毒。 种子：苦、微辛，寒。有小毒。清热祛痰，消积杀虫。用于白喉，咽喉肿痛，乳蛾，咳嗽，顿咳，食滞虫积；外用于阴道滴虫。 种仁：辛，平。消积辟恶。用于疳积，蛔虫病，腹中气胀，口臭。

附 注：功效相同的有**毛瓣无患子 S. rarak** DC.，分布于台湾、云南。

**石屏无患子**

**Sapindus rarak** DC. var. **velutina** C. Y. Wu et Y. L. Ming

生于海拔 1 200—1 260 米的疏林中。分布于云南。

根、叶、果实：收敛止痛。

**绒毛无患子** 星月菩提(云南植物志)

**Sapindus tomentosus** Kurz

生于海拔 1 700 米的杂木林中、沟谷旁边。分布于云南。

果实：杀虫，清热燥湿。

## 文冠果属 Xanthoceras Bunge

**文冠果** 温旦革子、文冠木(东北)，木瓜(陕西)，文冠花(救荒本草)

**Xanthoceras sorbifolia** Bunge

生于海拔 800—1 500 米的山坡、沟岸或栽培。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、河南。

木材或枝叶：甘，平。祛风除湿，消肿止痛，收敛。用于风湿关节痛，肿毒痛，黄水疮。

# 88. 七叶树科 Hippocastanaceae

## 七叶树属 Aesculus L.

**滇缅七叶树** 长柄七叶树(中国植物志)

**Aesculus assamica** Griff.

生于海拔 1 000—1 500 米的阔叶林中。分布于广西、云南。

果实：理气止痛，调经活血。用于胃痛，月经不调。

**七叶树**　　梭椤子(陕西)，开心果(江苏)，栃椤树(河南)，婆罗树(本草纲目拾遗)

**Aesculus chinensis** Bunge

生于低山谷地或路旁，常见栽培于村旁或庭园。河北、山西、陕西、河南有栽培，仅秦岭有野生。

种子(婆罗子)：甘，温。理气宽中，和胃止痛。用于肝胃气痛，脘腹胀满，经前腹痛，乳胀，疳积虫痛，痢疾。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。　② 功效相似的有**日本七叶树** **A. turbinata** Bl.，青岛、南京、上海有栽培。

**浙江七叶树**　　浙江天师栗(全国中草药汇编)

**Aesculus chinensis** Bunge var. **chekiangensis** (Hu et Fang) Fang——*A. chekiangensis* Hu et Fang

生于低海拔的丛林中，常见栽培。分布于浙江、江苏。

功效同七叶树。果实：作"婆罗子"入药。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**欧洲七叶树**

**Aesculus hippocastanum** L.

上海、青岛等城市有引种栽培。

花、果实、叶：用于胃病，风湿病。　种子：用于痔疮，崩漏，骨折。

**云南七叶树**　　阴阳果(云南)

**Aesculus wangii** Hu ex Fang

生于海拔 900—1 500 米的林中。分布于贵州、云南东南部。

果实(阴阳果)：甘，温。理气宽中，利湿消肿，杀虫。用于蛔积，痢疾，腹痛，乳房肿痛。

**天师栗**　　猴板栗、梭椤树(中国树木分类学)

**Aesculus wilsonii** Rehd.

生于海拔 1 000—1 800 米的阔叶林中。分布于陕西、江西、河南、湖北、湖南、广东、四川、贵州、云南。

功效同七叶树。种子作"婆罗子"入药。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 89. 清风藤科　Sabiaceae

### 泡花树属　Meliosma Bl.

**泡花树**　　降龙木(陕西中草药)，龙须木、黑木(中国树木分类学)

**Meliosma cuneifolia** Franch.

生于海拔 650—3 300 米的山坡或沟边灌丛中。分布于西南及陕西、甘肃、宁夏、河南、

湖北。

根皮(灵寿茨)：甘、微辛，平。清热解毒，利水镇痛。用于无名肿毒，毒蛇咬伤，膨胀水肿。

附　注：功效相同的有**光叶泡花树 M. cuneifolia** Franch. var. **glabriuscula** Cufod.，分布于四川、云南。

**垂枝泡花树**　　紫珠草(湖南)，大毛青杠(贵州)

**Meliosma flexuosa** Pamp.

生于海拔 600—2 750 米的密林或路旁。分布于陕西、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、广东、贵州。

树皮、叶：止血，活血，止痛，清热，解毒。用于热毒肿痛，瘀血疼痛，出血。

**香皮树**

**Meliosma fordii** Hemsl.

生于海拔 1 000 米以下的热带、亚热带常绿林中。分布于江西、福建、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南。

树皮、叶：滑肠通便。用于便秘。

**贵州泡花树**

**Meliosma henryi** Diels

生于海拔 700—1 400 米的常绿阔叶林中。分布于湖北、广西、四川、贵州、云南。

树皮：清热解毒，消肿止痛，祛风除湿。用于疮疡肿毒，风湿肿痛。

**多花泡花树**　　山东泡花树(山东)，青风树(湖南)

**Meliosma myriantha** Sieb. et Zucc.

生于荒地林缘。分布于山东、江苏、湖南。

根皮：利水，解毒。用于水肿，小便淋痛，热毒肿痛。

**红枝柴**　　羽叶泡花树(安徽)

**Meliosma oldhami** Miq ——*M. sinensis* Nakai

生于海拔 300—1 300 米的山坡、山谷林中。分布于陕西、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、广东、广西、贵州。

根皮：利水解毒。

**腺毛泡花树**

**Meliosma oldhami** Miq. var. **glandulifera** Cufod.

生于海拔 1 200—1 900 米的山地林间。分布于安徽、江西、湖南、广西。

根皮：利水解毒。

**细花泡花树**

**Meliosma parviflora** Lec

生于海拔 100—900 米的溪边丛林中。分布于江苏、浙江、湖北、四川。

树皮：利水解毒，消肿。

**笔罗子**

**Meliosma rigida** Sieb. et Zucc.

生于海拔 1 500 米以下的阔叶林中。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广

东、广西、贵州、云南。

根皮(笔罗子): 酸,平。解毒,利水,消肿。用于感冒咳嗽,水肿腹胀, 无名肿毒, 蛇咬伤。

**云南泡花树**　　峨眉泡花树(四川)

**Meliosma yunnanensis** Franch ——*M. simplicifolia* (Roxb.) Walp. subsp. *yunnanensis* (Franch.) Beus

生于海拔 1 000—3 000 米的混交林、常绿阔叶林中。分布于西南。

树皮: 清热解毒。

**山楝叶泡花树**　　罗壳木(海南)

**Meliosma thorelii** Lec. ——*M. buchananifolia* Merr.

生于海拔 200—1 000 米的林间。分布于福建、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根、枝、叶: 祛风除湿,消肿止痛。用于风湿骨痛,跌打劳伤,腰膝疼痛。

## 清风藤属　Sabia Colebr.

**平伐清风藤**　　云雾清风藤(贵州)

**Sabia dielsii** Lévl. ——*S. brevipetiolata* L. Chen

生于海拔 800—2 000 米的山坡、溪旁灌丛中或林缘。分布于广西、贵州、云南。

全株: 祛风湿,止痛。用于风湿关节痛。

**灰背清风藤**　　腰痛灵、风藤、叶上果(贵州)

**Sabia discolor** Dunn

生于海拔 1 000 米以下的山地灌丛中。分布于浙江、江西、福建、广东、广西、贵州。

根、枝: 祛风除湿,止痛。用于风湿骨痛,跌打劳伤,肝炎。

**凹萼清风藤**　　凹叶清风藤(中国植物志)

**Sabia emarginata** Lec.

生于海拔 400—1 500 米的灌丛中。分布于湖北、湖南、广西、四川、贵州。

全株: 祛风,除湿,止痛。用于风湿关节痛。

**簇花清风藤**

**Sabia facciculata** Lec. ex L. Chen

生于海拔 600—1 000 米的山岩、山谷及山坡林中。分布于福建、广东、广西、云南。

全株(小发散): 甘、微涩,温。祛风除湿,散瘀消肿。用于产后恶露不尽, 肾炎水肿, 跌打损伤,风湿骨痛。

**清风藤**　　寻风藤(本草纲目)

**Sabia japonica** Maxim.

生于海拔 800 米以下的山谷、林缘及灌丛中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、广东、广西。

茎藤(清风藤): 苦,平。祛风湿,利小便。用于风湿痹痛,鹤膝风,水肿。

附　注: 功效相同的有**鄂西清风藤 S. campanulata** Wall. ex Roxb. subsp **ritchieae** (Rehd. et Wils.) Y. F. Wu, 分布于陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、福建、湖北

湖南、广东、四川、贵州；**小花清风藤 S. parviflora** Wall.ex Roxb.，分布于广西、贵州、云南。

**柠檬清风藤**

**Sabia limoniacea** Wall.

生于海拔 800—1 300 米的密林中。分布于海南、广西、云南。

茎：祛风湿。用于风湿痹痛。

**四川清风藤**　　女儿藤、青木香(中国高等植物图鉴)

**Sabia schumanniana** Diels

生于海拔 1 200—1 600 米的山坡灌丛中。分布于陕西、甘肃、湖北、四川、贵州、云南。

根、茎(钻石风)：辛，温。止咳化痰，祛风活血。用于咳嗽，关节风湿痛。

附　注：功效相同的有**多花清风藤 S. schumanniana** Diels subsp. **pluriflora** (Rehd. et Wils.) Y. F. Wu，分布于湖北、四川；**两色清风藤 S. schumanniana** Diels subsp. **plurflora** (Rehd. et Wils.) Y. F. Wu var. **bicolor** (L. Chen) Y. F. Wu，分布于四川、贵州、云南。

**尖叶清风藤**

**Sabia swinhoei** Hemsl. ex Forb. et Hemsl.

生于海拔 400—2 300 米的山谷林中。分布于江苏、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州。

全株：除风湿，止痹痛。活血化瘀，舒筋活络。用于风湿关节痛，筋骨不利。

**云南清风藤**

**Sabia yunnanensis** Franch.

生于海拔 2 000—3 600 米的山谷、溪边疏林中。分布于云南西北部至中部。

根皮、叶(羊肌藤)：苦，寒。有小毒。祛风除湿，止痛。用于风湿瘫痪，腰痛，胃痛，皮肤疮毒，毒蛇咬伤。

附　注：功效相同的有**阔叶清风藤 S. yunnanensis** Franch. subsp. **latifolia** (Rehd. et Wils.) Y. F. Wu，分布江西、四川、贵州。

## 90. 凤仙花科　Balsaminaceae

### 凤仙花属　Impatiens L.

**大叶凤仙花**　　山泽兰(广西苍梧)

**Impatiens apalophylla** Hook. f.

生于林下潮湿处或小溪旁。分布于广西、云南、西藏。

全草：散瘀，通经。

**锐齿凤仙花**　　山金凤、接骨木(云南)

**Impatiens arguta** Hook. f. et Thoms.——*I. arguta* Hook. f. et Thoms. var. *bulleyana* Hook. f.

生于林下或山谷水边。分布于云南、西藏。

花：甘，温。通经活血，利尿。用于经闭腹痛，产后瘀血不尽，胎死腹中，小便淋痛，疔毒痈疽。

**凤仙花**　指甲花(通称)

**Impatiens balsamina** L.

全国各地普遍栽培。

种子(急性子)：微苦、辛，温。有小毒。破血，软坚，消积。用于经闭，难产，骨哽咽喉，肿块积聚。根(凤仙花根)：苦、甘、辛，平。有小毒。活血消肿。用于风湿筋骨痛，跌打肿痛，骨哽咽喉。花(凤仙花)：甘、微苦，温。祛风，活血，消肿止痛。用于经闭，跌打损伤，瘀血肿痛，风湿关节痛，痈疖疔疮，蛇咬伤，手癣。全草(凤仙透骨草)：辛、苦，温。有小毒。祛风，活血，消肿，止痛。用于风湿关节痛，屈伸不利；外用于疮疡肿毒，跌打损伤，瘀血肿痛，瘰疬。

附　注：①急性子为《中华人民共和国药典》1990年版收载。② 花功效相同的有**短距凤仙花 I. brachycentra** Kar. et Kir.；**小花凤仙花 I. parviflora** DC.，均分布于新疆北部。③ 全草功效相同的有**类鸭趾草凤仙花 I. commellinoides** Hand.-Mazz.，分布于浙江、福建、湖南、广东；**白花凤仙花 I. wilsonii** Hook. f.，分布于四川峨眉山。

**睫萼凤仙花**　透明麻(湖北)

**Impatiens blepharosepala** Pritz. ex Diels

生于山谷、路旁、草丛中、沟边及林缘。分布于江西、湖北、湖南、贵州。

根：用于贫血，外伤出血。

**华凤仙**　入冬雪、水凤仙、水指甲、象鼻花(全国中草药汇编)

**Impatiens chinensis** L.

生于沟谷边和沼泽地。分布于浙江、江西、福建、广东、海南、广西、云南。

全草(水边指甲花)：苦、辛，平。清热解毒，活血散瘀，消肿拔脓。用于肺痨，颜面及喉头肿痛，热痢，蛇头指疔，痈疮肿毒。

**棒凤仙**

**Impatiens claviger** Hook. f.

生于海拔1 000—1 800米的山坡林中。分布于广西、云南。

叶：用于热疮，痈疮肿毒。

**蓝花凤仙花**

**Impatiens cyanatha** Hook. f.

生于山谷阴湿处。分布于贵州、云南。

全草(凤仙花)：舒筋活络。用于跌打肿痛，蛇咬伤。

附　注：功效相同的有**毛凤仙花 I. lasiophyton** Hook. f.，分布于广西、贵州、云南；**路南凤仙花 I. loulanensis** Hook. f.，分布于贵州、云南。

**牯岭凤仙花**　黄凤仙花(中药大辞典)

**Impatiens davidii** Franch.

生于沟边草丛中或山谷阴湿处。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南。

根、全草(岩指甲花)：辛，温。消积止痛。用于腹痛，小儿疳积，无名肿毒。

附　注：福建民间用于牙龈溃烂。

**耳叶凤仙花**

**mpatiens delavayi** Franch.

多生于房屋后边。分布于四川、云南、西藏。

种子、茎：祛风除湿，止痛。

**齿萼凤仙花**

**Impatiens dicentra** Franch.

生于草丛中。分布于陕西、湖北、湖南、贵州。

种子：活血散瘀，利尿解毒。

**神农架凤仙花**

**Impatiens henryi** Pritz ex Diels

生于山坡湿地。分布于湖北神农架。

全草：用于风湿痛。

**同距凤仙花**

**Impatiens holocentra** Hand.-Mazz.

多生于房前屋后。分布于四川、贵州、云南。

根：祛风止痛，利湿解毒。用于毒蛇咬伤。

**细柄凤仙花**　　冷水七(湖北)，红冷草(湖南)，劳伤药(贵州)

**Impatiens leplocaulon** Hook. f.

生于山谷阴湿处或山坡草地水边。分布于湖北、湖南、四川、贵州、云南。

全草：理气活血，舒筋活络。用于风湿麻木，跌打损伤。

**长翼凤仙花**

**Impatiens longialata** Pritz. ex Diels

生于山谷沟边。分布于湖北、四川。

全草：活血调经，舒筋活络。

**小距凤仙**　　水指甲(贵州)，短距凤仙花(中药大辞典)

**Impatiens microcentra** Hand.-Mazz.

生于海拔 3 275—3 300 米的水边。分布于贵州、云南。

根(肉爬皂)：辛，寒。解热止痛。用于筋骨痛，咽喉痛。

**水金凤**　　辉菜花(中国高等植物图鉴)

**Impatiens noli-tangere** L.

生于山坡林下、林缘草地或水沟边。分布于东北、华北及陕西、山东、浙江、河南、湖北、湖南、四川、云南。

根、全草：甘，温。活血调经，舒筋活络。用于月经不调，痛经，跌打损伤，风湿痛，阴囊湿疹。

**丰满凤仙花**

**Impatiens obesa** Hook. f.

生于林下水沟旁。分布于广西。

全草：拔毒消肿。用于跌打损伤，痈疮肿毒。

附　注：广西特有药用植物。

**峨眉凤仙花**

**Impatiens omeiana** Hook. f.

生于荒山沟边潮湿处。分布于四川中部及西部。

根：祛风除湿，止痛。

附　注：四川特有药用植物。

**块节凤仙花**　　万年灺、串铃、小洋芋(贵州)，松林凤仙花(云南种子植物名录)

**Impatiens pinfanensis** Hook. f.

生于海拔 2 100—2 400 米的山坡林下阴湿处。分布于四川、贵州、云南。

块茎：辛，温。祛瘀止痛，祛风除湿。用于风寒感冒，风湿骨痛，经闭，乳蛾，骨折。

**冷水七**　　红苋、一口血、霸王七、止痛丹(湖北)

**Impatiens pritzelii** Hook. f. var. **hupehensis** Hook. f.

生于海拔 400—1 600 米的山坡林下阴湿处或草丛中。分布于湖北、四川。

根状茎(冷水七)：辛、甘，凉。祛风除湿，散瘀消肿，止痛止血，清热解毒。用于风湿痛，四肢麻木，关节肿大，腹痛，食积腹胀，泄泻，月经不调，痛经，痢疾。

**翼萼凤仙花**　　冷水丹、水牛膝、金牛膝、冷子草、蹦蹦子(湖北)

**Impatiens pterosepala** Pritz. ex Diels

生于山坡灌丛中或林下阴湿地。分布于陕西、湖北、四川。

全草：用于跌打损伤。

**弯距凤仙花**　　天芝麻(湖北)

**Impatiens recurvicornis** Maxim

生于山谷湿地或沟边。分布于湖北。

全草：用于肾虚。

附　注：湖北特有药用植物。

**黄金凤**　　野牛膝(湖北)，纽子七(四川)，岩胡椒(贵州)

**Impatiens siculifer** Hook. f.

生于河边草丛中或林下阴湿处。分布于江西、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

根、全草、种子(黄金凤)：祛瘀消肿，清热解毒，活血止痛。用于跌打损伤，风湿麻木，劳伤，风湿骨痛，痈肿，烧、烫伤。

**野凤仙花**　　假凤仙花、假指甲花(陆川本草)

**Impatiens textori** Miq.

生于山沟溪流处。分布于东北至西南。

块根(霸王七)：辛、苦，凉。祛瘀消肿，解毒。用于跌打损伤，痈疮。　全草：苦，寒。清凉，解毒，祛腐。用于恶疮溃疡。

附　注：功效相同的有**窄萼凤仙花 I. stenosepala** Pritz. ex Diels，分布于山西、陕西、甘肃、河南、湖北、湖南、四川、贵州。

**天全凤仙花**

**Impatiens tienchuanensis** Y. L. Chen

生于房屋后边。分布于四川。

茎、种子：祛风除湿，止痛。

附　注：四川特有药用植物。

**滇水金凤**

**Impatiens uliginosa** Franch.

生于海拔 1 750—2 500 米的山坡林下。分布于贵州、云南中部和西北部。

根、全草：甘，温。活血调经，舒筋活络。用于月经不调，痛经，跌打损伤，风湿痛，阴囊湿疹。

## 91. 冬青科　Aquifoliaceae

### 冬青属　Ilex L.

**满树星**　　鼠李冬青、天星木(全国中草药汇编)，白杆根、青心木(中国油脂植物)

**Ilex aculeolata** Nakai

生于疏林中。分布于江西、福建、湖南、广东、广西。

根皮(满树星)：微苦、甘，凉。清热解毒，止咳化痰。用于感冒咳嗽，烧、烫伤、牙痛。

**梭枝冬青**　　山绿茶(广西)

**Ilex angulata** Merr. et Chun

生于山坡或山脚的灌丛中。分布于广东、海南、广西。

叶(山绿茶)：清热解毒，降脂浊，消肿，通经活络。用于高血压症，血脂增高，口疮，疖肿，咽喉痛，附件炎。

附　注："山绿茶"为广西民间常用的中草药，在当地作"山绿茶"用的有**海南冬青 I. hainanensis** Merr.，分布于海南、广西、四川、贵州；**滇桂冬青**(黔越冬青) **I. stewardii** S. Y. Hu，分布于广东、广西、贵州、云南；**茶果冬青 I. theicarpa** Hand.-Mazz.，分布于华南及江西、福建、贵州。

**梅叶冬青**　　红军草、订称仔(福建)

**Ilex asprella** (Hook. et Arn.) Champ. ex Benth. ——*Prinos asprella* Hook. et Arn.

生于低山坡、丘陵坡地、疏林下或山地灌丛中。分布于华东及华南。

根、叶(岗梅)：苦、甘，凉。清热解毒，生津止渴。用于感冒，肺痈，乳蛾，咽喉肿痛，淋浊，风火牙痛，瘰疬，痈疽疔疖，过敏性皮炎，痔血，蛇咬伤，跌打损伤。

**刺叶冬青**　　苗栗冬青(广西)，耗子刺、台湾冬青(云南种子植物名录)

**Ilex bioritsensis** Hayata

生于林中或灌丛中。分布于西南及台湾。

根、枝、叶：滋阴，补肾，清热，止血，活血。

**华中冬青**　　针齿冬青(湖北)

**Ilex centrochinensis** S. Y. Hu

生于山坡、沟边或林下。分布于陕西南部、湖北、四川、云南。

根、叶：祛风除湿。用于风湿关节痛。

**珊瑚冬青**　野枇杷、白蜡叶、红果冬青(全国中草药汇编)

**Ilex corallina** Franch. ——*I. corallina* Franch. var. *pubesc-ens* S. Y. Hu

生于山坡林缘或疏林中。分布于西南及甘肃、湖北、湖南。

根、叶：甘，凉。清热解毒，活血止痛。用于烧、烫伤，劳伤痛，黄癣。

**枸骨**　功劳叶(江苏)，圣诞树(福建)，老虎刺、鸟不宿、八角刺(云南)，猫儿刺(本草纲目)

**Ilex cornuta** Lindl.

生于山坡、谷地、溪边杂木林或灌丛中。分布于长江中下游及陕西、河南。

根(枸骨根)：苦，寒。补肝肾，清风热。用于风湿关节痛，腰肌劳损，头痛，牙痛，黄疸。叶(枸骨叶)：苦，凉。补肝肾，养气血，祛风湿。用于肺痨潮热，咳嗽咯血，头晕耳鸣，腰酸脚软，白癜风。果实(枸骨子)：滋阴，益精，活络。用于阴虚身热，淋浊，崩漏，带下，筋骨痛，白带过多。

附　注：①枸骨叶为《中华人民共和国药典》1990 年版收载。② **双核冬青 I. dipyrena** Wall.，分布于四川、云南、西藏，叶在西藏作枸骨叶药用。

**黄毛冬青**　苦莲奴(福建)

**Ilex dasyphylla** Merr.

生于海拔 450 米以下的常绿杂木林中。分布于江西、福建、湖南、广东、广西、云南。

根：苦，寒。清热解毒。用于无名肿毒。

**长柄冬青**

**Ilex dolichopoda** Merr. et Chun

生于灌丛或林中。分布于广东、海南、广西。

枝、叶：外用于痔瘘。

**榕叶冬青**　仿蜡树(广东)

**Ilex ficoidea** Hemsl.

生于山林或灌丛中。分布于长江流域以南及台湾。

根：解毒，消肿止痛。用于肝炎，跌打损伤。

**薄叶冬青**　高山冬青(拉汉英种子植物名称)

**Ilex fragilis** Hook. f.

生于海拔 2 200—3 100 米的阔叶林下。分布于西南。

根、叶：清热解毒。用于烧、烫伤。

**康定冬青**　黑皮紫皮(云南)，山枇杷(中国高等植物图鉴)，川鄂冬青(拉汉英种子植物名称)

**Ilex franchetiana** Loes.

生于疏林中。分布于西南及湖北、湖南、广西。

叶(山枇杷)：涩，平。降气平喘，敛肺止咳。用于久咳气喘，咳痰带血。

**长叶冬青**　长叶枸骨(云南种子植物名录)

**Ilex georgei** Comb.

生于海拔 1 650—2 900 米的疏林或灌丛中。分布于四川、云南。

树皮：作黄连制剂的代用品。

附　注：功效相同的有**皱叶冬青 I. perryana** S. Y. Hu，分布于云南。

**伞花冬青**　　米碎木(海南植物志)

**Ilex godajam** (Colebr.) Wall. ——*Prinos godajam* Colebr. ex Wall.

生于林中。分布于广东、海南、广西、云南。

树皮(米碎木)：驱虫，止痛。用于腹痛，蛔虫病。

**无毛短梗冬青**

**Ilex hylonoma** Hu et Tang var. **glabra** S. Y. Hu

生于山坡灌丛中。分布于浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

叶：用于跌打损伤。

**苦丁茶冬青**

**Ilex kudingcha** C. J. Tseng

生于林缘或疏林中。分布于广东、广西。

**叶**(苦灯茶)：苦、甘，凉。清热解毒，祛暑。用于头痛，齿痛，目赤，热病烦渴，痢疾。

附　注：本种为广西"甘和茶"的主要原料。

**广东冬青**

**Ilex kwangtungensis** Merr.

生于山坡灌丛中。分布于浙江、江西、福建、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根、叶：清热解毒，消肿止痛。

**大叶冬青**

**Ilex latifolia** Thunb.

生于山林中、山谷溪边。分布于华东及河南、湖北。

叶(苦丁茶)：苦、甘，寒。清热解毒，清头目，除烦渴，止泻。用于头痛，齿痛，目赤，热病烦渴，痢疾。

**大果冬青**　　臭樟树、青刺香(云南)

**Ilex macrocarpa** Oliv.

生于山麓坡地、疏林中或林缘。分布于华东、中南及西南。

根、枝、叶：清热解毒，消肿止痒，祛瘀。用于遗精，月经不调，崩漏。

附　注：功效相同的有**长梗大果冬青 I. macrocarpa** Oliv. var. **longipedunculata S. Y. Hu**，分布于江苏、安徽、浙江、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

**河滩冬青**　　柳叶冬青(湖北)

**Ilex metabaptista** Loes. ex Diels

生于山坡、溪边或灌丛中。分布于湖北、广西、四川、贵州、云南。

根：祛风除湿。用于风湿痛。　叶：止血。

**小果冬青**

**Ilex micrococca** Maxim

生于山坡灌丛中。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、贵州。

根、叶：清热解毒，消肿止痛。

**毛梗小果冬青**　　绿姑妮树、绿樱桃、小红果(云南)，猪肚木(傣语)

**Ilex micrococca** Maxim. f. **pilosa** S. Y. Hu

生于海拔(800—)1 300—1 900 米的阔叶林或杂木林中。分布于湖北、广东、广西、四川、贵州、云南。

树皮：止痛。

**具柄冬青**　落霜红(广西)

**Ilex pedunculosa** Miq.

生于海拔 750—2 000 米的山坡林中或灌丛中。分布于陕西、安徽、浙江、江西、福建、台湾、河南、湖北、湖南、广西、四川、贵州。

树皮(一口血)：苦，凉。活血止血，清热解毒。用于痢疾，痔疮出血，外伤出血。

**猫儿刺**　雀不站(贵州)

**Ilex pernyi** Franch

生于海拔 2 000 米以下的山坡疏林中。分布于陕西、甘肃、安徽、江西、福建、湖北、四川、贵州、云南。

根(老鼠刺)：苦，寒。清热解毒，润肺止咳。用于带下病，遗精，头痛，牙痛，耳鸣，中耳炎，目赤。

**多脉冬青**　青皮树(云南)

**Ilex polyneura** (Hand-Mazz.) S. Y. Hu ——*I. micrococca* Maxim. var. *polyneura* Hand.-Mazz.

生于海拔 1 260—2 600 米的林中或灌丛中。分布于四川、贵州、云南。

树皮：止痛。

**毛冬青**　细叶青(浙江)，茶叶冬青(广东)，喉毒药、六月霜(广西)，水火药(新编中医学概要)

**Ilex pubescens** Hook. et Arn

生于山坡灌丛中。分布于长江流域以南各地及台湾。

根(毛冬青)：甘、苦，凉。清热凉血，通脉止痛，消肿解毒。用于风热感冒，肺热喘咳，喉头肿，乳蛾，痢疾，胸痹，中心性视网膜炎，疮疡。叶(毛冬青叶)：苦、涩，平。清热解毒，止痛消炎。用于牙龈肿痛，疖痈，缠腰火丹，脓疱疮、烧、烫伤。

附　注：功效相同的有**罗浮冬青 I. lohfouensis** Merr.，分布于安徽、浙江、江西、福建、湖南、广东、广西；**秃毛冬青 I. pubescens** Hook et Arn. var. **glaber** Chang. 分布于南部各省区。

**广西毛冬青**

**Ilex pubescens** Hook. et Arn. var. **kwangsiensis** Hand.-Mazz.

生于海拔 550—1 410 米的林中。分布于广西、贵州、云南。

根、叶：苦，寒。凉血止血，清热解毒。用于烧、烫伤，咽喉痛，口疮，脱疽，胸痹心痛。

**冬青**　冻青、万年枝(陕西)，油叶树(湖南)，鸡眼睛、顶树子(广东)，红冬青(四川)

**Ilex purpurea** Hassak.

生于山坡杂木林中、林缘。分布于长江流域以南各地及陕西。

根皮、树皮(冬青皮)：甘、苦、凉。生血，补益肌肤。用于烧、烫伤。叶(四季青)：苦、涩，寒。凉血止血。用于烧、烫伤，溃疡久不愈合，脱疽，咳嗽，小便淋痛，痢疾，外伤出血，冻疮，皮肤皲裂。果实(冬青子)：甘、苦，凉。祛风，补虚。用于风湿痹痛，痔疮。

**铁冬青**　山熊胆、白银香(福建)

**Ilex rotunda** Thunb.

生于山坡疏林中、河边或丘陵地带。分布于长江流域以南至台湾

茎皮、叶、根(救必应)：苦，凉。清热解毒，消肿止痛。用于吐泻，胃痛，中暑腹痛，痢疾，胆囊炎，胰腺炎，水肿，感冒发热，风湿关节痛，滴虫病，烧、烫伤，毒蛇咬伤，疮肿，无名肿毒，跌打损伤，关节扭伤。

附　注：功效相同的有**毛铁冬青 I. rotunda** Thunb. var. **microcarpa** (Lindl. et Paxt.) S. Y. Hu，分布于长江流域以南各省区；**四川冬青 I. szechwanensis** Loes.，分布于中南、西南及陕西、安徽。

**落霜红**　猫秋子草、毛仔树(全国中草药汇编)

**Ilex serrata** Thunb.

生于山间丛林中。分布于浙江、福建、江西、湖北。

根皮、叶：甘、苦，凉。清热解毒，凉血止血。用于烧、烫伤，创伤出血，疮疖溃疡，肺痈。

**香冬青**

**Ilex suaveolens** (Lévl.) Loes. ——*Celastrus suaveolens* Lévl.

生于海拔 1 000 米以下的山坡灌丛中。分布于长江流域以南各省区。

根：用于劳伤身痛。

**亮叶冬青**　绿冬青(福建)，细叶三花冬青(海南植物志)

**Ilex viridis** Champ. ex Benth. ——*I. triflora* Bl. var. *viridis* (Champ. ex Benth.) Loes.

生于山坡疏林或灌丛中。分布于华东及广东、广西。

根、叶：甘、微辛，凉。凉血解毒，祛腐生新。根：用于关节痛。叶：用于烧、烫伤，创伤出血。

**尾叶冬青**　江南冬青(云南)

**Ilex wilsonii** Loes.

生于山坡灌丛中。分布于长江流域以南及陕西、台湾。

根、叶：清热解毒，消肿止痛。

**云南冬青**

**Ilex yunnanensis Franch.**

生于山坡灌丛中。分布于西南及陕西、甘肃、湖北。

根、叶：清热解毒。用于烧、烫伤。

## 92. 卫矛科　Celastraceae

### 巧茶属　Catha Benth.

**巧茶**

**Catha edulis** Forssk

原产埃塞俄比亚至非洲南部。海南、广西、云南有栽培。

叶(巧茶): 清解解毒,提神,止渴。

## 南蛇藤属 Celastrus L.

**过山枫**

**Celastrus aculeatus** Merr.

生于海拔100—1 000米的山坡路旁、疏林或灌丛中。分布于浙江、江西、福建、广东、广西、云南。

根皮(过山枫): 用于白血病,风湿痹症,痛风,水肿,胆囊炎,高血压症。

**苦皮藤** 苦树皮、菜药(陕西),马断肠(甘肃、浙江), 南蛇根(湖北), 老虎麻藤(四川、贵州),吊杆麻(贵州)

**Celastrus angulatus** Maxim.

生于海拔600—1 500米的荒坡或灌丛中。分布于华东、中南、西南及陕西、甘肃。

根或根皮(吊干麻): 辛、苦,凉。有小毒。清热解毒,消肿,杀虫,透疹,调经, 舒筋活络。 根: 用于风湿痛,劳伤。 根皮或茎皮: 用于秃疮,黄水疮,头虱,跌打损伤。

**刺苞南蛇藤** 爬山虎(东北),刺南蛇藤(新华本草纲要)

**Celastrus flagellaris** Rupr.

生于旷野林下、河边、石坡上。分布于东北及河北、山东、浙江。

根、茎、果实: 甘,平。祛风除湿,活血止痛。用于风湿关节痛,跌打损伤,无名肿毒。

**哥兰叶** 穿山龙(福建),胎小科(贵州苗语),山货椰、白花藤(云南), 霜红藤(中国高等植物图鉴)

**Celastrus gemmatus** Loes

生于山坡灌丛及树林内。分布于华东(除山东)、中南及陕西、甘肃、四川、贵州、云南。

根、茎、叶(霜红藤): 苦、辛,温。祛风湿,行气血,壮筋骨,消痈肿。用于风湿关节痛,腰腿痛,胃痛,疝气,经闭,月经不调,儿枕,产后瘀血,癥瘕,缠腰火丹, 痈肿疔疮, 跌打损伤,骨折。

**皱脉灰叶南蛇藤** 南蛇藤(贵州),皱叶南蛇藤(西藏植物名录)

**Celastrus glaucophyllus** Rehd. et Wils. var. **rugosus** (Rehd et Wils.) C Y. Wu et T. C. Kao ——*C. rugosus* Rehd. et Wils.

生于海拔1 700—2 700米的山坡阔叶林或灌丛中。分布于西南及甘肃、湖北、广西。

根: 用于癥瘕,风湿疹,劳伤。

**青江藤** 勾弄杉(广西壮语)

**Celastrus hindsii** Benth.

生于海拔1 000—1 500米的山地林下。分布于江西、福建、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根: 通经,利尿。 根皮: 用于毒蛇咬伤,肿毒。 叶: 清热解毒。

**粉背南蛇藤** 绵藤(中国树木分类学),麻妹条(贵州草药),来阿片(苗语)

**Celastrus hypoleucus** (Oliv.) Warb. ——*Erythrospermum hypole-ucum* Oliv.

生于山地丛林中。分布于中南及陕西、甘肃、安徽、浙江、四川、贵州、云南。

根、叶(绵藤)：辛，平。化瘀消肿，止血生肌。用于跌打损伤，刀伤。

**圆叶南蛇藤**　　称星蛇(通称)，双虎排牙(广东)，过山枫、铁包金(广西)

**Celastrus kusanoi** Hayata

生于山坡林下。分布于福建、台湾、广东、海南、广西。

根(称星蛇)：微甘，平。宣肺化痰，止咳，解毒。用于咽喉痛，肺痨，跌打损伤，骨折。

**独籽藤**　　岩风、单籽南蛇藤(海南植物志)

**Celastrus monospermus** Roxb.

生于海拔 240—1 900 米的森林中。分布于华南及福建、云南。

种子：催吐。

**南蛇藤**　　青藤、明开夜合(东北、河北、山东、山西)，苦树皮、降龙草(江苏)，七寸麻(湖北)

**Celastrus orbiculatus** Thunb.

生于山沟灌丛中。分布于东北、华北、西北、华东至西南。

根(南蛇藤根)：微辛，温。祛风除湿，行气散血，消肿解毒。用于跌打损伤，风湿痹痛，瘕症，呕吐，腹痛，经闭，缠腰火丹，肿毒，毒蛇咬伤。　茎藤(南蛇藤)：微辛，温。祛风湿，活血脉。用于筋骨痛，四肢麻木，小儿惊风，瘕症，痢疾。　叶(南蛇藤叶)：用于湿疹，痈疖，毒蛇咬伤。

附　注：功效相同的有**滇边南蛇藤 C. hookeri** Prain.，分布于云南、西藏；**窄叶南蛇藤 C. oblanceifolius** Wang et Tsoong，分布于安徽、浙江、江西、湖南、广东、广西；**丛花南蛇藤 C. rosthornianus** Loes. var. **loeseneri** (Rehd. et Wils.) C. Y. Wu，分布于中南及陕西、甘肃、四川、贵州、云南。

**楔叶南蛇藤**

**Celastrus orbiculatus** Thunb. var. **cancatus** (Rehd. et Wils.) Wuzhi

生于山坡灌丛中。分布于湖北。

根：用于风湿关节痛，跌打损伤，经闭。　果实：用于心悸，失眠，健忘。

**灯油藤**　　打油果(云南)，滇南蛇藤(中国树木分类学)，锥序南蛇藤(中国高等植物图鉴)

**Celastrus paniculatus** Willd.

生于低山林中或村旁灌丛中。分布于福建、台湾、广东、广西、贵州、云南、西藏。

种子(灯油藤)：缓泻，催吐，提神，祛风湿，止痹痛。用于风湿痹痛。

**多花毛叶灯油藤**

**Celastrus paniculatus** Willd. subsp. multiflorus (Roxb.) D. Hou——*C. multiflorus* Roxb.

生于 600—1 500 米的村缘灌丛中。分布于云南。

种子：催吐。

**短梗南蛇藤**　　白花藤、大藤菜(云南)，黄绳儿(中国高等植物图鉴)

**Celastrus rosthornianus** Loes.

生于山间丛林或路旁。分布于中南、西南及陕西、甘肃、安徽、浙江、福建、台湾。

根、根皮(黄绳儿)：苦，凉。清热解毒，消肿。 根：用于筋骨痛，扭伤，胃痛，经闭，月经不调，牙痛，失眠，无名肿毒。 根皮：用于蛇咬伤，肿毒。

**显柱南蛇藤** 山货椰、茎花南蛇藤(新华本草纲要)。

**Celastrus stylosus** Wall. ——*C. stylosus* Wall. subsp. *glaber* D. Hou

生于海拔1 000—2 500米的山坡林中。分布于西南及安徽、江西、湖北、湖南、广东、广西。

茎(山货椰)：酸，平。有小毒。祛风消肿，舒筋活络，解毒。用于脱疽，尿急腰痛，跌打损伤。

## 十齿花属(十萼花属) Dipentodon Dunn

**十齿花** 十萼花(中国种子植物科属辞典)

**Dipentodon sinicus** Dunn

生于山坡疏林中。分布于广西、贵州、云南、西藏墨脱。

全株：止痛，消炎。

附 注：国家二级保护植物。

## 卫矛属 Euonymus L.

**刺果卫矛** 硬筋藤、扣子花(贵州)，藤杜仲、刺果藤杜仲(云南)

**Euonymus acanthocarpus** Franch.

生于丛林、山谷、溪边阴湿处。分布于长江流域、珠江流域及陕西、甘肃。

藤、茎皮(藤杜仲)：辛，温。祛风除湿，止痛，止血。用于崩漏，风湿痛，外伤出血，跌打骨折。

附 注：功效相同的有**长梗刺果卫矛 E. acanthocarpus** Franch. var. **longipes** (Loes.) Blakel.；**疏花刺果卫矛 E. acanthocarpus** Franch. var. **sutchuanensis** Franch. ex Loes.，均分布于云南。

**攀生刺果卫矛** 藤杜仲(云南丽江)

**Euonymus acanthocarpus** Franch var. **scandens** (Loes.) Blakel.——*E. theifolium* Wall. var. *scandens* Loes.

生于海拔1 300—3 000米的山坡林下。分布于云南。

功效同刺果卫矛。云南用于风湿痛。

**软刺卫矛** 白背紫刺卫矛(云南种子植物名录)，黄刺卫矛(中国高等植物图鉴)

**Euonymus aculeatus** Hemsl.

生于山坡林中，常缠绕于大树或岩石上。分布于湖北、湖南、广东、广西、贵州、云南。

根(小千斤)：辛、微涩，温。祛风除湿，舒筋活络。用于风湿痛，脚腿转筋。

**卫矛** 卫尖菜、四棱茶(辽宁)，山鸡条子(东北)，山扁榆(河北)，见肿消(江苏)，鬼箭(神农本草经)

**Euonymus alatus** (Thunb.) Sieb. —— *Celastrus alatus* Thunb.

生于针、阔叶混交林中、林缘及山坡草地。全国各地均有分布。

根、带翅的枝叶(卫矛、鬼箭羽): 苦，寒。行血通经，散瘀止痛。用于经闭，癥瘕，产后瘀滞腹痛，虫积腹痛，漆疮。

附　注: 功效相同的有**毛叶卫矛 E. sacrosancta** Koidz.，分布于东北、华北。

**紫刺卫矛**　　棱枝卫矛、小千斤(贵州)

**Euonymus angustatus** Sprague

生于海拔 1 000 米以下的山谷中。分布于湖南、广东、广西、贵州。

根(棱枝卫矛): 辛、微涩，温。祛风除湿，舒筋活络。用于风湿痛，脚腿转筋。

**刺叶卫矛**

**Euonymus aquifolius** Loes. et Rehd.

生于山坡林中。分布于贵州。

根皮: 消肿解毒。

附　注: 贵州特有药用植物。

**丝棉树**　　合欢花(华北、东北、山东)，白桃树(上海、浙江)，南仲根(浙江)

**Euonymus bungeanus** Maxim

生于旷野路边、山坡、林缘。分布于东北、华北、华东及陕西、甘肃、河南、湖北、湖南、四川。各地庭院有栽培。

全株(丝棉树): 苦、涩，寒。有小毒。祛风湿，活血，止血。用于脱疽，风湿关节痛，腰痛，痔疮。枝叶: 熏洗漆疮。果实: 用于失眠，肾虚。

附　注: ①功效相同的有**华北卫矛 E. maeck** Rupr.，分布于东北、华北。② **半常绿白杜树 E. bungeanus** Maxim. var. **semipersistens** (Rhed.) Schneid.，布分于云南，根用于腰膝痛。

**肉花卫矛**　　四棱子(浙江)，野杜仲、土杜仲(中国高等植物图鉴)

**Euonymus carnosus** Hemsl.

生于山坡、林缘。分布于江苏、上海、安徽、浙江、江西、福建、台湾、河南、湖北。

根(疯药): 微苦、涩，平。软坚散结，祛风除湿，通经活络。用于瘰疬，跌打腰痛，风湿痛，经闭，痛经。

**百齿卫矛**　　七星剑(广西)

**Euonymus centidens** Lévl.

生于山坡杂木林、竹林等湿润处。分布于江西、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根、茎皮、果实: 甘，温。活血化瘀，强筋壮骨。用于腰膝痛，跌打损伤，月经不调，气喘。

附　注: 功效相同的有**裂果卫矛 E. dielsianus** Loes.，分布于江西、湖北、湖南、广东、四川、贵州、云南。

**中华卫矛**　　杜仲藤(广东)

**Euonymus chinensis** Lindl.

生于山坡林中。分布于浙江、福建、广东、广西及沿海岛屿。

全株(杜仲藤): 微辛、涩，平。舒筋活络，强筋壮骨。用于风湿腿痛，跌打损伤，高血压症。

**角翅卫矛**　双叉子树、抓蛛树(湖北)

**Euonymus cornutus** Hemsl.

生于山坡灌丛中。分布由甘肃向南直达贵州。

根、根皮、果实：散寒，止咳。用于关节痛，腰痛，外感风寒，咳嗽。

**鸦椿卫矛**

**Euonymus euscaphis** Hand. -Mazz.

生于山坡密林或山坡路旁。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖南、广东。

根、根皮：甘，微苦，微温。活血通络，祛风除湿，解表散寒。用于脱疽，风湿关节痛，腰疼，跌打损伤。

**扶芳藤**　白墙络、白对叶肾(浙江)，爬行卫矛(广西)，软筋藤(贵州)，惊风草(云南文山)，滂藤(本草纲目拾遗)

**Euonymus fortunei** (Turcz.) Hand.-Mazz. ——*Elaeodendron fortunei* Turcz.; *E. radicans* Sieb

生于林缘或匍匐于溪边岩壁或攀援于树上。分布于长江流域以南及山西、陕西、山东、河南。

茎、叶(扶芳藤)：苦、甘，温。散瘀止血，舒筋活络。用于腰肌劳损，风湿痹痛，咯血，慢性泄泻，血崩，月经不调，跌打损伤，骨折，创伤出血。

附　注：**伸长冷地卫矛 E. fortunei** (Turcz.) Hand.-Mazz. var. elongatus Cowan，分布于云南，茎皮在云南代杜仲入药。

**冷地卫矛**　丝棉木卫矛(西藏常用中草药)

**Euonymus frigidus** Wall.

生于海拔 2 700—2 800 米的铁杉林下。分布于云南、西藏。

枝：苦，寒。破血，止痛，杀虫。用于月经不调，癥结腹痛，产后血晕，关节痛。

**滇藏冷地卫矛**

**Euonymus frigidus** Wall. var. **wardii** (W. W. Smith) Blakel.

生于海拔 1 100—3 300 米的混交林下。分布于云南、西藏。

茎皮：在云南作杜仲的代用品。

**纤齿卫矛**

**Euonymus giraldii** Loes.

生于山坡灌木林下。分布于河北、陕西、河南、四川。

根、果实：用于衄血，跌打损伤。

**滇桂**　野杜仲(陕西)，金丝杜仲(浙江)，木本青竹标(贵州)，软皮树、摆衣耳柱(云南)

**Euonymus grandiflorus** Wall.

生于山坡灌丛中、沟谷林缘。分布于西南及陕西、甘肃、浙江、江西、湖北、湖南。

根、根皮及树皮(野杜仲)：微苦、涩，平。祛风湿，舒筋络，补肾。根及根皮：用于瘰疬。茎皮：用于高血压病，腰膝痛，风湿痛，骨折。

附　注：**柳叶大花卫矛 E. grandiflorus** Wall. var. **salicifolius** Stapf et Ballard，分布于云南，茎皮在云南代杜仲药用。

**西南卫矛**　土杜仲(贵州),明开夜合(盛京通志),桃叶卫矛(本草纲目)

**Euonymus hamiltonianus** Wall. ——*E. europaea* L. var. *hamiltoniana* Maxim.

生于海拔1 000米以下的山地林中。分布于西北、西南及长江流域各省区。

根、根皮、果实(桃叶卫矛):微甘,微温。活血,止血,祛风除湿。用于鼻衄,脱疽,风湿痛,跌打损伤,漆疮。

**西南桃叶卫矛**

**Euonymus hamiltonianus** Wall f. **koehneanus** (Loes.) Blakel.

生于山坡灌丛中。分布于云南。

根、果实:止血,泻热。用于鼻衄。

**披针叶卫矛**

**Euonymus hamiltonianus** Wall. f. **lanceifolius** (Loes.) C. Y. Cheng ——*E. lanceifolius* Loes.

生于山地林中。分布于西北、西南及长江流域各地。

根、根皮、果实:微苦,平。祛风除湿,活血,止血。用于劳伤痛。

**桃叶卫矛**

**Euonymus hamiltonianus** Wall. var. **yedoensis** (Koeh.) Blakel.——*E. yedoensis* Koeh.

生于山坡林中。分布于陕西、甘肃、山东、江苏、浙江、河南、湖北、四川、贵州、云南。

茎皮:用于劳伤痛。

**常春卫矛**

**Euonymus hederaceus** Champ. ex Benth.

生于疏林及山坡上。分布于浙江、福建、台湾、湖南、广东、广西、贵州、云南。

茎、叶:苦、甘,温。散瘀止血,舒筋活络。用于鼻衄,脱疽,风湿痛,跌打损伤,漆疮。

**冬青卫矛**　八木、调经草(贵州),四季青、大叶黄杨(中国树木分类学)

**Euonymus japonicus** L.

全国各地均有栽培。

根:苦、辛,温。调经止痛,用于月经不调,痛经,跌打损伤,骨折,小便淋痛。

**银边卫矛**

**Euonymus japonicus** L. var. **albo-marginata** T. Moore ex Rehd.

全国各地均有栽培。

全株:接骨。用于骨折,跌打。

**胶东卫矛**　胶州卫矛(浙江)

**Euonymus kiautschovicus** Loes.

生于山谷林中多岩石处。分布于东南沿海各省至陕西、安徽、江西、湖北。

茎、叶:苦、甘,温。散瘀止血,舒筋活络,用于鼻衄,脱疽,风湿痛,跌打损伤,漆疮。

**柳叶卫矛**

——**E. lawsonii** Clarke var. **salicifolius** (Loes) Blakel.——*E. salicifolius* Loes.

生于山地灌丛中。分布于广西、云南。

根：外用于跌打损伤。

**疏花卫矛**　丝棉木(福建)，土杜仲、山杜仲(广东)，木牛七、四季青(广西)，堵仲木(壮语)，烧炮木(瑶语)，五稔子、佛手仔(中国高等植物图鉴)

**Euonymus laxiflorus** Champ.

生于山坡林下灌丛中或水边较阴湿处。分布于江西、福建、广东、广西、贵州、云南。

根、茎皮、叶(土杜仲)：甘、辛，微温。益肾气，健腰膝。根、茎皮：用于水肿，腰膝酸痛，跌打损伤，骨折。叶：用于骨折，跌打损伤。

**革叶卫矛**

**Euonymus lecleri** Lévl.

生于林阴下或沟边。分布于湖北、四川、贵州。

枝、叶、果实：散寒，定喘。用于寒喘。

**线叶卫矛**　小接骨丹、金丝杜仲、黄皮杜仲(云南)，线叶金丝杜仲(云南种子植物名录)

**Euonymus linearifolia** Franch.

生于海拔1 900米处的山坡。分布于云南。

全株：补肾壮阳。用于水肿，月经不调，风湿痛，骨折，外伤出血。

附　注：云南特有药用植物。

**小果卫矛**

**Euonymus microcarpus** (Oliv.) Sprague——*E. chinensis* Lindl. var. *microcarpus* Oliv.

生于山谷或平地河边。分布于陕西、湖北、四川、云南。

根：活血祛瘀，祛风除湿。用于跌打损伤，风湿腰痛。

**大果卫矛**　白鸡槿(浙江)，青得乃(广西苗语)

**Euonymus myrianthus** Hemsl.

生于溪边、沟谷较湿润处。分布于陕西、安徽、浙江、江西、福建、湖北、广东、广西、四川、云南。

根(黄楮)：淡，平。补肾活血，健脾利湿。用于肾虚腰痛，产后恶露不净，带下病，潮热。

**矮卫矛**

**Euonymus nanus** Bieb.

生于石质山坡及林地。分布于内蒙古、山西、陕西、甘肃、河南。

根、树皮：祛风除湿。用于风寒湿痹，关节肿痛，肢体麻木。

**矩叶卫矛**　白鸡肫(福建)，鸡血蓝(贵州药用植物名录)

**Euonymus oblogifolius** Loes. et Rehd.

生于林边、溪边潮湿处。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖北、广东、广西、四川、云南。

根、果实：有小毒。止血，泻热。用于鼻衄，跌打损伤。

**毛根杜仲**　大尺扶芳藤(云南种子植物名录)

**Euonymus orgyalis** W. W. Smith.

生于海拔 1 300—2 100 米的山坡林中。分布于云南。

根、叶：用于腰痛，骨折。

**垂丝卫矛**　球果卫矛、五棱子(浙江)，豆腐树、青皮(中国树木分类学)，小米饭(中国经济植物志)

**Euonymus oxyphylla** Miq.

生于山坡杂林中。分布于辽宁、山东、江苏、安徽、浙江、江西、湖南。

根、根皮、树皮、果实(青皮树)：辛、苦，微温。活血化瘀，通经逐水。根：用于关节酸痛。根皮、茎皮：用于跌打损伤，瘀滞作痛，经闭，腹痛。茎皮：用于阴囊湿痒。果实：用于痢疾初起。

**栓翅卫矛**　白檀子、八肋木(宁夏)，翅卫矛(高原中草药治疗手册)

**Euonymus phellomanus** Loes.

生于山坡、林缘或路旁。分布于陕西、甘肃、宁夏、河南、湖北、四川。

枝皮：苦，寒。破血落胎，调经。用于月经不调，产后瘀血腹痛，血崩，风湿痛。

**紫花卫矛**　白木(湖北)

**Euonymus porphyreus** Loes.

生于山坡灌丛中。分布于陕西、湖北、四川、贵州、云南。

枝：清热镇痛。

**八宝茶**　甘青卫矛(青海中草药名录)

**Euonymus przewalskii** Maxim.

生于山坡林下阴处。分布于河北、山西、甘肃、青海、新疆、四川、云南、西藏。

枝、叶(八宝茶)：苦，寒。活血破瘀，清热明目。用于产后瘀血腹痛，经闭，关节痛，痈肿。

**陕西卫矛**　八树、石枣(湖北)

**Euonymus schensianus** Maxim.

生于海拔 600—1 000 米的山地沟边丛林中。分布于陕西、甘肃、湖北、四川。

树皮：用于风湿痛。

**中亚卫矛**　鬼箭羽(新疆)，津恰起利(维吾尔语)，新疆卫矛(全国中草药汇编)

**Euonymus semenovii** Regel et Hard.

生于山坡灌丛中。分布于新疆。

带翅的嫩枝、根(新疆卫矛)：苦，寒。破血消瘀，活血止痛。用于产后瘀血腹痛，经闭，关节痛，痈疮红肿。

附　注：新疆特有药用植物。

**无柄卫矛**　接骨树(广西)

**Euonymus subsessilis** Sprague

生于山坡地。分布于陕西、江西、福建、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

全株：微苦，平。祛风湿，强筋骨。用于风湿痹痛，劳伤；外用于骨折。

**腾冲卫矛**

**Euonymus tengyuehensis** W. W. Smith

生于海拔 1 800—2 300 米的山坡林下。分布于贵州、云南。

茎皮(白皮)：淡，平。止血，生肌。用于刀伤。

**染用卫矛**　脉瓣卫矛(云南经济植物)

**Euonymus tingens** Wall.

生于海拔2 500米以上的山地林中及沟边。分布于广西、四川、云南。

茎皮：补肾阳，强腰膝。云南丽江民间作杜仲代用品。

**游藤卫矛**　银丝杜仲、白皮、牛千金(贵州)，金丝杜仲、银杜仲(云南丽江)

**Euonymus vagans** Wall.

生于海拔2 000米以下的河谷杂木林中。分布于西南及广西。

茎皮(银丝杜仲)：祛风除湿，补肾。用于风湿腰痛，肾虚腰痛，筋骨痿软，刀伤出血。

**荚蒾卫矛**

**Euonymus viburnoides** Prain.

生于山坡灌丛中。分布于广西、四川、贵州、云南。

全株：祛风除湿。

**常绿卫矛**　黄皮杜仲(云南)，山杜仲、岩杜仲(曲靖专区中草药手册)

**Euonymus virens** C. Y. Wu

生于山坡。分布于云南。

茎皮(棉花杜仲)：微苦、涩，微温。祛风除湿，壮腰固精，止痛。用于劳伤，肾虚腰痛，水肿，骨折。

**长刺卫矛**　小梅花树(广西)，扣子花、岩风(中国高等植物图鉴)，刺果卫矛(中国树木分类学)，狭叶刺果卫矛(云南种子植物名录)

**Euonymus wilsonii** Sprague

生于山谷密林中。分布于四川、贵州、云南。

根：辛，温。祛风除湿，止痛。用于风湿痛，劳伤，水肿。

附　注：功效相同的有**宝兴卫矛 E. mupinensis** Loes. et Rehd.，分布于四川、云南。

**云南卫矛**　小青黄、野石榴(云南)，金丝杜仲(植物名实图考)

**Euonymus yunnanensis** Franch.——*E. decorus* W. W. Smith

生于疏林中或河谷岩石坡上。分布于云南、西藏。

根皮、茎皮(金丝杜仲)：微苦、涩，温。有毒。祛风除湿，散瘀消肿。用于跌打损伤，风湿痛，腰腿痛，胎动不安。

## 沟瓣木属　Glyptopetalum Thw.

**罗甸沟瓣木**

**Glyptopetalum feddei** (Lévl.) D. Hou——*Euonymus feddi* Lévl.

生于山坡林下。分布于广西西北部、贵州南部。

根：用于肝硬化腹水。

## 美登木属　Maytenus Molina.

**滇南美登木**

**Maytenus aust royunnanensis** S. J. Pei et Y. H. Li

生于海拔800—900米的山坡灌丛中。分布于云南南部。

全株：抗癌。含有抗癌活性成分美登新类物质。

**小檗美登木**　　小檗状裸实(云南种子植物名录)

**Maytenus berberoides** (W. W. Smith) C. Y. Cheng——*Gymnosporia berberoides* W. W. Smith

生于海拔1 900—3 000米的山坡灌丛中、干燥的石堆中或沙土地上。分布于云南西北部。

根：祛风除湿，止痛。　全株：抗癌。

**密花美登木**　　亚棱侧(广西壮语)

**Maytenus confertiflora** J. Y. Luo et X. X. Chen

生于山坡灌丛中。分布于广西。

叶：用于跌打损伤。　全株：抗癌。含有抗癌活性成分美登新类物质。

附　注：广西特有药用植物。

**变叶美登木**　　绣花针(福建)，刺仔木咬眼刺(海南)，变叶裸实(中国高等植物图鉴)

**Maytenus diversifolius** (Hemsl.) D. Hou——*Catha diversifolius* Hemsl.; *Gymnosporia divetsifolia* (Hemsl.) Maxim.

生于山坡、平地及海岸。分布于福建、台湾、广东、海南、广西。

全株：抗癌。含有抗癌活性成分美登新类物质。

**贵州裸实**　　细叶裸实(云南种子植物名录)

**Maytenus esquirolii** (Lévl.) C. Y. Cheng——*Gymnosporia esquirolii* Lévl.

生于山坡灌丛中。分布于贵州、云南。

根：抗癌。含有抗癌活性成分美登新类物质。

**广西美登木**　　陀螺钮(广西)

**Maytenus guangxiensis** C. Y. Cheng et W. L. Sha

生于山地丛林中。分布于广西。

根、茎、叶：祛风，止痛。用于风湿痹痛。　叶：外用于疮疖。　茎：抗癌。含有抗癌活性成分美登新类物质。

附　注：广西特有药用植物。

**美登木**　　梅丹(云南种子植物名录)

**Maytenus hookeri** Loes.

生于山坡丛林或山谷密林中。分布于云南西双版纳。

叶(美登木)：苦，寒。活血化瘀，抗癌，用于癌症初起。

附　注：功效相似的有**疏花美登木 M. gracilira** S. J. Pei et Y. H. Li，分布于广西、云南；**长梗美登木 M. hookeri** Loes. var. **longiradiata** S. J. Pei et Y. H. Li

分布于云南；**隆林美登木 M. lunglinensis** C. Y. Cheng et W. L. Sha，分布于广西；**少花美登木 M. oliganthus** C. Y. Cheng et W. L. Sha，分布于广西；**厚叶美登木 M. orbiculata** C. Y. Wu ex S. J. Pei et Y. H. Li。

**刺茶**　刺茶裸实、牛王刺(中国高等植物图鉴)

**Maytenus variabilis** (Loes.) C. Y. Cheng——*Gymnosporia varabilis Loes.*

生于山坡、河岸。分布于湖北、四川、贵州。

根(刺茶)：解毒，抗癌。

**广西刺茶**

**Maytenus variabilis** (Loes.) C. Y. Cheng f. **inermis** C. Y. Cheng et W. L. Sha

生于石灰岩上。分布于广西。

叶：用于头癣，牛皮癣，神经性皮炎，臁疮。

## 假卫矛属　Microtropis Wall. ex Mcissn.

**福建假卫矛**

**Microtropis fokienensis** Dunn

生于海拔 800—1 600 米的山谷林中。分布于华南及浙江、福建、台湾。

枝、叶：消肿散瘀，接骨。

**密花假卫矛**

**Microtropis gracitipes** Merr. et Metc.——*M. confertiflora* Merr. et Freem.

生于林中近水阴湿处。分布于福建、湖南、广东、广西、贵州。

根：利尿。

**方茎假卫矛**　四棱假卫矛(拉汉英种子植物名称)

**Microtropis tetragona** Merr. et Freem.

生于山地林中。分布于广西、贵州、云南。

枝、叶：舒筋活络。用于跌打损伤。

## 核子木属　Perrottetia H. B. K.

**核子木**

**Perrottetia racemosa** (Oliv.) Loes.——*Ilex racemosa* Oliv.

生于海拔 900 米以下的山林中近水处。分布于湖北、四川、贵州。

根皮：祛风除湿。用于风湿关节痛。

## 雷公藤属　Tripterygium Hook. f.

**火把花**　黄藤根(广西)，胖关藤、掉毛草(云南)，昆明山海棠(云南种子植物名录)，大莽子(中国经济植物志)

**Tripterygium hypoglaucum** (Lévl.) Hutch.——*Aspidoteris hypoglaucum* Lévl.

生于山野向阳沟边、灌丛或疏林中。分布于长江流域以南至西南。主产西南地区。

根、全株(掉毛草)：苦、涩，温。有大毒。祛风除湿，活血散瘀，续筋接骨。 根：用于风湿关节痛，骨痨，瘰疬。 根皮(云南紫金皮)：有毒。用于痈疮红肿，跌打损伤。

附　注：功效相似的有**东北雷公藤 T. regelii** Sprague et Takeda., 分布于东北。

**雷公藤**　红药、红紫根(江西)，山砒霜(福建药物志)，三棱花、旱禾花(湖南)，黄藤木(广西药用植物名录)

**Tripterygium wilfordii** Hook. f.

生于山地林缘阴湿处。分布于长江流域以南至西南。主产长江中、下游地区。

根、叶、花、果实(雷公藤)：苦、辛，凉。有大毒。祛风解毒，杀虫。用于风湿关节痛，腰腿痛，末梢神经炎，麻风，骨髓炎，手指疔疮。

附　注：本种为中药中最好的激素类药物。

## 93. 省沽油科　Staphyleaceae

### 野鸦椿属　Euscaphis Sieb. et Zucc.

**福建野鸦椿**　腋毛野鸦椿、圆齿野鸦椿(福建植物志)

**Euscaphis fukienensis** P. S. Hsu——*E. konishii* Hayata

生于低海拔至中海拔的山谷林缘及疏林中。分布于江西、福建、广东、广西。

花：镇痛。用于头痛，眩晕。

**野鸦椿**　鸡眼椒(陕西、四川)，红棕(湖北、四川)，洒药花、鸡肾果(广西)，山海椒(云南)

**Euscaphis japonica** (Thunb.) Dippel——*Sambucus japonica* Thunb.

生于海拔900—1 400米的山坡灌丛中。全国除宁夏、青海、新疆外，各地均有分布。

根(野鸦椿)：微苦，平。解表，清热，利湿。用于感冒，风湿腰痛，胃痛。 果实、种子(鸡肫花)：辛，温。祛风散寒，行气止痛。用于头痛，眩晕，感冒，癣疹，漆疮，疝气。

### 省沽油属　Staphylea L.

**省沽油**　水条(辽宁)，双蝴蝶(浙江)

**Staphylea bumalda** DC.

生于海拔800—1 300米的山沟杂木林中。分布于东北及河北、山西、陕西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖北、四川。

根：用于产后瘀血不净。 果实：用于干咳。

**膀胱果**　白凉子、泡泡树(陕西)，凉子树(河南)，大果省沽油(峨眉植物志)

**Staphylea holocarpa** Hemsl.

生于海拔700—2 400米的杂木林中。分布于陕西、甘肃、安徽、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、西藏。

果实、根：润肺止咳，祛风除湿。

### 山香圆属　Turpinia Vent.

**锐尖山香圆**　　五寸铁树、尖树、黄柿(广西)

**Turpinia arguta** (Lindl.) Seem.——*Ochranthe arguta* Lindl.

生于杂木林中或林缘。分布于江西、福建、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根、叶(两指剑)：苦，寒。活血散瘀，消肿止痛。　根：用于肝脾肿大。　叶：用于跌打损伤。

### 瘿椒树属(银鹊树属)　Tapiscia Oliv.

**瘿椒树**　　银鹊树(通称)，瘿漆树(湖北)，皮巴风(湖南)，丹树、泡花(广东)

**Tapiscia sinensis** Oliv

生于山地林中或林缘路旁。分布于陕西、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广西、四川、贵州。

根、果实：解表，清热，祛湿。

**附　注**：国家三级保护植物。

## 94. 翅子藤科　Hippocrateaceae

### 五层龙属　Salacia L.

**五层龙**

**Salacia prinoides** (Willd.) DC.——*Tontelea prinoides* Willd.

生于海拔60—700米的丛林中。分布于广东、海南。

根(粉拉木)：涩，温。通经活络，祛风除湿。用于风湿关节痛，腰肌劳损，体虚无力。

**无柄五层龙**　　楼子藤、鸡卵黄(广西)，野黄果、野柑子(云南)

**Salacia sessiliflora** Hand.-Mazz.

生于海拔(200—)600—1 600米的山坡灌丛中。分布于广东、广西、贵州、云南。

果实：用于胃脘痛。

## 95. 黄杨科　Buxaceae

### 黄杨属　Buxus L.

**雀舌黄杨**　　匙叶黄杨、黄杨木(浙江)，小叶黄杨、千年矮(福建)，细叶黄杨(广州)

**Buxus bodinieri** Lévl.

生于海拔400—2700米的平地或山坡林下。分布于中南及陕西、甘肃、浙江、江西、四川、贵州、云南。

鲜叶、茎、根(黄杨木)：苦、甘，凉。清热解毒，化痰止咳，祛风，止血。　根：民间用于吐血。　嫩枝叶：用于目赤肿痛，痈疮肿毒，风湿骨痛，咯血，声哑，狂犬咬伤，妇女难产。

附　注：功效相同的有**华南黄杨 B. harlandii** Hance，分布于福建、广东、海南沿海地区。

**头花黄杨**　　细叶黄杨、万年青、千年矮(贵州)

**Buxus cephalantha** Lévl. et Vant.

生于山坡灌丛中。分布于广西、贵州。

根、茎、叶：苦、辛，平。清热利湿，解毒镇静。用于胸痹，黄疸，劳咳，牙痛，风热瘙痒，无名肿毒。

**大花黄杨**　　桃叶黄杨(四川)

**Buxus henryi** Mayr.

生于海拔 350—2 000 米的山坡灌丛或山沟石缝中。分布于湖北、四川、贵州。

根皮、全株：活血祛瘀，消肿解毒。用于风火牙痛。

**阔柱黄杨**　　假黄杨(广西)

**Buxus latistyla** Gagnep.

生于山坡、溪边、林下。分布于广西、云南。

树皮：镇惊熄风。用于小儿惊风。　叶：接骨生肌。用于骨折，刀伤。

**杨梅黄杨**　　结青树(广东)

**Buxus myrica** Lévl.

生于海拔 250—2 000 米的溪边、灌丛中或阔叶林内。分布于湖南、广东、海南、广西、贵州、云南。

根：清热利湿，止咳平喘。用于喘咳。

**黄杨**

**Buxus sinica** (Rehd. et Wils.) M. Cheng——*B. microphylla* Sieb. et Zucc. var. *sinica* Rehd. et Wils.

生于海拔 1 200—2 600 米的山地或山坡多岩石处。分布于陕西、甘肃、山东、江苏、安徽、浙江、湖北、江西、广东、广西、四川、贵州、云南。全国各地也有栽培。

根(黄杨根)：苦、辛，平。祛风除湿，行气活血。用于筋骨痛。目赤肿痛，吐血。　茎(黄杨木)：苦，平。祛风除湿，理气止痛。用于风湿痛，胸腹气胀，牙痛，疝痛，跌打损伤。　叶(黄杨叶)：用于难产，暑疖。　果实(黄杨子)：用于中暑，面上生疖。

附　注：功效相同的有**皱叶黄杨 B. rugulosa** Hatusima，分布于四川、云南；铺地黄杨 **B. rugulosa** Hatusima subsp. **prostrata** (W. W. Smith) Hatusima，分布于云南；**石生黄杨 B. rugulosa** Hatusima subsp. **rupicola** (W.W.Smith) Hatusima，分布于四川、云南、西藏；**小叶黄杨 B. sinica** (Rehd. et Wils) M. Cheng var. **parvifolia** M. Cheng，分布于安徽、浙江、江苏、湖北；**长叶黄杨 B. megistophylla** Lévl.，分布于江西、湖北、湖南、广东、广西、贵州。福建有栽培。

**尖叶黄杨**　　长叶黄杨(中国高等植物图鉴)

**Buxus sinica** (Rehd et Wils.) M. Cheng subsp **aemulans** (Rehd. et Wils.)

M. Cheng——*B. mirophylla* Sieb. et Zucc. var. *aemulans* Rehd. et Wils.

生于山坡。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川。

树皮：用于风火牙痛。

## 板凳果属 Pachysandra Michx.

**板凳果** 山板凳(贵州)，白金三角咪、小清喉(云南)

**Pachysandra axillaris** Franch.

生于海拔1 800—2 500米的林下或灌丛中湿润地上。分布于台湾、广西、四川、云南。

全株(金丝矮陀)：辛、苦，温。有小毒。祛风除湿，舒筋活络。用于风湿关节痛，肢体麻木，跌打损伤，头痛。

**毛叶板凳果**

**Pachysandra axillaris** Franch. var. **stylosa** (Dum.) M. Cheng——*P. stylosa* Dunn.

生于海拔700—2 200米的密林下或岩石缝中。分布于陕西、江西、福建、湖南、广东、云南。

根状茎或全草(三角咪)：苦、辛，温。有毒。祛风湿，活血止痛。用于风湿痛，劳伤腰痛，跌打损伤，腹痛。

**雪山林** 孙儿茶、捆仙绳(陕西)，长青草(甘肃)，顶花板凳果(拉汉英种子植物名录)

**Pachysandra terminalis** Sieb. et Zucc.

生于海拔1 700—2 400米的山谷林下湿润的腐殖土上或灌丛阴湿处。分布于陕西、甘肃、浙江、湖北、四川。

带根全草(雪山林)：苦、微辛，凉。除风湿，清热解毒，镇静止血，调经活血，止带。用于风湿筋骨痛，腰腿痛，带下病，月经不调，烦躁不安。

## 野扇花属 Sarcococca Lindl.

**羽脉野扇花** 西藏野扇花(中国树木志)，云南野扇花(中国树木分类学)

**Sarcococca hookeriana** Baill.

生于灌丛中。分布于四川、西藏。

全株(铁角兰)：涩，寒。散瘀止血，行气止痛，拔毒生肌。用于胃痛，咳嗽痰喘，肝炎，蛔虫病；外用于跌打损伤，刀伤出血，无名肿毒。 根：外用于无名肿毒，黄水疮。

**双蕊野扇花** 小叶野扇花(广西)，八爪金龙、山豆根(四川)，矮树八爪龙、树八爪龙(云南)

**Sarcococca hookeriana** Baill. var. **digyna** Franch.

生于高山灌丛中。分布于陕西、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

根：辛、苦，平。祛风通络，活血止痛。用于跌打损伤。

**长柄野扇花**　千年青、柑子风(广东)

**Sarcococca longipetiolata** M. Cheng

生于海拔 350—800 米的山谷、溪边、林下。分布于湖南、广东、广西。

全株：苦、涩，寒。散瘀止血，拔毒生肌。用于跌打损伤，刀伤出血，无名肿毒。

**东方野扇花**　三两根、大风消、土丹皮(江西)

**Sarcococca orientalis** C. Y. Wu ex M. Cheng

生于海拔 250—1 100 米的溪边、林内或灌丛中。分布于浙江、江西、福建、广东、贵州。

根(大风消)：辛，温。活血舒筋，祛风消肿。用于跌打损伤，老伤发痛，水肿。

**野扇花**　千年崖(陕西)，棉草木、花子藤(四川)，观音柴(贵州)，青香桂(云南)

**Sarcococca ruscifolia** Stapf

生于海拔 400—2 600 米的石灰岩山坡密林中。分布于西南及陕西、甘肃、湖北、湖南、广西。

根(胃友)：辛、苦，平。祛风通络，活血止痛。用于胃痛，风湿痛，跌打损伤。　果实(野扇花果)：养肝安神，用于头晕，心悸，视力减退。

**海南野扇花**

**Sarcococca vagans** Stapf

生于海拔 500—800 米的山谷或林下。分布于海南、广西、云南。

根：接骨。外用于骨折。

**厚叶清香桂**　云南野扇花(中国高等植物图鉴补编，云南植物志)

**Sarcococca wallichii** Stapf

生于海拔 500—1 500 米的热带河谷及石灰岩林下。分布于云南。

根、果实：用于跌打损伤，泄泻，胃痛。

## 96. 茶茱萸科　Icacinaceae

### 粗丝木属　Gomphandra Wall. ex Lindl.

**粗丝木**　毛蕊木(中国树木分类学)，海南粗丝木(全国中草药汇编)

**Gomphandra tetrandra** (Wall. et Roxb.) Sleum. ——*Lasianthera tetrandra* Wall.; *G. hainanensis* Merr.

生于海拔 500—2 200 米的疏、密林下、路旁、灌丛及林缘。分布于广东、海南、广西、贵州、云南。

根(黑骨走马)：甘、苦，平。清热利湿，解毒。用于骨髓炎，吐泻。

### 微花藤属　Iodes Bl.

**大果微花藤**

**Iodes balansae** Gagn.

生于海拔 120—1 300 米的山谷、疏林中。分布于广西、云南。

根：用于水肿。

**微花藤**　　麻雀筋藤、花心藤(广西)

**Iodes cirrhosa** Turcz.

生于海拔 400—950 (—1 300) 米的沟谷疏林中。分布于广东、云南。

根：祛风湿，止痛。用于风湿痛。

**瘤枝微花藤**　　丁公藤(广西)

**Iodes seguini** (Lévl.) Rehd.——*Vitis seguini* Lévl.

生于海拔 200—1 200 米的石灰山林中。分布于广西、贵州、云南。

根：用于劳伤。　茎：用于风湿痹痛。　枝叶：用于毒蛇咬伤。

**小果微花藤**　　白吹风(广西)，牛奶藤(贵州)，犁耙树(云南)

**Iodes vitiginea** (Hance) Hemsl.——*Erythrostaphyle vitiginea* Hance

常生于海拔 120—1 300 米的沟谷季雨林至次生灌丛中。分布于海南、广西、贵州、云南。

根皮、茎：辛，微温。祛风湿，下乳，活血化瘀。用于风湿痛，劳伤，乳汁不通；外用于目赤，跌打损伤，刀伤。

## 定心藤属(甜果藤属)　Mappianthus Hand.-Mazz.

**定心藤**　　黄马胎、甜果藤(广东)，麦撇花藤、藤蛇总管、黄九牛(广西)

**Mappianthus iodoides** Hand.-Mazz.

生于山地林中或箐边，常攀援树上。分布于福建、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南。

根、藤茎(甜果藤)：微苦、涩，平。祛风除湿，调经活血，止痛。用于风湿关节痛，黄疸，跌打损伤，月经不调，痛经，经闭；外用于外伤出血。

## 心翼果属　Peripterygium Hassk.

**大心翼果**　　青梅藤(广西)

**Peripterygium platycarpum** (Gagnep.) Sleum.——*Cardiopteris platycarpa* Gagnep.

生于海拔 130—1 300 米的疏林、沟谷密林及灌丛中。分布于广西、云南。

根：通经。用于月经不调。

## 假柴龙树属　Nothapodytes Bl.

**马比木**　　公黄珠子(全国中草药汇编)

**Nothapodytes pittosporoides** (Oliv.) Sleum.——*Mappia pittosporoides* Oliv.

生于海拔 (150—)450—1 600(—2 500) 米的山坡林中。分布于甘肃东南部、湖北、湖

南，广东、广西、四川、贵州、云南。

根皮(贵州追风散)：辛，温。祛风除湿，理气散寒。用于浮肿，小儿疝气，关节痛。

### 假海桐属　Pittosporopsis Craib

**假海桐**　芒果(云南勐仑)

**Pittosporopsis kerrii** Craib.

生于海拔350—1 600米的山溪密林中。分布于云南。

树皮(杨翠木)：清热解毒，祛风解表。用于感冒，时行感冒发热，顿咳，疟疾。

## 97. 鼠李科　Rhamnaceae

### 勾儿茶属　Berchemia Neck.

**腺花勾儿茶**　小叶勾儿茶(四川)

**Berchemia edgeworthii** Laws.

生于海拔2 100—4 500米的亚高山灌丛或峭壁。分布于四川、云南、西藏。

根：祛痰止咳，散瘀。

**黄背勾儿茶**　大叶甜果子(甘肃)，大鸭公藤、牛儿藤(四川)，甜茶、金背黄鳝藤(云南种子植物名录)

**Berchemia flavescens** (Wall.) Brongn.——*Zizyphus flavescens* Wall.; *B. hypochrysa* Schneid.

生于海拔1 200—4 000米的山坡、山谷林下及灌丛中。分布于陕西、甘肃、湖北、四川、云南、西藏。

根、茎(石蔓藤)：苦、辛，凉。清热解表。　根：用于胸腹胀满，痢疾，跌打损伤，筋骨痛。　茎：用于崩漏，带下病，月经不调。

**多花勾儿茶**　牛鼻圈(陕西、广东)，扁担藤(河南)，金刚藤、牛儿藤(四川)

**Berchemia floribunda** (Wall.) Brongn.——*Zizyphus floribunda* Wall.; *B. racemosa* Sieb. et Zucc.; *B. giraldiana* Schneid.; *B floribunda* (Wall.) Brongn. var. *megalophylla* Schneid.

生于海拔3 600米以下的山坡、山谷灌丛中或林下。分布于中南、西南及山西、陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、福建。

根(黄鳝藤根)：甘、苦，平。健脾利湿，通经活络。用于脾虚食少，小儿疳积，风湿痹痛，黄疸，水肿，淋浊，痛经；外用于骨折，跌打损伤。　茎、叶(黄鳝藤)：甘，寒。清热解毒，利尿。用于衄血，黄疸，风湿腰痛，经前腹痛。

**大叶勾儿茶**

**Berchemia huana** Rehd.

生于海拔1 000米以下的山坡林下。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南。

根、茎、叶：微涩，温。祛风利湿，活血止痛，解毒。用于风湿关节痛，黄疸，胃脘痛，脾胃虚弱，食欲不振，小儿疳积，痛经；外用于跌打损伤，目赤，多发性疖肿。

**牯岭勾儿茶**　熊柳、青藤(中国植物志)

**Berchemia kulingensis** Schneid.

生于海拔300—2 150米山坡向阳处灌丛、路旁、林缘。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

根：微涩，温。祛风利湿，活血止痛。用于风湿关节痹痛，小儿疳积，骨髓炎，湿疹，经闭。

**铁包金**　老鼠乌(福建)，乌金藤、老鼠耳(四川)，米拉藤、小叶黄鳝藤(台湾植物志)

**Berchemia lineata** (L.) DC.——*Rhamnus lineata* L.

生于低海拔的山野坡地、路旁或沟谷灌丛中。分布于福建、台湾、广东、广西。

根(铁包金)：微苦、涩，平。固肾益气，化瘀止血，镇咳止痛。用于风毒流注，肺痨，消渴，胃痛，子痫，遗精，风湿关节痛，腰膝酸痛，跌打损伤，瘰疬，癥瘕，痈疽肿毒，风火牙痛。

**多叶勾儿茶**　小通花(广西)，鸭公头(贵州)，水车藤(云南种子植物名录)

**Berchemia polyphylla** Wall. ex Laws.

生于海拔1 900米以下的山地灌丛或林中。分布于陕西、甘肃、广西、四川、贵州、云南。

叶、果实：甘、淡，平。清热利湿。用于目赤，痢疾，黄疸，热淋，崩漏，带下病。　全株：用于瘰疬，跌打损伤。

**光枝勾儿茶**　光枝水车藤(云南种子植物名录)

**Berchemia polyphylla** Wall. ex Laws. var. **leioclada** Hand.-Mazz.

生于海拔2 100米以下的山坡、沟边、灌丛或林缘。分布于陕西、福建、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全株：止咳，祛痰，平喘，安神，调经。用于咳嗽，癫狂。　种子：四川民间用于痨病。

附　注：**毛叶勾儿茶 B. polyphylla** Wall. ex Laws. var. **trichophylla** Hand.-Mazz.，分布于贵州、云南，根、叶：清热解毒，除湿，生新，补虚。

**峨眉勾儿茶**

**Berchemia omeiensis** Fang

生于山坡林中。分布于湖北、四川、贵州。

地上部分：祛风除湿、活血止痛。

**勾儿茶**　牛鼻足秧(河南)，铁光棍(湖北)

**Berchemia sinica** Schneid.

生于海拔1 000—2 500米的山坡、山谷或杂木林中。分布于山西、陕西、甘肃、安徽、河南、湖北、贵州。

根：用于哮喘。

**云南勾儿茶**

**Berchemia yunnanensis** Franch.——*B. pycnantha* Schneid.

生于海拔1 500—3 900米的山坡、山谷林缘或灌丛中。分布于西南及陕西、甘肃、江

西、湖北、湖南、广东、广西。

根、叶(鸭公甲): 甘、淡,平。清热利湿,祛风活络,活血止痛。用于黄疸,水肿,痢疾,带下病,风湿骨痛,痛经等;外用于骨折,跌打损伤,痈疮肿毒。

## 小勾儿茶属 Berchemiella Nakai

**小勾儿茶**

**Berchemiella wilsonii** (Schneid.) Nakai——*Chaydaia wilsonii* Schneid.

生于山坡阔叶林中或沟旁。分布于安徽霍山和歙县、湖北兴山。

根皮、叶: 祛风,活血。

附　注: 国家二级保护植物。

## 苞叶木属 Chaydaia Pitard

**苞叶木**　十两叶(广西),红脉麦果(海南植物志)

**Chaydaia rubrinervis** (Lévl.) C. Y. Wu ex Y. L. Chen——*Embelia rubrinervis* Lévl.; *C. crenulata* Hand.-Mazz.

生于海拔1 500米以下的山地林中或灌丛中。分布于广东、海南、广西、贵州、云南。

全株(苞叶木): 淡,平。利胆退黄。用于黄疸,肝硬化腹水。

## 蛇藤属 Colubrina Rich. ex Brongn.

**大海蛇藤**

**Colubrina arborescens** (Mill.) Sarg.——*Ceanothus arborescens* Mill.

云南勐腊有栽培。

根、叶: 清热,消肿。

附　注: 现已从同属植物 **C. taxensis** Grag., 中分离出抗癌活性成分美登新类物质。全国产2种: **蛇藤 C. asiatica** (L.) Brongn., 分布于台湾、广东、海南、广西; **毛蛇藤 C. pubescens** Kurz, 分布于云南。有待研究开发。

## 嘴签属 Gouania Jacq.

**毛嘴签**　烧伤藤、节节藤(云南),爪哇下果藤(云南种子植物名录)

**Gouania javanica** Miq.

生于低、中海拔疏林中或溪边,常攀援于树上。分布于福建、广东、海南、广西、贵州、云南。

茎、叶: 微苦、涩,凉。清热解毒,收敛止血。用于烧、烫伤,外伤出血,湿疹,痈疮肿毒。

**嘴签**　风吹藤(广西),下果藤(云南)

**Gouania leptostachya** DC.

生于低、中海拔的疏林中，常攀援于树上。分布于广西、云南。

茎、叶(下果藤)：涩、微苦，凉。清热解毒，凉血，舒筋活络。用于四肢麻木；外用于烧、烫伤，疮疡。

附　注：功效相同的有**大果嘴签 G.leptostachya** DC. var. **macrocarpa** Pitard. 分布于云南。

**越南嘴签**　　烧伤藤(广西)

**Gouania leptostachya** DC. var. **tonkinensis** Pitard.

生于低、中海拔的林中或灌丛中。分布于广西、贵州、云南。

茎、叶：用于外伤出血，烧、烫伤。

## 枳椇属　Hovenia Thunb.

**枳椇**　　拐枣(通称)，鸡爪树(江苏、安徽)，金果梨(浙江)，南枳椇(黄山植物的研究)

**Hovenia acerba** Lindl.

生于海拔2 100米以下的开旷地、山坡林缘或疏林中；庭院也有栽培。分布于中南及陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、四川、贵州、云南。

种子(枳椇子)：甘，平。除烦止渴，解酒毒，利二便。用于醉酒，烦热，口渴，呕吐，二便不利。　果序：民间制"拐枣酒"，用于风湿痛。

附　注：**侠江枳椇 H. acerba** Lindl. var. **kiukiangensis** (Hu et Cheng) C. Y. Wu ex C. Y. Chen，分布于云南、西藏，在云南种子也作枳椇子入药。

**北枳椇**　　鸡爪梨、枳椇子(北京)，拐枣(华北)，甜半夜(河南)，北拐枣(拉汉英种子植物名称)

**Hovenia dulcis** Thunb.

生于海拔200—1 400米的次生杂木林中或庭院栽培。分布于河北、山西、陕西、甘肃、山东、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、四川。

种子(枳椇子)：功效见枳椇。　根：甘，温。行气活血。用于虚劳吐血，风湿筋骨痛。　根皮或茎皮(枳椇木皮)：甘，温。活血舒筋。用于风湿麻木，食积，铁棒锤中毒。　叶(枳椇叶)：功效同果实，且能止呕，解酒毒及铁棒锤中毒。　树干中流出液汁：甘，平。用于脓臭。　果实：健胃，补血。

**毛果枳椇**　　毛枳椇(中国树木分类学)

**Hovenia trichocarpa** Chun et Tsiang

生于山坡或有栽培。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖南、广东、广西、贵州。

果实、皮：清热利尿。用于热病烦渴，呃逆，呕吐，二便不利。

**光叶毛果枳椇**　　毛枳椇(浙江)

**Hovenia trichocarpa** Chun et Tsiang var. **robusta** (Nakai et Kimura) Y. L. Chen et P. K. Chou——*H. robusta* Nakai et Kimura

生于山坡疏林中、山麓、旷野。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖南、广东、广西。

种子：浙江作枳椇子入药。

## 马甲子属　Paliurus Tourn. ex Mill.

**铜钱树**　摇钱树、刺凉子(陕西),金钱树(安徽),鸟不宿(浙江),串树(四川)

**Paliurus hemsleyanus** Rehd.

生于海拔1 100米以下的山坡、山谷林中。分布于中南、西南及陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江。

根(金钱木根):苦、涩,寒。祛风湿,止痹痛,解毒。用于劳伤乏力,跌打损伤,痢疾。

**硬毛马甲子**　钩交刺(广西),长梗铜钱树(中国树木分类学)

**Paliurus hirsutus** Hemsl.

生于山坡林缘或灌丛中。分布于江苏、安徽、浙江、福建、湖北、湖南、广东、广西。

全株:解毒消肿。

**马甲子**　雄虎刺(福建),箭子(广东)铁篱笆、铜钱树、马鞍树(四川)

**Paliurus ramosissimus** (Lour.) Poir.——*Aubletia ramosissimum* Lour.

生于海拔2 000米以下的山地、平原或栽培。分布于陕西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根:苦,平。祛风湿,散瘀血,解毒。用于风湿,劳伤痹痛,无名肿毒,狂犬咬伤。

## 猫乳属　Rhamnella Miq.

**猫乳**　山黄(安徽),鼠矢枣(浙江),糯米牙(湖北),长叶绿柴(中国树木分类学)

**Rhamnella franguloides** (Maxim.) Weberb.——*Microrhamnus frangulodes* Maxim.

生于海拔1 100米以下的山坡、路旁或林中。分布于河北、山西、陕西、山东、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北、湖南。

根及全株:补气益精。用于劳伤乏力,疥疮,小儿脓疱疮。

**西藏猫乳**　生等(藏药名)

**Rhamnella gilgitica** Mansf. et Melch.

生于海拔2 600—2 900米的杂木林中、灌丛中。分布于西南。

木材(生等):微苦,凉。凉血,消肿。用于风湿关节痛,黄水病,高山多血症。

**多脉猫乳**　香叶树(四川),秤杆木(贵州)

**Rhamnella martinii** (Lévl.) Schneid.——*Rhamnus martinii* Lévl.

生于山坡灌丛中。分布于西南及湖北、广东。

根、茎皮、叶:用于劳伤。

## 鼠李属　Rhamnus L.

**铁马鞭**

**Rhamnus aurea** Hepp1.

生于海拔 1 800—2 400 米的山坡林中。分布于云南。

全株：活血化瘀。

**陷脉鼠李**　地马桑、鼠李(贵州)

**Rhamnus bodinieri** Lévl

生于山坡灌丛中。分布于广西、贵州、云南。

全株：祛风杀虫，解毒止痢。

**山绿柴**

**Rhamnus brachypoda** C. Y. Wu ex Y. L. Chen

生于海拔 500—1 700 米的山坡、路旁、灌丛或山谷疏林中。分布于浙江、江西、福建、湖南、广东、广西、贵州。

根：外用于牙痛。

**药鼠李**

**Rhamnus cathartica** L.

生于海拔 1 200—1 400 米的山地河谷或山坡灌丛中。分布于新疆裕民和霍城。

果实：用于慢性便秘。

**长叶冻绿**　绿柴、山黑子(湖北)，山黄、苦李根(广西)，黄药(开宝本草)

**Rhamnus crenata** Sieb et Zucc.——*Frangula crenata*(Sieb. et Zucc.) Miq.

生于海拔 2 000 米以下的山地林下或灌丛中。分布于华东、中南及陕西、四川、贵州、云南。

根(黎罗根)：苦、辛，平。有毒。清热利湿，杀虫止痒。外用于疥疮，顽癣，湿疹，脓疱疮。

**鼠李**　臭李子(吉林)，老鹳眼(辽宁)，大绿(河北)，女儿茶、牛李子(救荒本草)，牙西拉(蒙语)

**Rhamnus davurica** Pall

生于海拔 1 800 米以下的山谷、山坡疏林中。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏。

根(鼠李根)：有毒。用于龋齿，口疳，发背肿毒。　树皮(鼠李皮)：苦，凉。有小毒。清热通便。用于风痹，热毒肿痛，便秘。　果实(鼠李)：苦、凉，平。有小毒。清热利湿，止咳祛痰，解毒杀虫。用于水肿胀满，咳喘，龋齿，瘰疬，痈、疖、疥、癣。

附　注：功效相同的有**乌苏里鼠李 R. davurica** Pall. var. **nipponica** Makino，分布于东北及河北、内蒙古、山东、江苏；**朝鲜鼠李 R. koraiensis** Schneid.，分布于辽宁、吉林、山东；**东北鼠李 R. yoshinoi** Makino，分布于吉林、辽宁、河北、山西、山东。

**刺鼠李**　叶李子(四川)

**Rhamnus dumetorum** Schneid.

生于海拔 900—3 300 米的山坡灌丛或林下。分布于西南及陕西、甘肃、安徽、浙江、江西、湖北。

果实(刺鼠李)：泻下。在四川康定民间作为泻药。

**柳叶鼠李**　窄叶鼠李、黑格兰(内蒙古、陕西)，红木鼠李(山西)，黑疙瘩(秦岭植物志)，哈日-牙日拉(蒙语)

**Rhamnus erythroxylon** Pall.

生于海拔 1 000—1 200 米的山坡或山谷灌丛中。分布于华北及陕西、甘肃、青海。

叶：甘，寒。消食健胃，清热泻火。用于消化不良，泄泻。

**贵州鼠李**　铁滚子、紫棍柴(贵州)，无刺鼠李(中国高等植物图鉴)

**Rhamnus esquirolii** Lévl.

野生于灌丛中或栽培。分布于湖北、广西、四川、贵州、云南。

根、叶，果实：活血消积，理气止痛。用于腹痛，食积，月经不调。

附　注：功效相同的有**小冻绿树 R. rosthornii** Pritz.，分布于陕西、甘肃、湖北、广西、四川、贵州、云南。

**木子花**

**Rhamnus esquirolii** Lévl. var. **glabrata** Y. L. Chen et P. K. Chou

生于海拔 500—1 800 米的山地、林缘及灌丛中。分布于四川、贵州。

叶、果实：外用于刀伤。

**欧鼠李**　药绿柴(新疆)，药炭鼠李(中国树木分类学)

**Rhamnus fragula** L.

生于林缘、河岸或湖近。分布于新疆玛纳斯、额尔齐斯河。

树皮：催吐，通便。用于腹痛，便秘。

**黄鼠李**　紫背药(广西)

**Rhamnus fulvo-tincta** Metcalf

生于海拔 400 米左右的石灰岩山坡灌丛或林缘。分布于广东、广西、贵州。

全株：解毒，祛风湿。用于乳蛾，风湿痹痛。

**川滇鼠李**　刺绿皮(植物名实图考)，金沙鼠李(云南种子植物名录)

**Rhamnus gilgiana** Heppl.

生于海拔 2 200—2 700 米的杂木林下或灌丛中。分布于四川、云南。

叶、果实：清热解毒，通便顺气。

**圆叶鼠李**　偶栗子(山东)，冻绿树、黑旦子(安徽)，山绿柴、冻绿(浙江)

**Rhamnus globosa** Bunge

生于海拔 2 000 米以下的山坡、山谷灌丛中。分布于辽宁、河北、山西、陕西、甘肃、宁夏、山东、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖南。

根皮、茎、叶(冻绿刺)：用于瘰疬，哮喘，寸白虫病。

**海南鼠李**

**Rhamnus hainanensis** Merr. et Chun

生于灌丛中。分布于海南。

根、果实：消气，顺气，活血，祛痰。

**异叶鼠李**　崖枣树(中国树木分类学)

**Rhamnus heterophylla** Oliv.

生于海拔 300—1 500 米以下的山坡灌丛或林缘。分布于陕西、甘肃、湖北、四川、贵州、云南。

根、枝、叶(女儿茶)：涩、微苦，凉。清热利湿，凉血，止血。用于痢疾，吐血，咯血，痔血，血崩，带下病，暑热烦渴。

**湖北鼠李**

**Rhamnus hupehensis** Schneid.

生于山坡林缘、路旁。分布于湖北、贵州。

果实：利水，消食。

**薄叶鼠李**

**Rhamnus leptophylla** Schneid.

生于海拔700—2 100米的山坡、山谷林中及路边。分布于中南、西南及陕西、山东、安徽、浙江、福建。

根(绛梨木根)：苦，寒。消食，行水，祛瘀。用于食积饱胀，水肿，经闭。　叶(绛梨木叶)：用于食积饱胀。　果实(绛梨木子)：苦，寒。有毒。消食，行水，通便。用于食积饱胀，水肿，便秘。

附　注：功效相同的有**帚枝鼠李 R. virgata** Roxb.，分布于西南。

**长柄鼠李**

**Rhamnus longipes** Merr. et Chun

生于海拔500—1 700米的山地密林中。分布于广东、海南、广西、云南。

根皮或全株：清热泻下，消瘰疬。

**尼泊尔鼠李**　　染布叶(浙江)，纠序鼠李(广西植物名录)

**Rhamnus nepalensis** (Wall.) Laws.——*Ceanothus nepalensis* Wall.

生于海拔1 800米以下的疏林或灌丛中。分布于浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南、西藏。

叶、果实：外用于疮疥。

**小叶鼠李**　　黑格铃(河北、内蒙古)，大绿(植物学杂志)，牙黑日-牙西拉(蒙语)

**Rhamnus parvifolia** Bunge

生于海拔400—2 300米的向阳山坡、草丛或灌丛中。分布于东北、华北及陕西、宁夏、山东、河南。

果实：苦、凉。有小毒。清热泻下，消瘰疬。用于腹满便秘，疥癣，瘰疬。

**皱叶鼠李**　　乌茶(甘肃)

**Rhamnus rugulosa** Hemsl.

生于山坡。分布于山西、陕西、甘肃、安徽、江西、湖北、湖南、广东、四川。

果实：解热泻下。用于肿毒，疮疡。

**甘青鼠李**　　粗叶鼠李(秦岭植物志)

**Rhamnus tangutica** J. Vass

生于海拔1 300—3 700米的山谷林下或灌丛中。分布于陕西、甘肃、河南、四川、云南、西藏。

全株：清热，解毒，活血。

**冻绿**　　黑疙瘩(陕西)，油葫芦子、黑狗丹(浙江)，大头头(河南)，冻木刺(湖北)

**Rhamnus utilis** Decne.

生于海拔2 000米以下的山坡、山谷、沟边、路旁或林中。分布于中南及河北、山西、陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、福建、四川、贵州。

根、根皮、树皮(鹿蹄根)：苦，寒。清热凉血，解毒。用于疥疮，湿疹，痞胀腹痛，跌打损伤。　**种子**：用于食积腹胀。

## 雀梅藤属　Sageretia Brongn.

**纤细雀梅藤**　　铁藤、筛子簸箕果(云南)

**Sageretia gracilis** J. R. Drumm. et Sprague

生于海拔 1 200—3 400 米的山地和山谷灌丛或林中。分布于广西、云南、西藏。

根：用于皮肤癌，乳房瘤，淋巴囊肿，水肿。

**钩状雀梅藤**　　猴栗(浙江)岩猴藤、大胖药(云南)

**Sageretia hamosa** (Wall.) Brongn.——*Ziziphus hamosa* Wall.

生于山坡灌丛或林中。分布于西南及浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西。

根：祛风湿，活血祛瘀。　果实：苦，寒。有毒。用于疮疡。

**梗花雀梅藤**　　红雀梅藤、红藤(广西)，皱棉(四川)，柄花雀梅藤(云南)

**Sageretia henryi** J. R. Drumm. et Sprague

生于海拔 400—2 500 米的山坡林下或灌丛中。分布于陕西、甘肃、浙江、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

果实：苦，寒。清热，降火。

**亮叶雀梅藤**　　倒勾茶(湖北)

**Sageretia lucida** Merr.

生于海拔 300—800 米的山谷疏林中。分布于华南及福建、湖北。

叶：用于泄泻。　果实：健胃。

**刺藤子**

**Sageretia melliana** Hand.-Mazz.

生于海拔 1500 米以下的山地林缘或林下。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、贵州、云南。

根：用于跌打损伤，风湿痹痛。

**少脉雀梅藤**　　对节刺(河南、贵州)，对节木(中国树木分类学)

**Sageretia paucicostata** Maxim.

生于山坡、山谷、林缘或疏林中。分布于西南及河北、山西、陕西、甘肃。

果皮、果仁：祛风除湿。

**对节刺**　　铁勒鞭棵棵(四川巫山)，沙糖果(贵州)

**Sageretia pycnophylla** Schneid.

生于山坡灌丛中。分布于陕西、甘肃、四川、贵州。

根、果实：清热解毒，理气止痛。用于咳嗽，胃痛，无名肿毒。

**皱叶雀梅藤**　　九把伞(湖南)，绣毛雀梅藤(四川)

**Sageretia rugosa** Hance

生于海拔 1 600 米以下的山地灌丛或林中，山地、平地也有散生。分布于湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根：舒筋活络。用于风湿痹痛。

**雀梅藤**　双角刺(江苏)，对节刺、碎米子(浙江)，酸味(广州)

**Sageretia thea** (Osbeck) Johnst.——*Rhamnus thea* Osbeck; *S. theezans* (L.) Brongn.

生于山坡路旁。分布于江苏、安徽、浙江、江西、台湾、湖北、广东、广西、四川、云南。

根：甘，淡，平。行气化痰。用于咳嗽气喘，胃痛。　茎、叶：酸，凉。消肿解毒，止痛；外用于疮疡肿毒。烧、烫伤。

**毛叶雀梅藤**

**Sageretia thea** (Osbeck) Johnst. var. **tomentosa** (Schneid.) Y. L. Chen et P. K. Chou——*S. theezans* (L.) Brongn. var. *tomentosa* Schneid.

生于山坡灌丛中。分布于甘肃、安徽、浙江、江西、福建、台湾、广东、广西、四川、云南。

根：用于肝炎，伤寒。　全株：外用于跌打损伤。

## 翼核果属　Ventilago Gaertn.

**海南翼核果**　斜叶翼核果(云南)

**Ventilago inaequilateralis** Merr. et Chun

生于低海拔的山谷林中。分布于海南、广西、贵州、云南。

全株：用于蛇咬伤。

**翼核果**　穿破石(广西)，血风根、青筋藤、扁果藤(海南植物志)

**Ventilago leiocarpa** Benth.

生于海拔1 500米以下山间沟边的疏林下或灌丛中。分布于福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、云南。

根：苦，温。养血祛风，舒筋活络。用于气血亏损，月经不调，风湿痹痛，四肢麻木，跌打损伤。

附　注：功效相同的有**毛叶翼核果 V. leiocarpa** Benth. var. **pubescens** Y. L. Chen et P. K. Chou，分布于广西、贵州、云南。

## 枣属　Ziziphus Mill.

**印度枣**　麦抱(广西)，滇枣(中国树木分类学)，褐果枣、弯叶枣(云南种子植物名录)

**Ziziphus incurva** Roxb

生于海拔1 000—2 500米的混交林中。分布于广西、贵州、云南、西藏。

根：舒筋活络。用于跌打损伤。

**枣**　枣子(俗称)，枣子树(通称)，枣树(陕西)，红枣树、刺枣(四川)

**Ziziphus jujuba** Mill.

通常栽培于海拔1 700米以下的山区、丘陵、平原。全国各地均有栽培。

果实(大枣)：甘，温。补中益气，养血安神。用于血虚气弱、脾胃虚弱、泄泻。　根(枣树根)：甘，平。祛风，活血，调经。用于关节酸痛，胃痛，吐血，血崩，月经不调，风疹，丹毒，癣疹。　树皮(枣树皮)：苦、涩，温。收敛，止泻，祛痰，镇咳，解毒，止血。用于痢疾，泄泻，崩漏，咳嗽，刀伤出血。　叶(枣叶)：甘，温。用于小儿外感发热，疮疖。　果核(枣核)：苦，平。用于臁疮，走马牙疳。

附　注：大枣为《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**无刺枣**　　大枣、大甜枣(通称)

**Ziziphus jujuba** Mill. var. **inermis** (Bunge) Rehd.——*Z. vulgaris* Lam. var. *inermis* Bunge

生于海拔 1 600 米以下的山区、丘陵，平原。分布于华东及吉林、辽宁、河北、山西、陕西、甘肃、新疆、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

功效同枣。

**酸枣**　　棘、酸枣树、角针(山东)，硬枣、山枣树(河南)，哲日力格-查巴嘎(蒙语)

**Ziziphus jujuba** Mill. var. **spinosa** (Bunge) Hu ex H. F. Chow——*Z. vulgaris* Lam. var. *spinosa* Bunge

生于海拔 1 000 米以下的向阳或干燥山坡、山谷的沟边。分布于华北、西北及辽宁、江苏、安徽、河南、湖北、贵州。

种子(酸枣仁)：甘、酸，平。补肝，宁心，敛汗，生津。用于虚烦不眠，惊悸怔忡，虚汗，失眠健忘。　根皮(酸枣根皮)：涩，温。涩精止血。用于便血，高血压症，头晕头痛，遗精，带下病，烧、烫伤。　叶(棘叶)：用于臁疮。　花(棘刺花)：苦，平。用于金疮，视物昏花。　棘刺(棘针)：辛，寒。消肿，溃脓，止痛。用于痈肿有脓，心腹痛，尿血，喉痹。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**滇刺枣**　　酸枣(广东、云南)，缅枣(云南)

**Ziziphus mauritiana** Lam.

生于海拔 1 800 米以下的山坡、丘陵、河边湿润林中或灌丛中。分布于广东、海南、广西、四川、云南。福建、台湾也有栽培。

树皮(滇刺枣)：涩、微苦，平。解毒生肌。用于烧、烫伤。

## 98. 葡萄科　Vitaceae

### 酸蔹藤属　Ampelocissus Planch.

**酸蔹藤**　　大九节铃、艾叶酸蔹藤、牛角天麻、铜皮铁箍(云南)

**Ampelocissus artemisiaefolia** Planch.

生于海拔 2 000 米的河谷灌丛中。分布于四川、云南。

根(大九节铃)：辛、涩、微麻，凉。续筋接骨，清热解毒，止血止痛。用于骨折，刀枪伤，烧伤，痈疖，痔疮出血。

## 蛇葡萄属　Ampelopsis Michx.

**乌头叶蛇葡萄**　过山龙(陕西)、草葡萄、草血藤、洋葡萄、狗葡萄(全国中草药汇编)

**Ampelopsis aconitifolia** Bunge

生于山坡、路旁。分布于华北及陕西、甘肃、宁夏、山东、河南、湖北。

根皮：涩、微辛，平。散瘀消肿，祛腐生肌。用于骨折，跌打损伤，痈肿，风湿关节痛。

**掌裂蛇葡萄**　金线吊蛤蟆、石蛤蟆(全国中草药汇编)

**Ampelopsis aconitifolia** Bunge var. **glabra** Diels et Gilg——*A. aconitifolia* Bunge f. *glabra* (Diels et Gilg) Kitag.

生于山坡，路边。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、山东、江苏、安徽、湖北、四川。

块根(独脚蟾蜍)：甘、苦，寒。清热解毒，豁痰。用于结核性脑膜炎，痰多胸闷，疮疡痈肿。

附　注：块根为白敛的混用品。

**蓝果蛇葡萄**　大接骨丹(陕西)，闪光蛇葡萄、过山龙(全国中草药汇编)

**Ampelopsis bodinieri** (Lévl. et Vant.) Rehd. ——*Vitis bodinieri* Lévl. et Vant.

生于海拔 400—1 300(—3 000) 米的山谷或沟边。分布于西南及陕西、甘肃、河南、湖北、湖南。

根(上山龙)：酸、涩、微辛，平。消肿解毒，止痛止血，排脓生肌，祛风除湿。用于跌打损伤，骨折，风湿腿痛，便血，崩漏，带下病。

附　注：功效相同的有**灰毛蛇葡萄 A. bodinieri** (Lévl. et Vant.) Rehd. var. **cinerea** (Gagnep.) Rehd.，分布于甘肃南部、湖北、四川、贵州。

**东北蛇葡萄**　蛇白蔹、假葡萄、山葡萄、绿葡萄、见毒消(全国中草药汇编)

**Ampelopsis brevipedunculata** (Maxim.) Trautv.——*Cissus brevipedunculata* Maxim.

生于山坡灌丛中或河边疏林中。分布于吉林、辽宁。

根皮：辛、苦，凉。清热解毒，祛风活络，止痛止血。用于风湿关节痛，呕吐，泄泻，溃疡，跌打损伤，疮疡肿毒，外伤出血，烧、烫伤。

**牯岭蛇葡萄**　铁骨扇(广西)

**Ampelopsis brevipedunculata** (Maxim.) Trautv. var. **kulingensis** Rehd.

生于海拔 700—900 米的山坡疏林中、石上或灌丛中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

根、茎：利尿，消肿，止血。用于无名肿毒，慢性肾炎。

**广东蛇葡萄**　白蔹茶、白劝须、辣梨茶(全国中草药汇编)

**Ampelopsis cantoniensis** (Hook. et Arn.)Planch.——*Cissus cantoniensis* Hook. et Arn.

生于山坡、林下。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南。

全株(山甜藤)：甘、微苦，凉。清热解毒，解暑。用于暑热感冒，皮肤湿疹。

**羽叶蛇葡萄**　鱼藤(湖北)，羽叶牛果藤(云南)

**Ampelopsis chaffanijonii** (Lévl.) Rchd.——*Vitis chaffanijonii* Levl.

生于山坡灌丛中。分布于安徽、江西、福建、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

茎藤：祛风除湿。用于气窜作痛，劳伤，风湿疼痛。

**三裂蛇葡萄**　见肿消(陕西)，五爪金、五爪龙、破石珠(全国中草药汇编)，赤木通(植物名实图考)

**Ampelopsis delavayana** (Franch.) Planch. ex Franch.——*Vitis delavayana* Franch.

生于低山灌丛或林缘。分布于西南及陕西、甘肃、江苏、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广西。

根皮(金刚散)：辛，平。消肿止痛，舒筋活血，止血。用于外伤出血，骨折，跌打损伤，风湿关节痛。

附　注：功效相同的有**毛三裂蛇葡萄** **A. delavayana** (Franch.) Planch. ex Franch. var. **gentiliana** (Lévl. et Vant.) Hand.-Mazz.，分布于陕西南部、甘肃南部、湖北、四川、贵州。

**柔毛蛇葡萄**　红芥(云南)

**Ampelopsis delavayana** Planch. ex Franch. var. **mollissima** C. Y. Wu

生于海拔 1 200—2 000 米的沟边或林缘潮湿处。分布于云南武定。

根：苦、麻，湿。有毒。续筋骨。用于骨折。

**显齿蛇葡萄**　甜茶藤、田婆茶(全国中草药汇编)

**Ampelopsis grossedentata** (Hand.-Mazz.) W. T. Wang——*A. cantoniensis* (Hook. et Arn.) Planch. var. *grossedentata* Hand.-Mazz.

生于海拔 400—1 300 米的山地灌丛中、岩石上、沟边。分布于江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、贵州、云南。

金株(甜茶藤)：甘、淡，凉。清热解毒。用于黄疸，风热感冒，咽喉肿痛，痈疖。

附　注：闽西北一带用茎、叶作解暑饮料。

**葎叶蛇葡萄**　小接骨丹、活血丹(陕西)，葎叶山葡萄(全国中草药汇编)

**Ampelopsis humulifolia** Bunge

生于低山坡或沟谷。分布于辽宁、河北、山西、陕西、福建、河南。

根皮(七角白蔹)：辛，热。活血散淤，解毒，生肌长骨，祛风除湿。用于跌打损伤，骨折，疮疖肿痛，风湿关节痛。

附　注：**三叶白蔹** **A. humulifolia** Bunge f. **trisecta** (Nakai) Kitag.，分布于东北及河北、内蒙内。

**异叶蛇葡萄**　光叶蛇葡萄(吉林)

**Ampelopsis humulifolia** Bunge var. **heterophylla** (Thunb.) K. Koch——*Vitis heterophylla* Thunb.; *A brevipedunculata* (Maxim.) Trautv. var. *maximowiczii* (Regel) Rehd.

生于林缘或林中。分布于吉林、辽宁、江苏、安徽、浙江、福建、台湾、湖北、湖南、广东。

根皮：用于风湿关节痛，呕吐，泄泻，溃疡病；外用于疮疡肿毒，外伤出血，烧、烫伤。

**白蔹**　山地瓜、野红薯、白根、王爪藤(全国中草药汇编)，鹅抱旦(云南种子植物名录、植物名实图考)

**Ampelopsis japonica** (Thunb.) Makino——*Vitis japonica* Thunb.

生于海拔1 000米以下的山坡及路旁杂草丛中。分布于东北、华北、华东、西南及陕西、河南、湖北、湖南。

块根(白蔹)：苦，平。清热解毒，消肿止痛。用于咳嗽痰喘，带下病，痔漏；外用于疮疖肿毒，瘰疬，跌打损伤，烧、烫伤。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**大叶蛇葡萄**　藤茶(贵州)，大叶牛果藤(云南)

**Ampelopsis megalophylla** Diels et Gilg

生于海拔1 300—2 400米的山地林中或灌丛中。分布于陕西、甘肃、福建、湖北、四川、贵州、云南。

根、叶：酸、涩，平。清热利湿，活血化瘀。用于痢疾，泄泻，小便淋痛。

附　注：**毛枝蛇葡萄 A. megalophylla** Diels et Gilg var. **puberula** W. T. Wang，分布于福建、湖南、广西、四川、贵州。

**爬墙风**

**Ampelopsis mirabilis** Diels et Gilg

生于山坡灌丛中。分布于贵州东南部。

根：祛风除湿。

**蛇葡萄**　山天萝(浙江)

**Ampelopsis sinica** (Miq.) W. T. Wang——*Vitis sinica* Miq.

生于山坡、林缘、路旁。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根、藤(蛇葡萄)：苦，平。清热解毒，祛风活络，止痛，止血。用于风湿关节痛，呕吐，泄泻，溃疡；外用于跌打损伤，疮疖肿毒，外伤出血，烧、烫伤。

附　注：功效相同的有**光叶蛇葡萄 A. sinica** (Miq.) W. T. Wang var. **hancei** (Rehd.) W. T. Wang，分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西。

## 乌蔹莓属　Cayratia Juss.

**角花乌蔹莓**　九龙根、九牛子(广西)

**Cayratia corniculata** (Benth.) Gagnep.——*Vitis corniculata* Benth.

生于山坡灌丛或山谷林中。分布于江西、福建、台湾、广东、海南、广西。

块根(九牛薯)：甘，平。润肺，止咳，化痰，止血。用于肺痨，咳嗽，血崩。

**膝曲乌蔹莓**　大麻藤果(通称)

**Cayratia geniculata** (Bl.) Gagnep.——*Cissus geniculata* Bl.

生于山野灌丛中。分布于海南、广西、贵州、云南。

茎：平喘。用于哮喘。

**乌蔹莓**　母猪藤(通称)，五爪龙、五叶藤、五龙草(全国中草药汇编)

**Cayratia japonica** (Thunb.) Gagnep.——*Vitis japonica* Thunb.

生于海拔1 100米以下的山谷或林下。分布于华东、中南及陕西、甘肃、四川、贵州、云南。

根或全草(乌蔹莓)：苦、酸，寒。清热解毒，利湿，消肿，活血化瘀。用于咽喉肿痛，目翳，咯血，尿血，痢疾；外用于痈肿，丹毒，痄腮，跌打损伤，毒蛇咬伤。

附　注：功效相似的有**灰毛乌蔹莓 C. japonica** (Thunb.) Gagnep. var. **canescens** W. T. Wang；**锈毛乌蔹莓 C. japonica** (Thunb.) Gagnep. var. **ferruginea** W. T. Wang；**毛乌蔹莓 C. mollis** (Wall.) C. Y Wu，均分布于云南。

**车索藤**　毛叶乌蔹莓、五爪龙、母猪茶(全国中草药汇编)

**Cayratia japonica** (Thunb.) Gagnep. var. **pubifolia** Merr. et Chun

生于山坡林缘。分布于湖南、广东、广西。

全草(红母猪藤)：淡，寒。清热毒，消痈肿。用于小便出血，目赤肿痛，肺痈，跌打损伤。

**大叶乌蔹莓**　野葡萄、绿叶扁担藤(全国中草药汇编)

**Cayratia oligocarpa** (Lévl. et Vant.) Gagnep.——*Vitis oligocarpa* Lévl. et Vant.

生于山地林中、常攀援于大树上。分布于浙江、江西、福建、湖北、湖南、四川、贵州。

根、叶(大母猪藤)：微苦，平。祛风湿，通经络。用于牙痛，风湿关节痛，无名肿毒。

附　注：功效相同的有**樱叶乌蔹莓 C. oligocarpa** (Lévl. et Vant.) Gagnep. var. **glabra** (Gagnep.) Rehd.，分布于浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

**尖叶乌蔹莓**　母猪藤(陕西)

**Cayratia pseudotrifolia** W. T. Wang

生于海拔1 000米左右的山坡林下或沟谷两岸。分布于陕西、甘肃、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

根：苦，寒。有毒。清热解毒。外用于蛇咬伤，疮毒，跌打损伤。

**细叶乌蔹莓**　五叶藤、五爪金龙(全国中草药汇编)

**Cayratia tenuifolia** (Wight et Arn.) Gagnep.——*Vitis tenuifolia* Wight et Arn

生于山坡灌丛中。分布于海南、云南。

全株：淡，寒。清热解毒，利尿消肿。用于痈疮肿毒，跌打损伤，毒蛇咬伤，水肿，尿血，目赤肿痛。

**三叶乌蔹莓**　狗脚迹、三爪龙(云南)，小拉蛇、蜈蚣藤(全国中草药汇编)

**Cayratia trifolia** (L.) Domin.——*Vitis trifolia* L.

生于海拔800—1 200米的山坡灌丛中。分布于海南、云南。

根：辛，温。解毒止痛，散瘀消肿。用于跌打损伤，骨折，风湿骨痛，腰肌劳损，湿疹，皮肤溃疡，疮疖。

**圆叶乌蔹莓**　三爪龙、小黑牛(云南)

**Cayratia trifolia** (L.) Domin var. **quinquefoliola** W. T. Wang

生于海拔1 000—2 100米的山坡、林地、灌丛中。分布于云南南部。

根：散瘀活血，祛风除湿。用于跌打损伤，骨折，风湿骨痛，腰肌劳损，湿疹，疮疖。

## 白粉藤属　Cissus L.

**苦朗藤**　毛叶白粉藤(中国高等植物图鉴)，东爬藤、葫芦叶、粗壳藤、左边藤(全国中草药汇编)

**Cissus assamica** (Laws.) Graib——*Vitis assamica* Laws.

生于山坡灌丛中。分布于西南及江西、福建、湖北、湖南、广东、海南、广西。

根(风叶藤)：淡、微涩，平。拔毒消肿，散瘀止痛。用于跌打损伤，扭伤，风湿关节痛，骨折，痈疮肿毒。

附　注：孕妇忌服。

**粉藤果**　小花叶、白葡萄、大绿藤(云南)

**Cissus glaberrima** Planch.

生于海拔320—1 500(—2 000)米的山谷林中。分布于海南、云南。

根、藤：用于跌打损伤，骨折。

**翅茎白粉藤**　方茎宽筋藤(全国中草药汇编)

**Cissus hexangularis** Thorel ex Planch.

生于山间疏林中。分布于福建、广东、海南、广西。

藤(六方藤)：微苦，凉。祛风通络，散瘀活血。用于风湿关节痛，腰肌劳损，跌打损伤。

**紫茎藤**　粪虫叶、花斑叶、抽筋藤、花脸藤(云南)，青紫葛(拉汉英种子植物名称)

**Cissus javana** DC.——*C. discolor* Bl.

生于山坡林中。分布于海南、四川、云南。

全株(花斑叶)：辛，温。疏风解毒，消肿散瘀，续筋接骨。用于癣疹，湿疹，过敏性皮炎，骨折筋伤，跌打损伤，风湿麻木。

**戟叶白粉藤**　舒筋藤、四方钻、万戈藤、翼枝白粉藤(全国中草药汇编)

**Cissus hastata** (Miq.) Planch.——*Vitis hastata* Miq.; *C. pteroclacla* Hayata

生于山谷林下。分布于福建、台湾、广东、海南、广西。

藤(四方藤)：微酸、涩，平。祛风湿，舒筋络。用于风湿痹痛，腰肌劳损，筋脉拘急。

**鸡心藤**

**Cissus kerrii** Craib——*C. medeccoides* Planch. var. *subintegra* Gagnep.; *C. medeccoides* Planch. var. *Kerrii* Craib

生于山谷灌丛中。分布于广东、海南、广西、云南。

根、藤(独脚乌桕)：甘、苦，凉。清热解毒，散结行血。用于水肿，痈疽疮疡，瘰疬，跌打损伤。　叶(独脚乌桕叶)：苦，寒。有小毒。拔毒消肿。用于痈疮，瘰疬，疔疽。

**白粉藤**　伸筋藤(广西)，白鼻藤(云南)

**Cissus repens** Lam.

生于山沟边灌丛中。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

根：淡、微辛，凉。清热解毒，消肿止痛，强壮，补血。用于咽喉痛，疔疮，蛇咬伤。　全株(白粉藤)：苦，寒。拔毒消肿。用于痰火瘰疬，水肿，痢疾；外用于蛇伤。

## 爬山虎属　Parthenocissus Planch.

**川鄂爬山虎**　猪蹄甲子(陕西)，飞天香(湖北)，红叶爬山虎(秦岭植物志)

**Parthenocissus henryana** (Hemsl.) Diels et Gilg——*Vitis henryana* Hemsl.

生于山坡林中。分布于陕西、湖北、四川、贵州、云南。

全株：酸、苦，寒。破血散瘀，消肿解毒。用于疮毒。

**异叶爬山虎**　吊岩风、上木蛇、上木三叉虎、上竹龙、上树蜈蚣(广西)

**Parthenocissus heterophyllus** (Bl.) Merr.——*Ampelopsis heterophyllus* Bl.

生于山林岩石上或乔木上。分布于上海、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根、茎(吊岩风)：酸、涩，温。祛风通络，活血止痛。用于风湿筋骨痛，带下病，产后瘀血腹痛；外用于骨折，跌打肿痛，疮疖。

**三叶爬山虎**　岩山甲、大血藤、三窝草(云南)，小红藤(中药大辞典)

**Parthenocissus himalayana** (Royle) Planch.——*Ampelopsis himalayana* Royle

生于海拔 1 200—2 000 米的山坡林下阴湿处。分布于西南及陕西、甘肃、河南、湖北、湖南、广东。

全草(三爪金龙)：辛，温。接骨祛瘀，驱风，除湿。用于风湿筋骨痛；外用于骨折，跌打损伤。

附　注：功效相似，在云南药用的有**毛脉三叶爬山虎 P. himalayana** (Royle) Planch. var. **chinensis** Gagnep.，分布于云南；**红三叶爬山虎 P. himalayana** (Royle) Planch. var. **rubrifolia** (Lévl. et Vant.) Gagnep.，分布于陕西、甘肃、湖北、四川、云南；**黄毛三叶爬山虎 P. himalayana** (Royle) Planch. var. **vestita** Hand.-Mazz.，分布于云南。

**绿爬山虎**　大绿藤(云南)

**Parthenocissus laetivirens** Rehd.

生于山坡路旁、溪边、灌丛中，攀援于其他植物上。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

藤(大绿藤)：辛，温。舒筋活络，消肿散瘀，接骨。用于跌打损伤，骨折，风湿关节痛，腰肌劳损。

**栓翅爬山虎**

**Parthenocissus suberosa** Hand.-Mazz.

生于山坡林下。分布于贵州。

根、茎：破瘀血，消肿毒。

**爬山虎**　多脚草、土鼓藤、飞天蜈蚣、枫藤(云南)，常春藤(植物名实图考)

**Parthenocissus tricuspidata** (Sieb et Zucc.) Planch.——*Ampelopsis tricuspidata* Sieb. et Zucc.

生于山坡、沟边湿处或岩壁上，庭院常有栽培。分布于全国各地。

根、茎：甘，温。活血通络，祛风，止痛，解毒。用于风湿关节痛，跌打损伤，痈疖肿毒。

## 崖爬藤属 Tetrastigma Planch.

**七小叶崖爬藤**

**Tetrastigma delavayi** Gagnep.

生于林中潮湿处。分布于广西、贵州、云南。

根、藤(一把箩)：酸、麻，寒。清热利尿，散瘀活血，祛风除湿。用于小便涩痛，淋证，风湿骨痛，跌打损伤，蛇咬伤，疮疖肿毒。

附　注：功效相同的有**福贡崖爬藤 T. delavayi** Gagnep. f. **majus** W.T. Wang，分布于云南。

**海南崖爬藤**

**Tetrastigma hainanense** Chun et How

生于山坡林中。分布于海南、广西。

全株：用于骨折，疔疮。

**显孔崖爬藤**

**Tetrastigma lenticellatum** C. Y. Wu

生于深山沟边及湿润处。分布于云南南部。

根、茎(大五爪金龙)：辛，温。祛风，活血，消肿。用于风湿关节痛，口腔破溃，鼻塞流涕，跌打损伤，骨折。

附　注：云南特有药用植物。

**三叶爬崖藤**　丝线吊金钟(海南)，石老鼠、石猴子(全国中草药汇编)，蛇附子(植物名实图考)

**Tetrastigma hemsleyanum** Diels et Gilg

生于山谷疏林中或石壁阴湿处。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

块根、全草(三叶青)：微苦，平。清热解毒，祛风化痰，活血止痛。用于白喉，小儿高热惊厥，肝炎，痢疾，毒蛇咬伤，乳蛾，瘰疬，带下病，痈疮，跌打损伤。

附　注：浙江民间用块根治肺癌。

**蒙自崖爬藤**　滇琼崖爬藤(拉汉英种子植物名称)

**Tetrastigma henryi** Gagnep.

生于海拔 1 400—1 900 米的山坡林中。分布于云南。

块根、根：活血化瘀，解毒。

附　注：功效相同的有**柔毛崖爬藤 T. henryi** Gagnep. **var. mollifolium** W. T. Wang，分布于云南。

**狭叶崖爬藤**　　五虎下山、雪里高(云南),白背崖爬藤(云南种子植物名录)

**Tetrastigma hypoglaucum** Planch. ex Franch

生于山谷林下阴湿处、攀援于树上或崖壁上。分布于西南及湖北、湖南、广西。

全草(五爪金龙):苦、涩,温。祛风通络,活血止痛。用于风湿骨痛,跌打损伤,骨折,外伤出血。

**毛狭叶崖爬藤**

**Tetrastigma hypoglaucum** Planch. ex Franch. var. **puberulum** W. T. Wang et Cao

生于海拔 2 300—2 600 米的山坡林中。分布于云南、西藏。

根、全草:用于风湿关节痛,跌打损伤。

**毛枝崖爬藤**

**Tetrastigma obovatum** (Laws ) Gagnep ——*Vitis obovatum* Laws.

生于灌木林中。分布于贵州、云南。

根(红五加):辛、涩,温。行气活血,强筋壮骨,用于劳伤,骨折。

**崖爬藤**　　爬山虎、红五加、藤五加、五爪金龙(全国中草药汇编)

**Tetrastigma obtectum** (Wall.) Planch.——*Vitis obtectum* Wall.

生于海拔 1 200 米以下的山坡林下阴湿处、崖壁上。分布于中南、西南及陕西。

根或全草(走游草):苦、涩,温。祛风通络,活血止痛。用于跌打损伤,风湿麻木,关节筋骨痛。

附　注:功效相同的有**巧家崖爬藤 T. obtectum** (Wall.) Planch. var. **trichocarpum** Gagnep., 分布于云南。

**无毛崖爬藤**　　光叶崖爬藤、毛五加、藤五加、土树蜈蚣、铜丝线(全国中草药汇编),钝叶崖爬藤(海南植物志)

**Tetrastigma obtectum**(Wall.)Planch. var. **glabrum** (Lévl. et Vant.)Gagnep.

生于密林中。分布于江西、福建、台湾、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根、全草(九节莲):辛、酸,温。有小毒。活血解毒,祛风除湿。用于头痛,身痛,风湿麻木,游走性痛,疮毒。

**毛叶崖爬藤**

**Tetrastigma obtectum**(Wall ) Planch var. **pilosum** Gagnep.

生于疏林中或路旁。分布于陕西、湖北、湖南、广西、贵州、云南。

块根及全株:祛风除湿,通经通络,活血止痛。用于瘿瘤,跌打肿痛。

**钝头崖爬藤**

**Tetrastigma obtectum** (Wall.) Planch. var. **potentilla** (Lévl. et Vant.) Gagnep.——*Vitis potentilla* Lévl. et Vant.

生于海拔 1 500—2 600 米的山地。分布于四川、贵州、云南。

全株:用于跌打损伤,风湿痛,痢疾。

**扁担藤**　　铁带藤、过江扁龙、扁骨风、腰带藤、羊带风(全国中草药汇编)

**Tetrastigma planicaule** (Hook. f.) Gagnep.——*Vitis planicaule* Hook. f.

生于山谷密林中。分布于福建、广东、海南、广西、贵州、云南。

全株(扁担藤)：辛、涩，温。祛风除湿，舒筋活络。用于风湿骨痛，腰肌劳损，跌打损伤，半身不遂。

**毛脉崖爬藤**　　勾瓣(广西上林壮语)

**Tetrastigma pubinerve** Merr. et Chun

生于山坡灌丛中。分布于海南、广西。

叶：用于刀伤。

**网脉崖爬藤**　　草藤(广西)

**Tetrastigma retinerium** Planch.

生于疏林下。分布广西、云南。

根：用于习惯性流产。　果实：抗着床。用于计划生育。

**细齿崖爬藤**　　小五爪金龙(云南)

**Tetrastigma serrulatum** (Roxb.) Planch.——*Cissus serrulatum* Roxb.

生于海拔950—2 400(—2 700)米的密林中。分布于贵州、云南、西藏。

茎：祛风除湿，接骨，止血。

附　注：功效相同的有**毛细齿崖爬藤** **T. serrulatum** (Roxb.) Planch. var. **puberulum** W. T. Wang，分布于云南。

**上林崖爬藤**

**Tetrastigma shanglinense** W. T. Wang.

生于山坡林中。分布于广西上林、宁明、凌云。

茎：祛风，消肿。

附　注：广西特有药用植物。

**菱叶崖爬藤**

**Tetrastigma triphyllum** (Gagnep.) W. T. Wang——*T. yunnanense* Gagnep. var. *triphyllum* Gagnep.

生于山谷林中。分布于云南。

茎、叶：用于风湿关节痛，骨折。

**云南崖爬藤**　　滇岩爬藤、石葡萄(全国中草药汇编)

**Tetrastigma yunnanense** Gagnep.

生于山坡林中。分布于云南西部。

全草：苦、涩、湿。祛风通络，活血止痛。用于风湿骨痛，跌打损伤；外用于骨折，外伤出血。

## 葡萄属　Vitis. L.

**蘡薁**　　野葡萄、山葡萄(全国中草药汇编)

**Vitis adstricta** Hance——*V. thunbergii* Sieb. et Zucc. var. *adststricta* (Hance) Gagnep

生于山地林缘。分布于北京、江苏、上海、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、广西、云南。

根、茎、叶及果实或全株(蘡薁)：酸、甘、涩，平。清热解毒，祛风除湿。用于肝炎，肺痈、肠痈、乳痈，多发性脓肿，风湿关节痛，疮痈肿毒，中耳炎，蛇、虫咬伤。

**山葡萄**　黑水葡萄、野葡萄(全国中草药汇编)，山藤藤(长白山植物药志)，哲日乐格-乌吉姆(蒙语)

**Vitis amurensis** Rupr.

生于山地林缘。分布于东北及河北、山西山东。

根、茎(山藤藤秧)：酸，凉。祛风，止痛。用于外伤痛，风湿骨痛，胃痛，腹痛，头痛，术后痛。　果实(山藤藤果)：酸，凉。清热利尿。用于烦热口渴，膀胱湿热。

**小果野葡萄**　葡萄血藤、野葡萄、大血藤(全国中草药汇编)，小葡萄(海南植物志)

**Vitis balanseana** Planch.

生于石缝或石坎。分布于广东、海南、广西、云南。

根皮：涩，平。舒筋活络，清热解毒，利尿。用于骨折，风湿瘫痪，劳伤、疮疡肿毒，痢疾。

**桦叶葡萄**

**Vitis betulifolia** Diels et Gilg

生于海拔1 500—2 700米的山地林中、林缘或沟边。分布于西南及陕西、湖北。

根、根皮：舒筋活络。用于风湿瘫痪，劳伤。

**华北葡萄**

**Vitis bryoniifolia** Bunge

生于山坡沟谷。分布于河北、山西、陕西、山东、河南。

根、全株：祛风湿、消肿毒。

**东南葡萄**

**Vitis chunganensis** Hu

生于山坡灌丛或疏林中。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖南、广西、贵州。

根、茎：祛风除湿。用于风湿痛。

**闽赣葡萄**　背带藤(全国中草药汇编)

**Vitis chungii** Metcalf

生于山地丛林。分布于江西、福建、广东、广西。

全株(红扁藤)：甘、涩，平。消肿拔毒。用于疮痈疖肿。

**刺葡萄**　山葡萄(全国中草药汇编)

**Vitis davidii** (Roman.) Foëx——*Spinovitis davidii* Roman.

生于山坡灌丛中。分布于陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

根：甘，平。祛风湿，利小便。用于关节痛，跌打损伤。

**榕叶葡萄**

**Vitis ficifolia** Bunge

生于山坡灌丛中。分布于河北、北京、山西、陕西、山东、江苏、河南、湖北。

根、茎：止渴，利尿。

**蔓藟**　千岁藟(植物名实图考)

**Vitis flexuosa** Thunb.

生于海拔600--1 200米的山地灌丛中或林缘。分布于华东、中南及陕西、四川、云南。

根(葛藟根)：甘，平。滋补气血，续筋骨，长肌肉。用于关节酸痛，跌打损伤。 藤汁(葛藟汁)：甘，平。补五脏，续筋骨，益气，止渴。用于五脏虚弱，筋骨痛，气虚，干渴。 果实(葛藟果)：甘，平。润肺止咳，清热凉血，消食。用于咳嗽、吐血，积食。

附 注：功效相同的有**大千岁藟 V. flexuosa** Thunb. var. **malayana** Planch.，分布于云南；**小叶葛藟 V. flexuosa** Thunb. var. **parvifolia** (Roxb.) Gagnep.，分布于河北、陕西、江苏、安徽、江西、福建、湖北、湖南、广东、云南。

**美洲葡萄** 酒葡萄(云南)，狐葡萄(华北树木志)

**Vitis labrusca** L.

全国各地稀有栽培。

全株：用于跌打损伤，风湿痛。

**绵毛葡萄** 绿葡萄(云南)

**Vitis lanata** Roxb.

生于山坡林缘。分布于广东、海南、广西、贵州、云南、西藏。

根：用于风湿痛，跌打损伤。

**复叶葡萄** 黑葡萄(全国中草药汇编)

**Vitis piasezkii** Maxim.

常生于海拔2 000米以下的山坡或沟谷中。分布于山西、陕西、甘肃、宁夏、河南、江西、湖南、广东、广西、四川。

幼茎的液汁(麻羊藤)：微苦、涩，平。消食，清热，凉血。用于肠胃实热，头痛发热，骨蒸劳热，目赤，鼻衄。

附 注：功效相同的有**少毛复叶葡萄 V. piasezkii** Maxim. var. **pagnuccii** (Roman.) Rehd.，分布于山西、陕西、甘肃、河南、湖北、四川。

**波叶葡萄**

**Vitis rapnanda** Veighta.

新疆有栽培。

根、藤(葡萄根)：止吐，安胎，利尿消肿。

**毛葡萄** 橡根藤、飞天蜈蚣、飞天白鹤、止血藤(全国中草药汇编)

**Vitis quinquangularis** Rehd.

多生于海拔600—1 500米的山坡灌丛或林缘。分布于西南及陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、台湾、湖北、广西。

根皮：微苦、酸，平。调经活血，补虚止带。用于月经不调、带下病；外用于跌打损伤，筋骨痛。 全株(野葡萄藤)：清热，祛风湿，止血。用于癣疹。 叶(野葡萄叶)：微苦、酸，平。止血。用于外伤出血。

**裂叶毛葡萄**

**Vitis quiquangularis** Rehd. var. **lobata** Gagnep.

生于海拔1 200—1 350米的山坡林缘，分布于云南南部。

根、根皮：用于跌打损伤，刀伤出血。

**绒毛葡萄**

**Vitis retordii** Roman.

生于山坡林缘。分布于广东、广西、贵州、云南、西藏。

根：用于风湿痛，跌打损伤。

**秋葡萄**　　扁担藤、野葡萄(全国中草药汇编)

**Vitis romanetii** Roman.

生于低山坡灌丛中或沟旁。分布于陕西、甘肃、河南、江苏、湖北、湖南、四川。

茎(秋葡萄)：甘、微涩，凉。祛瘀止血，生肌。用于吐血，月瘀，跌打损伤。

**小叶葡萄**

**Vitis sinocinerea** W. T. Wang——*V. thunbegii* Sieb. et Zucc. var. *cinerea* Gagnep.

生于山地河岸灌丛中。分布于浙江、江西、福建、广东、湖北、湖南。

根、全株：祛风除湿，解毒。

**湖北葡萄**　　野葡萄(江西)

**Vitis silvestrii** Pamp.

生于山坡林下。分布于江西，湖北西部。

根、藤：辛、苦，凉。清热解毒，祛风活络，止痛止血。用于风湿关节痛，呕吐，泄泻，溃疡，跌打损伤，肿痛，外伤出血，烧、烫伤，疮疡肿毒。

**网脉葡萄**

**Vitis wilsonae** Veitch.

生于山坡灌丛中。分布于西南及陕西、安徽、浙江、湖北、湖南。

根：用于骨髓炎。　全株：用于骨关节酸痛。

**葡萄**　　索索葡萄(新疆)，欧洲葡萄(中国沙漠植物志)，乌吉姆(蒙语)

**Vitis vinifeii** L.

全国各地普遍栽培。

根或藤(葡萄根)：甘、涩，平。除风湿，利小便。用于风湿骨痛，水肿；外用于骨折。茎叶(葡萄藤叶)：甘、涩，平。利小便，通小肠，消肿满。用于小便淋痛。　果实(葡萄)：甘、酸，平。解表透疹，利尿，安胎。用于小便淋痛，胎动不安，麻疹不透。

附　注：玫瑰香葡萄秧(为玫瑰香葡萄每年修剪下的藤、叶、梢)制成的注射剂，用于坐骨神经痛。

## 俞藤属　Yua C. L. Li

**大果俞藤**　　东南爬山虎(植物分类学报)

**Yua austro-orientalis** (Metcalf) C. L. Li——*Parthenocissus austro-orientalis* Metcalf

生于山坡林中。分布于江西、福建、广东、广西。

全株：酸，平。祛风通络，散瘀消肿。

**俞藤**　细母猪藤(贵州),粉叶爬藤(经济植物手册)，粉叶爬山虎(中国高等植物图鉴)

**Yua thomsonii** (Laws.) C.L. Li——*Parthenocissus thomsonii* (Laws.) Planch.; *Vitis thomsonii* Laws.

攀援于墙壁、岩石或树上。分布于陕西、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

根、茎(粉叶地锦)：微甘、辛，平。清热解毒，祛风除湿。　根：用于无名肿毒，风湿关节痛，带下病。　茎：用于关节痛。

## 99. 火筒树科　Leeaceae

### 火筒树属　Leea L.

**翅序火筒树**　九子不离母、山荜荠、猴背、理肺散(云南)，单羽火筒树(云南种子植物名录)

**Leea crispa** L.

生于海拔250—1 500(—2 000)米山坡灌丛中。分布于云南。

根：利湿退黄。用于黄疸。

附　注：功效相同的有**大叶火筒树 L. macrophylla** Roxb. ex Hornem.，分布于云南、西藏。

**火筒树**　红吹风(广西),牛眼睛果(云南)

**Leea indica** (Burm. f.) Merr.——*Staphylea indica* Burm. f.

生于山坡灌丛中。分布于台湾、广东、广西、贵州、云南。

根、茎髓、果实或全株：淡，平。清热解毒。外用于疮疡。　茎髓、果实：用于枪弹头人肉。

**红果火筒树**

**Leea guineensis** G. Don

生于海拔600—1 300米的山地。分布于云南。

全株：清热解毒。

## 100. 杜英科　Elaeocarpaceae

### 杜英属　Elaeocarpus L.

**中华杜英**　小冬桃、老来红、高山望(广西)

**Elaeocarpus chinensis** (Gardn. et Champ.) Hook. f.——*Friesia chinensis* Gardn. et Champ

生于低山坡杂木林中。分布于浙江、江西、福建、广东、广西、贵州、云南。

根(华杜英)：辛，温。散瘀消肿。用于跌打瘀肿，风湿痛。　叶、花：用于胃痛，遗

精，带下病。

附　注：功效相同的有**山杜英 E. sylvestris** (Lour.) Poir.，分布于浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西。

**冬桃**　　大关杜英(云南种子植物名录)，广西杜英(拉汉英种子植物名称)

**Elaeocarpus duclouxii** Gagnep.

生于山谷或丘陵。分布于长江流域以南各省区。

果实(冬桃)：理肺止咳，清热通淋，养胃消食。

**锡兰橄榄**

**Elaeocarpus serratus** Benth.

广东、广西、云南引种栽培。

根：辛，温。祛风止痛。用于风湿筋骨痛，跌打损伤。

## 猴欢喜属　Sloanea L.

**仿栗**　　药王树(湖北)

**Sloanea hemsleyana** (Ito) Rehd. et Wils.——*Echinocarpus hemsleyana* Ito

生于山地林中。分布于甘肃东南部、湖北、广西、四川、贵州、云南。

根：用于痢疾，腰痛。

**薄果猴欢喜**　　红壳木(广西)

**Sloanea leptocarpa** Diels

生于山林中。分布于福建、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根：消肿止痛，祛风除湿。用于骨折，跌打损伤，风寒感冒，皮肤瘙痒。

**猴欢喜**

**Sloanea sinensis** (Hance) Hemsl.——*Echinocapus sinensis Hance*

生于高山丛林中。分布于长江流域以南各省区。

根：健脾和胃，祛风，益肾。

# 101. 椴树科　Tiliaceae

## 一担柴属　Colona Cav.

**一担柴**　　大泡火绳、野火绳、大毛叶子红绳(云南)，柯榔木(中国经济植物志)

**Colona floribunda** Craib.——*Columbia floribunda* (Wall.) Kurz

生于海拔1 000—1 400米的山坡次生林中或林边。分布于云南南部。

根：清热解毒。

## 田麻属　Corchoropsis Sieb. et Zucc.

**田麻**

**Corchoropsis tomentosa** (Thunb.) Makino——*Corchorus tomentosa* Thunb.

生于海拔700—1 100米的低山和丘陵地区的干山坡、石砾荒地、路边或林下。分布于东北、华北、华东、中南及陕西、四川、贵州。

全草(田麻)：酸，平。平胆利湿，解毒。用于风湿痛，跌打损伤，黄疸。

附　注：功效相同的有**光果田麻 C. psilocarpa** Harms et Loes.，分布于辽宁、河北、甘肃、山东、江苏、河南、湖北。

## 黄麻属　Corchorus L.

**甜麻**　假黄麻(通称)，铁茵陈、藤肥皂(贵州)，针筒草(中国高等植物图鉴)

**Corchorus aestuans** L.——*C. acutangulus* Lam.

生于路旁、田边或草坡上。分布于长江流域以南各地。

全草(野黄麻)：辛、甘，温。祛风除湿，舒筋活络。用于风湿痛，跌打损伤。

**黄麻**　络麻(便民图纂)，牛泥茨、三珠草、天紫苏(医方集听)

**Corchorus capsularis** L.

长江流域以南亚热带地区栽培甚广。

根(黄麻根)：苦，温。利尿。用于石淋，泄泻，痢疾。　叶(黄麻叶)：苦，温。理气止血，排脓生肌。用于腹痛，痢疾，血崩，疮痈。　种子(黄麻子)：热。有毒。用于咳嗽，血崩。

**长蒴黄麻**　昔椹子(云南)

**Corchorus olitorius** L.

生于草地、溪边或田埂上。栽培于广东、海南、广西、云南。

全草：疏风止咳，利湿。　种子：行气止痛。

## 扁担杆属　Grewia L.

**苘麻叶扁担杆**

**Grewia abutilifolia** Vent. ex Juss.

生于丘陵或低山坡。分布于台湾、广东、海南、广西、云南。

根：用于肝炎。　叶：用于痢疾。

**扁担杆**

**Grewia biloba** G. Don

生于丘陵或低山路旁、草地。分布于长江流域以南各省区。

根、枝、叶：甘、苦，温。健脾养血，祛风湿，消痞。　根：用于疮疡肿毒。　枝、叶：用于小儿疳积，消化不良，崩漏，带下病，阴挺，脱肛。

**小花扁担杆**　吉利子树(云南)

**Grewia biloba** G.Don var. **parviflora** (Bunge) Hand.-Mazz.——*G. parviflora* Bunge

生于低山灌丛中或平原。分布于华北至华南、西南及辽宁。

枝、叶：辛、甘、湿。祛风除湿，理气消痞。用于风湿关节痛，脘腹胀满，胸痞，小儿疳积，崩漏，带下病，脱肛。

附　注：功效相同的有**小叶扁担杆 G. biloba** G. Don var. **microphylla** (Maxim.) Hand.-Mazz.，分布于四川、云南。

**毛果扁担杆**　马尾巴大绳、野麻根、黑神果、细大绳(云南)，毛果解宝树(中国经济植物志)

**Grewia eriocarpa** Juss.

生于丘陵灌丛中。分布于台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

根：止血。用于出血，牙痛。　枝、花：用于胃痛。

**镰叶扁担杆**　黄龙粉、猴子饭团、炸腰果、狗卵子果(云南)，镰叶解宝树(中国经济植物志)

**Grewia falcata** C. Y. Wu ex Cheng

生于海拔 500—1 700 米的山坡灌丛中。分布于云南。

全株：止血。用于外伤出血。

**寡蕊扁担杆**　四眼果(广西)

**Grewia oligandra** Pierre

生于山坡灌丛中。分布于广东、广西。

根：用于小便涩痛，尿浊，尿血。　根皮：用于痢疾。

## 破布叶属(布渣叶属)　Microcos L.

**破布叶**　瓜剥木，剥果木(中国经济植物志)

**Microcos paniculata** L.

生于丘陵、平地路旁或山坡灌丛中。分布于广东、海南、广西、云南。

叶(布渣叶)：淡、微酸，平。清热解毒，止泻。用于感冒，消化不良，泄泻，黄疸，蜈蚣咬伤。

## 斜翼属　Plagiopteron Griff.

**斜翼**　扣丝、山钩藤(广西)，华斜翼(云南植物研究)

**Plagiopteron suaveolens** Griff.——*P. chinensis* X. X. Chen

生于海拔 220—250 米的石灰岩山间、丘陵、平地及山坡灌丛中。分布于广西龙州。

全株：用于关节屈伸不利，风湿骨痛，肾虚腰痛，跌打损伤，刀伤出血。

## 椴属　Tilia L.

**紫椴**　籽椴(黑龙江)

**Tilia amurensis** Rupr.

生于杂木林中。分布于东北。

花：发汗解热，抑菌。用于感冒，水肿，口腔破溃，咽喉肿痛。

附　注：功效相同的有**西伯利亚紫椴 T. amurensis** Rupr. var. **sibirica** (Fisch. ex Bayer) Y. C. Chu，分布于吉林、辽宁；**朝鲜紫椴 T.amurensis** Rupr. f. **koreana** (Nakai) Y. C. Chu，分布于黑龙江、辽宁；**蒙椴 T. mongolica** Maxim.，分布于华北及辽宁、河南。

**小叶紫椴**

**Tilia amurensis** Rupr. var. **taquetii** (Schneid.) Liou et Li

生于山坡林内。分布于长白山地区。

花：解毒，解表。用于感冒，肾盂肾炎，口腔破溃，咽喉痛。

**中华椴**

**Tilia chinensis** Maxim.

生于潮湿山坡或山谷中。分布于陕西、甘肃、河南、湖北、四川、云南。

根：用于跌打损伤。

**糯米椴**

**Tilia henryana** Szyszyl.

生于海拔高达 2 000 米的山坡疏林中。分布于陕西、安徽、江西、河南、湖北、湖南。

根：祛风活血，镇痛。

附　注：功效相同的有**秃糯米椴 T. henryana** Szyszyl. var. **subglabra** Engl.，分布于江苏、安徽、浙江、江西。

**华东椴**

**Tilia japonica** Simonk.

生于海拔 800 米以上的阴湿山坡、山谷杂木林中。分布于山东、江苏、安徽、浙江。

根、根皮：强壮，止咳。用于劳伤乏力，久咳。

**粉椴**　　鄂椴(湖北)

**Tilia oliveri** Szyszyl.

生于山坡林中。分布于陕西、甘肃、浙江、湖北、湖南、四川。

根：用于久咳，跌打损伤。

附　注：功效相同的有**灰背椴 T. oliveri** Szyszyl. var. **cinerascens** Rehd. et Wils.，分布于湖北。

**糠椴**

**Tilia mandshurica** Rupr. et Maxim.

生于山坡沟谷、杂木林中。分布于东北、华北。

花：用于感冒，肾盂肾炎，口腔破溃，咽喉肿痛。

**南京椴**

**Tilia miqueliana** Maxim.

生于山坡、山沟阴湿处。分布于江苏、安徽、浙江、江西。

根皮、树皮(菩提树皮)：用于劳伤，乏力，久咳。　花(菩提树花)：镇静，镇痉，清热，解表。

**峨眉椴**

**Tilia omeiensis** Fang

生于山坡林中。分布于四川。

根皮(白郎花)：苦、辛，凉。通经理气。用于跌打损伤，劳伤。

**少脉椴**　筒果椴、小叶椴(湖北)

**Tilia paucicostata** Maxim.

生于海拔1 500—1 700米的山坡或阔叶林中。分布于陕西、甘肃、河南、湖北、四川、云南。

树皮：接骨疗损。用于跌打损伤。

**椴树**　千层皮(湖北)，叶上果(贵州)

**Tilia tuan** Szysz.

生于山坡或山谷杂木林中。分布于浙江、江西、湖北、湖南、广西、四川、贵州。

根(椴树根)：辛，温。祛风除湿，活血镇痛。用于风湿麻木，跌打损伤。

附　注：功效相同的有**毛芽椴 T. tuan** Szysz. var. **chinensis** Rehd. et Wils.，分布于江苏、浙江、湖北、四川、贵州。

## 刺蒴麻属　Triumfetta L.

**单毛刺蒴麻**　野卷单(贵州)，粘人草、小刺蒴麻(云南)

**Triumfetta annua** L.

生于山坡路边。分布于长江流域以南地区。

根：祛风，活血，镇痛。

**刺蒴麻**　密麻椿(云南)

**Triumfetta bartramia** L.

生于林缘灌丛中。分布于福建、台湾、广东、广西、云南。

全株(黄花虱麻头)：甘、淡，凉。解表清热，利尿散结。用于风热感冒，石淋。

**长钩刺蒴麻**　细山马栗(云南)

**Triumfetta pilosa** Roth.

生于干燥阳坡灌丛中。分布于广西、四川、贵州、云南。

根、叶(金纳香)：辛，平。祛风除湿，利水消肿。用于风湿痛，小便淋痛，水肿。

**毛刺蒴麻**　粘巴头(云南)

**Triumfetta tomentosa** Bojer

生于平地或丘陵灌丛中。分布于福建、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

**全草：** 用于风湿痛，乳房肿块。

# 102. 锦葵科　Malvaceae

## 秋葵属(黄葵属)　Abelmoschus Medic.

**长毛黄葵**　黄花马宁(海南)，黄葵(贵州)，野棉花(云南)，山芙蓉(植物分类学报)，

格放叶木槿(四川中草药)

**Abelmoschus crinitus** Wall. ——*Hibiscus cancellatus* Roxb.; *H. crinitus* (Wall.) G. Don

生于山坡、路旁、林缘、草丛中。分布于海南、广西、四川、贵州、云南。福建有栽培。

根、叶(黄茄花): 淡,平。补脾,化痞,通经,消食。 根: 用于胸腹胀满,消化不良。叶: 用于烧、烫伤。

**咖啡黄葵** 秋葵(通称),越南芝麻(湖南),羊角豆(广东),糊麻(上海植物名录)

**Abelmoschus esculentus** (L.) Moench——*Hibiscus esculentus* L.

河北、山东、江苏、浙江、福建、湖北、湖南、广东、贵州、云南有引种栽培。

根: 止咳。树皮: 通经。用于月经不调。 种子: 催乳。用于乳汁不足。 全株: 清热解毒,润燥滑肠。

**黄蜀葵** 棉花葵、假阳桃(福建、广东、广西),黄花莲、鸡瓜莲(江西), 荞面花(云南昆明)

**Abelmoschus manihot** (L.) Medic.——*Hibiscus manihot* L.

生于海拔 1 000 米以下的山坡、山谷、路旁,也有栽培。分布于中南、西南及河北、山东、陕西、福建。

根: 甘、苦,寒。利水,散瘀,解毒。用于水肿,淋证,乳汁不通;外用于痈肿,疼腿, 骨折。 茎或茎皮: 甘、滑,寒。活血, 除邪热。用于产褥热; 茎皮: 外用于烫伤。 叶: 甘、寒、滑。解毒托疮,排脓生肌;外用于痈疽疔疮,疼腿,烫伤,(研末敷)刀伤出血。 花: 甘,寒、滑。通淋,消肿,解毒。用于砂淋;外用于痈疽肿毒,(浸油涂)烫伤,小儿秃疮, (烧存性研末治)小儿口疮。 种子: 甘,寒。健胃润肠,利水,通乳,消肿。用于消化不良,不思饮食,二便不利,水肿,淋证,乳汁不通,痈肿,跌打损伤。

**刚毛黄蜀葵** 桐麻、黄秋葵、辛麻、眼睛花(云南)

**Abelmoschus manihot** (L.) Medic. var. **pungens** (Roxb.) Hochr.——*Hibiscus pungens* Roxb.

生于海拔 1 300—3 000 米的山坡灌丛中。分布于台湾、湖北、广东、广西、四川、贵州、云南。

根(黄秋葵根): 苦,平。清热利湿。用于水肿,小便淋痛。 叶(黄秋葵叶): 苦,平。消肿止痛。用于痈肿,骨折,跌打损伤。

**黄葵** 山油麻(福建),鸟笼胶(广东),假三稔、山芙蓉(海南),野油麻(广西、云南)

**Abelmoschus moschatus** Medic.

生于山谷、沟旁或草坡,或栽培。分布于江西、台湾、湖南、广东、广西、云南。

根、叶、花: 微甘,凉。清热利湿,拔毒排脓。用于高热不退。 根: 用于肺热咳嗽,产后乳汁不通,大便秘结、痢疾,石淋。 叶: 外用于痈疮肿毒,瘰疬, 骨折。 花: 外用于烧、烫伤。

**木里秋葵**

**Abelmoschus mulinensis** Feng

生于海拔 1 250—2 100 米的山坡草丛中。分布于四川。

根: 通经。用于月经不调,经闭,痛经。

**箭叶秋葵**　接桐花、野棉花(贵州),铜皮、五指山手参、小红芙蓉(云南)

**Abelmoschus sagittifolius** (Kurz) Merr.——*A. esquirolii* (Lévl.) S. Y. Hu; *Hibiscus sagittifolius* Kurz

生于荒坡草地、路边灌丛中。分布于广东、广西、贵州、云南。

全株(五指山参):甘,凉。清热解毒,滑肠润燥。　根:用于风湿痛。　种子:用于便秘,水肿,乳汁缺少,耳聋。

## 苘麻属　Abutilon Mill.

**磨盘草**　磨子树、磨龙子(海南),石磨子(福建、广西),磨档草、耳响草(广东、广西)

**Abutilon indicun** (L.) Sweet——*Sida indica* L.

生于海拔800米以下的海滨、平原、沙地、旷野或路旁。分布于福建、台湾、广东、广西、贵州、云南。

根、种子:辛、甘,寒。散风清血热,开窍活血,滑肠通便,利尿下乳。　根:用于泄泻,淋证,疝气,痈肿,瘾疹,疟腮。　种子:用于便秘,水肿,乳汁少,耳聋。

附　注:**小花磨盘草 A. indicum** (L.) Sweet. var. **forrestii** (S. Y. Hu) Feng,分布于四川、云南,在云南全草用于散风活血。

**华苘麻**　老熊花(贵州)

**Abutilon sinense** Oliv.

生于海拔300—2 000米的山坡疏林、竹林、路旁。分布于湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根皮(豹子眼睛花):苦、辛,凉。清热解毒,接骨。用于肝炎,淋巴腺炎,乳痈,疮疖,骨折,脚癣。

**金铃花**　灯笼花(广州),金棒花(广西)

**Abutilon striatum** Dickson

原产南美洲的巴西、乌拉圭等地。辽宁、北京、江苏、浙江、福建、湖北、广东、广西、云南有栽培。

叶、花:活血祛瘀,舒筋通络。用于跌打损伤。

**苘麻**　桐麻(陕西、四川),塘麻(安徽),磨盘草(江西),椿麻(湖北),白麻(本草纲目)

**Abutilon theophrasti** Medic.

生于海拔1 000米以下的田边、路旁、沟边及河岸,也有栽培。分布于全国各地,东北有栽培。

种子(苘麻子):苦,平。清热利湿,解毒,退翳。用于角膜云翳,痢疾,痈肿。　根(苘麻根):用于小便淋痛,痢疾。　全草或叶(苘麻):苦,平。解毒,祛风。用于痈疽疮毒,痢疾,中耳炎,耳鸣,耳聋,关节酸痛。

附　注:苘麻子为《中华人民共和国药典》1990年版收载。

## 蜀葵属　Althaea L.

**药蜀葵**

**Althaea officinalis** L.

生于宅旁、田边、原野。原产欧洲。分布于新疆塔城。北京、西安、南京、江西、昆明有栽培。

根、全株(药蜀葵)：甘，温。解表散寒，利尿消肿，止咳。用于外感风寒，痰咳，小便淋痛，疔疮肿毒。

**蜀葵**　　淑气花(通称)，一丈红(陕西、贵州)，麻杆花(河南)，棋盘花(四川，贵州)，栽秧花(贵州)

**Althaea rosea** (L.) Cavan.——*Alcea rosea* L.

全国各地均有栽培或野生。

根(蜀葵根)：甘，寒。清热凉血，利尿排脓。用于小便淋痛，尿血，吐血，血崩，带下病，肠痈；外用疮肿，丹毒。　茎叶(蜀葵苗)：甘，微寒。用于热毒下痢，淋证，金疮，火疮。　花(蜀葵花)：甘，寒。活血润燥，通利二便。用于痢疾，吐血，血崩，带下病，二便不利，疟疾，小儿风疹；外用于痈肿疮疡。　种子(蜀葵子)：甘，寒。利水通淋，滑肠，催生。用于水肿，淋证，二便不通。

附　注：孕妇忌服。

## 大萼葵属　Cenocentrum Gagnep.

**大萼葵**

**Cenocentrum tonkinense** Gagnep.

生于海拔 750—1 600 米的河谷、沟谷、疏林、草丛或落叶灌丛中。分布于贵州、云南。

根：清热解毒，滑肠。

## 棉属　Gossypium L.

**草棉**　　阿拉伯棉、小棉(通称)

**Gossypium herbaceum** L.

甘肃、新疆、广东、四川、云南有栽培。

根、根皮(棉花根)：甘，温。补虚，止咳，平喘。用于体虚咳喘，肢体浮肿、乳糜尿，月经不调，阴挺，胃下垂。　种子(棉籽)：辛，热。有毒。补肝肾，强腰膝，暖胃止痛，止血，催乳，避孕。用于腰膝无力，遗尿，胃脘作痛，便血，崩漏，带下病，痔漏，脱肛，乳汁缺少，睾丸偏坠，手足皲裂。

附　注：功效相同的有：**树棉 G. arboreum** L.，长江流域广为种植；**海岛棉 G. barbadense** L.，广东、海南、广西、云南有种植；**陆地棉 G. hirstum** L.，各地普遍种植。

## 木槿属　Hibiscus L.

**美丽芙蓉**　大棟山芙蓉(海南),野芙蓉、野棉花(云南),芙蓉木槿(海南植物志)

**Hibiscus indica** (Burm. f.) Hochr.——*Alcaea indica* Burm. f.

生于海拔700—2 000米的山坡灌丛中。分布于广东、海南、广西、四川、云南。

根、叶：消痈解毒。用于肠痈;外用于痈疮肿毒。

**贵州芙蓉**　白东桃、湖榕树(广西)

**Hibiscus labordei** Lévl.

生于海拔1 300米的山坡、路旁。分布于广西、贵州。

叶：止痢。

**木芙蓉**　芙蓉花(陕西、江苏、湖南、四川),酒醉芙蓉(福建、广东)

**Hibiscus mutabilis** L.

分布于华北、辽宁、陕西及长江流域以南各地。

根(木芙蓉根)：微辛,凉。清热解毒。用于痈肿,肺痈,乳痈,臁疮,咳嗽气喘,带下病。叶(木芙蓉叶)：苦、微辛,平。消热解毒。用于痈疽疔疮,痄腮,缠腰火丹,烧、烫伤,肺痈,肠痈。花(木芙蓉花)：辛,平。清热解毒,凉血,消肿。用于痈肿,疔疮,肺痈,肺热咳嗽,吐血,崩漏,带下病。

附　注：**重瓣木芙蓉 H. mutabilis** L. f. **plenus** (Andr.) S. Y. Hu, 栽培于浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、云南。在云南叶、花入药,清肺,凉血,散热.解毒。

**辐射刺芙蓉**　金线吊芙蓉(厦门)

**Hibiscus radiatus** Cav.

福建厦门、漳州有栽培。

花：用于咳嗽,肺痨。

**朱槿**　状元红(云南),扶桑(本草纲目),佛桑(南越笔记),大红花(汉英韵府),桑槿(酉阳杂俎)

**Hibiscus rosa-sinensis** L.

生于山地疏林中,或栽培。分布于福建、台湾、广东、广西、四川、云南。

根(扶桑根)：清热解毒,止咳,利尿,调经。用于痄腮,目赤,咳嗽,小便淋痛,带下病,白浊,月经不调,经闭,血崩。叶(扶桑叶)：甘,平。清热解毒;外用于痈疮肿毒,汗斑。花(扶桑花)：甘,寒。清肺,化痰,凉血,解毒。用于肺热咳嗽,咳血,衄血,痢血,赤白浊,月经不调,疔疮痈肿,乳痈。

附　注：**重瓣朱槿 H. rosa-sinensis** L. var. **rubroplenus** Sweet., 栽培于北京、广东、广西、四川、云南。在云南药用,根皮：调经,止咳。叶、花：清热解毒,利尿消肿。

**玫瑰茄**　红金梅、红梅果(福建),山茄子(广东)

**Hibiscus sabdariffa** L.

江西、福建、台湾、广东、云南有栽培。

花萼：酸,凉。清热解渴,敛肺止咳。用于高血压症,咳嗽,中暑,酒醉。

**吊灯扶桑**　吊灯花(海南),假西藏红花(广州)

**Hibiscus schizopetalus** (Mast.) Hook. f.——*H. rosa-sinensis* L. var. *schizopetalus* Mast.

福建、台湾、广东、广西、四川、云南有栽培。

叶：消肿。用于腋下疮疡。

**华木槿**

**Hibiscus sinosyriacus** Bailey

生于海拔 1 000 米以下的山谷灌丛中。分布于江西、湖南、广西、贵州。

根皮、叶、种子：甘，平。清热解毒，祛湿利尿。用于痢疾，带下病，咯血，干咳，疖肿，烧、烫伤。　根皮：用于痛经，跌打损伤。　叶：用于无名肿毒。　种子：用于偏头痛，黄水疮。

**木槿**　木棉、荆条(江苏)，喇叭花(福建)，朝开暮落(本草纲目)

**Hibiscus syriacus** L.

全国各地均有栽培。

根皮、茎皮(**木槿皮**)：甘、苦，凉。清热，利湿，解毒，止痒。用于黄疸，痢疾，肠风泻血，肺痈、肠痈，带下病，痔疮，脱肛，阴囊湿疹，疥癣。　根(木槿根)：甘，平、滑。清热解毒，利湿，消肿。用于咳嗽，肺痈、肠痈，痔疮肿毒，带下病、疥癣。　叶(木槿叶)：苦，寒。清热。　花(木槿花)：甘、苦，凉。清热，利湿，凉血。用于肺热咳嗽，吐血，肠风便血，痢疾，痔血，带下病，痈肿疮毒。　果实(木槿子)：甘，平。清肺化痰，解毒止痛。用于肺热咳嗽，痰喘，偏正头痛，黄水疮。

**黄槿**　盐水面头果(台湾)，万年春(广东)，桐花、海麻(海南)

**Hibiscus tiliaceus** L.

福建、台湾、广东、广西引种栽培。

树皮、叶、花：甘、淡，凉。清热解毒，散瘀消肿。用于木薯中毒，疮疖肿痛。

**野西瓜苗**　小秋葵(贵州)，香铃草、灯笼花、黑芝麻、火炮草(云南)

**Hibiscus trionum** L

生于海拔 4 00—1900 米的荒地、山坡或路旁。全国各地均有分布。

根或全草：甘，寒。清热，祛湿，止咳。用于风热咳嗽，风湿痛，烧、烫伤。

## 翅果麻属　Kydia Roxb.

**翅果麻**　棓的木、棓的槿(云南)

**Kydia calycina** Roxb.

生于海拔 5 00—1600 米的山谷、疏林中。分布于云南。

叶、花：清热解毒。

附　注：云南特有药用植物。

## 锦葵属　Malva A. Gray

**冬葵**　蕲菜(江西)，葵菜、冬寒(苋)菜(湖南、四川、贵州)，皱叶锦葵(华北经济植物

志要）

**Malva crispa** L.

我国早在汉代以前栽培作蔬菜，现江西、湖南、四川、贵州、云南仍有栽培。北京、甘肃会宁也偶见。

全株：甘，凉。利尿，止血，补气止汗。　种子：用于水肿，淋浊。　叶：外用于刀伤出血。　根：用于气虚自汗。

**北锦葵**

**Malva mohileviensis** Downor.

生于田野、砂质地。分布于东北、华北、西北。

种子(冬葵子)：甘，寒。利水，滑肠，下乳。用于水肿，便秘，乳汁不下。　根：补气，止汗，生肌，利尿。用于气虚自汗，水肿，小便淋痛，疮疡久不收口。

**圆叶锦葵**　土黄芪、烧饼花(陕西、甘肃)，野锦葵、金爬齿(山东)，托盘果(江苏)

**Malva rotundifolia** L.——*M. neglecmia* Wall.

生于山坡草地、路边、村旁和山谷河岸。分布于西南及河北、山西、陕西、甘肃、新疆、山东、江苏、安徽、河南。

根：甘，温。益气止汗，利尿，通乳，托毒排脓。用于贫血，自汗，肺痨咳嗽，崩漏，脱肛，阴挺，水肿，尿血，乳汁缺少，疮疡溃后久不愈合。

**锦葵**　小钱花(江苏)，棋盘花(四川)，淑(俗)气花(云南)，小白淑气花(滇南本草)

**Malva sinensis** Cav.——*M. mauritiana* L. var. *sinensis* (Cav.) DC.

全国各地均有野生或栽培。

茎、叶、花：咸，寒。清热利湿，理气通便。用于大便不畅、脐腹痛，瘰疬，带下病。

**野葵**　棋盘菜(湖北)，巴巴叶、棋盘叶、冬苋菜(云南)，芣葵叶(滇南本草)

**Malva verticillata** L.

生于海拔 1 000—2 000 米的村边、路旁或河岸山谷中。全国各地均有分布。

果实(冬葵果)：甘、涩，凉。清热利尿，消肿。用于小便淋痛，尿闭，水肿，口渴。根(冬葵根)：甘、辛，寒。清热解毒，利窍，通淋。用于消渴，淋证，二便不利，乳汁少，带下病，虫螫伤。　嫩苗或叶(冬葵叶)：甘，寒。清热，行水，滑肠。用于肺热咳嗽，热毒下痢，黄疸，二便不通，丹毒、金疮。　种子(冬葵子)：甘，寒。利水，滑肠，下乳。用于二便不通，淋证，水肿，乳汁不行，乳房肿痛。

附　注：① 冬葵果为常用的蒙药。②《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**华野葵**　天葵(本草图经)，乳痈药(广西药用植物名录)

**Malva verticillata** L. var. **chinensis** (Mill.) S. Y. Hu——*M. chinensis* Mill.

生于山坡、路旁及村庄附近的荒地。分布于华东及河北、山西、陕西、甘肃、新疆、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

茎、叶：(菟葵)：甘，寒。解毒止痛，利尿通淋。

## 赛葵属　Malvastrum A. Gray

**赛葵**　黄花草、黄花棉(广西)

**Malvastrum coromandelianum** (L.) Garcke——*Malva coromandeliana* L.

多生于海拔 1 000 米以下的山地、旷野及路旁。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、云南。为我国归化植物。

全草、叶(黄花棉): 微甘、凉。清热利湿,祛瘀消肿。用于感冒,泄泻,痢疾,黄疸, 风湿关节痛;外用于跌打损伤,疔疮痈肿。

## 黄花稔属 Sida L.

**黄花稔** 扫把麻(海南),亚罕闷(傣语)

**Sida acuta** Burm. f.

生于河岸两旁、村落附近的旷地及田园中。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、云南。

全株: 甘、淡,凉。清热利湿,排脓止痛。用于感冒发热,乳蛾,痢疾,砂淋, 石淋, 黄疸,疟疾,腹痛;外用于痈疖疔疮。

附 注: 功效相同的有**小叶黄花稔 S. alnifolia** L var. **microphylla** (Cav.) S. Y. Hu, 分布于福建、广东、广西、云南。

**桤叶黄花稔** 小柴胡(海南),地马庄、地膏药、牛筋麻(广西)

**Sida alnifolia** L.——*S. retusa* L.

生于低海拔的山坡、疏林下、村旁及路旁空旷地。分布于江西、福建、台湾、广东、广西、云南。

根、叶(脓见愁): 微酸、涩,凉。清热拔毒。 根: 用于久痢,疟疾, 黄疸。 叶: 用于疮疖,蜂螫伤。

**倒卵叶黄花稔** 圆齿小柴胡(海南植物志)

**Sida alnifolia** L. var. **obovata** (Wall.) S. Y. Hu——*S. obovata* Wall.

生于干坝、路旁。分布于广东、海南、广西、云南。

全草: 清热解毒,利湿。

**中华黄花稔**

**Sida chinensis** Retz.

生于向阳山坡草从间或沟旁。分布于台湾、海南、云南。

全草: 清热解毒,活血排脓。

**长梗黄花稔** 藤本粘头婆(广西防城)

**Sida cordata** (Burm. f.) Borss.——*Melochia cordata* Burm. f.

生于海拔 450—1 300 米的山谷丛林、路旁、草丛中。 分布于福建、台湾、广东、海南、广西、云南。

全株: 利尿,清热解毒。用于水肿,小便淋痛,咽喉痛,感冒发热、泄泻。 叶: 用于疮疖。

**心叶黄花稔** 吸血草(闽南民间草药),孛仔草(实用中草药)

*Sida cordifolia* L.

生于海拔 200—1 400 米的山坡或路旁灌丛中。分布于福建、台湾、广东、广西、四川、

云南。

根、叶(黄花仔)：甘、微辛，平。活血行气，清热解毒。用于肝炎，痢疾，腰肌劳损、乏力、脓疡。

附　注：功效相同的有**粘毛黄花稔 S. mysoensis** Wigth et Arn.，分布于华南及台湾、云南。

**东方黄花稔**

**Sida orientalis** Cav.

生于海拔 100—2 300 米的向阳山坡。分布于台湾、云南。

全草：清热利湿，活血排脓。用于感冒，乳蛾。

**白背黄花稔**　　黄花母雾(猛)(广东)，亚母头(广西壮语)

**Sida rhombifolia** L.

生于低海拔的山坡、路旁、河岸、溪边及村庄附近的空旷地。分布于江西、福建、台湾、湖北、广东、广西、四川、贵州、云南。

全株(黄花母)：甘、辛，凉。清热利湿，活血排脓。用于时行感冒，乳蛾，痢疾，泄泻，黄疸，痔血，吐血，扁疽疔疮。　根(黄花母根)：微甘、涩，凉。清热利湿，益气排脓。用于感冒，哮喘，泻痢，黄疸，疮痈气虚，难溃或溃后排脓不清，新肌不生。

**橡叶黄花稔**　　亚拉满(云南傣语)

**Sida subcordata** Span

生于海拔 500—1 400 米疏林缘的草丛中。分布于广东、广西、云南。

全株(黄花稔)：甘、淡，凉。清热，利湿，排脓止痛。用于感冒发热，乳蛾，痢疾，砂淋，石淋，黄疸，疟疾，腹痛；外用于痈疖疔疮。

**拔毒散**　　尼(迷)马庄棵(云南)，小粘药(昆明)，王不留行(滇南本草)

**Sida szechuensis** Matsuda

生于荒坡灌丛间、松林缘、路旁、沟谷边。分布于广西、四川、贵州、云南。

全株(拔毒散)：苦，平。解毒消肿，调经消肿。用于乳蛾，乳痛，痢疾，跌打损伤，月经不调。

## 桐棉属　Thespesia Soland. ex Corr.

**桐棉**　　杨叶肖槿(海南植物志)

**Thespesia populnea** (L.) Soland. ex Corr.——*Hibiscus populneus* L.

生于泥滩内沿岸上。分布于台湾、广东、海南。

叶：用于头痛和疥疮。　果实：(制药膏)杀虱。

## 梵天花属　Urena L.

**地桃花**　　野棉花(浙江、湖北、广西、四川、贵州)，千下槌(江西)，粘油子、厚皮草(四川峨眉)，野鸡花(云南)，梵天花(中国种子植物科属词典)

**Urena lobata** L.

生于荒坡、村旁、路旁及疏林下。分布于长江流域以南各省区。

全株：辛，微温。行气活血，祛风解毒。用于跌打损伤，风湿痛，痢疾，刀伤出血，吐血。

**中华地桃花**　糙脉梵天花(海南植物志)

**Urena lobata** L. var. **chinensis** (Osbeck) S. Y. Hu——*U. chinensis* Osbeck

多生于低海拔的山坡灌丛中或沟谷的路边。分布于安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西。

全株：用于痢疾，疮疖。

**粗叶地桃花**　消风草(江西)，狗扯尾、田芙蓉、千金垂草(贵州)

**Urena lobata** L. var. **scabriuscula** (DC.) Walp.——*U. scabriuscula* DC.

生于山坡灌丛中或路边草地。分布于福建、广东、四川、贵州、云南。

全株：辛，微温。行气活血，祛风解毒。用于跌打损伤，风湿痛，痢疾，刀伤出血，吐血。

附　注：功效相同的有**云南地桃花 U. lobata** L. var. **yunnanensis** S. Y. Hu，分布于广西、四川、贵州、云南。

**梵天花**　三角枫、三合枫(浙江、江西)，叶瓣花(福建)，虱麻头(广东)

**Urena procumbens** L

生于海拔 1 000 米以下的山坡灌丛、溪岸、路旁及村庄附近的空旷地。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西。

根、叶(狗脚迹)：微甘，涩，平。行气活血，祛风利湿，清热解毒。　根：用于风湿痛，劳倦乏力，肝炎，痛经，跌打损伤，狂犬咬伤。　叶：用于缠腰火丹，毒蛇咬伤。花：用于糜疹。

**波叶梵天花**

**Urena repanda** Roxb. ex J. E. Smith

生于海拔 300—1 600 米的山坡灌丛中。分布于广西、贵州、云南。

根、叶：祛风解毒。

## 103. 木棉科　Bombacaceae

### 木棉属　Bombax L.

**木棉**　斑芝花、英雄树(福建、台湾、广东)，红棉、攀枝花(广东)

**Bombax ceiba** L.——*B. malabaricum* DC.; *Gossompinus malabarica* (DC.) Merr.

生于丘陵或低山次生林中。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。南方各城市也有栽培。

根、茎皮：微苦，凉。祛风利湿，通经舒络。用于风湿关节痛，腰腿痛。　花(木棉花)：甘、淡，凉。清热解暑，收敛止血。用于痢疾，咳血，呕血，外伤出血，消渴，血崩，牙痛，冻疮，湿疹，疮癣。

### 榴莲属　Durio Adans.

**榴莲**

**Durio zibethinus** Merr.

原产马来西亚。湖南、广东、海南、广西有引种栽培。

果实：甘，温。用于暑痢，心腹冷气。

## 104. 梧桐科　Sterculiaceae

### 昂天莲属　Ambroma L. f.

**昂天莲**　仰天盅、水麻、假芙蓉(全国中草药汇编)

**Ambroma augusta** (L.) L.f.——*Theobroma augusta* L.

生于海拔 200—1 200 米的山谷沟边或林缘。分布于广东、海南、广西、贵州、云南。

根、叶：微苦，平。通经行血，散瘀消肿。用于疮疖红肿，跌打肿痛。

### 刺果藤属　Byttneria Loefl.

**刺果藤**　大胶藤、牛蹄麻、鸡冠麻(全国中草药汇编)

**Byttneria aspera** Colebr.——*Buettneria aspera* Colebr.

多生于低海拔的山地疏林中或山坡沟谷溪旁岩隙中。分布于福建、广东、海南、广西、云南。

根：涩、微苦，微温。祛风湿，壮筋骨。用于产后筋骨痛，风湿骨痛，腰肌劳损。

### 可乐果属　Cola Schott. et Endl.

**苏丹可乐果**　可拉、红可乐(简明生物学词典)

**Cola acutminata** Schott. et Endl.

原产非洲西部热带地区。我国南方已引种成功。

种子：提神。

### 火绳树属　Eriolaena DC.

**广西火绳树**　桂火绳(中国高等植物图鉴)

**Eriolaena kwangsiensis** Hand.-Mazz.

生于海拔 800—1 500 米的山谷密林和灌丛中。分布于广西、云南。

根、茎：续筋骨。外用于骨折。

**火绳树**　接骨丹、火索树(云南)

**Eriolaena spectabilis** (DC.) Planch. ex Mast.——*Microchlaena spectabilis* DC.; *E. malvacea* (Levl.) Hand.-Mazz.

生于海拔 300—1 500 米的河谷干热稀树山坡。分布于广西、贵州、云南。四川渡口一带有栽培。

根内皮(赤火绳): 苦、涩,凉。收敛止血,续筋接骨。用于外伤出血,骨折,烧、烫伤,胃痛。

## 梧桐属 Firmiana Marsili

**梧桐** 青桐、桐麻(陕西),桐麻碗(四川中药志),瓢羹树(草木便方)

**Firmiana platanifolia** (L. f.) Marsili——*Sterculia platanifolia* L. f.; *F. simplex* (L.) W. F. Wight

全国各地均有栽培。

种子(梧桐子): 甘,平。顺气,和胃,消食。用于胃痛,疝气,伤食,小儿口疮。 根(梧桐根): 淡,平。祛风湿,和血脉,通经络。用于风湿关节痛,肠风下血,月经不调,跌打损伤。 梧桐白皮: 甘。祛风,除湿,活血止痛。用于风湿痹痛,跌打损伤,月经不调,痔疾,丹毒。 叶(梧桐叶): 苦,寒。祛风湿,清热解毒。用于风湿痛,麻木,痈疮肿毒,痔疮,臁疮,外伤出血,高血压症。 花(梧桐花): 甘,平。清热解毒。用于水肿,秃疮,烧、烫伤。

## 山芝麻属 Helicteres L.

**山芝麻** 白头公、油麻甲(江西),田油麻、仙桃草(福建),山油麻(广州),假芝麻(广西)

**Helicteres angustifolia** L.

生于海拔 120—800 米山地丘陵、草坡。分布于江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、云南。

全草: 甘,寒。清热解毒,消肿止痒。用于感冒发热,头痛,口渴,疟腮,麻疹,痢疾,泄泻,痈肿,瘰疬,疮毒,湿疹,痔疮。

长序山芝麻 长叶山芝麻、野芝麻(云南)

**Helicteres elongata** Wall.

生于拔海 190—1 600 米的路旁、林缘的荒地上或干旱草坡上。分布于广西、云南。

根(野山芝麻): 苦,凉。清热解表,截疟,止泻。用于恶性疟疾,感冒,高热,乳蛾,疟腮。

**细齿山芝麻** 小芝麻、小黑药(云南),光叶山芝麻(广西)

**Helicteres glabriuscula** Wall.

生于草坡或灌丛中。分布于广西、贵州、云南。

根(野芝麻根): 苦,寒。清热解毒,截疟,杀虫。用于疟疾。

**火索麻** 癞皮树(广州),鞭龙(云南),大麻树、黎仔麻木(中国药用植物纲要)

**Helicteres isora** L.

生于海拔100—580米的荒坡、林缘、丘陵地或灌丛中。分布于广东、海南、云南。

根：辛、微苦，温。解表，理气，止痛。用于胃痛。

**剑叶山芝麻**　万头果、坡芝麻(中国高等植物图鉴)，大叶山芝麻(海南植物志)

**Helicteres lanceolata** DC.

生于山坡、草坡或灌丛中。分布于广东、海南、广西、云南。

根：止咳，解表，透疹。

**大剑叶山芝麻**

**Helicteres lanceolata** DC. var. **megaphylla** Hsue

生于向阳山坡草地。分布于广西。

全草：用于感冒。

**矮山芝麻**

**Helicteres plebeja** Kurz

生于草坡或灌丛中。分布于广西、云南。

枝、叶：止咳。用于咳嗽。

**粘毛山芝麻**

**Helicteres viscida** Bl.

生于海拔330—850米的山坡上或丘陵地的灌丛中。分布于海南、云南。

茎、叶：用于腹痛，腹泻，痢疾，便血，脱肛。

## 银叶树属　Heritiera Dryand.

**银叶树**

**Heritiera littoralis** Dryand.

生于海滩河口岸泥滩处、高潮可达的滩地。分布于台湾、广东、海南。

树皮：用于血尿症。

## 马松子属　Melochia L.

**马松子**　野路葵、野棉花秸(全国中草药汇编)

**Melochia corchorifolia** L.

生于田间或低山丘陵地旷野间，为一杂草。分布于长江流域以南和台湾、海南。

茎、叶(木达地黄)：淡，平。清热利湿。用于黄疸。

## 午时花属　Pentapetes L.

**午时花**　夜落金线(秋傳花镜)

**Pentapetes phoenicea** L.

原产亚洲热带。福建、广东、广西、四川、云南有栽培。

全株(午时花): 清热解毒,消肿。外用于痈肿疮毒。

## 翅子树属 Pterospermum Schreber

**翅子树**

**Pterospermum acerifolium** (L.) Willd.——*Pentapetes acerifolium* **L.**

生于海拔 1 200—1 640 米的山坡上。分布于云南。福建、台湾有栽培。

树皮: 消肿散结,通经络。

**翻白叶树** 半枫荷(广东),异叶翅子木(海南植物志)

**Pterospermum heterophyllum** Hance

多生于海拔 500 米以下的山地林中或山坡林缘路旁及河谷地。分布于福建、广东、海南、广西。

根(半枫荷): 甘、淡,微温。祛风除湿,活血通络。用于风湿痹痛,腰肌劳损,手足酸麻无力,跌打损伤。

**景东翅子树**

**Pterospermum kingtungense** C. Y. Wu ex Hsue

生于海拔 1 430 米以下的山坡草地。分布于云南。

树皮: 消肿散瘀,通经活络。

附 注: 云南特有药用植物。

**窄叶半枫荷** 假木棉(广东),翅子树(海南植物志)

**Pterospermum lanceaefolium** Roxb.

生于海拔 300—900 米的山谷、山坡密林中。分布于广东、海南、广西、云南。

根: 祛风湿,止痛。用于风湿关节痛。

**裁裂翅子树**

**Pterospermum truncatalobatum** Gagnep.

生于石灰岩山上密林中。分布于广西宁明和龙州、云南金平。

根: 用于腰腿痛。

## 梭罗树属 Reevesia Lindl.

**梭罗树** 野梦花(贵州),毛叶梭罗(海南植物志)

**Reevesia pubescens** Mast.

生于海拔 550—2 500 米的山坡或山谷疏林中。分布于海南、广西、四川、贵州、云南。

根皮: 辛,温。祛风除湿,消肿止痛。用于风湿痛,跌打损伤。

## 苹婆属 Sterculia L.

**短柄苹婆**

**Sterculia brevissima** Hsue

生于海拔540—1 300米的山谷和山坡上的混交林中、沟谷雨林中。分布于云南西双版纳。

根：用于肝炎，泄泻，腹痛。

附　注：云南特有药用植物。

**粉苹婆**

**Sterculia euosma** W. W. Smith

生于海拔2 000米以下的山坡疏、密林中。分布于广西、云南。

树皮：止咳。用于咳嗽。

**海南苹婆**　　小苹婆(中国树木分类学)

**Sterculia hainanensis** Merr. et Chun

生于山谷密林中。分布于海南、广西。

叶：外用于跌打损伤。

**假苹婆**　　个则王(广西壮语)，鸡冠木(云南)，赛苹婆(中国树木分类学)

**Sterculia lanceolata** Cav.

常生于山谷溪旁。分布于广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根、叶：甘，微温。舒筋通络，祛风活血。用于风湿痛，产后风瘫，跌打损伤，腰腿痛，黄疸，外伤出血。

**胖大海**　　大洞果(本草纲目拾遗)

**Sterculia lychnophora** Hance

产于热带地区。广东、海南、广西、云南已有引种。

种子(胖大海)：甘、淡，凉。清火，解毒。清肺，利咽。用于干咳无痰，咽喉痛，音哑，骨蒸内热，鼻衄，目赤，牙痛，热结便秘，痔疮漏管。

附　注：《中华人民共和国药典》1990版收载。

**苹婆**　　凤眼果(广州)，七姐果(全国中草药汇编)

**Sterculia nobilis** W. W. Smith

生于山地林中或灌丛中。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

种子(凤眼果)：甘，温。温胃，杀虫。用于虫积腹痛，翻胃吐食，疝痛。　果荚(凤眼果壳)：平，淡。用于中耳炎，血痢，疝气；外用于痔疮。

**野生苹婆**　　假九层皮(广西)

**Sterculia nobilis** W. W. Smith var. **subspontanea** Hsue et S. J. Xu

生于山地疏林中。分布于广西。

叶：祛风湿。用于风湿关节痛。

## 可可属　Theobroma L.

**可可**　　可可树(通称)

**Theobroma cacao** L.

原产美洲中部及南部。海南、云南有引种。

种子：温阳，利尿，提神。

### 蛇婆子属　Waltheria L.

**蛇婆子**　和他草、仙人撒网、满地毯(福建)，大古钶(广西)

**Waltheria indica** L.——*W. americana* L.

生于山野间及向阳的草坡上。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、云南。

根、茎：辛、微甘，平。祛湿，解毒。用于带下病，疮疖，乳痈。

## 105. 毒鼠子科　Dichapetalaceae

### 毒鼠子属　Dichapetalum Thou.

**毒鼠子**　滇毒鼠子(云南种子植物名录)

**Dichapetalum gelonioides** (Roxb.) Engl.——*Moacurra gelonioides* Roxb.

生于海拔1 500米以下的潮湿密林中。分布于广东、海南、四川、云南。

果实：有毒。用于除四害。

**海南毒鼠子**　长瓣毒鼠子(广西)

**Dichapetalum longipetalum** (Turcz.) Engl.——*Chailletia longipetala* Turcz.

生于中海拔山谷密林中。分布于广东、海南、广西。

茎、叶(长瓣毒鼠子)：用于血吸虫病。

## 106. 瑞香科　Thymelaeaceae

### 沉香属　Aquilaria Lam.

**沉香**　奇南香木(台湾)，沉水香树、容水沉香树，伽罗树(中药材品种论述)

**Aquilaria agallocha** Roxb.

台湾、广东、广西有少量栽培。

心材(土沉香)：辛、苦，寒。降气调中，暖肾止痛。用于脘腹痛，呕吐，气逆，呃逆，气喘。

**土沉香**　海南沉香、岭南沉香、白木香、莞香、六麻树(中药材品种论述)

**Aquilaria sinensis** (Lour.) Gilg——*Ophispermum sinensis* Lour; *A. grandiflora Benth.*

生于低山疏林中。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、云南。

心材(沉香)：辛、苦，微温。降气调中，暖肾止痛。用于胸腹疼痛，胸闷，呕吐呃逆，腹鸣泄泻，气逆喘促。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

## 瑞香属　Daphne L.

**尖瓣瑞香**　野梦花(贵州),尖裂瑞香(云南种子植物名称)

**Daphne acutiloba** Rehd.

生于海拔1 200—3 000米的山地。分布于湖北、四川、贵州、云南。

全株：辛、甘,凉。理气,消积,祛风除湿。用于胃痛,风湿痛,目赤。

叶、花：杀虫。

**阿尔泰瑞香**　尖瓣瑞香(中国高等植物图鉴)

**Daphne altaica** Pall.

生于山坡灌丛中。分布于新疆伊犁及阿勒泰地区。

皮、叶：辛,温。有毒。解表发汗,止咳祛痰,止痛。用于风寒感冒,胃痛。

**橙花瑞香**　黑沉香(云南)

**Daphne aurantica** Diels

生于海拔2 500—4 000米的高山灌丛中或岩石上。分布于四川、云南。

根部黑色心材：宁心,通脉,降气。

**长轴瑞香**

**Daphne championii** Benth.

生于海拔300—800米的山坡林下或灌丛中。分布于江西、广东、广西。

根、茎皮：用于腰痛,痈疮肿毒,跌打损伤。

**滇瑞香**　桂花矮陀陀、黄皮杜仲、黄根构皮、月月绿(云南),野瑞香(云南经济植物志)

**Daphne feddei** Lévl.

生于山沟树林下。分布于四川、贵州、云南。

全株或根(桂花岩陀)：辛、涩,温。有小毒。祛风除湿,舒筋活络。用于跌打损伤,风湿关节痛,胃痛。

**芫花**　闷头花(陕西、河南、四川、贵州),野丁香花(山东),老鼠花(江苏、江西),石棉皮(江西),头疼皮(湖南),头疼花(本草纲目),金腰带(植物名实图考)

**Daphne genkwa** Sieb. et Zucc.

生于海拔600—2 200米的山坡、山谷、路旁。分布于辽宁、河北、陕西、甘肃、山东、河南及长江流域各省区。

花蕾(芫花)：辛、苦,温。泻水逐饮,解毒杀虫。用于痰饮癖积,咳喘,水肿,胁痛,心腹症结胀满,食物中毒,疟疾,痈肿。　根(芫花根)：辛、苦,温。消肿,活血,止痛。用于水肿,瘰疬,乳痈,痔瘘,疥疮。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**黄芫花**　金腰带(陕西),黄瑞香(种子植物名称),祖师麻(陕西中药志)

**Daphne giraldii** Nitsche

生于海拔600—2 200米的灌丛或山地。分布于西北(除新疆)及山西、四川。

根皮、茎皮(祖师麻)：辛、苦,温。有小毒。祛风除湿,止痛散瘀。用于头痛,牙痛,风

湿关节痛，胃痛，腰腿疼及四肢麻木。　种子(去风子)：用于吐泻。

附　注：祖师麻是医治跌打损伤的重要草药，民谚有"打得顺地爬，离不开祖师麻"的美誉。

**天目瑞香**

**Daphne grueningiana** Winkl.

生于湿润的山谷、山坡石隙缝中、山麓灌草丛中。分布于浙江天目山。

全株：甘、咸，温。有毒。活血消肿，利咽。

**长白瑞香**　辣根草(吉林)

**Daphne koreana** Nakai

生于海拔600—1 800米的针、阔叶混交林中。分布于东北。

根状茎、全株：辛，热。温中散寒，行瘀止痛。用于冠心病，心绞痛，慢性冠状动脉供血不足，脱疽，关节痛，心腹痛，预防冻疮。

附　注：长白瑞香为吉林近年来研究的新药源之一。

**瑞香**　雪地开花(江西)，野梦花(湖北、湖南、贵州)，雪冻花(湖南)，山棉皮(云南)，睡香(清异录)，蓬莱紫(群芳谱)

**Daphne odora** Thunb.

野生于山野、溪旁阴湿处或栽培。分布于安徽、浙江、江西、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

根、茎、花：苦、辛，温。祛风除湿，活血止血。用于风湿关节痛，腰腿痛，牙疼，咽喉痛，跌打损伤，早期乳腺癌及疮疡。

**毛瑞香**　白瑞香、野水菖花、蒙花(皮)(浙江)，大金腰带(江西)，奇香花(本草纲目拾遗)，紫茎瑞香(中药大辞典)

**Daphne odora** Thunb var. **atrocaulis** Rehd.

生于山坡疏林下或灌丛中。分布于中南及江苏、安徽、浙江、江西、四川、贵州。

根、花(铁牛皮)：苦、辛，温。有毒。祛风除湿，通经活血。　根：用于风湿骨疼，劳伤腿疼，咽喉痛。　花：用于牙痛，遗精。

**铜牛皮**　棕枝瑞香、金腰带(四川)

**Daphne odora** Thunb. var. **kiusiana** Keissler

生于山坡疏林下或灌丛中。分布于四川。

根：辛，有毒。祛风活血，清热解毒。用于跌打损伤，瘰疬，腰腿痛。

**白瑞香**　身保暖(广西)，蒙花枝(四川)，开花矮陀陀(云南)，纸用瑞香(种子植物名称)

**Daphne papyracea** Wall. ex Steud.——*D. cannabina* Lour. ex Wall.

生于山坡疏林下或灌丛中。分布于湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根皮、茎皮、花、果实(软树皮)：甘、辛，微温。有毒。祛风除湿，活血调经，止痛。用于跌打损伤，大便下血，各种内脏出血，痛经。

附　注：**毛花雪花构 D. papyracea** Wall. ex Steud. var. **crassiusula** Rehd.；**云南雪花构 D. papyraceae** Wall. ex Steud. var. **duclouxii** Lecomte. 均分布于云南，根皮用作接骨，跌打损伤。

**凹叶瑞香**　　杂兰(浙江),桂花矮陀陀、白花矮陀陀、冷水跌打、黄眼枸皮(云南)

**Daphne retusa** Hemsl.

生于山坡疏林或灌丛中。分布于陕西、甘肃、青海、浙江、湖北、四川、云南。

根皮：在陕西也作祖师麻入药,祛风止痛。浙江民间常用其治疗慢惊风。

**华瑞香**

**Daphne rosmariniifolia** Rehd.

生于海拔3 000米的高山针叶林下、山地或石砾阴湿地。分布于甘肃、四川。

根皮、树皮：活血止血。

**甘肃瑞香**　　冬夏青(青海),唐古特瑞香(华北经济植物志要)

**Daphne tangutica** Maxim ——*D. szechuanica* Winkl.; *D. wilsonii* Rehd.

生于海拔1 400—3 900米的山坡灌丛中。分布于陕西、甘肃、宁夏、青海、湖北、四川、云南、西藏。

茎皮、根皮、花(祖师麻)：辛、苦,温。有毒。祛风除湿,散瘀止痛。用于梅毒性鼻炎,下疳,骨痛及关节腔积水。　花：用于肺痈。

## 粟麻属　Diarthron Turcz.

**草瑞香**　　粟麻、山胡麻(中国沙漠植物志),好苏乐高诺(蒙语)

**Diarthron linifolium** Turcz.

生于草丛中。分布于东北、华北及西北。

根皮、茎皮：活血止痛。外用于风湿痛。

## 结香属　Edgeworthia Meissn.

**结香**　　沈杏花(陕西)，水蒿花(湖北),新蒙花(湖南),一身宝暖(广西),喜花(重庆草药),密蒙花(本草纲目),打结花、梦冬花(中国树木分类学)

**Edgeworthia chrysantha** Lindl ——*E. papyrifera* Sieb. et Zucc.

多生于海拔600—2 000米的山坡、山谷、灌丛中,或栽培于村边及田埂上。分布于中南及陕西、江苏、安徽、浙江、四川、云南。

花蕾(梦花)：淡,平。养阴,安神,明目,祛障翳。用于青盲,翳障,多泪,羞明，梦遗,虚淋,失音。　根(梦花根)：辛,温。安心神,益肾气。用于梦遗,早泄,白浊,虚淋，带下病,血崩。

附　注：功效相同的有**滇结香 E. gardneri** (Wall.) Meisen.——*Daphne gardneri* Wall.，分布于云南西部。

## 毛花瑞香属　Eriosolena Bl.

**毛花瑞香**　　山条皮、桂花叶子兰、桂花跌打(云南)

**Eriosolena composita** (L. f.) Van Tieghem——*E. involucrata* (Wall.) Van

*Tieghem.*

生于海拔 1 500—1 600 米的山坡上。分布于云南东南部。

根皮及全株(桂花跌打): 辛,微温。镇痛散瘀,接骨续筋,祛湿活络。用于风湿痛,跌打损伤。

## 狼毒属 Stellera L.

**狼毒** 断肠草(河北),绵大戟(山西、河南),红火柴头花、一把香(四川),大将军(云南),鸡肠狼毒(滇南本草),川狼毒(集效方), 瑞香狼毒(中国高等植物图鉴), 达伦-图茹(蒙语)

**Stellera chamaejasme** L.

生于海拔 1 200—2 900 米的山坡草地或河滩。分布于东北、华北、西北、西南及江西、河南。

根(狼毒): 辛、苦,平。有毒。逐水祛痰,破积杀虫。用于水气胀肿,瘰疬,疥癣,外伤出血,疮疡,跌打损伤。

## 荛花属 Wikstroemia Endl.

**白花荛花** 荛花(湖南)

**Wikstroemia alba** Hand.-Mazz.

生于海拔 600 米的林阴下或路旁。分布于安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东。

根皮: 消坚破瘀,止血,镇痛。

**荛花** 黄荛花(本草纲目)

**Wikstroemia canescens** Meissn.

生于海拔 1 500—2 800 米的山坡灌丛中。分布于西藏。

根(荛花根): 辛,温。逐水通经,祛风除湿。用于水肿,咳逆上气,寒热有痰。 花蕾(荛花): 苦,寒。有毒。泻水饮,破积聚。

**头序荛花**

**Wikstroemia capitata** Rehd.

生于山坡草地。分布于陕西、湖北、四川、贵州。

根: 用于便秘。

附 注: 功效相同的有**革叶荛花 W. scytophylla** Diels, 分布于西南。

**河朔荛花** 芫蒿、黄荛花(东北),花鱼梢(北京),野瑞香(山西),羊厌厌、北芫花(陕西)

**Wikstroemia chamaedaphne** Meissn.

生于山坡、草地。分布于华北及陕西、甘肃、江苏、河南、湖北、四川、贵州。

花蕾: 辛,温。有小毒。泻下逐水。用于水肿胀满,痰饮积聚,哮喘,病毒性肝炎。

**一把香** 一柱香、香构(四川),矮陀陀、竹腊皮、铁扁担(云南),山皮香、矮陀陀(滇南本草),长花荛花(中国高等植物图鉴)

**Wikstroemia dolichantha** Diels

生于山坡上。分布于四川、云南。

根(一把香)：辛、苦，温。宽中理气，活血化瘀，接骨。用于哮喘，胸病，牙痛，外伤出血，骨折。云南民间用于性病。

附　注：功效相同的有**毛长花荛花 W. dolichantha** Diels **var. pubescens** Domke

**构皮荛花**

**Wikstroemia effusa** Rehd.

生于灌丛中或山坡上。分布于贵州、云南、西藏。

茎皮：驱虫。

**了哥王**　铺银草、红灯笼(福建)，了王麻，山麻皮(广东)，雀儿麻(广西)，南岭荛花(中国树木分类学)

**Wikstroemia indica** (L.) C. A. Mey.——*Daphne indica* L.

生于丘陵草坡或灌丛中。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南。

根、叶：微辛、苦，寒。有毒。清热解毒，通经利水，化痰止咳。用于瘰疬，风湿痛，跌打损伤，出血、咳嗽。

附　注：还用于风热及咳嗽痰喘。民间也用于麻风，乳痈，乳癌。

**细叶荛花**

**Wikstroemia leptophylla** W. W. Smith

生于海拔 1 770—2 850 米的石山林阴下或灌丛中。分布于西南。

根：用于小儿疳积，肺炎。

**小黄构**　冬青、黄构皮(陕西)，娃娃皮(四川)，野棉皮(云南)

**Wikstroemia micrantha** Hemsl.

生于海拔 400—1 040 米的山坡、河岸、路旁。分布于西南及陕西、甘肃、湖北、湖南、广东、广西。

根、茎皮：淡，平。止咳化痰。用于哮喘，风火头痛。

**北江荛花**

**Wikstroemia monnula** Hance

生于山地灌丛中。分布于浙江、江西、福建、湖南、广东、广西、贵州。

根：甘、辛，微温。有小毒。散结散瘀，清热消肿，通经逐水。

**细轴荛花**　野发麻(福建)，野棉花(华南)

**Wikstroemia nutans** Champ.

生于山地灌丛中。分布于江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根、茎皮、花：辛，温。消坚破瘀，止血，镇痛。用于瘰疬初起，跌打损伤。

**圆锥荛花**

**Wikstroemia paniculata** Li

生于山地疏林中。分布于广西。

全株：用于疝气。

**毛花荛花**　柔毛荛花(安徽)，

**Wikstroemia pilosa** Cheng

生于山坡林缘或灌丛中。分布于浙江、安徽、江西、湖南。

根、茎皮(浙雁皮)：苦，微辛，寒。有小毒。破结散瘀，清热解毒，消肿逐水。

## 107. 胡颓子科　Elaeagnaceae

### 胡颓子属　Elaeagnus L.

**沙枣**　银柳、桂香柳、香柳(河南)，牙格达、红豆(蒙语)

**Elaeagnus angustifolia** L.

多生于沙漠地区或栽培。分布于东北、华北、西北及山东、河南。

果实(沙枣)：甘、酸、涩，平。强壮，健胃，止泻，调经，利尿，固精。用于消化不良，胃痛，腹泻，月经不调，小便淋痛。　树皮(沙枣树皮)：涩、微苦，凉。收敛止痛，清热凉血。用于咳喘，泄泻，胃痛，带下病；外用于烧、烫伤，止血。　叶(沙枣叶)：甘、微涩，凉。清热解毒。用于痢疾，泄泻。　花(沙枣花)：甘、涩，温。止咳平喘。用于咳喘。

附　注：功效相同的有**东方沙枣 E. angustifolia** L. var. **orientalis** (L.) O. Kuntze 分布于内蒙古、甘肃、宁夏、新疆；**大果沙枣 E. moorcroftii** Wall. ex Schlecht.，分布于新疆、西藏；**尖果沙枣 E. oxycarpa** Wall. ex Schlecht.，分布于甘肃、新疆；**准噶尔沙枣 E. songarica**(Bernh. ex Schlecht.) Schlecht.，分布于新疆。

**佘山羊奶子**　牛奶子(浙江)，羊奶子(湖北)，佘山胡颓子(江苏南部种子植物手册)

**Elaeagnus argyi** Lèvl.

生于山麓旷野路旁、水沟边、田埂边及疏林下。分布于江苏、上海、安徽、浙江、江西、湖北、湖南。

根、叶、果实：淡、涩，温。止咳平喘，祛风除湿。　根、叶：用于咳嗽痰喘。　果实：用于泄泻。

**长叶胡颓子**　马鹊树、牛奶子(四川成都)，牛奶果(贵州)

**Elaeagnus bockii** Diels

生于海拔500—2 000米的山坡、沟旁或灌丛中。分布于陕西、甘肃、湖北、四川、贵州。

根：甘，平。清热利湿，消肿止痛。用于痢疾，吐血，咳嗽痰喘，水肿，牙痛，风湿关节痛。　枝、叶：顺气化痰。用于咳嗽痰喘，痔疮。

**密花胡颓子**

**Elaeagnus conferta** Roxb.

生于海拔50—1 500米的热带密林中。分布于广西、云南。

根：祛风通络，行气止痛。　果实：收敛止泻。

**毛木半夏**

**Elaeagnus courtoisii** Belval

生于海拔300—1 500米的热带密林中。分布于安徽、浙江、江西、湖北。

根：平喘，活血，止痢。用于哮喘，痢疾，跌打损伤。

**巴东胡颓子**　半圈子(四川)，铜叶胡颓子(中国高等植物图鉴)

**Elaeagnus difficilis** Serv.——*E. cuprea* Rehd.

生于海拔600—1 800米的向阳山坡灌丛中或林中。分布于中南、西南及浙江、江西。

根(盐匏藤)：酸、微甘，温。温下焦，祛寒湿，收敛止泻。用于小便失禁，外感风寒。

**蔓胡颓子**　加豆叶(贵州)，抱君子、藤胡颓子(中国植物志)

**Elaeagnus glabra** Thunb.

生于海拔1 000米以下的向阳林中或林缘。分布于江苏、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

根：酸，平。利水通淋，散瘀消肿。用于跌打肿痛，吐血，砂淋、石淋。　叶：酸、平。止咳平喘。用于咳嗽痰喘，鱼骨哽喉。　果实：酸，平。利水通淋。用于泄泻。

**角花胡颓子**　羊母奶子、吊中子藤(全国中草药汇编)

**Elaeagnus gonyanthes** Benth.

生于海拔1 000米以下的热带和亚热带地区。分布于湖南、广东、海南、广西、云南。

根：微苦、涩，温。祛风通络，行气止痛，消肿解毒。用于风湿关节痛，腰腿痛，河豚中毒，狂犬咬伤，跌打肿痛。　叶：微苦、涩，温。平喘止咳。用于咳嗽，哮喘。　果实：微苦、涩，温。收敛止泻。用于泄泻

**宜昌胡颓子**　串串子、三月黄(湖北)，羊奶奶(贵州)

**Elaeagnus henryi** Warb.

生于低山坡灌丛中。分布于陕西及长江流域以南各省区。

茎叶(红鸡踢香)：苦，涩，凉。驳骨消积，清热利湿，消肿止痛，止咳止血。用于痢疾，痔血，血崩，吐血，咳喘，骨髓炎，消化不良。　果实：四川草医用于痢疾。

**披针叶胡颓子**　沉匏、补阴丹(全国中草药汇编)

**Elaeagnus lanceolata** Warb.

生于海拔500—2 000米的山坡、沟旁、林中或林缘。分布于陕西、甘肃、湖北、广西、四川、贵州、云南。

根(盐匏藤)：酸、微甘。温下焦，祛寒湿。用于小便失禁，外感风寒。　果实：用于痢疾。

**鸡柏紫藤**　吊中子藤、灯吊子(广东)，吊灯笼(云南)，炮仗花(中国植物志)

**Elaeagnus loureirii** Champ.

生于海拔500—2 260米的山地灌丛中。分布于江西、广东、广西、云南。

全株：酸、涩，微温。止咳平喘，收敛止泻。用于哮喘，咳嗽，泄泻，咯血，慢性骨髓炎，子痈，胃痛；外用于疮癣，痔疮，肿毒痛，跌打肿痛。

**大花胡颓子**

**Elaeagnus macrantha** Rehd.

生于海拔1 300—1 500米的密林中。分布于贵州、云南。

根：消肿，清热解毒，利湿，安神镇静。　果实：收敛止泻，镇咳。

**银果牛奶子**　银果胡颓子(中国高等植物图鉴)

**Elaeagnus magna**(Serv.) Rehd.——*E. umbellata* Thunb. subsp. *magna* Serv.

生于海拔100—1 200米的山地、路旁、林缘，河边向阳砂质土壤上。分布于江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

根、叶：辛、甘，凉。清热解毒，解表透疹。　根：用于麻疹不透。　叶：用于无名肿毒。

**木半夏**　羊不来、莓粒团(安徽)，牛脱(福建)，羊奶子(贵州)，四月子、牛奶子(云南)

**Elaeagnus multiflora** Thunb.——*E. multiflora* Thunb. var. *crispa* (Thunb.) Maxim.

生于低山坡灌丛中。分布于华东及河北、陕西、河南、湖北、湖南、广东、四川、贵州、云南。

果实：酸、涩，温。活血行气，平喘止咳，收敛止痢。用于哮喘，痢疾，跌打损伤，痔疮。根或根皮：平。活血行气。用于虚损，恶疮疥癣。

**细枝木半夏**

**Elaeagnus multiflora** Thunb. var. **tenuipes** C.Y. Chang

生于海拔1 800米处的阴湿岩壁、灌丛中。分布于四川峨眉山。

根、叶、果实：用于痔漏，白浊，阴疮。

附　注：四川特有药用植物。

**福建胡颓子**　锅底刺、宜梧(福建)

**Elaeagnus oldhami** Maxim.

生于海拔500米以下的空旷地区。分布于福建、台湾、广东。

全株、果实：酸、涩，平。祛风理湿，下气定喘，固肾。用于疲倦乏力，泄泻，胃痛，消化不良，风湿关节痛，哮喘久咳，肾亏腰痛，盗汗，遗精，带下病，跌打损伤。

**胡颓子**　牛奶子、半春子、半含春、石滚子、四枣、柿模、羊奶奶、甜棒锤(全国中草药汇编)

**Elaeagnus pungens** Thunb.

生于山坡林缘、灌丛中。分布于陕西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、贵州。

果实：酸、涩，平。消食止痢。用于泄泻，痢疾，食欲不振。　根：酸，平。祛风利湿，消积利咽，止咳止血。用于传染性肝炎，小儿疳积，风湿关节痛，咯血，吐血，便血，崩漏，带下病，跌打损伤。　叶：微苦、酸，平。止咳平喘。用于咳嗽，哮喘。

附　注：功效相同的有**大叶胡颓子 E. macrophylla** Thunb.，分布于山东、江苏、浙江及沿海岛屿、台湾。

**攀援胡颓子**　牛虱子果、羊山味树、长蔸茎胡颓子(全国中草药汇编)

**Elaeagnus sarmentosa** Rehd.

生于海拔1 000—1 500米的山野地带。分布于广西、云南。

根、叶、果实(羊奶果)：酸，平。止咳定喘，收敛止泻。用于哮喘，咳嗽，泄泻，跌打损伤肿痛，黄疸，吐血，咯血，风湿痛，咽喉痛，感冒，小儿惊风，疮癣。

**星毛羊奶子**　马奶子(贵州)

**Elaeagnus stellipila** Rehd.

生于海拔 500—1 200 米的向阳丘陵地区、溪边矮林中或路旁、田边。分布于江西、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

果实：清热利湿，收敛。用于跌打损伤，痢疾。

**牛奶子**　剪子梢(陕西)，剪子果、甜枣(河南)，牛奶奶、秋胡颓子(贵州)

**Elaeagnus umbellata** Thunb.

生于干燥山坡、山沟及河边沙地。分布于华北、华东、西南、西北及辽宁、河南、湖北。

根、叶、果实(牛奶子)：酸、甘，凉。清热利湿，止血。用于泄泻，痢疾，热咳，哮喘，跌打损伤，血崩。

**绿叶胡颓子**　羊奶子(湖北)

**Elaeagnus viridis** Serv.

生于山坡灌丛中或林缘。分布于陕西、湖北。

根、枝条：用于胃痛。

**白绿叶**　羊奶果、天青地白、小羊奶果(云南)，丽江胡颓子(云南种子植物名录)

**Elaeagnus viridis** Serv. var **delavayi** Lecomte

生于海拔 1 800—2 500 米的向阳灌丛中。分布于云南。

根皮、茎皮、叶(白绿叶)：酸，平。利尿排石，止咳定喘，行气止痛。用于水肿，砂淋，石淋，胃痛，咳嗽痰喘。

**巫山胡颓子**

**Elaeagnus wushanensis** C. Y. Chang

生于山坡灌丛中。分布于陕西、湖北、四川。

叶、果实：用于痢疾。

## 沙棘属　Hippophae L.

**肋果沙棘**　黑刺(青海)

**Hippophae neurocarpa** S. W. Liu et T. N. He

生于河滩。分布于甘肃、青海、四川、西藏。

果实：酸、涩，温。活血化瘀，化痰宽胸。

**中国沙棘**　沙棘(通称)，醋柳(山西)，酸刺溜、黄酸刺、酸溜溜(陕西)

**Hippophae rhamnoides** L. subsp. **sinensis** Rousi

生于阳坡、沙地、沟谷。分布于华北、西北及四川。

果实(沙棘)：酸、涩，温。化痰止咳，消食化滞、活血散瘀。用于咳嗽痰多，消化不良，食积腹痛，跌打损伤瘀肿，瘀血经闭。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。② 功效相同的有**云南沙棘 H. rhamnoides** L. subsp. **yunnanensis** Rousi，分布于四川、云南、西藏。

**西藏沙棘**

**Hippophae thibetana** Schlecht.

生于海拔 3 300—5 200 米的高山草地河漫滩及岸边。分布于甘肃、青海、四川、西藏。

果实：酸、涩，温。活血散瘀，化痰宽胸，滋补。

附　注：藏民用于肝炎。

## 108. 大风子科　Flacourtiaceae

### 山桂花属　Bennettiodendron Merr.

**短柄山桂花**　山桂花(广西)，短柄本勒木(海南植物志)

**Bennettiodendron brevipes** Merr.

生于海拔500—1 800米的山地林中。分布于湖南、广东、海南、广西、贵州、云南。

全株：用于消化不良。

### 山羊角树属　Carrierea Franch.

**山羊角树**　嘉丽树(广西)，山丁木(四川)

**Carrierea calycina** Franch.

生于海拔1 500—4 500米的山地或山坡林中。分布于陕西南部、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

种子(红木子)：苦，凉。补脑熄风。用于头昏目眩。

### 嘉赐树属(脚骨脆属)　Casearia Jacq.

**嘉赐树**　扁鱼膦、熊胆树皮(广西)，球花脚骨脆(中国高等植物图鉴)

**Casearia glomerata** Roxb.

生于低海拔的疏林中。分布于福建、广东、海南、广西。

根：用于风湿骨痛，跌打损伤。　树皮：用于腹痛，泻痢。

附　注：广西产**毛脉嘉赐树 C. glomerata** Roxb. f. **pubinervis** How et Ko，根、树皮用于跌打损伤。

### 刺篱木属　Flacourtia Comm. ex L'Herit.

**刺篱木**

**Flacourtia indica** (Burm. f.) Merr.——*Gmelina indica* Burm. f.; ***F. parvifolia*** Merr.

生于海拔500—1 400米的混交林及丛林中，路边也常见。分布于广东、海南、广西。

果实：用于消化不良。

附　注：功效相同的有**山李子 F. montana** Grah.，分布于云南。

**挪挪果**　揉揉果、木关果、山李子、棠梨(云南)，诺红(云南傣语)

**Flacourtia ramontchii** L'Herit.

生于海拔500—1 700米的灌丛中或以壳斗科为建群种的林中。分布于广西、贵州、

云南。

树皮、种子：祛风除湿。　树液汁：用于泄泻，痢疾。　种子亦用于消化不良。

**大叶刺篱木**　炉甘果(云南)

**Flacourtia rukam** Zoll. et Mor.

生于海拔 2 000 米以下的疏林中。分布于广东、海南、广西、云南。

根、果实(幼果)：用于腹泻，痢疾。枝、叶：外用于皮肤瘙痒。　叶亦用于眼疾。根、果汁为妇科要药，用于月经不调。

## 马蛋果属　Gynocardia R. Br.

**马蛋果**　阿皮杜(藏语)

**Gynocardia odorata** R. Br.

生于海拔 1 000—1 400 米的山坡林中。分布于云南、西藏。

种子：用于麻风，皮肤病。

## 天料木属　Homalium Jacq.

**柳叶天料木**

**Homalium sabiaefolium** How et Ko

生于阔叶季雨林中。分布于广西龙州。

全株：消肿，透风疹。用于疮疡肿毒，风疹。

## 大风子属　Hydnocarpus Gaertn.

**印度大风子**　高山大风子(云南种子植物名录)

**Hydnocarpus alpina** Wight.

原产印度。云南西双版纳有栽培。

种子油：用于麻风病及皮肤病。

**大风子**　泰国大风子(云南)，大枫子(本草品汇精要)

**Hydnocarpus anthelminticus** Pierre et Laness

原产泰国、印度等地。福建、台湾、海南、广西、云南有栽培。

种子(大风子)：辛，温。有毒。祛风燥湿，解毒杀虫。用于麻风；外用于疥癣，梅毒。

附　注：① 种仁《中华人民共和国药典》1990 年版附录收载。② 功效相同的有**库氏大风子 H. kurzii** Warburg；**卫氏大风子 H. wightiana** Bl.，均分布于台湾。

**海南大风子**　龙角、高根(海南)

**Hydnocarpus hainanensis** (Merr.) Sleum. —— *Taraktogenos hainanensis* Merr.

生于高温高湿半阴蔽环境中。分布于海南、广西。

种子：有毒。外用于麻风，牛皮癣，风湿痛，疮疡肿毒。

附　注：国家三级保护植物。

## 山桐子属　Idesia Maxim.

**山桐子**　　水冬瓜子(云南)

**Idesia polycarpa** Maxim.

生于海拔500—3 500米的向阳山坡或林中。分布于浙江、台湾至西南及陕西、甘肃。

叶(山桐子)：辛、甘，寒。清热凉血，散瘀消肿。用于骨折，烧、烫伤，外伤出血，吐血。种子油：杀虫。用于疥癣。

## 栀子皮属　Itoa Hemsl.

**栀子皮**　　野厚朴(通称)，大黄树(广西)，盐巴菜、长叶子老重、木桃果(云南)

**Itoa orientalis** Hemsl.

生于海拔1 000—2 000米的林中。分布于广西、四川、贵州、云南。

根：祛风除湿，活血通络。用于风湿骨痛，跌打损伤，贫血。

附　注：功效相同的有**光栀子皮 I. orientalis** Hemsl. var. **glabrescens** C. Y. Wu，分布于广西。

## 蔹芩属　Scolopia Schreb.

**蔹芩**　　红苗簕(广西)

**Scolopia chinensis**(Lour.) Clos——*Phoberis chinensis* Lour.

生于荫蔽的丛林或疏林中。分布于福建、广东、海南、广西。

全株：活血祛瘀。　根：用于风湿骨痛，跌打损伤。　叶：用于跌打损伤，内伤痛，痈肿疮肿。

## 龙角属　Taraktogenos Hassk.

**大叶龙角**　　广西大风子(广西)，梅氏大风子、马旦果(云南)，麻波罗（中国油脂植物）

**Taraktogenos annanensis** Gagnep.——*Hydnocarpus merrillianus* Li; *T. merrilliana* (Li) C. Y. Wu

生于海拔150—1 200米的林中。分布于广西、云南。

种子：辛，热。有毒。攻毒杀虫。用于麻风病，疥癣，疮疡肿毒，过敏性皮炎，风湿骨痛。

## 柞木属　Xylosma G. Forst.

**南岭柞木**

**Xylosma controversum** Clos

生于海拔150—2 200米的空旷山地。分布于广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根、叶：辛、甘，寒。清热凉血，散瘀消肿。用于骨折，烧、烫伤，外伤出血，吐血。

**柞木**　　檬子树(通称)，柞树、葫芦刺、刺柞、鼠木(全国中草药汇编)

**Xylosma racemosum** (Sieb. et Zucc.) Miq.——*Hisingera racemosa* Sieb. et Zucc.; *X. japonicum* (Walp.) A. Gray

常生于村落附近。分布于秦岭以南和长江流域以南各地。

根、根皮、茎皮、叶(柞木)：苦、涩，寒。清热利湿，散瘀止血，消肿止痛。　根、叶：用于跌打肿痛，骨折，脱臼，外伤出血。　根皮、茎皮：用于黄疸，水肿，死胎不下。

**毛枝柞木**　　檬子树(陕西)，檬子刺根(四川中药志)

**Xylosma racemosum** (Sieb. et Zucc.) Miq. var. **pubescens** Rehd. et Wils.

生于海拔500—2 000米的山坡林中。分布于陕西、甘肃、浙江、福建、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

根、叶：散瘀消肿，催生。用于黄疸，水肿，死胎不下，跌打损伤，骨折，脱臼。

**长叶柞木**　　铁破箩、箩柞树(云南)

**Xylosma longifolium** Clos

生于海拔500—1 600米的混交林及丛林中、路旁也常见。分布于长江以南各地。

根皮、茎皮、叶：苦、涩，寒。清热利湿，散瘀止血，消肿止痛。　根皮、茎皮：用于黄疸，水肿，死胎不下。　根、叶：用于跌打损伤，骨折，脱臼，肿痛，外伤出血。

## 109. 堇菜科　Violaceae

### 堇菜属　Viola L.

**鸡腿堇菜**　　走边疆、红铧头草(陕西)，鸡脚堇菜(东北植物检索表)，奥古特图--尼勒-其其格(蒙语)

**Viola acuminata** Ledeb.

生于海拔700—1 800米的山坡、山沟或草地。分布于东北、华北、西北及浙江、湖北、四川。

叶：淡，寒。清热解毒，消肿止痛。用于肺热咳嗽，疮痈，跌打损伤。

**戟叶堇菜**　　野半夏(贵州)，青地黄瓜(贵州、四川)，堇堇菜(救荒本草)

**Viola betonicifolia** Smith——*V. caespitosa* D. Don; *V. betonicifolia* Smith subsp. *nepalensis* W. Beck.

生于草坡、田野较湿润处。分布于陕西和长江流域及以南各省区。

全草(铧头草)：苦，微寒。清热解毒，祛瘀消肿。用于肠痈，淋浊，疔疮肿毒，刀伤出血，烧、烫伤。

附　注：功效相同的有**鳞茎堇菜 V. bulbosa** Maxim. 分布于甘肃、四川西部、云南、西藏；**川西堇菜 prattii** W. Beck. 分布于四川、贵州、云南。

**双花堇菜**　　谷穗补(云南)

**Viola biflora** L.

生于海拔2 700—4 100米的草坡、林缘、灌丛中。分布于东北、华北、西北及四川、云南、西藏。

根、茎：用于跌打损伤，吐血。

**硬毛双花堇菜**

**Viola biflora** L. var. **hirsuta** W. Beck.

生于海拔约3 000米的山坡草地上。分布于云南、西藏。

根、茎：用于小儿奶毒，跌打损伤，风热咳嗽，咳血。

**阔叶堇菜**

**Viola bifloea** L. var. **platyphylla** Delavay ex Franch.

生于海拔2 300米的山坡草地上。分布于云南。

根状茎：用于跌打损伤，小儿奶毒。

**南山堇菜**

**Viola chaerphylloides** (Regel) W. Beck.——*V. pinnata* L. var. *chaerphylloides* Regel

生于山地林下或沿河及溪谷的阴湿处。分布于东北、华北及安徽、浙江、江西、湖北、四川。

全草：用于风热咳嗽。

**毛果堇菜**　怀胎草(陕西)，山核桃、地丁子、匙头菜、(贵州)

**Viola collina** Bess.

生于海拔450—1 400米的林缘或疏林下、山坡草地阴湿处。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、江苏、上海、安徽、浙江、河南、湖北、四川、贵州。

全草(地核桃)：苦、涩，凉。清热解毒，消肿止血。用于痈疽疮毒，肺痈，跌打损伤，刀伤出血。

**短毛堇菜**　紫花地丁(浙江)

**Viola confusa** Champ.

生于山坡草地、平地、田野或河边。分布于浙江、广东、广西、贵州。

全草：苦，寒。清热解毒，凉血消肿。用于痈疽疮毒，毒蛇咬伤。

**深圆齿堇菜**

**Viola davidii** Franch.

生于溪边草坡、石上或密林下。分布于江西、湖北、湖南、广东、四川、贵州、云南。

全草(紫花地丁)：苦，寒。清热解毒，散瘀消肿。用于风火眼肿，跌打损伤，无名肿毒，刀伤，毒蛇咬伤。

**灰叶堇菜**　土细辛、黄花细辛、踏膀药、小黄药(云南)，黄花地草果(滇南本草)

**Viola delavayi** Franch.

生于林下或溪边。分布于四川、云南。

全草：酸、甘，温。温经通络，除湿止痛。用于风寒咳嗽。根：用于虚弱头晕，风湿关节痛，小儿疳积，跌打损伤。

**少花堇菜**

**Viola delavayi** Franch var. **depaupcrata** Diets

分布于云南大理。

根：用于虚弱头晕，风湿关节炎，小儿疳积，跌打损伤。 全草：用于肺炎。

附 注：功效相同的有**短毛黄花堇菜 V. delavayi** Franch. var. **villosa** W. Beck.，分布于云南昆明、丽江。

**七星莲** 地白草、黄瓜菜(陕西、湖北、湖南、贵州)，抽脓拔(浙江)，野白菜(福建、贵州)，蔓茎堇菜(中国高等植物图鉴)，匍伏茎(新华本草纲要)

**Viola diffusa** Ging ex DC.

生于海拔700—1 350米的山坡草地、路旁、或林下湿润处。分布于长江流域以南各省区及陕西、甘肃。

全草(地白菜)：苦，寒。清热解毒，消肿排脓，清肺止咳。用于疮毒疖痈，毒蛇咬伤，小儿久咳音嘶，风热咳嗽，顿咳，肺痈，目赤，跌打损伤。

**光叶堇菜** 抽脓草(湖北)

**Viola diffusa** Ging ex DC. var. **glabella** H. Boiss.

生于山坡草丛。分布于湖北。

全草(抽脓草)：排脓。用于脓肿。

**裂叶堇菜** 赛尼图-尼勒-其其格(蒙语)

**Viola dissecta** Ledeb.

生于山坡草地、林缘、林下、灌丛或河岸附近。分布于东北、华北、西北及安徽、浙江、江西、湖北。

全草(疔毒草)：微苦，凉。清热解毒，消痈肿。用于痈疮疔毒，淋浊，无名肿毒。

附 注：功效相同的有**短毛裂叶堇菜 V. dissecta** Ledeb. f. **pubescens** (Regel) Kitag.，分布于东北、华北、西北。

**紫点堇菜** 白花地丁、山白花(云南)

**Viola dudouxii** W. Beck.

生于海拔2 400—2 700米的山坡林下。分布于云南。

全草(刀口药)：用于无名肿毒，刀伤，咽喉肿痛。

**密毛堇菜** 黄瓜香、野白菜(湖北)

**Viola fargesii** H. Boiss.

生于山坡林缘或林下。分布于湖北，四川。

全草：用于疔疮痈疖，蛇咬伤。

**阔萼堇菜** 大萼堇菜、峨眉堇菜(云南)

**Viola grandisepala** W. Beck.——*V. brunneostipulosa* Hand.-Mazz.

生于密林下或阴湿石坡上。分布于湖南、四川、贵州、云南。

全草：外用于毒疮。

**紫花堇菜** 肾气草(贵州)，白帝黄瓜、铧嘴菜(贵州民间方药集)，曲角堇(中国种子植物分类学)

**Viola grypoceras** A. Gray

生于海拔600—1 340米的山坡林下、河边、路旁及草地上。分布于陕西、甘肃及长江

流域以南各省区。

全草(地黄瓜): 微苦,凉。清热解毒,凉血,止血,化瘀。用于咽喉肿痛,疔疮肿毒,败血症,湿热黄疸,目赤,便血,刀伤出血,跌打损伤。

**柔毛紫花堇菜**

**Viola grypoceras** A. Gray var. **pubescens** Nakai

生于林下或潮湿荒地。分布于陕西、浙江、湖北。

全草: 清热解毒,消肿。用于皮肤热毒,无名肿痛。

**如意草**

**Viola hamiltoniana** D. Don——*V. arcuata* Bl.; *V. alata* Burgsd.

生于海拔 1 600—2 800 米的山坡草地、林中。分布于广东、广西、四川、云南。

全草(如意草): 辛、麻,温。温经通络,止血,接骨。用于开放性骨折,外伤出血。

**长萼堇菜** 铧头草(华南、江西、云南)

**Viola inconspicua** Bl.

生于草坡、田边和溪边。分布于陕西及长江流域以南各省区。

全草(铧头草): 苦,寒。清热解毒,消肿止痛。用于目赤,咽喉痛,乳痈,疖痈,疔疮。

附 注: 功效相同的有**耳钩草 V. japonica** Langsd., 分布于陕西、浙江、江西、湖北、湖南、四川、云南。

**江西堇菜**

**Viola kiangsiensis** W. Beck.

生于海拔 600—1 000 米的山坡草地。分布于江西、湖南、广东、广西、贵州。

全草: 消肿排脓。用于脓肿。

**宽叶白花堇菜**

**Viola lactiflora** Nakai

生于山坡草地。分布于辽宁、云南。

全草: 用于五劳七伤,全身疼痛。

**白花东北堇菜**

**Viola mandshurica** W. Beck. f. **albiflora** P. Y. Fu et Y. C. Teng

生于山坡草地。分布于辽宁。

全草: 清热解毒,消肿。

**乌蔹连** 堇(通称),白三百棒(云南)

**Viola moupinensis** Franch.——*V. vaginata* Maxim.

生于海拔 1 600 米以下的山坡草地、山间阴湿处或路旁林下。分布于陕西及长江流域以南各省区。

全草(乌蔹连): 微甘,寒。清热,解毒,活血,止血。用于乳痈,肿毒,刀伤,咳血。

**香堇菜**

**Viola odorata** L.

栽培于各大中城市的公园内。

全草: 凉。清热镇咳,祛痰,镇痛,止泻。

**新疆香堇** 必乃甫谢(新疆)

**Viola oxycentra** Turcz.

生于山坡草地上。分布于新疆。

全草：苦、辛，寒。清热解毒。用于乳痈，急性脓肿，肝炎，泄泻，痢疾，肠痈，目赤。

**白花堇菜**　犁头草(陕西)，烙铁草(四川)，白犁头尖(云南)，青地黄瓜（四川中药志）

**Viola patrinii** DC.

生于海拔 680—1 500 米的山坡草地、路旁、沟岸或田间。分布于东北、华北、西北及江苏、湖北、四川。

全草(铧头草)：辛、微苦，寒。清热解毒，消瘀消肿。用于疮毒红肿，淋浊，狂犬咬伤，目赤，咽喉肿痛。

**宝剑草**

**Viola philippica** Cav.

生于山坡、原野。分布于全国南部地区。

全草：苦、微辛，寒。清热解毒，消炎止痛。用于疔疮，瘰疬。

**地果草**　金盘银盏、拔疔草(江西)，犁嘴菜、剪刀菜(云南)

**Viola philippica** Cav. subsp. **malesica** W. Beck.

生于山地林下。分布于江西、云南。

全草(地果草)：辛、酸，微寒。散风，清热，消肿。用于风火赤眼，目翳，乳痈，瘰疬，疔肿。

**倒甸堇菜**

**Viola pilosa** Bl.——*V. serpens* Wall. ex Ging

生于海拔 2 500 米以下的山地林下。分布于云南、西藏。

茎、叶：清热解毒，消肿止痛。用于蛇咬伤，刀伤。

**柔毛堇菜**　白阿飞(贵州)

**Viola principis** H. Boiss.

生于疏林或密林下及沟边湿润草坡。分布于湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草：辛、苦，寒。清热解毒，祛瘀生新。用于骨折，跌打伤痛，无名肿毒。

**圆叶小堇菜**　圆叶黄堇菜(云南)

**Viola rockiana** W. Beck.

生于草坡、灌丛及林缘。分布于四川、云南、西藏。

全草：退热。用于发热诸症。

**辽宁堇菜**　白铧头草(陕西)

**Viola rossii** Hemsl.

生于山坡林下腐殖质土中。分布于东北、华北及陕西、浙江、江西、湖南、四川。

全草(寸节七)：苦、辛，凉。清热解毒，止血。用于疮疖肿毒，针眼，毒蛇咬伤，外伤出血，肺痨。

**浅圆齿堇菜**

**Viola schneideri** W. Beck.

生于石山疏林或密林下。分布于广东、广西、四川、贵州、云南。

根：接骨。用于骨折。

**深山堇菜**

**Viola selkirkii** Pursh.

生于山野阴湿处。分布于东北、华北、西北及四川、贵州。

全草：清热解毒，消暑，消肿。用于无名肿毒，暑热。

**天山堇菜**

**Viola tianshanica** Maxim

生于山坡草地上。分布于新疆。

全草：微苦、辛，凉。清热解毒。用于感冒发热，疔疮毒肿，瘰疬。

附　注：本种为维吾尔族用药。

**三角叶堇菜**　　扣子兰(广西)

**Viola triangulifolia** W. Beck.

生于疏林、灌丛或溪旁草坡。分布于安徽、江西、湖南、广东、广西、贵州。

全草：清热利湿，解毒。用于目赤。

**三色堇**　　蝴蝶花(中国药用植物图鉴)

**Viola tricolor** L.——*V. tricolor* L. var. *hortensis* DC.

全国各地均有栽培。

全草：清热解毒，散瘀，止咳，利尿。用于咳嗽，小儿瘰疬，无名肿毒。

**斑叶堇菜**　　天蹄(陕西)

**Viola variegata** Fisch.

生于海拔530—1 700米的山坡草地、林下或阴坡岩石上。分布于东北、华北及陕西、甘肃、湖北。

全草：甘，凉。清热解毒，止血。用于创伤出血。

**堇菜**　　白老碗、三角金砖、如意草(浙江)，白花蛇舌草(广东)，消毒药、罐嘴菜（贵州)，玉如意(本草纲目拾遗)

**Viola verecunda** A. Gray

生于山坡湿草地、草坡、田野。分布于东北、华北至长江流域以南地区。

全草：微苦，凉。清热解毒，散瘀，止咳。用于疖肿，无名肿毒，肺热咳嗽，目赤，毒蛇咬伤及刀伤。

**紫花地丁**　　白毛堇菜、犁铧草(陕西)，金剪刀(江苏)，宝剑草(植物名实图考)，宝日-尼勒-其其格(蒙语)

**Viola yedoensis** Makino——*V. philippica* Cav. subsp. *munda* W. Beck.; *V. ailsoviana* Kiss

生于海拔600—1 350米的平川及山坡、路旁荒草地、田埂阴湿处或水沟边。广布于全国南北各地。

全草(紫花地丁)：苦、辛，寒。清热解毒，凉血消肿，散瘀。用于目赤，咽喉痛，黄疸，疙瘩，蛇咬伤，烧、烫伤，疔疮痈肿。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。② 功效相似的有**心叶堇菜** **V.**

**cordifolia** W. Beck.，分布于江苏、安徽、湖北、湖南、四川、云南；**紫叶堇菜 V. henryi** H. Boiss.，分布于湖北、湖南、四川；**硬毛香堇 V. hirta** L.，分布于新疆伊犁、北疆；**光叶堇菜 V. hossei** W. Beck.，分布于广东、广西、贵州、云南；**东北堇菜 V. mandshurica** W. Beck.，分布于东北及河北、北京、山西、陕西、山东、河南；**伊吹堇菜**（奇异堇菜）**V. mirabilis** L.，分布于东北；**蒙古堇菜 V. mongolica** Franch.，分布于东北、华北；**白果堇菜 V. phalacrocarpa** Maxim.，分布于东北、华北、西北及河南、四川；**早开堇菜 V. prionantha** Bunge，分布于东北、华北、西北及四川、云南；**庐山堇菜 V. stewardiana** W. Beck.，分布于甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、广东、四川；**黄花堇菜 V. xanthopetala** Nakai，分布于东北。

**白瓣紫花地丁**

**Viola yedoensis** Makino f. **candida** Kitag.

生于林缘及沟谷。分布于辽宁、宁夏。

全草：清热解毒，凉血消肿。用于目赤，咽喉痛。

**阴地堇菜**

**Viola yezoensis** Makino

生于山地、路旁。分布于辽宁。

全草：用于痈疖疔疮。

**云南堇菜**

**Viola yunnanensis** W. Beck. et H. Boiss.

生于林缘半阳坡或湿润处。分布于海南、四川、云南。

全草：用于小儿疳积。

**滇中堇菜**

**Viola yunnanfuensis** W. Beck.

生于山坡草地或路旁。分布于四川、贵州、云南。

全草：辛、涩，平。清热解毒。用于痈疽疮疡。

## 110. 旌节花科 Stachyuraceae

### 旌节花属 Stachyurus Sieb. et Zucc.

**中国旌节花**

**Stachyurus chinensis** Franch.

生于海拔 400—3 000 米的林中。分布于西南及江西、福建、湖北、湖南、广东、广西。

茎髓(小通草)：淡，平。清热，利尿，渗湿，通乳。用于乳汁不下，小便淋痛，关节风湿痛。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②功效相同的有**椭圆叶旌节花 S. callosus** C. Y. Wu，分布于贵州、云南；**短穗旌节花 S. chinensis** Franch. subsp. **brachystachyus** (C. Y. Wu et S. K. Chen) Y. C. Tang et Y. L. Cao，分布于四川、云南、西藏；**宽叶旌节花 S. chinensis** Franch. subsp. **latus** (Li) Y. C. Tang et Y. L.

Cao——*S. chinensis* Franch. var. *latus* Li,分布于陕西、甘肃、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖北、湖南、四川、贵州;**西域旌节花 S. himalaicus** Hook. f. et Thoms. ex Benth.,分布于中南、西南及甘肃、台湾;**凹叶旌节花 S. retusus** Yang，分布于四川、云南;**柳叶旌节花 S. salicifolius** Franch.，分布于广东、四川、贵州、云南;**四川旌节花 S. szechuanense** Fang,分布于四川;**云南旌节花 S. yunnanensis** Franch.,分布于华南、西南(除西藏)及湖北、湖南。

**倒卵叶旌节花**　　卵叶旌节花(峨眉植物图鉴)

**Stachyurus obovatus** (Rehd.) Li——*S. yunnanensis* Franch. var. *obovata* Rehd

生于海拔 500—1 700 米的常绿阔叶林下或林缘，也多生于岩边。分布于广西、四川、贵州、云南。

茎髓：利尿渗湿。用于水肿，淋症。

## 111. 西番莲科　Passifloraceae

### 蒴莲属　Adenia Forsk.

**三开瓢**　　假瓜蒌、肉杜仲、红牛白皮、三瓢果(云南)

**Adenia cardiophylla** (Mast.) Engl. ——*Modecca cardiophylla* Mast.

生于海拔 500—1 800 米的山坡林中。分布于云南。

果实：云南代瓜蒌用。

**蒴莲**　　云龙党参、过山参、土党参(海南)，软骨清藤(广西)

**Adenia chevalieri** Gagnep.

生于低海拔的山坡草地。分布于广东、海南、广西。

根(蒴莲)：甘、微苦，凉。滋补强壮，祛风除湿，通经活络。用于风湿痹痛，虚弱，阴挺；外用于疮疥。

全草：用于胃痛。

### 西番莲属　Passiflora L.

**月叶西番莲**　　蝴蝶暗消、藤子暗消、苦胆七、燕子尾(全国中草药汇编)

**Passiflora altebilobata** Hemsl.

生于海拔 600—1 500 米的山林中。分布于云南西南部。

根、叶(羊蹄暗消)：苦，平。健胃，理气，除湿。用于腹痛，腹胀，腹泻，跌打损伤，风湿关节痛，肝炎，毒蛇咬伤。

**西番莲**　　西洋鞠(越南笔记)，转心莲、洋酸茄花、时计草(植物分类学报)

**Passiflora coerulea** L.

原产南美洲。江西、福建、广西、四川、贵州、云南有栽培，也常逸生于湿润的山坡林地。其他地区如温室或庭院有栽培。

全草、根、果实(转心莲)：苦，温。祛风除湿，活血止痛。用于风湿痹痛，疝气痛，痛

经;外用于骨折。

**杯叶西番莲**　　叉痔草、双飞蝴蝶(广西)

**Passiflora cupiformis** Mast.

生于海拔 1 700—2 000 米的山坡、路旁灌丛中。分布于湖北、湖南、广东、广西、贵州、云南。

全草或根(对叉疔草): 甘、微涩,温。止血解毒,祛风镇痛。　根: 用于跌打损伤,蛇咬伤,疮疖。

全草: 用于鹤膝风,风湿痹痛。

**鸡蛋果**　　洋石榴(云南),紫果西番莲(植物分类学报)

**Passiflora edulis** Sims

原产巴西。福建、台湾、广东、云南有栽培。云南也见逸生于海拔 180—1 900 米的山坡草地。

果实(鸡蛋果): 甘、酸,平。清热解毒,镇痛安神。用于痢疾,痛经,失眠。

**龙珠果**　　香花果、野仙桃(云南),龙须果、大种毛葫芦(全国中草药汇编),假苦瓜(植物分类学报)

**Passiflora foetida** L.

原产西印度群岛。台湾、广东、广西、云南有栽培; 也见逸生于海拔 120—500 米的草坡路旁、灌丛中。

全草(龙珠果): 甘、酸,平。清热凉血,润燥化痰。用于外伤性眼角膜炎,目赤,疖肿,烧、烫伤,肺痨咳嗽。

**细柱西番莲**

**Passiflora gracilis** Jacq. ex Link

原产南美北部。云南西双版纳有栽培。

全草: 祛风除湿,活血止痛。

**圆叶西番莲**　　螃蟹眼睛草、闹蛆草、燕子尾(云南),锅铲叶、老鼠铃(全国中草药汇编)

**Passiflora henryi** Hemsl.

生于海拔 450—1 600 米的山坡、沟谷灌丛中。分布于云南。

全草(燕子尾): 苦,温。补肺益气,消毒杀虫。用于肺痨,咳嗽,痢疾。外用于杀蛆、矛盾。

**广东西番莲**　　散痈草(广西)

**Passiflora kwangtungensis** Merr.

生于海拔 650—800 米的山坡、林缘、灌丛中。分布于江西、广东、广西。

全草: 解毒,除湿。用于痈疮肿毒,湿疹。

**长叶蛇王藤**

**Passiflora moluccana** Reinw. ex Bl. var. **glaberrima** (Gagnep.) Wilde——*P. octandra* Gagnep. var. *glaberrima* Gagnep.

生于海拔 100—1 000 米的山坡丛林中。分布于云南。

全株: 清热解毒。用于疥疮。

**蛇王藤**　　双眼蛇、蛇眼藤、山水瓜、黄豆树、海南西番莲(植物分类学报)

**Passiflora moluccana** Reinw. ex Bl. var. **teysmanniana** (Miq.) Wilde——*P. cochinchinensis* Spreng.

生于海拔100—1 000米的灌丛或山谷中。分布于广东、海南、广西。

全草(蛇王藤)：辛、苦，凉。清热解毒，消肿止痛。用于毒蛇咬伤，溃疡病，瘰疬，疮疖。

**蝴蝶藤**　羊角断、半边草(广西)

**Passiflora papilio** Li

生于海拔450米的山坡草地。分布于广西西南部。

全草(蝴蝶藤)：苦、甘，平。止血散瘀，镇痉止痛。　根：用于小儿惊风，时行感冒，乙型脑炎，心胃气痛，慢性肝炎，癥瘕积聚，贫血，衄血，吐血，月经不调，产后流血不止，胎动不安，毒蛇咬伤。　茎：用于风湿痹痛，吐泻，跌打损伤。　叶：用于蛇咬伤。

**菱叶西番莲**

**Passiflora rhombiformis** Pao

生于山谷阴处。分布于贵州。

全草：清热解毒，消肿止痛。

**镰叶西番莲**　半截叶、金边莲、半节叶、半节观音(云南)

**Passiflora wilsonii** Hemsl.

生于海拔1 300—2 500米的山坡草地。分布于云南、西藏。

全草(锅铲叶)：微苦，温。舒筋通络，散瘀活血。用于风湿关节痛，跌打损伤，肝炎，疟疾，蛔虫病。

## 112. 红木科　Bixaceae

### 红木属　Bixa L.

**红木**　胭脂木(云南)

**Bixa orellana** L.

原产美洲热带地区。福建、台湾、广东、广西、云南有栽培。

种子：收敛，退热。用于肝炎，尿血。

## 113. 柽柳科　Tamaricaceae

### 水柏枝属　Myricaria Desv.

**宽苞水柏枝**　具苞水柏枝、红柳(陕西)

**Myricaria bracteata** Royle ——*M. alopecuroides* Schrenk

适生于沟底、河岸及沙滩上。分布于西北及河北、山西、四川、西藏。

幼嫩枝条：甘，温。升阳发散，解毒透疹。用于麻疹不透，风湿关节痛，皮肤瘙痒，血热酒毒，癍疹。

**秀丽水柏枝**

**Myricaria elegans** Royle

生于河边山谷、山坡脚下。分布于新疆，西藏。

嫩枝、叶：用于风疹顽癣，皮肤瘙痒。

**水柏枝**

**Myricaria paniculata** P. Y. Chang et Y. J. Chang——*M. germanica* Sensu (L.) Desv.

生于海拔 1 000—2 800 米的山地、河谷两岸、砂砾质河滩、湖边沙地、山前冲积砂砾质戈壁至高山阳坡地带。分布于陕西、甘肃、宁夏、青海、河南、四川、云南。

嫩枝、叶(水柏枝)：辛、甘，温。发表透疹。用于麻疹不透。

**宽叶水柏枝**　　沙红柳、喇嘛棍(中国沙漠植物志)

**Myricaria platyphylla** Maxim

生于海拔 1 300 米的河滩、沙地、沙坡及流动沙丘间洼地。分布于内蒙古、陕西北部、宁夏。

嫩枝(沙红柳)：辛、甘，温。发表，透疹。用于麻疹不透高热，感冒发烧，肺痨，乌头中毒；外用于癣疹。

**匍匐水柏枝**

**Myricaria prostrata** Benth. et Hook. *f.* ——*M. hedinii* Paulsen

生于海拔 4 000—5 200 米的河滩沙地、沙坡、及流动沙丘间洼地。分布于甘肃、青海、新疆、西藏。

嫩枝：辛、甘，平。透疹解表，疏风止咳，清热解毒。

附　注：新疆民间用地上部分治疗消化不良。

**具鳞水柏枝**　　三春柳(拉汉英种子植物名称)，山柳、鳞序水柏枝(中国沙漠植物志)

**Myricaria squamosa** Desv.

生于海拔 2 400—4 600 米的山地、河岸、沙砾质河滩、河滩沙地、山前冲积地。分布于山西、甘肃、青海、新疆、四川、云南、西藏。

嫩枝、叶：甘、微苦、涩，平。发散解毒。用于水肿，风热咳嗽，咽喉肿痛，黄水病，乌头中毒；外用于疥癣。

附　注：功效相同的有**卧生水柏枝 M. rosea** W. W. Smith，分布于云南、西藏。

## 红砂属　Reaumuria L.

**五柱红砂**　　五柱枇杷柴(中国沙漠植物志)

**Reaumuria kaschgarica** Rupr.

生于草原、山坡荒漠、砾石阶地。分布于内蒙古、甘肃、青海、新疆、西藏。

嫩枝、叶：用于湿疹，皮炎。

**红砂**　　枇杷柴、琵琶柴(中国沙漠植物志)

**Reaumuria soongorica** (Pall.) Maxim. ——*Tamarix soongorica* Pall.

生于荒漠、半荒漠的山前平原、河流阶地、戈壁。分布于东北西部，西北及内蒙古。

全株：甘、辛，温。解表发汗。用于湿疹，皮炎。

附　注：功效相同的有**黄花红砂 R. trigyna** Maxim.，分布于内蒙古、甘肃、宁夏。

## 柽柳属　Tamarix L.

**紫茎柽柳**　　紫杆柽柳、直立紫杆柽柳(中国沙漠植物志)

**Tamarix androssowii** Litw

生于沙漠地区盐渍化地、河沿岸、湖盆边缘沙地。分布于甘肃、宁夏、新疆。

嫩枝、叶：解表透疹，祛风利尿。

附　注：功效相同的有**密花柽柳 T. arcenthoides** Bunge，分布于甘肃、新疆。

**柽柳**　　西河柳、山川柳(陕西)，三春柳、松柽柳、华北柽柳(中国沙漠植物志)

**Tamarix chinensis** Lour. —— *T. juniperina* Bunge

生于湿润的盐碱地或沙地，通常生于田埂、河漫滩及村旁或栽培。分布于东北、华北、向南至长江中下游至广东、广西、云南。

嫩枝、叶(西河柳)：甘、辛，平。散风解表，透疹。用于感冒，疹疹不透，风湿关节痛，小便淋痛；外用于风疹瘙痒。　花（柽柳花）：清热毒，发疹。用于风疹。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。② 功效相同的有**甘蒙柽柳 T. austromongolica** Nakai，分布于西北(除新疆)及内蒙古；**甘肃柽柳T. gansuensis** H. S. Zhang 分布于内蒙古、甘肃、青海、新疆；**多枝柽柳 T. ramosissima** Ledeb.，分布于东北(西部)、西北及内蒙古。

**长穗柽柳**　　红柳(青海)

**Tamarix elongata** Ledeb.

生于河岸、湖滨、渠旁、绿洲边缘的沙地、沙丘、冲积平原、盐渍化土壤上。分布于内蒙古、甘肃、宁夏、青海、新疆。

嫩枝：甘、辛，平。透疹解表，疏风止咳，清热解毒。

**翠枝柽柳**　　异花柽柳(中国沙漠植物志)

**Tamarix gracelis** Willd.

生于荒漠河岸阶地，湖边盐渍化沙地。分布于甘肃、青海、新疆。

嫩枝、叶：祛风除湿，解表，利尿。用于风湿病。

**多花柽柳**　　霍氏柽柳(中国沙漠植物志)

**Tamarix hohenackeri** Bunge

生于荒漠地区河岸、湖边、田边沙地或盐渍化土壤上。分布于甘肃、宁夏、青海、新疆。

嫩枝、叶：祛风除湿，利尿，解表。

**毛红柳**　　刚毛柽柳(中国高等植物图鉴)

**Tamarix hispida** Willd.

生于沙漠边缘、湖边、渠边、绿洲边缘的重盐渍化土壤上。分布于甘肃、宁夏、青海、新疆。

嫩枝、叶：祛风除湿，利尿，解表。

**短毛柽柳**

**Tamarix karelinii** Bunge

生于荒漠地带、河、湖沿岸、沙漠边缘、盐渍化土壤上。分布于甘肃、青海、新疆。

嫩枝、叶：祛风除湿，解表，利尿，解毒。

**短穗柽柳**

**Tamarix laxa** Willd.

生于盐碱沙地、湖岸、渠边、河流阶地及河漫滩。分布于西北及内蒙古。

嫩枝、花：辛、甘，平。疏风，解毒，透疹，止咳，清热。

**细穗柽柳**

**Tamarix leptostachys** Bunge

生于荒漠地下水位较高的盐渍化沙土、河流沙滩、湖盆边缘。分布于内蒙古、甘肃、宁夏、青海、新疆。

嫩枝、果穗：甘，平。发汗，解表，透疹，利尿。

**莎车柽柳**

**Tamarix sachunensis** P. Y. Zhang et M. T. Liu

生于流动沙丘间重盐碱沙地。分布于新疆莎车。

嫩枝、叶：解酒毒。用于醒酒，中风。

附　注：功效相同的有**沙生柽柳 T. taklamakaensis** M. T. Liu，分布于新疆塔里木盆地。

**塔里木柽柳**

**Tamarix tarenensis** P. Y. Zhang et M. T. Liu

生于流动沙丘边缘及河岸沙地。分布于新疆塔里木盆地、安迪河下游。

嫩枝、叶：祛风，透疹。用于麻疹不透，风湿腿痛。

## 114. 沟繁缕科　Elatinaceae

### 田繁缕属　Bergia L.

**田繁缕**　　火开荆、假水苋菜(云南)

**Bergia ammannioides** Roxb.

生于田边、溪边草地。分布于台湾、湖南，广东、海南、广西、云南。

全草(密花草)：甘，凉。清热解毒。用于小便淋痛。

## 115. 番木瓜科　Caricaceae

### 番木瓜属　Carica L.

**番木瓜**　　木瓜(通称)，满山抛、树冬瓜(云南)，埋西抱(云南傣语)，万寿果(肇庆府志)，番瓜(植物名实图考)

**Carica papaya** L.

原产美洲热带。福建、台湾、广东、海南、广西、云南有栽培。

果实(番木瓜): 甘，平。消食，驱虫，消肿解毒，通乳，降压。用于消化不良，绦虫病，蛲虫病，痈疖肿毒，跌打肿痛，湿疹，蜈蚣咬伤，溃疡病，产妇乳少，痢疾，高血压症，二便不畅。根、叶、花: 用于骨折，肿毒溃烂。

## 116. 秋海棠科 Begoniaceae

### 秋海棠属 Begonia L.

**无翅秋海棠** 红小姐(植物名实图考)，黄疸草(中国中草药资料)，酸味秋海棠(云南种子植物名录)

**Begonia acetosella** Craib.

生于海拔 800—1 800 米的山坡常绿阔叶林下。分布于云南、西藏。

全草(红小姐): 活血通络，补气。用于经闭。

附 注: 功效相同的有**毛叶无翅秋海棠 B. acetosella** Craib. **var. hirtifolia** Irmsch.，分布于云南思茅。

**无翅果秋海棠**

**Begonia aptera** Bl.

生于阴湿的林下、溪旁。分布于云南。

根(野海棠): 酸、涩，凉。清热止咳，散瘀消肿。用于肺热咳嗽，外感发热，乳蛾，顿咳，无名肿毒，跌打损伤。

**糙叶秋海棠**

**Begonia asperifolia** Irmsch.

生于海拔 1 000—3 200 米的山坡阔叶林下。分布于贵州、云南、西藏。

根状茎: 凉血止血，消肿止痛。

**歪叶秋海棠** 思茅秋海棠(云南种子植物名录)

**Begonia augustinii** Hemsl.

生于密林下潮湿的岩石上。分布于海南、广西、贵州、云南。

全草: 散瘀消肿，止血止痛。用于蛇咬伤。

**美丽秋海棠** 虎爪龙(中国高等植物图鉴)

**Begonia calophylla** Irmsch.

生于密林下、山沟乱石缝中。分布于江西、湖南、贵州。

根状茎: 酸、辛，凉。行气活血，消肿止痛。用于跌打损伤，瘰疬，吐血。

**花叶秋海棠** 花酸苔(云南)，中华秋海棠、公鸡酸苔、苦酸苔 (云南种子植物名录)

**Begonia cathayana** Hemsl.

生于林下阴湿石缝中。分布于福建、广西、云南。

全草: 酸、涩，凉。清热解毒，活血祛瘀。用于烧、烫伤，痈疮疖肿，跌打瘀痛。

**盾叶秋海棠** 爬树龙、过山龙、青竹标、金草箍、麒麟叶(云南)，冒咸秋海棠(海南

植物志）

**Begonia cavaleriei** Lévl.

生于林下阴湿的岩石上。分布于海南、广西、贵州、云南。

全株：酸、涩，凉。祛痰止血，消肿止痛。用于骨折，跌打损伤，风湿腰腿痛，痈疖疮肿，感冒，咽喉肿痛。

**周裂秋海棠**　石酸苔、酸汤杆、大麻酸杆、一口血（云南）

**Begonia circumlobata** Hance

生于林下石缝中。分布于江西、福建、湖南、广东、广西、贵州、云南。

根状茎：活血止血，接骨，镇痛。用于月经不调，痛经，跌打损伤，痈疮，烧、烫伤。

**粗喙秋海棠**　鬼边榜（广州），半边风、山蚂蝗、红莲（广西）

**Begonia crassirostris** Irmsch.

生于林下岩石上。分布于福建、湖南、广东、海南、广西、云南。

全草（肉半边莲）：酸、涩，凉。解毒，消肿止痛。用于温热病下血，咽喉肿毒，疮肿疥癣，蛇咬伤。

附　注：本品为喉科要药。

**槭叶秋海棠**　一口血（江西），水八角（云南）

**Begonia digyna** Irmsch.

生于林下潮湿石岩上。分布于浙江、江西、福建、湖南、云南。

全草：酸，平。清热解毒，祛风活血。

**葡萄叶秋海棠**　食用秋海棠（云南）

**Begonia edulis** Lévl.

生于密林下、水边。分布于广东、广西、四川、贵州、云南。

根状茎：酸、涩，寒。清热解毒，凉血润肺。用于肺热咯血，吐血，痢疾，跌打损伤，刀伤出血。

附　注：功效相同的有**思茅食用秋海棠**（酸芦藤）**B. edulis** Lévl. var. **henry;** Lévl.，分布于云南。

**秋海棠**　岩丸子、大红袍（陕西），一口血（贵州），八月春、无名断肠草（云南）

**Begonia evansiana** Andr.

生于山谷、河岸、岩旁阴湿处。分布于华东及河北、陕西、河南、湖北、四川、贵州、云南。

块根（秋海棠根）、果实：苦、酸、涩，寒。活血化瘀，止血清热。用于跌打损伤，吐血咯血，鼻衄，胃溃疡，痢疾，月经不调，崩漏，带下病，淋浊，咽喉痛。　**茎叶**（秋海棠茎叶）：酸，寒。清热，消肿。用于咽喉肿痛，痈疮，跌打损伤。　花（秋海棠）：苦、涩、酸，寒。活血化瘀，清热解毒。用于疥癣。

**紫背天葵**　红天葵（江西）

**Begonia fimbristipulata** Hance

生于山坡、沟谷湿润的石壁上。分布于浙江、江西、福建、广东、海南、广西、四川、云南。

块茎及全草（散血子）：甘、淡，凉。清热凉血，止咳化痰，散瘀消肿。用于暑热高烧，肺热咳嗽，咯血，跌打损伤，血瘀疼痛，疮毒，疥癣，烧、烫伤。

**短茎秋海棠**　异株秋海棠（云南）

**Begonia handelii** Irmsch.

生于山谷、林下岩石上。分布于广东、海南、广西、云南。

全草：利咽，消食，消肿。用于咽喉肿痛，食滞，跌打损伤。

**柔毛秋海棠**　石鼓子(贵州)，独牛，活血、岩酸(云南)

**Begonia henryi** Hemsl.

生于阴湿的石缝中。分布于湖北、四川、贵州、云南。

根状茎(岩丸子)：酸、涩，凉。理气消痞，化瘀止血。用于痞块，癥瘕，咯血，胃出血，尿血。

**心叶秋海棠**　一口血(贵州)，丽江秋海棠、红盘、大岩酸(云南种子植物名录)

**Begonia labordei** Lévl.

生于林下阴湿的岩石上。分布于广西、四川、贵州、云南。

根状茎：酸、涩，寒。清热凉血，止痛止血。用于咳嗽，哮喘，肺心病引起的浮肿，跌打损伤，吐血，血崩，毒蛇咬伤。

**团扇叶秋海棠**　石上莲(广西)，癞叶秋海棠(云南种子植物名录)

**Begonia leprosa** Hance

生于林下岩石上。分布于广东、广西、云南。

全草：消疮消肿。用于疮疖，蛇咬伤。

**戟叶秋海棠**　七星花(贵州)

**Begonia limprichtii** Irmsch.

生于林下阴湿石岩上。分布于四川、贵州。

根状茎：酸、涩，寒。清热凉血，止痛止血。用于跌打损伤，吐血，血崩，蛇咬伤。

**竹节秋海棠**

**Begonia maculata** Raddi

全国各地栽培。

全草：用于咽喉肿痛，半身不遂，小便淋痛，水肿，毒蛇咬伤。

**莲叶秋海棠**

**Begonia nymphaefolia** Yü

生于海拔1 000—1 400米的山坡林下阴湿处。分布于云南。

根状茎：用于跌打损伤，虚肿，肺痨。

**裂叶秋海棠**　红八角莲(贵州)，岩红(云南)

**Begonia palmata** D. Don ——*B. laciniata* Roxb.

生于林下阴湿的岩石上。分布于西南及浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西。

全草(红孩儿)：酸，凉。清热解毒，化瘀消肿。用于跌打损伤，吐血，感冒，咳嗽，蛇咬伤，瘰疬。

**掌裂叶秋海棠**　一点血(云南)

**Begonia pedatifida** Lévl.

生于林阴下。分布于江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根状茎及全草(水八角)：酸、涩，寒。清热凉血，止痛止血。用于风湿关节痛，跌打损伤，水肿，尿血，蛇咬伤，痢疾。

**四季秋海棠**　　蚬肉秋海棠(海南植物志)

**Begonia semperflorens** Link et Otto

全国各地栽培。

全草：酸，凉。清热解毒，散结消肿。用于疮疖。

**中华秋海棠**　　珠芽秋海棠(云南种子植物名录)

**Begonia sinensis** A. DC.

生于河岸、山谷及岩旁阴湿处。分布于长江流域以南及辽宁、河北、山西、陕西、甘肃。

块茎(红白二丸)：苦、涩、酸，寒。活血散瘀，清热，止痛，止血。用于跌打损伤，吐血，咯血，崩漏，带下病，内痔，筋骨痛，毒蛇咬伤。

**长柄秋海棠**　　红八角莲(贵州)

**Begonia smithiana** Yü

生于林下潮湿的石岩上。分布于四川、贵州。

根状茎：酸，寒。清热止痛，止血。用于跌打损伤，筋骨疼痛，血崩，毒蛇咬伤。

**台湾秋海棠**

**Begonia taiwaniana** Hayata

生于山林下潮湿的岩石上。分布于台湾、海南、贵州。

根状茎：凉血止血，消肿止痛，解毒。用于内出血。

**大理秋海棠**

**Begonia taliensis** Gagnep.

生于海拔 1 700 米左右的阴湿处。分布于云南。

根、全草：健胃，行血，消肿，清热。

**少鳞秋海棠**　　富宁秋海棠(云南种子植物名录)，爬山猴(全国中草药资料)

**Begonia wangii** Yü

生于林下阴湿的石岩上。分布于贵州、云南。

根状茎：活血止血，止痛接骨，补虚。用于蛇咬伤，脱疽，肺痨。

**一点血秋海棠**

**Begonia wilsonii** Gagnep.

生于阴湿的石岩上。分布于湖南、四川、贵州、云南。

根状茎(一点血)：甘、酸，凉。止血活血。用于血崩，带下病。

**云南秋海棠**　　水八角、金蝉脱壳、红耗子、酸苹果、小桃红、化血丹、血当归(云南)

**Begonia yunnanensis** Lévl.

生于林下潮湿的石岩上。分布于广西、四川、贵州、云南。

根、果实或全草(山海棠)：辛、酸、涩，微温。活血祛瘀，行气止痛。用于胃痛，月经不调，痛经，小儿吐泻，疝气，跌打损伤。

## 117. 葫芦科　Cucurbitaceae

### 盒子草属　Actinostemma Griff.

**盒子草**　　水荔枝(黑龙江)，葫芦棵子、黄丝藤、马陵儿(江苏)，无白草(上海)，小盒

子草(湖北)

**Actinostemma tenerum** Griff.

生于水边草丛、山坡草地、路旁、山坡阴湿地、沟边、常攀援于其他植物上。分布于东北、华北、华东、西南及河南、湖北、湖南、广东。

叶、种子或全草(盒子草)：苦，寒。有小毒。利尿消肿，清热解毒，祛湿。用于水肿，湿疹，疮疡肿毒，疳积，蛇咬伤。

## 冬瓜属 Benincasa Savi

**冬瓜** 白瓜、猪子冬瓜(海南植物志)

**Benincasa hispida** (Thunb.) Cogn. ——*Cucurbita hispida* Thunb.

全国各地有栽培。云南南部(西双版纳)有野生，但果实较小。

茎(冬瓜藤)：苦，寒。用于肺热痰火，脱肛。叶(冬瓜叶)：用于消渴，疟疾，泻痢；外用于蜂螫肿毒。果实(苦冬瓜)：甘、淡，凉。利水，消痰，清热，解毒。用于水肿，咳喘，暑热烦闷，泻痢。外果皮(冬瓜皮)：甘，凉。清热利尿，消肿。用于水肿，小便淋痛，泄泻。瓤(冬瓜瓤)：甘，平。清热，止渴，利水消肿。用于烦喝，水肿，淋证，痈肿。种子(冬瓜子)：甘，凉。润肺，除湿，化痰，消痈利水。用于肺热咳嗽，肺痈，肠痈，淋证，水肿。

附 注：冬瓜皮为《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**节瓜**

**Benincasa hispida** (Thunb.) Cogn. var. **chieh-qua** How

我国南方，尤其广东、广西普遍栽培。

果实(节瓜)：甘，淡。生津止渴，驱暑，健脾，下气利水。皮、种子：润肺化痰，利水消肿。

## 假贝母属 Bolbostemma Franquet.

**刺儿瓜** 拉拉藤(广西天等)

**Bolbostemma biglandulosum** (Hemsl.) Franquet ——*Actinostemma biglandulosum* Hemsl.

生于海拔 1 300—1 400 米的林缘及杂木林中。分布于广西、云南。

叶：用于瘰疬，跌打损伤。

附 注：我国特有属。

**假贝母** 土贝母(通称)，大贝母(本草纲目拾遗)，地苦胆、草贝(陕西中草药)

**Bolbostemma paniculatum** (Maxim.) Franquet —— *Mitrosicyos paniculatus* Maxim.

生于海拔 700—1 520 米的山坡、山地、阴湿草丛、河谷岸边、灌丛中或栽培。分布于西北及吉林、辽宁、河北、山西、山东、江苏、安徽、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

鳞茎(土贝母)：苦，凉。清热解毒，散结消肿。用于瘰疬，附骨疽，疮疡肿毒，蛇、虫咬伤，外伤出血。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 西瓜属　Citrullus Neck.

**西瓜**　　寒瓜(陶弘景注)

**Citrullus lanatus** (Thunb.) Matsum. et Nakai——*Momordica lanatus* Thunb.

全国各地普遍栽培，品种甚多。其原种可能来自非洲，金、元时始传入我国。

果皮(西瓜皮)：甘，凉。清热解暑，止渴，利小便。用于暑热烦渴，水肿，口舌生疮。中果皮(西瓜翠)：甘、淡，寒。清热解暑，利尿。用于暑热烦渴，浮肿，小便淋痛。　蜜品加工品(西瓜黑霜)：用于水肿，肝病腹水。　瓤(西瓜)：甘，寒。清热解暑，解烦止渴，利尿。用于暑热烦渴，热盛津伤，小便淋痛。　种皮：用于吐血，肠风下血。　种仁：清热润肠。未成熟的果实与皮硝的加工品(西瓜霜)：用于热性咽喉肿痛。

## 香瓜属　Cucumis L.

**甜瓜**　　梨瓜(陕西关中)，蜜糖埕(广州)，香瓜(滇南本草)，甘瓜(名医别录)

**Cucumis melo** L.

全国各地普遍栽培。

根(甜瓜根)：用于风癞。　全草(穿肠草)：祛火败毒；外用于痔疮肿毒，漏疮生管，脏毒湿热，流水刺痒。　茎(甜瓜茎)：用于鼻中息肉，鼾鼻。　叶(甜瓜叶)：生发，祛瘀血。花(甜瓜花)：用于疮毒，心痛咳逆。果柄(甜瓜蒂)：苦，寒。有毒。催吐，退黄，抗癌。用于食积不化，食物中毒，癫痫痰盛，急、慢性肝炎，肝硬化，肝癌。　果实(甜瓜)：甘，寒。消暑热，解烦渴，利尿。　果皮(甜瓜皮)：清热，去烦渴，止牙痛。　种子(甜瓜子)：甘，寒。软结，消瘀，清肺，润肠，化痰排脓。用于肺痈，咳嗽痰沫，大便不畅。

**菜瓜**　　白瓜(本草求原)，生瓜(本经逢原)，越瓜(本草经集注)，梢瓜(饮膳正要)

**Cucumis melo** L. var. **conomon** (Thunb.) Makino ——*C. conomon* Thunb.

全国各地普遍栽培。

果实(越瓜)：苦、甘，寒。利小便，解热毒。用于烦热口渴，小便淋痛。

**黄瓜**　　胡瓜(嘉祐本草)，王瓜(滇南本草)，刺瓜(植物名实图考)

**Cucumis sativus** L.

全国各地普遍栽培。

根(黄瓜根)：甘、苦，凉。用于泄泻，痢疾。　茎藤(黄瓜藤)：苦，平。清热，祛痰，镇静。用于泄泻，痢疾，癫痫。　叶：苦，平。有小毒。用于泄泻，痢疾。　幼苗(黄瓜秧)：用于高血压症。　果实(黄瓜)：甘，凉。清热利尿。用于烦渴，小便淋痛，咽喉肿痛，烧、烫火伤。　制霜(黄瓜霜)：清热解毒。用于乳蛾。

## 南瓜属　Cucurbita L.

**南瓜**　　北瓜(陕西关中、江苏)，番瓜(江苏)，倭瓜(植物名词汇编)，饭瓜(中国药用

植物图鉴)，番南瓜(群芳谱)

**Cucurbita moschata** (Duch. ex Lam.) Duch. ex Poiret ——*C. pepo* L. var. *moschata* Duch. ex Lam.

原产墨西哥到中美洲一带。全国各地普遍种植。

根(南瓜根)：淡，平。清热解毒，渗湿，通乳。用于淋证，黄疸，痢疾，乳汁不通。茎藤(南瓜藤)：甘、苦，微寒。清热，和胃，通络。用于肺痨低热，胃病，月经不调，烫伤。叶：用于痢疾，疳积，创伤。花：凉。清湿热，消肿毒。卷须：用于妇人乳缩。果实：甘，温。补中益气，止痛，杀虫，解毒。果瓤：用于烫伤。果柄(南瓜蒂)：甘，平。清热，安胎。用于先兆流产，痈疡，疔疮，烫伤。种子(南瓜子)：甘，温。驱虫。用于绦虫病，蛔虫病，吸血虫病。

**西葫芦**

**Cucurbita pepo** L.

原产欧洲。全国各地普遍种植。

果实：甘、微苦，平。用于咳喘。种子：驱虫。

## 毒瓜属 Diplocyclos (Endl.) Post et Kuntze

**毒瓜** 花瓜(广东)

**Diplocyclos palmatus** (L.) C. Jeffrey ——*Bryonia palmata* L.

生于海拔1 000米左右的山坡疏林及灌丛中。分布于台湾、广东、广西、贵州。

块茎：用于疮疖。全草：用于淋证。

附 注：根和果实有毒。

## 裸瓣瓜属(金瓜属) Gymnopetalum Arn.

**金瓜** 老鼠瓜(广西平南)，越南裸瓣瓜(中国植物志)

**Gymnopetalum chinense** (Lour.) Merr. ——*Evonymus chinensis* Lour.

生于海拔430—900米的山坡、路旁、疏林下及灌丛中。分布于海南、广西、云南。

全草：用于瘰疬。

## 绞股蓝属 Gynostemma Bl.

**缅甸绞股蓝** 毛绞股蓝(中国高等植物图鉴)

**Gynostemma burmanicum** King ex Chakr.

生于海拔800--1 200米的疏林或灌丛中。分布于云南南部。

全草：苦，寒。清热解毒，止咳祛痰。用于咳嗽，传染性肝炎，呕吐，腹泻。

**心籽绞股蓝**

**Gynostemma cardiospermum** Cogn. ex Oliv. ——*Trirostellum cardiosperma* (Cogn. ex Oliv.) Z. P. Wang et Q. Z. Xie

生于海拔 1 000—2 300 米的山坡林下及灌丛中。分布于陕西南部、湖北西部、四川。

根：清热利湿，解毒，镇痛。用于发痧，腹痛，吐泻，痢疾，牙痛，疔疮。

**长梗绞股蓝**

**Gynostemma longipes** C. Y. Wu ex C. Y. Wu et S. K. Chen

生于海拔 1 000—3 200 米的沟边丛林中。分布于陕西、广西、四川、贵州、云南。

根、全株：清热解毒。

**光叶绞股蓝**　　三叶绞股蓝(海南植物志)

**Gynostemma laxum** (Wall.) Cogn. ——*Zanonia laxa* Wall.

生于中海拔地区的沟谷密林或石灰山地的混交林中。分布于海南、广西、云南。

全草：用于蛇咬伤。

**绞股蓝**　　七叶胆(安徽)，小苦药、公罗锅底、遍地生根(中药大辞典)

**Gynostemma pentaphyllum** (Thunb.) Makino——*Vitis pentaphylla* Thunb.

生于海拔 100—3 200 米的山谷密林、山坡疏林、沟谷灌丛、林缘、路旁草丛、阴湿坡地、荒野或庭园中栽培，但以山坡林下阴湿的环境中最常见。分布于长江流域以南各省区及陕西、甘肃。

全草(七叶胆)：苦，寒。清热解毒，止咳祛痰。用于咳嗽，传染性肝炎，小便淋痛，吐泻，癌肿。

附　注：本种含有 50 多种人参皂甙类成分，具有类似人参的功能，并对多种癌细胞有显著的抑制作用。我国已有系列产品。

**毛绞股蓝**

**Gynostemma pubescens** (Gagnep.) C. Y. Wu ex C. Y. Wu et S. K. Chen ——*G. pedata* Bl. var. *pubescens* Gagnep.

生于海拔 620—2 600 米的丛林中。分布于云南东南部、南部及西北部。

根状茎、全草：清热解毒，止咳祛痰。

**喙果绞股蓝**

**Gynostemma yixingense** (Z. P. Wang et Q. Z. Xie) C. Y. Wu et S. K. Chen——*Trirostellum yixingense* Z. P. Wang et Q. Z. Xie

生于海拔 60—100 米的林下、灌丛中、溪谷两岸、疏林下、林缘及水沟旁。分布于江苏宜兴、浙江杭州。

根状茎、全株：苦，寒。补气，止咳，平喘，涩精，抗癌。

附　注：本种皂甙含量比绞股蓝含量高，但分布较局限。

## 雪胆属　Hemsleya Cogn.

**曲莲**　　雪胆(四川)，金龟莲、小蛇莲(贵州)，可爱雪胆(四川中药名录)

**Hemsleya amabilis** Diels

生于海拔 1 800—2 700 米的杂木林下及灌丛阴湿处。分布于广西、四川、贵州、云南中部及西部。

块根(金龟莲)：苦，寒。有小毒。清热解毒，利湿镇痛，消肿。用于痢疾，咳嗽，疔肿，

肝炎，泄泻。

附　注：块根可作提取雪胆素原料。

**雪胆**

**Hemsleya chinensis** Cogn. ex Forbes et Hemsl.

生于海拔 1 200—2 200 米的杂木林下、林缘、沟边或栽培。分布于江西、湖北、广西、四川、贵州、云南。

块根(金龟莲)：苦，寒。有小毒。清热解毒，消肿止痛。用于发烧，咽喉痛，泄泻，痢疾，牙龈肿痛，咳嗽。全草：用于疮毒。

附　注：功效相同的有**短柄雪胆 H. delavayi** (Gagnep.) C. Jeffrey ex C. Y. Wu et C. L. Chen，分布于四川西南部、云南中部至西部。

**翼蛇莲**　石黄连(广西三江)

**Hemsleya dipteriga** Kuang et A. M. Lu

生于海拔 500—1 100 米的山坡林中或山谷中。分布于广西。

块根(石黄连)：用于牙痛，牙周炎，发烧，咽喉痛，腹痛，跌打损伤，疮疖。

附　注：广西特有药用植物。

**长果雪胆**

**Hemsleya dolichocarpa** W. J. Chang

生于海拔 2 000 米左右的山谷灌丛阴湿处。分布于四川。

块根(金龟莲)：清热解毒，消肿。也可作提取雪胆素原料。

附　注：四川特有药用植物。

**马铜铃**　响铃子(四川)，纤花雪胆(四川中药名录)

**Hemsleya graciliflora** (Harms) Cogn. ——*Alsomitra graciliflora* Harms

生于海拔 1 200—2 400 米的杂木林中、灌丛阴湿处及林缘。分布于湖北、湖南、广西、四川。

块根(金龟莲)：清热解毒，消肿。果实(土乌兜铃)：化痰止咳。用于咳嗽。

**罗锅底**　大籽雪胆(广西、四川)

**Hemsleya macrosperma** C. Y. Wu ex C. Y. Wu et C. L. Chen

生于海拔 1 800—2 900 米的疏林下、灌丛中或阴湿山坡上，也有栽培。分布于广西、四川、云南中部。

块根(金龟莲)：苦，寒。有小毒。清热解毒，消肿止痛，补中益气，祛湿利尿。用于痢疾，泄泻，胃痛，肝炎，小便淋痛。

**峨眉雪胆**

**Hemsleya omeiensis** L. T. Shen et W. J. Chang

生于海拔 1 800—2 000 米的林缘、山谷灌丛、山坡、沟谷草丛或阴湿处。分布于湖北、四川中部。

块根(金龟莲)：清热解毒，消肿。

**蛇莲**

**Hemsleya sphaerocarpa** Kuang et A. M. Lu

生于海拔 800—1 400 米的阔叶林缘、山谷疏林下或灌丛阴湿处。分布于湖南南部、

广西东部至东北部、四川、贵州东南部至南部。

块根(金龟莲)：苦，寒。有小毒。清热解毒，消肿止痛，利湿。用于痢疾，泄泻，胃痛，肝炎，小便淋痛。

## 波棱瓜属　Herpetospermum Wall.

**波棱瓜**　　色尔格美多(藏语)

**Herpetospermum pedunculosum** (Ser.) C. B. Clarke ——*Bryonia pedunculosa* Ser.; *H. caudigerum* Wall.

生于海拔 2 300—3 500 米的山坡灌丛、林缘或路旁。分布于云南、西藏。

果实：苦，寒。清热解毒，柔肝。用于黄疸，消化不良。　种子：平肝，泻火，解毒。

附　注：本种为藏药。

## 油渣果属　Hodgsonia Hook. f. et Thoms.

**油渣果**　　油瓜、猪油果、有棱油瓜(中国植物志)

**Hodgsonia macrocarpa** (Bl.) Cogn. ——*Trichosanthes macrocarpa* Bl.

生于海拔 300—1 600 米的常绿阔叶林下、灌丛中、山坡路旁或栽培。分布于广西、云南、西藏。

果皮：用于胃脘痛。　种仁：甘，凉。凉血止血，解毒消肿。用于痈疮肿毒，外伤出血，湿疹。　根：苦，寒。有毒。清热，催吐。用于疟疾。

附　注：功效相同的有**腺点油瓜 H. macrocarpa** (Bl.) Cogn. var. **capniocarpa** (Ridl.) Tsai。

## 葫芦属　Lagenaria Ser.

**葫芦**

**Lagenaria siceraria** (Molina) Standl. ——*Cucurbita siceraria* Molina

全国各地普遍栽培。

果皮、种子：甘，平。利尿，消肿，散结。用于水肿，腹水，瘰疬。　茎(苦葫芦蔓)：用于疥疮。　花(苦葫芦花)：用于鼠瘘。

**瓠瓜**　　匏瓜(四川)

**Lagenaria siceraria** (Molina) Standl. var. **depressa** (Ser.) Hara ——*L. vulgaris* Ser. r. *depressa* Ser.

全国各地均有栽培。

果实(壶芦)：甘、淡，平。利水，清热，止渴，除烦。用于小便淋痛，烦渴，水肿，黄疸。种子(瓠瓜子)：用于齿龈肿露，齿摇疼痛。　陈旧老熟果皮(陈壶芦瓠)甘，平。利水，消肿，杀虫。　果皮(葫芦瓢)：甘，平。利水消肿。用于水肿腹胀，石淋。

**瓠子**　　扁蒲(中国植物志)

**Lagenaria siceraria** (Molina) Standl var. **hispida**(Thunb.)Hara——*Cucurbita hispida* Thunb.

全国各地均有栽培。

果实：甘，寒。利水，清热，止渴，除烦。　种子：用于哑瘴，棒疮跌打。果实(蒲种壳)：苦，寒。利水，消肿。用于腹胀。

**小葫芦**　束腰葫芦、桠腰葫芦、神仙葫芦、药葫芦(江苏)，京葫芦(安徽)

**Lagenaria siceraria** (Molina) Standl. var. **microcarpa** (Naud.) Hara ——*L. microcarpa* Naud.

全国各地普遍栽培。

果实(京葫芦)：苦，寒。利水消肿。用于水肿，黄疸，消渴，癃闭，痈肿，疮毒，疥癣。

## 丝瓜属　Luffa L.

**广东丝瓜**　粤丝瓜(贵州)，棱角丝瓜(中国高等植物图鉴)

**Luffa acutangula** (L.) Roxb. ——*Cucumis acutangula* L.

全国主要栽培于南方各省区。河北、河南也有少量栽培。

果实的维管束(丝瓜络)：甘，平。通经和络，清热化痰。用于风湿骨痛，肺热咳嗽。根：活血，通络，消肿。用于偏头痛，腰痛，乳痈，喉风肿痛，肠风下血，痔漏。茎汁（天萝水)：消痰火，清内热，镇咳。藤：舒筋活血，健脾杀虫。叶：清热解毒。用于痈疽肿毒。花：清热解毒。用于肺热咳嗽。果实：清热化痰，凉血，解毒。用于肺热咳嗽，烦渴。

**丝瓜**

**Luffa cylindrica** (L.) Roem. ——*Momordica cylindrica* L.

全国各地普遍栽培。云南南部有野生，但果实较小。

根(丝瓜根)：甘，平。活血，通络，消肿。用于鼻塞流涕。藤(丝瓜藤)：甘，平。通经络，止咳化痰。用于腰痛，咳嗽，鼻塞流涕，咳嗽。叶(丝瓜叶)：苦、酸，凉。止血，化痰止咳，清热解毒。用于顿咳，咳嗽，暑热口渴，创伤出血，疥癣，天疱疮，痱子。果实维管束(丝瓜络)：甘，平。清热解毒，活血通络，利尿消肿。用于筋骨痛，胸胁痛，经闭，乳汁不通，乳痈，水肿。果柄：用于小儿痘疹，咽喉肿痛。果皮：用于金疮，疔疮，臀疮。种子(丝瓜子)：微甘，平。清热化痰，润燥，驱虫。用于咳嗽痰多，驱虫，便秘。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 苦瓜属　Momordica L.

**苦瓜**　凉瓜(广东)，癞葡萄(救荒本草)，癞瓜(民间常用草药汇编)，红姑娘（群芳谱)

**Momordica charantia L.**

全国各地普遍栽培。

根、藤、叶及果实：苦，寒。清热解毒，明目。用于中暑发热，牙痛，泄泻，痢疾，便血，

痱子，疔疮疖肿。

**木鳖子**　糯饭果(云南河口)，番木鳖(中国经济植物志)，老鼠拉冬瓜(中国植物志)

**Momordica cochinchinensis** (Lour.) Spreng.——*Muricia cochinchinensis* Lour.; *Momordica macrophylla* Cogn.

生于海拔140—2 000米的山沟、林缘、路旁、山谷阴湿处或栽培。分布于华东、中南、西南及河北、陕西、甘肃等地偶有栽培。

根、叶：苦、甘，温。散结，消肿，解毒。用于疮疡肿毒，乳痈，瘰疬，痔漏，疥癣，秃疮。种子：苦、微甘，温。有毒。散结消肿。用于脓肿，乳痈，头癣，痔疮。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**四萼木鳖**　野苦瓜、山苦瓜(广西)

**Momordica subangulata** Bl.

生于海拔800—1 500米的山坡、路旁阴湿处或山谷林下。分布于广东、广西、贵州、云南。

根：用于疟腮，咽喉肿痛，目赤，疮疡肿毒，瘰疬。　卷须：用于月经不调。

## 帽儿瓜属(红钮子属)　Mukia Arn.

**帽儿瓜**　山苦瓜、野毛瓜(山东)，毛花马蛟儿(中国植物志)，野苦瓜(中国高等植物图鉴)

**Mukia maderaspatana** (L.) M. J. Roem.——*Cucumis made-raspatanus* L.

生于海拔450—1 700米的山坡岩石上、灌丛、山沟、林缘或丛林中。分布于山东、台湾、广东、广西、贵州、云南。

果实：清热，利尿，消肿。　全草：用于咳嗽，疮疡肿毒。

## 棒锤瓜属　Neoalsomitra Hutch.

**棒锤瓜**　穿山龙(台湾植物志)，曲莲、细叶罗锅底(云南思茅中草药选编)

**Neoalsomitra integrifoliola** (Cogn ) Hutch —— *Gynostemma integrifoliola* Cogn.; *Hemsleya elongata* (Merr.) Cogn.; *H henryi* Cogn.

生于海拔550—1 600米的沟谷雨林、次生林中或灌丛中。分布于台湾、广东、广西、云南。

块根(赛金刚)：苦、涩，寒。清热解毒，收敛止痛。用于痢疾，泄泻，溃疡病，小便淋痛，咽喉肿痛，便血。

## 裂瓜属　Schizopepon Maxim.

**湖北裂瓜**　毛水瓜蔓(甘肃)，毛瓜(湖北)

**Schizopepon dioicus** Cogn. ex Oliv

生于海拔1 000—2 400米的山坡林下、山沟草丛、山坡路旁及荒坡灌丛中。分布于

陕西、甘肃、湖北、湖南、四川。

根状茎：清热解毒，祛风除湿。

## 佛手瓜属 Sechium P. Br.

**佛手瓜** 洋丝瓜(云南)

**Sechium edule** (Jacq.) Swartz ——*Sicyos edulis* Jacq.

原产南美洲。广东、广西、贵州、云南、西藏有栽培或逸为野生。

叶：用于疮疡肿毒。 果实：健脾消食，行气止痛。用于胃脘痛，消化不良。

## 罗汉果属 Siraitia Merr.

**罗汉果** 光果木鳖(中国高等植物图鉴)，拉汗果、假苦瓜(广西药用植物名录)

**Siraitia grosvenorii** (Swingle) C. Jeffrey ex Lu et Z. Y. Zhang ——*Momordica grosvenorii* Swingle; *Thladiantha grosvenorii* (Swingle) C. Jeffrey

生于海拔400—1 400米的山坡林下、河边湿地、山坡阴湿处、灌丛或栽培。分布于福建、江西、湖南南部、广东、广西、贵州。

果实(罗汉果)：甘，凉。清肺止咳，润肠，通便。用于咳嗽，顿咳，乳蛾，大便秘结。块根：用于感冒发烧，咽喉痛，脘腹痛，跌打肿痛。 叶：用于咽喉痛、咳嗽。

附 注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**翅子罗汉果** 凡力(壮语)，红汞藤(广西那坡)

**Siraitia siamensis** (Craib) C. Jeffrey ex Zhong et D. Fang——*Thladiantha siamensis* Craib

生于海拔300—700米的山坡林中、山谷或林缘阴湿处。分布于广西、云南。

块根：用于胃脘痛，感冒发烧，咽喉痛，胆囊炎。 叶：外用于神经性皮炎，疥癣。

## 茅瓜属 Solena Lour.

**茅瓜** 老鼠瓜(江西、广西)，地苦胆、天山瓜(广西)，牛奶子(四川)、杜瓜、耗子瓜(贵州)，小鸡黄瓜、狗尿瓜、老鼠冬瓜(云南)

**Solena amplexicaulis** (Lam) Gandhi ——*Bryoma amplexicaulis* Lam.; *Melothria heterophylla* (Lour.) Cogn.; *S heterophylla* Lour.

生于海拔600—2 700米的山坡路旁、林下、杂木林中、灌丛、疏林或山坡草丛。分布于西南及江苏、浙江、江西、福建、台湾、广东、海南、广西。

块根(土白蔹)：甘、苦，寒。清热化痰，利湿，散结消肿。用于热咳，痢疾，淋证，风湿痹痛，咽喉痛，目赤。 藤、叶及果实：利水，解毒，除痰散结。用于腹水，肿疡，湿疹，咽喉肿痛，疟腮，小便淋痛。

## 赤瓟属 Thladiantha Bunge

**心叶赤瓟**

**Thladiantha cordifolia** (Bl.) Cogn. —— *Luffa cordifolia* Bl.; ***T. calcarata*** (Wall.) C B. Clarke

生于海拔(180—)800—2 600 米的林中或溪旁。分布于广东、广西、云南、西藏。

根：清热解毒，健胃止痛。 果实：消肿。

**川赤瓟**

**Thladiantha davidii** Franch.

生于海拔 1 100—2 100 米的路旁、沟边、灌丛及山沟草丛中。分布于四川、贵州。

根(王瓜根)、果实：清热，利胆，通乳。

**齿叶赤瓟** 猫儿瓜、龙须尖(四川南川)

**Thladiantha dentata** Cogn.

生于海拔 500—2 100 米的路旁、山坡、沟边或灌丛中。分布于湖北、湖南、四川、贵州、云南。

根：生津开胃，健脾补虚。

**赤瓟** 土瓜、野甜瓜、野丝瓜(陕西)，赤包、山屎瓜(东北常用中草药手册)

**Thladiantha dubia** Bunge

生于海拔 300—3 100 米的山坡林下、草丛、河谷两岸或栽培。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、山东、江苏、江西、河南、广东、贵州。

根：苦，寒。活血通乳，祛痰，清热解毒。用于乳汁不下，乳房胀痛。 果实：酸、苦，平。理气，活血，祛痰，利湿。用于跌打损伤，嗳气吐酸，黄疸，泄泻，痢疾，肺痨咯血。

**球果赤瓟** 野苦瓜(广西南丹)

**Thladiantha globicarpa** A. M. Lu et Z. Y. Zhang

生于海拔 200—1 200 米的山坡林下、沟谷灌丛及水沟旁。分布于湖南、广东、广西、贵州。

全草：用于深部脓肿，各种疮疡。

**皱果赤瓟**

**Thladiantha henryi** Hemsl. ——*T. dictyocarpa* Hand. -Mazz.

生于海拔 1 150—2 000 米的山坡林下、路旁或灌丛中。分布于陕西、湖北、湖南、四川。

根(米来瓜)：败火，调气，止痛，清热解毒。

**喙赤瓟**

**Thladiantha henryi** Hemsl. var. **verrucosa** (Cogn.) A. M. Lu et Z. Y. Zhang——*T. verrucosa* Cogn.

生于海拔 1 100—1 800 米的山坡林下。分布于湖南、四川。

全草(老蛇头)：平，苦。散热。用于头痛发热。

**异叶赤瓟** 粗茎罗锅底(云南)

**Thladiantha hookeri** C. B. Clarke

生于海拔 1 250—3 300 米的山坡林下或林缘。分布于云南。

根：苦，寒。有小毒。健胃，解毒，止血，止痛。用于腹胀，痢疾，肝炎，前列腺炎，外伤出血。

**七叶赤飑**　山土瓜(云南)

**Thladiantha hookeri** C. B. Clarke var. **heptadactyla** (Cogn.) A. M. Lu et Z. Y. Zhang ——*T. heptadactyla* Cogn.

生于海拔 1 400 米的杂木林中。分布于贵州、云南。

茎、根：理气止痛，消肿，止痢。

**三叶赤飑**

**Thladiantha hookeri** C. B. Clarke var. **palmatifolia** Chakr.——*T. trifoliolata* (Cogn.) Merr.

生于海拔 950—2 100 米的山坡灌丛、林缘或林下。分布于湖北、云南南部。

根：清热解毒。

**五叶赤飑**　山土瓜(云南)

**Thladiantha hookeri** C. B. Clarke var. **pentadactyla** (Cogn.) A. M. Lu et Z. Y. Zhang ——*T. pentadactyla* Cogn.

生于海拔 1 100—2 700 米的沟边、林下或栽培。分布于贵州、云南。

根、茎：苦，寒。润肺化痰，散结，解毒。用于痢疾，泄泻，咽喉痛。

**长叶赤飑**

**Thladiantha longifolia** Cogn. ex Oliv.

生于海拔 1 000—2 200 米的山坡杂木林、沟边或灌丛中。分布于湖北、湖南、广西、四川、贵州。

根、果实：清热解毒，利胆，通乳。用于头痛，发热，便秘，无名肿毒。

**南赤飑**　赤飑儿(江苏)，裸花赤飑(安徽)，野丝瓜、土瓜蒌、毛瓜(湖北)，南丝瓜(四川)

**Thladiantha nudiflora** Hemsl. ex Forbes et Hemsl.

生于海拔 900—1 700 米的沟边、林缘、山坡灌丛中或林下。分布于中南及陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、四川、贵州。

根(王瓜根)：苦，寒。通乳，清热利胆。用于乳汁不下，乳房胀痛。果实(赤飑)：酸、苦，平。理气活血，祛痰利湿。用于跌打损伤，嗳气吐酸，黄疸，泄泻，痢疾，肺痨咯血。

**鄂赤飑**　苦瓜蔓(陕西)，水葡萄(甘肃)，野瓜、苦瓜蒌、光赤飑(湖北)，野苦瓜藤(四川)

**Thladiantha oliveri** Cogn. ex Mottet

生于海拔 660—2 100 米的山坡、路旁、灌丛或山沟阴湿处。分布于陕西南部、甘肃东南部至南部、湖北西北部、四川东部和南部、贵州。

根(王瓜根)、果实：清热，利胆，通乳，消肿，排脓。用于无名肿毒，烧、烫伤，跌打损伤。茎叶：杀虫。

附　注：湖北部分地区将本种块根误作天花粉用。

**短柄赤瓟**　　野黄瓜(四川)

**Thladiantha sessilifolia** Hand.-Mazz.

生于海拔 1 800—2 300 米的山坡灌丛及沟边阴湿处。分布于四川西昌、会理。

根：清热解毒。

附　注：四川特有药用植物。

**长毛赤瓟**　　白斑王瓜(湖北)

**Thladiantha villosula** Cogn.

生于海拔 2 000—2 900 米的沟边林下或灌丛中。分布于西南及陕西、甘肃、河南、湖北。

根：苦，寒。有小毒。清热解毒，健胃止痛。

## 栝楼属　Trichosanthes L.

**蛇瓜**　　蛇豆、豆角黄瓜(中国植物志)

**Trichosanthes anguina** L.

原产印度。全国各地有栽培。

根、种子：清热化痰，散结消肿，止泻，杀虫。　果实：用于消渴。

**短序栝楼**　　假老鼠藤(广西天等)

**Trichosanthes baviensis** Gagnep.

生于海拔 600—1 500 米的常绿阔叶林下或灌丛中。分布于广西、贵州、云南。

全草：退热，利水。用于疮疡肿毒。

**心叶栝楼**

**Trichosanthes cordata** Roxb.

生于海拔 1 000 米左右的常绿阔叶林中。分布于西藏墨脱。

根(天花粉)：甘、微苦，凉。清热化痰，养胃生津，解毒消肿。用于肺热燥咳，津伤口渴，消渴，疮疡疖肿。　果实(瓜蒌)：甘、微苦，寒。润肺祛痰，滑肠散结。用于肺热咳嗽，胸闷，心绞痛，便秘，乳痈。　种子(瓜蒌子)：甘，寒。润燥滑肠，清热化痰。用于大便燥结，肺热咳嗽，痰稠难咯。

**瓜叶栝楼**　　王瓜、土瓜(安徽)

**Trichosanthes cucumerina** L.

生于海拔 450—1 600 米的山谷丛林、山坡灌丛、沟边或草丛中。分布于安徽、广西、云南南部。

根(土瓜根)：清热解毒，利尿消肿，散瘀止痛。用于头痛，咳嗽。　果实：用于胃病，气喘，消渴。　种子(王瓜子)：清热凉血，杀虫。

**王瓜**　野西瓜、苦王瓜、杜瓜(江苏)，长猫瓜、土王瓜(湖北)，野王瓜(广西)，天花粉(贵州)

**Trichosanthes cucumeroides** (Ser.) Maxim. —— *Bryonia cucumeroides* Ser.; *T. cavalerei* Lévl.

生于海拔 250—1 700 米的山谷密林、山坡疏林、灌丛、草地、沟边、荒地或路边。分布

于华东、中南、西南及新疆。

根(王瓜根)：苦，寒。有小毒。清热解毒，利尿消肿，散瘀止痛。用于毒蛇咬伤，乳蛾，痈疮肿毒，跌打损伤，小便淋痛，胃痛。　果实：苦，寒。清热，生津，消瘀，通乳。用于消渴，黄疸，乳汁滞少，痈肿，咽喉痛。　种子：酸、苦，平。清热，凉血。用于肺痿吐血，黄疸，痢疾，肠风下血。

附　注：江苏、浙江、湖北将本种的果实和种子作栝楼和栝楼子用。

**糙点栝楼**

**Trichosanthes dunniana** Levl. ——*T. rubriflos* Thorel ex Cayla f. *macrosperma* C. Y Cheng et Yueh

生于海拔920—1 900米的山谷密林、山坡疏林或灌丛中，多攀援于灌木上。分布于广西、四川、贵州、云南。

根：外用于疮疡肿毒。　种子：润肺，化痰，滑肠。用于痰热咳嗽，燥结便秘，痈种，乳少。

**湘桂栝楼**　　圆子栝楼(广东中药名录)，雷山栝楼(贵州中药名录)

**Trichosanthes hylonoma** Hand. -Mazz

生于海拔800—950米的山谷灌丛中、山坡、林下、林缘或草丛中。分布于湖南、广东、广西，贵州。

根：生津止渴，降火润燥。　果实：甘、苦，寒。润肺，化痰，宽胸，散结，滑肠。用于痰热咳嗽，肺痿咯血，消渴，便秘，痈肿初起。　果皮：宽胸散结，清化热痰。　种子：润肺化痰。

**井冈山栝楼**

**Trichosanthes jinggangshanica** Yueh

生于中海拔地区的山地灌丛中。分布于江西。

根(天花粉)：甘、微苦，凉。消热化痰，养胃生津，解毒消肿。用于肺热燥咳，津伤口渴，消渴，疮疡疖肿。　果实(栝楼)：甘、微苦，寒。润肺祛痰，滑肠散结。用于肺热咳嗽，胸闷，心绞痛，便秘，乳痈。

附　注：江西特有药用植物。

**栝楼**　　瓜蒌(针灸甲乙经)，瓜楼(中国植物志)，鸭屎瓜(广东中药)，药瓜(四川中药志)

**Trichosanthes kirilowii** Maxim. ——*T obtusiloba* C. Y. Wu ex C. Y. Cheng et Yueh

生于海拔200—1 800米的山坡林下、灌丛、林缘、草地、田边、阴湿山谷或栽培。分布于华北、华东、中南及辽宁、陕西、甘肃、新疆、四川、贵州、云南。

根(天花粉)：甘、微苦，凉。清热化痰，养胃生津，解毒消肿。用于肺热燥咳，津伤口渴，消渴，疮疡疖肿。　果实(栝楼)：甘、微苦，寒。润肺祛痰，滑肠散结。用于肺热咳嗽，胸闷，心绞痛，便秘，乳痈。　果皮(栝楼皮)：甘，寒。润肺化痰，利气宽胸。用于痰热咳嗽，咽喉痛，胸痛，消渴，便秘。　种子(栝楼子)：甘，寒。润肺化痰，滑肠。用于痰热咳嗽，燥结便秘，乳少。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。② 天花粉制剂可引产并可治疗

恶性葡萄胎，绒毛膜上皮癌，对癌细胞有杀伤作用。

**长果栝楼**

**Trichosanthes kerrii** Craib

生于海拔700—1 900米的狭谷密林中、溪旁潮湿的疏林或灌丛中。分布于广西、云南。

果实、种子：润肺，祛痰。用于咳嗽，疥癣。

**长萼栝楼**　裂苞栝楼(广西中药名录)

**Trichosanthes laceribractea** Hayata ——*T. sinopunctata* C. Y. Cheng et Yueh; *T. schizostroma* Hayata; *T. hupehensis* C. Y. Cheng et Yueh

生于海拔200—1 020米的山谷密林、山坡路旁、山谷阴湿处或栽培。分布于江西、台湾、湖北、广东、广西、四川。

根：生津止渴，降火润燥。　果实：甘、苦，寒。润肺，化痰，散结，滑肠。用于痰热咳嗽，结胸，消渴，便秘。种子：用于燥咳痰粘，肠燥便秘。

**马干铃栝楼**　马干铃(云南)

**Trichosanthes lepiniana** (Naud.) Cogn. ——*Involucraria lepiniana* Naud.

生于海拔540—2 100米的河谷、沟谷林下，常攀援于灌丛。分布于云南、西藏。

种子：宽胸散结，润肠，滑肠。

**卵叶栝楼**

**Trichosanthes ovata** Cogn.

生于密林、沟谷林缘或灌丛中。分布于云南景洪、勐腊、西双版纳。

根、种子：微苦，凉。清热解毒。用于腹内肿块疮疡，砂淋、石淋，疖疮肿毒。

**全缘栝楼**　鸭屎瓜(广西)，假栝楼(广东中药名录)，喙果栝楼(贵州中药名录)，佛顶珠(中药大辞典)

**Trichosanthes ovigera** Bl. ——*T. himalensis* C. B. Clarke; *T. chingiana* Hand.-Mazz.; *T. rostrata* Kitam.

生于海拔700—2 500米的山谷丛林、山坡疏林、灌丛、林缘或沟边草丛中。分布于广东、广西、贵州、云南。

根(实葫芦)：甘，寒。清热化痰，解毒消肿。用于肺热咳嗽，津伤口渴，疮疡疖肿，跌打损伤。　果实：甘、微苦，寒。润肺祛痰，滑肠散结。用于肺热咳嗽，乳痈，便秘，心绞痛。

**趾叶栝楼**　石蛤蜞(广西平南)，叉指叶栝楼(广东中药名录)

**Trichosanthes pedata** Merr. et Chun ——*T. pedata* Merr. et Chun var. *yunnanensis* C. Y. Cheng et Yueh

生于海拔200—2 000米的山坡疏林、灌丛或路旁草地中。分布于江西、湖南、广东、广西、云南。

根、果实：清热化痰，生津止渴，降火润肠。　种子：宽胸散结，润肠。

**五角栝楼**

**Trichosanthes quinquangulata** A. Gray

生于海拔580—850米的山坡林中、路旁、灌丛或草丛中。分布于台湾、贵州、云南南部。

根、叶、果实：用于肺热咳嗽，便秘。

**两广栝楼**　毛瓜蒌(广西金秀)

**Trichosanthes reticulinervis** C. Y Wu et S. K. Chen

生于海拔320米左右的山坡疏林、灌丛中或山谷阴湿处。分布于广东、广西。

根：用于热病烦渴，肺热燥咳，消渴，疮疡肿毒。

**华中栝楼**　尖果栝楼(湖北)，川贵栝楼(四川)，双边栝楼(中国植物志)，日本栝楼(中药大辞典)

**Trichosanthes rosthornii** Harms ——*T. crenulata* C. Y. Cheng et Yueh; *T. guizhouensis* C. Y Cheng et Yueh; *T. stylopodifera* C. Y. Cheng et Yueh; *T. uniflora* Hao

生于海拔400—1 850米的山谷密林、疏林、灌丛、荒地或草丛中。分布于陕西、甘肃、山东、江西、湖北、广东、广西、四川、贵州、云南。

根(天花粉)：甘、微苦，凉。清热化痰，养胃生津，解毒消肿。用于肺热燥咳，津伤口渴，消渴，疮疡疖肿。果实(栝楼)：甘、微苦，寒。润肺祛痰，滑肠散结。用于肺热咳嗽，胸闷，心绞痛，便秘，乳痈。种子(栝楼子)：甘，寒。润燥滑肠，清热化痰。用于大便燥结，肺热咳嗽，痰稠难咯。

附　注：天花粉注射剂可引产和治疗恶性葡萄胎，绒毛膜上皮癌。栝楼对癌细胞有杀伤作用。②《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**多卷须栝楼**　瓜蒌(广西全州)

**Trichosanthes rosthornii** Harms var. **multicirrata** (C. Y. Cheng et Yueh) S. K Chen ——*T. multicirrata* C. Y. Cheng et Yueh; *T. damiaoshanensis* C. Y. Cheng et Yueh

生于海拔600—1 500米的林下、灌丛、林缘、疏林下，草地上或栽培。分布于广东、广西、四川、贵州。

根：用于热病烦渴，肺热燥咳，消渴，疮疡肿毒。果实：用于肺热咳嗽，痰浊黄稠，胸痹心痛，结胸痞满，乳痈，肺痈，肠痈，肿痈，大便秘结。种子：用于燥咳痰粘，肠燥便秘。

**丝毛栝楼**

**Trichosanthes sericeifolia** C. Y. Cheng et Yueh

生于海拔700—1 500米的山坡灌丛、林下阴湿处、河滩灌丛、村旁及田边。分布于广西西部、贵州西南部、云南东南部。

根：用于热病烦渴，肺热燥咳，内热消渴，疮疡肿毒。

**粉花栝楼**

**Trichosanthes subrosea** C. Y Cheng et Yueh

生于海拔1 700米左右的林中或灌丛中。分布于广西、云南。

根：用于热病烦渴，肺热燥咳，消渴，疮疡肿毒。果实：用于肺热咳嗽，痰浊黄稠，胸痹心痛，结胸痞满，乳痈，肺痈，疮疡，肿毒，大便秘结。

**三尖栝楼**

**Trichosanthes tricuspidata** Lour. ——*T. bracteata* (Lam.) Voigh

生于海拔500—1 900米的山坡灌丛或疏林中。分布于西南。

果实：甘，寒。润肺祛痰，滑肠散结。用于肺热咳嗽，胸闷，心绞痛，便秘，乳痈。

**截叶栝楼**　　大瓜蒌(广西)，大子栝楼(植物分类学报)

**Trichosanthes truncata** C. B. Clarke

生于海拔300—1 600米的山地密林或山坡灌丛中。分布于广东、广西、云南南部。

种子：甘，寒。润肺，化痰，滑肠。用于燥咳痰粘，肠燥便秘，痈肿，乳少。

**密毛栝楼**

**Trichosanthes villosa** Bl.

生于海拔350—950米的丛林、山坡疏林或山谷中。分布于广西西南部、云南南部。

种子：用于燥咳痰粘，肠燥便秘。

**薄叶栝楼**

**Trichosanthes wallichiana** (Ser.) Wight —— *Involucraria wallichiana* Ser.

生于海拔920—2 400米的山谷混交林中。分布于西南及湖北、广东。

根、果实：润肺止咳，生津止渴，降火润燥，排脓消肿，利尿，通乳。用于热病口渴，消渴，黄疸，肺燥咳血，痈肿，痔瘘。　果皮：润肺化痰，利气宽胸。用于痰热咳嗽，咽喉痛，胸痛，吐血，衄血。　种子：宽胸散结，润肺，滑肠，化痰。用于痰热咳嗽，燥结便秘，痈肿，乳少。

## 翅子瓜属　Zanonia L.

**翅子瓜**

**Zanonia indica** L.

生于海拔285米左右的河边、山坡或林下。分布于广西那坡。

茎：用于风湿痹痛，跌打损伤。

## 马胶儿属　Zehneria Endl.

**马胶儿**　　野苦瓜(江苏)，老鼠拉冬瓜(江苏、安徽)、野梢瓜(浙江)，山冬瓜、老鼠瓜(广西)，耗子拉冬瓜、玉钮子(贵州)

**Zehneria indica** (Lour.) Keraudren ——*Melothria indica* Lour.

生于海拔500—1 600米的林中阴湿处、灌丛、林缘、路旁、田边、沟边、旷野阴湿处或荒地上。分布于中南及江苏、安徽、浙江、福建、江西、四川、贵州、云南。

根、叶(马胶儿)：甘、苦，凉。清热解毒，消肿散结。用于咽喉肿痛，目赤，疮疡肿毒，瘰疬，子痈，湿疹。　全草：清热解毒，利尿消肿，除痰散结。用于瘰疬，烧、烫伤，皮肤瘙痒，疮疡肿毒。

**钮子瓜**　　土瓜(湖南)，野苦瓜(广西)，野杜瓜(贵州)

**Zehneria maysorensis** (Wight et Arn.) Arn. ——*Bryonia maysorensis* Wight et Arn.; *Melothria maysorensis* (Wight et Arn.) Chang

生于海拔500—1 000米的林缘、山坡路旁阴湿处、旷野、水沟边或灌丛中。分布于江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草、果实：甘，平。清热利湿，化痰，利尿。

## 118. 千屈菜科 Lythraceae

### 水苋菜属 Ammannia L.

**耳基水苋菜**

**Ammannia arenaria** H. B. K. ——*A auriculata* Willd.

生于湿地和稻田中。分布于河北、陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、福建、河南、湖北、广东、海南、云南。

全草：用于小便淋痛，带下病。

**水苋菜** 细叶水苋(海南植物志)，浆果水苋(中国种子植物分类学)

**Ammannia baccifera** L.

生于潮湿处或水田中。分布于华东、华南及河北、陕西、湖北、湖南、云南。

全草(水苋菜)：苦、涩，凉。消瘀止血，接骨。用于内伤吐血，疔伤痛，外伤出血，跌打损伤，骨折，蛇咬伤。

### 紫薇属 Lagerstroemia L.

**紫薇** 痒痒树(陕西、江苏、河南)，紫金标(江西)，搔痒树、紫荆皮(四川)，紫荆花(四川、贵州)，百日红(海南图史)，无皮树(灌圃草木识)

**Lagerstroemia indica** L.

全国各地有栽培，也有野生。

根、树皮(紫薇根)：微苦、涩，平。活血止血，解毒消肿。用于各种出血，骨折，乳痈，湿疹，肝炎，肝硬化，臌胀。茎、叶：苦，平。祛风利湿，凉血散瘀。用于风湿痹痛，湿热腹泻，咽喉肿痛，风疹，暴聋，身痒，跌打损伤。叶(紫薇叶)：苦、微涩，寒。清热解毒，止血。用于痢疾，黄疸；外用于湿疹，痈疮肿毒。花(紫薇花)：微酸，寒。活血止血，清热。用于胎动不安，月经不调，痢疾，偏头痛，跌打损伤，痈疮肿毒。

**银薇** 白花紫薇(通称)

**Lagerstroemia indica** L. f. **alba** (Nichols.) Rehd.

全国各地有栽培。

根、树皮：用于咯血，吐血，便血。树皮，叶、花：攻逐泻下。

**阔叶紫薇**

**Lagerstroemia indica** L. f **latifolia** Koehne.

我国南方栽培。

树皮：清热解毒。用于喉痹，经闭，皮肤痒疹。

**大花紫薇** 百日红(广东)，大叶紫薇(岭南大学校园植物名录)

**Lagerstroemia speciosa** (L.) Pers ——*Munchausia speciosa* L.

福建、广东、海南、广西有栽培。

根：作收敛剂；也用于痈疮肿毒。 树皮、叶：作泻药。 种子：具有麻醉作用。

**南紫薇** 九芎(台湾)，马铃花(湖北)，蚊仔草(广东)，苞饭花(植物名实图考)，拘那花(桂海虞衡志)

**Lagerstroemia subcostata** Koehne

生于林缘边湿润肥沃的土壤上。分布于青海、江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

花或根(拘那花)：淡、微苦，凉。败毒消瘀。用于疟疾，鹤膝风。

**绒毛紫薇**

**Lagerstroemia tomentosa** Presl

生于海拔 600—1 200 米的混交林中。分布于云南。

叶：用于疮疖肿毒，顽癣，疥疮。

附 注：云南特有药用植物。

## 散沫花属 (指甲花属) Lawsonia L.

**散沫花** 指甲花、指甲叶(广东)，牛甲木、指甲木、干甲树(海南)

**Lawsonia inermis** L.

江苏、浙江、福建、广东、海南、广西、云南有栽培。

叶：苦，凉。清热解毒。用于外伤出血，疮疡。 树皮：用于黄疸，精神病。

## 千屈菜属 Lythrum L.

**千屈菜** 大关门草(贵州)

**Lythrum salicaria** L.

生于水旁湿地，也有栽培。全国各地广布。

地上部分(千屈菜)：苦，寒。清热解毒，凉血止血。用于肠炎，便血，血崩，高烧，月经不调，腹泻，外伤出血。

附 注：功效相同的有**无毛千屈菜 L. salicaria** L. var. **glabrus** Ledeb，分布于东北及河北、内蒙古、新疆；**多枝千屈菜，L. virgatum** L.，分布于河北、新疆；**亚麻叶千屈菜；L. linifolium** Kar. et Kir.，分布于新疆。

**绒毛千屈菜** 水滨柳、铁菱角(云南)

**Lythrum salicaria** L. var. **tomentosa** DC.

生于河岸、湖畔、溪边和潮湿草地，或有栽培。分布于陕西、江苏、江西、湖南、四川、贵州、云南。

全株：甘、苦，凉。清热解毒，凉血止血。用于痢疾，血崩，高烧。 根状茎：用于官颈炎，烧、烫伤。

## 节节菜属 Rotala L.

**异叶节节菜**

**Rotala diversifolia** Koehne

生于木旁湿地。分布于海南、广西。

全草：用于疮痈肿毒。

**节节菜**　节节草(江苏)，水马兰(安徽)，碌耳草(广西)

**Rotala indica** (Willd.) Koehne ——*Peplis indica* Willd.

生于稻田中或湿地上。分布于陕西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全草：清热解毒。外用于疮疡。

**薄瓣节节菜**

**Rotala pentandra** (Roxb.) Blatt. et Hallb——*Ammannia pentandra* Roxb.

生于湿地、田野或水田中，为我国南方田间常见的杂草之一。分布于江苏、福建、海南、广西、贵州、云南。

全草：外用于痈疮肿毒，湿疹。

**圆叶节节菜**　千虾菜、假桑子(广东)，水水花(贵州)，水苋菜，水马桑、水豆瓣、肉矮陀陀(云南)

**Rotala rotundifolia** (Buch.-Ham. ex Roxb.) Koehne ——*Ammannia rotundifolia* Buch.-Ham. ex Roxb.

生于水田或潮湿处。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全草：甘、淡，凉。清热解毒，健脾利湿，消肿。用于肺热咳嗽，痢疾，黄疸，小便淋痛；外用于痈疖肿毒。

**轮叶节节菜**　水松叶(贵州)

**Rotala mexicana** Cham. et Schltdl.

生于浅水湿地中。分布于陕西、江苏、浙江、河南、贵州。

全草：清热解毒，止血活瘀。

## 虾子花属　Woodfordia Salisb.

**虾子花**　红蜂蜜花、吴福花、野红花、破血药、沙花、虾花(广东)

**Woodfordia fruticosa** (L.) Kurz ——*Lythrum fruticosa* L.

生于山坡路旁。分布于广东、广西、云南。

根、花(虾子花)：微甘、涩，凉。调经活血，凉血止血，收敛。用于妇女血崩，月经不调，风湿关节痛，腰肌劳损，鼻衄，咳血。　花：(国外)用于痢疾，肝炎，烫伤，痔疮。

# 119. 菱科　Trapaceae

## 菱属　Trapa L.

**红菱**　菱(本草纲目)，乌菱、菱角、水菱角、风菱(全国中草药汇编)

**Trapa bicornis** Osbeck

常栽培于池塘或湖泊中。分布于长江流域以南各省区。

果实、叶柄：甘、涩，平。健胃止痢，抗癌。用于胃溃疡，痢疾，食道癌，乳腺癌，子宫颈癌。果柄：外用于皮肤多发性疣赘。果壳(烧灰)：外用于黄水疮，痔疮。

附　注：功效相似的有**格菱 T. pseudoincisa** Nakai，分布于东北、华北、华东及华中；**四角菱 T. quadrispinosa** Roxb. 分布于全国各地，南方常见栽培。

**二角菱**　菱(通称)

**Trapa bispinosa** Roxb.

生于池沼湖泊或浅湖中，也有栽培。分布于全国南北各地。

果实(菱)：甘，凉。生食：清热解暑，除烦止渴。熟食：益气，健脾。茎(菱茎)：甘、涩，平。用于胃溃疡，多发性疣赘。叶(菱叶)：用于小儿马牙疳，小儿头疮。果壳(菱壳)：甘、涩，平。收敛止泻，解毒消肿。用于泄泻，痢疾，便血，胃溃疡；外用于痔疮，天泡疮，黄水疮，无名肿毒。果柄(菱蒂)：用于溃疡病，皮肤疣，胃癌，食道癌，子宫癌。

附　注：功效相同的有**野菱 T. incisa** Sieb. et Zucc. 分布于华北、中南、西南；**耳菱 T. potaninii** V Vassil. 分布于东北、华东、华中、西南。

菱角　丘角菱(东北植物检索表)，无冠菱、菱(长白山植物药志)

**Trapa japonica** Fler ——*T. korshinskyi* V. Vassil.

生于湖泊、池塘水中。分布全国南北各地。

果实：甘，平。补脾，止泻，止渴。用于脾虚泄泻，消渴、痢疾。果壳：收敛，止血，止泻。

附　注：功效相同的有**东北菱 T. manshurica** Fler. 分布于东北及内蒙古；**短颈东北菱 T. manshurica** Fler. f. **komarovi** (Skv.)S. H. Li et Y. L. Chang 分布于东北西部及南部。

**细果野菱**

**Trapa maximowiczii** Korsh.

生于湖泊、池塘的水面上。分布于东北、华北、中南、西南。

果实：甘、涩，平。健胃止痢，抗癌。用于胃溃疡，乳房结块，便血。

## 120. 桃金娘科　Myrtaceae

### 岗松属　Baeckea L.

**岗松**　石松草、铁扫把、扫把枝(广东)，羊脚叶(海南)

**Baeckea frutescens** L.

生于低丘、荒山草坡及灌丛中，为酸性土壤的指示植物。分布于华南及福建、江西。

根、全株(岗松)：辛、苦、涩，凉。祛风除湿，解毒，利尿，止痛，止痒。根：用于感冒高烧，黄疸，胃痛，风湿关节痛，脚气痛，小便淋痛。全株：外用于湿疹，天疱疮，脚癣。叶：用于毒蛇咬伤，烧、烫伤。

## 红千层属　Callistemon R. Br.

**红千层**

**Callistemon rigidus** R. Br.

原产澳大利亚。广东、广西、云南引种栽培。

小枝、叶：祛痰泄热。

## 水翁属　Cleistocalyx Bl.

**水翁**　水榕、土榕皮(广东)，水香、酒翁(全国中草药汇编)

**Cleistocalyx operculatus** (Roxb.) Merr. et Perry——*Eugenia operculata* Roxb.

生于水边。分布于广东、广西、云南。

花蕾、根、树皮、叶(水翁花)：苦，寒。清暑解毒，祛湿消滞，止痒。　花蕾：用于感冒发热，痢疾，吐泻，消化不良。　根：用于黄疸。　树皮：外用于烧伤，麻风，皮肤瘙痒，脚癣。　叶：外用于乳痈。

## 子楝树属　Decaspermum J. R. et G. Forst.

**华夏子楝树**　山稔、山稔木、山桃稔(广西)

**Decaspermum esquirolii** (Lévl.) Chang et Miau——*Eugenia esquirolii* Lévl.

生于林中。分布于广东、广西、贵州。

根：用于痢疾，肝炎，胃脘痛，腰肌劳损，月经不调，　叶：用于风湿痹痛，跌打损伤。

**子楝树**　米碎木(海南)，炸香棵(云南)

**Deoaspermum gracilentum** (Hance) Merr. et Perry——*Eugenia gracilentum* Hance

生于低海拔至中海拔的森林中。分布于华南及福建、云南。

根：止血，止痢。用于外伤出血，痢疾。　叶、果实：甘、辛，温。理气止痛，芳香化湿。

附　注：功效相同的有**五瓣子楝树 D. fruticosum** J. R. et G. Forst.；**狭叶碎米树 D. fruticosum** J. R. et G. Forst. var. **khasianum** (Duthie) C. Y. Wu，均分布于云南。

## 桉属　Eucalyptus L'Herit.

**赤桉**

**Eucalyptus camaldulensis** Dehnh.

原产澳大利亚。广东、海南、广西至西南均有栽培。

枝叶(赤桉)：辛、苦，温。清热解毒，防腐止痒。　果实：用于小儿疳积。

**柠檬桉**　　香桉(全国中草药汇编)

**Eucalyptus citriodora** Hook. f.

原产澳大利亚。福建、广东、海南、广西、贵州引种栽培。

叶：苦，温。消肿散毒。外用于洗疮疖，皮肤诸病，风湿痛。民间用于痢疾，驱蚊。

附　注：叶中含挥发油作轻化工业调香料。

**窿缘桉**

**Eucalyptus exserta** F. Muell.

原产澳大利亚。广东、海南、广西广泛栽培。

叶：辛、苦，温。祛风除湿，防腐。用于风湿，皮肤病。

附　注：作农药，杀蛆、孑孓。并作防腐剂。

**蓝桉**　　洋草果、灰杨柳、玉树油树(全国中草药汇编)

**Eucalyptus globulus** Labill.

原产澳大利亚。广西、四川、云南有栽培，最北可达四川成都、陕西汉中。

功效与大叶桉相似。叶蒸馏所得的挥发油(桉油)：用于神经痛。

附　注：桉油为《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**多花桉**

**Eucalyptus polyanthermos** Schauer

原产澳大利亚。云南昆明有栽培。

叶、果实：疏风解毒。

**大叶桉**　　桉、大叶有加利(海南植物志)

**Eucalyptus robusta** Smith

南方各地有栽种，在四川、云南个别地区适生环境下生长良好。

叶(大叶桉)：微辛、微苦，平。疏风解热，防腐止痒。预防流行性感冒，流行性脑脊髓膜炎。用于咽喉痛，肺炎，急慢性肾盂肾炎，泄泻，痢疾，丝虫病；外用于烧、烫伤，痈疽疖肿，丹毒，水田皮炎，皮肤湿疹，脚癣，皮肤消毒。

附　注：功效相同的有**细叶桉 E. tereticornis** Smith，福建、广东、海南、广西、贵州、云南有栽培。

**柳叶桉**

**Eucalyptus viminalis** Labill.

云南丽江有栽培。

叶、果实：清热，消食。

## 番樱桃属　Eugenia L.

**丁子香**　　丁香(中药志)，支解香、雄丁香(本草蒙荃)，公丁香(本草原始)

**Eugenia caryophyllata** Thunb.——*E. aromatica* Baill.

我国南方有引种栽培。

花蕾(丁香)：辛，温。温中暖肾，降逆。用于呃逆，呕吐，反胃，泻痢，心腹冷痛，痃癖，癣疾。果实(母丁香)：辛，温。温中散寒。用于暴心气痛，胃寒呕逆，风冷齿痛，妇人阴

冷，小儿疝气。 根(丁香根)：辛，温。用于风热毒肿。 树皮(丁香树皮)：辛，温。温中散寒，消胀止痛。用于中寒脘腹痛胀，泄泻，齿痛。 树枝(丁香枝)：散寒，温中，止泻。用于一切冷气，心腹胀满，恶心，泄泻，滑脱不禁。 花蕾蒸馏所得的挥发油(丁香油)：辛、甘，大热。用于胃寒痛胀，呃逆，吐泻，痹痛，疝痛，口臭，牙痛。

附 注：丁香为《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 番石榴属 Psidium L.

**番石榴** 鸡矢果、拔子、花稔(广东)，广东石榴(四川)，交桃(贵州)，缅桃(云南)

**Psidium guajava L.**

原产美洲热带。台湾、广东、广西、海南、四川、贵州、云南引种栽培，常逸生于荒地或低丘陵地，北达四川西南的安宁河谷。

叶、果实：甘、涩，平。收敛止泻，止血。用于泄泻，痢疾，小儿消化不良。鲜叶：外用于跌打损伤，外伤出血，臁疮久不收口。

## 白千层属 Melaleuca L.

**白千层** 玉树、千层皮(全国中草药汇编)

**Melaleuca leucadendron** (L.) L.——*Myrtus leucadendra* L.

原产澳大利亚。福建、台湾、广东、海南、广西有栽培。

树皮(白千层)：淡，平。安神镇静。用于失眠。 叶(白千层叶)：辛、涩，温。解表，祛风止痛。用于感冒发热，风湿关节痛，神经痛，泄泻腹痛；外用于过敏性皮炎，湿疹。

附 注：功效相同的有**白油树 M. quinquenerria** S. T. Blake，分布于云南。

## 桃金娘属 Rhodomyrtus Reich.

**桃金娘** 桃娘(福建)，山稔、岗稔、当梨、稔子、木刀莲(广东)

**Rhodomyrtus tomentosa** (Ait.) Hassk.——*Myrtus tomentosa* Ait.

生于丘陵坡地，为酸性土壤指示植物。分布于华南及福建、台湾、湖南、贵州、云南。

根(山稔根)：甘、微酸，平。祛风除湿，止痛止血。用于吐泻，胃痛，消化不良，肝炎，痢疾，风湿关节痛，腰肌劳损，崩漏，脱肛；外用于烧、烫伤。 叶(山稔叶)：甘，平。收敛止泻，止血。用于吐泻，消化不良，痢疾，外伤出血。 果实(山稔子)：甘、涩，平。补血止血，滋养安胎，涩肠固精。用于贫血，病后体虚，耳鸣，遗精。 花：行血。用于跌打瘀血。

## 蒲桃属 Syzygium Gaertn.

**线枝蒲桃**

**Syzygium araiocladum** Merr. et Perry.

生于雨林中。分布于海南、广西。

根：止泻。用于泻痢。

**华南蒲桃**

**Syzygium austrosinense** (Merr. et Perry) Chang et Miau——*S. buxifolium* Hook. et Arn. var. *austrosinense* Merr. et Perry

生于中海拔的常绿林中。分布于浙江、江西、福建、广东、广西、四川、贵州、云南。

全株：收敛。用于泻痢。

**短药蒲桃**　野冬青果、麻里果、沙糖树果(云南)

**Syzygium brachyantherum** Merr. et Perry

生于中海拔的山谷密林中。分布于海南、广西、云南。

茎皮、叶、果实：苦、涩，平。润肺定喘。用于哮喘，肺痨。

**短序蒲桃**

**Syzygium brachythyrsum** Merr. et Perry

生于中海拔的常绿林中。分布于云南东南部。

果实(野冬青果)：苦、涩，平。润肺定喘。用于肺痨，哮喘。　树皮、叶(野冬青皮)：苦、涩，凉。清热解毒。用于吐泻，痢疾。

附　注：功效相同的有**乌墨**(海南蒲桃) **S. cumini** (L.) Skeels——*Myrtus cumini* L. 分布于福建、广东、海南、广西、云南。

**黑嘴蒲桃**　碎叶子、黑嘴树(海南)

**Syzygium bullockii** (Hance) Merr. et Perry——*Eugenia bullockii* Hance

生于平地次生林中。分布于广东、海南、广西。

根：用于痨伤咳血，风火牙痛，湿热腹泻，肝炎，风湿痛，胃痛。

**赤楠**　赤楠蒲桃、鱼鳞木、细子莲(全国中草药汇编)，金牛子(植物名实图考)

**Syzygium buxifolium** Hook. et Arn.

生于低山疏林或灌丛。分布于华南及安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖南、贵州。

根或根皮、叶(金牛子)：甘，平。清热解毒，利水平喘。　根、根皮：用于浮肿，哮喘，烧、烫伤。　叶：用于瘰疬，疔疮，漆疮，烧、烫伤。

**簇花蒲桃**　鼻虫窝树、黑叶蒲桃、黑果树、水榕树(云南)

**Syzygium fruticosum** (Roxb.) DC.——*Eugenia fruticosa* Roxb.

生于低海拔的疏林或荒地上。分布于广西、贵州、云南。

树皮：驱蛔虫。

**轮叶蒲桃**　构柃子、紫藤子、赤兰(全国中草药汇编)

**Syzygium grijsii** (Hance) Merr. et Perry——*Eugenia grijsii* Hance

生于山林或灌丛中。分布于浙江、江西、福建、广东、广西。

根、叶(山乌珠)：辛，微温。祛风散寒，活血破瘀。用于跌打损伤，风寒感冒，风湿头痛。

**蒲桃**　香果、风鼓、檐木(台湾)，水桃树、水石榴、水蒲桃(海南)

**Syzygium jambos** (L.) Alston——*Eugenia jambos* L.

生于河边及河谷湿地。分布于华南及福建、台湾、贵州、云南。

根皮、果实(蒲桃)：甘、涩，平。凉血收敛。用于泄泻，痢疾，刀伤出血。

**少花老挝蒲桃**　野苹果(云南)

**Syzygium laosense** (Gagnep.) Merr. et Perry **var. quocense** (Gagnep.) Chang et Miau——*Eugenia laosensis* Gagnep. var. *quocensis* Gagnep.

生于常绿林中。分布于云南。

根皮、叶、果实：凉血，消肿，杀虫，收敛。

**四角蒲桃**　大树果、时令树果(云南)，棱翅蒲桃(海南植物志)

**Syzygium tetragonum** Wall.——*S. nienkui* Merr. et Perry

生于山谷或溪边。分布于海南、广西、云南。

根皮：祛风除湿。用于风湿关节痛。

## 121. 海桑科　Sonneratiaceae

### 海桑属　Sonneratia L. f.

**海桑**

**Sonneratia caseolaris** (L.) Engl.——*Rhizophora caseolaris* L.

生于海滩红树植物群落中。分布于广东、海南。

果实：用于扭伤。

附　注：**杯萼海桑 S. alba** Smith 分布于海南，果汁：(发酵后)用于脑溢血。

## 122. 石榴科　Punicaceae

### 石榴属　Punica L.

**石榴**　安石榴(通称)，山力叶(东北)

**Punica granatum** L.

全国各地均有栽培。

果皮(石榴皮)：酸、涩，温。涩肠止泻，止血，驱虫。用于痢疾，泄泻，便血，脱肛，崩漏，带下病，蛔虫病，绦虫病；外用于牛皮癣。　根(石榴根)：苦、涩，温。杀虫，涩肠，止泻。用于蛔虫病，绦虫病，久泻久痢，带下病。叶(石榴叶)：用于跌打损伤，痘风疮，风癫。花(石榴花)：酸、涩，平。止血。用于鼻衄，吐血，创伤出血，月经不调，崩漏，带下病。味酸的肉质外种皮(酸石榴)：酸，温。收敛止泻。用于泻下，遗精，滑精，崩漏，带下病。味甜的肉质外种皮(甜石榴)：甘、酸、涩，温。生津，止渴，杀虫。用于咽燥口渴，虫积，久泻。种子(石榴子)：用于食欲不振，胃寒病，消化不良，泄泻。

附　注：①石榴皮为《中华人民共和国药典》1990 年版及附录收载。② 功效相同的有**千瓣红石榴 P. granatum** L. var. **pleniflora** Hayne.，全国各地栽培。

**白石榴**

**Punica granatum** L. cv. **albescens** DC.

全国各地公园及庭院栽培。

根(白石榴)：苦、涩，微温。祛风湿，杀虫。用于风湿痹痛，蛔虫、绦虫、姜片虫病。花(白石榴花)：酸、甘，平。止血，涩肠。用于咳血，吐血，衄血，便血，久痢。

附　注：功效相同的有**重瓣白花石榴 P. granatum** L. cv. **multiplex** Sweet，全国各地栽培。

## 123. 玉蕊科　Lecythidaceae

### 玉蕊属　Barringtonia J. R. et Forst.

**梭果玉蕊**　　马旦果、金刀木、小叶金刀木(云南种子植物名录)

**Barringtonia fusicarpa** Hu——*B. yunnanensis* Hu

生于密林中潮湿处。分布于云南。

根：退热。　果实：止咳。

附　注：功效相同的有**玉蕊**（水茄苳），**B. racemosa**（L.）Spreng，分布于台湾海南。

## 124. 野牡丹科　Melastomataceae

### 异形木属　Allomorphia Bl.

**异形木**　　山暗赤(广西)

**Allomorphia balansae Cogn.**

生于海拔 420—1 500 米的林下阴湿处。分布于海南、广西。

根、茎：用于周身骨痛，阴挺，跌打损伤。　枝、叶：用于痧症；外用于脚癣。　全株：用于刀伤。

### 毛药花属　Barthea Hook. f.

**棱果花**　　毛药花(中国高等植物图鉴补编)，刚毛药花(中国种子植物科属辞典)

**Barthea barthei** (Hance) Krass.——*Dissochaeta barthei* Hance

生于海拔 400—1 300 (—2 800)米的山坡、山谷及山顶疏、密林中或水旁。分布于福建、台湾、湖南、广东、广西。

根、叶：止痛。

### 柏拉木属　Blastus Lour.

**线萼金花树**　　叶下红(湖南)，黄金梢(拉汉英种子植物名称)

**Blastus apricus** (Hand.-Mazz.) H. L. Li——*B. spathulicalyx* Hand.-Mazz. var. *apricus* Hand.-Mazz.

生于海拔 300—800 米的山谷、山坡疏、密林下阴湿处。分布于江西、福建、湖南、广东。

全株：利水消肿，调经。用于水肿，跌打损伤，疮疖，月经不调。

附　注：功效相同的有**长瓣金花树 B. apricus** (Hand.-Mazz.) H. L. Li var. **longiflorus** (Hand.-Mazz.) C. Chen——*B. longiforus* Hand.-Mazz.，分布于江西、广东、广西。

**悬萼柏拉木**

**Blastus cavaleriei** Lévl. et Vant.

生于海拔 100—1 600 米的山坡、山谷疏、密林下潮湿的路旁或灌丛中。分布于湖南、广东、广西、贵州、云南。

叶：用于带下病，创伤出血。

**柏拉木**　　黄金梢(广东)，山甜娘(海南)，崩疮药(广西)

**Blastus cochinchinensis** Lour.

生于海拔 200—1 300 米的阔叶林中。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、云南。

根(山崩砂)：涩、微酸，平。收敛，止血，消肿解毒。用于产后流血不止，月经过多，泄泻，跌打损伤，外伤出血，疮疡溃烂。　全株：拔毒生肌。用于疮疖。

**金花树**　　木暗棚(广西)，巨萼柏拉木(拉汉英种子植物名称)

**Blastus dunnianus** Lévl.

生于海拔 230—1 520 米的山谷、山坡疏、密林下土壤肥沃处、溪边或路旁。分布于江西、福建、湖南、广东、广西、贵州。

全株：祛风湿，止血。用于带下病，风湿关节痛，痢疾，跌打损伤，外伤出血。

**少花柏拉木**　　小花柏拉木(海南植物志)

**Blastus pauciflorus** (Benth.) Guillaum.——*Allomorphia pauciflora* Benth.

生于低海拔的山坡林下。分布于江西、广东。

根、叶：拔毒，生肌。用于疥疮。

## 野海棠属　Bredia Bl.

**秀丽野海棠**　　金石榴、活血藤、活血丹、水杨树、高脚山茄(全国中草药汇编)

**Bredia amoena** Diels.

生于海拔 400—1 100 米的山谷、山坡疏、密林下、溪边或路旁。分布于安徽、浙江，江西、福建、湖南、广东。

根或全株(野海棠)：苦，平。祛风利湿，活血调经。用于风湿关节痛，月经不调，带下病，跌打损伤，毒蛇咬伤。

**心叶野海棠**　　千地红(广西)，山红活麻、罐罐草、鸡窝红麻、红水麻叶(四川)

**Bredia esquirolii** (Lévl.) Lauener var. **cordata** (H. L. Li) C. Chen——***B. cordata*** H. L. Li

生于海拔 600 米的山坡林下湿润处或林缘草丛中。分布于广西、四川。

全株：用于痢疾，鼻衄，胃出血，崩漏，月经不调，带下病，手脚麻木，刀伤出血。

**长萼野海棠**　　血经草、天青地红、紫背红、叶下红(湖南)，露水葛(贵州)

**Bredia longiloba** (Hand.-Mazz.) Diels——*Fordiophyton gracile* Hand.-Mazz. var. *longilobum* Hand.-Mazz.

生于海拔 600—900 米的山坡、山谷疏林下。分布于江西、湖南、广西、贵州。

全株(血经草)：辛、苦，平。祛风利湿，活血通络。用于风湿关节痛，痢疾、咳嗽，月经不调，带下病，跌打损伤。

**过路惊**

**Bredia quadrangularis** Cogn.

生于海拔 300—1 400 米的山坡、山谷林中。分布于浙江、江西、福建。

全株：用于小儿夜啼。

**短柄野海棠**　　水牡丹(广西)

**Bredia sessilifolia** H. L. Li

生于海拔 800—1 200 米的山谷、山坡或山脚林下阴湿处、水旁或岩石积土上。分布于广东、广西、贵州。

根：止咳。用于咳嗽。

**鸭脚茶**　　山落茄(浙江)，雨伞子、九节兰(福建)，中华野海棠(中国高等植物图鉴)

**Bredia sinensis** (Diels) H. L. Li——*Tashiroea sinensis* Diels

生于海拔 400—1 200 米的山谷、山坡林下、阴湿路旁、沟旁草丛中或岩石积土上。分布于浙江、江西、福建、广东。

根(鸭脚茶根)：用于头痛，疟疾，腰痛。　叶(鸭脚茶叶)：用于感冒。

**红毛野海棠**

**Bredia tuberculata** (Guillaum.) Diels——*Fordiophyton tuberculatum* Guillaum.

生于海拔 750—1 200 米的山地、草丛、林缘。分布于四川、云南。

全株(紫背牛)：祛风除湿，活血调经。

## 异药花属　Fordiophyton Stapf

**异药花**　　酸猴儿、臭骨草(四川)，伏毛异药草(中国高等植物图鉴)

**Fordiophyton faberi** Stapf

生于海拔 600—1 100(—1 800) 米的林下、沟边、路旁灌丛中及岩石潮湿处。分布于四川、贵州、云南。

全株：祛风除湿，活血。　叶：擦漆疮。

**肥肉草**　　酸酒子、酸杆(江西)，福笛木(湖南)，羊刀尖、棱茎木(广西)

**Fordiophyton fordii** (Oliv.) Krass.——*Sonerila fordii* Oliv.

生于海拔 540—1 700 米的密、疏林下阴湿处、水旁、山坡草地及土质肥厚湿润处。分布于浙江、江西、福建、湖南、广东、广西、贵州。

全株：甘、涩，平。清热利湿，祛瘀消肿。用于痢疾，泄泻，吐血，痔血。

## 酸脚杆属　Medinilla Gaud.

**北酸脚杆**　黄稔根、藤稔、酸接木(广西)

**Medinilla septentrionalis** (W. W. Smith) H. L. Li——*Oritrephes septentrionalis* W. W. Smith

生于海拔200—1 760米的山谷、山坡密林中或林缘阴湿处。分布于广东、广西、云南。

根：用于小儿惊风。　全株：用于痢疾。

## 野牡丹属　Melastoma L.

**多花野牡丹**　老鼠丁根(福建)，酒瓶果(云南)，炸腰果、水石榴、爆肚叶(全国中草药汇编)

**Melastoma affine** D. Don——*M. polyanthum* Bl.

生于海拔300—1 830米的湿润或干燥的山坡、山谷林下、疏林中。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

根、叶：苦、涩，凉。清热利湿，化瘀止血。用于消化不良，痢疾，泄泻，肝炎，衄血；外用于跌打损伤，外伤出血。

**野牡丹**　铜罐草、毛足杆、红暴牙狼、谷口巴、猪母稔，(全国中草药汇编)

**Melastoma candidum** D. Don——*M. septemnrvium* Lour.

生于海拔1 200米以下的山坡松林下或开阔的灌、草丛中。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、云南。

根、叶：甘、酸、涩，平。清热利湿，消肿止痛，散瘀止血。用于消化不良，泄泻，痢疾，肝炎，衄血，便血，脱疽。　叶：用于跌打损伤，外伤出血。

**地茶**　地茄子、地兰子、地石榴、铺地锦(全国中草药汇编)

**Melastoma dodecandrum** Lour.

生于海拔1250米以下的山坡矮草丛中。为酸性土壤常见的植物。分布于浙江、江西、福建、湖南、广东、广西、贵州。

根或全株(地茶)：甘、涩，平。清热解毒，祛风利湿，补血止血。用于泄泻，痢疾，肺痈，盆腔炎，崩漏，贫血，带下病，腰腿痛，风湿骨痛，外伤出血，蛇咬伤。

**细叶野牡丹**　山石榴(海南)，铺地莲(广西)

**Melastoma intermedium** Dunn

生于海拔1 300米以下的山坡、田边矮草丛中。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、贵州。

全株：解毒，止痢。用于痢疾、口腔破溃；外用于毒蛇咬伤。

**展毛野牡丹**　老虎杆(四川)，肖野牡丹、白暴牙狼(全国中草药汇编)

**Melastoma normale** D. Don

生于海拔150—2 800米的开旷山坡灌草丛中或疏林下，为酸性土壤上常见的植物。

分布于福建、台湾、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根、叶(野牡丹)：甘、酸、涩，平。清热利湿，消肿止痛，散瘀止血。　根：用于消化不良，泄泻，痢疾，肝炎，衄血，便血，脱疽。　叶：用于跌打损伤，外伤出血。

**毛萼**　射牙郎、亭娘、甜娘、雉头叶(海南)，豺狗舌(全国中草药汇编)

**Melastoma sanguineum** Sims

生于海拔400米以下的低海拔山麓、沟边、湿润的灌草丛或矮灌丛中。分布于广东、海南、广西。

根、叶(红毛萼)：涩，平。止血，止痢。用于便血，月经过多，泄泻，创伤出血。

## 谷木属　Memecylon L.

**谷木**　角木、子楝树(海南)，子棱木(广西)，壳木(中国高等植物图鉴)

**Memecylon ligustrifolium** Champ.

生于海拔160—1 540米的密林下。分布于福建、广东、海南、广西、云南。

枝、叶：活血祛瘀，止血。用于跌打损伤，腰背痛。

**细叶谷木**　羊角、羊角扭(海南)，螺丝木、铁树、硬造(广西)

**Memecylon scutellatum** (Lour.) Hook. et Arn.——*Scutela scutellata* Lour.

生于海拔3 000米以下的山坡、平地或缓坡的疏、密林中。分布于广东、海南、广西。

叶：解毒消肿。外用于疮疡肿毒。

## 金锦香属　Osbeckia L.

**金锦香**　天香炉、装天甕(海南)，七孔莲、蜂窝草(全国中草药汇编)

**Osbeckia chinensis** L.

生于海拔1 100米以下的荒山草坡、路旁、田边或疏林下向阳处。分布于广西以东、长江流域以南各省区。

全草(金锦香)：淡，平。清热利湿，消肿解毒，止咳化痰。用于痢疾，肝痈，感冒咳嗽，咽喉肿痛，哮喘，肺痨，咯血，肠痈，毒蛇咬伤，疔疮疖肿。

附　注：功效相同的有**宽叶金锦香** O. **chinensis** L. var. **angustifolia** (D. Don) C. Y. Wu et C. Chen，分布于四川、云南。

**假朝天罐**　盅盅花(贵州)，九果根(云南)，阿不答石(瑶语)

**Osbeckia crinita** Benth.

生于海拔800—2 300 (—3 100)米的向阳山坡、草地、地埂或矮灌丛中。分布于西南及湖北、湖南、广西。

根、果实：甘、涩，平。清热利湿，止咳调经。用于吐泻，痢疾，消化不良，咳嗽，吐血，月经不调，带下病。

**三叶金锦香**

**Osbeckia mairei** Craib

生于海拔600—900米的次生杂木林缘。分布于四川、云南、西藏。

根或果枝(爆腰果)：补虚益肾，收敛止血。用于肾虚，腰痛，外伤出血，泄泻。

**蚂蚁花**　窄腰泡(云南)，野牡丹、尼泊尔金锦香(全国中草药汇编)

**Osbeckia nepalensis** Hook. f.

生于海拔 550—1 900 米的开旷的山坡草地、灌丛、路旁及田边，也见于疏林缘、溪边湿润处。分布于广西、云南、西藏。

根(蚂蚁花)：苦、涩，凉。清热，止泻。用于黄疸、泄泻，痢疾，外伤瘀血。

**朝天罐**　向天葫芦、瓶儿草、倒罐子、猫耳朵(全国中草药汇编)

**Osbeckia opipara** C. Y. Wu et C. Chen

生于海拔 250—800 米的山坡、山谷、水边、路旁疏林中或灌丛中。分布于台湾、广西、贵州及长江流域各省区。

根、果实(朝天罐)：甘、涩，平。清热利湿，止咳，调经。用于吐泻，痢疾，消化不良，咳嗽，吐血，月经不调，带下病。

**湿生金锦香**

**Osbeckia paludosa** Craib

生于山坡草地或灌丛中。分布于云南、西藏。

全株：收敛，清热，止血。

附　注：功效相同的有**响铃金锦香 O. pulchra** Geddes 分布于云南；**秃金锦香 O. rostrata** D. Don 分布于云南、西藏；**星毛金锦香 O. sikkimensis** Craib 分布于四川、云南。

## 尖子木属　Oxyspora DC.

**尖子木**　小煨罐、暴牙郎、拜杆菜(全国中草药汇编)

**Oxyspora paniculata** (D. Don) DC.——*Arthrostemma paniculatum* D. Don

生于海拔 500—1 900 米的向阳山谷密林下阴湿处或溪边；也见于山坡疏林下及灌丛中湿润处。分布于广西、贵州、云南、西藏。

全株(尖子木)：甘、微涩，平。清热解毒，利湿。用于痢疾，疔疮，泄泻。

附　注：功效相同的有**刚毛尖子木O. vagans** (Roxb.) Wall.，分布于云南。

## 锦香草属　Phyllagathis Bl. emend.

**毛柄锦香草**

**Phyllagathis anisophylla** Diels

生于海拔 700—900 米的山谷、山坡疏、密林下。分布于湖南、广东、广西。

全株：清热，利水。用于肝炎，臌胀。

**锦香草**　熊巴掌、熊巴耳、铺地毡(广西)

**Phyllagathis cavaleriei** (Lévl. et Vant.) Guillaum——*Allomorphia cavaleriei* Lévl. et Vant.; *Oxyspora cavaleriei* Lévl.

生于海拔 400—1 500 米的山谷、山坡、疏密林下阴湿处或水沟旁。分布于湖南、广

东、广西、贵州、云南。

全株(熊巴掌)：辛、苦，寒。清热解毒，利湿消肿。用于痢疾、痔疮，小儿阴囊肿大，带下病，月经不调，崩漏。

附　注：功效相同的有**短毛熊巴掌 P. cavaleriei**(Lévl. et Vant.) Guillaum. var. **tankahkesi** (Merr.) C. Y. Wu ex C. Chen——*P.tankahkesi* Merr.，分布于江西、福建、湖南、广东、广西、贵州、云南。

**红敷地发**　大崩沙、碑边救生、石发、石莲(广西)

**Phyllagathia elattandra** Diels

生于海拔200—910(—2 000)米的山坡、山谷疏林下、岩石上湿土中。分布于广东、广西。

全株：用于肺痨咳嗽，疮疥，皮肤病，烧、烫伤，风热咳喘，胃脘痛，跌打损伤。

**叶底红**　叶下红(浙江)，大毛蛇、血还魂(广西)，假紫苏(广东)

**Phyllagathia fordii** (Hance) C. Chen —— *Otanthera fordii* Hance;*Bredia fordii* (Hance) Diels

生于海拔100—1 350米的山地疏、密林下、溪边或路旁土层肥厚处。分布于浙江、江西、福建、广东、广西、贵州。

全株(野海棠)：甘、酸，温。益肾调经，补血活血。用于吐血，经闭，跌打损伤，小儿疳积；外用于烧、烫伤，疥疮。

**大叶熊巴掌**　大叶野海棠(云南植物志)

**Phyllagathia longiradiosa** (C. Chen) C. Chen——*Bredia longiradiosa* C. Chen; *Fordiophyton cavaleriei* (Lévl.) Guillaum.

生于海拔300—2 200米的阔叶林下。分布于广西、贵州、云南。

全株(血螃蟹)：辛、苦，平。清热解毒，润肺止咳。用于吐血，咽喉肿痛，肺热咳嗽。

**丽萼熊巴掌**　删纳、果娌娜(广西壮语)

**Phyllagathis longiradiosa** (C. Chen) C. Chen **var. pulchella** C. Chen

生于阔叶林下。分布于广西龙津、大新。

全草：祛风，止痛。用于风湿痹痛，产后头痛。

附　注：广西特有药用植物。

## 偏瓣花属　Plagiopetalum Rehd.

**偏瓣花**

**Plagiopetalum esquirolii** (Lévl.) Rehd.——*Sonerila esquirolii* Lévl.

生于海拔500—2 000米的山坡疏林下。分布于广西、贵州、云南。

根：辛，凉。清热降火，解毒消肿。用于高烧，感冒，无名肿毒。

## 肉穗草属　Sarcopyramis Wall.

**肉穗草**　小肉穗草(云南植物志)

**Sarcopyramis bodinieri** Lévl. et Van.

生于海拔1 000—2 450米的山谷林下。分布于广西、四川、贵州、云南。

全株(肉穗草)：甘、涩，平。清热利湿，凉血止血。用于痢疾，泄泻，吐血，咳嗽。

**楮头红**　　满江红(贵州)

**Sarcopyramis nepalensis** Wall.

生于海拔1 300—3 200米的密林下阴湿处或溪边。分布于华南、西南及江西、福建、湖北、湖南。

全草(楮头红)：酸，凉。清热，平肝。用于肺热咳嗽，头目眩晕，心悸失眠。

附　注：功效相同的有**斑楮头红 S. nepalensis** Wall. var. **maculata** C. Y. Wu ex C. Chen，分布于云南。

## 蜂斗草属　Sonerila Roxb.

**翅茎蜂斗草**

**Sonerila alata** Chun et How ex C. Chen

生于林下阴湿的石上积土中或坑边。分布于广东、广西。

全株：用于鹅口疮，跌打损伤。

**短萼蜂斗草**　　田螺掩、山风穿筋藤(广西)

**Sonerila alata** Chun et How ex C. Chen var. **triangula** C. Chen

生于海拔500米以下的山谷疏、密林下阴湿处岩石上。分布于广东、广西。

全株：活血祛瘀，退翳。用于跌打损伤；外用于目翳。

**蜂斗草**　　尖尾疯、喉痧药(广东)，四大天王、桑勒草(广西)，地胆(拉汉英种子植物名称)

**Sonerila cantonensis** Stapf

生于海拔1 000—1 500米的山谷、山坡密林下阴湿处或荒地上。分布于福建、广东、广西、云南。

全草：清热解毒。用于痢疾，产后流血不止；外用于创伤，蛇伤。

附　注：功效相同的有**毛蜂头草 S. cantonensis** Stapf var. **strigosa** C. Chen 分布于海南、云南。

**小蜂斗草**　　地胆(植物名实图考)，花叶叶、小花草、彩斑桑勒草(全国中草药汇编)

**Sonerila laeta** Stapf

生于海拔130—1 350米的山谷，山坡林下阴湿处或路旁。分布于贵州、云南。

全株(花花草)：淡，平。清热解毒。用于目赤，肺痨，胃痛，骨折，麻风。

**溪边桑勒草**　　溪边地胆(拉汉英种子植物名称)

**Sonerila rivularia** Cogn.

生于海拔500—830米山地、山谷、路边向阳处、灌丛中或水旁石上。分布于福建、广东、广西。

全株：外用于枪弹伤。

**三蕊草**　　短药地胆(云南植物志)

**Soneriia tenera** Royle

生于海拔 800—1 800 米的松林下、林间空地、林缘路旁草丛中及草地上。分布于江西、广东、广西、云南。

全株：补血，活血。用于妇科出血。

## 无距花属　Stapfiophyton Li

**败蒸无距花**　蛇迷草(广西)

**Stapfiophyton degeneratum** C. Chen

生于海拔 200—300 米的山谷疏林下、水旁岩石缝间或积土上。分布于广东、广西。

全株：用于蛇咬伤。

## 长穗花属　Styrophyton S. Y. Hu

**长穗花**　假欧人草(云南哈尼族语)

**Styrophyton caudatum** (Diels) S. Y. Hu —— *Anerincleistus caudata* Diels; *Allomorphia causata* H. L. Li

生于海拔 400—1 500 米的山谷密林中阴湿处或沟边灌丛中。分布于广西、云南。

根：用于阴挺。

# 125. 红树科　Rhizophoraceae

## 木榄属　Bruguiera Lamk.

**木榄**　包罗剪定、鸡爪浪(广东)，剪定(海南)，大头榄(广西)

**Bruguiera gymnorrhiza** (L.) Savigny——*Rhizophora gymnorrhiza* L.

生于淤泥深厚、表土较为坚实的盐土上。分布于福建、台湾、广东、海南、广西。

果、胚轴：作腹泻的收敛剂。　叶：用于疟疾。

附　注：功效相似的有**柱果木榄 B. cylindrica** (L.) Bl.；**海莲 B. sexangula** (Lour.) Poir.，均分布于海南。

## 竹节树属　Carallia Roxb.

**竹节树**　鹅肾木、竹球、气管木、山竹公、山竹梨、鹅仵树(广东、海南)

**Carallia brachiata** (Lour.) Merr.——*Diatoma brachiata* Lour.

生于低海拔至中海拔的丘陵灌丛或山谷杂木林中。分布于广东、海南沿海岛屿、广西。

树皮：截疟。用于疟疾。

**锯叶竹节树**

**Carallia lanceaefolia** Roxb.——*C. diphopetala* Hand.-Mazz.

生于海拔 730 米以下的山地林中。分布于广东、广西、云南。

根、叶(锯齿王): 微甘、涩,凉。清热凉血,利尿消肿, 接骨。用于感冒发热, 暑热口渴,崩漏,跌打损伤,骨折,刀伤出血。

**旁杞木** 锯齿王(广西)

**Carallia longipes** Chun ex Ko

生于山谷杂木林中。分布于广东、广西、云南。

根、枝、叶: 微甘、涩,凉。清热凉血。利尿消肿,接骨。 根: 用于心胃气痛,风湿骨痛。 枝、叶: 用于痢症,刀伤出血,跌打损伤。

## 角果木属 Ceriops Arn.

**角果木** 剪子树、海枷仔、海淀仔(海南)

**Ceriops tagal** (Perr.) C. B. Rob.——*Rhizophora tagal* Perr.

生于海水涨潮时能淹没树杆基部的泥滩、海湾内至沼泽地。分布于台湾、广东、海南、广西。

全株: 收敛退热。 树皮: 止血,收敛,通便。也用于恶疮。 种子油: 止痒。用于疥癣,冻疮。 叶: 曾作奎宁代用品用于疟疾。

## 红树属 Rhizophora L.

**红茄苳** 木考皮、茄藤(台湾)

**Rhizophora mucronata** Poir.

生于海湾两岸盐滩或潮水到达的沼泽地。分布于福建、台湾、广东、海南。

树皮: 收敛。

# 126. 使君子科 Combretaceae

## 萼翅藤属 Calycopteris Lam.

**萼翅藤**

**Calycopteris floribunda** (Roxb.) Lam.——*Getonia floribunda* Roxb.

生于海拔 300—600 米的季雨林中或林缘。分布于云南盈江。

叶: 在柬埔寨用作强壮剂和解毒剂, 妇女分娩后 15 天内作为饮料。 果实: 兴奋剂。

## 风车子属 Combretum Loefl.

**风车子** 使君子藤(广东),水番桃、清凉树(全国中草药汇编),华车风子(植物分类

学报)

**Combretum alfredii** Hance

生于海拔 200—800 米的河边、谷地。分布于江西、湖南、广东、广西。

根(风车子根): 甘、淡、微苦,平。清热利胆。用于黄疸。 叶(风车子叶): 甘、淡、微苦,平。健胃,驱虫。用于蛔虫病、鞭虫病。

**阔叶风车子**

**Combretum latifolium** Bl.

生于海拔 540—1 000 米的林中。分布于贵州、云南。

全株: 清热解毒。

**石风车子**

**Combretum wallichii** DC.

生于海拔 (480—)1 000—1 800 米的山坡路旁。分布于广西、四川、贵州、云南。

叶: 甘、微苦,平。驱虫,清热解毒。

**云南风车子**

**Combretum yunnanense** Exell

生于海拔 500—1 600 米的河谷、河边或疏林中。分布于云南。

种子: 消积,杀虫。

## 榄李属 Lumnitzera Willd.

**榄李** 海滩疤(海南)

**Lumnitzera racemosa** Willd.

生于高潮带或洪潮可淹到的泥滩上。分布于台湾、广东、海南、广西。

树液熬汁: 用于鹅口疮、雪口疮。

## 使君子属 Quisqualis L.

**使君子** 留求子(南方草木状),史君子、四君子(新本草纲目)

**Quisqualis indica** L.

生于山坡林边灌丛或溪边林中。分布于四川、贵州至南岭以南各地;长江中下游以北无野生记录。主产于福建、台湾、江西、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

果实(使君子): 甘,温。驱虫消积。用于蛔虫、蛲虫病,小儿疳积。 根(使君子根): 杀虫,开胃,健脾,止咳。用于咳嗽,蛔虫病,呃逆。叶(使君子叶): 平。杀虫,消疳,开胃。用于疳积。

附 注: ①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。② 功效相同的有**毛使君子 Q. indica** L. var. **villosa** C. B. Clarke、分布于台湾、福建、四川。

## 诃子属(榄仁树属) Terminalia L.

**银叶诃子** 小诃子(云南),曼纳(云南傣语)

**Terminalia argyrophylla** Pott. et Prain

生于海拔500米以下的次生竹林中。分布于云南西南部。

果实：代诃子入药。

**诃子**　诃黎勒(本草纲目)

**Terminalia chebula** Retz.

生于海拔800—1 800米的疏林中。分布于云南。广东、广西也有栽培。

果实(诃子)：苦、酸、涩，平，敛肺涩肠。用于久咳失音，久泻，久痢，脱肛，便血，遗精，尿频。　未成熟的果实(藏青果)：苦、微甘、涩，凉。清热生津，利咽解毒。用于咽喉痛，咽喉干燥。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②功效相同的有**榄仁树**(山枇杷树) **T. catappa** L. 分布于台湾、广东、海南、广西。

**绒毛诃子**

**Terminalia chebula** Retz. var. **tomentella** (Kurz) C. B. Clarke——*T. tomentella* Kurz

生于山坡疏林中。分布于云南西部。

果实(诃子)：功效参见诃子项下。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**毗黎勒**

**Terminalia bellirica** (Gaertn.) Roxb.——*Myrobalanus bellirica* Gaernt

生于海拔540—1350米的向阳山坡及疏林中。分布于云南南部。

果实(生诃子)：甘、涩，平。清热解毒，调和诸病，收敛，养血。用于各种热疟，泻痢，黄水病(藏医病名)，肝胆病，病后虚弱。

附　注：①毛诃子为重要的藏药。②《中华人民共和国药典》1990年版收载。

## 127. 柳叶菜科　Onagraceae

### 柳兰属　Chamaenerion Seguier

**柳兰**　红筷子(四川)，糯芋、遍山红(西藏植物志、长白山植物药志)

**Chamaenerion angustifolium** (L.) Scop.——*Epilobium angustifolium* L.

生于水边、沟渠、沼泽地和稻田中。分布于东北、华北、西北至西南。

全草(铁筷子)：辛、苦，平。有小毒。下乳，润肠，调经活血，消肿止痛。用于乳汁不下，肠燥便秘，月经不调，骨折，关节扭伤。

附　注：功效与分布相同的有**毛柳兰**，**C. angustifolim** (L.) Scop. f. **pubescens** (Hausskn.) Kitag.——*Epilobium angustifolium* L. var. *pubescns* Hausskn.

**宽叶柳兰**

**Chamaenerion latifolium** (L.) Scop.——*Epilobium latifolium* L.

生于海拔4 000—4 500米的冷杉林下、河谷。分布于新疆、云南、西藏。

叶：下乳，润肠。果实冠毛：用于月经不调、外伤出血。

## 露珠草属　Circaea L.

**高山露珠草**

**Circaea alpina** L.——*C. alpina* L. var. *imaicola* Asch. et Magn.; *C. alpina* L. var. *caulescens* Kom.

生于海拔 1 500 米以上的山坡针叶林、高山栎林及河谷杂木林下，也见于林间草地、山坡灌丛中。分布几遍全国各地。

全草：辛、苦，凉。清热解毒，拔脓生肌。用于脓肿，瘰疬，黄癣，湿疣。

附　注：功效相同的有**高寒露珠草 C. alpina** L. subsp. **micrantha** (Skvortsov) Boufford，分布于甘肃、青海、云南、西藏。

**露珠草**　夜麻光(贵州、西藏)，都格里巴(藏名)，牛泷草(中国高等植物图鉴)，心叶露珠草(台湾植物志)

**Circaea cordata** Royle

生于海拔 800—3 000 米的林内、灌丛中、山谷或箐沟石上。分布于东北、华北、西南及陕西、甘肃、安徽、浙江、江西、台湾。

全草(牛泷草)：辛，凉。有小毒。清热解毒，生肌。用于疥疮，脓疮，刀伤。

**谷蓼**　台湾露珠草(台湾植物志)

**Circaea erubescens** Franch. et Sav.

生于林下或山谷阴湿处。分布于安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

全株：(谷蓼)：辛，凉。清热解毒，化瘀止血。用于无名肿毒疮疔，刀伤出血，挤癣。

附　注：功效相同的有**狭叶露珠草 C. alpina** L. subsp. **angustifolia** (Hand.-Mazz.)Boufford——*C. imaicola* (Asch. et Magn.) Hand.-Mazz. var. *mairei* (Lévl.) Hand.-Mazz.，分布于四川、贵州、云南。

**曲毛露珠草**

**Circaea hybrida** Hand.-Mazz.

生于山坡、林缘。分布于东北、华北、西南。

全草：清热解毒。

**南方露珠草**　土灵仙、三角叶(湖北)，辣椒七、白辣蓼草(广西)

**Circaea mollis** Sieb. et Zucc.

生于箐沟、山谷、溪边的林下。分布于辽宁、河北、江苏、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草：辛、苦，凉。有小毒。清热解毒，理气止痛，生肌杀虫。用于风湿关节痛，内伤，胃脘痛，毒蛇咬伤，皮肤过敏。

**白花谷蓼**

**Circaea ovata** (Honda) Boufford——*C. quadrisulcata* (Maxim.) Franch. et Sav. var. *ovata* Honda

生于海拔 1 900 米以下的阔叶林下。分布于四川、贵州、云南。

全草：清热解毒。

**水珠草**　水蓼(陕西)

**Circaea quadrisulcata** (Maxim.) Franch et Sav. ——*C. lutetiana* L. f. *quadrisulcata* Maxim.

多生于海拔1 500—2 400米的山坡林下。分布于东北、华北、西北、华东及河南、四川。

全草：辛、苦，凉。清热解毒，化瘀止血。用于无名肿毒，刀伤出血，疥疮，月经不调，小便淋痛，脘腹痛。

附　注：功效相同的有**绿萼水珠草，C. quadrisulcata** (Maxim.) Franch. et Sav. f. **viridicalyx** (Hara) Kitag. —— *C. maximowiczii* (Lévl.) Hara var. *viridicalyx* Hara，分布于东北东部。

## 柳叶菜属　Epilobium L.

**毛脉柳叶菜**　兴安柳叶菜(东北)

**Epilobium amurense** Hausskn.

生于森林地区或林缘溪流或温泉附近。分布于东北、华北至西南及台湾。

全草：苦、涩，温。收敛止血，止痢。用于泄泻，痢疾，月经过多，带下病。

**广布柳叶菜**　毛脉钝叶柳叶菜、羊角草、羊角豆(湖北)

**Epilobium brevifolium** D. Don subsp. **trichoneurum** (Hausskn.) Raven. —— *E. trichoneurum* Hausskn.

生于海拔1 500—2 900(—3 650)米的灌丛、草地、沟边沼泽地。分布于陕西、浙江、江西、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草：用于静脉曲张，肾炎水肿，高血压头痛，习惯性便秘。

**光华柳叶菜**　岩生柳叶菜、水串草(贵州)

**Epilobium cephalostigma** Hausskn.

生于海拔1 000—3 200米的林下、草地、沟边。分布于吉林、辽宁，内蒙古、陕西、甘肃、宁夏、青海、安徽、浙江、江西、河南、湖北、四川、贵州、云南。

全草(虾筏草)：苦，平。疏风清热，除湿消肿。用于伤风声哑，咽喉肿痛，月经过多，水肿。

**柳叶菜**　水接骨丹(陕西)，光明草(湖南)，小杨柳(贵州)，水兰花，水红花、通经草(云南)，水朝阳花(云南植物志、植物名实图考)

**Epilobium hirsutum** L.

生于海拔500—3 000米的土壤肥沃、日光充足的山沟溪旁及湿地。分布于全国各地。

根：淡，平。理气，活血，止血。用于胃痛，食滞饱胀，经闭。　花：淡，平。清热解毒，调经止痛。用于牙痛，目赤，咽喉肿痛，月经不调，带下病。　带根的全草：用于骨折，跌打损伤，疔疮痈肿，外伤出血。

附　注：功效相似的有**抱茎柳叶菜 E. adnatum** Griseb.；**高山柳叶菜 E. alpinum**

L.; **新疆柳叶菜，E. minutiflorum** Hausskn.，**显脉柳叶菜**；**E. nervosum** Bioss et Buhe，**短毛柳叶菜，E. velutinum**. Nevski.，均分布于新疆。功效相似的还有**圆柱柳叶菜，E. cylindricum** D. Don——*E. tianschanicum* Pavlov 分布于西南及新疆、湖北；**多枝柳叶菜 E. fastigiatoramosum** Nakai 分布于东北、华北及新疆；**异叶柳叶菜 E. propinquum** Hausskn. 分布于东北及新疆。

**水湿柳叶菜**　　独木牛(西藏)，沼生柳叶菜(中国高等植物图鉴)

**Epilobium palustre** L.

生于沼泽或草甸中。分布于东北、华北、西北及河南、湖北、四川、云南、西藏。

全草：淡，平。疏风清热，镇咳，止泻。用于风热咳嗽，声嘶，咽喉肿痛，泄泻。

**小花柳叶菜**

**Epilobium parviflorum** Schreb.

生于沼泽或山沟水旁。分布于华北及陕西、甘肃、新疆、河南、湖北、湖南。

全草：清热解毒，疏风镇咳。　根：用于劳伤腰痛。　全草：用于泄泻，疔疮，咳嗽。

**阔柱柳叶菜**　　鬼松针(河北)，针筒线、心胆草(湖北)

**Epilobium platystigmatosum** C. B. Robins.

生于阔叶林下、沼泽地带。分布于河北、陕西、甘肃、台湾、湖北、四川、云南。

全株：用于月经不调。

**长籽柳叶菜**　　小对经草(全国中草药汇编)，心胆草(陕西中草药)

**Epilobium pyrricholophum** Franch. et Sav.

生于海拔 800—1 500 米的山坡、沟旁阴湿处。分布于陕西、宁夏、江苏、浙江、江西、湖北、湖南、四川、云南。

全草、种毛(针筒线)：苦、微甘，平。　全草：活血调经，止痢、安胎。用于月经不调，便血，痢疾，胎动不安。　种毛：止血。外用于刀伤出血。

**喜山柳叶菜**　　刷把草、怀胎草(全国中草药汇编)

**Epilobium royleanum** Hausskn.——*E. himalayense* Hausskn.

生于海拔 2 800—4 000 米的林缘、水沟旁、河滩、石缝中。分布于云南、西藏。

全草(无风自动菜)：辛，平。有小毒。祛风除湿，止血。用于风湿关节痛，筋骨痛，咽喉痛，外用于创伤出血。

**大花柳叶菜**　　胆黄草、紫药参、通经草(四川)，对对草(西藏)

**Epilobium wallichianum** Hausskn.

生于海拔 1 800—4 000 米的密林下。分布于西南及青海。

全草：通经。四川民间用于月经不调，水肿；西藏用于烧、烫伤。

## 山桃草属　Gaura L.

**小花山桃草**　　倒扣草(湖北)

**Gaura parviflora** Douglas

原产美洲。我国中部和北部时见引种栽培。

全草：清热解毒，利尿。

## 丁香蓼属　Ludwigia L.

**水龙**　过江藤、过塘蛇、鱼鳔草(四川)，玉钗草、草里银钗(本草纲目拾遗)

**Ludwigia adscendens** (L.) Hara——*Jussiaea adscendens* L.; *J. repens* L.

生于水田或浅水池塘。分布于长江流域以南各省区及台湾。

全草(过塘蛇)：甘，寒。清热利尿，消肿解毒。用于暑热烦渴，咽喉肿痛，痢疾，热淋，膏淋，带状疱疹，痈疽疔疮，毒蛇咬伤。

**线叶丁香蓼**　草龙(海南植物志)，细叶水丁香(台湾植物志)

**Ludwidia hyssopifolia** (G. Don) Exell —— *Jussiaea hyssopifolia* G. Don; *J. linifolia* Vahl.

生于海拔240—750(—2 400)米的沼泽、湿草地、田边、水沟边、河滩。分布于台湾、海南、广西、云南。

全草：淡，凉。清热解毒，凉血消肿。用于感冒发烧，咽喉肿痛，口疮，疔疮。

**草龙**　毛草龙、扫锅草(广西)，水龙、水秧草(云南)，草里金钗(本草纲目拾遗)，水丁香(台湾植物志)

**Ludwigia octovalvis** (Jacq.) Roven —— *Oenothera octovalvis* Jacq.; *Jussiaea suffruticosa* L.

生于海拔1 600米以下的山坡、沟边、路旁、田边、草地、荒地或水箐。分布于华南及江西、台湾、云南。

根、全草：淡，凉。清热解毒，祛腐生肌。　根：用于臌胀，疟疾，乳痈。　全草：用于水肿，带下病，痔疮，无名肿毒，咽喉肿痛，口疮，天泡疮，发烧。

**细花丁香蓼**　小花水丁香(台湾植物志)

**Ludwigia perennis** L.——*L. caryophylla* (Lam.) Mert. et Metc.

生于海拔400—1 000米的水边沙地、河谷灌丛、河漫滩地。分布于台湾、广东、海南、四川、云南。

全草：清热解毒，利尿消肿。

**丁香蓼**　红豇豆、草龙(陕西)，针筒草(湖北)，水硼砂(贵州)，小石榴树、小疔药(云南)

**Ludwigia prostrata** Roxb.——*Jussiaea prostrata* (Roxb.)Levl.; *L. epilobioides* Maxim.

生于渠岸、河边、田埂或稻田中。分布于黑龙江、陕西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、云南。

全草(丁香蓼)：苦，凉。利尿消肿，清热解毒。用于水肿，淋证，肝炎，咽喉肿痛，痢疾，带下病，痈肿，狂犬咬伤。

## 月见草属　Oenothera L.

**月见草**　待霄草、夜来香、山芝麻(东北)

**Oenothera biennis** L.——*Onagra biennis* (L.) Scop.

栽培或逸为野生于向阳山坡、荒草地、沙质地及路旁、河岸沙砾地。原产北美洲。我国各地均有分布，主产东北。

根：甘，温。祛风湿，强筋骨。用于风湿筋骨痛。　种子油：用于高胆固醇、高血酯引起的冠状动脉梗塞、硬化及脑血栓，消渴，肥胖病，风湿关节痛。目前欧、美、亚各国及我国制成多种月见草胶囊用于临床。

**红萼月见草**　月见草、夜来香(全国中草药汇编)

**Oenothera erythrosepala** Borb.

全国各地有引种栽培或逸为野生。

根：甘，温。强筋壮骨，祛风除湿。用于风湿病，筋骨痛。

**粉花月见草**

**Oenothera rosea** L'Hérit. ex Ait.

我国南方有引种栽培或逸为野生，已成为有害的杂草。

根：消炎，也用于高血压症。

**待霄草**　月见草(云南)

**Oenothera stricta** Ledeb. ex Link

原产南美。我国各地均有栽培。

根：辛，凉。解表散寒，祛风止痛。用于咽喉肿痛，感冒发烧。

## 128. 小二仙草科　Haloragidaceae

### 小二仙草属　Haloragis J. R. et G. Forst

**黄花小二仙草**　石崩(广西)

**Haloragis chinensis** (Lour.) Merr.——*Gaura chinensis* Lour.

生于荒山砂地上。分布于广东、海南、广西、云南。

全草：清热解毒。用于哮喘，咳嗽。

**小二仙草**　豆瓣草、蚁塔、砂生草(全国中草药汇编，

**Haloragis micrantha** (Thunb.) R. Br. ex Sieb. et Zucc. ——*Goniocarpus micranthus* Thunb.

生于荒坡沙地。分布于江苏南部、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全株(小二仙草)：苦，凉。止咳平喘，清热利湿，调经活血。用于咳嗽，哮喘，痢疾，小便淋痛，疔疮，月经不调，跌打损伤，蛇咬伤，烧、烫伤。

### 狐尾藻属(茨属)　Myriophyllum L.

**穗状狐尾藻**　狗尾巴草、大茨草(云南)，茨(中国高等植物图鉴)

**Myriophyllum spicatum** L.

生于池塘、沟渠中，分布于全国南北各地。

全草：清热解毒。用于痢疾。

**狐尾藻**　轮叶狐尾藻(中国高等植物图鉴)

**Myrophyllum verticillatum** L.

生于池塘。分布于全国南北各地。

全草：清热。用于痢疾。

## 129. 杉叶藻科　Hippuridaceae

### 杉叶藻属　Hippuris L.

**杉叶藻**

**Hippuris vulgaris** L.

生于浅水、河边水草地及溪流中。分布于全国南北各地。

全草(杉叶藻)：苦、微甘，凉。清热凉血，生津养液。用于高热烦渴，肺痨咳嗽，痨热骨蒸，肉肪痛，泄泻。

## 130. 锁阳科　Cynomoriaceae

### 锁阳属　Cynomorium L.

**锁阳**　锈铁锤、地毛球、锁燕(全国中草药汇编)

**Cynomorium songaricum** Rupr.

生于干燥盐碱沙地，常寄生于白刺根上。分布于西北及内蒙古、云南(南华、双柏)。

肉质茎(锁阳)：甘，温。补肝肾，益精血，润肠通便。用于阳痿，滑精，腰腿酸痛，肠燥便秘。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 131. 八角枫科　Alangiaceae

### 八角枫属　Alangium Lam.

**八角枫**　山霸王、白尖子(陕西)，白龙须(陕西、贵州、云南)

**Alangium chinense** (Lour.) Harms——*Stylidium chinense* Lour.

生于海拔 500—1 200 米的山坡灌丛中。分布于陕西、甘肃、河南及长江流域以南各地。

根、须根、根皮(八角枫根)：辛、微温。有毒，须根毒更甚。祛风除湿，散瘀镇痛。用于风湿痹痛，跌打损伤，风寒感冒，骨折劳伤，咳嗽，月经不调，经闭，小儿慢惊。　叶：止血接骨。用于外伤出血，骨折，乳结疼痛。　花：用于头风痛及胸腹胀满。

附　注：功效相同的有**小花八角枫**（西南八角枫）**A. faberi** Oliv.，分布于湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南；**毛八角枫 A. kurzii** Craib，分布于华南及江苏、安徽、浙江、江西、湖南、贵州、云南；**云山八角枫**（心叶八角枫）**A. kurzii** Craib var. **handelii**（Schnarf）Fang，分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖南、广东、广西、云南；**瓜木 A. platanifolium**（Sieb. et Zucc）Harms——*Marlea platanifolia* Sieb. et Zucc.，分布于吉林、辽宁、河北、山西、陕西、甘肃、山东、浙江、江西、台湾、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

**阔叶八角枫**

**Alangium faberi** Oliv. var. **platyphyllum** Ghun et How

生于海拔400米以下的疏林中。分布于华南。

根：用于小儿疳积，风湿骨痛。　全株：用于目赤，疮疖。

**三裂八角枫**　灵角（鞍山市千山），假瓤子（辽宁本溪）

**Alangium platanifolium**（Sieb. et Zucc.）Harms var. **trilobum**（Miq.）Ohwi——*Marlea platanifolia* Sieb. et Zucc. var. *triloba* Miq.

生于林边、杂木林中较阴处。分布于辽宁东南部及南部。

侧根、须根、叶、花：辛，温。有毒。祛风除湿，散瘀止痛。用于风湿关节痛，跌打损伤，劳伤腰痛，瘫痪。

附　注：孕妇忌服，小儿及年老体弱者慎用。

**土坛树**　割舌罗（海南）

**Alangium salviifolium**（L. f.）Wanger.——*Grewia salviifolia* L. f.

生于海拔1 200米以下的疏林中。分布于华南。

根、叶：用于风湿痛，跌打损伤；也作催吐剂和解毒剂。

## 132. 蓝果树科　Nyssaceae

### 喜树属　Camptotheca Decne.

**喜树**　天梓树（湖南），水桐树（华南），千张树（四川），旱莲木（植物名实图考）

**Camptotheca acuminata** Decne.

生于山地疏林或作行道树。分布于长江流域以南各省区及陕西、甘肃。

树枝、树皮、叶、果实（喜树）：苦、涩，凉。抗癌，清热，杀虫。用于胃癌，结肠癌，直肠癌，膀胱癌，慢性粒细胞性白血病，急性淋巴细胞性白血病；外用于牛皮癣。

附　注：我国特有属。

### 蓝果树属　Nyssa Gronov ex L.

**蓝果树**　紫树（中国树木分类学），椐萨木（中国植物图谱）

**Nyssa sinensis** Oliv.

生于海拔300—1 700米的山谷或溪边潮湿的混交林中。分布于江苏、安徽，浙江、江

西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根：抗癌。

## 133. 珙桐科 Davidiaceae

### 珙桐属 Davidia Baill.

**珙桐** 山白果(湖北)，水梨子、水冬瓜(四川)，空桐(中国植物图鉴)

**Davidia involucrata** Baill.

生于海拔1 500—2 200米的湿润的常绿阔叶落叶混交林中。分布于陕西、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

根(珙桐根)：收敛止血。 果皮(水梨)：清热解毒，消痈。 叶：抗癌，杀虫。用于各种癌症初起，疥癣。

附 注：①我国特有属。②国家一级保护植物。

## 134. 山茱萸科 Cornaceae

### 桃叶珊瑚属 Aucuba Thunb.

**桃叶珊瑚** 软叶罗伞(广西)

**Aucuba chinensis** Benth.

生于海拔1 000米以下的林中。分布于江西、台湾、湖北、广东、广西、云南。

根、叶：苦、辛，温。祛风除湿，活血化瘀。用于跌打损伤，骨折，风湿痹痛，烧、烫伤，痔疮。

附 注：功效相同的有**绿花桃叶珊瑚 A. chlorascens** F. T. Wang，分布于贵州、云南；**枇杷叶珊瑚 A. eriobotryaefolia** F. T. Wang，分布于云南；**洒金珊瑚 A. japonica** Thunb. var. **variegata** D'ombr.，各地庭园及温室栽培。

**峨眉桃叶珊瑚**

**Aucuba chinensis** Benth. subsp. **omeiensis** (Fang) Fang et Soong

生于海拔1 000米以下常绿阔叶林中。分布于四川峨眉山、成都龙泉山。

叶、果实：清热解毒，凉血。用于烧、烫伤，痔疮。

附 注：四川特有药用植物。

**西藏桃叶珊瑚**

**Aucuba himalaica** Hook. f. et Thoms. ex Hook. f.

生于海拔1 500—2 500米的林下。分布于西南及陕西、湖北。

根：辛、苦，温。祛风除湿，舒筋活络。用于风湿骨痛，跌打损伤。

**长叶珊瑚** 长叶岩马桑(湖北)

**Aucuba himalaica** Hook. f. et Thoms. var. **dolichophylla** Fang et Soong

生于山坡林下。分布于湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

果实：用于风湿关节痛，跌打损伤。

**密毛桃叶珊瑚**　柔毛桃叶珊瑚、紫竹叶(湖北)

**Aucuba himalaica** Hook. f. et Thoms var. **pilossima** Soong

生于海拔 1 200—1 500 米的沟谷林下。分布于陕西、湖北、湖南、四川。

根：用于腿痛。

**倒心叶珊瑚**　青竹叶(湖北)

**Aucuba obcordata** (Rehd.) Fu——*A. chinensis* Benth. f. *obcordata* Rehd.

生于山坡沟边、林缘。分布于陕西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

叶：用于烧、烫伤，跌打损伤。

## 梾木属　Cornus L.

**红瑞木**　红瑞山茱萸(东北)，凉子木(江苏)

**Cornus alba** L.

生于山坡、沟谷。分布于东北及内蒙古、甘肃、宁夏、青海。河北、陕西、山东、江西有栽培。

树皮：收敛，强壮。　叶：用于咯血，恶饮。　树皮、枝条、叶：清热解毒，止痢，止血，发表透疹。用于泄泻，痢疾，目赤。

附　注：蒙医用其枝条作蒙药"澳恩布"(河柏)的代用品，用于感冒，咳嗽，麻疹不透。藏医用于胸膜炎和肾病。

**头状四照花**　一支箭、云母树、节节树(四川)，羊树(云南)，鸡嗉子(中国高等植物图鉴)

**Cornus capitata** Wall.——*Dendrobenthamia capitata* (Wall.) Hutch.

生于海拔 1 600—3 200 米的山坡常绿阔叶林中。分布于西南及浙江、湖北、湖南、广西。

叶：苦、涩，平。　果实：甘、苦，平。清热解毒，利胆行水，消积杀虫。用于食积气胀，小儿疳积，肝炎，蛔虫病；外用于烧、烫伤，外伤出血。

**尖叶头状四照花**

**Cornus capitata** Wall. subsp. **angustata** (Chun) Q. Y. Xiang —— *C. kousa* Buerg var. *angustata* Chun.; *Dendrobenthamia angustata* (Chun) Feng

生于海拔 700—2 200 米的山坡常绿阔叶林中。分布于江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

叶、花(野荔枝)：涩，平。收敛止血。用于外伤出血，痢疾，骨折。　果实：苦。清热利湿，止血，驱蛔。用于蛔积，黄疸，刀伤出血。

**灯台树**　瑞木(山东)，乌牙树(安徽)，鸡肚皮(浙江)，六角树(四川)，伞柄树、猫猫头(云南)

**Cornus controversa** Hemsl.

生于海拔 400—1 800 (—2 500) 米的山坡混交林中。分布于华北、华东、西南及辽宁、陕西、甘肃、广东、海南、广西。

果实(灯台树)：苦。清热利湿，止血，驱蛔。用于蛔积，肝炎。

**朝鲜株木**

**Cornus coreana** Wanger.

生于向阳山坡、石缝中。分布于吉林、辽宁。

枝条：祛风活络。用于腰腿痛。　枝叶：外用于漆疮。　果实：止咳。

**红椋子**　娘子木(湖北)，青杨(四川)，晒晒完啦(云南)

**Cornus hemsleyi** Schneid et Wanger.

生于海拔 1 200—3 000 米的山坡林中。分布于西南及山西、陕西、甘肃、青海、河南、湖北。

树皮：祛风止痛，舒筋活络。用于风湿筋骨痛，腰腿痛，跌体瘫痪。

**香港四照花**

**Cornus hongkongensis** Hemsl.——*Dendrobenthamia hongkongensis* (Hemsl.) Hutch.

生于海拔 600—1 800 米的山坡常绿阔叶林中。分布于福建、湖南、广东、广西、贵州、云南。

叶、花：苦、涩，凉。清热解毒，止血。　果实：甘、苦，温。驱蛔。　全株：用于风湿骨痛。

**大叶香港四照花**　大鸡嗉子、山荔子(云南种子植物名录)

**Cornus hongkongensis** Hemsl. subsp. **gigantea** (Hand.-Mazz.) Q.Y. Xiang ——*C. hongkongensis* Hemsl. var. *gigantea* Hand.-Mazz.

生于海拔 700—1 700 米的山坡常绿阔叶林中。分布于四川、贵州、云南。

叶、花、果实：清热解毒，消积杀虫。

附　注：功效相同的有**多脉四照花 C. multinervosa** (Pojark.) Q.Y. Xiang，分布于四川、云南。

**东瀛四照花**　日本四照花(通称)

**Cornus kousa** Hance ——*Dendrobenthamia japonica* (A.P. DC.) Fang

江苏、浙江、贵州有栽培。

果实：消积驱虫，清热利湿。用于肝炎，腹水，结核病。

**四照花**

**Cornus kousa** Hance subsp. **chinensis** (Osborn) Q.Y. Xiang——*C. kousa* Hance var *chinensis* Osborn

生于海拔 450—2 500 米的森林中。分布于山西、陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

叶、花(四照花)：涩，平。收敛止血。用于痢疾，骨折，跌打损伤。　果实：补肝肾，益精血。

**矩圆叶株木**　粉帕木(贵州)

**Cornus oblonga** Wall.

生于海拔 1 200—3 400 米的山坡灌丛中。分布于湖北、四川、贵州、云南。

全株：清热解毒，收敛止血。用于皮炎，疮疖。

**椋子**　　棶木(通称),冬青果、光皮树(江西),椋子木(河南)

**Cornus macrophylla** Wall.

生于海拔 600—2 200 米的山区。分布于西南及山西、陕西、甘肃、山东、江苏、安徽、浙江、江西、台湾、河南、湖北、湖南。

树皮(丁榔皮): 苦,平。祛风止痛,舒筋活络。用于风湿筋骨痛,腰腿痛,肢体瘫痪。

附　注: 果肉、种仁含油脂较高,内含不饱和脂肪酸约 77.68%，其中油酸约 38.3%，亚油酸 35.85%，用于高血酯症。

**乳突棶木**

**Cornus papilliosa** Fang et W. K. Hu

生于山坡林中。分布于四川、云南。

果肉: 解表清热。

**小花棶木**　　贵州四照花、贵州棶木（贵州)

**Cornus parviflora** Chien

常生于密林中或溪边山坡上。分布于广西、贵州。

树皮: 甘、咸,平。通经活络。用于瘫痪,骨折,痛经,痞块,跌打损伤,高烧,疟疾。

**小棶木**

**Cornus paucinervis** Hance

生于海拔 200—2 000 米的沟边、河滩或疏林中。分布于陕西、甘肃、江苏、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全株: 微酸,涩,凉。解表清热,止痛。用于感冒头痛,风湿关节痛。

**黑椋子**

**Cornus poliophylla** Schneid. et Wanger.

生于山坡林中。分布于陕西、甘肃、河南、四川、云南、西藏。

全株: 解表清热。用于感冒头痛。

**康定棶木**

**Cornus schindleri** Wanger.

生于海拔 2 400—3 200 米的溪旁杂木林中。分布于四川、云南。

枝、叶: 清热解毒。

**毛棶**　　车梁木(河北、山东),椋子木、油树(陕西),小六谷(四川)

**Cornus walteri** Wanger.

生于海拔 300—3 300 米的阳坡、半阳坡。分布于华北及辽宁、陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

枝、叶(癞树叶): 微苦、凉。清热解毒,止痒。用于漆疮。

## 青荚叶属　Helwingia Willd.

**中华青荚叶**　　叶长花、叶上珠、月亮公公树(云南)

**Helwingia chinensis** Batal.

生于海拔 1 200—2 300 米的密林中潮湿处。分布于陕西、甘肃、湖北、湖南、四川、贵

州、云南。

根、叶、果实：苦、涩，温。舒筋活络，化瘀调经。用于跌打损伤，骨折，风湿关节痛，胃痛，痢疾，月经不调；外用于烧、烫伤，痈肿疮毒，蛇咬伤。

附　注：功效相同的有**钝齿青荚叶 H. chinensis** Batal. var. **crenata** (Lingelsh et Limpr) Fang，分布于陕西、湖北、四川、云南；**小叶青荚叶，H. chinensis** Batal. var. **microphylla** Fang et Soong，分布于陕西、甘肃、湖北、四川；**大叶青荚叶 H. chinensis** Batal. f. **megaphylla** Fang，分布于云南。

**西藏青荚叶**　叶上珠、西域青荚叶、叶上果、泡通青荚叶、通心草、野山花(云南种子植物名录)

**Helwingia himalaica** Hook. f. et Thoms. ex C.B. Clarke

生于海拔 1 200—2 400 米的密蔽潮湿林下。分布于西南及广东、海南、广西。

根、全株：苦、微涩、凉。活血化瘀，清热解毒。用于跌打损伤，骨折，风湿性关节痛，胃痛，痢疾，月经不调；外用于烧、烫伤，疮疖肿毒，毒蛇咬伤。

附　注：功效相同的有**小叶青荚叶 H. himalaica** Hook. f. et Thoms. ex C. B. Clarke var. **parvifolia** Li，分布于云南。

**青荚叶**　叶长花(通称)

**Helwingia japonica** (Thunb.) Dietr.——*Osyris japonica* Thunb.

生于海拔 2 000 米以下的林中。分布于西南及陕西、甘肃、安徽、浙江、台湾、湖北、湖南、广东、广西。

根、全株：苦、微涩，凉。活血化瘀，清热解毒。用于水肿，小便淋痛，尿急尿痛，乳汁较少或不下。　叶：清热除湿。用于便血。　果实：用于胃痛。

果实：用于胃痛。

附　注：功效相同的有**白背青荚叶 H. japonica** (Thunb.) Dietr. var. **hypoleuca** Hemsl. ex Rehd.，分布于陕西、湖北、四川、贵州；**乳凹青荚叶 H. japonica** (Thunb.) Dietr. var. **papillosa** Fang et Soong，分布于陕西、甘肃、四川、西藏；**峨眉青荚叶 H. omeiensis** (Fang) Hara et Kuros.，分布于湖南、广西、四川、贵州。

## 山茱萸属　Macrocarpium Nakai

**山茱萸**　萸肉、山萸肉、药枣、枣皮(通称)

**Macrocarpium officinalis** (Sieb et Zucc.) Nakai——*Cornus officinalis* Sieb. et Zucc.

生于海拔 400—1 500 米的阴湿山坡、林缘、林内。分布于山西，陕西、甘肃、山东、安徽、浙江、河南、湖北、湖南、四川。

果肉(山茱萸)：酸、涩，微温。补肝益肾，涩精固脱。用于头晕目眩，耳聋，自汗，腰膝酸软，阳痿，遗精，尿频。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。　② 功效相似的有**川鄂山茱萸 M. chinensis** (Wanger.) Hutch. ——*Cornus chinensis* Wanger. 分布于陕西、甘肃、河南、湖北、广东、四川、贵州、云南。

## 鞘柄木属　Torricellia DC.

**角叶鞘柄木**　　水冬瓜、水五加(贵州)，大接骨丹、蓝茶叶(云南)

**Torricellia angulata** Oliv.

生于海拔900—1 500米的山区。分布于湖北、四川、贵州、云南。

树皮、叶：苦、涩，平。活血祛瘀，通络止痛，舒筋接骨。用于风湿关节痛，腰痛，骨折，跌打损伤，血瘀经闭，泄泻。

**粗齿角叶鞘柄木**　　烂泥树、大接骨丹(云南)

**Torricellia angulata** Oliv. var. **intermedia** (Harms) Hu—— *T. intermedia* Harms

生于海拔400—1 800米的林下或灌丛中。分布于陕西、甘肃、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

根、叶、花：苦、辛，温。活血祛瘀，祛风利湿，舒筋接骨。用于骨折，跌打损伤，干血劳伤，哮喘，乳蛾。

**鞘柄木**　　大葫芦叶(云南)，椴叶烂泥树、椴叶叨里木(云南种子植物名录)，叨里木(植物学名词)

**Torricellia tiliifolia** (Wall.) DC. ——*Sambucus tiliifolia* Wall.

生于海拔1 640—2 600米的林中。分布于湖北、贵州、云南。

茎皮、叶(鞘柄木)：甘，平。活血止痛，祛风除湿。用于风湿关节痛，产后腰痛，泄泻；外用于骨折，跌打损伤。　花：用于血瘀痛经，经闭。

## 阴荃属　Ynquania Z.Y. Zhu

**阴荃**　　团圆果(四川沐川)

**Ynquania muchuanensis** Z. Y. Zhu

生于海拔800米处山坡半阴杂木林中。分布于四川沐川。

树皮：用于风湿麻木，跌打损伤。

附　注：四川特有属、种和药用植物。

# 135. 五加科 Araliaceae

## 五加属　Acanthopanax Miq.

**短柄五加**　　倒挂牛(陕西)，倒卵叶五加(中国植物志)

**Acanthopanax brachypus** Harms——*A. obovatus* Hoo

生于海拔1 000—1 500米的山坡灌丛中。分布于陕西、甘肃、宁夏。

茎(短柄五加)：益气健脾，补肾安神。

附　注：经陕西中药研究所研究表明，本品对肾虚，失眠，阳痿高血压及妇科更年期综合症等症的疗效良好。是一种新型的保健药物，现已制成冲剂销售。

**吴茱萸叶五加**　树五加（贵州），吴茱叶五加（中国种子植物分类学），黄叶五加（广西植物名录）

**Acanthopanax evodiaefolius** Franch.

生于海拔1 000—3 000米的湿润山坡林中。分布于陕西太白山、东至浙江沿海山区、西南至四川、南至广西南部、云南西部。

根皮：辛，温。祛风除温，理气化痰。用于风湿痹痛、心气痛，痨咳，吐血，哮喘。

**锈毛吴茱萸叶五加**　乔木五加（全国中草药汇编）

**Acanthopanax evodiaefolius** Franch. var. **ferrugineus** W.W. Smith

生于海拔1 300—3 200米的山坡林中。分布于西南及广西。

根皮（五加皮）：辛，温。除风湿，强筋骨，活血。用于风湿关节痛，腰腿酸痛，半身不遂，跌打损伤，水肿。

**红毛五加**　纪氏五加（经济植物手册），川加皮、刺加皮（药材资料汇编），毛五加皮（四川中药志）

**Acanthopanax giraldii** Harms ——*A. giraldii* Harms var *hispiidus* Hoo

生于海拔1 300—3 500米的山地灌丛中。分布于陕西、甘肃、宁夏、青海、河南、湖北、四川、云南。

树皮（红毛五加皮）：辛，温。祛风湿，强筋骨，通关节。用于痿证，足膝无力，风湿痹痛。

附　注：**毛叶红毛五加 A. giradii** Harms var. **pilosulus** Rehd.，分布于陕西、甘肃、青海、四川，在四川树皮也作红毛五加入药。

**五加**　白簕树（广东），五叶路刺、白刺尖（四川），五叶木（新本草纲目），南五加皮（全国中草药汇编）

**Acanthopanax gracilistylus** W.W. Smith

生于林内、灌丛中、林缘或路旁。分布于山西、陕西、甘肃南部，西南至四川、云南，东至江苏、上海、浙江，南至东南沿海。

根皮（五加皮）：苦、辛，温。祛风湿，强筋骨，益气。用于风湿关节痛，腰腿酸痛，半身不遂，跌打损伤，水肿。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。② **柔毛五加 A. gracilistylus** W.W. Smith var. **pubescens** (Pamp.) Li，分布于陕西、甘肃、湖北、湖南、四川、贵州；**糙毛五加 A. gracilistylus** W.W. Smith var. **nodiflorus** (Dunn) Li，分布于陕西、甘肃、江西、湖北、湖南、广东、广西，在甘肃、湖北等地也作五加皮入药。

**糙叶五加**　刺五加（云南）

**Acanthopanax henryi** (Oliv.) Harms----*Eleutherococcus henryi* Oliv.

生于海拔800—3 200米的林缘、路旁或灌丛中。分布于山西、陕西、安徽、浙江、福建、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

根皮：辛，温。祛风湿，壮筋骨，活血祛瘀。用于风湿关节痛，腰痛，小儿行迟，水肿，脚气，跌打损伤。

**康定五加**　藏三加、三加皮(西藏)，新炉五加(植物分类学报增刊)，毛蕊三甲(全国中草药汇编)

**Acanthopanax lasiogyne** Harms

生于海拔2 000—3 400米的林内、灌丛中、路旁。分布于四川、云南、西藏。

根皮(三加皮)：辛，温。祛风除湿，壮筋强骨，逐瘀活血。用于风湿关节痛，跌打损伤。

附　注：在西藏作五加皮入药。

**藤五加**　秤杆树(云南)，白根五加(中国种子植物分类学)

**Acanthopanax leucorrhizus** (Oilv.) Harms——*Eleutherococcus leucorrhizus* Oliv.

生于海拔1 000—3 200米的山坡丛林中。分布于陕西、甘肃、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、四川、贵州、云南。

根皮：辛，温。祛风除湿，强筋壮骨。用于风湿关节痛，腰腿酸痛，半身不遂，跌打损伤，水肿。

附　注：功效相似的有**糙叶藤五加 A. leucorrhizus** (Oliv.) Harms var. **fulvescens** Harms et Rehd.，分布于长江流域(除安徽、浙江)，北至陕西、甘肃；**狭叶藤五加 A. leucorrhizus** (Oliv.) Harms var. **angustifolatus** (Hoo) Shang，分布于四川。

**匙叶五加**　白五加皮(湖北)，芮氏五加(植物分类学报增刊)

**Acanthopanax rehderianus** Harms

生于海拔1 500—2 600米的沟谷杂灌丛中。分布于湖北、四川。

根、根皮：祛风湿，通关节，止痛。

**刺五加**　坎拐棒子(吉林)，一百针、老虎潦(河北)

**Acanthopanax senticosus** (Rupr. et Maxim.) Harms. —— *Hedera senticosa* Rupr et Maxim.; *A. senticosus* (Rupr. ex Maxim.) Harms var. *subinermis* (Regel) Kitag.

生于林内、灌丛中、沟边及路旁。分布于东北及河北、北京、山西、河南。

根及根状茎(刺五加)：辛、微苦，温。益气健脾，补肾安神。用于肾虚，气虚无力，高、低血压症，冠心病，心绞痛，高血脂症，糖尿病，风湿病，咳嗽痰喘，慢性中毒，肿瘤切除后辅助药物。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②国家三级保护植物。

**无梗五加**　刺拐棒(东北)，乌鸦子(中国树木分类学)，短梗五加(东北木本植物志)

**Acanthopanax sessiliflorus** (Rupr. et Maxim ) Seem. ——*Panax sessiliflorum* Rupr. et Maxim.

生于海拔200—1 000米的山坡林内、灌丛中。分布于东北及河北、北京、天津、山西。

根皮：辛，温。祛风除湿，强筋壮骨，补精，益智。用于风湿关节痛，筋骨痿软，腰膝作痛，水肿，小便不利，小便淋痛，寒湿脚气，阴囊潮湿，神疲体倦。

附　注：①东北朝鲜族药农习用本品作五加皮药用。②功效相同的有**小果短梗五加 A. sessiliflorus** (Rupr. et Maxim.) Seem. var **parviceps** Rehd.，分布于东北及河北。

**蜀五加**　四川五加(中国种子植物分类学),无毛五加(全国中草药汇编)

**Acanthopanax setchuenensis** Harms ex Diels

生于海拔1 000—3 200米的灌丛中、林缘、路旁。分布于陕西、甘肃、河南、湖北、四川。

根皮：辛,温。祛风除湿,强筋壮骨。用于风湿关节痛,腰腿酸痛,半身不遂,跌打损伤,水肿,小儿麻痹症,咳嗽,哮喘。

附　注：功效相同的有**阔叶蜀五加 A. setchuenensis** Harms ex Diels var. **latifoliatus** Hoo, 分布于甘肃、湖北。

**刚毛白簕**

**Acanthopanax setosus** (Li) Shang——*A. trifoliatus* (L.) Merr. var. *Setosus* Li

生于海拔1 300米以下的山坡林内、灌丛中。分布于江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、贵州、云南。

全株：祛风湿,强筋骨。用于风湿痹痛,跌打损伤,感冒,吐泻。

**细刺五加**

**Acanthopanax setulosus** Franch.

生于海拔800米以下的林中、沟边、路旁。分布于安徽、浙江、四川。

根：祛风湿,强筋骨。用于风湿痹痛,腰肌劳损。

**刚毛五加**　白五加(贵州),西门五加(经济植物手册),雷五加(云南种子植物名录)

**Acanthopanax simonii** Schneid.

生于海拔1 800米以下的林中。分布于江西、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

根皮：辛,温。舒筋活络,祛风除湿。用于风湿痛,劳伤,头晕目眩,骨折,无名肿毒。

附　注：**长梗刚毛五加 A. simonii** Schneid. var. **longipipedicellatus** Hoo, 分布于四川、贵州,根皮在四川入药,功效同刚毛五加。

**白簕**　三加皮(浙江、湖北),鹅掌簕禾掌簕(广东),三叶五加(广西),簕钩荣(全国中草药汇编)

**Acanthopanax trifoliatus** (L.) Merr.——*Zanthoxylum trifoliatum* L.

生于海拔700—3 200米的林中、林缘、灌丛中。分布于中南、西南及陕西。

根、叶或全株(三加)：苦、涩,凉。清热解毒,祛风除湿,散瘀止痛。用于黄疸,泄泻,胃痛,风湿关节痛,腰腿痛;外用于跌打损伤,疮疖肿毒,湿疹。　嫩枝叶：辛、苦,微寒。用于疔疮痈肿,疥癣,创伤,胃痛。

**轮伞五加**

**Acanthopanax verticillatus** Hoo

生于海拔2 900—3 200米的密林中。分布于西藏东南部。

根皮：辛,温。祛风除湿,强筋壮骨。用于风湿关节痛,小儿筋骨萎软,跌打损伤,阳痿。

附　注：本品在西藏作五加皮入药。

## 楤木属　Aralia L.

**芹叶龙眼独活**　　牛尾独活(云南)，黑羌活、肉五加(全国中草药汇编)

**Aralia apioides** Hand -Mazz.

生于海拔 3 600 米以下的山坡丛林中。分布于四川、云南。

根(牛角七)：苦、辛，微温。祛风除湿，通经活络。用于风湿痛，跌打损伤。

**虎刺楤木**　　广东楤木(中国树木分类学)

**Aralia armata** (Wall.) Seem.——*Panax armatum* Wall

生于海拔 1 400 米以下的林中、林缘。分布于江西、广东、海南、广西、贵州、云南。

根、根皮(鹰不扑)：微苦、辛，平。活血化瘀，祛风利湿。用于跌打损伤，风湿骨痛，肝炎，前列腺炎，胃痛，泄泻，痢疾，乳痈，疮疖，无名肿毒。

**浓紫龙眼独活**

**Aralia atropurpurea** Franch.

生于海拔 2 000—3 000 米的山坡疏林、草地、灌丛中。分布于四川、云南、西藏。

根状茎(九眼独活)：辛、苦，温。祛风燥湿，活血止痛，消肿。用于风湿腰腿痛，腰肌劳损。

**楤木**　　刺龙袍、百鸟不落、刺椿头、飞天蜈蚣、鸟不宿(陕西)

**Aralia chinensis** L.

多生于海拔 2 700 米以下的山沟、林缘。分布于西北、华东、中南、西南及河北、山西。

根、根皮(楤木根)：辛，平。祛风湿，利小便，散瘀血，消肿毒。用于风湿关节痛，肾炎水肿，肝硬化，膨胀，肝炎，胃痛，淋浊，血崩，跌打损伤，瘰疬，痈肿。　茎枝(鸟不宿)：辛，平。有小毒。追风行血。用于风湿痹痛，胃痛。　茎的韧皮部(楤木白皮)：微咸，温。补腰肾，壮筋骨，舒筋活络，散瘀止痛，用于风湿痹痛，跌打损伤。　叶(楤木叶)：用于泄泻，痢疾。

附　注：功效相同的有**白背叶楤木 A. chinensis** L. var. **nuda** Nakai 分布于中南及河北、陕西、甘肃、江西、四川、贵州、云南。

**东北土当归**　　牛尾大活(东北)，香秸颗(河北)，长白楤木(东北木本植物志)

**Aralia continentalis** Kitag.

生于针阔叶混交林、杂木林或山坡灌丛中。分布于东北、华北及陕西、四川、西藏。

根、根皮(长白楤木)：辛、苦，温。祛风燥湿，活血止痛。用于风湿腰腿痛，腰肌劳损。

**食用土当归**　　土当归(中国高等植物图鉴)，食用楤木(经济植物手册)，心叶九眼独活(全国中草药汇编)

**Aralia cordata** Thunb.

生于山坡草丛中、林阴下。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、广西、贵州。

根状茎(九眼独活)：辛、苦，温。祛风燥湿，活血止痛，消肿。用于风湿腰腿痛，腰肌劳损。

**头序楤木**　　雷公种(广州)，木尾木(广东)，毛叶楤木(中国高等植物图鉴)

**Aralia dasyphylla** Miq.

生于海拔 1 000 米以下的林缘、路旁及灌丛中。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根皮：辛，温。祛风除湿，杀虫。用于风湿痛，带下病，阴痒。

**黄毛楤木**　　鸟不企(广东植物志)，大鹰不扑(全国中草药汇编)

**Aralia decaisneana** Hance

生于海拔 1 200—1 300 米的向阳山坡林中。分布于安徽、江西、福建、台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

根皮：甘、微苦，平。祛风除湿，散瘀消肿。用于风湿腰痛，肝炎，肾炎水肿。

**棘茎楤木**

**Aralia echinocaulis** Hand.-Mazz.

生于海拔 2 600 米以下的林中、沟边湿地。分布于陕西、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根皮(红楤木)：微苦，温。祛风除湿，行气活血，解毒消肿。用于跌打损伤，骨折，痈疽，风湿痹痛，胃痛。

**秀丽楤木**

**Aralia elegans** C.N. Ho

生于山谷灌丛中。分布于广东、广西。

根：用于跌打损伤。

**辽宁楤木**　　刺龙牙(吉林)，刺老鸦(东北)，鹊不踏(本草纲目)，龙牙楤木(本草纲目拾遗)

**Aralia elata** (Miq.) Seem. ——*Dimorphanthus elatus* Miq.; *A. mandshurica* Maxim.

生于海拔 1 000 米以下的阔叶林中或林缘。分布于东北及河北。

根皮(龙牙楤木)：甘、苦，平。补气活血，健脾利水，祛风除湿，活血止痛。用于气虚无力，颅外伤后无力综合症，肾虚，阳痿，风湿痛，胃痛，肝炎，消渴，肾炎水肿。

附　注：功效相同的有**少刺辽宁楤木 A. elata** (Miq.) Seem. f. **subinermis** Y. C. Chu，分布于辽宁宽甸、本溪、凤城。

**龙眼独活**

**Aralia fargesii** Franch.

生于海拔 1 800—2 600 米的林下或溪流边潮湿地。分布于陕西、湖北、四川、云南、西藏。

根、根状茎：祛风除湿，散瘀止痛。　根：用于小儿痘疹。　根状茎：用于跌打损伤，头痛，头晕。

**柔毛龙眼独活**　　短序九眼独活(全国中草药汇编)

**Aralia henryi** Harms

生于山坡草丛中及林缘。分布于陕西、安徽、湖北、四川。

根状茎(龙眼独活)：辛、苦，温。祛风除湿，活血止痛，消肿。风湿腰痛，腰肌劳损。

**湖北楤木**　　刺包头、飞天蜈蚣(湖北)

**Aralia hupehensis** Hoo

生于海拔 1 200 米以下的向阳山坡。分布于陕西、湖北、四川、云南。

根：接骨，用于跌打损伤，骨折。

**黑果土当归**　丛枝土当归(植物分类学报)，丛林楤木、牛角七、蜜油参(全国中草药汇编)

**Aralia melanocarpa**(Lévl.) Lauener ——*Eleutherococcus melanocarpa* Lévl.; *A dumetorum* Hand.-Mazz.

生于海拔 2 600 米以下的草丛、灌丛中。分布于贵州、云南。

根(白九股牛)：辛、微甘，平。补中益气，托毒外出。用于淋巴腺炎，疖痈，慢性化脓性骨髓炎。

**长刺楤木**　刺叶楤木(福建师范学院学报)

**Aralia spinifolia** Merr.

生于海拔 1 000 米以下的荒山、荒地或林缘。分布于江西、福建、湖南、广东、广西。

根，树皮：祛风除湿，利水消肿，散瘀。用于风湿痹痛，吐血，崩漏，跌打损伤。

**波缘楤木**　红刺老包、顶天刺、三百棒(贵州)

**Aralia undulata** Hand.-Mazz.

生于海拔 800—1 500 米的山谷林中。分布于湖南、广东、广西、四川、贵州。

根皮：活血化瘀，除湿止痛。用于经闭，骨折，劳伤痛，风湿痛，跌打损伤。

**云南龙眼独活**　龙眼独活、大九股牛、珠钱草、松香疳药(云南)

**Aralia yunnanensis** Franch.

生于海拔 2 000—2 700 米的疏林、山坡草丛中。分布于四川、云南。

根(草独活)：甘、辛，微温。发散风寒，健脾利湿，强筋壮骨。用于感冒，咳嗽，胸满胁痛，腰痛，跌打损伤，风湿痛，月经不调，小儿疳积。

## 罗伞属　Brassaiopsis Decne. et Planch.

**假通草**　刺篦桐(云南)，纤细罗伞(中国树木志)，纤齿柏那参(植物分类学报)

**Brassaiopsis ciliata** Dunn——*Euaraliopsis ciliata* (Dunn) Hutch.

生于海拔 2 200 米以下的山谷林中或阳坡。分布于西南及广西。

根皮：清热解毒，祛风除湿。用于麻风病。

**盘叶罗伞**　盘叶掌叶树(中国植物志)，盘叶柏那参(植物分类学报)

**Brassaiopsis fatsioides** Harms ——*Euaraliopsis fatsioides* (Harms) Hutch.

生于海拔 500—2 700 米的沟谷及山坡林中。分布于西南。

根、茎皮：祛风除湿，解毒消肿。

**锈毛罗伞**　锈毛树参、阴阳枫(全国中草药汇编)

**Brassaiopsis ferruginea** (Li) Hoo ex Hoo et Tseng ——*Dendropanax ferrugineus* Li; *Euaraliopsis ferrugines* (Li) Hoo et Tseng

生于海拔 1 500—2 000 米的密林中。分布于广东、广西、四川、贵州、云南。

根、茎枝(半枫荷)：甘，温。舒筋活络，祛风除湿。用于痹证，腰腿痛，跌打损伤，扭挫

伤，偏头痛，臂痛；外用于刀伤出血。

**罗伞**　空壳涧(广西)，掌叶木、七加皮(云南)，鸭脚罗伞(中国高等植物图鉴)

**Brassaiopsis glomerulata** (Bl.) Regel ——*Aralia glomeulata* Bl.; *B. glomerulata* (Bl.) Regel var. *coriacea* (W.W. Smith) Li

生于海拔 400—2 400 米的山谷或山坡密林中。分布于西南及海南、广西。

根、树皮、叶(刺鸭脚木)：甘、微辛，温。祛风除湿，活血散瘀。用于风湿骨痛，跌打损伤，腰肌劳损。

附　注：功效相同的有**长梗罗伞 B. glomerulata** (Bl.) Regel var. **longipedicellata** Li，分布于广西、四川、贵州、云南。

**栎叶罗伞**

**Brassaiopsis quercifolia** Hook.

生于山坡灌丛中、山谷中。分布于广西、贵州镇宁。

根：活血消肿，祛风除湿。

**三叶罗伞**　显脉罗伞、三叶莲(广西)

**Brassaiopsis tripteris** (Lévl.) Rehd. ——*Heptapleurum tripteris* **Lévl.**

生于海拔 800 米以下山地林缘。分布于广东、广西、贵州、云南。

全株：舒筋活络，祛风壮阳。用于风湿骨痛，跌打损伤，阳痿。

## 树参属　Dendropanax Decne. et Planch.

**树参**　鸭脚木(江西)，白半枫荷(广东、广西)，枫荷梨、枫荷桂(广西)，半荷枫(中国高等植物图鉴)

**Dendropanax dentiger** (Harms ex Diels) Merr ——*Gilibertia dentiger* Harms ex Diels

生于常绿阔叶林或灌丛中。分布于安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根、茎枝(枫荷梨)：甘，温。祛风除湿，舒筋活络。用于痹证，腰腿痛，半身不遂，跌打损伤，扭挫伤，偏头痛，臂痛；外用于刀伤出血。

附　注：功效相同的有**缅甸树参 D. burmaricus** Merr.，分布于云南。

**大果树参**　大果木五加(云南)

**Dendropanax macrocarpus** C.N. Ho

生于海拔 1 000—2 000 米的混交林中。分布于广西、云南。

根皮：祛风除湿，活血散瘀，消肿止痛。

**变叶树参**　白半枫荷(广东)，三层楼(广西)，铁锹树(全国中草药汇编)

**Dendropanax proteus** (Champ.) Benth. ——*Hedera protea* Champ.

生于山谷溪边密林中及阳坡、路旁。分布于江西、福建，湖南、广东、广西、云南。

根、树皮(半枫荷)：甘，温。舒筋活络，祛风除湿。用于痹证，腰腿痛，半身不遂，跌打损伤，扭挫伤；外用于刀伤出血。

## 马蹄参属　Diplopanax Hand.-Mazz.

**马蹄参**　野枇杷(广西),大果五加(中国种子植物科属辞典)

**Diplopanax stachyanthus** Hand. -Mazz.

生于海拔800—1800米的山区常绿阔叶林中。分布于湖南、广东、广西、贵州、云南。

树皮：具有人参的强壮作用。

## 八角金盘属　Fatsia Decne. et Planch.

**八角金盘**　手树(华北经济植物志要)

**Fatsia japonica** (Thunb.) Decne. et Planch. ——*Aralia japonica* Thunb.

原产日本。长江流域以南各城市有栽培,华北地区多盆栽于温室中。

根：用于麻风。　叶：用于咳嗽。

## 常春藤属　Hedera L.

**洋常春藤**

**Hedera helix** L.

原产欧洲。全国南方多见栽培。

茎、叶：苦、辛,温。祛风利湿,活血消肿。用于风湿骨痛,腰痛、跌打损伤、目赤,肾炎水肿,经闭;外用于痈疖肿毒,癣疹,湿疹。

**尼泊尔常春藤**　多枝常春藤(全国中草药汇编)

**Hedera nepalensis** K. Koch.

生于海拔2 100--2 400米的山坡林中。分布于西藏樟木、定结。

全株．苦、辛,温。祛风利湿,活血消肿。用于风湿关节痛,腰痛，跌打损伤，肾炎水肿,经闭;外用于痈疖肿毒,癣疹,湿疹。

**常春藤**　爬崖藤、追风藤、上天龙、扒岩枫(陕西),爬树藤(湖北)

**Hedera nepalensis** K. Koch var. **sinensis** (Tobl.) Rehd.

多生于低山坡、林下及沟岸,常攀援在大树或石壁上。分布于华东、中南、西南及陕西、甘肃。

茎、叶：苦,凉。祛风利湿,活血消肿。用于风湿关节痛,腰痛,跌打损伤，肾炎水肿,经闭;外用于痈疖肿毒,癣疹,湿疹。果实(常春藤子)：甘,温。用于羸弱,腹内冷痛,血虚经闭。

## 幌伞枫属　Heteropanax Seem.

**短梗幌伞枫**

**Heteropanax brevipedicellatus** Li

散生于林中、路旁。分布于江西、福建、湖南、广东、广西。

根、树皮：用于跌打损伤，烧、烫伤及疔疮。

**华幌伞枫**

**Heteropanax chinensis** (Dunn) Li——*H. fragrans* (Roxb.) Seem. var. *chinensis* Dunn

生于海拔800—1 400米的杂木林中、山坡灌丛中或沟边。分布于福建、广东、广西，云南。

根、树皮：微苦，凉。解毒消肿。用于疔疮，跌打损伤。

**幌伞枫**　大蛇药、五加通、凉伞木(广西)

**Heteropanax fragrans** (Roxb.) Seem ——*Panax fragrans* Roxb.

生于海拔1 400米以下的山坡林中。分布于广东、海南、广西、云南。

根、树皮(幌伞枫)：苦，凉。清热解毒，活血消肿，止痛。用于感冒，中暑头痛，痈疖肿毒，骨折，烧、烫伤，扭挫伤，蛇咬伤。

附　注：功效相同的有**狭叶幌伞枫 H. fragrans** (Roxb.) Seem. var. **attenuatus** C.B. Clarke，分布于云南。

## 刺楸属　Kalopanax Miq.

**刺楸**　老虎棒子(山东)，鼓钉刺(浙江)，刺枫树(江西)，刺桐(湖南)

**Kalopanax septemlobus** (Thunb.) Koidz. ——*Acer septemlobum* Thunb.

生于海拔800—2 500米的山坡稀疏灌丛中。分布于东北、华北、西南及陕西、甘肃。

根或根皮(刺楸根)：苦，凉。有小毒。清热凉血，祛风除湿，排脓生肌。用于肠风，痔血，跌打损伤，风湿骨痛，肾炎水肿。　树皮(刺楸树皮)：辛、苦，平。祛风除湿，解毒杀虫。用于风湿关节痛，腰膝痛，急性吐泻，痢疾，痈肿，疥癣，虫牙痛。

附　注：功效相同的有**深裂刺楸 K. septemlobus** (Thunb.) Koidz. var. **maximowiczii** (V. Houtte) Hand.-Mazz.，分布于辽宁、山东、江苏、上海、浙江、河南；**毛叶刺楸 K. septemlobus** (Thunb.) Koidz. var. **magnificus** (Zabel) Hand.-Mazz.，分布于浙江、湖北、四川、云南。

## 大参属　Macropanax Miq.

**大参**

**Macropanax dispermus** (Bl.) O. Kuntze——*Aralia dispermus* Bl.; *M. oreophilus* Miq.

生于海拔300—2 300米的混交林中。分布于贵州、云南。

根(油散木)：甘、微辛，平。健脾理气，舒筋活络。用于小儿疳积，筋骨痛。

**短梗大参**　七叶风(湖南)，节梗大参(广西)，千豆豉干、王爪金(贵州)

**Macropanax rosthornii** (Harms ex Diels) C.Y. Wu ex Hoo ——*Nothopanax rosthornii* Harms ex Diels

生于山坡灌丛中。分布于陕西、甘肃、江西、福建、湖北、湖南、广东、四川、贵州。

根、叶(七角枫)：甘，平。祛风除湿，化瘀生新。用于风湿痛，骨折。

**波缘大参**

**Macropanax undulatus** (Wall.) Seem. ——*Hedera undulatus* Wall.

生于海拔1 800米的山坡林下。分布于广西、贵州，云南。

全株：用于劳伤。

## 常春木属　Merrilliopanax Li

**常春木**　　长果柄常春木(中国高等植物图鉴)

**Merrilliopanax listeri** (King) Li ——*Dendropanax listeri* King; *M. chinensis* Li

生于海拔1 300—1 500米的山坡林中。分布于贵州、云南。

根、枝：祛风除湿，强筋壮骨。用于风湿筋骨痛。

## 梁王茶属　Nothopanax Miq.

**异叶梁王茶**　　闷头黄(云南)，阔叶梁王茶、三叶枫、三叶树、金刚尖(全国中草药汇编)

**Nothopanax davidii** (Franch.) Harms ex Diels ——*Panax davidii* Franch.; *N. latifolius* Hand.-Mazz.

生于海拔600—1 800米的山坡、河岸等处。分布于西南及陕西、湖北、湖南。

根皮、树皮(树五加)：苦、辛，凉。祛风湿，活血脉，通经止痛，生津止渴。用于风湿痹痛，跌打损伤，劳伤腰痛，月经不调，肩臂痛，暑热喉痛，骨折。

**掌叶梁王茶**　　羊毛金刚山槟榔、白鸡骨头树、金刚树(云南)

**Nothopanax delavayi** (Franch.) Harms ex Diels ——*Panax delavayi* Franch.

生于海拔1 500—2 500米的山坡林中或灌丛中。分布于四川、贵州、云南。

全株(良旺茶)：甘、微苦，凉。清热解毒，活血舒筋。用于咽喉肿痛，目赤，消化不良，风湿腰腿痛；外用于骨折，跌打损伤。

附　注：功效相同的有**尾叶梁王茶 N. delavayi** (Franch.) Harms ex Diels var. **longicaudatus** Feng，分布于云南。

## 刺人参属　Oplopanax Miq.

**东北刺人参**　　刺参(吉林长白山、中国植物志)

**Oplopanax elatus** Nakai ——*Echinopanax eletus* Nakai

生于海拔1 400—1 800米的山坡针、阔叶混交林下，湿润肥沃的土壤上。分布于吉林长白山和辽宁本溪、宽甸、桓仁。

根、根状茎(刺人参)：甘，温。滋补强壮，解热，镇咳，调整血压。用于肾虚，精神抑郁，低血压病，阳痿，精神分裂症，糖尿病。

附　注：国家二级保护植物。

## 人参属　Panax L.

**人参**　棒棰(东北)

**Panax ginseng** C.A. Mey. ——*P. schineng* Nees

生于东北东部山区针阔叶混交林下。在产区多为栽培。其他省区也有少量引种栽培。

根(人参)：甘、微苦，平。大补元气，复脉固脱，补脾益肺，生津，安神。用于久病气虚，疲倦无力，脾虚作泻，饮食少进，热病伤津，汗出口渴，失血虚脱，头晕健忘，喘促心悸，脉搏无力，消渴心烦，肺虚喘嗽，肾虚阳痿，小心慢惊。　侧根(人参须)：甘、苦，平。益气，生津，止渴。用于胃虚吐逆、口渴、咳嗽、咯血。功效近人参而力弱，可用于轻病代人参条。　根状茎(人参芦)：甘、苦，温。升阳。用于泻泄日久，阳气下陷。　叶(人参叶)：苦、甘，寒。止渴，祛暑，降虚火。用于热病伤津，暑热口渴，肺热声嘶，虚火牙痛。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②国家一级保护植物。

**竹节参**　萝卜七、峨三七、竹根七(四川)，罗汉三七、野三七(云南)

**Panax japonicus** C.A. Mey. ——*P. pseudo-ginseng* Wall. var. *japonicus* (C. A. Mey.) Hoo et Tseng

生于海拔1 800—2 600(—3 200)米的山谷阔叶林中。分布于安徽、浙江、广西、四川、贵州、云南。

根状茎(竹节参)：甘、微苦，温。滋补强壮，散瘀止痛，止血。用于病后虚弱，肺痨，咯血，经闭，产后瘀血，跌打损伤。　叶(参叶)：甘、苦，微寒。清热生津，利咽。用于骨蒸劳热，腰腿痛，防中暑，咽喉肿毒。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**疙瘩七**　羽叶七(云南)，钮三七(中国药用植物志)，羽叶三七(中国植物志)

**Panax japonicus** C.A. Mey. var. **bipinnatifidus** (Seem.) C.Y. Wu et Feng ex C. Chow ——*P. bipinnatifidus* Seem.

生于海拔(900—)1 800—3 600米的针阔叶混交林中阴湿的地方。分布于陕西、甘肃、青海、湖北、四川、西藏。

根状茎(珠子参)：功效见珠子参。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**珠子参**　钮子七(陕西、甘肃、四川)，土三七、疙瘩七、盘七(云南)

**Panax japonicus** C.A. Mey. var. **major** (Burk.) C.Y. Wu et K.M. Feng——*Aralia quinquefolia* Decne. et Planch. var. *major* Burk.

生于海拔1 200米以上的山地阔叶林下或针叶林下。分布于山西、陕西、甘肃、宁夏、河南、湖北、湖南、贵州、云南、西藏。

根状茎(珠子参)：苦、甘，微寒。补肺，养阴，活络，止血。用于跌打损伤，外伤出血，腰腿痛，月经不调，便血，气血双亏，虚劳咳嗽。　叶(参叶)：苦、甘，微寒。清热生津，利咽。用于咽喉痛，暑热伤津，头晕目眩。做茶茗常服有滋补强壮之效，并能解暑热。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②功效相同的有**狭叶竹节参** **P. japonica** C.A. Mey. var. **angustifolius** (Burk.) Cheng et Chu ——*Aralia quin-*

*quefolia* Decne. et Planch. var. *angustifolia* Burk., 分布于四川、贵州、云南。

**三七**　田七、参三七、汉三七(通称),金不换(江西),盘龙七(四川)

**Panax notoginseng** (Burk.) F.H. Chen ex C. Chow ——*P. pseudo-ginseng* Wall. var. *notogiseng* (Burk.) Hoo et Tseng

生于海拔 1 200—1 800 米的地带,云南东南部和广西西南部多栽培。近年来浙江、江西、福建、四川、贵州也有试种。

块根(三七): 甘、微苦,温。活血祛瘀,止血,消肿止痛。用于衄血,吐血,咯血,便血,崩漏,产后瘀血,跌打损伤。　叶(三七叶): 功效同三七而力弱。　花(三七花): 甘,凉。清热,平肝降压。用于咽喉痛,头昏。

附　注:《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**参三七**　假人参(中国植物志)

**Panax pseudo-ginseng** Wall.

生于海拔 2 300—3 200 米的阔叶林内或针阔叶混交林中。分布于西藏吉隆、樟木、定结、墨脱、林芝。

根状茎: 行瘀止血,消肿止痛。用于跌打损伤,吐血,衄血,便血,血崩及产后恶露不止。

附　注: 国家三级保护植物。

**西洋参**　广东人参(商品名),花旗参(习称)

**Panax quinquefolium** L.

原产北美。我国大多数地方引种栽培成功。

根(西洋参): 甘、苦,凉。益肺阴,清虚火,生津止渴。用于肺虚咳血,潮热及肺胃津亏,烦渴少气。

**屏边三七**　野三七、香刺、土三七、竹节七、白三七(云南)

**Panax stipuleanatus** Tsai et Feng ex C. Chow

生于海拔 1 100—1 700 米的山谷潮湿林内。分布于云南东南部。

根状茎: 散瘀定痛,疗伤止血,滋补。用于跌打损伤,风湿痛,咳血,外伤出血,吐血,衄血,便血,崩漏,病后虚弱,贫血,肺痨。

**姜状三七**

**Panax zingiberensis** C. Y. Wu et Feng ex C. Chow

原产云南东部思茅、蒙自、马关等地的亚热带常绿阔叶林下。近在砚山铳卡农场及昆明引种栽培。

根状茎: 用于跌打损伤,劳虚咳嗽,外伤出血,贫血。民间用作三七代用品。

附　注: 国家三级保护植物。

## 羽叶参属(五叶参属)　Pentapanax Seem.

**锈毛羽叶参**　马肠子树(云南),锈毛五叶参(中国植物志)

**Pentapanax henryi Harms**

生于杂木林中。分布于安徽、江西、湖北、四川、云南。

根皮：祛风除湿，活血化瘀。

附　注：功效相同的有**绒毛羽叶参 P. tomentellus** (Franch.) Shang，分布于云南。

**黄山五叶参**

**Pentapanax henryi** Harms var. **hwangshanensis** Cheng

生于海拔1 100—1 600米的山谷疏林中或林缘。分布于安徽、浙江。

根、茎：祛风除湿，散寒止痛。

**羽叶参**　五叶参(全国中草药汇编)

**Pentapanax leschenaultii** (Wight et Arn.) Seem.——*Hedera leschenaultii* Wight et Arn.

生于海拔2 000—3 200米的山坡林下、灌丛中。分布于四川、云南、西藏。

根皮、茎皮(岩五加)：微苦、涩、温。祛风除湿，散寒止痛。用于关节痛，胃痛。

**西南羽叶参**　川西楤木(中国植物志)

**Pentapanax wilsonii** (Harms) Shang——*Aralia wilsonii* Harms

生于海拔2 100—2 700米的灌丛中、村旁。分布于四川、云南。

根：补中益气，祛风除湿。

附　注：功效相同的有**糙叶羽叶参 P. plumosus** (Li) Shang，分布于四川、云南。

## 鹅掌柴属　Schefflera J. R. et G. Forst.

**鹅掌藤**　狗脚蹄(台湾)，七加皮、七叶藤、汉桃叶(广西)

**Schefflera arboricola** Hayata

生于海拔900米以下的溪边或较湿润的林中。分布于台湾、海南、广西、贵州。

茎.叶：苦、甘，温。止痛，散瘀，消肿。　茎：用于跌打损伤，风湿关节痛，溃疡痛。叶：用于外伤出血。

**短序鹅掌柴**　川黔鸭脚木(云南种子植物名录)

**Shcefflera bodineri** (Lévl.) Rehd. ——*Heptapleurum bodireri* Lévl.

生于海拔400--1 000米山坡林中。分布于湖北、四川、贵州、云南。

根、茎、叶：祛风止痛，散瘀消肿，补肝肾，强筋骨。用于风湿痛，胃痛。

附　注：功效相同的有**中华鹅掌柴 S. chinensis** (Dunn) Li，分布于云南。

**穗序鹅掌柴**　大五加皮(广西)，假通脱木(贵州)，大加皮，绒毛鸭脚木、野巴戟(云南)

**Schefflera delavayi** (Franch.) Harms ex Diels——*Agalma delavayi* Franch.

生于海拔600—3 000米的常绿阔叶林中、林缘及疏林内。分布于江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根、茎：苦、涩，微寒。活血化瘀，消肿止痛，祛风通络，补肝肾，强筋骨。用于骨折，扭挫痛，腰肌劳损，风湿关节痛，肾虚腰痛，跌打损伤。

**球序鹅掌柴**　五加皮(云南)，团花鸭脚木(广西植物名录)

**Schefflera glomerulata** Li

生于海拔1 700米以下的谷地或山坡常绿阔叶林中。分布于广东、广西、贵州、云南。

根皮、树皮：活血止痛，消肿生肌。用于跌打损伤，风湿关节痛，骨折，臌胀，感冒发热。

**红河鹅掌柴**　通草(云南)、何氏鹅掌柴(植物分类学报)

**Schefflera hoi** (Dunn) Vig.——*Heptapleurum hoi* Dunn

生于海拔1 400—3 300米的山坡沟谷密林中。分布于四川、云南、西藏。

茎、髓心：清热，利尿，通气。

附　注：功效相同的有**大叶红河鹅掌柴 S. hoi** (Dunn) Vig. var. **macrophylla** Li，分布于云南。

**白背鹅掌柴**　泡通、大木通、隔子通、饭包叶、豆豉叶(云南)

**Schefflera hypoleuca** (Kurz) Harms——*Heptapleurum hypoleucum* Kurz

生于海拔1 200—2 000米的山坡林中。分布于贵州、云南。

根、茎、树皮、叶(大泡通)：苦、涩，微寒。消肿止痛，祛风除湿，舒筋活络，通便。根、茎：用于牙痛，胃痛，腹痛，便秘，跌打损伤，闭合性骨折。　树皮：用于风湿麻木，关节肿痛，跌打疼痛，腰膝酸痛，胃痛。　叶：用于湿疹，风疹。

**扁盘鹅掌柴**　西南鹅掌柴、七叶加、鸭脚木、七叶莲(云南)，印度鹅掌柴(云南植物志)

**Schefflera khasiana** (C. B. Clarke) Vig.——*Heptapleurum khasianum* C. B. Clarke

生于海拔800—1 500米的山坡林中。分布于云南南部盈江。

茎皮、叶(龙爪树)：微甘、苦、温。祛风除湿，止痛。用于跌打损伤，风湿关节痛，胃痛，感冒，湿疹。

**白花鹅掌柴**　广西鹅掌柴、七叶莲、七多(广西)

**Schefflera leucantha** Vig.——*S. kwangsiensis* Merr. ex Li; *S. yunnanensis* Li

生于海拔1 200—1 700米的沟谷常绿阔叶林中。分布于广西、云南，广东有栽培。

全株：苦、甘，温。祛风止痛，舒筋活络。　茎：用于跌打损伤，风湿关节痛，胃痛　叶：用于创伤出血。

附　注：孕妇忌服。

**龙州鹅掌柴**　大叶鸭掌柴(广西)

**Scheffera lociana** Grushv et N. Shv. **var. megaphylla** Shang

生于山坡密林中或石缝间。分布于广西龙州。

叶：接骨。用于骨折，跌打损伤。

**星毛鹅掌柴**　七加皮、鸭麻木(广西)，通脱木(云南)，星毛鸭脚木(中国高等植物图鉴)

**Schefflera minutistellata** Merr. ex Li

生于海拔1 800米以下的山坡疏林或灌丛中。分布于江西、福建、湖南、广东、广西、贵州、云南。

根皮、茎、叶：甘、苦，温。祛风除湿，利水消肿，活血止痛。用于风湿关节痛，跌打损伤，胃痛。

**鹅掌柴**　公母树(福建),鸭母树(台湾),五指通、伞托树、鸭脚板(广西、云南)

**Schefflera octophylla** (Lour.) Harms——*Aralia octophylla* Lour.

生于海拔 2 100 米以下的山坡常绿阔叶林中。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、贵州、云南、西藏。

根、根皮、叶(鸭脚木): 苦,凉。清热解毒,止痒,散瘀消肿。　根、根皮: 用于感冒发热,咽喉肿痛,风湿骨痛,跌打损伤。　叶: 外用于过敏性皮炎,湿疹。

**小叶鹅掌柴**　小豆豉秆、伞把木(广西)

**Schefflera parvifoliolata** Tseng et Hoo

生于海拔 1 900—2 600 米的山坡林中。分布于贵州、云南。

根皮: 舒筋活络,消肿止痛。用于风湿关节痛,骨折。

**樟叶鹅掌柴**　火柴木(广西)

**Schefflera pes-avis** Vig.——*S. cinnamomifoliolata* Shang

生于海拔 600—800 米的山谷、山坡密林及阳坡疏林中。分布于广西南部的龙州、靖西。

叶: 用于跌打肿痛。

**红花鹅掌柴**　七叶莲、五加风、五加皮(云南)

**Schefflera rubriflora** Tseng et Hoo

生于海拔 900 米以下的山谷常绿阔叶林中。分布于云南。

全株: 舒筋活络,消肿止痛。用于骨折,外伤痛,风湿骨痛。

**密脉鹅掌柴**　七叶莲(广东、广西),七叶藤、汉桃叶、狗脚蹄、五梨风(全国中草药汇编)

**Schefflera venulosa** (Wight et Arn.) Harms——*Paratropia venulosa* Wight et Arn.; *S. fukienensis* Merr.

生于海拔 900—2 100 米的较湿润的山坡林中。分布于东南至西南。

茎、叶: 苦、甘,温。止痛,散瘀消肿。茎: 用于跌打损伤,风湿关节痛,胃痛。　叶: 外用于外伤出血。

## 通脱木属　Tetrapanax K. Koch

**通脱木**　大通草(陕西),花草、通草(台湾),天麻子,白龙须(云南)

**Tetrapanax papyriferus** (Hook.) K. Koch——*Aralia ? papyrifera* Hook.

生于低山坡及沟谷两岸或栽培。分布于中南、西南及陕西。

茎髓(通草): 甘、淡,微寒。清热利尿,通乳。用于水肿,小便淋痛,尿急,乳汁较少或不下。

附　注: ①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②我国特有属。

## 刺通草属(广叶参属)　Trevesia Vis.

**刺通草**　脱萝(广西),梳树(植物学名词),广叶参(中国种子植物科属辞典)

**Trevesia palmata** (Roxb.) Vis.——*Gastonia palmata* Roxb.

生于海拔1 000—2 000米的山坡林中。分布于广西、贵州、云南。

叶：用于跌打损伤。　茎髓：云南作通草入药。

附　注：功效相同的有**棱果刺通草 T. palmata** (Roxb.) Vis. **var. costata** Li，分布于云南。

## 多蕊属　Tupidanthus Hook. f. et Thoms.

**多蕊木**　　大七叶莲(云南)，脱辟木(植物学名词)

**Tupidanthus calyptratus** Hook. f. et Thoms.

生于海拔1 600米以下的山林中。分布于贵州、云南。

茎、叶(龙爪叶)：苦，温。舒筋活络，散瘀止痛，行气除湿。用于跌打损伤，骨折，风湿骨痛，肝炎，感冒。

# 136. 伞形科　Umbelliferae

## 羊角芹属　Aegopodium L.

**东北羊角芹**

**Aegopodium alpestre** Ledeb.

生于杂木林下或林缘、草甸、溪流旁、山坡草地。分布于东北及河北、山西、陕西、甘肃、新疆、湖北。

根(小叶芹)：镇痛。用于风湿骨痛。　全草：用于眩晕。

**巴东羊角芹**

**Aegopodium henryi** Diels

生于海拔500—1 650米的山坡草地、河边、路旁。分布于陕西、甘肃、湖北、四川。

全草：用于头痛。

## 蒔萝属　Anethum L.

**蒔萝**　　洋茴香(黑龙江)

**Anethum graveolens** L.

原产欧洲南部。我国东北、天津、陕西、甘肃、安徽、浙江、湖北、广东、广西、四川、云南有栽培。

果实(蒔萝)：辛，温。温脾肾，醒胃，散寒，行气，解毒。用于脘腹气胀，两胁痞满，食欲不振。　根、叶：化痰止咳，止呕。

## 当归属　Angelica L.

**东当归**

**Angelica acutiloba** (Sieb. et Zucc.) Kitag.——*Ligusticum acutilobum* Sieb. et Zucc.

原产日本。吉林省延边朝鲜族自治州有栽培。

根(延边当归)：甘、辛，温。调经，止痛，润燥。用于月经不调，痛经，腰痛，崩漏。

**黑龙江当归**　叉子芹(辽宁)，阿穆尔独活(吉林)，朝鲜白芷(长白山植物志)

**Angelica amurensis** Schischk.

生于山顶草地、山坡林缘、湿草甸及林间路旁。分布于东北及内蒙古。

根：祛风燥湿，消肿止痛。用于身痛，疮疡肿痛。

**库页当归**　香大活(黑龙江)，狭叶当归(长白山植物药志)

**Angelica anomala** Lallem.——*A. jaluana* Nakai

生于山谷湿地、林缘溪旁、林间路边及石砾质河边。分布于东北及内蒙古。

根：辛，温。解表，祛风，止痛，活血。用于感冒，头痛，牙痛，痈肿。

附　注：黑龙江依兰以本种的根作独活入药，称香大活。

**骨缘当归**　对芹(辽宁)

**Argelica cartilagino-marginata** (Makino) Nakai var. **foliosa** Yuan et Shan

生于林下草地。分布于东北及内蒙古、山东、江苏、安徽、湖北。

根及全草：辛，温。祛风除湿。用于头痛，腹痛。

**青海当归**　独活(青海)，麻母(四川)

**Angelica chinghaiensis** Shan

生于山坡、石缝。分布于甘肃南部、青海东南部、四川北部。

根：甘、辛，温。补血活血，润燥滑肠。花：用于头痛。

**白芷**　兴安白芷、大活(长白山植物药志)

**Angelica dahurica** (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. cv. **Qibaizhi**

生于林间草地、林缘、灌丛湿润地。分布于东北、华北。北方省区多有栽培。

根[(白芷)祁白芷、禹白芷、会白芷]：辛，温。散风除湿，通窍止痛，消肿排脓。用于感冒头痛，眉棱骨痛，鼻塞，鼻渊，牙痛，带下病，疮疡肿痛。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**杭白芷**

**Angelica dahurica** (Fisch. ex Hoffm.) Benth. ex Hook. cv. **Hangbaizhi**——*A. dahurica* (Fisch. ex Hoffm.) Benth. ex Hook. var. *formosana* (Boiss.) Shan et Yuan; *A. formosana* Boiss.

福建、台湾有野生。浙江、四川及南方一些省区有栽培。

根(白芷)：辛，温。祛风，散寒，燥湿，消肿，排脓，止痛。用于感冒头痛，眉棱骨痛，鼻渊，牙痛，带下病，疮疡肿痛。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**紫花前胡**

**Angelica decursiva** (Miq.) Franch. et Sav.——*Porphyroscias decursiva* Miq.; *Peucedanum decursivum* (Miq.) Maxim.

生于山坡路旁或林缘。分布于华东、中南及吉林、辽宁、陕西、四川。

根(前胡)：苦、辛，凉。清热，散风，降气，化痰。用于风热咳嗽痰多，痰热喘满，咯痰黄稠。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②功效相同的有鸭巴前胡 **A. decursiva** (Miq.) Franch. et Sav. f. **albiflora** (Maxim.) Nakai，分布于东北。

**大当归**　朝鲜当归(长白山植物药志)

**Angelica gigans** Nakai

生于林内溪流旁、林缘草地及林间路边，常成群落状态生长。分布于东北及台湾。

根(东北土当归)：甘、辛，温。祛风，活血，调经，润燥。用于关节肿痛，闪挫疼痛，月经不调，经闭，腹痛，风湿痹痛，痈疽疮毒，血虚肠燥。

**疏叶当归**　臊羌、臭羌、山芹菜(陕西)

**Angelica laxifoliata** Diels——*A. erythrocarpa* Wolff

生于山坡、林缘阴湿灌丛下。分布于陕西、甘肃南部、湖北、四川。

根：辛、苦，温。祛风燥湿，散寒止痛。用于风湿痛，腰膝酸痛，痈疮肿痛。

**福参**　福参当归(拉汉英种子植物名称)

**Angelica morii** Hayata

生于山坡草地及林缘。分布于浙江、福建、台湾、云南。

根(建参)：辛、甘，温。补中，益气。用于脾虚泄泻，虚寒咳嗽，蛇咬伤。

**峨眉当归**　山芹菜(四川)

**Angelica omeiensis** Shan et Yuan

生于海拔2 000米左右的山坡林下或林缘疏灌丛中。分布于四川西部。

根：民间用根煮鸡蛋食，用于妇女难产。

附　注：四川特有药用植物。

**牡丹叶当归**

**Angelica paeoniaefolia** Shan et Yuan

生于海拔3 800—4 000米的山坡林缘、河滩草丛及石砾地。分布于西藏。

根：补血，活血，润燥。

附　注：西藏特有药用植物。

**拐芹**　山菜菜(辽宁、山东)

**Angelica polymorpha** Maxim.

生于山区林缘溪沟旁。分布于东北及河北、陕西南部、山东、江苏、浙江、湖北、四川。

根：辛，温。祛风散寒，散湿，消肿，排脓，止痛。

**紫茎独活**　雾灵独活(河北)

**Angelica porphyrocaulis** Nakai et Kitag.

生于山地河谷、山坡草丛及阴湿林下。分布于辽宁、河北、山西、陕西、宁夏。

根：苦，温。镇痉，镇痛。用于感冒头痛，骨节痛，风湿痛。

**毛当归**　香独活(浙江)，野独活(湖北)，毛独活(广西)

**Angelica pubescens** Maxim.

生于山谷、沟边、林缘、草丛中。分布于安徽、浙江、江西、湖北、广西。

根(独活)：辛、苦，微温。祛风除湿，通痹止痛。用于风寒湿痹，风寒头痛，手足挛痛，

腰膝酸痛。

**重齿毛当归**

**Angelica pubescens** Maxim. f. **biserrata** Shan et Yuan

生于山坡林下或林缘草丛中。分布于陕西、湖北、四川、贵州。其他省区有栽培。

根(独活)：辛、苦，微温。祛风除湿，通痹止痛。用于风寒湿痹，腰膝痛，少阴，头痛。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**林当归**　　阿克尔克尔哈(维吾尔语)，新疆羌活(新疆)

**Angelica silvestris** L.

生于山谷林下、灌丛或河边。分布于新疆伊犁，昌吉地区。

根(新疆羌活)：辛，温。发汗解表，祛风除湿。用于周身酸痛，感冒发热，风湿关节痛。

**当归**　　秦归(陕西)，岷归(甘肃)，云归(云南)

**Angelica sinensis** (Oliv.) Diels——*A. polymorpha* Maxim. var. *sinensis* Oliv.

生于海拔 2 500—3 000 米的杂木林下阴湿地。分布于甘肃东南部，以岷县产量多，质量好；其次为陕西、湖北、四川、云南，均为栽培。根(当归)：甘、辛，温。补血活血，调经止痛，润肠通便。用于经闭，痛经，血虚萎黄，眩晕心悸，虚寒腹痛，风湿痹痛，肠燥便秘，跌打损伤，痈疽疮疡。

附注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。② 陕西秦岭地区民间医生将该地产的**秦岭当归 A.tsinlingensis** K. T. Fu 的根作当归使用。

**金山当归**　　乌当归、差风(四川)

**Angelica valida** Diels

生于山坡林缘或岩石旁，分布于四川南川、武隆。

根：民间代当归入药。用于月经不调，崩漏，血虚体弱。

## 峨参属　Anthriscus (Pers.) Hoffm.

**刺果峨参**　　胡萝卜缨子(长白山植物药志)

**Anthriscus nemorosa** (M. Bieb.) Spreng——*Chaerophyllum nemorosum* M. Bieb.; *A. aemula* (Woron.) Schischk.

生于海拔 1 600—3 800 米的山坡草丛及林下。分布于东北及河北、内蒙古、陕西、甘肃、新疆、四川、云南、西藏。

根、叶：甘、辛、微苦，微温。补中益气，祛瘀生新。用于跌打损伤，腰痛，肺虚咳嗽，水肿。

**峨参**　　见肿消(陕西)，萝卜七(湖北)，土田七(四川)

**Anthriscus sylvestris** (L.) Hoffm.——*Chaerophyllum sylvestre* L.

生于海拔 4 500 米以下的山坡林下、路旁及山谷溪沟边。分布于华北、西北、华东、西南及辽宁、河南、湖北。

根(峨参)：甘、辛，微温。补中益气，祛瘀生新。用于肺虚咳嗽，咳嗽咯血，脾虚腹胀四肢无力，老年尿频，跌打损伤，腰痛，水肿。

## 芹属　Apium L.

**旱芹**　　药芹(江苏)，芹菜(名医别录)

**Apium graveolens** L.

全国各省区均有栽培。供蔬菜食用。

全草：甘，平。祛风利湿，平肝，清热。用于头晕脑胀，小便淋痛，尿血，崩中带下。

## 古当归属　Archangelica Hoffm.

**短茎古当归**　　短茎独活(全国中草药汇编)

**Archangelica brevicaulis** (Rupr.)Rchb.——*Angelocarpa brevicaulis* Rupr.; *Angelica brevicaulis* (Rupr.) Fedtsch.

生于海拔 2400 米以上的山区森林河谷、林缘湿地。分布于新疆天山。

根：辛，温。祛风除湿，止痛。用于风湿关节痛，腰、足冷痛，牙痛。

**下延古当归**　　走马芹(内蒙古)

**Archangelica decurrens** Lédeb.

生于山地沟谷、林下、林缘、沟边灌丛或草丛中。分布于内蒙古、新疆阿尔泰山。

根：用于白癜风。

## 柴胡属　Bupleurum L.

**金黄柴胡**　　贯叶柴胡、穿叶柴胡

**Bupleurum aureum** Fisch.——*B. longifolium* var. *aureum* (Fisch.) Wolff

生于海拔 1 400—1 900 米的山坡林缘、灌木林中、林间草地或河岸边。分布于甘肃临潭、新疆天山及阿勒泰山区。

根及全草：功效见北柴胡。

附注：新疆、甘肃产区作柴胡入药。

**锥叶柴胡**　　红柴胡(陕西)

**Bupleurum bicaule** Helm.——*B. falcatum* L. var. *bicaule* Wolff

生于海拔 650—1 550 米的山坡向阳草原和干旱多砾石的草地。分布于华北及黑龙江、陕西、宁夏。

根及全草(柴胡)：功效见北柴胡。

附　注：陕西北部及内蒙古(伊克昭盟)以根作红柴胡入药。

**川滇柴胡**　　飘带草(昆明)

**Bupleurum candollei** Wall. ex DC.

生于 1 900—2 900 米的山坡草地或疏林下。分布于四川、云南。

全草：苦、辛，平。解毒消肿，祛风止痒。用于疮毒疖肿。

**柴首**

**Bupleurum chaishou** Shan et Sheh

生于海拔 2 100—2 700 米的向阳山坡矮灌丛中。分布于四川阿坝自治州。

根及根颈部(柴首)：功效见北柴胡。

附　注：①根在产地(茂汶)称柴首，为传统习用药材，多自产自销。②四川特有药用植物。

**北柴胡**　　硬苗柴胡、韭叶柴胡

**Bupleurum chinense** DC.

生于向阳山坡路边或草丛中。分布于东北、华北、西北、华东及河南、湖北、湖南，亦有栽培.

根及地上部分(柴胡)：苦，凉。疏风退热，舒肝，升阳。用于感冒发热，寒热往来，疟疾，胸胁胀痛，月经不调，脱肛，阴挺。

附注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②功效相同的有**线叶柴胡 B. angustissimum** (Franch.) Kitag.，分布于华北及陕西、甘肃、青海、宁夏；**多伞北柴胡 B. chinense** DC. f. **chilioscladium,** (Wolff) Shan et Y. Li，分布于河北，陕西，安徽等地；**北京柴胡 B.chinense** DC. f. **pekinense** (Franch.) Shan et Y. Li，分布于北京、河北、山西、陕西；烟台柴胡 **B. chinense** DC. f. **vanheurckii** (Muell.-Arg.) Shan et Li，分布于吉林、辽宁、山西、山东等省；**百花山柴胡 B. chinense** DC. f. **octoradiata** (Bunge) Shan et Sheh，分布于吉林、河北、山西、宁夏。

**紫花鸭跖柴胡**　　小柴胡、宽苞柴胡(四川)

**Bupleurum commelynoideum** de Boiss.

生于海拔 3 000—4 320 米的山顶或高山草地及山坡草丛中。分布于四川、云南、西藏。

根(柴胡)：功效见北柴胡。

附　注：在甘肃、宁夏作柴胡的有**黄花鸭跖柴胡 B. commelynoideum** de Boiss. var. **flaviflorum** Shan et Y. Li，分布于甘肃、青海、宁夏、四川、西藏。

**簇生柴胡**

**Bupleurum condensatum** Shan et Y. Li

生于海拔 3 000—3 700 米的向阳山坡、荒地或河滩。分布于青海。

根(柴胡)：功效见北柴胡。

附注：青海特有药用植物。

**密花柴胡**

**Bupleurum densiflorum** Rupr.

生于海拔 2 500—3 100 米的高山草甸、斜坡石砾土中。分布于青海、新疆。

根(柴胡)：功效见北柴胡。

附　注：新疆乌鲁木齐作柴胡入药。

**太白柴胡**

**Bupleurum dielsianum** Wolff

生于海拔 1 600—2 700 米的山坡林缘或路旁草丛中。分布于陕西太白山。

根(柴胡)：功效见北柴胡。

附注：①在民间应用和收购的药材中，亦有将本种作柴胡使用。②陕西特有药用植物。

**新疆柴胡**

**Bupleurum exaltatum** Marsch.-Bieb.

生于海拔 1 500 米的山坡林缘、石砾及浅土层的土坡上。分布于新疆乌鲁木齐及伊犁、塔城、阿勒泰。

根(柴胡)：功效见北柴胡。

附　注：新疆特有药用植物。

**长白柴胡**

**Bupleurum komarovianum** Lincz.——*B. chinense* DC. var. *komarovianum* (Lincz.) Liou et Huang

生于海拔 230 米左右的阔叶林或灌丛边缘、疏散的柞林山坡、草地及石砾质土壤中。分布于东北。

根(柴胡)：解热，调经。用于感冒，疟疾，月经不调。

附　注：东北地区用根作柴胡入药。

**贵州柴胡**

**Bupleurum kweichowense** Shan

生于海拔 2 100 米左右的山坡草地及多岩石山坡地。分布于贵州。

全草(柴胡)：苦，凉。疏肝解热。

附　注：贵州特有药用植物。

**空心柴胡**

**Bupleurum longicaule** Wall. ex DC var. **franchetii** de Boiss.

生于海拔 1 400—4 000 米的山坡草地。分布于西南及陕西、甘肃、宁夏、湖北。

根(柴胡)：功效见北柴胡。

附　注：四川、贵州有些地区以地上部分收购作柴胡入药。

**秦岭柴胡**

**Bupleurum longicaule** Wall. ex DC. var. **giraldii** Wolff

生于海拔 2 800—3 300 米的山坡草丛中。分布于山西、陕西、甘肃、宁夏、青海。

全草：发表祛风，清肝利胆。用于感冒，虚劳骨蒸，月经不调，肝气不舒，消渴。

**竖挺柴胡**

**Bupleurum longicaule** Wall. ex DC. var. **strictum** C. B. Clarke

生于海拔 1 400—3 500 米的山坡草地。分布于青海、湖北、四川。

根：苦，凉。解表和里，疏肝解郁，升阳。用于感冒发烧，月经不调，胸胁胀痛，疟疾。

**大叶柴胡**

**Bupleurum longiradiatum** Turcz.

生于山坡草地、林缘灌丛下。分布于东北及内蒙古、甘肃。

根状茎(柴胡)：功效见北柴胡。

附　注：东北地区以此作柴胡入药。有强烈的呕吐作用，不宜作柴胡使用。

**短伞大叶柴胡**

**Bupleurum longiradiatum** Turcz. var. **breviradiatum** Fr. Schmidt——*B. sachalinense* Fr. Schmidt

生于山坡草丛、林缘灌丛下。分布于黑龙江、辽宁

根状茎(柴胡)：功效见北柴胡。

附　注：辽宁庄河地区用本种的根状茎作柴胡入药。

**紫花大叶柴胡**

**Bupleurum longiradiatum** Turcz. var. **porphyranthum** Shan et Y. Li——*B longiradiatum* Turcz. var. *genuinum* Wolff

生于海拔 800—1 500 米的山坡林下、山沟阴湿地及阴地草坡。分布于陕西、甘肃、宁夏、河南、湖北、四川。

根状茎(柴胡)：功效见北柴胡。

附　注：宁夏多自销或外销。

**马尔康柴胡**

**Bupleurum malconense** Shan et Y. Li

生于海拔 2 040—2 950 米的山坡草地、灌木林缘、河边及田边。分布于甘肃、青海、四川、西藏。

全草(马尾柴胡)：功效见北柴胡。

附　注：在四川产地收购多自销。

**竹叶柴胡**　　紫柴胡(湖北)，竹叶防风(云南)

**Bupleurum marginatum** Wall. ex DC.——*B. falcatum* L. subsp. *marginatum* (Wall.) Wolff

生于海拔 750—2 300 米的林下或山坡草地。分布于中南、西南及山西、陕西、宁夏、江西。

全草、根(竹叶柴胡)：功效见北柴胡。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版附录收载。

**窄竹叶柴胡**

**Bupleurum marginatum** Wall. ex DC. var. **stenophyllum** (Wolff) Shan et Y. Li——*B. falcatum* L. var. *stenophyllum* Wolff

生于海拔 2 700—4 000 米的高山地区林下、山坡、沟边或路旁。分布于西南及陕西、宁夏、湖北。

全草、根(竹叶柴胡)：功效见北柴胡。

**马尾柴胡**　　线柴胡、竹叶柴胡(四川)

**Bupleurum microcephalum** Diels

生于海拔 1 400—3 200 米的开旷山坡、或旁或灌丛下。分布于甘肃、青海、四川、云南、西藏。

全草(马尾柴胡)：功效见北柴胡。

附　注：四川(茂县、汶川、黑水)用全草入药，称马尾柴胡。

**细茎有柄柴胡**

**Bupleurum petiolulatum** Franch. var. **tenerum** Shan et Y. Li

生于海拔 2 800—3 850 米的山坡栎类林下。分布于青海、四川、西藏。

根(柴胡)：功效见北柴胡。

**短茎柴胡**

**Bupleurum pusillum** Krylov

生于海拔 2 300—3 500 米的干旱山坡草地及石砾堆或灌丛下。分布于内蒙古、宁夏、青海、新疆。

根(柴胡)：功效见北柴胡。

**丽江柴胡**

**Bupleurum rockii** Wolff

生于海拔 1 950—4 200 米的山坡草地或疏林下。分布于四川、云南、西藏

根(柴胡)：功效见北柴胡。

**红柴胡**　香柴胡(东北)，韭叶柴胡(江苏、安徽)

**Bupleurum scorzonerifolium** Willd.

生于海拔 160—2 250 米的干燥草原、山坡灌缘。分布于东北、华北、华东及陕西、甘肃、宁夏、青海、河南、湖北、广西、贵州。

根(柴胡)：苦，凉。疏风退热，舒肝，升阳。用于感冒发热，寒热往来，疟疾，胸胁胀痛，月经不调。

附　注：①功效相同的有**长伞红柴胡 B. scorzonerifolium** Willd.f. **longiradiarum** Shan et Y. Li，分布于辽宁、河北、青海；**少花红柴胡 B. scorzonerifolium** Willd. f.**pauciflorum** Shan et Y. Li，分布于江苏。②红柴胡为《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**兴安柴胡**

**Bupleurum sibiricum** Vest——*B.dauricum* Fisch. et Mey.

生于海拔 300—800 米的山地草原。分布于东北和内蒙古。

根(柴胡)：功效见北柴胡。

**黑柴胡**

**Bupleurum smithii** Wolff

生于海拔 1 400—3 400 米的山坡草地、山谷及山顶阴处。分布于华北及陕西、甘肃、宁夏、青海、河南。

根(柴胡)：苦，微寒。解表，舒肝，镇痛。用于感冒发热。

附　注：功效相似的有**黑耳叶柴胡 B. smithii** Wolff var. **auriculatum** Shan et Y. Li，分布于山西；**小叶黑柴胡 B. smithii** Wolff var. **parvifolium** Shan et Y. Li，分布于山西、内蒙古、陕西、甘肃、宁夏、青海。

**小柴胡**

**Buleurum tenue** Buch.-Ham. ex D. Don

生于海拔 600—2 900 米(以 1 500 米以上最多)的山坡草丛或干燥沙地瘠土中。分布于西南及湖北、广西。

全草(柴胡)：苦，凉。解表和里，退热，升阳，解郁。

**天山柴胡**

**Bupleurum tianschanicum** Freyn

生于海拔 1 700—2 000 米的草坡或石砾堆中。分布于新疆天山。

根、全草(柴胡)：功效见北柴胡。

附　注：阿克苏、温宿等地用全草作柴胡入药。

**三辐柴胡**

**Bupleurum triradiatum** Adams ex Hoffm.

生于海拔 2 350—4 900 米的草甸、山坡阳处或石缝中。分布于青海、新疆、四川西北部及西藏。

根(柴胡)：甘，凉。疏肝解郁，解热镇痛。

**汶川柴胡**

**Bupleurum wenchuanense** Shan et Y. Li

生于山坡草丛中。分布于四川汶川。

全草(柴胡)：功效见北柴胡。

附　注：①四川茂县、汶川、黑水、马尔康以全草入药。称马尾柴胡。②四川特有药用植物。

**银州柴胡**　　软柴胡、红柴胡(陕西)

**Bupleurum yinchowense** Shan et Y. Li

生于海拔 500—1 900 米的干燥山坡草地及多沙地带。分布于内蒙古、陕西、甘肃、宁夏。

根(柴胡)：功效见北柴胡。

附　注：本种在陕西称红柴胡或软柴胡，认为是柴胡中质量最佳品种。

**云南柴胡**　　竹柴胡、飘带草(滇南本草)

**Bupleurum yunnanense** Franch.

生于海拔 2 500—3 800 米的山坡草丛中。分布于云南西北部。

全草(柴胡)：苦，凉。解表，发汗。用于寒热往来，胸胁痛，月经不调。

附　注：云南特有药用植物。

## 山茴香属　Carlesia Dunn

**山茴香**　　岩茴香(山东)

**Carlesia sinense** Dunn

生于海拔 300—950 米的山峰石隙中。分布于辽宁、山东。

根(山茴香)：甘，温。温中散寒，驱风下气，活血镇痛，健胃止痢。用于脘腹胀满，痢疾。

## 葛缕子属　Carum L.

**田葛缕子**　　抽麻苔(陕西)

**Carum buriaticum** Turcz.

生于田间、路旁、堤岸、林下及山地草丛中。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、青海、四川、西藏。

根、果实(田蒿芹)：甘、辛，温。驱风，行气散寒，消食健胃，镇吐，驱虫。

**葛缕子**　　小防风(甘肃)，防风(青海)，郭乌(西藏)

**Carum carvi** L.

生于高山草甸、林下、路旁、草地或河滩草丛中。分布于东北、华北、西北及四川西部、西藏。

果实、根(藏茴香)：微辛、温。驱风理气，芳香健胃。用于胃痛，腹痛，疝气。　根：辛、甘，微温。除湿止痛，祛风发表。用于风湿关节痛，感冒，头痛，寒热无汗。

## 积雪草属　Centella L.

**积雪草**　　落得打(江苏)，老公根(广东)，崩大碗(广西)，地细辛(四川)

**Centella asiatica** (L.) Urban——*Hydrocotyle asiatica* L.

生于海拔200—1 900米的阴湿草地或溪沟旁。分布于华东、中南、西南及陕西。

全草(积雪草)：苦、辛，寒。清热利湿，解毒消肿。用于湿热黄疸，中暑腹泻，砂淋血淋，痈肿疮毒，跌打损伤。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

## 矮泽芹属　Chamaesium Wolff

**矮泽芹**

**Chamaesium paradoxum** Wolft

生于海拔340—4 800米的山坡湿草地。分布于青海、四川、云南。

全草：消肿，止痛。

## 明党参属　Changium Volff

**明党参**　　山萝卜(浙江)，山花(江苏)，粉沙参(中药志)

**Changium smyrnioides** Wolff

生于山坡林下土层肥厚处、竹林下及岩石缝隙中。分布于江苏、上海、安徽、浙江、江西、河南南部、湖北东部。

根(明党参)：甘、微苦，凉。润肺化痰，养阴和胃，平肝，解毒。用于肺热咳嗽，呕吐反胃，食少口干，目赤眩晕，疔毒疮疡。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

## 川明参属　Chuanminshen Sheh et Shan

**川明参**　　明沙参，明参(四川)

**Chuanminshen violaceum** Sheh et Shan

生于山坡林下、路边或岩石旁及石缝中。分布于湖北西部、湖南部分地区、四川、贵州部分地区。四川多为栽培。

根(川明参)：甘，平，微温。用于肺热咳嗽，热病伤阴。

附　注：①过去文献中均作明党参加以记载，属错误鉴定，应予纠正。②我国特有属。

## 毒芹属　Cicuta L.

**毒芹**　走马芹(东北)，野胡萝卜(新疆)，芹叶钩吻(金匮要略)

**Cicuta virosa** L

生于海拔400—2 900米杂木林下、湿地或水沟边。分布于东北及河北、北京、内蒙古、陕西、甘肃、宁夏、新疆、四川。

根状茎(毒芹)：辛、甘，温。有大毒。拔毒、散瘀。外用于附骨疽。

附　注：**宽叶毒芹 C. virosa** L. var. **latisecta** Celak.，分布于吉林、江苏。在江苏栽培历史悠久，其果实称兴化蔚萝，为牲畜的肥膘饲料，亦用于调香剂。江苏已作为资源开发项目，作进一步研究。

## 蛇床属　Cnidium Cuss.

**蛇床**

**Cnidium monnieri** (L.) Cuss.——*Selinum monnieri* L.

生于田边、路旁、草地及河边湿地。分布于东北、华北、西北、华东、中南、西南。

果实(蛇床子)：辛、苦，温。有小毒。温肾壮阳，燥湿，祛风杀虫。用于阳痿，胞宫虚冷，寒湿带下，湿痺腰痛；外用于外阴湿疹，妇女阴痒。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②功效相同的有**兴安蛇床 C. dahuricum** (Jacq.) Turcz. ex Fisch. et Mey.，分布于黑龙江、吉林、河北、内蒙古。

## 高山芹属　Coelopleurum Ledeb.

**高山芹**

**Coelopleurum saxatile** (Turcz.) Drude——*Angelica saxatile* Turcz.; *C. alpium* Kitag.

生于高山阔叶林下阴湿处。分布于吉林东部长白山区。

根：民间用于健胃。

## 山芎属　Conioselinum Fisch. ex Hoffm.

**鞘山芎**

**Conioselinum vaginatum** (Spreng.) Thell.——*Ligusticum vaginatum* Spreng.

生于山坡草丛、林缘、河谷地。分布于新疆北部山区。

根状茎(新疆药本)：辛，温。散风寒，燥湿，止痛。用于风寒感冒，偏头痛，腹痛，胃痉挛，粉刺。

## 毒参属 Conium L.

**毒参**

**Conium maculatum** L.

生于林缘和农田边。分布于新疆。

根：民间用于镇痛，镇痉，癌病，子宫纤维瘤。

附　注：①本植物根有毒，慎用。②新疆特有药用植物。

## 芫荽属 Coriandrum L.

**芫荽**　香菜(通称)

**Coriandrum sativum** L.

原产欧洲地中海地区。全国各地均有栽培。

全草、果实(胡荽)：辛，温。发汗透疹，消食下气。用于麻疹透发不快，食积。果实：辛、酸，平。散风寒，透疹，健胃。用于痘疹透发不畅，饮食乏味，痢疾，痔疮。

## 鸭儿芹属 Cryptotaenia DC.

**鸭儿芹**

**Cryptotaenia japonica** Hassk.

生于海拔200—2400米的山地、山沟及林下阴湿地。分布于长江流域以南各省区及河北、山西、陕西、甘肃、台湾。

全草(鸭儿芹)：辛、苦，平。消炎清热，解毒，活血消肿。用于肺热咳喘，肺痈，淋证，疝气，风火牙痛，痈疽疔肿，缠腰火丹，皮肤瘙痒。果实：辛，温。消积顺气。用于消化不良。根：辛，温。发表散寒，止咳化痰。用于风寒感冒，呛咳，跌打损伤。

附　注：功效相同的有**深裂鸭儿芹，C. japonica** Hassk. f. **dissecta** (Yabe) Hara，分布于陕西、江西、湖北、湖南、广西、四川。

## 孜然芹属 Cuminum L.

**孜然芹**

**Cuminum cyminum** L.

原产埃及、埃塞俄比亚。新疆有栽培。

果实(孜然)：辛，温。祛寒止痛，理气和胃。用于胃寒痛，消化不良。

附　注：民间将果实研末，用作食品调味料。

## 胡萝卜属　Daucus L.

**野胡萝卜**

**Daucus carota** L.

生于田边、路旁、荒野草地。分布于全国各省区。

果实(南鹤虱)：辛，平。有小毒。杀虫消积。用于蛔虫病，蛲虫病，虫积腹痛，小儿疳积。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**胡萝卜**

**Daucus carota** L. var. **sativa** DC.

全国各地作蔬菜栽培食用。

根：甘，平。健胃，化滞。用于消化不良，咳嗽，久痢。果实：用于久痢，咳喘，时痢。

## 马蹄芹属　Dickinsia Franch.

**马蹄芹**　　山荷叶、双叉草(四川)

**Dickinsia hydrocotyloides** Franch.

生于海拔 1 500—3 200 米的阴湿林下或水沟边。分布于湖北、四川、贵州、云南。

全草：清热解毒。用于头痛。

## 刺芹属　Eryngium L.

**刺芹**　　香信、野芫荽(广东)，刺芫荽(广西)，阿瓦芫荽(云南)

**Eryngium foetidum** L.

生于海拔 100—1 540 米的丘陵、山地林下、沟边、路旁等阴湿处。分布于广东、广西、贵州、云南。

全草：辛，温。疏风清热，行气消肿，健胃，止痛。用于感冒，胸脘痛，泄泻，消化不良；外用于蛇咬伤，跌打肿痛。

**扁叶刺芹**

**Eryngium planum** L.

生于杂草地带和沙丘。分布于新疆北部。

全草：祛痰止咳。用于咳嗽。

## 阿魏属　Ferula L.

**硬阿魏**　　沙茴香、沙前胡(内蒙古)，沙椒(陕西)

**Ferula bungeana** Kitag.

生于沙地、固定沙丘和石质干山坡。分布于华北及黑龙江、辽宁、陕西、甘肃、宁夏、青

全草、根(沙茴香)：甘，平。清热解毒，消肿止痛。用于瘰疬，乳蛾，胸胁痛，脓疡。

**阜康阿魏**

**Ferula fukanensis** K. M. Shen

生于海拔约 700 米有粘质土的冲刷沟边。分布于新疆阜康。

树脂(阿魏)：苦、辛，温。消积，散痞，杀虫。用于肉食积滞，腹中痞块，虫积腹痛，瘀血症瘕。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②新疆特有药用植物。

**橄绿阿魏**　丽江万丈深(云南种子植物名录)

**Ferula olivacea** (Diels) Wolff ex Hand.-Mazz.——*Peucedanum olivaceum* Diels

生于峡谷石隙中。分布于云南丽江。

根(万丈深)：祛痰止咳，散寒发表，降气。

附　注：云南特有药用植物。

**新疆阿魏**

**Ferula sinkiangensis** K. M. Shen

生于海拔 800 米的荒漠中和带砾质粘土和石质干土坡上。分布于新疆伊宁。

树脂(阿魏)：苦、辛，温。杀虫，散痞，消积。用于虫积腹痛，腹中痞块，肉食积滞，瘀血癥瘕。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②所述各种均为新疆特有药用植物③功效相同，均分布于新疆的种类有**里海阿魏　F. caspica** Marsh.-Bieb.；**圆锥茎阿魏**；**F. conocaula** Korov.；**多伞阿魏**；**F. ferulaeoides** (Steud.) Korov.；**托里阿魏**；**F. krylovii** Korov.；**准噶尔阿魏**；**F. songorica** Pall. ex Spreng.；**臭阿魏　F. teterrima** Kar. et Kir.。

## 茴香属　Foeniculum Mill.

**茴香**

**Foeniculum vulgare** Mill.

原产地中海地区。全国各地田园栽培。

果实(小茴香)：辛，温。散寒止痛，理气和胃。用于寒疝腹痛，睾丸偏坠，痛经，少腹冷痛，脘腹胀痛，食少吐泻，水疝。　根：辛、甘，温。温肾和中，行气止痛。用于寒疝腹痛，风湿关节痛，胃寒腹痛。　茎、叶：甘、辛，温。祛风，顺气止痛。用于痧气，痈肿，疝气。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 北沙参属　Glehnia F. Schmidt

**珊瑚菜**

**Glehnia littoralis** (A. Gray) Fr. Schmidt ex Miq.——*Cymopteris littoralis*

A. Gray

生于海边沙滩或栽培。分布于辽宁、河北，山东、江苏、浙江、福建、台湾、广东。

根(北沙参)：甘、微苦，凉。养阴清肺，益胃生津。用于肺热燥咳，劳嗽痰血，热病津伤口渴。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 单球芹属　Haplosphaera Hand.-Mazz.

**单球芹**

**Haplosphaera phaea** Hand.-Mazz.

生于海拔 3 000—3 800 米的山坡林地。分布于四川、贵州、云南。

全草：发表散寒。

## 独活属　Heracleum L.

**渐尖叶独活**

**Heracleum acuminatum** Franch.

生于海拔 3 000—3 900 米的林间草地、林缘或溪谷旁。分布于四川、云南、西藏。

根(牛尾独活)：祛风除湿，活络止痛。

**法罗海**　红独活(四川)，法罗海(滇南本草)

**Heracleum apaensis**(Shan et Yuan) Shan et T.S.Wang——*Angelica apaensis* Shan et Yuan

生于海拔 3 000—4 000 米的山坡、沟边、林下和草丛中。分布于四川、云南、西藏。

根(法罗海)：辛、微温。宽胸理气，健胃，止痛。用于面寒，胃痛，胁痛。

**印度独活**　香白芷(云南)

**Heracleum barmanicum** Kurz.

生于海拔 600—3 200 米的山地、山岭、水沟旁。分布于广西、贵州、云南。

根：祛风除湿，止咳。用于腹痛，寒气痛。

**白亮独活**　骚独活(四川)，滇独活(云南)，朱噶尔(西藏)

**Heracleum candicans** Wall. ex DC.

生于海拔 2 000—4 200 米的山坡林下、路旁草地。分布于四川、云南、西藏。

根(白独活)：辛、苦，温。祛风除湿，止痛。用于风寒头痛，风湿关节痛。

**多裂独活**

**Heracleum dissectifolium** K. T. Fu

生于海拔 1 900—3 200 米的山谷灌丛下或山地草丛。分布于甘肃、四川。

全草：民间用于创伤及麻风病。

**兴安独活**

**Heracleum dissectum** Lédeb.

生于湿草地、草甸、山坡林下或林缘。分布于黑龙江、吉林、新疆。

根(牛防风): 辛、苦,温。发表,祛风,活血,排脓。

**独活**

**Heracleum hemsleyanum** Diels

生于山坡阴湿的林下或灌丛中。分布于湖北、四川。

根(牛尾独活): 辛、苦,微温。祛风止痛。用于风寒湿痺,腰膝酸痛,痈肿。

**思茅独活**　　缅瓜七、荷花七(云南)

**Heracleum henryi** Wolff

生于海拔 1 500—2 300 米的山坡林缘及草地。分布于云南思茅。

根(南瓜七): 辛,温。通经活络,镇痛散瘀。用于风湿痛,跌打损伤,痛经,月经不调。

附　注: 云南特有药用植物。

**裂叶独活**　　藏当归(西藏),千叶独活(秦岭植物志)

**Heracleum millefolium** Diels

生于海拔 3 850—5 000 米的山坡草地。分布于甘肃、青海、四川、西藏。

全草: 辛、甘,寒。止血。外用于创伤出血。

**短毛独活**　　老山芹(东北),小法罗海(四川),山毛羌(陕西)

**Heracleum moellendorffii** Hance——*H. morifolium* Wolff

生于向阳山坡林下或山沟旁、草甸、林缘。分布于东北、华北及陕西、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、四川、云南。

根(山独活): 辛、苦,微温。祛风除湿,发表散寒,止痛。用于风湿关节痛,伤风头痛,腰腿酸痛。

附　注: 功效相同的有**狭叶短毛独活 H. moellendorffii** Hance **var. subbipinnatum** (Franch.) Kitag. 分布于黑龙江、吉林。

**白云花**　　滇独活、毛爪参(云南),云南独活(植物名实图考)

**Heracleum rapula** Franch.

生于海拔 2 000—2 200 米的山坡、沟边或田埂。分布于云南、西藏。

根(白云花): 苦,温。祛风除湿,止咳平喘,止痛。用于风湿痛,风寒咳喘,脘腹痛。

**粗糙独活**　　野香芹,滇白芷(滇南本草),白芷(植物名实图考)

**Heracleum scabridum** Franch.

生于海拔 2 000 米以上的高山灌木林下草丛中。分布于四川、贵州、云南。

根(滇白芷): 辛、微甘,温。祛风除湿,止痛。用于风湿痹痛,胃寒痛,痈疮,带下病。

**椴叶独活**

**Heracleum tillifolium** Wolff

生于山坡向阳灌丛或溪沟林缘。分布于安徽、江西、湖南、贵州。

根: 用于感冒头痛。

**平截独活**

**Heracleum vicinum** de Boiss.

生于海拔 2 600—3 100 米的山坡林缘或灌丛中。分布于湖北、四川。

根: 祛风除湿,散寒止痛。

**永宁独活**

**Heracleum yungningense** Hand.-Mazz.

生于海拔高达 2 700 米的山坡灌木林下或溪谷草丛中。分布于湖北、四川、云南。

根：用于风寒湿痹，腰膝酸痛，四肢痉挛。

## 天胡荽属 Hydrocotyle L.

**中华天胡荽** 铜钱草、地弹花(四川)

**Hydrocotyle chinensis** (Dunn) Craib——*H. javanica* Thunb. var. *chinensis* Dunn ex Shan et S. L. Liou

生于海拔 1 060—2 900 米的河沟边及阴湿的路旁草地。分布于安徽、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

全草：辛、微苦，温。清热利湿，镇痛。用于小便淋痛，湿疹，腹痛。

**普渡天胡荽** 小红袍、五叶藤(四川)，地星(云南)

**Hydrocotyle handelii** Wolff

生于海拔高达 2 350 米的山坡、路旁、林缘、草地等潮湿处。分布于四川、云南。

全草：苦，平。有小毒。活血散瘀，祛风祛湿。用于跌打损伤，骨折，风湿麻木。

**红马蹄草** 红石胡荽(湖北)，大样驳骨草(广东)，铜钱草(四川)，闹鱼草(云南)

**Hydrocotyle nepalensis** Hook.

生于海拔 350—2 080 米的山坡、路旁、阴湿地和溪沟边草丛中。分布于中南、西南及陕西、安徽、浙江、江西、福建。

全草(红马蹄草)：辛、微苦，凉。活血止血，清肺止咳。用于感冒，咳嗽，跌打损伤，吐血；外用于痔疮及外伤出血。

**天胡荽** 遍地锦(福建)，满天星(湖北)，盆上芫荽(广西)，落地金钱(贵州)

**Hydrocotyle sibthorpioides** Lam.——*H. rotundifolia* Roxb.

生于海拔 100—3 000 米的湿润草地、林缘及溪沟边。分布于华东、中南、西南及陕西。

全草(天胡荽)：苦、辛，寒。清热利尿，解毒消肿。用于黄疸，痢疾，淋证，小便淋痛，目翳，喉肿，痈疽疔疮，跌打瘀肿。

**破铜钱** 满天星(陕西)，小叶铜钱草(安徽)，天星草(广西)

**Hydrocotyle sibthorpioides** Lam. var. **batrachium** (Hance) Hand.-Mazz ex Shan——*H.batrachium* Hance

生于 150—2 500 米的湿润草地、路旁、滩沟、溪谷及山地。分布于陕西、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川。

全草：清热利湿，祛痰止咳。用于黄疸，膨胀，胆结石，小便淋痛，感冒咳嗽，乳蛾，目翳。

**肾叶天胡荽** 透骨草、水雷公根，冰大海(广东)，山灯盏、鱼藤草(广西)

**Hydrocotyle wilfordi** Maxim.

生于海拔 350—1 400 米的阴湿山谷、田野、沟边、溪旁。分布于安徽、浙江、江西、福建、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草：清热利湿，排石，镇痛，解毒。用于小便淋痛，胃脘痛。

## 欧当归属　Levisticum Hill.

**欧当归**　保当归(通称)

**Levisticum officinalis** Koch

1957年自欧洲引种。现辽宁、河北、北京、内蒙古、山西、陕西、新疆、山东、江苏、河南均有栽培。

根：用于经闭，月经涩少，痛经。

## 岩风属　Libanotis Hill.

**岩风**　长春七、长虫七(陕西)

**Libanotis buchtormensis** (Fisch.) DC.——*Bubon buchtormensis* Fisch.; *Seseli buchtormensis* (Fisch.) Koch

生于海拔1 000—3 000米的向阳石质山坡、石隙、路边及河滩草地。分布于陕西、甘肃、宁夏、新疆，四川。

根(长虫七)：甘、辛，温。发表散寒，祛风活络，镇痛解毒。用于感冒风寒，风湿骨节关节肿痛，咳嗽，头痛，跌打损伤，麻木。

附　注：功效相同的有**灰毛岩风 L. spodotrichoma** K. T. Fu，分布于陕西、甘肃。

**密花岩风**　山胡萝卜(河北)，胡芹菜(山西)

**Libanotis condensata** (L.) Crantz——*Athamanta condensata* L.; *Seseli condensatum* (L.) Reichb. f.

生于海拔1 400—2 400米的山坡草地、路旁或林中。分布于华北及新疆阿尔泰山。

根：用于扩张冠状动脉，并有解痉作用。

**伊犁岩风**　克买克(维吾尔语)

**Libanotis iliensis** (Lipsky) Korov.——*Seseli iliense* (Regel et Schmalh.) Lipsky

生于海拔1 000米左右的砾石山坡、山沟或路旁。分布于新疆伊犁、乌鲁木齐等地。

根：辛、甘，温。祛风除湿，发表，镇痛。用于风寒感冒，偏头痛，瘾疹，风湿关节痛。

**条叶岩风**　黑风(河北)，长春七(陕西)，岩风(河南)

**Libanotis lancifolia** K. T. Fu

生于海拔400—1 100米的向阳草坡、灌木丛中及山谷岩石陡坡上。分布于河北、山西、陕西、河南。

根(长春七)：甘、辛，温。功效同岩风。

**香芹**　昂给拉玛-朝古日(蒙语)，邪蒿(中药大辞典)

**Libanotis seseloides** (Fisch. et Mey. ex Turcz.) Turcz.——*Ligusticum seseloides* Fisch. et Mey. ex Turcz.; *Seseli seseloides* (Fisch. et Mey. ex Turcz.) Hiroe

生于开阔的山坡草地、草甸、林缘灌丛中。分布于东北及内蒙古、山东、江苏、河南、湖

北。

根：辛，温。利肠胃，通血脉。用于痢疾，恶疮。

**亚洲岩风**

**Libanotis sibirica** (L.) C. A. Mey.——*Athamanata sibirica* L.

生于海拔1 000—1 400米的山坡林缘、灌丛草地以及草原上。分布于陕西、甘肃、新疆。

根：用于外感发热。

## 藁本属 Ligusticum L.

**尖叶藁本** 水藁本(四川)

**Ligusticum acuminatum** Franch.

生于海拔1 500—3 500米的林下、草地及石崖上。分布于陕西、河南、湖北、四川、云南。

根及根状茎：辛，温。祛寒，散风，胜湿，镇痛。

**短片藁本** 川防风(四川、云南)

**Ligusticum brachylobum** Franch.

生于海拔1 600—3 300米的林下、荒坡草地。分布于青海、湖北、四川、贵州、云南。

根(川防风)：甘、辛，温。祛风除湿，发表，镇痛。用于关节痛，外感，头痛昏眩，四肢拘挛，目赤疮疡。

**美脉藁本**

**Ligusticum calophlebium** Wolff

生于海拔2 800—4 000米的林下及草地。分布于云南省西北部。

根：苦、辛，微寒。清热散风，降气化痰。用于风热头痛，痰多咳嗽，胸膈胀闷，呕逆。

附 注：①云南丽江地区作前胡入药。②云南特有药用植物。

**川芎**

**Ligusticum chuanxiong** Hort.

栽培植物。主产四川、河北、内蒙古、陕西、甘肃、江苏、浙江、江西、湖北、广西、贵州、云南。

根状茎(川芎)：辛、微苦，温。祛风止痛，活血行气。用于风寒感冒，头晕、头痛，月经不调，经闭，痛经，癥瘕腹痛，胸胁刺痛，风湿痹痛，跌打肿痛。

附 注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②江西、湖北栽培的称**抚芎 L. chuanxiong** Hort. cv. **Fuxiong**，功效与川芎相同。

**羽苞藁本** 山芹菜(四川、云南)，红前胡(云南)

**Ligusticum daucoides** (Franch.) Franch.——*Trichydium daucoides* Franch.

生于海拔2 500—4 000米的山坡草地。分布于四川、贵州、云南。

根：祛风，散寒，止痛。用于感冒，骨折，风寒咳嗽。

**丽江藁本**

**Ligusticum delavayi** Franch.

生于海拔2 800—3 800米的灌丛、草地。分布于云南丽江地区。

根(黄藁本)：功效见藁本。

附　注：①云南丽江地区作藁本人药。②云南特有药用植物。

**异色藁本**

**Ligusticum discolor** Lédeb.

生于海拔1 200米左右的山地灌丛下。分布于新疆北部。

根：祛风，除湿，止痛。

**辽藁本**　北藁本、香藁本(河北、东北)

**Ligusticum jeholense** (Nakai et Kitag.) Nakai et Kitag.——*Cnidium jeholense* Nakai et Kitag.

生于海拔1 250—2 500米的林下、草甸及沟边等阴湿处。分布于华北及吉林、辽宁、山东。

根状茎(藁本)：辛，温。祛风，散寒，除湿，止痛。用于风寒感冒，巅顶疼痛，风湿肢节痹痛。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**蕨叶藁本**　岩川芎，岩林(云南)

**Ligusticum pteridophyllum** Franch.——*Ligusticopsis pteridophylla* (Franch.) Leute

生于海拔2 400—3 300米的林下、草坡、水沟边。分布于四川、云南。

根：辛，温。散寒，祛湿，止痛，镇静。用于胃寒痛，头痛，偏头痛，风寒感冒。

**抽葶藁本**

**Ligusticum scapiforme** Wolff ——*L. pseudomodestum* Wolff

生于海拔2 700—3 800米的草甸、灌丛。分布于四川、云南。

根状茎：辛，温。祛风，散寒，止痛。

**藁本**　西芎(江西、湖北、四川)

**Ligusticum sinense** Oliv.

生于海拔1 000—2 700米的林下、沟边草丛中或栽培。分布于山西、陕西、甘肃、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖北、湖南、广西、四川、云南。

根状茎及根(藁本)：辛，温。祛风，除湿，散寒，止痛。用于风寒感冒，巅顶疼痛，风湿痹痛；外用于疥癣，神经性皮炎。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**岩茴香**　桂花三七(浙江)

**Ligusticum tachiroei** (Franch. et Sav.) Hiroe et Constance ——*Seseli tachiroei* Franch. et Sav.

生于海拔1 200—2 500米的河岸湿地、石砾荒原及岩石缝间。分布于华北及辽宁、吉林、青海、安徽、浙江、河南、湖北、四川。

根：用于伤风感冒，跌打损伤。

**细叶藁本**

**Ligusticum tenuissimum** (Nakai) Kitag. ——*Angelica tenuissima* Nakai

生于多石质山坡林下。分布于吉林、辽宁、内蒙古。

根：辛，温。镇痛，镇痉。用于头痛，胸痛。

附　注：辽宁省部分地区用根和根状茎称火藁本入药，功效与藁本相同。

## 紫伞芹属　Melanosciadium de Boiss.

**紫伞芹**　水独活、山羌活(四川)

**Melanosciadium pimpinelloideum** de Boiss.

生于海拔1 400—1 800米荫蔽潮湿的竹林下或林缘草地。分布于湖北、四川东部、贵州西北部。

根：祛风，散寒，止痛。

附　注：我国特有属。

## 白苞芹属　Nothosmyrnium Miq.

**白苞芹**　石防风(湖南)

**Nothosmyrnium japonicum** Miq.

生于山坡林下阴湿草丛中或杂木林下。分布于陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖北、湖南、广西、四川、贵州。

根状茎：辛、苦，温。镇痉，止痛。用于风寒感冒，头痛，筋骨痛。

**川白苞芹**

**Nothosmyrnium japonicum** Miq. var. **sutchenense** de Boiss.

生于林下草丛中。分布于陕西、甘肃、江西、湖北、广东、广西、四川、云南。

根：用于咳喘。

## 羌活属　Notopterygium de Boiss.

**宽叶羌活**　岷羌活(秦岭)，大头羌(青海)

**Notopterygium forbesii** de Boiss.

生于海拔1 700—4 500米的林缘及灌丛中。分布于内蒙古、山西、陕西、甘肃、青海、湖北、四川、云南。

根状茎及根(羌活)：辛、苦，温。祛风，散寒，除湿，止痛。用于风湿痹痛，风寒感冒，头痛，肩背酸痛。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②我国特有属。

**卵叶羌活**

**Notopterygium forbesii** de Boiss var. **oviforme** (Shan) H. T. Chang —— *N. oviforme* Shan

生于山坡林下较阴湿处或林缘草丛中。分布于陕西、四川。

根状茎及根(羌活)：功效见羌活。

附　注：其根状茎较松软，但质量较次。

**羌活**　蚕羌(青海),竹节羌活(四川)

**Notopterygium incisum** Ting ex H. T. Chang

生于海拔2 000—4 000米的林缘及灌丛中。分布于西南及内蒙古、陕西、甘肃、青海。

根状茎及根(羌活): 辛、苦,温。祛风,除湿,散寒,止痛。用于感冒头痛,风湿痹痛,肩背酸痛。

附　注:《中华人民共和国药典》1990年版收载。

## 水芹属　Oenanthe L.

**短辐水芹**　少花水芹(中国高等植物图鉴)

**Oenanthe benghalensis** Benth. et Hook. f.

生于海拔500—1 500米的山坡林下溪边、沟旁及水田边。分布于台湾、江西、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草(水芹菜): 辛,凉。平肝,解表,透疹。用于高血压症,失眠,麻疹初起。

**西南水芹**　野芹菜(江西),臭蒿、胡萝卜七(湖北)

**Oenanthe dielsii** de Boiss.

生于海拔750—2 000米的山坡、山谷林下阴湿地或溪旁。分布于西南及陕西、浙江、江西、湖北、广西。

全草: 用于胃痛,咳嗽。

**细叶水芹**　野茴香(湖北)

**Oenanthe dielsii** de Boiss var. **stenophylla** de Boiss.

生于海拔1 500—2 000米的山谷杂木林下、溪旁水边草丛中。分布于江西、湖北、四川、贵州。

全草: 苦,凉。清热解毒,利尿消肿。用于咽喉肿痛,风热咳嗽,肾炎水肿,高血压症。

**水芹**　水芹菜(通称),小叶芹(东北),帕安俄(云南),恶介芹菜(西藏)

**Oenanthe javanica** (Bl.) DC. ——*Sium javanicum* Bl.; *Oenanthe stolonifera* (Roxb ) Wall ex DC.

生于浅水低洼地或池沼、水沟旁。农舍附近常见栽培,也有野生。全国各地均有分布。

全草(水芹): 辛,凉。清热解毒,凉血降压。用于暴热烦渴,黄疸,水肿,淋症,带下病,瘰疬,疖腮,高血压症。

**蒙自水芹**　水芹(贵州)

**Oenanthe rivularis** Dunn

生于海拔1 100—2 000米的山谷斜坡疏林下、潮湿地、沼泽地。分布于云南、贵州。

全草: 甘,凉。清热,凉血,降压。用于头晕,目眩,浮肿,高血压症。

**卵叶水芹**　水川芎(湖北)

**Oenanthe rosthornii** Diels

生于海拔1 400—4 000米的山谷林下、水沟旁草丛中。分布于西南及湖北、湖南、广

东、广西。

全草：清热，利水，止血。用于外伤出血。

**中华水芹**　油芹(江苏)

**Oenanthe sinense** Dunn

生于水田沼地及山坡路旁湿地。分布于江苏、浙江、江西、湖北、湖南、广西、四川、贵州。

全草：辛，凉。清热解毒，利尿消肿，止血，降压。用于咽喉肿痛，风热咳嗽，肾炎水肿，高血压症。

## 香根芹属　Osmorhiza Rafin.

**香根芹**　水芹三七(安徽)

**Osmorhiza aristata** (Thunb.) Makino et Yabe ——*Chaerophyllum aristatum* Thunb.

生于海拔250—1 120米的山坡林下、溪边及路旁草丛中。分布于东北、华东、中南、西南。

根(香根芹)：散寒，发表，止痛。用于头顶痛，风寒感冒，周身痛。

**疏叶香根芹**

**Osmorhiza aristata** (Thunb.) Makino et Yabe var. **laxa** (Royle) Constance et Shan ——*O. laxa* Royle

生于海拔1 600—3 500米的山坡林下、山沟及河边草地。分布于西南及山西、甘肃。

根(香根芹)：辛，温。散寒，发表，止痛。用于风寒感冒，周身痛，头顶痛。

## 山芹属　Ostericum Hoffm.

**隔山香**　人参归(广西)，九步香(浙江)，过山香(湖南)，香前胡(福建)

**Ostericum citriodorum** (Hance) Shan et Yuan ——*Angelica citriodora* Hance

生于山坡向阳的灌丛或林缘。分布于浙江、福建、江西、湖南、广东、广西。

根(隔山香)：辛，微温。清热解毒，行气止痛，化痰止咳，活血化瘀。用于风热咳嗽，咳嗽痰喘，疳腮，胃痛，胸痹，跌打损伤，风湿痛，疟疾，痢疾，经闭，带下病，毒蛇咬伤。

**大齿山芹**　山水芹菜(浙江)

**Ostericum grosseserratum** (Maxim.) Kitag. ——*Angelica grosseserrata* Maxim.; *A. mongolica* Franch.

生于林下、林缘、山坡草地。分布于东北及河北、内蒙古、陕西、山东、江苏、安徽、浙江、福建、河南、湖北、贵州。

根：辛、微甘，温。补中益气，温脾散寒。用于脾胃虚寒，虚寒咳嗽，泄泻。

**全叶山芹**

**Ostericum maximowiczii** (Fr. Schmidt ex Maxim.) Kitag. ——*Gomphopetal-*

*um maximowiczii* Fr. Schmidt ex Maxim.

生于山地林下、林缘、草甸、采伐迹地。分布于黑龙江、吉林。

全草：用于毒蛇咬伤。

附　注：功效基本相同的有**大全叶山芹 O. maximowiczii** (Fr. Schmidt et Maxim.) Kitag. var. **australe** (Kom.) Kitag.，分布于黑龙江、吉林。

**山芹**　望天芹(辽宁)，哲日力格-朝古日(蒙语)

**Ostericum sieboldi** (Miq.) Nakai ——*Peucedanum sieboldi* Miq.; *Angelica miqueliana* Maxim.

生于林下草地、山谷溪边。分布于东北及河北、山东、江苏、安徽、浙江。其他地区一些场、圃亦有栽培。

根：祛风除湿，散寒，止痛。

附　注：江苏有些地区用根作独活入药。

## 前胡属　Peucedanum L.

**竹节前胡**

**Peucedanum dielsianum** Tedde ex Wolff

生于海拔 600—1 500 米的山坡湿润的岩石上。分布于湖北、四川。

根：祛风除湿，发表。

**刺尖前胡**

**Peucedanum elegans** Kom.

生于石山、针叶疏林内、碎石地或河岸旁。分布于黑龙江、吉林。

根：功效见石防风

附　注：吉林部分地区产地作石防风入药。

**滨海前胡**

**Peucedanum japonicum** Thunb.

生于海滨滩地或近海山地。分布于山东、江苏、上海、浙江、台湾等沿海地区。

根：辛，寒。有毒。消热利湿，坚骨益髓，消肿散结。用于小便淋痛，高热抽搐，红肿热痛，无名肿毒。

**华中前胡**　岩棕、土前胡(贵州)

**Peucedanum medicum** Dunn

生于海拔 700—2 000 米的山坡草丛和湿润的岩石上。分布于江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

根：辛、微苦，温。散寒，祛风除湿。用于风寒感冒，风湿痛，小儿惊风。

附　注：功效相同的有**光前胡 P. medicum** Dunn var. **gracile** Dunn，分布于四川东部。

**准噶尔前胡**　细叶前胡、胃寒草(新疆)

**Peucedanum morissonii** Bess.

生于海拔 1 200—1 700 米的山地灌丛和草坡。分布于新疆北部。

根：祛风散寒，理气止痛。

**白花前胡**　山独活(江苏)，官前胡(湖北)，棕色前胡(湖南)

**Peucedanum praeruptorum** Dunn

生于向阳山坡草丛中。分布于华东、中南及陕西、甘肃、四川、云南。

根(前胡)：苦、辛，凉。散风清热，降气化痰。用于风热咳嗽痰多，痰热喘满，咯痰黄稠。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**石防风**　山茭、山胡芹(山东)，哈尔-疏日古根(蒙语)

**Peucedanum terebinthaceum** (Fisch.) Fisch. ex Trevir. ——*Selinum terebinthaceum* Fisch. ex Trevir.

生于山坡草地、林下及林缘。分布于东北、华北、华东及陕西、甘肃、新疆、河南、湖北、四川、贵州。

根：苦、辛，凉。发散风热，降气化痰。用于感冒，咳喘，妊娠咳嗽。

附　注：河北、陕西、山东、河南有些地区将根作前胡入药。

**宽叶石防风**　风芹(辽宁)

**Peucedanum terebinthaceum** (Fisch) Fisch. ex Trevir. **var. deltoideum** Makino ——*P. deltoideum* Makino ex Yabe

生于林下灌丛。分布于吉林、辽宁、河北。

根：用于风湿痛，感冒。

附　注：在产地有时也作石防风收购，为混淆种类。

**长前胡**　川西防风(四川)

**Peucedanum turgeniifolium** Wolff

生于海拔2 000—3 600米的阳性山坡草地、灌丛、河谷滩地。分布于甘肃、四川。

根：苦、辛，凉。祛痰镇咳，宣散风热，下气。用于风热感冒，咳嗽，痰稠喘满，头痛，胸闷。

**泰山前胡**　狗头前胡(山东)

**Peucedanum wawrae** (Wolff.) Su ——*Seseli wawrae* Wolff

生于山坡草地、林缘、路旁。分布于辽宁、山东、江苏、安徽。

根：功效见前胡。

附　注：山东部分地区用根作前胡入药。

## 胀果芹属　Phlojodicarpus Turcz.

**胀果芹**

**Phlojodicarpus sibiricus** (Steph. ex Spreng.) K.-Pol.——*Cachrys sibirica* Steph. ex Spreng.

生于干燥多石山地、草原或石质山顶。分布于黑龙江、河北、内蒙古。

根：内蒙古锡林郭勒盟右旗作当归的代用品。

## 滇芎属　Physospermopsis Wolff

**滇芎**　拟囊果芹(云南)

**Physospermopsis delavayi** (Franch.) Wolff ——*Arracacia delavayi* **Franch.**

生于山坡草地。分布于云南洱源、建水、宾川。

根：用于偏头痛。

附　注：云南特有药用植物。

## 茴芹属　Pimpinella L.

**锐叶茴芹**

**Pimpinella arguta** Diels

生于海拔 1 500—3 400 米的山地沟谷中或林缘草地。分布于陕西、甘肃、河南、湖北、四川、贵州。

根及全草：活血化瘀、解毒，消肿。

**短果茴芹**　大叶芹(东北)

**Pimpinella brachycarpa** (Kom.) Nakai ——*P. colycina* Maxim. var. *brachycarpa* Kom

生于海拔 500—900 米的河边或林缘。分布于吉林、辽宁、河北、贵州。

全草：用于胃寒痛。

**杏叶茴芹**　羊膻臭(四川)，马蹄防风(云南)，杏叶防风(滇南本草)

**Pimpinella candolleana** Wight et Arn.

生于海拔 1 350—3 500 米的灌丛、草坡、沟边或林下。分布于广西、四川、贵州、云南。

根及全草(杏叶防风)：辛，温。行气温中，祛风除湿，活血消肿。用于胸腹冷痛，胃痛，筋骨痛，风湿麻木，跌打损伤，瘰疬，肿毒。

**尾尖茴芹**

**Pimpinella caudata** (Franch.) Wolff ——*Carum caudatum* Franch.

生于海拔最高达 3 400 米的高山地区。分布于湖北、四川西部，云南。

根：用于风湿腰痛。

**革叶茴芹**

**Pimpinella coriacea** (Franch.) de Boiss. ——*Carum coriaceum* Franch.

生于海拔 950—3 200 米的沟边或林下。分布于广西、四川、贵州、云南。

全草、根：祛风除湿，活血化瘀，消肿。

**异叶茴芹**　八月白(浙江)，鹅脚板(广西)，骚羊股(四川)，山当归(贵州)

**Pimpinella diversifolia** DC.

生于海拔 160—3 300 米的沟边林下、山坡草丛中。分布于华东、中南、西南及陕西、甘肃。

全草及根(鹅脚板)：辛、微苦，温。祛风活血，解毒消肿。用于感冒，痢疾，黄疸；外用

于跌打损伤，毒蛇咬伤，皮肤瘙痒。

**菱叶茴芹**　　鄂西独活(湖北)

**Pimpinella rhomboides** Diels

生于海拔 1 200—3 700 米的林下、沟边灌丛或草地。分布于陕西、甘肃、河南、湖北、四川。

根：消肿止痛。

**羊红膻**　　六月寒(秦岭植物志)

**Pimpinella thellungiana** Wolff

生于海拔 600—1 700 米的河边、林下、草坡和灌丛中。分布于东北、华北及陕西、山东、江苏。

根及全草(羊红膻)：辛，温。温中散寒。用于克山病，心悸，气短，咳嗽。

## 棱子芹属　Pleurospermum Hoffm.

**棱子芹**

**Pleurospermum camtschaticum** Hoffm.

生于林下。分布于华北及吉林、辽宁、四川。

根：温中，化湿，止带。

附　注：其果实为蒙医用药。

**粗茎棱子芹**

**Pleurospermum crassicaule** Wolff

生于海拔 3 000—4 500 米的山坡草地。分布于甘肃、青海、四川、云南。

花：甘、辛，温。滋补健胃。

**鸡冠棱子芹**

**Pleurospermum cristatum** de Boiss.

生于海拔 1 300—2 600 米的山坡林缘、山谷草地。分布于山西、陕西、甘肃、宁夏、青海、河南、湖北、四川。

根：解表，祛风散寒。

**松潘棱子芹**　　黄芫(陕西)

**Pleurospermum franchetianum** Hemsl.

生于海拔 2 500—4 300 米的高山坡地或山脊草地。分布于陕西、甘肃、宁夏、青海、湖北、四川。

根、果实：滋补健胃。

**太白棱子芹**　　药茴香(陕西)

**Pleurospermum giraldii** Diels

生于海拔 3 000—3 600 米的山坡草地。分布于陕西、甘肃、湖北、四川。

全草(药茴香)：甘、微辛，温。温中，化食，止带。用于胃寒腹痛，腹胀，不思饮食，带下病。

**西藏棱子芹**　　哉果(藏语)

**Pleurospermum hookeri** C. B. Clarke **var. thomsonii** C. B. Clake

生于海拔 3 500—4 500 米的山脊草坡地。分布于甘肃、青海、四川、云南、西藏。

全草(哉果): 辛,温。理气活血,止痛。用于月经不调,瘀滞腹痛。

附　注: 本种为藏药。

**康定棱子芹**

**Pleurospermum prattii** Wolff

生于海拔 3 500 米左右的河滩或山坡草地。分布于四川西部。

全草: 用于疮疡肿痛。

附　注: 四川特有药用植物。

**青海棱子芹**

**Pleurospermum szechenyii** Kanitz

生于海拔 3 700—4 200 米的山坡草地。分布于甘肃、青海。

根及果实: 甘、辛、涩,热。滋补,健脾胃。

**乌拉尔棱子芹**

**Pleurospermum uralense** Hoffm.

生于高山草地。分布于黑龙江、新疆北部。

全草: 温中理气,健脾燥湿。

## 囊瓣芹属　Pternopetalum Franch.

**散血芹**　　水芹花(四川)

**Pternopetalum botrychioides** (Dunn) Hand.-Mazz. ——*Cryptotaeniopsis botrychioides* Dunn

生于海拔 740—3 000 米的山坡,林下阴湿沟谷或灌丛。分布于四川、贵州。

全草: 清热解毒。用于刀伤出血,烧、烫伤。

**薄叶囊瓣芹**　　水中芹(四川)

**Pternopetalum leptophyllum** (Dunn) Hand.-Mazz. ——*Cryptotaeniopsis leptophylla* Dunn

生于海拔 1 000—1 800 米的丛林和阴湿的岩石上。分布于四川峨眉山及灌县。

全草: 解毒,止痛。

附　注: 四川特有药用植物。

**矮茎囊瓣芹**

**Pternopetalum longicaule** Shan var. **humile** Shan et Pu ——*P. brevium* (Shan et Pu) K. T. Fu

生于海拔 1 900—3 700 米的林下或草丛中。分布于陕西、甘肃、四川。

根: 祛风除湿,止痛。

**裸茎囊瓣芹**

**Pternopetalum nudicaule** (de Boiss.) Hand.-Mazz. —— *Cryptotaeniopsis nudicaulis* de Boiss.

生于海拔 600—1 000 米的阴蔽潮湿处。分布于江西、广东、贵州、云南。

全草：清热解毒，止血，散结。

**膜蕨囊瓣芹**　细沙毛(四川)

**Pternopetalum trichomanifolium** (Franch.) Hand.-Mazz. ——*Carum trichomanifolium* Franch.

生于海拔 680—2 400 米的林下，沟边及阴湿的岩石上。分布于江西、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

全草：清热解毒。用于胃痛，跌打损伤，蛇咬伤。

**五匹青**　紫金沙(中药大辞典)

**Pternopetalum vulgare** (Dunn) Hand.-Mazz ——*Cryptotaeniopsis vulgaris* Dunn

生于海拔 1 400—3 500 米的山谷、沟边或林下阴蔽湿润处。分布于湖北、湖南、四川、贵州、云南。

根(紫金砂)：辛，温。散寒，理气，止痛。用于胃痛，腹痛，胸胁痛。

附　注：功效相同的有**江西囊瓣芹 P. kiangsiense** (Wolff) Hand.-Mazz.，分布于江西、广东、广西、四川、贵州。

**尖叶五匹青**　刷把草(四川)

**Pternopetalum vulgare** (Dunn) Hand.-Mazz. **var. acuminatum** G. Y. Wu

生于海拔 1 300—1 600 米的河沟边、林下或阴湿坡地。分布于陕西、四川、云南。

全草：四川民间用于(浸酒治)跌打损伤。

**毛叶五匹青**

**Pternopetalum vulgare** (Dunn) Hand.-Mazz. **var. strigosum** Shan et Pu

生于海拔 1 900—2 500 米的林下或阴湿草丛中。分布于四川。

根：四川峨眉县用于瘰疬。

## 变豆菜属　Sanicula L.

**川滇变豆菜**　五角枫(四川)，三台草(云南)

**Sanicula astrantiifolia** Wolff ex Kretsch.

生于海拔 1 932—3 000 米的山坡草地、沟边杂木林下。分布于西南。

根(小黑药)：甘、微苦，温。补肺，益肾。用于肺痨，肾虚腰痛，头昏。

**变豆菜**　山芹菜(青岛)，鸭脚板(四川)

**Sanicula chinensis** Bunge

生于海拔 200—2 300 米的阴湿山坡、路旁、杂灌林下、竹林边、溪边等草丛中。分布于东北、西北、华东、中南、西南。

全草：甘、辛，凉。清热解毒，杀虫。用于痈肿疮毒，蛔虫病。

**天蓝变豆菜**　山五爪龙、散血草(四川)

**Sanicula coerulescens**. Franch.

生于海拔 820—1 550 米的溪边湿地、路旁竹林下或阴湿杂木林下。分布于湖北、四

川、云南。

全草：甘、辛，温。散寒止咳，活血通经。用于风寒咳嗽，顿咳，月经不调，经闭，腰痛，跌打损伤。

附　注：功效相同的有**鳞果变豆菜 S. hacquetioides** Franch.，分布于西南。

**薄片变豆菜**　　鹅掌脚草(安徽)，乌豆草(四川)

**Sanicula lamelligera** Hance

生于海拔 510—2 000 米的山坡林下、沟谷、溪边及湿润的沙质土地。分布于中南及安徽、浙江、台湾、江西、四川、贵州。

全草(大肺经草)：甘、辛，温。散寒止咳，活血通经。用于风寒咳嗽，月经不调，经闭，腰痛，顿咳。

**直刺变豆菜**　　直刺山芹菜(广西)，黑鹅脚板(四川)

**Sanicula orthacantha** S. Moore

生于海拔 260—3 200 米的山涧林下、路旁、沟谷及溪边。分布于中南、西南及陕西、甘肃、安徽、浙江、福建、江西。

全草(黑鹅脚板)：苦，凉。清热解毒。用于麻疹后热未尽，耳热瘙痒，跌打损伤。

**短刺变豆菜**　　鸭脚七(四川)

**Sanicula orthacantha** S. Moore var. **brevispina** de Boiss.

生于海拔 1 780—2 400 米的山坡路旁或林下。分布于四川峨眉山、金佛山。

全草：用于跌打损伤。

附　注：四川特有药用植物。

**红花变豆菜**　　鸡爪芹(吉林)

**Sanicula rubriflora** Fr. Schmidt

生于海拔 200—470 米的山间林下、阴湿及腐殖质较多处。分布于东北、内蒙古。

根：民间用作利尿药。

**锯叶变豆菜**

**Samicula serrata** Wolff

生于海拔 1 360—3 160 米的杂木林下。分布于陕西、甘肃、湖北、四川、云南、西藏。

根：用于跌打损伤。

## 防风属　Saposhnikovia Schischk.

**防风**　　关防风、东防风(通称)

**Saposhnikovia divaricata** (Turcz.) Schischk. ——*Stenocoelium divaricatum* Turcz.; *Siler divaricata* (Turcz.) Benth. et Hook. f.; *Ledebouriella divaricata* (Turcz.) Hiroe

生于山坡草丛或丘陵地区及田间、路旁。分布于东北及河北、内蒙古。其他省区也有引种栽培。

根(防风)：辛，甘，温。祛风解表，胜湿，止痉。用于风湿痹痛，风疹，破伤风。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 西风芹属 Seseli L.

**多毛西风芹**

**Seseli delavayi** Franch.

生于海拔 1 700—4 500 米的高山草坡。分布于贵州、云南。

根：功效见竹叶西风芹。

附　注：常与云防风混合收购，有些地区统称防风入药。

**竹叶西风芹**　　西防风、云防风(四川)、鸡足防风(云南)，竹叶防风(滇南本草)

**Seseli mairei** Wolff

生于海拔 1 200—3 200 米的向阳山坡、稀疏林下，草丛和旷地土坡。分布于广西、四川、贵州、云南。

根(云防风)：甘、辛，温。祛风，解表，胜湿。用于风寒湿痹，感冒，破伤风。

**松叶西风芹**　　松叶防风(云南)

**Seseli yunnanense** Franch.

生于海拔 600—3 100 米的山坡、林下、灌林和草丛中。分布于四川、贵州、云南。

根(云防风)：辛，温。祛风，解表，解毒。用于风湿骨痛，感冒，头痛。

附　注：云南产区以云防风入药，为地方习惯用药。

## 西归芹属 Seselopsis Schischk.

**西归芹**　　土当归(新疆)，天山邪蒿(中国高等植物图鉴)

**Seselopsis tianschanicum** Schischk.

生于海拔 1 500—2 500 米的草原灌丛中和草坡地。分布于新疆天山。

根：活血祛瘀，止痛。用于跌打损伤，贫血。

## 滇芹属 Sinodielsia Wolff

**滇芹**　　黄藁本、秦归(云南)，槎纳儿(彝族语)

**Sinodielsia yunnanensis** Wolff

生于海拔 2 000—2 520 米的山坡草地、疏林或岩石缝中。分布于云南。

根：辛，温。用于风寒感冒，发热头痛。彝族用于上呼吸道感染，急、慢性肾盂肾炎，偏头痛。

附　注：为我国特有属。滇芹为云南特有药用植物。

## 泽芹属 Sium L.

**欧泽芹**　　泽芹(新疆)

**Sium latifolium** L.

生于沼泽及水沟旁草丛中。分布于新疆。

全草：甘，平。散风寒，止头痛，降血压。

附　注：功效相同的有**中亚泽芹 S. medicum** Fisch. et Mey.，分布于新疆。

**泽芹**　　狭叶泽芹(东北)，野蒲芹(江苏)

**Sium suave** Walt.

生于沼泽、湿草甸、溪边、水旁较阴湿处。分布于东北、华北、华东。

全草(山蒟本)：甘，平。散风寒，止头痛，降血压。用于风寒感冒头痛，高血压症。

附　注：江苏曾作山蒟本收购使用，但用量甚少。

## 迷果芹属　Sphallerocarpus Bess. ex DC.

**迷果芹**　　小叶山红萝卜(河北)，达扭(四川)

**Sphallerocarpus gracilis** (Bess.) K.-Pol. ——*Chaerophyllum gracile* Bess.

生于海拔 580—2 800 米的山坡路旁、村庄附近、田园及荒草地。分布于东北、华北及甘肃、青海、新疆、四川。

果实：辛、苦，温。益肾，壮阳，祛风燥湿。

## 东俄芹属　Tongoloa Wolff

**宜昌东俄芹**　　红花芹(中国高等植物图鉴)

**Tongoloa dunnii** (de Boiss.) Wolff ——*Pimpinella dunnii* de Boiss.

生于海拔 2 000—3 500 米的山坡林下。分布于湖北、四川。

根：甘、微苦，平。祛风除湿，活血散瘀，镇痛，止血。用于跌打损伤，外伤出血，劳伤，风湿腰腿痛。

**城口东俄芹**　甜三七(秦岭)

**Tongoloa silaifolia** (de Boiss.) Wolff ——*Pimpinella silaifolia* de Boiss.

生于海拔 2 230—3 350 米的潮湿草地。分布于陕西、四川。

根(太白三七)：甘、温，平。祛风湿，强筋骨，活血，止血。用于风湿关节痛，崩漏，跌打损伤，外伤出血。

**牯岭东俄芹**　　山蛇床(庐山)

**Tongoloa stewardii** Wolff

生于海拔 820—950 米的山谷湿地、路边和草丛中。分布于江西。

根：民间作川芎入药。

## 窃衣属　Torilis Adans.

**小窃衣**　　大叶山胡萝卜(河北)

**Torilis japonica** (Houtt.) DC. ——*Caucalis japonica* Houtt.

生于海拔 150—3 060 米的杂木林下、林缘、路旁、河沟及溪边草丛中。除黑龙江、内

蒙古和新疆外，全国均有分布。

果实(窃衣)：苦、辛，微温。有小毒。活血消肿，收敛，杀虫。用于痈疮溃烂久不收口，久泻，蛔虫病。

附　注：功效相同的有**窃衣 T. scabra** (Thunb.) DC.，分布于华东、中南及陕西、甘肃、青海、四川、贵州。

### 糙果芹属　Trachyspermum Link

**阿育魏**

**Trachyspermum ammi** (L.) Sprague

本属分布于非洲至南亚。我国引种栽培，新疆和田、喀什地区普遍种植。

果实(阿育魏)：苦、辛，温。理气开胃，祛寒除湿，止痛。用于瘫痪，抽搐，胃寒痛，消化不良，砂淋，石淋。

## 137. 岩梅科　Diapensiaceae

### 岩匙属　Berneuxia Decne.

**岩匙**　白奴花、岩菠菜(四川)，石莲、露寒草(云南)

**Berneuxia thibetica** Decne. ——*B. yunnanensis* Li; *Shortia thibetica* (Decne.) Franch.

生于海拔 1 800—4 000 米的林中、阴湿岩缝中。分布于四川、云南、西藏。

全草(岩筋菜)：辛，平。散寒平喘，消炎镇痛。用于感冒，风寒咳嗽，劳伤，哮喘，跌打损伤。

### 岩梅属　Diapensia L.

**红花岩梅**

**Diapensia purpurea** Diels

生于海拔 2 600—4 500 米的潮湿岩石缝中、灌木林下。分布于四川、云南。

全草：祛风除湿，活血消肿。

### 岩扇属 Shortia Torr. et Gray

**华岩扇**

**Shortia sinensis** Hemsl.

生于海拔 1 000—1 500 米的山坡林中。分布于贵州、云南。

根：清热解毒。

## 138. 山柳科 Clethraceae

### 山柳属 Clethra Gronov. ex L.

**华东山柳**

**Clethra barbinervis** Sieb. et Zucc.

生于海拔 1 300 米以下的山坡阔叶林中。分布于华东及湖北、湖南。

根(山柳): 清热解毒。用于疖毒痈肿。

**江南山柳**

**Clethra cavaleriei** Lévl.

生于海拔 780—1 250 米的山坡灌丛或疏林中。分布于浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、贵州。

叶: 外用于皮肤瘙痒。

**华中山柳** 花培子(湖北),构骨树(贵州)

**Clethra fargesii** Franch.

生于疏林或灌丛中。分布于江西、湖北、湖南、四川、贵州。

根: 祛风除湿。用于风湿痛,跌打劳伤。

**大叶山柳** 脱壳树(广西)

**Clethra kaipoensis** Lévl.

生于海拔 1 000—2 100 米的山坡林中。分布于湖南、广西、贵州。

根、叶: 祛风镇痛。用于风湿痹痛。

**单叶山柳**

**Clethra monostachya** Rehd. et Wils.

生于海拔 700—2 000 米的山坡阔叶林中。分布于四川、贵州、云南。

全株: 祛风。

## 139. 鹿蹄草科 Pyrolaceae

### 假水晶兰属 Cheilotheca Hook. f.

**假水晶兰**

**Cheilotheca macrocarpa** (H. Andr.) Y. L. Chou——*Monotropastrum macrocarpum* H. Andr.; *M. lingchuanense* K. F. Wu

生于海拔 2 250—3 450 米的山坡林下。分布于西南及浙江。

全草: 润肺止咳,清热。

### 梅笠草属 Chimaphila Pursh.

**梅笠草** 喜冬树(中国种子植物科属词典)

**Chimaphila japonica** Miq. ——*C. fukuyamai* Masamune

生于海拔 1 700—3 100 米的山坡林下。分布于东北、华北、华中、西北及台湾、四川、云南、西藏。

叶：消炎，利尿，镇痛，滋补强壮。

附　注：功效相同的有**伞形梅笠草 C. umbellata** (L.) Barton.，分布于东北及内蒙古。

## 松下兰属　Hypopitys Hill

**松下兰**　锡仗花(拉汉种子植物名称)

**Hypopitys monotropa** L.

生于山坡林下阴湿处。分布于东北及山西、陕西、甘肃、青海、新疆、湖北。

全草：镇静，止咳，解痉。用于痉挛性咳嗽，哮喘。　地下部分：利尿，催吐。

## 水晶兰属　Monotropa L.

**水晶兰**　梁山草(湖北)，梦兰花(云南)

**Monotropa uniflora** L.

生于海拔 500—3 850 米的针叶林下。分布于东北、西南及河北、陕西、甘肃、安徽、浙江、江西、湖北、西藏。

全草(水晶兰)：微咸，平。补虚止咳。用于肺虚咳嗽。

## 鹿蹄草属　Pyrola L.

**鹿蹄草**　鹿寿草、白鹿寿草(陕西)

**Pyrola calliantha** H. Andr. ——*P. rotundifolia* L. subsp. *chinensis* H. Andr.

生于海拔 700—4 100 米的山坡、路旁、林下、沟谷旁阴湿处。分布于华东、西南及河北、山西、陕西、甘肃、青海、河南、湖北、湖南、西藏。

全草(鹿衔草)：甘、苦，温。祛风湿，强筋骨，止血。用于风湿痹痛，腰膝无力，月经过多，久咳劳嗽。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②功效相同的有**紫背鹿蹄草 P. atropurpurea** Franch.，分布于陕西、河南、四川、云南、西藏；**长叶鹿蹄草 P. elegantala** H. Andr.，分布于浙江、江西、福建、湖南、广东、广西、贵州；**红花鹿蹄草 P. incarnata** Fisch.，分布于东北及河北、内蒙古、新疆；**珍珠鹿蹄草 P. sororia** H. Andr，分布于东北及新疆、四川、云南、西藏；**肾叶鹿蹄草 P. renifolia** Maxim.，分布于东北及河北、内蒙古；**皱叶鹿蹄草 P. rugosa** H. Andr.，分布于陕西、甘肃、四川、云南；**四川鹿蹄草 P. szechuanica** H. Andr.，分布于四川；**短柱鹿蹄草 P. minor** L.，分布于东北及新疆、四川、云南、西藏。

**贵阳鹿蹄草**

**Pyrola corbieri** Lévl.

生于灌木林下。分布于贵州。

全草：甘、苦，温。补虚，益肾。祛风除湿，活血调经。用于虚劳咳嗽，劳伤吐血，风湿关节痛，崩漏，带下病。

**卵叶鹿蹄草**

**Pyrola decorata** H. Andr. ——*P. handeliana* H. Andr.; *P. oreodoxa* H. Andr.

生于海拔600—3 700米的山坡林下或草地。分布于华东、西南及陕西、河南、湖北、湖南。

全草：用于肺痨咳嗽，筋骨痛。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②功效相同的有**白花鹿蹄草** **P. decorata** H. Andr. var. **alba** (H. Andr.) Y. L. Chou，分布于湖南、贵州、云南。

**大理鹿蹄草**

**Pyrola forrestiana** H. Andr.

生于海拔1 500—3 600米的灌木林下、疏林等阴湿处。分布于云南、西藏。

全草：祛风湿，补虚益气。

**日本鹿蹄草**

**Pyrola japonica** Klenze ex Alef.

生于针、阔叶混交林下。分布于东北及河北、台湾、河南。

全草(鹿寿草)：苦，平。补肾壮阳，收敛止血。用于虚劳咳嗽，风寒湿痹，半身不遂，足膝无力及各种出血症。

**小叶鹿蹄草**

**Pyrola media** Sw.

生于针叶林下潮湿地。分布于新疆。

全草：祛风除湿，强筋壮骨，止血，止痢。

## 140. 杜鹃花科　Ericaceae

### 树萝卜属　Agapetes D. Don ex G. Don

**红花树萝卜**　　灯笼花(植物名实图考)

**Agapetes hosseana** Diels

生于海拔1 800—2 500米的阴湿杂木林中、岩石上或附生于树干上。分布于云南。

根：活血散瘀。

**白花树萝卜**

**Agapetes mannii** Hemsl.——*A. yunnanensis* Franch.

附生于海拔1 400—3 000米处的大树干上。分布于云南。

块根(小叶爱楠)：淡，凉。舒肝，祛风，利湿，散瘀消肿。用于黄疸，月经不调，风湿骨痛，腰膝痹痛，小儿惊风，麻风。

**倒挂树萝卜**　树吊瓜(云南)

**Agapetes pensilis** Airy-Shaw

生于海拔1 900—3 450米的崖壁、雨林中,附生于树干上。分布于云南、西藏。

根:涩,凉。消炎利水,活血散瘀。

## 岩须属　Cassiope D. Don

**扫帚岩须**　雪灵芝(云南),血地红(西藏)

**Cassiope fastigiata** (Wall.) D. Don——*Andromeda fastigiata* Wall.

生于海拔3 800—4 400米的山坡灌丛中或冰渍岩石缝中。分布于云南、西藏。

全株:用于气喘。

**岩须**　铁刷把、万年青(云南)

**Cassiope selaginoides** Hook. f. et Thoms. ——*C. mairei* Lévl.

生于海拔3 000—4 500米的高山岩石上、灌丛中或草地上。分布于四川、云南、西藏。

全株(草灵芝):辛、微苦,平。行气止痛,安神。用于肝胃气痛,食欲不振,肾虚。

## 假木荷属　Craibiodendron W. W. Smith

**柳叶假木荷**　毒药树(四川、云南),柳叶金叶子(云南种子植物名录)

**Craibiodendron henryi** W. W. Smith

生于海拔1 300—2 400米的山坡灌丛中、松、栎杂木林下。分布于云南。

叶:舒筋活血。

**假木荷**　美娥(广西),厚皮金叶子(云南种子植物名录),泡花树(中国高等植物图鉴)

**Craibiodendron stellatum** (Piere) W. W. Smith——*C. shanicum* W. W. Smith; *Schima stellata* Piere

生于海拔200—1 800米的松、栎杂木林中或山坡疏林中。分布于广东、广西、贵州、云南。

根(狗脚草根):有毒。抗炎,镇痛,舒筋,活络。用于风湿关节痛,劳伤,跌打损伤,瘫痪。

**云南假木荷**　紧羊叶、美娥、果母(壮语),疯姑娘、闹羊花、马虱子草(云南)

**Craibiodendron yunnanense** W. W. Smith

生于海拔2 100—2 500米的疏林或灌丛中。分布于广西、云南。

叶(金叶子):涩、辛,温。有剧毒。发表温经,活络止痛。用于跌打损伤,风湿麻木,肌肉痛,关节痛,神经性皮炎,外感风寒。

## 吊钟花属　Enkianthus Lour.

**灯笼花**　钓鱼钩树(湖北),曼榕、息利学落(纳西语)

**Enkianthus chinensis** Franch.——*E. leveilleanus* Craib; *E. himalaicum* Hook. et Thoms. var. *chinensis* (Franch.) Diels

生于海拔3 660米以下的灌丛或杂木林中。分布于华东及湖北、湖南、福建、广东、广西、四川、云南。

花：清热止血，调经。

**毛叶吊钟花**　油萝树(广西)

**Enkianthus deflexus** (Griff.) Schneid.——*Rhodora deflexus* Griff.; *E. himalaicum* Hook. f. et Thoms.; *E. defluxus* (Griff.) Schneid. var. *variegatus* Forrest

生于海拔1 400—3 700米的灌丛中、阔叶林下或杂木林中。分布于湖北、广西、四川、云南、西藏。

叶：用于跌打损伤。

**齿缘吊钟花**　九骨筋、野支子、山枝仁(四川)

**Enkianthus serrulatus** (Wils.) Schneid.—— *E. quinqueflorus* Lour. var. *serrulatus* Wils.

生于海拔1 400—1 800米的杂木林或灌丛中。分布于江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根：祛风除湿，活血。

## 白珠树属　Gaultheria Kalm ex L.

**白珠树**

**Gaultheria cumingiana** Vidal

生于山坡灌丛中。分布于福建、台湾、广东、海南、贵州。

全株：活血化瘀，行气止痛。

**地檀香**　岩子果、香叶子(云南)，阿门吉利(云南纳西语)

**Gaultheria forrestii** Diels

生于海拔2 000—3 600米的向阳灌丛中或荒草地。分布于湖南、四川、云南。

根或叶(大透骨消)：辛，温。祛风除湿，活血止痛。用于风湿骨痛，冻疮。

附　注：功效相同的有**刚毛地檀香 G. forrestii** Diels var. **setigera** C. Y. Wu ex T. Z. Hsu，分布于云南。

**尾叶白珠**　阿门支力(纳西语)

**Gaultheria griffithiana** Wight——*G. caudata* Stapf

生于海拔3 050—3 450米的杂木林中。分布于西南。

根：祛风除湿。

**红粉白珠**

**Gaultheria hookeri** C. B. Clarke——*G. veitchiana* Craib; *G. stapfiana* Airy-Shaw

生于海拔600—3 800米的山脊阳处、山坡草丛或灌丛中。分布于西南。

全株(河果)：辛、涩、微甘，平。祛风除湿，止咳平喘。用于风湿关节痛，跌打损伤，胸

膜炎，咳嗽，哮喘。

**滇白珠**　野茶泡(湖北)，老虎尿(湖南)，千里香(广西)，黑油果、透骨草(云南)

**Gaultheria leucocarpa** Bl. var. **crenulata** (Kurz)T. Z. Hsu——*G. crenulata Kurz G. yunnanensis* (Franch.) Rehd.

生于灌丛中。分布于长江流域以南各省区。

全株(透骨香)：辛，温。祛风除湿，活血通络。用于风湿关节痛，水膨，跌打损伤，牙痛，湿疹。

**硬毛白珠**　金钗(广西)

**Gaultheria leucocarpa** Bl. var. **hirsuta** (D. Fang et N. K. Liang) T. Z. Hsu——*G. yunnanensis* (Franch.) Rehd. var. *hirsuta* D. Fang et N. K. Liang

生于海拔1 000—2 800米的灌丛中或干燥山坡上。分布于广东、广西、云南。

全株：用于疝气，风湿痛，劳伤，牙痛，皮肤瘙痒，跌打损伤，毒蛇咬伤。

**铜线白珠**　四川白珠(中国树木分类学)

**Gaultheria nummularioides** D. Don——*G. nummularioides* D. Don var. *elliptica* Rehd. et Wils.

生于海拔2 200—3 600米的山坡草地、岩石上或林中。常成垫状。分布于四川、云南、西藏。

全株：祛风除湿，活血通经。

**梨叶白珠**　鹿蹄草叶白珠(云南种子植物名录)

**Gaultheria pyrolaefolia** Hook. f. ex C. B. Clarke

生于海拔2 300—4 200米的山坡灌丛中或垫状草地灌丛中。分布于四川、云南、西藏。

根：舒筋活血。

**五雄白珠**

**Gaultheria semi-infera** (C. B. Clarke) Airy-Shaw——*Diplycisia semi-infera* C. B. Claeke

生于海拔2 000—2 600(—3 200)米的疏林下或草坡。分布于云南、西藏。

全株：祛风除湿，活血止痛。

**华白珠**

**Gaultheria sinensis** Anth.——*G. sinensis* Anth. var. *major* Airy-Shaw

生于海拔3 400—3 850米的山坡杜鹃丛中。分布于云南。

全草：祛风，活血。

## 杜香属　Ledum L.

**狭叶杜香**　喇叭茶(中国种子植物科属词典)，好宁-苏日嘎日(蒙语)

**Ledum palustre** L. var. **angustum** N. Busch.

生于针叶或落叶松林下、沼泽地、水湿地及林间山地草坡。分布于东北及内蒙古。

叶(白山苔)：辛，寒。止咳平喘，祛痰，止痒，调经。用于咳嗽，结肠炎，感冒，皮肤瘙

痒，头癣，脚气，月经不调，不孕症。

**杜香**

**Ledum palustre** L. var. **dilatatum** Wahl.

生于针叶或落叶林下、水甸边、林缘或草地上。分布于东北及内蒙古。

叶(杜香)：辛、苦，寒。化痰，止咳，平喘。用于咳嗽痰喘。

## 木藜芦属　Leucothoë D. Don

**尖基木藜芦**　　透骨草(云南)，当琴(藏语)

**Leucothoë griffithiana** C. B. Clarke

生于海拔 2 000—3 000 米的针阔叶杂交林中或路旁。分布于云南。西藏。

全草：祛风除湿。

## 南烛属　Lyonia Nutt.

**美花米饭花**

**Lyonia compta** (W. W. Smith et J. F. Jeffrey) Hand.-Mazz. ——*Pieris compta* W. W. Smith et J. F. Jeffrey; *Xolisma compta* (W. W. Smith et J. F. Jeffrey) Rehd.

生于海拔 1 700—3 200 米的向阳山坡灌丛中或泥炭藓沼泽中。分布于云南。

全株：辛，温。消炎止痛，舒筋活络，接骨。用于跌打损伤。

**南烛**　　山胡椒(云南)，狗胡椒、牛醉木、珍珠花(植物名实图考)

**Lyonia ovalifolia** (Wall.) Drude——*Andromeda ovalifolia* Wall.; *Pieris ovalifolia* (Wall.) D. Don; *Xolisma ovalifolia* (Wall.) Rehd.

生于海拔 700—3 400 米山坡、山谷林中或灌丛下。分布于西南及陕西、台湾、湖南、广西。

枝、叶：涩、微酸，温。有毒。外用于皮肤疮毒，麻风。果实：甘，温。有毒。活血，祛瘀，止痛；外用于跌打损伤，闭合性骨折。

**小果南烛**　　娘木(通称)，白心木(湖北)

**Lyonia ovalifolia** (Wall.) Drude var. **elliptica** (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz.——*Andromeda elliptica* Sieb. et Zucc.; *Pieris ovalifolia* Wall. var. *elliptica* (Sieb. et Zucc.) Rehd. et Wils.

生于向阳山坡灌丛中。分布于华东、中南及陕西、四川、贵州、云南。

枝、叶、果实：甘，温。有毒。祛风解毒，强壮滋补。用于脾虚腹泻，跌打损伤，全身酸麻，刀伤。

**毛果南烛**

**Lyonia ovalifolia** (Wall.) Drude var. **hebecarpa** (Franch. ex Hemsl.) Chun ——*Pieris ovalifolia* D. Don var. *hebecarpa* Franch. ex Hemsl.

生于向阳山坡河谷及河边灌丛中。分布于云南。

根、叶：甘、酸、平。根：活血。叶：健脾，止泻。

**长叶南烛**　灯笼草(广西)

**Lyonia ovalifolia** (Wall.) Drude var. **lanceolata** (Wall.) Hand.-Mazz.——*Andromeda lanceolata* Wall.; *Xolisma ovalifolia* (Wall.) Rehd. var. *lanceolata* (Wall.) Rehd.

生于海拔 1 300—2 300 米的山坡灌丛下或林缘。分布于华东、中南及西南。

枝、叶：活血祛瘀，止痛。用于骨鲠喉，疮疖。

**毛叶南烛**　野胡椒、油萝树(广西)，小豆柴、亮子药(云南)

**Lyonia vilosa** (Wall.)Hand.-Mazz.——*Andromeda villosa* Wall.; *Xolisma villosa* (Wall.) Rehd.

生于海拔 2 700—2 900 (—3 470) 米的沟边杂木林中或灌丛下。分布于西南及广西。

枝、叶：微酸、涩，温。祛风除湿，活血化瘀，止痛。用于风湿痹痛，跌打损伤，骨折，疥疮发痒，麻风。

## 红莓苔子属　Oxycoccus Hill.

**小果红莓苔子**　毛蒿豆(内蒙古植物志)

**Oxycoccus microcarpus** Turcz. ex Rupr.

生于针叶林内或苔藓沼泽地上。分布于东北及内蒙古。

果实：酸，凉。止血，抗菌，消炎。用于伤口化脓，减少汗液分泌，减轻瘙痒。

附　注：功效相同的有**红莓苔子 O. quadripetalus** Gilib.，分布于东北。

## 马醉木属　Pieris D. Don

**美丽马醉木**　细梅树、炮仗花(云南)

**Pieris formosa** (Wall.) D. Don——*Andromeda formosa* Wall.; *P. bodinieri* Lévl.; *Lyonia formosa* (Wall.) Hand.-Mazz.

生于海拔 1 500—2 800 米的疏林或灌丛中。分布于西南及江西、福建、湖北、湖南、广东、广西。

全株：消炎止痛，舒筋活络。

**马醉木**

**Pieris polita** W. W. Smith et J. F. Jeffrey

生于山坡疏林下、林缘及溪谷旁灌丛中。分布于安徽、浙江、江西、福建。

叶：苦，凉。有剧毒。用于疥疮。

## 杜鹃花属　Rhododendron L.

**紫花杜鹃**

**Rhododendron amsiae** Rehd. et Wils.

生于海拔 2 200—3 000 米的山坡林中。分布于四川。

叶：止咳，平喘，祛痰。

**安徽杜鹃**　　黄山杜鹃(中国高等植物图鉴)

**Rhododendron anhweiense** Wils.

生于海拔 1 100—1 700 米的林中、山坡灌丛中。分布于安徽、浙江、江西、湖南、广西。

根：活血止痛。　用于跌打损伤。叶、花：消炎，杀虫。

**桃叶杜鹃**

**Rhododendron annae** Franch.

生于海拔 1 400 米的山坡林中。分布于贵州、云南。

根皮：化痰止咳。

**团花杜鹃**

**Rhododendron anthosphaerum** Diels

生于海拔 1 800—3 600 米的阔叶林或针阔叶混交林中。分布于贵州、云南。

叶：用于湿疹。

**树形杜鹃**

**Rhododendron arboreum** Smith——*R. puniceum* Roxb.; *R. windsorii* Nutt.

生于海拔 2 380—3 550 米的山坡混交林中。分布于四川、西藏。

花：清热，止血，调经。

**毛肋杜鹃**

**Rhododendron augustinii** Hemsl.

生于海拔 1 300—3 000 米林中或灌丛中。分布于陕西、甘肃、湖北、四川、云南。

花：用于咳嗽痰喘。

**张口杜鹃**

**Rhododendron augustinii** Hemsl. subsp. **chasmanthum** (Diels) Cullen——*R. chasmanthum* Diels

生于海拔 2 500—2 600 米的山坡灌丛中。分布于四川、云南。

根：止咳，固精，止带。　花：用于红崩。

**耳叶杜鹃**

**Rhododendron auriculatum** Hemsl.

生于海拔 2 000 米的山林中。分布于湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

根：理气，止咳。

**腺萼马银花**

**Rhododendron bachii** Lévl.

生于疏林中。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

叶：用于咳嗽，哮喘。

**短柱杜鹃**

**Rhododendron brachyanthum** Franch.

生于海拔 2 800—3 600 米的松林下或组成群落。分布于云南。

叶、花：甘、酸，平。清热解毒，化痰止咳，止痒。

**短脉杜鹃**

**Rhododendron brevinerve** Chun et Fang

生于疏林或灌丛中。分布于湖南、广东、广西、四川、贵州。

花：清热，止血，调经。

**美容杜鹃**

**Rhododendron calophytum** Franch.

生于海拔 2 000—3 000 米的山坡林中或灌丛中。分布于四川、云南。

根：祛风除湿。

**弯果杜鹃**

**Rhododendron campylocarpum** Hook. f.

生于海拔 3 000—3 900 米的冷杉林下或灌丛中。分布于西藏。

花：苦，凉。有毒。平喘，清热，拔毒，止血，调经。用于咳嗽痰喘，骨髓炎，，消化道出血，衄血，咯血，月经不调。

**头花杜鹃**　　黑香紫(陕西)

**Rhododendron capitatum** Maxim.

生于海拔 2 500—3 600 米高山灌丛中。分布于陕西、甘肃、青海。

枝、叶(小叶杜鹃)：辛，温。止咳平喘，祛痰。用于咳嗽痰喘，哮喘。

**多花杜鹃**

**Rhododendron cavaleriei** Lévl.

生于高山灌丛或疏林中。分布于湖南、广西、贵州。

枝、叶：清热解毒，止血通络。

**毛喉杜鹃**

**Rhododendron cephalanthum** Franch.

生于海拔 3 600—4 400 米的高山杜鹃灌丛中，常组成群落。分布于四川、云南、西藏。

花：平喘，清热。

**刺毛杜鹃**　　瘦石榴(湖南)

**Rhododendron championae** Hook.

生于向阳山坡、林缘或灌丛中。分布于浙江、福建、江西、湖南、广东、广西。

根、枝：涩，温。祛风解表，活血止痛。用于咳嗽。

**牛皮茶**

**Rhododendron chrysanthum** Pall.

生于海拔 1 700 米以上的高山岳桦林下或石质苔藓层上。分布于东北。

叶：收敛，抗菌，发汗，强心。用于痢疾，四肢痛风。

**睫毛杜鹃**

**Rhododendron ciliatum** Hook. f.

生于海拔 2 700—3 500 米的陡峭岩石上或陡坡上的杜鹃灌丛中。分布于西藏。

全株：活血调经，清热解毒。

**长柱杜鹃**

**Rhododendron cillicalyx** Franch. subsp. **lyi** (Lévl.) R. C. Fang —— *R. lyi* **Lévl.**

生于石灰岩石山上。分布于贵州、云南。

花：止咳，平喘。

**秀雅杜鹃**　　臭枇杷(陕西)

**Rhododendron concinuum** Hemsl.

生于海拔 1 500—3 950 米的山坡灌丛中。分布于陕西、甘肃、河南、湖北、四川、云南。

叶、花：清热解毒，止血调经。

**兴安杜鹃**　　迎山红、映山红(东北)，鞑子香(黑龙江)

**Rhododendron dauricum** L.

生于向阳山坡林下、林缘、山脊、石砾缝中。分布于东北及内蒙古。

根(满山红根)：用于痢疾。　叶(满山红)：苦，寒。止咳，祛痰。用于咳嗽痰喘，感冒头痛。

附　注：① 从叶中经水蒸气蒸馏得到的挥发油有止咳，祛痰的功效。②《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**腺果杜鹃**

**Rhododendron davidii** Franch.

生于海拔 1 700—3 000 米的杂交林下。分布于四川、贵州、云南。

花：清热止血，调经。

**大白杜鹃**

**Rhododendron decorum** Franch.

生于海拔 2 000—3 300 米的林下、山地灌丛中。分布于四川、贵州、云南。

花：辛、酸，温。止咳，止痒，固精，杀虫。用于肾虚。

**马缨杜鹃**　　红杜鹃(云南)，马银花，(植物名实图考)

**Rhododendron delavayi** Franch.——*R. arboreum* Smith subsp. *delavayi*(Franch.) Chamber.

生于海拔 2 400—3 100 米的山坡灌丛中。分布于广西、四川、贵州、云南。

花(马缨花)：苦，凉。有小毒。清热解毒，止血，调经。用于月经不调，衄血，咯血，消化道出血，骨髓炎。

附　注：功效相同的有**悦人杜鹃 R. delavayi** Franch **var. peramoenum** (Balf. f. et Forrest) T. L. Ming，分布于云南。

**树生杜鹃**

**Rhododendron dendrocharis** Franch.

常附生于山坡林中树杆上。分布于四川。

花：清热解毒，调经。

**缺顶杜鹃**

**Rhododendron emarginatum** Hemsl. et Wils.

生于海拔 1 200—2 000 米的灌丛中或常绿季雨林中，常附生于树叉上。分布于四川、云南。

叶：止咳，平喘，祛痰。

**粉红杜鹃**

**Rhododendron fargesii** Franch.

生于海拔2 000米以上的山坡密林中。分布于陕西、甘肃、湖北、四川。

叶：清肺，化痰。

**丁香杜鹃**

**Rhododendron farrerae** Tate

生于林缘、坡地、灌丛中。分布于江西、福建、湖南、广东、广西、贵州。

全株：苦、微酸、微涩，平。疏风，止咳。

**云锦杜鹃**

**Rhododendron fortunei** Lindl.

生于海拔800—1 600米的山地林中。分布于安徽、浙江、江西、湖北、湖南、广西。

根、叶、花：消炎，杀虫。

**喇叭杜鹃**　　马缨花(湖北)

**Rhododendron fortunei** Lindl. subsp. **discolor** (Franch.) Chamberlain——*R. discolor* Franch.

生于海拔1 600—1 900米杂木林中或山坡灌丛中。分布于湖北、四川、云南。

根皮：用于消化道出血、衄血，咯血，月经不调。　花：用于骨髓炎。

**粉白杜鹃**

**Rhododendron hypoglaucum** Hemsl.

生于海拔1 300米以上的山坡林中或山沟林下。分布于陕西、湖北、四川。

叶、花：止咳，平喘。

**隐蕊杜鹃**

**Rhododendron intricatum** Franch.

生于海拔13 000—4 500米的冷杉林下、杜鹃丛、高山草甸、草原和湿草原上。分布于四川、云南。

花：用于消化道出血。

**鹿角杜鹃**　　老虎花(湖南)

**Rhododendron latoucheae** Franch.

生于海拔800—1 200米的阴山坡、山谷混交林内。分布于浙江、福建、江西、湖南、广东、广西。

花、叶：甘、酸，温。疏风行气，止咳祛痰，活血化瘀。

**紫腺杜鹃**

**Rhododendron leei Fang**

生于林中或灌丛中。分布于四川西部黑水河流域。

根、叶：祛风除湿，散瘀消肿。

**百合花杜鹃**

**Rhododendron liliflorum Lévl.**

生于疏林中。分布于湖南、广西、贵州、云南。

全株：清热利湿，活血，止血。

**乳源杜鹃**

**Rhododendron lingii** Chun

生于石山林缘、坡地上。分布于福建、广东北部。

全株：用于咳嗽痰喘。

**岭南杜鹃**

**Rhododendron mariae** Hance

生于低山坡、丘陵灌丛中。分布于江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、贵州。

根皮(紫杜鹃)：苦，平。镇咳平喘，祛痰。用于咳嗽痰喘。

**满山红**

**Rhododendron mariesii** Hemsl. et Wils.

生于丘陵地带疏灌丛中。分布于长江下游各省南至福建、台湾及河南。

叶：酸、辛，平。活血调经，止痛，消肿，止血，平喘止咳，祛风利湿。

**照山白**　　万经棵(山东)，达里(藏语)

**Rhododendron micranthum** Turcz.

生于山坡灌丛中、石砾向阳处。分布于东北、华北及陕西、甘肃、山东、河南、湖北、四川。

枝、叶或花(照山白)：辛、酸，温。有大毒。祛风，通络，止血，止咳祛痰。用于咳嗽痰喘，痢疾，风湿痹痛，腰痛，痛经，产后周身痛。

**亮毛杜鹃**　　金瓶花(云南)

**Rhododendron microphyton** Franch.

生于海拔 1 000—2 300 (—3 000) 米的疏灌丛中或岩石上。分布于青海、河南、湖北、四川、贵州、云南。

根(洒瓶花)：微苦、涩，凉。清热，熄风，利尿。用于感冒，小儿惊风，水肿。

**碧江亮毛杜鹃**

**Rhododendron microphyton** Franch. **var. trichanthum** A. L. Chang ex R. C. Fang

生于海拔 2 200 米的山坡林缘或灌丛中。分布于云南。

根：清热解毒。

**羊踯躅**　　黄喇叭花(浙江)，一杯倒、三钱三(广西)

**Rhododendron molle** (Bl.) G. Don——*Azalea mollis* Bl.

生于丘陵地带疏灌丛中。长江流域以南广为分布。

花(闹羊花)：辛，温。有大毒。祛风除湿，舒筋活血，镇痛止痛。用于风湿顽痹，骨折痛，牙痛、皮肤顽癣。　果实(云轴子)：苦，温。有大毒。蠲痹止痛，定喘止泻。用于跌打损伤，风湿关节痛。　根：辛，温。有毒。祛风，止咳散瘀止痛，杀虫。用于风湿痹痛，跌打损伤，神经痛，咳嗽痰喘，外用于肛门瘘管，杀灭钉螺。　茎、叶：杀蝇蛆，子孓，钉螺。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**百花杜鹃**　　白花映山红、白杜鹃(广州植物志)

**Rhododendron mucronatum** (Bl.) G. Don——*Azalea mucronatum* Bl.

生于灌丛中或广泛栽培于庭园。分布于华东及四川、贵州、云南。

全株(白花映山红)：辛、甘，温。止咳，固精，活血，散瘀。用于吐血，咳嗽、遗精，白带，血崩，跌打损伤。

**迎红杜鹃**　　满山红(吉林)

**Rhododendron mucronulatum** Turcz.

生于山地灌丛中。分布于东北、华北及山东、江苏，湖南栽培。

叶(迎山红)：苦，平。有毒。解表，清肺，止咳。用于感冒，头痛，咳嗽痰喘。

**火红杜鹃**

**Rhododendron neriiflorum** Franch.

生于海拔 2 400—3 600 米的林中或空草地。分布于云南、西藏。

根、叶：镇静，止痛，麻醉。

**北方雪层杜鹃**

**Rhododendron nivale** Hook. f. subsp. **boreale** M. N. Philipson et W. R Philipson

生于海拔 3 800—4 600 米的高山灌丛中或云杉林下。分布于青海、四川、云南、西藏。

嫩枝、叶：镇咳祛痰。

**圆叶杜鹃**

**Rhododendron orbiculare** Decne.

生于海拔 2 500—3 000 米的山坡林中。分布于湖南、广西、四川。

根、叶：祛风除湿，止痛。

**山光杜鹃**

**Rhododendron oreodoxa** Franch.

生于海拔 1 700—2 400 米的山坡、山谷林中。分布于陕西、甘肃、湖北、四川。

叶：平喘，镇咳，祛痰。

**马银花**

**Rhododendron ovatum** Planch.

生于低山、丘陵溪涧滩地及路边灌丛中。分布于华东及湖南。

根：有毒。清热利湿。

**小叶杜鹃**

**Rhododendron parvifolium** Adams.

生于高山草原、亚高山灌丛，石质坡地或林间草地。分布于东北及内蒙古、青海。

枝、叶：辛，温。祛痰，止咳，平喘。

**金背枇杷**　　野枇杷(陕西)

**Rhododendron przewalskii** Maxim.

生于海拔 3 000—4 000 米的高山阴坡混交林中。分布于陕西、甘肃、青海、四川。

叶(金背枇杷叶)：辛、苦，平。清肺泻火，止咳化痰。用于咳嗽，痰喘。　花(金背枇杷花)：甘、苦，平。清肺泻火，止咳化痰。用于咳嗽，咯血，肺痈，带下病。

**太白杜鹃**　　药枇杷(陕西)

**Rhododendron purdomii** Rehd. et Wils.

生于海拔 1 800—3 400 米的山坡混交林中。分布于陕西、甘肃、河南。

叶：功效等参见金背枇杷。　花：辛、甘，平。清热泻火，止咳化痰，健胃顺气，调经。

**红棕杜鹃**　茶花杜鹃(中国高等植物图鉴)

**Rhododendron rubiginosum** Franch.——*R. desquamatum* Balf. f. et Forrest

生于海拔 2 400—4 200 米的冷杉林下、杂木林或灌丛中。分布于甘肃、四川、云南。

花：清热，止血，调经。

**毛果杜鹃**

**Rhododendron seniavinii** Maxim.

生于丘陵地带及向阳山坡灌丛中。分布于福建、贵州、湖南。

叶(满山白)：辛，凉。祛痰，止咳，平喘，消炎。用于咳嗽痰喘。

**杜鹃**　映山红(通称)，红紫讠花(浙江)，清明花、怀春花(江西)

**Rhododendron simsii** Planch.

生于海拔 3 600 米以下的疏灌丛中。分布于长江流域各省，东至台湾，西达四川、云南。

根(杜鹃花根)：酸、甘、湿。活血，止痛，祛风，止痛。用于吐血、衄血，月经不调，崩漏，风湿痛，跌打损伤。　叶(杜鹃花叶)：酸，平。清热解毒，止血。用于痈肿疔疮，外伤出血，癣疹。　花(杜鹃花)：酸、甘，温。活血，调经，祛风湿。用于月经不调，经闭，崩漏，跌打损伤，风湿痛，吐血，衄血。

**爆仗花**

**Rhododendron spinuliferum** Franch.

生于海拔700—1 000 (—2 500) 米的油杉林、栎林、及灌丛中。分布于四川、云南。

根、叶、花：辛，温。有小毒。祛风除湿，通经活络，消炎。花亦用于治癣。

附　注：功效相同的有**少毛炮仗花 R. spinuliferum** Franch. var. **glabrescens** K. M. Feng ex R. C. Fang，分布于云南。

**长蕊杜鹃**　林角木、六骨筋(湖北)

**Rhododendron stamineum** Franch.

生于杂木林、灌丛或疏林中。分布于湖北、湖南、四川、贵州、云南。

枝、叶、花：用于狂犬病。

**四川杜鹃**

**Rhododendron sutchuenense** Franch.

生于海拔 2 500 米的山坡林中。分布于陕西、湖北、湖南、四川、贵州。

根、叶：祛风除湿，止痛。用于带下病。

**千里香杜鹃**

**Rhododendron thymifolium** Maxim.

生于海拔 2 400—3 800 米的湿润山坡，常形成灌丛。分布于甘肃、青海、四川。

全株(百里香杜鹃)：辛，温。止咳平喘，祛痰。用于咳嗽痰喘。

**毛蕊杜鹃**

**Rhododendron websterianum** Rehd. et Wils.

生于海拔 3 000--4 200 米的灌丛或湿草原上。分布于四川。

嫩枝、叶：止咳，祛痰。

**圆叶杜鹃**

**Rhododendron williamsianum** Rehd. et Wils.

生于海拔 1 850—3 000 米的疏林或灌丛中。分布于四川。

叶、花：祛风，活血，调经。

**云南杜鹃**

**Rhododendron yunnanense** Franch.——*R. rigidum* Franch.

生于海拔 2 800—3 000 米的松林中岩石上。分布于四川、云南。

花：清热，止血，调经。

## 越橘属　Vaccinium L.

**短序越橘**

**Vaccinium brachybotrys** (Franch.) Hand.-Mazz. ——*V. donnianum* Wight var. *brachybotrys* Franch.

生于海拔 2 000—2 400 米的山坡灌丛中。分布于贵州、云南。

根：甘，酸，温。散瘀，消肿。

**乌饭树**　冷饭籽(湖北)，羊爪子(湖南)

**Vaccinium bracteatum** Thunb. ——*V. spicatum* (Lour.) Poir.; *V. chinense* Champ.

生于海拔 2 600 米以下的山坡灌丛或林下。分布于华东、中南及四川、贵州、云南。

根(南烛根)：甘、酸，温。散瘀，消肿，止痛。用于牙痛，跌打损伤。　叶(南烛叶)：酸、涩，平。益精气，强筋骨，明目，止泻。　果实(南烛子)：酸、甘，平。益肾固精，强筋明目。用于身体虚弱、久泄梦遗，久痢久泻，带下病。

**泡泡叶越橘**

**Vaccinium bullatum** (Dop) Sleum. ——*Agapetes bullata* Dop.

生于海拔 1 100—1 500 米的山坡灌丛中。分布于广西、云南。

根：用于精神分裂症。

**短尾越橘**

**Vaccinium carlesii** Dunn

生于向阳山坡路旁、混交林下及林缘。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、贵州。

全株：甘、酸，温。清热解毒，止血，固精。

**贝叶越橘**

**Vaccinium conchophyllum** Rehd.

生于灌丛中。分布于四川。

根：顺气，消饱胀。

附　注：四川特有药用植物。

**苍山越橘**　　老鸦果(云南会泽)

**Vaccinium delavayi** Franch.

生于海拔2 500—4 200米的铁杉、杜鹃林中,附生于岩石或树干上，或生于林下苔藓层中。分布于西南。

根：甘、辛,平。顺气,消饱胀。用于胸腹气痛,胀满。

**樟叶越橘**

**Vaccinium dunalianum** Wight

生于海拔1 500—3 100(—3 600)米的山坡阔叶林中岩石上。分布于广西、贵州、云南、西藏。

全株(大透骨草)：微苦,微温。祛风除湿,舒筋活络。用于风湿关节痛。

附　注：功效相同的有**大叶樟叶树橘 V. dunalianum** Wight var. **megaphyllum** Sleum.，分布于云南；**尾叶越橘 V. dunalianum** Wight var. **urophyllum** Rehd et Wils.，分布于广西、贵州、云南、西藏。

**乌鸦果**　　土千年健(云南)

**Vaccinium fragile** Franch.

生于海拔1 100—3 400米的山坡灌丛或云南松林下。分布于西南。

根(土千年健)：酸,凉。舒筋通络,活血,止痛,消炎。用于风寒湿痹,筋骨挛痛,手足顽麻,跌打损伤,目赤,疟腮,痢疾,胃痛,半身不遂。　叶(土千年健叶)：敷疮，消风。果实(乌饭子)：用于久咳,失眠。

附　注：根功效相同的有**大理土千年健 V. fragile** Franch. var. **mekongense** (W. W. Smith) Sleumer，分布于云南。

**无梗越橘**

**Vaccinium henryi** Hemsl.

生于海拔1 000—1 800米的山坡林中。分布于陕西、甘肃、浙江、福建、湖北、湖南、四川。

枝、叶：祛风除湿,消肿。

**黄背越橘**

**Vaccinium iteophyllum Hance**

生于海拔700—2 400米的山坡常绿林下。长江流域以南各地均有分布。

全株：祛风除湿,舒筋活络。

**朝鲜越橘**

**Vaccinium koreanum** Nakai

生于高山针叶林中。分布于吉林、辽宁。

叶、果实：收敛,清热。

**小叶珍珠花**

**Vaccinium laetum** Diels

生于山坡灌丛中。分布于四川、云南。

枝、叶(饱饭花枝叶)：苦,平。强筋益气,消肿。用于偏头痛。　果实(饱饭花)：酸、甘,平。强筋,益气,消肿。用于筋骨酸软,四肢无力。

**宝兴越橘**

**Vaccinium moupinense** Franch.

常附生于海拔 1 900—2 020 米的林内大树上。分布于四川、贵州、云南。

全株：祛风除湿，舒筋活络。

**黑果越橘**

**Vaccinium myrtillus** L.

生于高山针叶林下阴湿处。分布于新疆。

叶：解毒，利尿，消炎。果实：用于痢疾。

**腺齿越橘**

**Vaccinium oldhamii** Miq.

生于林缘、灌丛中。分布于山东、江苏。

枝、叶：祛风除湿。

**峨眉越橘**

**Vaccinium omeiense** Fang

生于灌丛中。分布于四川峨眉山。

全株：止咳，平喘，消肿。

附　注：四川特有药用植物。

**椭圆叶越橘**

**Vaccinium pseudorobustum** Sleumer

生于林中或灌丛中。分布于广东、广西、贵州。

根：用于肺痨。

**石生越橘**

**Vaccinium saxicolum** Chun ex Sleumer ——*V. chengae* **Fang**

生于林下或灌丛中。分布于四川。

枝、叶(石瓜子莲)：苦、辛，凉。通经散瘀。用于跌打损伤，闪腰挫气。

**美蕊叶越橘**

**Vaccinium sikkimense** C. B. Clarke

生于海拔 2900—3 600(—4 200) 米的山坡灌丛中。分布于西南。

全株：祛风除湿，舒筋活络。

**凸脉越橘**

**Vaccinium suprocostatum** Hand. -Mazz.

生于海拔 1 500 米以下的疏灌丛中。分布于广西、贵州。

全株：活血散瘀，止痛。

**刺毛越橘**

**Vaccinium trichocladum** Merr. et Metcalf

生于山坡疏林或灌丛中。分布于浙江、江西、福建、广东、广西、贵州。

果实：消食化积。

**笃斯越橘**

**Vaccinium uliginosum** L

生于高山冻原带、针叶林下湿润山坡或有苔藓层的水甸子。分布于东北及内蒙古、新疆。

叶、果实：消炎，利水。

**红花越橘**

**Vaccinium urceolatum** Hemsl.

生于海拔1 900米以下的山坡林中。分布于广西、四川、贵州。

全株：散瘀活血，祛风。

**越橘**　　牙疙瘩、熊果叶(黑龙江)

**Vaccinium vitis-idaea** L.

生于亚寒带针叶林下。分布于东北及内蒙古、新疆。

叶：苦、涩，凉。有小毒。利尿解毒。用于淋症，小便涩痛。　果实酸、甘，平。止痢。用于泄泻，痢疾。

## 141. 紫金牛科　Ardisiaceae

### 紫金牛属　Ardisia Swartz

**细罗伞**　　波叶紫金牛(中国高等植物图鉴)

**Ardisia affinis** Hemsl. ——*Tinus affinis* (Hemsl.) O. Kuntze.

生于海拔100—600米的石灰岩林下、溪边及山谷阴湿处。分布于江西、湖南、广东、广西。

根：散瘀活血，理气止痛。用于跌打损伤，乳娥。

附　注：功效相同的有**凹脉紫金牛 A. brunnescens** Walker，分布于广东、广西。

**少年红**　　念珠藤叶紫金牛(广西)

**Ardisia alyxiaefolia** Tsiang ex C. Chen

生于海拔600—1 200米的山谷林下或坡地。分布于福建、湖南、广东、广西、四川、贵州。

全株：平喘止咳。用于咳嗽痰喘。

附　注：广西用于跌打损伤。

**小乔木紫金牛**　　地打果树(云南)，石狮子(云南植物志)

**Ardisia arborescens** Wall. ex A. DC.

生于海拔350—1 400米的石灰岩林下或山坡疏林灌丛中。分布于广西、贵州、云南、西藏。

全株：用于哮喘，贫血，产后腹痛，月经不调，恶露不尽。

**北碚紫金牛**　　藤八爪(四川)

**Ardisia beibeinensis** Z. T. Zhu

生于海拔300米的竹林下阴湿处。分布于四川。

全株：用于四肢麻木，风湿关节痛，咽喉痛，小便淋痛。

附　注：四川特有药用植物。

**九管血**　血猴爪(江西),活血胎(广西),山豆根(贵州、云南),血党(中国高等植物图鉴)

**Ardisia brevicaulis** Diels

生于海拔400—1 200米的密林下。分布于西南及安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西。

根(矮茎朱砂根):苦、微涩,平。祛风清热,散瘀消肿。用于咽喉肿痛,风火牙痛,风湿筋骨痛,腰痛,跌打损伤,无名肿毒。

**尾叶紫金牛**　点抵改房、两逊(瑶语),峨眉紫金牛(中国高等植物图鉴)

**Ardisia caudata** Hemsl.

生于海拔1 000—2 200米的山谷、山坡林下、溪边等阴湿处。分布于广东、广西、四川、贵州、云南。

根:清热,祛风,除湿。用于咽喉肿痛,淋巴腺肿大,胃痛,牙痛,风湿痛,跌打骨折。

**小紫金牛**　华紫金牛(台湾),产后草、石狮子、衫纽根(广西)

**Ardisia chinensis** Benth. ——*Bladhia chinensis* Nakai; *A. triflora* Hemsl.

生于海拔300—800米的山谷、山地疏、密林下、溪旁等阴湿处。分布于浙江、江西、福建、台湾、广东、广西。

全株:苦,平。活血,散瘀,止血,止痛。用于肺痨,咳嗽痰喘,咯血,吐血,跌打损伤,经闭,痛经,小便淋痛,黄疸。

**散花紫金牛**

**Ardisia conspersa** Walker

生于海拔850—1 400米的山谷、疏密林下等阴湿处。分布于广西、贵州、云南。

根:清热,止痛。

**伞形紫金牛**　紫背绿(广西),不待劳(云南),毛高(傣语),西南紫金牛(中国高等植物图鉴)

**Ardisia corymbifera** Mez

生于海拔700—1 500(—1 800)米的疏、密林下、潮湿或略干燥的地方。分布于广西、贵州、云南。

根(硃砂根):苦,凉。清热解毒,消肿止痛。用于风湿关节痛,跌打损伤,咽喉肿痛,胃气痛。

附　注:广西作硃砂根用。

**块根紫金牛**

**Ardisia corymbifera** Mez var. **tuberifera** C. Chen, ined.

生于海拔300—730米的石灰岩山顶或山坡林下。分布于广西。

根:用于咽喉肿痛,胃脘痛,月经不调,贫血,骨折,跌打损伤,风湿痹痛。

**粗脉紫金牛**　小罗伞树(海南)

**Ardisia crassinervosa** Walker

生于海拔100—1 800米的山坡林下、草坡灌丛中或坡地疏林、密林下向阳处。分布于海南。

根:祛风散瘀。

附　注：海南特有药用植物。

**硃砂根**　珍珠伞(江苏、浙江)，万龙、万雨金(台湾)，山豆根(云南)，土丹皮(广西中药志)

**Ardisia crenata** Sims

生于海拔 90—2 400 米的疏、密林下阴湿处。西藏至台湾，江苏、湖北至海南均有分布。

根(硃砂根)：苦、辛，凉。清热解毒，祛风止痛。用于上呼吸道感染，乳蛾，咽喉痛，白喉，丹毒，淋巴结炎，劳伤吐血，心胃气痛，风湿骨痛，跌打损伤。

附　注：功效相同的有**红凉伞 A. crenata** Sims f. **hortensis** (Migo) W. Z. Fang et K. Yao。

**百两金**　矮茶(浙江、广东)，开喉箭(江西、湖南、四川、贵州)，高脚凉茶(广西)，八爪金龙(四川)

**Ardisia crispa** (Thunb.) A. DC. ——*Bladhia crispa* Thunb.

生于海拔 200—2 400 米的山谷林下阴湿处。分布于除海南外长江流域以南各省区及陕西。

根及叶(百两金)：苦、辛，凉。清热，祛痰，祛风，利湿，活血，止痛。用于咽喉肿痛，肺热咳嗽，咯痰不畅，湿热黄疸，水肿，痢疾，白浊，风湿骨痛，子痈。

**大叶百两金**　八爪金、高八爪(四川)

**Ardisia crispa** (Thunb.) A. DC. var. **amplifolia** Walker

生于海拔 900—2 450 米的山坡疏、密林下阴湿处或苔藓林下。分布于台湾、广东、广西、四川、贵州、云南。

根：祛风止咳，清热解毒。用于风湿，跌打损伤，咽喉痛。

**细柄百两金**　山豆根(云南)

**Ardisia crispa** (Thunb.) A. DC. var. **dielsii** (Lévl.) Walker——*A. dielsii* Lévl.

生于海拔 900—2 120 米的山坡疏、密林下阴湿处。分布于台湾、广东、广西、四川、贵州、云南。

全株：止血，消炎。用于刀伤，咽喉痛。

**密鳞紫金牛**　罗芒树、山马皮、黑度、仙人血树(海南)

**Ardisia densilepidotula** Merr.

生于海拔 250—2 000 米的山谷、山坡密林中。分布于海南儋县。

树皮：滋补强壮。用于腹痛，产后体虚。

附　注：海南特有药用植物。

**圆果罗伞**　拟罗伞树(中国高等植物图鉴)，开展紫金牛(云南药用植物名录)

**Ardisia depressa** C. B. Clarke

生于海拔 300—1 300 (—1 600)米的山坡密林、沟谷林中等阴湿处。分布于湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根：用于肺痨。　叶：止血。用于衄血。

**郎伞木**　高脚鸡眼、小罗伞(广东)，胭脂木、雀儿肾、大罗伞(广西)，美丽紫金牛(中国高等植物图鉴)

**Ardisia elegans** Andr.

生于海拔1 300米以下的山谷、山坡疏、密林下、溪边等阴湿处。分布于湖南、广东、海南、广西。

根：用于腰骨痛，跌打损伤。　叶：拔疮毒。

**剑叶紫金牛**　开喉箭(广西)

**Ardisia ensifolia** Walker

生于海拔700米以下的密林下、石缝间等阴湿处。分布于湖南、广西、四川、云南。

全株：镇咳祛痰，活血，利尿解毒。　根：用于乳蛾。

**月月红**　毛虫草(广西)，红毛走马胎(四川)，毛青杠(四川、贵州、云南)，江南紫金牛(中国高等植物图鉴)

**Ardisia faberi** Hemsl.

生于海拔1 000—1 300米的山谷林下、水旁、石缝间等阴湿处。分布于湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全株：清热解毒，祛痰利湿。用于感冒，咳嗽，乳蛾。

**狭叶紫金牛**　喘咳木(广西)

**Ardisia filiformis** Walker

生于海拔200—980米的山坡密林下。分布于广西。

全株：止咳平喘。用于咳嗽，哮喘。

**灰色紫金牛**　细罗伞(广西)

**Ardisia fordii** Hemsl.

生于海拔100—800米的疏、密林下或水边、溪旁等阴湿处。分布于广东、广西。

全株：活血消肿。用于跌打损伤。

**走马胎**　马胎(广东)，山猪药(海南)，走马风(广西)

**Ardisia gigantifolia** Stapf

生于海拔1 300米以下的山间疏、密林下阴湿处。分布于江西、福建、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根状茎(走马胎)：辛，温。祛风除湿，强筋壮骨，活血祛瘀。用于风湿筋骨痛，跌打损伤，产后血瘀。　叶(走马胎叶)：淡，寒。祛腐，生肌，消炎。用于痈疽发背，溃疡。

**大罗伞树**

**Ardisia hanceana** Mez

生于海拔430—1 500米的山谷、山坡林下等阴湿处。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖南、广东、广西。

根：用于跌打损伤，风湿痹痛，经闭。

附　注：华东地区有以根代硃砂根用。

**矮紫金牛**

**Ardisia humilis** Vahl

生于海拔40—1 100米的山间、山坡疏、密林下。分布于广东、海南。

树皮：用于头痛，便血。

**紫金牛**　矮脚樟菜(陕西)，老勿大(江苏、上海、浙江)，千年不大(中国药用植物

志),野枇杷叶(上海常用中草药)

**Ardisia japonica (Thunb.) Bl.** ——*Bladhia japonica* Thunb.

生于海拔 1 200 米以下山坡林下、溪旁、竹林下等阴湿处。分布于长江流域以南各省区(海南省除外)及陕西。

全株(紫金牛): 苦,平。镇咳,祛痰,活血,利尿,清热解毒。用于乳蛾,肺痨,咳嗽咯血,吐血,脱力劳伤,筋骨酸痛,肝炎,痢疾,水肿,高血压症,疝气,肿毒。

**夹江紫金牛**

**Ardisia jiajiangensis** Z. Y. Zhu

生于海拔 450 米的疏、密林下阴湿处。分布于四川。

全株: 活血祛瘀,止咳,止痛。

附　注: 四川特有药用植物。

**心叶紫金牛**

**Ardisia maclurei** Merr.

生于海拔 230—1 900 米的密林下、水旁、石缝间等阴湿处。分布于台湾、广东、海南,广西、贵州。

全株(红云草): 苦,凉。止血,清热解毒。用于吐血,便血,疮疖。

**伞珍珠**　　紫背绿(云南)

**Ardisia maculosa** Mez

生于海拔 1 200—1 600(—1 900) 米的沟谷林下阴湿处。分布于广西、云南。

全株(伞珍珠): 苦,凉。舒筋活络,强筋壮骨。用于跌打损伤,腰痛,胃痛。

**虎舌红**　　红毡(广东),白毛毡、毛地红(广西),肉八爪、红毛针(云南)

**Ardisia mamillata** Hance

生于海拔 500—2 200 米的山谷密林下。分布于浙江、江西、福建、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全株(红毛走马胎): 苦、辛,凉。清热利湿,活血化瘀。用于痢疾,肝炎,胆囊炎,风湿痹,跌打劳伤,咳血,吐血,痛经,血崩,小儿疳积,疮疖痈肿。

**南方紫金牛**

**Ardisia neriifolia** Wall. ——*A. austroasiatica* Walker

生于海拔 600—1 800 米的山谷、山坡林中或林缘。分布于广西、云南。

嫩叶: 清热解毒,止渴。

**多脉紫金牛**

**Ardisia nervosa** Walker

生于海拔 400 米以下的山坡、山谷密林下,潮湿处或水旁。分布于海南崖县。

树皮: 用于腹痛,便血。

附　注: 海南特有药用植物

**花脉紫金牛**

**Ardisia perreticulata** C. Chen

生于海拔 110—1 000 米的林下、灌丛等阴湿处。分布于广东、广西。

根: 用于肺痨,跌打损伤,风湿痹痛。

**莲座紫金牛**　毛虫药、老虎舌(广东),毛脚皮、赫地涩(广西)

**Ardisia primulaefolia** Gardn. et Champ.

生于海拔600—1 400米的山谷及山坡林下阴湿处。分布于江西、福建、广东、海南、广西、贵州、云南。

根：微苦、辛，凉。散瘀止血，祛风解毒。　全株：补血，止咳，通络。用于劳伤咳喘，风湿痛，跌打损伤，疮疖及毛虫刺伤。

**山血丹**　铁雨伞(浙江),郎伞(江西),细罗伞树、小罗伞(广东)，血党、活血胎(广西),沿海紫金牛(中国高等植物图鉴)

**Ardisia punctata** Lindl.

生于海拔270—1 150米的山谷、山坡林下、水旁等阴湿处。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖南、广东、广西、贵州。

全株及根(小罗伞)：苦、甘、辛，温。活血调经，祛风除湿。用于经闭，痛经，风湿痹痛，跌打损伤。

**九节龙**　矮茶子(江西),轮叶紫金牛(台湾),地茶、猴接骨(湖南),蛇药(广东)，狮子头(广西)

**Ardisia pusilla** A. DC.

生于海拔200—700米的林下或灌丛中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、四川、贵州。

全株(毛青杠)：苦、辛，温。活血通络，消肿止痛。用于跌打损伤，风湿筋骨痛，腰痛，月经不调。

**罗伞树**　火泡树、鸡眼树(广东),提枯杨、晒梗(黎语)

**Ardisia quinquegona** Bl.

生于海拔200—1 000米的山坡、山谷杂木林中。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

根、叶：苦、辛，平。清咽消肿，散瘀止痛。用于咽喉肿痛，风湿关节痛，跌打损伤，疖肿。

**多枝紫金牛**　树杞(台湾),东南紫金牛(中国高等植物图鉴)

**Ardisia sieboldii** Miq.

生于山坡灌丛中。分布于浙江、福建、台湾、贵州。

根：消炎止痛。

**紫脉紫金牛**

**Ardisia velutina** Pitard

生于海拔550—1 800米的石灰岩山坡密林下、山谷林下等阴湿处。分布于广西、云南。

全株：用于风湿骨痛。

**雪下红**　医药师(云南),珊瑚树(花镜),卷毛紫金牛(中国高等植物图鉴)

**Ardisia villosa** Roxb.

生于海拔500—1 540米的疏、密林下石缝间、坡近灌丛中等阴湿处或山坡路旁阳处。分布于广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全株(矮脚罗伞)：苦、辛，温。祛风除湿，活血止痛。用于风湿痛，跌打肿痛，咳嗽吐血，寒气腹痛。

**毛叶雪下红**

**Ardisia villosa** Roxb. var. **ambovestita** Walker

生于疏、密林下较干燥处。分布于广东、海南、广西、云南。

全株：消肿，活血散瘀。

**纽子果**　黑星紫金牛(台湾)，扣子果(云南)，绿叶紫金牛(中国高等植物图鉴)，圆齿紫金牛(海南植物志)

**Ardisia virens** Kurz

生于海拔300—2 700米的密林下阴湿而土层肥厚的地方。分布于台湾、海南、广西、贵州、云南。

根：祛痰，解毒，活血，消肿。

**长叶纽子果**

**Ardisia virens** Kurz var. **annamensis** Pitard

生于海拔900米以下的疏林阴湿处。分布于广西、贵州。

根：祛痰，解毒，行血，消肿。

**滇紫金牛**

**Ardisia yunnanensis** Mez

生于海拔700—2 400米的山谷、山坡疏、密林中、坡边等阴湿处。分布于广西、贵州、云南。

根：消炎止痛。

## 酸藤子属　Embelia Burm. f.

**酸藤子**　信筒子(福建)，甜酸叶(海南)，咸酸果(广西)，酸果藤(中国高等植物图鉴)

**Embelia laeta** (L.) Mez ——*Samara laeta* L.

生于海拔100—1 500(—1 850)米的山坡疏、密林下，疏林缘及开阔的草坡、灌丛中。分布于江西、福建、台湾、广东、海南、广西、云南。

根及枝叶(酸藤木)：酸，凉。用于咽喉肿痛，齿龈出血，跌打瘀血，痔疮。　果实(酸藤果)：酸、甘，平。强壮补血。用于胃酸缺乏，食欲不振。

**长叶酸藤子**　吊罗果(广西)，没归息(景颇语)

**Embelia longifolia** (Benth.) Hemsl. ——*Samara longifolia* Benth.

生于海拔300—2 300(—2 800)米的山谷、山坡疏、密林中或路边灌丛中。分布于福建、江西、广东、广西、四川、贵州、云南。

全株(大叶酸藤)：酸、涩，平。祛风利湿，消肿散瘀。用于水肿，泄泻，跌打瘀肿。果实：驱蛔虫。

**多脉酸藤子**　断骨藤(广西)，粗糖果(云南)，马挂花(傣语)，矩叶酸藤果(中国高等植物图鉴)

**Embelia oblongifolia** Hemsl.

生于海拔300—1 900米的山谷、山坡疏、密林中、溪边及河边林中等阴湿地。分布于广东、海南、广西、贵州、云南。

果实(马桂花)：甘、酸，平。驱虫。用于绦虫病，蛔虫病。

**当归藤**　筛箕簕(广西)，估枯(瑶语)，小花酸藤子(云南植物志)

**Embelia parviflora** Wall. ex A. DC.

生于海拔300—1 800米的山间密林中、林缘、灌丛中等土质肥沃处。分布于西南及安徽、浙江、福建、湖南、广东、海南、广西。

根、枝(当归藤)：苦、涩，温。活血散瘀，补肾强腰。用于月经不调，经闭，不孕症，贫血，跌打损伤，骨折。

**疏花酸藤子**

**Embelia pauciflora** Diels

生于海拔1 300—1 500米的山坡、山谷疏、密林下等阴湿多石处。分布于四川、贵州。

根(过山消)：辛、微苦，凉。祛痰，解毒，行瘀消肿。用于乳蛾，红丝疔。

**匍匐酸藤子**

**Embelia procumbens** Hemsl.

生于海拔1 300—2 550米的山坡密林中或竹林中。分布于四川、云南。

全株：辛、微苦，凉。祛痰解毒，活血消肿。

**白花酸藤果**　牛脾菽(广东)，羊公板仔(海南)，碎米果(云南)，马桂郎(傣语)

**Embelia ribes** Burm. f.

生于海拔50—2 000米的林内、林缘、灌丛中、路边及坡边灌丛中。分布于福建、广东、海南、广西、贵州、云南。

根(咸酸簕)：甘、酸，平。用于经闭，小儿头疮，跌打损伤，痢疾，泄泻，刀枪伤，外伤出血。　叶：用于外伤。

**厚叶白花酸藤果**

**Embelia ribes** Burm. f. var. **pachyphylla** Chun ex C. Y. Wu et C. Chen

生于海拔700—1 800米的山谷林下。分布于广东、海南、广西、云南。

根：用于跌打损伤。

**网脉酸藤子**　了哥利(广西)，蚂蟥藤(贵州)，白木浆果、山胡椒(云南)

**Embelia rudis** Hand.-Mazz. ——*Calispermum rude* (Hand.-Mazz.) Nakai

生于海拔200—1 600米的山坡灌丛中、溪边或疏、密林下等阴湿处。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

果实：酸、甘，平。强壮，补血。　根、枝条：清凉解毒，滋阴补肾。用于经闭，月经不调，风湿痛。

**瘤皮孔酸藤子**　假刺藤(广西)

**Embelia scandens** (Lour.) Mez ——*Calispermum scandens* Lour.

生于海拔200—850(—1 300)米的山坡、山谷疏、密林中或疏灌丛中。分布于广东、海南、广西、云南。

根、叶(假刺藤)：淡、涩，平。有小毒。舒筋活络，敛肺止咳。用于风湿痹痛，肺痨。

鲜叶可以灭虱。

**大叶酸藤子**　阿林希(怒语),近革叶酸藤果(中国高等植物图鉴)

**Embelia subcoriacea** (C. B. Clarke) Mez——*E. nagushia* D. Don var. *subcoriacea* C. B. Clarke

生于海拔1 400—2 300米的山谷、山坡疏、密林中。分布于广西、贵州、云南。

全株：通经活血,祛湿补肾。　果实：驱蛔虫。

**密齿酸藤子**　打虫果、米汤果(云南)

**Embelia vestita** Roxb.

生于海拔200—1 700米的石灰岩山地林下。分布于云南。

果实：驱蛔虫、绦虫。

## 杜茎山属　Maesa Forsk.

**银叶杜茎山**　观音树(云南)

**Maesa argentea** (Wall.) A. DC. ——*Baebotrys argentea* Wall.

生于海拔1 500—2 900米的疏、密林中、沟谷、山坡或水边。分布于四川、云南。

全株：解毒。外用于小儿皮肤病。

**顶花杜茎山**

**Maesa balansae** Mez

生于林下、林缘或海边空旷的灌木丛中。分布于海南、广西。

根：用于吐血。　叶：用于小儿疳积。

**湖北杜茎山**

**Maesa hupehensis** Rehd.

生于海坡500—1 700米的山间密林下、溪边林下或路边林缘灌丛中湿润处。分布于湖北、湖南、广西、四川。

全株：清热利湿，活血散瘀。

**包疮叶**　小姑娘茶、大白饭果(云南),甲满(傣语)

**Maesa indica** (Roxb.) A. DC. ——*Bacobotrys indica* Roxb.

生于海拔500—2 000米的山间疏、密林下、山坡、沟底阴湿处。分布于广西、四川、云南。

全株(两面青)：微苦,凉。清热解毒。用于肝炎,癞疹,泄泻，胃痛，高血压症。叶：外用于疮毒。

**杜茎山**　金砂根(江西),山桂花(台湾),白茅茶(广东),白花茶(海南、云南)，野胡椒(广西)

**Maesa japonica** (Thunb.) Moritzi. ex Zoll. —— *Doraena japonica* Thunb.

生于海拔300—2 000米的山坡、石灰岩山杂木林下阳处或路旁灌丛中。分布于西南至台湾以南各省区。

根、叶：苦,寒。祛风,解疫毒,消肿胀。用于感冒,头痛,眩晕,水肿,腰痛。

**金珠柳**　野兰、普洱茶(四川),观音茶(四川、云南),杜宏山(贵州)，阿哦吐都

西(彝语)

**Maesa montana** A. DC.

生于海拔 400—2 800 米的山间杂木林下或疏林下。分布于西南至台湾以南各省区。

根、叶：消炎、止泻。用于痢疾。

**鲫血胆**　野黑胡椒(湖南)，空心花(广西)，冷饭果(云南)

**Maesa perlaria** (Lour.) Merr. ——*Dortus perlarius* Lour.

生于海拔 150—1 350 米的村边开阔灌丛中或疏林中。分布于福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全株(空心花)：苦，平。接骨消肿，生肌祛腐。用于跌打损伤，刀伤，疔疮。

**秤杆树**　冷饭果(云南)

**Maesa ramentacea** (Roxb.) A. DC. ——*Bacobotrys ramentacea* Roxb.

生于海拔 300—1 650 米的疏林下、林缘、路旁、坡边、沟底及溪边灌丛中。分布于广西、云南。

根、叶：用于骨折，跌打损伤，风湿痹痛。

## 铁仔属　Myrsine L.

**铁仔**　野茶(陕西)，明立花(广西)，豆瓣柴(贵州)，牙痛草(云南)

**Myrsine africana** L.

生于海拔 1 000—3 600 米的石山坡、荒坡疏林中或林缘等向阳干燥的地方。分布于西南及陕西、甘肃、浙江、江西、台湾、河南、湖北、湖南、广西。

根或全株(大红袍)：甘、淡，凉。活血，祛风，理湿。用于风湿痹痛，泄泻，痢疾，血淋，劳伤咳血。

**尖叶铁仔**

**Myrsine africana** L. var. **acuminata** C. Y. Wu et C. Chen

生于海拔 1 200—1 500 米的疏密林下、灌丛中或路旁。分布于云南。

全株：消炎镇痛。

**针齿铁仔**　齿叶铁仔(中国高等植物图鉴)

**Myrsine semiserrata** Wall.

生于海拔 500—2 700 米的石灰岩山坡疏、密林下、路旁、沟边等阳处。分布于西南及陕西南部、甘肃、江西、湖北、湖南。

根：用于小儿遗尿。　果实：用于驱绦虫。

**光叶铁仔**　蔓竹杞(台湾)，匍匐铁仔(中国高等植物图鉴)

**Myrsine stolonifera** (Koidz.) Walker ——*Anamtia stolonifera* Koidz

生于海拔 250—2 100 米的疏、密林下阴湿处。分布于安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根或全株：苦、涩，微平。清热利湿，收敛止血。

## 密花树属　Rapanea Aubl.

**广西密花树**

**Rapanea kwangsiensis** Walker

生于海拔650—1 000米的山谷混交林中，或石灰岩山杂木林中。分布于广西、贵州、云南。

根：用于跌打损伤。

**密花树**　大明橘(台湾)，打铁树(海南)，狗骨头(云南)，哈雷(傣语)

**Rapanea neriifolia** (Sieb. te Zucc.) Mez——*Myrsine neriifolia* Sieb. et Zucc.; *R neriifolia* (Sieb. et Zucc.) Mez var. *yunnanensis* Walker

生于海拔650—2 400米的混交林中、苔藓林中或林缘、路旁灌丛中。分布于西南至台湾以南各省区。

根皮、叶(鹅骨梢)：淡，寒。清热解毒，凉血，祛湿。用于乳痈初起；外用治湿疹，疮疖。

# 142. 报春花科　Primulaceae

## 琉璃繁缕属　Anagallis L.

**琉璃繁缕**　龙吐珠(福建)

**Anagallis arvensis** L.

生于滨海荒野地。分布于浙江、福建、台湾、广东。

全草(四念癀)：酸、涩，平。用于毒蛇及狂犬咬伤，疮疡，鹤膝风。

## 点地梅属　Androsace L.

**假羽衣草**

**Androsace alchemilloides** Franch.

生于海拔(2 500—)3 600—4 000米的山坡向阳草丛中。分布于云南。

全草：用于咽喉痛，跌打损伤。

**景天点地梅**

**Androsace bulleyana** Forr.

生于海拔1 800—2 100(—3 600)米的荒地灌丛中。分布于云南。

全草(点地梅)：苦，寒。利水。用于热性水肿。

**直茎点地梅**

**Androsace erecta** Maxim.

生于海拔(2 200—)2 600—4 000米的河旁灌丛中、山地阴湿处。分布于甘肃、青海、四川、云南、西藏。

全草：利水消肿。

**东北点地梅**

**Androsace filiformis** Retz.

生于林缘、河滩草甸。分布于东北及内蒙古、新疆。

全草：苦、辛，寒。清热解毒，消炎止痛。用于咽喉肿痛，乳蛾，口腔溃烂，目赤，头痛，牙痛，跌打损伤。

**高山点地梅**　　小点地梅(中国植物志、东北植物检素表)

**Androsace gmelinii** (Gaertn.) Roem. et Schult. ——*A. gmelinii* Gaertn.

生于河岸草甸、山地沟谷、林缘草甸及高山石坡上。分布于东北、华北。

全草：祛风清热，消肿解毒。

**莲叶点地梅**

**Androsace henryi** Oliv.

生于海拔 2 400—3 200 米的山坡阴湿处。分布于陕西、湖北、四川、云南、西藏。

全草：清热，止咳，利水。

**白花点地梅**

**Androsace incana** Lam.

生于山坡草地、山顶或向阳的草原及山坡上。分布于华北及新疆。

全草：除湿利尿。

**石莲叶点地梅**　　朵的(藏语)

**Androsace integra** (Maxim.) Hand. -Mazz.——*A. aizoon* Duby **var.** *integra* Maxim.

生于海拔 2 500—3 850 米的山坡草地、路旁、石缝中或疏林下及林缘。分布于青海、四川、云南、西藏。

全草：辛、淡，平。除湿利尿。用于关节痛。

**西藏点地梅**

**Androsace mariae** Kanitz. **var. tibetica** (Maxim.) Hand.-Mazz.

生于海拔 1 840—4 400 米的石质坡地、高山草甸。分布于内蒙古、甘肃、宁夏、青海、四川、西藏。

全草：苦、辛，寒。清热解毒，消炎止痛。用于热性水肿，淋证，咽喉肿痛，乳蛾，口疮，目赤。

附　注：蒙族用药。

**雪山点地梅**

**Androsace septentrionalis** L.

生于海拔 1 950—3 600 米的林缘、河地灌丛、砾石质草原及高山草甸。分布于河北、内蒙古、甘肃、新疆。

全草：辛、甘、微寒。清热解毒，消肿止痛。用于疖痛，创伤。

附　注：蒙族用药。

**刺叶点地梅**

**Androsace spinulifera** (Franch.) R. Knuth——*A. strigillosa* Franch. **var.** *spinulifera* Franch.

生于海拔(2 300—)2 900—3 775米的干燥岩石上或草坡。分布于四川、云南。

全草：苦、辛，寒。清热散瘀，解毒消肿，止痛。

**垫状点地梅**

**Androsace tapete** Maxim.

生于海拔3 500—5 000米的高山草甸、流石带、山坡河谷阶地及平缓山顶。分布于甘肃、青海、新疆、四川、云南、西藏。

全草：苦，寒。祛风清热，消肿解毒。

**点地梅**　　白花珍珠草(上海)，五星草(湖南)，佛顶珠(贵州)，天星花(云南)

**Androsace umbellata** (Lour.) Merr.——*Drosera umbellata* Lour.

生于林下、路旁、沟边等湿地。分布于东北、华北、秦岭及东南各省区。

全草(喉咙草)：辛、甘，微寒。祛风，清热，消肿，解毒。用于咽喉肿痛，口疮，目赤，目翳，头痛，牙痛，风湿热痛，哮喘，淋浊，带下病，疔疮肿毒，跌打损伤，烫伤。

**雅江点地梅**

**Androsace yargongensis** Petitm.

生于高山草甸、沼泽地、水边、灌丛和草丛中。分布于甘肃、青海、四川。

全草：苦，寒。祛风清热，消肿解毒。

## 海乳草属　Glaux L.

**海乳草**　　西尚(藏语)

**Glaux maritima** L.

生于海拔3 700—4 850米的河边湿地、湿草地、沼泽草甸。分布于黄河流域以北及新疆、四川、西藏。

全草：清热解毒。

## 珍珠菜属　Lysimachia L.

**广西过路黄**

**Lysimachia alfredii** Hance

生于山谷溪边及林下。分布于江西、福建、湖南、广东、广西、贵州。

全草：苦、辛，凉。祛风燥湿，活血止血。用于黄疸，尿道结石，淋证。

**耳叶珍珠菜**　　二郎箭(陕西)

**Lysimachia auriculata** Hemsl.

生于海拔400—1 600米的山坡荒地向阳处。分布于陕西、甘肃、湖北、四川。

根及根状茎(耳叶排草)：苦、涩，平。止血，活血，消肿。用于跌打损伤，刀伤。

**狼尾花**　　狼巴草、酸溜子(陕西)，虎尾草(救荒本草)，重穗排草(中国经济植物志)

**Lysimachia barystachys** Bunge

生于海拔600—2 700米的山坡、路旁阴湿处。分布于东北、华北、华东、西北及河南、

湖北、四川、贵州、云南。

带根全草(狼尾巴花)：酸、苦，平。调经散瘀，清热消肿。用于月经不调，痛经血崩，感冒风热，咽喉肿痛，乳痈，跌打损伤。

**展枝过路黄**

**Lysimachia brittenii** R. Knuth

生于山地林下。分布于湖北。

全草：用于红肿，痈，疖。

**泽珍珠菜**　灵疾草(陕西)，小硼砂(贵州)，泽星宿菜(植物分类学报)

**Lysimachia candida** Lindl.

生于海拔300—2 500米的路旁潮湿处及水田中。分布于华东、中南、西南及陕西、甘肃。

全草(单条草)：辛，凉。有毒。解热，凉血，活血。用于痈疮肿毒，跌打伤痛。

**细梗香草**　排草、香草(四川)，毛柄珍珠菜(广西植物名录)

**Lysimachia capillipes** Hemsl.

生于海拔2 000米的山坡路边、林下。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草(排香草)：甘，平。祛风，止咳，调经。用于感冒，咳喘，风湿痛，月经不调，肾虚。

**石山细梗香草**

**Lysimachia capillipes** Hemsl. **var. cavaleriei** (Lévl.) Hand.-Mazz.

生于林下、沟边等阴湿处。分布于广东、广西、贵州、云南。

全草：用于肝炎，肝癌。

**浙江过路黄**

**Lysimachia chekiangensis** C. C. Wu

生于路边、沟边及荒地。分布于浙江。

全草：微苦，凉。清热解毒，利尿通淋，消肿散瘀。

**过路黄**　寸金丹(陕西)，对座草(江苏、上海、浙江)，临时救(浙江)，遍地黄(湖南)，窝里俄(苗语)

**Lysimachia christinae** Hance

生于海拔2 000米以下的山坡疏林下、路旁阴湿处。分布于华东、西南及河北、山西、陕西、甘肃、福建、河南、湖北、湖南、广东、广西。

全草(金钱草)：甘、咸，微寒。清利湿热，通淋，消肿。用于热淋，沙淋，尿涩作痛，黄疸尿赤，痈肿疔疮，毒蛇咬伤，肝胆结石。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。② **点腺过路黄 L. hemsleyana** Maxim. 在四川作金钱草入药。

**露珠珍珠菜**　黄金楼、见缝合、对叶红线草(陕西)

**Lysimachia circaeoides** Hemsl.

生于海拔2 000米以下的石灰岩草坡、沟旁、湿地。分布于陕西、江西、湖北、四川、贵州。

带根全草(水红袍)：苦、辛，寒。活血散瘀，消肿止痛，凉血止血，生肌。用于骨折，跌

打损伤，外伤出血，烧、烫伤，疮疖，乳痛，咽喉痛，毒蛇咬伤。

**珍珠菜**　红丝毛(陕西)，红根草(浙江)，矮脚荷(江西)，散血草(湖南)，大红袍(贵州)

**Lysimachia clethroides** Duby

生于海拔 2 700 米以下的山坡、路旁、田埂及溪边草丛中。分布于东北、华东、中南、西南及陕西。

根或全草(珍珠菜)：辛、涩，平。活血调经，利水消肿。用于月经不调，带下病，小儿疳积，水肿，痢疾，跌打损伤，咽喉痛，乳痈，石淋，胆囊炎。

**聚花过路黄**　风寒草、红头蝇(四川)

**Lysimachia congestiflora** Hemsl.

生于海拔(1 100)—1 300—2 100(—3 000)米的林下阴湿处、路边及荒地。分布于华东、中南及陕西、甘肃、四川、贵州、云南。

全草(小过路黄)：甘、辛，微温。祛风散寒。用于感冒咳嗽，头痛身痛，泄泻，小儿疳积，蛇咬伤。

**厚叶香草**

**Lysimachia crassifolia** C. Z. Gao et D. Fang

生于石山灌丛中、林下阴湿处。分布于广西。

叶：外用于疮疖。

**黄连花**

**Lysimachia davurica** Ledeb. ——*L. vulgaris* L. var. *davurica* (Ledeb.) R. Knuth

生于林下、路旁、草丛中。分布于东北、华北、华东及云南。

带根全草(黄连花)：酸、涩，微寒。镇静，降血压。用于高血压症，失眠。

**延叶珍珠菜**

**Lysimachia decurrens** Forst. f.

生于海拔 500—1 400 米的山谷林下或沟边草丛中。分布于江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全草(疬子草)：苦、辛，平。活血调经，消肿散结。用于月经不调；外用于跌打损伤，瘰疬。

**小叶金黄**

**Lysimachia deltoides** Wight var. **cinerascens** Franch.

生于海拔 1 000—3 000 米的山坡草地、灌丛中或岩缝中。分布于广西、四川、贵州、云南。

全草：微甘，平。消热解毒，除湿止痛。用于腹痛，风湿关节痛。

**独山香草**

**Lysimachia dushanensis** Chen et C. M. Hu

生于林下阴湿处。分布于广西、贵州。

全草：用于跌打损伤。

**纤柄香草**　排草(广西)

**Lysimachia filipes** C. Z. Gao et D. Fang

生于石山岩洞内。分布于广西。

全草：外用于跌打损伤。

**管茎过路黄**　　头顶一朵花(湖北)

**Lysimachia fistulosa** Hand.-Mazz.

生于林下。分布于湖北、湖南、四川。

全草：用于毒蛇咬伤。

**灵香草**　　排草(植物名实图考)

**Lysimachia foenum-graecum** Hance

生于海拔800—1 700米的林下及山谷阴湿地带。分布于湖南、广东、广西。

全草(灵陵香)：辛、甘，温。祛风寒，辟秽浊。用于伤寒，感冒头痛，胸腹胀满，鼻塞，牙痛。

**大叶过路黄**　　大叶排草(中国高等植物图鉴)

**Lysimachia fordiana** Oliv.

生于海拔750—1 000米的山谷林下、溪边等阴湿处。分布于广东、广西、云南。

根：用于跌打损伤，咽喉痛，痈毒，毒蛇咬伤。

**星宿菜**　　红筋草(浙江)，血丝草(江西)，定经草(福建)，泥鳅菜(广东)，百煎草(广西)，红根草(植物名实图考)

**Lysimachia fortunei** Maxim

生于路旁、田埂及溪边草丛中。分布于华东、中南。

全草(星宿菜)：苦、涩，平。活血，散瘀，利水，化湿。用于跌打损伤，关节风湿痛，经闭，乳痈，瘰疬，目赤肿痛，黄疸，疟疾，痢疾。

**福建过路黄**　　福建排草(中国高等植物图鉴)

**Lysimachia fukienensis** Hand.-Mazz.

生于荒山草坡及疏林中。分布于浙江、江西、福建、广东。

全草：微酸，平。祛风止咳，调经。

**腺萼珍珠菜**

**Lysimachia glanduliflora** Hanelt.

生于山坡荒地。分布于江西、河南、湖北。

全草：用于月经不调，跌打损伤。

**金爪儿**　　枪伤药、小救架、雷公须(贵州)，窝纱衣(苗语)

**Lysimachia grammica** Hance

生于路边及荒地中。分布于陕西、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北。

全草(金爪儿)：酸、苦，凉。止血解热，理气活血，拔毒消肿，定惊止搐。用于小儿急惊，鼻肿痛，中耳炎，跌打损伤，刀斧伤。

**叶苞过路黄**

**Lysimachia hemsleyi** Franch.——*L. franchetii* R. Knuth

生于海拔1 900—3 100米的林下、路边灌丛中。分布于四川、贵州、云南。

全草：清热解毒，利尿通淋。

**黑腺珍珠菜**　满天星(江苏南部种子植物手册)

**Lysimachia heterogenea** Klatt

生于水边湿地。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖北、湖南、广东。

全草：苦、酸，平。行气破血，消肿解毒。

**三叶香草**　节骨草、解毒草(广西)，八爪金龙(贵州)，三块瓦(广西，云南)

**Lysimachia insignis** Hemsl.

生于海拔700—1 500米的山谷林下阴湿地。分布于广西、贵州、云南。

全草(三张叶)：辛、苦，温。活血散瘀，行气止痛，疏风通络，平肝。用于风湿腰痛，高血压症，头晕，黄疸，虚劳咳嗽，胃胀寒痛，跌打损伤，骨折。

**小茄**

**Lysimachia japonica** Thunb.

生于路旁及空旷荒地中。分布于江苏、浙江、台湾、海南。

全草：祛瘀，消肿。

**景东香草**　小果香草(植物分类学报)，小果排草(云南种子植物名录)

**Lysimachia jingdongensis** Chen et C. M. Hu

生于海拔1 950—2 550米的林下阴湿处。分布于云南。

全草：补虚，疏风通气，通经活血，活血，止咳，退热止痛。

**轮叶过路黄**　见血住(湖北)，轮叶排草(中国高等植物图鉴)

**Lysimachia klattiana** Hance

生于山坡、路边及荒地。分布于华东及河南、湖北、湖南。

带根全草(黄开口)：微酸、涩，凉。降血压，止血，解蛇毒。用于高血压症，肺痨咯血；外用于毒蛇咬伤，外伤出血。

**长叶香草**

**Lysimachia lancifolia** Craib

生于海拔1 200—1 540米的山坡常绿林下。分布于云南。

全草：用于风湿痛，跌打损伤。

**临桂香草**　鸟龟草(广西)

**Lysimachia linguiensis** C. Z. Gao

生于林下、山谷阴湿处。分布于广西。

全草：用于肺痨，子痛。

**长蒌珍珠菜**　刀口药(贵州)，乳肿药(广西)

**Lysimachia lobelioides** Wall.

生于山地沟谷、溪边湿地。分布于广西、四川、贵州、云南。

全草(花被单)：甘，平。补虚，镇咳，止血。用于虚症咳嗽，乳房肿痛，刀伤。

**长梗过路黄**

**Lysimachia longipes** Hemsl.

生于低山坡、山谷、溪沟边及林下阴湿草丛中。分布于安徽、浙江、江西、福建。

全草：用于小儿惊风，肺痨咳血，疟疾。

**山萝过路黄**

**Lysimachia melampyroides** R. Knuth

生于山谷林下。分布于江西、湖北、湖南、广西、四川、贵州。

全草：用于跌打损伤，深部脓肿。

**垂花香草**

**Lysimachia nutantiflora** Chen et C. M. Hu

生于山谷、山坡林下。分布于广西。

全草：用于疮疖。

**峨眉过路黄**

**Lysimachia omeiensis** Hemsl.

生于荒坡及灌木林下。分布于四川、云南。

全草：清热，解毒，消肿。

**琴叶过路黄**

**Lysimachia ophelioides** Hemsl.

生于山谷林下。分布于湖北、四川。

全草：用于咳嗽痰多，咽喉肿痛，泄泻，小儿惊风。

**耳柄过路黄**

**Lysimachia otophora** C. Y. Wu ex Wu et Li

生于海拔600—1 700米的山地林下、溪旁及山谷阴湿处。分布于广西、云南。

全草：用于疮疡肿毒。

**落地梅**　四片瓦、四大块瓦(湖南)，重楼排草(中国高等植物图鉴)

**Lysimachia paridiformis** Franch.

生于海拔350—600米的林下及山谷阴湿处。分布于湖北、湖南、四川、贵州。

全草(四块瓦)：辛，温。有毒。祛风，除湿，活血，散瘀。用于风寒咳嗽，风湿麻木，月经不调，跌打损伤。

**狭叶落地梅**　惊风伞、公接骨丹(贵州)，伞叶排草(中国高等植物图鉴)

**Lysimachia paridiformis** Franch. var. **stenophylla** Franch.

生于海拔800—1 600米的林下及沟边阴湿处。分布于湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根或全草(追风伞)：苦、辛，温。祛风，活血。用于风湿痹痛，半身不遂，跌打损伤，小儿惊风。

附　注：四川有作四块瓦入药。

**小叶星宿菜**

**Lysimachia parvifolia** Franch. ex Hemsl.

生于林下、溪边湿地。分布于江苏、上海、浙江、安徽、江西、福建、河南、湖北、湖南、广东、四川、贵州、云南。

全草：行气止血，消肿散瘀。

**巴东过路黄**　铺地黄(湖南)

**Lysimachia patungensis** Hand.-Mazz.

生于山谷、溪边及疏林下。分布于浙江、安徽、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四

川、贵州。

全草：微苦，凉。清热解毒，利尿通淋，消肿敛疮。

**狭叶珍珠菜**

**Lysimachia pentapetala** Bunge

生于山坡、路边湿地。分布于东北、华北及陕西、甘肃、山东、安徽、河南、湖北。

全草：祛风解毒，消肿。

**叶头过路黄**　　姜花草、痰药(四川)

**Lysimachia phyllocephala** Hand. -Mazz.

生于海拔900—2 400米的阴湿路边草丛中。分布于浙江、江西、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

全草(大过路黄)：淡，平。祛风，清热，化痰。用于风热喉痛，咳嗽，大便带血，腹痛，热毒疮。

**疏头过路黄**

**Lysimachia pseudo-henryi** Pamp.

生于林下、山坡路边。分布于陕西、浙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广东、四川。

全草：用于黄疸，痢疾，无名肿毒，跌打损伤。

**点地落叶梅**

**Lysimachia punctatilimba** C. Y. Wu et Li

生于海拔1 300—1 900米的密林中、溪边及山谷林下。分布于湖北、云南。

全草：用于血淋，结石，无名肿毒。

**折瓣珍珠菜**

**Lysimachia reflexifolia** Hand.-Mazz.

生于海拔1 700—2 200米的草坡。分布于四川、云南。

全草：清热解毒，消肿，止血、止咳。

**显苞过路黄**

**Lysimachia rubiginosa** Hemsl.

生于溪边、林下等阴湿处。分布于浙江、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

全草：祛风，清热，化痰。

**阔叶假排草**

**Lysimachia sikokiana** Miq. subsp. **petelotii** (Merr.) C. M. Hu

生于林下、溪边、山岩阴湿处。分布于湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草：用于乳痈。

**茂汶过路黄**　　筷子草、背花草、高坡酸(贵州)

**Lysimachia stellarioides** Hand. -Mazz.

生于林下、路边阴湿处。分布于四川。

全草(退血草)：酸、凉。清热拔毒，利湿。用于目赤，泄泻，痞背，乳痈。

**腺药珍珠菜**

**Lysimachia stenosepala** Hemsl

生于海拔1 300—1 900米的山坡、溪边湿地及灌丛中。分布于陕西、浙江、江西、湖北、

湖南、四川、贵州、云南。

全草：苦、酸、涩，平。行气破血，消肿解毒。

**毛黄连花**

**Lysimachia vulgaris** L.

生于湿草地。分布于新疆。

全草：活血调经，散瘀消肿。

## 羽叶点地梅属　Pomatosace L.

**羽叶点地梅**　　热衮巴(藏语)

**Pomatosace filicula** Maxim.

生于高山河滩地、高山草甸及山坡草地。分布于青海、四川、西藏。

全草：苦、辛，寒。平肝，凉血，止血.镇痛。用于降血压。

## 报春花属　Primula L.

**冷报春**　　寒地报春(中国植物志)

**Primula algida** Adams

生于海拔1 600—3 000米的向阳山坡、草甸及河滩林下。分布于新疆。

全草：活血化瘀，祛湿止痛。

**白心球花报春**　　象治恩保(藏语)

**Primula atrodentata** W. W. Smith

生于海拔2 400—4 700米的林下、灌丛草地或山坡草甸。分布于西藏。

花：止泻。

**巴塘报春**

**Primula bathangensis** Petitm.

生于海拔1 600—3 000米的灌丛边、石灰岩缝中。分布于四川、云南。

全草：苦、平。清热解毒，消炎。

**木里报春**

**Primula boreio-calliantha** Balf. f. et Forr.——*P. muliensis* Hand.-Mazz.

生于海拔(3 300)—3 900—4 200米的石灰岩冷杉密林中。分布于四川、云南。

花：苦、寒。清热燥湿，泻肝，止血。

**黔西报春**　　贵州报春(拉汉种子植物名称)

**Primula cavaleriei** Petitm.

生于山坡阴湿处。分布于贵州、云南。

全草：清热解毒。

**垂花穗状报春**

**Primula cernua** Franch.

生于海拔 2 700—3 650(—3 900)米的山坡林下阴湿处或湿润岩缝中。 分布于四川、云南。

根(米伞花): 辛、甘,平。补虚,通乳。用于肺痨咳嗽,乳汁不下。

**中甸灯台报春** 中甸报春(中国高等植物图鉴)

**Primula chungensis** Balf. f. et Ward

生于海拔 1 700—4 360 米的山坡林间草地和水边。分布于四川、云南、西藏。

根: 补虚、通乳。

**毛茛叶报春**

**Primula cicutariifolia** Pax——*P. ranunculoides* Chen; *P. ranunculoides* Chen var. *minor* Chen

生于低、高丘陵地带的阴湿山谷、沼泽中分布于浙江、安徽、江西、湖北、湖南。

全草: 用于毒蛇咬伤。

**滇北球花报春**

**Primula denticulata smith subsp. sinodenticulata** (Balf. f. et Forr.) W.W. Smith—— *P. sinodenticulata* Balf. f. et Forr.

生于灌木林下。分布于四川、贵州、云南。

带根全草(三月花): 辛、微苦,微温。止血,消疳。 用于产后流血不止,红崩,小儿疳积。

**石岩报春**

**Primula dryadifolia** Franch.

生于海拔 3 400—5 200 米的石灰岩山坡或高山草甸。分布于四川、云南、西藏。

全草: 清热燥湿,泻肝止血。

附 注: 功效相同的有**宝兴报春 P. moupinensis** Franch.; **掌叶报春 P. palmata** Hard.-Mazz.

**无粉报春**

**Primula efarinosa** Pax

生于海拔 1 300—2 000 米的林缘湿润处。分布于湖北、四川。

根: 用于毒蛇咬伤。 全草: 用于劳伤。

**二郎山报春** 西南报春(拉汉种子植物名称)

**Primula epilosa** Craib——*P. cheniana* Fang

生于海拔 2 000—2 900 米的林缘和灌木林下。分布于四川。

根(豆叶参): 甘、辛,凉。清湿热,祛风痰。用于头昏,耳聋,湿热黄疸,尿少色黄。

**峨眉报春** 峨山雪莲花(四川)

**Primula faberi** Oliv.

生于海拔 2 725—3 375(—3 900)米的林下阴湿处。分布于四川、云南。

带根全草(峨山雪莲花): 苦、辛、凉。清热除湿,止汗。 用于五淋癃闭,男子白浊,带下病。

**红花粉叶报春** 粉报春(拉汉种子植物名称,中国植物志)

**Primula farinosa** L.

生于海拔 2 300 米以下的阴坡林下。河滩沼泽化草甸。分布于东北及内蒙古。

全草：消肿愈疮，解毒。用于疖痈，创伤。

附　注：蒙族用药。

**束花报春**　　束花粉报春(西藏植物志)

**Prumula fasciculata** Balf. f et Ward

生于海拔 3 300—4 500 米的沼泽地、草甸。分布于甘肃、青海、四川、云南、西藏。

全草：辛、苦、涩，微寒。清热解毒，清肿止痛，消炎止血。

**黄花粉叶报春**　　香智赛饶(藏语)

**Prumula flava** Maxim.

生于海拔 3 000—4 400 米的林缘、灌丛、高山山坡。分布于甘肃、青海、四川。

全草：苦，寒。清热解毒，止血，消肿，止痛。用于水肿，烫伤。

附　注：藏族用药。

**小报春**　　痢头花(云南)

**Primula forbesii** Franch.

生于海拔 1 500—2 000 米的田边及湿草地。分布于云南。

全草(小报春花)：辛、微甘，凉。清热解毒，消肿止痛。用于高热咳嗽，小儿风热咳喘，咽喉痛，口腔破溃，乳蛾，牙痛，目赤红肿，水肿，外伤出血，跌打损伤，瘀血。

**灰岩皱叶报春**　　鹿角七、石捞参(云南)

**Primula forrestii** Balf. f.

生于海拔 2 900—3 300 米的石灰岩缝中。分布于四川、云南。

根(松打七)：苦、涩，平。祛风除湿，舒筋活络，止咳化痰。用于咳嗽，痰多，风湿痛，泄泻，内、外伤出血，跌打扭伤。

**苞芽报春**　　苞芽粉报春(西藏植物志)

**Primula gemmidera** Batal.

生于海拔 4 100—4 300 米的疏林下或山谷阴坡积水处。分布于甘肃、四川、西藏。

全草：用于水肿，炭疽病。

**厚叶苞芽报春**

**Primula gemmifera** Batal. var. **amoena** Chen

生于海拔 3 900—4 200(—4 375)米的溪边草地、山坡草甸。分布于四川、云南。

全草：清热解毒，止痛。

**太白山紫穗报春**

**Primula giraldiana** Pax.

生于海拔 3 000—3 700 米的山坡林下或草坡。分布于陕西。

全草：清热，泻火，止血。

附　注：陕西特有药用植物。

**雅江报春**

**Primula involuclata** Wall. subsp. **yargongensis** (Petitn.) W. W. Smith——*P. yargongensis* Petitm.

生于海拔 3 100—4 325 米草坡、沼泽地及草甸。分布于四川、云南、西藏。

全草：用于淋证，小便混浊。

**贵州报春**

**Primula kweichouensis** W. W. Smith

生于杂木林下石灰岩石上。分布于贵州。

全草：清热解毒，除湿消肿。

**报春花**

**Primula malacoides** Franch.

生于海拔 1 800—3 000 米的林缘、荒野、田边等阴湿处。分布于广西、贵州、云南。

全草：利水消肿，止血。

**胭脂花**

**Primula maximowiczii** Regel

生于海拔 2 000—2 900 米的沟谷或溪边。分布于吉林、河北、内蒙古、山西、陕西。

全草：清热解毒，止痛，祛风。用于癫痫，头痛。

附　注：蒙族用药。

**新疆报春**

**Primula nivalis** Pall. var. **farinosa** Schrenk——*P. nivalis* Pall. var. *turkestanica* Haage et Schmidt

生于海拔 3 000—4 500 米的阴湿岩缝及高山草地。分布于新疆。

全草：活血化瘀，祛湿止痛。

**天山报春**　西伯利亚报春(中国高等植物图鉴)

**Primula nurtans** Georgi——*P. sibirica* Jacq

生于高山草甸及河滩沼泽地。分布于内蒙古、甘肃、青海、新疆、四川。

全草：苦，寒。清热解毒，止血止痛，敛疮。

**鄂报春**

**Primula obconica** Hance

生于海拔 1 000—2 600 米的山地石灰岩地区，喜生于排水良好、富含腐殖质的土壤上。分布于中南、西南及江西。

根(鄂报春)：用于腹痛，酒精中毒。

**齿萼报春**

**Primula odontocalyx** (Franch.) Pax——*P. petiolaris* Wa Wall. var. *odontocalyx* Franch.

生于山坡林下、草丛中。分布于陕西、甘肃、河南、湖北、四川。

根：用于腹痛。

**卵叶报春**

**Primula ovalifolia** Franch.

生于海拔 600—2 500 米的林下、路边或沟边。分布于湖北、湖南、四川、贵州。

全草：清热解毒，消肿止痛。用于肺热咳嗽，风湿病，食积。

**羽叶穗花报春**

**Primula pinnatifida** Franch.

生于海拔 3 600 米的冷杉林下或高山悬崖雪沟中。分布于四川、云南。

全草：清热燥湿，止血。

**滇海水仙花**

**Primula pseudodenticulata** Pax

生于海拔 1 500—2 300 米的沼泽地、泉边。分布于四川、云南。

全草：微苦、麻、凉。解毒，接骨，祛瘀。用于小儿发热，脱肛，骨折，跌打劳伤，外伤红肿，瘀血。

**丽花报春**

**Primula pulchella** Franch.——*P. pulchelloides* Ward

生于海拔 2 000—4 000 米的石灰岩上或阳坡谷地。分布于四川、云南、西藏。

全草：清热解毒，消肿止痛。

**樱草**

**Primula sieboldii** E. Morren

生于海拔 1 360—2 500 米的山地沟谷、林下及河滩草地。分布于东北及河北、内蒙古。

根(翠蓝草)：甘，平。止咳化痰，平喘。用于上呼吸道感染，咽喉痛，咳嗽痰喘。

**锡金报春**　曲门巴、象治塞保(藏语)，钟花报春(西藏植物志，中国植物志)

**Primula sikkimensis** Hook.

生于海拔 3 200—4 730 米的林下阴湿处、湿草甸及泉边。分布于四川、云南、西藏。

花：苦，寒。清热燥湿，泻肝胆火，止血。用于小儿高热抽搐，泄泻，痢疾。

附　注：功效相同的有**偏花叶报春 P. secundiflora** Franch.

**藏报春**　年景花(四川)

**Primula sinensis** Sabine ex Lindl.

生于山坡林下阴湿处或温室栽培。分布于陕西、甘肃、湖北、四川、贵州。

全草：用于皮疹。

**铁梗报春**

**Primula sino-listerii** Balf. f. ——*P. obconica* Hance subsp. sino-listeri (Balf. f.) W. W. Smith

生于海拔 2 000—3 100 米的草坡及疏林中。分布于云南。

全草：苦，平。清热，消炎。

附　注：功效相同的有**糙叶铁梗报春 P. sino-listerii** Balf. f. var. **aspera** W. W. Smith et Fletch.

**苣叶报春**

**Primula sonchifolia** Franch.

生于海拔 3 000—4 500 米的冷杉、杜鹃林下。分布于四川、云南、西藏。

全草：辛、甘，凉。清热利湿。用于小便淋痛，淋浊，带下病。

**四川报春**

**Primula szechuanica** Pax

生于林下阴湿处。分布于湖北、四川、云南。

全草(偷筋草)：活血散瘀。用于跌打损伤。

**甘青报春**　　香智莫葛(西藏)，奥勒西(藏语)

**Primula tangutica** Duthie

生于海拔 3 000—4 000 米的高山草原、近水沼泽地带及林下。分布于甘肃、青海，宁夏、四川。

种子：辛、苦、涩，微寒。清热解毒，安神止痛。用于疮疖，肺痨，神经痛，关节痛，心脏病。

附　注：青海藏药。

**高穗报春花**

**Primula vialii** Delav. ex Franch.

生于海拔 2 800—3 500 米的沼泽草甸、草地及灌丛中。分布于四川、云南。

全草：清热燥湿，泻肝，止血。

**云南报春**

**Primula yunnanensis** Franch.

生于海拔 2 800—3 600 米的石灰岩上。分布于四川、云南。

全草：清热泻火，止血。

## 假婆婆纳属　Stimpsonia Wright ex A. Gray

**假婆婆纳**

**Stimpsonia chamaedryoides** Wright ex A. Gray

生于丘陵林下或草丛中。分布于江苏、浙江、安徽、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、贵州。

全草：活血，消肿止痛。

# 143. 白花丹科　Plumbaginaceae

## 蓝雪花属　Ceratostigma Bunge

**小蓝雪花**　　风湿草、监花岩陀(云南)，小角柱花(中国高等植物图鉴)

**Ceratostigma minus** Stapf ex Prain

生于海拔 1 000—4 500 米的旱山坡、干热河谷的岩壁或砾石砂质土上。分布于西南及甘肃、西藏。

根(紫金标)：辛、苦，温。有毒。通经活络，祛风湿。用于风湿麻木，脱疽，跌打劳伤。

**蓝雪花**　　山灰柴、假靛(河南)，角柱花(中国高等植物图鉴)

**Ceratostigma plumbaginoides** Bunge

生于海拔 1 000 米以下的浅山山麓或平地上。分布于河北、山西、山东、江苏、上海、浙江、河南。

根(紫金莲)：甘，温。活血止痛，化瘀生新。用于跌打损伤，接骨。

附　注：功效相同的有**岷江蓝雪花 C. willmottianum** Stapf。

## 补血草属　Limonium Mill.

**黄花补血草**　黄花苍蝇架(内蒙古)，黄星子白(宁夏)，金佛花(青海)，黄花矾松(东北植物检索表)，金色补血草(中国高等植物图鉴)

**Limonium aureum** (L.) Hill——*Statice aurea* L.

生于海拔1 000—3 800米的黄土坡、河滩砾石地及荒漠草原。分布于西北及黑龙江、辽宁、河北、内蒙古、四川。

花(金匙叶草)：淡，凉。止痛，解毒，补血。用于神经痛，月经少，乳汁少，耳鸣；外用于各种炎症。

**二色补血草**　苍蝇架、苍蝇花(东北)，蝇子架(陕西、甘肃)，二色匙叶草(山东大学学报)

**Limonium bicolor** (Bunge) O. Kuntze——*Statice bicolora* Bunge

生于海拔500—2 000米的海滨碱滩草地、沙丘。分布于东北、黄河流域各省区及江苏。

带根全草(二色补血草)：甘，平。补血，止血，散瘀，调经，益脾，健胃。用于崩漏，尿血，肾盂肾炎，月经不调。

**大叶补血草**　克迷克、拜赫曼(维吾尔语)

**Limonium gmelinii** (Willd.) O. Kuntze——*Statice gmelinii* **Willd.**

生于盐渍化荒地或碱水湖边。分布于新疆。

全　草：清热祛湿，止血散瘀。

附　注：根含单宁较多(10—18%)，产地民间传统用以鞣革。

**补血草**　海蔓荆(河北)，海赤芍(福建)，鲂仔草(台湾)，中华补血草(中国高等植物图鉴)

**Limonium sinense** (Girard) O. Kuntze——*Statice sinensis* Girard

生于海滨盐碱地、沙碱地。分布于辽宁、河北、天津、山东、江苏、浙江、福建、台湾、广东、海南、广西。

根：苦，微寒。清热，祛湿，补血。用于湿热便血，血淋，痔疮出血，月经不调。

**海芙蓉**　石苋蓉(台湾)

**Limonium wrightii** (Hance) O. Kuntze——*Statice wrightii* Hance; *L. arbusculum* (Maxim.) Makino

生于海岸和岛屿的岩石缝隙中。分布于台湾。

全草(海芙蓉)：咸，温。用于风湿头痛，高血压症。

## 鸡娃草属　Plumbagella Spach

**鸡娃草**　鹅斯恪莫日(藏语)，小蓝雪花(中国高等植物图鉴)

**Plumbagella micrantha** (Ledeb.) Spach——*Plumbago micrantha* Ledeb. *P*

*spinosa* Hao

生于海拔 2 000—4 350 米的湿寒山区的山谷、山坡下部向阳草丛中。分布于甘肃、宁夏、青海、新疆、四川、西藏。

全草：苦，寒。解毒、杀虫。用于神经性皮炎，牛皮癣，头癣，手癣，足癣，疣痣。

## 白花丹属 Plumbago L.

**紫花丹** 紫花藤、谢三娘(广东)

**Plumbago indica** L.

生于海拔 200—1 980 米向阳湿润而土质松软的丘陵、山坡。分布于海南、广西、云南，南方其他地区亦有栽培。

花及全草(紫雪花)：辛，温。破血，止痛，调经。用于经闭，经期腹痛，湿癣，溃疡。

**白花丹** 乌面马(台湾)，一见消(海南)，照药(广西)，白皂药(四川)

**Plumbago zeylanica** L.

生于海拔 150—1 600 米的阴湿处或半阴处。分布于福建、台湾、湖北、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根及全草：辛、苦、涩，温。有毒。祛风，散瘀，解毒，杀虫。用于风湿关节痛，血瘀经闭，跌打损伤，肿毒恶疮，疥癣。

# 144. 山榄科 Sapotaceae

## 金叶树属 Chrysophyllum L.

**金叶树** 大横纹(广东)

**Chrysophyllum lanceolatum** (Bl.) A. DC. **var. stellatocarpon** van Royen

生于山坡杂木林中。分布于广东、海南、广西。

根(大横纹)：甘、涩，温。活血祛瘀，消肿止痛。用于跌打瘀肿，风湿关节痛，骨折，脱臼。

## 梭子果属 Eberhardtia Lecte

**锈毛梭子果** 油柯木(广东)，山枇杷、血胶树(云南)

**Eberhardtia aurata** (Pierre ex Dubard) H. Lecomte——*Planchonella aurata* Pierre ex Dubard; *Pouteria aurata* (Pierre ex Dubard) Baehni

生于海拔 190—1 350 米的山地常绿阔叶林、混交林中。分布于广东、广西、云南。

叶：用于咳嗽，顿咳。

## 紫荆木属 Madhuca J. F. Gmel.

**紫荆木** 马胡卡(广东)，铁色、木花生(广西)，出奶木(云南)

**Madhuca pasquieri** (Dubard) Lam.——*Dasillipe pasquieri* Dubard; *M. subquincuncialis* Lam. et Kerpel

生于海拔 1 300 米以下的山地疏林或灌丛中。分布于广东、海南、广西、云南。

根：用于风湿性心脏病。

## 铁线子属　Manilkara Adans.

**人心果**

**Manilkara zapota** (L.) van Royen——*Achras zapota* Linn.

原产美洲热带。我国广东、广西、云南有栽培。

树皮：用于胃痛，泄泻，乳蛾。果实：用于胃脘痛。

# 145. 柿科　Ebenaceae

## 柿属　Diospyros L.

**乌柿**　丁香柿(浙江)，山柿子(四川)

**Diospyros cathayensis** A. N. Steward

生于海拔 600—1 500 米的河谷、山地或山谷林中。分布于安徽、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

根(黑塔子)：苦、涩，凉。清热除湿。用于痔疮，肠风下血，风火牙痛，肺热咳嗽。

叶：外用于疖肿，烧、烫伤。

**福州柿**

**Diospyros cathayensis** A. N. Steward var. **foochowensis** (Metc. et Chen) S Lee——*D. foochowensis* Metc. et Chen

生于山坡杂木林中。分布于福建、四川、贵州。

根(黑塔子根)：苦、涩，微寒。清热，凉血，通经，利水。用于肺热咳嗽，吐血，肠风下血，经闭，腹胀。　叶(黑塔子叶)：外用于疮疖，烧、烫伤。

**岩柿**　小叶柿、石柿花(云南)，涩米粒(彝语)

**Diospyros dumetorum** W W. Smith——*D. mollifolia* Rehd. et Wils.

生于海拔 700—2 700 米的山地灌丛、混交林下、山谷、河边或村边田畔。分布于四川、贵州、云南。

叶(紫藿香)：辛、涩、微苦，平。清热，解毒，健脾胃。用于小儿营养不良，泄泻，小儿消化不良；外用于疮，疖，烧、烫伤。

**乌材**　乌杆仔(台湾)，小叶乌椿、乌木(海南)，米汉(广西)

**Diospyros eriantha** Champ. ex Benth

生于海拔 500 米以下的山地林中、灌丛中或山谷溪边林中。分布于台湾、广东、海南、广西。

根皮、果实：用于风湿，疝气，心气痛。

**粉叶柿**　毛梨壳、鸡粪柿(浙江)，浙江柿(中国树木分类学)

**Diospyros glaucifolia** Metc.——*D. glaucifolia* Metc. var. *pubescens* Ling

生于山坡、山谷混交疏、密林中或山谷溪边林中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建。

叶、宿萼：苦、涩，温。温中下气。　果实：消渴，祛湿热。

**柿**

**Diospyros kaki** Thunb.——*D. sinensis* Naud.

原产长江流域，全国各地作为果树而普遍栽培。

根(柿根)：涩，平。凉血止血。用于血崩，血痢，下血。　树皮(柿木皮)：用于下血，汤火烫伤。　叶(柿叶)：苦，寒。降压，止血。用于高血压症，咳喘，肺气肿，各种内出血。　花(柿花)：外用于痘疮破烂。　果实(柿子)：甘、涩，寒。清热，润肺，止渴。用于热渴，咳嗽，吐血，口疮。　宿存花萼(柿蒂)：苦、涩，平。降逆下气。用于呃逆。　柿皮(外果皮)：外用于疔疮，无名肿毒；柿饼(经加工的果实)：甘、涩，寒。润肺，涩肠，止血。用于吐血，血淋，肠风，痔漏，痢疾。　柿漆(幼果经加工制成的胶状液)：涩、苦，凉。用于高血压病。　柿霜(加工柿饼的附产品)：甘，凉。清热，润燥，化痰。用于肺热燥咳，咽干喉痛，口舌生疮，吐血，消渴。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**野柿**　山柿、油柿(四川)，毛柿花、马楝榔(云南)

**Diospyros kaki** Thunb. **var. silvestris** Makino

生于海拔 1 600 米以下的山地的疏林或次生林、山坡灌丛中。分布于华东、中南及陕西、甘肃、四川、贵州、云南。

根、叶、宿萼：苦、涩，平。开窍辟恶，行气活血，祛痰，清热凉血，润肠。

**君迁子**　软枣、黑枣、牛奶柿(河北、山东、河南)

**Diospyros lotus** L.

生于海拔 500—2 300 米的山地、山坡、山谷灌丛中或林缘，亦有栽培。分布于华北、华东、西南及辽宁、陕西、甘肃、新疆、河南、湖北、湖南。

果实(君迁子)：甘、涩，凉。止渴，除痰，清热，解毒，健胃。用于消渴。

**罗浮柿**　山红柿、山柿(台湾)，山榉树、牛古柿、乌蛇木(广东)，野柿花(云南)

**Diospyros morrisiana** Hance

生于海拔 650—1 600 米的山坡、山谷疏、密林中或灌丛中。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

树皮、叶、果实(野柿花)：苦、涩，凉。解毒，收敛。用于食物中毒，泄泻，痢疾；外用于烧、烫伤。

**油柿**　漆柿、油绿柿、乌榉(江苏、浙江)，方柿(浙江)

**Diospyros oleifera** Cheng

生于海拔 1 000 米以下的山坡、沟旁阔叶林中或林缘，亦有栽培。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖南、广东、广西。

果实：清热，润肺。

**老鸦柿**　野山柿(江苏)，苦李、拳李、黑柿子(浙江)

**Diospyros rhombifolia** Hemsl.

生于海拔 2 000 米以下山坡灌丛或山谷沟边林中或栽培。分布于陕西、江苏、上海、安徽、浙江、江西、福建。

根或枝(老鸦柿): 苦、涩,平。活血利肝。用于肝硬化,黄疸,骨痨,跌打损伤。

**山榄叶柿** 凌扣、枚辣柿、喃咛(广西)

**Diospyros siderophylla** H. L. Li

生于海拔 400—500 米的石灰岩山地疏、密林中或山谷林中。分布于广西。

枝、叶: 用于皮癣。

## 146. 安息香科 Styracaceae

### 赤杨叶属 Alniphyllum Matsum.

**赤杨叶** 冬瓜木、白苍术(广东),红皮岭麻(海南),水冬瓜(广西),依果白(瑶语)

**Alniphyllum fortunei** (Hemsl.) Makino——*Halesia fortunei* Hemsl.; *A. fortunei* (Hemsl.) Makino f. *hypoglaucum* C. Y. Wu

生于海拔 200—2 200 米的常绿阔叶林中。分布于华东及湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根、心材: 理气和胃。

### 陀螺果属 Melliodendron Hand.-Mazz.

**陀螺果** 水冬瓜(广西),冬瓜木(云南),鸦头梨(中国高等植物图鉴)

**Melliodendron xylocarpum** Hand.-Mazz.——*M. wangianum* Hu

生于海拔 1 000—1 500 米的山谷、山坡阴湿林中。分布于江西、福建、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根、叶: 清热,杀虫。

### 白辛树属 Pterostyrax Sieb. et Zucc.

**白辛树** 鄂西野茉莉(中国树木分类学),裂叶白辛树(广西植物名录)

**Pterostyrax psilophyllus** Diels ex Perkins——*Styrax leveillei* Fedde ex Lévl.; *P. leveillei* (Fedde ex Lévl.) Chun

生于海拔 600—2 500 米的阴湿林中。分布于湖北、湖南、广西、四川、贵州,云南。

根皮: 散瘀。

### 木瓜红属 Rehderodendron Hu

**木瓜红** 野草果(云南)

**Rehderodendron macrocarpum** Hu——*R. mapienense* Hu

生于海拔 1 000—1 500 米的密林中。分布于广西、四川、云南。

花序：清热，杀虫。

## 安息香属 Styrax L.

**赛山梅** 油榨果(广东)，白扣子(广西)，白山龙(中国高等植物图鉴)

**Styrax confusus** Hemsl.——*S. fukienensis* W. W. Smithet Jeffrey

生于海拔 100—1 700 米的丘陵、山地疏林中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

叶、果实：辛，温。祛风除湿。

**垂珠花** 小叶硬田螺(浙江)，白花树(贵州)

**Styrax dasyanthus** Perkins

生于海拔 100—1 700 米的丘陵、山地、山坡及溪边杂木林中。分布于华东及河南、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

叶(白克马叶)：苦、甘，寒。润肺止咳。用于肺燥咳嗽。

**白花龙** 梦童子、响铃子(江西)，白龙条、扫酒树(广东)

**Styrax faberi** Perkins

生于海拔 100—600 米的低山区及丘陵地灌丛中。分布于华东及湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

根：用于胃脘痛。叶：用于外伤出血，风湿痹痛，跌打损伤。果实：用于感冒发热。

**老鸦铃** 赫斯黎野茉莉(峨眉植物图志)

**Styrax hemsleyanus** Diels

生于海拔 1 000—2 000 米的向阳山坡、疏林、林缘或灌丛中。分布于陕西、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

果实：驱虫，止痛。

**野茉莉** 君迁子(陕西)，木橘子(湖北)，耳完桃(广东)，黑茶花、茉莉苞(亨利氏中国植物名录)

**Styrax japonicus** Sieb. et Zucc.

生于海拔 400—1 800 米的山地疏林、灌丛中。分布于华东、中南及陕西、四川、贵州、云南。

全株：辛，温。祛风除湿。花：清火。用于咽喉肿痛，牙痛。

**玉铃花** 老丹皮、山楝子(山东)

**Styrax obassia** Sieb. et Zucc.

生于海拔 700—1 500 米的山坡、山谷杂木林中。分布于辽宁、河北、山东、江苏、安徽、浙江、江西、湖北。

果实：消肿止痛，驱虫。

**芬芳安息香** 野菱莉(浙江)，白木(广西)，郁香野茉莉(中国高等植物图鉴)

**Styrax odoratissimus** Champ.

生于海拔600—1 600米的阴湿山谷、山坡疏林中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、贵州。

叶：微苦，微温。祛风除湿，理气止痛，润肺止咳。

**粉花安息香**　粉花野茉莉(中国高等植物图鉴)

**Styrax roseus** Dunn

生于海拔1 000—2 300米的疏林中。分布于西南及陕西、湖北。

种子：清热解毒。

**皱叶安息香**

**Styrax rugosus** Kurz

生于海拔1 000—1 500米的混交林中。分布于云南。

树脂：开窍，辟秽，行气血。

**栓叶安息香**　红皮树、叶下白(台湾)，稠树(广东)，赤皮(广西)

**Styrax suberifolius** Hook. et Arn.

生于海拔100—3 000米的山地、丘陵地常绿阔叶林中。分布于长江流域以南各省区及台湾、海南。

根、叶(红皮)：辛，微温。祛风除湿，理气止痛。用于风湿关节痛，胃气痛。

**越南安息香**　泰国安息香(通称)，白花木(广东)，白脉安息香(广西)，牛奶树(云南)

**Styrax tonkinensis** (Pierre) Craib ex Hartw.——*Anthostryx tonkinensis* Pierre; *S hypoglaucus* Perkins; *S. subniveus* Merr. et Chun

生于海拔100—2 000米山坡、山谷疏林中或林缘。分布于江西、福建、湖南、广东、广西、贵州、云南。

树脂(安息香)：辛、苦，平。开窍，清神，行气，活血，止痛。用于中风痰厥，气郁暴厥，中恶昏迷，心腹疼痛，产后血晕，小儿惊风。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

## 147. 山矾科　Symplocaceae

### 山矾属　Symplocos Jacq.

**薄叶山矾**　薄叶冬青(中国树木分类学)

**Symplocos anomala** Brand

生于海拔1 000—1 700米的山地杂木林中。分布于西南及江苏、上海、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西。

果实：清热解毒，平肝泻火。

**总状山矾**

**Symplocos botryantha** Franch

生于海拔600—1 700米的山地林间。分布于湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

果实：补肝益肾，强筋壮骨。

**华山矾**　土常山(通称),檬子柴(江西),地黄木(广东),止血树、雷公针(广西)

**Symplocos chinensis** (Lour.) Druce——*Myrtus chinensis* Lour.

生于海拔 1 300 米以下的丘陵、山坡、杂木林中。分布于华东、中南、西南及陕西。

根：微苦,温。祛痰,止血,理气止痛。用于疟疾,水肿。　枝、叶(华山矾)：苦,凉。有小毒。清热利湿,止血生肌。用于痢疾,泄泻,创伤出血,水火烫伤,溃疡。

**十棱山矾**　鸟脚木(中国高等植物图鉴),上身眉(两广乔灌木名录)

**Symplocos chunii** Merr.

生于海拔 400—2 000 米的溪边或山坡疏、密林中。分布于海南、广西、贵州。

枝、叶：清热解毒。

**越南山矾**　火灰树(海南)

**Symplocos cochinchinensis** (Lour.) S. Moore——*Dicalix cochinchinensis* Lour. *S. ferruginifolia* Kanehira

生于海拔 1 500 米以下的溪边、路旁及热带阔叶林中。分布于西南及福建、台湾、广东、海南、广西。

花蕾：清热舒肝,解郁。

**南岭山矾**

**Symplocos confusa** Brand——*Bobua confusa* (Brand) Kanehira et Sasaki

生于海拔 500—1 600 米的溪边、路旁、石山或山坡阔叶林中。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、贵州、云南。

叶：辛、苦,平。清热利湿,理气化痰。

**密花山矾**

**Symplocos congesta** Benth.

生于海拔 200—1 500 米的密林中。分布于江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西。

根：用于跌打损伤。

**美山矾**

**Symplocos decora** Hance——*Dicalix decorus* (Hance) Migo

生于海拔 500—1 800 米的杂木林中或山谷边,亦有栽培。分布于浙江、广东、广西。

叶：清热解毒。

**长毛山矾**

**Symplocos dolichotricha** Merr

生于低海拔的路旁、山谷密林中。分布于广东、广西。

根：用于黄疸,水肿,泄泻,脾虚,消化不良,痞症。

**羊舌树**

**Symplocos glauca** (Thunb.) Koidz.——*Laurus glauca* Thunb.; *S. koshunensis* Kanehira

生于海拔 600—1 600 米的山坡林中,分布于浙江、福建、台湾、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根皮：用于感冒。

**团花山矾**

**Symplocos glomerata** King ex Gamble

生于海拔1 600—2 700米的山坡密林中。分布于云南、西藏。

根：用于跌打损伤。

**光叶山矾**　　刀灰树、滑叶常山(湖南)

**Symplocos lancifolia** Sieb. et Zucc. ——*S. fulvipes* (C. B. Clarke) Brand; *S. formosana* Brand

生于海拔1 500米以下的林中。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全株(刀灰树)：甘，平。和肝健脾，止血生肌。用于外伤出血，吐血，咯血，疳积，目赤红肿。　根：用于跌打损伤。

**黄牛奶树**　　泡花子(四川)，苦山矾(中国高等植物图鉴)

**Symplocos laurina** (Retz.) Wall.——*Myrtus laurina* Retz.

生于海拔1 600—3 000米的村边石山上，密林中。分布于华东、西南及湖南、广东、海南、广西。

树皮(泡花子)：苦、涩，凉。散寒清热。用于伤风头昏，热邪口燥，感冒身热。

**白檀**　　檀花青(陕西)，黄檀树(甘肃)，乌子树、地胡椒(云南)

**Symplocos paniculata** (Thunb.) Miq. ——*Prunus paniculata* Thunb. *S. paniculata* Wall.; *Palura chinensis* Nakai var. *pilosa* Nakai

生于海拔760—2 950米的山坡、路边、疏、密林中。分布于东北、华北、华东、中南、西南及陕西、甘肃。

全株：苦、涩，微寒。解毒，软坚，调气。用于乳痈，瘰疬，疝气，肠痈，胃癌，疮疖。

**叶萼山矾**　　茶条果(中国高等植物图鉴)

**Symplocos phyllocalyx** C. B. Clarke——*S. ernesti* Dunn

生于海拔2 600米以下的山地杂木林中。分布于西南及陕西、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西。

叶：用于疮毒，水火烫伤。

**柔毛山矾**

**Symplocos pilosa** Rehd.

生于海拔1 700—2 600米的山坡密林中。分布于云南。

根、树皮：清热。用于跌打损伤。

附　注：云南特有药用植物。

**珠仔树**　　总序山矾(拉汉种子植物名称)

**Symplocos racemosa** Roxb.

生于海拔130—1 600米的山坡林中。分布于海南、广西、四川、云南。

枝、叶：用于肝炎，风湿痹痛，跌打损伤，外伤出血。

**四川山矾**

**Symplocos setchuensis** Brand

生于海拔1 800米以下的山坡杂木林中。分布于华东及湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

全株：行水，定喘。用于水湿胀满，咳嗽，喘逆。

**多花山矾**

**Symplocos ramosissima** Wall. ex G. Don——*S. stapfiana* Lévl.

生于海拔 1 000—2 600 米的溪边、阴湿岩壁及密林中。 分布于西南及湖北、湖南、广东、广西。

根：生肌收敛。

**老鼠矢**

**Symplocos stellaris** Brand——*S. eriobotryaefolia* Hayata

生于海拔 1 600 米的山地、路旁或疏林中。 分布于长江流域以南各地区及台湾。

根：祛风，解毒。

**山矾** 尾叶山矾(浙江)，邦徐、那合徐(藏语)

**Symplocos sumuntia** Buch.-Ham. ex D. Don——*S. caudata* Wall.

生于海拔 200—1 500 米的向阳山坡林中。 分布于华东、西南及湖北、湖南、广东、海南、广西。

根(山矾根)：苦、辛，平。清湿热，祛风，凉血。 用于黄疸，痢疾，风火头痛，腰背关节痛，血崩。 叶(山矾叶)：微甘、涩，平。清热，收敛。用于肺痨咯血，便血，久痢，乳蛾，急性中耳炎。 花(山矾花)：苦、辛，平。理气化痰。用于咳嗽，胸闷。

**微毛山矾** 月橘叶灰木(台湾)，土常山(湖南)

**Symplocos wikstroemiifolia** Hayata——*Bobus wikstroemiifolia* (Hayata) Kanehira et Sasaki; *Dicalix wikstroemiifolius* (Hayata) Migo

生于海拔 900—2 500 米的山坡密林中。 分布于浙江、福建、台湾、湖南、广东、海南广西、贵州、云南。

根、叶：解表祛湿，解毒，除烦，止血。

## 148. 木犀科 Oleaceae

### 流苏树属 Chionanthus L.

**流苏树** 牛筋条、白花茶(陕西)，炭栗树(植物名实图考)

**Chionanthus retusus** Lindl. et Part.

生于海拔 100—3 300 米的向阳山坡、山沟。分布于华东及河北、山西、陕西、甘肃、河南、广东、广西、云南。

叶：清热，止泻。

### 雪柳属 Fontanesia Labill.

**雪柳** 五谷树(江苏)

**Fontanesia fortunei** Carr.

生于路旁、溪边，或栽培于村舍附近，在江南一带常作绿篱。 分布于华北、华东及陕

西、甘肃、河南、湖南、云南。东北至广东有栽培。

根：用于脚气病。

## 连翘属　Forsythia Vahl

**秦连翘**

**Forsythia giraldiana** Lingelsh.

生于海拔 1 200—1 700 米的山地。分布于陕西、甘肃、湖北、湖南、贵州。

果实：苦，微寒。清热解毒，消肿散结。

**丽江连翘**

**Forsythia likiangensis** Ching et Feng ex P. Y. Bai

生于海拔 2 500—2 600 米的山地。分布于云南。

果实：苦，微寒。清热解毒，消肿散结，利尿。用于咽喉痛，乳蛾，痈疮肿毒，瘰疬，丹毒，淋证。

**连翘**

**Forsythia suspensa** (Thunb.) Vahl——*Syringa suspensa* Thunb.; *Ligustrum suspensus* Thunb. ex Juel

生于海拔 1 000 米以下的山地或栽培于庭园。分布于东北、华北、西北及河南、湖北、湖南、贵州、云南。

果实(连翘)：苦，微寒。清热解毒，消肿散结。用于痈疽，瘰疬，乳痈，丹毒，风热感冒，温病初起，高热烦渴，神昏，发斑，热淋，尿闭。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**金钟花**　金梅花、金铃花(云南)

**Forsythia viridissima** Lindl.

生于海拔 2 800 米以下的低山或丘陵地带的水沟边、林下及灌丛中或栽培于庭园。分布于华东及陕西、甘肃、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

果实：苦，温。清热解毒，祛湿，泻火。

## 梣属　Fraxinus L.

**梣**　白蜡树(通称)，鸡糠树(云南)

**Fraxinus chinensis** Roxb.

生于海拔 700—2 050 米的山坡、沟谷林下。分布于华北、西北、华东、中南、西南及辽宁。

树皮(秦皮)：苦、涩，寒。清热燥湿，收敛，明目。用于热痢，泄泻，带下病，目赤肿痛，目生翳膜。叶(白蜡树叶)：辛，温。调经，止血，生肌。花(白蜡花)：止咳，定喘。用于咳嗽，哮喘。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②功效相同的有**小叶梣 F. bungeana** DC. 分布于东北、华北及陕西、江苏、河南、湖北；**水曲柳 F. mandshurica** Rupr. 分布于东北、华北及新疆、山东；**秦岭白蜡树 F. paxiana** Lingelsh. 分布于陕西、

湖北、湖南、四川；**尾叶梣 F. medicinalis** S. S. Sun ——*F. chinensis* Roxb. var. *acuminata* Lingelsh. 分布于河北、山西、陕西、甘肃、河南。

**锈毛白蜡树**　　跳皮树、锈毛白枪杆(云南)

**Fraxinus ferruginea** Lingelsh.

生于海拔 145—1 700 米的山坡林中。分布于云南。

树皮(跳皮树)：苦、涩，凉。收敛，消炎。用于顽固性泄泻、痢疾，蛔虫病。

**苦枥木**

**Fraxinus floribunda** Wall. subsp. **insularis** (Hemsl.) S. S. Sun——*F. insularis* Hemsl.; *F. retusa* Champ.

生于海拔 600—1 000 米的山谷林中。分布于陕西、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川，贵州。

树皮：清热燥湿。　枝、叶：外用于风湿痹痛。

**云南白蜡树**

**Fraxinus lingelsheimii** Rehd.

生于山坡林中。分布于云南。

树皮：清热燥湿，清肝明目。

**白枪杆**　　大皮药、造皮树(云南)

**Fraxinus malacophylla** Hemsl.

生于海拔 1 300 米的山坡林中。分布于云南。

根：苦、涩，寒。清热，利尿，通便。用于膀胱湿热，小便淋涩，石淋，便秘，疟疾。　树皮(大树皮)：消食，健胃，止痛。

附　注：为云南著名的民间抗疟药。

**短梗水曲柳**

**Fraxinus mandshurica** Rupr. var. **brevipedicella** S. Z. Qu et T. C. Chui

生于山地林中。分布于陕西。

树皮：苦、涩，寒。清热燥湿，收敛明目。

**大叶梣**　　苦枥白蜡树、花曲柳(东北木本植物图志)

**Fraxinus obovata** Bl.——*F. chinensis* Roxb. var. *rhynchophylla* (Hance) Hemsl.

生于山坡、疏林及沟旁。分布于东北、华北及陕西、山东、河南。

树皮：功效参见梣。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。② 东北作秦皮用。

**美洲绿梣**　　洋白腊树(华北经济植物志要)

**Fraxinus pennsylvania** Marsh. var. **lanceolata** (Borkh) Sarg.——*F. lanceolata* Borkh

原产北美。我国大部分地区有栽培，作行道树或园林绿化树种。

树皮、种子：清热燥湿，止痢，明目。

**柳叶梣**

**Fraxinus stylosa** Lingelsh.——*F. fallax* Lingelsh. *F. fallax* Lingelsh. var.

*stylosa* (Lingelsh.) Chu et J. L. Wu

生于海拔 1 500—3 200 米的山坡林中。分布于陕西。

树皮(秦皮)：功效参见桦。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 素馨属　Jasminum L.

**白萼素馨**　　青藤(广西)

**Jasminum albicalyx** Kobuski

生于灌丛中。分布于广西。

根、驱虫。用于蛔虫病。　叶：生肌。用于跌打损伤。

**扭肚藤**　　断骨草(广西)

**Jasminum amplexicaule** Buch.-Ham. ex G. Don

生于海拔 480—3 000 米的林中及路旁。分布于江西、广东、海南、广西、贵州、云南。

嫩茎叶：微苦，凉。清热，利湿。　用于湿热腹痛，痢疾，泄泻，四肢麻痹肿痛，瘰疬，疥疮。

**红茉莉**　　小铁藤(云南)，红素馨(植物分类学报)

**Jasminum beesianum** Forrest et Diels——*J. violascens* Lingelsh.

生于海拔 1 900—2 900 米的杂木林内开阔处或林缘路旁。分布于四川、贵州、云南。

全株(小酒瓶花)：微苦、涩，平。通经活络，利尿。用于经闭，风湿麻木，小便淋痛。

**密花素馨**　　清明花、白花断肠草(云南)

**Jasminum coarctatum** Roxb.

生于海拔 250—1 200 米的水边灌丛中。分布于广西、云南。

全株：有毒。祛风止痒，活血止痛。用于小儿疳积，皮肤瘙痒。

**夹竹桃叶素馨**

**Jasminum duclouxii** (Lévl.) Rehd.——*Melodinus duclouxii* Lévl.

生于海拔 1 200—2 400 米的山地疏林中。分布于广西、云南。

根：理气止痛、清热明目。用于腹痛，目赤红肿。

**探春花**　　山救驾(陕西)

**Jasminum floridum** Bunge

生于海拔 125—2 000 米的坡地或栽培于庭园。分布于黄河流域及江苏、湖北、湖南、四川、贵州。

根(小柳拐)：微苦、涩，温。生肌，收敛。用于刀伤。

**黄素馨**　　刺龙花、山救驾(陕西)，牛眼睛(甘肃)

**Jasminum floridum** Bunge. subsp. **giraldii** (Diels) Miao —— *Jasminum giraldii* Diels

生于海拔 540—1 500 米的山坡、山谷及灌丛中。分布于山西、陕西、甘肃、河南、湖北、四川。

根(荃皮)：微苦，涩，温。活血散瘀，生肌，收敛。用于跌打损伤，瘀血内滞，骨折，刀伤。

**栀花素馨**

**Jasminum gradeniiflorum** Chia

生于疏林中。分布于广西。

茎：用于慢性肝炎，肝硬化腹水，水肿，淋证，胆囊炎，肺炎，肺痨。

**矮素馨**

**Jasminum humile** L.——*J. humile* L. var. *siderophyllum* (Lévl.) Kobuski; *J. mairei* Lévl. var. *siderophyllum* Lévl.

生于海拔200—3 200米的灌丛及草坡。分布于西南。

叶(小黄素馨)：苦、甘、涩，凉。清火，解毒。用于水火烫伤，疮毒红肿。

**北清香藤**　　破风藤(江西)，花木通(贵州)，疙瘩藤(云南)

**Jasminum lanceolarium** Roxb.

生于海拔1 000—2 000米的山坡或路旁。分布于陕西、甘肃、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根、枝条(破骨风)：苦，温。祛风除湿，活血止痛。用于风湿腰腿痛，跌打损伤，腰痛。

**素馨花**

**Jasminum grandiflorum** L.——*J. officinale* L. f. *grandiflorum* (L.) Kobuski

生于海拔3 000米以下的林下、路边，或栽培于庭园。分布于云南。浙江、福建、台湾、广东、四川有栽培。

花蕾(素馨花)：甘，平。舒肝解郁，化滞，解痛。用于胸胁不舒，心胃气痛，下痢腹痛。

**桂枝素馨**　　岭南茉莉(中国高等植物图鉴)

**Jasminum laurifolium** Roxb.

生于海拔500—1 200米的山地林中或灌丛中。分布于海南、广西、贵州、云南、西藏。

全株(桂叶素馨)：苦，寒。清热解毒，利尿，消肿散瘀。用于痢疾，小便涩痛，水肿，跌打损伤。

**云南黄素馨**　　金腰带、金梅花(云南)

**Jasminum mesnyi** Hance

生于海拔1 200—2 600米的山坡疏林中。分布于广西、四川、贵州、云南。

全株：清热解毒。用于肿毒，跌打损伤，发汗。

**青藤仔**　　大素馨花(云南)

**Jasminum nervosum** Lour.

生于海拔300—1 700米的阳坡疏林中。分布于台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

全株(青藤子)：微苦，凉。清湿热，拔毒生肌，接骨。用于痢疾，劳伤腰痛，疮疡溃烂。

**迎春花**

**Jasminum nudiflorum** Lindl.

生于海拔700—2 500米的灌丛或岩石缝中，或栽培于庭园。分布于陕西、甘肃、四川、贵州、云南。

叶(迎春花叶)：苦、涩，平。活血解毒，消肿止痛。用于肿毒恶疮，跌打损伤；创伤出血。　花(迎春花)：苦，平。发汗，解热利尿。用于发热头痛，小便涩痛。

**厚叶素馨**

**Jasminum pentaneurum** Hand.-Mazz.

生于山坡灌丛中。分布于海南、广西。

全株：用于口腔破溃，咽喉痛，疮疖，跌打损伤。

**多花素馨**　　素兴花(植物名实图考)

**Jasminum polyanthum** Franch.

生于海拔 1 000—2 800 米的山坡疏林、灌丛中。分布于四川、贵州、云南。

全株(野素馨)：苦、微辛、涩，平。活血，行气，止痛。用于胸膈胀满，胃痛，月经不调，痛经，带下病，子痈，瘰疬。

**茉莉花**

**Jasminum sambac** (L.) Aiton ——*Nyctanthes sambac* L.

生于林中，或栽培于庭园、温室。分布于福建、湖南、广东、广西、贵州、云南。

根(茉莉根)：苦，温。有毒。麻醉，止痛。用于跌损筋骨，龋齿，头痛，失眠。　叶(茉莉叶)：辛，凉。清热解表。用于外感发热，腹胀泻泻。　花(茉莉花)：辛、甘，温。理气，开郁，辟秽，和中。用于下痢腹痛，目赤红肿，疮毒。

**亮叶茉莉**　　白花藤(云南)

**Jasminum sequinii** Lévl.

生于海拔 200—1 900(—3 000)米的山坡路旁及丛林中等较干燥处。分布于海南、广西、四川、贵州、云南。

根、叶(四季素馨花)：涩，凉。　舒筋活络、止血。　用于跌打损伤，外伤出血，骨折，疮疖。

**华素馨**　　金银花(湖南)

**Jasminum sinense** Hemsl.

生于海拔 680—2 000 米的混交林中。　分布于甘肃、浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全株：消炎、止痛，活血，接骨。用于外伤出血，烧、烫伤。

**光素馨**　　三爪皮、鸡脚三树(云南)

**Jasminum subhumile** W. W. Smith var. **glabricymosum** (W. W. Smith) Miao ex P. Y. Bai ——*J. heterophyllum* var. *glabricymosum* W. W. Smith

生于海拔 800—3 000 米的山脚林下。分布于云南。

根、枝皮、叶：苦、辛，平。祛风除湿，止血，消炎。　用于风湿关节痛，腰痛，感冒发热，骨折，全身酸痛，跌打损伤，外伤出血，刀枪伤。

**川素馨**

**Jasminum urophyllum** Hemsl.

生于山地疏林中。分布于台湾、湖北、湖南、四川、贵州。

枝条：用于风湿关节痛，风寒头痛。

## 女贞属 Ligustrum L.

**蜡子树**

**Ligustrum acutissimum** Koehne

生于山坡或林中。分布于陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、福建、河南、湖北、湖南、四川、贵州。

树皮、叶：清热泻火，除湿。

**长叶女贞**

**Ligustrum compactum** (Wall. ex DC.) Hook. f. et Thoms. ex Brand. —— *Olea compactum* Wall. ex DC.

生于海拔(700—)1 700—2 800(—3 000)米的林中或路旁。分布于湖北、四川、贵州、云南。

树皮、叶：清热除烦。种子：甘，平。滋阴补血。用于肝肾亏损。

**川滇蜡树**

**Ligustrum delavayanum** Hariot

生于海拔(1 300—)2 750(—3 500)米的山坡岩石旁。分布于四川、贵州、云南。

根、叶：清热解毒。

**扩展女贞**

**Ligustrum expansum** Rehd.

生于灌丛及水沟边。分布于湖北、四川、云南。

果实：补肝益肾，强筋壮骨。

**兴山蜡树** 爬岩香、野芥蜡籽(陕西)，翘鼻子(甘肃)

**Ligustrum henryi** Hemsl.

生于海拔520—1 500米的山坡灌丛及岩石旁。分布于陕西、甘肃、湖北、四川、贵州、云南。

根皮、树皮：用于小儿口舌生疮，口腔破溃。

**长筒兴山蜡树**

**Ligustrum henryi** Hemsl. var. **longitubum** P. S. Hsu

生于海拔800米以下的阴湿沟谷或密林中。分布于安徽。

叶：清热解毒。

**日本女贞**

**Ligustrum japonicum** Thunb.

生于山林中，或栽培于庭园。分布于四川、贵州。江苏、上海有引种。

叶：清热解毒。

**柔毛女贞** 鸡衣(苗语)

**Ligustrum japonicum** Thunb. var. **pubescens** Koidz.

生于林中或灌丛中。分布于四川、贵州。

叶(苦茶叶): 苦、微甘,凉。清热解毒。用于目赤、口疳,齿蠹,乳痈,肿毒,水火烫伤。

**女贞**　　米蜡树(湖南),白蜡树(云南)

**Ligustrum lucidum** Ait. f.

生于海拔130—3 000米的混交林中、林缘及谷地,或栽培于庭园、围墙边。分布于华北、华东、中南、西南及陕西、甘肃。

果实(女贞子): 甘、辛、凉。滋补肝肾,明目乌发。 用于眩晕耳鸣,腰膝酸软,须发早白,目暗不明。

附　注:《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**水蜡树**

**Ligustrum obtusifolium** Sieb. et Zucc.

生于海拔800米以下的林缘、沟旁。分布于华东及陕西、河南、湖南。

叶: 清热祛暑,消炎利尿。

**总梗女贞**

**Ligustrum pedunculare** Rehd.

生于林中或水沟旁。分布于湖北、四川、贵州。

叶(苦丁茶): 甘、苦,微寒。清热散风,除烦解渴。 用于头痛,齿痛,目赤,聤耳,热病烦渴,痢疾。

附　注: 四川地区以叶作苦丁茶入药。

**小叶女贞**　　野石榴、水白蜡(陕西),小蜡树(云南)

**Ligustrum quihoui** Carr.

生于海拔400—2 200米的灌丛中、石崖上、路边向阳处,或栽培于庭园。分布于华北、华东、西南及陕西、河南、湖北、湖南。

树皮(水白蜡树皮): 用于烫伤。　叶(水白蜡): 苦,凉。清热解毒。用于烧、烫伤,外伤。

**小蜡**　　小黄杨、山指甲(广东、广西)

**Ligustrum sinense** Lour.

生于山地疏林下、路旁及沟边,或栽培于庭园。分布于华东、中南及四川、贵州、云南。陕西有栽培。

叶(小蜡树): 苦、微甘,凉。清热解毒,消肿止痛,祛腐生肌。用于黄疸,痢疾,肺热咳嗽;外用于跌打损伤,创伤感染,烧、烫伤。

**多毛小蜡**

**Ligustrum sinense** Lour var. **coryanum** (W. W. Smith) Hand.-Mazz.——*L. coryanum* W. W.. Smith

生于海拔1 700—2 300米的石灰山季雨林中。分布于云南。

树皮、叶: 苦、涩,寒。 清热解毒,消肿止痛。 用于跌打肿痛,疮疡肿毒,黄疸,烧、烫伤,产后会阴水肿。

**光萼小蜡**　　苦丁茶、苦味散(贵州)

**Ligustrum sinense** Lour. **var. myriantum** (Diels) Hook. f. ——*L. myrianthum* Diels

生于海拔1 000—2 100(—2 500)米的山坡灌丛中。分布于贵州、云南。

叶：清热解毒，消肿止痛。用于咽喉痛，口腔破溃，疮疖，跌打损伤。

**亮叶小蜡**

**Ligustrum sinense** Lour. var. **nitidum** Rehd.

生于拔海900—2 000米的灌丛中。分布于海南、广西、四川、云南。

树皮、叶(水白蜡)：淡、微苦，平。清热，降火。用于吐血，牙痛，口疮，咽喉痛，黄水疮。

**毛叶小蜡**

**Ligustrum sinense** Lour. var. **stauntonii** Rehd.

生于山坡疏林中。分布于贵州。

叶：清热解毒。

## 插柚柴属　Linociera Sw. ex Schreb.

**黑皮插柚柴**　　柚柴、鸟骨(海南)

**Linociera ramiflora** (Roxb.) Wall. ——*Chionanthus ramiflorum* Roxb.

生于海拔500—1 100米的山坡林中。分布于台湾、广东、海南、广西、云南、西藏。

根：清热解毒，散瘀。

## 夜花属　Nyctanthes L.

**夜花**

**Nyctanthes arbor-tristis** L.

原产印度南部。云南有栽培。

枝、叶：祛风除湿。

## 木犀榄属　Olea L.

**油橄榄**　　齐墩果(西阳杂俎)

**Olea europaea** L.

原产地中海地区。长江流域以南地区及陕西有栽培。

果油：缓泻，降血压，助消化；也用于水火烫伤。

**红花木犀榄**

**Olea rosea** Graib

生于海拔850—1 520米的杂木林中。分布于云南。

果油：用于水火烫伤。

## 木犀属　Osmanthus Lour.

**红柄木犀**

**Osmanthus armatus** Diels

生于灌木林中。分布于陕西、湖北、湖南、四川。

根：清热解毒。

**华东木犀**

**Osmanthus cooperi** Hemsl.

生于林中或灌丛中。分布于安徽、浙江、江西、福建。

根：祛风湿，散寒。　花：化痰，散瘀。果实：暖胃，平肝，散寒。

**山桂花**

**Osmanthus delavayi** Franch.

生于海拔 1 950(—2 400)—3 680 米的山坡灌丛中。分布于四川、贵州、云南。

树皮、叶(豆瓣香)：甘，平。清热解毒，止血生肌。用于咳嗽痰喘；外用于骨折，外伤出血，扭伤痛。

**桂花**　木犀(雅称)

**Osmanthus fragrans** (Thunb.) Lour. ——*Olea fragrans* Thunb.

原产我国西南部，现长江流域以南及陕西、甘肃均有栽培。

根或根皮(桂树根)：辛、甘，温。用于胃痛，牙痛，风湿麻木，筋骨疼痛。　花(桂花)：辛，温。化痰，散瘀。用于痰饮喘咳，肠风血痢，疝瘕，牙痛，口臭。　果实(桂花子)：甘、辛，温。暖胃，平肝，益肾，散寒，止

附　注：**丹桂 O. fragrans** (Thunb.) Lour. f. **aurantiacus** (Makino) P. S. Green 的花亦作桂花入药，分布同原种。

**柊树**

**Osmanthus heterophyllus** (G. Don) P. S. Green ——*Ilex heterophyllus* G. Don

生于林下。分布于台湾。

全株(香木菌桂)：微苦，凉。补肝肾，健腰膝。用于顿咳；外用于痈疔肿毒。

**月桂**

**Osmanthus marginatum** (Champ. ex Benth.) Hemsl.

生于山坡密林中。分布于安徽、浙江、台湾、湖南、广东、海南、广西、四川。

花：提神，醒脑。

**牛矢果**

**Osmanthus matsumuranus** Hayata

生于海拔 850—1 540 米的丘陵、山谷及林中。分布于安徽、浙江、江西、台湾、湖南、广东、海南、广西、四川、云南。

树皮、叶(羊屎木)：苦，寒。散脓血。用于痈疮发背。

**野桂花**

**Osmanthus yunnanensis** (Franch.) P. S. Green——*Pittosporum yunnanensis* Franch.

生于海拔 1 500—3 050 米的山坡林中。分布于四川、云南、西藏。

叶、花：辛，温。解表。

## 丁香属 Syringa L.

### 蓝丁香

**Syringa meyeri** Schneid.

生于山坡疏林中。分布于河北、河南。北京有栽培。

树皮：消炎镇咳，利水。

### 紫丁香

**Syringa oblata** Lindl.

生于海拔300—2 600米的山地、沟谷，或栽培于庭园。分布于东北、华北、西北及山东、安徽、河南、四川、云南、西藏。

树皮：清热燥湿，止咳定喘。叶：苦，寒。清热，解毒，止咳，止痢。用于咳嗽痰咳，泄泻痢疾，疟腮，肝炎。

附注：功效相同的有**白丁香 S. oblata** Lindl. var. **affi-nis** (L. Henry) Lingelsh.

### 花叶丁香

**Syringa persica** L.

生于山坡阳处。分布于陕西、甘肃、四川。辽宁、新疆有栽培。

花蕾(野丁香)：辛，温。暖胃散寒，降逆止呕。用于胃寒呃逆，呕吐，胃粘膜充血。

### 羽叶丁香

**Syringa pinnatifolia** Hemsl.

生于海拔1 780—2 300米的山地沟谷中。分布于内蒙古、陕西、青海、宁夏、四川。

根、枝：辛，微温。降气，温中，暖肾。用于寒喘，胃腹胀痛，阴挺，脱肛；外用于皮肤损伤。

附注：① 国家三级保护植物。② 内蒙古阿拉善左旗以枝作沉香入药。

### 毛叶丁香

**Syringa pubescens** Turcz.

生于海拔800—2 000米的山地沟谷或崖石上，或栽培于庭园。分布于辽宁、河北、山西、陕西、甘肃、河南。

树皮：清热、镇咳，利水。

### 暴马丁香

**Syringa reticulata** (Bl.) Hara var. **mandshurica** (Maxim.) Hara

生于海拔1 150—1 700米的山坡混交林中或林缘。分布于东北及内蒙古、山西、陕西、甘肃、宁夏、青海、山东、河南。亦有栽培。

枝条(暴马子)：苦，微寒。消炎，镇咳，利水。用于痰鸣喘嗽，心脏性浮肿。

### 四川丁香

**Syringa sweginzowii** Koehne et Lingelsh.

生于河谷杂木林中、岩石边、山坡林中及路旁。分布于陕西、甘肃、四川。

树皮：祛风除湿。

### 红丁香

**Syringa villosa** Vahl

生于荒山林中或栽培。分布于东北及辽宁、陕西、甘肃、四川。

花蕾：温胃散寒，降逆止呕。

**辽宁丁香**

**Syringa wolfi** Schneid.

生于阔叶林内、水沟边及河旁湿地。分布于东北及河北、山西。

树皮：清肺化痰，止咳平喘，利尿。

## 149. 马钱科 Loganiaceae

### 灰莉属 Fagraea Thunb.

**灰莉**

**Fagraea ceilanica** Thunb.

生于疏林中或石灰岩杂木林中。分布于台湾、广东、广西、云南。

叶：外用于伤口溃烂。

### 蓬莱葛属 Gardneria Wall.

**狭叶蓬莱葛**

**Gardneria angustifolia** Wall. ——*G. glabra* Wall. ex D. Don

生于山坡灌丛中。分布于湖北、四川、贵州。

根(黑老头)：苦，温。祛风活络，健脾利湿。用于风湿骨痛，劳伤。 茎(小血光藤)：苦、涩，凉。安五脏，通九窍，除风湿，解热。用于腰膝痛，小便频数，跌打损伤，劳伤，耳聋。

**披针叶蓬莱葛**

**Gardneria lanceolata** Rehd. et Wils.

生于海拔500—3 000米的山坡林中或林缘。分布于安徽、四川、贵州、云南。

根：苦，温。利湿祛风，活络健脾。用于劳伤，风湿骨痛。

**蓬莱葛** 多花蓬莱葛(湖南植物名录)

**Gardneria multiflora** Makino

生于海拔500—2 100米的山坡林下、灌丛中。分布于华东及陕西、江苏、安徽、浙江、台湾、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

根、种子：祛风活血。用于关节痛，创伤出血。

### 断肠草属 Gelsemium Juss.

**钩吻**

**Gelsemium elegans** (Gardn. et Champ.) Benth.——*Medicia elegans* Gardn. et Champ.

生于丘陵、疏林或灌丛中。分布于浙江、福建、江西、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南。

根(大茶药根)：苦，寒。有剧毒。消肿，止痛，接骨。用于疔疮肿毒，跌打损伤，骨折。　全株(钩吻)：辛、苦，温。有剧毒。祛风，攻毒，消肿，止痛。用于疥癣，湿疹，瘰疬，痈肿，疔疮，跌打损伤，风湿痹痛，神经痛。

附　注：误食中毒后，饮羊血 200—300 毫升可解毒。

## 姬苗属　Mitrasacme Labill.

### 水田白

**Mitrasacme pygmaea** R. Br.

生于路边、山坡向阳处。分布于浙江、台湾、湖南、广东、广西、云南。

全草：用于小儿疳积，小儿惊风。

## 度量草属　Mitreola L.

### 毛叶度量草

**Mitreola pedicellata** (Gmel.) Benth.——*Cynoctonum pedicellatum* Gmel.

生于海拔 400—2 100 米的林中阴湿处。分布于湖北、四川、贵州、云南。

全草：用于跌打损伤，筋骨痛。

## 马钱属　Strychnos L.

### 牛眼马钱

**Strychnos angustiflora** Benth.

生于山地疏林、灌丛中。分布于海南、广西。

种子(牛眼珠)：苦，寒。有大毒。通络，消肿，止痛。用于风湿关节痛，手足麻木，半身不遂；外用于痈疽肿毒，跌打损伤。

**华马钱**　登欧梅罗(海南黎语)，牛目椒(云南种子植物名录)

**Strychnos cathayensis** Merr.

生于海拔 1 300—1 500 米的丛林阴湿处。分布于海南、广西、云南。

全株：用于头痛，胃脘痛，疟疾，外伤出血。　根、种子：解热，止血。用于头痛，心气痛，刀伤，疟疾。

### 马金长子

**Strychnos ignatii** Bergius——*S. hainanensis* Merr. et Chun

生于海拔 400—580 米的石灰岩疏林中。分布于海南、广西、云南。

种子：苦，寒。有大毒。祛风散结，消肿止痛。用于咽喉肿痛，风湿麻痹，肿瘤痞块，痈疽恶疮，中耳炎。

附　注：功效相同的有**尾叶马钱 S. wallichiana** Steud. ex DC.；**云南马钱 S.**

**yunnanensis** S. Y. Pao。

**车里马钱**　　滇南马钱(云南种子植物名录)

**Strychnos nitida** G. Don

生于海拔200—1 800米的灌丛中或密林中。分布于广西、云南。

种子(滇南马钱)：苦，寒。有剧毒。兴奋健胃，消肿毒，凉血。用于四肢麻木，瘫痪，食欲不振，痞块，痈疮肿毒，咽喉肿痛。

**伞花马钱**

**Strychnos umbellata** (Lour.) Merr.——*Cissus umbellata* Lour.

生于林中或灌木丛中。分布于海南。

根(伞花马钱)：苦、辛，温。有大毒。祛风湿。用于风湿寒痹，寒湿性水肿。

## 150. 龙胆科　Gentianaceae

### 穿心草属　Canscora Lam.

**穿心草**　　串钱草(贵州)

**Canscora lucidissima** (Lévl. et Vant.) Hand. -Mazz.——*Euphorbia lucidissima* Lévl. et Vant.

生于石灰岩山坡较阴湿岩壁下或石缝中。分布于广西、贵州。

全草：微甘、微苦，平。清热解毒、止咳，止痛。用于肺热咳嗽，胃痛，黄疸，毒蛇咬伤。

**罗星草**

**Canscora melastomacea** Hand. -Mazz.

生于海拔200—1 400米的山谷、林下、田中。分布于广东、海南、广西、云南。

全草：苦，寒。清热消肿、散瘀止痛，接骨。用于急性胆囊炎，泄泻，乳蛾，跌打骨折，关节肿痛。

### 百金花属　Centaurium Hill.

**百金花**　　东北埃蕾(中国北部植物图志)

**Centaurium pulchellum** (Swartz) Druce var. **altaicum** (Gri-seb.) Kitag. et Hara——*Erythraea ramosissima* var. *altaica* Griseb.; *E. meyeri* Bunge; *C. meieri* (Bunge) Druce

生于海拔50—2 200米的潮湿荒地、田野、草地、水边、沙滩地。分布于东北、华北、西北、华东、中南。

带花全草(东北埃蕾)：苦，寒。清热消肿，散瘀止痛，接骨。用于急性胆囊炎，泄泻，乳蛾，跌打损伤，骨折，关节肿痛，牙痛，头痛发热。

### 喉毛花属　Comastoma (Wettst.) Toyokuni

**镰萼喉毛花**　　镰萼假龙胆(中国高等植物图鉴)

**Comastoma falcatum** (Turcz. ex Kar. et Kir.) Toyokuni——*Gentiana falcata* Turcz. ex Kar. et Kir.; *Gentianella falcata* (Turcz. ex Kar. et Kir.) H. Smith

生于海拔 2 100—5 300 米的河滩、山坡草地、林下、灌丛、高山草甸。分布于华北、西北及新疆、四川、西藏。

全草：苦，寒。祛风除湿、清热解毒。

**长梗喉毛花**

**Comastoma pedunculatum** (Royle ex D. Don) Holub——*Eurythalia pedunculata* Royle ex D. Don

生于海拔 2 500—4 800 米的河滩、湖边、沼泽草甸及高山草甸。分布于甘肃、青海、新疆、四川、云南、西藏。

全草：祛风除湿，清热解毒。

**喉毛花**　喉花草(中国高等植物图鉴)

**Comastoma pulmonarium** (Turcz.) Toyokuni——*Gentiana pulmonaria* Turcz.

生于海拔 3 000—4 800 米的高山草甸、河滩、林下、山坡草地及灌丛中。分布于山西、陕西、甘肃、青海、四川、云南、西藏。

全草：苦，寒。祛风除湿，清热解毒。

## 蔓龙胆属　Crawfurdia Wall.

**云南蔓龙胆**

**Crawfurdia campanulacea** Wall. ex Griff. et C. B. Clarke

生于海拔 1 800—3 400 米的山坡草地或林下。分布于云南。

全草：清热、泻火、利湿。

**裂萼蔓龙胆**

**Crawfurdia crawfurdioides** (Marq.) H. Smith *Gentiana crawfurdioides* Marq.; ——*C. crawfurdioides* (Marq.) H. Smith var. *macrophylla* Marq.; *C. forrestii* H. Smith

生于海拔 1 600—3 900 米的高山草地、山坡、灌丛草地、冷杉林下或竹林中。分布于云南、西藏。

全草：清热利胆，消炎止咳。

**福建蔓龙胆**

**Crawfurdia pricei** (Marq.) H. Smith——*Gentiana pricei* Marq.

生于海拔 430—2 000 米的山坡草地、山谷灌丛或密林中。分布于福建、湖南、广东、广西。

全草：清热解毒。

## 藻百年属　Exacum L.

**藻百年**

**Exacum tetragonum** Roxb.

生于海拔 200—1 500 米的草地、山坡路旁。分布于江西、广东、广西、贵州、云南。

全草：用于口腔破溃，骨折，跌打损伤。

## 龙胆属　Gentiana L.

**高山龙胆**　苦龙胆(中国高等植物图鉴)

**Gentiana algida** Pall.

生于海拔 1 200—5 300 米的山坡草地、河滩草地、灌丛中、林下、高山冻原。分布于吉林、新疆。

全草(白花龙胆)：苦，寒。清肝胆，除湿热，健胃。用于流行性脑脊髓膜炎，目赤，咽喉痛，肺热咳嗽，胃脘痛胀，淋证，阴痒，阴囊湿疹。

附　注：在西藏作白花龙胆用的有**云雾龙胆 G. nubigena** Edgew.，分布于甘肃、青海、四川、西藏。

**刺芒龙胆**　柏夏拉、玉相(藏语)，尖叶龙胆(中国高等植物图鉴)

**Gentiana aristata** Maxim.

生于海拔 1 800—4 600 米的山坡草地、林间草丛、阳坡砾石地、河滩草地、沼泽草地、草滩及高山草甸。分布于甘肃、青海、四川、云南、西藏。

全草：苦、辛，寒。祛湿，解毒。用于黄水疮。

附　注：功效相同的有**白条纹龙胆 G. burkillii** H. Smith，分布于青海、西藏；**粗根龙胆 G. callistantha** Diels et Gilg，分布于甘肃、青海、西藏；**中国龙胆 G. chinensis** Kusnez.，分布于湖北、四川、云南；**线叶龙胆 G. farreri** Balf. f.，分布于甘肃、青海、四川、西藏；**青藏龙胆 G. futtereri** Diels et Gilg，分布于甘肃、青海、四川、云南、西藏；**垂花龙胆 G. nutans** Bunge，分布于新疆。

**头花龙胆**　龙胆(滇南本草)

**Gentiana cephalantha** Franch. ex Hemsl.

生于海拔 1 800—4 450 米的山坡草地、山坡路边、林缘、林下及灌丛中。分布于广西、四川、贵州、云南。

根：泻肝火、清下焦、除湿热。

**粗茎秦艽**　秦艽(云南)粗茎龙胆(内蒙古大学学报)

**Gentiana crassicaulis** Duthie ex Burk

生于海拔 2 100—4 500 米的山坡草地、洪积扇、草甸及林缘。分布于西南及甘肃、青海、西藏。

根(秦艽)：辛、苦，平。祛风湿、清湿热，止痹痛。用于风湿痹痛，筋脉拘挛，骨节烦痛，日晡潮热，小儿疳积发热。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载的秦艽尚有**达乌里秦艽 G. dahurica** Fisch.，分布于东北、华北、西北及四川、西藏；**秦艽 G. macrophylla** Pall.，分布于东北、华北及甘肃、宁夏、新疆；**麻花艽 G. straminea** Maxim.，分布于甘肃、青海、宁夏、河南、湖北、四川、西藏。②功效相同或相似的有**中亚秦艽 G. kaufmanniana** Regel

et Schmalh.; **管花秦艽 G. siphonantha** Maxim. ex Kusnez., 分布于甘肃、青海、宁夏、四川；**西藏秦艽 G. tibetica** King ex Hook. f., 分布于四川、西藏，**天山龙胆 G. tianschanica** Rupr., 分布于新疆；**新疆秦艽 G. walujewii** Regel et Schmalh., 分布于新疆。

**五岭龙胆**　　倒地莲(福建)，九头青(湖南)

**Gentiana davidii** Franch.——*Gentianodes davidii* (Franch.) A. et D. Löve

生于海拔 350—2 500 米的山坡草丛、山坡路旁、林缘及林下。分布于安徽、浙江、福建、江西、湖南、广东、广西。

全草　(落地荷花)：凉，苦。清热解毒，利尿明目。用于化脓性骨髓炎，淋证，目赤，疖、痈。

**无尾尖龙胆**

**Gentiana ecaudata** Marq.

生于海拔 2 500—4 500 米的沼泽草甸、山坡草地。分布于云南、西藏。

全草：清热利湿，健脾止咳，疏风，杀虫。

**贵州龙胆**

**Gentiana esquirolii** Lévl.

生于海拔 5 00—2 200 米的山坡草地、路旁及灌丛中。分布于四川、贵州、云南。

全草：清肝胆热。

**丝柱龙胆**　　邦见我那(藏语)，蓝花龙胆(西藏常用中草药)

**Gentiana filistyla** Balf. f. et Forrest ex Marq.——*Gentianodes filistyla* (Balf f. et Forrest) A. Löve et D. Löve

生于海拔 2 900—4 500 米的山地草地、岩石地及高山草甸。分布于云南、西藏。

全草(蓝花龙胆)：苦，寒。清肝胆火，解毒。用于目赤头痛，咽喉痛，湿热黄疸。

附　注：功效相同的有**蓝玉簪龙胆 G. veitchiorum** Hemsl., 分布于甘肃、四川、云南、西藏，在西藏药用。

**喜湿龙胆**

**Gentiana helophila** Balf. f. et Forrest ex Marq.

生于海拔 3 100—4 600 米的草坝内或林中。分布于云南。

花：苦，寒。清热利胆，明目。

附　注：云南特有药用植物。

**六叶龙胆**　　吉解那保(藏语)

**Gentiana hexaphylla** Maxim. et Kusnez.

生于海拔 2 700—4 400 米的山坡草地、高山草甸及碎石带。分布于甘肃、青海、四川。

根：祛风活络。

**长白山龙胆**　　白山龙胆(东北植物检索表)

**Gentiana jamesii** Hemsl.

生于海拔 1 100—2 450 米的山坡草地、路旁、岩石上。分布于吉林、辽宁。

根及根状茎：清虚热，祛风湿。

**蓝白龙胆**

**Gentiana leucomelaena** Maxim

生于海拔 1 940—5 000 米的山坡草地、沼泽化草甸。分布于甘肃、青海、新疆、四川、西藏。

全草：清热降火，除湿。

**华南龙胆**　紫花地丁(湖南、四川)

**Gentiana loureirii** (G. Don) Griseb.——*Ericala loureirii* G. Don

生于海拔 300—2 300 米的山坡路旁、荒山坡及林下。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西。

全草(龙胆地丁)：苦、辛，寒。清热利湿，解毒消痈。用于咽喉肿痛，肠痈，带下病，尿血；外用于疮疡肿毒，瘰疬。

附　注：功效相同的有**鳞叶龙胆 G. squarrosa** Ledeb. 分布于东北、华北、西北及四川、贵州、云南。

**条叶龙胆**　土胆草(湖南)，东北龙胆(东北植物检索表)

**Gentiana manshurica** Kitag.

生于海拔 100—1 100 米的山坡草地、路旁草丛。分布于东北、中南及内蒙古、江苏、安徽、浙江、江西。

根及根状茎(龙胆)：苦，寒。清热燥湿，泻肝胆火。用于湿热黄疸，阴肿阴痒，带下病，强中，湿疹瘙痒，目赤，耳聋，肿痛，惊风抽搐。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载的有**滇龙胆草 G. rigescens** Franch. ex Hemsl.；**龙胆 G.scabra** Bunge；**三花龙胆 G. triflora** Pall.

**黄管秦艽**　解吉那保(藏语)

**Gentiana officinalis** H. Smith

生于海拔 2 300—4 200 米的高山草甸、灌丛、山坡草地及河滩地。分布于甘肃、青海、四川。

全草：清热解毒、利湿消肿。

附　注：功效相同的有**流苏龙胆 G. panthaica** Prain et Burk. 分布于江西、湖南、广西、四川、贵州、云南；**假水生龙胆 G. pseudo-aquatica** Kusnez. 分布于东北、华北、西南及甘肃、青海、新疆、河南；**岷县龙胆 G. purdomii**. Marq. 分布于甘肃、青海、四川、西藏。

**倩翅龙胆**

**Gentiana pudica** Maxim.

生于海拔 2 230—5 000 米的山坡草地、高山灌丛、高山草甸及河滩地。分布于甘肃、青海、四川。

根：清热解毒、利湿消肿。

**红花龙胆**　九日花(湖北)，小青鱼胆(贵州)，加架山(苗语)

**Gentiana rhodantha** Franch. ex Hemsl.

生于海拔 400—2 300 米的山坡草丛、林下或疏灌丛中。分布于陕西、甘肃、湖北、河南、广西、四川、贵州、云南。

根或全草(小龙胆草)：苦，寒。清热利湿，凉血解毒。用于热咳痨咳，痰中带血，黄

疸，痢疾，胃痛，便血。

**深红龙胆**　二郎箭、石肺筋(湖北)，玉米花(湖南)

**Gentiana rubicunda** Franch.

生于海拔 500—3 500 米的荒地、路边、溪边、山坡草地、林下、岩边及山沟。分布于甘肃、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

全草：用于跌打损伤，消化不良。

**水繁缕叶龙胆**

**Gentiana samolifolia** Franch.——*G. rubicunda* Franch. var. *samolifolia* (Franch.) Marq.

生于海拔 900—3 000 米的山坡草地、山谷沟边、潮湿草地、山坡路旁、灌丛中、林下及林缘。分布于湖北、湖南、四川、贵州。

全草：用于黄疸，痢疾，小儿风热咳喘。

**菊花参**　一颗参、金钱参(云南)，半边钱(昆明民间常用草药)

**Gentiana sarcorrhiza** Ling et Ma ex T. N. Ho

生于海拔 1 580—1 900 米的山坡草地。分布于四川、云南。

根：苦、甘，微寒。益肺肾，退虚热。用于肺虚咳嗽，肾虚遗精，遗尿，虚劳发热不退。

**华丽龙胆**　邦见察保(藏语)

**Gentiana sino-ornata** Balf. f.

生于海拔 2 400—5 000 米的山坡草地。分布于四川、云南、西藏。

全草：清肝胆实火，解毒。

**匙叶龙胆**　奥拉毛(藏语)

**Gentiana spathulifolia** Maxim. ex Kusnez.

生于海拔 2 800—3 800 米的山坡草地、灌丛、河滩地。分布于甘肃、青海、四川。

叶、花：利咽止痛。

**条纹龙胆**

**Gentiana striata** Maxim.

生于海拔 2 200—3 900 米的山坡草地及灌丛中。分布于甘肃、青海、宁夏、四川。

全草：苦、辛，寒。清热解毒，利湿消肿。

**乌奴龙胆**　加参冈嘎穷(藏语)，乌双龙胆(中国高等植物图鉴)

**Gentiana urnula** H. Smith f. **pallida** Marq.

生于海拔 3 700—5 700 米的高山砾石带、高山草甸、沙石山坡。分布于青海、西藏。

全草：寒，苦。清热解毒。止泻。用于时行感冒发烧，咽喉肿痛，黄疸，热性泄泻。

**长梗秦艽**　长梗龙胆(内蒙古大学学报)

**Gentiana waltonii** Burk.——*G. waltonii* Burk. f. *nana* Hsiao et K. C. Hsia

生于海拔 3 000—4 800 米的山坡草地、山坡砾石地及林下。分布于西藏。

根：祛风除湿、活络止痛。

**矮龙胆**

**Gentiana wardii** W. W. Smith

生于海拔 3 500—4 550 米的高山草甸、碎砾石山坡上。分布于云南、西藏。

全草：清热解毒。

附　注：功效相同的有**笔龙胆 G. zollingeri** Fawcett，分布于东北及河北、山西、陕西、山东、江苏、浙江、江西、湖北、贵州。

**灰绿龙胆**　　水上含花(湖北)

**Gentiana yokusai** Burk.——*G. tenuissima* Hayata

生于海拔50—2 650米的水边湿草地、空旷地、荒地、路旁、农田、山坡阳处、山顶草地、林下及灌丛中。分布于华东及河北、山西、陕西、甘肃、福建、台湾，湖北、湖南、广东、四川、贵州。

全草：苦，微寒。清热解毒，活血消肿。

**云南龙胆**

**Gentiana yunnanensis** Franch.——*Gentianodes yunnanensis* (Franch.) A. Löve et D. Löve

生于海拔2 000—4 400米的山坡草地、灌丛、林下及高山草甸。分布于西南。

全草：清热解毒，清肝明目。

## 假龙胆属　Gentianella Moench.

**尖叶假龙胆**　　苦龙胆(东北植物检索表)

**Gentianella acuta** (Michx.) Hulten——*Gentiana acuta* Michx. *Gentiana amarella* L. var. *fastigiata* Ling

生于海拔1 800—2 500米的林下、林缘及草甸。分布于东北、华北。

全草：清热解毒，利胆。

**紫红假龙胆**

**Gentianella arenaria** (Maxim.) T. N. Ho——*Gentiana arenaria* Maxim.

生于海拔3 400—5 400米的高山流石滩、河滩沙地。分布于甘肃、青海、西藏。

全草：苦、寒。清热利湿，解毒消肿。

## 扁蕾属　Gentianopsis Ma

**扁蕾**　　铁木尔-地格达(蒙语)

**Gentianopsis barbata** (Fröel.) Ma——*Gentiana barbata* Fröel.

生于海拔700—4 400米的山坡草地、灌丛、河滩地及林缘草甸。分布于东北、华北、西北、西南及河南。

全草(扁蕾)：苦，寒。清热解毒，消肿。用于传染性热病，外伤肿痛，肝胆湿热。

附　注：**细萼扁蕾 G. barbata** (Fröel.) Ma var. **stenocalyx** H. W. Li ex T. N. Ho 的全草亦作扁蕾入药。

**大花扁蕾**

**Gentianopsis grandis** (H. Smith) Ma——*Gentiana grandis* H. Smith; *Gentianella grandis* H. Smith

生于海拔 2 000—4 050 米的水沟边、山谷河边及山坡草地。分布于四川、云南。

全草：苦，寒。清热利胆，退虚热。

**湿生扁蕾**　假斗格尔布(藏语)

**Gentianopsis paludosa** (Hook. f.) Ma——*Gentiana detonsa* Rottb. var. *paludosa* Hook. f.; *G. paludosa* (Hook. f.) H. Smith

生于海拔 1 180—4 900 米的河滩、山坡草地及林下。分布于华北、西南及陕西、甘肃、青海、宁夏。

全草：西藏地区作龙胆用。

**卵叶扁蕾**　糙边扁蕾(植物分类学报)

**Gentianopsis paludosa** (Hook. f.) Ma var. **ovato-deltoidea** (Burk.) Ma ex T. N. Ho——*Gentiana detonsa* Rottb. var. *ovato-deltoidea* Burk.; *G. scabromarginata* (H. Smith) Ma; *Genanella scabromarginata* H. Smith; *G. barbata* (Froel.) Ma var. *ovato-deltoidea* (Burk.) Ma

生于海拔 1 190—3 000 米的山坡草地、潮湿地及林下。分布于华北及陕西、甘肃、青海、湖北、四川、云南。

全草：清热解毒，清肝明目。

## 花锚属　Halenia Borkh.

**花锚**　希赫日-地格达(蒙语)，西伯利亚花锚(中国北部植物图志)

**Halenia corniculata** (L.) Cornaz——*Swertia corniculata* L.;*H. sibirica* Borkn。

生于海拔 200—1 750 米的山地草地、林下及林缘。分布于东北、华北及陕西。

全草(花锚)：甘、苦，寒。清热解毒、凉血止血。用于肝炎，脱疽，外伤感染发烧，外伤出血。

**卵萼花锚**　椭圆叶花锚(中国高等植物图鉴)

**Halenia elliptica** D. Don

生于海拔 700—4 100 米的高山林下、灌丛、山坡草地、河滩及草原。分布于西北、西南及辽宁、内蒙古、山西、河南、湖北、湖南。

全草(黑及草)：苦，寒。清热利湿，平肝利胆。用于黄疸，胆囊炎，胃痛，头晕头痛，牙痛。

**大花花锚**

**Halenia elliptica** D. Don var. **grandiflora** Hemsl.

生于海拔 1 300—2 500 米的山坡草地、水沟边。分布于陕西、甘肃、青海、湖北、四川、贵州、云南。

根或全草：清热祛湿，平肝利湿，疏风清暑，镇痛。

## 匙叶草属　Latouchea Franch.

**匙叶草**

**Latouchea fokiensis** Franch.

生于海拔 1 020—1 800 米的山坡路边、林下。分布于福建、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草：活血祛痰，清热，止咳。

附　注：我国特有属。

## 肋柱花属　Lomatogonium A. Br.

**辐状肋柱花**　肋柱花(中国高等植物图鉴)，辐花侧蕊(中国北部植物图志)

**Lomatogonium rotatum** (L.) Fries ex Nym.——*Swertia rotata* L.

生于海拔 1 400—4 200 米的河边沙地或山坡草地，分布于东北、华北、西北、西南。

全草：苦，寒。清热，健胃，利胆。

## 翼萼蔓属　Pterygocalyx Maxim.

**翼萼蔓**　双蝴蝶(陕西)

**Pterygocalyx volubilis** Maxim.——*Crawfurdia volubilis* (Maxim.) Makino; *C. pterygocalyx* Hemsl.

生于海拔 1 100—2 800 米的山坡林下、林缘。分布于东北、华北及陕西、甘肃、青海、宁夏、河南、湖北、四川、云南、西藏。

全草：用于肺痨。

## 獐牙菜属　Swertia L.

**狭叶獐牙菜**

**Swertia angustifolia** Buch.-Ham. ex D. Don

生于海拔 150—3 300 米的田边、草坡、荒地。分布于江西、福建、湖北、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南。

全草：清肝利胆，除湿清热。

附　注：功效相同的有**西南獐牙菜 S. cincta** Burk.，分布于四川、贵州、云南。

**美丽獐牙菜**　土疸药、肝炎草(云南)，粤北獐牙菜(广州植物志)

**Swertia angustifolia** Buch.-Ham. ex D. Don var. **pulchella** (D. Don) Burk.——*Ophelia pulchella* D. Don; *S. vacillans* Maxim.

生于海拔 150—3 300 米的田边、草地、荒地。分布于江西、福建、湖北、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南。

全草(青叶胆)：苦，寒。清热解毒，舒肝健胃。用于黄疸，咽喉痛，乳蛾，淋证，小便涩痛，时行感冒，感冒，疟疾。

**二叶獐牙菜**　乌金草(陕西中草药)

**Swertia bifolia** Batal.——*S. heterantha* Ling

生于海拔 2 850—4 300 米的高山草甸、灌丛草甸、沼泽草甸或林下。分布于陕西、甘肃、青海、四川、西藏。

全草(乌金草): 甘、微苦,平。平肝,强心,养血,调经。用于头晕,肾虚,贫血,高血压症,月经不调。

**獐牙菜** 双点獐牙菜(全国中草药汇编)

**Swertia bimaculata** (Sieb. et Zucc.) Hook. f. et Thoms. ex C. B. Clarke——*Ophelia bimaculata* Sieb. et Zucc.

生于海拔 250—3 000 米的河滩地、山坡草地、林下、灌丛中、沼泽地。分布于华东、中南、西南及河北、山西、陕西、甘肃。

全草(大苦草): 苦,寒。清热解毒,舒肝利胆。用于急慢性肝炎,胆囊炎,淋证,肠胃痛,感冒发热,时行感冒,咽喉痛,牙痛。

**川东獐牙菜** 青鱼胆草,水灵芝(四川)

**Swertia davidii** Franch.

生于海拔 900—1 200 米的山坡林下、河边、潮湿地、草地上。分布于湖北、湖南、四川、云南。

全草(鱼胆草): 苦,凉。清肺热,杀虫。用于湿热黄疸,喉头红肿,恶疮疥癣。

**丽江獐牙菜** 青叶丹(云南)

**Swertia delavayi** Franch.

生于海拔 1 700—4 000 米的向阳多石山坡、林下沙地。分布于四川、云南。

全草: 清热利胆。

**歧伞獐牙菜** 腺鳞草(中国高等植物图鉴),歧伞当药(中国北部植物图志)

**Swertia dichotoma** L.——*Anagallidium dichotomum* (L.) Griseb.

生于海拔 1 050—3 100 米的河边、山坡、林缘。分布于东北、华北、西北及河南、湖北、四川。

全草(獐牙菜): 苦,寒。清热,健胃,利湿。用于消化不良,胃脘痛胀,黄疸,目赤,牙痛,口疮。

附 注: 功效相同的有**北方獐牙菜 S. diluta** (Turcz.) Benth. et Hook. f., 分布于河北至华中;**细毛獐牙菜 S. pseudochinensis** Hara, 分布于东北、华北及河南、山东;**云南獐牙菜 S. yunnanensis** Burk., 分布于云南。

**峨眉獐牙菜** 一匹瓦(四川)

**Swertia emeiensis** Ma ex T. N. Ho et S. W. Liu

生于海拔 2 650—3 000 米的山坡林下。分布于四川峨眉山。

入药部位及功效与狭叶獐牙菜相似。

附 注: 四川特有药用植物。

**红直獐牙菜** 红直当药(中国北部植物图志)

**Swertia erythrosticta** Maxim.

生于海拔 1 500—4 300 米的河滩、干草原、高山草甸及疏林中。分布于华北及甘肃、青海、湖北、四川。

全草(红直当药): 苦,凉。清热解毒,健胃杀虫。用于风热咳喘,黄疸,梅毒,疮肿,咽

喉肿痛，疥癣。

**抱茎獐牙菜**

**Swertia franchetiana** H. Smith

生于海拔 2 200—3 600 米的沟边、山坡、林缘、灌丛。分布于甘肃、青海、四川、西藏。

全草：甘、苦，寒。清肝利胆，健胃。

**浙江獐牙菜**

**Swertia hickinii** Burk.

生于海拔 100—1 600 米的山坡、田边、林下、谷地。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖南、广西。

全草：苦，寒。清热，利湿，解毒。

**贵州獐牙菜**

**Swertia kouitchensis** Franch.

生于海拔 750—2 000 米的河边、草坡、林下。分布于陕西、甘肃、湖北、四川、贵州、云南。

全草(青鱼胆草)：用于小儿高烧，口苦潮热，湿热黄疸，咽喉肿痛，毒蛇咬伤。

**大籽獐牙菜**

**Swertia macrosperma** (C. B. Clarke) C. B. Clarke——*Ophelia macrosperma* C. B. Clarke

生于海拔 1 400—3 950 米的河边、山坡草地、杂木林或竹林下、灌丛中。分布于西南及台湾、湖北、广西。

全草：清肝，泻热。

**膜边獐牙菜**

**Swertia marginata** Schrenk

生于海拔 2 520—3 000 米的山坡草地。分布于新疆。

全草：清热、利胆。

附　注：功效相同的有**川西獐牙菜 S. mussotii** Franch.，分布于青海、四川、云南、西藏；**苇叶獐牙菜 S. phragmitiphylla** T. N. Ho et S. W. Liu，分布于西藏；**四数獐牙菜 S. tetraptera** Maxim.，分布于甘肃、青海、四川、西藏。

**青叶胆**　　肝炎草(云南)

**Swertia mileensis** T. N. Ho et W. L. Shi

生于海拔 1 300—1 650 米的山坡草丛中。分布于云南。

全草：苦、甘，寒。清肝利胆，清热利湿。用于黄疸尿赤，热淋涩痛。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②为成药青叶胆片的主要原料。③云南特有药用植物。

**显脉獐牙菜**　　四棱草(四川)

**Swertia nervosa** (G. Don) Wall. ex C. B. Clarke——*Agathotes nervosa* G. Don

生于海拔 460—2 700 米的河滩、山坡、疏林下及灌丛中。分布于西南及陕西、甘肃、广西。

全草：苦，寒。清热解毒。用于泄泻，月经不调，黄疸。

**紫红獐牙菜**　土黄莲(湖南)

**Swertia punicea** Hemsl.

生于海拔400—3 800米的山坡草地、河滩、林下及灌丛中。分布于湖北、湖南、四川、贵州、云南。

全草(山飘儿草)：苦，寒。清肝利胆，除湿清热。用于黄疸，胆囊炎。

**大药獐牙菜**

**Swertia tibetica** Batal.

生于海拔3 200—4 800米的河边草地、山坡草地、林下、林缘、水边、乱石坡地。分布于四川、云南、西藏。

全草：苦、辛，寒。清热熄风，安神定惊。

**华北獐牙菜**　代哇(藏语)，乌氏当药(中国北部植物图志)

**Swertia wolfangiana** Grüning

生于海拔1 500—5 260米的高山草甸、沼泽草甸、灌丛中、潮湿地。分布于山西、甘肃、青海、湖北、四川、西藏。

花：苦，寒。清热利胆。

## 双蝴蝶属　Tripterospermum Bl.

**双蝴蝶**　铁板青(浙江民间常用草药)

**Tripterospermum chinense** (Migo) H. Smith——*Crawfurdia chinensis* Migo

生于海拔300—1 100米的山坡林下、林缘、灌丛或草丛中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、广西。

全草(肺形草)：辛，寒。清肺止咳，解毒消肿。用于肺热咳嗽，肺痨咳嗽，肺痈，水肿，疮痈疖肿。

附　注：功效相同的有**峨眉双蝴蝶 T. cordatum** (Marq.) H. Smith; **细茎双蝴蝶 T. filcaule** (Hemsl.) H. Smith; **香港双蝴蝶 T. nienkui** (Marq.) C. J. Wu。

**盐源双蝴蝶**

**Tripterospermum coeruleum** (Hand. -Mazz.) H. Smith——*Crawfurdia coerulea* Hand. -Mazz.

生于海拔2 500—3 050米的山坡灌丛中或竹林下。分布于四川。

全草(小筋骨藤)：甘，平。舒筋活络，接骨。用于骨折，断指再接。

**日本双蝴蝶**

**Tripterospermum japonicum** (Sieb. et Zucc.) Maxim.——*Crawfurdia japonica* Sieb. et Zucc.

生于海拔1 300—2 400米的山坡林下、路边阴湿地。分布于台湾。

全草(青鱼胆草)：苦，凉。清热，健脾，清肺止咳。用于黄疸，风热咳嗽，风湿痛，蛔虫病。

**尼泊尔双蝴蝶**

***Tripterospermum volubile*** (D. Don) Hara——*Gentiana volubile* D. Don

生于海拔 2 300—3 100 米的山坡林下。分布于西藏。

全草：清热解毒，养阴润肺。

## 黄秦艽属 Veratrilla (Baill.) Franch.

**黄秦艽** 大苦参、黄龙胆(云南)，滇黄芩(中国高等植物图鉴)

**Veratrilla baillonii** Franch.

生于海拔 3 600—4 600 米的山坡草地、灌丛中及高山灌丛草甸。分布于四川、云南、西藏。

根：苦，寒。有毒。清热，解毒。用于痢疾，肺热，烧伤。

# 151. 睡菜科 Menyanthaceae

## 睡菜属 Menyanthes (Tourn.) L.

**睡菜**

**Menyanthes trifoliata** L.

生于海拔 450—3 600 米的沼泽地、池塘或水边湿地，常成群落。分布于东北、西南及河北、内蒙古、新疆、浙江。

叶或全草：甘、微苦，寒。健脾消食，养心安神。用于胃痛，消化不良，心悸失眠，心神不安。

## 荇菜属 Nymphoides Seguier

**金银莲花** 白花莕菜、印度莕菜(中国北部植物图志)

**Nymphoides indica** (L.) O. Kuntze——*Menyanthes indica* L.; *Limnanthemum indica* (L.) Griseb.

生于海拔 50—1 530 米的池塘中。分布于东北、华北、华东及广东、海南、广西。

全草：清热利尿，消肿解毒。

**荇菜** 水锦钱(湖南)，莲叶荇菜(中国北部植物图志)

**Nymphoides peltatum** (Gmel.) O. Kuntze——*Limnanthemum peltatum* Gmel.

生于海拔 60—2 400 米的池塘或不甚流动的河溪中。全国大部分地区均有分布。

全草(荇菜)：甘，寒。清热，利尿，消肿，解毒。用于寒热，热淋，痈肿，火丹。

# 152. 夹竹桃科 Apocynaceae

## 香花藤属 Aganosma G. Don

**广西香花藤** 石上羊奶树、廖刁竹(广西)

**Aganosma kwangsiensis** Tsiang

生于海拔 300—1 300 米的山地密林中或疏林沟谷潮湿林地，常攀援在树上或灌丛中。分布于广西、云南。

全株：用于水肿。

**贵州香花藤**

**Aganosma navaillei** (Lévl.) Tsiang——*Trachelospermum navaillei* **Lévl.**

生于海拔 170—1 000 米的山坡疏林中或灌丛中，常攀援树上。分布于广西、贵州、云南。

叶：用于皮肤湿疹。

**海南香花藤**　　小血藤(广西)

**Aganosma schlechteriana** Lévl.

生于海拔 500—1 700 米的山地疏林中、路旁或水沟旁的灌丛中，攀援树上。分布于广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

叶：外用于皮肤湿疹。

## 黄蝉属　Allemanda L.

**大花软枝黄蝉**

**Allemanda cathartica** L. var. **hendersonii** (Bull. ex Dombr.) Bail. et Raff.——*A. hendersonii* Bull. ex Dombr.

福建、台湾、广东、广西有栽培。

全株：有毒。杀虫，用于疥癣，灭子孓。

**黄蝉**　　黄兰蝉(广东)

**Allemanda neriifolia** Hook.

北京、福建、台湾、广东、广西均有栽培。

全株：有毒。杀虫，灭子孓。

## 鸡骨常山属　Alstonia R. Br.

**广西羊角棉**　　水柳(广西)

**Alstonia guangxiensis** D. Fang et X. X. Chen

生于山地疏林中或水沟旁。分布于广西。

根、叶：外用于疮疡肿毒。

**羊角棉**　　小鸡骨常山、闹狗药、见血飞(贵州)、鸡舌头树(云南)

**Alstonia mairei** Lévl.

生于海拔 700—1 500 米的山地疏林下岩石上。分布于四川、贵州、云南。

叶：辛，温。有毒。散血止痛，排脓生肌。外用于刀伤出血，疮毒。

**糖胶树**　　面条树(广东、广西、云南)，象皮木、灯台木、肥猪叶(广西)，鸭脚木(云南)

**Alstonia scholaris** (L.) R. Br.——*Echites scholaris* L.

生于海拔650米以下的山地疏林中、路旁或水沟边。分布于广西、云南。台湾、湖南、广东、湖南有栽培。

嫩枝、树皮、叶(灯台树)：淡，平。有毒。清热解毒，止痛，化痰止咳，止血。用于咳嗽痰喘，感冒，顿咳，胃痛，泄泻，疟疾，风湿；外用于外伤、溃疡出血，跌打创伤，骨折，痈疮红肿。

**鸡骨常山**　白虎木(广西)，红辣树(广西、贵州)，鸭脚树(云南)，滇鸡骨常山（中药志）

**Alstonia yunnanensis** Diels

生于海拔1 100—2 400米的山坡或沟谷地带灌木丛中。分布于广西、四川、贵州、云南。

根：苦，寒。有小毒。清热解毒，截疟，止痛，降压。用于感冒发热，头痛，疟疾，肺热咳嗽，咽喉肿痛，口疮，高血压病。　叶：苦，凉。有小毒。消炎，止血，接骨，止痛。用于疟疾，肝炎；外用于外伤出血，骨折。

## 链珠藤属　Alyxia Banks ex R. Br.

**海南链珠藤**　白骨藤(海南)

**Alyxia hainanensis** Merr. et Chun

生于海拔250—950米的山地、丘陵疏林下或山谷、路旁阴湿处。分布于广东、海南、广西、四川。

茎、叶：微苦，凉。清热解毒。用于慢性肝炎。

**筋藤**　香藤(广东)，九牛藤、骚羊果、坎香藤、藤满山香、三托藤(广西)

**Alyxia levinei** Merr.

生于海拔250—400米的山地疏林下或山谷、水沟旁。分布于广东、广西、云南。

全株：微苦，温。消肿止痛，祛瘀生新。用于风湿痹痛，小儿疳积，抽筋，腰痛，胃痛，疮疖。

**勐龙链珠藤**

**Alyxia menglungensis** Tsiang et P. T. Li

生于海拔750—1 950米的山地密林下。分布于云南。

全株：苦、涩，平。有小毒。清热解毒。用于疟疾。　根：用于风湿关节痛。

**链珠藤**　春根藤、满山香(福建、广东)，念珠藤(广州)，过山香(广东、贵州)。

**Alyxia sinensis** Champ. ex Benth.

生于矮林或灌丛中。分布于浙江、江西、福建、湖南、广东、广西、贵州。

全株(瓜子藤)：辛、微苦，温。祛风活血，通经活络。用于风湿关节痛，腰痛，跌打损伤，闭经。　根(阿利藤)：有小毒。解热镇痛，消痈解毒。用于风火牙痛，风湿关节痛，脾虚泄泻，湿性脚气，水肿，胃痛，跌打损伤。

**长序链珠藤**　白龙须(广西)

**Alyxia yunkuniana** Tsiang

生于海拔250—1 000米的山地疏林中、灌丛中或山谷、溪旁。分布于广东、广西、云

南。

茎：用于妇女乳汁缺少。

## 毛车藤属　Amalocalyx Pierre

**毛车藤**　酸果藤、锯子藤(贵州、云南)

**Amalocalyx yunnanensis** Tsiang

生于海拔800—1 000米的山地疏林中。分布于贵州、云南。

根(毛车藤)：催乳。用于妇女乳汁缺少。

## 水甘草属　Amsonia Walt.

**水甘草**

**Amsonia sinensis** Tsiang et P. T. Li

生于水边。分布于江苏、安徽。

全草(水甘草)：甘，凉。清热解毒。用于小儿风热，丹毒疮肿。

## 鳝藤属　Anodendron A. DC.

**鳝藤**　铁骨藤(广西)

**Anodendron affine** (Hook. et Arn.) Druce

生于山地稀疏杂木林中。分布于华东、中南、西南及台湾。

茎：微苦、辛，温。有小毒。祛风行气，燥湿健脾，通经络，解毒。

## 罗布麻属　Apocynum L.

**罗布麻**　牛茶(吉林)，茶叶花(陕西、甘肃、青海、河北)，红麻(陕西)，野麻(新疆、甘肃、青海)

**Apocynum venetum** L.——*Trachomitum venetum* (L.) Woods.

生于盐碱荒地和沙漠边缘及河流两岸。分布于东北、华北、西北、华东。湖北、四川、贵州有栽培。

叶(罗布麻叶)：甘、苦，凉。平肝安神，清热利水。用于肝阳眩晕，心悸失眠，浮肿尿少，高血压症，肾虚，水肿。　全草(罗布麻)：甘、苦，凉。有小毒。清火，降压，强心，利尿。用于心脏病，高血压症，肾虚，肝炎腹胀，水肿。　乳汁：用于愈合伤口。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②同科植物**大叶白麻 Poacynum hendersonii** (Hook. f.) Woods.，分布于甘肃、青海、新疆；**白麻 P. pictum** (Schrenk) Baill.，分布于甘肃、青海、新疆，在新疆也作罗布麻入药。

## 清明花属 Beaumontia Wall.

**清明花** 刹抱龙(傣语)

**Beaumontia grandiflora** Wall.

生于海拔720—800米的山地疏林中。分布于云南。福建、广东、广西有栽培。

根、叶(炮弹果): 辛,温。祛风湿,散瘀活血,接骨。用于风湿关节痛,腰腿痛,跌打损伤,腰肌劳损,骨折。

**思茅清明花** 百解(云南)

**Beaumontia murtonii** Craib

生于海拔800—1 400米的山地杂木林中。分布于云南。

根、叶: 祛风湿,散瘀活血,接骨。用于风湿关节痛,腰肌劳损,骨折。

**广西清明花** 补乳藤(广西)

**Beaumontia pitardii** Tsiang

生于海拔700—1 000米的山谷密林中或疏林中,攀援大树上。分布于广西、云南。

叶: 催乳。用于妇女乳汁缺少。

## 假虎刺属 Carissa L.

**假虎刺** 刺郎果、黑奶奶果(贵州、云南)

**Carissa spinarum** L.

生于海拔540—1 650米的砂地灌木丛中。分布于福建、贵州、云南。

根(老虎刺): 苦、辛,凉。消炎,解热,止痛。用于黄疸,胃痛,风湿关节痛,疮疖,淋巴腺炎,目赤红肿,牙周炎,咽喉肿痛。

## 黄花夹竹桃属 Cascabela Rafin.

**黄花夹竹桃** 番仔桃(福建),黄花状元竹(广东),柳木子(广西),酒杯花(贵州)

**Cascabela thevetia** (L.) Lippold——*Cerbera thevetia* L.; *Cerbera peruviana* Pers.

原产美洲热带。北京、福建、台湾、河南、湖北、广东、广西、四川、贵州、云南有栽培。

种子: 辛、苦,温。有大毒。强心,利尿,消肿。用于心力衰竭,阵发性室上性心动过速,阵发性心房纤颤。 叶: 苦,温。有毒。强心,解毒,消肿。用于蛇头疔。

## 长春花属 Catharanthus G. Don

**长春花** 雁来红(广东、贵州),三万花、日日草、日日新(广东、广西)

**Catharanthus roseus** (L.) G. Don——*Vinca rosea* L.

华东、中南、西南有栽培。

全株(长春花)：微苦，凉。有毒。抗癌，降血压。用于急性淋巴细胞性白血病，淋巴肉瘤，肺癌，绒毛膜上皮癌，子宫癌，巨滤泡性淋巴瘤，高血压症。

附　注：功效相同的有**白长春花 Catharanthus roseus** (L.) G. Don cv. **Albus**，广东、海南、广西有栽培；**黄长春花 C. roseus** (L.) G. Don cv. **Flavus**，海南有栽培。

## 海杧果属 Cerbera L.

**海杧果**　猴欢喜(台湾)，黄金茄、牛金茄、牛心荔(广东、海南)

**Cerbera manghas** L.

生于海边或近海边湿润处。分布于台湾、广东、海南、广西。

种子(牛心茄子)：有毒。用于外科膏药或麻醉药。　树液(海杧果)：催吐，泻下，堕胎。

## 鹿角藤属 Chonemorpha G. Don

**鹿角藤**　毛凉薯藤、大奶藤、黄藤、奶汁藤(广西)

**Chonemorpha eriostylis** Pitard

生于山地疏林及湿润山谷中。分布于广东、广西、云南。

茎藤：用于风湿骨痛，淋浊，黄疸。

**长萼鹿角藤**　藤仲、草杜仲、大杜仲、金丝杜仲、银丝杜仲、土杜仲(云南)

**Chonemorpha megacalyx** Pierre

生于海拔 900—1 500 米的山地林边、山坡、沟谷向阳处。分布于云南。

茎藤：辛，温。通经活络，活血止痛，接骨生肌，降压。用于肾亏腰痛，高血压症，风湿骨痛，骨折，跌打损伤。　种毛：止血(外敷)。

**毛叶藤仲**　土杜仲(贵州、云南)，九牛藤(云南)

**Chonemorpha valvata** Chatt.

生于海拔 900—1 600 米的山地密林中及沟谷阴湿处。分布于贵州、云南。

根、茎皮(藤仲)：淡，平。有小毒。祛风活络，止血，接骨。用于风湿关节痛；外用于外伤出血，骨折筋伤。

## 花皮胶藤属 Ecdysanthera Hook. et Arn.

**酸叶胶藤**　厚皮藤(海南)，红背酸藤、黑风藤、风藤(广西)，酸叶藤(云南)

**Ecdysanthera rosea** Hook. et Arn.

生于山地杂木林中或山谷、水沟旁较湿润处。分布于长江以南各省区。

全株：酸、微涩，凉。利尿，消肿，止痛。用于咽喉肿痛，口腔破溃，牙龈炎，水肿，泄泻，风湿骨痛，跌打瘀肿，疔疮，蛇咬伤。

**花皮胶藤**　花杜仲藤、眼角蓝、刺耳蓝(广东、广西、云南)，喉崩癀、花喉崩(海南)

**Ecdysanthera utilis** Hayata et Kawan.

生于海拔 200—1 000 米的山地密林中及山谷、水沟旁湿润处。分布于台湾、广东、海南、广西、云南。

茎皮(花皮胶藤): 外用于小儿白泡疮。

## 思茅藤属 Epigynum Wight

**思茅藤** 土杜仲(云南)

**Epigynum auritum** (Schneid.) Tsiang et P. T. Li——*Trachelospermum auritum* Schneid.

生于海拔 600—1 900 米的河谷、林缘、杂木林中阴湿处，攀援树上。分布于云南。

根皮、茎皮: 苦、涩，温。强筋壮腰。

## 狗牙花属 Ervatamia (A. DC.) Stapf

**单瓣狗牙花**

**Ervatamia divaricata** (L.) Burk.——*Nerium divaricatum* L.

生于山地疏林中。分布于云南。台湾、广东、广西有栽培。

根、叶、花、: 苦、辛，凉。有小毒。清热解毒，散结利咽，消肿止痛，降压。用于目赤肿痛，乳痈，疮疖，狂犬咬伤，蛇咬伤，高血压症，头痛。

**狗牙花** 狗颠木、狮子花、豆腐花、白狗牙(广西)

**Ervatamia divaricata** (L.) Burk. cv. **Gouyahua**

南部各省区有栽培。

根(狗牙花): 酸，凉。清热解毒。用于咽喉肿痛，头痛，骨折。 叶、花: 酸，凉。清热解毒，利水消肿，降压。用于高血压症，疮疖，目赤肿痛，头痛，疮疖，蛇咬伤。

**海南狗牙花** 独根木、山辣椒树、震天雷、艾角青(海南)，鸡爪花(广西)

**Ervatamia hainanensis** Tsiang

生于海拔 100—530 米的山地密林中及丘陵灌丛中。分布于广东、海南、广西、云南。

根(单根木): 苦、辛，凉。有小毒。清热解毒，止痛，降血压。用于高血压症，咽喉肿痛，风湿关节痛，胃痛，痢疾; 外用于乳痈，疖肿，毒蛇咬伤，跌打损伤。 叶(单根木叶): 苦、辛，凉。有小毒。消炎止痛。用于疮疖，跌打肿痛，毒蛇咬伤。

**广西狗牙花** 大驳骨、山狮子(广西)

**Ervatamia kwangsiensis** Tsiang

生于海拔 500—1 000 米的山坡灌丛中。分布于广西。

根皮、叶: 活血散瘀。用于跌打肿痛，骨折。

**贵州狗牙花**

**Ervatamia kweichowensis** Tsiang

生于山地林中。分布于贵州。

根皮、叶: 活血散瘀。用于跌打损伤，骨折。

**药用狗牙花**

**Ervatamia officinalis** Tsiang

生于海拔 150—800 米的山地疏林中及山谷中。分布于海南、云南。

根：用于腹痛。

## 止泻木属　Holarrhena R. Br.

**止泻木**

**Holarrhena antidysenterica** Wall. ex A. DC.

生于海拔 500—1 000 米的山地疏林中、山坡路旁或山谷水沟边。分布于台湾、海南、广西、贵州、云南。

树皮：退热，止泻。用于痢疾，肠胃气胀，发热。　根、叶：止泻。　种子：补肾壮阳。

## 腰骨藤属　Ichnocarpus R. Br.

**腰骨藤**　羊角藤、勾临链、犁田公藤(海南)

**Ichnocarpus frutescens** (L.) W. T. Ait.——*Apocynum frutescens* L.

生于海拔 150—950 米的山地疏林中、低丘陵灌丛中或路旁。分布于福建、广东、广西、贵州、云南。

种子(腰骨藤)：祛风除湿，补肾，壮阳，止痛。用于腰骨风湿痛。　叶：用于小儿消化不良。

毛叶腰骨藤

**Ichnocarpus frutescens** (L.) W. T. Ait. f. **pubescens Markgr.**

生于山地疏林中或灌丛中。分布于广西、贵州。

茎、叶：外用于癣疹。

**少花腰骨藤**　红杜仲(广西)

**Ichnocarpus oliganthus** Tsiang

生于海拔 300—500 米的山地疏林中。分布于广东、广西。

树皮：舒筋活血。用于筋骨痛，风湿痹痛。

## 蕊木属　Kopsia Bl.

**云南蕊木**　梅桂、柯蒲木(云南)，马蒙加锁(傣语)

**Kopsia officinalis** Tsiang et P. T. Li

生于海拔 500—800 米的山地疏林中或路旁。分布于云南。

叶、果实(云南蕊木)：苦、辛，凉。有毒。止痛，舒筋活络，解毒。用于咽喉肿痛，乳蛾，风湿骨痛，四肢麻木。　树皮：消肿。用于水肿。

## 山橙属 Melodinus J. R. et G. Forst.

**尖山橙** 驳筋树、青竹藤、竹藤、藤皮黄(广西),岩山枝(贵州)

**Melodinus fusiformis** Champ. ex Benth.

生于海拔 300—1 400 米的山地疏林中或山坡路旁、山谷水沟边。分布于广东、海南、广西、贵州。

全株(尖山橙): 活血,祛风,补肺,通乳。用于风湿痹痛,风湿性心脏病,跌打损伤。果实: 有毒。行气,止痛。

**川山橙** 山橙子(四川),岩山枝(贵州)

**Melodinus hemsleyanus** Diels

生于海拔 500—1 500 米的山地疏林中、山坡路旁或岩石上。分布于四川、贵州。

果实: 解热镇静,活血散瘀。 根: 清热凉血,解毒。

**思茅山橙**

**Melodinus henryi** Craib

生于海拔 760—2 800 米的山林中或岩石向阳处。分布于贵州、云南。

果实(岩山枝): 甘、微辛,寒。解热镇痉,活血散瘀,消炎止痛。用于小儿角弓反张(脑膜炎),骨折,挫伤青肿。

**山橙** 马骝藤、马骝橙藤(广东),猴子果(广西)

**Melodinus suaveolens** Champ. ex Benth.

生于丘陵、山谷,攀援树上或石壁上。分布于广东、海南、广西、贵州。

果实(山橙): 苦,凉。有小毒。行气止痛,清热利尿,消积化痰。用于消化不良,小儿疳积,手痛,疝气,腹痛,咳嗽痰多,皮肤热毒,湿癣疥癞,瘰疬。

**雷打果**

**Melodinus yunnanensis** Tsiang et P. T. Li

生于海拔 1 000—2 000 米的潮湿密林中。分布于云南。

全株: 解热,镇痉,活血散瘀。用于跌打损伤,骨折。

## 夹竹桃属 Nerium L.

**夹竹桃** 柳叶桃(河北、青海、四川),红花夹竹桃(广东),四季红(广西),洋笔桃(贵州),白羊桃(云南)

**Nerium indicum** Mill.

全国各省区均有栽培,尤以南方为多。

叶(夹竹桃): 辛、苦、涩,温。有毒。强心利尿,祛痰杀虫。用于心力衰竭,癫痫;外用于甲沟炎,斑秃、杀蝇。 全株: 有毒。强心,利尿,发汗,祛痰,散瘀,止痛,解毒,透疹。用于哮喘,羊癫痫,心力衰竭;杀蝇,灭子孓。

**白花夹竹桃** 指甲桃(贵州)

**Nerium indicum** Mill. cv. **Paihua**

河北、广东、广西、四川、贵州均有栽培。

**根皮**：有毒。强心，杀虫。用于心力衰竭，癫痫；外用于甲沟炎，斑秃。

## 杜仲藤属　Parabarium Pierre

**毛杜仲藤**　藤仲(广东、广西、贵州、云南)，土杜仲、红杜仲、鸡头藤(广西、贵州)

**Parabarium huaitingii** Chun et Tsiang

生于海拔200—1 000米的山地疏林中或沟谷小树丛中。分布于湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根、老茎(杜仲藤)：苦、微辛，平。有小毒。祛风活络，补腰肾，强筋骨。用于肾虚腰痛，扭伤，骨折，风湿痹痛，阳痿，高血压症；外用于外伤出血。

附　注：功效相同的有**红杜仲藤 P. chunianum** Tsiang，分布于广东、广西；**杜仲藤 P. micranthum** (A. DC.) Pierre，分布于广东、广西、四川、云南；**海南杜仲藤 P. hainanense** Tsiang，分布于海南。

**牛角藤**　养当杜、杜仲藤(云南)

**Parabarium linearicarpum** (Pierre) Pichon——*Ecdysanthera linearicarpum* Pierre

生于海拔500—1 300米的热带雨林中或疏林中的湿润处。分布于云南。

根、茎：祛风活血，强腰，壮骨。用于风湿关节痛，肾虚腰痛，扭伤。

## 长节珠属　Parameria Benth.

**长节珠**　金丝杜仲、银光杜仲、节荚藤、杜仲藤(云南)

**Parameria laevigata** (Juss.) Moldenke——*Aegiphila laevigata* Juss.

生于海拔800—1 500米的山地林中或山谷潮湿地，攀援大树上。分布于广西、云南。

全株(长节珠)：苦、甘，平。祛风活血，散瘀止痛。用于风湿骨痛，跌打损伤，肾下垂，水肿。　茎、茎皮(金丝藤仲　)：苦、甘，平。止血，壮腰补肾。用于风湿骨痛，跌打损伤、水肿，肾下垂；外用于外伤出血，毒蛇咬伤。

## 同心结属　Parsonsia R. Br.

**广西同心结**

**Parsonsia goniostemon** Hand.-Mazz.

生于海拔800米的岩石上或山坡灌木丛中。分布于广西。

全株：用于肝脾肿大。

## 鸡蛋花属　Plumeria L.

**鸡蛋花**　蛋黄花、擂捶花(广东)，大季花、鸭脚木(广西)，缅栀子，(植物名实图考)

**Plumeria rubra** L. cv. **Acutifolia**

福建、广东、广西、云南有栽培。

花(鸡蛋花)：甘，凉。清热解暑，利湿，润肺止咳。用于肺热咳喘，肝炎，消化不良，咳嗽痰喘，小儿疳积，痢疾，感冒发热，肺虚咳嗽，贫血；预防中暑。　树皮：用于痢疾，感冒高热，哮喘。

## 帘子藤属　Pottsia Hook. et Arn.

**大花帘子藤**　　乳汁藤(广西)

**Pottsia grandiflora** Markgr.

生于海拔400—1 100米的山地疏林中或湿润的密林山谷中，攀援树上。分布于浙江、湖南、广东、广西、云南。

茎：用于腰骨酸痛，贫血，妇女产后虚弱。

**帘子藤**　　花拐藤(福建、湖南、广西)，黄心泥藤(广东)，菜豆藤(广西)，长角胶藤(贵州)

**Pottsia laxiflora** (Bl.) O. Kuntze——*Vallaris laxiflora* Bl.; *P. cantonensis* Hook. et Arn.

生于海拔200—1 600米的山地疏林中或山坡灌丛中。分布于江西、福建、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根、茎、乳汁(帘子藤)：苦、辛，微温。活络行血，祛风除湿。用于腰腿酸痛，贫血，风湿，跌打损伤，痈疽，经闭。

## 萝芙木属　Rauvolfia L.

**古巴萝芙木**

**Rauvolfia cubana** A. DC.

原产古巴。云南有栽培。

根：清热，凉血，解毒，接骨。用于感冒发热，风湿，骨折。

**风湿木**　　山熊胆、奎宁木(广西)

**Rauvolfia latifrons** Tsiang

生于海拔300—800米的山地水沟边、路旁灌丛中或丘陵山谷、密林石上。分布于广西。广东南部有栽培。

根、茎(风湿木)：祛风活血，降压。用于风湿痹痛，胆囊炎，疟疾，高血压症；外用于骨折。

附　注：本种的根，总碱及利血平含量较高。

**蛇根萝芙木**

**Rauvolfia perakensis** King et Gamble

原产马来西亚。海南、云南有栽培。

根：降血压。用于高血压症。

**蛇根木**　印度萝芙木、印度蛇根木、印度蛇根草(药学学报)

**Rauvolfia serpentina** (L.) Benth. ex Kurz——*Ophioxylon serpentinum* L.

生于山地林中。分布于云南。广东、海南、广西、贵州有栽培。

根、茎皮、叶(蛇根木)：苦，凉。清风热，降肝火，消肿毒，降压。用于高血压症，感冒发热，咽喉肿痛，头痛眩晕，吐泻，风痒疮疥，癫痫，虫蛇咬伤。

**四叶萝芙木**

**Rauvolfia tetraphylla** L.

原产南美洲。广东、广西、云南有栽培。

树汁(四叶萝芙木)：催吐，泻下，祛痰，利尿，消肿。　根(四叶萝芙木根)：降压。用于高血压症。

**吊罗山萝芙木**

**Rauvolfia tiaolushanensis** Tsiang

生于山地沟谷、溪边、林下阴湿处。分布于海南。

根：降压。用于高血压症。

附　注：本种的根，总碱及利血平含量较高。

**萝芙木**　野辣椒、鱼胆木、刀伤药(广西)，十八爪(贵州)，羊屎果(云南)

**Rauvolfia verticillata** (Lour.) Baill.——*Dissolaena verticillata* Lour.

生于溪边、林缘、坡地、旷野潮湿处及山腰以下疏林中或灌丛中。分布于台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。福建、湖北、四川有栽培。

根(萝芙木)：苦，寒。有小毒。镇静，降压，活血止痛，清热解毒。用于高血压症，头痛，眩晕，失眠，高热不退，胆囊炎，黄疸；外用于跌打损伤，毒蛇咬伤，疮疥。

附　注：功效相同的有**云南萝芙木 R. yunnanensis** Tsiang，分布于广西、贵州、云南；**红果萝芙木 R. verticillata** (Lour.) Baill. f. **rubrocarpa** H. T. Chang，分布于海南、广西。

**海南萝芙木**

**Rauvolfia verticillata** (Lour.) Baill. var. **hainanensis** Tsiang

生于低海拔山地沟谷边阴湿处。分布于海南、广西。

全株：用于高血压症，带下病，淋浊，月经不调，疝气，咽喉痛。　根：用于高血压症，头痛，眩晕，失眠，高热不退。　叶：外用于恶疮，溃疡。

附　注：本种根的总碱含量较高。

**倒披针叶萝芙木**

**Rauvolfia verticillata** (Lour.) Baill. var. **oblanceolata** Tsiang

生于海拔 1 100—1 800 米的山地丛林中。分布于广西、贵州、云南。

根、全株：用于高血压症，头晕，失眠。

**药用萝芙木**　奎宁树、大叶萝芙木(广西)

**Rauvolfia verticillata** (Lour.) Baill. var. **officinalis** Tsiang

生于海拔 500—800 米的山地沟谷潮湿地方。分布于广西、贵州、云南。

全株：清热解毒，止痛，祛风，降压。用于高血压症，感冒，头痛，骨痛，胃痛，腹痛，咳嗽，伤寒，疟疾，蛇咬伤。

**催吐萝芙木**

**Rauvolfia vomitoria** Afzel. ex Spreng.

广东、广西、云南有栽培。

根(催吐萝芙木)：降压。用于高血压症；可提制呕吐、泻下药物。　茎皮：清热解毒。用于高热，消化不良，疥癣。　乳汁：用于腹痛，泻下。

附　注：本种的根，国内已作为提取利血平的原料，其总碱已应用于临床。

## 毛药藤属　Sindechites Oliv.

**毛药藤**　　土牛党七(湖南、广西)，黄经树、蔷薇根(四川)

**Sindechites henryi** Oliv.——*S. esquirolii* Woods.

生于海拔600—1 300米的山地疏林中、山腰路旁向阳处，灌丛中或山谷密林中水沟旁。分布于浙江、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根：滋补。孕妇忌用。

## 羊角拗属　Strophanthus DC.

**羊角拗**　　羊角藤(福建)，羊角树，牛角藤(广东、广西)，断肠草(广西)

**Strophanthus divaricatus** (Lour.) Hook. et Arn.——*Pergularis divaricata* Lour.

生于山坡路旁、疏林湿地或灌丛中。分布于福建、广东、广西、贵州、云南。

根、茎叶(羊角拗)：苦，寒。有毒。祛风湿，通经络，解疮毒，杀虫。用于风湿痹痛，小儿麻痹后遗症，跌打损伤，痈疮，疥癣。　叶、种子(羊角扭)：苦，寒。有毒。强心，消肿，止痛，止痒，杀虫。用于风湿关节痛，小儿麻痹后遗症，皮癣，腱鞘炎，骨折，多发性疖肿。

**箭毒羊角拗**　　羊角树(福建)

**Strophanthus hispidus** DC.

原产非洲南部。福建、广东、广西、云南有栽培。

种子：有毒。强心，利尿。　全株：苦、辛，温。有毒。祛风除湿，消肿，杀虫。用于关节痛，水肿初起，背疽，疥疮。

**云南羊角拗**　　藤羊角拗(云南)

**Strophanthus wallichii** A. DC.

生于海拔540—950米的山地杂木林中或路旁灌丛中。分布于云南。

种子：强心，利尿，消肿。

## 络石属 Trachelospermum Lem.

**紫花络石**　　杜仲藤(福建)，藤杜仲(湖北、湖南)，车藤(广西)，络石藤(四川)，牛角藤(贵州)

**Trachelospermum axillare** Hook. f.

生于山地疏林中或山谷水沟边。分布于西南及浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广

西。

全株(紫花络石)：辛、微苦，温。有毒。解表发汗，通经活络，止痛。用于感冒，风湿，跌打损伤，痰喘咳嗽，肺痨。

**短柱络石**　羊角草、龙骨风盖墙风(广西)

**Trachelospermum brevistylum** Hand.-Mazz.

生于海拔600—1 100米的山地疏林中，缠绕于树上或石上。分布于安徽、福建、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

茎：用于风湿痹痛。

**乳儿绳**　五根树、鸡屎藤(浙江)，岩岗豆(湖北)

**Trachelospermum cathayanum** Schneid.

生于山地疏林下或山谷水沟边。分布于西南及浙江、湖北、湖南、广东、海南、广西。

茎藤：用于肾虚泄泻，腰肌劳损，风湿性关节痛，风湿痹痛。

**锈毛络石**　六角藤(湖南)，大黑骨头、橡胶藤(广西)

**Trachelospermum dunnii** (Lévl.) Lévl.——*Melodinus dunnii* Lévl.

生于海拔320—1 550米的山地疏林中或溪边、路旁、山脚下灌丛中。分布于湖南、广西、贵州、云南。

叶芽：活血散瘀。外用于跌打损伤。

**无腺络石**

**Trachelospermum eglandulatum** D. Fang

生于山地疏林中、溪边或山坡灌丛中。分布于广西。

根、茎：用于风湿痹痛。

**湖北络石**　爬山虎(湖北)，络石藤(湖北、四川)

**Trachelospermum gracilipes** Hook. f. var. **hupehense** Tsiang et P. T. Li

生于海拔1 000米左右的山谷密林中，攀于树上或岩石上。分布于浙江、湖北、湖南、广东、四川、贵州。

全株：解毒，祛风活血，通络止痛。用于感冒，风湿痹痛，关节痛，跌打损伤，痈肿。

**络石**　乳风绳(浙江)，爬墙虎(江苏)，石气柑(四川)，钻骨风(贵州)，白花藤(植物名实图考)

**Trachelospermum jasminoides** (Lindl.) Lem.——*Rhynchospermum jasminoides* Lindl.

生于山野、溪边、坑谷、路旁杂木林中，常攀援树上或墙壁、岩石上。分布于华北、华东、中南及陕西、甘肃、四川、贵州、云南。

茎藤(络石藤)：苦，微寒。祛风通络，凉血消肿。用于风湿热痹，筋脉拘挛，腰膝酸痛，喉痹，痈肿，跌打损伤。　果实(络石果)：用于筋骨痛。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**石血**　爬山虎(陕西、江苏、安徽)，茉莉藤(浙江)，悬石(湖南)，九庆藤(广西)，铁栏杆(贵州)

**Trachelospermum jasminoides** (Lindl.) Lem. var. **heterophyllum** Tsiang

生于山野岩石上或攀伏在墙上、树上。分布于华北、华东、中南、西南及陕西、甘肃、宁

夏。

全株(石血)：苦、微涩，温。祛风止痛，通经络，利关节。用于风湿骨痛，腰膝酸痛，肾虚泄泻，跌打损伤。

## 纽子花属　Vallaris Burm. f.

**大纽子花**　糯米饭花(云南)

**Vallaris indecora** (Baill.) Tsiang et P. T. Li——*Beaumontia indecora* Baill.

生于海拔1 500—2 125米的山地密林沟谷中。分布于广西、四川、贵州、云南。

全株：用于血吸虫病。

附　注：种子有毒。

## 蔓长春花属　Vinca L.

**花叶蔓长春花**

**Vinca major** L. cv. **Variegata**

原产欧洲。江苏、浙江、四川有栽培。

茎　叶：清热解毒。

## 盆架树属　Winchia A. DC.

**盆架树**　岭刀柄、山苦常、鸭脚常、白叶糖胶(海南)，马灯盆(云南)

**Winchia calophylla** A. DC.

生于海拔500—1 100米的热带和亚热带山地常绿林中或山谷热带雨林中。分布于海南、云南。福建有引种。

茎皮、叶：消炎止痛，止咳平喘。用于咳嗽痰喘，顿咳，胃痛，泄泻，疟疾；外用于跌打损伤。　乳汁：外用于外伤出血。

## 倒吊笔属　Wrightia R. Br.

**蓝树**　七星树、山蓝树(广东)，大青叶、板蓝根(广西)，大蓝靛(广西、贵州)

**Wrightia laevis** Hook. f.

生于村旁、路边、山地疏林中或山谷向阳处。分布于广东、广西、贵州、云南。

根、叶：止血。外用于刀伤，跌打损伤。　果实：用于肺痨。

**倒吊笔**　章表根、墨柱根(广东)，细姑木、乳酱树、苦杨(海南)

**Wrightia pubescens** R. Br.

生于低海拔热带雨林中或干燥山麓疏林中。分布于广东、海南、广西、贵州、云南。

根(倒吊笔)：甘，平。祛风利湿，消肿生肌，化痰散结。用于瘰疬，风湿关节痛，腰腿痛，咳嗽痰喘，黄疸，肝硬化腹水，带下病。　叶(倒吊笔叶)：甘，凉。用于感冒发热，急性

炎症感染。

**个瓣**

**Wrightia sikkimensis** Gamble

生于海拔500—1 500米的山地路旁、山谷、山坡的疏林中或丘陵石灰岩上，也有生于潮湿的密林中。分布于广西、贵州、云南。

叶：止血。

**囊木**

**Wrightia tomentosa** (Roxb.) Roem. et Schult.——*Nerium tomentosum* Roxb.

生于海拔200—1 500米的山地沟谷密林中或山脚潮湿疏林中。分布于广西、贵州、云南。

**根、茎**：解毒消肿。外用于蛇咬伤。

## 153. 萝藦科 Asclepiadaceae

### 乳突果属 Adelostemma Hook. f.

**乳突果**

**Adelostemma gracillimum** (Wall. ex Wight) Hook. f.——*Cynanchum gracillimum* Wall. ex Wight

生于海拔500—2 100(—2 700)米的山地灌丛或山谷林中。分布于广西、贵州、云南。

果实：外用于疮疖，毒蛇咬伤。

### 马利筋属 Asclepias L.

**马利筋** 金凤花(广东)，山桃花(广西)，金银花台、土常山(云南)

**Asclepias curassavica** L.

原产美洲。全国各地均有栽培，南方亦有逸生。

根(莲生桂子草根)：辛，平。有毒。止血，杀虫，解毒，消痞。 全草(莲生桂子花)：苦，寒。有毒。清热解毒，活血止血。用于乳蛾，肺热咳嗽，痰喘，小便淋痛，崩漏，带下病，外伤出血。

### 秦岭藤属 Biondia Schltr.

**秦岭藤**

**Biondia chinensis** Schltr.

生于海拔1 000—2 400米的山地杂林中或路旁。分布于陕西、甘肃、湖北、四川。

全草：用于跌打损伤。

附 注：我国特有属。

**宽叶秦岭藤** 寸金藤(陕西)

**Biondia hemsleyana** (Warb.) Tsiang——*Gongronema hemsleyana* Warb.

生于海拔1 000—2 500米的山地杂木林中。分布于陕西、甘肃、湖北、四川、贵州。

茎：用于胃痛。

**青龙藤**　藤叶细辛、捆仙绳(陕西)

**Biondia henryi** (Warb. ex Schltr. et Diels) Tsiang et P. T. Li——*Cynanchum henryi* Warb. ex Schetr. et Diels

生于山地疏林中、崖边或石隙中。分布于陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、河南、四川、贵州。

带根全草(捆仙丝)：淡，温。活血舒筋，理气祛风。用于跌打损伤，下肢冷痛麻木，风湿手足麻木，牙痛。

## 润肺草属　Brachystelma R. Br.

**润肺草**

**Brachystelma edule** Çoll. et Hemsl.

生于海拔300—1 800(—3 500)米的山地林下。分布于广西、云南。

块根：润肺，止咳。

## 牛角瓜属　Calotropis R. Br.

**牛角瓜**　羊浸树(云南)

**Calotropis gigantea** (L.) Dryand ex Ait. f.——*Asclepias gigantea* L.

生于海拔300—1700米的向阳山坡、旷野或海边。分布于广东、海南、广西、四川、云南。

茎皮：用于体癣，疥疮。　叶：淡、涩，平。祛痰定喘。用于顿咳，咳嗽痰喘。　全草：酸，平。清热解毒。用于无名肿毒，骨折。

## 吊灯花属　Ceropegia L.

**短序吊灯花**

**Ceropegia christenseniana** Hand.-Mazz.

生于山地林中、河边阴沟处或阴湿岩缝中。分布于贵州、云南。

全草(吊灯花)：酸，平。清热解毒。用于肿毒，骨折。

**长叶吊灯花**

**Ceropegia dolichophylla** Schltr.

生于海拔500—2 700米的山地密林中。分布于西南及广西。

根(双剪菜)：辛、苦，温。祛风除湿，补虚。用于劳伤虚弱，脚气病。

**普吉藤**　太子参(云南)，金雀马尾参(植物名实图考)

**Ceropegia mairei** (Lévl.) H. Huber——*Aristolochia mairei* Lévl.

生于海拔1 000—3 000米的山地荒坡、石缝中。分布于贵州、云南。

根：用于癞疮。

**西藏吊灯花**　底线参(云南)

**Ceropegia pubescens** Wall.

生于海拔 1 400—3 200 米的阔叶林中。分布于贵州、云南、西藏。

根(对叶林根)：辛，寒。杀虫。用于蛔虫病。全株(对叶林)：辛，寒。解毒。用于疔疮。

**吊灯花**

**Ceropegia trichantha** Hemsl.

生于海拔 400—800 米的山谷疏林中或林旁。分布于广东、海南、广西。

全株：用于骨折，跌打损伤，体癣，疮疖。

## 白叶藤属　Cryptolepis R. Br.

**古钩藤**　断肠草(广西)，白浆藤、大暗消、白都宗(云南)

**Cryptolepis buchananii** Roem. et Schult.

生于海拔 2 40—1 700 (—2 200) 米的山地林中或灌丛中，常攀援于树上。分布于广东、广西、贵州、云南。

根、叶：淡，寒。有毒。活血，消肿，舒筋活络，镇痛。用于跌打损伤，骨折，腰痛，腹痛，水肿，癣疥。　果实：有强心作用。

**白叶藤**

**Cryptolepis sinensis** (Lour.) Merr.——*Pergularia sinensis* Lour.

生于丘陵、山地灌丛中。分布于台湾、广东、广西、贵州、云南。

全株：甘、淡，凉。有小毒。清热解毒，散瘀止痛，止血。用于肺痨咯血，肺热咯血，胃出血，毒蛇咬伤，疮毒溃疡，疥疮，跌打损伤。

## 鹅绒藤属　Cynanchum L.

**合掌消**

**Cynanchum amplexicaule** (Sieb. et Zucc.) Hemsl.——*Vincetoxicum amplexicaule* Sieb. et Zucc.; *Alexitoxicon amplexicaule* (Sieb. et Zucc.) Pobed. et Zucc.

生于海拔 100—1 000 米的山坡草地或沙滩草丛中。分布于东北及内蒙古。

根及全草：微苦，平。清热，祛风湿，消肿解毒。用于胃痛，泄泻，急性肝炎，风湿痛，偏头痛，便血，痈肿湿疹。

**紫花合掌消**　野留心波子(陕西)，甜胆草(江西、湖南)

**Cynanchum amplexicaule** (Sieb. et Zucc.) Hemsl. var. **castaneum** Makino——*Vincetoxicum castaneum* Kitag.

生于荒地、草原、山坡。分布于东北、华北及陕西、江苏、安徽、江西、河南、湖北、湖南、四川、广西。

全草：清热解毒，祛风除湿。用于风湿关节痛，腰痛，偏头痛，月经不调，乳痈；外用于

疔疮肿毒。

**潮风草**　白薇(河北)

**Cynanchum ascyrifolium**(Franch. et Sav.) Matsum.——*Vincetoxicum ascyrifolium* Franch et Sav.

生于疏林下或山坡草地。分布于东北及河北。

根：苦、咸，寒。清热，利尿。功效类似于白薇。

**白薇**　老君须、荞麦细辛(陕西)，薇草(云南)，芮改容(苗语)

**Cynanchum atratum** Bunge——*Alexitoxicon atratum* (Bunge) Pobed

生于海拔100—2 600米的山坡、草丛、林缘、灌丛或荒地。分布于东北、华北、华东、中南、西南及陕西。

根及根状茎(白薇)：苦、咸，寒。清热凉血，利尿通淋，解毒疗疮。用于温邪发热，阴虚发热，骨蒸潮热，产后血虚发热，热淋，血淋，痈疽肿毒。

附　注：功效相同的有**变色白前 C. versicolor** Bunge，分布于吉林、辽宁、河北、山东、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、四川、贵州。均为《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**牛皮消**　隔山消(四川、贵州)，飞来鹤(植物名实图考)，耳叶牛皮消(中国药用植物志)

**Cynanchum auriculatum** Royle ex Wight

生于海拔3 500米以下的林缘、灌丛中或沟边湿地。除东北外全国各地均有分布。江苏有栽培。

带根全草(飞来鹤)：甘、微苦，平。有小毒。解毒消肿，健胃消积。用于食积腹痛，胃痛，小儿疳积，痢疾；外用于毒蛇咬伤，疔疮。

附　注：江苏栽培作白首乌用。

**白首乌**　地葫芦(河北)，泰山何首乌(山东)

**Cynanchum bungei** Decne.

生于海拔1 800米以下的山坡、灌丛或岩石缝中。分布于华北及辽宁、陕西、甘肃、宁夏、山东、安徽、河南、湖北、四川、西藏。

块根(白首乌)：苦、甘、涩，微温。补肝肾，强筋骨，益精血。用于久病虚弱，贫血，须发早白，风痹，腰膝酸软，性神经衰弱，痔疮，肠出血，体虚。　茎：安神，祛风，止汗。

**羊角子草**

**Cynanchum cathayense** Tsiang et Zhang

生于海拔900—1 400米的水边湿地或阴湿处。分布于河北、甘肃、宁夏、新疆。

根：祛风除湿，止腹痛。

**蔓剪草**

**Cynanchuum chekiangense** M. Cheng

生于山谷、溪边、林中及灌草丛中。分布于中南及江苏、安徽、浙江、江西、福建、四川。

根：辛，温。理气健胃，散瘀消肿，杀虫。用于跌打损伤，疥疮。

**鹅绒藤**

**Cynanchum chinense** R. Br.——*C. pubescens* Bunge

生于灌丛、沙地、田边、路旁。分布于华北及吉林、辽宁、陕西、甘肃、宁夏、山东、江苏、

浙江、河南、湖北、四川、贵州。

根：苦，寒。祛风解毒，健胃止痛。用于小儿疳积。　乳汁：用于疣赘。

**刺瓜**　乳蚕、野苦瓜(云南)

**Cynanchum corymbosum** Wight

生于海拔100—2 100米的溪边、河边灌丛及疏林中。分布于福建、广东、广西、四川、云南。

全草：甘、淡，平。益气，催乳，解毒。用于乳汁不足，肾虚水肿。

**豹药藤**　西川鹅绒藤(四川)，西川白前(种子植物名录)

**Cynanchum decipiens** Schneid.

生于海拔2 000—3 500米的山地沟谷、山坡及路旁的灌丛中或林中向阳处。分布于四川、云南。

根：有毒。清热解毒。

**山白前**

**Cynanchum fordii** Hemsl.

生于海拔300米以下的山地林缘、山谷疏林下或路旁灌丛向阳处。分布于福建、湖南、广东、海南、广西、云南。

根：用于风湿病。

**群虎草**　蛇辣子、搜山虎(云南)

**Cynanchum forrestii** Schltr.

生于海拔1 500—3 500米的向阳山坡、路边、灌丛及林缘。分布于西南及陕西、甘肃、青海。

根及根状茎(大羊角瓢)：苦、微甘，寒。清热凉血，止痛，消炎，安胎，补气。

附　注：云南、西藏作白薇用。

**峨眉牛皮消**

**Cynanchum giraldii** Schltr.

生于林下、灌丛林缘草地或石壁上。分布于陕西、甘肃、河南、四川。

根、茎：清热解毒，补脾健胃。

**白前**　羊奶子(陕西)，水竹消(湖南)，芫花叶白前(中药志)

**Cynanchum glaucescens** (Decne.) Hand.-Mazz. ——*Pentasacme glaucescens* Decne.

生于山坡路旁、河岸及沙石地。分布于华东、中南及陕西、四川、贵州、云南。

根及根状茎(白前)：辛、苦，凉。降气，消痰，止嗽。用于肺气壅实，咳嗽痰多，胸满喘急。　全草：清热解毒。用于肝炎，麻疹不透；外用于毒蛇咬伤，皮肤湿疹。

附　注：功效相同的有**柳叶白前 Cynanchum stauntonii** (Decne.) Schltr. ex Lévl. 分布于华东、中南及河北、四川、贵州。均为《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**华北白前**

**Cynanchum hancockianum** (Maxim.) Iljin.——*Vincetoxicum mongolicum* Maxim. *β. hancockianum* Maxim.

生于山坡或荒地。分布于华北及陕西、甘肃、河南、四川。

全草(对叶草)：苦，温。有毒。活血，止痛，解毒。用于关节痛，牙痛，秃疮。

**竹灵消**　牛角风、九造台(陕西)

**Cynanchum inamoenum** (Maxim.) Loes.——*Vincetoxicum inamoenum* Maxim.

生于海拔100—3 500米的山坡灌丛、林缘及草地。分布于华北及辽宁、陕西、甘肃、宁夏、山东、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北、湖南、四川、贵州、西藏。

根及根状茎(老君须)：辛，平。健脾补肾，化毒，调经活血。用于虚劳久嗽，浮肿，带下病，月经不调，瘰疬，疮疥。　种子：藏医作为退烧止泻药，并用于胆囊炎。

**老瓜头**　牛心朴子、黑牛心朴子(内蒙古、宁夏)

**Cynanchum komarovii** Iljin.

生于海拔2 000米以下的沙漠、半固定沙地、沙质草原及河边沙地。分布于华北及陕西、甘肃、宁夏。

种子：退热，止泻。

附　注：可作杀虫药。

**毛白前**

**Cynanchum mooreanum** Hemsl.

生于海拔200—700米的灌丛或疏林中。分布于华东及中南。

根：苦，平。清热解毒，行气健脾，活血通经。用于肠结核。

**朱砂藤**　朱砂莲(湖北)，藤白芍(湖南)，青阳参(滇南本草)

**Cynanchum officinale** (Hemsl.) Tsiang et Zhang ex Tsiang et P. T. Li——*Pentatropis officinalis* Hemsl.

生于海拔460—2 250米的沟谷水边、灌丛或疏林下。分布于中南及陕西、甘肃、宁夏、安徽、江西、四川、贵州、云南。

根(托腰散)：苦，温。有小毒。理气止痛，强筋骨，除风湿，明目。用于胃痛，腹痛，腰痛，跌打损伤。

**青洋参**　奶浆草、白药(云南)

**Cynanchum otophyllum** Schneid.

生于海拔1 500—3 000米的山坡路边、疏林或灌丛中。分布于西南及湖南、广西。

根：甘、辛，温。补肾，镇静，祛风湿。用于腹痛，头晕，耳鸣，癫痫，风湿骨痛，癣疹。

**徐长卿**　竹叶细辛(陕西)，寮刁竹(湖南)，柳叶细辛(四川)，加嘎陇给、芮六容（苗语）

**Cynanchum paniculatum** (Bunge) Kitag.——*Asclepias paniculatum* Bunge; *Pycnostelma paniculatum* K. Schum.

生于海拔1 800米以下的砾石山坡、干燥丘陵山坡或草丛中。分布于东北、华北、华东、中南及陕西、四川、贵州、云南。

全草(徐长卿)：辛，温。祛风除湿，行气通经。用于风湿痹痛，胃气胀满，腰痛，牙痛，跌打肿痛；外用于神经性皮炎，癣疹，缠腰火丹。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**西藏牛皮消**

**Cynanchum saccatum** W. T. Wang ex Tsiang et P. T. Li

生于海拔 2 000—3 400 米的林中或草地潮湿处。分布于四川、云南、西藏。

根：苦，寒。清热凉血，止血。

**地梢瓜**　羊奶草(陕西)，女青(本草新注)

**Cynanchum thesioides** (Freyn) K. Schum.——*Vincetoxicum thesioides* Freyn; *Cynanchum sibiricum* Willd.

生于山坡向阳处、沙质荒地、田边及路旁。分布于东北、华北、西北及山东、江苏、安徽、河南、湖北。

果实及全草(地梢瓜)：甘，平。补肺气，清热降火，生津止渴，消炎止痛。用于气血亏虚，脑神经衰弱，咽喉痛。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版附录收载。

**雀瓢**　地瓜瓜、马奶草(陕西)

**Cynanchum thesioides** (Freyn) K. Schum. var. **australe** (Maxim.) Tsiang et P. T. Li——*Vincetoxicum sibiricum* Decne. var. *australe* Maxim.

生于山坡、路旁、河岸及沟边。分布于东北、华北、西北及山东、江苏。

全草：苦，平。益气，下乳，生津止渴。用于体虚乳汁不下；外用于瘰疬。

**药用白前**　催吐白前(中国植物志)

**Cynanchum vincetoxicum** (L.)Pers.——*Asclepias vincetoxicum* **L.**

生于海拔 3 500 米以下的杂木林中。分布于台湾、四川、云南。

根：催吐。　种子：强心。

**昆明杯冠藤**　团花奶浆根(贵州)，金线壶芦(植物名实图考)

**Cynanchum wallichii** Wight

生于山坡草地、灌丛或山谷。分布于四川、贵州、云南。

根(断节参)：甘、微苦，温。壮腰健肾，强筋骨，解毒。用于肾虚腰痛，病后体虚，营养不良，跌打损伤，骨折。

**隔山消**　过山飘(四川)

**Cynanchum wilfordii** (Maxim.) Hemsl.——*Cynoctonum wilfordii* Maxim.

生于山坡、林缘、灌丛、路边。分布于华北及吉林、辽宁、陕西、甘肃、新疆、山东、江苏、河南、湖北、湖南、四川、贵州。

块根：苦、甘，平。补肝益肾，强筋壮骨。用于肾虚，阳痿遗精，腰腿疼痛。

## 马兰藤属　Dischidanthus Tsiang

**马兰藤**

**Dischidanthus urceolatus** (Dence.) Tsiang——*Marsdenia urceolatus* Decne.

生于山地杂木林或灌丛中。分布于湖南、广东、海南、广西。

全株：通乳。

## 眼树莲属　Dischidia R. Br.

**尖叶眼树莲**　南瓜子金(云南)

**Dischidia australis** Tsiang et P. T. Li

生于海拔500—680米的山地疏林中。分布于广西、云南。

全株(金瓜核)：甘、微酸，寒。清热化痰，凉血解毒。用于肺热咳血，肺痨咳嗽，顿咳，小儿疳积，痢疾，疔肿疖疮。

附　注：功效相同的有**眼树莲 D. chinensis** Champ. ex Benth.，分布于广东、广西、云南。

**金瓜核**　黔越(云南)

**Dischidia esquirolii** (Lévl.) Tsiang——*Hoya esquirolii* Lévl.

生于海拔200—1 200米的山地杂木林中、岩石上或灌丛中。分布于广西、贵州、云南。

叶：用于目赤肿痛，疥疮。

**小叶眼树莲**　别不(傣语)

**Dischidia minor** (Vahl) Merr.——*Collyris minor* Vahl

生于海拔500—950米的山地丛林、山谷中。分布于云南西双版纳。

叶：清热凉血，养阴生津。

## 金凤藤属　Dolichopetalum Tsiang

**金凤藤**

**Dolichopetalum kwansiense** Tsiang

生于海拔1 320米以下的山地灌丛中。分布于广西、云南。

全株：解毒消肿。用于毒蛇咬伤。

附　注：我国特有属。

## 南山藤属　Dregea E. Mey.

**苦绳**　豆花藤(陕西)，小木通、通天散、刀枪药(云南)

**Dregea sinensis** Hemsl.

生于海拔500—3 000米的山地疏林中。分布于陕西、甘肃、湖北、四川、贵州、云南。

全株：微苦、涩，平。解毒，通乳，利尿，除湿，止痛。用于乳汁不通，小便不利，虚咳，胃痛，风湿痛，痈疮疖肿。

**贯筋藤**　刀口药(四川)

**Dregea sinensis** Hemsl. var. **corrugata** (Schneid.) Tsiang et P. T. Li——*D. corrugata* Schneid.

生于海拔1 200—2 900米的山地疏林或灌丛林中。分布于湖北、广西、四川、云南、西藏。

根：行气活血，通经。

**南山藤**　苦菜藤(云南),帕空(傣语)

**Dregea volubilis** (L. f.) Benth. ex Hook. f.——*Asclepias volubilis* L. f.

生于海拔500—1 700米的山地林中，常攀援于大树上。分布于台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

全株：苦、辛，凉。清热，解毒，止吐。用于感冒，咳嗽痰喘，妊娠呕吐，食道癌，胃癌，痣疾。

## 纤冠藤属　Gongronema (Endl.) Decne.

**纤冠藤**

**Gongronema nepalense** (Wall.) Decne.——*Gymnema nepalensis* Wall.

生于海拔500—1 900米的林中、山坡水沟旁、林缘或灌丛中。分布于广东、海南、广西、贵州、云南。

全株：补精，通乳，祛风活血。用于腰肌劳损，关节痛，乳汁不下，阴挺。

## 天星藤属　Graphistemma Champ. ex Benth. et Hook. f.

**天星藤**

**Graphistemma pictum** (Champ.) Benth. et Hook. f. ex Maxim.——*Holostemma pictum* Champ.

生于丘陵疏林或灌丛中。分布于广东、海南、广西、贵州。

全株：催乳。

## 匙羹藤属　Gymnema R. Br.

**会东藤**

**Gymnema longiretinaculatum** Tsiang

生于海拔1 000—2 800米的山地灌丛中。分布于广西、四川、云南。

根(会东藤根)：微苦、辛，平。活血，止痛，祛瘀。用于跌打损伤，风湿关节痛，毒蛇咬伤，刀伤。种毛(会东藤)：止血。用于刀伤出血。

**匙羹藤**

**Gymnena sylvestre** (Retz.) Schult.——*Periploca sylvestris* Retz ; *G. alternifiorum* Merr.

生于林中或灌丛中。分布于浙江、福建、台湾、广东、海南、广西、四川、云南。

根(武靴藤)：苦，平。消肿解毒，清热凉血。用于多发性脓肿，深部脓肿，乳痈，痈疮肿毒。　嫩枝叶：苦，平。止痛，生肌，消肿。用于枪弹伤，杀虱。

附　注：孕妇慎用。

**大叶匙羹藤**

**Gymnena tingens** (Roxb.) Spreng. ——*Asclepias tingens* Roxb.

生于海拔 440—1 300 米的山地溪边、林中或灌丛中。分布于广东、海南、广西、云南。

根：消肿止痛，生肌。用于风湿痛。

## 醉魂藤属 Heterostemma Wight et Arn. ex Wight

**醉魂藤**

**Heterostemma alatum** Wight

生于海拔 380—1 500 米的林中、山谷阴湿处，林缘及灌丛中。分布于广东、海南、广西、四川、贵州，云南。

全株：辛，平。除湿，解毒，截疟。用于风湿脚气，疟疾。

**贵州醉魂藤**　　黔桂百灵藤(广西植物名录)

**Heterostemma esquirolii** (Lévl.) Tsiang——*Pentasacma esquirolii* Lévl.

生于山地疏林中。分布于广西、贵州、云南。

根及全株(黔桂醉魂藤)：辛，平。除湿，解毒。用于风湿脚气，胎毒，疟疾。

**催乳藤**

**Heterostemma oblongifolium** Cost.

生于海拔 500 米以下的杂木林或灌丛中。分布于广东、海南、广西、云南。

全株：催乳。用于乳汁不下。

## 铰剪藤属 Holostemma R. Br.

**铰剪藤**

**Holostemma annulare** (Roxb ) K. Schum.——*Asclepias annularis* Roxb.

生于丘陵、荒坡或灌丛中。分布于广东、广西、贵州、云南。

全株：用于产后虚弱，少乳。

## 球兰属 Hoya R. Br.

**球兰**　　玉蝶梅、玉叠梅(植物名实图考)

**Hoya carnosa** (L. f.) R. Br.——*Asclepias cornosa* L. f.

生于海拔 260—1 200 米的平原、山地林中，常攀援于树上或大岩石上。分布于浙江、福建、台湾、广东、海南、广西、四川、云南。

全株：苦，平。清热化痰，消肿止痛。用于肺热咳嗽，痈肿，瘰疬，乳妇奶少，关节痛，子痈。

**护耳草**　　大奶汁藤(广西)，打不死(云南)

**Hoya fungii** Merr.

生于海拔 300—700 米的山地疏林中或山谷中，常附生于大树上。分布于广东、海南、广西、贵州、云南。

全株：用于风湿，跌打损伤，脾肿大，吐血，骨折。

**荷秋藤**　　狭叶荷秋藤(贵州中草药名录)

**Hoya lancilimba** Marr.

生于海拔300—800米的山地密林中,常攀援于大树上。分布于广东、海南、广西、贵州、云南。

全株:消肿,接骨。用于跌打损伤,刀伤。

**香花球兰**　　铁足板(广西)

**Hoya lyi** Lévl.

生于海拔2 600米以下的山地密林中,常攀援于树干或岩石上。分布于广西、四川、贵州、云南。

全株(石草鞋):辛、微酸,温。除风湿,消食积,散瘀血。用于脚弓痛,胸闷胀痛,跌打损伤。

**琴叶球兰**

**Hoya pandurata** Tsiang

生于海拔1 350—2 100米的疏林中或杂木林中。分布于云南西双版纳。

全株:苦,寒。有小毒。止痛,活血,接骨通络。用于跌打损伤,骨折,刀枪伤。

**铁草鞋**　　咪卖龙(傣语)

**Hoya pottsii** Traill.

生于海拔600米以下的密林中或山谷林中,常攀援于树上或岩石上。分布于台湾、广东、海南、广西、云南。

叶:接筋骨,散瘀消肿,排脓生肌。外用于跌打损伤,骨折筋伤,疮疡肿毒。

**毛球兰**

**Hoya villosa** Cost.

生于海拔2 000米以下的山谷、疏林中,常攀援于树上或岩石上。分布于广东、广西、贵州、云南。

全株:苦,寒。舒筋活络,除风祛湿。用于跌打损伤。

## 牛奶菜属　Marsdenia R. Br.

**大白药**　　大掰角牛、小白解(云南)

**Marsdenia griffithii** Hook. f.

生于海拔800—1 500米的常绿阔叶林下。分布于云南西部。

全株(大白药):苦、涩,凉。有毒。止血,接骨。外用于外伤出血,骨折。

**大叶牛奶菜**

**Marsdenia koi** Tsiang

生于海拔2 300—2 700米的杂木林中、溪边及岩壁上。分布于广东、广西、贵州、西藏。

全株:苦、辛,寒。活血,止痛。用于跌打损伤。

**海枫藤**

**Marsdenia officinalis** Tsiang et P. T. Li

生于海拔2 200—2 300米的山地林中岩石上或攀援于树上。分布于浙江、四川、贵

州、云南。

全株：舒筋通络，祛寒湿，止痛。

**喙柱牛奶菜**

**Marsdenia oreophila** W. W. Smith

生于海拔 800—3 000 米的山坡疏林中。分布于西南及陕西、甘肃。

全株：舒筋活血，行气止痛。

**牛奶菜**　　三百银(湖南)

**Marsdenia sinensis** Hemsl.

生于疏林中。分布于浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西。

根及全株：舒筋活络，行气止痛，健胃利肠。用于腰肌扭伤，风湿关节痛，跌打损伤。

**通光散**　　地甘草、大白楷(云南)

**Marsdenia tenacissima** (Roxb.) Moon——*Asclepias tenacissima* Roxb.

生于海拔 600—2 200 米的疏林中。分布于广西、贵州、云南。

茎(通光散)：苦、辛，寒。宣肺止咳，平喘，清热解毒，消炎，抑制癌细胞。用于咽喉痛，咳嗽痰喘，乳汁不通，小便不利，癌肿。　叶：外用于痈疮疖疡。

**蓝叶藤**

**Marsdenia tinctoria** R. Br.

生于潮湿的疏林或灌丛中。分布于台湾、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

茎(蓝叶藤)：用于风湿骨痛，肝肿大。　果实：用于胃脘痛。

**滇南牛奶菜**

**Marsdenia yaungpiensis** Tsiang et P. T. Li

生于海拔 1 800—2 700 米的山地林中。分布于贵州、云南。

茎(鹿角藤)：苦、辛，寒。活血，止痛。用于跌打损伤。

## 萝藦属　Metaplexis R. Br.

**华萝藦**　　小隔山草(陕西)，奶浆藤(云南)，芮伍烂(苗语)

**Metaplexis hemsleyana** Oliv.

生于海拔 380—2 200 米的山谷、路旁或山脚湿润灌丛中。分布于河北、陕西、江西、台湾、河南、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

全草：苦、涩，寒。补肾强壮，通乳利尿。用于肾亏遗精，少乳，跌打劳伤。

**萝藦**　　斫合子(本草纲目拾遗)

**Metaplexis japonica** (Thunb.) Makino ——Pergularis japonica Thunb.

生于荒地、山脚、河边及灌丛中。分布于东北、华北、西北及河南、湖北、湖南、广西、四川、贵州。

全草：甘、辛，平。补肾强壮，行气活血，消肿解毒。用于虚损劳伤，阳痿，带下病，乳汁不通，丹毒疮肿。　果实(天浆壳)：辛，温。补虚助阳，止咳化痰。用于体质虚弱，痰喘咳嗽，顿咳，阳痿，遗精；外用于创伤出血。　根：甘，温。补气益精。用于体质虚弱，阳痿，带下病，乳汁不足，小儿疳积；外用于疔疮，五步蛇咬伤。

## 翅果藤属　Myriopteron Griff.

**翅果藤**

**Myriopteron extersum** (Wight) K. Schum.——*Streptocaulon extensum* Wight

生于海拔 300—2 200 米的山地疏林中、路边或溪边灌丛中。分布于广西、贵州、云南。

根：甘、辛，平。补中益气，止咳，调经。用于感冒，咳嗽，月经过多，阴挺，脱肛。茎：苦，寒。杀虫，润肺，止咳。用于咳嗽，蛔虫病。

## 尖槐藤属　Oxystelma R. Br.

**尖槐藤**

**Oxystelma esculentum** (L. f.) F. A. Schult.——*Periploca esculentum* L. f.

生于海拔 780 米以下的山谷林缘、山丘林中潮湿处及沟边。分布于福建、广东、广西、云南。

根：用于黄疸，跌打损伤，牙伤。　全株(尖槐藤)：抗癌。

## 石萝藦属　Pentasacme Wall. ex Wight

**石萝藦**　凤尾草(广东)

**Pentasacme championii** Benth.

生于丘陵、山地疏林下或溪边、石缝中。分布于湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草：苦，凉。清热解毒。用于肝炎，风火眼痛。

## 杠柳属　Periploca L.

**青蛇藤**　黑骨藤(贵州)

**Periploca calophylla** (Wight) Falc.——*Streptocaulon calophylla* Wight

生于海拔 2 700 米以下的山谷杂木林中。分布于西南及甘肃、湖北、广西。

茎(青蛇藤)：苦，凉。舒筋，活络，祛风。用于毒蛇咬伤，腰痛，胃痛，跌打损伤，风湿麻木。

**黑龙骨**　青蛇胆(昆明)，飞仙藤(植物名实图考)

**Periploca forrestii** Schltr.——*P. calophylla* (Wight) Falc. subsp. *forrestii* (Schltr.) Browicz

生于海拔 2 500 米以下的疏林向阳处或灌丛中。分布于西南及陕西、广西。

根(黑龙骨)：苦、辛，温。有毒。祛风除湿，通经活络。用于风湿关节痛，跌打损伤，胃痛，消化不良，乳痈，经闭，月经不调，疟疾；外用于骨折。　叶：含强心甙。

**杠柳**　香加皮(江苏、上海)，山五加皮(河南)

**Periploca sepium** Bunge

生于平原及低山丘陵的林缘、沟坡。分布于东北、华北、西北、华东及河南、湖北、湖南、四川、贵州。

根皮(香/加皮): 辛、苦,微温。有毒。祛风湿,强筋骨。用于风湿痹痛,腰腿关节痛,心悸气短,下肢浮肿。

附　注:《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 大花藤属　Raphistemma Wall.

**大花藤**　　响藤(云南)

**Raphistemma pulchellum** (Roxb.) Wall.——*Asclepias pulchellum* Roxb.

生于海拔 700—1 650 米的山坡密林中或灌丛中,常攀援于树上或蔓生于岩石上。分布于云南。

茎: 苦,寒。舒筋活络。用于跌打损伤。

附　注: 云南特有药用植物。

## 肉珊瑚属　Sarcostemma R. Br.

**肉珊瑚**

**Sarcostemma acidum** (Roxb.) Voigt——*Asclepias acida* Roxb.

生于海边灌丛中或林中。分布于广东、海南。

全株: 收敛,止咳,催乳。

## 鲫鱼藤属　Secamone R. Br.

**鲫鱼藤**　　黄花藤(海南)

**Secamone lanceolata** Bl.

生于海拔 500 米以下的山谷疏林中,常攀援于树上。分布于广东、海南、广西、贵州、云南。

根: 用于风湿痹痛,跌打损伤,疮疡肿毒。　叶、花: 用于瘰疬。

**吊山桃**

**Secamone sinica** Hand.-Mazz.

生于海拔 500—1 400 米的密林或溪旁疏林中,常攀援于树上。分布于广东、广西、贵州、云南。

叶: 强筋壮骨,补精,催乳。

**催吐鲫鱼藤**

**Secamone szechuanensis** Tsiang et P. T. Li

生于海拔 800—1 290 米的疏林向阳处。分布于广西、四川、贵州、云南。

根: 有毒。催吐。　叶、花: 有毒。用于瘰疬。

## 须药藤属 Stelmatocrypton Baill.

**须药藤** 冷水发汗(云南),够哈哄(傣语)

**Stelmatocrypton khasianum** (Benth.) Baill.——*Periploca khasianum* Benth.

生于海拔600—1 500米的山坡、山谷杂木林中或路边灌丛中。分布于广西、贵州、云南。

全株(香根藤): 甘、辛,温。解表温中,祛风通络,止痛行气。用于感冒,咳嗽痰喘,痞胀,胃寒痛,风湿痛。

## 黑鳗藤属 Stephanotis Thou.

**假木通**

**Stephanotis chunii** Tsiang

生于山地密林潮湿处。分布于广东、广西。

叶(假木通): 补血,通经活络。用于产后血虚,乳汁不足,月经不调,痛经。 根: 强筋壮骨。

**黑鳗藤**

**Stephanotis mucronata** (Blanco) Merr.——*Apocynum mucronatum* Blanco

生于海拔500米以下的山地林中。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州。

茎: 补肾益气,调经。

## 马莲鞍属 Streptocaulon Wight et Arn.

**马莲鞍** 十暗消、地苦参(云南)

**Streptocaulon griffithii** Hook. f.

生于海拔950—1 500米的山野、疏林或灌丛中。分布于广西、贵州、云南。

根(马莲鞍): 苦,凉。清热解毒,行气止痛。用于消化不良,感冒,泄泻,跌打损伤,腰、腿痛,水肿,肛痛,肠痈。

**暗消藤**

**Streptocaulon juventas** (Lour.) Merr.——*Apocynum juventas* Lour.

生于海拔300—1 300米的山野坡地、山谷疏林中或路边灌丛中。分布于广西、云南。

根、茎: 健脾胃,通乳,祛翳。

## 夜来香属 Telosma Cov.

**华南夜来香**

**Telosma cathayensis** Merr.

生于海拔500米以下的丘陵疏林向阳处。分布于广东、广西、云南。

花：清肝明目。

**夜来香**

**Telosma cordata** (Burm f.) Merr.——*Asclepias cordata* Burm. f.

原产广东、广西。南方各地均有栽培。

叶、花、果实(夜来香)：甘、淡，平。清肝，明目，祛翳，拔毒生肌。用于目赤红肿，角膜生翳；外用于疮疖脓肿。

## 弓果藤属 Toxocarpus Wight et Arn.

**弓果藤**

**Toxocarpus wightianus** Hook. et Arn.

生于海拔700米以下的丘陵山地灌丛中。分布于广东、广西、云南。

全株：化气祛风，祛瘀止痛，消肿解毒。

附　注：兽医用于牛厌食。

## 娃儿藤属 Tylophora R. Br.

**老虎须**

**Tylophora arenicola** Merr.

生于旷野或海近沙地。分布于广东、海南、广西。

根(沙地娃儿藤)：用于跌打瘀肿，毒蛇咬伤。

**阔叶娃儿藤**

**Tylophora astephanoides** Tsiang et P. T. Li

生于海拔1 070—1 500米的山地林中。分布于云南西双版纳。

全株：用于跌打损伤，手指生疮。

**三分丹**

**Tylophora atrofolliculata** Metc.

生于丘陵疏林及灌丛中。分布于广东、海南、广西、云南。

根(三分丹)：甘、微辛，平。有毒。祛瘀止痛。用于跌打损伤，风湿痛。

**七层楼**

**Tylophora floribunda** Miq.

生于山坡林缘、灌丛或疏林中。分布于华东及陕西、湖北、湖南、广东、广西、贵州。

根(双飞蝴蝶)：辛，温。有小毒。祛风化痰，通经散瘀。用于小儿惊风，白喉，咳嗽痰喘，月经不调，毒蛇咬伤，跌打损伤。

**人参娃儿藤**

**Tylophora kerrii** Craib.

生于海拔700—1 150米的草丛、山谷、溪旁及灌丛中。分布于广东、广西、贵州、云南。

根：止痛。用于牙痛，胃脘痛，肝硬化腹水，癌症，毒蛇咬伤，跌打损伤，风湿痹痛。

**通天连**

**Tylophora koi** Merr.

生于海拔 1 000 米以下的山谷密林中或灌丛中。分布于湖南、广东、海南、广西、云南。

全株(通天连): 解毒,消肿。用于感冒,跌打损伤,毒蛇咬伤,疮疖痈肿。

**通脉丹** 三白根、大白前(广东)

**Tylophora mollissima** Wight

生于海拔 500 米以下的山地林中。分布于广东、海南、广西。

根: 清肺热,止咳。用于感冒发热,咳嗽。 全株: 用于哮喘。

**娃儿藤** 土细辛、哮喘草(广东),婆婆针线包,山辣子(云南)

**Tylophora ovata** (Lindl.) Hook. ex Steud.——*Diplolepis ovata* Lindl.

生于海拔 700—1 300 米的沟谷雨林、常绿阔叶林缘、杂木林中或灌丛中。分布于江西、台湾、广东、广西、云南。

根及根状茎(三十六汤): 止咳,祛痰,平喘。

**攀竹藤**

**Tylophora panzhutenga** Z. Y. Zhu

生于海拔 800 米的沟边、路旁、荒坡竹木林中向阳处。分布于四川沐川。

全株: 祛风湿,化瘀,解毒。用于风湿关节痛,腰背疼痛,扭伤,无名肿毒。

**扒地蜈蚣**

**Tylophora renchangii** Tsiang

生于丘陵林中或灌丛中。分布于广东、海南、广西、贵州。

叶: 微酸、涩,平。活血散瘀,解毒。用于毒蛇咬伤,跌打损伤。

**蛇胆草**

**Tylophora secamonoides** Tsiang

生于山地林中。分布于海南、广西。

根: 止咳。用于咳嗽。

**贵州娃儿藤**

**Tylophora silvestris** Tsiang

生于密林或灌丛中。分布于江苏、江西、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全株: 通经活络。

**圆叶娃儿藤**

**Tylophora trichophylla** Tsiang

生于山地疏林或灌丛中。分布于广东、海南、广西。

根: 用于风湿病,跌打损伤。

**云南娃儿藤** 蛇辣子(云南)

**Tylophora yunnanensis** Schltr.

生于海拔 (1 750—) 1 900—2 700 米的林下或灌丛中。分布于贵州、云南。

根(小白薇): 苦、涩,微温。舒筋活血,调经止血。用于跌打损伤,风湿骨痛,肝炎,胃溃疡,虚劳,恶性疟疾。

# 154. 茜草科 Rubiaceae

## 水团花属 Adina Salisb.

**水团花** 水杨梅(江苏、江西、湖北、湖南、广东、广西、贵州),水杨柳 (安徽), 满山香,水石榴(江西)

**Adina pilulifera** (Lam.) Franch. ex Drake——*Cephalanthus pilulifera* Lam.

生于海拔 200—350 米的山谷疏林下或旷野路旁、溪涧水畔。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

全株、花、果实(水团花): 苦、涩,凉。清热解毒, 散瘀消肿。用于感冒发热,咳嗽,疟腮,咽喉肿痛,吐泻,浮肿,痢疾;外用于跌打损伤,骨折,疮疡肿痛,皮肤瘙痒,创伤出血。根(水团花根): 苦、涩,凉。清热利湿,行瘀消肿。用于感冒咳嗽,肝炎,疟腮, 关节痛;外用于跌打损伤。

**鸡仔木** 水冬哥(安徽、广西、贵州)

**Adina racemosa** (Sieb. et Zucc.) Miq.——*Nauclea racemosa* Sieb. et Zucc.

生于海拔 350—600 米的山地林带或沟谷、溪旁、河边。分布于江苏、安徽、浙江、江西、台湾、湖南、广东、广西、四川、贵州。

茎: 清热解毒,杀虫。用于感冒发热,吐泻,痢疾,咳嗽痰喘,风火牙痛,湿疹,疮疖。叶: 散瘀活血,清热解毒,止痛。用于跌打损伤,扭伤,骨折,创伤出血,痈疽肿毒, 皮肤湿疹。

**细叶水团花** 水红桃(江苏),绣球柳(湖北),穿鱼草(湖南),水石榴(广西)

**Adina rubella** Hance

生于海拔 250—500 米的山地疏林下、溪旁或河边的砂堆上、山坡潮湿地。分布于华东、中南及陕西、四川、贵州。

全株、花、果实(水杨梅): 苦、涩,凉。清热解毒,祛风解表,消肿止痛,利湿杀虫。用于风火牙痛,痢疾,皮肤湿疹,疮疖,稻田皮炎,吐泻,阴道滴虫病,跌打损伤,骨折,创伤出血。根(水杨梅根): 淡,平。清热解毒,散瘀止痛。用于感冒发热,疟腮,咽喉肿痛,肝炎,风湿疼痛,肺热咳嗽,小儿惊风,跌打损伤,疖肿,下肢溃疡。

## 团花属 Anthocephalus A. Rich.

**大叶黄梁木** 黄梁木(广东、广西、云南)

**Anthocephalus chinensis** (Lam.) A. Rich. ex Walp.——*Cephalanthus chinensis* Lam.

生于海拔 600—1 000 米的山谷、溪边的杂木林下。分布于广东、广西、云南。

树皮(团花): 清热解毒,止痛,降压。用于高热不退,失眠,头痛,眩晕,高血压症。叶: 用于神经性皮炎,牛皮癣。

## 丰花草属 Borreria Mey. G. F. W.

**粗叶丰花草** 捕鱼草(广西)

**Borreria articularis** Williams

生于旷野、路旁。分布于台湾、广东、海南、广西。

全草：外用于鱼骨刺伤。

**丰花草** 叶里藏珠(广西)，破帽草(贵州)

**Borreria pusilla** (Wall.) DC.——*Spermacoce pusilla* Wall.; *S. stricta* L. f.; *B. stricta* (L. f.) K. Schum.

生于海拔 1 450—2 000 米的空旷地、草坡或路边。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全草：消炎止痛，散瘀活血。用于痈疽肿毒，跌打损伤，骨折，毒蛇咬伤。

## 短萼齿木属 Brachytome Hook. f.

**短萼齿木**

**Brachytome wallichii** Hook. f.

生于海拔 540—600 米的山地林中或草坡上。分布于海南、贵州、云南。

根：用于小儿惊风，跌打损伤，骨折。

## 鱼骨木属 Canthium L.

**鱼骨木**

**Canthium dicoccum** (Gaertn.) Teysm. et Binn. —— *Psydrax dicocca* Gaertn.

生于海拔 540—800 米的山坡阔叶林中或灌丛中。分布于广东、海南、广西、云南南部及东南部、西藏。

树皮：解热止痛。用于感冒发热，头痛。

**猪肚木** 刺鱼骨木(广东)，山石榴、铁拳随(广西)

**Canthium horridum** Bl.

生于海拔 600 米以下的山地疏林下或灌丛中。**分布**于广东、海南、广西、云南。

根：用于黄疸；外用于跌打肿痛。 树皮、果实：用于肝炎。 根皮：用于痢疾。

叶：用于肺痨，指疔。

**铁屎米**

**Canthium parvifolium** Roxb.

生于海拔 900 米的山地疏林中或灌丛中。分布于广西、贵州、云南。

根：驱虫。

**大叶鱼骨木** 六大天王(广西)

**Canthium simile** Merr.

生于低海拔至中海拔的山地雨林中。分布于广东、海南、广西。

根、茎、叶：接骨。用于跌打损伤，骨折。　树皮：用于痢疾。

## 头九节属　Cephaelis Sw.

**吐根**

**Cephaelis ipecacuatha** (Brotero) A. Rich

原产巴西。云南有引种栽培。

根：祛痰，催吐，发汗，利胆。用于痢疾。

## 风箱属　Cephalanthus L.

**风箱树**　水杨梅(江西、湖南)，大叶柳(江西)，水泡木、红扎树(广西)

**Cephalanthus occidentalis** L.

生于溪边、沟边，山坡疏林中或灌丛中。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西、贵州。

根、根皮(风箱树根)：苦，凉。清热化湿，散瘀消肿，止血生肌，祛痰止咳。用于感冒发热，咳嗽，咽喉肿痛，泄泻，痢疾，痈肿，跌打损伤。　叶(风箱树叶)：苦，凉。清热解毒，收湿止痒。用于皮肤痒疮，对口疮，天疱疮，牙痛，泄泻，痢疾，跌打损伤，骨折。　花序(风箱树花)：苦，凉。清热利湿。收敛止泻。用于泄泻，痢疾。

## 弯管花属　Chassalia Comm. ex Poir.

**弯管花**　水松罗(广西)

**Chassalia curviflora** (Wall.) Thwaites——*Psychotria curviflora* Wall.

生于低海拔至中海拔的山地林下湿润处。分布于广东、广西、云南、西藏。

全株：祛风止痛，舒筋活络。用于风湿痹痛，腰腿酸痛，腰肌劳损，跌打损伤，骨折，妇女贫血，经闭。　根、叶：清热解毒。

## 金鸡纳属　Cinchona L.

**鸡纳树**

**Cinchona succirubra** Pav.

原产秘鲁。台湾、广东、海南、广西、云南均有栽培。

树皮(金鸡纳皮)：苦，寒。强壮健胃，镇痛解热，抗疟。用于疟疾，高热，时行感冒，消化不良。

附　注：①本种的树皮和叶为提取生物碱的原料，用于疟疾，高热。②功效相同的有**金鸡纳树 C. ledgeriana** Moench，台湾、海南、云南有栽培；**正鸡纳树 C. officinalis** L.，海南、云南有栽培。

## 穴果木属 Coelospermum Bl.

**穴果木**

**Coelospermum kanehirae** Merr.

生于山地疏林中或灌丛中。分布于广东、海南、广西。

茎：舒筋活络，祛风除湿。用于风湿痹痛，腰腿酸痛，风湿关节痛。

## 咖啡属 Coffea L.

**小果咖啡**

**Coffea arabica** L.

原产东非。广东、海南、广西、云南有引种栽培。

种子：苦、涩，平。助消化，利尿，提神。

附　注：功效相同的有**中果咖啡 C. canephora** Pierre ex Froehn.，海南有引种栽培；**大果咖啡 C. liberica** Bull. ex Hien，云南引种栽培。

## 流苏子属 Coptosapelta Korth.

**流苏子**　　小青藤(广西)，牛老药藤(广西、云南)

**Coptosapelta diffusa** (Champ. ex Benth.) Van Steenis——*Thysanospermum diffusum* Champ. ex Benth.

生于海拔 180—900 米的山坡疏林中。分布于安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根：辛，温。杀菌。用于皮炎，皮肤瘙痒。　茎：用于风湿痹痛，风湿关节痛；外用于疮疡。

## 虎刺属 Damnacanthus Gaertn. f.

**云桂虎刺**

**Damnacanthus henryi** (Lévl.) H. S. Lo——*Canthium henryi* Lévl.

生于海拔 1 950 米以下的山坡林下或灌丛中。分布于广西、贵州、云南。

叶：外用于跌打损伤，骨折。

**虎刺**　　绣花针、黄脚鸡(通称)，伏牛花(安徽、浙江、福建、广西)，胖儿草(四川)

**Damnacanthus indicus** Gaertn. f.——*D. indicus* Gaertn. f. var. *formosanus* Nakai; *D. formosanus* (Nakai) Koidz.

生于海拔 1 000—3 000 米的山坡灌丛中、竹林下、林边及溪谷两旁疏林中。分布于华东、中南、西南。

根、全株(虎刺)：甘、苦，平。祛风利湿，清热解毒，活血消肿，止痛。用于咽喉肿痛，

风湿关节痛，痛风，风湿痹痛，感冒咳嗽，黄疸，肝脾肿大，肺痈，水肿，经闭，小儿疳积，跌打损伤，龋齿痛。 花(伏牛花)：甘、苦，平。祛风除湿，舒筋止痛。用于风湿痹痛，头痛，四肢拘挛。

**柳叶虎刺**

**Damnacanthus lahordei** (Lévl.) H. S. Lo——*Canthium labordei* Lévl.; *Prismatomeris labordei* (Lévl.) Merr.

生于海拔1 950米以下的林中或山坡、林缘、溪边谷地灌丛中。分布于湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根：清热利湿，舒筋活血，祛风止痛。

**四川虎刺**　　恩施巴戟、土巴戟、古巴戟(湖北)

**Damnacanthus officinarum** Huang

生于山坡林中或灌丛中。分布于湖北、四川。

根：微甘，平。用于肾虚腰痛，头晕。

附　注：本种的根在部分地区误称巴戟天，应注意识别。

**短刺虎刺**　　黄鸡脚(江西)，黄鸡郎、黄鸡胖(湖南)，树莲藕(广西)

**Damnacanthus subspinosus** Hand.-Mazz.

生于向阳山坡、林缘或沟谷两旁灌丛中。分布于浙江、江西、湖南、广东、广西、贵州。

根：苦、甘，平。补养气血，舒筋活血，收敛止血，祛风除湿。用于肾虚，贫血，黄疸，风湿痹痛，瘰疬，附骨疽，咳嗽，小儿疳积，肝脾肿大，月经不调，肠风下血，体弱血虚，跌打损伤。 全株：清热利湿，舒筋活血，祛风止痛。

**西南虎刺**

**Damnacanthus tsaii** Hu

生于海拔1 900米以下的山坡林下或灌丛中。分布于四川、云南。

根：清热解毒，行血祛风，消肿利尿。用于咽喉肿痛，风湿痹痛，感冒咳嗽，肝炎，水肿，跌打损伤。

## 绣球茜属　Dunnia Tutch.

**绣球茜草**

**Dunnia sinensis** Tutch.

生于山地林缘或山坡疏林中。分布于广东。

根：清热，泻火。

附　注：国家三级保护植物。

## 香果树属　Emmenopterys Oliv.

**香果树**　　小冬瓜(云南)

**Emmenopterys henryi** Oliv.

生于海拔700—900米的山坡、路旁或河边疏林下的湿润肥沃土壤上。分布于陕西、

江苏、安徽、浙江、福建、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

根、树皮：用于反胃，呕吐。

附　注：我国特有属。国家二级保护植物。

## 拉拉藤属　Galium L.

**爬拉殃**

**Galium aparine** L. var. **echinospermum** (Wallroth) Cuf. ——*G. agreste* L. var. *echinospermum* Wallroth; *G. spurium* L. var. *echinospermum* (Wallroth) Hayek

生于山地灌丛中、草原、草甸或沟边、路旁。分布于黑龙江、吉林、内蒙古、云南。

全草：清热解毒，活血通络，利尿，止血。

**猪殃殃**　锯锯藤(通称)，锯齿草(江西)，八仙草(四川)，细茜草(四川、云南)

**Galium aparine** L. var. **tenerum** (Gren. et Godr.) Reichb.——*G. spurina* L. var. *tenerum* Gren. et Godr.

生于林缘、河滩、草地、路边、荒地、田埂。分布于东北、华北、西北、华东、中南、西南。

全草(猪殃殃)：辛、苦，凉。清热解毒，利尿消肿。用于感冒，肠痈，小便淋痛，水肿，牙龈出血，痛经，带下病，崩漏，月经不调，淋证，乳腺癌，白血病；外用于乳痈初起，痈疖肿毒，跌打损伤。

**八仙草**　锯锯藤、小舒筋、小血藤、糯米草(云南)

**Galium asperifolium** Wall. —— *G. mollugo* L. subsp. *asperifolium* (Wall.) **Kitam.**

生于海拔 1 800—2 700 米的山坡、路旁、田边、荒地、灌丛中或草地上。分布于广西、云南、西藏。

全草(八仙草)：苦、涩、微甘，平。清热，祛风湿，散瘀血。用于痰火热症，风热眼雾，风湿痛，淋浊，尿血，中耳炎，跌打肿痛，外伤瘀肿，肠痈，疖肿。　根：舒筋活络。用于目赤红肿，月经不调，跌打损伤。

**小叶八仙草**

**Galium asperifolium** Wall. var. **sikkimense** (Gandoger) Cuf.——*G. sikkimense* Gandoger

生于海拔 1 500—3 500 米的山坡林下、灌丛中或草地上。分布于西南及山西、陕西、甘肃、青海、广西。

全草：辛、苦，寒。清热解毒，利尿消肿，排脓生肌，止血。

**六叶葎**　土茜草(四川)

**Galium asperuloides** Edgew. var. **hoffmeisteri** (Klotzsch) Hand.-Mazz.——*Asperula hoffmeisteri* Klotzsch; *G. asperuloides* Edgew. subsp. *hoffmeisteri* (Klotsch) Hara et Gould

生于海拔 1 500—3 450 米的林下或沟边阴湿处。分布于西北、华东、中南、西南。

全草：清热解毒，止痛，止血。用于感冒，肠痈，小儿口疮，痈疖肿毒，跌打损伤。

**北方拉拉藤**

**Galium boreale** L.

生于海拔 2 500—3 900 米的山坡林下、沟谷岩石上、路旁、田边、林缘、灌丛中。分布于东北、华北、西北及湖北、四川、西藏。

全草：苦，寒。清热解毒，利尿渗湿，活血止痛。用于瘰疬，肾炎水肿，风湿头痛，风热咳嗽，皮肤病，带下病，经闭。

**四叶葎** 散血丹(陕西)，四叶草(甘肃、江西、湖北)，四方草(广西)，风车草(四川)，锯锯藤(贵州)

**Galium bungei** Steud

生于海拔 650—2 200 米的山坡草丛中或路旁、田边、沟边、宅旁、荒地、林下阴湿处。分布于东北、华北、华东、中南及陕西、甘肃、四川、贵州。

全草(四叶葎)：甘，平。清热解毒，利尿消肿，止血，消食。用于痢疾，吐血，风热咳嗽，小儿疳积，小便淋痛，带下病；外用于蛇头疔，痈肿，皮肤溃疡，跌打损伤，骨折。

**毛四叶葎**

**Galium bungei** Steud. var. **pundua noides** Cuf.

生于原野路旁、田边、沟边、林下或坡地草丛中。分布于甘肃、湖北、四川。

全草：清热解毒，利尿消肿，止血，消食，接骨。用于小便涩痛，风热咳嗽，小儿疳积，淋浊，带下病；外用于痈疖疮肿，跌打损伤，骨折。

**阔叶四叶葎**

**Galium bungei** Stend. var. **trachyspermum**(A. Gray) Cuf. ——*G.trachyspermum* A. Gray; *G. hachyspermum* A. Gray

生于荒地、沟边、林下、灌丛中或山坡草地上。分布于四川、贵州。

全草：清热解毒，利尿，消食。用于小便淋痛，风热咳嗽，小儿疳积，淋浊，带下病。

**西南拉拉藤** 小红参(云南)

**Galium elegans** Wall. ex Roxb.

生于海拔 1 960—3 300 米的山野、草地、田边、路旁、沟谷、松林下。分布于西南。

根(小活血)：甘、微苦；温。舒筋活血，祛瘀生新。用于夹阴伤寒，肺痨，内伤吐血，痰中带血，经闭，月经不调，带下病，产后关节痛，风湿疼痛，跌打损伤，骨折。

**毛拉拉藤** 小红参(云南)

**Galium elegans** Wall. ex Roxb. var. **velutinum** Cuf.

生于海拔 2 600 米以下的空旷地、路边、草坡、松林下。分布于湖北、四川、云南。

全草：消肿解毒，祛瘀生新。用于无名肿毒，痈疽，疮疖。

**显脉拉拉藤** 生血丹(陕西)，小锯锯藤、岩茜草(湖北)

**Galium kinuta** Nakai et Hara

生于海拔 850—2 000 米的山坡林下、草坡或荒地、田边、路旁、水边岩石上。分布于山西、陕西、甘肃、河南、湖北、四川。

全草：用于泄泻，痢疾。

**东北猪殃殃**

**Galium manshuricum** Kitag.

生于山坡、林下、山涧溪流边、路旁。分布于黑龙江、吉林。

全草：清热解毒，利尿消肿。

**奇特猪殃殃**

**Galium paradoxum** Maxim.

生于海拔 1 600—3 200 米的山坡、田边、路旁、林下湿地。分布于东北及河北、山西、陕西、甘肃、湖北、四川、云南、西藏。

全草：清热解毒，利尿，止血，消食。

**少花拉拉藤**

**Galium pauciflorum** Bunge

生于山坡、田野、草地、河边、灌丛中。分布于东北、华北及青海、四川、西藏。

全草：清热解毒，活血通络，利尿止血。

**弯梗拉拉藤**

**Galium tricorne** Stokes

生于海拔 3900—4 300 米的荒地、路旁、田边、山麓、溪边、林缘等阴湿处。分布于青海、新疆、湖北、西藏。

全草：清热解毒，利尿消肿，活血通络。

附　注：本植物的根在有的地方混作茜草入药，应注意鉴别。

**小叶猪殃殃**　小红参(云南)

**Galium trifidum** L.

生于海拔 700—2 400 米的山地林中、草丛湿地上。分布于吉林、江苏、安徽、浙江、江西、福建、广东、广西、四川、贵州、云南。

根、全草：甘，平。清热解毒，通经活络，利尿消肿，安胎，抗癌。用于胃脘痛，贫血，流产，癌症。

**沼猪殃殃**

**Galium uliginosum** L.

生于田野、林下、河岸、山谷、湿草丛中。分布于黑龙江、吉林。

全草：清热解毒，消肿止痛，利尿消食。

**蓬子菜**　土黄连(陕西)，土茜草、白茜草、黄牛尾(江苏)，铁尺草(四川)

**Galium verum** L.

生于海拔 600—3 000 米的山坡草地、山谷、河滩、林缘、荒地、田边、路旁。全国大部分地区均有分布。

全草(蓬子菜)：辛、苦，寒。清热解毒，活血破瘀，利尿，通经，止痒。用于肝炎，风热咳嗽，水肿，咽喉肿痛，稻田皮炎，癣疹，疔疮痈肿，跌打损伤，骨折，妇女血气痛，阴道滴虫病，蛇咬伤。　根：甘，寒。清热止血，活血祛瘀。用于吐血，衄血，便血，血崩，尿血，月经不调，腹痛，瘀血肿痛，跌打损伤，痢疾。

**长叶蓬子菜**

**Galium verum** L. var. **asiaticum** Nakai

生于山坡、丘陵、砂质草地、草甸、河滩、林缘。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、山东、江苏、河南、湖北、四川。

根、全草：辛、苦，寒。清热解毒，利湿止痒。用于癣疹，水田皮炎，静脉炎，痈疖疔疮，

肝炎，疟腮，跌打损伤，妇女血气痛。

**白花蓬子菜**

**Galium verum** L. var. **lacteum** Maxim.

生于林缘、路旁、沟谷、荒野、灌丛中或草地上。分布于黑龙江。

根、全草：清热解毒，利湿止痒，行瘀消肿，利尿，利胆。

**毛果蓬子菜**

**Galium verum** L. var. **trachycarpum** DC.

生于山地林缘、山坡灌丛中或路旁、沟边。分布于黑龙江。

全草：清热解毒，活血散瘀，消肿止痛。

**粗糙蓬子菜**　　拉拉蔓(陕西)

**Galium verum** L. var. **trachyphyllum** Wall.

生于海拔600—2 000米的山坡林下、山谷、河滩或草坡上。分布于东北及山西、陕西、甘肃、河南。

全草：辛、苦，寒。清热解毒，利尿，行血止痒。用于肝炎，风热咳嗽，水肿，皮炎，癍疹，阴道滴虫病，疮疖肿毒，蛇咬伤。

## 栀子属　Gardenia Ellis

**海南栀子**

**Gardenia hainanensis** Merr.

生于山野荒坡、溪旁、水沟边，也有栽培。分布于广东、海南、广西。

果实：清热利湿，泻火解毒。

**栀子**　　黄栀子、山枝子(通称)，红枝子(江苏)

**Gardenia jasminoides** Ellis

生于低山温暖的疏林中或荒坡、沟边、路旁，也有栽培。分布于中南及陕西、甘肃、新疆、江苏、上海、安徽、浙江、福建、台湾、四川、贵州、云南。

果实(栀子)：苦，寒。清热泻火，凉血止血，利尿，散瘀。用于热病高烧，心烦不眠，实火牙痛，口舌生疮，鼻衄，吐血，目赤红肿，疮疡肿毒，黄疸，淋疾，流脑，肾炎水肿，尿血；外用于外伤出血，扭挫伤。根(栀子根)：苦，寒。清热凉血，解毒。用于风火牙痛，黄疸，吐血，淋证，痈疮肿痛。叶(栀子叶)：苦、涩，寒。消肿解毒。用于跌打损伤。花(栀子花)：苦，寒。清热，渗湿，凉血。用于伤风，肺热咳嗽，鼻衄。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。② 果实已用于提取黄色食用色素。

**重瓣栀子**　　白蝉(通称)

**Gardenia jasminoides** Ellis var. **fortuniana** Lindl.

全国南部和中部地区有栽培。

果实：清热解毒，凉血，止血。花：用于妇女产后子宫收缩疼痛。

**大花栀子**　　栀子花(福建、湖北、四川、贵州)

**Gardenia jasminoides** Ellis var. **grandiflora** Nakai

福建、湖北、四川、贵州有栽培。

果实(水栀子)：苦，寒。清热解毒。用于热毒，扭伤，黄疸，鼻衄，肾炎水肿。 根(水栀根)：甘，平。解热凉血，镇静止痛，疏风除湿。用于黄疸，关节痛，风火牙痛。 叶(水栀叶)：涩，平。消肿毒。用于跌打损伤。

**水栀子**

**Gardenia jasminoides** Ellis var. **radicans** (Thunb.) Makino——*G. radicans* Thunb.

生于山野、溪涧旁。也有栽培。分布于海南、广西、四川。

果实(水栀子)：苦，寒。清热解毒。用于热毒，扭伤，黄疸，鼻衄，肾炎水肿。

**大黄栀子**　　糯帅聋(傣语)

**Gardenia sootepensis** Hutch.

生于山地阔叶林下。也有栽培。分布于云南。

叶、花、果实：清热解毒，止血，泻火，消肿，舒筋活血。用于充血性炎症，目赤热痛，吐血，衄血，血痢；外用于跌打损伤，痈疮肿毒。

**狭叶栀子**　　水黄枝(广西)

**Gardenia stenophylla** Merr.

生于溪涧边。分布于广东、海南、广西。

果实(山枝子)：苦，寒。清热解毒，凉血泻火。用于黄疸，感冒高热，瘰疬，肾炎水肿，流脑，吐血，烧、烫伤，疮疡肿痛，跌打损伤，解断肠草和羊角拗中毒。

## 爱地草属　Geophila　D. Don

**爱地草**　　出山虎(广西、云南)，边耳草(广西)

**Geophila herbacea** (L.) O. Kuntze

生于海拔500—1 000米的林下湿地。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、云南。

全草(爱地草)：消肿，排脓，止痛。用于胃脘痛；外用于蛇咬伤，跌打损伤，骨折，外伤肿痛。

## 耳草属　Hedyotis L.

**金草**　　糖果草(广西)

**Hedyotis acutangula** Champ.——*Oldenlandia acutangula* (Champ.) O. Kuntze

生于山坡、灌丛中。分布于广东、海南、广西。

全草：清热解毒，凉血利尿。用于小便淋沥赤浊。

**广花耳草**

**Hedyotis ampliflora** Hance——*Oldenlandia ampliflora* (Hance) O. Kuntze

生于林缘、疏林下或阳光充足、土壤干燥的灌丛中。分布于海南。

全草：祛风湿，强筋骨，补气益胃。

**耳草**　　蜈蚣草(福建)，节节花(湖南、广东、广西)，鲫鱼胆草(广东、广西)，野甘草

(贵州)

**Hedyotis auricularia** L.——*Oldenlandia auricularia* (L.) F. Muell.

生于草坡、林缘、山野、旷地或灌丛中。分布于福建、广东、海南、广西、贵州。

全草(耳草): 苦,凉。清热解毒,凉血消肿。用于感冒发热,肺热咳嗽,咽喉肿痛,便血,痢疾,小儿疳积,小儿惊风,湿疹,皮肤瘙痒,痈疮肿毒,蛇咬伤,跌打损伤。

**双花耳草** 青骨蛇(广西)

**Hedyotis biflora** (L.) Lam.——*Oldenlandia biflora* L.

生于湿润空旷地、林下或溪边。分布于江苏、台湾、广东、广西、云南。

全草: 外用于疮疖。

**小头凉喉茶** 荞花黄连、接骨丹、小兰花、土红参(云南)

**Hedyotis capitellata** Wall. ex G. Don —— *Oldenlandia capitellata* (Wall. ex G. Don) O. Kuntze

生于海拔1550米的山坡草丛中或林下、谷地湿润处。分布于云南。

全株(沙糖根): 淡,温。散寒通络,养血截疟。用于感冒,疟疾;外用于骨折。

**聚伞白花耳草**

**Hedyotis capituligera** Hance——*Oldenlandia capituligera* (Hance) O. Kuntze

生于林缘、路旁或山坡草丛中。分布于贵州。

全草(一柱香): 辛,凉。清热散瘀,消炎接骨。用于肝炎,风湿骨痛,眼红肿; 外用于无名肿毒,骨折,外伤出血。

**金毛耳草** 伤口草(通称),地蜈蚣(江苏),过路蜈蚣草(福建),铺地蜈蚣(湖北),细节节花(广西)

**Hedyotis chrysotricha** (Palib.) Merr.——*Anotis chrysotricha* Palib.; *Oldenlandia chrysotricha* (Palib.) Chun

生于山谷林下岩石上、山坡路旁、溪边湿地或灌丛中。分布于中南及江苏、上海、安徽、浙江、江西、福建、贵州、云南。

全草(黄毛耳草): 苦,凉。清热利湿,消肿解毒,舒筋活血。用于外感风热,吐泻,痢疾,黄疸,急性肾炎,中耳炎,咽喉肿痛,小便淋痛,血崩,便血;外用于毒蛇、蜈蚣咬伤,跌打损伤,外伤出血,疔疮肿毒,骨折,刀伤。

**伞房花耳草** 鹅不食草(江西),蛇舌草(广西)

**Hedyotis corymbosa** (L.) Lam.——*Oldenlandia corymbosa* L.

生于路旁、溪边、空旷地、耕地边、山谷灌丛中或丘陵坡地草丛中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全草(水线草): 甘,平。清热解毒,活血,利尿,抗癌。用于恶性肿瘤,乳蛾,肝炎,小便淋痛,咽喉痛,肠痈,疟疾,跌打损伤;外用于疮疖痈肿,毒蛇咬伤,烫伤。

**脉耳草** 节节草(广西),大接骨丹(贵州),黑节草(云南)

**Hedyotis costata** Roxb.——*Oldenlandia costata* (Roxb.) Koord.

生于向阳山坡、路旁、草丛中或林缘。分布于广东、海南、广西、贵州、云南。

全草(脉耳草): 辛、微苦,凉。清热解毒,除湿,消炎,抗疟接骨。用于疟疾,肝炎,风湿骨痛,目赤,跌打损伤,骨折,外伤出血。

**白花蛇舌草**　蛇总管(福建),蛇利草(广西),小叶锅巴草(云南)

**Hedyotis diffusa** Willd.——*Oldenlandia diffusa* (Willd.) Roxb.

生于潮湿的田边、沟边、路旁、草丛中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全草(白花蛇舌草):甘、淡,凉。清热解毒,利湿消痈,抗癌。用于恶性肿瘤,肠痈,咽喉肿痛,湿热黄疸,小便不利,疮疖肿毒,毒蛇咬伤。

附　注:《四川省中药材标准》1987 年版收载。

**长梗白花蛇舌草**

**Hedyotis diffusa** Willd. var. **longipes** Nakai

生于山地路旁或荒地草丛中。分布于湖北。

全草:用于肠痈,乳蛾。

**顶湖耳草**

**Hedyotis effusa** Hance

生于林下、溪旁或灌丛中。分布于广东。

全草:清热解毒,凉血,消肿。用于感冒发热,肺热;外用于跌打损伤,痈疮肿毒,蛇咬伤。

**牛白藤**　山甘草(福建),土加藤(广东),脓见消(广西),接骨丹(云南)

**Hedyotis hedyotidea** (DC.) Merr.——*Spermacoce hedyotidea* DC.; *Oldenlandia hedyotidea* (DC.) Hand.-Mazz.

生于海拔 600—1 640 米的坡地、沟谷灌丛中或林下。分布于福建、广东、广西、贵州、云南。

根、全株(牛白藤):甘、淡,凉。清热解暑,祛风湿,续筋骨。用于中暑,感冒咳嗽,吐泻,风湿关节痛,痔疮出血,疮疖痈肿,跌打损伤,骨折;外用于皮肤湿疹,瘙痒,缠腰火丹。

**剑叶耳草**　硬杆野甘草(江西),山甘草(福建),少年红(广西)

**Hedyotis lancea** Thunb. ——*Oldenlandia lancea* (Thunb.) O. Kuntze

生于山地林下、丘陵坡地或沟谷溪旁灌丛中。分布于江西、福建、广东、广西。

全株:甘,凉。疏风退热,润肺止咳,消积,止血,止泻。用于小儿发热,咽喉肿痛,咳喘,小儿疳积,肺痨咳嗽,风湿痹痛,泄泻,咳血;外用于跌打肿痛,外伤出血。根:用于肺痨,咳嗽,哮喘,跌打肿痛。叶:用于目疾。

**长突耳草**

**Hedyotis longiexserta** Merr. et Metc.

生于疏林下、山坡灌丛中或路旁。分布于广西。

全株:清热解毒。用于赤眼。

**卷毛耳草**　野甘草(江西),竹根草(广西),阿草娃(贵州)

**Hedyotis mellii** Tutch. ——*Oldenlandia mellii* (Tutch.) Dunn

生于山地疏林下、山坡草地上或灌丛中。分布于江西、福建、湖南、广东、广西、贵州。

全草:甘、酸,凉。清热解毒,消食化积,消肿,止血。用于感冒咳喘,脚气病,湿疹,小儿疳积,乳痈,痢疾,腰痛,外阴瘙痒,刀伤出血,毒蛇咬伤,毒蜂螫伤。叶:外用于疖疮肿毒。

**延龄耳草**

**Hedyotis Paridifodia** Dunn——*Oldenlandia paridifolia* (Dunn) Chun

生于山坡丛林下。分布于广东、海南、贵州。

叶：外用于疮疖，无名肿毒。

**松叶耳草**　了哥舌、鸟舌草(广西)

**Hedyotis pinifolia** Wall. ex G. Don——*Oldenlandia pinifolia* (Wall. ex G. Don) K. Schum.

生于丘陵、旷地、海滩砂地或山地路旁。分布于福建、湖北、广东、海南、广西、云南。

全草(鹅哥舌)：辛，凉。消肿止痛，消积，止血。用于小儿疳积；外用于跌打损伤，毒蛇咬伤。

**大托叶耳草**　月禁风(广西)

**Hedyotis platystipula** Merr.——*Oldenlandia platystipula* (Merr.) Chun

生于山坡、路旁、沟谷阴湿处、密林下或草丛中。分布于广东、广西。

全草：用于小儿腹痛，妇女风肿，产后骨痛。

**翅果耳草**

**Hedyotis pterita** Bl. ——*Oldenlandia pterita* (Bl.) Miq.

生于灌丛中或较阴湿的荒地上。分布于广东、广西。

全草：清热解毒，活血祛瘀，消肿止痛。

**凉喉茶**　接骨草、理肺散、接骨丹(云南)

**Hedyotis scandens** Roxb.——*Oldenlandia scandens* (Roxb.) O. Kuntze

生于海拔 1 200—1 800 米的山坡灌丛中或山地疏林缘。分布于广东、云南、西藏。

全株(凉喉茶)：辛、苦，平。润肺化痰，接骨生肌，截疟消炎。用于咳嗽痰喘，肺痨，口疮，疟疾；外用于骨折。　根：清热，消炎，止咳，化痰，截疟。

**纤花耳草**　尖刀草(广西)，虾子草、红虾子草(四川、云南)，石枫药、箭头草(云南)

**Hedyotis tenelliflora** Bl. ——*Oldenlandia tenelliflora* (Bl.) O. Kuntze.

生于海拔 600—2 000 米的田边、路旁、山坡草丛中或旷野向阳处。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全草(纤花耳草)：苦、辛，凉。清热解毒，消肿止痛，行气活血。用于癌症，慢性肝炎，肺热咳嗽，肝硬化腹水，肠痈，痢疾，小儿疝气，经闭，风湿关节痛，风火牙痛，跌打损伤，毒蛇咬伤，刀伤出血。

**方茎耳草**　白衣草(广西)

**Hedyotis tetrangularis** (Korth.) Walp.——*Diplohragma tetrangulare* Korth.; *Oldenlandia tetrangularis* (Korth.) Merr.

生于旷地、路旁、草坡或田埂上。分布于广东、海南、广西。

全草：用于发热，肝炎，肺痨。

**长节耳草**　节节草(福建)，黑头草、小绣球、一扫光、酒药草(云南)

**Hedyotis uncinella** Hook. et Arn.——*Oldenlandia uncinella* (Hook. et Arn.) O. Kuntze

生于海拔 2 000 米以下的阔叶林下、林缘灌丛中或干燥旷地上。分布于福建、湖北、

湖南、广东、海南、广西、贵州、云南。

根、全草：辛、酸，温。消食，祛风、散寒，除湿。用于风湿关节痛，小儿疳积，小儿泄泻，小儿惊风，蛇咬伤。

**糙叶长节耳草**　四方梗(广西)，叶上绣球、野鸡草、小绣球(云南)

**Hedyotis uncinella** Hook. et Arn. var. **scabrida** Franch.——*Oldenlandia uncinella* (Hook. et Arn.) O. Kuntze var. *scabrida* (Franch.) Hand.-Mazz.

生于海拔1 800米以下的山地疏林下或路旁草地上。分布于广西、云南。

全草(牙疳药)：甘、辛，凉。祛风利湿，健脾消积，清热解毒。用于小儿疳积，泄泻，风湿关节痛，痢疾，牙疳；外用于皮肤瘙痒，目赤红肿。　根：苦，凉。泻火逐瘀，清热凉血，健脾除湿。用于牙疳，小儿疳积，风湿痹痛。　叶：凉血。

**粗叶耳草**　锅老根(广西)，节节花(广西、云南)

**Hedyotis verticillata** (L.) Lam.——*Oldenlandia verticillata* L.; *Hedyotis hispida* Retz.; *O. hispida* (Retz.) Benth.

生于草丛、路旁、疏林下或山坡灌丛中。分布于福建、广东、海南、广西、贵州、云南。

全草(粗叶耳草)：苦，凉。清热解毒，消肿止痛。用于感冒发热，咽喉肿痛，小儿麻疹症，吐泻；外用于毒蛇咬伤，蜈蚣咬伤，疯狗咬伤。

**黄叶耳草**

**Hedyotis xanthochroa** Hance——*Oldenlandia xanthochroa* (Hance) O. Kuntze

生于山溪旁、林缘、沟谷湿润的岩石旁。分布于广东。

全草：用于风湿关节痛，骨痛，腰痛。

## 土连翘属　Hymenodictyon Wall.

**高网膜籽**　梅宋戈(傣语)

**Hymenodictyon excelsum** (Roxb.) Wall.——*Cinchona excelsa* Roxb.

生于次生阔叶林中。分布于云南。

树皮(土连翘)：苦，凉。清热解毒，止咳，抗疟。用于感冒高热，咳嗽痰多，疟疾。　叶(土连翘叶)：外用于关节红肿，疮疖，无名肿毒。

**土连翘**　梅宋戈(傣语)

**Hymenodictyon flaccidum** Wall.

生于海拔1 270—3 000米的山地林中。分布于广西、四川、云南。

树皮：抗疟。用于疟疾。

## 石丁香属　Hymenopogon Wall.

**疏果石丁香**　石针打不死(云南)

**Hymenopogon oligocarpus** Li

生于海拔2 400米以下的林下岩石上。分布于云南贡山独龙江。

全株：用于跌打损伤，骨折。

**石丁香**　石参、岩五加(云南)

**Hymenopogon parasiticus** Wall. var. **longiflorus** How

生于海拔1 800—2 700米,附生于林中树干上或岩石上。分布于云南、西藏。

根、全株(石老虎):微苦、涩,平。壮筋骨,除湿止痛,利水解毒。用于营养不良性水肿,跌打损伤,湿疹,肾虚腰痛。

## 龙船花属　Ixora L.

**团花龙船花**

**Ixora cephalophora** Merr.

生于山地杂木林中或林缘、沟谷溪涧阴湿处。分布于广东、海南。

根:用于产后流血过多(配方用药)。

**龙船花**　红樱花(广东),百日红、大将军、卖木子(广西)

**Ixora chinensis** Lam.

生于疏林下、灌丛中或旷野路旁,也有栽培。分布于福建、台湾、广东、广西。

花(龙船花):甘、辛,凉。调经,活血。用于月经不调,经闭,高血压症。　根(龙船花根):苦、微涩,凉。行气止痛,活血通络。用于肺痨咯血,咳嗽,风湿关节痛,胃痛,跌打损伤。　茎、叶(龙船花茎叶):苦、微涩,凉。祛风活络,散瘀止痛。用于跌打损伤,瘀血疼痛,疮疖痈肿,湿疹。

**黄龙船花**

**Ixora coccinea** L. var. **lutea** Corner

生于山地林中或林缘、山谷阴湿处。分布于广东、广西。

全株:甘,凉。清热凉血,消肿止痛,续筋接骨。用于咯血,胃痛,疮疡,风湿痛,月经不调,经闭,高血压症,跌打损伤。

**白花龙船花**　白骨木(广西),绣球花(云南)

**Ixora henryi** Lévl.

生于山谷阴处、山坡灌丛中、溪畔林中。分布于广东、海南、广西、贵州、云南。

全株:外用于疮疡肿毒,跌打损伤,骨折。

**长叶龙船花**

**Ixora nienkui** Merr. et Chun

生于山地密林中或林缘较湿润地上。分布于广东、海南、广西。

全株:清热解毒。用于肝炎。

## 钩毛草属　Kelloggia Torr.

**云南钩毛草**

**Kelloggia chinensis** Franch.

生于海拔2 800—4 500米的山地湿润草坡及高山草甸。分布于广西、四川、云南、西藏。

全草：苦，凉。清热，解毒，散血。

## 红芽大戟属 Knoxia L.

**假红芽大戟** 山必时(广西)

**Knoxia corymbosa** Willd.

生于海拔1 100—1 500米的山地林下或丘陵山坡上。分布于广西、云南。

全草：用于经闭，贫血，跌打损伤。 根：用于小儿风热咳喘。

**红大戟** 红芽大戟(通称)，红萝卜、走沙黄、红心薯(广西)，娃娃参(云南)

**Knoxia valerianoides** Thorel ex Pitard

生于低山坡草丛中的半阴半阳处。分布于福建、广东、广西、贵州、云南。

块根(红大戟)：苦，寒。有小毒。泻水逐饮，攻毒消肿，散结。用于胸腹积水，二便不利，痈肿疮毒，瘰疬。

附 注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

## 粗叶木属 Lasianthus Jack.

**长尾粗叶木** 硬骨牛夕、铁骨人参(江西)

**Lasianthus acuminatissimus** Merr.

生于山谷密林中。分布于湖南、广东、广西、贵州。

根、茎、叶：苦，温。祛风除湿，活血止痛。

**云贵粗叶木**

**Lasianthus biermanni** King ex Hook. f.

生于海拔400—2 040米的常绿阔叶林下或灌丛中。分布于西南。

根：补肾活血，行气驱风。用于风湿腰痛。 全株：清热，消炎，止咳。

**粗叶木** 木黄(广西)

**Lasianthus chinensis** Benth.

生于低海拔山谷、溪畔或湿润的疏林下。分布于江西、福建、台湾、广东、海南、广西。

根(鸡屎树)：甘、涩，平。补肾活血，行气驱风，止痛。用于风湿腰腿痛，骨痛。 全株、叶：清热，解毒，除湿。用于湿热黄疸症。

**污毛粗叶木**

**Lasianthus hartii** Franch.

生于低海拔至中海拔的山地疏林下或沟谷地带。分布于江西、福建、湖南、广东、广西、贵州、云南。

根：辛、微甘，温。行气活血，祛风湿，强筋骨，止痛。用于跌打损伤，风湿关节痛，腰肌劳损。 全株：祛风除湿。用于风湿痹痛。

**西南粗叶木**

**Lasianthus henryi** Hutch.

生于海拔1 640米以下的疏林下或山谷灌丛中。分布于广东、广西、四川、云南。

全株：清热，消炎，止咳。

**黄毛粗叶木**

**Lasianthus koi** Merr. et Chun

生于密林下或山谷灌丛中。分布于广东、海南、广西。

叶：清热解毒，消炎止痛。用于毒蛇咬伤。

**槭绿粗叶木**

**Lasianthus lancilimbus** Merr.

生于海拔 300—500 米的疏林下或沟谷地斜坡上。分布于浙江、江西、福建、湖南、广东、广西。

全株：行气活血，祛风利湿。用于风湿关节痛，腰痛，跌打损伤。

**云广粗叶木**　　沙连树(广西)

**Lasianthus longicaudus** Hook. f.

生于海拔 1 300—1 600 米的山坡阔叶林下或山谷阴湿的斜坡上。分布于广东、广西、云南、西藏。

全株：清热解毒，消炎止痒。用于肝炎，水肿；外用于皮肤瘙痒，湿疹。

**上思粗叶木**　　千里马(广西)

**Lasianthus tsangii** Merr. ex Li

生于山地林下或山谷斜坡灌丛中。分布于广西。

茎、叶：用于跌打内伤。

**斜基粗叶木**　　赶狗木(广西)

**Lasianthus wallichii** Wight

生于海拔 600—1 300 米的山坡杂木林中或林缘谷地灌丛中。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、云南、西藏。

全株：消炎，止痛。用于毒蛇咬伤，犬咬伤。　根：舒筋活血。用于跌打损伤。

## 野丁香属　Leptodermis Wall.

**长毛野丁香**

**Leptodermis pilosa** Diels

生于海拔 1 640—2 100 米的疏林下、灌丛中或山坡、路边草地上。分布于云南。

叶(石楠叶)：苦，平。祛风除湿。用于头痛，风湿关节痛。

**纤枝野丁香**　　搜山虎(云南)

**Laptodermis schneideri** H. Winkl.

生于海拔 600—3 000 米的山地、河边、林缘。分布于甘肃、四川、云南。

全株：苦，凉。祛瘀活血，舒筋活络。

**毛野丁香**

**Leptodermis tomentella** H. Winkl.

生于海拔 1 500—2 100 米的疏林下、灌丛中或草地上。分布于四川、云南。

叶：苦，平。祛风除湿。用于头痛，风湿骨痛。

## 报春茜属 Leptomischus Drake

**小花报春茜** 土石楠藤(云南)

**Leptomischus parviflorus** H. S. Lo

生于山坡、林缘、沟谷疏林下或竹林下湿地上。分布于海南、云南。

叶：祛风除湿，止痛，接骨，生肌。

**报春茜** 土石楠藤(云南)

**Leptomischus primuloides** Drake

生于海拔 50—1 800 米的山坡、林缘、沟谷疏林下或竹林下。分布于云南东南部。

叶：淡，温。祛风除湿，止痛，接骨，生肌。

## 滇丁香属 Luculia Sweet

**馥郁滇丁香**

**Luculia gratissima** (Wall.) Sweet——*Cinchona gratissima* Wall.

生于海拔 800—2 400 米的林下或灌丛中。分布于云南、西藏。

根、花、果实：止咳化痰，活血调经，消炎止痛。用于咳嗽，顿咳，咳嗽痰喘，肺痨，月经不调，痛经，风湿疼痛，偏头痛，小便淋痛，石淋，外伤感染，毒蛇咬伤。

**滇丁香** 满山香(广西)，野丁香(云南)

**Luculia intermedia** Hutch.

生于海拔 800—2 600 米的山坡灌丛中或常绿阔叶林下。分布于广西、贵州、云南、西藏。

根、花、果实(小黄树)：涩、微苦，凉。止咳化痰，活血调经，消炎止痛。用于咳嗽，顿咳，肺痨，月经不调，痛经，偏头痛，小便淋痛，石淋，病后头昏，心悸，风湿疼痛，黄肿病。

茎、树皮：用于类风湿，小便涩痛，跌打损伤。 叶：消肿。用于跌打损伤。

**藏丁香**

**Luculia pinceana** Hook.

生于海拔 1 550—1 660 米的山坡林中。分布于云南、西藏。

根：祛风除湿，理气止痛，补肾强身。

## 巴戟天属 Morinda L.

**狭叶巴戟** 狭叶鸡眼藤(云南种子植物名录)

**Morinda angustifolia** Roxb.

生于海拔 540 米左右的常绿阔叶林中。分布于云南勐腊。

根皮：消炎，除湿，利胆。

**大果巴戟** 酒瓶藤、黄心藤、三角藤(广东、广西、云南)，扣灯(广西)

**Morinda cochinchinensis** DC.

生于海拔 540 米左右的沟谷林中。分布于广东、海南、广西、云南。

根：清热解毒，祛风除湿，止咳。用于风湿痹痛，感冒，咳嗽。

**巴戟天**　兔儿肠(福建)，鸡肠风(广东、广西)，鸡眼藤、三角藤、巴戟(广西)

**Morinda officinalis** How

生于山谷、溪边、山地疏林下，也有栽培。分布于福建、广东、海南、广西。四川、云南有引种。

根(巴戟天)：甘、辛，微温。补肾阳，强筋骨，祛风湿。用于阳痿遗精，宫冷不孕，月经不调，小腹冷痛，风湿痹痛，筋骨痿软，胃脘寒痛。　茎：补肾壮阳，强筋骨。用于腰膝酸软，阳痿，早泄。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**百眼藤**　爬山虎、五眼子(广东)，鸡眼藤(广西)，细叶巴戟天(海南植物志)

**Morinda parvifolia** Bartl. ex DC.

生于路旁及山野灌丛中。分布于江西、福建、广东、海南、广西。

根、全株(百眼藤)：甘，凉。清热利湿，化痰止咳，散瘀止痛。用于感冒咳嗽，痰咳，顿咳，消化不良，泄泻，大便秘结，跌打损伤，腰肌劳损，湿疹。

**羊角藤**　土巴戟(江西、福建)，建巴戟(福建)，红头根(广西)

**Morinda umbellata** L.

生于低海拔山坡、林缘、幼树丛中或山谷沟边灌丛中。分布于安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根、根皮(羊角藤)：辛、微甘，温。祛风湿，补肾，止痛。用于风湿关节痛，肾虚腰痛，胃痛。　全株：有毒。清热，泻火，解毒。　叶：外用于创伤出血，蛇咬伤。

附　注：本品常混作巴戟天药用。应注意鉴别。

## 玉叶金花属　Mussaenda L.

**短裂玉叶金花**　克五华(傈僳语)

**Mussaenda breviloba** S. Moore

生于海拔 1 350—1 950 米的林下或林缘、灌丛中。分布于云南。

全株：清热解毒。

**展枝玉叶金花**

**Mussaenda divaricata** Hutch.

生于海拔 1 100—1 800 米的山坡、林缘、沟谷、溪旁林下或灌丛中。分布于湖北、广西、四川、贵州、云南。

根(白常山)：苦，寒。有毒。清热解毒，抗疟。用于疟疾发寒热，毒蛇咬伤，劳伤。

茎、叶：解表，消暑，利湿，活血。

**楠藤**　火烧藤、胶鸟藤(广西)

**Mussaenda erosa** Champ.

生于海拔 660—2 000 米的山地、沟谷灌丛中或疏林中，常攀援于树上。分布于台湾、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

茎、叶(大茶根)：微甘，凉。清热热解毒。用于疥疮，热积，疮疡肿毒，烧、烫伤。

**大叶白纸扇**　合叶通草(湖北)，铁尺树(广西)

**Mussaenda esquirolii** Lévl.

生于山地林下或溪旁灌丛中。分布于福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

根：祛风，降气，化痰，消炎，止痛。用于风湿关节痛，腰痛，咳嗽，毒蛇咬伤。茎、叶：甘、苦，凉。清热解毒，消肿排脓。用于感冒，小儿高热，小便不利，痢疾，无名肿毒。

**毛玉叶金花**

**Mussaenda hirsutula** Miq.

生于海拔700米左右的林下、林缘或灌丛中。分布于湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根、叶：清热，解毒，抗疟。全株：清热，疏风。

**红毛玉叶金花**　期里(傣语)

**Mussaenda hossei** Craib

生于海拔600—1 700米的林下或林缘、灌丛中。分布于云南思茅。

根(叶天天花)：甘、淡，平。清热解毒，凉血止血，抗疟。用于疟疾。

**广西玉叶金花**

**Mussaenda kwangsiensis** Li

生于山坡或沟谷山地的灌丛中。分布于广西。

根：用于风湿骨痛。果实：用于泄泻。

**玉叶金花**　山甘草(江西、湖南)，甜茶(福建)，鸡良藤(广东、广西)，白常山(四川)

**Mussaenda pubescens** Ait. f.

生于海拔1 200—1 500米的阴湿山坡、沟谷、溪旁或灌丛中。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根、茎、叶(玉叶金花)：甘、淡，凉。清热解暑，凉血解毒。用于中暑，感冒，咳嗽痰喘，乳蛾，咽喉肿痛，肾炎水肿，泄泻，崩漏，野菌中毒，烧、烫伤，毒蛇咬伤。

## 腺萼木属　Mycetia Reinw.

**华腺萼木**　甜茶(广西)

**Mycetia sinensis** (Hemsl.) Craib —— *Adenosacme longifolia* Wall. var. *sinensis* Hemsl.

生于密林中。分布于广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根：祛风除湿，利尿。用于风湿痹痛，腰痛，小便不利。

## 密脉木属　Myrioneuron R. Br.

**密脉木**

**Myrioneuron faberi** Hemsl.

生于海拔480米以下的林下或灌丛中。分布于湖北、广东、广西、四川、云南。

全株：用于跌打损伤。

## 乌檀属　Nauclea L.

**药乌檀**　山熊胆、熊胆树(广东)

**Nauclea officinalis** Pierre ex Pitard

生于海拔2 200米以下的山地杂木林中或半山腰阴湿地带。分布于广东、海南、广西、云南。

根、茎、树皮(胆木)：苦，寒。清热解毒，消炎止痛。用于感冒发热，乳蛾，咽喉肿痛，乳痈，泄泻，痢疾，胆囊炎，小便淋痛，下肢溃疡，外耳道疖肿，皮肤湿疹，疮疖。

## 假耳草属　Neanotis W. H. Lewis

**薄叶假耳草**

**Neanotis hirsuta** (L. f.) W. H. Lewis——*Oldenlandia hirsuta* L. f.; *Anotis hirsuta* (L. f.) Boerl.

生于林下或山谷、溪边的潮湿地。分布于江苏、安徽、浙江、福建、广东、广西、四川、贵州。

全草：清热解毒，利尿退黄，解毒止痛。用于黄疸，肾炎水肿，毒蛇咬伤，中痧呕吐。

**假耳草**

**Neanotis ingrata** (Wall. ex Hook. f.) W. H. Lewis——*Anotis ingrata* Wall. ex Hook. f.; *Hedyotis ingrata* Wall.

生于海拔1 100—2 700米的灌丛中、路旁、山坡草地或林下阴湿处。分布于西南及湖北。

全草(一柱香)：辛，凉。清热解毒，散瘀活血。用于赤眼红肿，无名肿毒，跌打损伤，蛇咬伤。

**尾叶假地耳草**　黑脚杆、蹄耳草(四川)

**Neanotis urophylla** (Wall. ex Benth. et Hook. f.) W. H. Lewis——*Anotis urophylla* (Wall.) Benth. et Hook.; *Hedyotis urophylla* Wall.

生于山坡林下、灌丛中或山谷、路旁、溪边阴湿处。分布于四川、贵州。

全草(胖儿草)：甘、酸，平。健脾，利湿，消肿，消疳。用于小儿疳积，脾虚水肿，黄疸，疮毒。

**西南假耳草**

**Neanotis wightiana** (Wall. ex Wight et Arn.) W. H. Lewis——*Hedyotis wightiana* Wall. ex Wight et Arn.; *Anotis wightiana* (Wall. ex Wight et Arn.) Hook. f.

生于海拔1 300—2 900米的路边、溪边阴湿处或林缘地带。分布于西南及湖北、广西。

全草：清热解毒，散瘀活血。用于咽喉肿痛，风火牙痛，疔毒，痈疽，石淋，胆结石。

## 薄柱草属　Nertera Banks et Soland.

**薄柱草**　　水泽兰(江西、四川),冷水草(湖南)

**Nertera sinensis** Hemsl.

生于海拔 1 200—2 160 米的密林下或溪旁、山谷中、河边岩石上。分布于湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草：清热解毒,化痰止咳,祛瘀活血。用于感冒咳嗽;外用于烧、烫伤。

## 蛇根草属　Ophiorrhiza L.

**广州蛇根草**

**Ophiorrhiza cantoniensis** Hance

生于海拔 1 700—2 700 米的溪边或山坡林下阴湿处。分布于湖北、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根：清热解毒,消肿止痛。用于吐泻,月经不调,跌打损伤。

**日本蛇根草**　　钻地风(陕西),活血丹、散血草(广西),岩泽兰、血经草(云南)

**Ophiorrhiza japonica** Bl.

生于海拔 1 500—2 000 米的山坡、沟谷岩石上或密林下。分布于中南及陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、四川、贵州、云南。

全草(蛇根草)：淡,平。止咳祛痰,活血调经。用于肺痨咯血,劳伤吐血,咳嗽痰喘,大便下血,月经不调;外用于扭挫伤。

**蛇根草**

**Ophiorrhiza mungos** L.

生于海拔 800—1 500 米的山坡常绿阔叶林下。分布于广西、贵州、云南、西藏。

根：用于毒蛇咬伤。

**透明蛇根草**

**Ophiorrhiza pellucida** Lévl.

生于中海拔至低海拔的密林下阴湿处或溪畔岩石上。分布于广东、广西、贵州。

全草：活血祛瘀,消肿毒。

**短小蛇根草**　　荷包草(福建)

**Ophiorrhiza pumila** Champ. ex Benth.

生于林下潮湿的土壤上或水边岩石上。分布于福建、广东、海南、广西。

全草：苦,寒。清热解毒,止痛。用于感冒高热,顿咳,外伤感染,痈疽肿毒,毒蛇咬伤。根、叶：消肿解毒。

**滇桂蛇根草**

**Ophiorrhiza succirubra** King ex Hook. f.

生于海拔 1 700—2 300 米的山坡阔叶林下湿地或山野路旁。分布于广西、贵州、云南、西藏。

根(地贵草)：辛，温。舒筋活络。用于风湿疼痛。

**葫生蛇根草**　血经草、天青地红、岩泽兰(贵州)

**Ophiorrhiza umbricola** W. W. Smith

生于海拔 2 100—2 400 米的山坡林下阴湿处或田野上。分布于贵州、云南。

全草(自来血)：微甘、涩，温。活血调经，补气养血，生肌，止咳。用于劳伤咳嗽，气血不足，月经不调；外用于刀伤，跌打损伤，骨折。

## 鸡矢藤属　Paederia L.

**广西鸡矢藤**　狗屁藤(广西)

**Paederia pertomentosa** Merr. ex Li

生于石灰岩山地灌丛中。分布于广西、贵州。

根：用于肺痨。　全株：用于痈疮肿毒，毒蛇咬伤。　叶：消积食，祛风湿。

**鸡矢藤**　臭藤子(江苏)，牛皮冻(浙江)，清风藤(福建)，狗屁藤(广西、云南)

**Paederia scandens** (Lour.) Merr.——*Gentiana scandens* Lour.

生于海拔 600—2 500 米的山坡、河谷、路旁、林缘灌丛中或荒山草地上。分布于山西、陕西、甘肃、江苏、上海、安徽、浙江、福建、河南、湖北、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草(鸡矢藤)：甘、微苦，平。祛风利湿，消食化积，消炎止咳，活血止痛。用于黄疸，积食饱胀，经闭，痢疾，胃气痛，风湿疼痛，泄泻，肺痨咯血，顿咳，消化不良，小儿疳积，气虚浮肿；外用于皮炎，湿疹，疮疡肿毒，毒蛇咬伤，毒虫螫伤。汁液：用于毒虫螫伤，冻疮。

**毛鸡矢藤**　打屁藤(云南)

**Paederia scandens** (Lour.) Merr. var. **tomentosa** (Bl.) Hand.-Mazz.——*P. tomentosa* Bl.

生于海拔 560—1 800 米的山坡草地、路旁灌丛中或林下、河边阴湿处。分布于华东、中南及陕西、甘肃、四川、贵州、云南。

全草(白鸡屎藤)：甘，平。清热解毒，健胃利湿。用于疟疾，黄疸，痢疾，消化不良，腹痛。　根：用于黄疸，积食饱胀，小儿疳积，蛔虫腹痛，妇女血虚经少，胃气痛。

**云南鸡矢藤**　狗屁藤(云南)

**Paederia yunnanensis** (Lévl.) Rehd.——*Cynanchum yunnanensis* Lévl.

生于海拔 400—2 800 米的林缘、路旁、沟边灌丛中或山坡草地上。分布于广西、四川、贵州、云南。

根及茎藤：甘、微苦，凉。消炎，止痛，消食，接骨。用于肝炎，消化不良，目赤红肿，骨折，跌打损伤。

## 大沙叶属　Pavetta L.

**满天星**　山铁尺(广西)

**Pavetta hongkongensis** Bremek.

生于海拔 1 300 米左右的山坡、路旁、林缘灌丛中或山地疏林中。分布于广东、海南、

广西、贵州、云南。

根、茎、叶(大沙叶)：苦，寒。清热，清暑利湿，活血祛瘀。用于感冒发热，中暑，肝炎，小便淋痛，风湿痹痛，跌打损伤，疮疥。

附　注：**大沙叶 P. arenosa** Lour. 供药用。根：用于肺痨。叶：用于跌打损伤。分布于广东、广西。

## 三角瓣花属　Prismatomeris Thw.

**西南三角瓣花**

**Prismatomeris henryi** (Lévl.) Rehd. ——*Canthium henry* Lévl.

生于山地杂木林中或灌丛中。分布于广西。

叶：用于跌打损伤。

**南山花**　　狗骨木(广西)

**Prismatomeris tetrandra** (Roxb.) K. Schum.——*Coffea tetrandra* Roxb.

生于海拔1 200米左右的坡地、沟谷杂木林中。分布于广东、海南、广西、云南。

根(黄根)：微苦，凉。凉血止血，消炎止痛，利湿退黄。用于亚急性粒细胞白血病，黄疸肝性炎，再生障碍性贫血，牙龈出血，小便淋痛，风湿关节痛，跌打损伤。叶：外用于疔疮。

## 九节属　Psychotria L.

**黄果九节**　　牙齿硬(云南)

**Psychotria calocarpa** Kurz

生于海拔1 640—2 040米的山坡常绿阔叶林中。分布于云南、西藏。

全株：苦，凉。清热解毒，祛风利湿，镇静，镇痛。用于痢疾，泄泻，咳嗽，癫痫，肾炎水肿，小便涩痛，风湿腰腿痛。

**滇南九节**

**Psychotria henryi** Lévl.

生于海拔600—1 320米的山坡常绿阔叶林中。分布于云南。

根：健脾除湿，理气止痛。

**九节**　　山大刀(贵州)，刀斧伤(广西)

**Psychotria rubra** (Lour.) Poir.——*Antherura rubra* Lour.

生于丘陵、坡地、沟谷疏林中。分布于浙江、福建、广东、海南、广西、贵州、云南。

根、叶(山大颜)：苦，寒。清热解毒，消肿拔毒。用于感冒发热，白喉，乳蛾，咽喉肿痛，痢疾，胃痛，风湿骨痛。叶：外用于跌打肿痛，外伤出血，毒蛇咬伤，疮疡肿毒，下肢溃疡。全株：用于风湿骨痛，牙痛，胃痛，感冒高热，咳嗽，木薯中毒；外用于跌打损伤，骨折。

**蔓九节**　　白花风不动(福建)，络石藤(广东)，上木蛇(广西)

**Psychotria serpens** L.

生于山谷岩石上或攀附于山坡林中树上。分布于浙江、福建、台湾、广东、海南、广西。

全株(穿根藤)：苦、微辛，微温。祛风除湿，舒筋活络，消肿止痛。用于虚弱无力，风湿关节痛，头风痛，小儿疳积，手足麻木，腰腿痛，腰肌劳损，附骨疽，多发性脓肿，跌打损伤，骨折，毒蛇咬伤。

**毛九节**　驳骨草、百样花(广西)，小功劳(云南)、

**Psychotria siamica** (Craib) Hutch.——*Cephaelis siamica* Craib

生于海拔1 470—1 640米的山坡常绿阔叶林下阴湿处。分布于广西、贵州、云南。

全株(驳骨九节)：苦，凉。清热解毒，散瘀止血，祛风止痛，用于痢疾，泄泻，咽喉痛，咳嗽，咯血，内痔出血，消化不良，小儿疳积，月经过多，风湿骨痛，跌打损伤，骨折，疮疖，烫伤，毒蛇咬伤。

**黄脉九节**

**Psychotria straminea** Hutch.

生于低海拔至中海拔森林中。分布于广东、海南、广西、云南。

全株：消肿，解毒，止血。用于风湿骨痛，外伤出血，解木薯、断肠草中毒。

**小叶九节**

**Psychotria tutcheri** Dunn

生于山坡、沟谷杂木林中。分布于海南、广西。

全株：用于风湿痹痛，跌打肿痛。

**云南九节**

**Psychotria yunnanensis** Hutch.

生于海拔800—2 000米的山坡常绿阔叶林中。分布于广西、云南、西藏。

全株：用于风湿骨痛，跌打损伤。

## 山黄皮属　Randia L.

**香楠**　水楠木(广西)

**Randia canthioides** Champ.

生于山地林中。分布于台湾、广东、海南、广西、贵州。

茎、叶：外用于刀伤。

**山黄皮**

**Randia cochinchinensis** (Lour.) Merr.——*Adina cochinchinensis* Lour.

生于海拔1 500—2 000米的混交林中。分布于广东、广西、贵州、云南。

根、茎、叶：解毒，消肿。　根：清热利湿，润肺止咳。用于痢疾，咳嗽。

**西南香楠**

**Randia henryi** Pritz.

生于海拔1 300米左右的山坡林中。分布于广西、云南。

叶：外用于跌打肿痛，骨折。

**尖萼山黄皮**　公王枝(广西)

**Randia oxyodonta** Drake

生于林中。分布于广东南部、海南、广西。

根：外用于跌打损伤，刀伤出血。

**柳叶香楠**

**Randia salicifolia** Li

生于山坡林中。分布于广西。

根：接骨。用于骨折。 叶：用于胃痛，筋骨痛，风湿骨痛。

**鸡爪簕**　　痧麻木、九耳木、凉粉木(广西)

**Randia sinensis** (Lour.) Schult. ——*Oxyceros sinensis* Lour.

生于村边、旷地或田园旁。分布于广东、海南、广西。

全株(鸡爪簕)：甘、涩、微苦，凉。清热解毒，祛风除湿，散瘀消肿。用于痢疾，风湿疼痛，吐血，跌打肿痛，疮疡肿毒。 叶：外用于痈疮肿毒。

**山石榴**　　假石榴、对面花、簕泡木(广西)，猪肚筋(云南)

**Randia spinosa** (Thunb.) Poir. ——*Gardenia spinosa* Thunb.

生于村边、旷野、林中。分布于广东、海南、广西、贵州。

根、叶、果实(山石榴)：苦、涩，凉。有毒。散瘀消肿。用于跌打瘀肿，外伤出血，疮疥。

**岭罗麦**

**Randia wallichii** Hook. f. —— *Aidia wallichii* (Hook. f.) Yamazaki

生于海拔 600—1 650 米的山坡林中。分布于广东、海南、广西、贵州、云南。

树皮：消食化气。

## 茜草属　Rubia L.

**高原茜草**　　茜根(广西)

**Rubia argyi** (Lévl. et Vand.) Hara ex Lauener —— *Galium argyi* Lévl. et Vand.

生于林下、河谷灌丛中。分布于广东、广西、云南。

根及根状茎：用于吐血，衄血，崩漏下血，外伤出血，经闭瘀阻，关节痹痛，跌打肿痛。

**中华茜草**　　疔毒草(黑龙江)，小丹参(云南)

**Rubia chinensis** Regel et Maack

生于海拔 2 000—3 400 米的田边、路旁灌丛中或山坡阔叶林下。分布于东北、西南及河北、内蒙古、陕西、甘肃、青海。

根及根状茎(细茜草)：苦，寒。行血止血，通经活络，止咳祛瘀。用于吐血，衄血，血崩，经闭，肿痛，跌打损伤。

**茜草**　　破血丹(陕西)，红根草(安徽)，红丝线(江西、湖南)，染蛋藤(福建)，锯锯藤(四川)

**Rubia cordifolia** L.

生于山坡、路旁、沟谷、田边、灌丛中及林缘。全国大部分地区均有分布。

根及根状茎(茜草)：苦，寒。凉血，止血，祛瘀，通经。用于吐血，衄血，崩漏，外伤出血，经闭瘀阻，关节痹痛，跌打肿痛。

茎、叶：辛，微寒。活血消肿，止血，祛瘀。用于吐血，血崩，跌打损伤，风湿痹痛，腰痛，痈疮疔毒。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**革叶茜草**

**Rubia cordifolia** L. var. **coriacea** Z. Y. Zhang

生于海拔 1 200—2 700 米的山沟或桦树林下。分布于陕西、甘肃、四川。

根及根状茎：清热解毒，活血通络，利湿止血，祛瘀生肌。用于吐血，内出血，月经不调，经闭，风湿骨痛，跌打肿痛。

**肉叶茜草**　　小血藤(贵州)

**Rubia cordifolia** L. var. **herbacea** Chun et How

生于山坡、林缘或灌丛中。分布于广西、贵州。

根及根状茎：凉血止血，祛瘀生新，止咳化痰。用于产后血虚，月经不调，经闭腹痛，瘀血肿痛，吐血，衄血，便血，血崩，尿血，痔疮出血，咳嗽，劳伤，接骨。

**柔毛茜草**

**Rubia cordifolia** L. var. **mollis** Chun et How

生于山坡、路旁、沟谷、田边、灌丛中或林缘。分布于广西。

根及根状茎：凉血止血，活血祛瘀。用于月经不调，吐血，衄血，血崩，经闭腹痛，跌打损伤，瘀血肿痛。

**狭叶茜草**　　土茜草、四棱草(广西)

**Rubia cordifolia** L. var. **stenophylla** Franch.

生于山地林缘或灌丛中。分布于广西、四川、贵州。

根及根状茎：苦，寒。清热解毒，活血通经，利湿，止血，祛瘀生新。用于衄血，吐血，便血，尿血，崩漏，月经不调，经闭腹痛，风湿关节痛，水肿，肠痈，肝炎，泄泻，痢疾；外用于跌打损伤，疖肿，神经性皮炎。　全草：用于风湿脚气。

**长叶茜草**　　锯锯藤(陕西、四川)，沾沾草(陕西)

**Rubia lanceolata** Hayata ——*R. cordifolia* L. var. *longifolia* Hand.-Mazz.

生于海拔 600—2 600 米的山沟、山坡林下、路旁灌丛中或河滩草地上。分布于中南及陕西、甘肃、安徽、江西、福建、台湾、四川、贵州、云南。

根及根状茎：苦，寒。行血活血，通经活络，止痛。用于吐血，衄血，崩漏，经闭，月经不调，风湿骨痛，跌打损伤，牙痛。

**大茜草**

**Rubia magna** Hsiao

生于山坡、路旁、沟谷、田边、灌丛中或林缘。分布于四川。

根及根状茎(大茜草)：苦，寒。凉血，止血，祛瘀，通经。用于吐血，衄血，崩漏下血，外伤出血，经闭瘀阻，关节痹痛，跌打肿痛。

**大理茜草**　　小茜草、鸡血生(云南)

**Rubia mandersii** Coll. et Hemsl.

生于海拔 1 900—3 000 米的山坡、路旁、沟谷、灌丛中或林缘。分布于云南。

根及根状茎：凉血，止血，活血通经，祛瘀，止痛。用于月经不调，吐血，崩漏下血，外伤出血，经闭，风寒湿痹，跌打损伤，胃痛。

**膜叶茜草**　　大活血丹、猪猪藤(陕西)

**Rubia membranacea** (Franch.) Diels——*R. cordifolia* L. var. *membranacea* Franch.

生于海拔 1 500—3 300 米的山沟、山坡林下、灌丛中或草坡上。分布于陕西、青海、四川、云南、西藏。

根及根状茎：苦，寒。行血止血，通经活络，止咳祛痰。用于吐血，衄血，崩漏下血，外伤出血，经闭，关节疼痛，跌打损伤。

**钩毛茜草**　　四棱草(广西)，小血藤(贵州)，活血丹(云南)

**Rubia oncotricha** Hand.-Mazz.

生于海拔 1 600—3 200 米的山沟常绿阔叶林下、山坡草丛中或林缘。分布于广西、贵州、云南、西藏。

根及根状茎：苦，寒。行血止血，通经活络，祛瘀止痛。用于便血，衄血，病后虚弱，月经不调，经闭腹痛，关节疼痛，跌打肿痛。

**卵叶茜草**

**Rubia ovatifolia** Z. Y. Zhang

生于海拔 1 300—2 700 米的山坡林下或沟谷灌丛中。分布于陕西、甘肃、四川。

根及根状茎：涩，平。清热解毒，利尿，消肿，退黄，止血。用于黄疸，水肿。

**红花茜草**　　小血藤(贵州)，活血草(云南)

**Rubia podantha** Diels

生于海拔 1 500—3 000 米的山坡、沟谷林中阴湿处或灌丛中。分布于广西、四川、贵州、云南。

根及根状茎：清热解毒，凉血止血，活血祛瘀，祛风除湿。用于痢疾，腹痛，泄泻，吐血，崩漏下血，风湿骨痛，跌打肿痛，外伤出血。

**大叶茜草**　　土茜草、茜草藤(四川)，小红藤、四块瓦(贵州)，小血散(云南)

**Rubia schumanniana** Pritz.

生于海拔 1 900—3 000 米的草地、山坡、路旁、灌丛中或林中。分布于青海、河南、四川、贵州、云南。

根状茎(茜草)：苦，寒。凉血止血，祛瘀通经，健胃。用于吐血，衄血，崩漏下血，外伤出血，经闭瘀阻，关节痹痛，小儿疳积，跌打肿痛。

附　注：《四川省中药材标准》1987 年版收载。

**林茜草**　　穿心草(黑龙江)

**Rubia sylvatica** Nakai

生于杂木林下、草甸或草地上。分布于黑龙江、吉林。

根及根状茎：苦，寒。凉血止血，祛瘀，通经。用于吐血，衄血，崩漏下血，外伤出血，经闭瘀阻，关节疼痛，跌打肿痛。

**西藏茜草**

**Rubia tibetica** Hook. f.

生于海拔 3 600 米以下的河滩砾石地、田边、路旁。分布于新疆、西藏。

根及根状茎：凉血，止血，活血，消瘀。用于内出血，鼻衄，月经不调，痛经，经闭，扭伤，腰痛。叶：外用于疔疮痈肿。

**西洋茜草**

**Rubia tinctorum** L.

生于田埂、菜地、果园。分布于新疆。

根及根状茎：行血止血，通经活络，止咳祛痰。

**光茎茜草**　金线草(广西)

**Rubia wallichiana** Decne.

生于海拔 1 500—3 080 米的山地林中、林缘或灌丛中。分布于广西、西藏。

根及根状茎：用于吐血，崩漏下血，衄血，外伤出血，经闭瘀阻，关节痹痛，跌打肿痛。

**小红参**　小茜草、小活血、红根、小舒筋(云南)

**Rubia yunnanensis** (Franch.) Diels——*R. sikkimensis* Kurz var. *yunnanensis* Franch.

生于海拔 1 900—3 000 米的山坡杂木林下、路旁、沟谷灌丛中。分布于四川、云南。

根及根状茎(小红参)：甘、微苦，温。通经活血，祛风除湿，镇静，止痛。用于月经不调，跌打损伤，风寒湿痹，胃痛，经闭。全草(滇茜草)：甘，平。补血活血，祛风除湿，软坚破积。用于贫血，跌打损伤，慢性胃脘痛，脂肪瘤，月经不调。

附　注：《云南省药品标准》1974 年版收载。

## 裂果金花属　Schizomussaenda Li

**裂果金花**　根辣、白头将军(广西)，大树甘草(云南)，当娜(傣语)

**Schizomussaenda dehiscens** (Craib) Li——*Mussaenda dehiscens* Craib

生于海拔 500—1 300 米的热带林中及河谷、丘陵、砂岩地带。分布于广西、云南。

根、茎(树甘草)：甘，平。清热解毒，消炎利尿。用于风热感冒，肺热咳嗽，咽喉肿痛，乳蛾，水肿，小便涩痛，疟疾。叶：用于感冒咳嗽，声哑。

## 六月雪属　Serissa Comm.

**六月雪**　路边金(贵州)

**Serissa japonica** (Thunb.) Thunb.——*Lycium japonicum* Thunb.; *L. foetidum* L. f.; *S. foetida* (L. f.) Comm.

生于山坡、路旁、溪边、灌丛中，也有栽培。分布于华东、中南、西南。

全株(六月雪)：淡、微辛，凉。舒肝解郁，清热利湿，消肿拔毒，止咳化痰。用于急性肝炎，风湿腰腿痛，痈肿恶疮，蛇咬伤，脾虚泄泻，小儿疳积，带下病，目翳，肠痈，狂犬病。

**白马骨**　满天星(江苏、江西、广东、广西、贵州、云南)，过路黄荆(江西)，路边荆(湖南)，路边姜(四川)

**Serissa serissoides** (DC.) Druce ——*Democrites serissoides* DC.

生于海拔800—1 900米的山坡林缘、路边、溪边灌丛中，也有栽培。分布于华东、中南及陕西、四川、贵州。

全株(六月雪)：淡、微辛，凉。疏风解表，清热利湿，舒筋活络。用于感冒，咳嗽，牙痛，乳蛾，咽喉肿痛，急慢性肝炎，泄泻，痢疾，小儿疳积，高血压头痛，偏头痛，目赤肿痛，风湿关节痛，带下病，痈疽，瘰疬。

根：清热解毒。用于小儿惊风，带下病，风湿关节痛，解雷公藤中毒。

## 螺序草属 Spiradiclis Bl.

**长叶螺序草**

**Spiradiclis oblanceolata** W. L. Sha et X. X. Chen

生于林下、路边或岩石上。分布于广西。

根状茎：外用于疮疡肿毒。

## 乌口树属 Tarenna Gaertn.

**乌口树** 杀山虫(广西)

**Tarenna attenuata** (Voigt) Hutch.——*Stylocaryna attenuata* **Voigt**

生于低海拔山地的丛林中。分布于广东、海南、广西。

全株(乌口树)：酸、辛、微苦，微温。祛风消肿，散瘀止痛。用于跌打扭伤，风湿骨痛，蜂窝组织炎，脓肿，胃肠绞痛，肝炎。叶：外用于口疮，跌打损伤。

**白皮乌口树** 白骨木、假枝子(广西)，狗骨头(云南)

**Tarenna depauperata** Hutch.

生于海拔200—1 640米的林中或灌丛中。分布于湖南、广东、广西、贵州、云南。

叶：外用于疮疖溃烂。

**白花苦灯笼** 黑虎(福建)，乌木(广西)

**Tarenna mollissima** (Hook. et Arn.) Rob. —— *Cupia mollissima* Hook. et Arn.

生于山地疏林中或灌丛中。分布于浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州。

根(麻糖风)：辛、微苦，凉。清热解毒，祛风利湿，补脾肾。用于感冒发热，头痛，咳嗽，腰腿痛，肾炎水肿，风湿关节痛。叶：消肿，止痛；外用于枪伤，疮疖脓肿。

## 狗骨柴属 Tricalysia A. Rich.

**狗骨柴** 狗骨子(浙江)，三萼木(广西)

**Tricalysia dubia** (Lindl.) Ohwi ——*Canthium dubium* Lindl.

生于山坡、溪边沟旁、灌丛中或疏林中。分布于浙江、江西、福建、湖南、广东、海南、广

西、贵州。

根(狗骨柴): 苦,凉。消肿散结,解毒排脓。用于瘰疬,背痈,头疖,跌打损伤。

**毛狗骨柴**　　黄鸡脚(江西)

**Tricalysia fruticosa** (Hemsl.) K. Schum. ——*Diplospora fruticosa* Hemsl.

生于海拔 1 500 米以下的山坡、沟谷疏林中或灌丛中。分布于广东、广西、四川、贵州、云南。

根: 甘、微苦,平。益气养血,收敛止血。用于血崩,肠风下血,血虚,关节痛。

## 钩藤属　Uncaria Schreb.

**毛钩藤**

**Uncaria hirsuta** Havil.

生于海拔 1 600—1 800 米的山谷、溪边疏林中或灌丛中。分布于福建、台湾、广东、广西、四川、贵州、云南。

带钩茎枝(钩藤): 甘,凉。清热平肝,熄风定惊。用于头痛眩晕,感冒夹惊,小儿癫痫,妊娠子痫,高血压症。　根: 用于风湿关节痛,腰腿痛。

附　注:《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**印支钩藤**

**Uncaria homomalla** Miq. ——*Uruparia homomalla* (Miq.) O. Kuntze

生于海拔 1 200 米左右的山地林中或林缘、沟谷灌丛中。分布于广西、云南。

根(四棱通): 甘、涩,微寒。清热平肝,熄风镇痉,活血通经。用于风湿关节痛,跌打损伤,腰腿痛,骨折,小儿惊风,高血压症,偏头痛,小儿脱肛,带下病,外伤出血。　带钩茎枝: 用于头痛眩晕,感冒夹惊,惊痫抽搐,妊娠子痫,高血压症。

**平滑钩藤**　　双钩藤、光钩藤(云南)

**Uncaria laevigata** Wall. ex G. Don

生于海拔 500—1 200 米的山谷、溪边疏林中或灌丛中。分布于广西、云南。

带钩茎枝(倒挂金钩): 甘,微寒。清热平肝,熄风定惊,活血通经,镇痛。用于头痛眩晕,感冒夹惊,小儿癫痫,妊娠子痫,高血压症。

**披针叶钩藤**

**Uncaria lancifolia** Hutch.

生于海拔 1 640—1 900 米的山谷、溪边疏林中或灌丛中。分布于广西、贵州、云南。

带钩茎枝(钩藤): 见毛钩藤。　根: 甘、苦,平。祛风通络。用于风湿痹痛。

**大叶钩藤**

**Uncaria macrophylla** Wall.

生于海拔 600—1 500 米的山地次生林中或路边灌丛中。分布于广东、海南、广西、云南。

带钩茎枝(钩藤): 见毛钩藤。　根: 用于风湿关节痛,腰腿痛。

附　注:《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**膜叶钩藤**

**Uncaria membranifolia** How

生于山地疏林中或沟谷、溪边灌丛中。分布于广西。

带钩茎枝(钩藤)：见毛钩藤。

**钩藤**　　孩儿茶(广西)，老鹰爪(贵州)

**Uncaria rhynchophylla** (Miq.) Jacks.——*Nauclea rhynchophylla* Miq.

生于山谷、林缘、溪边的疏林中或湿润灌丛中。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

带钩茎枝(钩藤)：见毛钩藤。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**类钩藤**　　方枝钩藤(广西)

**Uncaria rhynchophylloides** How

生于山坡、沟谷、溪旁的灌木林中。分布于广东、广西。

带钩茎枝(钩藤)：见毛钩藤。

**攀茎钩藤**　　倒钩风、鹰爪风(云南)

**Uncaria scandens** (Smith) Hutch ——*Nauclea scandens* Smith

生于海拔 1 300—2 000 米的山坡阔叶林中或沟边、地埂、灌丛中。分布于广东、海南、广西、贵州、云南、西藏。

带钩茎枝(钩藤)：见毛钩藤。根：祛风除湿，舒筋活血。用于风湿骨痛，腰腿痛。

**无柄果钩藤**　　白钩藤(云南种子植物名录)

**Uncaria sessilifructus** Roxb ——*Nauclea sessilifructus* Distr.

生于海拔 800—1 600 米的山坡疏林中或林缘、沟谷灌丛中。分布于广东、广西、云南。

带钩茎枝(钩藤)：见毛钩藤。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**华钩藤**　　鹰爪风(陕西、四川)、双钩藤(陕西)

**Uncaria sinensis** (Oliv.) Havil. ——*Nauclea sinensis* Oliv.

生于海拔 800—2 900 米的山地疏林中或湿润次生林中。分布于陕西、甘肃、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

带钩茎枝(钩藤)：见毛钩藤。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**鹰爪风**

**Uncaria wangii** How

生于中海拔山地的林缘、沟谷中。分布于广东、广西、云南。

带钩茎枝：清热平肝，熄风定惊，镇痛。用于头痛眩晕，小儿惊风，高血压症。叶：外用于风湿病。

**云南钩藤**　　麦和海(傣语)

**Uncaria yunnanensis** K. C. Hsia

生于海拔 570 米的林缘或林中。分布于云南。

根：用于腰痛。

附　注：经测定，本种带钩枝条的总生物碱含量为 0.22—0.26%，是一种含量较高，有生产价值的钩藤资源植物。

## 尖叶木属　Urophyllum Wall.

**尖叶木**　　鱼骨木(广西)

**Urophyllum chinense** Merr. et Chun

生于海拔 1 470 米以下的山坡灌丛中或疏林中。分布于广东、广西、云南。

茎、叶：外用于疮疖。

## 水锦树属　Wendlandia Bartl. ex DC.

**短花台湾水锦树**

**Wendlandia formosana** Cowan subsp. **breviflora** How

生于山地林中、沟谷、溪边。分布于广西。

叶：外用于跌打损伤。

**粗叶水锦树**　　硃赤木(广西)

**Wendlandia scabra** Kurz

生于海拔 500—1 540 米的山地林中。分布于广西、云南。

叶：用于跌打肿痛，产后骨痛。

**粗毛水锦树**

**Wendlandia tinctoria** (Roxb.) DC. subsp. **barbata** Cowan

生于海拔 1 200—1 800 米的山地林中或灌丛中。分布于广西、贵州、云南。

叶：外用于跌打肿痛。

**东方水锦树**　　沙牛木(广西)

**Wendlandia tinctoria** (Roxb.) DC. subsp. **orientalis** Cowan

生于海拔 1 750—1 800 米的山坡林中或灌丛中。分布于广西、云南。

叶：外用于跌打损伤。

**水锦树**　　猪血木、饭汤木(广西)

**Wendlandia uvariifolia** Hance

生于山地林中、林缘或溪边。分布于广东、广西、贵州。

根(水锦树)：微苦，凉。祛风除湿，散瘀消肿。用于风湿关节痛，跌打损伤。叶：止血生肌。外用于外伤出血，疮疡溃烂久不收口。全株：用于膀胱湿热，小便淋痛，风湿痹痛，烧、烫伤。

**中华水锦树**　　猪血树、饭汤树(广西)

**Wendlandia uvariifolia** Hance subsp. **chinensis** (Merr.) Cowan ——*W. chinensis* Merr.

生于山地林中或溪边。分布于广东、广西。

根：用于风湿痹痛，跌打损伤。　叶：用于崩漏，恶疮。

## 155. 花荵科 Polemoniaceae

### 花荵属 Polemonium L.

**花荵** 鱼翅菜(辽宁),手参、穴菜、电灯花(山西)

**Polemonium coeruleum** L.

生于海拔(1 000—)1 700—3 700 米的山坡草丛、山谷疏林下、山坡路边灌丛或溪流附近湿处。分布于东北及山西、内蒙古、新疆、云南。

根及根状茎(电灯花): 微苦,平。止血,祛痰,镇静。用于咳血,吐血,衄血,便血,胃痛,崩漏,咳嗽痰喘,癫痫,失眠。

**中华花荵** 山波菜(四川)

**Polemonium coeruleum L.** var. **chinense** Brand——*P. chinense* (Brand) Brand

生于海拔 2 000—4 000 米的潮湿草丛、河边、沟边林下、山谷密林或山坡路旁杂草间。分布于黑龙江、山西、陕西、甘肃、青海、宁夏、湖北、四川。

根状茎: 微苦,平。祛痰,止血,镇静。用于内出血,月经过多,崩漏,咳嗽痰喘,癫痫,失眠。

**小花荵**

**Polemonium liniflorum** Vass.

生于向阳草坡、湿草甸。分布于黑龙江、内蒙古。

根及根状茎(花荵): 苦,平。祛痰,止血,镇静。用于咳嗽痰喘,胃溃疡出血,咳血,衄血,崩漏,癫痫,失眠,带下病。

## 156. 旋花科 Convolvulaceae

### 心萼薯属 Aniseia Choisy

**心萼薯** 满山香、黑面藤(广西),毛牵牛(贵州)

**Aniseia biflora** (L.) Choisy —— *Convolvulus biflorus* L.: *Ipomoea sinensis* (Desr.) Choisy

生于海拔 150—1 800 米的山坡、山谷、路旁或林下。分布于福建、台湾、江西、湖南、广东、广西、贵州、云南。

全草: 甘、微苦,平。清热解毒,消疳祛积。用于感冒,蛇咬伤,小儿疳积。种子: 用于跌打损伤,蛇咬伤。

### 白鹤藤属 Argyreia Lour.

**白鹤藤** 银背藤、白背绸(广东、广西),白背丝绸(广西)

**Argyreia acuta** Lour.

生于海拔 700—1 000 米的山坡、河谷、溪边及灌丛中。分布于广东、海南、广西。

全株(一匹绸)：微酸、微苦，凉。祛风利尿，化痰止咳，止血活络，拔毒生肌。用于肾炎水肿，肝硬化腹水，风湿疼痛，崩漏，带下病，咳嗽痰喘，跌打损伤；外用于乳痈，疮疖脓肿，湿疹。

附　注：功效相同的有**东京银背藤 A. pierreana** Boiss.，分布于广西、贵州、云南。

**头花银背藤**　　毛藤花(海南)，硬毛白鹤藤(海南植物志)

**Argyreia capitata** (Vahl) Arn. ex Choisy ——*Convolvulus capitatus* Vahl

生于海拔 125—155 (—2 200) 米的沟谷密林、疏林或灌丛中。分布于广东、海南、广西、贵州、云南。

叶：生肌止痛。用于跌打损伤。

**银背藤**　　一匹绸、白鹤藤(广东、广西)，白背绸缎、白底丝绸(广西)

**Argyreia obtusifolia** Lour.

生于海拔 250—1 800 米的沟谷密林中。分布于广东、海南、广西。

全株：用于内外伤出血，跌打损伤，肺热咳嗽，血崩，带下病，痢疾。

**灰毛白鹤藤**　　红心果、猪叶菜、合苞叶(云南)

**Argyreia osyrensis** (Roth) Choisy var. **cinerea** Hand.-Mazz.

生于海拔 220—1 600 米的疏林或灌丛中。分布于广西、云南。

根、叶(藤本夜门关)：微涩、淡，平。消炎收敛。用于阴挺，偏头痛，外伤出血。

**白花银背藤**　　白牛藤(广西)，葛藤、跌打王、山牡丹(云南)

**Argyreia seguinii** (Lévl.) Vaniot ex Lévl. ——*Lettsomia seguinii* Lévl.

生于海拔 600—1 300 米的林下、路边灌丛中。分布于广西、贵州、云南。

根皮或全株(山牡丹)：微温。接骨，止血生肌，清心，润肺止咳。用于臌胀，跌打损伤，内外伤出血，血崩，带下病，疮毒烂脚，咳嗽痰喘。

**大叶银背藤**　　羊角藤、小团叶(云南)

**Argyreia wallichii** Choisy

生于海拔 750—1 460 米的混交林及灌丛中。分布于广东、广西、四川、云南。

根：用于乳痈。

## 苞叶藤属　Blinkworthia Choisy

**苞叶藤**　　马铃铛(广西)，鸡帐蓬(云南)

**Blinkworthia convolvuloides** Prain ——*B. discostigma* Hand.-Mazz.

生于海拔 360—600 (—2 500) 米的干热河谷内稀疏乔木林及灌丛草地中。分布于广西、云南。

全株：用于胃脘痛，小儿腹胀。

## 月光花属　Calonyction Choisy

**月光花**　嫦娥奔月(云南)

**Calonyction aculeatum** (L.) House ——*Convolvulus aculeatus* L.

原产美洲。陕西、江苏、浙江、江西、广东、海南、广西、四川、云南有栽培，或逸为野生。

全株：用于蛇咬伤。　种子：用于跌打肿痛，骨折。

**丁香茄**　跌打豆(广西)，天茄(救荒本草)

**Calonyction muricatum** (L.) G. Don ——*Convolvulus muricatus* L.

生于海拔 580—1 200 米的灌丛中或河漫滩干平坝上。分布于广西、云南。

叶：用于胃脘痛。　种子：用于跌打损伤。

## 打碗花属　Calystegia R. Br.

**打碗花**　狗儿蔓(陕西)，扶子苗(山东)，兔耳草(江苏)，面根藤(四川)，老母猪草(云南)

**Calystegia hederacea** Wall. ex Roxb.

生于农田、荒地、路旁、草地，为常见杂草。全国各地均有分布。

根状茎、花(打碗花)：甘、淡，平。　根状茎：健脾益气，利尿，调经止带。用于脾虚消化不良，月经不调，带下病，乳汁稀少。　花：止痛。外用于牙痛。

**藤长苗**　野兔子苗(江苏)，狗藤花、兔耳苗(安徽)，狗儿秧、毛胡弯(河南)

**Calystegia pellita** (Ledeb.) G. Don ——*Convolvulus pellita* Ledeb.

生于海拔 380—700(—1 700)米的平原路边、田边、荒地、山地草丛。分布于东北、华北、华东及陕西、甘肃、新疆、河南、湖北、湖南、四川。

全草：益气利尿，强筋壮骨，活血祛瘀。

**篱打碗花**　吊茄子(江西)，饭藤子、野苕(湖北)，狗儿弯藤(四川)，打碗花(贵州)，葛子根(救荒本草)

**Calystegia sepium** (L.) R. Br. ——*Convolvulus sepium* L.

生于海拔 140—2 080(—2 600) 米的路旁、溪边、草丛、农田边或山坡林缘。全国各地均有分布。

根(篱天剑)：甘，寒。清热利湿，理气健脾。用于目赤肿痛，咽喉痛，带下病，疝气。

**长裂打碗花**

**Calystegia sepium** (L.) R. Br. var. **japonica** (Choisy) Makino——*C. japonica* Choisy

生于田间及荒地。分布于江苏、浙江、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

带根全草(狗狗秧)：甘，寒。清热，滋阴，降血压，利尿。用于高血压症，小便不利，消化不良，感冒，目赤肿痛，疟腮，咽喉肿痛；外用于骨折，创伤，丹毒。

**肾叶打碗花**　扶子苗(山东)，滨旋花(江苏、浙江)

**Calystegia soldanella** (L.) R. Br. ——*Convolvulus soldanella* L.

生于海滨沙地或海岸岩石缝中。分布于华东及辽宁、河北。

全草(滨旋花)：微苦，温。祛风利湿，化痰止咳。用于咳嗽，肾炎水肿，风湿关节痛。

## 旋花属　Convolvulus L.

**银灰旋花**　彩木(蒙语)

**Convolvulus ammannii** Desr.

生于干旱草原、沙地、路边。分布于东北、西北及河南、西藏。

全草：辛，温。解表，止咳。用于感冒，咳嗽。

**田旋花**　三齿草藤(甘肃)，田福花(新疆)，燕子草(山东)，扶田秧、扶秧田(江苏)，白花藤(四川)

**Convolvulus arvensis** L.

生于田间、路旁、荒坡、草地。分布于东北、华北、西北、西南及山东、江苏、河南、湖南。

全草：微咸，温。活血调经，止痒，止痛，祛风。用于神经性皮炎，风湿关节痛，牙痛。

**刺旋花**

**Convolvulus tragacanthoides** Turcz.

生于海拔 2 500 米以下的干旱山坡石缝中及戈壁滩。分布于东北、西北及河北、内蒙古、四川。

全草：祛风除湿。

## 菟丝子属　Cuscuta L.

**菟丝子**　龙须子(辽宁)，山麻子(河北)，黄丝藤、无叶藤(江西)，雷真子、禅真(四川)，朱匣琼瓦(藏语)

**Cuscuta chinensis** Lam.

寄生于海拔 200—1 300 米的田边、山地向阳处、路边灌丛或海边沙丘的豆科、菊科、藜藜科等植物上。分布于东北、华北、西北、华东、西南及河南、湖南。

种子(菟丝子)：甘，温。滋补肝肾，固精缩尿，安胎，明目，止泻。用于阳痿遗精，尿有余沥，遗尿尿频，腰膝酸软，目昏耳鸣，肾虚胎漏，胎动不安，脾肾虚泻；外用于白癜风。　全草(菟丝)：甘、辛，平。清热凉血，利水解毒。用于吐血，衄血，便血，血崩，淋浊，带下病，痢疾，黄疸，痈疽，疔疮，热毒痱疹。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②功效相同的有**金灯藤 C. japonica** Choisy，分布于全国各地；**南方菟丝子 C. australis** R. Br.，分布于西北、华东、中南及河北、吉林、辽宁、四川、贵州、云南；**欧洲菟丝子 C. europaea** L.，分布于华北、西北、西南及黑龙江、辽宁；**大花菟丝子 C. reflexa** Roxb.，分布于西南及湖南、广西。

## 马蹄金属　Dichondra J. R. et G. Forst.

**马蹄金**　金钱草(江苏、浙江、湖南、广西、贵州)，小元宝草(江苏)，黄疸草(福建)，

铜钱草(浙江),小灯盏(四川)

**Dichondra repens** Forst.

生于海拔100—1 980米的山坡草地、路旁或沟边。分布于华东、中南及四川、贵州、云南。

全草(马蹄金): 辛,平。清热利湿,解毒消肿。用于肝炎,胆囊炎,痢疾,肾炎水肿,淋证,乳蛾,跌打损伤。

## 丁公藤属 Erycibe Roxb.

**九来龙** 凹脉丁公藤(海南植物志)

**Erycibe elliptilimba** Merr. et Chun

生于低山坡路旁、溪畔或海边疏林中,常攀援于大树上。分布于海南。

根、茎: 祛风止痛。

附 注: 海南特有药用植物。

**丁公藤** 斑鱼列、麻辣仔藤(广东)

**Erycibe obtusifolia** Benth.

生于山谷湿润密林中或路旁灌丛。分布于广东、海南、广西、云南。

藤茎(丁公藤): 辛,温。有毒。祛风除湿,舒筋活络,消肿止痛。用于风湿关节痛,类风湿关节痛,腰腿疼痛,半身不遂,跌打肿痛。

附 注:《中华人民共和国药典》1990年版附录收载。

**光叶丁公藤** 丁公藤(海南植物志)

**Erycibe schmidtii** Craib

生于海拔250—1 200米的山谷密林或疏林中,常攀援于乔木上。分布于广东、海南、广西、云南。

茎: 用于风湿痹痛,半身不遂,跌打损伤。

## 土丁桂属 Evolvulus L.

**土丁桂** 毛将军(福建),银丝草(湖南、贵州),毛辣花、白鸽草(广东、广西)

**Evolvulus alsinoides** (L.) L. ——*Convolvulus alsinoides* L.

生于海拔300—1 800米的旷野、山坡及路边草丛中。分布于中南及江苏、福建、台湾、安徽、浙江、江西、四川、贵州、云南。

全草(土丁桂): 苦、涩,平。止咳平喘,清热利湿,散瘀止痛。用于咳嗽痰喘,黄疸,胃痛,消化不良,痢疾,泄泻,淋证,带下病,跌打损伤,腰腿痛。

**银丝草** 白头妹(广西)

**Evolvulus alsinoides** (L.) L. var. **decumbens** (R. Br.) v. Ooststr. ——*E. decumbens* R. Br.

生于海拔1 160—1 800米的山地草地。分布于江西、湖北、湖南、广东、海南、广西、云南。

全草：用于咳嗽痰喘，肾虚腰痛，跌打损伤。

## 甘薯属 Ipomoea L.

**蕹菜** 蒿菜(福建、上海)，空心菜(福建、湖南、广西、四川、贵州)，通菜(广东)，藤藤菜(四川、江苏)

**Ipomoea aquatica** Forsk.

原产我国，现已作为蔬菜广泛栽培，或有时逸为野生状态，北方较少，宜生于气候温暖湿润、土壤肥沃的地方。分布于华东、中南、西南。陕西、甘肃有栽培。

全草(蕹菜)：辛、淡，凉。清热解毒，止血。用于乳痈，牙痛，疮痛，痔漏，食物中毒，蜈蚣、毒蛇咬伤。

**番薯** 地瓜(辽宁)，山药(河北)，红薯(山西)，山芋(江苏)，红苕(陕西、四川)

**Ipomoea batatas** (L.) Lam.——*Convolvulus batatas* L.

原产南美洲及大、小安的列斯群岛。我国各地作为粮食或工业原料广泛栽培。

根、茎(甘薯)：甘、涩，微凉。补中，生津，止血，排脓。用于胃痛，崩漏；外用于无名肿毒。

**五爪金龙** 上竹龙、牵牛藤、黑牵牛、五齿芩(广西)

**Ipomoea cairica** (L.) Sweet ——*Convolvulus cairica* L.

生于海拔 90—610 米的平地、山地路边及灌丛向阳处。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、四川、云南。

块根、叶(五叶藤)：甘，寒。清热解毒，止咳，止血，通淋利水。用于骨蒸劳热，咳嗽，咳血，淋证，水肿，小便不利，痈肿疮疖。果实：用于跌打损伤。

**七爪龙** 藤商陆、千斤藤(广东)，五爪薯(海南)，野牵牛、苦瓜藤(广西)

**Ipomoea digitata** L.

生于海拔 280—1 020 米的海滩边矮林、山地疏林或溪边灌丛。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、云南。

块根、叶(藤商陆)：苦，寒。有毒。清热解表，逐水消肿。用于二便不利，水肿腹胀，瘰疬，痰饮，乳痈，疮疡肿毒。

**二叶红薯** 蜜藤(福建)，沙藤(浙江)，沙灯心(广东)，海薯(海南)，海茹藤(广西)

**Ipomoea pescaprae** (L.) Sweet ——*Convolvulus pescaprae* L.

生于沙滩及路边向阳处。分布于福建、台湾、浙江、广东、海南、广西。

全草(马鞍藤)：辛、微苦，温。祛风除湿，拔毒消肿。用于风寒感冒，风湿关节痛，腰肌劳损；外用于疮疖，痔疮。

## 鱼黄草属 Merremia Dennst.

**金钟藤** 假白薯(云南)，多花山猪菜(海南植物志)

**Merremia boisiana** (Gagn.) v. Ooststr. ——*Ipomoea boisiana* Gagn.

生于海拔 120—680 米的疏林湿润处或次生杂木林中。分布于广东、海南、广西、云南。

茎：用于血虚。

**黄毛金钟藤**　白九前(广西)

**Merremia boisiana** (Gagn.) v. Ooststr. var. **fulvopilosa** (Gagn.) v. Ooststr.——*Ipomoea boisiana* (Gagn.) v. Ooststr. var. *fulvopilosa* Gagn.

生于海拔 450—1 300 米的热带雨林林缘、山谷阴处、河谷低丘或向阳疏林。分布于广西、云南。

全草：用于风湿骨痛。

**篱栏网**　犁头网、篱网藤、蛤仔藤、鱼网草(广西)，茉栾藤(云南)，小花山猪菜(海南植物志)

**Merremia hederacea** (Burm. f.) Hall. f.——*Evolvulus hederaceus* Burm. f.

生于海拔 130—760 米的灌丛或路旁草丛中。分布于福建、台湾、江西、广东、海南、广西、云南。

全草(篱栏网)：甘、淡，凉。清热解毒，利咽喉。用于感冒，乳蛾，咽喉痛，目赤肿痛。

**毛山猪菜**　九里草、五月艾(广东)，万丈丝(广西)，宿苞山猪菜(海南植物志)

**Merremia hirta** (L.) Merr.——*Convolvulus hirtus* L.; *M. decurrens* (Hand.-Mazz.) Kiu

生于海拔 260—1 000 米的空旷草地或林缘。分布于台湾、广东、海南，广西、云南。

全草：外用于风湿关节痛。

**山土瓜**　野红苕、山萝卜(四川)，野土瓜藤(贵州)，红土瓜、地瓜(云南)

**Merremia hungaiensis** (Lingelsh. et Borza) R.C. Fang——*Ipomoea hungaiensis* Lingelsh. et Borza

生于海拔 1 200—3 200 米的草坡、山坡灌丛或松林下。分布于四川、贵州、云南。

块根(土瓜)：甘，平。清肝利胆，润肺止咳。用于黄疸，小儿疳积，急、慢性肝炎，咳嗽，虚热，盗汗。

**线叶土山瓜**

**Merremia hungaiensis** (Lingelsh. et Borza) R. C. Fang var. **linifolia** (C. C. Huang ex C.Y. Wu et H. W. Li) R. C. Fang —— *Ipomoea hungaiensis* Lingelsh. et Borza var. *linifolia* C. C. Huang ex C. Y. Wu et H. W. Li

生于海拔 1 200—2 500 米的路旁或灌丛中。分布于四川、云南。

块根：用于小儿疳积，急、慢性肝炎，咳嗽，虚热，盗汗。

**北鱼黄草**　钻之灵(贵州)，小瓠瓜(云南)

**Merremia sibirica** (L.) Hall. f. ——*Convolvulus sibirica* L.

生于海拔 600—2 800 米的路边、田边、山地草丛或山坡灌丛中。分布于黑龙江、吉林、河北、北京、山西、陕西、甘肃、山东、江苏、安徽、浙江、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

全草：用于跌打损伤，疔疮，腿痛。　种子：泻下祛积，逐水消肿。用于大便秘结，食积。

**尖萼鱼黄草**　凉粉草、过腰蛇(海南)，野通心菜(云南)，尖萼山猪菜(海南植物志)

**Merremia tridentata** (L.) Hall. f. subsp. **hastata** (Desr.) v. Ooststr.——*Convolvulus hastata* Desr.

生于海拔 140—260 米的旷野沙地、路旁及疏林中。分布于台湾、广东、广西、云南。

全草：外用于关节痛。

**山猪菜**　小薯藤(广东)，野薯藤、土瓜藤(广西)，假红薯、假番薯(海南)

**Merremia umbellata** (L.) Hall. f. subsp. **orientalis** Hall. f. ——*M. umbellata* (L.) Hall. f. var. *orientalis* (Hall. f.) v. Ooststr.

生于海拔(55—)550—1 600 米路旁、山谷疏林或杂草灌丛中。分布于广东、海南、广西、云南。

全草：用于乳汁不下。　根：敷疮毒。

**掌叶鱼黄草**　毛五爪龙、毛牵牛(广东)，黄花牵牛(广西)，红藤(云南)，掌叶山猪菜(海南植物志)

**Merremia vitifolia** (Burm. f.) Hall. f.——*Convolvulus vitifolia* Burm. f.

生于海拔(90—)400—1 600 米路旁、灌丛或林中。分布于广东、海南、广西、云南。

全草：用于淋证，胃脘痛。

## 盒果藤属　Operculina S. Manso

**盒果藤**　紫翅藤(广东)，松筋藤、红薯藤、软筋藤、宽筋藤(广西)

**Operculina turpethum** (L.) S. Manso ——*Convolvulus turpethum* L.

生于海拔 500 米左右的溪边、山谷路旁灌丛阳处或村舍附近。分布于台湾、广东、海南、广西、云南。

全草：甘、微辛，平。利水消肿，舒筋活络。用于水肿，大便秘结，骨折后期筋络挛缩。根皮：用作泻药。

## 牵牛属　Pharbitis Choisy

**牵牛**　筋角拉子(江苏)，大牵牛花(广西)，窝比窝收、窝明翁(苗语)，喇叭花(贵州)

**Pharbitis nil** (L.) Choisy—— *Convolvulus nil* L.

生于海拔 100—200(—1 600)米的山坡灌丛、干燥河谷路边、园边宅旁、山地路边，或为栽培。全国各地均有分布。

种子(牵牛子)：苦，寒。有毒。泻水通便，消痰涤饮，杀虫攻积。用于水肿胀满，二便不通，痰饮积聚，气逆喘咳，虫积腹痛，蛔虫病，绦虫病。

附　注：①功效相同的有**圆叶牵牛** **P. purpurea** (L.) Voigt，分布于全国各地。②两种牵牛子为《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 飞蛾藤属　Porana Burm. f.

**小萼飞蛾藤**　红薯细辛(云南)

**Porana mairei** Gagnep. et Courch.

生于海拔 1 600—2 500(—3 500)米的疏林中或沟谷边。分布于云南。

根：用于咳嗽。

**飞蛾藤**　打米花(湖南)，小元宝(广西)，马郎花(贵州)，六甲(哈尼语)

**Porana racemosa** Roxb.

生于海拔(600—)1 500—2 000(—3 200)米的灌丛，喜生长在石灰岩山地上。分布于陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全株：辛，温。破血，行气，消积。用于感冒，食积不消，跌打损伤。

**大果飞蛾藤**　异萼飞蛾藤(中国高等植物图鉴)

**Porana sinensis** Hemsl.

生于海拔 1 000—2 200 米的石灰岩山坡林下。分布于甘肃、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全株：辛，温。行气，破血，消肿。

**近无毛飞蛾藤**　青藤(云南)

**Porana sinensis** Hemsl. var. **delavayi** (Gagnep. et Courch.) Rehd.——*P. delavayi* Gagnep. et Courch.

生于海拔 600—1 800 米的石灰岩灌丛中或林缘。分布于陕西、湖北、四川、贵州、云南。

全株：用于水肿，肝硬化腹水。

**大花飞蛾藤**　知列藤(广西)

**Porana spectabilis** Kurz var. **megalantha** (Merr.) How——*P. megalantha* Merr.

生于山地疏林或灌丛中。分布于海南、广西。

全株：用于胸痛。

## 蔓萝属　Quamoclit Mill.

**蔓萝松**　金丝线、五角星(广西)，金凤毛(贵州)，蔓萝(花历百泳)，锦屏封(中国高等植物图鉴)

**Quamoclit pennata** (Desr.) Boj.——*Convolvulus pennatus* Desr.

原产美洲热带。全国各地广泛栽培，为庭园观赏植物。

根、全草(金凤毛)：微苦，温。祛风除湿，通经活络。

# 157. 紫草科　Boraginaceae

## 牛舌草属　Anchusa L.

**药用牛舌草**

**Anchusa officinalis** L.

原产欧洲。全国有栽培。

全草：用于狂犬咬伤，牙痛。

## 长蕊斑种草属　Antiotrema Hand.-Mazz.

**长蕊斑种草**　跌打药(广西),漏绿根、白紫草(云南、四川)

**Antiotrema dunnianum** (Diels) Hand.-Mazz.——*Cynoglossum dunnianum* Diels

生于海拔1 600—2 500米的山坡疏林下、灌丛或山坡草地上。分布于广西、贵州、云南。

根(黑阳参):苦、微甘,微寒。养阴补虚,清热解毒。用于虚劳发热,头昏,热淋,痈肿,口疮,牙疳;外用于跌打损伤,红肿。

附　注:我国特有属。

## 软紫草属　Arnebia Forsk.

**软紫草**　新疆紫草(中药志)

**Arnebia euchroma** (Royle) Johnst.——*Lithospermum euchromon* Royle; *Macrotomia euchroma* (Royle) Paulsen

生于海拔2 500—4 200米的多石砾山坡、洪积扇草甸。分布于新疆、西藏。

根(紫草):甘、咸,寒。凉血,活血,解毒透疹。用于血热毒盛,斑疹紫黑,麻疹不透,疮疡,湿疹,烧、烫伤。

附　注:功效相同的有**内蒙古紫草 A. guttata** Bunge,分布于河北、内蒙古、甘肃、宁夏、新疆、西藏。均为《中华人民共和国药典》1990年版收载。

## 糙草属　Asperugo L.

**糙草**

**Asperugo procumbens** L.

生于海拔2 000米以上的山坡、田边及村旁。分布于西北及内蒙古、山西、四川、西藏。

根:凉血活血,消肿解毒,透疹。

## 斑种草属　Bothriospermum Bunge

**斑种草**

**Bothriospermum chinense** Bunge

生于海拔100—1 600米的丘陵草坡或平原草地及竹林下。分布于辽宁、河北、山西、陕西、甘肃、山东、河南。

全草(蛤蟆草):微苦,凉。解毒消肿,利湿止痒。用于痔疮,肛门肿痛,湿疹。

**云南斑种草**

**Bothrospermum hispidissimum** Hand -Mazz.

生于海拔 1 600—2 100 米的路旁、林缘、山坡草地上。分布于四川西南部、云南。

全草：健脾，补虚。

**狭苞斑种草**

**Bothriospermum kusnezowii** Bunge

生于海拔 800—2 500 米的山坡路旁或平原草地上。分布于华北及辽宁、陕西、甘肃、宁夏、青海、山东、河南、四川。

全草：解毒消肿，利湿止痒。

**多苞斑种草**

**Bothriospermum secundum** Maxim.

生于海拔 200—2 100 米的山坡路旁、荒地、山谷溪边或林缘。分布于东北及河北、陕西、甘肃、宁夏、青海、山东、江苏、安徽、河南、湖北、湖南、四川、云南。

全草(野山蚂蟥)：祛风，解毒，杀虫。用于遍身暴肿，疮毒。

**柔弱斑种草**

**Bothriospermum tenellum** (Hornem.) Fisch et Mey.——*Anchusa tenellum* Hornem

生于海拔 300—1 900 米的路旁、荒地或山坡草地上。分布于东北、华东、中南及河北、四川、贵州、云南。

全草(鬼点灯)：有小毒。止咳，止血。

## 基及树属 Carmona Cav.

**基及树**

**Carmona microphylla** (Lam ) G. Don——*Ehretia microphylla* Lam.

生于旷野灌丛及山坡灌丛中。分布于台湾、广东、海南、广西西南部。

全株：用于咯血，便血。

## 破布木属 Cordia L.

**破布木** 青桐木(云南)

**Cordia dichotoma** Forst. f.

生于海拔 360—1 900 米的山坡疏林及山谷溪边。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、贵州、云南、西藏东南部。

根(青桐翠木)：微甘，平。行气止痛，化痰止咳。用于胃脘胀痛。 果实：用于咳嗽。

## 琉璃草属 Cynoglossum L.

**倒提壶** 蓝布裙(四川)，一把抓、狗屎花(云南)，牛舌头花(四川中药志)

**Cynoglossum amabile** Stapf et Drumm.

生于海拔 1 400—4 000 米的山坡草地、山坡灌丛、干旱路边及针叶林林缘。分布于云南及甘肃。

全草(蓝布裙): 苦,凉。清热利湿,散瘀止血,止咳。用于疟疾,肝炎,痢疾,尿痛,带下病,咳嗽;外用于创伤出血,骨折,关节脱臼。

**滇西倒提壶**

**Cynoglossum amabile** Stapf et Drumm. var. **pauciglochidiatum** Y. L. Liu

生于海拔 2 700—3 650 米的林缘。分布于四川西南部、云南西北部。

全草: 清热,利尿,消肿。

**大果琉璃草**

**Cynoglossum divaricatum** Steph.

生于海拔 500—2 300 米的干草坡、沙丘或石滩上。分布于东北、华北、西北。

根(琉璃草根): 淡,寒。清热解毒。用于乳蛾,疮疖痈肿。 果实(琉璃草果实): 苦,平。收敛止泻。用于小儿泄泻。

**小花琉璃草** 鹤虱(云南),小花倒提壶(云南种子植物名录)

**Cynoglossum lanceolatum** Forsk.——*C. micranthum* Desf.

生于海拔 2 800 米以下的丘陵或山地草坡、路边。分布于陕西、甘肃及长江中上游以南各省区。

全草(牙痛草): 苦,寒。清热解毒,利尿消肿,活血。用于急性肾炎,牙周炎, 痈疮肿毒,月经不调,毒蛇咬伤。

**红花琉璃草**

**Cynoglossum officinale** L.

生于海拔 1 500—1 800 米的阴湿山坡及山沟草场。分布于新疆。

全草: 用于肺痨吐血,衄血。

**琉璃草** 铁道板(陕西),青菜参(广西),贴骨散(云南)

**Cynoglossum zeylanicum** (Lehm.) Brand——*Myosotis zeylanica* Lehm.; *C. zeylanicum* (Vahl) Thunb. ex Lehm.

生于海拔 300—3 000 米的路边或山坡。分布于华东、中南、西南及陕西、甘肃。

根皮、叶(铁箍散): 苦,寒。清热解毒,活血散瘀,消肿止痛,提脓生肌,调经。用于疮疖痈肿,毒蛇咬伤,跌打损伤,骨折,月经不调。

## 厚壳树属 Ehretia L.

**西南粗糠树**

**Ehretia corylifolia** C. H. Wright

生于海拔 1 300—2 600 米的山坡林中。分布于四川西南部、贵州西部、云南。

树皮(滇厚朴): 燥湿,导滞,下气,除满。用于脘腹胀痛,食积气滞,泄泻,痢疾, 气逆喘咳。

附 注: 在云南部分地区有以树皮代厚朴用。

**长花厚壳树** 鸡肉树(广西)

**Ehretia longiflora** Champ. ex Benth.

生于山地林中。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、云南。

根：用于产后腹痛。

**粗糠树**　野枇杷、糠桐(陕西)

**Ehretia macrophylla** Wall. ex Roxb.——*E. dicksoni* Hance

生于山坡疏林及土质肥沃的山脚阴湿处。分布于华东、中南、西南及陕西、甘肃南部、青海南部。

枝、叶、果实：清热解毒，消食健胃。用于食积腹胀，小儿消化不良。

附　注：功效相同的有**光叶粗糠树 E. macrophylla** Wall. ex Roxb. var. **glabrescens** (Nakai) Y. L. Liu，分布于河南、湖北、四川、贵州、云南。

**厚壳树**

**Ehretia thyrsiflora** (Sieb. et Zucc.) Nakai——*Cordia thyrsiflora* Sieb. et Zucc.; *E. acuminata* R. Br. var. *obovata* (Lindl.) Johnston

生于海拔100—1 700米的丘陵及山地林中。分布于华东、中南及四川、贵州。

枝：苦，平。收敛止泻。用于泄泻。　心材：甘、咸，平。破瘀生新，止痛生肌。用于跌打损伤，肿痛，骨折，痈疮红肿。　叶(厚壳树)：甘、微苦，平。清热解暑，祛腐生肌。用于感冒，偏头痛。

**上思厚壳树**　大天王(广西)

**Ehretia tsangii** Johnston

生于海拔200—450米的林下或灌丛中。分布于广西、云南。

叶：用于毒蛇咬伤，食物中毒。

## 齿缘草属　Eritrichium Schrad.

**石生齿缘草**

**Eritrichium rupestre** (Pall.) Bunge——*Myosotis rupestre* Pall.

生于海拔1 400—2 000米的山地石上或干燥山坡。分布于东北北部、华北及甘肃、宁夏。

带花全草(齿缘草)：苦、甘，寒。清凉解热。用于温热病，脱疽。

附　注：本种为蒙药。

## 天芥菜属　Heliotropium L.

**大尾摇**　臭柠檬(广州植物志)

**Heliotropium indicum** L.

生于丘陵、草地或荒地。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

根及全草(大尾摇)：苦，平。清热，利尿，消肿，解毒，排脓止痛。用于脓胸，咽喉痛，咳嗽，咳咯脓痰，石淋，小儿急惊，口腔糜烂，痈肿，子痈。

## 鹤虱属 Lappula V. Wolf.

**蓝刺鹤虱**

**Lappula consanguinea** (Fisch. et Mey.) Gürke——*Echinospermum consangninea* Fisch. et Mey.

生于低山草坡或田边草地。分布于河北、内蒙古、甘肃、青海、宁夏、新疆。

果实：驱虫，消积。

**异刺鹤虱**　东北鹤虱(东北植物检索表)

**Lappula heteracantha** (Ledeb.) Gürke——*Echinospermum heteracantha* Ledeb.

生于平原荒地、沙丘、山地及田野。分布于东北、华北。

果实：消积，杀虫。

附　注：东北以果实作鹤虱用。

**鹤虱**

**Lappula myosotis** V. Wolff—— *L. echinata* Gilib.

生于海拔 3 800 米以下的山坡草地、丘陵坡地及田埂。分布于华北、西北及黑龙江、西藏。

果实：苦、辛，平。消积杀虫。用于蛔虫病，蛲虫病，绦虫病，虫积腹痛。

附　注：**卵盘鹤虱 L. redowskii** (Hornem.) Greene，分布于东北、华北、西北及四川西北部、西藏。黑龙江以果实作鹤虱用。

**石果鹤虱**

**Lappula spinocarpos** (Forssk.) Aschers. et O. Kuntze ——*Anchusa spinocarpos* Forssk.

生于戈壁滩或荒漠灌丛中。分布于新疆。

果实：驱虫，杀虫。

## 紫草属 Lithospermum L.

**田紫草**　麦家公(江苏植物名录)

**Lithospermum arvense** L.——*Buglossoides arvensis* (L.) Johnston

生于荒漠、丘陵、低山草坡或田埂。分布于东北及河北、山西、陕西、甘肃、新疆、山东、江苏、安徽、浙江、河南、湖北。

果实(地仙桃)：甘、辛，温。温中健胃，消肿止痛。用于胃胀反酸，胃寒疼痛，吐血，跌打损伤，骨折。

**紫草**　紫血(湖南)，加少(苗语)

**Lithospermum erythrorrhizon** Sieb. et Zucc.

生于山地路边、干旱石质山坡、灌丛下及林缘。分布于东北、华北及陕西、宁夏、新疆、山东、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西北部、四川、贵州。

根(紫草)：甘、咸，寒。清热凉血，解毒透疹。用于疹痘未发，斑疹未透，猩红热，疮疡。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**云南紫草**

**Lithospermum hancockianum** Oliv.

生于海拔 1 500—2 500 米的石灰岩山坡石缝中。分布于贵州西部、云南。

全株：用于跌打损伤，补虚弱。

**小花紫草**

**Lithospermum officinale** L.

生于山地草坡、石质坡地。分布于内蒙古、甘肃、宁夏、新疆。

全草(珍珠透骨草)：用于关节痛。

**梓木草**

**Lithospermum zollingeri** DC.

生于山坡、灌丛或草丛中。分布于陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、台湾、四川、贵州。

果实：消肿，止痛。用于疔疮，肿疡。

## 狼紫草属　Lycopsis L.

**狼紫草**

**Lycopsis orientalis** L.

生于海拔 500—2 000 米的河边沙地、山地草原、田野及路旁。分布于华北、西北及河南、西藏。

叶(狼紫草)：消炎止痛。用于疮肿。

## 砂引草属　Messerschmidia L. ex Hebenstr.

**细叶砂引草**

**Messerschmidia sibirica** L. var. **angustior** (DC.) W. T. Wang——*Tournefortia arguzia* Roem. et Schul. var. *angustior* DC.; *M. sibirica* L. subsp. *angustior* (DC.) Kitag.

生于固定砂丘、沙质地、盐碱地及海滨沙地。分布于华北及辽宁、黑龙江、陕西、甘肃、宁夏、山东、江苏、河南。

全草：排脓敛疮。

## 微孔草属　Microula Benth.

**微孔草**

**Microula sikkimensis** (C. B. Clarke) Hemsl.——*Anchusa sikkimensis* C. B. Clarke

生于海拔 2 700—4 700 米的草坡、村边及田埂。分布于陕西、甘肃、青海、四川、云南、西藏。

全草：清热解毒，活血。

## 滇紫草属　Onosma L.

**密花滇紫草**

**Onosma confertum** W. W. Smith——*O. forrestii* W. W. Smith

生于海拔2 000—4 500米的高山灌丛中或砾石坡地。分布于四川西南部、云南西北部。

根：清热解毒，凉血。

附　注：功效相同的有**昭通滇紫草 O. cingulatum** W. W. Smith et J. E. Jeffrey，分布于云南中部至东北部；**露蕊滇紫草 O. exsertum** Hemsl. 分布于四川西南部、贵州、云南。

**细花滇紫草**

**Onosma hookeri** C. B. Clarke——*O. hookeri C. B. Clarke* var. *intermedium* (Stapf) Johnston

生于海拔 3 000—4 100 米的山坡草丛及山谷草地。分布于西藏。

根：清热，凉血。

**长花滇紫草**

**Onosma hookeri** C. B. Clarke var. **longiflorum** (Duthie) Duthie——*O. longiflorum* Duthie

生于海拔 3 300—4 600 米的砾石山坡。分布于西藏。

根：甘、咸，寒。清热凉血，解毒透疹。用于风热咳喘，丹毒，肺痨咯血。

附　注：西藏地区以根代紫草入药。

**滇紫草**

**Onosma paniculatum** Bur. et Franch.——*O. paniculatum* Bur. et Franch. var. *hirsutistylum* Lingelsh.

生于海拔 1 500—3 100 米的山地干燥山坡。分布于西南。

根：（滇紫草）：甘、咸，寒。清热凉血，透疹解毒。用于斑疹痘毒。

附　注：云南地区以根代紫草入药。

## 车前紫草属　Sinojohnstonia Hu

**短蕊车前紫草**

**Sinojohnstonia moupinensis** (Franch.) W. T. Wáng——*Omphalodes moupinensis* Franch.

生于山地林下阴湿处或草地上。分布于山西、陕西、甘肃、宁夏、浙江、湖北、四川。

全草：清热凉血。外用于毒蛇咬伤。

附　注：我国特有属。

**车前紫草**

**Sinojohnstonia plantaginea** Hu

生于海拔900米左右的丘陵沟边草地。分布于甘肃南部、四川。

带根全草：清热利湿，散瘀止血。

## 紫筒草属 Stenosolenium Turcz.

**紫筒草**

**Stenosolenium saxatiles** (Pall.) Turcz.——*Anchusa saxatile* Pall.

生于平原、丘陵、低山的草地或田边。分布于华北及吉林、辽宁、陕西、甘肃、宁夏、山东、河南、四川。

全草(紫筒草)：苦，温。祛风除湿。用于关节痛。

## 盾果草属 Thyrocarpus Hance

**弯齿盾果草**

**Thyrocarpus glochidiatus** Maxim.

生于丘陵草坡、路边或田边。分布于辽宁、陕西、甘肃、江苏、安徽、江西、河南、广东、四川。

全草：清热解毒，消肿。

附　注：我国特有属。

**盾果草**

**Thyrocarpus sampsonii** Hance

生于海拔200—1 600米的丘陵草地及石山灌丛中。分布于华东、中南、西南及陕西。

全草：苦，凉。清热解毒，消肿。用于痈疖疔疮，痢疾，泄泻，咽喉痛；外用于乳疮，疔疮。

## 紫丹属 Tournefortia L.

**紫丹**

**Tournefortia montana** L.

生于山坡路旁。分布于广东、海南、广西、云南。

全株：用于风湿骨痛。

## 附地菜属 Trigonotis Stev.

**钝萼附地菜**

**Trigonotis amblyosepala** Nakai et Kitag.

生于低山山坡林缘或灌草丛中。分布于东北、华北及陕西、宁夏、山东、河南。

全草：清热，消炎，止痛，止痢。

**西南附地菜**

**Trigonotis cavaleriei** (Lévl.) Hand.-Mazz.——*Omphalodes cavaleriei* **Lévl.**

生于海拔 1 000—2 000 米的山地阴湿处。分布于四川、贵州、云南。

全草：清热解毒，凉血。

**狭叶附地菜**

**Trigonotis compressa** Johnston

生于沟边、荒坡。分布于四川南川。

全草：清热解毒，活血。

附　注：功效相同的有**多花附地菜 T. floribunda** Johnston，分布于四川；**秦岭附地菜 T. giraldii** Brand，分布于陕西、四川；**南川附地菜 T. laxa** Johnston，分布于江西、湖南、四川、贵州；**大叶附地菜 T. macrophylla** Vant.，分布于四川、贵州；**峨眉附地菜 T. omeiensis** Matsuda，分布于四川。

**毛脉附地菜**

**Trigonotis microcarpa** (A. DC.) Benth. ex C. B. Clarke——*Eritrichium microcarpum* A. DC.

生于海拔 1 400—2 400 米的山地草坡或杂草丛中。分布于西南及广西西部。

全草：清热，解毒，凉血。

**湖北附地菜**

**Trigonotis mollis** Hemsl.

生于海拔 800—1 600 米的路边或荒坡草丛中。分布于陕西东部、湖北西部。

全草：清热解毒，祛风除湿，止痢。

**附地菜**

**Trigonotis peduncularis** (Trev.) Benth. ex Baker —— *Myosotis peduncularis* Trev.

生于海拔 3 000 米以下的山坡草地、林缘、田埂及路旁。全国各地均有分布。

全草：甘、辛，温。温中健胃，消肿止痛，止血。用于手脚麻木，胸胁疼痛，遗尿，胃痛作酸，吐血；外用于跌打损伤，骨折。

## 158. 马鞭草科　Verbenaceae

### 海榄雌属　Avicennia L.

**海榄雌**　咸水矮让木(广东)，海榄钱(广西)，白骨浪(海南植物志)

**Avicennia marina** (Forsk.) Vierh.——*Sceura marina* Forsk.

生于海边和盐沼地带，通常是组成海岸红树林的植物种类之一。分布于福建、台湾、广东、海南、广西。

果实：用于痢疾。

## 紫珠属 Callicarpa L.

**木紫珠** 马踏皮(广西),白叶子树(云南),南洋紫珠(植物分类学报)

**Callicarpa arborea** Roxb.

生于海拔150—1 800米的向阳山坡及灌丛中。分布于广西、云南南部、西藏东南部。

根、叶:辛、苦,平。止血。用于外伤出血,消化道出血,崩漏。 茎皮:祛风。用于皮肤病。

**珍珠枫** 珍珠风(安徽、四川),爆竹紫(安徽),白棠子树(浙江),白木姜(贵州),紫珠(云南植物志)

**Callicarpa bodinieri** Lévl.——*C. seguini* Lévl.

生于海拔200—2 300米的林中、林缘、山坡路旁或溪边灌丛中。分布于江苏南部、安徽、浙江、江西、福建、河南南部、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

根、茎叶(珍珠枫):辛,平。活血通经,祛风除湿,收敛止血。用于月经不调,虚劳,带下病,产后血气痛,外伤出血,风寒感冒;外用于蛇咬伤,丹毒。

**柳叶紫珠**

**Callicarpa bodinieri** Lévl. var. **inteophylla** C. Y. Wu

生于海拔(500)—1 050—1 590米的林中或灌丛中。分布于四川、云南南部。

根、叶:活血通经,祛风除湿。

**南川紫珠** 斑鸠米(广西)

**Callicarpa bodinieri** Lévl. var. **rosthornii** (Diels) Rehd. —— *C. longifolia* Lam. var. *rosthornii* Diels

生于林下或灌丛中。分布于广西、四川、贵州。

叶:消肿,止血。用于疮疡,跌打损伤;外用于口腔破溃。

**短柄紫珠** 红米碎木(广西)

**Callicarpa brevipes** (Benth.) Hance —— *C. longifolia* Lamk. var. *brevipes* Benth.

生于海拔600—1 400米的山坡路旁、林下。分布于浙江南部、广东、广西。

根、叶:祛风除湿,化痰止咳。用于风湿关节痛,咳嗽痰喘。

**白毛紫珠**

**Callicarpa candicans** (Burm. f.) Hochr.——*Urtica candicans* Burm. f.; *C. cana* L.

生于平原、山坡、路旁或空旷荒芜处。分布于湖南、广东、海南。

叶:有毒。止血,散瘀。用于皮肤病。

**华紫珠** 止血草、创伤草(江苏),鱼显子(云南植物志)

**Callicarpa cathayana** H. T. Chang

生于海拔1 200米以下的山坡、谷地及丛林中。分布于中南及江苏、福建、安徽、浙江、江西、贵州、云南。

根、叶:苦、涩,凉。清热,凉血,止血。用于各种出血,痈疽肿毒。

**小叶鸦鹊饭**　紫球(北京),梅灯狗散(广西),小叶紫球(广西药用植物名录)

**Callicarpa dichotoma**(Lour.) K. Koch——*Porphyra dichotoma* Lour.

生于海拔600米以下的低山丘陵灌丛中。分布于华东、中南及河北、北京、贵州。

根、茎、叶(紫球):涩,凉。收敛止血,祛风除湿。用于吐血,咯血,衄血,便血,崩漏,创伤出血。

附　注:功效相同的有**杜虹花 C. formosana** Rolfe,分布于台湾。

**老鸦糊**　紫珠(陕西),米筛子(江西),尖叶蜘蛛(湖南),鱼胆(四川),鸡米树(贵州),小米团花(云南)

**Callicarpa giraldii** Hesse ex Rehd.——*C. giraldiana* Hesse; *C. bodinieri* Lévl. var. *giraldiana* (Hesse) Rehd. ex Li

生于海拔200—3 400米的疏林和灌丛中。分布于华东、中南及陕西南部、甘肃、四川、贵州、云南。

全株:苦、辛,凉。祛风除湿,散瘀解毒。用于风湿痛,跌打损伤,外伤出血,尿血。

**毛叶老鸦糊**　珍珠树、紫珠树(湖北)

**Callicarpa giraldii** Hesse ex Rehd. var. **lyi** (Lévl.) C. Y. Wu——*C. lyi* Levl.; *C. bodinieri* Lévl. var. *lyi* (Lévl.) Rehd.

生于海拔2 300米以下的林中或林缘。分布于中南及江苏南部、安徽、浙江、江西、四川、贵州、云南。

叶:用于内伤出血。　花或鲜叶:用于外伤出血。

**全缘叶紫珠**　月中风(广西)

**Callicarpa integerrima** Champ.

生于海拔200—700米的山坡或谷地林中。分布于浙江南部、江西、福建、湖南、广东、广西。

根、叶、果实:苦、涩,凉。清热,凉血,止血。用于风湿骨痛,各种出血。

**日本紫珠**

**Callicarpa japonica** Thunb.——*C. japonica* Thunb. f. *glabra* Péi

生于海拔220—1 000米的低阴湿山坡、谷地、溪边及灌丛中。分布于华东及辽宁、河北、湖北、湖南、四川东部、贵州。

根、叶、果实:苦、涩,凉。清热,凉血,止血,消炎。用于各种出血。

**窄叶紫珠**　止血草(湖北)

**Callicarpa japonica** Thunb. var. **angustata** Rehd.——*C. membranacea* H. T. Chang

生于海拔1 300米以下的山坡、溪旁林中或灌丛中。分布于中南及陕西(秦岭)、江苏、安徽、浙江、江西、四川东部、贵州。

叶:(止血草):辛、微苦,凉。散瘀止血,祛风止痛。用于吐血,咯血,衄血,便血,崩漏,创伤出血,痈疽肿毒,喉痹。

**枇杷叶紫珠**　黄紫珠(江西),山枇杷、野枇杷(中国高等植物图鉴)

**Callicarpa kochiana** Makino——*C. longiloba* Merr.; *C. loureiri* Hook. et Arn.

生于海拔100—850米的山坡或谷地溪旁林中和灌丛中。分布于华东及河南南部、湖

北、湖南、广东。

根、叶、果实：苦、涩，凉。清热，收敛，止血。用于咳嗽，头痛，外伤出血。

**广东紫珠**　小叶紫珠菜(湖南)，金刀菜(湖南药物志)

**Callicarpa kwangtungensis** Chun

生于海拔300—600(—1600)米的山坡林中或灌丛中。分布于浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南。

根、茎、叶：酸、涩，温。止痛止血。用于胸痛，吐血，偏头痛，胃痛，外伤出血。

**光叶紫珠**　绿英柴(安徽)

**Callicarpa lingii** Merr.

生于海拔300米左右的丘陵、山坡、谷地、溪边及郊野路边灌丛中。分布于安徽南部、浙江、江西。

根、叶、果实：苦、涩，凉。清热，凉血，止血。

**尖萼紫珠**

**Callicarpa lobo-apiculata** Metc.

生于海拔300—500米的山坡、谷地或溪旁林中。分布于湖南、广东、广西、贵州、云南。

叶：外用于体癣。

**长叶紫珠**　老哈眼(海南)

**Callicarpa longifolia** Lam.

生于海拔120—1 400米的山坡疏林中或沟边。分布于台湾、广东、海南、云南。

根：祛风除湿。　叶：止血。

**白毛长叶紫珠**　大枫木(广西)

**Callicarpa longifolia** Lam. var. **floccosa** Schauer

生于海拔1 000米左右的山坡灌丛中。分布于广西西北部、四川东南部、贵州东北部。

叶：用于风湿，头晕；外用于中耳炎。

**长柄紫珠**

**Callicarpa longipes** Dunn

生于海拔300—500米的山坡灌丛或疏林中。分布于安徽南部、江西、福建、广东。

叶：祛风除湿，止血。

**尖尾凤**　雪突、牛舌广(福建)，粘手凤、穿骨枫(广西)，大样尖尾凤(贵州)

**Callicarpa longissima** (Hemsl) Merr.——*C. longifolia* Lam. var. *longissima* Hemsl.

生于海拔1 200米以下的荒野、山坡、谷地丛林中。分布于江西、福建、台湾、广东、广西、四川。

全株：辛、微苦，温。散瘀止血，祛风止痛。用于咯血，呕血，产后风痛，四肢瘫痪，风湿痹痛，跌打损伤，外伤出血。

**大叶紫珠**　赶风紫、贼子叶(广东、广西)，白骨风(广西)，羊耳朵、止血草(云南)

**Callicarpa macrophylla** Vahl

生于海拔100—2 000米的疏林下和灌丛中。分布于福建、广东、广西、贵州、云南。

根、叶：辛、苦，平。散瘀止血，消肿止痛。用于暑痧热症，烦热口渴，消化道出血，咯血，衄血，跌打肿痛，外伤出血。

**裸花紫珠**　鸦鹊饭(广西)

**Callicarpa nudiflora** Hook. et Arn.

生于平地至海拔1 200米的山坡、谷地、溪旁林中或灌丛中。分布于广东、广西、贵州。

全株：辛、苦，平。散瘀消肿，止血止痛，消炎。用于风湿骨痛，跌打肿痛，内伤出血。

**钩毛紫珠**　红斑鸠米(广西)

**Callicarpa peichieniana** Chun et S. L. Chen——*Premna peii* Chun ex H. T. Chang

生于山坡林中、林缘或灌丛中。分布于湖南、广东、广西。

叶：用于感冒，外伤出血。

**藤紫珠**　三爪风(广西)

**Callicarpa peii** H. T. Chang——*C. formosana* Rolfe var. *chinensis* Péi

生于海拔250—1 500米的山坡林中、林缘、或谷地溪边。分布于江西、湖北西部、湖南、广东西北部、广西东部、四川东部。

全株：用于泄泻，感冒发热，风湿痛。

**长毛紫珠**

**Callicarpa pilosissima** Maxim.——*C. pilosissima* Maxim. var. *henryi* Yamamoto

生于海拔2 000—2 200米的山地或山坡林中。分布于台湾。

根、叶：苦，凉。截疟，消炎，清热，解毒，凉血，止血。

**红紫珠**　山霸王(广西)，空壳树(四川)，复生药、对节树(贵州)，小红米果(云南)，白金子风(湖南药物志)

**Callicarpa rubella** Lindl.

生于海拔150—1 900米的山坡、河谷的林中或灌丛中。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根、叶：辛、微苦，凉。清热，活血消肿，止血止痛。用于带下病，月经不调，痔疮出血，体癣，蛔虫病，疔疮，骨折。

**狭叶红紫珠**　节节风(广西)

**Callicarpa rubella** Lindl. f. **angustata** Péi

生于海拔700—3 500米的山坡林中或灌丛中。分布于广东、广西、四川、贵州、云南。

根、叶：用于小儿惊风，咳嗽，外伤出血，疟疾，漆疮。

附　注：四川用根浸酒，有调气活血之功效。

**钝齿红紫珠**　沙药草(广西)，冒勒巴(壮语)

**Callicarpa rubella** Lindl. f. **crenata** Péi

生于海拔100—1 650米的山坡、谷地、溪边的林中或灌丛中。分布于江西、福建、湖南、广东、广西、贵州、云南。

根、叶：清热，止血，消肿，止痛。用于肝炎，痢疾，外伤出血，跌打损伤。

**云南紫珠**

**Callicarpa yunnanensis** W. Z. Fang

生于海拔530—560米的江边疏林或沟谷林中。分布于云南南部。

叶：止血，散瘀。

## 莸属 Caryopteris Bunge

**金腺莸** 跌打接骨菜(广西)，八瓜金(贵州)

**Caryopteris aureoglandulosa** (Vant.) C. Y. Wu——*Ocimum aureoglandulosum* Vant.

生于海拔550—750米的草坡、林缘及灌丛中。分布于广西、四川南部、贵州、云南西南部。

叶：外用于骨折。

**叉枝莸**

**Caryopteris divaricata**(Sieb. et Zucc.)Maxim.——*Clerodendron divaricatum* Sieb. et Zucc.

生于海拔660—2 900米的山坡草地或疏林中。分布于山西、陕西、甘肃、江西、河南、湖北、四川、云南。

全株：消炎，止痛，止血。用于感冒，出血，风湿关节痛；外用于痈疮肿毒。

**灰毛莸** 兰香草(贵州)，白叶莸(中国高等植物图鉴)

**Caryopteris forrestii** Diels

生于海拔1 700—3 000米的阳性灌丛、山坡、路旁及荒地上。分布于西南。

根、叶：疏风，止咳，祛湿，行气。

**小叶灰毛莸**

**Caryopteris forrestii** Diels var. **minor** Péi et S. L. Chen et C. Y. Wu

生于海拔2 000—3 950米的干热河谷、高山干旱草坡或灌丛中。分布于四川西南部、云南西北部、西藏东南部。

花：辛、苦，温。用于心脏病。

**兰香草** 山薄荷(江西、广东)，石黄精(湖南)，婆绒花(广东)

**Caryopteris incana** (Thunb.) Miq.——*Nepeta incana* Thunb.

多生于较干旱的山坡、路旁或林缘。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

全草(兰香草)：辛，温。疏风解表，祛痰止咳，散瘀止痛。用于上呼吸道感染，顿咳，咳嗽痰喘，风湿关节痛，跌打肿痛，产后瘀血腹痛，毒蛇咬伤，湿疹，皮肤瘙痒。

**蒙古莸** 白沙蒿(陕西)，山狼毒(宁夏)，苏尔吉尔(蒙语)

**Caryopteris mongholica** Bunge

生于海拔1 100—1 250米的干旱坡地、沙丘荒野及干旱碱质土壤上。分布于华北及陕西、甘肃、宁夏、青海。

全株(蒙古莸)：甘，寒。消食理气，祛风湿，活血止痛。用于消化不良，腹胀，风湿疼

痛，小便赤涩，脚气湿痒，虚肿；外用于肿毒。

**荻**　野芫草、半枝莲(浙江)

**Caryopteris nepetaefolia** (Benth.) Maxim.——*Teucrium nepetaefolia* Benth.

生于阴湿山坡、林缘或平原路旁、水沟边。分布于江苏、安徽、浙江、福建、河南。

全株(荆芥叶荻)：甘，凉。祛暑解表，利尿解毒。用于中暑，感冒，淋证，带下病，外伤出血。

**锥花荻**　紫红鞭(贵州)

**Caryopteris paniculata** C. B. Clarke

生于海拔650—2 300米的山坡、路旁、疏林或杂木林中。分布于广西、四川、贵州西部、云南。

**根、叶**：解热，止血，利湿。用于面赤目红，发热口渴，痢疾，吐血，下血。

**光果荻**　山薄荷、老鼠精(湖北)

**Caryopteris tangutica** Maxim.

生于海拔1 000—2 500米的干燥草坡、路旁。分布于河北、陕西、甘肃、青海、河南、湖北、四川。

全株：苦、微辛，平。调经活血，祛风湿。用于膝关节痛。月经不调，创伤出血。

**三花荻**　野荆芥、黄刺泡(陕西)，金谷草、毛老虎(湖北)，风寒草、蜂子草、金线草(四川)，兰香草(贵州)

**Caryopteris terniflora** Maxim.

生于海拔300—2 600米的山坡、路边灌丛及草地。分布于中南及河北、山西、陕西、甘肃、新疆、山东、安徽、浙江、江西、湖北、广西、四川、贵州、云南。

**全株**：苦、辛，平。清热解毒，祛风除湿，消肿止痛。用于外感风湿，咳嗽，烫伤，产后腹痛；外用于刀伤，烧、烫伤，瘰疬，痈疽，毒蛇咬伤。

## 大青属　Clerodendrum L.

**臭牡丹**　臭八宝(河北)，臭梧桐(江西)，矮桐子(四川)

**Clerodendrum bungei** Steud.

生于海拔2 500米以下的山坡、林缘、沟谷、路旁、灌丛润湿处。分布于华北、西北、华东、西南及湖北、湖南、广西。

根、叶(臭牡丹)：苦、辛，平。祛风除湿，解表散瘀。用于风湿关节痛，跌打损伤，高血压症，头晕头痛。

**灰毛大青**　六灯笼(广东)，狮子球、人瘦木(广西)，毛赪桐(中国高等植物图鉴)

**Clerodendrum canescens** Wall.

生于海拔220—880米的山坡路边或疏林中。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全株：淡，凉。养阴清热，宣肺祛痰，镇痛退热，凉血止痛。用于感冒高热，肺痨，痢疾，带下病，风湿痛，痛经；外用于乳疮。

**腺茉莉**　过墙风(广西)，臭牡丹(云南)

**Clerodendrum colebrookianum** Walp.

生于海拔500—2 000米的山坡疏林、灌丛或路边。分布于广东、广西、云南、西藏。

根：用于风湿关节痛，咳嗽。

**大青**　山靛青(江苏、浙江)，木大青、臭婆根(福建)，山漆(台湾)，土常山、大青木(湖北)，臭叶树(湖南)，鬼点灯(广西)，臭尿青(贵州)

**Clerodendrum cyrtophyllum** Turcz.

生于海拔1 700米以下的平原、丘陵、山地林下或溪谷旁。分布于华东、中南、西南。

根(大青木)：苦，寒。清热利湿，凉血解毒。用于感冒头痛，麻疹并发咳喘，疟腮，乳蛾，传染性肝炎，痢疾，淋证。　叶(大青叶)：苦，寒。清热凉血，解毒。用于流行性乙型脑炎，流行性感冒，疟腮，风热咳喘，急性肝炎，热病发斑，丹毒，疔疮肿毒，蛇咬伤。

**广西大青**　地骨皮(广西)

**Clerodendrum cyrtophyllum** Turcz. var. **kwangsiense** S. L. Chen et T. D. Zhuang

生于山坡灌丛中。分布于广西。

根皮：用于骨蒸，劳热。

附　注：广西特有药用植物。

**白花灯笼**　红花大青(福建)，鬼灯笼(广东)，苦灯笼、鬼把火(广西)

**Clerodendrum fortunatum** L.

生于海拔1 000米以下的丘陵、山坡、路边、村旁和旷野。分布于江西、福建、湖南、广东、海南、广西。

全株：微苦，凉。清热解毒，止咳定痛。用于感冒发热，咽喉痛，咳嗽痰喘，肺痨潮热，胃痛，疝痛，跌打损伤，疔疮痈肿。

**海南赪桐**

**Clerodendrum hainanense** Hand.-Mazz.

生于海拔150—900米的山坡林下、沟谷阴湿处。分布于海南、广西。

全株：用于肺痨。

**南垂茉莉**　都劳九(贵州)，哈沙皮虎(傣语)

**Clerodendrum henryi** Péi

生于海拔680—1 200米的沟谷密林湿润处或低山林下。分布于云南南部。

根、叶：用于痢疾。

附　注：傣族以根入药，有健脾，开胃之功效。

**长管大青**　长管假茉莉(云南植物志)

**Clerodendrum indicum** (L.) O. Kuntze——*Siphonanthus indica* L.

生于海拔400—1 000米的向阳山坡、路边草丛中。分布于广东、云南。

全株：苦，凉。消炎利尿，活血消肿，祛风湿。用于小便涩痛，膀胱湿热，跌打损伤，风湿骨痛。

附　注：傣医用于疟疾。

**苦郎树**　海常山、见水生(广西)，苦蓝盘(中国树木分类学)，许树(海南植物志)

**Clerodendrum inerme** (L.) Gaertn.——*Volkameria inermis* L.

生于海岸沙滩及池塘、沟边等湿地，常见于沿海潮汐能至的地方。分布于福建、台湾、广东、海南、广西。

根、叶：苦，寒。有毒。清热解毒，散瘀除湿，舒筋活络。用于风湿骨痛，跌打损伤，腰腿痛，疟疾，湿疹，疥癣。

**赪桐**　朱桐(福建)，大叶红花倒水莲(湖南)，贞桐花、状元红、荷包花(广东)

**Clerodendrum japonicum** (Thunb.) Sweet——*Volkameria japonica* Thunb.; *C. japonicum* (Thunb.) Sweet var. *album* Péi

生于平原或海拔100—1 600米的山谷、溪边、疏林中或栽培于庭园。分布于中南及江苏、浙江、江西、福建、台湾、四川、贵州、云南。

根、叶(赪桐)：微甘、淡，凉。祛风利湿，散瘀消肿，解毒排脓。用于风湿骨痛，腰肌劳损，跌打损伤。

**广东大青**　红花鬼灯笼(广西)，广东臭茉莉(云南植物志)

**Clerodendrum kwangtungense** Hand.-Mazz.

生于海拔600—1 340米的林中、林缘或山坡沟边。分布于浙江、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根：清热利湿。用于咳嗽，风湿痛，腿脚乏力。

**尖齿臭茉莉**　鬼点火(江西)，过墙风(广西)，臭茉莉(中国树木分类学)

**Clerodendrum lindleyi** Decne. ex Planch.

生于海拔2 800米以下的山坡、沟边、杂木林或路旁。分布于江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全株：苦、辛，平。清热解毒，祛风除湿，消肿止痛。用于风湿痛，中耳炎，跌打损伤。

**黄腺大青**

**Clerodendrum luteopunctatum** Péi et S. L. Chen

生于海拔625—1 150米的山坡路旁或灌丛中。分布于湖北、湖南、四川、贵州。

根：祛风湿。

**海通**　臭梧桐(江西)，桐木树、朴瓜根、线桐树、鞋头树(湖南)，白灯笼、木常山、水通木(广西)，铁枪桐(贵州)，小花泡桐、牡丹树、泡桐树(云南)

**Clerodendrum mandarinorum** Diels

生于海拔250—2 200米的溪边、路旁或丛林中。分布于江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根、枝、叶：清热解毒，祛风利水。用于水肿，小儿麻痹症，中风。

**重瓣臭茉莉**　臭朱桐(福建)，走马风(广西)，臭梧桐(贵州)，大髻婆(云南植物志)

**Clerodendrum philippinum** Schauer——*C. fragrans* Hort. ex Vent.

生于海拔1 000—1 500米的溪边、林下或栽培观赏。分布于福建、台湾、浙江、江西、河南、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根、叶(臭茉莉)：苦，平。祛风利湿，化痰止咳，活血消肿。　根：用于风湿关节痛，脚气水肿，带下病，咳嗽痰喘。　叶：外用于湿疹，皮肤瘙痒。

**臭茉莉**　白花臭牡丹(云南)，朋必(壮语)，兵叫(傣语)

**Clerodendrum philippinum** Schauer var. **simplex** Moldenke

生于海拔650—1 500米的林中或溪边。分布于广西、贵州、云南。

根或全株：苦，平。驱风活血，解毒消肿。用于风湿关节痛，脚气水肿，皮肤瘙痒。

**附　注**：傣族民间以根入药，用于食物中毒，火眼。

**三对节**　　三多(广西)，三百棒(贵州)

**Clerodendrum serratum** (L.) Moon——*Volkameria serratum* L.

生于海拔210—1 800米的山坡疏林和谷地沟边灌丛中。分布于广西、贵州、云南、西藏。

根、叶或全株(三对节)：苦、辛，凉。有小毒。清热解毒，截疟，接骨，祛风除湿。用于乳蛾，咽喉痛，风湿骨痛，疟疾，肝炎；外用于痈疖肿痛，骨折，跌打损伤。

附　注：功效相同的有**三台花 C. serratum** (L.) Moon var. **amplexifolium** Moldenke，分布于广西、贵州、云南。本品对恶性疟疾有较好的疗效。

**草本三对节**

**Clerodendrum serratum** (L.) Moon var. **herbaceum** (Roxb.) C. Y. Wu——*Volkameria herbaceum* Roxb.

生于海拔400—1 450米的山坡路旁灌丛或次生灌丛中。分布于广西、贵州、云南。

根、叶：用于疟疾，肝炎，风湿痛，骨折，痢疾；外用于疮疡肿毒，蜈蚣咬伤。

**龙吐珠**　　白萼赪桐(海南植物志)

**Clerodendrum thomsonae** Balf.

原产西非。我国南部各地庭园或温室栽培。

全株：用于跌打损伤，慢性中耳炎。

**海州常山**　　香椒(山东)，臭梧、追骨风(江苏)，后庭花(江苏、福建)，泡火桐(四川)，泡花桐(中国树木分类学)

**Clerodendrum trichotomum** Thunb.——*Clerodendron trichotomum* Thunb. var. *fargesii* (Dode) Rehd.

生于海拔2 400米以下的山坡灌丛中。分布于华北、华东、中南、西南及辽宁、陕西、甘肃。

根(臭梧桐根)、叶(臭梧桐叶)：苦、甘，平。祛风除湿，降血压。用于风湿关节痛，高血压症，疟疾，痢疾。　带宿萼花或幼果(臭梧桐花)：祛风湿，平喘。

附　注：《上海中药炮制规范》1977年版收载。

**滇常山**

**Clerodendrum yunnanense** Hu ex Hand.-Mazz.

生于海拔2 000—3 000米的山坡疏林或山谷沟边、灌丛湿润处。分布于四川西南部、云南东南部至西部。

根、叶(滇常山)：辛，温。祛风止痛，降血压。用于风湿关节痛，腰腿痛，高血压症；外用于痔疮，脱肛。

## 假连翘属　Duranta L.

**假连翘**　　番仔刺、花墙刺(福建)，莲荞(广东)，篱笆树(中国高等植物图鉴)

**Duranta repens** L.

原产美洲热带，我国南部省区常见栽培。或逸为野生。

叶、果实(假连翘)：甘、微辛，温。有小毒。散热透邪，行血祛瘀，止痛杀虫，消肿解毒。用于疟疾，痈毒初起，脚底深部脓肿。

根：止痛，止渴。

## 石梓属 Gmelina L.

**亚洲石梓** 蛇头花、假石榴(广西)

**Gmelina asiatica** L.——*G. asiatica* L. var. *typica* Lam et Bakh.

生于山坡灌丛中。分布于广东、广西南部。

根：用于风湿痛。

**石梓**

**Gmelina chinensis** Benth.

生于海拔 500—1 200 米的山坡林中。分布于福建、广东、广西、贵州。

根(石梓)：甘、微辛、苦，微温。有小毒。活血祛瘀，祛湿止痛。用于风湿痛，经闭。

**小叶石梓**

**Gmelina delavayana** P. Dop——*G. montana* W. W. Smith

生于山坡林中。分布于四川西南部、云南西北部。

根：辛，温。健胃消食，理气镇痛，化痞截疟。用于食欲不振，食积腹胀，胃痛，久疟。

## 马缨丹属 Lantana L.

**马缨丹** 五色梅(华北)，五彩花(福建)，臭草、如意草(福建、广东、广西)，臭根花(广西)

**Lantana camara** L.

原产美洲热带。我国各地庭园常栽培供观赏，或逸生于海拔 80—1 500 米的海边沙滩及空旷地。

根或全株(五色梅)：淡，凉。清热解毒，散结止痛。用于感冒高热，久热不退，瘰疬，风湿骨痛，胃痛，跌打损伤。 花：辛、苦、甘，凉。清热解毒，止血消肿。用于湿疹，吐泻，肺痨咯血。

## 过江藤属 Phyla Lour.

**过江藤** 野千年锤(湖南)，苦舌草(海南)，大二郎箭、虾子草、水黄芹、过江龙(四川)，水马齿苋、鸭脚板、铜锤草(云南)

**Phyla nodiflora** (L.) Greene ——*Verbena nodiflora* L.; *Lippia nodiflora*(L.) Rich.

生于海拔 300—1 880(—2 300) 米的山坡、平地、河滩等湿润处。分布于西南及江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西。

全草(过江藤)：微苦、辛，平。清热解毒，散瘀消肿。用于痢疾，乳蛾，跌打损伤；外用于痈疽疔毒，缠腰火丹，慢性湿疹。

## 豆腐柴属　Premna L.

**尖齿豆腐柴**　　尖叶臭黄荆(中国高等植物图鉴)

**Premna acutata** W. W. Smith

生于海拔 1 700—3 000 米的向阳山坡、灌木林边。分布于四川西南部、云南西北部。

全株：苦、酸，寒。清肝，明目。

**滇桂豆腐柴**　　太阳木(广西)

**Premna confinis** Péi et S. L. Chen ex C. Y. Wu

生于海拔 600 米左右的杂木林中。分布于广西西部、云南东南部。

叶：外用于跌打损伤，风湿关节痛。

**石山豆腐柴**　　黄皮树(云南)

**Premna crassa** Hand.-Mazz.

生于海拔 500—1 600 米的石山杂木林中。分布于广西西部、贵州西南部、云南东南部。

全株：用于风湿骨痛。　叶：用于拔脓。

**黄毛豆腐柴**　　战骨(广西)，斑鸠占(贵州)

**Premna fulva** Craib——*P. longipila* Péi

生于海拔 500—1 200 米的阴湿处常绿阔叶林或路边疏林中。分布于广西西南部、贵州南部、云南东南部和南部。

根、叶：清湿热，调经，解毒。用于月经不调，风湿关节痛，水肿，无名肿毒。　叶：用于接骨。

**臭黄荆**　　斑鹊子、斑鸠站、臭豆腐干(四川)

**Premna ligustroides** Hemsl.

生于海拔 500—1 000 米的山坡林中或林缘。分布于江西、湖北、广西、四川、贵州、云南。

根、叶(臭黄荆)：苦，凉。清热利湿，解毒消肿。用于痢疾，疟疾，风热头痛，肾炎水肿，痔疮、脱肛。　叶：外用于疮疡肿毒。　种子：除风止痛。用于头痛。

**豆腐柴**　　止血草(江苏)，草冻柴(福建)，豆腐草、观音草(安徽)，臭黄荆、观音柴(浙江)，小青(湖北)，铁箍散、臭常山(湖南)

**Premna microphylla** Turcz.——*P. microphylla* Turcz. var. *glabra* Nakai

生于山坡林下或林缘。分布于华东、中南及四川、贵州。

根、叶(腐婢)：苦、涩，寒。清热解毒，消肿止痛，收敛止血。用于痢疾，肠痈，雷公藤中毒；外用于烧、烫伤，瘰疬，痈肿疮疖，毒蛇咬伤，外伤出血。

**狐臭柴**　　木臭牡丹、土常山(湖北)，跌打王(广西)，水白腊(四川)，长柄臭黄荆 (中国高等植物图鉴)

**Premna puberula** Pamp.——*P. subcordata* Nakai

生于海拔 700—1 800 米的山坡路边丛林中。分布于陕西、甘肃、福建，湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根、叶：辛、微甘，平。清热利湿，调经解毒。用于月经不调，风湿关节痛，水肿。茎皮：用于牙痛。

**毛狐臭柴**　臭叶草(广西)

**Premna puberula** Pamp. var. **bodinieri** (Lévl.) C. Y. Wu et S. Y. Pao——*P. bodinieri* Lévl.

生于海拔 700—1 760 米的石灰岩山麓灌丛中。分布于广西西部、贵州、云南东南部。

全株：用于咳嗽，水肿，崩漏，月经不调；外用于角膜白斑，疮疥。

**塘虱角**　大蛇药、牛尾鸟(广东)

**Premna sunyiensis** Péi

生于山地、山坡林缘。分布于广东、广西。

全株：消积杀虫。用于痈疮肿毒。

附　注：全株可作兽药，消肿止痛，消积杀虫。

**思茅豆腐柴**　类梧桐、戳皮树(云南)，接骨树(中国高等植物图鉴)

**Premna szemaoensis** Péi

生于海拔 500—1 500 米的较干燥疏林中。分布于云南。

根皮、茎：甘、涩，寒。止血，镇痛，消炎。用于外伤出血，跌打，骨折，筋骨疼痛。

附　注：云南特有药用植物。

**麻叶豆腐柴**　筋骨散(云南)

**Premna urticifolia** Rehd.

生于海拔 1 500 米以下疏林中。分布于云南。

根：苦、辛，温。祛风湿，强筋骨，止痛。用于风湿关节痛，筋骨痛，胃痛。

## 千解草属　Pygmaeopremna Merr.

**千解草**　土巴戟(广西)，细三对节、细八棱麻、小常山(云南)，草臭黄荆(海南植物志)

**Pygmaeopremna herbacea** (Roxb.) Moldenke——*Premna herbacea* Roxb.

生于海拔 200—1 670 米的灌丛及路旁，常为火烧地的特有种。分布于广西、海南、云南西部。

根：祛风除湿，散寒止痛，健脾消食。用于风湿，胃脘痛，疮疡肿毒，跌打损伤，消化不良。

## 四棱草属　Schnabelia Hand.-Mazz.

**四棱草**　西方草(广西)，四棱筋骨草(四川、云南)，蔑奄郎(壮语)，假马鞭草(中国植物志)，筋骨草(中国药用植物志)

**Schnabelia oligophylla** Hand.-Mazz.

生于海拔约700米的山谷溪旁、石灰岩上、河边林下、疏林中。分布于江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

全草(四棱筋骨草)：辛、苦，温。活血通经，祛风逐湿，行气活络，散瘀止痛。用于经闭，感冒，风湿痹痛，四肢麻木，跌打损伤，骨节肿痛，烧、烫伤，痈疮肿毒。

附　注：①功效相同的有**四齿四棱草 S. tetrodonta** (Sun) C. Y. Wu et C. Chen——*Chienodoxa tetrodonta* Sun，分布于湖北、四川中部、贵州北部。②我国特有属。

## 假马鞭草属　Stachytarpheta Vahl

**假马鞭**　倒团蛇、大蓝草(广东)，玉龙鞭(广东、广西)，假败酱(种子植物名录)

**Stachytarpheta jamaicensis** (L.) Vahl——*Verbena jamaicensis* L.

生于海拔300—580米的山谷阴湿处草丛中。分布于福建、广东、海南、广西、云南南部。

全草(玉龙鞭)：微苦，寒。清热解毒，利水通淋。用于淋证，风湿筋骨痛，咽喉痛，目赤红肿；外用于痈疖肿毒。

## 柚木属　Tectona L. f.

**柚木**　脂树、紫油木(云南)

**Tectona grandis** L. f.

原产亚洲热带地区。生于海拔900米以下的潮湿疏林中。栽培于福建、台湾、广东、广西、云南。

花、种子：用于小便不利。　茎、叶：用于呕吐，过敏性皮炎。

## 马鞭草属　Verbena L.

**马鞭草**　铁马鞭(华东)，蜻蜓草(福建、浙江)，马鞭子(云南)，马鞭稍(滇南本草、四川)，牙项燕(傣语)

**Verbena officinalis** L.

生于路边、山坡、溪边、林缘及村边荒地。除东北和内蒙古外，全国各地均有分布。

全草(马鞭草)：苦，凉。活血散瘀，截疟，解毒，利水消肿。用于癥瘕积聚，经闭痛经，疟疾喉痹，痈肿，水肿，热淋。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

## 牡荆属　Vitex L.

**灰毛牡荆**　灰牡荆(海南)，灰布荆(云南)

**Vitex canescens** Kurz.——*V. kweichowensis* Péi

生于海拔 200—1 550 米的山坡、旷野混交林中。分布于西南及江西、湖北、湖南、广东、海南、广西。

根：用于外感风寒，疟疾，蛲虫病。　果实：用于胃痛。

**黄荆**

**Vitex negundo** L.

生于山地、丘陵、平原、林缘。分布于华东、中南、西南及辽宁、陕西、甘肃、四川、贵州。

根、茎、叶：苦，平。清热止咳，化痰截疟。用于咳嗽痰喘，疟疾，肝炎。　果实（黄荆子）：辛、苦，温。祛风，除痰，行气，止痛。用于感冒，咳嗽，哮喘，风痹，疟疾，胃痛，疝气，痔疮。

**白毛黄荆**　白叶黄荆（云南植物志）

**Vitex negundo** L. f. **alba** Péi

生于海拔 1 200—2 500 米的溪边、山坡或灌丛中。分布于四川、云南。

种子：镇痛，镇静，消炎，祛痰，止咳。

**牡荆**

**Vitex negundo** L. var. **cannabifolia** (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz.——*V. cannabifolia* Sieb.et Zucc.

生于山坡路边灌丛中。分布于华东、中南及河北、山西、甘肃、四川、贵州、云南。

全株：辛、微苦，温。祛风化痰，下气，止痛。用于咳嗽哮喘，中暑发痧，胃痛、疝气，带下病，风湿关节痛。　叶油（牡荆油）：祛痰，止咳平喘。用于咳嗽痰喘。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**荆条**

**Vitex negundo** L. var. **heterophylla** (Franch.)Rehd.——*V. incisa* Lam. var. *heterophylla* Franch.; *V. chinensis* Mill.

生于山坡、林缘及路边灌丛中。分布于华北，华东及辽宁、陕西、甘肃、宁夏、河南、湖南、四川、贵州。

全株：苦，温。清热止咳，化湿截疟。　果实：祛风，祛痰，镇痛。　叶：解表，止疟，消暑。用于咳嗽痰喘。　根：祛风湿，利关节，驱虫。

**疏序黄荆**

**Vitex negundo** L. f. **laxipaniculata** Péi

生于海拔 450—1 400 米的河边密林或山坡灌丛中。分布于四川、云南。

叶、种子：消炎镇痛，镇静，祛痰，止咳。

**小叶荆**

**Vitex negundo** L. var. **microphylla** Hand.-Mazz.——*V. microphylla* (Hand.-Mazz.) Péi ex C. Y. Wu

生于海拔 1 200—3 200 米的河边灌丛中。分布于四川、云南、西藏东南部。

全株：苦、辛，温。散寒，止咳，行气止痛。　果实：用于寒咳，哮喘，胃痛。　根：用于外感风寒，疟疾。　枝、叶：用于风寒泄泻，皮肤瘙痒。

**长序荆**

**Vitex peduncularis** Wall.

生于海拔 560—1 200 米的混交林中。分布于云南南部。

叶、果实：用于眼疾。

**山牡荆**　莺歌(海南)，梅哈忍(傣语)

**Vitex quinata** (Lour.) Will.——*Cornutia quinata* Lour.

生于海拔 180—1 200 米的沟边、溪边和山坡林中。分布于福建、台湾、浙江、江西、湖北、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南。

根皮：苦、辛，平。宣肺排脓，止咳定喘，镇静退热。用于咳嗽痰喘，气促，小儿发热烦躁不安。叶：苦、辛，凉。清热解表，凉血。

**微毛布惊**　走胆药(云南)

**Vitex quinata** (Lour.) Will. var. **puberula** (Lam.) Moldenke *V. heterophylla* Roxb. var. *puberula* Lam.

生于海拔 650—1 700 米的山坡疏林或山谷路旁。分布于广西、四川、贵州、云南。

根、茎髓：止咳，定喘，镇静，退热。

**蔓荆**　白叶、水稔子(广东)，三叶蔓荆(云南)，官底、碗底(傣语)

**Vitex trifolia** L.

生于平原、河滩、疏林及村寨附近。分布于福建、台湾、广东、广西、海南。

根(牡荆根)：苦、辛，温。用于感冒，头痛，疟疾，风湿关节痛。茎(牡荆茎)：用于感冒，风湿，喉痹，疮肿，牙痛。茎汁(牡荆沥)：甘，平。除风热，化痰涎，通经络，行气血。用于中风口噤，痰热惊痫，头晕目眩，喉痹，热痢，火眼。果实(蔓荆子)：辛、苦，微寒。疏散风热，清利头目。用于风热感冒头痛，齿龈肿痛，目赤多泪，目暗不明，头晕目眩。

附　注：① 功效相同的有**单叶牡荆 Vitex trifolia** L. var. **simplicifolia** Cham.，分布于辽宁、河北、山东、江苏、安徽、江西、福建、台湾、广东、云南。② 均为《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**异叶蔓荆**

**Vitex trifolia** L. var. **subtrisecta** (O. Kuntze) Moldenke——*V. ovata* Thunb. var. *subtrisecta* O. Kuntze

生于海拔 300—1 700 米的山地路旁或林中。分布于广东、广西、云南南部。

叶：用于跌打损伤。　果实(蔓荆子)：见蔓荆子。

## 159. 水马齿科　Callitrichaceae

### 水马齿属　Callitriche L.

**沼生水马齿**

**Callitriche pulustris** L.

生于溪流、沼泽、水田沟旁及林中湿地。分布于东北、华东至西南各地。

全草：清热，解毒，利湿消肿。用于目赤肿痛，水肿，小便淋痛；外用于烧伤。

# 160. 唇形科 Labiatae

## 藿香属 Agastache Clayt.

**藿香** 土藿香(通称),兜娄婆香(北方通称),拉拉香(辽宁),野(叶)藿香(浙江、四川、贵州),排草香(中国药用植物志)

**Agastache rugosa** (Fisch. et Mev.) O. Kuntze——*Lophanthus rugosus* Fisch. et Mey.

生于山坡林缘、灌丛中,也常见栽培。全国各地广泛分布。

地上部分(北藿香): 辛,微温。祛暑解表,化湿和中,理气开胃。用于暑湿感冒,胸闷,腹痛吐泻,不思饮食,疟疾,痢疾;外用于手足癣。

## 筋骨草属 Ajuga L.

**九味一枝蒿** 地胆草、赛西林、止痢蒿(云南)

**Ajuga bracteosa** Wall. ex Benth

生于海拔 1 500—1 900 米的开阔山坡中疏矮草丛及略肥沃的土壤上。分布于四川、贵州、云南。

根: 止血,消炎。

**鸡花筋骨草** 止痢蒿(云南)

**Ajuga camphylantha** Diels

生于海拔 2 800—3 500 米的高山灌丛、杜鹃灌丛中、松林下及放牧草地上。分布于云南西北部。

全草(止痢蒿): 用于痢疾。

附 注: 云南特有药用植物。

**康定筋骨草**

**Ajuga campylanthoides** C. Y. Wu et C. Chen

生于海拔 2 200—2 800 米的山坡或疏林草地。分布于四川西南部和西部、云南、西藏东南部。

全草: 清热解毒,止血。用于肺热咯血,痢疾。

**筋骨草** 缘毛筋骨草(全国中草药汇编)

**Ajuga ciliata** Bunge

生于海拔 340—2 000 米的山谷溪旁、阴湿草地、林下湿润处及路旁草丛中。分布于河北、北京、山西、陕西、甘肃、宁夏、山东、浙江、河南、湖北、四川、贵州。

全草: 苦,寒。清热,凉血,消肿。用于肺热咯血,咽喉痛,乳蛾及跌打损伤。

附 注: 功效基本相同的有**微毛筋骨草 A. ciliata** Bunge var. **glabrescens** Hemsl., 分布于陕西、甘肃、湖北、四川;**长毛筋骨草 A. ciliata** Bunge var. **hirta** C. Y. Wu et C Chen, 分布于四川。

**金疮小草** 筋骨草(江苏、安徽、浙江、广东、广西、云南),散血草(中国药用植物

志),紫背金盘(植物名实图考),白毛夏枯草(本草纲目拾遗),青鱼胆草(中国高等植物图鉴)

**Ajuga decumbens** Thunb.

生于海拔 360—1 400 米的溪边、路旁、湿润草丛中。分布于中南及甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、四川、贵州、云南。

全草(筋骨草):苦、甘,寒。清热解毒,止咳祛痰,活络止痛,舒筋活血。用于咳嗽痰喘,咽喉痛,乳蛾,关节疼痛,外伤出血。

**痢止蒿** 止痢蒿(四川、云南),白龙须、无名草、散血草(云南),痢止草(全国中草药汇编)

**Ajuga forrestii** Diels

生于海拔 1700—3 200(—4 000) 米的开阔路旁、溪边等潮湿的草地、矮草丛中,常成片生长。分布于西南。

全草或根:苦,寒。清热消炎,利尿通淋,散瘀镇痛,止痢,驱虫。用于痢疾,水肿,咽喉痛,肺热咳嗽,蛔虫病,跌打损伤,脱疽,乳痈。

附 注:云南(主要是昆明)常与紫背金盘 *A. nipponensis* Makino 混用。

**线叶筋骨草**

**Ajuga linearifolia** Pamp.

生于海拔 700—900 米的山地干草坡及沟边。分布于辽宁、河北、山西、陕西、山东、湖北。

全草:用于感冒头痛 。

**细枝筋骨草** 裂叶筋骨草、毛盖缘(贵州)

**Ajuga lobata** D. Don

生于海拔 1 500—3 000 米的密林下。分布于贵州、云南西北部、西藏东南部。

根:祛风,利尿,止血。全草:祛风除湿,祛瘀止血,通利血脉,生肌接骨。果实:舒筋理气,活血止痛,除烦利尿。 种子:用于五劳七伤。

**白苞筋骨草** 甜格缩缩草(山西),大苞筋骨草(北京),忽布筋骨草(青藏高原药物图鉴),白毛夏枯草(西藏常用中草药),生斗尕尔摸、森地(藏语)

**Ajuga lupulina** Maxim.

生于海拔(1 300—)1 900—3 200(—3 500)米的河滩沙地、高山草地或陡坡石缝中。分布于河北、山西、甘肃、青海、四川、云南、西藏。

全草:苦,寒。清热解毒,活血消肿。用于急性热病,感冒发热,咽喉痛,咳嗽,吐血,高血压症,面瘫,梅毒,炭疽,跌打肿痛。

附 注:本种在西藏作筋骨草入药。

**齿苞筋骨草** 森地尕摸(藏语)

**Ajuga lupulina** Maxim. var. **major** Diels

生于海拔 2 800—3 500(—4 200)米的高山林缘、草地或村边草坡处。分布于四川西部和西南部、云南西北部。

全草:云南藏医用于急性热病,流脑。

**大籽筋骨草** 散血草(贵州)

**Ajuga macrosperma** Wall. ex Benth.

生于海拔350—1 750(—2 600)米的林下阴湿处、水沟边及路边草丛中。分布于台湾、广东、广西、贵州、云南。

全草：散血。

附　注：功效相同的有**无毛大籽筋骨草 A. macrosperma** Wall. ex Benth. **var. thomsonii** (Maxim.) Hook. f.，分布于云南西北部。

**多花筋骨草**

**Ajuga multiflora** Bunge

生于开阔的山坡疏草丛、河边草地及灌丛中。分布于东北、华北及山东、江苏、安徽、湖北。

全草：用于跌打损伤。

附　注：①本种与紫背金盘混用。②朝鲜用作利尿药。

**紫背金盘**　白头翁(浙江、江西)，苦地胆(广东、广西)，散瘀草(云南)，筋骨草、白毛夏枯草(中国药用植物图鉴)

**Ajuga nipponensis** Makino

生于海拔100—2 300米的田边、矮草地湿润处、林内及向阳坡地。分布于陕西、安徽、江西、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

全草：苦，寒。消炎，凉血，接骨。用于脓疮，风热咳喘，乳蛾，咳嗽痰喘，痄腮，急性胆囊炎，肝炎，痢疾，梅毒，痔疮，肿瘤，鼻衄，牙痛，目赤肿痛，便血，蛋白尿，血瘀肿痛，产后瘀血，妇女血气痛及小儿斑秃；外用于金疮，刀伤，烧伤，外伤出血，跌打损伤，骨折，痈肿疮疖，毒蛇及狂犬咬伤。

附　注：兽医用于牛、马肚痛，发水。

**矮生紫背金盘**

**Ajuga nipponensis** Makino var. **pallescens** (Maxim.) C. Y. Wu et C. Chen ——*A. genevensis* L. var. *pallescens* Maxim.

生于海拔1 350—3 300米的疏草坡上、路旁及干旱河边。分布于陕西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、四川、云南。

全草：苦，寒。散血，消肿，止痛。用于跌打损伤，痈疮肿毒及各种炎症。

**散瘀草**　山苦草、散血草、苦草、胆草(云南)

**Ajuga pantantha** Hand.-Mazz.

生于海拔2 400—2 700米的干燥荒坡矮草丛中。分布于云南。

全草：苦，寒。清热平肝，解毒。用于慢性肝炎，小便淋痛，口腔破溃，疮疡肿毒，黄水疮，骨折。

附　注：云南特有药用植物。

## 水棘针属　Amethystea L.

**水棘针**　细叶山紫苏(吉林)，土荆芥(云南)，山油子(救荒本草)

**Amethystea caerulea** L.

生于海拔 200—3 400 米的田边旷野、河岸沙地、开阔路边及溪旁。分布于华北、西北及吉林、辽宁、山东、安徽、河南、湖北、四川、云南。

全草：止痢，止泻，健脾，消食。

附　注：云南昭通代荆芥用。

## 排草香属　Anisochilus Wall.

**排草香**　　耙草、排草(广东、广西)

**Anisochilus carnosus** (L.) Wall.——*Lavandula carnosa* L.

栽培于广东、广西。

根状茎：辛，温。利尿，辟秽。用于水肿，浮肿病。全草：淡，温。解毒，燥湿。用于风湿病，水肿。

附　注：本种也作香料与防腐用。

## 药水苏属　Betonica L.

**药水苏**

**Betonica officinalis** L.——*Stachys officinalis* (L.) Trev. ex Briq.

原产于欧洲及西亚。我国各地植物园及药圃引种栽培。

根及根状茎供药用。

附　注：本种含水苏素 (betonicine) 和异水苏素 (Ituricine)。

## 毛药花属 Bostrychanthera Benth.

**毛药花**　　垂花铃子香(植物分类学报)，环药花(中国高等植物图鉴)

**Bostrychanthera deflexa** Benth.

生于海拔 500—1 120 米的密林下湿润处。分布于江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

全草：清热解毒，活血止痛。用于泄泻，风湿骨痛。

附　注：我国特有属。

## 新风轮属　Calamintha Mill.

**新风轮**

**Calamintha debilis** (Bunge) Benth.——*Thymus debilis* Bunge

生于海拔 500—2 000 米的亚高山草甸、砾石山坡、浅水石滩、岩峭及石堆上。分布于新疆。

全草：清热解毒，凉血止血。

## 心叶石蚕属 Cardioteucris C. Y. Wu

**心叶石蚕** 野苏麻(四川)

**Cardioteucris cordifolia** C. Y. Wu

生于海拔 2 000—2 700 米的山地亚热带林下及灌丛中。分布于四川、云南。

全草：辛，温。宣肺止咳，疏风解表，解毒消肿。

附注：我国特有属。

## 铃子香属 Chelonopsis Miq.

**浙江铃子香** 铃子三七(浙江)

**Chelonopsis chekiangensis** C. Y. Wu

生于山坡、林下草丛稍阴处。分布于浙江、安徽、江西。

根、全草：辛，温。散风寒，通经络。用于外感风寒，咳嗽，食积，筋骨酸痛。

## 肾茶属 Clerodendranthus Kudo

**肾茶** 猫须草、猫须公(广东)，牙努秒(傣语)

**Clerodendranthus spicatus** (Thunb.) C. Y. Wu ex H. W. Li——*Clerodendron spicatum* Thunb.

生于海拔 1 050 米以下的林下、沟边潮湿处及阳光充足的旷地，多为栽培。分布于福建、台湾、海南、广西、贵州、云南。

全草(猫须草)：甘、微苦，凉。清热祛湿，排石利尿。用于水肿，小便涩痛，砂淋，风湿关节痛。

## 风轮菜属 Clinopodium L.

**风轮菜** 九塔草、落地梅花(浙江)，山薄荷(江西)，九层塔、苦刀草、野凉粉藤(广西)，野凉粉草(中国高等植物图鉴)

**Clinopodium chinensis** (Benth.) O. Kuntze——*Calamintha chinensis* Benth.

生于海拔 1 000 米以下的山坡、草地、路边、沟边、灌丛林下。分布于华北、华东、中南和西南。

地上部分(断血流)：涩、苦，凉。清热解毒，凉血止血。用于妇科出血及其他出血症，泄泻，痢疾，疮疡肿毒，蛇犬咬伤。

附 注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**邻近风轮菜** 光风轮菜(通称)，节节花、剪刀草(浙江)，回文草(湖南)，四季草(四川)

**Clinopodium confine** (Hance) O. Kuntze——*Calamintha confinis* Hance

生于海拔约500米以下的田边、山坡、草地。分布于中南及江苏、安徽、浙江、江西、福建、四川、贵州。

全草(剪刀草)：苦、辛，凉。清热解毒，止血。用于痈疖，乳痈，无名肿毒，刀伤，癍疹及过敏性皮炎。

**细风轮菜**　瘦风轮(通称)，剪刀草、塔花(江苏、广东)，野香草(浙江)，野薄荷(江西)

**Clinopodium gracile** (Benth.) Matsum.——*Calamintha gracilis* Benth.

生于海拔700—2 400米的山坡草地、灌丛、林缘、沟边、路旁及田野。分布于华东、中南、西南及陕西。

全草：辛、苦，凉。清热解毒，消肿止痛。用于白喉，咽喉肿痛，泄泻，痢疾，乳痈，感冒，产后咳嗽及雷公藤中毒；外用于过敏性皮炎。

**寸金草**　盐烟苏(四川)，蛇床子、土白芷、莲台夏枯草、麻布草、山夏枯草、灯笼花(云南)

**Clinopodium megalanthum** (Diels) C. Y. Wu et Hsuan ex H. W. Li——*Calamintha chinensis* Benth. var. *megalantha* Diels; *C. megalantha* (Diels) Hand.-Mazz.

生于海拔1 300—3 200米的山坡、草地、路旁、灌丛中及林下。分布于湖北、四川、贵州、云南。

全草(寸金草)：辛、微苦，凉。清热平肝，消肿活血。用于牙痛，小儿疳积，避孕，风湿跌打。　种子：壮阳。

附　注：功效相同的有**居间寸金草 C. megalanthum** (Diels) C. Y. Wu et Hsuan ex H. W. Li **var. intermedium** C. Y. Wu et Hsuan ex H. W. Li，分布于云南西北部；**披针叶寸金草 C. megalanthum** (Diels) C. Y. Wu et Hsuan ex H. W. Li **var. lancifolium** C. Y. Wu et Hsuan ex H. W. Li，分布于云南西部。

**峨眉风轮菜**

**Clinopodium omeiense** C. Y. Wu et Hsuan ex H. W. Li

生于海拔约1 700米的林下、荒坡草丛中。分布于四川。

全草：清热，活血，散瘀。

附　注：四川特有药用植物。

**阴风轮**　灯笼草(四川、云南)

**Clinopodium polycephalum** (Vaniot) C. Y. Wu et Hsuan ex H. W. Li——*Calamintha polycephalum* Vaniot

生于山坡林缘及路旁草地。分布于华东、西南及河北、山西、陕西、甘肃、河南、湖北、湖南、广西。

全草(断血流)：苦、涩，凉。清热解毒，凉血止血。用于各种出血，白喉，黄疸，感冒，腹痛，小儿疳积，疔疮痈肿，跌打损伤，蛇犬咬伤。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**风车草**　麻叶风轮菜(辽宁、河北、四川)，紫苏(河北)，荨麻叶风轮菜(宁夏)

**Clinopodium urticifolium** (Hance) C. Y. Wu et Hsuan ex H. W. Li——

*Calamintha clinopodium* Benth. var. *urticifolia* Hance

生于海拔 300—2 240 米的山坡、草地、路旁、林下。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、山东、江苏、河南、四川。

全草：苦，凉。疏风清热，解毒止痢，活血止血。用于感冒，中暑，痢疾，肝炎，急性胆囊炎，疖腮，目赤红肿，疔疮肿毒，皮肤瘙痒，妇女各种出血，尿血，外伤出血。

## 羽萼木属 Colebrookea Smith

**羽萼木** 野山茶、马垮皮、黑羊巴巴(云南)，羽萼(植物分类学报)

**Colebrookea oppositifolia** Smith

生于海拔 200—2 200 米干热地区的稀树乔木林或灌丛中。分布于云南。

叶：辛，平。消炎，止血。用于鼻衄，咳血；外用于外伤出血，皮炎及肤癣。

## 鞘蕊花属 Coleus Lour.

**肉叶鞘蕊花** 假回菜(广东)

**Coleus carnosifolius** (Hemsl.) Dunn——*Plectranthus carnosifolius* Hemsl.

生于石山林下或岩石上。分布于广东、广西。

全草：用于咽喉肿痛，小儿疳积；外用于疮疡肿毒，蛇咬伤，疮疥。

**毛萼鞘蕊花** 岩紫苏、红旋、白花紫苏(云南)

**Coleus esquirolii** (Lévl.) Dunn——*Calamintha esquirolii* Lévl.

生于海拔 1 100—1 800 米的石山、山谷岩石旁、草地斜坡等多石处。分布于台湾、贵州、云南。

全草：辛，平。解表散寒，祛痰止咳。用于感冒，肺痨咳嗽，咯血，肺痈，也用于止血，接骨。

**毛喉鞘蕊花**

**Coleus forskohlii** (Willd.) Briq.——*Plectranthus forskohlii* Willd.

生于海拔 2 300 米左右的旷野山坡上。分布于云南东北部。

全草：抗癌。

附 注：云南特有药用植物。

**五彩苏** 彩叶洋紫苏(广东)，洋紫苏(广州植物志)，锦紫苏(种子植物名称)

**Coleus scutellarioides** (L.) Benth.——*Ocimum scutellarioides* L.; *C. blumei* Benth.

原产印度尼西亚爪哇。全国各地园圃普遍栽培。

叶：消炎，消肿，解毒。用于蛇伤。

**小五彩苏** 五色草、假紫苏、洋紫苏(广东)，金耳环、金钱炮(广西)

**Coleus scutellarioides** (L.) Benth. var. **crispipilus** (Merr.) H. Keng——*C. macrathus* Merr. var. *crispipilus* Merr.

生于溪旁、路旁、旷野、山谷、山地及田野的草丛或林中，亦有栽培。分布于福建、台

湾、广东、广西、贵州。

全草(金耳环)：辛，凉。清凉解毒。用于疮疡，疥疮。

## 火把花属 Colquhounia Wall.

**火把花** 密蒙花、细羊巴巴花(云南)，炮仗花(植物分类学报)

**Colquhounia coccinea** Wall. var. **mollis** (Schlecht.) Prain——*C. mollis* Schlecht.

生于海拔 1 450—3 000 米的多石草坡及灌丛中，在密林中少见。分布于云南西部至中部、西藏东南部。

花：用于明目。

附 注：代密蒙花用。

**秀丽火把花** 秀丽炮仗花(植物分类学报)

**Colquhounia elegans** Wall.

生于海拔 1 550—2 000 米的阳性灌丛或林中。分布于云南西部。

根：消炎，止血，止痢。

附 注：云南特有药用植物。

**细棉花** 碎密花、杂密花、细花火把花(云南)，各落尾(彝语)

**Colquhounia elegans** Wall. var. **tenuiflora** (Hook. f.)Prain——*C. tenuiflora* Hook. f.

生于海拔 1 120—1 800 米的灌丛或杂木林下。分布于云南中南部及西南部。

根：消炎，止血，止痢。用于跌打损伤，外伤出血，痢疾。 叶及嫩枝：用于骨折。

附 注：云南特有药用植物。

**藤状火把花** 苦梅叶(云南)，藤状炮仗花(植物分类学报)

**Colquhounia sequinii** Vaniot

生于海拔 240—2 700 米的灌丛中。分布于湖北西部、广西西部、贵州、云南西北部及东部。

全草：清热消炎，止血，解毒。

## 绵穗苏属 Comanthosphace S. Moore

**绵穗苏** 半边苏、野鱼香、野苏、火胡麻(贵州)

**Comanthosphace ningpoensis** (Hemsl.) Hand.-Mazz.——*Caryopteris ningpoensis* Hemsl.

生于海拔 1 220 米以下的山坡草丛、溪旁、山谷疏林下及林缘。分布于浙江、江西、湖南、贵州。

全草：辛、微苦，温。祛风发汗，解毒，止血。用于瘫痪，感冒，疮毒，产后诸病，劳伤吐血。

## 青兰属 Dracocephalum L.

**光萼青兰** 北青兰(吉林)

**Dracocephalum argunense** Fisch. ex Link

生于海拔 180—750 米的山坡草地、草原、江岸沙质草甸、林缘灌丛中。分布于东北及河北、内蒙古。

全草：清热燥湿，凉血止血。用于头痛，咽喉痛 。

**羽叶枝子花** 羽叶青兰(新疆)

**Dracocephalum bipinnatum** Rupr.

生于海拔 2 500—2 600 米的山溪石缝中、砾质山坡、沙质河滩、草原或半沙漠。分布于新疆、西藏。

茎、叶、花：止咳，平喘，清热。

附 注：功效相同的有**二花羽叶枝子花 D. bipinnatum** Rupr. var. **biflorum** C. Y. Wu ex W. T. Wang，分布于新疆；**短裂羽叶枝子花 D. bipinnatum** Rupr. var. **brevilobum** C. Y. Wu et W. T. Wang，分布于新疆西部；**紫花异叶青兰 D. diversifolium** Rupr.，分布于新疆南部；**宽齿青兰 D. paulsenii** Briq.，分布于新疆天山。

**大花毛建草** 大花青兰(新疆)

**Dracocephalum grandiflorum** L.

生于海拔 2 200—2 900 米的山坡草地、高山潮湿坡地。分布于内蒙古、新疆。

全草：清热解毒，祛痰平喘。

附 注：功效相同的有**无髭毛建草 D. imberbe** Bunge，分布于新疆(阿尔泰及天山东段)；**铺地青兰 D. origanoides** Steph. ex Willd.，分布于新疆；**掌叶青兰 D. palmatoides** C. Y. Wu et W. T. Wang，分布于新疆西北部；**刺齿枝子花 D. peregrinum** L.，分布于新疆西北部；**香花青兰 D. thymiflorum** L.，分布于新疆天山、阿尔泰山。

**白花枝子花** 异叶青兰(内蒙古、新疆)，白花甜蜜蜜(甘肃、青海)，白花夏枯草(青海)，祖帕尔(维吾尔语)，奥尕(藏语)

**Dracocephalum heterophyllum** Benth.

生于海拔 1 100—2 800(5 000)米的山地草原及半荒漠多石干燥地区。分布于西北及山西、内蒙古、四川、西藏。

全草：苦、辛，寒。清热，止咳，清肝火，散郁结。用于高血压症，咳嗽痰喘，瘿瘤，瘰疬，口腔溃疡。

附 注：本种也为维吾尔民族用药，用于咳嗽痰喘，胃病。

**全叶青兰** 天山青兰(新疆)，马尔赞居西(维吾尔语)，全缘叶青兰(中国植物志)

**Dracocephalum integrifolium** Bunge

生于海拔 900—2 450 米的石质或沙质山坡、山坡草地或云杉、冷杉混交林下及森林草原地带。分布于甘肃、青海、新疆。

地上部分：苦，凉。祛痰，止咳，平喘。用于咳嗽痰喘。

附　注：功效相同的有**白花全叶青兰 D. integrifolium Bunge var. albiflorus** G.J. Liou，分布于新疆。

**香青兰**　山薄荷(吉林)，青兰(山西、陕西、甘肃)，枝子花(北京、内蒙古)，昂凯鲁莫勒·毕日阳古(蒙语)，巴德兰古(维吾尔语)

**Dracocephalum moldavica** L.

生于海拔220—1 600(—2 700)米的干燥山地草坡、林缘、山谷或河滩多石处，亦有栽培。分布于东北、华北、西北及河南。

地上部分：甘、苦，凉。泻火，清热，止痛，止血。用于咳嗽痰喘，感冒，头痛，咽喉痛，黄疸，吐血，衄血。

附　注：也为蒙古族和维吾尔族习用药材。

**垂花青兰**

**Dracocephalum nutans** L.

生于海拔1 200—2 600米的山地阳坡、山谷向阳处、高山林缘灌丛或落叶松林下。分布于黑龙江、内蒙古、新疆北部。

全草：用于咳嗽痰喘。

**毛建草**　岩青兰(辽宁、内蒙古、宁夏、青海)，毛尖(河北、山西)，哈敦-毕日阳古(蒙语)，那乌黄乃(藏语)

**Dracocephalum rupestre** Hance

生于海拔650—2 400(—3 100)米的高山草原、草坡及疏林下向阳处。分布于华北及辽宁、宁夏、青海、河南、贵州。

全草(岩青兰)：甘、辛，凉。清热解毒，凉血止血。用于外感风热，头痛，咽喉痛，咳嗽，胸胁胀满，黄疸，吐血，衄血，痢疾。

附　注：可代茶。

**青兰**　路易斯青兰(新疆)

**Dracocephalum ruyschiana** L.

生于山地草甸、草原多石处及林缘。分布于黑龙江北部、辽宁、内蒙古东北部、新疆北部。

全草：用于头痛，咽喉痛。

**大理青兰**

**Dracocephalum taliense** Forrest ex W. W. Smith

生于海拔2 800米左右的山坡草地。分布于云南西北部。

全草：疏肝和胃。用于黄疸。

附　注：云南特有药用植物。

**甘青青兰**　杂毕样(西藏)，知羊故(藏语)，唐古特青兰(植物分类学报)，陇蜜青兰(中国经济植物志)

**Dracocephalum tanguticum** Maxim.

生于海拔1 900—4 000米的干燥河谷的河岸、田野、草滩、林缘。分布于甘肃西南部、青海东部、四川西部、西藏东南部。

带根全草或地上部分：甘、苦，寒。和胃疏肝，清热利水，止咳化痰。用于胃脘痛，溃疡病，肝炎，肝肿大，腹水，浮肿，咳嗽痰多。　幼苗：用于腹水，浮肿。

附　注：也为藏族用药。

## 水蜡烛属　Dysophylla El-Gazzar et Watson ex Airy-Shaw

**齿叶水蜡烛**　水龙(广西)，斑叶水虎尾、水芙蓉、野香芹(广东药用植物名录)，森氏水珍珠菜(广州植物志)

**Dysophylla sampsonii** Hance

生于沼泽中、沟边、水边等潮湿地。分布于江西、湖南、广东、广西、贵州。

全草：辛，平。有小毒。行气止痛，散瘀消肿。用于毒蛇咬伤，疮痈肿毒，湿疹，跌打瘀肿。

**水虎尾**　边氏水珍珠菜(广州植物志)，水老虎(全国中草药汇编)，水箭草(广东药用植物名录)

**Dysophylla stellata** (Lour.) Benth.——*Mentha stellata* Lour.; *D. benthamiana* Hance

生于海拔1 550米以下的稻田中或水边。分布于安徽、浙江、江西、福建、河南、湖南、广东、云南。

全草：辛，平。有小毒。行气止痛，散血毒，散瘀消肿。用于毒蛇咬伤，疮痈肿毒，湿疹，跌打瘀肿及皮肤红肿。

**三姐妹**　水虎尾中间变种(中国植物志)

**Dysophylla stellata** (Lour.) Benth. var. **intermedia** (C. Y. Wu et Hsuan) C.Y. Wu et H.W. Li——*D. benthamiana* Hance var. *intermedia* C.Y. Wu te Hsuan

生于海拔300—1 300米的水田中或潮湿的平地上。分布于海南、广西。

全草：清热解毒，消肿止痛。

**水蜡烛**

**Dysophylla yatabeana** Makino

生于水池中、水稻田内、湿润空旷地上及山坡疏林内。分布于江苏、安徽、浙江、湖北、湖南、贵州。

全草：灭虱。

## 香薷属　Elsholtzia Willd.

**紫花香薷**　野薄荷(浙江)，香薷、牙刷花(江西)，土荆芥、假紫苏(广东)

**Elsholtzia argyi** Lévl.

生于海拔200—1 200米的山坡灌丛中、林下、溪旁及河边草地。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

全草：辛，微温。发汗解暑，利尿，止吐泻，散寒湿。用于感冒，发热无汗，黄疸，淋证，带下病，咳嗽，暑热口臭，吐泻。

**四方蒿**　野薄荷(贵州)，鸡肝散、四棱蒿、黑头草(云南)，岩合合罗(哈尼语)

**Elsholtzia blanda** Benth.

生于海拔800—2 500米的林中旷处、路旁、沟边及灌木丛中。分布于广西、四川、贵州、云南。

全草(鸡肝散): 辛、微苦,凉。清热消炎,发汗解表,利湿,止痒,止痛。用于水肿,感冒,泄泻,痢疾,牙痛,目赤红肿,小儿疳积,腋臭,烧伤;外用于湿疹,脚癣。

**东紫苏** 牙刷草、凤尾茶、云松茶、锈山茶、半边红花(云南)

**Elsholtzia bodinieri** Vaniot

生于海拔1 200—3 000米的阳坡石灰岩隙、干燥红壤松林下或山坡草地上。分布于贵州、云南。

全草(凤尾茶): 辛,平。发散解表,清热利湿,理气和胃。用于感冒发热,头痛身痛,咽喉痛,虚火牙痛,乳蛾,消化不良,目赤红痛,尿闭,肝炎。 嫩尖: 清热解毒。

附 注: 嫩尖可代茶饮,清热解毒。

**香薷** 山苏子(黑龙江、吉林、河北、山西、福建),半边苏(贵州),野芝麻、野苎子、野坝蒿(云南),疾尔色尔布(藏语)

**Elsholtzia ciliata** (Thunb.) Hyland. ——*Sideritis ciliata* Thunb.; *E. cristata* Willd.

生于海拔3 400米以下的路旁、山地、荒地、林内、河岸及阴湿草地,亦有栽培。除青海外,全国都有分布。

全草(土香薷): 辛,微温。祛风,发汗,解暑,利尿。用于急性吐泻,感冒发热,恶寒无汗,中暑,胸闷,口臭,小便不利,并可解食鱼中毒。

附 注: ① 本种在山东、四川、广西、陕西、甘肃个别地区作中药香薷(海州香薷)使用。② 功效同本种的有**重圆齿香薷 E. ciliata** (Thunb.) Hyland. var. **duplicatocrenata** C. Y. Wu et S. C. Huang, 分布于云南西北部; **多枝香薷 E. ciliata** (Thunb.) Hyland. var. **ramosa** (Nakai) C. Y. Wu et H. W. Li, 分布于河北、云南。

**吉龙草** 吉笼草、遍罗香菜(云南)

**Elsholtzia communis** (Coll. et Hemsl.) Diels——*Dysophylla communis* Coll. et Hemsl.

生于海拔800—1 000米的热带山区沙壤土中,多为栽培。分布于四川、贵州、云南。

茎、叶: 辛,凉。清热,解毒,解表。用于感冒,头痛,发热,消化不良,乳蛾,鼻渊,疔疮。

附 注: 民间用嫩茎叶作佐料,清香可口。

**野草香** 野苏麻(湖南、四川),木姜花、鱼香菜(贵州),狗尾草(云南),古克多(纳西语)

**Elsholtzia cypriani** (Pavol.) S. Chow ex Hsu——*Lophanthus cypriani* Pavol.

生于海拔400—2 900米的田边、路旁、河谷两岸、林中或林边草地。分布于陕西、安徽、河南、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

全草或叶(木姜花): 辛,凉。清热,解毒,解表。用于伤风感冒,疔疮,鼻渊,喉蛾。花穗: 止血。

**密花香薷** 咳嗽草、野紫苏、臭香茹、息肉巴(四川),密香薷(西藏)

**Elsholtzia densa** Benth.

生于海拔 1 000—4 500 米的林下、林缘、高山草甸、河边、山坡荒地。分布于华北及陕西、甘肃、青海、新疆、四川、云南、西藏。

全草：辛，微温。发汗解暑，利水消肿。用于伤暑感冒，水肿；外用于脓疮及皮肤病。

附　注：本种在西藏作土香薷(香薷)使用；亦有作中药香薷(海州香薷)使用。

**莓果香薷**　　香薷(新疆)，土香薷(西藏)

**Elsholtzia densa** Benth. var. **calycocarpa** (Diels) C. Y. Wu et S. C. Huang——*E. calycocarpa* Diels

生于海拔 2 200—3 500 米的山坡荒地、草地及田边。分布于山西、甘肃、青海、新疆、四川、云南。

全草：辛，微温。发汗，解暑，利湿，行水。用于伤暑感冒，水肿；外用于脓疮及皮肤病。

附　注：本种在新疆民间作中药香薷(海州香薷)使用；在西藏个别地区有作土香薷(香薷)使用。

**细穗密花香薷**　　密香薷(西藏)

**Elshotzia densa** Benth. var. **ianthina** (Maxim. ex Kanitz) C. Y. Wu et S.C. Huang——*Dysophylla ianthina* Maxim. ex Kanitz; *E. ianthina*(Maxim. ex Kanitz) Dunn

生于海拔 1 000—3 000 米的山坡及荒地。分布于辽宁、河北、山西、陕西、甘肃、青海、四川、西藏。

全草：祛风发汗。

附　注：本种在西藏个别地区亦有作中药香薷(海州香薷)使用。

**毛穗香薷**　　切柔赛保(藏语)，黄花香薷(青藏高原药物图鉴)

**Elsholtzia eriostachya** Benth.

生于海拔 3 500—4 100 米的山坡草地。分布于甘肃、青海、四川、云南、西藏。

地上部分：辛、涩，温。发散解表。用于感冒；外用于皮肤瘙痒。

**高原香薷**　　野木香叶(四川)，小红苏、香薷(云南)

**Elsholtzia feddei** Lévl.

生于海拔 2 800—4 400 米的林缘、路边、草坡、林下、灌丛及沟边。分布于青海、四川、云南、西藏。

全草：发汗解表，祛暑化湿。用于中暑感冒，发热头痛，腹痛，泄泻，水肿。

附　注：功效相同的有**疏苞高原香薷 E. feddei** Lévl. f. **remotibracteata** C.Y. Wu et S. C Huang，分布于四川、云南。

**野苏子**　　野苏、修仙果、大叶香薷、大叶香芝麻、大野坝艾(云南)

**Elsholtzia flava** (Benth.) Benth. ——*Aphanochilus flavus* Benth.

生于海拔 1 050—2 900 米的开旷耕地、路边、沟谷旁、灌丛中或林缘。分布于浙江、湖北、四川、贵州、云南。

全草：用于发表。代紫苏入药。

**鸡骨柴**　　洒药花、沙虫药(贵州)，双翎草、柴油苏、香芝麻叶(云南)，普尔芝拉冈(藏语)

**Elsholtzia fruticosa** (D.Don) Rehd. ——*Perilla fruticosa* D.Don

生于海拔700—3 200米的山谷两侧、谷底、路旁、开旷山坡及草地中。分布于西南及河北、陕西、甘肃、青海、湖北、广西。

根：苦、涩，温。温经通络，祛风除湿。用于风湿关节痛。　叶：外用于脚癣，疥疮。

**异叶香薷**　凤尾茶、野山茶、松茶(云南)

**Elsholtzia heterophylla** Diels

生于海拔1 200—2 400米的村旁、田边、沼泽及河沟附近。分布于云南。

全株：发汗，镇咳，健胃，利尿，镇痛，解热。用于风寒感冒，鱼蟹中毒，吐泻，咳嗽多痰。

附　注：① 本种与**东紫苏 E. bodinieri** Vaniot 多混用。② 云南特有药用植物。

**湖南香薷**　耳齿紫苏(中国植物志)

**Elsholtzia hunanensis** Hand.-Mazz. —— *Perilla frutescens* (L.) Britt. var. *auriculatodentata* C. Y. Wu et Hsuan ex H. W. Li

生于海拔200—2 500米的石灰山上、亚热带林内或栽培。分布于安徽、浙江、江西、湖北、湖南、贵州。

枝、茎、叶：功效同紫苏 Perilla frutescens (L.) Britt.

**水香薷**　猪菜草(广西)，水薄荷(云南)，安南木(景颇语)

**Elsholtzia kachinensis** Prain

生于海拔1 200—2 800米的河边、路旁、林下、山谷或水中，常见于湿润处。分布于江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、云南。

全草：用于跌打损伤。

**淡黄香薷**　黄香薷、寸薷(中药大辞典)

**Elsholtzia luteola** Diels

生于海拔2 200—3 600米的林缘、草坡或溪沟边潮湿地。分布于福建、四川西南部、云南西北部及东北部。

全草(黄香薷)：辛、香，微温。清暑热，利小便，除胸满，理烦渴。用于中暑下痢，发热口渴，心烦胁痛，口臭，舌出血。

**鼠尾香薷**　疳积散、香紫苏、大香花棵(云南)

**Elsholtzia myosurus** Dunn

生于海拔2 600—3 000米的山坡、荒地及沟谷中。分布于四川、云南。

全草：辛，温。止咳，解表。用于感冒，顿咳，咳嗽痰喘，肾盂肾炎，小儿疳积；外用于骨髓炎。

**大黄药**　大黑头草、黄药、野苏子棵、野芝麻(云南)，垂花香薷(中国经济植物志)

**Elsholtzia penduliflora** W. W. Smith

生于海拔1 100—2 400米的山谷边、密林中、开旷坡地及荒地上。分布于云南西部及南部。

地上部分(大黄药)：辛，凉。清热解毒，消炎止痛，止咳，截疟。用于炭疽病，时行感冒，风热咳喘，咳嗽痰喘，乳蛾，乳痈，流脑，咽喉痛，疟疾，小便淋痛，外伤感染。

附　注：① 本种也为云南苗族常用草药。② 云南特有药用植物。

**野拔子**　土荆芥(广西),野坝蒿(四川),香苏草、皱叶香薷、野巴子(云南)

**Elsholtzia rugulosa** Hemsl.

生于海拔1 300—2 800米的山坡草地、旷地、路旁、林中或灌丛中。分布于广西、四川、贵州、云南。

全草:辛,凉。清热解毒,疏风解表,消食化积,利湿,止血止痛。用于伤风感冒,消化不良,腹痛腹胀,吐泻,痢疾,鼻衄,咳血,外伤出血,疮疡,蛇咬伤。

**岩生香薷**

**Elsholtzia saxatilis** (Kom.) Nakai ex Kitag. ——*E. cristata* Willd. f. *saxatilis* Kom.

生于石缝中。分布于东北及山东。

全草:用于皮肤瘙痒。

**川滇香薷**　木姜菜(四川)

**Elsholtzia souliei** Lévl.

生于海拔2 800—3 300米的山坡、草丛。分布于四川西部、云南。

全草:用于小儿惊风。

附　注:本种在四川个别地区作中药香薷(海州香薷)使用。

**海州香薷**　窄叶香薷(山东),铜草(江西)

**Elsholtzia splendens** Nakai ex F. Maekawa ——*E. haichowensis* Sun ex C. H.Hu; *E. lungtangensis* Sun et C. H. Hu

生于海拔200—1 200米的山坡路旁、草丛中或栽培。分布于辽宁、河北、青海、山东、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北、广东、四川、贵州。主产江西、河北、河南等省。以江西产量大,质量佳。

地上部分(香薷):辛,微温。发汗解表,和中利湿。用于暑湿感冒,恶寒发热,头痛无汗,腹痛吐泻,小便不利。

附　注:《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**穗状香薷**　土香薷(云南)

**Elsholtzia stachyodes** (Link) C. Y. Wu ——*Hyptis stachyodes* Link

生于海拔800—2 800米的开旷山坡、路旁、荒地、林中旷处或石灰岩上。分布于陕西、甘肃、安徽、浙江、湖北、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草:清热解毒,发汗解暑,利水。

**木香薷**　柴荆芥(河北、北京、山西),香荆芥、荆芥(河北),紫花鸡骨柴(甘肃),野荆芥(河南)

**Elsholtzia stauntoni** Benth.

生于海拔500—1 400米的山坡、山谷路旁、沟岸、林缘。分布于河北、山西、陕西、甘肃、河南。

全草:辛、苦,微温。理气,止痛,开胃。用于胃气疼痛,气滞疼痛,呕吐,泄泻,痢疾,感冒,发烧,头痛,风湿关节痛。

**球穗香薷**　野苏麻、臭苏麻(四川)

**Elsholtzia strobilifera** (Benth.) Benth. ——*Cyclostegia strobilifera* Benth.

生于海拔 2 300—3 700 米的山坡、草地、沟谷、林隙及灌丛边。分布于四川、云南、西藏。

全草：发表。

**白香薷**　毛香薷、四方蒿(云南)，麻永牙(傣语)

**Elsholtzia winitiana** Craib

生于海拔 600—2 200 米的林中旷处、草坡或灌丛中。分布于广西西部、云南南部。

全草：消炎止痛。

## 广防风属　Epimeredi Adans.

**广防风**　豨莶草(福建、广东、广西)，防风草（广东、广西、贵州、云南)，土藿香(广东、贵州、云南)，落马衣(广东)，秽草(广东、广西)

**Epimeredi indica** (L.) Rothm. ——*Nepeta indica* L.; *Anisomeles indica* (L.) O. Kuntze; *A. ovata* R. Br.

生于海拔 40—1 580 (—2 400)米的热带及亚热带地区林缘、路旁等荒地上。分布于西南及浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、贵州。

全草：辛、苦，温。祛风解表，理气止痛。用于感冒发热，风湿关节痛，胃痛，吐泻；外用于皮肤湿疹，神经性皮炎，虫蛇咬伤，痈疮肿毒。

附　注：本种在广东、广西误作为菊科植物豨莶草 Siegesbeckia pubescens Makino 使用。

## 绵参属　Eriophyton Benth.

**绵参**　光杆琼(全国中草药汇编)，榜参布柔(青藏高原药物图谱)

**Eriophyton wallichii Benth.**

生于海拔(2 700—)3 400—4 700(—5 300)米高山顶、高山岩石强度风化堆积形成的乱石堆中或流沙处。分布于青海、四川、云南、西藏。

根：苦，寒。滋补，调气血，补中气，催乳。用于贫血，病后体虚，乳少。　全草：苦，寒。清热解毒。用于风热咳喘，痢疾，水草及食物中毒。

附　注：本种也为藏药，称"榜参布柔"。

## 宽管花属　Eurysolen Prain

**宽管花**

**Eurysolen gracilis** Prain

生于海拔 600—1 900 米的热带、亚热带干季雨林中。分布于云南南部、东南部及西南部。

全草：消炎。

## 小野芝麻属　Galeobdolon Adans.

**小野芝麻**　假野芝麻(植物分类学报),地绵绵、蜘蛛草(全国中草药汇编)

**Galeobdolon chinense** (Benth.) C. Y. Wu ——*Lamium chinense* Benth.

生于海拔 50—300 米的荒山林下。分布于中南及江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾。

块根：用于外伤出血。

## 鼬瓣花属　Galeopsis L.

**鼬瓣花**　野苏子(黑龙江),野芝麻(四川)

**Galeopsis bifida** Boenn.

生于海拔 2 300—4 300 米的林缘、路旁、田边、灌丛及草地。分布于东北、西南及山西、内蒙古、陕西、甘肃、青海、湖北。

根：止咳,化痰。　全草：发汗解表,祛暑化湿,利尿。

## 活血丹属　Glechoma L.

**白透骨消**　大铜钱草(湖北),长管活血丹(新华本草纲要)

**Glechoma biondiana** (Diels) C. Y. Wu et C Chen ——*Dracocephalum biondianum* Diels

生于海拔 1 000—1 700 米的溪边、林缘阴湿肥沃土上。分布于陕西秦岭、湖北西部。

全草：清热,消肿。用于筋骨痛,风湿疼痛。

**狭萼白透骨消**

**Glechoma biondiana** (Diels) C. Y. Wu et C. Chen var. **angustituba** C. Y. Wu et C. Chen

生于密林下。分布于湖北西部、四川北部。

全草：用于跌打损伤。

**见肿消**　透骨消(甘肃),补血丹(河南)

**Glechoma biondiana** (Diels) C.Y. Wu et C. Chen var. **glabrescens** C.Y. Wu et C. Chen

生于海拔 1 200—2 200 米的山谷林下、水沟边及阴湿肥沃土上。分布于河北、陕西、甘肃、河南、湖北。

全草：利尿消肿。用于黄疸,石淋。

**活血丹**　透骨消(通称),连钱草(辽宁、内蒙古、山西、江苏、湖北、广东、云南),透骨草(陕西、江西、广东、广西、贵州、云南),特巩消(侗语),金钱草(本草纲目拾遗)

**Glechoma longituba** (Nakai) Kupr. ——*G. hederacea* L. var. *longituba* Nakai

生于海拔 50—2 000 米的林缘、疏林下、草地中、路旁、溪边等阴湿处。除青海、西藏外,全国各地普遍分布。

地上部分(连钱草)：辛、微苦，凉。利湿通淋，清热解毒，散瘀消肿。用于热淋，石淋，湿热黄疸，疮痈肿痛，跌打损伤。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②本种在广东地区作透骨草用；在陕西个别地区与白透骨消混用。③商品金钱草的同名异物者甚多，其中上海、江苏地区所指的金钱草即为本种。④功效相同的有**欧活血丹 G. hederacea** L.，分布于新疆。

**大花活血丹**　　大筋草、透骨消(云南)

**Glechoma sinograndis** C. Y. Wu

生于海拔2 000—2 900米的沟边杂木林中湿润处。分布于云南西部、西北部及东北部。

全草：用于小儿咳嗽痰喘，骨折。

附　注：云南特有药用植物。

## 锥花属　Gomphostemma Wall. ex Benth.

**中华锥花**　　棒红花(广东)，山继谷、老虎耳、棒丝花(广西)

**Gomphostemma chinense** Oliv.

生于海拔460—650米的山谷湿地密林中。分布于福建、江西、广东、广西。

块根：用于水肿。全草：益气补虚，补血，舒筋活络，祛风湿。用于肾虚，肝炎，刀伤出血，断指，口疮。

**宽叶锥花**

**Gomphostemma latifolium** C. Y. Wu

生于海拔840—1 500米林内或灌丛中的湿润处，或放荒地上。分布于广东西南部、广西、云南南部。

叶：用于外伤、枪伤出血，湿疹。

**细齿锥花**　　假走马胎(广西)

**Gomphostemma leptodon** Dunn

生于沟谷、石灰岩密林下及灌丛中。分布于广西。

全株：用于烧、烫伤。

附　注：广西特有药用植物。

**小齿锥花**　　木锥花(云南)，细郎刀(傣语)

**Gomphostemma microdon** Dunn

生于海拔640—1 300米的沟谷或平地的热带雨林下。分布于贵州、云南。

根：苦，凉。清热解毒，止咳化痰，消炎利尿。用于风热咳喘，咳嗽痰多，小便淋痛，水肿，砂淋。

**槽茎锥花**

**Gomphostemma sulcatum** C. Y. Wu

生于海拔约1 100米的沟谷中。分布于云南东南部。

根、叶：用于跌打损伤，刀伤出血。

附　注：云南特有药用植物。

**顶序锥花**

**Gomphostemma wallichii** Franch.

生于林下。分布于云南西部。

全草：用于石淋。

## 四轮香属　Hanceola Kudo

**四轮香**　　野藿香、火汉草(四川)

**Hanceola sinensis** (Hemsl.) Kudo——*Hancea sinensis* Hemsl.

生于海拔1 240—2 200米的亚热带常绿林或混交林中及路边阴湿处。分布于湖南、广西、四川、贵州、云南。

全草：清热凉血，杀虫。

附　注：我国特有属。

## 异野芝麻属　Heterolamium C. Y. Wu

**异野芝麻**

**Heterolamium debile** (Hemsl.) C. Y. Wu——*Orthosiphon debilis* Hemsl.

生于海拔约1 700米以下的山坡丛林下。分布于陕西、湖北、四川。

全草：用于疮毒。

附　注：我国特有属。

**细齿异野芝麻**

**Heterolamium debile** (Hemsl.) C. Y. Wu var. **cardiophyllum** (Hemsl.) C. Y. Wu——*Plectranthus cardiophyllus* Hemsl.

生于海拔1 550—2 750米的林下、竹林中、水沟旁、草坡及林缘。分布于湖北、湖南、四川及云南。

全草：用于天花。

## 全唇花属　Holocheila (Kudo) S. Chow

**全唇花**

**Holocheila longipedunculata** S. Chow

生于海拔1 600—2 200米的混交林下、灌丛边阴处、草地及刺竹丛中。分布于贵州、云南中部、东南、中南至西南部。

根：用于风热咳喘。

附注：我国特有属。

## 山香属　Hyptis Jacq.

**吊球草**　　假走马胎(广东、海南、广西)，石柳、四俭草(广东)，四方骨(海南)

**Hyptis rhomboidea** Mart. et Gal.

原产美洲热带。生于开阔的荒地上，亦有栽培。分布于台湾、广东、海南、广西。

全草：用于肝炎；外用于疮疡肿毒。

**山香**　山薄荷(福建、广东)，假藿香(广东)，毛老虎(广东、广西)，蛇百子(广西)，香苦草、狗母苏、假走马胎(台湾植物志)

**Hyptis suaveolens** (L.) Poit.——*Ballota suaveolens* L.

原产美洲热带。生于丘陵草地、村边、路旁、海岸沙滩上，或栽培于屋旁、庭园。分布于福建、台湾、广东、广西。

全草：苦、辛，平。疏风散瘀，行气利湿，解毒止痛。用于感冒头痛，胃肠胀气，风湿骨痛；外用于跌打肿痛，创伤出血，痈肿疮毒，虫蛇咬伤，湿疹，皮炎。

## 神香草属　Hyssopus L.

**神香草**

**Hyssopus ambiguus** (Trautv.) Iljin——*H. officinalis* L. var. *ambiguus* Trautv.

生于石质山坡、干旱草地上。分布于新疆北部。

全草：清热解毒，消炎。

附　注：功效相同的有**硬尖神香草 H. cuspidatus** Boriss.，分布于新疆北部；**白花硬尖神香草 H. cuspidatus** Boriss. var. **albiflorus** C. Y. Wu et H. W. Li，分布于新疆北部；**宽唇神香草 H. latilabiatus** C. Y. Wu et H. W. Li，分布于新疆；**大花神香草 H. macranthus** Boriss.，分布于新疆北部。

## 香茶菜属　Isodon (Schrad. ex Benth.) Spach

**腺花香茶菜**　水龙胆草、食疙瘩、铁石元(贵州)，路边金、大扭子七(云南)

**Isodon adenanthus** (Diels) Kudo——*Plectranthus adenanthus* Diels; *Rabdosia adenantha* (Diels) Hara

生于海拔(1 150—)1 600—2 300(—3 400)米的松林、松栎林、竹林下或林缘草地上。分布于四川、贵州、云南。

根：辛、涩，温。健脾利湿，镇呕理气。用于食积饱胀，吐泻，痢疾和狂犬咬伤。全草(水龙胆草)：苦、微甘，寒。清热解毒。用于无名肿毒，大头瘟。

附　注：本属多种植物经化学、药理研究表明，具有一定的抗菌消炎和抗癌活性物质。

**香茶菜**　铁棱角(浙江、广东)，痱子草(福建)，蛇总管(广东、广西)，盘龙七(云南)，小叶蛇总管(中药大辞典)

**Isodon amethystoides** (Benth.) C. Y. Wu et Hsuan——*Plectranthus amethystoides* Benth.; *Rabdosia amethystoides* (Benth.) Hara

生于海拔 200—920 米的山坡、路旁、林下或草丛中的湿润处。分布于华东(除山东外)及湖北、广东、广西、贵州。

根：甘，凉。清热解毒，消肿止痛。用于劳伤，筋骨酸痛，跌打肿痛，疮毒，毒蛇咬伤，为蛇伤要药。全草(小叶蛇总管)：苦、辛，凉。清热散血，疏风解表，消肿解毒。用于感冒发热，经闭，乳痈，肝硬化，黄疸，肺痈，疳积，跌打肿痛。

附　注：本种在广东部分地区误作为溪黄草 I. serra (Maxim.) Kudo 使用。

**狭叶香茶菜**

**Isodon angustifolius** (Dunn) Kudo——*Plectranthus angustifolia* Dunn; *Rabdosia angustifolia* (Dunn) Hara

生于海拔 1 200--2 600 米的草坡或松林下。分布于云南中部、中南部及西北部。

根：用于克山病，消化不良。

附　注：云南特有药用植物。

**苍山香茶菜**

**Isodon bulleyanus** (Diels) Kudo——*Plectranthus bulleyanus* Diels; *Rabdosia bulleyana* (Diels) Hara

生于海拔 2 700—3 000 米的干燥地灌丛中。分布于云南。

根：活血，止痛。用于跌打损伤。全草：清热解毒，健胃。

**细锥香茶菜**　地疳(广西)，六棱麻(四川)，野苏麻、野藿香(贵州)，癞克巴草(云南)

**Isodon coetsus** (Buch.-Ham. ex D. Don) Kudo——*Plectranthus coetsa* Buch.-Ham ex D. Don; *Rabdosia coetsa* (Buch.-Ham. ex D. Don) Hara; *R. menthoides* (Benth.) C. Y. Wu et H. W. Li

生于海拔 650—2 700 米的草坡、灌丛、林中旷地、路边、溪边、河岸、林缘及常绿阔叶林中。分布于西南及安徽、湖南、广东、广西。

根：苦，温。行血，止痛。用于跌打损伤，麻风。全草(野苏麻)：苦、辛，微温。解表散寒，除风湿。用于风寒感冒，呕吐，腹泻，风湿麻木，疮痒及刀伤。枝、叶：外用于脚癣。

**假细锥香茶菜**　野坝子(云南)

**Isodon coetsoides** (C. Y. Wu) Hara——*Rabdosia coetsoides* C. Y. Wu

生于海拔 700—1 700 米的路旁、灌丛中、疏林下或林缘等处。分布于云南西部。

全草：用于头痛。

附　注：云南特有药用植物。

**紫毛香茶菜**　黑头草(云南)，唠嗷底阿拔(哈尼语)

**Isodon enanderianus** (Hand.-Mazz.) Hara——*Plectranthus enanderianus* Hand.-Mazz.; *Rabdosia enanderiana* (Hand.-Mazz.) Hara

生于海拔 700—2 500 米河谷干热地区的山坡、路旁、灌丛或林中。分布于四川、云南。

全草：平喘养心，镇静安神。

**毛萼香茶菜**　沙虫药(贵州)，黑头草、虎尾草、火麻根、四棱蒿(云南)

**Isodon eriocalyx** (Dunn) Kudo——*Plectranthus eriocalys* Dunn; *Rabdosia eriocalyx* (Dunn) Hara

生于海拔 750—2 600 米的山坡阳处、荒地及灌丛中。分布于广西、四川、贵州、云南。

根：苦、辛，温。止泻，止痢。用于痢疾，泄泻。叶：苦、辛，温。除湿，杀虫。用于脚

癖。

**尾叶香茶菜**　高丽花(辽宁),野苏子(吉林),龟叶草(中国植物图鉴)

**Isodon excisus** (Maxim.) Kudo——*Plectranthus excisus* Maxim.; *Rabdosia excisa* (Maxim.) Hara

生于海拔 550—1 100 米的山地林缘、林下、路边、草地。分布于东北。

全草：用于跌打损伤，瘀血肿痛，骨折，创伤出血。有一定的抗肿瘤作用。

**鄂西香茶菜**　见肿消(湖北)

**Isodon henryi** (Hemsl.) Kudo——*Plectranthus henryi* Hemsl.; *Rabdosia henryi* (Hemsl.) Hara

生于海拔(260) 800—2 600 米的谷地、山坡、林缘、溪边、路旁。分布于河北、山西、陕西、甘肃、河南、湖北、四川、贵州。

根：健脾利湿，降逆。　全草：清热解毒，发汗止咳，散瘀消肿。

**刚毛香茶菜**　烂脚丫巴草(云南)

**Isodon hispidus** (Benth.) Murata——*Plectranthus hispidus* Benth.; *Rabdosia hispida* (Benth.) Hara

生于海拔 2 000 米以下的林下或灌丛中。分布于云南。

根状茎：用于跌打损伤。

**内折香茶菜**　山薄荷香茶菜(东北植物检索表),山薄荷(中国植物图鉴)

**Isodon inflexus** (Thunb.) Kudo——*Ocimum inflexus* Thunb.; *Rabdosia inflexa* (Thunb.) Hara; *Plectranthus inflexus* (Thunb.) Vahl ex Benth.

生于海拔 800—1 800 米的山谷溪旁、疏林中、山坡、草丛或阳处。分布于吉林、辽宁、河北、山东、江苏、浙江、江西、湖北、湖南。

全草：清热解毒，祛湿，止痛。

**露珠香茶菜**　野把子(云南)

**Isodon irroratus** (Forrest ex Diels) Kudo——*Plectranthus irroratus* Forrest ex Diels; *Rabdosia irrorata* (Forrest ex Diels) Hara

生于海拔 3 000—3 500 米的松林、竹林及冷杉林下或林缘干燥处。分布于贵州、云南。

根：苦、微甘，寒。清热解毒。用于大头瘟(颜面丹毒)。全草：苦、微甘，寒。清热解毒，解表散寒，祛风湿，止呕。用于无名肿毒。

**毛叶香茶菜**　四棱杆、山苏子、猛一撒(河南)

**Isodon japonicus** (Burm. f.) Hara——*Scutellaria japonica* Burm. f.; *Rabdosia japonica* (Burm. f.) Hara

生于海拔 700—2 100 米的山坡、谷地、路旁、灌丛中。分布于山西、陕西、甘肃、江苏、河南、湖北、四川。

叶：苦，涩。解毒，活血，健胃。

附　注：① 本品含有苦味成份延命素，有抑制肿瘤细胞生长和抑菌的作用。② 日本作苦味健胃药。

**蓝萼香茶菜**　野苏子(吉林),山苏子(吉林、河北),香茶菜(宁夏),倒根野苏(东北

常用中草药手册),回菜花(中国经济植物志)

**Isodon japonicus** (Burm. f.) Hara var. **glaucocalyx** (Maxim.) Hara——*Plectranthus glaucocalyx* Maxim.; *I. glaucocalyx* (Maxim.) Kudo; *Rabdosia japonica* (Burm. f.) Hara var. *glaucocalyx* (Maxim.) Hara

生于干山坡、山地阔叶林下、林缘、沟谷或灌丛中。分布于东北、华北及山东。

全草: 苦、甘,凉。清热解毒,活血化瘀,健脾。用于感冒发热,咽喉肿痛,乳蛾,胃脘痛,乳痈,癌症(食道癌、贲门癌、肝癌、乳腺癌)初起,经闭,跌打损伤,关节痛,蛇虫咬伤。

**长管香茶菜** 铁菱角、四角薄荷、溪薄荷、铁拳头(全国中草药汇编)

**Isodon longitubus** (Miq.) Kudo——*Plectranthus longitubus* Miq.; *Rabdosia longituba* (Miq.) Hara

生于海拔约 1 130 米的山地竹丛中。分布于浙江、福建。

全草: 苦,寒。清热解毒,凉血止血,消痈止痛。用于中暑腹痛,小便淋痛,筋骨酸痛,乳痈,蕲蛇咬伤。

**线纹香茶菜** 熊胆草(广东、广西),土茵陈(广西),碎兰花(贵州),黑疙瘩、涩疙瘩、黑节草(云南)

**Isodon lophanthoides** (Buch.-Ham. ex D. Don) Hara——*Hyssopus lophanthoides* Buch.-Ham. ex D. Don; *Rabdosia lophanthoides* Buch.-Ham. ex D. Don; *Plectranthus striatus* Benth.

生于海拔 500—2 700 米的溪旁、沼泽地上或林下潮湿处。分布于西南及陕西、甘肃、安徽、浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西。

全草(溪黄草): 苦,寒。清热利湿,凉血散瘀,退黄,驱虫。用于黄疸,急性胆囊炎,咽喉痛,痢疾,泄泻,跌打肿痛,妇科病,瘤型麻风,皮炎,可解草乌中毒。

**狭基线纹香茶菜** 熊胆草、风血草(广东),野苏麻(四川),沙虫叶、白线草(云南)

**Isodon lophanthoides** (Buch.-Ham. ex D. Don) Hara var. **gerardianus** (Benth.) Hara——*Plectranthus gerardiana* Benth.; *Rabdosia lophanthoides* (Buch.-Ham. ex D. Don) Hara var. *gerardiana* (Benth.) Hara

生于海拔 430—2 900 米的杂木林下及灌丛中。分布于西南及甘肃、湖南、广东、广西。

全草或根: 清热利湿。用于黄疸,急性胆囊炎,蛔虫病;外用于毒蛇咬伤。

**细花线纹香茶菜**

**Isodon lophanthoides** (Buch.-Ham. ex D. Don) Hara var. **graciliflorus** (Benth.) Hara——*Plectranthus graciliflora* Benth.; *Rabdosia lophanthoides* (Buch.-Ham. ex D. Don) Hara var. *graciliflora* (Benth.) Hara

生于田间或山谷溪边。分布于江西、福建、广东。

全草: 清热解毒。用于肝炎。

**岐伞香茶菜** 大叶香茶菜(安徽)

**Isodon macrophyllus** (Migo) Hara——*Amethystanthus macrophyllus* Migo; *Rabdosia macrophylla* (Migo) C. Y. Wu et H. W. Li

生于海拔约 120 米的山坡、路旁或杂木林下。分布于江苏、安徽。

全草：清热解毒，利湿。

**大锥香茶菜**　九头狮子草、四棱草、血剑草、豆杆沙(云南)

**Isodon megathyrsus** (Diels) C. Y. Wu et Hsuan——*Plectranthus megathyrsus* Diels; *Rabdosia megathyrsa* (Diels) Hara

生于海拔 2 300—2 900(—3 500)米的山谷松栎林或云杉林下。分布于贵州、云南。

根：用于止血，顺气。全草：苦、辛，微温。解表散寒，透疹，活血散瘀，祛风湿，解毒，止呕。用于风寒感冒，呕吐泄泻，麻疹，黄水疮，跌打损伤，风湿麻木，偏瘫及毒蛇咬伤。

**显脉香茶菜**　藿香(南京)，山薄荷、铁菱角(浙江)，蓝花柴胡、大叶蛇总管(广西)

**Isodon nervosus** (Hemsl.) Kudo——*Plectranthus nervosus* Hemsl.; *Rabdosia nervosa* (Hemsl.) C. Y. Wu et H. W. Li

生于海拔(60—)300—600(—1 500)米的山谷、草丛及林下阴湿处。分布于中南及陕西、江苏、安徽、浙江、江西、四川、贵州。

全草(大叶蛇总管)：辛、苦，寒。清热，利湿，解毒。用于感冒，黄疸，毒蛇咬伤，疮毒，湿疹，皮肤瘙痒，痱症，烫伤。

附　注：本种在湖北个别地区误作佩兰药用。

**叶穗香茶菜**　虎尾草、斑鸠钻(云南)

**Isodon phyllostachys** (Diels) Kudo——*Plectranthus phyllostachys* Diels; *Rabdosia phyllostachys* (Diels) Hara

生于海拔 1 600—3 000 米的灌丛中或路边草坡上。分布于四川、云南。

根：苦，平。清热，收敛，止血。用于泄泻，痢疾，胃痛。

**川藏香茶菜**　兴木蒂那布(藏语)

**Isodon pseudo-irrorata** (C. Y. Wu) Hara——*Rabdosia pseudoirrorata* C. Y. Wu

生于海拔 3 300—4 300 米的山坡林缘、碎石间、石岩上或灌丛中。分布于四川、西藏。

叶、花：用于驱蛔虫，祛腐。

**总序香茶菜**

**Isodon racemosus** (Hemsl.) Hara——*Plectranthus racemosus* Hemsl.; *Rabdosia racemosa* (Hemsl.) Hara

生于海拔 700—1 500 米的山坡草地、林下。分布于湖北、四川。

茎、叶：外用于疮毒。

**瘦花香茶菜**　野苏、(白)野紫苏、野藿香(四川)

**Isodon rosthornii** (Diels) Kudo——*Plectranthus rosthornii* Diels; *Rabdosia rosthornii* (Diels) Hara

生于海拔 550—2 300 米的开旷山坡及灌丛下。分布于四川、贵州。

全草：辛，温。解表散寒，清热化痰，消痈肿。

**碎米桠**　冰凌草、山茌(河南)，破血丹(四川)，山香草(贵州)，冰凌花(中药志)

**Isodon rubescens** (Hemsl.) Hara——*Plectranthus rubescens* Hemsl.; *Rabdosia rubescens* (Hemsl.) Hara

生于海拔 100—2 800 米的山坡、灌丛、林地、砾石地及路边向阳处。分布于河北、山

西、陕西、甘肃、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、广西、四川、贵州。主产于河南及黄河流域以南地区。

地上部分(冬凌草)：苦、甘，凉。清热解毒，祛风除湿，活血止痛，抗癌；消炎，抗菌。用于咽喉肿痛，乳蛾，感冒头痛，咳嗽，慢性肝炎，风湿关节痛，蛇虫咬伤，癌症。

附　注：① 近年来研究结果表明，本种对多种癌症有缓解症状，延长生命的作用。②《中药大辞典》中学名误定为 *I. pubescens* (Hemsl.) C. Y. Wu et Hsuan。

**皱叶香茶菜**　藿香(西藏)

**Isodon rugosa** (Wall.) Codd.——*Plectranthus rugosa* Wall.; *Rabdosia rugosa* (Wall.) Hara

生于海拔 1 000—3 350 米的山坡、路旁、沟边及灌丛、林下。分布于四川、云南、西藏。

叶及嫩叶：解毒，消炎，止血。

**黄花香茶菜**　白沙虫药、痢药(贵州)，烂脚草、臭蒿子、假荨麻(云南)

**Isodon sculponeata** (Vaniot) Kudo——*Plectranthus sculponeatus* Vaniot; *Rabdosia sculponeata* (Vaniot) Hara

生于海拔 500—2 800 米的空旷草地或灌丛中。分布于陕西、广西、四川、贵州、云南。

全草(白沙虫药)：苦、辛，凉。理气，利湿，清热，解毒。用于感冒，小儿疳积，口腔溃烂，痢疾，皮肤瘙痒，脚癣；并可解草乌中毒。　叶：用于脚癣。

附　注：茎、叶中分离出四个结晶成分：黄花香茶菜甲、乙、丙素 (Sculponeatin A, B and C) 和延命素，有较强抑癌活性。

**溪黄草**　毛果香茶菜(辽宁)，溪沟草、台湾延胡索(广东)，马瓦省(仫佬语)，棵来落(壮语)

**Isodon serra** (Maxim.) Kudo——*Plectranthus serra* Maxim.; *Rabdosia serra* (Maxim.) Hara

生于海拔 120—1 800 米的山坡、路旁、田边、溪旁、河岸、草丛、灌丛及林下沙壤土上，常成丛生长。分布于东北、中南及山西、陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、台湾、四川、贵州。

全草：苦，凉。清热利湿，凉血散瘀。用于急性肝炎，急性胆囊炎，跌打瘀肿。

**长叶香茶菜**　四方草(广西)，海南香茶菜、溪黄草(海南岛常用中草药手册)

**Isodon stracheyi** (Benth. ex Hook. f.) Hara——*Plectranthus strachyei* Benth. ex Hook. f.; *Rabdosia stracheyi* (Benth. ex Hook. f.) Hara

生于海拔 1 060—1 220 米的水边、林下潮湿处。分布于广东、海南、广西西南部、云南南部。

全草：苦，寒。清热消炎，退黄祛湿，祛瘀止痛。用于急性黄疸，急性胆囊炎，湿热水肿，中暑，腹痛，跌打，胸痛，咯血，乳疮。

**牛尾草**　伤寒头(广西)，虫牙药(贵州)，牛尾巴蒿、马鹿尾(云南)，三叶香茶菜(中药大辞典)

**Isodon ternifolius** (D. Don) Kudo——*Plectranthus ternifolius* D. Don; *Rabdosia ternifolia* (D. Don) Hara

生于海拔 140—2 200 米的空旷山坡或疏林下。分布于广东、广西、贵州、云南。

全草或根(虫牙药)：微苦，凉。清热解毒，祛风，化痰利湿，止咳利胆，消肿止痛。用于外感发热，牙痛，头痛，咳嗽痰喘，痢疾，泄泻，黄疸，咽喉痛，乳蛾，小便淋痛，水肿，刀伤出血；外用于蛇伤，疮肿。叶：用于小儿疳积；外用于黄水疮。

**不育红**　云南香茶菜、九头狮子草、血疙瘩、小铁牛、地龙园(云南)

**Isodon yunnanensis** (Hand.-Mazz.) Hara——*Plectranthus yunnanensis* Hand.-Mazz.; *Rabdosia yunnanensis* (Hand.-Mazz.) Hara

生于海拔1 800—3 000米的松林下或草丛中。分布于四川西南部、云南中部、西北部及东北部。

根状茎：苦、辛，温。有毒。舒筋活血，通经活络，消食理气，止痛，止痢。用于痛经，经闭，胃寒痛，狂犬咬伤，跌打损伤及妇女不育症。

## 香简草属　Keiskea Miq.

**香薷状香简草**　山紫苏(广西)，香薷状霉柱(植物分类学报)

**Keiskea elsholtzioides** Merr.

生于海拔约500米的红壤丘陵草丛或树丛中。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西。

全草：祛风除湿，镇痛。用于风湿痹痛。

附　注：本种在湖北个别地区误作苏梗及苏子使用。

## 动蕊花属　Kinostemon Kudo

**粉红动蕊花**

**Kinostemon alborubrum** (Hemsl.) C. Y. Wu et S Chow——*Teucrium alborubrum* Hemsl.

生于海拔1 500米以下的灌丛中及山坡草丛中。分布于湖北西部、四川东北部。

全草：用于劳伤，风湿疼痛。

附　注：我国特有属。

**动蕊花**　野藿香(贵州)

**Kinostemon ornatum** (Hemsl.) Kudo——*Teucrium ornatum* Hemsl.

生于海拔740—2 550米的山坡林下及灌丛中。分布于陕西、湖北、广西、四川、贵州、云南。

全草：清热解毒。用于头痛，发热，肿瘤，肠痈，肝炎，肺痈。

**镰叶动蕊花**

**Kinostemon ornatum** (Hemsl.) Kudo f **falcatum** C. Y. Wu et S. Chow

生于海拔约1 200米的岩石山林下。分布于湖北、四川。

全草：用于烧、烫伤。

## 兔唇花属 Lagochilus Bunge

**大花兔唇花**

**Lagochilus grandiflorus** C. Y. Wu et Hsuan

生于山坡岩石上。分布于新疆北部。

全草：消炎，止血，镇静。

## 夏至草属 Lagopsis (Bunge ex Benth.) Bunge

**夏至草** 白花益母草(甘肃、云南)，灯笼棵(江苏)，白花夏枯(云南)，兴托里尕保(藏语)，夏枯草(滇南本草)

**Lagopsis supina** (Steph. ex Willd.) Ik.-Gal. ex Knorr. —— *Leonurus supinus* Steph. ex Willd.; *Marrubium incisum* Benth.

生于海拔2700米以下的路旁、低山水边及旷地上。分布于东北、华北、西北、西南及山东、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北。

地上部分：微苦，平。有小毒。养血调经。用于贫血性头晕，半身不遂，月经不调，水肿。

附 注：①本种在甘肃个别地区作益母草使用，称"白花益母草"。② 功效相同的有**黄花夏至草 L. flava** Kar. et Kir.，分布于新疆天山南北麓。

## 独一味属 Lamiophlomis Kudo

**独一味** 大巴、打布巴(藏语)

**Lamiophlomis rotata** (Benth.) Kudo——*Phlomis rotata* Benth. ex Hook. f.

生于海拔 2 700—4 500 米的高原、高山上强度风化的碎石滩中、石质高山草甸、河滩地。分布于甘肃、青海、四川、云南、西藏。

根及根状茎：苦，凉。有小毒。活血祛瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，骨折，腰部扭伤，关节积液。

附 注：为藏医常用药。

## 野芝麻属 Lamium L.

**短柄野芝麻** 野芝麻(吉林、辽宁、内蒙古)

**Lamium album** L.

生于海拔 1 400—2 400 米的落叶松林林缘、云杉林破坏后的湿润地及谷底半阴坡草丛中。分布于吉林、辽宁、内蒙古、山西、甘肃、新疆。

地上部分：甘、苦，凉。活血散瘀，消炎止痛。用于跌打损伤，痛经，带下病，小便淋痛，子宫内膜炎。

**宝盖草**　珍珠莲(江西),接骨草、莲台夏枯草(云南),赞木噶、扎西个则(藏语)

**Lamium amplexicaule** L.

生于海拔700—4 350米的路旁、林缘、沼泽草地及宅旁。分布于西北、华东、西南及河北、河南、湖北、湖南。

全草：辛、苦,平。清热利湿,活血祛风,消肿解毒。用于黄疸,高血压症，筋骨疼痛,面神经麻痹,四肢麻木,半身不遂,跌打损伤,骨折,瘰疬,黄水疮。

**野芝麻**　白花野芝麻(黑龙江),山苏子(辽宁),野油麻(湖南),野藿香、山麦胡(四川)

**Lamium barbatum** Sieb. et Zucc.——*L. album* L. var. *barbatum* (Sieb. et Zucc.) Franch.

生于海拔2 600米以下的路旁、溪旁、田埂及荒地上。分布于东北、华北、华东及陕西、甘肃、河南、湖北、湖南、四川、贵州。

根(野芝麻)：微甘,平。清肝利湿,活血消肿。用于眩晕,肝炎,肺痨,水肿，带下病,疳积,痔疮,肿毒。　全草：甘、辛,平。散瘀,消积，调经,利湿。用于跌打损伤，小儿疳积,带下病,痛经,月经不调,水肿,小便涩痛。　花：甘、辛，平。调经，利湿。用于月经不调,带下病,小便不利。

## 薰衣草属　Lavandula L.

**薰衣草**

**Lavandula angustifolia** Mill.——*L. spica* L.

原产地中海地区。栽培于陕西、新疆、湖北。

全草：防腐,消炎,杀菌,驱虫。用于烫、烧伤,皮肤病,神经痛。　花：为提取香精的原料。

## 益母草属　Leonurus L.

**益母草**　益母蒿、坤草(通称),森蒂(藏语),马凉丹(仫佬语),益母夏枯(滇南本草)

**Leonurus japonicus** Houtt.——*L. heterophyllus* Sweet; *L. artermisia* (Lour.) S. Y. Hu; *Stachus artemisia* Lour.

生于原野荒地、路旁、草地、堤旁、溪边、多石的山坡,以阳处为多,亦有栽培.全国各地普遍分布。

地上部分(益母草)：苦、辛,凉。活血调经,利尿消肿。用于月经不调,痛经,经闭,恶露不尽,水肿尿少。　幼株(童子益母草)：补血,祛瘀生新。用于疮疡肿毒,跌打损伤。花(益母草花)：微苦，甘。用于肿毒疮疡，利水行血。妇人胎产诸病。民间用作妇女补血剂。　果实(茺蔚子)：辛、苦,凉。活血调经。用于经闭,痛经,产后瘀血腹痛。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。② 本属植物中以下种类在部分地区与益母草同用的有**白花益母草 L. japonicus** Houtt. var. **albiflorus** (Migo) S. Y. Hu——*L. sibiricus* L. var. *albiflorus* Migo，分布于江苏、浙江、江西、福建、湖北、广

东、广西、四川、贵州、云南；**细叶益母草 L. sibiricus** L.，分布于华北及吉林、辽宁、陕西、新疆、贵州；**白花细叶益母草 L. sibiricus** L. f. **albiflorus** (Nakai et Kitag.) C. Y. Wu et H. W. Li，分布于内蒙古；**灰白益母草 L. glaucescens** Bunge，分布于内蒙古、新疆；**玛纳斯益母草 L. manacencus** G. J. Liou，分布于新疆；**绵毛益母草 L. panzerioides** M. Pop.，分布于新疆阿尔泰山；**兴安益母草 L. tataricus** L.，分布于吉林、内蒙古东北部；**突厥益母草 L. turkestanicus** V. Krecz. et Kupr.，分布于新疆。

**大花益母草**　白花益母草(河北)

**Leonurus macranthus** Maxim.

生于海拔 400 米以下的草坡及灌丛中。分布于吉林、辽宁、河北、内蒙古。

茎、叶：接骨止痛，固表止血。用于筋骨疼痛，虚弱，痿软，自汗，盗汗，血崩，跌打损伤。

附　注：本种在河北部分地区作益母草使用，民间称"白花益母草"。

**錾菜**　山玉米膏(河北)，白花益母膏(山西)

**Leonurus pseudomacarthus** Kitag.

生于海拔 100—1 700 米的山坡、丘陵地上或灌丛中。分布于华北及辽宁、陕西、甘肃、山东、江苏、安徽、河南、湖北。

全草：辛、微苦，凉。破瘀，调经，利尿。用于产后腹痛，痛经，月经不调，水肿。

附　注：①錾菜(本草拾遗)作为 *L. macranthus* Kitag. 系日本学者误释。②本种在山东、陕西部分地区作益母草使用。③ 功效相同的有**白花錾菜 L. pseudomacranthus** Kitag. f. **leucanthus** Kitag.，分布于江苏、江西。

## 绣球防风属　Leucas R. Br.

**蜂巢草**　锡兰绣球防风(广东)，蜂窝草(海南)

**Leucas aspera** (Willd.) Link——*Phlomis aspera* Willd.

生于海拔约 100 米的田地、空旷潮湿地或沙质草地上。分布于广东、海南、广西。

全草：苦、辛，凉。发散风寒，化痰止咳。用于顿咳，风热咳嗽，感冒发热，风火牙痛，咽喉痛，痈肿。

**绣球防风**　灵继六(四川)，包团草、泡花草(贵州)，绣球草、蜜蜂草、紫药(云南)，克眼拿补(哈尼语)

**Leucas ciliata** Benth.

生于海拔 500—2 800 米的山谷草地、灌丛、溪边、路旁。分布于广西、四川、贵州、云南。

根：辛、苦，温。祛风解毒，舒肝理气。用于风寒感冒，肝气郁结，风湿麻木疼痛，痢疾，小儿疳积，皮疹，脱肛。　全草(绣球防风)：苦、辛，凉。破血通经，明目退翳，解毒消肿。用于妇女血瘀经闭，小儿雀目，青盲翳障，骨折，痈疽肿毒。　果实：用于风寒感冒，小儿风热咳喘。

**白绒草**　北风草(广东、云南)，一包针(四川)，银针七、灯笼草(花)(云南)

**Leucas mollissima** Wall.

生于海拔750—2 000米的阳坡灌丛、路旁、草地及荫蔽和溪边湿润地上，亦有栽培。分布于广西、四川、贵州、云南。

全草：甘、微辛，平。清肺止咳，解毒。用于肺热咳嗽，咯血，胸痛，肾虚遗精，阳痿；外用于疖肿，乳痈，骨折。

**疏毛绒草**　引生草、皱面草(海南)，节节香、野芝麻(四川)

**Leucas mollissima** Wall var. **chinensis** Benth.

生于海拔750—2 700米干燥向阳的灌丛草地及沟边。分布于福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全草：驱寒发表。外用于疮疖，疮毒。

**皱面草**　蜂窝草(广东、云南)，蜂巢草(广东)，半夜花(海南)，打毒金(全国中草药汇编)

**Leucas zeylanica** (L.) R. Br. ——*Phlomis zeylanica* L.

生于海拔250米以下砂壤质的滨海地、田间、路旁及缓坡向阳处。分布于广东、海南、广西、云南。

全草(蜂窝草)：苦、辛，温。解表，止咳，通经，明目。用于感冒，头痛，牙痛，咽喉痛，咳嗽，顿咳，消化不良，经闭，夜盲症，疥癣。

## 米团花属　Leucosceptrum Smith

**米团花**　蜂蜜树、山蜂蜜、渍糖树(云南)，考西垫(佤语)，白杖木(中国种子植物科属辞典)

**Leucosceptrum canum** Smith

生于海拔1 000—1 900(—2 600)米的干燥开阔荒地、路边、谷地溪边、林缘、灌丛中及石灰岩上。分布于四川西南部、云南。

叶、皮：苦，凉。清热解毒，利湿消肿，止血。用于皮肤溃疡，外伤出血，无名肿毒，骨折，附骨疽，肌腱炎，高热无汗，肝炎，肝劳。

## 扭藿香属　Lophanthus Adans.

**阿尔泰扭藿香**

**Lophanthus krylovii** Lipsky

生于海拔2 000—2 500米的山谷阴湿处、泉边及岩脚、草地。分布于新疆。

全草：消暑止呕，行气止泻。

## 斜萼草属　Loxocalyx Hemsl.

**斜萼草**　佛座(四川)

**Loxocalyx urticifolius** Hemsl.

生于海拔1200—2700米的林下沟谷中、荒坡草地上及潮湿处。分布于河北、陕西、甘

肃、河南、湖北.四川、贵州、云南。

全草：用于风湿疼痛，痢疾；亦可杀虫。

附　注：我国特有属。

## 地笋属　Lycopus L.

**毛叶地笋**　毛叶地瓜儿苗(通称)，地笋(吉林、陕西、江苏、湖北、广东、广西、四川、贵州、云南)，地环(东北及北方各省)，地石蚕(陕西)，蛇王草(广东)

**Lycopus lucidus** Turcz. var. **hirtus** Regel

生于海拔2100米以下的沼泽地、水边等潮湿处，亦有栽培。分布于东北、华北、华东、中南、西南及陕西、甘肃。

地上部分(泽兰)：苦、辛，微温。活血化瘀，行水消肿。用于月经不调，经闭，痛经，产后瘀血腹痛，水肿，跌打损伤，金疮痈肿。　根(地笋)：甘、辛，温。益气，活血，消肿。用于吐血，衄血，产后腹痛，带下病，咳嗽，乳痈，痈肿。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②本属植物中以下种类在部分地区也作泽兰用的有**地笋 L. lucidus** Turcz.，分布于东北、华北及陕西、青海、新疆、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南；**异叶地笋 L. lucidus** Turcz. var. **maackianus** Maxim. ex Herd.——*L. maackianus* (Maxim.) Makino，分布于黑龙江、吉林；**小叶地笋 L. coreanus** Lévl.，分布于吉林、辽宁、安徽、浙江、江西；**欧地笋 L. europaeus** L.，分布于河北北部、陕西、新疆、云南；**深裂地笋 L. europaeus** L.var. **exaltatus** (L. f.) Hook f. ——*L. exaltatus* L. f.，分布于新疆；**小花地笋 L. parviflorus** Maxim.，分布于黑龙江、吉林。

## 欧夏至草属　Marrubium L.

**欧夏至草**

**Marrubium vulgare** L.

生于路旁、沟边、干燥灰壤上。分布于新疆。

全草：健胃，祛痰。用于呼吸器官的慢性病。

附　注：可作为金鸡纳霜皮的代用品。

## 龙头草属　Mcehania Britt.

**华西龙头草**　水升麻(四川)，红紫苏(贵州)，华西美汉花(植物分类学报)

**Meehania fargesii** (Lévl.) C. Y. Wu——*Dracocephalum fargesii* Lévl.

生于海拔1900—3500米的针阔叶混交林或针叶林下阴处。分布于四川东部及西部、贵州东北部、云南西北部。

全草：辛，温。发表散寒。用于风寒感冒。

**梗花龙头草**　发口菜(广西)，疏麻菜、山苏麻(四川)

**Meehania fargesii** (Lévl.) C. Y. Wu var. **pedunculata** (Hemsl.) C. Y. Wu——*Dracocephalum urticifolium* Miq. var. *pedunculata* Hemsl.

生于海拔1 400—3 500米的山地常绿林或针阔叶混交林内。分布于湖北、湖南、广西、四川、云南。

根、叶：用于牙痛。　全草：用于泄泻。

**走茎龙头草**　木犀臭(江西)，红紫苏(贵州)

**Meehania fargesii** (Lévl.) C. Y. Wu var. **radicans** (Vaniot) C. Y. Wu——*Dracocephalum radicans* Vaniot

生于海拔1 200—1 800米的常绿及落叶阔叶混交林下阴湿处。分布于浙江、江西、湖北、广东、四川、贵州、云南。

全草：用于风寒感冒；外用于蛇咬伤，疮疖，湿疹。

**龙头草**　长穗美汉花(植物分类学报)

**Meehania henryi** (Hemsl.) Sun ex C. Y. Wu——*Dracocephalum henryi* Hemsl.

生于低海拔地区的常绿林或混交林下。分布于湖北西部、湖南西部、四川东南部、贵州东南部。

根：(浸酒服)补血。　叶：外用于蛇咬伤。

**荨麻叶龙头草**　芝麻花(辽宁)，美汉花(植物分类学报)

**Meehania urticifolia** (Miq.) Makino——*Dracocephalum urticifolia* Miq.

生于混交林或针叶林林下苔藓中阴湿处。分布于吉林、辽宁。

根、叶：补血；外用于蛇咬伤。

## 蜜蜂花属　Melissa L.

**蜜蜂花**　水风轮(广西)，红活美、鼻血草(四川)，滇荆芥、土荆芥(云南)

**Melissa axillaris** (Benth.) Bakh. f. ——*Geniosporum axillare* Benth.; *M. parviflora* Benth.

生于海拔600—2 800米的路旁、山地、山坡、谷地向阳草丛或灌丛中。分布于西南及陕西、江西、湖北、湖南、广东、广西。

全草(鼻血草)：苦、涩，平。清热解毒。用于风湿麻木，麻风，吐血，鼻衄，痢疾，皮肤瘙痒，疮疹，癫症，崩漏，蛇咬伤。

**香蜂花**

**Melissa officinalis** L.

原产苏联、伊朗至地中海及大西洋沿岸。全国有引种栽培。

全草：作刺激剂或轻泻剂；多用于头痛及牙痛。

## 薄荷属　Mentha L.

**薄荷**　野薄荷(通称)，见肿消(江苏)，水薄荷(四川、云南)，古尔蒂(西藏)，薯荷菜(千金、食治)

**Mentha haplocalyx** Briq.

生于海拔3500米以下的河旁、沟旁、路边、小溪边及山野湿地。全国各地普遍分布。

地上部分(薄荷)：辛，凉。宣散风热，明目，透疹。用于风热感冒，风温初起，头痛，目赤，喉痹，口疮，风疹，麻疹，胸胁胀闷。　挥发油(薄荷油)：芳香，调味及祛风药。用于皮肤或粘膜产生清凉感以减轻疼痛。　鲜茎、叶的蒸馏液(薄荷露)：辛，凉。和中，发汗，解热，宣滞，凉膈，清头目。用于头痛，热嗽，皮肤痧疹，耳目咽喉口齿诸病。　薄荷油中得到的一种饱和的环状醇(薄荷脑)：祛痰；外用止痛，止痒。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。② 功效相同的有**家薄荷 M. haplocalyx** Briq. var. **piperascens** (Malinvand) C. Y. Wu et H. W. Li，栽培于天津、江苏、河南、四川；**龙脑薄荷 M. arvensis** L. var. **malinvaudi** (Levl.) C.Y. Wu et H. W Li，栽培于江苏苏州、太仓；**假薄荷 M. asiatica** Boriss.，分布于新疆、四川西北部、西藏；**兴安薄荷 M. dahurica** Fisch. ex Benth.，分布于黑龙江、吉林、内蒙古东北部；**灰薄荷 M. vagans** Boriss.，分布于新疆。③在上海等地的薄荷商品中时混有留兰香。

**辣薄荷**　　欧薄荷(全国中草药汇编)

**Mentha piperita** L.

原产欧洲。栽培于北京、南京、湖北。

叶中所得之黄酮体（flavonoid）经试验给犬口服有强利胆作用。能使胆汁、胆酸盐总量排出增加，但胆酸盐、胆色素、cholestenis的浓度下降。本品有抗腮腺炎病毒作用。

**圆叶薄荷**　　留兰香、土薄荷(四川)，白香菜、圆叶留兰香(贵州)，鱼香草(分类草药性)

**Mentha rotundifolia** (L.) Huds.——*M. spicata* L. r. *rotundifolia* L.

原产中欧。栽培于北京、南京、上海、四川、贵州、云南丽江、昆明。

根(鱼香草根)：用于气痛，阴寒，痢疾。　茎叶或嫩枝头：辛，凉。散风热，消肿毒。用于伤风感冒，胃气痛，鼻衄，目赤，疔疮，热疖。

**东北薄荷**　　兴安薄荷、野薄荷(全国中草药汇编)

**Mentha sachalinensis** (Briq.) Kudo——*M. arvensis* L. subsp. *haplocalyx* Briq. var. *sachalinensis* Briq

生于海拔170—1 100米的河旁、湖旁、潮湿草地。分布于东北及内蒙古。

全草：辛，凉。驱风解热。用于外感风热，头痛，咽喉肿痛，牙痛。

**留兰香**　　香花菜、绿薄荷(广东、云南)，青薄荷(广东、贵州)，鱼香菜(贵州)，土薄荷(贵州、云南)

**Mentha spicata** L. ——*M. viridis* L.

原产南欧、加那利群岛、马德拉群岛、原苏联。我国中南及河北、陕西、山东、江苏、安徽、浙江、四川、贵州、云南有栽培。新疆有原生。

全草(留兰香)：辛、甘，微温。祛风散寒，止咳，消肿解毒。用于感冒，咳嗽，胃痛，腹胀，神经性头痛；外用于跌打肿痛，目赤红痛，小儿疮疖。

附　注：《四川中药志》误定为 *M. rotundifolis* (L.) Huds.

## 凉粉草属 Mesona Bl.

**凉粉草** 仙人草、仙草(广东),仙人伴(广东、广西),仙人冻(本草纲目拾遗)

**Mesona chinensis** Benth.

生于山坡、沟谷的草丛中或干沙地草丛中,栽培于农田、庭园。分布于浙江、江西、台湾、广东、广西、贵州。

全草:甘、淡,凉。清热利湿,凉血。用于中暑,消渴,高血压症,肌肉关节疼痛。

附 注:干燥全草煎汁与米浆混合煮熟,制成黑色胶状物,为广东、广西地区暑天常有出售的清凉饮料,称凉粉或仙人伴。

## 箭叶水苏属 Metastachydium Airy-Shaw

**箭叶水苏**

**Metastachydium sagittatum** (Regel) C. Y. Wu et H. W. Li——*Phlomis sagittata* Regel

生于河岸溪边、山谷湿地及山地草甸上。分布于新疆。

地上部分:健胃,祛痰。

附 注:新疆作"水苏"药用。

## 姜味草属 Micromeria Benth.

**小香薷**

**Micromeria barosma** (W. W. Smith) Hand.-Mazz. ——*Calamintha barosma* W. W. Smith

生于海拔 2 000 米左右的石灰岩山地草丛中。分布于云南西北部。

全草:辛,温。祛风解表,温中除湿。用于感冒咳嗽,吐泻,胃痛,消化不良,腹痛,疝气,并可防治痢疾。

**姜味草** 小姜草、小香草、灵芝草、香草、胡椒草、桂子香(云南)

**Micromeria biflora** (Buch.-Ham. ex D. Don) Benth. ——*Thymus biflora* Buch.-Ham. ex D. Don

生于海拔 2 000—2 550 米的石灰岩山地及开阔草地。分布于贵州、云南。

全草(姜味草):苦、辛,温。温中,理气,祛风解表,止痛。用于感冒咳嗽,胃痛,腹痛,疝气痛,吐逆,噎膈。

## 冠唇花属 Microtoena Prain

**云南冠唇花** 野香薷(云南)

**Microtoena delavayi** Prain

生于海拔 1 930—2 600 米的阴湿林内，灌丛中或林缘、路边及草坡上。分布于云南西北部、中部、中南部至西部。

全草：止痛。用于腹痛，风湿痛。

附　注：云南特有药用植物。

**冠唇花**　　广藿香(广东、云南)，野藿香(云南)，牙皮弯(傣语)

**Microtoena insuavis** (Hance) Prain ex Dunn——*Gomphostemma insuave* Hance

生于海拔 600—1 000 米的林下、林缘或灌丛中。分布于广东、海南、四川、贵州、云南。

全草(野藿香)：苦、辛，温。芳香健胃，温中理气。用于风寒感冒，喘咳气急，消化不良，气胀腹痛，泄泻，痢疾。

**峨眉冠唇花**　　四棱香、大叶紫苏、野大麻(四川)

**Microtoena omeiensis** C. Y. Wu et Hsuan ex Hsuan

生于海拔 1 500—1 700 (—4 000) 米的灌丛中或空旷草地。分布于四川。

全草：芳香，化浊，理气。

附　注：四川特有药用植物。

**滇南冠唇花**　　野土藿香、土藿香(云南)，斑草刚(景颇语)，牙皮弯(傣语)

**Microtoena patchouli** (C. B. Clarke ex Hook. f.) C. Y. Wu et Hsuan ex Hsuan——*Plectranthus patchouli* C B. Clarke ex Hook. f.

生于海拔 (560—670)1 100—2 000 米的路边、林下、灌丛中或空旷草坡上。分布于广西、四川、云南。

全草：辛，微温。解暑化湿，行气和胃。用于风寒感冒，喘咳气急，吐泻，头痛，腹痛，胸闷，食欲不振，泄泻，痢疾；外用于手足癣。

**少花冠唇花**　　疏花香薷(云南)

**Microtoena pauciflora** C. Y. Wu ex Hsuan

生于海拔 1 600 米左右的村寨边。分布于云南西部。

全草：止痛。用于感冒头痛，腹痛。

附　注：云南特有药用植物。

**南川冠唇花**　　龙头花(四川)

**Microtoena prainiana** Diels

生于海拔 1 000—2 200 米的林下、林缘、沟边或荒坡上。分布于四川、贵州、云南东北部。

全草：解表散寒，降气消痰。

**麻叶冠唇花**

**Microtoena urticifolia** Hemsl.

生于山坡林下或草丛中。分布于湖北西北部。

全草：用于风湿关节痛。

附　注：湖北特有药用植物。

## 石荠苎属　Mosla (Benth.) Buch.-Ham. ex Maxim.

**小花荠苎**　　野香薷、细叶七星剑(广东)，土荆芥(广西)，痱子草(贵州)

**Mosla cavaleriei** Lévl.——*Orthodon cavaleriei* (Lévl.) Kudo

生于海拔 160—1 800 米的疏林下及山坡草地。分布于浙江、江西、湖北、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草(七星剑): 辛,微温。发汗解暑,健脾利湿,止痒,解蛇毒。用于感冒中暑,吐泻,消化不良,水肿;外用于湿疹,疮疖肿毒,跌打肿痛,狂犬、毒蛇咬伤。

**石香薷** 痱子草(陕西),华荠苎(江苏、浙江、湖南、广西),青香薷(江西、湖南、广西),小香薷(江西、福建、广东、广西、四川),细叶香薷(湖南、广西)

**Mosla chinensis** Maxim.——*Orthodon chinensis* (Maxim.) Kudo

生于海拔 1 400 米以下的山坡荒地、草地、田边及灌丛中,或为栽培。分布于华东、中南及陕西、四川、贵州。主产于广西桂林和全县,广东,湖南长沙和湘潭,湖北孝感和黄岗等地。

全草(青香薷): 辛,微温。发汗解表,和中利湿。用于暑湿感冒,恶寒发热,头痛无汗,腹痛吐泻,小便不利。

**小鱼仙草** 石荠苎、痱子草(江西、福建、广东),热痱草、土荆芥(广东、广西),疏花荠苎(中药志)

**Mosla dianthera** (Buch.-Ham.) Maxim. ——*Lycopus dianthera* Buch.-Ham.; *Orthodon dianterus* (Buch.-Ham.) Hand.-Mazz.

生于海拔 175—2 300 米的山坡、路旁或沟边。分布于华东、中南及陕西、甘肃、四川、贵州、云南。

全草(大叶香薷): 辛,温。祛风发表,利湿止痒。用于感冒头痛,乳蛾,中暑,溃疡病,痢疾;外用于湿疹,痱子,皮肤瘙痒,疮疖,蜈蚣咬伤。

附 注: 全草可薰蚊。

**荠苎** 水苋菜(贵州),臭苏、青白苏(日华子本草)

**Mosla grosseserrata** Maxim. ——*Orthodon grosseserrata* (Maxim.) Kudo

生于河边、山坡草地及灌丛中。分布于吉林、辽宁、江苏、安徽。

根: 辛,温。宣肺平喘。用于哮喘。 茎叶(荠苎): 辛,温。用于泄泻,胃作酸水,也可作驱虫剂。

**杭州荠苎**

**Mosla hangchowensis** Matsuda

生于向阳山坡、丘陵及荒坡路边草丛中。分布于浙江。

全草: 辛,温。解表,清暑,和中,解毒。

**少花荠苎**

**Mosla pauciflora** (C. Y. Wu) C Y Wu et H.W. Li—— *Orthodon pauciflorus* C. Y. Wu

生于海拔 980—1 350 米的路旁、林缘、溪畔。分布于湖北、四川、贵州。

全草: 用于感冒,咽喉肿痛,中暑,吐泻。

**石荠苎** 痱子草(江苏、四川、贵州),土荆芥(江苏、江西、湖北、湖南、广东、广西、贵州、四川),沙虫药(广东、广西),土香薷草(四川),粗糙荠苎(中药大辞典)

**Mosla scabra** (Thunb.) C. Y. Wu et H. W. Li —— *Ocimum scabra* Thunb.;

*Orthodon scabra* (Thunb.) Hand. -Mazz.

生于海拔 50—1 150 米的山坡、路旁或灌丛下。分布于华东、中南及吉林、辽宁、北京、陕西、甘肃、四川、贵州。

全草(石荠苧): 辛,微温。疏风清暑,行气理血, 利湿止痒。用于感冒头痛, 咽喉肿痛,中暑,吐泻,痢疾,小便不利,水肿,带下病。炒炭用于便血,崩漏;外用于跌打损伤, 外伤出血,痱子,湿疹,脚癣,多发性疖肿及毒蛇咬伤。

附 注: 本种在四川东部、西部作香薷使用。

**苏州荠苧** 土香薷、小叶香薷、土荆芥、天香油、痧药草(浙江)

**Mosla soochowensis** Matsuda —— *Orthodon soochowensis* (Matsuda) C. Y. Wu

生于丘陵、荒坡及山脚路边的草丛中。分布于江苏、上海、安徽、浙江、江西。

地上部分(五香草): 辛,温。解表理气,解毒消炎,利尿镇痛。用于感冒,中暑,乳蛾,痧气腹痛,胃气痛;外用于蜈蚣咬伤。

## 荆芥属 Nepeta L.

**荆芥** 小荆芥(湖北),樟脑草(广西),拟荆芥(云南),土荆芥(西藏)

**Nepeta cataria** L

生于海拔 2 500 米以下的山坡、林缘、灌丛及宅旁或栽培。分布于西南及河北、山西、陕西、甘肃、新疆、山东、河南、湖北。

全草: 辛,凉。祛风发汗,解热,透疹,散瘀消肿,止血,止痛。用于伤风感冒, 头痛发热,咽喉肿痛,目赤红肿,麻疹不透,跌打损伤,吐血,鼻衄,外伤出血,毒蛇咬伤,疔疮疖肿。

**蓝花荆芥**

**Nepeta coerulescens** Maxim

生于海拔 3 300—4 400 米的山坡上或石缝中。分布于甘肃西部、青海东部、四川西部、西藏南部。

全草: 散瘀消肿,止血止痛。

**密花荆芥**

**Nepeta densiflora** Kar. et Kir.

生于海拔 2 300—2 500 米的高山沙石草坡上或疏林下。分布于新疆北部。

全草: 解毒透疹,祛风湿。

附 注: 功效相同的有**南疆荆芥 N. fedtschenkoi** Pojark., 分布于新疆南部; **小花荆芥 N. micrantha** Bunge, 分布于新疆北部; **重齿荆芥 N. pannonica** L., 分布于新疆。

**心叶荆芥**

**Nepeta fordii** Hemsl.

生于海拔 130—700 米的亚热带灌丛中。分布于陕西南部、甘肃东南部、湖北、湖南、广东、四川。

全草: 发表散寒,祛风解毒。

**穗花荆芥** 荆芥(云南)

**Nepeta laevigata** (D. Don) Hand. -Mazz.——*Betonica laevigata* D. Don

生于海拔 2 300—4 100 米的针叶林或混交林的林缘及林中草地、灌丛草坡上。分布于四川西部、云南西北部至东北部、西藏东部。

地上部分：解表。

附　注：在云南曲靖、昭通地区作荆芥入药。

**康藏荆芥**　　野藿香(青海、四川)

**Nepeta prattii** Lévl.

生于海拔 1 920—4 350 米的山坡草地、潮湿处。分布于河北、山西、陕西、甘肃、青海、四川、西藏。

全草：辛，凉。疏风，解表，利湿，止血，止痛。

**大花荆芥**

**Nepeta sibirica** L.

生于海拔 1 750—2 650 米的山坡上。分布于内蒙古、甘肃、宁夏、青海。

全草：散瘀消肿，止血止痛。

**狭叶荆芥**

**Nepeta souliei** Lévl.

生于海拔 2 600—3 350 米的山地草坡或疏林中。分布于四川、西藏。

全草：清肝热。用于口腔破溃。

## 龙船草属　Nosema Prain

**龙船草**　　全缘萼(广东)，假夏枯草(广东、广西)

**Nosema cochinchinensis** (Lour.) Merr. —— *Dracocephalum cochinchinense* Lour

生于海拔 100—1 000 米的山坡、路旁、山谷。分布于广东、广西。

全草或花序：清肝明目，散郁结。用于痈疮肿毒，目赤肿痛，瘰疬。

## 钩萼草属　Notochaete Benth.

**钩萼草**　　钩萼(中国种子植物科属检索表)

**Notochaete hamosa** Benth.

生于海拔 1 200—2 500 米的亚热带常绿林缘或谷地。分布于云南西部。

全草：祛风解表。

## 罗勒属　Ocimum L.

**灰罗勒**

**Ocimum americanum** L.

分布于云南西南部。

叶：用于皮肤病。

**罗勒**　香佩兰(山东)，零陵香(华东)，省头草(江苏)，九层塔(福建、广东、广西)，千层塔(云南)

**Ocimum basilicum** L.

多为栽培或南部各省区有逸生。生于路旁、村边或空阔地。栽培于华东、中南及吉林、河北、北京、天津、甘肃、新疆、四川、贵州、云南。

根：用于小儿黄烂疮。　全草(省头草)：辛，温。发汗解表，祛风利湿，散瘀止痛。用于风寒感冒，头痛，胃腹胀满，消化不良，胃痛，泄泻，月经不调，跌打损伤；外用于虫蛇咬伤，湿疹，皮炎。　嫩叶：驱风发汗，芳香健胃，并可代茶。　种子(光明子)：甘、辛，凉。明目。用于目赤肿痛，目翳。并试用于避孕。

附　注：功效相同的有**毛罗勒 O. basilicum** L. var. **pilosum** (Willd.) Benth.，栽培于华东、中南及河北、新疆、四川、贵州、云南；**毛叶丁香罗勒 O. gratissimum** L. var. **suave** (Willd.) Hook. f.，栽培于新疆、浙江、福建、台湾、广东、广西、云南。其中毛叶丁香罗勒的挥发油《中华人民共和国药典》1990 年版收载，称为丁香罗勒油。

**圣罗勒**　九层塔(中药大辞典)

**Ocimum sanctum** L.

生于干燥沙质草地上。分布于台湾、海南、四川。

全草：用于头痛，哮喘。　叶：可作调味品及茶用。

## 牛至属　Origanum L.

**牛至**　白花茵陈(江西、湖南、云南)，土茵陈(福建、广东、广西)，土香薷(云南)，川香薷(四川、贵州、云南)，滚堆尖(西藏)，小叶薄荷(植物名实图考)

**Origanum vulgare** L.

生于海拔 500—3 600 米的向阳山坡、林下、路旁及草地。分布于中南、西南及陕西、甘肃、新疆、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾。主产于四川、贵州、云南。

地上部分(牛至)：辛，微温。消暑解表，利水消肿。用于暑湿感冒，头痛身重，腹痛吐泻，水肿。

附　注：本种带花的枝叶在湖南、广西等地作土茵陈用；江西称白花茵陈，并且出口。

## 鸡脚参属　Orthosiphon Benth.

**石生鸡脚参**　山薄荷、蛇头花、熊尾草、当芽(广西)

**Orthosiphon marmoritis** (Hance) Dunn ——*Plectranthns marmoritis* Hance

生于阴处岩石上或路旁。分布于广东、广西。

全株：用于口腔溃疡，蛇伤。

**海南深红鸡脚参**　小种龙狗尾(广西)，披针叶直管草(植物分类学报)，海南猫须草(全国中草药汇编)

**Orthosiphon rubicundus** (D. Don) Benth. **var. hainanensis** Sun ex C. Y. Wu

生于密林下阴湿处及荒地上。分布于海南、广西。

块根：用于贫血。　全草：用于肺热咳嗽。

附　注：全草在产地个别地区作猫须草(肾茶)使用。

**鸡脚参**　山肓菜(四川)，普渡(贵州)，山槟榔、山萝卜、地葫芦、土地黄、红根草、化积药(云南)

**Orthosiphon wulfenioides** (Diels) Hand.-Mazz. —— *Coleus wulfenioides* Diels

生于海拔(500—)1 200—3 000米的松林下或草坡上。分布于四川、贵州、云南。

根(山槟榔)：甘、辛，平。清肺润燥，益阴敛汗，祛风除湿，镇痛化积，接骨生肌。用于消化不良，食积，蛔虫病，风湿痛，虚弱头晕，虚汗，咳嗽，骨折，脱疽。

附　注：功效相同的有**鸡肝花 O. wulfenioides** (Diels) Hand.-Mazz. var. **foliosus** Peter-Stib.，分布于广西、四川、贵州、云南。

## 脓疮草属　Panzerina J. Sojak

**脓疮草**　白龙疮、白花益母草(内蒙古)，白龙串彩(内蒙古、陕西)，野芝麻(甘肃)

**Panzerina alaschanica** Kupr.

生于海拔900—1 350米的荒漠草原或沙地上。分布于内蒙古、陕西、甘肃、宁夏。

全草：辛、微苦，平。调经活血，清热利水。用于产后腹痛，月经不调，水肿，崩漏，乳痈，丹毒，疮疥，疖肿。

附　注：①本种在内蒙古西部地区作益母草使用，称白花益母草。②孕妇不宜使用。

## 假糙苏属　Paraphlomis Prain

**白花假糙苏**　四轮麻(四川)

**Paraphlomis albiflora** (Hemsl.) Hand.-Mazz. —— *Phlomis albiflora* Hemsl.

生于海拔100—800米的谷地林下潮湿处。分布于湖北、四川。

全草：用于感冒，咳嗽，咽喉痛。

**纤细假糙苏**　野木姜花(四川)

**Paraphlomis gracilis** Kudo

生于海拔600—810米的林下阴湿处。分布于湖北、湖南、四川、贵州。

全草：辛，温。解表。

**假糙苏**　皱叶假糙苏(云南)

**Paraphlomis javanica** (Bl.) Prain——*Leonurus javanicus* Bl.; *P. rugosa* (Benth.) Prain

生于海拔320—1350米的热带林下、路边、灌丛中。分布于台湾、湖北、海南、广西、四川、云南。

全草：清肝，发表，滋阴润燥，润肺止咳，补血调经。用于感冒发热，劳伤，月经不调，水肿，骨鲠喉。

**小叶假糙苏**　玖檀花(广西),十二槐花、金槐、壶瓶花、茬子香(贵州)

**Paraphlomis javanica** (Bl.) Prain var. **coronata** (Vaniot) C. Y. Wu et H. W. Li——*Lamium coronata* Vaniot; *P rugosa* (Banth.) Prain var. *coronata* (Vaniot) C. Y Wu

生于海拔400—2 400米的亚热带常绿林或混交林下及路边、灌丛中。分布于江西、台湾、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草或根：甘,平。滋阴润燥,止咳,调经补血。用于虚劳咳嗽,月经不调。

## 紫苏属　Perilla L.

**紫苏**　香苏(东北及河北),赤苏(山西、福建),白苏、黑苏(江苏),苏麻(湖北、四川)

**Perilla frutescens**(L.) Britt.——*Ocimum frutescens* L.

全国各地普遍栽培。主产于湖北、河南、四川、江苏、广西、山东、广东、浙江、河北、山西。以湖北、河南、四川、山东、江苏产量大,广东、广西、湖北、河北所产者品质佳,销全国并有出口。

茎(紫苏梗)：辛,温。理气宽中,止痛,安胎。用于胸膈痞闷,胃脘疼痛,嗳气呕吐,胎动不安。　叶(或带嫩枝)(紫苏叶)：辛,温。解表散寒,行气和胃。用于风寒感冒,咳嗽呕恶,妊娠呕吐,鱼蟹中毒。　果实(紫苏子)：辛,温。降气消痰,平喘,润肠。用于痰壅气逆,咳嗽气喘,肠燥便秘。　根及近根的老茎(紫苏头)：辛,温。除风散寒,祛痰降气。用于咳逆上气,胸膈痰饮,头晕身痛及鼻塞流涕;外用于洗疮。　宿萼(紫苏苞)：用于血虚感冒。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。② 功效相似的有**野生紫苏 P. frutescens** (L.) Britt. var. **acuta** (Thunb.) Kudo——*Ocimum acuta* Thunb.,分布于河北、山西、宁夏、江苏、浙江、江西、福建、台湾、湖北、广东、广西、四川、贵州、云南;**回回苏 P. frutescens** (L.) Britt. var. **crispa** (Thunb.) Hand.-Mazz. —— *Ocimum crispa* Thunb.,全国各地均有栽培。

## 糙苏属　Phlomis L.

**深紫糙苏**

**Phlomis atropurpurea** Dunn

生于海拔2 800—3 900米的沼泽草甸上。分布于云南西北部。

全草：辛,苦,温。利水,消肿,解毒。

附　注：云南特有药用植物。

**假黄芪**　白玄参(四川),雪山甘草、白洋参、白元参、土甘草(云南),粗弓(纳西语)

**Phlomis betonicoides** Diels

生于海拔2 700—3 000米的林间草地、林下或草坡上。分布于四川、云南、西藏。

块根：甘、苦,凉。清热解毒,理气健脾。用于消化不良,腹胀,咽喉疼痛,感冒,解各种药物中毒。

附　注：功效相同的有**白花假糙苏 P. betonicoides** Diels f. **alba** C. Y. Wu，分布于云南中甸。

**丽江糙苏**　　多苞糙苏、香苏、野苏子、豨莶草(云南)

**Phlomis likiangensis** C. Y. Wu

生于海拔约 3 500 米的山坡林下或草地上。分布于云南西北部。

全草：苦，微温。有小毒。祛风除湿。用于口眼歪斜，风痰壅盛，瘰疬不仁，白癜风，眉发脱落，带下病。

附　注：①本种在云南个别地区有作豨莶草使用。②云南特有药用植物。

**长萼糙苏**

**Phlomis longicalyx** C. Y. Wu

生于海拔 3 650 米左右的竹林下。分布于云南西北部。

全草：利水，消肿，解毒。

附　注：云南特有药用植物。

**大叶糙苏**　　野苏子(通称)，山苏子、丁黄草、大丁黄、苏木帐子(辽宁)

**Phlomis maximowiczii** Regel

生于林缘、林间草地及河岸等处。分布于吉林、辽宁、河北。

根：清热消肿。用于无名肿毒，疮疖。

**大花糙苏**　　老鼠刺(全国中草药汇编)

**Phlomis megalantha** Diels

生于海拔 2 500—4 200 米的冷杉林下及灌丛草坡。分布于山西、陕西、河南、湖北、四川。

全草：苦、微辛，凉。祛风，清热解毒。用于麻风，痈肿。

附　注：功效相同的有**黄观糙苏 P. ornata** C. Y. Wu，分布于四川西部、云南西北部；**具梗糙苏 P. pedunculata** Sun ex C. H. Hu，分布于四川西部。

**串铃草**　　毛尖茶(河北)，蒙古糙苏(内蒙古)，野洋芋(甘肃、宁夏)

**Phlomis mongolica** Turcz.

生于海拔 770—2 200 米的草原、山地草原、山坡草甸上。分布于华北及陕西、甘肃、宁夏。

块根：有毒。祛风清热，止咳化痰，敛疮生肌。　全草：祛风燥湿，强筋骨，疗烫伤。

**草原糙苏**

**Phlomis pratensis** Kar. et Kir.

生于海拔 1 500—2 550 米的亚高山谷地、荒野及草原上。分布于新疆。

根：用于痢疾，泄泻，麻风。

**块根糙苏**　　块茎糙苏(中药大辞典)，野山药(高原中草药治疗手册)

**Phlomis tuberosa** L.

生于海拔 1 200—2 100 米的湿草原或山沟中及河岸草丛中。分布于黑龙江、吉林、内蒙古、宁夏及新疆。

全草或根：微苦，温。有小毒。解毒。用于月经失调，梅毒，化脓性创伤。

**糙苏**　　山芝麻(辽宁)，常山(河北)，小兰花烟(山西)，山苏子(内蒙古)，续断(陕西、

甘肃、宁夏）

**Phlomis umbrosa** Turcz.

生于海拔200—3 000米的林下、林缘、山坡草丛、路旁。分布于华北及辽宁、陕西、甘肃、宁夏、山东、河南、湖北、广东、四川、贵州、云南。

根或全草：辛，平。祛风活络，强筋壮骨，消肿，生肌，续筋接骨；补肝肾，强腰膝，安胎。用于感冒，风湿关节痛，腰痛，跌打损伤，疮疖肿毒。

附　注：本种根在四川、宁夏个别地区误作续断使用；全草在云南个别地区误作豨莶草使用。

**南方糙苏**　山甘草、白升麻、牛王肺筋草、大黑理肺散、豨莶草（云南）

**Phlomis umbrosa** Turcz. var. **australis** Hemsl.

生于海拔1 600—3 200米的山坡、灌丛、草地及沟边。分布于陕西、甘肃、安徽、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

根：消炎，止咳。用于肺痨咳嗽，也用于牛、马肺痈。　全草：消炎，止咳。用于吐泻，风热咳喘，感冒。

**螃蟹甲**　露木、露木尔（藏语），藏糙苏（中华人民共和国药典 1977 年版）

**Phlomis younghusbandii** Mukerj.

生于海拔4 300—4 600米的干燥山坡，灌丛及田野。分布于青海、西藏。

块根：甘，平。祛风清热，止咳化痰，生肌敛疮。用于感冒咳嗽，咳嗽痰喘，久疮不愈。

## 扭连钱属　Phyllophyton Kudo

**扭连钱**　榜参布柔（藏语）

**Phyllophyton complanatum** (Dunn) Kudo——*Nepeta complanata* Dunn

生于海拔4 100—5 000米的高山上强度风化的乱石滩石隙间。分布于青海西部、四川西部、云南西北部、西藏东部。

全草：为藏药。用于胃病。

**西藏扭连钱**　榜参布柔（青藏高原药物图谱）

**Phyllophyton tibeticum** (Jacq. ex Benth.) C. Y. Wu —— *Glechoma tibetica* Jacq. ex Benth.

生于海拔5 300米的高山强度风化的乱石滩上。分布于西藏西部。

根：用于贫血，病后体弱，乳痈。　全草：清热解毒。用于风热咳喘，痢疾，食物中毒。

附　注：本种为藏药。与绵参共称“榜参布柔”。

## 刺蕊草属　Pogostemon Desf.

**水珍珠菜**　蛇尾草（广东、广西），水蜡烛（云南），毛射草、牛触臭（中国高等植物图鉴），毛水珍珠菜（广州植物志）

**Pogostemon auricularius** (L.) Hassk.—— *Mentha auricularis* L.; *Dysophylla*

***auricularia*** (L.) Bl.

生于海拔300—1 700米的疏林下湿润处或溪边近水潮湿处。分布于福建、台湾、江西、广东、广西、云南。

全草：辛、微苦，平。清热化湿，消肿止痛。用于盗汗，感冒发热，风湿关节痛，湿疹，口腔破溃，疮疖，脚癣，疝气。

**短冠刺蕊草**　水大靛(广西)，马鹿菜(云南)

**Pogostemon brevicorollus** Sun ex C. H. Hu

生于海拔1 200—2 300米的山谷或林中。分布于广西、四川西南部、云南。

叶：用于疮疡肿毒。

**广藿香**　藿香(福建、广东)，枝香，刺蕊草(广东)

**Pogostemon cablin** (Blanco) Benth.——*Mentha cablin* Blanco

栽培于江西、福建、台湾、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

地上部分(广藿香)：辛，微温。芳香化浊，开胃止呕，发表解暑。用于湿浊中阻，脘痞呕吐，暑湿倦怠，胸闷不舒，寒湿闭暑，腹痛吐泻，鼻渊头痛。也可预防时行感冒，亦为芳香健胃，解热镇吐剂；外用于手足癣。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②本种以海南为大宗，销全国，并供香料厂用。

**膜叶刺蕊草**　野蓝靛(广西)，鸡骨头菜(云南)，爬努阿帕(蛤尼语)

**Pogostemon esquirolii** (Lévl.) C. Y. Wu et Y. C. Huang——*Caryopteris esquirolii* Lévl.

生于海拔2 000米以下的山谷、溪边、路旁等处。分布于广东、广西、贵州、云南。

枝、叶：用于阴挺。

**刺蕊草**　走马胎(广西)，鸡排骨草、野靛(云南)

**Pogostemon glaber** Benth.

生于海拔1 300—2 700米的山坡、路旁、荒地、山谷、林中等阴湿处。分布于云南。

全草(鸡排骨草)：苦，凉。清热解毒，凉血止血。用于肺痨，吐血，吐泻。

**黑刺蕊草**　紫花一柱香(云南)

**Pogostemon nigrescens** Dunn

生于海拔1 100—2 600米的山坡、路旁、灌丛及林中，干燥或湿地上。分布于云南南部。

全草：用于腹痛。

## 夏枯草属　Prunella L.

**山菠菜**　灯笼头(江苏)，夏枯草(中国高等植物图鉴)，东北夏枯草(东北药用植物)

**Prunella asiatica** Nakai

生于海拔1 700米以下的山坡草地、路旁、灌丛及潮湿地上。分布于东北、华北、华东及河南、贵州。

花、果穗或全草(夏枯草)：苦、辛，寒。清肝明目，清热，散郁结，强心利尿，降低血压。

用于肺痨，瘰疬，瘿瘤，黄疸，筋骨疼痛，眼涩肿痛，羞明流泪，眩晕，口眼歪邪，高血压症、头痛，耳鸣，乳痈，疟腮，痈疮肿毒，淋症，崩漏，带下病。

**夏枯草**　大头花(浙江)，夏库菜(藏语)，欧夏枯草(中国高等植物图鉴)，铁色草(本草纲目)，夏枯头(全国中草药汇编)

**Prunella vulgaris** L.

生于海拔3 000米以下的荒坡、草地、溪边及路旁等湿润地。分布于华东、中南、西南及陕西、甘肃、新疆。

带花的果穗(夏枯草)：辛、苦，寒。清火，明目，散结，消肿。用于目赤肿痛，目珠夜痛，头痛眩晕，瘰疬，瘿瘤，乳痈肿痛，乳腺增生症，高血压症。　夏枯草制成的煎膏(夏枯草膏)：甜、微涩。清火，明目，散结，消肿。用于头痛眩晕，瘰疬，瘿瘤，乳痈肿痛，乳腺增生症，高血压症。

附注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②功效相同，在少数地区作夏枯草的有**硬毛夏枯草 P. hispida** Benth.，分布于西南；**狭叶夏枯草 P. vulgaris** L var. **lanceolata** (Barton) Fernald——*P. lanceolata* Barton，分布于湖北、四川、云南。

## 鼠尾草属　Salvia L.

**橙色鼠尾草**　红丹参、紫丹参、红秦艽、大叶丹参(四川)，马蹄叶红仙茅(云南)

**Salvia aerea** Lévl.

生于海拔。2 550—3 300米的林内、灌丛中、草地、山坡。分布于四川、贵州、云南。

根：苦，凉。清热凉血，活血调经，强筋壮骨，舒筋活络。用于头晕，红崩，月经不调，经闭，吐血，便血，肾虚腰痛，风湿痛。

**裂萼鼠尾草**　黄花紫丹参(云南)

**Salvia campanulata** Wall. var. **codonantha** (Stib.) Stib.—— *S. codonantha* Stib.

生于海拔2 800—3 800米的沟边杂林内或山坡路旁草丛中。分布于云南西北部。

根：用于月经不调，体弱。

**贵州鼠尾草**　血盆草、反背红、叶下红(广东、贵州)，气草(广西)，朱砂草(贵州)

**Salvia cavaleriei** Lévl.

生于海拔530—1 300米的多石山坡、林下、水沟边。分布于湖北、广东、广西、四川、贵州。

全草或根(朱砂草)：苦、辛，寒。凉血，止血，活血，行气，止痛。用于吐血，咳血，鼻衄，血痢，血崩，刀伤出血，月经过多，胃脘痛；外用于跌打损伤，疖肿。

**紫背鼠尾草**　女菀(植物名实图考)

**Salvia cavaleriei** Lévl. var. **erythrophylla** (Hemsl.) Stib. —— *S. japonica* Thunb. var. *erythrophylla* Hemsl.

生于海拔700—2 000米的林下、路旁、草坡。分布于陕西、湖北、湖南、广西、四川、云南。

全草：用于月经不调，痛经，经闭，肾虚腰痛，疟疾。

**血盆草**　野丹参(广西),气喘药(四川),红青菜(贵州),紫背丹参(云南),单叶血盆草(四川中药志)

**Salvia cavaleriei** Lévl. var. **simplicifolia** Stib.

生于海拔460—2 700米的山坡、林下、沟边及灌丛中。分布于江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根：宽胸,补中益气,调经,止血,祛风湿。用于月经不调,阴挺,崩漏,带下病。恶疮肿毒,疥疮。　全草：微苦,凉。止血,清湿热。用于咳嗽,吐血,崩漏,血痢,创伤出血。

**华鼠尾草**　石打穿(江苏),紫参(江苏、江西),小丹参(江西、湖南),野沙参(广西),活血草(四川)

**Salvia chinensis** Benth.

生于海拔120—500米的山坡、平地的林阴处、草丛、路边、田野或栽培。分布于华东、中南及四川、云南。主产于江苏。

地上部分(石见穿)：苦、辛,平。清热解毒,活血,理气,止痛。用于急慢性肝炎,脘胁胀痛,湿热带下,乳痈,噎膈,痰喘,疖肿。

**朱唇**　小红花(云南)

**Salvia coccinea** L.

原产美洲。栽培于河北、北京、江苏、贵州、云南。云南南部及东南部逸为野生。

全草(小红花)：辛、微苦、涩,凉。凉血,止血,清热利湿。用于血崩,高热,腹痛。

**新疆鼠尾草**

**Salvia deserta** Schang

生于海拔270—1 850米的田野荒地、沟边、沙滩草地及林下。分布于新疆。

全草：清热解毒,止咳祛痰,消肿利尿。

**毛地黄鼠尾草**　银紫丹参、白背丹参、白元参(云南),玉名喇叭(纳西语)

**Salvia digitaloides** Diels

生于海拔2 500—3 400米的松林下阴湿处或荒坡草地。分布于四川西南部、云南西北部。

根：补中益气,调经,止血。用于月经不调,阴挺,崩漏,带下病,恶疮肿毒,痛经。

附　注：本种在云南部分地区作丹参药用。

**胶质鼠尾草**　吉子莫保(藏语)

**Salvia glutinosa** L.

生于山坡灌丛中。分布于西藏西部。

根：甘、涩,温。用于胃出血,咯血。

**瓦山鼠尾草**

**Salvia himmelbaurii** Stib.

生于海拔约3 300米的草坡、路旁等处。分布于四川。

根：清热解毒,祛风除湿。

附　注：四川特有药用植物。

**河南鼠尾草**　丹参(河南)

**Salvia honania** Bailey

生于平原阳处水田中或潮湿地、山坡草丛。分布于河南、湖北。

根：活血调经，祛瘀止痛。用于月经不调。

**湖北鼠尾草**

**Salvia hupehensis** Stib.

生于山坡林下。分布于湖北西部。

根：用于咳嗽，痰喘，感冒头痛。

附　注：湖北特有药用植物。

**鼠尾草**　秋丹参(浙江)，霸王鞭(湖南)，消炎草(广西)

**Salvia japonica** Thunb.

生于海拔220—1 100米的山坡、路旁、阴蔽草丛、水边及林阴下。分布于华东(除山东外)及湖北、广东、广西、贵州。

根、全草：苦、辛，平。清热解毒，活血祛瘀，消肿，止血。用于跌打损伤，风湿骨痛，水肿，带下病，痛经，产后流血过多，瘰疬，肝炎，丝虫病，颜面神经麻痹，神经痛，乳痈，疔肿。

**关公须**　根下红、小活血(江西、福建)，落地红(江西)，江西鼠尾(中国高等植物图鉴)

**Salvia kiangsiensis** C. Y. Wu

生于山坡或疏林下。分布于江西、福建、湖南。

根及全草：苦、辛，凉。活血凉血，消肿散结，止血止痛。用于吐血，便血，衄血，陈旧性腰痛，感冒发热。　叶：用于外伤出血。

**舌瓣鼠尾草**　长叶丹参(浙江药用植物志)

**Salvia liguliloba** Sun

生于海拔约800米的山坡林缘、路旁及山脚田边、草丛中。分布于安徽、浙江。

全草：活血通络。用于关节酸痛，月经不调。

**鄂西鼠尾草**　红秦艽(四川)

**Salvia maximowicziana** Hemsl.

生于海拔1 500—3 450米的路旁、草坡、林缘、山坡、山顶及林下。分布于陕西、甘肃、河南、湖北、四川、云南、西藏。

根：四川茂汶代秦艽用。　叶：清热解毒，散瘀消肿。外用于疮毒。

**湄公鼠尾草**

**Salvia mekongensis** Stib.

生于海拔2 800—4 100米的山坡草地上。分布于云南西北部。

根：有抗金黄色葡萄球菌的作用。

**丹参**　血参(根)(东北及江苏、河南、湖北)，紫丹参(山东、江苏、四川)，活血根(江苏)，赤参(江西、四川)，红丹参(湖北)

**Salvia miltiorrhiza** Bunge

生于海拔120—1 300米的山坡、林下草丛、灌丛及溪谷旁或栽培。分布于华北、华东、中南及辽宁、陕西、甘肃、宁夏、新疆、四川、贵州。主产于四川、山西、河北、江苏、安徽。

根及根状茎(丹参)：苦，凉。祛瘀止痛，活血通经，清心除烦。用于月经不调，经闭，痛经，症瘕积聚，胸腹刺痛，热痹疼痛，疮疡肿痛，心烦不眠，肝脾肿大，心绞痛。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②功效相似在部分地区与丹参同用的有**南丹参 S. bowleyana** Dunn，分布于浙江、江西、福建、湖南、广东、广西；**栗色鼠尾草 S. castanea** Diels，分布于四川西南部、云南西北部；**雪山鼠尾草 S. evansiana** Hand. Mazz.，分布于四川西南部、云南西北部；**掌花鼠尾草 S. evansiana** Hand.-Mazz. var. **seaposa** Stib.，分布于云南西北部；**黄花鼠尾草 S. flava** Forrest ex Diels，分布于四川西南部、云南西北部；**荞麦地鼠尾草 S. kiaometiensis** Lévl.，分布于四川中南部、云南东北部；**柔毛地鼠尾草 S. kiaometiensis** Lévl. f. **pubescens** Stib.，分布于四川西南部、云南西北部；**洱源鼠尾草 S. lankongensis** C. Y. Wu，分布于云南西北部；**东川鼠尾草 S. mairei** Lévl.，分布于云南东北部；**白花丹参 S. miltiorrhiza** Bunge f. **alba** C. Y. Wu，分布于山东、安徽、河南、湖北；**皖鄂丹参 S. paramiltiorrhiza** H. W. Li et X. L. Huang，分布于安徽、湖北；**紫花皖鄂丹参 S. paramiltiorrhiza** H. W. Li et X. L. Huang f. **purpureo-rubra** H. W. Li，分布于安徽、湖北；**甘西鼠尾草 S. przewalskii** Maxim.，分布于甘肃、宁夏、青海、新疆、四川、云南、西藏；**褐毛甘西鼠尾草 S. przewalskii** Maxim. var. **mandarinorum** (Diels) Stib.，分布于甘肃、青海、湖北、四川、云南、西藏；**浙皖丹参 S. sinica** Migo，分布于安徽、浙江、湖北；**紫花浙皖丹参 S. sinica** Migo f. **purpurea** H. W. Li，分布于安徽、湖北。

**单叶丹参**　血参(湖北)

**Salvia miltiorrhiza** Bunge var. **charbonnelii** (Lévl.) C. Y. Wu ——*S. charbonnelii* Lévl.

生于草丛、山坡或路旁。分布于河北、山西、河南、湖北。

根：活血调经。用于月经不调。

**南川鼠尾草**

**Salvia nanchuanensis** Sun

生于海拔1 700—1 800米的河边岩石上或山坡林中。分布于湖北、四川。

根：用于月经不调。

**撒尔维亚**　香草(云南)

**Salvia officinalis** L.

原产欧洲。我国各地有栽培。

叶：作咽喉痛的漱剂。

**峨眉鼠尾草**　白生麻、南茄草、白气草、野苏麻(四川)

**Salvia omeiana** Stib.

生于海拔2 200—3 200米的山坡、草地、林缘、路旁。分布于四川。

根：清热解毒，祛风除湿。

附　注：四川特有药用植物。

**荔枝草**　雪见草(江苏、浙江、江西、湖北、贵州)，癞蛤蚂草(江苏、江西)，野芥菜(江苏、江西、广西)，土荆芥、猴臂草、紫丹参(云南)，野苏麻、虾蟆草(中国高等植物图鉴)

**Salvia plebeia** R. Br.

生于海拔60—2 800米的山坡草地、路旁、沟边、田野潮湿的土壤上。除青海、新疆、西藏外，全国各地普遍分布。

地上部分(荔枝草)：苦、辛，凉。清热，解毒，凉血，利尿。用于咽喉肿痛，痈肿疮毒，乳痈，痔疮肿痛，出血，咳嗽痰喘，咳血，吐血，水肿腹胀，跌打损伤，蛇犬咬伤。

根：苦、辛，凉。凉血，活血，消肿。用于吐血，衄血，崩漏，跌打伤痛，腰痛，肿毒，流火。

**长冠鼠尾草**　　活血草、散血草(四川)，红骨参(陕西中草药)，紫参(滇南本草)

**Salvia plectranthoides** Griff.

生于海拔400—2 500米的山坡、谷地、疏林下及溪边。分布于陕西、河南、湖北、广西、四川、贵州、云南。

根(红骨参)：苦、甘，温。活血强筋，补虚调经，温经活络。用于风寒湿痹，手足麻木，筋骨痛，半身不遂，痿软，流涎及伤风咳嗽。　全草：通经活络。用于月经不调，风寒感冒，腹痛。

附　注：本种根在云南部分地区亦作丹参药用。

**红根草**　　红根子、小丹参(江西)，红地胆(广西)，黄埔鼠尾(中国植物学杂志)

**Salvia prionitis** Hance

生于海拔100—800米的山坡、山脚路边向阳草丛中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、广东、广西。

全草：微苦，凉。清热解毒，抗菌消炎。用于乳蛾，咽喉痛，咳嗽痰喘，泄泻，痢疾。

**粘毛鼠尾草**　　野芝麻(甘肃中草药手册)，黄花鼠尾草(新华本草纲要)

**Salvia roborowskii** Maxim.

生于海拔2 500—3 900米的山坡草地、沟边阴处、山脚山腰。分布于甘肃西部、青海、四川西部及西南部、云南西北部、西藏。

根：甘、涩，温。止血，活血，祛瘀。全草、果实：甘、微苦，平。滋肝，明目。用于产后体虚，目赤肿痛。

**地埂鼠尾草**　　山字止(福建)，田芹菜(广东)，白补药(贵州)，花茎状丹参(中药大辞典)

**Salvia scapiformis** Hance

生于山坡灌丛、溪边草地、山谷、林下及山顶。分布于江西、福建、台湾、湖南、广东、广西。

根：活血调经，止痛。用于月经不调，带下病，痛经。　全草(白补药)：辛，平。强筋壮骨，补虚益损。用于肺痨，虚弱干瘦，头晕目眩。

**硬毛鼠尾草**　　白补药(贵州)

**Salvia scapiformis** Hance **var. hirsuta** Stib.

生于海拔120—1 250米的山地、路旁、疏林下或村边。分布于浙江、福建、广东、广西、贵州。

全草：用于劳伤疼痛，虚弱干瘦，病后虚弱。

**一串红**　　墙下红(北京)，炮仔花(福建)，象牙红、西洋红(广东)，象牙海棠(云南)

**Salvia splendens** Ker-Gawl.

原产巴西。我国各地庭园广泛栽培。

全草：消肿，解毒，凉血。用于蛇伤。

**佛光草**　　乌痧草(广西)，湖广草(四川、贵州)，盐咳草、小退火草(贵州)，蔓茎鼠尾

(中国植物学杂志)

**Salvia substolonifera** Stib.

生于海拔 40—950 米的林下、沟边、石隙等潮湿地。分布于浙江、江西、福建、湖北、湖南、广西、四川、贵州。

全草(走茎丹参): 微苦、辛,平。清热利湿,平喘止咳,调经止血。用于风湿,咳嗽痰多气喘,吐血,带下病,尿频,腰痛,瘕症。

**三叶鼠尾草** 小红参、紫丹参、小红丹参(四川、云南), 红根根药、三对叶丹参(四川)

**Salvia trijuga** Diels

生于海拔 1 900—3 900 米的山坡、山谷、沟边、灌丛中、林下或草地上。分布于四川、云南、西藏。

根: 苦、甘,温。调经活血,祛瘀生新。用于月经不调,血崩,痛经,血虚经闭, 肾虚腰痛,失眠,阳痿。

附 注: 本种在云南部分地区作丹参药用。

**荫生鼠尾草** 山苏子、山椒子(河北)

**Salvia umbratica** Hance

生于海拔 600—2 000 米的山坡、谷地或路旁。分布于河北、山西、陕西、甘肃、宁夏、安徽、四川。

全草: 凉血,止血,活血。种子: 调经活血。

**野丹参**

**Salvia vasta** H. W. Li

生于海拔1 400米左右的山坡、林缘、路边向阳处。分布于湖北。

根: 苦,寒。祛瘀生新,活血调经,清心除烦。用于心烦失眠,关节疼痛,肝脾肿大。

附 注: 功效相同的有**齿唇野丹参 S. vasta** H. W. Li var. **fimbriata** H. W. Li, 分布于湖北;**紫花野丹参 S. vasta** H. W. Li var. **purpurea** H. W. Li, 分布于湖北。

**云南鼠尾草** 滇丹参、紫丹参、云南丹参、小红参、山槟榔(云南)

**Salvia yunnanensis** C. H. Wright

生于海拔 1 800—2 900 米的山坡草地、林缘路旁或疏林干旱地上。分布于四川、贵州、云南。

根及根状茎(滇丹参): 苦,凉。活血调经, 清心除烦,行瘀止痛, 安神。用于月经不调,经闭,痛经,产后腹痛,跌打损伤,关节疼痛,疝痛,腰痛,肝硬化,疮疡肿毒。

附 注: 本种在云南部分地区亦作丹参药用。

## 裂叶荆芥属 Schizonepeta Briq.

**裂叶荆芥** 荆芥(通称),香荆芥(河北),小茴香(四川),假苏(神农本草经),四棱杆蒿(北方常用中草药)

**Schizonepeta tenuifolia** (Benth.) Briq.——*Nepeta tenuifolia* Benth.

生于海拔 540—2 700 米的山坡路边、山谷、林缘、村庄附近，多为栽培。分布于东北、华北、西北及河南、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。主产河北安国、易县、唐县、承德，江苏江都、扬州、泰兴，浙江萧山、杭州，江西吉安、吉水，湖北，湖南，供应全国并出口。

地上部分或全草(荆芥)、半花半果的花序(荆芥穗)：辛，微温。解表散风，透疹；炒炭止血。用于感冒，头痛，麻疹，风疹，疮疡初起；炒炭后用于便血，崩漏，产后血晕。但后者发散之力较强。　根：用于吐血，牙痛，瘰疬。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②功效相同的有**多裂叶荆芥 S. multifida** (L.) Briq.——*Nepeta multifida* L.，分布于东北、华北、西北及安徽、河南、湖北、四川。

## 黄芩属　Scutellaria L.

**滇黄芩**　土黄芩(贵州)，(条、枯)子芩(云南)，(小)黄芩(滇南本草)，川黄芩(中国经济植物志)

**Scutellaria amoena** C. H. Wright

生于海拔 1 300—3 000 米的松林下草地中，或栽培于海拔 500—600 米的山地上。分布于四川、贵州、云南。

根：功效同黄芩，但质量较差。民间用于猩红热，湿热黄疸，痢疾，泄泻。

附　注：① 本种在西南地区亦作黄芩使用，称滇黄芩。② 功效相同的有**灰毛黄芩 S. amoena** C. H. Wright var. **cinerea** Hand.-Mazz.，分布于四川西南部、云南西北部；**竹林黄芩 S. bambusetorum** C. Y. Wu，分布于云南南部；**灰岩黄芩 S. forrestii** Diels，分布于云南西北部；**屏边黄芩 S. pingbienensis** C. Y. Wu et H. W. Li，分布于云南南部；**瑞丽黄芩 S. shweliensis** W. W. Smith，分布于云南西南部。

**黄芩**　山茶根、黄芩茶、黄金条根(黑龙江、辽宁、河北、内蒙古、山东)，香水水草(内蒙古)，(条)子芩(中国药用植物志)

**Scutellaria baicalensis** Georgi

生于海拔 60—2 000 米的向阳草地、荒地或栽培。分布于东北、华北及陕西、甘肃、新疆、山东、江苏、河南、湖北、四川。主产于东北及河北承德、保定，山西汾阳，河南，陕西，内蒙古。以山西产量最多，承德质量最好，销全国各地。

根(黄芩)：苦，寒。清热燥湿，泻火解毒，止血，安胎。用于湿温、暑温胸闷呕恶，湿热痞满，泻痢，黄疸，肺热咳嗽，高热烦渴，血热吐衄，痈肿疮毒，胎动不安。　果实(黄芩子)：用于肠癖脓血。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。② 国家三级重点保护野生药材。③ 功效相似，在个别地区亦作黄芩药用的有**阿拉善黄芩 S. alaschanica** Tschern.，分布于内蒙古；**念珠根黄芩 S. moniliorrhiza** Kom.，分布于吉林长白山；**薄叶黄芩 S. regeliana** Nakai var. **ikonnikovii** (Juz.) C. Y. Wu —— *S. ikonnikovii* Juz.，分布于黑龙江、吉林、内蒙古；**甘肃黄芩 S. rehderiana** Diels，分布于山西、陕西、甘肃、宁夏、四川；**大黄芩 S. tenax** W. W. Smith var. **patentipilosa** (Hand.-Mazz.) C. Y. Wu，分布于四川西南部、云南东北部；**粘毛黄芩 S. viscidula** Bunge 分布于华北及吉

林、山东、贵州。

**半枝莲**　牙刷草、田基草、水黄芩(江苏),赶山鞭、瘦黄芩(四川),狭叶韩信草(广州植物志)

**Scutellaria barbata** D. Don——*S. rivularis* Wall.

生于海拔100—1 800米的水田边、溪边、湿润草地或栽培。分布于华东、中南、西南及河北、陕西、甘肃、新疆。

全草(半枝莲):辛、苦,寒。清热解毒,化瘀利尿,抗癌。用于疔疮肿毒,咽喉肿痛,毒蛇咬伤,跌打伤痛,水肿,黄疸,癌症。

附　注:①《中华人民共和国药典》1990年版收载。② 民间用于食道癌,胃癌,子宫癌。

**荻状黄芩**

**Scutellaria caryopteroides** Hand. Mazz.

生于海拔800—1 500米的谷地河岸、向阳坡地上。分布于陕西、河南、湖北。

全草:用于肾虚腰痛,慢性肝炎。

**野鸡黄**

**Scutellaria caudifolia** Sun ex C. H. Hu var. **obliquifolia** C. Y. Wu

生于海拔1 280米左右的坡地灌丛中。分布于四川南部。

全草:民间泡酒,用于劳伤内损。

附　注:四川特有药用植物。

**中甸黄芩**

**Scutellaria chungtiensis** C. Y. Wu

生于海拔3 000—3 300米的草坡地上。分布于云南西北部。

根:苦,寒。泻火,除湿热。

**异色黄芩**　土黄芩(贵州),挖耳草、一支蒿、夜(野)行草、熊胆草、紫背草(云南),紫背黄芩(中国高等植物图鉴)

**Scutellaria discolor** Wall. ex Benth.

生于海拔(20)—600—1 800米的山地林下、溪边或草地上。分布于广西、贵州、云南。

全草(紫背黄芩):苦,寒。解表退热,消炎解毒。用于感冒高热,咽喉肿痛,痈毒疔疮,中耳炎,肺痨,跌打损伤。

**地盆草**　结筋草(云南)

**Scutellaria discolor** Wall. ex Benth. var. **hirta** Hand.-Mazz.

生于海拔约2 000米的向阳山坡草地上或路旁。分布于四川西南部、云南中部及西北部。

全　草:用于筋骨伸缩不利。

**岩藿香**　犁头草(贵州),方茎犁头草(全国中草药汇编)

**Scutellaria franchetiana** Lévl.

生于海拔830—1 500(—2 300)米的山坡湿地、荒坡草地上。分布于陕西、河南、湖北、四川、贵州。

全草:苦,凉。清热凉血,化瘀,消肿,止咳。用于风温咳嗽,跌打损伤。

**盔状黄芩**

**Scutellaria galericulata** L.

生于海拔 440—1 060 米的渠旁、沟边湿地上。分布于内蒙古、陕西、新疆。

全草：苦，寒。清热解毒，活血止痛，利尿消肿。用于淋证，肝炎，疟疾，跌打损伤，疮痈肿毒。

**连翅叶黄芩**　魁芩、条(子)芩、土大芩(四川)，川黄芩(中药志)，草地黄芩(全国中草药汇编)

**Scutellaria hypericifolia** Lèvl.

生于海拔 (900)—2 600—3 200—(4 000) 米的山地草坡上。分布于四川西部。

根(川黄芩)：苦，寒。清热止咳，利湿解毒。用于风热咳嗽，湿热黄疸，高热头痛，目赤肿痛，泻痢腹痛，小便淋痛，胎动不安，痈疖疔疮。

附　注：《四川中药志》误定为滇黄芩 *S. amoena* C. H. Wright。

**韩信草**　向天盏(浙江、福建)，疔疮草(浙江)，耳挖草(福建、广东、贵州)，大力草(广东)，地苏麻(贵州)

**Scutellaria indica** L.

生于海拔 1 900 米以下的山地、丘陵地、疏林下、路旁空地及草地上。分布于华东(除山东)及陕西、甘肃、河南、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草(向天盏)：辛、微苦，平。清热解毒，活血散瘀，疏肝。用于胸胁疼痛，肺痈，痢疾，泄泻，带下病；外用于疔疮痈肿，毒蛇咬伤，蜂螫伤，跌打损伤，外伤出血。

**长毛韩信草**

**Scutellaria indica** L. var. **elliptica** Sun ex C. H. Hu

生于海拔 900 米以下的山坡、路旁、草地上。分布于安徽、浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

全草：用于跌打损伤，吐血，痈肿，牙痛。

**小叶韩信草**

**Scutellaria indica** L var. **parvifolia** (Makino) Makino——*S. indica* L. var. *japonica* Franch. et Sav. f. *parvifolia* Makino

生于路旁、疏林下、山坡、荒坡草地上。分布于安徽、台湾、湖南、广东、广西、云南。

全草：外用于跌打肿痛，蛇咬伤。

**缩茎韩信草**　金耳挖、天田盏(福建)，小金疮草(广西)

**Scutellaria indica** L. var. **subacaulis** (Sun ex C. H. Hu) C. Y. Wu et C. Chen——*S. indica* L. f. *subacaulis* Sun ex C. H. Hu

生于海拔 1 500 米以下的石缝、石上阴湿处。分布于江苏、浙江、江西、福建、河南、湖南、广东、广西、云南。

全草：清热解毒，消肿止痛。用于跌打肿痛，疮疡肿毒。

**丽江黄芩**　小黄芩、白花黄芩(云南)

**Scutellaria likiangensis** Diels

生于海拔 2 500—3 100 米的山地干燥灌丛中及草坡上。分布于云南。

根(丽江黄芩)：苦，寒。清热凉血，消炎，安胎。用于更年期崩漏，胎动不安，热病，肺

热咳嗽，泄泻，痢疾，吐血，衄血，便血，热淋，高血压症。

附　注：①本种在产地个别地区亦作黄芩用，当地民间又作滇黄芩。② 云南特有药用植物。

**钝叶黄芩**　　蛇头花(广西)

**Scutellaria obtusifolia** Hemsl.

生于海拔 420—1 400 米的森林、灌丛中或水田旁湿润处。分布于湖北、广西、四川、贵州。

全草：用于泻痢，口苦，感冒；外用于蛇咬伤，跌打瘀血。

**三脉钝叶黄芩**　　大叶耳挖草(广西)

**Scutellaria obtusifolia** Hemsl. var. **trinervata** (Vaniot) C. Y. Wu et H. W. Li——*S. trinervata* Vaniot

生于海拔 600—1 000(—2 500) 米的林下湿地或溪边。分布于广西西部、贵州南部。

全草：用于蛇虫咬伤，疮痈肿毒。

**峨眉黄芩**　　白蜜香(四川)

**Scutellaria omeiensis** C. Y. Wu

生于海拔 1 605—3 035 米的亚热带阔叶林下。分布于四川。

全草：祛风除秽。民间用于止霍乱呕吐。

附　注：四川特有药用植物。

**锯叶峨眉黄芩**

**Scutellaria omeiensis** C. Y. Wu var. **serratifolia** C. Y. Wu et S. Chow

生于海拔 1 500—2 500 米的亚热带阔叶林下。分布于湖北西部、四川东部、贵州西部。

全草：清热，除湿，祛风。

**直萼黄芩**　　屏风草、小黄芩、半枝莲、兰花地丁(云南)，紫花地丁(滇南本草)

**Scutellaria orthocalyx** Hand.-Mazz.

生于海拔 1 200—2 300(—3 300) 米的荒地、草坡或松林中。分布于青海、四川、云南。

全草(屏风草)：苦、微辛，凉。消炎退热，解毒消肿。用于咽喉痛，胃痛，痈疽肿毒，疥疮，体癣，手足癣，小儿走马牙疳。

附　注：①本种在云南亦作滇黄芩使用，玉溪地区用于癌症。②《滇南本草》(整理本)记载，云南民间以本种代紫花地丁(苦远志 **Polygala sibirica** L. var. megalopha Franch.)入药，功效相似。

**京黄芩**　　筋骨草、丹参(北京)

**Scutellaria pekinensis** Maxim.

生于海拔 600—1 800 米的石坡、潮湿谷地或林下。分布于吉林、河北、陕西、山东、浙江、河南。

全草：清热解毒。用于跌打损伤。

附　注：功效相同的有**紫茎京黄芩 S. pekinensis** Maxim. var. **purpureicaulis** (Migo) C. Y. Wu et H. W. Li——*S. japonica* Franch. et Sav. var. *purpureicaulis*

Migo，分布于山东、江苏、浙江、江西、福建、湖北；**黑龙江黄芩 S. pekinensis** Maxim. var. **ussuriensis** (Regel) Hand.-Mazz.——*S. japonica* Morr. et Decne. var. *ussuriensis* (Regel) Kudo，分布于东北及内蒙古。

**四裂花黄芩**　四香花、土薄荷(四川)

**Scutellaria quadrilobulata** Sun ex C. H. Hu

生于海拔2 000—3 000米的山地林下或草坡、荒地上。分布于四川、贵州、云南。

全草：清肝，解表。

**并头黄芩**　头巾草(内蒙古)，山麻子(山西)

**Scutellaria scordifolia** Fisch. ex Schrenk

生于海拔2 100米以下的草地或湿草甸上。分布于东北、华北及宁夏、青海、新疆。

全草：微苦，凉。清热解毒，利尿。用于肝炎，肠痈，跌打损伤，蛇咬伤。　叶：可代茶。

**石蜈蚣草**　吊鱼杆、胡豆草(四川)，无柄黄芩(中药大辞典)

**Scutellaria sessilifolia** Hemsl.

生于海拔800—2 000米的亚热带沟谷林下、灌丛中或潮湿的石山上。分布于四川。

全草(胡豆草)：苦、涩，平。散风，除热。用于风热目雾，感冒头昏，肾寒缩阴，肝热耳鸣。

附　注：四川特有药用植物。

**沙滩黄芩**　瓜子兰、海滨黄芩(河北)

**Scutellaria strigillosa** Hemsl.

生于海边沙地、沙滩及荒滩上。分布于辽宁、河北、山东、江苏。

全草：清热利尿，消肿。

**偏花黄芩**　土黄芩(贵州)

**Scutellaria tayloriana** Dunn

生于林下灌丛中、河边草丛及旷地上。分布于江西、湖南、广东、广西、贵州。

根：苦，寒。清热燥湿。用于肺热咳嗽，吐血，赤白痢疾。

**假活血草**

**Scutellaria tuberifera** C. Y. Wu et C. Chen

生于海拔100—200(—1 550)米的草坡阴处、竹林、密林下、溪边草丛中。分布于江苏、安徽、浙江、贵州、云南。

全草：用于妇科各种炎症。

**红茎黄芩**　多子草(四川、云南)

**Scutellaria yunnanensis** Lèvl.

生于海拔900—1 200米的山地林下或山谷沟边。分布于四川、贵州、云南。

全草：散寒，清火，退烧，明目。用于目热生翳，退烧。

**柳叶红茎黄芩**　血沟丹、土黄芩(四川)，一麻消(贵州)

**Scutellaria yunnanensis** Lévl. var. **salicifolia** Sun ex C. H. Hu

生于海拔460—1 600米的沟谷边或灌丛中。分布于四川东南部、贵州北部。

全草：清火。

## 筒冠花属 Siphocarnion Kudo

**筒冠花** 草藤乌(四川),大花筒冠花(植物分类学报)

**Siphocranion macranthum** (Hook. f.) C. Y. Wu —— *Plectranthus macranthus* Hook. f.

生于海拔 1 300—3 200 米的亚热带常绿林或混交林内。分布于西南及湖北、广西。

茎、叶：外用于痈疮肿毒。

附 注：功效相同的有**光柄筒冠花 S. nudipes** (Hemsl.) Kudo——*Plectranthus nudipes* Hemsl.，分布于江西、福建、湖北、广东、四川、贵州、云南。

## 子宫草属 Skapanthus C. Y. Wu et H. W. Li

**子宫草** 龙老根、葶花(云南)

**Skapanthus oreophilus** (Diels) C. Y. Wu et H. W. Li——*Plectranthus oreophilus* Diels

生于海拔 2 700—3 100 米的松林下或林缘草坡上。分布于云南西北部。

根：调经。用于月经不调。

附 注：①我国特有属。②功效相同的有**茎叶葶花 S. oreophilus** (Diels) C. Y. Wu et H. W. Li var. **elongatus** (Hand.-Mazz.) C. Y. Wu et H. W. Li —— *Plectranthus oreophilus* Diels var. *elongatus* Hand.-Mazz.,分布于四川西南部、云南西北部。

## 水苏属 Stachys L.

**少毛甘露子** 蚕子(湖北)

**Stachys adulterina** Hemsl.

生于海拔 1 800 米左右的湿地或菜地边。分布于湖北、四川。

根状茎：用于消化不良。

**毛水苏** 水苏草(内蒙古),好姆亭(蒙语),野香苏(云南)

**Stachys baicalensis** Fisch. ex Benth.

生于海拔 450—1 670 米的湿草地及河岸上。分布于东北、华北及陕西、甘肃、山东、河南。

根：清火,平肝,补阴。用于失音,咳嗽,打伤,外伤,疮癣烂痛,吐血。 全草：辛,平。疏风理气,止血消炎。用于感冒,瘕症,肺痿,肺痛,头晕目眩,口臭,咽喉痛,痢疾, 胃酸过多,产后中风,吐血,衄血,血崩,血淋,疮疖肿毒,跌打损伤。

附 注：功效相同的有**华水苏 S. chinensis** Bunge ex Benth.，分布于东北、华北及陕西、甘肃。

**地蚕** 冬虫夏草、五眼草(广西),妈奔(仡佬语),肺痨草(全国中草药汇编)

**Stachys geobombycis** C. Y. Wu

生于海拔 170—700 米的荒地、田间及草丛湿地上。分布于浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西。

块茎：甘，平。益肾润肺，滋阴补血，清热除烦。用于肺痨，肺虚气喘，吐血，盗汗，贫血，小儿疳积。　全草：祛风毒。用于跌打损伤，疮疖。

**水苏**　宽叶水苏(东北)，元宝草、芝麻草(江苏)，水鸡苏(江西)，鸡苏(本草纲目)

**Stachys japonica** Miq.

生于海拔 230 米以下的水沟旁、河岸边及湿草地上。分布于东北、华北、华东及河南、湖北、湖南、贵州。

全草或根：功效同毛水苏；又可用于久痢。　块根：用于缠腰火丹。

**西南水苏**　猫猫菜、山波罗子(四川)，野甘露、白根药、(麻)破布草(云南)

**Stachys kouyangensis** (Vaniot) Dunn——*Lamium kouyangense* Vaniot

生于海拔 900—2 100(—2 800) 米的山坡草地、旷地及潮湿沟边。分布于湖北、四川、贵州、云南。

全草(破布草)：微苦、咸，寒。消炎解毒，排脓。用于疮疖，附骨疽，赤白痢疾，湿疹。根：用于肺痨。

**针筒菜**　千密罐(河南)，水茴香(四川)，野油麻、地参(贵州)，长圆叶水苏(江苏南部种子植物手册)

**Stachys oblongifolia** Benth.

生于海拔 210—1 350(—1 900) 米的林下、河岸、竹丛、灌丛、苇丛、草丛及湿地中。分布于中南及陕西、江苏、安徽、江西、台湾、四川、贵州、云南。

全草或根(野油麻)：辛、微甘，温。补中益气，止血生肌。用于久痢，病后虚弱，外伤出血。

**细柄针筒菜**　臭草(广西)

**Stachys oblongifolia** Benth. var. **leptopoda** (Hayata) C. Y. Wu——*S. leptopoda* Hayata

生于海拔 500 米以下的干燥沙地及荒地中。分布于福建、台湾、广东、广西、四川、云南。

全草：用于小儿疳积，肺痨。

**沼生水苏**　光叶水苏、白马兰、野地蚕(浙江)，望江青、天芝麻(本草纲目拾遗)

**Stachys palustris** L.

生于海拔约 500 米的湖边湿润高草沼泽地或沟边湿地。分布于河北、新疆、浙江、湖北。

根、全草：微甘，平。清热解毒，化痰。用于风热上攻，咽喉肿痛，顿咳，痢疾，缠腰火丹。

**狭齿水苏**

**Stachys pseudophlomis** C. Y. Wu

生于海拔 800 米的竹林下或山坡湿草地上。分布于湖北、四川。

全草：用于关节痛，胃痛。

**甘露子**　旱螺蛳(湖北)，土人参(四川 贵州)，地钮(贵州)，罗汉菜(云南)，宝塔菜

(中国蔬菜栽培学)

**Stachys sieboldi** Miq.

生于海拔 3 200 米以下的湿润地、积水处或栽培。分布于华北、西北、中南及辽宁、山东、江苏、安徽、浙江、江西、四川、贵州、云南。

块茎或全草：甘，平。祛风热，利湿，活血散瘀。用于黄疸，小便淋痛，风热感冒，肺痨，虚劳咳嗽，小儿疳积，疮毒肿痛，蛇虫咬伤。

附　注：本种在广西及湖北个别地区伪充冬虫夏草。

## 香科科属　Teucrium L.

**安龙香科科**　野苏子(云南)

**Teucrium anlungense** C. Y. Wu et S. Chow

生于海拔 550—1 500 米的山坡开旷地上。分布于贵州、云南。

全草：用于小儿消化不良，脘腹胀痛。

**二齿香科科**　细沙虫草(贵州)，白花石蚕(中国高等植物图鉴)

**Teucrium bidentatum** Hemsl.——*Kinostemon bidentatum* (Hemsl.) Kudo

生于海拔 950—2 000 米的山地林下及灌丛中。分布于台湾、湖北、广西、四川、贵州及云南。

根：辛、微甘，温。解毒，健脾利湿。用于痢疾，白斑。

**穗花香科科**　石蚕(江苏)，水薤香(四川)，毛秀才(贵州)

**Teucrium japonicum** Willd.

生于海拔 500—1 500 米的山地、灌丛下及田野上。分布于江苏、浙江、江西、湖南、广东、四川、贵州。

全草：辛、微苦，温。发表散寒。用于外感风寒。

**峨眉香科科**　野荞(四川)，峨眉石蚕(植物分类学报)

**Teucrium omeiense** Sun ex S. Chow

生于海拔 1 200—2 000 米的湿润林下。分布于湖北、四川。

全草：消肿，止泻，止血。用于毒蛇咬伤，疮疖红肿疼痛。

**庐山香科科**　细沙虫草(贵州)，白花石蚕(中药大辞典)

**Teucrium pernyi** Franch.

生于海拔 150—1 120 米的山地、林下、溪涧岸边、草丛及田野等阴湿地带。分布于中南及江苏、安徽、浙江、江西、福建、四川、贵州。

根及全草(细沙虫草)：辛、微甘，温。健脾利湿，解毒。用于痢疾，白斑，跌打损伤。叶：外用于痈疮。

**长毛香科科**　铁马鞭(四川)

**Teucrium pilosum** (Pamp.) C. Y. Wu et S. Chow —— *T. japonicum* Willd. var. *pilosum* Pamp.

生于海拔 340—2 500 米的山坡林缘、河边。分布于浙江、江西、湖北、湖南、广西、四川、贵州。

根状茎：用于瘀症。

**铁轴草**　凤凰草(贵州)，牛尾草、绣球防风(云南)，梁欧(侗语)，杀列使(瑶语)

**Teucrium quadrifarium** Buch.-Ham.

生于海拔350—2 400米的山地阳坡、林下及灌丛中或山溪边、草地。分布于江西、福建、湖南、广东、广西、贵州、云南。

根：用于吐胀，泻痢。　全草：清热解毒，止痛。用于感冒风热，头痛，痢疾，风热咳喘，毒蛇咬伤，跌打肿痛，瘀症，皮肤湿疹。　叶：消炎，止血。用于外伤出血，刀、枪伤。

**香科科**　荆芥(广西)

**Teucrium simplex** Vaniot

生于海拔1 500—2 000米的阔叶常绿林下的阴湿处或灌丛中。分布于广西、四川、贵州、云南。

全草：清热解毒，疏风解表。

**黑龙江香科科**

**Teucrium ussuriense** Kom.

生于向阳多石山坡、河边、草丛中。分布于辽宁、河北。

全草：清暑化湿，芳香健胃。

**血见愁**　消炎草(广西)，假香菜(云南)，山藿香、贼子草、假紫苏(中国高等植物图鉴)

**Teucrium viscidum** Bl.

生于海拔120—1 530米的山地、林下阴湿处或荒坡、田边及靠近石灰岩半阴的草丛中。分布于西南及江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、河南、湖南、广东、广西。

全草(山藿香)：辛，凉。凉血止血，散瘀消肿，舒筋活络，解毒止痛。用于吐血，衄血，肠风下血，痛经，咽喉肿痛，咳血，跌打损伤，产后瘀血腹痛，痈疮，痔疮，毒蛇或蜈蚣咬伤。

附　注：功效相同的有**大唇血见愁 T. viscidum** Bl. var. **macrostephanum** C. Y. Wu et S. Chow，分布于广西西部、贵州、云南。

**光萼血见愁**

**Teucrium viscidum** Bl. var. **leiocalyx** C. Y. Wu et S. Chow

生于海拔1 700米以上的水沟边、山坡林下。分布于陕西、甘肃、湖北、四川。

全草：用于感冒。

**微毛血见愁**

**Teucrium viscidum** Bl. var. **nepetoides** (Lèvl.) C. Y. Wu et S. Chow —— *T. nepetoides* Lèvl.

生于海拔700—2 200米的山地林下阴湿处。分布于陕西、安徽、浙江、江西、湖北、四川、贵州。

全草：用于胃气痛，吐泻，吐血，感冒。

## 百里香属　Thymus L.

**阿尔泰百里香**　地椒(新疆)，地腊香(本草纲目拾遗)

**Thymus altaicus** Klok. et Shost.

生于海拔 1 100—1 400 米的沟边、草地及石砾地上。分布于新疆北部。

全草：辛，凉。有小毒。消肿通淋，止咳化痰，解表杀虫。

附　注：《新疆中草药》误定为 *T. serpyllum* L.。

**长齿百里香**

**Thymus disjunctus** Klok.

生于砾石草地、沙质谷地。分布于东北。

全草：止咳，祛风，杀虫。

**异株百里香**

**Thymus marschallianus** Willd.

生于多石斜坡、盆地、山沟及水边。分布于新疆北部。

全草：健胃消积，消炎止痛。

**百里香**　　地角花(河北)，地姜、千里香(山西、甘肃)，地椒叶(陕西)

**Thymus mongolicus** (Ronn.) Ronn.——*T. serpyllum* L. var. *mongolicus* Ronn.

生于海拔 1 100—3 600 米的多石山地、斜坡、山沟、路旁及杂草丛中，亦有栽培。分布于华北、西北及河南。

地上部分(地椒)：辛，温。有小毒。祛风解表，行气止痛。用于感冒，头痛，牙痛，周身疼痛，腹胀冷痛。

附　注：功效相同的有**地椒 T. quinquecostatus** Celak.，分布于辽宁、河北、山西、山东、河南；**亚洲地椒 T. quinquecostatus** Celak. var. **asiaticus** (Kitag.) C. Y. Wu et Y. C. Huang，分布于内蒙古、陕西、宁夏；**展毛地椒 T. quinquecostatus** Celak. var. **przewalskii** (Kom.) Ronn.，分布于东北、华北及陕西、甘肃、河南。

**拟百里香**

**Thymus proximus** Serg.

生于海拔 2 000—2 100 米的山沟潮湿地或山顶阳坡。分布于新疆北部。

全草：温中散寒，和胃止呕，镇咳祛风。

**麝香草**　　百里香(上海植物名录)

**Thymus vulgaris** L.

原产地中海沿岸。我国有栽培。

全草：为芳香性镇静剂。驱风，镇静，驱钩虫。用于顿咳，急性咳嗽，痰喘，咽喉痛，皮肤刺激剂及防腐性洗涤药。

## 新塔花属　Ziziphora L.

**新塔花**　　小叶薄荷(新疆)，续则(维吾尔语)

**Ziziphora bungeana** Juz.

生于海拔 700—1 100 米的砾石坡地、半荒漠草地及沙滩上。分布于新疆。

地上部分：辛，凉。安神，强壮。用于失眠，心慌，软骨病，阳痿。

**唇香草**

**Ziziphora clinopodioides** Lam.

生于低山阴湿处。分布于新疆。

全草：强心利尿，清热解毒，安眠，降压。用于高血压症，冠心病。

附　注：功效相同的有**南疆新塔花 Z. pamiroalaica** Juz. ex Nevski，分布于新疆南部；**小新塔花 Z. tenuior** L.，分布于新疆北部；**天山新塔花 Z. tomentosa** Juz.，分布于新疆北部。

## 161. 茄科　Solanaceae

### 山莨菪属　Anisodus Link et Otto

**三分三**　　野烟(四川)，大搜山虎、山茄子(云南)

**Anisodus acutangulus** C. Y. Wu et C. Chen ex C. Chen et C. L. Chen

生于海拔 2 700—3 100 米的山坡、田埂上或林中路旁，亦有少量栽培。分布于云南西北部。

根(三分三)、茎、叶、种子：苦、辛，温。有大毒。解痉止痛，祛风除湿，止血。用于胃痛，胆、肾绞痛，肠痉挛，震颤麻痹，风湿痹痛，骨折，跌打损伤。

附　注：①生药最大剂量不得超过三分三钱，否则易引起中毒。② 在云南个别地区亦作三分三药用的种类有**三分七 A. acutangulus** C. Y. Wu et C. Chen var. **breviflorus** C. Y. Wu et C. Chen——*Scopolia breviflorus* C. Y. Wu et C. Chen，分布于四川西南部、云南西北部；**铃铛子 A. luridus** Link et Otto，分布于云南西北部、西藏东南部；**搜山虎 A. mairei** (Lévl.) C. Y. Wu et C. Chen —— *Scopolia mairei* Lévl.，分布于云南。

**丽江山莨菪**

**Anisodus luridus** Link et Otto var. **fischerianus** (Pascher) C. Y. Wu et C. Chen——*A. fischerianus* Pascher

生于海拔 2 800—3 000 米的山坡草地阳处或灌丛中。分布于云南、西藏。

根：镇痛。也作三分三入药。

**山莨菪**　　藏茄(青海)，樟柳参(青海、云南)，唐古特莨菪(云南)，唐冲藕乌、唐春木那布(藏语)

**Anisodus tanguticus** (Maxim.) Pascher——*Scopolia tangutica* Maxim.

生于海拔 2 800—4 200 米的山坡、草坡阳处、高山疏林草丛中，亦有栽培。分布于西南及甘肃、青海。主产青海玉树、果洛、黄南、海北藏族自治州，四川甘孜、阿坝藏族自治州，西藏东部地区及甘肃西南部。

根(山莨菪)：苦、辛，温。有大毒。镇痛解痉，麻醉。用于溃疡病，吐泻，胃肠神经官能症，胆道蛔虫病和胆道结石症等引经的疼痛；外用于疮疖痈疽肿毒，骨折，跌打损伤，外伤出血。

附　注：本种为西藏、青海民间草药。

## 地海椒属 Archiphysalis Kuang

**地海椒**

**Archiphysalis sinensis** (Hemsl.) Kuang——*Chamaesaracha sinensis* Hemsl.

生于海拔1 200—1 400米的山坡林下。分布于湖北西部、四川、贵州。

全草：清热解毒。用于疔疮，消毒。

## 颠茄属 Atropa L.

**颠茄**

**Atropa belladonna** L.

原产欧洲中部、西部和南部。我国引种栽培。喜生于温暖湿润气候，排水良好，含腐殖质的砂质壤土，忌连作。栽培于河北、新疆、山东、上海、安徽、浙江、河南、湖北、广西、云南。云南有逸生。主要栽培于北京、山东烟台、浙江温州。

全草(颠茄草)：为抗胆碱药。本品制剂用于解痉，止痛，止分泌。　根：为外用镇痛药，局部使用，可减轻风湿病，神经痛，腰痛，静脉炎，痔疮及肛门瘘的疼痛。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 天蓬子属 Atropanthe Pascher

**天蓬子**　搜山虎(四川、云南)，白商陆(四川)，小独活(贵州)，新莨菪(云南)

**Atropanthe sinensis** (Hemsl.) Pascher——*Scopolia sinensis* Hemsl.

生于海拔 (730—)1 380—3 000 米的杂木林下阴湿处或沟边。分布于湖北西部、四川东南部、贵州西北部、云南东北部。

根：辛、苦，温。有大毒。祛风散寒，舒筋活络，止痛。用于风寒感冒，跌打损伤，风湿关节痛，瘫痪，破伤风。

附　注：我国特有属。

## 木曼陀罗属 Brugmansia Pers.

**木曼陀罗**　木本曼陀罗(通称)，大花曼陀罗(云南)，乔木状曼陀罗(中国药用植物志)

**Brugmansia arborea** (L.) Steud.——*Datura arborea* L.

原产美洲热带。福建、广东、云南有引种栽培。北京、青岛、南京温室亦有栽培。

叶、花、种子：麻醉，镇痛。

## 番茉莉属 Brunfelsia L.

**鸳鸯茉莉**　番茉莉(广东)

**Brunfelsia acuminata** Benth.

原产美洲热带。广东庭园有栽培。

叶：甘，平。清热消肿。用于水肿。

## 辣椒属 Capsicum L.

**辣椒** 鸡嘴椒(广东)，牛角椒、海椒、长辣椒(云南)

**Capsicum annuum** L.——*C. frutescens* L. var. *longum* Bailey

原产墨西哥至哥伦比亚。我国各地普遍栽培。

根：辛，温。活血消肿。用于崩漏。 茎：用于风湿冷痛。 果实(辣椒)：辛、辣，温。温中散寒，健胃，发汗。用于脾胃虚寒，消化不良；外用于风湿痛，腰腿痛，冻疮。 叶：用于水肿。 种子：用于风湿痛。

附 注：功效相同的有**簇生椒 C. annuum** L. var. **fasciculatum** (Sturt.) Irish——*C. fasciculatum* Sturt. 及**菜椒 C. annuum** L. var. **grossum** (L.) Sendt.——*C. grossum* L.，全国各地均有栽培。

**樱桃椒** 五彩椒、五色椒(广东)

**Capsicum annuum** L. var. **cerasiforum** Irish

原产南美洲。我国各地有栽培。

根：用于风湿痛。 果实：辛，热。用于脾胃虚寒，食欲不振。

**朝天椒** 指天椒、小辣椒(广东)

**Capsicum annuum** L. var. **conoides** (Mill.) Irish——C. conoides Mill.

原产南美洲热带地区。全国各地普遍栽培，间有野生。

果实：辛，温。外用于冻疮，脚气，狂犬咬伤。

**小米辣** 米辣、野辣子(云南)

**Capsicum frutescens** L.

栽培于河南、湖北、湖南、云南。

根：外用于冻疮。 茎：辛，热。除寒湿，逐冷痹，散瘀血凝滞。用于风湿冷痹，冻疮。 果实：辛，热。温中，散寒，开胃；消食。用于感冒，寒滞腹痛，咳嗽，吐血，消化不良，呕吐，冻疮，疥癣。

## 夜香树属 Cestrum L.

**夜香树** 洋素馨、夜来香、夜香花(广东)

**Cestrum nocturnum** L.

原产南美洲。栽培于福建、广东、广西、贵州、云南。

叶：苦，凉。清热消肿。外用于乳痈，痈疮。

## 树番茄属 Cyphomandra Sendt.

**树番茄** 缅茄(中国植物志)

**Cyphomandra betacea** Sendt.

原产南美洲。热带和亚热带地区有引种。栽培于贵州、云南及西藏南部。

果实：解毒。

## 曼陀罗属　Datura L.

**洋金花**　风(枫)茄花(江苏、上海)，闹羊花(南方)，枫茄子(上海)，白曼陀罗(福建)，狗核桃(云南)

**Datura metel** L.——*Datura fastuosa* L.

生于海拔100—2 000米的荒坡草地或住宅旁，广为栽培。分布于东北、华北、华东、中南及陕西、新疆、四川、贵州、云南。

花(洋金花)：辛，温。有毒。平喘止咳，镇痛，解痉。用于哮喘咳嗽，脘腹冷痛，风湿痹痛，小儿慢惊，外科麻醉。　根(曼陀罗根)：用于恶疮，筋骨疼痛，牛皮癣，狂犬咬伤。叶(曼陀罗叶)：苦，辛。用于喘咳，痹痛，顽固性溃疡，脚气，脱肛。　果实或种子(曼陀罗子)：辛、苦，温。有大毒。平喘，祛风，止痛。用于咳喘，惊痫，风寒湿痹，泻痢，脱肛，跌打损伤。

附　注：①本种为《中华人民共和国药典》1990年版收载。②功效相同的有**毛曼陀罗 D. innoxia** Mill.，分布于华北、华东及辽宁、陕西、新疆、河南、湖北、湖南、四川、贵州；**无刺曼陀罗 D. stramonium** L. ——*D. tatula* L.；*D. inermis* Jacq.，全国各地普遍分布。③本属植物全株有毒，尤以种子最毒，慎用。

## 天仙子属　Hyoscyamus L.

**莨菪**　天仙子(通称)，牙痛子(华北、西北)，唐葱莨菪子(藏语)，特纳格—乌布斯(蒙语)，冈伍人克(维吾尔语)

**Hyoscyamus niger** L.

生于海拔3 400米以下的山坡、路旁、宅旁及河岸沙地，栽培或逸为野生。分布于华北、西北、华东、西南及河南、湖北。

种子(天仙子)：苦，温。有大毒。解痉，止痛，安神。用于胃痉挛疼痛，咳喘，泄泻，癫狂，震颤性麻痹及抗眩晕；外用于痈肿疮疖，龋齿痛。　根：苦，寒。有毒。用于疥癣，杀虫。　叶：苦，寒。有大毒。镇痛，解痉。用于胃痛，齿痛，咳喘。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②功效相同的有**小天仙子 H. bohemicus** F. W. Schmidt.——*H. agrestis* Kit. ex Schult.，分布于东北及河北、内蒙古、宁夏；**中亚天仙子 H. pusillus** L.，分布于新疆、西藏西部。

## 红丝线属　Lycianthes (Dunal) Hassl.

**红丝线**　猫耳朵(广西)，野花毛辣角(贵州)，十萼茄(广州植物志)，血见愁(植物名实图考)

**Lycianthes biflora** (Lour.) Bitter——*Solanum biflorum* Lour.

生于海拔150—2 000米的荒野阴湿地、林下、路旁、水边及山谷中。分布于江西、福建、台湾、广东、广西、四川南部、贵州、云南。

全株(毛药)：涩，凉。祛痰止咳，清热解毒。用于感冒，虚劳咳嗽，气喘，消化不良，疟疾，跌打，外伤出血，骨鲠喉，疮疖及狂犬咬伤。

**密毛红丝线**　金扣钮(广西)

**Lycianthes biflora** (Lour.) Bitter var. **subtusochracea** Bitter

生于海拔(450—)1 200—1 700米的路旁、林下。分布于云南。

根、叶：外用于蛇虫咬伤。

附　注：云南特有药用植物。

**单花红丝线**　锈草、佛葵(四川)

**Lycianthes lysimachioides** (Wall.) Bitter——*Solanum lysimachioides* Wall.

生于海拔1500—2200米的林下、荒坡、路旁。分布于台湾、湖北、广西、四川、贵州、云南。

全草(佛葵)：辛，温。有小毒。杀虫，解毒。用于痈肿疮毒。

附　注：功效相同的有**心叶单花红丝线 L. lysimachioides** (Wall.) Bitter var. **cordifolia** C. Y. Wu et S. C. Huang，分布于四川；**紫单花红丝线 L. lysimachioides** (Wall.) Bitter var. **purpuriflora** C. Y. Wu et S. C. Huang，分布于湖北、四川。

## 枸杞属　Lycium L.

**宁夏枸杞**　津枸杞(天津)，山枸杞(山西)，白疙针(内蒙古)，中宁枸杞、西枸杞(青海)

**Lycium barbarum** L.

原产我国华北和西北。生于海拔2 000—3 000米土层深厚的沟岸、山坡、田埂、宅旁。现广泛栽培于华北、西北及辽宁、山东、江苏、浙江、河南、湖北、西藏；尤以宁夏及天津地区栽培多。

果实(枸杞子)：甘，平。滋补肝肾，益精明目。用于虚劳精亏，腰膝酸痛，眩晕耳鸣，内热消渴，血虚萎黄，目昏不明。　根皮(地骨皮)：甘，寒。凉血除蒸，润肺降火。用于阴虚潮热，骨蒸盗汗，肺热咳嗽，咯血，衄血，内热消渴。　叶：苦、甘，凉。补虚益精，清热，止渴，祛风明目。用于虚劳发热，烦渴，目赤肿痛，翳障夜盲，崩漏，带下病，热毒疮肿。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。② 功效相同的有**黄果枸杞 L. barbarum** L. var **auranticarpum** K. F. Ching，分布于宁夏；**枸杞 L. chinense** Mill.，全国各地普遍分布，其中根皮(地骨皮)作为正品，《中华人民共和国药典》1990年版收载；**北方枸杞 L. chinense** Mill. var. **potaninii** (Pojark.) A. M. Lu——*L. potaninii* Pojark.，分布于华北、西北及四川；**新疆枸杞 L. dasystemum** Pojark.——*L. turcomanicum* Turcz. ex Boiss.，分布于甘肃、青海、新疆；**黑果枸杞 L. ruthenicum** Murr.，分布于西北及西藏；**截萼枸杞 L. truncatum** Y. C. Wang，分布于华北及陕西、甘肃、新疆；**云南枸杞 L. yunnanensis** Kuang et A.M. Lu，分布于云南。

## 番茄属　Lycopersicon Mill.

**番茄**　西红柿(通称),番柿(中国植物志),番李子(广州植物志)

**Lycopersicon esculentum** Mill.——*Solanum lycopersicum* L.

原产南美洲。我国各地均有栽培。

果实(番茄):甘、酸,微寒。生津止渴,健胃消食。用于口渴,食欲不振。

## 茄参属　Mandragora L.

**茄参**　向阳花(云南),曼陀茄(中国植物志)

**Mandragora caulescens** C. B. Clarke

生于海拔2 200—4 200米的山坡草地。分布于西南。

根(曼陀茄根):甘、微苦,温。有毒。温中散寒,解郁止痛。用于胃痛,腹痛,跌打损伤。

**青海茄参**

**Mandragora chinghaiensis** Kuang et A. M. Lu

生于海拔3 650—4 000米的河滩草地或岩石缝中。分布于青海、西藏。

全草:用于肺痈。

附　注:本种为藏医常用药。

## 假酸浆属　Nicandra Adans.

**假酸浆**　水晶凉粉(贵州),冰粉、鞭打绣球、大千生(云南)

**Nicandra physaloides** (L.) Gaertn.——*Atropa physaloides* L.

原产南美洲。栽培于华北、西南及甘肃、新疆。河北、陕西、甘肃、四川、贵州、云南、西藏有逸生,生于田边、荒地或宅旁。

全草(假酸浆):甘、淡、微苦,平。镇静,祛痰,清热,解毒。用于感冒,咳嗽,狂犬病,精神病,癫痫,风湿痛,疮疖,痧气,疥癣。　花、果实或种子:微甘、酸、涩,平。有小毒。清热,解毒,祛风,退火,利尿。用于发烧,胃热,热淋,风湿关节痛,疮痈肿毒。

## 烟草属　Nicotiana L.

**黄花烟草**　山烟(山西),小花烟(陕西),莫合烟(新疆)

**Nicotiana rustica** L.

原产南美洲。我国西北、西南及河北、山西、湖北、广东有栽培。

叶:有毒。行气,解毒,止血,杀虫。用于疔疮肿毒,头癣。

**烟草**　烟叶(通称)

**Nicotiana tabacum** L.

原产南美洲。我国各地普遍栽培。

全草：辛，温。有毒。行气止痛，麻醉，发汗，镇静，催吐，解毒，杀虫。用于食滞饱胀，气结疼痛，骨折疼痛，偏头痛，疟疾，痈疽，疔疮，肿毒，头癣，白癣，秃疮，蛇、犬咬伤。烟油垢：用于蛇伤，蜈蚣咬伤。

## 碧冬茄属 Petunia Juss.

**碧冬茄** 彩花茄(广东)

**Petunia hybrida** Vilm.

原产南美洲。我国各地公园普遍栽培。

种子：行气，杀虫。用于腹水，腹胀便秘，蛔虫病。

## 散血丹属 Physaliastrum Makino

**江南散血丹** 龙须参(江苏)，刺酸浆(中药大辞典)

**Physaliastrum heterophyllum** (Hemsl.) Migo——*Chamesaracha heterophyllum* Hemsl.

生于海拔450—1 100米的山坡、山谷林下潮湿处。分布于陕西、江苏、浙江、江西、河南、湖北、湖南、四川。

根(龙须参)：滋补。用于虚弱劳伤。

**日本散血丹** 山茄子(中国高等植物图鉴)

**Physaliastrum japonicum** (Franch. et Sav.) Honda——*Chamaesaracha japonica* Franch. et Sav.

生于山沟及山坡草丛中。分布于东北及河北、山东、江苏。

根：活血散瘀，祛风散寒，收敛止痛。

## 酸浆属 Physalis L.

**酸浆** 灯笼草(云南)，欧亚酸浆(中药志)

**Physalis alkekengi** L.

生于山坡或空旷地。分布于陕西、甘肃、河南、湖北、四川、贵州、云南。

全草、花、种子：行水利湿，清热解毒。用于风湿关节痛，鼻渊，感冒，咽喉痛，咳嗽。果实：在欧美用于轻泻，利尿，退热，护肝。

**挂金灯** 酸浆(通称)，红姑娘(东北及河北、北京、天津)，锦灯笼(陕西、广东)，打拍草(广西)，天泡果(四川、贵州)

**Physalis alkekengi** L. var. **francheti** (Mast.) Makino——*P. francheti* Mast.; *P. francheti* Mast. var. *bunyardii* Makino

生于海拔500—3 100米的田野、沟边、山坡草地、林下或路旁水边，亦普遍栽培。除西藏外，全国各地均有分布。以东北、华北产量大，品质好，销全国各地。

宿萼或带果实的宿萼(锦灯笼)：苦，寒。清热解毒，利咽，化痰，利尿。用于咽痛音哑，痰热咳嗽，小便不利；外用于天疱疹，湿疹。　根状茎：苦，寒。清热，利水。用于疟疾，黄疸，疝气。　地上部分：酸、苦，寒。清热解毒，利尿。用于咳嗽，黄疸，疟疾，水肿，疔疮，丹毒。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**苦蘵**　灯笼草(华东、广东)，灯笼泡(广西)

**Physalis angulata** L.

生于海拔500—1 500米的山谷林下及村边路旁。分布于华东、中南、西南及陕西。

带浆果的宿萼：功效同挂金灯。　全草：苦，寒。清热解毒，消肿散结。用于咽喉肿痛，疟腮，牙龈肿痛，急性肝炎，菌痢，蛇伤。　根：苦，寒。利尿，通淋。用于水肿腹胀，黄疸，热淋。

附　注：本种带浆果的宿萼在浙江作挂金灯药用。

**毛苦蘵**

**Physalis angulata** L. var. **villosa** Bonati

生于村边、田野、旷地等草丛中。分布于江西、湖北、广东、云南。

全草：清热解毒，化痰止咳。

**小酸浆**　天泡果(中药志)，黄姑娘(中药大辞典)，灯笼泡(草)(全国中草药汇编)，天泡子(分类草药性)

**Physalis minima** L.

生于海拔1 000—1 300米的山坡、田野及土坝上。分布于湖北、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草或果实(天泡子)：苦，凉。清热利湿，祛痰止咳，软坚散结，杀虫。用于黄疸，胆囊炎，感冒发热，咽喉肿痛，咳嗽痰喘，肺痈，疟腮，子痈，小便涩痛，尿血，瘰疬；外用于脓疱疮，湿疹，疖肿。

**灯笼果**　小果酸浆(广东)，灯笼草、沙灯笼、炮掌果(云南)

**Physalis peruviana** L.

原产南美洲。生于海拔1 200—2 100米的路旁、河谷或栽培。在广东、贵州、云南栽培或归化。

全草：苦，凉。清热解毒，消炎利水。用于感冒发热，疟腮，咳嗽痰喘，急性肾盂肾炎，子痈，泡疹，疖疮，疝气痛。

**毛酸浆**　黄姑娘、洋姑娘(吉林)

**Physalis pubescens** L.

原产美洲。黑龙江、吉林有栽培或逸生，多生于草地或田边路旁。

全草或果实：清热解毒，利气。

## 泡囊草属　Physochlaina G. Don

**漏斗泡囊草**　二月旺(山西)，华山参、秦参(陕西)，大红参、大紫参(河南)

**Physochlaina infundibularis** Kuang

生于海拔1000米以上的山谷林下。分布于山西南部、陕西中部至东部、河南西部、湖北。

根(华山参、热参)：甘、微苦，热。有毒。平喘止咳，安神镇惊。用于寒痰喘咳，心悸失眠，易惊。　叶：止血。

附注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②本品不宜多服，以免中毒。青光眼患者禁用。孕妇及前列腺极度肥大者慎用。

**泡囊草**　大兴狼毒、汤乌普(内蒙古)

**Physochlaina physaloides** (L.) G. Don——*Hyoscyamus physaloides* L.

生于山坡草地或林缘。分布于东北、华北及新疆。

根：甘、微苦，热。有毒。补虚温中，安神，定喘。用于虚寒泄泻，劳伤，咳嗽痰喘，心慌不安。　全草：苦，平。有毒。清热解毒，祛湿杀虫。用于中耳炎，鼻窦炎，咽喉肿痛，疮痈肿痛，头痛。　花、茎：止血。

## 马尿泡属　Przewalskia Maxim.

**马尿泡**　唐古特马尿泡(中国植物志)，矮莨菪(中药志)，唐冲嘎薄(藏语)

**Przewalskia tangutica** Maxim.

生于海拔3 200—5 000米的高山砂砾地及干旱草原。分布于甘肃、青海、四川、西藏。

根(矮莨菪)：微苦，平。有毒。镇痛，解痉，杀虫，消炎。用于胃肠痉挛疼痛，白喉，炭疽；外用于疮疡，皮肤瘙痒。

附　注：①为藏医常用药。习用地上部分或根作镇痛药。②我国特有属。

## 赛莨菪属　Scopolia Jacq.

**赛莨菪**　七厘散、无慈、疯药、搜山虎(云南)

**Scopolia carniolicoides** C. Y. Wu et C. Chen

生于海拔3 000—3 600米的草坡、林缘灌丛中或疏林下草丛中，有时生于石缝间。分布于四川、云南西北部。

根(三分三)：有剧毒。茎、叶、种子：功效同三分三。

附　注：功效相同的有**齿叶赛莨菪 S. carniolicoides** C. Y. Wu et C. Chen var. **dentata** C. Y. Wu et C. Chen ex C. Chen et C. L. Chen，分布于四川西南部、云南西北部。本种有剧毒。

## 茄属　Solanum L.

**澳洲茄**

**Solanum aviculare** Forst.

原产大洋洲。栽培于河北、江苏、湖北、云南。

根、皮、叶、果实：祛风除湿。

附　注：本品为提取茄解定(solasodine)的理想原料。

**千年不烂心**　假辣椒(广西),毛田猪藤、排风藤(四川)

**Solanum cathayanum** C. Y. Wu et S. C. Huang—— *S. dulcamara* L. var. *chinensis* Dunal

生于海拔530—1 250(130—1 950)米的灌丛中、山谷及山坡等阴湿处。分布于华东、中南及陕西、甘肃、四川、贵州、云南。

茎：用于小儿惊风。　枝、叶：用于偏头痛，蛇伤。　全草：功效同白英。

附　注：本种易与白英混用。

**野茄**　丁茄(广东),牛茄子(海南),苦天茄、黄天茄(云南)，黄水(刺)茄(全国中草药汇编)

**Solanum coagulans** Forsk.

生于海拔180—1 100米的灌丛中、缓坡地带。分布于台湾、广东、广西、贵州、云南。

根、果实(黄水茄)：苦、辛,温。清热利湿,消肿止痛。用于风湿关节痛,子痈，牙痛，腹痛,淋证,痒疹,头皮痒。　全株：苦、涩,寒。有毒。清热解表,止痛。用于疟疾,感冒，小儿疳积。

**欧白英**　千年不烂心、苦茄、天泡草(中国药用植物志)

**Solanum dulcamara** L.

生于海拔1 600—3 300米的村边坡地。分布于四川西南部、贵州、云南西北部。

全草：甘,寒。清热解毒。用于恶疮,疥疮,食管癌,子宫癌,乳腺癌,外伤出血。　果实(苦茄)：用于利尿,神经痛,消肿。

**毛茄**　大叶毛刺茄(广东、广西、云南),毛茄树(广东),大样颠茄(海南),羊不食(云南)

**Solanum ferox** L.

生于海拔220—1 000米的沟谷湿润地、灌丛中、路旁疏林及密林下。分布于台湾、广东、广西、云南南部及东南部。

根：有小毒。通脉定痛，散瘀消肿。用于跌打肿痛，疝气。　全株：消炎。用于咳嗽,咽喉痛,水肿,淋证,跌打损伤,疝气。

**刺天茄**　小癫茄(广东),金钮扣、紫花茄(广东、云南),天茄子(滇南本草)，巴山虎(岭南采药录)

**Solanum indicum** L.

生于海拔180—1 700米的林下、路边、荒地，在干燥灌丛中有时成片生长。分布于福建、台湾、广东、广西、四川、贵州、云南。

根：苦,平。有小毒。清热除湿,祛瘀消肿。用于风湿痹痛,疝气腹痛,头痛,牙痛,咽喉痛,乳蛾,疳积,跌打损伤,瘰疬。　全株：微苦,凉。有小毒。消炎止痛,消肿散瘀。用于乳蛾,咽喉痛,瘰疬,胃痛,牙痛,偏头痛,肠痈,疝气,风湿痛,消化不良,腹胀,疟疾,痈疮肿毒,跌打损伤。　果实(天茄子)：用于伤风咳嗽,牙痛,疝痛。

**野海茄**

**Solanum japonense** Nakai

生于海拔(250—)600—1 800(—2 800)米的荒坡、山谷、水边、路旁及山崖疏林下。分布于东北、中南及河北、陕西、青海、新疆、山东、上海、江苏、安徽、浙江、四川、云南。

全草：甘，寒。清热解毒，利尿消肿，祛风湿。用于风湿关节痛，经闭。

附　注：本种易与白英混用。

**喀西茄**　苦颠茄、苦天茄、刺天茄（云南），阿公（哈尼语），刺茄子（中药大辞典）

**Solanum khasianum** C. B. Clarke

生于海拔1 300—2 300米的沟边、路边灌丛、荒地、草坡或疏林中。分布于广西、贵州及云南。

根、果实（刺天茄）：微苦，寒。有小毒。消炎解毒，镇痉止痛。用于风湿，跌打疼痛，神经性头痛，胃痛，牙痛，乳痛，疔腮。　叶（刺天茄叶）：微苦，凉。消炎止痛，解毒。用于小儿惊厥，麻风，腹痛，牙痛。　叶、果实：外用于疮毒。

附　注：果实含茄解定，为合成激素的原料。

**白英**　蔓茄（陕西），白草（广东），北风藤（四川），白毛藤（本草纲目拾遗），鬼目（名医别录）

**Solanum lyratum** Thunb. ——*S. dulcamara* L. var. *lyratum* (Thunb.) Sieb. et Zucc. ex Bonati

生于海拔600—2 800米的山谷草地、路旁、田边或栽培。分布于华东、中南及河北、山西、陕西、甘肃、青海、四川、贵州、云南。主产浙江、江苏和安徽。

地上部分（白英）：甘、苦，寒。清热解毒，祛风利湿，化瘀。用于湿热黄疸，风湿关节痛，带下病，水肿，淋证，丹毒，疔疮，癌瘤。　根（白毛藤根）：苦、辛，平。用于风火牙痛，头痛，瘰疬，痈肿，痔漏。　果实（鬼目）：酸，平。明目。用于目赤，牙痛。

**乳茄**　五指茄、五角茄（广东），五指丁茄（广东、广西），五子登科（广西）

**Solanum mammosum** L.

原产美洲。广东、广西、云南有栽培。

果实：苦、涩，寒。有毒。镇痛，散瘀，消肿。用于心胃气痛，瘰疬，疮疖肿痛。　全草：有毒。用于胃脘痛。

**茄**　茄子（通称），矮瓜（广东），茄子花、东风草（云南）

**Solanum melongena** L. ——*S. melongena* L. var. *esculentum* (Dunal) Nees Sendtner 认为原产阿拉伯。我国各地均有栽培。

根（茄根）：甘，凉。清热利湿，祛风止咳，收敛止血。用于风湿关节痛，老年慢性咳嗽痰喘，水肿，久咳，久痢，带下病，遗精，尿血，便血；外用于冻疮。　叶（茄叶）：散血消肿。用于血淋，血痢，肠风下血，阴挺，齿衄，痈肿，冻伤。　花（茄花）：用于金疮，牙痛。　果实（茄子）：甘，凉。清热，活血，止痛，消肿，宽肠，杀虫，止痒，利尿。用于疟疾，痢疾，心痛，肠风下血，血痔，小儿抽搐，皮肤溃疡，乳痈。疔疮痈疽，冻疮。　宿萼：用于肠风下血，痈疽肿毒，口疮，牙痛。

**龙葵**　黑天天（东北），黑姑娘（河北），黑辣椒（浙江），野海椒（四川），苦葵（中国药用植物志）

**Solanum nigrum** L.

生于田边、路旁、荒地、草地上，也有栽培。全国各地均有分布。

全草（龙葵）：苦，寒。有小毒。清热，解毒，活血，消肿。用于疔疮，痈肿，丹毒，跌打扭伤，慢性咳嗽痰喘，水肿，癌肿。　根：苦、微甘，寒。用于痢疾，淋浊，带下病，跌打损

伤，痈疽肿毒。　种子：甘，温。明目，镇咳，祛痰。用于乳蛾，疔疮。

**少花龙葵**　乌疔草(福建)，古钮菜(广东、广西)，白花菜(广东、云南)，扣子草(广东)

**Solanum photeinocarpum** Nakamura et Odashima ——*S. nigrum* L. var. *pauciflorum* Liou

生于海拔110—1 400 米的溪边、密林阴湿处或林边荒地。分布于江西、台湾、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草(少花龙葵)：微苦，寒。清热，解毒，利尿，散血，消肿，抗癌。用于感冒发热，痢疾，淋证，目赤，咽喉痛，疔疮及狂犬咬伤。

**海桐叶白英**

**Solanum pittosporifolium** Hemsl.

生于海拔 500—2 500 米的路旁、沟边、密林或山地林下。分布于河北、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草：清热解毒，散瘀消肿，祛风除湿，抗癌。

**海南茄**　小丁茄、耳环锤(草)、鸡公箭子(广东)，杉纽藤(海南)，细颠茄、金纽头、卜古雀(中国植物志)

**Solanum procumbens** Lour.

生于海拔 300 米左右的灌丛中或林下。分布于广东、海南、广西。

根：微苦，凉。有小毒。凉血散瘀，消肿止痛。用于乳蛾，咽喉痛，跌打，蛇伤。　叶：用于乳痈。

**珊瑚樱**　玉珊瑚茄(广东)，吉杏(广西)，洋辣子、万寿果(云南)，冬珊瑚(中药大辞典)

**Solanum pseudo-capsicum** L.

原产南美。我国有栽培，亦有逸生，生于路边、沟边及空旷地。栽培于河北、江苏、安徽、江西、河南、湖北、广东、广西、四川、贵州、云南。

根(玉珊瑚根)：咸、微苦，温。理气，止痛，生肌，解毒，消炎。用于腰肌劳损，牙痛，血热，水肿，疮疡肿毒。

附　注：全株有毒。

**珊瑚豆**　刺石榴(陕西)，冬珊瑚(湖南)，陈龙茄(广西)，洋海椒(四川)

**Solanum pseudo-capsicum** L. var. **diflorum** (Vell.) Bitter ——*S. diflorum* Vell.; *S. capsicastrum* Link. ex Schau

生于海拔 1 350—2 800 米的田边、路旁、丛林中、水沟边或栽培。原产巴西。分布于河北、陕西、新疆、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全株(野海椒)：用于水肿，风湿痛。　果实：杀虫。

**青杞**　野茄子(河北、陕西)，红葵、野枸杞(内蒙古)，裂叶龙葵(中药大辞典)，蜀羊泉(植物名实图考)，药人豆(中国沙漠地区药用植物)

**Solanum septemlobum** Bunge

生于海拔(300—)900—1 600(—2 500)米的山坡向阳处。分布于东北、华北、西北及山东、江苏、安徽、河南、四川。

全草、果实：苦，寒。有毒。清热解毒。用于咽喉肿痛，目昏眼赤，皮肤瘙痒。

**旋花茄**　百两金(广西)，大苦溜溜、苦凉菜、理肺散(云南)，帕笠(傣语)

**Solanum spirale** Roxb.

生于海拔500—1 900米的溪边灌丛中、林下，稀生于荒地上。分布于湖南、广西、贵州、云南。

全株(大苦溜溜)：苦，寒。清热解毒，利湿。用于感冒发热，咳嗽，咽喉痛，疟疾，腹痛，泄泻，痢疾，小便短赤，小便涩痛，风湿跌打，疮疡肿毒。　叶：用于咳嗽，疮疡肿毒；外用于皮肤过敏。

附　注：印度用根作麻醉剂及利尿剂。

**牛茄子**　(野)颠茄、刺荆(广东、海南)，丁茄、山马铃(广西)，油辣果(贵州)

**Solanum surattense** Burm. f. ——*S. aculeatissimum* Jacq.

生于海拔125—1 180米的路旁、荒地、疏林、灌丛中，亦有栽培。分布于华东、中南及辽宁、河北、北京、河南、四川、贵州、云南。

根或全株(野颠茄)：苦、辛，温。有毒。活血散瘀，麻醉止痛，镇咳平喘。用于风湿腰腿痛，跌打损伤，慢性咳嗽痰喘，胃脘痛，慢性骨髓炎，瘰疬，冻疮，脚癣，痈疮肿毒。　果实：有毒。外用于龋齿。

**水茄**　金衫扣(广东、广西)，一面针(广西)，天茄子(贵州)，野茄子(云南)，木哈蒿(傣语)

**Solanum torvum** Swartz

生于海拔200—1 650米亚热带地区的路旁、荒地、灌丛中、沟边及村庄附近等潮湿处或栽培。分布于台湾、广东、广西、贵州、云南南部。河北有栽培。

根(水茄)：辛，微凉。有小毒。散瘀消肿，活血止痛，止咳，发汗，通经。用于感冒，久咳，胃痛，牙痛，瘀症，经闭，跌打瘀痛，腰肌劳损，疖疮，痈肿。　叶：淡，平。有小毒。用于无名肿毒。　果实：明目。

**马铃薯**　洋芋(通称)，土豆(东北)，山药豆(华北)，山药蛋(河北)

**Solanum tuberosum** L.

原产美洲热带。我国各地均有栽培。

块茎：甘，平。补气，健脾，消炎。用于疖腮，烫伤。　叶：外用于下肢溃疡。

**假烟叶树**　假烟叶、茄树(广东、广西、四川)，野烟叶(广西)，戈吗嘿(傣语)，野茄树(全国中草药汇编)

**Solanum verbascifolium** L.

生于海拔300—2 100米的荒山、荒地灌丛中。分布于福建、台湾、广东、广西、四川、贵州、云南。

根：苦，温。有毒。消炎解毒，止痛，祛风解表。用于胃痛，腹痛，骨折，跌打损伤，慢性粒细胞性白血病；外用于疮毒，癣疥。　全株：辛，温。有毒。消肿，杀虫，止痒，止血，止痛，行气，生肌。用于痈疮肿毒，蛇伤，湿疹，腹痛，骨折，跌打肿痛，小儿泄泻，阴挺，外伤出血，稻田皮炎，风湿痹痛，外伤感染。　叶(野烟叶)：辛，平。有毒。消肿，止痛，止血，杀虫。用于水肿，痛风，血崩，跌打肿痛，牙痛，瘰疬，痈疮肿毒，湿疹，皮炎，皮肤溃疡及外伤出血。

**黄果茄**　黄水茄(福建),刺天果(四川),大苦果、野茄果(云南)

**Solanum xanthocarpum** Schrad. et Wendl.

生于海拔 125—800(—1 100)米的干旱河谷沙滩上。分布于台湾、湖北、海南、四川、贵州。

根、果实、种子(黄果茄): 苦、辛,温。消瘀止痛,拔脓,利湿。用于子痈,牙痛,手足麻痹,风湿关节痛,头部疮肿。

附　注: ①印度用于咳嗽,发热及心脏病。②本种在个别地区亦作黄水茄(野茄)药用。果实是提取茄解定,是合成激素的理想原料,其含量在 1 % 左右。

### 龙珠属　Tubocapsicum (Wettst). Makino

**龙珠**　红珠草(福建),大毛秀才(广西)

**Tubocapsicum anomalum** (Franch. et Sav.) Makino——*Capsicum anomalum* Franch. et Sav.

生于山谷、水旁、山坡密林中。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、贵州、云南。

根(龙珠根): 用于痢疾。　全草: 苦,寒。用于水肿,疔疮,疮疡肿毒,淋证。　果实(龙珠子): 苦,寒。清热解毒,除烦热。用于恶疮,疖肿。

## 162. 醉鱼草科　Buddlejaceae

### 醉鱼草属　Buddleja L.

**巴东醉血草**

**Buddleja albiflora** Hemsl. ——*B. giraldii* Diels; *B. hemsleyana* Koehne

生于海拔 450—2 800 米的山坡灌丛中。分布于陕西、甘肃、湖北、四川、贵州、云南。

全草: 祛瘀,杀虫。

**互叶醉鱼草**

**Buddleja alternifolia** Maxim.

生于海拔 300—3 800 米的干旱山坡、林缘。分布于西北及内蒙古、山西、河南、西藏。

叶、花: 辛,温。有小毒。祛风除湿,止咳化痰,散瘀,杀虫。

**驳骨丹**

**Buddleja asiatica** Lour.

生于海拔 30—2 800 米的河岸沙石地、向阳山坡。分布于华东、中南、西南。

全株(白鱼尾): 苦、微辛,温。有小毒。祛风,化湿,通络,杀虫。用于风寒发热,头身疼痛,风湿关节痛,脾湿腹胀,痢疾,丹毒,跌打损伤,虫积腹痛。　果实(白鱼尾果): 用于小儿蛔虫,疳积。

**皱叶醉鱼草**

**Buddleja crispa** Benth.——*B. tibetica* W. W. Smith; *B. farreri* Balf. f. et W.

W. Smith; *B. crispa* Benth. var. *grandiflora* (Marq.) S. Y. Bao

生于海拔 1 100—4 300 米的干旱山坡、路边。分布于西南。

全株：清肝明目，止咳。

**大叶醉鱼草**

**Buddleja davidii** Franch. ——*B. variabilis* Hemsl.

生于海拔 1 300—2 600 米的丘陵、沟边及灌丛中。分布于陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

根皮、树叶：辛、微苦，温。有毒。祛风散寒，活血止痛。用于风湿关节痛，跌打损伤，骨折；外用于脚癣。

**紫花醉鱼草**　拔白哥(白语)

**Buddleja fallowiana** Balf. f. et W. W. Smith ——*B. fallowiana* Balf. f. et W. W. Smith var. *alba* Sabourin

生于海拔 560—3 800 米的干旱山坡灌丛中。分布于云南、西藏。

花：清热解毒，退黄。

**苍山醉鱼草**

**Buddleja forrestii** Diels ——*B. henryi* Rehd. et Wils.; *B. subherbacea* Keehan

生于海拔 1 800—4 000 米的山坡灌丛中。分布于贵州、云南。

叶：清热消炎。

**全缘叶醉鱼草**

**Buddleja heliophilla** W. W. Smith.

生于海拔 2 400—2 700 米的山坡林缘、灌丛等向阳处。分布于贵州、云南。

全株：活血，解毒，消肿。

**醉鱼草**

**Buddleja lindleyana** Fort. ex Lindl.

生于海拔 100—1 300 米的山沟、河边旷野及丛林中或栽培。分布于华东及陕西、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根(七里香)：辛、苦，温。有小毒。活血化瘀。用于经闭，癥瘕，血崩，小儿疳积，疟腮。　枝、叶(醉鱼草)：辛、苦，温。有毒。祛风，杀虫，活血。用于时行感冒，咳嗽，哮喘，风湿关节痛，蛔虫病，跌打，外伤出血，疟腮，瘰疬。　花(醉鱼草花)：辛、苦，温。有小毒。用于痰饮咳喘，久疟成癖，疳积，水火烫伤。

**大序醉鱼草**

**Buddleja macrostachya** Benth.

生于海拔 1 500—2 600 米的山坡路旁、灌丛等向阳处。分布于贵州、云南。

全株：辛，温。祛风散寒，消积止痛。

**多花醉鱼草**

**Buddleja myriantha** Diels ——*B. duclouxii* Marq.

生于海拔 1 100—2 700 米的灌丛中。分布于云南。

花：清肝明目。

**密蒙花**　蒙花(江苏、上海、浙江),豆嘎勒(苗语)

**Buddleja officinalis** Maxim.

生于山坡、丘陵及河边等杂木林中。分布于西南及陕西、甘肃、安徽、福建、湖北、湖南、广西。

花序及花蕾(密蒙花): 甘,微寒。清热养肝,明目退翳。用于目赤肿痛,多泪羞明,眼生翳膜,肝虚目暗,视物昏花。

附　注:《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**圆锥醉鱼草**

**Buddleja paniculata** Wall. ——*B. gynandra* Marq.

生于海拔 600—2 800 米的河边杂木林中。分布于云南。

花: 清热利湿。

## 163. 玄参科　Scrophulariaceae

### 毛麝香属　Adenosma R. Br.

**毛麝香**　蓝花毛麝香(广东),香草(广西),五凉草(岭南采药录)

**Adenosma glutinosum** (L.) Druce——*Gerardia glutinosum* L.; *A. glutinosma* (L.) Druce var. *caeruleum* (R. Br.) Tsoong

生于海拔 300—2 000 米的荒山坡及疏林下湿润处。分布于江西、福建、广东、海南、广西、贵州、云南。

全草(毛麝香): 辛,温。气芳香。祛风除湿,消肿解毒,散瘀行气,止痛止痒。用于小儿麻痹症初期,受凉腹痛,风湿骨痛,跌打损伤,疮疡肿毒,黄蜂螫伤, 蛇伤, 皮肤湿疹,癣疹,瘙痒。

**球花毛麝香**　大头陈(广东、广西),黑头草(广东、云南),地松茶(广东)

**Adenosma indianum** (Lour.) Merr. ——*Manulea indiana* Lour.

生于海拔 200—600 米的瘠地、干燥山坡、溪旁、荒地。分布于广东、广西、云南。

全草(大头陈): 辛、微苦,微温。疏风解表,化湿消滞。用于感冒,咳嗽,发热头痛,消化不良,腹痛,泄泻,皮炎,蛇伤。

**凹裂毛麝香**　山薄荷、毛麝香(广西)

**Adenosma retusilobum** Tsoong et Chin

生于海拔 600—850 米的溪旁荒地上。分布于广西、云南。

全草: 用于跌打损伤。

### 金鱼草属　Antirrhinum L.

**金鱼草**　香彩雀、龙口花(广东),龙头花(中国高等植物图鉴)

**Antirrhinum majus** L.

原产地中海。公园、庭园栽培,有时逸为野生。分布于陕西、新疆、山东、安徽、湖北、

广东、广西、云南。

全草：苦，凉。清热解毒，凉血消肿。外用于跌打扭伤，疮疡肿毒。

## 假马齿苋属 Bacopa Aubl.

**假马齿苋** 蛇鳞菜、白花猪母菜(广东、云南)

**Bacopa monnieri** (L.) Wettst. ——*Lysimachia monnieri* L.; *Bramia monnieri* (L.) Pennell

生于水边、湿地及沙滩。分布于福建、台湾、广东、广西、云南。

全草(白花猪母菜)：微甘、淡，寒。清热凉血，解毒消肿。用于痢疾，目赤肿痛，丹毒，毒疮肿痛；外用于象皮肿。

附 注：体质虚寒无热者勿服。

## 来江藤属 Brandisia Hook. f. et Thoms.

**茎花来江藤** 红花金银藤(广西)

**Brandisia cauliflora** Tsoong et Lu

生于矮山林中及林缘。分布于广西西南部。

全株：舒筋活络。用于风湿骨痛；外用于骨折。

附 注：广西特有药用植物。

**异色来江藤**

**Brandisia discolor** Hook. f. et Thoms.

生于海拔1 500米左右的林中及路旁。分布于云南南部。

根：杀菌消肿。用于痢疾。

**来江藤** 猫花(广西、四川)，蜂糖罐(贵州)，蜜桶花(云南)，小叶来江藤(中药大辞典)

**Brandisia hancei** Hook. f.

生于海拔500—2 600米的林中及林缘。分布于中南、西南及陕西、甘肃、江西。

根：清热解毒。用于附骨疽，黄疸。 叶：用于乳痈。 全株：微苦，寒。清热解毒，祛风利湿，止血。用于附骨疽，骨膜炎，黄疸，跌打损伤，风湿筋骨痛，浮肿，泻痢，吐血，心悸；外用于疮疖。

**广西来江藤**

**Brandisia kwangsiensis** Li

生于海拔900—2 700米的灌丛及林中。分布于广西、贵州、云南。

叶：用于咳嗽。

**岭南来江藤**

**Brandisia swinglei** Merr.

生于海拔500—1 000米的坡地及灌丛中。分布于湖南、广东、广西。

叶：外用于梅毒。

## 黑草属 Buchnera L.

**黑草** 鬼羽箭、坡饼(中国植物志)

**Buchnera cruciata** Buch.-Ham.

生于旷野、山坡及疏林中。分布于江苏、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、贵州、云南。

全草(黑草): 淡、微苦,凉。清热,解毒,凉血,解暑。用于时行感冒,中暑腹痛,蛛网膜下腔出血,崩漏,胃脘痛,暑痉热症,疟疾,肺痨,瘾疹,暑热口渴,癫痫。

## 胡麻草属 Centranthera R. Br.

**胡麻草** 兰胡麻草(广东、云南),皮虎怀(傣语)

**Centranthera cochinchinensis** (Lour.) Merr.——*Digitalis cochinchinensis* Lour.

生于海拔500—1 400米的路旁草地、干燥或湿润处。分布于长江流域以南各省区。

全草(胡麻草): 酸、微辛、温。消肿散瘀,止血止痛。用于咯血,咳血,吐血,跌打损伤,瘀血,风湿关节痛,小儿疳积。

附 注: 功效相同的有**长花胡麻草 C. cochinchinensis** (Lour.) Merr. var. **longiflora** (Merr.) Tsoong ——*Razumovia longiflora* Merr., 分布于广东、广西、云南; **西南胡麻草 C. cochinchinensis** (Lour.) Merr. var. **nepalensis** (D. Don) Merr. ——*C. nepalensis* D. Don, 分布于四川、云南、西藏。

**大花胡麻草** 金猫头(广西),野蚕豆、化血丹、灵芝草(云南)

**Centranthera grandiflora** Benth.

生于海拔800—1 060米的山坡、路旁、空旷处。分布于广西、贵州、云南。

根: 甘、淡,温。活血调经,舒筋活络,止痛。用于经闭,痛经,崩漏,腹部痞块疼痛,跌打损伤,风湿骨痛,肝炎,不孕症;外用于外伤出血。

## 芯芭属 Cymbaria L.

**达乌里芯芭** 大黄花、白蒿茶、兴安芯芭、芯玛芭(全国中草药汇编)

**Cymbaria dahurica** L.

生于海拔620—1 100米的干山坡与砂砾草原上。分布于东北及河北、内蒙古。

全草: 微苦,凉。祛风湿,利尿,止血。用于风湿关节痛,月经过多,吐血,衄血,便血,外伤出血,水肿,黄水疮。

附 注: 功效相同的有**蒙古芯芭 C. mongolica** Maxim., 分布于华北及陕西、甘肃、宁夏、青海。

## 毛地黄属　Digitalis L.

**毛地黄**　紫花洋地黄(中华人民共和国药典),洋地黄(全国中草药汇编)

**Digitalis purpurea** L.

原产欧洲。栽培于河北、新疆、山东、上海、浙江、江西、湖北、贵州、云南。

叶(洋地黄叶): 强心。用于兴奋心肌,增加心肌收缩力,迟缓心博跳动,利尿。

附　注: ①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。② 本种仅供制造制剂的原料。③功效相同的有**毛花毛地黄 D. lanata** Ehrh.,栽培于北京、上海、浙江。

## 野胡麻属　Dodartia L.

**野胡麻**　多德草(内蒙古),牛含水(甘肃),刺儿草、倒打草(中国沙漠地区药用植物),倒爪草(全国中草药汇编)

**Dodartia orientalis** L.

生于海拔 300—1 400 米的多沙的山坡及田野。 分布于内蒙古、甘肃、宁夏、新疆、四川。

根或全草(牛含水): 微苦,凉。清热解毒,散风止痒。用于老年慢性咳嗽痰喘, 小儿肺热咳嗽,乳蛾,乳痈,目赤,小便淋痛,肾虚;外用于湿疹,癣疹,皮肤瘙痒。

## 幌菊属　Ellisiophyllum Maxim.

**幌菊**

**Ellisiophyllum pinnatum** (Wall.) Makino ——*Mazus pinnatus* Wall.

生于海拔 1 500—2 500 米的田野、沟边、草地及疏林中。分布于西南及河北、甘肃、江西、台湾。

全草: 用于眩晕。

## 小米草属　Euphrasia L.

**小米草**　芒叶小米草(全国中草药汇编)

**Euphrasia pectinata** Ten. ——*E. tatarica* Fisch. ex Spreng.

生于阴坡草地及灌丛中。分布于华北及吉林、辽宁、甘肃、宁夏、新疆、河南。

全草: 苦,寒。清热解毒。用于咽喉肿痛,风热咳嗽,口疮。

附　注: 功效相同的有**高枝小米草 E. pectinata** Ten. subsp. **simplex** (Freyn) Hong ——*E. maximowiczii* Wettst. var. *simplex* Freyn; *E. maximowiczii* Wettst. 分布于东北、华北及山东。

**短腺小米草**

**Euphrasia regelii** Wettst.

生于海拔1 200—2 500米的亚高山草地、湿草地及林中。分布于华北、西北及湖北、四川、云南。

全草(小米草)：苦，凉。清热，除烦，利尿。用于热病口渴，头痛，小便不利。

## 鞭打绣球属 Hemiphragma Wall.

**鞭打绣球** 红顶珠(贵州)，小铜锤、地草果(云南)，区茹程丹(藏语)，羊膜草(中国植物志)

**Hemiphragma heterophyllum** Wall.

生于海拔2 300—4 000米的高山草地、石缝中。分布于西南及陕西、甘肃、台湾、湖北。

全草：淡，平。活血调经，舒筋活络，祛风除湿，益气止痛。用于经闭，月经不调，肺痨，乳蛾，跌打损伤，风湿腰痛，瘰疬，疮疡，砂淋，疝气。 根：外用于黄水疮，口腔破溃。

## 兔耳草属 Lagotis Gaertn.

**短筒兔耳草** 洪连(藏名)，藏黄连(全国中草药汇编)

**Lagotis brevituba** Maxim.

生于海拔3 000—4 420米的高山草地及多砂砾的坡地上。分布于甘肃西南部、青海东部、西藏。

全草(洪连)：苦，寒。清热解毒，凉血，行血调经。用于肝炎，高血压症，乳腺癌。

附 注：①本种为常用藏药。②功效相同的有**革叶兔耳草 L. alutacea** W. W. Smith，分布于四川西南部、云南西北部；**裂唇革叶兔耳草 L.alutacea** W. W. Smith var. **rockii** (Li) Tsoong ——*L. rockii* Li，分布于四川西南部、云南西北部；**短穗兔耳草 L. brachystachya** Maxim.，分布于甘肃、青海、四川、西藏；**大萼兔耳草 L. clarkei** Hook. f.，分布于西藏南部，藏药；**兔耳草 L. glauca** Gaertn.，分布于山西、内蒙古、西藏。藏药；**全缘兔耳草 L. integra** W. W. Smith，分布于青海西南部、四川西部、云南西北部、西藏东部；**喀穆兔耳草 L. kunawurensis** (Royle et Choisy) Rupr.，分布于西藏西南部；**紫叶兔耳草 L. praecox** W.W. Smith，分布于四川西部、云南西北部、西藏；**高大兔耳草 L. spectabilis** Kurz，分布于西藏。

**倾卧兔耳草** 兔耳草(新疆)

**Lagotis decumbens** Rupr.

生于海拔4 800—5 500米的冰碛石、溪旁及石坡上。分布于新疆、西藏西部。

全草：强心利尿，消肿。

附 注：功效同本种的有**中亚兔耳草 L. integrifolia** (Willd.) Schischk. ex Vikulova，分布于山西、内蒙古、新疆。

## 肉果草属 Lancea Hook. f. et Thoms.

**肉果草** 兰石草(西藏)，巴雅杂巴(藏名)

**Lancea tibitica** Hook. f. et Thoms.

生于海拔2 000—4 500米的草地、疏林中或沟谷旁。分布于甘肃、青海、四川、云南、西藏。

全草(兰石草)：甘、苦，寒。清肺，祛痰，解毒。用于风热咳喘，肺痈，咳嗽，时行感冒，痢疾，咽喉肿痛。　根：用于风热咳喘。　花：用于风湿关节痛。　果实(兰石草果)：用于月经不调，下腹疼痛，便秘。

## 石龙尾属　Limnophila R. Br.

**紫苏草**　麻雀草、水芙蓉、水薄荷(广东、云南)，双漫草(海南)，止咳草(云南)

**Limnophila aromatica** (Lam.) Merr. ——*Ambulia aromatica* Lam.

生于旷野、塘边水湿处。分布于江苏、江西、福建、台湾、广东、广西、云南。

全草(水芙蓉)：辛、微涩，凉。清热凉血，清肺止咳，解毒消肿。用于感冒，咳嗽，顿咳，毒蛇咬伤，痈疮肿毒，皮癣，皮肤瘙痒，跌打损伤。

**中华石龙尾**　肖紫草(广东)，风肿草(广西)，蛤胆草、过塘蛇(云南)

**Limnophila chinensis** (Osbesk) Merr. ——*Columnea chinensis* Osbesk

生于水旁或田边湿地。分布于广东、广西、云南。

全草：微甘、苦，凉。清热利尿，凉血解毒。用于水肿，目赤红痛，小儿疳积，风疹，天疱疮，周身痒痛，毒蛇、蜈蚣咬伤。

**大叶石龙尾**　水薄荷(广东、云南)，水八角(广东、广西)，水茴香(分类草药性)

**Limnophila rugosa** (Roth) Merr. ——*Herpestis rugosa* Roth

生于水旁、山谷、草地及平原沼泽地上，亦有栽培。分布于浙江、福建、台湾、湖南、广东、广西、四川、云南。

全草(水茴香)：辛、甘，凉。清热解表，健脾利湿，祛风止痛，理气化痰，止咳。用于感冒，咽喉肿痛，肺热咳嗽，痰喘，胃痛，水肿，胸腹胀满，小儿疳积，子痈，风湿痛，湿疹，天疱疮，脓疱疮，痈疮溃烂，毒虫及蜈蚣螫伤。

**石龙尾**　菊藻(江西)

**Limnophila sessiliflora** (Vahl) Bl. ——*Hottonia sessiliflora* Vahl

生于水塘、沼泽、水田或路旁、沟边湿处。分布于中南及辽宁、江苏、安徽、浙江、江西、福建、四川、贵州、云南。

全草：清热解毒，利尿消肿。用于烧、烫伤；外用于疮疡肿毒，头虱。

## 水茫草属　Limosella L.

**水茫草**　还阳草(云南)，伏水茫草(东北植物检索表)

**Limosella aquatica** L.

生于海拔1 700—2 400(—4 000)米的河岸、溪旁及林缘湿草地，有时浮于水中。分布于东北及青海、四川、云南、西藏。

全草：淡，平。清热解毒，生津。

## 柳穿鱼属 Linaria Mill.

**中国柳穿鱼** 柳穿鱼(中国植物志)

**Linaria vulgaris** Mill. subsp. **sinensis** (Bebeaux) Hong ——*L. vulgaris* Mill. var. *sinensis* Bebeaux

生于山坡、路旁、田边草地及多砂的草原上。分布于东北、华北及陕西、甘肃、山东、江苏、安徽、河南。

地上部分(**柳穿鱼**): 甘、微苦,寒。清热解毒,散瘀消肿,利尿。用于头痛,头晕,黄疸,小便不利,痔疮,便秘,皮肤病,烧、烫伤。

附 注: 功效相同的有**新疆柳穿鱼 L. vulgaris** Mill. subsp. **acutiloba** (Fisch. ex Rchb.) Hong ——*L. acutiloba* Fisch. ex Rchb.,分布于新疆西北部。

## 钟萼草属 Lindenbergia Lehm.

**钟萼草** 茸草(广西)

**Lindenbergia philippensis** (Cham.) Benth. ——*Stemodia philippensis* Cham.

生于海拔 1 200—2 600 米的干山坡、岩缝及墙缝中。分布于湖北、湖南、广东、广西、贵州、云南。

根: 用于浮肿。 叶: 用于骨髓炎。

**野地钟萼草**

**Lindenbergia ruderalis** (Vahl) O. Kuntze ——*Stemodia ruderalis* Vahl

生于海拔 800—2 500 米的路旁、河边或干山坡上。分布于西南及广东、广西。

全草: 用于疮疡肿毒。

## 母草属 Lindernia All.

**长蒴母草** 四方草(福建、广西),长果母草(中国高等植物图鉴),定经草(泉州本草),鸭嘴癀(全国中草药汇编)

**Lindernia anagallis** (Burm. f.) Pennell ——*Ruellia anagallis* Burm. f.; *L. cordifolia* (Colsm.) Merr.

生于海拔 1 600 米以下的村边、溪旁及田野较湿润处。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草: 甘、淡,凉。清热利湿,解毒消肿。用于乳蛾,咽喉痛,咳嗽,泄泻,小儿消化不良,风热目痛,带下病,痢疾,淋证,乳痈,痄腮,蛇头疮,脓疱疮,毒蛇咬伤。

**狭叶母草** 羊角草(福建),陌上番椒(广东),羊角桃、蛇舌草(贵州)

**Lindernia angustifolia** (Benth.) Wettst. ——*Vandellia angustifolia* Benth.

生于海拔 1 500 米以下的水田、沟流旁等低湿处。分布于中南及陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、四川、贵州、云南。

全草(羊角草): 甘,平。清热解毒,化瘀消肿,和胃。用于吐泻,急性咽喉痛,乳蛾,黄疸,痢疾,跌打损伤。

**泥花草**　水辣椒(广西),水虾子草(四川),定经草(云南)

**Lindernia antipoda** (L.) Alston ——*Ruellia antipoda* L.

生于田边、水边、沼泽及潮湿的草地上。分布于中南及江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、四川、贵州、云南。

全草(水虾子草): 甘、微苦、平。清热,解毒,消肿,祛瘀。用于肺热咳嗽,咽喉痛,蛇咬伤,扭伤,热疮,淋证。

**刺齿泥花草**　五月莲、齿叶泥花草(广西),锯齿草(全国中草药汇编)

**Lindernia ciliata** (Colsm.) Pennell ——*Gratiola ciliata* Colsm.; *Ilysanthes serrata* (Roxb.) Urban

生于海拔 600—1 500 米的稻田、草地、荒地和路旁低湿处。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、云南、西藏。

全草(齿叶泥花草): 淡,平。清热解毒,祛瘀消肿,止痛。用于毒蛇咬伤,跌打损伤,产后瘀血腹痛;外用于疮疖肿毒。

**母草**　四方草、四方拳草(广东),小叶四方草(广西)

**Lindernia crustacea** (L.) F. Muell ——*Carparia crustacea* L.

生于田边、草地、路旁等低湿处。分布于华东、中南、西南。

全草(母草): 微苦,凉。清热解毒,健脾止泻,利尿消肿。用于感冒,痢疾,吐泻,消化不良,肝炎,水肿,带下病;外用于痈疖肿毒。

**红骨草**　粘毛母草(广东),狗毛草(广西)

**Lindernia montana** (Bl.) Koord. ——Diceros montanus Bl.

生于海拔 900—1 400 米的荒芜田野、向阳山坡、山谷灌丛、林边及水溪旁。分布于江西南部、福建、广东、广西、云南南部。

全草: 外用于乳痈,毒疮,跌打损伤。

**宽叶母草**　野苞麦(云南),阿头麻车多(傈僳语),圆叶母草、飞疔药(全国中草药汇编)

**Lindernia nummularifolia** (D. Don) Wettst. ——*Vandellia nummularifolia* D. Don

生于海拔 1 800 米以下的田边、沟边等湿润处。分布于西南及陕西、甘肃、江苏、浙江、湖北、湖南、广西。

全草: 苦,平。清热解毒,消炎止痛,凉血。用于呛咳出血,痄疾,疔疮;外用于蜂螫伤。

**棱萼母草**　四方草、公母草(全国中草药汇编)

**Lindernia oblonga** (Benth.) Merr. et Chun ——*Vandellia oblonga* Benth.

多生于干燥沙质土壤中。分布于海南。

全草(棱萼母草): 苦、涩,平。清热解毒,收敛止泻。用于痢疾,泄泻,疖肿。

**陌上菜**　对座神仙(广西)

**Lindernia procumbens** (Krock.) Philcox ——*Anagalloides procumbens* Kro-

ck.

生于水边及潮湿处。分布于东北、中南、西南及河北、陕西、山东、江苏、安徽、浙江、江西。

全草：清热解毒。用于尿血。

**旱田草**　调经草、鸭嘴癀(福建)，锯齿草(云南)

**Lindernia ruellioides** (Colsm.) Pennell ——*Gratiola ruellioides* Colsm.

生于草地、平原、山谷、林下。分布于西南及江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西。

全草：甘、淡，平。理气活血，消肿，解毒，止痛。用于经闭，痛经，胃痛，痢疾，口疮，瘰疬，跌打损伤，痈肿疼痛，蛇、狂犬咬伤。

**粘毛母草**

**Lindernia viscosa** (Hornem.) Merr. ——*Gratiola viscosa* Hornem.

生于海拔900—1 300米的林中及岩石旁。分布于江西、广东、云南南部。

全草：止血生肌，清心肺热。

## 通泉草属　Mazus Lour.

**纤细通泉草**　噎膈草(湖北)

**Mazus gracilis** Hemsl.

生于海拔500米以下的潮湿丘陵、路旁、水边。分布于江苏、浙江、江西、河南、湖北。

全草：清热解毒，抗癌。用于咽喉痛，胃癌，食道癌。

**通泉草**　白花草(广西)，绿兰花(四川)，脓泡药(贵州)，石淋草、虎仔草(泉州本草)

**Mazus japonicus** (Thunb.) O. Kuntze ——*Lindernia japonica* Thunb.; *M. rugosus* Lour.

生于海拔2 500米以下的湿润草坡、沟边、路边及林缘。除内蒙古、宁夏、青海、新疆外，全国各地普遍分布。

全草(绿兰花)：苦，平。止痛，健胃，解毒消肿。用于偏头痛，消化不良，疔疮，脓疱疮，无名肿毒，烧、烫伤，毒蛇咬伤。

**莲座叶通泉草**　小仙桃草(云南)

**Mazus lecomtei** Bonati

生于海拔1 000—2 600米的湿润草坡、路旁、水边。分布于四川西南部、云南西北部。

全草：苦、微涩，凉。清热解毒，润肺，止咳。用于感冒头痛，鼻疳，黄疸，肺热咳嗽。

**匍茎通泉草**　野田菜(湖北)

**Mazus miquelii** Makino

生于海拔300米以下潮湿的路旁、荒林及疏林中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广西。

全草：止痛，健胃，解毒。

**岩白翠**

**Mazus omeiensis** Li

生于海拔500—2 000米的岩壁阴湿处。分布于四川西南部、贵州西北部。

全草：清热解毒。用于头痛，祛疯毒。

**美丽通泉草**

**Mazus pulchellus** Hemsl.

生于海拔 1 600 米以下阴湿的岩缝及山坡林下潮湿处。分布于湖北、四川、云南。

全草：清热解毒。用于劳伤吐血，跌打损伤。

**弹刀子菜**　　小苏叶通泉草、四叶细辛(湖北)

**Mazus stachydifolius** (Turcz.) Maxim. ——*Tittmannia stachydifolia* Turcz.

生于海拔 1 500 米以下较湿润的路旁、草坡、林缘。分布于东北、华北及陕西、江苏、安徽、浙江、台湾、河南、湖北、广东、四川、贵州。

全草(弹刀子菜)：微辛，凉。解蛇毒。用于毒蛇咬伤。

## 山罗花属　Melampyrum L.

**山罗花**

**Melampyrum roseum** Maxim.

生于海拔 900—2 000 米的山坡灌丛及高草丛中。分布于东北、华北、西北、华东及河南、湖北、湖南、贵州。

根：清凉，代茶。　全草：清热解毒。用于感冒，月经不调，肺热咳嗽，风湿关节痛，腰痛，跌打损伤，痈疮肿毒。

**钝叶山罗花**

**Melampyrum roseum** Maxim. var. **obtusifolium** (Bonati) Hong ——*M. obtusifolium* Bonati

生于山坡林下潮湿处。分布于湖北、广东北部、贵州。

全草：清热解毒。用于疮毒。

## 黑蒴属　Melasma Berg.

**黑蒴**　　红根草(广西)，化血胆、小化血草(云南)

**Melasma arvense** (Benth.) Hand.-Mazz. ——*Glossostylis arvensis* Benth.; *Alectra arvensis* (Benth.) Merr.

生于海拔 700—2 100 米的山坡草地或疏林中。分布于台湾、广东、广西、云南。

全草：微苦，凉。祛湿，平肝，散瘀活血。用于黄疸，肝脾肿大，跌打瘀肿，痛经，感冒，高热，咳嗽痰喘，哮喘。

## 沟酸浆属　Mimulus L.

**南红藤**　　宽叶沟酸浆(中国植物志)，猫眼睛(四川中药志)

**Mimulus tenellus** Bunge var. **platyphyllus** (Franch.) Tsoong ——*M. nepalensis* Benth. var. *platyphyllus* Franch.

生于海拔1 900—2 200米的林下、路旁。分布于四川、云南。

全草(猫眼睛)：涩，平。收敛，止泻，止痛，解毒。用于湿热痢疾，脾虚泄泻及带下病。

附　注：功效相同的有**髯生沟酸浆 M. bodinieri** Vant.，分布于四川、云南西南部；**小苞沟酸浆 M. bracteosa** Tsoong，分布于四川西部；**四川沟酸浆 M. szechuanensis** Pái，分布于西南及陕西、甘肃、湖北、湖南；**沟酸浆 M. tenellus** Bunge，分布于辽宁、陕西、湖北、四川；**尼泊尔沟酸浆 M. tenellus** Bunge var. **nepalensis** (Benth.) Tsoong ——*M. nepalensis* Benth.，分布于福建、广西、四川；**高大沟酸浆 M. tenellus** Bunge var. **procerus** (Grant) Hand.-Mazz.，分布于四川、云南。

## 鹿茸草属　Monochasma Maxim.

**单花鹿茸草**

**Monochasma monantha** Hemsl.

生于山谷及草坡上。分布于广东、广西。

全草：用于传染性肝炎。

**绵毛鹿茸草**　　牙痛草、六月霜(江西)，白毛鹿茸草(全国中草药汇编)

**Monochasma savatieri** Franch. ex Maxim.

生于山坡岩石旁、路边、山坡向阳处杂草中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、贵州。

全草(鹿茸草)：微苦、涩，平。清热解毒，凉血止血。用于感冒，烦热，小儿高热，风热咳喘，牙痛，吐血，便血，月经不调，风湿骨痛，小儿鹅口疮，乳痈，外伤出血。

**鹿茸草**　　栀子草(浙江)

**Monochasma sheareri** Maxim. ex Franch. et Sav.

生于海拔100米以上低山的多沙山坡及草丛中。分布于山东、江苏、安徽、浙江、江西、湖北。

全草：苦，凉。清热解毒，凉血止血。

## 疗齿草属　Odontites Ludwig

**疗齿草**　　齿叶草(东北植物检索表)

**Odontites serotina** (Lam.) Dum.——*Euphrasia serotina* Lam.

生于海拔2 000米以下的沙地、河岸、阴坡草地。分布于东北、华北、西北。

全草(齿叶草)：苦，凉。有小毒。清热燥湿，凉血止痛。用于热性病，肝胆湿热，瘀血作痛，肝火头痛，胁痛。

## 泡桐属　Paulownia Sieb. et Zucc.

**毛泡桐**　　绣毛泡桐、绒叶泡桐(中药志)，紫花桐、日本泡桐(中药大辞典)

**Paulownia tomentosa** (Thunb.) Steud. ——*Bignonia tomentosa* Thunb.

生于海拔200—1 800米的山谷、村旁或路旁，通常栽培，西部有野生。分布于辽宁南部、河北、北京、天津、山西、陕西、新疆、山东、江苏、上海、安徽、江西、河南、湖北、贵州。主产于山东、河南。

近成熟果实(泡桐果)：淡、微甘，温。祛痰，止咳，平喘。用于咳嗽，痰多，气喘。　嫩根或根皮(桐根)：苦，寒。祛风，解毒，消肿，止痛。用于肠胃热毒，风湿腿痛，筋骨疼痛，肠风下血，痔疮，疮疡肿毒，崩漏，带下病。　木质部(桐木)：用于下肢浮肿。　树皮(桐皮)：用于痔疮，淋证，丹毒，跌打损伤。　叶：苦，寒。用于痈疽，疔疮，创伤出血。　花(泡桐花)：用于上呼吸道感染，风热咳嗽，乳蛾，痢疾，泄泻，目赤红痛，痄腮，疖肿。

附　注：①本种花在东北、华北、华南、西南个别地区误作凌霄花药用。② 功效相同的有**兰考泡桐 P. elongata** S. Y. Hu，栽培于河北、山西、陕西、山东、江苏、安徽、河南、湖北，河南有野生；**川泡桐 P. fargesii** Franch.，分布于湖北、湖南、四川、贵州、云南；**白花泡桐 P. fortunei** (Seem.) Hemsl. ——*Campsis fortunei* Seem.，分布于华东、中南及河北、陕西、四川、贵州、云南；**台湾泡桐 P. kawakamii** Ito，分布于浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、贵州；**光泡桐 P. tomentosa** (Thunb.) Steud. var. **tsinlingensis** (Pái) Gong Tong，分布于河北、山西、陕西、甘肃、山东、河南、湖北、湖南、四川北部。

## 马先蒿属　Pedicularis L.

**阿拉善马先蒿**

**Pedicularis alaschanica** Maxim.

生于海拔2 000—4 850米的河谷多石砾沙质向阳山坡、湖边平川地及灌丛草原上。分布于内蒙古、甘肃、宁夏、青海、四川、西藏。

全草：苦、辛，寒。清肝明目，散结。

**西藏鸭首马先蒿**　　鹅首马先蒿(西藏常用中草药)

**Pedicularis anas** Maxim. var. **tibetica** Bonati

生于海拔3 600—4 400米的湿草地、林中及高山草地上。分布于四川西部、西藏东南部。

花：甘、涩，温。利尿，平喘，止痛。用于水肿，尿少，气喘，营养不良，骨髓炎引起的针刺样疼痛。

**俯垂马先蒿**　　虫莲、垂头马先蒿(云南)

**Pedicularis cernua** Bonati

生于海拔3500—4 000(—4 575)米的高山草丛中。分布于四川西南部、云南西北部。

根：安胎，明目。用于胎动不安，目翳。

附　注：功效相同的有**大管马先蒿 P. macrosiphon** Franch.，分布于四川西北部至云南西北部。

**碎米蕨叶马先蒿**

**Pedicularis cheilanthifolia** Schrenk

生于海拔 2 150—4 900 米河滩、水沟等水分充足的高山谷地、草丛及阴坡桦木林中。分布于甘肃、青海、新疆、西藏。

根：祛湿止痛，强心安神。　花序：苦，寒。利尿消肿，滋补。

附　注：功效相同的有**阿尔泰马先蒿 P. altaica** Steph. ex Stev.，分布于新疆阿尔泰及天山山脉；**准噶尔马先蒿 P. songarica** Schrenk，分布于新疆。

**鹅首马先蒿**

**Pedicularis chenocephala** Diels

生于海拔 3 660—4 300 米的沼泽状草地中。分布于甘肃西南部、青海东北部、四川北部。

花：清热，活血。

**四叶马先蒿**　　干黑马先蒿(中国高等植物图鉴)

**Pedicularis comptoniaefolia** Franch. ex Maxim.

生于海拔 2 400—3 000(—3 640)米的干草坡与草滩中。分布于四川西南部、贵州、云南。

根：补中益气。　全草：解毒，利尿，消肿。

附　注：与本种功效相同的有**菊叶马先蒿 P. phaceliaefolia** Franch.，分布于四川西部、云南西北部；**多齿马先蒿 P. polyodonta** Li，分布于四川西部、西北部，贵州；**高超马先蒿 P. princeps** Bur. et Franch.，分布于四川西部、云南西北部；**蔓生马先蒿 P. vagans** Hemsl.，分布于四川峨眉山。

**紫堇状马先蒿**　　野萝卜(云南)

**Pedicularis corydaloides** Hand.-Mazz.

生于海拔 2 400—3 800 米的山坡草地、阴湿地上、林缘、灌丛及林下。分布于云南西北部、西藏东部。

根：健脾，化滞。

**凸额马先蒿**

**Pedicularis cranolopha** Maxim.

生于海拔 3 800 米左右的高山草原中。分布于甘肃西南部、青海东北部、四川北部。

全草：苦，寒。清热解毒，活血，固齿。

附　注：功效相同的有**甘肃马先蒿 P. kansuensis** Maxim.，分布于甘肃西南部、青海、四川西部、西藏；**白花甘肃马先蒿 P. kansuensis** Maxim. f. **albiflora** Li，分布于甘肃南部、青海、四川西部、西藏；**青甘马先蒿 P. kansuensis** Maxim. subsp. **kokonorica** Tsoong，分布于青海西部、西藏北部。

**扭盔马先蒿**　　黑参、黑参马先蒿(全国中草药汇编)，太白参、大卫马先蒿(中药大辞典)

**Pedicularis davidii** Franch.

生于海拔 1 750—3 500 米的沟边、路旁及草坡上。分布于陕西南部、甘肃西南部、青海、湖北、四川。

根(太白参)：甘、微苦，温。滋阴补肾，补中益气，健脾和胃，止痛。用于身体虚弱，阴虚潮热，关节疼痛，不思饮食。

附　注：功效相同的有**美观马先蒿 P. decora** Franch.，分布于陕西南部、甘肃南部、河南、湖北西部、四川东北部；**等蕊马先蒿 P. dunniana** Bonati，分布于四川西部、云南西北部；**粗野马先蒿 P. rudis** Maxim.，分布于内蒙古、甘肃西部、青海、四川北部、贵州。

**极丽马先蒿**

**Pedicularis decorissima** Diels

生于海拔 2 900—3 500 米的高山草地中。分布于甘肃南部、青海东部、四川西部。

全草：消炎，杀菌，解毒。

附　注：功效相同的有**三叶马先蒿 P. ternata** Maxim.，分布于内蒙古、甘肃、青海。

**二歧马先蒿**　　怀阳草、大马蔺(云南)

**Pedicularis dichotoma** Bonati

生于海拔 2 700—4 270 米的山坡，亦见于疏林中。分布于四川西南部、云南西北部。

全草：苦，平。清热解毒，除烦。

**全裂马先蒿**　　太白丽参、太白土高丽参(全国中草药汇编)

**Pedicularis dissecta** (Bonati) Pennell——*P. petitmenginii* Bonati var. *dissecta* Bonati

生于海拔 2 700—3 200 米的高山草地和岩壁上。分布于陕西秦岭。

根(太白丽参)：甘、微苦，平。有小毒。益气养阴，托毒外出，止痛。用于病后体虚，阴虚潮热，疮毒内陷，关节疼痛。

附　注：陕西特有药用植物。

**包磨马先蒿**　　裹盔马先蒿(中国高等植物图鉴)

**Pedicularis elwesii** Hook. f.

生于海拔 3 200—5 000 米的高山草地、古冰碛物及阴坡杜鹃灌丛中。分布于青海、云南西北部、西藏南部及东部。

花：苦，寒。利水消肿，滋补。

**华中马先蒿**

**Pedicularis fargesii** Franch.

生于海拔 1 400—3 800 米的石灰岩上及松林中。分布于甘肃南部、湖北西部、四川东部。

全草：清热，解毒，利尿。用于泄泻，痢疾。

**江南马先蒿**　　羊肚参(广东、云南)，凤尾参、追风箭(云南)，互叶凤尾参(中药大辞典)

**Pedicularis henryi** Maxim.

生于海拔 400—1 420 米的空旷处、草丛及村边。分布于江苏、安徽、江西、福建、湖北、湖南、广东和广西的北部、贵州、云南。

根(凤尾参)：甘、微苦，温。补气血，通经络，止咳平喘。用于肾虚，头晕耳鸣，心慌气短，虚寒咳嗽，手足酸软，半身不遂，筋骨疼痛，咳嗽痰喘，疮疡肿毒，蛇伤溃烂。

附　注：功效相同的有**长茎马先蒿 P. longicaulis** Franch. ex Maxim.，分布于云

南。

**硕大马先蒿**

**Pedicularis ingens** Maxim.

生于海拔 3 350—4 000 米的高山草坡及多岩石处或阴坡草甸上。分布于甘肃、青海东部、四川北部。

带果实全草：清肝火，散郁结。

附　注：功效相同的有**毛颏马先蒿 P. lasiophrys** Maxim.，分布于甘肃、青海；**阴郁马先蒿 P. tristis** L.，分布于山西、甘肃、青海。

**全叶马先蒿**

**Pedicularis integrifolia** Hook. f.

生于海拔 3 400—5 100 米的高山石砾草原中或高山阳坡草甸上。分布于西藏。

花：苦，寒。利水，滋补。

**西南马先蒿**　　长喙马先蒿(云南种子植物名录)

**Pedicularis labordei** Vant. ex Bonati

生于海拔 2 700—3 500 米的高山草地上。分布于四川西南部、贵州西部、云南西北部及东部。

根：解毒，补虚。

**长花马先蒿**

**Pedicularis longiflora** Rudolph

生于海拔 3 350—3 500 米的高山湿草地中及溪流旁。分布于河北、甘肃、青海、新疆。

全草：苦，寒。清热除湿。　　花：利水，涩精。

附　注：功效相同的有**中国马先蒿 P. chinensis** Maxim.，分布于河北、山西、甘肃、青海；**聚齿马先蒿 P. roborowskii** Maxim.，分布于甘肃、青海、四川。

**管状长花马先蒿**　　露茹色尔布(藏语)，长筒马先蒿(中药大辞典)

**Pedicularis longiflora** Rudolph var. **tubiformis** (Klotzsch) Tsoong ——*P. tubiformis* Klotzsch

生于海拔 2 700—5 300 米的高山草甸、溪流旁、云杉林缘。分布于青海、四川西部、云南西北部、西藏。

全草：甘，平。健脾开胃，消食化积，利水涩精。用于小儿疳积，食积不化，胸腹胀满，水肿，遗精，耳鸣。　　花：涩，寒。清热除湿，利水，涩精。用于肝炎，胆囊炎，水肿，遗精，耳鸣，口舌干燥，小便带脓血，痈肿。

**鸡冠子花**　　东北马先蒿(吉林)

**Pedicularis mandshurica** Maxim.

生于海拔 1 025 米以下的湿润腐殖质土中及岩石上。分布于吉林、辽宁。

全草：清热利尿，祛风除湿。

**藓生马先蒿**　　土人参(中药大辞典、全国中草药汇编)

**Pedicularis muscicola** Maxim.

生于海拔 1 750—2 650 米的杂木林、冷杉林下苔藓层中或阴湿处。分布于华北及陕西、甘肃、宁夏、青海、湖北、四川。

根：甘、微苦，温。大补元气，生津安神，强心。用于气血虚损，虚劳多汗，虚脱衰竭，降低血压。

附　注：功效相同的有**藓状马先蒿 P. muscoides** Li,分布于四川西部、云南、西藏；**穗花马先蒿 P. spicata** Pall.,分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、湖北、四川；**轮叶马先蒿 P. verticillata** L.,分布于东北、华北、西北及河南、四川、贵州、西藏；**唐古特轮叶马先蒿 P. verticillata** L. subsp. **tangutica** (Bonati) Tsoong——*P. tangutica* Bonati,分布于山西、甘肃、青海、四川。

**薄菜叶马先蒿**　　乌龙毛(湖北)

**Pedicularis nasturtiifolia** Franch.

生于海拔2 000米以下的山坡林下及潮湿处。分布于陕西南部、湖北西部、四川东部。

全草：活血祛瘀，清热解毒。用于跌打损伤，筋骨痛。

**华马先蒿**

**Pedicularis oederi** Vahl var. **sinensis** (Maxim.) Hurus.——*P. versicolor* Wahlenb. var. *sinensis* Maxim.

生于海拔5 300米以下的山地湿润草丛及林下。分布于西南及河北、山西、陕西、甘肃、青海。

根(华马先蒿)：苦，平。祛风利湿，杀虫。用于风湿关节痛，砂淋，肝炎，小便不利；外用于疥疮。　花：用于肝炎。

附　注：功效相同的有**广布马先蒿 P. oederi** Vahl,分布于青海、新疆、西藏。

**西藏马先蒿**　　背茸马先蒿(青海)，扭盔马先蒿(西藏植物志)

**Pedicularis oliveriana** Prain

生于海拔2 900—4 600米的灌丛、沟谷及草甸湿润处或河岸柳林下，喜生于沙性土壤。分布于青海、西藏。

根、花：苦，寒。清热解毒，燥湿。用于食物中毒，胃痛，湿热泄泻。

**沼地马先蒿**

**Pedicularis palustris** L. subsp. **karoi** (Freyn) Tsoong ——*P. karoi* Freyn

生于海拔370米左右的山脚潮湿处或沼泽化草甸上。分布于黑龙江北部、内蒙古东北部。

地上部分：利水通淋。用于石淋，小便不利，疟疾寒热，中风湿痹，带下病。

**矮小青海马先蒿**　　青海马先蒿(青海)，矮小马先蒿(青海、四川)

**Pedicularis przewalskii** Maxim. subsp. **microphyton** (Bur. et Franch.) Tsoong —— *P. microphyton* Bur. et Franch.

生于海拔4 200—4 830米的高山草地中。分布于青海、四川西部、西藏。

花：甘，寒。清热，解毒，利尿。

**返顾马先蒿**　　马尿泡(山西)，阿兰(内蒙古)，马先蒿(中药大辞典)

**Pedicularis resupinata** L.

生于海拔300—2 300米的山坡湿润草地及林缘。分布于东北、华北及陕西、甘肃、新疆、山东、安徽、河南、湖北、四川、贵州。

根或茎叶(马先蒿)：苦，平。祛风，胜湿，利水。用于风湿关节痛，小便不利，砂淋，带下病，疥疮。

附　注：功效相同的有**野苏子 P. grandiflora** Fisch.，分布于东北中部及东部、内蒙古。

**粗茎返顾马先蒿**　　白沙药(广西)

**Pedicularis resupinata** L. subsp. **crassicaulis** (Vaniot ex Bonati)Tsoong——*P. crassicaulis* Vaniot ex Bonati

生于山坡路旁及山坡草丛中。分布于湖北、广西、四川、贵州。

根：行气，止痛。

**大王马先蒿**　　四方盒子草、五凤朝阳草(贵州)，还阳草、凤尾参(云南)，羊肝狼头草(植物名实图考)

**Pedicularis rex** C. B. Clarke ex Maxim.

生于海拔 2 500—4 300 米的空旷山坡草地及稀疏针叶林中，亦见于山谷中。分布于四川西南部、贵州、云南北部。

根：微甘，凉。补益气血，健脾利湿。用于阴虚潮热，风湿瘫痪，肝硬化腹水，慢性肝炎，小儿疳积，妇女乳汁少，宫寒不孕。　全草：甘、微苦，温。祛风活络，散寒止咳。用于关节冷痛，风湿痛，虚劳咳嗽，麻疹。

**拟鼻花马先蒿**　　锉叶马先蒿(新疆)

**Pedicularis rhinanthoides** Schrenk ex Fisch. et Mey.

生于海拔 3 000—5 350 米的多水或潮湿草甸中。分布于新疆。

全草：补气，安神。用于吐泻，食物中毒。

**大拟鼻花马先蒿**　　大唇马先蒿(青海)

**Pedicularis rhinanthoides** Schrenk ex Fisch. et Mey. subsp. **labellata** (Jacq.) Tsoong——*P. labellata* Jacq.

生于海拔 3 000—5 000 米的山谷潮湿地和高山草甸中。分布于河北、山西、陕西、甘肃、青海、河南、四川、云南、西藏。

全草、花：甘、苦，平。清热，解毒，利湿。

**肉根马先蒿**　　草甸马先蒿(中国高等植物图鉴)

**Pedicularis roylei** Maxim.

生于海拔 3 450—5 500 米的沼泽草甸、高山湿草甸中。分布于四川西南部、云南西北部、西藏。

全草：补虚，健脾，消炎。

**半扭卷马先蒿**

**Pedicularis semitorta** Maxim.

生于海拔 2 500—3 900 米的高山草地。分布于甘肃、青海东部、四川北部。

根：淡，温。补肾，活血，安胎。用于不育症。　全草、花：清热解毒，利湿退黄。

**红纹马先蒿**　　野芝麻(陕西)

**Pedicularis striata** Pall.

生于海拔 950—2 650 米的山坡草地、草原及疏林中。分布于华北及陕西、甘肃、宁

夏、河南。

全草：清热解毒，利水，涩精。用于水肿，遗精，耳鸣。

**华丽马先蒿**　莲座参(云南)

**Pedicularis superba** Franch. ex Maxim.

生于海拔 2 800—4 300 米的高山草地或开旷山坡，有时见于林缘阴湿处。分布于四川西南部、贵州、云南西北部。

全草：清热解毒，利湿消肿。

**四川马先蒿**　浪那尕保(藏语)

**Pedicularis szetschuanica** Maxim.

生于海拔 3 380—4 450 米的高山草地、云杉林、水流旁及溪流岩石上。分布于青海、四川。

花：清热解毒。

**纤裂马先蒿**　细裂马先蒿、凤尾参(云南)

**Pedicularis tenuisecta** Franch. ex Maxim.

生于海拔 1 500—3 660 米的草原与松柏林缘。分布于四川西南部、贵州西部、云南西北部。

根：益气补血，止咳祛痰。用于肾虚，病后体虚，虚寒咳嗽，哮喘，筋骨疼痛，虚热不退。

**马鞭草叶马先蒿**

**Pedicularis verbenaefolia** Franch. ex Maxim.

生于海拔 3 100—4 000 米的岩缝、草地及灌丛中。分布于四川南部、贵州、云南西北部。

全草：补虚弱。

**象头马先蒿**　举喙马先蒿(中国高等植物图鉴)

**Pedicularis vialii** Franch. ex Forb. et Hemsl.

生于海拔 2 700—4 300 米的针叶林下或草坡中。分布于四川西部、云南西北部、西藏东部。

全草：泻火解毒，止血调经。

**云南马先蒿**

**Pedicularis yunnanensis** Franch. ex Maxim.

生于海拔 3 040—4 000 米的高山草地中。分布于云南大理苍山一带。

全草：补气，安神。

附　注：云南特有药用植物。

## 松蒿属　Phtheirospermum Bunge

**松蒿**

**Phtheirospermum japonicum** (Thunb.) Kanitz ——*Geradia iaponica* Thunb.

生于海拔 150—1 900 米的山坡灌丛阴处及路旁、草地上。除青海、新疆外，全国各地

普遍分布。

全草(松蒿): 微辛,平。清热,利湿。用于黄疸,水肿,风热感冒,鼻蹩,口蹩, 牙蹩。

**细裂叶松蒿** 松叶接骨草、松叶蒿、蜈蚣草(四川),黄花松蒿(云南), 草柏枝(中国植物志)

**Phtheirospermum tenuisectum** Bur. et Franch.

生于山坡草地上。分布于西南及甘肃东南部、青海。

根(细裂叶松蒿): 苦、辛,平。养心安神,止血。用于心脏衰弱,心悸, 咳嗽, 痰中带血。 全草: 清热解毒,止痛。用于咽喉肿痛,蛇、犬咬伤,骨折疼痛。

## 苦玄参属 Picria Lour.

**苦玄参** 四环素草(广东),蛇总管、苦胆草、地胆草(广西),鱼胆草(云南)

**Picria fel-terrae** Lour.

生于海拔 750—1 400 米的疏林中及荒田上。分布于广东、广西、贵州、云南南部。

全草(苦草): 苦,凉。清热解毒,消肿止痛。用于风热感冒,咽喉肿痛,胃痛, 消化不良,痢疾,毒蛇咬伤,跌打损伤,淋巴结炎,疖肿。

附 注: 民间用于消化道癌肿。

## 胡黄连属 Picrorhiza Royle

**胡黄连** 假黄连(中药大辞典),西藏胡黄连(中药志、中药大辞典)

**Picrorhiza scrophulariiflora** Pennell

生于海拔 3 600—4 400 米的高山草地及石堆中。分布于四川西部、云南西北部、西藏南部。

根状茎(胡黄连): 苦,寒。清湿热,除骨蒸,消疳热。用于湿热泻痢,黄疸,痔疮,骨蒸潮热,小儿疳热。

附 注: ①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②国家三级重点保护野生药材。

## 翅茎草属 Pterygiella Oliv.

**圆茎翅茎草** 利胆草(云南)

**Pterygiella cylindrica** Tsoong

生于海拔 1 800—2 100 米的山地草坡上。分布于四川西南部、云南。

全草: 苦、微酸,寒。利胆,退黄,清热消炎。

附 注: 我国特有属。

**疏毛翅茎草** 疳积药、鬼见羽(云南),紫茎牙痛草(全国中草药汇编)

**Pterygiella duclouxii** Franch.

生于海拔 1 000—2 800 米的林缘、草坡、路旁。分布于广西西部、四川西南部、贵州南部、云南。

根：破血杀虫。　全草：苦，凉。清热平肝，祛风湿，消肿止痛。用于急、慢性肝炎，泄泻，口腔破溃，咽喉肿痛，牙痛，风湿痛，蛇伤。

## 地黄属　Rehmannia Libosch. ex Fisch. et Mey.

**天目地黄**　浙地黄(浙江)

**Rehmannia chingii** Li

生于海拔190—500米的山坡、路旁草丛中。分布于安徽、浙江。

根状茎：甘、苦，寒。清热，凉血。用于鼻衄，热病口干，中耳炎。

**地黄**　生地、怀庆地黄(通称)，蛤蟆草(天津)

**Rehmannia glutinosa** (Gaertn.) Libosch. ex Fisch. et Mey. ——*Digitalis glutinosa* Gaertn.; *R. glutinosa* Libosch. f. *hueichingensis* (Chao et Schich) Hsiao

生于海拔50—1 320米的砂质土壤、荒野、山脚、墙边、路旁，药用为栽培品。分布于华北、西北、华东、中南及辽宁、贵州。主产于河南、山东，习称为怀庆地黄。

鲜根状茎(鲜地黄)：甘、苦，寒。清热生津，凉血，止血。用于热邪伤阴，舌绛烦渴，发斑发疹，吐血，衄血，咽喉肿痛。　根状茎(生地黄)：甘，寒。清热凉血，养阴，生津。用于热病舌绛烦渴，阴虚内热，骨蒸劳热，内热消渴，吐血，衄血，发斑发疹。　蒸熟的根状茎(熟地黄)：甘，微温。滋阴补血，益精填髓。用于肝肾阴虚，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精，内热消渴，血虚萎黄，心悸怔忡，月经不调，崩漏，眩晕，耳鸣，须发早白。　叶：用于恶疮，手、足癣。　花：用于消渴，肾虚腰痛。　种子(地黄实)：功效同根状茎。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②本种野生开花的地上部分(野生地秧子)在天津使用，称“蛤蟆草”。

**湖北地黄**　鄂地黄、岩白菜(湖北)

**Rehmannia henryi** N. E. Brown

生于路旁或石缝中。分布于湖北。

根：补血，止血，强壮。用于吐血，鼻衄，崩漏。

附　注：湖北特有药用植物。

**裂叶地黄**

**Rehmannia piasezkii** Maxim.

生于海拔340—1 500米的山坡草地上。分布于陕西南部、湖北。

全草：寒。用于火烫伤，疔疮。

## 炮仗竹属　Russelia Jacq.

**炮仗竹**　爆仗竹、吉祥草(中国高等植物图鉴)

**Russelia equisetiformis** Schlecht. et Cham.

原产中美洲。我国庭园有栽培，少有逸为野生。栽培于福建、广东、广西。

全株：用于跌打，骨折。



1037

## 野甘草属 Scoparia L.

**野甘草** 四时茶(福建),土甘草(广东、广西),冰糖草(广东、云南),米碎草(云南)
**Scoparia dulcis** L.

原产美洲热带。喜生于荒地、路旁,偶见于山坡,或成群生长。分布于江西、福建、广东、广西、云南。

全株(野甘草): 甘,平。清热解毒,利尿消肿,生津止渴,疏风止痒。用于外感风热,肺热咳嗽,泄泻,痢疾,小便不利,小儿疳积,脚气浮肿,小儿麻疹,湿疹,热痱,咽喉痛,丹毒,蛇伤,预防中暑,目赤红痛。

## 细穗玄参属 Scrofella Maxim.

**细穗玄参**
**Scrofella chinensis** Maxim.

生于海拔 2 800—3 900 米的草甸及林缘草地上。分布于甘肃、青海、四川。

全草: 清血热,泻肝胆。

附 注: 我国特有属。

## 玄参属 Scrophularia L.

**重齿玄参** 小黑药、苦玄参(云南)
**Scrophularia diplodonta** Franch.

生于海拔 3 000—3 600 米的山坡草地或杂木林下。分布于云南西北部。

根: 消热消炎。用于热病烦渴,咽喉肿痛。

附 注: 云南特有药用植物。

**长梗玄参**
**Scrophularia fargesii** Franch.

生于海拔 2 000—3 300 米的空旷草地及灌丛草地上。分布于湖北西部、四川。

块根(鄂玄参): 清火,解毒,滋补。

**鄂西玄参** 玄台、黑参(全国中草药汇编)
**Scrophularia henryi** Hemsl.

生于海拔 2 700—3 100 米的山坡草丛或岩石上。分布于湖北西部。

根: 清热,利湿,解毒。用于咽喉痛,口腔破溃,目赤红痛,淋巴腺肿,呼吸道炎症,跌打损伤。

附 注: 湖北特有药用植物。

**丹东玄参** 大山玄参、土玄参、安东玄参、川玄参(全国中草药汇编)
**Scrophularia kakudensis** Franch.

生于山坡灌丛或栽培。分布于辽宁。

根：苦、咸，凉。滋阴，降火，除烦，解毒。用于热病烦渴，发斑，骨蒸痨热，夜寝不安，咽喉肿痛，痈肿，瘰疬，津伤便秘。

**大果玄参**　一扫光(云南)

**Scrophularia macrocarpa** Tsoong

生于海拔2 200—3 000米的山坡林下。分布于四川西南部、云南北部。

根：外用于疮毒。

**玄参**　元参(通称)，浙玄参、黑参、乌元参(江苏、浙江)

**Scrophularia ningpoensis** Hemsl.

生于海拔1 700米以下的竹林、溪旁、丛林及高草丛中，并有栽培。分布于河北南部、山西、陕西南部、江苏、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖北、湖南、广东、四川、贵州。我国各省均有栽培。主产于浙江东阳、杭州、临海、义乌、临安、富阳、桐庐等地。

根(玄参)：甘、苦、咸，微寒。凉血滋阴，泻火解毒。用于热病伤阴，舌绛烦渴，温毒发斑，津伤便秘，骨伤痨嗽，目赤，咽喉痛，瘰疬，白喉，痈肿疮毒。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。② 本品为常用中药，浙江产量大，质量高，销往全国并有出口。③功效相似的有**北玄参 S. buergeriana** Miq. 分布于东北、华北及甘肃、新疆、山东、江苏、安徽、河南；**秦岭北玄参 S. buergeriana** Miq. var. **tsinglingensis** Tsoong，分布于山西、陕西、甘肃；**砾玄参 S. incisa** Weinm. 分布于黑龙江、内蒙古、甘肃、宁夏、青海东北部、新疆；**穗花玄参 S. spicata** Franch. 分布于云南西北部。④不宜与藜芦同用。

## 阴行草属　Siphonostegia Benth.

**阴行草**　刘寄奴(东北及天津、山东)，除毒草(吉林)，山(天)芝麻(山东、浙江)，土茵陈(江西、湖南、广西)，金钟茵陈(贵州、云南)

**Siphonostegia chinensis** Benth.

生于海拔500—3 400米的干山坡、草地上。分布于东北、华北、华东、中南、西南及陕西、甘肃、宁夏。

全草(北刘寄奴)：苦，凉。破血通经，敛疮消肿，利湿。用于经闭症瘕，产后瘀血，跌打损伤，金疮出血，烧、烫伤，痈肿。民间用于黄疸。

附　注：①本品为较常用中药，商品北方称北刘寄奴或刘寄奴，南方称金钟茵陈。② 功效相同的有**腺毛阴行草 S. laeta** S. Moore，分布于浙江。

## 短冠草属　Sopubia Buch.-Ham.

**短冠草**　英雄草(广东、广西)，虫药(广西)，小伸筋草(云南)

**Sopubia trifida** Buch.-Ham. ex D. Don

生于海拔1 600—2 100米的空旷草坡或荒地中。分布于江西、福建、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草(小伸筋草)：苦、涩，温。舒经活络，温肾止痛。用于风湿骨痛，胃寒痛，肾虚腰

痛，毛囊炎，驱除肠寄生虫，蛇伤。

## 独脚金属　Striga Lour.

独脚金　　矮脚子（江西），金锁匙（福建、广东），疳积草、干草（广东），独脚柑（中药大辞典）

**Striga asiatica** (L.) O. Kuntze——*Buchnera asiatica* L.

生于农田和荒草地，通常寄生于寄主的根部。分布于江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、贵州、云南。

全草（独脚金）：甘、淡，平。清肝，健脾，消食，杀虫。用于小儿疳积，小儿泄泻，小儿夏季热，黄疸，夜盲，毒蛇咬伤。

**大独脚金**

**Striga masuria** (Ham. ex Benth.) Benth. —— *Buchnera masuria* Ham. ex Benth.

生于山坡草地及杂木林内。分布于江苏、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草（小白花苏）：甘、淡，凉。健脾消食，清热渗湿，利尿。用于小儿疳积，食欲不振，小便淋涩疼痛，水肿，黄疸，臌胀。

## 蝴蝶草属　Torenia L.

**毛叶蝴蝶草**　　毛叶蓝猪耳、粗毛蝴蝶草（广东），地粘儿（广西），黄蝴蝶草（海南植物志），毛叶翼萼（中国高等植物图鉴）

**Torenia benthamiana** Hance

生于山坡、路旁、溪旁阴湿处。分布于福建、台湾、广东、海南、广西。

全草：活血消肿。用于疔疮，小儿鹅口疮，腰腿痛。

**单色蝴蝶草**　　单色翼萼（中国高等植物图鉴），蓝猪耳、蝴蝶花、散胆草、老蛇药（全国中草药汇编）

**Torenia concolor** Lindl.

生于林下、山谷及路旁。分布于台湾、广东、广西、贵州。

全草：苦，凉。清热解毒，利湿，止咳，和胃止呕，化瘀。用于发痧呕吐，黄疸，血淋，风热咳嗽，泄泻，跌打损伤，蛇咬伤，疔毒。

**黄色蝴蝶草**　　黄花蓝猪耳、黄蝴蝶草（广东），泡卜儿（广西），黄色翼萼（中国高等植物图鉴）

**Torenia flava** Buch.-Ham.

生于空旷干燥处及林下溪旁湿处。分布于台湾、广东、广西。

全草：用于阴囊肿大。

**蓝猪耳**

**Torenia fournieri** Linden.

原产越南。我国南方常见栽培，广东及云南南部有时在路旁、墙边或旷野草地上也偶见有逸生。

全草：用于泄泻，痢疾。

**光叶蝴蝶草**　倒胆草、老蛇药(贵州)，苦生叶(云南)，光叶翼萼(中国高等植物图鉴)

**Torenia glabra** Osbeck

生于海拔300—1 700米的山坡、路旁或阴湿处。分布于西南及浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西。

全草(水韩信草)：甘，凉。清热利湿，解毒，化瘀，消肿止痛。用于热咳，黄疸，泻痢，牙痛，口腔破溃，小儿疳积，疔毒，跌打损伤，中耳炎，子痈，毒蛇咬伤。

**紫萼蝴蝶草**　紫色翼萼(中国高等植物图鉴)

**Torenia violacea** (Azaola) Pennell——*Mimulus violacea* Azaola ex Blanco

生于海拔200—2 000米的山坡草地、林下、田边及路旁潮湿处。分布于华东、中南、西南及甘肃文县。

全草：微苦，凉。清热解毒，利湿止咳，化痰。用于小儿疳积，吐泻，痢疾，目赤，黄疸，血淋，疔疮，痈肿，毒蛇咬伤。

## 呆白菜属　Triaenophora (Hook. f.) Solereder

**呆白菜**　岩白菜、巴东岩白菜(湖北)

**Triaenophora rupestris** (Hemsl.) Solereder——*Rehmannia rupestris* Hemsl.

生于海拔290—1 200米的山坡林下及悬岩上。分布于湖北。

全草：明目补肾。用于月经不调。

附　注：我国特有属。本种为湖北特有药用植物。

## 毛蕊花属　Verbascum L.

**毛蕊花**　牛耳草(新疆)，大毛叶、一柱香(云南)

**Verbascum thapsus** L.

生于海拔1 400—3 200米的山坡草地、河岸草地或有栽培。分布于陕西、甘肃、新疆、山东、江西、上海、安徽、浙江、湖北、四川、云南、西藏。

全草(毛蕊花)：辛、苦，寒。有小毒。清热解毒，止血散瘀。用于咳喘，肠痈；外用于外伤出血，关节扭痛，疮毒。

附　注：功效相同的有**毛瓣毛蕊花 V. blattaria** L. 分布于新疆北部；**紫毛蕊花 V. phoeniceum** L. 分布于新疆北部，各地偶有栽培；**准噶尔毛蕊花 V. songoricum** Schrenk ex Fisch. et Mey., 分布于新疆。

## 婆婆纳属　Veronica L.

**阿拉套婆婆纳**

**Veronica alatavica** M. Pop.

生于海拔 1 500—2 500 米的亚高山草甸、草丛、山坡。分布于新疆。

全草：祛风除湿，消炎止痛。

附　注：新疆特有药用植物。

**北水苦荬**　　水莴苣、水仙桃草(云南)，仙桃草(四川中药志)

**Veronica anagallis-aquatica** L.

生于海拔 4 000 米以下的水边、沼泽地带及山谷阴湿处。分布于东北、华北、西北、西南及山东、江苏、河南、湖北、湖南。

根：微苦、辛，寒。清热解毒。用于风热上壅，咽喉肿痛，项上风疬。　带虫瘿的全草：苦，凉。清热利湿，止血化瘀。用于感冒，咽喉痛，劳伤咳血，痢疾，血淋，月经不调，疝气，疔疮，跌打损伤。　果实(或带虫瘿的果实)：用于腰痛，肾虚，小便涩痛，跌打损伤，劳伤吐血。

**长果水苦荬**

**Veronica anagalloides** Guss.

生于水沟、河边及湿草地。分布于西北及黑龙江、吉林、山西、内蒙古。

全草：活血止血，解毒消肿。

附　注：功效相同的有**毛果婆婆纳 V. eriogyne** H. Winkl.，分布于甘肃、青海、四川、云南。

**直立婆婆纳**

**Veronica arvensis** L.

生于海拔 2 000 米以下的路旁及荒野草地。分布于华东及新疆、河南、湖北、贵州。

全草(脾寒草)：清热，除疟。用于疟疾。

**有柄水苦荬**

**Veronica beccabunga** L.

生于草甸、沼泽、水边。分布于新疆、四川、贵州、云南。

全草：化痰消肿，清热利尿。

**两裂婆婆纳**

**Veronica biloba** L.

生于海拔 800—3 600 米的荒地、草原和山坡。分布于西北及四川、西藏。

全草：苦，寒。清热解毒。

附　注：功效相同的有**灰毛婆婆纳 V. cana** Wall.，分布于四川、云南、西藏；**穗花婆婆纳 V. spicata** L.，分布于新疆；**四川婆婆纳 V. szechuanica** Batal.，分布于陕西、甘肃、湖北、贵州、四川。

**长果婆婆纳**　　八夏噶(藏语)

**Veronica ciliata** Fisch.

生于海拔 3 300—3 760 米的高山草地。分布于西北及内蒙古、四川、云南、西藏。

全草(纤毛婆婆纳)：苦、涩，寒。清热解毒，祛风利湿。用于肝炎，胆囊炎，风湿关节痛，瘾疹。

**中甸长果婆婆纳**

**Veronica ciliata** Fisch. subsp. **zhongdianensis** Hong

生于高山林下或草地。分布于四川西部、云南北部、西藏东南部。

全草：苦、辛，寒。清热解毒，活血止血。

**婆婆纳**　石补丁(湖南)，双果草(云南)，卵子草(四川中药志)，双铜锤、双肾草(中药大辞典)

**Veronica didyma** Ten.——*V. polita* Fries.

生于海拔 450—1 450 米的荒坡、路旁、农田中。分布于西北、华东、中南、西南及河北、北京。

全草(婆婆纳)：淡，平。补肾壮阳，凉血，止血，理气止痛。用于吐血，疝气，子痈，带下病，崩漏，小儿虚咳，阳痿，骨折。

**华中婆婆纳**

**Veronica henryi** Yamazaki

生于海拔 500—2 800 米的阴湿地。分布于陕西、江西、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

全草：活血祛瘀，活络。用于小儿鹅口疮，跌打损伤。

**白婆婆纳**

**Veronica incana** L.

生于草原及砂丘上。分布于黑龙江、吉林、内蒙古。

全草：苦，凉。消肿止血。用于痈疖红肿。

**多枝婆婆纳**　贡布区敦木(藏语)，爪哇婆婆纳(中药大辞典)

**Veronica javanica** Bl.

生于海拔 2 300 米以下的山坡、路旁、溪边湿草丛中。分布于西南及陕西、浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西。

全草(小败火草)：辛、苦，凉。祛风散热，解毒消肿。用于乳痈，痢疾，跌打损伤，疮疖肿痛。

**疏花婆婆纳**　卵子草(四川)

**Veronica laxa** Benth.

生于海拔 1 500—3 400 米的沟谷阴处或山坡林下。分布于陕西、甘肃、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

全草：用于疮疡肿毒。

**细叶婆婆纳**　追风草(天津)

**Veronica linariifolia** Pall. ex Link

生于草甸、草地、灌丛及疏林下。分布于东北及内蒙古。

全草：祛风湿，解毒，止痛。用于伤风感冒，肢节酸痛。

**水蔓青**　追风草(河北)，蜈蚣草、斩龙剑(山东)，一枝香、细叶婆婆纳(江苏)，气管炎草(中药大辞典)

**Veronica linariifolia** Pall. ex Link subsp. **dilatata** (Nakai et Kitag.) Hong——*V. linariifolia* Pall. ex Link var. *dilatata* Nakai et Kitag.

生于山坡、路旁、草丛、河滩草地。分布于华东、中南、西南及河北、山西、陕西、甘肃、

宁夏。

全草(水蔓青)：苦，微寒。清热解毒，利尿，止咳化痰。用于咳嗽，肺痈，水肿，小便涩痛，疖肿；外用于痔疮，皮肤湿疹，风疹瘙痒。

**兔儿尾苗**　长尾婆婆纳(东北植物检索表)

**Veronica longifolia** L.

生于海拔1 500米左右的草甸、山坡草地、林缘草地、桦木林下。分布于黑龙江、吉林、新疆。

全草：祛风除湿，解毒止痛。

附　注：功效相同的有**羽叶婆婆纳 V. pinnata** L.，分布于新疆。

**蚊母草**　(水)仙桃草(江苏、浙江、江西、福建)，接骨仙桃(江西、福建、河南、湖南、贵州)、接骨丹、止血草(河南)

**Veronica peregrina** L.

生于海拔3 000米以下的潮湿荒地、路边、水沟边、河畔。分布于东北、华东、西南及河南、湖北、湖南。

带虫瘿的全草(仙桃草)：甘、苦，温。活血、止血，消肿，止痛。用于跌打损伤，瘀血肿痛，吐血，咯血，衄血，便血。

附　注：本品虫瘿内的小虫为象虫科昆虫仙桃草直喙象 *Gymnetron miyoshii* Miyoshi。

**阿拉伯婆婆纳**　灯笼草、波斯婆婆纳(江苏南部种子植物手册)，波斯水苦荬(中药大辞典)，灯笼婆婆纳(全国中草药汇编)

**Veronica persica** Poir.

生于路边、荒野杂草丛中。分布于华东及新疆、湖北、贵州、云南、西藏。

全草(肾子草)：苦、辛、咸，平。解热毒，祛风湿，截疟。用于肾虚，风湿疼痛，疟疾，小儿阴囊肿大，疥疮。

**光果婆婆纳**　两股钗(陕西)

**Veronica rockii Li**

生于海拔1 400—3 600米的山坡草地、林缘、灌丛。分布于华北及陕西、甘肃、青海、河南、湖北、四川。

全草：生肌愈疮。

**朝鲜婆婆纳**

**Veronica rotunda** Nakai var. **coreana** (Nakai) Yamazaki——*V. coreana* Nakai

生于山坡草地、山沟旁、山脚水沟边草丛中。分布于辽宁、山西、安徽、浙江、河南。

全草：镇咳、祛痰，消炎，平喘。

**小婆婆纳**　仙桃草、荞皮草(陕西)，百里香叶婆婆纳(中药大辞典)

**Veronica serpyllifolia** L.

生于海拔1 450—3 000米的中山至高山草甸、林缘、草丛中。分布于东北、西北、西南及河北、河南、湖北、湖南。

果实带虫瘿的全草(地涩涩)：甘、苦、涩，平。活血散瘀，止血，解毒。用于月经不调，

跌打内伤，口疮，外伤出血，烧、烫伤，蛇咬伤。

**丝茎婆婆纳**　邓木扯(藏语)，卷毛婆婆纳(全国中草药汇编)

**Veronica teucrium** L.

生于海拔2 000米以下的疏林下及草地上。分布于黑龙江、新疆。

全草：苦，寒。清热解毒，祛风除湿。用于风湿疼痛，感冒，小便涩痛。

**水苦荬**　芝种草(全国中草药汇编)，水仙桃草(四川中药志)，水莴苣(救荒本草)，水菠菜(中国植物志)

**Veronica undulata** Wall.

生于水边及沼泽地。除内蒙古、宁夏、青海、西藏外，全国各地普遍分布。

带虫瘿果实的全草(水苦荬)：苦、微辛，凉。解热，利尿，活血，止血，止痛。用于血滞痛经，跌打损伤，咳血，吐血、血崩，咽喉肿痛，疮疖肿痛及血小板减少性紫癜。　果实：用于腰痛，并有降血压的作用。

## 腹水草属　Veronicastrum Heist. ex Fabr.

**爬岩红**　毛脉腹水草、钓鱼杆(中药大辞典)，腹水草(全国中草药汇编)

**Veronicastrum axillare** (Sieb. et Zucc.) Yamazaki——*Paederota axillaris* Sieb. et Zucc.; *Botryopleuron axillare* (Sieb. et Zucc.) Hemsl.

生于林下、林缘草地及山谷阴湿处。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、广东。

全草：微苦，凉。清热解毒，利水消肿，散瘀止痛。用于肺热咳嗽，肝炎，水肿；外用于跌打损伤，毒蛇咬伤，烧、烫伤。

附　注：功效相同的有**宽叶腹水草 V. latifolium** (Hemsl.) Yamazaki——*Calorhabdos latifolia* Hemsl.; *Botryopleuron latifolium* Hemsl.，分布于湖北、湖南、四川、贵州；**细穗腹水草 V. stenostachyum** (Hemsl.) Yamazaki —— *Colorhabdos stenostachya* Hemsl.，分布于陕西、甘肃、湖北、湖南、四川、贵州。

**美穗草**

**Veronicastrum brunonianum** (Benth.) Hong —— *Calorhabdos brunoniana* Benth.

生于海拔1 300—3 000米的山谷、阴坡、草地及林下。分布于西南及湖北。

根状茎及全草：苦，寒。消炎，解毒，止咳化痰，降气平喘，消肿止痛。用于乳蛾，胃痛，小便涩痛，乳痈，疮痈肿毒，痢疾，咳嗽。

**四方麻**　青鱼胆(湖南)，狼尾拉花(广东)

**Veronicastrum caulopterum** (Hance) Yamazaki——*Calorhabdos cauloptera* Hance

生于海拔2 000米以下的山谷草丛、疏林下。分布于江西、湖北、湖南、广东、广西、贵州、云南。

全草(四方麻)：苦，寒。清热解毒，消肿止痛，生肌长肉。用于赤白痢疾，咽喉痛，目赤，黄肿，淋证，下疳，刀伤，痈疽，瘰疬，皮肤溃疡，湿疹，烫伤。

**长穗腹水草**　吊杆青筋(广西)

**Veronicastrum longispicatum** (Merr.) Yamazaki——*Botryopleuron longispicatum* Merr.

生于林中及灌丛中。分布于湖南、广东、广西。

叶：用于跌打损伤。

**大叶腹水草**　九拱桥(广西)

**Veronicastrum robustum** (Diels) Hong subsp. **grandifolium** Chin et Hong

生于疏林及灌丛中。分布于湖南、广西。

叶：用于痢疾，风湿骨痛，跌打损伤。

**草本威灵仙**　斩龙剑、狼尾巴花(中药大辞典)，草灵仙(全国中草药汇编)，轮叶婆婆纳(东北植物检索表)

**Veronicastrum sibiricum** (L.) Pennell——*Veronica sibirica* L.

生于海拔 2 500 米以下的路边、山坡草地、山坡灌丛中。分布于东北、华北及陕西、甘肃、山东、河南。

根或全草(斩龙剑)：微苦，寒。清热解毒，祛风除湿，止血，止痛。用于感冒，风湿腰腿痛，肌肉痛，小便涩痛，外伤出血，毒蛇咬伤，毒虫螫伤。

**腹水草**　腋生腹水草、腋生多穗草、虎尾悬铃草(中药大辞典)

**Veronicastrum stenostachyum** (Hemsl.) Yamazaki subsp. **plukenetii** (Yamazaki) Hong——*Botryopleuron plukenetii* Yamazaki

生于林下、林缘草地。分布于江西、福建、河南、湖北、湖南、广东、贵州。

全草：苦、辛，凉。有小毒。利尿消肿，散瘀解毒。用于腹水，水肿，小便不利，肝炎，月经不调，经闭，跌打损伤；外用于疖腮，疔疮，烧、烫伤，毒蛇咬伤。

附　注：功效相同的有**毛叶腹水草 V. villosulum** (Miq.) Yamazaki——*Paederota villosula* Miq. 分布于安徽、浙江、江西、福建。

**铁钓竿**　两头忙(安徽)

**Veronicastrum villosulum** (Miq.) Yamazaki var. **glabrum** Chin et Hong

生于林下及灌丛下。分布于安徽、浙江南部。

全草：用于血吸虫病，外伤。

**云南腹水草**　金钩莲(四川、云南)

**Veronicastrum yunnanensis** (W. W. Smith) Yamazaki——*Botryopleuron yunnanensis* W. W. Smith

生于灌丛中及林缘。分布于四川西南部、云南。

全草：清热解毒，消肿止痛，祛瘀生肌。

## 美丽桐属　Wightia Wall.

**美丽桐**　岩梧桐(云南)

**Wightia speciosissima** (D. Don) Merr.——*Gmelinia speciosissima* D. Don

生于海拔 2 500 米以下的林中或田边。分布于云南中部、南部。

根：用于跌打骨折，风湿关节痛，胃痛，月经不调，体虚。

## 164. 紫葳科 Bignoniaceae

### 紫葳属 Campsis Lour.

**凌霄花** 紫葳、女葳花(中国高等植物图鉴)

**Campsis grandiflora** (Thunb.) Loisel. ex K. Schumann——*Bignonie grandiflora* Thunb.

攀援于崖壁、树干或它物上，海拔可达 2 700 米，多栽培供观赏，亦有野生。栽培于华东、中南及河北、北京、天津、陕西、四川、贵州、云南。

花(凌霄花)：甘、酸，寒。行血祛瘀，凉血祛风。用于经闭症瘕，产后乳肿，风疹发红，皮肤瘙痒，痤疮。 根(紫葳根)：苦，凉。活血散淤，解毒消肿。用于风湿痹痛，跌打损伤，骨折，脱臼，吐泻。 茎、叶：苦，平。凉血，散淤。用于血热生风，皮肤瘙痒，癜疹，手脚麻木，咽喉肿痛。

附 注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。 ② 功效相同的有**美国凌霄 C. radicans** (L.) Seem.，原产美洲。山东、江苏、上海、安徽、湖北有栽培。《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

### 梓属 Catalpa Scop.

**楸树** 楸木(云南)，金丝楸、梓桐、水桐(全国中草药汇编)，楸白皮(中药大辞典)

**Catalpa bungei** C. A. Mey.

生于肥沃土壤中或栽培。分布于河北、北京、山西、陕西、甘肃、青海、山东、江苏、安徽、浙江、河南、湖北、四川、贵州、云南。

根皮、树皮(楸木皮)：苦，凉。清热解毒，散淤消肿。用于跌打损伤，骨折，痈疮肿毒，疔疮，吐逆，咳嗽。 叶(楸叶)：苦，凉。消肿拔毒，排脓生肌。用于肿疡，瘰疬。 花：苦，凉。解毒，止痛，生肌。 果实、种子：苦，凉。清热利尿。用于小便淋痛，石淋，热毒，疥疮。

**灰楸**

**Catalpa fargesii** Bureau

生于海拔 500—2 500 米的河谷、山麓或栽培。分布于山西、陕西、甘肃、山东、安徽、河南、湖北、广西、四川、贵州。

树皮(泡桐木皮)：苦，平。清热，止痛，消肿。用于风湿潮热，肢体困痛，关节痛，浮肿，热毒，疥疮。 根皮：用于皮肤病。 果实：利尿。

**滇楸** 紫楸(云南)，光灰楸(中国高等植物图鉴)

**Catalpa fargesii** Bureau f. **duclouxii** (Dode) Gilmour——*C. duclouxii* Dode

生于海拔 900—2 800 米的村庄附近。分布于湖北、四川、贵州、云南。

根、叶、花：解毒，止痛，生肌。用于风湿痛，咳嗽，胃痛。

附　注：民间用于绝育。

**梓树**　　臭梧桐、花楸、水桐(中药大辞典)

**Catalpa ovata** G. Don

生于海拔530—1 600米的平原浅山或栽培。常作行道树或庭园绿化树种。栽培于东北、华北、华东、中南及陕西、甘肃、宁夏、新疆、四川、贵州、云南。

根或茎的韧皮部(梓白皮)：苦，寒。清热解毒，和胃降逆，杀虫。用于腰肌劳损，时病发热，黄疸，反胃，湿疹，皮肤瘙痒，疮疥，小儿头疮。　木材(梓木)：用于手足痛风，霍乱。叶(梓叶)：微苦，平。消肿解毒。用于手脚烂疮，疮疥，皮肤瘙痒。　果实(梓实)：甘，平。有毒。利尿，消肿，杀虫。用于水肿，小便涩痛，蛋白尿，肝硬化腹水。

## 角蒿属　Incarvillea Juss.

**毛子草**　　两头毛、金鸡豇豆、燕山红(云南种子植物名录)

**Incarvillea arguta** (Royle) Royle—— *Amphicome arguta* Royle

生于海拔650—3 500米的干燥地、山坡、草丛及干热河谷地区。分布于西南及甘肃。

根、全草(唢呐花)：苦，凉。祛风除湿，解毒止痛，活血散瘀，止血，止痢，消食健胃。用于泄泻，痢疾，消化不良，风湿骨痛，月经不调，跌打扭伤，胃脘痛，骨折，痈肿，疮疖。

**密生波罗花**　　全缘角蒿(中国高等植物图鉴)

**Incarvillea compacta** Maxim.

生于海拔2 400—4 900米的高山阴坡砾石处或山地潮湿处。分布于甘肃、青海、四川、云南、西藏。

根、花、种子：辛、微苦、甘，平。清热燥湿，祛风止痛，健胃。用于胃脘痛，高血压症。

附　注：①本种在甘肃部分地区作角蒿使用。②功效相同的有**四川波罗花 I. beresowskii** Batal.，分布于四川、云南、西藏。

**红波罗花**　　角蒿(云南)，鸡肉参(汉拉英中草药名称)

**Incarvillea delavayi** Bur. et Franch

生于海拔2 400—3 500米的草地、灌丛或疏林中。分布于云南大理、洱源、实川。

根(鸡肉参)：甘、淡，温。滋补强壮，补养气血。用于产后少乳，久病虚弱，头晕，贫血。

附　注：云南特有药用植物。

**黄波罗花**　　土生地、圆麻参(云南)，黄花角蒿(中国高等植物图鉴)

**Incarvillea lutea** Bur. et Franch.

生于海拔2 000—4 500米的向阳草坡上或杂木林下。分布于四川、云南、西藏。

根：滋补。用于病后体虚。

**鸡肉参**　　大花角蒿、波罗花、土生地、山羊参(云南)，滇川角蒿(中国高等植物图鉴)

**Incarvillea mairei** (Lévl.) Grierson——*Tecoma mairei* Lévl.

生于海拔2 400—4 500米的高山草坡。分布于四川、云南。

根：甘、苦，凉。生用：凉血生津。干用：调血。熟用：补血，调经。用于骨折肿痛，产后少乳，体虚，久病虚弱，头晕，贫血，消化不良。

附　注：功效相同的有**大花鸡肉参 I. mairei** (Lévl.) Grierson **var. grandiflora** (Wehrhahn) Grierson —— *I. compacta* Maxim. var. *grandiflora* Wehrhahn，分布于青海、四川、云南。

**角蒿**　　羊角透骨草(通称)，羊角草蒿(东北)，角蒿透骨草(全国中草药汇编)

**Incarvillea sinensis** Lam.

生于海拔 650—3 850 米的山坡、灌丛、田野、路旁草丛中。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、青海、山东、河南、四川。

全草(角蒿)：辛、苦，平。有小毒。散风祛湿，解毒止痛。用于口疮，齿龈溃烂，耳疮，湿疹，疥癣，阴道滴虫病。

附　注：本种在东北及河北、山东、内蒙古部分地区作透骨草使用，习称羊角透骨草。

**丛枝角蒿**　　角蒿(云南)，马先蒿、猪牙菜(救荒本草)

**Incarvillea sinensis** Lam. subsp. **variabilis** (Batal.) Grierson——*I. variabilis* Batal.

生于海拔 1 200—2 800 米的山坡、路旁、荒地向阳处。分布于山西、陕西、甘肃、四川、云南、西藏。

全草：辛、苦，平。有小毒。散风祛湿。用于口疮，齿龈溃烂，耳疮，湿疹，疥癣，阴道滴虫病。

**藏波罗花**　　乌确码子布(藏语)，角蒿(西藏常用中草药)，西藏角蒿(全国中草药汇编)

**Incarvillea younghusbandii** Sprague

生于海拔 3 600—5 400 米的向阳山坡、灌丛、路旁及田边。分布于青海、四川、西藏。

根、种子：甘、淡，温。补养气血，滋补强壮。用于产后乳少，久虚体弱，头晕，贫血。

## 火烧花属　Mayodendron Kurz

**火烧花**

**Mayodendron igneum** (Kurz) Kurz——*Spathodea igneum* Kurz

生于海拔 200—1 520 米的山地林下或林缘。分布于台湾、广东、广西、云南。

根皮：用于产后体虚，恶露不尽。

## 烟筒花属　Millingtonia L. f.

**烟筒花**　　姊妹树、老鸦烟筒花(云南)，夏剎拢(傣语)

**Millingtonia hortensis** L. f.

栽培于海拔 500—1 200 米的平坝地区村寨附近。分布于云南。

树皮或叶(姊妹树)：苦，凉。祛风止痒，驱虫解毒，祛痰止咳。用于癣疹，湿疹，皮肤过敏，咳嗽痰喘，蛔虫病。

## 千张纸属 Oroxylum Vent.

**木蝴蝶** 千张纸(通称),千纸肉(广东),破布子、白故纸、白千层(云南)

**Oroxylum indicum** (L.) Vent. ——*Bignonia indica* L.

生于海拔100—1 800米的山坡、溪边、山谷、灌丛中。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

种子(木蝴蝶): 苦、甘,凉。清肺利咽,舒肝和胃,生肌。用于肺热咳嗽,喉痹,音哑,肝胃气痛。 树皮(木蝴蝶树皮): 微苦、甘,凉。清热利湿,消肿解毒。用于肝炎,小便涩痛,咽喉肿痛,湿疹,痈疮溃烂。

附 注:《中华人民共和国药典》1990年版收载。

## 翅叶木属 Pauldopia van Steenis

**翅叶木** 紫豇豆、金丝岩拓、细口袋花(云南)

**Pauldopia ghorta** (Buch.-Ham. ex G. Don) van Steenis —— *Bignonia ghorta* Buch.-Ham. ex G. Don

生于海拔1 350—1 750米的山坡密林中。分布于云南。

根皮: 凉血解毒,接骨止痛。

## 炮仗花属 Pyrostegia C. Presl

**炮仗花** 黄鳝藤(云南)

**Pyrostegia venusta** (Ker) Miers——*Bignonia venusta* Ker; *P. venusta* Baill.

原产南美洲巴西。我国引种栽培于福建、海南、广东、广西、云南。

全株或茎、叶: 苦、微涩,平。清热,利咽喉,润肺止咳。用于肺痨,咳嗽,咽喉肿痛,肝炎,咳喘,跌打,骨折。 花: 甘,平。润肺止咳。用于咳嗽,并试用于肿瘤。

## 菜豆树属 Radermachra Zoll. et Moritzi

**豇豆树**

**Radermachera pentandra** Hemsl.

生于海拔1 000—1 650米的山谷及林下沟边。分布于云南南部及东南部。

树皮: 清热解毒。

**菜豆树** 牛尾树(广西),豇豆树、辣辣树(云南)

**Radermachera sinica** (Hance) Hemsl. ——*Stereospermum sinicum* Hance

生于海拔340—750米的石灰岩山坡疏林中。分布于福建、台湾、广东、广西、云南。

根、叶、果实(菜豆树): 苦,寒。清热解毒,散瘀消肿,止痛。用于伤暑发热,高热头痛,胃痛,跌打损伤,痈疖,毒蛇咬伤。

**滇菜豆树**　土厚朴、豇豆树、蛇尾树(云南)

**Radermachera yunnanensis** C. Y. Wu et W. C. Yin

生于海拔850—2 200米的山坡阔叶林缘处。分布于云南、西藏。

树皮：清热解毒。用于痉挛性腹痛，痢疾，呕吐，腹胀，喘咳，高热，胃痛。

### 羽叶楸属　Stereospermum Cham.

**羽叶楸**　四角夹子树、铁刀木(云南)

**Stereospermum personatum** (Hassk.) Chatt. —— *Dipterospermum* personatum Hassk.

生于海拔200—1 500(—1 800)米的干热河谷疏林中。

分布于广西、云南。

全株：用于感冒，精神病，蝎螫伤。

### 硬骨凌霄属　Tecomaria Spach

**硬骨凌霄**　竹林标(云南)

**Tecomaria capensis** (Thunb.) Spach——*Bignonia capensis* Thunb.

原产南非洲。我国引种栽培于福建、广东、海南、广西、贵州、云南。

根、叶(竹林标)：微苦、辛，凉。清热消炎，散瘀消肿。用于肺痨，风热咳喘，咽喉肿痛，跌打损伤，骨折，蛇伤。　花：酸，寒。通经，利尿。用于月经不调，小便不利。

## 165. 爵床科　Acanthaceae

### 老鼠簕属　Acanthus L.

**老鼠簕**　软骨牡丹、蚣瓜簕(中国高等植物图鉴)

**Acanthus ilicifolius** L.

生于海边泥滩和潮汐能至的河涌边。分布于福建、广东、海南、广西的沿海地带。

根或全株(老鼠簕)：微咸，凉。清热解毒，消肿散结，止咳平喘。用于淋巴肿大，急、慢性肝炎，肝脾肿大，胃痛，咳嗽，哮喘。

### 鸭嘴花属　Adhatoda Mill.

**鸭嘴花**　大驳骨(广东、云南)，硬罗汉(广西)，大还魂(广州植物志)，野靛叶(中国高等植物图鉴)

**Adhatoda vasica** Nees——*Justicia adhatoda* L.

生于海拔850—1 800米的平坝路边灌丛中或栽培。分布于广东、海南、广西、云南。

全株：苦、辛，温。祛风活血，散瘀止痛，接骨。用于骨折，扭伤，风湿关节痛，腰痛。

## 尖蕊花属　Aechmanthera Nees

**尖药花**　尖蕊花、蓝花草(广西)

**Aechmanthera tomentosa** (Wall.) Nees—— *Ruellia tomentosa* Wall.

生于海拔 900—1 600 米的山坡、草地或疏林缘。分布于广西、贵州、云南。

叶：用于蛇伤，口腔破溃。

## 穿心莲属　Andrographis Wall.

**疏花穿心莲**　野榄核莲(广西)，白花穿心莲(海南植物志)，须药草(云南种子植物名录)

**Andrographis laxiflora** (Bl.) Lindau——*Eriauthera laxiflora* Bl.

生于海拔 900—1 800 米的山坡路旁。分布于海南、广西、云南。

全草：用于感冒，风热咳嗽，泄泻。

附　注：本种在海南亦作穿心莲使用。

**穿心莲**　榄核莲、一见喜(中国高等植物图鉴)，印度草(云南种子植物名录)

**Andrographis paniculata** (Burm f.) Nees——*Justicia paniculata* Burm. f.

原产印度。华东、中南及河北、北京、天津、陕西、新疆、江苏、四川、贵州、云南有栽培，以广东、海南、广西种植最多。

地上部分(穿心莲)：苦，寒。清热解毒，凉血，消肿，止痛。用于感冒发热，咽喉肿痛，口腔溃烂，顿咳，泄泻痢疾，热淋涩痛，痈肿疮疡，毒蛇咬伤。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 十万错属　Asystasia Bl.

**十万错**　盗偷草、跌打草(广西)

**Asystasia gangetica** (L.) T. Anders.——*Justicia gangetica* L.; *A. chelonoides* Nees

生于海拔 500—1 500 米的山野林下。分布于广西、云南。

全草：用于跌打损伤，骨折。

## 白接骨属　Asystasiella Lindau

**白接骨**　接骨草、血见愁(浙江)，假牛膝(广东)，蛀木虫(广西)，小阿西达(中药大辞典)

**Asystasiella chinensis** (S. Moore) E. Hossain —— *Asystasiella chinensis* S. Moore

生于海拔 400—2 400 米的林下或溪边。分布于中南及江苏、安徽、浙江、江西、福建、

四川、贵州、云南。

根状茎、全草(白接骨)：淡，凉。清热解毒，散瘀止血，利尿。用于肺痨，咽喉肿痛，消渴，腹水；外用于外伤出血，扭伤，疖肿。

## 假杜鹃属　Barleria L.

**假杜鹃**　　蓝花草(广东)，假红蓝(广西)，叶红草、地狗胆(云南)

**Barleria cristata** L.

生于海拔 40—1 700 米的干旱山坡、林缘、灌丛中或石灰岩山林下。分布于广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全株(紫靛)：甘、淡，凉。清肺化痰，止血截疟，祛风除湿，消肿止痛，透疹止痒。用于肺热咳嗽，疟疾，枪弹、竹刺入肉，疮疖，风湿痛。

**花叶假杜鹃**　　刺血红(全国中草药汇编)

**Barleria lupulina** Lindl.

栽培观赏植物。我国见于广东、海南、广西、云南。

全株：辛、苦，温。通经活络，解毒消肿。用于毒蛇咬伤，犬咬伤，跌打损伤，痈肿，外伤出血。

**黄花假杜鹃**

**Barleria prionitis** L.

生于海拔 600—1 200 米的干旱山坡或灌丛中。分布于云南。

根：解毒，消肿，止咳。用于牙痛，咳嗽；外用于痔疮。　叶或全株：涩，凉。散瘀消肿，续筋接骨。用于跌打损伤，木刺入肉。

## 杜根藤属　Calophanoides Ridl.

**中华赛爵床**　　杜根藤(中国高等植物图鉴)

**Calophanoides chinensis** (Benth.) C. Y. Wu et H. S. Lo——*Adhatoda chinensis* Benth.; *Justicia yunnanensis* C. B. Clarke

生于海拔 100—2 000 米的路旁、山坡、草丛或林下。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草：微咸，温。清热解毒，散瘀消肿，活血通络。用于蛇咬伤，肿毒。

**广西赛爵床**　　白马骨(广西)

**Calophanoides kwangsiensis** H. S. Lo

生于山坡草丛或林下。分布于广西。

全株：用于时行感冒，阴挺。

附　注：广西特有药用植物。

**杜根藤**　　大青草(全国中草药汇编)

**Calophanoides quadrifaria** (Wall.) Ridl. —— *Justicia quadrifaria* Wall.

生于林缘、山地路旁及沟溪边。广布于长江中、下游至南岭山地。

全草：苦，寒。清热解毒。用于口舌生疮，时行热毒，丹毒，黄疸。

**柳叶爵床**

**Calophanoides salicifolia** (T. Anders.) Bremek. —— *Justicia salicifolia* T. Anders.

生于海拔500—1 200米的灌丛及林缘。分布于广西。

全草：用于毒蛇咬伤，跌打损伤，关节痛。

## 鳄嘴花属 Clinacanthus Nees

**鳄嘴花** 青箭(广西)，柔刺草(中药大辞典)，竹节黄、扭序花(全国中草药汇编)

**Clinacanthus nutans** (Burm. f.) Lindau —— *Justicia nutans* Burm. f.; *C. burmannii* Nees

生于海拔520—650米的灌丛中及林缘、路旁。分布于广东、海南、广西、云南。

全草(青箭)：甘、微苦，辛。清热除湿，消肿止痛，散瘀。用于黄疸，风湿痹痛，月经不调；外用于跌打，骨折，刀伤，枪伤。

## 钟花草属 Codonacanthus Nees

**钟花草** 青木香草(广西)

**Codonacanthus pauciflorus** (Nees) Nees —— *Asysticia pauciflorus Nees*; *C. acuminatus* Nees

生于海拔800—1 500米的密林下或潮湿的山谷。分布于台湾、广东、海南、广西、云南。

全草：用于跌打损伤，风湿病，口腔破烂。

## 鳔冠花属 Cystacanthus T. Anders.

**滇鳔冠花**

**Cystacanthus yunnanensis** W. W. Smith

生于海拔1 000—2 100米的灌丛中。分布于四川、云南。

根、茎、叶(蓝花棵)：苦，凉。清热解毒，消炎止咳。用于咳嗽，崩漏。

## 狗肝菜属 Dicliptera Juss.

**印度狗肝菜**

**Dicliptera bupleuroides** Nees

生于海拔800—1 200米的林缘、草丛中。分布于四川、贵州、云南。

全草：清热，凉血，利尿，解毒。

**狗肝菜** 路边青(广东、广西)，半枝莲、灯台草、中华狗肝菜(云南)，青蛇仔(岭南草

药志)

**Dicliptera chinensis** (L.) Nees —— *Justicia chinensis* L.

生于疏林下、溪沟边及路旁。分布于浙江、福建、台湾、广东、广西。

全草(狗肝菜): 甘、淡,凉。清热解毒,凉血生津,利尿。用于感冒高热,斑疹发热,暑热烦渴,乙脑,风湿关节痛,咽喉肿痛,目赤,小便不利;外用于疖肿,缠腰火丹。

## 虾衣花属 Drejerella Lindau

**虾衣草** 麒麟塔(广西),麒麟吐珠(中国高等植物图鉴)

**Drejerella guttata** (Brandegee) Bremek. —— *Beloperone guttata* Brandegee; *Callispidia guttata* (Brandegee) Bremek.

原产墨西哥。我国广东、海南、广西有栽培。

茎、叶: 散瘀消肿。用于跌打损伤。

## 喜花草属 Eranthemum L.

**华南喜花草** 对节菜(广西)

**Eranthemum austrosinense** H. S. Lo

生于海拔 300—800 米的林缘或沟溪边。分布于广东、广西。

根: 用于风湿关节痛。

**喜花草** 可爱花(海南植物志)

**Eranthemum pulchellum** Andr. —— *E. nervosum* (Vahl) R. Br.

生于海拔 190—800 米的山坡、林下或庭园有栽培。分布于广东、广西、贵州、云南。

叶: 清热解毒,散瘀消肿。用于跌打肿痛。

## 驳骨草属 Gendarussa Nees

**黑叶接骨草** 黑叶爵床(广东),大接骨(广西),大驳骨丹(岭南采药录),大驳骨(中国高等植物图鉴)

**Gendarussa ventricosa** (Wall.) Nees —— *Justicia ventricosa* Wall.; *Adhatoda ventricosa* (Wall.) Nees

生于海拔 50—800 米近村的疏林下或灌丛中,也有栽培。分布于台湾、广东、海南、广西、云南。

全株(大驳骨): 辛、微酸,平。活血散瘀,祛风除湿,续筋接骨。用于骨折,跌打损伤,风湿关节痛,腰腿痛,外伤出血。

**小驳骨** 爬滩良(傣语),百节芒(广州植物志),驳骨草、裹篱樵(中国高等植物图鉴)

**Gandarussa vulgaris** Nees —— *Justicia gendarussa* Burm. f.

生于海拔 50—550 米的林下、灌丛、草地或栽培于屋边、园边肥沃地上。分布于福建、

台湾，广东、海南、广西、云南。

全株(小驳骨)：辛、微酸，平。续筋接骨，消肿止痛。用于骨折，扭挫伤，风湿关节痛。树皮：催吐。　叶：为杀虫剂。

## 山一笼鸡属　Gutzlaffia Hance

**山一笼鸡**　白背草、一炉香、野古蓝(广西)

**Gutzlaffia aprica** Hance —— *Strobilanthes apricus* (Hance) T. Anders.; *G. dielsiana* (W. W. Smith) S. Moore; *S. dielsiana* W. W. Smith

生于海拔 100—2 000 米的向阳山坡草地、灌丛中。分布于江西、湖北、广东、广西、四川、贵州、云南。

根(山一笼鸡)：辛、微苦，凉。发汗解表，清肺止咳。用于感冒发热，咳嗽，痢疾。

## 裸柱花属　Gymnostachyum Nees

**裸柱草**　广西裸柱花(广西)

**Gymnostachyum kwangsiense** H. S. Lo —— *G. sanguinolentum* (Vahl) T. Anders.

生于海拔 400 米处的林缘或疏林下。分布于广西、云南。

全草：用于跌打损伤，风湿骨痛。

## 水蓑衣属　Hygrophila R. Br.

**大花水蓑衣**　六角英(广东)

**Hygrophila salicifolia** (Vahl) Nees var. **megalantha** (Merr.) H. S. Lo—— *H. megalantha* Merr.

原产东南亚。我国广东、海南、广西有栽培，亦有野生。

全草(大青草)：甘、微苦，凉。清热解毒，化瘀止痛。用于咽喉痛，乳痈，吐血，衄血，顿咳；外用于骨折，跌打损伤，毒蛇咬伤。　种子(南天仙子)：淡。健脾消食，散瘀消肿。用于癫狂，抽搐，哮喘，胃痛；外用于痈肿，恶疮。

## 枪刀药属　Hypoestes Soland. ex R. Br.

**枪花药**

**Hypoestes poilanei** R. Br.

生于林下、路边、荒山土坡上。分布于贵州。

全草(野辣子)：微苦，凉。生肌，止血。用于刀枪伤。

**枪刀药**

**Hypoestes purpurea** (L.) R. Br.——*Justicia purpurea* L.; *H. sinica* Mia

生于路边、林下或山谷阴湿处，亦有栽培。分布于台湾、广东、海南、广西。

全草(青丝线)：甘、淡、微香，凉。清热解毒，凉血止血。用于肺痨咯血，咳嗽，消渴，刀伤出血，跌打肿痛。

**三花枪刀药**　土巴戟(云南)

**Hypoestes triflora** (Forssk.) Roem. et Schult.——*Justicia triflora* Forssk.

生于海拔1 800—2 600米的林缘、山坡下。分布于贵州、云南、西藏。

根：淡，温。强腰健肾，祛风除湿。用于风湿腰痛。全草：微涩，凉。清热解毒，止咳化痰，止血生肌。

## 鳞花草属　Lepidagathis Willd.

**齿叶鳞花草**

**Lepidagathis fasciculata** Nees

生于低海拔处的灌丛中、干旱草坡或河岸砂地上。分布于云南。

全草：止咳化痰。

**鳞花草**　鳞衣草、牛膝琢(广东)，蛇疮草(广西)

**Lepidagathis incurva** Buch.-Ham. ex D. Don——*L. hyalina* Nees

生于海拔200—2 200米的灌丛、干旱草坡或河岸沙地。分布于广东、海南、广西、贵州、云南。

全草：甘、微苦，寒。清热解毒，消肿止痛。用于蛇疮，口唇糜烂，眼痛；外用于疮疡肿毒。

## 拟地皮消属　Leptosiphonium F. Muell.

**拟地皮消**　飞来蓝(广西)

**Leptosiphonium venustum** (Hance) E. Hossain——*Ruellia venusta* Hance; *R. secluse* S. Moore

生于海拔500—2 000米的林下或山坡草地。分布于江西、福建、湖北、广东、广西。

全草：用于白喉，感冒发热，咽喉肿痛，头晕。

## 野靛棵属　Mananthes Bremek.

**南岭野靛棵**　细穗爵床(广西中药志)

**Mananthes leptostachya** (Hemsl.) H. S. Lo——*Justicia leptostachya* Hemsl.

生于海拔500—1 400米的山地林下或溪边。分布于湖南南部、广东北部、广西。

全草：散瘀，止痛，止血。用于跌打损伤，骨折。

**龙州野靛棵**　假走马胎(广西)

**Mananthes vasculosa** (Nees) Bremek.——*Adhatoda vasculosa* Ness

生于海拔500米左右的林下、山谷中。分布于广西。

全草：用于跌打损伤。

## 地皮消属 Pararuellia Bremek. et Nannenga-Bremek.

**地皮消** 岩威灵仙、喜栎小苞爵床(中药大辞典)，芦利草、红头翁(全国中草药汇编)，蛆药(中国高等植物图鉴)

**Pararuellia delavayana** (Baill.) E. Hossain——*Ruellia delavayana* Baill.; *P. drymophila* (Diels) C. Y. Wu

生于海拔1 300—3 000米的灌丛或山坡草地。分布于湖北、四川、贵州、云南。

根：清热补脾，消食健胃。 全草：苦，平。清热解毒，消肿止痛。用于乳蛾，痄腮，咳嗽痰喘，风热咳嗽，瘰疬；外用于骨折，刀伤感染，疮毒痈肿。

## 九头狮子草属 Peristrophe Nees

**观音草** 染色九头狮子草(中国高等植物图鉴)，山蓝(汉拉英中草药名称)，野靛青(中药大辞典)，青红线(常用中草药彩色图谱)

**Peristrophe baphica** (Spreng.) Bremek.——*Justicia baphica* Spreng.

生于海拔280—1 800米的山坡林下，多为栽培。分布于广东、海南、广西、云南。

全草(红丝线)：甘、淡，凉。清肺止咳，散瘀止血。用于肺痨咯血，风热咳嗽，消渴，跌打损伤，肿痛。

**九头狮子草** 六角英(福建)，九节篱、辣叶青药(广东)，土红蓝(广西)

**Peristrophe japonica** (Thunb.) Yamazaki——*Dianthera japonica* Thunb.; *Didiptera japonica* (Thunb.) Makino

生于海拔700—2 000米的沟边、路旁、草地、林下或栽培。分布于华东、中南及陕西、四川、贵州、云南。

全草(九头狮子草)：辛、微苦，凉。发汗解表，解毒消肿，镇痉。用于感冒发热，咽喉肿痛，白喉，小儿消化不良，小儿高热惊风；外用于痈疖肿毒，毒蛇咬伤，跌打损伤。

## 火焰花属 Phlogacanthus Nees

**火焰花** 弯花焰爵床(云南)，禾木张(傣语)

**Phlogacanthus curviflorus** (Wall.) Nees——*Justicia curviflorus* Wall.

生于海拔400—1 600米的沟谷雨林下、水边、沼泽地上。分布于云南。

根(焰爵床)：苦，寒。清热解毒。用于疟疾。

**糙叶火焰花** 地蓝(广西)

**Phlogacanthus vitellinus** (Roxb.) T. Anders.——*Justicia vitellinus* Roxb.

生于海拔200米左右的林下湿热处。分布于广西、云南。

根：用于风湿，跌打损伤，骨折。

## 山壳骨属 Pseuderanthemum Radlk.

**海康山壳骨**

**Pseuderanthemum haikangense** C. Y. Wu et H. S. Lo

生于海拔 100—800 米的林下或旷野中。分布于广东、海南。

全草：清热解毒。

**多花山壳骨** 云南山壳骨(中国高等植物图鉴)

**Pseuderanthemum polyanthum** (C. B. Clarke) Merr.——*Eranthemum polyanthum* C. B. Clarke

生于海拔 580—1 700 米的低中山沟谷雨林林缘或石灰山疏林下。分布于广西、云南。

根：用于骨折。全株：用于崩漏，跌打损伤。

## 白鹤灵芝属 Rhinacanthus Nees

**白鹤灵芝** 灵芝草、癣草(广东、云南)，仙鹤灵芝草(广东)，假红蓝(广西)

**Rhinacanthus nasutus** (L.) Kurz——*Justicia nasuta* L.; *R. communis* Nees

生于海拔 700 米左右的灌丛或疏林下，多为栽培。分布于广东、海南、广西、云南。

根：可解毒蛇咬伤。 枝、叶(白鹤灵芝)：甘、淡，平。润肺降火，杀虫，灭疥。用于早期肺痨，蛇咬伤，体癣，湿疹，疥癞。

## 爵床属 Rostellularia Reichb.

**两广线叶爵床** 人面草(广西象州)

**Rostellularia linearifolia** Bremek. subsp. **liangkwangensis** H. S. Lo

生于海拔 300—500 米的草地上。分布于广东、广西。

全草：用于风湿关节痛，蛇咬伤。

**爵床** 疳积草(江西民间草药)，毛泽兰(四川中药志)，六角英(中国高等植物图鉴)

**Rostellularia procumbens** (L.) Nees——*Justicia procumbens* L.

生于海拔 600—2 450 米的旷野、林下、路旁阴湿处。分布于华东、中南、西南及陕西。

全草(爵床)：微苦，寒。清热解毒，利尿消肿，活血止痛。用于感冒发热，疟疾，咽喉肿痛，小儿疳积，痢疾，呕吐，肝炎，水肿，小便淋痛，痈疮疖肿，跌打损伤。

## 孩儿草属 Rungia Nees

**中华孩儿草**

**Rungia chinensis** Benth.

生于山地、路旁、溪边。分布于广东、广西。

全草：咸、辛，寒。清热解毒，利湿消滞，活血。用于感冒，咳嗽，咽喉痛，痢疾，黄疸，

水肿，筋骨疼痛，小儿疳积。

**密花孩儿草**

**Rungia densiflora** H. S. Lo

生于海拔500—800米的林下或林缘。分布于安徽、浙江、江西、福建、广东。

全草：微苦，寒。清热解毒，利尿，消肿。

**孩儿草**　积药草、土夏枯草(广东)，火炭草(广西)，蓝色草(广州植物志)，疳积草(全国中草药汇编)

**Rungia pectinata** (L.) Nees——*Justicia pectinata* L.

生于海拔200—1 500米的河边、疏林下、草地、路边水湿处。分布于台湾、广东、海南、广西、云南。

全草(孩儿草)：辛、苦，凉。清热利湿，消积导滞。用于小儿疳积，消化不良，肝炎，泄泻，感冒，咽喉痛，目赤，瘰疬，疖肿。

## 黄球花属　Sericocalyx Bremek.

**黄球花**　毛虫包、火漂藤(陆川本草)

**Sericocalyx chinensis** (Nees) Bremek.——*Ruellia chinensis* Nees; *Hemigraphis chinensis* (Nees) T. Anders.

生于海拔50—300米的林下或溪边阴湿地。分布于广东、广西。

全株(狗泡草)：微辛，凉。凉血解毒，消肿止痛。用于脓疱疮，口腔破溃，痢疾；外用于皮肤瘙痒。

## 马蓝属　Strobilanthes Bl.

**铜毛紫云菜**　十三年花(全国中草药汇编)

**Strobilanthes aenobarbus** W. W. Smith

生于海拔2 300—3 200米的山坡、草坡上。分布于云南贡山。

根、叶：淡、微苦，平。活血调经，清肝热。用于目赤，月经不调，产后腹痛，黄疸，疟疾，心悸，哮喘。

**顶头马蓝**　顶头草、汗斑草(广西)

**Strobilanthes affinis** (Griff.) Y. C. Tang——*Adenosma affinis* Griff.; *Tarphochlamys affinis* (Griff.) Bremek.

生于海拔500—1 900米的山坡、草地或灌丛中。分布于广西、云南。

根：淡、甘，凉。解毒，凉血。用于时行感冒，流脑，乙脑，肺热咳嗽，丹毒，热毒发斑，神昏，吐血，蛇咬伤。　全草：外用于汗斑，蛇咬伤。

**马蓝**　南板蓝根、大青叶、蓝靛(中国高等植物图鉴)

**Strobilanthes cusia** (Nees) O. Kuntze——*Goldfusia cusia* Nees; *Baphicanthus cusia* (Nees) Bremek.

生于海拔300—2 100米的林下或溪旁阴湿地，或栽培。分布于西南及浙江、江西、福

建、台湾、河南、湖南、广东、海南、广西。

根(马蓝根)：苦，寒。清热解毒，凉血。用于温病发热，发斑，风热感冒，咽喉肿烂，流脑，乙脑，肺炎，痄腮。叶或茎叶经加工制得的粉末或团块状物（青黛)：咸，寒。清热解毒，凉血，定惊。用于温毒发斑，血热吐衄，胸痛咳血，口疮，痄腮，喉痹，小儿惊痫。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**曲枝假蓝**　曲枝黄猄草(广东)，蓝靛(广西)

**Strobilanthes dalzielii** (W. W. Smith) R. Ben.——*Acanthopale dalzielii* W. W. Smith

生于海拔 1 000—1 900 米的林下或林缘灌丛中。分布于江西、广东、海南、广西、云南。

全草：清热解毒，凉血利尿。用于痢疾，痄腮，咽喉痛，乳蛾，蛇咬伤。

**杜牛膝**　野牛膝(湖北)

**Strobilanthes dimorphotrichus** Hance

生于山坡林下。分布于湖北西南部。

全草：用于咽喉肿痛，跌打损伤，毒蛇咬伤，风湿关节痛。

**红背马蓝**　疏花金足草(西双版纳植物名录)

**Strobilanthes dyerianus** Mast.——*Perilepta dyerianus* (Mast.) Bremek.

原产缅甸。栽培于广东、广西、贵州、云南。

全草：用于痢疾，月经不调，产后恶露，痄腮，跌打损伤，骨折。　叶：用于蛇头疮。

**腺毛马蓝**

**Strobilanthes forrestii** Diels——*Pteracanthus forrestii* (Diels) C. Y. Wu

生于海拔 2 700—3 600 米的松林下或草坡上。分布于湖北、四川西部、贵州、云南。

根(味牛膝)：酸、苦，平。行瘀血，消肿痛，强筋骨。用于经闭癥瘕，淋痛，难产，腰膝痹痛。

附　注：功效相同的有**牛膝马蓝 S. nemorosus** R. Ben.——*S. grossus* C. B. Clarke，分布于湖北、四川、云南。

**日本马蓝**　红泽兰、马兰(云南)，垂序马蓝(中药大辞典)

**Strobilanthes japonicus** (Thunb.) Miq. ——*Championella japonica* (Thunb.) Bremek.

栽培于四川、云南。

全草(红泽兰)：苦、微辛，温。消瘀行水，舒肝散郁，活血通经。用于月经不调，产后淋漓，腹痛，血晕，癥瘕，痈肿，跌打损伤，浮肿。

**灯笼花**　灯笼草(湖北)

**Strobilanthes lamium** C. B. Clarke et W. W. Smith

生于山坡林下。分布于湖北来凤、五峰及长阳。

全草：用于痈肿清热解毒，散瘀止血。

**少花马蓝**　紫云英马蓝(全国中草药汇编)

**Strobilanthes oliganthus** Miq.——*Championella oligantha* (Miq.) Bremek.

生于林下或阴湿地。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖南、贵州。

全草：苦，凉。清热凉血。用于高热发狂。

**球花马蓝**　　湿大青、大青草(浙江)，头花金足草(广西)

**Strobilanthes pentstemonoides** (Nees) T. Anders.——*Goldfussia pentstemonoides* Nees

生于海拔650—1 700米的林下或山谷阴湿处。分布于浙江、湖北、广东、广西、四川、贵州。

全株：甘，凉。滋肾养阴，清热泻火。用于肝炎，风湿关节痛，蛇咬伤；咽喉肿痛，骨折。

附　注：本种在四川灌县作马蓝根用；在浙江温州地区作大青叶用；在湖北误作威灵仙用。

**细穗金足草**　　细穗曲蕊马蓝、红石蓝(广西)，六月青、汗斑草(全国中草药汇编)

**Strobilanthes psilostachys** C. B. Clarke ex W. W. Smith——*Goldfussia psilostachys* (C. B. Clarke ex W. W. Smith) Bremek.

生于海拔700—1 600米的山坡林下或林缘。分布于广西。

茎、叶(六月青)：淡、微辛，凉。解毒消肿，行血散瘀。用于毒蛇咬伤，跌打肿痛，疮疖肿痛。根及根状茎：用于风热感冒，咽喉肿痛，乙脑，肝炎，疟腮。

**菜头肾**

**Strobilanthus sarcorrhiza** (C. Ling) H. S. Lo——*Championella sarcorrhiza* C. Ling

生于山坡、路旁等阴湿处。分布于浙江。

根：微甘，凉。养阴补肾。用于肾虚腰痛，阴虚牙痛，迁延型或慢性肝炎，肾炎水肿。茎、叶：微甘，凉。清热解毒。用于肝炎，疔疮疖肿，肌腱扭伤。

**四子马蓝**

**Strobilanthes tetraspermus** (Champ. ex Benth.) Druce——*Ruellia tetrasperma* Champ. ex Benth.

生于林下石上或阴湿草地。分布于江西、福建、湖北、湖南、广东、四川。

全草：微苦，凉。清热解毒，消肿。用于跌打损伤。

**三花马蓝**

**Strobilanthes triflorus** Y. C. Tang

生于林下或阴湿地。分布于江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、西藏。

全草：舒筋活络，止血生肌。

**滇紫云菜**　　云南马蓝(中国高等植物图鉴)

**Strobilanthes yunnanensis** Diels——*S. hygrophiloides* C. B. Clarke ex W. W. Smith

生于海拔2 400—3 000米的山坡杂木林中。分布于四川、云南。

全草：清热解毒，止痛消肿。

## 山牵牛属 Thunbergia Retz.

**巢腺山牵牛**

**Thunbergia adenophora** W. W. Smith

生于海拔600米左右的山地林下及林缘。分布于广西、云南。

叶：用于跌打损伤。

**翼叶山牵牛** 翼叶老鸦嘴(广东)

**Thunbergia alata** Bojer

原产非洲。我国南方各地有栽培。

全株：消肿止痛。用于跌打肿痛。

**碗花草** 铁贯藤(植物名实图考)，老鸦嘴(中国高等植物图鉴)

**Thunbergia fragrans** Roxb.

生于海拔600—2 500米的山坡林下、灌丛中及田边。分布于广东、广西、四川、贵州、云南。

根、种子：涩，寒。泻水下气，解毒，消食健胃。用于腹胀。

**山牵牛** 大花山牵牛、大花老鸦嘴(中国高等植物图鉴)

**Thunbergia grandiflora** (Roxb. ex Rottler) Roxb.——*Flemingia grandiflora* Roxb. ex Rottler

生于海拔400—900(—1 500)米的低山、平坝、河边、灌丛中或栽培。分布于广东、海南、广西、云南。

根(通骨消)：微辛，平。祛风。用于风湿，跌打，骨折。 根皮、茎、叶(老鸦嘴)：甘，平。消肿拔毒，排脓生肌，止痛。 根皮：用于跌打损伤，骨折。 茎、叶：用于蛇咬伤，疮疖。 叶：用于胃痛。 花、种子：用于跌打损伤，风湿痛，疮疡肿毒，痛经。

**刚毛山牵牛**

**Thunbergia lacei** Gamble.

生于海拔350—2 000米的灌丛中。分布于云南。

根、茎：消肿拔毒，止痛。

## 166. 胡麻科 Pedaliaceae

### 胡麻属 Sesamum L.

**胡麻** 芝麻(通称)，油麻(食疗本草)，巨胜(神农本草经)，脂麻(本草衍义)

**Sesamum indicum** L.——*S. orientale* L.

原产亚洲热带。除西藏高原外，全国各地均有栽培。

黑色的种子(黑芝麻)：甘，平。补肝肾，益精血，润肠燥，通乳。用于头晕眼花，耳鸣耳聋，须发早白，病后脱发，肠燥便秘，妇人乳少。 种子油(麻油)：用于润肠，润肺。 茎(麻秸)：用于哮喘，浮肿，聤耳出脓。 叶(胡麻叶)：甘，寒。益气，补脑髓，坚筋骨。用于

五脏邪气，风寒湿痹。 花(胡麻花)：用于秃发，冻疮。 果壳(芝麻壳)：用于半身不遂，烫伤。 胡麻枯饼：用于揩牙乌须，疳疮有虫。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 167. 苦苣苔科　Gesneriaceae

### 芒毛苣苔属　Aeschynanthus Jack.

**芒毛苣苔**　　大叶榕根(广东)，石难风、白背风(广西)

**Aeschynanthus acuminatus** Wall.

生于海拔 120—2 400(—4 000)米的山谷林下及雨林下、岩石上或沼泽草地上。分布于福建南部、台湾、广东、广西、四川西部及南部、云南南部、西藏东南部。

全株(石榕)：甘、淡，平。养阴清热，益血宁神。用于肾虚，慢性肝炎，风湿关节痛，跌打损伤。

**广西芒毛苣苔**　　下山虎、小叶石仙桃(广西)

**Aeschynanthus austroyunnanensis** W. T. Wang var. **guangxiensis** (Chun) W. T. Wang——*A. guangxiensis* Chun

生于海拔 400—1 000 米的石灰山地、疏、密林中、陡崖阴处或攀缓于低山石上。分布于广西、贵州南部。

全株：用于风热咳嗽，腰腿痛，关节痛。

**黄杨叶芒毛苣苔**　　上树蜈蚣(广西桂林)

**Aeschynanthus buxifolius** Hemsl.

生于海拔 1 380—2 900 米的山地石上或乔木树干上。分布于广西、云南。

全草：用于蛇虫咬伤。

### 直瓣苣苔属　Ancylostemon Craib

**凸瓣苣苔**

**Ancylostemon convexus** Craib

生于海拔 2 400—3 000 米的山地阴湿石上。分布于云南大理、滕冲。

全草：补虚。用于牙痛。

附　注：①我国特有属。②云南特有药用植物。

**直瓣苣苔**　　铁板还阳(陕西)

**Ancylostemon saxatilis** (Hemsl.) Craib——*Didissandra saxatilis* Hemsl.

生于海拔 1 300—2 100 米的山地阴湿石上。分布于陕西、甘肃、湖北西部、四川东部。

全草：苦、涩，凉。清热解毒。

### 大苞苣苔属　Anna Pellegr.

**漏斗苣苔**　　青竹标、白花大苞苣苔(中国高等植物图鉴)

**Anna ophiorrhizoides** (Hemsl.) Burtt et Davidson——*Lysionotus ophiorrhizoides* Hemsl.

生于海拔 850—1 200 米的山沟边或林下。分布于四川。

根：涩，平。止血，止咳，利湿，镇痛。用于咳血，风湿疼痛。

## 旋蒴苣苔属 Boea Comm. ex Lam.

**旋蒴苣苔** 岩巴绿(云南)

**Boea clarkeanus** Hemsl.——*Streptocarpus clarkeanus* (Hemsl.) Hilliard et Burtt

生于海拔 1 900—3 000 米的丘陵、低山岩石上或背阴山坡潮湿处。分布于陕西、安徽、浙江、湖北、四川、云南。

全草(散血草)：苦，凉。清热，止血，散血，消肿。用于外伤出血，跌打损伤。

**厚叶旋蒴苣苔** 石斑、石白菜(云南)

**Boea crassifolia** Hemsl.

生于海拔 1 900—2 200 米的山地石崖上及山坡草丛中。分布于湖北西部、四川、贵州、云南。

全草：甘，平。滋补强壮，止血，止咳。用于肝脾虚弱，劳伤吐血，内伤咯血，肺痨咳喘，带下病，无名肿毒。

**网脉旋蒴苣苔** 大还魂、山枇杷、吊气还魂(广东)

**Boea dictyoneura** Hance

生于海拔 1 000—1 460 米的山地石崖上。分布于广东、云南。

全草：辛、甘，温。活血散瘀，消肿止痛。用于跌打肿痛，骨折。

**猫耳朵** 地虎皮、还魂草(云南)，八宝茶、石花子(中国高等植物图鉴)，石胆草(滇南本草)，牛耳草、翻魂草(植物名实图考)

**Boea hygrometrica** (Bunge) R. Br.——*Dorcoceras hygrometrica* Bunge

生于海拔 300—1 250 米的丘陵或低山石崖上。分布于中南、西南及辽宁南部、河北、山西、陕西、甘肃、山东、安徽、浙江、江西、福建。

全草(牛耳草)：苦、涩，平。散瘀，止血，解毒。用于创伤出血，跌打损伤，吐泻，中耳炎，小儿疳积，食积，咳嗽痰喘。

## 短筒苣苔属 Boeica C. B. Clarke

**短筒苣苔**

**Boeica porosa** C. B. Clarke——*B. tonkinensis* (Kraenzl.) Burtt; *Oreocharis tonkinensis* Kraenzl.

生于海拔 120—1 200 米的山坡疏林阴湿处。分布于广西、云南东南部。

全草：利水通淋，凉血，止血。用于水肿，咳嗽。

## 粗筒苣苔属　Briggsia Craib

**粗筒苣苔**　　苦苣苔(四川)

**Briggsia amabilis** (Diels) Craib——*Didissandra amabilis* Diels

生于海拔 2 000—3 200 米的山地林中石上、树上或草坡上。分布于四川西南部、云南西北部。

全草：消肿散瘀，止血。

**浙皖粗筒苣苔**　　岩青菜(中国高等植物图鉴)

**Briggsia chienii** Chun

生于海拔 800—1 000 米的山谷沟边石上。分布于安徽南部、浙江西北部、江西东北部。

全草(佛肚花)：微苦，平。解表，祛风，活血，消肿毒。用于小儿惊风，感冒头痛，筋骨酸痛；外用于痈疮，无名肿毒，湿疹。

**盾叶粗筒苣苔**　　盾叶佛肚苣苔(云南种子植物名录)

**Briggsia longipes** (Hemsl.) Craib——*Didissandra longipes* Hemsl.

生于海拔 1 300—1 900 米的山坡林下或岩石上。分布于贵州南部、云南东南部。

全草：强筋壮骨，止咳，生肌，止血补虚。用于刀伤，劳伤，跌打损伤，咳嗽。

**革叶粗筒苣苔**　　小岩青菜(湖北)，岩莴苣(贵州)，锈草(中国高等植物图鉴)

**Briggsia mihieri** (Franch.) Craib——*Didissandra mihieri* Franch.; *B. fritschii* (Lévl. et Vant.) Craib

生于海拔1000米左右的山地石崖上。分布于湖北、湖南西部、广西、四川、贵州。

全草：苦，温。强筋壮骨，补虚，止咳，生肌，止血。用于刀伤，劳伤，咳嗽，跌打损伤。

**川鄂粗筒苣苔**

**Briggsia rosthornii** (Diels) Burtt——*Didissandra rosthornii* Diels

生于海拔 1 400—2 000 米的山地林下石上或石崖上。分布于湖北西部、四川、贵州。

全草：止咳润肺，也用于跌打损伤。

**鄂西粗筒苣苔**　　雅头还羊(全国中草药汇编)

**Briggsia speciosa** (Hemsl.) Craib——*Didissandra speciosa* Hemsl.

生于丘陵地带。分布于湖北西部。

全草：活血祛湿，止血生肌，止痛。用于月经不调，胃脘痛，肺热咳嗽，劳伤。

**蟾蜍草**

**Briggsia stewardii** Chun

生于山坡林下阴处。分布于广西三江。

全草：用于高血压症，中耳炎。

## 朱红苣苔属　Calcareoboea C. Y. Wu

**朱红苣苔**　　山艾(广西)

**Calcareoboea coccinea** C. Y. Wu ex H. W. Li

生于海拔1 000—1 500米的石灰岩山地常绿林下岩石上或岩缝中。分布于广西西南部、云南东南部。

全草：用于咳嗽，吐血。

附　注：我国特有属。

## 唇柱苣苔属　Chirita Buch.-Ham. ex D. Don

**短头唇柱苣苔**　　红花根(广西)

**Chirita brachystigma** W. T. Wang

生于山谷阴处。分布于广西河池。

根状茎：用于胃脘痛。

附　注：广西特有药用植物。

**牛耳朵**　　石虎耳(广东、广西)，岩青菜(广东)，岩白菜、山石兰(广西、贵州)，光白菜、猫耳朵(贵州)，中耳岩白菜(全国中草药汇编)

**Chirita eburnea** Hance——*C. fauriei* Franch.

生于海拔100—1 500米的石灰岩山地林中石上或沟边林下。分布于湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

根状茎、全草(牛耳朵)：甘，平。补虚，止咳，止血，除湿。用于阴虚咳嗽，肺痨咳血，崩漏，带下病。

附　注：功效相同的有**烟叶长蒴苣苔 C. heterotricha** Merr.，分布于广东、海南、四川。

**蚂蝗七**　　岩白菜、飞天蜈蚣(湖南)，石螃蟹(广东)，红蚂蝗七(广西)，石蜈蚣(中国高等植物图鉴)，睫萼长蒴苣苔(中药大辞典)

**Chirita fimbrisepala** Hand.-Mazz. ——*Didymocarpus fimbrisepalus* (Hand-Mazz) Hand.-Mazz

生于海拔400—1 000米的山地林中石上或石崖上、山谷溪边。分布于江西、福建、湖南、广东、广西、贵州南部。

根状茎(蚂蝗七)：苦，凉。健脾消食，清热利湿，活血止痛。用于小儿疳积，胃痛，肝炎，痢疾，肺痨咳血，刀伤出血，无名肿毒，跌打损伤。

**密毛蚂蝗七**　　石蚂蝗(广西)

**Chirita fimbrisepala** Hand.-Mazz. var. **mollis** W. T. Wang

生于海拔760—950米的山谷林中岩石上。分布于广西南部。

根状茎：用于哮喘。

附　注：广西特有药用植物。

**桂林唇柱苣苔**　　蚂蝗七、山蚂蝗(广西)

**Chirita guilinensis** W. T. Wang

生于海拔800米左右的石灰岩山地林下或阴湿处。分布于广东东北部及东部、广西西部。

根状茎、叶：用于咳嗽，跌打损伤。

**钩序唇柱苣苔**

**Chirita hamosa** R. Br.

生于海拔330—1 500米的林下岩石上、沟边或陡崖上。分布于广西西部、云南南部。

全草：用于蛇咬伤，小便不利。

**肥牛草**　　耳草长蒴苣苔、石上莲(全国中草药汇编)

**Chirita hedyotidea** (Chun) W. T. Wang——*Didymocarpus hedyotidea* Chun

生于海拔约160米处的石灰山阴处石上或陡崖上。分布于广西西南部。

全草(红接骨草)：微苦、涩，凉。凉血散瘀，消肿止痛。用于劳伤咳嗽，跌打损伤，骨折，痈疮肿肿。

附　注：广西特有药用植物

**来凤唇柱苣苔**

**Chirita laifengensis** W. T. Wang

生于海拔900米的山地岩石上。分布于湖北来凤、巴东、宣恩。

全草：用于劳伤，肺热咳嗽，跌打损伤。

附　注：湖北特有药用植物。

**线叶唇柱苣苔**　　红接骨、石上莲(广西)

**Chirita linearifolia** W. T. Wang

生于海拔100米处的石山阴处岩石上或小石洞中。分布于广西西南部。

根状茎：用于劳伤咳嗽；外用于骨折，跌打肿痛，疔疮。

附　注：广西特有药用植物。

**弄岗唇柱苣苔**

**Chirita longgangensis** W. T. Wang

生于海拔250—320米的林缘中。分布于广西。

根状茎：用于跌打损伤，风湿关节痛。

附　注：广西特有药用植物。

**红药**

**Chirita longgangensis** W. T. Wang var. **hongyao** S. Z. Huang

生于石灰山石缝中及阴湿处。分布于广西天等。

全草：温补养血。用于贫血，痢疾。

附　注：广西特有药用植物。

**药用唇柱苣苔**　　牛耳朵(广西)

**Chirita medica** D. Fang ex W. T. Wang

生于石灰山石缝中。分布于广西平乐。

根状茎：用于痢疾。

附　注：广西特有药用植物。

**条叶唇柱苣苔**　　耳羊(广西)

**Chirita ophiopogoides** D. Fang et W. T. Wang

生于海拔160米的石灰岩山地陡崖上。分布于广西扶绥、龙州。

根状茎：用于风湿痹痛，跌打损伤，骨折，劳伤咳嗽。

附　注：广西特有药用植物。

**微斑唇柱苣苔**　　上石蚂蝗(广西)

**Chirita minutimaculata** D. Fang et W. T. Wang

生于石灰山林中石上。分布于广西西南部。

根状茎：用于疮疡肿毒。

附　注：广西特有药用植物。

**小叶唇柱苣苔**　　胡连(广西)

**Chirita parvifolia** W. T. Wang

生于石山岩石上。分布于广西贵县。

根状茎：用于小儿疳积。

附　注：广西特有药用植物。

**羽裂唇柱苣苔**　　石岩菜(广西)

**Chirita pinnatifida** (Hand.-Mazz.) Burtt——*Didymocarpus pinnatifidus* Hand.-Mazz.

生于海拔600—1 500米的山谷林中石上或溪边石上。分布于浙江、江西、福建、湖南、广东、广西、贵州。

全草：用于痢疾，跌打损伤。

**斑叶唇柱苣苔**

**Chirita pumila** D. Don

生于海拔800—2 380米的山地林中、溪边石上、陡崖或土山草丛中。分布于广西西北部、贵州西南部、云南南部及西南部、西藏东南部。

全草：解表发汗，止咳止血。用于咳嗽，吐血，带下病。

**刺齿唇柱苣苔**　　山芭蕉(广西)

**Chirita spinulosa** D. Fang et W. T. Wang

生于海拔100米左右的石灰岩山地阴湿处。分布于广西扶绥。

根状茎：用于风湿痹痛，跌打损伤，骨折，劳伤咳嗽。

附　注：广西特有药用植物。

**钻萼唇柱苣苔**　　飞蛾树(湖北)

**Chirita subulatisepala** W. T. Wang

生于海拔约700米的山地岩壁阴湿处。分布于湖北西南部、四川东南部。

全草：清热解毒，活血散瘀。用于跌打损伤，月经不调，带下病。

**钟冠唇柱苣苔**　　白芨药、肥知母(广西)

**Chirita swinglei** (Merr.) W. T. Wang——*Didymocarpus swinglei* Merr.

生于山谷林中或陡崖上。分布于广东罗浮山、广西南部。

全草：用于疮疡肿毒。

**薄叶唇柱苣苔**

**Chirita tenuifolia** W. T. Wang

生于石灰岩山地。分布于广西东兰。

全草：用于跌打损伤，疮疖。

**神农架唇柱苣苔**　　小岩白菜(湖北)

**Chirita tenuituba** (W. T. Wang) W. T. Wang ——*C. shennungjiaensis* W T. Wang

生于海拔 370—1 100 米的山地岩石缝中或林下。分布于湖北西部、湖南西部、四川东南部。

全草：用于肺热咳嗽。

## 小花苣苔属　Chiritopsis W. T. Wang

**羽裂小花苣苔**　　白疔芋(广西)

**Chiritopsis bipinnatifida** W. T. Wang

生于林下阴湿处。分布于广西临桂。

全草：外用于疮疡肿毒。

附　注：①我国特有属。②广西特有药用植物。

**心叶小花苣苔**

**Chiritopsis cordifolia** D. Fang et W. T. Wang

生于石灰山石壁上。分布于广西柳江。

全草：用于跌打损伤，烫伤，疮疖。

附　注：广西特有药用植物。

**小花苣苔**　　阴山泽、水滴(广西)

**Chiritopsis repanda** W. T. Wang

生于林下沟旁的石上。分布于广西天峨、桂林、上林。

全草：用于肺痨。

附　注：广西特有药用植物。

## 苦苣苔属　Conandron Sieb. et Zucc.

**苦苣苔**　　一张白、水鳖草(中国高等植物图鉴)

**Conandron ramondioides** Sieb. et Zucc.

生于低山石崖较阴湿处。分布于江苏、安徽南部、浙江、江西、福建、台湾。

全草：苦，寒。清热解毒，消肿止痛。用于疔疮，痈肿，毒蛇咬伤，跌打损伤。

## 珊瑚苣苔属　Corallodiscus Batal.

**珊瑚苣苔**　　还魂草、岩白菜(四川、贵州)，滴滴花(全国中草药汇编)

**Corallodiscus cordatulus** (Craib) Burtt——*Didissandra cordatula* Craib

生于海拔 200—2 100 米的山地阴处石崖上。分布于河北、山西、陕西南部、甘肃南部、河南西部、湖北西部、湖南西部、四川、贵州、云南北部。

全草(虎耳还魂草)：淡，平。健脾，止血，化瘀。用于小儿疳积，跌打损伤，刀伤。

**石花**　　扁叶珊瑚盘、镇心草、石指甲(云南)，石莲花(中国高等植物图鉴)，石胆草

(中药大辞典)

**Corallodiscus flabellatus** (Craib) Burtt——*Didissandra flabellata* Craib

生于海拔1 700—3 100米的荒野岩石上或山地石坡上。分布于西南。

全草(石胆草)：苦、辛，寒。有小毒。活血，消肿，止血；生肌，止痛。用于月经不调，带下病，心悸，胃脘痛，湿热痹症，小儿疳积，外伤出血，疖肿。

**卷丝苣苔**　卷丝珊瑚苣苔(中药大辞典)，渣加哈梧(中国高等植物图鉴)

**Corallodiscus kingianus** (Craib) Burtt——*Didissandra kingianus* Craib

生于海拔3 200—4 900米的山坡石上或陡崖上。分布于西藏。

全草：甘、苦，寒。清热解毒，补肾，止血。用于泄泻，阳痿早泄，月经不调，带下病，并可解野菜、肉类及乌头中毒。

**绢毛石花**　石芮、石莲花(云南)，绢毛石胆草(云南种子植物名录)

**Corallodiscus sericeus** (Craib) Burtt——*Didissandra sericeus* Craib

生于海拔1 000—3 150米的石山上或旧瓦屋上。分布于云南。

全草：甘、苦，寒。清热解毒，补肾，止血。用于疮肿，痢疾，阳痿，早泄，月经失调，带下病。

## 漏斗苣苔属　Didissandra C. B. Clarke

**长筒漏斗苣苔**

**Didissandra macrosiphon** (Hance) W. T. Wang—— *Chirita macrosiphon* Hance

生于林中湿石上。分布于广东。

全草：外用于咽喉肿痛，疮疡肿毒。

**大叶锣**　白毛草(中国高等植物图鉴)，大一面锣(四川中药志)

**Didissandra sesquifolia** C. B. Clarke

生于海拔1 500米左右的山地林下。分布于四川。

根、全草(大一面锣)：甘、咸，平。益气，补肾，固精，化痰止咳。用于心脏衰弱，咳嗽，带下病，梦遗滑精，小便淋沥。

**无毛漏斗苣苔**　接骨草(广西)

**Didissandra sinica** (Chun) W. T. Wang——*Raphiocarpus sinicus* Chun

生于山地沟边及林下石上。分布于广西南部。

全草(岩白菜)：甘、微苦，平。养阴清热，活血止痛。用于劳伤咯血，崩漏，跌打损伤，痛经。

## 长蒴苣苔属　Didymocarpus Wall.

**温州长蒴苣苔**　长蒴苣苔(浙江)

**Didymocarpus cortusifolius** (Hance) Lévl. ——*Chirita cortusifolia* Hance

生于山地岩石上。分布于浙江东南部。

全草：清肺止咳，补虚止血。

附　注：浙江特有药用植物。

**东南长蒴苣苔**　　石茶(全国中草药汇编)

**Didymocarpus hancei** Hemsl.

生于山地林下潮湿石上。分布于江西、福建南部、湖南南部、广东北部。

全草(石茶)：苦，凉。清热解毒。用于咽喉痛。

**闽赣长蒴苣苔**

**Didymocarpus heucherifolius** Hand.-Mazz.

生于海拔1 200米左右的山坡岩石上。分布于安徽南部、浙江西部、江西、福建、广东北部。

全草：甘，凉。解毒，消肿。

**蒙自长蒴苣苔**

**Didymocarpus mengtze** W. W. Smith

生于海拔1 800—2 300米的山地林中。分布于云南南部。

根：淡，温。祛风除湿。用于风湿关节痛。

附　注：云南特有药用植物。

**绵毛长蒴苣苔**

**Didymocarpus niveolanosus** D. Fang et W. T. Wang

生于山谷阴湿处石上。分布于广西西北部。

全草：用于跌打损伤。

附　注：广西特有药用植物。

**狭冠长蒴苣苔**

**Didymocarpus stenanthos** C. B. Clarke

生于海拔 800—1 800米的山地阴处石上。分布于四川、云南东北部。

全草：祛风除湿，活血化瘀。

**沅陵长蒴苣苔**

**Didymocarpus yuanlingensis** W. T. Wang

生于山地阴处石上。分布于湖南沅陵。

全草：用于跌打损伤，外伤出血。

附　注：湖南特有药用植物。

**云南长蒴苣苔**

**Didymocarpus yunnanensis** (Franch.) W. W. Smith——*Roettlera yunnanensis* Franch.

生于海拔1 300—3 300米的背阴山坡、潮湿岩石上。分布于云南。

全草：辛，凉。宣肺止咳。用于咳嗽。

## 双片苣苔属　Didymostigma W. T. Wang

**双片苣苔**

**Didymostigma obtusum** (C. B. Clarke) W. T. Wang——*Chirita obtusa* C. B. Clarke; *Didymocarpus clarkei* Lévl.

生于山地溪边湿处。分布于福建南部、广东。

根：清热解毒，止咳。

附　注：我国特有属。

## 圆唇苣苔属　Gyrocheilos W. T. Wang

**圆唇苣苔**　蚂蝗七(广西)

**Gyrocheilos chorisepalum** W. T. Wang

生于石崖上。分布于广西大明山。

全草、叶：用于疮疖溃烂。

附　注：①我国特有属。②广西特有药用植物。

**北流圆唇苣苔**　白天葵(广西)

**Gyrocheilos chorisepalum** W. T. Wang var. **synsepalum** W. T. Wang

生于草山岩石上。分布于广西北流。

根状茎、叶：外用于头疮。

附　注：广西特有药用植物。

## 半蒴苣苔属　Hemiboea C. B. Clarke

**贵州半蒴苣苔**　水松萝(广西)

**Hemiboea cavaleriei** Lévl.

生于海拔250—1 600米的山坡林下或山谷阴湿处。分布于江西西部、福建南部、湖南南部、广东、广西、四川南部、贵州、云南东南部。

全草(半蒴苣苔)：微酸、涩，凉。清热解毒。用于跌打损伤，刀伤出血，腹水。

**疏脉半蒴苣苔**　尿泡草、尿猴草(广西)

**Hemiboea cavaleriei** Lévl. var. **paucinervis** W. T. Wang et Z. Y. Li

生于海拔260—1 600米的石灰岩山地林下。分布于广西、贵州南部、云南。

叶：外用于疱疹，湿疹。全草：功效同贵州半蒴苣苔。

**华南半蒴苣苔**　山竭(广西)

**Hemiboea follicularis** C. B. Clarke

生于海拔240—1 500米的山谷林下或潮湿的石壁上。分布于广东北部、广西、贵州。

全草：用于咳嗽，风热咳喘，骨折。

**半蒴苣苔**　山白菜、石苋菜(浙江)，尿桶草(广西)

**Hemiboea henryi** C. B. Clarke

生于海拔300—2 100米的丘陵、山地林下或沟边阴湿处。分布于陕西南部、甘肃南部、江苏南部、安徽南部、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南东部。

全草：甘，寒。清暑热，利湿，解毒。用于中暑，麻疹，咽喉痛，黄疸，烧、烫伤。

**全叶半蒴苣苔**

**Hemiboea integra** C. Y. Wu

生于海拔 120—400 米的林中沟边或岩石上。分布于云南东南部。

全草：用于子痈。

附　注：云南特有药用植物。

**龙州半蒴苣苔**

**Hemiboea lungzhouensis** W. T. Wang et Z. Y. Li

生于海拔 1 470 米左右的石山上。分布于广西西南部、云南东南部。

根、叶：用于蛇咬伤。

**蛛蛇草**　　无茎苣苔、阿格造来(贵州)

**Hemiboea subacaulis** Hand.-Mazz.

生于阴坡、路边或岩石旁。分布于湖南、广西北部、贵州东部。

全草：微苦、涩，凉。有毒。清热，祛风。用于肺痨，蛇咬伤，疮疖。

**降龙草**　　水泡菜叶(云南)，虎山叶、四台花(中国高等植物图鉴)

**Hemiboea subcapitata** C. B. Clarke

生于海拔 100—2 100 米的山谷林下或岩石上。分布于陕西南部、甘肃南部、浙江、江西、湖北、湖南、广东北部、广西、四川、贵州、云南东南部。

全草(降龙草)：微苦、涩，凉。有毒。清热解毒，利尿，止咳，生津。用于伤暑，蛇咬伤，疮疖。

**密齿降龙草**　　白四门(广西)

**Hemiboea subcapitata** C. B. Clarke var. **denticulata** W. T. Wang et Z. N. Li

栽培于广西。

全草：用于咳嗽。

## 金盏苣苔属　Isometrum Craib

**紫花金盏苣苔**

**Isometrum lancifolium** (Franch.) K. Y. Pan——*Didissandra lancifolia* Franch; *Ancylostemon lancifolius* (Franch.) Burtt

生于山地灌丛中。分布于四川西部。

全草：清热解毒，祛风除湿。

附　注：我国特有属。

## 紫花苣苔属　Loxostigma C. B. Clarke

**紫花苣苔**　　岩参(云南)

**Loxostigma griffithii** (Wight) C. B. Clarke——*Didymocarpus griffithii* Wight

生于海拔 1 150—2 900 米的山谷林中，附生于树上。分布于广西、四川西部、贵州西

部、云南。

全草：苦、微涩，平。清热解毒，消肿止痛，健脾燥湿。用于跌打损伤，骨折，消化不良，泄泻，痢疾，咳血，风湿痛，咳嗽，哮喘，疟疾，贫血，预防时行感冒及乙脑。

## 吊石苣苔属 Lysionotus D. Don

**桂黔吊石苣苔** 山接风、五加皮(广西)

**Lysionotus aeschynanthoides** W. T. Wang

生于海拔400—1 900米的山坡岩壁上、山地灌丛、溪边、密林水边岩石上，或栽培。分布于广西、贵州、云南东南部。

根皮：用于风湿关节痛。 全株：甘、苦，寒。清热解毒，润肺止咳。用于咳血，咳嗽，肺痨，风湿痛，骨折。

**蒙自吊石苣苔** 肉叶吊石苣苔(中药大辞典)，岩泽兰(贵州草药)

**Lysionotus carnosus** Hemsl.

生于海拔700—2 400米的山地林中树上或石上。分布于云南东南部。

全株：辛、微甘，平。祛风止咳，健脾消积。用于感冒，咳嗽痰喘，钩端螺旋体病，劳伤吐血，小儿疳积。

**海南吊石苣苔**

**Lysionotus hainanensis** Merr. et Chun

生于海拔620—1 200米的山谷林中树上或岩石上阴湿处。分布于海南。

全株：用于劳伤，咳嗽，哮喘，吐血。

**异叶吊石苣苔**

**Lysionotus heterophyllus** Franch.——*L. brachycarpus* Rehd.

生于海拔700—2 300米的山地石崖或树上。分布于四川、云南东北部。

全株：祛风止咳，消食健脾。

附 注：功效相同的有**川西吊石苣苔 L. wilsonii** Rehd.，分布于四川西部、云南东北部。

**小叶吊石苣苔**

**Lysionotus microphyllus** W. T. Wang

生于岩石上。分布于湖北西南部、湖南西北部。

全草：用于风湿关节痛，外伤。

**吊石苣苔** 条枝草(浙江)，石豇豆、产后茶(广西)

**Lysionotus pauciflorus** Maxim.

生于海拔300—2 000米的丘陵、山地沟谷林中、树上或阴处石崖上。分布于中南及陕西南部、甘肃南部、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南东部。

地上部分(石吊兰)：甘、苦，凉。清热利湿，祛痰止咳，活血调经。用于肺热咳嗽，吐血，痢疾，疳积，钩端螺旋体病，风湿痹痛，跌打损伤，月经不调，崩漏，带下病。

**披针叶吊石苣苔**

**Lysionotus pauciflorus** Maxim. var. **lancifolius** W. T. Wang

生于海拔 360—500 米的石上。分布于广西南部。

全株：用于疮疡肿毒。

**宽叶吊石苣苔**　岩泽兰(广西)

**Lysionotus pauciflorus** Maxim. var. **latifolius** W. T. Wang

生于海拔 400—1 500 米的山坡灌丛、山谷石上、密林中树上及潮湿悬崖上。分布于广西西部、贵州南部、云南东南部。

全株：用于骨折，产褥热，咳嗽痰喘，痈疽肿毒。

**齿叶吊石苣苔**　苏叶草、苦浆苔(云南)，青竹标(中药大辞典)，石光棍、岩参(全国中草药汇编)

**Lysionotus serratus** D. Don

生于海拔 770—3 200 米的山地石上或草坡上。分布于广西西北部、贵州西南部、云南、西藏东南部。

根(青竹标根)：涩，平。凉血，止血，止咳，利湿。用于咯血，风湿疼痛。

**翅茎吊石苣苔**　齿叶石苣苔、岩参(云南)

**Lysionotus serratus** D. Don var. **pterocaulis** C. Y. Wu——*L. australis* C. Y. Wu ex H. W. Li

生于海拔 1 000—1 200 米，附生于树干或石壁上及潮湿的森林中。分布于云南南部。

根：清热利湿，接骨。

## 马铃苣苔属　Oreocharis Benth.

**黄橙马铃苣苔**　灯笼花(云南)

**Oreocharis aurantiaca** Franch.——*Perantha forrestii* Craib

生于海拔 1 700—3 000 米的阴地石岩处、陡崖上及灌丛中。分布于云南西北部。

全草：淡、甘，凉。清热解毒，消肿止痛。用于牙痛，眼痛，烧、烫伤，水肿。

附　注：云南特有药用植物。

**长鳞马铃苣苔**　皱皮草(广西)

**Oreocharis auricula** (S. Moore) C. B. Clarke——*Didymocarpus auricula* S. Moore

生于海拔 400—1 600 米的丘陵或低山阴处石崖上。分布于江西、福建、湖北、湖南、广东、广西北部、四川东南部、贵州。

全草：淡，平。清热解毒，凉血止血。用于跌打损伤，痈疽肿痛，各种出血。

**大叶石上莲**　马铃苣苔(广东)，毛板草、毛耳草、晒不死(广西)

**Oreocharis benthamii** C. B. Clarke

生于海拔 200—400 米的石灰岩石上。分布于江西南部、广东、广西。

全草：用于咳嗽，跌打损伤，刀伤出血。

**石上莲**　网脉石上莲(广东)，白蚂蝗七(广西)

**Oreocharis benthamii** C. B. Clarke var. **reticulata** Dunn

生于低山林下岩石上。分布于福建、广东、广西。

全草：止血。用于刀伤出血。 叶：用于湿疹。

**黄花马铃苣苔** 小岩白菜(四川中药志)，黄毛岩白菜(中药大辞典)

**Oreocharis flavida** Merr.

生于海拔1 600—1 800米的山坡林下。分布于海南。

全草：甘，平。润肺益气。用于肺虚久咳。

**丽江马铃苣苔** 石苇(云南)

**Oreocharis forrestii** (Diels) Skan——*Roettlera forrestii* Diels

生于海拔2 300—3 600米的山坡林下岩石上。分布于四川西南部、云南西北部。

根：用于泄泻。 全草：苦，寒。清热解毒。用于咽喉肿痛。

**川滇马铃苣苔** 岩白菜(四川)，黄花岩白菜(云南)

**Oreocharis henryana** Oliv.

生于海拔650—2 600米的山地阴处石上。分布于甘肃南部、四川西部、云南北部。

全草(黄毛岩白菜)：淡，平。清肺止咳，平喘，止血，养心安神。用于劳伤咳嗽，哮喘，吐血。

**大花石上莲** 福建苦苣苔(福建)

**Oreocharis maximowiczii** C. B. Clarke——*O. fookienensis* Franch.

生于海拔210—280米的山坡路旁及林下岩石上。分布于江西、福建。

全草：甘，平。清肺止咳，祛瘀止血。用于咳嗽，咯血，头晕，头痛，水肿，淋巴管炎，经闭，崩漏，带下病，乳痈，跌打损伤。

**绢毛马铃苣苔**

**Oreocharis sericea** (Lévl.) Lévl.——*Didymocarpus sericeus* Lévl.

生于海拔300—1 800米的山坡、山谷、林下阴湿岩石上。分布于安徽、江西、福建、湖北西南部、湖南、广东西北部、广西北部、贵州。

全草：用于无名肿毒。

**湘桂马铃苣苔**

**Oreocharis xiangguiensis** W. T. Wang et K. Y. Pan

生于海拔800—1 400米的山坡、山谷、路旁岩石上。分布于湖南南部、广西北部。

全草：用于跌打损伤。

## 喜鹊苣苔属 Ornithoboea Parish ex C. B. Clarke

**滇桂喜鹊苣苔**

**Ornithoboea wildeana** Craib

生于海拔1 300米处的开旷山坡上。分布于广西、云南。

全草：用于附骨疽。

## 蛛毛苣苔属 Paraboea (C. B. Clarke) Ridl.

**白花蛛毛苣苔** 火艾(广西)

**Paraboea martinii** (Lévl. et Vant.) Burtt——*Didymocarpus martinii* Lévl. et Vant.

生于石山林下。分布于广西北部、贵州。

全草：用于吐血，浮肿，痢疾，阴挺，跌打损伤，骨折。

**锈色蛛毛苣苔**　回生草(广西)，锈毛旋蒴苣苔、岩枇杷、岩莴苣（中国高等植物图鉴）

**Paraboea rufescens** (Franch.) Burtt——*Boea rufescens* Franch.

生于海拔 650—2 000 米的阴湿岩石上。分布于广西西部、贵州南部、云南东南部。

全草：甘、微涩，温。止咳，解毒，镇痛，生肌，固脱。用于咳嗽，阴挺，痈疮红肿，骨折。

**宽萼蛛毛苣苔**　六百斤(广西)，门听(壮语)

**Paraboea sinensis** (Oliv.) Burtt——*Phylloboea sinensis* Oliv.; *Chlamydoboea sinensis* (Oliv.) Stapf

生于海拔 900—2 200 米的山地沟边、林中石上或陡崖上。分布于湖北西部、四川、贵州。

全草(石青菜)：苦，凉。疏风清热，止咳平喘，利湿。用于黄疸，咳嗽痰喘，痢疾；外用于瘾疹，外伤出血。

附　注：功效相同的有**大宽萼苣苔 P. sinensis** (Oliv.) Burtt f. **macra** (Stapf) C. Y. Wu，分布于云南；**大叶宽萼苣苔 P. sinensis** (Oliv.) Burtt f. **macrophylla** (Stapf) C. Y. Wu，分布于云南。

**锥序蛛毛苣苔**　牙硝(广西)

**Paraboea swinhoi** (Hance) Burtt——*Boea swinhoi* Hance

生于海拔 300—700 米的山地林下石上。分布于台湾、广西。

全株：用于带下病，大便出血，小儿疳积，骨折。

## 石山苣苔属　Petrocodon Hance

**石山苣苔**　石钟花(中国种子植物科属辞典)

**Petrocodon dealbatus** Hance——*P. longistylus* Kraenzl.

生于山谷石崖上。分布于湖北西南部、广东北部、广西、贵州。

全草：用于肺热咳嗽，吐血，肿痛，出血。

附　注：我国特有属。

## 石蝴蝶属　Petrocosmea Oliv.

**显脉石蝴蝶**

**Petrocosmea nervosa** Craib

生于海拔 1 200—1 950 米的荒野山坡上。分布于四川西南部、云南西北部。

全草：清热解毒。

**中华石蝴蝶**　石头花、石花(云南)

**Petrocosmea sinensis** Oliv.

生于海拔 1 560—2 200 米的山谷石上。分布于湖北西部、四川、贵州、云南。

全草：清热解表，健脾和胃。用于感冒，小儿疳积。

## 异裂苣苔属 Pseudochirita W. T. Wang

**异裂苣苔** 两面稠(广西)

**Pseudochirita guangxiensis** (S. Z. Huang) W. T. Wang——*Chirita guangxiensis* S. Z. Huang

生于石山山谷中。分布于广西西部。

叶：用于跌打肿痛，疮疡肿毒。

附 注：我国特有属。

## 尖舌苣苔属 Rhynchoglossum Bl.

**尖舌苣苔** 一串珍珠(广西)，大脖子药(贵州)，半边脸(云南中草药)，歪冠苦苣苔(中药大辞典)

**Rhynchoglossum obliquum** Bl.

生于海拔 1 100—2 300 米的山地林下石上及常绿阔叶林下灌丛中。分布于贵州南部、云南东南部及西南部。

根(大脖子药)：微咸，平。软坚。用于瘰瘤。 全草：微苦、辛，平。散瘀，解毒。

附 注：功效相同的有**全唇尖舌苣苔 R. obliquum** Bl. var. **hologlossum** (Hayata) W. T. Wang，分布于台湾、广西西部、四川西南部、贵州西南部、云南西部及南部。

## 线柱苣苔属 Rhynchotechum Bl.

**线柱苣苔** 横脉线柱苣苔(广东)，山枇杷、白马胎(广西)，大叶猪食(云南)，白饭公(中国高等植物图鉴)

**Rhynchotechum obovatum** (Griff.) Burtt——*Chiliandra obovatum* Griff.; *R. latifolium* Hook. f. et Thoms.

生于海拔 300—1 500 米的山谷密林中或溪边。分布于福建南部、广东、海南、广西、四川西南部、贵州南部、云南南部。

全草：清肝，解毒。用于疮疥。 叶、花：用于咳嗽，烧、烫伤。

## 黔苣苔属 Tengia Chun

**黔苣苔**

**Tengia scopulorum** Chun

生于山地石崖阴处。分布于贵州南部。

全草：解表祛风，消肿。
附　注：①我国特有属。②贵州特有药用植物。

## 台闽苣苔属　Titanotrichum Solered.

**台闽苣苔**　台地黄(中国种子植物科属辞典)
**Titanotrichum oldhamii** (Hemsl.) Solered.——*Rehmannia oldhamii* **Hemsl.**
生于山地陡崖阴处或林中。分布于福建、台湾。
全草：苦，微温。活血通瘀。用于肺痨，风湿关节痛，腰痛，跌打损伤。
附　注：我国特有属。

## 短檐苣苔属　Tremacron Craib

**短檐苣苔**
**Tremacron forrestii** Craib
生于海拔 2 400—3 200 米的山地石上或陡崖上。分布于四川西南部、云南西北部。
全草：用于跌打损伤，咳嗽。
附　注：我国特有属。

## 唇萼苣苔属　Trisepalum C. B. Clarke

**唇萼苣苔**
**Trisepalum birmanicum** (Craib) Burtt——*Boea birmanica* Craib, *Dichiloboea birmanica* (Craib) Stapf
生于海拔 1 000—1 800 米的林中阴湿处。分布于云南。
全草：凉血散瘀，消肿止痛。

## 异叶苣苔属　Whytockia W. W. Smith

**白花异叶苣苔**
**Whytockia tsiangiana** (Hand.-Mazz.) A. Weber——*Staurantbera tsiangiana* Hand.-Mazz.
生于海拔 1 300—1 500 米的山地密林中石上或山谷阴湿处。分布于湖北西南部、湖南西部、广西北部、四川南部、贵州、云南东南部。
根状茎：外用于跌打损伤。
附　注：我国特有属。

# 168. 列当科 Orobanchaceae

## 野菰属 Aeginetia L.

**野菰** 土灵芝草、烟管头草(江苏),蛇箭草(江西),蔗寄生(云南)

**Aeginetia indica** L.

生于海拔530—1 800米的林下、草地或阴湿处,寄生在禾草类植物根上。分布于中南及江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、四川、贵州、云南。

全草(野菰): 苦,凉。有小毒。解毒消肿,清热凉血。用于乳蛾,咽喉肿痛,小便淋痛,附骨疽。 花: 用于疮疖,毒蛇咬伤。

**东野菰** 野菰(浙江)

**Aeginetia orientale** L.

生于林下阴湿处。分布于浙江。

根、花: 苦,凉。清热解毒。用于乳蛾,咽喉痛,小便淋痛,小儿高热,附骨疽,疔疮,毒蛇咬伤。

**中国野菰** 箭杆七、草寄生(云南)

**Aeginetia sinensis** G. Beck

生于阴湿林下草丛中、灌丛下及沟边,常寄生于禾草类植物根上。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、贵州、云南。

全草: 云南绥江用于风湿痛。

## 草苁蓉属 Boschniakia C. A. Mey.

**草苁蓉** 苁蓉(通称),宝日-高要(蒙语),肉苁蓉(中国高等植物图鉴)

**Boschniakia rossica** (Cham. et Schlecht.) Fedtsch.——*B. glabra* C. A. Mey.

生于海拔1 500—1 800米的山坡、林下低湿处及河边,寄生于桦木科桤木属 *Alnus* Mill. 植物根上。分布于东北及内蒙古、新疆。

全草(草苁蓉): 甘、咸,温。补肾壮阳,润肠通便。用于肾虚阳痿,腰膝冷痛,肠燥便秘。

附 注: 本种在内蒙古作肉苁蓉的代用品。

## 肉苁蓉属 Cistanche Hoffmgg. et Link

**肉苁蓉** 苁蓉、大芸(内蒙古),察干-高要(蒙语)

**Cistanche deserticola** Y. C. Ma

生于海拔225—1 150米的梭梭荒漠沙丘或洪积扇冲积地上,主要寄生在藜科植物梭梭 *Haloxylon ammodendron* (C. A. Mey.) Bunge 及白梭梭 *H. persicum* Bunge ex Boiss. 的根上。分布于内蒙古、甘肃、新疆。

肉质茎(肉苁蓉)：甘、咸，温。补肾壮阳，益精血，润肠通便。用于阳痿，不孕，腰膝酸软，筋骨无力，肠燥便秘。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②国家三级保护植物。③功效相同的有**迷肉苁蓉 C. ambigua** (Bunge) G. Beck，分布于内蒙古、甘肃、新疆；**内蒙古肉苁蓉 C. mongonica** G. Beck，分布于新疆；**盐生肉苁蓉 C. salsa**(C. A. Mey.) G. Beck，分布于西北及内蒙古；**沙苁蓉 C. sinensis** G. Beck，分布于内蒙古、陕西、甘肃、宁夏、青海；**管花肉苁蓉 C. tubulosa** (Schenk) Wight，分布于新疆。

## 藨寄生属　Gleadovia Gamble et Prain

**川藨寄生**　　石腊竹(广西)

**Gleadovia lepoensis** Hu

生于林下阴湿处或灌丛中。分布于四川、广西。

全草：用于阴疳。

**藨寄生**

**Gleadovia ruborum** Gamble et Prain

生于海拔900—3 500米的林下湿处或灌丛中，寄生在蔷薇科悬钩子属 *Rubus* L. 植物根上。分布于湖南、广西、四川、云南。

全草：用于梅毒。

## 豆列当属　Mannagittaea H. Smith

**豆列当**

**Mannagettaea labiata** H. Smith

生于海拔3 600米以下的山坡灌丛及林下，寄生于豆科锦鸡儿属 *Caragana* Fabr. 植物的根部。分布于湖北、四川。

全草：用于无名肿毒，痈肿，泄泻。

## 列当属　Orobanche L.

**列当**　　独根草(东北及河北)，兔子拐棒(辽宁、吉林、河北、内蒙古、山东)，鬼见愁(天津、北京)，特莫根-素勒-乌布斯(蒙语)

**Orobanche coerulescens** Steph.——*O. ammophila* C. A. Mey.

生于海拔500—4 400米的荒地上，寄生在菊科蒿属 *Artemisia* L. 植物的根上。分布于东北、华北、西北、西南及山东、江苏、安徽、河南、湖北。

根及全草(列当)：甘，温。补肾助阳，强筋骨。用于腰膝冷痛，阳痿，遗精；外用于小儿久泻。蒙医用于炭疽。

附　注：功效相同的有**分枝列当 O. aegyptiaca** Pers.，分布于新疆；**西藏列当 O. alsatica** Kirschl.，分布于西北及西藏；**美丽列当 O. amoena** C. A. Mey.，分布

于新疆；**黑龙江列当 O. amurensis** Kom.，分布于东北及内蒙古；**梭梭大列当 O. bungeana** G. Beck，分布于新疆；**北亚列当 O. coerulescens** Steph. f. **koshinskyi** (Novopokr.) Ma，分布于宁夏贺兰山；**欧亚列当 O. cumana** Wallr.，分布于内蒙古、陕西、宁夏贺兰山、新疆；**黄花列当 O. pycnostachya** Hance，分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、新疆、山东、河南、湖北、四川。

### 黄筒花属 Phacellanthus Sieb. et Zucc.

**黄筒花**

**Phacellanthus tubiflorus** Sieb. et Zucc.

生于草丛，寄生于木本植物的根部。分布于吉林、陕西、浙江、湖北、湖南、四川。

全草：温肾，消胀，止痛。

### 丁座草属 Xylanche G. Beck

**丁座草** 千斤坠、一支腊、蒙茯苓、都拉(云南)

**Xylanche himalaica** (Hook. f. et Thoms.) G. Beck——*Boschniakia himalaica* Hook. f. et Thoms.

生于海拔2 500—4 400米的高山林下或灌丛中，常寄生于杜鹃花科杜鹃花属 *Rhododendron* L. 植物根上。分布于陕西、甘肃、青海、台湾、湖北、四川、云南、西藏。

块茎、全草(枇杷芋)：涩、微苦，温。有小毒。理气止痛，止咳化痰，消胀健胃，解毒杀虫。用于胃痛，腹胀，跌打损伤，风湿关节痛，月经不调，血吸虫病，疟腮。

## 169. 狸藻科 Lentibulariaceae

### 狸藻属 Utricularia L.

**黄花狸藻**

**Utricularia aurea** Lour.

生于海拔高达2 000米的湖泊、池塘、水塘内。分布于东北及内蒙古、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、四川、云南。

全草：外用于目赤红肿。

**挖耳草** 割鸡芒(中国高等植物图鉴)

**Utricularia bifida** L.

生于海拔600—2 500米的水田、沟边、沼泽地、湿草地上。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖南、广东、广西、云南。

全草：用于中耳炎。

## 170. 苦槛蓝科 Myoporaceae

### 苦槛蓝属 Myoporum Banks et Soland. ex Forst. f.

**苦槛蓝** 苦蓝盘(广东),叉蓝盘(中国高等植物图鉴)

**Myoporum bontioides** (Sieb. et Zucc.) A. Gray——*Pentacaelium bontioides* Sieb. et Zucc.

生于海边潮界线上。分布于浙江、福建、台湾、广东、广西。

根:用于肺痨。

## 171. 透骨草科 Phrymataceae

### 透骨草属 Phryma L.

**透骨草** 仙人一把遮、神砂一把抓、倒扣草(云南),蝇毒草、老婆子针线(中国药用植物志)

**Phryma leptostachya** L.

生于海拔1 200—2 800米的杂木林下湿润处。分布于东北、华北及陕西、江苏、福建、贵州、云南。

全草(老婆子针线):辛、微苦,凉。有小毒。清热解毒,杀虫,生肌;外用于金疮,毒疮,痈肿,疥疮,漆疮。

附 注:根用于杀蛆、蝇。

## 172. 车前科 Plantaginaceae

### 车前属 Plantago L.

**车前** 车轱辘菜(东北),猪耳草(青海),牛耳朵草(江苏),饭匙草(福建),蛤蚂草(滇南本草)

**Plantago asiatica** L.

生于山野、草地、沟谷、路旁、田埂河边等潮湿处,海拔可达3 200米。分布几遍全国。

种子(车前子):甘,微寒。清热利尿,渗湿通淋,明目,祛痰。用于水肿胀满,热淋涩痛,暑湿泄泻,目赤肿痛,痰热咳嗽。全草(车前草):甘,寒。清热利尿,祛痰,凉血,解毒。用于水肿尿少,热淋涩痛,暑湿泻痢,痰热咳嗽,吐血衄血,痈肿,疮毒。

附 注:《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**平车前** 车轱辘菜(东北),车前(北京),主根车前(山东),猪耳朵穗子(青海)

**Plantago depressa** Willd.

生于山坡草地、灌木丛、路旁、田野、河边及村庄附近,海拔可达4 500米。分布几遍全

国。

种子、全草：功效同车前。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②功效相似的有**大叶车前 P. major** L.，分布于华东、中南、西南及辽宁、陕西、新疆；**蛛丝毛车前 P. axachnoidea** Schrenk.，分布于新疆；**海滨车前 P. camtschatica** Link，分布于辽宁、山东、上海；**长柄车前 P. cornutia** Gouan.，分布于新疆；**疏花车前 P. erosa** Wall.，分布于贵州、云南、西藏；**长叶车前 P. hostifolia** Nakai et Kitag.，分布于东北及河北、内蒙古；**日本车前 P. japonica** Franch. et Sav.，分布于辽宁、内蒙古、四川；**毛车前 P. jehonlensis** Koidz.，分布于辽宁、内蒙古；**条叶车前 P. lessingii** Fisch. et Mey.，分布于西北及内蒙古；**盐生车前 P. maritima** L. var. **salsa** (Pall.) Pilger，分布于内蒙古、陕西、新疆；**亚麻车前 P. psyllium** L.，栽培于新疆；**西藏车前 P. tibetica**(Ait.) Willd.，分布于新疆、西藏；**钱贯草 P. formosana** Tateishi et Masamune，分布于台湾、广东、广西。③国外将车前子作为容积性泻药和避孕药载体及安全有效的子宫颈扩张剂。

## 173. 忍冬科 Caprifoliaceae

### 六道木属　Abelia R. Br.

**六道木**　神仙菜、神仙叶子、鸡骨头(陕西)，六条木(顺天府志)，双花六道木(中国植物志)

**Abelia biflora** Turcz.

生于海拔1 000—2 000米的阴坡、林下及灌丛中。分布于华北及辽宁、河南。

果实(六翅木)：祛风湿，消肿毒。用于风湿筋骨痛，痈毒红肿。

**糯米条**　大叶白马骨(浙江)，茶条树、山柳树(湖南)，白花树(广西富川)

**Abelia chinensis** R. Br.

生于海拔170—1 900米的山地、灌丛中、疏林中、岩缝中、溪边或空旷地上。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根：用于牙痛。枝、叶：清热解毒，凉血止血。用于跌打损伤，疖肿，小儿口腔破溃。花：用于头痛，牙痛。

**南方六道木**　太白六道木(中国树木分类学)

**Abelia dielsii** (Graebn.) Rehd.——*Linnaea dielsii* Graebn.; *A. zanderii* (Graebn.) Rehd.

生于海拔800—3 700米的落叶阔叶林中、山坡灌丛中、岩缝中及草地上。分布于西南及河北、山西、陕西、甘肃、宁夏、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖北。

果实(红丝线)：清热利湿，解毒，止痛。用于风湿痹痛。

**蓪梗花**　短枝六道木(中国高等植物图鉴)

**Abelia engleriana** (Graebn.) Rehd.——*Linnaea engleriana* Graebn.; *A. graebneriana* Rehd.

生于海拔520—1 640米的山坡林下、灌丛中、林缘或沟边。分布于西南及陕西、甘

肃、河南、广西。

果实或花(紫荆丫)：苦、涩，平。祛风湿，解热毒。用于风湿筋骨痛，痈疮红肿。 根：理气止痛，清热燥湿。用于牙痛，高热，目赤。

**二翅六道木** 空心树、假拉药藤(湖北)，紫荆桠(四川)

**Abelia macrotera** (Graebn. et Buchw.) Rehd.——*Linnaea macrotera* Graebn. et Buchw.

生于海拔950—1 500米的山坡杂木林中、灌丛中、溪边或岩缝中。分布于陕西、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

根、枝、叶：祛风湿，消肿毒。用于风湿关节痛，跌打损伤。 花、果实：祛风湿，解热毒。

**小叶六道木** 鸡壳肚花、鸡肚子、棵棵兜(四川)，福建六道木(中国高等植物图鉴)

**Abelia parvifolia** Hemsl.

生于海拔240—2 000米的疏林内、林缘、岩缝中、路边或草丛中。分布于陕西、甘肃、福建、湖北、四川、贵州、云南。

根、枝、叶：清热解毒，止血止泻。 果实(鸡肚子)：祛风除湿，消肿解毒。

## 双盾木属 Dipelta Maxim.

**双盾木** 双楯(中国树木分类学)

**Dipelta floribunda** Maxim.

生于海拔650—2 200米的杂木林中或灌丛中。分布于陕西、甘肃、湖北、湖南、广西、四川。

根：散寒解表。用于瘾疹，丹毒，湿热身痒。

附 注：我国特有属。

**云南双盾木** 云南双楯(云南)，垂枝双楯(中药大辞典)

**Dipelta yunnanensis** Franch.——*D. ventricosa* Hemsl.

生于海拔1 200—3 400米的杂木林下或山坡灌丛中。分布于陕西、甘肃、湖北、四川、贵州、云南。

根(鸡骨柴)：苦，平。散寒发汗。用于麻疹痘毒，湿热身痒。

## 鬼吹箫属 Leycesteria Wall.

**鬼吹箫** 野芦柴、梅叶竹(云南)，金鸡一把锁、云通(西藏)，来色木(植物学名词)，夜吹箫(全国中草药汇编)

**Leycesteria formosa** Wall.

生于海拔1 100—3 300米的林下、林缘、灌丛中或溪边。分布于西南。

全株：苦，凉。破血，祛风，平喘。用于风湿关节痛，月经不调，黄疸，水肿。

**狭萼鬼吹箫** 小泡桐、鬼吹哨(贵州)，鬼炮仗、水橡子、梅竹叶(云南)，叉活活(云南纳西族语)

**Leycesteria formosa** Wall. var. **stenosepala** Rehd. ——*L. formosa* Wall. var. *glandulosissima* Airy-Shaw

生于海拔 1 600—3 500 米的山坡、山谷、溪边、林下、林缘或灌丛中。分布于四川西部、云南西北部、中部至东部、西藏东南部和南部。

全株(泡掌筒): 苦,平。利湿,理气,活血,消肿。用于小便涩痛,水肿, 咳嗽痰喘,风湿关节痛,痔疮,食积腹胀,外伤出血,骨折。

## 忍冬属 Lonicera L.

**淡红忍冬** 石山金银花(广西全州),肚子银花(四川), 野金银花(云南大理),巴东忍冬(中国高等植物图鉴)

**Lonicera acuminata** Wall.——*L. henryi* Hemsl.

生于海拔 500—3 200 米的山坡、山谷的林中、林间空旷地或灌丛中。分布于西南及陕西、甘肃、安徽、浙江、江西、台湾、湖北、湖南、广东、广西。

花蕾: 甘,凉。清热解毒,通络。用于暑热感冒,咽喉痛,风热咳喘,泄泻,疮疡肿毒,丹毒。

**西南忍冬**

**Lonicera bournei** Hemsl.——*L. obscura* Hemsl.

生于海拔 780—2 000 米的山坡灌丛及林缘。分布于广西隆林、云南东部至西南部。

花蕾: 用于暑热感冒,咽喉痛,风热咳喘,泄泻,疮疡肿毒。

**长距忍冬** 距花忍冬(中国高等植物图鉴)

**Lonicera calcarata** Hemsl.

生于海拔 1 200—2 500 米的山坡密林、林缘及灌丛中。分布于广西那坡、四川西南部、贵州安龙和朗岱、西藏墨脱。

花蕾、嫩枝: 甘,凉。清热解毒,舒筋活血。用于感冒,目赤,热痢便血,肿毒。

**阿尔泰忍冬**

**Lonicera caerulea** L. var. **altaica** Pall.——*L. altaica* Pall.

生于海拔 1 500—3 500 米的落叶松林下、针叶林下或山沟灌丛中。分布于新疆阿尔泰山。

花蕾: 清热解毒。用于腹胀,血痢。

**金花忍冬** 黄花忍冬(东北木本植物图志)

**Lonicera chrysantha** Turcz.

生于海拔 250—2 000 米的沟谷、林下或灌丛中。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、青海东部、山东、江西北部、湖北、四川东部和北部。

花蕾、嫩枝、叶: 清热解毒。

附 注: 功效相同的有**蓝锭果 L. caerulea** L. var. **edulis** Turcz. ex Hemsl., 分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、青海、四川、云南。

**华南忍冬** 土银花、左转藤(广东),山银花(广东汕头、海南),土花、黄鳝花(广东云浮),土忍冬(广东、广西),大金银花、山金银花(广西)

**Lonicera confusa** (Sweet) DC.——*Nintooa confusa* Sweet

生于丘陵地的山坡、杂木林中、灌丛中、平原、旷野、路旁及河边。分布于浙江、江西、福建、湖南、广东、海南、广西。

叶(土银花叶)：甘，凉。清热解毒。用于痈疮疔毒，麻疹痘毒，痈疮痢疾。花蕾(金银花)、嫩枝：甘，寒。清热解毒。用于感冒发热，咽喉痛，泄泻，淋巴腺炎。

附　注：①为华东地区"金银花"中药材的主要品种。②《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**匍匐忍冬**

**Lonicera crassifolia** Batal.——*L. rhododendroides* Graebn.

生于海拔900—2 300米的溪沟旁、湿润的林缘岩壁或岩缝中。分布于湖北西南部、湖南西北部、四川南部和西南部、贵州西部和北部、云南麻栗坡。

花蕾、嫩枝：用于风湿关节痛。

**水忍冬**　　毛柱金银花、水银花(广西横县、都安)

**Lonicera dasystyla** Rehd.

生于海拔300米以下的水边灌丛中或旷野草丛中。分布于广东肇庆、广西。

花蕾(金银花)、嫩枝、叶：甘，寒。清热解毒。用于风热感冒，咽喉痛，风热咳喘，痢疾，疮疡肿毒，丹毒。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**锈毛忍冬**　　老虎合藤(广东从化)

**Lonicera ferruginea** Rehd.——*L. fulva* Merr.

生于海拔600—2 000米的山坡疏、密林中或灌丛中。分布于江西黎川、福建、广东从化、广西隆林和那坡、四川雷波和峨边、贵州、云南。

花蕾：清热解毒，利尿消炎。　嫩枝：舒筋活络。

**苦糖果**　　神仙豆腐、苦竹泡、驴奶果(陕西)，狗蛋子(山东烟台)，滕把树（安徽肖县)，裤裆泡(湖北)，羊尿泡(四川南川)

**Lonicera fragrantissima** Lindl. et Paxt. subsp. **standishii** (Carr.) Hsu et H. J. Wang——*L. standishii* Carr.; *L. pseudoproserantha* Pamp.

生于海拔100—2 700米的向阳山坡林中、灌丛中或溪涧旁。分布于陕西南部、甘肃南部、山东、安徽、浙江、江西、河南、湖北、湖南、四川、贵州有野生。大连、上海、杭州、武汉有栽培。

根、嫩枝、叶(破骨风)：甘，凉。祛风除湿，清热止痛。用于风湿关节痛，劳伤，疔疮。

**黄褐毛忍冬**

**Lonicera fulvotomentosa** Hsu et S. C. Cheng

生于海拔850—1 300米的山坡灌木林、林缘或疏林中。分布于广西西北部、贵州西南部、云南。

花蕾：清热解毒，消肿。用于暑热感冒，咽喉痛，风热咳喘，泄泻。

**蕊被忍冬**　　腺背忍冬(安徽)

**Lonicera gynochlamydea** Hemsl.

生于海拔1 200—3 000米的山坡、沟谷疏林中、灌丛及岩缝中。分布于陕西南部、甘

肃南部、四川、湖北西部、湖南西北部、贵州、安徽南部。

花蕾：清热解毒，止痢。用于痢疾，疟疾。

**大果忍冬**

**Lonicera hildebrandiana** Coll. et Hemsl.

生于海拔1 070—2 300米的林中、林缘湿润地、灌丛中或石缝中。分布于广西那坡、云南东南部至西南部。

根、嫩枝、叶：用于跌打损伤。

**刚毛忍冬**　刺毛忍冬、刺毛金银花(中国树木分类学)

**Lonicera hispida** Pall. ex Roem. et Schult.

生于海拔1 700—4 800米的山坡林中、林缘、灌丛中或高山草地。分布于西北及河北西部、山西、四川西部、云南西北部、西藏东部和南部。

嫩枝、叶：清热解毒，通经活络。　花蕾：清热解毒。　果实：甘、酸，寒。清肝明目，止咳平喘。

**蕊腺忍冬**　山银花(浙江、广东)，大叶金银花(江西安福)，大银花(湖南)，狗牙花(广东)，红腺忍冬(中国高等植物图鉴)

**Lonicera hypoglauca** Miq.

生于海拔200—1 500米的疏林中、灌丛中、山坡林缘或路旁。分布于浙江、安徽、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

花蕾(金银花)：甘，凉。清热解毒，疏散风热。用于风热感冒，咽喉痛，风热咳喘，泄泻，丹毒。　嫩枝：清热解毒，通络。

附　注：①花蕾在湖南、广东、广西、贵州均作"金银花"收购入药，也是广西"金银花"中药材的主要来源。②《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**净花蕊腺忍冬**

**Lonicera hypoglauca** Miq. subsp. **nudiflora** Hsu et H. J. Wang

生于海拔1 200—1 800米的灌丛中或林缘。分布于广东北部和西部、广西、贵州西南部、云南。

花蕾：甘，凉。清热解毒，疏散风热。用于风热感冒，咽喉痛，风热咳喘，泄泻，疮疡肿毒，丹毒。　嫩枝：清热解毒，通络。

**忍冬**　鸳鸯藤、茶叶花(辽宁盖平)，银藤(江苏、浙江临海)，金银藤(江西铅山、云南楚雄)，银花秧(河南)，金银花(本草纲目)

**Lonicera japonica** Thunb.

生于山坡灌丛中、疏林中、乱石堆、路旁及村旁，也常栽培。全国除黑龙江、内蒙古、青海、宁夏、新疆、西藏无自然生长外，其他省区均有分布。

茎叶(忍冬藤)：甘，凉。清热，解毒，通经活络。用于咽喉痛，时行感冒，风湿关节痛，风热咳喘，痄腮，癍疹，疔疮肿毒。花蕾(金银花)：甘，凉。清热，解毒。用于咽喉痛，时行感冒，乳蛾，乳痈，肠痈，痈疖脓肿，丹毒，外伤感染，带下病。　果实(银花子)：苦、涩，凉。清热凉血，化湿热。用于肠风，泄泻。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②脾胃虚寒及气虚疮疡脓清者忌服。

**柳叶忍冬**

**Lonicera lanceolata** Wall.

生于海拔 2 000—2 900 米的针、阔叶混交林、冷杉林或林缘灌丛中。分布于湖北西部、四川东部和西部、云南东北部至西北部和西南部、西藏东部至南部。

花蕾：清热解毒，疏散风热。用于肿毒。

**亮叶忍冬**　铁楂子(四川宝兴)，云南蕊帽忍冬(中国高等植物图鉴)

**Lonicera ligustrina** Wall. subsp. **yunnanensis** (Franch.) Hsu et H. J. Wang——*L. ligustrina* Wall. *β. yunnanensis* Franch.; *L. pileata* Oliv. f. *yunnanensis* (Franch.) Rehd.

生于海拔 1 600—3 000 米的山谷林中。分布于陕西西南部、甘肃武都及文县、四川北部和西南部、云南东北部至西北部及富宁。

花蕾：清热解毒，截疟。

**金银忍冬**　王八骨头(吉林)，金银木(山东)，狗骨头树、马尿树(云南)，鸡骨头树(全国中草药汇编)

**Lonicera maackii** (Rupr.) Maxim.——*Xylosteum maackii* Rupr.; *L. maackii* (Rupr.) Maxim. f. *podocarpa* Franch. ex Rehd.

生于海拔 1 000—2 800 米的山坡灌丛中、林缘或路旁。分布于东北、华北、华东、西南及陕西、甘肃。

根：解毒截疟。　茎叶：祛风解毒，活血祛瘀。　花：淡，平。祛风解表，消肿解毒。产地作金银花入药。

**大花忍冬**　大金银花(上海)，大花金银花(广西)

**Lonicera macrantha** (D. Don) Spreng.——*Caprifolium macranthum* D. Don

生于海拔 300—2 200 米的山谷、山坡林中及灌丛中。分布于西南及浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西。

全株：镇惊，祛风，败毒，清热。用于小儿急惊风，疮毒。　花蕾：苦，平。清热，解毒。用于咽喉痛，时行感冒，乳蛾，乳痈，风热咳嗽，泄泻，目赤红肿，肠痈，疮疖脓肿，丹毒，外伤感染，带下病。

附　注：功效相同的有**异毛忍冬 L. macrantha** (D. Don) Spreng. var. **heterotricha** Hsu et H. J. Wang，分布于浙江、江西、福建、湖南、广西、四川、贵州、云南。

**灰毡毛忍冬**　木银花(湖南、贵州)，大金银花(湖南新宁)，左转藤(江西)，大山花(广西)

**Lonicera macranthoides** Hand.-Mazz.

生于海拔 500—1 800 米的山谷溪流旁、山坡、山顶混交林中。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

花蕾：甘，凉。清热解毒，宣散风热。产地作金银花入药。

**小叶忍冬**　麻配(内蒙古)，吉吉格-那布其特-达邻-哈力苏(蒙语)

**Lonicera microphylla** Willd. ex Roem. et Schult.

生于海拔 1 100—4 050 米的干旱多石山坡、疏林下、林缘、灌丛或草地中。分布于华北、西北及西藏。

枝叶、花蕾：淡，凉。清热解毒，强心消肿，固齿。

**下江忍冬**　吉利子树(浙江天目山)，山钢盒(浙江天台)，素忍冬(黄山植物的研究)

**Lonicera modesta** Rehd.

生于海拔500—1 300米的山地杂木林下或灌丛中。分布于浙江、安徽、江西、湖北、湖南。

茎、叶、花蕾：清热解毒，活血止痛。

**越桔叶忍冬**　丘马(西藏亚东)

**Lonicera myrtillus** Hook. f. et Thoms.

生于海拔2 400—4 700米的山坡灌丛、溪边、疏林中、河谷滩地及石砾处。分布于青海玉树、四川西南部、云南西部和西北部至北部、西藏南部至东南部。

果实：辛，温。养血安神，调经活血。

**短柄忍冬**　山银花(安徽青阳)，小金银花(湖南、贵州)，狗爪花(广西全州)，贵州忍冬(中国高等植物图鉴)

**Lonicera pampaninii** Lévl.

生于海拔150—1 400米的林下、灌丛中。分布于安徽南部、浙江、江西、福建北部、湖北西南部、湖南、广东北部、广西、四川东南部、贵州、云南东南部。

花蕾：清热解毒，舒筋通络，截疟。用于鼻衄，吐血，疟疾。

**蕊帽忍冬**　白地木瓜(湖北)

**Lonicera pileata** Oliv.

生于海拔350—2 200米的山谷水边沙滩上、溪边、疏林中潮湿处或灌丛中。分布于陕西南部、湖北西部、湖南、广东北部、广西西北部、四川、贵州、云南。

花蕾：清热解毒，截疟，补肾。

**皱叶忍冬**　大山花(广西)，土银花、左转藤(云南)

**Lonicera rhytidophylla** Hand.-Mazz.——*L. reticulata* Champ.

生于海拔400—2 000米的山地灌丛或林中。分布于江西西南部、福建中部和西部、湖南南部、广东、广西东北部。

根：微苦，凉。舒筋通络。用于丹毒，疔疖。　嫩枝：用于风湿关节痛，骨痨，肺痈，水肿，乳痈。　花蕾：清热解毒，消肿。

**岩生忍冬**　西藏忍冬(中国北部植物图志)

**Lonicera rupicola** Hook. f. et Thoms.——*L. thibetica* Bur. et Franch.

生于海拔2 100—4 950米的高山灌丛、林缘、溪边、流石滩边缘、草甸或河滩草地。分布于甘肃临潭、宁夏南部、四川西部、云南西北部、西藏东部和西南部。

叶、花蕾：平，温。温胃止痛。

**红花忍冬**

**Lonicera rupicola** Hook. f. et Thoms. var. **syringantha** (Maxim.) Zabel——*L. syringantha* Maxim.; *L. syringantha* Maxim. var. *wolfii* Rehd.

生于海拔2 000—4 600米的山坡灌丛中、林缘或河漫滩。分布于甘肃西北部至南部、宁夏南部、青海东部、四川西北部至西南部、云南西北部、西藏东南部。

枝条：强心，消肿。

**毛药忍冬**　　山咪咪(河南)

**Lonicera serreana** Hand.-Mazz.——*L. hopeiensis* Chien

生于海拔800—2 800米的山坡、山谷或山顶的灌丛中或林中。分布于河北北部、山西、陕西、甘肃、宁夏、河南、四川北部。

花蕾：清热解毒，截疟。

**细毡毛忍冬**　　岩银花(四川)，细苞忍冬(拉汉种子植物名称)，吊子银花、大金银花(中国高等植物图鉴)，细绒忍冬(云南中药名录)

**Lonicera similis** Hemsl.——*L. similis* Hemsl. var. *delavayi* (Franch.) Rehd.

生于海拔550—2 200米的山谷溪旁或向阳山坡灌丛或林中。分布于陕西南部、甘肃南部、浙江、福建、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南东部至北部。

花蕾(金银花)：清热解毒，截疟。功效同金银花。　全株(大金银花)：甘，平。镇惊，祛风，败毒。用于小儿急惊风，疮毒。　叶：用于蛔虫病，寒热腹胀。

附　注：本种为西南地区"金银花"中药材的主要来源，收购以野生品为主，近年来有些地区已引种栽培。

**峨眉忍冬**

**Lonicera similis** Hemsl. var. **omeiensis** Hsu et H. J. Wang

生于海拔400—1 700米的山沟或山坡灌丛中。分布于四川东部、东北部、北部及西南部。

花蕾：功效同金银花。

附　注：①四川特有药用植物。②四川旺苍、江油作"金银花"收购入药。

**唐古特忍冬**　　裤裆花(湖北)，鬼脸刺、瓦山银花(四川)，陇塞忍冬(中国北部植物图志)

**Lonicera tangutica** Maxim.——*L. shensiensis* (Rehd.) Rehd.; *L. cylindriflora* Hand.-Mazz.

生于海拔1 600—3 900米的溪边、灌丛中或云杉、落叶松林及竹林下或混交林中。分布于陕西南部、甘肃南部、宁夏南部、青海东部、湖北西部、四川东南部及西北部、西藏东部及南部。

根及根皮：用于子痈。　枝条(去皮)：用于气喘，疮疖，痈肿。　花蕾：清热解毒，截疟。

**新疆忍冬**　　桃色忍冬(东北木本植物图志)

**Lonicera tatarica** L.

生于海拔900—1 600米的石质山坡、山沟、林缘或灌丛中。分布于新疆北部。黑龙江、辽宁有栽培。

花蕾：清热解毒，通络。

附　注：功效相同的有**小花忍冬** **L. tatarica** L. var. **micrantha** Trautv.，分布于新疆巩留及新源。

**华北忍冬**　　花蕉树(辽宁)

**Lonicera tatarinowii** Maxim.

生于海拔400—1 750米的林缘或灌丛中。分布于辽宁南部和西南部、河北西北部、

山东东部。

嫩枝、花蕾：祛风湿，通经络。

**盘叶忍冬**　贯叶忍冬(浙江)，杜银花、土银花(四川峨眉)，大金银花(贵州)，大叶银花、叶藏花(陇海沿线树产目录)

**Lonicera tragophylla** Hemsl.

生于海拔700—3 000米的林下、灌丛中或河旁岩缝中。分布于河北西南部、山西南部、陕西、甘肃、宁夏南部、安徽、浙江、河南西北部、湖北、四川、贵州北部。

花蕾及带叶嫩枝：甘，凉。清热解毒，活血止痛，通络。

**长叶毛花忍冬**　千萼忍冬(中国高等植物图鉴)

**Lonicera trichosantha** Bur. et Franch. var. **xerocalyx** (Diels) Hsu et H. J. Wang——*L. xerocalyx* Diels; *L. deflexicalyx* Batal.

生于海拔2 400—4 600米的林下、林缘、灌丛中、沟谷水旁或阳坡草地上。分布于甘肃南部、四川西部、贵州东南部、云南西北部。

花蕾、枝条：清热解毒。用于风热感冒，咽喉痛。

**毛花忍冬**

**Lonicera trichosantha** Bur. et Franch.

生于海拔2 700—4 100米的林下、林缘、灌丛或河边。分布于陕西南部、甘肃南部、四川西部、云南西北部、西藏东部。

花蕾：清热解毒，活血止痛。

**毛萼忍冬**

**Lonicera trichosepala** (Rehd.) Hsu——*L. henryi* Hemsl. var. *trichosepala* Rehd.

生于海拔400—1 500米的山坡林中或灌丛中。分布于安徽南部、浙江天目山及天台山、江西西北部、湖南南岳。

花蕾、枝条：甘，凉。清热解毒。

**华西忍冬**　裂叶忍冬(中国树木志)

**Lonicera webbiana** Wall. ex DC.——*L. tatsiensis* Franch.

生于海拔1 800—4 000米的针、阔叶混交林中、灌丛中、沟边及阳坡草地。分布于西南及山西五台山、陕西南部、甘肃南部、宁夏、青海东部、江西、湖北西部。

花蕾：清热解毒。

## 接骨木属　Sambucus L.

**血满草**　臭草、血当归(贵州)，大血草、血莽草(云南种子植物名录)，苛草、接骨木(西藏常用中草药)

**Sambucus adnata** Wall.

生于海拔1 600—3 800米的林下、沟边、灌丛中、山谷斜坡湿地及高山草地上。分布于西南及陕西、甘肃、宁夏、青海。

根及全草(血满草)：辛、甘，温。祛风，利水，散瘀，通络。用于风湿关节痛，扭伤瘀血

肿痛，水肿；外用于骨折，跌打损伤。

**接骨草**　臭根草、地马桑(陕西)，接骨丹(陕西、四川)，走马风、赶山虎(中国高等植物图鉴)，蒴藋(名医别录)，陆英(神农本草经)

**Sambucus chinensis** Lindl.——*S. hookeri* Rehd.; *S. formosana* Nakai; *S. javanica* auct. non Reinw. ex Bl.: 中药大辞典，下册，2455. 1977.

生于海拔 300—2 700 米的山坡林下、沟边或草丛中，也有栽培。分布于中南、西南及陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾。

全草或根(蒴藋)：甘、酸，温。祛风除湿，活血散瘀。用于风湿关节痛，水肿，脚气浮肿，泄泻，黄疸，咳嗽痰喘；外用于跌打损伤，骨折。　果实(蒴藋赤子)：用于手足忽生疣目。

附　注：孕妇禁服。

**西伯利亚接骨木**

**Sambucus sibirica** Nakai

生于山地森林、河谷灌丛、石质山坡及河边岩石缝中。分布于新疆富蕴及福海。

根皮及嫩枝：祛风活络，散瘀止痛。

**接骨木**　野杨树(内蒙古)，鸭脚风(广西藤县)，白马桑(陕西中草药)，木蒴藋(唐本草)，续骨草(本草纲目)

**Sambucus williamsii** Hance——*S. mandshurica* Kitag.; *S. sieboldiana* auct. non Bl.: 中药大辞典，下册，2093. 1977.

生于海拔 540—2 400 米的山坡林下、灌丛、沟边、路旁及宅边。分布于东北、华东、中南及河北、山西、陕西、甘肃、四川、贵州、云南。

茎枝(接骨木)：甘、苦，平。祛风，利湿，活血，止痛。用于风湿筋骨痛，腰痛，水肿，风疹，瘾疹，产后血晕，跌打肿痛，骨折，创伤出血。　根或根皮(接骨木根)：甘，平。用于风湿关节痛，痰饮，水肿，泄泻，黄疸，跌打损伤，烫伤。　叶(接骨木叶)：苦，凉。活血，行瘀，止痛。用于跌打骨折，风湿痹痛，筋骨疼痛。　花(接骨木花)：用于发汗，利尿。

附　注：孕妇忌服。

**毛接骨木**

**Sambucus williamsii** Hance var. **miquelii** (Nakai) Y. C. Tang——S. buergeriana Bl. var. miquelii Nakai

生于海拔 1 000—1 400 米的松林、桦木林中、林间及山坡岩缝中。分布于东北及内蒙古。

根、枝、叶(马尿烧)：甘、苦，平。活血，止痛，祛风湿，祛痰利水。用于风湿痹痛，跌打损伤，骨折。

## 毛核木属　Symphoricarpos Duham.

**毛核木**　雪莓(中国树木分类学)，雪果(中国种子植物科属辞典)

**Symphoricarpos sinensis** Rehd.

生于海拔 610—2 200 米的干旱山坡及灌丛中。分布于陕西南部、甘肃南部、湖北西部、广西、四川东部、云南北部。

全株：清热解毒。

## 莲子蕉属 Triosteum L.

**穿心莲子蕉** 五转七、大对月草、钻子七(陕西)

**Triosteum himalayanum** Wall.——*T. fargesii* Franch.

生于海拔1 800—4 600米的山坡、林缘、林下、沟边或草地上。分布于陕西、河南、湖北、四川、云南、西藏。

全株(五转七)：苦，凉。利尿消肿，调经活血。用于小便涩痛，浮肿，月经不调，劳伤疼痛。

**莲子蕉** 天王七、四大天王、鸡爪七、白果七(陕西)

**Triosteum pinnatifidum** Maxim.——*T. intermedium* Diels

生于海拔1 800—2 900米的山坡林下或沟边阴湿处。分布于河北、山西、陕西、甘肃、宁夏、青海、河南、湖北、四川。

根、果实(天王七)：苦、涩，平。祛风湿，理气活血，健脾胃，消肿镇痛，生肌。用于劳伤，风湿腰腿痛，跌打损伤，消化不良，月经不调，带下病。 叶(天王七叶)：用于刀伤。

## 荚蒾属 Viburnum L.

**桦叶荚蒾** 糯米条(陕西)，山杞子、对节子(四川)，卵叶荚蒾、红对节子、高粱花(全国中草药汇编)

**Viburnum betulifolium** Batal.

生于海拔900—3 100米的山谷林中及山坡灌丛中。分布于西南及陕西南部、甘肃南部、湖北、湖南。

根：涩，平。调经，涩精。用于月经不调，梦遗虚滑，肺热口臭，带下病。

**短序荚蒾** 短球荚蒾(拉汉种子植物名称)，球花荚蒾(植物分类学报)

**Viburnum brachybotryum** Hemsl.

生于海拔600—1 900米的林下或灌丛中。分布于江西、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

根：清热止痒，祛风除湿。用于风湿关节痛，跌打损伤。 叶：用于皮肤瘙痒。 花：用于风热咳喘。

**金佛山荚蒾** 雀儿屎树、黑桃子(四川)，金山荚迷(拉汉种子植物名称)，贵州荚蒾(植物分类学报)

**Viburnum chinshanense** Graebn.

生于海拔400—1 900米的疏林内或灌丛中。分布于陕西、甘肃、四川、贵州、云南东部。

全株：用于泄泻，痔疮出血，风湿关节痛，跌打损伤。 果实：清热解毒，破瘀通经，健脾。

**伞房荚蒾** 雷公子(广西龙胜)

**Viburnum corymbiflorum** Hsu et S. C. Hsu

生于海拔 1 000—1 800 米的山谷、山坡密林中、灌丛中或湿润处。分布于浙江南部、江西、福建北部、湖北、湖南、广东北部、广西、四川、贵州、云南东南部。

根、叶及种子：（捣烂外敷）用于痈毒。

**水红木**　斑鸠柘、灰色树（湖北），四季青、大路通（广西），山女贞、抽刀红（四川），灰包木、睡眠果、粉果叶、羊脆骨（中药大辞典）

**Viburnum cylindricum** Buch.-Ham. ex D. Don——*V. crassifolium* Rehd.; *V. coriaceum* auct. non Bl. ex D. Don: 中药大辞典，上册，885. 1977。

生于海拔 500—3 300 米的阳坡疏林或灌丛中。分布于西南及陕西、甘肃南部、湖南西部、湖北西部、广东北部、广西。

根（揉白叶根）：苦，凉。祛风活络。用于跌打损伤，风湿筋骨痛。叶（揉白叶）：苦，凉。清热解毒。用于泄泻，口腔破溃，淋证；外用于烧、烫伤，疮疡肿毒，皮肤瘙痒。花（揉白叶花）：苦，凉。润肺止咳。用于风热咳喘。

**荚蒾**　酸梅子（江苏），野花绣球（安徽），土兰条（河南），红楂梅（湖南），乌酸木（广西）

**Viburnum dilatatum** Thunb.

生于海拔 100—2 300 米的山坡、山谷林下、林缘及灌丛中。分布于中南及河北南部、陕西南部、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、四川、贵州、云南。

根（荚蒾根）：辛、涩，凉。祛瘀消肿。用于瘰疬，跌打损伤。枝、叶（荚蒾）：酸，凉。清热解毒，疏风解表。用于疔疮发热，暑热感冒；外用于过敏性皮炎。

**宜昌荚蒾**　糯米条子（陕西、湖北），苦索花（浙江），对节木（四川），野绣球（植物名实图考）

**Viburnum erosum** Thunb.——*V. ichangensis* Rehd.

生于海拔 300—2 300 米的山坡林下或灌丛中。分布于华东、中南及陕西南部、四川、贵州、云南。

茎、叶及根（对叶散花）：涩，平。祛风散寒，祛湿止痒。用于口腔破溃，风寒湿痹，脚丫湿痒。果实：补血。

**红荚蒾**　淡红荚蒾（中国高等植物图鉴）

**Viburnum erubescens** Wall.

生于海拔 1 500—3 000 米的针、阔叶混交林中。分布于西藏东南部。

根：清热解毒，凉血，止血。

**紫药红荚蒾**

**Viburnum erubescens** Wall. var. **prattii** (Graebn.) Rehd.——*V. prattii* Graebn.

生于海拔 1 400—3 500 米的山谷溪涧旁密林中或林缘。分布于陕西、甘肃、湖北、广西东北部、四川、贵州、云南北部。

根及根皮：止咳化痰，消积破瘀，止痢，止血。

**臭荚蒾**　碎米果（云南）

**Viburnum fortidum Wall.**

生于海拔 600—3 100 米的林缘灌丛中。分布于西藏南部至东南部。

根、叶、果实(冷饭果)：涩，平。清热解毒，止咳，接骨。 根、叶：用于脓肿，骨折。 果实：用于头痛，咳嗽，风热咳喘，跌打损伤，走马牙疳，癣疹。

**珍珠荚蒾** 冷饭子(贵州)，臭荚菜、糯米果、冷饭团(云南)，珍珠花(植物名实图考)

**Viburnum foetidum** Wall. var. **ceanothoides** (C. H. Wright) Hand.-Mazz.——*V. ceanothoides* C. H. Wright

生于海拔 900—2 600 米的山坡密林中或灌丛中。分布于四川西南部、贵州西部、云南东北部至西部和西南部。

根、叶：甘、微苦、微涩，平。消肿止痛，敛疮生肌，止血止泻。根：用于泄泻，痢疾，血崩，先兆流产，癣疹。 叶：用于骨折，疖肿，跌打损伤，刀伤。 果实：酸、涩，平。清热解毒，止咳，止血。用于咳嗽，风热咳喘。

**直角荚蒾** 山羊柿子、豆搭子、半牛尾藤(四川)，狭叶荚蒾(台湾植物志)

**Viburnum foetidum** Wall. var. **rectangulatum** (Graebn.) Rehd.——*V. rectangulatum* Graebn.

生于海拔 600—2 400 米的山坡中或灌丛中。分布于西南及陕西西南部、江西、台湾、湖北西部、湖南、广东北部、广西。

嫩枝、叶、果实(小五味子)：清热解毒，利湿生津，止咳，接骨。

**南方荚蒾** 酸汤泡(湖南)，酸闷木、小雷公子、猫尿果、大柴木(广西)

**Viburnum fordiae** Hance

生于低海拔至 1 300 米的溪边、疏林中、灌丛中及平原旷野。分布于安徽南部、浙江、江西、福建、湖南、广东、广西、贵州、云南东南部。

根、茎：苦，凉。祛风清热，散瘀活血。用于暑热感冒，月经不调。 根：用于肥大性脊椎炎，风湿痹痛，跌打骨折；外用于湿疹。

**聚花荚蒾** 丛花荚蒾(拉汉种子植物名称)，球花荚蒾(中国高等植物图鉴)

**Viburnum glomeratum** Maxim.

生于海拔 1 100—3 200 米的山谷林中、灌丛中或阴湿处。分布于陕西东部、甘肃南部、宁夏南部、河南西部、湖北西部、四川西北部、云南西北部。

根：祛风清热，散瘀活血。

**海南荚蒾** 油炸木、牛疫鞭(广西)

**Viburnum hainanense** Merr. et Chun

生于海拔 600—1 400 米的丛林或灌丛中。分布于广东南部、海南、广西南部。

根、叶：用于跌打损伤，风湿骨痛，蛇咬伤，泄泻，小便淋痛，蛔虫病。

**巴东荚蒾**

**Viburnum henryi** Hemsl.

生于海拔 900—2 600米的山坡密林中或湿润草坡上。分布于陕西南部、浙江、江西西部、福建北部、湖北西部、湖南、四川、贵州东南部、广西北部。

根：清热解毒。枝、叶：用于小儿鹅口疮。

**厚绒荚蒾** 猪脚杆树(云南西畴)，六股筋(云南富宁)，特异荚蒾(拉汉种子植物名称)，毛叶荚蒾(中国高等植物图鉴)

**Viburnum inopinatum** Craib

生于海拔 700—1 400 米的山坡密林中。分布于广西西南部、云南东南部至西南部。

叶：用于风湿骨痛。

**朝鲜荚蒾**

**Viburnum koreanum** Nakai

生于海拔 1 400 米左右的针叶林中或林缘。分布于吉林长白山区。

嫩枝、叶、果实：通经活络，祛风止痒。

**披针叶荚蒾**　猪母柴、六角藤(浙江)，沙罗树(江西)

**Viburnum lancifolium** Hsu

生于海拔 200—500 米的山坡疏林中、林缘或灌丛中。分布于浙江西南部、江西东部和南部、福建西北部。

根：发表散寒。也用于无名肿毒。

**淡黄荚蒾**　早禾子树、猪肚木(广西)，黄荚蒾(海南植物志)

**Viburnum lutescens** Bl.

生于海拔 180—1 000 米的山坡林中、灌丛中或河边冲积沙地上。分布于广东、海南、广西。

叶：祛瘀消肿。用于风湿关节痛。

**吕宋荚蒾**　细叶火柴树(广东)，罗盖叶、牛伴木(广西)，福州荚蒾(拉汉种子植物名录)

**Viburnum luzunicum** Rolfe

生于海拔 100—700 米的山谷溪涧旁疏林中、山坡灌丛中或路旁。分布于浙江南部、江西东南部、福建、台湾、广东、广西、云南东南部。

枝、叶：用于跌打损伤。

**绣球荚蒾**　绣球花、八仙花、紫阳花(南京)，绣球(广群芳谱)，木绣球(拉汉种子植物名称)

**Viburnum macrocephalum** Fort.

华东及河北、陕西、河南、湖北、湖南、广西、四川有栽植或有少量野生。

茎(木绣球茎)：除湿止痒。用于风湿疥癣，皮肤湿烂痒痛。

**琼花**　八仙花(花镜)，蝴蝶花(拉汉种子植物名录)，聚八仙(洪武郡志)

**Viburnum macrocephalum** Fort. f. **keteleeri** (Carr.) Rehd.——*V. ketelcerl* Carr.

生于丘陵地区、石灰岩山地林下或灌丛中，庭园也常栽植。分布于山东、江苏南部、安徽、浙江、江西西北部、河南、湖北西部、湖南、广西、贵州。

茎：除湿止痒。用于风湿疥癣，皮肤湿烂痒痛。

**黑果荚蒾**

**Viburnum melanocarpum** Hsu

生于海拔 350—1 100米的山地林中、溪旁或灌丛中。分布于江苏南部、安徽南部和西部、浙江东部和西北部、江西庐山、河南鸡公山。

果实：用于无名肿毒，外伤出血。

**蒙古荚蒾**　白暖条(内蒙古),蒙古绣球花(中国树木分类学),土连树(陇海沿线树产目录)

**Viburnum mongolicum** (Pall.) Rehd. ——*Lonicera mongolica* Pall.

生于海拔800—2 400米的疏林中、灌丛中及河滩上。分布于华北及陕西、甘肃南部、宁夏南部、青海东部。

根、叶:祛风活血。　果实:清热解毒,破瘀通经,健脾。

**显脉荚蒾**　心叶荚蒾(拉汉种子植物名称)

**Viburnum nervosum** D. Don—— *V. cordifolium* Wall. ex DC.

生于海拔 1 800—4 500 米的山顶、山坡林下、林缘、灌丛中,冷杉林下常见。分布于湖南天堂山、广西临桂、四川西部和西南部、云南东北部和西北部至西部、西藏南部至东南部。

根:涩,温。活血止痛。用于风湿麻木,筋骨疼痛,跌损瘀凝,腰胁气胀。　叶:清热解毒。用于毒疮。

**珊瑚树**　早禾树(广东),沙糖树、麻油香、枫饭树(广东),猪耳木、利桐木、鸭屎木、四季青(广西),沙糖禾(云南)

**Viburnum odoratissimum** Ker-Gawl.

生于海拔 200—1 300 米的林中、溪边或灌丛中,也常有庭园栽植。分布于江苏、浙江、江西、福建、台湾、陕西、湖北、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南。

根、树皮、叶(沙糖木):辛,凉。清热祛湿,通经活络,拔毒生肌。用于感冒,跌打损伤,骨折。

**欧洲荚蒾**

**Viburnum opulus** L.

生于海拔 1 000—1 600 米的河谷云杉林下。分布于新疆伊犁、塔城、阿尔泰。

根皮、嫩枝:苦,平。清热凉血,消肿止痛,镇咳止泻。

**鸡树条**　鸡树条子(吉林、辽宁)

**Viburnum opulus** L. var. **calvescens** (Rehd.) Hara ——*V. sargentii* Koehne var. *calvescens* Rehd.; *V. sargentii* Koehne

生于海拔 1 000—1 650 米的溪谷边疏林下或灌丛中。分布于东北及河北、山西、陕西、甘肃、山东、安徽、浙江西北部、江西、河南、湖北、四川。

嫩枝、叶:甘、苦,平。通经活络,解毒止痒,活血消肿。　根:用于腰腿关节酸痛,跌打闪挫伤。叶:用于疮疖,皮肤瘙痒,疥癣。　果实:甘、苦,平。止咳。用于咳嗽,痰喘。

**卵叶荚蒾**

**Viburnum ovatifolium** Rehd.

生于林下、林缘或灌丛中。分布于云南东南部。

根(红对节子):涩,平。调经,涩精。用于月经不调,梦遗滑精,肺热口臭,白浊,带下病。

**粉团**　粉团花(杭州),蝴蝶树(拉汉种子植物名称),雪球荚蒾(中国高等植物图鉴)

**Viburnum plicatum** Thunb.

生于海拔 1 900 米以下的山坡林缘、沟旁疏林中。湖北西部、贵州中部有野生。各地常有栽植。

根、枝条：清热解毒，健脾消积。

**蝴蝶戏珠花**　绣球花(四川)，苦酸汤(贵州)，蝴蝶树(典籍便览)，蝴蝶荚蒾(中国高等植物图鉴)

**Viburnum plicatum** Thunb. var. **tomentosum** (Thunb.) Miq.——*V. tomentosum* Thunb.; *V. plicatum* Thunb. f. *tomentosum* (Thunb.) Rehd.

生于海拔 240—1 800 米的山坡、山谷混交林内及沟谷旁灌丛中。分布于中南及陕西南部、安徽、浙江、江西、福建、台湾、四川、贵州、云南。

根或枝条(蝴蝶树)：苦、酸、辛，微温。解毒，健脾消积。用于小儿疳积。

**球核荚蒾**　水马蹄(湖北利川)，臭药(广西阳朔)，兴山绣球(中国树木分类学)

**Viburnum propinquum** Hemsl.

生于海拔 500—1 300 米的山谷林中或灌丛中。分布于陕西南部、甘肃南部、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东北部、广西北部、四川东部、贵州。

根皮、叶、全株(六股筋)：苦、涩，温。止血，消肿止痛，接骨续筋。用于风湿关节痛，骨折，跌打损伤，外伤出血。

**鳞斑荚蒾**　大青藤(云南富民)，点叶荚蒾(中国高等植物图鉴)

**Viburnum punctatum** Buch.-Ham. ex D. Don

生于海拔 700—1 900 米的密林中、林缘及溪边。分布于四川西南部、贵州清镇、云南。

根、叶：活血。用于风湿关节痛。

**皱叶荚蒾**　野枇杷、黑汉条子(湖北兴山)，山枇杷、毛羊屎树（四川），枇杷叶荚蒾(中国高等植物图鉴)

**Viburnum rhytidophyllum** Hemsl.

生于海拔 800—2 400 米的山坡林下、溪边或灌丛中。分布于陕西南部、湖北西部、四川东部及东南部、贵州。

根、枝、叶(山枇杷)：清热解毒，祛风除湿，活血止血。

**陕西荚蒾**　鸡骨头(陕西石泉)，冬兰条、土连材(河南)，土栾树(救荒本草)

**Viburnum schensianum** Maxim.

生于海拔 700—2 200米的山谷混交林、松林下及山坡灌丛中。分布于山东济南、河北内丘、山西南部、陕西南部、甘肃东南部至南部、河南、四川松潘。

果实：清热解毒，祛风消瘀。　全株：下气，消食，活血。

**常绿荚蒾**　苦柴枝、猪妈柴、冬红果、咸鱼汁树(广东)，坚荚树(云南)

**Viburnum sempervirens** K. Koch

生于海拔 100—1 800 米的山谷密林或疏林中、灌丛中、溪边或丘陵地。分布于江西南部、广东南部、海南、广西南部。

枝：消肿止痛，活血散瘀。　叶：消肿，活血。用于跌打损伤。

**茶荚蒾**　饭汤子(浙江)，跑路杆子(湖北)，水茶子(湖南永兴)，甜茶(四川)，鸡公柴(植物名实图考)

**Viburnum setigerum** Hance ——*V. bodinieri* Lévl.

生于海拔 200—1 650 米的山谷溪涧旁疏林或山坡灌丛中。分布于江苏、安徽、浙江、

江西、福建、台湾、陕西南部、湖北、湖南、广东北部、广西北部、四川、贵州、云南。

根(鸡公柴)：微苦。用于破血通经，止血，白浊，肺痈。果实：健脾。用于脾胃虚弱，纳呆。

**合轴荚蒾**　白糯米条子(湖北)

**Viburnum sympodiale** Graebn.

生于海拔 800—2 600 米的山坡林下、林缘、灌丛中或沟旁。分布于陕西南部、甘肃南部、浙江、江西、福建北部、台湾、湖北西部、湖南、广东北部、广西东北部、四川、贵州、云南。

根：清热解毒，消积。外用于疮毒。

**台东荚蒾**　雪里藏珠、四季青(广西)

**Viburnum taitoense** Hayata

生于多石灌丛中或山谷溪涧旁。分布于台湾东部、湖南南部、广西北部。

枝、叶：用于跌打损伤。

**三叶荚蒾**

**Viburnum ternatum** Rehd.

生于海拔 650—1 400 米的山谷、山坡丛林中或灌丛中。分布于湖北西南部、湖南桑植、四川东南部至西部、贵州、云南东北部。

根、叶：用于腰腿痛。

**烟管荚蒾**　羊屎子、黑汉条(湖北)，灰毛条、冷饭团(贵州)，羊屎柴(本草纲目)

**Viburnum utile** Hemsl. ——*V. bockii* Graebn.

生于海拔 500—1 800 米的山坡林缘或灌丛中。分布于陕西西南部、湖北西部至北部、四川东北部、贵州东北部。

根、全株(黑汉条)：酸、涩，平。清热利湿，祛风活络，凉血止血。用于泄泻，下血，痔疮脱肛，风湿痹痛，带下病，疮疡，风湿筋骨痛，跌打损伤。　花：用于肠痈。

## 锦带花属　Weigela Thunb.

**锦带花**　山脂麻(河北)，空枝子(山东)，锦带、海仙（植物名实图考），连萼锦带花(中国北部植物图志)

**Weigela florda** (Bunge) A. DC. ——*Calysphyrum flordum* Bunge

生于海拔 100—1 450米的杂木林下、灌丛中或岩缝中。各地有栽植。分布于东北、华北及陕西、河南、山东北部、江苏北部。

花：活血止痛。

**半边月**　鸡骨柴(浙江)，麻布柴(江西)，白马桑(湖北、四川)，水马桑(中国高等植物图鉴)

**Weigela japonica** Thunb. var. **sinica** (Rehd.) Bailey ——*Diervilla japonica* DC. var. *sinica* Rehd.

生于海拔 450—1 800 米的山坡林下、山顶灌丛和沟边。分布于浙江、安徽、江西、福建、湖北、湖南、四川、贵州。广东、海南、广西有栽植。

根：甘，平。理气健脾，滋阴补虚。用于食少气虚，消化不良，体质虚弱。　枝、叶：用

于疮疡肿毒。

## 174. 败酱科 Valerianaceae

### 甘松属 Nardostachys DC.

**甘松** 帮贝(藏语),香松(中药志),甘松香(开宝本草)

**Nardostachys chinensis** Batal.

生于海拔 3 200—5 000 米的高山草丛、灌丛、疏林下、沼泽、草甸及河漫滩。分布于西南及甘肃、青海南部。主产四川。

根状茎及根(甘松): 甘、辛,温。理气止痛,醒脾健胃。用于胸腹胀痛,胃痛呕吐, 食欲不振,消化不良,牙痛,癔病,脚气;外用适量熏烟可避秽气。

附 注:《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**匙叶甘松** 宽叶甘松(开宝本草)

**Nardostachys jatamansi** (D. Don) DC. ——*Patrinia jatamansi* D. Don; *N. grandiflora* DC.

生于海拔 2 600—5 000 米的高山灌丛、疏林下、草地及砾石地。分布于青海、四川、云南、西藏。

根状茎(甘松): 甘、辛,温。理气止痛,醒脾健胃。用于胸腹胀痛,胃痛呕吐, 食欲不振,消化不良,牙痛;外用适量熏烟可去秽气。

### 败酱属 Patrinia Juss.

**墓头回** 异叶败酱(通称),追风箭、摆子草(河北承德),箭头风(广西中药志)

**Patrinia heterophylla** Bunge

生于海拔 300—2 600 米的山地岩缝中、草丛、路边、沙质山坡或土坡、山沟灌丛或疏林下。分布于华北及辽宁、陕西、甘肃南部、宁夏南部、青海东部、安徽、浙江、河南。

根(墓头回)或全草: 苦、微酸、涩,凉。清热解毒,消肿,生肌,止血,止带,截疟,抗癌。用于子宫颈糜烂,早期宫颈癌,带下病,崩漏,疟疾,跌打损伤。

附 注: ①江苏用的墓头回为苦荬菜的干燥全草。②墓头回制剂对艾氏癌细胞在试管内有抑制及伤害作用。

**窄叶败酱** 盲菜(浙江雁荡山),苦菜(江西庐山),狭叶败酱(安徽、湖北、四川), 蜘蛛香(湖北),白升麻、大升麻、九层叶(贵州)

**Patrinia heterophylla** Bunge subsp. **angustifolia** (Hemsl.) H. J. Wang——*P. angustifolia* Hemsl.

生于山坡草丛、路旁、沟边、灌丛、林缘或林下。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖北、湖南、四川、贵州。

根(狭叶败酱): 辛,温。发表散寒,燥湿理气。用于风寒感冒,泄泻,小儿阴缩。

附 注: 湖北、安徽以带根全草作败酱的类同品入药。

**中败酱**　黄花败酱(新疆)

**Patrinia intermedia** (Vahl) Roem. et Schult.——*Fedia rupestris* (Pall.) Juss. var. *intermedia* Vahl; *F. intermedia* (Vahl) Horn.

生于海拔 1 000—3 000 米的山麓林缘、山坡草地、荒漠化草原、灌丛、干山坡、干石山坡及砾质山坡。分布于新疆阿尔泰山、伊犁及天山。

根、根状茎(败酱)：行气止痛，活血通经，止带，消痈。

**少蕊败酱**　山芥花(河北)，蚓头草(四川峨眉山)，白升麻、土花蓝(贵州)，单蕊败酱(中国高等植物图鉴)，单药败酱(全国中草药汇编)

**Patrinia monandra** C. B. Clarke

生于海拔 150—3 100 米的山坡草丛、灌丛、林下、林缘、田野溪边或路旁。分布于西南及辽宁东南部、河北、陕西、甘肃南部、山东、江苏、江西、台湾、河南、湖北、湖南。

全草：苦，平。清热解毒，消肿排脓，止血止痛。用于肠痈，泄泻，肝炎，赤眼，产后瘀血腹痛，痈肿疔疮。

**斑花败酱**　无心草(浙江德清)，马竹胥(江西安福)，细样苦荅(广西桂林)，箭头风(贵州天等)

**Patrinia punctiflora** Hsu et H. J. Wang

生于海拔 100—1 600 米的山坡草地、疏林下、山谷、路旁或溪边。分布于中南及陕西西南部、江苏、安徽、浙江、福建、四川、贵州。

根：(浸酒内服)用于跌打损伤。叶：外敷洗疮毒。全草：消肿，化瘀，排脓，利尿。用于跌打损伤。

**大斑花败酱**　萌菜(浙江天台山)

**Patrinia punctiflora** Hsu et H. J. Wang **var. robusta** Hsu et H. J. Wang

生于海拔 970—1500 米的山坡、林下阴处、路边及草丛中。分布于江苏南部、浙江、江西、广东西北部、广西东北部、西北部。

全草：消肿，化瘀，排脓，利尿。用于肠痈，跌打损伤。

**岩败酱**

**Patrinia rupestris** (Pall.) Juss.——*Valeriana rupestris* Pall.

生于海拔 200—2 500 米的山坡林缘、林下、石质山坡、岩缝、草甸、草地或路旁。分布于东北、华北。

全草(岩败酱)：苦，凉。清热解毒，活血，排脓。用于肠痈，泄泻。

附　注：①可代缬草用作镇静。②黑龙江、吉林有作败酱入药。

**糙叶败酱**　山败酱(通称)

**Patrinia rupestris** (Pall.) Juss. subsp. **scabra** (Bunge) H. J. Wang——*P. scabra* Bunge

生于海拔 250—2 340 米的草原、森林草原、石质丘陵、石缝、较干燥的阳坡草丛、墓地及荒地。分布于东北、华北及山东、陕西、甘肃南部、宁夏南部、青海、河南。

根或全草(墓头回)：苦、微酸、涩，凉。清热解毒，消肿，生肌，止血，止带，截疟，抗癌。用于子宫颈糜烂，早期宫颈癌，带下病，崩漏，疟疾，跌打损伤。

**败酱**　野黄花、野芹(黑龙江)，山芝麻(山东蒙山)，将军草、臭根子、流注(江苏)，苦

菜(江西、湖北)，黄花龙牙(植物名实图考)

**Patrinia scabiosaefolia** Fisch. ex Trev.——*P. scabiosaefolia* Fisch. var. *hispida* (Bunge) Franch.

生于海拔 50—2 900 米的山谷、山坡草地、林缘、灌丛、林下、路边或田边。全国除宁夏、青海、新疆、西藏外，其他省区均产。

根、全草：苦、辛，凉。清热利湿，解毒排脓，活血祛瘀。用于肠痈，泄泻，目赤，产后瘀血腹痛，痈肿疮疖。

**西伯利亚败酱**

**Patrinia sibirica** (L.) Juss. ——*Valeriana sibirica* L.

生于海拔 1 760 米以下的山坡林地、林缘、森林草原、砾石山坡、草地或河岸砾石滩。分布于黑龙江、内蒙古、新疆西北部和北部。

根：行气解郁，活血止带。

**秀苞败酱**

**Patrinia speciosa** Hand.-Mazz.

生于海拔 1 900—4 050 米的山坡灌丛、高山草坡、石质草坡、沙质山坡、林下。分布于云南西北部、西藏东南部。

全草：清热解毒，活血排脓。

**攀倒甑**　獐大耳(黑龙江)，苦菜(浙江、江西大余、湖北)，苦斋(福建闽西、江西遂川、四川长寿)，大升麻(贵州)

**Patrinia villosa** (Thunb.) Juss. ——*Valeriana villosa* Thunb.

生于海拔 50—2 000 米的山地林下、林缘、灌丛、山坡草地、山谷、草丛或路旁。分布于东北、华东、中南及河北、四川、贵州。

根状茎、带根全草(败酱)：苦、辛，凉。清热利湿，解毒排脓，活血祛痰。用于肝炎，目赤红肿，泄泻，肠痈，产后瘀滞腹痛，痈肿疔疮。

## 缬草属　Valeriana L.

**黑水缬草**　拔地麻(黑龙江)

**Valeriana amurensis** Smir. ex Kom.

生于山坡草甸、高山草坡、湿草地、落叶松和桦木林下、林缘或沟边。分布于黑龙江、吉林。

根及根状茎(缬草)：辛、甘，温。安神，理气，止痛。用于肾虚，失眠，癔病，癫痫，胃胀腹痛，腰腿痛，跌打损伤。

**鬓毛缬草**　通经草(云南)，细须缬草(云南中药名录)

**Valeriana barbulata** Diels

生于海拔 2 700—4 200 米的山坡、石砾堆上、潮湿草甸。分布于四川西部、云南西北部、西藏南部。

全草：活血通经。

**瑞香缬草**

**Valeriana daphniflora** Hand.-Mazz. ——*V. delavayi* Franch.

生于海拔 2 600—3 400 米的山坡草丛、山顶、山坡林中。分布于西南。

根状茎：理气，安神，止痛。

**新疆缬草**

**Valeriana fedtschenkoi** Coincy

生于海拔 2 000 米左右的山坡林下、山顶草地。分布于新疆。

根：镇静安神。

**柔垂缬草**　小蜘蛛香(湖北)，水臭草、岩边香(贵州)

**Valeriana flaccidissima** Maxim.

生于海拔 1 000—3 600 米的山坡、林缘、草地、溪边等水湿环境中。分布于陕西、台湾、湖北、四川、贵州、云南。

全草：辛、甘，平。健脾消积，理气止痛。用于消化不良，食积饱胀。

**长序缬草**　阔叶缬草(广西)，老君须(四川)，蛇头细辛、小蜘蛛香(贵州)，岩参(云南)，西南缬草(中药大辞典)

**Valeriana hardwickii** Wall.

生于海拔 1 000—3 800 米的草坡、林缘、林下、林间草地或溪边。分布于西南及江西、湖北、湖南、广东、广西。

根或全草(豆豉草)：辛、甘，温。活血调经，散瘀止痛，健脾消积。用于月经不调，痛经，经闭，脱疽，跌打肿痛，腰痛，风湿骨痛，小儿疳积，肾虚身痒。

**蜘蛛香**　大救驾(陕西、四川)，老君须(陕西)，马蹄香(广西那坡、西林)，九转香(贵州)，心叶缬草(陕西中药名录)

**Valeriana jatamansi** Jones ——*V. wallichii* DC.

生于海拔 3 000 米以下的山顶草地、林中、灌丛、山沟草地、溪边等阴湿肥沃土壤，也有栽培。分布于西南及陕西、甘肃、河南、湖北、湖南、广西。

根状茎、根或全草(蜘蛛香)：辛、微苦，温。消食健胃，理气止痛，祛风解毒。用于胃痛腹胀，消化不良，小儿疳积，泄泻，风湿关节痛，腰膝酸软。

**缬草**　拔地麻、媳妇菜(东北)，香草(河北、甘肃)，珍珠香、满山香(陕西)，大救驾、小救驾(陕西、四川)，满坡香、五里香(湖南)

**Valeriana officinalis** L. ——*V. stubendorfi* Kreyer ex Kom.

生于海拔 500—4 000米的山坡草地、林下、沟边、荒地、河谷岸边或水沟边湿草地。分布于东北、华北、西北、西南及山东、安徽、台湾、河南、湖北、湖南。

根及根状茎(小救驾)：辛、甘、苦，温。安神镇静，祛风解痉，生肌止血，止痛。用于肾虚失眠，癔病，癫痫，胃腹胀痛，腰腿痛，跌打损伤。

**宽叶缬草**　墨香、七里香(湖北)，随手香(贵州)

**Valeriana officinalis** L. var. **latifolia** Miq.

生于海拔1500米以下的山坡、林下、沟边或草丛中。分布于山东、江苏、安徽、浙江、河南、湖北、四川、贵州。

根或全草(缬草)：辛、甘，温。安神，理气，止痛。用于肾虚失眠，癔病，癫痫，胃腹胀痛，腰腿痛，跌打损伤。

**小颈草**　　知贝(藏语),香毛草、小香草(全国中草药汇编)

**Valeriana tangutica** Batal.

生于海拔1 200—3 600米的山沟、潮湿草地、阴坡草地、草甸及草丛中。分布于内蒙古、甘肃、宁夏、青海、新疆。

带根全草(香草仔):甘、微辛、苦,平。止血,止咳,止痛。用于崩漏,鼻衄,咳嗽,风湿关节痛,腰腿痛。

## 175. 川续断科　Dipsacaceae

### 川续断属　Dipsacus L.

**深紫续断**　　卢汉、陆汗(四川)

**Dipsacus atropurpureus** C. Y. Cheng et Z. T. Yin

生于沟边草丛及田野荒坡上。分布于四川南川。

根:活血消肿,续筋接骨,生肌止痛。

附　注:四川特有药用植物。

**川续断**　　续断(湖北贺县、富川),和尚头(贵州、云南),鼓锤草(云南)

**Dipsacus asperoides** C.Y. Cheng et T. M. Ai

生于海拔500—3 500米的山坡草丛、路旁、沟边或林缘。分布于西南及浙江、江西、湖北、湖南。

根:苦、辛,微温。补肝肾,强筋骨,利关节,止崩漏。用于腰膝酸痛,风湿关节痛,骨折,跌打损伤,先兆流产,崩漏,带下病,遗精,尿频。

附　注:①《中华人民共和国药典》1990年版收载。② 我国以往中药书籍中将川续断误定为 *Dipsacus asper* Wall.

**大头续断**

**Dipsacus chinensis** Batal.

生于海拔2 300—3 900米的林下、沟边或草坡。分布于青海、四川、云南、西藏。

根:强筋续骨,调血脉。果实(巨胜子):微苦。补肾活血,化瘀镇痛。用于腰痛,遗精,崩漏,金疮痈疡。

**日本续断**　　假续断(湖北),小血转(中药大辞典)

**Dipsacus japonicus** Miq.

生于山坡阴湿草丛、灌丛、河谷两岸、沟边及路旁。分布于全国各地。

根(小血转):苦、辛,微温。补肝肾,续筋骨,调血脉。用于腰背酸痛,足膝无力,崩漏,带下病,遗精,金疮,跌打损伤,痈疽疮肿。

**拉毛果**

**Dipsacus sativa** (L.) Honck.

原产于欧洲。我国浙江东部余姚、慈溪有栽培。

种子(巨胜子):微苦。补肾活血,化瘀镇痛。用于腰痛,遗精,带下病,金疮痈疡。

## 刺参属　Morina L.

**圆萼刺参**　　摩苓草(青藏高原药物图鉴)

**Morina chinensis** (Batal.) Diels ——*M. parviflora* Kar. et Kir. var. *chinensis* Batal.

生于海拔 2 800—4 000 米的高山草坡或灌丛中。分布于内蒙古西部、甘肃中部、青海南部、四川西部。

全草(华刺参)：甘、苦，温。健胃，催吐，消肿。用于胃痛;外用于疮痈肿痛。　果实：用于关节疼痛，小便失禁，腰痛，眩晕。

**青海刺参**　　小花刺参(中国高等植物图鉴)

**Morina kokonorica** Hao

生于海拔 3 000—4 900 米的砂质石山坡、山谷草地、河滩或路旁。分布于甘肃、青海南部、四川西北部、西藏东部及中部。

全草：甘、微苦，温。健胃，催吐，消肿。用于胃痛;外用于疮痈肿痛。

**刺续断**　　刺参(中国高等植物图鉴)，细叶刺参(西藏常用中草药)

**Morina nepalensis** D. Don ——*M. betonicoides* Benth.

生于海拔 3 000—4 500 米的山坡草地、草甸、灌丛、林缘及混交林下。分布于四川西部、云南西北部、西藏东部及中部。

根(刺参)：补肝益肾，填精续骨。　全草(刺摩苓草)：甘、微苦，温。健胃，催吐，消肿。用于胃痛;外用于疮痈肿痛，化脓性创伤。

**白花刺参**

**Morina nepalensis** D. Don var. **alba** (Hand.-Mazz.) Y. C. Tang——*M. alba* Hand.-Mazz.

生于海拔 3 000—4 200 米的草甸、山坡、草坡、灌丛或林下。分布于甘肃东南部、青海南部、四川中部及西部、云南西部及北部、西藏东部及中部。

全草：甘、微苦，温。健胃，催吐，消肿。用于胃痛;外用于疮痈肿痛。

**大花刺参**

**Morina nepalensis** D. Don var. **delavayi** (Franch.) C. H. Hsing——*M. delavayi* Franch.; *M. bulleyana* Forr. et Diels

生于海拔 2 600—4 200 米的山坡草甸及灌丛中。　分布于四川西南部、云南西北部。

根(刺参)：甘、微苦，温。补气血，接筋骨。用于神经官能症，贫血，肺虚咳嗽，消化不良，带下病，阴挺;外用于跌打损伤。

## 翼首花属　Pterocephalus Adans.

**裂叶翼首花**　　棒子头、狮子草(全国中草药汇编)

**Pterocephalus bretschneideri** (Batal.) Pritz.——*Scabiosa bretschneideri* Batal.

生于海拔1 600—3 400米的山地岩石缝中、林下、灌丛中或草坡上。分布于四川西南和西南部、云南西北部和北部、西藏郎县。

带根全草(岩七)：祛风除湿，活血祛瘀，止痛。

附　注：身体虚弱者和孕妇忌服。

**匙叶翼首花**　翼首花(西藏)，邦子毒乌(藏语)

**Pterocephalus hookeri** (C. B. Clarke) Hoeck. ——*Scabiosa hookeri* C. B. Clarke

生于海拔1 800—4 800米的山坡草地、高山草甸、林缘、田边、路旁或石缝中。分布于甘肃、青海南部、四川西部和北部、云南西北部、西藏东部。

带根全草(翼首草)：苦，凉。有小毒。清热解表，清心凉血，祛风湿，止痛。用于感冒及各种温热病引起的发烧，心中烦热，咳血，吐血，便血，尿血。

## 蓝盆花属　Scabiosa L.

**窄叶蓝盆花**　细叶山萝卜(东北植物检索表)

**Scabiosa comosa** Fisch. ex Roem. et Schult.

生于海拔500—1 600米的干燥砂质地、砂质干山坡、草原、林缘或草地上。分布于东北及河北北部、内蒙古、宁夏。

花：甘、微苦，凉。清热泻火。用于肝火头痛，发热，肺热咳嗽，黄疸。

**高山蓝盆花**

**Scabiosa lapestris** Kar. et Kir.

生于海拔3 000米左右的高山草地及草丛中。分布于新疆昭苏及霍城。

根：用于风寒咳嗽，降血压。

附　注：功效相同的有**黄盆花 S. ochroleuca** L.，分布于新疆昭苏及布尔津。

**华北蓝盆花**　山萝卜(通称)

**Scabiosa tschiliensis** Grun.

生于海拔300—1 500米的山坡草地、荒坡、草甸、沙质山坡、草地、林缘及灌丛中。分布于东北、华北及陕西、甘肃东部、宁夏固原。

根、花：甘、微苦，凉。清热泻火。用于肝火头痛，发烧，肺热咳嗽。

**大花蓝盆花**

**Scabiosa tschiliensis** Grun. var. **supera** (Grun.) S. Y. He——*S. supera* Grun.

生于海拔1 600—3 200米的高山草甸、山顶、山坡或路旁。分布于河北北部、山西五台山。

花：清热泻火。

## 双参属　Triplostegia Wall. ex DC.

**双参**　西南囊苞花(四川)，都拉参、都拉(四川中药志)，对对参、双参、萝卜参、土贼酱(昆明民间常用草药)

**Triplostegia glandulifera** Wall. ex DC.

生于海拔 1 500—4 000 米的林下、溪旁、山坡、草地、草甸、林缘、路旁或草丛中。分布于西南及陕西南部、甘肃南部、台湾玉山、湖北西部。

根(双参): 甘、微苦,平。有毒。健脾益肾,活血调经,止崩漏,解毒,止血。用于肾虚腰痛,贫血,虚劳咳,遗精,阳痿,带下病。 全草: 补气壮阳,养心止血。

**大花双参** 青羊参、大花囊苞花(中国植物志),合合参(云南中草药选编),萝卜参、童子参、羊蹄参、山苦参、子母参(云南中草药)

**Triplostegia grandiflora** Gagnep.

生于海拔 2 000—3 100 米的山谷林下、林缘、山坡、草坡及草丛中。分布于四川、云南。

根(双参): 甘、苦,平。益肾补气,活血固精。用于肾虚腰痛,遗精,阳痿,带下病。

## 176. 桔梗科 Campanulaceae

### 沙参属 Adenophora Fisch.

**二型叶沙参** 奥奥温达-哄呼-其其格(蒙古语)

**Adenophora biformifolia** Y. Z. Zhao

生于山地沟谷、林下、林缘、草甸及水沟边。分布于河北、内蒙古、宁夏。

根: 养阴清肺,祛痰止咳。

附 注: 功效相同的有**天蓝沙参 A. coelestis** Diels, 分布于四川西南部、云南; **狭长花沙参 A. elata** Nannf., 分布于华北; **多歧沙参 A. wawreana** Zahlbr., 分布于华北及辽宁西南部、河南嵩山。

**丝裂沙参** 泡参(湖北、贵州),线齿沙参(四川),毛鸡脚(贵州),龙胆草 (中国植物志)

**Adenophora capillaris** Hemsl. ——*A. longisepala* Tsoong

生于海拔 1 400—2 800 米的山坡草地、路旁、林下、林缘或灌丛中。分布于陕西南部、河南、湖北西部、四川西部、贵州纳雍和毕节。

根: 甘、微苦,凉。养阴清肺,祛痰止咳。用于咳嗽痰喘。

附 注: 四川巴东作桔梗用。

**细萼沙参** 壶花沙参(云南热带亚热带植物区系研究报告)

**Adenophora capillaris** Hemsl. subsp. **leptosepala** (Diels) Hong ——*A. leptosepala* Diels; *A. urceolata* C. Y. Wu

生于海拔 2 000—3 600 米的林下、林缘、草地及草丛中。分布于四川木里、贵州、云南西部。

根: 养阴清肺,祛痰止咳。用于顿咳,痰喘。

**展枝沙参** 萨日伯格日-哄呼-其其格(蒙古语)

**Adenophora divaricata** Franch. et Sav.

生于海拔 500—1 600 米的林下、灌丛中或草地上。分布于东北及河北易县以北地区、

山西五台山、山东昆嵛山。

根：清肺化痰，止咳。

**狭叶沙参**　　柳叶沙参、厚叶沙参(中国植物志)

**Adenophora gmelinii** (Spreng.) Fisch. ——*Campanula gmelinii* Spreng.

生于海拔 2 600 米以下的山坡草地或灌丛下。分布于东北、华北。

根：清热养阴，润肺止咳，祛痰。

**喜马拉雅沙参**

**Adenophora himalayana** Feer

生于海拔 1 200—4 700 米的林下、草地、灌丛下、山坡或林缘。分布于甘肃、青海、新疆、四川西部、西藏东部。

根：清肺养阴，生津止渴，化痰。

**高山沙参**

**Adenophora himalayana** Feer subsp. **alpina** (Nannf.) Hong ——*A. alpina* Nannf.; *A. tsinlingensis* Pax et Hoffm.

生于海拔 2 500—4 200 米的草地、荒坡、沟边或林缘。分布于陕西南部、甘肃东南部、四川西北部。

根：甘、微苦，凉。清热养阴，祛痰止咳。

**鄂西沙参**

**Adenophora hubeiensis** Hong

生于海拔 1 900—2 600 米的山坡草地、灌丛中或林中岩石上。分布于湖北神农架。

根：清热养阴，润肺止咳。

附　注：湖北特有药用植物，当地作沙参用。

**杏叶沙参**　　宽裂沙参(中国高等植物图鉴)

**Adenophora hunanensis** Nannf.

生于海拔 2 000 米以下的山坡、丘陵荒地、沟边、草丛、林缘或灌丛中。分布于中南及河北南部、山西南部、陕西铜川以南地区、江西西部、四川东北部、贵州凯里。

根：清热养阴，润肺止咳，生津，祛痰。

**华东杏叶沙参**

**Adenophora hunanensis** Nannf. subsp. **huadungensis** Hong

生于海拔 1 900 米以下的山坡草地、林缘、路旁或林下草丛中。分布于江苏溧阳及南京、安徽黄山及九华山、浙江龙泉及天目山、江西东部、福建西部。

根：甘，凉。养阴生津，祛痰止咳。用于阴虚，肺热，痰粘，舌干口渴。

**甘孜沙参**　　保科参(云南丽江)，阿墩沙参、小钟沙参(中国植物志)

**Adenophora jasionifolia** Franch.

生于海拔 3 000—4 700 米的草地或林缘草丛中。分布于四川西南部、云南西北部、西藏东部。

根：养阴生津，润肺止咳。

附　注：云南丽江地区作沙参用。

**云南沙参**　　泡参(云南)，玫花沙参、重齿沙参、变白沙参、两型沙参、丽江沙参、雪花

沙参(中国植物志)

**Adenophora khasiana** (Hook. f. et Thoms.) Coll. et Hemsl.——*Campanula khasiana* Hook. f. et Thoms.; *A. bulleyana* Diels; *A. diplodonta* Diels

生于海拔 1 000—3 000 米的杂木林、灌丛或草丛中。分布于西南。

根：甘、微苦，凉。养阴生津，润肺止咳。用于贫血，咽喉痛，虚劳咳嗽。

**新疆沙参**

**Adenophora liliifolia** (L.) Bess. ——*Campanula liliifolia* L.

生于山坡草丛、林中或灌丛中。分布于新疆阿克苏及托里。

根：养阴清肺，生津止血。

附　注：我国分布新纪录。

**川藏沙参**　　陆维多杰咸巴(藏语)

**Adenophora liliifolioides** Pax et Hoffm.——*A. gracilis* Nannf.

生于海拔 1 950—4 600 米的山地林缘、灌丛、草丛、路边及乱石中。分布于甘肃东南部、青海西南部、四川西北部、西藏东北部。

根：甘、微苦，凉。清热养阴，止咳祛痰。用于肺热燥咳，虚劳咳嗽，咽喉痛。

**细叶沙参**　　宝日-哄呼-其其格(蒙语)

**Adenophora paniculata** Nannf.

生于海拔 1 100—2 800 米的山坡草地、沟边草丛或山坡上。分布于华北及陕西南部、甘肃东南部、宁夏南部、山东泰山、河南西南部、湖北西部、四川。

根(蓝花沙参)：清热养阴，祛痰止咳。

附　注：湖北、四川也作沙参用。湖北民间误将本种作桔梗用。

**长白沙参**　　额鲁存奈-哄呼-其其格(蒙语)，阔叶沙参(中药大辞典)

**Adenophora pereskiifolia** (Fisch. ex Roem. et Schult.) G. Don——*Campanula pereskiifolia* Fisch. ex Roem. et Schult.

生于海拔 1 000 米以下的林缘、林下、草地或草甸中。分布于东北及内蒙古。

根：甘、微苦，凉。清热养阴，祛痰止咳。用于肺热燥咳，虚劳久咳，咽喉痛。

**石沙参**　　哈丹-好恩好-其其格(蒙语)，糙萼沙参(中药大辞典)

**Adenophora polyantha** Nakai ——*A. scabridula* Nannf.

生于海拔 2 000 米以下的山坡、路旁、灌丛、草丛或阳坡开旷草地。分布于华北及辽宁、陕西、甘肃、宁夏、山东、江苏、安徽、河南、湖北。

根：甘、微苦，凉。清热养阴，祛痰止咳。用于肺热燥咳，虚劳久咳，咽喉痛。

**泡沙参**　　灯笼花、泡参(中国植物志)，灯花草、奶腥菜花、鸡把腿、山沙参(四川中药志)

**Adenophora potaninii** Korsh.

生于海拔 1 250—3 100 米的山坡草地、田边、疏林下、灌丛、林缘或草甸。分布于山西西南部、陕西北部和西部、甘肃东南部、宁夏南部、青海东部、四川西北部。

根：甘，凉。清热养阴，润肺止咳，祛痰。用于肺虚久咳，咳嗽痰喘。

**薄叶荠苨**

**Adenophora remotiflora** (Sieb. et Zucc.) Miq.—— *Campanula remotiflora*

Sieb. et Zucc.

生于海拔 1 700 米以下的山坡草丛、林缘、林下或草地中。分布于东北。

根(荠苨): 甘,凉。清热,解毒,化痰。用于疮毒,咽喉痛,消渴,咳嗽。 **幼苗:** 用于痰壅,咳嗽。

**多毛沙参**

**Adenophora rupincola** Hemsl. ——*A. pubescens* Hemsl.

生于海拔 1 500 米以下的山沟或山坡草丛中。分布于江西庐山、湖北西部。

根: 清热养阴,祛痰止咳。

附 注: 功效相同的有**中华沙参 A. sinensis** A. DC., 分布于安徽祁门、江西东部、福建建宁、湖南湘英山、广东北部; **湖北沙参 A. longipedicellata** Hong, 分布于湖北西部、四川、贵州习水;**宁夏沙参 A. ningxianensis** Hong, 分布于内蒙古伊克昭盟千里山、甘肃兰州、宁夏贺兰山;**沼沙参 A. palustris** Kom., 分布于吉林东部、辽宁东部; **秦岭沙参 A.petiolata** Pax et Hoffm., 分布于山西南部、陕西南部、甘肃东部、河南西南部;**扫帚沙参 A. stenophylla** Hemsl., 分布于黑龙江、吉林、内蒙古、山西。

**长柱沙参** 乌日图-套古日朝格图-哄呼-其其格(蒙语)

**Adenophora stenanthina** (Ledeb.) Kitag.——*Campanula stenanthina* Ledeb.

生于海拔 3 400米以下的山坡草丛、林缘、沙石地带、沟边、砂地、砂丘、草滩、草地或农田边。分布于华北及陕西、甘肃、宁夏。

根(泡参): 甘、苦,凉。清热养阴,利肺止咳,生津。

**沙参** 风箱灵子、钻天老、苦桑头、龙须沙参、沙獭子(江苏),白沙参(湖南),杏叶沙参(本草纲目)

**Adenophora stricta** Miq. ——*A. axilliflora* Borb ; *A. sinensis* A. DC. var. *pilosa* A. DC.; *A. rotundifolia* Lévl.; *A. argyi* Lévl.

生于低山草丛中或岩石缝中。分布于江苏、浙江、江西、湖南。

根(南沙参): 甘、微苦,凉。清热养阴,润肺止咳。用于咳嗽痰喘,咯痰黄稠, 也可用于头痛,带下病。

附 注:《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**昆明沙参** 罗兰参(云南)

**Adenophora stricta** Miq. subsp. **confusa** (Nannf.) Hong——*A. confusa* Nannf.

生于海拔 2 000—3 800 米的山坡草丛中或林中。分布于云南。

根: 补中益气,滋养生津,止血。用于咳嗽咯血。

附 注: 云南特有药用植物。

**无柄沙参** 泡参(陕西镇坪)

**Adenophora stricta** Miq. subsp. **sessilifolia** Hong

生于海拔 600—2 100 米的山坡草地、林缘或疏林下。分布于陕西、甘肃、河南、湖北、湖南、广西、四川、云南。

根: 甘,凉。养阴清肺,化痰,益气。用于肺热咳嗽,口燥咽干,干咳痰粘,气阴不足。

**轮叶沙参** 铃儿草、羊婆奶、桔参(黑龙江),四叶沙参(安徽),塔拉音-哄呼-其其格

(蒙语)

**Adenophora tetraphylla** (Thunb.) Fisch. ——*Campanula tetraphylla* Thunb.; *A. verticillata* Fisch.

生于草地、灌丛、林缘及丘陵。分布于东北、华北、华东、中南及四川、贵州、云南东南部。

根(南沙参): 甘、微苦,凉。清热养阴,润肺止咳。用于肺热咳嗽,咯痰黄稠。

附　注: ①轮叶沙参不宜与藜芦同用。②《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**荠苨**　梅参(浙江),杏参(本草图经),杏叶沙参、白面根(救荒本草),甜桔梗(本草纲目),心叶沙参、杏叶菜、老母鸡肉(中国植物志)

**Adenophora trachelioides** Maxim.

生于山坡、草丛、林缘、林下或灌丛中。分布于华北及黑龙江、辽宁、山东、江苏北部、浙江天目山、安徽黄山、湖北东南部。

根(甜桔梗): 甘,凉。清热解毒,化痰。用于肺热咳嗽,咽喉痛,消渴,疔疮肿毒。

**聚叶沙参**　妇奶参(湖北)

**Adenophora wilsonii** Nannf.

生于海拔1 600米以下的山坡、灌丛中或沟边岩石上。分布于陕西南郑、湖北西部、四川天全、剑阁、城口、贵州仁怀。

根: 补虚,下乳。

## 牧根草属　Asyneuma Griseb. et Schenk

**球果牧根草**　止咳草、咳嗽草、土沙参(广西),鸡肉参、喉节草(云南)

**Asyneuma chinensis** Hong

生于海拔3 000米以下的山谷、山坡草地、林缘或灌丛中。分布于湖北、广西、四川、贵州、云南。

根: 养阴清肺,清虚火,止咳。用于咳嗽,小儿疳积。

## 风铃草属　Campanula L.

**灰毛风铃草**　着色风铃草(云南)

**Campanula cana** Wall.——*C. aprica* Nannf.

生于海拔1 600—2 400米的山野及疏林下。分布于四川西部、云南北部、西藏。

根: 养血除风。

**西南风铃草**　蓝花石参、鸡肉参(四川、云南),小石参、土桔梗(四川),山鹅儿肠、土人参(贵州),土沙参、岩兰花(中国植物志)

**Campanula colorata** Wall.——*C. microcarpa* C. Y. Wu

生于海拔1 000—4 000米的山坡草地和疏林下。分布于西南。

根(岩兰花): 甘,温。祛风,利湿,养血。用于风湿关节痛,肺痨咯血。

**流石风铃草**　补肺参(云南丽江)

**Campanula crenulata** Franch.

生于海拔 2 600—4 200 米的石上、石缝中及草地上。分布于四川木里、云南维西、中甸、丽江、鹤庆。

根：用于肺痈，咳嗽痰喘，食欲不振，泄泻，崩漏。

**北疆风铃草**

**Campanula glomerata** L.

生于海拔 1 300—2 600 米的山谷草地、草原、亚高山草甸或林缘。分布于新疆天山及以北地区。

全草：清热解毒，止痛。用于咽喉痛，头痛。

**聚花风铃草**

**Campanula glomerata** L. subsp. **cephalotus** (Nakai)Hong——*C. cephalotus* Nakai

生于山坡、林缘、草地或灌丛中。分布于东北及山西、内蒙古东北部。

全草：苦，寒。清热解毒，止痛。用于咽喉肿痛，声音嘶哑，头痛。

**紫斑风铃草**　独叶灵(黑龙江)，灯笼花、吊钟花(中国植物志)

**Campanula punctata** Lam.

生于海拔 1 000—2 800 米的山坡、山地林中、灌丛、草地及路旁。分布于东北、华北及陕西中部、甘肃东部、河南西部、湖北西部、四川东北部。

根：清热解毒，祛风除湿，止痛，平喘。　全草：用于咽喉痛，头痛，难产。

## 金钱豹属 Campanumoea Bl.

**大花金钱豹**　蔓人参、蔓桔梗、土人参(广东)，土党参(广东、广西、云南)，奶参(广东、四川)，棱子党参、古灯茶根、古东根(云南思茅)，算盘果、野党参果(中国植物志)

**Campanumoea javanica** Bl.

生于海拔 700—2 800 米以下的林缘、灌丛及疏林中。分布于广东、广西、四川、贵州、云南。

根：甘，平。清热，镇静，健脾补气，祛痰止咳。用于气虚乏力，泄泻，肺虚咳嗽，肾虚，小儿疳积，乳汁稀少。

**金钱豹**　土党参(浙江、江西、福建、湖北、广西)，藤参(广西藤县)，奶参(福建、四川)，浮萍参、浮瓶子、香浮萍(四川)，奶浆根(贵州)

**Campanumoea javanica** Bl. subsp. **japonica** (Makino) Hong——*C. javanica* Bl. var. *japonica* Makino

生于山地草坡、丛林中及山谷林下。分布于陕西、甘肃、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根(土党参)：甘、微苦，平。补中益气，润肺生津，祛痰止咳。用于肾虚泄泻，肺虚咳嗽，小儿疳积，乳汁稀少。

**长叶轮钟草**　皮罗盖(广西富川)，蜘蛛果、土党参、山荸荠(贵州)，肉英盘(中国植物志)，红果参(贵州草药)

**Campanumoea lancifolia** (Roxb.) Merr.——*Campanula lancifolia* Roxb.

生于海拔 300—1 800 米的林中、沟边、草坡、灌丛、林缘及草地中。 分布于福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根(蜘蛛果): 甘、微苦,平。益气,补虚,祛痰,止痛。用于气虚乏力,跌打损伤,肠绞痛。

## 党参属 Codonopsis Wall.

**二色党参**

**Codonopsis bicolor** Nannf.

生于海拔 3 100—4 200 米的林缘草地、山坡或高山灌丛中。分布于甘肃南部、青海南部、四川西部和北部、云南西北部、西藏东部。

根: 补气,益血,生津。功效同党参。

附 注: 功效相同的有**管钟党参 C. bulleyana** Forrest ex Diels, 分布于四川西南部、云南东北部至西北部、西藏东南部;**灰毛党参 C. canescens** Nannf., 分布于青海南部、四川西部、贵州平坝、西藏东部。

**光叶党参** 小人参(贵州梵净山),臭参、高山党参(云南),大头党参(全国中草药汇编)

**Codonopsis cardiophylla** Diels

生于海拔 2 000—2 900 米的山坡草地、林下、灌丛中或石崖上。分布于山西南部、陕西南部、湖北西部、四川、贵州。

根(小人参): 甘,温。补虚弱。用于病后体虚,自汗,盗汗。

**新疆党参**

**Codonopsis clematidea** (Schrenk) C. B. Clarke——*Wahlenbergia clematidea* Schrenk

生于海拔 1 700—2 500 米的山地林中、草地、河谷或山溪附近。分布于新疆、西藏西部。

根: 甘,平。补中益气,生津,健脾。用于脾胃虚弱,气血两亏,体倦无力,食少,口渴,泄泻,脱肛。

**鸡蛋参** 白地瓜(贵州),金线吊葫芦(贵州、云南),补血草、牛尾参(云南中草药),金线壶芦(植物名实图考)

**Codonopsis convolvulacea** Kurz

生于海拔 300—3 000 米的山坡草地、草坡、灌丛中或缠绕于灌木上。 分布于西南。

根: 甘、苦,微温。润肺止咳,补气生津,祛瘀止痛。用于气虚自汗, 肠绞痛, 肺痈咳嗽,疝气,偏坠。

**鸡腰参** 珠儿参、白地瓜(贵州),大金线吊葫芦(云南)

**Codonopsis convolvulacea** Kurz var. **forrestii** (Diels) Ballard——*C. forrestii* Diels

生于海拔 1 200—3 600 米的山坡灌丛中。分布于四川西南部、贵州普安、云南中部至北部。

根(珠子参)：甘，平。养阴补虚，止血生肌。用于肺虚咳嗽；外用于刀伤疮。

**毛叶鸡蛋参**　兰花参、土党参、獭头参(云南保山)

**Codonopsis convolvulacea** Kurz var. **hirsuta** (Hand.-Mazz.) Nannf.——*C. limprichtii* Lingelsh et Borza var. *hirsuta* Hand.-Mazz.

生于草坡。分布于四川会理和盐源、云南丽江。

根：滋补强壮。用于贫血，体弱。

附　注：功效相似的有**直立鸡蛋参 C. convolvulacea** Kurz var. **limprichtii** (Lingelsh. et Borza) Anthony，分布于云南大理；**松叶鸡蛋参 C. convolvulacea** Kurz var. **pinifolia** (Hand.-Mazz.) Nannf.，分布于四川西南部、贵州威宁、云南中部至西北部。

**薄叶鸡蛋参**　辐冠党参(中国高等植物图鉴)

**Codonopsis convolvulacea** Kurz var. **vinciflora** (Kom.) L. T. Shen——*C. vinciflora* Kom.

生于海拔 2 500—4 000 米的林缘、草丛或山坡灌丛中。分布于四川西部、云南西北部、西藏波密至南木林。

根：甘、微苦，微温。补养脾胃，润肺生津，镇咳祛痰。用于贫血，自汗，肺虚咳嗽。

**三角叶党参**　土党参、泡参(四川)，白党参(云南)

**Codonopsis deltoides** Chipp

生于海拔 1 800—2 800 米的山地林下或灌丛中。分布于甘肃南部、湖北神农架、四川西部、贵州。

根(土党参)：补脾胃，益气血，生津。功效与党参相似。

**臭党参**

**Codonopsis foetens** Hook. f. et Thoms.

生于海拔 3 900—4 600 米的高山草甸、灌丛或石缝中。分布于西藏错那、林芝、波密、亚东。

根：补中益气，祛痰止咳，生津。

**贡山党参**

**Codonopsis gombalana** C. Y. Wu

生于海拔 3 400 米左右的山地灌丛及竹箐中。分布于云南西北部贡山。

全株：滋补强壮。

附　注：云南特有药用植物。

**川鄂党参**　阿家蓼(贵州苗语)

**Codonopsis henryi** Oliv.

生于山地草坡、林缘或灌丛。分布于湖北西部、四川、贵州。

根：补中益气，和胃生津；也用于疟疾。

**羊奶**　奶参(山东、福建、湖南、广东)，四叶参(江苏、安徽、贵州)，羊奶参(河南、江西)，山海螺(本草纲目拾遗)，白蟒肉、山胡萝卜(东北药用植物志)

**Codonopsis lanceolata** (Sieb. et Zucc.) Trautv.——*Campanumoea lanceolata* Sieb. et Zucc.

生于山地林中、灌丛下、阔叶林内或沟边阴湿处。分布于东北、华北、华东、中南及贵州。

根(山海螺)：甘、辛，平。滋补强壮，补虚通乳，排脓解毒，祛痰。用于血虚气弱，肺痈咯血，乳汁少，各种痈疽肿毒，瘰疬，带下病，喉蛾。

**大萼党参**　线党(四川)

**Codonopsis macrocalyx** Diels

生于海拔2 000—4 150米的山地草坡、沟边、林缘或灌丛中。分布于西南。

根：甘，温。补中益气，和胃生津。

附　注：西藏代党参用。

**小花党参**　野党参(湖南)，细条党参、党参(四川)，臭党参、理党参(云南)，土党参(植物名实图考)

**Codonopsis micrantha** Chipp

生于海拔1 000—2 600米的山地灌丛或阳坡林下草丛中。分布于湖南、四川西南部、贵州、云南昆明、大理、丽江。

根：补中益气，祛痰止咳。

附　注：四川代党参用。

**脉花党参**　党参、柴党、臭党(四川)，紫党参(云南)

**Codonopsis nervosa** (Chipp) Nannf.——*C. ovata* Benth. var. *nervosa* Chipp

生于海拔3 000—4 500米的山坡草地、河岸草丛中、灌丛或林下。分布于西南及甘肃南部、青海东南部。

根(柴党)：甘，平。补中益气，健脾益肺。用于脾胃虚弱，气血两亏，体倦无力，食少，口渴，泄泻，脱肛。

**大花党参**　狮头党、大头党参、柴党、泡参(四川)

**Codonopsis nervosa** (Chipp) Nannf. var. **macrantha** (Nannf.) L. T. Shen——*C. macrantha* Nannf.

生于海拔3 600—4 250米的山坡草地或灌丛中。分布于四川西南部、云南西北部、西藏东南部。

根：补中益气，和胃生津。功效与党参相似。

**党参**　凤党(陕西凤县)，西党、纹党、晶党(四川)，台参、仙草根、叶子菜(中国高等植物图鉴)

**Codonopsis pilosula** (Franch.) Nannf.——*Campanumoea pilosa* Franch.

生于海拔1 560—3 800米的山地林缘及灌丛或栽培。分布于东北、华北、西北、华东、西南及湖南。

根(党参)：甘，平。补中益气，和胃生津，祛痰止咳。用于脾虚食少便溏，四肢无力，心悸，气短，口干，自汗，脱肛，阴挺。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**闪光党参**　小叶党参(四川)

**Codonopsis pilosula** (Franch.) Nannf. var. **handeliana** (Nannf.) L. T. Shen——*C. handeliana* Nannf.

生于海拔 2 300—3 600 米的山地草坡及灌丛中。分布于四川西南部、云南西北部。

根(岩人参)：苦、微甘、辛，平。止血，镇痛。用于外伤出血，内外伤疼痛。

**紫花党参**　西党、文元党、南坪党、晶党(四川)

**Codonopsis pilosula** (Franch.) Nannf. var. **modesta** (Nannf.) L. T. Shen——*C. modesta* Nannf.

生于海拔 1 500—3 400 米的山地林下、林缘或灌丛中，也有栽培。分布于山西中部、陕西南部、甘肃、青海、四川西北部、云南。

根(党参)：甘，平。补中益气，健脾益肺，祛痰止咳。

附　注：本种是商品药材"西党"的原植物之一。《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**缠绕党参**　茂党、甜党、白党、肉党、臭党(四川)

**Codonopsis pilosula** Nannf. var. **volubilis** (Nannf.) L. T. Shen——*C. volubilis* Nannf.

生于海拔 1 800—3 600 米的山坡灌丛或林缘。分布于山西、甘肃南部、四川西部。

根：补中益气，健脾益肺。

附　注：四川阿坝地区将根部加工后，称"茂党"。

**紫花党参**　岩人参(云南大理)

**Codonopsis purpurea** (Spreng.) Wall.——*Campanula purpurea* Spreng.

生于海拔 2 000—3 300 米的山坡草丛及灌丛中或附生于林内树干上。分布于贵州西部、云南西北部、西藏南部。

全草：苦、微甘、辛，平。止血镇痛。用于外伤出血及伤痛。

**球花党参**　甘孜党、蛇头党、南路蛇头党(四川)，臭参(云南丽江)

**Codonopsis subglobosa** W. W. Smith

生于海拔 2 500—3 500 米的山地草坡、多石砾处、山地林下、沟边灌丛中，或栽培。分布于四川西部、云南西北部。

根：补中益气，和胃生津。

附　注：四川西部及云南西北部将根称"甘孜党"、"蛇头党"。在云南常与管花党参混用。

**抽葶党参**　党参、野党参、康南党(四川)

**Codonopsis subscaposa** Kom.

生于海拔 2 500—4 200 米的山坡草地或疏林中。分布于四川西部、云南西北部。

根：补中益气，和胃生津。

附　注：功效相似的有**藏南党参 C. subsimplex** Hook. f. et Thoms.，分布于西藏南部郎县、米林、亚东。

**川党参**　板党、东党参(湖北)，巫山党、单支党、条党、禹党(四川)

**Codonopsis tangshen** Oliv.

生于海拔 800—2 300 米的山坡、林缘或灌丛中，现已大量栽培。分布于陕西南部、湖北西部、湖南西北部、四川北部及东部、贵州北部。

根(川党参)：甘，平。补中益气，健脾益肺，生津。用于脾胃虚弱，气血两亏，体倦无

力，食少，口渴，泄泻，脱肛。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**长花党参**

**Codonopsis thalictrifolia** Wall. var. **mollis** (Chipp) L. T. Shen——*C. mollis* Chipp

生于海拔 3 500—4 600 米的山坡草地及灌丛中。分布于西藏南部及中部。

根：祛风湿，利关节，消肿。

附　注：长花党参为藏药；西藏资源丰富。

**秦岭党参**　　大头党参(陕西眉县)

**Codonopsis tsinlingensis** Pax et Hoffm.

生于海拔 2 100—3 600 米的高山或中山林下、林缘、灌丛或草丛中。分布于陕西南部、宁夏南部、四川西北部。

根：甘，平。补中益气，生津止渴。用于脾胃虚弱，食欲不振，气虚体弱，慢性泄泻，贫血。

**管花党参**　　西昌党参、白党、甜党(四川)，牛尾党参(云南永胜)，理党参(云南大理)

**Codonopsis tubulosa** Kom.

生于海拔 1 800—3 675 米的山地草坡、灌木林下或草丛中。分布于广西全州、四川西南部、贵州纳雍及盘县、云南蒙自、大理、兰坪。

根：甘，平。益气血，和脾胃，生津。用于气短心惊，体倦乏力，食少便溏，脾胃虚弱，泄泻，脱肛。

**雀斑党参**

**Codonopsis ussuriensis** (Rupr. et Maxim.) Hemsl.——*Glossocomia ussuriensis* Rupr. et Maxim.

生于海拔 800 米左右的山谷及水浸草地、林中或灌丛中，喜生于砂质土壤上。分布于黑龙江、吉林。

根：补中益气，健脾润肺。

**绿花党参**

**Codonopsis viridiflora** Maxim.

生于海拔 3 000—4 000 米的高山草甸、林下及林缘。分布于陕西太白山、甘肃东南部、宁夏南部、青海东部、四川西北部。

根：甘，平。补中益气，生津。用于脾胃虚弱，气血两亏，体倦无力，食少，口渴，泄泻。

## 蓝钟花属　Cyananthus Wall. ex Benth.

**总花蓝钟花**　　马鬃参、补草根、小白棉、银叶蓝钟花(云南)

**Cyananthus argenteus** Marq.

生于海拔 2 900—3 600 米的干旱山坡、沙丘或松林间沙地。分布于四川、云南西北部。

根、全草：甘、苦，温。健脾除湿。用于小儿泄泻，风湿关节痛，跌打损伤。

**川西蓝钟花**

**Cyananthus dolichosceles** Marq.

生于海拔 3 500—4 800 米的林中、山坡草地或岩石上。分布于四川西部。

根：补虚弱，催乳。

附　注：功效相同的有**蓝钟花 C. hookeri** C. B. Clarke，分布于甘肃南部、青海同仁、四川西部、云南西北部、西藏东部和南部。

**束花蓝钟花**

**Cyananthus fasciculatus** Marq.

生于海拔 2 400—3 600 米的山地林下、灌丛或草坡。分布于四川西南部、云南西部。

全株：用于小儿惊风。

**美丽蓝钟花**　奶浆果(云南)

**Cyananthus formosus** Diels

生于海拔 2 600—3 600 米的向阳山坡及林边砂石地上。分布于四川西南部、云南西北部。

根：甘，温。利水消肿。

**灰毛蓝钟花**　小白棉、草补药(云南丽江)

**Cyananthus incanus** Hook. f. et Thoms.

生于海拔 3 100—5 400 米的高山草地、灌丛、林下、草地、路边或河滩草地。分布于青海囊谦、四川西南部、云南西北部、西藏南部和东部。

全草：用于小儿体虚，劳伤疼痛。

**胀萼蓝钟花**

**Cyananthus inflatus** Hook. f. et Thoms.

生于海拔 1 900—4 900 米的山坡灌丛、草坡或草甸中。分布于四川、云南、西藏。

全草(风药)：辛、苦，凉。清热解毒，舒肝解痉。用于小儿惊风，风湿痹痛。

## 同钟花属　Homocodon Hong

**同钟花**　扭子菜(贵州)，小三楞草(云南腾冲)，白异钟花(四川、贵州)，异钟花(中国种子植物科属辞典)

**Homocodon brevipes** (Hemsl.) Hong——*Wahlenbergia brevipes* Hemsl.

生于海拔 1 000—2 900 米的沟边、林下、灌丛及山坡草地。分布于四川西部、贵州西南部、云南。

全草(扭子菜)：甘、微苦，凉。清热解毒，降火止咳。用于白口疮，口糜，高热，风热咳嗽。

附　注：我国特有属。

## 半边莲属　Lobelia L.

**半边莲**　细米草(浙江、广东)，小急解锁(江西、湖南、广东、广西)，奶浆草、蜈蚣草

(福建),长虫草(河南),疳积草(湖南)

**Lobelia chinensis** Lour.——*L. radicans* Thunb.

生于水田边、沟边、湿草地上、山坡或路旁。分布于中南及江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、四川、贵州。

带根全草(半边莲):甘,平。清热解毒,利尿消肿。用于黄疸,肝硬化腹水,晚期血吸虫病腹水,水肿,乳蛾,肠痈;外用于跌打损伤,痈疖疔疮,毒蛇咬伤。

附　注:《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**密毛山梗菜**　白毛大将军、大将军(云南),彪蚌法(西双版纳傣语)

**Lobelia clavata** E. Wimm.

生于海拔 2 000 米以下的山坡草地、林下、路旁或湿草地上。分布于贵州西南部、云南。

根、叶或全草:辛,凉。有毒。解毒,止痛,祛风,杀虫。用于疟腮,风湿关节痛,跌打损伤,瘰症;外用于蛇咬伤,痈肿;全草也用于杀蛆。

**狭叶山梗菜**　红根一枝花(云南种子植物名录)

**Lobelia colorata** Wall.

生于海拔 1 000—3 000 米的草坡、疏林下、沟边或潮湿草地上。分布于贵州、云南。

全草:辛,平用于膨胀,痰喘,跌打损伤,骨折。

**思茅山梗菜**　小桃叶、红根一枝花(云南双柏),水将军(云南新平),水莴笋(云南峨山),胃软草(云南玉溪),独脚一枝箭、红杆一枝蒿(云南安宁)

**Lobelia colorata** Wall. var. **baculus** E. Wimm.

生于海拔 540—2 000 米的沟谷灌丛或潮湿草地上。分布于云南中部至中南部。

全草:辛,温。有毒。解毒,止痛。用于感冒,头痛,胃痛。

**江南山梗菜**　穿耳草、偏杆草(四川南川),苦菜、节节花(中国植物志)

**Lobelia davidii** Franch.

生于海拔 2 300 米以下的山坡路旁、山地林缘、沟边较阴湿处。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

根:用于痈肿疮毒,胃寒痛。全草:辛、平有小毒。宣肺化痰,清热,利尿,消肿。用于咳嗽痰喘,水肿,痈肿疔毒,胃寒痛,毒蛇咬伤,蜂螫,疔疮。

**直立山梗菜**　野莴笋、竹叶草(云南),马波罗(云南中药名录)

**Lobelia erectiuscula** Hara——*L. erecta* Hook. f. et Thoms.

生于海拔 1 600—4 000 米的林缘、灌丛或林中。分布于云南、西藏错那。

根、叶:有大毒。用于跌打损伤,疟腮,乳蛾,皮肤瘙痒。

**假半边莲**　紫菀莲(广西南宁)

**Lobelia hancei** Hara——*L. chinensis* Hance

生于潮湿的山坡、河边、路旁、草地及田野中。分布于台湾、广东、广西、云南。

全草:用于蛇伤。

**线萼山梗菜**　大种半边莲(福建、江西),韶关大将军、东南山梗菜(中国植物志)

**Lobelia melliana** E. Wimm.

生于海拔 1 000 米以下的沟谷、路旁、水沟边、林中潮湿地或沼泽地。分布于浙江龙

泉、江西、福建、湖南宜章和郴县、广东。

全草：辛，平。宜肺化痰，清热解毒，利尿消肿。用于咳嗽痰喘，水肿，蛇毒咬伤，蜂刺，痈肿疔疮。

**毛萼山梗菜**　毛萼大将军(中国植物志)

**Lobelia pleotricha** Diels

生于海拔2 000—3 100米的山坡草地、灌丛或竹林缘。分布于贵州、云南。

根：甘，平。滋补。全草：用于疟疾。

**毛瓣山梗菜**　紫花大将军、山鸡腿(云南临沧)

**Lobelia pleotricha** Diels var. **handelii** (E. Wimm.) C. Y. Wu——*L. handelii* E. Wimm.

生于山坡草地或灌丛中。分布于云南中南部、西部至西北部。

全草：用于痄腮，跌打损伤，风湿关节痛，瘰症。

附　注：云南特有药用植物。

**塔花山梗菜**　铁栏杆(全国中草药汇编)。

**Lobelia pyramidalis** Wall.——*L. wallichiana* Hook. f. et Thoms.

生于海拔1 900米以下的山坡草地、灌丛、路旁及土坎上。分布于江西、湖北、广西西部、贵州西南部、云南、西藏。

全草(铁栏杆)：辛、微苦，平。解毒，杀虫。用于对口疮，皮肤发痒，肠痈；并能杀臭虫，虱子。

**西南山梗菜**　野烟、野叶子烟(湖北、贵州、云南)，破天菜(广西田林、西林)，铁栏杆、野叶烟(贵州)，大将军、野莴笋、气死名医草(云南)，红雪柳(中国植物志)

**Lobelia seguinii** Lévl. et Vant.

生于海拔500—3 000米的山坡草地、林缘、路旁。分布于湖北巴东、广西、四川、贵州、云南。

根、全草(野烟)：辛，凉。有剧毒。祛风，止痛，清热，解毒。用于风湿关节痛，跌打损伤，疮疡肿毒，痄腮，乳蛾。

附　注：本品有剧毒，忌内服。

**山梗菜**　半边莲(通称)，红雪柳、对节白(云南)，水白菜(江西草药手册)，水苋菜、节节花(湖南药物志)，大种半边莲(中国植物图鉴)

**Lobelia sessilifolia** Lamb.

生于海拔900—3 200米的平原、山坡湿草地或河边、沼泽、草甸等湿处。分布于东北及河北、内蒙古、山东、浙江、江西、福建、台湾、广东、广西北部、云南西北部。

根或带根全草：甘，平。有小毒。宣肺化痰，清热解毒，利尿消肿。用于咳嗽痰喘，水肿，痈肿疔疮，毒蛇咬伤，蜂螫。

**大理山梗菜**　大理大将军、红雪柳(云南)，紫燕草(中药大辞典)

**Lobelia taliensis** Diels——*L. hybrida* C. Y. Wu

生于海拔1 000—3 000米的山坡草地、向阳田边、沙滩上。分布于云南西北部至西南部。

全草(紫燕草)：微苦，平。止血接骨。用于刀伤，骨折。

附　注：云南特有药用植物。

**卵叶半边莲**　　半边旗(广东)

**Lobelia zeylanica** L.——*L. succulenta* Bl.

生于海拔2 000米以下的水田边、山谷沟边等阴湿处。分布于福建、台湾、广东、广西、云南。

全草：用于毒蛇咬伤，狂犬病，晚期吸血虫病，白喉，瘰疬，疮疡肿毒，蛇伤。

**大花半边莲**　　大叶肉半边莲(云南)

**Lobelia zeylanica** L. var. **lobbiana** (Hook. f. et Thoms.) Lian——*L. lobbiana* Hook. f. et Thoms.; *L. succulenta* Bl. var. *lobbiana* (Hook. f. et Thoms.) E. Wimm.

生于海拔130—1 300米的阴湿林下、溪沟边。分布于广东、广西、云南。

全草：用于毒蛇咬伤。

## 袋果草属　Peracarpa Hook. f. et Thoms.

**袋果草**　　肉荚草(云南)

**Peracarpa carnosa** (Wall.) Hook. f. et Thoms. ——*Campanula carnosa* Wall.

生于海拔3 000米以下的沟边潮湿岩石上、林缘、山地林下、山谷、山坡草丛或石山上。分布于西南及江苏南部、浙江杭州、台湾太平山、湖北神农架、广西。

全草(岩胁草)：用于筋骨痛，小儿惊风。

## 桔梗属　Platycodon A. DC.

**桔梗**　　道拉基(延边)，苦菜根(河北)，铃铛花(山东)，大药、土人参、包袱花(江苏)，鸡把腿(贵州)

**Platycodon grandiflorus** (Jacq.) A. DC.——*Campanula grandiflora* Jacq.

生于海拔2 100米以下的阳坡草丛、灌丛、林下或栽培。分布于东北、华北、华东、中南、西南及陕西、甘肃、宁夏、新疆。

根(桔梗)：苦、辛，微温。宣肺，散寒，祛痰，排脓。用于外感咳嗽，咳痰不爽，咽喉痛，胸闷腹胀，肺痈。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

## 铜锤玉带属　Pratia Gaud.

**山紫锤草**　　小铜锤、地钮子(中国高等植物图鉴)

**Pratia montana** (Reinw. ex Bl.) Hassk.——*Lobelia montana* Reinw. ex Bl.

生于海拔1 000—2 600米的潮湿山谷、林缘、草地或阴湿处。分布于云南、西藏。

全草：祛风活血，凉血，止血。

**铜锤玉带草**　　金钱草(湖南)，铜锤草(广西、云南)，骂补神(广西三江侗语)，乌金钟

(广西融水苗语),小铜锤(四川、贵州)

**Pratia nummularia** (Lam.) A. Br. et Aschers.——*Lobelia nummularia* Lam.; *P. begoniifolia* (Wall.) Lindl.

生于海拔500—2 300 米的潮湿草地、山林阴处、疏林下、阴湿田边、低山草坡、丘陵、田边及路旁。分布于华东、西南及湖北、湖南、台湾、广东、广西。

全草(地茄子草): 苦、甘,平。清热解毒,活血,祛风利湿。用于肺虚久咳,风湿关节痛,跌打损伤,乳痈,乳蛾,无名肿毒。

**广西铜锤草**　　土半边莲(广西武鸣)

**Pratia wollastonii** S. Moore

生于海拔 1 300 米以下的田边或路旁。分布于广西北部。

全草: 用于蛇伤,疮疡肿毒。

附　注: 我国新分布。

### 尖瓣花属　Sphenoclea Gaertn.

**尖瓣花**　　木空菜(广西玉林),楔瓣花、空心菜、牛奶菜(云南)

**Sphenoclea zeylanica** Gaertn.

生于海拔 580—780 米的水田边、池塘边、沼泽地或潮湿处。分布于台湾、广东、海南、广西、云南西双版纳。

全草: 用于疮疡肿毒,热疮。

### 蓝花参属　Wahlenbergia Schrad. ex Roth

**蓝花参**　　细叶沙参(江苏),娃儿菜(广东),罐罐草、沙参(四川),霸王草、小绿细辛(贵州),土参(滇南本草)

**Wahlenbergia marginata** (Thunb.) A. DC.——*Campanula marginata* Thunb.

生于海拔 500—2 800 米的山坡、灌丛、沟边、草地、荒地、田边、路旁、丘陵或平原。分布于中南、西南及陕西、江苏、安徽、浙江、江西、福建。

根或带根全草: 甘、微苦,平。益气补虚,祛痰,截疟。用于病后体虚,伤风咳嗽,带下病,衄血,咯血,盗汗,泄泻。

## 177. 草海桐科 Goodeniaceae

### 离根香属　Calogyne R. Br.

**离根草**　　肉桂草(中国植物志)

**Calogyne pilosa** R. Br.

生于海拔1 000 米以下的稻田、干旱的稀树草地上、山坡或田园边。分布于福建厦门。

全草: 辛,温。祛风散寒,行气止痛,活血化瘀。用于跌打损伤,蛇咬伤。

附　注：福建特有药用植物。

### 草海桐属　Scaevola L.

**草海桐**　　大网梢(广西钦州)

**Scaevola sericea** Vahl

生于海边，通常在开旷的海边砂地上或海岸峭壁上。分布于福建、台湾、广东、广西。

叶：用于扭伤，风湿关节痛。

## 178. 花柱草科　Stylidiaceae

### 花柱草属 Stylidium Sw. ex Willd.

**花柱草**　　红口锁(广西北流)

**Stylidium uliginosum** Sw.

生于丘陵溪边湿草地上。分布于广东、广西等沿海地区。

全　草：用于咽喉痛。

## 179. 菊科　Compositae

### 蓍属　Achillea L.

**齿叶蓍**　　蜈蚣草(黑龙江)，单叶蓍(东北植物检索表)

**Achillea acuminata** (Ledeb.) Sch.-Bip.——*Ptarmica acuminata* Ledeb.

生于山坡林缘、林下阴湿处、草甸及山坡草丛中。分布于东北及内蒙古、陕西中部、甘肃东部、宁夏六盘山、青海西宁。

全草(一枝蒿)：活血祛风，止痛解毒，止血消肿。

**高山蓍**　　蜈蚣草(分类草药性)，锯草(内蒙古中草药)，羽衣草(贵州草药)，蚰蜒草、锯齿草(中国植物志)

**Achillea alpina** L.——*A. sibirica* Ledeb.

生于海拔 850 米以上的山坡灌丛、林缘、草丛、沟旁、路旁、村旁或河道旁。分布于东北、华北及甘肃、宁夏、青海、山东、安徽、湖北、湖南、四川、贵州。

全草(一枝蒿)：辛、苦，平。有小毒。解毒消肿，止血，止痛。用于风湿关节痛，牙痛，经闭腹痛，胃痛，吐泻，泄泻，毒蛇咬伤，痈疖肿毒，跌打损伤。

**亚洲蓍**

**Achillea asiatica** Serg.

生于海拔 590—2 600米的山坡草地、河边、草场、林缘湿地、山谷或湿草地。分布于黑龙江、辽宁、河北、内蒙古、新疆北部。

全草：解毒消肿，活血止血，健胃。

附　注：功效相似的有**短鳞蓍 A. ptarmicoides** Maxim.，分布于河北北部、内蒙古。

**蓍**　千叶蓍(陕西、安徽)、一枝蒿、一支箭、一苗蒿(陕西)，多叶蓍(陕西中药名录)，欧蓍(东北植物检索表)，锯草(华北经济植物志要)

**Achillea millefolium** L.

生于海拔 600—2 700 米的荒坡、湿草地、铁路沿线、河岸砂质、石质地带或沟谷，庭园常有栽培。分布于东北及河北、内蒙古、陕西、甘肃、宁夏、新疆、山东、江苏、安徽、江西、四川、贵州。

全草(洋蓍草)：辛、苦，平。有小毒。消肿，止痛，止血。用于风湿关节痛，牙痛，经闭腹痛，泄泻，蛇伤，痈疖肿毒，跌打损伤。

**云南蓍**　一枝蒿、蓍草(贵州)，飞天蜈蚣(中国植物志)，西南蓍草、茅草一枝蒿、白花一枝蒿(全国中草药汇编)

**Achillea wilsoniana** Heimerl ex Hand.-Mazz.

生于海拔 600—3 400 米的山坡林缘、荒坡、草丛或山坡阴湿处。分布于山西、陕西、甘肃、河南、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

全草(土一枝蒿)：辛、苦，平。有小毒。解毒消肿，止血，止痛。用于风湿关节痛，牙痛，经闭腹痛，胃痛，肠痈，泄泻，毒蛇咬伤，痈疖肿毒，跌打损伤，外伤出血。

## 猫儿菊属　Achyrophorus Scop.

**猫儿菊**　黄金菊(通称)，车格车黑(蒙语)，高粱菊(全国中草药汇编)

**Achyrophorus ciliatus** (Thunb.) Sch.-Bip ——*Arnica ciliata* Thunb.

生于海拔 1 000 米以上的山坡灌丛、林下、林缘、路旁、草地或草甸。分布于东北、华北及山东、河南。

根(猫儿黄金菊)：利水消肿。用于臌胀。

## 顶羽菊属　Acroptilon Cass.

**顶羽菊**　牙千-图如古(蒙语)，苦蒿(陕西)，灰叫驴(内蒙古植物志)

**Acroptilon repens** (L.) DC.——*Centaurea repens* L.

生于中海拔地区的干荒坡、田野、荒漠地带、山坡、丘陵、平原或农田中。分布于华北、西北。

全草：苦，凉。清热解毒，活血消肿。用于疮疡痈疽，无名肿毒，关节肿痛。

## 和尚菜属　Adenocaulon Hook.

**和尚菜**　葫芦叶(黑龙江、安徽、贵州)，腺梗菜(中国高等植物图鉴)，水葫芦、水马蹄草(全国中草药汇编)

**Adenocaulon himalaicum** Edgew.——*A. adhaerascens* Maxim.

生于平原到海拔 3 400 米的水沟边、阴坡、湖旁、河岸、峡谷或密林下阴湿处。分布于

全国各地。

**根状茎(葫芦叶)**：苦、辛，温。止咳平喘，利水散瘀。用于咳嗽气喘，水肿，产后瘀血，腹痛，骨折。

## 下田菊属　Adenostemma J. R. et G. Forst.

**下田菊**　水胡椒(安徽、江西)，风气草(安徽、贵州)，汗苏麻、回筋草(贵州)，猪耳朵叶、白龙须(云南)，马桑西哈(傣语)

**Adenostemma lavenia** (L.) O. Kuntze——*Verbesina lavenia* L.; *A. lavenia* (L.) O. Kuntze var. *elatum* (D. Don) Kitam.

生于海拔460—2 000米的山坡灌丛中、林下阴湿处、水边、路旁、沼泽地或低湿地。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全草(风气草)：苦，凉。清热利湿，解毒消肿。用于风湿关节痛，咳嗽痰喘，咽喉肿痛，乳蛾，黄疸，痈疖疮疡。

**阔叶下田菊**　重皮冲(四川)

**Adenostemma lavenia** (L.) O. Kuntze var. **latifolium** (D.Don) Hand.-Mazz.——*A. latifolium* D. Don

生于海拔500—2 300米的林下、林缘、灌丛中、河边阴湿地及水沟旁。分布于福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、云南、西藏。

全草(重皮冲)：苦，凉。解毒消炎，行气活血。用于脚气病，风湿关节痛，无名肿毒，外伤出血。

**小花下田菊**

**Adenostemma lavenia** (L.) O. Kuntze var. **parviflorum** (Bl.) Hochreut.——*Lavenia parviflora* Bl.

生于林缘、河边阴湿地及水旁。分布于江西、湖南、海南。

全草：清热解毒，祛风消肿。用于感冒，痈肿疮疖，疟疾，五步蛇咬伤。

## 藿香蓟属　Ageratum L.

**藿香蓟**　咸虾花、白毛苦、白花臭草(广东)，毛麝香(海南)，狗扯尾、野棉花、脓泡草、绿升麻(贵州)，广马草、重阳草、水丁药、油贴贴果(云南)，胜红蓟(中国植物图鉴)

**Ageratum conyzoides** L.

生于海拔200—2 800米的山坡林下、林缘、丘陵、平原、草丛、路边、山谷、沟边或栽培。分布于江西、福建、广东、广西、四川、贵州、云南。河北、陕西、浙江有栽培。

全草(胜红蓟)：辛、微苦，凉。祛风清热，止痛，止血，排石。用于乳蛾，咽喉痛，泄泻，胃痛，崩漏，肾结石，湿疹，鹅口疮，痈疮肿毒，下肢溃疡，中耳炎，外伤出血。

**熊耳草**

**Ageratum houstonianum** Mill.

原产墨西哥。我国黑龙江、山东、江苏、广东、广西、四川、云南有栽培或逸生。

全草：微苦，凉。清热解毒。用于中耳炎。

## 兔儿风属　Ainsliaea DC.

**心叶兔儿风**　大一枝箭(四川)，兔儿风、小接骨丹(贵州)

**Ainsliaea bonatii** Beauverd——*A. cordiophylla* Franch.

生于海拔1 700—3 400米的山坡丛林中或山坡路旁。分布于四川、贵州、云南。

根(双股箭)：苦、微涩，凉。清热利水，舒筋活血。用于风热咳嗽，水肿，风湿筋骨痛，跌打损伤。

**秀丽兔儿风**　背毛红草(广西靖西)

**Ainsliaea elegans** Hemsl.

生于海拔2 000米以下的山坡林下或岩石上。分布于广西、贵州、云南。

全草：用于风湿关节痛，肺痨。

**红毛叶兔儿风**　红毛叶、马蹄香、反背马蹄红(云南)

**Ainsliaea elegans** Hemsl. var. **strigosa** Mattf.

生于海拔2 000—2 500米的山野丛林中。分布于云南红河及蒙自。

根、叶：清热利湿，止咳化痰。叶：用于感冒，咳嗽痰喘。根：用于风热咳喘，头痛，消化不良。

**杏香兔儿风**　吐血草、急儿风(江苏)，飞针(广西)，红太极图、牛皮菜(贵州)，白走马胎、金边兔儿草(中国高等植物图鉴)

**Ainsliaea fragrans** Champ.

生于山坡灌丛、沟边、草丛、山坡阴湿处或林下。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、河南、湖北、湖南、广西、四川、贵州。

全草(金边兔耳)：甘，凉。清热利湿，凉血，解毒。用于虚痨咳血，湿热黄疸，瘰疬，水肿，痈疽肿毒。

**光叶兔儿风**　血筋草、散血草(湖北)，心肺草、石凤丹(四川)

**Ainsliaea glabra** Hemsl.

生于海拔800—2 000米的山坡林下、灌丛下或溪边岩石上。分布于湖北、湖南、四川、贵州、云南。

全草(兔儿风)：甘，凉。养阴清肺，凉血利湿。用于风湿痛，跌打损伤，虚劳咳嗽，肺痨吐血。

**纤细兔儿风**　相思草(广西桂平)

**Ainsliaea gracilis** Franch.

生于海拔1 200—1 800米的山坡林下、山谷或水旁。分布于湖北、广西。

全草：用于咳血，无名肿毒，跌打损伤。

**粗齿兔儿风**　灯盏七、一柱香(湖北)，灯台草、青菜果(贵州)

**Ainsliaea grossedentata** Franch.

生于海拔1 200—2 100米的林下或灌丛下。分布于湖北、四川、贵州。

全草：甘，凉。清热利湿，凉血，解毒。用于虚痨咯血，湿热黄疸，瘰疬，水肿，痈疽肿

毒，惊痫，风热头痛，刀伤出血。

**长穗兔儿风**　二郎箭(四川)，滇桂兔儿风(云南种子植物名录)

**Ainsliaea henryi** Diels

生于海拔800—2 500米的山坡灌丛林下或草地上。分布于湖北、广西、四川、贵州、云南。

全草(兔儿风)：清热解毒，凉血，利湿。用于咳嗽痰喘，小儿疳积，毒蛇咬伤。

**长叶兔儿风**　披针叶兔儿风(全国中草药汇编)，肺经草、小血金丹(中药大辞典)

**Ainsliaea lancifolia** Franch.

生于海拔1 000—1 900米的山坡林下、河边、水沟旁、草丛中或潮湿岩石上。分布于四川、贵州、云南。

全草(肺经草)：辛，平。止血。用于肺痈，咯血，胃出血，咳嗽痰喘。

**宽穗兔儿风**　刀口箭、大叶一枝箭(云南)，三花兔儿风(中国高等植物图鉴)，倒赤伞(全国中草药汇编)，翅柄兔儿风(海南植物志)

**Ainsliaea latifolia** (D.Don) Sch.-Bip.——*Liatris latifolia* D. Don; *A. triflora* (Buch.-Ham.) Druce

生于海拔700—3 300米的沟边、荒坡、路边、山坡林下或水边。分布于西南及陕西、甘肃、湖北。

全草(倒赤伞)：辛、微苦，温。祛风散寒，止咳，止泻。用于风寒咳嗽，泄泻。　叶：酝、辛，平。止血，生肌。用于刀伤。

**卵叶兔儿风**　一支箭、肾炎草(云南)，牛尾一枝箭(全国中草药汇编)

**Ainsliaea latifolia** (D. Don) Sch.-Bip. var. **obovata** (Franch.) Griers. et Lauen.——*A. pteropoda* DC. var. *obovata* Franch.; *A. spicata* Vant.

生于海拔1 900—2 400米的山坡林下。分布于四川、云南。

根(肾炎草)：涩、苦，凉。消炎，杀菌，利尿，杀虫。用于阿米巴痢疾，水肿，小便淋痛，咽喉痛，脚气病，食欲不振，腹胀。

**铁灯兔儿风**　永嘉兔儿风(安徽)，灯台草(湖北)

**Ainsliaea macroclinidioides** Hayata

生于海拔1 200—2 100米的林下、山坡灌丛等阴湿处或河谷。分布于安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、贵州、云南。

根：用于咳嗽，腰腿痛。　全草：清热解毒。用于鹅口疮。

**叶下花**　牛毛细辛(贵州)，地黄连、追风箭、白背兔儿风(云南)

**Ainsliaea pertyoides** Franch.

生于山坡、林下或石缝中。分布于四川、贵州、云南。

全草：清热解毒，凉血利湿，止痛，止血。用于外伤出血，风湿关节痛，胃痛。

**白背叶下花**　牛毛细辛(贵州)，追风箭(云南中草药)

**Ainsliaea pertyoides** Franch. var. **albo-tomentosa** Beauverd

生于海拔700—2 700米的疏林下、灌丛中、荒地或山坡石缝中。分布于四川、贵州、云南。

全草(叶下花)：苦，温。有小毒。除湿止痛，行气活血。用于风湿关节痛，跌打损伤，

骨折，瘰疬，经闭。

**红背兔儿风**　牛皮菜(贵州)，红走马胎(中国高等植物图鉴)

**Ainsliaea rubrifolia** Franch.

生于海拔1 500米以下的灌丛下或林缘岩石上。分布于四川、贵州。

全草：辛、涩，平。生肌，止血。用于刀伤，外伤出血，风湿筋骨痛。

**青兔儿风**　走马胎(四川、贵州)，罗汗草、土兔儿风、血筋草(四川中药志)，红脉兔儿风(全国中草药汇编)

**Ainsliaea rubrinervis** Chang

生于海拔500—1 500米的灌丛下、悬岩陡壁或林边岩石上。分布于四川、贵州。

全草(青兔儿风)：苦、辛，温。祛风散寒，止咳，止痛。用于风寒咳嗽，头痛，风湿关节痛，跌打损伤，瘰疬，毒蛇咬伤。

**狭叶兔儿风**

**Ainsliaea walkeri** Hook. f.

生于山谷林下或山地水旁。分布于江西、广东、广西。

全草：苦、辛，平。清热解毒，消积散结，止咳，止血。

**云南兔儿风**　羊耳草(贵州)，双股箭、铜脚威灵(云南)，倒吊花、接骨一支箭（中药大辞典）

**Ainsliaea yunnanensis** Franch.

生于海拔2 000—3 600米的山坡草丛、荒地或林缘。分布于四川、贵州、云南。

全草(燕麦灵)：苦，平。祛风湿，舒筋，续骨。用于跌打损伤，骨折，风湿筋骨痛。

## 亚菊属　Ajania Poljak.

**蓍状亚菊**

**Ajania achilloides** (Turcz.) Poljak. ex Grubov.——*Artemisia achilloides* Turcz.

生于山坡、草原和荒漠草原。分布于内蒙古、青海。

全草：清肺止咳。

附　注：功效相似的有**细叶亚菊 A. tenuifolia** (Jacq.) Tzvel.，分布于甘肃中部、青海、四川西北部、西藏东部。

**多花亚菊**　千花亚菊(中国高等植物图鉴)，蜂窝菊(云南中药名录)

**Ajania myriantha** (Franch.) Ling ex Shih——*Tanacetum myrianthum* Franch.

生于海拔400—3 200米的山坡、村旁及河谷中。分布于甘肃东南部、青海南部、四川西部、云南北部、西藏东南部。

花序：苦，凉。清热，止咳化痰，润肺。

**束伞亚菊**　看阿中(藏语)，小花亚菊(中国高等植物图鉴)

**Ajania parviflora** (Grun.) Ling——*Chrysanthemum parviflorum* Grun.

生于海拔1 400米左右的低山区或丘陵地区。分布于河北西部、山西西部和西北部。

全草：清热消肿。用于风热咳喘。

**柳叶亚菊**　　藏花儿、艾菊(青海)

**Ajania salicifolia** (Mattf.) Poljak.——*Tanacetum salicifolium* Mattf.

生于海拔 1 600—4 600 米的山坡、林缘、草丛、林下或河滩上。分布于陕西西南部、甘肃东部、青海东部、四川西北部。

全草：苦、辛，平。清肺热，止咳。

**异叶亚菊**　　太白艾(陕西太白山)

**Ajania variifolium** (Chang) Tzvel.——*Chrysanthemum variifolia* Chang

生于海拔 1 200—3 000 米的岩石山坡或高山草坡。间断分布于黑龙江绥芬河流域、陕西中部、湖北西北部、贵州铜仁。

全草：辛、微苦，平。祛风镇静，清热解毒。用于小儿惊风，风湿麻木，肠痈。

## 香青属　Anaphalis DC.

**黄腺香青**　　香蒿(湖北)

**Anaphalis aureo-punctata** Lingelsh. et Borza

生于海拔 1 700—3 800 米的林下、灌丛、林缘、草地、河谷或石砾地。分布于中南及山西、陕西、甘肃、青海、江西、四川、贵州、云南。

全草：甘、淡，凉。清热解毒，利湿消肿。用于口腔破溃，小儿惊风，疮毒，泄泻，水肿，蛇咬伤。　叶：用于感冒，泄泻，咳嗽痰喘，外伤出血。

**黑鳞香青**　　五花草(云南)

**Anaphalis aureo-punctata** Lingelsh. et Borza var. **atrata** Hand.-Mazz.

生于海拔 3 000—4 450 米的林下、草坡、石砾地。分布于四川木里及康定、云南西北部。

全草：辛、苦，温。解表祛风，消肿止痛。

**二色香青**　　三轮蒿、白头蒿(全国中草药汇编)

**Anaphalis bicolor** (Franch.) Diels——*Gnaphalium bicolor* Franch.

生于海拔 2 000—3 500 米的草地、荒地、灌丛及针叶林下。分布于甘肃西南部、青海、四川西部及西南部、云南西部及北部。

全草(三轮蒿)：苦、辛，凉。清热，镇痛，补虚。用于中暑腹痛，痧气肚痛，肺痨。

**粘毛香青**　　风蒿(贵州)，五香草、香青、香附草(云南)，昆明香青(四川中药名录)

**Anaphalis bulleyana** (J. F. Jeffrey) Chang——*Pluchea bulleyana* J. F. Jeffrey

生于海拔 1 180—3 300 米的亚高山阴湿坡地、低山草地、草丛、疏林下及灌丛中。分布于四川西部、贵州中部、云南西北部和北部。

全草(午香草)：辛、苦，凉。清热利湿，止咳，截疟。用于感冒，咳嗽痰喘，乳蛾，泄泻，小便涩痛，淋证，小儿疳积，疟疾，顿咳。

**旋叶香青**

**Anaphalis contorta** (D. Don) Hook. f.——*Antennaria contorta* D. Don

生于海拔 1 800—2 900 米的山坡杂草丛中或路旁。分布于西南。

全草：祛风止咳，清热利湿。用于劳伤咳嗽。

**薄叶香青**

**Anaphalis contorta** (D. Don) Hook. f. var. *pellucida* (Franch.) Ling——*Gnaphalium pellucidum* Franch.

生于海拔 1 700—3 500 米的干燥或湿润的山坡草地。分布于贵州黄草坝、云南中部至西部。

全草：消肿止痛，健胃行气。用于乳蛾，泄泻，咳嗽痰喘，疟疾，小便涩痛，淋证，小儿疳积，顿咳。

**淡黄香青**　　铜钱花(四川西部)，清明菜(四川康定)

**Anaphalis flavescens** Hand.-Mazz.

生于海拔 2 800—4 700 米的高山、亚高山坡地、草地、草甸、林下或灌丛中。分布于陕西南部、甘肃西部和南部、青海东部、四川西部、西藏东部和南部。

全草：辛、苦，凉。解毒，止咳。四川也用于治疮癣。

**糙叶香青**

**Anaphalis gracilis** Hand.-Mazz. var. **aspera** Hand.-Mazz.

生于海拔 2 600—3 500 米的高山草地、亚高山灌丛及山谷坡地。分布于四川西北部及西部。

全草：活血，祛瘀。

附　注：四川特有药用植物。

**铃铃香青**　　铃铃香(河北)，铜钱花(四川)，稀毛香青(全国中草药汇编)

**Anaphalis hancockii** Maxim.

生于海拔 2 000—3 700 米的亚高山山顶、山坡草地或山地草甸。分布于华北及陕西、甘肃、青海、四川、西藏。

全草(灵香蒿、五月霜)：苦、微辛，凉。清热解毒，杀虫。用于带下病，阴道滴虫病。

**乳白香青**　　大白茅香(甘肃)，哇日多罗(藏语)，大茅香艾(中药大辞典)

**Anaphalis lactea** Maxim.

生于海拔 1 800—3 400 米的亚高山、低山草地、草甸、针叶林下或林缘。分布于甘肃南部、宁夏南部、青海东部、四川西北部。

全草：辛、苦，寒。活血散瘀，平肝潜阳，止咳，止血，祛痰。用于血瘀包块，肺热咳嗽，创伤出血。

**宽翅香青**

**Anaphalis latialata** Ling et Y. L. Chen

生于海拔 2 500—3 600 米的山坡、草丛或向阳山地。分布于甘肃、四川西部。

全草：活血散瘀，平肝。

**珠光香青**　　牛舌草(安徽)，白头翁(广西)，山荻（中国植物图鉴），大火草(重庆草药)，一面青(分类草药性)

**Anaphalis margaritacea** (L.) Benth. et Hook. f.——*Gnaphalium margaritaceo* L.

生于海拔 300—3 400 米的亚高山或低山草地、石砾地、山沟、路旁、林下、灌丛等向阳

排水较好的地方。分布于西南及河北、陕西、甘肃、青海、山东、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西。

全草或根(大叶白头翁)：微苦、甘，平。清热解毒，祛风通络，驱虫。用于感冒，牙痛，泄泻，风湿关节痛，蛔虫病，刀伤，跌打损伤，瘰疬。

**黄褐香青**

**Anaphalis margaritacea** (L.) Benth. et Hook. f. **var. cinnamomea** (DC.) Herd. ex Maxim.——*Antennaria cinnamomea* DC.

生于海拔500—2 800米的低山或亚高山灌丛、山坡、草地或溪岸。分布于陕西南部、甘肃东部及南部、湖北西部、四川、贵州、云南。

全草(大火草)：清热泻火，燥湿。

**线叶香青**　火花草(湖北)，天青地白(广西)，娃鲁嘎鲁(藏语)

**Anaphalis margaritacea** (L.) Benth. et Hook. f. **var. japonica** (Sch.-Bip.) Makino——*Antennaria japonica* Sch.-Bip.

生于海拔300—3 400米的草地、石砾地、山沟、河边、山坡或路旁。分布于西南及陕西南部、甘肃南部和西部、湖北西部。

全草：甘、淡，凉。清热化痰，补虚止痛，润肺止咳。用于肺痨咳嗽，泄泻，肝炎。

**尼泊尔香青**　香草(甘肃)，清明草(四川)，打火草(西藏常用中草药)

**Anaphalis nepalensis** (Spreng.) Hand.-Mazz.——*Elichrysum nepalensis* Spreng.

生于海拔1 000—4 500米的高山或亚高山草地、林缘、沟边、岩石上或草丛中。分布于西南及陕西南部、甘肃南部及西南部、青海。

全草(打火草)：甘，平。清热解毒，止咳定喘。用于感冒，咳嗽痰喘，风湿关节痛，高血压症。

**香青**　通肠香(安徽、浙江)，牛香草(安徽)，萩、簇辫(尔雅)，白四棱锋、枫茄香（中药大辞典)

**Anaphalis sinica** Hance

生于海拔400—2 200米的山坡、灌丛、林下、溪岸、草地或田边。分布于山西、陕西、甘肃、宁夏、江苏、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖北、湖南、广西、四川。

全草：苦，温。解表祛风，消肿止痛，镇咳平喘。用于感冒头痛，咳嗽，咳嗽痰喘，泄泻，吐泻。

**蜀西香青**

**Anaphalis souliei** Diels

生于海拔3 000—4 200米的高山和亚高山草地、林下或灌丛中。分布于青海东南部、四川西部、云南德钦。

全草：苦、辛，凉。活血散瘀，平肝潜阳，祛痰止咳。

**萌条香青**　五香花(云南丽江)

**Anaphalis surculosa** (Hand.-Mazz.) Hand.-Mazz.——*A. pterocaula* Maxim. var. *surculosa* Hand.-Mazz.

生于海拔180—2 700米的空旷草地及灌丛中。分布于四川西北部及西部、云南西北

部。

全草：用于感冒，头痛，急性吐泻。

## 山黄菊属　Anisopappus Hook. et Arn.

**山黄菊**　　旱山菊(广西)

**Anisopappus chinensis** (L.) Hook. et Arn.——*Verbesina chinensis* L.

生于海拔840—2 100米的干燥山坡、沙地、荒地上、阴湿山坡或林缘。分布于福建、广东、海南、广西、贵州、云南。

花序：苦，凉。清热化痰。用于感冒头痛，慢性咳嗽痰喘。　叶：消肿止痛。

## 蝶须属　Antennaria Gaertn.

**蝶须**　　兴安蝶须(东北植物检索表)，宝拉于-塔布格(蒙语)

**Antennaria dioica** (L.) Gaertn——*Gnaphalium dioica* L.

生于海拔2 400—2 700米的中山和亚高山地带的向阳湿润草地、干燥坡地、砂砾地或草甸。分布于黑龙江兴安岭、新疆阿尔泰山和天山。

全草：止咳，愈伤。用于创伤，咳嗽。

## 牛蒡属　Arctium L.

**牛蒡**　　然娃娃(陕西宜君)，弯把钩子、土大桐子、鼠尖子、万把钩(江苏)，鼠粘草(名医别录)，夜叉头(救荒本草)，象耳朵、老母猪耳朵、老鼠愁、鼠见愁(中药大辞典)

**Arctium lappa** L.

生于海拔400—4 000米的山地旷野、沟边、山坡、路旁、河滩草地、村旁或沟谷两岸。分布于全国各地。

根(**牛蒡根**)：苦、辛，凉。清热解毒，疏风利咽，消肿。用于风热感冒，咳嗽，咽喉痛，疮疖肿毒，脚癣，湿疹。　茎叶：甘。用于头风痛，烦闷，金疮，乳痈，皮肤风痒。　果实(**牛蒡子**)：辛、苦，凉。疏风散热，宣肺透疹，解毒利咽。用于风热感冒，头痛，咽喉痛，痄腮，疹出不透，痈疖疮疡。

附　注：果实为《中华人民共和国药典》1990年版收载。鲜全草为《中华人民共和国药典》1990年版附录收载。

**毛头牛蒡**

**Arctium tomentosum** Mill.

生于荒地、沟边或路旁。分布于新疆天山。

根：清热解毒，疏风利咽。　果实：辛、苦，凉。疏散风热，宣肺透疹，散结解毒。

附　注：新疆特有药用植物。

## 蒿属 Artemisia L.

**中亚苦蒿**

**Artemisia absinthium** L.

生于海拔1 100—1 500米的干山坡、荒地、路旁、宅旁、草原、林中空地、荒滩、灌丛或林缘。分布于新疆天山以北地区。

全草：健胃，驱虫，消炎，利尿。　叶：温经散寒，止痛止血，杀虫。

附　注：全草含苦味素，常作饮料的苦味剂。

**东北丝裂蒿**　看阿中、若尔盖(四川)，阿氏蒿(全国中草药汇编)，丝叶蒿(内蒙古植物志)

**Artemisia adamsii** Bess.

生于低海拔地区的河湖岸边、盐渍化草原、草甸、石质草原或小山坡上。分布于黑龙江西部、内蒙古东部。

全草：苦，凉。清热解毒，健胃。用于风热咳嗽，吐泻，咽喉痛，乳蛾。

**碱蒿**　大蒟萝蒿(中国高等植物图鉴)

**Artemisia anethifolia** Weber

生于海拔800—2 300米的山坡、干河谷、碱性滩地、盐渍化草原、田边及固定沙丘。分布于东北西部、华北北部、西北。

幼苗：清热利湿，清肝利胆。

附　注：本种可作茵陈的代用品。

**茴蒿**

**Artemisia anethoides** Mattf.

生于海拔3 300米以下的干山坡、河、湖边砂地、荒地、路旁、宅旁、盐碱地、草原、半荒漠草原或森林草原。分布于东北、华北、西北及山东北部、河南北部、四川北部。

幼苗：苦、辛，凉。清热利湿，利胆退黄。

附　注：本种为茵陈的代用品之一。

**狭叶牡蒿**

**Artemisia angustissima** Nakai

生于低海拔的山坡及路旁。分布于东北、华北及陕西、甘肃、山东、江苏、河南。

全草：凉血，解暑。

附　注：本种常与牡蒿混用。

**黄花蒿**　黄蒿(陕西、江苏)，臭蒿(陕西、江苏、安徽)，野茼蒿、香蒿、苦香蒿、苦蒿(江苏)，假香菜、香丝草(海南)，野蒿、良蒿(贵州)

**Artemisia annua** L.

生于海拔450—3 700米的荒坡、路旁、旷野、草地、河岸、村旁、沟边、草原、森林草原、干河谷及半荒漠砾质坡地。分布于全国各地。

全草(青蒿)：辛、苦，凉。清热凉血，截疟，退虚热，解暑。用于肺痨潮热，疟疾，伤暑低热，无汗，小儿惊风，泄泻，恶疮疥癣，灭蚊。　根：用于劳热，骨蒸，关节酸疼，大便下血。

果实：甘，凉。清热明目，杀虫。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。② 本种含青蒿素，治疟疾效果极佳。

**奇蒿**　六月霜(江苏)，六月雪(安徽)，六月白(广西)，苦连婆（闽东本草），金寄奴(日华子本草)

**Artemisia anomala** *S. Moore*

生于低海拔地区的林下、林缘、灌丛、路旁、沟边、河岸、荒坡或旷野。分布于华东、中南及四川东部、贵州、云南。

全草(刘寄奴)：辛、苦，平。清暑利湿，活血行瘀，通经止痛。用于中暑，头痛，泄泻，经闭腹痛，风湿关节痛，跌打损伤，外伤出血，乳痈。

**密毛奇蒿**

**Artemisia anomala** S. Moore var. **tomentella** Hand.-Mazz.

生于林缘、灌丛、路边、河岸或荒坡。分布于浙江、江西、湖北、湖南、广东、广西。

全草：清热解毒，利湿，消食，止痛，消炎；也用于血丝虫病。

**艾蒿**　土艾、大叶艾、野艾(江苏)，艾叶(陕西、安徽)，艾(诗经)，家艾(医林纂要)

**Artemisia argyi** Lévl. et Vant.

生于海拔 2 000—2 800 米的林缘、荒坡、路旁、草地、荒野、河谷两岸及岩石旁，或栽培。分布于东北、华北、华东、中南及陕西、四川、贵州、云南。

叶(艾叶、陈艾)：苦、辛，温。散寒，除湿，温经，止血，安胎。用于崩漏，先兆流产，痛经，月经不调，湿疹，皮肤瘙痒；外用于关节酸痛，腹中冷痛，湿疹，疥癣。果实(艾实)：苦、辛，热。明目，壮阳，利腰膝，暖子宫。

附　注：① 作艾灸用。② 功效相同的有**朝鲜艾蒿 A. argyi** Lévl. et Vant. var. **gracilis** Pamp.，分布于东北、华北。③ 艾叶为《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**暗绿蒿**

**Artemisia atrovirens** Hand.-Mazz.

生于海拔 2 400 米以下的山坡、草地或路旁。分布于中南及陕西、甘肃、安徽、浙江、江西、福建、四川、贵州、云南。

叶：散寒，止痛，温经，止血。

附　注：可作艾蒿的代用品。

**山蒿**　乌拉-音-沙巴嘎(蒙语)，岩蒿(内蒙古中草药)

**Artemisia brachyloba** Franch.

生于阳坡草地、砾质坡地、半荒漠草原、戈壁或岩石缝中。分布于华北及陕西北部、甘肃、宁夏。

全草(岩蒿)：苦、辛，平。清热燥湿，消炎，杀虫。用于偏头痛，咽喉痛，风湿关节痛。

附　注：年老，体弱，孕妇忌服。

**茵陈蒿**　白蒿、青蒿、桐蒿草、棉茵陈、臭蒿(江苏)，猴子毛、绒蒿(江苏、安徽)，小马尿蒿、土茵陈(贵州)，茵陈(本草经集注)

**Artemisia capillaris** Thunb.

生于海拔 300—3 200 米的路边、荒草丛、河滩、田边、旷野、河岸及海岸附近的湿润砂

地上。分布于华东、中南及辽宁、河北、山西、陕西、甘肃、宁夏、新疆、四川、贵州。

幼嫩茎叶(茵陈蒿)：苦、辛，凉。清热利湿，利胆退黄。用于黄疸，胆囊炎，膀胱湿热，风痒疮疥。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**青蒿**　香蒿(说文)，黑蒿(山东中药)

**Artemisia caruifolia** Buch.-Ham.——*A. apiacea* Hance

生于海拔 400—2 800 米的荒坡、路旁、沟坎、海边湿地、河岸、林缘、草地及村旁。分布于东北、华东、中南及河北、山西、陕西、甘肃、新疆、四川、贵州、云南。

根(青蒿根)：用于痨热骨蒸，关节酸痛，大便下血。　果实(青蒿子)：甘，凉。清热明目，杀虫。用于痨热骨蒸，泄泻，恶疮，疥癣，风疹。　全草(青蒿)：苦、微辛，凉。清热，解暑，除蒸。用于温病，暑热，痨热骨蒸，疟疾，泄泻，黄疸，疥疮，瘙痒。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**大头青蒿**　大花青蒿(云南中药名录)

**Artemisia caruifolia** Buch.-Ham. var. **schochii** (Mattf.) Pamp.——*A. schochii* Mattf.; *A. apiacea* Hance var. *schochii* (Mattf.) Hand.-Mazz.

生于山坡荒地及草坡。分布于江苏、江西、湖北、湖南、广东、广西、贵州、云南。

全草：清热解暑，祛风止痒。

**锥那蒿**

**Artemisia conaensis** Ling et Y. R. Ling

生于海拔 3 000—4 000 米的田边、滩地及砾质地。分布于西藏错那、加查、朗县。

全草：清热，止咳。

附　注：西藏特有药用植物。

**纤杆蒿**

**Artemisia demissa** Krasch.

生于海拔 2 600—4 800 米的山谷、山坡、路旁、草坡、砂质或砾质草地上。分布于内蒙古、甘肃、青海、四川、西藏。

幼嫩茎叶：用作茵陈的代用品。

**侧蒿**

**Artemisia deversa** Diels

生于海拔 1 000—2 300 米的山谷、林下、林缘、坡地及河边。分布于陕西南部、甘肃东南部、湖北西部、四川东北部。

全草：苦，凉。清热解毒，止泻。用于热淋，泄泻。

附　注：秦岭、大巴山地区的特有药用植物。

**龙蒿**　草蒿(青海)，狭叶青蒿(新疆中药名录)

**Artemisia dracunculus** L.

生于海拔 500—3 800 米的亚高山草甸、山坡、草原、半荒漠草原、森林草原、林缘、田边、路旁、干河谷或河岸阶地。分布于东北、华北及西北。

全草：清热凉血，退虚热，解暑。用于暑湿发热。

附　注：功效相似的有**宽裂龙蒿 A. dracunculus** L. var. turkestanica Krasch.,

分布于新疆。

**牛尾蒿**

**Artemisia dubia** Wall. ex Bess.

生于海拔 3 500 米以下的疏林下、林缘、山坡或草原。分布于内蒙古、甘肃、四川、云南、西藏。

全草：清热，解毒，镇咳。

**无毛牛尾蒿**　牛尾蒿(通称)

**Artemisia dubia** Wall. ex Bess. var. **subdigitata** (Mattf.) Y. R. Ling——*A. subdigitata* Mattf.

生于海拔 800—3 600 米的山坡、林缘、荒坡石滩、石缝、河边、路旁、沟谷、田野或沙地。分布于华北及陕西、甘肃、宁夏、青海、山东、河南、湖北、广西、四川、贵州、云南。

全草(茶绒)：辛，温。止咳，化痰，平喘。用于慢性咳嗽痰喘。

**直茎蒿**　察尔汪(藏语)，劲直蒿(中药大辞典)，短叶蒿(全国中草药汇编)

**Artemisia edgeworthii** Balakr.——*A. stricta* Edgew.

生于海拔 2 200—4 700 米的山坡、林缘、灌丛、路旁、河滩、荒地、田边或村旁。分布于甘肃、青海、新疆、四川、云南、西藏。

幼苗：苦、辛，凉。清热利湿。

附　注：西藏以幼苗作茵陈用，系代用品。

**峨眉蒿**

**Artemisia emeiensis** Y. R. Ling

生于林下、谷地、路旁、荒山或坡地。分布于四川。

全草：清热解毒，杀虫。

附　注：四川特有药用植物。

**南牡蒿**

**Artemisia eriopoda** Bunge

生于海拔 1 700 米以下的疏林中、林缘、灌丛、草坡、路旁、溪边、山谷河滩、荒地草丛或沙质地上。分布于华北及吉林、辽宁、陕西、山东、江苏、安徽、河南、湖北、湖南、四川、云南。

带根全草：苦、甘，温。祛风除湿，解毒。用于风湿关节痛，头痛，浮肿，毒蛇咬伤。

附　注：作黄花蒿或牡蒿的代用品。

**冷蒿**　白蒿、小白蒿、刚蒿(全国中草药汇编)

**Artemisia frigida** Willd.

生于海拔 1 000—4 000 米的高山草甸、森林草原、草原、荒漠草原、干旱或半干旱山坡、路旁、固定沙丘或戈壁上。分布于东北东部、华北北部、西北及西藏。

带花序全草(小白蒿)：辛，温。燥湿，杀虫。用于胆囊炎，蛔虫病，蛲虫病。

附　注：东北及新疆部分地区以幼苗作茵陈用，系代用品。

**湘赣蒿**

**Artemisia gilvescens** Miq.

生于低海拔地区的山坡、灌丛或林缘。分布于江西、湖北、湖南、四川。

全草：作艾蒿的代用品。

附　注：用作艾蒿代用品的有**岐茎蒿 A. igniaria** Maxim.，分布于东北、华北及陕西、山东、河南；**辽宁蒿 A. verbenacea** (Kom.) Kitag.，分布于东北、华北、西北及四川西部。

**细裂叶莲蒿**　铁杆蒿(陕西)，蚊烟草(广西)，白蒿(云南)，白莲蒿（中国植物图鉴）

**Artemisia gmelinii** Web. ex Stechm.

生于海拔 1 500—4 900 米的山坡灌丛、草原、半荒漠草原、草甸、砾质阶地、砂地、村边及路旁。分布于西北及黑龙江、辽宁、内蒙古、山东、江苏、湖北、广西、四川、贵州、西藏。

全草(万年蒿)：苦、辛，平。清热解毒，凉血止血。用于泄泻，肠痈，小儿惊风，阴虚潮热，创伤出血。

**盐蒿**　差把嘎蒿、沙蒿、沙漠蒿(吉林)，差不嘎蒿(东北植物检索表)

**Artemisia halodendron** Turcz. ex Bess.

生于流动、半流动或固定的沙丘上、荒漠草原、草原、森林草原、砾质坡地、河岸沙地及盐土地上。分布于东北、华北、西北。

嫩枝、叶(沙漠嘎)：辛，温。祛痰止咳，平喘解表，祛湿。用于慢性咳嗽痰喘，感冒，风湿关节痛。

**臭蒿**　狼尾巴蒿(青海)，桑子那保(藏语)

**Artemisia hedinii** Ostenf.

生于海拔 2 000—5 000 米的山坡、林缘、湖边、草地、河滩、砾质坡地、田边、路旁及沟谷。分布于内蒙古、甘肃、宁夏、青海、新疆、四川、云南、西藏。

全草：辛、微苦，凉。清热解毒，凉血，消肿，除湿退黄，杀虫。

**五月艾**　小野艾、艾叶(贵州)

**Artemisia indica** Willd.——*A. vulgaris* L. var. *indica* Maxim.

生于低海拔或中海拔湿润地区的林缘、灌丛、草坡、路旁或荒野。全国除西北干旱、高原地区外，其它省区均有分布。

叶：理气血，逐寒湿，止血，温经，安胎。用于痛经，崩漏，胎动不安。全草(鸡脚蒿)：利膈，开胃，温经。用于慢性咳嗽痰喘，风湿关节痛，止血，(敷洗)疮毒。

附　注：作艾蒿的代用品。

**柳叶蒿**

**Artemisia integrifolia** L.

生于低海拔或中海拔湿润或半湿润地区的林缘、灌丛、路旁、河边草地、草甸、森林草原及沼泽地的边缘。分布于东北及内蒙古东部、河北。

全草：苦，凉。有小毒。清热解毒。用于痈疽疮肿，风湿关节痛。

**牡蒿**　牛尾蒿、白花蒿、香青蒿、熊掌草(江苏)，齐头蒿(唐本草)，油蒿、马连蒿（浙江民间常用草药)，流尿蒿(四川中药志)

**Artemisia japonica** Thunb.

生于海拔 500—2 500 米的山谷河滩、山坡、草地、林下或路边草丛中。全国除黑龙江、吉林、内蒙古、宁夏、青海、新疆外，均有分布。

全草：苦、甘，平。清热凉血，解暑。用于感冒发热，中暑，疟疾，肺痨潮热，高血压症，

创伤出血，疔疖肿毒。 根(牡蒿根)：苦、微甘，温。用于风湿痹痛，寒湿浮肿。

**海南牡蒿**

**Artemisia japonica** Thunb. var. **hainanensis** Y. R. Ling

生于路边及林缘。分布于海南。

全草：清热解毒，祛风，祛湿，健胃，止血。或代青蒿用。

附　注：海南特有药用植物。

**菴蔺**

**Artemisia keiskeana** Miq.

生于山坡、林下、灌丛、山坡草丛、路旁及石砾缝中。分布于东北及河北、山东。

果实(菴蔺子)：苦、辛，温。行瘀，祛湿。用于血瘀经闭，产后停瘀腹痛，跌打损伤，身体诸痛。 全草：辛、苦，温。通经，止血，祛湿。

附　注：无瘀滞湿热者慎服，孕妇忌服。

**白苞蒿**　肺痨草(安徽)，鸭脚菜、甜艾(广西)，土鲫菜(福建中药志)，鸭脚艾、四季菜(广州植物志)

**Artemisia lactiflora** Wall. ex DC.

生于海拔 400—2 300 米的山坡、灌丛、林缘、路旁、村边、山谷阴处、溪旁、沟岸及草地上。分布于华东、中南及陕西南部、甘肃南部、四川、贵州、云南。

全草(鸭脚艾)：甘、微苦，平。理气，活血，调经，利湿，解毒，消肿。用于月经不调，经闭，慢性肝炎，肝硬化，水肿，带下病，癥瘕，腹胀，疝气。

**白山蒿**　石艾(黑龙江)

**Artemisia lagocephala** Fisch. ex Bess.

生于山地针叶林带及相邻的森林草原带内多石质山坡和岩石裸露处。分布于黑龙江、内蒙古。

叶：镇咳，祛痰，平喘，抗过敏。用于慢性支气管炎，尤对喘息型慢性支气管炎远期疗效较佳。

**矮蒿**　青蒿、细叶蒿(广西)

**Artemisia lancea** Vant.——*A. feddei* Lévl. et Vant.

生于疏林下、山坡、林缘、路旁、荒坡或草地上。全国除甘肃、宁夏、青海、新疆、西藏外，其它省区均有分布。

根：用于淋证。 叶(细叶艾)：辛、苦，温。有小毒。散寒止痛，温经止血。用于小腹冷痛，月经不调，宫冷不孕，吐血，衄血，崩漏，妊娠下血，皮肤瘙痒。

附　注：作艾蒿与茵陈的代用品。

**野艾蒿**　蕲艾(安徽、四川)，祈艾(广西)

**Artemisia lavandulaefolia** DC.

生于低海拔或中海拔地区的山坡、林缘、灌丛、路旁、河湖边、山谷、田边或草地上。分布于东北、华北、华东、中南及陕西、甘肃、宁夏、四川、贵州、云南。

叶：苦、辛，温。散寒除湿，温经止血，安胎。用于崩漏，先兆流产，痛经，月经不调，湿疹，皮肤瘙痒。

附　注：作艾蒿的代用品。

**白叶蒿**

**Artemisia leucophylla** (Turcz. ex Bess.) C. B. Clarke——*A. vulgaris* L. var. *leucophylla* Turcz. ex Bess.

生于低海拔至4 000米的山坡、林缘、路旁、草地、河湖岸边及砾质坡地。分布于东北、华北、西北、西南。

叶：散寒除湿，温经止血，安胎。

附　注：作艾蒿的代用品。

**滨海牡蒿**

**Artemisia littoricola** Kitam.

生于低海拔地区的河岸、盐碱化或沼泽化的草地上。分布于黑龙江西部、内蒙古呼伦贝尔盟。

全草：清热凉血，解暑。

附　注：作牡蒿的代用品。

**大花蒿**

**Artemisia macrocephala** Jacq. ex Bess.

生于海拔1 500—4 850米的草原、荒漠草原、森林草原、山谷、洪积扇、河湖岸边、砂砾地、草坡、路边、盐碱地、河滩、山坡及林缘。分布于西北及西藏南部。

全草：健胃消食，祛风活血，散瘀消肿。

附　注：可作兽药。

**小亮苞蒿**　　东川蒿(云南种子植物名录)

**Artemisia mairei** Lévl.

生于海拔2 000—3 600米的山坡或旷野。分布于云南东川、昆明及会泽。

全草(滇茵陈)：除湿热，散风解郁，发汗利尿。

附　注：云南特有药用植物。

**东北牡蒿**

**Artemisia manshurica** (Kom.) Kom.——*A. japonica* Thunb. *β. manshurica* Kom.

生于湿润、半湿润地区的山坡、林缘、灌丛、草原、森林草原、路旁或沟边。分布于东北及河北北部。

全草：消炎，止血，清热，杀虫。

**粘毛蒿**

**Artemisia mattfeldii** Pamp.

生于海拔2 600—4 700米的山坡、林缘、荒地、河滩、路旁及村庄。分布于甘肃西南部、青海南部、四川西部、西藏东部。

全草：苦，辛。清肝利胆，消肿解毒。

**蒙古蒿**

**Artemisia mongolica** (Fisch. ex Bess.) Nakai——*A. vulgaris* L. var. *mongolica* Fisch. ex Bess.

生于山坡灌丛、河湖岸边、路旁、草原、草甸、干河谷及沙丘上。分布于东北、华北、西

北及江西、福建、台湾、广东、广西、四川、贵州。

茎叶：辛、苦，温。散寒除湿，温经止血，清热凉血，解暑。

附　注：作艾蒿的代用品。

**小球花蒿**

**Artemisia moorcroftiana** Wall. ex DC.

生于海拔 2 000—5 000 米的山坡、河滩、干河谷、田边、台地、砂砾地、坡地、亚高山或高山草原及草甸。分布于西南及甘肃、宁夏、青海。

全草：消肿止血，祛风杀虫。

**多花蒿**

**Artemisia myriantha** Wall. ex Bess.

生于海拔 1 000—2 800 米的山坡、灌丛及路旁。分布于山西中条山、甘肃南部、青海、广西、四川、贵州、云南。

全草：外用作消炎剂。

**黑沙蒿**　哈拉-沙巴嘎(蒙语)，油蒿(内蒙古中草药)，鄂尔多斯蒿(中国沙漠地区药用植物)

**Artemisia ordosica** Krasch.

生于海拔 1 500 米以下的荒漠、半荒漠地区的流动与半流动沙丘或固定沙丘上、干草原或干旱的坡地上。分布于华北、西北。

根：辛、苦，微温。止血。用于鼻衄，吐血，崩漏。枝叶及花蕾(黑沙蒿)：辛、苦，微温。祛风湿，提脓拔毒。用于风湿关节痛，感冒，咽喉痛，疮疖痈肿。种子(黑沙蒿子)：利水。用于小便淋痛不利。

**东方蒿**

**Artemisia orientali-hengduangensis** Ling et Y. R. Ling——*A. roxburghiana* Bess. var. *orientalis* Pamp.

生于海拔 2 300—3 200 米的山坡、灌丛、路旁、草地及荒地上。分布于四川西部、云南西部。

全草：清热解毒。

附　注：功效相似的有**西南牡蒿 A. parviflora** Buch.-Ham. ex Roxb.，分布于陕西、甘肃、青海、湖北、四川、云南、西藏。

**伊朗蒿**

**Artemisia persica** Boiss.

生于海拔 2 900—3 300 米或更高地区的砾质坡地或砂地。分布于青海西部、西藏南部。

全草：清热止血，祛风，祛湿，止痛。

**魁蒿**　五月艾(广西)

**Artemisia princeps** Pamp.

生于海拔 200—1 600 米的山坡、林缘、灌丛、路旁、沟边及旷野。分布于华北、华东、中南及辽宁、陕西、四川、贵州、云南。

叶：辛、苦，温。解毒消肿，散寒除湿，温经止血。用于月经不调，经闭腹痛，崩漏，产后腹痛，腹中寒痛，胎动不安，鼻衄，肠风出血，赤痢下血。

附　注：作艾蒿的代用品。

**秦岭蒿**

**Artemisia qinlingensis** Ling et Y. R. Ling

生于海拔 1 300—1 500 米的山坡、林缘及路旁。分布于陕西南部、甘肃东部、河南西南部。

全草：作艾蒿的代用品。

附　注：秦岭地区的特有药用植物。

**灰苞蒿**

**Artemisia roxburghiana** Bess.

生于海拔 700—3 900 米的荒地、干河谷、阶地、路旁、草地或田埂。分布于西南及陕西南部、甘肃南部、青海、湖北西部。

全草：甘、苦，凉。清热解毒，除湿，止血。用于痈疽疮毒。

附　注：可作艾蒿的代用品。

**岩蒿**　一枝蒿(新疆)

**Artemisia rupestris** L.

生于海拔 1 100—2 900 米的干山坡、林下、荒漠草原、半荒漠草原、草甸、冲积平原、干河谷地带及森林草原带的砾石山坡上。分布于新疆阿尔泰山、天山、昆仑山。

全草(一枝蒿)：辛，微凉。清热解毒，健胃消食，活血散瘀。用于胃痛，胃胀，痛经，痔疮出血，无名肿毒，跌打损伤，毒蛇咬伤，癣疹，神经性皮炎。

**白莲蒿**　万年蒿、铁秆蒿(全国中草药汇编)

**Artemisia sacrorum** Ledeb.

生于低海拔地区的山坡、林缘、灌丛、森林草原、山谷、路旁、河滩及草地上。除台湾、西藏未见分布外，全国均有分布。

全草(万年蒿)：苦、辛，平。清热解毒，凉血止血。用于肝炎，肠痈，小儿惊风，阴虚潮热，创伤出血。

附　注：① 东北部分地区作茵陈的代用品。② 功效与分布相同的有**灰莲蒿 A. sacrorum** Ledeb. var. **incana** (Bess.) Y. R. Ling

**密毛白莲蒿**

**Artemisia sacrorum** Ledeb. var. **messerschmidtina** (Bess.) Y. R. Ling——*A. messerschmidtina* Bess.

生于低海拔地区的山坡及路旁。分布于东北、华北、西北及山东、江苏、河南。

全草：清热解毒，止血，利湿。

附　注：可作茵陈的代用品。

**猪毛蒿**　滨蒿、北茵陈(中药大辞典)

**Artemisia scoparia** Waldst. et Kit.

生于海拔 300—2 250 米的山坡、灌丛、林缘、路旁、草原、黄土高原、荒漠边缘、河滩荒地、海边、田边、山坡草丛、砂地及河岸盐碱地。除东部、东南部沿海地区不产外，分布几遍全国。

幼嫩茎叶(茵陈蒿)：苦、辛，凉。清热利湿，利胆退黄。用于黄疸，尿少，湿疮瘙痒，风

痒疥疮。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**蒌蒿**　蒌蒿子、水艾、小蒿子(江苏)，水蒿(江苏、安徽)，狭叶艾(安徽、四川、贵州)

**Artemisia selengensis** Turcz. ex Bess.

生于海拔1 000—3 000米的疏林中、林缘、山坡、山谷、荒地、路旁、河边及湿地上。我国除福建、台湾、广东、广西、西藏外，其它省、区均有分布。

全草(红陈艾)：苦、辛，温。破血行瘀，下气通络。用于黄疸，产后瘀积，小腹胀痛，跌打损伤，瘀血肿痛，内伤出血。

**大籽蒿**　小艾叶、洋艾(贵州)，白艾蒿(僧深集方)，蓬蒿(开宝本草)

**Artemisia sieversiana** Willd.

生于海拔500—4 200米的山坡、林缘、路旁、田边、旷野、荒地、河漫滩、草原、森林草原、河岸及杂草地上。分布于东北、华北、西北、西南及山东、江苏、福建、河南。

全草及花蕾(白蒿)：苦，凉。清热解毒，消炎止痛。用于痈肿疔毒，黄水疮，皮肤湿疹，宫颈糜烂。

**球花蒿**

**Artemisia smithii** Mattf.

生于海拔3 200—4 600米的中高山草原、草甸或山坡上。分布于甘肃南部、青海久治、四川西部。

全草：消肿解毒，杀虫。

**圆头蒿**　白沙蒿(陕西中药名录)

**Artemisia sphaerocephala** Krasch.

生于海拔1 000—2 850米的荒漠地区的流动、半流动、固定沙丘或干旱荒坡上。分布于西北及内蒙古西南部、山西北部。

果实(白沙蒿)：辛，平。消肿散瘀，利气宽胸，杀虫。用于疟腮，乳蛾，疮疖，腹胀。

**阴地蒿**　毛蒿(湖北)，野蒿(湖北、贵州)

**Artemisia sylvatica** Maxim.

生于海拔650—2 000米的林下、林缘、灌丛下阴湿处。分布于东北、华北及陕西、甘肃、青海、浙江、安徽、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

全草：用于崩漏，带下病，经闭，腹痛。

附　注：可作艾蒿的代用品。

**裂叶蒿**

**Artemisia tanacetifolia** L.

生于海拔2 000米以下的林下、林缘、灌丛、森林草原、草原、草甸、草坡、河滩、荒地及村庄。分布于东北、华北北部及陕西北部、甘肃北部、宁夏、青海。

全草：清肝利胆，消肿解毒。

**甘青蒿**

**Artemisia tangutica** Pamp.

生于海拔3 000—3 800米的山坡、路旁、河边或砂地上。分布于甘肃中部与西南部、四川西部、西藏东部。

全草：平喘，退热。

**湿地蒿**

**Artemisia tournefortiana** Reichb.

生于海拔 800—1 500 米的滩地、山谷、田野、坡地及疏林下。分布于新疆、西藏西部。

全草：清热，解毒，止血。

附　注：本种在新疆药用。

**南艾蒿**

**Artemisia verlotorum** Lamotte

生于山坡、田边及路旁。除华北、西北干旱地区外，全国均有分布。

根、叶：散寒，止痛，止血。用于淋证。

附　注：作艾蒿的代用品。

**毛莲蒿**　　蚊子艾(广西)，普尔那(藏语)，结血蒿、万年蓬(全国中草药汇编)

**Artemisia vestita** Wall. ex Bess.

生于海拔 4 000 米以下的山坡、山麓、灌丛、林缘、林中空地、草地、田边、路旁及旷野。分布于西北、西南及河北、内蒙古、湖北西部、广西西北部。

全草(结血蒿)：苦，凉。清虚热，健胃，祛风止痒。用于瘟疫内热，四肢酸痛，骨蒸发热。

**北艾**　　五月艾、火艾(中药大辞典)，野艾、田艾蒿、野蒿(贵州中药名录)

**Artemisia vulgaris** L.

生于海拔 1 500—2 500 米的灌丛、林缘、草原、森林草原、山涧、河谷、坡地、荒野、路边及渠边。分布于陕西秦岭、甘肃西部、青海、新疆、四川西部、贵州。

叶(艾叶)：苦、辛，温。理气血，驱寒湿，温经，止血，安胎。用于心腹冷痛，泄泻，月经不调，崩漏，带下病，胎动不安，痈疡，疥癣。

附　注：以往文献记载的"艾蒿" *Artemisia vulgaris* auct. non Linn.，实际上包括了艾蒿 *A. argyi* Lévl. et Vant.，野艾蒿 *A. lavandulaefolia* DC.，南艾蒿 *A. verlotorum* Lamotte，蒙古蒿 *A. mongolica* (Fisch. et Bess.) Nakai，五月艾 *A. indica* Willd.，魁蒿 *A. princeps* Pamp. 及歧茎蒿 *A. igniaria* Maxim. 等多种复合群体的混称。

**藏沙蒿**

**Artemisia wellbyi** Hemsl. et Pers.

生于海拔 3 600—5 300 米的河湖边、砂砾地、山坡草地、砾质坡地、高山草原及草甸。分布于西藏。

全草：清热，止血。

附　注：本种为藏药。

## 紫菀属　Aster L.

**三脉紫菀**　　红管药(安徽)，野白菊(广西)，山白菊(四川、贵州)，白升麻(贵州)，野白菊花(植物名实图考)

**Aster ageratoides** Turcz.

生于海拔 100—3 350 米的林下、林缘、灌丛、山谷湿地、水沟及路旁。分布几遍全国。

带根全草(红管药): 苦、辛,凉。清热解毒,利尿止血。用于咽喉肿痛,咳嗽痰喘,乳蛾,疟腮,乳痈,小便淋痛,痈疖肿毒,外伤出血。

**异叶紫菀**　玉米托子花(河北)

**Aster ageratoides** Turcz. var. **heterophyllus** Maxim.

生于低海拔到中海拔地区的林下、林缘、灌丛及山谷湿地。分布于河北、山西、陕西、甘肃、河南、湖北、四川、云南北部。

根(紫菀): 苦,凉。润肺,化痰,止咳。用于咳嗽痰喘,肺痈咯血。

附　注: 本种在甘肃药用。

**毛枝紫菀**　细叶六月雪(广西),大柴胡、银柴胡、马兰头(贵州),毛茎马兰 (全国中草药汇编)

**Aster ageratoides** Turcz. var. **lasiocladus** (Hayata) Hand.-Mazz. ——*A. lasiocladus* Hayata

生于山坡林下、阴湿沟边、草坡或田埂上。分布于安徽、江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全草(青箭杆草): 微苦、辛,凉。散风热,理气,止痛,解毒。用于风热感冒, 头痛,咳嗽,胸痛,周身疼痛,蛇咬伤,烧、烫伤。

**宽伞紫菀**　红管药(湖北)

**Aster ageratoides** Turcz. var. **laticorymbus** (Vant.) Hand.-Mazz. ——*A. laticorymbus* Vant.

生于山坡。分布于陕西、安徽、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

全草(红管药): 清热解毒,利尿,止血。

**小花紫菀**　山白菊、野鸡尾巴(湖北)

**Aster ageratoides** Turcz. var. **micranthus** Ling

生于海拔 800—1 600 米的山坡、林下、灌丛或沟边草丛中。分布于湖北、四川。

全草: 清热解毒,疏风。

**卵叶紫菀**　山白菊(浙江)

**Aster ageratoides** Turcz. var. **oophyllus** Ling

生于山坡疏林下、丘陵、山谷两旁、路边或水沟边草丛中。分布于陕西、浙江、湖北、四川、云南。

根、全草: 苦、辛,凉。清热解毒,理气止痛,凉血止血。

**微糙紫菀**　野粉团儿(湖南),鸡儿肠(救荒本草),马兰 (江苏南部种子植物手册),山白菊(广州植物志)

**Aster ageratoides** Turcz. var. **scaberulus** (Miq.) Ling——*A. scaberulus* Miq.

生于山坡林下、林缘、路旁、荒山或草丛中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草(山白菊): 清热解毒,祛痰止咳,疏风。用于感冒发烧,头痛,蛇伤。

**翼柄紫菀**　伏花、九灵光(湖北),柴胡、大柴胡、红柴胡(中国植物志)

**Aster alatipes** Hemsl.

生于海拔 800—1 600 米的山坡或山沟阴湿处或溪岸。分布于陕西商县、湖北秭归及房县。

全草(九灵光): 清热,活血,止渴,止汗;也用于疮疥。

**小舌紫菀**

**Aster albescens** (DC.) Hand. -Mazz.——*Amphirhapis albescens* DC.

生于海拔 500—4 100 米的低山至高山林下、灌丛中或路旁。分布于西南及陕西南部、甘肃南部、湖北。

全草(石灰条): 苦,凉。解毒消肿,杀虫,止咳。

**高山紫菀**

**Aster alpinus** L.

生于海拔 2 100—2 900 的亚高山多石山坡。分布于东北及河北西北部、山西宁武、甘肃舟曲、新疆北部。

花序: 清热解毒,润肺止咳。用于咳嗽痰喘。

**星舌紫菀**　　漏庆(藏语),块根紫菀(青海中药名录)

**Aster asteroides** (DC.) O. Kuntze——*Heterochaeta asteroides* DC.

生于海拔 2 700—4 700 米的中山或亚高山灌丛、湿润草地或冰碛物上。分布于青海东部、四川西部、云南西北部、西藏中部及南部。

花序: 辛、苦,凉。清热解毒,降血压。

**耳叶紫菀**　　毛叶子、散药(贵州),银线菊(云南)

**Aster auriculatus** Franch.

生于海拔 1 500—3 000 米的疏林下、林缘、灌丛及草地上。分布于四川西南部至南部、贵州西部、云南东北部至西部。

根: 苦,凉。润肺止咳,清热凉血。用于风热感冒,久咳,多汗,月经过多。 全草: 解毒消肿。用于蛇伤。

**白舌紫菀**

**Aster baccharoides** (Benth.) Steetz.——*Diplopappus baccharoides* Benth.

生于海拔 50—900 米的山坡林缘、路旁、草地或沙地。分布于浙江、江西、福建、湖南、广东、贵州。

全株: 清热解毒,止血生肌,杀虫;也用于感冒。 根: 苦,温。温肺止咳。

**巴塘紫菀**

**Aster batangensis** Bur. et Franch.

生于海拔 3 400—4 400 米的森林和灌丛边缘、草地或石砾地。分布于四川西部及西南部、云南西北部、西藏昌都地区。

根(万年青): 解毒。用于伤寒。

**重冠紫菀**　　漏盂(青海藏语),美多类(四川),寒风参、太阳花(云南)

**Aster diplostephioides** (DC.) C. B. Clarke ——*Heterochaeta diplostephioides* DC.

生于海拔 1 000—4 600 米的高山及亚高山草地、山坡、灌丛或潮湿沟边。分布于甘肃

西部、青海东部、四川西部及西南部、云南西北部、西藏南部。

根(土紫菀)：暖胃，止咳，消痰。花序：清热解毒。

附　注：本种在西藏为紫菀的混淆品种。

**狭苞紫菀**　　漏庆(青海藏语)，线叶紫菀(青海中药名录)

**Aster farreri** W. W. Smith et J. F. Jeffrey

生于海拔 2 700—3 400 米的山坡草丛或亚高山草地。分布于河北北部、山西关帝山及五台山、甘肃南部及东部、青海东部、四川西部。

根及全草(羊眼花)：苦、辛，凉。清热解毒，排脓，利尿，止血。

**萎软紫菀**　　肠经草(陕西)，太白菊(陕西中草药)

**Aster flaccidus** Bunge

生于海拔 1 800—5 100 米的高山及亚高山草地、灌丛或石砾地。分布于我国北部、西北部、西部、西南部及新疆、云南德钦、贡山及西藏东部至南部。

全草(太白菊)：苦、微辛，凉。清热解毒，止咳。用于肺痈，肺痨，风热咳喘，顿咳，目疾。

**灰毛萎软紫菀**

**Aster flaccidus** Bunge f. **griseo-barbatus** Griers.

生于海拔 3 200—4 870 米的高山草地或石砾地。分布于云南西北部、西藏东部及南部。

花序：清热解毒，排脓。用于时行感冒发烧，食物中毒。全草：用于肺痈，风热咳喘，顿咳。

**褐毛紫菀**

**Aster fuscescens** Bur. et Franch.

生于海拔 2 900—4 200 米的高山及亚高山草坡、灌丛边缘、石砾地及沟涧旁。分布于西南。

根：润肺化痰，止咳。

**圆苞紫菀**

**Aster maackii** Regel

生于海拔 900—1 000 米的阴湿坡地、杂木林缘、积水草地和沼泽地。分布于黑龙江带岭及勃利、吉林东部和南部。

全草：用于风湿关节痛，牙痛。

**石生紫菀**　　菊花暗消、野冬菊、肋痛草(云南)

**Aster oreophilus** Franch.

生于海拔 2 300—4 000 米的高山及亚高山针叶林下或山坡路旁。分布于四川西南部、云南北部及西北部。

花序(野冬菊)：苦，凉。清热消肿。用于牙痛，咽喉痛，眼痛，口腔破溃。

**琴叶紫菀**　　大风草(安徽)，鱼鳅串(贵州)，福氏紫菀、岗边菊(全国中草药汇编)

**Aster panduratus** Nees ex Walp.

生于海拔 100—1 400 米的山坡灌丛、林缘、草地、溪岸、路边、山顶、低山坡或丘陵。分布于江苏南部、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

全草(岗边菊)：苦、辛，温。温中散寒，止咳，止痛。用于咳嗽痰喘，慢性胃痛，泄泻，消

化不良，血崩。

**灰枝紫菀**　　漏枪(青海藏语)，灰木紫菀(青海)

**Aster poliothamnus** Diels

生于海拔1 800—3 300米的山坡及溪岸。分布于甘肃南部、青海东部、四川西部。

全草：苦、辛，凉。清热解毒，降血压。

**短舌紫菀**　　接骨草(广西宁明)，小儿还魂草(贵州)，黑根紫菀（全国中草药汇编），桑氏紫菀(广州植物志)

**Aster sampsonii** (Hance) Hemsl.——*Heteropappus sampsonii* Hance

生于山坡草地及灌丛中。分布于湖南、广东、广西、贵州。

根：苦，温。理气活血，消积，止汗。用于小儿疳积，气虚自汗，月经不调。全草：用于骨折。

**狗舌紫菀**

**Aster senecioides** Franch.

生于海拔2 000—3 000米的高山山谷坡地、针叶林下及山顶砾石地上。分布于西南及青海、新疆。

根(黑根药)：祛风除湿，散寒止痛。用于风寒感冒。全草：止血生肌。

**甘川紫菀**

**Aster smithianus** Hand.-Mazz.

生于海拔1 350—3 800米的低山及亚高山沟坡草地、石砾河岸、沼泽地及田埂上。分布于甘肃南部、四川西部、云南西北部。

全草：辛、苦，凉。宣肺化痰，止咳止痛。用于咳嗽痰喘。

**缘毛紫菀**　　西藏紫菀(全国中草药汇编)

**Aster souliei** Franch.

生于海拔1 800—4 600米的高山针叶林缘、灌丛、高山草甸、山坡草地及田野。分布于西南及甘肃南部、青海东北部至东南部。

根状茎：苦，温。润肺化痰，止咳。用于咳嗽痰喘，肺痨。花序：苦，凉。清热解毒，止咳，明目。

**圆耳紫菀**

**Aster sphaerotus** Ling

生于海拔2 700米以下的山地林下或山坡上。分布于广西资源及大苗山。

全草：用于胃脘痛，咳嗽痰喘。

附　注：广西特有药用植物。

**钻形紫菀**

**Aster subulatus** Michx.

生于潮湿碱性的土壤中、潮湿沟边。原产北美。逸生于江苏、浙江、江西、四川、贵州西部、云南中部。

全草(端连草)：苦、酸，凉。清热解毒。用于湿疹，肿毒。

**紫菀**　　青牛舌头花(河北)，小辫子、驴耳朵草(安徽)，青菀(吴普本草)，山白菜、驴夹板菜、还魂草(中国植物志)

Aster tataricus L. f.

生于海拔 400—2 250 米的疏林下、灌丛、林缘、阴湿坡地、山顶、草地、沼泽、河边或栽培。分布于东北、华北、西北及山东、江苏、安徽、浙江、河南、广东、四川、贵州。

根及根状茎(紫菀): 苦,温。润肺,化痰,止咳。用于咳嗽痰喘,肺痨,咯血。

附　注:《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**陀螺紫菀**　　一支香(安徽、浙江),单头紫菀(安徽),百根条(浙江)

**Aster turbinatus** S. Moore

生于海拔 200—800 米的低山山谷、溪岸、林阴地、林缘及溪涧草丛。分布于江苏南部、安徽南部、浙江、江西东部、福建东部至西部。

根(单头紫菀根): 微苦,凉。清热解毒。用于乳蛾,乳痈,小儿疳积,消化不良。全草(单头紫菀): 微苦,凉。清热解毒,健脾止痢,止痒。用于乳痈,乳蛾,泄泻。

**仙白草**

**Aster turbinatus** S. Moore var. **chekiangensis** C. Ling

生于山坡疏林下、灌丛或草丛中。分布于浙江仙居、天台、云和、兰溪、杭州、海宁和瓯江。

根及全草: 辛、涩,温。解毒。主要用于毒蛇咬伤。

附　注: 浙江著名的治蛇伤草药。

**密毛紫菀**　　烧盏花(云南)

**Aster vestitus** Franch.

生于海拔 2 200—3 200 米的林缘、草坡、溪岸、沙地、荒坡及路边。分布于四川南部、云南西北部及北部、西藏南部。

全草: 散寒解表,活血舒筋。

**云南紫菀**

**Aster yunnanensis** Franch.

生于海拔 1 900—4 500 米的高山及亚高山草地、草甸、林缘及灌丛中。分布于青海玛沁、四川西部及西南部、云南西北部。

花序: 辛、苦,凉。清热解毒,降血压。

## 紫菀木属　Asterothamnus Novopokr.

**中亚紫菀木**

**Asterothamnus centrali-asiaticus** Novopokr.

生于草原、荒漠或干旱山坡。分布于内蒙古、甘肃、宁夏、青海。

花序: 用于外感疮毒。

## 苍术属　Atractylodes DC.

**朝鲜苍术**

**Atractylodes coreana** (Nakai) Kitam.——*Atractylis coreana* Nakai

生于海拔 200—700米的山坡灌丛中、林下、干燥山坡或山坡草地上。分布于辽宁、山东。

根状茎：健脾燥湿，祛风辟秽。

**苍术**　京苍术、茅山苍术、茅术(江苏)，茅苍术(安徽)，南苍术(全国中草药汇编)

**Atractylodes lancea** (Thunb.) DC.——*Atractylis lancea* Thunb.; *A. chinensis* Koidz.

生于海拔650—2 000米的山坡灌丛、林缘、草丛、低山阴坡及岩石缝隙中。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、山东、江苏、安徽、浙江、河南、湖北、湖南、江西、四川。

根状茎(苍术)：辛、苦，温。燥湿健脾，祛风散寒，明目，辟秽。用于脘腹胀痛，泄泻，水肿，风湿痹痛，脚气痿蹙，风寒感冒，雀目。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**白术**　于术、种术(安徽)，冬白术(得配本草)

**Atractylodes macrocephala** Koidz. ——*Atractylis macrocephala* (Koidz.) Hand. -Mazz

生于山坡林下及山坡草地、丘陵或栽培。野生分布于安徽、浙江、江西、湖南、四川。现华北、西北、华东、中南大部分省区及四川、贵州、云南有栽培。

根状茎(白术)：苦、甘，温。健脾益气，燥湿利水，止汗，安胎。用于脾虚食少，消化不良，泄泻，水肿，自汗，胎动不安。苗(术苗)：祛水，止自汗。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。② 中药白术来源于栽培种，以浙江产量大而质优。③ 阴虚燥渴、气滞胀闷者忌服。

**关苍术**

**Atractylodes japonica** Koidz. ex Kitam.

生于海拔200—800米的林下及林缘。分布于东北及河北、河南。

根状茎：补脾，益胃，燥湿，和中。药用与苍术类同。

附　注：日本、朝鲜习以本种作白术使用。

## 云木香属　Aucklandia Falc.

**木香**　云木香(植物分类学报)，广木香(普济方)，南木香(世医得效方)，青木香(本草经集注)

**Aucklandia lappa** (Decne.) Ling——*Aplotaxis lappa* Decne.; *Saussurea lappa* C. B. Clarke

原产印度。我国河北、山西、陕西、甘肃、新疆、山东、浙江、江西、福建、河南、湖北、广西、四川、贵州、云南有栽培。

根(木香)：辛、苦，温。行气止痛，健脾消食。用于胸脘胀痛，泻痢后重，食积不消，不思饮食。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

## 雏菊属　Bellis L.

**雏菊**　马兰头花、延命菊(中国植物志)

**Bellis perennis** L.

原产欧洲。全国各地庭园栽培。

叶：止血消肿。花序：祛痰镇咳。

## 鬼针属　Bidens L.

**婆婆针**　鬼针草(通称)，鬼钗草(黑龙江)，脱力草、止血草(江苏苏州)，刺针草(安徽)，锥叉菜、毛锥子草(贵州)

**Bidens bipinnata** L

生于海拔 340—3 000 米的山坡、荒地、农田、路旁及旷野。分布几遍全国。

全草(刺针草)：苦，平。清热解毒，活血祛风。用于咽喉痛，肠痈，传染性肝炎，吐泻，消化不良，风湿关节痛，疟疾，疮疖，毒蛇咬伤，跌打肿痛。

附　注：孕妇忌服。

**金盏银盘**

**Bidens biternata** (Lour.) Merr. et Sherff.——*Coreopsis biternata* Lour.

生于路边、村旁及荒地上。分布于华东、中南、西南及辽宁、河北、山西、陕西、甘肃。

全草：甘、淡，平。清热解毒，活血散瘀。用于咽喉痛，肠痈，急性黄疸，吐泻，风湿关节痛，疟疾，疮疖，毒蛇咬伤，跌打肿痛。

附　注：妇女行经期忌服。

**柳叶鬼针草**

**Bidens cernua** L.

生于草甸、沼泽边缘或水中。分布于东北、华北及新疆、四川、云南、西藏。

全草：清热解毒，散瘀消肿。

**大狼把草**　外国脱力草、接力草(上海)

**Bidens frondosa** L.

生于田野湿润处、路旁、沟边、山坡草丛及山脚水池边。原产北美。我国上海、安徽、浙江、湖北有野生。

全草(狼把草)：苦，平。强壮，清热解毒。用于体虚乏力，盗汗，咯血，痢疾，疳积，丹毒。

**羽叶鬼针草**

**Bidens maximowicziana** Oett.

生于河边湿地、水边及路旁。分布于东北及内蒙古东部。

全草：止血，止汗。

**小花鬼针草**　细叶刺针草、小刺叉、小鬼叉、锅叉草、一包针（东北、华北），小鬼叉子、鬼骨针(江苏)

**Bidens parviflora** Willd.

生于海拔 500—2 000 米的山坡、林缘、向阳草地、田间、路旁及河岸。分布于东北、华北、西北及山东、江苏、江西、福建、河南、湖北、四川。

全草(鹿角草)：苦，平。清热解毒，活血散瘀。用于感冒发热，咽喉痛，吐泻，肠痈，痔

疮，跌打损伤，冻疮，毒蛇咬伤。

**鬼针草**　豆渣草、豆渣菜(陕西、四川)，一包针(江苏、安徽、广西防城)，盲肠草(福建、广东、广西)，三叶鬼针草、虾钳草、蟹钳草(广东、广西)，对叉草、粘人草、粘连子(云南)

**Bidens pilosa** L.

生于海拔500—3 200米的荒地、山坡、田野、住宅旁及路旁。分布于华东、中南、西南及陕西、甘肃。

全草(刺针草)：苦，平。清热解毒，活血祛风。用于咽喉肿痛，吐泻，消化不良，风湿关节痛，疟疾，疮疖，毒蛇咬伤，跌打肿痛。

附　注：妇女行经期忌服。

**白花鬼针草**　金盏银盘(广东)

**Bidens pilosa** L. var. **radiata** Sch.-Bip.——*B. pilosa* L. var. *minor* (Bl.) Sherff.

生于山坡草地、荒地、路边及村旁。分布于华东、中南、西南及陕西、甘肃、新疆。

全草：苦，平。清热解毒，活血祛风。用于咽喉肿痛，吐泻，消化不良，风湿关节痛，疟疾，疮疖，毒蛇咬伤，跌打肿痛。

**狼把草**　鬼针、一包针(黑龙江)，鬼叉(黑龙江、安徽)，金盏银盘(广西贺县)

**Bidens tripartita** L.

生于海拔570—3 700米的山坡草地、沟边、路旁、荒野、水边、湿地、浅水滩及沟渠。分布于东北、华北、华东、中南、西南及陕西、甘肃，新疆。

全草(狼把草)：苦、甘，平。清热解毒，养阴敛汗。用于感冒，乳蛾，咽喉痛，泄泻，肝炎，小便淋痛，脘痞，疖肿，湿疹。　根(狼把草根)：用于泄泻，盗汗，丹毒。

**矮狼把草**

**Bidens tripartita** L. var. **repens** (D. Don) Sherff.——*B. repens* D. Don

生于山坡、荒地、路旁、田边及渠岸。分布于河北、陕西、新疆、四川、云南。

全草：清热解毒，养阴敛汗。

## 百能葳属　Blainvillea Cass.

**百能葳**　鱼鳞菜(广西钦州)

**Blainvillea acmella** (L.) Philipson——*Verbasina acmella* L.

生于疏林、山顶草坡、荒坡及路旁。分布于湖南、广东、海南、广西、四川、云南。

全草：用于肺痨咯血，感冒，扭伤。

## 艾纳香属　Blumea DC.

**薄芳艾纳香**　山风(广西上林)，香艾(植物分类学报)

**Blumea aromatica** DC.——*B. leptophylla* Hayata

生于低山林缘、林下、荒坡或山谷路旁。分布于江西、福建、台湾、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草：辛、微苦，温。祛风湿，消肿，止血，止痒。用于风湿关节痛，湿疹，皮肤瘙痒，外伤出血。

**艾纳香**　打蚊艾、鹤老麻(广东)，大风艾(广西凌云)，土冰片、艾粉(贵州)，冰片草、冰片叶(云南)，大艾、大枫草(中国树木分类学)

**Blumea balsamifera** (L.) DC.——*Conyza balsamifera* L.; *B. balsamifera* (L.) DC. var. *microcephala* Kitam.,

生于海拔 300—1 800 米的山坡灌丛、林缘、林下、河床谷地、草地及田边。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

叶及嫩枝(艾纳香)：辛、微苦，微温。祛风消肿，活血散瘀。用于感冒，风湿关节痛，跌打损伤，疮疖痈肿，湿疹，皮炎。叶的加工品(艾片)：甘、苦，凉。通窍，散热，明目，止痛。用于热病神昏，惊痫痰迷，目赤红痛，急性乳蛾，口疮，痈疮，霉菌性阴道炎，烧伤。

**七里明**

**Blumea clarkei** Hook. f.——*B. hongkongensis* Lévl. et Vant.

生于海拔 400—700 米的山谷、湿草地、荒地、山坡旷野、路旁、草地、山坡、林缘及疏林中。分布于福建、广东、海南、广西、贵州。

全草：苦、微辛，凉。清热解毒，利尿消肿，止痒。用于泄泻，蛇虫咬伤。

**密花艾纳香**　大黑蒿、大升麻(云南)，歪那(傣语)

**Blumea densiflora** DC.

生于海拔 200—2 800 米的密林下、山谷、林缘及丘陵地。分布于云南东南部经景东至西北部澜沧江一带。

全株(大黑蒿)：苦，凉。清热凉血，截疟。用于疟疾，高血压症，泄泻，感冒发热。

**节节红**　草骨黄(广西田林)，聚花艾纳香(广西植物名录)

**Blumea fistulosa** (Roxb.) Kurz——*Conyza fistulosa* Roxb.; *B. glomerata* DC.

生于海拔 200—2 000 米的山坡林缘、空旷草地、溪边或路旁。分布于广东、海南、广西、贵州、云南。

全草：用于身体虚弱。

**台北艾纳香**

**Blumea formosana** Kitam.

生于低山坡、疏林下、草丛、溪边、路边。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西。

全草：苦、微辛，凉。清热解毒，利尿消肿。

**毛毡草**　地菊(海南儋县)，坡艾草(海南临高)

**Blumea hieracifolia** (D. Don) DC.——*Erigeron hieracifolia* D. Don

生于海拔 450—1 600 米的低山灌丛、草地、田边及路旁。分布于浙江、福建、台湾、广东、广西、四川、贵州南部、云南西部及西南部。

全草(毛毡草)：微辛，凉。清热解毒。用于泄泻，毒蛇咬伤，肿痒疼痛。

**见霜黄**　甲各仗(广西龙州)

**Blumea lacera** (Burm. f.) DC.——*Conyza lacera* Burm. f.; *B. subcapitata* DC.

生于海拔 120—800 米的草地、路旁、田边、丘陵、湿润草坡及河沟边。分布于江西南

都、福建、台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

全草(红头草)：苦，凉。清热解毒，消肿。用于小儿风热咳喘，乳蛾，痄腮，口腔破溃，痈肿疮毒，皮肤瘙痒。

**六耳铃**　　吊钟黄(广州植物志)，飞山虎、牛耳三稔、羊耳三稔(广东中草药)

**Blumea laciniata** (Roxb.) DC ——*Conyza laciniata* Roxb.; *B. onnaensis* Hayata

生于海拔300—800米的山坡、林缘、林中空旷草地、农田、草地、河边。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全草(走马风)：辛、苦，温。祛风除湿，通经活络。用于风湿痹痛，头痛，跌打肿痛，湿疹，毒蛇咬伤。

**千头艾纳香**　　大叶艾纳香(海南植物志)

**Blumea lanceolaria** (Roxb.) Druce——*Conyza lanceolaria* Roxb.; *B. myriocephala* DC.

生于海拔420—1 500米的山坡、林缘、较湿润林地、路旁、草地、溪边及谷地。分布于台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

叶(火油草)：辛，平。祛风除湿，消肿止痛。用于风湿关节痛，妇女产后关节痛，跌打肿痛。　全草：用于咳嗽痰喘，口腔破溃。

**裂苞艾纳香**　　走马胎(广西都安)

**Blumea martiniana** Vant.

生于海拔700—850米的山坡、林下、山谷、溪流边、空旷草地及路旁。分布于广西西南部、贵州西部、云南南部。

全草：用于风湿关节痛。

附　注：功效相同的有**戟叶艾纳香 B. sagittata** Gagnep.，分布于广西西部、贵州南部、云南东南部。

**东风草**　　黄帽顶(广东乐昌)，九里明(广西)，青钓鱼杆(云南)，无毛大艾(海南植物志)

**Blumea megacephala** (Randeria) Chang et Y. Q. Tseng——*B. riparia* (Bl.) DC. var. *megacephala* Randeria

生于山坡、林缘、灌丛、丘陵阳坡、旷野草丛及山谷。分布于浙江、江西南部、福建、台湾、湖南南部、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全草(大头艾纳香)：微苦、淡，微温。祛风除湿，活血调经。用于风湿关节痛，跌打肿痛，产后血崩，月经不调，疮疖。

**柔毛艾纳香**　　那猪草(广西乐业)，红头小仙、紫背倒提壶(全国中草药汇编)

**Blumea mollis** (D. Don) Merr. ——*Erigeron mollis* D. Don; *B. wightiana* DC.

生于海拔400—2 000米的田野、空旷草地、路旁、阴坡、沟边及田埂。分布于浙江、台湾、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全草(红头小仙)：微苦，平。消肿，止咳，解热。用于风热咳喘，咳嗽痰喘，乳痈。

**长圆叶艾纳香**

**Blumea oblongifolia** Kitam.

生于疏林下、山坡草丛、山谷溪流边、路旁、田边、草地。分布于浙江西南部、江西东部和南部、福建中部至西南部、台湾、广东东北部和东南部。

全草：苦、微辛，凉。清热解毒，利尿消肿。用于咳嗽痰喘，泄泻，水肿，小便淋痛，疖肿。

**拟毛毡草**　丝毛艾纳香(植物分类学报)

**Blumea sericans** (Kurz) Hook. f.——*B. barbata* DC. var. *sericans* Kurz

生于路旁、荒地、田边、山谷及丘陵地带草丛。分布于浙江西南部、江西、福建中部及西南部、台湾、湖南西部及西南部、广东、海南、广西、贵州南部。

全草：清热利尿。用于水肿，毒蛇咬伤。

## 蟹甲草属　Cacalia L.

**兔耳风花蟹甲草**　小八里麻(陕西镇坪)，蜘蛛草(中药大辞典)

**Cacalia ainsliaeflora** (Franch.) Hand. -Mazz.——*Senecio ainsliaeflorus* Franch.

生于海拔 1 000—2 600 米的山沟、灌丛、山坡、杂木林下阴湿处及草丛中。分布于陕西南部、河南、湖北西部、湖南、四川、贵州。

根(八角香)：辛、微涩，温。散瘀，杀虫。用于无名肿毒，癣癣，风湿浮肿。

**两似蟹甲草**　登云鞋(陕西华山)

**Cacalia ambigua** L.

生于海拔 1 500—2 200 米的山坡灌丛及路旁阴湿处。分布于河北、山西、陕西、甘肃、安徽、河南。

全草(臭藿麻)：淡、涩，平。利尿消肿。

**耳叶蟹甲草**

**Cacalia auriculata** DC.

生于海拔 1 300—2 300 米的山坡、林下、林缘、草甸及路旁阴湿处。分布于东北及内蒙古、陕西、甘肃、湖北。

全草：祛风除湿，舒筋活血。

**拟球蟹甲草**　大老虎草(湖北)

**Cacalia bulbiferoides** Hand. -Mazz.

生于山坡、山谷湿地。分布于湖北西北部。

全草：用于风寒感冒，咽喉肿痛。

**翠雀叶蟹甲草**　兔耳伞、雨伞菜(湖北)

**Cacalia delphiniphyllus** (Lévl.) Hand. -Mazz.——*Senecio delphiniphylla* Lévl.

生于海拔 1 780—3 200 米的山坡疏林下、山谷湿地及路边草地上。分布于甘肃东部、湖北(恩施、建始、鹤峰、五峰)、贵州。

全草：祛风除湿，解毒活血。用于腰腿疼痛，跌打损伤。

**三角叶蟹甲草**

**Cacalia deltophylla** (Maxim.) Mattf.——*Senecio deltophylla* Maxim.

生于海拔 3 350—4 000 米的山坡林下、山谷及路边阴湿处。分布于甘肃、青海、四川。

根：甘，平。镇痉熄风，养肝疗痹。

**蝙蝠草**

**Cacalia farfarefolia** Sieb. et Zucc. subsp. **petasitoides** (Lévl.) H. Koyama——*Senecio petasitoides* Lévl.

生于山坡草丛、林下或灌丛中。分布于浙江天目山、湖北、四川巫山及广元、贵州。

叶：甘，凉。活血化瘀，清热解毒。用于肺痨咯血，无名肿毒，刀伤出血。

**山尖子**　伊古新纳(蒙语)

**Cacalia hastata** L.

生于林下、灌丛、林缘及河滩草地。分布于东北、华北及甘肃、宁夏、河南。

全草：解毒，消肿，利水。用于伤口化脓，小便不利。

**无毛山尖子**

**Cacalia hastata** L. var. **glabra** Ledeb.

生于海拔 1 500—2 300 米的山坡及草甸。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏。

全草：煎汤洗浴可消肿生肌，愈合伤口。

**线叶山尖子**　牛菜草、蝙蝠草(湖北)

**Cacalia hastata** L. subsp. **lancifolia** (Franch.) H. Koyama——*Senecio sagittatus* Sch.-Bip. var. *lancifolia* Franch.

生于林缘、灌丛或草地上。分布于湖北、四川。

全草(三尖子)：凉血，接骨。

**白头蟹甲草**　泡桐七(湖北)

**Cacalia leucocephala** (Franch.) Hand.-Mazz.——*Senecio leucocephala* Franch.

生于林缘或草地上。分布于湖北西部至西南部、四川东部。

全草：利水消肿，清热。

**耳翼蟹甲草**

**Cacalia otopteryx** Hand.-Mazz.

生于海拔 1 800—2 000 米的林下或阴湿处。分布于陕西山阳、河南卢氏、湖北西部至西南部、四川。

全草：用于痈疮，蛇咬伤，泄泻。

**掌裂蟹甲草**

**Cacalia palmatisecta** (J. F. Jeffrey) Hand.-Mazz. ——*Senecio palmatisecta* J. F. Jeffrey

生于海拔 3 000—3 500 米的冷杉林下或林缘。分布于四川西部及西南部、云南西北部、西藏察隅及错那。

根状茎(羊角天麻)：祛风除湿，活血通络。

**深山蟹甲草**　泡桐七(湖北)

**Cacalia profundorum** (Dunn) Hand.-Mazz.——*Senecio profundorum* Dunn

生于林缘或山谷阴湿处。分布于湖北神农架、保康、随州、四川巫山。

全草：用于无名肿毒，头癣，跌打损伤。

**蛛毛蟹甲草**

**Cacalia roborowskii** (Maxim.) Ling——*Senecio roborowskii* Maxim.

生于海拔1 550—3 200米的山沟、山坡、林缘、林下、灌丛中、山谷、沟边及路旁。分布于陕西、甘肃、青海、四川、云南、西藏。

根：甘，平。镇痉熄风，养肝疗痨。

**矢族叶蟹甲草**

**Cacalia rubescens** (S. Moore) Matsuda——*Senecio rubescens* S. Moore

生于山地林下或林缘阴湿地。分布于浙江、安徽黄山、江西庐山、湖北、湖南。

根状茎：祛风除湿，活血通络，清热解毒。用于乳蛾，外伤出血。

## 金盏花属 Calendula L.

**小金盏花** 金盏花、醒酒花(宛陵集诗注)，长春花(本草纲目)，金仙花、长春草（现代实用中药）

**Calendula arvensis** L.

原产欧洲。全国各地庭园有栽培。

全草(金盏草)：利尿，发汗，兴奋，缓下，通经。用于小便淋痛，月经不调。 根(金盏草根)：用于疝气。 花序(金盏草)：用于肠风下血。

**金盏菊** 棒红、甘菊花(贵州)，水涨菊、山金菊(福建中草药)，大金盏花(广西药用植物名录)

**Calendula officinalis** L.

原产南欧。全国各地庭园有栽培。

根(金盏菊)：淡，平。行气活血。用于胃寒痛，疝气，症瘕。 花序（金盏菊)：甘，凉。凉血，止血。用于肠风便血。

## 翠菊属 Callistephus Cass.

**翠菊** 五月菊(云南)，江西腊(中国植物志)

**Callistephus chinensis** (L.) Nees——*Aster chinensis* L.

生于海拔30—2 700米的疏林阴湿处、山坡撂荒地、山坡草丛及水边，或公园、庭园栽培。分布于吉林、辽宁、河北、山西、山东、四川、云南。

叶、花序：清热凉血。

## 凋缨菊属 Camchaya Gagnep.

**凋缨菊** 俪俪菊(云南)

**Camchaya loloana** Kerr——*Vernonia loloana* Dunn ex Kerr

生于海拔540—1 800米的山坡草丛、山谷、林下、林缘、河边、田埂。分布于云南河口、思茅、武定、西双版纳、景东。

全草：苦，凉。清热解毒。

## 小甘菊属　Cancrinia Kar. et Kir.

**小甘菊**

**Cancrinia discoidea** (Ledeb.) Poljak.——*Pyrethrum discoidea* Ledeb.; *Chrysanthemum ledebourianum* Ling

生于山坡、荒地、戈壁及山前砾质山坡。分布于甘肃、新疆、西藏。

幼苗：清热利湿，清肝利胆。

**灌木小甘菊**

**Cancrinia maximoviczii** C. Winkl.

生于海拔 2 100—3 600 米的石砾山坡、河岸冲积扇上或干沙滩上。分布于甘肃、青海、新疆。

花序：清热明目，利湿。

## 飞廉属　Carduus L. emend. Gaertn.

**节毛飞廉**　　刺飞廉(中药大辞典)

**Carduus acanthoides** L.

生于海拔 260—4 000 米的山坡、林缘、灌丛、山谷、草地、山沟边、水边、路旁及田边。分布几遍全国。

根或全草(飞廉)：微苦，平。散瘀止血，清热利湿。用于吐血，鼻衄，尿血，崩漏，带下病，小便淋痛，膀胱湿热，痈疖，疔疮。　果实：利胆。用于黄疸，胆绞痛。

附　注：①茎部含有降压生物碱飞廉碱和去氢飞廉碱。②不宜与麻黄配伍。③功效相似的有**丝毛飞廉 C. crispus** L.，分布几遍全国。

**飞廉**　　垂花飞廉(新疆中药名录)

**Carduus nutans** L.——*C. songaricus* (C. Winkl.) Tamamsch.; *C. coloratus* Tamamsch.

生于海拔 540—2 300 米的田边、草地或沟谷。分布于新疆乌鲁木齐、特克斯、塔城、沙湾、查布查尔。

全草：凉血止血，清热解毒，消肿。

## 天明精属　Carpesium L.

**天明精**　　野烟(黑龙江)，拔子盖子、绵苍娘子、烟管头草(江苏)，北鹤虱(安徽)

**Carpesium abrotanoides** L.

生于海拔 320—3 000 米的山坡、林下、林缘、路旁草丛、山谷、荒地及住宅旁。分布于华东、中南、西南及黑龙江、河北、陕西、甘肃、宁夏、新疆。

果实(鹤虱)：苦、辛，平。有小毒。消肿杀虫。用于蛔虫病，蛲虫病，绦虫病，虫积腹

痛。　全草(天明精)：辛，凉。祛痰，清热，破血，止血，解毒，杀虫。用于乳蛾，喉痹，疟疾，急性肝炎，急、慢惊风，虫积，血瘕，衄血，血淋，疔肿疮毒，皮肤痒疹。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**烟管头草**　构儿菜(甘肃、云南)，烟袋草(安徽、云南)，蛋黄草(广西三江)，挖耳草(贵州、云南)，金挖耳(四川中药志)

**Carpesium cernuum** L.

生于海拔3 000米以下的山坡、林缘、荒坡、路边及草丛。分布于东北、华北、华东、中南、西南及陕西、甘肃、宁夏。

全草(挖耳草)：苦、辛，凉。有小毒。清热解毒，消肿止痛。用于感冒发热，咽喉痛，牙痛，泄泻，小便淋痛，瘰疬，疮疖肿毒，乳痈，痄腮，毒蛇咬伤。　根(挖耳草根)：苦，凉。清热解毒，消肿止痛。用于牙痛，阴挺，泄泻，喉蛾。

附　注：慢惊忌服。

**金挖耳**　野葵花(广西南宁)，倒盖菊(全国中草药汇编)，滁州鹤虱(大观本草)，挖耳草(重庆草药)

**Carpesium divaricatum** Sieb. et Zucc.

生于山坡灌丛、林缘、沟边、田边、路旁或草地。分布于东北、华东、中南、西南及河北、宁夏。

全草(金挖耳)：苦、辛，凉。有小毒。清热解毒，消肿止痛。用于感冒发热，咽喉痛，牙痛，泄泻，瘰疬，小便淋痛，乳痈，痄腮，疮疖肿毒，缠腰火丹，毒蛇咬伤。　根(挖耳草根)：用于产后气痛，泄泻，牙痛，乳蛾。

附　注：本种果实为本草中记载的滁州鹤虱。

**贵州天名精**　银挖耳子草(湖北)

**Carpesium faberi** Winkl.——*C. kweichowense* Chang

生于海拔700—1 900米的林缘、路边及旷地。分布于台湾、湖北、广西、四川、贵州。

全草：用于跌打损伤，头痛，驱虫。

**高原天名精**　贡布美多露米(西藏)，高山天名精(中药大辞典)

**Carpesium lipskyi** Winkl.

生于海拔1 600—4 300米的灌丛、林缘、林下、山坡草地、沟谷草丛、路旁、山间河滩及草甸。分布于陕西南部、甘肃东南部、青海东部、四川西部、云南西北部、西藏东部。

全草(挖耳子草)：苦，凉。清热解毒，祛痰，截疟。用于牙痛，疟疾，咽喉痛，疮肿，胃痛，虫蛇咬伤。　果实：苦、辛，平。消积杀虫。

**长叶天名精**　乌金野烟、野烟、烟管草(湖北)

**Carpesium longifolium** Chen et C. M. Hu

生于海拔800—2 300米的山坡灌丛边缘及林下。分布于陕西太白山、甘肃东南部、湖北、四川、贵州、云南。

全草(马蹄草)：清热解毒。用于感冒，咽喉痛，痈肿，疮毒，毒蛇咬伤，咳嗽痰喘。

**大花金挖耳**　香油罐、千日草、神灵草、仙草(东北)，大烟锅草(全国中草药汇编)

**Carpesium macrocephalum** Franch. et Sav.——*C. eximum* Winkl.

生于海拔3 600米以下的山坡林缘、灌丛中、山谷、路旁及草丛中。分布于东北、华北

及陕西南部、甘肃南部、青海民和、河南、四川北部。

全草(大烟锅草): 苦,凉。凉血,散瘀,止血。用于跌打损伤,外伤出血,吐血, 衄血。

**小花金挖耳** 散血草(湖北),茄叶细辛(广西全州),止血药(贵州),小金挖耳(贵州中药名录)

**Carpesium minus** Hemsl.

生于海拔 800—1 000 米的山坡草丛、灌丛、水沟边、路旁及草坡。分布于江西井冈山、湖北、广西、四川、贵州、云南。

全草: 辛、苦,凉。清热凉血,消肿解毒。用于咯血,血崩,吐血,尿血,无名肿毒。

**尼泊尔天名精** 挖耳草(湖北)

**Carpesium nepalense** Less.

生于海拔 3 100 米以下的林下、山坡灌丛中或山坡草地上。分布于台湾、湖北西南部、云南西北部、西藏南部。

全草: 用于感冒发热,咽喉痛,牙痛,肿毒,蛇咬伤。

**棉毛天名精** 野向阳花(广西资源),挖耳子草 (四川), 野烟、野叶子烟 (贵州、云南),倒提壶、地朝阳、野葵花(云南)

**Carpesium nepalense** Less. var. **lanatum** (Hook. f. et Thoms. ex C. B. Clarke) Kitam.——*C. cernuum* L. *α. lanatum* Hook. f. et Thoms. ex C. B. Clarke

生于海拔 1 000—2 900 米的山坡林缘、林下、山谷、路旁。分布于西南及陕西、甘肃、湖北、湖南、广西。

全草(地朝阳): 清热解毒,消肿,止痛。用于疥疮,脓疱疮,痔疮。

**四川天名精**

**Carpesium szechuanense** Chen et C. M. Hu

生于海拔 1 400—2 500 米的山坡、林缘、草丛及山地路旁。分布于甘肃南部、湖北西部、四川南川、天全、峨眉山。

全草(红钓杆): 用于热淋,黄疸,痔疮,泄泻。

**暗花金挖耳** 东北金挖耳(东北植物检索表)

**Carpesium triste** Maxim.——*C. manshuricum* Kitam.

生于海拔 3 250 米以下的林下、灌丛中及溪边。分布于东北及四川、云南、西藏米林及波密。

全草: 清热解毒,消肿,止痛。

附 注: 功效相同的有**粗齿天明精 C. trachelifolium** Less., 分布于四川宝兴,云南贡山,西藏察隅。

## 红花属 Carthamus L.

**红花** 草红花(通称),红蓝花(江苏镇江),杜红花(江苏南通、徐州),淮红花 (江苏南通)

**Carthamus tinctorius** L.

生于海拔 4 400 米以下的农田或庭园。原产埃及。全国各地有栽培。

花序(红花)：辛，温。活血通经，散瘀止痛。用于经闭，难产，产后恶露不行，痛经，冠心病心绞痛，跌打损伤，腰腿痛。种子(白平子)：解毒止痛。用于痘疹不出，妇女产后中风。　苗(红花苗)：用于浮肿。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 蓼菊属　Cavea W. W. Smith et J. Small

**蓼菊**　　嘎(西藏)

**Cavea tanguensis** (J. R. Drumm.) W. W. Smith et J. Small——*Saussurea tanguensis* J. R. Drumm.

生于海拔 3 300—5 080 米的高山近雪线地带的砾石坡地、干燥沙地或河谷灌丛中。分布于四川康定及贡嘎山一带、西藏亚东及定日。

全草：用于头痛。

## 矢车菊属　Centaurea L.

**矢车菊**　　车轮花(河北)，蓝芙蓉(中国高等植物图鉴)

**Centaurea cyanus** L.

原产欧洲。全国各地庭园栽培。

全草：清热解毒，消肿活血。　边花：利尿。

附　注：全草浸出液可明目。

**欧亚矢车菊**　　黄花漏芦(新疆中药名录)

**Centaurea ruthenica** Lam.——*Centaurium ruthenicum* (Lam.) C. Koch

生于海拔 1 200—1 900 米的山坡、山沟近水处、河谷及草地。分布于新疆昭苏、塔城、布尔津、阿尔泰。

根：清热解毒，消肿下乳。

附　注：我国分布新纪录。

## 石胡荽属　Centipeda Lour.

**石胡荽**　　二郎箭(陕西、江苏)，球子草(江苏、安徽)，白顶顶 (贵州)，鹅不食草(食性本草)，鸡肠草(本草纲目)

**Centipeda minima** (L.) A. Br. et Aschers.——*Artemisia minima* L.; *Myriogyne minuta* Less.

生于海拔 300—1 900 米的阴湿处、山坡草丛、田间水边、路旁及河岸。分布于东北、华北、华东、中南、西南及陕西。

全草(鹅不食草)：辛，温。祛风，散寒，胜湿，去翳，通窍。用于感冒，喉痹，顿咳，痧气腹痛，鼻渊，目翳涩痒。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 果香菊属　Chamaemelum Mill.

**果香菊**　白花春黄菊(北京植物志),罗马揩暮米辣(中国植物图鉴)

**Chamaemelum nobile** (L.) All.——*Anthemis nobilis* L.

我国早年有引种栽培,现已不多见。

花序：发汗,镇痉。

## 茼蒿属　Chrysanthemum L.

**茼蒿**　艾菜(海南植物志)

**Chrysanthemum coronarium** L.——*Matricaria coronaria* (L.) Desr.

生于村边较干燥的肥沃土地上。全国各地庭园栽培。河北、山东有野生。

全草(茼蒿菊)：辛、甘,平。和脾胃,通便,消痰饮,清热养心,润肺祛痰。

附　注：南方栽培的**南茼蒿 C. segetum L.**——*C. coronarium* L. var. *spatiosum* Bailey，全草用于小便淋痛不利。

## 岩参属　Cicerbita Wall.

**兰岩参菊**　大桦口草(贵州),犁头尖、雪兰山菊（云南），戟叶锡莎菊(贵州中药名录),蓝锡莎菊(中药大辞典)

**Cicerbita cyanea** (D. Don) Beauverd——*Sonchus cyaneus* D. Don

生于海拔1 650—3 500米的山野疏林、草丛中,或栽培。分布于贵州、云南。

根(蓝锡莎菊)：辛、微苦,平。清热消肿,健脾和胃,止痛。用于胃痛,吐泻,泄泻，食积饱胀,水肿,湿疹。

## 菊苣属　Cichorium L.

**毛菊苣**

**Cichorium glandulosum** Boiss. et Huet

生于农田、路旁、草滩或沙滩上。

分布于新疆。陕西西安植物园有引种栽培。

全草：淡,凉。清热解毒,消肿利尿,健胃。用于肝炎,水肿,胃热。

**菊苣**　欧洲菊苣(东北植物检索表)

**Cichorium intybus** L.

生于低海拔的农田、路旁、草滩或山沟。分布于东北、华北、西北及山东、江西。

全草(菊苣)：苦,凉。清肝利胆。健胃消食,利尿消肿。用于湿热黄疸,胃痛食少,水肿尿少。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

## 瓜叶菊属　Cineraria L.

**瓜叶菊**

**Cineraria cruenta** Mass. ex L'Herit.——*Senecio cruentus* DC.

原产大西洋肯那列群岛。全国各地庭园、公园有栽培。

全草：清热解毒。用于止泻。

## 蓟属　Cirsium Mill.

**两面刺**　　青刺蓟、滇大蓟、白马刺(全国中草药汇编)，大蓟(滇南本草)

**Cirsium chlorolepis** Petrak ex Hand.-Mazz.

生于海拔 1 300—1 900 米的山坡草地及林缘。分布于贵州东部、云南中部。

根：甘，凉。清热解毒，凉血止血，消肿。用于吐血，咯血，尿血。　全草：凉血止血，行瘀消肿；外用于跌打，肿毒。

附　注：两面刺在云南作大蓟药用。

**贡山蓟**　　毛头蓟(云南)，藏大蓟(全国中草药汇编)，大刺儿菜(中药大辞典)

**Cirsium eriophoroides** (Hook. f.) Petrak——*Cnicus eriophoroides* Hook. f.; *Cirsium bolocephalum* Petrak ex Hand.-Mazz.

生于海拔 2 000—4 370 米的山坡灌丛中、林缘、山坡草地、草甸、河滩及水边。分布于四川冕宁、云南大理、丽江、维西及贡山、西藏东南部。

全草(大刺儿菜)：甘、苦，凉。凉血，止血，散瘀消肿。用于吐血，鼻衄，尿血，崩漏，黄疸，疮痈。　根：苦，平。清热凉血，利水，祛风。

**莲座蓟**　　食用蓟(内蒙古中草药)

**Cirsium esculentum** (Sievers) C. A. Mey.——*Cnicus esculentus* Sievers

生于海拔 500—3 200 米的平原、山地潮湿地、水边、河岸湿草地及沼泽草甸。分布于东北及内蒙古、河北、新疆乌恰及特克斯。

全草：甘，凉。散瘀消肿，排脓托毒，止血。用于肺痈，疮痈肿毒，皮肤病，肝热，各种出血。

**灰蓟**

**Cirsium griseum** Lévl.——*C. botryodes* Petrak ex Hand.-Mazz.

生于海拔 1 800—3 000 米的山谷、山坡草地及荒坡草丛、水边潮湿处。分布于四川南部、贵州东部、云南北部。

根：清热凉血。用于月经不调，乳癌，烧伤。　全草(恶鸡婆)：凉血，止血。

**阿尔泰蓟**

**Cirsium incanum** (S. G. Gmel.) Fisch. ex MB. ——*Serratula incanum* S. G. Gmel.

生于海拔 500—1 700 米的河滩草地、干旱路旁及山地草原。分布于新疆额敏、阿尔泰、富蕴。

全草：甘、苦，凉。清热解毒，凉血止血，散瘀消肿。

附　注：我国分布新纪录。

**蓟**　野刺菜、铁刺杆草(江苏)，刺蓟菜(安徽、海南)，山萝卜(广东)，牛口参(广西贵县)，大蓟(本草集注)

**Cirsium japonicum** Fisch. ex DC.——*C. belingshanicum* Petrak ex Hand.-Mazz.; *C. bodinieri* (Vant.) Lévl.

生于海拔350—3 100米的山坡林中、林缘、灌丛、草地、荒地、田间、路旁或溪旁。分布于华东、中南及河北、陕西、甘肃、四川、贵州。

根及全草(大蓟)：甘，凉。凉血止血，散瘀消肿。用于衄血，咯血，吐血，尿血，崩漏，产后出血，肝炎，水肿，乳痈，跌打损伤，外伤出血，痈肿肿毒。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②脾胃虚寒而无瘀滞者忌服。

**魁蓟**

**Cirsium leo** Nakai et Kitag.——*C. pinnatibracteatum* Ling; *C. chienii* Chang

生于海拔700—3 400米的山坡草地、山谷、林缘、河滩、石滩地、岩石缝隙中、河边及田间。分布于河北、山西、河南、陕西、甘肃、宁夏、四川西北部。

全草：凉血，止血，祛瘀，消肿。

**线叶蓟**　条叶蓟(通称)，轮蓟(安徽)，细叶蓟、刺儿菜(贵州)，小蓟(滇南本草)，滇小蓟(云南种子植物名录)

**Cirsium lineare** (Thunb.) Sch.-Bip. ——*Carduus lineare* Thunb.; *C. lineare* (Thunb.) Sch.-Bip. var. *pallidum* (Kitam.) Ling

生于海拔900--1 700米的山坡、路旁、草地、灌丛、丘陵、水沟边、空旷地。分布于安徽、浙江、江西、福建、四川。

根或花序：酸，温。活血散瘀，消肿解毒。用于月经不调，经闭，痛经，带下病，小便淋痛，跌打损伤。　全草(苦芙)：甘、苦，凉。清热解毒，凉血，活血。用于暑热烦闷，崩漏，吐血，痔疮，疔疮。

**野蓟**　牛戳口(东北)

**Cirsium maackii** Maxim.——*C. japonicum* DC. var. *ussuriensis* (Regel) Kitam.

生于海拔140—1 100米的山坡草地、林缘、草甸或路旁。分布于东北及河北、内蒙古、宁夏、山东、江苏、安徽、浙江、广东、四川。

根及全草：凉血，行瘀，止血，破血。

附　注：广东作大蓟用。

**烟管蓟**

**Cirsium pendulum** Fisch. ex DC.——*Cnicus pendulus* (Fisch. ex DC.) Maxim.

生于海拔300—2 240米的山谷、山坡草地、林缘、林下、岩石缝隙、溪旁、河谷两岸、田野及路边。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、四川。

根、全草：凉血止血，祛瘀消肿，止痛。

附　注：东北作大蓟用。

**总序蓟**

**Cirsium racemiforme** Ling et Shih

生于海拔 1 000—1 300 米的山谷、山脚、林缘、林下潮湿地或山坡草地。分布于江西、福建、湖南、广西、贵州、云南。

根：用于小儿消化不良，外伤出血。

**块蓟**

**Cirsium salicifolium** (Kitag.) Shih——*C. vlassovianum* Fisch. ex DC. var. *salicifolium* Kitag.; *C. viridifolium* (Hand.-Mazz.) Shih

生于海拔 200—2 000 米的湿地、溪边、路旁或山坡。分布于吉林、河北、内蒙古。

根：祛风，除湿，止痛。

**刺儿菜**　小蓟(通称)，大小蓟、野红花(浙江)，细叶蓟(贵州)，大刺儿菜（中国植物志)，刻叶刺儿菜(中药大辞典)

**Cirsium setosum** (Willd.) MB.——*Serratula setosa* Willd.; *C. segetum* Bunge

生于海拔 170—2 650 米的山坡、平原、丘陵、山地、荒地、田间、旷野、路旁及草地上。分布于全国各地。

全草(小蓟)：苦，凉。凉血，止血，行瘀消肿。用于衄血，尿血，传染性肝炎，崩漏，外伤出血，痈疖疮疡。

附　注：①脾胃虚寒而瘀滞者忌服。②《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**葵花大蓟**　聚头蓟(中国高等植物图鉴)

**Cirsium souliei** (Franch.) Mattf.——*Cnicus souliei* Franch.

生于海拔 1 930—4 800 米的山坡路旁、林缘、荒地、河滩地、田间、水旁潮湿地、向阳山坡及草原。分布于甘肃、青海、四川、西藏。

全草：苦，凉。散瘀消肿，凉血止血，祛瘀生新。用于吐血，鼻衄，崩漏，黄疸，疮痈。

**绒背蓟**　斩龙草、猫腿菇(黑龙江)

**Cirsium vlassovianum** Fisch. ex DC.——*C. vlassovianum* Fisch. ex DC. var. *solicifolium* Kitag.

生于海拔 350—1 400 米的山坡林中、林缘、河边及潮湿地。分布于东北、华北。

根(猫腿菇)：微辛，温。祛风，除湿，止痛。用于风湿关节痛，四肢麻木。

## 大叶千里光属　Cissampelopsis (DC.) Miq.

**岩穴大叶千里光**　庐山藤(广西环江)

**Cissampelopsis spelaeicola** (Vant.) C. Jeffrey et Y. L. Chen——*Vernonia spelaeicola* Vant.; *Senecio spelaeicola* (Vant.) Gagnep.

生于海拔 1 000—2 000 米的溪边或山地林下。分布于广西、四川、贵州、云南。

茎、叶：用于风湿关节痛，跌打损伤，小儿慢惊风。

**滇南大叶千里光**　大叶千里光(全国中草药汇编)

**Cissampelopsis volubilis** (Bl.) Miq.——*Cacalia volubilis* Bl.; *Senecio hoi* Dunn

生于海拔 780—2 000 米的疏林下或灌丛中。分布于广东、海南、贵州、云南。

藤茎（大叶千里光)：辛、微苦，微温。舒筋活络，祛风除湿。用于风湿痹痛，肌腱挛缩，小儿麻痹后遗症。

## 藏掖花属　Cnicus L.

**藏掖花**

**Cnicus benedictus** L.——*Centaurea benedicta* L.

分布于新疆天山地区。近年来各地植物园及药物园有栽培。

全草：健胃。

## 白酒草属　Conyza Less.

**熊胆草**　苦蒿尖、苦龙胆(滇南本草)，苦蒿、矮脚苦蒿、苦艾(中国植物志)，鱼胆草(云南中草药选)，龙胆草(四川中草药通讯)

**Conyza blinii** Lévl.——*C. dunniana* Lévl.

生于海拔 1 800—3 600 米的山坡草地、荒地路旁及旷野。分布于湖南、四川、贵州、云南。

全草(矮脚苦蒿)：苦，凉。清热，解毒，消肿。用于中耳炎，目赤，风火牙痛，口腔破溃，咽喉痛。

**香丝草**　小山艾(安徽)，野塘蒿、野地黄菊、蓑衣草(广西)，小白菊(云南永胜)

**Conyza bonariensis** (L.) Cronq.——*Erigeron bonariensis* L.; *E. crispus* Pourr.; *E. linifolius* Willd.

生于海拔 350—3 000 米的山坡路旁、河岸、旷野及草丛中。分布于华东、中南、西南及陕西、甘肃。

全草(野塘蒿)：苦，凉。清热祛湿，行气止痛。用于感冒，疟疾，风湿关节痛，外伤出血。

**小蓬草**　小白酒草(通称)，鱼肥草(黑龙江)，蛇舌草(广西药用植物名录)，飞蓬、小飞蓬(中国植物志)，鱼胆草、苦蒿(云南中草药)

**Conyza canadensis** (L.) Cronq.——*Erigenron canadensis* L.

生于海拔 450—3 200 米的山坡、林缘、河滩、田野及路旁草丛中。分布于全国各地。

全草(祁州一枝蒿)：苦，凉。清热解毒，祛风止痒。用于口腔破溃，中耳炎，目赤，风火牙痛，风湿骨痛。

附　注：北美洲用作治痢疾，泄泻，创伤及驱蠕虫；中欧常用新鲜的植株作止血药，但其液汁和捣碎的叶有刺激皮肤的作用。

**白酒草**　假蓬、山地菊(广西)，鱼腥草(四川)，白酒棵、白酒香、酒香草、酒药草、银钮子(中国植物志)

**Conyza japonica** (Thunb.) Less.——*Erigeron japonicum* Thunb.

生于海拔 700—2 600 米的山谷、田边、山坡草地或林缘。分布于西南及浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西。

根或全草：辛、微苦，平。消肿镇痛，祛风化痰。用于小儿风热咳喘，胸膜炎，咽喉痛，目赤，小儿惊风。

**粘毛白酒草**　假蓬(云南)，白花白酒草、粘毛假蓬(中国高等植物图鉴)

**Conyza leucantha** (D. Don) Ludlow et Raven——*Erigeron leucantha* D. Don

生于田边、路旁。分布于福建、海南、广西、云南。

全株：清热解毒，消肿止痛。

**苏门白酒草**　竹叶艾(广西梧州)

**Conyza sumatrensis** (Retz.) Walker——*Erigeron sumatrensis* Retz.

生于山坡草地、旷野及路旁。分布于江西、福建、台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

全草：用于风湿关节痛，咳嗽，崩漏。

## 金鸡菊属　Coreopsis L.

**剑叶金鸡菊**　线叶金鸡菊(南京)，除虫菊(贵州草药)

**Coreopsis lanceolata** L.

原产美洲。我国各地庭园有栽培。

全草(大金鸡菊)：苦，凉。清热解毒，化瘀消肿。用于咳嗽，无名肿毒，外伤出血。

**两色金鸡菊**　痢疾草(广西马山)，蛇目菊(江苏南部种子植物手册)

**Coreopsis tinctoria** Nutt.——*Calliopsis tinctoria* (Nutt.) DC.

原产北美洲。我国各地庭园有栽培。

全草(波斯菊)：甘，平。清热解毒，化湿。用于痢疾，目赤肿痛，痈疮肿毒。

## 秋英属　Cosmos Cav.

**秋英**　水茼蒿、红菊(湖北)，大波斯菊（植物学大辞典），波斯菊(华北习见观赏植物)

**Cosmos bipinnata** Cav.

生于海拔500—2 700米的路旁、田埂及溪岸。原产美洲墨西哥。我国各地庭园广为栽培，四川、云南已大面积归化。

花序、种子或全草：清热解毒，明目化湿。

**黄秋英**　硫磺菊(广州常见经济植物)

**Cosmos sulphureus** Cav.

生于海拔500—1 600米的山坡及草丛。原产墨西哥至巴西。云南西南部及南部常见归化。我国各地庭园常有栽培。

全草(硫磺菊)：清热解毒，明目化湿。用于咳嗽。

## 野茼蒿属　Crassocephalum Moench

**野茼蒿**　革命菜(安徽、海南、广西南宁)，山茼蒿(海南、广西)

**Crassocephalum crepidioides** (Benth.) S. Moore——*Gynura crepidioides* Benth.

生于海拔1 700—2 400米的山坡、阴山沟、林下、林缘、荒地、水旁或路旁。分布于陕西、甘肃、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全草(假蒿蒿): 辛,平。行气利尿,健脾消肿,清热解毒。用于感冒发热,泄泻,水肿,小便淋痛,乳痈。

## 垂头菊属 Cremanthodium Benth.

**褐毛垂头菊** 尕七尔哇(藏语)

**Cremanthodium brunneo-pilosum** S. W. Liu

生于海拔 4 100—4 300 米的沼泽草甸、河滩、高山草甸、草地及潮湿的沟边。分布于青海南部、四川西北部、西藏那曲。

全草: 苦,凉。清热解毒。

**喜马拉雅垂头菊**

**Cremanthodium decaisnei** C. B. Clarke

生于海拔 3 500—5 400 米的灌丛中、高山岩石缝中、高山草地、草甸或沼泽碎石地。分布于甘肃南部、青海南部、四川西部、云南西北部、西藏东部至南部。

全草: 健胃,止咳。

**盘花垂头菊** 曲头那保(藏语)

**Cremanthodium discoideum** Maxim.

生于海拔 3 000—5 300 米的灌丛中、高山草地、潮湿处或沼泽地。分布于甘肃、青海、四川、西藏。

全草: 淡,平。用于中风。

**块根垂头菊** 点头菊(全国中草药汇编)

**Cremanthodium ellisii** (Hook. f.) S. W. Liu——*Werneria ellisii* Hook. f.; *C. plantagineum* Maxim. **var.** ***ellisii*** Hook. f.

生于海拔 4 500 米以下的草原潮湿地带、水边及岩缝中。分布于甘肃康乐、青海、云南德钦、西藏普兰。

全草(点头菊): 甘、苦,温。祛痰止咳,宽胸利气。用于咳嗽痰喘,劳伤及老年虚弱头痛。

**祁连垂头菊**

**Cremanthodium ellisii** (Hook. f.) S. W. Liu var. **ramosum** (Ling) Ling et S. W. Liu——*C. discoideum* Maxim. subsp. *ramosum* Ling

生于海拔 3 000—4 000 米的高山草甸、林下或灌丛中。分布于青海湟源。

全草: 清热止痉。

**矮垂头菊** 小垂头菊(青海),芒尖赛保(藏语)

**Cremanthodium humile** Maxim.

生于海拔 4 100—5 300 米的高山草地、多砾石的山坡、流石滩地、沙土乱石处及干旱山坡。分布于甘肃、青海、四川、云南西北部、西藏东南部。

全草: 苦、辛,凉。清热解毒,镇静。用于水肿。

**线叶垂头菊** 热肖(藏语)

**Cremanthodium lineare** Maxim.

生于海拔 2 500—5 000 米的高山草地、草丛湿地、沼泽草地、溪边及草原潮湿地带。分布于甘肃、青海、四川、西藏林芝及米林。

全草：苦，凉。清热消肿。用于高热症引起的急惊痉挛，神志昏迷。

**壮观垂头菊**

**Cremanthodium nobile** (Franch.) Diels ex Lévl.——*Senecio nobile* Franch.

生于海拔 3 600—4 200 米的高山草地、杜鹃灌丛的沙地。分布于四川西南部、云南西北部。

全株：苦，凉。截疟。

**侧茎垂头菊**

**Cremanthodium pleurocaule** (Franch.) Good——*Senecio pleurocaule* Franch

生于海拔 3 100—4 000 米的高山草地及湖边沼泽。分布于四川乐山、云南西北部。

全草：清热解毒，消炎。

**长柱垂头菊**

**Cremanthodium rhodocephalum** Diels

生于海拔 3 000—4 800 米的高山草坡、灌丛乱石中及林缘。分布于四川西南部、云南西北部、西藏东南部。

花序：清热，消肿，止痛。

附　注：本种为藏药混用品。四川以全草入药。

**箭叶垂头菊**

**Cremanthodium sagittifolium** Ling et Y. L. Chen ex S. W. Liu

生于海拔 2 780—4 000 米的山坡草地。分布于云南东川、会泽、禄劝。

全草：退热。

**膜苞垂头菊**

**Cremanthodium stenactinum** Diels ex Limpr.

生于海拔 3 000 米以上的草地、潮湿的沟边或水边。分布于四川西部、西藏江达。

全草：苦，凉。清热解毒。用于痈疽肿毒，外伤感染，烧伤疼痛。

**线舌垂头菊**

**Cremanthodium stenoglossum** Ling et S. W. Liu

生于高山草甸湿地、阴坡或石缝中。分布于青海久治。

全草：清热解毒，利湿。

## 还阳参属　Crepis L.

**还羊参**　小苦荬(青海)，屠还阳参、驴打滚儿(内蒙古植物志)，宝黑-额布斯(蒙语)

**Crepis crocea** (Lamk.) Babc.——*Hieracium croceum* Lamk.

生于草原、荒漠草原带的丘陵砂质坡地、山谷、山地阳坡、田边或路旁。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、青海。

全草(还羊参)：苦，凉。止咳，化痰，平喘。用于老年性咳嗽痰喘。

**弯茎还羊参**　矛日爱-宝黑-额布斯(蒙语)

**Crepis flexuosa** (DC.) Benth. et Hook. f.——*Barkhausia flexuosa* DC.

生于高山草地、溪边、石隙中、路边、沙滩或河滩沙砾地。分布于甘肃、青海、西藏。

花序：苦，凉。清热止血。用于肝炎，胃出血。

**绿茎还阳参**　刷把细辛、竹叶青(贵州)，万丈深、马尾参、土麻黄、铁扫把(云南)

**Crepis lignea** (Vant.) Babc.——*Lactuca lignea* Vant.

生于海拔1 000—3 000米的向阳山坡、田边、路旁及草丛中。分布于海南、广西、四川、贵州、云南。

根(万丈深)：苦、微甘，平。健脾消积，清热解毒，下乳。用于小儿疳积，乳汁不足，咳嗽痰喘，风热咳喘，肝炎，带下病，肠风下血，筋骨痛，跌打损伤，疮疖痈肿。

**芫菁还阳参**　肉根还阳参(全国中草药汇编)

**Crepis napifera** (Franch.) Babc.——*Lactuca napifera* Franch.

生于海拔1 400—3 300米的松林下、开旷的草地、山坡及路旁，或栽培。分布于贵州、云南。

根或全草(肉根还阳参)：苦，凉。润肺止咳，消肿生肌。用于夜盲，咳嗽痰喘，顿咳。

**万丈深**　还阳参、竹叶参、奶浆参、奶浆柴胡(全国中草药汇编)，竹叶青、岔子菜、小粘连(云南中草药)

**Crepis phoenix** Dunn

生于海拔1 400—3 300米的松林下开旷的草地上。分布于云南昆明及蒙自。

根(奶浆参)：苦、微甘，平。健脾消积，解毒，下乳。用于小儿疳积，贫血，带下病，水肿，肝炎，缺乳，跌打损伤，肠风下血。　全草(奶浆柴胡)：苦，平。祛风散寒，清热解毒。用于感冒，咽喉肿痛，咳嗽痰喘。

**川滇还阳参**　天竹参、独花蒲公英、还阳参(滇南本草)

**Crepis rigescens** Diels

生于海拔560—3 000米的山坡、草丛或石隙中。分布于四川、贵州、云南。

根(还阳参)：补肾阳，养气血。

**长茎还阳参**　天竺参、万丈深、竹叶青、独花蒲公英(滇南本草)，铁刷把、有根无叶(文山中草药)

**Crepis tibetica** Babc.——*C. elongata* Babc.

生于海拔2 100米以下的山坡、田边、路旁及荒地草丛。分布于四川西部、云南西北部、西藏南部。

根(还阳参)：苦，温。补肾阳，益气血，健脾胃。用于肾虚阳痿，宫冷不孕，带下病，头晕耳鸣，心悸怔忡，小儿消化及营养不良。

附　注：肺热者忌用。

## 芙蓉菊属　Crossostephium Less.

**芙蓉菊**　千年艾(广西)，玉芙蓉(岭南采药录)，蕲艾(中国高等植物图鉴)，白艾、白香菊(福建中草药)

**Crossostephium chinense** (L.) Makino—— *Artemisia chinensis* L.; *C. artemi-*

*sioides* Less.

我国中南及上海、浙江、江西、福建、台湾、四川有栽培。

根(芙蓉菊根)：辛、苦，微温。祛风湿。用于风湿关节痛，胃脘冷痛。叶(香菊)：辛、苦，微温。祛风湿，消肿毒。用于风寒感冒，小儿惊风，痈疽疔疮。

## 杯菊属　Cyathocline Cass.

**杯菊**　小艾(广西)，红蒿枝、小红蒿(云南玉溪)

**Cyathocline purpurea** (Buch.-Ham. ex D. Don) O. Kuntze——*Tanacetum purpureum* Buch.-Ham. ex D. Don; *C. lyrata* Cass.

生于海拔150—2 600米的山坡林下、山坡草地、村舍路旁、田边水旁或沟边潮湿处。分布于广东、广西、四川、贵州、云南。

全草(红蒿枝)：苦，凉。清热解毒，消肿止血，除湿利尿，杀虫。用于急性吐泻，中暑，小便淋痛，咽喉痛，口腔破溃，吐血，衄血。

## 菜蓟属　Cynara L.

**菜蓟**

**Cynara scolymus** L.

原产地中海。我国西安、南京、上海、广州等城市有栽培。

叶(菜蓟叶)：用于慢性肝炎，肝胆病，消化系统疾病，肾脏病。

附　注：功效相同的有**刺苞菜蓟 C. cardunculus** L.，北京、西安、上海、广州等城市有栽培。

## 大丽花属　Dahlia Cav.

**大丽花**　大理菊(通称)，西番莲(北京)，洋芍药(广州、贵州)，金黄花(贵州)，天竺牡丹(植物学大辞典)

**Dahlia pinnata** Cav.

原产墨西哥。全国各地有栽培。

根(大丽菊根)：甘、微苦，凉。清热解毒，消肿。用于头风，脾虚食滞，疟腮，龋齿牙痛。

附　注：①有些地方将本品块根加工伪充天麻，系伪品，应注意鉴别。②块根含“菊糖”，为医药工业原料。

## 菊属　Dendranthema (DC.) Des Moul.

**小红菊**

**Dendranthema chanetii** (Lévl.) Shih——*Chrysanthemum chanetii* Lévl.; *D.*

*erubescens* (Stapf) Tzvel.

生于草原、山坡林缘、灌丛、河滩、沟边，或栽培。分布于东北、华北及陕西华山、甘肃东南部、青海东部、山东。

花序：清热解毒，消肿。用于外感风热，咽喉痛，疮疡肿毒。

**野菊**　疟疾草(江苏)，黄菊仔(广西)，山菊花(福建、广西昭平)，野黄菊(广州)，野菊花(贵州)

**Dendranthema indicum** (L.) Des Moul.——*Chrysanthemum indicum* L.

生于海拔300—1 500米的山谷、灌丛、林缘、路旁、草坡、旷地、田坎及丘陵荒地上。全国除新疆、西藏外，各地均有分布。

花序(野菊花)：苦、辛，凉。清热解毒，疏肝明目，降血压。用于感冒，高血压症，肝炎，泄泻，痈疖疔疮，毒蛇咬伤，防治流脑，预防时行感冒。　根、全草(野菊)：苦、辛，凉。清热解毒。用于痈肿，疔疮，目赤，瘰疬，天疱疮，湿疹。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**甘菊**　野菊(青海)，北野菊(中药大辞典)，岩香菊(东北植物检索表)，细裂野菊(全国中草药汇编)

**Dendranthema lavandulifolium** (Fisch. ex Trautv.) Ling et Shin——*Pyrethrum lavandulifolium* Fisch. ex Trautv.; *Chrysanthemum lavandulifolium* (Fisch. ex Trautv.) Makino

生于海拔630—2 800米的山坡、岩石上、河谷、河岸、荒地、黄土丘陵地、路旁、村旁及田野。分布于东北、华北、西北及山东、江苏、浙江、江西、湖北、云南。

花序(野菊花)：苦、辛，凉。清热解毒，凉血降压。用于痈肿疔疮，目赤，瘰疬，天疱疮，湿疹。　根、全草(野菊)：用于咳嗽痰喘。

**甘野菊**　北野菊(安徽)

**Dendranthema lavandulifolium** (Fisch. ex Trautv.) Ling et Shih var. **seticuspe** (Maxim.) Shih——*Pyrethrum seticuspe* Maxim.; *D. boreale* (Makino) Ling

生于山坡、丘陵地疏林下、林缘、水沟边荒草丛及裸岩旁。分布于东北及河北、陕西、甘肃、湖北、湖南、江西、四川、云南。

花序：苦、微辛，凉。清热解毒，平肝。　根、全草：性味功效同野菊。

**毛叶甘菊**

**Dendranthema lavandulifolium** (Fisch. ex Trautv.) Ling et Shih var. **tomentellum** (Hand.-Mazz.) Ling et Shih——*Chrysanthemum lavandulifolium* (Fisch. ex Trautv.) Makino var. *tomentellum* Hand.-Mazz.

生于海拔1 900—2 600米的山坡、路旁。分布于云南东川、昆明。

花序：用于痈肿疔疮，目赤肿痛，头痛眩晕。

**蒙菊**　蒙古乐-乌达巴拉(蒙语)

**Dendranthema mongolicum** (Ling) Tzvel.——*Chrysanthemum mongolicum* Ling

生于海拔1 500—2 500米的石质山坡或山地草原。分布于内蒙古乌拉山、山西。

花序：清热解毒。

附　注:功效相似的有**楔叶菊 D. naktongense** (Nakai) Tzvel.——*Chrysanthemum naktongense* Nakai，分布于东北及内蒙古、河北。

**菊花**　秋菊(北京)，贡菊、滁菊、毫菊(安徽)，杭菊(浙江)，小白菊(贵州)

**Dendranthema morifolium** (Ramat.) Tzvel.——*Chrysanthemum morifolium* Ramat.

全国各地有栽培。

花序(菊花)：甘、苦，凉。疏风清热，明目解毒，平肝。用于风热感冒，头痛，目赤，咽喉痛，头眩，耳鸣，疔疮肿毒。　根(菊花根)：利水。用于疔肿，喉疔，喉癣。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②菊花是自古以来深受我国人民喜爱的一种花卉，栽培品种有 1 000 余种之多。③气虚胃寒，食少泄泻宜少用之。

**委陵菊**

**Dendranthema potentilloides** (Hand.-Mazz.) Shih——*Chrysanthemum potentilloides* Hand. Mazz.

生于林缘、向阳山坡及低山丘陵地。分布于山西南部、陕西东部和西北部。

花序：祛风解热，解毒明目。

**毛华菊**　艾精、野黄菊(湖北)

**Dendranthema vestitum** (Hemsl.) Ling——*Chrysanthemum sinense* Sabine var. *vestitum* Hemsl.

生于海拔 340—1 500 米的低山坡、丘陵地及阴湿处。分布于安徽西部、河南西部、湖北西部。

全草：用于皮肤瘙痒。

**紫花野菊**　山菊(东北植物检索表)

**Dendranthema zawadskü** (Herb.) Tzvel.——*Chrysanthemum zawadskii* Herb.; *C. hwangshanense* Ling

生于海拔 850—1 800 米的草原、林间草地、林下和溪边。分布于东北、华北及陕西、甘肃、安徽。

叶、花序：清热解毒，降血压。

## 鱼眼草属　Dichrocephala L'Herit. ex DC.

**鱼眼草**　鱼眼菊、胡椒草(贵州)，口疮叶、馒头草、地苋菜（云南），肉桂草、泥鳅菜(福建中草药)，夜明草、白头菜(广西药用植物名录)

**Dichrocephala auriculata** (Thunb.) Druce——*Ethulia auriculata* Thunb.; *D. latifolia* (Pers.) DC.; *D. integrifolia* (L. f.) O. Kuntze

生于海拔 200—2 000 米的山坡、山谷阴处、阳处、林下荒地及水沟边。分布于陕西南部、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草(蚯疽草)：苦、辛，平。活血调经，解毒消肿。用于月经不调，扭伤肿痛，毒蛇咬伤，疔毒。

**小鱼眼菊**　鸡眼菊(广西乐业)，鹅子草、地细辛(贵州)，小馒头草、蛆头草、地胡椒

(云南)

**Dichrocephala benthamii** C. B. Clarke——*D. bodinieri* Vant.

生于海拔 1 350—3 200 米的山坡、山谷草地、河岸、溪旁、路旁、田边及旷野阴湿处。分布于湖北西部、广西、四川、贵州、云南。

全草(鱼眼草): 苦,凉。祛风明目,清热解毒。用于肝炎,小儿消化不良,小儿感冒高烧,风热咳嗽,泄泻,疟疾,牙痛,夜盲,疮疡,蛇咬伤。 根(鱼眼草根): 辛、甘, 温。利小便。

**菊叶鱼眼草** 辣菜(贵州)

**Dichrocephala chrysanthemifolia** DC.

生于海拔 2 900 米以下的山坡、路旁、草丛、溪边及田边。分布于西南。

全草(鱼眼草): 苦,凉。清热解毒,祛风明目。用于肝炎,小儿消化不良,小儿感冒高烧,风热咳嗽,泄泻,疟疾,牙痛,夜盲症,疮疡,蛇咬伤。

## 重羽菊属 Diplazoptilon Ling

**重羽菊** 青木香(云南)

**Diplazoptilon picridifolium** (Hand.-Mazz.) Ling——*Jurinea picridifolium* Hand-Mazz.

生于海拔 3 600—3 800 米的高山或亚高山草地。分布于四川西部、云南西北部。

根: 疏肝理气。

附 注: 我国特有属。

## 东风菜属 Doellingeria Nees

**短冠东风菜** 白花菜(广西恭城)

**Doellingeria marchandii** (Lévl.) Ling——*Aster marchandii* Lévl.

生于海拔 500—1 100 米的山谷、水边、田边、田间或路旁, 也有栽培。分布于江苏南部、浙江雁荡山、江西遂川、湖北西部、广东连南、广西百色、四川西部、贵州册亨、云南东北部有栽培。

全草: 辛、甘,凉。有小毒。清热解毒。用于中暑,咽喉痛,急性水肿,毒蛇咬伤,小儿疳积。

**东风菜** 山哈芦(安徽),土田七(广西博白),草三七、疙瘩药(贵州),盘龙草、白云草(湖南药物志)

**Doellingeria scaber** (Thunb.) Nees——*Aster scaber* Thunb.; *A. komarovii* Lévl.

生于海拔 2 000 米以下的山坡、山谷路旁、林缘、溪谷及灌丛中。分布于东北、华北、华东及陕西、河南、湖北、湖南、广西、四川、贵州。

根 (东风菜根): 辛,温。祛风,行气, 活血, 止痛。用于泄泻,风湿关节痛, 跌打损伤。 全草(东风菜): 甘,凉。清热解毒,祛风止痛,行气活血。用于风湿关节痛,感冒头

痛，目赤肿痛，咽喉痛，疮疖，毒蛇咬伤。

## 川木香属　Dolomiaea DC.

**厚叶川木香**　阿巴(云南纳西族语)，青木香、木香(云南中草药选)

**Dolomiaea berardioidea** (Franch.) Shih——*Saussurea edulis* Franch. *β. berardioidea* Franch.; *Vladimiria berardioidea* (Franch.) Ling

生于海拔 2 800—4 000 米的山坡草地、灌丛或疏林中。分布于云南西北部。

根(青木香)：辛、苦，温。疏肝理气，健胃止痛。用于腹痛，慢性吐泻，消化不良，咳嗽痰喘。

附　注：云南特有药用植物。

**越隽川木香**　越西木香(四川)

**Dolomiaea denticulata** (Ling) Shih——*Vladimiria denticulata* Ling

生于海拔 3 000—3 500 米的山坡林缘、疏林中、草地或向阳坡地。分布于四川西南部越隽、木里。

根(越西木香)：性味功能药用同川木香。但力稍逊。

附　注：四川特有药用植物

**菜木香**　大理木香(四川)

**Dolomiaea edulis** (Franch.) Shih——*Saussurea edulis* Franch.; *Vladimiria edulis* (Franch.) Ling; *V. edulis* (Franch.) Ling f. *caulescens* Ling

生于海拔 2 900—4 000 米的山坡林缘、荒地、草地，或栽培。分布于四川西南部、云南西北部、西藏东南部。

根(越西木香)：功效同越隽川木香。

**膜缘川木香**　压巴(云南)

**Dolomiaea forrestii** (Diels) Shih——*Jurinea forrestii* Diels; *Vladimiria forrestii* (Diels) Ling

生于海拔 3 000—4 100 米的山谷、山坡草甸、灌丛、林缘、针叶林下、石堆上或石缝中。分布于四川西南部、云南西北部。

根(越西木香)：功效同越隽川木香。

**川木香**

**Dolomiaea souliei** (Franch.) Shih——*Jurinea souliei* Franch.; *Vladimiria souliei* (Franch.) Ling

生于海拔 3 700—4 200 米的高山草地及灌丛中。分布于四川西部、西藏东部。

根(川木香)：辛、苦，温。行气止痛，和胃止泻。用于肝胃气痛，呕吐，腹痛，泄泻，痢疾里急后重。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**灰毛川木香**

**Dolomiaea souliei** (Franch.) Shih var. **mirabilis** (Anth.) Shih——*Jurinea mirabilis* Anth.; *Vladimiria souliei* (Franch.) Ling var. *cinerea* Ling; V. *muliensis*

Hand. -Mazz.

生于海拔 3 500—4 200 米的山脊及阳坡草地。分布于四川西南部及西北部、云南西北部、西藏东部。

根(川木香): 辛、苦,温。行气止痛,和胃止泻。用于肝胃气痛,呕吐,腹痛, 泄泻,痢疾里急后重。

附　注:《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 多榔菊属　Doronicum L.

**阿尔泰多榔菊**　　小紫菀(陕西太白山)

**Doronicum altaicum** Pall.

生于海拔 2 500—4 200 米的山坡林下、灌丛草地及路旁。分布于西北及内蒙古西部、四川西北部、云南西北部至东南部、西藏东部。

全草(太白小紫菀): 甘、苦,温。祛痰止咳,宽胸利气。用于咳嗽痰喘。

**多榔菊**

**Doronicum stenoglossum** Maxim.

生于海拔 3 200—4 000 米的高山草坡、林缘及阴坡灌丛中。分布于甘肃、青海、云南、西藏。

全草: 清热解毒,清肝明目。

## 厚喙菊属　Dubyaea DC.

**紫舌厚喙菊**

**Dubyaea atropurpurea** (Franch.) Stebb.——*Lactuca atropurpurea* Franch.

生于海拔 3 000—4 000 米的高山草地,或栽培。分布于四川乐山、云南大理、丽江、中甸。

花序: 清热解毒。

## 蓝刺头属　Echinops L.

**砂蓝刺头**　　刺甲盖、恶背火草、刺头、火绒草(中国沙漠地区药用植物)

**Echinops gmelinii** Turcz.——*E. turczaninowii* Ledeb. ex Turcz.

生于海拔 580—3 120 米的山坡、石砾地、荒漠草原、黄土丘陵及河滩沙地。分布于东北、华北、西北及河南北部。

根(沙漏芦): 咸、苦,凉。清热解毒,排脓,通乳。用于疮痈肿痛,乳痈, 乳汁不通,瘰疬,痔漏。

**华东蓝刺头**　　漏芦(江苏盱眙、镇江、清江),大蓟根、升麻根(江苏盱眙),土防风(广西钟山)

**Echinops grijsii** Hance

生于山坡草地、荒坡、草丛、丘陵、沙地及平原。分布于辽宁南部、山东、江苏、安徽、福建、台湾、河南、湖北、广西。

根(漏芦)：苦、咸，凉。清热解毒，消肿排脓，下乳，通筋脉。用于痈疽发背，乳房肿痛，乳汁不通，瘰疬恶疮，湿痹筋脉拘挛，热毒血痢，痔疮出血。　花序：活血，通络。用于跌打损伤。

附　注：江苏将本种的根作禹州漏芦。

**全缘叶蓝刺头**

**Echinops integrifolium** Kar. et Kir.

生于干旱石质山坡。分布于新疆西北部至西南部。

根、花序、果实：清热解毒，消肿排脓，生肌下乳。

附　注：新疆特有药用植物。

**驴欺口**　追骨风(黑龙江)，蓝刺头(东北植物检索表)，华州漏芦、禹州漏芦(中药大辞典)

**Echinops latifolius** Tausch——*E. dahuricus* Fisch.

生于海拔120—2 200米的山坡疏林下、灌丛、林缘、山坡草地、草原或草甸。分布于东北、华北及陕西、甘肃东部、宁夏、山东、江苏、河南、湖北、广东、四川。

根(漏芦)：苦、咸，凉。清热解毒，消肿排脓，下乳，通筋脉。用于痈疽发背，乳房肿痛，乳汁不通，瘰疬恶疮，湿痹筋脉拘挛，骨疼痛，热毒血痢，痔疮出血。　花序（追骨风)：活血，发散。泡酒服，用于跌打损伤。

附　注：①气虚、疮疡平塌不起及孕妇忌服。②《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**丝毛蓝刺头**　小蓝刺头(新疆)

**Echinops nannus** Bunge

生于海拔1 300—1 500米的干旱石质山坡及荒漠中。分布于新疆天山地区。

根、花序、果实：清热解毒，消肿排脓，生肌下乳。

**硬叶蓝刺头**　新疆蓝刺头(中药大辞典)

**Echinops ritro** L.

生于海拔1 200—2 400米山坡、田埂、山脚及砾石地。分布于新疆阿尔泰山及天山。

根、花序、果实：强心，降血压。

附　注：新疆将本种的根作禹州漏芦。

**薄叶蓝刺头**　毛鳞蓝刺头(新疆中药名录)

**Echinops tricholepis** Schrenk

生于山脚、山坡及田埂。分布于新疆托里及塔城。

根、花序、果实：强心，降血压。

## 鳢肠属　Eclipta L.

**鳢肠**　臭脚把子草、臭脚挝、猪食草、水旱莲(江苏盱眙)，墨菜(广州)，黑墨草(广西南宁)，墨斗草、水葵花(贵州)，旱莲草、旱子(本草图经)

**Eclipta prostrata** (L.) L.——*Verbesina prostrata* L.; ***E. alba*** (L.) Haask.

生于海拔200—1 900米的山坡、路旁、荒地上、沟边、河边及水田边。分布于华东、中南、西南及辽宁、河北、山西、陕西、甘肃、新疆。

全草(墨旱莲)：甘、酸，凉。清热解毒，凉血，止血，滋补肝肾。用于肝肾阴虚，头晕目眩，吐血，咳血，衄血，尿血，便血，血痢，刀伤出血。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②脾胃虚寒者忌服。

## 地胆草属　Elephantopus L.

**地胆草**　地胆头、磨地胆(广州)，鹿耳草(海南)，疔疮药、地苦胆(贵州)，苦地胆(本草纲目拾遗)，草鞋底(岭南采药录)

**Elephantopus scaber** L.——*Asterocephalus cochinchinensis* Spreng.

生于海拔700—1 400米的山坡、山谷、林缘、路旁及丘陵。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南。

全草(地胆草)：苦，凉。清热解毒，利尿消肿。用于感冒，痢疾，吐泻，乳蛾，咽喉痛，水肿，目赤红痛，疖肿。　根(苦地胆根)：苦，凉。清热，除湿，解毒。用于中暑发热，温毒发斑，赤痢，头风，风火牙痛，痈肿。

附　注：孕妇忌服。

**白花地胆草**　牛舌草(海南)，白毛地胆草(贵州中药名录)，毛地胆草、高地胆草(全国中草药汇编)

**Elephantopus tomentosus** L.——*E. bodiniri* Gagnep.

生于山坡、路旁或山坡阴湿地。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、贵州。

全草(苦地胆)：苦、辛，凉。清热解毒，凉血利水。用于鼻衄，黄疸，淋证，脚气，水肿，痈肿，疔疮，蛇虫咬伤。

## 一点红属　Emilia Cass.

**细红背叶**　天青地红(广西临桂)，散血草一点红、羊蹄草(贵州)，挖耳草(云南)

**Emilia prenanthoides** DC.

生于海拔1 500—2 000米的草地阴处、山坡、田埂、湿地上。分布于福建、广西、贵州、云南。

全草或带根全草：辛、苦，凉。清热解毒，消肿止痛。用于小儿惊风，蛇头疔，阴道肿痛，咽喉痛，漆疮，跌打，蛇伤。

**一点红**　羊蹄草(安徽、海南、云南)，红背叶(安徽)，红背果(海南)，饿死老公公(贵州)，红头草、牛奶奶(云南)

**Emilia sonchifolia** (L.) DC.——*Cacalia sonchifolia* L.; *Senecio sonchifolia* (L.) Moench

生于村边、路旁、田间、旷野草地及荒地上，或栽培。分布于华东、中南及云南。其他地区栽培于公园或庭园。

全草或带根全草(羊蹄草)：苦，凉。清热解毒，散瘀消肿，凉血。用于咽喉痛，口腔破溃，风热咳嗽，泄泻，痢疾，小便淋痛，子痈，乳痈，疖肿疮疡。

附　注：孕妇慎用。

## 球菊属　Epaltes Cass.

**球菊**　鹅不食草、拳头草(海南、广西、云南)，苡芭菊（中国种子植物科属辞典)，地胡椒(陆川本草)

**Epaltes australis** Less.——*Sphaeromorphaea australis* (Less.) Kitam.

生于海拔320—1 000米的旱田中、旷野沙地上、水田边、草丛、荒地、路边及村旁。分布于福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、四川、云南。

全草(老鼠脚迹)：辛，温。用于风寒感冒，疟疾，跌打损伤。

## 菊芹属　Erechthites Raf.

**梁子菜**　大旱菜、水三七、飞机菜(湖北)，野青菜(云南江川)，革命菜、野茼蒿(云南种子植物名录)

**Erechthites hieraciifolia** (L.) Raf. ex DC.——*Senecio hieraciifolia* L.

生于山坡林下、灌丛中、水沟旁阴湿地上。分布于江西、福建、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草(梁子菜)：清热解毒，杀虫。用于跌打损伤，痢疾，痈疔。

## 飞蓬属　Erigeron L.

**飞蓬**

**Erigeron acer** L.——*E. kamtschaticus* DC. var. *hirsuta* Ling

生于海拔1 400—3 700米的山坡、林缘、灌丛下、草地、牧场、草甸、草原、田野及路旁。分布于华北、西北及辽宁、吉林、四川、西藏。

全草：苦、辛，凉。祛风利湿，散瘀消肿。用于风湿关节痛。

**一年蓬**　治疟草、野蒿(江苏)，牙肿消、牙根消(南京)，千层塔(江西)，千张草、墙头草、长毛草、地白菜、油麻草(浙江民间常用草药)

**Erigeron annuus** (L.) Pers.——*Aster annuus* L.; *E. heterophyllus* Muhl. ex Willd.

生于海拔400—2 300米的杂木林中、路边旷野、山坡荒地、村边、田边。原产北美洲。分布于华北、华东、中南、西南及陕西、甘肃、青海。

根及全草(一年蓬)：淡，平。凉热解毒，助消化，抗疟。用于消化不良，泄泻，传染性肝炎，瘰疬，尿血，疟疾。

附　注：有抗癌作用。

**短葶飞蓬**　野菠菜、细药(贵州)，灯盏细辛(贵州、云南)，地顶草、地朝阳(云南)，灯

盏花(滇南本草)

**Erigeron breviscapus** (Vant.) Hand.-Mazz. ——*Aster breviscapus* Vant.; *E. dielsii* Lévl.

生于海拔 1 200—3 500 米的山坡、草地及林缘。分布于西南及青海、湖北、湖南、广西。

全草(灯盏细辛): 辛、微苦,温。祛风除湿,活络止痛,健脾消积。用于瘫痪,风湿关节痛,牙痛,胃痛,小儿疳积,小儿麻痹及脑膜炎后遗症。

**长茎飞蓬** 灯盏花、白带丹(甘肃),紫苞飞蓬(中国高等植物图鉴),紫苞蓬(东北植物检索表)

**Erigeron elongatus** Ledeb.

生于海拔 1 900—3 700 米的林下、灌丛、林缘、草地、沟边、草原或草甸。分布于东北、华北及甘肃、宁夏、新疆、四川、云南、西藏。

全草(红蓝地花): 甘、微苦,平。解毒,消肿,活血。用于结核型、瘤型麻风,视物模糊。

**山飞蓬**

**Erigeron komarovii** Botsch.——*E. consanguineus* Kitam.

生于海拔 1 700—2 600 米的草地、苔原及林缘。分布于吉林长白山、延边、通化、安图、抚松。

全草: 解表散寒,舒筋活血。

**密叶飞蓬** 牙瘤药(贵州)

**Erigeron multifolius** Hand.-Mazz.

生于海拔 2 800—4 100 米的草地或林缘。分布于贵州、云南德钦及贡山、西藏察隅。

全草: 甘,温。活血化瘀,健脾消积。用于小儿疳积,牙痛,瘫痪,咳嗽,疥疮,牙出血。

**多舌飞蓬**

**Erigeron multiradiatus** (Lindl.) Benth.——*Stenactis multiradiata* Lindl.; *Aster radiatus* Wall. nom. nud.; *E. multiradiatus* (Lindl.) Benth. var. *platyphyllus* Franch. et Lévl.

生于海拔 2 500—4 600 米的山坡、林缘、灌丛、草地、草甸。分布于青海、四川、云南、西藏。

全草: 解表散寒,助消化。

## 都丽菊属 Ethulia L.

**都丽菊**

**Ethulia conyzoides** L.——*E. angustifolia* Bojer ex DC.

生于海拔 600—1 400 米的山坡、路边、池塘或稻田边。分布于台湾、贵州毕节、云南南部。

全草: 疏风解表。

## 泽兰属　Eupatorium L.

**大麻叶泽兰**

**Eupatorium cannabinum** L.——*E. nodiflorum* Wall.

生于低山顶、山坡草丛及村旁竹林内。分布于江苏宜兴、浙江杭州。

全草：辛，平。消暑，辟秽，化湿，调经。

**多须公**　华泽兰(通称)，六月霜、白头翁(广东、广西)，兰草、白月雪树(海南)，水泽兰(贵州)

**Eupatorium chinense** L.——*E. crenatifolium* Hand.-Mazz.; *E. reevesii* Wall.

生于海拔800—2 200米的山坡林下、山谷、灌丛、林缘、草地及路旁阴湿处。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根(华泽兰)：微苦，凉。清热解毒，利咽化痰。用于白喉，咳嗽痰喘，风湿关节痛，乳痈，咽喉痛，感冒发烧，麻疹，痈疖肿毒，毒蛇咬伤。　叶：有毒。消肿止痛。用于蛇伤，肿毒。

**佩兰**　香草(北方通称)，失力草(江苏)，蓝花一支箭、野泽兰(云南)，兰草（植物名实图考)

**Eupatorium fortunei** Turcz.——*E. stoechadosmum* Hance; *E. caespitosum* Miq.

生于海拔2 100米以下的山坡草地、山谷、林旁荒地及路旁，或栽培。分布于华东及河北、陕西、甘肃、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

茎叶(佩兰)：辛，平。化湿醒脾，开胃，发表解暑。用于夏季伤暑，发热头重，胸闷腹胀，食欲不振，口中发粘，吐泻，胃腹胀痛，月经不调。

附　注：①阴虚，气虚者忌服。②《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**异叶泽兰**　红升麻(云南)，红梗草(滇南本草)

**Eupatorium heterophyllum** DC.——*E. wallichii* DC. var. *heterophyllum* (DC.) Diels

生于海拔1 700—3 600米的山坡林下、灌丛中、林缘、草丛、河谷或路旁。分布于西南及陕西、广东。

全草(红升麻)：甘、苦，微温。活血祛瘀，除湿止痛，消肿利水。用于产后瘀血不行，月经不调，水肿，跌打损伤。　根(红升麻根)：苦、微辛，凉。解表退热。用于感冒。　叶：用于刀伤。

**白头婆**　孩儿菊(福建、湖南)，六月雪(江西、海南)，麻婆娘(湖北)

**Eupatorium japonicum** Thunb.——*E. wallichii* DC.; *E. chinense* L. var. *simplicifolium* (Makino) Kitam.

生于海拔2 400米以下的山坡、山谷、林缘、疏林下、灌丛、水湿地、草地、河岸水旁及路旁。分布于东北、华东、中南及山西、陕西、四川、贵州、云南。

根或全草(秤杆草)：苦、辛，平。发表散寒，透疹。用于脱肛，麻疹不透，寒湿腰痛，风寒咳嗽。

**三裂叶白头婆**

**Eupatorium japonicum** Thunb. var. **tripartitum** Makino——*E. fortunei* Turcz. var. *triparticum* (Makino) Nakai

生于海拔 800—2 900 米的山坡草地或灌丛中。分布于甘肃、山东、江苏、浙江、四川、贵州、云南。

茎叶：苦、辛，微温。活血通络，清热解毒，健胃消食。

**林泽兰**　毛泽兰(北京)，白鼓钉(江西、贵州)，尖佩兰(江苏苏州、贵州)，野马追(江苏盱眙)，升麻、土升麻、秤杆升麻(贵州)

**Eupatorium lindleyanum** DC.——*E. kirilowii* Turcz.; *E. lindleyanum* DC. var. *trifoliatum* Makino

生于海拔 200—2 600 米的山坡林下、山谷、草原、溪旁及路旁较阴湿处。除新疆外，全国各地均有分布。

根(野马追)：苦，平。祛痰定喘，降压。用于咳嗽痰喘，高血压症。

**南川泽兰**

**Eupatorium nanchuanense** Ling et Shih

生于海拔 1 200—1 650 米的山坡向阳处。分布于四川南川金佛山。

根：用于阴虚潮热，小儿疳积。

附　注：四川特有药用植物。

**飞机草**　香泽兰(四川)

**Eupatorium odoratum** L.

生于海拔 600—1 500 米的丘陵地、森林破坏迹地、垦荒地、路旁、住宅及田间，或灌丛中及稀树草原上。原产美洲。曾引入海南。现逸为野生，分布于广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全草(飞机草)：微辛，温。有小毒。散瘀消肿，止血，杀虫。用于跌打肿痛，外伤出血，旱蚂蝗叮咬出血不止，疮疡肿毒。

## 花佩属　Faberia Hemsl.

**花佩菊**

**Faberia sinensis** Hemsl.

生于山谷溪旁、岩壁阴湿处。分布于四川乐山、云南。

全草：活血祛瘀，疏风。

## 大吴风草属　Farfugium Lindl.

**大吴风草**　活血莲(湖北)，荷叶三七、独足莲、铁铜盘、野金瓜(浙江民间常用草药)

**Farfugium japonicum** (L.) Kitam.——*Tussilago japonica* L.; *Ligularia kaempyferi* (DC.) Sieb. et Zucc.

生于山谷、沟边阴湿处、石崖下或庭园温室。分布于安徽、浙江、福建、江西、湖北、贵

州。

全草(莲蓬草)：辛、甘、微苦，凉。活血止血，散结消肿。用于咳嗽咯血，便血，月经不调，跌打损伤，乳痈，痈疖肿毒。

## 线叶菊属　Filifolium Kitam.

**线叶菊**　兔毛蒿(东北植物检索表)

**Filifolium sibiricum** (L.) Kitam.——*Tanacetum sibiricum* L.; *Artemisia sibirica* (L.) Maxim.

生于山坡草地、草原或草甸。分布于东北、华北。

全草(兔毛蒿)：苦，凉。清热解毒，安神镇惊，调经止血。用于传染病高热，心悸，失眠，肾虚，带下病，中耳炎，肿痛，臁疮。

## 牛膝菊属　Galinsoga Ruiz et Pav.

**辣子草**　肥猪苗、辣子草(湖北)，铜锤草(贵州、云南)，向阳花、珍珠草(中国高等植物图鉴)

**Galinsoga parviflora** Cav.

生于林下、河谷地、荒野、河边、近郊路旁及田间。分布于西南及吉林、辽宁、内蒙古、浙江、江西、湖北。

全草(辣子草)：淡，平。消肿，止血。用于乳蛾，咽喉痛，急性黄疸，外伤出血。花序(向阳花)：腥、微苦、涩，平。清肝明目。用于夜盲症，视力模糊及其他眼疾。

## 蒲公幌属　Geblera Andrz. ex Béss.

**蒲公幌**

**Geblera tenuifolia** Kitag.

生于向阳山坡、草地或石砬子。分布于吉林。

全草：补气，解毒。

## 扶郎花属　Gerbera L. ex Cass.

**钩苞大丁草**　背面白(云南)，毛大丁草(全国中草药汇编)，白叶不翻、小一支箭(中国高等植物图鉴)

**Gerbera delavayi** Franch.——*G. henryi* Dunn; *G. uncinata* Beauverd

生于海拔1 900—2 800米的松林下、山坡林缘或草丛中。分布于四川、贵州、云南。

根(白地紫菀)：辛、微苦，平。清热利湿，理气化痰，消积杀虫。用于痢疾，胃痛，消化不良，乳蛾，感冒，咳嗽，蛔虫病。

**白背大丁草**　折菇草(云南)

**Gerbera nivea** Sch.-Bip.

生于海拔 2 100—2 300 米的山地、林缘或草地上。分布于云南、西藏。

全草：苦，凉。清热解毒。

**毛大丁草**　一柱香(海南)，白眉(广西百色、南宁)，白头翁（云南丽江），头顶一支草、贴地消(江西民间草药)，小一枝箭(滇南本草)

**Gerbera piloselloides** (L.) Cass.——*Arnica piloselloides* L.

生于山坡林下、林缘、草坡、田边、路旁。分布于西南及江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西。

全草(毛大丁草)：辛、苦，平。宣肺，止咳，发汗，利水，行气，活血。用于咳嗽痰喘，水肿胀满，小便不通，小儿食积，经闭，跌打损伤，痈疽疔疮。　根(毛大丁草根)：苦，平。清热解毒，理气和血。用于痈肿，乳蛾，痄腮，瘰疬，胸胁痞气，疝气，痢疾，衄血。

## 鹿角草属　Glossogyne Cass.

**鹿角草**　鹞鹰爪(广西)，了哥利(广西、贵州)，金锁匙(海南植物志)，香茹（中国高等植物图鉴）

**Glossogyne tenuifolia** Cass.

生于沙土、空旷沙地及海边。分布于福建、台湾、广东、海南、广西。

全草(香茹)：微辛，凉。清热利湿，镇咳化痰。用于中暑吐泻，痢疾，湿热浮肿，齿龈肿痛，背痛，带状疱疹。

## 鼠曲草属　Gnaphalium L.

**宽叶鼠曲草**　白头翁(广西博白)，地膏药(云南)

**Gnaphalium adnatum** (Wall. ex DC.) Kitam.——*Anaphalis adnata* Wall. ex DC.; *G. formosanum* Hayata

生于海拔 500—3 000 米的山坡、山谷、灌丛及路旁。分布于陕西、甘肃、江苏、浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

叶或全草(地膏药)：苦，凉。消肿，止血。用于痈疮肿毒，刀伤出血。

**鼠曲草**　佛耳草(江苏、安徽)，白猫耳、追骨风、风尾草(江苏)，清明菜(南京民间草药、贵州)

**Gnaphalium affine** D. Don——*G. multiceps* DC.

生于自低海拔至4 500米的山坡、草地、沟边、田边或路旁潮湿处。分布于华北、西北、华东、中南、西南。

全草(鼠曲草)：甘，平。化痰，止咳，祛风寒。用于咳嗽痰喘，风寒感冒，蚕豆病，筋骨疼痛，带下病，痈疮。

**贝加尔鼠曲草**　白嘎拉音-黑薄古日根纳(蒙语)，湿鼠曲草(中药大辞典)

**Gnaphalium baicalense** Kirp.

生于水旁、河边或湿地上。分布于辽宁、吉林安图、河北围场、内蒙古赤峰及海拉尔。

全草：用于高血压症。

**秋鼠曲草**　　毛志药、黄火草(贵州)

**Gnaphalium hypoleucum** DC.——*G. confertum* Benth.

生于海拔200—3 200米的山坡灌丛、林缘、山地路旁、空旷沙土地或河岸沙滩。分布于西北、华东、中南、西南。

全草(下白鼠曲草)：甘、苦，凉。祛风止咳，清热利湿。用于感冒，肺热咳嗽，痢疾，瘰疬，下肢溃疡。

附　注：江苏有些地区以本种作鼠曲草药用。

**细叶鼠曲草**　　神仙眼镜草(广西乐业)，白背鼠曲草(江苏、安徽)，日本鼠曲草(中药大辞典)

**Gnaphalium japonicum** Thunb.

生于海拔1 800米以下的山坡、山谷、草地或田间阴湿场所。分布于华东、中南、西南及陕西、甘肃。

全草(天青地白)：甘，凉。解表，清热，明目，利尿。用于感冒，咳嗽，头痛，咽喉痛，目赤翳障，膀胱湿热，小便淋痛，带下病，痈肿，疔疮。

**东北鼠曲草**

**Gnaphalium mandshuricum** Kirp.

生于落叶松林下或水边湿地上。分布于黑龙江哈尔滨太阳岛及帯岭。

全草：甘，平。化痰止咳，解毒疗疮，平肝，降血压。用于咳嗽，痰喘，风湿筋骨痛，湿热痢疾，胃痛，高血压症初期；外用于痈疮肿毒，烧、烫伤，外伤出血，瘘管，长期不愈合的溃疡。

**匙叶鼠曲草**

**Gnaphalium pensylvanicum** Willd.

生于荒地、田间及篱园。分布于江苏、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、云南。

全草：甘，平。清热解毒，宣肺平喘。用于感冒，风湿关节痛。

**多茎鼠曲草**　　田艾(海南澄迈)，狭叶鼠曲草、黄花艾(海南植物志)

**Gnaphalium polycaulon** Pers.——*G. indica* auct. non **L.**：海南植物志，3：399. 1974.

生于湿润山地、砂土草地、耕地及田园中。分布于上海、浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南。

全草：祛痰，止咳，平喘，祛风湿。用于热痢，咽喉痛，小儿食积。

**平卧鼠曲草**　　仰卧鼠曲草(新疆中药名录)

**Gnaphalium supinum** L.——*Omalotheca supina* (L.) Cass.

生于海拔2 500米左右的高山干旱草坡上或草地上。分布于新疆北部天山及阿尔泰地区。

全草：止咳，化痰，降血压。

附　注：功效相似的有**林地鼠曲草 G. sylvaticum** L.，分布于新疆北部布尔津；**天山鼠曲草 G. kasachstanicum** Kirp.；**挪威鼠曲草 G. norvegicum** Gunn.，均分

布于新疆。

**湿生鼠曲草**

**Gnaphalium tranzschelii** Kirp.

生于沟谷、河边、沙地、河边或路旁。分布于东北及河北。

全草(湿鼠曲草)：甘，平。止咳平喘，理气止痛，降血压。用于咳嗽痰喘，风湿关节痛，胃痛，高血压症。

## 田基黄属 Grangea Adans.

**田基黄** 荔枝草(中国种子植物科属辞典)

**Grangea maderaspatana** (L.) Poir.——*Artemisia maderaspatana* L.

生于低海拔至1 000米的疏林、灌丛、溪边、草丛、干燥荒地、河边沙滩或水旁向阳处。分布于浙江、福建、台湾、广东、海南、广西、云南。

全草：清热解毒，镇痉，调经。用于耳痛，肺痈。 叶：健胃，调经，止咳。

## 三七草属 Gynura Cass.

**紫背菜** 红菜(福建、台湾)，血匹菜、观音苋(重庆草药)，木耳菜、血皮菜(植物名实图考)，两色三七草(海南植物志)

**Gynura bicolor** (Willd.) DC.——*Cacalia bicolor* Willd.

生于低山阴湿处、旷野湿地及平原上。分布于浙江、福建、台湾、广东、海南、广西、四川、贵州。

根(观音苋根)：淡，温。行气活血。用于产后瘀血腹痛，血崩，疟疾。 全草(观音苋)：微甘、辛，平。活血止血，解毒消肿。用于痛经，血崩，咳血，创伤出血，溃疡久不收口。

**木耳菜**

**Gynura cusimbua** (D. Don) S. Moore——*Cacalia cusimbua* D. Don

生于海拔1 500—2 150米的荒地或林下阴湿处。分布于云南东南部、西北部及西部。

全草(箐跌打)：甘、苦，平。接骨续筋，消肿散瘀。用于骨折，跌打扭伤，风湿关节痛。

**白子菜** 鸡菜(海南)，土生地(广西南宁)，血三七(广西苍梧)，玉枇杷(贵州中药名录)，叉花土三七(云南种子植物名录)

**Gynura divaricata** (L.) DC.——*Senecio divaricata* L.

生于海拔1 000—2 100米的山野疏林下、山谷潮湿处，或栽培。分布于台湾、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根及根状茎(白背三七)：甘，凉。清热凉血，散瘀消肿。用于咳嗽痰喘，肺痈，崩漏，烫伤，跌打损伤，刀伤出血。 茎叶(白背三七茎叶)：咸、微辛，凉。清热，舒筋，止血，祛瘀。用于顿咳，风湿关节痛，骨折，创伤出血，痈肿疮疖。

**三七草** 菊三七、土三七(通称)，破血丹、散血丹(陕西洋县、宁强)，紫三七(江苏南京)，血当归、见肿消(贵州)

**Gynura japonica** (L. f.) Juel——*Arnica japonica* L. f.

生于海拔500—1 500米的山坡、山沟、林下、荒地草丛、路旁，或栽培于庭园。分布于全国各地。

根(菊三七)：甘、苦，温。破血散瘀，止血，消肿。用于跌打损伤，创伤出血，吐血，产后血气痛。　茎叶(三七草)：甘，平。活血，止血，解毒。用于跌打损伤，衄血，咳血，吐血，乳痈，无名肿毒，毒虫螫伤。

**蔓三七草**　烂脚杆叶(贵州)，蛇接骨(贵州中药名录)，乌凤七、半卧土三七(中药大辞典)

**Gynura procumbens** (Lour.) Merr.——*Cacalia procumbens* Lour.

生于山坡草丛、林间溪旁砂质土上。分布于安徽、海南、广西、贵州、云南。

全草(蛇接骨)：辛、甘，平。散瘀消肿，止咳，通经活络。用于跌打损伤，软组织损伤，咳嗽痰喘，肺痈。

**紫背天葵**　萝卜母、见肿消(贵州)，牛舌三七(中药大辞典)

**Gynura pseudo-china** (L.) DC.——*Senecio pseudo-china* L.; G. bodinieri Lévl.

生于海拔1 800—2 500米的山坡、疏林下、潮湿沟边或石缝中。分布于四川、贵州、云南。

块根(矮人陀)：苦，凉。有小毒。活血止血，消肿解毒。用于跌打损伤，产后瘀滞，衄血，吐血，风湿关节痛，乳痈，痈疮疖肿。

**止血丹**

**Gynura sagittata** DC.

生于山野草坡。分布于江西、湖南、广东、广西、贵州。

全草(止血丹)：苦，凉。行血，解毒。用于蛇咬伤。

## 向日葵属　Helianthus L.

**向日葵**　葵花(通称)，倒葵(陕西东部)，转葵(江苏)，向阳花(安徽)，泥玛多美(藏语)

**Helianthus annuus** L.

原产北美洲。全国各地有种植。

种子(向日葵子)：淡，平。滋阴，止痢，透疹。用于血痢，麻疹不透，痈肿。　根(向日葵根)：甘，平。止痛润肠。用于胸胁、胃脘作痛，二便不通，跌打损伤。　茎髓(向日葵茎髓)：淡，平。利水通淋。用于血淋，砂淋，小便淋痛。　叶(向日葵叶)：淡，平。清热解毒，截疟，降血压。用于高血压症。　花序(向日葵花)：祛风，明目，催生。用于头昏，面肿。花托(葵花托)：甘，平。养阴补肾，降血压，止痛。用于头痛，目昏，牙痛，胃、腹痛，痛经，疮肿。　果壳(向日葵壳)：用于耳鸣。

**菊芋**　洋姜(通称)，洋生姜、洋芋头(江苏)，洋羌、番羌(广东)，五星草(广西)，黄葵花(贵州)

**Helianthus tuberosus** L.

原产北美洲。全国各地有栽培。

块茎、茎叶(菊芋)：甘，凉。清热凉血，接骨。用于热病，肠热下血，跌打骨伤，消渴。

## 蜡菊属　Helichrysum L.

**沙生蜡菊**

**Helichrysum arenarium** (L.) Moench.——*Gnaphalium arenarium* L.

生于海拔900—2 400米的沙丘、沙质地、盐土山坡、草地上或松林下。分布于新疆青河、托里、阿尔泰。

花序：用于胆囊炎，胆结石。

附　注：全草含单宁和挥发油。

## 泥胡菜属　Hemistepta Bunge

**泥胡菜**　小牛蒡口、奶浆藤(陕西)，剪刀草(安徽)、臭风子、绒球（广东），艾草(海南)，猪兜菜(广西)

**Hemistepta lyrata** (Bunge) Bunge——*Cirsium lyrata* Bunge

生于海拔50—3 280米的山坡、山谷、林下、林缘、荒地、草地、丘陵、平原、水沟、农田及路旁。除新疆、西藏外，全国各地均有分布。

全草(泥胡菜)：苦，凉。清热解毒，消肿祛痰，止血，活血。用于痔漏，痈肿疔疮，外伤出血，骨折。

## 狗娃花属　Heteropappus Less.

**阿尔泰狗娃花**　阿尔泰紫菀(中国植物图鉴)

**Heteropappus altaicus** (Willd.) Novopokr.——*Aster altaicus* Willd.

生于从海滨至4 000米的干旱山坡、荒漠草原、沙地、河谷、河滩、石砾上、路旁或村旁。分布于东北、华北、西北及江苏、河南、湖北、四川、西藏。

花序或全草：微苦，凉。清热降火，排脓。用于肝胆火旺，疱疹疮疖。　根：苦，温。散寒润肺，降气化痰，止咳利尿。用于阴虚咳血，咳嗽痰喘。

附　注：根在新疆作“紫菀”用。

**千叶狗娃花**　多叶狗娃花(陕西中药名录)

**Heteropappus altaicus** (Willd.) Novopork. var. **millefolius** (Vant.) W. Wang——*Aster altaicus* Willd. var. *millefolius* Vant.

生于石质或黄土山坡、台地或干燥地上。分布于华北及黑龙江、辽宁、陕西、甘肃、新疆。

全草：微苦，凉。清热降火，排脓。用于外感发热，肝胆火旺，疱疹疮疖。

**青藏狗娃花**

**Heteropappus boweri** (Hemsl.) Griers.——*Aster boweri* Hemsl.

生于海拔2 700—5 300米的砾石山坡、沙地、灌丛或草甸。分布于甘肃西部、青海(祁

连、柴达木、都兰、夏日)、西藏南部至西北部。

花序：甘、苦，凉。清热解毒。

**圆齿狗娃花**　田边菊、野菊花(青海)，其米(藏语)

**Heteropappus crenatifolius** (Hand.-Mazz.) Griers. ——*Aster crenatifolius* Hand.-Mazz.

生于海拔1 000—3 900米的山坡林缘、沟岸、潮湿的石砾或沙土上、田野及路旁。分布于西南及陕西、甘肃、青海。

全草(路旁菊)：苦，凉。解毒消炎，止咳。用于感冒，咳嗽，咽喉痛，蛇咬伤。

**狗娃花**　狗喳花(安徽)，三十六样风(广西武鸣)

**Heteropappus hispidus** (Thunb.) Less.——*Aster hispidus* Thunb.

生于海拔2 400米以下的林缘、荒地、草地、河谷、岸边及路旁。分布于东北、华北、西北及安徽、浙江、江西、台湾、湖北、广西、四川。

根(狗喳花)：苦，凉。解毒消肿。用于疮肿，蛇咬伤。

**鞑靼狗娃花**　细枝狗娃花(内蒙古植物志)

**Heteropappus tataricus** (Lindl.) Tamamsch.——*Calimeris tatarica* Lindl.

生于林下、林缘、草甸、沙丘及河岸沙地上。分布于东北、华北。

花序：清热解毒，消肿。

## 山柳菊属　Hieracium L.

**柳叶山柳菊**　九里明、黄花母(植物名实图考)

**Hieracium krameri** Franch. et Sav.

生于山麓、沟边、积水处或潮湿地上。分布于江西、贵州。

全草：清热解毒，利湿，消痞。用于赤、白痢，淋证，腹痛，痞块。

**山柳菊**　伞花山柳菊(拉汉种子植物名称)

**Hieracium umbellatum** L.

生于山坡、路旁或草地上。分布于东北、华北、西北、西南及河南、湖北、湖南。

根及全草(山柳菊)：苦，凉。清热解毒，利湿消积。用于痈肿疮疖，小便淋痛，腹痛积块，痢疾。

## 女蒿属　Hippolytia Poljak.

**川滇女蒿**　孩儿参、土参、珠儿参(云南滨川)，止咳菊(云南丽江)，菊花参(滇南本草)

**Hippolytia delavayi** (Franch. et W. W. Smith) Shih——*Tanacetum delavayi* Franch. et W. W. Smith; *Chrysanthemum delavayi* (Franch. et W. W. Smith) Hand.-Mazz.

生于海拔2 900—4 000米的高山草甸或林下阴湿处。分布于四川西南部、云南西北部。

块根(菊花参)：辛、甘，温。止咳，化痰，补肺。用于肺虚咳嗽痰喘，久咳不止。

**垫状女蒿**　藏女蒿(中国高等植物图鉴)

**Hippolytia kennedyi** (Dunn) Ling——*Tanacetum kennedyi* Dunn; *Chrysanthemum kennedyi* (Dunn) Kitam.

生于海拔4 700—5 200米的高山荒漠石砾处。分布于西藏拉萨、加查、朗县。

全草：用于咽喉痛。

附　注：①本种为藏药。②西藏特有药用植物。

## 旋覆花属　Inula L.

**欧亚旋覆花**　小野烟(贵州)，旋覆花(中国植物图鉴)，大花旋覆花（中国高等植物图鉴)，毛旋覆花(中药大辞典)

**Inula britanica** L.

生于山野、草甸、河岸、阴湿山坡、田埂或路旁。分布于东北、华北及宁夏、青海、新疆、江苏、江西、四川、贵州。

花序(旋覆花)：咸，温。消痰，降气，软坚，行水。用于胸中痰结，胁下胀满，咳嗽痰喘，呃逆，唾如胶漆，噫气不除，水肿。　茎叶(金佛草)：咸，温。散风寒，化痰饮，消肿毒。用于咳嗽痰喘，胁下胀痛，疔疮，肿毒。　根(旋覆花根)：平喘镇咳，也用于风湿痛，刀伤，疔疮。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**羊耳菊**　八面风(浙江)，山白芷、白牛胆、白面猫子骨(广东)，猪耳风(广西)，蜡毛香(四川)，羊耳风(贵州)

**Inula cappa** (Buch.-Ham.) DC.——*Conyza cappa* Buch.-Ham.

生于海拔300—3 200米的低山和亚高山的湿润或干燥丘陵地、灌丛、草地、荒地及路旁。分布于西南及浙江、江西、福建、湖南、广东、广西。

根(羊耳菊根)：辛，温。祛风散寒，活血舒筋。用于风寒感冒，咳嗽痰喘，风湿痹痛，月经不调。　全草(白牛胆)：微苦、辛，温。祛风，利湿，行气，化滞。用于风湿关节痛，胸膈痞闷，疟疾，泄泻，产后感冒，肝炎，痔疮，疥癣。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版附录收载。

**里海旋覆花**

**Inula caspica** Bl.——*I. caspica* Ledeb.

生于海拔270—1 580米的盐化草甸、洼地、干旱荒地、河岸沙丘及田边沙地。分布于甘肃金塔、新疆北部及西北部。

花序、全草：清热利尿，预防时行感冒。

**土木香**　玛奴(藏语)，青木香(本草衍义)，祁木香（河北药材)，黄花菜(中药大辞典)

**Inula helenium** L.

生于河边、田边、河谷等潮湿处。分布于新疆。其它地区常栽培，主产河北。

根(土木香)：辛、苦，温。健脾和胃，行气止痛。用于胸腹胀满疼痛，呕吐泄泻，痢疾，

症疾。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②驱除家畜蛔虫病效果很好。

**水朝阳旋覆花**　旋覆花(贵州)，水朝阳花、水葵花、野葵花(云南)，水朝阳草（植物名实图考）

**Inula helianthus-aquatica** C. Y. Wu et Ling——*I. serrata* Bur. et Franch.

生于海拔1 200—3 000米的低山湿润坡地、林下、溪边、稻田中、河流旁，稀生于山坡草地或灌丛中。分布于甘肃南部、四川西部及南部、贵州西部、云南。

根(水朝阳根)：消肿。用于牙龈、口腔破溃。　花序(水朝阳)：苦，凉。解表，化痰。用于感冒头痛，胸闷咳喘。

附　注：贵州、云南有些地方以其花序作旋覆花用。

**湖北旋覆花**　金佛草(湖北)

**Inula hupehensis** (Ling) Ling——*I. helianthus-aquatica* C. Y. Wu et Ling subsp. *hupehensis* Ling

生于海拔1 300—1 900米的林下和山坡草地上。分布于湖北西南部、四川东部。

茎叶(金佛草)：咸，温。散风寒，化痰饮，消肿毒。用于咳嗽痰喘，胁下胀痛，疔疮，肿毒。　花序(旋覆花)：咸，温。消痰，降气，软坚，行水。用于胸中痰结，胁下胀满，咳嗽痰喘，呃逆，唾如胶漆，噫气不除，水肿。

**锈毛旋覆花**

**Inula hookeri** C. B. Clarke

生于海拔2 000—3 500米的亚高山山谷坡地、灌丛及林下草地。分布于云南西北部、西藏东部至南部。

全草：用于肌肉神经痛。

**旋覆花**　六月菊(河北)，金佛草、金佛花（江苏、浙江、安徽），驴儿菜、百叶草(江苏)，水葵花(贵州)

**Inula japonica** Thunb.

生于海拔150—2 400米的山坡、湿润草地、沼泽、河岸、田埂、草滩、路旁及村旁，或栽培。分布于东北、华北及陕西、甘肃、青海、江苏、安徽、浙江、福建、湖南、广东、广西、四川、贵州。

茎叶(金佛草)：咸，温。散风寒，化痰饮，消肿毒。用于风寒咳嗽，伏饮痰喘，胁下胀痛，疔疮，肿毒。　花序(旋覆花)：咸，温。消痰，下气，软坚，行水。用于胸中痰结，胁下胀满，咳喘，呃逆，唾如胶漆，噫气不除，大腹水肿。　根（旋覆花根)：平喘镇咳。用于风湿，刀伤，疔疮。

附　注：①功效相似的有**线叶旋覆花 I. linariaefolia** Turcz.，分布于东北、华北、华东及陕西、宁夏、河南、湖北、湖南、四川、贵州。②两种均为《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**显脉旋覆花**　乌草根(广西百色)，黑根(贵州兴义)，小黑药(贵州、云南)，威灵仙、黑威灵(云南)

**Inula nervosa** Wall.——*Aster vellereus* Franch.

生于海拔1 200—2 600米的山地林下、草坡及湿润草地上。分布于西南及广西西部。

根(草威灵)：辛、苦，温。祛风寒，消积滞，通经络。用于脘腹冷痛，食积腹胀，噎膈，胃痛，体虚多汗，感冒咳嗽，风湿脚气。

**翼茎羊耳菊**　大黑洋参、石如意大黑药、大黑根(云南)，翼茎旋覆花（中药大辞典）

**Inula pterocaula** Franch.

生于海拔 2 000—2 800 米的亚高山灌丛、林下和草地上。分布于四川西部和南部、云南北部和西北部。

根(大黑药)：苦，平。清热解毒，止咳，化痰，补虚，通经络，利水除湿。用于头晕，心慌，耳鸣，出虚汗，感冒，咳嗽，痈疡肿毒，骨痨。

**总状土木香**　玛奴(西藏藏语)，以木香(祁州药志，误用)，木香（玛利氏植物名录）

**Inula racemosa** Hook. f.

生于海拔 400—4 400 米的水边、河滩、湿润草地，或栽培。分布于新疆伊宁、昭苏、阜康、托里、布尔津。全国其它省区有栽培。

根(土木香)：辛、苦，温。健脾和胃，调气解郁，行气止痛。用于胸腹胀满疼痛，呕吐泄泻，痢疾，疟疾。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②新疆、西藏地区使用。

**羊眼花**

**Inula rhizocephala** Schrenk

生于海拔 1 700—3 500 米的针叶林下、石砾坡地及高山岩石上、沙丘、河岸、田边及路旁。分布于新疆西部和西北部、西藏西部。

花序：理气止痛，开胃驱虫。

**柳叶旋覆花**　歌仙草(中国植物图鉴)

**Inula salicina** L.——*I. salicina* L. subsp. *asiatica* (Kitam.) Kitag.

生于海拔 250—1 000 米的寒温带及温带山顶、山坡草地、沙丘、田边或路旁。分布于东北及内蒙古东部和北部、新疆、山东、河南西部。

花序：降气平逆，祛痰止咳，健胃。药用同旋覆花。

**蓼子朴**　山猫眼(河北宣化)，黄喇嘛、秃女子草(陕西、甘肃)，沙地旋覆花（中药大辞典）

**Inula salsoloides** (Turcz.) Ostenf.——*Conyza salsoloides* Turcz.; *I. ammophila* Bunge

生于海拔 500—2 000 米的干旱草原、半荒漠、荒漠地区的戈壁滩地、流沙地、固定沙丘、湖、河沿岸冲积地、黄土高原风沙地和丘陵顶部。分布于华北、西北及辽宁西部、河南东部和北部。

花序、全草(沙旋覆花)：苦、辛，凉。清热利尿，解毒。用于外感发热，小便不利，痈疮肿毒，黄水疮，湿疹。

## 苦荬菜属　Ixeris Cass.

**岩荷苦荬菜**　盘儿草(黑龙江)

**Ixeris chelidonifolia** Stebb. var. **saxatilis** (Baranov) Zhu et C. J. Guo——*I.*

*saxatilis* Baranov

生于山坡、林下、草地及田野上。分布于黑龙江。

根：散瘀止痛，止血止带。　全草：清热解毒，凉血消肿。

**山苦荬**　苦菜(北方通称)，奶浆菜、面条子(陕西)，活血草(甘肃)，小苦荬(安徽)，七托莲(广西苍梧)

**Ixeris chinensis** (Thunb.) Nakai——*Prenanthus chinensis* Thunb.; *Lactuca chinensis* (Thunb.) Makino

生于海拔 500—4 000 米的山坡、荒野、田间或路旁。分布于全国各地。

全草：苦，凉。清热解毒，泻火，凉血，止血，止痛，调经，活血，祛腐生肌。用于无名肿毒，阴囊湿疹，风热咳嗽，泄泻，痢疾，吐血，衄血，黄水疮，跌打损伤，骨折。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版附录收载。

**黄鼠草**

**Ixeris chinensis** (Thunb.) Nakai subsp. **versicolor** (Fisch.) Kitam.——*Lagoseris versicolor* Fisch. ex Link

生于石砾质山坡、草原、草地或荒野。分布于全国各地。

全草：清热解毒，利水消肿。

**丝叶苦荬菜**　丝叶苦菜(东北植物检索表)

**Ixeris chinensis** (Thunb.) Nakai var. **graminifolia** (Ledeb.) H. C. Fu

生于山野、荒地、砂质草原、石质山坡或砂质地。分布于东北及内蒙古、宁夏。

全草：清热解毒，凉血，拔脓。

**剪刀股**　鹅公英(安徽)，低滩苦荬菜(中国高等植物图鉴)

**Ixeris debilis** A. Gray——*I. japonica* Nakai

生于山野沙地、荒地、河堤岸边潮湿地、海边、田边及路旁。分布于华东、中南及河北、四川。

全草(剪刀股)：甘、苦，凉。解热毒，消痈肿，凉血，利尿。用于赤眼，水肿，疔毒，淋证。

**齿缘苦荬菜**

**Ixeris dentata** (Thunb.) Nakai——*Prenanthes dentata* Thunb.

生于海拔 3 300 米以下的山坡、林下、溪边、稻田边及路旁。分布于华东、西南及广东、广西。

全草：苦，凉。活血止血，排脓祛瘀。用于痈疮肿毒。

**苦荬菜**　苦菜、一点红(陕西北部)，盘儿草(陕西、安徽、云南)，稀须菜、剪刀草(江苏)，黄花菜(广西靖西)

**Ixeris denticulata** (Houtt.) Stebb.——*Prenanthus denticulata* Houtt.

生于山坡、山谷、疏林下、林缘、灌丛、荒野、田野、路边或宅旁。分布于全国各地。

全草(苦荬菜)：苦，凉。清热解毒，消痈散结。用于肺痈，乳痈，血淋，疖肿，跌打损伤，无名肿毒，蛇虫咬伤。

附　注：功效相似的有**毛苦荬菜 I. denticulata** (Houtt.) Stebb. subsp. **pubescens** Stebb.，分布于湖北神农架。

**细叶苦荬菜**　蛇箭草(广西金秀),牛舌片细辛(贵州)

**Ixeris gracilis** (DC.) Stebb.——*Lactuca gracilis* DC.

生于海拔650—3 150米的荒野、草坡、田边或路旁。分布于中南、西南及河北、陕西、甘肃、浙江、福建、江西。

全草(粉苞苣):苦,凉。清热解毒,消肿止痛。用于黄疸,目赤红痛,疖肿。

**平卧苦荬菜**　蔓生苦荬菜(湖北)

**Ixeris humifusa** (Dunn) Stebb.——*Lactuca humifusa* Dunn

生于海拔600—1 700米的山坡阴湿林下。分布于陕西、湖北、四川。

全草:清热解毒,消痈肿。

附　注:功效相似的有**平滑苦荬菜 I. laevigata** (Bl.) Sch.-Bip. —— *Prenanthes laevigata* Bl.,分布于福建、台湾、江西。

**多头苦荬菜**　山鸭舌草(安徽),苦菜(湖北)

**Ixeris polycephala** Cass.——*Lactuca polycephala* (Cass.) Benth.

生于海拔700—2 400米的山坡草地、河边、田野及路旁。分布于华东、中南、西南。

全草:甘、苦,凉。清热解毒,利湿消痞。用于肺热喉痛,痞块,疔疮肿毒,乳痈,肠痈,目赤肿痛,皮肤风疹。

**匍匐苦荬菜**

**Ixeris repens** A. Gray

生于海滨沙地、田间或荒地上。分布于东北、华东、中南。

全草:清热解毒,活血排脓。

**抱茎苦荬菜**　黄鼠草(陕西),苦碟子、苦荬菜(中国高等植物图鉴)

**Ixeris sonchifolia** (Bunge) Hance——*Prenanthes sonchifolia* Bunge

生于海拔400—2 000米的山坡、疏林下、荒野及路旁。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、山东、江苏、安徽、河南。

当年生幼苗(苦碟子):苦,凉。清热解毒,排脓,止痛。用于肠痈,痢疾,各种化脓性炎症,吐血,衄血,头痛,牙痛,胸、腹痛,黄水疮,痔疮。

附　注:功效相似的有**秋抱茎苦荬菜 I. sonchifolia** (Bunge) Hance var. **serotina** (Maxim.) Kitag.——*Youngia serotina* Maxim.,分布于东北及内蒙古。

## 苓菊属　Jurinea Cass.

**蒙疆苓菊**　鸡毛狗(宁夏),久苓草、久苓菊、地棉花(新疆),蒙古久苓草(中药大辞典)

**Jurinea mongolica** Maxim.

生于海拔1 040—1 500米的沙丘、沙滩或沙质地上。分布于内蒙古西部、陕西北部、宁夏北部、新疆东北部。

茎基部的绒毛(鸡毛狗):淡,平。止血。用于外伤出血,鼻衄。　全草:苦,凉。止血消肿。用于外伤出血,鼻衄,阴囊肿大。

附　注:本种止血有特效,产区流传有:"家有鸡毛狗,不怕刀落手"。

**多花苓菊**

**Jurinea multifolia** (L.) B. Fedtsch.——*Serratula multiflora* **L.**

生于山坡草地、沙地或沙丘上。分布于新疆塔城及托里。

茎基部的绒毛：止血。

## 马兰属　Kalimeris Cass.

**裂叶马兰**

**Kalimeris incisa** (Fisch.) DC.——*Aster incisa* Fisch.

生于山坡草地、灌丛、林间空地、湿草地或河岸边。分布于东北及内蒙古。

全草：消食，除湿热，利小便。

**马兰**　鸭子食、白龙头(黑龙江)，泥鳅串(陕西、湖北、广西、四川、贵州)，田边菊(江苏、福建、广东)，路边菊(江苏、福建、广东、广西)，裳衣莲(云南)

**Kalimeris indica** (L.) Sch.-Bip.——*Aster indicus* L.

生于海拔500—1 950米的山坡、林缘、草丛、山谷、山沟、河谷两岸、路旁及田边。分布于华东、中南及辽宁、陕西、四川、贵州、云南。

根及全草(马兰)：辛，凉。清热，凉血，解毒，利湿。用于吐血，衄血，血痢，疮伤出血，疟疾，水肿，淋浊，咽喉痛，痔疮，痈肿，丹毒，蛇咬伤。

**狭叶马兰**　路边草(湖北)，多型马兰(湖北中药名录)，窄叶鸡儿肠(中药大辞典)

**Kalimeris indica** (L.) Sch.-Bip. var. **stenolepis** (Hand.-Mazz.) Kitam.——*Asteromoea indica* (L.) Bl. var. *stenolepis* Hand.-Mazz.

生于山坡、林缘、灌丛或路旁。分布于山西、江苏、江西、河南、湖北。

全草：苦、微辛，平。消食健胃，祛瘀解毒，止痢。用于小儿疳积，泄泻，痢疾，蛇咬伤，外伤出血。

**全叶马兰**　黄花三草、野白菊(湖北)，全叶鸡儿肠(江苏南部种子植物手册)

**Kalimeris integrifolia** Turcz. ex DC.——*Asteromoea integrifolia* (Turcz.) Loes.

生于山坡、林缘、灌丛及路旁。分布于东北、华北、华东及陕西、河南、湖北、湖南、四川、贵州。

全草：清热解毒，止血消肿，利湿。　花序：清热明目。用于眼病。

**山马兰**　山鸡儿肠(东北植物检索表)

**Kalimeris lautureana** (Debx.) Kitam.——*Boltonia lautureana* Debx.

生于山坡、草原、灌丛、草地及路边。分布于东北、华北及陕西、山东、江苏、河南、四川、贵州。

根及全草：清热，凉血，利湿，解毒。

**蒙古马兰**　北方马兰(陕西中药名录)

**Kalimeris mongolica** (Franch.) Kitam.——*Aster mongolica* Franch.; *Asteromoea mongolica* (Franch.) Kitam.

生于山坡、灌丛、草丛及田边。分布于华北及吉林、辽宁、陕西、甘肃、宁夏、青海、山

东、河南、四川、贵州。

根及全草：凉血，清热，利湿，解毒。用于吐血，衄血，血痢，创伤出血，疟疾，黄疸，水肿，淋浊，咽喉痛，痔疮，丹毒，蛇咬伤。

**毡毛马兰**　岛田鸡儿肠(江苏南部种子植物手册)

**Kalimeris shimadai** (Kitam.) Kitam.——*Asteromoea shimadai* Kitam.

生于林缘、草坡及溪岸。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、贵州。

全草：辛、苦，凉。清热解毒，利尿，凉血，止血，也用于目赤。

## 莴苣属　Lactuca L.

**莴苣**　莴笋(滇南本草)，莴菜(本草纲目)

**Lactuca sativa** L.

原产欧洲。全国各地均有栽培。

嫩茎：甘、苦，凉。清热解毒，利尿通乳。用于小便不利，乳汁不通，尿血。　果实(莴苣子)：苦，凉。活血，祛瘀，通乳。用于阴肿，痔瘘下血，伤损作痛。

**野莴苣**

**Lactuca serriola** Torner

生于平原、盆地、渠边及路边。分布于新疆。

全草：清热解毒，活血祛瘀。

## 山莴苣属　Lagedium Sojak

**山莴苣**　北山莴苣(中国高等植物图鉴)

**Lagedium sibiricum** (L.) Sojak——*Sonchus sibirica* L.; *Lactuca sibirica* (L.) Benth. ex Maxim.

生于山地林缘、河岸及草甸。分布于东北及内蒙古、陕西、青海、山东。

根：消肿止血。　全草：清热解毒，理气止血。

## 六棱菊属　Laggera Sch.-Bip. ex Hochst.

**六棱菊**　六棱锋、六耳铃(海南)，六耳棱(广西)，冈药、羊毛草(贵州)，白蓬草(云南)

**Laggera alata** (D. Don) Sch.-Bip. ex Oliv.——*Erigeron alatum* D. Don

生于海拔400—2 400米的山坡、旷野、田埂及路旁。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、广东、海南、广西、贵州、云南。

全草(鹿耳翎)：辛，温。祛风，除湿，化滞，散瘀，消肿，解毒。用于感冒咳嗽，身痛，泄泻，风湿关节痛，经闭，跌打损伤，疔痈，瘰疬，湿毒瘙痒。　根(羊毛草根)：辛，凉。调气，补虚，清热，解表。用于虚劳，经闭，感冒。

**翼齿六棱菊**　黄牛草(贵州)，山桂丹(云南)，臭灵丹(滇南本草)

**Laggera pterodonta** (DC.) Benth.——*Blumea pterodonta* DC.

生于海拔200—2 400米的山谷疏林中或空旷草地上。分布于西南及湖北西部、广西西南部。

全草：辛、苦，凉。有小毒。清热解毒，镇痛消肿。用于乳蛾，咽喉痛，口腔破溃，咳嗽痰喘，疟疾，疮痈肿毒，毒蛇咬伤，跌打损伤。

## 稻搓菜属　Lapsana L.

**稻搓菜**

**Lapsana apogonoides** Maxim.

生于海拔760—2 500米的荒山坡、荒地、沟边及田野。分布于中南及陕西、江苏、安徽、浙江、江西、四川、云南。

全草：苦，平。清热凉血，消痈解毒。用于咽喉痛，痢疾下血，乳痈。

## 栓果菊属　Launaea Cass.

**无茎栓果菊**　土蒲公英(广西)

**Launaea acaulis** (Roxb.) Babc. ex Kerr——*Prenanthes acaulis* Roxb.

生于山坡草地或山野路旁。分布于广东、广西、四川、贵州、云南。

全草：甘、苦，凉。清热解毒。用于消化不良，小便淋痛，肠痈，目赤红痛，痈疽疔疮，乳痈，疔腮。

## 大丁草属　Leibnitzia Cass.

**大丁草**　翻白草、苦马菜、鸡毛蒿(贵州)，白蒿枝、细叶火草(云南)，烧金草(本草纲目)

**Leibnitzia anandria** (L.) Nakai——*Tussilago anandria* L.; *Gerbera anandria* (L.) Sch.-Bip.

生于海拔700—2 900米的山坡、林缘、灌丛、草地或路旁。分布于全国各地。

全草或带根全草：苦，温。清热利湿，解毒消肿，止咳止血。用于风湿肢体麻木，咳嗽痰喘，疔疮，外伤出血，小儿疳积。

## 火绒草属　Leontopodium R. Br.

**白灰火绒草**

**Leontopodium albo-griseum** Hand.-Mazz.

生于海拔2 700—3 500米的亚高山和高山草地、灌丛、坡地及岩石上。分布于贵州、云南。

全草：用于小儿高烧，咳嗽痰喘。

**松毛火绒草**　　火草、小地松(云南)

**Leontopodium andersonii** C. B. Clarke——*Gnaphalium andersonii* (C. B. Clarke) Franch.

生于海拔1 000—2 500米的干草坡、开旷草地、针叶林下和丘陵顶部。分布于贵州中部及西部、云南东部、西北部至南部。

全草：苦、辛，温。舒筋活络，润肺理气。

**艾叶火绒草**

**Leontopodium artemisiifolium** (Lévl.) Beauv.——*Gnaphalium artemisiifolium* Lévl

生于海拔1 000—3 000米的杂木林缘、山谷、溪岸、草地或牧场上。分布于四川西部及西南部、贵州、云南北部和西北部。

全草(蛾药)：用于乳蛾，咽喉痛。

**短星火绒草**

**Leontopodium brachyactis** Gandog.

生于海拔3 000—4 000米的高山或亚高山干旱草地或坡地上。分布于新疆、西藏西部。

全草：清热凉血，消肿。

**美头火绒草**

**Leontopodium calocephalum** (Franch.) Beauv.——*Gnaphalium leontopodium* L. *γ. calocephalum* Franch.

生于海拔2 800—4 700米的高山草甸、灌丛、冷杉和其它针叶林下、林缘、石砾坡地、湖岸或沼泽地。分布于甘肃西部至南部、宁夏南部、青海东部、四川北部至西南部、云南西北部至北部。

全草：辛、苦，凉。凉血，利尿，祛风，利湿。

**疏苞火绒草**

**Leontopodium calocephalum** (Franch.) Beauv. var. **depaupeiatum** Ling

生于山地草甸或河滩沙地上。分布于甘肃张掖、青海门源。

全草：用于风湿关节痛。

**湿生火绒草**

**Leontopodium calocephalum** (Franch.) Beauv. var. **uliginosum** Beauv.

生于海拔1 500—3 750米的山坡、林下、草地、草甸及沼泽地上。分布于甘肃、宁夏、青海、四川、云南。

全草：清热凉血，利尿。

附　注：本种使用于青海，全株磨成粉末作外敷剂，用于风湿关节痛。

**山野火绒草**

**Leontopodium campestre** (Ledeb.) Hand.-Mazz.——*L. alpinus* Cass. *α. campestre* Ledeb.

生于海拔1 400—3 000米的干旱草原、干燥坡地、河谷阶地、沙地、石砾地，也生于较湿润的林间草地。分布于新疆阿尔泰山、天山、昆仑山。

全草：清热凉血，消肿。

**团球火绒草**　剪花火绒草(东北植物检索表)

**Leontopodium conglobatum** (Turcz.) Hand.-Mazz.——*L. sibiricum* Cass. var *conglobatum* Turcz.

生于干山坡、干燥草原、向阳坡地、石砾地、沙地及稀疏灌丛或林中草地上。分布于黑龙江大兴安岭、内蒙古东部及东北部。

全草：清热凉血，益肾利水。

**戟叶火绒草**　火草、火艾、白蒿(云南)，札哇(藏语)

**Leontopodium dedekensii** (Bur. et Franch.) Beauv.——*Gnaphalium dedekensii* Bur. et Franch.

生于海拔 1 400—3 500 米的高山和亚高山的针叶林、林缘、干燥灌丛、干草地及山沟阳坡。分布于西南及陕西南部、甘肃南部及西部、青海、湖北西部。

全草：辛、苦，凉。清热凉血，利尿，疏风解表。

附　注：藏医用本品作艾炙用。

**坚杆火绒草**

**Leontopodium franchetii** Beauv.

生于海拔 1 800—5 000 米的高山干草地、石砾坡地及河滩湿地上。分布于甘肃南部、四川西部和西南部、云南西北部。

全草(山毛香)：辛，平。解毒，消肿止痛，润肺止咳，通经活络。

**鼠麴火绒草**

**Leontopodium forrestianum** Hand.-Mazz.

生于海拔 3 400—4 000 米的高山及亚高山的干燥草地、石砾地及灌丛中。分布于云南贡山及德钦。

全草(小火草)：甘、淡，平。清肝明目，消肿生肌，止咳驱虫。用于小儿泄泻，蛔虫病，感冒，咳嗽痰喘，角膜云翳，外伤，疮疡久不收口。

**香芸火绒草**

**Leontopodium haplophylloides** Hand.-Mazz.

生于海拔 2 600—4 000 米的高山草地、石砾地、灌丛或针叶林缘。分布于甘肃西南部、青海东部、四川西部和北部。

全草：苦、微辛，平。润肺止咳，解毒，下乳，止血。

**薄雪火绒草**　小毛香、小白头翁(陕西)，薄雪草(植物学大辞典)，火艾(中国植物图鉴)

**Leontopodium japonica** Miq.

生于海拔 1 000—2 000 米的山地灌丛、林下、林缘、草坡和草甸。分布于河北、山西、陕西、甘肃、宁夏、安徽、河南、湖北、四川、贵州。

花序(小毛香)：淡、微甘，平。止咳。用于咳嗽。

**火绒草**　老头草、老头艾(东北)，火绒蒿(河北)，海哥斯梭利(内蒙古)，大头毛香、小毛香艾(甘肃)

**Leontopodium leontopodioides** (Willd.) Beauv.——*Filago leontopodioides*

Willd.; *L. sibiricum* Cass.

生于海拔 100—3 200 米的干旱草原、黄土坡地、山谷、沟岸、石砾地及草地上。分布于东北、华北、西北及山东、江苏、河南。

全草(老头草): 微苦,凉。清热凉血,益肾利水。用于急、慢性水肿,尿血,淋浊。

**长叶火绒草**　　兔耳子草(山西)

**Leontopodium longifolium** Ling

生于海拔 1 200—4 800 米的山坡草地、灌丛及岩石上。分布于华北及陕西、甘肃、宁夏、青海、四川、西藏。

全草: 清肺,化痰,止咳。

**矮火绒草**　　小毛香艾(青海)

**Leontopodium nanum** (Hook. f. et Thoms.) Hand.-Mazz. —— *Antennaria nana* Hook. f. et Thoms.

生于海拔 1 600—5 500 米的低山和高山湿润草地、泥炭地及石砾坡地。分布于陕西西部、甘肃中部至西部、青海柴达木及湟源、新疆南部、四川西部至西北部、云南中甸、西藏。

全草: 苦,凉。清热凉血,止血利尿,镇咳,降血压。

**弱小火绒草**

**Leontopodium pusillum** (Beauv.) Hand.-Mazz. —— *L. alpinum* Cass. var. *pusillum* Beauv.

生于海拔 3 500—5 000 米的高山雪线附近的草滩地、盐湖边及石砾地上。分布于青海北部、新疆南部、西藏东北部、中部及南部。

全草: 清热凉血,消肿。

附　注: 功效相似的有**黄白火绒草 L. ochroleucum** Beauv.,分布于青海祁连及海晏、新疆北部、南部及西部、西藏中部、南部及西部。

**华火绒草**

**Leontopodium sinense** Hemsl.

生于海拔 1 600—3 400 米的亚高山干旱草地、草甸、沙地灌丛、针叶林中、平地或田边。分布于西南。

全草(蛾药): 辛,凉。清热解毒,消肿止痛。用于咽喉痛,乳蛾。

附　注: 西藏以根入药,功效同全草。

**川西火绒草**

**Leontopodium wilsonii** Beauv.

生于海拔 2 000—3 000 米的山谷、岩石上及林中。分布于四川西部和西北部。

全草(小地松): 甘、淡,平。止咳平喘,驱虫,止泻。用于感冒,咳嗽痰喘,蛔虫症,小儿泄泻,外伤出血,高血压症,癫痫,风湿关节痛。

附　注: 四川特有药用植物。

## 小滨菊属　Leucanthemella Tzvel.

**小滨菊**　　线叶菊(东北植物检索表),小白菊(吉林中药名录)

**Leucanthemella linearis** (Matsum.) Tzvel.——*Chrysanthemum lineare* Matsum.

生于沼泽地或湿草地上。分布于东北。

花序：解毒，消肿，散瘀。

## 橐吾属 Ligularia Cass.

**褐毛橐吾** 一碗水(陕西)，马蹄草(中国高等植物图鉴)

**Ligularia achyrotricha** (Diels) Ling——*Senecio achyrotricha* Diels

生于海拔 3 000 米以上的高山林缘、坡地、水沟旁等湿润场所。分布于陕西、甘肃、四川。

根(马蹄草)：催吐。外用于疮疖。

**帕米尔橐吾**

**Ligularia alpigena** Poljak.

生于高山草甸、草丛或林下。分布于新疆。

根：理气活血，止咳祛痰。

附 注：功效相似的有**阿尔泰橐吾 L. altaica** DC.，分布于甘肃、新疆。

**齿叶橐吾** 禾叶天(广西全州)，马蹄黄(贵州)

**Ligularia dentata** (A. Gray) Hara——*Erythrochaeta dentata* A. Gray

生于海拔 1 500—3 000 米的山坡、林缘或草地上。分布于山西、陕西、甘肃、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

根(马蹄黄)：辛，微温。舒筋活血，散瘀消肿。用于跌打损伤，月经不调，便血。

**网脉橐吾**

**Ligularia dictyoneura** (Franch.) Hand.-Mazz.——*Senecio dictyoneura* Franch.

生于海拔 2 950—3 450 米的山坡林下或草坡上。分布于四川、云南。

根：苦，温。宣肺利气，镇咳祛痰，利尿。用于伤风感冒，咳嗽，肺痈咳血，吐血，痰中带血。

**大黄橐吾** 大黄(四川松潘)

**Ligularia duciformis** (C. Winkl.) Hand.-Mazz.——*Senecio duciformis* C. Winkl.

生于海拔 3 500—4 000 米的山坡林下、溪岸、沟谷或沼泽地。分布于甘肃、宁夏、湖北、四川、云南、西藏。

根(脑顶须)：清热解毒，止痛，镇咳，祛痰，利尿。

**巴山橐吾** 铁铲头(湖北)

**Ligularia fargesii** (Franch.) Diels——*Senecio fargesii* Franch.

生于山坡、草地及沟边。分布于湖北巴东及神农架。

根及根状茎：止咳平喘。用于咳嗽。

附 注：湖北特有药用植物。

**肾叶橐吾** 大救驾、荷叶七(陕西太白山)

**Ligularia fischeri** (Ledeb.) Turcz.——*Cineraria fischeri* Ledeb.

生于海拔500—4 000米的山坡、林下、灌丛、山谷及溪旁草地上。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、青海、河南、四川、西藏。

根及根状茎(葫芦七)：甘、辛，温。理气活血，止痛，止咳，祛痰。用于跌打损伤，劳伤，腰腿痛，咳嗽痰喘，顿咳，肺痨咯血。

附　注：①本种也作紫菀入药，名为"山紫菀"。②忌浆水。③阴虚，肝热干咳者慎用。④藏医用于黄疸。⑤原苏联民间用全草外敷关节脓肿。

**异叶橐吾**

**Ligularia heterophylla** Chang

生于海拔 2 900 米的河谷温草地或灌丛中。分布于云南维西及丽江。

根：补虚散结，止咳祛痰。

**鹿蹄橐吾**　一块瓦(广西融安)，马蹄当归(贵州)，地麝香、牛尾参、化血丹、红紫菀(云南)，滇紫菀(滇南本草)

**Ligularia hodgsonii** Hook.

生于山坡、林下、林缘、山谷、河边、溪岸或草地上。分布于甘肃、安徽、河南、湖北、广西、四川、贵州、云南。

根及根状茎(南瓜七)：淡、微辛，温。活血行瘀，润肺降气，止咳。用于劳伤咳嗽，吐血，跌打损伤。　叶：用于跌打损伤。

**细茎橐吾**

**Ligularia hookeri** (C. B. Clarke) Hand.-Mazz.——*Cremanthodium hookeri* C. B. Clarke

生于海拔 2 800—4 000 米的林下、灌丛、山坡草地或流水旁。分布于西南及陕西、甘肃。

带根全草(太白小紫菀)：辛、苦，平。化痰止咳，宽胸利气，通窍生津。

**狭苞橐吾**　紫菀、退水干(湖北)

**Ligularia intermedia** Nakai

生于山坡、林缘、沟边及路旁。分布于东北、华北、华东、中南。

根及根状茎(山紫菀)：苦，温。润肺化痰，止咳，平喘。

附　注：湖北以本种作窄头橐吾用。

**长白山橐吾**　嘎查-扎牙海(蒙语)，单花橐吾(东北植物检索表)

**Ligularia jamesii** (Hemsl.) Kom.——*Senecio jomesii* Hemsl.

生于林下、林缘、沟谷、草甸及高山草地上。分布于东北及内蒙古。

根及根状茎：宣肺利气，镇咳祛痰。

**大头橐吾**

**Ligularia japonica** (Thunb.) Less.——*Arnica japonica* Thunb.

生于山坡草地、山谷、混交林下、林缘、阴湿处或溪边草丛中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、广东、云南。

根、全草：辛，微温。舒筋活血，解毒消肿。用于跌打损伤，无名肿毒，毒蛇咬伤。

**克洛岑橐吾**

**Ligularia knorringana** Poljak.

生于山坡、林缘或草地上。分布于新疆。

根：理气活血，止咳祛痰。

**牛蒡叶橐吾**　　大马蹄香、大独叶草、化血丹、发罗海(云南)

**Ligularia lapathifolia** (Franch.) Hand.-Mazz.——*Senecio lapathifolius* Franch.

生于海拔1 800—3 000米的山坡草丛中。分布于四川西部及云南东川、昆明、宾川、丽江。

根、叶(大独叶草)：辛、微苦，热。有小毒。活血，散瘀，止痛。用于跌打损伤，瘀肿疼痛，风湿筋骨痛。

**宽戟橐吾**

**Ligularia latihastata** (W. W. Smith) Hand.-Mazz.——*Senecio latihastatus* W. W. Smith

生于海拔1 800—3 600米的山坡草地、林缘或溪岸。分布于四川涪陵、云南丽江及大理。

根及根状茎：甘，温。止咳化痰，润肺降气，平喘。

**贵州橐吾**　　接骨丹、马蹄当归(贵州)

**Ligularia leveillei** (Vant.) Hand.-Mazz.——*Senecio leveillei* Vant.

生于山坡草地。分布于四川、贵州。

根：辛、苦，温。温肺下气，祛痰止咳，通利水道。用于肺痈，风寒咳嗽，小便不利，水肿，淋浊。

**川滇橐吾**

**Ligularia limprichtii** (Diels) Hand.-Mazz.——*Senecio limprichtii* Diels

生于海拔1 900—2 400米的山地针叶林缘及溪流沿岸。分布于四川、贵州、云南。

根及根状茎：甘，温。宣肺化痰，平喘，降气。

**大叶橐吾**

**Ligularia macrophylla** (Ledeb.) DC.——*Cineraria macrophylla* Ledeb.

生于山坡、林缘及草坡上。分布于新疆。

根：补虚散结，镇咳祛痰。

附　注：功效相似的有**天山橐吾 L. narynensis**(C. Winkl.)O. et B. Fedtsch.——*Senecio narynensis* Winkl.，分布于新疆。

**全缘橐吾**　　扎牙海(蒙语)

**Ligularia mongolica** (Turcz.) DC.——*Cineraria mongolica* Turcz.

生于山地林缘、灌丛、草甸、草原及石质坡地。分布于东北、华北。

根及根状茎：宣肺利气，镇咳祛痰，除湿利水。　全草：止血。

**莲叶橐吾**　　一碗水(陕西)

**Ligularia nelumbifolia** (Bur. et Franch.) Hand.-Mazz.——*Senecio nelumbifolius* Bur. et Franch.

生于山地、林缘、林下、灌丛、溪岸及沟边阴湿处。分布于陕西南部、甘肃南部、湖北、四川、云南。

根(一碗水)：辛、微甘，平。止咳化痰，祛风。用于肺痨，风寒咳嗽。

**掌叶橐吾**

**Ligularia przewalskii** (Maxim.) Diels——*Senecio przewalskii* Maxim.

生于海拔1 200—2 800米的山坡、山谷、林缘、草坡、草甸、沟谷或溪边。分布于内蒙古、山西、陕西、甘肃、宁夏、青海、湖北、四川。

根：苦，温。润肺，止咳，化痰。幼叶：催吐。　花序：苦，凉。清热利湿，利胆退黄。

**青海橐吾**

**Ligularia purdomii** (Turrill) Chitt.——*Senecio purdomii* Turrill

生于海拔3 600—3 900米的沼泽或流水边。分布于青海门源、海晏、班玛。

根、叶：辛，温。催吐。外用于疮疖。

**藏橐吾**　卵叶橐吾(全国中草药汇编)

**Ligularia rumicifolia** (Drumm.) S. W. Liu——*Senecio rumicifolius* Drumm.

生于山地。分布于西藏。

根：苦，温。散寒，润肺降气，化痰止咳，利尿。用于咳嗽痰喘，肺痨咳嗽，咽喉痛。

**箭叶橐吾**

**Ligularia sagitta** (Maxim.) Mattf.——*Senecio sagitta* Maxim.

生于海拔2 300—4 000米的高山灌丛、林下、林缘、山坡草地、草滩、草丛或河边沼泽地上。分布于内蒙古、陕西、甘肃、宁夏、青海、四川西部、西藏东部。

根：润肺化痰，止咳。　幼叶：催吐。花序：苦，凉。清热利湿，利胆退黄。

**橐吾**

**Ligularia sibirica** (L.) Cass.——*Othonna sibirica* L.

生于灌丛、林缘、草甸、沼泽及河滩。分布于北部及东北。

根及根状茎：润肺，化痰，定喘，止咳，止血，止痛。用于肺痨。

**准噶尔橐吾**

**Ligularia songarica** (Fisch.) Ling——*Senecio songaricus* Fisch.

生于河谷或溪边湿草地上。分布于新疆。

根：止咳化痰，温肺平喘。叶、草：清热，解毒，利尿。用于乳痈，水肿，瘰疬。

**窄头橐吾**

**Ligularia stenocephala** (Maxim.) Matsum. et Koidz.——*Senecio stenocephalus* Maxim.

生于林下、林缘、草坡或草地上。分布于河北、山西、江苏、安徽、浙江、江西、台湾、河南、湖北、贵州。

根及根状茎(山紫菀)：苦，温。润肺止咳，舒筋活络。用于咳嗽痰喘，肾虚腰痛，肺痨咯血，乳痈，水肿。

**锥花橐吾**

**Ligularia thyrsoidea** (Ledeb.) DC.——*Cineraria thyrsoidea* Ledeb.

生于河谷及溪边湿润草地上。分布于新疆。

根：止咳化痰，温肺平喘。

**苍山橐吾**　尖叶橐吾(全国中草药汇编)

**Ligularia tsangchanensis** (Franch.) Hand.-Mazz.——*Senecio tsangchanensis*

Franch.

生于海拔 3 000—4 050 米的林下、灌丛、山坡、水边或草场上。分布于四川西南部、云南北部、西藏东部。

根：苦，温。散寒，润肺降气，化痰止咳，利尿。用于咳嗽痰喘，肺痨咯血，咽喉痛。

**离舌橐吾**　水荷叶、白紫菀(湖北)

**Ligularia veitchiana** (Hemsl.) Greenm.——*Senecio veitchianus* Hemsl.

生于海拔 1 000—3 700 米的山坡、林下及湿地上。分布于陕西、甘肃、湖北、四川、贵州、云南。

根及根状茎：甘，凉。润肺降气，祛痰止咳，活血祛瘀。

**绵毛橐吾**

**Ligularia vellerea** (Franch.) Hand.-Mazz.——*Senecio vellereus* Franch.

生于海拔 2 050—3 670 米的荒坡草地上。分布于四川渡口、云南西北部。

根：温肺定喘，散瘀止痛。

**黄帚橐吾**　热肖(藏语)

**Ligularia virgaurea** (Maxim.) Mattf.——*Senecio virgaureus* Maxim.

生于海拔 3 000—4 300 米的高山草坡、草滩或草原上。分布于甘肃、青海、四川、云南西北部、西藏东北部至南部。

幼叶：微甘、苦，温。化痰止咳，催吐。

**川鄂橐吾**

**Ligularia wilsoniana** (Hemsl.) Greenm.——*Senecio wilsonianus* Hemsl.

生于山坡林下、林缘、草地及阴湿处。分布于湖北、四川、云南。

根及根状茎(川紫菀)：润肺化痰，止咳。

**黄毛橐吾**

**Ligularia xanthotricha** (Gruning) Ling——*Cacalia xanthotricha* Gruning

生于山坡阴湿沟地及灌丛中。分布于河北、山西。

全草：活血散瘀。

## 母菊属　Matricaria L.

**同花母菊**

**Matricaria matricarioides** (Less.) Porter ex Britton——*Artemisia matricarioides* Less.; *M. discoidea* DC.

生于旷野、路边或宅旁。分布于吉林珲春、双辽、洮南、白城。

花序：驱虫，解表。

**母菊**

**Matricaria recutita** L.——*M. chamomilla* L.

生于河谷旷野或田边。新疆北部和西部有野生。全国其它地区有栽培。

花序或全草：甘，平。祛风解表。用于感冒，风热疼痛。

## 小舌菊属　Microglossa DC.

**小舌菊**　九里明、过山龙(海南)，梨叶小舌菊(广西)

**Microglossa pyrifolia** (Lamk.) O. Kuntze——*Conyza pyrifolia* Lamk.; *M. volubilis* DC.

生于海拔400—1 800米的山坡灌丛、林缘、疏林中、路旁或旷野。分布于台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

全株：消肿，解毒，生肌，明目。用于疮疥，脓肿。

## 裸菀属　Miyamayomena Kitam.

**裸菀**　白虎草(云南)

**Miyamayomena piccolii** (Hook. f.) Kitam.——*Aster piccolii* Hook. f.; *Gymnaster piccolii* (Hook. f.) Kitam.

生于海拔950—2 000米的山坡灌丛中或山坡草地上。分布于山西、陕西、河南、四川、云南。

根、花序：苦，凉。清热泻火，解毒。用于牙痛。

## 乳菊属　Mulgedium Cass.

**乳菊**

**Mulgedium tataricum** (L.) DC.——*Senecio tataricus* L.; *Lactuca tatarica* (L.) C. A. Mey.

生于河滩、湖边、盐化草甸、田边、沙滩或固定沙丘上。分布于东北、华北、西北及山东、河南、西藏。

全草：苦，凉。清热解毒，利胆退黄。

## 粘冠草属　Myriactis Less.

**羽裂粘冠草**　牙痛草(云南)

**Myriactis delavayi** Gagnep.

生于海拔近3 000米的山坡林下及山坡草地上。分布于四川、云南。

全草(牙痛草)：用于牙痛。

**圆舌粘冠草**　野朝阳、杧果菜、油头草、山羊梅(云南)，尼泊尔千星菊（云南种子植物名录）

**Myriactis nepalensis** Less.——*Dichrocephala leveillei* Vant.

生于海拔600—3 500米的山谷山坡林下、林缘、灌丛中、潮湿地或荒地上。分布于西南及江西、湖北、广东、广西。

全草(油头草)：微辛，凉。清热解毒，止痛。用于痢疾，泄泻，慢性中耳炎，牙痛，关节痛。　根：解表透疹。

## 毛冠菊属　Nannoglottis Maxim.

**狭舌毛冠菊**

**Nannoglottis gynura** (C. Winkl.) Ling et Y. L. Chen——*Senecio gynura* C. Winkl.

生于海拔 1 800—3 900 米的山顶草地、灌丛及路旁。分布于四川西部、云南西北部。

全草(山青菜)：清热解毒。

附　注：我国特有属。

## 栉叶蒿属　Neopallasia Poljak.

**栉叶蒿**　蓖齿蒿、恶臭蒿、粘蒿、籽蒿(全国中草药汇编)

**Neopallasia pectinata** (Pall.) Poljak.——*Artemisia pectinata* Pall.; *N. yunnanensis* (Pamp.) Y. R. Ling

生于荒漠、沙地、退化草场、河谷砾石地及山坡荒地。分布于东北、华北、西北、西南。

全草：微苦、涩，凉。清肝利胆，消肿止痛。用于急性黄疸，头痛，头晕。

附　注：全草也作蒙药用。

## 蝟菊属　Olgaea Iljin

**火媒草**　鳍蓟(东北植物检索表)

**Olgaea leucophylla** (Turcz.) Iljin——*Carduus leucophylla* Turcz.; *O. leucophylla* (Turcz.) Iljin var. *aggregata* Ling

生于海拔 750—1 730 米的草地、农田或水渠边。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏。

根及全草：甘，凉。破血行瘀，凉血，止血。用于痈疮肿毒，各种出血，吐血。

附　注：功效相似的有**蝟菊 O. lomonosowii** (Trautv.) Iljin，分布于华北及吉林、陕西、甘肃、宁夏。

**刺疙瘩**　青海鳍蓟(中国高等植物图鉴)

**Olgaea tangutica** Iljin——*O. echinantha* Ling

生于海拔 1 200—2 000 米的山坡、山谷灌丛、草坡、河滩地、荒地或农田中。分布于内蒙古乌审旗、河北张家口、陕西北部、甘肃合水及定西、宁夏海源。

全草：苦，凉。清热解毒，消肿，止血。

## 大翅蓟属　Onopordum L.

**大翅蓟**

**Onopordum acanthium** L.

生于山坡、荒地或水沟边。分布于新疆天山、准噶尔盆地、阿拉套。西安有引种栽培。
全草：止血。

## 太行菊属　Opisthopappus Shih

**太行菊**　野菊花(河南济源)
**Opisthopappus taihangensis** (Ling) Shih——*Chrysanthemum taihangense* Ling
生于山坡岩石上。分布于山西陵川及晋城、河南济源。
花序：清肝明目。
附　注：①我国特有属。②河南济源以太行菊的花序代菊花用，效果比菊花好。

## 假福王草属　Paraprenanthes Chang

**假福王草**　堆莴苣(中国高等植物图鉴)
**Paraprenanthes sororia** (Miq.) Chang——*Lactuca sororia* Miq.
生于山坡林下或草丛中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、云南、西藏。
全草：甘，平。清热解毒，止泻，止咳润肺。用于疮疖肿毒，骨痨，肺痨，外伤出血。
**林生假福王草**
**Paraprenanthes sylvicola** Shih——*Lactuca diversifolia* auct. non Vant.: 中国高等植物图鉴，4：693. 1975.
生于山坡林下、林缘、路旁或草丛中。分布于浙江、江西、福建、陕西、湖南、广西、四川、云南。
带根全草：清热解毒。用于疮疖肿毒，外伤出血，蝮蛇咬伤。

## 银胶菊属　Parthenium L.

**银胶菊**　假芹(广西凌云)，野益母艾(云南河口)
**Parthenium hysterophorus** L.
生于海拔 90—1 500(—2 400) 米的山坡、旷野、路旁或河边。分布于广东东北部和西南部、广西西部、贵州西南部、云南南部。
全草：用于疮疡肿毒。
附　注：对人、畜(牛)易引起过敏性皮炎。

## 苇谷属　Pentanema Cass.

**苇谷草**　野罗伞(广西平果)，草金沙、止血草(云南红河)
**Pentanema indicum** (L.) Ling——*Inula indica* L.; *Vicoa auriculata* Cass.

生于山坡、林缘及荒地上。分布于广西西部和南部、云南。

全草：清热解毒，止血，利水通淋。用于感冒，疟疾，咳嗽，小儿惊风。

**白背苦谷草**

**Pentanema indicum** (L.) Ling var. **hypoleucum** (Hand.-Mazz.) Ling——*Inula indica* L. var. *hypoleuca* Hand.-Mazz.

生于海拔650—2 000米的山坡林缘、草地或荒地上。分布于广西西部和南部、贵州南部、云南。

全草(草金杉)：淡，凉。清热解毒，利水通淋。用于疳积，疟腮，黄疸，石淋，角膜云翳；外用于外伤出血。

## 帚菊属　Pertya Sch.-Bip.

**两色帚菊**

**Pertya discolor** Rehd.

生于中海拔地区的山坡林缘。分布于山西、甘肃、青海。

花序：止咳平喘。

## 蜂斗菜属　Petasites Mill.

**蜂斗菜**　葫芦叶(陕西长安)，蛇头草(江西草药)，野饭瓜、南瓜三七、野南瓜(浙江民间常用草药)

**Petasites japonicus** (Sieb. et Zucc.) F. Schmidt——*Nardosmia japonica* Sieb. et Zucc.

生于向阳山坡林下、溪谷旁、潮湿草丛中。分布于陕西、宁夏、江苏、安徽、江西、福建、河南、湖北、四川。

根状茎：苦、辛，凉。解毒祛瘀，消肿止痛。用于乳蛾，痈疖肿毒，毒蛇咬伤，跌打损伤。

**毛裂蜂斗菜**　冬花(陕西、甘肃)，旱荷叶(陕西平利)

**Petasites tricholobus** Franch.

生于海拔700—3 300(—4 200)米的山谷坡地、林缘或阴湿处。分布于陕西、甘肃、青海、湖北、四川、贵州、西藏。

根状茎、全草：苦、辛，凉。消肿，解毒，散瘀。

附　注：陕西、青海有些地区作款冬花用，系混淆品。

## 毛连菜属　Picris L.

**兴安毛连菜**　粘叶子草(黑龙江)

**Picris davurica** Fisch.

生于山坡、林缘、路旁或田边。分布于东北及内蒙古。

根：收敛止泻。　花序或全草：功效同毛连菜。

**滇苦菜**

**Picris divaricata** Vant.

生于海拔 1 800—3 000 米的灌丛中、草丛中、草地或路旁。分布于四川、贵州、云南。

全草(尖刀苦马菜)：苦，凉。清热解毒。用于感冒发热；外用于毒蛇咬伤，刀伤，无名肿毒。

**褐毛毛连菜**

**Picris hieracioides** L. subsp. **fuscipilosa** Hand.-Mazz.

生于海拔 2 900—3 900 米的松林下、林缘、灌丛中、田边或路旁。分布于四川、云南、西藏。

花序：苦、咸，微温。理肺止咳，化痰平喘，宽胸。用于咳嗽痰喘，胸腹闷胀。

**毛连菜**　　毛柴胡、毛牛耳大黄(贵州)，羊下巴、牛踏鼻(中药大辞典)

**Picris hieracioides** L. subsp. **japonica** (Thunb.) Krylov——*P. japonica* Thunb.

生于海拔 400—2 500 米的山坡草地、溪边、田边或路旁。分布于华北、华东、中南、西南及陕西、甘肃、青海。

根(枪刀菜根)：利小便。用于腹部胀满；外用于跌打损伤。　全草（枪刀菜)：辛，凉。泻火，解毒，祛瘀止痛。用于无名肿毒，高烧。　花序：苦、咸，微温。宣肺止血，化痰平喘。

## 阔苞菊属　Pluchea Cass.

**长叶阔苞菊**　　香艾(广西大新)

**Pluchea eupatorioides** Kurz

生于海拔 1 900 米以下的旷野及路旁。分布于广西南部、云南南部。

全草：用于跌打损伤。

**阔苞菊**　　格杂树(海口)，五里香(广西北海)，栾樨(岭南采药录)

**Pluchea indica** (L.) Less.——*Baccharis indica* L.

生于海滨沙地或近潮水的空旷地上。分布于台湾、广东、海南、广西。

叶：暖胃消积。用于小儿疳积。

## 盘果菊属　Prenanthes L.

**川滇盘果菊**

**Prenanthes henryi** Dunn

生于海拔 2 900 米以下的山坡林缘。分布于四川中部、云南西北部。

全草：清热解毒。

## 翅果菊属　Pterocypsela Shih

**高大翅果菊**　　山苦菜(黄山植物的研究)，高株山莴苣(中药大辞典)

**Pterocypsela elata** (Hemsl.) Shih——*Lactuca elata* Hemsl.; *L. raddeana* Maxim. var. *elata* (Hemsl.) Kitam.

生于山坡林下、灌丛中、阴湿处或路旁。分布于中南及吉林、辽宁、河北、陕西、甘肃、安徽、浙江、江西、四川、贵州、云南。

根(水紫菀)：辛，平。止咳化痰，祛风。用于风寒咳嗽，肺痈。　全草：清热解毒，祛风，除湿，镇痛。

**台湾翅果菊**　九刀参、八楞木、乳浆草(江苏)，台湾莴苣(全国中草药汇编)

**Pterocypsela formosana** (Maxim.) Shih——*Lactuca formosana* Maxim.

生于山坡、山谷、路旁、河道及草地上。分布于中南及陕西、江苏、安徽、江西、福建、台湾、四川、贵州、云南。

全草(八楞麻)根(丁萝卜)：苦，凉。有小毒。清热解毒，祛风活血。用于疥癣，疔疮痈肿，蛇咬伤。

**翅果菊**　白龙头、蝴蝶菜、猪人参(江苏)，鸭子食(东北植物检索表)，驴干粮、苦马菜、野大烟(河南中草药手册)，山莴苣(救荒本草)

**Pterocypsela indica** (L.) Shih——*Lactuca indica* L.

生于海拔780—2 500米的山坡林下、灌丛中、农田中、路边或荒野。分布几遍全国。

全草(山莴苣)：苦，凉。清热解毒，活血祛瘀。用于肠痈，乳痈，带下病，产后瘀血作痛，崩漏，痔疮下血，痈疖肿毒。　根(白龙头)：苦，凉。有小毒。清热凉血，消肿解毒。用于乳蛾，妇女血崩，疖肿，乳痈。

**多裂翅果菊**

**Pterocypsela laciniata** (Houtt.) Shih——*Prenanthes laciniata* Houtt.

生于山坡林下、林缘、草地或路旁。分布于东北、华东及河北、山西、陕西、河南、湖南、广东、四川、云南。

全草、根：清热解毒，理气止血。用于暑热痞气，腹胀疼痛，带下病。

**毛脉翅果菊**　毛脉山莴苣(东北植物检索表)

**Pterocypsela raddeana** (Maxim.) Shih——*Lactuca raddeana* Maxim.

生于海拔800—2 500米的山坡林下、灌丛中及平原草地上。分布于东北及河北、山西、陕西、甘肃、山东、河南。

全草：苦，寒。清热解毒，祛风除湿，镇痛。用于风湿关节痛，脓疡疖肿，发痞腹痛，毒蛇咬伤。　根：辛，平。止咳化痰，祛风。用于风寒感冒，肺痨。

**翼柄翅果菊**　翼柄山莴苣(东北植物检索表)

**Pterocypeela triangulata** (Maxim.) Shih——*Lactuca triangulata* Maxim.

生于林下、山谷、林缘、灌丛中、草地或草甸。分布于东北、华北、西北。

根、全草：清热解毒，消肿止血。

## 蚤草属　Pulicaria Gaertn.

**金仙草**　金花蚤草(中国高等植物图鉴)

**Pulicaria chrysantha** (Diels) Ling——*Inula chrysantha* Diels

生于海拔 2 200—3 000 米的亚高山草地或林缘。分布于四川、广西、云南。

花序：咸，凉。消痰，降气，软坚，利水。用于感冒咳嗽，小儿风热咳喘，胸中痰结，胁下胀满，大腹水肿。

**臭蚤草**

**Pulicaria insignis** Drumm. ex Dunn

生于海拔 4 000—4 600 米的山脊岩石上、石砾坡地或草丛中。分布于西藏南部。

全草：苦，凉。镇咳舒肝，清血热，透骨蒸。用于肺痨咳嗽，两胁疼痛，劳热骨蒸。　花序：清热，止痛。

附　注：西藏特有药用植物。

**蚤草**

**Pulicaria prostrata** (Gilib.) Ascher——*Inula prostrata* Gilib.; *P. vulgaria* Gaertn.

生于沟渠边、湿沙地、草地或路旁。分布于新疆西部和北部。

全草：用于痢疾。

## 匹菊属　Pyrethrum Zinn.

**除虫菊**　　白花除虫菊(通称)

**Pyrethrum cinerariifolium** Trev.——*Chrysanthemum cinerariifolium* (Trev.) Vis.

我国东北及陕西、山东、江苏、浙江、安徽、江西、湖南、广东、四川、云南有栽培。原产欧洲。

花序或全草（除虫菊）：苦，凉。有毒。杀虫。外用于疥癣。可制成煤油浸剂，喷杀蚊、蝇、虱，或制成熏烟剂以驱蚊。

**红花除虫菊**

**Pyrethrum coccineum** (Willd.) Worosch.——*Chrysanthemum coccineum* Willd.

原产高加索。我国引种栽培。

全草：用作杀虫剂。

附　注：**短舌匹菊 P. parthenium** (L.) Smith——*Matricaria parthenium* L.，我国引种栽培。花序可清热解毒。

**川西小黄菊**　　打箭菊(青海)，鞑靼菊(西藏常用中草药)

**Pyrethrum tatsienense** (Bur. et Franch.) Ling ex Shih——*Chrysanthemum tatsienense* Bur. et Franch.

生于海拔 3 500—5 200 米的高山草甸、灌丛或山坡砾石地。分布于青海西南部、四川西北部及西南部、云南西北部、西藏东部。

花序(鞑新菊)：苦，凉。活血，祛湿，消炎，止痛。用于跌打损伤，湿热。

## 秋分草属　Rhynchospermum Reinw. ex Bl.

**秋分草**　　白鱼鳅串、调羹草(全国中草药汇编)

**Rhynchospermum verticillatum** Reinw.

生于海拔400—2 500米的山坡林下、林缘、沟边及水旁。分布于西南及江西、福建、台湾、湖北、广东、广西。

全草(大鱼鳅串)：淡，平。清热除湿。用于急、慢性肝炎，水肿，带下病。

## 金光菊属　Rudbeckia L.

**金光菊**　　太阳菊(全国中草药汇编)

**Rudbeckia laciniata** L.

原产北美。我国庭园常见栽培。

根：用于跌打损伤。　花序：用于带下病，感冒，咳嗽，头痛，目赤红痛，咽喉痛，疔疮。　叶：苦，凉。清热解毒。用于急性吐泻，痈疮。

## 风毛菊属　Saussurca DC.

**光叶风毛菊**

**Saussurea acrophila** Diels

生于海拔2 820—3 100米的山顶疏林下。分布于陕西户县、太白山、佛坪。

全草、根(破血丹)：淡，平。散瘀结，消肿。用于跌打损伤，经闭。

附　注：陕西特有药用植物。

**翅风毛菊**　　岩牛蒡子(湖北)

**Saussurea alatipes** Hemsl.

生于高山草地。分布于陕西、湖北、四川。

全草：活血化瘀，祛风除湿。用于风湿关节痛。

**草地风毛菊**　　塔拉音-哈拉特日干那(蒙语)，驴耳风毛菊、羊耳朵(中国高等植物图鉴)

**Saussurea amara** (L.) DC.——*Serratula amara* L.; *Saussurea glomerata* Poir

生于森林草地、荒山坡、荒地、田边或路边。分布于东北、华北、西北。

全草(羊耳朵)：清热解毒，消肿。

**龙江风毛菊**　　阿木日音-哈拉特日干那(蒙语)，齿叶风毛菊(东北植物检索表)

**Saussurea amurensis** Turcz.

生于森林地带、森林草原地带、沼泽化草甸及河流两岸草甸。分布于黑龙江、吉林、内蒙古。

全草：杀虫。

**沙生风毛菊**　　杂迟哇昌卡(藏语)

**Saussurea arenaria** Maxim.

生于海拔 4 200 米以下的山坡或沙地、干河滩。分布于甘肃、青海、西藏左贡。

全草：苦，凉。用于肝炎，胆囊炎，感冒发烧。

**绵毛雪莲**　　云状雪兔子(西藏植物名录)

**Saussurea aster** Hemsl.

生于高山泥石流滩、草甸或河滩。分布于青海、新疆、西藏。

全草：甘、微苦，温。舒筋活络，补肾壮阳，通经活血。

**羽裂风毛菊**　　天蓬草、八面风(贵州)

**Saussurea bodinieri** Lévl.

生于海拔 3 500—4 700 米的山坡灌丛或高山草甸。分布于西南。

全草(雪莲花)：苦、辛，凉。祛风除湿，镇痛，解毒。用于风湿关节痛，麻风初起，咳嗽痰喘，无名肿毒，跌打损伤。

**心叶风毛菊**　　山牛蒡(湖北)

**Saussurea cordifolia** Hemsl.

生于海拔 1 000 米以上的山坡、林缘及草地上。分布于陕西、江西、河南、湖北、湖南、四川、贵州。

根(马蹄细辛)：辛，温。散寒，镇痛。用于关节痛，恶寒，头痛，劳伤，咳嗽。

**三角叶风毛菊**　　野烟(广西富川)，翻白叶、娃儿草(贵州)，大叶防风(云南丽江)

**Saussurea deltoidea** (DC.) C. B. Clarke——*Aplotaxis deltoidea* DC.

生于海拔 860—2 600 米的林缘、山坡路旁、岩石上及溪旁阴湿处。分布于华东、中南、西南及陕西、甘肃。

根(白牛蒡根)：淡，微温。有香气。健脾消疳，催乳，祛风湿，通经络。用于产后乳少，带下病，消化不良，腹胀，小儿疳积，病后体虚，胃寒痛，风湿关节痛，痈疖疔毒。

**长梗风毛菊**

**Saussurea dolichopoda** Diels

生于海拔 1 400—2 750 米的山坡路旁及山谷林下。分布于陕西、甘肃、湖北、四川。

根状茎：清热解毒，消肿散瘀。用于痈肿疮疖，湿疹，毒蛇咬伤。

**川西风毛菊**

**Saussurea dzeurensis** Franch.

生于高山草地。分布于甘肃东部、青海、四川西部。

全草：清肝，明目。用于头晕。

**矮丛风毛菊**

**Saussurea eopygmaea** Hand.-Mazz.

生于高山向阳山坡。分布于青海东南部、南部、西北部及西南部。

全草：苦，凉。清热凉血。

**柳叶风毛菊**　　叶格相(藏语)

**Saussurea epilobioides** Maxim.

生于高山草坡、山谷或林缘。分布于甘肃、青海。

全草：微苦，平。镇痛，止血，解毒，愈疮。用于刀伤，产后流血不止。

附　注：功效相同的有**灰毛风毛菊 S. epilobioides** Maxim. var. **cana** Hand.-Mazz.，分布于甘肃南部、四川西部。

**毛头雪莲花**　　雪兔子(云南)

**Saussurea eriocephala** Franch.

生于海拔 4 500—4 800 米的高山冰碛中。分布于云南丽江、中甸、维西、泸水。

带根全草(雪莲花)：甘、微苦，温。补肾壮阳，调经止血。用于月经不调，雪盲，牙痛；外用于创伤出血。

**变红风毛菊**

**Saussurea erubescens** Lipsch.

生于高山草甸。分布于青海湟源、海南、玛沁、祁连。

全草：清热解毒，祛风透疹，活血调经。

**奇形风毛菊**

**Saussurea fastuosa** (Decne.) Sch.-Bip.——*Aplotaxis fastuosa* Decne.; *S. forrestii* Diels

生于海拔 2 400—4 150 米的高山山谷、山坡林下、林缘、岩石上或路旁。分布于四川西南部、云南西北部。

全草：苦、辛，温。祛风活络，散瘀止痛。

**球花风毛菊**

**Saussurea globosa** Chen

生于高山草坡或草地上。分布于甘肃玛曲、四川、云南。

全草：清肝热，明目。用于头晕。

附　注：功效相似的有**紫苞风毛菊 S. iodostegia** Hance，分布于东北、华北及陕西、甘肃、四川。

**鼠曲风毛菊**

**Saussurea gnaphaloides** (Royle) Ostenf.——*Aplotaxis gnaphaloides* Royle

生于高山山顶碎石间、高山流石滩、干旱山坡、河谷及林缘。分布于青海玛多、新疆、四川、西藏。

全草(鼠曲雪兔子)：舒筋活血，破瘀，通络，止痛。

附　注：鼠曲风毛菊为一小体型雪莲，质量较差。

**禾叶风毛菊**　　那林—哈拉特日干那(蒙语)，占车(藏语)

**Saussurea graminea** Dunn

生于海拔 3000 米以上的高山草地、草坡。分布于内蒙古、甘肃、四川、云南、西藏。

全草：微苦，凉。清热凉血。用于肝炎，吐泻，内脏出血。

**长毛风毛菊**　　解息尔(藏语)

**Saussurea hieracioides** Hook. f.——*S. villosa* Franch.

生于高山碎石土坡、坡地及草地上。分布于甘肃、青海、湖北、四川、云南、西藏。

全草：苦、涩，凉。祛风透疹，活血，调经，镇静。

**雪莲花**　　大苞雪莲花、新疆雪莲花(中药大辞典)，雪莲、荷莲(全国中草药汇编)

**Saussurea involucrata** Kar. et Kir.

生于高山石缝中、高山砾石处或沙质河滩中。分布于甘肃、青海、新疆。

全草(雪莲花)：微苦，热。有毒。活血通经，散寒除湿，强筋助阳。用于风湿关节痛，肺寒咳嗽，小腹冷痛，经闭，胎衣不下，阳痿。

附　注：①孕妇忌服，过量可导致大汗淋漓。②国家三级保护植物。

**风毛菊**　　哈拉特日干那(蒙语)，山苦子(广西钟山)，八面风、三棱草(贵州草药)

**Saussurea japonica** (Thunb.) DC.——*Serratula japonica* Thunb.

生于海拔 500—2 200 米的山坡草地、沟边、林缘、草滩或路旁。分布于东北、华北、西北、华东、中南及云南。

全草(八棱麻)：辛、苦，平。祛风活血，散瘀止痛。用于风湿痹痛，跌打损伤，麻风。

附　注：血虚体弱者忌用。

**大通风毛菊**

**Saussurea katochaeta** Maxim.

生于高山草甸或草地上。分布于甘肃、青海。

全草：苦、涩，寒。清热解毒，祛风透疹，活血调经，镇静。

**绵头雪莲花**　　大雪兔子(云南丽江)

**Saussurea laniceps** Hand.-Mazz.——*S. gossypiphora* auct. non D. Don: 中药大辞典，下册，2088. 1977.

生于海拔 4 200—5 300 米的高山上、以流石滩或岩石缝中较多。分布于四川西南部、云南西北部、西藏东部。

带根全草(雪兔子)：甘、苦，温。除寒，壮阳，填精，止血。用于雪盲，牙痛，风湿关节痛，阳痿，月经不调，崩漏，带下病；外用于创伤出血。

附　注：①绵头雪莲花为一大型雪莲，产量大，质量较好。②功效相同的有**三指雪莲花 S. tridectyla** Sch.-Bip. ex Hook. f.，分布于西藏。

**披针叶风毛菊**

**Saussurea lancifolia** Hand.-Mazz.

生于高山裸岩或沙地上。分布于甘肃、青海。

全草：苦，微寒。用于胆囊炎，感冒发烧，肝炎。

**绵毛风毛菊**

**Saussurea lanuginosa** Vant.

生于海拔 2 300—2 600 米的山坡、草地、阴湿处或路旁。分布于贵州、云南。

根(臭威灵)：甘、辛，温。润肺止咳，解毒止痛。用于肺痨，咳嗽痰喘，咯血，偏头痛；外用于狂犬咬伤。

**光果风毛菊**

**Saussurea leiocarpa** Hand.-Mazz.

生于山坡云杉林下阴湿处或灌丛中。分布于青海门源。

全草：清热解毒。

**白毛雪兔子**

**Saussurea leucoma** *Diels*

生于海拔 4 200—4 750 米的高山草地上。分布于云南丽江、永宁、中甸、德钦。

全草(雪兔)：凉血，补血。用于夜盲症，头昏，月经不调，血崩，肺痨，跌打损伤。

**川陕风毛菊**

**Saussurea licentiana** Hand.-Mazz.

生于海拔 2 000—3 300 米的山顶、山坡林下及路旁。分布于陕西太白山、甘肃天水、四川。

全草：清热凉血，消肿破血。

**长叶风毛菊**

**Saussurea longifolia** Franch.

生于海拔 2 300—5 000 米的高山草地或灌丛中。分布于西南。

全草：清热解毒，消肿祛瘀。

**大耳叶风毛菊**

**Saussurea macrota** Franch.——*S. otophylla* Diels

生于海拔 2 200—2 900 米的山坡路旁、杂木林下、草丛或阴湿处。分布于甘肃、湖北、四川。

全草：除寒，壮阳，调经，止血。

**柴达木风毛菊**

**Saussurea malitiosa** Maxim.

生于山坡林缘或灌丛中。分布于甘肃、青海玛沁。

全草：微苦，平。镇痛，止血，解毒。

**水田雪莲花**　雪莲(西北)，恰羔素巴(藏语)

**Saussurea medusa** Maxim.——*S. trullifolia* W. W. Smith

生于海拔 4 400—5 600 米的高山多砾石山坡或流石滩中。分布于甘肃、青海、四川、云南、西藏。

全草(雪莲花)：微苦，热。有毒。强筋活络，补肾壮阳，通经活血。用于风湿关节痛，肾虚腰痛，阳痿，妇女小腹冷痛，经闭，胎衣不下，肺寒咳嗽，麻疹不透。

**华北风毛菊**　蒙古乐-哈拉特日干那(蒙语)，蒙古风毛菊(东北植物检索表)

**Saussurea mongolica** (Franch.) Franch.——*S. ussuriensis* Maxim. var. *mongolica* Franch.

生于山地阳处、林下及林缘。分布于东北、华北。

全草：苦，凉。清热解毒，活血消肿。

**耳叶风毛菊**

**Saussurea neofranchetii** Lipsch.

生于高山草坡或林缘。分布于四川西部和西南部、云南西北部。

全草：清热凉血，消肿。

**紫苞风毛菊**　黑紫风毛菊(中药大辞典)

**Saussurea nigrescens** Maxim.

生于海拔 2 200—3 400 米的山顶或山坡林缘、草地或草甸。分布于陕西、甘肃、青海、河南。

全草(瑞苓草)：苦、辛，凉。活血调经，祛风除湿，清热明目。用于月经不调，虚劳骨

蒸，目疾。

**苞叶风毛菊**

**Saussurea obvallata** (DC.) Edgew.——*Aplotaxis obvallata* DC.

生于海拔 3 600—4 400 米的高山草地、石缝或砾石中。分布于青海大通及玛多、四川、云南西北部、西藏。

苞花序全草(大苞雪莲)：苦，凉。清热，退烧，镇静，麻醉。用于时行感冒，食物中毒。

**东方风毛菊**

**Saussurea obvallata**(DC.)Edgew. var. **orientalis** Diels——*S. tangutica* Maxim.

生于海拔 3 700—4 600 米的山地、草丛及碎石砾上。分布于甘肃、青海、云南、西藏。

全草：苦，寒。清热解毒，祛风。用于时行感冒，咽喉肿痛，瘾疹，食物中毒。

**少花风毛菊**

**Saussurea oligantha** Franch.

生于海拔 2 200—3 800 米的山坡路旁或草丛中。分布于陕西、湖北、四川、西藏察隅及波密。

根(岩边菊)：用于泄泻。

**褐毛风毛菊**

**Saussurea phaeantha** Maxim.

生于高山草地或山坡砾石地。分布于甘肃、青海、四川、西藏察瓦龙及那曲。

根、全草(褐毛雪莲花)：苦，凉。清热解毒，祛风透疹。

**松林风毛菊**

**Saussurea pinetorum** Hand.-Mazz.

生于海拔 3 200 米以下的松林中。分布于湖北西南部、四川西南部、云南西北部。

全草(透骨风)：祛风湿，解毒。用于风湿关节痛，毒蛇咬伤。

**多头风毛菊**

**Saussurea polycephala** Hand.-Mazz.

生于山坡、山谷路旁。分布于湖北、四川。

全草：祛风湿。用于风湿腰腿痛。

附　注：功效相似的有**杨叶风毛菊 S. populifolia** Hemsl.，分布于陕西、甘肃、湖北、四川。

**红毛雪兔子**

**Saussurea prexima** Diels

生于高山流石滩上。分布于青海玛多、四川、西藏昌都及江达。

全草：清热解毒。

附　注：功效相似的有**盐地风毛菊 S. salsa** (Pall.) Spreng.——*Serratula salsa* Pall.，分布于内蒙古、青海刚察、新疆。

**祁连风毛菊**

**Saussurea przewalskii** Maxim.

生于阴坡或灌丛中。分布于甘肃、青海。

花序：苦，凉。清热，调经。

**美花风毛菊**　　高要-哈拉特日干那(蒙语)

**Saussurea pulchella** Fisch. ex DC

生于山地林缘、森林草原地带、灌丛、沟谷草甸、河岸湿地或草原上。分布于东北、华北。

全草：解热，祛湿，止泻，止血，止痛。

**槲叶雪莲花**

**Saussurea quercifolia** W. W. Smith——*S. hypsipeta* Diels

生于高山草坡、草甸或石砾滩上。分布于青海东部和东南部、四川西部、云南西北部。

带花序全草(黑毛雪兔子)：微苦，热。补肾壮阳，通经活血。

**鸢尾叶风毛菊**　　蛇眼草(广西)，粉草、大麻草、蛇箭、雨过天晴(云南)，线叶风毛菊(中药大辞典)

**Saussurea romuleifolia** Franch.

生于海拔2 500—3 400米的山坡草地、草甸、疏林下或林缘。分布于甘肃南部、四川西部和西南部、贵州西部、云南西北部。

全草(蛇眼草)：辛、苦，凉。有小毒。祛风活络，解毒，消积。用于风湿关节痛，跌打损伤，小儿疳积。　根：用于毒蛇咬伤，无名肿毒。

**星状风毛菊**　　苏尔公玛保(藏语)，匐地风毛菊(高原中草药治疗手册)

**Saussurea stella** Maxim.

生于海拔2 700—5 400米的高山草地、河边草地、沼泽草地、阴山坡及灌丛下。分布于甘肃、青海、四川、云南、西藏。

全草：苦，凉。清热，降火，燥湿。用于风湿筋骨痛，中毒性热症，骨折。

**矮美丽风毛菊**　　漏子多吾(藏语)

**Saussurea superba** Anthony f. **pygmaea** Anthony

生于高海拔的山脚、草地、草原或路边。分布于甘肃、青海、云南、西藏。

根：苦，凉。清热解毒，祛风。用于时行感冒，咽喉痛，麻疹，癮疹。

**松潘风毛菊**

**Saussurea sunpangensis** Hand.-Mazz.

生于海拔3 200—4 300米的山坡草地上。分布于青海都兰及杂多、四川北部、云南西北部、西藏左贡、察隅、林芝。

花序：苦，凉。清热解毒，镇静止痛。

附　注：功效相似的有**林生风毛菊 S. sylvatica** Maxim.，分布于甘肃、青海；**蒲公英风毛菊 S. taraxacifolia** Wall. ex DC.，分布于青海及西藏米林、林芝、加查。

**草甸风毛菊**

**Saussurea thoroldii** Hemsl.

生于阳坡灌丛、沼泽草地、河滩、湖滨沙地或盐碱地。分布于青海、新疆、西藏。

全草：苦，凉。清热解毒，祛风透疹，活血调经。

**乌苏里风毛菊**　　乌苏日音-哈拉特日干那(蒙语)

**Saussurea ussuriensis** Maxim.

生于山坡林下、灌丛中或草丛中。分布于东北、华北及陕西、甘肃、青海。

根：辛，温。祛寒，散瘀，镇痛。用于感冒头痛，关节痛，劳伤。

**毡毛风毛菊**　　黄绒风毛菊(云南种子植物名录)

**Saussurea velutina** W. W. Smith

生于海拔 3 300—4 300 米的高山石缝中。分布于四川西南部、云南西北部。

全草：辛，温。祛风通络，散寒止痛。

附　注：功效相似的有**羌塘雪兔子 S. wellbgi** Hemsl.，分布于青海玛多及西藏双湖、班戈、安多。

## 鸦葱属　Scorzonera L.

**笔管草**　　查干-哈比斯干那(蒙语)，华北鸦葱(东北植物检索表)，白茎鸦葱(中国高等植物图鉴)，箭头草、倒扎花(中药大辞典)

**Scorzonera albicaulis** Bunge

生于山坡林下、灌丛中、林缘、干燥草坡、田间、路旁或河谷两岸。分布于东北、华北、华东及陕西、甘肃、湖北、四川。

根(仙茅根)：甘，温。祛风除湿，理气活血。用于外感风寒，发热头痛，久年哮喘，风湿痹痛，倒经，疔疮，缠腰火丹，关节痛。

**鸦葱**　　塔拉吉-哈比斯干那(蒙语)，罗罗葱(中药大辞典)

**Scorzonera austriaca** Willd.——*S. ruprechtiana* Lipsch. et Krasch.

生于石质山坡、山地草原、山坡草地或阳坡黄土崖上。分布于东北、华北。

根(鸦葱)：微苦、涩，凉。消肿解毒。用于五劳七伤，疔疮痈肿，毒蛇咬伤，蚊虫叮咬，乳痈。

**叉枝鸦葱**　　苦葵鸦葱、散枝鸦葱、羊奶及及(中国沙漠地区药用植物)，女苦奶(内蒙古中草药)

**Scorzonera divaricata** Turcz.

生于向阳山坡、河谷砾石处、草原化荒漠、荒漠地带的干河床及沟谷中。分布于华北、西北。

全草、根(苦葵鸦葱)：苦、辛，凉。消肿散结。用于疔肿，扁平疣。

附　注：本种试用于治疗胃癌，甲状腺癌。

**剑叶鸦葱**

**Scorzonera ensifolia** MB.

生于山坡、沟谷或草地上。分布于新疆。

根：清热解毒，通乳利湿。

**东北鸦葱**　　曼吉音-哈比斯干那(蒙语)

**Scorzonera manshurica** Nakai——*S. glabra* Rupr. var. *manshurica* (Nakai) Kitag.

生于山地阳坡、石质山坡或稀树疏林下。分布于东北及内蒙古。

根：清热解毒。

附　注：功效相似的有**伊犁鸦葱 S. iliensis** Krasch.，分布于新疆。

**蒙古鸦葱**　　蒙古乐-哈比斯干那(蒙语)，巴多拉(藏语)

**Scorzonera mongolica** Maxim.

生于干山坡、河谷、石砾地、荒漠草原至荒漠地带的盐化低地、湖盆边缘及河滩地。分布于华北及甘肃、宁夏、青海、新疆、山东、江苏。

根：微苦，凉。清热解毒，利尿，通乳。用于痈肿疔疮，乳腺炎，尿浊，淋证，带下病。

附　注：藏医用于骨折及齿龈炎。

**假叉枝鸦葱**　　好古日麻嘎其-哈比斯干那(蒙语)

**Scorzonera pseudo-divaricata** Lipsch.——*S. divaricata* Turcz. var. *foliata* Maxim.

生于盐碱地、河滩湿地、荒漠草原至荒漠地带的石质残丘上。分布于内蒙古、新疆。

根：用于疔疮痈肿，五劳七伤。

**深红鸦葱**

**Scorzonera purpurea** DC.

生于草地及沟谷。分布于新疆。

根：祛风除湿，活血调经，止喘。

**狭叶鸦葱**　　那林-哈比斯干那(蒙语)

**Scorzonera radiata** Fisch.

生于山地林缘、林下、山坡、草甸、草地及河滩砾石地。分布于东北及河北、内蒙古、新疆。

根(草防风)：甘、苦，温。发表散寒，祛风除湿痛。用于风湿，感冒，筋骨疼痛。

**桃叶鸦葱**

**Scorzonera sinensis** Lipsch. et Krasch.——*S. austriaca* Willd. subsp. *sinensis* Lipsch. et Krasch.

生于山坡草地或林下灌丛中。分布于东北、华北。

根：祛风除湿，理气活血，清热解毒，通乳消肿。

**准噶尔鸦葱**

**Scorzonera songorica** (Kar. et Kir.) Lipsch.——*Podospermum laciniatum* var. *songorica* Kar. et Kir.

生于山坡、河谷及草地上。分布于新疆。

根：消肿散结，补气生津。

**禾兰鸦葱**

**Scorzonera tragopogonoides** Regel et Schmalh.

生于河谷、碱地或草地上。分布于新疆。

根：理气活血。用于跌打损伤。

## 千里光属　Senecio L.

**额河千里光**　　羽叶千里光(东北植物检索表)，大蓬蒿(中国高等植物图鉴)

**Senecio argunensis** Turcz.

生于海拔 500—3 300 米的山坡林下、林缘、灌丛中、河谷岸边、路旁及草地上。分布

于东北、华北、西北、中南及山东、江苏、四川。

带根全草(斩龙草)：苦，凉。有毒。清热解毒。用于痢疾，瘰疬，目赤，咽喉痛，痈肿疮毒，湿疹，皮炎，毒蛇咬伤，蝎、蜂螫伤。　带花的地上部分：用于骨髓造血功能障碍，脑炎，贫血。

**糙叶千里光**

**Senecio asperifolius** Franch.

生于海拔690—2 600米的山坡、路旁或草地上。分布于四川、贵州遵义及云南昆明、东川、蒙自。

根(毛叶红杆草)：苦、辛，平。健胃，消肿。用于咽喉痛，乳蛾，胃痛腹胀；外用于湿疹，皮疹。

**麻叶千里光**　宽叶还魂草(东北植物检索表)

**Senecio cannabifolius** Less.

生于山沟林缘、林下、溪边、路旁或湿草甸上。分布于东北及河北。

全草：止血，镇痛。用于心脏病，咳嗽痰喘。

**散生千里光**

**Senecio exul** Hance——*S. oryzetorum* Diels

生于海拔620—2 700米的林缘、灌丛、草坡、路旁及荒地上。分布于青海、湖北、广东、四川、贵州、云南。

全草(大白顶草)：甘，平。清热解毒，祛痰消肿。用于小儿口腔破溃，疔疮，无名毒疮，跌打。

**密花千里光**　峨眉千里光(中国高等植物图鉴)

**Senecio faberi** Hemsl.

生于海拔950—2 700米的山坡林下、灌丛、草地、路旁及草坡上。分布于甘肃、青海、广西、四川、贵州、云南。

带花序全草(山青菜)：苦，凉。清热解毒，清肝明目。

**纤花千里光**

**Senecio graciliflorus** (Wall.) DC. ——*Cacalia graciliflorus* Wall.; *S. pleopteris* Diels

生于海拔2 000—4 100米的山坡、林缘、山谷湿地、溪岸、路旁或草地上。分布于西南。

花序：清热解毒。

附　注：功效相似的有**草甸千里光 S. jocobaea** L.，分布于新疆。

**菊状千里光**　滇败酱(云南潞西)，野青菜、山青菜(云南种子植物名录)

**Senecio laetus** Edgew.——*S. chrysanthemoides* DC.

生于海拔1 100—3 750米的灌木林缘、草地及河岸边。分布于西南及湖北、湖南。

全草或根(土三七)：淡、苦，凉。　活血，消肿，祛风，除湿。用于肋下疼痛，跌打损伤，血瘀肿痛，痈疮肿疡，乳痈。

**林荫千里光**　森林千里光(中药大辞典)

**Senecio nemorensis** L.

生于海拔770—3 000米的林下阴湿处、林缘及草甸上。分布于东北、华北、西北、华东

又湖北、四川、贵州。

全草(黄菀)：苦、辛，凉。清热解毒。用于热痢，目赤红痛，痈疖肿毒。

**紫背千里光**　紫背鹿衔草、天青地红(云南)，紫贝草(滇南本草)

**Senecio nudicaulis** Buch.-Ham. ex D. Don

生于海拔 1 500—2 100 米的山坡或草丛潮湿处。分布于四川、贵州、云南。

全草(紫贝草)：辛、微酸、涩，平。清热，消肿，通经活络，利湿，调经。用于肝炎，水肿，小儿疳积，月经不调，带下病，产后腹痛，跌打骨折。

**钝叶千里光**

**Senecio obtusatus** Wall. ex DC.

生于海拔 1 500—3 300 米的山坡及灌丛中。分布于广西、四川、贵州、云南。

全草：用于蛇咬伤。

**千里光**　九里光(滇南本草)，九里明(生草药性备要)，九岭光(草木便方)，千里明(昆明药用植物调查报告)，七里光(江西民间草药)

**Senecio scandens** Buch.-Ham. ex D. Don

生于海拔 500—3 200 米的山坡林中、灌丛中、山沟、河滩、沟畔、路边及荒野。分布于华东、中南、西南及河北、陕南、甘肃。

全草(千里光)：苦，凉。有小毒。清热解毒，凉血消肿，清肝明目。用于目赤红肿，目翳，伤寒，痢疾，风热咳喘，乳蛾，泄泻，时行感冒，痈肿疔毒，湿疹，过敏性皮炎，痔疮。

附　注：功效相同的有**深裂千里光 S. scandens** Buch.-Ham. ex D. Don var. **incisus** Franch.，分布同千里光。

**闽粤千里光**

**Senecio stauntonii** DC.

生于山坡疏林中、灌丛中、水边或田野。分布于福建、广东、广西。

全草：祛腐生肌，清肝明目。

**天山千里光**　赛波格则(藏语)

**Senecio thianschanicus** Regel

生于海拔 2 460—5 000 米的山谷、河滩、草场及石砾地。分布于甘肃、青海、新疆、四川、西藏。

全草：微苦，凉。清热解毒，祛腐生肌，清肝明目。

**欧洲千里光**　普通千里光(云南种子植物名录)

**Senecio vulgaris** L.

生于海拔 300—2 300 米的山坡、路旁、荒地、草地或村旁。分布于西南及辽宁、吉林、内蒙古。

全草(大白顶草)：苦，凉。清热解毒，祛瘀消肿。用于口腔破溃，湿疹，小儿顿咳，无名毒疮，肿瘤。

**岩生千里光**　水泽兰(云南)，弯齿千里光(云南种子植物名录)

**Senecio wightii** (DC.) Benth. ex C. B. Clarke——*Doronicum wightii* DC.

生于海拔 1 150—3 000 米的山坡灌丛、路旁及沟边。分布于四川、贵州、云南。

全草、根：清热明目。

## 绢蒿属 Seriphidium (Bess.) Poljak.

**小针裂叶绢蒿**

**Seriphidium amoenum** (Poljak.) Poljak.——*Artemisia amoena* Poljak.

生于海拔 1 500 米以下的荒坡、戈壁、砾质坡地、耐干旱与盐碱化的土壤。分布于新疆北部。

花序：含挥发油与生物碱，挥发油中含山道年成分，可提取作驱蛔虫药的原料。

**短叶绢蒿**

**Seriphidium brevifolium** (Wall. ex DC.) Ling et Y. R. Ling——*Artemisia brevifolia* Wall. ex DC.

生于海拔 2 700—4 500 米的高山地区，常见于盐渍化的土壤中。分布于西藏西部。

花序：含挥发油与山道年成分，可作驱蛔虫药的原料。

**蛔蒿** 山道年蒿(中国药用植物图鉴)，山道尼格、希那(中国植物图鉴)

**Seriphidium cinum** (Berg. ex Poljak.) Poljak.——*Artemisia cina* Berg. ex Poljak.

原产原苏联中亚南部。我国东北、华北、西北部分地区有引种栽培，适于干冷气候、土层深厚、肥沃、透水良好的砂质壤土和砂质灰壤土地区引种栽培。

花序：含山道年成分，为提取驱蛔虫药的主要原料。也可驱蛲虫。

**东北蛔蒿** 塔尔斯图-哈木巴-沙里尔日(蒙语)

**Seriphidium finitum** (Kitag.) Ling et Y. R Ling——*Artemisia finita* Kitag.

生于低海拔地区砾质坡地、半荒漠草原、或河、湖岸边草甸及草原上。分布于内蒙古东部呼伦贝尔盟、锡林郭勒盟。

花蕾：辛、苦，凉。有毒。驱蛔虫。用于蛔虫病，腹痛。

附 注：内蒙古特有药用植物。

**三裂叶绢蒿**

**Seriphidium junceum** (Kar. et Kir.) Poljak.——*Artemisia juncea* Kar. et Kir.

生于海拔 800—1 500 米的砾质坡地、山麓、戈壁、荒漠化或半荒漠化草原及漠钙土地区，也见于河谷地带。分布于新疆北部。

花序：含挥发油及生物碱，可提取作驱蛔虫药的原料。

附 注：功效与分布相同的有**大头三裂叶绢蒿 S. junceum** (Kar. et Kir.) Poljak. var. **macrosciadia** (Poljak.) Ling et Y. R. Ling

**白茎绢蒿** 白蒿(新疆)

**Seriphidium terrae-albae**(Krasch.) Poljak.——*Artemisia terrae-albae* Krasch.

生于沙漠及沙漠边缘沙质戈壁地区。分布于新疆北部。

花序：含挥发油及生物碱，可提取驱蛔虫药的原料。

**伊犁绢蒿**

**Seriphidium transiliense** (Poljak.) Poljak.——*Artemisia transiliensis* Poljak.

生于低海拔小丘陵下部、山谷、砾质或黄土质的坡地、河岸边、草原及路旁。分布于新

疆北部。

花序：含挥发油及生物碱，可提取作驱蛔虫药的原料。

## 麻花头属　Serratula L.

**麻花头**　　苦郎头、和尚头(湖北)，洪吉日-扎拉(蒙语)

**Serratula centauroides** L.——*S. komarovii* Iljin; *S. hsinganensis* Kitag.

生于海拔 1 100—1 590 米的山坡林缘、草原、草甸、田间或路旁。分布于东北、华北及陕西、甘肃、山东、湖北。

全草：清热解毒，止血，止泻。用于痈肿，疔疮。

**华麻花头**　　野麻菜(广东、广西)，升麻(广西金州)

**Serratula chinensis** S. Moore

生于海拔 1 150—3 500 米的山坡草地或林缘、林下或灌丛中。分布于陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖南、广东。

根(广东升麻)：甘、辛、苦，凉。清热解毒，升阳透疹。

附　注：华麻花头在福建、广东地区作升麻药用。

**伪泥胡菜**　　假升麻(陕西)，地特木图-洪吉日-扎拉(蒙语)

**Serratula coronata** L.

生于海拔 130—1 600 米的山坡林下、林缘、河岸、草甸、干旱或半干旱山地。分布于东北及河北、内蒙古、陕西、新疆、山东、江苏、湖北、贵州。

根、叶：用于呕吐，淋证，疝气，肿瘤。　茎：用于咽喉痛，贫血，疟疾。

**缢苞麻花头**　　蕴苞麻花头(中国高等植物图鉴)

**Serratula strangulata** Iljin

生于海拔 1 300—3 500 米的山坡、草地、路旁、河滩及田间。分布于河北、山西、陕西、甘肃、宁夏、青海、四川。

根：微苦，凉。清热解毒。

## 虾须草属　Sheareria S. Moore

**虾须草**　　沙小菊(钟氏考订名称)，绿绿草、草麻黄(中药大辞典)

**Sheareria nana** S. Moore

生于低海拔地区的山坡湿地、稻田边、河、湖边草地或河边沙滩上。分布于陕西南部、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、广东、贵州、云南。

全草：苦，平。清热解毒，利水消肿，疏风。用于水肿，无名肿毒，风热头痛。

附　注：我国特有属。

## 华蟹甲草属　Sinacalia H. Robins. et Brettell

**双舌华蟹甲草**　　双舌蟹甲草(中国高等植物图鉴)

**Sinacalia davidii** (Franch.) Hand.-Mazz.——*Senecio davidii* Franch.; *Cacalia davidii* (Franch.) Hand.-Mazz.

生于海拔 650—2 000 米的山坡、林缘、灌丛或草丛中。分布于陕西、四川、云南、西藏。

根状茎(红川乌)：祛风除湿，活血通络。用于风湿瘫痪，半身不遂，头疮白秃。

**羽裂华蟹甲草**　水萝卜(陕西洋县)，水葫芦七(陕西中草药)，猪肚子、唐古特蟹甲草(中药大辞典)

**Sinacalia tangutica** (Maxim.) B. Nord.——*Senecio tangutica* Maxim.; *Cacalia tangutica* (Maxim.) Hand.-Mazz.

生于海拔 800—3 000 米的山坡疏林下、灌丛中、山沟旁或草地上。分布于河北、山西、陕西、甘肃、青海、湖北、四川。

根状茎(羊角天麻)：辛、微苦，平。有小毒。祛风，化痰，平肝。用于头痛眩晕，风湿关节痛，偏瘫，咳嗽痰喘。

附　注：①某些地区将羽裂华蟹甲草的根状茎混作天麻，系伪品。②我国特有属。

## 豨莶属　Siegesbeckia L.

**毛梗豨莶**　棉苍狼(江苏云台山)，母猪油(湖北)，肥猪草(云南丽江)

**Siegesbeckia glabrescens** Makino——*S. orientalis* L. f. *glabrescens* Makino

生于海拔 300—1 000 米的山坡林下、灌丛中、林缘、路边杂草中或草地上。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、四川、云南。

全草(豨莶草)：苦，凉。祛风湿，利筋骨，降血压。用于四肢麻痹，筋骨疼痛，腰膝无力，疟疾，急性肝炎，高血压症，疔疮肿毒，外伤出血。　根(豨莶根)：用于风湿顽痹，头风，带下病，烫伤。　果实(豨莶果)：用于驱蛔虫。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②功效相似的有**豨莶 S. orientalis** L.，分布于华东、中南、西南及山西、陕西、甘肃、宁夏，《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**腺梗豨莶**　棉苍狼、粘金强子、野洋姜草(江苏)，珠草(福建)，毛豨莶 (东北植物检索表)

**Siegesbeckia pubescens** (Makino) Makino——*S. orientalis* L f. *pubescens* Makino

生于海拔 160—3 400 米的山坡、山谷林缘、灌丛林下、河谷、溪边、河槽潮湿地、旷野及耕地上。分布于东北、华北、西南及陕西、甘肃、宁夏、江苏、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖北。

性味功效同毛梗豨莶。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②功效与分布相同的有**无腺豨莶 S. pubescens** (Makino) Makino f. **eglandulosa** Ling et Hwang

## 水飞蓟属　Silybum Adans.

**水飞蓟**　水禾、飞雉(名医别录)

**Silybum marianum** (L.) Gaertn.——*Carduus marianus* L.

原产南欧至北非。我国华北、西北地区有栽培。

果实(水飞蓟)：苦，凉。清热解毒，保肝，利胆，抗X射线。用于急、慢性肝炎，肝硬变，代谢中毒性肝损伤，砂淋。

## 华千里光属　Sinosenecio B. Nord.

**锦葵叶华千里光**　岩葵(湖北)

**Sinosenecio dryas** (Dunn) C. Jeffrey et Y. L. Chen——*Senecio dryas* Dunn

生于林缘、灌丛或草坡上。分布于湖北、四川。

全草：清热解毒，祛湿。用于肠胃病，跌打损伤，劳伤。

**直梗华千里光**　一面锣、狗耳朵(湖北)

**Sinosenecio eriopodus** (Cumm.) C. Jeffrey et Y. L. Chen——*Senecio eriopodus* Cumm.

生于山坡、林缘或灌丛中。分布于湖北兴山、宣恩、来凤、秭归及五峰。

全草(一面锣)：用于血瘀腹痛，跌打损伤。

附　注：湖北特有药用植物。

**齿裂华千里光**　槭叶千里光(中国高等植物图鉴)

**Sinosenecio euosmus** (Hand.-Mazz.) B. Nord.——*Senecio euosmus* Hand.-Mazz.; *Senecio winklerianus* Hand.-Mazz.

生于海拔2 400—4 000米的高山林下、林缘及山坡草地。分布于陕西、甘肃、湖北、云南、西藏。

花序：清热解毒，清肝明目。

附　注：功效相似的有**紫毛华千里光 S. subcoriaceus** C. Jeffrey et Y. L. Chen，分布于四川、贵州、云南。

**秃果华千里光**　莲花七、水八角草(湖北)

**Sinosenecio globigerus** (Chang) B. Nord.——*Senecio globigerus* Chang

生于海拔1 500—2 100米的山坡林下、水边及路旁。分布于湖北、四川、贵州、云南。

全草：清热解毒，化痰止咳。用于带下病，咽喉痛，风湿疼痛，跌打损伤。

**广西华千里光**　走马须(广西灵川)，白背青(广西阳朔)

**Sinosenecio guangxiensis** C. Jeffrey et Y. L. Chen

生于海拔940—1 600米的山地林缘或路旁。分布于广西灵川及阳朔。

全草(白背青)：用于风湿关节痛。

附　注：广西特有药用植物。

**单头华千里光**　猪耳朵、大寒草(湖北)

**Sinosenecio hederifolius** (Dunn.) B. Nord.——*Gerbera hederifolia* Dunn.; *Senecio goodianus* Hand.-Mazz.

生于林下及山沟中。分布于陕西西南部、甘肃南部、四川、湖北。

全草：清热利湿，消肿，止血，止咳化痰，通经活血。

**蒲儿根**　黄菊莲(广西天等)，肥猪苗(贵州民间药物)

**Sinosenecio oldhamianus** (Maxim.) B. Nord.——*Senecio oldhamianus* Maxim.

生于海拔 360—2 300 米的林下湿地、林缘、山坡路旁、荒地、沟边及草坡上。分布于西南及山西、陕西、甘肃、江苏、安徽、福建、湖北、广东、广西。

全草(肥猪苗)：辛、苦，凉。有小毒。解毒，活血。用于疮疡，疮毒化脓，金疮。

## 一枝黄花属　Solidago L.

**加拿大一枝黄花**　金棒草(中国植物志)

**Solidago canadensis** L.

原产北美。我国公园及植物园引种栽培。上海松江县有逸生。

全草：疏风清热，抗菌消炎。

**一枝黄花**　金锁钥、满山黄(江苏、浙江)，百根草(福建)，一支箭、朝天一柱香(湖南、江西)，黄花草、六叶七星剑、蛇头黄(广东、广西)

**Solidago decurrens** Lour.——*S. virgaurea* L. var. *leiocarpa* (Benth.) A. Gray; *S. virgaurea* L. var. *pubescens* (Wall.) C.B. Clarke

生于海拔 560—2 850 米的阔叶林缘、林下、灌丛中及山坡草地上。分布于陕西、江苏、安徽、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草或带根全草(见血飞)：辛、苦，凉。有小毒。疏风清热，消肿解毒。用于感冒头痛，咽喉痛，黄疸，顿咳，小儿惊风，跌打损伤，痈肿发背，鹅掌风。

**钝苞一枝黄花**

**Solidago pacifica** Juz.——*S. virgaurea* L. subsp. *coreana* Kitag.

生于山坡草地、灌丛中、林缘或林下。分布于东北及河北。

全草：清热解毒，化痰平喘，止血消肿。

**毛果一枝黄花**

**Solidago virgaurea** L.

生于海拔 1 200—2 620 米的林下、林缘及灌丛中。分布于新疆阿尔泰山及天山地区。

全草：用于水肿，小便涩痛。

**寡毛一枝黄花**　兴安一枝蒿(东北药用植物志)

**Solidago virgaurea** L. var. **dahurica** Kitag.——*S. dahurica* Kitag.

生于海拔 1 600—2 800 米的林下、林缘、山坡草地或路旁。分布于东北、华北及新疆。

全草：疏风清热，健胃，利尿。在东北代一枝黄花入药。

## 裸柱菊属　Soliva Ruiz et Pavon

**裸柱菊**　座地菊(广州)

**Soliva anthemifolia** (Juss.) R. Br.——*Gymnostyles anthemifolia* Juss.

原产南美洲。生于荒地及田野。分布于江西、福建、台湾、广东、海南。

全草：辛，温。有小毒。化气散结，消肿解毒。

## 苦苣菜属　Sonchus L.

**苣荬菜**　野苦荬(广州植物志)，山苦荬(广西中草药)

**Sonchus arvensis** L.

生于山坡、草地、路旁及田野。分布于东北、华北、西北、西南及江西、湖北、广东、海南、广西。

全草(牛舌头)：苦，凉。清热解毒。用于肠痈，痢疾，痔疮，遗精，白浊，乳痈，疮疖肿毒，烫火伤。

**续断菊**　羊奶草、花叶滇苦菜(云南)，白石头(中国高等植物图鉴)

**Sonchus asper** (L.) Hill——*S. oleraceus* L. var. *asper* L.

生于海拔 400—2 000 米的田野或路边，也有栽培。分布于新疆、安徽、广西、四川、贵州、云南。

全草：消肿止痛，祛瘀解毒。用于带下病，白浊，痈肿，痢疾，肠痈，目赤红肿，产后瘀血腹痛，肺痨咯血，小儿气喘。

**苦苣菜**　苦菜(通称)，小鹅菜、空心苦马菜、奶浆草(云南)，滇苦荬菜(云南种子植物名录)

**Sonchus oleraceus** L.

生于海拔 500—2 300 米的山谷、山坡路旁、田野或农田中。分布几遍于全国。

全草：苦，凉。有小毒。清热解毒，祛风湿。用于急性黄疸，肠痈，乳痈，口腔破溃，咽喉痛，乳蛾，吐血，衄血，咯血，便血，崩漏，泄泻，痢疾。　根：利小便。用于血淋。　花序及果实：甘，平。安心神。

**沼生苦苣菜**

**Sonchus palustris** L.

生于河、湖边及沼泽草地上。分布于新疆。

全草：清热解毒，行瘀活血，消肿排脓。

附　注：功效相同的有**湿生苦苣菜 S. uliginosus** Bied.。

## 绢毛菊属　Soroseris Stebb.

**金沙绢毛菊**

**Soroseris gillii** (S. Moore) Stebb.——*Crepis gillii* S. Moore; *C. trichocarpa* Franch.

生于海拔 3 700—5 000 米的高山草地、丛林或沙砾上。分布于四川、云南中甸及德钦。

全草：辛，凉。平肝，降血压，凉血，止痛。

**绢毛菊**　喇叭花(陕西太白山)，扫工色尔布(藏语)

**Soroseris hookeriana** (C. B. Clarke) Stebb.——*Crepis hookeriana* C. B. Clarke

生于海拔 3 300—3 600 米的山坡草地上。分布于陕西、青海、四川、云南、西藏。

全草：苦，凉。退热，清热降火，解毒，止血。用于外伤及食物中毒。

**糙芥绢毛菊**　　扫干色尔布(藏语)

**Soroseris hookeriana** (C. B. Clarke) Stebb. subsp. **erysimoides** (Hand.-Mazz.) Stebb.——*Crepis gillii* S. Moore var. *erysimoides* Hand.-Mazz.

生于海拔 3 200—5 150 米的高山草地上。分布于陕西、甘肃、青海、新疆、四川、云南、西藏。

全草(空桶参)：苦、微辛，平。润肺止咳，调经止血。用于肺痨咯血，咽喉痛，风湿关节痛，发烧；外用于湿疹，缠腰火丹，疔疮，毒蛇咬伤，目赤。

**蓬状绢毛菊**

**Soroseris rosularis** (Diels) Stebb.——*Crepis rosularis* Diels

生于海拔 3 300—3 600 米的高山草地上。分布于云南丽江。

根：补益气血。用于贫血，病后体虚。

**伞花绢毛菊**　　条参、红条参(云南)

**Soroseris umbrella** (Franch.) Stebb.——*Crepis umbrella* Franch.

生于海海 3 400—5 140 米的高山山顶草地或石坡上。分布于四川、云南丽江及维西、西藏亚东。

根(条参)：苦、甘，温。健脾益气，养阴生津。用于身体虚弱，四肢无力，头晕。

## 戴星草属　Sphaeranthus L.

**戴星草**　　田艾草、三点花(海南)

**Sphaeranthus africanus** L.——*S. cochinchinensis* Lour.

生于海拔 1 300—2 000 米的田间、荒地或山坡上。分布于台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

全草：健胃，利尿。

**绒毛戴星草**

**Sphaeranthus indicus** L.——*S. hirtus* Willd.; *S. mollis* Roxb.

生于海拔 700—1 000 米的山坡、灌丛中、河边沙滩、荒地及草地上。分布于云南勐腊、澜沧、西盟。

全草：强壮，清凉，利尿。用于小便淋痛，消化不良。

附　注：功效相同的有**非洲戴星草 S. senegalensis** DC.，分布于云南南部。

## 金钮扣属　Spilanthes Jacq.

**美形金钮扣**　　小麻药、小铜锤、铜锤草(云南)

**Spilanthes callimorpha** A. H. Moore

生于海拔 1 000—1 900 米的山谷溪边、林缘、潮湿的沟边、林下草地及路旁荒地。分

布于云南。

全草(小铜锤): 辛、苦,温。有小毒。祛风除湿,散瘀止痛。用于骨折,跌打损伤,风湿关节痛,经闭,胃寒痛。

附　注: ①云南特有药用植物。②孕妇忌服。

**金钮扣**　　红细水草、散血草、天文草(广东),遍地红、黄花草、过海龙(云南)

**Spilanthes paniculata** Wall. ex DC.——*S. acumella* auct. non. L.: 中药大辞典,上册, 321, 1977.

生于海拔 100—1 900 米的林缘、田边、沟边、溪旁潮湿地、路旁及荒地上。分布于台湾、海南、广西防城、云南东南部及西部、西藏墨脱。

全草(天文草): 辛、苦,凉。有小毒。解毒利湿,止咳定喘,消肿止痛。用于疟疾,牙痛,泄泻,痢疾,咳嗽痰喘,顿咳,肺痈;外用于毒蛇咬伤,狗咬伤,痈疖肿毒。

## 祁州漏芦属　Stemmacantha Cass.

**鹿草**

**Stemmacantha carthamoides** (Willd.) Dittrich——*Cnicus carthamoides* Willd.; *Rhaponticum carthamoides* (Willd.) Iljin

生于海拔 2 000—2 700 米的山坡草地、草甸。分布于新疆塔城、富蕴。

根状茎: 健脑,补气。

**漏芦**　　祁州漏芦(河北),老虎爪(山西),郎头花、牛馒头、大口袋花、和尚头(内蒙古),大脑袋花、土烟叶(陕西),打锣锤(河南)

**Stemmacantha uniflora** (L.) Dittrich——*Cnicus uniflorus* L.; *Rhaponticum uniflorum* (L.) DC.

生于海拔 390—2 700 米的山坡丘陵地、草地、田埂、路旁、松林下及桦木林下。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、青海、山东、河南、四川。

根状茎(漏芦): 苦、咸,凉。清热解毒,消肿排脓,下乳,通筋脉。用于乳痈,乳汁不通,疔腮,疖肿,瘰疬,风湿关节痛,痔疮。

附　注:《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 甜叶菊属　Stevia Cav.

**甜叶菊**

**Stevia rebaudiana** (Bertoni) Hemsl.——*Eupatorium rebaudianum* Bertoni

原产巴拉圭。我国大多数地区引种栽培。

全草: 甘,平。生津止咳。用于消渴。

## 金腰箭属　Synedrella Gaertn.

**金腰箭**　　苞壳菊、苦草(广西),水蒸姑、猪毛草(云南)

**Synedrella nodiflora** (L.) Gaertn.——*Verbesina nodiflora* L.

生于海拔 110—930 米的旷野、耕地、路旁及宅旁。原产美洲。现已归化。分布于台湾、广东、海南、广西、云南。

全草(苦草)：微辛，凉。清热解暑，凉血散毒。用于瘟郁，感冒发热；外用于疮疡肿毒，疥疮。

## 兔儿伞属 Syneilesis Maxim.

**兔儿伞** 贴骨伞、龙头七(陕西)，观音伞、小鬼伞(江苏)，一把伞(广西、贵州)，破阳伞、铁凉伞、雨伞草(浙江民间常用草药)，南天扇、伞把草(湖南药物志)

**Syneilesis aconitifolia** (Bunge) Maxim.——*Cacalia aconitifolia* Bunge

生于海拔 800—1 800 米的山坡林下、林缘、草地、荒地及路旁。分布于东北、华北、华东及陕西、甘肃、宁夏、河南、湖北、湖南、广西、贵州。

根或全草(兔儿伞)：苦、辛，温。有毒。祛风除湿，解毒活血，消肿止痛。用于风湿肢体麻木，风湿关节痛，腰腿痛，骨折，月经不调，痛经。

## 尾药千里光属 Synotis (C. B. Clarke) C. Jeffrey et Y. L. Chen

**密花尾药千里光** 白叶火草(云南思茅)，密花千里光(中国高等植物图鉴)

**Synotis cappa** (Buch.-Ham. ex D. Don) C. Jeffrey et Y. L. Chen——*Senecio cappa* Buch.-Ham. ex D. Don; *S. densiflorus* Wall.

生于海拔 1 500—2 300 米的灌丛、林缘或草坡上。分布于西南及湖北、湖南、广西。

全草：清热解毒，清肝明目。用于咳嗽，带下病，风湿腰痛，关节痛，产后出血，急、慢性吐泻。

**双花尾药千里光** 榆古兴噶尔布(藏语)，双花千里光(中国高等植物图鉴)

**Synotis erythropappa** (Bur. et Franch.) C. Jeffrey et Y. L. Chen——*Senecio erythropappus* Bur. et Franch.

生于海拔 1 500—3 900 米的林缘、灌丛中、山坡草地、草丛或溪岸。分布于西南及湖北。

全草(一扫光)：苦，凉。祛风除湿，清热解毒，止痒。用于急性目赤红肿，疮疖，皮炎，跌打损伤。

**血当归**

**Synotis duclouxii** (Dunn) C. Jeffrey et Y. L. Chen——*Senecio duclouxii* Dunn

生于海拔 750—2 500 米的荒坡草丛中。分布于四川乐山、云南。

全草(金毛草)：活血祛瘀，止咳，化痰。

**拿嘎尾药千里光** 火门艾(广西富川)，拿嘎千里光(中国高等植物图鉴)

**Synotis nagensium** (C. B. Clarke) C. Jeffrey et Y. L. Chen——*Senecio nagensium* C. B. Clarke

生于海拔 100—2 000 米的山坡、灌丛、荒地或草地上。分布于西南及湖南、广西。

根或全草(白叶火草)：淡，平。祛风，清热，利尿。用于感冒发热，咳嗽痰喘，水肿，小便涩痛。

**三舌尾药千里光**　　山东风(广西北流)

**Synotis triligulata** (Buch.-Ham. ex D. Don) C. Jeffrey et Y. L. Chen——*Senecio triligulatus* Buch.-Ham. ex D. Don

生于海拔 1 200—2 100 米的山坡灌丛中。分布于贵州、云南、西藏樟木。

全草：清热解毒，退翳。

## 山牛蒡属　Synura Iljin

**山牛蒡**

**Synurus deltoides** (Ait.) Nakai——*Onopordum deltoides* Ait.

生于海拔 550—2 200 米的山坡林下、林缘、草甸或草地上。分布于东北、华北及陕西、浙江、安徽、江西、河南、湖北、四川。

根：辛、苦，凉。有小毒。清热解毒，消肿，利水散结。用于顿咳，妇女炎症，带下病。果实：用于瘰疬。

## 万寿菊属　Tagetes L.

**万寿菊**　　黑苦艾(广西西林)

**Tagetes erecta** L.

原产墨西哥。我国各地有栽培。

根：苦，凉。解毒消肿。用于痈疮肿毒。　叶：甘，寒。用于痈、疮、疖、疔，无名肿毒。　花序：苦，凉。平肝解热，祛风化痰。用于头晕目眩，头风眼痛，小儿惊风，感冒咳嗽，顿咳，乳痈，疟腮。

**孔雀草**　　红黄草(北京、云南)，小万寿菊(北京、安徽、云南)，西番菊、臭菊花、缎子花、藤菊(中药大辞典)

**Tagetes patula** L.

全国各地有栽培。

全草：苦，平。清热利湿，止咳。用于咳嗽，痢疾，顿咳，牙痛；风火眼痛；外用于疟腮，乳痛。

## 菊蒿属　Tanacetum L.

**菊蒿**　　艾蒿(东北植物检索表)

**Tanacetum vulgare** L.

生于海拔 250—2 400 米的山坡、桦木林下、草地、河滩或丘陵。分布于黑龙江、新疆。

茎、花序：用作杀虫剂。

## 蒲公英属　Taraxacum Weber

**西疆蒲公英**

**Taraxacum bessarabicum** (Horn.) Reichb.——*Leontodon bessarabicum* Horn.

生于草地上。分布于新疆。

全草：清热解毒，消肿散结。

**两角蒲公英**

**Taraxacum bicorne** Dahlst.

生于沟谷、渠边及河滩上。分布于新疆。

全草：补脾和胃，利尿散结。

**芥叶蒲公英**　得米格力格-巴格巴盖-其其格(蒙语)

**Taraxacum brassicaefolium** Kitag.

生于山地草甸、林缘及河边湿沙地上。分布于东北及内蒙古。

全草：清热解毒，利尿散结。

**密叶蒲公英**

**Taraxacum compactum** Schischk.

生于盐碱草甸、草坡及砾石地上。分布于新疆。

全草：解毒消炎，泻火通乳。

**多裂蒲公英**　伊木图-巴格巴盖-其其格(蒙语)

**Taraxacum dissectum** (Ledeb.) Ledeb.——*Leontodon dissectum* Ledeb.

生于草原、荒漠草原、草甸、草坡、砾石地及盐渍低地。分布于西北及山西、内蒙古、云南、西藏。

全草：清热解毒，利尿散结。

**红梗蒲公英**　乌兰-巴格巴盖-其其格(蒙语)

**Taraxacum erythropodium** Kitag.

生于山坡、阔叶林下、沟谷、草甸、轻度盐渍化草甸或草地上。分布于东北、华北及甘肃、宁夏。

全草：清热解毒，消肿散结，利尿通淋。

**兴安蒲公英**　兴安乃-巴格巴盖-其其格(蒙语)

**Taraxacum falcilobum** Kitag.

生于山坡或沙地上。分布于东北及内蒙古。

全草：清热解毒，利尿散结。

**异苞蒲公英**　敖恩导-巴格巴盖-其其格(蒙语)

**Taraxacum heterolepis** Nakai et Koidz. ex Kitag.

生于林缘、草地、田野或路旁。分布于东北及河北、内蒙古。

全草：清热解毒，消肿散结，利尿通淋。

**光苞蒲公英**

**Taraxacum lamprolepis** Kitag.

生于山坡、草甸、沙地、河边及田边。分布于东北及内蒙古、宁夏。

全草：清热解毒，利尿散结。

附　注：功效相同的有**长春蒲公英 T. junpeianum** Kitam.，分布于内蒙古。

**白花蒲公英**　　亚洲蒲公英、戟叶蒲公英(中国高等植物图鉴)

**Taraxacum leucanthum** (Ledeb.) Ledeb.——*Leontodon leucanthum* Ledeb.; *T. asiaticum* Dahlst.; *T. cuspidatum* Dahlst.

生于林缘、荒地、草甸、草滩、水边及农田中。分布于东北、华北、西北及四川、西藏。

全草：甘、苦，寒。清热解毒，消痈散结。

**辽东蒲公英**

**Taraxacum liaotungensis** Kitag.

生于草地、田野及路旁。分布于吉林、辽宁。

全草：清热解毒，消肿散结，利尿通淋。

**紫花蒲公英**

**Taraxacum lilacinum** Krassn ex Schischk.

生于草甸及河滩上。分布于新疆。

全草：养阴凉血，通乳益精。

**川甘蒲公英**

**Taraxacum lugubre** Dahlst.

生于海拔 2 500—4 200 米的林缘、荒地、水边、田边及草地上。分布于甘肃、宁夏、青海、四川。

全草：苦、甘，寒。用于高烧，吐泻，胆囊炎，肝炎，肠痈。

**川藏蒲公英**

**Taraxacum macrocarpum** Dahlst.

生于海拔 3 000—4 600 米的林缘、草坡、河边、荒地、水沟边及路旁。分布于青海、四川、西藏。

全草：清热解毒，消痈散结。

附　注：功效相同的有**细裂蒲公英 T. multisectum** Kitag.，分布于吉林。

**大叶蒲公英**

**Taraxacum majus** Schischk.

生于山坡或溪边。分布于新疆。

全草：清热解毒，补脾和胃。

**蒲公英**　　古丁、婆补丁、白婆婆丁、黄草地丁、浆浆菜、奶奶草(江苏)

**Taraxacum mongolicum** Hand.-Mazz.

生于海拔 350—2 600 米的山坡林缘、荒野、河岸、草滩、田间及路旁。分布于全国各地。

全草：甘、苦，寒。清热解毒，消肿散结，利尿通淋，止痛。用于急性乳痈，目赤，胃炎，肝炎，胆囊炎，小便淋痛，瘰疬，疔毒。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**东北蒲公英**　　曼吉英-巴格巴盖-其其格(蒙语)

**Taraxacum ohwianum** Kitam.

生于山野、溪流边、河边及路旁。分布于东北及内蒙古。

带根全草：苦、甘，寒。清热解毒，利尿散结。

附　注：功效相同的有**沼生蒲公英 T. palustre** (Willd.) DC.，分布于西藏。

**极小蒲公英**

**Taraxacum perpusillum** Schischk.

生于高山草坡及草地上。分布于新疆。

全草：养阴凉血，乌须发，壮筋骨。

**白缘蒲公英**　　乌日根-巴格巴盖-其其格(蒙语)

**Taraxacum platypecidum** Diels

生于阔叶林下、沟谷、草甸及山坡草丛中。分布于东北、华东及甘肃。

全草：清热解毒，消肿散结，利尿通淋。

**拟白花蒲公英**　　查干-巴格巴盖-其其格(蒙语)，白花蒲公英(内蒙古植物志)

**Taraxacum pseudo-albidum** Kitag.

生于山坡、草地、田边及路旁。分布于东北及内蒙古。

全草：清热解毒，消肿散结，利尿通淋。

**华蒲公英**　　胡吉日色格-巴格巴盖-其其格(蒙语)，扑灯儿(内蒙古植物志)，碱地蒲公英(陕西中药名录)

**Taraxacum sinicum** Kitag.

生于海拔 700—3 400 米的盐碱草甸、草坡、山坡、砾石缝中、田间或路旁。分布于东北、华北、西北、西南。

性味功效同蒲公英。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**托克逊蒲公英**

**Taraxacum tujuksuensis** Qraz.

生于山谷、沟边及河滩上。分布于新疆。

全草：清热解毒，通乳益精。

**阴山蒲公英**

**Taraxacum yinshanicum** Z. Xu et H. C. Fu

生于山坡及林缘。分布于内蒙古大青山。

全草：清热解毒，利尿散结。

附　注：内蒙古特有药用植物。

## 狗舌草属　Tephroseris (Reichenb.) Reichenb.

**红轮狗舌草**

**Tephroseris flammea** (Turcz. ex DC.) Holub——*Senecio flammeus* Turcz. ex DC.

生于海拔 1 200—2 100 米的山地草坡或林中。分布于黑龙江、吉林、山西、陕西、甘

肃、宁夏。

花序：苦，寒。活血调经。　全草(红轮狗舌草)：苦，寒。清热解毒。用于疔毒痈肿。

**狗舌草**　朝阳花(贵州)，一枝花(湖北)

**Tephroseris kirilowii** (Turcz. ex DC.) Holub——*Senecio kirilowii* Turcz. ex DC.

生于海拔250—1 540米的山坡、林下、山沟、河边及路旁阴湿处。分布于东北、华北、华东及陕西、甘肃、宁夏、青海、河南、湖北、湖南、广东、四川、贵州。

全草：苦、微甘，寒。有小毒。清热解毒，利水，杀虫。用于肺痈，小便淋痛，白血病，口腔破溃，疖肿。

**长白狗舌草**

**Tephroseris phaeantha** (Nakai) C. Jeffrey et Y. L. Chen——*Senecio phaeantha* Nakai

生于海拔2 000—2 500米的山坡、塘边及路边湿地上。分布于东北。

根及全草：苦，寒。有小毒。清热，利水，活血消肿，杀虫。

**红舌狗舌草**　阿夏塞卷(藏语)

**Tephroseris rufa** (Hand.-Mazz.) B. Nord.——*Senecio rufus* Hand.-Mazz.

生于海拔2 650—4 000米的高山草甸及沟谷湿地上。分布于甘肃、青海、四川、西藏。

花序及全草：苦，寒。有毒。清热解毒，利尿。

## 肿柄菊属　Tithonia Desf. ex Juss.

**肿柄菊**　假向日葵(云南)

**Tithonia diversifolia** A Gray

我国广东、广西、云南引种栽培。

叶：苦，凉。清热解毒，消肿拔毒。用于急性吐泻，疮疡肿毒。

## 婆罗门参属　Tragopogon L.

**阿尔泰婆罗门参**

**Tragopogon altaicus** Nikit.

生于山坡、沟谷或草地上。分布于新疆。

根：补肺降火，养胃生津。

附　注：功效相似的有**近缘婆罗门参 T. marginifolius** S. Nikit.；**东方婆罗门参 T. orientalis** L.，均分布于新疆。

**蒜叶婆罗门参**

**Tragopogon porrifolius** L.

生于荒地、田野或村庄旁。分布于新疆。贵州、云南有栽培。

全草：具有明显抗疲劳，耐缺氧，镇静，催眠，消肿，祛痰，镇咳，增强记忆力的生理活

性，毒性低且安全性高。

**草地婆罗门参**

**Tragopogon pratensis** L.

生于草地及河滩。分布于新疆。

根：补肺降火，养胃生津。

## 女菀属　Turczaninowia DC.

**女菀**

**Turczaninowia fastigiata** (Fisch.) DC.——*Aster fastigiata* Fisch.

生于海拔 50—1 000 米的低山坡、荒地或路旁。分布于东北及河北、山西、陕西、山东、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北、湖南、四川。

根或全草(女菀)：辛，温。温肺化痰，和中，利尿。用于咳嗽气喘，泄泻，痢疾，小便淋痛。

## 款冬属　Tussilago L.

**款冬**　款冬花(中国高等植物图鉴)，冬花、虎须(贵州中药名录)，渣涧木(藏语)

**Tussilago farfara** L.

生于海拔 400—3 400 米的河边、沙地、山涧、水沟旁或山坡上，也有栽培。分布于全国各地。

花蕾(款冬花)：辛、微苦，温。润肺下气，止咳化痰。用于急、慢性咳嗽痰喘，肺痨。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 斑鸠菊属　Vernonia Schreb.

**驱虫斑鸠菊**　印度山茼香(中国植物志)

**Vernonia anthelmintica** (L.) Willd.——*Conyza anthelmintica* L.

生于海拔 1 000 米左右的宅旁荒地或路旁。分布于新疆、云南西部。

果实：用于白癜风，止痒。全草：杀虫。

附　注：①我国分布新纪录。②印度作驱虫药，用于皮肤病。

**糙叶斑鸠菊**　六月雪(海南)，黑升麻(贵州)，糙叶咸虾花(海南植物志)

**Vernonia aspera** (Roxb.) Buch.-Ham.——*Eupatorium asperum* Roxb.

生于山坡、空旷草地或路旁。分布于海南、贵州、云南西南部和南部。

根：辛、甘，温。发表散寒。用于风寒感冒。　茎、叶：辛、苦，温。祛风解表，补气健脾。用于风寒感冒，气虚食少。

**喜斑鸠菊**

**Vernonia blanda** (Wall.) DC.——*Conyza blanda* Wall.

生于山坡、灌丛或密林中。分布于广东、广西龙州大青山、云南西南部、南部及东南

部、西藏墨脱。

根：苦、微甘，凉。清热止痛。用于风湿骨痛，感冒发热，头痛，咽喉痛，泄泻，慢性肝炎。

**广西斑鸠菊**　　棠菊(广西)，大阳关(广西忻城)

**Vernonia chingiana** Hand.-Mazz.

生于海拔400—600米的石山疏林下、灌丛中及岩石上。分布于广西。

根：用于小儿惊风，目赤红痛。

附　注：广西特有药用植物。

**夜香牛**　　寄色草、消山虎、伤寒草、染色草(广西)，拐棍参(云南昆明)

**Vernonia cinerea** (L.) Less.——*Conyza cinerea* L.; *V. abbreviata* (Wall.) DC.

生于海拔1 500—1 800米的山坡、旷野、荒地、田边或路旁。分布于华东、西南及湖北、湖南、广东、广西。

全草(伤寒草)：苦、微甘，凉。疏风散热，拔毒消肿，安神镇静，消积化滞。用于感冒发热，肾虚失眠，痢疾，疳积，跌打扭伤，蛇伤，乳痈，疮疖肿毒。

**毒根斑鸠菊**　　藤牛七、发痧藤(广东)，过山龙、惊风红、虎三头、大木菊(广西)

**Vernonia cumingiana** Benth.——*V. andersonii* auct. non C. B. Clarke: 中国高等植物图鉴，4: 403. 1975.

生于海拔200—1 700米的山谷阴处灌丛、疏林、河边或溪边。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全株：苦，凉。有小毒。祛风解表，舒筋活络，截疟。用于风湿关节痛，腰肌劳损，四肢麻痹，感冒发热，疟疾，牙痛，目赤红肿。

**斑鸠菊**　　鸡菊花、大藤菊(广西)，火烧叶、火炭叶、火烫叶、火烫树(云南)

**Vernonia esculenta** Hemsl.——*V. papillosa* Franch.

生于海拔1 000—2 700米的山坡阳坡、草坡、灌丛、山谷疏林或林缘。分布于广西、四川、贵州、云南。

根(斑鸠菊)：甘、涩，温。消肿，解毒。用于肠痈，疮疖。　叶：用于烫、火伤。

**展枝斑鸠菊**　　茄叶一枝蒿、小黑升麻(云南)

**Vernonia extensa** DC.

生于海拔1 200—2 400米的山坡、山谷疏林中、沟边灌丛或路旁。分布于贵州关岭、云南中部至南部。

全草：用于疟腮，牙痛。

**南漳斑鸠菊**　　狗仔草(湖北)

**Vernonia nantcianensis** (Pamp.) Hand.-Mazz.——*V. bracteata* Wall. var. *nantcianensis* Pamp.

生于海拔700—1 950米的山谷、山坡、林缘。分布于湖北西部、四川东南部至西南部。

全草：用于蛇咬伤。

附　注：湖北有将本品根误作小蓟。

**滇缅斑鳩菊**　大发散、镇心丸、大红花远志(云南思茅),野辣烟(云南文山)

**Vernonia parishii** Hook. f.

生于海拔 560—2 600 米的山坡灌丛及杂木林中。分布于云南西部、南部至东南部。

根：甘、苦,平。祛风散寒,益气。用于感冒发烧,心悸,产后体虚,风湿关节痛,肝炎。

**咸虾花**　大叶咸虾花(广州),狗仔菜(海南),鲫鱼胆(广西梧州),狗仔花(广西南宁),鬼点火、烟斗草(云南)

**Vernonia patula** (Dryand.) Merr.——*Conyza patula* Dryand.

生于海拔 160—800 米的荒地、旷野、田边、路边或村边。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

全草(咸虾花)：微苦、辛,平。清热利湿,散瘀消肿。用于感冒发热,头痛,乳痈,吐泻,痢疾,疮疖,湿疹,癣疹,跌打损伤。

**柳叶斑鳩菊**　牙金药(广西北流),白头升麻、白龙须(云南思茅)

**Vernonia saligna** DC.——Conyza saligna Wall.

生于海拔 220—2 700 米的山坡、林缘、灌丛、山谷及旷野。分布于广东、广西、贵州、云南。

根：催产堕胎。　叶：用于高烧。　全草：用于疟疾。

**茄叶斑鳩菊**　大过山龙(海南),斑鸠木、斑鸠菊(广西),肿风(广西桂林、梧州)

**Vernonia solanifolia** Benth.——*V. fortunei* Sch.-Bip.

生于海拔 500—1 000 米的山谷疏林中或攀援于乔木上。分布于福建、广东、海南、广西、云南。

根、叶：甘、苦,凉。凉血止血,润肺止咳。根：用于咽喉痛,肺痨咳嗽,咯血。叶：用于外伤出血。　全草：用于腹痛，泄泻，瘕气。

**折苞斑鳩菊**　六月雪(广西陆川),金沙斑鸠菊(云南)

**Vernonia spirei** Gandog.——*V. stibaliae* Hand.-Mazz.

生于海拔 1 000—2 400 米的山坡草地、灌丛或林缘。分布于广西大瑶山、贵州册亨、云南西南部、南部至东南部。

根、叶：用于疟疾。

**刺苞斑鳩菊**　白脚威灵仙、紫花地丁、剪子草、黑继参(云南)

**Vernonia squarrosa** (D. Don) Less.——*Acilepis squarrosa* D. Don

生于海拔 1 200—1 800 米的山坡。分布于云南蒙自及屏边。

根(紫威灵)：苦、辛,凉。健脾消食,止痛,除湿,消肿。用于消化不良，脘腹胀闷,风湿关节痛,偏头痛,疮疖。

附　注：试用于治疗食道癌,胃癌。

**大叶斑鳩菊**　大叶鸡菊花(云南)

**Vernonia volkameriaefolia** (Wall.) DC.——*Conyza volkameriaefolia* Wall.

生于海拔 800—4 000 米的山谷灌丛或杂木林中。分布于广西、贵州、云南、西藏。

根及全草：用于风湿关节痛,小便脓血,小便淋痛。

## 扁芒菊属　Waldheimia Kar. et Kir.

**西藏扁芒菊**　　刚布(藏语)

**Waldheimia glabra** (Decne.) Regel——*Allardia glabra* Decne

生于海拔 4 900—5 500 米的高山碎石坡石缝中。分布于西藏南部。

全草：用于感冒。

## 蟛蜞菊属　Wedelia Jacq.

**李花蟛蜞菊**　　黄泥菜(广西防城)

**Wedelia biflora** (L.) DC.——*Verbesina biflora* L.

生于草地、林下、灌丛中或海岸干燥沙地上。分布于台湾、广东、海南、广西、云南。

全草：用于风湿关节痛，跌打损伤，疮疡肿毒。

**蟛蜞菊**　　蟛蜞花(广州)，黄花草(广西玉林、蒙山)

**Wedelia chinensis** (Osbeck) Merr.——*Solidago chinensis* Osbeck

生于山脚、湿润草地、河堤、田埂、沟边或路旁。分布于辽宁、浙江、福建、台湾、广东、海南。河南有栽培。

根或全草(蟛蜞菊)：甘、淡，凉。清热解毒，祛瘀消肿。用于白喉，顿咳，痢疾，痔疮，跌打损伤。

**卤地菊**

**Wedelia prostrata** (Hook. et Arn.) Hemsl.——*Verbesina prostrata* Hook. et Arn.

生于海岸干燥沙地。分布于江苏、浙江、福建、台湾、广东、海南、广西。

全草(卤地菊)：甘、酸，平。清热解毒，祛痰止咳。用于感冒，喉蛾，喉痹，白喉，顿咳，咽喉痛，疮疡肿毒。

**麻叶蟛蜞菊**　　血参(云南)，小血藤(全国中草药汇编)

**Wedelia urticaefolia** (Bl.) DC.——*Verbesina urticaefolia* Bl.

生于溪畔、谷地、坡地及空旷草丛中。分布于湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根(滴血根)：甘，温。温经，通络，养血，补肾。用于肾虚腰痛，气血虚弱，跌打损伤。

**山蟛蜞菊**　　乳腺草(广西平果)，细针果(贵州)，麻叶蟛蜞菊(全国中草药汇编)

**Wedelia wallichii** Less.

生于海拔 500—3 000 米的溪边、路旁或沟谷中。分布于西南及湖北、海南、广西。

全草(血参)：甘，温。有毒。补血，活血。用于贫血，产后流血过多，子宫肌瘤，经闭。

附　注：本种有毒。猪、牛、羊和家兔误食能致死。

## 苍耳属　Xanthium L.

**蒙古苍耳**　　东北苍耳(中国高等植物图鉴)

**Xanthium mongolicum** Kitag.

生于干旱山坡及砂质荒地上。分布于黑龙江、辽宁、河北、内蒙古。

果实：散风止痛，祛湿杀虫，通鼻窍。

**苍耳**　苍耳子(通称)，野茄(河北)，猪耳、菜耳(甘肃)，粘头婆(广州)

**Xanthium sibiricum** Patrin ex Widder——*X. japonicum* Widder; *X. strumarium* L.

生于海拔 300—1 700 米的山坡、旷野、河滩及路旁。分布于全国各地。

根(苍耳根)：用于疔疮，痈疽，缠喉风，丹毒，高血压症，痢疾。　茎、叶(苍耳)：苦、辛，凉。有小毒。祛风散热，解毒杀虫。用于头风，头晕，湿痹拘挛，目赤目翳，疔疮毒肿，崩漏，麻风。　花序(苍耳花)：用于白癜顽癣，白痢。　果实(苍耳子)：辛、苦，温。有毒。散风湿，通鼻窍，止痛杀虫。用于风寒头痛，鼻塞流涕，齿痛，风寒湿痹，四肢挛痛，疥癣，瘙痒。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**刺苍耳**

**Xanthium spinosum** L.

原产南美洲。河南郸城县栽培，并已归化。

果实：散风止痛，祛湿，杀虫。用于风寒头痛，鼻渊，齿痛，风寒湿痹，瘙痒。

## 黄缨菊属　Xanthopappus C. Winkl.

**黄缨菊**　马刺盖、九头妖(甘肃、青海)，黄冠菊(中国种子植物科属辞典)

**Xanthopappus subacaulis** C. Winkl.——*X. multicephalus* Ling

生于海拔 2 400—4 000 米的干燥山坡、草原或草甸。分布于甘肃西南部、青海西部、四川北部与西部、云南西北部。

全草：苦，凉。止血，催吐。用于吐血，崩漏，食物中毒。

附　注：我国特有属。

## 黄鹌菜属　Youngia Cass.

**红果黄鹌菜**

**Youngia erythrocarpa** (Vant.) Babc. et Stebb. ——*Lactuca erythrocarpa* Vant.

生于荒草坡或灌丛中。分布于安徽、浙江、四川、贵州。

全草：清热解毒，消肿止痛。

附　注：功效相同的有**异叶黄鹌菜　Y. heterophylla** (Hemsl.) Babc. et Stebb.，分布于陕西、福建、湖北、湖南、云南；**细茎黄鹌菜　Y. tenuicaulis** (Babc. et Stebb.) Czerep.，分布于我国北部；**细叶黄鹌菜　Y. tenuifolia** (Willd.) Babc. et Stebb.，分布于东北、华北及新疆、西藏。

**黄鹌菜**　苦菜药(广西隆林)

**Youngia japonica** (L.) DC.——*Prenanthes japonica* L.

生于海拔600—2 600米的山坡荒地、荒野、林下、林缘、沟谷或路边。分布于河北、陕西、甘肃、青海、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、河南、湖北、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根或全草(黄鹌菜)：甘、微苦，凉。清热解毒，利尿消肿，止痛。用于咽喉痛，乳痈，牙痛，小便不利，肝硬化腹水，疮疖肿毒。

**川西黄鹌菜**　黄苦麻草(湖北)

**Youngia prattii** (Babc.) Stebb.——*Crepis prattii* Babc.

生于岩缝中或湿草地上。分布于湖北、四川。

全草：外敷可治火伤。

**碱黄鹌菜**　好吉日苏格-杨给日干那(蒙语)

**Youngia stenoma** (Turcz.) Ledeb.——*Crepis stenoma* Turcz.

生于河滩、草甸或盐渍低地上。分布于东北及内蒙古。

全草：微苦，寒。清热解毒，消肿止痛。用于疮肿疔毒。

## 百日菊属　Zinnia L.

**百日菊**　火毡花(东北)，步登高(北京)，节节高(上海)，鱼尾菊(广州)，万寿菊(云南)

**Zinnia elegans** Jacq.

原产墨西哥。现我国各地有栽培。

全草：清热利湿，止痢，通淋。用于痢疾，小便淋痛，乳痈。

# 单子叶植物　Monocotyledoneae

## 180. 泽泻科　Alismataceae

## 泽泻属　Alisma L.

**琵琶泽泻**

**Alisma angustifolium** Roth

生于平原池塘、沼泽、溪边。分布于新疆。

球茎：清热，渗湿，利尿。

**窄叶泽泻**　真武剑(广西全州)，大箭(四川常用中草药)

**Alisma canaliculatum** A. Braun et Bouche

生于沼泽边缘、湖塘沟渠及稻田中。分布于长江流域以南各省区。

全草(大箭)：淡、微辛，平。清热，渗湿。用于皮肤疱疹，小便淋痛，水肿，蛇咬伤。

**草泽泻**

**Alisma gramineum** Gmel.

生于沟渠、湖塘、河边河滩及浅水中。分布于东北、华北及甘肃、宁夏、新疆。

球茎：利水，渗湿，泄热。

**泽泻**　水车前、如意花(吉林)，水泽、如意菜(陕西、甘肃、贵州)，水白菜、水蛤蟆叶(云南)，天鹅蛋、天秃(药材资料汇编)

**Alisma orientale** (Sam.) Juzep.——*A. plantago-aquatica* L. var. *orientale* Sam.

生于河滩沙地、浅水池沼、水稻田及潮湿地，也有栽培。全国各省区均有分布。福建、四川等地有大面积栽培。

球茎(泽泻)：甘，寒。利小便，清湿热。用于小便淋痛，水肿胀满，泄泻尿少，痰饮眩晕，热淋涩痛，高血脂症。　叶(泽泻叶)：咸，平。用于慢性咳嗽痰喘，乳汁不通。　果实(泽泻实)：甘，平。用于风痹，消渴。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②福建、江西产者称"建泽泻"个大，光圆，品质佳；四川、贵州、云南产者称"川泽泻"，个小，皮较粗糙。

## 慈姑属　Sagittaria L.

**长叶慈姑**　长叶泽泻、剪刀草(四川、贵州毕节)，姑妈菜(贵州)，水慈姑(贵阳民间草药)

**Sagittaria aginashi** Makino

生于稻田、水沟、沼泽地。分布于山东、四川、贵州。

全草(水慈姑)：辛，凉。利水渗湿，泻热解毒。外用于骨痛，疮毒，毒蛇咬伤及蜂刺伤，赤眼；呕血，疳积，带下病，脱肛，痔瘘。

**冠果草**　田莲藕(广东)，水菱角(广西)，土紫蔻、假菱角(中药大辞典)

**Sagittaria guyanensis** Kunth subsp. **lappula**(D. Don) Bogin——*S. lappula* D. Don; *Lophotocarpus guyanensis* (Kunth)M. Mich. var. *lappula* (D. Don) Buchen

生于稻田、水边及湿地。分布于我国东南部、南部至西南部。

全草(冠果草)：微苦，寒。清热利尿。用于风热咳喘，痢疾，疥疮；外用于痈肿初起。

**弯喙慈姑**

**Sagittaria latifolia** Willd.

生于池沼、湖畔或浅水处。分布于东北及陕西、四川。

球茎：苦、甘，凉。行血通淋。

**矮慈姑**　鸭舌头(陕西、四川、贵州)，鸭舌草、瓜皮草(江西、湖北、云南)，水蒜(广东)，扁簪草(广东遂溪)

**Sagittaria pygmaea** Miq.

生于水田中及池沼、沟塘边或湿地上，亦有栽培。分布于华东、中南、西南及陕西、台湾。

全草(鸭舌头)：甘、苦，凉。清热解毒，除湿镇痛。用于无名肿毒，小便淋痛，咽喉痛；外用于痈肿，蛇咬伤。

**长裂叶慈姑**　长瓣慈姑(江西、贵州、江苏植物志),水马慈、水箭草(福建),水慈姑、燕尾草(贵州中草药名录)

**Sagittaria sagittifolia** L. var. **longiloba** Turcz.——*S. trifolia* L. f. *longiloba* (Turcz.) Makino

生于稻田、沼泽地或栽培。分布于华东。

球茎及叶：甘、微苦,寒。　球茎：通淋逐瘀。用于淋浊,乳腺结核,胎衣不下，骨膜炎，子痈。　叶：消肿解毒。用于疔疖。

**野慈姑**　剪刀草(云南)

**Sagittaria trifolia** L.

生于海拔 2 500—2 800 米的水稻田或沼泽地。分布于长江流域以南及云南东南部至南部。

全草：甘、苦,凉。清热止血,解毒消肿,散结。

**长瓣慈姑**　慈果子(宁夏中卫),剪刀草(分类草药性)，水慈姑、慈姑草(四川中药志),燕尾草(贵州草药)

**Sagittaria trifolia** L. var. **angustifolia** (Sieb.) Kitag. ——*S. sagittifolia* L. var. *angustifolia* Sieb.; *S. sagittifolia* L. subsp. *leucopetala* (Miq.) Hartog

生于沼泽、浅水湖塘及稻田中。分布于华北、华东、西南及宁夏、河南、湖北、广西、海南。

全株(剪刀草)：清热解毒,凉血消肿。用于黄疸，瘰疬,蛇咬伤。　根状茎：用于狂犬咬伤;外用于疮疡肿毒。

**慈姑**　茨菇(东北、药性论),白地栗(本草图经),华夏慈姑(华东维管束植物)

**Sagittaria trifolia** L. var. **edulis** (Sieb. et Zucc.) Ohwi——*S. sagittifolia* L. var. *edulis* Sieb. et Zucc.;*S. trifolia* L. var. *sinensis* (Sims) Makino; *S. sinensis* Sims

生于水田、沼泽及浅水沟中。全国大部分省区均有分布。南方各地常有栽培。

球茎(慈姑)：苦、甘,凉。行血通淋。用于产后血瘀,胎衣不下,淋证,咳嗽痰血。　叶(慈姑叶)：甘、微苦,寒。消肿,解毒。用于疮肿,丹毒,恶疮。　花(慈姑花)：明目,祛湿。用于疔肿痔漏。

## 181. 花蔺科　Butomaceae

### 花蔺属　Butomus L.

**花蔺**　花蔺草(秦岭植物志)

**Butomus umbellatus** L.

生于河岸、沟渠、池沼浅水处。分布于东北、华北、华东及陕西、宁夏、新疆、河南。

茎叶：清热解毒,止咳平喘。

# 182. 水鳖科 Hydrocharitaceae

## 水筛属 Blyxa Noronha

**有尾水筛** 有刺水筛(江苏),杉毛藻(江西),鸭舌草(四川)

**Blyxa echinosperma** (C. B. Clarke) Hook. f.——*Hydrotrophus echinospermus* C. B. Clarke

生于稻田、淡水池沼或阴湿地。分布于江苏、安徽、江西、台湾、湖南、四川、云南。

全草: 清热解毒,利湿。

## 黑藻属 Hydrilla Rich.

**黑藻** 车轴草(河北),水草(云南),轮叶黑藻、轮叶水草(中国高等植物图鉴)

**Hydrilla verticillata** (L. f.) Rich.——*Serpicula verticillata* L. f.

生于河湖池沼淡水中或稻田内。分布于华东、中南、西南及黑龙江、河北、陕西。

全草(水王孙): 清热解毒,利尿祛湿。用于疮疡肿毒。

## 水鳖属 Hydrochris L.

**水鳖** 白萍(河北),天泡草(四川),马尿花(植物名实图考), 水青药、水旋复(滇南本草)

**Hydrochris dubia** (Bl.) Backer——*Pontederia dubia* Bl.; *H. asiatica* Miq.

生于静水池沼、沟渠及水田中。分布于华北、华东、中南及陕西、四川、云南。

全草(马尿花): 苦、微咸,凉。用于带下病。

## 软骨草属 Lagarosiphon Harv.

**软骨草** 泥藻(江西),鸭仔草(广东)

**Lagarosiphon alternifolius** (Roxb.) Druce——*Vallisneria alternifolia* Roxb.

生于淡水池沼或稻田中。分布于江西、广东、云南及南部各省。

全草: 利水除烦。用于水肿烦渴。

## 水车前属 Ottelia Pers.

**海菜花** 水菜花、水茄子、海茄子(贵州),海菜、龙爪菜(植物名实图考),蓼叶海菜花(中国高等植物图鉴)

**Ottelia acuminata** (Gagnep.) Dandy——*Boottia acuminata* Gagnep.

生于海拔700—2 700米的湖泊、池沼、水田中。分布于广西、四川、贵州、云南。

根及叶(龙爪菜)：清热解毒，软坚散结。用于瘿瘤。

**水车前**　水芥菜(广西北流)，水白菜(湖南)，龙爪草(贵州民间方药集)，飘羹菜、山窝鸡(贵州草药)

**Ottelia alismoides** (L.) Pers.——*Stratiotes alismoides* L.

生于池塘、水边、稻田中或阴湿处。分布于华东、中南及黑龙江、河北、四川、贵州、云南。

全草(龙舌草)：甘、淡，凉。清热化痰，解毒利尿。用于肺热咳嗽，肺痨，咳血，哮喘，水肿，小便不利；外用于痈肿，烧、烫伤。

### 苦草属　Vallisneria L.

**苦草**　带子孔、脚带小草(北方)，蓼萍草(湖南)，韭菜草、面条草、水茜、密齿苦草(广西)

**Vallisneria natans** (Lour.) Hara——*Physkium natans* Lour.

生于池沼、溪沟、河、溏浅水中。全国大部分省区均有分布。

全草(苦草)：苦，温。用于带下病，恶露。

## 183. 水麦冬科　Juncaginaceae

### 水麦冬属　Triglochin L.

**海韭菜**　圆果水麦冬、三尖草(中药大辞典)，那冷门(藏名)

**Triglochin maritimum** L.

生于高山沼泽地、湿草地或海边沙地、河边湿地、盐碱洼地及湖塘沟边浅水中。分布于东北、华北、西北、西南及山东。

全草：甘，平。清热养阴，生津止渴。用于胃热烦渴，口干舌燥。　果实：淡，温。滋补，止泻，镇静。用于眼病。

**水麦冬**　小麦冬(内蒙古)，牛毛墩(甘肃)，长果水麦冬(新疆)

**Triglochin palustre** L.

生于河岸湿地、沼泽地、河湖岸边或盐碱化湿草地。分布于东北、华北、西北、西南。

全草及果实：清热利湿，消肿止泻。用于腹水。

## 184. 眼子菜科　Potamogetonaceae

### 眼子菜属　Potamogeton L.

**菹草**　鹅草(江苏)，丝草(江西)，扎草、虾藻(中国高等植物图鉴)

**Potamogeton crispus** L.

生于静水池沼、河湖沟渠或稻田中。为习见的沉水植物。全国均有分布。

全草(菹草)：苦，寒。清热利水，止血，消肿，驱蛔虫。

**小叶眼子菜**　突果眼子菜、水竹叶(中国高等植物图鉴)

**Potamogeton cristatus** Regel et Maack

生于静水沟塘及稻田中,是广泛危害的稻田杂草。分布于东北、华北及河南、湖北、湖南、四川、贵州。

全草:功效同眼子菜。

附　注:四川等地作眼子菜入药。

**眼子菜**　案板菜(陕西),鸭吃草(种子植物名称),牙齿草(滇南本草),水案板(分类草药性),札水板(四川中药志)

**Potamogeton distinctus** A. Benn.

生于静水池沼、河流浅水处或稻田中,是广泛危害的田间杂草。全国各地均有分布。

全草(眼子菜):苦,寒。清热,利水,止血,消肿,驱蛔虫。用于目赤红痛,痢疾,黄疸,淋证,水肿,带下病,血崩,痔血,小儿疳积,蛔虫病;外用于痈疖肿毒。

**微齿眼子菜**　线叶菹、竹叶草(云南种子植物名录)

**Potamogeton maackianus** A. Benn.

生于浅湖及静水池沼中。分布于东北、华东、华中及四川、云南。

全草(线叶菹):功效同眼子菜。

**竹草眼子菜**　水龙草(黑龙江),竹叶藻(吉林),马来眼子菜、箬叶藻(中国高等植物图鉴)

**Potamogeton malaianus** Miq.

生于静水池沼中、水渠、河道等流水中。全国大部分地区均有分布。

全草:功效同眼子菜。

附　注:宁夏部分地区作眼子菜入药。

**浮叶眼子菜**　厚叶眼子菜(新疆),活叶眼子菜(安徽),西藏眼子菜(全国中草药汇编)

**Potamogeton natans** L.——*P. morongii* A. Benn.

生于池沼水田及浅水域中。全国各地均有分布。

全草(水案板):甘、微苦,凉。解热,利水,止血,补虚,健脾。用于目赤红肿,牙痛,水肿,痔疮,蛔虫病,干血痨,小儿疳积。

**篦齿眼子菜**　松毛草、马尾巴草(云南),红线儿菹、龙须眼子菜(中国高等植物图鉴),线形眼子菜(全国中草药汇编)

**Potamogeton pectinatus** L.——*P. amblyophyllus* C. A. Mey.

生于池沼及河湖渠沟浅水中。全国均有分布。

全草(红线儿菹):微苦,凉。清热解毒。用于肺炎。藏医用于风热咳喘;熬膏外用于疮疖。

**穿叶眼子菜**　酸水草、抱茎眼子菜(全国中草药汇编)

**Potamogeton perfoliatus** L.

生于池沼、沟渠、淡水湖和缓流河水中。分布于东北、华北、西北及山东、河南　贵州、云南。

全草(酸水草):淡,凉。渗湿解表。用于湿疹,皮肤瘙痒。

**篦叶眼子菜**

**Potamogeton polygonifolius** Pourr.

生于浅水池沼及缓流溪水中。分布于河北、陕西、甘肃、山东。

全草(眼子草)：甘、微苦，凉。解热，利水，止血，补虚，健脾。

## 大叶藻属　Zostera L.

**大叶藻**　海带草(山东)，海带(嘉佑本草)，海马蔺、海草(东北药用植物志)

**Zostera marina** L.

生于海滩或碱水湖中。分布于辽宁、河北、山东沿海地区。

全草(海带草)：咸，寒。软坚化痰，利水泄热。用于瘿瘤，症瘕，水肿，脚气。

附　注：①据考证，现代所称的海带为 Laminaria japonica Aresch.，药材中作昆布使用。在《嘉佑本草》中描述的"登州人干之以东器物"的海带，是本种海韭菜 Phyllospadix scouleri Hook.。因登州一带仅产大叶藻和海韭菜，在山东称为"海草"。辽宁亦以大叶藻入药称为海带。故将大叶藻称海草较妥。②功效相同的有**纤细大叶藻 Z. minor** Roth，分布于新疆。

# 185. 百合科　Liliaceae

## 粉条儿菜属　Aletris L.

**高山粉条儿菜**　一支箭(贵州)，高山肺筋草(秦岭植物志)

**Aletris alpestris** Diels

生于海拔 800—3 600 米的荒坡草坪、灌丛林下或岩石上。分布于陕西太白山、四川、贵州西南部、云南丽江。

全草：清热，润肺，止咳。

**灰绢粉条儿菜**

**Aletris cinerascens** Wang et Tang

生于海拔 2 700—3 100 米的山顶草地、荒坡、草坪及林下。分布于广西、四川、云南。

全草：清热，润肺，止咳。

**无毛粉条儿菜**　蛆芽草(陕西)，光叶肺筋草(陕西、甘肃、四川、贵州)，小肺筋草(陕西、甘肃)，光叶肺筋草(湖北)

**Aletris glabra** Bur. et Franch.

生于海拔 2 000—4 000 米的林下、灌丛中或荒草地。分布于西南及陕西南部、甘肃南部、福建、台湾、湖北。

根、全草：甘、微苦，平。清热利湿，润肺止咳，调经，杀虫。用于消化不良，肝炎，胃酸过多，肺痨，咳嗽，乳汁不足，带下病，经闭腰痛，小儿蛔虫病，风火牙痛，疔腮。

**疏花粉条儿菜**

**Aletris laxiflora** Bur. et Franch.

生于海拔 1 300—2 850 米的林下、岩石上或荒坡草坪。分布于四川成都、西藏昌都地区西部。

全草：清热，润肺，止咳。

**少花粉条儿菜**　　百味参(云南)

**Aletris pauciflora** (Klotz.) Franch.——*Stachyopogon pauciflorus* Klotz.

生于海拔(1 450—)2 800—4 000 米的高山草坡或荒坡、灌丛草坪。分布于甘肃、四川、云南、西藏。

全草：辛、微苦，温。补气，止血。用于体虚出汗，吐血，下血。

附　注：功效相同的有**穗花粉条儿菜　A. pauciflora** (Klotz.) Franch. **var. khasiana** (Hook. f.) Wang et Tang，分布于西南。

**短柄粉条儿菜**　　铁卵子(浙江)

**Aletris scopulorum** Dunn

生于荒地或草地上。分布于浙江、江西、湖南、广东、广西。

根：消肿解毒。

**粉条儿菜**　　金线吊米(通称)，蛆芽菜(陕西)，细米荠(江西)，谷穗草(福建)，百味参、翠绿草(云南)，肺痨草、小肺筋草(四川中药志)

**Aletris spicata** (Thunb.) Franch.——*Hypoxis spicata* Thunb.

生于海拔 350—2 900 米的阳光充足空旷草地或山坡、路边、灌丛及林缘。分布于华东、中南、西南及河北、山西、陕西南部、甘肃南部。

根、全草(小肺筋草)：苦、甘，平。清肺，化痰，止咳，活血，杀虫。用于咳嗽痰喘，顿咳，咳嗽吐血，气喘，肺痛，乳痈，肠风便血，妇人乳少，经闭，小儿疳积，蛔虫病，疼腮。

**星花粉条儿菜**

**Aletris stelliflora** Hand.-Mazz.

生于海拔 500—3 500 米的高山草地及沼泽地或荒坡草坪。分布于四川成都及天全、云南西北部。

全草：清热润肺，止咳。

**狭瓣粉条儿菜**　　驱蛆草、一窝蛆、肺筋草(湖北)，狭叶粉条儿菜(云南种子植物名录)

**Aletris stenoloba** Franch.

生于海拔 300—3 300 米的林缘草坡或山坡林下、路边、草丛中。分布于陕西、甘肃、湖北、广西、四川、贵州、云南。

全草：清热润肺，止咳，驱虫。也外用于骨髓炎。

## 葱属　Allium L.

**阿尔泰葱**

**Allium altaicum** Pall.

生于乱石山坡及草地或石质山崖上。分布于黑龙江西部、内蒙古、新疆北部、

鳞茎：用于坏血病，消化不良。

附　注：鳞茎及叶可作蔬菜食用。

**火葱**　香葱、细香葱(中国植物志)，分葱、科葱(中国蔬菜栽培学)

**Allium ascalonicum** L.

原产亚洲西部。我国南部、中部各省区广泛栽培。作调料蔬菜食用。

全草(胡葱)：辛，温。温中，下气。用于水肿胀满，肿毒。　种子(胡葱子)：解毒。

附　注：河南将带根全草用于风寒感冒，疮疡红肿。

**洋葱**　大头葱(湖北)，洋葱头(全国中草药汇编)，玉葱(植物学大辞典)

**Allium cepa** L.

原产亚洲西部。我国各地广泛栽种，作蔬菜食用。

鳞茎(洋葱)辛，温。气香。解毒消肿，杀虫。外用于创伤，溃疡，滴虫病，阴道炎。并用于动脉硬化症，消渴，肠无力症，痢疾，泄泻。

附　注：鳞茎能降低胆固醇，提高胃肠逆张力增加胃液分泌。

**藠头**　薤白(本草图经)，薤白头(药材学)，薤、荞头(中国植物志)

**Allium chinense** G. Don

生于田园、郊野、路旁、河边、山地或山坡草丛阴湿处。分布于全国大部分地区，长江流域和以南各省区广泛栽培供食用。

鳞茎(薤白)：辛、苦，温。温中通阳，理气宽胸。用于胸痛，胸闷，心绞痛，胁肋刺痛，咳嗽痰喘，慢性胃脘痛胀，痢疾。　叶(薤叶)：用于疥疮(煮洗或捣如泥敷)及喘急。

附　注：①广西地区用全草敷毒蛇咬伤。②本种鳞茎为"薤白"来源之一。

**天兰韭**　野葱、兰花葱(陕西)，天扁韭、岩韭(湖北)，白狼葱(中国高等植物图鉴)

**Allium cyaneum** Regel

生于海拔1 500—5 000米的高山草坡、草地、林下或林缘。分布于河北、山西、陕西、甘肃、宁夏、青海、河南、湖北、四川、西藏。

全草(兰花葱)：辛，温。发散风寒，通阳，健胃。用于风寒外感，阴寒腹痛，肢冷脉微，跌打损伤。

**星花蒜**　脱苞韭(新疆)

**Allium decipiens** Fisch.

生于山地阴坡、草甸、草原。分布于新疆西北部。

鳞茎(薤白)：理气，散结，止痛。

附　注：新疆地区以本种的鳞茎作"薤白"使用。

**葱**　四季葱(湖北)，香葱(湖南)，葱茎白(本草纲目)

**Allium fistulosum** L.

全国各地广泛栽培作蔬菜食用。

鳞茎(葱白)：辛，温。发表，通阳，解毒。用于伤寒寒热头痛，阴寒腹痛，虫积内阻，二便不通，痢疾，痈肿。　须根(葱须)：用于风寒头痛，喉疮，冻伤。　葱叶：祛风发汗，解毒消肿。用于风寒感冒，头痛鼻塞，身热无汗，中风，面目浮肿，疮痈肿痛，跌打创伤。　种子(葱实)：辛，温。温肾，明目。用于阳痿，目眩。　葱汁：散瘀，解毒，驱虫。用于头痛，衄血，尿血，虫积，痈肿，跌打损伤。

**玉簪叶韭**　岩蒜(湖北)，天韭(陕西中草药)，天蒜、鹿耳韭(中药大辞典)

**Allium funckiaefolium** Hand. Mazz.

生于海拔 2 300 米以下的林下、草坡或阴湿山沟。分布于陕西、湖北西部、四川东部。

全草(鹿耳韭): 辛、苦,温。散瘀镇痛,祛风,止血。用于跌打损伤, 瘀血肿痛,衄血,漆疮。

**头花韭**

**Allium glomeratum** Prokh.

生于山坡、草甸、草原。分布于新疆天山。

鳞茎: 理气,散结,止痛。

附　注: 新疆地区以本种的鳞茎作薤白使用。

**宽叶韭**　大叶韭菜(江西),大叶韭(中国植物志),丽江野葱(云南种子植物名录)

**Allium hookeri** Thwaites

生于海拔 1 500—4 000 米的湿润山坡或林下,或栽培。分布于西南及江西、广东、广西。

全草: 理气宽中,通阳散结,消肿止痛。

**大花韭**

**Allium macranthum** Baker

生于海拔 2 500—4 200 米的高山草地或山坡荒地。分布于陕西、甘肃、四川、云南、西藏。

全草: 补肾壮阳。

**小根蒜**　子根蒜(东北),小根菜(辽宁),薤白(华北),野蒜(陕西、宁夏、新疆),密花小根蒜、团葱(中国植物志)

**Allium macrostemon** Bunge

生于田野、路旁及山坡草地、林缘或栽培。全国均有分布。主产东北及河北、江苏、湖北。

鳞茎(薤白): 辛、苦,温。温中通阳,理气宽胸。用于胸痛,胸闷,心绞痛, 胁肋刺痛,咳嗽痰喘,胃脘痛胀,痢疾。

附　注: ①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。② 功效相同的有**密花小根蒜 A. macrostemon** Bunge var. **uralense** (Franch.) Airy-Shaw, 分布于东北及河北、天津、内蒙古、山东; **兰花山药 A. coeruleum** Pall., 分布于新疆阿克苏、天山; 野葱 **A. grayi** Regel, 上海以鳞茎作药用; 长梗薤 **A. neriniflorum** Baker, 分布于东北、华北。

**滇韭**

**Allium mairei** Lévl.

生于海拔 1 200—4 200 米的山坡、石缝、草地或林下。分布于西南。

全草: 温中壮阳。

**峨眉韭**

**Allium omeiense** Z. 'Y. Zhu

生于海拔 1 200 米的山坡林缘灌林中。分布于四川峨眉及洪雅。

根: 通经活血,祛瘀消肿,止痛。用于跌打损伤,红肿,扭伤。 种子: 固精,止带。用于带下病,淋证,阳痿,遗精。

附　注：四川特有药用植物。

**卵叶韭**　　天蒜、天韭(湖北)，鹿耳韭(中国植物志)，卵叶山葱(云南种子植物名录)

**Allium ovalifolium** Hand.-Mazz.——*A. prattii* C.H. Wright var. *latifoliatum* Wang et Tang

生于海拔1 500—4 200米的山谷林下、林缘、沟边或阴湿山坡。分布于陕西、甘肃、青海。

全草：活血散瘀，止血止痛。用于跌打损伤，瘀血肿痛，衄血。

**碱韭**　　紫花韭(中国植物志)

**Allium polyrrhizum** Turcz. ex Regel

生于海拔1 000—3 700米的向阳山坡或草地。分布于东北、华北及甘肃、宁夏、青海、新疆。

鳞茎、全草：发汗解表，通阳健胃。

**太白韭**　　野葱(陕西、湖北、贵州)，日葱(藏名)，太白山葱(云南种子植物名录)

**Allium prattii** C. H. Wright ex Forb. et Hemsl.——*A. prattii* C. H. Wright var. *ellipticum* Wang et Tang

生于海拔2 000—4 900米的高山草地或阴湿山坡、沟边、灌丛或林下。分布于西南及陕西、甘肃、青海、安徽、河南、湖北。

全草(野葱)：辛，温。发汗，消肿，健胃。用于伤风感冒，头痛发烧，腹部冷痛，消化不良。

**青甘韭**　　青甘野韭(中国植物志)

**Allium przewalskianum** Regel

生于海拔2 000—4 800米的沟边石缝中或山坡、草地、灌丛下。分布于西北及四川、云南、西藏。

全草：活血祛瘀。

**蒜**　　大蒜(本草经集注)，蒜、蒜头(全国中草药汇编)

**Allium sativum** L.

原产亚洲西部或欧洲。我国各地广泛栽培。

鳞茎(大蒜)：辛，温。健胃，止咳，杀菌，驱虫。预防时行感冒，流脑，肺痨，顿咳，食欲不振，消化不良，痢疾，阿米巴痢疾，泄泻，蛲虫病，钩虫病；外用于阴道滴虫，急性阑尾炎。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版附录收载。

**类北葱**　　类比韭(新疆)

**Allium schoenoprasoides** Regel

生于高山和亚高山地带的山坡、草甸或林缘。分布于新疆天山地区。

鳞茎：散寒解表，祛痰利尿。

**北葱**

**Allium schoenoprasum** L.

生于潮湿的草地、河谷、山坡或草甸。分布于新疆阿尔泰山区。

全草、根(细香葱)：辛，温。通气发汗，散寒解表。用于风寒感冒头痛；外用于痛风，

疮疡。

**高山韭**

**Allium sikkimense** Baker

生于海拔2 400—5 000米的山坡、草地、林缘或林下、灌丛及水边。分布于陕西、甘肃、宁夏、青海、四川、云南、西藏。

全草：除寒，发表，解毒。

**韭菜**　韭(名医别录)，韭子(本草经集注)，韭菜子(滇南本草)，韭黄(本草纲目)，起阳草(侯宁极"药谱")

**Allium tuberosum** Rottl. ex Spreng.

原产亚洲东南部。我国各地均有栽培或野生。

根、鳞茎(韭根)：辛，温。温中，行气，散瘀。用于胸痹，食积腹胀，带下病，吐血，衄血，癣疮，跌打损伤。　种子(韭子)：辛、甘，温。温补肝肾，暖腰膝，壮阳固精。用于阳痿梦遗，小便频数，遗尿，腰膝酸软冷痛，泄泻，带下病。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**茖葱**　山葱(唐本草)，隔葱、鹿耳葱(救荒本草)，各山葱(尔雅)，天韭(全国中草药汇编)

**Allium victorialis** L.

生于海拔1 000—2 500米的阴湿山坡、林下、草地、沟边或岩石上。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、山东、浙江、河南、湖北、湖南、四川、云南。

鳞茎、全草(天韭)：辛，微温。止血，散瘀，镇痛。用于衄血，瘀血，跌打损伤。

**多星韭**　山韭菜(云南中草药)，黑花野韭、野韭菜、野薤白(全国中草药汇编)，苍山野韭(云南种子植物名录)

**Allium wallichii** Kunth

生于海拔2 300—4 800米的山坡、草地、林缘灌丛下或沟边。分布于西南及湖南、广西。

全草(山韭菜、黑花韭)：甘，平。散瘀止痛，拔异物，止痒。用于跌打损伤，刀枪伤，异物人肉，漆疮，癣疹，疟疾，牛皮癣。

## 芦荟属　Aloe L.

**芦荟**　油葱(广东)，象鼻连(植物名实图考)，逼火丹、雅郎(傣语)

**Aloe vera** L. var. **chinensis** (Haw.) Berg. ——*A. barbadensis* Mill. var. *chinensis* Haw.

喜生于湿热环境。南方各省区和温室常见栽培或为野生。

根(芦荟根)：用于小儿疳积，淋证。　叶(芦荟叶)：苦、涩，寒。有小毒。泻火，通经，杀虫，解毒。用于白浊，尿血，经闭，带下病，小儿惊痫，疳积，烫伤，痔疮，疥疮，痈肿。　花(芦荟花)：用于咳嗽，咯血，吐血，白浊，尿血。

附　注：中药所用芦荟为非洲产的 **Aloe vera** L. 及 **A. ferox** Mill. 等几种的汁液制成的干燥品，有杀虫通便，清热凉肝等作用。

## 知母属　Anemarrhena Bunge

**知母**　蒜辫子草、兔子油草(辽宁),羊胡子草(河北),穿地龙(山东中药)

**Anemarrhena asphodeloides** Bunge

生于向阳山坡、草地、路旁较干燥处。分布于东北、华北、西北及山东、江苏、安徽、河南、四川、贵州。主产于河北、山西。

根状茎(知母):苦、甘,寒。清热泻火,生津润燥。用于外感热病,高热烦渴,肺热燥咳,骨蒸潮热,内热消渴,怀胎蕴热,胎动不安,肠燥便秘。

附　注:①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②我国特有属。

## 天门冬属　Asparagus L.

**山文竹**　天冬(江西、广西),假天冬、千条蜈蚣赶条蛇(江西)

**Asparagus acicularis** Wang et S. C. Chen

生于海拔80—1 400米的山坡、草地、湖边、路旁或疏林、灌丛中。分布于江苏北部、江西西北部、湖北、湖南、广东西北部、广西中部至东北部。

根、全草:凉血,解毒,通淋。

**折枝天门冬**　荒漠天门冬(新疆)

**Asparagus angulofractus** Iljin

生于海拔1 350—2 000米的荒漠带的沙质土、砾质坡地或绿州边缘。分布于新疆。

块根:润肺止咳。

**攀援天门冬**　短叶天门冬(内蒙古),寄马桩(甘肃、宁夏、青海),短叶石刁柏(青海),海滨天冬(东北植物检索表)

**Asparagus brachyphyllus** Turcz.

生于海拔800—2 000米的山坡灌丛、荒漠草原、沟谷、田边、河湖岸边或盐渍化土壤。分布于华北及吉林、辽宁、陕西、甘肃、宁夏贺兰山、青海。

块根:苦、辛,平。祛风除湿,清热解毒,润肺止咳。　鲜块根:外用于排脓,生肌,敛疮拔毒。

**天门冬**　小叶青(江西、福建),老虎尾巴(湖北),三百棒(湖南),丝冬(海南);天冬(药品化义),天棘(本草纲目)

**Asparagus cochinchinensis** (Lour.) Merr. —— *Melanthium cochinchinensis* Lour.

生于山坡、路边、林缘、草丛中或山谷、荒地、灌丛中。分布于华东、中南、西南及河北、北京、山西、陕西、甘肃、新疆。主产于广西、四川、贵州。

块根(天门冬):甘、苦,寒。养阴生津,润肺清心。用于肺燥干咳,虚劳咳嗽,津伤口渴,心烦失眠,内热消渴,肠燥便秘,白喉。

附　注:①鲜块根临床用于治疗早期乳癌及乳腺小叶增生症均有效。②《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**兴安天门冬**

**Asparagus dauricus** Fisch. ex Link

生于海拔 2 200 米以下的山地草原、林缘草甸或多沙山坡及干燥沙丘上。分布于东北、华北及陕西北部、山东东部、江苏北部。

根：利尿。　全草：舒筋活血。用于月经不调。

**羊齿天门冬**　土百部(甘肃、四川)，小天冬、滇百部、月牙一支蒿(云南)，千锤打(四川中药志)

**Asparagus filicinus** Buch.-Ham. ex D. Don

生于海拔 1 200—4 000 米的山坡、林下、林缘、草丛中或山谷、灌丛阴湿处。分布于中南、西南及山西、陕西、甘肃、宁夏、青海、安徽、浙江。

块根(土百部)：甘、淡、平，微寒。清热润肺，养阴润燥，止咳，杀虫，止痛消肿。用于肺痨久咳，骨蒸潮热，顿咳，小儿疳积，牙痛，跌打损伤；外用于疥癣。

**戈壁天门冬**　鸡麻抓、寄马桩(宁夏)，寄子桩(河南)

**Asparagus gobicus** Ivan. ex Grubov

生于荒漠和半荒漠带的沙地、湖盆边缘或干旱山坡及固定沙丘。分布于西北及内蒙古、河南。

全株(寄马桩)：辛、咸，平。祛风，杀虫，止痒。外用于神经性皮炎，牛皮癣，疮疖痈肿；全草捣烂外敷和煎服，用于痄腮。　根：润肺止咳。

**甘肃天门冬**

**Asparagus kansuensis** Wang et Tang

生于低山较干旱的坡地上。分布于甘肃文县及舟曲。

块根：甘、苦，大寒。滋阴，润肺，生津。用于虚劳咳嗽，肺热燥咳，阴虚口渴，吐血咯血，消渴，便秘。

附　注：本种块根膨大，深埋地下，当地群众挖掘，用来蒸食或代替天冬用。

**短梗天门冬**　山百部(湖南、云南)，乌小天冬、土百部(四川)，石松状天门冬(云南)，山扫帚、山獐芦、铁扫把(全国中草药汇编)

**Asparagus lycopodineus** Wall. ex Baker

生于海拔 450—3 000 米的山野、林下及灌丛阴湿处。分布于陕西南部、甘肃南部、湖北西部、湖南西部、广西西南部、四川、贵州、云南。

块根(土百部)：甘、淡，平。润肺，止咳，化痰，平喘。用于咳嗽痰多，气逆。

**密齿天门冬**　小天冬、天冬(全国中草药汇编)，小茎叶天门冬(中药大辞典)

**Asparagus meioclados** Lévl.

生于海拔 1 300—3 500 米的山坡、林下、山谷、溪边。分布于四川西南部、贵州东南部、云南西北部至东南部。

根(小天冬)：甘、淡，平。滋阴，润肺，止咳。用于肺痨久咳，潮热咯血，咳嗽痰喘，水肿，疝气，乳汁不足。

附　注：四川、云南作天门冬入药。

**多刺天门冬**

**Asparagus myriacanthus** Wang et S. C. Chen

生于海拔 2 100—3 100 米的开旷山坡、草丛、荒地或灌丛下。分布于云南西北部和西藏东南部。

块根：甘、微苦，寒。养阴清热，润燥生津。

附　注：本种在西藏作天门冬药用。

**石刁柏**　芦笋(通称)，露笋(广州)，龙须菜(云南)，小百部(广西中药志)，山文竹、细叶百部、索罗罗(中药大辞典)

**Asparagus officinalis** L.

原产欧洲。野生于河滩、沟谷、砾质地。分布于新疆乌鲁木齐、伊犁、阿勒泰、喀什。各地多有栽培。

块根(小百部)：苦、甘，微温。润肺镇咳，祛痰杀虫。用于肺热，疳积；外用于皮肤疥癣及寄生虫病。　全草：凉血解毒，利尿通淋。

附　注：本种在广西作百部使用；嫩根茎(芦笋)可作蔬菜食用，近年并已研制多种保健食品，用于防癌治癌。

**南玉带**　南立带(内蒙古)

**Asparagus oligoclonos** Maxim.

生于海拔较低的草原、山坡草地、沟边、林下、灌丛或潮湿地。分布于东北及河北东部、内蒙古东部、山东北部至东部、河南西部。

根：清热解毒，止咳平喘，利尿。

**龙须菜**　雉隐天冬(东北植物检索表)

**Asparagus schoberioides** Kunth

生于海拔 400—2 300 米的山谷、林下、林缘草丛或栽培。分布于东北及河北、山西、陕西南部、甘肃东南部、山东、河南西部。

根、根状茎：润肺降气，下痰止咳。用于肺实喘满，咳嗽多痰，胃脘疼痛。　全草：止血利尿。

**文竹**　蓬莱竹(福建民间草药)，小百部(全国中草药汇编)

**Asparagus setaceus** (Kunth) Jessop——*Asparagopsis setacea* Kunth

原产非洲南部。我国各地常见栽培。

块根：甘、微苦，平。润肺止咳。用于肺痨咳嗽，咳嗽痰喘，阿米巴痢疾。　全草(文竹)：苦，寒。凉血解毒，利尿通淋。用于郁热咳血，小便淋沥。

**滇南天门冬**　天门冬、土天冬、小茎叶天冬(云南)

**Asparagus subscandens** Wang et S. C. Chen

生于海拔 850—1 700 米的林下、灌丛及湿润处。分布于云南勐海、思茅、屏边、景洪。

块根：当地民间作百部药用，也与天门冬混用。

**西藏天门冬**

**Asparagus tibeticus** Wang et S. C. Chen

生于海拔 3 500—4 000 米的山坡、灌丛、草坡、路旁或河滩上。分布于西藏。

块根：养阴润燥，清肺生津。

附　注：本种在西藏作天门冬入药。

**曲枝天门冬**　毛叶天冬、霸天王、抓地龙、糙叶天冬(全国中草药汇编)

**Asparagus trichophyllus** Bunge

生于海拔 2 100 米以下的山地草原、田边、沙丘、路旁、荒草丛中或林下阴湿处。分布于华北及辽宁、陕西、甘肃、宁夏、青海。

根：甘、微苦，凉。祛风除湿。用于风湿腰腿痛，局部性浮肿；外用于瘙痒，渗出性皮肤病，疮疖红肿。

## 蜘蛛抱蛋属 Aspidistra Ker-Gawl.

**丛生蜘蛛抱蛋**

**Aspidistra caepitosa** Péi

生于海拔 500—1 100 米的林下或竹林下。分布于四川南部至西南部。

根状茎：活血通淋，泄热通络。

**长药蜘蛛抱蛋**

**Aspidistra dolichanthera** X. X. Chen

生于林下阴湿处。分布于广西龙州。

根状茎：用于骨折，跌打损伤。

附　注：同属植物中，以根状茎或全草入药的有**长梗蜘蛛抱蛋 A. longipedunculata** D. Fang，分布于广西，全草用于风湿痹痛；**长瓣蜘蛛抱蛋 A. longipetala** S. Z. Huang，分布于广西柳州及武鸣，根状茎用于咳嗽；**糙果蜘蛛抱蛋 A. muricata** How ex K. Y. Lang，分布于广西那坡，根状茎用于清热，止咳；**广西蜘蛛抱蛋 A. retusa** K. Y. Lang et S. Z. Huang，分布于广西临桂、阳朔、金秀，全草用于跌打损伤。

**蜘蛛抱蛋**　竹叶伸筋（恒山民间草药），大九龙盘、竹叶盘（贵州民间药物），地蜈蚣、九节龙（湖南药物志），单枝白叶（福建中草药）

**Aspidistra elatior** Bl.

生于山谷及山坡林下阴湿草丛中，各地公园多有栽培。分布于陕西南部、甘肃东南部、新疆及长江流域至西南。

根状茎（蜘蛛抱蛋）：辛、微涩，温。活血通络，泄热利尿。用于跌打损伤，风湿筋骨痛，腰痛，经闭腹痛，头痛，牙痛，热咳伤暑，泄泻，砂淋。

**九龙盘**　赶山鞭（江西、云南），蜈蚣草、龙盘七（湖南、四川、云南），蛇退（云南中草药），花棕叶、棕巴叶（全国中草药汇编）

**Aspidistra lurida** Ker-Gawl.

生于海拔 600—1 700 米的山坡林下或沟边。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根状茎（蛇退）：辛、微苦，平。健胃止痛，接骨生肌。用于小儿消化不良，胃痛，骨折，刀枪伤，风湿骨痛，肾虚腰痛，跌打损伤。

**小花蜘蛛抱蛋**　毛知母（广西）

**Aspidistra minutiflora** Stapf

生于林下、灌丛中或路旁、山腰石壁上。分布于广东、广西、四川、贵州。

根状茎：活血通淋，泄热通络。

**峨眉蜘蛛抱蛋**　　赶山鞭(四川)

**Aspidistra omenensis** Z. Y. Zhu

生于山坡林下。分布于四川乐山。

根状茎：活血通淋，泄热通络。

附　注：功效相同的有**蜘蛛抱蛋 A. sichuanensis** K. Y. Lang et Z. Y. Zhu，分布于四川乐山。

**卵叶蜘蛛抱蛋**

**Aspidistra typica** Baill.

生于海拔 50—2 000 米的阴湿杂木林中或山谷、溪边、深山密林阴湿处。分布于广西西南部、贵州、云南。

根状茎：甘、微辛，平。滋阴，止咳，润肺，生津止渴。

**棕耙叶**　　棕子叶(四川)

**Aspidistra zongbayi** K. Y. Lang et Z. Y. Zhu

生于林下肥沃的腐殖质土壤中或沟边崖石上。分布于四川乐山。

根状茎：活血祛瘀，接骨止痛。

## 大百合属　Cardiocrinum (Endl.) Lindl.

**荞麦叶大百合**　　百合莲(江西)，号筒花、大百合(湖北)，水百合(贵州民间草药)，荞麦叶贝母、喇叭、山丹(中药大辞典)

**Cardiocrinum cathayanum** (Wils.) Stearn——*Lilium cathayanum* Wils.

生于山地林下阴湿处或山谷、路旁、水沟边、草丛中。分布于陕西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、贵州。

鳞茎及根(水百合)：苦、微甘，寒。　鳞茎：凉血消肿。用于鼻渊，中耳炎。根：润肺止咳，健脾消积。

附　注：湖北民间鳞茎用于带下病。

**大百合**　　云南大百合(陕西、云南)，号筒花、海百合(湖北)，水草蒙(广西)，荞麦叶(贵州)，山菠萝根、山芋头(云南中草药)

**Cardiocrinum giganteum** (Wall.) Makino——Lilium giganteum Wall.

生于山地林下草丛中或石山上。分布于西南及陕西、湖北、湖南、广西。

鳞茎(山菠萝根)：淡，平。清热止咳，宽胸利气。用于肺痨咯血，咳嗽痰喘，小儿高烧，胃痛及反胃，呕吐。

## 白丝草属　Chionographis Maxim.

**中国白丝草**　　白花菜(广西)

**Chionographis chinensis** Krause——*Siraitos chinensis* (Krause) Wang et Tang

生于山坡、路旁的阴湿地或阴湿岩石上。分布于福建、湖南、广东、广西。

全草：利尿通淋，清热安神。外用于烧、烫伤。

## 吊兰属　Chlorophytum Ker-Gawl.

**硬叶吊兰**　金边吊兰(南宁药物志)，八叶兰、兰草(广西中草药)，钓兰(岭南采药录)

**Chlorophytum capense** (L.) O. Kuntze

南方各省区广为栽培。

全草(吊兰)：甘、微辛，平。养阴清肺，润肺止咳。用于小儿高热，肺热咳嗽，声哑，吐血，跌打肿痛，痈疽肿毒，耵耳，牙痛。

**银边吊兰**　银边兰、金边草(全国中草药汇编)

**Chlorophytum capense** (L.) O. Kuntze var. **variegatum** Hort.

全国各地广为栽培。

全草：甘、苦，凉。清热解毒，化痰止咳，活血散瘀。用于肺热咳血，咳嗽痰喘；外用于疔疮肿毒，痔疮肿痛，骨折，烧伤。

**吊兰**　挂兰、倒挂兰(福建)，折鹤兰(中国植物图鉴)，匍匐兰(福建民间草药)，树蕉瓜(文山中草药)

**Chlorophytum comosum** (Thunb.) Baker——*Anthericum comosum* Thunb.

原产非洲南部。我国各地广泛栽培。云南等地有野生，多附生于大树上。

全草(挂兰)：甘、苦，平。止咳化痰，消肿解毒，活血接骨。用于咳嗽痰喘，痈肿疔疮，痔疮肿痛，骨折，烧伤。

附　注：广州民间取全草煎服，用于声音嘶哑。

**小花吊兰**　三角草、山韭菜(广西)，疏花吊兰(中国植物志)，土麦冬(南方主要有毒植物)

**Chlorophytum laxum** R. Br.

生于山坡、林下或草地上。分布于广东、海南、广西。

根或全草(三角草)：微苦，凉。有毒。　根：用于黄疸、内伤。　全草：清热解毒，消肿止痛。用于毒蛇咬伤，跌打肿痛。

## 七筋姑属　Clintonia Raf.

**七筋姑**　搜山虎、剪刀七、竹叶七、对口剪(全国中草药汇编)，雷公七（陕西中草药）

**Clintonia udensis** Trautv. et Mey.——*Smilacina alpina* Royle

生于海拔1 600—4 000米的山坡林下、灌丛中。分布于东北、华北、西南及陕西、甘肃、宁夏、河南、湖北。

全株(雷公七)：苦、微辛，凉。有小毒。祛风，败毒，散瘀，止痛。用于跌打损伤，劳伤。

附　注：此药不宜与其他药合用，服药过量会引起腹泻。

## 铃兰属　Convallaria L.

**铃兰**　香水花、芦藜草、鹿铃花(东北药用植物志)，草寸香（陕西中草药），草玉玲(中国植物图鉴)

**Convallaria majalis** L.——*C. keiskei* Miq.

生于山地阴湿地带林下、林缘、灌丛、草丛中或栽培。分布于东北、华北、西北及山东、江苏、安徽、浙江、河南、湖南、云南。

根及全草(铃兰)：甘、苦，温。有毒。温阳利水，活血祛风。用于心力衰竭，浮肿，劳伤，崩漏，带下病，跌打损伤。

## 山菅属　Dianella Lam.

**山菅**　石兰花(浙江)，老鼠砒、家鼠草(福建民间草药)，山交剪(广西中草药)，桔梗兰(中国植物图鉴)，山猫儿(生草药性备要)

**Dianella ensifolia** (L.) DC.——*Dracaena ensifolia* L.

生于海拔 240—1 700 米的山坡、林下、林缘、草丛中或海岛裸岩旁及岩缝中。分布于浙江、福建、江西、台湾、广东、广西、四川、贵州、云南。

根状茎(山菅兰、山猫儿)：甘、辛，凉。有大毒。拔毒消肿。(磨干粉，调醋)外敷用于痈疮脓肿，癣，瘰疬。

附　注：全株有毒，严禁内服。家畜食之易致死，可用于毒鼠。

## 竹根七属　Disporopsis Hance

**散斑竹根七**　黄鳝七、竹根七(湖北)，玉竹(广西)，大玉竹(四川)，小玉竹(云南)，散斑假万寿竹(中国高等植物图鉴)

**Disporopsis aspera** (Hua) Engl. ex Krause——*Aulisconema aspera* Hua

生于海拔 1 100—2 900 米的林下、灌丛阴湿地或阴蔽山谷及溪边。分布于湖北、湖南、广西、四川，贵州、云南。

根状茎：养阴润肺，化痰止痛。用于肺胃阴伤，燥热咳嗽，风湿疼痛，跌打损伤。

**竹根七**　石边七(江西)，盘龙七、血蜈蚣(湖北)，黄精(广西贵县)，石竹子、假寿竹(四川)，假万寿竹(中国高等植物图鉴)

**Disporopsis fuscopicta** Hance

生于海拔 500—1 200(—2 400 米)的山谷林下阴湿地或山坡岩石阴处。分布于江西、福建、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根状茎及全草：养阴生津，补脾润肺，止血消肿。用于脾胃虚弱，肺虚燥咳，跌打损伤，刀伤出血。

附　注：本种在广西钟山县混称玉竹；在广西个别地区亦误作黄精用，应注意鉴别。

**长叶竹根七**　黄精(广西)，三子果(云南)，长叶假万寿竹(中国高等植物图鉴)

**Disporopsis longifolia** Craib

生于海拔 120—2 200 米的林下、灌丛、草地岩石上或溪旁。分布于广西、贵州、云南。

根：解毒消肿。

附　注：广西龙州.宁明、天等、大新等地误作黄精用。广西以根状茎入药，用于脾胃虚弱，肺虚燥咳。

**深裂竹根七**　竹根七(江西、湖北)，黄脚鸡、玉竹(贵州草药)，竹根假万寿竹(中国高等植物图鉴)，剑叶假万寿竹(中药大辞典)

**Disporopsis pernyi** (Hua) Diels——*Aulisconema pernyi* Hua

生于海拔 500—2 700 米的林下、灌丛、石山、溪旁或山坡阴湿处。分布于浙江南部、江西、台湾、湖北、湖南、广东北部、广西、四川南部、贵州西南部、云南东南部。

根状茎(黄脚鸡)：甘，平。养阴润肺，生津止咳。用于虚咳多汗，产后虚弱。

## 万寿竹属　Disporum Salisb.

**长蕊万寿竹**　万寿竹、竹凌霄(江西)，牛尾参、玉竹参(湖北)

**Disporum bodinieri** (Lévl. et Vant.) Wang et Tang——*Tovaria bodinieri* Lévl. et Vant.

生于海拔 400—800 米的灌丛、草丛、山沟、竹林中或林下岩石上。分布于西南及陕西南部、甘肃南部、湖北。

根(竹凌霄)：甘、淡，平。清肺化痰，止咳，健脾消食，舒筋活血。用于肺痨咳嗽，食欲不振，胸腹胀满，筋骨疼痛，腰腿痛；外用于烧、烫伤，骨折。

附　注：四川个别地区以其根部误作"白薇"入药。

**短蕊万寿竹**

**Disporum brachystemon** Wang et Tang

生于海拔 2 800—3 000 米的山坡林下及灌丛中。分布于广西、四川西南部、贵州南部、云南西北部。

根：用于产后虚弱。　叶、花：用于泄泻。

**距花万寿竹**　距花宝铎草、狗尾巴草(云南种子植物名录)，狗尾巴参(云南思茅中草药选)，倒竹散、宝铎草(中药大辞典)

**Disporum calcaratum** D. Don

生于海拔 900—2 400 米的林下、山沟阴湿处或山坡、荒地、草丛中。分布于四川、贵州、云南南部。

根状茎(狗尾巴参)：甘，平。养阴润肺，生津益气。用于肺热咳嗽，骨蒸劳热，腰膝酸软，盗汗，淋浊，白带。

**万寿竹**　石竹根、竹根七(贵州)，竹叶参、白毛七、白龙须(陕西中草药)，黑龙须、迎风不动草(云南中药资源名录)

**Disporum cantoniense** (Lour.) Merr.——*Fritillaria cantoniense* Lour.

生于海拔 120—3 000 米的山坡草地或林下、灌丛中。分布于中南、西南及陕西、安徽、福建、台湾。

根及根状茎(竹叶参)：苦、辛，凉。清热解毒，祛风湿，舒筋活血。用于高热不退，虚劳骨蒸潮热，风湿麻痹，关节腰腿疼痛，痛经，月经过多，疮疖，跌打损伤，骨折。

附　注：本种在贵州作"百尾笋"，润肺止咳，健脾消积。用于虚损咳喘，痰中带血，肠风下血，食积胀满。

**大花万寿竹**　山竹花、白龙须(湖北)

**Disporum megalanthum** Wang et Tang

生于山坡林下阴湿地。分布于陕西南部、甘肃南部、湖北、四川。

根：用于劳伤，气血虚损。

**宝铎草**　小仲筋草(陕西)，狗尾巴(湖北)，遍地姜(广西龙胜)，竹林胃(四川中药志)，百尾笋、黄牛尾巴(贵州民间方药集)

**Disporum sessile** D. Don

生于海拔 600—2 500 米的林下、灌丛、草丛、阴湿山坡刺丛中。分布于华东、中南及辽宁、吉林、河北、陕西、广西、四川、贵州、云南。

根(竹林胃、百尾笋)：甘、淡，平。清肺化痰，止咳，健脾消食，舒筋活血。用于肺痨咳嗽，咯血，食欲不振，胸腹胀满，肠风下血，筋骨疼痛，腰腿痛；外用于烧、烫伤，骨折。

**宝珠草**　绿宝珠草(吉林、辽宁)

**Disporum viridescens** (Maxim.) Nakai——*Uvularia viridescens* Maxim.

生于海拔 500—600 米的林下或山坡草地。分布于东北。

根：清肺化痰，止咳，祛风湿。　全草：驱虫。

## 鹭鸶草属　Diuranthera Hemsl.

**鹭鸶草**　土洋参(四川)，鹭鸶兰(植物名实图考)，野鞠冬、书带草(滇南本草)，长生草(植物名实图考)

**Diuranthera major** Hemsl.

生于海拔 1 200—1 900 米的山坡或林下草坡中。分布于湖北、四川、贵州、云南。

根(鹭鸶兰)：甘，平。消肿，止血。用于跌打损伤，外伤出血。

附　注：我国特有属。

**小鹭鸶草**　天生草、山韭菜、漏芦、蛇咬药(云南中草药)，小鹭鸶兰(全国中草药汇编)

**Diuranthera minor**(C. H. Wright) Hemsl.——*Paradisea minor* C. H. Wright

生于海拔 1 300—3 200 米的草坡、林下、路旁。分布于湖北、四川、贵州、云南。

根(小鹭鸶兰)：淡，平。清热解毒，健脾利湿。用于风湿，小儿疳积，乳痈，毒蛇咬伤。

## 独尾草属　Eremurus M. Bieb.

**独尾草**　龙须草(四川)

**Eremurus chinensis** O. Fedtsch.

生于海拔 1 000—2 900 米的平坝、山坡或山坡悬岩处。分布于甘肃南部、四川西部、

云南西北部、西藏。

根：辛、甘，温。祛风除湿，补肾强身。

附　注：四川地区以根入药，用于中耳炎。

## 贝母属　Fritillaria L.

**美丽贝母**

**Fritillaria amoena** C. Y. Yan et Z. Y. Wan

生于沙石灌丛中。分布于新疆塔城及塔尔巴哈。

鳞茎(贝母)：清热润肺，止咳化痰，解毒。

附　注：新疆地区作贝母入药。

**安徽贝母**

**Fritillaria anhuiensis** S. C. Chen et S. F. Yin

生于山野林下、草丛中。分布于安徽大别山区、湖北。安徽各地有栽培。

鳞茎(安徽贝母)：养阴润肺，止咳化痰，散结消肿。

附　注：安徽特有药用植物。

**巴尔鲁克贝母**

**Fritillaria boroensis** Q. Z. Zhang et Y. M. Lu

生于海拔 2 000 米左右的沙石灌丛间。分布于新疆裕民及巴尔鲁克山。

鳞茎：清热润肺，止咳化痰，解毒。

附　注：功效相似的有**乌恰贝母 F. ferganensis** A. Los.，分布于新疆乌恰；**哈拉布拉贝母 F. halabulanica** X. Z. Duan et X. J. Zheng，分布于新疆裕民；**和丰贝母 F. heboksarensis** X. Z. Duan et X. J. Zheng，分布于新疆和丰；**阿勒泰贝母 F. meleagris** L.，分布于新疆阿勒泰；**额敏贝母 F. meleagroides** Patrin ex Schult，分布于阿勒泰山；**黄绿花额敏贝母 F. meleagroides** Patrin ex Schult var. **flavovirens** X. Z. Duan et X. J. Zheng，分布于新疆额敏孟布拉克；**重瓣额敏贝母 F. meleagroides** Patrin ex Schult var. **flareplena** X. Z. Duan et X. J. Zheng，分布于新疆额敏莫台；**红花额敏贝母 F. meleagroides** Patrin ex Schult var. **rhodanthus** X. Z. Duan et X. J. Zheng，分布于新疆额敏莫台；**直花贝母 F. olgae** Vueb. 分布于新疆塔城、新源；**沙湾贝母 F. shawanensis** X. Z. Duan et X. J. Zheng，分布于新疆沙湾、天山北坡；**塔城贝母 F. tachangensis** X. Z. Duan et X. J. Zheng，分布于新疆塔城；**白花托里贝母 F. tortifolia** X. Z. Duan et X. J. Zheng var. **albiflora** X. Z. Duan et X. J. Zheng，分布于新疆裕民；**重瓣托里贝母 F. tortifolia** X. Z. Duan et X. J. Zheng var. **floreplena** X. Z. Duan et X. J. Zheng，分布于新疆裕民；**小花托里贝母 F. tortifolia** X. Z. Duan et X. J. Zheng var. **parviflora** X. Z. Duan et X. J.Zheng，分布于新疆裕民白皮仙水库；**托里贝母 F. tortifolia** X. Z. Duan et X. J. Zheng，分布于新疆托里、裕民；**多轮贝母 F. verticillata** Willd.，分布于塔城、阿勒泰；**吉木乃多轮贝母 F. verticillata** Willd. var. **jimunaica** X. Z. Duan et X. J. Zheng，分布于塔城、塔尔巴哈台；**绿茎多轮贝母 F. verticildata** Willd. var. **viridicaulinus** X. Z.

Duan et X.J. Zheng,分布于新疆吉木乃;**乌苏贝母 F. wusunica** X. Z. Duan et X. J. Zheng, 分布于新疆乌苏;**新源贝母 F. xinyuanensis** Y. K. Yang et J. K. Wu, 分布于新疆新源; **裕民贝母 F. yuminensis** X. Z. Duan, 分布于新疆裕民; **白花裕民贝母 F. yuminensis** X. Z. Duan var. **albiflora** X. Z. Duan et X. J. Zheng, 分布于新疆裕民;**粉红花裕民贝母 F. yuminensis** X. Z. Duan var. **roseifolia** X. Z. Duan et X. J. Zheng, 分布于新疆裕民。

**川贝母**　贝母、空草(神农本草经),鸡心贝、夹贝(云南种子植物名录)

**Fritillaria cirrhosa** D. Don——*F. cirrhosa* D. Don f. *glabra* P. Y. Li

生于海拔 1 800—5 000 米的高山草甸、林下、灌丛下、草地、河滩及山谷湿地或岩缝中。主产四川西部、云南西北部、西藏南部至东部，也见于山西南部、陕西、甘肃、青海、宁夏、河南。

鳞茎(川贝母)：苦、甘,微寒。清热润肺,化痰止咳。用于肺热燥咳,干咳少痰，阴虚劳嗽,咯痰带血。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。② **康定贝母 F. cirrhosa** D. Don var. **ecirrhosa** Franch. 分布于四川康定,也是川贝来源之一。

**米贝母**　米百合(四川宝兴)

**Fritillaria davidii** Franch.

生于海拔 1 800—2 300 米的山坡林下、沟边或阴湿石缝中。分布于四川成都、宝兴、天全、彭县。

鳞茎(米贝)：清热润肺,化痰止咳。

**棱砂贝母**　雪山贝(青海),炉贝(四川),阿皮卡(西藏),德氏贝母(中药志)

**Fritillaria delavayi** Franch.

生于海拔 3 800—5 400 米的高山砾石带或山坡砂石地上。分布于青海南部、四川西部、云南西北部、西藏。

鳞茎(川贝母)：苦、甘,微寒。清热润肺,化痰止咳。用于肺热燥咳，干咳少痰,阴虚劳嗽,咯痰带血。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。鳞茎为药材"炉贝"的来源。

**高山贝母**

**Fritillaria fusca** Turrill

生于海拔 5 000—5 400 米的高山砾石带。分布于西藏隆子、错那、浪卡子、措美、南木林、康马。

鳞茎：润肺,止咳,化痰。

附　注：西藏地区作贝母用。

**湖北贝母**　贝母、宽贝(湖北),奉节贝母(四川),窍贝、极贝(中国植物志)

**Fritillaria hupenensis** Hsiao et K. C. Hsia

生于山坡、丘陵、水沟旁及灌木丛中。分布于安徽、河南、湖北、湖南、四川。

鳞茎：润肺,化痰止咳,散结。

附　注：湖北作贝母入药。

**轮叶贝母**　一轮贝母(全国中草药汇编),北贝(中药大辞典)

**Fritillaria maximowiczii** Freyn

生于海拔 1 400—1 500 米的山坡、林下、草原、灌丛中。分布于东北、华北及新疆、云南。

鳞茎：甘、苦，寒。润肺散结，止咳化痰。

附　注：河北承德、内蒙古昭盟及新疆民间以鳞茎作贝母入药。

**天目贝母**

**Fritillaria monantha** Migo

生于海拔 700—1 200 米的山坡林下、灌丛中。分布于安徽大别山区、浙江北部西天目山及临安、河南东南部商城。

鳞茎(天目贝母)：苦，寒。养阴润肺，止咳化痰，散结消肿。

附　注：功效相同的有**铜陵黄花贝母 F. monantha** Migo var. **tonglingensis** S. C. Chen et S. F. Yin，分布于安徽铜陵。

**峨眉贝母**

**Fritillria omeiensis** S. C. Chen

生于海拔 3 000 米左右的高山灌丛或石岩上或竹林下。分布于四川峨眉山及乐山。

鳞茎：清热润肺，化痰止咳。

附　注：四川特有药用植物。

**伊犁贝母**　生贝(通称)，伊贝母(中药志)，西贝母(中药大辞典)

**Fritillaria pallidiflora** Schrenk

生于海拔 1 300—2 500 米的山地、草甸、林下及阳坡草地，也有栽培。分布于新疆伊犁、塔城、阿勒泰山。河北、北京、陕西、甘肃、山东、湖北，有少量引种栽培。

鳞茎(伊贝母)：苦、甘，微寒。清肺，化痰，散结。用于肺热咳嗽，胸闷痰粘，瘰疬，痈肿。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②国家三级保护植物。③功效相同的有**新疆贝母 F. walujewii** Regel，分布于新疆天山、阿勒泰、阿克苏；**重瓣伊犁贝母 F. pallidiflora** Schrenk var. **floreplena** X. Z. Duan et X. J. Zheng，分布于新疆博乐；**砂贝母 F. karelinii** (Fisch.) Baker，分布于新疆西北部塔城、托里、伊犁、察布查尔。

**甘肃贝母**　岷贝(甘肃)，西北贝母(中国植物志)

**Fritillaria przewalskii** Maxim. ex Baker

生于海拔 2 800—4 500 米的高山灌丛中或阴湿地上。分布于甘肃南部、青海东部和南部、四川西部、西藏。

鳞茎(川贝母)：苦、甘，微寒。清热润肺，化痰止咳。用于肺热燥咳，干咳少痰，阴虚劳嗽，咯痰带血。

附　注：①本种为"川贝母"主要来源之一，《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②功效相同的有**陇南贝母 F. gansuensis** S. C. Chen，分布于甘肃舟曲县大尖山；**舟曲贝母 F. taipaiensis** P. Y. Li var. **zhouquensis** S. C. Chen et G. D. Yu，分布于甘肃舟曲；**榆中贝母 F. yuzhongensis** G. D. Yu et Y. S. Zhou，分布于榆中。

**太白贝母**　太贝(陕西)，尖贝、野贝母(湖北)

**Fritillaria taipaiensis** P. Y. Li

生于海拔 2 000—3 150 米的山坡草丛中或水边。分布于陕西南部、甘肃东南部、湖北西北部、四川东北部。

鳞茎(太贝)：苦、甘，微寒。作川贝入药。

**宁夏贝母**　贝母、灯笼草(宁夏)

**Fritillaria taipaiensis** P. Y. Li var. **ningxiaensis** Y. K. Yang

生于林缘、草甸。分布于宁夏六盘山。

鳞茎：祛痰止咳。用于肺热燥咳，干咳少痰，阴虚劳嗽，咯痰带血。

附　注：宁夏特有药用植物资源，自产自销。

**浙贝母**　大贝(陕西)，浙贝、象贝母(百草镜)，大贝母(本草正义)，象贝(经验广集)，土贝母(本草正义)

**Fritillaria thunbergii** Miq.——*F. verticillata* Willd. var. *thunbergii* (Miq.) Baker

生于山坡草丛、林下较阴处或栽培。分布于山东、江苏、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖北、湖南。

鳞茎(浙贝母)：苦，寒。清热化痰，开郁散结。用于风热燥咳，痰火咳嗽，肺痈，乳痈，瘰疬，疮毒，心胸郁闷。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**东贝母**

**Fritillaria thunbergii** Miq. var. **chekiangensis** Hsiao et K. C. Hsia

栽培于疏松、肥沃的砂质土壤上。分布于浙江东阳及磐安。

鳞茎(浙贝母)：苦，微寒。清肺化痰，散结消肿。

附　注：鳞茎为药材东贝的来源。在浙江作浙贝用；远销广东代川贝用。

**暗紫贝母**　松贝、冲松贝(中国植物志)，乌花贝母(中药志)

**Fritillaria unibracteata** Hsiao et K. C. Hsia

生于海拔 3 200—4 500 米的高山草甸、灌丛、林缘或草地上。分布于甘肃南部、青海东南部、四川西北部。

鳞茎(川贝母)：苦、甘，微寒。清热润肺，化痰止咳。用于肺热燥咳，干咳少痰，阴虚劳嗽，咯痰带血。

附　注：本种是川贝的主要来源，《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**平贝母**　平贝(中药大辞典)

**Fritillaria ussuriensis** Maxim.

生于山沟溪流两岸的林下、灌丛、草甸或栽培。野生于长白山，主产东北。河北安国和怀安、北京昌平、山东、福建、河南、四川、云南也有栽培。

鳞茎(平贝)：微苦，微寒。功效与川贝母类同。

附　注：① 国家三级保护植物。② 本种栽培历史悠久，是药材平贝的唯一来源。

## 顶冰花属　Gagea Salisb.

**林生顶冰花**　　线叶顶冰花(新疆)

**Gagea filiformis** (Ledeb.) Kunth——*Omithogalum filiforme* Ledeb.

生于高山山谷，湿润草地林下、灌丛中。分布于新疆北部和西部天山、奇台、乌鲁木齐、伊犁、塔城、阿尔泰。

鳞茎：清热散结，止咳止血。

**小顶冰花**

**Gagea hiensis** Pasch.

生于海拔 2 300 米以下的山坡、林下、林缘或河岸湿草地。分布于东北、华北及陕西、甘肃、青海。

鳞茎：强心利尿。用于心脏病。

**顶冰花**

**Gagea lutea** (L.) Ker-Gawl.——*Omithogalum luteum* L.

生于山坡、林下、灌丛或河岸湿草地。分布于东北。

鳞茎：强心利尿，用于心脏病。

## 嘉兰属　Gloriosa L.

**嘉兰**　　舒筋散、何发来(勐海傣语)

**Gloriosa superba** L.

生于海拔 600—1 250 米的林下灌丛中或栽培。分布于云南滇中及西双版纳。

根状茎：用于半身瘫痪，周身关节痛，高热抽搐，周身肿胀。

附　注：根状茎剧毒，含秋水仙碱等十七种生物碱，为提取秋水碱的原料。

## 萱草属　Hemerocallis L.

**金针菜**　　宜男花(云南)

**Hemerocallis aurantiaca** Baker

栽培或逸生于山坡、路旁及林下。分布于云南。大部分地区栽培。

花：甘，凉。利湿热，宽胸膈。用于小便赤涩，黄疸，胸膈烦闷，夜少安寝，痔疮便血。

**黄花菜**　　金针菜(通称)，金钟菜(安徽)，黄花萱草(浙江)，柠檬萱草(全国中草药汇编)，黄金萱(中药大辞典)，萱草(中药志)，萱草根(本草拾遗)

**Hemerocallis citrina** Baroni

生于海拔 2 000 米以下的山坡、山谷、荒地、林缘及草丛中，多为种植。分布于秦岭以南各省区及辽宁、河北、北京、山西、甘肃、宁夏、新疆、山东。主产湖南、江苏、陕西、四川、甘肃。

根及根状茎(萱草)：甘，凉。有小毒。利水，凉血。用于水肿，小便不利，淋浊，带下

病，黄疸，衄血，便血，崩漏，乳痈。

附　注：根有抗菌、抗血吸虫的作用，临床上用于肺痨，血吸虫病。但黄花菜根有引起视力障碍或失明的副作用，且鲜花不宜多食，特别是花药，因含多种生物碱，会引起腹泻等中毒现象。

**朝鲜萱草**

**Hemerocallis coreana** Nakai

生于山坡、草地、林下阴湿处。分布于黑龙江、吉林。

根：清热，利尿，凉血，止血。

**西南萱草**

**Hemerocallis forrestii** Diels

生于海拔 2 000—3 100 米的山坡草地。分布于四川西南部、云南西北部。

根：甘，凉。利水消肿，润肺，凉血。

**萱草**　黄花、野金针(江西)，栽秧花、镇心丹(云南)，黄花萱草(东北植物检索表)，漏芦、芦葱(滇南本草)

**Hemerocallis fulva** (L.) L. ——*H. lilio-asphodelus* L. *β. fulva* L.

野生于山沟溪边或林下阴湿地。全国各地广泛栽培。主产秦岭以南各省区，如湖南、浙江、江西、福建。

根及根状茎(大萱草)：甘，凉。有小毒。利水，凉血。用于水肿，小便不利，淋浊，带下病，黄疸，衄血，便血，崩漏，乳痈。

附　注：功效相同的有**北黄花菜 H. lilioasphodelus** L.，分布于长江流域及以南地区；**大花萱草 H. middendroffii** Trautv. et Mey，分布于东北。

**小黄花菜**　小萱草(中药大辞典)，红萱、黄花、金针(中国高等植物图鉴)，蜜萱(植物名实图考)，细叶萱草(云南种子植物名录)

**Hemerocallis minor** Mill.——*H. flava* L. var. *minor* (Mill.) M. Hotta

生于海拔 2 600 米以下的山坡草地、荒地、沼泽地或林下、林缘，亦有栽培。分布于东北、华北及陕西、甘肃、新疆、山东、江苏、安徽、河南、湖北、四川、云南。贵州有栽培。

根及根状茎(萱草、小萱草)：功效同黄花菜。　嫩苗(萱草嫩苗)：甘，凉。利湿热，宽胸，消食。

**矮萱草**

**Hemerocallis nana** Forrest et W. W. Smith

生于海拔 2 100—3 400 米的山坡草地。分布于贵州梵净山、黔南州及云南西北部。

根：清热解毒，补虚益肾。

**折叶萱草**　黄花菜、连珠炮、下奶药(昆明民间常用草药)，野皮菜、鸡脚参、凤尾一枝蒿(云南中草药)

**Hemerocallis plicata** Stapf

生于海拔 1 200—3 000 米的山坡、草丛、沟边或栽培。分布于湖北、四川、贵州、云南。

根：甘，平。有小毒。养血平肝，利尿消肿。用于头晕，耳鸣，心悸，腰痛，止血，衄血，大肠下血，水肿，淋证，咽喉痛，乳痈。

## 肖菝葜属 Heterosmilax Kunth

**肖菝葜** 土茯苓、白革藓(台湾)，土革薛(广东)，白土苓、铁架子土茯苓(四川)，卵叶土茯苓(全国中草药汇编)

**Heterosmilax japonica** Kunth

生于海拔500—1 800米的山坡林中或路边杂木林下。分布于陕西、甘肃、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、四川、云南。

根状茎：甘、淡，平。清热解毒，利湿。用于风湿关节痛，痈疖肿毒，湿疹，皮炎。

附 注：①宁夏使用的土茯苓，多为此种。②功效相同的有**合丝肖菝葜 H. japonica** Kunth **var. gaudichaudiana** (Kunth) Wang et Tang，分布于福建、广东、广西；**短柱肖菝葜 H. yunnanensis** Gagnep.，分布于湖北、广东、广西、四川、贵州、云南。

## 玉簪属 Hosta Tratt.

**东北玉簪** 剑叶玉簪(东北)，卵叶玉簪(吉林、辽宁)

**Hosta ensata** F. Maekawa

生于山地林下、林缘及阴湿地。分布于东北。

根、叶、花：清热解毒，消肿止痛。

**玉簪** 鱼鳔花(四川)，吉祥草、竹节草(云南)，化骨莲(江西草药手册)，白玉簪、小芭蕉(分类草药性)

**Hosta plantaginea** (Lam.) Aschers.——*Hemerocallis plantaginea* Lam.

生于山坡、林下阴湿处。南方各省区有少数野生，其他各地园圃多有栽培。

根状茎、叶：甘、辛，寒。有毒。清热解毒，消肿止痛。 根(玉簪花根)：用于咽肿，吐血，骨鲠。外用于乳痈，中耳炎，疮痈肿毒，烧、烫伤。 叶(玉簪叶)：用于痈肿，疔疮，蛇虫咬伤；外用于下肢溃疡。 花(玉簪花)：甘，凉。清咽，利尿，通经。用于咽喉肿痛，小便不通，疮毒，烧伤。

**粉叶玉簪** 大鱼鳔花、紫玉簪(四川)

**Hosta sieboldiana** Engl.

多栽培于庭园。四川等地野生于灌丛林下阴湿处。

根或花(大鱼鳔花)：清热解毒，理气。 根：外用于疮毒。 花：(与猪蹄同煮佐食)用于头痛。

**紫萼** 红鳔花(四川)，棱子草、耳叶七(江西草药)，紫玉簪(品汇精要)，石玉簪(贵州民间药物)

**Hosta ventricosa** (Salisb.) Stearn——*Bryocles ventricosa* Salisb.

生于山坡、路旁、灌丛、林下阴湿处。各地常见栽培。分布于华东、中南、西南及陕西。

根(玉簪花根)：甘、苦，平。用于咽喉肿痛，牙痛，胃痛，血崩，带下病，痈疽，瘰疬。叶(紫玉簪叶)：用于崩漏，带下病，溃疡。花(紫玉簪)：甘、微苦，温、平。理气，和血，补虚。

用于遗精，吐血，妇女虚弱，带下病。

## 百合属 Lilium L.

**滇百合** 红百合(植物名实图考)

**Lilium bakerianum** Coll. et Hemsl.

生于海拔3 000米以下的向阳山坡、草坡或林缘。分布于四川西部、贵州、云南西北部。

鳞茎：辛、微苦，平。润肺止咳，宁心安神。用于肺痨咳嗽，痰中带血，虚烦惊悸，神志恍惚。

附 注：功效相同的有**黄花红百合 L. bakerianum** Coll. et Hemsl. var. **aureum** Grove et Cotton，分布于四川、云南；**苍山红百合 L. bakerianum** Coll. et Hemsl. var. **delavayi** (Franch.) Wils.，分布于四川、贵州、云南；**紫红花红百合 L. bakerianum** Coll. et Hemsl. var. **rubrum** Grove et Stearn，分布于云南；**无斑红百合：L. bakerianum** Coll. et Hemsl. var. **yunnanease** (Franch.) Sealy ex Woodc. et Stearn，分布于四川、云南。

**野百合** 百合(湖北、广西、贵州)，米百合(湖北)，淡紫百合(四川)

**Lilium brownii** F. E. Br. ex Niellez.

生于山坡、路边、草丛中或林缘、灌丛及岩石边、石缝中。分布于中南及河北、陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、四川、贵州、云南。

鳞茎：微苦，平。养阴润肺，清心安神。用于阴虚久咳，痰中带血，虚烦惊悸，失眠多梦。

**百合** 野百合(江苏、江西)，药百合、家百合(全国中草药汇编)，白花百合（救生苦海）

**Lilium brownii** F. E. Br. **var. viridulum** Baker

生于山坡、草丛、沟边、地边、村旁或疏林下，也有栽培。分布几遍全国，大部分地区有栽培。

鳞茎(百合)：甘，寒。养阴润肺，清心安神。用于阴虚久咳，痰中带血，虚烦惊悸，失眠多梦，精神恍惚。花(百合花)：润肺，清火，安神。用于咳嗽，眩晕，夜寐不安，天疱疮。种子(百合子)：用于肠风下血。

附 注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**渥丹** 有斑百合(吉林)，红百合(日华子本草)，山百合、山豆子花（山东中草药手册)，红花百合(随息居饮食谱)，山丹(食疗本草)，山丹花(本草纲目)

**Lilium concolor** Salisb.

生于山坡草丛、路旁、灌丛下及石缝中，也有栽培。分布于东北、华北及陕西、山东、江西、河南、湖北、湖南、四川、贵州。

鳞茎(山丹)：甘、苦，凉。除烦热，润肺，止咳，安神。用于虚劳咳嗽，吐血，心悸，失眠，浮肿。花(山丹花)：甘，凉。活血。花蕊：用于疔疮恶肿。

附 注：功效相同的有**赛渥丹 L. concolor** Salisb. var. **partheneion** Baker，分布于东北。

**卷丹** 药百合(陕西、湖北、湖南)，卷丹百合(江西)，家百合、水百合(湖北)

**Lilium lancifolium** Thunb.

生于林缘、路旁、山坡、草地或灌丛下。各地均有栽培。分布于东北、西北、中南、西南及河北、山西、山东、江苏、安徽、浙江、江西。

鳞茎(百合)：甘，寒。养阴润肺，清心安神。用于阴虚久咳，痰中带血，虚烦惊悸，失眠多梦，精神恍惚。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**麝香百合**　岩破壳(贵州)，岩百合、红岩百合(中药大辞典)

**Lilium longiflorum** Thunb.

栽培或野生于山林。分布于台湾、广东、贵州。贵阳有栽培。

鳞茎及花：清热解毒，润肺止咳。用于咳嗽，尿血，胎盘不下，无名肿毒。

**山丹**　细叶百合(通称)，卷莲花、灯伞花、散莲花(中药大辞典)

**Lilium pumilum** DC.

生于海拔 400—2 600 米的山坡、草地、林缘或沼泽湿地，也有栽培。分布于东北、华北、西北及山东、河南、四川、贵州。

鳞茎(百合)：甘，寒。养阴润肺，清心安神。用于阴虚久咳，痰中带血，虚烦惊悸，失眠多梦，精神恍惚。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②功效相同的有**条叶百合 L. callosum** Sieb. et Zucc.，分布于东北及江苏、安徽、浙江、台湾、河南、湖南、广东；**松叶百合 L. cernuum** Kom.，分布于东北；**东北百合 L. distichum** Nakai，分布于东北；**毛百合 L. dauricum** Ker-Gawl.，分布于东北、华北及河南；**大花卷丹 L. leichtlinii** Hook. f. var. **maximowiczii** (Regel) Baker，分布于东北、华北及陕西；**川百合 L. davidii** Duch.，分布于西北、西南及湖北；**宜昌百合 L. leucanthum** (Baker) Baker，分布于陕西、甘肃、湖北、四川；**绿花百合 L. fargesii** Franch.，分布于陕西、湖北、四川、云南；**宝兴百合 L. duchartrei** Franch.，分布于西南及甘肃；**乳头百合 L. papilliferum** Franch.，分布于陕西、四川、云南；**小花百合 L. brownii** Regel var. **microflora** An.，分布于新疆阿克苏，喀什栽培；**欧百合 L. martagon** L.，新疆乌鲁木齐栽培；**新疆百合 L. martagon** L. var. **pilosiusculum** Freyn，分布于新疆北部；**湖北百合 L. henryi** Baker，分布于江西、湖北、贵州；**南川百合 L. rosthornii** Diels，分布于湖北、四川、贵州；**青岛百合 L. tsingtauense** Gilg，分布于山东、安徽；**药百合 L. speciosum** Thunb. var. **gloriosoides** Baker，分布于安徽、浙江、江西、湖南、广西；**淡黄花百合 L. sulphureum** Baker，分布于广西、四川、贵州、云南；**小百合 L. nanum** Klotz et Garcke，分布于四川、云南、西藏；**黄花小百合 L. nanum** Klotz et Garcke var. **flavidum** (Rendle) Sealy，分布于云南、西藏；**蒜头百合 L. semper vivoideum** Lévl.　分布于四川、云南；**大理百合 L. taliense** Franch.，分布于四川、贵州、云南；**卓巴百合 L. wardii** Stapf ex Stearn，分布于西藏。

## 山麦冬属　Liriope Lour.

**禾叶山麦冬**　禾叶麦冬(安徽、浙江)，土麦冬(浙江、江西)，大麦冬(贵州)，禾叶土

麦冬(中国高等植物图鉴)

**Liriope graminifolia** (L.) Baker——*Asparagus graminifolius* L.

生于海拔100—2 300米的山坡草丛、山谷林下灌丛中或山沟阴湿处，也有栽培。分布于华东及河北、山西、陕西、甘肃、新疆、河南、湖北、广东、四川、贵州、云南。

块根(土麦冬)：甘、微苦，寒。养阴润肺，清心除烦，益胃生津。用于肺燥干咳，吐血，咯血，肺痿，肺痈，虚劳烦热，消渴，热病津伤，咽干，口燥，便秘。

**甘肃山麦冬**　麦葱子(四川)

**Liriope kansuensis** (Batal.) C. H. Wright——*Ophiopogon kansuensis* Batal.

生于灌丛、溪边。分布于甘肃、四川乐山。

块根：作麦冬药用。

**矮小山麦冬**　小麦冬(甘肃、浙江、贵州)

**Liriope minor** (Maxim.) Makino——*Ophiopogon spicatus* Ker-Gawl. var. *minor* Maxim.

生于阴湿山谷、山坡林下、路旁及溪沟岸边。分布于辽宁、陕西、甘肃、江苏、浙江、广西、贵州。

块根(小麦冬)：甘、微苦，微寒。功效同麦冬。

**阔叶短茎山麦冬**　麦冬(广西)

**Liriope muscari** (Decne.) Bailey var **communis** (Maxim.) P. C. Hsu et L. C. Li——*Ophipogon spicatus* Ker-Gawl. var. *communis* Maxim.

生于林下、灌丛中。分布于广西。

块根：养阴润肺，益胃生津。用于肺燥干咳，津伤口渴，肠燥便秘。

**阔叶山麦冬**　大叶麦冬(湖南、贵州)，麦棕子(四川)，大麦冬(中药志)，阔叶土麦冬(中国高等植物图鉴)

**Liriope platyphylla** Wang et Tang

生于山地林下或潮湿处。分布于华东、中南、西南(除西藏外)及河北。南方各地常有栽培。

块根(大麦冬)：功效同麦冬。

**山麦冬**　麦冬(北京)，门冬、山韭菜(江西)，节菖蒲(贵州)，大叶麦冬(中药大辞典)，土麦冬(中国高等植物图鉴)

**Liriope spicata** (Thunb.) Lour.——*Convallaria spicata* Thunb.

生于山坡、竹林下、溪谷两旁潮湿的草丛或灌丛中。除吉林、黑龙江、内蒙古、青海、新疆、西藏外，全国各地广泛分布和栽培。

块根(土麦冬)：甘、微苦，凉。养阴润肺，清心除烦，益胃生津。用于肺燥干咳，吐血，咯血，肺痿，肺痈，虚劳烦热，消渴，热病津伤，咽干口燥，便秘。

附　注：功效相同的有**湖北麦冬 L. spicata** (Thunb.) Lour. var. **prolifera** Y. T. Ma，河南南阳、湖北谷城等地广泛栽培。

## 洼瓣花属 Lloydia Salisb.

**西藏洼瓣花** 高山罗蒂、狗牙贝、尖贝(全国中草药汇编)

**Lloydia thibetica** Baker ex Oliv.——*Huolirion montana* (Dammer) Wang et Tang ex P. C. Kuo; *L. montana* (Dammer) P. C. Kuo

生于海拔 2 300—4 100 米的高山山坡林缘或草地上。分布于西南及山西、陕西、甘肃、青海、湖北。

鳞茎(狗牙贝): 甘、微苦,平。祛痰止咳,消肿止血。用于咳嗽,哮喘; 外用于痈肿疮毒,外伤出血。

## 午鹤草属 Maianthemum Weber.

**二叶午鹤草** 午鹤草(中国植物志)

**Maianthemum bifolium** (L.) F. W. Schmidt——*Convallaria bifolia* L.

生于高山阴坡林下。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、青海、湖北、四川。

全草: 酸、涩,微寒。凉血,止血。用于外伤出血,并可试用于吐血,尿血,月经过多。

## 假百合属 Notholirion Wall. ex Boiss.

**假百合** 太白米(陕西中草药)

**Notholirion bulbuliferum** (Lingelsh.) Stearn——*Paradisea bulbulifera* Lingelsh.

生于高山草丛或灌丛阴湿处。分布于陕西、甘肃、青海、四川、云南、西藏。

鳞茎(太白米): 辛、甘、微苦,温。宽胸利气,止痛调经,健胃,止吐,镇痛,止咳。

## 沿阶草属 Ophiopogon Ker-Gawl.

**连药沿阶草** 野麦冬(四川)

**Ophiopogon bockianus** Diels

生于海拔 900—1 300 米的灌丛、沟边。分布于四川乐山、云南。

块根: 清热润肺,养阴生津。

附 注: **短药沿阶草 O. bockianus** Diels var. **angustifoliatus** Wang et Tang, 分布于湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。块根功效相同,全草用于腰椎肥大。

**沿阶草** 韭叶麦冬(湖北),野麦冬(广西、四川)

**Ophiopogon bodinieri** Lévl.

生于山坡、林下、沟边、灌丛中或山谷潮湿处。分布于西南、西北及河北、山西、台湾、河南、湖北。

块根: 养阴,生津,润肺,止咳。

附　注：作麦冬用。

**长茎沿阶草**　　韭叶柴胡、山韭菜(广西)，野麦冬、铁丝草(四川)

**Ophiopogon chingii** Wang et Tang

生于海拔1 000—2 150米的山坡灌丛中或林下、沟边、岩石缝中。分布于广东西南部、海南、广西、四川东南部、贵州、云南南部。

块根：清热润肺，养阴生津。　全草：外用于脓疮。

**厚叶沿阶草**

**Ophiopogon corifolium** Wang et Dai

生于疏林草丛、路旁。分布于贵州兴仁、望谟、镇宁。

块根：润肺止咳，清心除烦。

**褐鞘沿阶草**　　少年青(广西)，大叶沿阶草(云南思茅中草药选)，八宝镇心丹(中药大辞典)

**Ophiopogon dracaenoides** (Baker) Hook. f.——*Flueggea dracaenoides* Baker

生于海拔1 000—1 400米的林下潮湿处。分布于广西、贵州、云南。

小块根(八宝镇心丹)：甘，平。定心安神，止咳化痰。用于心悸，心慌，风湿性心脏病，肺痨，咳嗽痰喘。　全草：用于感冒发烧，风湿痹痛；外用于跌打损伤。

**异药沿阶草**　　舒筋草(湖北)

**Ophiopogon heterandrus** Wang et Dai

生于海拔1 200—1 500米的林下或山坡草丛中。分布于湖北、四川、贵州。

块根：舒筋活络，止痛，消肿。

**间型沿阶草**　　野麦冬(四川)，紫花沿阶草(云南种子植物名录)，长茅沿阶草(海南植物志)，蜈蚣七(中药大辞典)

**Ophiopogon intermedius** D. Don

生于海拔1 000—3 000米的山谷、林下阴湿处或灌丛、水沟边。分布于中南、西南及陕西南部、安徽、台湾。

块根：清热润肺，养阴生津。用于肺燥干咳，吐血，咯血，咽干口燥。

附　注：本种在西藏地区作麦冬用。

**麦冬**　　小叶麦冬、韭叶麦冬(江西)，地麦冬、寸冬(湖北)，麦门冬(神农本草经)，沿阶草(江西通志)

**Ophiopogon japonicus** (L. f.) Ker-Gawl.——Convallaria japonica L. f.

生于海拔4 000米以下的山坡阴湿处或林下、溪旁、草丛中，也有栽培。除东北外，全国大部分省区均有野生。浙江、广西、四川有栽培。

块根(麦冬)：甘、微苦，微寒。养阴润肺，清心除烦，益胃生津。用于肺燥干咳，吐血，咯血，肺痿，肺痈，虚劳烦热，消渴，热病津伤，咽干口燥，便秘。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**西南沿阶草**　　麦冬(湖北)，野麦冬(四川)

**Ophiopogon mairei** Lévl.

生于海拔800—1 800米的林下阴湿处。分布于湖北、四川、贵州、云南。

块根：清热润肺，养阴生津，清心除烦。

附　注：功效相同的有**粉叶沿阶草 O. chingii** Wang et Tang var. **glaucifolius** Wang et Dai，分布于广东、广西；**大叶沿阶草 O. latifolius** Radrig.，分布于云南南部；**狭叶沿阶草 O. stenochyllus** (Merr.) Rodrig.，分布于江西、广东、广西、四川、贵州、云南；**林生沿阶草 O. sylvicola** Wang et Tang，分布于四川成都、峨眉山、江安、巴县、南川；**阴生沿阶草 O. umbraticola** Hance，分布于江西、湖北。

**多花沿阶草**　　大叶麦冬、竹叶茶、糯米草、假麦冬(全国中草药汇编)

**Ophiopogon tonkinensis** Rodrig.

生于海拔 1 000—1 500 米的山坡密林下。分布于广西宁明、南丹、那坡及云南东南部。

块根：甘、微苦，微寒。润肺生津，止咳化痰。用于顿咳，淋证，肺痨咳嗽，咯血，咳嗽痰喘。　全草：用于关节痛。

## 重楼属　Paris L.

**巴山重楼**　　露水珠、独龙钻山(湖北)

**Paris bashanensis** Wang et Tang

生于林下阴处或山坡林缘。分布于湖北神农架、兴山、郧县，四川城口、万县、长汶、宝兴。

根状茎：用于头痛，蛇咬伤。

**凌云重楼**

**Paris crcnquistii** (Tarht.) H. Li

生于林下潮湿处。分布于广西凌云及保德。

根状茎：清热解毒，消肿止痛。用于咽喉肿痛，痈疖肿毒，毒蛇咬伤，跌打损伤，惊风抽搐。

**球药隔重楼**

**Paris fargesii** Franch.

生于海拔 550—2 100 米的林下或阴湿处。分布于江西、湖北、广东、四川、贵州。

根状茎：清热解毒，消肿止痛，平喘止咳。

附　注：功效相似的有**具柄重楼 P. fargesii** Franch. var. **petiolata** (Baker ex C. H. Wright) Wang et Tang，分布于江西、广西、四川、贵州；**文县重楼 P. wenxianensis** Z. X. Peng et R. N. Zhao，分布于甘肃东南部。

**七叶一枝花**　　灯台七(湖南)，九道箍(四川、贵州)，独角莲(滇南本草)，独叶一枝花(浙江民间常用草药)，蚤休(植物名实图考)，重楼(唐本草)

**Paris polyphylls** Smith

生于海拔 1 800—3 200 米的山坡林下阴湿处或溪边。分布于中南、西南及陕西、甘肃、宁夏、青海、安徽、福建。

根状茎(重楼)：苦，微寒。有小毒。清热解毒，消肿止痛，凉肝定惊。用于咽喉肿痛，小儿惊风，毒蛇咬伤，疔疮肿毒；外用于疖肿，痔腿。

附　注：本种变异很大，种下等级较多，生境多相似，分布较广，功效相同的有**缺瓣重**

楼 P. **polyphylls** Smith var. **apetala**(Hand.-Mazz.), H. Li 分布于四川、贵州、云南；**短梗重楼 P. polyphylls** Smith var. **appendiculata** Hara，分布于西南及江西、湖北、湖南；**短瓣七叶一枝花 P. polyphylla** Smith var. **brevipetala** Y. K. Yang，分布于福建；**宽叶重楼 P. polyphylla** Smith var. **latifolia** Wang et Chang，分布于山西、陕西、甘肃、宁夏、安徽、福建、河南、湖北、广东、四川、云南、西藏；**狭叶重楼 P. polyphylla** Smith var. **stenophylla** Franch.，分布于华东、中南、西南及山西、陕西、甘肃；**长药隔重楼 P. polyphylla** Smith var. **thibetica** (Franch.) Hara，分布于湖北、四川、贵州、云南；**喜山重楼 P. polyphylla** Smith var. **wallichii** Hara，分布于云南。

**华重楼**　七叶一枝花(通称)，铁灯台(陕西、江西、湖南、广东、广西)，金钱重楼(江西、福建、四川、贵州、云南)，蛇药子(福建)，独脚莲(广东、广西)

**Paris polyphylla** Smith. var. **chinensis** (Franch.) Hara——*P. chinensis* Franch.

生于山坡林下及灌丛、草丛、沟边阴湿处。分布于华东、中南、西南及山西、陕西、甘肃。

根状茎(重楼)：苦，微寒。有小毒。清热解毒，消肿止痛，凉肝定惊。用于咽喉肿痛，小儿惊风，毒蛇咬伤，疔疮肿毒；外用于疖肿，痄腮。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**宽瓣重楼**　七叶一枝花、草河车(通称)，滇重楼(广西)，云南重楼(全国中草药汇编)，阔瓣蚤休(中药大辞典)

**Paris polyphylla** Smith var. **yunnanensis** (Franch.) Hand.-Mazz.——*P. yunnanensis* Franch.

生于海拔 700—3 600 米的灌丛下或路旁、草丛阴湿处。分布于福建、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

根状茎：性味功效同七叶一枝花。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**毛重楼**　毛脉蚤休(中药大辞典)

**Paris pubescens** (Hand.-Mazz.) Wang et Tang——*P. polyphylla* Smith var. *Pubescens* Hand.-Mazz.

生于海拔 900—3 300 米的高山灌丛、草丛或山坡林下。分布于四川西南部、贵州、云南西北部。

根状茎：功效同七叶一枝花。

**北重楼**　七叶一枝花(北京、天津)，露水一颗珠(湖北)，轮叶王孙(中药大辞典)，上天梯、王孙(全国中草药汇编)

**Paris verticillata** M.Bieb.

生于山坡林下、林缘、草丛阴湿地或沟边。分布东北、华北、西北及安徽、浙江、湖北、四川、贵州。

根状茎(上天梯)：苦，寒。有小毒。清热解毒，散瘀消肿。用于高热抽搐，咽喉肿痛，痈疖肿毒，毒蛇咬伤。

附　注：浙江民间用根状茎祛风湿，健脾胃，益气血，消肿，止痛。湖北民间全草用于

心脏病。

**花叶重楼**

**Paris violacea** Lévl.

生于海拔 2 800—3 200 米的高山及山坡林下。分布于西南。

根状茎：清热解毒，消肿止痛。

## 球子草属　Peliosanthes Andr.

**大盖球子草**　蓼叶伸筋、扁担七(湖北)，大叶球子草(海南植物志)，蜘蛛草、人地蜈蚣(全国中草药汇编)

**Peliosanthes macrostegia** Hance

生于海拔 350—1 700 米的山谷林下、竹林下或灌丛、草丛潮湿处。分布于台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根及根状茎(蜘蛛草)：甘、淡、平，微温。祛痰止咳，舒肝止痛。用于咳嗽痰稠，胸痛，胁痛，跌打损伤，小儿疳积。　全草：止血开胃，健脾补气。

**长苞球子草**　毛标七(广西凤山)

**Peliosanthes ophiopogonoides** Wang et Tang

生于海拔 1 300—1 400 米的林下石缝中。分布于广西、云南。

根：用于月经不调。

**倒钩球子草**　老鼠竹(广西)

**Peliosanthes sinica** Wang et Tang

生于海拔 850—1 400 米的林下石缝中或林下。分布于广西、云南南部。

全草：疏风，清热。用于风湿痹痛。

**小球子草**　山百足、过界蜈蚣、过岭蜈蚣、上山蜈蚣(全国中草药汇编)

**Peliosanthes teta** Andr.——*P. mino* Yamamoto

生于林下。分布于海南、广西。

根及根状茎(山百足)：甘、淡、平，微温。祛痰止咳，舒肝止痛。用于痰稠，胸痛，胁痛，跌打损伤，小儿疳积。

## 黄精属　Polygonatum Mill.

**囊丝黄精**　姜形黄精(通称)，南黄精(江西、广东、广西)，白芨黄精(浙江)，多花黄精、长叶黄精(中药志)，黄精(植物名实图考)

**Polygonatum cyrtonema** Hua——*P. multiflorum* All. var. *longifolium* Merr.

生于海拔 500—2 100 米的山坡林下、灌丛、草丛中或沟谷两旁阴湿地，也有栽培。分布于华东、中南及四川，贵州。

根状茎(黄精)：甘，平。补气养阴，健脾，润肺，益肾。用于脾虚胃弱，体倦乏力，口干食少，肺虚燥咳，精血不足，内热消渴。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②功效相同的有**阿里黄精** P.

**arisanense** Hayata，分布于台湾； **鄂西黄精 P. cirrhifolium**（Wall.）Royle，分布于西北及湖北、四川、云南、西藏。湖北有的地区作黄精入药；**长梗黄精 P. filipes** Merr.，长江以南省区将本种混入黄精用；**距药黄精 P. franchetii** Hua，分布于陕西、湖北、湖南、四川；**庐山黄精 P. lasianthum** Maxim.，分布于江西；**变态广叶黄精 P. lasianthum** Maxim. var. **commutatum**（A. Dietr.）Baker，分布于江西；**湖北黄精 P. zanlanscianense** Pamp.，分布于西北、中南及江苏、四川、贵州。

**滇黄精** 德保黄精(广西)，节节高(贵州、云南)，仙人饭(云南)，西南黄精(全国中草药汇编)

**Polygonatum kingianum** Coll. et Hemsl.

生于林下、灌丛或阴湿草坡。分布于广西、四川、贵州、云南。

根状茎(黄精)：甘，平。补气养阴，健脾，润肺，益肾。用于脾胃虚弱，体倦乏力，口干食少，肺虚燥咳，精血不足，内热消渴。

附 注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。② 功效相同的有**互卷黄精 Polygonatum altenicirrhosum** Hand.-Mazz.，分布于四川、贵州；**棒丝黄精 P. cathcartii** Baker，分布于四川、贵州、云南、西藏；**重叶黄精 P. curvistylum** Hua，分布于四川、云南；**节根黄精 P. nodosum** Hua，分布于甘肃、湖北、四川、贵州、云南；**格脉黄精 P. tessellatum** Wang et Tang，分布于云南。根状茎健脾胃，润肺生津，并能舒筋络，祛风湿，补虚；**小黄精 P. uncinatum** Diels，分布于云南。

**玉竹** 铃铛菜、笔管菜(东北)，玉参、玉竹参(湖北)，尾参(湖北、湖南、广西)，萎蕤(神农本草经)

**Polygonatum odoratum**（Mill.）Druce——*Convallaria odorata* Mill.；*P. officinale* All.

生于山野、林下、灌丛阴湿处或石隙间。除云南、西藏外，全国均有分布，并有栽培。

根状茎(玉竹)：甘，微寒。养阴润燥，生津止渴。用于肺胃阴伤，燥热咳嗽，咽干口渴，内热消渴。

附 注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。② 功效相同的有**毛筒玉竹 P. inflatum** Kom.，分布于东北；**小玉竹 P. humile** Fisch. ex Maxim.，分布于东北及河北、北京、山西、贵州；**热河黄精 P. macropodium** Turcz.，分布于东北、华北；**新疆黄精 P. roseum**（Ledeb.）Kunth，分布于新疆；**康定玉竹 P. pratii** Baker，分布于四川、云南。

**点花黄精** 黄精(广西)，树刁(四川中药志)，滇钩吻(植物名实图考)，斑茎黄精(海南植物志)

**Polygonatum punctatum** Royle ex Kunth

生于海拔1 100—2 700米的山谷阴处及岩石缝中或附生树上。分布于西南及福建、海南、广西、西藏。

根状茎(树刁)：辛，平。清热解毒。外用于肿毒，疔疮。

**黄精** 鸡头黄精(通称)，黄鸡菜、笔管菜(东北)，鸡头参(陕西、宁夏、青海)，西伯利亚黄精(甘肃、青海)，穆胡子-察干(蒙语)

**Polygonatum sibiricum** Delar. ex Redouté

生于山地林下、草地、灌丛、山坡阴处或固定沙地低湿处。分布于东北、华北、西北、华东及河南、湖北、四川、贵州。

根状茎(黄精)：甘，平。补气养阴，健脾，润肺，益肾。用于脾胃虚弱，体倦乏力，口干食少，肺虚燥咳，精血不足，内热消渴。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②功效相同的有**五叶黄精 P. acuminatifolium** Kom.，分布于吉林、河北。

**轮叶黄精**　羊角参、臭儿参(陕西、甘肃)，地吊(四川、云南种子植物名录)，玉竹参(云南、中药志)

**Poygonatum verticillatum** (L.) All.——*Convallaria verticillata* L.

生于海拔 1 700—4 000 米的阴湿山坡草地、林下灌丛中。分布于西北、西南及山西。

根状茎(羊角参)：甘、微苦，凉。平肝熄风，养阴明目，清热凉血。用于头痛目疾，咽喉痛，高血压症，癫痫，疖痈。

附　注：①本种根状茎在陕西、甘肃、青海作黄精用。②功效相同的有**细根茎黄精 P. gracile** P. Y. Li，分布于山西、陕西、甘肃；**二苞黄精 P. involucratum** (Franch. et Sav.) Maxim.，分布于东北、华北及陕西、山东、河南、四川、贵州；**大苞黄精 P. megaphyllum** P. Y. Li，分布于河北、山西、陕西、甘肃、四川；**狭叶黄精 P. stenophyllum** Maxim.，分布于东北。

## 吉祥草属　Reineckia Kunth

**吉祥草**　米腊参(陕西)，观音草(四川)，九节莲(四川中药志)，竹根七(湖南药物志)，松寿兰(植物名实图考)

**Reineckia carnea** (Andr.) Kunth——*Sanseviera carnea* Andr.

生于海拔 170—3 200 米的阴湿山坡、草地、灌丛、林下，尤以低山区为多，亦有栽培。分布于华东、中南、西南及陕西、甘肃。

带根全草(吉祥草)：甘，平。清肺，止咳，凉血，解毒。用于肺热咳嗽，吐血，衄血，便血，疮毒，目赤，疳积；外用于跌打损伤，骨折。

附　注：功效相同的有**卵果吉祥草 Reineckia ovata** Z. Y. Zhu et Z. R. Chen，分布于四川。

## 万年青属　Rohdea Roth

**万年青**　冬不凋草(湖北)，开口剑、斩蛇剑(植物名实图考)，白河车(江苏植物志)

**Rehdea japonica** (Thunb.) Roth——*Orontium japonicum* Thunb.

生于海拔 750—1 790 米的林下潮湿处或草地上，各地多有栽培。分布于西北、华东、中南、西南。

根及根状茎(万年青根)：甘、苦，寒。有小毒。强心利尿，清热解毒，止血。用于心力

衰竭，咽喉肿痛，白喉，水肿，臌胀，咯血，吐血，疔疮，丹毒，蛇咬伤，烫伤。 叶(万年青叶)：苦、涩，微寒。功效同根。 花(万年青花)：用于肾虚腰痛，跌打损伤。

## 绵枣儿属 Scilla L.

**绵枣儿** 山大蒜(江苏、江苏植物志)，鲜薤白(江苏淮阴)，野扁韭(湖北)，散血草(广西全州)，催生草、药狗蒜(东北药用植物志)

**Scilla scilloides** (Lindl.) Druce——*Barnardia scilloides* Lindl.

生于海拔2 900米以下的山坡、草地、路旁或林缘。除内蒙古、青海、新疆、西藏外，全国大部分地区有分布。

鳞茎或全草(绵枣儿)：甘、苦，寒。有小毒。活血解毒，消肿止痛。用于跌打损伤，腰腿疼痛，筋骨痛，牙痛，心脏病引起的水肿；外用于痈疽，乳痈，毒蛇咬伤。

附 注：江苏曾以鳞茎代薤白收购。

## 鹿药属 Smilacina Desf.

**鹿药** 山糜子(辽宁)，偏头七，狮子七(陕西、湖北)，铁梳子(湖北)，盘龙七(贵州民间药物)

**Smilacina japonica** A. Gray

生于海拔900—3 000米的林下、山坡阴湿处或林缘、石岩缝湿处。分布于东北、华北、华东、中南、西南及陕西、甘肃。

根及根状茎(鹿药)：甘、苦，温。补气益肾，祛风除湿，活血调经。用于劳伤，阳痿，偏正头痛，风湿疼痛，月经不调；外用于乳痈，痈疖肿毒，跌打损伤。

附 注：功效相同的有**管花鹿药 S. henryi** (Baker) Wang et Tang，分布于西北、中南、西南及山西、山东；**高大鹿药 S. atropurpurea** (Franch.) Wang et Tang，分布于四川、云南；**兴安鹿药 S. dahurica** Turcz.，分布于黑龙江、吉林、内蒙古、四川；**金佛山鹿药 S. ginfoshanica** Wang et Tang，别名：乌金草(湖北)，分布于湖北、四川、贵州；**丽江鹿药 S. lichiangensis** (W. W. Smith.) W. W. Smith，分布于甘肃、四川、贵川、云南；**长柱鹿药 S. oleracea** (Baker) Hook. f. et Thoms.，分布于贵州、云南、西藏；**紫花鹿药 S. purpurea** Wall.，分布于四川、云南、西藏；**合瓣鹿药 S. tubifera** Batal.，分布于陕西、甘肃、青海、湖北、四川；**窄瓣鹿药 S. paniculata** (Baker) Wang et Tang，分布于湖北、广西、四川、贵州、云南。

## 菝葜属 Smilax L.

**光叶菝葜** 千斤坠(云南)

**Smilax arisanensis** Hayata

生于海拔700—2 400米的林中、灌丛下或山谷溪边阴蔽处。分布于浙江、江西、福建、台湾、广东、广西、四川、贵州、云南。

根状茎：清热利湿，活血。用于小便淋涩不利。

附　注：四川以根状茎混称土茯苓。

**西南菝葜**　　菝葜、金刚藤(四川、西藏)

**Smilax bockii** Warb.

生于海拔700—2 900米的林下或灌丛中。分布于西南及甘肃、湖南、广西。

根状茎(藏金刚藤)：微辛，温。祛风，活血，解毒。用于风湿腰腿痛，跌打损伤，瘰疬。

**菝葜**　　金刚刺、金刚藤(湖北)，土茯苓(贵州)，金刚头、马甲头(云南)，铁菱角(本草纲目)

**Smilax china** L.

生于海拔800—2 000米的山坡、林下、灌丛中或林缘、山谷、路旁。分布于华东、中南、华南、西南及辽宁、陕西。

根状茎(菝葜)：甘，温。祛风利湿，解毒消肿。用于关节疼痛，肌肉麻木，泄泻，痢疾，水肿，淋证，疔疮，肿毒，瘰疬，痔疮。叶：外用于痈疖疔疮，烫伤。

**托柄菝葜**　　土萆薢(陕西)，金刚刺(湖北)，土茯苓、长柄菝葜(四川)，金刚豆藤(贵州)，短柄菝葜(贵州草药)

**Smilax discotis** Warb.

生于海拔300—2 100(—2 600)米的林下、山坡灌丛。分布于中南、西南及陕西、甘肃、安徽、江西、福建。

根状茎(短柄菝葜)：淡、微涩，平。清热利湿，活血，止血。用于风湿痛，血崩，尿血。

附　注：本植物根状茎，在陕西地区有时作萆薢(长柄菝葜)使用。

**长托菝葜**　　萆薢、大菝葜(云南)，刺萆薢(昆明)，美人扇、红萆薢(中药大辞典)

**Smilax ferox** Wall. ex Kunth

生于海拔900—3 400米的林下、山坡阴蔽处或高山阴湿灌丛中。分布于西南及湖北、广东、广西。

根及根状茎(刺萆薢)：涩、微苦，平。祛风利湿，解疮毒。用于风湿筋骨疼痛，淋浊，梅毒，臁疮，皮肤过敏，湿疹。

附　注：云南地区除**无刺菝葜 S. mairei** Lévl.，又名：滇红菝葜、小萆薢及长托菝葜，也叫红萆薢外，还有一种白萆薢 **S. lunglingensis** Wang et Tang，别名：马钱叶菝葜，根状茎均为祛风除湿、利水通淋药。

**土茯苓**　　土萆薢、饭团根(广西)，土茯苓(四川)，红萆薢(云南)，光叶菝葜(广州植物志)

**Smilax glabra** Roxb.

生于海拔300—2 400米的林下、灌丛中或河谷、林缘，常攀援在矮灌木上。分布于华东、中南及陕西、甘肃、四川、贵州、云南。

根状茎(土茯苓)：甘、淡，平。除湿，解毒，通利关节。用于湿热淋浊，带下病，痈肿，瘰疬，疥癣，梅毒及汞中毒所致的肢体拘挛，筋骨疼痛。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②目前商品中的“白土苓”或“白茯苓”实际是菝葜类植物的根状茎，功效相同的有**兰果土茯苓 Smilax glabra** Roxb.

var. **concolor** (C. H. Wright) Wang et Tang., 分布于江苏、浙江、江西、四川、贵州、云南;**暗色菝葜 S. lanceiefolia** Roxb. var. **opaca** A. DC., 四川称白土茯苓,分布于浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南; **防己叶菝葜 S. menispermoidea** A. DC., 别名: 七茯苓(甘肃、宁夏、四川)、白菝葜(湖北), 分布于西南及陕西、甘肃、宁夏、湖北、陕西、甘肃、四川、西藏。

**粉菝葜** 金刚藤头、铁菱角、冷饭巴(陕西、四川),鲜土苓(江苏),黑果菝葜(中国植物志)

**Smilax glauco-china** Warb.

生于山坡林下及林缘、旷野、灌丛、草丛中。分布于华东、中南及山西、陕西、甘肃。

根状茎(金刚藤头): 甘,平。清热,除风毒。用于崩漏带下病, 血淋, 瘰疬, 跌打损伤。 嫩叶:用于臁疮。

**小叶菝葜** 乌鱼刺、地茯苓藤(全国中草药汇编)

**Smilax microphylla** C. H. Wright

生于海拔 500—2 200 米的林下、山谷、沟边或灌丛、山坡阴处。分布于中南、西南及陕西、甘肃。

块茎(乌鱼刺): 甘、微苦,平。清热,解毒,祛湿消肿。用于崩漏,带下病,瘰疬,疮疖,跌打损伤。

**白背牛尾菜** 大伸筋(中国植物志),长叶牛尾菜(中药大辞典), 牛尾伸筋、牛尾蕨(湖南药物志),马尾伸筋(江西中药)

**Smilax nipponica** Miq.

生于山坡、林下、灌丛、草丛或水旁。全国大部分地区均有分布。

根及根状茎(马尾伸筋): 苦,平。舒筋活血, 通络止痛。用于腰腿筋骨痛。 叶: 解毒消肿。用于癌肿,消渴,关节痛,慢性结肠炎,带下病,痢疾。

**穿鞘菝葜** 翅柄菝葜(海南植物志),穿耳菝葜、九牛力(全国中草药汇编)

**Smilax perfoliata** Lour.

生于海拔 500—2 100 米的山谷、林下或灌丛中。分布于台湾、广东、海南、广西、云南。

根状茎: 淡,平。健脾益胃,强筋壮骨。用于风湿腰痛。

**牛尾菜** 草菝葜、大伸筋草(陕西),老龙须(江西),春根藤(广东), 白须公、软叶菝葜(广西)

**Smilax riparia** A. DC.

生于海拔 600—2 000 米的林下、灌丛、山沟、路旁或山坡草丛中。除内蒙古、青海、宁夏、新疆、四川外,全国均有分布。

根及根状茎(牛尾菜): 甘、苦,平。补气活血, 舒筋通络。用于气虚浮肿,筋骨疼痛,偏瘫,头晕头痛,咳嗽吐血,骨痨,带下病。

附 注: **尖叶牛尾菜 S. riparia** A. DC. var. **acuminata** (C. H. Wright) Wang et Tang, 根: 祛风除湿,舒筋活络,分布于江西、湖北、湖南。

**短梗菝葜** 威灵仙(河北、陕西),金刚刺、金刚藤(陕西、四川),红革藓(湖北),铁丝威灵仙、黑刺菝葜(中药志)

**Smilax scobinicaulis** C. H. Wright

生于海拔600—3 000米的山坡灌丛下、林下或山谷沟岸。分布于中南、西南及河北、山西、陕西、甘肃、江西。

根及根状茎(铁丝威灵仙)：苦、辛，平。祛风除湿，散瘀，解毒。用于风湿腰腿痛，疮疖。

附　注：本品在北方作威灵仙药用已有较长历史。《陕西中草药》记载，可除风湿，活血，解毒，镇惊熄风，抗癌。用于风湿腰腿痛，小儿惊风，肠炎，疮疖，瘰疬，癌肿。

**华东菝葜**　粘鱼须牛尾菜(辽宁)，鲢鱼须(湖北)，粘鱼须(救荒本草)，粘鱼须菝葜(山西中药志)，倒钩刺、铁丝威灵仙(中药志)

**Smilax sieboldii** Miq.

生于林下灌丛或山坡草丛中。分布于华东及吉林、辽宁、河北、河南。

根及根状茎(铁丝威灵仙)：参见短梗菝葜。

附　注：用作铁丝威灵仙混用的有①**鞘柄菝葜：S. stans** Maxim.，分布于西北、西南及河北、山西、山东、安徽、浙江、台湾、河南、湖北。根及块茎(鞘菝葜)：辛、咸，温。祛风除湿，活血顺气，止痛。用于风湿疼痛，跌打损伤，外伤出血，鱼刺鲠喉。根及块茎在甘肃、宁夏亦作威灵仙入药，四川、云南作铁丝威灵仙入药。②功效相同的有**黑叶菝葜 S. nigrescens** Wang et Tang，分布于陕西、甘肃、湖北、四川、贵州、云南。

## 白穗花属　Speirantha Baker.

**白穗花**

**Speirantha gardenii** Baill.

生于海拔630—900米的山谷溪边及林下。分布于江苏、浙江、安徽、江西。

根状茎(扁担三七)：凉血解毒。用于劳伤乏力，感冒头痛。

## 扭柄花属　Streptopus Michx.

**扭柄花**　算盘七、曲柄算盘七(陕西)，钝叶算盘七(云南)

**Streptopus obtusatus** Fassett

生于海拔1 900—3 600米的山坡林下阴湿处。分布于陕西、甘肃、四川、云南。

根：清肺止咳，健脾和胃。

**小花扭柄花**　高山竹林梢(四川)，小花算盘七(云南)

**Streptopus parviflorus** Franch.

生于海拔2 000—3 500米的灌丛中、林下或高山草地。分布于四川、云南。

根：清热，利湿，健脾胃。

**膜花扭柄花**　鸡爪参、野参须(陕西)，单茎算盘七(四川、中药大辞典)，算盘花(云南)，竹林消(四川、西藏)，女楂(藏语)

**Streptopus simplex** D. Don

生于海拔1 000—4 000米的林下、竹林、灌丛中或高山草地。分布于西南。

根(竹林消)：甘、淡，寒。清热解毒，止咳镇痛。用于肺痨咳嗽，虚劳损伤，脾胃不和，心慌气短、妇女血亏，筋骨疼痛。

## 异蕊草属　Thysanotus R. Br.

**异蕊草**　　化骨龙(广西)

**Thysanotus chinensis** Benth.

生于山谷、林下。分布于福建、广东、海南、广西。

全草：用于鱼刺鲠喉。

## 岩菖蒲属　Tofieldia Huds.

**叉柱岩菖蒲**　　九节莲(四川)，云南岩菖蒲(云南)，复生草、扁竹兰、扁竹参(全国中草药汇编)

**Tofieldia divergens** Bur. et Franch.

生于海拔 1 000—4 300 米的草坡、溪边、林下岩缝中或岩石上。分布于云南。

全草(复生草)：淡，平。利尿，调经，滋阴补虚。用于水肿，头晕，耳鸣，月经不调，胃痛，小儿泄泻，营养不良。

附　注：功效相同的有**岩菖蒲 T. thibetica** Franch.，分布于湖北、四川、贵州、云南。

## 油点草属　Tricyrtis Wall.

**宽叶油点草**

**Tricyrtis latifolia** Maxim.

生于山坡林下。分布于陕西、甘肃、台湾、湖北、四川、贵州。

根：补虚止咳。

**油点草**　　红酸七、粗轴油点草、牛尾参(全国中草药汇编)

**Tricyrtis macropoda** Miq.

生于海拔 800—2 400 米的山坡林下、竹林下或林缘、草丛中。分布于华东、中南及陕西、四川、贵州。

全草或根(红酸七)：甘，温。补虚止咳。用于肺痨咳嗽。

**黄花油点草**　　山黄瓜、柔毛油点草(云南)，黄瓜菜、疏毛油点草(陕西中草药)，黑点草(四川中药志)

**Tricyrtis maculata** (D. Don) Machride——*Compsoa maculata* D. Don; *T. bakerii* Koidz.

生于海拔 280—2 300 米的山坡林下、路旁或灌丛中。分布于中南、西南及河北、陕西、甘肃、浙江、江西。

全草(黑点草)：涩，平。用于周身发肿，发痧气痛，风疹瘙痒。　根(山黄瓜)：甘、淡，

平。安神除烦，健脾止渴，活血消肿。用于虚烦口渴，狂躁不安，劳伤，跌打损伤。

## 延龄草属　Trillium L.

**延龄草**　芋儿七、狮儿七(陕西)，头顶一颗珠(安徽、湖北)，华延龄草、黄花三七(浙江)，入河(纳西语)

**Trillium tschonoskii** Maxim.

生于海拔 1 600—3 800 米的山坡、林下、草丛、山谷阴湿处或路旁岩石下。分布于陕西、甘肃、安徽、浙江、台湾、河南、湖北、四川、云南、西藏。

根及根状茎(芋儿七)：甘、辛，温。祛风，舒肝，活血，止血，解毒。用于高血压症，肾虚，头昏头痛，跌打骨折，腰腿疼痛，月经不调，崩漏；外用于疔疮。

附　注：功效相同的有**白花延龄草 T. camtschaticum** Pall.，分布于东北；**西藏延龄草 T. govanianum** Wall. ex Royle，分布于西藏。

## 郁金香属　Tulipa L.

**老鸦瓣**　棉花包光姑(黑龙江)，山蛋(山西)，毛地梨(江苏、中国植物志)，山慈姑(江西、福建、广东)，光慈姑(中药志)

**Tulipa edulis** (Miq.) Baker——*Orithya edulis* Miq.

生于向阳山坡、林下、荒地或杂草丛中，也有栽培。分布于东北、西北、华东、中南及山西、贵州。

鳞茎(光慈姑)：辛、甘，寒。有小毒。清热解毒，消肿散结。用于疔肿，瘰疬，蛇虫咬伤。

附　注：功效相同的有**伊犁郁金香 T. iliensis** Regel，分布于新疆天山；**阿尔泰郁金香 T. altaica** Pall.；**毛蕊郁金香 T. dasystemon** (Regel) Regel；**异瓣郁金香 T. heterophylla** (Regel) Baker，均分布于新疆。

## 开口箭属　Tupistra Ker-Gawl.

**开口箭**　竹根七、牛尾七(陕西、江西、云南)，开喉箭(湖北、四川)，老蛇莲(广西)，心不干(中药大辞典)

**Tupistra chinensis** Baker

生于海拔 1 000—3 000 米的山坡草地、灌丛下阴湿处或溪沟、路旁近水处。分布于华东、中南、西南及陕西、甘肃。

根状茎(竹根七)：甘、微苦，寒。滋阴泻火，活血调经，散瘀止痛。用于风湿关节痛，腰腿疼痛，跌打损伤，月经不调，骨蒸劳热。

附　注：功效相同的有**筒花开口箭 T. delavayi** Franch.，分布于湖北、湖南、四川、贵州、云南。

**须瓣开口箭**　开喉箭(四川)，齿瓣开口箭(中国植物志)，云南铁扁担、竹根七、万年

青(全国中草药汇编)

**Tupistra fimbriata** Hand.-Mazz.

生于海拔 1 200—2 800 米的灌丛或林下潮湿处。分布于四川、云南。

根状茎及全草(铁扁担)：苦、微甘，寒。有小毒。清热解毒，强心利尿，舒筋活血。用于心脏病引起的水肿，跌打损伤，风湿痛，胃痛，外伤出血，毒蛇咬伤。

附　注：功效相同的有**凉山开口箭 T. langshanensis** Z. Y. Zhu，分布于四川；**箭叶开口箭 T. ensifolia** Wang et Tang，分布于云南。

**峨眉开口箭**　竹节兰(四川)

**Tupistra omeiensis** Z. Y. Zhu

生于灌丛林下。分布于四川。

全草：祛风除湿，活血化瘀。

附　注：功效相同的有**碟花开口箭 T. tui** (Wang et Tang) Wang et Liang，分布于四川；**台湾开口箭 T. watanabei** (Hayata) Wang et Liang，分布于台湾、广东，根：用于胃痛，跌打肿痛。

**弯蕊开口箭**　老蛇莲(广西)，扁竹兰(云南)，柄叶开口箭、白跌打(中药大辞典)，见血封口、竹叶兰(全国中草药汇编)

**Tupistra wattii** (C. B. Clarke) Hook. f.——*Campylandra wattii* C. B. Clarke

生于海拔 800—3 000 米的山间疏林潮湿背阴处。分布于西南及广东、广西。

根状茎或全草(扁竹兰)：辛、苦，寒。有毒。清热解毒，散瘀止痛。用于感冒，咽喉痛，乳蛾，咳嗽痰喘，牙痛，胃痛，胃出血，小便涩痛；外用于跌打损伤，骨折，外伤出血。

## 藜芦属　Verartum L.

**藜芦**　黑藜芦(通称)，老旱葱(黑龙江)，山葱(吉林、河北、山西、山东)，棕色脚(江西)，人头发(四川)

**Veratrum nigrum** L.

生于海拔 1 200—3 300 米的山坡林下、林缘、灌丛或草丛中。分布于东北、华北、西北、中南、西南及山东、江苏、安徽、江西。

根及根状茎(藜芦)：辛、苦，寒。有毒。涌吐风痰，杀虫疗疮。用于中风痰壅，喉痹不通，黄疸，癫痫，久疟，泄泻，头痛，鼻渊，恶疮；油调外涂治疥癣秃疮。

附　注：功效相似在当地或民间用的有**兴安藜芦 V. dahurium** (Turcz.) Loes. f.，分布于东北及内蒙古、新疆；**黑紫藜芦 V. japonicum** (Baker) Loes. f.，分布于安徽、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、贵州、云南；**毛叶藜芦 V. grandiflorum** (Maxim.) Loes. f.，分布于浙江、江西、台湾、湖北、湖南、四川、贵州、云南；**毛穗藜芦 V. maackii** Regel，分布于东北及河北、内蒙古、山东、湖北、湖南；**牯岭藜芦 V. schindleri** Loes. f.，分布于华东及中南；**狭叶藜芦 V. stenophyllum** Diels，分布于四川、云南、贵州；**大理藜芦 V. taliense** Loes. f.，分布于四川、贵州、云南；**小藜芦 V. mengtzeanum** Loes. f.，分布于四川、贵州、云南；**峨眉藜芦 V. omeiensis** Wang et Tang，分布于四川；**尖被藜芦 V. oxysepalum** Turcz.，分布于东北；**新疆藜芦 V. lobelianum** Bernh.

分布于新疆阿尔泰山区。

### 丫蕊花属　Ypsilandra Franch.

**丫蕊花**　　百合三七(湖北),峨眉石凤丹、随身丹(四川)

**Ypsilandra thibetica** Franch.

生于海拔1 300—2 850米的灌丛下、路旁湿地或沟边。分布于湖北、湖南、四川、广西。

根：活血散瘀,催吐利水。全草(峨眉石凤丹)：清热,解毒,利湿。用于瘰疬。

附　注：功效相同的有**小果丫蕊花 Y. cavaleriei** Lévl. et Vant.，分布于湖南、广东、广西、贵州；**甘肃丫蕊花 Y. kansuensis** R. N. Zhao et Z. X. Peng，分布于甘肃；**云南丫蕊花 Y. yunnanensis** W. W. Smith et J. E. Jeffrey，分布于云南、西藏**高山丫蕊花 Y. alpinia** Wang et Tang，分布于云南、西藏。

## 186. 百部科　Stemonaceae

### 黄精叶钩吻属　Croomia Torr. ex Torr. et Gray

**黄精叶钩吻**　　金刚大(中国高等植物图鉴)

**Croomia japonica** Miq.

生于山谷林下。分布于安徽黄山、浙江天目山及天台山、江西上饶。

根及根状茎：辛,微凉。有毒。清热散风,解蛇毒。用于咽喉肿痛,银环蛇咬伤,跌打损伤。

### 百部属　Stemona Lour.

**蔓生百部**　　婆妇草、虱婆草、大叶百部(江西),药虱药(河南),一窝虎(江苏植物志)

**Stemona japonica** (Bl.) Miq.——*Roxburghia japonica* Bl.

生于阳坡灌丛下或郊野路旁、竹林中。分布于华东及陕西、河南、湖北、湖南、四川、贵州。主产江苏、安徽、浙江。

块根(百部)：甘、苦,微温。润肺止咳,杀虫灭虱。用于寒热咳嗽,肺痨咳嗽,顿咳,老年咳喘,咳嗽痰喘,蛔、蛲虫病;外用于皮肤疥癣,湿疹,头虱、体虱及阴虱。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**云南百部**　　狭叶百部、线叶百部(云南)

**Stemona mairei** (Lévl.) Krause——*Dianella mairei* Lévl.

生于海拔1 600—3 000米的山坡林下。分布于云南。

块根：功效同大叶百部。

附　注：云南特有药用植物。

**细花百部**　　小花百部(海南植物志),大百部(新华本草纲要)

**Stemona parviflora** C. H. Wright

生于山坡灌丛或旷野疏林中。分布于广东湛江，海南乐东、崖县、万宁。

块根：润肺止咳，杀虫止痒。

**直立百部**　百部袋、一窝虎(江苏)

**Stemona** sessielifolia (Miq.) Franch. et Sav.——*Roxburghia sessillifolia* Miq.

生于山坡灌丛、林下草地或竹林中，也有栽培。分布于华东及河北、新疆、河南、湖北、四川、贵州。

块根(百部)：功效同蔓生百部。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**对叶百部**　大百部(通称)，百条根(福建)，山百部(湖南)，大春根药(广东、云南)，野天门冬根(西南)

**Stemona tuberosa** Lour.

生于山坡、路旁、溪边及林缘灌丛、草丛中。分布于江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。主产湖北、福建、广东、四川、贵州。

块根(百部)：功效同蔓生百部。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

## 187. 龙舌兰科　Agavaceae

### 龙舌兰属　Agave L.

**龙舌兰**　剑兰(山东)，洋棕(湖北)，番麻(广东、云南)，石莲花(贵州)，菠萝麻(云南)

**Agave americana** L.

原产美洲热带。华东、中南、西南大部分省区引种栽培。云南滇中高原及各干热河谷地带常逸生。

叶：酸、涩，温、平。止血消炎，抑制霉菌生长。用于崩漏，盆腔炎，皮肤疥癣。

附　注：①本种水浸剂对黑根霉菌有明显的抑制作用。②叶片生产纤维后的渣液中所含的替告皂甙元和海柯皂甙元为生产甾体激素药品的原料。　③新鲜液汁有轻泻利尿作用，犬实验对肾炎有某些治疗作用。叶含辛辣挥发油，可作局部刺激剂。

**金边龙舌兰**　一片消(福建)，金边菠萝(广西南宁)，金边莲、黄边龙舌兰(四川、贵州)，银边龙舌兰(云南)，金边假菠萝(南宁市药物志)

**Agave americana** L. var. **variegata** Nichols.

我国西南及新疆、安徽、浙江、福建、河南、广东、广西有栽培，多栽培于庭园或近海砂地。

叶：辛，平。润肺化痰，止咳，平喘，透疹，祛瘀生新。用于肺燥咳嗽，阴虚咳喘，麻疹不透，痈疽疔疮；外用于疮毒。

**马盖麻**　狭叶龙舌兰麻(福建)，亚洲马盖麻(广西植物名录)

**Agave cantula** Roxb.

原产墨西哥。我国南方各省区引种栽培。

叶：功效同狭叶龙舌兰。

附　注：日本学者原宽认为热带亚洲广泛种植和归化的，系本种而非真正的 Agava americana L.

**狭叶龙舌兰**　短叶龙舌兰麻、假菠萝麻(广东)

**Agave rigida** Mill.——*A. angustifolia* Haw.

原产美洲。我国南方各省区引种栽培，其他大部分省区常为温室盆栽。该植物由于替告皂甙元含量高，是合成蛋白同化激素药物的重要原料。

**剑麻**　菠萝麻(海南)

**Agave sisalana** Perr. ex Engelm.

原产墨西哥。我国南部及西南部各省区引种栽培。

叶：凉血，止血，散瘀，排脓，止痛。用于肺痨咯血，痔疮出血，衄血，便血，痢疾，风湿跌打；外用于痈疖疮疡。

## 朱蕉属　Cordyline Comm. et Juss.

**朱蕉**　红铁树、红叶铁树(广西)，铁树(云南)，牙竹麻、假槟榔树(傣语)

**Cordyline fruticosa** (L.) A. Chvval.——*Convallaria fruticosa* L.

台湾、福建、广东、海南、广西、云南露地栽培。其他省区多为温室盆栽。

叶、根、花：微甘，平。清热，止血，散瘀。用于痢疾，吐血，便血，胃痛，尿血，月经过多，跌打肿痛。

附　注：傣医用于跌打瘀肿，各种出血性疾病。

**剑叶朱蕉**　剑叶铁树、小叶铁树、剑叶万年青(广东、广西)，狭叶铁树(云南种子植物名录)

**Cordyline stricta** Endl.

广东、广西、云南栽培。

叶：甘、淡，平。清热止血，散瘀。用于跌打损伤，咳嗽吐血，鼻衄，二便出血，外伤出血，小儿疳积，哮喘，痢疾。　根、茎：用于痢疾。

## 龙血树属　Dracaena Vand. ex L.

**龙血树**　马骝蔗树(广东、云南)，竹木参、山竹蔗(广西)，长花龙血树(中国植物志)，竹木料(全国中草药汇编)

**Dracaena angustifolia** Roxb.——*Pleomele angustifolia* (Roxb.) N. E. Br.

生于较低海拔的密林阴处。分布于海南、广西、云南河口。

根、叶：甘、淡，平。润肺止咳，清热凉血，止血。用于咳血，吐血，衄血，二便出血，哮喘，痢疾，小儿疳积，跌打外伤出血。傣医用于淋证，便秘，泄泻，胃病，产后虚弱，跌打损伤，刀伤，癫痫，心动过速。

附　注：血竭是中医传统的内外伤要药，有止血生肌，散瘀定痛之效。该药在我国记

载及应用至少有 1 500 多年历史。历代诸家本草所说的都不是生产血竭的原植物，我国不生产血竭。经药理、毒性与临床试验，证明本种生产的血竭与进口的印度血竭具有相似的效果，并载入云南的《药品标准》(1974 年版)。

**小花龙血树**　山海带、柬埔寨龙血树(海南)，山铁树、剑叶木、乌猿蕉(广西)

**Dracaena cambodiana** Pierre ex Gagnep.——*Pleomele cambodiana* (Gagnep.) Merr. et Chun

生于密林中或干燥沙壤土上。分布于海南崖县、广西龙州、云南。

叶：甘、淡，平。止血，散瘀，止咳平喘。用于咳血，吐血，衄血，二便出血，哮喘，痢疾，小儿疳疾；外用于跌打外伤出血。

附　注：本种和剑叶龙血树的树脂都作为中药"血竭"的主要原料来源。

**剑叶龙血树**　山铁树(广西)，岩棕(云南)，埋嘎筛、老鸦树(西双版纳傣语)

**Dracaena cochinchinensis** (Lour.) S. C. Chen——*Aletris cochinchinensis* Lour.; *Pleomele cochinchinensis* (Lour.) Merr. et Gagnep.

生于海拔 950—1 700 米的石灰岩上。是耐旱嗜钙树种，有时形成优势树种。分布于广西南部、云南南部。

叶：用于吐血，咳血，衄血，便血，哮喘，小儿疳积，月经过多，痔疮出血，赤白痢疾，跌打损伤及外伤出血。

附　注：提取的树脂作血竭用，功效较小花龙血树 D. cambodiana Pierre 为好，现已正式收购应用。

**非洲龙血树**

**Dracaena dreco** L.

原产非洲热带卡拉里半岛。我国云南景洪栽培。

树脂：活血，止血。

**矮龙血树**　竹节兰(云南)，点点领(傣语)，大剑叶木(全国中草药汇编)

**Dracaena temiflora** Roxb.——*Pleomele temiflora* (Roxb.) Merr.

生于低、中山山坡或沟谷密林下。分布于云南景洪。

全株：活血，止血。　根：甘，平。祛风湿，通经络，补肾壮阳。用于风湿关节痛，腰腿痛，小便淋涩，产后大出血。

## 晚红玉属　Polianthes L.

**晚红玉**

**Polianthes tuberosa** L.

原产墨西哥。我国北京、江苏、浙江、广东、四川、云南已有大面积栽培。以四川、广东、云南生长良好。

根：甘、淡，凉。清热解毒，消肿。

## 虎尾兰属　Sansevieria Thunb.

**虎尾兰**　弓弦麻、龙舌兰(海南)，花蛇草(云南)，老虎尾(陆川本草)，万哦来(傣语)

**Sansevieria trifasciata** Prain

原产非洲西部。我国广东、广西、贵州引种栽培。云南多见野生，其他各地有盆栽。

叶：酸，凉。清热解毒，祛腐生肌。用于感冒咳嗽，咳嗽痰喘，跌打损伤，痈疮肿毒，毒蛇咬伤。

附　注：①傣医用根适量捣烂外敷，用于风湿关节痛，四肢麻木，跌打损伤。②广西民间根、叶用于瘰疬，痈疮肿毒，脓疡。

**金边虎尾兰**

**Sansevieria trifasciata** Prain var. **laurentii** N. E. Br.

广东、广西、贵州、云南有栽培。

叶：酸，凉。清热解毒，祛腐生肌。用于感冒咳嗽，咳嗽痰喘，跌打损伤，痈疮肿毒，毒蛇咬伤。

附　注　广西民间叶也用于瘰疬，水、火烫伤；同瘦猪肉炖汤，用于肺痨咯血。

### 丝兰属　Yucca L

**凤尾兰**　凤尾丝兰、菠萝花、剑麻(通称)，白棕(浙江舟山)

**Yucca gloriosa** L.

原产北美东部和南部。长江流域以南各省区均有栽培。

花：民间用花和紫苏叶煮水，用于咳嗽痰喘。

## 188. 石蒜科　Amaryllidaceae

### 君子兰属　Clivia Lindl.

**君子兰**　大花君子兰(北京植物志)

**Clivia miniata** Regel

原产非洲南部。我国各地温室盆栽。

根(君子兰根)：用于咳嗽痰喘。

附　注：功效相同的有**垂笑君子兰 C. nobilis** Lindl.，各地温室栽培。

### 文殊兰属　Crinum L.

**文殊兰**　白花石蒜(新疆)，海带七(江西)，十八学士(广州植物志)，文兰树(植物名实图考)，罗裙带(本草纲目)

**Crinum asiaticum** L. var. **sinicum** (Roxb. et Herb.) Baker——*C. sinicum* Roxb. ex Herb.

野生于海滨或河旁沙地、村旁及山涧林下阴湿地，现多栽培供观赏。分布于江西、福建、台湾、广东、广西。新疆、安徽、浙江、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南有栽培。

叶及鳞茎：辛，凉。有小毒。行血散瘀，消肿止痛。用于咽喉痛，跌打损伤，痈疖肿

蛰，蛇咬伤。 果实：外用于扭筋肿痛。

附 注：①全株有毒，以鳞茎最毒，内服宜慎。②功效相同的有**西南文殊兰 C. latifolium** L.，分布于湖北、广西、贵州、云南。

## 网球花属 Haemanthus L.

**网球花**

**Haemanthus multiflorus** Martyn

原产非洲热带。我国云南有引种栽培。

鳞茎：外用于无名肿毒。

## 朱顶红属 Hippeastrum Herb.

**朱顶红** 朱顶兰(河南、广西)，红花莲(海南植物志)

**Hippeastrum rutilum** (Ker-Gawl.) Herb.——*Amaryllis rutilum* Ker-Gawl.

原产秘鲁。我国各地引种栽培。

鳞茎(红花莲)：甘、辛，温。有小毒。散瘀活血，解毒消肿。用于痈疮肿毒。

附 注：功效相同的有**花朱顶红 H. vittatum** (L'Herit.) Herb.，原产南美。我国各地引种栽培。

## 水鬼蕉属 Hymenocallis Salisb.

**水鬼蕉** 蜘蛛兰(云南种子植物名录)

**Hymenocallis littoralis** (Jacq.) Salisb.——*Pancratium littoralis* Jacq.; *H. americana* Roem.

原产美洲热带。我国福建、广东、广西、云南引种栽培。

叶：辛，温。舒筋活血，消肿止痛。用于风湿关节痛，甲沟炎，跌打肿痛，痈疽，痔疮。

## 石蒜属 Lycoris Herb.

**乳白石蒜**

**Lycoris albiflora** Koidz.

生于山坡、草地或林缘。分布于江苏。

鳞茎：功效同忽地笑。

**安徽石蒜**

**Lycoris anhuiensis** Y. Hsu et Q. J. Fan

生于山坡阴湿处或石缝中。分布于江苏、安徽。

鳞茎：辛、甘，微温。有毒。解疮毒，消庸肿，杀虫。用于痈肿，疔疮，烧、烫伤。

**忽地笑** 黄花石蒜(通称)，独蒜(广西)，龙爪花、金灯花(云南)，铁色箭(本草纲

曰),大一支箭(滇南本草)

**Lycoris aurea** (L'Herit.) Herb.——*Amaryllis aurea* L' Herit.

生于阴湿山坡草地、山谷林下岩石上或崖下土壤肥沃处，庭园也有栽培。分布于华东、中南、西南(西藏除外)。

鳞茎：辛，平。有小毒。解热消肿，润肺祛痰，催吐。用于痈肿疮毒，虫、疮作痒，耳下红肿，烧、烫伤。

附　注：①本种鳞茎为提取石蒜碱，加兰他敏的原料。②全植物含石蒜碱等多种生物碱。有毒，以鳞茎最毒，用时宜慎。③功效相同的有**中国石蒜 L. chinensis** Thunb.，分布于河北、江苏、浙江、河南。

**广西石蒜**

**Lycoris guangxiensis** Y. Hsu et Q. J. Fan

生于山坡阴湿处。分布于广西。

鳞茎：有毒。外用于疮疡肿毒。

附　注：功效相同的有**玫瑰石蒜 L. rosea** Traub et Moldenke，分布于江苏、浙江、湖北。

**长筒石蒜**

**Lycoris longituba** Y. Hsu et Q. J. Fan

生于山坡阴湿地。分布于江苏。

鳞茎：功效同忽地笑。

附　注：①本种鳞茎为提取加兰他敏的原料。②功效相同的有**江苏石蒜 L. houdyshi** Thunb.，分布于江苏、浙江；**黄长筒石蒜 L. longituba** Y. Hsu et Q. J. Fan **var. flava** Y. Hsu et S. L. Huang，分布于江苏江宁。

**石蒜**　龙爪花、老鸦蒜(陕西、江西、福建、湖北)，野蒜子、红花石蒜(广西)

**Lycoris radiata** (L'Herit.) Herb.——*Amaryllis radiata* L'Herit.

野生于林缘、山坡、路旁、草丛中及石崖阴湿处，庭园也有栽培。分布于华东、中南、西南及陕西、甘肃。

鳞茎(石蒜)：辛，温。有小毒。解毒，祛痰，利尿，催吐。用于咽喉肿痛，水肿，小便不利，痈肿疮毒，瘰疬，咳嗽痰喘，食物中毒。

附　注：①石蒜有一定抗癌活性，并能抗炎，解毒，催吐。②民间用本品灭蛆，灭鼠。鳞茎接触皮肤后红肿发痒，进入呼吸道会引起鼻出血。

**玫瑰石蒜**

**Lycoris rosea** Traub et Moldenke

生于阴湿山坡竹林下或石缝中。分布于江苏、上海、浙江、湖北。

鳞茎：用于疔疮肿毒，蛇咬伤。

**换锦花**

**Lycoris sprengeri** Comes ex Baker

生于山坡湿地或竹林中。分布于江苏、安徽、浙江、湖北。

鳞茎：功效与石蒜相似。

附　注：本种鳞茎为提取加兰他敏的原料。

**鹿葱**　夏水仙、老和尚头(江苏)

**Lycoris squamigera** Maxim.

野生于山沟、溪边阴湿处。分布于山东、江苏、浙江。河北、河南有栽培。

鳞茎：功效同石蒜。

## 水仙属　Narcissus L.

**水仙**　水仙花(通称)

**Narcissus tazetta** L. var. **chinensis** Roem.

生于潮湿地。原产亚洲东部海滨温暖地区。浙江、福建沿海岛屿有自生。其他省区常见盆栽。

鳞茎(水仙根)：苦、微辛，寒。有小毒。清热解毒，散结消肿。用于鱼骨鲠喉；外用于痈肿疮毒，疔腮，虫咬。　花(水仙花)：祛风除热，活血调经。用于月经不调。

附　注：①鳞茎液汁有毒，含石蒜碱、多花水仙碱等多种生物碱，外科用作镇静剂。②牛羊误食鳞茎后，出现痉挛，瞳孔放大，暴泻等症状，故不宜内服，宜慎用。

## 葱莲属　Zephryanthes Herb.

**葱莲**　葱兰(通称)，肝风草(福建)

**Zephryanthes candida** (Lindl.) Herb.——*Amaryllis candida* Lindl.

原产南美。我国江苏南部、安徽、浙江、福建、广东、广西、四川、贵州、云南常栽培，作观赏。

全草：甘，平。平肝熄风，散热解毒。用于小儿急惊风，癫痫；外用于痈疮，红肿。

**韭莲**　风雨花(通称)，独蒜(广西)，赛番红花(广西、贵州)，红菖蒲莲(云南)，旱水仙、空心韭菜(贵州草药)

**Zephryanthes grandiflora** Lindl.

原产中、南美洲。我国各地庭园引种栽培。贵州、云南常见野生。

全草及鳞茎：苦，寒。散热解毒，活血凉血。用于跌伤红肿，毒蛇咬伤，吐血，血崩。根(旱水仙根)：外用于痈疮红肿。

# 189. 仙茅科　Hypoxidaceae

## 仙茅属　Curculigo Gaertn.

**短葶仙茅**　大莎草(广西南宁)

**Curculigo breviscapa** S. C. Chen

生于海拔550米以下的山坡、丘陵、草丛中。分布于广西西南部。广东有栽培。

根状茎：民间用于水肿。

**大叶仙茅**　大仙茅、大白茭、松兰(广西)，花叶、大地棕(四川)，假槟榔树(海南)，鹰

借玉娃(傣语)

**Curculigo capitulata** (Lour.) O. Kuntze——*Leucojum capitulatum* Lour.

生于海拔850—2 200米的林下及沟边阴湿处或栽培。分布于西南及福建、台湾、广东、广西。

根状茎(大地棕根)：苦、涩，平。润肺化痰，止咳平喘，镇静健脾，补肾固精。用于肾虚喘咳，腰膝酸痛，带下病，遗精。

附　注：傣医将根状茎用于感染，高血压症，风湿关节痛。

**疏花仙茅**　小棕包(贵州)

**Curculigo gracilis** (Wall. ex Kurz) Hook. f.——*Molineria gracilis* (Wall. ex Kurz) Kurz

生于海拔1 000米左右的林下或阴湿山坡。分布于广西西北部至西部、四川南部、贵州西部。

根状茎：祛风，活络，调经，祛痰，催吐。

**仙茅**　千年棕、独角丝茅(江西、湖南)，独角仙茅(广东、广西、云南)，山党参、小棕包、假虫草(云南)

**Curculigo orchioides** Gaertn.

生于海拔1 600米以下的林下草地、灌丛或荒坡，也有栽培。分布于华东、西南及湖北、湖南、广东、广西。主产四川、贵州、云南。新疆石河子有少量栽培。

根状茎(仙茅)：辛，温。有小毒。温肾阳，强筋骨，祛寒湿。用于阳痿精冷，筋骨痿软，崩漏，腰膝痿软，阳虚冷泻，痈疽，瘰疬，更年期高血压症。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

## 小金梅属　Hypoxis L.

**小金梅草**　野鸡草(贵州)，小仙茅(贵州、云南)，小金锁梅(云南)

**Hypoxis aurea** Lour.

生于山坡、草地。分布于长江流域以南各省及台湾、西藏。

全草(小金梅草)：甘、微辛，温。温肾，壮阳，补气。用于病后阳虚，疝气痛，阳痿精冷；外用于跌打肿痛。

# 190. 箭根薯科　Taccaceae

## 裂果薯属　Schizocapsa Hance

**裂果薯**　屈头鸡、水虾公(广东、广西)，水三七(贵州)，水鸡仔(广西中药志)，水田七(南宁市药物志)

**Schizocapsa plantaginea** Hance——*Tacca plantaginea* (Hance) Drenth

生于海拔200—600米的山谷、林下、路边及水边潮湿处。分布于江西南部、湖北、湖南南部、广东、广西、贵州、云南。

根状茎：苦，寒。有毒。清热解毒，散瘀消肿，理气止痛，截疟。用于慢性胃脘痛胀，咽喉痛，风热咳喘，乳蛾，痄腮，牙痛，肝硬化腹水；外用于跌打损伤，疮疡肿毒，毒蛇咬伤。叶：用于无名肿毒。

### 箭根薯属　Tacca Forst.

**箭根薯**　大叶屈头鸡(广西、云南)，碧石雷、黑冬叶、山大黄(云南种子植物名录)，老虎须(全国中草药汇编)，咪米哇、黄牛胆(傣名)

**Tacca chantrieri** Andre

生于林下阴湿处。分布于广东、海南、广西、贵州、云南。

根状茎：辛、苦，凉。有小毒。清热解毒，理气止痛。用于泄泻，痢疾，消化不良，肝炎，胃痛，时行感冒，咽喉肿痛，乳蛾，风热咳喘，疟疾；外用于痈疮肿毒，烧、烫伤，乳痈。

## 191. 薯蓣科　Dioscoreaceae

### 薯蓣属　Dioscorea L.

**参薯**　大薯(浙江)，落子薯(福建)，毛薯(广西)，脚板苕(四川)，四棱薯(云南)

**Dioscorea alata** L.

原产于孟加拉湾的北部和东部。我国西南及浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西常有栽培。

块茎(毛薯)：甘，平。补脾肺，涩精气，消肿止痛，收敛生肌。用于疮疡，面疮。

**蜀葵叶薯蓣**　龙骨七(贵州)，穿山龙(云南)

**Dioscorea althaeoides** R. Kunth

生于海拔 1 000—2 000 米的山坡沟旁、林缘或路边的杂木林下。分布于西南。

根状茎(蜀葵叶薯蓣)：辛，温。舒筋活络，祛风除湿。用于肢体风湿麻木，跌打损伤，积食饱胀，消化不良。

**大青薯**

**Dioscorea benthamii** Prain et Burkill

生于海拔 300—900 米的山地、山谷、水边、路旁灌丛。分布于福建西部、台湾、广东、广西。

块茎：苦、涩，凉。活血，止血。用于跌打损伤，风湿痹痛，月经不调，外伤出血，崩漏。

**异叶薯蓣**　野山药(贵州)

**Dioscorea biformifolia** Péi et C. T. Ting

生于海拔 600—1 800 米的河谷、山坡杂灌丛及林缘阴湿处。分布于贵州、云南。

根状茎：用于风湿痛，咳嗽。

**黄独**　金线吊蛤蟆(浙江、江西)，土首乌(福建)，金线吊蛋(广东)，薯衣包(云南)，曼喃(傣语)，黄药子(图经本草)

**Dioscorea bulbifera** L.

生于海拔 2 300 米以下的溪沟边及山谷杂木林缘。分布于华东、中南、西南及陕西南部、甘肃南部。河北、山东有栽培。

块茎(黄药子): 苦,平。有小毒。消肿解毒,化痰散结,凉血止血。用于瘿瘤,咳嗽痰喘,咳血,吐血,瘰疬,疮疡肿毒,毒蛇咬伤。

山**葛薯**　三百棒(广西)

**Dioscorea chingii** Prain et Burkill

生于海拔 600—1 800 米的山坡灌丛阴处或岩石缝中。分布于广西、贵州、云南。

根状茎: 消肿,止痛。用于跌打损伤。

**薯莨**　红孩儿(浙江、江西),染布薯(广西),朱砂莲(贵州、湖南),山羊头、金花果(云南),赫魁(名医别录)

**Dioscorea cirrhosa** Lour.

生于海拔 350—1 800 米的山坡路旁、河谷边杂木林下及灌丛中。分布于西南及浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西。

块茎(薯莨): 微苦、涩,凉。止血,活血,养血。用于崩漏,产后出血,咯血,尿血,上消化道出血,贫血,月经不调。

附　注: **异块茎薯莨 D. cirrhosa** Lour. var. **cylindrica** C. T. Ting et M. C. Chang, 分布于福建、海南、贵州。块茎也有止血作用。

**叉蕊薯蓣**　饭沙子(四川),蛇头草(贵州),黄山药、白山药、黄姑娌、大山药 (云南)

**Dioscorea collettii** Hook. f.

生于海拔 1 000—3 200 米的河谷、沟谷、山坡的次生林和灌丛中。分布于福建、湖北、四川西部、贵州、云南。

根状茎(叉蕊薯蓣): 苦、微辛,平。祛风除湿,止痒,止痛。用于风湿关节痛,皮炎,腰腿酸痛,尿浊,带下病,毒蛇咬伤,跌打损伤。

**粉背薯蓣**　黄山姜(浙江),山萆薢(湖北),山姜黄(湖南)

**Dioscorea collettii** Hook. f. var. **hypoglauca** (Palib.) Péi et C. T. Ting——*D. hypoglauca* Palib.

生于海拔 300—1 300 米的陡坡、山谷或水沟边混交林或疏林下。分布于中南及安徽、浙江、江西、福建、台湾北部、四川、贵州。

根状茎(粉萆薢): 苦,平。利湿祛浊,祛风除痹。用于膏淋,尿浊,带下病,风湿痹痛,腰膝酸痛。

附　注: 《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**三角叶薯蓣**　山药(西藏)

**Dioscorea deltoidea** Wall. ex Griseb.

生于海拔 1 600—4 000 米的沟谷阔叶林下及灌丛中。分布于西南。

根状茎(三角叶薯蓣): 苦,寒。祛风除湿。用于关节痛,心脏病,胃病,下肢肌肉痉挛。

**圆果三角叶薯蓣**　母猪藤、风车草(四川),黄山药(四川、云南)

**Dioscorea deltoidea** Wall. ex Griseb. var. **orbiculata** Prain et Burkill

生于海拔 2 000—3 100 米的稀疏阔叶林内或灌木林中,干旱河谷坡地也能生长。分

布于四川、云南。

根状茎：苦，寒。祛风除湿。用于心脏病，关节痛。

**七叶薯**　白参(广西)，血参、七爪金龙(云南)

**Dioscorea esquirolii** Prain et Burkill

生于海拔600—1 400米的山坡、山谷林下湿地。分布于广西、贵州、云南。

块茎：辛、苦，凉。消肿止痛。用于跌打损伤，产后腹痛，痛经，肺痨咳嗽。

**山薯**　秤根薯(福建)

**Dioscorea fordii** Prain et Burkill

生于海拔50—1 150米的山坡、山凹溪沟边或路旁杂木林中。分布于浙江南部、福建、湖南南部、广东、海南、广西、贵州。

块茎：甘，平。补肺益肾，健脾益精。

**福建薯蓣**　猴子薯(浙江)，土萆薢、猴骨草(福建)

**Dioscorea futschanensis** Uline ex Kunth

生于海拔700米以下的山坡灌丛、林缘、沟谷边及路旁。分布于浙江南部、福建、湖南、广东北部、广西。

根状茎(绵萆薢)：苦，平。利湿祛浊，祛风通痹。用于淋证，尿浊，带下病，湿热疮毒，腰膝酸痛。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**光叶薯蓣**　盘薯(广西)，红山药(贵州)，羊角山药、草巴山药、苦山药(云南)

**Dioscorea glabra** Roxb.

生于海拔250—1 500米的山坡路边、沟旁的常绿阔叶林下或灌丛中。分布于福建、广东、海南、广西、贵州、云南。

块茎(红山药)：涩、微辛，平。利水，解毒消肿，健胃，通经活络，止血，止痢。用于崩漏，月经不调，腰肌劳损，外伤出血。

**纤细薯蓣**　癞蛤蟆(浙江)，黄生姜(江西)，白萆薢(中药大辞典)

**Dioscorea gracillima** Miq.

生于海拔200—2 200米的阴湿山谷、河谷及山坡疏林下。分布于安徽南部、浙江、江西、福建北部、湖北西南部、湖南东北部、贵州。

根状茎(白萆薢)：苦，平。利湿浊，祛风湿。用于瘰疬。

**粘山药**　粘沾沾、盛末花、粘口薯、粘薯(云南)

**Dioscorea hemsleyi** Prain et Burkill

生于海拔1 000—3 100米的山坡疏灌丛中。分布于广西、四川、贵州、云南。

块茎：甘，平。润肺，益肾，健脾祛湿。用于肺痨，脾虚泄泻。

**高山薯蓣**　滇白药子(贵州)

**Dioscorea henryi** (Prain et Burkill) C. T. Ting——*D. kamoonensis* Kunth var. *henryi* Prain et Burkill

生于海拔2 000—3 000米的林缘、山坡路旁或次生灌丛中。分布于四川西部、贵州北部、云南东南部。

块茎：用于咳嗽，风湿痛。

**白薯莨**　山薯(福建),山朴薯(广东),板薯(海南),大力王(云南)

**Dioscorea hispida** Dennst.

生于海拔500—2 500米的山坡沟边、灌丛或林缘。野生或栽培。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、云南、西藏。

块茎(白薯莨):苦,寒。有毒。散瘀消肿,解毒。用于痈疽肿毒,梅毒,跌打损伤。

**日本薯蓣**　野山药(通称),山蝴蝶(浙江),风车子(江西),野白姑(湖南),小粘狗苕(贵州),狂风藤(植物名实图考)

**Dioscorea japonica** Thunb.

生于海拔150—1 200米的向阳山坡、山谷、溪沟路旁杂木林下或草丛中。分布于中南及江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、四川、贵州。

块茎(风车儿):甘,平。补脾养胃,生津益肺,补肾涩精。效用参见薯蓣。

附　注:功效相同的有**毛藤日本薯蓣 D. japonica** Thunb. var. **pilifera** C. T. Ting et M. C. Chang,分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广西、贵州。

**毛芋头薯蓣**　马蹄细心、滇白药子(贵州),防风党参(云南)

**Dioscorea kamoonensis** Kunth——*D. fargesii* Franch.

生于海拔500—3 000米的林缘、山谷、山沟路旁和次生灌丛中。分布于西南及陕西、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西。

块茎:甘,温。舒筋壮骨,止痛,补虚。用于劳伤,虚弱。

**黑珠芽薯蓣**　毛狗卵(贵州),黑弹子、粉渣渣、白药子(云南)

**Dioscorea melanophyma** Prain et Burkill

生于海拔1 300—2 500米的林缘或稀疏灌丛中。分布于西南及广西。

块茎:用于咽喉肿痛,痈肿热毒。

**穿龙薯蓣**　穿山龙、穿地龙(通称),金刚骨(华北),鸡骨头(河北、山东),常山(山西、陕西)

**Dioscorea nipponica** Makino

生于海拔100—1 700米的山坡、河谷两侧林缘或灌丛中,海拔300—900米处生长较多。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、青海南部、山东、安徽、浙江北部、江西庐山、河南、湖北、四川西北部。

根状茎(穿山龙):甘、苦,温。祛风除湿,舒筋活血,止咳平喘,止痛。用于风湿关节痛,腰腿酸痛,麻木,大骨节病,跌打损伤,咳嗽痰喘。

附　注:本种为甾体激素药物的重要原料之一。含此成分的还有**柴黄姜 D. nipponica** Makino subsp. **rosthornii** (Prain et Burkill) C. T. Ting,分布于陕西、甘肃、湖北、湖南、四川、贵州。

**薯蓣**　怀山药(通称),山药蛋(东北及山东),山药薯(湖南),山板薯(广西),野牛尾苕(四川)

**Dioscorea opposita** Thunb.——*D. batatas* Decne.

生于海拔150—1 500米的山坡、山谷、溪边灌丛或杂草中,多为栽培。分布于东北、华东、中南及河北、北京、天津、陕西、甘肃、四川、贵州、云南。

块茎(山药):甘,平。补脾养胃,生津益肺,补肾涩精。用于脾虚食少,久泻不止,肺

虚喘咳，肾虚遗精，带下病，尿频，虚热消渴。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**黄山药**　　黄姜、老虎姜(四川、云南)，猴节莲(贵州)，姜黄草(植物名实图考)

**Dioscorea panthaica** Prain et Burkill——*D. biseriolis* Prain et Burkill

生于海拔 1 000—3 500 米的山坡灌丛下、林缘或山地路旁。分布于湖北、湖南西北部、四川西部，贵州西部、云南北部。

根状茎(滇白药子)：苦、辛，平。祛风除湿，消肿止痛，解毒。用于胃痛，跌打损伤，瘰疬。

**小花盾叶薯蓣**　　苦良姜、老虎姜(云南)

**Dioscorea parviflora** C. T. Ting

生于海拔 400—2 000 米的山坡石灰岩干热河谷地区的林下或疏灌丛中。分布于云南泸水、永胜、禄劝、开远及弥勒。

根状茎：消肿解毒。用于疮疡肿毒，软组织损伤。

附　注：云南特有药用植物。

**五叶薯蓣**　　血参(广西)，毛团子、苦卡拉(云南)

**Dioscorea pentaphylla** L.

生于海拔 500—1 500 米的林缘或灌丛中。分布于江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、四川、云南、西藏。

块茎：补肾壮阳。用于肾虚，瘰疬，腹痛，痈肿疮毒。

**褐苞薯蓣**　　山薯(广西)

**Dioscorea persimilis** Prain et Burkill

生于海拔 100—2 100 米的山坡、路旁、山谷杂木林下或灌丛中，多为栽培。分布于湖南、广东、海南、广西、贵州、云南。

块茎(山药)：甘，平。补脾肺，涩精气。

附　注：本种在广西、广东以山药供药用。

**绵萆薢**　　畚箕斗、狗粪棵(浙江)，山畚箕(江西)，大萆薢(福建、湖南)

**Dioscorea septemloba** Thunb.

生于海拔 450—750 米的山坡路旁疏林下或灌丛中。分布于浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西。

根状茎(绵萆薢)：苦，平。利湿祛浊，祛风通痹。用于淋证，白浊，带下病，湿热疮毒，腰膝痹痛。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**马肠薯蓣**

**Dioscorea simulans** Prain et Burkill

生于海拔 600 米以下的山坡疏灌丛中或路旁岩石缝中。分布于湖南南部、广东北部、广西。

根状茎：用于跌打损伤，肿毒。

**毛胶薯蓣**　　粘狗苕(贵州)，粘山药、黄山药(云南)，牛尾参(滇南本草)

**Dioscorea subcalva** Prain et Burkill

生于海拔 700—3 200 米的山谷、山坡灌丛中或林缘湿地。分布于湖南、广西、四川、贵州、云南。

块茎(粘山药): 甘,平。健脾祛湿,补肺益肾。用于脾虚泄泻,消渴,跌打损伤。

**细柄薯蓣** 小黄连、野生姜(浙江)

**Dioscorea tenuipes** Franch. et Sav.

生于海拔 800—1 100 米的海滨岩石、山谷疏林下或林缘、竹林、溪畔或灌丛中。分布于安徽南部、浙江、江西南部、福建、湖南南部、广东北部。

根状茎: 苦,温。舒筋活血,祛风止痛。用于风湿关节痛,腰腿疼痛,跌打损伤,咳嗽气喘,大骨节病。

**山萆薢** 土黄连(江苏),竹根薯(浙江),小萆薢、土黄姜(湖南)

**Dioscorea tokoro** Makino

生于海拔 60—1 000 米的稀疏杂木林或竹林下。分布于江苏南部、安徽南部、浙江、江西南部、福建、河南南部、湖北、湖南、四川、贵州。

根状茎(山萆薢): 舒筋活血,祛风利湿。用于风湿痹痛,腰膝酸痛,淋浊,带下病。

**盾叶薯蓣** 枕头根(湖北、四川),水黄姜(四川),苦良姜、老虎姜、黄姜(云南)

**Dioscorea zingiberensis** C. H. Wright

生于海拔 100—1 800 米的杂木林、森林的沟谷边缘及腐殖质深厚的土层中。分布于陕西、甘肃、河南南部、湖北、湖南、四川、云南。

根状茎(枕头根): 甘、苦,凉。消肿解毒。用于痈疖肿毒,软组织损伤,蜂螫、虫咬伤。

附 注: 本种为生产薯蓣皂素的原料之一。

## 192. 雨久花科 Pontederiaceae

### 凤眼莲属 Eichhornia Kunth

**凤眼莲** 水葫芦(通称),凤眼兰(中药大辞典、全国中草药汇编),水浮莲、洋水仙(广州植物志),水莲花、水鸭婆(云南种子植物名录)

**Eichhornia crassipes** (Mart.) Solms——*Pontederia crassipes* Mart.

野生或栽培于池塘、湖沼、水田或流水缓慢的河渠中。原产美洲热带。我国南北各地均有分布,长江流域以南诸省区生长较多。

全草(水葫芦): 淡,凉。清热解暑,利尿消肿,祛风湿。用于中暑烦渴,水肿,小便不利;外敷热疮。

### 雨久花属 Monochoria Presl

**箭叶雨久花** 山芋(中国高等植物图鉴)

**Monochoria hastata** (L.) Solms——*Pontederia hastata* L.

生于水田、池塘、河边或海滨湿地。分布于我国南部各省区。

全草: 清热解毒,定喘,消肿。

**雨久花**　田菜、福菜(福建)，雨韭(本草纲目拾遗)，浮蔷(救荒野谱)，兰鸟花(植物名汇)，水白菜(全国中草药汇编)

**Monochoria korsakowii** Regel et Maack

生于池塘、湖沼边、溪沟或水田中。分布于东北、华北、华东、中南及陕西。

全草(雨韭)：甘，凉。清热解毒，止咳平喘，祛湿消肿。用于高烧咳喘，小儿丹毒。

**鸭舌草**　水玉簪(陕西)，猪耳菜、鸭嘴菜(江苏药材志)，鸭儿嘴(植物名实图考)，啪哽(傣语)，罗妞妞剖(哈尼语)

**Monochoria vaginalis** (Burm. f.) Presl——*Pontederia vaginalis* Burm. f.

生于湿地、浅水沟塘或水田中。我国大部分省区均有分布。

全草(鸭舌草)：苦，凉。清热解毒。用于泄泻，痢疾，乳蛾，齿龈脓肿，丹毒；外用于蛇虫咬伤，疮疖。

## 193. 鸢尾科　Iridaceae

### 射干属　Belamcanda Adans.

**射干**　野萱花(西北)，扇子草(山西、陕西、甘肃、湖北)，老鸦扇(陕西)，铁扁担(江苏)，交剪草(广东、广西)

**Belamcanda chinensis** (L.) DC.—— *Ixia chinensis* L.

生于向阳山坡、干草原、灌丛、林缘或河谷滩地，亦有栽培。全国均有分布。主产江苏、安徽、浙江、河南、湖北、湖南、贵州、云南。

根状茎(射干)：苦，寒。有小毒。清热解毒，利咽消痰。用于咽喉肿痛，痰咳气喘。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

### 雄黄兰属　Crocosmia Planch.

**雄黄兰**　倒挂金钩、标竿花、黄大蒜(云南)，扭子药、火焰兰(云南种子植物名录)，观音兰(庐山植物园栽培植物手册)

**Crocosmia crocosmaeflora** (Nichols.) N. E. Br.——*Tritonia crocosmaeflora* Nichols.

为园艺杂交种，我国北方多为盆栽，南方露地栽培于花坛，常逸为半野生。

球茎(扭子药)：有小毒。散瘀止痛，消炎，止血，生肌。用于全身筋骨疼痛，跌打损伤，外伤出血，痔瘘。

### 番红花属　Crocus L.

**白番红花**　阿拉套番红花(新疆)

**Crocus alatavicus** Regel et Sem.

生于海拔 1 200—3 000 米的山坡、河滩草地或林缘。分布于新疆伊犁、新源、巩留、尼

勒克。

球茎：新疆哈萨克族医生将本种球茎代马钱子药用，有毒，应慎用。

**番红花**　西红花(通称)，藏红花(英拉汉植物名称)

**Crocus sativus** L.

原产欧洲南部至伊郎。我国河北、北京、陕西、甘肃、新疆、山东、江苏、浙江、上海、河南、湖北、广东、四川、西藏引种栽培。

柱头(番红花)：甘，平。活血，祛瘀，止痛。用于血滞月经不调，产后恶露不行，瘀血作痛，跌打损伤，忧郁痞闷，胸胁胀闷。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

## 红葱属　Eleutherine Herb.

**红葱**　小红蒜(云南思茅)，百步还阳(云南耿马)，怕波亮(傣语)

**Eleutherine plicata** Herb. ——*E. americana* Merr. ex Heyne

原产印度群岛。广西及云南热带地区常见栽培，并常逸为半野生。

鳞茎：苦，凉。止血，活血，清热解毒，散瘀消肿。用于月经过多，红崩，衄血，胃肠出血，痢疾及跌打损伤。傣医将鳞茎用于刀伤，癫痫抽搐，关节疼痛，头晕，心慌，胸闷呕吐，全身疲乏无力。

附　注：国外用鳞茎泡酒服，有增强体力的功效。

## 香雪兰属　Freesia Klatt

**香雪兰**　菖蒲兰(武汉)，小鸢尾(四川)，小蔓兰(拉汉种子植物名录)

**Freesia refracta** Klatt

原产非洲南部。我国南方各地多露天栽培，北方各地多盆栽。

球茎：清热解毒，活血。用于蛇伤疮痛。

## 唐菖蒲属　Gladiolus L.

**唐菖蒲**　荸荠莲(东北、云南)，十样景(北京)，十三太保(四川)，标样花(全国中草药汇编)，搜山黄(贵州民间草药)

**Gladiolus gandavensis** Van Houtte.

原产南非。我国各地庭园广为栽培，贵州、云南有些地区常逸为半野生。

球茎：苦，凉。有毒。解毒散瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，咽喉肿痛；外用于疔腮，蛇伤疮毒，瘰疬。

## 鸢尾属　Iris L.

**单苞鸢尾**　蛇不见(浙江)，夏无踪(江西)，避蛇参、春不见(湖北)，仇人不见面(广

西）

**Iris anguifuga** Y. T. Zhao ex X. J. Xue

生于山坡草地或栽培。分布于安徽、湖北、广西。浙江、江西、贵州常见栽培。

根状茎(蛇不见)：消肿解毒，泻下通便。用于毒蛇咬伤，毒蜂螫伤，痈肿疮毒。

**金脉鸢尾**　周玛(藏名)，金纹鸢尾(中国高等植物图鉴)，金网鸢尾(中国植物学杂志)

**Iris chrysographes** Dykes

生于海拔1 200--4 400米的山坡草地或林缘竹丛中。分布于西南。河北有少量栽培。

根状茎及种子：消积破瘀，利水。用于食滞腹胀，气痛，肿毒。

**高原鸢尾**　小棕包(中国高等植物图鉴)，小棕皮头(昆明民间常用草药)

**Iris collettii** Hook. f.

生于海拔1 600—4 000米的高山草地、向阳山坡或石隙间。分布于四川、云南、西藏。

根、叶柄残基及叶：辛，温。有大毒。祛瘀，止血，止痛，通窍，杀蛆。用于跌打损伤，鼻塞不通，神经性牙痛；外用于外伤出血，疮毒生蛆。

附　注：本品有大毒，须慎用，服药后禁酒。

**扁竹兰**　扁竹根、扁竹(四川、云南)，都拉鸢尾(全国中草药汇编)，兰花扁竹(云南中草药选)

**Iris confusa** Sealy

生于平地、林缘、疏林下、沟谷湿地或山坡草地。分布于广西、四川、贵州、云南。

根状茎：苦，寒。清热解毒。用于急性乳蛾，急性咽喉痛，咳嗽痰喘。并解乌头、蕈类食物中毒。

**尼泊尔鸢尾**　小兰花(云南)

**Iris decora** Wall.——*I. nepalensis* D. Don

生于海拔1 200—3 100米高山带的荒山坡、草地、林缘、岩石缝隙及疏林下。分布于四川、云南、西藏。

根：轻泻，利尿。外用于疔疮，伤肿。

**野鸢尾**　扇子草(河北)，土射干、老鸦扇、二歧鸢尾(陕西)，白射干(中国高等植物图鉴)

**Iris dichotoma** Pall.

生于固定沙地、丘陵、山地灌丛和草地。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、青海、山东、江苏、安徽、江西、河南、湖北、贵州。

根状茎(白射干)：苦，寒。有小毒。清热解毒，活血消肿。用于咽喉肿痛，乳蛾，肝炎，肝肿大，胃痛，乳痈，牙龈肿痛。

**玉蝉花**　花菖蒲(中国高等植物图鉴)，紫花鸢尾(东北植物检索表)，东北鸢尾(庐山植物园栽培植物)

**Iris ensata** Thunb.——*I. kaempferi* Sieb.

生于湿草甸及沼泽地或河岸水湿地。分布于东北及山东、浙江、湖北、云南。

根状茎：辛，苦。有小毒。清热消食。用于食积饱胀，胃痛，气胀水肿。

附　注：湖北民间用于跌打损伤。

**德国鸢尾**

**Iris germanica** L.

原产欧洲。我国各地庭园有引种栽培。

茎叶：活血化痰，祛风利湿。

**锐果鸢尾**　　小排草(四川)

**Iris goniocarpa** Baker

生于海拔 2 400—4 000 米的高山草甸、山坡、草丛及林下、林缘或箐沟中。分布于陕西、甘肃、青海、宁夏、四川、云南、西藏。

根及种子：清热解毒，凉血利湿。用于咽喉肿痛，黄疸。

附　注：西藏少数地区根药用：活血祛瘀，消肿止痛，截疟，除湿。

**喜盐鸢尾**

**Iris halophila** Pall.

生于山溪、河湖周围台地。分布于甘肃、新疆。

根状茎、花及种子：甘、淡，凉。清热解毒，利尿，止血。种子：用于咽喉痛，吐血，月经过多。花：用于痈肿疮疖。根状茎：用于痔疮。

附　注：功效相同的有**蓝花鸢尾 I. halophila** Pall. var. **sogdiana** (Bunge) Grubov——*I. sogdiana* Bunge，分布于甘肃、新疆。

**蝴蝶花**　　铁扁担根(上海)，紫燕(浙江)，金剪刀(江西)，豆豉草、扁竹根(湖南、四川、贵州)，日本鸢尾(中国植物学杂志)

**Iris japonica** Thunb.

喜生于较阴湿的山坡、水边、疏林下或林缘草地。分布于华东、中南、西南及河北、陕西、甘肃。

根状茎及全草：苦，寒。有小毒。根状茎：泻下通便。全草：清热解毒，消肿止痛。用于肝炎，肝肿大，肝区痛，胃痛，食积胀满，咽喉肿痛，跌打损伤。

**白蝴蝶花**

**Iris japonica** Thunb. f. **pallescens** P. L. Chiu et Y. T. Zhao

生于山坡林缘或疏林下阴湿处。分布于浙江。

种子：(白蝴蝶花子)：用于小便淋痛不利。

**马蔺**　　马莲、马兰(东北、华北、西北)，尖瓣马蔺(黑龙江)，紫雪草、兰花草(安徽)，蠡实(神农本草经)

**Iris lactea** Pall. var. **chinensis** (Fisch.) Koidz.——*I. pallasii* Fisch. var. *chinensis* Fisch.

生于荒野、路旁、山坡草地，尤以盐碱化的草场生长较多。全国大部分省区有分布。

根(马蔺根)：甘，平。清热解毒。用于急性咽喉肿痛，病毒性肝炎，痔疮，牙痛。花(马蔺花)：咸、酸、苦，微凉。清热凉血，利尿消肿。用于吐血，咯血，衄血，咽喉肿痛，小便淋痛，外用于痈疖疮疡，外伤出血。种子(马蔺子)：甘，平。清热，利湿，止血解毒。用于黄疸，泄泻，吐血，衄血，血崩，带下病，喉痹，痈肿，肿瘤。

**天山鸢尾**

**Iris loczyi** Kanitz

生于海拔 2 000 米以上的高山向阳草地或山溪、河湖周围台地。分布于内蒙古、甘肃、宁夏、青海、新疆、四川、西藏。

根及种子：消肿止痛。

**卷鞘鸢尾**　　高原鸢尾(青藏高原植物图鉴)

**Iris potaninii** Maxim.

生于海拔 3 000 米以上的粘土、龟裂土、石质山坡及沙地、草地。分布于甘肃、青海、西藏。

种子：甘、淡，凉。退热，解毒，驱虫。用于肠痛，蛔虫病，蛲虫病。

**兰花卷鞘鸢尾**

**Iris potaninii** Maxim. var. **ionantha** Y. T. Zhao

生于石质山坡、灌丛、草甸。分布于甘肃、青海玛多、西藏。

根、花、种子：甘，平。除湿热，解毒，止血。

**粗壮小鸢尾**　　拟罗斯鸢尾大花变种(中国植物学杂志)

**Iris proantha** Diels var. **valida** (Chien) Y. T. Zhao—— *I. pseudorossii* Chien var. *valida* Chien

生于向阳山坡下部的林缘草地上或疏林下草丛中。分布于浙江。

根状茎：用于妇女产后劳伤。

**锥紫苞鸢尾**　　紫苞鸢尾(东北植物检索表)，紫石蒲(乾隆御制集)，俄罗斯鸢尾(中国植物学杂志)，苏联鸢尾(秦岭植物志)

**Iris ruthenica** Ker-Gawl. var. **nana** Maxim.

生于海拔 1 600—3 300 米的高山草地、湿润山谷或林下。分布于东北、华北、西北及山东、四川、云南、西藏。

根状茎：辛，温。有毒。活血祛瘀，接骨，止痛。全草：用于疮疡肿毒。

**溪荪**　　东方鸢尾(中国植物学杂志)，日鸢尾(黑龙江)，豆豉草、下搜山(贵州)，西伯利亚鸢尾(东北植物检索表)

**Iris sanguinea** Donn ex Hom.

生于山坡、山沟、林间、草地、沼泽地及低湿地。分布于东北及内蒙古。

根及根状茎：辛，平。消积行水。也用于胃痛。

**膜苞鸢尾**　　镰叶马蔺(中国沙漠植物志)

**Iris scariosa** Willd. ex Link

生于石质低山坡、碎石草地、河谷及盐化沙地。分布于新疆。

根状茎：消炎止痛。用于咽喉肿痛，音哑。

**山鸢尾**

**Iris setosa** Pall. ex Link

生于海拔 1 500—2 500 米的草地、旷野、沼泽地。分布于辽宁、吉林。

根状茎及花：外用于疥疮，牙痛，脓肿。

**准噶尔鸢尾**

**Iris songarica** Schrenk

生于向阳高山草地、石质山坡或山溪、河湖周围台地。分布于西北。

根及种子：消肿止痛。

**小花鸢尾**　野兰花(湖北)，八棱麻、红丝毛草(四川)，石菖蒲(贵州)，九节地菖蒲、山菖蒲(全国中草药汇编)

**Iris speculatrix** Hance——*L. grijsii* Maxim.

生于山地林缘、路旁或沟边潮湿草丛中及疏林下。分布于陕西、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州。

根状茎：辛、苦，寒。有小毒。消积，化瘀，行水，解毒。用于食滞腹胀，癥瘕积聚，跌打损伤，痔漏，痈肿疔毒。

**鸢尾**　蛤蟆七、青蛙七(陕西、湖北)，兰蝴蝶(浙江、江西、湖北、湖南、广东、广西、云南)，扁竹根(湖北)，土知母、川射干(四川)

**Iris tectorum** Maxim.

生于向阳山坡草地、林缘、灌丛及溪边潮湿地，庭园亦有栽培。分布于华东、中南、华南、西南及河北、山西、陕西、甘肃、西藏。

根状茎(鸢尾)：甘、微苦，寒。有小毒。活血祛瘀，祛风利湿，解毒，消积。用于跌打损伤，风湿疼痛，咽喉肿痛，食积腹胀，疟疾；外用于痈疖肿痛，外伤出血。

附　注：四川以鸢尾根状茎代射干用，并有较长历史。

**细叶鸢尾**　细叶马蔺、丝叶马蔺、老牛揣、(东北)，楚勒布尔-乌布斯(蒙语)

**Iris tenuifolia** Pall.

生于沙质土壤、沙砾质地、固定沙丘、石质碎石山坡或草原。分布于东北、华北、西北及内蒙古、新疆、西藏。

根及种子：微苦，凉。安胎养血。用于胎动血崩。　种子：功效同马蔺子。

**粗根鸢尾**　粗根马蔺(东北)，巴格查黑勒达格(蒙语)，拟虎鸢尾(中国植物学杂志)

**Iris tigridia** Bunge

生于碎石山坡、沙质地、草原或固定沙丘。分布于东北、西北及内蒙古、山西。

根及种子：养血安胎。

**北陵鸢尾**　香蒲叶鸢尾(东北植物检索表)

**Iris typhifolia** Kitag.

生于沙丘、山坡或沼泽地及水边湿地。分布于东北及内蒙古。

根：用于乳痈，口疮。

**单花鸢尾**

**Iris uniflora** Pall. ex Link

生于林下、湿草地或干山坡、林缘、路旁，多成片生长。分布于东北及内蒙古。

根及种子：甘，平。有小毒。　根：泻下，逐腹水，通便利尿；　种子：清热解毒。用于咽喉肿痛，黄疸，小便不利。

**扁形鸢尾**　铁扇子、老君扇、大扁竹兰、扁竹鸢尾、都拉(云南)

**Iris wattii** Baker ex Hook. f.

生于海拔1 200—2 300米的山坡阳处或林缘草地、河边湿地。分布于云南、西藏。

根状茎：苦，寒。清热消肿。用于乳蛾，咽喉痛，咳嗽痰喘。　全草：淡、微苦，平。解

毒。用于乌头、蕈类中毒及其他食物中毒。

**黄花鸢尾**　开口箭(湖北)

**Iris wilsonii** C. H. Wright

生于山坡草丛、林缘草地及河边湿地。分布于陕西、甘肃、湖北、四川、云南。

根状茎：用于咽喉肿痛。

### 肖鸢尾属　Moraea Mill.

**肖鸢尾**　蝴利兰(中国植物志)

**Moraea iridioides** L.

原产非洲南部。我国大部分地区有栽培。

根：清热解毒。

## 194. 水玉簪科　Burmanniaceae

### 水玉簪属　Burmannia L.

**三品一枝花**　少花水玉簪(海南植物志)，地沙、米洋参(中药大辞典)

**Burmannia coelestis** D. Don

生于 50—1 250 米的山坡、路旁、草丛中或溪边阴湿地。分布于浙江、江西、福建、广东、海南、广西、贵州、云南。

根及根状茎(地沙)：甘，平。健脾，消积。用于小儿疳积。

**水玉簪**　苍山贝母(云南大理)

**Burmannia disticha** L.

生于溪边、山坡、潮湿林中或灌丛、湿草地上。分布于福建、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南。

全草：用于水肿。

## 195. 田葱科　Philydraceae

### 田葱属　Philydrum Banks ex Gaertn.

**田葱**　水芦荟、水葱(福建)，中葱(生草药性备要)，扇合草(中国高等植物图鉴)

**Philydrum lanuginosum** Banks

生于池塘、水田或湿地上。分布于福建、台湾、广东、海南、广西。

全株：清热利湿。用于水肿热痹，多发性脓肿，疥癣。

# 196. 灯心草科 Juncaceae

## 灯心草属 Juncus L.

**翅茎灯心草** 三角草、水三棱草(湖北)，翅灯心草(秦岭植物志)

**Juncus alatus** Franch. et Sav.

生于水边、草丛中及潮湿地。分布于陕西及长江流域各省区。

全草：清热，通淋，止血。用于心烦口渴，口舌生疮，淋证，小便涩痛，带下病。

**葱状灯心草**

**Juncus allioides** Franch.

生于海拔1 800—3 650米的山坡、沟边近水潮湿处。分布于陕西、甘肃、青海、湖北、四川、贵州、云南。

全草：清热，通淋，利尿，止血。

**走茎灯心草** 拉冈(藏语)

**Junus amplifolius** A. Camus

生于海拔2 700—4 100米的高山湿草地或林缘。分布于陕西、甘肃、四川、云南、西藏。

根状茎(草香附)：辛、苦，平。理气止痛，调经活血。用于肝郁气滞，胸胁疼痛，月经不调，崩中带下。

**小花灯心草**

**Juncus articulatus** L. ——*J. lampocarpus* Ehrh. ex Hoffm.

生于水边、湿草地或山坡荒野、沟边阴湿处、分布于东北、华北、西北、华东及四川。

全草：甘、涩，寒。清热利尿，除烦。

**小灯心草**

**Juncus bufonius** L.

生于水边、湿草地及沼泽地。分布于长江以北各省区及安徽、四川、云南。

茎髓：清热，通淋，利尿，止血。

**扁茎灯心草**

**Juncus compressus** Jacq.

生于沼泽、池塘、湖泊。分布于新疆。

全草：清热解毒，利水消肿，安神镇惊。

**星花灯心草** 水扁九草、水三棱(湖北)，扁杆灯心草(四川)

**Juncus diastrophanthus** Buchen.

生于山沟水旁，湿润草丛中或沼泽地。分布于陕西、安徽、湖北、四川。

全草(螃蟹脚)：苦，凉。清热，消食，利尿。用于宿食内停，小便赤热。

**灯心草** 灯草(陕西、上海、四川)，灯心草(江苏、湖北、四川)，水灯心、虎须草(云南)，野席草(浙江民间草药)

**Juncus effusus** L.

野生于池边、堤岸、沟渠旁、溪边、田边及沼泽湿地，也有栽培。全国均有分布，四川、贵州有栽培。

茎髓(灯心草)：甘、淡，微寒。清热，利尿，安神。用于心烦少眠，口舌生疮，淋证，小便淋痛不利。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**片髓灯心草**

**Juncus inflexus** L.——*J. glaucus* Ehrh. ex Sibth.

生于山谷、河滩水湿地。分布于华北及陕西、甘肃、四川、云南。

全草：清热，利尿，镇静。

**细灯心草**

**Juncus gracillimus** (Buchen.) V. Krecz. et Gontsch.——*J. compressis* Jacq. var. *gracillimus* Buchen.

生于湖边、池沼、河滩、水边及浅水中。分布于东北、华北、西北及长江流域各省区。

全草：清热，通淋，利水祛湿。

**江南灯心草**　　水茅草(全国中草药汇编)，笋石蒿(海南植物志)

**Juncus leschenaultii** Gay

常生于潮湿草地上。分布于长江流域以南及陕西。

茎髓：功效同灯心草。　全草：清热除烦，利水通淋。用于尿血，水肿，咽喉肿痛，急性泄泻。

**多花灯心草**　　多花丝灯心草(秦岭植物志)

**Juncus modicus** N. E. Br.

生于海拔 3 000 米以下的潮湿地上、沼泽边缘及林间水草地。分布于陕西、甘肃、湖北、四川。

全草：清热，通淋，止血。

**长柱灯心草**　　北方灯心草(云南种子植物名录)

**Juncus przewalskii** Buchen

生于海拔 3 000 米左右的高山湿草地、沼泽边缘及林间水草地。分布于陕西、甘肃、青海、云南。

叶：微苦，寒。祛风明目，舒筋活络。

**野灯心草**　　铁灯草(四川)，仙人针(贵州)，秧草(云南)

**Juncus setchuensis** Buchen.

生于水沟路旁、潮湿沼泽地、或浅水中。分布于西南、河南及长江流域中下游各省。

茎髓：利尿通淋，泄热安神。用于小便不利，热淋，水肿，小便涩痛，心烦失眠，鼻衄，目赤，齿痛，血崩。

附　注：河南用根状茎入药。

**拟灯心草**　　龙须草、野席草(本草纲目拾遗)，野灯草(浙江民间常用草药)，水通草、秧草根(云南中草药)

**Juncus setchuensis** Buchen var. **effusoides** Buchen.

多生于潮湿地及沼泽边缘。分布于陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、河南、湖南、四川、贵州。

全草(龙须草): 淡,寒。利尿通淋,泄热安神。用于小便赤涩,热淋,水肿,头昏齿痛,鼻衄,咽喉痛,心烦。

**展苞灯心草**　　野灯心草(四川)

**Juncus thomsonii** Buchen.

生于潮湿草地或阴湿处。分布于陕西、甘肃、青海、四川、云南、西藏。

全草: 清热,利尿,凉血。

**三头灯心草**

**Juncus triceps** Rostk.

生于潮湿草地或阴湿处。分布于四川。

全草: 淡,平。清热利尿。用于热病烦渴,咽喉痛,咳嗽,小儿烦躁,多啼。

## 地杨梅属　Luzula DC.

**地杨梅**

**Luzula capitata** (Miq.) Miq. ex Kom.——*L. campestris* (L.) DC. var. *capitata* Miq.

生于平地、山坡、林缘或草地。分布于东北及河北、河南。

全草、果实: 辛,平。用于赤白痢疾。

**散序地杨梅**　　散穗地杨梅(秦岭植物志)

**Luaula effusa** Buchen.——*L. chinensis* N. E. Br.

生于海拔 1 500—3 200 米的山坡林下或林缘灌丛中。分布于西南及陕西、甘肃、湖北。

全草、果实: 用于赤白痢疾,消肿。

**多花地杨梅**　　野高粱(湖北)

**Luzula multiflora** (Retz.) Lej.——*Juncus multiflora* Retz.; *L. campestris* (L.) DC. var. *multiflora* (Retz.) C. B. Clarke

生于海拔 800—2 100(—4 050) 米的山坡林缘或草丛中。全国大部分省区均有分布。

全草、果实: 用于赤白痢疾,淋证,便秘。

# 197. 凤梨科　Bromeliaceae

## 凤梨属　Ananas Mill.

**菠萝**　　凤梨、露兜子(中国高等植物图鉴),打锣锤(云南种子植物名录)

**Ananas comosus** (L.) Merr.——*Bromelia comosa* L.

原产美洲热带。我国福建、广东、海南、广西、云南常见栽培。

果皮: 用于痢疾。

## 水塔花属　Billbergia Thunb.

**水塔花**　　水星菠萝(广西)

**Billbergia pyramidalis** Lindl.

广西、云南有栽培。

叶：消肿排脓。外用于疮疡肿毒。

## 198. 鸭跖草科 Commelinaceae

### 穿鞘花属 Amischotolype Hassk.

**穿鞘花** 鞘花(贵州)

**Amischotolype hispida** (Less. et A. Rich.) Hong——*Forrestia hispida* Less. et A. Rich.

生于海拔 1 100—1 700 米的山谷、溪边或林下、林缘阴湿处。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

全草：清热解毒，利水消肿。用于淋证，毒蛇咬伤。

### 鸭跖草属 Commelina L.

**饭包草** 兰花菜(吉林)，淡竹叶、大叶兰花草(江苏)，竹菜、竹仔菜（福建民间草药)，火柴头(江苏南部种子植物手册)

**Commelina benghalensis** L.

生于田边、沟内、路旁、林下阴湿处。分布于华东、西南及河北、陕西、甘肃、河南、湖北、广东、海南、广西。

全草(竹叶菜)：苦，寒。清热解毒，利水消肿。用于小儿风热咳嗽，小便不利，淋沥作痛，赤痢，疔疮肿毒，蛇咬伤。

**鸭跖草** 鸭食草、鸭子菜(辽宁经济植物志)，竹鸡苋(江西中药)，竹根菜(四川中药志)，竹叶菜、淡竹叶、碧蝉花(本草纲目)

**Commelina communis** L.

生于田野、路旁、溪边、山坡、林缘潮湿处。全国大部分省区有分布。

全草(鸭跖草)：甘、淡，寒。清热解毒，利水消肿，退烧。用于感冒发热，丹毒，痄腮，黄疸，咽喉肿痛，淋证，水肿，痈疽疔毒及毒蛇咬伤。

附 注：临床用于黄疸，感冒发烧，麦粒肿有效。

**竹节草** 黄花草(广西)，竹筋草(贵州)，竹节菜、竹节花(海南植物志)，竹蓄草(全国中草药汇编)

**Commelina diffusa** Burm. f.

生于山坡、草地、溪边、林下或林缘阴湿处。分布于福建、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南。

全草(竹节草、竹节菜)：淡，寒。清热解毒，利尿消肿，止血。用于咽喉痛，痢疾，白浊，疮疖，小便淋痛不利；外用于外伤出血。

**大苞鸭跖草** 竹叶茶(广西)，大苞地地藕(云南)

**Commelina paludosa** Bl.

生于海拔 1 000—2 700 米的山谷、溪边、林下及草丛中。分布于西南及福建、台湾、江西。

全草：功效同鸭跖草。

附　注：**波鸭跖草 C. undulaya** R. Br. 分布于云南、西藏。在西藏作鸭跖草入药。

## 兰耳草属　Cyanotis D. Don

**蛛丝毛兰耳草**　鸭脚菜(广西)，露水草、珍珠露水草、鸡冠参(全国中草药汇编)

**Cyanotis arachnoides** C. B. Clarke

生于山坡草地、路旁或林下石上。分布于福建、台湾、广东、广西、贵州、云南。

根：甘，平。祛风活络，利湿消肿，退虚热。用于风湿关节痛，四肢麻木，腰腿痛，水肿，虚热不退。全草(珍珠露水草)：外用于湿疹，脚癣，刀伤，毒蛇咬伤。

附　注：根含活性良好的 β- 脱皮激素，其含量约为全草干重的 1.2%，地下部分达 2.9%。

**四孔草**　竹夹草(广西)

**Cyanotis cristata** (L.) D. Don——*Commelina cristata* L.

生于海拔 200—1 00 米的山地林下或旷野、田边。分布于广东、海南、广西、云南。

全草：外用于痈疮肿毒。

**兰耳草**　露水草(昆明民间常用草药)

**Cyanotis vaga** (Lour.) J. A. et J. H. Schult.——*Tradescantia vaga* Lour.

生于山坡草地、海滨沙地或疏林下。分布于西南及台湾、广东、海南、广西。

根(露水草)：补虚，除湿，舒筋活络。用于虚热不退，水肿，风湿关节痛，湿疹；外用于中耳炎，脚癣。

## 聚花草属　Floscopa Lour.

**聚花草**　紫竹叶草(湖南)，水波草(广西)

**Floscopa scandens** Lour.

生于海拔 130—1 700 米的山谷、沟边、河旁、草地及林下。分布于浙江、江西、福建、湖南、广东、海南、广西、云南。

全草：清热解毒，利水消肿。用于疮疖肿毒，淋巴结肿大，水肿。

## 水竹属　Murdannia Royle

**大苞水竹叶**　青竹壳菜、疥子草(广西)，露水草(云南)，围夹草、癌草(全国中草药汇编)

**Murdannia bracteata** (C. B. Clarke) O. Kuntze ex J. K. Morton——*Aneilema nudiflorum* R. Br. var. *bracteatum* C. B. Clarke; *A. bracteatum* (C. B. Clar-

ke) O. Kuntze

生于海拔500—1 000米的箐沟水边或林下旷地草丛中。分布于广东、海南、广西、云南。

全草(痰火草)：甘、淡，凉。化痰散结。用于瘰疬，咽喉肿痛，高热，咳血，吐血，小便淋痛；外用于疮疡肿毒。

**紫背鹿衔草**　竹节草、黄竹参(贵州)，仙茅、土三七(云南)，竹叶参(昆明民间常用草药)

**Murdannia divergens** (C. B. Clarke) Bruckn.——*Aneilema herbaceum* C. B. Clarke var. *divergens* C. B. Clarke; *A. divergens* C. B. Clarke

生于山坡、草地及林缘。分布于广西、四川、贵州、云南。

根、全草(竹叶兰)：辛，凉。　根：补肺，健脾，益肾。用于气喘咳嗽，头晕耳鸣，吐血，外伤骨折。　全草：清肺，解毒。

**疣草**

**Murdannia keisak** (Hassk.) Hand.-Mazz.——*Aneilema keisak* Hassk.

生于水边。分布于东北及浙江、江西。

根：清热解毒，利尿消肿。用于小便淋痛，瘰疬，蛇咬伤。

**牛轭草**　晒不死(广西)

**Murdannia loriformis** (Hassk.) Rolla Rao et Kammathy——*Aneilema loriforme* Hassk.; *A. angustifolium* N. E. Br.

生于山谷、溪边、路旁。分布于广东、海南、广西、云南。

全草：用于小儿高烧，咳嗽，痢疾，痈疮肿毒。

**腺毛水竹叶**　山野茹草(贵州)

**Murdannia loureirii** (Hance) Rolla Rao et Kammathy——*Aneilema loureirii* Hance

生于低、中山沟谷雨林下、灌丛中，常附生于岩石或树上。分布于广东、海南、贵州普安、云南勐海。

全草：用于关节痛。

附　注：功效相同的有**大果水竹叶 M. macrocarpa** Hong，分布于广东、贵州兴义及晴隆、云南普文及镇康。

**裸花水竹叶**　红毛草(江苏)，紫花竹草、小征鸡舌癀(福建)，红竹壳菜(广西)，地韭菜(四川)，山韭菜(云南)

**Murdannia nudiflora** (L.) Brenan——*Commelina nudiflora* L.; *Aneilema nudiflora* (L.) R. Br.

生于潮湿荒地、溪旁、草丛及林下。分布于华东及河南、湖北、广西、四川、贵州、云南。

全草(红毛草)：甘、淡，平。清肺热，消肿毒，凉血，止血。用于肺热咳嗽，咳血，乳蛾，咽喉痛，急性泄泻，乳痈；外用于目赤肿痛，疮疡肿毒，蛇伤。

**细竹蒿草**　血见愁、云茅草、红韭菜、斑茅胆草、十二妹(广西)

**Murdannia simplex** (Vahl) Brenan——*Commelina simplex* Vahl; *Aneilema simplex* (Vahl) Kunth

生于海拔530—2 000米的林下及潮湿草地。分布于广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全草(细竹蒿草)：甘，平。凉血，止血，健脾。用于热症，小儿惊风，肺热咳嗽，吐血，目赤肿痛，痈疮肿毒。

附　注：云南全草用于补虚，除湿，舒筋活络，调经。

**水竹叶**　三角菜(江苏)，竹叶菜(湖北)，鸡舌草、鸡舌癀(泉州本草)

**Murdannia triquetra** (Wall.) Bruckn.——*Aneilema triquetra* Wall.

生于水田、草丛、浅水边或阴湿地。分布于东北、华东、中南、西南。

全草(水竹叶)：甘，平。清热解毒，利尿消肿。用于肺热咳喘，赤白下痢，小便淋痛，咽喉肿痛，痈疖疔肿；外用于关节肿痛，蛇蝎虫伤。

## 杜若属　Pollia Thunb.

**粗柄杜若**　水芭蕉(广西)，大杜若(贵州、云南)，七喜草(云南)，竹节兰、占占领(傣名)，大剑叶木(云南思茅中草药选)

**Pollia hasskarii** Rolla Rao

生于海拔700—2 000米的山谷密林中或溪旁。分布于海南、广西、贵州、云南。

根(大剑叶木)：甘，温。补虚，祛风湿，通经。用于风湿关节痛，腰腿痛，阳痿，小便涩痛，产后大出血；外用于脱肛，痈疮肿毒。

**杜若**　竹叶莲(江苏、湖南药物志)，山竹壳菜(广西)，竹叶花(四川)，地藕(湖南药物志)

**Pollia japonica** Thunb.

生于山谷、林下、林缘、溪边阴湿处。分布于华东、中南及四川、贵州。

根状茎或全草(竹叶莲)：辛，微温。根状茎：补肾。用于腰痛，跌打损伤。全草：理气止痛，疏风消肿。用于气滞作痛，肌肤肿痛，胃痛，淋证；外用于蛇虫咬伤，痈疔疖，脱肛。

**川杜若**　杜若(四川)

**Pollia omeiensis** Hong

生于海拔500—1 800米的灌丛林下阴湿处。分布于广西、四川、贵州、云南。

根及全草：解毒消肿，补肾壮阳。

**伞花杜若**

**Pollia subumbellata**, (C. B. Clarke) C. B. Clarke——*Aclisia subumbellata* C. B. Clarke

生于海拔(200—)630—1 600米的沟谷、灌丛或林下。分布于四川、贵州、云南。

根或全草：解毒消肿，补肾壮阳。

## 紫万年青属　Rhoeo Hance

**紫万年青**　蚌兰叶(广东中药)，蚌花(云南、广州植物志)，蚌兰花(岭南采药录)

**Rhoeo discolor** (L′ Hérit.) Hance

原产美洲热带。我国南方各省区常有露地栽培，其他省区见于温室栽培。

叶(蚌兰叶)：甘、淡，凉。清热，止血，祛瘀，用于肺热燥咳，吐血，便血，尿血，痢疾，跌打损伤。　花序(蚌兰花)：甘、淡，凉。清肺化痰，凉血，止痢。用于肺热燥咳，顿咳，瘰疬，吐血，衄血，血痢，便血。

## 竹叶吉祥草属　Spatholirion Ridl.

**竹叶吉祥草**　竹叶风(广西)，竹叶藤参(四川)，白龙须、马耳朵草(云南)，珊瑚草、缠百合(中药大辞典、全国中草药汇编)

**Spatholirion longifolium** (Gagnep.) Dunn——*Streptolirion longifolium* Gagnep.

生于溪旁或山谷林下阴湿处。分布于长江流域以南各省区。

根(竹叶藤参)：健脾，温胃，补肾壮阳。　花序(珊瑚草)：涩，凉。调经，止痛。用于月经不调，神经性头痛。

**竹叶子**　猪耳朵(陕西秦岭)，猪仔草、猪草(湖北)，水百步还魂(广西)，露水草(四川)

**Spatholirion volubile** Edgew.

生于山谷、林下、林缘、草地或农田旁的砂质湿润土壤中。分布于东北、华北、西南及陕西、甘肃、浙江、河南、湖北、广西。

全草：补气虚，止咳，调经，止痛。用于肺痨，跌打损伤，风湿痹痛，带下病。

附　注：**红毛竹叶子 S. volubile** Edgew. var. **khasianum** (C. B. Clarke) Hong，分布于贵州、云南。全草：祛风除湿。

## 紫露草属　Tragescantia L.

**紫露草**　花鸭跖草(湖北)，血见愁、紫鸭跖草(广西中药志)，鸭跖草、鸭舌癀(泉州本草)

**Tragescantia virginiana** L.

多栽培于庭园。安徽、福建、河南、湖北、广西有栽培。

全草(紫鸭跖草)：甘、淡，凉。活血，利水，消肿，解毒，散结。用于痈疽肿毒，瘰疬，淋证，毒蛇咬伤，跌打，风湿痛。

## 水竹草属　Zebrina Schnizl.

**吊竹梅**　水竹草(北京、浙江)，红莲(山西)，鸭舌红、红鸭跖草(福建)，花叶竹夹菜(广西民间常用草药)

**Zebrina pendula** Schnizl.

生于山边、村边和沟旁、田园边较阴湿的草地上。原产墨西哥。我国河北、山西、福建、浙江、广东、广西、云南均有栽培。

全草(吊竹梅): 甘,凉。有毒。清热解毒,凉血,利尿。用于肺痨咯血,喉咙肿痛,目赤红肿,痢疾,水肿,淋证,带下病;外用于痈毒,烧、烫伤,毒蛇咬伤。

## 199. 黄眼草科 Xyridaceae

### 黄眼草属 Xyris L.

**葱草** 红头草(广西),黄谷精(海南植物志),少花黄眼草(云南种子植物名录)

**Xyris pauciflora** Willd.

生于海拔900米以下的山谷、田野、沼泽及水田中。分布于我国东南部和南部。

全草: 外用于癣疥。

## 200. 谷精草科 Eriocaulaceae

### 谷精草属 Eriocaulon L.

**毛谷精草**

**Eriocaulon australe** R. Br.

生于水田、溪沟或向阳的潮湿地。分布于广东、海南、广西、贵州、云南。

带茎的头状花序(谷精珠)或全草: 疏散风热,明目,退翳。用于风热目赤,肿痛羞明,眼生翳膜,风热头痛;外用于疮疥。

附 注: ①福建、广东、广西作谷精草药用。②眼科要药。

**谷精草** 翳星草(江苏),珍珠草(湖北、云南),挖耳草(云南),佛顶草、灌耳草(四川中药志),文星草(本草纲目)

**Eriocaulon buergerianum** Koern.

生于水稻田、浅水池沼边及溪沟阴湿处。分布于华东、中南、西南及陕西、甘肃。

带茎的花序(谷精草): 辛、甘,平。疏散风热,明目,退翳。用于风热目赤,肿痛羞明,眼生翳膜,风热头痛。

附 注: 《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**冠鳞谷精草**

**Eriocaulon cristatum** Mart. var. **mackii** Hook. f.

生于海拔2 000—2 800米的田边、沼泽、低洼湿地。分布于广东、云南。

全草或花序: 苦,平。清肝明目,祛风除湿。

**长苞谷精草** 长苞谷精珠(福建)

**Eriocaulon decemflorum** Maxim.

生于路边、溪沟、田边阴湿地。分布于东北及山东、浙江、福建、湖南。

花序或全草: 辛、甘,平。功效同精谷草。

**异花谷精草**

**Eriocaulon heteroanthum** Benth.

生于水田边或溪旁。分布于陕西南部、福建、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草：清肝明目。

**小谷精草**

**Eriocaulon luzulifolium** Mart.

生于田边、湿地。分布于安徽、浙江、台湾、广东、广西、贵州、云南。

花序或全草：明目退翳，祛风止痛。

**宽叶谷精草**

**Eriocaulon robustius** (Maxim.) Makino——*E. alpestre* Hook. f. et Thoms. var. *robustius* Maxim.

生于水田及低湿地。分布于东北及河北、河南。

全草：疏散风热，明目退翳。

**华南谷精草**　　簪子草(海南)，谷精草(海南植物志)

**Eriocaulon sexangulare** L.——*E. wallichianum* Mart.

生于田边、路边、溪谷沟旁及低洼地。分布于江西、福建、台湾、湖北、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

花序(谷精珠)或全草：辛、甘，平。功效同谷精草。

附　注：福建、广东、广西习惯以本种作谷精草用。

**白药谷精草**　　赛谷精草(广州植物志)，流昨草(全国中草药汇编)

**Eriocaulon sieboldianum** Sieb. et Zucc. ex Steud.

生于水田、沟边及沼泽地。分布于华东、中南、西南及陕西、新疆。

花序或全草：辛、甘，平。功效同谷精草。

**瑶山谷精草**

**Eriocaulon yaoshanense** Ruhl.

生于稻田、水边及低洼地。分布于广东、广西。

花序或全草：清热祛风，清肝明目，利尿，镇痛。用于目赤肿痛，小便淋痛不利。

## 201. 禾本科　Gramineae

### 芨芨草属　Achnatherum Beauv.

**醉马草**　　醉针茅、药草(中国沙漠地区药用植物)，德里松-霍尔(蒙语)

**Achnayherum inebrians** (Hance) Keng——*Stipa inebrians* Hance

生于干旱山地草原或沟谷底部、坡地沿径流线生长。分布于西北及内蒙古、四川西部、西藏。

全草(药老)：甘、淡，平。有毒。清热解毒。用于疮疡肿毒，疔腮，关节疼痛。

**芨芨草**　　德里斯、滴里刺(蒙名)

**Achnatherum splendens** (Trin.) Nevski——*Stipa splendens* Trin.

生于干旱及半干旱区盐化草甸。分布于东北、华北、西北及青藏高原。

全草，花(芨芨草)：甘、淡，平。清热利尿。用于小便淋痛不利。　花：止血。

## 獐毛属　Aeluropus Trin.

**獐毛**　　马绊草、马牙头(中国沙漠植物志)

**Aeluropus littoralis** Parl. var. **sinensis** Debeaux

生于盐化草甸或盐土低地、盐湖周围、海滨盐滩。分布于东北、华北、西北、西南及江苏、河南。

全草：甘、淡，平。清热利尿，退黄。用于黄疸，胆囊炎，肝硬化腹水。

## 冰草属　Agropyron Gaertn.

**冰草**　　油日呼格(蒙语)

**Agropyron cristatum** (L.) Gaertn.——*Bromus cristatus* L.

生于干燥草地、山坡、丘陵及沙地。分布于东北、华北及甘肃、青海、新疆。

根：止血，利尿。

**沙芦草**　　蒙高勒-油日呼格(蒙语)

**Agropyron mongolicum** Keng

生于干燥草原、沙地、石砾质地。分布于山西、内蒙古、陕西北部、甘肃、宁夏。

根：止血，利尿。

## 剪股颖属　Agrostis L.

**剪股颖**

**Agrostis matsumurae** Hack. ex Honda

生于海拔300—1700米的草地、路边、山坡林下、田野、潮湿地。分布于华东、中南、西南。

全草：用于咳嗽。

## 看麦娘属　Alopecurus L.

**看麦娘**

**Alopecurus aequalis** Sobol.

生于山坡、田野、河滩、潮湿低地草甸。分布于华东及内蒙古、陕西、甘肃、宁夏、河南、湖北、湖南、广西、贵州。

全草：淡，凉。利湿，解毒消肿。用于水肿，水痘，小儿消化不良，泄泻。　种子：用于水肿，水痘，蛇咬伤。

**日本看麦娘**

**Alopecurus japonicus** Steud.

生于低海拔的麦田、湿草地。分布于陕西、江苏、浙江、湖北、广东、贵州。

全草：凉血，止血，活血。

**东北看麦娘**

**Alopecurus mandshuricus** Litw.

生于田野、河岸、草甸。分布于东北。

全草：利水消肿，解毒。

## 悬竹属　Ampelocalamus S. L. Chen, T. H. Wen et G. Y. Sheng

**射毛悬竹**

**Ampelocalamus actinotrichus** (Merr. et Chun) S. L. Chen, T. H. Wen et G. Y. Sheng——*Arundinaria actinotricha* Merr. et Chun

生于山地疏林中。分布于海南、四川、贵州、云南。

全株：祛风清热。

附　注：我国特有属。

## 水蔗草属　Apluda L.

**水蔗草**　　崩疮草(广西)

**Apluda mutica** L.

生于海拔300—2 100米的旷野或河堤、林缘、篱边。分布于西南及广东、海南、广西。

全草：清热解毒，祛腐生肌。用于毒蛇咬伤，阳痿。

## 三芒草属　Aristida L.

**华三芒草**

**Aristida chinensis** Munro

生于山坡草地、江边岩石或干山坡上。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

全草：清热解毒，利尿。

## 荩草属　Arthraxon Beauv.

**荩草**　　炮竹草(江苏)

**Arthraxon hispidus** (Thunb.) Makino——*Phalaris hispida* Thunb.

生于山坡草地、路旁或阴湿处。全国各省区普遍分布。

全草(荩草)：苦，平。止咳定喘，杀虫，解毒。用于久咳，上气喘逆，惊悸，恶疮疥癣。

附　注：功效相同的有**中亚荩草 A. hispidus** (Thunb.) Makino var. **centrasiaticus** Honda，分布于东北、西北、华东及内蒙古、河南、湖北、湖南；**匿芒荩草 A. hispidus** (Thunb.) Makino var. **cryptatherus** (Hack.) Honda，分布于华北、华东、中南、西南，用于肺痨。

**矛叶荩草**

**Arthraxon lanceolatus** (Roxb.) Hochst.——*Andropogon lanceolatus* Roxb.

生于山坡、旷野或阴湿处。分布于华北、华东、西南及河南、湖北、湖南、广西。

全草：止咳定喘，杀虫。

## 野古草属 Arundinella Raddi

**野古草**

**Arundinella hirta** (Thunb.) C. Tanaka —— *Poa hirta* Thunb.; *A. anomala* Steud.

生于山坡草地、树阴下或湿地上。除青海、新疆、西藏外，分布几遍全国。

全草：清热，凉血。

## 芦竹属 Arundo L.

**芦竹** 荻芦竹(广西)

**Arundo donax** L.

生于堤岸、道旁，适应性较强。分布于华东、中南、西南。东北及河北、陕西有引种栽培。

根状茎(芦竹)：苦，寒。清热利水。用于热病发狂，虚劳骨蒸，淋证，小便淋痛不利，风火牙痛。

## 燕麦属 Avena L.

**莜麦** 油麦(经济植物学)

**Avena chinensis** (Fisch. ex Roem. et Schult.) Metzg.——*A. nuda* L. var. *chinensis* Fisch. ex Roem. et Schult.

野生于山坡路旁、高山草甸及湿地。华北、西北、西南及湖北广泛栽培。

种仁(青稞)：咸，平、凉。下气宽中，补虚益气，除湿发汗，止泻。

**野燕麦** 乌麦(长白山植物志)

**Avena fatua** L.

生于荒野、路旁、麦田中。全国南北各地均有分布。

全草(燕麦草)：甘，温。补虚损。用于吐血，虚汗，崩漏。

附 注：功效相同的有**光稃野燕麦 A. fatua** L. var. **glabrata Peterm.**，分布于全国各地；**光轮野燕麦 A. fatua** L. var. **mollis** Keng，分布于陕西、江苏、安徽、湖北、湖南、广东、四川。

**燕麦** 野麦、浮小麦(广西)

**Avena sativa** L.

原产欧洲，品种很多。我国东北、华北、西北、中南、西南及江苏广为栽培。

种仁：退虚热，益气，止汗，解毒。

## 簕竹属 Bambusa Schreb.

**粉单竹**

**Bambusa chungii** McClure——*Lingnaria chungii* (McClure) McClure

生于村旁、路边或丘陵地上。分布于广东、海南、广西。

叶芽：用于皮疹。

**坭簕竹**

**Bambusa dissemulator** McClure

广州有栽培。分布于广东。

根：用于狂犬病。 竹茹：用于胃热呕吐。

**慈竹**

**Bambusa emeiensis** Chia et H. L. Fung——*Lingnaria affinis* (Rendle) Keng f.

生于低山丘陵及平地。分布于陕西南部、湖北西部、湖南、广西、四川、贵州、云南。

叶、花、竹茹、根、笋(慈竹)：甘、苦，凉。清心热，止烦渴。 花：用于劳伤吐血。 竹茹：甘，凉。清热凉血，除烦止呕。 根：用于乳汁不下。 笋：用于脱肛，疝气。

**凤尾竹** 观音竹

**Bambusa glaucescens** (Willd.) Sieb. ex Munro cv. **fernleaf** (Young) Young

庭园种植。长江流域以南各省区均有栽培。

叶：甘，凉。清热，除烦，利尿。

**撑篙竹**

**Bambusa pervariabilis** McClure

野生或种植。分布于广东、海南、广西。

叶、茎皮：甘，凉。清热，除烦，止呕。

**车角竹**

**Bambusa sinospinosa** McClure

生于向阳山坡或河流沿岸较高处。分布于广东、广西、四川、贵州。

幼苗(刺竹笋)：苦，平。清热，凉血，止痢。用于小儿高热，风热感冒，小便淋痛，鼻衄，消化不良，痢疾；外用于竹木刺入肉。

**青皮竹**

**Bambusa textilis** McClure

种植或野生。分布于广东、广西。华东、西南有栽培。

竿内分泌物(竹黄)：甘，寒。清热豁痰，清心定惊。用于热病神昏，中风痰迷，小儿痰热惊痫，抽搐，夜啼。

附 注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**青秆竹**

**Bambusa tuldoides** Munro

原产广东，其他省区有栽培。

茎的中间层(竹茹)：甘，微寒。清热化痰，除烦止呕。用于痰热咳嗽，胆火挟痰烦热

呕吐，惊悸失眠，中风痰迷，口强不语，胃热呕吐，妊娠恶阻，胎动不安。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**密节竹**　　佛肚竹

**Bambusa ventricosa** McClure

特产广东。台湾、广西、海南、四川、云南有栽培。

嫩叶：清热，除烦。

**黄金间碧竹**

**Bambusa vulgaris** Schrad. ex Wendland var. **vittata** (A. et C. Riviere) Gamble

多为栽培观赏，长江流域以南各省区均有分布。福建、台湾、广东、海南、广西、四川、贵州、云南种植较多。

叶：清凉解热。

## 茵草属　Beckmannia Host.

**茵草**　　茵米(尔雅翼)，水稗子(南满洲植物名录)

**Beckmannia syzigachne** (Steud.) Fern.——*Panicum syzigachne* Steub.

生于海拔 3 700 米以下的湿地、水沟边或浅流水中。全国各地均有分布。

种子：滋养益气，健胃利肠。

## 臂形草属　Brachiaria Grised.

**毛臂形草**

**Brachiaria villosa** (Lam.) A. Camus——*Panicum villosum* Lam.

生于海拔 800—2 200 米的田野、山坡草地。分布于陕西、甘肃、安徽、浙江、福建、湖北、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草：用于大便秘结，小便短赤。

## 雀麦属　Bromus L.

**雀麦**

**Bromus japonicus** Thunb.

生于海拔 3 000 米以下的山坡、荒野，路旁。分布于东北、华东及陕西、青海、新疆、河南、湖北、湖南、广西、四川、云南。内蒙古有引种。

茎、叶(雀麦)：甘，平。催产，杀虫，止汗。用于自汗盗汗，汗出不止，难产，虫积。

## 沿沟草属　Catabrosa Beauv.

**沿沟草**　　但物尕拉(藏名)

**Catabrosa aquatica** (L.) Beauv.——*Aira aquatica* L.

生于沼泽、草甸及河沟边。分布于内蒙古、甘肃、青海、四川、云南。

全草：甘、酸，寒。清热，消炎。用于风热咳喘。

附　注：本种为藏药。

## 酸模芒属　Centotheca Desv.

**酸模芒**

**Centotheca lappacea** (L.) Desv.——*Cenchrus lappaceus* L.

生于疏林下的林间旷地或林缘道旁。分布于台湾、广东、海南、广西、云南。

全草：甘、淡，寒。清热除烦，利尿。

## 山涧草属　Chikusichloa Koidz.

**无芒山涧草**

**Chikusichloa mutica** Keng

生于山谷、溪沟旁。分布于广西、海南、贵州。

根：清热解毒。用于咽喉肿痛。

## 虎尾草属　Chloris Swartz

**虎尾草**　　刷头草、布尔干-苏利(蒙语)

**Chloris virgata** Swartz

生于田间、荒野、路旁、堤岸和土墙上。全国各地均有分布。

全草：清热除湿，杀虫，止痒。

## 金须茅属　Chrysopogon Trin.

**竹节草**　　鸡谷草、草谷子(广西)

**Chrysopogon aciculatus** (Retz.) Trin.——*Andropogon aciculatus* Retz.

生于海拔 250—1 840 米的山坡、草地、旷野。分布于台湾、广东、海南、广西、云南。

全草(鸡谷草)：苦，凉。清热利湿，消肿，止痛。用于感冒发热，小便短赤，木薯中毒。根：用于毒蛇咬伤。

## 隐子草属　Cleistogenes Keng

**多叶隐子草**

**Cleistogenes polyphylla** Keng

生于干燥山坡、草原、草甸。分布于东北、华北及陕西、河南北部及黄土高原地区。

全草：利尿，消肿。

## 薏苡属　Coix L.

**薏苡**　薏米（通称），川谷（救荒本草），野绿米、素珠果（滇南本草）

**Coix lacryma-jobi** L. var. **mayuen** (Roman) Stapf

多为种植。全国各地多有栽培。

种仁（薏苡仁）：甘、淡，凉。健脾渗湿，除痹止泻，清热排脓。用于水肿，脚气，小便淋痛不利，湿痹拘挛，脾虚泄泻，肺痈，肠痈，扁平疣。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 香茅属　Cymbopogon Spreng.

**青香茅**　桔香草、香花草（广西）

**Cymbopogon caesius** (Nees) Stapf——*Andropogon caesius* Nees

生于山坡草地。分布于广东、海南、广西。

全草：辛，温。祛风除湿，消肿止痛。也用于阳痿。

**香茅**　柠檬茅（种子植物名称），茅香草（通称），牛腿芒（广西）

**Cymbopogon citratus** (DC.) Stapf——*Andropogon citratus* DC.

为栽培的一种香料植物。分布于福建、台湾、湖北、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全草（香茅）：辛，温。疏风解表，祛瘀通络。用于风湿痛，头痛，胃痛，月经不调。

**芸香草**

**Cymbopogon distans** (Nees ex Steud.) W. Wats.——*Andropogon distans* Nees ex Steud.

生于海拔 1 500—3 200 米的山坡草地。分布于陕西、甘肃、广西、四川、贵州、云南。

全草（芸香草）：辛、苦，凉。解表，利湿，止咳平喘。用于咳喘，风湿关节痛，泄泻，消化不良。

**桔草**　五香草（广西）

**Cymbopogon goeringii** (Steud.) A. Camus——*Andropogon goeringii* Steud.

生于海拔 900—3 000 米的山坡草地。分布于华北、华东、中南、西南。

全草（野香茅）：辛，温。平喘止咳，止痛，止泻，止血。用于咳嗽。

**扭鞘香茅**　细香草、生姜草（广西）

**Cymbopogon tortilis** (Presl) A. Camus——*Anthistiria tortilis* Presl

生于海拔 300—2 700 米的林缘、山坡草丛中。分布于华东、中南、西南。

全草：辛、微苦，凉。用于瘴气，水土不服，风热暑湿，胸膈痞胀，呕吐水泻。

附　注：傣族民间用于避孕。

## 狗牙根属　Cynodon Rich.

**狗牙根**　爬根草(江苏),铁线草、鸡肠草(广西),绊根草(中国沙漠植物志)

**Cynodon dactylon** (L.) Pers.——*Panicum dactylon* L.

生于路旁、草地,也有栽培作地被植物。全国各地均有分布。

全草(铁线草): 微甘,平。祛风,活络,止血,生肌。用于咽喉肿痛,肝炎,痢疾,小便淋涩,鼻衄,咯血,便血,呕血,脚气水肿,风湿骨痛,癣疹,半身不遂,手脚麻木,跌打损伤;外用于外伤出血,骨折,疮痈,小腿溃疡。

## 龙爪茅属　Dactyloctenium Willd.

**龙爪茅**　野掌草(广西)

**Dactyloctenium aegyptium** (L.) Beauv.——*Cynosurus aegyptius* L.

生于低海拔处的山坡、旷野、草地。分布于浙江、福建、台湾、广东、海南、广西、云南。

全草: 补虚益气。

## 绿竹属　Dendrocalamopsis (Chia et Fung) Keng f.

**大头典竹**

**Dendrocalamopsis beecheyana** (Munro) Keng f. var. **pubescens** (P. F. Li) Keng f.——*Sinocalamus beecheyanus* (Munro) McClure var. *pubescens* P. F. Li

生于山坡、路旁、平地,多为种植。分布于广东、海南、广西。

竿的中间层(竹茹): 甘,寒。清热化痰,除烦止呕。

附　注: ①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②我国特有属。

**绿竹**

**Dendrocalamopsis oldhamii** (Munro) Keng f.——*Bambusa oldhamii* Munro; *Sinocalamus oldhamii* (Munro) McClure

生于山坡、路旁。分布于浙江、福建、台湾、广东、海南、广西。

笋干、茎的内膜: 甘,平。祛痰,平喘;止咳。

## 牡竹属　Dendrocalamus Nees

**龙竹**

**Dendrocalamus giganteus** Munro——*Sinocalamus giganteus* (Munro) A. Camus

生于山坡、路旁。云南西南部为分布区北界。

竹液的块状物: 清热化痰。用于烦躁失眠,小儿惊痫,中风。

**麻竹**

**Dendrocalamus latiflorus** Munro——*Sinocalamus latiflorus* (Munro) McClure

生于水边、谷地、村旁，多为种植。分布于浙江、江西、福建、台湾、广东、海南、广西、贵州。

花：止咳化痰。

**吊丝竹**　　乌药竹(通称)

**Dendrocalamus minor** (McClure) Chia et Fung——*Sinocalamus minor* McClure

生于路边、平地或山坡，多为种植。分布于广东、广西、贵州、云南。

茎、叶：用于风湿骨痛。

**牡竹**

**Dendrocalamus strictus** (Roxb.) Nees——*Bambusa strictus* Roxb.

生于海拔1 000米以下的山谷或河堤，常有种植。分布于台湾、广东、广西、云南。

花：清热，利尿。

## 龙常草属　Diarrhena Beauv.

**龙常草**

**Diarrhena manshurica** Maxim.

生于海拔1 500米以下的林下阴湿处。分布于东北及河北、陕西。

全草：清热解毒。

## 马唐属　Digitaria Heister ex Fabr.

**止血马唐**

**Digitaria ischaemum** (Schreb.) Schreb. ex Muhl.——*Panicum ischaemum* Schreb.

生于河边、田埂和荒野湿润处。全国各地均有分布。

全草：甘，寒。凉血，止血，收敛。

**马唐**

**Digitaria sanguinalis** (L.) Scop.——*Panicum sanguinale* L.

生于山坡草地、田野路旁。我国各地均有分布。

全草(马唐)：甘，寒。明目，润肺。

## 油芒属　Eccoilopus Steud.

**油芒**

**Eccoilopus cotulifera** (Thunb.) A. Camus——*Andropogon cotulifera* Thunb.

生于平原旷野、山谷草地。分布于华东、中南、西南及陕西、甘肃。

全草：用于痢疾。

## 稗属　Echinochloa Beauv.

**光头稗**

**Echinochloa colonum** (L.) Link——*Panicum colonum* L.

生于田野、园圃、路边湿润处。分布于华东、中南、西南及陕西。

全草：微苦，温。利尿，止血。用于水肿，腹水，咯血。

**稗**　　水高粱(广西)，稗子(救荒本草)

**Echinochloa crusgalli** (L.) Beauv.——*Panicum crusgalli* L.

生于沼泽、沟旁和稻田中。全国各地均有分布。

全草(稗)：微苦，微温。止血，生肌。用于金疮及损伤出血，麻疹。

附　注：功效相同的有**无芒稗 E. crusgalli** (L.) Beauv. var. **mitis** (Pursh) Peterm.；**孔雀稗 E. crusgalli** (L.) Beauv. var. **cruspavonis** (H. B. K.) Hitch.；**锡兰稗 E. crusgalli** (L.) Beauv. var. **zelayensis** (H.B. K.) Hitch.，全国均有分布。

## 穇属　Eleusine Gaertn.

**穇子**　　龙爪稷(北方)，野鸭粟(广西)

**Eleusine coracana** (L.) Gaertn.——*Cynosurus coracanus* L.

为农作物之一，多有种植。分布于华东、中南、西南。

果实(穇子)：甘，温。补中益气，涩肠止泻。

**牛筋草**　　蟋蟀草(上海)，扁草(江西)，野鸭脚粟(广西)

**Eleusine indica** (L.) Gaertn.——*Cynosurus indicus* L.

生于荒野、路边、草地。全国各地均有分布。

全草(牛筋草)：甘、淡，平。祛风利湿，清热解毒，散瘀止血。用于防治乙脑，流脑，风湿关节痛，黄疸，小儿消化不良，泄泻，痢疾，小便淋痛；跌打损伤，外伤出血，犬咬伤。

## 画眉草属　Eragrostis Beauv.

**鼠妇草**　　串鱼草(广西)

**Eragrostis atrovirens** (Desf.) Trin. ex Steud.——*Poa atrovirens* Desf.

生于田野、路旁或水湿处。分布于广东、海南、广西、云南。

全草：甘、淡，凉。清热利湿。用于暑热病，小便短赤，痢疾。

**大画眉草**

**Eragrostis cilianensis** (All.) Link ex Vign.-Lut.——*Poa cilianensis* All.；*E. megastachya* Link

生于山坡、路旁、旷野处。全国大部分地区均有分布。

全草、花序(星星草)：甘、淡，凉。疏风清热，利尿。用于砂淋，石淋，水肿，目赤。花

序：淡，平。解毒，止痒。用于黄水疮。

**知风草**

**Eragrostis ferruginea** (Thunb.) Beauv.——*Poa ferruginea* Thunb.

生于海拔 3 000 米以下的山坡、路旁、草地。分布于华北、西北、华东、中南、西南及吉林。

根：甘，平。舒筋散瘀。用于跌打损伤。

**华南画眉草**　　石骨儿(广西)

**Eragrostis nevinii** Hance

生于旷野。分布于福建、广东、海南、广西。

叶：止血。

**黑穗画眉草**

**Eragrostis nigra** Nees ex Steud.

生于山坡、草地、路旁。分布于陕西、甘肃、广西、四川、贵州、云南。

全草(露水草)：甘，平。清热，止咳，镇痛。用于顿咳，腹痛。

**宿根画眉草**　　串鱼草(广西)

**Eragrostis perennans** Keng

生于田野、路旁草地。分布于福建、广东、海南、广西。

全草：用于痢疾。

**画眉草**

**Eragrostis pilosa** (L.) Beauv.——*Poa pilosa* L.

生于田野、旷地、路边。全国各地均有分布。

全草(画眉草)：甘、淡，凉。疏风清热，利尿。用于砂淋，石淋，水肿。　花序：解毒，止痒。用于黄水疮。

附　注：功效相同的有**无毛画眉草 E. pilosa** (L.) Beauv. var. **imberbis** Franch.，分布于东北、华北、华东、中南、西南。

**小画眉草**　　星星草(宁夏)

**Eragrostis poaeoides** Beauv.

生于草地、田野、路边。全国各地普遍分布。

全草：淡，凉。疏风清热，利尿。用于目赤，砂淋、石淋，脓疱疮。

**乱草**　　鲫鱼草(海南)

**Eragrostis tenella** (L.) Beauv. ex Roem. et Schult——*Poa tenella* L.

生于田野、路旁、河边低湿处。分布于长江流域以南各地区及台湾。

全草(香椎草)：咸，平。清热凉血。用于咳血，吐血。

## 蜈蚣草属　Eremochloa Büese

**假俭草**

**Eremochloa ophiuroides** (Munro) Hack.——*Ischaemum ophiuroides* Munro

生于山坡、旷野、路旁或湿草地。分布于长江流域以南各省区。

全草：用于劳伤腰痛，骨节酸痛。

## 蔗茅属　Erianthus Michx.

**蔗茅**

**Erianthus rufipilus** (Steud.) Griseb.——*Saccharum rufipilus* Steud.

生于海拔1 000—2 700米的山坡、草坡疏林中及河堤。分布于陕西、湖北、四川、贵州、云南。

根：清热解毒。

## 野黍属　Eriochloa Kunth

**野黍**

**Eriochloa villosa** (Thunb.) Kunth——*Paspalum villosum* Thunb.

生于田边、路旁、旷野、山坡、耕地和潮湿处。分布于东北、华北、华东、西南及河南、湖北、湖南。

全草：用于目赤。

## 拟金茅属　Eulaliopsis Honda

**拟金茅**

**Eulaliopsis binata** (Retz.) C. B. Hubb.——*Andropogon binatum* Retz.

生于海拔150—2 600米的山坡、草地。分布于陕西、台湾、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

全草(蓑草)：甘、淡，平。清热解毒，平肝明目，止血。用于感冒，肝炎，小儿风热，咳喘，乳痈，癣疹。

## 箭竹属　Fargesia Franch.

**箭竹**　拐棍竹(中国高等植物图鉴)，华桔竹(种子植物名称)

**Fargesia spathacea** Franch.

生于海拔2 000—3 000米的山坡林缘或林内。分布于陕西、甘肃、青海、湖北、四川、云南。为我国特有属。

叶：甘，寒。清热除烦，利尿。用于发热烦躁，口渴，小便短少黄赤。

## 黄茅属　Heteropogon Pers.

**黄茅**　茅刺草(广西)，毛针子草(贵州)，地筋(植物名实图考)

**Heteropogon contortus** (L.) Beauv. ex Roem.et Schult.——*Andropogon con-*

*torius* L.

生于海拔 150—2 200 米的山坡、草地和石山上。分布于中南、西南及陕西南部、浙江。

全草(地筋): 甘,温。祛风除湿,散寒,止咳。用于风寒咳嗽,风湿关节痛。

## 茅香属 Hierochloa R. Br.

**茅香**

**Hierochloa odorata** (L.) Beauv.——*Holcus odoratus* L.

生于海拔 850—3 750 米的阴坡、河滩或湿草地。分布于华北、西北及山东、云南。

根状茎(茅香): 甘,寒。清热利尿,凉血,止血。用于热淋,吐血,尿血,水肿。

附 注: 功效相同的有**毛鞘茅香 H. odorata** (L.) Beauv. var. **pubescens** Kryl,分布于华北、西北及四川。

## 大麦属 Hordeum L.

**大麦**

**Hordeum vulgare** L.

全国各地均有种植。但以西部和北部地区种植较多。

发芽的果实(麦芽): 甘,平。健脾开胃,行气消食,退乳消胀。用于食积不消,脘腹胀痛,脾虚食少,乳汁郁积,乳房胀痛,妇女断乳。

附 注: 《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**裸麦**

**Hordeum vulgare** L. var. **nudum** Hook. f.

适宜高原气候种植。分布于西北、西南。

发芽的果实(青稞麦): 咸,温。消食,和中。用于食欲不振,食积胀满,呕吐泄泻。

## 膜稃草属 Hymenachne Beauv.

**弊草**

**Hymenachne assamica** (Hook. f.) Hitchc.——*Panicum assamicum* Hook. f.

生于田边或湿地。分布于广东、海南、广西。

全草: 用于湿热病证,肺痨。

**膜稃草** 灯心草(海南)

**Hymenachne pseudointerrupta** C. Muell.

生于田间或沼泽浅水中。分布于广东、海南、广西、云南。

全草: 淡,凉。清热利尿。

## 白茅属 Imperata Cyrillo

**白茅** 茅草(通称),茅根、龙狗尾(广西),茅针(图经本草)

**Imperata cylindrica** (L.) Beauv. var. **major** (Nees) C. E. Hubb. ex Hubb et Vaughan——*I. koenigii* (Retz.) Beauv. var. *major* Nees

生于山坡、草地、路边、荒野、沙地，全国各地均有分布。

根状茎(白茅根)：甘，寒。凉血止血，清热利尿。用于血热吐血，衄血，尿血，热病烦渴，黄疸，水肿，热淋涩痛。花：甘，温。止血，定痛。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 箬竹属　Indocalamus Nakai

### 阔叶箬竹

**Indocalamus latifolius** (Keng) McClure——*Arundinaria latifolia* Keng

生于海拔 1 000 米以下的山坡、林下、河岸。分布于华东、中南、西南及陕西。

叶、果实：甘，寒。清热解毒，止血。用于喉痹，失音，妇女血崩。

### 箬竹

**Indocalamus tessellatus** (Munro) Keng f.——*Bambusa tessellata* Munro

生于低山丘陵、林下或林缘。分布于长江流域各省区。

叶(箬竹)：甘，寒。清热解毒，止血，消肿。用于吐衄，衄血，尿血，小便淋痛不利，喉痹，痈肿。

## 大节竹属　Indosasa McClure

### 大节竹

**Indosasa crassiflora** McClure

生于海拔 1 200 米左右的山谷路旁和灌丛中。分布于广西、云南。

杆伤流液干燥物：清热，祛痰，定惊，安神。用于高热神昏，谵语，中风痰热，小儿惊风抽搐。

## 柳叶箬属　Isachne R. Br.

### 柳叶箬

**Isachne globosa** (Thunb.) O. Kuntze——*Milium globosum* Thunb.

生于稻田、低湿地或浅水中。除东北外，其他省区均有分布。

全草：用于小便淋痛，跌打损伤。

## 假稻属　Leersia ex Swartz

### 假稻

**Leersia japonica** Makino

生于海拔 1 000 米左右的山谷、水边湿地。分布于河北、陕西、江苏、上海、安徽、浙江、

江西、福建、台湾、河南、湖北、湖南、四川、贵州。

全草(假稻)：辛，温。除湿，利水。用于风湿麻痹，下肢浮肿。

**田中游草**　　蓉草(广州)，牛草(四川)

**Leersia oryzoides** (L.) Swartz——*Phalaris oryzoides* L.

生于田野、溪边或丘陵疏林下。分布于中南及福建、台湾、四川、贵州。

全草(游草)：涩，平。解表散寒，通经活络，利尿。用于感冒，头痛，身痛，疟疾，痹痛麻木，带下病。

## 千金子属　Leptochloa Beauv.

**千金子**　　油草(湖南)

**Leptochloa chinensis** (L.) Nees——*Poa chinensis* L.

生于山坡、河谷、平原湿地或园圃。分布于华东、中南、西南及陕西。

全草(油草)：淡，平。行水，破血，攻积聚。用于症瘕，久热不退。

## 赖草属　Leymus Hochst.

**赖草**　　厚穗滨草、通克(蒙语)

**Leymus secalinus** (Georgi) Tzvel.——*Triticum secalinum* Georgi; *Aneurolepidium dasystachys* (Trin.) Nevski

生于山地草原、平原绿洲、沙地。分布于东北、华北、西北及四川。

根(水草)：甘，寒。清热，止血，利尿。用于感冒，衄血，哮喘，痰中带血，水肿。　菌穗：苦，凉。清热利湿。用于淋证，带下病。

附　注：功效相同的有**羊草 L. chinensis** (Trin.) Tzvel.，分布于东北、华北及陕西、新疆；**毛穗赖草 L. paboanus** (Claus) Pilger，分布于甘肃、青海、新疆。

## 淡竹叶属　Lophatherum Brongn.

**淡竹叶**

**Lophatherum gracile** Brongn.

生于山坡疏林下或阴湿地。分布于长江流域以南各省区。

茎叶(淡竹叶)：甘、淡，寒。清热除烦，利尿。用于热病烦渴，小便赤涩，淋痛，口舌生疮。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**中华淡竹叶**

**Lophatherum sinense** Rendle

生于山坡、林缘、溪沟边。分布于江苏南部、浙江、江西、福建、河南南部、湖北、湖南。

根：清热利尿，催生。

## 臭草属　Melica L.

**臭草**　猫毛草(甘肃)

**Melica scabrosa** Trin.

生于山坡、田野、路边。分布于东北、华北、西北、华东及河南、湖北。

全草(金丝草)：甘，凉。清热利尿，通淋。用于小便赤涩淋痛，水肿，感冒发热，黄疸，消渴。

附　注：功效相同的有**广序臭草 M. onoei** Franch. et Sav.，分布于华北、华东、中南及陕西。

## 莠竹属　Microstegium Nees

**蔓生莠竹**

**Microstegium gratum** (Hack.) A. Camus——*Pollinia grata* **Hack.**

生于林下、阴坡或潮湿处。分布于广东、海南、广西。

全草：止血。

## 芒属　Miscanthus Anderss.

**五节芒**

**Miscanthus floridulus** (Labill.) Warb. ex Schum. et Lauterb.——*Saccharum floridulum* Labill.

生于海拔 50—1 700 米的山坡、草地、河堤岸边。分布于华东、中南、西南。

根状茎部叶鞘内的虫瘿(巴芒果)：辛，温。理气，发表，散瘀。用于小儿疝气，小儿疹出不畅，月经不调。

**荻**　巴茅、山苇子(黑龙江)，红刚芦、红柴(江苏)

**Miscanthus sacchariflorus** (Maxim.) Benth. ex Hook. f.——*Imperata sacchariflora* Maxim.

生于海拔 1 000 米左右的山坡草地、堤岸及河滩地湿润处。分布于东北、华北、西北、华东及河南、贵州。

根状茎：甘，凉。清热，活血。用于干血痨，潮热，产妇失血口渴，牙痛。

**芒**　芒草(通称)，芭芒(黑龙江)，芒花草(广西)

**Miscanthus sinensis** Anderss.

生于山坡、田埂、沟堤岸旁。分布于东北、华北、华东、中南、西南及陕西。

茎、根状茎(芒)：甘，平。清热解毒，利尿。用于咳嗽，带下病，小便淋痛不利。　花序：甘，平。活血通经。用于月经不调，半身不遂。　幼茎内有寄生虫者(气笋子)：甘，平。调气，生津，补肾。用于妊娠呕吐，精枯阳痿。

**紫芒**　荻草(黑龙江)

**Miscanthus sinensis** Anderss. var. **purpurascens** (Anderss.) Matsum.——*M. purpurascens* Anderss.

生于干山坡草地或撩荒地。分布于东北、华北及陕西。

花序、根状茎(紫芒)：活血，通络。 根状茎：止渴，利尿。

## 类芦属 Neyraudia Hook. f.

**类芦** 篱笆竹、石芒草(广西)，望冬草(海南)，石珍茅(华南经济禾草)

**Neyraudia reynaudiana** (Kunth) Keng ex Hitchc.——*Arundo reynaudiana* Kunth

生于河边、草坡或石山上。分布于长江流域以南各省区及台湾。

幼茎、嫩叶(类芦)：甘、淡，平。清热利湿，消肿解毒。用于水肿。 嫩叶：用于毒蛇咬伤，竹木刺人肉。

## 求米草属 Oplismenus Beauv.

**求米草** 皱叶茅(湖北)

**Oplismenus undulatifolius** (Arduino) Roem. et Schult.——*Panicum undulatifolium* Arduino

生于山坡、林下或阴湿处。分布于华东、中南、西南及陕西、台湾。

全草：用于跌打损伤。

## 稻属 Oryza L.

**稻**

**Oryza sativa** L.

全国各地广为种植。

发芽的果实(稻芽)：甘，温。消食和中，健脾开胃。用于食积不消，腹胀口臭，脾胃虚弱，不饥食少。

附 注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**糯稻**

**Oryza sativa** L. var. **glutinosa** Matsum.

全国各地均有种植。

根(糯稻根)：甘，平。止汗。用于自汗，盗汗。

## 稷属 Panicum L.

**稷(黍)**

**Panicum miliaceum** L.

我国东北、华北、西北及江苏北部、安徽北部、河南等地广为种植。

种子：甘，平。益气补中。用于泻痢，烦渴，吐逆，咳嗽，胃痛，烧、烫伤。茎：辛，热。利尿。用于水肿，妊娠尿血。根：辛，热。有小毒。用于腹水胀满。

**心叶稷**　硬骨草(海南)，土淡竹叶(广西)

**Panicum notatum** Retz.

生于丘陵灌丛中或林缘湿地。分布于台湾、广东、海南、广西、云南。

全草：清热，生津。

**铺地黍**　枯骨草(海南)，藤竹草(广西)

**Panicum repens** L.

生于海边或潮湿处。分布于江苏、上海、浙江、福建、广东、海南、广西等沿海地区。

全草、根状茎(铺地黍)：甘、苦，平。清热利湿，平肝，解毒。用于淋浊，湿热带下。根状茎：用于高血压症，鼻窦炎，衄血。

## 雀稗属　Paspalum L.

**圆果雀稗**

**Paspalum orbiculare** G. Forst.

生于山坡草地或荒野。分布于浙江、江西、福建、台湾、广东、海南、广西、四川、贵州。

全草：清热，利尿。

**雏稗雀稗**

**Paspalum scrobiculatum** L.

生于荒野及潮湿处。分布于台湾、广东、海南、广西。

全草：广西民间用于驱蚊。

**雀稗**　鱼眼草、猪儿草(湖北)

**Paspalum thunbergii** Kunth ex Steud.

生于山坡草地及荒野和水湿地。分布于华东、中南、西南及陕西、台湾、河南。

全草：用于目赤肿痛，风热咳喘，肝炎，跌打损伤。

## 狼尾草属　Pennisetum Rich.

**狼尾草**　蒺草(江苏)，打死还阳(湖北)，狗子尾(广州)，黑狗尾草(四川)

**Pennisetum alopecuroides** (L.) Spreng.——*Panicum alopecuroides* L.

生于田岸、路旁、山坡、旷野。全国普遍分布。

全草、根(狼尾草)：甘，平。明目，散血。用于目赤肿痛。根：甘，平。清肺止咳，解毒。用于肺热咳嗽，咯血，疮毒。

**白草**　白草根(陕西)，倒虫草(青海)，得儿哇(藏语)

**Pennisetum flaccidum** Griseb.

生于低山坡、路旁较干燥处。分布于东北、华北、西北、西南。

根状茎：甘，寒。清热凉血，利尿。用于胃热呕吐，鼻衄，水肿，癃闭，肺热咳嗽，黄疸，

高血压症。

## 显子草属 Phaenosperma Munro ex Benth.

**显子草** 岩高粱(贵州)

**Phaenosperma globosa** Munro ex Benth.

生于海拔 1 500—2 900 米的山坡林下或山谷。分布于陕西、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

全草：甘，平。补虚，健脾，活血，调经。用于经闭，病后体虚。

## 鹅观草属 Phalaris L.

**鹅观草** 五色草(通称)，马羊草(吉林)，草芦(植物学大辞典)

**Phalaris arundinacea** L.

生于海拔 75—3 200 米的林下、潮湿草地或水湿处。分布于东北、华北、西北、华东及河南、湖南、四川、云南。

全草：用于带下病，月经不调。

## 梯牧草属 Phleum L.

**蜡烛草**

**Phleum paniculatum** Huds.

生于海拔 800—2 000 米的农田或道旁潮湿处。分布于长江流域及陕西、甘肃、河南。

全草：清热，利尿。用于顿咳，跌打损伤，狂犬咬伤。

**梯牧草**

**Phleum pratense** L.

原产欧、亚大陆温带地区。我国引种作牧草，有逸生于路旁、田野或荒芜场所。东北及河北、陕西、江苏、江西、河南多有野生。

全草：用于消化不良，泄泻，痢疾，小便淋痛不利。

## 芦苇属 Phragmites Trin.

**芦苇** 苇子草(黑龙江)，大芦柴(江苏)，芦(名医别录)，库米什(维吾尔语)

**Phragmites australis** (Cav.) Trin. ex Steud.——*Arundo australis* Cav.; *P. communis* Trin.

生于池沼、河岸、道旁、滩地湿润处。全国各地均有分布。

根状茎(芦根)：甘，寒。清热生津，除烦，止呕，利尿。用于热病烦渴，胃热呕哕，肺热咳嗽，肺痈吐脓，热淋涩痛。

附 注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**大芦**　水芦荻(广西、贵州),卡开芦(江苏植物名录)

**Phragmites karka** (Retz.) Trin. ex Steud.——*Arundo karka* Retz.

生于海拔 50—1 900 米的河堤、溪边或湿润处。分布于台湾、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根状茎(水芦荻): 苦,寒。清热,利尿。用于感冒发热,水肿,热泻。

## 毛竹属　Phyllostachys Sieb. et Zucc.

**桂竹**　烂头桂(通称),刚竹(竹谱详录)

**Phyllostachys bambusoides** Sieb. et Zucc.

生于低山坡。分布于华东及陕西、河南、湖北、湖南、广西、贵州、云南。

根、壳、花(斑竹): 苦,寒。祛风除湿。用于气喘咳嗽,四肢顽痹,筋骨疼痛。 壳: 清血热,透斑疹。 花: 用于烂喉疫痧。

**淡竹**(粉绿竹)

**Phyllostachys glauca** McClure

生于河滩或山脚处,常种植于房前舍后。分布于江苏、上海、安徽、浙江、河南。

内膜、竹沥、竹茹: 用于痰热咳嗽,音哑。

**水竹**

**Phyllostachys heteroclada** Oliv.——*P. congesta* Rendle

生于河堤、湖边、山坡或灌丛中。分布于黄河流域以南各地。

叶、根: 清热,凉血,化痰。

**毛竹**

**Phyllostachys heterocycla** (Carr.) Mitford cv. **pubescens**

生于海拔 400—1 000 米的酸性土山地。 分布于秦岭、汉水流域至长江流域以南各地。

幼苗(毛笋): 甘,寒。解毒。用于小儿痘疹不透。 叶: 甘,寒。清热利尿,活血,祛风。用于烦热,消渴,小儿发热,高热不退,疳积。 根状茎: 用于风湿关节痛。

**台湾桂竹**　筜竹(食物本草)

**Phyllostachys makinoi** Hayata

生于山地或平原。台湾中部及北部特产,浙江、福建也有栽植。

幼苗(桂笋): 甘,寒。用于小儿痘疹不透。

**篲竹**　大节竹(广西),花竹(竹类植物志略)

**Phyllostachys nidularia** Munro

生于向阳山坡及开阔山地。分布于长江流域以南各省区及河南。

叶: 清热利尿。

**紫竹**　黑竹(广西)

**Phyllostachys nigra** (Lodd.) Munro——*Bambusa nigra* Lodd.

生于山坡林缘或庭园种植。分布于长江流域以南各省区。

根状茎(紫竹): 辛,平。祛风,散瘀,解毒。用于风湿痹痛,经闭,症瘕,狂犬咬伤。

**毛金竹**　淡竹(图经本草)

**Phyllostachys nigra** (Lodd.) Munro var. **henonis** (Mitf.) Stapf ex Rendle——*P. henonis* Mitf.

通常庭园种植。分布于长江流域以南各省区及陕西。

竹竿的中间层(竹茹)：甘，微寒。清热化痰，除烦止呕。用于痰热咳嗽，胆火挟痰，烦热呕吐，惊悸失眠，中风痰迷，舌强不语，胃热呕吐，妊娠恶阻，胎动不安。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**黄皮绿金竹**　金竹(通称)

**Phyllostachys viridis** (Young) McClure cv. **robert**

生于海拔800—1 000米的山坡，现多种植于庭园。分布于长江流域以南各省区。

竿内薄膜(竹衣)：用于音哑，劳咳。

## 苦竹属　Pleioblastus Nakai

**苦竹**

**Pleioblastus amarus** (Keng) Keng f.——*Arundinaria amara* Keng

生于向阳山坡、山谷或平原。分布于长江流域以南各省区。

叶、竹沥、竹茹、竹笋(苦竹)：苦，寒。清热明目，利窍，解毒，杀虫。用于消渴，烦热不眠，目赤，口疮，失音，烧、烫伤。竹沥：清火消痰，明目，利窍。用于目赤肿痛，牙痛。竹茹：用于尿血。竹笋：甘，寒。清热除湿，利水，明目。用于消渴，面黄，脚气。

## 早熟禾属　Poa L.

**早熟禾**　发汗草(湖北)

**Poa annua** L.

生于路边、田野、草地。全国普遍分布。

全草：用于咳嗽，湿疹，跌打损伤。

**草地早熟禾**　六月禾(中国沙漠植物志)

**Poa pratensis** L.

生于山坡、路边、草地。分布于东北、华北、西北、西南及山东、江西、河南。

全草：用于消渴。

**硬质早熟禾**　龙须草(内蒙古)

**Poa sphondylodes** Trin. ex Bunge

生于山坡、草地、路旁。分布于东北、华北、西北及山东、江苏、河南、湖北、贵州。

全草(龙须草)：甘、淡，平。清热解毒，利尿，止痛。用于小便淋涩，黄水疮。

## 金发草属　Pogonatherum Beauv.

**金丝草**　墙头竹(福建)，水路草(湖北)，猫毛草(广州)

**Pogonatherum crinitum** (Thunb.) Kunth——*Andropogon crinitum* Thunb.

生于河边、山坡、旷野湿地。分布于安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全草(笔仔草)：甘、淡，寒。清解解毒，利尿通淋，凉血。

**金发草**　龙奶草、吉祥草(广西)

**Pogonatherum paniceum** (Lam.) Hack. ——*Saccharum paniceum* Lam.

生于山坡、石缝或河岸湿地。分布于浙江、福建、台湾、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草：甘，凉。清热利尿。用于黄疸，脾脏肿大，消化不良，小儿疳积，消渴。

## 棒头草属　Polypogon Desf.

**棒头草**　麦毛草(湖北)

**Polypogon fugax** Nees ex Steud. ——*P. higegaweri* Steud.

生于低山、平原近水湿处。除东北、西北部分省区外，分布几遍全国。

全草：用于关节痛。

## 鹅观草属　Roegneria C. Koch

**鹅观草**

**Roegneria kamoji** Ohwi

生于山坡、路边、林下和湿润草地。除青海、新疆、西藏外，其他省区均有分布。

全草(茅灵芝)：甘，凉。清热，凉血，镇痛。用于咳嗽痰中带血，劳伤疼痛，丹毒。

**秋鹅观草**

**Roegneria serotina** Keng

生于山坡草地。分布于陕西、青海、贵州。

全草(茅草箭)：甘，凉。清热凉血，镇痛。用于劳伤疼痛，咳嗽痰中带血。

## 筒轴茅属　Rottboellia L. f.

**钙生鹅冠草**　茅草箭、草灵芝(贵州)

**Roegneria calcicoal** Keng

生于海拔1 600—2 000米的生石灰岩土上或潮湿向阳地带。分布于四川、贵州、云南。

全草：甘，平。清热凉血，化瘀止痛。用于劳伤咳血，麻疹，丹毒，劳伤疼痛。

**筒轴茅**　蛇尾草(种子植物名称)

**Rottboellia exaltata** (L.)L. f.——*Aegilops exaltata* L.

生于田野、旷地、山谷或疏林下。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全草：广西民间用于小便淋痛不利。

## 甘蔗属 Saccharum L.

**斑茅** 芭茅(江西),管精(福建),大密(广东)

**Saccharum arundinaceum** Retz

生于海拔200—2 300米的山坡、溪涧、河岸和路边草地。分布于华东、中南、西南及陕西。

根(斑茅): 甘,淡。通窍,利水,破血,通经。用于跌打损伤,筋骨疼痛,经闭, 水肿臌胀。

**红甘蔗** 果蔗(通称)

**Saccharum officinarum** L.

生于海拔高达1 550米,现广植于热带和亚热带。分布于广东、海南、广西、云南。

茎杆(红甘蔗): 甘,平。除热止渴,和中,宽隔,行水。用于发热口干,肺燥咳嗽,咽喉肿痛,心胸烦热,反胃呕吐,妊娠水肿。

**甘蔗** 竹蔗(通称)

**Saccharum sinense** Roxb.

陕西秦岭南坡和江苏以南各省区及台湾均有种植。

茎杆(甘蔗): 甘,寒。清热,生津,下气,润燥。用于热病津伤,心烦口渴, 反胃呕吐, 肺燥咳嗽,大便燥结。

**甜根子草** 黑猴蔗(福建),割手密(广东)

**Saccharum spontaneum** L.

生于海拔500—2 000米的山坡、路旁或堤岸沟边。分布于华东、中南、西南及陕西、甘肃。

根状茎(甜根子草): 甘,凉。清热利尿,化痰止咳。用于顿咳,咳嗽,热淋。

## 囊颖草属 Sacciolepis Nash

**囊颖草** 英雄草(广西)

**Sacciolepis indica** (L.) A. Chase ——*Aira indica* L.

生于稻田边、湿地或浅水中。分布于华东、西南及广东、海南、广西。

全草: 用于疮疡,跌打损伤。

## 硬草属 Sclerochloa Beauv.

**硬草**

**Sclerochloa kengiana** (Ohwi) Tzvel. ——*Puccinellia kengiana* Ohwi

生于沟渠或田园中。分布于江苏、江西、贵州。

根: 通窍利水,破血通经。用于跌打损伤,筋骨痛,经闭,水肿臌胀。

## 狗尾草属　Setaria Beauv.

**大狗尾草**　　狗尾巴(江西)

**Setaria faberii** Herrm.

生于山野和荒坡。分布于华东、中南、西南。

根：甘，平。清热，消疳，杀虫止痒。用于小儿疳积，风疹，牙痛。

**莠狗尾草**　　光明草(贵州)

**Setaria geniculata** (Lam.) Beauv. ——*Panicum geniculatum* Lam.

生于海拔380—2 300米的丘陵山坡、草地及路旁湿润处。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

全草：淡，凉。清热明目，凉血解毒。用于目赤肿痛，痈疖疔疮。

**金色狗尾草**　　黄狗尾(江苏)，犬尾草(福建)，洗草(贵州)

**Setaria glauca** (L.) Beauv. ——*Panicum glaucum* L.

生于海拔190—3 400米的田边、路旁、旷野或湿地。全国各地均有分布。

全草(金色狗尾草)：淡，凉。清热明目，止泻。用于目赤肿痛，眼弦赤烂，痢疾。

**粟**　　小米(通称)，黄粟(北方)，谷子(江苏)

**Setaria italica** (L.) Beauv.——*Panicum italicum* L.

长江流域以北及广东、海南、广西、贵州均有种植，而以北方种植较多。

果实经发芽处理后(谷芽)：甘，温。消食，健脾。用于食积胀满，不思饮食。粟米：甘、咸，凉。和中，益肾，除热解毒。用于脾胃虚热，反胃呕吐，消渴，泄泻。

**棕叶狗尾草**　　涩船草(广西)

**Setaria palmifolia** (Koen.) Stapf ——*Panicum palmifolium* Koen.

生于海拔2 300米以下的山谷、林下或山坡阴湿处。分布于浙江、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根：用于脱肛，阴挺。

**皱叶狗尾草**　　胞叶草(广西)，烂衣草(贵州)

**Setaria pilicata** (Lam.) T. Cooke ——*Panicum pilicatum* Lam.

生于海拔2 360米以下的山谷、山坡草地。分布于华东、中南、西南。

全草(马草)：淡，平。解毒，杀虫，祛风。用于疥癣，丹毒。

**狗尾草**　　乌奈格英-苏利(蒙语)

**Setaria viridis** (L.) Beauv. ——*Panicum viride* L.

生于海拔600—3 200米的路旁、草地、旷野。全国各地均有分布。

全草(狗尾草)：淡，凉。除热，祛湿，消肿。用于痈肿，疮癣，目赤。

## 高粱属　Sorghum Moench

**拟高粱**　　山高粱(湖南)

**Sorghum propinquum** (Kunth) Hitchc.——*Andropogon propinquum* Kunth

生于河岸或草地。分布于台湾、湖南、广东、广西、四川、贵州。

根状茎(高粱七)：甘，凉。清肺热，益气血。用于劳伤咳嗽，吐血。

**蜀黍**　高粱(通称)，稻粟(陕西)

**Sorghua vulgare** Pers.

全国普遍种植，而以北方较多。

种子(高粱)：甘、涩，温。调中气，涩肠胃。用于霍乱，痢疾，小便淋痛不利，小儿消化不良。根：利尿。用于小便淋痛不利，膝痛，脚跟痛。

## 鼠刺属　Spinifex L.

**老鼠芳**

**Spinifex littoreus** (Burm. f.) Merr.——*Stipa littorea* Burm. f.

生于海滨沙地，为固沙植物。分布于福建、台湾、广东、海南、广西。

叶：用于刀伤出血。

## 大油芒属　Spodiopogon Trin.

**箭叶大油芒**

**Spodiopogon sagittifolius** Rendle

生于海拔1 500—1 800米的山地或林下。分布于云南。

全草(茨姑草)：淡，平。止血，催产。用于月经过多，难产，胸闷，气胀，阳痿。

**大油芒**

**Spodiopogon sibiricus** Trin.

生于山坡、草原、灌丛、草甸。分布于东北、华北、西北、华东。

全草：淡，平。用于胸闷，气胀，月经过多。

## 鼠尾粟属　Sporobolus R. Br.

**鼠尾粟**　线香草(福建)

**Sporobolus fertilis** (Stend.) *W*. D. Clayt.——*Agrostis fertilis* Steud.

生于海拔1 000—2 100米的田野、路边、山坡草地。分布于华东、中南、西南及陕西。

全草(鼠尾粟)：甘、淡，平。清热解毒，凉血。用于伤暑烦热，痢疾，热病便秘，尿血。

## 钝叶草属　Stenotaphrum Trin.

**钝叶草**　鸭口草(广西)

**Stenotaphrum helferi** Munro ex Hook. f.

生于林缘、路旁或湿润草地。分布于广东、海南、广西、云南。

全草：用于骨鲠喉，胃下垂，阴挺，滑胎。

## 菅属 Themeda Forsk.

**苞子草** 老虎须(广西)

**Themeda caudata** (Nees) A. Camus——*Anthistiria caudata* Nees; *T. gigantea* (Cav.) Hack. var. *caudata* (Nees) Keng

生于海拔1800米以下的山坡、旷野或河边。分布于广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

果苎：用于阳痿。

**黄背草** 山红草(江苏)，屈针草(广西)

**Themeda japonica** (Willd.) Tanaka——*Anthistiria japonica* Willd.; *T. triandra* Forsk. var. *japonica* (Willd.) Makino

生于干燥或湿润山坡草地。除内蒙古、青海、新疆外，分布几遍全国。

全草、根、幼苗：甘，温。活血调经，祛风除湿。用于经闭，风湿痛。 根：用于滑胎。幼苗：用于高血压症。

**菅**

**Themeda villosa** (Poir.) Camus——*Anthistiria villosa* Poir.

生于山坡草地。分布于中南、西南。

根(蚂蚱草)：辛，温。解表散寒，祛风除湿。用于风寒感冒，风湿麻木，淋证，水肿。

## 粽叶芦属 Thysanolaena Nees

**粽叶芦**

**Thysanolaena maxima** (Roxb.) O. Kuntze ——*Agrostis maxima* Roxb.

生于山坡、山谷、溪边、疏林或灌丛中。分布于台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

根：甘，凉。清热利湿，止咳平喘。用于泄泻，小儿消化不良，哮喘，风热咳嗽。

## 小麦属 Triticum L.

**小麦**

**Triticum aestivum** L.

全国各地普遍种植，品种很多，为主要农作物之一。

干瘪颖果(浮小麦)：甘，微寒。养心安神，止虚汗。用于神志不安，失眠。

## 玉蜀黍属 Zea L.

**玉蜀黍** 玉米(通称)，棒子(东北)，苞谷(浙江)，玉麦(四川)

**Zea mays** L.

为重要的农作物之一，品种很多。全国普遍种植。

花柱与柱头(玉米须)：甘，平。平肝利胆，利尿，消肿。用于水肿，胁痛，黄疸，高血压

症，消渴，石淋。

### 菰属 Zizania L.

**菰** 茭白(通称)，苽茎、黄尾草(广西)

**Zizania caduciflora** (Turcz.) Hand.-Mazz. ——*Limnochloa caduciflora* Turcz.; *Z. latifolia* Turcz.

生于湖沼、水沟、浅水处，栽培或野生。全国各地均有分布。

颖果(茭白子)：甘，寒。清热除烦，生津止渴。 菰根：甘，寒。清热解毒。用于黄疸，小便淋痛不利。 茭白：甘，凉。清热除烦，止渴，通乳，通二便。

## 202. 棕榈科 Palmae

### 假槟榔属 Archontophoenix Wendl. et Drude

**假槟榔**

**Archontophoenix alexandrae** Wendl. et Drude

原产澳大利亚。我国广东、海南、广西、云南引种栽培。多栽植庭园中作行道树。

叶鞘纤维煅炭：止血。用于外伤出血。

### 槟榔属 Areca L.

**槟榔** 槟榔子、槟榔玉、榔玉(通称)，青仔(台湾)，果玉(藏语)，戈马(傣语)，大腹槟榔(本草图经)

**Areca catechu** L.

宜生于高温地区，以土层深厚而湿润的砂质壤土或粘质壤土为佳。原产马来西亚。我国福建、台湾、广东、海南、广西、云南等地栽培。

种子(槟榔)：苦、辛，温。杀虫消积，降气，行气，截疟。用于绦虫、姜片虫、蛔虫病，蛔虫腹痛，食积，脘腹胀痛，痢疾，疟疾，水肿，脚气。 果皮(大腹皮)：辛，微温。行水下气，宽中。用于脘腹胀满，泄泻，水肿，小便淋痛不利，恶阻胀闷。 花(槟榔花)：味淡。健胃，止渴。

附 注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

### 桄榔属 Arenga Labill.

**桄榔** 砂糖椰子、糖树(中国高等植物图鉴、海南植物志)，桄榔子(开宝本草)，铁木(本草纲目)，桄榔子(本草拾遗)，莎木(植物名实图考)

**Arenga pinnata** (Wurmb.) Merr. ——*Saguerus pinnatus* Wurmb.

生于低湿潮热地区的石灰岩山林中，也有栽培。分布于广东、海南、广西、云南等地。

树干髓部的淀粉(桄榔面)：甘，平。作饼食，补益虚羸损乏。用于腰腿无力。 种子

(桄榔子)：苦，平。有毒。破血行瘀。用于妇女产后儿枕血瘕诸痛及心胃寒痛。

## 糖棕属　Borassus L.

**糖棕**

**Borassus flabellifer** L.

原产埃塞俄比亚。我国云南有栽培。

根：微甘，平。用于肝炎。

## 省藤属　Calamus L.

**大喙省藤**　　白藤(广西)，喙尖黄藤(云南种子植物名录)

**Calamus macrorrhynchus** Burret

生于山谷密林中。分布于广东、广西、云南。

果实：祛腐生新。

**省藤**　　宽刺藤(云南)

**Calamus platyacanthoidea** Merr.

生于山谷雨林或山地常绿阔叶林中。分布于广东、海南、广西、云南。

全株：功效同大喙省藤。

**华南省藤**　　弹弓藤(海南)，白藤、棕藤、手杖藤(广西)

**Calamus rhabdocladus** Burret

生于密林或山坡灌丛中。分布于福建、广东、海南、广西。

幼苗：用于跌打损伤。

附　注：功效相同的有**弓弦藤 C. rhabdocladus** Burret var. **globulosus** S. Y. Chen et S. T. Pei，分布于云南勐腊。

**白藤**　　鸡藤(海南)，山甘蔗(广西瑶语)，勾歪、扣外鸡(广西壮语)

**Calamus tetradactylus** Hance

生于疏或密林中，也有栽培。分布于福建、广东、海南、广西、云南栽培。

全株：剧毒。用于疔疮，疥疮。

## 鱼尾葵属　Caryota L.

**短穗鱼尾葵**　　小黄棕(云南)，阿莱皮(云南独龙族语)，西椰子(种子植物名称)

**Caryota mitis** Lour.

生于海拔1 300—1 500米的山谷林中或植于庭园中。分布于广东、海南、广西、贵州、云南。

髓部泡制淀粉：用于痢疾，泄泻，小儿泄泻尤宜。

**单穗鱼尾葵**

**Caryota monostachya** Becc.

生于海拔120—1 600米的低山沟谷雨林或常绿阔叶林中。分布于广西、贵州、云南。

根：用于高热抽搐。

**鱼尾葵**　假桄榔(海南)，棕木(广西)，青棕(云南)，长穗鱼尾葵、董棕、鸡榔(全国中草药汇编)

**Caryota ochlandra** Hance

生于低海拔的山林、灌丛中或植于庭园。分布于江苏、浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南。

根、叶：甘、涩，平。　根：强筋骨。用于肝肾虚，筋痿软。　叶鞘纤维炭：收敛止血。用于吐血，咯血，便血，血崩。

## 散尾葵属　Chrysalidocarpus H. Wendl.

**散尾葵**

**Chrysalidocarpus lutescens** H. Wendl.

原产马达加斯加。我国广东、广西、云南有栽培。多植于庭园和花圃中。

叶鞘：微苦，凉。收敛止血。用于各种出血。

## 椰子属　Cocos L.

**椰子**　胥余(史记)，越王头(南方草木状)，椰(台湾树木志)，郭保(西双版纳傣语)

**Cocos nucifera** L.

生于海拔130—500米的热带砂地上或气温较高的河流及溪谷两岸、较湿润的平地。台湾、广东、海南、广西、云南有栽培。

根皮(椰子皮)：苦，平。止血止痛。用于鼻衄，胃痛，吐泻。　内果皮(椰子壳)：用于杨梅疮，筋骨痛；熬膏外用于体癣，脚癣。　椰肉：甘，平。益气祛风。用于姜片虫病。　椰子油：用于疥癣，冻疮，神经性皮炎。　椰子液：甘，温。补虚，生津利尿。用于心脏性水肿，口干烦渴。

## 贝叶棕属　Corypha L.

**贝叶棕**

**Corypha umbraculifera** L.

云南栽培。一般见于寺院中。

叶：微苦，平。用于头晕，头痛，发热，咳嗽。

## 黄藤属　Daemonorops Bl. et Schult. f.

**藤血竭**

**Daemonorops draco** Bl.

生于低湿潮热地区。原产马来半岛。我国台湾、广东、云南引种栽培。

树脂：甘、咸，平。活血行瘀，止痛。用于跌打损伤，瘀血作痛，外伤出血，疮疡久不收口；外用止血，敛疮生肌。

**黄藤**　赤藤(广东、广西)，红藤(海南植物志)

**Damonorops margaritae** (Hance) Becc. ——*Calamus margaritae* Hance

常见于中海拔或低海拔的密林中。分布于台湾、广东、海南、广西、云南。

茎：苦，平。驱虫，利尿，祛风镇痛。用于蛔虫、蛲虫、绦虫病，小便热淋涩痛，牙齿痛。

## 双籽藤属　Didymosperma H. Wendl. et Drude

**双籽棕**　大辐棕(海南植物志、云南)，野棕、山棕(云南)，中项、假棕树(云南西双版纳傣语)

**Didymosperma caudatum** (Lour.) Wendl. et Drude——*Borassus caudatus* Lour.

生于低海拔的密林中。分布于广东、海南、广西、云南。

根：酸、涩，凉。止血清热，通经收敛。用于月经过多，血崩，阴挺，肺痨咯血。

附　注：果实和种子有毒。

**短序双籽棕**　野棕、山棕(云南)

**Didymosperma caudatum** (Lour.) Wendl. et Drude var. **tonkinense** Becc. ——*D. tonkinense* (Becc.) Becc. ex Gagnep.

生于海拔 200—400 米的低山沟谷雨林中。分布于云南。

根：酸、涩，凉。清热，通经，收敛。用于月经过多，血崩，阴挺，肺痨咯血。

## 油棕属　Elaeis Jacq.

**油棕**　油子(广东)

**Elaeis guineensis** Jacq.

原产热带非洲。我国福建、台湾、海南、广西南部、云南均有栽培。

根：苦，凉。消肿祛瘀。用于瘀积肿痛。

## 蒲葵属　Livistona R. Br.

**蒲葵**　扇叶葵(广东)，葵扇叶、葵扇木、蓬扇树(广西)，余蒲葵(广西仫佬语)

**Livistona chinensis** (Jacq.) R. Br.——*Latania chinensis* Jacq.

原产热带亚洲和澳大利亚。我国江苏、浙江、江西、福建、台湾、广东、广西、云南有栽培。

根：甘、涩，凉。止痛，止喘。用于哮喘。叶：用于崩漏，带下病，白浊，难产，胎盘不下。叶烧炭：外用止汗，内服止盗汗。种子：苦，寒。有小毒。抗癌，凉血，止血，止痛。用

于癌肿，白血病，慢性肝炎。

## 刺葵属　Phoenix L.

**枣椰子**　伊拉克枣（通称），仙枣（云南），海枣（南方草木状），藏枣、无漏子、波斯枣（本草纲目拾遗）

**Phoenix dactylifera** L.

原产热带非洲和亚洲。我国广东、广西、云南引种栽培。

果实：甘，温。补中益气，除痰嗽，补虚损，消食，止咳。

附　注：本种在云南元谋由回教徒引入，称“仙枣”，可结实；在越南至我国云南边界沿线直至昆明可露地栽培，但不结实。

## 棕竹属　Rhapis L. f.

**棕竹**　棕树、小松花（广西），美三（广西壮语、毛难语），筋头竹（种子植物名称）

**Rhapis excelsa** (Thunb.) Henry ex Rehd.——*Chamaerops excelsa* Thunb.

生于山地疏林中或栽植于庭园。分布于东南部至西南部。

根、叶：淡，平。镇痛止血。根：用于劳伤。叶鞘纤维炭：用于鼻衄，咯血及产后出血过多。

附　注：**粗棕竹 R. robusta** Burret 分布于广西，须根用于接骨。

## 棕榈属　Trachycarpus Wendl.

**棕榈**　棕树（通称），美送（广西侗语），都烧（广西苗语），根必、松档、棕竹（广西瑶语），棵棕、下扫把（广西壮语）

**Trachycarpus fortunei**(Hook. f.) H. Wendl.——*Chamaerops fortunei* Hook. f.

生于向阳山坡及林中。通常栽培于田边、地头、村边、道旁或庭园中。分布于华东、中南、西南及北京、陕西、甘肃。

棕榈根：淡，寒。利尿通淋，止血。用于血崩，淋证，小便淋痛不利。茎髓（棕树心）：用于心悸，头晕，崩漏。叶（棕树叶）：用于吐血，劳伤，虚弱，高血压症，预防中风。叶鞘纤维（棕树皮）：苦、涩，平。收敛止血。棕榈花：用于泻痢，肠风，血崩，带下病。果实（棕榈子）：涩肠，止泻，养血。用于泻痢，崩中带下。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**龙棕**　倒提壶、地棕花（云南）

**Trachycarpus nana** Becc.——*T. dracocephalus* R.C. Ching et Y. C. Hsu

生于海拔 1 700—2 700 米的深箐沟中。分布于云南禄丰、宾川、永胜、华坪、南华。

根：用于月经过多，阴挺。

# 203. 天南星科 Araceae

## 菖蒲属 Acorus L.

**菖蒲** 白菖蒲、水菖蒲(通称),臭草(北方各省),臭蒲(东北及山东、内蒙古、河南),土菖蒲(四川),泥菖蒲(本草纲目)

**Acorus calamus** L.

生于海拔 2 650 米以下的河、湖、渠边、浅池塘或沼泽湿地,也有栽培。全国各地均有分布。主产辽宁、湖北、湖南、四川。

根状茎(白菖蒲): 苦、辛, 温。化痰,开窍,健脾,利湿。用于癫痫,惊悸健忘,神志不清,湿滞痞胀,泄泻痢疾,风湿疼痛,痈肿疥疮。

附 注:《中华人民共和国药典》1990 年版附录收载。

**细根菖蒲**

**Acorus calamus** L. var. **verus** L.

生于海拔 1 540—1 750 米的水池边、沼泽地。分布于云南景洪、勐腊。

根状茎及叶: 辛,温,气香。祛风通窍,健脾,化气除痰,杀虫解毒。用于癫痫,中风,类风湿关节痛,牙痛,消化不良,腹痛,泄泻,水肿,痢疾,疥癣。

**金钱蒲** 鲜菖蒲(江苏),建菖蒲(四川), 随手香(四川、贵州), 钱蒲、菖蒲、石菖蒲(本草纲目),九节菖蒲(滇南本草)

**Acorus gramineus** Soland.

多生于海拔 2100 米以下的水边湿地、山溪旁、岩石缝中或石上,各地常见栽培。分布于华东、西南及北京、陕西、甘肃、新疆、湖北、湖南。

根状茎: 功效同石菖蒲。

**长苞菖蒲**

**Acorus rumphianus** S. Y. Hu

生于海拔 1 100—1 300 米的溪边阴湿处。分布于云南麻栗坡老君山。

根状茎: 功效同菖蒲。

**石菖蒲** 九节菖蒲(江苏、浙江、江西、湖南), 岩菖蒲、臭蒲 (广东), 骨首(云南彝语),格密亲(傣语)

**Acorus tatarinowii** Schott

生于海拔 20—2 600 米的密林阴湿处、溪旁岩石缝中或泉流附近,各地常见栽培。北起山东,南至广东,西至云南,东至江苏、台湾均有分布。主产江苏、浙江、四川。

根状茎(石菖蒲): 辛、苦,微温。化湿开胃,开窍,豁痰,醒神益智。用于脘痞不饥,噤口下痢,神昏癫痫,健忘耳聋。 叶: 洗疥,大风疮。 花: 调经行血。

附 注:《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 广东万年青属 Aglaonema Schott

**广东万年青** 大叶万年青(广东),亮丝草(中国高等植物图鉴)

**Aglaonema modestum** Schott ex Engl.

生于石山密林湿地上，多有栽培。分布于江西、福建、广东、海南、广西、贵州、云南。

全草或根状茎(粤万年青)：辛、微苦，寒。有毒。清热解毒，消肿止痛。用于蛇咬伤，咽喉肿痛，淋证，泄泻，肺热咳嗽；外用于痈疮肿毒，小儿脱肛。

**越南万年青**　万年青(广西、云南)，观音莲(云南)

**Aglaonema pierreanum** Engl.

生于海拔160—1 500米的河谷及箐沟。分布于广西及云南西部、南部至东南部。

全草：壮筋骨。　茎：用于泄泻。

## 海芋属　Alocasia (Schott) G. Don

**尖尾芋**　狼毒(广东、广西)，卜芥、假海芋(广西、四川)，虎耳菜(广西)，老虎芋(贵州、云南)，大麻芋、大附子(云南)

**Alocasia cucullata** (Lour.) Schott ——*Arum cucullatum* Lour.; *Caladium cucullatum* Pers.; *Colocasia cucullata* (Lour.) Schott

生于海拔2 000米以下的溪谷湿地、田边、寺旁或栽培。星散分布于浙江、福建、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根状茎或全株(卜芥)：辛、微苦，寒。大毒。清热解毒，消肿止痛。用于时行感冒，钩端螺旋体病，伤寒，肺痨，咳嗽痰喘；外用于毒蛇咬伤，毒蜂螫伤，蜂窝组织炎及肿毒初起。

附　注：本种生用有大毒，内服需去外皮，并需久煎(6小时以上)至煎液呈红色时方可内服。据药理实验证明，本种有镇咳作用。

**箭叶海芋**

**Alocasia longiloba** Miq.

生于海拔900—1 200米的林下及灌丛中，也有栽培。分布于广东、海南、云南景洪和勐腊。广州有栽培。

汁液：用于家畜伤口。

**海芋**　广狼毒(福建、广东、广西)，尖尾野芋头(广州)，痕芋头(广东、广西)，坡扣(傣语)，青芋、大麻芋(本草纲目拾遗)

**Alocasia macrorrhiza** (L.) Schott ——*Arum macrorrhizum* L.; *A. odorum* Roxb.

生于海拔1 700米以下的热带、亚热带沟谷雨林、季雨林及野芭蕉林内或山野、河谷、沟边、村庄附近阴湿地。分布于江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

茎及根状茎(海芋)：辛，寒。有毒。清热解毒，消肿散结，祛腐生肌。用于热病高烧，流感，肺痨，伤寒，风湿关节痛，鼻塞流涕；外用于疔疮肿毒，虫蛇咬伤。

附　注：①本品有毒，内服需煎3—5小时，并换水2—3次后方可服用。②广东、广西曾作狼毒使用，应予纠正。

## 磨芋属 Amorphophallus Bl.

**南蛇棒** 土南星(广西),岩芋(贵州),大头芋(海南植物志),蛇枪头(全国中草药汇编)

**Amorphophallus dunnii** Tutch.

生于海拔 200—800 米的路边或林下湿地。分布于湖南、广东南部、海南、广西、云南东南部。

块茎: 消肿散结,解毒止痛;外用于小儿麻痹后遗症。

**蛇枪头** 蛇春头、蛇蒜头(广东),土南星、七角莲(广西)

**Amorphophallus mellii** Engl.

生于海拔 1 000 米以下的林下灌丛阴湿处。分布于广东、广西大部分地区。

块茎: 消肿散结,解毒止痛;外用于疮疡肿毒。

**磨芋** 花杆莲、麻芋子(陕西),花伞把、蛇头根草(江西),蒟蒻(开宝本草),鬼芋(图经本草)

**Amorphophallus rivieri** Durieu ——*A. konjac* K. Koch

生于疏林下、林缘、山坡、溪旁湿地或栽培于房前屋后、田边地头。分布于陕西、甘肃、宁夏、新疆至长江流域以南各省区,华北部分地区有栽培。

块茎(蒟蒻): 辛,寒。消肿散结,解毒止痛。用于瘰疬,痈疖肿毒,毒蛇咬伤,烫火伤。

附 注: 本种为重要的淀粉植物,是很好的减肥食品。

**疏毛磨芋** 蛇六谷、鬼腊烛、蛇头草(上海、安徽),伍花莲(浙江),华东蒟蒻(全国中草药汇编)

**Amorphophallus sinensis** Belval

生于海拔 800 米以下的山谷、林下、灌丛中或种植于房前屋后。主产华东各省。

块茎(蛇头草): 辛,温。有毒。消肿散结,解毒止痛,化痰。用于痈疖肿毒,毒蛇咬伤,丹毒,烫火伤,跌打损伤,癌肿。

**野磨芋** 土南星(江西)

**Amorphophallus variabilis** Bl.

生于山坡灌丛中。分布于江西、福建、广东。

块茎: 消肿解毒。

**疣柄磨芋** 南星头、鸡爪芋、鞋极芋、南芋(广东),臭磨芋(中国高等植物图鉴)

**Amorphophallus virosus** N.E. Br.

生于海拔 780 米以下的热带河谷、江边草坡、灌丛及疏林下,也有栽培。分布于广东、广西南部、云南南部至东南部。

块茎: 消肿散结,解毒止痛,驱寒。

**滇磨芋** 岩芋(贵州),滇南磨芋(云南种子植物名录),长柱磨芋(中国高等植物图鉴)

**Amorphophallus yunnanensis** Engl. ——*A. kerrii* N. R. Br.

生于海拔 200—2 000 米的山坡林下或荒地草坡。分布于广西百色和那坡、贵州南部、

云南中部和西部及南部。

块茎：用于疮疡，瘰疬，红斑狼疮及蛇伤。

## 雷公连属　Amydrium Schott

**穿心藤**　穿孔藤(广西金秀)，假万年青(广西梧州)

**Amydrium hainanensis**(Ting et Wu ex H. Li)H. Li——*Epipremnopsis hainanensis* Ting et Wu ex H. Li

生于海拔1 300米以下的山谷或密林中，常附生于树干上或石上。分布于海南、广西。

全株：用于胃脘胀痛，胃溃疡，胆囊炎，肝炎，风湿痹痛；外用于疮疖。

**雷公连**　青藤、下山虎(湖南)，犬匹药、风湿药(贵州)，软筋藤(贵州、四川)，叫四门、叫恩妈(侗语)

**Amydrium sinense** (Engl.) H. Li——*Scindapsus sinensis* Engl.; *Epipremnopsis sinensin* (Endl.) H. Li

附生于海拔550—1 100米的常绿阔叶林中树干上或石崖上。分布于湖北西部、湖南西部和南部、广西、四川、贵州至云南东南部。

茎叶：用于风湿痛，心绞痛；外用于跌伤，骨折。

## 天南星属　Arisaema Mart.

**东北天南星**　山苞米、天老星、大头参(东北)，长虫苞米、天南星(辽宁)，大天落星(山东)

**Arisaema amurense** Maxim.

生于海拔50—1 200米的林间阴湿地或灌丛、沟谷、石砾中。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、山东、河南。主产东北、华北。

块茎(天南星)：苦、辛，温。有毒。燥湿化痰，祛风止痉，散结消肿。用于顽痰咳嗽，风疾眩晕，中风痰壅，口眼歪斜，半身不遂，癫痫，惊风，破伤风；生品外用于痈肿及蛇虫咬伤。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**齿叶东北南星**

**Arisaema amurense** Maxim.var. **serratum** Nakai

生于林间阴湿处或山野阴坡，常与东北天南星混生。分布于东北、华北及陕西、宁夏、山东、江苏、河南。

块茎：作天南星入药。

**朝鲜南星**　大参、山苞米(东北)，天南星(吉林)

**Arisaema angustatum** Franch. et Sav. var. **peninsulae (Nakai)** Nakai ——*A. peninsulae* Nakai

生于海拔500米以下的林间阴湿处。分布于东北及山东、河南。

块茎：燥湿化痰，祛风止痉，散结消肿。

附　注：东北作天南星入药。

**刺柄南星**　天南星、山苞谷(陕西)，白南星、三角莲、南星(湖北)，三步跳(四川)，绿南星(贵州)，刺梗天南星(秦岭植物志)

**Arisaema asperatum** N. E. Br.

生于海拔 1 300—2 900 米的干山坡、灌丛中或林下阴湿处。分布于陕西中部、甘肃南部、湖北西部、湖南东北部、四川东部、贵州。

块茎：有毒。祛风除湿，祛痰止咳，镇痛。用于劳伤；外敷疥疮，痈疽。

附　注：陕西、甘肃作天南星用。

**长耳南星**　半夏(四川)，大耳南星(中国高等植物图鉴)

**Arisaema auriculatum** Buchet

生于海拔 2 100—3 100 米的林下阴湿处或竹林内。分布于四川、贵州、云南西北部。

块茎：燥湿化痰，祛风止痉，散结消肿。

**银南星**　麻芋子、半夏(四川、云南)，地球半夏、银半夏(云南)，高鞘南星(中国高等植物图鉴)

**Arisaema bathycoleum** Hand.-Mazz.

生于海拔 1 600—3 400 米的山坡草地、路边、疏林下，常与山珠南星 A. yunnanense Buchet 混生。分布于四川西部、西南部及云南西北部及西部。

块茎：燥湿化痰。代半夏药用。

**双耳南星**　半夏(云南)

**Arisaema biauriculatum** W. W. Smith ex Hand.-Mazz.

生于海拔 1 900—3 300 米的山坡荒地、村边路旁及疏林下。分布于云南。

球茎：燥湿化痰，祛风止痉。

**短柄南星**

**Arisaema brevipes** Engl.

生于海拔 1 000 米左右的山沟中。分布于陕西宝鸡及凤县、四川万源。

块茎：陕西作天南星使用。

**红根南星**　红根、长虫包谷、小独角莲、见血飞、山磨芋、野磨芋(云南)

**Arisaema calcareum** H. Li

生于海拔 1 000—1 600 米的石灰岩山常绿阔叶林或灌丛内。分布于云南东南部。

根状茎(红根)：辛，寒。有剧毒。解毒拔脓，消肿止痛；外用于痈疮肿毒，乳痈，疔腮，毒蛇咬伤。

附　注：本品剧毒。严禁内服和搽涂破损的创面。若误服中毒可用生姜、甘草、防风各 15 克，水煎服，可解毒。

**白苞南星**　白南星(四川)

**Arisaema candidissimum** W.W. Smith

生于海拔 2 700—3 300 米的栎树林下及河谷灌丛中或岩石缝间。分布于四川西部、云南西北部、西藏。

块茎：辛、苦，温。燥湿化痰，祛风止痉，散结消肿。

**奇异南星**　铁灯台、青脚莲(广西)，蛇饭(云南腾冲)

**Arisaema decipiens** Schott

生于海拔880—3 400米的山坡灌丛或山沟林阴处。分布于广西容县、云南西北部。

根状茎：有毒。消炎解毒。外敷用于疮疡肿毒，乳痈，毒蛇咬伤，蜂蝎螫伤，蜘蛛及鼠咬伤。

**大理南星**

**Arisaema delavayi** Buchet

生于海拔可高达3 500米的阔叶林下及灌丛中。分布于云南西北部。

块茎：燥湿化痰，祛风止痉，散结消肿。

**云台南星**　细齿天南星(陕西)，江南南星(上海)，江苏天南星(陕西、安徽、福建、贵州)

**Arisaema du-bois-reymondiae** Engl.

生于海拔1 800米以下的山坡、林下或林缘、灌丛、竹林中。分布于华东及陕西太白山、河南、湖南、广东、贵州。

块茎：外用于无名肿毒初起，面神经麻痹，毒蛇咬伤，神经性皮炎；炙后内服治肺痈咳嗽。

附　注：江苏、安徽、江西等省部分地区作天南星入药。

**象南星**　虎掌、黑南星(四川)，水包谷(贵州)，大麻芋子、大半夏、银半夏(云南)，象鼻子(西藏)，象鼻南星(中国高等植物图鉴)

**Arisaema elephas** Buchet

生于海拔1 800—4 000米的河岸、山坡林下、林缘草地或山谷沟边。分布于西南及陕西、甘肃、宁夏。

块茎：剧毒。微量用于腹痛。

附　注：陕西、甘肃、四川作天南星使用。四川将块茎切片晒干称黑南星。

**吉沙南星**

**Arisaema elephas** Buchet var. **jishaense** H. Li et A. M. Li

生于海拔3 400米的云杉林中。分布于云南中甸吉沙。

块茎：剧毒。用于腹痛。

**一把伞南星**　山苞米(河北、河南、湖北)，蛇包谷(甘肃、江西、湖北、湖南)，一把伞(江西、广西、云南)，虎掌南星(本草纲目)，天南星(本草纲目拾遗、植物名实图考)

**Arisaema erubescens** (Wall.) Schott——*Arum erubescens* Wall.; *A. consanguineum* Schott

生于海拔3 200米以下的林下、灌丛阴湿地、草坡、荒地或栽培于排水良好的砂质土壤。广布于黄河流域以南，北起河北，西南至西藏，东至台湾，南至广东。

块茎：苦、辛，温。有毒。燥湿化痰，祛风止痉，散结消肿。用于顽痰咳嗽，风疾眩晕，中风痰壅，口眼歪斜，半身不遂，癫痫，惊风，破伤风；外用于痈肿，蛇虫咬伤。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**圆药南星**

**Arisaema exappendiculatum** Hara

生于海拔900—2 500米的山坡林下或林间草地。分布于贵州、西藏南部。

块茎：化痰散枳，行瘀解毒。

**螃蟹七**　天南星、虎掌南星(甘肃、湖北)，白南星(湖北)，红南星(四川)

**Arisaema fargesii** Buchet

生于海拔900—1 600米的林下、林缘、沟边或灌丛内多石处。分布于甘肃南部、湖北西部、四川东部至北部。

块茎：苦、辛，温。有大毒。燥湿化痰，祛风止痉，散结消肿。用于中风口眼歪斜，半身不遂，肢体麻木，破伤风口噤强直，小儿惊风，痰咳，痈肿及跌打损伤，风湿关节痛。

附　注：甘肃作天南星用，称虎掌南星。

**黄苞南星**　天南星(西藏)，达果(藏语)，黄花南星、狗角莲(中国高等植物图鉴)

**Arisaema flavum** (Forsk.) Schott——*Arum flavum* Forsk.

生于海拔2 200—4 400米的荒坡、碎石地、灌丛或田边、村旁，为西藏地区常见的杂草。分布于四川西部、云南西北部、西藏南部至东南部。

块茎：藏医用以退烧，杀菌，杀虫。用于咳嗽痰喘，破伤风，口噤强直，小儿惊风，癫痫。

**象头花**　三步跳(广西)，狗爪南星(四川、贵州)，老母猪半夏、红半夏、独叶半夏(云南)，紫盔南星(中国高等植物图鉴)

**Arisaema franchetianum** Engl.

生于海拔960—3 000米的林下、灌丛、沟边及田间阴湿草丛中。分布于甘肃南部、湖北、广西西部、四川西南部、贵州西南部及云南。

块茎(母猪半夏)：辛，热。有大毒。用于乳痈，瘰疬，无名肿毒，毒蛇咬伤，跌打损伤；兽医用于疮癣肿毒，镇喉癣。

附　注：四川作天南星使用，切片晒干称黑南星。

**疣柄南星**　土半夏(四川)，多疣天南星(中药大辞典)

**Arisaema griffithii** Schott var. **verrucosum** (Schott) Hara——*A. verrucosum* Schott

生于海拔2 700—3 700米的山谷、林下、草丛阴湿处。分布于四川乐山、贵州、云南。

块茎：功效同天南星。

**异叶天南星**　天老昨、小苞米(辽宁)，独角莲(陕西、江苏、江西)，土南星(福建、江西)，白南星、母子半夏(四川)，天南星(名医别录)

**Arisaema heterophyllum** Bl. ——*A. thunbergii* Bl. var. *heterophyllum* (Bl.) Engl.

生于海拔2 700米以下的林下、灌丛、山坡、荒地、路旁或草地阴湿处。除青海、新疆、西藏外，全国各地均有分布。

块茎(天南星)：苦、辛，温。有毒。燥湿化痰，祛风止痉，散结消肿。用于顽痰咳嗽，风疾眩晕，中风痰壅，口眼歪斜，半身不遂，癫痫，惊风，破伤风；外用于痈肿，蛇虫咬伤。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**湘南星**　南星(广西)

**Arisaema hunanense** Hand.-Mazz.

生于海拔200—750米的林下及山谷阴湿处。分布于湖南、广东北部、广西、四川东

部。

块茎：有毒。外用于疮疡肿毒。

**盈江南星**　三匹箭、三叶半夏(云南)

**Arisaema inkiangense** H. Li

生于海拔 380—1 700 米的山谷箐沟林下。分布于云南盈江、景东、澜沧、金平、屏边、景洪。

根状茎：祛痰，祛风湿，消肿毒。用于跌打损伤，风湿关节痛。

附　注：①功效相同的有**斑叶盈江南星 A. inkiangense** H. Li var. **maculatum** H. Li 分布于云南临沧、绿春。②云南特有药用植物。

**高原南星**　土半夏(西藏)，达瓦咸巴(藏语)，中南星(全国中草药汇编)

**Arisaema intermedium** Bl.

生于海拔 2 500—3 500 米的高山草坡、灌丛、林下、路边及田边。分布于云南西北部、西藏南部。

块茎(土半夏)：辛，温。燥湿化痰，和胃健脾，降逆止呃。用于胃脘胀痛，呕吐，咳嗽痰多及妊娠呕吐。

附　注：本品反乌头，生用有毒。

**凌云南星**　三步跳(广西)

**Arisaema lingyunense** H. Li

生于海拔 1 360—1 700 米的山坡林下、灌丛或山谷沼泽地。分布于广西田林、凌云、金秀。

块茎：有毒。外用于蛇虫咬伤。

附　注：广西特有药用植物。

**花南星**　绿南星、蛇芋头(湖北、四川)，花包谷、红包谷(四川)，虎芋(贵州)，金半夏(云南)，郭厚伍(融水苗语)

**Arisaema lobatum** Engl

生于山谷、林下、草坡或荒地。分布于陕西、甘肃、安徽、浙江、江西、河南、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

块茎：辛、苦，温。祛痰止咳。用于寒痰咳嗽，蛇咬伤，疟疾。

附　注：陕西用以代天南星，四川用作箭毒药。

**画笔南星**　蛇钻头、花伞柄、蛇姜头、蛇香头、广东土南星(全国中草药汇编)，三叶天南星(海南植物志)

**Arisaema penicillatus** N. E. Br.

生于海拔 1 000 米以下的林中。分布于广东、海南、广西、云南东南部。

块茎：辛，温。有毒。止痛，消肿拔毒。用于无名肿毒，毒蛇咬伤。

**河谷南星**　半夏(云南)

**Arisaema prazari** Hook. f.

生于海拔 150—1 560 米的干热河谷灌丛中。分布于云南思茅、红河、元阳、个旧、蒙自。

块茎：代半夏用。

**雷里见**　花脸、铁灯台(湖南)，麻醉药、大麻药(广西)，半截烂、躲雷草(贵州、云南)

**Arisaema rhizomatum** C. E. C. Fisch.

生于海拔650—2 800 米(--3 200)的山沟及常绿阔叶林下，多见于石缝、石上、石洞旁或岩坡。分布于西南及湖北、湖南、广西。

根状茎(雪里见)：辛，温。有毒。解毒，止痛，祛风，除湿。用于无名肿毒，蛇虫咬伤，劳伤疼痛，风湿麻木。

**绥阳雪里见**

**Arisaema rhizomatum** C. E. C. Fisch. var. **nudum** C. E. C. Fisch.

生于海拔1 650 米以下的山坡林下。分布于贵州绥阳、贵定及西藏东南部。

根状茎：有毒。功效同雪里见。

**黑南星**

**Arisaema rhombiforme** Buchet

生于海拔2100—3 000 米的林下或灌丛中。分布于四川西南部至东部。

块茎：四川作天南星使用。

附　注：**川中南星 A. wilsonii** Engl. 分布于四川峨眉至云南西北部。其块茎在四川也作天南星入药。

**普陀南星**　　衢南星(浙江)，黑南星、狗爪南星(四川)，小南星(植物名实图考)

**Arisaema ringens** (Thunb.) Schott——*Arum ringens* Thunb.

生于阴湿的山坡林下及沟边。分布于陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、台湾、河南、湖南、四川。

块茎(由跋)：辛、苦，温。有毒。用于毒肿热结。

附　注：浙江、甘肃作天南星使用。

**岩生南星**

**Arisaema saxatile** Buchet

生于海拔1 600—2 800 米的河谷草坡或灌丛中。分布于四川西南部、云南西北部、中部至东北部。

块茎：辛，温。有毒。接骨续筋，消肿生肌，止痛。

**全缘灯台莲**　　细齿灯台莲(浙江)

**Arisaema sikokianum** Franch. et Sav.

生于沟边或山坡林下阴湿处。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南。

块茎：苦、辛，温。有毒。燥湿化痰，祛风止痉，散结消肿。

附　注：**七叶灯台莲 A. sikokianum** Franch. et Sav. var. **henryanum** (Engl.) H. Li. 分布于湖北至广东北部。块茎在湖北、湖南作天南星使用。

**灯台莲**　　大叶天南星(江西)，山苞米(河南)，绿南星(湖北)，齿叶南星(湖北、湖南)，蛇根头(广西)

**Arisaema sikokianum** Franch. et Sav. var. **serratum** (Makino) Hand.-Mazz ——*A. sazensoo* (Buerg.) Makino var. *serratum* Makino

生于海拔650—1 500 米的山坡林下或沟谷岩石上。分布于中南及山西、陕西、江苏、安徽、浙江、福建、江西、四川、贵州。

块茎：苦、辛，温。有毒。燥湿化痰，祛风止痉，散结消肿；外用于蛇虫咬伤，疮疡肿

毒;乳痈。

附　注：陕西、江西、湖北、湖南等省作天南星用。

**瑶山南星**　　独角莲(广西),三角条(贵州)

**Arisaema sinii** Krause

生于海拔 1 000—2 300 米的林下或山谷阴湿处。分布于湖南、广西、贵州南部至云南中部。

块茎：辛,温。有毒。燥湿,化痰,和胃,健脾。外用于蛇虫咬伤。

**隐序南星**

**Arisaema wardii** Marq. et Shaw

生于海拔 2 400—4 200 米的林下、草地及灌丛阴湿处。分布于陕西太白山、甘肃南部、青海东部、西藏南部至东南部。

块茎：甘肃、西藏作天南星用。

**山珠南星**　　长虫磨芋、半夏、山珠半夏、滇南星(云南),小南星(植物名实图考)

**Arisaema yunnanense** Buchet

生于海拔 700—3 200 米的荒野山坡、路旁、疏林下或灌丛中。分布于四川西部、贵州西部及云南。

块茎：云南、贵州作半夏用,称山珠半夏。

## 五彩芋属　Caladium Vent.

**五彩芋**　　花叶芋(海南、云南),独角芋(红河中草药),红水芋(全国中草药汇编),红半夏、石芋头、红芋头(中药大辞典)

**Caladium bicolor** (Ait.) Vent. ——*Arum bicolor* Ait.

野生于山谷箐沟较阴湿处或栽培。原产南美。我国福建、台湾、广东、海南、云南有栽培。

块根(独角莲)：苦、辛,温。有毒。解毒消肿,散瘀止痛,接骨,止血。用于风湿疼痛,跌打肿痛,骨折,胃痛,牙痛;外用于无名肿毒,疔腮,痈、疮、疖、癣、湿疹,全身瘙痒及犬、蛇、虫咬伤,刀枪伤。

## 水芋属　Calla L.

**水芋**　　水葫芦、水浮莲(黑龙江)

**Calla palustris** L.

生于海拔 1 100 米以下的草甸、沼泽等浅水域中。分布于东北及内蒙古。

根状茎：有毒。解毒,消炎,利水,镇痛。

## 芋属　Colocasia Schott

**野芋**　　野芋头、红花野芋(江西),红广菜(贵州),红芋荷、野芋荷(江西民间草药验方)

**Colocasia antiquerum** Schott ——*Arum colocasia* L.; *C. esculentum* (L.) Schott var. *antiquerum* (Schott) Hubb. et Rehd

生于山谷林下阴湿处或水沟旁，常有栽培。分布于陕西及长江流域以南各省区。

块茎及全草(野芋)：辛，寒。有小毒。解毒，消肿止痛。用于痈疖肿毒，麻风，疥癣，瘰疬，指头疔，跌打损伤及虫蛇咬伤。

**芋**　芋头(通称)，毛芋(福建)，接骨草、独皮叶(云南)，芋艿(中国医学大辞典)

**Colocasia esculenta** (L.) Schott ——*Arum esculenta* L.

原产我国和印度、马来半岛等热带地区。我国各省区有栽培。

块茎(芋头)：甘、辛，平。消肿散结。用于瘰疬，肿毒，腹中痞块，乳痈，口疮，牛皮癣，烧、烫伤。芋梗：用于泻痢，肿毒。芋叶：辛，凉。止泻，敛汗，消肿解毒。用于癥瘕，疮疥。芋头花：辛，平。用于胃痛，吐血，阴挺，痔疮，脱肛。

**大野芋**　象耳芋(浙江)，山野芋、水芋(海南)，抬板七、抬板蕉(广西)，滴水芋(云南)

**Colocasia gigantea** (Bl.) Hook. f.——*Caladium giganteum* Bl. et Hassk.

生于海拔100—700米的石灰岩地区沟谷地带，常见于林下湿地或石缝中，也有栽培。分布于江西、福建、广东、广西、云南。江苏、上海、安徽、浙江、四川常有栽培。

块茎及全草：解毒，消肿止痛，祛痰镇痉。外用于疮疡肿毒。

**紫芋**　野芋头(四川)，广菜、东南菜、老虎广菜(贵州)，芋头花(云南)

**Colocasia tonoimo** Nakai

全国各地多有栽培。

块茎：清热解毒。外用于各种疮毒。

## 隐棒花属　Cryptocoryne Fisch. ex Wydler

**隐棒花**　沙滩草(广西、贵州)，岩榄(广西)

**Cryptocoryne sinensis** Merr.

生于山坡、田野、路旁阴湿处。分布于广西、贵州西南部。

全草：有毒。用于肾结石，石淋，附骨疽，跌打损伤，疟疾。

**八仙过海**

**Cryptocoryne yunnanensis** H. Li

生于无霜地区的河滩沙地。分布于云南思茅、勐腊。

全草：舒筋活络，祛风止痛。用于跌打损伤，风湿关节痛，泄泻，痢症。

## 麒麟叶属　Epipremnum Shott

**麒麟叶**　百宿蕉、百巨藤(广东)，爬树龙(海南、云南)，龟背竹(广州植物志)，麒麟尾、狮尾草(岭南采药录)，狮子尾(全国中草药汇编)

**Epipremnum pinnatum** (L.) Engl.——*Pothos pinnata* L.; *Scindapsus pinnatus* Schott

生于密林阴湿处，常附生雨林树干上或石壁上。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

根、茎、叶(狮子尾、麒麟尾)：淡、涩，平。清热润肺，消肿解毒，舒筋活络，散瘀止痛。用于发热，顿咳，伤寒，跌打，骨折，风湿痹痛，目赤，鼻衄；外用于痈疽疮疖，毒蛇咬伤，阴囊红肿，乳疮。

## 曲苞芋属 Gonatanthus Klotzsch.

**曲苞芋** 小野芋、岩芋(云南)

**Gonatanthus pumilus** (D. Don) Engl.——*Caladium pumilum* D. Don

附生于海拔 800—1 000 米的密林或灌丛中的石灰岩露头上。分布于贵州、云南、西南部。

块茎：消肿解毒。用于乳痈，跌打瘀肿，痈疖疮毒，癣疥，风湿关节痛。

## 千年健属 Homalomena Schott

**大千年健** 大黑麻芋(云南)

**Homalomena gigantea** Engl.

生于海拔 600—700 米的低山谷、雨林下、溪边。分布于云南西双版纳、思茅。

根状茎：有毒。润肺止咳，退热，祛风湿，止血。用于高烧，肺痨，咳血，咳嗽痰喘，时行感冒，风湿骨痛。

**千年健** 一包针、千年见(广西)，千颗针、绫丝线(云南)，湾洪(傣语)

**Homalomena occulta** (Lour.) Schott——*Calla occulta* Lour.

生于山谷溪边密林下或山坡、竹林、灌丛阴湿处。分布于广东、海南、广西、贵州、云南。

根状茎(千年健)：苦、辛，温。祛风湿，健筋骨。用于风寒湿痹，肢节酸痛，筋骨无力；外用于跌打肿痛，蛇头疮。

附 注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 刺芋属 Lasia Lour.

**刺芋** 炎水姑(广东)，旱慈姑、金慈姑、山慈姑(云南)，帕南、派克那(傣语)，慈姑(岭南采药录)

**Lasia spinosa** (L.) Thwait. ——*Dracontium spinosum* L.

生于海拔 1 530 米以下的林下、田边、沟旁、阴湿草丛、竹丛中。分布于台湾、广东南部、海南、广西南部、云南南部和西南部。

根状茎(慈姑)：辛，平。消炎，止痛，消食，健胃。用于胃脘胀痛，消化不良，风湿关节痛；外用于毒蛇咬伤，瘰疬。

附 注：①兽医用于牛马劳伤，催膘。②云南地区用全草可消炎解毒，清热除湿，利

尿。 根：清热利尿，生津止渴，止痛。用于浮肿，高血压症，狂犬咬伤，风湿痛，跌打，带下病，痛经，水肿，小便混浊，痄腮。

## 半夏属 Pinellia Tenore

**滴水珠** 水半夏(陕西、浙江、江西、广东)，一粒珠、独叶一支花(陕西、浙江、江西)，石半夏、石里开(江西)，心叶半夏(四川)

**Pinellia cordata** N. E. Br.

生于海拔800米以下的山地林缘、溪边、村旁或阴湿的岩石边及峭壁上。分布于陕西、河南及长江流域以南各省区。

块茎(滴水珠)：辛，温。有小毒。解毒，止痛，行瘀消肿。用于毒蛇咬伤，胃痛，腰痛；外用于痈疮肿毒，跌打损伤。(用鲜块茎适量，捣烂敷患处)。

**石蜘蛛** 一面锣、白铃子(四川)

**Pinellia integrifolia** N. E. Br.

生于山坡林下阴湿处。分布于湖北宜昌、四川叙永及重庆。

全株：有小毒。解毒散结，止痛通窍。用于跌打损伤，淋浊。

**虎掌** 掌叶半夏(通称)，狗爪半夏(湖北、四川、云南)，滇半夏(广西)，虎掌南星(四川)，独脚莲、独角莲(南京民间药草)

**Pinellia pedatisecta** Schott——*P. tuberifera* Tanore var. *pedatisecta* (Schott) Engl.

生于海拔1 000米以下的林下、山坡、田野或河谷阴湿处。除东北及宁夏、青海、西藏外，全国均有分布。

块茎(虎掌)：辛、甘，温。有毒。温肾，理气，消肿毒。外用于毒蛇咬伤及无名肿毒。

附 注：河北、山西、江苏、河南、四川等省部分地区，用其小块茎作半夏入药。

**盾叶半夏**

**Pinellia peltata** Péi

生于林下岩石上或山坡草丛中。分布于浙江、福建。

块茎：辛、涩，温。有小毒。消肿解毒，散瘀止痛。用于胃痛，腹痛，痈，毒蛇咬伤及跌打损伤。

**半夏** 药狗丹(东北、华北)，小天老星(东北)，三叶半夏(山西、江西、河南、广西)，三步跳(西南及陕西、江西、湖北、湖南)，麻芋子(陕西、四川)

**Pinellia ternata** (Thunb.) Breit.——*Arum ternatum* Thunb.; *Arisaema ternatum* (Thunb.) Schott

生于海拔2 500米以下的草坡、荒地、玉米地、房前屋后或河边、疏林下。为旱地杂草之一。除内蒙古、西藏尚未见野生的外，全国各省区均有分布。

块茎(半夏)：辛，温。有毒。燥湿化痰，降逆止呕，消痞散结。用于痰多咳喘，痰饮眩晕，风痰眩晕，痰厥头痛，呕吐反胃，胸脘痞闷，梅核气；生用：用于痈肿痰核。

附 注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

## 大漂属　Pistia L.

**大漂**　水浮莲(通称)，水葫芦(新疆)，水荷莲(浙江、江西、云南)，肥猪草(安徽)，"卡过"(傣语)，浮萍(广西药用植物名录)，天浮萍、水浮萍(岭南采药录)

**Pistia stratiotes** L.

栽培或野生于高温多雨环境，常漂浮于水田、池塘、沟渠中。分布于河北、福建、台湾、广东、广西、云南。新疆、山东、江苏、上海、安徽、浙江、江西、河南、四川、贵州有栽培。

全草(大浮萍)：辛，凉。祛风发汗，利尿解毒。用于感冒，水肿，小便淋痛不利，癃疹，皮肤瘙痒，风湿痛，麻疹不透；外用于无名肿毒，煎水洗汗斑，湿疹，跌打肿痛。

附　注：①本品在广东、广西、福建作浮萍药用。②根有微毒，内服应去须根。

## 石柑属　Pothos L.

**紫苞石柑**　石气柑(四川)

**Pothos cathcartii** Schott

附生于海拔500—1 800米的密林中树干上或岩石上。分布于广西、四川、云南。

全草(石柑子)：淡，平。祛风除湿，活血散瘀，消积，止咳。用于跌打损伤，晚期血吸虫病肝脾肿大，风湿关节痛，小儿疳积，咳嗽，骨折，中耳炎，鼻塞流涕。

**石柑子**　风瘫药、毒蛇上树(广西)，巴岩香、石葫芦(广西中药志)，石蒲藤(全国中草药汇编)，石气柑、柑子茵芋(分类草药性)

**Pothos chinensis** (Raf.) Merr.——*Tapanava chinensis* Raf.

生于海拔2 400米以下的林中阴湿处，常匍匐于岩石上或附生于树干上。分布于台湾、湖北、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全草(石柑子)：苦、辛，微温。功效同紫苞石柑。

附　注：①广西用全草入药，解毒，祛风湿。用于疳积，癫痫，小便淋痛不利，肝硬化腹水，急、慢性前列腺炎，风湿骨痛；外用于乳痈，跌打损伤，蛇咬伤。②云南以全草理气止痛，祛风湿。用于劳损性腰腿痛，心胃气痛，疝气，脚气，风湿骨痛。

**长柄石柑**

**Pothos chinensis** (Raf.) Merr. var. **lotiensis** C. Y. Wu et H. Li

生于海拔520—1 100米的阴湿山谷岩石上。分布于贵州罗甸、望谟、安龙、南盘江。

茎叶或全草：祛风除湿，活血散瘀，理气止痛，消积，止咳。

**长梗石柑**　勾轻(广西龙州壮语)

**Pothos kerrii** Bucher ex Gagnep.

生于林下阴湿处，常攀援在树干或附生于岩石上。分布于广西龙州及凭祥。

全株：消积。用于风湿骨痛，跌打损伤。

**地柑**　葫芦藤(广西)

**Pothos pilulifer** Bucher ex Gagnep.

常附生于海拔200—1 000米的林下阴湿岩石上。分布于广西西南部至云南东南部。

全株：清心，泻热。用于癫痫。

**百足藤**　蜈蚣藤(广东、贵州、云南)，姜藤(广西)，铁斑鸠、巴岩姜(贵州民间药物)，细叶藤柑、细叶石柑(全国中草药汇编)，细叶藤桔(中药大辞典)

**Pothos repens** (Lour.) Druce——*Flagellaria repens* Lour.

附生于海拔900米以下的林内石上、或灌丛阴湿处。分布于广东南部及沿海岛屿、广西南部、云南东南部。

全草或茎叶(飞天蜈蚣)：辛，温。祛风湿，消肿止痛。用于跌打损伤，劳伤，骨折，痈肿疮毒，眼生翳膜。叶：用于吐血，胃脘胀痛，风湿痹痛。

**螳螂铁打**　硬骨散(云南)，歪淋(傣语)，石柑子(中药大辞典)

**Pothos scandens** L.

生于海拔200—1 000米的山坡、平坝、河漫滩或沟谷雨林、季雨林中，多附生于树干或崖上。分布于广西及云南西双版纳、河口、广南、思茅。

茎、叶(螳螂铁打)：苦、辛，温。舒筋活络，接骨续筋，散瘀消肿，祛风湿。用于跌打损伤，骨折，风湿骨痛，腰腿痛。

附　注：傣族人用叶泡水作茶饮。

## 崖角藤属　Rhaphidophora Hassk.

**爬树龙**　石蛇(广东)，上木蜈蚣、过山标(广西)，爬山虎、过江龙(云南)，裂叶崖角藤(中国高等植物图鉴)

**Rhaphidophora decursiva** (Roxb.) Schott——*Pothos decursiva* Roxb.

生于海拔2 200米以下的阴湿密林或灌丛中，常攀附于树干上或匍匐在地面、石壁上。分布于福建、台湾、广东、广西、贵州、云南、西藏东南部。

根、茎(爬树龙)：苦，寒。活血祛瘀，止痛，止血，接骨消肿，清热解毒，镇咳。用于跌打损伤，骨折，蛇咬伤，痈疮疖肿，顿咳，咽喉肿痛，风湿腰腿痛。

**狮子尾**　爬树蜈蚣、青竹丝(福建)，大软筋藤(贵州药用植物名录)，爬树龙、金竹标(云南中草药选)，密脉崖角藤(海南植物志)，崖角藤(中国高等植物图鉴)

**Rhaphidophora hongkongensis** Schott

生于海拔80—2 000米的热带沟谷雨林内，常攀附于树干或岩石上。分布于福建、广东、广西、贵州、云南。

全株(青竹标)：苦，寒。有毒。祛瘀镇痛，润肺止咳，续筋接骨。用于脾肿大，高烧，风湿腰痛，咳嗽痰喘，顿咳；外用于跌打损伤，骨折，烫火伤。

附　注：本种有毒，内服微量，一般以1/4个叶片为限。

**毛过山龙**　大岩藤(四川)，过山龙、大百步还阳、龙咀草(云南)，大叶崖角藤(中国高等植物图鉴)

**Rhaphidophora hookeri** Schott

生于海拔280—2 200米的山谷密林中或阴湿山坡、沟边、灌丛中，多攀援于树上。分布于广东东南部、广西西部、四川南部、贵州南部、云南西北部、西南部至东南部。

全株：祛痰，镇痛，润肺止咳，接骨。

**大叶南苏**　金竹标、过江龙、小南苏、万年青(云南)

**Rhaphidophora peepla** (Roxb.) Schott——*Pothos peepla* Roxb.; *Scindapsus peepla* Schott

生于海拔 1 800—2 800 米的阔叶林内，附生于树干或岩石上。分布于云南。

全株(青竹标)：苦，寒。续筋接骨，活血，清肺止咳。用于骨折，跌打损伤，风湿麻木，咽喉痛，心绞痛，咳嗽痰喘，哮喘，顿咳。

## 落檐属　Schismatoglottis Zoll. et Mor.

**广西落檐**　过山龙(广西)

**Schismatoglottis calyptrata** (Roxb.) Zoll. et Mor. ——*Calla calyptrata* Roxb.; *Homalomena calyptratum* (Roxb.) Kunth.

生于海拔 740—880 米的热带密林下或灌丛中。分布于广西龙州。

茎：用于风湿腰痛。

## 泉七属　Steudnera C. Koch

**泉七**　小毒芋(云南)，团芋、湾洪(傣语)，香芋(中国高等植物图鉴)

**Steudnera colocasiaefolia** C. Koch

生于海拔 650—1 400 米的沟谷雨林下、溪边及林中湿地。分布于云南。

根状茎(香芋)：辛，温。有毒。舒筋络，祛风湿，止痛，解毒消肿。用于跌打损伤，骨折，外伤出血，风湿性腰腿痛，类风湿关节痛，血栓性脉管炎，蛇虫咬伤，疮疡肿毒，吐泻，痧症。

## 臭菘属　Symplocarpus Salisb.

**臭松**　黑瞎子白菜(吉林)

**Symplocarpus foetidus** (L.) Salisb.——*Dracontium foetidum* L.

生于海拔 300 米以下的潮湿针叶林或混交林下，常在溪流河岸阴湿处及沼泽地段成大片生长。分布于黑龙江、松花江、乌苏里江流域。

根及全草(臭菘)：有毒。强心，镇静，解痉，祛痰，解热，止痛。

## 犁头尖属　Typhonium Schott

**白脉犁头尖**

**Typhonium albidinervum** C. Z. Tang et H. Li

我国特有植物，产广东从化。广东植物园、广州各药圃栽培，云南昆明亦有引种。

块茎：解毒消肿，散结，止血。用于毒蛇咬伤，痈疖肿毒，血管瘤，瘰疬，跌打损伤及外伤出血。

**单籽犁头尖**　岩生犁头尖(中国植物图鉴)

**Typhonium calcicolum** C. Y. Wu et H. Li

生于海拔1 000—1 550米的山坡林下或石灰岩山上。分布于四川、云南东南部。

块茎：有毒。解毒消肿，散结，止痛。

附　注：有些地方充半夏药用。

**犁头尖**　土半夏(福建、广东、广西、云南)，芋叶半夏(广西)，鼠尾巴、白附子(四川)，狗半夏、山半夏(云南)

**Typhonium divaricatum** (L.)Decne.——*Arum divaricatum* L.

生于海拔1 200米以下的田野、路旁、房前屋后，低洼湿地及杂草中。分布于浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

块茎、全草(犁头尖)：苦、辛，温。有毒。解毒消肿，散结，止血。用于毒蛇咬伤，痈疖肿毒，血管瘤，瘰疬，跌打损伤，外伤出血。

附　注：一般外用，不作内服。福建、广东、广西等地曾作半夏使用。

**高原犁头尖**

**Typhonium diversifolium** Wall. ex Schott——*Heterostalis diversifolium* (Wall. et Schott) Schott

生于海拔2 900—3 700米的草坝、山坡、地边或高山草地。分布于四川、云南西北部至西藏南部吉隆。

块茎：祛风痰，逐寒湿。

**鞭檐犁头尖**　水半夏、田三七、疯狗薯(广西)，白苞犁头尖(中国高等植物图鉴)，戟叶犁头尖(全国中草药汇编)

**Typhonium flagelliforme** (Lodd.) Bl.——*Arum flagelliforme* Lodd.

生于海拔100—350米的山坡、路旁、田边、低洼湿地、林下或草丛中。分布于广东、广西、贵州、云南金平。

块茎(水半夏)：辛，温。有毒。燥湿，化痰，止咳。用于咳嗽痰喘。

附　注：本品曾作为半夏的代用品。

**独角莲**　白附子(通称)，禹白附(东北及河北)，红南星、麻芋子(陕西、甘肃)，鸡心白附(西藏)

**Typhonium giganteum** Engl.

生于海拔1 500米以下的山坡、荒地、水沟旁、林下、山涧阴湿地或栽培。野生于河北、北京、天津、山西、陕西、甘肃、宁夏、青海、安徽、湖南、四川、贵州、西藏。东北及新疆、山东、江苏、河南、湖北、广东、广西、云南有栽培。

块茎(白附子、禹白附)：辛、甘，大温。有毒。祛风痰，定惊搐，解毒散结。用于中风痰壅，口眼歪斜，语言涩謇，痰厥头痛，面神经麻痹，偏正头痛，喉痹咽痛，破伤风。全草(独角莲)：外用于毒蛇咬伤，瘰疬，跌打损伤。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**洪雅犁头尖**　白休籽(四川)

**Typhonium hongyanense** Z. Y. Zhu

生于山坡林下。分布于四川。

块茎：有毒。解毒消肿，散结，止痛。

**湖南犁头尖**　地金莲、夏无影、地花生(湖南)

**Typhonium hunanense** H. Li et Z. Q. Liu

生于海拔 120 米左右的竹林、灌丛中。分布于湖南郴县、耒阳、永兴。

根状茎：用于痈疖，无名肿毒，蛇咬伤。

**西南犁头尖**　野水芋(广西)，半夏、鸡包谷、红南星(四川)

**Typhonium omeiense** H. Li

生于竹林下杂草丛中。分布于广西、四川、贵州。

块茎：苦、辛，温。消肿，散瘀，止血。用于毒蛇咬伤，乳痈，疔疮。

**金慈姑**

**Tylhonium roxburgii** Schott

栽培或野生。分布于云南腾冲，昆明植物园有栽培。

块茎(金慈姑)：用于风湿关节痛。

**三叶犁头尖**　代半夏、花半夏(山西)

**Typhonium trifoliatum** Wang et Lo ex H. Li

生于丘陵坡地、田边、村旁。分布于华北及陕西。

附　注：内蒙古、山西以本种块茎代半夏入药。山西代县产的称"代半夏"，太谷县范村产的称"范半夏"。

**马蹄犁头尖**　马蹄跌打、小黑牛、山半夏(云南)，三裂叶犁头尖(全国中草药汇编)

**Typhonium trilobatum** (L.) Schott——*Arum trilobatum* L

生于海拔 650 米以下的热带芭蕉林、灌丛、草地、荒地及路旁。分布于广东、广西、云南。

块茎(山半夏)：辛，温。有毒。祛风寒，消肿，止痛。

附　注：①云南个别地区作半夏入药。②犁头尖属植物毒性大，未经科学研究证实，不宜代半夏用。

## 204. 浮萍科　Lemnaceae

### 浮萍属　Lemna L.

**青萍**　小浮萍(海南植物志)，浮萍(本草纲目)，浮萍草(本草图经)，水藓(品汇精要)

**Lemna minor** L.

生于池沼、湖泊、水田及其他静水中。全国各地均有分布。

全草(浮萍)：辛，寒。宣散风热，透疹，利尿。用于麻疹不透，风疹瘙痒，水肿尿少。

### 紫萍属　Spirodela Schleid.

**紫萍**　藻(浙江)，萍(福建)

**Spirodela polyrrhiza** (L.) Schleid.——*Lemna polyrrniza* L.

生于水田、水塘、湖湾、水沟或静水中，常与浮萍 Lemna minor L. 形成覆盖水面的飘浮植物群落。全国各地均有分布。

全草(浮萍)：辛，寒。宣散风热，透疹，利尿。用于麻疹不透，风疹瘙痒，水肿尿少。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 205. 露兜树科　Pandanaceae

### 露兜树属　Pandanus L. f.

**露兜草**

**Pandanus austrosinensis** T. L. Wu

生于山谷、密林下、溪边或河中。分布于广东湛江和惠阳、海南、广西。

根：清热祛湿。

**分叉露兜**　山菠萝、假菠萝(云南)，野菠萝、露兜(云南思茅中草药选)，罗金堆(傣语)

**Pandanus furcatus** Roxb.

生于海拔 1 750 米以下的山坡、低沟谷雨林下及热带多湿的水边。分布于广东、海南、广西、云南、西藏南部。

根(帕梯)：甘、淡，凉。清热利尿，发汗止痛。用于感冒发热，淋证，水肿，目赤肿痛，肝炎，风湿腰腿痛。果实(帕梯果)：用于痢疾。

**小露兜**

**Pandanus gressitii** B. C. Stone

生于林中、溪旁、水边。分布于台湾、广东、海南。

根(露兜根)：清热祛湿。果实：用于小肠疝气。

**露兜树**　野菠萝蜜(福建)，香露兜(云南)，林茶(中国高等植物图鉴)

**Pandanus tectorius** Soland.

生于海岸沙地或林下阴湿处，也有栽培。分布于福建、台湾、广东、海南。广西及云南勐腊也有栽培。

根及根头(露兜簕)：甘、淡，凉。清热解毒。用于感冒，温热，肝炎，水肿，淋证，跌打损伤。叶芽(露兜簕心)：甘、平，微寒。清热，凉血，解毒。用于麻疹，发斑，丹毒，暑热症，牙龈出血，恶疮，烂脚。花(露兜簕花)：甘，寒。用于疝气，小便不通。果实(橹罟子)：甘，凉。清热解毒。用于疝气，痢疾，痔疮，目生翳障，视物不明。

附　注：全株可解牲畜 666 中毒。

**小果山菠萝**

**Pandanus tonkinensis** Martelli

生于海拔 80—650 米的滇越边境。分布于云南东南部。

根：清热解毒，利尿消肿。

## 206. 黑三棱科 Sparganiaceae

### 黑三棱属 Sparganium L.

**曲轴黑三棱**

**Sparganium fallax** Graebn.

生于湖泊、水池及水沟中。分布于浙江南部。

块茎：苦，平。破血行气，消积止痛。

**小果黑三棱** 京三棱(新疆)

**Sparganium microcarpum** Celak.

生于沼泽、河渠、池塘、低水池。分布于新疆北部。

块茎：破瘀通经，行气止痛，消积。

**小黑三棱** 单枝黑三棱(通称)

**Sparganium simplex** Huds.

生于池沼、沟渠旁或水草丛中，也有栽培。分布于东北、华北及陕西、甘肃、新疆、贵州、云南。

块茎(三棱)：辛、苦，平。破血行气，消积止痛。用于血瘀气滞，腹部结块，肝脾肿大，经闭腹痛，食积胀痛。

**狭叶黑三棱** 细叶黑三棱(中药志，中药大辞典)

**Sparganium stenophyllum** Maxim.

生于池塘、水沟、沼泽地。分布于东北及河北。

块茎(三棱)：功效同黑三棱。

**黑三棱** 京三棱、三棱(通称)

**Sparganium stoloniferum** Buch.-Ham.

生于水塘、湖边、水湿低洼处及沼泽地，也有栽培。除福建、广东、海南、广西、云南外，其他省区均有分布。

块茎(三棱)：辛、苦，平。破血，行气，消积，止痛。用于血瘀气滞，腹部结块，肝脾肿大，经闭腹痛，食积胀痛。

**附 注**：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 207. 香蒲科 Typhaceae

### 香蒲属 Typha L.

**长苞香蒲** 蒲草(宁夏)，水蜡(四川)

**Typha angustata** Bory et Chaub.

生于水边及池沼中。分布于东北、华北、西北、华东及河南、四川、贵州。

花粉(蒲黄)：功效同水烛。带嫩茎的根状茎(蒲根)：甘，凉。清热凉血，利水消肿。

用于孕妇劳热，胎动下血，消渴，口疮，热痢，淋证，带下病，水肿，瘰疬。 全草(香蒲)：用于小便不利，水肿。 果穗(蒲棒)：甘、微辛，平。用于外伤出血。

**水烛** 狭叶香蒲(通称)，水蜡烛(江苏、浙江、江西、广东、广西、云南)，毛蜡烛(贵州)、水烛香蒲(中华人民共和国药典)，蒲草(华东水生维管束植物)

**Typha angustifolia** L.

生于池沼、沟边、河岸边、积水湿地或浅水中。全国均有分布。

花粉(蒲黄)：甘，平。止血，化瘀，通淋。用于吐血，咯血，崩漏，外伤出血，经闭痛经，脘腹刺痛，血淋涩痛；外用于口舌生疮，疖肿。 全草(香蒲)：用于小便不利，乳痈。

附 注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**蒙古香蒲** 毛腊黄(青海)，无苞香蒲(新疆)，达香蒲(中国沙漠植物志)，线叶香蒲(中药大辞典)

**Typha davidiana** Hand.-Mazz.

生于池塘、水泊、沼泽、湿沙地或浅水中。分布于东北、华北、西北及河南。

功效同水烛。

**象蒲**

**Typha elephantina** Roxb.

生于海拔 800—1 050 米的湿润草坡。分布于云南镇康。

花粉(蒲黄)：甘，平。止血，祛瘀。用于咯血，吐血，尿血，崩漏，腰腹刺痛，跌打损伤。

**宽叶香蒲**

**Typha latifolia** L.

生于池塘、沼泽、湿地、湖泊、水田及河水中。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、新疆、河南、四川、贵州。

功效同水烛。

**缺苞香蒲**

**Typha laxmanniii** Lepach.

生于湖泊、平原绿洲、河沟低洼积水地。分布于新疆。

花粉(蒲黄)：通络逐瘀，收敛止血。

**小香蒲** 水香蒲(青海)，细叶香蒲(全国中草药汇编)

**Typha minima** Funk-Hoppe

生于河滩、沟渠、河湖边及沼泽湿地。分布于东北、华北、西北、西南及山东、河南。

功效同水烛。

**东方香蒲** 水蜡烛(江苏)，草蒲黄(浙江)，毛蜡烛(湖北、贵州)

**Typha orientalia** Presl

生于河谷、水旁或沼泽中。分布于东北、华北、中南及陕西、甘肃、新疆、安徽、浙江、江西、四川、贵州、云南。

花粉(蒲黄)：甘，平。止血，化瘀，通淋。用于吐血，衄血，咯血，崩漏，外伤出血，经闭痛经，脘腹刺痛，跌打肿痛，血淋涩痛。 全草：用于小便不利，乳痈。带部分嫩茎的根状茎(蒲根)：甘，凉。清热凉血，利水消肿。用于孕妇劳热，胎动下血，消渴，口疮，热痢，淋证，带下病，水肿，瘰疬。 果穗(蒲棒)：甘、微辛，平。用于外伤出血。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**球序香蒲**

**Typha pallida** Pobed.

生于河湖边、沼泽地。分布于新疆北部。

花粉(蒲黄)：通络逐瘀，收敛止血。

## 208. 莎草科　Cyperaceae

### 球柱草属　Bulbostylis Kunth

**球柱草**　旗茅(辽宁沈阳)，龙爪草(江西新淦)，畎莎(广东)，秧草(海南琼山)，油麻草(广西桂林)

**Bulbostylis barbata** (Rottb.) Kunth——*Scirpus barbata* Rottb.

生于海边、河边沙地或郊野路旁、田边湿地上。分布于华东及辽宁、河北、河南、湖北、广东、海南、广西、贵州、云南。

全草：止血，清肝明目。

**丝叶球柱草**　黄毛草(广东惠阳、广西桂林)，细黄毛草(广东梅县)，羊胡须、龙须草(广西)

**Bulbostylis densa** (Wall.) Hand.-Mazz.——*Scirpus densus* Wall.

生于海拔100—3 200米的海边、河边沙地或荒坡、路旁及松林下。分布于华东、西南及河北、湖北、湖南、广东、广西。

全草：甘、淡，凉。清凉，解热。用于湿疹，中暑，腹泻，跌打肿痛，尿频。

### 苔草属　Carex L.

**高杆苔草**

**Carex alta** Boott——*C. remota* L. subsp. *alta* (Boott) Kukenth.

生于海拔2 000米以下的水边或山坡潮湿地。分布于广西、四川、贵州、云南。

根：祛风除湿。

**浆果苔草**　芭茅草、红稗、野高粱(云南种子植物名录)，土稗子、山高粱(云南中草药选)，山稗子(滇南本草)

**Carex baccans** Nees

生于河边、路旁或山坡、林缘、疏林及灌丛中。分布于中南、西南及江西、福建、台湾。

根及全草(山稗子)：苦、涩，微寒。凉血，止血，调经。用于月经不调，崩漏，鼻衄，消化道出血，狂犬咬伤。果实：甘、微辛，微寒。透疹止咳，补中利水。用于麻疹，水痘，顿咳，水肿，脱肛。

**亚大苔草**　三方草、白郎苔(江西、贵州)

**Carex brownii** Tuck.

生于林下、山坡、路旁及灌丛中。分布于长江流域各省及陕西、甘肃、台湾、河南。

根(三方草)：甘、苦，平。理气止痛，祛风除湿。用于小儿夜啼，风湿骨痛。

**栗褐苔草**

**Carex brunnea** Thunb.

生于林下、灌丛或山坡阴处、河边。分布于华东、西南及河南、湖北、湖南。

全草：收敛，止痒。

**中华苔草**

**Carex chinensis Retz.**

生于林下。分布于西南及浙江、福建、广东。

全草：理气止痛。

**十字苔草**　　三角草、三棱草(广西)，油草(海南植物志)

**Carex cruciata** Wahlenb.

生于山坡、草地、林下、灌丛、水旁。分布于西南及浙江、江西、福建、台湾、湖北、广东、海南、广西。

全草：辛、甘，平。凉血，止血，解表透疹。用于痢疾，麻疹不出，消化不良。

附　注：功效相似的有**缘苞苔草 C. chungii** C. P. Wang、分布于四川；**芒尖苔草 C. doniana** Spreng.，分布于中南、西南及陕西、安徽、浙江、江西；**尖叶苔草 C. hancockiana** Maxim.，分布于东北及河北、山西、甘肃、四川；**异穗苔草 C. heterostachya** Bunge，分布于东北、华北及陕西、甘肃、山东、河南；**日本苔草 C. japonica** Thunb.，分布于东北及河北、山西、陕西、河南、湖北、四川；**膨囊苔草 C. lehmannii** Drejer，分布于西南及山西、陕西、甘肃、青海、河南、湖北；**舌叶苔草 C. liguiata** Nees ex Wight，分布于中南、西南及陕西、江苏、安徽、浙江；**宝兴苔草 C. moupinensis** Franch.，分布于湖北、四川、云南；**翼果苔草 C. neurocarpa** Maxim.，分布于东北、华北及陕西、甘肃、山东、江苏、福建、河南；**花葶苔草 C. scaposa** C. B. Clarke，分布于西南及浙江、福建、广东、广西；**三穗苔草 C. tristachya** Thunb.，分布于江苏、浙江、福建、湖北、广东、海南、广西、四川；**硬果苔草 C. sclerocarpa** Franch.，分布于湖北、湖南、四川。

**长芒苔草**

**Carex davidii** Franch.

生于低山地、路旁。分布于陕西、甘肃、湖北、四川。

全草：用于风湿筋骨痛，半身不遂。

**棕树七**　　兰花七(湖北)

**Carex densefimbriata** Wang et Tang

生于山坡草地、路旁。分布于湖北恩施、咸丰、来凤、巴东。

根：用于劳伤，跌打损伤，催吐。

附　注：湖北特有药用植物。

**亮绿苔草**

**Carex finitima** Boott

生于海拔1 900—3 400米的杂木林下沟边。分布于四川、云南。

全草：甘、微辛，温。行血止痢，活血祛瘀。

**弯隆苔草**

**Carex gibba** Wahlenb.

生于山坡草地、田边路旁。分布于山西、陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、广东、广西、四川。

全草：用于风湿关节痛。

**砂钻苔草**　筛草、筛实(海药本草)，自然谷、禹余粮(张华《博物志》)，筛草实(本草纲目拾遗)

**Carex kobomugi** Ohwi

生于沿海沙滩地或沙地。分布于黑龙江、河北、山东、江苏、浙江、台湾。

果实(筛实)：甘，平。补虚损，温肠胃，止呕逆。

**披针苔草**　凸脉苔草、羊毛胡子、羊胡子草(东北及河北)，羊胡髭草(江苏药材学)，披叶苔(中药大辞典)

**Carex lanceolata** Boott

生于路旁、荒草坡、林下。分布于东北、华北、华东、西南及陕西、甘肃、青海、河南、湖北。

全草(羊胡髭草)：甘、苦，平。理气止痛，祛风除湿，收敛止痒。用于湿疮，黄水疮，小儿羊须疮。　果实：凉血，止血。

**青绿苔草**　哮喘草(湖北)，青菅(中国高等植物图鉴)

**Carex leucochlora** Bunge

生于山坡、山谷路旁。分布于东北、华东、中南及河北、陕西、四川、云南、西藏。

全草：用于肺热咳嗽，咳血，哮喘，顿咳。

**密叶苔草**　三角草、山马鞭草(广西罗城)，毛囊苔草(海南植物志)

**Carex maubertiana** Boott

生于林下或水边。分布于西南及浙江、福建、湖北、广东、海南、广西。

全草：辛、甘，平。清热，利尿。用于淋证，烧、烫伤。

**条穗苔草**　线穗苔草(海南植物志)

**Carex nemostachys** Bleud.

生于溪旁、林下、潮湿地。分布于江苏、安徽、浙江、福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西、贵州。

全草：利水。用于水肿。

**云雾苔草**

**Carex nubigena** D. Don

生于林下、河边及潮湿草地。分布于陕西、甘肃、安徽、湖北、四川、云南、西藏。

全草：用于痛经，经闭。

**镜子苔草**　三棱马尾、仙鹤草(贵州)，三棱草(贵州民间药物)，有喙红苞苔(中药大辞典)

**Carex phacota** Spreng.——*C. shichiseitensis* Hayata

生于路旁、水旁或山坡草丛中。分布于华东、中南、西南。

带根全草(三棱草)：辛，平。解表透疹，催生。用于小儿麻疹不透，妇女难产。

**白颖苔草**　硬苔草、细叶苔草(河北)

**Carex rigescens** (Franch.) V. Krecz. ——*C. stenophlla* Wahlb var. *rigescens* Franch.

生于山坡、道旁及村边荒地上。分布于东北、西北及山东、江苏、河南、湖北、安徽、四川。

种子：用于小儿秃疮，黄水疮。

**大理苔草**　羊胡子草(湖北)

**Carex rubro-brunnea** C. B. Clarke var. **taliensis** (Franch.) Kukenth.——*C. taliensis* Franch.

生于疏林下、水边、路旁。分布于陕西、甘肃、浙江、江西、湖北、广西、四川、云南。

全草：清热利湿，消疮止痒。

**砂地苔草**

**Carex satsumensis** Franch. et Sav.

生于沙质坡地。分布于台湾、贵州。

全草：清热解毒，发表散寒。

**宽叶苔草**　崖棕(中国高等植物图鉴)，崖棕根(图经本草)

**Carex siderosticta** Hance

生于山林下、水边。分布于东北、华北及陕西、山东、安徽、浙江、江西、河南、湖北。

根(崖棕根)：甘、辛，温。活血化瘀，通经活络。用于妇人血气，五劳七伤。　根状茎：清热，凉血，止血，利尿。

**广场苔草**　石柏苔草(广西)

**Carex spatiosa** Boott

生于林下石上或林中。分布于广西、云南。

全草：用于小儿惊风。

**东陵苔草**

**Carex tangiana** Ohwi

生于山坡、路旁、河边、平原湿地。分布于东北及河北、山西、陕西、甘肃、河南。

全草：清热解毒。

## 莎草属　Cyperus L.

**风车草**　九龙吐珠(泉州本草)，伞莎草(中药大辞典)

**Cyperus alternifolius** L. subsp. **flabelliformis** (Rottb.) Kukenth.——*C. flabelliformis* Rottb.

生于森林、草原地区河流沿岸的沼泽地及积水处，或栽培于水池中。原产非洲。我国各地庭园均有栽培。

茎叶(九龙吐珠)：酸、甘、微苦，凉。行气活血，退黄解毒。用于瘀血作痛，蛇虫咬伤。

**阿穆尔莎草**　三楞草(河南)，灯台草(湖北)，三棱草(云南)

**Cyperus amuricus** Maxim.

生于田间及山坡、地边、河边，为田园中的杂草。分布于辽宁、吉林、河北、山西、陕西、江苏、安徽、浙江、河南、湖北、四川、贵州、云南。

带根全草：用于风湿骨痛，瘫痪，麻疹。　根状茎：疏表解热，调经止痛。

**扁穗莎草**　天打锤(广西)

**Cyperus compressus** L.

生于旷野荒地上。分布于华东、中南及四川、贵州。

全草：养心，调经行气。外用于跌打损伤。

附　注：功效相同的有**长尖莎草 C. cuspidatus** Kunth，分布于浙江、福建、广东、四川、云南。

**异型莎草**　水蜈蚣(浙江、湖北)，香附(河南)，咸草(贵州)，咸草(江苏南部种子植物手册)

**Cyperus difformis** L.

常生于稻田中或水边潮湿处。全国大部分地区均有分布。

带根全草：咸、微苦，凉。行气，活血，通淋，利小便。用于热淋，小便不利，跌打损伤，吐血。

**穆穗莎草**　三角草、土三棱(广西)

**Cyperus eleusinoides** Kunth

生于山坡草地或山谷疏林中。分布于福建、台湾、广东、广西、云南。

全草：止血，散瘀。

**头状穗莎草**　聚穗莎草(河北、河南)，球穗莎草、头穗莎草(河北)，水莎草(河南)，球形莎草(中药大辞典)，三轮草、状元花(中国植物志)

**Cyperus glomeratus** L.

生于稻田、河岸、沼泽地、水边湿地或路旁阴湿的草丛中。分布于东北及河北、山西、陕西、甘肃、江苏、安徽、河南。

全草：止咳化痰。用于咳嗽痰喘。

**畦畔莎草**　三棱草(广西苍梧)

**Cyperus haspan** L.

生于山坡草地及田边，多见于水田、浅水池塘等多水处。分布于江苏、福建、台湾、广东、广西、四川、云南、西藏。

全草：用于婴儿破伤风。

**碎米莎草**　见骨草(黑龙江)，米莎草(安徽)，三方草(浙江)，三楞草(四川中药志)，三轮草、四方草(分类草药性)

**Cyperus iria** L.

生于田间、山坡、路旁阴湿处，为常见的田间杂草。全国大部分省区均有分布。

全草(野席草)：辛，平。祛风除湿，调经利尿。用于风湿筋骨痛，跌打损伤，瘫痪，月经不调，痛经，经闭、砂淋。

附　注：广西用根或全草可利湿热。用于痢疾，痔疮。

**短叶茳芏**　咸水草(广东、四川)，席草(福建)

**Cyperus malaccensis** Lam. var. **brevifolius** Boeklr.

多生于河旁、沟边、近水处或栽培。分布于江苏、福建、广东、广西、四川。

根及根状茎(席草)：淡，平。清热利尿，顺气调经，解痉。用于小便不利，经闭，急惊风。

附　注：**莎茎 C. malaccensis** Lam. 分布于广东，贵州有栽培。全草清热止痛。

**旋鳞莎草**　护儿草(河南)，护心草(四川中药志)，附心草(分类草药性)

**Cyperus michelianus** (L.) Link——*Scirpus michelianus* L.

生于潮湿空旷处或水边。分布于黑龙江、河北、北京、江苏、安徽、浙江、河南、广东、广西、四川、云南。

全草(护心草)：辛，平。养血，行气调经。用于痛经，月经不调。

**具芒碎米莎草**　太阳草(湖北)

**Cyperus microiria** Steud.

生于荒地路旁、河旁、草原湿处。全国各地均有分布。

全草：利湿通淋，行气活血

**垂穗莎草**　十瘿楼(广西都安)

**Cyperus nutans** Vahl

生于草地中或山谷湿处。分布于广东、海南、广西、云南。

根：用于小儿发热。

**三轮草**　水蜈蚣(湖北)

**Cyperus orthostachyus** Franch. et Sav.

多生于水边。分布于东北及河北、山东、湖北、四川、贵州。

根：用于妇科病。　全草：祛风止痛，清热泻火。用于感冒，咳嗽，疟疾。

**毛轴莎草**　三棱草、三角草(广西)

**Cyperus pilosus** Vahl

生于田边、水旁或草地潮湿处。分布于浙江、江西、福建、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全草：用于浮肿，跌打损伤。　花序：用于水肿。

**香附子**　夜夜青、雷公草(江西)，辣姜草(广西玉林)，缩缩草(江苏植物志)，香头草(广州植物志)，莎草(名医别录)

**Cyperus rotundus** L.

生于山坡草地、田间、路旁、河沟沙地或水湿地，亦有栽培。全国大部分省区均有分布。主产山东、浙江、河南、湖南。

根状茎(香附子)：辛、微苦、甘，平。理气解郁，调经止痛。用于肝郁气滞，胸、胁、脘腹胀痛，消化不良，胸脘痞闷，寒疝腹痛，乳房胀痛，月经不调，经闭，痛经。　茎叶：行气，开郁，祛风。用于胸闷不舒，皮肤风痒，痈肿。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 荸荠属　Eleocharis R. Br.

**荸荠**　通天草(浙江)，红慈姑(民间常用草药汇编)，马蹄(本草求原)

**Eleocharis dulcis** (Burm. f.) Trin. ex Henschel——*Andropogon dulce* Burm. f.; *E. tuberosa* Schult.

栽植于水田或池塘中。我国温暖地区均有栽培。

块茎(荸荠): 甘，寒。清热止渴，化痰消积，降血压。用于热病烦渴，咽喉肿痛，口腔破溃，湿热黄疸，高血压症，小便不利，麻疹，肺热咳嗽，矽肺，痔疮出血。 全草(通天草): 苦，平。化湿热，通淋利尿。用于小便不利，淋证。

**木贼状荸荠**

**Eleocharis equisetina** L. et C. Presl

生于水田、池塘边及潮湿处。分布于江苏、台湾、湖北、广东、海南。

全草: 用于风热咳喘。

**卵穗荸荠** 卵穗针蔺(云南种子植物名录)

**Eleocharis ovata** (Roth) Reom. et Schult.——*Scirpus ovata* Roth

生于海拔 2 500 米以下的沼泽地。分布于东北及云南、西藏。

根状茎: 解热，化痰，健胃，明目。

**透明鳞荸荠** 谷星草(广西)，膜苞藺(云南)

**Eleocharis pellucida** Presl

生于池塘、水田中及湖边湿地。除青藏高原、甘肃、新疆外，全国各省区均有分布。

全草: 清热，化痰，消积。用于目赤，夜盲症，小儿疳积，头痛，疮疖。

附 注: 功效相似的有**少花荸荠 E. pauciflora** (Lightf.) Link，分布于新疆；**龙师草 E. teraquetra** Nees，分布于华东及河南、广西、四川、云南。

**牛毛毡** 地毛(浙江)

**Eleocharis yokoscensis** (Franch. et Sav.) Tang et Wang——*Scirpus yokoscensis* Franch et Sav.

生于水田中、池塘边或河滩、水渠岸边及湿地上。分布几遍全国。

全草(牛毛毡): 辛，温。散寒祛痰，活血消肿。用于外感风寒身痛，咳嗽痰喘，跌打损伤。

## 羊胡子草属 Eriophrum L.

**丛毛羊胡子草** 心慌草、猴毛草(湖北)，岩梭(全国中草药汇编)

**Eriophorum comosum** (Wall.) Nees——*Scirpus comosum* Wall.

喜生于岩壁上或田边、荒地。分布于西南及甘肃、湖北、广西。

全草及花(岩棱): 辛，温。全草: 通经活络。用于风湿骨痛，跌打损伤。 花: 平喘止咳。用于咳嗽。 根: 清热解毒。用于心悸，胃痛。

**白毛羊胡子草** 羊胡子草(吉林)

**Eriophorum vaginatum** L.

生于沼泽地、湿草地或潮湿的旷野及林中。分布于东北。

根: 用于黄水疮。

## 飘拂草属　Fimbristylis Vahl

**夏飘拂草**　大牛毛毡(湖北),夏飘拂草(四川)

**Fimbristylis aestivalis** (Retz.) Vahl——*Scirpus aestivalis* Retz.

生于海拔1 800—2 200米的荒草地、池沼及稻田中。分布于浙江、福建、台湾、湖北、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全草：清热解毒,利尿消肿。用于风湿关节痛,跌打损伤。

**复序飘拂草**

**Fimbristylis bisumbellata** (Forssk.) Bubani——*Scirpus bisumbellatus* Forssk.

生于山坡湿地或河边、沟旁、山溪边、沙地及沼泽地。分布于河北、山西、陕西、山东、台湾、河南、湖北、广东、四川、云南。

全草：祛痰定喘,止血消肿。

附　注：功效相同的有**双穗飘拂草 F. subbispicata** Nees et Meyen，分布于东北及河北、山西、山东、江苏、浙江、福建、台湾、广东、河南。

**扁鞘飘拂草**

**Fimbristylis complanata** (Retz.) Link——*Scirpus complanatus* Retz.

生于海拔500—3 000米的草地、溪旁或山谷阴湿处。分布于西南及江苏、江西、台湾、湖北、湖南。

全草：清热解毒。

**两歧飘拂草**　飘拂草(植物名实图考)

**Fimbristylis dichotoma** (L.) Vahl——*Scirpus dichotomus* L.

生于空旷草地上、田野或稻田中。全国大部分地区均有分布。

全草(飘拂草)：清热解毒,利尿消肿。用于小便不利,瘰疬。

**起绒飘拂草**

**Fimbristylis dipsacea** (Rottb.) Benth.——*Scirpus dipsaceus* Rottb.

生于山坡草丛中或潮湿草地上。分布于湖南、广东、海南、广西、云南。

全草：清热,解热。

**暗褐飘拂草**　褐穗飘拂草(广州植物志)，山牛毛毡、田高粱、牛毛草(贵州民间药物),片角草(中国植物志)

**Fimbristylis fusca** (Nees) Benth.——*Abildgaardia fusca* Nees

生于山顶、山坡、田边及草地上。分布于江苏、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、贵州。

全草(山牛毛毡)：辛,平。解表,清热。用于斑疹,伤寒。

**木虱草**　旱草(广东),日照飘拂草(浙江民间常用草药),鹅草(中药大辞典)，眉毛草、牛毛草(全国中草药汇编)

**Fimbristylis miliacea** (L.) Vahl——*Scirpus miliacea* L.

生于潮湿的溪水边、沼泽地区及水田中。除东北及山西、内蒙古、甘肃、新疆、山东、西藏未见记载外,全国其他省区均有分布。

全草：甘、淡，凉。清热利尿，解毒消肿。用于暑热尿少，尿赤，泄泻，小腿疔伤肿痛，咳嗽痰喘，跌打损伤。

附　注：功效相同的有**烟台飘拂草 F. stauntoni** Debeaux et Franch.，分布于东北及河北、陕西、山东、江苏、安徽、浙江、河南。

**结壮飘拂草**　　水姜苞、姜苞草(贵州)，毛蜂子、茅草箭(中药大辞典)

**Fimbristylis rigidula** Nees

生于海拔300—2 850米的山坡、路旁、草地、林下。分布于中南、西南及江苏、安徽、浙江、江西。

根：甘，微寒。滋阴润燥，补脾益肺。用于血虚头晕，阴虚盗汗，肺痨久咳，风湿病。

**少穗飘拂草**　　谷精草(贵州)

**Fimbristylis schoenoides** (Retz.) Vahl——*Scirpus schoenoides* Retz.; *F. kagiensis* Hayata

生于田边、路旁、荒地、溪边或低洼潮湿处。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

全草：清肝明目，祛风平肝。用于目赤，尿结，头昏，头痛。

**四棱飘拂草**

**Fimbristylis tetragona** R. Br.

生于田中、山谷、沼泽地或旷野草地上。分布于福建、台湾、广东、海南、广西。

全草：用于跌打损伤。

## 芙兰草属　Fuirena Rottb.

**芙兰草**

**Fuirena umbellata** Rottb.

生于山坡草地或湿草原、河边。分布于台湾、广东、海南、广西、云南。

全草：用于小儿风湿，疟疾。

## 黑莎草属　Gahnia J. R. et G. Forst

**黑莎草**　　大头茅草、硷草茅草、瘦狗母(中国植物志)

**Gahnia tristis** Nees

生于干燥的荒山坡，路边或山脚下灌丛中。分布于福建、湖南、广东、海南、广西。

全草：用于阴挺。

## 水莎草属　Juncellus (Griseb.) C. B. Clarke

**水莎草**

**Juncellus serotinus** (Rottb.) C. B. Clarke——*Cyperus serotinus* Rottb.

生于浅水中、水边沙地或潮湿田中。分布于东北、华北、华东及陕西，甘肃、新疆、河

南、湖北、广东、贵州、云南。

块茎：止咳，破血，通经，行气，消积，止痛。用于咳嗽痰喘，症瘕积聚，产后瘀血，腹痛，消化不良，经闭及一切气滞血瘀，胸腹胁痛。

## 水蜈蚣属　Kyllinga Rottb.

**水蜈蚣**　金钮草（福建），疟疾草（江西、湖北），姜虫草、露水草（贵州），发汗草（中国植物图鉴）

**Kyllinga brevifolia** Rottb.

生于田边、水边、溪沟边、路旁草丛及空旷湿地。全国大部分省区均有分布。

根状茎或全草（水蜈蚣）：辛，温。疏风解表，清热利湿，止咳化痰，祛瘀消肿。用于风寒感冒，寒热头痛，筋骨疼痛，咳嗽，疟疾，黄疸，痢疾，疮疡肿毒，跌打刀伤。

附　注：①福建地区以全草用于乙脑，砂淋，角膜溃疡。②功效相同的有**光鳞水蜈蚣** **K. brevifolia** Rottb. var. **leiolepis** (Franch. et Sav.) Hara，分布于东北及河北、山西、陕西、甘肃、山东、江苏、河南、湖北、四川。

**单穗水蜈蚣**　一箭球、散寒草、姜牙草（广西民间常用草药），猴子草（海南植物志）

**Kyllinga nemoralis** (J. R. et G. Forst.) Dandy ex Hutch. et Dalziel——*Thryocephalon nemoralis* J. R. et G. Forst.; *K. monocephala* Rottb.

生于山坡林下、沟边、田边近水处或空旷草地上。分布于福建、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南。

全草（一箭球）：微甘、辛，平。疏风，清热，止咳，截疟，散瘀，消肿。用于感冒，咳嗽，顿咳，咽喉肿痛，痢疾，疟疾，跌打损伤，疮肿，毒蛇咬伤。

附　注：在《中国高等植物图鉴》第五册中，将本种定为 K. cororata (L.) Dauce。

**三头水蜈蚣**　金钮子、护心草（广西）

**Kyllinga triceps** Rottb.

多生于田边潮湿地上或水旁草丛中。分布于广东、海南、广西。

全草（金钮子）：微苦、辛，平。活血通经，止痛。用于胃痛，气滞腹痛，痛经，风湿关节痛，跌打肿痛。

## 湖瓜草属　Lipocarpha R. Br.

**湖瓜草**　疳积草（湖北）

**Lipocarpha microcephala** (R. Br.) Kunth——*Hypaelytrum microcephala* R. Br.

生于水边潮湿地或沼泽中。本种分布较广，从东北至西南及台湾均产。

全草：清热利湿。用于淋浊，小儿疳积；外治小儿惊风。

附　注：在《中国植物志》第十一卷中将本种定为华湖瓜草 Lipocarpha chinensis (Osbeck) Tang et Wang

## 砖子苗属　Mariscus Gaertn.

**密穗砖子苗**

**Mariscus compactus** (Retz.) Druce——*Cyperus compactus* Retz.

生于田边及沼泽地。分布于西南及台湾、广东、海南、广西。

全草：辛、苦，平。止咳化痰，宣肺解表。用于风寒感冒，咳嗽痰多。

**砖子苗**　假香附(陕西、云南)，三棱草(湖南)，大香附子(贵州草药)

**Mariscus sumatrensis** (Retz.) T. Koyama——*Kyllinga sumatrensis* Retz.

生于向阳山坡林缘、路旁草丛、溪边或松林下、灌丛中。分布于华东、中南、西南及陕西。

根状茎(大香附子)：辛，温。调经止痛，行气解表。用于感冒，月经不调，慢性子宫内膜炎，产后腹痛，跌打损伤，风湿关节痛。　全草：辛、微苦，平。祛风止痒，解郁调经。用于皮肤瘙痒，月经不调，血崩。

附　注：功效相同的有**展穗砖子苗 M. sumatrensis** (Retz.) T. Koyama var. **evolutior** (C. B. Clarke) C. Y. Wu，分布于广西、四川、贵州、云南；**喀西砖子苗 M. sumatrensis** (Retz.) T. Koyama var. **khasianus** (C. B. Clarke) C. Y. Wu，分布于云南。

## 扁莎草属　Pycreus　Beauv.

**球穗扁莎草**　梳子草、飞天蜈蚣(湖北)

**Pycreus globosus** (All.) Reichb——*Cyperus globosus* All.

生于田边、沟边、草甸及湿沙地。分布于东北、华东、西南及河北、山西、陕西、河南、湖北、湖南、广东、海南。

全草：破血行气，止痛。用于小便不利，跌打损伤，吐血，风寒感冒，咳嗽，百日咳。

**红鳞扁莎草**　水花毛、荸荠草(湖北)

**Pycreus sanguinolentus** (Vahl) Nees——*Cyperus sanguinolentus* Vahl

多生于向阳的山谷、田边、河边潮湿地或浅水处。全国大部分省区有分布。

根：用于肝炎。　全草：清热解毒，除湿退黄。

## 刺子莞属　Rhynchospora Vahl

**刺子莞**　一包金、一包刺(广东、广西)，龙须草、绣球草(全国中草药汇编)

**Rhynchospora rubra** (Lour.) Makino——*Schoenus ruber* Lour.

多生于海拔 100—1 500 米的山坡草地或沼泽地。分布于长江流域以南各省及台湾。

全草(刺子莞)：甘、咸，平。清热利湿。用于淋浊。

## 萤蔺属　Schoenoplectus (Reichb.) Palla

**猪毛草**

**Schoenoplectus grossus** (L. f.) Palla——*Scirpus grossus* L. f.; *S. wallichii* Nees

生于稻田中、溪边、河旁近水处或潮湿地。分布于江西、福建、台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

全草：清热利尿。用于肺热咳嗽，淋证。

**萤蔺**　假碱草(河北)，灯心草、水灯心(湖南)，牛毛草(海南澄迈)，野马蹄草(广西中草药)，直立席草(全国中草药汇编)

**Schoenoplectus juncoides** (Roxb.) Palla——*Scirpus juncoides* Roxb.

生于田边、塘边、溪旁、沼泽地或荒地潮湿处。除内蒙古、甘肃、西藏外，全国各地均有分布。

全草(野马蹄草)：甘、淡，平。清热解毒，凉血利水，清心火，止吐血。用于麻疹痘毒，肺痨咳血，火盛牙痛，目赤肿痛，小便淋痛。

附　注：**细秆萤蔺 S. juncoides** (Roxb.) Palla var. **hotarui** (Ohwi) T. Koyama，分布于辽宁、广西。全草：清湿热，利尿。用于黄疸，肾结石。

**水毛花**　三轮草、水灯心(湖南)，蒲草根、席草根(四川常用中草药)，水三棱草、丝毛草(中国经济植物志)

**Schoenoplectus mucronatus** (L.) Palla——*Scirpus mucronatus* L.; *Scirpus triangulatus* Roxb.

生于池边、湖旁、沼泽地及近水潮湿处，常与慈姑、莲同生。除新疆外，全国各地均有分布。

根(蒲草根、水毛花根)：淡、微苦，凉。清热利尿。用于外感发热，热证牙痛，淋证，带下病。　全草：苦、辛，凉。清热解表，润肺止咳。

附　注：功效相同的有**粗壮水毛花 S. mucronatus** (L.) Palla subsp. **robustus** (Miq.) T. Koyama; **红鳞水毛花 S. mucronatus** (L.) Palla var. **sanguineus** (Tang et Wang) C. Y. Wu; **三翅水毛花 S. mucronatus** (L.) Palla var. **trialatus** (Tang et Wang) C. Y. Wu，均分布于云南。

**水葱**　水丈葱(药材学)

**Schoenoplectus tabermaemontani** (C. C. Gmel.) Palla——*Scirpus tabermaemontani* C. C. Gmel.; *Scirpus validus* Vahl

生于湖边、沼泽地或浅水塘中。分布于东北、华北、西北、西南及江苏、安徽、浙江、河南。

茎(水葱)：淡，平。渗湿利尿。用于水肿胀满，小便不利。

**藨草**　野三棱(陕西)，野荸荠、光棍草、光棍子(全国中草药汇编)

**Schoenoplectus triqueter** (L.) Palla——*Scirpus triqueter* L.

生于沟塘、溪边、湖旁、河滩浅水中或沼泽阴湿地。除广东外，全国各省区均有分布。

全草：甘、涩，平。和胃理气。用于食积气滞，呕逆饱胀，经前腹痛，风湿关节痛。

## 藨草属 Scirpus L.

**庐山藨草** 三棱草、山交染(湖北)

**Scirpus asiaticus** Beehe——*S. lushanensis* Ohwi

生于溪边、路旁、草丛、沼泽湿地及山脚空旷处。分布于东北、华东、西南及河南、湖北。

根及种子：活血化瘀，清热利尿，止血。

**细辐射枝藨草**

**Scirpus filipes** C. B. Clarke

生于海拔1 000米左右的山坡草地及水旁。分布于福建、广西。

全草：用于黄疸。

**华东藨草**

**Scirpus karuizawensis** Makino

生于河边、溪边近水处或湿地。分布于东北及江苏、河南。

全草：清热解毒，凉血利尿。

**扁杆藨草** 水莎草、三棱(湖北)，扁杆荆三棱(云南种子植物名录)

**Scirpus planiculmis** F. Schmidt

生于山坡及河边、湖边、沟边及田边近水处。分布于东北、华北、西北及山东、江苏、浙江、河南、湖北、四川、云南。

根状茎或全草：苦，平。止咳，破血，通经，补气，消积，止痛。用于咳嗽，症瘕积聚，产后瘀阻腹痛，消化不良，经闭，胸腹胁疼痛。又为催乳剂。

**百球藨草** 百球荆三棱(云南种子植物名录)

**Scirpus rosthornii** Diels

生于海拔600—2 400米的林下、山坡、路旁、溪边及沼泽地。分布于西南及浙江、福建、湖北、广东。

全草：清热解毒，凉血利水。

**细秆藨草**

**Scirpus setaceus** L.

生于海拔2 800—3 400米的山坡、草地、岩石上。分布于陕西、甘肃、青海、四川、云南、西藏。

根：清肝明目。

**类头状花序藨草** 青丝还阳(湖北)，龙须草(浙江、广东)，龙须莞(全国中草药汇编)

**Scirpus subcapitatus** Thw.

生于海拔700—2 300米的林缘湿地、山溪石缝流水处、山坡、路旁或灌丛中。分布于华东、中南及四川、贵州、西藏。

根及全草(龙须莞)：淡，寒。利尿通淋，清热安神。用于淋证，消渴，失眠，目赤肿痛。

**荆三棱** 三棱草(通称)，三棱(本草纲目拾遗)，野荸荠、湖三棱(江苏)，三楞果、铁

荸荠(安徽)

**Scirpus yagara** Ohwi——*S. maritimus* C. B. Clarke; *S. flaviatillis* (Torr ) A. Gray

生于河、湖、池沼浅水中或水湿地。分布于东北、华北、华东、西南及陕西、甘肃、青海、新疆、河南、湖北。

块茎(三棱)：苦、辛，平。破血行气，消积止痛。用于症瘕积聚，气血凝滞，心腹痛，经闭，产后瘀血腹痛，跌打损伤，疮肿坚硬。

附　注：本种块茎在东北、内蒙古、陕西、新疆、江苏等地亦作"三棱"药用，商品习称黑三棱或带皮三棱。

## 珍珠茅属　Scleria Berg.

**毛果珍珠茅**　三角草(安徽、浙江)，蜈蚣七(湖北)，割鸡刀、三稔草(全国中草药汇编)

**Scleria laevis** Retz.——*S. hebecarpa* Nees

生于山坡草地或密林下灌丛湿处。分布于中南、西南及安徽、浙江、福建、台湾。

根：苦，温。消肿解毒。用于痢疾，咳嗽，消化不良，毒蛇咬伤。　全草：微苦，平。清热，祛风湿；通经络。

**纤秆珍珠茅**

**Scleria pergracilis** (Nees) Kunth——*Hypoporum pergracilis* Nees

生于海拔 1 700—4 000 米的高山草地和山谷牧场，常呈大片群落生长。分布于云南、西藏。

全草含有柠檬油，可用于驱蚊虫。

**高秆珍珠茅**　三楞筋骨草(四川常用中草药)

**Scleria terrestris** (L.) Fassett——*Zizania terrestris* L.; *S. elata* Thw.

生于海拔 2 000 米以下的山坡、路旁、田边。分布于安徽、浙江、福建、台湾、广东、海南、广西、四川、云南、西藏。

全草(三楞筋骨草)：微苦，平。除风湿，通经络，透疹。用于风湿筋骨痛，瘫痪，跌打损伤。

# 209. 芭蕉科　Musaceae

## 象腿蕉属　Ensete Bruce ex Horan.

**象腿蕉**　象腿芭蕉(云南)，康光(景颇语)，桂丁掌(傣语)

**Ensete glaucum** (Roxb.) Cheesm.——*Musa glauca* Roxb.

原产亚洲南部和非洲热带。野生或栽培于海拔 800—1 000 米的平坝、山地、喜生于沟谷旁的缓坡地带。分布于云南，野生或栽培。

假茎：苦、涩，寒。收敛止血。用于崩漏，便血，带下病。

## 芭蕉属　Mus L.

**野蕉**　山芭蕉(广东、海南、云南),树头芭蕉(广西),伦阿蕉(景颇语)

**Musa balbisiana** Colla

生于低、中山常绿阔叶林中或附生于树叉及树桩上。分布于福建、广东、海南、广西、云南。

种子(山芭蕉子): 苦、辛,凉。有小毒。破瘀血,通大便。用于跌打损伤,大便秘结。

**芭蕉**　板蕉、牙蕉(福建),大叶芭蕉(江西),大头芭蕉、芭蕉头(四川),蕉葵(傣语),甘蕉(植物名实图考)

**Musa basjoo** Sieb. et Zucc.

原产日本。我国秦岭、淮河以南可露地栽培,多植于庭园及农舍附近。

假根(芭蕉根): 甘,大寒。清热,止渴,利尿,解毒。用于热病烦闷,消渴,黄疸,水肿,脚气,血淋,血崩,痈肿,疔疮,丹毒。　叶(芭蕉叶): 甘、淡,寒。清热,利尿,解毒。用于热病,中暑,脚气,痈肿热毒,烫伤。　花蕾及花(芭蕉花): 酸、咸,温。用于寒痰停滞,呕吐恶心,吞酸吐酸,胸膈胀满,胃、腹疼痛。　种子(芭蕉子): 寒。生食可止渴润肺。　果仁: 通血脉,填精髓。　茎液汁(芭蕉油): 甘,凉。清热,止渴,解毒。用于热病烦渴,惊风,癫痫,高血压症头痛,疔疮痈疽,烫、火伤;外用于中耳炎。

**红蕉**　芭蕉红、指天蕉(云南),美人蕉、小芭蕉、麒麟花(全国中草药汇编)

**Musa coccinea** Andr.

生于海拔600米以下的沟谷及潮湿山坡上。分布于云南东南部河口、金平。广东、广西常见栽培。

根状茎: 甘、淡,平。补虚弱。用于虚弱头晕,虚肿,血崩,带下病。　花: 止鼻血。

附　注: 果实有毒,不可食。

**香蕉**　中国矮蕉(通称),龙溪蕉、天宝蕉(福建),梅花蕉(广东),甘蕉、香牙蕉(海南),矮角香蕉(云南),桂衣店、桂尖(西双版纳傣语)

**Musa nana** Lour.

原产我国南部。台湾、福建、广东、海南、广西南部、四川、贵州南部、云南均有栽培。

果实(香蕉): 清热,润肠,解毒。用于热病烦渴,便秘痔血。　根状茎(甘蕉根): 甘、涩,寒。清热,凉血,解毒。用于热喘,血淋,热疖痈肿,乙脑。　果皮(大蕉皮): 用于痢疾、霍乱引起的腹痛;外用于皮肤瘙痒。　香蕉花: 清热,降压。

**大蕉**　粉芭蕉、西贡蕉;甘蕉(云南),焦癸(西双版纳傣语)

**Musa sapientum** L.

原产印度、马来西亚。我国福建、台湾、广东、广西、云南有栽培。

根、果实、皮: 甘、寒,微涩。根: 清热,凉血,解毒。用于热喘,血淋,热疖痈肿。　果实: 止渴、润肺,解酒,清脾滑肠。用于热病烦渴,便秘,痔血,脾火盛者食后能止泻止痢。果皮: 用于痢疾,霍乱,煎水洗皮肤瘙痒。

**树头芭蕉**　野芭蕉(云南),桂谷(傣语),苦阿泡、苦阿窝(云南哈尼语)

**Musa wilsonii** Tutch.

多生于海拔2 700米以下的沟谷潮湿肥沃土中。分布于南岭以南各省区。

全株：甘，凉。清热截疟。用于疟疾。

### 地涌金莲属　Musella (Franch.) C. Y. Wu ex H. W. Li

**地涌金莲**　　金莲蕉(四川)，芭蕉蕉(贵州)，地金莲、地涌莲(云南种子植物名录)

**Musella lasiocarpa** (Franch.) C.Y. Wu et H. W. Li——*Musa. lasiocarpa* Franch.

生于海拔 1 500—2 500 米的山间坡地或栽培。分布于云南中部及西部，四川、贵州有栽培。为我国特有属。

根状茎：清热通淋。　茎汁：解乌头中毒及醒酒。　花：苦、涩，寒。收敛止血。用于带下病，崩漏，大肠下血，虚脱。

### 兰花蕉属　Orchidantha N. E. Br.

**兰花蕉**

**Orchidantha chinensis** T. L. Wu

生于山谷。分布于广东、广西。

根状茎：用于斑疹不退，烦热，咽喉肿痛。

## 210. 姜科　Zingiberaceae

### 茴香砂仁属　Achasma Griff.

**茴香砂仁**　　麻亮不(傣语)

**Achasma yunnanense** T. L. Wu et Senjen

生于海拔 640 米的疏林下。分布于云南南部西双版纳、勐岑。

根状茎：辛，温。消瘀，开胃。

### 山姜属　Alpinia L.

**竹叶山姜**

**Alpinia bambusifolia** C. F. Liang et D. Fang

生于海拔 1 300—1 360 米的山坡林下。分布于广西、贵州。

根状茎：用于胃肠气痛。

**云南草蔻**　　小白蔻(广西)，滇草蔻、小草蔻(云南)

**Alpinia blepharocalyx** K. Schum.

生于海拔 400—1 800 米的疏林阴处或山坡石缝中。分布于云南南部及西部。

果实：燥湿，暖胃，健脾。用于胃寒腹痛，脘腹胀满，噎膈，嗳气，反胃，寒湿吐泻。

附　注：功效相似的有**光叶云南草蔻 A. blepharocalyx** K. Schum. var. **glabrior** (Hand.-Mazz.) T. L. Wu，分布于广东、广西、云南。

**小花山姜**

**Alpinia brevis** T. L. Wu et Senjen

生于海拔700—2 000米的山地密林或林下石缝中。分布于广东、海南、广西、云南。

根状茎：祛风湿，解疮毒，祛瘀血。

**距花山姜**　小良姜(广西钟山)

**Alpinia calcarata** Rosc.

生于林中。分布于广东、广西。

根状茎：用于脘腹冷痛，胃寒呕吐。

**华山姜**　九姜连(广东、广西)，高良姜(江西)，廉姜(本草纲目拾遗)，箭杆风(中国经济植物志)

**Alpinia chinensis** (Retz.) Rosc. ——*Heritieria chinensis* Retz.

生于海拔1 000—2 500米的山谷、溪边、林下阴湿处。分布于安徽、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根状茎(廉姜)：辛，温。温中暖胃，散寒止痛，除风湿，解疮毒。用于胃寒冷痛，呃逆呕吐，腹痛泄泻，消化不良，风湿关节痛，肺痨咳喘，月经不调，无名肿毒。种子团(建砂仁)：祛寒暖胃，燥湿，止呃。

附　注：本种种子团在福建部分地区又作建砂仁或红豆蔻入药。

**节鞭山姜**

**Alpinia conchigera** Griff.

生于海拔600—1 080米的山坡密林下。分布于云南勐腊、勐养、沧源。

根状茎：用于蛇伤。　果实：辛，温。芳香健胃，祛风。用于胃寒腹痛，食滞。

**香姜**

**Alpinia coriandriodora** D. Fang

生于林下，常栽培。分布于广西龙州、南宁、那坡、凌云。

根状茎：祛风行气。用于宿食不消，并作调味香料。

**密苞山姜**

**Alpinia denesibracteata** T. L. Wu et Senjen

生于海拔2 300米以下的山谷林下阴湿处。分布于江西、福建、广东、广西、贵州、云南。

果实：温中散寒，止痛。

**美山姜**　土蔻(广西)，台湾山姜(云南种子植物名录)

**Alpinia formosana** K. Schum.

生于海拔1 620米以下的干燥处。分布于台湾、广西龙州、云南。广东海丰有栽培。

根状茎：行气消肿，止痛。　果实：行气。

**红豆蔻**　山姜、良姜、廉姜(广东、广西)

**Alpinia galanga** (L.) Willd. ——*Maranta galanga* L.

生于海拔100—1 300米的山野沟谷、灌丛、草丛中或林中湿处。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根状茎：(大高良姜)：辛，温。散寒，暖胃，止痛。用于胃脘冷痛，脾寒吐泻。　果实(红豆蔻)：辛，温。燥湿散寒，健脾消食。用于脘腹冷痛，食积胀满，呕吐泄泻，呃逆反胃，

症疾，痢疾。

附　注：① 根状茎(大高良姜)：部分地区作高良姜入药，功效同高良姜；唯气味稍差，质次。②《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**脆果山姜**　　白豆蔻、豆蔻(海南)

**Alpinia globosa** (Lour.) Horan. ——*Amomum globosa* Lour.

生于海拔 130—300 米的疏林下。分布于海南。云南金平、河口、马关有栽培。

果实：芳香健胃。

附　注：海南民间作白豆蔻药用。

**狭叶山姜**

**Alpinia graminifolia** D. Fang et G. Y. Lo

生于海拔 780—860 米的疏林、灌丛及沟旁。分布于广西。

根状茎：行气。用于胃寒痛。

**直穗山姜**　　小草蔻(海南)，滇南山姜(云南种子植物名录)

**Alpinia henryi** K. Schum.

原产海南密林中。湖南、广东、海南、广西、云南有少量栽培。

果实：用于胃寒腹痛胀满。

**光叶山姜**

**Alpinia intermedia** Gagnep.

生于山地灌丛中。分布于台湾、广东、广西。

根状茎及果实：用于脘腹气胀，食积。

**山姜**　　湘砂仁(湖南)，土砂仁(福建、江西)，白寒果(广西金秀)，九节莲(四川)，建砂仁(中药志)

**Alpinia japonica** (Thunb.) Miq. ——*Globba japonica* Thunb.

生于山野沟边或林下阴湿处。分布于安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根状茎：辛，温。理气通络，止痛。用于风湿关节痛，跌打损伤，牙痛，胃痛。　花(山姜花)：辛，温。调中下气，消食，解酒毒。　果实(土砂仁、建砂仁)：辛，温。祛寒燥湿，温胃止呕。用于胃寒腹泻，反胃吐酸，食欲不振。

附　注：本种浙江、福建代砂仁用，称建砂仁；广东作红豆蔻用。

**草豆蔻**　　草蔻(本草从新)，草蔻仁(海南植物志)，豆蔻(名医别录)，草果(通志)

**Alpinia katsumadai** Hayata

野生于山坡、林缘、灌丛、溪边或高山草丛中，通常栽培。分布于福建、广东、海南、广西。四川、贵州有栽培。

种子团(草蔻仁)：辛，温。祛寒燥湿，暖胃止呕。用于胃寒腹痛，脘腹胀满，冷痛，嗳气，呃逆，呕吐，食欲不振。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**长柄山姜**　　大豆蔻(广西武鸣)

**Alpinia kwangsiensis** T. L. Wu et Senjen

生于海拔 580—1 300 米的山谷林下阴湿处。分布于广东、广西、贵州、云南。

根状茎及果实：用于脘腹冷痛，呃逆，寒湿吐泻。

**假益智**　红扣(海南)，假草果(广西那坡)

**Alpinia maclurei** Merr.

生于林下阴湿处。分布于广东，海南、广西、云南。

根状茎及果实：行气。用于腹胀，呕吐。

**黑果山姜**

**Alpinia nigra** (Gaertn.) Burtt——*Zingiber nigrum* Gaertn.

生于海拔700—1 100米的密林阴湿地。分布于云南南部。

根状茎：行气，解毒。用于食滞及蛇、虫咬伤。

**毛瓣山姜**　玉蔻(广西龙州)

**Alpinia malaccensis** (Burm. f.) Rosc. ——*Maranta malaccensis* Burm. f.

生于林下或林缘阴湿处，也有栽培。分布于广西、云南西双版纳、西藏。广东有栽培。

种子：用于胸腹满闷，反胃呕吐，宿食不消。

**高良姜**　良姜、小良姜(广东、广西、云南)，贺哈(傣语)，草子真寒(哈尼语)，膏凉姜(本草经集注)，海良姜(药材学)

**Alpinia officinarum** Hance

栽培或野生于林中阴湿处。分布于西南及福建、台湾、广东湛江、海南、广西。广东、广西、四川、贵州有栽培。

根状茎(高良姜)：辛，温。温胃散寒，消食止痛。用于脘腹冷痛，胃痛呃吐，嗳气吞酸。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。② 本种果实在部分地区和本草中均混称红豆蔻。

**益智**　益智子(开宝本草)，益智仁(得配本草)

**Alpinia oxyphylla** Miq.

栽培或野生于林下阴湿处。分布于福建、广东南部、海南、广西、贵州。河北、福建、四川、贵州、云南有栽培。

果实(益智)：辛，温。温脾止泻，摄唾，暖肾固精，缩尿。用于脾寒泄泻，腹中冷痛，口多唾涎，肾虚遗尿，小便频数，遗精白浊。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**柱穗山姜**　土白蔻(广西上林)

**Alpinia pinnanensis** T. L. Wu et Senjen

生于山坡草丛、林下阴湿处。分布于广西。

种子：用于胸腹满闷，反胃呕吐，宿食不消。

**多花山姜**　土白蔻(广西龙州)

**Alpinia polyantha** D. Fang

生于山坡草丛、疏林阴湿处。分布于广西。

根状茎及种子：用于胸腹满闷，反胃呕吐，宿食不消，咳嗽。

**矮山姜**　产后姜(广西龙胜)

**Alpinia psilogyna** D. Fang

生于山谷、疏林中。分布于广西。

果实：祛风。用于产后虚弱。

**花叶山姜**　野姜黄(广东)，竹节风(广西)

**Alpinia pumila** Hook. f.

生于海拔500—1 100米的山谷阴湿处。分布于湖南、广东、广西、云南。

根状茎：辛，温。除湿消肿，行气止痛。用于风湿痹痛，脾虚泄泻，跌打损伤。

**箭杆风**　一支箭(四川)，假砂仁(贵州)

**Alpinia stachyoides** Hance

多生于溪边、山谷林下阴湿处。分布于江西、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根状茎：辛、微苦，温。除湿消肿，行气止痛。用于风湿痹痛，胃痛，跌打损伤。

附　注：果实在四川以"土砂仁"药用。

**球穗山姜**　野姜(广西那坡)

**Alpinia strobiliformis** T. L. Wu et Senjen

生于海拔1 000—1 900米的林下阴湿处。分布于广西、云南。

种子：用于感冒。

**滑叶山姜**　白蔻(广西宁明)

**Alpinia tonkinensis** Gagnep.

生于山坡、山谷、林下阴湿处。分布于广西、云南。

根状茎：外用于风湿痹痛。果实：行气开胃。用于胸腹满闷，反胃呕吐，宿食不消。

**艳山姜**　良姜、裸叶(福建)，土砂仁(四川、贵州)，大豆蔻、草蔻、草豆蔻(常见中草药手册)，月姚(云南种子植物名录)，玉姚(植物名实图考)

**Alpinia zerumbet** (Pers.) Burtt. et Smith—— *Costus zerumbet* Pres.

栽培或野生于山谷、溪边、林阴下。分布于浙江、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根状茎和果实：辛、涩，温。燥湿祛寒，除痰截疟，健脾暖胃。用于脘腹冷痛，胸腹胀满，痰湿积滞，消化不良，呕吐腹泻，咳嗽。

附　注：本种的果实在四川、贵州作土砂仁药用。

## 砂仁属　Amomum Roxb.

**红壳砂仁**　红砂仁、红壳砂(云南)

**Amomum auranticum** H. T. Tsai et S. W. Zhao

生于海拔600米左右的林下。分布于云南西双版纳。

果实：芳香健胃。功效同砂仁。

**三叶豆蔻**　土砂仁(广西贺县)，公天锥(广西富川)

**Amomum austrosinense** D. Fang

生于林下、山谷、路旁阴湿处。分布于广西。

全草：用于胃寒痛，风湿骨痛，跌打肿痛。

**海南假砂仁**　海南土砂仁、土砂仁(海南)

**Amomum chinense** Chun ex T. L. Wu

生于林缘及灌丛中。分布于广东湛江、海南。

果实：行气，消滞。民间作砂仁用。

**爪哇白豆蔻**　白豆蔻(通称)，多骨(本草纲目拾遗)，壳蔻(本草逢原)，白蔻(白草经集注)

**Amomum compactum** Soland. ex Maton

原产印度尼西亚或爪哇。生于沟谷或林下阴湿处。海南药物种植场及云南引种栽培，宜种植于排水及保肥性能良好的林下环境。

果实(豆蔻)：辛，温。理气宽中，开胃消食，化湿止呕。用于胃痛，腹胀，脘闷，嗳气，吐逆，反胃，消化不良。

附　注：①本种为进口白豆蔻的种类之一。②《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**长花豆蔻**　哥卡(广西龙州)

**Amomum dolichanthum** D. Fang

生于林下阴湿处。分布于广西龙州。

根状茎：用于胃脘痛。煎水洗用于足外伤。

**野草果**

**Amomum koenigii** J. F. Gmel.

生于海拔 240—1 500 米的林下阴湿处或栽培。分布于广西、云南。

果实(野草果)：用于脘腹胀满冷痛，反胃，呕吐，疟疾。

**白豆蔻**　豆蔻(名医别录)

**Amomum kravanh** Pierre ex Gagnep.

原产柬埔寨、泰国。我国福建、广东、海南、云南引种栽培。

果实(豆蔻)：辛，温。理气宽中，开胃消食，化湿止呕。用于胃痛，腹胀，脘闷嘈气，吐逆反胃，消化不良。　果壳(白豆蔻花)：微辛。宽胸开胃。　花(豆蔻花)：辛，平。开胃理气。用于止呕，宽闷胀。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**广西砂仁**　砂仁、土草果(广西)

**Amomum kwangsiense** D. Fang ex X. X. Chen

生于海拔 650 米左右的山坡疏林下。分布于广西、贵州。

果实：理气开胃，消食安胎。

**海南砂仁**　海南壳砂仁(海南)

**Amomum longiligulare** T. L. Wu

生于山谷密林中或栽培。分布于广东湛江、江门及海南澄迈、崖县、儋县。

果实(砂仁)：辛，温。行气，调中，安胎。

附　注：①本种果实可代砂仁用，唯果实挥发油含量较阳春砂仁或红壳砂仁为低，品质较差，但结实率较砂仁高。②《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**长柄豆蔻**

**Amomum longipetiolatum** Merr.

生于海拔 350—550 米的林下阴湿地。分布于海南崖县、保亭、白沙及广西宁明、龙州、那坡。

果实：用于脘腹胀痛，食欲不振，恶心，呕吐，胎动不安。

**九翅豆蔻**　邓嘎(广西凭祥)

**Amomum maximum** Roxb.

生于海拔 350—800 米的林中阴湿处。分布于广东、广西、云南、西藏南部。

果实：开胃，消食，行气，止痛。

**细砂仁**

**Amomum microcarpum** C. F. Liang et D. Fang

生于海拔 290—500 米的山坡密林中。分布于广西防城。

果实：开胃，消食，行气和中，止痛安胎。用于脘腹冷痛，食欲不振，恶心呕吐，胎动不安。

附　注：果实在广西作砂仁用。

**疣果豆蔻**　牛牯缩砂、菠萝砂(广东)，大砂仁(广西龙州)

**Amomum muricarpum** Elmer

生于海拔 300—1 000 米的密林中。分布于广东、海南、广西。

果实：开胃，消食，行气和中，止痛安胎。用于脘腹胀痛，食欲不振，恶心呕吐，胎动不安。

附　注：民间作砂仁用。

**波翅豆蔻**　野薄荷(广西)

**Amomum odontocarpum** D. Fang

生于海拔 1 550 米左右的山坡疏林下。分布于广西。

根状茎：外用于蛇伤。　果实：用于脘腹胀痛。

**香豆蔻**

**Amomum subulatum** Roxb.

生于海拔 300—1 300 米的林中阴湿处。分布于广西、云南、西藏墨脱。

种子：辛，温。健胃祛风，消肿，止痛。用于胃肠气胀，食滞，咽喉肿痛，嘻嘻，肺痨。

**长序砂仁**　土砂仁(广西宁明)

**Amomum thyroideum** Gagnep.

生于山谷及疏林中。分布于广西、云南。

根状茎：祛风散寒。用于疟疾。　果实：用于脘腹胀痛，食欲不振，恶心呕吐，胎动不安。

附　注：果实民间当砂仁用，唯品质较次。

**草果**　白草果、麻吼(广西那坡)，草果仁(传信适用方)，草果子(小儿卫生总微论方)

**Amomum tsaoko** Crevost et Lemarie

栽培或野生于疏林下。分布于广西、四川、贵州、云南。

果实(草果)：辛，温。燥湿散寒，祛痰截疟，消食化积。用于脘腹胀满冷痛，反胃呕

吐，疟疾，痰饮，泻痢，食积。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。② **红草果 A. hongtsaoko** C F. Liang et D. Fang，分布于广西那坡、都安、融水，与草果混用。

**阳春砂仁**　春砂仁(通称)，长泰砂仁(福建)，砂仁(本草原始)，缩砂仁、缩砂密(药性论)，阳春砂(南越笔记)

**Amomum villosum** Lour.

栽培或野生于山地林下阴湿处。分布于福建、广东、广西、四川、贵州、云南。

果实(砂仁)：辛，温。化湿开胃，温脾止泻，理气安胎。用于脘腹胀痛，食欲不振，恶心呕吐，妊娠恶阻，胎动不安。　果壳：平。功效同砂仁。　花：辛，平。宽胸理气，化痰。用于喘咳。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**矮砂仁**

**Amomum villosum** Lour. var. **nanum** H. T Tsai et S. W. Zhao

生于海拔 200 米的林下阴湿处。分布于云南南部富宁。

果实：功效与砂仁近似。

**缩砂密**　绿壳砂仁、勐仑砂仁(云南)

**Amomum villosum** Lour. var. **xanthioides** (Wall. ex Baker) T. L. Wu et Senjen—— *A. xanthioides* Wall. ex Baker

生于海拔 600—800 米的林下阴湿处。分布于福建(栽培)、云南南部勐腊、沧源。

果实(缩砂、壳砂)：辛，温。行气调中，和胃醒脾。用于腹痛痞胀，胃呆食滞，呃逆呕吐，寒泻冷痛，胎动不安。

附　注：①本种为我国近年来发现的砂仁新资源之一。挥发油含量和阳春砂仁相同或稍高，成分相同，现已收购，与阳春砂仁同等入药。②《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 大苞姜属　Caulokaempferia K. Larsen

**黄花大苞姜**　石竹花(广西上林)

**Caulokaempferia coenobialis** (Hance) K. Larsen——*Monolophus coenobialis* Hance

生于山地林下阴湿处。分布于广东、广西。

全草：用于蛇伤。

**大苞姜**　姜三七(云南)

**Caulokaempferia yunnanensis** (Gagnep.) R. M. Smith——*Kaempferia yunnanensis* Gagnep.; *Monolophus yunnanensis* T. L. Wu et Senjen

生于海拔 1 500—2 800 米的山地密林中。分布于四川、贵州、云南。

根状茎：辛，温。止血消肿。用于跌打损伤，骨折，吐血，衄血，崩漏，外伤出血。

## 闭鞘姜属　Costus L.

**闭鞘姜**　樟柳头、广商陆(广州)，水蕉花(海南、广西、贵州)，老妈妈拐棍(云南息.茅)，白石笋(岭南采药录)

**Costus speciosus** (Koen.) Smith——*Banksea speciosa* Koen.

生于海拔45—1 700米的疏林下、山谷阴湿地、路边草丛、荒坡及水沟边。分布于台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

根状茎(樟柳头)：辛、酸，微温。有小毒。利水，消肿，拔毒。用于水肿，小便不利，膀胱湿热淋浊，无名肿毒，麻疹不透，跌打扭伤。

附　注：①本种的根状茎在广东作商陆药用。②**莫箩花 C. lacerus** Gagnep.，分布于云南、西藏，与闭鞘姜混用。

**光叶闭鞘姜**

**Costus tonkinensis** Gagnep.

生于林阴下。分布于广东、广西、云南。

根状茎：利尿消肿。用于肝硬化腹水，淋证，肌肉肿痛，阴囊肿痛，水肿，无名肿毒。

## 姜黄属　Curcuma L.

**莪术**　蓝心姜、黑心姜、黑姜、兰姜、绿姜、乌姜(广东、广西)，凤姜(海南)，蓬莪(本草纲目拾遗)

**Curcuma aeruginosa** Roxb.

栽培或野生于林阴下、林缘谷地。分布于西南及山东、台湾、浙江、福建、江西、广东、广西。

主根状茎(莪术、文术)：苦、辛，温。破瘀行气，消积止痛。用于癥瘕积聚，气血凝滞或食积脘腹胀痛，血瘀经闭，跌打损伤，早期宫颈癌。　块根(绿丝郁金)：功效同郁金。

**狭叶姜黄**

**Curcuma angustifolia** Roxb.

生于林下、林缘、山坡。分布于广东、广西。

根状茎：祛风健胃。

附　注：为我国分布新记录。

**广西莪术**　莪术(广西)，毛莪术、桂莪术(中药志)

**Curcuma kwangsiensis** S. Lee et C. F. Liang

生于向阳、土壤湿润、肥厚的水沟边、林缘、山坡地上，野生或栽培。分布于广西、云南。

主根状茎(桂莪术)：苦、辛，温。破瘀行气，消积止痛。用于症瘕积聚，气血凝滞，食积脘腹痛，血瘀经闭，跌打损伤。　块根(莪术)：功效见姜黄。

附　注：本种的根状茎名莪术，块根名郁金，为《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**姜黄**　黄姜(生草药性备要),黄丝郁金(中药志),郁金(唐本草)

**Curcuma longa** L.—— *C. domestica* Valet.

栽培或半野生。多种植于向阳、土壤肥厚质松的田园中，野生于草地、路旁阴湿处或灌丛中。分布于西南及河北、江西、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西。

根状茎(姜黄)：苦、辛，温。破血行气，通经止痛，祛风疗痹。用于血瘀气滞，胸胁刺痛，经闭腹痛，产后瘀阻，腹中肿块，跌打肿痛，风痹臂痛。　块根(黄丝郁金)：辛、苦，寒。行气化瘀，清心解郁，利胆退黄。用于经闭痛经，胸腹胀痛，刺痛，热病神昏，癫痫发狂，黄疸尿赤。

附　注：①本种的根状茎名姜黄，块根名郁金分别为《中华人民共和国药典》1990年版收载。② 功效相同的有**毛郁金 C. aromatica** Salisb.，分布于广东、广西、云南。

**川郁金**　土文术(四川)，川莪术、白丝郁金(中药志)

**Curcuma sichuanensis** X. X. Chen

生于向阳、土壤肥沃的山坡上。四川有栽培或野生。

块根(白丝郁金)：辛、苦，寒。行气化瘀，清心解郁，利胆退黄。用于经闭痛经，胸腹胀痛，刺痛，热病神昏，癫痫发狂，黄疸尿赤。

附　注：本种根状茎在四川一些地区与姜黄 C. longa L. 混用。

**温郁金**　黑郁金(中药志)，姜黄(图经本草)，温州蓬莪茂(证类本草)

**Curcuma wenyujin** Y. H. Chen et C. Ling—— *C. aromatica* Salisb. cv. wenyujin

栽培或野生。生于向阳、土层深厚、排水良好的沙壤土中。主产浙江瑞安。

块根(温郁金、黑郁金)：辛、苦，寒。行气化瘀，清心解郁，利胆退黄。用于经闭痛经，胸腹胀痛，刺痛，热病神昏，癫痫发狂，黄疸尿赤。　根状茎(温莪术)：性味功效见莪术。

附　注：①近年用温莪术制剂治疗早期宫颈癌，卵巢癌，恶性淋巴癌，肺癌，肝癌，均有一定疗效。②《中华人民共和国药典》1990年版收载。

## 舞花姜属　Globba L.

**毛舞花姜**　野阳藿(四川)，洋荷(湖南)

**Globba barthei** Gagnep.

生于海拔240—1 000米的林下阴湿处或栽培。分布于湖南、贵州、四川、云南南部。

根状茎：开胃健脾，消肿止痛。　全草：温中散寒，祛风活血。

**峨眉舞花姜**

**Globba omeiensis** Z. Y. Zhu

生于海拔800米左右的灌丛中或沟边。分布于四川乐山。

全草：散寒止痛，行气。

**舞花姜**　羊合七(湖北)，竹叶草(广西)

**Globba racemosa** Smith

生于海拔240—1 400米的山坡林下阴湿处。分布于我国南部至西南部。

根状茎：用于急性水肿，崩漏，劳伤，咳嗽气喘，腹胀。　果实：健胃。

## 姜花属　Hedychium Koen.

**矮姜花**　那坡姜花、野山姜(广西)

**Hedychium brevicaule** D. Fang

生于林下石上。分布于广西。

根状茎：用于咳嗽痰喘。

**姜花**　蝴蝶花(广东)，夜寒苏(贵州)，白姜花、土砂仁(云南)，路边姜、土羌活(四川中药志)，白草果(植物名实图考)

**Hedychium coronarium** Koen.

生于林中或栽培。分布于台湾、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根状茎：辛，温。消肿止痛。用于风湿关节痛，胁肋痛，头痛，身痛，咳嗽。

**密花姜花**　高良姜(西藏常见中草药)，噶玛尔(藏名)

**Hedychium densiflorum** Wall.

生于海拔 2 100—2 300 米的山坡林下。分布于西藏波密、易贡、察隅、通麦、亚东、聂拉木。

根状茎：辛，温。温中散寒，止痛消食。用于消化不良，胃肠气胀，呕吐，呃逆，霍乱。

**黄姜花**　月家草(广西天峨)

**Hedychium flavum** Roxb.

生于海拔 900—1 200 米的山谷密林中或疏林、沟边、溪旁。分布于西南及广西。

花的挥发油：芳香健胃。　根状茎：用于咳嗽。

**圆瓣姜花**　大头姜(广西天峨)

**Hedychium forrestii** Diels

生于海拔 200—2 100 米的山谷密林或疏林、灌丛中。分布于西南及广西。

根状茎：用于血崩，月经不调。

**广西姜花**　卡现(广西龙州)

**Hedychium kwangsiense** T. L. Wu et Senjen

生于海拔 400 米左右的疏林中阴蔽处。分布于广西。

根状茎：外用于疮疡肿毒。

**小花姜花**　西藏良姜(西藏)

**Hedychium sino-aureum** Stapf

生于海拔 1 900—2 800 米的河边、山坡、杂木林下。分布于贵州、云南维西至贡山、西藏。

根状茎：温中散寒，止痛消食。

附　注：本种在西藏少数藏医作良姜使用。

**草果药**　野姜、良姜、草果(云南中草药)，豆蔻(植物名实图考)，长穗姜花(中国高等植物图鉴)，良姜花(滇南本草图谱)

**Hedychium spicatum** Buch.-Ham. ex Smith

生于海拔 1 200—2 900 米的山地密林中。分布于西南。

根状茎(土良姜)：辛、苦，温。温中散寒，理气止痛。用于胃寒痛，呕吐，食滞，寒疝气痛，牙痛，雀斑。果实及种子(草果药)：辛，温。宽中理气，开胃消食。用于胃寒疼痛，食积腹胀，寒疝，疟疾。

**毛姜花**

**Hedychium villosum** Wall.

生于海拔 80—3 400 米的林下、水旁及阴湿处。分布于广东、广西、云南。

根状茎：祛风止咳。用于咳嗽痰喘。

## 大豆蔻属 Homstedtia Retz.

**大豆蔻** 烂包头(广西防城)

**Homstedtia hainanensis** T. L. Wu et Senjen

生于山谷、山坡及疏林中。分布于海南、广西。

全株：用于水肿，小便不利。

## 山柰属 Kaempferia L.

**山柰** 土麝香(云南)，沙姜(岭南采药录)，三赖(本草品汇精要)

**Kaempferia galanga** L.

栽培或野生。云南等地野生于海拔 850 米的草地干燥处，其他地区多为栽培。分布于江西、福建、台湾、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

根状茎(山柰)：辛，温。行气温中，消食，止痛。用于胸膈胀满，脘腹冷痛，寒湿吐泻，跌打损伤，牙痛。

附 注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。② **大叶山柰 K. latifolia** (Dunn) Y. H. Chen，分布于云南文山、西双版纳，有些地区作山柰用。

**苦山柰**

**Kaempferia marginata** Carey

分布于云南耿马、景东。为我国分布新记录。

附 注：根据根状茎切面的颜色，可分为两个变型：① 苦山柰，根状茎黄色，主含桂皮酸乙酯。产地群众认为有毒，供外用(配制伤湿止痛膏)。② **白山柰 K. marginata** Carey f. **alba** Y. H. Chen，根状茎白色，不含黄色素。产地群众认为无毒，收购人药作山柰用。

**海南三七** 山田七(广西龙州)

**Kaempferia rotunda** L.

栽培或野生于海拔 500—2 400 米的山脚及草地阳陂。分布于海南、广西、云南。

根状茎：辛，温。有小毒。消肿止痛。用于跌打损伤及胃痛。

## 偏穗姜属 Plagiostachys Ridl.

**偏穗姜** 山姜(广西金秀)

**Plagiostachys austrosinensis** T. L. Wu et Senjen

生于林下及灌丛阴湿处。分布于广东、广西。

根状茎：用于风湿骨痛，胃脘痛。

## 喙花姜属　Rhynchanthus Hook. f.

**喙花姜**　　滇高良姜(植物名实图考)

**Rhynchanthus beesianus** W. W. Smith

生于海拔 1 500—1 900 米的路边及疏林下。分布于云南腾冲、丽江、大理、西盟。

根状茎、挥发油：芳香健胃。

## 象牙参属　Roscoea Smith

**象牙参**

**Roscoea purpurea** Smith

生于海拔 2 500—3 200 米的草坡及松、杉木林下。分布于云南、西藏。

根状茎(象牙参)：温中散寒，止痛消食。

**藏象牙参**　　鸡脚玉兰(云南)，鸡脚参、象牙参(中药大辞典)

**Roscoea tibetica** Batal.

生于海拔 2 100—3 800 米的山坡、草地或松、杉林下。分布于四川、云南、西藏。

根状茎(土中闻)：苦，凉。清肺止喘。用于咳嗽哮喘。

附　注：《中药大辞典》定名为 R. intermeda Gagnep.。

**滇象牙参**　　云南象牙参、象牙参、五兄弟(云南药用植物名录)

**Roscoea yunnanensis** Loes.

生于海拔 2 000—3 500 米的林缘、草地及杂木林下。分布于云南、西藏。

根：滋肾润肺。用于虚寒咳嗽，虚性水肿，病后体虚。

## 土田七属　Stahlianthus O. Kuntze

**姜三七**　　土田七、三七姜、姜田七(广西)，竹叶三七(中药大辞典)

**Stahlianthus involucratus** (King ex Baker) Craib——*Kaempferia involucrata* King ex Baker

生于林下、荒坡、沟边阴湿处或栽培。分布于江西、福建、湖南、广东、广西、云南。

根状茎：辛、微苦，温。散瘀消肿，行气镇痛。用于风湿骨痛，跌打损伤，吐血，衄血，月经过多，毒蛇、虫咬伤。

## 姜属　Zingiber Boehm.

**野姜**

**Zingiber cassumuner** Roxb.

生于中、低山、平坝、竹林下或次生林中。分布于云南勐腊、景洪。

根状茎：用于食积胀满，肝脾肿大，食滞呃逆。

**匙苞姜**　野阳荷(广西田林)

**Zingiber cochleariforme** D. Fang

生于山坡、山谷、疏林阴湿处。分布于广西、四川。

根状茎：温中散寒，止呕开胃。用于风寒感冒，小儿惊风；外用于风湿骨痛。

**珊瑚姜**

**Zingiber corallinum** Hance

生于山谷、溪旁、密林中。分布于广东、海南、广西。

根状茎：消肿，散瘀，解毒。用于传染性肝炎，风湿骨痛；外用于骨折。

**细根姜**　软姜(广西贺县)

**Zingiber leptorrhizum** D. Fang

生于林下阴湿处。分布于广东、广西钟山及贺县。

全草：行气祛风。

**乌姜**

**Zingiber lingyunense** D. Fang

生于山谷、疏林中或林下石上。分布于广西禾业、凌云、田林。

根状茎：用于风湿骨痛。

**襄荷**　野老姜、土里开花、莲花姜(浙江)，野姜(江西)，阳荷(广西南丹)

**Zingiber mioga** (Thunb.) Rosc.——*Amomum mioga* Thunb.

生于阴湿的山地、林下、沟边及低山竹林中或栽培。全国中南部省区多有分布。

根状茎(襄荷)：辛，温。温中理气，祛风止痛，止咳平喘。用于胃寒腹痛，气虚喘咳，痈疽肿毒，血崩经闭，胃寒牙痛，腰腿痛，跌打损伤，解乌头中毒。叶(襄草)：苦，寒。用于温疟寒热。花序(山麻雀)：用于咳嗽，配生香棰，用于小儿顿咳。果实(襄荷子)：用于胃痛(胃有出血史者忌用)。

**光果姜**　野姜(广西龙州)

**Zingiber nudicarpum** D. Fang

生于山谷、林下阴湿处。分布于广西。

根状茎：用于风湿痹痛。

**姜**　生姜、火姜、大肉姜(广西)，干姜、川姜(四川)

**Zingiber officinale** Rosc.

我国中部、东南部至西南部各省区广为栽培。云南有少量野生。

根状茎鲜品(生姜)：辛，温。发表，散寒，温中止呕，解毒。用于风寒感冒，胃寒呕吐，痰饮，喘咳，胀满，泄泻，解半夏、天南星及鱼蟹、鸟兽肉毒。根状茎干品(干姜)：辛，热。温中逐寒，回阳通脉。用于胃腹冷痛，虚寒吐泻，手足厥冷，痰饮咳嗽。根状茎外皮(姜皮)：辛，微温。行水，消肿。用于水肿胀满。叶(姜叶)：用于散水结，瘀血。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**峨眉姜**　地莲花(四川)

**Zingiber omeiense** Z. Y. Zhu

生于林下阴湿处。分布于四川乐山。

根状茎(地莲花)：辛，温。温中散寒。止呕开胃。

**红冠姜**　野阳荷(广西)

**Zingiber roseum** (Roxb.) Rosc. ——*Amomum roseum* Roxb.

生于海拔500—940米的河边、路旁或山坡、山谷阴湿处，也有栽培。分布于广西、云南。

根状茎：用于产褥热及风湿骨痛。

**阳荷**　山阳荷、野生姜(湖北)，野姜(中国植物志)，阴藿(植物名实图考)

**Zingiber striolatum** Diels

生于海拔300—3 000米的次生林阴下及溪边。分布于江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

根状茎：用于泄泻，痢疾。

**团聚姜**　莲花姜(四川)

**Zingiber tuanjuum** Z. Y. Zhu

生于林下。分布于四川。

根状茎(莲花姜)：活血调经，止咳祛痰。

**红球姜**　凤姜(广西容县)

**Zingiber zerumbet** (L.) Smith——*Amomum zerumbet* L.

生于林下及林缘阴湿处或栽培。分布于广东、广西、贵州、云南。

根状茎：辛，温。祛瘀消肿，解毒止痛。用于脘腹胀痛，消化不良，泄泻，跌打肿痛及解毒。

## 211. 美人蕉科　Cannaceae

### 美人蕉属　Canna L.

**蕉芋**　姜芋(广东)，姜芽(广东、贵州)，芭蕉芋(贵州、云南)，满咚(傣语)

**Canna edulis** Ker-Gawl.

原产西印度群岛和南美洲。我国南部及西南部各省区常见栽培，北方偶有栽培。

根：清热利湿，凉血解毒，滋补。　花：止血。

**黄花美人蕉**

**Canna flaccida** Salib.

原产南美洲。我国广东常见栽培。

根：止痛消肿，止痢。用于跌打损伤，痢疾。

**大花美人蕉**　美人蕉(上海)

**Canna generalis** Bailey

我国各地常见栽培，为园艺杂交种。

根状茎及花：功效同美人蕉。

附　注：四川一些地区也作美人蕉药用的有**和兰晏华　C. patans** Rosc.，分布于四川；**紫叶美人蕉 C. warszewiczii** A. Dietr.，分布于广州、四川、云南。

**美人蕉**　　破血红、洋芭蕉(江西)，小芭蕉头(四川中药志)，红玉簪花(贵州毕节名录)，观音姜(南宁药物志)

**Canna indica** L.

野生于旷野或栽培。原产印度。我国各地庭园常见栽培。

根状茎(美人蕉根)：甘、淡，凉。清热利湿，安神降压。用于黄疸，神经官能症，高血压症，久痢，咯血，血崩，带下病，月经不调，疮毒痈肿。　花(美人蕉花)：止血。用于金疮及其它外伤出血。

## 212. 竹芋科　Marantaceae

### 竹叶蕉属　Donax Lour.

**竹叶蕉**　　戈燕(傣名)

**Donax canniformis** (Forst.) K. Schum——*Thalia canniformis* Forst.

台湾、广东、海南、广西、云南有栽培。

块根或茎：淡，凉。清热解毒，止咳定喘，消肿。用于肺痨，咳嗽痰喘，高热，小儿麻疹，风热咳喘，感冒发热，各种皮肤病。

### 竹芋属　Maranta L.

**竹芋**　　结粉、山百合(全国中草药汇编)

**Maranta arundinacea** L.

原产南美洲。我国广东、海南、广西、云南南部均有栽培。

块茎：甘、淡，凉。清肺，利尿。用于肺热咳嗽，小便赤痛。

**花叶竹芋**

**Maranta bicolor** Ker-Gawl.

原产巴西。我国广东、广西、云南有栽培。

根状茎：微苦、辛，寒。有小毒。清热消肿。

### 柊叶属　Phrynium Willd.

**柊叶**　　棕粑叶、棕叶(全国中草药汇编)

**Phrynium capitatum** Willd.

生于海拔530—1 350米的密林中阴湿处或山谷潮湿地。分布于广东、海南、广西、云南。

根状茎及叶：甘、淡，微寒。清热解毒，凉血止血，利尿。　根状茎：用于肝肿大，痢疾、尿赤。　叶：用于音哑，咽喉痛。　叶柄：用于口腔溃疡，醒酒。

**尖苞柊叶**　　小花柊叶(中国种子植物科属辞典)

**Phrynium placentarium** (Lour.) Merr. ——*Phyllodes placentaria* Lour.

生于海拔 250—1 500 米的林下及阴湿处。分布于广东、海南、广西、贵州、云南。

根状茎、叶：功效同棯叶。

## 213. 兰科 Orchidaceae

### 脆兰属 Acampe Lindl.

**多花脆兰** 黑山蔗、乌猿蔗(广西)

**Acampe rigida** (Buch -Ham. ex Smith) P. F. Hunt——*Aechis rigida* Buch. Ham. ex Smith;——*Vanda multiflora* Lindl.; *A. multiflora* (Lindl.) Lindl.

生于海拔 320—1 100 米的疏林中树上或溪边丛林下岩石上。分布于广东、海南、广西、云南。

根、叶：用于跌打损伤，骨折。

### 无柱兰属 Amitostigma Schlecht.

**四裂无柱兰**

**Amitostigma basifoliatum** (Finet) Schlecht. ——*Peristylus tetralobus* Finet f *basifoliatus* Finet

生于海拔 2 500—4 100 米的草地、林下或岩石上。分布于四川、云南。

全草：解毒，止痛。

**无柱兰** 独叶一枝花(浙江、湖北)，双肾草(湖北)

**Amitostigma gracile** (Bl.) Schlecht. ——*Mitostigma gracile* Bl.; *A. chinensis* (Rolfe) Schlecht.

生于山坡林下阴湿处石上。分布于东北、华北、中南、西南。

块茎、全草(独叶一枝枪)：微甘，凉。解毒，消肿，止血。用于跌打损伤，吐血，毒蛇咬伤，无名肿毒。

**一花无柱兰**

**Amitostigma monanthum** (Finet) Schlecht. ——*Peristylus monanthus* Finet

生于海拔 2 700—3 700 米的山坡灌丛下或高山草地上。分布于陕西、甘肃、四川、云南、西藏。

块茎：解毒，消肿，止血。外用于无名肿毒，跌打损伤，蛇虫咬伤。

**大花无柱兰**

**Amitostigma pinguiculum** (Reichb. f. et S. Moore) Schltr. ——*Gymnadenia pinguicula* Reichb. f. et S. Moore; *Diplomeris chinensis* Rolfe

生于林下阴湿处岩石上。分布于浙江、湖北、四川。

块茎、全草：解毒，消肿，止血。用于无名肿毒，跌打损伤，吐血，毒蛇咬伤。

## 开唇兰属　Anoectochilus Bl.

**峨眉金线兰**　　蛇皮兰(四川)

**Anoectochilus emeiensis** K. Y. Lang

生于海拔900—1 500米的路旁灌丛中。分布于四川。

全草：清热解毒。用于蛇咬伤。

附　注：四川特有药用植物。

**艳丽开唇兰**

**Anoectochilus moulmeinensis** (Parish et Reichb. f.) Seidenf. ——*Etaeria moulmeinensis* Parish et Reichb. f.

生于海拔2 200米以下的山坡阔叶林中树干上、堆积腐殖质中。分布于西南及广西。

全草：清热解毒，凉血，消肿。

**花叶开唇兰**　　金线兰(福建)，金线枫(广东)，小叶金耳环(广西)，蛇皮兰(四川)

**Anoectochilus roxburghii** (Wall.) Lindl. ——*Chrysobaphus roxburghii* Wall.

生于山坡阔叶林下或竹林下阴湿处。分布于浙江、福建、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

全草(金线兰)：甘，平。清热凉血，解毒消肿，润肺止咳。用于咯血，咳嗽痰喘，小便涩痛，消渴，乳糜尿，小儿急惊风，对口疮，心脏病，毒蛇咬伤。

## 筒瓣兰属　Anthogonium Wall. ex Lindl.

**筒瓣兰**　　小白芨(四川)

**Anthogonium gracile** Wall. ex Lindl. ——*A. corydaloides* Schlecht.

生于海拔1 500—3 300米的山坡路旁、林下、灌丛中草地上。分布于广西、四川、云南、西藏。

根：清热，止咳，补肝。用于肺热咳嗽，肝炎。

## 牛齿兰属　Appendicula Bl.

**牛齿兰**　　石壁兰(广西)

**Appendicula cornuta** Bl. ——*A. bifaria* Lindl. ex Benth.

生于林下潮湿的岩石上或山谷、溪边岩石上。分布于台湾、广东、海南、广西。

全草：清热解毒。

## 竹叶兰属　Arundina Bl.

**禾叶竹叶兰**　　土白芨(福建)，幽涧兰(海南)，长杆兰(四川、贵州)，野兰花、地黄草

(四川)

**Arundina graminifolia** (D. Don) Hochr. —— *Bletia graminifolia* D. Don; *A. chinensis* Bl.

生于海拔 800—2 400 米的山坡草地上或沼地、林缘、河边草丛中。分布于西南及浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西。

根状茎、全草(山荸荠): 苦,平。清热解毒,祛风除湿,止痛,利尿。用于肝炎,关节痛,腰酸腿痛,胃痛,淋证,小便涩痛,脚气水肿,瘰疬,肺痨,牙痛,咽喉痛,感冒,小儿惊风,小儿疳积,咳嗽,食物中毒,跌伤,蛇咬伤,外伤出血。

## 鸟舌兰属 Ascocentrum Schlecht. ex J. J. Smith

**鸟舌兰**

**Ascocentrum ampullaceum** (Roxb.) Schlecht. —— *Aërides ampullaceum* Roxb.

生于海拔 1 150—1 500 米的山坡、路旁,附生于树上。分布于贵州、云南。

全草: 利尿,消肿。用于水肿。

## 白芨属 Bletilla Rchb. f.

**小白芨**

**Bletilla formosana** (Hayata) Schlecht. —— *Bletia formosana* Hayata; *Bletilla yunnanensis* Schlecht. ex Limpr; *Bletilla szechuanica* Schltr. ex Limpr.

生于海拔 500—3 400 米的山坡草丛中或小溪旁岩石上。分布于西南及陕西、台湾、广西。

块茎(小白芨): 苦,平。补肺,止血,生肌,收敛。用于肺痨咯血,矽肺,胃肠出血,跌打损伤。

**白花小白芨**

**Bletilla formosana** (Hayata) Schlecht. var. **limprichtii** Schlecht.

生于山坡灌丛中或山坡草地上。分布于云南。

块茎: 补肺,止血,止痛。

**黄花白芨** 黄术(广西)

**Bletilla ochracea** Schlecht.

生于海拔 300—3 050 米的山地草丛中或沟谷边岩石上。分布于陕西、甘肃、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

块茎(白芨): 苦、甘、涩,微寒。收敛止血,消肿生肌。用于咳血吐血,外伤出血,疮疡肿毒,皮肤皲裂,肺痨咯血,溃疡出血。

附 注:《四川省中药材标准》1987 年版收载。

**中华白芨** 小白芨(云南)

**Bletilla sinensis** (Rolfe) Schlecht. —— *Arethusa sinensis* Rolfe; *B. foliosa*(King et Pantl.) Wang et Tang

生于海拔 1 800 米左右的山坡疏林下草丛中或旷野草丛中。分布于云南。

块茎：补肺，止血。

**白芨**　鸡头参(陕西)，白鸡儿(四川)，白鸡(贵州)

**Bletilla striata** (Thunb.) Reichb. f. ——*Limodorum striata* Thunb.

生于山野、山谷较潮湿处。分布于中南及河北、北京、山西、陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、四川、贵州、云南。

块茎(白芨)：苦、甘、涩，微寒。收敛止血，消肿生肌。用于咳血吐血，外伤出血，疮疡肿毒，皮肤皲裂，肺痨咯血，溃疡出血，烧、烫伤。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**大花白芨**

**Bletilla striata** (Thunb.) Reichb. f. var. **gebina** (Lindl.) Reichb. f. ——*Bletio gebina* Lindl.

生于海拔 1 500—2 600 米的山坡灌丛中或草丛中阴湿处。分布于云南。

块茎：收敛补肺，消肿，止血 。

## 苞叶兰属　Brachycorythis Lindl.

**短距苞叶兰**　猕猴草、肾草(广西)

**Brachycorythis galeandra** (Reichb. f.) Summerh. ——*Phyllomphax galeandra* Reichb. f.

生于海拔 400—1 800 米的山坡林下。分布于台湾、湖南、广东、广西。

块茎：用于蛇咬伤。

## 石豆兰属　Bulbophyllum Thou.

**赤唇石豆兰**

**Bulbophyllum affine** Lindl.

生于海拔 1 100—1 550 米的林中，附生于树上或岩石上。分布于台湾、广东、海南、贵州、云南。

全草：滋阴，清热，化痰，祛瘀，止血。

**芳香石豆兰**

**Bulbophyllum ambrosia** (Hance) Schlecht.——*Eria ambrosia* Hance

生于海拔 1 300 米左右的密林中，附生树上或岩石上。分布于福建、广东、海南、云南。

全草：清热，止咳。用于肺热咳嗽。

**小绿石豆兰**

**Bulbophyllum calodictyon** Schlecht.

生于海拔 860—1 950 米的背阴山坡岩石上。分布于云南。

假鳞茎(小绿芨)：微甘，平。润肺止咳，消肿止痛，接骨。用于咳嗽；外用于乳痈，骨

折，扭伤，疮疖肿毒，脓肿。

**麦穗石豆兰**

**Bulbophyllum careyanum** (Hook.) Spreng. ——*Anisopetalon careyanum* Hook.

生于海拔 860—1 950 米的山坡疏林中树上或山谷岩石上。分布于贵州、云南。

全草：滋阴，清热，化痰。

**圆叶石豆兰**　果上叶、破石珠(贵州)

**Bulbophyllum drymoglossum** Maxim.

生于山坡林中或附生于林缘树上。分布于广西、贵州。

全草：清热润燥，生津止渴，接骨。

**黄花石豆兰**　石枣、米谷还阳(湖北)

**Bulbophyllum flaviflorum** Seidenf.

生于高山岩石缝中。分布于湖北西南部。

全草：润肺止咳，活血止痛。用于筋骨疼痛，风湿关节痛，劳伤。

**广东石豆兰**　岩枣(浙江)，扣子兰(广西)，石枣子(四川)

**Bulbophyllum kwangtungense** Schlecht.

生于山地阴湿的岩壁上或树干上。分布于浙江、福建、湖北、广东、广西、四川、贵州。

全草(广东石豆兰)：甘、淡，寒。滋阴润肺，止咳化痰，清热消肿。用于咽喉肿痛，乳蛾，口疮，高热口渴，乳痈，咳嗽痰喘，顿咳，肺痨，吐血，咯血，风湿痹痛，跌打损伤。

**齿瓣石豆兰**　密珠(浙江、云南)

**Bulbophyllum levinei** Schltr.

生于山地阴湿的岩壁上或林中树上。分布于浙江、广东、云南。

全草(齿瓣石豆兰)：甘、淡，寒。滋阴降火，清热消肿。用于咽喉肿痛，乳蛾，口疮，高热口渴，乳痈，关节痛。

**密花石豆兰**　万年桃(广西)，一匹草、石枣子(四川)，果上叶、石串莲(云南)

**Bulbophyllum odoratissimum** (Smith) Lindl. ——*Stelis odoratissimum* Smith

生于海拔 800—2 300 米的山坡林中树上或山沟阴湿的岩石上。分布于西南及福建、广东、广西。

全草(果上叶)：甘、淡，平。润肺化痰，舒筋活络，消肿。用于肺痨咯血，咳嗽痰喘，咽喉肿痛，虚热咳嗽，风火牙痛，头晕，疝气，小便淋沥，风湿筋骨痛，跌打损伤，骨折，刀伤。

**伏生石豆兰**

**Bulbophyllum reptans** (Lindl.) Lindl. ——*Tribrachia reptans* Lindl.

生于海拔 1 000—2 800 米的山坡林中树上。分布于广东、海南、广西、贵州、云南、西藏。

全草：润肺止咳，化痰，止痛。用于肺痨咳嗽，咽喉肿痛，消化不良，食欲不振，风湿痛，跌打损伤。

**伞花石豆兰**　白冰球(贵州)

**Bulbophyllum shweliense** W. W. Smith

生于海拔 1 500—2 000 米的山坡林中树上或阴湿的岩石上。分布于贵州、云南。

全草：甘、淡，凉。清热润燥，生津止渴。用于肺炎，胃炎，咯血，痨咳，咽喉肿痛，阴虚

溢汗。 果实：辛，温。用于跌打损伤。

## 虾脊兰属 Calanthe R. Br.

**泽泻虾脊兰** 八仙草、九子连环草(四川)

**Calanthe alismifolia** Lindl.——*C. nigropuncticulata* Fuhuyama

生于海拔700—2 100米的山地林下岩石上或灌丛中阴湿处。分布于西南。

全草：辛、苦，寒。清热解毒，祛风除湿，散瘀消肿，活血，止痛。用于肠痈，疖肿，瘰疬，热淋，尿血，跌打损伤。

**肾唇虾脊兰** 九子连环草(四川)

**Calanthe brevicornu** Lindl ——*C. lamellosa* Rolfe; *C. yunnanensis* Rolfe

生于海拔2 400—2 800米的山坡林下或灌丛中阴湿处。分布于西南及台湾、湖北。

全草：活血化瘀，消肿散结。用于痈肿疮毒，跌打损伤，毒蛇咬伤。

**剑叶虾脊兰** 九子连、九龙草(陕西)，羊角七、铁梳子(湖北)，马齿七(四川)

**Calanthe davidii** Franch.——*C. ensifolia* Rolfe

生于海拔1 700—3 000米的山地路旁、沟边或灌丛中阴湿处。分布于陕西、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

根、假鳞茎、全草(马牙七)：辛、苦，寒。有小毒。清热解毒，散瘀，止痛。用于咽喉肿痛，牙痛，瘰疬，胃溃疡，慢性肝炎，腰痛，腹痛，经闭，关节痛，砂淋，跌打损伤，蛇咬伤。

**少花虾脊兰** 九子连环草、肉连环(四川)

**Calanthe delavayi** Finet——*C. coelogyniformis* Kränzl.

生于海拔2 600—3 400米的林下或沟边多石潮湿处。分布于甘肃、四川、贵州、云南。

全草：清热止渴，消肿散结，活血化瘀。用于痈肿疮毒，瘰疬，热淋，跌打损伤。

**密花虾脊兰** 竹叶根节兰(台湾)

**Calanthe densiflora** Lindl.

生于海拔1 700—3 000米的山坡林下或山谷溪旁。分布于广东、海南、四川、云南。

全草：活血化瘀，消肿散结，祛风除湿。用于风湿关节痛，腰腿酸痛，疮痈肿痛，跌打损伤。

**虾脊兰** 九子连环草(四川、贵州)，一串红子(贵州)

**Calanthe discolor** Lindl.——*C. cheriana* Hand.-Mazz.; *C. esquirolei* Schlecht.

生于山坡林下肥沃处或灌丛中阴湿处。分布于江苏、湖北、四川、贵州。

全草(九子连环草)：辛，平。活血化瘀，消痈散结。用于瘰疬，风湿骨痛，痈疮肿毒，跌打损伤。 根：辛、苦，寒。解毒。用于瘰疬，痔疮，脱肛。

**流苏虾脊兰** 九子连(陕西)，铁牛杆子(湖北)，九子连环草、肉连环(四川)

**Calanthe fimbriata** Franch.——*C. buccinifera* Rolfe

生于海拔1 900—3 500米的山坡林下。分布于西南及陕西、甘肃、湖北。

全草(马牙七)：辛、苦，凉。有小毒。清热解毒，散瘀，止痛。用于咽喉肿痛，牙痛，瘰疬，胃溃疡，慢性肝炎，腰痛，腹痛，经闭，关节痛，砂淋，跌打损伤，蛇咬伤。 假鳞茎：消

炎，散结。用于瘰疬，咽喉肿痛。

**钩距虾脊兰**　--蒐棕(湖南)

**Calanthe graciliflora** Hayata——*C. hamata* Hand.-Mazz.

生于海拔1 700—2 400米的山坡林下阴湿草丛中或溪边湿地。分布于江苏、浙江、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草：清热解毒，滋阴润肺，活血祛瘀，消肿止痛，止咳。

**长茎虾脊兰**

**Calanthe gracilis** Lindl. ——*Cephalantheropsis gracilis* (Lindl.) S. Y. Hu

生于海拔800—1 400米的山坡林下或灌丛中阴湿地。分布于台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

根：祛风止痛。

**叉唇虾脊兰**　九子连环草(四川)

**Calanthe hancockii** Rolfe

生于海拔1 400—3 600米的山坡林下或灌木丛中阴湿处。分布于广西、四川、贵州、云南。

全草：苦，凉。清热解毒，软坚散结。用于瘰疬，痈疮，咽喉肿痛，毒蛇咬伤。

**细花虾脊兰**　九子连环草、肉连环、铁连环(四川)

**Calanthe mannii** Hook. f.——*C. pusilla* Finet; *C. brachychila* Gagnep.

生于海拔2 000—2 400米的山坡杂木林下。分布于西南。

全草：苦、辛，凉。清热解毒，软坚散结，祛风镇痛。用于痰喘，瘰疬，风湿疼痛，疮疖痈肿，痔疮，咽喉肿痛。

**长距虾脊兰**

**Calanthe masuca** (D. Don) Lindl. ex Wall.——*Bletia masuca* D. Don

生于海拔800—1 050米的山坡常绿阔叶林下阴湿处或河边。分布于广东、广西、贵州、云南、西藏。

全草：解毒，止痛，活血，化瘀。用于痈肿疮毒。

**香花虾脊兰**　大仙茅(广西)

**Calanthe odora** Griff.

生于山坡林下阴湿处。分布于广西、贵州、云南。

根：用于小儿疳积。

**镰叶虾脊兰**

**Calanthe puberula** Lindl. ex Wall.——*C. amoena* W. W. Smith

生于海拔2 100—2 300米的常绿阔叶林下或草坡上。分布于安徽、湖南、广西、四川、云南、西藏。

全草：清热解毒，软坚散结，祛风镇痛。

**反瓣虾脊兰**

**Calanthe reflexa** Maxim.

生于海拔1 500—2 750米的山坡林下或灌丛中阴湿处。分布于浙江、台湾、四川、贵州、云南。

全草：辛、苦，凉。清热解毒，软坚散结，活血，止痛。用于瘰疬，淋巴结炎，疮痈，疥癣，喉痹，经闭，跌打损伤，风湿痹痛，痢疾。

**棍似虾脊兰**

**Calanthe similis** Schlecht.

生于海拔2 400米左右的山坡林下阴湿处。分布于广西、云南。

全草：用于瘰疬，疥疮。

**三棱虾脊兰**　　铁连环、九子连环草(四川)，竹叶石凤丹(云南)

**Calanthe tricarinata** Lindl. ex Wall.——*C. megalopha* Franch.; *C. undulata* Schlecht.

生于海拔1 000--3 500米的山坡林下或灌丛中阴湿处。分布于西南及陕西、台湾、湖北。

根及根状茎(肉连环)：辛、甘，温。舒筋活络，祛风除湿，止痛。用于风湿、类风湿关节痛，腰肌劳伤，胃痛，跌打损伤。　全草：散结，解毒，活血，舒筋。用于瘰疬，乳蛾，痔疮，跌打损伤。

**三褶虾脊兰**　　石上蕉(广西)，肉连环(贵州)

**Calanthe triplicata** (Willemet) Ames——*Orchis triplicata* Willemet

生于山谷溪边或林下岩石上。分布于台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

根：用于风湿、类风湿关节痛，腰肌劳损，跌打损伤，骨折。　全草：通淋利尿。用于小便不利，淋证；外用于跌打损伤。

**四川虾脊兰**

**Calanthe whiteana** King et Pantl.

生于海拔1 000—1 800米的山坡林下或灌丛中阴湿处。分布于四川、云南、西藏。

全草：清热解毒，镇痛，祛风，散瘀。

## 头蕊兰属　Cephalanthera Rich.

**银兰**　　白花草(四川)

**Cephalanthera erecta** (Thunb.) Bl ——*Serapias erecta* Thunb.; *C. erecta* (Thunb.) Bl. var. *szechuanica* Schlecht.; *C. szechuanica* Schlecht.

生于海拔1 100—2 200米的山坡林下。分布于陕西、浙江、江西、湖北、广东、广西、四川、贵州、西藏。

全草(银兰)：清热利尿，解毒，祛风，活血。用于高热不退，口干，小便不利，咳嗽痰喘，感冒，骨折，软组织扭伤。

**金兰**　　黄花兰(四川)

**Cephalanthera falcata** (Thunb.) Lindl.——*Serapias falcata* Thunb.

生于海拔1 400—3 000米的路旁、草坡、灌丛中或林下。分布于江苏、安徽、浙江、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

全草(金兰)：辛、甘，温。清热，泻火，消肿，祛风，健脾，活血。用于脾虚食少，咽喉痛，牙痛，风湿痹痛，扭伤，骨折。

**长叶头蕊兰**

**Cephalanthera longifolia** (L.) Fritsch——*Serapias helleborine* L. var. *longifolia* L.; *S. longifolia* (L.) Huds.; *C. ensifolia* Rich.

生于海拔 2 000—3 600 米的山坡林下、路旁或河滩草地上。分布于陕西、甘肃、河南、湖北、四川、云南、西藏。

全草：用于咽喉肿痛，鹅口疮，痈疖肿毒，跌打损伤。

## 独花兰属 Changnienia Chien

**独花兰** 山慈姑(湖北)，半边锣、长年兰(四川)

**Changnienia amoena** Chien

生于林下或林缘阴湿处。分布于陕西、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、四川。

全草(独花兰)：清热，凉血，解毒。用于咳嗽，痰中带血，热疖疔疮。

附 注：我国特有属。国家二级保护植物。

## 叉柱兰属 Cheirostylis Bl.

**云南叉柱兰** 石头虾(广西)

**Cheirostylis yunnanensis** Rolfe

生于海拔 200—1 800 米的林下或沟边。分布于湖南、广东、海南、广西、贵州、云南。

全草：用于慢性溃疡病。

## 卷瓣兰属 Cirrhopetalum Lindl.

**抱茎卷瓣兰** 一匹草(云南)

**Cirrhopetalum amplifolium** Rolfe——*Bulbophyllum amplifolium* (Rolfe) Balakr et Chowdhury

生于海拔 700—2 000 米的山谷、江河、溪边岩壁上。分布于云南。

全草：甘，温。祛风除湿，活血祛瘀，止咳，消积。

**梳帽卷瓣兰** 果上叶(广西)，一匹草、一匹叶(四川、云南)

**Cirrhopetalum andersonii** Hook. f.——*C. henryi* Rolfe; *Bulbophyllum andersonii* (Hook. f.) J. J. Smith

生于海拔 1 400—2 000 米的林中树上或岩石上。分布于广西、四川、贵州、云南。

全草：甘，温。祛风除湿，活血，止咳，消食。用于妇女体虚，月经不调，小儿咳嗽，肺痨咳嗽，吐血，顿咳，男子肾亏，小儿疳积，风湿痹痛，跌打损伤。

**斑唇卷瓣兰** 毛边卷瓣兰(海南)，石上桃(广西)

**Cirrhopetalum miniatum** Rolfe

生于林中附生于树上或岩石上。分布于海南、广西。

全草：用于肺痨，肝炎。

## 隔距兰属 Cleisostoma Bl.

**红花隔距兰** 马尾吊兰、光棍草、鹿角草(广西)

**Cleisostoma hongkongense** (Rolfe) Garay——*Sarcanthus hongkongensis* Rolfe

生于林中树上或林下岩石上。分布于广东、海南、广西、云南。

全草：用于风湿痹痛，小儿麻痹症，小儿疳积，阳痿。

**大序隔距兰** 山吊兰(广西)

**Cleisostoma paniculatum** (Ker-Gawl.) Garay ——*Aerides paniculatum* Ker-Gawl.; *Sarcanthus paniculatum* (Ker-Gawl.) Lindl.

生于海拔800—2 400米的常绿阔叶林中树上。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、四川、云南、西藏。

全草：养阴，润肺，止咳。

**尖喙隔距兰** 蜈蚣草(广西)

**Cleisostoma rostratum** (Lindl.) Garay——*Sarcanthus rostratus* Lindl.

生于林中树上或岩石上。分布于广东、海南、广西、贵州、云南。

全草：用于跌打损伤，骨折。

**蜈蚣兰** 瓜子菜(湖北)

**Gleisostoma scolopendrifolium** (Makino) Garay——*Sarcanthus scolopendrifolius* Makino

生于林中树上或岩石上。分布于山东、江苏、浙江、福建、湖北。

全草(蜈蚣兰)：微苦，凉。清热解毒，润肺，止血。用于咳嗽痰喘，咯血，胆囊炎，咽喉肿痛，乳蛾，鼻渊，肾盂肾炎，小儿惊风，口疮。

## 凹舌兰属 Coeloglossum Hartm.

**凹舌兰** 手参(内蒙古、陕西、甘肃)

**Coeloglossum viride** (L.) Hartm. ——*Satyrium viride* L.; *Habenaria viride* (L.) Hartm. var. *bracteatum* (Willd.) Richter

生于海拔1 200—4 300米的林下或林缘湿地。分布于华北、西北及河南、四川、云南、西藏。

块茎：甘、苦，平。补血益气，生津止渴。用于肺虚咳喘，虚劳消瘦，肾虚，带下病，小儿遗尿，久泻，失血，乳汁稀少。

## 贝母兰属 Coelogyne Lindl.

**伞房贝母兰** 果上叶、止血果(云南)

**Coelogyne corymbosa** Lindl.

生于海拔1 300—2 800米的林中树上或阴湿的岩石上。分布于云南、西藏。

全草：苦、辛，凉。化痰止咳，活血祛瘀，舒筋止痛。用于感冒，咳嗽痰喘，跌打损伤。

**毛唇贝母兰**

**Coelogyne cristata** Lindl.

生于海拔 1 700—1 800 米的林中树上或林缘岩石上。分布于贵州、西藏。

全草：清肝明目。

**流苏贝母兰**　　石仙桃(广西)

**Coelogyne fimbriata** Lindl.

生于海拔 500—1 750 米的林下、沟谷旁岩石上或山坡常绿阔叶林中树上。分布于江西、广东、海南、广西、云南、西藏。

全草：用于感冒，咳嗽，风湿骨痛。

**粟鳞贝母兰**　　大果上叶(云南)

**Coelogyne flaccida** Lindl.

生于海拔 1 000—1 700 米的树上、林下石上或山岩石壁潮湿处。分布于贵州、云南。

全草：酸、涩，平。润肺止咳，消肿止痛，祛风除湿，行气活络，接骨。用于肺痨，咳嗽痰喘，咳血，风湿痹痛，疝气疼痛，跌打损伤，骨折，外伤瘀血。

**禾叶贝母兰**　　石仙桃、石莲草(广西)

**Coelogyne graminifolia** Parish et Reichb. f.

生于海拔 1 800 米以下的山地林中树上或林下岩石上。分布于广西、云南。

假鳞茎：用于感冒，风热咳喘，胃痛。

**卵叶贝母兰**

**Coelogyne occultata** Hook. f.

生于海拔 1 300—2 400 米的林中树上或林下、沟谷旁岩石上、路边阴湿处。分布于云南、西藏。

全草：甘、淡，凉。滋阴益肾，养胃生津，除烦止渴。用于热病伤津，病后虚弱，肺痨潮热，盗汗，遗精，腰酸无力，痔疮，胃脘痛胀，胃酸缺乏，食欲不振。

**贝母兰**

**Coelogyne ovalis** Lindl.

生于海拔 1 200—3 000 米的林下岩石上或附生于林中树上。分布于贵州、云南。

全草：清热，化痰，止咳。

**斑唇贝母兰**　　石巴蕉、对叶果、果上叶(云南)

**Coelogyne punctulata** Lindl.

生于海拔 1 300—3 100 米的山坡林中树上或沟边石上。分布于贵州、云南、西藏。

全草：甘、淡，凉。清热止咳，止血定痛，续筋，接骨。用于咳嗽痰喘，感冒，骨折，软组织挫伤，外伤出血。

**褐唇贝母兰**

**Coelogyne sanderae** Kränzl.

生于海拔 1 100—2 250 米的山地林中、山谷溪边阴湿的岩石上或树上。分布于四川、云南。

叶柄：清肺热，祛风除湿。用于风湿痹痛。

**粘贝母兰**

**Coelogyne viscosa** Reichb. f.

生于海拔 750--1 400 米的林中树上或江边疏林下岩石上。分布于广西、云南。

假鳞茎：用于感冒，风热咳喘，胃脘痛。

## 吻兰属 Collabium Bl.

**吻兰**

**Collabium chinense** (Rolfe) Tang et Wang——*Nephelaphyllum chinense* Rolfe

生于海拔 800—1 000 米的常绿阔叶林下阴湿处或溪畔石上。分布于广东、海南、云南、西藏。

全草：外用于疮疡肿毒。

## 杜鹃兰属 Cremastra Lindl.

**杜鹃兰** 山慈姑(湖北、四川、云南)，泥宾子、毛慈姑(四川)，三道箍(贵州)

**Cremastra appendiculata** (D. Don) Makino——*Cymbidium appendiculata* D. Don

生于山坡、林下阴湿处。分布于山西、陕西、甘肃、江苏、浙江、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

假鳞茎(毛慈姑)：辛、甘，寒。有小毒。消肿散结，清热解毒。用于痈肿疔毒，瘰疬，蛇虫咬伤。

附 注：《四川省中药材标准》1987 年版收载。

## 兰属 Cymbidium Sw.

**建兰** 山兰花、宫兰花(福建)，红丝毛草(四川)，兰草(云南)

**Cymbidium ensifolium** (L.) Sw.——*Epidendrum ensifolium* L.

生于海拔 500—3 300 米的疏林中树上、山坡林下或路旁，广为栽培。分布于华东、中南，西南。

全草(兰草)：辛、甘、微苦，平。滋阴润肺，止咳化痰，活血，止痛。用于血滞经闭，经行腹痛，产后瘀血腹痛，顿咳，肺痨咳嗽，咯血，肾虚，风湿痹痛，头晕，腰疼，小便淋痛，带下病。根(兰草根)：滋阴清肺，化痰止咳。花(兰草花)：辛，平。理气，宽中，明目。用于久咳，胸闷，泄泻，青盲内障。

**蕙兰** 土百部(陕西)，长叶兰、化气兰(四川)，九节兰(贵州)

**Cymbidium faberi** Rolfe

生于海拔 2 000—3 000 米的林下阴湿处，广为栽培。分布于华东、中南、西南及陕西。

根皮(蕙兰)：苦、甘，温。有小毒。润肺止咳，杀虫。用于久咳，蛔虫病，头虱(煎水洗)。

**多花兰**　牛角七(湖北),石羊果(广西),夏兰(四川)

**Cymbidium floribundum** Lindl.

生于海拔 1 200—2 500 米的山坡林下、岩石上或溪边。分布于华东、中南、西南。

全草：辛,平。清热解毒,滋阴润肺,化痰止咳。用于瘰疬,石淋,小儿夜啼，淋浊,带下病,疮疖。根：用于风湿痹痛,肺痨咯血。

**春兰**　吊兰花、草兰、山兰(四川、贵州),朵朵香、双飞燕(植物名实图考)

**Cymbidium goeringii** (Reichb. f.) Reichb. f.——*Maxillaria goeringii* Reichb f.; *C. yunnanense* Schlecht.

生于海拔 1 900—2 550 米的山坡林下或溪边,广为栽培。分布于华东、中南、西南及陕西、甘肃。

根：辛,凉。有小毒。活血祛瘀,凉血解毒。用于跌打损伤,骨折,肺热咳嗽，痰中带血,尿血,外伤出血,咽喉肿痛,狂犬咬伤。全草：清热润燥,驱蛔,补虚。用于肾虚,头昏腰痛,阴虚潮热盗汗,蛔积腹痛,痔疮。

**虎头兰**　青蝉、蝉兰(四川)

**Cymbidium hookerianum** Reichb. f.

生于海拔 1 100—2 700 米的山坡林下石上或林中树上。分布于西南。

根：外用于疮疖肿毒。全草：清肺,止咳,祛风。用于肺热咳嗽,痰中带血,风湿痹痛。

**黄蝉兰**

**Cymbidium iridioides** D. Don——*C. giganteum* Wall. ex Lindl.

生于海拔 1 100—2 400 米的林中树上或杂木林下岩石上。分布于西南及广西。

根：消肿,收敛,活血,止痛。全草：清肺,止咳。

**寒兰**

**Cymbidium kanran** Makino

生于海拔 1 200--2 000 米的林中树上、山坡林下或草丛中阴湿处,广为栽培。分布于华东、中南及贵州、云南。

全草：清心润肺,止咳平喘。

**兔耳兰**　竹柏兰(台湾),地青梅、搜山虎(四川),续筋草(广西)

**Cymbidium lancifolium** Hook.

生于海拔 1 000—2 200 米的山坡林下或树上。分布于西南及台湾、广东、广西。

全草：补肝肺,祛风除湿,强筋骨,清热解毒,消肿。

**硬叶吊兰**　剑兰(贵州),石吊兰(广西),吊兰(云南)

**Cymbidium pendulum** (Roxb.) Sw.——*Epidendrum pendulum* Roxb.

生于海拔 650—1 600 米的山谷岩石上或杂木林中树上，多为栽培。分布于广东、海南、广西、贵州、云南。

全草、种子(树葵瓜)：甘、淡,平。清热润肺,化痰止咳,散瘀止血。用于肺热咳嗽,肺痈,风热喘咳,咽喉肿痛,月经不调,带下病,骨折筋伤,外伤出血,风湿骨痛。

**墨兰**　春兰(广西)

**Cymbidium sinense** (Andr.) Willd.——*Epidendrum sinense* Andr.; *C. chinense* Heynh.

生于海拔 800—1 200 米的山地林下或山谷溪畔，广为栽培。分布于华东、中南、西南。

根：清心润肺，止咳定喘。

## 杓兰属 Cypripedium L.

**无苞杓兰**

**Cypripedium bardolphianum** W. W. Smith et Farrer——*C. nutans* Schlecht.

生于海拔 2 300—3 600 米的山坡疏林下。分布于甘肃、四川、云南、西藏。

根及根状茎：苦、微辛，温。利尿，祛风，活血，调经，止痛。用于水肿，风湿骨痛，带下病，经闭，疮痈肿毒。 全草：用于目赤肿痛，水肿，疮疖。

**杓兰** 斑花兰(黑龙江)

**Cypripedium calceolus** L.

生于林下草丛中或林缘草地上。分布于黑龙江、吉林、内蒙古。

根状茎：解热镇静，利尿。

**绵杓兰**

**Cypripedium corrugatum** Franch.

生于海拔 1 500—2 700 米的山地林下。分布于云南。

根及根状茎(兜兰)：甘、涩、微酸，平。调经活血，消肿止痛。用于月经不调，痛经，经闭，附件炎，小便涩痛，疝气。

**对叶杓兰** 二叶兰(四川)

**Cypripedium debile** Reichb. f.

生于灌木林下或竹林下阴湿处。分布于四川。

全草：活血祛瘀，消肿，止痛，利尿。

**毛瓣杓兰** 马蹄兰、飞蛾七、花叶两块瓦(四川)

**Cypripedium fargesii** Franch.——*C. margaritaceum* Franch. var. *fargesii* (Franch.) Pritz.; *C. ebracteatum* Rolfe

生于海拔 2 000—3 200 米的山地林下、林缘或山坡上。分布于湖北、四川。

全草(兰花双叶草)：甘，微凉。有小毒。补肝肾，明目，利尿，解毒，活血。用于目赤肿痛，水肿，角膜云翳，夜盲，白浊，疮痈肿毒。 根及根状茎(兰花双叶草根)：淡，平。补气，壮阳。

**大叶杓兰** 蜈公七、灯笼花、鸡嘴子(四川)

**Cypripedium fasciolatum** Franch.——*C. wilsoni* Rolfe

生于海拔 1 650—3 500 米的林下或疏林中。分布于青海、湖北、四川、贵州。

根及根状茎、全草：苦、辛，温。有小毒。利尿消肿，祛风除湿，活血止痛。用于全身浮肿，小便不利，带下病，淋证，风湿骨痛，跌打损伤，劳伤。 花：用于出血。

**黄花杓兰**

**Cypripedium flavum** P. F. Hunt et Summerh.——*C. luteum* Franch.

生于海拔 2 700—3 600 米的山坡林下、草坡或路旁。分布于甘肃、湖北、四川、云南、西

藏。

根及根状茎：甘、淡，温。强心利尿，活血调经。

**毛杓兰**　兰竹参(陕西)，龙舌箭(湖北)

**Cypripedium franchetii** Wils.

生于海拔1 500—3 700米的林下潮湿处。分布于山西、陕西、甘肃、河南、湖北、四川。

根及根状茎(牌楼七)：微苦，寒。理气，活血，消肿，止咳，止痛。用于气滞咳嗽，胸胁疼痛，腰腿痛，跌打损伤。

**紫点杓兰**　小口袋花(吉林)

**Cypripedium guttatum** Sw.

生于山坡林下、草地、草甸。分布于东北、华北及陕西、山东、四川、云南、西藏。

根状茎：镇静，解痉，止痛，解热，利尿。

**绿花杓兰**　野竹兰(湖北)，灯盏七、九根毛(四川)

**Cypripedium henryi** Rolfe——*C. chinense* Franch.

生于海拔800—2 300米的林下或林缘。分布于陕西、甘肃、湖北、四川、贵州、云南。

根及根状茎(龙舌箭)：苦，温。理气行血，消肿止痛。用于胃寒腹痛，腰腿疼痛，疝气痛，跌打损伤。　全草：活血，祛瘀，行水。

**扇脉杓兰**　飞蛾七、一把伞(四川)

**Cypripedium japonicum** Thunb.

生于海拔1 000—2 000米的林下、灌丛中或竹林下。分布于陕西、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、四川、贵州。

全草(扇子七)：辛，平。有毒。活血调经，祛风镇痛。用于月经不调，皮肤瘙痒，无名肿毒。　根及根状茎(扇子七根)：辛、涩，平。有毒。祛风除湿，活血通经，截疟。用于疟疾，跌打损伤，风湿痹痛，蛇咬伤。

**大花杓兰**　大口袋花(吉林、云南)，敦盛草(四川)

**Cypripedium macranthum** Sw.——*C. tibeticum* King ex Rolfe

生于山坡林间草地、灌丛下或沟谷河滩草丛中。分布于东北、华北、西南及陕西。

根及根状茎(蜈蚣七)：苦、辛，温。有小毒。利尿消肿，活血祛瘀，祛风镇痛。用于全身浮肿，小便不利，带下病，风湿腰腿痛，跌打损伤，痢疾。　花(蜈蚣七花)：用于外伤出血。

**斑叶杓兰**　花叶两块瓦(云南)

**Cypripedium margaritaceum** Franch.

生于海拔2 000—3 350米的林下或开旷的山坡上。分布于云南。

全草(兰花双叶草)：甘，微凉。有小毒。补肝肾，明目，利尿，解毒，活血。用于目赤肿痛，角膜云翳，目雾夜盲，水肿，热淋，白浊，疮痈肿毒。　根及根状茎(兰花双叶草根)：淡，平。补气，壮阳。

## 石斛属　Dendrobium Sw.

**钩状石斛**　黄草石斛、大黄草、红兰草(广西)，藤蓝、寄生草(贵州)

**Dendrobium aduncum** Wall. ex Lindl.——*D. aduncum* Wall. ex Lindl. var. *faulhaberianum* (Schlecht.) Tang et Wang; *D. faulhaberianum* Schlecht.

生于海拔 380—1 460 米的林中树上或山谷岩石上。分布于湖南、广东、海南、广西、贵州、云南。

茎(黄草钗斛): 甘、淡,微寒。滋阴,清热,益胃,生津,止渴。用于热病伤津,口干烦渴,病后虚热,食欲不振。

**兜唇石斛** 金耳环、黄草(广西)

**Dendrobium aphyllum** (Roxb.) C. E. C. Fisch.——*Limodorum aphyllum* Roxb.

生于海拔 1 000—1 800 米的林中树上或林下岩石上。分布于广西、贵州、云南。

全草: 微苦,凉。清热解毒。用于咳嗽,咽喉痛,口干舌燥,小儿惊风,食物中毒,烧、烫伤。

**矮石斛** 小美石斛(中药志)

**Dendrobium bellatulum** Rolfe

生于海拔 1 250—2 100 米的疏林中树上或林下岩石上。分布于云南。

茎(耳环石斛): 滋阴养胃,生津止渴。用于热病伤津,口干烦渴,病后虚热。

**黑节草** 铁皮石斛(广西、贵州、云南),铁皮兰(广西)

**Dendrobium candidum** Wall. ex Lindl.——*D. officinale* Kitamura et Migo

生于海拔 2 100—2 500 米的林中树上或林缘岩石上。分布于广西、贵州、云南、西藏。

茎(石斛): 甘,微寒。益胃生津,滋阴清热。用于阴伤津亏,口干烦渴,食少干呕,病后虚热,目暗不明。

附 注:《中华人民共和国药典》1990 年版收载。国家三级保护植物。

**翅萼石斛**

**Dendrobium cariniferum** Reichb. f.

生于海拔 1 200—1 400 米的山坡杂木林中树上或林下岩石上。分布于广西、云南。

茎: 滋阴养胃,生津止渴,清热除烦。

**束花石斛** 大黄草、马鞭草(广西),水打棒(贵州),金兰(云南)

**Dendrobium chrysanthum** Wall. ex Lindl.

生于海拔 700—2 500 米的山坡林中树上或河岸草坡石上。分布于西南及广西。

茎(石斛): 甘,微寒。益胃生津,滋阴清热。用于阴伤津亏,口干烦渴,食少干呕,病后虚热,目暗不明。

附 注:《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**鼓槌石斛**

**Dendrobium chrysotoxum** Lindl.——*D. suavissimum* Reichb. f.

生于海拔 520—2 800 米的山地林中树上或岩石上。分布于云南。

茎: 养阴生津,止渴,润肺。用于热病伤津,口干烦渴,病后虚热。

**玫瑰石斛** 大黄草、水打棒(贵州)

**Dendrobium crepidatum** Lindl. ex Paxt.

生于海拔 1 200—1 800 米的山地林中树上或山谷岩石上。分布于贵州、云南。

茎(黄草)：滋阴益胃，生津除烦。用于口干烦渴，阴伤津亏，病后虚热，目暗不明，肺痨，食欲不振。

**迭鞘石斛**　　大马鞭草、大黄草(广西)，马棒草(贵州)

**Dendrobium denneanum** Kerr.——*D. clavatum* Wall. ex Lindl.; *D. clavatum* Wall. ex Lindl. var. *aurantiacum* (Reichb. f.) Tang et Wang

生于海拔600—2 700米的山坡林中树上或林下岩石上，也有栽培。分布于台湾、广东、广西、四川、贵州、云南。

茎(黄草石斛)：滋阴，清热，益胃，生津止渴。用于热病伤津，口干烦渴，肺痨咳血，阴虚盗汗，腰膝酸软，食欲不振。

附　注：功效相同的有**霍山石斛 D. huoshanense** C. Z. Tang et S. T. Cheng及**黄花石斛 D. tosaense** Makino，分布于浙江、安徽、江西、福建、台湾、湖北。

**密花石斛**　　大黄草(云南)

**Dendrobium densiflorum** Lindl. ex Wall.

生于海拔700—2 400米的山坡林中树上或林下岩石上。分布于广东、海南、广西、贵州、云南、西藏。

茎(粗黄草)：甘、淡、微咸，寒。滋阴益胃，生津止渴，清热止咳。用于热病伤津，口干烦渴，病后虚弱，食欲不振，肺痨。

**齿瓣石斛**　　大黄草、水打棒、旱马棒(贵州)

**Dendrobium devonianum** Paxt.

生于海拔650—2 000米的林中树上或林下岩石上。分布于广西、贵州、云南。

茎(黄草石斛)：滋阴益胃，生津除烦。用于热病伤津，口干烦渴，病后虚弱，肺痨，食欲不振。

**串珠石斛**

**Dendrobium falconeri** Hook.

生于海拔1 600米以下的山坡林中树上或岩石上。分布于台湾、广西、云南。

茎(环钗斛)：养阴益胃，生津止渴。用于热病伤津，口干烦渴，病后虚热，食欲不振。

**流苏石斛**　　大马鞭草(广西)，大黄草、旱马棒(贵州)

**Dendrobium fimbriatum** Hook.——*D. fimbriatum* Hook. var. *oculatum* Hook.

生于海拔600—1 640米的杂木林中树上或山谷岩石上。分布于广东、广西、四川、贵州、云南。

茎(石斛)：甘，微寒。益胃生津，滋阴清热。用于阴伤津亏，口干烦渴，食少干呕，病后虚热，目暗不明。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**曲轴石斛**

**Dendrobium gibsonii** Lindl.——*D. fimbriatum* Hook. var. *gibsonii* (Lindl.) Finet ex Gagnep

生于海拔1 400—2 400米的林中树上或林下岩石上。分布于广西、云南。

茎：甘、微苦，凉。滋阴润肺，清热生津，止渴，益胃。用于热病伤津，口干烦渴，阴虚潮热，肺痨。

**细叶石斛**　　大马鞭草(广西),黑竹丫草(贵州),细黄草(云南)

**Dendrobium hancockii** Rolfe

生于海拔700—2 500米的林中树上或林下岩石上。分布于陕西、湖北、广西、四川、贵州、云南。

茎(黄草石斛):养阴益胃,生津止渴。用于热病伤津,口干烦渴,病后虚热,食欲不振。

**疏花石斛**

**Dendrobium henryi** Schlecht.——*D. evaginatum* Gagnep.

生于海拔600—1 500米的林中树上或林下岩石上。分布于广西、云南。

茎(黄草石斛):滋阴肾,益胃,生津除烦。用于热病伤津,口干烦渴,病后虚弱,肺痨,食欲不振。

**重唇石斛**　　鸡爪兰(广西),毫猪尖、中黄草(贵州)

**Dendrobium hercoglossum** Reichb. f.——*D. wangii* Tso

生于海拔600—2 400米的林中树上或岩石上。分布于江西、台湾、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

茎(黄草钗斛):甘、淡,微寒。滋阴益胃,清热润肺,生津止渴。用于热病伤津,口干烦渴,病后虚热,食欲不振。

**金耳石斛**

**Dendrobium hookerianum** Lindl.——*D. fimbriatum* Hook. var. *bimaculosum* Tang et Wang

生于海拔1 000—2 300米的山坡林中树上、岩石上或江边、河谷阴湿处。分布于云南、西藏。

茎:滋阴益胃,生津止渴。

**聚石斛**　　金黄泽、树上虾、鸡背石斛、土杵虾公(广东),上树虾(广西)

**Dendrobium jenkinsii** Wall. ex Lindl.——*D. aggregatum* Roxb.; *D. lindleyi* Steud. var. *majus* (Rolfe) S. Y. Hu

生于海拔1 800米以下的林中树上。分布于广东、海南、广西、贵州、云南。

全草(木虾公):甘、淡,凉。润肺化痰,止咳平喘,清热。用于肺热咳嗽,哮喘,痢疾,口疮,胃脘痛。

**距唇石斛**

**Dendrobium linawianum** Reichb. f.

生于林中树上或岩石上。分布于台湾、广西、贵州。

茎:甘、淡,平。滋阴益胃,生津止渴。用于热病伤津,口干烦渴,病后虚热,盗汗,关节痛。

**喇叭唇石斛**

**Dendrobium lituiflorum** Lindl.

生于海拔1 100—1 700米的山坡杂木林中树上或岩石上。分布于广西、云南。

茎:滋阴益胃,生津止渴。用于热病伤津,口干烦渴,病后虚热。

**美花石斛**　　小环草、环钗斛(广东、广西)

**Dendrobium loddigesii** Rolfe——*D. loddigesii* Rolfe var. ***album*** Tang et Wang

生于海拔400—2 700米的深山树上或林下岩石上，也有栽培。分布于广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

茎(环草石斛)：甘，微寒。益胃生津，滋阴清热。用于阴伤津亏，口干烦渴，食少干呕，病后虚热，目暗不明。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**罗河石斛**　　出芽草(广西)，黄竹丫、马鞭草(贵州)

**Dendrobium loohohense** Tang et Wang

生于海拔1 350米以下的林中树上或山谷岩石上岩缝中。分布于湖北、广东、广西、四川、贵州、云南。

茎(环钗斛)：甘、淡，微寒。滋阴益胃，生津止渴。用于热病伤津，口干烦渴，病后虚热，食欲不振。

**长距石斛**

**Dendrobium longicornu** Lindl.——*D. bulleyi* Rolfe

生于海拔1 200—2 700米的林中树上或岩石上。分布于广西、云南。

茎：滋阴益胃，生津止渴。用于热病伤津，口干烦渴，病后虚热。

**细茎石斛**　　小石斛、小环草、铜皮兰(广西)，铜皮石斛(中药志)

**Dendrobium moniliforme** (L.) Sw.——*Epidendrum moniliforme* L.

生于海拔600—3 000米的林中树上或阴湿的山谷石壁上。分布于湖北、广东、广西、四川、贵州、云南。

茎(环草石斛)：甘、淡，寒。用于热病伤津，痨伤咳血，口干烦渴，病后虚热，食欲不振。

**石斛**　　吊兰花(海南、贵州)，扁金钗(广西)，小黄草、金钗石斛(本草纲目)

**Dendrobium nobile** Lindl.

生于海拔800—1 700米的山坡林中树上或路边岩石上，多为栽培。分布于西南及台湾、湖北、广东、海南、广西。

茎(石斛)：甘，微寒。益胃生津，滋阴清热。用于阴伤津亏，口干烦渴，食少干呕，病后虚热，目暗不明。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**紫瓣石斛**

**Dendrobium parishii** Reichb. f.

生于山坡林中树上或林下岩石上。分布于贵州、云南。

茎：滋阴清热，生津止渴。用于热病伤津，口干烦渴，病后虚热。

**报春黄石斛**

**Dendrobium primulinum** Lindl.

生于山坡阔叶林中树上。分布于云南。

全草：微苦，凉。用于烧、烫伤，瘫痪，湿疹。

**梳唇石斛**

**Dendrobium strongylanthum** Reichb. f.

生于海拔 1 000—2 300 米的林中树上。分布于云南。

茎：滋阴养胃，清热生津。用于阴伤津亏，口干烦渴，食少干呕，病后虚热，目暗不明。

**刀叶石斛**

**Dendrobium terminale** Parish et Reichb. f.

生于海拔 800—1 900 米的林中树上或林下岩石上。分布于云南。

茎：甘、淡，凉。滋阴清热，生津止渴。用于热病伤津，口干烦渴，病后虚热，阴伤目暗。

**翅梗石斛**

**Dendrobium trigonopus** Reichb. f. ——*D. velutinum* Rolfe

生于海拔 1 250—1 500 米的林中树上。分布于广西、云南。

茎：滋阴养胃，生津止渴，清热除烦。

**黑毛石斛**　　毛石斛、鸡爪兰(广西)

**Dendrobium williamsonii** Day et Reichb. f.

生于山地林中树上。分布于广东、海南、广西、云南。

茎：滋阴益胃，生津，除烦。用于口干烦渴，病后虚弱，热病伤津，食欲不振，肺痨。

**广东石斛**　　铜皮兰(广东、云南)，中黄草(云南)

**Dendrobium wilsonii** Rolfe ——*D. kwangtungense* Tso; *D. kosepangii* Tso

生于海拔 1 000—1 600 米的林中树上或阴湿处岩石上。分布于湖北、广东、广西、四川、贵州、云南。

茎(环钗斛)：甘、淡，微寒。滋阴益胃，生津止渴。用于热病伤津，口干烦渴，病后虚热，食欲不振。

## 合柱兰属　Diplomeris D. Don

**合柱兰**　　独肾草、鸡肾草(四川)

**Diplomeris pulchella** D. Don ——*D. monantha* Tang et Wang

生于海拔约 1 000 米的山坡林下阴湿处岩石上。分布于西南。

全草：补益肾气。用于肾气虚弱。

## 蛇舌兰属　Diploprora Hook. f.

**蛇舌兰**　　爬石兰(广西)

**Diploprora championi** (Lindl.) Hook. f. ——*Cottonia championi* Lindl.; *Stenopsis championi* (Lindl.) Tang et Wang

生于海拔 900—1 300 米的山谷岩石上或树上。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、云南。

全草：用于跌打损伤，骨折。

## 金石斛属　Ephemerantha P. F. Hunt et Summerh.

**流苏金石斛**　果上叶(贵州),带爪石斛(广东)

**Ephemerantha fimbriata** (Bl.) P. F. Hunt et Summerh. ——*Desmotrichum fimbriatum* Bl.; *Dendrobium fimbriatum* (Bl.) Lindl.

生于林下岩石上或树上。分布于广东、海南、广西、贵州。

茎(有爪石斛):甘,平。滋阴清热,生津止渴,养胃,润肺止咳。用于肺痨,咳嗽,吐血,口疮,胸膜炎,热病伤津,口干烦渴,阴虚潮热。

**金石斛**　有爪石斛(广西)

**Ephemerantha lonchophylla** (Hook. f.) P. F. Hunt et Summerh. ——*Dendrobium lonchophyllum* Hook .f.

生于海拔 1 000 米左右的疏林中树上或林下岩石上。分布于广西、贵州、云南。

全草(响铃草):微苦,寒。用于肺痨,咳嗽,吐血,胸膜炎,口干烦渴,阴伤目暗,中暑,胃中虚热。

## 厚唇兰属　Epigeneium Gagnep.

**单叶厚唇兰**

**Epigeneium fargesii** (Finet) Gagnep. ——*Dendrobium fargesii* Finet

生于海拔 900—1 300 米的林中树上或山谷岩石上。分布于台湾、湖北、广东、广西、四川、云南。

全草:用于跌打损伤,腰肌劳损,骨折。

## 火烧兰属　Epipactis Zinn.

**小花火烧兰**　膀胱七(陕西)

**Epipactis helleborine** (L.) Crantz ——*Serapias helleborine* L.

生于海拔 700—3 300 米的林下、草坡上或路旁草丛中。分布于东北、华北、西北、西南。

根、全草(野竹兰):苦,寒。清热解毒,化痰止咳。用于肺热咳嗽,痰稠,咽喉肿痛,声音嘶哑,牙痛,目赤,病后虚弱,霍乱吐泻,疝气。

**大叶火烧兰**　鸡子花(河南)、小乌纱(云南)

**Epipactis mairei** Schlecht. ——*E. setschuanica* Ames et Schltr.; *Amesia mairei* (Schlecht.) Hu

生于海拔 1 100—3 400 米的林下草坡上或灌木丛下。分布于西南及陕西、甘肃、河南、湖北、湖南。

根及根状茎(兰竹参):苦、微涩,平。有小毒。祛瘀,舒筋,活络。用于跌打劳伤。全草:理气活血,消肿解毒。用于风湿痹痛,肢体麻木,关节屈伸不利,跌打损伤。

**细毛火烧兰**　　牛舌片(贵州)

**Epipactis papillosa** Franch.

生于林下草坡。分布于东北及贵州。

全草(鸡嗉子花)：甘，平。补中益气，舒肝和中。用于病后虚弱，吐泻，疝气。

## 虎舌兰属　Epipogium Gmel. et Borkh.

**裂唇虎舌兰**

**Epipogium aphyllum** Sw.

生于海拔 2 950—3 600 米的山坡林下。分布于吉林、湖北、四川、云南、西藏。

全草：活血散瘀。用于崩漏，带下病。

## 毛兰属　Eria Lindl.

**半柱毛兰**　　石壁风、蜢臂兰、老虎牙(广西)

**Eria corneri** Reichb. f.

生于海拔 680—1 500 米的林中树上、林下岩石上或山谷阴湿处。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

假鳞茎：用于小儿哮喘；外用于瘰疬，疮疡肿毒。　全草：清热解毒，润肺，消肿，益胃生津。

**足茎毛兰**

**Eria coronaria** (Lindl.) Reichb. f. ——*Coelogyne coronaria* Lindl.

生于海拔 1 100—2 700 米的林中树上或常绿阔叶林下岩石上。分布于广东、海南、广西、云南、西藏。

全草：清热解毒，益胃生津。

**反苞毛兰**

**Eria excavata** Lindl. ——*Octomeria excavata* Wall. ex Lindl.

生于海拔 1 300—1 700 米的山坡林中树上或林下岩石上。分布于江西、台湾、贵州、云南、西藏。

全草：生津止渴，润肺。

**禾叶毛兰**

**Eria graminifolia** Lindl.

生于海拔 1 700—2 700 米的山坡阔叶林中树上、林缘岩石上或田野草丛中较潮湿处。分布于云南、西藏。

全草：甘、淡，寒。益胃生津。用于热病伤津，口干烦渴，病后虚热，胃酸缺乏。

**指叶毛兰**　　蜈蚣草(云南)

**Eria pannea** Lindl.

生于海拔 800—2 000 米的山坡阔叶林中树上或林下岩石上。分布于广东、海南、广西、云南、西藏。

全草(树葱)：苦，凉。活血散瘀，解毒消肿。用于跌打损伤，骨折，痈疮疖肿，烧、烫伤，癣疹，药物(藜类、乌头类、磷化锌等)中毒。 根状茎：苦，凉。活血散瘀，解毒消肿。用于跌打损伤，骨折，痈疮疖肿，烧、烫伤。

**马齿毛兰**

**Eria szetschuanica** Schlecht.

生于海拔 1 400—2 300 米的山谷岩石上。分布于湖北、广东、四川、贵州、云南。

全草：清肝明目，生津止渴，润肺。

## 美冠兰属 Eulophia R. Br ex Lindl.

**美冠兰** 白蔹(河南)

**Eulophia dubia** (D. Don) Hochr. —— *Bletia dubia* D. Don; *E. campestris* Lindl.; *E. sinensis* Miq.; *E. faberi* Rolfe

生于海拔 2 100 米以下的山坡林下或山谷阴湿处。分布于中南及江苏、贵州、云南。

块茎：祛瘀，消肿，止血。用于跌打损伤，外伤出血。

## 山珊瑚属 Galeola Lour.

**山珊瑚** 公子天麻(四川)

**Galeola faberi** Rolfe

生于海拔 2 300 米以下林下、灌丛中或草丛中。分布于四川、贵州、云南。

全草：祛风除湿，润肺止咳，利尿通淋。用于风湿骨痛，肺痨咳嗽，头痛，眩晕。

**毛萼山珊瑚** 公子天麻(四川)，药跑(广西)

**Galeola lindleyana** (Hook. f. et Thoms.) Reichb. f. ——*Cyrtosia lindleyana* Hook. f. et Thoms.

生于海拔 800—2 100 米的山坡常绿阔叶林下或沟谷凹地。分布于西南及陕西、湖北、广东、广西。

全草：祛风除湿，润肺止咳，利水通淋。用于风湿骨痛，头痛，眩晕，肢麻木，肺痨咳嗽。

## 盆距兰属 Gastrochilus D. Don

**台湾盆距兰** 蜈蚣金钗(湖北)

**Gastrochilus formosanus** (Hayata) Schlecht. ——*Saccolabium formosanum* Hayata

生于山谷林下岩石上或林中树上。分布于台湾、湖北。

全草：清热生津，滋阴养胃。用于头晕。

## 天麻属 Gastrodia R. Br.

**天麻**

**Gastrodia elata** Bl. ——*G. elata* Bl. var. *gracilis* Pamp.; *G. mairei* Schlecht.

生于海拔 2 100—2 700 米的林下阴湿环境和腐殖质较厚的土壤上，或为人工栽培。分布于东北、西南及河北、陕西、甘肃、安徽、台湾、江西、河南、湖北、湖南、广西。

块茎(天麻)：甘，平。平肝熄风，止痉。用于头痛眩晕，肢体麻木，小儿惊风，癫痫抽搐，破伤风。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。国家三级保护植物。

## 地宝兰属　Geodorum G. Jacks.

**地宝兰**　双管、连罗(广西)

**Geodorum nutans** (Presl) Ames ——*Dendrobium nutans* Presl

生于山坡林下或山谷溪边。分布于台湾、广东、海南、广西。

块茎：外用于疮疖肿毒。

## 斑叶兰属　Goodyera R. Br.

**大花斑叶兰**　金线盘(四川)

**Goodyera biflora** (Lindl.) Hook. f. ——*Georchis biflora* Lindl.

生于海拔 2 000—2 400 米的山坡常绿阔叶林下、路旁或灌丛中。分布于陕西、江西、湖北、湖南、广东、四川、云南、西藏。

全草：苦，微凉。清热解毒，行气活血，祛风止痛。用于风湿关节痛，瘀肿疼痛，痈疮肿毒，毒蛇咬伤。

**短苞斑叶兰**　岩蒜、石花(四川、云南)

**Goodyera brachystegia** Hand.-Mazz.

生于海拔 2 000 米以下的石灰岩疏林下、路旁或沟谷溪边阴湿处。分布于四川、云南。

全草(双肾参)：甘、淡，平。舒筋活血，补中益气，补肾。用于跌打损伤，肾虚腰痛，头晕耳鸣，子痈。

**多叶斑叶兰**

**Goodyera foliosa** (Lindl.) Benth. ex Hook. f. ——*Georchis foliosa* Lindl.

生于海拔 1 750—2 800 米的山坡常绿阔叶林下或沟边阴湿处。分布于福建、台湾、广东、广西、云南、西藏。

全草：清热解毒，活血消肿。用于肺痨，肝炎，痈疖疮肿，毒蛇咬伤。

**光萼斑叶兰**

**Goodyera henryi** Rolfe

生于海拔 2 700 米以下的山坡阔叶林下。分布于湖北、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草：清热解毒，润肺化痰。用于肺痨，肺热咳嗽。

**高斑叶兰**　虎头蕉(福建)，观音竹、追风草(广西)，一根香(四川)，碎米兰(云南)

**Goodyera procera** (Ker-Gawl.) Hook. ——*Neottia procera* Wall. ex Ker-

Gawl.

生于海拔500—2 600米的山坡林下、路旁、溪边或山谷阴湿处。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、四川、云南、西藏。

全草(石凤丹)：苦、辛，温。祛风除湿，养血舒筋，润肺止咳，止血。用于风湿关节痛，半身不遂，肺痨咯血，咳喘，病后虚弱，肾虚腰痛，淋浊，黄疸，咳嗽痰喘，跌打损伤。

附　注：《四川省中药材标准》1987年版收载。

**小斑叶兰**　　花蛇一支箭(湖北)

**Goodyera repens** (L.) R. Br. ——*Satyrium repens* L.; *G. marginata* Lindl.; *G. repens* (L.) R. Br. var. *marginata* (Lindl.) Tang et Wang

生于海拔2 400—3 800米的山坡林下或山谷、溪边阴湿处。分布于东北、华北、西北、西南及湖北、湖南。

全草：甘，平。补肺益肾，散肿止痛。用于肺痨咳嗽，瘰疬，肺肾虚弱，喘咳，头晕，目眩，遗精，阳痿，肾虚腰膝疼痛；外用于痈肿疮毒，虫蛇咬伤。

**大斑叶兰**　　金边莲(广东、广西)，银耳环(广西)、九层盖(贵州)，银线莲(福建)，肺脚草(云南)

**Goodyera schlechtendaliana** Reichb. f. ——*G. secundiflora* Lindl.; *G. kwangtungensis* Tso

生于海拔2 100—2 530米的沟谷、山坡林下阴湿处富含腐殖质的土壤上。分布于西南及江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、海南、广西。

全草(斑叶兰)：淡，寒。清肺止咳，解毒消肿，止痛。用于肺痨咳嗽，痰喘，肾气虚弱；外用于毒蛇咬伤，骨节疼痛，痈疖疮疡。　根：补虚。　叶：止痛。

**绒叶斑叶兰**　　金线盘(四川)

**Goodyera velutina** Maxim.

生于海拔1 200—1 850米的山坡阔叶林下。分布于浙江、台湾、湖北、湖南、广东、四川、贵州、云南。

全草：清热解毒，活血止痛。

## 手参属　Gymnadenia R. Br.

**手参**　　佛手参、虎掌参(云南)

**Gymnadenia conopsea** (L.) R. Br. ——*Orchis conopsea* L.

生于海拔265—3 600米的山坡林下或砾石滩草丛中。分布于东北、华北、西北及四川、云南、西藏。

块茎(手参)：甘，平。滋养，生津，止血。用于久病体虚，肺虚咳嗽，失血，久泻，阳痿。

附　注：《四川省中药材标准》1987年版收载。

**短距手参**　　佛手参(四川)

**Gymnadenia crassinervis** Finet ——*G. crassinervis* Finet var. *elatior* Tang et Wang

生于海拔3 500—3 800米的山坡林下、高山草地上或林缘潮湿的肥沃处。分布于四

川、云南、西藏。

块茎(手掌参)：甘，平。补益气血，生津止渴。用于肺虚咳喘，虚劳消瘦，肾虚久泻，失血，带下病，乳少，慢性肝炎。

**峨眉手参**　佛手参(四川)

**Gymnadenia emeiensis** K. Y. Lang

生于海拔 3 075—3 100 米的灌丛下或草丛中。分布于四川。

块茎：补养气血，生津止渴。

附　注：四川特有药用植物。

**西南手参**　佛手参(云南)

**Gymnadenia orchidis** Lindl. ——*Platanthera orchidis* Lindl.

生于海拔 2 800—4 100 米的山坡林下、灌丛中或高山草地上。分布于陕西、甘肃、青海、湖北、四川、云南、西藏。

块茎(手参)：甘，平。滋养，生津，止血。用于久病体虚，肺虚咳嗽，失血，久泻，阳痿。

附　注：《四川省中药材标准》1987 年版收载。

## 玉凤花属　Habenaria Willd.

**落地金钱**　一面锣(四川)

**Habenaria aitchisoni** Reichb. f. ——*H. diceras* Schlecht.

生于海拔 1 300—4 700 米的山坡灌丛下或河谷草地上。分布于西南。

块茎：用于胃痛，肺痨，肿瘤。　全草：补肾，壮阳。

**鬼箭玉凤花**　倒杆章(傣语)

**Habenaria buchneroides** Schlecht.

生于海拔 1 400 米左右的山坡林下或草丛中。分布于云南思茅。

块茎(狭穗鹭兰)：甘、淡，平。补虚，健胃，益脾。用于体虚，营养不良，小儿消化不良，泄泻，风湿关节痛。

**毛葶玉凤花**　玉蜂兰(台湾)，鸡肾草(湖北)，鸡儿草、双肾草、地夫子(四川)

**Habenaria ciliolaris** (L.) Kränzl. ——*Orchis ciliolaris* L.

生于海拔 400—2 100 米的山坡林下或沟边。分布于湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

块茎：苦、甘，寒。补肾壮阳，解毒消肿。用于阳痿，遗精，小便涩痛，疝气；外用于毒蛇咬伤。　根：甘，温。补血，补气。用于妇女产后血虚。

**长距玉凤花**　对对参、鸡肾参、肾阳草(云南)

**Habenaria davidii** Franch.

生于海拔 1 000—3 200 米的山坡草地上或杂木林下。分布于西南及湖北、湖南。

块茎：补肝肾，散寒邪，调经。用于阳痿，遗精，腰痛，子痫，带下病。　根：补肾，消肿。

**厚瓣玉凤花**　鸡肾草、鸡肾子(四川)

**Habenaria delavayi** Finet

生于海拔 2 000—3 200 米的山坡林下或草丛中。分布于四川、贵州、云南。

块茎(鸡肾参)：甘、苦，温。补肾益气。用于肾虚腰痛，水肿，疝气，神经官能症。

**鹅毛玉凤花**　　腰子七(湖北)，鸡儿花、鸡肾草(四川)，白花草、对对参(云南)

**Habenaria dentata** (Sw.) Schlecht. ——*Orchis dentata* Sw.

生于海拔 800—2 200 米的山坡林下或路旁、沟边草丛中。分布于西南及安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西。

块茎(双肾参)：甘、微苦，平。补肺肾，利尿，消炎。用于肾虚腰痛，病后体虚，肾虚阳痿，疝气痛，胃痛，肺痨咳嗽，子痈，小便淋痛，肾炎水肿。

**粉叶玉凤花**　　疝气药、双叶兰、鸡肾草(四川)

**Habenaria glaucifolia** Bur. et Franch.

生于海拔 2 000—3 600 米的山坡林下或草丛中。分布于陕西、四川、云南、西藏。

块茎：甘、微苦，温。补肾健脾，行气活血，生肌，消炎，止痛。用于肾虚腰痛，遗精，脾虚腹泻，病后体虚，疝气痛，子痈，胃脘疼痛，月经不调。

**宽药隔玉凤花**　　大叶双肾草(湖北)，大理鸭头兰(云南)

**Habenaria limprichtii** Schlecht.

生于海拔 1 800—3 350 米的山坡林下或荒坡草丛中。分布于湖北、四川、贵州、云南。

块茎：补肺肾，利尿。用于肾盂肾炎。

**坡参**　　土沙参、沙姜(广西)，大贝母兰(四川)

**Habenaria linguella** Lindl. ——*H. acuifera* Wall. ex Lindl.

生于海拔 900—1 800 米的山坡草地上。分布于广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

块茎：甘，平。补肾，利尿，清肺热，止咳化痰，活血，消炎。用于阳痿，遗精，肺痨，咳嗽，跌打损伤，疮疡肿毒，疝气，劳伤腰痛。

**川滇玉凤花**

**Habenaria mairei** Schltr.

生于海拔 1 800—3 400 米的山坡林下或草丛中。分布于西南及湖北。

块茎：补肺肾，利尿。用于肾盂肾炎。

**裂瓣玉凤花**

**Habenaria petelotii** Gagnep. ——*H. pseudodenticulata* Hand.-Mazz.

生于海拔 320—1 200 米的山坡林下。分布于江西、福建、湖南、广东、四川、贵州。

块茎：补肾，利尿。用于腰痛，水肿。

**橙黄玉凤花**　　飞花羊、鸡母虫药(广西)，鸡肾草(四川)

**Habenaria rhodocheila** Hance

生于海拔 300—1 500 米的林下阴湿处、山谷石上或溪边潮湿多石的地上。分布于江西、福建、广东、海南、广西、四川、贵州。

块茎：滋阴润肺，止咳，消肿。用于咳嗽，跌打损伤，疮疡肿毒。　全草：淡，温。补肾壮阳。用于阳痿早泄，疝气。

**四川玉凤花**

**Habenaria szechuenica** Schlecht.

生于山坡林下或草丛中。分布于四川、西藏。

块茎：补肝肾，调经。用于阳痿，遗精，滑精，淋证，不孕症。

**西藏玉凤花**

**Habenaria tibetica** Schlecht.

生于海拔 3 700 米以下的河谷草丛中。分布于甘肃、青海、四川、西藏。

块茎：补肾壮阳，调和气血。用于阳痿，遗精。

## 舌喙兰属 Hemipilia Lindl.

**舌喙兰** 单肾草、一面锣(四川)

**Hemipilia cruciata** Finet

生于海拔 2 000—3 500 米的山坡上或山谷旁。分布于台湾、四川、云南。

全草：甘、微苦，平。补肺益肾。用于病后体虚，胃痛，疝气痛，遗精，白浊，肾虚腰痛，肺虚喘咳；外用于中耳炎，外伤出血。 块茎：甘，温。补气，补血。用于病后体弱。

**扇唇舌喙兰** 一面锣(四川)，无柄一叶兰(贵州)，独叶一枝花(云南)

**Hemipilia flabellata** Bur. et Franch. ——*H. cordifolia* Lindl. var. *subflabellata* Finet; *H. flabellata* Bur. et Franch. var. *grandiflora* Finet

生于海拔 1 800—3 200 米的林下、林缘或石灰岩石缝中。分布于西南及湖北。

全草(单肾草)：甘、微苦，平。滋阴润肺，补虚益损。用于肺燥咳吐腥痰，虚热，疝气，肾虚腰痛，小便脓血；外用于中耳炎，外伤出血。 块茎：淡、微甘，平。可解毒性中药中毒。

**短距舌喙兰**

**Hemipilia limprichtii** Schlecht. ex Limpr.

生于山坡或开旷的潮湿地。分布于贵州、云南。

全草：甘、辛，平。滋阴润肺，补肾壮阳，利尿。用于肺热咳嗽，疝气，阴虚盗汗。

## 角盘兰属 Herminium L.

**裂唇角盘兰**

**Herminium alaschanicum** Maxim.——*H. altigenum* Schlecht.

生于海拔 1 800—4 500 米的林下、山坡灌丛草地或山坡草地上。分布于华北、西北、西南。

块茎：补肾壮阳。用于肾虚，遗尿。

**条叶角盘兰**

**Herminium bulleyi** (Rolfe) Tang et Wang ——*Habenaria bulleyi* Rolfe

生于海拔 2 400—3 300 米的山坡草地上。分布于四川、贵州、云南。

块茎：滋阴益肾，生津止渴。

**宽唇角盘兰**

**Herminium josephii** Reichb. f. ——*H. forrestii* Schlecht.

生于海拔 3 050—3 600 米的山坡林间草地、河谷平台草地或山坡砾石滩草丛中。分布于四川、云南、西藏。

块茎：滋阴补肾。用于肾虚腰痛。

**叉唇角盘兰**　盘龙参(广西)，双肾草、独肾草、鹅掌参(四川)

**Herminium lanceum** (Thunb.) Vuijk——*Ophrys lancea* Thunb.; *H. longicruris* (C. H. Wright) Tang et Wang

生于海拔1 600—3 600米的山坡疏林下、灌丛下或草丛中。分布于山东以西、西藏以东、东北以南、广西及台湾以北的广大地区。

块茎：甘，平。补肾壮阳，润肺抗痨，止血。用于肾虚腰痛，阳痿，小儿疝气，子痈，遗精，淋证，肺痨；外用于刀伤出血。

**角盘兰**　人参果(陕西、四川)，人头七(甘肃)

**Herminium monorchis** (L.) R. Br.——*Ophrys monorchis* L.; *H. tanguticum* (Maxim.) Rolfe

生于海拔500—4 500米的山坡林下、林缘灌丛中、山坡草地上或河滩草地上。分布于东北、华北、西南及陕西、甘肃、青海、山东、河南。

全草(角盘兰)：甘，凉。滋阴补肾，健脾胃，调经。用于肾虚，头晕失眠，烦躁口渴，食欲不振，须发早白，月经不调。　块茎：滋阴补肾，养胃调经。

**川滇角盘兰**

**Herminium souliei** Rolfe——*H. angustifolium* Benth. var. *souliei* Finet et W. W. Smith

生于海拔2 800—4 200米的高山林下或山坡草地上。分布于西南。

块茎：补肾壮阳。

## 槽舌兰属　Holcoglossum Schlecht.

**管叶槽舌兰**

**Holcoglossum kimballianum** (Reichb. f.) Garay——*Vanda kimballianum* Reichb. f.

生于海拔1 000—1 630米的山谷岩石上或附生树上。分布于云南。

全草：祛风除湿，利尿。

**槽舌兰**　叶绿冬青(四川)

**Holcoglossum quasipinifolium** (Hayata) Schlecht. ——*Saccolabium quasipinifolium* Hayata

生于海拔800—1 000米的林中树上或山谷岩石上。分布于台湾、四川、云南。

全草：祛风除湿，利尿。用于关节痛。

## 瘦房兰属　Ischnogyne Schlecht.

**瘦房兰**　石海椒、石枣子(四川)

**Ischnogyne mandarinorum** (Kranzl.) Schlecht. ——*Coelogune mandarinorum* Krănzl.

生于海拔 1 000—1 500 米的山坡林下岩石上或树上。分布于陕西、湖北、四川、贵州。

全草：舒筋活血，止咳化痰。用于咳嗽，跌打损伤。

附　注：我国特有属。

## 尖囊兰属　Kingidium P. F. Hunt

**大尖囊兰**　　树葱(云南)

**Kingidium decumbens** (Griff.) P. F. Hunt ——*Aerides decumbens* Griff.; *Biermannia decumbens* (Griff.) Tang et Wang ex Merr. et Metc.

生于海拔 330—2 000 米的林中树上。分布于海南、云南。

根、全草：甘，温。舒筋活络，接骨，止血。用于风湿骨痛，跌打损伤，骨折。

## 羊耳蒜属　Liparis Rich.

**镰翅羊耳蒜**　　果上叶(湖北、四川)，石虾、石莲草(广西)，石苦蕊、石海椒(四川)

**Liparis bootanensis** Griff.——*L. plicata* Franch. et Sav

生于海拔 800—1 750 米的山坡常绿阔叶林中树上、林下石上或山谷岩石上。分布于西南及福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西。

全草(九莲灯)：辛、甘，微温。清热解毒，祛瘀散结，活血调经，除湿。用于肺痨，瘰疬，痰多咳喘，跌打损伤，白浊，月经不调，疮痈肿毒，风湿腰腿痛，腹胀痛，血吸虫病腹水。

**丛生羊耳蒜**　　石蒜头(广西)

**Liparis caespitosa** (Thouars) Lindl. ——*Malaxis caespitosa* Thouars

生于海拔 800—2 000 米的常绿阔叶林中树上。分布于广东、海南、广西、云南、西藏。

全草：清热解毒，凉血，止血。

**二褶羊耳蒜**

**Liparis cathcartii** Hook. f.

生于海拔 1 600—2 000 米的山坡草丛中。分布于云南。

全草：辛，温。温经散寒，止痛。

**大花羊耳蒜**　　虾仔兰、草斛、石泥鳅(广西)

**Liparis distans** C. B. Clarke——*L. yunnanensis* Rolfe

生于海拔 850—1 500 米的山坡常绿阔叶林中树上或山谷岩石上。分布于西南及广西。

全草：消肿，生津，养阴。用于肺热咳嗽，酒精中毒。

**大唇羊耳蒜**　　毛慈姑、岩芋(浙江)

**Liparis dunnii** Rolfe——*L. pauliana* Hand.-Mazz.; *L. cucullata* Chien

生于溪边石缝间或林下阴湿处。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、四川、贵州。

全草：苦，平。清热解毒，补肺止血。用于吐血，小儿惊风；外用于疖肿，毒蛇咬伤，外伤出血。

**小羊耳蒜**　　小石枣子(陕西)，石米(四川、贵州)

**Liparis fargesii** Finet

生于林中树上或山谷岩石上。分布于陕西、湖北、四川、贵州。

全草：甘，微寒。清热润肺，健脾消食，活血调经，止咳，止血。用于肺痨咳嗽，风热咳嗽，顿咳，小儿惊风，低血糖，小儿疳积，月经不调，外伤出血。

**长苞羊耳蒜**

**Liparis inaperta** Finet

生于山谷岩石上。分布于浙江、江西、广西、贵州。

全草：化痰，止咳，润肺。

**羊耳蒜**　　鸡心七(陕西)

**Liparis japonica** (Miq.) Maxim.——*Microstylis japonica* Miq.

生于海拔 900—2 600 米的林下、灌丛中或林间草地阴湿处。分布于东北及河北、山西、陕西、甘肃、山东、四川、贵州、西藏。

全草(羊耳蒜)：微酸，平。止血止痛，活血调经，强心，镇静。用于带下病，崩漏，产后腹痛，外伤出血。

**见血清**　　石虾公、半边兰(广西)，矮儿胖、肉蛉蟹(四川)

**Liparis nervosa** (Thunb.) Lindl.——*Ophrys nervosa* Thunb.

生于海拔 500—2 100 米的山坡阔叶林下阴湿处或山野、溪边石缝间。分布于西南及江西、福建、台湾、湖南、广东、广西。

全草(见血清)：苦，寒。清热，凉血，止血。用于肺热咯血，吐血，肺热咳嗽，风湿痹痛，小儿惊风，附骨疽；外用于创伤出血，疮疖肿毒，跌打损伤，皮炎，毒蛇咬伤。

**繁花羊耳蒜**　　石裂风(广西)

**Liparis nigra** Seidenf.——*L. macrantha* Rolfe ex Hemsl.

生于海拔 800—850 米的山坡常绿阔叶林下潮湿处或岩石上。分布于台湾、广东、海南、广西、贵州、云南、西藏。

全草：破瘀活血，除湿，清热解毒。用于风湿痹痛，皮炎，跌打损伤，疮疡肿毒。

**香花羊耳蒜**　　鸡心七(湖北)，化痰清(四川)

**Liparis odorata** (Willd.) Lindl.——*Malaxis odorata* Willd.

生于林下、灌丛中或山谷岩石上阴湿处。分布于浙江、台湾、湖北、湖南、广东、四川、贵州、云南。

全草：清热解毒，凉血止血，化痰止咳。用于咳嗽，痰多，咯血，疮痈肿毒。

**倒卵羊耳蒜**

**Liparis olivacea** Lindl. ex Wall.

生于海拔 550—1 100 米的杂木林下、灌丛中或草丛中阴湿处。分布于四川、云南。

全草：清热解毒，凉血止血，收敛止带。

**柄叶羊耳蒜**

**Liparis petiolata** (D. Don) P. F. Hunt et Summerh.——*Acianthus petiolatus* D. Don

生于海拔 1 000—2 900 米的山坡林下阴湿处或潮湿的岩石上。分布于江西、广东、广西、云南。

全草：润肺，止咳。

**扇唇羊耳蒜**　连珠兰(广西)

**Liparis stricklandiana** Reichb. f.——*L. malleiformis* W. W. Smith

生于海拔2 400米以下的阔叶林中树上或林下岩石上。分布于广东、海南、广西、云南。

全草：祛腐生新。

**滇羊耳蒜**

**Liparis tschangii** Schlecht.

生于海拔 2 200—2 300 米的林中树上或山谷湿润的岩石上。分布于云南。

假鳞茎：微酸、涩，腥。活血，止血。用于崩漏，月经过多。

**长茎羊耳蒜**　石蒜头(广西)，石鸭儿(四川)

**Liparis viridiflora** (Bl.) Lindl.——*Malaxis viridiflora* Bl.

生于海拔 800—3 350 米的山坡常绿阔叶林中树上或山谷岩石上。分布于西南及台湾、广东、海南、广西。

根及根状茎：用于毒蛇咬伤，风湿关节痛，跌打损伤。　全草：用于妇女产后腹痛。

## 对叶兰属　Listera R. Br.

**大花对叶兰**　半颗珠、小叶对口兰(湖北)

**Listera grandiflora** Rolfe

生于海拔 2 600—3 000 米的山坡林下阴湿处。分布于湖北、四川、云南、西藏。

全草：补中益气。用于麻疹，肺炎，神经衰弱。

**短柱对叶兰**　对叶草(四川)

**Listera mucronata** Panigrohi et J. J. Wood

生于海拔 700—2 300 米的山坡林下、林缘或荒地上。分布于四川。

全草：清热解毒，润肺止咳。

**对叶兰**

**Listera puberula** Maxim.——*L. major* Nakai

生于海拔 1 400—2 600 米的密林下阴湿处。分布于黑龙江、吉林、河北、山西、甘肃、青海。

全草：补肾滋阴，化痰止咳。

## 血叶兰属　Ludisia A. Rich.

**血叶兰**　石蚕(云南)

**Ludisia discolor** (Ker-Gawl.) A. Rich. ——*Goodyera discolor* Ker-Gawl.; *Haemaria discolor* (Ker-Gawl.) Lindl.

生于密林下或溪边潮湿处。分布于福建、广东、海南、广西、云南。

全草(石上藕)：甘，凉。滋阴润肺，清热凉血，止咳，止血。用于肺痨咯血，肾虚。

## 钗子股属 Luisia Gaud.

**纤叶钗子股** 牛角兰、寄生兰、鹿角草、吊竹(浙江)

**Luisia hancockii** Rolfe

生于山区岩壁、山谷岩隙石缝间或老树干上。分布于浙江。

全草(钗子股)：甘、酸，温。散风祛痰，解毒消肿。用于风湿关节痛，胸胁挫伤，咽喉肿痛，痈肿。

**钗子股** 大羊角、金环草(广西)，树葱(云南)

**Luisia morsei** Rolfe

生于海拔800—1 200米的山坡疏林中老树上或山谷阴湿处。分布于福建、广东、海南、广西、云南。

全草(钗子股)：辛、苦，平。祛风利湿，催吐解毒。用于风湿痛，头风，水肿，痈疽，疟疾，中耳炎，咽喉肿痛，小儿惊风，带下病。

**圆柱钗子股** 羊棍子、岩豇豆(湖北)，小黄草(贵州)

**Luisia teres** Bl.

生于山谷岩石上。分布于湖北、贵州。

全草：消肿，截疟，接骨。

**印缅钗子股** 树葱(云南)

**Luisia zeylanica** Lindl.

生于林中树干上或石壁上。分布于云南。

全草：苦，平。清热解毒，祛风利湿，截疟，催吐。用于乳蛾，咽喉肿痛，疟疾，中耳炎，骨折。

## 沼兰属 Malaxis Sw.

**阔叶沼兰**

**Malaxis latifolia** Smith——*Microstylis latifolia* (Smith) J. J. Smith

生于海拔500—2 000米的山坡林下。分布于福建、台湾、广东、广西、云南。

全草：清热解毒，利尿，消肿。

**沼兰** 夹叶一颗珠(湖北)，二片一条枪(四川)，小桂兰(云南)

**Malaxis monophyllos** (L.) Sw.——*Ophrys monophyllos* L.

生于海拔890—4 100米的山坡林下或沟谷阴湿草地上。分布于东北、华北及陕西、甘肃、青海、河南、湖北、四川、云南、西藏。

全草：甘，平。清热解毒，调经活血，利尿，消肿。用于肾虚，虚痨咳嗽，崩漏，带下病，产后腹痛。

**云南沼兰** 二片一条枪(四川)

**Malaxis yunnanensis** (Schlecht.) Tang et Wang—— *Microstylis yunnanensis* Schlecht.

生于海拔800—4 100米的山坡林下或草地上。分布于四川、云南。

全草：清热解毒，利尿，活血散瘀，消肿。

## 葱叶兰属　Microtis R. Br.

**葱叶兰**

**Microtis uniflora** Reichb. f.

生于海拔 310—750 米的山坡草地或荒坡草丛中。分布于甘肃东南部、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、四川。

全草(双肾草)：辛、淡，温。健脾益肾，行气除湿。用于脾虚食少，带下病，肾虚腰痛，疝气疼痛。

## 兜被兰属　Neottianthe Schlecht.

**大花兜被兰**　　老鸦蒜、石兰花、鸡心七、红冰粉子(四川)

**Neottianthe camptoceras** (Rolfe) Schlecht.——*Habanaria camptoceras* Rolfe; *Gymnadenia camptoceras* (Rolfe) Schlecht.

生于海拔 1 300—2 800 米的山坡松林下、沟谷石缝间或荒地上。分布于四川、云南。

块茎、全草(一口血)：用于小儿腹痛，肺痨，跌打损伤。

**兜被兰**

**Neottianthe cucullata** (L.) Schlecht.——*Orchis cucullata* L.

生于海拔 1 200—4 500 米的山坡林下、灌丛中或河谷岩石上。分布于东北、华北、西南及陕西、甘肃、青海、新疆、安徽、河南。

全草(百步还阳丹)：甘，平。醒脑回阳，活血散瘀，接骨生肌。用于外伤疼痛性休克，跌打损伤，骨折。

## 芋兰属　Nervilia Comm. ex Gaud.

**芋兰**　　一面锣、小一面锣(四川)

**Nervilia aragoana** Gaud.——*N. flabelliformis* (Lindl.) Tang et Wang; *N. tibetensis* Rolfe

生于海拔 1 300—2 300 米的林下、草坡或灌丛中阴湿处。分布于西南及台湾。

块茎(白铃子)：清热解毒，补肾，利尿，消肿，止带，杀虫。用于崩漏，淋证，白浊，带下病。

**毛唇芋兰**　　水肿药、青天葵、人地珍珠、假天麻(广西)

**Nervilia fordii** (Hance) Schlecht.——*Pogonia fordii* Hance

生于海拔 800—1 000 米的疏林下石灰岩上或田边、沃土上。分布于广东、广西、四川、云南。

全草(青天葵)：苦、甘，平。清肺止咳，健脾消积，镇静止痛，清热解毒，散瘀消肿。用于肺痨咳嗽，咯血，痰喘，小儿疳积，小儿肺热咳喘，胃痛，精神病，跌打肿痛，口疮，咽喉肿

痛，水肿，疮毒。

**毛叶芋兰**　　红毛天葵(广西)，白铃子、一面锣、青天葵(四川)

**Nervilia plicata** (Andr.) Schlecht.

生于山地路旁、岩石边或灌木林下阴湿处。分布于广东、广西、四川、云南。

块茎、全草：涩、微苦，凉。清热解毒，润肺止咳，益肾，止带，止血。用于肝炎，咳嗽气喘，遗精，带下病，吐血，崩漏。

## 鸢尾兰属　Oberonia Lindl.

**狭叶鸢尾兰**　　小金耳环、石三甲、五爪金叉(四川)，岩葱(云南)

**Oberonia caulescens** Lindl.——*Malaxis caulescens* (Lindl.) Reichb. f.

生于海拔 1 200—3 700 米的常绿阔叶林中树上或铁杉林下石上。分布于台湾、广东、四川、云南、西藏。

全草：辛，温。散瘀止血。外用于骨折，外伤出血。

**鸢尾兰**

**Oberonia iridifolia** (Roxb.) Lindl.——*Cymbidium iridifolium* Roxb.; *Malaxis iridifolium* (Roxb.) Reichb. f.

生于密林中树上或岩石上。分布于广东、云南。

全草(树扁竹)：淡，凉。理气消食，清热利尿，止咳止痛。用于消化不良，胃痛，泄泻，淋证，咳嗽，哮喘，跌打损伤，骨折，毒蛇咬伤。

**棒叶鸢尾兰**

**Oberonia myosurus** (Forst. f.) Lindl. ——*Epidendrum myosurus* Forst. f.

生于海拔 1 200—1 500 米的山坡林中树上或林下岩石上。分布于江西、贵州、云南。

全草(岩葱)：辛、微苦，凉。清热燥湿，消肿，利尿，散瘀止血。用于白浊，偏头痛，喉咽肿痛，风湿痛；外用于骨折，外伤出血。

## 齿唇兰属　Odontochilus Bl.

**西南齿唇兰**

**Odontochilus elwesii** C. B. Clarke

生于海拔 800—1 800 米的山坡林下。分布于广西、四川、贵州、云南。

全草：消肿，止痛。用于跌打损伤。

**云南齿唇兰**

**Odontochilus yunnanensis** Rolfe

生于海拔 1 000 米以下的山坡林下。分布于广东、广西、云南。

全草：消肿，止痛。用于跌打损伤。

## 红门兰属　Orchis L.

**广布红门兰**

**Orchis chusua** D. Don—— *O. delavayi* Schlecht.; *O. giraldiana* Kränzl.; *O pauciflora* Fisch. ex Lindl.

生于海拔 2 300—4 500 米的山坡林下、灌丛中、沟谷草地上、高山灌丛草甸及高山草甸中。分布于黑龙江、吉林、陕西、甘肃、湖北、四川、云南、西藏。

块茎：清热解毒，补肾益气，安神。用于白浊，肾虚，阳痿，遗精。

**二叶红门兰**

**Orchis diantha** Schlecht. ——*O. spathulata* (Lindl.) Reichb. f. ex Benth.

生于海拔 3 700—4 500 米的林下、山坡灌丛下或高山草甸中。分布于甘肃、四川、云南、西藏。

根状茎：清热解毒，消肿。

**宽叶红门兰**

**Orchis latifolia** L. ——*O. salina* Turcz. ex Lindl.

生于海拔 630—4 100 米的山坡林下或沟谷草丛中。分布于东北及内蒙古、甘肃、青海、新疆、四川、云南、西藏。

全草(红门兰)：甘，平。强心，补肾，生津，止渴，健脾胃。用于烦躁口渴，不思饮食，月经不调，虚劳贫血，头晕。 块茎：补血益气，生津，止血。用于久病体虚，虚劳消瘦，乳少，慢性肝炎，肺虚咳嗽，失血，久泻，阳痿。

**草甸红门兰**

**Orchis latifolia** L. **var. angustata** Maxim.

生于海拔 3 000—3 400 米的阴坡、湿润草地、草甸、水边。分布于甘肃、青海。

块茎：微甘，温。补脑壮阳，滋养生津，止血。用于肺虚咳嗽，久病体虚，失血，久泻，阳痿，遗精。

**华西红门兰**　　岩一支箭(陕西)

**Orchis limprichtii** Schlecht. ——*Ponerorchis limprichtii* (Schlecht.) Soó; *Ponerorchis hui* (Tang et Wang) Soó

生于海拔 1 800—1 900 米的阴湿岩石上。分布于陕西、甘肃、四川。

块茎、全草：甘、涩，平。清热解毒，补肾壮阳。用于肾虚，阳痿，遗精。

**毛轴红门兰**

**Orchis monophylla** (Coll. et Hemsl.) Rolfe ——*Habenaria monophylla* Coll. et Hemsl.; *Ponerorchis monophylla* (Coll. et Hemsl.) Soó

生于山坡林下、灌丛下或沟谷草地及灌丛草甸中。分布于云南、西藏。

块茎、全草：补肾益气，滋养生津。用于阳痿，遗精，久病体虚。

**北方红门兰**

**Orchis roborowskii** Maxim. ——*O paxiana* Schlecht.; *O. szechenyiana* Reichb. f. ex Kanitz.

生于海拔 4 500 米以下的山地林下、山坡灌丛草丛中或草甸中。分布于河北、甘肃、青海、四川、西藏。

根状茎：清热解毒，消肿。

## 山兰属 Oreorchis Lindl.

**长叶山兰** 山慈姑(四川)

**Oreorchis fargesii** Finet

生于山地林下、灌丛中或沟谷湿地。分布于浙江、湖北、四川。

假鳞茎：有小毒。清热解毒，消肿散瘀。用于痈疖疮毒，蛇虫咬伤。

**小山兰** 兰草(陕西)，连珠白芨(云南)，山慈姑、小白芨(西藏)

**Oreorchis foliosa** (Lindl.) Lindl. ——*Corallorrhiza foliosa* Lindl.

生于海拔 2 200—3 700 米的山坡、山谷灌丛下或混交林下。分布于陕西、湖北、四川、云南、西藏。

假鳞茎：甘、微辛，寒。有小毒。清热解毒，消肿散结。用于痈肿疔毒，瘰疬，喉痹肿痛，蛇虫咬伤，狂犬咬伤。 全草：辛，平。滋阴清肺，化痰止咳。

**山兰** 兰草(陕西)，山慈姑、冰球子(四川、云南)

**Oreorchis patens** (Lindl.) Lindl. ——*Corallorrhiza patens* Lindl.

生于海拔 1 800—2 600 米的山坡林下、灌丛中或沟边湿地。分布于东北及陕西、甘肃、四川、贵州、云南。

假鳞茎：甘、辛，寒。有小毒。解毒行瘀，杀虫消痈。用于痈疽疮肿，瘰疬，无名肿毒。 全草：辛，平。滋阴清肺，化痰止咳。

## 粉口兰属 Pachystoma Bl.

**粉口兰**

**Pachystoma pubescens** Bl. ——*P. senile* (Lindl.) Reichb. f.

生于海拔 100—900 米的山坡、路旁或草地上。分布于台湾、广东、广西、贵州、云南。

根状茎：清热解毒，化痰止咳。

## 兜兰属 Paphiopedilum Pfitz.

**卷萼兜兰**

**Paphiopedilum appletonianum** (Gower) Pfitz. ——*Cypripedium appletonianum* Gower

生于海拔 900—1 220 米的林下阴湿的腐殖土或岩石上。分布于广东、海南、贵州。

全草：清热解毒，润肺，祛风止痛。

**硬毛兜兰** 龙头兰(广西)

**Paphiopedilum barbigerum** Tang et Wang

生于林下或岩石上。分布于广西。

全草：用于痈疽疮疖。

**黄花兜兰** 老虎猁、狮子尾、狗舌草(广西)

**Paphiopedilum concolor** (Parish et Batem.) Pfitz. ——*Cypripedium concolo-* Parish et Batem.

生于海拔 1 430 米左右的阴湿岩缝中或树丛下。分布于广西、云南。

全草(巴掌草)：苦、酸，平。止咳平喘，清热解毒，祛风止痛。用于肺痨，咳嗽哮喘，风湿骨痛，类风湿关节炎，慢性胃痛，脾肿大，泄泻，蛇咬伤，疮疖，跌打损伤。

**兜兰**　斑叶兰(云南)

**Paphiopedilum parishii** (Reichb. f.) Pfitz. ——*Cypripedium parishii* Reichb. f

生于海拔 1 000 米的密林中树上、石山岩缝中、荒坡或路旁的杂草丛中。分布于云南蒙自。

全草(花叶子)：苦，凉。清热解毒，养心安神。用于癫痫，肾虚，风热咳嗽。

## 白蝶兰属　Pecteilis Raf.

**龙头兰**　土玉竹、土玉兰、鸡卵参(广西)，双肾参、和气草、白花参(云南)

**Pecteilis susannae** (L.) Raf. ——*Orchis susannae* L.

生于海拔 540—2 500 米的山坡或沟边疏林中阴湿处。分布于江西、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

块茎(白蝶花)：甘，微温。温肾壮阳。用于肾虚腰痛，阳痿，遗精，滑精，寒疝，水肿，脾胃虚弱。　全草：清热解毒。用于子痈。

## 阔蕊兰属　Peristylus Bl.

**小花阔蕊兰**　卵子草(湖北)，鸡肾草(四川)

**Peristylus affinis** (D. Don) Seidenf. ——*P. sampsoni* Hance

生于海拔 1 000—1 700 米的林下阴湿处。分布于湖北、广东、四川、贵州、云南。

块茎：补肾壮阳，活血止痛。用于子痈，阳痿，疝气。　全草：用于头晕。

**凸孔阔蕊兰**

**Peristylus coeloceras** Finet ——*Herminium coeloceras* (Finet) Schlecht.

生于海拔 2 000—3 900 米的山坡林下、灌木丛下及草地上。分布于西南。

块茎：补肾壮阳，润肺抗痨；外用于止血。

**狭穗阔蕊兰**　土天麻(广西)

**Peristylus densus** (Lindl.) Santap. et Kapad.

生于林下或沟边阴湿处。分布于广西。

块茎：用于头晕目眩。

**一掌参**

**Peristylus forceps** Finet ——*Herminium forceps* (Finet) Schlecht.

生于海拔 1 200—3 400 米的林下或山坡草地上。分布于西南。

块茎：滋阴益肾。

**绿花阔蕊兰**　珍珠草、山砂姜(广西)

**Peristylus goodyeroides** (D. Don) Lindl. ——*Habenaria goodyeroides* D. Don

生于海拔500—1 900米山坡的林下。分布于台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

全草：清热消肿，补肾壮阳，利尿。用于眩晕，乳痈，阳痿，遗精，小儿疝气，劳伤。

## 鹤顶兰属 Phaius Lour.

**斑叶鹤顶兰** 九子莲、虎牙庄(四川)，小花鹤顶兰(海南植物志)

**Phaius flavus** (Bl.) Lindl. ——*Limodorum flavum* Bl.; *Bletia woodfordii* Hook.; *P. woodfordii* (Hook.) Merr.

生于海拔2 200米以下的山谷、溪边或林下阴湿地。分布于福建、广东、海南、四川、贵州、云南。

假鳞茎：苦，寒。有小毒。清热解毒，消肿散结。用于痈疮溃烂，瘰疬。

**鹤顶兰** 大白芨、拐子药(广西)

**Phaius tankervilliae** (Banks ex L'Herit.) Bl. —— *Limodorum tankervilliae* (Banks ex L'Herit.)

生于海拔1 300米以下的疏林下、山谷或路旁阴湿地。分布于台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

假鳞茎(鹤顶兰)：微辛，凉。有小毒。清热解毒，祛痰止咳，活血止血。用于咳嗽痰多，肺热咳嗽，咳血；外用于跌打肿痛，乳痈，外伤出血。

## 蝶兰属 Phalaenopsis Bl.

**蝶兰** 金环草(广西)，捆仙绳(四川)

**Phalaenopsis wilsonii** Rolfe

生于海拔1 900—2 700米的林中树上、河谷或石上。分布于广西、四川、云南。

全草：用于感冒发热，头痛，小儿疳积，风湿关节痛。

## 石仙桃属 Pholidota Lindl.

**细叶石仙桃** 双叶岩珠(浙江)，果上叶(广西)

**Pholidota cantonensis** Rolfe

生于海拔200—1 000米的林下或溪边石上。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、贵州。

假鳞茎：微甘，凉。清热凉血，滋阴润肺。用于热病高热，咳血，头痛，咳嗽痰喘，牙痛，小儿疝气，跌打损伤。 全草：滋阴降火，清热消肿。用于咽喉肿痛，乳蛾，口疮，高热口渴，急性关节痛，乳痈。

**石仙桃** 石橄榄(福建、广西)，石槟榔、上树蛤蟆(广西)，麦斛、石上莲(云南)

**Pholidota chinensis** Lindl.

生于海拔1 000—2 100米的山坡常绿阔叶林中树上或岩石上。分布于西南及福建、广

东、海南、广西。

假鳞茎、全草(石仙桃)：甘、淡，凉。养阴，清肺，利湿，消瘀，化痰，止咳。用于肺痨咳血，肺气肿，哮喘，肺热咳嗽，肝炎，发热头痛，牙痛，胃痛，关节痛，内伤吐血，肾虚，痢疾，跌打损伤。

**圆柱石仙桃**

**Pholidota chinensis** Lindl. var. **cylindracea** Wang et Tang

生于山坡杂木林中树上或潮湿的岩石上。分布于云南。

假鳞茎：滋阴润肺，消肿止痛，清热解毒，化痰止咳，止血。用于咳嗽，咽喉肿痛，胃痛，消化不良；外用于外伤出血。

**云南石仙桃**　　石灵芝(四川)，石草果、石枣子、石海椒(云南)

**Pholidota yunnanensis** Rolfe

生于海拔 310—2 400 米的林中树上或林下及沟旁石上。分布于湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

假鳞茎(石枣子)：微苦，凉。滋阴润肺，祛风除湿，镇痛，生肌。用于肺热咳嗽，痰中带血，风湿骨痛，消化不良，腹痛，痈疮肿毒。　全草：甘，凉。滋阴清热，化痰止咳。用于肺热津伤，烦渴，阴虚内热，口干，胃阴不足，食少呕逆，牙龈肿痛，阴虚燥咳，咯血。

## 舌唇兰属　Platanthera Rich.

**二叶舌唇兰**　　土白芨、蛇儿参(四川)

**Platanthera chlorantha** Cust. ex Reichb. f. ——*Habenaria chlorantha* Bab.

生于海拔 400—3 500 米的山坡林下及山坡灌丛下。分布于东北、华北及陕西、甘肃、青海、河南、四川、云南、西藏。

块茎(蛇儿参)：苦，平。补肺，生肌，化瘀，止血。用于肺痨咳血，吐血，衄血；外用于创伤出血，痈肿，烧、烫伤。

**藏南舌唇兰**

**Platanthera clavigera** Lindl. ——*Habenaria clavigera* (Lindl.) Dandy

生于海拔 2 300—3 400 米的山坡针阔叶混交林下、山坡灌丛草地、河谷平台草地及河滩荒地上。分布于西藏。

全草(鸡肾草)：甘，温。补肾壮阳。用于阳痿，疝气，小儿遗尿。

**密花舌唇兰**

**Platanthera hologlottis** Maxim.

生于山坡潮湿草地上。分布于东北及山东、江西、福建、贵州、云南。

全草：润肺止咳。

**舌唇兰**　　龙爪参、猪聚参、蛇儿参(四川)，走肾草(贵州)

**Platanthera japonica** (Thunb.) Lindl. ——*Orchis japonica* Thunb.

生于海拔 800—3 500 米的密林下草丛中、草坡上或沟谷阴湿处。分布于陕西、甘肃、河南、湖北、四川、贵州、云南。

带根全草(骑马参)：甘，平。润肺，祛痰，止咳。用于肺热咳嗽，喘咳。　根：补肾壮

阳，补气生津，消肿解毒。用于肾虚腰痛，咳嗽气喘，蛇虫咬伤。

**丽江舌唇兰**

**Platanthera likiangensis** Tang et Wang

生于海拔 2 700—3 300 米的山坡林下或山坡灌丛中。分布于云南。

全草：甘，平。润肺，止咳，祛痰。用于肺热咳嗽，痰喘气壅。

**尾瓣舌唇兰**　　双肾草(湖北)

**Platanthera mandarinorum** Reichb. f.

生于海拔 660—1 700 米的林下或山坡草地上。分布于东北、华北、华东、西南及湖北。

块茎：甘，平。镇静解痉，益肾安神，利尿降压。全草：用于带下病，崩漏，遗尿，肺热咳嗽。

**小舌唇兰**　　观音竹(四川)

**Platanthera minor** (Miq.) Reichb. f. ——*P. interrupta* Maxim.

生于海拔 400—2 700 米的山坡林下或草地上。分布于东北及福建、台湾、河南、湖北、广东、海南、四川、贵州、云南。

全草(猪獐参)：甘，平。养阴润肺，益气生津。用于咳痰带血，咽喉肿痛，病后体弱，遗精，头昏身软，肾虚腰痛，咳嗽气喘，肠胃湿热，小儿疝气。

**狭穗舌唇兰**

**Platanthera stenostachya** Lindl. ——*Habenaria stenostachya* (Lindl.) Benth.

生于海拔 300—1 500 米的山坡林下或山坡草地上。分布于云南。

块茎：补虚，健胃，益脾。用于营养不良，体虚，小儿消化不良，泄泻，风湿关节痛。

## 独蒜兰属　Pleione D. Don

**独蒜兰**　　冰球子(四川)

**Pleione bulbocodioides** (Franch.) Rolfe——*Coelogyne bulbocodioides* Franch.

生于海拔 630—3 000 米的林下或沟谷旁有泥土的石壁上。分布于华东、中南、西南及陕西、甘肃。

假鳞茎(山慈姑)：甘、微辛，寒。有小毒。清热解毒，消肿散结。用于痈肿疔毒，瘰疬，喉痹疼痛，蛇虫咬伤，狂犬咬伤。

**大花独蒜兰**

**Pleione grandiflora** (Rolfe) Rolfe ——*Coelogyne grandiflora* Rolfe

生于海拔 2 500—3 000 米的山坡林下或有泥土的岩石上阴湿处。分布于云南。

假鳞茎：润肺清热，消肿散结，化痰止咳，生肌，止血。用于肺热咳嗽，痰喘，胃肠出血，疮疖肿毒，蛇咬伤。

**毛唇独蒜兰**

**Pleione hookeriana** (Lindl.) J.W. Moore ——*Coelogyne hookeriana* Lindl.

生于海拔 1 500—3 100 米的山坡林中树上、林下岩石上腐殖质土中。分布于西南及湖北、广东、广西。

假鳞茎：甘，平。有小毒。清热解毒，消肿散结，润肺，化痰，止咳，止血，生肌。用

于痈肿疔毒，瘰疬，蛇咬伤。

**二叶独蒜兰**

**Pleione scopulorum** W. W. Smith ——*Bletilla scopulorum* (W. W. Smith) Schlecht.

生于海拔 3 000—4 100 米的山坡密林下或沟谷旁有泥土的石壁上。分布于云南、西藏。

假鳞茎：清热解毒，消肿散结。有小毒。用于痈肿疔毒，瘰疬，蛇虫咬伤。

**云南独蒜兰**　冰球子(四川、贵州)，糯白芨、独叶白芨(云南)

**Pleione yunnanensis** (Rolfe) Rolfe ——*Coelogyne yunnanensis* Rolfe; *P. chiwuana* Tang et Wang

生于海拔 1 200—2 800 米的林下或沟谷边、路旁有泥土的石壁上。分布于四川、贵州、云南。

假鳞茎(山慈姑)：苦，凉。有小毒。清热解毒，消肿散结。用于痈肿疔毒，瘰疬，喉痹疼痛，蛇虫咬伤，狂犬咬伤，肺痨，咳嗽痰喘，外伤出血，跌打损伤。

## 朱兰属　Pogonia Juss.

**朱兰**　斩龙剑(广西)，祖师箭、青蛇剑(四川)

**Pogonia japonica** Reichb. f.——*P. kungii* Tang et Wang; *P. yunnanensis* Finet

生于海拔 450—3 000 米的山坡林下或山坡草丛中。分布于东北、华东及湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

全草：苦，寒。清热解毒，润肺止咳，消肿，止血。用于肝炎，胆囊炎，毒蛇咬伤，痈疮肿毒。

## 火焰兰属　Renanthera Lour.

**火焰兰**　红珊瑚(广西)

**Renanthera coccinea** Lour.

生于林中树上或岩石上。分布于广东、海南、广西、云南。

全草：用于风湿痹痛。

## 寄树兰属　Robiquetia Gaud.

**小叶寄树兰**

**Robiquetia succisa** (Lindl.) Tang et Wang——*Sarcanthus succisus* Lindl.

生于海拔 730—1 100 米的杂木林中树上或林下、溪边岩石上。分布于福建、广东、海南、广西、云南。

叶：润肺止咳。用于肺热咳嗽。

## 鸟足兰属 Satyrium Sw.

**缘毛鸟足兰** 假天麻(广西),腊烛花、鸡肾草(四川)

**Satyrium ciliatum** Lindl. ——*S. nepalense* D. Don **var.** ***ciliatum*** (Lindl.) Hook. f.

生于海拔 2 000—3 600 米的山坡林下或草坡阴湿处。分布于广西、四川、云南、西藏。

块茎: 甘,平。壮腰益肾,养血安神。用于肾虚腰痛,水肿,面足浮肿,心脏病,头晕目眩,遗精,阳痿,疝气痛。

**鸟足兰** 对对参,小鸡腿(云南)

**Satyrium nepalense** D. Don ——*S. henryi* Schlecht.

生于海拔 600—3 200 米的山地林下草地或林间空地草丛中。分布于云南、西藏。

块茎(鸟足兰): 甘,平。壮腰益肾,养血安神,消炎止痛。用于肾虚腰痛,水肿,面足浮肿,心脏病,带下病,阳痿。

## 苞舌兰属 Spathoglottis Bl.

**苞舌兰** 冰梨子(四川)

**Spathoglottis pubescens** Lindl. ——*S. fortunei* Lindl.

生于海拔 1 400—2 700 米的山坡岩石上、路旁或田野。分布于台湾、广东、广西、四川、贵州、云南。

假鳞茎(黄花独蒜): 苦、甘,凉。清热,补肺,止咳,生肌,敛疮。用于肺热咳嗽,咯痰不利,肺痨咯血,疮痈溃烂,跌打损伤。

## 绶草属 Spiranthes Rich.

**绶草** 龙抱柱、小猪獠参(四川),懒蛇上树(云南)

**Spiranthes sinensis** (Pers.) Ames——*Neottia sinensis* Pers.

生于海拔 400—3 500 米的山坡林下、灌丛下、草地、路边或沟边草丛中。分布几遍全国。

根、全草(盘龙参): 甘、淡,平。滋阴益气,凉血解毒,涩精。用于病后气血两虚,少气无力,气虚白带,遗精,失眠,燥咳,咽喉肿痛,缠腰火丹,肾虚,肺痨咯血,消渴,小儿暑热症;外用于毒蛇咬伤,疮肿。

## 金佛山兰属 Tangtsinia S. C. Chen

**金佛山兰**

**Tangtsinia nanchuanica** S. C. Chen

生于海拔 700—2 100 米的林下或山脚田边。分布于四川、贵州。

全草：清热，祛痰。

附　注：①国家二级保护植物。②我国特有属。

## 白点兰属　Thrixspermum Lour.

**小叶白点兰**　飞天草(四川)

**Thrixspermum japonicum** (Miq.) Reichb. f.——*Sarcochilus japonicus* Miq.

生于海拔 600—1 000 米的林中树上。分布于广东、四川。

全草：用于肺痨，劳伤；外用于刀伤出血。

## 笋兰属　Thunia Reichb. f.

**笋兰**　石笋、岩角、通兰(云南)

**Thunia alba** (Lindl.) Reichb. f. ——*Phaius albus* Lindl.; *T. marshalliana* Reichb. f.

生于海拔 1 500—2 300 米的阔叶林下岩石上或沟边。分布于四川、云南。

全草(岩笋)：淡，平。活血，祛瘀，接骨，生肌。用于跌打损伤，骨折，刀枪伤。

## 蜻蜓兰属　Tulotis Rafin

**蜻蜓兰**　竹叶兰(陕西)

**Tulotis asiatica** Hara ——*Perularia fuscescens* (L.) Lindl.

生于海拔 500—2 800 米的山坡林下。分布于东北、华北、西北及四川、云南。

根：甘，温。补肾益精。用于肾虚腰痛，病后虚弱，阳痿，遗精。

**小花蜻蜓兰**　小手掌参(四川)，半脊莲(陕西)

**Tulotis ussuriensis** (Regel et Maack) Hara ——*Platanthera tipuloides* Lindl. var. *ussuriensis* Regel et Maack; *Perularia ussuriensis* (Maxim.) Schlecht.

生于海拔 400—1 500 米的山坡林下。分布于东北及河北、陕西、新疆、浙江、江西、湖北、湖南、四川。

根(半脊莲)：辛、苦，凉。解毒，消肿。用于鹅口疮；外用于痈疖肿毒，跌打损伤。全草：甘，平。补肾壮阳。用于肾虚，身体虚弱，咳嗽气喘。

## 万带兰属　Vanda Jones

**万带兰**　吊兰、接骨草(云南)

**Vanda amesiana** Reichb. f.

生于海拔 1 200—1 800 米的林中树上或岩石上。分布于云南。

全草(九爪龙)：甘、淡、涩，平。清热消炎，活血散瘀，祛风除湿。用于疟疾，咽喉痛，乳蛾，小便涩痛，淋证，风湿痛，腰痛，月经不调，跌打损伤，骨折，外伤出血。

**琴唇万带兰**　　松兰(广西)，树兰(四川)

**Vanda concolor** Bl. ex Lindl.

生于海拔1 300—2 100米的林中树上或岩石上。分布于广西、四川、贵州、云南。

全草：祛风除湿，活血，止痛。用于风湿痹痛，疮疖肿痛。

**棒叶万带兰**　　棒叶玉兰(云南)，法拢(傣语)

**Vanda teres** Lindl. ——*Dendrobium teres* Roxb.

生于海拔500—940米的山地次生阔叶林中树上。分布于云南。南方各省区花圃常有栽培。

茎叶：活血消肿。

## 香子兰属　Vanilla Mill.

**香子兰**　　上树蜈蚣(广西、云南)

**Vanilla planifolia** Andr.

广东、广西、云南有栽培。

全株(香草兰)：清热解毒。用于毒蛇咬伤。

**香果兰**　　石蚕(广西)

**Vanilla siamensis** Rolfe

生于林中树上或岩石上。分布于广西、贵州、云南。

全株：用于肺热咳嗽。

# 药　用　动　物

# 无脊椎动物　Invertebrates

## 原生动物门　Protozoa

## 纤毛纲　Ciliata

### 1. 草履虫科　Parameciidae

草履虫属　Paramecium Hill

**大草履虫**　　草履虫、尾草履虫(通称)，草鞋底虫(湖北)

**Paramecium caudatum** Ehrenberg

生活在淡水池沼、水沟中，腐殖质丰富的水体内较多。分布几遍全国。

水溶性提取物：用于消化系统及女性生殖系统肿瘤的诊断。

附　注：功效相似的有**小核草履虫 P.multimicronucleatum** Pawers et Mitchell，分布几遍全国。

## 海绵动物门　Spongia

## 寻常海绵纲　Demospongiae

### 2. 简骨海绵科　Haploscleridae

针海绵属　Spongilla Lamarck

**脆针海绵**　　淡水海绵(通称)

**Spongilla fragilia** Lecidy

生活在清流或游水中，常附生在石块、树枝或水草上。分布几遍全国。

群体(紫梢花)：甘，温。补肾，益精，壮阳。用于阳痿，遗精，白浊，带下病，小便不禁。

附　注：功效相似的有**湖针海绵 S. lacustris** (Linnaeus)，见于四川。

# 腔肠动物门　Coeleterata

## 水螅纲　Hydrozoa

### 3. 水螅科　Hydridae

海棲螅属　Plumularia Lamarck

**刚毛海棲螅**

**Plumularia setacea** (Ellis)

固着生活在潮间带岩石上。分布几遍全国沿海。

提取物：神经镇静药物。

### 4. 僧帽水母科　Physalidae

僧帽水母属　Physalia Lamarck

**僧帽水母**

**Physalia physalis utriculus** Lamartiniere

浮游生活，为暖流中的指标种。分布于东海大陆架。

刺丝囊提取物：用于心血管与神经系统疾病。

附　注：本品有毒，慎用。

## 钵水母纲　Scyphozoa

### 5. 洋须水母科　Ulmaridae

海月水母属　Aurelia Thomson

**海月水母**

**Aurelia aurita** Lamarck

7、8 月间成群浮游生活在海湾内。分布于渤海、黄海沿岸，烟台、青岛多见。

提取物：用于神经系统疾病。

### 6. 霞水母科　Cyaneidae

霞水母属　Cyanea Agassiz

**长须霞水母**

**Cyanea capillata**(Linnaeus)——*C. arctica* Linnaeus

浮游生活。分布几遍全国沿海。

提取物：为神经组织的活性物质和组织胺释放剂。

附　注：本品有毒，慎用。

## 7. 根口水母科　Rhizostomatidae

### 海蜇属　Rhopilema Haeckel

**海蜇**

**Rhopilema esculenta** Kishinouye

漂浮生活在海湾、河口附近。分布几遍全国沿海，浙江较多。

口腕部(海蜇)：咸，平。清热，化痰，消积，润肠。用于痰嗽，哮喘，痞积胀满，大便燥结。伞部(海蜇皮)：咸、涩，温。化痰，消积，祛风，除湿。用于痞块，头风，带下病，膝髌风湿，无名肿毒。

附　注：功效相似的有**黄斑海蜇 R. hispidum** Vanhoeffen，分布于东海、台湾海峡、南海，广东沿海较多。

# 珊瑚纲　Anthozoa

## 8. 海葵科　Actiniidae

### 黄海葵属　Anthopleura Duchassaing et Michelotti

**星黄海葵**　　海葵、花虫(通称)

**Anthopleura stella** (Verrill)

固着生活，在浅海和沿岸处的岩石上。分布几遍全国沿海，渤海较多。

全体：用于痔疮，体癣。

附　注：本种有毒，忌内服。

**黄海葵**　　海葵、花虫、海菊花、沙筒、海腚根(通称)

**Anthopleura xanthogrammica** (Brandt)

生活在浅海干潮线以上。固着于泥沙中的介壳或石块上，营埋栖生活。分布于渤海、黄海、东海沿海。

全体：收敛固涩，燥湿杀虫。用于痔疮，脱肛，带下病，蛲虫病。

## 9. 银冠海葵科　Diadumenidae

### 肌海葵属　HaliPlanella Verrill

**纵条肌海葵**　　海葵、花虫(通称)

**Haliplanella luciae** (Verrill)

生活在潮间带岩石缝中，营固着生活。分布几遍全国沿海。

全体：止泻，驱虫。用于腹泄，蛲虫病。

## 10. 滨珊瑚科 Poritidae

### 滨珊瑚属 Porites Guettard

**灰黑滨珊瑚**

**Porites nigrescens** Dana

为浅水造礁石珊瑚。分布于广东沿海及东沙、西沙群岛等海域。

骨骼：清肺化痰。用于肺热咳嗽，痰饮积聚，瘿瘤。

## 11. 枇杷海葵科 Oculinidae

### 盔形珊瑚属 Galaxea Oken

**粗糙盔形珊瑚** 海白石、鹅卵石(通称)

**Galaxea aspera** Quelch

栖息于潮下带至 15 米左右的浅海礁平台上。分布于海南岛、西沙群岛。

骨骼：清热解毒，化痰止咳。用于咳嗽痰喘，痢疾，瘰疬。

**丛生盔形珊瑚** 珊瑚(通称)，珊瑚鹅管石(广西)

**Galaxea fascicularis** (Linnaeus)

生活在暖海约 10 米以下浅水带的珊瑚丛中。分布于南海海域，广东、海南、广西多见。

石灰质骨骼(鹅管石)：甘、咸，温。补肺，定喘，壮阳，通乳。用于肺痨，咳嗽气喘，吐血，阳痿，腰膝无力，乳汁不通。

## 12. 角珊瑚科 Antipathidae

### 角珊瑚属 Antipathes Pallas

**黑角珊瑚** 海铁树(通称)

**Antipathes** $sp_1$

生活在海域内，群体呈黑色矮树枝状。分布于海南岛三亚、北部湾、西帽岛。

全体：用于骨鲠，目赤红痛，食道粘膜损伤，血痢，盗汗，瘰疬。

**角珊瑚** 海柳(通称)

**Antipathes** $sp_2$

生活在海域内，群体呈金黄色马尾松树枝状。分布于海南岛三亚、北部湾、西帽岛。

全体：用于痔疮，出血，小儿惊风，腰痛。

## 13. 矶花科 Melitodidae

### 矶花属 Melitodes Verrill

**赭色海底柏** 海底柏(通称)

**Melitodes ochracea** (Linnaeus)

栖于 5—10 米深的海域。分布于西沙群岛、海南三亚、西帽岛等。

全部群体：止呕，止泻。用于霍乱。

**鳞海底柏** 矶花、红珊瑚(通称)

**Melitodes squanrata** Nutting

栖于浅水海域。分布于湛江硇洲岛、海南三亚、西帽岛、莺歌海等。

全部群体：用于肺痨，吐血，小儿惊风。

## 14. 柳珊瑚科 Gorgonidae

### 红珊瑚属 Corallium Marsigli

**桃色珊瑚** 红珊瑚(通称)

**Corallium japonicum** Kishinouye

着生于海底的岩礁上。分布于台湾海峡及南海沿海。

石灰质骨骼(珊瑚)：甘，平。去翳明目，安神镇惊。用于目生翳障，惊痫，吐衄。

附 注：①功效相似的有**珊瑚 C. elatius** Ridley，见于广东沿海；**石珊瑚 C. konojoi** Kishinouye，见于广东沿海。②以上 3 种均为国家一级保护野生动物。

## 15. 海鳃科 Pennatulidae

### 海仙人掌属 Cavernularia Valenciennes

**海仙人掌**

**Cavernularia habereri** Moroff

栖息于浅海低潮线的沙滩或泥沙滩中。分布几遍全国沿海。

全体：滋阴降火。

# 软体动物门 Mollusca

## 双神经纲 Amphineura

### 16. 隐板石鳖科 Cryptoplacidae

#### 毛肤石鳖属 Acanthochiton Herrmannsen

**红条毛肤石鳖** 石鳖、八节毛、海石鳖(通称)

**Acanthochiton rubrolineatus** (Lischke)

栖息于潮间带的岩石上,喜附着在岩石石缝或阴面处。分布于渤海、黄海、东海。

全体:软坚散结,活血止痛,清热解毒。用于瘰疬,麻风病。

### 17. 锉石鳖科 Ischnochitonidae

#### 锉石鳖属 Ischnochiton Gray

**函馆锉石鳖** 石鳖、八节毛(通称)

**Ischnochiton hakodadensis** Pilsbry

生活在潮间带岩石间。分布于渤海和黄海沿海。

全体:清肺化痰,止咳平喘。用于慢性咳嗽痰喘。

附 注:功效相似的有**朝鲜鳞带石鳖 Lepidozona koreanica**(Adams et Reeve),分布于渤海、黄海沿海。

## 腹足纲 Gastropoda

### 18. 鲍科 Haliotidae

#### 鲍属 Haliotis Linnaeus

**杂色鲍** 九孔鲍、鲍鱼(通称),千里光(浙江),鲍螺(广西)

**Haliotis diversicolor** Reeve

生活在低潮线至10米深左右的潮下带岩礁海底,盐度较高、水清和藻类丛生处多见。分布于东海、南海沿海。福建、广东已进行人工育苗及试养。

贝壳(石决明):咸,寒。平肝潜阳,清肝明目。用于头痛眩晕,目赤,翳障,视物昏花,青盲,雀目。肉(鲍鱼):甘、咸,平。滋阴清热,益精明目。用于痨热骨蒸,咳嗽,崩漏,带下病,淋证,青盲,内障。

附 注:①功效相同,与本种同载《中华人民共和国药典》1990年版的有**耳鲍 H.**

asinina Linnaeus，分布于南海，已开展养殖；**皱纹盘鲍**（盘大鲍）**H. discus hannai** Ino，分布于渤海、黄海沿海，已开展养殖并已南移至福建东山岛；**羊鲍 H.ovina** Gmelin，分布于台湾、海南岛及西沙群岛沿岸海域。②功效相似的有**多变鲍**（半纹鲍）**H. varia** Linnaeus，分布于台湾、广东、广西沿海。③《中华人民共和国药典》1990 年版收载，但我国无分布的尚有**白鲍(光滑鲍) H.laevigata** Donovan，产于澳大利亚；**澳洲鲍 H.ruber** Leach，产于澳大利亚及西南太平洋。

## 19. 帽贝科 Patellidae

### 蠙属 Cellana Adams

**嫁蠙** 帽贝(浙江)
**Cellana toreuma** (Reeve)
生活在潮间带中、下区的岩石上。分布几遍全国沿海。
壳：用于小儿惊风。

## 20. 马蹄螺科 Trochidae

### 凹螺属 Chlorostoma Swainson

**黑凹螺** 海决明、马蹄子(通称)，高腰螺(浙江)
**Chlorostoma nigerrima** (Gmelin)
生活在潮间带中、下区的岩石间。分布于东海和南海。
贝壳(海决明)：平肝潜阳，益肝补肾。用于高血压症，慢性肝炎。
附 注：功效相似的有**锈凹螺 C. rusticum** (Gmelin)，分布几遍全国沿海。

## 21. 蝾螺科 Turbinidae

### 蝾螺属 Turbo Linnaeus

**蝾螺** 流螺(通称)，醋鳖、郎君子(浙江)
**Turbo cornutus** Solander
生活在低潮线附近至 10 米深的岩石质海底。分布几遍全国沿海。
屑(甲香)：咸，平。清湿热，解疮毒，止泻痢。用于脘腹疼痛，肠风痔疾，疥癣、头疮，小便淋沥涩痛。
附 注：功效相似的有**节蝾螺 T. articulatus** Reeve，分布于东海及南海沿海；**金口蝾螺 T. chrysostomus** Linnaeus，分布于东海及南海沿海；**夜光蝾螺 T. marmoratus** Linnaeus，分布于南海沿海；**带蝾螺 T. petholatus** Linnaeus 分布于南海沿海；**粒花冠小月螺 Lunella coronata granulata** (Gmelin)，分布于东海南部及南海沿海。

## 22. 环口螺科　Cyclophoridae

### 环口螺属　Cyclophorus Montfort

**褐带环口螺**

**Cyclophorus martensianus** Moellendorff

生活在石灰岩丘陵地带的灌木丛、草丛中及多腐殖质的地方。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、四川。

去壳全体：补中益气，收敛止痢。用于尿频，红白痢疾，小儿夜尿。

### 多棱角螺属　Angulyagra Rao

**多棱角螺**

**Angulyagra polyzonata** (Frauenfeld)

生活在河流、湖泊、小溪及沟渠内。分布于江苏、浙江、江西、福建、湖南、广东、云南。

壳粉：咸，温。用于食积，脘腹寒冷。

### 环棱螺属　Bellamya Jousseaume

**方形环棱螺**　　金螺、石螺、湖螺(通称)水豆螺(吉林)，方田螺(贵州)

**Bellamya quadrata** (Benson)

生活在河流、湖泊、沟渠或池塘内，水田内偶有发现。多栖息在水底腐殖质丰富深1米左右的浅水水域。分布于华东及黑龙江、吉林、河北、河南、湖北、湖南、广东、云南。

去壳全体(螺蛳)：甘，寒。清热，利水，明目。用于黄疸，水肿，淋浊，消渴，痢疾，目赤翳障，痔疮，肿毒。陈旧螺壳(白螺蛳壳)：甘、淡，平。化痰，散结，止痛，敛疮。用于热痰咳嗽，反胃，胃痛，吐酸，瘰疬，溃疡，烫、烧伤。

附　注：功效相似的有**铜锈环棱螺 B. aeruginosa** (Reeve)，分布于东北及河北、内蒙古、山东、江苏、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖北、湖南、广东；**梨形环棱螺 B. purificata** (Heude)，分布于中南及吉林、辽宁、河北、内蒙古、山东、江苏、安徽、浙江、江西、云南。

## 23. 田螺科　Viviparidae

### 圆田螺属　Cipangopaludina Hanniba

**中国圆田螺**　　螺蛳、田螺(通称)，水螺(吉林)，黄螺(江西)，田嬴(广西)

**Cipangopaludina chinensis**(Gray)

生活在水草茂盛的湖泊、水库、河沟、池塘及水田内。分布几遍全国。

去壳全体(田螺)：甘、咸，寒。清热，利水。用于小便不通，黄疸，脚气，水肿，消渴，痔疮，便血，目赤肿痛，疔疮肿毒。壳(田螺壳)：甘，平。和胃，止泻，止血，化痰。用于反胃吐食，胃脘疼痛，泄泻，便血，小儿惊风，脓水湿疮。屎(田螺屎)：用于目翳。

附　注：功效相似的有**中华圆田螺 C. cathayensis** (Heude)，分布于河北、山西、陕西、山东、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南；**乌苏里圆田螺 C.ussuriensis** (Gerstfeldt) 分布于黑龙江、吉林。

**胀肚圆田螺**

**Cipangopaludina ventricosa** (Heude)

生活在湖泊、池塘及水田内。分布于四川、贵州、云南。

肉：用于痢疾，脱肛，小便不通，狐臭。　壳：用于胃痛，婴儿湿疹。

附　注：功效相似的有**长螺旋圆田螺 C. longispira** (Heude)，分布于四川、云南。

### 田螺属　Viviparus Montfort

**湖螺**

**Viviparus auodrafus** Benson

生活在湖荡中。见于太湖。

壳：甘，寒。清热化痰，止痛。用于胃痛泛酸，痰咳，鼻渊，下疳及烫火伤。

附　注：功效相似的有**东北田螺 V. chui** Yen，分布于黑龙江、吉林。

## 24. 滨螺科　Littorinidae

### 滨螺属　Littorina Ferussac

**短滨螺**　　鼓钉螺(浙江)

**Littorina brevicula** (Philippi)

栖于沿海沙岸、岩岸、砾石岸上。分布于渤海、黄海、东海沿海。

壳、肉：平肝清热。用于目翳，眼赤目痛。

## 25. 锥螺科　Turritellidae

### 锥螺属　Turritella Wollaston

**棒锥螺**　　锥螺、单螺(通称)，长螺(浙江)

**Turritella bacillum** Kiener

生活在潮间带的低潮线附近至潮下带深 10 米的泥沙质或软泥质海底。分布于东海、南海。

屎：清肝热，疗目疾。用于目赤红肿。

附　注：功效相似的有**笋锥螺 T.terebra** (Linnaeus)，分布于东海、南海。

## 26. 汇螺科　Potamididae

### 拟蟹守螺属　Cerithidea Swainson

**珠带拟蟹守螺**　　蟹守螺(浙江)
**Cerithidea cingulata** (Gmelin)
栖于沿海潮间带。见于浙江沿海。
肉：用于口腔溃烂，牙龈肿痛。

## 27. 宝贝科　Cypraeidae

### 宝贝属　Cypraea Linnaeus

**山猫眼宝贝**
**Cypraea lynx** (Linnaeus)
生活在低潮线附近的岩礁间。分布于南海。
贝壳：清心安神，平肝明目。
附　注：①本种为国家二级保护野生动物。②功效相似的有**虎斑宝贝 C. tigris** Linnaeus，分布于南海沿海。

### 眼球贝属　Erosaria Troschel

**蛇首眼球贝**
**Erosaria caputserpentis** (Linnaeus)
生活在低潮线附近岩石或珊瑚礁的洞穴内。分布于南海。
贝壳(紫贝)：咸，平。清热，平肝，安神，明目。用于热毒目翳，小儿斑疹入目，惊啼不眠。
附　注：功效相似的有**眼球贝 E. erosa** (Linnaeus)，分布于东海、南海沿海；**黍斑眼球贝 E. miliaris** (Gmelin)，分布于东海、南海沿海。

### 拟枣贝属　Erronea Troschel

**拟枣贝**　　**白贝齿**(浙江)
**Erronea errones** (Linnaeus)
生活在潮间带中区。分布于南海。
贝壳：清心安神，平肝明目。用于惊悸，心烦不眠，小儿麻疹，目赤翳膜。
附　注：功效相似的有**秀丽拟枣贝 E. pulchella** (Swainson)，分布于南海沿海；**日**

**本细焦掌贝 Palmadusta gracilis japonica** Schilder，分布于南海沿海。

### 货贝属 Monetaria Troschel

**环纹货贝** 白贝齿(通称)

**Monetaria annulus** (Linnaeus)

生活在潮间带中区的珊瑚及岩石间。分布于南海。

贝壳(贝子、白贝齿)：咸，凉。清热解毒，清心安神，清肝明目，利尿消肿。用于热痫，惊悸心烦，头晕头痛，热毒目翳，鼻渊头痛，小便不利。

附 注：功效相似的有**货贝 M. moneta** (Linnaeus)，分布于南海；**阿纹缘贝 Mauritia arabica** (Linnaeus)，分布于东海、南海。

## 28. 骨螺科 Muricidae

### 骨螺属 Murex Linnaeus

**栉棘骨螺** 骨螺、蝲螺、三列刺骨螺(通称)，勒螺(广西)

**Murex trirem**is (Perry)

生活在浅海泥沙质的海底。分布于东海、南海。

壳：咸，平。清热解毒。用于中耳炎，疖痈，疔疮。

附 注：功效相似的有**钩棘骨螺 M. aduncospinosus** Beck，分布于东海、南海；**直吻骨螺 M. rectirostris** Sowerby，分布于东海、南海；**三棘骨螺 M. ternispina** Lamarck，分布于东海、南海；**浅缝骨螺 M. trapa** Roding，分布于东海、南海。

### 荔枝螺属 Purpura Deshayes

**蛎敌荔枝螺** 辣螺(通称)，三角荔枝螺(浙江)

**Purpura gradata** Jonas

生活在潮间带中、下区沙泥滩有岩石的海底。分布于南海。

壳：咸，平。软坚散结。用于瘰疬，疮疡。

附 注：功效相似的有**疣荔枝螺 P. clavigera** Küster，分布几遍全国沿海；**黄口荔枝螺 P. luteostoma** (Holten)，分布于渤海、黄海、东海。

### 红螺属 Rapana Schumacher

**脉红螺** 海螺、红螺(通称)，假猪螺、海窝窝(浙江)

**Rapana venosa** (Valenciennes)

暖温带性，生活在深数米至十余米的浅海泥沙碎贝壳质海底，幼体常见于潮间带岩礁间。分布于渤海、黄海、东海沿海。

鲜肉(海螺)：甘，凉。清热，明目。用于胃脘热痛，目痛。贝壳(海螺壳)：甘、咸，寒。化痰消积，止痉。用于胃痛，吐酸，瘰疬，四肢抽搐。 壳：咸，平。清热解毒。用于中耳炎，疮疮。

附　注：功效相似的有**皱红螺 R. bezoar** (Linnaeus)，分布于东海、南海沿海；**红螺 R. thomasiana** Crosse，分布几遍全国沿海，北方沿海较多。

## 29. 蛾螺科　Buccinidae

### 东风螺属　Babylonia Schlueter

**泥东风螺**　　甜螺、东风螺、南风螺(通称)

**Babylonia lutosa** (Lamarck)

生活在深数米至数十米的沙泥质海底。分布于东海、南海沿海。广东西部较多。

壳：咸，凉。清热解毒，制酸止痛。用于胃酸过多，胃痛，疥癣，烫伤。 肉：止血，润燥。用于鼻衄，大便燥结。

附　注：功效相似的有**方斑东风螺 B. areolata** (Lamarck)，分布于东海、南海沿海；**香螺 Neptunea cumingi** Crosse，分布于渤海、黄海沿海。

## 30. 盔螺科　Galeodidae

### 角螺属　Hemifusus Swainson

**管角螺**　　海螺、角螺、响螺(通称)，号螺(浙江)

**Hemifusus tuba** (Gmelin)

生活在深 10—50 米的泥沙质海底。分布于东海、南海沿海。

屑：甘，平。燥湿，收敛，解毒。用于中耳炎，带下病，头疮。 肉：补益。用于腰痛。

附　注：功效相似的有**细角螺 H. ternatanus** (Gmelin)，分布于东海、南海。

## 31. 榧螺科　Olividae

### 榧螺属　Oliva Bruguiere

**伶鼬榧螺**　　马齿螺(通称)，惊螺(广西)

**Oliva mustellina** Lamarck

生活在潮间带至潮下带深 40 米的沙质或泥沙质海底。 分布于黄海南部至海南北部沿海。

壳：咸，平。平肝潜阳，润燥润肺。用于骨蒸痨热，青盲内障，高血压症，头晕。

附　注：功效相似的有**红口榧螺 O. miniacea** (Roding)，分布于南海。

## 32. 涡螺科 Volutidae

### 瓜螺属 Cymbium de Costa

**瓜螺** 油螺、红螺(通称),红塔螺(福建)

**Cymbium melo** (Solander)

生活在较深的近海沙质或泥沙质海底。分布于东海、南海。

卵群: 制酸止痛,解热。 肉: 用于眩晕。

## 33. 阿地螺科 Atyidae

### 泥螺(吐铁)属 Bullacta Bergh

**泥螺** 吐铁(通称),麦螺(江苏),梅螺(浙江),钻沙螺(广西)

**Bullacta exarata** (Philippi)

生活在海湾内潮间带泥砂质底。全国沿海均有分布,东海较多。

肉(吐铁): 甘、咸,寒。补肝肾,益精髓,明目,生津,润燥。

## 34. 海兔科 Aplysiidae

### 背肛海兔属 Notarchus Cuvier

**蓝斑背肛海兔** 海兔、海珠(通称),雨虎(浙江)

**Notarchus leachii cirrosus** Stimpson

生活在暖海地区。栖息于潮下带的海藻上,成群迁居在潮间带产卵。分布于东海、南海沿海。厦门附近有人工养殖。

卵群带(海粉): 甘、咸,寒。清热养阴,软坚消痰。用于肺燥喘咳,瘿瘤,瘰疬。

附 注: 功效相似的有**网纹海兔 Aplysia pulmonica** Gould,分布于东海沿海, 浙江、福建沿海较多。

## 35. 侧鳃海牛科 Pleurobranchidae

### 无壳侧鳃属 Pleurobranchaea Meckel

**蓝无壳侧鳃** 蓝侧鳃海牛(通称)

**Pleurobranchaea novaezealandiae** Cheeseman

生活在潮间带岩石、海藻间至水深 90 米左右的泥砂质底。分布于渤海、黄海、东海沿海。

全体：补肾，固精，壮阳。

## 36. 石磺海牛科　Homoiodoridae

### 石磺海牛属　Homoiodoris Bergh

**日本石磺海牛**　　海牛(通称)

**Homoiodoris japonica** Bergh

生活在潮间带石下。分布于渤海、黄海沿海。

全体：补肾，壮阳。

## 37. 椎实螺科　Lymnaeidae

### 椎实螺属　Lymnaea Lamarck

**静水椎实螺**　　椎实螺、水螺(通称)

**Lymnaea stagnalis** (Linnaeus)

生活在静水池塘、缓流小溪及湖泊、水库沿岸。分布于黑龙江及新疆北部。

新鲜全体(缘桑螺)：熄风镇静，消肿止痛。用于小儿惊风，痔疮，脱肛。

## 38. 石磺科　Oncidiidae

### 石磺属　Oncidium Agassiz

**石磺**　　土海参(浙江)

**Oncidium verruculatum** Cuvier

栖息在海滨岩石上。分布于东海、南海沿海，福建以南沿海分布广而数量多。

全体：滋补，强壮。

## 39. 玛瑙螺科　Achatinidae

### 玛瑙螺属　Achatina Lamarck

**褐云玛瑙螺**　　东风螺、非洲蜗牛(通称)，花螺、菜螺(广西)

**Achatina fulica** (Ferussac)

生活在菜地、农田、果园、公园、橡胶园的阴暗、潮湿处。常隐藏在芭蕉叶腋、菠萝叶腋中，树洞或石缝中。分布于福建、台湾、广东、广西、海南、云南。

肉：滋阴强壮。用于高血压症、冠心病的辅助治疗。

## 40. 坚齿螺科 Camaenidae

### 坚螺属 Camaena Albers

**皱疤坚螺** 天螺、圆螺(通称)

**Camaena cicatricosa** (Müller)

生活在山区、丘陵地带潮湿的树林、灌木丛、草丛及芭蕉丛中，石块下，树洞、石灰岩洞穴、缝隙及农田田埂边。分布于湖南、广东、广西、海南。

贝壳：收敛止血，解毒消疮。用于阴疮不敛。 肉：滋补强壮。

## 41. 嗜粘液蛞蝓科 Phiolomycidae

### 粘液蛞蝓属 Phiolomycus Benson

**双线嗜粘液蛞蝓** 蛞蝓、鼻涕虫(通称)

**Phiolomycus bilineatus** (Benson)

生活在农田、住宅附近阴暗潮湿、多腐殖质处，草丛、灌木丛中，石块或落叶下。分布于西南及河北、新疆、江苏、浙江、福建、湖北、湖南、广东、广西。

全体：消肿止痛，平喘，固脱。用于热疮肿痛，咳嗽痰喘，哮喘，脱肛。

附 注：功效相似的有**皱纹嗜粘液蛞蝓 P. rugulosus** Chen et Gao，分布于浙江西南部。

## 42. 蛞蝓科 Limacidae

### 蛞蝓(鼻涕虫)属 Limax Linnaeus

**黄蛞蝓** 蛞蝓、鼻涕虫、蜒蚰(通称)，夜游虫(湖北)

**Limax flavus** (Linnaeus)

生活在阴暗潮湿的温室、菜窖及住宅附近多腐殖质的地方，石块或落叶下，乱石堆、草丛中，下水道旁也常见。分布于黑龙江、河北、江苏、安徽、浙江、湖北、广西、云南。

全体(蛞蝓)：咸，寒。清热祛风，消肿解毒，破瘀通经。用于中风喎斜，筋脉拘挛，惊痫，喉痹，丹毒，痈肿，经闭，蜈蚣咬伤。

附 注：功效相似的有**大蛞蝓 L. maximus** Linnaeus，见于江苏；**野蛞蝓 Agriolimax agrestis** (Linnaeus)，分布于东南、中南、西南及河北、陕西、新疆。

## 43. 巴蜗牛科　Bradybaenidae

### 巴蜗牛属　Bradybaena Beck

**同型巴蜗牛**　　蜗牛(通称),土牛儿(吉林),瓜牛、里牛(青海),旱螺(广西)

**Bradybaena similaris** (Ferussae)

生活在潮湿、阴暗、多腐殖质的草丛、灌木丛中,农田、公园、温室、菜窖、牲畜棚圈的土石缝隙及石块、落叶下也常见。分布几遍全国。

全体(蜗牛): 咸,寒。清热,消肿,解毒。用于风热惊痫,消渴,喉痹,疟腮,瘰疬,痈肿,痔疮,脱肛,蜈蚣咬伤。壳(蜗牛壳): 用于小儿疳积,面上赤疮,鼻上酒皶,牙盲,脱肛。

附　注: 功效相似的有**江西巴蜗牛 B. kiangsiensis** (Marters),分布于东北及河北、江西、河南、湖北、湖南、广西、四川;**灰巴蜗牛 B. rivida** (Benson), 分布几遍全国;**华蜗牛 Cathaica fasciola** (Draparnaud), 分布于河北、山西、陕西、甘肃、山东、江苏、湖北、湖南;**三带壮蜗牛 Euhadra moreletiana** (Heude), 分布于安徽、浙江。

# 瓣鳃纲　Lamellibranchia

## 44. 蚶科　Arcidae

### 蚶属　Tegillarca Iredale

**泥蚶**　　蚶子、瓦楞子、毛蛤(通称),麻螺(江苏),粒蚶(浙江)

**Tegillarca granosa** Iredale——*Arca granosa* Linnaeus

生活在浅海软泥滩中,河口处也常见。分布几遍全国沿海。已开展养殖。

贝壳(瓦楞子): 甘、咸,平。化痰,软坚,散瘀,消积。用于痰积,胃痛,吐酸,牙疳,瘰疬,癥瘕。　肉(蚶): 甘;温。补血,温中,健胃。用于血虚麻痹,消化不良,下痢脓血。

附　注: ①功效相似的有**勃氏舟形蚶 Scapharca broughtnii** (Schrenck), 分布于渤海、东海沿海;**魁蚶 S. inflata** (Reeve)——*Arca inflata* Reeve, 分布几遍全国沿海;毛蚶 S. **subcrenata** (Lischke)——*Arca subcrenata* Lischke, 分布几遍全国沿海。②泥蚶、魁蚶、毛蚶为《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 45. 贻贝科　Mytilidae

### 肌蛤属　Musculus Bolten

**凸壳肌蛤**　　彩肌蛤、淡菜(通称), 寻氏肌蛤、寻氏短齿蛤(浙江)

**Musculus senhousei** (Benson)

成群地用足丝相连附着生活在潮间带低潮线附近的泥沙滩上。全国沿海均有分布。
**壳**：用于伤口发炎，慢性咳嗽痰喘，鼻疖，脚生鸡疔。 **肉**：功效同厚壳贻贝。

## 贻贝属 Mytilus Linnaeus

**厚壳贻贝** 贻贝、淡菜(通称)，壳菜(浙江)
**Mytilus coruscus** Gould

生活在较宽畅的海中岩石上，在经常有浪花冲击的岩石地带生长较好，北方多在深20米、南方在深10米左右的浅海中。分布于渤海、黄海、东海、台湾海峡。已开展养殖。

肉(淡菜)：咸，温。补肝肾，益精血，消瘿瘤。用于虚劳羸瘦，眩晕，盗汗，阳痿，腰痛，崩漏，瘿瘤，疝瘕。

附 注：功效相似的有**贻贝 M. edulis** Linnaeus，分布于渤海、黄海近岸及内湾浅海，已开展养殖；**麦氏偏顶蛤 Modiolus metcalfei** Hanly，分布于黄海、东海、南海；**偏顶蛤 M. modiolus** (Linnaeus)，分布于渤海、黄海、东海；**黑荞麦蛤 Vignadula atrata**(Lischke) 分布几遍全国沿海。

## 扁蛤属 Perna Dillwyn

**翡翠贻贝** 淡菜(通称)
**Perna viridis** Linnaeus

用足丝相互附着在水流畅通处的岩石上生活，自干潮线至深5米左右处较多。分布于东海南部及南海。已开展养殖。

壳：咸，平。平肝潜阳，滋阴，益精，止血。用于眩晕，高血压病，阳痿，肠道及子宫出血。 肉：益阴补血，益气填精，消瘿散结，止痢。用于虚劳消瘦，阳痿不举，肾虚腰痛，贫血，久痢，瘿气。

# 46. 钳蛤科 Vulsellidae

## 丁蛎属 Malleus Lamarck

**丁蛎** 海丁子、丁字贝、螺蛟(通称)
**Malleus malleus** (Linnaeus)

生活在潮间带下区至浅海泥沙质的海底。分布于南海。

贝壳：清热解毒。用于湿疮，疖肿。

附 注：功效相似的有**白丁蛎 M. albus** Lamarck，分布于南海沿海。

## 47. 珍珠贝科 Pteriidae

### 珠母贝属 Pinctada Bolten

**马氏珍珠贝** 合浦珍珠贝、马氏珠母贝(通称)

**Pinctada martensii** Dunker

亚热带种。生活在风浪较为平静的内湾,从低潮线到深 10 米左右的砂泥、岩礁或石砾较多的海底。分布于南海,广东较多。

蚌体珍珠囊中的培养物(珍珠): 甘、咸,寒。安神定惊,明目消翳,解毒生肌。用于惊悸失眠,惊风癫痫,目生云翳,疮疡不敛。经煅烧的贝壳珍珠层(珍珠母): 咸,寒。平肝潜阳,定惊明目。用于头痛眩晕,烦燥失眠,肝热目赤,肝虚目昏。

附 注: ①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②功效相似的有**解氏珠母贝**(长耳珠母贝),**P. chemnitzi** (Philippi), 分布于东海、南海沿海;**珠母贝P. margaritifera** Dunker, 分布于南海浅海海域;**大珠母贝 P. maxima** (Jameson), 分布于南海浅海海域(国家二级保护野生动物及国家二级保护野生药材物种); **企鹅珍珠贝 Pteria penguin** (Roding),分布于南海浅海海域。

## 48. 江珧科 Pinnidae

### 江珧属 Pinna Linnaeus

**栉江珧** **簸箕蛤蜊**(通称),马甲柱、牛角蛏(浙江)

**Pinna (Atrina) pectinata** Linnaeus

生活在深 30—40 米泥沙底的浅海。分布于东海、南海。

贝壳: 清热解毒,熄风镇静。用于高血压头痛,湿疮。 后闭壳肌(江珧柱): 甘、咸,平。滋阴补肾,调中。用于消渴,宿食。

## 49. 扇贝科 Pectinidae

### 栉孔扇贝属 Chlamys Beneden

**栉孔扇贝** 干贝、江珧柱(通称),干贝蛤(浙江)

**Chlamys farreri** (Jones et Preston)

生活在浅海水流较急的清水中,见于低潮附近至深 20 余米的海底。分布于渤海、黄海、东海北部沿海。已开展养殖。

壳、肉: 滋阴,养血,补肾,调中。

附 注: 功效相似的有**花鹧栉孔扇贝 C. pica** (Reeve),分布于东海、南海。

## 50. 海菊蛤科 Spondylidae

### 海菊蛤属 Spondylus Linnaeus

**皇皇海菊蛤** 刺蚶、蝲蚶(通称)

**Spondylus imperialis** Chenu

生活在潮间带和浅海。分布于南海。

贝壳: 咸,凉。清热解毒,止咳化痰,消肿散结。用于中耳炎,痰多咳嗽。

附 注: 功效相似的有**草莓海菊蛤 S. fragum** Reeve, 分布于广东、海南及西沙群岛浅海海域;**紫斑海菊蛤 S. nicobaricus** Chemnitz, 分布于东海、南海浅海海域。

## 51. 海月蛤科 Placunidae

### 海月属 Placuna Solander

**海月** 明瓦、窗贝(通称)

**Placuna placenta** (Linnaeus)

生活在潮间带中下区及浅海沙质或泥沙质的海滩表面。分布于东海、南海。

肉(海月): 甘,平。消食,利肠,祛痰。用于痰结, 食积。 壳 (海月壳): 咸,寒。解毒,消积,利五脏。用于小儿麻疹,疳积,消化不良,湿烂疮。

## 52. 牡蛎科 Ostreidae

### 牡蛎属 Ostrea Linnaeus

**长牡蛎** 大牡蛎、海蛎子、蚝(通称),大蛎歪(江苏),蛤(浙江)

**Ostrea gigas** Thunberg

生活在盐度较低的海区,潮间带至低潮线以下数米的泥滩上,河口及内湾较多。全国沿海均有分布。已进行养殖。

贝壳(牡蛎): 咸,微寒。潜阳补阴,软坚散结,收敛固涩。用于惊悸失眠,眩晕耳鸣,瘰疬痰咳,癥瘕痞块,自汗盗汗,遗精崩带,胃痛泛酸。

附 注: ①功效相同,与本种同收载《中华人民共和国药典》1990 年版的有**近江牡蛎 O. rivularis** Gould, 分布几遍全国沿海;**大连湾牡蛎 O. talienwhanensis** Crosse, 分布于渤海、黄海沿海,已开展养殖。②功效相似的有**密鳞牡蛎 O. denselamellose** Lischke. 分布几遍全国沿海,已开展养殖;**棘刺牡蛎 O. echinata** Quoy et Gaimard, 分布于东海、南海沿海;**叶片牡蛎 O. folium** Linnaeus, 分布于南海海域;**咬齿牡蛎 O.mordax** Gould, 分布于南海沿海;**褶牡蛎 O. plicatula** Gmelin, 分布几遍全国沿海, 已开展养殖。

## 53. 珍珠蚌科　Margaritanidae

### 珍珠蚌属　Margaritana Schumacher

**珠母珍珠蚌**　　蛤蜊(东北)

**Margaritana dahurica** (Middendorff)

生活在水质清澈的河流及小溪内。分布于黑龙江、吉林。

蚌体珍珠囊中的培养物(珍珠)：甘、咸，寒。安神定惊，明目消翳，解毒生肌。用于惊悸失眠，惊风癫痫，目生云翳，疮疡不敛。经煅烧的贝壳珍珠层（珍珠母)：咸，寒。平肝潜阳，定惊明目。用于头痛眩晕，烦躁失眠，肝热目赤，肝虚目昏。

## 54. 蚌科　Unionidae

### 尖脊蚌属　Acuticosta Simpson

**中国尖嵴蚌**　　蛤蜊(通称)

**Acuticosta chinensis** (Lea)

生活在沙质或泥底的湖泊与河流内。分布于江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南。

经煅烧的贝壳珍珠层(珍珠母)：平肝潜阳，定惊明目。

附　注：功效相似的有**卵形尖嵴蚌 A. ovata** (Simpson)，分布于江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南；**蚶形无齿蚌 Anodonta arcaeformis** (Heude)，分布于东北及河北、内蒙古、陕西、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北、湖南；**舟形无齿蚌 A. euscaphys** (Heude)，；分布于黑龙江、河北、江苏、湖南；**河无齿蚌 A. fluminea** (Heude)，分布于河北、江苏、安徽、浙江；**珠形无齿蚌 A. globosula** (Heude)，分布于安徽、江西、湖南；**圆背角无齿蚌 A. woodiana pacifica** (Heude)，分布于黑龙江、辽宁、河北、山东、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北、湖南；**扭蚌 Arconaia lanceolata** (Lea)，分布于江苏、安徽、浙江、江西、湖北，湖南；**楔形丽蚌 Lamprotula bazini** (Heude)，分布于江西、湖南；**洞穴丽蚌 L. caveata** (Heuke)，分布于江苏、江西、湖南的大中型湖泊及其相通的河流内；**绢丝丽蚌 L. fibrosa** (Heude)，分布于江苏太湖，安徽淮河，浙江菱湖，江西鄱阳湖及其相通的赣江、信江，湖北梁子湖，湖南洞庭湖；**背瘤丽蚌 L. leai** (Gray)，分布于河北、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、广东、广西；**佛耳丽蚌 L. mansuyi** (Dautzenberg et Fischer)，分布于广西右江(国家二级保护野生动物)；**多瘤丽蚌 L. polysticta** (Heude)，分布于江苏、浙江、江西、湖南；**猪耳丽蚌 L. rochechouarti** (Heude)，分布于江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南；**刻裂丽蚌 L. scripta** (Heude)，分布于江苏、安徽、江西、湖南；**天津丽蚌 L. tientsinensis** (Crosse et Debeaux)，分布于天津、江苏、安徽、浙江、湖南；**失衡丽蚌 L. tortuosa** (Lea)，分布于江苏、安徽、江西、湖北、湖南；**三巨瘤丽蚌 L. triclava**(Heude)，分布于江苏、浙江、江西、湖南；**环带丽蚌 L. zonata** (Heude)，分布于安徽、江西；**短褶矛蚌 Lanceolaria grayana** (Lea)，分布于黑龙江、河北、山东、江苏、安

徽、浙江、江西、湖北、湖南；**高顶鳞皮蚌 Lepidodesma langulati** (Heude)，分布于江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南；**射线裂脊蚌 Schistodesmus lampreyanus** (Baird et Adams)，分布于河北、山东、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南；**圆顶珠蚌 Unio douglasiae** (Gray)，分布几遍全国。

## 楔蚌属　Cuneopsis Simpson

**巨首楔蚌**　　老鸦嘴(通称)

**Cuneopsis capitata** (Heude)

栖息在泥底或泥沙底的河流及湖泊中。急流水域内较多。分布于江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南。

蚌体培养物(珍珠)：安神定惊，明目消翳，解毒生肌。经煅烧的贝壳珍珠层（珍珠母)：平肝潜阳，定惊明目。

附　注：功效相似的有**矛形楔蚌 C. celtiformis** (Heude)，分布于江西鄱阳湖、赣江、信江，湖南洞庭湖、沅水；**圆头楔蚌 C. heudei** (Heude)，分布于河北、山东、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南；**鱼尾楔蚌 C. pisciculus** (Heude)，分布于江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南；**微红楔蚌 C. rufescens** (Heude)，分布于江西鄱阳湖、湖南洞庭湖及其相通的河流、池塘内；**椭圆丽蚌 Lamprotula gottschei** (Von Martens)，分布于辽宁浑江及鸭绿江；**剑状矛蚌 Lanceolaria gladiola** (Heude)，分布于河北、山东、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南。

## 帆蚌属　Hyriopsis Conrad

**三角帆蚌**　　三角蚌、劈蚌、翼蚌、水壳、江贝(通称)

**Hyriopsis cumingii** (Lea)

栖息在大、中型湖泊及河流内，喜生活在水质清、水流急、底质略硬的泥底或泥沙底的水域内。分布于河北、山东、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南，已开展人工养殖。

蚌体珍珠囊中的培养物(珍珠)：安神定惊，明目消翳，解毒生肌。经煅烧的贝壳珍珠层(珍珠母)：平肝潜阳，定惊明目。肉(蚌肉)：甘、咸，寒。清热解毒，止血止带，滋阴明目。用于烦热，消渴，血崩，带下病，痔漏，目赤，湿疹。体内分泌液（蚌泪)：清热，明目，解毒。用于消渴，赤眼，烫伤。贝壳粉(蚌粉)：咸，寒。化痰消积，清热燥湿。用于痰饮咳嗽，胃痛，反酸，带下病，痈肿，湿疮。

附　注：功效相同，与本种同载《中华人民共和国药典》1990 年版的有**褶纹冠蚌 Cristaria plicata** (Leach)，分布于黑龙江、吉林、河北、山东、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北、湖南，已开展人工养殖；**背角无齿蚌 Anodonta woodiana woodiana** (Lea)，分布几遍全国。

## 珠蚌属　Unio Retzius

**川南珠蚌**

**Unio** sp.

生活在江河、湖泊中。分布于四川。

贝壳(土牡蛎): 咸、涩，微寒。固精敛汗，散结软坚。用于盗汗遗精，带下病，瘰疬，虚热外浮，头晕烦燥。

## 55. 蚬科 Corbiculidae

### 蚬属 Corbicula Megerle

**河蚬** 黄蚬、沙蛹、金蚶、扁螺(通称)，蟓仔(河南)

**Corbicula fluminea** (Müller)

栖息于泥底、沙泥底或沙底的江河、湖泊、沟渠、池塘及江河入海咸淡水交汇的河口区。营穴居生活。分布几遍全国。

肉(蚬肉): 甘、咸，寒。清热，利湿，解毒。用于消渴，目黄，湿毒脚气，疔疮痈肿。贝壳(蚬壳): 咸，温。和胃化痰，祛湿。用于反胃吐食，胃痛吞酸，咳嗽痰喘，湿疹，溃疡。

附 注: 功效相似的有**刻纹蚬 C. largillierti** (Philippi)，分布于江西鄱阳湖、湖南洞庭湖及其相通的河流内；**闪蚬 C. nitens** (Philippi)，分布于辽宁、陕西、湖北、湖南、广东、贵州。

## 56. 砗磲科 Tridacnidae

### 砗磲属 Tridacna Bruguiere

**库氏砗磲** 砌筋(广东、海南)

**Tridacna** (Dinodacna) **cookiana** (Iredale)

生活在浅海珊瑚礁间。分布于南海。

贝壳(砗磲): 甘、咸，寒。镇静，安神，解毒。用于心神不安，虫螫伤。

附 注: ①国家二级保护野生动物。②功效相似的有**鳞砗磲 T.(Chamestrachea) squamosa** Lamarck，分布于南海浅海海域；**长砗磲 T. (Chamestrachea) maxima** (Röding)，分布于南海浅海海域。

## 57. 帘蛤科 Veneridae

### 青蛤属 Cyclina Deshayes

**青蛤** 墨蚬(通称)，蛤壳(浙江)，神螺、沙煲螺(广西)

**Cyclina sinensis** (Gmelin)

生活在近海泥沙质的海底约 15 厘米深处，见于潮间带各区。全国沿海均有分布。

贝壳(蛤壳): 苦、咸，寒。清热化痰，软坚散结，制酸止痛。用于痰火咳嗽，胸胁疼痛，

瘰疬瘿瘤，胃痛吞酸，湿疹，烫伤。

附　注：①功效相同，与本种同载《中华人民共和国药典》1990 年版的有**文蛤 Meretrix meretrix** (Linnaeus)，分布几遍我国沿海。②功效相似的有**中国仙女蛤 Callista chinensis** (Holten)，分布于东海及南海沿海；**饼干镜蛤 Dosinia** (Phacosoma) **biscocta** (Reeve)，分布几遍全国沿海；**日本镜蛤 D.** (Phacosoma) **japonica** (Reeve)，分布几遍全国沿海；**薄片镜蛤 D.** (Lamellidosinia) **laminata** (Reeve)，分布几遍我国沿海；**等边浅蛤 Gomphina veneriformis** (Lamarck)，分布几遍全国沿海；**紫石房蛤 Saxidomus purpuratus** (Sowerby)，分布于渤海、黄海沿海；**斧文蛤 Meretrix lamarckii** Deshayes，分布于东海、南海沿海；**丽文蛤 M. lusoria** Rumphius，分布于东海及南海沿海，广东、海南较多。

### 布目蛤属　Protothaca Dall

**江户布目蛤**　　伊豆布目蛤(浙江)

**Protothaca jedoensis** (Lischke)

生活在岩石性海岸潮间带中区的砂砾中。分布于渤海、黄海沿海。

贝壳：清热解毒。用于臁疮，黄水疮。肉：降压。

附　注：功效相似的有**菲律宾蛤仔 Ruditapes philippinarum** (Adamas et Reeve)，分布于渤海、黄海沿海，山东胶州湾产量较多；**杂色蛤仔 Venerupis variegata** (Sowerby)，分布于东海及南海沿海。

## 58. 蛤蜊科　Mactridae

### 蛤蜊属　Mactra Linnaeus

**西施舌**　　沙蛤、车蛤(浙江)，白甲螺(广西)

**Mactra antiquata** Spengler

生活在潮间带下区及浅海的沙滩深 6—7 厘米的地方。全国沿海均有分布。

肉(西施舌)：甘、咸，平。滋阴养液，清热凉肝。用于肝肾阴虚，腰膝酸重，目赤。

**四角蛤蜊**　　蛤蜊、白蚶子、白蚬子、布鸽头、泥蚬子(通称)

**Mactra quadrangularis** Deshayes——*M. veneriformis* Deshayes

生活在潮间带中、下区及浅海泥沙滩深 5—10 厘米处。全国沿海均有分布。

肉(蛤蜊)：咸，寒。滋阴，利水，化痰，软坚。用于消渴，水肿，痰积，瘿瘤，痔疮，崩漏，带下病。贝壳粉末(蛤蜊粉)：咸，寒。清热，利湿，软坚，化痰。用于痰饮喘咳，水气浮肿，胃痛呕逆，崩中带下，白浊，瘿瘤，烫伤。

附　注：功效相似的有**中国蛤蜊 M. chinensis** Philippi，分布几遍全国沿海。

**凹线蛤蜊**　　珂、马鹿贝、马珂螺(通称)

**Mactra sulcataria** Deshayes

生活在潮间带中、下区浅海沙质海底，喜盐度较高、潮流畅通的海区。分布于渤海、黄

海。

贝壳(坷)：咸，平。消翳。用于目赤生翳，远视不明，痒涩。

## 59. 紫云蛤科 Psammobiidae

### 紫蛤属 Sanguinolaria Lamarck

**双线血蛤** 双线紫蛤、西施舌、沙施(浙江)

**Sanguinolaria diphos** (Linnaeus)

生活在潮间带细沙质海底深约 30 厘米处。分布于东海、南海沿海。

肉：清肝热，益精髓，补阴血。用于肝肾阴虚，腰膝酸重，目赤肿痛。

## 60. 斧蛤科 Donacidae

### 斧蛤属 Donax Linnaeus

**狄氏斧蛤**

**Donax dysoni** Deshayes

埋栖于潮间带沙滩中。分布于南海沿海

肉：消热退黄。用于黄疸，淋浊。

## 61. 樱蛤科 Tellinidae

### 明樱蛤属 Moerella Fischer

**红明樱蛤**

**Moerella rutila** (Dunker)

生活在潮间带砂滩中。分布于渤海、黄海沿海。

贝壳：清热化痰，软坚散结。

附 注：功效相似的有**烟台腹蛤 Gastrana yantaiensis** (Crosse et Debeaux)，分布于渤海、黄海沿海。

## 62. 竹蛏科 Solenidae

### 缢蛏属 Sinonovacula Prashad

**缢蛏** 蛏子、青子(通称)，蜻(浙江)

**Sinonovacula constricta** (Lamarck)

生活在河口或有少量淡水流入的内湾，潮间带中、下区的软沙滩深 10—20 厘米处。全

国沿海均有分布。浙江、福建已有养殖。

肉(蛏肉)：甘、咸，寒。补阴，除烦，清热。用于产后虚损，烦热口渴，湿热水肿，痢疾。壳(蛏壳)：用于喉风急痹，咽喉急症，胃痛。

### 竹蛏属　Solen Linnaeus

**长竹蛏**　　马刀(通称)，蛏(江苏)

**Solen gouldii** Conrad

生活在潮间带中区至潮下带的浅海沙质或泥沙质海底。全国沿海均有分布。

贝壳(马刀)：咸，凉。散结消痰，通淋。用于水瘿，气瘿，痰饮，淋证，带下病。肉(马刀肉)：甘，寒。明目，除热，止渴，解酒毒。

附　注：功效相似的有**细长竹蛏 S. gracilis** Philippi，分布于渤海、黄海浅海海域；**大竹蛏 S. grandis** Dunker，分布几遍全国沿海；**小刀蛏 Cultellus attenuatus** Dunker，分布于渤海、黄海浅海海滩；**尖刀蛏 C. scalprum** (Gould)，分布几遍全国沿海。

## 63. 海螂科　Myidae

### 海螂属　Mya Linnaeus

**砂海螂**

**Mya arenaria japonica** Linnaeus

生活在潮间带下至数米深的浅海及沿海泥沙滩中。分布于渤海、黄海沿海。

全体：用于肿瘤。

附　注：功效相似的有**日本海螂 M. japonica** Jay，分布于渤海、黄海沿海。

# 头足纲　Cephalopoda

## 64. 柔鱼科　Ommastrephidae

### 褶柔鱼属　Todarodes Steenstrup

**太平洋褶柔鱼**　　太平洋柔鱼、太平洋丛柔鱼(通称)，东洋鱿(山东)，北鱿(台湾)

**Todarodes pacificus** Steenstrup——*Ommastrephes sloani pacificus* Pfeffer

大洋性种类，但常接近岛屿边缘，很少进入内湾。主要栖居在岛屿周围、半岛外海、海峡附近、陆架边缘和陡倾海岸边缘，底质为砂砾、碎贝壳混杂的场所。分布于黄海北部和东海外海。

肉：用于腰肌劳损，风湿腰痛，肌肉痉挛，产后体虚，小儿疳积，带下病，疮疖。

## 65. 枪乌贼科　Loliginidae

### 枪乌贼属　Loligo Schneider

**火枪乌贼**　　水兔(辽宁),海兔子(山东),鬼拱、笔管(浙江),鱿仔(广东)

**Loligo beka** Sasaki

沿海岸性生活,春季集群进行生殖洄游,产卵场多在内湾。分布于渤海、黄海、东海、南海沿海。

肉：用于腹泻,石淋,下肢溃疡,产后风。

**中国枪乌贼**　　中国鱿鱼(通称),本港鱿鱼(福建),台湾锁管(台湾)

**Loligo chinensis** *Gray*——*Loligo formosana* Sasaki

浅海性生活，主要群体栖居于热带和亚热带海域。春季或夏季集群由越冬的深水区向浅水区进行生殖洄游。分布于东海、南海。

肉：用于腰肌劳损,产后体虚,带下病,小儿疳积。

附　注：功效相似的有**日本枪乌贼 L. japonica** Hoyle，分布于渤海、黄海、东海浅海海域。

## 66. 乌贼科　Sepiidae

### 乌贼属　Sepia Linnaeus

**金乌贼**　　乌鱼、墨鱼(通称),针墨鱼(广东)

**Sepia esculenta** Hoyle

浅海性生活。主要群体栖居于暖温带海区，春季集群从越冬的深水区向浅水区进行生殖洄游。繁殖场主要有山东南部的岚山头海域及青岛附近的胶州湾。分布于渤海、黄海、东海、南海海域。

骨状内壳(海螵蛸)：咸,涩,温。收敛止血,涩精止带,制酸,敛疮。用于吐血衄血,崩漏便血,遗精滑精,带下病,胃痛吐酸;外用于损伤出血,疮多脓汁。　肉：养血滋阴。用于血虚闭经,崩漏带下。　墨囊：用于功能性子宫出血,消化道出血及肺痨咯血。　蛋（乌鱼蛋)：开胃利水。

附　注：①功效相同,与本种同载《中华人民共和国药典》1990 年版的有**曼氏无针乌贼 Sepiella maindroni** de Rochebrune，分布于全国各海域,浙江及闽东海域较多;②功效相似的有**针乌贼 Sepia andreana** Steenstrup，分布于黄海沿海;**白斑乌贼 S. latimanus** Quoy et Gaimard，分布于南海海域；**虎斑乌贼　S. pharaonis** Ehrenberg，分布于南海海域。

**拟目乌贼**　　墨鱼(通称),尤乌(浙江),眼墨(福建),墨公花鸡鲳(广东)

**Sepia lycidas** Gray

主要生活在亚热带和热带海域。分布于东海、南海海域。

内壳：补阳固涩，生肌止痛，止血，健胃。 全体：用于胃溃疡，腰疼。

## 67. 蛸(章鱼)科 Octopodidae

### 蛸(章鱼)属 Octopus Lamarck

**短蛸** 章鱼(通称)，八带蛸(河北)，小蛸(山东)，四眼鸟(广东)，八爪鱼(广西)

**Octopus ocellatus** Gray

冷温性。主要群体栖居于温带偏北海域，营底栖生活，在繁殖期间有短距离的洄游移动。分布于渤海、黄海、东海、南海海域。

肉：用于关节痛，瘰疬，脚抽搐。

**长蛸** 章鱼(通称)，长爪章(河北)，大蛸(山东)，章拒(浙江)，水鬼(广东)

**Octopus variabilis** (Sasaki)

暖温性。主要栖居于温带偏南海域，营底栖生活，在繁殖期间有短距离的洄游移动。分布于渤海、黄海、东海、南海海域。

肉：滋补强壮，养血益气，收敛生肌。用于气血虚弱，乳汁不足，痈疽。

**真蛸** 章鱼(通称)，母猪章(广东)，十八梢鱼(广西)

**Octopus vulgaris** Cuvier

暖水性，但生活区很广，可扩至温带区，至寒带区边缘。主要群体营底栖生活，在繁殖期和越冬期有短距离洄游移动。分布于东海、南海海域。

肉：补养气血，收敛生肌。

# 星虫动物门 Sipuncula

## 星虫纲 Sipunculida

## 68. 星虫科 Sipunculidae

### 土钉虫属 Physcosoma Selenka

**土钉虫** 海涂虫(浙江)

**Physcosoma similis** Chen et Yen

生活在沿海海底泥沙中或珊瑚礁、岩石缝中。分布几遍全国沿海。

全体：益气，活血，通乳。用于产后奶水不足。

### 星虫属 Sipunculus Linnaeus

**裸体方格星虫** 光裸星虫、方格星虫、沙虫、沙肠子、海肠子(通称)

**Sipunculus nudus** Linnaeus

生活在沿海潮间带泥沙质滩涂，营穴居生活。分布几遍全国沿海。

全体：咸，寒。滋阴降火，清肺，健脾。用于骨蒸潮热，阴虚盗汗，胸闷痰多，肺痨咳嗽，牙齿肿痛。

# 环节动物门 Annelida

## 多毛纲 Polychaeta

### 69. 沙蚕科 Nereidae

#### 疣吻沙蚕属 Tylorrhynchus Grube

**疣吻沙蚕** 沙蚕、海蚯蚓、沙虫、禾虫(通称)

**Tylorrhynchus heterochaetus** (Quatrefages)

生活在淡水或咸淡水水域的泥质或泥沙质底内，性成熟成群浮于海面上。分布于全国各海区。

全体：补脾益胃，补血养血，利水消肿。用于脾胃虚弱，贫血，浮肿。

附 注：功效相似的有**日本沙蚕 Nereis japonica** Izuka，分布几遍全国沿海。

### 70. 矶沙蚕科 Eunicidae

#### 索沙蚕属 Lumbriconeis Orsted

**异足索沙蚕**

**Lumbriconeis heteropoda** Marenzeller

生活在沿海潮间带和潮下带上区的沙滩上，营穴居生活。分布几遍全国沿海。

全体：用于脚气病。

### 71. 吻沙蚕科 Glyceridae

#### 吻沙蚕属 Glycera Lamarck

**长吻沙蚕**

**Glycera chirori** Izuka

生活在海滩至深40米的海底。分布几遍全国沿海。

全体：用于脚气病。

## 72. 沙蠋科 Arenicolidae

### 沙蠋属(海蚯蚓属) Arenicola Lamarck

**巴西沙蠋** 海蚯蚓(通称)

**Arenicola brasiliensis** (Nonoto)

栖息于潮间带深 40—45 厘米的泥沙中,营掘土穴居生活。分布于渤海、黄海沿海。

全体: 解毒,敛疮,生肌,消肿止痛。用于痈疮肿毒。

附 注: 功效相似的有**沙蠋 A. cristata** Stimpson, 分布于渤海、黄海沿海。

# 寡毛纲 Oligochaeta

## 73. 钜蚓科 Megascolecidae

### 环毛属 Pheretima Kinberg

**参环毛蚓** 蚯蚓、曲蟮、地龙、广地龙(通称),鸭虫(广西)

**Pheretima aspergillum** (Perrier)

穴居生活在较潮湿、疏松的泥土中。分布于福建、广东、海南、广西、四川、云南南部。

除内脏的全体(广地龙): 咸,寒。清热定惊,通络,平喘, 利尿。用于高热神昏,惊痫抽搐,关节痹痛,肢体麻木,半身不遂,肺热喘咳,尿少水肿,高血压症。

附 注: 《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**河北环毛蚓** 蚯蚓、曲蟮、地龙(通称),环毛蚓(山东、河南),泥曲蟮(青海)

**Pheretima tschiliensis** (Michaelsen)

穴居生活在多腐殖质的较深土层中,较耐干旱。分布于华北、西北、华东、中南。

全体: 利尿通淋,清热解毒,活血通经,平喘,定惊,降压。用于慢性肾炎水肿,高热烦燥,半身不遂,咳嗽喘急,小儿惊风,高血压症;外用烫、烧伤及疮毒。

附 注: 功效相似的有**白颈环毛蚓 P. californica** (Kinberg),分布于江苏、安徽、浙江、福建、湖北、湖南、四川、云南;**秉氏环毛蚓 P. carnosa** (Goto et Hatui),分布于陕西、山东、江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、四川、贵州; **异毛环毛蚓 P. diffringens** (Boird), 分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、 贵州; **威廉环毛蚓 P. guillelmi** (Michaelsen), 分布于河北、江苏、安徽、浙江、湖北。 **湖北环毛蚓 P. hupeiensis** (Michaelsen), 分布于东北及河北、陕西、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、四川; **栉盲环毛蚓 P. pectinifera** (Michaelsen), 分布于江苏、 安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、贵州; **秉前环毛蚓 P. praepinguis** Gates, 见于四川; **壮伟环毛蚓 P. robusta** (E. Perrier), 分布于江苏、浙江、江西、福建、湖北、四川; **舒脉环毛蚓 P.schmardae**(Horst), 分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、贵州; **通俗环毛蚓 P. vulgaris** (Chen), 分布于河北、江苏、安徽、浙江、湖北; **天锡杜拉蚓 Drawida gisti** (Michaelsen), 分布于

华东、中南及河北、陕西；**日本杜拉蚓 D. japonicus** (Michaelsen)，分布几遍全国。

## 74. 正蚓科 Lumbricidae

### 异唇蚓属 Allolobophora Eisen

**背暗异唇蚓** 　编蚯蚓、土地龙、蚯蚓、曲蟮(通称)

**Allolobophora caliginose** (Ant. Duges)

生活在潮湿、有机质较多的泥土中。分布几遍全国。

全体(土地龙)：咸，寒。清热定惊，通络，平喘，利尿。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②我国有 2 个亚种，即**梯形亚种 A. c. trapezoides** (Ant. Duges)；**正亚种 A. c. typic** (Savigny)。

### 爱胜属 Eisenia Malm

**赤子爱胜蚓** 　蚯蚓、地龙、曲蟮(通称)

**Eiseria foetida** (Savigny)

生活在厩肥、烂草堆、污泥、垃圾场内。分布于东北及河北、陕西、江苏、四川。

全体：用于慢性肾炎水肿，高热烦燥，半身不遂，咳嗽喘急，小儿惊风，高血压病，疮毒，烫、烧伤。

## 蛭纲 Hirudinea

## 75. 医蛭科 Hirudidae

### 医蛭属 Hirudo Linnaeus

**日本医蛭** 　蚂蟥、水蛭、线蚂蟥(通称)，马鸡(江苏)

**Hirudo nipponica** (Whitman)

栖息于水田、沟渠中，吸食人畜血。分布几遍全国。

干燥全体(水蛭)：咸、苦，平。有毒。破血，逐瘀，通经。用于癥瘕痞块，血瘀经闭，跌打损伤。

附　注：①功效相同，与本种同载《中华人民共和国药典》1990 年版的有**尖细金线蛭 Whitmania acranulata** (Whitman)，分布几遍全国；**宽体金线蛭 W. pigra** (Whitman)，分布于华东、中南及吉林、辽宁、河北、陕西、甘肃、宁夏、四川、贵州、云南。②功效相似的有**细齿金线蛭 Whitmania edentula** (Whitman)，见于江苏、广东、四川；**光润金线蛭 W. laevis** (Baird)，分布几遍全国；**秀丽水蛭 Haemopis gracilis** Moore，见于江苏、浙江；**丽医蛭 Hirudo pulchra** Song，见于浙江。③近年用水蛭制品治疗角膜斑翳，老年白内障，并试用于肿瘤，收到较好疗效。

## 76. 山蛭科　Haemadipsidae

### 山蛭属　Haemadipsa Tennent

**日本山蛭**

**Haemadipsa japonica** Whitman

生活在深山草泽中，常附于草丛、灌木上，侵人、畜。见于山东、云南。

全体：用于血瘀经闭，跌打损伤。

# 节肢动物门　Arthropoda

# 肢口纲　Merostomata

## 77. 鲎科　Tachypleidae

### 鲎属　Tachypleus Leach

**中国鲎**　　鲎鱼、马蹄鲎、两公婆（通称），鲎蟹、三刺鲎（浙江）

**Tachypleus tridentatus** Leach

穴居生活在海底沙土中。分布于东海、南海沿海。

肉（鲎肉）：辛、咸，平。清热解毒，杀虫，明目。用于脓疱疮，白内障，青光眼，痔疮。壳（鲎壳）：咸，平。活血祛瘀，解毒。用于跌打损伤，烫伤，带状疱疹。尾（鲎尾：用于肠风泻血，崩中带下。胆（鲎胆）：用于风癫，杀虫。

# 蛛形纲　Arachnoidea

## 78. 钳蝎科　Buthidae

### 钳蝎属　Buthus Leach

**东亚钳蝎**　　蝎子、马氏钳蝎、全虫（通称），夏尾虫（河南、江西），问荆蝎（四川）

**Buthus martensii** Karsch

栖息在山坡石块、落叶下及墙隙、土穴、荒地等潮湿阴暗处。分布几遍全国，长江以北地区较多。

全体（全蝎）：辛，平。有毒。息风镇痉，攻毒散结，通络止痛。用于小儿惊风，抽搐痉挛，中风口喎，半身不遂，破伤风症，风湿顽痹，偏正头痛，疮疡，瘰疬。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 79. 蠖蛸科 Ctenizidae

### 拉土蛛属 Latouchia Pocock

**戴氏拉土蛛** 蠖蛸(通称),土蜘蛛(河南)

**Latouchia davidi** (Simon)

穴居土中。抽丝做圆筒形的巢,常将椭圆形的盖开放,捕食误入的小虫。分布于陕西、安徽、河南、广西、西藏。

全体(蠖蛸): 咸,寒。有毒。用于疔肿,附骨疽,宿肉赘瘤。

附 注: 功效相似的有**巴氏拉土蛛 L. pavlovi** Schenkel, 分布于山东、陕西、河南、广西。

## 80. 壁钱科 Urocteidae

### 壁钱属 Uroctea Dufour

**南国壁钱** 墙蜘蛛、壁蟢(通称),扁珠(广西)

**Uroctea compactilis** L. Koch

生活在老住宅的墙壁、屋角、门后。分布于华东、中南及四川、贵州、云南。

全虫(壁钱): 咸,平。解毒,止血。用于乳蛾,口舌糜烂,牙疳, 鼻衄, 痔疮, 金疮下血。 卵囊(壁钱幕): 用于喉痹,喉痧,乳蛾,牙痛,痔疮。

附 注: 功效相似的有**北国壁钱 U. lesserti** Schenkel,分布于吉林、河北、北京、山西、陕西、甘肃、山东。

## 81. 圆蛛科 Araneidae

### 圆蛛属 Aranea Linnaeu

**大腹圆蛛** 蜘蛛(通称),喜虫(宁夏),天狗(青海),蟢蜘(江苏),蟢蛛(江西)

**Aranea ventricosa** (L. Koch)

多栖于林间、屋檐、墙角,结网捕虫。分布几遍全国。

全虫(蜘蛛): 苦,寒。有毒。祛风,消肿,解毒。用于狐疝偏坠,中风口喎,小儿慢惊,口噤,疳疾,水肿,瘰疬,疥疡及蝎、蜂、蜈蚣螫伤。 网丝(蜘蛛网): 用于金创出血, 吐血, 毒疮。 蜕壳(蜘蛛蜕壳): 用于鹅口,牙疳。

附 注: 功效相似的有**棘圆蛛 A. angulopictus** Schenkel,见于山西。

## 82. 黄金蛛科 Argiopidae

### 黄金蛛属 Argiope Eudes-Deslongchamps

**悦目黄金蛛**

**Argiope amoena** L. Koch

生活在向阳的灌木丛及稻田边，结网捕虫。分布于浙江、湖北、湖南。

全体：微苦，凉。有小毒。消肿，截疟，杀虫，解毒，退黄，生肌。用于蛇咬伤，温症，疔毒疮肿。

附　注：功效相似的有**络新妇 Nephila clavata** (L. Koch)，分布于辽宁、山东、安徽、台湾、河南、湖南、四川、贵州、云南。

**横纹金蛛**　布氏黄金蛛(通称)，花蜘蛛(安徽)

**Argiope bruennichii** (Scopoli)

生活在阳光照射的草丛、潮湿地带。在草上或田边结网捕虫。分布于吉林、辽宁、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、四川。

全体(花蜘蛛)：解毒。用于瘰疬，疮肿，毒蛇咬伤。

## 83. 漏斗网蛛科 Agelenidae

### 漏斗网蛛属 Agelena Walckenaer

**迷路草蛛**　草蜘蛛、迷路漏斗网蛛(通称)，迷宫漏斗蛛(河北、浙江)，花蜘蛛(广西)

**Agelena labyrinthica** Clerck

多栖于草间低处、灌木近地面处及墙角、土坎、篱笆、石隙、树洞。分布几遍全国。

全体(草蜘蛛)：解毒。用于疔肿恶疮。

附　注：功效相似的有**缘纹边漏斗蛛 A. limbata** Thorell，分布于华东、中南及山西、贵州；**家隅蛛 Tegenaus domestica** (Clerck)，见于吉林。

## 84. 跳蛛科 Salticidae

### 蝇虎属 Menemerus Simon

**浊斑扁蝇虎**　短螯蝇虎、蝇虎(通称)，花蜘蛛(吉林)

**Menemerus confusus** (Böes et Str.)

生活于稻田及门、窗、墙壁。分布几遍全国。

全体(蝇虎)：活血祛瘀。用于跌打损伤。

# 甲壳纲　Crustacea

## 85. 铠茗荷科　Scalpellidae

### 龟足属　Mitella Oken

**龟足**(石砌)　　石砌(通称),佛手、观音手、龟脚(浙江)

**Mitella mitella**(Linnaeus)

亚热带及热带性海滨动物。生活在海浪冲击较大的沿岸高潮带，常密集成群固着于海水澄清的岩石缝隙中。分布于东海、南海。

肉(石砌)：甘、咸，平。滋补，利小便。用于积瘀，肿胀。

## 86. 茗荷科　Lepadidae

### 茗荷属　Lepas Linnaeus

**茗荷**(茗荷儿)

**Lepas anatifera** Linnaeus

附着在浮木、浮石、浮码头及船底上，营倒悬的漂浮生活。分布于全国各海区。

肉：补脾健胃，利水消肿。用于脾胃虚弱，肢体浮肿。

## 87. 藤壶科　Balanidae

### 藤壶属　Balanus Da Costa

**白脊藤壶**(白纹藤壶)　　藤壶、铫(浙江)

**Balanus albicostatus** Pilsbry——*B. amphitrite albicostatus* Pilsbry

附着生活于低盐海区及淡水流入的内湾潮间带岩石、栈桥桥基及木桩上，偶见于船底。分布几遍全国沿海。

肉：用于烧、烫伤，小儿头疖，疔疮肿毒。　壳：制酸止痛。用于胃痛，胃酸过多。

附　注：功效相似的有**布纹藤壶 B. reticulatus** Utinomi——*B. amphitrite communis* Darwin)，分布几遍全国沿海；**刺钟藤壶 B. volcano** Pilsbry——*B. tintinnabulum volcano* Pilsbry，分布于东海、南海沿海。

## 88. 笠藤壶科　Tetraclitidae

### 笠藤壶属　Tetraclita Schumacher

**日本笠藤壶**　　铃介、蛎客、马牙(通称)，藤壶、铫(浙江)

**Tetraclita japonica** Pilsbry

生活在沿海岩石阴面下。分布于东海、南海。

**肉**：用于疔疮肿毒，烫伤。 **壳**：用于胃痛，胃酸过多。

## 89. 缩头水虱科 Cymothoidae

### 鱼怪属 Ichthyoxenus Zimmer

**日本鱼怪** 鱼怪、鱼虱、鲤怪(通称)，鱼寄生(云南)

**Ichthyoxenus japonensis** Richardson

寄生在鲤、鲫鱼胸部围心腔后方的体腔内。见于长江、黄河流域、京津一带及台湾、云南的淡水鱼中，云南较多。

全体(鱼虱子)：咸，寒。降逆，开郁，解毒，止痛。用于噎膈，气逆，胸膈胀痛。

附 注：①近年试用本品稳定食道癌及子宫癌病情并有一定止痛作用。②功效相似的有**中华鱼怪 I.sinensis** Shen，见于黄河、长江流域淡水鱼中；**张氏鱼怪 I. tchangi Yu**，见于长江以南各水域淡水鱼中。

## 90. 珊瑚水虱科 Corallanidae

### 急流水虱属 Tachaea Leach

**中国急流水虱**

**Tachaea chinensis** Thielemann

栖于大陆架海底。见于浙江海域。

全体：用于胸膈胀痛，气逆，噎膈。

## 91. 团水虱科 Sphaeromidae

### 海底水虱属 Dynoides Barnard

**腔齿海底水虱**

**Dynoides dentisinus** Shen

栖于大陆架海底。分布于全国各海区，见于浙江。

全体：活血祛瘀。

## 92. 栉水虱科 Asellidae

### 栉水虱属 Asellus Geoffroy

**日本栉水虱**

**Asellus nipponensis** Nichols

栖于大陆架海底。分布于全国各海区，见于浙江。

全体：用于跌打损伤。

## 93. 平甲虫科(卷地鳖科) Armadillidae

### 卷地鳖属 Armadillidum Latreille

**平甲虫**(普通卷地鳖) 鼠妇、潮虫、西瓜虫(通称)，蒲鞋虫(江苏)，案板虫(青海)

**Armadillidum vulgara** (Latreille)

喜阴暗、潮湿的环境。多集栖于朽木、腐叶、石块下，偶见于房屋、庭院内。分布几遍全国。

全体(鼠妇)：酸，凉。破血，利水，解毒，止痛，平喘。用于小便不通，经闭癥瘕，口齿疼痛，鹅口诸疮，哮喘，湿痰，血淋，坠胎，解蜘蛛毒及蚰蜒入耳。

附 注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 94. 蜡鼠妇科 Porcellionidae

### 鼠妇属 Porcellio Latreille

**鼠妇** 潮虫(吉林)、平甲虫(贵州)

**Porcellio scaber** Latreille

多集居于潮湿的墙角或阴湿的砖石下。分布于吉林、辽宁、河北、山西、山东、江苏、浙江、湖北、湖南、贵州。

全体：用于小便不通，经闭癥瘕，口齿疼痛，哮喘，湿痰，血淋，坠胎。

附 注：功效相似的有**长鼠妇 P. elongata** Shen，见于浙江。

## 95. 潮虫科 Oniscidae

### 喜阴虫属 Philoscia Latreille

**柔毛喜阴虫**

**Philoscia villosa** Jackson

栖于阴暗潮湿场所。见于浙江。

全体：破瘀血，消癥瘕，利水。用于闭经，癥瘕，腹痛，小便不利。

## 96. 海蟑螂(海岸水虱)科 Ligiidae

### 海蟑螂属 Ligia Weber

**海蟑螂**(海岸水虱)　　海蛆(浙江)

**Ligia exotica** (Roux)

生活在高潮线及潮上带海岸岩石附近，善爬行。分布几遍全国沿海。

全体：用于小儿疳积，跌打损伤，痈疽。

## 97. 对虾科 Penaeidae

### 新对虾属 Metapenaeus Wood-Mason et Alcock

**布氏新对虾**

**Metapenaeus bukentoadi** Kubo

栖于沿海泥沙底上。分布于南海，见于海南。

雄虾：消肿利尿。用于水肿，肝炎。

**周氏新对虾**

**Metapenaeus joyneri** (Miers)

生活在泥沙底质的浅海。分布于山东半岛以南至广东海域。

全体：滋补强壮。

附　注：功效相似的有**鹰爪糙对虾 Trachypenaeus curvirostris** (Stimpson)，分布于全国各海区，渤海、黄海产量大。

### 对虾属 Penaeus Fabricius

**对虾**　　大虾(河北)，明虾(福建)，斑节虾(浙江)

**Penaeus orientalis** Kishinouye

生活在泥沙底的浅海。分布于渤海、黄海。已开展人工养殖。

肉或全体(海虾)：甘、咸，温。补肾壮阳，滋阴健胃。用于筋骨疼痛，肾虚阳痿，神经衰弱。　甲壳(海虾壳)：用于秃疮，疥癣，肾虚。

附　注：功效相似的有**日本对虾 P. japonicus** Bata，分布于黄海南部至南海海域，已开展养殖；**墨吉对虾 P. merguiensis** de Man，分布于广东、海南、广西沿海，已开展养殖；**斑节对虾 P. monodon** Fabricus，分布于东海南部至南海沿海，已开展养殖；**长毛对虾 P. penicillatus** Alcock，分布于福建、广东、海南、广西沿海，已开展养殖。

## 98. 长臂虾科 Palaemonidae

### 沼虾(青虾)属 Macrobrachium Bate

**日本沼虾** 青虾(通称),虾(宁夏),淡水虾(广西)

**Macrobrachium nipponense** (de Haan)

生活在淡水湖泊中。常栖息于多水草的岸边。分布几遍全国。

肉或全体(虾): 甘,温。补肾壮阳,通乳,托毒。用于阳痿,乳汁不下,丹毒,痈疽,臁疮。

附 注: 功效相似的有**罗氏沼虾 M. rosenbergi** (de Man),原产东南亚, 我国已引种试养,见于广西。

### 长臂虾属 Palaemon Weber

**脊尾白虾**

**Palaemon carinicauda** Holthuis

生活在近岸泥沙底的浅海中,对盐度变化的适应能力很强, 甚至在淡水中也能生活。我国沿海均有分布,渤海、黄海较多。

全体: 用于肾虚阳痿,半身不遂,筋骨疼痛。

附 注: 功效相似的有**秀丽长臂虾 P. modestus** (Heller), 分布几遍全国淡水河湖中;**锯齿长臂虾 P. serrifer** (Stimpson), 分布几遍全国沿海。

## 99. 龙虾科 Palinuridae

### 龙虾属 Panulirus Gray

**锦绣龙虾** 龙虾(通称)

**Panulirus ornatus** (Fabricius)

生活在10米以内的海底石缝中。分布于黄海南部至南海海域,舟山群岛以南海域习见。

全体(海虾): 甘、咸,温。补肾壮阳,镇静,健胃。用于阳痿,筋骨疼痛, 手足抽搐、肾虚。 甲壳(海虾壳): 用于疥癣,秃疮,肾虚。

附 注: 功效相似的有**波纹龙虾 P. homarus** (Linnaeus), 分布于南海近岸海区;**密毛龙虾 P. penicillatus** (Olvier), 分布于海南及西沙群岛海域;**中国龙虾 P. stimpsoni** Holthuis, 分布于东海南部至南海沿海。

**杂色龙虾** 龙虾(通称)

**Panulirus versicolor** (Fabricius)

生活在浅海岩礁间。分布于广东、海南、西沙群岛沿海海域。

全体：用于阳痿，乳蛾及过敏症。

## 100. 河虾科 Astacidae

### 蝲蛄属 Cambaroides Faxon

**东北蝲蛄** 蝲蛄(通称)，东北螯虾(东北)

**Cambaroides dauricus** (Pallas)

生活在山溪或山地附近的河川、湖泊中。分布于东北黑龙江流域。

胃内磨石(蝲蛄石)：止血，止泻，利尿，壮筋骨。用于外伤出血，泻痢，小儿软骨症。

附 注：功效相似的有**史氏蝲蛄 C. schrenkii** (Kessler)，分布于黑龙江下游；**朝鲜蝲蛄 C. similis** (Köelbel)，分布于辽宁。

## 101. 蝼蛄虾科 Upogebiidae

### 蝼蛄虾属 Upogebia Leach

**大蝼蛄虾** 蝼蛄虾(通称)

**Upogebia major** (de Haan)

穴居生活在浅海或海湾低潮线的泥土中。分布于渤海、黄海沿海。

全体：甘、咸，温。通经，下乳。用于产妇乳汁不足。

## 102. 虾蛄科 Squillidae

### 虾蛄属 Squilla Gronovius

**脊条虾蛄** 放尿泡、虾不类虫(浙江)

**Squilla costata** de Haan

栖于泥、沙砾底的潮间带或浅海，穴居底栖。分布于东海、南海。

全体：用于遗尿症。

附 注：功效相似的有**虾蛄 S. oratoria** de Hann，分布于东海沿海。

## 103. 寄居蟹科 Paguridae

### 寄居蟹属 Pagurus Fabricius

**大寄居蟹** 寄居虫、寄居虾、寄居蟹(通称)

**Pagurus ochotensis** Brandt

生活在海滨石块间或浅水内，寄居在空螺壳内。分布几遍全国沿海。

全体：甘，温。活血散瘀。用于血瘀，腹痛，瘰疬。

附　注：功效相似的有**呆寄居蟹 P. samuelis** (Stimpson)，分布几遍全国沿海，止于浙江；**下齿细螯寄居蟹 Clibanarius infraspinatus** Hilgendorf，分布于东海沿海；**艾氏活额寄居蟹 Diogenes edwardsii** (de Haan)，见于山东沿海。

## 104. 馒头蟹科　Calappidae

### 馒头蟹属　Calappa Weber

**公鸡馒头蟹**　　馒头蟹(通称)

**Calappa gallus** (Herbst)

生活在深 20—100 米的泥沙质海底、岩岸石缝或珊瑚礁中。分布于南海沿海。

壳：咸，凉。理气止痛。用于胸痛，脚癣，避孕。

附　注：功效相似的有**卷折馒头蟹 C. lophos** (Herbst)，分布于东海南部至南海沿海；**逍遥馒头蟹 C. philargius** (Linnaeus)，分布于东海、南海沿海；**红点黎明蟹 Matuta lunaris** (Forskal)，分布于东海、南海沿海。

## 105. 蜘蛛蟹科　Majidae

### 绒球蟹属　Doclea Leach

**羊毛绒球蟹**　　毛蟹、甲指红(通称)

**Doclea** vis (Herbst)

生活在河口的泥底或距海岸不远的泥滩、卵石滩上。分布于东海南部及南海沿海。

全体：咸，寒。清热燥湿。用于痢疾，脱肛，痔疮。

## 106. 菱蟹科　Parthenopidae

### 蚀菱蟹属　Daldorfia Rathbun

**粗糙蚀菱蟹**　　石蟹(通称)

**Daldorfia horrida** (Linnaeus)

生活在潮间带至深 125 米左右的岩石底、泥沙或具贝壳的海底及珊瑚礁浅水中。分布于台湾海峡至南海沿海。

壳：咸，寒。散结化痰。用于瘰疬，高血压病。　肉：用于高血压症。

## 107. 梭子蟹科 Portunidae

### 蚧属 Charybdis de Haan

**日本蚧** 红夹子、鬼脸儿(通称),石其角、拔卓子(浙江),海蚧(福建)

**Charybdis japonica** (A. Milne-Edwards)

生活在低潮线,有水草或泥沙的水底及石下。分布几遍全国沿海。

全体(蝤蛑): 咸,温。破血,通乳,消食,通经。用于血滞经闭,小儿软骨病,小儿头疖,黄疸,宿食及乳汁不足。

附 注: 功效相似的有**环纹蚧 C. annulata** (Fabricius),分布于南海沿海;**斑纹蚧 C. cruciata** (Herbst),分布几遍全国沿海。

### 梭子蟹属 Portunus Weber

**三疣梭子蟹** 枪蟹(通称),江蟹(浙江),花蟹(广西)

**Portunus trituberculatus** (Miers)

生活在深 10—30 米的沙泥或沙质海底。全国沿海均有分布。

壳: 咸,凉。活血散瘀,消肿解毒,止痛。用于跌打损伤,闪挫,乳痈,疮毒疖肿,小儿食积,冻伤,乳腺癌。 肉和内脏: 咸,寒。清热,散血,滋阴。用于湿热,产后血闭,阴虚。

附 注: 功效相似的有**远海梭子蟹 P. pelagicus** (Linnaeus),分布于东海南部至南海沿海;**红星梭子蟹 P. sanguinolentus** (Herbst),分布于东海南部至南海沿海。

### 青蟹属 Scylla de Haan

**锯缘青蟹** 羔蟹、朝蟹(浙江),红蚧(台湾),膏蟹(广东),青蟹(广西)

**Scylla serrata** (Forskal)

生活在近岸或河口附近,温暖而盐度较低的浅海中。分布于东海及南海沿海。

全体: 咸,寒。活血化瘀,利水消肿,滋补强壮。用于水肿,产后腹痛,乳汁不足。壳: 用于食虾过敏,产后腹痛。

## 108. 溪蟹科 Potamonidae

### 溪蟹属 Potamon Savigny

**锯齿溪蟹** 螃蟹,方海(通称)

**Potamon denticulatum** (H. Milne-Edwards)

生活在河、湖、水田或山溪中。分布于华东及山西、陕西、河南、湖北、湖南、四川。

全体(方海)：软坚散结，接骨。用于跌打损伤，骨折，癥瘕积聚。

附　注：①功效相同，与本种同载《中华人民共和国药典》1990年版的有**云南近溪蟹 P. yunnanense** Kemp，见于云南。②功效相似的有**溪蟹 P.spinescens** (Calman)，见于云南。

## 109. 华溪蟹科　Sinopotamidae

### 华溪蟹属　Sinopotamon Milne-Edwards

**锯齿华溪蟹**

**Sinopotamon denticulatum** (Milne-Edwards)

栖息在河、湖、稻田、山溪等水域中。分布于陕西、安徽、河南、湖北、湖南、四川、贵州。

全体：软坚散结，清热消肿，止咳，接骨。

## 110. 方蟹科　Grapsidae

### 绒螯蟹属　Eriochier de Haan

**中华绒螯蟹**　　河蟹、毛蟹(通称)

**Eriocheir, sinensis** H. Milne-Edwards

生活在通海的江、河、湖荡沿岸泥洞中，营穴居生活，洄游到近海河口处繁殖。分布于长江流域及辽宁至福建沿海各省。

全体(蟹)：咸，寒。微毒。清热，散血，续筋骨。用于筋骨损伤，疥癣，漆疮，烫伤，牙痛，扭伤，腰痛，子宫下垂，解莨菪毒。　爪(蟹爪)：破血，消积，坠胎。用于难产，产后瘀积腹痛，癥瘕。　甲壳(蟹壳)：破瘀消积。用于瘀血积滞，胁痛，腹痛，乳痈，冻疮。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②功效相似的有**日本绒螯蟹 E. japonicus** de Haan，分布于台湾、福建、广东雷州半岛东岸。

### 相手蟹属　Sesarma Say

**无齿相手蟹**　　螃蜞(通称)

**Sesarma** dehaani (H. Milne-Edwards)

穴居生活在河流泥岸或堤内。分布于辽宁、山东、江苏、安徽、浙江、福建、台湾、广东、海南。

脂肪(螃蜞)：咸，凉。有小毒。消肿，解毒。用于痈疮，湿癣，河豚中毒。

# 唇足纲　Chilopoda

## 111. 蜈蚣科　Scolopendridae

### 蜈蚣属　Scolopendra Linnaeus

**少棘蜈蚣**　　蜈蚣、少棘巨蜈蚣(通称)，百脚虫(江苏、浙江)，天龙(河南)，鱼公(湖北)
**Scolopendra subspinipes mutilans** L. Koch

生活在低山、丘陵地区林间石缝、沟坎、腐叶下的潮湿阴暗处。除东北、内蒙古、新疆、台湾、西藏外，全国均有分布。主产于长江中下游地区。

全体(蜈蚣)：辛，温。有毒。息风镇痉，攻毒散结，通络止痛。用于小儿惊风，抽搐痉挛，中风口㖞，半身不遂，破伤风症，风湿顽痹，疮疡，瘰疬，毒蛇咬伤。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。② 功效相似的有**多棘蜈蚣 S. subspinipes multidens** (Newport)，分布于福建、湖北、广西、云南。

## 112. 蚰蜒科　Scutigeridae

### 花蚰蜒属　Thereuopoda Verhoeff

**花蚰蜒**　　蚰蜒、钱串(通称)，草鞋虫(安徽)
**Thereuopoda** sp.

栖息于草丛、落叶、石下等潮湿环境，庭园、住室亦常见。分布于长江流域以南各省。

全体：用于毒蛇咬伤。

附　注：功效相似的有**索蚰蜒 Thereuonema** sp. 分布于东北、华北及长江流域以南各省。

# 倍足纲　Diplopoda

## 113. 球马陆科　Glomeridae

### 球马陆属　Glomeris Latreille

**日本球马陆**　　滚山虫、滚山球马陆(通称)，滚山珠(安徽)，地罗汉(云南)
**Glomeris nipponica** Kishida

多栖于山坡潮湿的枯枝腐叶下及山沟石下。分布于安徽、湖北、四川、贵州、云南。

全虫(滚山虫)：辛、咸，温。舒筋活血，祛风除湿，接骨止痛。用于风湿，骨折，跌打损伤，阴挺，脱肛，疮肿。

## 114. 圆马陆科 Paradoxosomatidae

### 陇带马陆属 Kronopolites Attems

**宽跗陇马陆** 掸子虫、马陆(通称),草鞋虫(广西)

**Kronopolites svenhedini** (Verhoeff)

喜生活在阴暗潮湿,有腐殖质的草丛、树荫下。分布于甘肃、四川、广西。

全体:解毒,镇痛,和中开胃。用于疮疖,乳痈,肝炎,胃脘痛胀。

附 注:功效相似的有**尖跗陇带马陆 K. acuminatus biagrilectus** Hoffman,见于广西;**窄跗陇带马陆 K. swirhoei** (Pocock),见于浙江。

## 115. 蟠马陆科 Sphaerotheriidae

### 圆刺蟠马陆属 Sphaerobelum Verhoeff

**毛圆刺蟠马陆** 滚山虫、山苏甲(通称),都婶(壮语)

**Sphaerobelum hirsutum** Verhoeff

生活在山坡潮湿多腐殖质的乔灌木丛中,落叶堆中,石下或洞穴中。见于广西。

全体:辛、咸,温。舒筋活血,消肿散瘀,接骨止痛。用于跌打损伤,骨折,脱臼,风湿,脱肛,阴挺。

## 116. 山蛩科 Spirobolidae

### 山蛩属 Spiroblus Brandt

**约安山蛩** 锅耳朵(广西)

**Spiroblus joannisi** (Brolemann)

栖息于阴暗潮湿,多腐殖质处。分布几遍全国。

全虫:辛,温。有毒。破积活血,祛风,解毒。用于痈肿,毒疮,瘰疬,痞满,麻风病,风湿痛。

### 旋马陆属 Spirobolus Brandt

**燕山蛩** 马陆(通称),约安巨马陆(山东、湖南),闷棒虫(广西)

**Spirobolus bungii** (Brandt)

栖于阴湿地区,多草根及腐殖质的地方。见于河北、河南、湖北的丘陵山地。

全体:破积,解毒。用于腹中症积痞块,乳蛾,疮毒。

附 注:功效相似的有**丽山蛩 S. exquisitus** Karsh,分布于华北、华东、中南。**绿山**

**蚤 S. marginatus** Brolemann，分布于华北、华东、中南；**浙山蚤 S. walkeri** Pocock，分布于华北、华东、中南；

# 昆虫纲 Insecta

## 117. 衣鱼科 Lepismatidae

### 衣鱼属 Lepisma Linnaeus

**衣鱼** 白鱼、蛀鱼、蠹鱼(通称)，蛟剪虫(甘肃)，书虫(安徽)

**Lepisma saccharina** Linnaeus

栖息在树叶、石块、青苔下等潮湿处，房屋、厨房及衣箱、书籍中也常见。分布几遍全国。

全虫(衣鱼)：咸，凉。利尿，通淋，祛风，解毒。用于小便不利，淋证，小儿惊痫，疮疖，目翳。

附 注：功效相似的有**毛衣鱼 Ctenolepisma villosa** (Fabricius)，分布几遍全国。

## 118. 蜓科 Aeschnidae

### 马大头属 Anax Leach

**大蜻蜓** 蜻蜓(通称)，绿豆蜻蜓(河北)，马大头(青海)，绿蜻蜓(新疆、云南)

**Anax parthenope** Selys

活动于原野、村舍、庭园及水边。分布几遍全国。

全体：甘，微寒。益肾滋阴，清热解毒，止咳。用于肾虚阳痿，遗精，咽喉肿痛，顿咳，中风惊痫，目翳，尿血，小便不利。

附 注：功效相似的有**蜻蜓 Aeschna melanictera** Selys，分布几遍全国。

## 119. 蜻科 Libellulidae

### 红蜻属 Crocothemis Brauer

**红蜻** 赤蜻蛉(通称)，红蜻蜓(广西)

**Crocothemis servilia** Drury

多在池沼附近活动。分布几遍全国。

成虫：补肾益精，解毒消肿，润肺止咳。用于阳痿遗精，咽喉肿痛，顿咳。

### 黄蜻属　Pantala Hagen

**黄蜻**　　黄衣(通称),海蜻蛉(福建)

**Pantala flavescens** Fabricius

生活在田野中。飞翔力强,有迁飞习性,能远飞过海。分布几遍全国。

成虫：用于阳痿遗精,咽喉肿痛及贫血性头痛,头晕。

### 赤卒属　Sympetrum Newman

**夏赤蜻**　　夏赤卒(通称),赤衣使者(河南)

**Sympetrum darwinianum** Selys

栖息于旷野池沼、河流附近草木繁茂的地方。分布于华北、华东、中南。

成虫：用于阳痿遗精,咽喉肿痛及顿咳。

附　注：功效相似的有**褐顶赤蜻 S. infuscatum** Selys,分布于东北、华北、华东、中南。

## 120. 蜚蠊科　Blattidae

### 大蠊属　Periplaneta Imms

**美洲大蠊**　　蟑螂、蜚蠊、灶马子、偷油婆(通称),大蜚蠊(河北、河南)

**Periplaneta americana** (Linnaeus)

栖息于室内,为工厂、商店、轮船、火车、图书馆、旅社、浴室、居民住房及各种仓库内的害虫。分布几遍全国。

成虫(蟑螂)：咸,寒。有毒。破瘀,化积,消肿,解毒。用于癥瘕积聚,小儿疳积,疔疮,喉蛾,痈肿,蛇虫咬伤。

**澳洲大蠊**　　蟑螂、红蜚蠊(通称)

**Periplaneta australasiae** (Fabricius)

喜居于家室内及仓库、商店、饭馆、旅社、轮船中,偶见于温室危害栽培植物幼苗。分布于广东、广西、云南。

成虫：活血散瘀,解毒消疳,利水消肿。用于癥瘕积聚,小儿疳积,脚气水肿,疔疮肿毒,蛇虫咬伤及跌打损伤。

## 121. 姬蠊科　Phyllodromiidae

### 姬蠊属　Blattela Caudell

**德国小蠊**　　蟑螂、茶婆虫(通称)

**Blattela germanica** (Linnaeus)

栖息于工厂、商店、仓库、旅馆、住室、火车、轮船等场所。常活动于厨房、浴室及书籍、纸张中。分布几遍全国。

成虫：活血散瘀，消疳，解毒，利水消肿。用于癥瘕积聚，小儿疳积，脚气水肿，疔疮肿毒及蛇咬伤。

### 后片蠊属　Opisthoplatia Brunner Von Wattenwyl

**东方后片蠊**　金边土鳖(福建、湖南)，赤边水蜜(贵州)

**Opisthoplatia orientalis** (Burmeister)

栖于阴暗潮湿的草堆、腐烂树枝、山坑石下及石隙中，室内墙角、伙房、仓底、酱坊、油坊、缸底、桶底及各种糠堆、麸饼下。分布于福建、湖南、广东、海南、广西、贵州。

雌虫成体：活血祛瘀，消肿止痛，通经下乳。用于跌打损伤，瘀血肿痛，血积癥瘕，经闭，乳汁不通及产后血瘀腹痛。

## 122. 鳖蠊科　Corydiidae

### 地鳖属　Eupolyphaga Chopard

**中华真地鳖**　中华地鳖、土鳖、土元、簸箕虫(通称)，蚂蚁虎(江苏)，地团鱼(湖北)

**Eupolyphaga sinensis** (Walker)

栖息于阴暗潮湿、腐殖质丰富的松土中及枯枝落叶下、石下，住室厨房、粮仓、灶脚、作坊墙边及柴草堆下。分布几遍全国。

雌性成虫体(土鳖虫)：咸，寒。有小毒。破瘀血，续筋骨。用于筋骨折伤，瘀血闭经，癥瘕痞块。

附　注：功效相同，与本种共载《中华人民共和国药典》1990 年版的有**冀地鳖 Polyphaga plancyi** Bolivar ——*Steleophaga plancyi* (Bolivar)，分布于河北、陕西、甘肃、青海、湖北、湖南、四川、贵州。

## 123. 螳螂科　Mantidae

### 小螳螂属　Statilia Stâl

**小刀螳螂**　螳螂、小刀螂(通称)，来尿宝儿(江苏)，斑螳螂(河南、湖北)

**Statilia maculata** (Thunberg)

栖于草丛、田园、灌丛中。分布于华东、中南及河北、山西、甘肃、四川、贵州。

卵鞘(桑螵蛸)：甘、咸，平。益肾固精，缩尿，止浊。用于遗精、滑精，遗尿、尿频，小便白浊。　成虫(螳螂)：甘、咸，温。用于惊痫，咽喉肿痛，痔疮。

附　注：①功效相同，与本种共载《中华人民共和国药典》1990 年版的有**拒斧(广腹)**

**螳螂 Hierodula patellifera** (Serville)，分布于福建、台湾、河南、湖北、广东。②功效相似的有**薄翅螳螂 Mantis religiosa** (Linnaeus)，分布几遍全国；**狭翅(华北)螳螂 Paratenodera angustipennis** Saussure，分布于东北、华北及陕西、安徽；**大刀(二点)螳螂 Tenodera aridifolia** (Stoll)，分布几遍全国。③**中华螳螂 Tenodera sinensis** Saussure 虽为《中华人民共和国药典》1990 年版收载，**索氏螳螂 Hierodula saussurei** Kirby 也认为药用，但由于目前我国螳螂目分支研究对该二种有所争议，故未收载。

## 124. 鼻白蚁科 Rhinotermitidae

### 家白蚁属 Coptotermes Wasmann

**家白蚁** 白蚁、白蚂蚁(通称)，蝝(河南)，飞蟻(湖南)
**Coptotermes formosanus** Shiraki

营群居生活。一般栖居于林地、庭园的土壤内或松、杉、竹、桉、柏、槐、桑、茶、合欢、麻栎、臭椿、银杏、木槿、棕榈、卫矛、梧桐、悬铃木、三叶橡胶等木材内、木材加工品以及活树的已死部分内，衣箱、书柜等家具内也有定居。分布于华东、中南及四川、云南。

成虫：滋补强壮。用于年老体衰，久病虚弱。

## 125. 白蚁科 Termitidae

### 土白蚁属 Odontotermes Holmgren

**黑翅土白蚁** 黑翅大白蚁、台湾白蚁(通称)
**Odontotermes formosanus** (Shiraki)

营群居生活。栖居于林缘土壤内或松、杉、柏、柳、桉、竹、茶、合欢、广玉兰、枫杨、杜仲、香樟、柿、女贞、龙眼、桂花、三叶橡胶等树上。分布于华东、中南、西南。

成虫：滋补强壮。

## 126. 蟋斯科 Tettigoniidae

### 纺织娘属 Mecopoda Audinet-Seryville

**纺织娘** 叫哥哥、叫姑姑(通称)，络丝娘(河南)，络纬蟋(湖南)，叫蚂蚱(广西)
**Mecopoda elongata** (Linnaeus)

栖于草丛中，成虫于夏、秋季间发现。分布于华东、中南及陕西、甘肃、四川、贵州。

成虫(叫姑姑)：熄风镇惊。用于小儿惊风，痉挛抽搐。

### 鸣蟋属 Gampsocleis Fieber

**聒聒** 蝈蝈、蟋斯(通称)，促织儿(广西)，聒盾蟋(云南)

**Gampsocleis gratiosa** Brunner-Wattenwyl

栖于田野、山麓的灌木丛或草丛间，多见于豆类植物上。分布于东北及河北、山西、陕西、江苏、安徽、河南、广西、贵州、云南。

成虫：清热解毒，消肿止痛，利水。用于中耳炎，水肿，腰腿疼痛。

附　注：功效相似的有**布氏蠖斯 G. buergeri** de Haan，见于河北、北京。

## 127. 沙螽科　Stenopelmatidae

### 灶马属　Diestrammena Brunner

**日本灶马**

**Diestrammena japonica** Blatchley

栖于阴湿处，夜间多集于灶房。见于安徽。

鲜全虫：用于跌伤疼痛。

## 128. 蝗科　Acrididae

### 蚱蜢属　Acrida Linnaeus

**东亚蚱蜢**　　中华蚱蜢、异色剑角蝗、扁担钩、尖头蚱蜢(通称)

**Acrida cinerea** (Thunberg)——*A. chinensis* (Westwood)

生活在禾本科杂草及棉田、农田附近。危害水稻、玉米、高粱、谷子、豆类、甘蔗、花生、棉花等农作物及禾本科植物。分布于河北、山西、陕西、山东、江苏、安徽、浙江、江西、广东、广西、四川。

全虫：止喘平喘，定惊熄风，清热解毒。用于咳嗽痰喘，顿咳，小儿惊风，冻疮。

### 飞蝗属　Locusta Linnaeus

**东亚飞蝗**　　飞蝗(通称)，蚂蚱(河北)，飞蚤(广西)

**Locusta migratoria manilensis** (Meyen)

喜栖于禾本科杂草茂密的辽阔荒地。取食芦苇、稗、雀麦、红草、大画眉草、茅草、狗尾草、蟋蟀草、狗牙草、马绊秧、三棱草等。分布于华北、东南、中南。

干或鲜成虫：咸，平。止咳平喘，滋补强壮，止疼，解毒透疹。用于小儿惊风，咽喉肿痛，疹出不畅，顿咳，咳嗽痰喘，中耳炎，痢疾，泄泻，小儿疳积，瘰疬，肾虚，

附　注：功效相似的有**棉蝗 Chondracris rosea** (De Geer)，分布于东南及河北、内蒙古、陕西、湖北、湖南、广东、广西、四川、云南；**长额负蝗 Atractomorpha lata**(Motschulsky)，分布于河北、山东、江苏、福建、台湾、河南、湖北；**黄脊竹蝗 Ceracris kiangsu** Tsai，分布于江苏、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、云南；**云斑车蝗 Gastrimargus marmoratus** (Thunberg)，分布于东南及河北、陕西、广东、四川、云

南；日本黄脊蝗 **Patanga japonica** (I. Bolivear)，分布于东南、中南、西南；褐色雏蝗 **Chorthippus brunneus** (Thunb)，分布于东北及河北、青海、新疆。

### 稻蝗属 Oxya Seryville

**中华稻蝗** 蝗虫(通称)，蚂蚱(河北)，麦蟑(宁夏)，油蚂蚱(云南)

**Oxya chinensis** (Thunberg)

多生活于水稻、玉米、高粱、甘蔗等田中，以及潮湿近水的草滩、田埂上，食害稻、玉米等作物。除东北及新疆、西藏外，全国均有分布。

全虫(蚱蜢)：辛、甘，温。有毒。用于小儿惊风，顿咳，冻疮，斑疹不出。

附 注：功效相似的有**二齿稻蝗 O. bidentata** Willemse 分布于江苏、浙江、广西、四川、贵州；**长翅稻蝗 O. velox** (Fabricius)，分布于东南及河北、山西、陕西、湖北、广东、广西、四川、贵州、西藏。

**小稻蝗** 蝗虫、稻蝗(通称)

**Oxya hyla intricata** (Stál)

常群集于稻田及禾本科杂草丛中，危害水稻、甘薯。分布于江苏、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、云南。

干或鲜全虫：止咳平喘，镇惊止痉，解毒透疹，消肿止痛。用于咳嗽痰喘，顿咳，小儿惊风，咽喉肿痛，疹出不畅，中耳炎。

## 129. 蟋蟀科 Gryllidae

### 小蟋蟀属 Gryllulus Uvarov

**中华蟋蟀** 小蟋蟀(通称)，姬蟋蟀(河北)

**Gryllulus chinensis** (Weber)

生活在较潮湿的耕地、溪沟边或乱石堆、草丛中。分布几遍全国。

成虫：辛、咸，温。有毒。利尿，破血。用于水肿，小便不通，尿路结石，肝硬化腹水。

### 蟋蟀属 Gryllus Latreille

**台湾油葫芦**

**Gryllus mitratus** Burmeister

隐栖于农田缝隙、墙角、砖石、杂草中。危害各种作物，亦入家室咬毁食品、衣物。分布于河北、北京、山西、山东、江苏、安徽、河南、广西、贵州、西藏。

成虫(大头狗)：辛、咸，温。利水消肿。用于水肿，小便不利。

附 注：功效相似的有**南方油葫芦 G. testaceus** Walker，分布于华北、华南及湖南、广东、广西。

### 小长颚蟋属 Scapsipedus Saussure

**长颚蟋** 瘪嘴、小咪、蟋蟀(通称)

**Scapsipedus aspersus** (Walker)

栖息于杂草丛、枯枝烂叶下、砖石、房角缝隙及菜园、农田田埂等较潮湿的地方。危害各种作物、豆类、甘薯、芝麻、瓜类、谷物、杨树等，并喜咬食作物近地的柔嫩部分，造成危害。分布几遍全国。

成虫(蟋蟀)：辛、咸，温。有毒。利尿，催生，透发痘疹。用于小儿遗尿，疹透不畅，水肿，小便不通，阳痿，妇女宫缩无力性难产。

附 注：功效相似的尚有**花生大蟋 Brachytrupes portentosus** Lichtenstein，分布几遍全国；**大扁头蟋 Loxoblemmus doenitzi** Stein，分布于河北、陕西、江苏、安徽、河南、广西、四川；**斗蟋 Scapsipedus micado** Saussure，分布于辽宁、河北、山东、江苏、安徽、福建、台湾、四川。

## 130. 蝼蛄科 Gryllotalpidae

### 蝼蛄属 Gryllotalpa Latreille

**非洲蝼蛄** 小蝼蛄、土狗、蝲蝲蛄(通称)，地老虎(贵州)

**Gryllotalpa africana** Palisot de Beauvois

生活在潮湿的田基、庭园等沙质土壤及碱性土壤中，多见于腐殖质较多的地方。危害稻、麦、玉米、高粱、蔬菜、棉、麻、桑、茶及杨、榆、落叶松、油松等各种树木幼苗。分布几遍全国。

成虫(蝼蛄)：咸，寒。利水，消肿，解毒。用于水肿，小便不利，石淋，大便秘结，跌打损伤，恶疮肿毒。

附 注：功效相似的有**台湾蝼蛄 G. formosana** Shiraki，分布于台湾、广东、广西；**华北蝼蛄 G. unispina** Saussure，分布于东北、华北、西北及山东、江苏、福建、湖北。

## 131. 蝉科 Cicadidae

### 蚱蝉属 Cryptotympana Stal

**蚱蝉** 黑蚱、知了(通称)，枯蝉(甘肃)

**Cryptotympana atrata** (Fabricius)——*C. pustulata* (Fabricius)

多栖息在杨、柳、榆、槐、桃、李、苹果、梨、柑桔、葡萄、桑、荔枝、水杉、苦楝、栎、悬铃木等树上，也见于竹、棉等植物上。分布几遍全国。

若虫羽化脱落的皮壳(蝉蜕)：甘，寒。散风除热，利咽，透疹，退翳，解痉。用于风热感冒，咽喉痛，音哑，麻疹不透，风疹瘙痒，目赤翳障，惊风抽搐，破伤风。 全虫(蚱蝉)：

咸、甘，寒。清热，熄风，镇惊。用于小儿惊风，癫痫，夜啼，三叉神经痛。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。② 功效相似的有**华南蚱蝉 C. mandarina** Distant，分布于广西、四川、贵州、云南；**蛁螬 Oncotympana maculaticollis** (Motschulsky)，分布于河北、山西、陕西、甘肃、山东、河南、湖北、四川。

## 红娘子属　Huechys Amyot et Serville

**黑翅红娘子**　　红蝉、红娘虫(通称)，红姑娘(广西、四川)

**Huechys sanguinea** (De Geer)

成虫栖于丘陵地带低矮树丛中；幼虫生活在未开垦的沙质土壤中，吸食树的根液。分布于华东及陕西、湖北、湖南、广东、广西、四川、云南。

成虫(红娘子)：苦、辛，平。有毒。强阴益精，行瘀活血，通经，解毒。用于瘀血腰痛，月经停闭，阳痿，瘰疬，翳障，疥癣恶疮。

附　注：功效相似的有**褐翅红娘子 H. philaemata** (Fabricius)，分布于东南及广东、海南、广西、云南；**短翅红娘子 H. thoracica** Distant，见于云南。

## 螗蚞属　Platypleura Amyot et Serville

**螗蚞**　　褐斑蝉(湖北)

**Platypleura kaempferi** (Fabricius)

栖息于杨、柳、泡桐、悬铃木、桑、茶、苹果、梨、梅、桃、李、柿、柑桔、核桃等树上。分布于华东及河北、陕西、河南、湖北、湖南、广东。

若虫羽化前被麦角菌科真菌致死的带菌虫体(土蝉花)：甘，寒。疏风散热，定惊，止疟。用于小儿夜啼，惊痫抽搐，心悸，疟疾。

附　注：寄生真菌为小蝉草 **Cordyceps sobolifera** (Hill) Berk. et Br.

## 蛁蝉属　Tibicen Berthold

**山蝉**

**Tibicen flammatus** (Distant)

栖于山区竹林中。分布于江苏、浙江、广东、四川、云南。

被麦角菌科真菌致死的幼虫(蝉花)：甘，寒。疏风清热，透疹解痉，止疟。用于惊痫，心悸，疟疾，小儿夜啼，痘疹不透。

附　注：寄生真菌为大蝉草 **Cordyceps cicadae** Shing。

# 132. 蜡蝉科　Fulgoridae

## 蜡蝉属　Lycorma Stai

**斑衣蜡蝉**　　樗鸡、灰蝉(通称)，椿皮蜡蝉(河北)，花娘子(河南)

**Lycorma delicatula** White

常数十至数百只群栖于树干或树叶上，叶柄处尤多。多危害臭椿、香椿、杨、黄杨、苦楝、刺槐、榆、悬铃木、梧桐、女贞、合欢等树上也见。分布于河北、陕西、山东、浙江、台湾、河南、湖北、广东。

成虫：有毒。破瘀散结，通经坠胎，解毒。用于闭经，癥瘕，疥癣，疮毒，瘰疬。

## 133. 绵蚜科 Pemphigidae

### 棓蚜属 Melaphis Walsh

**五倍子蚜** 角倍蚜(通称)，腻虫(广西)

**Melaphis chinensis** (Bell)

致瘿寄主为漆科植物盐肤木 (**Rhus chinensis** Mill.)，越冬寄主植物为：藓类提灯藓科疣灯藓 [**Trachystis macrophylla** (Doz. & Molk.) Lindb.]、侧枝提灯藓 (**Mnium maximoviczii** Lindb.)、尖叶提灯藓 (**M. cuspidatum** Hedw.)、圆叶提灯藓 (**M. vesicatum** Beach.) 等。形成虫瘿称角倍。除河北、山西、山东、江苏、西藏外，全国均有分布。主产于川东南、黔东北、湘西、鄂西南地区海拔 1 000 米左右的山区谷地。

虫瘿(五倍子)：酸、涩，寒。敛肺降火，涩肠止泻，敛汗止血，收湿敛疮。用于肺虚久咳，肺热痰咳，久泻久痢，盗汗，消渴，便血痔血，外伤出血，痈肿疮毒，皮肤湿烂。虫瘿中的蚜虫(五倍子内虫)：用于赤眼烂弦。

附 注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。② 功效相似的有**周氏棓花蚜 Floraphis choui** Xiang，分布于陕西；**铁棓花蚜 F. meitanensis** Tsai et Tang，分布于陕西、四川、贵州；**枣铁棓蚜 Kaburagia ensigallis** (Tsai et Tang)，分布于陕西、湖北、湖南、四川、贵州、云南；**蛋肚棓蚜 K. ovatirhusicola** Xiang，分布于陕西、湖北；**蛋铁棓蚜 K. ovogallis** (Tsai et Tang)，分布于陕西、湖北、湖南、四川、贵州、云南；**肚棓蚜 K. rhusicola** Takagi，分布于陕西、湖北，主产于秦岭、大巴山区海拔1 500 米以下的低山和丘陵地区；**红小铁枣棓蚜 Meitanaphis elongallis** Tsai et Tang，分布于陕西、四川、贵州；**米棓蚜 M. microgallis** Xiang，分布于陕西；**棓蛋蚜 Melaphis peitan** Tsai et Tang，分布于陕西、湖北、湖南、四川、贵州、云南；**圆角仿蚜 Nurudea sinica** Tsai et Tang，分布于陕西、湖南、贵州；**花冠棓样蚜 Nurudeopsis shiraii** (Matsumura)，分布于陕西、浙江、湖北、湖南、四川、贵州。

## 134. 蚧科 Coccidae

### 白蜡蚧属 Ericerus Chavannes

**白蜡蚧** 屁斑虫(河南)

**Ericerus pela** (Chavannes)

生活在白蜡树、女贞等木犀科植物上。分布于中南及陕西、江苏、安徽、浙江、江西、福

建、四川、贵州、云南。

分泌的白色蜡质精制品(虫白蜡)：甘，温。止血，生肌，定痛。用于金疮出血，尿血，下血，疮疡久溃不敛，下疳。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 135. 胶蚧科　Lacciferidae

### 胶蚧属　Laccifer Oken

**紫胶蚧**　　胶虫(通称)，奔胶虫(广西)

**Laccifer lacca** (Kerr)

生活在榕属、黄檀属、合欢属、金合欢属、木豆属植物上。分布于西南及江西、福建、湖北、湖南、广东、海南。

虫体分泌在树枝上的胶质(紫草茸)：甘、酸，寒。清热，凉血，行瘀，祛风，解毒。用于血热生风，身痒，风疹，麻疹、斑疹不透，产后血晕，带下病，疥疮。

## 136. 蝽科　Pentatomidae

### 九香虫属　Aspongopus Laporte

**九香虫**　　酒香虫、黑兜虫、打屁虫(通称)，屁斑虫(广西)，黑龟虫(贵州)

**Aspongopus chinensis** Dallas

喜群集于瓜类等植物上。成虫隐藏于瓜棚周围及河边石隙、石块、土块下，枯枝落叶下越冬。分布于华东、中南及陕西、四川、贵州、云南。

越冬期成虫(九香虫)：咸，温。理气止痛，温中壮阳。用于胃寒胀痛，肝胃气痛，肾虚阳痿，腰膝酸痛。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②功效相似的有**小皱蝽 Cyclopelte parva** Distant，除西北及黑龙江、吉林、西藏外，全国均有分布。

### 绿蝽属　Nezara Amyot et Serville

**稻绿蝽**　　绿点蝽(通称)

**Nezara viridula** (Linnaeus)

生活在农田、菜园、果园中，危害稻、麦、棉、粟、茶、玉米、花生、芝麻、豆类、甘蔗、苎麻、烟、蔬菜、柑桔、柴胡等粮食、油料及农作物。成虫在寄主附近杂草丛或林木茂密处越冬。分布于长江流域以南及西南、华北南部。

成虫：活血散瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，瘀血肿痛。

附　注：功效相似的有**荔蝽 Tessaratoma papillosa** (Drury)，分布于江西、福建、台湾、广东、广西、贵州、云南。

## 137. 黾蝽科 Gerridae

### 黾蝽属 Gerris Fabricius

**水黾** 水马(通称)

**Gerris (Aquarius) paludum (Fabricius)**

生活在较平静的河流、鱼塘等水面上，能在水面上疾走、捕食。分布于东北、华北及广东。

成虫(水黾)：解毒，退热，抗疟，疗痔。用于痔疮，疟疾。

附 注：①功效相似的有**背条水黾 Limnogonus fossarum** (Fabricius)，见于江西、广东；**水黾 Rhagadotarsus kraeplini** (Bred-din)，分布于台湾、广东、海南、广西。②本品有毒，慎用。

## 138. 步甲科 Carabidae

### 屁甲属 Pheropsophus Solier

**虎斑步甲** 行夜(通称)，夜引(吉林)，负盘(广西)

**Pheropsophus jessoensis** Morawitz

生活在田间、石块及朽木下等潮湿处，昼伏夜出，在地面疾走捕食。分布于华东、中南及吉林、辽宁、陕西、四川、云南。

成虫(行夜)：辛，温。有小毒。活血化瘀，消积止痛。用于血滞经闭腹痛，癥瘕，跌打损伤作痛。

附 注：功效相似的有**大步甲 Carabus (Coptolabrus) smaragdinus** Fischer，分布几遍全国；**爪哇屁步甲 Pheropsophus javanus** (Dejean)，分布于江苏、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

## 139. 龙虱科 Dytiscidae

### 龙虱属 Cybister Curtis

**三星龙虱** 东方潜龙虱(通称)，水鳖虫(江苏)

**Cybister tripunctatus orientalis** Gschwendtner

生活在池沼、水田、河沟多水草处，善游泳，入夜能飞行。分布于江苏、浙江、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川。

成虫(龙虱)：甘，平。补肾，活血。用于小便频数，小儿遗尿，面黡。

附 注：功效相似的有**黄边大龙虱 C. japonicus** Sharp，分布于东北、华北、华东；**小龙虱 Hydaticus bowringi** Clark，见于陕西。

## 140. 豉甲科 Gyrinidae

### 豉甲属 Gyrinus Linnaeus

**豉虫** 打水虫(通称),豉母虫(广西)

**Gyrinus curtus** Motschulsky

成虫常集浮水面旋转游泳或潜水中,夜间飞出。幼虫制土茧附小草上。

成虫(豉虫): 蚀息肉,敷恶疮。

附 注: 本品有毒,慎用。

## 141. 隐翅虫科 Staphilinidae

### 毒隐翅蛾属 Paederus Fabricius

**多毛隐翅虫** 花蚁虫、黄蚂蚁(通称)

**Paederus densipennis** Bernhauer

生活在田边、沟边及玉米根周围。分布几遍全国。

鲜成虫(花蚁虫): 杀虫,解毒,止痒。用于神经性皮炎,癣疮,息肉。

附 注: ①功效相似的有**小红隐翅虫 P. idae** Curtis, 分布几遍全国。 ② 本品有毒,慎用。

## 142. 萤科 Lampyridae

### 黄萤属 Luciola Laporte

**萤火虫** 夜光、宵烛(通称)

**Luciola vitticollis** Kies.

多群栖于水边的草丛中,昼伏夜出,幼虫栖于水边。分布几遍全国。

成虫(萤火): 辛,微温。用于青盲,小儿火疮伤。

附 注: 功效相似的有**黄萤 L. terminalis** E. Ol., 分布于江苏、浙江。

## 143. 叩甲(叩头虫)科 Elateridae

### 沟叩头虫属 Pleonomus Menetries

**沟金针虫**(沟叩头虫) 跳米虫(安徽),剥剥虫(广西)

**Pleonomus canaliculatus** Faldermann

栖于农田、菜地、棉田,危害麦、粟、高粱、棉、麻、瓜、甜菜、白菜、甘薯、马铃薯、茄及竹、

杨、桑。分布于华北及辽宁、陕西、甘肃、青海、山东、江苏、安徽、福建、河南、湖北、广西。

成虫(叩头虫)：辛，微温。强身健骨，除疟。用于四肢痿痹，筋骨酸痛，疟疾。

附　注：功效相似有**细胸金针虫**(细胸叩头虫) **Agriotes fusicollis** Miwa，分布于东北、华北、华东及陕西、甘肃、宁夏、河南；**褐纹梳爪叩头虫 Melanotus caudex** Lewis，分布几遍全国；**大叩甲 Agrypnus politus** Candeze，分布于广西、四川、贵州、云南。

## 144. 吉丁虫科　Buprestidae

### 金吉丁属　Chalcophora Solier

**日本吉丁虫**

**Chalcophora japonica chinensis** Schauffuss

栖于丛林中。成虫喜阳光，飞行极速，常见于树干向阳处。幼虫危害松、杉。分布几遍全国。

成虫：祛风，杀虫，止痒。用于疥癣，皮肤痛痒，风疹斑块。

## 145. 芫菁科　Meloidae

### 豆芫菁属　Epicauta Radtenbacher

**豆芫菁**　　锯角豆芫菁(通称)，白条芫菁(河北)

**Epicauta gorhami** Marseul

生活在农田及菜园附近，危害豆类、花生、甜菜、茄子及棉、桑。分布于华东、中南及河北、山西、陕西、新疆、四川、贵州。

成虫(葛上亭长)：辛，微温。有毒。逐瘀，破积。用于经闭，癥瘕，积聚，瘰疬，瘿肿，疥癣。

附　注：功效相似的有**长毛芫菁 E. apicipennis** Tan，见于四川；**豆小翅芫菁 E. aptera** (Kaszab)，分布于浙江、福建、广西、四川；**中华豆芫菁 E. chinensis** Laporte，分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、山东、江苏、安徽、台湾；**毛角豆芫菁 E. hirticornis** HaagRutenberg，分布于福建、台湾、广东、广西、云南；**沟角芫菁 E. impressicornis** Pic，见于云南；**大头豆芫菁 E. megalocephala** Gebler，分布几遍全国；**黑豆芫菁 E. taishoensis** Lewis，分布几遍全国；**陷胸芫菁 E. tentusi** (Kaszab)，分布于河北、山西、江苏、四川；**胫毛芫菁 E. tibialis** Waterhouse，分布于福建、台湾、广东、广西；**毛角芫菁 E. ruficeps** Illigor，分布于江西、广东、广西、四川。**花生叶芫菁 E. waterhousei** Haag-Rutenberg，分布于福建、台湾、广东、海南；

### 绿芫菁属　Lytta Fabricius

**绿芫菁**　　青虫、青娘子(通称)，全绿芫菁(河北)，相思虫(江西)

**Lytta caraganae** Pallas

生活在菜园及野生豆科植物附近，危害豆类、花生、苜蓿、刺槐、紫穗槐、黄芪、锦鸡儿。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、山东、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北、广西、云南、贵州。

成虫(青娘子)：辛，温。有毒。攻毒，逐瘀。用于瘰疬，疝气，目翳，耳聋，狂犬咬伤。

附　注：功效相似的有**绿边芫菁 L. suturella** Motschulsky，分布于河北、内蒙古、宁夏。

## 短翅芫菁属　Meloe Linnaeus

**地胆**　　土斑蝥(通称)

**Meloe coarctatus** Motschulsky

成虫栖于草丛中，幼虫寄生于蜂类。分布于东北、华北。

成虫(地胆)：辛，寒。有剧毒。攻毒，逐瘀。用于瘰疬，鼻息肉，瘢痕痞块，疥癣恶疮，牛皮癣，神经性皮炎。

附　注：功效相似的有**长地胆 M. violaceus** (Linnaeus)，分布于东北。

## 斑芫菁属　Mylabris Fabricius

**眼斑芫菁**　　黄黑小斑蝥(通称)，老虎斑毛(江苏)，苦苣斑蝥(云南)，香叉(藏语)

**Mylabris cichorii** (Linnaeus)

群集生活在菜园及棉田附近，危害豆类、花生、茄子、棉花。幼虫寄生于蝗卵。分布几遍全国。

成虫(斑蝥)：辛，热。有大毒。破血消症，攻毒蚀疮，发泡冷灸。用于癥瘕癌肿，积年顽癣，瘰疬，赘疣，痈疽不溃，恶疮死肌。

附　注：①功效相同，与本种同载《中华人民共和国药典》1990 年版的有**大斑芫菁 M. phalerata** Pallas，除黑龙江、吉林、内蒙古、青海、西藏外，全国均有分布；②功效相似的有**苹斑芫菁 M. calida** Pallas，分布于黑龙江、河北、内蒙古、陕西、新疆、山东、江苏、湖北；**大斑蝥 M. sidae** Fabricius，见于广东；**丽斑芫菁 M. speciosa** Pallas，分布于东北及河北、内蒙古、陕西。

# 146. 纷蠹科　Lyctidae

## 粉蠹属　Lyctus Fabricius

**褐粉蠹**　　竹蠹虫(通称)

**Lyctus brunneus** (Stephens)

栖于各种建筑材、家具材和加工材进行危害，竹制品尤烈。分布几遍全国。

幼虫(竹蠹虫)：用于小儿头癣。蛀屑(竹蠹虫蛀末)：用于中耳炎，烧、烫伤，湿毒

腺疮。

## 147. 金龟子科 Scarabaeidae

### 洁蜣螂属 Catharsius Hope

**蜣螂** 屎蜣螂、推粪虫(通称),神农蜣螂(湖北),滚屎虫(湖南)

**Catharsius molossus** (Linnaeus)

栖于畜粪、人粪中,吸食粪尿及动物尸体。分布几遍全国。

成虫(蜣螂虫): 咸,寒。有毒。定惊,破瘀,通便,攻毒。用于惊痫,癫狂,癥瘕,噎隔反胃,腹胀便结,淋证,疳积,血痢,痔漏,疔肿,恶疮。

附 注: 功效相似的有**牛粪蜣螂 Onthophagus vacca** Linnaeus, 见于甘肃;**大蜣螂 Scarabaeus sacer** Linnaeus, 分布于东北、华北、西北。

## 148. 犀金龟科 Dynastidae

### 叉犀金龟属 Allomyrina Arrow

**双叉犀金龟** 独角仙、独角蜣螂虫(通称),双叉独角仙(广西)

**Allomyrina dichotoma** (Linnaeus)

成虫栖于桑、榆、无花果及瓜类, 造成危害。幼虫栖于朽木、锯屑堆、肥料堆及垃圾堆中。分布几遍全国。

成虫: 咸,寒。有毒。解毒,消肿,通便。用于疮疡肿毒,痔漏,便秘。

附 注: 功效相似的有**突背蔗龟(黑色金龟子) Alissonotum impressicolle** Arrow,分布于广东、广西; **独角仙 Xylotrupes dichotomus** (Linnaeus), 分布几遍全国。

## 149. 鳃金龟科 Melolonthidae

### 齿爪鳃角金龟属 Holotrichia Hope

**大黑鳃角金龟**(东北大黑鳃金龟) 朝鲜黑金龟子(通称),地蚕(云南)

**Holotrichia diomphalia** (Bates)

栖于农田、菜园、果园,危害小麦、大豆、花生、高粱、向日葵、甘薯、甜菜、油菜、芝麻、麻类及桃、李、苹果、梨、杏、桑、栗、杨、柳、榆、榛。分布于东北及河北、河南。

幼虫(蛴螬): 咸,微温。有毒。破血,行瘀,散结,通乳。用于折损瘀痛, 破伤风, 喉痹,目翳,丹毒,痈疽,痔漏。

附 注: ①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。 ② 功效相似的有**华北大黑鳃金龟 H. oblita** (Faldermann), 分布于华北及辽宁、陕西、甘肃、宁夏、山东、安徽、河南、湖北;**暗黑鳃金龟 H. parallela** (Motschulsky), 分布于东北及河北、山西、陕西、甘肃、青

海、山东、江苏、安徽、浙江、河南、湖北、湖南、四川；**东南大黑鳃金龟 H. sauteri** Moser，分布于浙江、江西、福建、台湾、广东、贵州；**华脊鳃金龟 H. sinensis** Hope，分布于华东及湖北、广东；**棕色鳃金龟 H. titanis** Reitter，分布于吉林、辽宁、河北、山西、陕西、山东、浙江、河南；**爬皱鳃金龟 Trematodes potanini** (Semenov)，分布于青海、四川；**黑皱鳃金龟 T. tenebrioides** (Pallas)，分布于东北及河北、山西、陕西、山东、安徽、江西、台湾、河南、湖南；**黑绒金龟 Serica orientalis** Motschulsky，分布于东北、华北及宁夏、山东、江苏、安徽、河南；**阔胸金龟子 Pentodon patruelis** Frivaldszky，分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、青海、山东、江苏、浙江、河南。

## 150. 粪金龟科 Geotrupidae

### 粪金龟属 Geotrupes Latreille

**粪金龟** 推粪虫(宁夏)，紫蜣螂(山东)

**Geotrupes laevistriatus** Motschulsky

栖于畜粪及人粪中。分布于东北、华北及青海。

成虫：安神镇惊，破瘀通经，攻毒通便，解毒疗疮。用于惊痫癫狂，小儿惊风，大便秘结，痢疾，痔疮，疔疮肿毒。

附 注：功效相似的有**紫蜣螂 G. auratus** (Motschulsky)，分布于东北；**粪堆粪金龟 G. stercorarius** Linnaeus，见于黑龙江。

## 151. 丽金龟科 Rutelidae

### 丽金龟属 Anomala Samouelle

**铜绿异丽金龟** 青金龟子(河北)

**Anomala corpulenta** Motschulsky

成虫趋光性强，为果园及林木害虫，喜食苹果、核桃、杨、榆等树叶。幼虫栖于土内，危害小麦、大豆、马铃薯、芋头、甘薯、花生等。分布几遍全国。

幼虫：咸，微温。有毒。破瘀血，消肿止痛，明目。用于丹毒，痈肿，痔漏，目翳。

附 注：功效相似的有**红脚丽金龟 A. cupripes** Hope，分布于中南、西南；**黄褐丽金龟 A. exoleta** Faldermann，分布于东北、华北及江苏、安徽；**大条彩丽金龟 Mimela costata** (Hope)，分布于东北；**苹毛丽金龟 Proagopertha lucidula** (Faldermann)，分布于辽宁、河北、山东、江苏。

## 152. 花金龟科 Cetoniidae

### 星花金龟属 Potosia Mulsant

**白星花金龟**

**Potosia** (Liocola) **brevitarsis** (Lewis)

成虫群集栖息取食桃、李等成熟果实、玉米穗及榆、麻栎等多种树木汁液。幼虫栖于堆肥、烂草堆、厩肥及富腐殖质的土壤中。分布于东北、华北、中南。

幼虫：用于丹毒，痈肿，痔漏，目翳。

## 153. 拟步甲科 Tenebrionidae

### 洋虫属 Martianus Fairmaire

**洋虫**

**Martianus dermestoides** Chevrolat

原产印度尼西亚苏门答腊。我国江苏、浙江、福建、广东、海南已进行饲育。饲料为红枣、莲子、红花、黄芪、党参、龙眼、花生、核桃、槟榔、杜仲、米谷等。

成虫(洋虫)：温。活血祛瘀，温中理气。用于痨伤咳嗽，中风瘫痪，跌打损伤，心胃气痛，噎隔反胃。

## 154. 沟胫天牛科 Lamiidae

### 星天牛属 Anoplophora Hope

**星天牛** 铁牯牛(通称)，水牛郎(河南)，啮桑(贵州)

**Anoplophora chinensis** (Förster)

成虫栖于柑桔、苹果、梨、樱桃、无花果、枇杷、花红、柳、桑、榆、槐、白杨、苦楝、悬铃木上，以幼虫在树干或根中越冬。分布于华东、中南及辽宁、陕西、甘肃、四川、贵州。

成虫(天牛)：甘，温。有毒。熄风镇惊，活血祛瘀。用于小儿惊风，跌打损伤，瘀血作痛，乳汁不下，恶疮。 幼虫(桑蠹虫)：甘，平。有毒。活血，祛瘀，通经。用于劳伤瘀血，血滞闭经，腰背疼痛，崩漏，带下病。

附 注：功效相似的有**桑天牛 Apriona germari** (Hope)，分布于华东、中南及吉林、辽宁、河北、陕西、甘肃、四川、贵州；**云斑天牛 Batocera horsfieldi** (Hope)，分布于华东、中南及河北、陕西、四川、贵州、云南。

### 竖毛楔天牛属 Thyestilla Aurivillius

**麻天牛** 麻竖毛天牛(通称)

**Thyestilla gebleri** (Faldermann)

幼虫寄生于麻茎内，入冬潜于根中越冬。分布于河北、山东、江苏、浙江、福建、广东、四川。

幼虫(黄麻梗虫)：用于疔疮。

## 155. 天牛科 Cerambycidae

### 颈天牛属 Aromia Linnaeus

**桃红颈天牛**

**Aromia bungii** (Faldermann)

栖于桃、杏、樱桃、郁李、梅、柳等树上造成危害。分布于华北及辽宁、陕西、甘肃、山东、江苏、浙江、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川。

成虫：用于小儿惊风，跌打损伤，瘀血作痛，恶疮。

附　注：功效相似的有**桃褐天牛 Nadezhdiella aurea** Gressitt，分布于浙江、广西、四川；**橘褐天牛 N. cantori** (Hope)，分布于华东、中南及陕西、四川、云南。

## 156. 象甲(象虫)科 Curculionidae

### 弯颈象属 Cyrtotrachelus Schoenberr

**直锥象**　笋蛆(河南)，竹象鼻虫(湖北)，竹象蚺(广西)

**Cyrtotrachelus longimanus** Fabricius

成虫栖于竹笋、叶或杂草上，飞翔力很强。幼虫栖于竹笋上，造成危害。分布于中南及陕西、江苏、浙江、福建、台湾、四川、云南。

成虫：祛风湿，止痹痛。用于风寒腰腿疼痛。

## 157. 蚁蛉科 Myrmeleontidae

### 东蚁蛉属 Euroleon Esben-Petersen

**中华东蚁蛉**　地牯牛(通称)，蚁蛘(河北)，金沙牛(广东)

**Euroleon sinicus** (Navas)

幼虫生活在砂土地带或山地悬崖斜面、屋檐、墙角、大树干基部等砂土或细土中。成虫黄昏时飞行于草丛间。分布于河北、山西、陕西、湖北、广东、云南。

干或鲜幼虫(地牯牛)：咸，凉。有毒。平肝熄风，解热镇痉，清热利湿，拔毒消肿。用于高血压症，中风，小儿高热，惊厥，疟疾，小便淋痛，骨折，中耳炎，痈疮，无名肿毒。

附　注：功效相似的有**蛟蜻蛉 Hagenomyia micans** (Mac Lachlan)，分布于福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南；**蚁蛘 Myrmeleon formicarius** Linnaeus，分布于台湾、广东、海南、广西。

## 158. 石蛾科 Phryganeidae

### 石蛾属 Phryganea Linnaeus

**石蛾** 石蠶虫(通称)

**Phryganea japonica** Mac Lachlan

栖于静水或缓流水边草木上、水中石上亦见。成虫飞翔力不强,幼虫潜居水中吐丝做巢。分布几遍全国。

幼虫(石蚕): 咸,寒。有毒。除热,利水,坠胎。

附 注: 功效相似的有**紫石蛾 Neuronia regina** (Mac Lachlan),分布几遍全国。

## 159. 蝙蝠蛾科 Hepialidae

### 蝠蛾属 Hepialus Fabricius

**虫草蝠蛾** 冬虫夏草蛾(通称),绿蝙蝠蛾(四川),虫草蝙蝠蛾(云南)

**Hepialus armoricanus** (Oberthür)

栖于海拔 3 000 米左右高寒山区、草原、河谷、草丛中。幼虫取食珠芽蓼 **Polygonum viviparum** L. 的块茎,冬季蛰居于土中冬眠。麦角科真菌冬虫夏草菌 **Cordyceps sinensis** (Berk.) Sacc. 的菌丝侵入并致死冬眠中的幼虫,夏季可从幼虫头部长出子座。分布于西南及甘肃、青海、宁夏。

带冬虫夏草菌子座的幼虫(冬虫夏草): 甘,温。补虚损,益精气,止咳化痰。用于痰饮喘嗽,虚喘,痨嗽,咯血,自汗盗汗,阳痿遗精,腰膝酸痛,病后久虚不复。

附 注: 产于吉林的北虫草(蛹草),为虫草属真菌 **Cordyceps militaris** (Linnaeus) 侵染夜蛾科昆虫的幼虫虫体,待发育成蛹后才致死并形成子座。

## 160. 蓑蛾科 Psychidae

### 大蓑蛾属 Cryptothelea Duncan

**台湾大蓑蛾** 背包虫(江苏),包包虫(浙江),袋虫(湖南)

**Cryptothelea formosicola** Strand

栖于并危害柿、桃、梅、杏、李、苹果、樱桃、枇杷、柑桔、侧柏、桧柏、石榴、蓖麻。幼虫以虫囊悬挂在树枝上越冬。分布几遍全国。

幼虫: 清热解毒,生肌敛疮,消肿止痛。

附 注: 功效相似的有**大蓑蛾 C. pryeri** (Leech),分布于江苏、安徽、江西、福建、湖北、广东、广西。

## 161. 刺蛾科 Cochlidiidae

### 黄刺蛾属 Cnidocampa Dyar

**黄刺蛾** 洋蜘子、雀瓮(通称),毛八角(河北),相痴子(甘肃),天浆子(云南)
**Cnidocampa flavescens** Walker
危害柿、油桐、乌桕等多种果树及行道树。分布几遍全国。
虫茧(雀瓮): 甘,平。清热定惊。用于小儿惊风,脐风,痢疾,乳蛾,喉痹。

## 162. 草螟科 Crambidae

### 蛀草螟属 Proceras Bojer

**高粱条螟** 条螟(通称),高粱秆虫(吉林),高粱钻心虫(湖北)
**Proceras venosatum** (Walker)——*Diatraea venosata* Walker
栖于并危害高粱、玉米、粟、麻、甘蔗。幼虫蛀食茎秆。分布几遍全国。
幼虫(钻杆虫): 凉血,解毒。用于便血。

## 163. 野螟科 Pyraustidae

### 秆野螟属 Ostrinia Hübner

**亚洲玉米螟** 玉米钻心虫(通称),钻茎虫(河南),疔虫(贵州)
**Ostrinia furnacalis** Guenee
栖于玉米、高粱、谷子、大麻等多种作物及葎草等杂草,造成危害。分布几遍全国。
干或鲜幼虫: 清热解毒,凉血止血。
附 注: 功效相似的有**欧洲玉米螟 O. nubilalis** (Hübner),分布于宁夏、新疆。

## 164. 天蚕蛾科 Saturniidae

### 花天蚕蛾属 Antheraea Hübner

**柞蚕** 栎蚕、橡蚕(通称),天蚕(广西)
**Antheraea pernyi** (Geurin-Meneville)
取食栎叶。原产山东,后传至东北、华北及江苏、浙江、湖北、贵州,现几遍全国。
干或鲜茧蛹: 生津止渴,消食理气,镇痉。用于消渴,膨胀,淋证,癫痫。

### 长角天蚕蛾属 Philosamia Grote

**蓖麻蚕** 木薯蚕(广西)

**Philosamia cynthia ricina** Donovan

取食蓖麻、木薯、臭椿、乌桕、马桑等。原产印度。我国已广泛推广养殖。

幼虫或茧：祛风湿，止痹痛。用于风湿关节痛。

## 165. 家蚕蛾科 Bombycidae

### 蚕属 Bombyx Pliny

**家蚕** 桑蚕(通称)，蚕河(甘肃)

**Bombyx mori** Linnaeus

人工饲养，以桑叶为食。几遍全国。

幼虫粪便(蚕沙)：甘、辛，温。祛风除湿，活血定痛。用于风湿痹痛，风疹瘙痒，头风头痛，关节不遂，急剧吐泻转筋，腰腿冷痛，烂弦风眼。 感染白僵菌僵死的幼虫(僵蚕)：辛、咸，平。祛风解痉，化痰散结。用于惊痫，头风，喉风，喉痹，中风失音，瘰疬，风疮瘾疹，丹毒，乳痈。蚕蛹感染白僵菌发酵的制成品(僵蛹)：药用同僵蚕。 卵(原蚕子)：用于热淋，倒产难生。 雄性成虫(原蚕蛾)：咸，温。补肝益肾，壮阳涩精。用于阳痿，遗精，白浊，尿血，创伤，溃疡，烫伤。 茧壳(蚕茧)：甘，温。用于便血，尿血，血崩，消渴，疳疮，痈肿。 幼虫脱皮(蚕蜕)：甘，平。用于崩漏，带下病，痢疾，吐血，衄血，便血，牙疳，口疮，喉风，目翳。 蛹(蚕蛹)：甘，平。用于小儿疳疾，消瘦，消渴。 孵化后的卵壳(蚕退纸)：平。用于吐血，衄血，便血，崩漏，带下病，喉风，喉痹，牙疳，牙痛，疔肿，疮疡。 蚕茧下脚料精炼拉松制品(丝棉)：用于吐血，衄血，便血，血崩，痔漏，外伤出血，冻疮，中耳炎。

附 注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 166. 灯蛾科 Arctiidae

### 灯蛾属 Arctia Schrank

**豹灯蛾** 飞蛾、扑灯蛾(通称)

**Arctia caja phaeosoma** Butler

危害大麻、苧麻、桑、菊等，白天停息在植物上，夜晚活动。分布于华北。

成虫(灯蛾)：用于漏管。

## 167. 夜蛾科 Noctuidae

### 委夜蛾属 Athetis Huebner

**暮委夜蛾** 化香夜蛾、茶虫(广西)

**Athetis morosa** (Lederer)

栖于茶树。原分布于华北,广西等省引进饲养已获成功。

粪粒(虫茶、虫屎茶): 用于腹泻,衄血,牙龈出血,痔疮。

## 168. 弄蝶科 Hesperiidae

### 香蕉弄蝶属 Erionota Mabille

**香蕉弄蝶** 芭蕉卷叶蛾、蕉包虫(通称)

**Erionota thrax** (Linnaeus)

取食香蕉、芭蕉,幼虫在蕉卷叶中越冬。分布于江西、湖南、广东、广西。

幼虫或成虫: 清热解毒,消肿止痛。用于化脓性中耳炎。

## 169. 粉蝶科 Pieridae

### 豆粉蝶属 Colias Fabricius

**斑缘豆粉蝶** 黄蝴蝶(青海)

**Colias erata** Esper

栖于草原。见于青海。

成虫: 用于肌肉扭转缩痛,龋齿痛。

### 菜粉蝶属 Pieris Hübner

**白粉蝶** 菜粉蝶(通称),叶桃子(宁夏),菜白蝶(广西)

**Pieris rapae** (Linnaeus)

栖于并危害十字花科蔬菜,尤喜甘蓝。分布几遍全国。

成虫: 消肿止痛。用于跌打损伤。

## 170. 凤蝶科 Papilionidae

### 凤蝶属 Papilio Linnaeus

**黄凤蝶** 金凤蝶、茴香凤蝶(通称),马蝶(吉林),叶桃子(宁夏)

**Papilio machaon** Linnaeus

栖于并危害胡萝卜、茴香等伞形科植物。分布几遍全国。

幼虫(茴香虫)：甘、辛，温。用于胃痛，噎隔，疝气。

附　注：功效相似的有**花椒凤蝶**(柑橘凤蝶) **P. xuthus** Linnaeus，除西北外，全国均有分布。

## 171. 绢蝶科　Parnassiidae

### 绢蝶属　Parnassius Latreille

**绢蝶**　　花蝴蝶(青海)

**Parnassius mperator** Oberthür

山栖性蝶类，栖于高山草甸。分布于青海、甘肃、四川、西藏。

成虫：用于吞咽困难，咽喉痛。

## 172. 虻科　Tabanidae

### 黄虻属　Atylotus Osten-Sacken

**复双斑黄虻**　　复带虻、牛虻(通称)，牛蜢(江苏)，牛苍蝇(江西)，瞎蠓(云南)

**Atylotus bivittateinus** Takahashi——*Tabanus bivittatus* Matsumura

栖于草丛及树林中，性喜阳光，白昼活动，雌虻吸食牛、马、驴等家畜血液；雄虻不吸血，吸食植物汁液。分布几遍全国。

雌成虫(虻虫)：苦，凉。有毒。逐瘀，破积，通经。用于癥瘕，小腹蓄血，血滞经闭，扑损瘀血，坠胎。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②功效相似的有**土灰虻 Tabanus amaenus** Walker，分布于东北、华北、华东；**菩虻菩虻**(佛光虻) **T. budda** Portschinsky，分布于东北、华北、西北；**黄巨虻**(鹿虻) **T. chrysurus** Loew，分布于东北；**江苏虻 T. kiangsuensis** Kröber，除东北外，全国均有分布；**华虻 T. mandarinus** Schiner，分布于华北、中南及吉林、辽宁、山东、安徽、福建；**峨眉山虻 T. omeishanensis** Xu，见于四川；**雁虻 T. pleskei** Kröber，分布于东北、华北；**褐虻 T. sapporensis**(Shiraki)，见于广西；**三角虻 T. trigonus** Coquillet，分布于辽宁、青海、浙江；**山崎虻 T. yamasakii** Ouchi，分布几遍全国；**姚虻 T. yao** Macuart，分布于东北、华北、华东及云南；**骚扰黄虻 Atylotus miser**(Szilady)，分布几遍全国；**中华斑虻 Chrysops sinensis** Walker，分布几遍全国。

## 173. 食蚜蝇科 Syrphidae

### 尾蛆蝇属 Eristalis Latreille

**长尾食蚜蝇** 拟蜂蝇(河南),花虻(广西),鼠尾蛆(幼虫名)

**Eristalis tenax** (Linnaeus)

成虫栖于野外花丛间,幼虫孳生在稀粪坑、污水潭中。分布几遍全国。

幼虫: 消积食,健脾胃。用于消化不良,脘腹胀满,体倦无力。

## 174. 丽蝇科 Calliphoridae

### 金蝇属 Chrysomyia Robineau-Desvoidy

**大头金蝇** 红头蝇(通称),绿头苍蝇(宁夏),水仙子(云南)

**Chrysomyia megacephala** (Fabricius)

成虫为室内常见蝇类,传播各种疾病。幼虫主要孳生于厕所人粪中、腐败动物尸体、骨堆中,人畜伤口及鼻窦处也偶见。分布几遍全国。

幼虫(五谷虫): 苦,寒。清热,消滞。用于疳积腹胀,热病神昏谵语。

## 175. 蝇科 Muscidae

### 家蝇属 Musca Linnaeus

**舍蝇** 苍蝇、家蝇(通称),粪蝇(安徽)

**Musca domestica vicina** Macquart

成虫喜进入室内,传播各种疾病。幼虫孳生于牛、猪、马粪、各种禽粪及腐败动植物、垃圾、人粪中。分布几遍全国。

幼虫: 用于疳积腹胀,消化不良。

附 注: 功效相似的有**家蝇 M. domestica domestica** Linnaeus,见于新疆。

## 176. 蚁科 Formicidae

### 蚁属 Formica Linnaeus

**丝光褐林蚁** 蚂蚁(通称),大黑蚂蚁(云南)

**Formica fusca** Linnaeus

营群体生活,在地下筑巢。分布几遍全国。

成虫(黑蚂蚁): 咸,平。有毒。清热解毒。用于疔毒肿痛,蛇咬伤。

## 177. 土蜂科 Scoliidae

### 土蜂属 Scolia Fabricius

**赤纹土蜂** 地蜂(江西),马蜂(河南),蜚零(湖南)

**Scolia vittifrons** Saussure et Sichel

成虫栖于砂地或朽木中,幼虫寄生于蛴螬体内。分布于东北及河北、山西、甘肃、山东、安徽、江西、福建、河南、广东、贵州。

成虫(土蜂): 用于蜘蛛咬疮。 幼虫(土蜂子): 甘,凉。有毒。用于痈肿,丹毒,风疹。

## 178. 蜾蠃科 Eumenidae

### 德夜蛾属 Delta Saalmueller

**黄盾华丽蜾蠃** 赤纹蜾蠃、细腰蜂、蠮螉(通称),缸瓦蜂(广西)

**Delta campaniformis gracilis** (Saussure)

生活在川谷及人屋间,用泥土营巢筑在树枝或墙壁上。

成虫(蠮螉): 辛,平。有毒。降逆止呕,清肺止咳。用于咳嗽,呕逆,痈肿及蜂螫。

附 注: 功效相似的有**大华丽蜾蠃 D. petiolata** (Fabricius), 分布于广东、海南、广西。

## 179. 异腹胡蜂科 Polybiidae

### 长足胡蜂属 Parapolybia Saussure

**变侧异腹胡蜂** 异腹胡蜂(通称)

**Parapolybia varia** (Fabricius)

生活在山林灌丛中。分布于江苏、福建、台湾、湖北、广东、云南。

巢(蜂房): 甘,平。祛风,攻毒,杀虫,止痛。用于龋齿牙痛,疮疡肿毒,乳痈,瘰疬,皮肘顽癣,鹅掌风。

附 注: 《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 180. 马蜂科 Polistidae

### 马蜂属 Polistes Latreille

**日本马蜂** 日本长脚胡蜂(通称)

**Polistes japonicus** Saussure

生活在山林灌丛中。分布于广东、广西、四川、云南。

巢：用于龋齿牙痛，疮疡肿毒，乳痈，瘰疬，皮肤顽癣，鹅掌风。

附　注：功效相同，与本种同载《中华人民共和国药典》1990年版的有**果马蜂 P. olivaceous** (De Geer)，分布于广东、广西、四川、云南。

**柑马蜂(黄星长脚黄蜂)**

**Polistes mandarinus** Saussure

群集但非社会性，巢筑于树上或屋檐、裂缝中。分布几遍全国。

巢(露蜂房)：甘，平。有毒，祛风，攻毒，杀虫。用于惊痫，风痹，癥疹瘙痒，乳痈，疔毒，瘰疬，痔漏，风火牙痛，头癣，蜂螫肿疼。　幼虫(大黄蜂子)：甘，凉。有小毒。用于胸腹胀痛，干呕，面疮，雀斑。

附　注：功效相似的有**中华马蜂(华黄蜂) P. chinensis** Fabricius，分布几遍全国；**褐马蜂 P. confusa**(Smith)，分布于福建、台湾、广东；**台湾马蜂(台湾黄蜂) P. formosanus** Sonan，分布于台湾、广东；**亚非马蜂(梨长足黄蜂) P. hebraeus** Fabricius，分布于广东、海南、广西；**家马蜂 P. jadwigoe** Dalla Torre，见于广西；**约马蜂(长脚黄蜂) P. jokahamae** Radoszkowski，分布于东北及河北、江苏、浙江、江西、福建。

## 181. 胡蜂科　Vespidae

### 胡蜂属　Vespa Linnaeus

**黑尾胡蜂**

**Vespa ducalis** Smith

巢筑于墙壁及其空隙间。分布于辽宁、河北、福建、台湾、广西、贵州、云南。

巢：甘，平。有毒。祛风，杀虫，解毒。用于皮肤顽癣，疮疡肿毒，乳痈，瘰疬，牙痛，头风痛，顿咳，蜂螫肿痛。

附　注：功效相似的有**黄边胡蜂 V. crabro** Linnaeus，见于陕西；**金环胡蜂（远东大胡蜂）V. mandarinia** Smith，分布几遍全国；**蒙古黄胡蜂（黄斑胡蜂）Vespula mongolica** (Andre)，见于青海。

**大胡蜂**　　台湾大胡蜂(通称)，大黄蜂(广西)

**Vespa magnifica** Smith

巢常筑于树枝或檐下。分布于台湾、广西、四川、云南、西藏。

成虫：消肿解毒。用于痈肿疮毒及蜘蛛、蜈蚣螫伤。

**近胡蜂**　　赤翅胡蜂(通称)

**Vespa simillima** Smith

多集栖于杉、松林中。分布于东北。

成虫(赤翅蜂)：用于疔肿，疽疮及蜘蛛螫伤。

附　注：本品有毒，慎用。

## 182. 木蜂科 Xylocopidae

### 木蜂属 Xylocopa Latreille

**竹木蜂** 竹蜂(通称),留师(江西)

**Xylocopa nasalis** Westwood

常钻穴营巢于竹木茎杆中。分布于广东、广西。

全虫(竹蜂): 甘、酸,寒。清热化痰,定惊止抽。用于小儿惊风,口疮,咽喉肿痛。 蜜(留师蜜): 甘,寒。用于口疮,齿痛。

**中华木蜂** 竹筒蜂(广西)

**Xylocopa sinensis** Smith

采集长春花、大丽花、向日葵、海棠、桃等植物。分布于辽宁、河北、浙江、江西、湖北、广东、广西、四川、云南。

成虫: 解毒,消肿,止痛。用于疱疖红肿作痛。

附 注: 功效相似的有**黄胸木蜂 X. appendiculata** Smith, 分布于东南、中南、西南及辽宁、河北、陕西、甘肃; **灰胸木蜂 X. phalothorax** (Lepeletier), 分布于河北、福建、广东、广西,四川。

## 183. 蜜蜂科 Apidae

### 蜜蜂属 Apis Linnaeus

**中华蜜蜂** 中蜂、蜜蜂、东方蜜蜂(通称)

**Apis cerana** Fabricius

为社会性昆虫, 能筑大规模巢于树洞、岩洞、壁间、屋下或隐蔽所。现均为人工饲养,几遍全国。

蜜(蜂蜜): 甘,平。补中,润燥,止痛,解毒。用于脘腹虚痛,肺燥干咳,肠燥便秘, 疮疡不敛,烧、烫伤。 蜡(蜂蜡): 甘,微温。收涩,敛疮,生肌,止痛。用于溃疡不敛, 臁疮糜烂,创伤,烧、烫伤。 王浆(蜂乳): 甘、酸,平。滋补,强壮, 益肝, 健脾。用于病后虚弱,小儿营养不良,年老体衰,传染性肝炎,高血压病,风湿关节痛,胃病。工蜂尾刺的有毒液体(蜂毒): 用于咳嗽痰喘,瘰瘤,高血压症, 风湿性关节痛。分泌的黄褐或黑褐色粘性物质(蜂胶): 用于恶性肿瘤,鸡眼,跟疣,寻常疣。 幼虫(蜜蜂子): 甘,平。祛风,解毒,杀虫。用于头风,麻风,丹毒,风疹,虫积腹痛,带下病。

附 注: 功效相同, 与本种同载《中华人民共和国药典》1990 年版的尚有**意大利蜂 A. mellifera** Linnaeus,人工饲养,几遍全国。

# 苔藓动物门 Bryozoa

## 裸唇纲 Gymnolaemata

### 184. 胞孔苔虫科 Celleporidae

胞孔苔虫属 Celleporina Gray

**柯氏胞孔苔虫** 瘤胞孔苔虫、瘤苔虫(通称)
**Celleporina costazia** (Audouin)

附着在海带、贻贝壳、海藻、水螅虫及热带珊瑚礁上。分布于黄海、东海、南海。

骨骼(海浮石): 咸,寒。清热化痰,软坚散结,通淋。用于肺热咳嗽,瘿瘤,瘰疬,疝气,淋证,小便不利,目翳。

附 注: 功效相似的有**脊突苔虫 Costazia aculeata** Canu et Bassler, 分布于东海、南海。

# 棘皮动物门 Echinodermata

## 海参纲 Holothurioidea

### 185. 刺参科 Stichopodidae

刺参属 Stichopus Brandt

**刺参** 海参、刺海参、海鼠、沙噀(通称)
**Stichopus japonicus** Selenka

生活在波流静稳、海草茂盛、无淡水注入的海湾内,水深 3—15 米,岩礁或细沙泥质海底。分布于渤海、黄海。已开展养殖。

全体(海参): 咸,温。补肾壮阳,益气补阴,通肠润燥,止血,消炎。用于肾虚阳痿,肠燥便秘,肺痨,再生障碍性贫血,消渴。 肠(海参肠): 用于胃痛,小儿麻疹。

附 注: 功效相似的有**绿刺参 S. chloronotus** (Brandt),分布于南海海域; **花刺参 S. variegatus** (Sempen),分布于南海海域;**梅花参 Thelenota ananas** (Jaeger),分布于南海海域。

### 186. 海参科 Holothuriidae

怪参属 Halodeima Pearson

**黑怪参** 黑狗参(通称),黑参(广西)

**Halodeima atra** (Jaeger)

生活在潮间带和珊瑚礁的砂底，常成群出现，大形个体常栖息在4—6米或更深的海底。分布于南海海域，海南、西沙群岛习见。

全体：止血，止痛，补益。用于外伤出血，妇女缺乳。

## 海参属 Holothuria Linnaeus

**玉足海参**

**Holothuria leucospilota** (Brandt)

栖息在潮间带砂质海底。分布在广东、海南、西沙群岛沿海。

全体：用于脑震荡和脊椎损伤引起的痉挛。

**黑乳海参** 乌圆参(广东)

**Holothuria nobilis** (Seleka)

栖息在堡礁内有少数海草的沙底，有时匍匐在有海草的珊瑚上。分布于南海。

全体：甘、咸，温。补肾壮阳，通乳滋阴，催乳。用于经痛，产后乳汁不足。

**荡皮海参** 红参(广西)

**Holothuria vagabunda** Selenka

幼体常栖息在潮间带珊瑚礁或岩石下，成体多生活在石礁多的水洼中。分布于南海海域，广东、海南、西沙群岛常见。

全体：滋补强壮，生肌止血。用于疮疖，外伤出血。

附 注：功效相似的有**糙海参 H. scabra** Jaeger，分布于南海海域，广东、海南、西沙群岛常见；**白底辐肛参 Actinopyga mauritiana** (Quoy et Gaimard)，分布于西沙群岛沿海；**蛇目布氏参 Bohadschia argus** Jaeger，分布于西沙群岛沿海；**二斑布氏参 B. bivittata** (Mitsukuri)，分布于西沙群岛沿海；**图纹布氏参 B. marmorata** Laeger，分布于海南及西沙群岛海域。

# 海星纲 Asteroidea

## 187. 槭海星科 Astropectinidae

### 镶边海星属 Craspidaster Sladen

**镶边海星** 海星、五角星(通称)，饭瓜花(浙江)

**Craspidaster hesperus** (Müller et Troschel)

栖息在浅海沿岸深17—75米的泥或泥沙底。分布于东海、台湾海峡、南海。

全体：软坚散结，清热解毒，制酸止痛。用于瘿瘤，胃痛，胃酸过多。

## 188. 角海星科 Goniasteridae

### 五角海星属 Anthenea Gray

**真五角海星**

**Anthenea pentagonula** (Lamack)

栖息在低潮线至深 75 米，带有碎贝壳和石块的沙泥底。分布于东海、南海，福建及广东沿海习见。

全体：用于瘰瘤。

附　注：功效相似的有**蔷薇海星 Rosaster symbolicus** Sladen，分布于海南东部海域；**骑士章海星 Stellaster equestris** (Retzius)，分布于东海、南海。

## 189. 太阳海星科 Solasteridae

### 太阳海星属 Solaster Forbes

**陶氏太阳海星**

**Solaster dawsoni** Verrill

生活在深 25—400 米的沙泥质海底。分布于渤海、黄海。

全体：平肝，和胃，镇惊，消炎。

## 190. 棘海星科 Echinasteridae

### 鸡爪海星属 Henricia Gray

**鸡爪海星**

**Henricia leviuscula** (Stimpson)

生活在深 15—45 米的岩石海底中。分布于渤海、黄海。

全体：消肿，镇惊。用于胃脘痛胀，肝炎。

## 191. 海燕科 Asterinidae

### 海燕属 Asterina Nardo

**海燕**

**Asterina pectinifera** Müller et Troschel

生活在岩礁底或碎贝壳底的潮间带浅水海域。分布于渤海、黄海。

干燥全体(海燕)：咸，温。滋阴，壮阳，祛湿，止痛。用于阳痿，风湿腰腿痛，胃痛。

附　注：功效相似的有**林氏海燕 A. limboonkengi** G. A. Smith，分布于福建、广东沿海。

## 192. 海盘车科　Asteriidae

### 海盘车属　Asterias Linnaeus

**多棘海盘车**　　海星、五角星、海盘车(通称)

**Asterias amurensis** Lutken

生活在潮间带至40米深浅海中，泥沙底处较多，石底处也有发现。分布于渤海、黄海。

干燥全体：咸，平。平肝和胃，制酸止痛，清热解毒，镇惊。用于胃痛，泄泻，瘰瘤，中耳炎，癫痫。

附　注：功效相似的有**粗钝海盘车 A. argonanta** Djakonov，分布于渤海、黄海沿海；**罗氏海盘车 A. rollestoni** Bell，分布于渤海、黄海沿海；**异色海盘车 A. versicolor** Sladen，分布于渤海、黄海沿海；**尖棘筛海盘车 Coscinasterias acutispina** (Stimpson)，分布于东海、南海沿海，福建、广东沿海习见。

# 蛇尾纲　Ophiuroidea

## 193. 阳遂足科　Amphiuridae

### 阳遂足属　Amphiura Forbes

**滩栖阳遂足**　　蛇尾(浙江)

**Amphiura vadicola** Matsumoto

生活在潮间带中、下区的泥沙滩上，营穴居生活。分布于辽宁、山东、浙江沿海。

**全体：**用于皮肤顽癣，试用于癌症。

# 海胆纲　Echinoidea

## 194. 长海胆科　Echinometridae

### 紫海胆属　Anthocidaris Luetken

**紫海胆**　　海胆(通称)，海针、海栗子、海底空(浙江)

**Anthocidaris crassispina** (A. Agassiz)

生活在潮间带的岩石下或石缝内，有时也裸露在由岩石形成的水洼中。垂直分布可达85米。分布于东海、台湾海峡、南海。

骨壳：咸，平。制酸止痛，清热解毒。用于胃痛。

### 石笔海胆属　Heterocentrotus Brandt

**石笔海胆**　　海胆、烟嘴海胆、粗棒海胆(通称)

**Heterocentrotus mammillatus** (Linnaeus)

栖息在潮间带死珊瑚礁的洞穴内，为珊瑚礁内著名种类，在深 20 米处也能采到。分布于南海，海南南部及西沙群岛习见。

棘刺：咸，平。清热解毒。用于中耳炎。

## 195. 毒棘海胆科　Toxopneustidae

### 三列海胆属　Tripneustes Agassiz

**白棘三列海胆**

**Tripneustes gratilla** (Linnaeus)

生活在海岸或浅海海草多的沙质海底。分布于台湾海峡、南海海域，台湾、广东、海南、西沙群岛习见。

壳：消肿。用于胃脘痛胀，甲沟炎。

## 196. 刻肋海胆科　Temnopleuridae

### 刻肋海胆属　Temnopleurus Agassiz

**细雕刻肋海胆**　　海胆(通称)，刺海螺(河北)，刺锅子(浙江)

**Temnopleurus toreumaticus** (Leske)

生活在潮间带至深 45 米的沙泥底，常成群隐蔽栖息于石块、海藻、碎贝壳等处。分布几遍全国沿海。

胃壳(海胆)：咸，平。软坚散结，化痰消肿。用于瘰疬，胸肋胀痛，积痰不化。

附　注：功效相似的有**哈氏刻肋海胆 T. hardwickii** (Gray)，分布几遍全国沿海；**芮氏刻肋海胆 T. reevesii** (Gray)，分布于东海、南海；**疏棘角孔海胆 Salmacis bicolor rarispina** L. Agassiz，分布于南海沿海；**刻孔海胆 Temnotrema seulptum** (A. Agassiz)，分布于山东沿海。

## 197. 球海胆科　Strongylocentrotidae

### 马粪海胆属　Hemicentrotus (A. Agassiz)

**马粪海胆**　　海胆(通称)，海锅、海肚脐、海底空(浙江)

**Hemicentrotus pulcherrimus** (A. Agassiz)

生活在潮间带至深 4 米的砂砾底和藻类繁茂的岩礁间石下或石缝内。分布于渤海、黄海、东海。

骨壳：用于瘰疬，积痰不化，胸胁胀满。

附　注：功效相似的有**光棘球海胆 Strongylocentrotus nudus** (A. Agassiz)，分布于渤海及黄海北部沿海，辽东半岛及山东半岛北部习见。

## 198. 蛛网海胆科　Arachnoididae

### 蛛网海胆属　Arachnoides Klein

**扁平蛛网海胆**

**Arachnoides placenta** (Linnaeus)

栖息在潮间带沙内，常半露在沙面并集成大群。分布于南海沿海，福建、广东沿海习见。

骨壳：软坚散结，化痰消肿。

# 原索动物门　Protochordata

## 尾索动物纲　Urochordata

## 199. 玻璃海鞘科　Cionidae

### 玻璃海鞘属　Ciona Fleming

**玻璃海鞘**　　海鞘(通称)

**Ciona intestinalis** Linnaeus

温水性种。生活在浅海 6—10 米处，成体固着在码头、岩石、珊瑚礁及双壳类贝壳、海藻上。我国沿海均有分布，黄海港湾较多。

全体：提取类副肌球蛋白。

## 头索动物纲　Cephalochordata

## 200. 文昌鱼科　Branchiostomidae

### 文昌鱼属　Branchiostoma Banks

**厦门文昌鱼**　　文昌鱼、白氏文昌鱼(通称)

**Branchiostoma belcheri** (Gray)

多生活在低潮线附近 5—10 米的沙质海底。平时半埋在沙中。分布于黄海、东海、南海。

全体：提取副肌球蛋白。

附　注：功效相似的有**青岛文昌鱼 B. belcheri tsingtaoensis** Tchang et Koo,分布于渤海、黄海。

# 脊椎动物　Vertebrates

## 脊椎动物门　Vertebrata

## 圆口纲　Cyclostomata

### 201. 七鳃鳗科　Petromyzonidae

七鳃鳗属　Lampetra Gray

**日本七鳃鳗**　七鳃鳗、七星鳗、八目鳗(通称)

**Lampetra japonica** (Martens)

洄游性鱼类。部分时期栖息于海中，成鱼春季溯河流上游产卵，幼鱼秋季下海，3—5年后发育为成鱼。分布于黑龙江、图们江流域。

肉或全体(八目鳗)：甘，温。通经活络，明目。用于口眼歪斜，角膜干燥，夜盲症。

附　注：功效相似的有**东北七鳃鳗 L. morii** (Berg)，分布于鸭绿江流域；**雷氏七鳃鳗 L. reissneri** (Dybowsky)，分布于黑龙江、松花江、嫩江流域。

## 软骨鱼纲　Chondrichthyes

### 202. 六鳃鲨科　Hexanchidae

哈那鲨属　Notorhynchus Ayres

**扁头哈那鲨**　哈那鲨(通称)

**Notorhynchus platycephalus** (Tenore)

近海底栖鱼类。卵胎生。分布于黄海、东海、南海。

肝脏提取的脂肪油(鱼肝油)：滋补强壮，明目，壮骨。用于夜盲症，干燥性眼炎，佝偻病，软骨症，营养不良，痨病。　肉：健脾利水。　鳍：健胃，补气，消肿。用于肺气虚弱，小儿泄泻，疮毒。　骨：用于泄泻。　胎：养血调经，滋补强壮。用于痛经，久病体虚，咳嗽。

## 203. 虎鲨科 Heterodontidae

### 虎鲨属 Heterodontus Blainville

**宽纹虎鲨** 大猫鲨(浙江)
**Heterodontus japonicus** Dumeril
近海底栖鱼类。分布于黄海、东海。
肝：制取鱼肝油。
附 注：功效相似的有**狭纹虎鲨 H. zebra** (Gray)，分布于东海南部至南海。

## 204. 锥齿鲨科 Carchariidae

### 锥齿鲨属 Carcharias Rafinesque

**欧氏锥齿鲨** 白蒲鲨、白生鲨(浙江)
**Carcharias owstoni** Garman
底栖或近底栖。卵胎生。分布于黄海、东海。
肉：滋补强壮。 肝：制取鱼肝油。

## 205. 姥鲨科 Cetorhinidae

### 姥鲨属 Cetorhinus Blainville

**姥鲨** 姥鲛、老鼠鲨(通称)，猪嘴鲨、昂鲨(浙江)
**Cetorhinus maximus** (Gunner)
大洋性上层鱼类。好群游，千百成群。分布于黄海、东海、南海。
肝：制取鱼肝油。 肉：健脾利水。

## 206. 须鲨科 Orectolobidae

### 斑竹鲨属 Chiloscyllium Müller et Henle

**条纹斑竹鲨** 狗鲨、犬鲨(浙江)，狗仔鲨(广西)
**Chiloscyllium plagiosum** (Bennett)
栖息在底层多藻类生长的浅海中。卵生。分布于东海、南海。
去皮和肝脏的鲜肉：甘，温。补脾，利水，强壮。用于脾虚浮肿，久病体虚，创伤久不愈合。 肝：明目。用于夜盲症。 脂肪油：清热解毒，消肿止痛。用于烧、烫伤。 鳍：甘、咸，平。益气，开胃，补虚消肿。用于肺气虚弱，疮毒。 胆：解毒。用于疮痈。 骨·

用于泄泻。

附　注：鲨鱼的软骨、骨髓韧带及血管组织中均含有软骨素，从中提制的硫酸软骨素，有降血脂、抗动脉硬化和抗凝血作用，临床用于动脉硬化，冠心病。

### 豹纹鲨属　Stegostoma Müller et Henle

**豹纹鲨**　　金鲨(广西)

**Stegostoma fasciatum** (Hermann)

暖水性底栖鱼类。分布于东海南部、南海。

皮：用于胃脘痛，慢性腰腿痛。

## 207. 鲸鲨科　Rhincodontidae

### 鲸鲨属　Rhincodon Smith

**鲸鲨**　　大鲨鱼(通称)

**Rhincodon typus** Smith

大洋性上层鱼类。好群游，进行远程洄游，在我国沿海夏秋北上，冬春南返。分布于黄海、东海、台湾海峡、南海。

胆汁：清热解毒。用于疮疡。　鳍：补血，补气，补肾，补肺。用于各种慢性虚劳病证。　脊椎骨：祛风湿，止痛。用于风湿关节痛，头痛。

附　注：由骨提制的硫酸软骨素有降血脂、抗动脉硬化和抗凝血作用。临床用于动脉硬化，冠心病。

## 208. 猫鲨科　Scyliorhinidae

### 梅花鲨属　Halaelurus Gill

**梅花鲨**　　梅花鲨鱼(通称)

**Halaelurus burgeri** (Müller et Henle)

暖水性近海底栖鱼类。分布于东海南部、南海。

皮：滋补。用于胃病，肺病。

## 209. 皱唇鲨科　Triakidae

### 星鲨属　Mustelus Linck

**白斑星鲨**　　白点鲨(浙江)

**Mustelus manazo** Bleeker

冷温性近海栖息鱼类。卵胎生。分布于黄海、东海，南海少见。

肉(鲛鱼)：甘、咸，平。滋补强壮，消肿去瘀。用于脾虚浮肿，久病体虚，创伤久不愈合。　皮(鲛鱼皮)：甘、咸，平。解鱼毒，杀虫，补虚。　胆(鲛鱼胆)：苦，寒。用于喉闭。鳍(鲛鱼翅)：甘、咸，平。益气，开胃，消肿。用于肺气虚弱，疮毒。　鳔(鲛鲨白)：甘、咸，平。益肺补心，消痰，逐水，养精固气，滋阴补阳。　胎：滋补强壮，通经活血。用于久病体虚，咳嗽，妇女痛经。

附　注：功效相似的有**灰星鲨 M. griseus** Pietschmann，分布于东海、南海，黄海罕见；**皱唇鲨 Triakis scyllium** Müller et Henle，分布于黄海、东海，南海罕见。

## 210. 真鲨科　Carcharhinidae

### 真鲨属　Carcharhinus Blainville

**阔口真鲨**　　真鲨(浙江)

**Carcharhinus latistomus** Fang et Wang

暖温性近海栖息鱼类。分布于黄海、东海。

肉：健脾利水。　鳍：健胃，补气，消肿。用于肺气虚弱，小儿泄泻，疮毒。　骨：用于泄泻。　胎：养血调经，滋补强壮。用于痛经，久病体虚，咳嗽。　肝脏提取的脂肪油(鱼肝油)：滋补强壮，明目，壮骨。用于夜盲症，干燥性眼炎，佝偻病，软骨症，营养不良，痨病，病后恢复期及幼儿、产妇。

附　注：功效相似的有**乌翅真鲨 C. melanopterus** (Quoy et Gaimard)，分布于东海南部、南海；**黑印真鲨 C. menisorrah** (Müller et Henle)，分布几遍全国沿海；**侧条真鲨 C. pleurotaenia** (Bleeker)，分布于东海至南海；**沙拉真鲨 C. sorrah** (Müller et Henle)，分布于东海南部、南海。

### 斜齿鲨属　Scoliodon Müller et Henle

**尖头斜齿鲨**　　斜齿鲨(浙江)

**Scoliodon sorrakowah** (Cuvier)

暖水性鱼类。卵胎生。分布于东海中部与南部、南海，黄海和东海北部罕见。

肉：滋补强壮。　鳔：滋阴补阳，养精固气。　鳍：补虚益气。

附　注：功效相似的有**黑鳍基齿鲨 Hypoprion atripinnis** Chu，分布于南海。

## 211. 双髻鲨科　Sphyrnidae

### 双髻鲨属　Sphyrna Rafinesque

**路氏双髻鲨**　　相公鲨(浙江)

**Sphyrna lewini** (Griffith)

暖水性中大型凶猛鱼类。分布几遍全国沿海。

骨：用于腹泻。　心、鳍：补五脏，长腰力、益气开膈，清痰健胃。用于胃病。

附　注：功效相似的有**锤头双髻鲨 S. zygaena** (Linnaeus)，分布于黄海、东海、南海。

## 212. 角鲨科　Squalidae

### 角鲨属　Squalus Linnaeus

**白斑角鲨**　　刺鲨、锉鱼(浙江)

**Squalus acanthias** Linnaeus

冷温性近海栖息鱼类。卵胎生。分布于黄海、东海。

肉：甘、咸，平。滋补强壮，消肿去瘀。用于脾虚浮肿，久病体虚，创伤久不愈合。皮：甘、咸，平。解毒，杀虫，补虚。　胆：苦，寒。用于喉闭。　鳍：甘、咸，平。益气，开胃，消肿。用于肺气虚弱，疮毒。　鳔：甘、咸，平。益肺，补心，消痰逐水，养精固气，补阳。　胎：滋补强壮，通经活血。用于体虚，咳嗽，痛经。

附　注：功效相似的尚有**短吻角鲨 S. brevirostris** Tanaka，分布几遍全国沿海；**法氏角鲨 S. fernandinus** Molina，分布于渤海、黄海；**长吻角鲨 S. misukurii** Linnaeus，分布于黄海、东海、南海；**萨氏角鲨 S. suckleyi** Molina，分布于渤海、黄海。

## 213. 扁鲨科　Squatinidae

### 扁鲨属　Squatina Dumeril

**日本扁鲨**

**Squatina japonica** Bleeker

冷温性近海底栖鱼类。卵胎生。分布于黄海、东海，南海罕见。

肝：制取鱼肝油。肉：滋补强壮。皮：补虚，解毒。　鳔：补心，益肺，滋阴固气。

## 214. 锯鲨科　Pristiophoridae

### 锯鲨属　Pristiophorus Müller et Henle

**日本锯鲨**

**Pristiophorus japonicus** Günther

冷温性近海底栖鱼类。分布于黄海、东海、南海。

肝：制取鱼肝油。

## 215. 锯鳐科 Pristidae

### 锯鳐属 Pristis Linck

**尖齿锯鳐** 齿鳐(浙江),锯鲨(广西)

**Pristis cuspidatus** Latham

暖水性近海底栖鱼类,有时进入河口。卵胎生。分布于东海南部、南海。

肉:祛瘀,消炎。用于跌打损伤,风湿关节痛,肌囊炎。 肝脏蒸出之脂肪油:补益用于痨病,胃病。 鳍:滋补。用于虚劳。

## 216. 梨头鳐科 Rhinobatidae

### 梨头鳐属 Rhinobatos Linck

**许氏梨头鳐**

**Rhinobatos schlegelii** Müller et Henle

暖温性近海底栖鱼类。卵胎生。分布几遍全国沿海。

鳍:益气开膈,化痰健胃。

附 注:功效相似的有**颗粒梨头鳐 Scobatus granulatus** (Cuvier),分布于东海南部、南海。

## 217. 鳐科 Rajidae

### 鳐属 Raja Linnaeus

**何氏鳐** 梨头鲨(浙江)

**Raja hollandi** Jordan et Richardson

暖温性近海底栖鱼类。分布于东海、南海。

肉:祛风除湿,活血散瘀,消肿解毒,生肌敛疮。用于风湿关节痛,跌打肿痛,疮疖溃疡。 肝:提制鱼肝油,功效用同扁头哈那鲨。

附 注:功效相似的有**斑鳐 R. kenojei** Müller et Henle,分布于黄海、东海、台湾海峡;**孔鳐 R. porosa** Günther,分布于黄海、东海。

## 218. 虹科 Dasyatidae

### 虹属 Dasyatis Rafinesque

**赤虹**

**Dasyatis akajei** (Müller et Henle)

暖温性近海底栖鱼类。分布于东海、南海，亦见于广西南宁及龙洲淡水域中。

肉(海鹞鱼)：甘、咸，平。用于男子白浊膏淋，阴茎涩痛。　牙齿(海鹞鱼齿)：用于瘰疬。　尾刺：消肿清热，化结除症。用于咽喉肿痛，乳痈，疟疾。　脂肪油：用于小儿疳积。　肝：用于夜盲症。

附　注：功效相似的有**黄虹 D. bennetti** (Müller et Henle)，分布于东海至南海海域；**齐氏虹 D. gerrardi** (Gray)，分布于东海、台湾海峡、南海；**古氏虹 D. kuhlii** (Müller et Henle)，分布于台湾海峡、南海；**光虹 D. laevigatus** Chu，分布于黄海、东海；**小眼虹 D. microphthalmus** Chen，分布于东海南部、台湾海峡；**奈氏虹 D. navarrae** (Steindachner)，分布于渤海、黄海、东海；**中国虹 D. sinensis** (Steindachner)，分布于渤海、黄海、东海；**尖嘴虹 D. zugei** (Müller et Henle)，分布几遍全国沿海。

**花点虹**

**Dasyatis uarnak** (Forskal)

暖水性近海底栖鱼类。分布于东海南部、南海。

胆：散瘀健胃，清热利湿。用于胃病，跌打损伤，湿热黄疸。　尾刺：清热解毒。用于牙痛。

## 219. 燕虹科　Gymnuridae

### 燕虹属　Gymnura van Hasseler

**双斑燕虹**

**Gymnura bimaculata** (Norman)

近海底栖鱼类。分布于东海、台湾海峡、南海。

肉：祛风除湿。　胆汁：用于风湿关节痛，跌打肿痛，疮疖溃疡。

附　注：功效相似的有**日本燕虹 G. japonica** (Temminck et Schlegel)，分布于东海、南海。

## 220. 鳐科　Myliobatidae

### 鳐属　Myliobatis Cuvier

**鹞鳐**　　菱形鱼、头鱼(浙江)

**Myliobatis tobijei** Bleeker

温水性近海底栖鱼类。分布于渤海、黄海、东海。

尾刺：清热消炎，化结除症。用于乳痈，咽喉痛，疟疾，胃癌，食道癌。　肝：提制鱼肝油，功效同扁头哈那鲨。

## 221. 蝠鲼科 Mobulidae

### 蝠鲼属 Mobula Rafinesque

**日本蝠鲼** 蝙鱼、黑蝙、角燕(通称),锅盖鱼、角花鱼(浙江)

**Mobula japonica** (Müller et Henle)

暖温性中上层鱼类。卵胎生。分布于东海、南海。

鳃体: 清热解毒,透疹。用于小儿麻疹,疮疖。 脑: 化瘀。用于跌打损伤。

附 注: 功效相似的有**双吻前口蝠鲼 Manta birostris** (Walbaum), 分布几遍全国沿海。

## 222. 银鲛科 Chimaeridae

### 银鲛属 Chimaera Linnaeus

**黑线银鲛** 银鲛鱼(通称),兔子鱼(浙江)

**Chimaera phantasma** Jordan et Snyder

冷温性栖息较深水域的鱼类,冬季向近海洄游。分布于黄海、东海、南海。

肉: 滋补益气。

# 硬骨鱼纲 Osteichthyes

## 223. 鲟科 Acipenseridae

### 鲟属 Acipenser Linnaeus

**中华鲟** 鲟鱼(通称),龙鲨(浙江),黄腊子(湖北)

**Acipenser sinensis** Gray

生活于大江和近海中,是底层鱼类。具有洄游性或半洄游性。分布于黄海中部和北部、东海、南海,长江、钱塘江、闽江、珠江。

肉(鲟鱼): 甘,平。益气补虚, 活血通淋。 鳔(鱼鳔): 甘,平。补肾益精, 滋养筋脉,止血,散瘀,消肿。用于肾虚滑精,产后风痉,破伤风,吐血,血崩,创伤出血,痔疮。

附 注: ①国家一级保护野生动物。②功效相似的有**史氏鲟 A. schrencki Brandt**, 分布于黑龙江、松花江、嫩江、乌苏里江、兴凯湖;**达氏鲟 A. dabryanus** Dumeril, 分布于黄河、长江,亦见于东海沿岸。为国家一级保护野生动物。

### 鳇属 Huso Brandt

**鳇**

**Huso dauricus** (Georgi)

生活在江河中下层。产卵于河道的砂砾底上。分布于黑龙江、松花江、牡丹江、嫩江、乌苏里江、兴凯湖。

肉(鳇鱼)：甘，平。益气补虚。　肝(鳇鱼肝)：用于恶疮疥癣。　鳔(鳇鱼鳔)：功效同中华鲟。

## 224. 匙吻鲟科　Polyodontidae

### 白鲟属　Psephurus Günther

**白鲟**

**Psephurus gladius** (Martens)

生活在河流的中下层。性凶猛。分布于长江、钱塘江。

肉：益气补肾，活血通淋。

附　注：国家一级保护野生动物。

## 225. 鲱科　Clupeidae

### 鲱属　Clupanodon Lacépède

**斑鲦**　气泡子(河北)，古眼鱼(山东)，油鱼(福建)，黄流鱼(广东)

**Clupanodon punctatus** (Temminck et Schlegel)

近海中上层鱼类。栖息于沿海港湾和河口5—15米处，可在海水或咸淡水中生活，有时进入淡水。分布几遍全国沿海。

去内脏全体：清热解毒，消食补虚。

### 鲱属　Clupea Linnaeus

**鲱**　太平洋鲱(通称)

**Clupea harengus pallasi** Cuvier et Valenciennes

栖息于深80米左右的海域中央深水区，每年春季到近岸有水草和岩礁的地方产卵。分布于渤海、黄海。

肉：利尿，解毒。用于浮肿，小便不利，肺痨。卵：用于哮喘。

附　注：成熟精巢可提取鱼精蛋白、脱氧核苷酸、精氨酸；鱼精蛋白及其制剂，用于糖尿病，暴发型传染性肝炎的出血倾向，又对因过量注射肝素而导致的上消化道急性出血、肺痨咳血有较好的止血作用；脱氧核苷酸配制的DNA——单核苷酸钠注射液，对再生障碍性贫血、颗粒白细胞减少症、血小板减少紫癜、慢性放射所致的白细胞下降等疗效较好，对肝炎患者亦有一定的辅助疗效；精氨酸对肝昏迷及肝癌有一定疗效。

### 青鳞鱼属 Harengu la Cuvier et Valenciennes

**青鳞鱼** 青皮、青鳞、柳叶鱼(通称)

**Harengula zunasi** (Bleeker)

生活在沿岸浅海中、上层水体。分布于渤海、黄海、东海、南海。

肉：解毒。用于海蛇咬伤。

附 注：功效相似的有**中华青鳞鱼 H. nymphaea** (Richardson)，分布于南海；**大眼青鳞鱼 H. ovalis** (Bennett)，分布于东海、南海。

### 鳓属 Ilisha Richardson

**鳓鱼** 白鱼、糟白鱼、白鳞鱼、鲚鱼(通称)，白力鱼(浙江)

**Ilisha elongata** (Bennett)

近海洄游性中、上层鱼类，水温低时一般栖息于外海，水温高时游近沿岸。分布于全国各海区。

肉(鳓鱼)：甘，平。养心安神，健脾强胃。用于心悸，慢性泄泻。

### 鲥属 Macrura van Hasselt

**鲥** 时鱼(江西)，三来、三黎鱼(广西)

**Macrura reevesii** (Richardson)

暖水性中上层海洋鱼类。平时栖息于近海，每年春末夏初溯河作生殖洄游。分布于我国沿海及长江、钱塘江、珠江等水系。

肉或全体(鲥鱼)：甘，平。行水消肿，健脾补肺。用于营养不良，咳嗽水肿。 鳞(鲥鱼鳞)：用于疔疮，烫、烧伤，腿疮，下疳。

附 注：功效相似的有**花点鲥 M. kelee** (Cuvier)，分布于东海、南海。

### 小沙丁鱼属 Sardinella Valenciennes

**金色小沙丁鱼**

**Sardinella aurita** Valenciennes

生活于近海。分布于东海、南海。

全体：甘、咸，平。化食，益气。用于脾气虚，气短心悸，食积久痢，咳血。

## 226. 鳀科 Engraulidae

### 小公鱼属 Anchoviella Fowler

**康氏小公鱼**

**Anchoviella commersonii** (Lacepede)

生活于近海中。分布于东海、南海。

全体：健脾强胃。用于脾胃虚弱，脚跟肿痛。

附　注：功效相似的有**中华小公鱼 A. chinensis** (Günther)，分布于东海、台湾海峡、南海；**赤鼻棱鳀 Thrissa kammalensis** (Bleeker)，分布几遍全国沿海。

### 鲚属　Coilia Gray

**刀鲚**　　刀鱼、子鱼、鲚鱼(通称)，河刀鱼、凤尾鱼(浙江)

**Coilia ectenes** Jordan et Seale

生活在海洋中，每年 2—3 月由海进入江河，5—6 月产卵，幼鱼次年入海。分布于渤海、黄海、东海及黄河(东平湖)、长江和沿江通连的湖泊。

肉(鲚鱼)：甘，温。补气活血。用于慢性胃肠功能紊乱、消化不良。

附　注：功效相似的有**短颌鲚 C. brachygnathus** Kreyenberg et Pappenheim，分布于长江中下游的干支流和与其相通的湖泊；**七丝鲚 C. grayii** Richardson，分布于东海、南海；**凤鲚 C. mystus** (Linnaeus)，分布于渤海、黄海、东海。

### 鳀属　Engraulis Cuvier

**日本鳀**　　鳀(通称)，海蜒、丁香娘、灿肚岙儿(浙江)

**Engraulis japonicus** Temminck et Schlegel

生活在浅海中、上层，喜阴影，有趋光性。分布于渤海、黄海、东海。

全体：滋补。

### 黄鲫属　SetiPinna Swainson

**黄鲫**　　白连儿、黄尖子、薄口、麻口(浙江)

**Setipinna taty** (Cuvier et Valenciennes)

近海中、下层鱼类。分布几遍全国沿海。

肉：补气活血，助消化。

## 227. 鲑科　Salmonidae

### 大麻哈鱼属　Oncorhynchus Suckley

**大麻哈鱼**

**Oncorhynchus keta** (Walbaum)

生殖洄游性鱼类，每年秋季生殖鱼群由海洋进入河流中产卵。分布于黑龙江、松花江、乌苏里江、图们江。

肉：滋补，利水，健胃。用于消化不良，胸腹胀满，消瘦，水肿。

## 228. 香鱼科 Plecoglossidae

### 香鱼属 Plecoglossus Temminck et Schlegel

**香鱼** 鲜鱼、时鱼(浙江)

**Plecoglossus altivelis** Temminck et Schlegel

洄游性鱼类。每年夏季鱼群由海入河，沿河上溯，8—9 月在河中产卵，幼鱼当年入海越冬。分布于图们江、鸭绿江至福建沿海，广西北伦河。

鳔、肉：补气活血，催乳。

## 229. 银鱼科 Salangidae

### 间银鱼属 Hemisalanx Regan

**前颌间银鱼** 面条鱼、面鱼(浙江)

**Hemisalanx prognathus** Regan

生活于近海，每年 3 月下旬，由海进入河口产卵。分布于东海和入海河口。

全体(银鱼)：甘，平。补虚，健胃，益肺，利水。用于营养不良，消化不良，小儿疳积。

附 注：功效相似的有**大银鱼 Protosalanx hyalocranius** (Abbott)，分布于渤海、黄海、东海沿岸及长江、淮河中下游河道和湖泊；**尖头银鱼 Salanx acuticeps** Regan，分布几遍我国沿海和入海河口；**长鳍银鱼 S. longianalis** (Regan)，分布于渤海、黄海、东海沿海。

### 新银鱼属 Neosalanx Wakiya et Takahasi

**太湖新银鱼** 太湖短吻银鱼(通称)，小银鱼(安徽)

**Neosalanx taihuensis** Chen

生活在淡水湖泊中。分布于长江中下游及附属湖泊、淮河中游、灵江以及江浙内地小河道。

全体(水晶鱼)：甘，平。疏利肠胃，润肺。

## 230. 狗母鱼科 Synodidae

### 蛇鲻属 Saurida Cuvier et Valenciennes

**长蛇鲻** 丁鱼、神仙棱(浙江)，奎龙、狗棍(广西)

**Saurida elongata** (Temminck et Schlegel)

近海底栖鱼类。分布几遍全国沿海。

肉：健脾补肾，固精缩尿。用于小儿麻痹后遗症，遗精，夜尿。　尾：清热消炎。用于乳蛾。

附　注：功效相似的有**长条蛇鲻 S. filamentosa** Ogilby，分布于东海、南海；**多齿蛇鲻 S. tumbil** (Bloch et Schneider)，分布于东海、南海；**花斑蛇鲻 S. undosquamis** (Richardson)，分布于东海、南海。

### 大头狗母鱼属　Trachinocephalus Gill

**大头狗母鱼**　　蚕龙鱼、狗棍(浙江)

**Trachinocephalus myops** (Bloch et Schneider)

生活在沿海近岸浅海湾底层或珊瑚礁中。分布于东海、南海。

尾：清热消肿。用于乳蛾。

## 231. 龙头鱼科　Harpodontidae

### 龙头鱼属　Harpodon Lesueur

**龙头鱼**　　细鱼、水定、豆腐鱼(浙江)

**Harpodon nehereus** (Hamilton)

生活在浅海泥底的海湾中。分布于东海、南海。

全体：健脾益气，滋补肝肾。

## 232. 鳗鲡科　Anguillidae

### 鳗鲡属　Anguilla Shaw

**鳗鲡**　　白鳝(江苏)，鳗鱼(福建)

**Anguilla japonica** Temminck et Schlegel

降河性洄游鱼类，在淡水中生长，到海水中产卵。分布于我国各海区以及辽河至珠江、海南各主要淡水水系。

全体或肉(鳗鲡鱼)：甘，平。补虚羸，祛风湿，解毒，杀虫。用于肺痨，瘰疬，虚劳骨蒸，风湿痹痛，阳痿，恶疮，溃疡。血(鳗鲡鱼血)：用于眼翳。　骨(鳗鲡鱼骨)：用于痢疾，肠风，带下病。　脂肪(鳗鲡鱼膏)：用于痿疮，风热咳喘。

附　注：①功效相似的有**花鳗鲡 A. marmorata** Quoy et Gaimard，分布于长江以南各江河水域。②国家二级保护野生动物。

## 233. 康吉鳗科 Congridae

### 星鳗属 Astroconger Jordan et Hubbs

**星鳗** 鳗鱼(通称)

**Astroconger myriaster** (Brevoort)

近岸底层鱼类。分布于渤海、黄海、东海。

肉：滋补益气。

附 注：功效相似的有**黑尾吻鳗 Rhynchoconger ectenurus** (Jordan et Richardson)，分布于东海、南海；**短尾突吻鳗 Rhynchocymba sivicola** (Matsubara et Ochiai)，分布于东海。

## 234. 海鳗科 Muraenesocidae

### 海鳗属 Muraenesox McClelland

**海鳗** 狼牙鳝(河北)，海寄钩(江苏)，狼耳(浙江)，勾鱼(福建)，门鳝(广西)

**Muraenesox cinereus** (Forskal)

凶猛性底层鱼类，常栖息于深 50—80 米、泥沙或沙泥底的海区中，有季节性洄游。分布于全国各海区。

肉(海鳗)：甘，平。有毒。消食，清热解毒。用于食欲不振，皮肤恶疮，疥癣，痔疮。鳔：滋养补虚，祛风明目，活血通经。

## 235. 海鳝科 Muraenidae

### 裸胸鳝属 Gymmothorax Bloch

**网纹裸胸鳝** 海黄鳝、海蛇鱼(浙江)

**Gymmothorax reticularis** Bloch

暖水性近海底层鱼类。栖息于沿岸岩礁间。分布于东海南部、台湾海峡、南海。

全体：消肿，收敛。用于痔疮，胸痛；外用于无名肿毒。 血：止血。用于外伤出血。

附 注：功效相似的有**豆点裸胸鳝 G. favagineus** Bloch et Schneider，分布于东海、台湾海峡、南海；**细斑裸胸鳝 G. fimbriatus**(Bennett)，分布于台湾海峡及南海海域；**黑点裸胸鳝 G. melanospilus** (Bleeker)，分布于东海、台湾海峡、南海；**斑点裸胸鳝 G. meleagris** (Shaw)，分布于东海南部至南海；**花斑裸胸鳝 G. pictus** (Ahl)，分布于东海南部至南海；**斑条裸胸鳝 G. punctatofasciatus** Bleeker，分布于东海、台湾海峡、南海；**勾斑裸胸鳝 G. reevesi** (Richardson)，分布于南海；**异纹裸胸鳝 G. richardsoni** Bleeker，分布于台湾海峡、南海；**波纹裸胸鳝 G. undulatus** (Lacepede)，分布于东海、

台湾海峡、南海。

### 长体鳝属　Thyrsoidea Kaup

**长体鳝**　　海鳝(浙江)

**Thyrsoidea macrurus** (Bleeker)

近海暖水性底层鱼类。分布于东海。

全体：清热解毒。

## 236. 蠕鳗科　Echelidae

### 虫鳗属　Muraenichys Bleeker

**裸鳍虫鳗**　　黄鳗(浙江)

**Muraenichthys gymnopterus** Bleeker

近海暖水性底层鱼类，栖息于滩涂中。分布于东海、台湾海峡、南海。

全体：滋补强壮。

## 237. 蛇鳗科　Ophichthyidae

### 须鳗属　Cirrhimuraena Kaup

**中华须鳗**　　面鳗(浙江)，软骨鳗(福建)

**Cirrhimuraena chinensis** Kaup

栖息于深 50—80 米泥沙底海区。分布于东海、南海。

全体：祛风湿，除瘀止痛，活血。用于跌打损伤，骨折，风湿痹痛。

### 蛇鳗属　Ophichthus Ahl

**尖吻蛇鳗**　　硬骨鳗、油芯(浙江)

**Ophichthus apicalis** (Bennett)

栖息于深 50—80 米泥沙底海区。分布于东海、南海。

全体：补气血，祛风湿。用于气血不足的头痛及风湿痛。

附　注：功效相似的有**鳄形短体鳗 Brachysomophis crocodilinus (Bennett)**，分布于东海、南海。

### 豆齿鳗属　Pisoodonophis Kaup

**食鳖豆齿鳗**　　豆齿鳗(通称)，墨鳗(浙江)

**Pisoodonbphis cancrivorus** (Richardson)

栖息于深 50—80 米泥沙底海区。分布于东海、南海。

全体：补气血，祛风湿，滋补强壮。用于腰肌劳损。

## 238. 鲤科 Cyprinidae

### 光唇鱼属 Acrossocheilus Oshima

**宽口光唇鱼**

**Acrossocheilus monticola** (Günther)

喜生活在水质澄清、多巨石洞穴、水缓流处。分布于长江中上游。

肉：滋补，强壮，泻火，健胃。

附　注：功效相似的有**云南光唇鱼 A. yunnanensis** (Regan)，分布于长江上游及云南东部各水体。

### 鳙属 Aristichthys Oshima

**鳙**　胖头、花鲢(通称)，大头鲢(安徽)，大头鱼(广西)

**Aristichthys nobilis** (Richardson)

生活于水的中上层。分布于东部平原各主要水系。

肉(鳙鱼)：甘，温。益脑，暖胃，去头眩，健筋骨。用于风寒头痛，头晕，胃寒，腰膝酸软。

附　注：鳙鱼头亦用于头晕。鳙鱼胆汁有短暂的降压作用，加大剂量则作用持久。近年曾发生吞服鱼胆中毒致死病例，应慎用。

### 鲫属 Carassius Jarocki

**鲫**　喜头、鲫鱼(通称)，吉鱼(吉林)，鲫瓜子(河北)，土鱼(湖南)

**Carassius auratus** (Linnaeus)

广适性鱼类，生活在各种水体中。多在浅水湖湾或沟湾的水草丛生地带产卵。分布于全国各水系、水体。

肉或全体(鲫鱼)：甘，平。健脾利湿，温中利胃，行水消肿。用于反胃吐食，脾胃虚弱，食欲不振，痢疾，水肿，淋证，溃疡。卵(鲫鱼子)：调中，补肝。用于翳障。头(鲫鱼头)：用于咳嗽，痢疾，小儿口疮。骨(鲫鱼骨)：用于鼠疮。胆(鲫鱼胆)：解毒，消肿。用于疳疮，骨骾、竹刺不出，白喉。脑(鲫鱼脑)：用于耳聋。鳔：用于疝气。鳞：止血。

**金鱼**　锦鱼(河南)，朱砂鱼(广西)

**Carassius auratus domestic** Linnaeus

大部分地区均有饲养。

肉或全体(金鱼)：苦，微咸，平有小毒。清热，利水，解毒。用于水臌，黄疸，咳嗽。

## 鲮属 Cirrhinus (Cuvier) Oken

**鲮** 青鳞鱼(通称)，雪鱼、雷黄(福建)，雪鲮(广西)

**Cirrhinus molitorella** (Cuvier et Valenciennes)

中下层鱼类，生活在水温较高的水体中。分布于闽江、珠江、元江、澜沧江及海南。

肉(鲮鱼)：甘，平。活血行气，清热利湿，补中开胃，强健筋骨。用于膀胱湿热，黄疸，水肿，臌胀，骨节酸痛。

## 铜鱼属 Coreius Jordan et Starks

**北方铜鱼** 鸽子鱼(宁夏)

**Coreius septentrionalis** (Nichols)

中下层鱼类，喜栖于水底多沙石处。分布于黄河水系。

肉：清热解毒，醒酒，开胃。

## 草鱼属 Ctenopharyngodon Steindachner

**草鱼** 草根(宁夏)，草鲩(湖南)，草包鱼(广西)，鲩曰鳙(云南)

**Ctenopharyngodon idellus** (Cuvier et Valenciennes)

喜生活在水的中下层和多水草的水域。分布于我国东部黑龙江至珠江、云南元江各水系。

肉(鲩鱼)：甘，温。暖胃和中，平肝祛风，治痹，截疟。用于虚劳，久疟，风湿头痛。胆(鲩鱼胆)：苦，寒。有毒。降压，镇咳，清热解毒。

附 注：民间常有服用草鱼胆治疗高血压症及咳嗽。但因其有毒，已有多起因吞服鱼胆中毒致死的报道，内服者应遵医嘱。

## 鲌属 Culter Basilewsky

**红鳍鲌**

**Culter erythropterus** Basilewsky

栖息于多水草的开阔水体中上层，冬季在深水处越冬。分布几遍全国各水系。

肉：利水消肿。用于消瘦浮肿，产后抽搐。

附 注：功效相似的有**鲌 C. alburnus** Basilewsky，分布于黑龙江、松花江水系；**短鳍近红鲌 Ancherythroculter wangi** (Tchang)，分布于四川。

## 鲤属 Cyprinus Linnaeus

**鲤** 鲤拐子、河鲤(通称)，镜鲤(贵州)

**Cyprinus (Cyprinus) carpio** Linnaeus

底栖性鱼类，喜活动于松软底层和水草丛生处。分布于全国各水系，水体。

肉或全体(鲤鱼)：甘，平。开胃健脾，消肿利尿，止咳平喘．下乳安胎。用于反胃吐食，久咳气喘，乳汁不通，胎动不安，小便不利。　目(鲤鱼目)：用于中风水肿；除肉中刺。皮(鲤鱼皮)：用于鱼鲠，癥疹。　血(鲤鱼血)：用于口眼歪斜，小儿丹肿及疮。　肠(鲤鱼肠)：解毒，杀虫。用于小儿肌疮，聤耳，痔瘘。　齿(鲤鱼齿)：用于淋证，小便不通。胆(鲤鱼胆)：苦，寒。清热明目，散翳消肿。用于目赤肿痛，青盲障翳，咽痛喉痹。　脂肪(鲤鱼脂)：用于小儿痫疾，惊悸。　脑(鲤鱼脑)：温。用于耳聋，青盲。　鳞(鲤鱼鳞)：散血，止血。用于吐血，衄血，崩漏带下，瘀滞腹痛，痔漏。　鳔：用于疝气。　骨：利湿，解毒。用于带下病，阴疽。

## 盘鮈属　Discogobio Lin

**云南盘鮈**

**Discogobio yunnanensis** (Regan)

生活在河流中。分布于长江上游、元江、南盘江及滇池。

肉：补虚，健脾胃，下乳。

## 鳡属　Elopichthys Bleeker

**鳡**　　生母鱼、大口鳡、鲟鱼(通称)，黄颊鱼(安徽)，竿鱼(湖北)

**Elopichthys bambusa** (Richardson)

生活在水的中上层。分布于东部黑龙江至珠江各水系。

肉：暖中，益胃，止呕。用于脾胃虚弱，反胃吐食。

## 红鲌属　Erythroculter Berg

**翘嘴红鲌**　　翘嘴鲌、大鲌鱼(通称)，白鱼(安徽)，翘嘴鲢子(河南)

**Erythroculter ilishaeformis** (Bleeker)

生活在流水及大水体中，一般活动于水的中上层。分布几遍全国各水系。

肉(白鱼)：甘，平。开胃健脾，消食行水。用于胃气不降，水肿。

附　注：功效相似的有**戴氏红鲌 E. dabryi** (Bleeker)，分布几遍全国各水系；**蒙古红鲌 E. mogolicus**(Basilewsky)，分布几遍全国各水系；**拟尖头红鲌 E. oxycephaloides** (Kreyenbery et Pappenheim)，分布于长江水系；**尖头红鲌 E. oxycephalus** (Bleeker) 分布于长江水系。

## 颌须鮈属　Gnathopogon Bleeker

**嘉陵颌须鮈**

**Gnathopogon herzensteini** (Günther)

喜流水性生活，常见于水流较缓的石涧隙处。分布于汉江、嘉陵江。

肉：补虚，健脾，益胃，下乳。

附　注：功效相似的有**短须颌鉤 G. imberbis** (Sauvage et Dabry)，分布于长江中下游水系。

## 裸鲤属　Gymnocypris Günther

**青海湖裸鲤**　　湟鱼(青海)

**Gymnocypris przewalskii** (Kessler)

喜生活在浅水中。生殖洄游时由湖入河中繁殖。分布于青海湖水系。

肉：用于吐泻。

附　注：①繁殖季节，卵巢及精巢有毒，腹膜也具毒性，药用时应除去。②功效相似的有**花斑裸鲤 G. eckloni** Herzenstein，分布于黄河上游、石羊河、弱水、疏勒河、格尔木河。

## 裸重唇鱼属　Gymnodiptychus Herzenstein

**厚唇裸重唇鱼**　　麻鱼、重唇花鱼(通称)，谢花鱼(青海)

**Gymnodiptychus pachycheilus** Herzenstein

生活在江河上游的高原宽谷河段，少数较小个体见于邻近的峡谷河流中。分布于长江上游、雅砻江及黄河上游水系。

肉：祛淤，排脓，消炎。用于吐泻，疮疖化脓。　骨：消肿。用于水肿。　胆：清热，消翳障。用于疮疡热痛，白内障；外用于烧伤。

## 鲴属　Hemibarbus Bleeker

**唇鲭**　　唇鲮(甘肃)，鲮鲭(贵州)

**Hemibarbus labeo** (Pallas)

多栖于水流湍急的河流、水温较低的水域中下层，其产卵活动在流水中进行。分布几遍全国各主要水系。

肉(重唇鱼)：甘。补益脾肾，祛风湿，强筋骨。用于腰背疼痛，腿膝酸木。

附　注：功效相似的有**花鲭 H. maculatus** Bleeker，分布几遍全国各主要水系；**似鲭 Belligobio nummifer** (Boulenger)，分布于长江、灵江、富春江水系。

## 鳌属　Hemiculter Bleeker

**鳌**　　白条鱼(安徽)，鳌子(湖北)，穿鲦子(广西)

**Hemiculter leucisculus** (Basilewsky)

常群栖于河流、湖泊沿岸水体上层。冬季在深水处越冬。分布几遍全国各水系。

肉(鲦鱼): 甘,温。暖胃。用于冷泻。

附　注: 功效相似的有**油鲦 H. bleekeri** Warpachowsky, 分布几遍全国各水系。

## 鲢属　Hypophthalmichthys Bleeker

**鲢**　　鲢子、白鲢(通称),白鱼(广西),白脚鲢(云南)

**Hypophthalmichthys molitrix** (Cuvier et Valenciennes)

栖息在江河、湖泊及其附属水域的上层,冬季到河床或湖泊较深处越冬。分布于东部黑龙江至珠江各水系。

肉(鲢鱼): 甘,温。温中益气,利水,泽肤。用于久病体虚,水肿。

## 鲸属　Luciobrama Bleeker

**鲸**

**Luciobrama macricephlus** (Lacepede)

生活在水体中下层。分布于黑龙江、长江、闽江、珠江等水系。

肉(鲸鱼): 甘,平。益筋骨,健脾胃,滋补强壮。用于腰膝酸软,脾胃虚弱,食欲不振。

## 鲂属　Megalobrama Dybowsky

**鲂**　　三角鲂、乌鳊、三角鳊(通称),鲂鱼(河南),鳊鱼(湖北)

**Megalobrama terminalis** (Richardson)

栖息于底质为淤泥或石砾,生长在有深水植物和淡水壳菜的敞水区,冬季一般集在深水的石隙中越冬。分布于我国东部黑龙江至珠江各水系。

肉(鲂鱼): 甘,平。调胃健脾。用于消化不良,胸腹胀满。

附　注: 功效相似的有**团头鲂 M. amblycephala** Yih, 分布于长江中下游附属湖泊;**鳊 Parabramis pekienensis** (Basilewsky), 分布几遍全国各水系。

## 青鱼属　Mylopharyngodon Peters

**青鱼**　　青鲩(安徽),青鲹(湖南),螺蛳青(广西),黑鲹(云南)

**Mylopharyngodon piceus** (Richardson)

生活在水体中下层,冬季在河床深处越冬。分布于东部黑龙江至珠江、云南元江各水系。

肉(青鱼): 甘,平。益气化湿,和中截疟,养肝明目。枕骨(青鱼枕):用于心腹痛。胆(青鱼胆): 苦,寒。有毒。泻热,明目。用于目赤肿痛,翳障,喉痹,热疮,喉痹,疔腮,白秃。

附　注: 服用鱼胆中毒,甚至死亡的报道很多。《本草纲目》记载了各种鱼胆的应用,

应作进一步的研究。

## 马口鱼属 Opsariichthys Bleeker

**马口鱼**

**Opsariichthys bidens** Günther

生活在各种水体，尤喜石底的山涧急流。分布于我国东部、华北向南至海南各水系。

去鳞及内脏全体：补虚，壮阳，催乳。

## 鲈鲤属 Percocypris Chu

**鲈鲤** 花鱼、青脖(贵州)

**Percocypris pingi** (Tchang)

生活在河流的支流或干流，成鱼常在大水面生活。中上层鱼类。分布于长江上游干支流。

肉(花鱼)：甘，平。祛痰，止血，镇静。用于咳嗽痰喘，胃溃疡出血，咯血，衄血，崩漏，癫痫，失眠，月经过多。

附 注：功效相似的有**小鲈鲤 P. grahami** (Regan)，见于云南。

## 鲌属 Phoxinus Agassiz

**洛氏鲌** 拉氏鲌(陕西)

**Phoxinus lagowskii** Dybowski

生活于水的中上层，一般在稍清冷的水体中。分布于东北、华北地区各水系及长江中、上游的支流。

肉：强筋骨，和脾胃。

## 似鮈属 Pseudogobio Bleeker

**似鮈**

**Pseudogobio vaillanti** (Sauvage)

喜生活在深潭、洞、洄水湾处。分布于黄河、长江中游、闽江。

肉：健脾，益胃，补虚，下乳。

## 麦穗鱼属 Pseudorasbora Bleeker

**麦穗鱼** 麦穗子(陕西)

**Pseudorasbora parva** (Temminck et Schlegel)

生活在水草丛生的小湖、溪、沟渠浅水中。分布几遍全国各水系。

肉：补中益气，滋补强壮。

## 鳑鲏属　Rhodeus Agassiz

**中华鳑鲏**　　鳑鲏(通称)，板卒子(福建)，青衣鱼(贵州)

**Rhodeus sinensis** Günther

栖息于江河、湖泊、池泽中，喜生活在多水草处。分布于华北地区向南至珠江流域各水系。

肉(鳑鲏鱼)：甘，温。益脾健胃，补肾壮阳。用于久病体虚。

附　注：功效相似的有**彩石鳑鲏 R. lighti** (Wu)，分布几遍全国各主要水系；**高体鳑鲏 R. ocellatus** (Kner)，分布于长江、闽江、西江水系及海南；**兴凯鱊 Acheilognathus chankaensis** Dybowski，分布于东部黑龙江至珠江各水系；**大鳍鱊 A. macropterus** (Bleeker)，分布于东部黑龙江至海南各水系；**斑条鱊 A. taenianalis**(Günther)，分布于长江水系。

## 鲴属　Sarcocheilichthys Bleeker

**华鲴**　　猪鱼(吉林)，山鲫鱼(贵州)

**Sarcocheilichthys sinensis** Bleeker

栖息于水体中下层。分布几遍全国各主要水系。

肉(石鲫)：甘，平。强健脾胃，通利小便，清热解毒。用于水肿胀满，黄疸，疮毒。

附　注：功效相似的有**黑鳍鲴 S. nigripinnis** (Günther)，分布几遍全国各主要水系。

## 裸裂尻鱼属　Schizopygopsis Steindachner

**黄河裸裂尻鱼**　　小嘴巴鱼(青海)

**Schizopygopsis pylzovi** Kessler

栖息在缓流或静水中。分布于黄河上游、柴达木河、伊尔格次湖水系。

肉：用于淋证。

附　注：本属某些种鱼卵有毒，服用未经充分煮熟的鱼卵，往往发生呕吐，腹泻，晕眩等中毒现象。用时应除去。

## 裂腹鱼属　Schizothorax Heckel

**云南裂腹鱼**　　公鱼(通称)

**Schizothorax yunnanensis** Norman

栖息于多水草泥质底的静水域中，为中下层鱼类。分布于云南洱海、剑湖、莫汉沼。

肉(公鱼)：甘。滋补，止血，解毒。用于妇人劳损，崩漏，小儿痰热风痫，丹毒。

附　注：功效相似的有**昆明裂腹鱼 S. grahami** (Regan)，分布于金沙江水系；**齐口裂腹鱼 S. prenanti** (Tchang)，分布于长江上游干流及岷江、大渡河；**大理裂腹鱼 S. taliensis** Regan，分布于云南洱海(国级二级保护野生动物)。

## 唇鲮属　Semilabeo Peters

**泉水鱼**　　油鱼(通称)

**Semilabeo prochilus** (Sauvage et Dabry)

喜栖息在石底的江河溪涧的流水中。分布于长江上游干流及支流。

肉(油鱼)：甘。益补元气，止血止痢。用于泄痢，吐血，崩漏。

## 华鲮属　Sinilabeo Rendahl

**桂华鲮**

**Sinilabeo decorus** (Peters)

喜栖息于水流较急的河流及山涧溪流，尤喜石块底，为下层鱼类。分布于珠江水系。

肉(竹鱼)：甘，温。益气和中，除湿气。用于久病体虚，腰腿疼痛。

附　注：①功效相同的有**华鲮 S. rendahli** (Kimura)，分布于长江上游主、支流。②功效相似的有**湘华鲮 S. tungting** (Nichols)，分布于洞庭湖及其上游各支流及湖北洪湖。

## 倒刺鲃属　Spinibarbus Oshima

**倒刺鲃**　　鲃鱼、青鲃、青竹鲤(通称)，锯倒刺鲃(云南)

**Spinibarbus denticulatus** (Oshima)

中下层鱼类，生活于急流水中，常栖于乱石间隙和岩穴中。分布于珠江、元江水系及海南。

肉(鲃鱼)：甘，热。有小毒。补中壮阳。用于腰膝酸软。

附　注：功效相似的有**中华倒刺鲃 S. sinensis** (Bleeker)，分布于长江中上游及附属水体。

## 金线鲃属　Sinocyclocheilus Fang

**金线鲃**

**Sinocyclocheilus grahami** (Regan)

栖息于石底清澈的湖中，生殖时游入湖边岩洞泉水中。分布于云南。

肉(金线鱼)：甘。滋阴补气，暖肾填精。用于虚劳损伤，肾虚滑精。

附　注：①国家二级保护野生动物。②我国有 3 个亚种，即指名亚种 **S. g. grahami** (Regan)；抚仙亚种 **S. g. tingi** Fang；阳宗亚种 **S. g. yangzongensis** Tsü et Chen。

## 赤眼鳟属 Squaliobarbus Günther

**赤眼鳟** 赤眼鳟(辽宁),红眼鱼(宁夏),赤眼鱼(贵州)

**Squaliobarbus curriculus** (Richardson)

喜生活在流速较慢的水域中,为中、下层鱼类。分布于东部黑龙江至珠江、云南元江各水系。

肉(鳟鱼): 甘、酸,温。暖中和胃。用于反胃吐食,脾胃虚寒泄泻。

## 突吻鱼属 Varicorhinus Rüppell

**多鳞铲颌鱼**

**Varicorhinus** (Scaphesthes) **macrolepis** (Bleeker)

栖息于底质为砂石、水质澄清的河段。分布于长江、渭河,滹沱河。

肉: 补虚,壮阳,催乳。

**白甲鱼**

**Varicorhinus** (Onychostorna) **Simus** (Sauvage et Dabry)

栖息于水流较急,底层多砾石的江河中,喜在底层活动。分布于长江中上游及珠江水系。

肉: 补益强壮,清热,下乳。

## 鲴属 Xenocypris Günther

**黄尾鲴** 黄姑子(通称),黄片(安徽)

**Xenocypris davidi** Bleeker

栖息于较宽阔的水域中,常活动于水的中下层。冬季群集于敞水区的深处越冬。分布于黄河以南各水系。

肉(黄鲴鱼): 甘,温。温中止泻。用于胃寒泄泻。

附 注: 功效相似的有**银鲴 X. argentea** Günther, 分布于黑龙江至珠江、云南元江各水系; **湖北圆吻鲴 Distoechodon hupeinesis** Yin, 分布于长江水系; **圆吻鲴 D. tumirostris** Peters, 分布于长江、钱塘江、珠江、闽江各水系及台湾。

## 鱊属 Zacco Jordan et Evermann

**宽鳍鱊** 双尾鱼(湖北),石鲋鱼(贵州)

**Zacco platypus** (Temminck et Schlegel)

生活于各种水体,尤喜砂石底的浅滩急流。分布于东部各水系。

全体(石鲋鱼): 甘,平。有小毒。解毒杀虫。用于疮、疥、癣。

# 239. 鳅科 Cobitidae

## 副鳅属 Paracobitis Bleeker

**红尾副鳅**

**Paracobitis varigatus** (Sauvage et Dabry)

喜栖息在岩缝、石隙或多巨石的洄水湾处。分布于渭河、长江上游、南盘江。

除内脏的全体；补虚弱，清湿热。

附　注：　功效相似的有**短体副鳅 P. potanini** (Günther)，分布于长江上游水系；**安氏高原鳅 Triplophysa (Triplophysa) anglei** (Fang)，分布于四川西部雅砻江。

## 薄鳅属 Leptobotia Bleeker

**长薄鳅**

**Leptobotia elongata** (Bleeker)

山地边缘河流中的底层鱼类。分布于长江中上游、西江上游。

肉：补中，益气，壮阳。

附　注：功效相似的有**紫薄鳅 L. taeniops** (Sauvage)，分布于长江中游及其附属水体；**闽江扁尾薄鳅 L. tientaiensis compressicauda** (Nichols)，分布于闽江上游；**汉水扁尾薄鳅 L. tientaiensis hansuiensis** Fang et Hsu，分布于汉江，清江。

## 泥鳅属 Misgurnus Lacepede

**泥鳅**　　**鳅**，肉泥鳅(通称)，福泥鳅(河北)，鱼鳅(贵州)，鳝鱼(云南)

**Misgurnus anguillicaudatus** (Cantor)

淡水底栖鱼类，常出没于湖泊、池塘、沟渠和水田底层富有植物碎屑的淤泥表层。分布于东部辽河至澜沧江各水系。

肉或全体(泥鳅)：甘，平。补中益气，清热解毒，消肿止渴。用于温病大热，神昏口渴，水气浮肿，黄疸，肝炎，小便不利，疥癣痔疾。　皮肤中分泌的粘液(泥鳅滑液)：用于小便不通，热淋，痈肿。

附　注：　功效相似的有**大鳞泥鳅 M. mizolepis** (Günther)，分布于长江中下游及其湖泊、河渠等水系；　**大斑花鳅 Cobitis macrostigma** Dabry，分布于长江中游及其附属湖泊；**中华花鳅 C. sinensis** Sauvage，分布于我国东部辽河至珠江、云南元江各水系；**大鳞副泥鳅 Paramisgurnus dabiyanus** Sauvage，分布于长江中上游、浙江、台湾。

## 240. 平鳍鳅科 Homalopteridae

### 似原吸鳅属 Paraprotomyzon Pellegrin et Fang

**似原吸鳅**

**Paraprotomyzon multifasciatus** Pellegrin et Fang

生活在山间溪流中，常吸附在水流较急的岩石上。分布于长江上游、西江。

肉：清热，健胃，暖脾。

## 241. 鲇科 Siluridae

### 鲇属 Silurus Linnaeus

**鲇** 鲶鱼(通称)，鲶胡子(安徽)，鲇巴郎(广西)

**Silurus asotus** Linnaeus

底层肉食性鱼类。除青藏高原、新疆外，全国各水系均有分布。

肉或全体(鲴鱼)：甘，平。滋阴开胃，催乳利尿。用于虚损不足，乳汁少，水气浮肿，小便不利。 目(鲴鱼目)：用于刺伤中毒。 尾(鲴鱼尾)：用于口眼㖞斜。皮肤分泌的粘液(鲴鱼涎)：用于消渴。

附 注：功效相似的有**大口鲇 S. meridionalis** Chen，分布于长江、闽江、珠江流域。

## 242. 胡鲇科 Clariidae

### 胡鲇属 Clarias Scopoli

**胡鲇** 须子鲇(安徽)，塘虱鱼(江西)，角鱼(广西)，暗钉鱼(云南)

**Clarias batrachus** (Linnaeus)

生活在河川、池塘、水草茂盛的沟渠、稻田和沼泽中的黑暗处洞穴内。分布于长江中上游至珠江水系。

肉或全体(塘虱鱼)：甘，平。补血，补肾，调中。用于腰膝酸痛，久疟体虚，小儿疳积，衄血，黄疸。

## 243. 鳗鲇科 Plotosidae

### 鳗鲇属 Plotosus Lacepede

**鳗鲇** 沙鳗(福建)

**Plotosus anguillaris** (Bloch)

沿海底层小型鱼类。栖息于近海沿岸岩石海底。分布于东海、台湾海峡、南海。

肉：泻火，开胃。

## 244. 鲿科 Bagridae

### 鮠属 Leiocassis Bleeker

**长吻鮠** 准王鱼(安徽)

**Leiocassis longirostris** Günther

生活在江河底层，冬季在有岩石或乱石的深水处越冬。分布于辽河至闽江水系。

肉(鮠鱼)：甘，平。补中益气，利水开胃。

附 注：功效相似的有**纵带鮠 L. argentivittatus** (Regan)，分布于黑龙江至珠江水系；**粗唇鮠 L. crassilabris** Günther，分布于长江干支流及附属的湖泊、闽江、珠江水系。

### 黄颡鱼属 Pelteobagrus Bleeker

**黄颡鱼** 鲇丝(安徽)，嘎牙子(湖北)

**Pelteobagrus fulvidraco** (Richardson)

底层肉食性鱼类，多生活在江河缓流、岸边或湖泊中。除西部高原、新疆外，广布于各水系。

肉或全体(黄颡鱼)：甘，平。祛风，解毒，利水。用于水肿，小儿痘疹，瘰疬。 皮肤中分泌的粘液(黄颡鱼涎)：用于消渴。 颊骨(黄颡鱼颊骨)：用于喉痹。

附 注：功效相似的有**长须黄颡鱼 P. eupogon** (Boulenger)，分布于长江水系；**光泽黄颡鱼 P. nitidus** Sauvage et Dabry，分布于长江、闽江水系；**瓦氏黄颡鱼 P. vachelli** (Richardson)，分布于黄河南至珠江水系。

### 拟鲿属 Pseudobagrus Bleeker

**短尾拟鲿**

**Pseudobagrus brevicaudatus** (Wu)

生活在河流中。分布于长江水系。

肉：滋补强壮，健胃。

附 注：功效相似的有**细体拟鲿 P. pratti** (Günther)，分布于长江水系；**切尾拟鲿 P. truncatus** (Regan)，分布于长江水系；**乌苏里拟鲿 P. ussuriensis** (Dybowski)，分布于我国东部黑龙江至珠江水系。

## 245. 钝头鮠科　Amblycipitidae

### 鮡属　Liobagrus Hilgendorf

**白缘鮡**

**Liobagrus marginatus** (Günther)

底层肉食性鱼类，栖居于山溪或石砾底质的急流中。分布于长江上游。

全体：补虚，清热，催乳。

附　注：功效相似的尚有**黑尾鮡 L. nigricauda** Regan，分布于长江及附属水体；**司氏鮡 L. styani** Regan，分布于长江中下游。

## 246. 鮡科　Sisoridae

### 原鮡属　Glyptosternum McClelland

**黑斑原鮡**　　藏鮡(西藏)，巴格里(藏语)

**Glyptosternum maculatum** (Regan)

栖息于急流水中的石下或石隙间。分布于西藏雅鲁藏布江及邻近水域。

胆：消肿解毒，明目退翳。用于疮疡热痛，白内障，烧伤。　肉：开胃健脾，消肿利水。用于吐泻，疮疖。　骨粉：用于水肿。

附　注：功效相似的有**中华纹胸鮡 Glyptothorax sinense** (Regan)，分布于洞庭湖；**青石爬鮡 Euchiloglanis davidi** (Sauvage) 分布于四川青衣江上游。

## 247. 海鲇科　Ariidae

### 海鲇属　Arius Cuvier et Valenciennes

**中华海鲇**　　海鲇、油松(浙江)

**Arius sinensis** (Lacepede)

生活在近海中下层。分布于东海、南海。

全体：用于**慢性溃疡**，鞘膜积液。

附　注：功效相似的有**海鲇 A. thalassinus** (Rüppell)，分布于东海南部、南海。

## 248. 颌针鱼科　Belonidae

### 扁颌针鱼属　Ablennes Jordan et Fordice

**尖嘴扁颌针鱼**　　颚针鱼(浙江)

**Ablennes anastomella** (Cuvier et Valenciennes)

生活于近海或河口。分布于全国各海区。

肉：健脾胃。

## 249. 鱵科 Hemiramphidae

### 鱵属 Hemiramphus Cuvier

**鱵鱵**

**Hemiramphus far** (Forskål)

近海暖水性鱼类。栖息于中上层水域。分布于台湾海峡南部、南海。

功效同日本鱵。

附　注：功效相似的有**乔氏鱵 H. georgii** (Valenciennes)，分布于台湾海峡、南海；**九州鱵 H. kurumeus** Jordan et Starks，分布于长江中、下游及附属湖泊。

**日本鱵**　针鱼、单针鱼(通称)，扛针(广西)

**Hemirhamphus sajori** (Temminck et Schlegel)

栖息于浅海、河口，有时亦人淡水中。分布于渤海、黄海、东海。

肉(鱵鱼)：甘，平。滋阴，补气，解毒。用于阴虚内热，盗汗烦热及疮疡不易收口。

## 250. 飞鱼科 Exocoetidae

### 燕鳐属 Cypselurus Lowe

**少鳞燕鳐**　飞鱼(福建)，飞斋鱼(广西)

**Cypselurus oligolepis** (Bleeker)

近海暖水性中上层鱼类。栖息于澄清海区表层，常成群洄游。分布于台湾海峡、南海。

肉：止痛，催产。用于胃痛，难产。

附　注：功效相似的有**弓头燕鳐 C. arcticeps** (Günther)，分布于南海；**背斑燕鳐 C. bahiensis** (Ranzani)，分布于东海、南海；**尖头燕鳐 C. oxycephalus**(Bleeker)，分布于台湾海峡、南海；**斑鳍燕鳐 C. spilopterus** (Cuviet et Valenciennes)，分布于南海；**三峰燕鳐 C. starksi** Abe，分布于台湾沿海。

### 拟飞鱼属 Parexocoetus Bleeker

**短鳍拟飞鱼**　飞斋鱼(广西)

**Parexocoetus brachypterus** (Richardson)

近海暖水性鱼类。栖息于中上层水域，常成群生活于澄清的海区。分布于东海、台湾海峡、南海。

肉：用于妇女难产。

### 真燕鳐属　Prognichthys Breder

**真燕鳐**　燕子鱼、飞鱼(浙江)

**Prognichthys agoo** (Temminck et Schlegel)

暖水性上层鱼类，喜群集洄游。分布于渤海、黄海、东海。

肉(文鳐鱼)：甘，酸。催产，止痛。用于难产，胃痛。

## 251. 鳕科　Gadidae

### 鳕属　Gadus Linnaeus

**大头鳕**　大头腥(通称)

**Gadus macrocephalus** Tilesius

底层冷水性群聚鱼类。分布于渤海、黄海。

全体：活血，消肿，止痛。

### 江鳕属　Lota Oken

**江鳕**　花鲶鱼(吉林)

**Lota lota** (Linnaeus)

生活在山溪、河流、湖泊中。分布于额尔齐斯河、黑龙江、松花江、乌苏里江及鸭绿江水系。

肝：提制鱼肝油。

## 252. 烟管鱼科　Fistulariidae

### 烟管鱼属　Fistularia Linnaeus

**鳞烟管鱼**　火管梭、竹鱼(福建)

**Fistularia petimba** Lacépède

近海暖水性底层鱼类。栖息于泥沙底质的海区。分布于黄海东海、台湾海峡、南海。

全体：清热利尿，抗癌。

## 253. 玻甲鱼科　Centriscidae

### 玻甲鱼属　Centriscus Linnaeus

**玻甲鱼**

**Centriscus scutatus** Linnaeus

近海暖水性鱼类。分布于东海、南海。

**全体**：用于恶疮疖肿。

## 254. 海龙科 Syngnathidae

### 海马属 Hippocampus Rafinesque

**克氏海马** 大海马(通称),线纹海马(浙江)

**Hippocampus kelloggi** Jordan et Snyder

近海暖水性鱼类。栖息于水质澄清、海藻丛生的海区。分布于渤海、东海、南海。

去皮膜及内脏的全体(海马)：甘,温。温肾壮阳,散结消肿。用于阳痿,遗尿,肾虚作喘,症瘕积聚,跌扑损伤;外用于痈肿疔疮。

附 注：①功效相同,与本种同载《中华人民共和国药典》1990年版的有**刺海马 H. histrix** Kaup，分布于东海、台湾海峡、南海;**日本海马 H. japonicus** Kaup，分布几遍全国沿海;**管海马 H. kuda** Bleeker，分布于渤海、东海、南海;**斑海马 H. trimaculatus** Leach,分布于东海、台湾海峡、南海。②功效相似的有**冠海马 H. coronatus** Temminck et Schlegel，分布于渤海、黄海。

### 海龙属 Syngnathus Linnaeus

**尖海龙** 海龙(通称),杨枝鱼(河北),鞋底索(福建)

**Syngnathus acus** Linnaeus

近海暖水性小型鱼类。生活于藻类繁多的浅海中。受精卵在雄鱼育儿囊内发育。分布于渤海、黄海、南海。

去皮膜及内脏的全体(海龙)：甘,温。温肾壮阳,散结消肿。用于阳痿遗精，症瘕积聚,瘰疬痰咳,跌扑损伤,痈肿疔疮。

附 注：①功效相同，与本种同载《中华人民共和国药典》1990年版的尚有**拟海龙 Syngnathoides biaculeatus** (Bloch)，分布于东海南海;**刁海龙 Solegnathus hardwicki** (Gray),分布于东海。②功效相似的有**刺冠海龙 Corythoichthys crennlatus** (Weber)，分布于东海，**冠海龙 C. fasciatus** (Gray)，分布于东海、南海;**珠海龙 Syngnathus argyrostictus** Kaup，分布于东海、南海;**蓝海龙 S. cyanospilus** Bleeker，分布于东海、南海;**低海龙 S. djarong** Bleeker，分布于台湾海峡、南海;**粗吻海龙 Trachyrhamphus serratus** (Temminck et Schlegel)，分布于东海、台湾海峡、南海。

## 255. 鲹科 Sphyraenidae

### 鲹属 Sphyraena Bloch et Schneider

**油鲹** 油鱼(浙江)

**Sphyraena pinguis** Günther

栖息于近海海域。分布于全国各海区。

肉：益胃健脾。

## 256. 鲻科 Mugilidae

### 鲻属 Mugil Linnaeus

**鲻** 梭鱼、乌鲻、子鱼(通称)，白眼(浙江)，斋鱼(广西)

**Mugil cephalus** Linnaeus

浅海中上层鱼类，栖息于浅海或河口的咸淡水交界处。分布几遍全国沿海。

肉(鲻鱼)：甘，平。健脾益气，消食导滞。用于脾虚泄泻，消化不良，小儿疳积，贫血。

附 注：功效相似的有**梭鲻 M. soiuy** Basilewsky，分布于我国各海区；**棱鲻 Lizacar natus** (Cuvier et Valenciennes)，分布于东海、南海；**鲮 L. haematocheila** (Temminck et Schlegel)，分布于全国各海区；**黄鲻 Ellochelon vaigiensis** (Quoy et Gaimard)，分布于南海。

**英氏鲻**

**Mugil engeli** (Bleeker)

浅海中上层鱼类。见于福建沿海。

肉：用于扭伤疼痛。

## 257. 马鲅科 Polynemidae

### 四指马鲅属 Eleutheronema Bleeker

**四指马鲅** 马鲅、马友鱼(通称)，午鱼(浙江)

**Eleutheronema tetradactylum** (Shaw)

热带及温带海产鱼类，喜栖于沙底海区，有时亦进入淡水。分布于全国各海区。

全体：消肿，健脾止咳。用于消化不良，顿咳，乳蛾。

附 注：功效相似的有**六指马鲅 Polynemus sextarius** Bloch et Schneider，分布于东海、南海。

## 258. 合鳃鱼科 Synbranchidae

### 黄鳝属 Monopterus Lacépède

**黄鳝** 鳝鱼(通称),鳝(广西),黄鳝(云南)

**Monopterus albus** (Zuiew)

生活于水岸泥窟中,夏出冬蛰。分布于除青藏高原外的全国各水系。

肉或全体(鳝鱼): 甘,温。补虚损,强筋骨,除风湿。用于虚痨咳嗽,风寒湿痹,产后淋沥,下痢脓血,痔瘘,臁疮。 头(鳝鱼头): 甘,平。用于痢疾,消渴,耳疾,肠痈。 皮(鳝鱼皮): 用于乳痈。 血(鳝鱼血): 咸、甘,平。祛风,活血。用于口眼㖞斜,耳痛,鼻衄,癣,瘘。 骨(鳝鱼骨): 用于风热痘毒。

## 259. 鲈科 Serranidae

### 石斑鱼属 Epinephelus Bloch

**青石斑鱼** 鲗鱼(浙江),石斑、过鱼(广东),青斑(广西)

**Epinephelus awoara** (Temminck et Schlegel)

沿海暖水性中下层鱼类,栖息于沿海岩礁底质海区。分布于东海、台湾海峡、南海。

肉: 用于食积不消,呕吐泻痢,小儿疳疾,遗尿,遗精。

附 注: 功效相似的有**宝石石斑鱼 E. areolatus** (Forskal), 分布于南海;**网纹石斑鱼 E. chlorostigma** (Cuvier et Valencinnes), 分布于东海、台湾海峡、南海;**鲑点石斑鱼 E. fario** (Thunberg), 分布于南海;**指印石斑鱼 E. megachir** (Richardson), 分布于东海、南海;**云纹石斑鱼 E. moara** (Temminck et Schlegel), 分布于东海、南海。

**点带石斑鱼** 带石斑鱼(浙江)

**Epinephelus malabaricus** (Bloch et Schneider)

温热带底层鱼类,喜栖息于海底有岩礁处。分布于南海。

肉: 健脾,益气。用于产后妇女补食。

附 注: 功效相似的有**镰点石斑鱼 E. amblycephalus** (Bleeker), 分布于东海、南海;**橙点石斑鱼 E. bleekeri** (Vaillant et Bocourt), 分布于南海。

### 花鲈属 Lateolabrax Bleeker

**花鲈** 鲈鱼、鲈(通称),鲈甲、鲈板(浙江)

**Lateolabrax japonicus** (Cuvier et Valenciennes)

近岸浅海鱼类,喜栖息于河口咸淡水处,亦可生活于淡水中。分布几遍全国沿海。

肉(鲈鱼): 甘,平。益脾胃,补肝肾,安胎。用于脾胃虚寒泄泻,水气,风痹。 鳃:

止咳化痰。用于小儿顿咳。

### 鳜属 Siniperca Gill

**鳜** 桂鱼、鳜花鱼(通称),鳌鱼(河南),石桂鱼(贵州),桂花鱼(广西)

**Siniperca chuatsi** (Basilewsky)

生活在静水或缓流的水体中,喜潜伏水底,春夏季多在沿岸浅水区觅食。产卵多在干流和大支流的流水处。分布于全国各水系。

肉(鳜鱼): 甘,平。补气血,益脾胃。用于虚劳羸瘦,肠风泻血。 胆(鳜鱼胆): 苦,寒。用于骨鲠,竹木签刺喉中。

附 注: 功效相似的有**大眼鳜 S. kneri** Garman, 分布于长江流域及黄河下游水系;**斑鳜 S. scherzeri** Steindachner, 分布于全国各水系。

## 260. 大眼鲷科 Priacanthidae

### 大眼鲷属 Priacanthus Oken

**短尾大眼鲷** 大眼鱼(浙江)

**Priacanthus macracanthus** Cuvier et Valenciennes

热带海产底栖鱼类。分布于东海、南海。

肉: 消食利水。

## 261. 乳香鱼科 Lactariidae

### 鳢属 Sillago Cuvier

**多鳞鳢**

**Sillago sihama** (Forskal)

浅海底层鱼类,喜栖息于水质澄清的沙底海区,亦可进入淡水。分布于全国各海区。

肉: 利水消肿。

附 注: 功效相似的有**少鳞鳢 S. japonica** Temminck et Schlegel, 分布于东海、南海。

## 262. 方头鱼科 Branchiostegidae

### 方头鱼属 Branchiostegus Rafinesque

**日本方头鱼** 马头鱼(浙江)

**Branchiostegus japonicus** (Houttuyn)

温带近海中下层鱼类。通常栖息于深 150 米以内的沙泥底海区。分布于渤海、黄海、东海。

肉：清热解毒。

## 263. 鲹科 Carangidae

### 圆鲹属 Decapterus Bleeker

**蓝圆鲹** 圆鲹(通称)，钯鲹(浙江)，棍子、黄尾(广西)

**Decapterus maruadsi** (Temminck et Schlegel)

暖水性中上层鱼类，洄游性，喜结群。分布于全国各海区。

全体：化食利气，清热解毒。用于久痢，咳血，恶疮肿毒。

### 竹筴鱼属 Trachurus Rafineque

**竹筴鱼** 大眼棍(浙江)

**Trachurus japonicus** (Temminck et Schlegel)

为中上层洄游性鱼类，喜结群，有趋光性。分布于全国各海区。

肉：消肿排脓。用于疮疖。

## 264. 乌鲳科 Formionidae

### 乌鲳属 Formio Whitley

**乌鲳** 墨鲳、乌鳞鲳(通称)，铁板鲳(浙江)

**Formio niger** (Bloch)

热带及亚热带中上层鱼类。分布于黄海、东海、南海。

全体：益气健胃。

## 265. 石首鱼科 Sciaenidae

### 黄唇鱼属 Bahaba Herre

**黄唇鱼** 金钱鲍(通称)，黄柑(浙江)

**Bahaba flavolabiata** (Lin)

中下层鱼类，栖息于沿海海域。分布于东海南部、台湾海峡。

膘：甘，平。补肾益精，滋养筋脉。 鳃：甘、咸，平。调经活血。用于产妇血崩、子宫出血。 心：用于胸痛。 肝：滋补。提取鱼肝油。 耳石：同大黄鱼。

附 注：国家二级保护野生动物。

## 梅童鱼属　Collichthys Günther

**棘头梅童鱼**　　梅子鱼、梅童鱼、朱梅鱼(浙江)

**Collichthys lucidus** (Richardson)

生活于沿海近岸。分布于黄海、东海、南海。

全鱼：滋补强壮，健脾开胃。用于小儿夜尿，贫血，消化不良。

附　注：功效相似的有**黑鳃梅童鱼 C. niveatus** Jordan et Starks，分布于黄海、东海。

## 叫姑鱼属　Johnius Bloch

**皮氏叫姑鱼**

**Johnius belengerii** (Cuvier et Valenciennes)

海洋中下层鱼类。生殖季节结群向近岸洄游。分布于全国沿海。

全体：活血化瘀。用于挫、扭伤。　鳔：消食，利水。

## 鮸属　Miichthys Linnaeus

**鮸**　　敏鱼、敏子(通称)，米鱼(浙江)

**Miichthys miiuy** (Basilewsky)

暖水性底层鱼类，喜栖息于底层泥或泥沙处。分布于全国沿海。

肉和鳔：甘、咸，平。养血益气，补肾固精，解毒消肿，止血。用于肾虚遗精，疮疖肿痛，乳痈，吐血，再生障碍性贫血。

## 黄姑鱼属　Nibea Jordan et Thompson

**黄姑鱼**　　铜罗鱼(通称)，黄姑子(河北)，花鲈(广西)

**Nibea albiflora** (Richardson)

暖温性近海中下层鱼类。具明显的季节洄游，有发声能力。分布于全国沿海。

鳔：补肾益精，利水消肿，止血。用于水肿，妇女产后腹痛，肾虚遗精。

附　注：功效相似的有**白姑鱼 Argyrosomus argentatus** (Houttuyn)，分布几遍全国沿海；**黑姑鱼 Argyrosomus nibe** (Jordan et Thompson)，分布于黄海至南海沿海。

## 黄鱼属　Pseudosciaena Bleeker

**大黄鱼**　　大黄花鱼(通称)，大鲜(浙江)

**Pseudosciaena crocea** (Richardson)

亚热带结群性近海洄游底层鱼类，通常栖息于软泥或泥沙质海区。分布于黄海、东海、南海。

肉(石首鱼)：甘，平。开胃益气，明目安神。 干制鱼(石首鱼鲞)：甘，平。开胃，消食，健脾，补虚。用于食积腹胀，泄泻。 头骨中之耳石(鱼脑石)：咸，平。化石，通淋，消肿。用于石淋，小便不利，中耳炎，鼻塞流涕，脑漏。 鳔(鱼鳔)：甘，平。补肾益精，滋养筋脉，止血，散瘀，消肿。用于肾虚滑精，产后风痉，破伤风，吐血，血崩，创伤出血，痔疮。

附　注：功效相似的有**小黄鱼 P. polyactis** Bleeker，分布于渤海、黄海、东海。

## 266. 鳚科　Leiognathidae

### 鳚属　Leiognathus Lacépède

**黄斑鳚**　　金仔花、鳚鱼(通称)

**Leiognathus bindus** (Cuvier et Valenciennes)

暖水性鱼类，栖息于近岸海区。分布于东海、南海。

肉：甘，平。健脾益气。用于小儿消化不良，肝炎恢复期。

附　注：功效相似的有**长鳚 L. elongatus** (Günther)，分布于南海；**长棘鳚 L. fasciatus** Lacepede，分布于南海；**静鳚 L. insidiator** (Bloch)，分布于南海；**虎斑鳚 L. ruconius** (Hamilton)，分布于黄海、东海、南海。

## 267. 鲷科　Sparidae

### 真鲷属　Pagrosomus Gill

**真鲷**　　加拉鱼、王山鱼(浙江)，立鱼(广西)

**Pagrosomus major** (Temminck et Schlegel)

暖水性近海底层鱼类，一般多生活在 30—90 米的砂砾及沙泥底质海区，生殖季节游向近岸。分布于全国沿海。

全体：补肾益气，活血养血，祛风湿，止痛。用于虚劳羸瘦，食少气短，盗汗，遗精，风湿腰痛。

### 鲷属　Sparus Linnaeus

**黑鲷**　　黑立、黑加吉、岩雀(浙江)

**Sparus macrocephalus** (Basilewsky)

浅海底层鱼类，喜栖息于沙泥底或多岩礁的海区。分布于全国沿海。

全体：健脾利水，补气活血。用于脾虚水肿，小儿脾胃不健，消化不良，病后气血虚弱。

附　注：功效相似的有**黄鳍鲷 S. latus** Houttuyn，分布于东海、南海。

### 黄鲷属　Taius Jordan et Thompson

**黄鲷**　黄加立、波立(浙江)

**Taius tumifrons** (Temminck et Schlegel)

亚热带及热带近海底层鱼类。分布于东海、南海。

全体：滋补益气，养血。

## 268. 石鲈科　Pomadasyidae

### 髭鲷属　Hapalogenys Richardson

**横带髭鲷**　条纹髭鲷(通称)，铜盆鱼(辽宁)，金鼓(浙江)，海猴(福建)

**Hapalogenys mucronatus** (Eydoux et Souleyet)

暖温性近海中下层鱼类，喜栖息于岩礁多的海区。分布于我国沿海。

鳔：清热消肿。用于疖腮。

附　注：功效相似的有**纵带髭鲷 H. kishinouyei** Smith et Pope，分布于东海、南海；**黑鳍髭鲷 H. nigripinnis** (Temminck et Schlegel)，分布几遍全国沿海；**斜带髭鲷 H. nitens** (Richardson)，分布几遍全国沿海。

## 269. 金钱鱼科　Scatophagidae

### 金钱鱼属　Scatophagus Cuvier et Valenciennes

**金钱鱼**　金鼓、金鼓鱼(通称)

**Scatophagus argus** (Linnaeus)

暖水性鱼类，生活在近岸多岩石或海藻丛生的海区，常进入咸淡水或淡水中。分布于东海、南海。

胆：平肝镇惊。用于小儿惊风，发热，痢疾。

## 270. 隆头鱼科　Labridae

### 猪齿鱼属　Choerodon Bleeker

**蓝猪齿鱼**

**Choerodon azurio** (Jordan et Snyder)

温带性近海鱼类，多栖息于岩礁海藻间。分布于南海。

肉：健脾胃。

## 271. 鳐科 Uranoscopidae

### 青鳐属 Gnathagnus Gill

**青鳐** 臆鱼(浙江)

**Gnathagnus elongatus** (Temminck et Schlegel)

近海肉食性底栖鱼。分布于全国沿海。

肉：清热解毒。

### 鳐属 Uranoscopus Linnaeus

**日本鳐** 网纹臆(通称)，铜锣槌、金刚脚趾头(浙江)

**Uranoscopus japonicus** Houttuyn

底栖肉食性海鱼。分布于黄海、东海、南海。

肉：健脾胃，助消化。

附 注：功效相似的有**少鳞鳐 U. oligolepis** Bleeker，分布于东海、南海。

## 272. 绵鳚科 Zoarcidae

### 长绵鳚属 Enchelyopus Gronow

**长绵鳚** 光鱼(浙江)

**Enchelyopus elongatus** Kner

近海底层鱼类，通常栖息于深 40—60 米的海区，多匍匐海底。卵胎生。分布于渤海、黄海、东海。

全体：滋补强壮。

## 273. 蓝子鱼科 Siganidae

### 蓝子鱼属 Siganus Forskal

**褐蓝子鱼** 蓝子鱼(通称)，泥猛、梨猛(浙江)

**Siganus fuscescens** (Houttuyn)

热带及温带近海鱼类，常栖息于岩礁和珊瑚丛中。分布于黄海、东海、南海。

胆：清热解毒。用于中耳炎，疮疖肿毒。

附 注：功效相似的有**黄斑蓝子鱼 S. oramin** (Bloch et Schneider)，分布于东海、南海。

## 274. 带鱼科 Trichiuridae

### 带鱼属 Trichiurus Linnaeus

**带鱼** 鳞刀鱼、牙带(浙江)

**Trichiurus haumela** (Forskal)

中上层结群性洄游鱼类。分布几遍全国沿海。

肉(带鱼): 甘,温。滋补强壮,解毒,止血。 头: 和中、开胃,祛风杀虫。用于呃逆。鳞: 止血。用于外伤出血。

附 注: 功效相似的有**小带鱼 T. muticus** Gray, 分布几遍我国沿海; **沙带鱼 T. savala** (Cuvier et Valenciennes), 分布于东海、南海。

## 275. 鲭科 Scombridae

### 鲳属 Pneumatophorus Jordan et Gilbert

**鲳** 马需棍(广西),青花鱼、花鲹(浙江)

**Pneumatophorus japonicus** (Houttuyn)

暖水性远洋洄游鱼类。分布于黄海、东海、南海。

肉: 滋补强壮。用于吐泻,肺痨虚损,肾虚。

## 276. 鲅科 Cybiidae

### 马鲛属 Sawara Lacepede

**蓝点马鲛**

**Sawara niphonia** (Cuvier et Valenciennes)

暖温性中下层鱼类。夏、秋季结群向近海洄游。分布于黄海、东海、南海。

鳃: 补气,平喘。用于肺虚咳喘。

附 注: 功效相似的有**斑点马鲛 S. guttatus** (Bloch et Schneider), 分布于东海、南海;**朝鲜马鲛 S. koreana** (Kishinouye), 分布于东海、南海。

## 277. 金枪鱼科 Thunnidae

### 舵鲣属 Auxis Cuvier

**圆舵鲣**

**Auxis tapeinosoma** (Bleeker)

热带性海鱼。分布于黄海、东海、南海。

胰：提取胰岛素。

## 278. 鲳科 Stromateidae

### 鲳属 Stromateoides Bonaparte

**银鲳** 鲳鱼(通称)，午鱼(浙江)，车片鱼(广西)

**Stromateoides argenteus** (Euphrasen)

中下层鱼类。平时栖息外海，每年春末游向近海。分布几遍全国沿海。

肉(鲳鱼)：甘，平。补胃，益气，养血，舒筋。用于消化不良，脾虚，泄泻，贫血，筋骨酸痛，四肢麻木。

附 注：功效相似的有**燕尾鲳 S. nozawae** (Ishikawa)，分布于东海、南海；**中国鲳 S. sinensis** (Euphrasen)，分布于东海、南海；**刺鲳 Psenopsis anomala** (Temminck et Schlegel)，分布于东海、南海。

## 279. 塘鳢科 Eleotridae

### 乌塘鳢属 Bostrichthys Duméril

**乌塘鳢** 涂鱼、乌鳢(浙江)

**Bostrichthys sinensis** (Lacépède)

多生活于河口附近咸淡水内，或进入淡水内。底栖鱼类。分布于东海、南海。

全体：滋补强壮，健脾，益气。

### 沙塘鳢属 Odontobutis Bleeker

**沙塘鳢** 塘鳢(安徽)，沙鳢(湖北)

**Odontobutis obscurus** (Temminck et Schlegel)

生活于河沟及湖泊底层，喜栖于泥沙、杂草和碎石混杂的岸边浅水中。冬季潜伏水层较深处或石块下越冬。分布于辽河至珠江流域。

全体(土附)：甘，温。补脾胃，益元气，养荣血。用于噎膈，水肿湿气，疮疥。卵(土附子)：补肾壮阳。用于半身不遂，筋骨疼痛。

附 注：功效相似的有**黄蚴 Hypseleotris swinhonis** (Günther)，分布于黑龙江、黄河、长江、珠江水系。

### 鲈塘鳢属 Perccottus Dybowski

**葛氏鲈塘鳢** 老头鱼(吉林)

**Percottus glehni** Dybowski

生活于江河中。分布于黑龙江、图们江、辽河。

全体：用于消渴。

## 280. 鰕虎鱼科 Gobiidae

### 刺鰕虎鱼属 Acanthogobius Gill

**黄鳍刺鰕虎鱼** 沙吻鱼、光鱼、油光鱼(通称)，沙鲤、呵浪鱼(浙江)

**Acanthogobius flavimanus** (Temminck et Schlegel)

栖息于沿海及河流中，多居于水的下层。分布于渤海、黄海。

肉(鰕虎鱼)：甘、咸，平。暖中益气，补肾壮阳。用于虚寒腹痛，胃痛，疳积，消化不良，阳痿，早泄，小便淋沥。

附 注：功效相似的有**矛尾鰕虎鱼 Chaeturichthys stigmatias** Richardson，分布几遍全国沿海。

### 栉鰕虎鱼属 Ctenogobius Gill

**波氏栉鰕虎鱼**

**Ctenogobius cliffordpopei** (Nichols)

喜生活于溪流中底质为沙、砾石或多贝壳等的浅水地带，幼鱼常见于水的中上层。分布于长江水系。

除内脏的全体：补虚，清热，滋阴。

附 注：功效相似的有**子陵栉鰕虎鱼 C. giurinus** (Rutter)，分布于辽河南至珠江各平原水系；**神农栉鰕虎鱼 C. shennongensis** Yang et Xie，分布于汉水。

## 281. 弹涂鱼科 Periophthalmidae

### 大弹涂鱼属 Boleophthalmus Cuvier et Valennciennes

**大弹涂鱼**

**Boleophthalmus pectinirostris** (Linnaeus)

栖息于海水或河口附近，常活动于岸边滩涂上。分布于黄海、东海、台湾海峡、南海。

全体：平肝，潜阳，明目，滋补。用于耳鸣，重听，耳聋，头晕，盗汗，年老流泪。

### 弹涂鱼属 Periophthalmus Bloch et Schneider

**弹涂鱼** 跳鱼、跳跳鱼(通称)，泥猴、蓝河狗(浙江)

**Periophthalmus cantonensis** (Osbeck)

栖息于海水或半咸水河口附近。分布于黄海、东海。

全体：甘，平。补虚益气，止血，固肾。用于劳倦乏力，耳鸣重听，腰酸，肾虚，阳痿，痔疮出血。

### 青弹涂鱼属　Scartelaos Swainson

**青弹涂鱼**

**Scartelaos viridis** (Hamilton)

栖息于海水及半咸水中，常栅栅于河口附近沿岸滩涂上。分布于东海、台湾海峡、南海。

全体：滋补益气。

附　注：功效相似的有**大青弹涂鱼 S. gigas** Chu et Wu，分布于东海。

## 282. 鳗鰕虎鱼科　Taenioididae

### 狼牙鰕虎鱼属　Odontamblyopus Bleeker

**红狼牙鰕虎鱼**

**Odontamblyopus rubicundus** (Hamilton)

栖息于浅海沿岸。分布几遍全国沿海。

全体：凉血，止血。用于鼻衄。

附　注：功效相似的有**孔鰕虎鱼 Trypauchen vagina** (Bloch et Schneider)，分布于东海、台湾海峡、南海。

## 283. 斗鱼科　Belontiidae

### 斗鱼属　Macropodus Lacépède

**圆尾斗鱼**　　斗鱼(通称)

**Macropodus chinensis** (Bloch)

喜生活于小溪近岸杂草间。分布于黄河及长江水系。

全体：清热解毒。用于疮毒。

**叉尾斗鱼**　　斗鱼(通称)，蝴蝶鱼(广西)

**Macropodus opercularis** (Linnaeus)

栖于水田、溪流、池塘内。分布于长江以南各水系。

肉(菩萨鱼)：甘，淡。解毒，清热。外用于眼翳，疮痈。

## 284. 乌鳢科 Ophiocephalidae

### 鳢属 Channa Scopoli

**月鳢** 花财鱼(贵州)

**Channa asiatica** (Linnaeus)

栖息于淡水河中水草茂繁处。分布于长江以南各流域。

肉(张公鱼)：甘，平。滋阴壮骨。用于阴虚，四肢无力。

附 注：功效相似的有**斑鳢 C. maculata** (Lacepede)。

### 乌鳢属 Ophiocephalus Cantor

**乌鳢** 黑鱼、乌鱼(通称)

**Ophiocephalus argus** Cantor

生活于江河、湖泊、池沼中，喜栖于水草较多及有污泥的浑浊水底。分布几遍全国各水系。

肉或全体(鳢鱼)：甘，寒。补脾利水，解毒去热。用于风湿水肿，小便不利，脚气，痔疮，疥癣。 血(鳢鱼血)：利关节，活脉络。 肠(鳢鱼肠)：用于痔瘘。 胆(鳢鱼胆)：苦、甘、寒。泻火。用于喉痹，目翳，白秃疮。 头：通经活血。用于月经错后，经闭。 骨：用于抽搐麻木。

## 285. 鲫科 Echeneidae

### 鲫属 Echeneis Linnaeus

**鲫** 鲫鱼(通称)，食屎狗(广西)

**Echeneis naucrates** (Linnaeus)

为世界性温热带食肉性海鱼。分布于全国各海区。

全体：滋补，燥湿化痰。用于肺虚久咳，气喘，阳痿遗精，癥痕头。

### 短鲫属 Remora Forster

**白短鲫** 吸盘鱼(浙江)

**Remora albescens** (Temminck et Schlegel)

栖息于热带及温带海区。分布于东海、南海。

全体：滋补强壮。用于肺痨，久病体虚。

附 注：功效相似的有**短鲫 R. remora** (Linnaeus)，分布于全国各海区。

## 286. 鲉科 Scorpaenidae

### 棘鲉属 Hoplosebastes Schmidt

**棘鲉** 鲉鱼(浙江)

**Hoplosebastes armatus** (Cuvier et Valenciennes)

生活在海洋中。分布于东海、南海。

肉：清热解毒，消肿止痛。

### 鲉属 Scorpaena Linnaeus

**裸胸鲉** 伊豆鲉、笠子(浙江)

**Scorpaena izensis** Jordan et Starks

近海肉食性杂鱼。分布于全国沿海。

肉：暖中开胃。

附 注：功效相似的有**斑鳍鲉 S. neglecta** Temminck et Schlegel，分布几遍全国沿海。

### 平鲉属 Sebastes Cuvier

**无备平鲉** 黑石鲈(浙江)

**Sebastes inermis** Cuvier et Valenciennes

生活在海洋中。分布于黄海。

肉：健脾，开胃，益气。

附 注：功效相似的有**褐菖鲉 Sebastiscus marmoratus** (Cuvier et Valenciennes)，分布几遍全国沿海。

## 287. 毒鲉科 Synanceiidae

### 鬼鲉属 Inimicus Jordan et Starks

**鬼鲉** 日本鬼鲉(通称)，海蝎子(河北)，虎鱼(浙江)，老虎鱼(广西)

**Inimicus japonicus** (Cuvier et Valenciennes)

近海底层鱼类。生活于近岸浅水处。分布于全国沿海。

肉：舒筋骨，清热解毒。用于偏头痛，脓疡不敛，小儿疮疖，湿疹，乳汁不足，腰腿痛。

附 注：功效相似的有**虎鲉 Minous monodactylus** (Bloch et Schneider)，分布几遍全国沿海。

## 288. 鲂鲉科 Triglidae

### 绿鳍鱼属 Chelidonichthys Kaup

**绿鳍鱼**

**Chelidonichthys kumu** (Lesson et Garnot)

近海底栖鱼类，喜栖息于沙泥底海区。分布于全国沿海。

肉：补肾止痛，平肝明目。用于风湿腰背痛，肾虚，视物模糊。

### 红娘鱼属 Lepidotrigla Günther

**短鳍红娘鱼**

**Lepidotrigla micropterus** Günther

为底栖群聚性海鱼，春夏到近岸产卵。分布于渤海、黄海、东海。

全体：健脾益气。

附　注：功效相似的有**翼红娘鱼 L. alata** (Houttuyn)，分布于东海至南海北部。

## 289. 六线鱼科 Hexagrammidae

### 斑头鱼属 Agrammus Günther

**斑头鱼**　　褐斑鱼(浙江)

**Agrammus agrammus** (Temminck et Schlegel)

近海中下层鱼类。分布于黄海、东海。

全体：用于消化不良。

### 六线鱼属 Hexagrammos Tilesius

**大泷六线鱼**

**Hexagrammos otakii** Jordan et Starks

冷水性近海底层鱼类，常栖息于沿岸浅水的岩礁石砾地带。分布于黄海、东海。

肉：用于肠胃痛，消化不良。

## 290. 鲬科 Platycephalidae

### 鲬属 Platycephalus Bloch

**鲬**　　鲬鱼、辫子鱼(通称)，牛尾鱼、竹甲、刀甲(浙江)

**Platycephalus indicus** (Linnaeus)

近海底栖鱼类，平时栖于沙底海区。分布于全国沿海。

肉：利水消肿，平喘止咳。用于水肿，风湿关节痛，小儿哮喘，伤口难愈合。

### 大眼鲬属 Suggrundus Whitley

**大眼鲬** 大眼泡(浙江)

**Suggrundus meerdervoorti** (Bleeker)

近海底栖鱼类。分布于东海、南海。

金鱼：清热，解毒，消肿。

## 291. 杜父鱼科 Cottidae

### 松江鲈属 Trachidermus Heckel

**松江鲈** 杜父鱼、船叮鱼(通称)，媳妇鱼、豆鳃鲈(浙江)

**Trachidermus fasciatus** Heckel

近海底层鱼类，亦进入淡水。分布于黄海、东海。

肉：健脾益气，益肝肾，安胎。用于慢性胃病，脾虚泄泻，小儿疳积，消化不良。

附 注：国家二级保护野生动物。

## 292. 牙鲆科 Paralichthyidae

### 牙鲆属 Paralichthys Girard

**褐牙鲆** 比目鱼、左口鱼、偏口(通称)，牙鳎、地仔(浙江)

**Paralichthys olivaceus** (Temminck et Schlegel)

暖温性底层鱼类，栖息在沙泥底上。分布于全国沿海。

肉：健脾益气，消肿解毒。用于急性吐泻，消化不良，食鱼中毒。

### 斑鲆属 Pseudorhombus Bleeker

**大牙斑鲆** 地鱼、缔鱼(浙江)

**Pseudorhombus arsius** (Hamilton)

近海底层鱼类，常侧卧潜伏于泥沙中。分布于东海。

肉：益力气，补脾胃，催吐。用于急性吐泻，食鱼中毒。

附 注：功效相似的有**桂皮斑鲆 P. cinnamomeus** (Temminck et Schlegel)，分布几遍我国沿海；**马来斑鲆 P. malayanus** Bleeker，分布于南海；**少牙斑鲆P. oligodon** (Bleeker)，分布于南海北部。

## 293. 鲽科 Pleuronectidae

### 木叶鲽属 Pleuronichthys Girard

**角木叶鲽** 比目鱼、角鲽、猴子鱼(浙江)
**Pleuronichthys cornutus** (Temminck et Schlegel)
暖温性近海底层鱼类，栖息于沙泥底质海区。分布于黄海、东海、南海北部。
全体：壮阳补气。用于腰酸背痛。
附 注：功效相似的有**虫鲽 Eopsetta grigorjewi** (Herzenstein)，分布于黄海、东海。

## 294. 鳎科 Soleidae

### 条鳎属 Zebrias Jordan et Snyder

**带纹条鳎** 斑条鳎、花鳎(通称)，花牛舌、花鞋底(浙江)
**Zebrias zebra** (Bloch)
热带性底层鱼类，栖息于沙泥底质海区。分布于全国沿海。
全体：健脾补肾。

## 295. 舌鳎科 Cynoglossidae

### 舌鳎属 Cynoglossus Hamilton

**黑尾舌鳎** 舌鳎(通称)，牛舌(浙江)
**Cynoglossus melampetalus** (Richardson)
热带性底层鱼类。分布于东海、南海北部。
全体：补虚健脾，益气养血。
附 注：功效相似的有**短吻三线舌鳎 C. abbreviatus** (Gray)，分布于渤海、东海、南海北部；**窄体舌鳎 C. gracilis** Günther，分布于渤海、黄海、东海、南海北部及附近江河下游；**断线舌鳎 C. interruptus** Günther，分布于东海、南海北部；**东亚单孔舌鳎 C. itinus** (Snyder)，分布于南海北部；**短吻红舌鳎 C. joyneri** Günther，分布几遍全国沿海；**宽体舌鳎 C. robustus** Günther，分布于渤海、黄海、东海、南海北部；**半滑舌鳎 C. semilaevis** Günther，分布几遍全国沿海；**褐斑三线舌鳎 C. trigrammus** Günther，分布于东海南部、南海北部及珠江下游。

## 296. 三刺鲀科 Triacanthidae

### 三刺鲀属 Triacanthus (Cuvier) Oken

**短吻三刺鲀** 炮台鱼、绒皮鱼、牛鱼(浙江),剥皮鱼(广西)

**Triacanthus brevirostris** Temminck et Schlegel

底栖肉食性海鱼。分布于我国沿海。

肉: 甘,温。有毒。利水消肿消积开脾,消痰化食。用于水肿,食积,咳嗽,胃病。 鳔: 消肿解毒。用于中耳炎,瘰疬,乳痈。 皮: 用于口疮,咽喉肿痛。 肝: 提制鱼肝油。

附 注: 功效相似的有**尖吻假三刺鲀 Pseudotriacanthus strigilifer** (Cantor),分布于台湾海峡、南海。

## 297. 革鲀科 Aluteridae

### 马面鲀属 Navodon Whitley

**绿鳍马面鲀** 剥皮鱼、象皮鱼、皮匠鱼(浙江)

**Navodon septentrionalis** (Günther)

外海暖温性底层鱼类,栖息于深 50—120 米的海区。分布于黄海、东海、台湾海峡、南海。

全体: 解毒,止血。用于消化道出血,乳痈。 肉: 健胃消食。用于胃病。

附 注: 鱼皮可制明胶,作药用胶囊或填充剂;肝供提取肝油用。

## 298. 鲀科 Tetraodontidae

### 东方鲀属 Fugu Abe

**虫纹东方鲀** 河豚、气鼓鱼、面艇巴(通称),乌郎、鸡枪(浙江)

**Fugu vermicularis** (Temminck et Schlegel)

近海底栖肉食性鱼类。分布于全国各海区。

肉(河豚): 甘,温。有毒。滋补强壮。用于腰腿痿软,肢体无力,痔疾。 卵(河豚子): 剧毒。用于疥癣虫疮。 眼睛(河豚目): 用于鸡眼。 肝脏熬出的油(河豚鱼肝油): 用于瘰疬,慢性皮肤溃疡。

附 注: 功效相似的有**铅点东方鲀 F. alboplumbeus** (Richardson),分布于全国各海区;**黑绿东方鲀 F. basilewskianus** (Basilewsky),分布于渤海、黄海;**双斑东方鲀 F. bimaculatus** (Richardson),分布于全国各海区;**菊黄东方鲀 F. flavidus** Li, Wang et Wang,分布于渤海、黄海、东海;**星点东方鲀 F. niphobles** (Jordan et Snyder),分布几遍全国沿海;**横纹东方鲀 F. oblongus** (Bloch),分布于东海、南海;**暗纹东方**

**鲀 F. obscurus** (Abe)，分布于黄海、东海及长江中下游； **弓斑东方鲀 F. ocellatus** (Osbeck)，分布于黄海、东海、南海及长江下游、珠江下游；**豹纹东方鲀 F. pardalis** (Temminck et Schlegel)，分布于渤海、黄海；**紫色东方鲀 F. porphyreus** (Temminck et Schlegel)，分布于渤海、黄海、东海； **假睛东方鲀 F. pseudommus** (Chu)，分布于渤海、黄海、东海及黄河下游、长江下游； **网纹东方鲀 F. reticularis** Tian, Cheng et Wang，分布于渤海、黄海、东海；**红鳍东方鲀 F. rubripes** (Temminck et Schlegel)，分布于渤海、黄海、东海； **条纹东方鲀 F. xanthopterus** (Temminck et Schlegel)， 分布几遍全国沿海。

### 腹刺鲀属 Gastrophysus Müller

**棕斑腹刺鲀** 棕斑兔头(通称)，金龟鱼、青皮乘(浙江)
**Gastrophysus spadiceus** (Richardson)

暖水性近海底层鱼类。分布于东海、南海。

皮和鳔：健脾止痢，润肺止咳。用于胃病，寒咳，赤痢。

附 注：功效相似的有**月腹刺鲀 G. lunaris** (Bloch et Schneider)， 分布于东海、南海；**黑鳃兔头鲀 Lagocephalus inermis** (Temminck et Schlegel)，分布于东海、南海。

## 299. 刺鲀科 Diodontidae

### 短刺鲀属 Chilomycterus Bibron

**刺额短刺鲀** 勒鱼(广西)
**Chilomycterus echinatus** (Gronow)

热带近海鱼类。分布于南海。

皮：补益肝肾，润肺止咳，催乳。用于老年寒喘，体弱多梦，遗精，遗尿，肝炎。

附 注：功效相似的有**匪短刺鲀 C. orbicularis** (Bloch)， 分布于东海、南海。

### 刺鲀属 Diodon Linnaeus

**六斑刺鲀** 刺龟、刺乖(浙江)
**Diodon holacanthus** Linnaeus

近海鱼类。分布于黄海、东海、台湾海峡、南海。

皮：健脾利湿。

附 注：功效相似的有**九斑刺鲀 D. novemmaculatus** Cuvier， 分布于南海。

## 300. 翻车鲀科 Molidae

### 翻车鲀属 Mola Koelreuter

**翻车鲀** 翻车鱼(通称)

**Mola mola** (Linnaeus)

世界性热带海鱼。分布于黄海、东海、南海。

肝：用于跌打，刀伤，烫、烧伤，腹痛。

附 注：功效相似的有**矛尾翻车鲀 Masturus lanceolatus** (Lienard)，分布于南海。

## 301. 海蛾鱼科 Pegasidae

### 海蛾鱼属 Pegasus Linnaeus

**海蛾鱼** 海麻雀、海燕(广东、广西)

**Pegasus laternarius** Cuvier

底层鱼类，栖深海。分布于南海。

全体：化痰止咳。用于小儿咳嗽痰喘，麻疹，泄泻。

**附 注：功效相似的有飞海蛾鱼 P. volitans** Cuvier，分布于南海。

## 302. 鲛鳚科 Lophiidae

### 黄鲛鳚属 Lophius Linnaeus

**黄鲛鳚** 老头鱼、海蛤蟆、蛤蟆鱼(通称)，结巴鱼、吞天王(浙江)

**Lophius litulon** (Jordan)

冷温性近海底层鱼类，常栖伏水底或水藻间。分布于渤海、黄海、东海。

头骨：消肿。用于疮疖，牙痛，牙龈脓肿。胆：清热解毒。用于目赤肿痛，水肿，黄疸。

附 注：功效相似的有**黑鲛鳚 Lophiomus setigerus** (Vahl)，分布于东海、南海。

## 303. 蝙蝠鱼科 Ogcocephalidae

### 棘茄鱼属 Halieutaea Cuvier et Valenciennes

**棘茄鱼** 红壳鱼(浙江)

**Halieutaea stellata** (Vahl)

热带性底层海鱼。分布几遍全国沿海。

肉：补肾缩尿。用于小儿遗尿。

**附　注**：功效相似的有**牙棘茄鱼 Halicmetus reticulatus** Smith et Radcliffe，分布于南海。

# 两栖纲　Amphibia

## 304. 小鲵科　Hynobiidae

### 山溪鲵属　Batrachuperus Boulenger

**角鞘山溪鲵**　　山溪鲵、羌活鱼(通称)，羌活虫(四川、贵州)

**Batrachuperus pinchonii** (David)

生活于海拔 1 500—3 900 米高山地区的溪流中。分布于西南及甘肃。

全体(羌活鱼)：辛、咸，平。行气止痛，补血健脾。用于肝胃气痛，血虚脾弱，面色萎黄。

**北方山溪鲵**　　山溪鲵、羌活鱼(通称)，西能山溪鲵(甘肃)，西藏山溪鲵(西藏)

**Batrachuperus tibetanus** Schmidt

生活在海拔 3 400 米左右平缓泉水流溪或水流较急的山溪内。分布于陕西、甘肃、青海、四川、西藏。

全体：祛风湿，通经络，止痛，定惊。

附　注：此药在甘肃称为接骨丹。

### 小鲵属　Hynobius Tschudi

**中国小鲵**　　小娃娃鱼(湖北)

**Hynobius chinensis** Güenther

栖于潮湿近水源的陆地上，产卵于水中。分布于浙江、福建、湖北。

全体：祛瘀止痛，续筋接骨。

附　注：功效相似的有**巴鲵 Liua shihi** (Liu)，分布于陕西、湖北、湖南、四川；**秦巴北鲵 Ranodon tsinpaensis** Liu et Hu，分布于陕西、湖北、四川。

## 305. 隐鳃鲵科　Cryptobranchidae

### 大鲵属　Andrias Tschudi

**大鲵**　　娃娃鱼(通称)，狗鱼(广西)

**Andrias davidianus** (Blanchard)

栖息于山溪下段水流急湍清晰的山间河流中，白天多潜伏于石穴中，夜间出来觅食。

分布于中南及河北、山西、陕西、甘肃、青海、江苏、安徽、浙江、江西、福建、四川、贵州。

肉：甘，平。补气，截疟，滋补强壮。用于病后虚弱，肾虚，贫血，疟疾，痢疾。

附　注：国家二级保护野生动物。

## 306. 蝾螈科　Salamandridae

### 蝾螈属　Cynops Tschudi

**东方蝾螈**　　水狗子(通称)，四脚鱼(安徽、河南)

**Cynops orientalis** (David)

生活在清寒的静水内，亦在池塘、稻田内活动。分布于山东、江苏、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖北、湖南。

全体(水狗子)：咸，凉。清热解毒。用于烧、烫伤。

### 肥螈属　Pachytriton Boulenger

**肥螈**　　蝾螈(福建)

**Pachytriton brevipes** (Sauvage)

生活在清寒的静水内。分布于浙江、江西、福建、广东、广西、贵州。

全体：消积。用于皮肤痒疹，烧、烫伤，小儿疳积。

### 瘰螈属　Paramesotriton Chang

**中国瘰螈**　　山和尚(通称)

**Paramesotriton chinensis** (Gray)

生活在山区溪流边，很少进入水内。分布于安徽、浙江、广东、广西。

全体：消积，清热，解毒。

### 疣螈属　Tylototriton Anderson

**红瘰疣螈**

**Tylototriton verrucosus** Anderson

生活在陆地上，5、6月间交配时进入静水池内。分布于云南。

去内脏全体：用于小儿疳积。

## 307. 盘舌蟾科　Discoglossidae

### 铃蟾属　Bombina Oken

**东方铃蟾**　　山蛤(吉林)

**Bombina orientalis** (Boulenger)

习居于山地丘陵小山溪的石下或静水坑内。分布于东北及河北、山东、江苏。

全体：用于痔疮。

## 308. 蟾蜍科 Bufonidae

### 蟾蜍属 Bufo Laurenti

**大蟾蜍** 癞蛤蟆(通称)，疥蛤蟆(河北)，癞宝(江苏、江西)，癞蚪(湖北)，

**Bufo bufo** Cantor

穴居于泥土中或栖息于石块下、杂草间。生殖季节密集于静水池塘中。全国除宁夏、新疆、西藏外，均有分布。

耳后腺分泌物(蟾酥)：辛，温。有毒。解毒，止痛，开窍醒神。用于痈疽疔疮，咽喉肿痛，中暑吐泻，腹痛神昏，手术麻醉。 全体(干蟾)：辛，凉。有毒。破症结，行水湿，化毒，杀虫，定痛。用于疔疮，发背，阴疽瘰疬，恶疮，猘犬伤疮。 胆(蟾胆)：用于咳嗽痰喘。 肝(蟾肝)：用于痈疽疔毒。 皮(蟾皮)：辛，凉。微毒。清热解毒，利水消胀。用于痈疽，肿毒，瘰疬，肿瘤，疳积腹胀，慢性咳嗽痰喘。 头(蟾头)：用于小儿疳积。 舌(蟾舌)：用于拔疔。

附 注：① 我国有 2 个亚种，即**中华亚种 B. b. gararizans** Cantor；**华西亚种 B. b. andrewsi** Schmidt. ② 本种为国家二级保护野生动物及国家二级保护野生药材。③ 功效相同，同载《中华人民共和国药典》1990 年版的有**黑眶蟾蜍 B. melanostictus** Schneider，分布于浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南(国家二级保护野生药材。④ 功效相似的有**花背蟾蜍 B. raddei** Strauch，分布于东北、华北西北及山东、江苏、安徽、青海；**西藏蟾蜍 B. tibetanus** Zarevski，分布于四川、云南、西藏；**绿蟾蜍 B. viridis** Laurenti，分布于新疆、西藏。

## 309. 雨蛙科 Hylidae

### 雨蛙属 Hyla Laurenti

**无斑雨蛙** 梆梆狗(河北、河南、湖北)

**Hyla arborea immaculata** Boettger ——*Hyla japonica* Guenther

生活在稻田或沼泽的草丛中或灌木林间的潮湿土地上或树根附近的石隙间，雨后多出现在路旁活动。分布于东北、华北及陕西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖北、湖南、四川、贵州。

全体：解毒，杀虫。用于湿癣。

**中国雨蛙** 金蛤蟆(通称)

**Hyla chinensis** Guenther

日间匍伏在树根附近石隙或洞穴内，晚间一般栖息在路旁灌木上。分布于中南及江

苏、浙江、江西、福建、台湾。

全体(金蛤蟆)：淡，平。生肌，止血，止痛。用于跌打损伤，骨折，外伤出血。

附　注：功效相似的有**华西雨蛙 H. annectans** (Jerdon)，分布于湖南、广西、四川、贵州、云南；**三港雨蛙 H. sanchiangensis** Pope，分布于安徽、浙江、福建、广西、贵州；**秦岭雨蛙 H. tsinlingensis** Liu et Hu，分布于陕西、湖北、四川。

## 310. 蛙科　Ranidae

### 蛙属　Rana Linnaeus

**中国林蛙**　　蛤士蟆、蛤蟆、田鸡、青蛙(通称)，山蛤蟆(河北)

**Rana chensinensis** David

4月下旬至9月下旬营陆地生活，栖息在山坡、树林、农田、草丛中，以潮湿的山林背坡居多。9月下旬至翌年3月下旬，营水栖生活，常分散蛰居在水底砂砾、淤泥里，桥桩下、乱石堆下或水草树根间，然后潜向深水处，进行深沉的群体冬眠。3月中旬至4月中旬产卵繁殖，完成生殖行为的个体，分别潜入水底进行十多天的生殖休眠。分布于东北、华北及陕西、甘肃、青海、新疆、山东、江苏、湖北、湖南、四川、西藏。

输卵管(蛤蟆油)：甘、咸，平。补肾益精，养阴润肺。用于身体虚弱，病后失调，精神不足，心悸失眠，盗汗不止，痨嗽咳血。　雌体(蛤士蟆)：咸，凉。养肺滋肾。用于虚痨咳嗽。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载；国家二级保护野生药材。② 功效相似的有**黑龙江林蛙 R. amurensis** Boulenger，分布于东北及内蒙古。

**棘腹蛙**　　石蛙(通称)，梆梆(湖北)

**Rana boulengeri** Guenther

习居于较小的山溪瀑布下及山溪水塘边的石上或水边石下。蝌蚪则分散生活在小山溪水坑内。冬季潜伏在腐烂的水草叶下越冬。分布于山西、陕西、甘肃、湖北、湖南、广西、四川、贵州。

肉：滋补，强壮，去疳。用于小儿痨瘦，疳积，病后虚弱。

附　注：功效相似的有**双团棘胸蛙 R. phrynoides** Boulenger，分布于四川、贵州、云南；**隆肛蛙 R. quadranus** Liu, Hu et Yang，分布于陕西、甘肃、安徽、湖北、四川；**棘胸蛙 R. spinosa** David，分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西。

**沼蛙**　　青蛙、田鸡(通称)，蚂蚓(广西)

**Rana guentheri** Boulenger

生活在静水池塘或稻田内。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

肉：活血消积。用于疳积。

**泽蛙**　　青蛙、田鸡、蛤蟆(通称)，山蛤蚂(河南、广西)，土蛙(云南)

**Rana limnocharis** Boie

生活在平原及丘陵地带的田野、池泽附近。分布于华东、中南及陕西、甘肃、四川、贵

州、云南。

全体(虾蟆)：甘，寒。清热解毒，健脾消积。用于痈肿，热疖，口疮，瘰疬，泄泻，疳积。皮(虾蟆皮)：用于疖肿，瘰疬。 肝(虾蟆肝)：用于蛇咬伤，白屑疮，疔疮。 胆(虾蟆胆)：用于小儿失音不语。 脑(虾蟆脑)：明目，疗青盲。 幼体(蝌蚪)：用于热毒疮肿。

**黑斑蛙** 青蛙、田鸡(通称)，癞呱呱(宁夏)

**Rana nigromaculata** Hallowell

栖息在平原地区的池塘、河沟、稻田内，水傍草丛中。除新疆、台湾、海南、广西、云南、西藏外，全国均有分布。

全体(青蛙)：利水消肿，止咳解毒。用于水肿、咳喘、麻疹、月经不调。 胆(青蛙胆)：苦，寒。清热解毒。用于咽喉肿痛，风热痰喘。 幼体(蝌蚪)：用于热毒疮肿。 输卵管：用于体虚，精力不足。

附 注：功效相似的有**金线蛙 R. plancyi** Lataste，分布于华东及河北、山西、河南、湖北、湖南；**花臭蛙 R. schmackeri** Beettger，分布于甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖北、湖南、广东、四川、贵州、云南；**虎纹蛙 R. tigrina rugulosa** (Wiegmann)，分布于中南及江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、贵州、云南，为国家二级保护野生动物。

**粗皮蛙** 青蛙、蛤蚧(通称)，癞皮蛙(东北)

**Rana rugosa** (Schlegel)

常栖息于山区冷水溪流边的乱石堆、岩缝隙中。分布于东北。

全体：清热解毒。用于瘰疬，痈疽，脱肛。

## 311. 树蛙科 Rhacophoridae

### 树蛙属 Rhacophorus Kuhl et Van Hasselt

**斑腿树蛙** 树蛙(通称)，竹溜、上树蜞(广西)，射尿蜞(贵州、云南)

**Rhacophorus leucomystax** (Gravenhorst)

多栖息在丘陵地区稻田或玉米地内，有时隐蔽在草间、石下、竹上或其他植物上。分布于西南及甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西。

全体(射尿蜞)：咸，微寒。用于外伤出血，跌打损伤，骨折。

附 注：功效相似的有**经甫树蛙 R. chenfui** Liu，分布于福建、湖北、四川；**大树蛙 R. dennysi** Blanford，分布于安徽、浙江、江西、福建、湖南、广东、广西、四川、贵州。

## 312. 姬蛙科 Microhylidae

### 姬蛙属 Microhyla Tschudi

**花姬蛙** 姬蛙、犁头蛙、三跳蜞(通称)，三角蚂蜞(广西)

**Microhyla pulchra** (Hallowell)

生活在河边、塘边、沟里、草地、菜地、玉米地、甘蔗地、粪堆、草垛、泥缝、土洞中及菜根

部。分布于浙江、福建、湖北、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南。

全体：祛风，活血，祛瘀生新，壮筋骨。用于风湿骨痛，腰扭伤痛，跌打骨折。

附　注：功效相似的有**小弧斑姬蛙 M. heymonis** Vogt，分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南；**饰纹姬蛙 M. ornata** (Dumeril et Bibron)，分布于中南及山西、陕西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、四川、贵州、云南。

# 爬行纲　Reptilia

## 313. 平胸龟科　Platysternidae

### 平胸龟属　Platysternon Gray

**平胸龟**　大头平胸龟、鹰嘴龟(通称)，大头龟(江西、云南)

**Platysternon megacephalum** Gray

生活在山涧清澈的溪流中，亦见于沼泽地水潭中，有时也到山涧的河边、田边活动。分布于江苏、上海、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南。

肉(阴鲜)：甘、咸，寒。滋阴清热。用于泄泻，肺痨。

## 314. 龟科　Emydidae

### 乌龟属　Chinemys Smith

**乌龟**　龟(通称)，草龟(河北)，金龟(河南)，泥龟(湖南)，金线龟(广西)

**Chinemys reevesii** (Gray)

常群栖于河川、湖泊、池沼和溪流中或岸边潮湿的草地上，也爬到农田中活动。分布于华东、中南及河北、北京、天津、陕西、甘肃、四川、贵州、云南。

腹甲(龟板)：咸、甘，平。滋阴，潜阳，补肾，健骨。用于肾阴不足，骨蒸痨热，吐血，衄血，久咳，遗精，崩漏，带下病，腰痛，骨痿，阴虚风动、久痢，久疟，痔疮，小儿囟门不合。背甲(龟上壳)：功效同龟板。龟板制成的胶块(龟板胶)：甘、咸，平。滋阴，补血，止血。用于阴虚血亏，劳热骨蒸，吐血，衄血，烦热惊悸，肾虚腰痛，脚膝痿弱，崩漏，带下病。龟上壳制成的胶块(龟甲胶)功效同龟板胶。肉(龟肉)：甘、咸，平。益阴补血。用于劳瘵骨蒸，久嗽咯血，久疟，血痢，肠风痔血，筋骨疼痛。血(龟血)：咸，寒。用于脱肛。胆汁(龟胆汁)：苦，寒。用于痘后目肿，闭经。雄生殖器(龟鞭)：滋补强壮。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②功效相似的有**眼斑水龟 Clemmys bealei** (Gray)，分布于福建、广东、海南、广西、贵州、云南；**黄喉水龟 C. mutica** (Cantor)，分布于江苏、安徽、浙江、福建、台湾、广东、海南、云南。

### 闭壳龟属 Cuora Gray

**黄缘闭壳龟** 断板龟、闭壳龟、驼背龟(通称),夹板龟(安徽),克蛇龟(湖南)

**Cuora flavomarginata** (Gray)

生活在平原、丘陵或山区的溪间、河边、池塘附近。分布于江苏、安徽、浙江、福建、台湾、河南、湖北、湖南、广西。

全体:滋补强壮。用于肥大性脊椎炎。鲜龟捣敷,用于跌打损伤,瘰疬,恶疮。煅全龟炭:活血,消肿,解毒。用于咽喉肿痛, 瘰疬,脓肿,风湿痹痛, 附骨疽。 腹甲:功效同乌龟龟板。

附 注:近年研制的断板龟注射液,用作治疗癌症的辅助剂。

**三线闭壳龟** 乌龟、三棱闭壳龟(通称),红肚龟、金头龟(广西)

**Cuora trifasciata** (Bell)

生活在山谷溪流间。分布于福建、广东、海南、广西。

肉:用于风湿痛。 腹甲:功效同乌龟龟板。

附 注:国家二级保护野生动物。

### 摄龟属 Cyclemys Bell

**锯缘摄龟** 摄龟、夹蛇龟(通称),断板龟(江苏),克蛇龟(浙江)

**Cyclemys mouhotii** Gray

栖于山溪中。分布于湖南、广东、海南、广西、云南。

全体(夹蛇龟):用于痨热骨蒸,崩漏,带下病,小儿囟门不合,久疟,痔疾,瘰疬,喉蛾。肉(夹蛇龟肉):甘,寒。有毒。补益,解毒。

### 花龟属 Ocadia Gray

**花龟** 乌龟(通称),八卦龟、中华花龟(广西)

**Ocadia sinensis** (Gray)

生活在静水域中,多见于河流、池塘附近。分布于江苏、浙江、福建、台湾、广东、海南、广西。

肉:用于风湿痛。 腹甲:功效同乌龟龟板。

## 315. 陆龟科 Testudinidae

### 陆龟属 Testudo Linnaeus

**缅甸陆龟** 乌龟、陆龟(通称),枕头龟(广西)

**Testudo elongata** Blyth

生活于小山区低海拔处。见于广西。

肉：用于小儿遗尿，肺痨吐血。 腹甲、背甲：用于肺痨咳嗽，水肿，妇女阴虚血热，月经过多，疮疖溃烂，流脓流水、久不收口。 血：用于妇女闭经，干血痨。 头：用于小儿脱肛。

附　注：功效相似的有**四爪陆龟 T. horsfielde** Gray，见于新疆，国家一级保护野生动物；**凹甲陆龟 T. impressa** (Güenther)，见于云南，国家二级保护野生动物。

## 316. 海龟科 Cheloniidae

### 蠵龟属 Caretta Rafinesque

**蠵龟**　　红海龟、灵龟、嘴蠵(通称)，灵蠵、赤灵蠵(浙江)

**Caretta caretta olivacea** (Eschscholtz)

生活在海洋中。分布于黄海、东海、南海沿海。

皮及鳞甲(蠵龟筒)：甘、咸，平。用于血疾及刀箭毒。 血(蠵龟血)：咸，平。微毒。用于疔毒，刀箭伤。 胆：抗肿瘤。 脂肪：清热解毒，活血生肌，滋阴。 腹甲、背甲：退骨蒸，除瘿瘤。

附　注：国家二级保护野生动物。

### 海龟属 Chelonia Latreille

**海龟**　　绿海龟(通称)

**Chelonia mydas** (Linnaeus)

生活在海洋中上层。产卵于海滩上。分布于黄海、东海、南海沿海。

腹背甲及掌：滋阴潜阳，柔肝补肾，清火明目。用于阴虚内热，阳亢眩晕，目赤目暗，肝硬化，咳嗽痰喘，风湿关节痛。 海龟胶：滋补。用于胃病及癌肿。 肉：用于咳嗽哮喘。

附　注：国家二级保护野生动物。

### 玳瑁属 Eretmochelys Fitzinger

**玳瑁**　　文甲、十三鲃龟、瑇瑁(通称)，长命龟(浙江)

**Eretmochelys imbricata** (Linnaeus)

生活于海洋中，春季产卵于砂中。分布于黄海、东海、台湾海峡、南海沿海。

背甲(玳瑁)：甘、咸，寒。清热，解毒，镇惊。用于热病惊狂，谵语，痉厥，小儿惊痫，痈肿疮毒。 肉(玳瑁肉)：甘，平。行气血，去胸膈中风痰，养心安神，逐邪热，利大小肠，通妇人经脉。

附　注：国家二级保护野生动物。

## 317. 棱皮龟科 Dermochelyidae

### 棱皮龟属 Dermochelys Blainville

**棱皮龟** 海龟(通称)

**Dermochelys coriacea** (Linnaeus)

生活在海洋中,生殖时期到海岸上产卵。分布几遍我国沿海。

肉: 用于哮喘,咳嗽痰喘。背腹甲: 用于目赤目暗,咳嗽痰喘,风湿关节痛。

附 注: 国家二级保护野生动物。

## 318. 鳖科 Trionychidae

### 鼋属 Pelochelys Gray

**鼋** 沙鳖、绿团鱼、蓝团鱼(通称),癞头鼋(广西)

**Pelochelys bibroni** (Owen)

栖息在大江河深水中。繁殖季节,雌性在夜间离水到河边向阳的多沙地方掘穴产卵。分布于江苏、浙江、福建、广东、海南、广西、云南。

甲壳(鼋甲): 甘,平。逐风,杀虫。用于恶疮,痔瘘,风顽疥癣; 也用续筋骨, 解百虫毒、百药毒。 肉(鼋肉): 甘,平。微毒。用于湿气,解百虫毒、百药毒。 胆(鼋胆): 苦,寒。有毒。用于喉痹。 脂肪(鼋膏): 用于恶疮。

附 注: 国家一级保护野生动物。

### 鳖属 Trionyx Geoffray

**中华鳖** 脚鱼、甲鱼、团鱼(通称),水龟(广西、湖南)

**Trionyx sinensis** Wiegmann

生活在河流、淀泊、湖沼及池塘中。除宁夏、青海、新疆、西藏外全国均有分布。

背甲(鳖甲): 咸,微寒。滋阴潜阳,软坚散结,退热除蒸。用于阴虚发热,劳热骨蒸,虚风内动,经闭,症瘕,久疟。 头(鳖头): 养阴补气。用于久痢脱肛, 阴挺, 阴疮。 肉(鳖肉): 甘,平。滋阴凉血。用于骨蒸痨热,久疟,久痢,崩漏,带下病,瘰疬。 血(鳖血): 滋阴退热。用于口眼㖞斜, 虚劳潮热, 脱肛。 卵(鳖卵): 咸,寒。用于久泻久痢。 胆(鳖胆): 用于痔漏。 脂肪(鳖脂): 用于眼睫倒毛。 胶(鳖甲胶): 滋阴,补血,退热, 消瘀。用于阴虚潮热,久疟不愈,症瘕疟母、痔核肿痛。

附 注: ①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。 ② 功效相似的有**山瑞鳖 T. steindachneri** Siebenrock, 分布于广东、海南、广西、贵州、云南, 国家二级保护野生动物。

## 319. 鬣蜥科 Agamidae

### 鬣蜥属 Agama Daudin

**喜山鬣蜥** 鬣蜥(通称)

**Agama himalayana** (Steindachner)

多栖于山坡岩石间,日出后活动频繁。分布于青海、新疆、西藏。

全体: 滋补壮阳。用于肾虚阳痿。 脑: 外用敛疮生肌。

附 注: 我国有2个亚种,即**指名亚种 A. h. himalayana** Steindachner; **拉萨亚种 A. h. sacra** Smith。

### 树蜥属 Calotes Rafinesque

**变色树蜥** 马蓼蛇、公鸡蛇、雷公蛇(通称),阿么蛇、鸡冠蛇(广西)

**Calotes versicolor** (Daudin)

栖息于平原或山区的河边、地边、田边、路边、荒地、山坡草丛中、稀树林、村舍里的草垛、禾垛,尤以人畜活动的地方及居民点附近最多。分布于广东、海南、广西、云南。

全体: 祛风,活血,滋补。用于小儿疳积,腰腿疼痛,血虚体弱。

附 注: 功效相似的有**长鬣蜥 Physignothus cocincinus** Cuvier, 分布于广东、广西、云南。

### 飞蜥属 Draco Linnaeas

**斑飞蜥** 飞蛇、飞蜥、飞龙(通称)

**Draco maculatus** (Gray)

生活在低矮的山林边缘,营树上生活。分布于海南、广西、云南、西藏。

全体: 清热解毒,透疹。用于麻疹,痘毒。

### 龙蜥属 Japalura Gray

**草绿龙蜥** 四脚蛇、公蛇(通称)

**Japalura flaviceps** Barbour et Dunn

生活在山边、路旁的草丛乱石中。分布于陕西、甘肃、湖北、四川、云南、西藏。

全体(四脚蛇): 咸,寒。有毒。用于瘰瘤,瘰疬,溃疡。

附 注: 功效相似的有**丽纹龙蜥 J. splendida** Barbour et Dunn, 分布于陕西、甘肃、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

**马蓼蛇** 雷公蛇(广西),树蜥蜴(动物学大辞典)

**Japalura polygonata** (Hallowell)

多栖于矮小的树枝上或草丛中。分布于广东、海南、广西。
除内脏的全体(盐蛇)：甘，温。滋养强壮，祛风湿。用于风湿骨痛，小儿疳积。

### 蜡皮蜥属　Leiolepis Dumeril et Bibron

**蜡皮蜥**
**Leiolepis belliana rubritaeniata** Mertens
生活在近海边地区，雌雄成对居于洞内。分布于广东、海南、广西。
肉：滋补，消积。用于小儿疳积。

### 沙蜥属　Phrynocephalus Kaup

**青海沙蜥**　　沙蜥(通称)
**Phrynocephalus vlangalii** Strauch
生活在沙漠地区。分布于甘肃、青海、新疆。
全体：滋补强壮，解毒。用于体虚，头痛，鼻痒。　血：用于内脏损伤。

## 320. 壁虎科　Gekkonidae

### 壁虎属　Gekko Linnaeus

**大壁虎**　　蛤蚧、蛤蚧蛇、仙蟾(通称)，合蛇(广西)，多德(壮语)
**Gekko gecko** (Linnaeus)
栖息在悬岩石壁洞缝中、树洞中及房舍顶部。分布于福建，台湾、广东、广西、云南。
全体(蛤蚧)：咸，平。补肺益肾，纳气定喘，助阳益精。用于虚喘气促，劳嗽咳血，阳痿遗精。
附　注：① 国家二级保护野生动物及国家二级保护野生药材。② 《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**蹼趾壁虎**　　守宫、天龙、无疣壁虎(通称)
**Gekko subpalmatus** Günther
栖息于屋檐、墙缝内及林木间。分布于浙江、江西、福建、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。
全体(壁虎)：咸，寒。有小毒。祛风，活络，散结。用于中风瘫痪，风湿关节痛，附骨疽，瘰疬，试用于食道癌。
附　注：功效相似的有**中国壁虎 G. chinensis** Gray，分布于福建、广东、海南、广西、云南；**多疣壁虎 G. japonicus** (Dumeril et Bibron)，分布于陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、四川、贵州；**无蹼壁虎 G. swinhonis** Güenther，分布于辽宁、河北、山西、陕西、甘肃、宁夏、山东、安徽、浙江、江西、福建、河南；**原尾蜥虎 Hemidactylus bowringii** (Gray)，分布于福建、台湾、广东、海南、广西、云南；**密疣蜥虎**

**H. brookii** Gray，分布于浙江、福建；**疣尾蜥虎 H. frenatus** Schlegel，分布于台湾、广东、海南、云南；**锯尾蜥虎 H. garnotii** Dumeril et Bibron，分布于广东、海南、云南；**半叶趾虎 Hemiphyllodactylus yunnanensis** (Boulenger)，分布于广西、贵州、云南。

## 321. 石龙子科 Scincidae

### 石龙子属 Eumeces Wiegmann

**石龙子** 蜥蜴、守宫、四脚蛇(通称)，中国石龙蜥(河北)，山龙子(河南)

**Eumeces chinensis** (Gray)

栖息于山野草丛中。分布于华东、中南及河北、四川、贵州、云南。

全体(石龙子)：咸，寒。有毒。破结，行水。用于小便不利，石淋，恶疮瘰疬，臁疮。

附 注：功效相似的有**蓝尾石龙子 E. elegans** Boulenger，分布于中南及江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、四川、贵州、云南；**黄纹石龙子 E. xanthi** Güenther，分布于河北、陕西、甘肃、湖北、四川；**桓仁滑蜥 Scincella huanrenensis** Zhao et Huang，分布于辽宁；**宁波滑蜥 S. modestum** (Güenther)，分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北；**股鳞蜓蜥 Lygosoma boulengeri** (Van Denburgh)，分布于福建、台湾、湖北、湖南、广西、云南；**蜓蜥 L. indicum** (Gray)，分布于中南、西南及陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾。

## 322. 蜥蜴科 Lacertidae

### 麻蜥属 Eremias Wiegmann

**丽斑麻蜥** 麻蛇子、蛇狮子(通称)，马蛇子(天津)，马蛇鼠(青海)

**Eremias argus** Peters

生活在山坡、平原的田野草丛。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、青海、山东、江苏、安徽、河南。

全体(蜥蜴)：消瘿散瘰。用于瘰疬，癫痫，小便不通，咳嗽痰喘。

附 注：功效相似的有**山地麻蜥 E. brenchleyi** Güenther，分布于华北及山东、江苏、安徽、河南；**密点麻蜥 E. multiocellata** (Güenther)，分布于辽宁、内蒙古、甘肃、宁夏、青海、新疆；**黑龙江草蜥 Takydromus amurensis** (Peters)，分布于东北及甘肃；**北草蜥 T. septentrionalis** Güenther，分布于华东及吉林、陕西、甘肃、河南、湖南、广东、四川、贵州；**白条草蜥 T. wolteri** Fischer，分布于东北及江苏、安徽、江西、福建、湖北、四川。

## 323. 蛇蜥科 Anguidae

### 脆蛇蜥属 Ophisaurus Daudin

**脆蛇蜥** 脆蛇、碎蛇(通称),地鳝(广西),仝蛇(云南)

**Ophisaurus harti** Boulenger

栖息于阴凉、湿润的草丛、岩隙、腐殖质疏松深厚的土壤里。分布于江苏、安徽、浙江、福建、台湾、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

全体(脆蛇): 甘、咸,温。祛风除湿,舒筋活络。用于风湿疼痛,头晕目眩。

附 注: 功效相似的有**细脆蛇蜥 O. gracilis** (Gray), 分布于广西、贵州、云南、西藏。

## 324. 蟒科 Boidae

### 沙蟒属 Eryx Daudin

**沙蟒** 土棍子(通称)

**Eryx miliaris** (Pallas)

栖于沙漠,尤其草原地带的沙丘中较多, 常埋于沙中 10 厘米处。分布于内蒙古、甘肃、宁夏、新疆。

肉: 祛风,除湿。

### 蟒属 Python Daudin

**蟒蛇** 南蛇、琴蛇、蚺蛇(通称),王蛇(广西)

**Python molurus** (Linnaeus)

生活在山区林中。分布于福建、广东、海南、广西、贵州、云南。

肉(蚺蛇肉): 甘,温。有小毒。祛风,杀虫。用于风痹,瘫痪,疥风, 疥癣。 胆(蚺蛇胆): 甘、苦,寒。有毒。燥湿,杀虫,明目。用于腹中虫痛,痢疾,痔疮, 目翳肿痛。 脂肪(蚺蛇膏): 甘,平。有小毒。用于风毒癞疾,漏疮。

附 注: 国家一级保护野生动物。

## 325. 游蛇科 Colubridae

### 脊蛇属 Achalinus Peters

**黑脊蛇** 黄脊游蛇(通称),白线蛇(吉林),黄线蛇(河北)

**Achalinus spinalis** Peters

生活在丘陵及山区。分布于东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、山东、江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

全体(白线蛇)：祛风湿。用于风湿关节痛，麻木不仁。 蜕下的表皮膜(蛇蜕)：用于小儿惊风，抽搐痉挛，角膜出翳，喉痹，皮肤瘙痒。 胆(蛇胆)：用于小儿风热咳喘，咳嗽痰喘，痰热惊厥，急性风湿关节痛。

## 两头蛇属 Calamaria Boie

**钝尾两头蛇** 两头蛇(通称)

**Calamaria septentrionalis** Boulenger

生活在高山及平原地区的泥土下。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖南、广东、海南、广西、贵州。

全体：用于疟疾。

## 链蛇属 Dinodon Dumeril et Bibron

**黄链蛇**

**Dinodon flavozonatum** Pope

生活在山区林地。分布于安徽、浙江、江西、福建、广东、海南、广西、贵州。

全体：祛风，去湿，止痛。用于风湿关节痛。 蛇蜕、蛇胆：功效同黑脊蛇。

**赤链蛇** 火赤链(通称)，大链蛇(江西、安徽)，红斑蛇(河南、广西)

**Dinodon rufozonatum** (Cantor)

生活于田野、丘陵地区，常出现于住宅周围。分布于东北、华北、华东、华中及陕西、四川、贵州、云南。

全体(赤链蛇)：用于慢性瘘管及溃疡。 蜕下的表皮膜(蛇蜕)、胆(蛇胆)：功效同黑脊蛇。

## 锦蛇属 Elaphe Fitzinger

**王锦蛇** 黄蟒蛇、油菜花蛇、棱锦蛇、臭黄颌(通称)，大王蛇(湖北)

**Elaphe carinata** (Güenther)

生活在山区及平原。分布于中南及陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、四川、贵州、云南。

全体(蛇肉)：祛风湿，通经络，定惊抽，强腰膝。用于中风半身不遂，口眼歪斜，筋脉抽搐，湿痹不仁，骨节疼痛。蜕下的表皮膜(蛇蜕)：咸、干，平。祛风，定惊，解毒，退翳。用于小儿惊风，抽搐痉挛，角膜出翳，喉痹，皮肤瘙痒。 胆(蛇胆)：甘、微苦，凉。清热解毒，化痰镇痉。用于小儿风热咳喘，痰热惊厥，急性风湿关节痛。

附 注：① 功效相同，与本种同载《中华人民共和国药典》1990 年版的有**翠青蛇 Entechinus mojor** (Güenther)，分布于中南及甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台

湾、四川、贵州、云南。② 功效相似的有**双斑锦蛇 Elaphe bimaculata** Schmidt，分布于河北、山东、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北、四川；**团花锦蛇 E. davidi** (Sauvage)，分布于东北及河北、山西；**白条锦蛇 E. dione** (Pallas)，分布于东北、华北、西北及山东、江苏、安徽、河南、湖北、四川；**灰腹绿锦蛇 E. frenata** (Gray)，分布于安徽、浙江、福建、河南、广东、贵州；**玉斑锦蛇 E. mandarina** (Cantor)，分布于西南及河北、陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西；**百花锦蛇 E. moellendorffi** (Boettger)，分布于湖南、广东、广西；**紫灰锦蛇 E. porphyracea** (Cantor)，分布于西南及甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、河南、湖南、广东、海南、广西；**三索锦蛇 E. radiata** (Schlegel)，分布于福建、广东、广西、贵州、云南；**红点锦蛇 E. rufodorsata** (Cantor)，分布于东北、华北、华东及河南、湖北；**棕黑锦蛇 E. schreneckii** (Strauch)，分布于东北及河北、山西、山东、湖北、湖南；**中国水蛇 Enhydris chinensis** (Gray)，分布于中南及江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾；**铅色水蛇 E. plumbea** Boie. 分布于江苏、浙江、江西、福建、台湾、广东、海南、广西、云南；**纯绿翠青蛇 Entechinus doriae** (Boulenger)，分布于云南；**双全白环蛇 Lycodon fasciatus** (Anderson)，分布于浙江、湖北、四川、云南；**锈链游蛇 Natrix craspegaster** (Boulenger)，分布于山西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖北、湖南、广东、四川、贵州；**游蛇 N. natrix** (Linnaeus)，分布于新疆；**颈槽游蛇 N. nuchalis** (Boulenger)，分布于西南及陕西、甘肃、湖北、广西；**丽纹游蛇 N. optata** Hu et ZHao，分布于湖南、四川、贵州；**乌游蛇 N. percarinata** (Boulenger)，分布于中南及甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、四川、贵州、云南；**草游蛇 N. stolata** (Linnaeus)，分布于浙江、江西、福建、台湾、河南、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南；**虎斑游蛇 N. tigrina** (Boie)，分布于东北、华北、华东及陕西、甘肃、河南、湖北、湖南、广西、四川、贵州；**灰链游蛇 N. vibakari** (Boie)，分布于东北；**福建后棱蛇 Opisthotropis maxwelli** (Boulenger)，分布于江西、福建、湖北、广东；**平鳞钝头蛇 Pareas boulengeri** (Angel)，分布于甘肃、江西、广东、四川、贵州；**钝头蛇 P. chinensis** Barbour，分布于安徽、浙江、江西、福建、广东、广西、四川、贵州、云南；**福建颈斑蛇 Plagiopholis styani** (Boulenger)，分布于甘肃、安徽、浙江、江西、福建、湖北、广西、四川；**斜鳞蛇 Pseudoxenodon macreps** (Blyth)，分布于西南及陕西、甘肃、福建、河南、湖北、湖南、广西；**滑鼠蛇 P. yas mucosus** (Linnaeus)，分布于西南及安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西；**黑头剑蛇 Sibynophis chinensis** (Güenther)，分布于中南及陕西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、四川、贵州；**渔游蛇 Xenochrophis piscator** (Schneider)，分布于江苏、浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南、西藏。

**黑眉锦蛇**　菜花蛇、黄颔蛇、家蛇(通称)，双线蛇(湖南)，黄梢蛇(广西)

**Elaphe taeniura** Cope

生活在丘陵、草地、田园中，常在房屋内及其附近活动。分布于中南、西南及辽宁、河北、山西、陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾。

肉(黄颔蛇)：甘，温。有小毒。用于风癣漏疮，妇女乳痈，獭犬咬伤。头部（黄颔蛇头)：用于久疟及肠痈。骨（黄颔蛇骨)：用于久疟，劳疟。蛇蜕、蛇胆：功效同王锦蛇。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

### 鼠蛇属　Ptyas Fitzinger

**灰鼠蛇**　过树龙、过树榕(通称)，索蛇(江西)，黄肚龙(湖南)，黄梢蛇(广西)

**Ptyas korros** (Schlegel)

生活在海拔 1 000 米以下的平原及山区丘陵地带，常营树上生活。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南。

除去内脏的全体(黄梢蛇)：用于风湿关节痛，麻痹，瘫痪。蛇蜕、蛇胆：功效同王锦蛇。

### 乌梢蛇属　Zaocys Cope

**乌梢蛇**　乌风蛇、乌蛇(通称)

**Zaocys dhumnades** (Cantor)

生活在平原、丘陵、山区的田野间及路旁草丛中或近水边。分布于东南、中南及陕西、甘肃、四川、贵州、云南。

剥皮并除内脏的全体(乌梢蛇)：甘，平。祛风，通络，止痉。用于风湿顽痹，麻木拘挛，中风口眼㖞斜，半身不遂，抽搐痉挛，破伤风症，麻风疥癣，瘰疬恶疮。卵(乌蛇卵)：用于大风癫疾。脂肪(乌蛇膏)：用于耳聋。皮(乌蛇皮)：用于风毒气，眼生翳，唇紧，唇疮。蛇蜕、蛇胆：功效同王锦蛇。

附　注：① 国家二级保护野生动物及国家二级保护野生药材。② 《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 326. 眼镜蛇科　Elapidae

### 环蛇属　Bungarus Daudin

**金环蛇**　金甲带、黄节蛇(通称)，黄花团基甲(江西)，铁包金(湖南)，金蛇(广西)

**Bungarus fasciatus** (Schneider)

生活在山地潮湿处及水边。分布于江西、福建、广东、海南、广西、云南。

除内脏的全体(金环蛇)：咸，温。用于风湿麻痹，手足瘫痪，肿痛。毒液(蛇毒)：逐痹，镇痛。用于风湿关节痛，癫痫，心脏病。蛇蜕、蛇胆：功效同王锦蛇。

**银环蛇**　白花蛇、寸白蛇(通称)，白花团基甲(江西)，白节蛇(湖南)，银包铁(广西)

**Bungarus multicinctus** Blyth

生活在平原及丘陵多水地带及山坡、坟堆、路旁、田埂、河浜鱼荡、水沟、墙脚、菜园、住宅附近。分布于中南及安徽、浙江、江西、福建、台湾、四川、贵州、云南。

除内脏的幼体(金钱白花蛇)：甘、咸，温。有毒。祛风，通络，止痉。用于风湿顽痹，麻木拘挛，中风口㖞，半身不遂，抽搐痉挛，破伤风症，麻风疥癣，瘰疬恶疮。成体(蛇肉)及

蛇蜕、蛇胆：功效同王锦蛇。 蛇毒：功效同金环蛇。

附　注：① 我国有 2 个亚种，即**指名亚种 B. m. muliticinctus** Blyth；**云南亚种 B. m. wanghaotingii** Pope. ②《中华人民共和国药典》1990 年版收载。③ 国家二级保护野生药材物种。

### 眼镜蛇属　Naja Laurenti

**眼镜蛇**　犁头蝮、蝙蝠蛇、膨颈蛇(通称)，饭铲头(湖南)，万蛇(广西)

**Naja naja** (Linnaeus)

栖息于平原、丘陵或山区，垂直分布可达海拔 1 000 米左右。常发现于丘陵山坡、坟堆、灌丛、竹园等处。分布于安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南。

除去内脏的全体(眼镜蛇)：甘、咸，温。有毒。通经络，祛风湿。用于风湿关节痛，脚气。 蛇蜕、蛇胆：功效同王锦蛇。 蛇毒：功效同金环蛇。

附　注：功效相似的有**眼镜王蛇 Ophiophagus hannah** (Canton)，分布于浙江、江西、福建、广东、海南、广西、贵州、云南。

## 327. 海蛇科　Hydrophiidae

### 扁尾海蛇属　Laticauda Laurenti

**半环扁尾海蛇**　海蛇(通称)

**Laticauda semifasciata** (Reinwardt)

栖于海洋中。分布于辽宁、台湾沿海。

全体(蛇婆)：咸，平。解毒，补气血，壮筋骨。用于痢疾，恶疮，风湿关节痛，疥癣，咳嗽痰喘，烧、烫伤。

附　注：功效相似的有**青灰海蛇 Hydrophis caerulescens** (Shaw)，见于山东、广西沿海；**青环海蛇 H. cyanocinctus** Daudin，分布几遍我国沿海；**环纹海蛇 H. fasciatus atriceps** (Güenther)，分布于东海至南海沿海；**黑头海蛇 H. melanocephalus** (Gray)，分布于东海至南海沿海；**淡灰海蛇 H. ornatus** (Gray)，见于山东、台湾、广东、海南、广西沿海；**平颏海蛇 Lapemis hardwickii** (Gary)，分布见于山东、福建、台湾、广东、海南、广西沿海；**小头海蛇 Microcephalophis gracilis** (Shaw)，分布于福建、台湾、广东、海南、广西沿海；**长吻海蛇 Pelamis platurus** (Linnaeus)，分布于黄海南部至南海沿海。

### 海蝰属　Praescutata Wall

**海蝰**　海蛇(通称)

**Praescutata viperina** (Schmidt)

栖于海洋中。分布于福建、广东、海南、广西沿海。

肉：清热解毒。用于皮肤湿疹，疮疖。

## 328. 蝰科 Viperidae

### 蝮属 Agkistrodon Beauvois

**尖吻蝮** 五步蛇、蕲蛇、白花蛇(通称)，聋婆蛇、棋盘蛇(广西)

**Agkistrodon acutus** (Güenther)

生活在山区森林中，常盘居于山区水涧岩石上，在较低的丘陵山地亦有发现。分布于中南及安徽、浙江、江西、福建、台湾、四川、贵州、云南。

头部(白花蛇头)：有毒。用于麻风癞疾。 眼睛(白花蛇目睛)：用于小儿夜啼。 除内脏的全体(蕲蛇)：甘、咸，温。有毒。祛风，通络，止痉。用于风湿顽痹，麻木拘挛，中风口眼㖞斜，半身不遂，抽搐痉挛，破伤风症，麻风疥癣。 蛇胆：功效同王锦蛇。 蛇毒：功效同金环蛇。

附 注：① 国家二级保护野生药材。②《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**蝮蛇** 草上飞、七寸子、土公蛇(通称)，地扁蛇(河南)，土笼子(湖北)

**Agkistrodon halys** (Pallas)

生活在平原及丘陵地带。除青海、广东、海南、广西、云南、西藏外，全国均有分布。

除去内脏的全体(蝮蛇)：甘，温。有毒。祛风，攻毒。用于麻风，癫疾，顽痹，瘰疬，痔疾。 皮(蝮蛇皮)：用于疔肿，恶疮，骨疽。 骨(蝮蛇骨)：用于赤痢。 胆(蝮蛇胆)：苦，微寒。有毒。用于瘰疬，诸漏，下部虫。 脂肪(蝮蛇脂)：用于耳聋，肿毒。 蜕下的皮膜(蝮蛇蜕皮)：用于身痒，疮、疥、癣。 蛇毒：功效同金环蛇。

**高原蝮**

**Agkistrodon strauchii** Bedriaga

栖于海拔 3 000 米左右的高原地区，常群集在溪流旁或田边杂草乱石堆上。分布于甘肃、青海、四川、西藏。

全体(蛇肉)：祛风，解毒。 蛇胆：功效同王锦蛇。 蛇毒：功效同金环蛇。

附 注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

### 烙铁头属 Trimeresurus Lacepede

**白唇竹叶青** 竹叶青、青竹蛇(通称)，青蛇(广西)

**Trimeresurus albolabris** Gray

栖于有草丛或树的平原及丘陵山区，夜间活动，常入住宅区。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、贵州、云南。

全体(青竹蛇)：甘、咸。消肿解毒。用于恶疮肿疖。 蛇毒：功效同金环蛇。

**菜花烙铁头** 菜花蛇(四川)

**Trimeresurus jerdonii** Güenther

栖于海拔1 700—3 100米左右的山区石堆及杂草中。分布于西南及山西、甘肃、河南、湖北、湖南。

全体：祛风，明目。 蛇毒：功效同金环蛇。

附 注：功效相似的有**山烙铁头 T. monticola** Güenther，分布于西南及浙江、福建、台湾、湖南、广东、广西；**烙铁头 T. mucrosquamatus** (Cantor)，分布于甘肃、安徽、浙江、江西、福建、台湾、河南、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州。

**竹叶青** 青竹蛇、刁竹青、焦尾巴(通称)，青蛇(广西)

**Trimeresurus stejnegeri** Schmidt

栖于山区溪涧边的灌木丛中，亦出现在山区住宅旁的瓜棚和柴堆中。分布于中南及甘肃、安徽、浙江、江西、福建、台湾、四川、贵州、云南。

全体：祛风，止痛。 蛇毒：功效同金环蛇。

附 注：我国有2个亚种，即**指名亚种 T. s. stejmeger** Schmidt；**云南亚种 T. s. yunnanensis** Schmidt。

### 蝰属 Vipera Laurenti

**极北蝰** 龙纹蝰(通称)，高山蝰(吉林)

**Vipera berus** (Linnaeus)

栖息于森林及沼泽地的洞穴或石块下等隐蔽处。分布于吉林、新疆。

全体：祛风，止痛。 蛇毒：功效同金环蛇。

## 329. 鼍(钝吻鳄)科 Crocodidae

### 鼍属 Alligator Cuviev

**鼍(扬子鳄)** 鳄鱼(通称)，土龙(安徽)

**Alligator sinensis** Fauvel

生活在缓流的江河、湖沼中或水边芦苇、竹林地带，在浅水海湾地区也有发现。分布于江苏、安徽、浙江。

鳞甲(鼍甲)：辛，温。有毒。逐瘀，消积，杀虫。用于癥瘕积聚，崩中带下，疮疡，恶疮。 肉(鼍肉)：甘，微寒。有小毒。用于症瘕，恶疮溃烂。

附 注：国家一级保护野生动物。

# 鸟纲 Aves

## 330. 鸊鹈科 Podicipedidae

### 鸊鹈属 Podiceps Latham

**凤头鸊鹈** 油鸭(通称)，水驴子(吉林)

**Podiceps cristatus** (Linnaeus)

栖息于江河、湖泊、沼泽、池塘。除海南外，分布几遍全国。

肉(油鸭)：补中益气，收敛止痛。用于遗尿、脱肛，痔疮。

附　注：功效相似的有**赤颈鸊鹈 P. grisegena** (Boddaert)，分布于东北及河北、福建、广西，国家二级保护野生动物；**小鸊鹈 P. ruficollis** (Pallas)，分布几遍全国。

## 331. 鹈鹕科　Pelecanidae

### 鹈鹕属　Pelecanus Linnaeus

**斑嘴鹈鹕**　　淘河、塘鹅(通称)

**Pelecanus philippensis** Gmelin

栖息于江河、湖泊中，喜群居，在小岛地面营巢产卵。分布于黄河和长江中下游、沿海地区及新疆、云南。

脂肪油(鹈鹕脂油)：咸，温。通经活络，通窍。用于瘰症，肿毒，耳聋。羽毛和皮(鹈鹕毛皮)：用于反胃吐食。嘴(鹈鹕嘴)：咸，平。用于痢疾。

附　注：① 我国有 2 个亚种，即**指名亚种 P. p. philippensis** Gmelin；**新疆亚种 P. p. crispus** Bruch。② 国家二级保护野生动物。③ 功效相似的有**白鹈鹕 P. onocrotalus** Linnaeus，分布于青海、新疆、河南、福建，国家二级保护野生动物。

## 332. 鸬鹚科　Phalacrocoracidae

### 鸬鹚属　Phalacrocorax Brisson

**鸬鹚**　　鱼鹰、水老鸦、鱼老鸦、黑鱼郎(通称)，摸鱼公(广西)

**Phalacrocorax carbo** Linnaeus

栖息于河溪、水库、沼泽及池塘中。在河畔之柳、松等树上营巢。分布几遍全国。

去内脏及羽毛的全体(鸬鹚肉)：酸、咸，凉。微毒。利水消肿。用于腹胀水肿。骨(鸬鹚骨)：用于雀斑，鱼骨鲠。涎(鸬鹚涎)：用于顿咳，鱼刺哽咽。嗉囊(鸬鹚嗉囊)：用于鱼刺及麦芒哽咽。翅羽(鸬鹚翅羽)：用于鱼鲠。

附　注：我国仅 1 个亚种，即**中国亚种 P. c. sinensis** (Blumenbach)。

## 333. 鹭科　Ardeidae

### 鹭属　Ardea Linnaeus

**苍鹭**　　灰鹭、青桩、老等(通称)，深水径(海南)

**Ardea cinerea** Linnaeus

栖息于水田边、湖泊、水库等浅水沼泽地。营巢于大树上。分布几遍全国。

肉：活血，利水，止痛。用于骨折、水肿。

附　注：我国有2个亚种，即**指名亚种 A. c. cinerea** Linnaeus；**普通亚种 A. c. rectirostris** Gould。

**草鹭**　　紫鹭(通称)，黄庄(海南)

**Ardea purpurea** Linnaeus

栖息于水田边、沼泽、池塘、湖泊，营巢于芦苇草丛间。分布于东北、华东、中南及河北、陕西、甘肃、四川。

全体：补肺气，止喘咳，消痰积。

附　注：我国仅1个亚种，即**普通亚种 A. p. manilensis** Meyen。

## 池鹭属　Ardeola Boie

**池鹭**　　沙鹭、红毛鹭、花鹅、田螺鹭、沼鹭(通称)

**Ardeola bacchus** (Bonaparte)

栖息于沼泽、溪边、水田、池塘，亦见于竹林和桑田，营巢于竹林或高大乔木上。分布于华北、华东、中南及吉林、辽宁、陕西、甘肃、青海、四川、贵州、云南。

肉：解毒。用于鱼虾中毒。

## 牛背鹭属　Bubulcus Bonaparte

**牛背鹭**　　黄头鹭、尼鹭、红头鹭、畜鹭(通称)，放牛郎(安徽、湖北)

**Bubulcus ibis** (Linnaeus)

栖息于沼泽、池塘、耕地或荒地上。分布于长江流域以南地区。

肉：益气，解毒。用于虚弱，疮肿。

附　注：我国仅1个亚种，即**普通亚种 B. i. coromandus** (Boddaert)。

## 绿鹭属　Butorides Blyth

**绿鹭**　　鹭鸶(通称)

**Butorides striatus** (Linnaeus)

栖息于沼泽、江河、水田地及山溪边、也见于树上或岩石上。分布于东北、华东、中南及河北、山西、陕西、四川、贵州、云南。

肉：补气，益脾，解毒。

附　注：我国有3个亚种，即**黑龙江亚种 B. s. amurensis** von Schrenck；**瑶山亚种 B. s. connectens** Stresemann；**海南亚种 B. s. javanicus** (Horsfield)。

## 白鹭属　Egretta Forster

**大白鹭**　　白鹭鸶、白漂鸟、雪客(通称)，冬庄(宁夏)，白庄(海南)

**Egretta alba** (Linnaeus)

栖息于近水处，营巢于人烟稀少的高大乔木上或稠密的芦苇和竹林中。分布几遍全国。

肉：解毒。用于痔疮，痈肿。

附　注：我国有 2 个亚种，即**指名亚种 E. a. alba** (Linnaeus)；**普通亚种 E. a. modestus** (J. E. Gray)。

**白鹭**　　鹭鸶、丝禽、白鹭鸶、雪客、春锄(通称)

**Egretta garzetta** (Linnaeus)

栖息于水田、沼泽、池塘、湖泊、海岸的浅滩处。分布于四川西昌以东长江流域以南地区。

肉(鹭肉)：咸，平。益脾补气，解毒。用于虚弱，疔疮痈肿。

附　注：①我国仅 1 个亚种，即**指名亚种 E. g. garzetta** (Linnaeus)。② 功效相似的有**中白鹭 E. intermedia** (Wagler)，分布于四川西昌以东长江流域以南地区；**岩鹭 E. sacra** (Gmelin)，分布于浙江、福建、广东、海南。

### 苇鸦属　Ixobrychus Billberg

**栗苇鸦**　　水骆驼、水老等(吉林)，黄鹤(海南)

**Ixobrychus cinnamomeus** (Gmelin)

栖息于水滨，结群在稻田及附近的小灌木上。巢筑于稻田附近的芒丛中。分布于华东、中南及辽宁、河北、陕西南部、四川西南部、云南东南部。

全体：益气健脾，利水渗湿，祛风解毒。

## 334. 鹳科　Ciconiidae

### 鹳属　Ciconia Brisson

**白鹳**　　老鹳(通称)

**Ciconia ciconia** (Linnaeus)

栖于开阔的平原、沼泽的浅水处，营巢于大树上。分布于东北、华东及河北、内蒙古、新疆、湖北、湖南、广东。

肉(鹳肉)：用于干血痨，经血不来，身痛发烧，喘咳。　骨(鹳骨)：甘，寒。用于痨瘵，胸腹痛，喉痹，蛇咬伤。

附　注：①我国有 2 个亚种，即**新疆亚种 C. c. asiatica** Severtzov；**东北亚种 C. c. boyciana** Swinhoe。②国家一级保护野生动物。

# 335. 鸭科 Anatidae

## 鸳鸯属 Aix Boie

**鸳鸯** 匹鸟、官鸭(通称),黄鸭(广西、云南)

**Aix galericulata** (Linnaeus)

栖息于山地的河谷、溪流,常见于阔叶林和针阔混交林的沼泽、苇塘、湖泊及被水浸没的草原、田地中。巢筑于离地较高的树洞里。分布于东北、华北、华东、中南及陕西、甘肃、四川、贵州、云南。

肉:咸,平。清热解毒。用于痔疮,疥癣。

附 注:国家二级保护野生动物。

## 鸭属(河鸭属) Anas Linnaeus

**绿翅鸭** 小水鸭、小麻鸭、八鸭(通称),小鳆鸭(广东),小凫(古名)

**Anas crecca** Linnaeus

栖于湖泊、河流、水库的静水处。分布几遍全国。

肉:补中益气。用于脾胃虚弱,脱肛,阴挺。

附 注:功效相似的有**斑嘴鸭 A. poecilorhyncha** Forster,除新疆、海南,全国均有分布;**青头潜鸭 Aythya baeri** (Radde),分布于东北、华北、中南及山东、江苏、安徽、浙江、江西、福建;**白眼潜鸭 A. nyroca** (Guldenstädt),分布于西北、西南及内蒙古、湖北、湖南、广西。

**绿头鸭** 大麻鸭、大红腿鸭(通称),青鸭(安徽),对鸭(湖北),凫(古名)

**Anas platyrhynchos** Linnaeus

栖息于各种淡水河流和湖泊的芦苇中。除海南外,分布几遍全国。

肉(凫肉):甘,凉。补中益气,消食和胃,利水,解毒。用于病后虚羸,食欲不振,水气浮肿,热毒疮疖。 羽毛(凫羽):咸,平。解毒退火。用于溃疡及烫伤。

附 注:功效相似的有**针尾鸭 A. acuta** Linnaeus,分布几遍全国;**琵嘴鸭 A. clypeata** Linnaeus,除云南外,全国均有分布;**罗纹鸭 A. falcata** Georgi,分布于东北、华北、华东、中南及陕西、四川、贵州;**花脸鸭 A. formosa** Georgi,分布于东北、华北、华东、中南及陕西、四川、贵州、云南;**赤颈鸭 A. penelope** Linnaeus,分布几遍全国。

**家鸭** 鸭子(通称),家凫(广西)

**Anas platyrhynchos domestica** (Linnaeus)

全国均有饲养。

肉(白鸭肉):甘、咸,平。滋阴养胃,利水消肿。用于痨热骨蒸,咳嗽,水肿。 头(鸭头):用于阳水暴肿,面赤,烦燥,喘急,小便涩痛。 血(鸭血):咸,寒。补血,解毒。用于劳伤吐血,中风,痢疾。 卵(鸭卵):甘,凉。滋阴,清肺。用于膈热,咳嗽,咽喉痛,齿痛,泄痢。 脂肪油(鸭肪):甘,平。用于水肿,瘰疬,蚯蚓瘘。胆(鸭胆):苦、辛,寒。清热

解毒。用于痔疮，目赤初起。　唾涎(鸭涎)：用于小儿惊风，阴肿，谷芒刺喉。　砂囊的角质内壁(鸭肫衣)：用于诸骨鲠，噎膈翻胃。　鸭蛋腌制品(变蛋)：辛、涩、甘、咸，寒。泻肺热，醒酒，去大肠火。用于泄泻。

## 雁属　Anser Brisson

**白额雁**　　大雁、雁(通称)，花斑、明斑(湖北)

**Anser albifrons** (Scopoli)

栖息于湖泊、沼泽地区。分布于东北、华东及河北、山西、新疆、河南、湖北、湖南、西藏。

肉(雁肉)：甘，平。祛风壮骨。用于顽麻风痹。　脂肪(雁肪)：甘，平。活血祛风，清热解毒。用于气血不足，痈肿疮毒，中风偏枯，手足拘挛，心胸结热，痞寒呕逆，疮痈，肾虚脱发。

附　注：①我国仅1个亚种，即**指名亚种 A. a. albifrons** (Scopoli)。② 国家二级保护野生动物。③ 功效相似的有**灰雁 A. anser** (Linnaeus)；**鸿雁 A. cygnoides** (Linnaeus)，除西南及海南外，全国均有分布；**小白额雁 A. erythropus** (Linnaeus)，分布于东北、华东及河北、河南、湖北、湖南、广东；**豆雁 A. fabalis** (Latham)，分布于东北、华北、西北、华东及河南、湖北、湖南、广东、海南、四川；**斑头雁 A. indicus** (Latham)，分布于华北、西北、西南及湖北、湖南。

**家鹅**　　鹅(通称)

**Anser cygnoides orientalis** (Linnaeus)

全国各地均有饲养。

脂肪(白鹅膏)：甘，凉。润皮肤，消痈肿。用于皮肤皲裂。　肉(鹅肉)：甘，平。益气补虚，和胃止渴。用于虚羸，消渴。　血(鹅血)：咸，平。解毒。用于噎膈反胃，肿毒，血吸虫病。　胆(鹅胆)：苦，寒。解热毒，止咳。用于痔疮初起，咳嗽气喘。　唾涎(鹅涎)：用于稻刺塞喉，小儿鹅口疮。　尾肉(鹅臊)：用于聤耳，耳聋，手足皲裂。羽毛(鹅毛)：用于痈肿疮毒，疥癣，痹痛，噎膈，惊痫。　砂囊内壁(鹅内金)：健脾止痢，助消化。　卵壳(鹅卵壳)：用于无头痈疽。　咽喉(鹅喉管)：用于喉痹，哮喘，带下病。　胫跗骨(鹅腿骨)：用于犬咬伤。

## 麝鸭属　Cairina Fleming

**麝鸭**　　麝香鸭、洋鸭、旱鸭(通称)，番鸭(湖北、广西)

**Cairina moschata** Linnaeus

原产中美及南美，喜生活于水滨。我国已有引入，南方各省如浙江、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西等均有饲养。

肉：助阳道，健腰膝，补命门，暖水脏。

## 天鹅(鹄)属　Cygus Bechstein

**大天鹅**　天鹅、黄嘴天鹅、咳声天鹅、白鹅(通称)，鹄(古名)

**Cygnus cygnus** (Linnaeus)

栖息于有水生植物的大型湖泊、池塘、水库等处，巢多筑在干燥地面或浅滩上。分布于东北、华北、西北及河南、湖北、湖南。

脂肪油(鹄油)：用于痈肿，小儿耳疳。　绒毛(鹄绒毛)：用于刀杖金疮，刀伤出血。

附　注：①我国仅1个亚种，即**指名亚种 C. c. cygnus** (Linnaeus)。② 国家二级保护野生动物。③功效相似的有**小天鹅 C. columbianus** (Ord)，分布于东北、华北、华东及甘肃、新疆、河南、湖北、湖南、广东，国家二级保护野生动物；**疣鼻天鹅 C. olor** (Gmelin)，分布于辽宁、河北、内蒙古、甘肃、青海、新疆、山东、四川，国家二级保护野生动物。

## 秋沙鸭属　Mergus Linnaeus

**普通秋沙鸭**　秋沙鸭(通称)，鱼鸭子(宁夏)，水鸭子(青海)，尖嘴鸭(安徽)，鱼钻子(湖北)

**Mergus merganser** Linnaeus

栖息于湖泊、水库、河畔、沼泽及森林山溪中，巢筑于离地面较高的树洞或岩石绝壁上。除海南外，分布几遍全国。

肉：清热解毒，镇痉。用于发热头痛，痉挛抽搐。　骨：解毒，利水。用于全身性水肿，药物及食物中毒。

附　注：①我国有2个亚种，即**指名亚种 M. m. merganser** Linnaeus；**中亚亚种 M. m. comatus** Salvaeori。②功效相似的有**斑头秋沙鸭 M. albellum** (Linnaeus)，除台湾、海南、西藏外，全国均有分布；**中华秋沙鸭 M. squamatus** Gould，分布于东北及河北、内蒙古、山东、江苏、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖北、湖南、广东、四川、贵州，国家一级保护野生动物。

## 麻鸭属　Tadorna Fleming

**赤麻鸭**　黄鸭(通称)，红雁(内蒙古)，赤谢鸭(青海)，红鸭(安徽)

**Tadorna ferruginea** (Pallas)

栖息于清净河畔、湖边的沼泽草地或湖中小岛上，巢一般筑在靠近水边的土岩或峭壁的洞穴中。除海南外，分布几遍全国。

肉：补中益气，补肾壮阳。用于脾胃虚弱，脱肛，阴挺，体虚，阳痿，疮肿，风湿症。

# 336. 鹰科 Accipitridae

## 鹰属 Accipiter Brisson

**苍鹰** 黄鹰(河南),鹞鹰(湖北、湖南),鸡鹰(广西),角鹰(云南)

**Accipiter gentilis** (Linnaeus)

栖息于有针叶林、阔叶林、杂木林的山麓,营巢于高大乔木树上。除海南外,分布几遍全国。

头部(鹰头):祛风解毒。用于头目眩晕,痔瘘。 骨骼(鹰骨):辛、咸,温。续筋骨,祛风湿。用于损伤骨折,筋骨疼痛。眼睛(鹰眼睛):明目,退翳障。嘴和脚爪(鹰脚爪):用于痔疮。

附 注:① 我国有5个亚种,即**新疆亚种 A. g. buteoides** Menzbier; **普通亚种 A. g. schvedowi** (Menzbier); **西藏亚种 A. g. khamensis** (Bianchi); **黑龙江亚种 A. g. albidus** (Menzbier); **台湾亚种 A. g. fujiyamae** (Swann et Hartert)。②功效相似的有**雀鹰 A. nisus** (Linnaeus),分布几遍全国;**松雀鹰 A. virgatus** (Temminck),分布于东北、华北、华东、中南、西南及陕西。

## 秃鹫属 Aegypius Savigny

**秃鹫** 狗头鹫、座山雕(通称),秃鹰(广西)

**Aegypius monachus** (Linnaeus)

栖息于海拔2 000—4 000米山区,营巢于乔木上。分布于华北、西北,偶见于吉林、辽宁及长江流域以南地区。

肉:滋补养阴。用于肺痨。 骨:软坚散结。用于瘿瘤。

附 注:国家二级保护野生动物。

## 鵰属 Aquila Brisson

**金鵰** 红头鵰、洁白雕、大山鸮(通称),鹫雕(河北、青海)

**Aquila chrysaetos** (Linnaeus)

栖息于海拔2 000—4 000米、人迹较少的荒原及湖畔,营巢于距地面15—18米的云杉和松树、桦树或杨树上。除台湾、海南外,分布几遍全国。

骨骼(雕骨):活血止痛。用于跌扑骨折。

附 注 ①我国有2个亚种,即**东北亚种 A. ch. kamtschatica** Severtzov; **华西亚种 A. ch. daphanea** Menzbier。② 国家一级保护野生动物。

## 鵟属 Buteo Lacepede

**普通鵟**

**Buteo buteo** (Linnaeus)

常见于岩石裸露的山顶、空阔的湖畔及稀疏的针叶林中。分布几遍全国。

羽毛：用于妇女脸肿，贫血，小便涩痛。粪便：解毒拔脓。 卵：用于阴茎红肿脓血

附　注：①我国有 2 个亚种，即**新疆亚种 B. b. vulpinus** (Gloger)；**普通亚种 B. b. burmanicus** Hume。② 国家二级保护野生动物。

**大鵟**　白鹭豹(通称)，土豹(辽宁)，老鹰(宁夏)，花豹、豪豹(河南)

**Buteo himilasius** Temminck et Schlegel

栖息于山坡及干草原上，巢置于崩壁缝隙或乔木上。分布于长江以北地区。

肉(鸶肉)：滋补，消肿。用于久病体虚，脸部浮肿。 羽毛：止血。用于外伤出血。

附　注：国家二级保护野生动物。

## 鹞属　Circus Lacépède

**白尾鹞**　鸡鹰(吉林)，鹞鹰(安徽)，灰鹰(海南)，泽鹞(广西)，鸱(云南)

**Circus cyaneus** (Linnaeus)

栖息于开阔地带，常单独生活。分布几遍全国。

头(鸱头)：咸，平。用于头风眩晕，痫疾。 肉(鸱肉)：用于癫痫，积食。 翅骨(鸱骨)：用于鼻衄不止。

附　注：①我国仅 1 个亚种，即**指名亚种 C. c. cyaneus** (Linnaeus)。② 功效相同，与本种同载《中华人民共和国药典》1990 年版的尚有**草原鹞 C. macrourus** (Gmelin)，分布于河北、新疆西部、江苏、江西、海南、广西、贵州、西藏南部。

## 胡兀鹫属　Cypaetus Storr

**胡兀鹫**　大胡子鹫、髭兀鹰(通称)，黑鹰(青海)

**Gypaetus barbatus** (Linnaeus)

栖息于海拔 2 000—4 000 米的高原和山麓。营巢于岩壁凹处或石洞中。分布于西北及四川、西藏，偶见于长江流域以北地区。

肉：镇静，消肿，化积。用于癫痫，癫狂，肺痈，泄泻，食积。

附　注：①我国仅 1 个亚种，即**北方亚种 G. b. hemachalanus** (Hutton)。② 国家一级保护野生动物。

## 海鵰属　Haliaeetus Savigny

**玉带海鵰**　黑鹰(通称)

**Haliaeetus leucogaster** (Gmelin)

栖居于开阔地带的高山湖泊附近，营巢于芦苇丛或乔木上。分布于华北、西北及黑龙江、四川、西藏。

肉：镇静安神。用于惊痫，失眠，癫狂。

附　注：国家一级保护野生动物。

### 鸢属　Milvus Lacépède

**鸢**　老鹰(通称)，饿老刁(河南)，岩鹰(湖南)，黑耳鸢(广西)，鹞鹰(云南)

**Milvus korschun** (Gmelin)

常见于城镇及村野。巢多筑于山岩棚上或山谷间的高树上。分布几遍全国。

脑髓(鸢脑髓)：止痛解毒。用于头风，痔疮。　脚爪(鸢脚爪)：咸，凉。有小毒。清热镇惊，强筋壮骨。用于小儿惊风，头昏晕及痔瘘，跌打损伤。　骨(鸢翅骨)：活血止痛。用于跌打骨折。　脂肪油(鸢油)：用于癞癣。　胆(鸢胆)：用于心胃气痛。　嘴(鸢嘴)：用于小儿惊风。

附　注：①我国有 2 个亚种，即**普通亚种 M. k. lineatus** (J. E. Gray)；**云南亚种 M. k. govinda** Sykes。②国家二级保护野生动物。

### 鹗属　Pandion Savigny

**鹗**　鱼鹰、鱼雕、鱼江鸟(通称)，吃鱼鹰(海南)

**Pandion haliaetus** Linnaeus

常活动于江河、湖沼及海滨地带。营巢于海岸或岛屿的岩礁上或湖沼、河流附近的松、桦、云杉等乔木上。分布于东北、华北、西北及沿海地区、四川、西藏。

骨骼(鱼鹰骨)：活血止痛。用于跌打骨折。

附　注：①我国有 3 个亚种，即**指名亚种 P. h. haliatus** (Linnaeus)；**东北亚种 P. h. friedmanni** Wolfe；**东南亚种 P. h. mutuus** Kipp. ②国家二级保护野生动物。

### 鹰鹃属　Spizaetus Vieillot

**鹰鹃**　鹃(广西)

**Spizaetus nipalensis** (Hodgson)

栖于高山密林中。巢多筑于高山近溪的大树上。分布于东北及内蒙古、安徽、浙江、福建、台湾、广东、海南、广西、云南。

骨：用于损伤骨折。

附　注：①我国有 4 个亚种，即**东方亚种 S. n. orientalis** Temminck et Schlegel；**福建亚种 S. n. fokiensis** Sclater；**云南亚种 S. n. nipalensis** (Hodgson)；**海南亚种 S. n. whiteheadi** Swann。②国家二级保护野生动物。

## 337. 松鸡科　Tetraonidae

### 榛鸡属　Tetrastes Keyserling et Blasius

**花尾榛鸡**　树鸡(吉林)

**Tetrastes bonasia** (Linnaeus)

栖于森林中。巢置于灌木丛下、倒木旁的落叶层中。分布于东北及河北、内蒙古。

肉：补肾壮阳。

附　注：我国有 2 个亚种，即**北方亚种 T. b. sibiricus** Buturlin，**黑龙江亚种 T. b. amurensis** Riley。

## 338. 雉科　Phasianidae

### 竹鸡属　Bambusicola Gould

**灰胸竹鸡**　竹鸡、竹鹧鸪(通称)，竹雀(湖南)，泥滑滑(广西)，山菌子(云南)

**Bambusicola thoracica** (Temminck)

栖息于丘陵地带的丛林间，营巢于波密的灌木草丛间的地面上。分布于云南西北部以东长江流域以南地区。

肉(竹鸡)：甘，温。补中，杀虫。用于久病虚损。

附　注：①我国有 2 个亚种，即**指名亚种 B. th. thoracica** (Temminck)；**台湾亚种 B. th. sonorivox** Gould。②功效相似的有**棕胸竹鸡 B. fytchii** Anderson，分布于四川、云南。

### 锦鸡属　Chrysolophus J. E. Gray

**白腹锦鸡**　铜鸡、笋鸡、衾鸡(通称)，凤凰鸟(广西)，箐鸡(贵州)

**Chrysolophus amherstiae** (Leadbeater)

栖息于多岩石的山地，出没于多刺灌丛和矮竹间。营巢于竹丛间凹下处。分布于西南。

肉或全体：止血解毒。用于血痔，痈疮肿毒。

附　注：国家二级保护野生动物。

**红腹锦鸡**　金鸡、锦鸡、架鸡(通称)，毛毛鸡(河南)，鹭雉(云南)

**Chrysolophus pictus** (Linnaeus)

栖于高山的灌丛和密林中。分布于西南及陕西、甘肃、青海、河南、湖北、湖南、广西。

肉(鹭雉)：甘、辛，温。微毒。温中补虚，益肝和血。

附　注：国家二级保护野生动物。

### 鹑属　Coturnix Bonnaterre

**鹌鹑**　鹑、赤喉鹑(通称)，罗群(海南)，红面鹌鹑(广西)

**Coturnix coturnix** (Linnaeus)

栖息于平原、溪边及矮山的杂草、灌丛间，巢筑在较湿润的草地浅土坑内，亦有筑于灌木丛下。分布几遍全国。已有养殖。

肉或全体(鹌鹑)：甘，平。补中气，止泻，止咳。用于小儿疳积，泄泻，顿咳，湿痹。卵(鹌鹑蛋)：用于胃病，肺痨，肾虚，肋膜炎。

附　注：我国有2个亚种，即**指名亚种 C. c. coturnix** (L.)；**普通亚种 C. c. japonica** T. et S.。

## 马鸡属　Crossoptilon Hodgson

**藏马鸡**

**Crossoptilon crossoptilon** (Hodgson)

栖于高山地区林中。分布于青海、四川、云南、西藏。

肉：健胃、镇静。　头：用于惊厥，抽搐，癫痫。

附　注：我国有5个亚种，即**昌都亚种 C. c. drouynii** J. Verreaux；**丽江亚种 C. c. lichiangense** Delacour；**藏南亚种 C. c. harmani** Elwes；**玉树亚种 C. c. dolani** de Schauensee；**指名亚种 C. c. crossoptilon** (Hodgson)。

## 鹇鸡属　Francolinus Stephens

**鹇鸡**　越雉、中国鹇鸡(通称)，怀南(湖南)，十二两平平(广西)，花鸡(云南)

**Francolinus pintadeanus** (Scopoli)

多在小丘的灌丛草坡中活动，营巢于灌木及草丛间。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南。

肉或全体(鹇鸡)：甘，温。利五脏，开胃，益心神，补中，消痰。用于胃病，失眠，下痢，小儿疳积，顿咳。　血(鹇鸡血)：用于便血。　脂肪(鹇鸡脂)：用于痹证。　爪(鹇鸡爪)：甘，温。微毒。用于中耳炎。

## 原鸡属　Gallus Brisson

**原鸡**　茶花鸡、红原鸡、烛夜(通称)，鼍鼍(海南)，山鸡(广西)

**Gallus gallus** (Linnaeus)

常见于栎林、次生竹林、竹阔混交林、稀树灌丛、田野及村落附近。营巢于隐蔽的灌丛和刺丛间。分布于海南、广西、云南。

肉：补肝益肾，强筋壮骨。用于病后筋骨痿软无力，崩漏带下病。

附　注：①我国有2个亚种，即**滇南亚种 G. g. spadiceus** (Bonnaterre)；**海南亚种 G. g. jabouillei** Delacour et Kinnear。②国家二级保护野生动物。

**家鸡**　鸡(通称)

**Gallus gallus domesticus** Brisson

全国各地均有饲养。

沙囊内壁(鸡内金)：甘，平。健胃消食，涩精止遗。用于食积不消，呕吐，泄泻，小儿疳积，遗精。　蛋壳内膜(凤凰衣)：甘，凉。养阴，清肺。用于久咳，咽痛失音，瘰疬，溃疡

不敛。　卵(鸡蛋)：甘，平。滋阴润燥，养血安胎。用于热病烦闷，燥咳声哑，目赤咽痛，胎动不安，产后口渴，下痢，烫伤。　头(鸡头)：甘，温。养肝益肾，宣阳助阴，通络活血，堕死胎，安生胎。用于小儿痘浆不起，时疹毒疮。　肉(鸡肉)：甘，温。温中，益气，补精，添髓。用于虚劳羸瘦，中虚胃呆食少，泄泻，下痢，消渴，水肿，小便频数，崩漏，带下病，产后乳少，病后虚弱。　血(鸡血)：咸，平。祛风，活血，通络。用于小儿惊风，口面㖞斜，痿痹，折伤，目赤流泪，痈疽疮癣。　肝(鸡肝)：甘，微温。补肝肾。用于肝虚目暗，小儿疳积，妇女胎漏。　肠(鸡肠)：用于遗尿，遗精，白浊，痔疮。　胆(鸡胆)：苦，寒。清热，止咳，祛毒，明目。用于顿咳，咳嗽痰喘，小儿痢疾，砂淋，目赤流泪，耳后湿疮，痔疮。　脑(鸡脑)：用于小儿癫痫，难产。　嗉囊(鸡嗉)：用于噎膈不通，小便不禁，发背肿毒。　蛋白(鸡子白)：甘，凉。润肺利咽，清热解毒。用于咽喉痛，目赤，咳逆，下痢，疟疾，烧伤，热毒肿痛。　蛋壳(鸡子壳)：用于停饮脘痛，反胃，小儿佝偻病，各种出血，眼生翳膜，头身疮疖，聤耳流脓。　蛋黄(鸡子黄)：甘，平。滋阴润燥，养血息风。用于心烦不眠，热病痉厥，虚劳吐血，呕逆，下痢，胎漏下血，烫伤，热疮，湿疹，小儿消化不良。　粪便上的白色部分(鸡屎白)：苦、咸，凉。利水，泄热，祛风，解毒。用于膨胀积聚，黄疸，淋证，风痹，破伤中风，筋脉挛急。　翅羽(鸡翮羽)：破瘀消肿。用于血闭，小便不禁。痈疽，阴肿，骨哽。雄性的口涎(雄鸡口涎)：用于蜈蚣咬伤。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**乌骨鸡**　乌鸡、药鸡(通称)，泰和武山鸡(江西)，绒毛鸡(河南)，竹丝鸡(广西)

**Gallus gallus nigrosceus** Brisson

全国各地有饲养。

去内脏及羽毛的全体：甘，平。补肝肾，益气养血，退虚热，调经止带。用于虚损诸病，崩中带下，腰腿酸痛，遗精，消渴，久痢。

## 鷩属　Lophura Fleming

**白鷩**　白雉、银雉(通称)，银鸡(浙江)，越禽(海南)，寒鸡(广西)

**Lophura nycthemera** (Linnaeus)

栖息于多林的山地。分布于浙江、江西、福建、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

肉(白鷩)：甘、酸，平。补中益肺，解毒。用于虚痨发热，咳嗽。

附　注：①我国有 8 个亚种，主要为**滇西亚种 L. n. occidentalis** Delacor；**峨眉亚种 L. n. omeiensis** Cheng, Cheng et Tang；**福建亚种 L. n. fokiensis** Delacour；**海南亚种 L. n. whiteheadi** (Ogilvie-Grant) 等。② 功效相似，均为国家二级保护野生动物的有**黑鷩 L. leucomelana** (Latham)，分布于云南、西藏。

## 孔雀属　Pavo Linnaeus

**绿孔雀**　孔雀(通称)

**Pavo muticus** (Linnaeus)

栖居于海拔 2 000 米以下的针叶林或稀树草坡。营巢于郁密的灌丛、竹林及高草丛

间。分布于云南。

肉：解毒。用于痈肿，食物及药物中毒。　粪便：利水解毒。用于带下病，小便不利，恶疮。　羽毛：消肿排脓。

附　注：国家一级保护野生动物。

## 山鹑属　Perdix Brisson

**斑翅山鹑**　沙半鸡(吉林)，斑鸡(青海)

**Perdix dauuricae** (Pallas)

栖于半荒漠草原带的山坡。分布于东北、华北、西北及河南。

肉或全体：滋补，收敛，生肌，祛风湿。

附　注：①本种我国有3个亚种，即**新疆亚种 P. d. dauuricae** (Pallas)；**青海亚种 P. d. przewalskii** Sushkin；**华北亚种 P. d. suschkini** Poljakov。②功效相似的有**高原山鹑 P. hodgsoniae** (Hodgson)，分布于甘肃、青海、四川、西藏东北部。

## 雉属　Phasianus Linnaeus

**环颈雉**　雉鸡、野鸡、山鸡(通称)，呱拉鸡(宁夏)，项圈野鸡(广西)

**Phasianus colchicus** Linnaeus

栖于河边灌丛、草丛、苇塘、丘陵地、大片农田附近及林缘山坡。常筑巢于草地山坡。除海南外，分布几遍全国。

肉或全体(雉)：甘、酸，温。补中益气，止泻。用于脾虚泄泻，胸腹胀满，下痢，消渴，小便频数。　脑(雉脑)：用于冻疮。　头：用于丹毒。　肝(雉肝)：用于小儿疳疾。　尾羽(雉尾)：用于丹毒，中耳炎。

附　注：我国有19个亚种，主要为**东北亚种 P. c. pallasi** Rothschild；**塔里木亚种 P.c. tarimensis** Pleske；**华东亚种 P. c. torquatus** Gmelin；**川南亚种 P. c. elegans** Elliot 等。

## 长尾雉属　Syrmaticus Wagler

**白冠长尾雉**　地鸡(安徽、河南)，鹮(湖南)，雷鸡、蒌鸡、箐鸡(贵州)

**Syrmaticus reevesii** (J. E. Gray)

栖息于海拔600—1 800米山区地带，营巢于草丛或灌丛间。分布于河北、山西、陕西、甘肃、安徽、河南、湖北、湖南、四川、贵州。

肉(鹮雉)：甘，平。有小毒。补中益气，平喘。用于久病虚损，咳喘。

附　注：①国家二级保护野生动物。②功效相同的有**白颈长尾雉 S. ellioti** (Swinhoe)，分布于安徽南部、浙江西部、江西东部、福建西北部及广东北部，国家一级保护野生动物；**黑颈长尾雉 S. humiae** (Hume)，分布于广西、云南，国家一级保护野生动物。

### 雪鸡属　Tetraogallus J. E. Gray

**淡腹雪鸡**　雪鸡(青海)，藏雪鸡、西藏雪雷鸟、恐姆(西藏)

**Tetraogallus tibetanus** (Gould)

栖息于高山裸岩带，营巢于险峻陡峭的山边草丛或灌丛中。分布于甘肃、青海、新疆、四川、西藏。

肉：滋补壮阳，镇痉，解毒。用于久病虚弱，癫痫，狂犬咬伤。

附　注：①我国有5个亚种，即**指名亚种 T. t. tibetanus** Gould；**疆南亚种 T. t. tschimenesis** Sushkin；**藏南亚种 T. t. aquilonifer** R. et A. Meinertzhagen；**青海亚种 T. t. przewalskii** Bianchi；**四川亚种 T. t. henrici** Oustalet。②功效相同，与本种同载《中华人民共和国药典》1990年版的尚有**暗腹雪鸡 T. himalayensis** G. R. Gray，分布于甘肃、青海、新疆。

## 339. 三趾鹑科　Turnicidae

### 三趾鹑属　Turnix Bonnaterre

**黄脚三趾鹑**　水鹌鹑、三爪爬(通称)，三斑鹑(吉林)，黄地闷子(海南)，水鸡(广西)

**Turnix tanki** Blyth

栖息于山坡、平原的灌丛、草丛间。营巢于草丛灌木中。分布于东北、华北、华东、中南及陕西、四川、贵州、云南。

肉(鹑)：甘，平。清热解毒。用于诸疮阴疆。熟食可去热。

附　注：①我国仅1个亚种，即**南方亚种 T. t. blanfordii** Blyth。②功效相似的有**棕三趾鹑 T. suscitator**(Gmelin)，见于广西。

## 340. 鹤科　Gruidae

### 蓑衣鹤属　Anthropoides Vieillot

**蓑羽鹤**

**Anthropoides virgo** (Linnaeus)

生活在草原及湖泊地区。分布于东北及河北、内蒙古东部、青海东部、宁夏、新疆西部、西藏南部。

脂肪：用于手足麻木。

附　注：国家二级保护野生动物。

### 鹤属　Grus Brisson

**丹顶鹤**　白鹤、仙鹤、红顶子(通称)

**Grus japonensis** (P. L. S. Müller)

生活在芦苇及其他荒草的沼泽地带，夜间多栖于四周环水的草滩上，巢多营于周围环水的浅滩枯草丛中。分布于东北及河北、江苏、江西。

肉(鹤肉)：咸，平。补气，止渴。　骨骼(鹤骨)：辛、咸，温。补益，除痹，壮骨，解毒。　脑髓(鹤脑)：明目。

附　注：①国家一级保护野生动物。② 功效相似的有**灰鹤 G. grus**(Linnaeus)，除台湾、西藏外，全国均有分布，国家二级保护野生动物。

**黑颈鹤**　鹤(通称)，鹭鹭(贵州)

**Grus nigricollis** (Przevalski)

多见于开阔的草原和沼泽地，营地面生活。筑巢于浅滩的枯草丛中。分布于西南及甘肃、青海。

骨：利尿通淋。　肉：解热。用于发烧头痛，骨热捞蒸。

附　注：国家一级保护野生动物。

## 341. 秧鸡科 Rallidae

### 黑水鸡属　Gallinula Brisson

**黑水鸡**　红骨顶、鹨(通称)，江鸡(海南)

**Gallinula chloropus** (Linnaeus)

栖息于平原和山地的沼泽、小溪周围的灌木杂草或芦苇丛中，亦见于田野。巢筑于沼泽及其周围密集的草丛、芦苇或灌丛中。分布几遍全国。

肉：滋补强壮，开胃消食。用于脾虚泄泻。

附　注：我国有 2 个亚种，即**指名亚种 G. c. chloropus** (Linnaeus)；**普通亚种 G. c. indica** Blyth。

### 田鸡属　Porzana Vieillot

**斑胁田鸡**　田鸡(吉林)

**Porzana paykullii** (Ljungh)

生活在稻田及沼泽水草丰茂处。分布于东北及河北、内蒙古中部、山东、江苏、福建、广东、广西。

全体：用于消渴。

### 秧鸡属　Rallus Linnaeus

**普通秧鸡**　秧鸡(通称)

**Rallus aquaticus** Linnaeus

栖息于水田或近水的灌丛中。除海南外，分布几遍全国。

肉(秧鸡)：甘，温。杀虫解毒，补中益气。用于瘘疮，脾胃虚弱，食欲不振。

附　注：①我国有2个亚种，即**新疆亚种 R. a. korejewi** Zarudny；**东北亚种 R. a. indicus** Blyth。②功效相似的有**蓝胸秧鸡 R. striatus** Linnaeus，分布于云南中部以东长江以南地区。

## 342. 鸨科　Otidae

### 鸨属　Otis Linnaeus

**大鸨**　　野雁、地鹤、羊鹤、青鹤(通称)

**Otis tarda** Linnaeus

栖息于草原起伏不平的草甸与水洼地之间或耕地边缘。巢筑于干燥的草岗向阳的缓坡上。分布于东东、华北及陕西、甘肃、新疆、山东、江苏、河南。

肉(鸨肉)：甘，平。补益，去风痹气。　脂肪：补肾壮阳，解毒益气，润泽肌肤。用于脱发，痈疖肿毒，肌肤粗裂。

附　注：①我国有2个亚种，即**指名亚种 O. t. tarda** Linnaeus；**普通亚种 O. t. dybowskii** Taczanowski。②国家一级保护野生动物。

## 343. 鹬科　Scolopacidae

### 杓鹬属　Numenius Brisson

**大杓鹬**　　彭鸡、红腰杓鹬、大鸻喽儿(通称)

**Numenius madagascariensis** (Linnaeus)

常见于海滨、河流、池塘、沼泽、草原、稻田。营巢于河畔、沼泽草丛中的凹陷处。分布于东北至东南沿海。

肉：滋养补虚，开胃健脾，益精明目。用于久病虚损。

附　注：功效相似的有**白腰杓鹬 N. arquata** Linnaeus，分布几遍全国。

### 鹬属　Tringa Linnaeus

**白腰草鹬**　　草鹬(通称)，绿鹬(海南)

**Tringa ochropus** Linnaeus

栖于河边沙滩、水田或田埂上。分布几遍全国。

肉：清热解毒，补虚；也用于麻疹。

**红脚鹬**　　红腿鹬、红腿泥岸鹬、东方红腿、亦足鹬(通称)

**Tringa totanus** (Linnaeus)

栖息于海岸、沼泽、池塘、河口。巢营于沼泽、河川等草丛干燥处。分布几遍全国。

肉(鹬肉)：甘，温。滋养补虚，开胃健脾，益精明目。

附　注：①我国仅1个亚种，即**指名亚种 T. t. totanus** (Linnaeus)。② 功效相似的有**青脚鹬 T. nebularia** (Gunnerus)，分布几遍全国。

## 344. 鸥科　Laridae

### 鸥属　Larus Linnaeus

**红嘴鸥**　　笑鸥、钓鱼郎、水鸽子(通称)，水鸦(贵州)

**Larus ridibundus** Linnaeus

栖息于沿海、河流、湖泊及水田中。巢置于干草堆、芦苇丛或平坦而潮湿的土壤上。分布几遍全国。

肉(鸥)：甘。养阴润燥，除烦止渴。

附　注：功效相似的有**银鸥 L. argentatus** Pontoppidan，分布几遍全国；**海鸥 L. canus** Linnaeus，分布于东北及河北、河南，长江流域东自江苏、浙江，西至四川西布，福建、台湾、广东、海南、云南；**普通燕鸥 Sterna hirundo** Linnaeus，分布于东北、华北、西北及山东、四川、西藏。

## 345. 沙鸡科　Pteroclididae

### 毛腿沙鸡属　Syrrhaptes Illiger

**毛腿沙鸡**　　沙鸡(通称)，半鸡子(宁夏)，厥雀(云南)

**Syrrhaptes paradoxus** (Pallas)

冬季作不规则迁徙而抵居我国东北平原，常见于开阔地带。巢仅在沙土中挖个浅窝或稍敷以杂草。分布于东北、华北、西北及山东。

肉(突厥雀)：甘，热。补中益气，暖胃健脾。用于脾胃虚寒，食少作泻，肢体倦怠。

## 346. 鸠鸽科　Columbidae

### 鸽属　Columba Linnaeus

**家鸽**　　鸽子(通称)，鹁鸽(甘肃、湖南)，飞奴(江西)

**Columba livia domestica** (Linnaeus)

全国各地均有饲养。

肉或全体(鸽)：咸，平。益气解毒，祛风活血，调经止痛。用于虚羸，消渴，久疟，血虚经闭，恶疮疥癣。　卵(鸽卵)：甘、咸，平。益气，解毒。用于恶疮疥癣，痘疹不透。

**岩鸽**　　野鸽子、山石鸽(通称)

**Columba rupestris** Pallas

栖于山区多岩和峭壁的地方，常小群在山谷或平原田野上觅食。营巢于岩隙或峭壁上的岩洞中，亦见于建筑物上。分布于东北、华北、西北及山东、江苏、河南、四川、云南、西藏。

肉：祛风，补益。

附　注：①我国有 2 个亚种，即**指名亚种 C. r. rupestris** Pallas；**新疆亚种 C. r. turkestanica** Buturlin。② 功效相同的有**中亚鸽 C. eversmanni** Bonaparte，见于新疆西部、北部；**点斑林鸽 C. hodgsonii** Vigors，分布于陕西南部、甘肃西部、四川北部、中部西南部、云南、西藏西南部；**原鸽 C. livia** Gmelin，分布于东北西南部、河北东北部、内蒙古中部、新疆北部、中部、西部；**鸥鸽 C. oenas yarkandensis** Buturlin，见于新疆西部。

## 斑鸠属　Streptopelia Bonaparte

**山斑鸠**　金背斑鸠(通称)，雉鸠(河北)，山鸽子(宁夏)，灰咕咕(青海)，薄鸳(广西)

**Streptopelia orientatis** (Latham)

栖于平原和山地的树林间、农田中。营巢于较隐蔽的矮树上。分布几遍全国。

肉(斑鸠)：甘，平。益气明目，强筋壮骨。用于久病虚损，气虚，呃逆。　粪便：用于中耳炎。

附　注：①我国有 4 个亚种，即**指名亚种 S. O. orientalis** (Latham)；**新疆亚种 S. O. meena** (Sykes)；**云南亚种 S. O. agricola** (Tickell)；**台湾亚种 S. O. orii** Yamashina。② 功效相似的有**珠颈斑鸠 S. chinensis** (Scopoli)，分布于华东、中南、西南及河北、山西、陕西、甘肃、宁夏；**火斑鸠 Oenopopelia tranquebarica** (Harmann)，分布几遍全国。

# 347. 鹦鹉科　Psittacidae

## 鹦鹉属　Psittacula Cuvier

**绯胸鹦鹉**　鹦鹉、鹦哥(通称)，英哥(海南)

**Psittacula alexandri** (Linnaeus)

栖息于深山密林，地点较固定，觅食时飞至山脚、平原、河谷及村庄附近。分布于广东、海南、广西、云南。

肉(鹦鹉)：甘、咸，温。滋补。用于体虚咳嗽。

附　注：①我国仅 1 个亚种，即**华南亚种 P. a. fasciata** (Müller)。②国家二级保护野生动物。③功效相同的有**花头鹦鹉 P. cyanocephala** (Linnaeus)，分布于广东、广西、云南；**灰头鹦鹉 P. himalayana** (Lesson)，分布于四川、云南，均为国家二级保护野生动物。

## 348. 杜鹃科 Cuculidae

### 鸦鹃属 Centropus Illiger

**褐翅鸦鹃** 毛鸡、红毛鸡(通称),红鹁(广西),落谷(壮名)

**Centropus sinensis** (Stephens)

常见于林缘灌丛、稀树草坡灌丛或溪边灌丛和芦苇丛中,有时在树冠中部栖息。分布于浙江、福建、广东、海南、广西、贵州、云南。

去内脏、羽毛的全体(红毛鸡): 甘,温。滋补强壮,调经通乳,祛风湿。用于妇女产后头风痛,手足麻痹,乳汁少,跌扑损伤。 骨(绿结鸡骨): 甘、咸, 温。强筋壮骨。用于风湿骨痛,跌打伤积。

附 注 ①我国有 2 个亚种,即**指名亚种 C. s. sinensis** (Stephens); **云南亚种 C. s. intermedius** (Hume)。②功效相似, 同列为国家二级保护野生动物的有**小鸦鹃 C. toulou** (P. L. S. Müller), 分布于中南及安徽、浙江、江西、福建、台湾、四川、贵州、云南。

### 杜鹃属 Cuculus Linnaeus

**四声杜鹃** 花喀咕、杜鹃(通称),光棍好过(陕西、河北),快快割麦(广西)

**Cuculus micropterus** Gould

栖息于密林中。分布于东北、华北、华东、中南及陕西、甘肃、四川、贵州、云南。

去内脏全体: 消瘰,通便,镇咳。用于瘰疬,便秘,顿咳。

附注: ①我国仅 1 个亚种,即**指名亚种 C. m. micropterus** Gould。② 功效相似的有**大杜鹃 C. canorus** Linnaeus, 除台湾、海南外, 全国均有分布; **中杜鹃 C. saturatus** Blyth, 分布于东北、华北、华东、中南及陕西、四川、贵州、云南。

**小杜鹃** 阴天打酒喝(河北),阳雀(甘肃),点灯捉各蚤(安徽),子规(广西)

**Cuculus poliocephalus** Latham

栖于杂木林林缘一带。分布于华东、中南及吉林、辽宁、河北、山西、陕西、甘肃、青海、四川、贵州、云南。

肉或全体(杜鹃): 甘,平。滋养补虚,解毒杀虫。

附 注: 我国仅 1 个亚种,即**指名亚种 C. p. poliocephalus** Latham。

## 349. 鸱鸮科 Strigidae

### 鹰鸮属 Bubo Duméril

**鹰鸮** 猫头鹰、夜猫子(通称),大猫王(江西),咕咕雀(广西),欧瓜(藏语)

**Bubo bubo** (Linnaeus)

常栖于山地、林间，冬季常迁至平原树丛中。白天潜伏，夜间活动。除台湾、海南外分布几遍全国。

全体：定惊，解毒。用于瘰疬，噎食，癫痫。

附　注：①我国有7个亚种，主要为**天山亚种 B. b. hemachalana** Hume；**东北亚种 B. b. ussuriensis** Poljakov；**华南亚种 B. b. kiautschensis** Reichenow；**西藏亚种 B. b. tibetanus** Bianchi 等。②功效相似的有**短耳鸮 Asio flammeus** (Pontoppidan)，分布几遍全国；**长耳鸮 A. otus** (Linnaeus)，分布于东北、华北、西北、华东及河南、湖北、湖南、广东、四川。

## 鸺鹠属　Glaucidium Boie

**斑头鸺鹠**　猫头鹰、横纹小鸮(通称)，草鸮(江西)，山鸮(贵州)，咕咕雀(广西)

**Glaucidium cuculoides** (Vigors)

栖于山地、丘陵、平原的丛林间，白昼静伏，夜间活动。营巢于树洞或鸢鹊的废巢中。分布于云南西北部以东长江流域以南地区。

肉(鸮)：甘，温。截疟，祛风，散结。用于噎食，惊痫，瘰疬，恶疮。

附　注：①我国有3个亚种，即**华南亚种 G. c. whiteleyi** (Blyth)；**云南亚种 G. c. rufescens** Stuart Baker；**海南亚种 G. c. persimile** Hartert。②功效相同的有**领鸺鹠 Glaucidium brodiei** (Burton)，分布于南部各省，西达云南西部、四川峨眉，北至甘肃南部、陕西南部、河南南部及安徽、江苏。

## 角鸮属　Otus Pennant

**红角鸮**　猫头鹰、夜猫子(通称)、红角(上海)

**Otus scops** (Linnaeus)

昼伏树林间，夜间外出活动。分布于东北、华北、华东、中南及陕西、甘肃、新疆、四川、贵州、云南。

肉、骨(鸱鸮)：酸、微咸，寒。祛风，定惊，解毒。用于眩晕，癫痫，瘰疬，疟疾，噎食。

附　注：①我国有5个亚种，主要为**新疆亚种 O. s. pulchellus** (Pallas)；**东北亚种 O. s. stictonotus** (Sharpe)；**华南亚种 O. s. malayanus** (Hay) 等。②功效相同的有**黄嘴角鸮 O. spilocephalus** (Blyth)，分布于福建、台湾、广东，海南、广西。

# 350. 夜鹰科　Caprimulgidae

## 夜鹰属　Caprimulgus Linnaeus

**普通夜鹰**　夜燕(宁夏)，蚊母鸟(河南)，鬼鸟(海南)，贴树皮(广西)

**Caprimulgus indicus** Latham

栖息于山地林区边缘、丘陵次生林区的稀疏丛林及平原砍伐地、林缘。除新疆、台湾

外，分布几遍全国。

脂肪：滋补益阴。用于肢体倦怠，妇女不育。

附　注：①我国有 2 个亚种，即**普通亚种 C. i. jotaka** Temminck；**西藏亚种 C. i. hazarae** Whistler。② 功效相似的有**林夜鹰 C. affinis** Horsfield，分布于福建、台湾、广东、海南、广西、云南。

## 351. 雨燕科　Apodidae

### 雨燕属　Apus Scopoli

**楼燕**

**Apus apus** (Linnaeus)

见于古塔及高楼隐蔽处。分布于东北、华北及陕西南部、甘肃、青海东部、山东、江苏、河南、四川。

肺：清热消痈。

### 金丝燕属　Collocalia G.R. Gray

**短嘴金丝燕**　　燕子(通称)，岩燕(贵州)

**Collocalia brevirostris** (Mcclelland)

栖于山区岩洞内。营巢于岩壁上。分布于西南及湖北。

巢窝(土燕窝)：甘、淡，平。养肺阴，开胃，止血。用于肺痨吐血，体弱遗精，咳嗽痰多，小便频数。　全体：滋阴润燥。

附　注：①我国有 3 个亚种，即**西藏亚种 C. b. brevirostris** (McClelland)；**云南亚种 C. b. rogersi** Deignan；**四川亚种 C. b. innomilata** Hume。② 功效相似的有**褐背金丝燕 C. ·napina** Thayer et Bangs，见于湖北、四川、云南。

## 352. 翠鸟科　Alcedinidae

### 翠鸟属　Alcedo Linnaeus

**普通翠鸟**　　钓鱼郎(河南)，金鸟仔(广西)，鱼狗(贵州)，翠雀儿(云南)

**Alcedo atthis** (Linnaeus)

栖息于溪边、湖边的矮树或岩石上。巢筑在水边光裸而垂直的土洞中。分布几遍全国。　肉或全体(鱼狗)：咸，平。止痛，解毒，定喘，通淋。用于痔疮，淋证，鱼骨哽咽。

附　注：①我国有 2 个亚种，即**指名亚种 A. a. atthis** (Linnaeus)；**普通亚种 A. a. bengalensis** Gmelin。② 功效相似的有**冠鱼狗 Ceryle lugubris** (Temminck)，分布于中南及辽宁、河北、山西、陕西、山东、江苏、安徽、浙江、江西、福建、四川、贵州、云南；**斑鱼狗 C. rudis** (Linnaeus)，分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、海

南、广西、云南。

### 翡翠属　Halcyon Swainson

**白胸翡翠**　　鱼狗(安徽),红嘴吃鱼鸟(海南)

**Halcyon smyrnensis** (Linnaeus)

常见于平原和丘陵的树丛中或沼泽附近。营巢于河流堤岸或山丘坟墓的隧道中。分布于东自浙江南部、西达云南西北部一线以南地区。

肉(翡翠):甘,平。利小便。用于水肿,小便不利。

附　注:①我国仅1个亚种,即**华南亚种 H. s. perpulchra** Madarasz。②功效相似的有**蓝翡翠 H. pileata**(Boddaert),分布于华东、中南及辽宁、河北、山西、陕西、甘肃、四川、贵州,云南。

## 353. 戴胜科　Upupidae

### 戴胜属　Upupa Linnaeus

**戴胜**　　鸡冠鸟、山和尚、臭姑鸪(通称),呼哮哮(云南),布泽(藏语)

**Upupa epops** Linnaeus

栖息于田野、村庄附近。营巢于树洞或在岩隙岸堤和墙壁的窟窿里。分布几遍全国。

全体(屎咕咕):柔肝熄风,镇心安神。用于癫痫、癫狂、疟疾。

## 354. 啄木鸟科　Picidae

### 蚁䴕属　Jynx Linnaeus

**蚁䴕**　　地啄木、蛇皮鸟(通称),歪脖(河南),蛇颈鸟、鹞鸟(海南)

**Jynx torquilla** Linnaeus

在丘陵、平原的树枝、树干甚至地面上活动。分布几遍全国。

肉或全体:滋养补虚,解毒止痛。用于虚痨,小儿疳积。

附　注:我国有3个亚种,即**普通亚种 J. t. chinensis** Hesse;**新疆亚种 J. t. torquilla** Linnaeus;**西藏亚种 J. t. himalayana** Vaurie。

### 绿啄木鸟属　Picus Linnaeus

**黑枕绿啄木鸟**　　山鴗、啄木鸟、火老鸦(通称),绿啄米棍(安徽),山啄木(河南)

**Picus canus** Gmelin

夏季栖于山地密林,冬季迁栖于丘陵平原次生丛林。巢筑在树洞里。分布几遍全国。

肉或全体(啄木鸟):甘,平。补虚,解郁,平肝。用于虚劳,疳积,噎膈,癫痫,痔疮。

附　注:功效相似的有**星头啄木鸟 Dendrocopos canicapillus** (Blyth),分布于

东北、华东、中南及河北、山西、陕西、四川、贵州、云南；**赤胸啄木鸟 D. cathpharius** (Blyth)，分布于陕西南部、甘肃南部、湖北西南部、四川、云南、西藏；**棕胸啄木鸟 D. hyperythrus** (Vigors)，分布于东北及河北、陕西、山东、江苏、安徽、河南、湖北、湖南、广西、四川、云南、西藏；**白背啄木鸟 D. leucotos** (Bechstein)，分布于东北及河北、内蒙古、陕西、新疆、福建、台湾、四川；**斑啄木鸟 D. major** (Linnaeus)，除台湾、西藏外，全国均有分布；**姬啄木鸟 Picumnus innominatus** Burton，分布于云南西北部以东长江流域以南地区。**棕啄木鸟 Sasia ochracea** Hodgson，分布于广西、云南。

## 355. 百灵科 Alaudidae

### 云雀属 Alauda Linnaeus

**云雀** 阿鹨、朝天柱(通称)，百灵(吉林、陕西)，小百灵(河北)，焦尕(藏语)
**Alauda arvensis** Linnaeus

喜栖于开阔的环境，草原和沿海一带的平原区尤为常见。巢多营造在开阔的地面上。分布于东北、华北、西北、华东及河南、湖北、湖南、广东。

去内脏全体：解毒，缩小便。用于赤痢，肺痨，胎毒，遗尿。 脑：滋补，壮阳。

附 注：功效相似的有**小云雀 A. gulgula** Franklin，分布于华东、中南、西南及陕西、甘肃、宁夏、青海。

## 356. 燕科 Hirundinidae

### 毛脚燕属 Delichon Horsfield et Moore

**毛脚燕** 石燕(通称)，白腰燕(河北)
**Delichon urbica** (Linnaeus)

栖居于高山峡谷。营巢于山地古建筑物廊廓，高山悬崖壁突出或凹进处，高大桥梁的桥墩上。分布几遍全国。

全体：用于风湿痛。

附 注：我国有5个亚种，主要为**指名亚种 D. u. urbica** (Linnaeus)；**东北亚种 D.u. lagopoda** (Pallas)；**西南亚种 D. u. cashmeriensis** (Gould)；**福建亚种 D. u. nigrimentalis** (Hartert) 等。

### 燕属 Hirundo Linnaeus

**金腰燕** 赤腰燕、黄腰燕(通称)，巧燕(河北)，胡燕(广西)，花燕(云南)
**Hirundo daurica** Linnaeus

习见夏候鸟，多栖于山间村镇附近的树枝或电线上，大部分时间在原野飞行。除新疆、台湾外，分布几遍全国。

卵(胡燕卵)：用于水肿。　泥巢(燕窠土)：咸，寒。清热解毒。用于风瘙瘾疹，浸淫湿疮，丹毒，口疮。　肉：用于顿咳。

附　注：①我国有4个亚种，即**指名亚种H. d. daurica** Linnaeus；**青藏亚种 H. d. gephrya** Meise；**西南亚种 H. d. nipalensis** Hodgson；**普通亚种 H. d. japonica** Temminck et Schlegel。②功效相似的有**家燕 H. rustica** Linnaeus，分布几遍全国。

### 沙燕属　Riparia Forster

**灰沙燕**　　沙燕(通称)，水燕子(甘肃)，土燕(宁夏)

**Riparia riparia** (Linnaeus)

生活在河川、湖泊的泥沙滩上或其附近的岩石间。除台湾、海南、云南外，分布几遍全国。

全体：清热解毒，活血消肿。　巢泥：清热解毒。用于湿疹，恶疮，丹毒。　卵：用于疮肿。

附　注：我国有4个亚种，即**东北亚种 R. r. ijimae** (Lönnberg)；**新疆亚种 R. r. diluta** (Sharpe et Wyatt)；**青藏亚种 R. r. tibetana** Stegmann；**福建亚种 R. r. fokienensis** (La Touche)。

## 357. 鹡鸰科　Motacillidae

### 鹡鸰属　Motacilla Linnaeus

**白鹡鸰**　　点水雀(通称)，白面鸟、濑鹡(海南)

**Motacilla alba** Linnaeus

常活动于河边、溪流、水塘边、湖沼、水渠、稻田及其附近。分布几遍全国。

全体：补益脾肾，利水消肿。

附　注：我国有9个亚种，主要为**新疆亚种 M. a. personata** Gould；**西南亚种 M. a. alboides** Hodgson；**东北亚种 M. a. baicalensis** Gmelin；**普通亚种 M. a. leucopsis** Gould 等。

## 358. 黄鹂科　Oriolidae

### 黄鹂属　Oriolus Linnaeus

**黑枕黄鹂**　　黄鹂、黄莺、黄鸟(通称)，黄伯劳(广西)

**Oriolus chinensis** Linnaeus

生活在丘陵、平原或村庄附近的大树或疏林中。除青海、新疆、西藏外，分布几遍全国。

肉(莺)：甘，温。补气壮阳，温脾。用于肢体倦怠，脾胃虚寒，泄泻。

附　注：①我国有2个亚种，即**普通亚种 O. c. diffusus** Sharpe；**云南亚种 O. c.**

**tenuirostris** Blyth。② 效功相似的有**鹊色黄鹂 O. mellianus** Stresemann，见于广东、广西、四川；**栗色黄鹂 O. traillii** (Vigors)，分布于台湾、海南、广西、贵州、云南。

## 359. 椋鸟科 Sturnidae

### 八哥属 Acridotheres Vieillot

**八哥** 鸲鹆(浙江)，三哥(海南)，鹩哥(广西)

**Acridotheres cristatellus** (Linnaeus)

常见于丘陵地带的乡村、城镇、农田及庭院附近。巢筑于建筑物、大树或峭壁的洞穴里。分布于云南西北部以东长江流域以南地区。

肉(鸲鹆)：甘，平。下气，止血。用于久嗽，呃逆，痔疮出血。

附 注：我国有 3 个亚种，即**指名亚种 A. c. cristatellus** (Linnaeus)；**台湾亚种 A. c. formosanus** (Hartert)；**海南亚种 A. c. brevipennis** Hartert。

### 鹩哥属 Gracula Linnaeus

**鹩哥** 了王(海南)

**Gracula religiosa** Linnaeus

常见于山地林区。分布于广东、海南、广西、云南。

肉：滋补强壮。

附 注：我国仅 1 个亚种，即**华南亚种 G. r. intermedia** Hay。

### 椋鸟属 Sturnus Linnaeus

**灰椋鸟** 假画眉、灰札子(吉林)

**Sturnus cineraceus** Temminck

多栖息于较开阔的林缘、田野、山岗荒地等处。分布于东北、华北、华东、中南及陕西、甘肃、宁夏、四川、贵州、云南。

全体：益气血，补肺、肾。

## 360. 鸦科 Corvidae

### 鸦属 Corvus Linnaeus

**渡鸦** 老鸹、渡鸟(通称)

**Corvus corax** (Linnaeus)

常见于开阔地、林缘、河旁、村镇等附近。营巢于陡壁悬崖的石隙或大树及建筑物上。分布于西北及黑龙江、河北、内蒙古、四川、西藏。

肉：祛风散寒。

附　注：我国有2个亚种，即**东北亚种 C. c. kamtschaticus** Dybovski；**青藏亚种 C. c. tibetanus** Hodgson。

**小嘴乌鸦**　　老鸹、细嘴乌鸦(通称)，黑老鸹(宁夏)

**Corvus corone** (Linnaeus)

常见于村落附近或田野间。除台湾、西藏外，分布几遍全国。

肉：滋补强壮。

附　注：我国有2个亚种，即**新疆亚种 C. c. sharpii** Oates；**普通亚种 C. c. orientalis** Eversmann。

**大嘴乌鸦**　　老鸹、乌鸦(通称)，老呱(河南)，黑老鸦(云南)

**Corvus macrorhynchus** Wagler

栖于山区或近村落的树丛中。筑巢于山林中高大树顶上。除新疆外，分布几遍全国。

肉或全体(乌鸦)：酸，平。祛风定惊，补气止血。用于头风，眩晕，小儿风痫，虚痨，咳嗽吐血，骨蒸潮热。　头(乌鸦头)：用于瘰疬，烂眼边。　胆(乌鸦胆)：用于风眼红烂。翅羽(乌鸦翅羽)：活血祛瘀。用于跌扑瘀血，破伤风。

附　注：我国有4个亚种，即**普通亚种 C. m. colonorum** Swinhoe；**西藏亚种 C. m. intermedius** Adams；**青藏亚种 C. m. tibetosinensis** Kleinschmidt et Weigold；**东北亚种 C. m. mandschuricus** Buturlin。② 功效相似的有**秃鼻乌鸦 C. frugilegus** Linnaeus，分布于东北、华北、西北、华东及河南、湖北、湖南、广东、海南、四川。

**寒鸦**　　慈鸟(河南)，寒老鸹(贵州)

**Corvus monedula** Linnaeus

常见于山地、平原的山崖、田野及城乡居民点附近。营巢于高原地带山沟的土洞里或旧城墙屋檐、楼阁等裂缝处以及树洞里。除海南外，分布几遍全国。

肉(慈鸟)：酸、咸，平。补气，强壮。用于骨蒸羸弱，咳嗽。　胆(慈鸟胆)：明目解毒。用于烂弦风眼及翳障。

附　注：我国有2个亚种，即**指名亚种 C. m. monedula** Linnaeus；**普通亚种 C. m. dauuricus** Pallas。

**白颈鸦**　　老鸹(通称)，玉颈鸦、鬼雀、白颈三荷(海南)，白颈老鸹(贵州)

**Corvus torquatus** Lesson

栖息于竹、灌木丛以及次生林缘地带，亦常活动于农田。分布于华东、中南及辽宁、河北、山西、陕西、甘肃、四川、贵州、云南。

肉：消食散结。

## 松鸦属　Garrulus Brisson

**松鸦**　　火老鸦(吉林)，松雀(贵州)

**Garrulus glandarius** (Linnaeus)

栖于树干顶端。除青海、海南外，全国均有分布。

全体：补肝肾，壮筋骨，益气力。

附　注：我国有 8 个亚种，主要为**北疆亚种 G. g. brandtii** Eversmann；**北京亚种 G. g. pekingensis** Reichenow；**普通亚种 G. g. sinensis** Swinhoe；**西藏亚种 G. g. interstinctus** Hartert 等。

### 鹊属　Pica Brisson

**喜鹊**　　鹊、客鹊(通称)，马札子(河南)，夹阿(藏语)

**Pica pica** (Linnaeus)

全国各地常见。

肉(鹊)：甘，寒。清热，散结，通淋，止渴。用于石淋，胸膈痰结，肺痨发热，消渴，鼻衄。

附　注：我国有 4 个亚种，即**普通亚种 P. p. sericea** Gould；**新疆亚种 P. p. bactriana** Bonaparte；**东北亚种 P. p. leucoptera** Gould；**青藏亚种 P. p. bottanensis** Delessert。

### 拟地鸦属　Pseudopodoces Zarudny et Loudon

**褐背拟地鸦**　　褐被地鸦(甘肃)，老鸹(宁夏)

**Pseudopodoces humilis** (Hume)

栖息于草原、荒漠和高原地区。分布于甘肃、宁夏、青海、新疆、四川、西藏。

肉：祛风活血，镇惊熄风。

### 山鸦属　Pyrrhocorax Tunstall

**红嘴山鸦**　　红嘴乌鸦(辽宁)，山老鸹(宁夏)，红嘴鸦(青海)

**Pyrrhocorax pyrrhocorax** (Linnaeus)

结群栖于山地谷间，有时亦见于山村附近庄稼地中。营巢于边远山区的悬崖陡壁或破旧洞窖的裂缝间。分布于东北、华北、西北及山东、河南、四川、云南、西藏。

肉：滋养补虚。用于虚劳发热，咳嗽。　血：避孕。

附　注：我国有 2 个亚种，即**青藏亚种 P. p. himalayanus** (Gould)；**北方亚种 P. p. brachypus** (Swinhoe)。

## 361. 河乌科　Cinclidae

### 河乌属　Cinclus Borkhausen

**河乌**　　水老鸹(云南)

**Cinclus cinclus** (Linnaeus)

生活在高海拔地带的溪流、岩石或浅滩处。巢筑在急流边的石隙中，略高出水面。分布于甘肃、青海、新疆、四川、云南、西藏。

肉：清热解毒，消肿散结。用于瘰疬。

附　注：①我国有3个亚种，即**新疆亚种 C. c. leucogaster** Bonaparte；**青藏亚种 C. c. przewalskii** Bianchi；**西藏亚种 C. c. cashmeriensis** Gould。②功效相似的有**褐河乌 C. pallasii** Temminck，除内蒙古、海南外，全国均有分布。

## 362. 鹪鹩科　Troglodytidae

### 鹪鹩属　Troglodytes Vieillot

**鹪鹩**　山螅蝴、巧妇(通称)

**Troglodytes troglodytes** (Linnaeus)

夏季多栖于高山密林灌丛中，冬时移向较低地带，在山泉、溪流沿岸的砾石堆中活动。营巢于茂密的灌木丛间或长有苔藓的岩石堆隙间或树洞中。除海南外，分布几遍全国。

去内脏全体：补脾，益肺，滋肾。用于脾虚作泻，肺虚喘嗽。

附　注：我国有7个亚种，主要为**普通亚种 T. t. idius** (Richmond)；**东北亚种 T. t. dauricus** Dybowski et Taczanowski；**四川亚种 T. t. szetschuanus** Hartert；**天山亚种 T. t. tianschanicus** Sharpe 等。

## 363. 鹟科　Muscicapidae

### 苇莺属　Acrocephalus Naumann

**大苇莺**　刮苇、车喝子(吉林)

**Acrocephalus arundinaceus** Linnaeus

喜栖于河畔或湖边的苇丛中，亦见于附近的灌丛中。分布于东北、华北、华东及陕西、甘肃、宁夏、新疆、河南、湖北、湖南、广东、海南、云南。

全体：祛风解痉，和血柔筋。

附　注：我国有2个亚种，即**新疆亚种 A. a. zarudnyi** Hartert；**普通亚种 A. a. orientalis** (Temminck et Schlegel)。

### 鹊鸲属　Copsychus Wagler

**鹊鸲**　信鸟、土更鸟(海南)，四喜、猪屎雀(贵州)

**Copsychus saularis** (Linnaeus)

栖居于村寨附近的园圃、篱笆和小树林中，亦见于圈舍的墙上和屋顶上。分布于云南西北部以东长江流域以南地区。

肉：清热消痔。

附　注：我国有2个亚种，即**云南亚种 C. s. erimelas** Oberholser；**华南亚种 C. s. prosthopellus** Oberholser。

## 啸鸫属　Myiophoneus Temminck

**紫啸鸫**　黑雀儿(宁夏)，鸣鸡(湖北)，山鸣鸡(广西)，岩八哥(贵州)

**Myiophoneus caeruleus** (Scopoli)

栖息于多石的山涧溪流旁，亦见于居民点厕所附近。巢置于山溪近旁的岩隙间。分布于西北、华东、中南、西南及辽宁、河北、山西。

肉：滋养补虚。用于肾虚。　胃内壁：消食。用于消化不良。

附　注：我国有3个亚种，即**指名亚种 M. c. caeruleus** (Scopoli)；**西南亚种 M. c. eugenei** Hume；**西藏亚种 M. c. temminckii** G. R. Gray。

## 红尾鸲属　Phoenicurus Forster

**北红尾鸲**　朗鹞(通称)，花红燕儿、红尾溜(海南)

**Phoenicurus auroreus** (Pallas)

常成对活动在村寨附近的灌丛或矮树、电线或屋脊上。除新疆外，分布几遍全国。

全体：补肾缩尿。

附　注：我国有2个亚种，即**指名亚种 P. a. auroreus** (Pallas)；**青藏亚种 P. a. leucopterus** Blyth。

## 寿带属　Terpsiphone Gloger

**寿带鸟**　练鹊、绶带鸟、长尾鹞(通称)，一枝花(河北)，长尾巴练(湖北)

**Terpsiphone paradisi** (Linnaeus)

常见于山区阔叶林带，多在高大乔木的中、下层成对或小群活动。分布于东北、华东、中南及河北、山西、陕西、甘肃、宁夏、四川、贵州、云南。

去内脏全体：解毒杀虫，止血。用于痔疮，龋齿。

附　注：我国有3个亚种，即**普通亚种 T. p. incei** (Gould)；**滇南亚种 T. p. indochinensis** (Salomonsen)；**滇西亚种 T. p. saturatior** (Salomonsen)。

## 鸫属　Turdus Linnaeus

**乌鸫**　黑鸫、百舌、反舌(通称)，日雀(海南)，牛屎八(广西)

**Turdus merula** Linnaeus

栖于林区、小镇和乡村的林木间。巢大都营筑在乔木的枝梢上。分布于西北、中南、西南及江苏、上海、安徽、浙江、江西、福建。

肉(百舌鸟)：甘、咸，平。用于血虚头晕，胃痛，小儿语迟。　巢及粪：用于诸虫咬

伤。

附　注：我国有4个亚种，即**新疆亚种 T. m. intermedia** (Richmond)；**西藏亚种 T. m. maximus** (Seebohm)；**普通亚种 T. m. mandarinus** Bonaparte；**四川亚种 T. m. sowerbyi** Deignan。

**斑鸫**　　红尾鸫(吉林)

**Turdus naumanni** Temminck

常见于松林、杂木林或荒山灌丛中，在地面或树上觅食。除海南、西藏外，全国均有分布。

肉：活血，消肿，止痛。

附　注：我国有2个亚种，即**北方亚种 T. n.eunomus** Temminck；**指名亚种 T. n. naumanni** Temminck。

**灰头鸫**

**Turdus rubrocanus** G. R. Gray

栖于田野或林间。分布于陕西、甘肃、宁夏，青海、湖北、四川、云南、西藏。

肉：补虚益气，镇静。

附　注：我国仅1个亚种，即**西南亚种 T. r. gouldii** (Verreaux)。② 功效相似的有**宝兴歌鸫 T. mupinensis** Laubmann，分布于河北、陕西、甘肃、四川、贵州、云南。

### 地鸫属　Zoothera Vigors

**虎斑地鸫**　　顿鸡(海南)

**Zoothera dauma** (Latham)

常见单个或成对于松、杉林或灌丛或农田活动觅食。除海南、西藏外，全国均有分布。

肉：补气益脾。

附　注：我国有4个亚种，即**普通亚种 Z. d. aurea** (Holandre)；**西南亚种 Z. d. socia** (Thayer et Bangs)；**日本亚种 Z. d. toratugumi** (Momiyama)；**台湾亚种 Z. d. horsfieldi** (Bonaparte)。

## 364. 山雀科　Paridae

### 山雀属　Parus Linnaeus

**大山雀**　　白脸山雀(通称)，白面公、灰山雀(海南)

**Parus major** Linnaeus

常栖息于山区阔叶林或针叶林间，夏季可见于海拔3 000米左右的高山，冬时降至平原地带的林间、农田或庭园中活动。分布几遍全国。

全体：滋阴补肾，强腰壮膝。

附　注：我国有6个亚种，主要为**北方亚种 P. m. kapustini** Portenko；西南亚种

**P. m. subtibetanus** Kleinschmidt et Weigold; **华北亚种 P. m. artatus** Thayer et Banga; **华南亚种 P. m. commixtus** Swinhoe 等。

## 365. 鸸科 Sittidae

### 鸸属 Sitta Linnaeus

**普通鸸** 贴树皮(吉林)

**Sitta europaea** Linnaeus

栖息于山区树林中,常在高大的针、阔叶树上活动。除青海、海南外,分布几遍全国。

全体: 润肺止咳。

附 注: 我国有5个亚种,主要为**新疆亚种 S. e. seorsa** Portenko; **黑龙江亚种 S. e. amurensis** Swinhoe; **华东亚种 S. e. sinensis** Verreaux; **西南亚种 S. e. montium** La Touche 等。

## 366. 攀雀科 Remizidae

### 攀雀属 Remiz Jarocki

**攀雀** 倒攀山雀(吉林)

**Remiz pendulinus** (Linnaeus)

常集群活动于近水的苇丛和柳、桦、杨等阔叶树间。分布于东北、华北、西北、长江流域中下游及云南。

巢窝: 止痛。用于疝气。

附 注: 我国有3个亚种,即**东北亚种 R. p. consobrinus** (Swinhoe); **疆西亚种 R. p. coronatus** (Severtzov); **新疆亚种 R. p. stoliczkae** (Hume)。

## 367. 绣眼鸟科 Zosteropidae

### 绣眼鸟属 Zosterops Vigors et Horsfield

**暗绿绣眼鸟** 金眼圈、绣眼儿(通称),白绣眼鸟(山西),绿豆(青海),相思仔(海南)

**Zosterops japonica** Temminck et Schlegel

多见于山地林间、田野和村寨附近的高大乔木上,常集群活动在阔叶树林中。分布于华东、中南及河北、山西、陕西、四川、贵州、云南。

肉和骨: 强心利水。用于水肿,心脏病。

附 注: ①我国有3个亚种,即**普通亚种 Z. j. simplex** Swinhoe; **海南亚种 Z. j. hainana** Hartert; **兰屿亚种 Z. j. batanis** McGregor。 ② 功效相似的有**红胁绣眼鸟 Z. erythropleura** Swinhoe, 分布于东北、西南及河北、山西、陕西、甘肃、山东、江苏、浙

江、福建、河南。

## 368. 文鸟科 Ploceidae

### 麻雀属 Passer Brisson

**麻雀** 家雀、老家贼(通称),谷雀(湖南),照夜(海南),只只(广西)

**Passer montanus** (Linnaeus)

成群栖于村镇和农田附近,常营巢于房檐、墙隙或树洞中。分布几遍全国。

肉或全体(雀):甘、温。壮阳益精,暖腰膝,缩小便。用于阳虚羸瘦,阳痿,疝气,小便频数,崩漏,带下病。 卵(雀卵):甘、咸,温。补肾阳,益精血,调冲任。用于男子阳痿,妇女血枯,崩漏,带下病。 脑髓(雀脑):平。用于聤耳,冻疮。 头部血液(雀头血):用于雀盲。 粪便(白丁香):苦,温。化积,消翳。用于疝瘕,症癖,目翳,鲠肉,龋齿。

附 注:①我国有6个亚种,主要为**指名亚种 P. m. montanus** (Linnaeus);**新疆亚种 P. m. dilutus** Richmond;**普通亚种 P. m. saturatus** Stejneger;**云南亚种 P. m. malaccensis** Dubois 等。②功效相似的有**山麻雀 P. rutilans (Temminck)**,分布于华东、中南、西南及河北、山西、陕西、甘肃、青海。

## 369. 雀科 Fringillidae

### 金翅雀属 Carduelis Brisson

**金翅雀** 芦花黄雀(吉林)

**Carduelis sinica** (Linnaeus)

常成群活动于稀疏的针叶林或村寨、路旁的树上。分布于东北、华北、华东、中南及陕西、甘肃、宁夏、青海、四川、贵州、云南。

全体:养心安神。

附 注:①我国有4个亚种,即**东北北部亚种 C. s. chaborovi** (Stegmann);**东北南部亚种 C. s. ussuriensis** (Hartert);**指名亚种 C. s. sinica** (Linnaeus);**台湾亚种 C. s. kawarahiba** (Temminck)。②功效相似的有**黄雀 C. spinus** (Linnaeus),分布于东北、华北、长江中下游及沿海地区。

### 锡嘴雀属 Coccothraustes Brisson

**锡嘴雀** 铁嘴、灰儿雀(吉林)

**Coccothraustes coccothraustes** (Linnaeus)

栖于平原和山地针叶林或针阔混交林中,冬季多在树枝的上部向阳处。分布于东北、华北、西北、华东及河南、湖北、湖南、四川。

全体:解毒,敛疮。

附　注：我国有 2 个亚种，即**指名亚种 C. c. coccothraustes** (Linnaeus)；**日本亚种 C. c. japonicus** Temminck et Schlegel。

## 鹀属　Emberiza Linnaeus

**黄喉鹀**　　黄画眉(湖北)

**Emberiza elegans** Temminck

栖息于林缘、山道旁次生林、沟谷杂木林及农田边的灌丛中或草地上。分布于东北、华北、华东、中南及陕西、甘肃、四川、贵州、云南。

肉：补中益气，祛风湿，壮筋骨。

附　注：我国有 3 个亚种，即**东北亚种 E. e. ticehursti** Sushkin；**西南亚种 E. e. elegantula** Swinhoe；**指名亚种 E. e. elegans** Temminck。

**灰头鹀**　　青头雀、青头鹀(通称)，蒿雀(广西)

**Emberiza spodocephala** Pallas

栖息于山地或平原的灌丛、荆棘间。筑巢多在离地面不高的矮灌木丛的树枝上。除新疆、西藏外，全国均有分布。

肉或全体(蒿雀)：甘，温。滋补，解毒。用于酒中毒，蕈中毒，阳痿。

附　注：①我国有 3 个亚种，即**指名亚种 E. s. spodocephala** Pallas；**西北亚种 E. s. sordida** Blyth；**日本亚种 E. s. personata** Temminck。②功效相似的有**黄胸鹀 E. aureola** Pallas，除青海、西藏外，全国均有分布。

## 蜡嘴雀属　Eophona Gould

**黑头蜡嘴雀**

**Eophona personata** (Temminck et Schlegel)

栖息于山地混交林或平原杂木林中。分布于东北、华东及河北、河南、湖北、湖南、广东、四川、贵州。

肉(桑鸡)：甘，温。用于虚损羸瘦。

附　注：①我国有 2 个亚种，即**指名亚种 E. p. personata** (Temminck et Schlegel)；**东北亚种 E. p. magnirostris** Hartert。②功效相似的有**黑尾蜡嘴雀 E. migratoria** Hartert，分布于东北、华北、华东、中南及陕西、四川、贵州、云南。

# 哺乳纲　Mammalia

## 370. 猬科　Erinaceidae

### 猬属　Erinaceus Linnaeus

**刺猬**　　刺球子、猬鼠、毛刺(通称)，毛猬(河南)，刺鱼(云南)

**Erinaceus europaeus** Linnaeus

广泛栖居于山地、丘陵、平原的田野、灌丛、草丛及瓜地、果园。 分布几遍全国。江苏已开展试养。

皮刺(刺猬皮): 苦,平。降气定痛,凉血止血。用于反胃吐食,腹痛疝气, 肠风痔漏, 遗精。 胆(猬胆): 清热,明目,解毒。 脂肪油(猬脂): 用于皮肤病及维生素缺乏症。脑(猬脑): 用于狼瘘。 心(猬心),肝(猬肝): 用于瘘疮,瘰疬恶疮。 肉(猬肉): 用于胃脘痛,痔瘘。

附 注: 功效相似的有**候氏猬 E. hughi** Thomas, 见于陕西;**大耳猬 Hemiechinus auritus** Gmelin, 分布于内蒙古、陕西、新疆; **达乌尔猬 H. dauricus** Sundevall, 分布于东北及河北、山西、内蒙古。

## 371. 鼹鼠科 Talpidae

### 鼹属 Euroscaptor Milne-Edwards

**长吻鼹** 鼹鼠(通称),地老鼠(安徽),翻手老鼠(广西)

**Euroscaptor longirostris** Milne-Edwards

栖于山间盆地、河谷地、丘陵缓坡的常绿阔叶林、稀树灌丛、农耕地和菜园。分布于安徽、福建、湖北、广西、四川、云南。

肉: 解毒,止血。用于刀伤,溃疡。

附 注: 功效相似的有**白尾鼹 Parascaptor leucura** Blyth, 分布于四川、云南。

### 缺齿鼹属 Mogera Pomel

**缺齿鼹** 鼹鼠、地爬子、田鼠(通称)

**Mogera robusta** Nehring

栖息于森林草原地带的潮湿、多草、土地松软、腐殖质丰富的地方以及草地和耕田附近。分布于东北。

去内脏全体(鼹鼠): 咸,寒,解毒,理气,杀虫。用于痈疽,疔肿,痔疮,喘息, 淋证,蛔虫病,胃癌。

附 注: 功效相似的有**华南缺齿鼹 M. latauchei** Thomas, 分布于江苏、安徽、江西、福建、台湾、海南、广西、贵州; **小缺齿鼹 M. wogura** Temminck, 见于东北及河南; **麝鼹 Scaptochirus moschatus** Milne-Edwards, 分布于华北及陕西、甘肃、宁夏、山东。

## 372. 蝙蝠科 Vespertiliónidae

### 蝙蝠属 Vespertilio Thomas

**东方蝙蝠** 蝙蝠、盐老鼠(通称),夜燕(江西),飞鼠(河南)

**Vespertilio superans** Thomas

栖息于屋檐、房梁、石缝、岩洞或树洞中。分布于除黑龙江、宁夏、新疆、台湾、广西、西藏外的广大地区。

粪便(夜明砂)：辛，寒。清热明目，散血消积。用于青盲雀目，内外障翳，瘰疬，疳积，疟疾。　全体(蝙蝠)：咸，平。用于久咳，疟疾，淋证，惊风，目翳，瘰疬，金疮。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②功效相似的有**长翼蝠 Miniopterus schreibersi** (Kuhl)，分布于河北、浙江、福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、四川、云南；**大管鼻蝠 Murina leucogaster** Milne-Edwards，分布于吉林、陕西、福建、四川；**长耳蝠 Plecotus auritus** Linnaeus，分布于东北及河北、内蒙古、陕西、甘肃、青海、新疆、四川；**北棕蝠 Eptesicus nilssoni** Keyserling et Blasius，分布于东北、西北及内蒙古、山东、广东、四川、云南、西藏；**大棕蝠 E. serotinus** (Schreber)，分布于华北、华东及吉林、辽宁、陕西、甘肃、宁夏、新疆、河南、湖北、云南；**亚洲阔耳蝠 Barbastella darjelingensis** Dobson，分布于甘肃、新疆、四川；**阔耳蝠 B. leucomelas** (Cretzschmar)，分布于甘肃、青海、四川、云南；**南蝠 Ia io** Thomas，分布于江苏、湖北、四川、贵州、云南；**西南鼠耳蝠 Myotis altarium** Thomas，分布于湖北、四川、贵州、云南；**尖耳鼠耳蝠 M. blythi** (Thomas)，分布于内蒙古、陕西、新疆、湖北；**水鼠耳蝠 M. daubentoni** (Kuhl)，分布于东北、西南及江苏、安徽、江西、河南、湖北、湖南；**绯鼠耳蝠 M. formosus** Hodgson，分布于华东、中南及辽宁；**伊氏鼠耳蝠 M. ikonnikovi** Ognev，分布于东北及陕西；**长尾鼠耳蝠 M. langecaudatus** Ognev，见于东北；**大鼠耳蝠 M.myotis**(Borkhausen)，分布于黑龙江、陕西、浙江、福建、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南；**须鼠耳蝠 M. mystacinus** Kuhl，分布于华北、西北及黑龙江、辽宁、江西、福建、台湾、四川、云南；**纹氏鼠耳蝠 M. nathereri** Kuhl，分布于东北；**大足蝠 M. rickettia** Thomas，分布于山东、安徽、福建、湖北；**高颅鼠耳蝠 M. sitigoensis** (Horsfield)，分布于福建、湖北、海南、云南；**山蝠 Nyctalus noctula** (Schreber)，分布于吉林、辽宁、河北、陕西、山东、江苏、浙江、福建、四川、云南；**家蝠 Pipistrellus abramus** (Temminck)，分布几遍全国；**大黄蝠 Scotophilus heathi** (Horsfield)，分布于福建、广东、海南、广西、云南；**普通蝙蝠 Vespetilio murinus** Linnaeus，分布于东北及甘肃、新疆南部；**萨氏蝙蝠 V. savii** Bonaparte，分布于东北及山东；**小夜蝠 V. serotinus** Schreber，分布于东北。

## 373. 狐蝠科　Pteropidae

### 犬蝠属　Cynopterus Cuvier

**犬蝠**　短鼻果蝠(西藏)

**Cynopterus sphinx** (Vahl)

栖息于850米左右气候闷热、潮湿的热带季雨林中。分布于西南及广东、广西、海南。

粪便：用于青盲雀目，翳障，瘰疬，疳积，疟疾。　肉：用于疟疾，惊风，淋证，目翳，瘰疬，金疮。

附　注：功效相似的有**棕果蝠 Rousettus leschenaulti** Desmarest，分布于福建、

广东、海南、广西、贵州、云南；**长舌果蝠 Eonycteris spelaeu** Dobson，见于广西、云南。

## 374. 鞘尾蝠科 Emballonuridae

### 鞘尾蝠属 Taphozous Oken

**黑髯墓蝠**

**Taphozous melanopogon** Temminck

栖于山洞、树洞中。分布于广东、海南、广西、云南。

粪便：用于疟疾，疳积，瘰疬，目翳。

## 375. 菊头蝠科 Rhinolophidae

### 菊头蝠属 Rhinolophus Lacepede

**中菊头蝠** 蝙蝠、盐老鼠(通称)

**Rhinolophus affinis** Horsfield

群栖于洞穴或废旧坑道内。分布于江苏、浙江、福建、湖北、湖南、广西、四川、云南。

粪便：用于疟疾，疳积，瘰疬，目翳，青盲雀目。

附 注：功效相似的有**小菊头蝠 R. cornutus** Temminck，分布于福建、湖北、海南、广西、四川、云南；**马铁菊头蝠 R. ferrumequinum** (Schreber)，分布于吉林、河北、山东、福建、河南、湖北、四川、云南；**短翼菊头蝠 R. lepidus** Blythi，分布于湖北、四川、云南；**皮氏菊头蝠 R. pearsoni** Horsfield，分布于福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、云南；**鲁氏菊头蝠 R. rouxi** Temminck，分布于江苏、安徽、江西、浙江、福建、湖北、广东、四川、云南。

## 376. 蹄蝠科 Hipposideridae

### 蹄蝠属 Hipposideros Gary

**大蹄蝠** 蝙蝠、盐老鼠、大马蹄蝠(通称)

**Hipposideros armiger** (Hodgson)

群栖于洞穴或废旧坑道内。分布于江苏、浙江、福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

粪便：明目退翳，活血消积。用于夜盲，疳积，小儿惊风。

附 注：功效相似的有**双色蹄蝠 H. bicolor** (Temminck)，分布于福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西、云南；**普氏蹄蝠 H. patti** Thomas，分布于江苏、浙江、福建、广西、四川、云南；**三叶蹄蝠 Aselliscus wheeleri** (Osqood)，分布于广西、贵州、云南。

## 377. 懒猴科 Lorisidae

### 蜂猴属 Nycticebus Geoffray

**蜂猴** 懒猴、风猴(通称)

**Nycticebus coucang** Boddaert

栖于热带、亚热带的森林中。营树上生活，很少下地。分布于广西南部、云南西南部及南部。

脑：镇静熄风。用于风疾。 尿：熄风。用于风疾。

附 注：①我国仅1个亚种，即**北部亚种 N. c. benglensis** (Lacepede)。② 国家一级保护野生动物。

## 378. 猴科 Cercopithesidae

### 猕猴属 Macaca Lacepede

**猕猴** 猴子、恒河猴、猢狲(通称)，黄猴(安徽)，马騧(广西)

**Macaca mulatta** Zimmermann

栖息于树林、石山、裸岩等环境中，特别喜欢在河岸岩壁的林中。分布于中南、西南及河北、山西、陕西、甘肃、青海、安徽、浙江、福建。

骨骼(猴骨)：酸，平。祛风湿、通经络、镇惊，截疟。用于风寒湿痹，四肢麻木，惊痫，疟疾。 粪尿复合物(猴结)：用于干血痨、贫血。 肉(猴肉)：酸，平。用于诸风劳，久疟。 胆(猴胆)：清热解毒，明目退翳。 血(猴血)：消疳化积。 脂肪(猴脂)：敷疮。阴茎及睾丸(猴肾)：壮阳。

附 注：① 国家二级保护野生动物。② 功效相似的有**熊猴 M. assamensis** M' Clelland，分布于广西、贵州、云南、西藏，国家一级保护野生动物；**短尾猴 M. thibetana** Milne-Edwards，分布于西南及福建、广东、广西，国家二级保护野生动物。

## 379. 叶猴科 Colobidae

### 叶猴属 Presbytis Eschscholtz

**黑叶猴** 乌猴、乌叶猴

**Presbytis francoisi** Pousargues

栖息于石灰岩山地的密林中。性喜群居，多栖悬崖处的山洞，居住较固定。分布于广西、贵州。

骨、肉浸酒(乌猿酒)：滋补壮阳，祛风健骨，活血。用于体虚，阳痿，风湿痹痛，肾虚，半身不遂。

附　注：①我国有3个亚种，即**白颊亚种 P. f. francoisi** Pousargues；**白臂亚种 P.f. delacour** Osgood；**白头亚种 P. f. leucocephalus** Tan。② 国家一级保护野生动物。

### 仰鼻猴属　Rhinopithecus Milne-Edwards

**金丝猴**　仰鼻猴

**Rhinopithecus roxellanae** (Milne-Edwards)

栖息于较高寒人烟罕到的阔叶林或混交林中。群居，营树栖生活。分布于陕西、甘肃、湖北、四川、贵州、西藏。

脂肪油或血肉(猇)：甘、酸，温。用于五痔。

附　注：国家一级保护野生动物。

## 380. 长臂猿科　Hylobatidae

### 长臂猿属　Hylobates Illiger

**黑长臂猿**　黑冠长臂猿、乌猿、猿、猨(通称)

**Hylodates concolor** (Harlen)

栖息于热带或热带性地区的原始森林中。完全营树栖生活，家族性群居。分布于海南、云南。

骨骼：祛风壮骨，活血。用于风湿痹痛，半身不遂。

附　注：①我国有2个亚种，即**指名亚种 H. c. concolor** (Harlan)；**云南亚种 H. c. leucogenys** Ogilby。② 国家一级保护野生动物。

## 381. 穿山甲科　Manidae

### 穿山甲属　Manis Linnaeus

**穿山甲**　鲮鲤(通称)，龙鲤、钱鳞甲(广西)

**Manis pentadactyla** Linnaeus

栖息于丘陵山地的树林灌木、草莽中。分布于中南及江苏、安徽、江西、浙江、福建、台湾、四川、贵州、云南。

体表鳞片(穿山甲)：咸，凉。消肿溃痈，搜风活络，通经下乳。用于疮疡疮肿，风寒湿痹，月经停闭，乳汁不通。外用于出血。　肉(鳞鲤)：杀虫，行血，攻坚散瘀。

附　注：①我国有3个亚种，即**指名亚种 M. p. pentadactyla** Linnaeus；**海南亚种 M. p. pusilla** Allen；**华南亚种 M. p. aurita** Hodgson。②国家二级保护野生动物及国家二级保护野生药材物种。③《中华人民共和国药典》1990年版收载。

## 382. 鼠兔科 Ochotonidae

### 鼠兔属 Ochotona Link

**东北鼠兔** 石兔、啼兔、北啼兔、北极鼠兔(通称)

**Ochotona hyperborea** Pallas

栖息于山地碎石坡的林中或林缘的天然石堆及岩隙中。营群居生活，多筑巢于乱石间，以天然石隙为洞口，有时亦建巢于大石块下或树洞中。分布于东北及内蒙古。

全体：益精，补血，止血，明目。

**藏鼠兔** 啼兔、兔鼠子、西藏啼兔(通称)

**Ochotona thibetana** Milne-Edwards

栖于较高山地的山坡灌丛、草丛中或草甸草原上。营穴居生活，一般在草根下方筑洞。分布于山西、陕西、甘肃、青海、湖北、四川、云南、西藏。

粪便(草灵脂)：苦、咸，温。通经，祛瘀。用于月经失调，产后腹痛，跌打损伤及瘀血积滞。

附 注：①我国有4个亚种，即**指名亚种 O. t. thibetana** Milne-Edwards；**峨眉亚种 O. t. sacraria** Thomas；**拉萨亚种 O. t. lhasaensis** Fang et Kao；**太白亚种 O. t. huangensis** (Matschie)。② 功效相似的有**高山鼠兔 O. alpina** Pallas，分布于东北及甘肃、宁夏、新疆；**间颅鼠兔 O. cansus** (Lyon)，分布于山西、陕西、甘肃、青海、四川、西藏；**黑唇鼠兔 O. curzoniae** (Hodgson)，分布于甘肃、青海、四川西北部、西藏；**达呼尔鼠兔 O. daurica** Pallas，分布于华北及黑龙江、辽宁、陕西、甘肃、青海、西藏；**红耳鼠兔 O. erythrotis** Buchner，分布于甘肃、青海、四川、西藏；**灰颈鼠兔 O. forresti** (Thomas)，分布于云南西北部、西藏东南部；**川西鼠兔 O. gloveri** Thomas，分布于青海、四川、云南、西藏；**灰鼠兔 O. roylei** (Ogilby)，分布于四川西南部、云南西北部、西藏。

## 383. 兔科 Leporidae

### 兔属 Lepus Lirmaeus

**草兔** 野兔、沙兔、草原兔、跳猫(通称)

**Lepus capensis** Linnaeus

栖息于草原、半荒漠或荒漠地区，也常见于盆地的盐渍荒漠、沼泽草甸及芦苇地、沙丘、农田。分布于东北、华北、西北及山东、安徽、江西、福建、河南、湖北、四川、贵州、云南。

粪便(望月砂)：辛，寒。明目，杀虫。用于目暗生翳，疳积，痔瘘。 肉(兔肉)：甘，凉。养阴补虚，凉血解毒。用于消渴羸瘦，胃热呕吐，便血。 肝(兔肝)：补肝，明目。用于肝虚眩晕，目暗昏花，目翳，目痛。 骨(兔骨)：用于消渴，头昏眩晕，疥疮。 脑(兔

咸)：用于胎产不利，疟疮，火伤，皮肤皲裂。　血(兔血)：咸，寒。凉血，活血，解胎中热毒，催生易产。　皮毛(兔皮毛)：用于灸疮久不敛，烫伤。　头骨(兔头骨)：甘、酸，平。用于头痛眩晕，消渴，难产，恶露不下，小儿疳疾，痈疽疮毒。

附　注：①我国有8个亚种，主要为**帕米尔亚种 L. c. pamirensis** Güntheer；**长江流域亚种 L. c. aurigineus** Hollister；**内蒙古亚种 L. c. tolia Pallas**；**青海亚种 L. c. huangshuiensis** Luo 等。②功效相似的有**东北兔 L. mandschuricus** Radde，分布于东北及河北、内蒙古；**华南兔 L. sinensis** Gray，分布于江苏、安徽、浙江、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西；**雪兔 L. timidus** Linnaeus，分布于黑龙江、内蒙古、新疆，国家二级保护野生动物。

**灰尾兔**　野兔、长毛兔(通称)，高原兔(青海、云南)

**Lepus oiostolus** Hodgson

栖息于海拔较高的高山草甸及草原地区。分布于西南及甘肃、青海、新疆。

脑：用于痢疾，肠痈，乳汁不足，眼疾。

附　注：我国有4个亚种，即**指名亚种 L. o. oiostolus** Hodgson；**四川亚种 L. o. sechuensis** De Winton et Styan；**柴达木亚种 L. o. przewalskii** Satunin；**康定亚种 L. o. grahami** Howell。

### 穴兔属　Oryctolagus Lilljeborg

**家兔**　兔、兔子(通称)

**Oryctolagus cuniculus domesticus** (Gmelin)

全国各地均有人工饲养。

除粪便不做药用外，其他部位功效均同草兔。

## 384. 松鼠科　Sciuridae

### 赤腹松鼠属　Callosciurus Gray

**赤腹松鼠**　松鼠、松狗(通称)，刁老鼠(安徽)，红腹松鼠(云南)

**Callosciurus erythraeus** (Pallas)

栖于山区常绿阔叶林、次生稀树灌丛、矮灌丛上。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、云南。

骨：活血祛瘀。用于跌打损伤。

附　注：功效相似的有**珀氏长吻松鼠 Dremomys pernyi** (Milne-Edwards)，分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川；**红颊长吻松鼠 D. rufigenis** (Blanford)，分布于福建、湖北、海南、广西、四川、贵州、云南；**岩松鼠 Sciurotamias davidianus** (Milne-Edwards)，分布于河北、山西、陕西、甘肃、宁夏、山东、安徽、河南、湖北、四川、贵州；**侧纹岩松鼠 S. forresti** (Thomas)，分布于广西西南部、贵州西南部、云南；**隐纹花松鼠 Tamiops swinhoei** (Milne-Edwards)，分布于北京、

陕西、甘肃、浙江、福建、台湾、湖北、广东、海南、广西、四川、云南。

## 黄鼠属　Citellus Oken

**草原黄鼠**　　黄鼠、地松鼠、大眼贼(通称)

**Citellus dauricus** Brandt

栖居于草原和沙土地带。常见于农田附近的草地、墓地及丘陵地带、半沙坨地、土丘田埂及小渠堤旁。筑洞独居。分布于东北、华北。

脂肪：润肺生津，解毒止痛。外敷疮肿。　肉(黄鼠肉)：甘，平。润肺生津，解毒止痛。煎膏贴疮肿。

## 旱獭属　Marmota Blumenbach

**喜马拉雅旱獭**　　旱獭、高原旱獭、藏旱獭(通称)，雪猪(云南)，哈拉(藏语)

**Marmota himalayana** (Hodgson)

栖于海拔 2 800—3 600 米的高山草甸草原带。多在阳坡的山坳、斜坡、谷地附近筑穴。分布于甘肃、青海、新疆、四川、云南、西藏。

肉(雪猪肉)：辛、咸，平。用于风湿痹痛，脚膝肿痛，痔瘘。　油(雪猪油)：辛，温。祛风除湿，解毒。用于风湿肿痛，痒疹疮毒，臁疮久烂。　骨(雪猪骨)：咸、辛，温。除风湿。用于筋骨疼痛及四肢麻木。

附　注：功效相似的有**灰旱獭 M. baibacina** Brandt，见于新疆；**草原旱獭 M. bobak** (Müller)，分布于黑龙江、内蒙古、青海、四川、云南、西藏；**长尾旱獭 M. caudata** (Jacquemont)，分布于新疆西部。

## 松鼠属　Sciurus Linnaeus

**松鼠**　　灰鼠、松狗(通称)

**Sciurus vulgaris** Linnaeus

栖息在亚寒带针叶林或针阔混交林中，栖居于树洞中或在树上筑巢。分布于东北及河北、内蒙古、新疆、河南。

全体(松鼠)：甘、咸，平。调经理气，消积。用于月经不调，痔瘘，肺痨，瓜果食积。

附　注：我国有 4 个亚种，即**东北亚种 S. v. mantchuricus** Thomas；**河北亚种 S. v. chiliensis** Sowerby；**阿尔泰亚种 S. v. altaicus** Serbrennikov；**鄂毕亚种 S. v. exalbidus** Pallas。

## 花鼠属　Tamias Trouessart

**花鼠**　　串树林(通称)，五道眉(吉林)，花丽棒(宁夏)

**Tamias sibiricus** Laxmann

栖息于山区的针叶林、针阔混交林、落叶阔林和稀树灌丛林中，多以树洞、石洞、土穴、石缝为栖息场所。分布于东北、华北、西北及河南、四川北部。

全体：理气，调经。用于肺痨，肋膜炎，月经不调，痔疮。　脑：降压。用于高血压症。

附　注：我国有6个亚种，主要为**指名亚种 T. s. sibiricus** (Laxmann)；**黑龙江亚种 T. s. lineatus** (Siebold)；**河北亚种 T. s. sensecens** Miller；**乌苏里亚种 T. s. orientalis** (Bonhote) 等。

## 385. 鼯鼠科　Petauristidae

### 鼯鼠属　Petaurista Link

**棕鼯鼠**　大鼯鼠、飞虎(通称)，飞鼠、耳鼠(云南)

**Petaurista petaurista** (Pallas)

栖息于南亚热带常绿阔叶林和热带雨林、季雨林中。以岩洞、石缝、树洞或树叉上大型鸟类的弃巢为穴。夜间活动。分布于福建、台湾、广东、广西、四川、云南。

全体：微温。用于坠胎。

附　注：我国有3个亚种，即**台湾亚种 P. p. grandis** Swinhoe；**四川亚种 P. p. rubicundus** Howell；**福建亚种 P. p. rufipes** Allen。

### 复齿鼯鼠属　Trogopterus Heude

**复齿鼯鼠**　橙足鼯鼠、飞虎(通称)，寒号鸟(广西)，曷蛋(云南)，夏马息吾(藏语)

**Trogopterus xanthipes** Milne-Edwards

栖于长有松柏树的高山岩石陡壁的石洞或石缝中。分布于河北、陕西、湖北、四川、云南、西藏。

粪便(五灵脂)：苦、甘，温。行血止痛。用于心腹血气诸痛，妇女闭经，产后瘀血作痛；外用蛇、蝎、蜈蚣咬伤。　炒用：止血。用于血崩，带下病。

附　注：①我国有4个亚种，即**指名亚种 T. x. xanthipes** Milne-Edwards；**湖北亚种 T. x. mordix** Thomas；**西藏亚种 T. x. humalaieus** Thomas；**滇西亚种 T. x. edithae** Thomas，《中华人民共和国药典》1990年版收载。②功效相似的有**毛耳飞鼠 Belomys pearsoni** (Gray)，分布于台湾、广东、海南、广西、四川、贵州、云南；**黑白鼯鼠 Hylopetes alboniger** Hodgson，分布于海南、广西、四川、贵州、云南；**红白鼯鼠 Petaurista alborufus** Milne-Edwards，分布于台湾、湖北、广西、四川、贵州、云南；**灰头小鼯鼠 P. eleganus** Muller，分布于西南及陕西、湖北、湖南、广西；**高地鼯鼠 P. xanthotis** (Milne-Edwards)，分布于河北、甘肃、青海、云南、西藏；**云南鼯鼠 P. yunanensis** Anderson，分布于广西、云南、西藏；**沟牙鼯鼠 Aeretes melanopterus** Milne-Edwards，见于河北；**飞鼠 Pteromys volans** Linnaeus，分布于东北、华北及甘肃、新疆、河南。

## 386. 河狸科 Castoridae

### 河狸属 Castor Linnaeus

**河狸** 海狸(新疆)

**Castor fiber** Linnaeus

半水栖大型啮齿动物,主要栖息在林区的河边,穴居于堤岸上。夜行性,好群居。分布于新疆北部。

香囊分泌物(海狸香): 用于瘫痪,四肢麻木,痉挛,失眠。

附 注: 我国仅1个亚种,即**亚洲亚种 C. f. pohlei** Serebrennikov。

## 387. 豪猪科 Hystricidae

### 豪猪属 Hystrix Linnaeus

**豪猪** 刺猪、箭猪、豺猪(通称)

**Hystrix hodgsoni** (Gray)

栖息于山坡、丘陵山坡地、草丛、稀树灌丛林或原始阔叶林中。分布于陕西、江苏、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

肉(豪猪肉): 甘,大寒。有毒。利大肠。 肚(豪猪肚): 寒。清热利湿。用于黄疸,水肿,脚气。 毛刺(豪猪毛刺): 行气,止痛;外用拔竹签刺和枪弹片。

附 注: ①我国有2个亚种,即**海南亚种 H. h. papne** (Allen); **华南亚种 P. p. subcristata** Swinhoe。② 功效相似的有**云南豪猪 H. yunnanensis** Anderson, 见于云南西部;**扫尾豪猪 Atherurus macrourus** (Linnaeus),见于广西。

## 388. 竹鼠科 Rhizomyidae

### 竹鼠属 Rhizomys Gray

**中华竹鼠** 竹鼠、竹鼬、灰竹鼠(通称),竹狗(广西)

**Rhizomys sinensis** Gray

栖息于竹林密集的山坡。筑洞穴居,夜晚活动。分布于华东、中南、西南及陕西、甘肃。

肉(竹鼬肉): 甘,平。益气养阴,解毒。用于痨瘵,消渴。 子牙(竹鼬子牙): 用于小儿破伤风。 脂肪油(竹鼬子油): 淡、甘,平。解毒排脓,生肌止痛。用于烫伤,无名肿毒,拔取异物。

附 注: ① 我国有4个亚种,即**指名亚种 R. s. sinensis** Gray; **福建亚种 R. s. davidi** Thomas; **云南亚种 R. s. wardi** Thomas; **四川亚种 R. s. vestitus** Milne-

Edwards。② 功效相似的有**花白竹鼠 R. pruinosus** Blyth，分布于浙江、江西、福建、湖南、广东、广西、贵州、云南；**大竹鼠 R. sumatrensis** (Rattles)，分布于云南南部和西南部。

## 389. 仓鼠科 Cricetidae

### 鼢鼠属 Myospalax Laxmann

**中华鼢鼠** 原鼢鼠、瞎老鼠、鼢鼠(通称)

**Myospalax fontanieri** Milne-Edwards

栖于农田、草原、丘陵台地、河谷及草甸中。穴居。分布于河北、山西、陕西、甘肃、宁夏、青海、山东、安徽、河南、湖北、四川。

干燥全体：清热解毒，活血祛瘀。用于红斑狼疮，慢性肝炎，胃溃疡。

附 注：功效相似的有**草原鼢鼠 M. aspalax** (Pallas)，分布于东北、华北；**东北鼢鼠 M. psilurus** (Milne-Edwards)，分布于东北及河北、内蒙古、陕西、甘肃、山东、河南；**洛氏鼢鼠 M. rothschildt** Thomas，见于湖北；**甘肃鼢鼠 M. smithi** Thomas，见于甘肃。

### 麝鼠属 Ondatra Link

**麝鼠** 水耗子(通称)

**Ondatra zibethica** Linnaeus

栖息于有挺水植物生长较茂密的场地。原产于北美洲，1927 年苏联开始引入，1953 年新疆北部发现由苏联境内迁入，1958 年我国开始人工放养及饲养。现东北较多，华北及贵州也有饲养。

香腺分泌物：开窍，通经，消肿，止痛。研制代麝香药用。

## 390. 鼠科 Muridae

### 鼠属 Rattus Fischer von waldheim

**黄胸鼠** 老鼠(通称)，房顶鼠(安徽)，长尾吊(湖南、广西)

**Rattus flavipectus** (Milne-Edwards)

栖息于住家及其附近的农耕地、灌草丛中。分布于长江流域及以南各地。

肉(鼠肉)：甘，平。用于虚劳羸瘦，臌胀，小儿疳积，烫伤，折伤，冻疮，疮肿。皮(鼠皮)：用于痈疽，骨疽疮。 肝(鼠肝)：用于难产。 肾(鼠肾)：用于小儿惊风，疝气。胆(鼠胆)：苦，寒。用于青盲，雀目，聍耳。 脂肪油(鼠脂)：用于烫、烧伤。 雄鼠粪(牡鼠粪)：苦、咸，寒。导浊行滞，清热通瘀。用于伤寒劳复发热，疝瘕，腹痛，淋浊，闭经，痞积，乳痈，瘘疮，疔肿。

附　注：功效相似的有**褐家鼠 R. norvegicus** Barkenhout，分布几遍全国；**小家鼠 Mus musculus** Linnaeus，分布几遍全国。

**黑家鼠**　　家鼠、黑鼠(通称)，屋顶鼠(福建)

**Rattus rattus** Linnaeus

栖息于人房、畜舍及野外近水源处。分布于辽宁、江苏、浙江、江西、福建、台湾、广东、海南、广西、贵州、云南、西藏。

幼鼠：解毒，止血。用于烫伤，外伤出血。其他药用部位功效同黄胸鼠。

## 391. 露脊鲸科　Balaenidae

### 黑露脊鲸属　Eubalaena Gray

**黑露脊鲸**　　鲸鱼、黑真鲸、直背鲸、瘤头鲸(通称)

**Eubalaena glacialis** (Borowski)

生活在海洋中。在南半球，分布于南纬 20 度以南和 50 度以北；在北半球，分布于北纬 20 度以北和 70 度以南的太平洋和大西洋。在北半球，每年冬季南下生殖进入黄海、东海和南部东部海域；夏季北上索饵。

肝：制取鱼肝油。　胰：制取胰岛素。

附　注：国家二级保护野生动物。

## 392. 灰鲸科　Eschrichtiidae

### 灰鲸属　Eschrichtius Gray

**灰鲸**　　鲸鱼、克鲸、腹沟鲸(通称)

**Eschrichtius gibbosus** (Erxleben)

生活在海洋中。春季洄游中经过渤海、黄海海域。

肝：制取鱼肝油。　胰：制取胰岛素。

附　注：国家二级保护野生动物。

## 393. 须鲸科　Balaenopteridae

### 须鲸属　Balaenoptera Lacepede

**小须鲸**　　鲸鱼、小缉鲸、尖头鲸(通称)

**Balaenoptera acutorostata** Lacepede

生活在海洋近岸和内海海域。每年 12 月至翌年 7 月在渤海、黄海海域，7 月前后离开。

骨骼：制取鲸骨注射液，用于抗风湿及增强免疫力。　肝：制取鱼肝油。　胰：制

取胰岛素。

附　注：功效相似，与本种同为国家二级保护野生动物有**大须鲸 B. borealis** Lesson，洄游经渤海、黄海海域；**蓝鲸 B. musculus**(Linnaeus)，洄游经渤海、黄海海域；**长须鲸 B. physalus** (Linnaeus)；洄游经黄海、东海、南海海域；**座头鲸 Megaptera novaeangliae** (Borowski)；洄游经黄海、东海、南海海域。

## 394. 抹香鲸科　Physeteridae

### 抹香鲸属　Physeter Linnaeus

**抹香鲸**　　鲸鱼(通称)

**Physeter catodon** Linnaeus

生活在热带、亚热带的温暖海域。洄游经黄海、东海、南海海域，尤以台湾以南为多。

肠内分泌物(抹香鲸)：甘，酸。行气活血，散结止痛，利水通淋。用于气结症积，心腹疼痛，淋证。

附　注：国家二级保护野生动物。

## 395. 淡水豚科　Platanistidae

### 白鳖豚属　Lipotes Miller

**白鳖豚**　　白鳍豚、白旗、白江猪(通称)

**Lipotes vexillifer** Miller

栖息于长江中下游及洞庭、鄱阳湖中。

脂肪：清热解毒。用于咳嗽，烧、烫伤。

附　注：国家一级保护野生动物。

## 396. 海豚科　Delphinidae

### 真海豚属　Delphinus Linnaeus

**真海豚**　　普通海豚(通称)

**Delphinus delphis** Linnaeus

生活在温带及热带海洋中。分布几遍全国沿海。

肝：制鱼肝油。　肉：用于瘴疟。　皮下脂肪：用于恶疮，疥癣，痔瘘。

附　注：功效相似的有**宽吻海豚 Tursiops truncatus** (Montagu)，分布几遍我国各海域。

## 397. 鼠海豚科 Phocoenidae

### 江豚属 Neophocaena Palmer

**江豚** 江猪、海豚、海和尚(通称)

**Neophocaena phocaenoides** (G. Cuvier)

生活在咸、淡水交界处或潮流冲击的地方。分布几遍全国沿海及长江、湘江、洞庭湖。

脂肪：用于烧、烫伤。

### 鼠海豚属 Phocoena G. Cuvier

**鼠海豚** 无喙豚、大西洋鼠海豚(通称)

**Phocoena phocoena** (Linnaeus)

生活在温带海域。分布于渤海、黄海。

肉：用于瘴疟。 脂肪：用于恶疮，疥癣，痔瘘。 肝：制取鱼肝油。

## 398. 领航鲸科 Globicephalidae

### 虎鲸属 Orcinus Fitzinder

**虎鲸** 逆戟鲸、恶鲸(通称)

**Orcinus orca** (Linnaeus)

生活在各大海洋中。5月后洄游进入渤海、黄海，冬季南下。渔场主要有黄海北部海洋岛附近，渤海小龙山附近。

肝：制取鱼肝油。 胰：制取胰岛素。

附 注：功效相似，与本种同为国家二级保护野生动物的有**北太领航鲸 Globicephala macrorhyncha** Gray，分布于渤海、黄海海域。

## 399. 犬科 Canidae

### 犬属 Canis Linnaeus

**家犬** 狗、犬(通称)，地羊(广西)，白龙(湖南)

**Canis familiaris** Linnaeus

全国各地均有饲养。

胃结石(狗宝)：甘、咸，平。降逆气，开郁结，解毒。用于噎膈反胃，痈疽，疔疮。 肾(狗肾)：平，微毒。用于妇女产后肾劳。 阴茎和睾丸(狗鞭)：咸，温。补命门，暖冲任。

用于阳痿，带下病。　骨骼(狗骨)：甘，温。健脾和络，活血生肌。用于风湿痛，腰腿无力，四肢麻木，久痢，疮瘘，冻疮。　肉(狗肉)：咸，温。补中益气，温肾助阳。用于脾肾气虚，胸腹胀满，膨胀，浮肿，腰膝软弱，寒疝，败疮久不收敛。　心(狗心)：甘、酸、咸，温。用于狂犬咬，除邪气，风痹，鼻衄及下部疮。　肝(狗肝)：甘、苦、咸，温。用于脚气，下痢腹痛。　胆(狗胆)：苦，寒。清肝明目，止血消肿。用于风热眼痛，目赤涩痒；吐血，鼻衄；聤耳，疮疡。　脑(狗脑)：用于头风痹痛，下部蠹疮，鼻中息肉。　血(狗血)：咸，温。用于虚劳吐血，疔疮恶肿。　四足(狗蹄)：酸，平。用于癫狂病，下乳汁。　齿(狗齿)：平，微毒。用于癫痫，痘疹，发背。　毛(狗毛)：用于难产，热油汤火烧疮。　头骨(狗头骨)：甘、酸，平。用于久痢，崩中带下，头风目眩，创伤出血，瘘疮。　乳汁(狗乳汁)：用于青盲。

**狼**　灰狼(通称)，毛狗(江西、湖北、湖南、广西)，江克(藏语)

**Canis lupus** Linnaeus

栖息于山地、丘陵、平原、森林地带、草原、荒漠及冻原等多种环境。除台湾、广东、云南的极南缘外，分布几遍全国。

脂肪(狼膏)：祛风补虚，润肤。用于风痹，肺痨，年迈咳嗽，皮肤皲裂，秃疮。　甲状腺体(狼喉靥)：用于噎病。　肉(狼肉)：咸，温。补五脏，厚肠胃。用于虚劳，冷积。骨：用于眩晕，神经痛。　粪便：用于瘰疬。

附　注：我国仅1个亚种，即**北部亚种 C.l. chanco** Gray。

## 豹属　Cuon Hodgson

**豺**　豺狗、红狼(通称)，班狗(安徽)

**Cuon alpinus** Pallas

生活环境多样，主要栖息在有森林覆盖的山地、丘陵。除台湾、海南及南海诸岛外，分布几遍全国。

肉(豺肉)：甘、酸，温。滋补行气。　皮(豺皮)：用于冷痹脚气，疳痢。　胃：消食化积。

附　注：①我国有3个亚种，即**江西亚种 C. a. lepturus** Heude；**川西亚种 C. a. fumosus** Pocock；**克什米尔亚种 C.a. laniger** Pocock。②国家二级保护野生动物。

## 貉属　Nyctereutes Temminck

**貉**　狸(通称)，貉子(安徽)，金毛獾(广西)

**Nyctereutes procyonoides** Gray

生活在平原、丘陵及部分山地的河谷、草原和溪流、河川、湖沼附近的丛林中。分布几遍全国。

肉(貉肉)：甘，温。滋补强壮。用于虚劳。

附　注：我国有3个亚种，即**指名亚种，N.p. procyonoides** Gray；**东北亚种 N. p. ussuriensis** Matschie；**西南亚种 N. p. orestes** Thomas。

## 狐属 Vulpes Oken

**赤狐** 狐狸(通称),草狐(吉林、青海),红狐(河北、河南),哇(藏语)

**Vulpes vulpes** Linnaeus

栖息于森林、草原、荒漠、高山、丘陵、平原等多种环境。分布几遍全国。

肉(狐肉): 甘,温。补虚暖中,解疮毒。用于虚劳,健忘,惊痫,水积黄肿,疥疮。 心(狐心): 补益,镇痉。用于癫狂。 肝(狐肝): 用于破伤风,中风瘫痪,癫痫,心气痛。 肺(狐肺): 补肺,化痰,定喘。 胆(狐胆): 甘、苦,寒。用于癫痫,心气痛,疟疾。 肠(狐肠): 止痛,用于心胃气痛。 头(狐头): 用于瘰疬,头晕。 四足(狐四足): 用于痔漏下血。

附 注: ① 我国有5个亚种,即**蒙新亚种 V. v. karagan** Erxleben; **西藏亚种 V. v. montana** Pearson; **华南亚种 V. v. hoole** Swinhoe; **东北亚种 V. v. dauri-ca** Ognev; **华北亚种 V. v. tschiliensis** Matschie。②功效相似的有**藏狐 V. ferrilata** Hodgson, 分布于青海、四川、云南、西藏。

# 400. 熊科 Ursidae

## 黑熊属 Selenarctos Heude

**黑熊** 狗熊、黑瞎子(通称),熊瞎子(湖南、广西)

**Selenarctos thibetanus** G. Cuvier

林栖动物,主要生活在阔叶林和针阔混交林中,东北的柞树林和南方的热带雨林均为其栖息地。分布于东北、西南及河北、内蒙古、陕西、甘肃、青海、山东、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西。

胆囊及胆汁(熊胆): 苦,寒。清热,镇痉,明目,杀虫。用于暑泻,小儿惊痫,疳疾,蛔虫痛,目翳,喉痹,鼻蚀,疔痔恶疮。 骨骼(熊骨): 咸、微辛,温。祛风除湿。用于风湿骨节痛。 肉(熊肉): 甘,温。补虚损,强筋骨。用于脚气,风痹,手足不遂,筋脉挛急。 脂肪油(熊脂): 甘,温。补虚损,强筋骨,润肌肤。用于风痹不仁,筋脉挛急,虚损羸瘦,头癣,白秃,臁疮。 脑髓(熊脑): 用于白秃风屑,耳鸣耳聋。 足掌(熊掌): 甘、咸,温。除风湿,健脾胃。用于脾胃虚弱,风寒湿痹及诸虚损症。 肌腱(熊筋): 壮筋强力,搜风壮骨。

附 注: ①我国有5个亚种,即**指名亚种 S. t. thibetanus** G. Cuvier; **喜马拉雅亚种 S. t. laniger** Pocock; **四川亚种 S. t. mupinensis** Heude; **台湾亚种 S. t. formosanus** Swinhoe; **东北亚种 S. t. ussuricus** Hedde。②功效相同,同载《中华人民共和国药典》1990年版,同为国家二级保护野生动物及国家二级保护野生药材物种的尚有**棕熊 Ursus arctos** Linnaeus, 分布于黑龙江、吉林、甘肃、青海、新疆、四川、贵州。③功效相似的有**马来亚熊 Helarctos malayanus** Raffles, 见于云南南部,国家一级保护野生动物。

# 401. 鼬科 Mustelidae

## 猪獾属 Arctonyx F. Cuvier

**猪獾** 獾子、沙獾(通称),狗(陕西),串猪(甘肃),猪鼻獾(江苏)

**Arctonyx collaris** F. Cuvier

挖洞穴居于荒丘或栖居于岩石裂缝和树洞之中。分布几遍全国,多见于南方。

肉(貒肉): 补脾胃,利水道,止痛。用于高血压病,头痛,疝气,腹痛,风湿腿痛。 脂肪油(貒膏): 甘,平。降气,消肿解毒,润燥。用于咳逆上气,秃疮,顽癣,痔疮,臁疮;外用于烧、烫伤。 四肢骨(貒骨): 辛、酸,温。祛风,镇痛,止咳。用于咳嗽, 风湿筋骨疼痛,皮肤湿热发痒。

附 注: 我国有 2 个亚种,即**南方亚种 A. c. albogularis** Blyth; **北方亚种 A. c. leucolaemus** Milne-Edwards。

## 水獭属 Lutra Brisson

**水獭** 獭猫、獭(通称),海洛(蒙语),纠困(鄂温克语),几勒布格(达斡尔语)

**Lutra lutra** Linnaeus

营半水栖生活,主要栖居于河流、湖泊、两岸林木繁茂的溪河地带。大面积的沼泽地、低洼水地、池塘、养鱼较多的山区及沿海咸、淡水交界地区,也常有水獭活动。分布几遍全国。

肝脏(水獭肝): 甘、咸,平。养阴,除热,宁嗽,止血。用于虚劳,骨蒸潮热, 盗汗, 咳嗽,气咳,咯血,夜盲,痔疮下血。 骨髓(獭骨): 用于水积黄肿,无名恶疮、鱼鲠。 胆囊(獭胆): 苦,寒。用于眼翳黑花,结核瘰疬。 四肢(獭四足): 用于手足皮皲裂, 痨瘵虫积。 皮毛(獭皮毛): 用于痢黄。 肉(獭肉): 甘、咸,寒。用于虚劳骨蒸,水肿胀满,二便秘涩,经闭。

附 注: ① 我国有 4 个亚种, 即**指名亚种 L. l. lutra** Linnaeus; **中华亚种 L. l. chinensis** Gray; **西藏亚种 L. l. kutab** Schinz; **海南亚种 L. l. hainana** Xu et Liu。②功效相似, 同为国家二级保护野生动物的有**江獭 L. perspicillata** Geoffroy, 分布于广东及云南;**小爪水獭 Aonyx cinerea** Illiger, 分布于福建、台湾、广东、海南、广西、云南。

## 鼬属 Martela Pinel

**艾鼬** 艾虎、黑脚鼬(通称),臭狗子(宁夏、青海),代络(藏语)

**Martela eversmanni** Lesson

栖息在海拔 3 200 米以下的开阔山地、草原、森林草原、灌丛及村庄附近。分布于华北、西北及吉林、辽宁、江苏北部及四川、西藏。

肉：用于癫痫。

附　注：我国有3个亚种，即**西藏亚种 M. e. larvatus** Hodgson；**北疆亚种 M. e. michnoi** Kastschenko；**静宁亚种 M. e. tiarata** Hollister。

## 貂属　Martes Pinel

**紫貂**　水貂(通称)，巴勒格(鄂伦春、达斡尔语)，顿·扎塞顿(朝鲜语)，布鲁贡(维吾尔语)，安德列卡克(鄂温克语)

**Martes zibellina** Linnaeus

栖息于亚寒带针叶林及针阔叶混交林中。分布于东北及新疆。现已有不少省、市进行引种饲养。

尾和皮毛(貂尾)：用于冻疮。

附　注：①我国有3个亚种，即**阿尔泰亚种 M. z. altaica** Kyznetzov；**大兴安岭亚种 M. z. princeps** Birula；**长白山亚种 M. z. hamgyenensis** Kishida。②国家一级保护野生动物。

## 狗獾属　Meles Brisson

**狗獾**　獾子、芝麻狗(通称)，精巴(藏语)，咪格什(蒙语)，命马(傣语)

**Meles meles** Linnaeus

栖息于森林、山坡灌丛、荒野、沙丘草丛及湖泊堤岸。除海南及台湾外，全国各地均有分布。

肉(獾肉)：甘、酸，平。补中益气，杀蛔虫。用于小儿疳瘦。　脂肪油(獾油)：用于中气不足，阴挺，咳血，痔疮，疳疮，疥癣，白秃，烫伤，冻疮。

附　注：①我国有6个亚种，主要为**西藏亚种 M. m. leucurus** Hodgson；**东北亚种 M. m. amurensis** Schrenck；**北方亚种 M. m. leptorhynchus** Milne-Edwards；**华南亚种 M. m. chinensis** Gray 等。②功效相似的有**鼬獾 Melogale moschata** Gray，分布于陕西南部及长江流域以南各地。

## 鼬属　Mustela Linnaeus

**香鼬**　香鼠、香鼬子(通称)，社蒙(藏语)

**Mustela altaica** Pallas

通常栖息在森林、森林草原、高山灌丛及草甸，亦见于海拔3 000米的高山荒漠地带及河谷地区。分布于黑龙江、吉林、内蒙古、甘肃、青海、四川、西藏。

肉：用于肉食中毒，药物中毒。

附　注：本种我国有4个亚种，即**指名亚种 M. a. altaica** Pallas；**锡金亚种 M. a. temon** Hodgson；**柴达木亚种 M. a. tsaidamensis** Hilzheimer；**东北亚种 M. a. raddei** Ognev。

**黄鼬**　黄鼠狼(通称),黄皮子(河南),鼬鼠(湖北),黄狼(广西)

**Mustela sibirica** Pallas

能在极为多样的环境条件中生活,主要栖息于平原、沼泽、丘陵、山区、高原的河谷、沟沿、土坡、草丘及灌丛中,村落仓库、厩舍及土洞、柴堆、倒木下也常见。分布几遍全国。

肉(鼬鼠肉): 甘,温,有小毒。解毒,杀虫,涩尿。

附　注: ①我国有7个亚种,主要为**东北亚种 M. s. manchurica** Brass; **华北亚种 M. s. fontanieri** Milne-Edwards; **东南亚种 M. s. davidiana** Milne-Edwards; **西南亚种 M. s. moupinesis** Milne-Edwards 等。② 功效相似的有**黄腹鼬 Mustela kathiah** Hodgson, 分布于安徽、浙江、福建、台湾、湖北、广东、海南、广西、四川、云南; **青鼬 Martes flavigula** Boddaert, 分布于东北、中南、西南及山西、陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾。国家二级保护野生动物。

## 402. 灵猫科　Viverridae

### 花面狸属　Paguma Gray

**花面狸**　果子狸、青猸(通称),破脸狗(云南),哼纳波(傣语),巴邑(傈僳语)

**Paguma larvata** Hamilton-Smith

花面狸为常见的林缘兽类。主要栖居于季雨林、常绿或落叶阔叶林、稀树灌丛或间杂石山的稀树裸岩地。多利用山岗的岩洞、土穴、树洞或浓密灌丛作隐居场所。分布于中南(除河南)、西南及北京、山西、陕西、上海、安徽、浙江、江西、福建、台湾。

骨: 祛风除湿,舒筋,活络。用于风湿关节痛。　脂肪油: 润肤。　肉: 滋补。

附　注: 我国有9个亚种,主要为**指名亚种 P. l. larvata** Hamilton-Smith; **秦巴亚种 P. l. reevesi** Matschie; **西南亚种 P. l. intrudens** Wroughton; **台湾亚种 P. l. taivana** Swinhoe 等。

### 大灵猫属　Viverra Linnaeus

**大灵猫**　九节狸、麝香猫、青鬃皮(通称)

**Viverra zibetha** Linnaeus

栖息于热带季雨林、亚热带常绿阔叶林的林缘灌丛、草丛、土穴、岩洞、树洞等隐蔽处。分布于陕西、江苏、安徽、浙江、福建、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。

肉(灵猫肉): 甘,温。滋补,暖胃。　香腺分泌物(灵猫香): 辛,温。辟秽,行气,止痛。用于心腹卒痛,疝痛。

附　注: ①我国有4个亚种,即**华东亚种 V. z. ashtoni** Swinhoe; **印缅亚种 V. z. picta** Wroughton; **印度支那亚种 V. z. surdaster** Thomas; **海南亚种 V.z. hainana** Wang et Xu。②功效相似,同为国家二级保护野生动物的有**小灵猫 Viverricula indica** Desmarest, 分布于中南(除河南)、西南及陕西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾。

# 403. 猫科 Felidae

## 猫属 Felis Linnaeus

**豹猫** 狸猫、麻狸(通称),钱猫(台湾),石虎(河南),抓鸡虎(湖南、广西)

**Felis bengalensis** Kerr

栖息于山地林区或郊野灌丛等近水处。分布几遍全国。

肉(狸肉): 甘,温、平。补中益气。用于肠风下血,痔漏, 瘰疬。 骨骼(狸骨): 甘,温。除风湿,开郁结,杀虫。用于关节痛,噎膈,疳疾,瘰疬,痔瘘,恶疮。

附 注: 我国有 4 个亚种, 即**北方亚种 F. b. euptilura** Elliot; **华东亚种 F. b. chinensis** Gray; **指名亚种 F. b. bengalensis** Kerr, **海南亚种 F. b. hainana** Xu et Liu。

**家猫** 猫(通称),猫公(广西)

**Fleis catus** Linnaeus

全国各地均有饲养。

肉(猫肉): 甘、酸,温。滋补,解毒,祛风。用于虚劳,风湿痹痛,瘰疬, 恶疮, 烫伤。头(猫头): 甘、酸,温。用于瘰疬,痈疽,恶疮, 痔疾。 脂肪油(猫油): 用于烧伤。 骨骼(猫骨): 消肿,解毒,杀虫。用于瘰疬,水肿,虫积。 肝(猫肝): 用于喘息, 痨瘵; 杀虫。 皮毛(猫皮毛): 用于瘰疬,疮疡。 胎盘(猫胞衣): 甘、酸,温。用于噎膈反胃,胃脘痛。

## 猞猁属 Lynx Kerr

**猞猁** 马猞猁、羊猞猁、猞猁狲(通称)

**Lynx lynx** Linnaeus

栖息于林下岩石缝隙、树洞内。分布于东北、华北及甘肃、青海、新疆、四川、云南、西藏。

肠: 用于泄泻。

附 注: ①本种暂划为 1 个亚种,即**中国亚种 L.l. isabellina** Blyth。② 国家二级保护野生动物。

## 云豹属 Neofelis Gray

**云豹** 乌云豹、荷叶豹、龟纹豹(通称),樟豹(台湾)

**Neofelis nebulosa** Griffith

树栖性较强的兽类, 栖息于海拔 1 600—3 000 米热带至亚热带山区的常绿林区。分布于陕西及长江流域以南诸省。

肉(豹肉): 甘、酸,温。补肾,益气,强筋骨。 骨骼(豹骨): 辛,温。追风定痛,强壮

筋骨。用于筋骨疼痛，风寒湿痹，四肢痉挛。　脡骨(豹膝)：功效同豹骨。认为药效最佳，常单独入药。

附　注：①我国有2个亚种，即**指名亚种 N. n. nebulosa** Griffith；**台湾亚种 N. n.** Swinhoe。② 功效相同，同载《中华人民共和国药典》1990年版，与本种同为国家一类保护野生动物及国家一级保护野生药材的尚有**豹 Panthera pardus** Linnaeus，除新疆、台湾外，全国均有分布。

## 豹属　Panthera Oken

**虎**　老虎、大虫(通称)，扁担花(四川)，打哈(藏语)

**Panthera tigris** Linnaeus

栖息于森林山地，丘陵起伏的山林、灌木及野草丛生处。分布于东北、中南、西南及河北、山西、陕西、甘肃、新疆、山东、江苏、安徽、浙江、江西、福建。但各地数量不多，濒临绝灭。

肉(虎肉)：甘、酸，温。补脾胃，益气力，壮筋骨。用于脾胃虚弱，腰腿寒痛，疟疾。骨骼(虎骨)：辛，温。追风定痛，健胃，镇惊。用于历节风痛，四肢拘挛，腰脚不随，惊悸癫痫，痔瘘脱肛。　脡骨：功效同虎骨。认为药效最佳而单独入药。　阴茎和睾丸：补虚，壮阳。　胃(虎肚)：用于反胃吐食。　眼睛(虎睛)：镇惊，明目。用于惊悸，癫痫，目翳。　胆(虎胆)：用于小儿惊痫，疳痢，跌打损伤。　肾(虎肾)：用于瘰疬。　肌腱(虎筋)：用于风湿关节痛。　牙齿(虎牙)：杀痨虫。用于猘犬伤发狂，男子阴头疮及疰瘘。爪(虎爪)：用于脱骨疽。　脂肪油(虎膏)：用于反胃，头疮白秃，痔疮下血。　骨骼煎煮而成的胶(虎骨胶)：咸，温。补益气血，强健筋骨。用于中风瘫痪，筋骨拘挛，四肢麻木，不能屈伸及痿躄。

附　注：①本种我国有6个亚种，主要为**东北亚种 P.t. altaica** Temminck；**华北亚种 P.t. coreensis** Brass；**华南亚种 P. t. amoyensis** Hilzheimer；**西北亚种 P. t. lecoqi** Schwarz 等。②《中华人民共和国药典》1990年版收载。③ 本种为国家一级保护野生动物及国家一级保护野生药材。按规定，本种不准药用。

## 金猫属　Profelis Severtzov

**金猫**　红金猫、灰金猫、花金猫、红春豹(通称)，黄虎(广西)

**Profelis temmincki** Vigors et Horsfield

栖息于温带、热带森林地区。分布于陕西、甘肃、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、云南、西藏。

骨骼：祛风，散寒。　全体(除去皮毛及内脏)：用于久病体弱，风湿关节痛。　头骨：用于瘰疬。

**附　注：国家二级保护野生动物。**

### 雪豹属　Uncia Gray

**雪豹**　　艾叶豹(通称),打马热(藏语)

**Uncia uncia** Schreber

高原地区岩栖性动物，常栖于海拔 2 500—5 000 米高山的空旷多岩石的地方。分布于内蒙古、甘肃、青海、新疆、四川、西藏。

骨骼：辛、咸，温。追风定痛，强筋健骨。　毛：用于鼻衄。　脂肪油：用于癫痫。齿：固齿。用于牙痛。

附　注：国家一级保护野生动物及国家一级保护野生药材。

## 404. 海狮科　Otariidae

### 海狗属　Callorhinus Gray

**海狗**　　腽肭兽、北海熊(通称)

**Callorhinus ursinus** (Linnaeus)

生活在海洋中，5 月末至 6 月到岛上繁殖。分布于渤海、黄海沿海。

雄性外生殖器(海狗肾)：咸，热。暖肾壮阳，益精补髓。用于虚劳损伤，阳痿精衰，腰膝痿弱。　脂肪油(海狗油)：用于三焦浊逆，水肿寒积，停饮，皲裂。

附　注：国家二级保护野生动物。

## 405. 海豹科　Phocidae

### 斑海豹属　Phoca Linnaeus

**斑海豹**　　腽肭兽、海狗(通称)，港豹(河北)

**Phoca vitulina** Linnaeus

生活在寒带、温带的海洋中。春季洄游到渤海沿海海域。

雄性外生殖器：用于虚劳损伤，阳痿精衰，腰膝痿弱。　脂肪油：用于三焦浊逆，水肿寒积，停饮，皲裂。

附　注：国家一级保护野生动物。

## 406. 儒艮科　Dugongidae

### 儒艮属　Dugong Lacepede

**儒艮**　　人鱼(通称)，海牛、海人(广西)

**Dugong dugon** Muller

生活在海岸的浅水地带，有时进入河口，但不能在淡水中栖息，多在傍晚和黎明出现。分布于台湾海峡及南海沿海。

油：滋养补虚。用于体质虚弱，肺痨。

附　注：国家一级保护野生动物。

## 407. 象科　Elephantidae

### 象属　Elephas Linnaeus

**亚洲象**　　印度象、野象、大象、老象(通称)

**Elephas maximus** Linnaeus

生活在热带、亚热带或其他复合类型的沟谷、山坡及稀树草原地带，常在草、竹及阔叶树混交林中开阔的地段活动。分布于云南南部和西南部。

牙(象牙)：甘，寒。清热镇惊，解毒生饥。用于痫病惊悸，骨蒸痰热，痈肿疮毒，痔漏。　皮(象皮)：甘、咸，温。止血，敛疮。用于外伤出血及一切创伤，溃疡久不收口。肉(象肉)：甘、淡，平。用于秃疮。　骨(象骨)：解毒。　胆(象胆)：苦，寒。清肝，明目消肿。用于目生翳障，痞积，疔肿。

附　注：国家一级保护野生动物。

## 408. 马科　Equidae

### 马属　Equus Linnaeus

**驴**　　毛驴(通称)

**Equus asinus** Linnaeus

全国各地均有饲养。

皮经煎煮、浓缩制成的固体胶(阿胶)：甘，平。补血滋阴，润燥，止血。用于血虚萎黄，眩晕心悸，肌瘦无力，心烦不眠，虚风内动，肺燥咳嗽，痨嗽咯血，吐血尿血，便血崩漏，妊娠胎漏。　肉(驴肉)：甘、酸，平。补血，益气。用于劳损，风眩，心烦。　乳汁(驴乳)：甘，寒。用于消渴，黄疸，小儿惊痫，风热赤眼。　雄性外生殖器(驴鞭)：甘、咸，温。益肾强筋。用于阳痿不举，筋骨酸软及骨痨、骨髓炎，气血虚亏，乳汁不足。　头(驴头)：用于中风头眩，消渴，黄疸。　骨骼(驴骨)：用于消渴，历节风。　脂肪(驴脂)：用于咳嗽，疟疾，耳聋，疮疥。　毛(驴毛)：用于头中风。　蹄(驴蹄)：用于疟疾，毒疮。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。②功效相似的有**野驴 E. hemionus** Pallas，分布于内蒙古、甘肃、青海、新疆、西藏，国家一级保护野生动物。

**马**

**Equus caballus** Linnaeus

全国各地均有饲养。

胃肠或膀胱结石(马宝)：甘、咸，平。镇惊化痰，清热解毒。用于惊痫癫狂，痰热内

盛，神志昏迷，吐血衄血，恶疮肿毒。　肉(马肉)：甘、酸，寒。除热下气，强腰脊。　乳汁(马乳)：甘，凉。补血润燥，清热止渴。用于血虚烦热，虚劳骨蒸，消渴，牙疳。　肝(马肝)：用于妇女月经不调，心腹滞闷，四肢疼痛。　牙(马齿)：甘，平。有小毒。用于惊痫，疔疮，牙痛。　皮(马皮)：用于小儿赤秃，牛皮癣。　心(马心)：用于心昏多忘。　骨髓(马骨)：甘，凉。用于头疮，耳疮，阴疮，瘰疬。　鬃毛或尾毛(马鬃)：有毒。用于妇女崩中、带下病，疮，痈。　胎盘(驹胞衣)：用于妇女天癸不通。　雄性外生殖器(白马阴茎)：甘、咸，温。补肾益气。用于阳痿精衰，虚弱羸瘦。　蹄甲(马蹄甲)：甘，平。用于崩漏带下，牙疳，秃疮，疥癣，脓疱疮。　项上的皮下脂肪(马鬃膏)：甘，平。有小毒。用于面黑，手足皲粗。

**骡**　　骡子(通称)

**Equus asinus** X Equus caballus

骡是马和驴杂交所得的后代。全国各地均有饲养，长江以北地区较多。

胃结石(骡宝)：甘、微咸，平。定惊解毒，清热化痰。用于小儿急惊风，痰热内蕴及癫狂谵语。　蹄甲：祛风，镇痛，活络。

**野马**

**Equus przewalskii** Poliakov

栖息于戈壁沙漠西端草原上。仅见于新疆东北部。

肉(野马肉)：辛，平。用于筋脉不收，寒痹，肌肉不仁。

附　注：国家一级保护野生动物。

## 409. 犀科 Rhinocerotidae

### 犀属　Rhinoceros Herrmannsen

**印度犀**　　犀牛、独角犀(通称)

**Rhinoceros unicornis** Linnaeus

生活于亚热带潮湿、茂密的树林及丛莽草原。西藏南部、云南西双版纳偶有分布。

肉(犀肉)：微温，甘。主瘴气，除客热头痛及五痔诸血痢。　角(犀角)：酸、咸，寒。清热，凉血，定惊，解毒。用于伤寒温疫，热入血分，惊狂，烦躁，谵妄，斑疹，吐血，衄血，下血，痈疽肿毒。　皮(犀牛皮)：祛风活血。按规定，本种不准药用。

## 410. 猪科　Suidae

### 野猪属　Sus Linnaeus

**野猪**　　山猪(河北、湖南)，野豚(贵州)，木豚(傣语)

**Sus scrofa** Linnaeus

多在灌木丛或较低湿的草地或混交林、阔叶林中栖息。分布几遍全国。

肉(野猪肉)：甘、咸，平。用于虚弱羸瘦，便血，痔疮出血。　胆(野猪胆)：清热解

毒。用于疔疮肿毒，瘰疬，烧、烫伤。　皮(野猪皮)：用于鼠瘘恶疮。　脂肪(野猪脂)：催乳。用于风肿毒疮。　蹄爪(野猪蹄)：祛风治痹。用于漏疮。　头骨(野猪头骨)：用于积年下血。　睾丸(野猪外肾)：用于崩中带下，肠风泻血，血痢。　胆囊中的结石(野猪黄)：甘，平。用于癫痫，惊风，血痢，金疮。

**家猪**　　猪(通称)

**Sus scrofa domestica** Brisson

全国各地均有饲养。

胆(猪胆)：苦，寒。清热，润燥，解毒。用于里热燥渴，便秘，黄疸，顿咳，哮喘，泄泻，痢疾，目赤，喉痹，聤耳，痈肿疔疮。　肾(猪肾)：咸，平。滋补强壮。用于肾虚腰痛，身面水肿，遗精，盗汗，老人耳聋。　肝(猪肝)：甘、苦，平。补肝，养血，明目利水。用于血虚萎黄，夜盲，目赤，浮肿，脚气。　心(猪心)：甘、咸，平。用于惊悸，怔忡，自汗，不眠。肉(猪肉)：甘、咸，平。滋阴，润燥。用于热病伤津，消渴羸瘦，燥咳，便秘。　血(猪血)：咸，平。用于头风眩晕，中满腹胀，宫颈糜烂。　肺(猪肺)：甘，平。用于肺虚咳嗽，咯血。　脑(猪脑)：甘，寒。用于头风，眩晕；外涂冻疮，皲裂。　皮肤(猪肤)：甘，凉。用于咽喉痛。　胃(猪肚)：甘，温。补虚损，杀痨虫，止痢，健脾胃。用于虚劳羸弱，泄泻，下痢，消渴，小便频数，小儿疳积。　肠(猪肠)：甘，微寒。用于便血，血痢，痔疮，脱肛。　甲状腺体(猪靥)：用于项下瘿气。　毛(猪毛)：用于崩漏，烫伤。　骨(猪骨)：用于下痢，疮癣。　膀胱(猪脬)：甘、咸，平。用于遗尿。　脊髓和骨髓(猪髓)：甘，寒。补阴益髓。用于骨蒸劳热，消渴，疮疡。　脾(猪脾)：甘、涩，平。健脾胃，助消化。用于脾胃虚热，气弱，脾积痞块。　胰(猪胰)：甘，寒。微毒。益肺，补脾，润燥。用于肺损咳嗽，咯血，肺胀喘急，脾虚气弱，乳汁不通，手足皲裂。　四足(猪蹄)：甘、咸，平。补血，通乳，托疮。用于妇女乳少，痈疽，疮毒。　口蹄甲(猪蹄甲)：咸，平。用于咳嗽喘息，痔疮，白秃，冻疮。睾丸(豚卵)：甘，温。补肾纳气，止痛利尿。用于哮喘，疝气，少腹急痛，癃闭。　脂肪油(猪脂膏)：甘，凉。补虚，润燥，解毒。用于脏腑枯涩，大便不利，燥咳，皮肤皲裂。　肾精子(膀胱结石)：利尿通淋。　腿腌制品(火腿)：甘、咸，温。健脾开胃，生津益血。用于虚劳怔忡，胃口不开，虚痢，久泻。

## 411. 骆驼科　Camelidae

### 骆驼属　Camelus Linnaeus

**双峰驼**　　骆驼、野骆驼(通称)

**Camelus bactrianus** Linnaeus

栖息于干旱地区，随季节变化而迁移。夏季生活在戈壁沙漠有牧草的地区；冬季生活在平原、丘陵、山区的荒漠地带。分布于内蒙古、甘肃、青海、新疆。

毛(骆驼毛)：咸，平。用于寒热惊痫，癫痉狂走。　肉(骆驼肉)：甘，温。祛风，下气，壮筋，润肤。　胶汁脂肪(骆驼脂)：甘，温。润燥，祛风，活血，消肿。用于风疾，顽痹不仁，筋肉挛急，疮疡，肿毒，折伤。　胆结石(骆驼黄)：苦，平。微毒。用于风热惊疾。　乳汁(峰驼乳汁)：甘，温。补中益气，壮筋骨。

# 412. 鹿科 Cervidae

## 麅属 Capreolus Gray

**麅** 狍、狍子(通称),狍鹿(青海)

**Capreolus capreolus** Linnaeus

栖于丘陵山地的疏林、林缘或沟谷的灌、草丛中。分布于东北、华北、西北及山东、江西、河南、湖北、四川。

雄体未骨化的幼角(麅茸)、角:功效同梅花鹿。肝:解毒。用于肺痈。血:调经。用于月经过多。

附 注:我国有2个亚种,即**中南亚种 C. c. pygargus** (Pallas);**山西亚种 C. c. bedfordi** Thomas。

## 鹿属 Cervus Linnaeus

**梅花鹿** 鹿、花鹿(通称)

**Cervus nippon** Temminck

栖于混交林、山地草原和森林边缘。现多人工饲养。分布几遍全国。

雄鹿未骨化的幼角(鹿茸):甘、咸,温。壮肾阳,益精血,强筋骨,调冲任,托疮毒。用于阳痿滑精,宫冷不孕,羸瘦,神疲,畏寒,眩晕,耳鸣耳聋,腰脊冷痛,筋骨痿软,崩漏带下,阴疽不敛。 角(鹿角):咸,温。温肾阳,强筋骨,行血消肿。用于阳痿遗精,腰脊冷痛,阴疽疮疡,乳痈初起,瘀血肿痛。 角熬制的胶块(鹿角胶):甘、咸,温。温补肝肾,益精养血。用于阳痿滑精,腰膝酸冷,虚劳羸瘦,崩漏下血,便血尿血,阴疽肿痛。 熬制鹿角胶剩余的骨渣(鹿角霜):咸,温。温肾助阳,收敛止血。用于脾肾阳虚,食少壮泻,带下病,遗尿尿频,崩漏下血,痈疽溃核。 睾丸和阴茎(鹿鞭):甘、咸,温。补肾壮阳,益精。用于劳损,腰膝酸痛,肾虚耳聋,耳鸣,阴痿,宫冷不孕。 胎兽及胎盘(鹿胎):甘、咸,温。益肾壮阳,补虚生精。用于虚损劳瘵,精血不足,妇女虚寒,崩漏带下。 四肢肌腱(鹿筋):淡、微咸,温。壮筋骨。用于劳损,风湿关节痛,转筋。 尾(鹿尾):甘、咸,温。暖腰膝,益肾精,滋补。用于腰脊疼痛,肾虚遗精,阳痿及头昏耳鸣。 肉:甘,温。补五脏,调血脉。用于虚劳羸瘦,产后无乳。 血(鹿血):甘、咸,热。补虚和血。用于虚损腰痛,心悸失眠,肺痿吐血,崩中带下。 皮:咸,温。补气,涩滑。用于带下病,血崩,肾虚滑精;外敷漏疮。 胆:苦,寒。消散肿毒。 齿:用于鼠瘘及疮毒。 骨:甘,微热。补虚羸,强筋骨。用于风湿四肢痛及筋骨冷痹。 脂肪油:用于痈肿死肌,四肢不随,疱疮。 脊髓及骨髓:甘,温。补阳益阴,生精润燥。用于虚劳羸弱,肺痿咳嗽,阳痿,血枯。 甲状腺体(鹿靥):用于瘿病。 头肉:补气益精。用于虚劳,消渴。 蹄肉:用于风寒湿痹,腰腿酸痛。

附 注:①我国有5个亚种,即**东北亚种 C. n. hortulorum** Swinhoe;**台湾亚种 C. n. taiouanus** Blyth;**华北亚种 C. n. mandarinus** Milne-Edwards;**山西亚种 C. n. grassianus** (Heude);**华南亚种 C. n. kopschi** Swinhoe。②国家一级保护野生动

物及国家一级保护野生药材物种。③功效相同，与本种同载《中华人民共和国药典》1990年版的有**马鹿 C. elaphus** Linnaeus，分布于华北、西北及四川，国家二级保护野生动物及国家二级保护野生药材物种。④功效相似的有**白唇鹿 C. albirostris** Przewalski，分布于甘肃、青海、四川、西藏，国家一级保护野生动物；**海南坡鹿 C. eldi** M'Clelland，仅分布在海南；**白臀鹿 C. macneilli** Lydekker，分布于四川、西藏，国家二级保护野生动物；**水鹿 C. unicolor** Kerr，分布于江西、台湾、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南；**驼鹿 Alces alces** Linnaeus，分布于黑龙江，均为国家二级保护野生动物；**驯鹿 Rangifer tarandus** Linnaeus，分布于黑龙江。

## 麋鹿属 Elaphurus Milne-Edwards

**麋鹿** 四不象(通称)

**Elaphurus davidianus** Milne-Edwards

原产于黄河下游的芦苇地带，野生已绝迹，1894年前饲养于北京南苑，少数流传到国外，国内已灭绝。解放后由国外引回，现进行人工饲养。

肉(麋肉)：大热。益气，强筋。用于虚劳不足，腰脚软弱。 骨化老角(麋角)：甘，温。强筋骨，益血脉。用于虚劳内伤，腰膝酸软，筋骨疼痛。 未骨化带茸毛的幼角(麋茸)：甘，温。壮阳，补精，强筋，益血。用于虚劳羸瘦，腰膝酸软，筋骨疼痛，阳痿，不孕症。 骨(麋骨)：除虚劳。 脂肪(麋脂)：辛，温。通血脉，润皮肤。用于风寒湿痹，恶疮痈肿。

附 注：国家一级保护野生动物。

## 獐属 Hydropotes Swinhoe

**獐** 河獐、牙麂(通称)，河麂(湖南)，牙獐(广西)

**Hydropotes inermis** Swinhoe

栖于低山、丘陵地区草坡灌丛及河岸、湖边等潮湿地或沼泽地的芦苇丛中。分布于中南及江苏、安徽、浙江、江西、贵州。

骨髓及脊髓(獐髓)：益气力，悦泽人面。用于虚风。 肉(獐肉)：甘，温。补益五脏。 骨(獐骨)：甘，温。用于虚损泄精。

附 注：①本种我国仅1个亚种，即**指名亚种 H. i. inermis** Swinhoe。② 国家二级保护野生动物。

## 麂属 Muntiacus Rafinesque

**黑麂** 麂、麂子(通称)

**Muntiacus crinifrons** Sclater

栖息于丘陵山地的森林、灌丛、草丛中。分布于浙江、广东、云南。

肉(麂肉)：甘，平。补气，暖胃，祛风，化湿。用于腰腿痛，胃痛。

附　注：① 国家一级保护野生动物。②功效相似的有**赤麂 M. muntjak** (Zimmermann)，分布于广东、海南、广西、四川、贵州、云南；**小麂 M. reevesi** Ogilby，分布于陕西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

## 413. 麝科　Moschidae

### 麝属　Moschus Linnaeus

**林麝**　　獐子、香獐(通称)，香子(青海)

**Moschus berezovskii** Flerov

栖息于山区针叶林和针阔混交林多岩石地区的荫蔽、干燥处。分布于西北及山西、安徽、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、西藏。

雄麝香腺分泌物(麝香)：辛，温。开窍醒神，活血通经，消肿止痛。用于热病神昏，中风痰厥，气郁暴厥，中恶昏迷，经闭，症瘕，难产死胎，心腹暴痛，痈肿瘰疬，咽喉肿痛，跌扑伤痛，痹痛麻木。　香腺囊外壳(麝香壳)：辛，温。通关利窍，消肿解毒。用于疔毒肿痛，痈肿久烂及疮疖硬痛；外敷用于痈肿硬痛。　肉：甘，温。用于腹中症积。

附　注：①功效相同，与本种同载《中华人民共和国药典》1990 年版，同为国家二级保护野生动物及国家二级保护野生药材物种的有**马麝 M. sifanicus** Büchner，分布于甘肃、青海、四川、云南、西藏；**原麝 M. moschiferus** Linnaeus，分布于黑龙江、吉林、河北、安徽。② 功效相似的有**黑(褐)麝 M. fuscus** Li，分布于云南西部贡山、西藏东南缘察隅、墨脱、米林，国家二级保护野生动物及国家二级保护野生药材。③**喜马拉雅麝 M. chrysogaster** Hodgson 的种类地位尚有争议。

## 414. 牛科　Bovidae

### 牛属　Bos Linnaeus

**牦牛**　　野牦牛、犏牛(通称)

**Bos grunniens** Linnaeus——*Poëphagus grunniens* (Linnaeus)

栖息于高原、高山的荒凉处。分布于青海、新疆南部、四川西北部、西藏。

角(牦牛角)：酸、咸，凉。清心解热，镇静镇痉。用于惊痫，高热神昏，谵言，热毒，斑疹，痈疡吐血，衄血。从乳中提炼的脂肪油(酥油)：甘，微寒。补五脏，益气血。用于肺痿咳喘，止吐血，止消渴，缩小便，润肌肤。　胆结石：用于惊痫癫狂。

附　注：①野生种为国家一级保护野生动物。②在青藏高原地区已驯为家养。

**黄牛**

**Bos taurus domesticus** Gmelin

全国各地均有饲养。

胆结石(牛黄)：甘，凉。清心，豁痰，开窍，凉肝，息风，解毒。用于热病神昏，中风痰迷，惊痫抽搐，癫病发狂，咽喉肿痛，口舌生疮，痈肿疔疮。　胆汁(牛胆)：苦，大寒。清肝

明目，利胆通肠，解毒消肿。用于风热目疾，黄疸，便秘，消渴，小儿惊风，痈肿，痔疮。　胃内的草结块(牛草结)：淡，微温。降逆止呕，镇静。用于噎膈反胃，吐酸，胃溃疡，胃痛，晕车，晕船呕吐。　肉(牛肉)：甘，平。补脾胃，益气血，强筋骨。用于虚损羸瘦，消渴，脾弱不运，痞积，水肿，腰膝酸软。　血(牛血)：咸，平。理血，补中。用于便血，血痢，经闭，血虚羸瘦。　脂肪(牛脂)：甘，温。微毒。用于诸疮，疥癣，白秃。　肝(牛肝)：甘，平。养血，补肝，明目。用于血虚萎黄，虚劳羸瘦，青盲，雀目。　胃(牛肚)：甘，平。补虚，益脾胃。用于病后虚羸，气血不足，消渴，风眩。　脑髓(牛脑)：甘，温。微毒。用于头风眩晕，消渴，痞气。　肾(牛肾)：补肾气，益精，去湿痹。用于五劳七伤，阳痿气乏。　乳汁(牛乳)甘，平。补虚损，益肺胃，生津润肠。用于虚弱劳损，反胃噎膈，消渴，便秘。　脾(牛脾)：甘，微酸。健脾消积。用于脾胃失健，消化不良，食积痞满。　肺(牛肺)：补肺，止咳逆。　骨骼(牛骨)：甘，温。用于吐血，崩中，带下病，泻血。　肌腱(牛筋)：补肝强筋，益气力，续绝伤。　鼻(牛鼻)：用于消渴，妇女无乳。　甲状腺体(牛靥)：用于喉痹，气瘿。　肠(牛肠)：用于汤风痔漏。　蹄(牛蹄)：用于水气浮肿，腹肚胀满，小便涩少，崩中，带下病。脊髓和骨髓(牛髓)：甘，温。润肺，补肾，填髓。用于虚劳羸瘦，精血亏损，消渴，跌扑损伤，手足皴裂。　齿(牛齿)：用于小儿癫痫，背疮肿痛，诸恶疮不合。　唾涎(牛口涎)：用于噎膈，反胃呕吐。　角中的骨质角髓(牛角鳃)：苦，温。止血，止痢。用于便血，衄血，崩漏，带下病，赤白痢，泄泻。　胎盘(牛胞衣)：用于臁疮不敛。　喉咙(牛喉咙)：用于反胃吐食。　蹄甲(牛蹄甲)：用于癫痫，臁胫烂疮，损伤骨折，小儿夜啼。　皮所熬的胶(黄明胶)：甘，平。滋阴润燥，止血消肿。用于虚劳肺痿，咳嗽咯血，吐衄，崩漏，跌扑损伤，痈肿，烫伤。　牛乳制成的食用脂肪(醍醐)：甘，平。滋阴，润燥，止渴。用于虚劳肺痿，咳唾脓血，消渴，便秘，风痹，皮肤瘙痒。　肉熬炼成的膏(覆天膏)：甘，温。补气益气，健脾安中。用于虚劳羸瘦，中风偏废，脾虚痞积，消渴。　睾丸和阴茎(牯牛卵囊)：用于疝气。　牛乳加工制成品(乳腐)：甘，微寒。润五脏，利大小便。用于赤白痢。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 水牛属　Bubalus Smith

**水牛**

**Bubalus bubalis** Linnaeus

南方各省均有饲养。

角(水牛角)：苦，寒。清热解毒，凉血，定惊。用于温病高热，神昏谵语，发斑发疹，吐血，衄血，惊风，癫狂。　角的半浓缩粉(水牛角浓缩粉)：功效同水牛角。　皮、尾：用于浮肿，小便涩少。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 羚牛属　Budorcas Hodgson

**羚牛**　　白羊、扭角羚、金毛扭角羚(通称)

**Budorcas taxicolor** Hodgson

栖居在海拔 2 000 米以上的高山地带丛林或竹林中。有季节性迁移现象。分布于陕西、甘肃、青海、四川、云南、西藏。

角：解热，镇惊。睾丸：壮阳。用于肾虚小腹疼痛。

附　注：我国有 3 个亚种，即**指名亚种 B. t. taxicolor** Hodgson；**川西亚种 B. t. tibetana** Milne-Edwards；**陕西亚种 B. t. bedfordi** Thomas。

## 山羊属　Capra Linnaeus

**山羊**　　羊(通称)，居里(青海)

**Capra hircus** Linnaeus

全国各地均有饲养。

血(羊血)：咸，平。止血，祛瘀。用于吐血鲠血，肠风痔血，妇女崩漏，产后血晕，外伤出血，跌打损伤。　胆囊结石(羊黄)：苦，平。有小毒。泻热，利痰，通窍，镇惊。用于风痰闭窍，痰火昏迷，热病谵妄，小儿惊痫。　胆(羊胆)：苦，寒。清火，明目，解毒。用于风热目赤，青盲，翳障，肺痨吐血，喉头红肿，黄疸，便秘，热毒疮疡。　肝(鲜羊肝)：甘、苦，凉。益血，补肝，明目。用于血虚痿黄羸瘦，肝虚目暗昏花，雀目，青盲，障翳。　脂肪油(羊脂)：甘，温。补虚，润燥，祛风，化毒。用于虚劳羸瘦，肌肤枯憔，久痢，丹毒，疮癣。　心(羊心)：甘，温。解郁，补心。用于胸闷，惊悸。　脑(羊脑)：甘，温。有毒。润皮肤，去黡黯。用于风寒入脑，头疼久不愈，损伤，丹瘤，肉刺。　肾(羊肾)：甘，温。补肾气，益精髓。用于肾虚劳损，腰脊疼痛，足膝痿弱，耳聋，消渴，阳痿，尿频，遗溺。　乳汁(羊乳)：甘，温。温润补虚。用于虚劳羸弱，消渴，反胃，哕逆，口疮，漆疮。　甲状腺体(羊靥)：甘、淡，温。用于气瘿。　母羊腹中的胎兽(羊胎)：调补肾虚羸瘦。　胰脏(羊胰)：用于久咳，带下病。　皮(羊皮)：补虚劳，祛风。用于肺中虚风，蛊毒下血。　胃(羊肚)：甘，温。补虚，健脾胃。用于虚劳羸瘦，消渴，盗汗，尿频。　肺(羊肺)：甘，平。补肺气，通水道。用于肺痿咳嗽，消渴，小便不利。　骨骼(羊骨)：甘，温。补肾，强筋骨。用于虚劳羸瘦，腰膝无力，筋骨挛痛，白浊，淋证，泄泻。　膀胱(羊脬)：甘，温。用于肾虚遗尿。　须(羊须)：用于小儿口疮、疳疮，尿疮。　蹄肉(羊蹄肉)：甘，平。补肾益精。用于肾虚劳损。　骨髓和脊髓(羊髓)：甘，温。益阴补髓，润肺泽肌。用于虚劳羸弱，肺痿，骨蒸，咳嗽，消渴，皮发憔悴，痈疽，疮疡，目赤，目翳。　睾丸(羊外肾)：甘、咸，温。补肾，益精，助阳。用于肾虚腰痛，遗精，带下病，阳痿，消渴，小便频数，子痈。　胃中的草结(羊胶子)：温。解草药毒。用于噎膈反胃。　雄羊角(羖羊角)：咸，凉。清热，镇惊，明目，解毒。用于小儿惊痫，风热头痛，烦闷，吐血，青盲，肿毒。　肉(羊肉)：甘，温。益气补虚，温中暖下。用于虚劳羸瘦，腰膝酸软，产后虚冷，腹痛，寒疝，中虚反胃。　皮肤分泌附于羊毛上的脂肪精制品(羊毛脂)：作软膏基质，生产胆固醇和羊毛醇。

附　注：①功效相同，与本种同载《中华人民共和国药典》1990 年版的有**绵羊 Ovis aries** Linnaeus，全国各地均有饲养。②功效相似的有**北山羊 Capra ibex** Linnaeus，分布内蒙古及新疆。

## 鬣羚属 Capricornis Ogilby

**苏门羚** 鬣羚、明鬃羊、山驴子(通称),石羊(广西)

**Capricornis sumatraensis** (Bechstein)

栖于高山岩崖上,偶在草原及平地间活动。分布于陕西、甘肃、青海、安徽、浙江、江西、福建、湖北、广东、广西、四川、贵州、云南。

骨(山驴骨): 辛、咸,温。用于四肢酸痛,麻木不仁,腰腿疼痛。

附 注: ①我国有 3 个亚种,即**华西亚种 C. s. milnedwardsi** David; **滇西亚种 C. s. montinus** Allen; **东南亚种 C. s. argyrochaetes** Heude。② 国家二级保护野生动物。

## 斑羚属 Naemorhedus Smith

**斑羚** 青羊、山羊(通称),岩羊、羰(云南)

**Naemorhedus goral** Hardwicke

栖于较高的山林中,常在人迹罕到的地方或山顶多崖石地区活动。分布于东北、华北、西南及陕西、甘肃、宁夏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西。

肉(山羊肉):甘,热。补虚助阳。用于虚劳内伤,筋骨痹弱,腰脊酸软,阳痿,带下病,不孕症。 血(山羊血):咸,热。活血,散瘀,通络,解毒。用于跌打损伤,筋骨疼痛,吐血,衄血,便血,尿血,痈肿。 肝(山羊肝): 用于夜盲。 角(山羊角): 镇静,退热,明目,止血。用于小儿惊痫,头痛,产后腹痛,痛经。 油(山羊油): 用于心疝及诸疝。

附 注: ①我国有 4 个亚种,即**华北亚种 N. g. caudatut** (Milne-Edwards); **西南亚种 N. g. griseus** Milne-Edwards; **西藏亚种 N. g. baileyi** Pocock; **东南亚种 N. g. arnouxianus** (Heude)。②国家二级保护野生动物。

## 绵羊属 Ovis Linnaeus

**盘羊** 大角羊、羰羊、盘角子(通称),大头弯羊(青海),年(藏语)

**Ovis ammon** Linnaeus

栖息于无林的高原、丘陵地带,喜欢在山麓开旷的各种山坡地上,有习惯喜爱的居住地段。分布于华北及甘肃、宁夏、青海、新疆、云南、西藏。

角: 解热。用于瘟病发烧。 肺: 调经止痛。用于痛经。 睾丸: 滋补,壮阳。用于体弱肾虚,阳痿。

附 注: ① 我国有 6 个亚种,主要为**西藏亚种 O. a. hodgsoni** Blyth; **伊犁亚种 O. a. littledalei** Lydekker; **罗布泊亚种 O. a. adametzi** Kowarzik; **华北亚种 O. a. darwini** Przewalski 等。②国家二级保护野生动物。

## 藏羚属　Pantholops Hodgson

**藏羚**　　羚羊、一角兽(通称)

**Pantholops hodgsoni** (Abel)

栖于海拔 4 000 米以上的高原山谷地带，峻岭溪涧旁、人迹罕到之处多见。分布于青海、西藏。为青藏高原特产。

角：清热解毒，消肿。用于胃脘痛胀，瘿瘤。　血：止泻。用于泄泻。

附　注：国家一级保护野生动物。

## 原羚属　Procapra Hodgson

**黄羊**　　蒙古原羚、蒙古瞪羚、短尾巴黄羊(通称)

**Procapra gutturosa** Pallas

栖息于草原丘陵地带和半荒漠地区，偶见于高山或峡谷低地。分布于东北、西北及陕西、甘肃、青海。

角(黄羊角)：甘、淡，平。平肝熄风，清热解毒。用于痫症，中风，小儿惊风，肝火炽盛。　肉(黄羊肉)：甘，温。补中益气。用于劳伤，虚寒。　油(黄羊油)：用于痔疮。

附　注：①我国仅 1 个亚种，即**指名亚种 P. g. gutturosa** Pallas。② 国家二级保护野生动物。

**藏原羚**　　原羚、小羚羊、山黄羊、西藏黄羊(通称)

**Procapra picticaudata** Hodgson

栖息于高原地区的荒漠草原地带。分布于甘肃、四川西部、青海、西藏。

角(原羚角)：清热解毒，平肝熄风。用于痫症，中风，小儿惊风，温热。

附　注：① 国家二级保护野生动物。② 功效相似的有**普氏原羚 P. przewalskii** Buchner，分布于内蒙古、甘肃、宁夏、青海、新疆东南部；国家一级保护野生动物；**鹅喉羚 Gazella subgutturosa** Guldenstaedt，分布于内蒙古、甘肃、青海、新疆、西藏，国家二级保护野生动物。

## 岩羊属　Pseudois Hodgson

**岩羊**　　石羊、半羊、青羊(通称)，那(藏语)

**Pseudois nayaus** (Hodgson)

栖息于海拔 2 000 米以上高原地区，多在山峦起伏及开阔的山谷草地活动。分布于西北及内蒙古、四川、云南、西藏。

角：清热解毒。用于高烧，脓肿。

附　注：我国有 2 个亚种，即**指名亚种 P. n. nayaus** (Hodgson)；**四川亚种 P. n. szechuanensis** Rothschild。

## 高鼻羚羊属　Saiga Gray

**高鼻羚羊**　　赛加羚羊(通称)

**Saiga tatarica** Linnaeus

栖息于荒漠及半荒漠的开阔地区,冬季为避风雪,迁往比较平缓的山间坡地、谷地或山间平原中过冬。仅分布于新疆北部。

角(羚羊角):咸,寒。平肝熄风,清热镇惊,解毒。用于热病神昏痉厥,谵语发狂,头痛眩晕,惊痫抽搐,目赤翳膜。　肉(羚羊肉):甘,平。用于筋骨急强,中风。

附　注:①我国仅1个亚种,即**蒙古亚种 S. t. mongolica** Bannikov。②国家一级保护野生动物及国家一级保护野生药材。③《中华人民共和国药典》1990年版收载。

# 药 用 矿 物

# 1. 铁化合物类

**黄铁矿**

**Pyritum**

产于热液作用沉积矿层及变质作用形成的矿床中。分布于安徽、浙江、湖北、广东、四川。

矿物(自然铜)：辛，平。散瘀，接骨，止痛。用于跌打肿痛，筋骨折伤，瘀血胀痛。黄铁矿结核(蛇含石)：甘，寒。安神镇惊，止血定痛。用于惊风，癫痫，骨节酸痛。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**磁铁矿**

**Magnetitum**

产于岩浆岩、变质岩，也见于砂矿床中。分布于辽宁、河北、甘肃、山东、江苏、安徽、广东。

矿物(磁石)：辛、咸，寒。平肝潜阳，聪耳明目，镇惊安神，纳气平喘。用于头昏目眩，视物昏花，耳鸣耳聋，惊悸失眠，肾虚气喘。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**褐铁矿**

**Limonitum**

产于风化地壳中，以含铁矿物经氧化分解，胶溶凝集而成。分布于甘肃、江苏、浙江、河南、湖北、四川。

多矿物集合体(禹余粮)：甘、涩，平。涩肠止血。用于泄泻，崩漏，带下病，痔漏。褐铁矿结核(蛇含石)：甘，寒。安神镇惊，止血定痛。用于心悸惊痫，肠风血痢，心痛，骨节酸痛。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**赤铁矿**

**Hematitum**

产于沉积铁矿床、沉积变质铁矿床、火成岩、接触变质矿床、热液矿脉及金属矿床的铁帽中。分布于河北、山西、甘肃、山东、河南、湖南、广东、四川。

矿物(赭石、代赭石)：苦，寒。平肝潜阳，降逆，止血。用于眩晕耳鸣，呕吐，噫气，呃逆，喘息，吐血，衄血，崩漏下血。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**铁**

**Ferrum**

由赤铁矿、褐铁矿、磁铁矿冶炼而成。分布于辽宁、河北、山西、山东、江苏、安徽、浙江、河南、湖南、广东、四川。

钢铁飞炼而成的粉末或生铁打碎成粉，用水漂出的细粉(铁粉)：咸，平。平肝，镇

心。用于惊痫，发狂，脚气冲心，疔疮。　生铁浸于水中生锈后形成的溶液(铁浆)：甘、涩，平。镇心定痛，解毒敛疮。用于癫痫狂乱，疔疮肿毒。　生铁煅至红赤，外层氧化时被锤落的铁屑(铁落)：辛，凉。平肝镇惊。用于癫狂，热病谵妄，心悸，易惊善怒，疮疡肿毒。　铁露置空气中氧化后生成的褐色锈衣(铁锈)：辛，寒。清热解毒，镇心平肝。用于疔疮肿毒，口疮，重舌，疥癣，烫伤，毒虫螫伤，痫病。　炼铁炉中的灰烬(铁精)：辛、苦，平。镇惊安神，消肿解毒。用于惊痫心悸，疔毒，阴肿，脱肛。　铁与醋酸作用生成的锈末(铁华粉)：咸，平、寒。养血安神，平肝镇惊。用于血虚，惊悸，健忘，痫疾，痃癖，脱肛痔漏。　制造钢针时磨下的细屑(针砂)：酸，辛，平。补血，除湿，利水。用于黄胆，水肿。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**水绿矾**

**Melanteritum**

产于氧化带以下富含黄铁矿半分解矿石的裂隙中。分布于陕西、甘肃、新疆、山东、安徽、浙江、河南、湖南。

矿物(绿矾)：酸涩，凉。燥湿化痰，消积杀虫，止血补血，解毒敛疮。用于黄肿胀满，痞积久痢，肠风便血，血虚萎黄，湿疮疥癣，喉痹口疮，烂弦风眼。

**纤铁矾**

**Fibroferritum**

由黄铁矿氧化形成，产于长石及粗面岩内。分布于内蒙古、陕西、贵州。

矿物(黄矾)：咸、酸涩。有毒。用于痔瘘，恶疮，疥癣。

## 2. 铜化合物类

**蓝铜矿**

**Azuritum**

产于含铜硫化物矿床氧化带，是原生含铜矿物氧化后所形成的表生矿物，与绿青(孔雀石)共生。分布于吉林、辽宁、内蒙古、甘肃、湖北、广东。

块状矿物(扁青)：酸、咸，平。有小毒。祛痰，催吐，破积，明目，解毒气，提精神。用于风痰癫痫，惊风，目痛，目翳，创伤，痈肿。　层状矿物(曾青)：酸，小寒。明目，镇惊，杀虫。用于风热目赤疼痛涩痒，头风，惊痫，风痹。　中空或球形矿物(空青)：甘、酸，寒。有小毒。明目，去翳，利窍。用于青盲，雀目，翳膜内障，赤眼肿痛，中风，口㖞，头风，耳聋。

**氯铜矿**

**Atacamitum**

产于铜矿床地表氧化带中，属卤化物矿物。分布于华东及中南。

矿物(绿盐)：咸、苦、辛，平。明目消翳。

**斑铜矿**

**Bornitum**

产于热液矿床及铜矿床的次生硫化矿床的富集带中，为铜的硫化物类矿物。分布于浙江、湖北、湖南。

矿物(紫铜矿)：镇心利肺，降气坠痰。

**铜**

**Cuprum**

为各种地质作用中还原条件下的产物，形成于原生热液矿床。也见于含铜矿床的氧化带下部，系由含铜硫化物经变化还原而成。分布于吉林、辽宁、内蒙古、甘肃、浙江、湖北、广东。

煅铜时打落的屑末(赤铜屑)：苦，平。微毒。用于筋骨折伤，外伤出血，烂弦风眼，孤臭。　铜器表面经二氧化碳或醋酸作用生成的绿色锈衣(铜绿)：酸、涩，平。有毒。退翳，去腐，敛疮，杀虫，吐风痰。外用于鼻息肉，眼睑糜烂，疮疡顽癣。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**孔雀石**

**Malachitum**

产于含铜硫化物矿床氧化带，属铜矿的次生矿物，与少量的石英等矿物伴生。分布于甘肃、湖北、广西。

矿物(绿青)：酸，寒。有毒。用于痰迷惊痫，疳疮。

**胆矾**

**Chalcanthitum**

产于铜矿床的氧化带中，为含铜硫化物氧化分解形成的次生矿物，与蓝铜矿，孔雀石等矿物共生。分布于山西、陕西、甘肃、江西、湖北、广东、云南。

矿物(胆矾)：酸、辛，寒。有毒。催吐，祛腐，解毒。用于风痰壅塞，喉痺，癫痫，牙疳，口疮，风眼，痔疮。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 3. 镁化合物类

**透闪石**

**Tremolitum**

产于各种变质岩中，分布于河南、湖北。

矿物(阳起石)：咸，温。温补命门。用于阳痿早泄，子宫虚冷不孕，下焦虚寒，腰膝疲软冷痺，癥瘕崩漏。

**阳起石**

**Actinolitum**

产于区域变质和接触变质岩中。分布于河北、山东、河南、湖北。

矿物(阳起石)：咸，温。补肾壮阳。用于阳痿早泄，子宫虚冷不孕，下焦虚寒，腰膝痿软冷痛。

**滑石**

**Talum**

产于变质岩、石灰岩、白云岩、菱镁矿及顶岩中。分布于辽宁、河北、山西、陕西、甘肃、山东、江苏、浙江、福建、湖北、广东、广西。

矿物(滑石)：甘，寒。清热，渗湿，利窍。用于暑热烦渴，小便不利，水泻，热痢，淋证，

黄疸，水肿，鼻血，脚气，皮肤湿烂。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**滑石片岩**

**Talc schist**

产于各种变质岩层带中。为一种短纤维的石棉类矿石，与阳起石相伴而生。分布于甘肃、河南、湖北。

单矿岩(阴起石)：起阴助阳，温暖子宫。用于子宫寒冷，久不受孕，带下病，淋漓不止。

**角闪石石棉**

**Asbestos hornblendum**

产于变质岩中。分布于河北、山西、陕西、河南、湖北、四川。

石棉(不灰木)：甘，寒。清热，除烦，利尿。用于肺热咳嗽，咽喉肿痛，烦热内热，小便不利，热痱。

附　注：功效相似的有**蛇纹石石棉 Asbestos serpentinum**，分布于河北、山西、陕西、河南、湖北，四川。

**软玉**

**Nephritum**

产于变质岩中。分布于吉林、辽宁、甘肃、新疆、湖北。

矿物粒屑(玉屑)：甘，平。润心肺，清胃热。用于喘息烦满，消渴，明目去翳。

## 4. 钙化合物类

**石膏**

**Gypsum**

产于海湾盐湖和内陆湖泊中形成的沉积岩中。常与石灰岩、粘土岩盐共生。分布于中南及甘肃、山东、安徽、四川、云南。

透明板块状、纤维状集合体矿物(石膏)：甘、辛，大寒。清热泻火，除烦止渴。用于外感热病，高热烦渴，肺热喘咳，胃火亢盛，头痛，牙痛。　粉红色扁平块状矿物(寒水石)：辛，寒。凉血降火，解毒。　青白色龟背状矿物(玄精石)：咸，寒。滋阴，降火，软坚，消痰。用于壮热烦渴，头风脑痛，目赤障翳，咽喉生疮。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**硬石膏**

**Anhydritum**

产于蒸发作用形成的盐湖沉积物中，常与石膏共生。低温热液脉，灰岩或白云质灰岩层中亦产。分布于山西、湖北。

矿物(长石)：辛，寒。利小便，通血脉，明目去翳。

**透石膏**

**Selenitum**

产于海湾盐湖和内陆湖泊中形成的沉积岩中。常与石灰岩、粘土盐岩共生。分布于

中南及甘肃、山东、安徽、四川、云南。

透明或近透明的矿物晶体(长石)：辛，寒。利小便，通血脉，明目去翳。

**纤维石膏**

**Gypsum fibrosum**

产于内陆湖泊形成的沉积岩中。分布于中南及山东、安徽、四川、云南。

矿物(理石)：辛、甘，寒。清热，除烦，止咳，开胃解烦，益精明目，破积，驱虫。

**钙芒硝**

**Glauberitum**

为盐湖中化学沉积物，可共存于现代和地质时代的湖相沉积层中。分布于辽宁、内蒙古、陕西、青海、新疆，湖北、四川、云南。

矿物(玄精石)：咸，寒。滋阴，降火，软坚，消痰。用于壮热烦渴，头风脑痛，目赤障翳，咽喉生疮。

**方解石**

**Calcitum**

产于内生热液矿脉或石灰岩、大理岩溶洞、裂隙的沉积物中。分布于河北、甘肃、安徽、江西、河南、湖南、四川。

矿物(方解石)：苦、辛，大寒。用于胸中留热，黄疸热甚者。　矿物(寒水石)：辛，寒。凉血，降火，解毒。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**白垩**

**Creta**

为由方解石质点和有孔虫、软体动物与球菌类的方解石质碎屑组成的生物化学沉积岩。产于白垩纪的沉积岩中。分布于河北、湖北。

土状结块或粉末(白垩)：苦，温。温中，涩肠，止血，敛疮。用于泄泻，吐血，衄血，眼弦赤烂，臁疮。

**石灰岩**

**Limestonum**

产于内生热液矿脉或大理岩溶洞、裂隙的沉积物中。分布于河北、安徽、江西、河南、湖北、湖南、四川。

经煅烧的石灰岩(石灰)：辛，温。有毒。燥湿，杀虫，止血，定痛，蚀恶肉。用于疥癣，湿疮，创伤出血，烧、烫伤，痔疮，脱肛，赘疣。

**钟乳石**

**Stalactitum**

产于石灰岩的溶洞或裂隙中。系含碳酸钙的水溶液从岩石裂隙滴下，经水分蒸发后沉积形成。分布于山西、陕西、甘肃、浙江、湖北、广东、广西、四川、云南。

圆柱状或圆锥状单矿岩(钟乳石)：甘，温。温肺，壮阳，下乳汁。用于虚劳咳喘，寒嗽，阳痿，腰脚冷痹，乳汁不通。　笔管状、圆柱状或中空稍弯曲的单矿岩（钟乳鹅管石或滴乳石)：功效同钟乳石。

**浮石**

**Pumex**

为火山作用形成的多孔质熔结熔岩。产于火山岩地区及其转石分布的河滩；或以贝壳碎屑为核心沉积形成的结核，产于沿海岛屿；或为胞孔科动物脊突苔虫、瘤苔虫类的骨骼。分布于辽宁、天津、山东、安徽、浙江、福建、湖北、广东。

多孔状块状物岩石(海浮石)：咸，寒。清肺化痰，软坚散结。用于痰热喘咳，老痰积块，瘿瘤，瘰疬，淋证，疝气，疮肿，目翳。　不规则结构块状石灰华(小海浮石)、胞孔科动物骨骼：功效均同海浮石。

**荧石**

**Fluoritum**

产于自热液脉中或伟晶气液作用形成的矿脉中。分布于黑龙江、辽宁、河北、甘肃、江苏、安徽、浙江、湖北、湖南。

矿物(紫石英)：甘，温。镇心，安神，降逆气，暖子宫。用于虚痨惊悸，咳逆上气，妇女不孕。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**黄土钙质结核**

**Calcareous loess nodule**

产于石灰岩风化淋滤的钙质结核和黄土结核地带。分布于东北、华北、西北。

矿石(姜石)：咸，寒。用于疔疮肿毒。

**蛇纹石大理岩**

**Ophicalcitum**

产于煤系地层中。为石灰岩或白云岩在高温和高压下重结晶的产物，是一种变质岩。分布于河北、山西、陕西、江苏、浙江、河南、湖北、湖南、四川。

复矿岩(花蕊石)：酸、涩，平。化瘀，止血。用于吐血，衄血，便血，崩漏，产妇血晕，死胎，胞衣不下，金疮出血。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 5. 钾化合物类

**硝石**

**Nitrum**

产于干燥土壤，岩石表面、洞穴及地表沉积物中。分布于山东、江苏、湖北、湖南、四川、贵州。

炼制出的结晶(消石)：苦、咸，温。有毒。破坚散积，利尿泻下，解毒消肿。用于瘀胀，心腹疼痛，吐泻，黄疸，淋证，目赤，喉痹，疔毒，痈肿。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**明矾石**

**Alunitum**

产于火山岩中。为含硫酸的溶液或蒸气与含钾和铝的岩石，尤其是酸性火山岩经化学变化而成。分布于山西、甘肃、安徽、浙江、福建、湖北。

炼制出的结晶(白矾)：酸、涩，寒。有毒。消痰，燥湿，止泻，止血，解毒，杀虫。用于癫痫，喉痹，痰涎壅盛，黄疸，肝炎。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 6. 钠化合物类

**硼砂**

**Borax**

产于干涸的含硼盐湖中，主产于干燥的内陆地带。分布于陕西、甘肃、青海、新疆、四川、西藏。

精制出的矿物结晶(硼砂)：甘、咸，凉。清热消痰，解毒防腐。用于咽喉肿痛，口舌生疮，目赤翳障，骨哽，噎膈，咳嗽痰稠。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**石盐**

**Halitum**

产于炎热干燥地区的内陆盐湖和海滨浅水泻湖中，常与其他盐类、石膏以及砂岩、粘土等伴生于沉积岩中。分布于内蒙古、陕西、甘肃、青海、新疆、山东、安徽、云南、西藏。

矿物结晶(大青盐)：咸，寒。凉血，明目。用于尿血，吐血，齿舌出血，目赤疼痛，风眼烂弦，牙痛。　红色或紫红色矿物(紫硇砂)：咸、苦、辛，温。有毒。消积软坚，破瘀散结。用于癥瘕痃癖，噎膈反胃，痰饮，喉痹，积痢，经闭，疔疮，痈肿恶疮。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**食盐**

**Sal communis**

产于海边或内陆盐井、盐池、盐泉中。分布于河北、青海、山东、江苏、安徽、湖北、四川。

食盐沥下的卤汁(盐胆水)：咸、苦。有大毒。用于疥，癣，瘘。　食盐加工制品(咸秋石)：咸，寒。滋阴降火。用于骨蒸劳热，咳嗽，咳血，咽喉肿痛，噎食反胃，遗精，白浊，膏淋，带下病。　天然食盐的结晶(光明盐)：咸，平。祛风明目。

**盐水**

**Salinus**

产于海水或盐井、盐池、盐泉中。分布于西北及河北，天津、内蒙古、山东、江苏、安徽、云南、西藏。

经煎晒而成的盐水结晶(食盐)：咸，寒。涌吐，清火，凉血，解毒。用于食停上脘，心腹胀痛，胸中痰癖，二便不通，咽喉痛，牙痛，目翳，疮疡，毒虫螫伤。

**盐卤**

**Bittenn**

产于海边或内陆盐湖、盐井及盐碱地。分布于辽宁、天津、青海、山东、江苏、上海、浙江、福建、台湾、湖北、四川。

结晶(盐卤)：苦、咸，寒。用于克山病，大骨结病，瘿瘤，高血压症，风湿性心脏病，慢

性咳嗽痰喘，皮炎，风热赤眼。

**芒硝**

**Mirabilitum**

产于含钠离子和硫酸根离子饱和溶液的内陆盐湖中。分布于河北、山西、甘肃、山东、江苏、安徽、河南、湖北。

矿物芒硝的精制品(芒硝)：辛、苦、咸，寒。泻热，润燥，软坚。用于实热积滞，腹胀便秘，停痰积聚，目赤障翳，丹毒，痈肿。　经风化失去结晶水而成的无水硫酸钠(玄明粉)：辛、咸，寒。泻热，润燥，软坚。用于实热积滞，大便不通，目赤肿痛，咽肿口疮，痈疽肿毒。粗制结晶(朴消)：功效同芒硝。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 7. 汞化合物类

**汞**

**Hydrargyrum**

产于辰砂(硫化汞)矿脉的氧化带，常呈小珠球存在于矿脉及岩石的洞隙内及浮土中。分布于甘肃、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

液态汞(水银)：辛，寒。有毒。杀虫，攻毒。用于疥癣，梅毒，恶疮，痔漏。　加工制成的赤色硫化汞(银朱)：辛，温。有毒。攻毒，杀虫，燥湿，祛痰。用于疥癣恶疮，痰气心腹痛。　加工制成的氯化亚汞结晶(轻粉)：辛，寒。有毒。杀虫，攻毒，利水，通便。用于疥癣，瘰疬，梅毒，下疳，皮肤溃疡，水肿，膨胀，大小便闭。　加工制成的二氯化汞和氯化亚汞混合结晶(白降丹)：败毒消肿，化腐生肌。用于痈疽发背，疔毒恶疮。　加工制成的氧化汞(升药)：有毒。搜脓，拔毒，去腐，生肌。用于痈疽，疔疮，梅毒，下疳。　加工制成的氯化亚汞和氯化汞的精制品(粉霜)：辛，温。有毒。攻毒，利水，通便。用于牙疳，梅毒恶疮，水肿，膨胀，大小便闭。　炼制升药后留在锅底的残渣(升药底)：杀虫，止痒。用于疥疮。　炼制轻粉所用器具内积累而成的黑色厚片(黑砂)：功效同轻粉。多外用。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**辰砂**

**Cinnabaris**

产于近代火山岩及温泉沉积附近的矿脉中或在石灰岩、白云岩中与方解石、白云石连生。在晶洞中，呈晶簇状结晶集合体存在。分布于西南及湖北、湖南、广西。

矿物晶体(朱砂)：甘，微寒。有毒。清心镇惊，安神解毒。用于心悸，失眠多梦，癫痫发狂，小儿惊风，视物昏花，口疮，喉痹，疮疡肿毒。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

## 8. 砷化合物类

**雄黄**

**Realgar**

产于低温热液矿脉中，温泉及火山附近也有存在。常与雌黄，辉锑矿等共生。分布于

甘肃、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

矿物(雄黄)：辛、苦，温，有毒。燥湿，祛风，杀虫，解毒。用于疥癣，秃疮，痈疽，走马牙疳，缠腰火丹，破伤风，蚊虫螫伤，腋臭，腋疮，哮喘，喉痹，惊痫，痔疮。

附　注：《中华人民共和国药典》1990年版收载。

**雌黄**

**Auripigmentum**

产于低温热液矿脉中，常与雄黄共生。在火山口壁和多孔性熔岩空隙中有极少量出产。分布于陕西、湖北、湖南、四川、贵州、云南。

矿物(雌黄)：辛，平。有毒。燥湿，杀虫，解毒。用于疥癣，恶疮，蚊虫螫伤，癫痫，寒痰咳喘，虫积腹痛。

**砷华**

**Arsenolitum**

产于含砷矿物的矿床氧化带，为典型的次生矿物。分布于甘肃、江西、湖南，广东、广西、贵州。

矿物(砒石)：辛、酸，热。有毒。祛痰截疾，杀虫。用于寒痰哮喘，疟疾，痔疮，瘰疬，走马牙疳，癣疮，溃烂腐肉不脱。　砒石经升华而得到的精制品(砒霜)：功效同砒石。

**雄砂**

**Arsenopyritum**

产于高中温热液矿床和某些接触变化矿床中，在热液矿脉中，与黄铁矿及其他硫磷化物共生，在接触变化矿床中与磁黄铁矿等共生，并有多种脉石矿物伴生。分布于甘肃、湖北、湖南、广东、广西。

矿物(雄石)：辛、甘，热。有毒。消冷积，祛风寒，蚀恶肉，杀虫。用于癥冷腹痛，积聚坚癖，风冷湿痹，痔漏息肉，恶疮癣疾。

## 9. 硅化合物类

**石英**

**Quartz**

产于热液矿脉中和岩石晶洞中，多产于伟晶岩、石英脉和金属矿脉中。分布于河北、陕西、甘肃、江苏、福建、湖北、广东。

白色晶体矿物(白石英)：甘，温。温肺肾，安心神，利小便。用于肺寒咳喘，阳痿，消渴，心神不安，小便不利，黄疸。

**白云母**

**Muscovitum**

产于酸性岩浆岩、花岗岩、伟晶岩、云英岩、变质岩及片麻岩中。是一种在较高温度和压力下形成的矿物。分布于吉林、辽宁、内蒙古、山西、山东、江苏、安徽、江西、浙江、湖北、湖南、西藏。

矿物(银精石)：甘，温。纳气坠痰，止血敛疮。用于虚喘，眩晕，惊悸，久痢，金疮出血。

**蛭石**

**Vermiculitum**

产于蚀变的含黑云母或金云母的岩脉中，是黑云母和金云母变化的产物。分布于山西、内蒙古、山东、河南、四川。

矿物(金精石)：咸，寒。有小毒。镇惊安神，明目去翳。用于目疾翳障，心悸怔忡，夜不安眠。

**水云母**

**Hydromica**

产于各种有色金属蚀变带，为热液蚀变的产物。分布于河南、广西、贵州。

矿物(黄石脂)：甘，平。养脾气，安五脏，调中，去虫。用于黄疸，泄泻，肠癖浓血，阴蚀下血，头痛恶疮。

**高岭石**

**Kaolinitum**

产于沉积岩系或煤层中或岩浆岩，变质岩等热液蚀变产物中，少存于风化壳中。分布几遍全国。

粘土矿物(白石脂)：甘、酸，平。涩肠，止血。用于久泻，久痢，崩漏带下，遗精。

**多水高岭石**

**Halloysitum**

产于岩石的风化壳和粘土层中。为湿热气候和氧化条件下风化生成的外生矿物。分布于山西、陕西、甘肃、山东、江苏、福建、安徽、河南、湖北。

粘土矿物(赤石脂)：甘、涩，温。涩肠，收敛，生肌。用于久泻久痢，便血，脱肛，遗精，崩漏带下，溃疡不敛。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**玉髓**

**Chalcedony**

产于喷出岩空洞、热液脉或温泉沉积中，由低温热液而成。也有由风化沉积而成的，产于风化壳碎屑沉积物中。分布于辽宁、陕西、甘肃、新疆、江苏、安徽、浙江、台湾、河南、湖北、四川、云南。

由多色玉髓组成并具同心带状结构的晶块(玛瑙)：辛，寒。清热明目。外用于眼生翳障，目赤红肿，视物不清。

**水黑云母片岩**

**Hydrobiotite schist**

产于区域变质作用形成的云母片岩中。分布于河北、河南。

复矿岩(金蒙石)：咸，平。逐痰，平肝。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990 年版收载。② 功效相似的有**蛭石片岩 Vermiculite schist**，分布于河北、河南。

**黑云母片岩**

**Biotite schist**

产于变质岩地带。分布于江苏、浙江、湖北、湖南、四川。

复矿岩(青礞石)：咸，平。坠痰，消食，下气，干肝。用于顽痰癖积，宿食癥瘕，癫狂惊痫，咳嗽喘急，痰涎上壅。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②功效相似的有**绿泥石化云母碳酸盐片岩 Chloritified mica carbonacite**，分布于江苏、浙江、湖北、湖南、四川。

**蒙脱石**

**Montmorillonitum**

为凝灰岩或基性火成岩在碱性环境中风化作用蚀变形成物。分布于吉林、河北、青海、甘肃、浙江、湖北。

土状矿物(甘土)：解毒。

**井底泥**

**Shaft bottom clay**

为井底淤积的灰黑色泥土。产于全国各地。

淤泥(井底泥)：寒。清热解毒。用于妊娠热病，胎动不安，头风热痛，天泡疮，热疖。

**地浆**

**Earth mud**

产于黄土水坑中。

地浆水(地浆)：甘，寒。清热，解毒，和中。用于中暑烦渴，伤食吐泻，脘腹胀痛，痢疾，食物中毒。

**漂白土**

**Fullers earth**

为在碱性作用下蚀变成的凝灰岩或玻璃质火成岩分解后的产物。分布于吉林、河北、甘肃、青海、浙江、湖北。

土状矿物(甘土)：解毒。

**灶心土**

**Terra flava usta**

为灶底久经柴草熏烧的土块。各地有产。

灶底中心之土块(伏龙肝)：辛，温。温中燥湿，止呕止血。用于呕吐反胃，腹痛泄泻，吐血，衄血，便血，尿血，妊娠恶阻，崩漏带下，痈肿溃疡。

## 10. 有色金属化合物类

**自然金**

**Aurum Natura**

产于高、中、温热液成因的含金石英脉中或火山岩系里与火山热液作用有关的热液矿床中。分布几遍全国。

锤或碾压成纸状薄片(金箔)：辛、苦，平。镇心，安神，解毒。用于惊痫，癫狂，心悸，疮毒。

**自然银**

**Argentum Natura**

产于热液矿脉或其氧化带内，少见于热水成矿的溶液沉淀物中。分布于辽宁、青海、浙江、广东、四川、云南。

锤炼成的薄片(银箔)：大寒。安神，镇惊，用于惊痫，癫狂，心悸恍惚，夜不安寐。

**菱锌矿**

**Smithsonitum**

产于原生铅锌矿的氧化带中。分布于湖南、广西、四川、云南。

矿物(炉甘石)：甘，温。去翳退赤，收湿敛疮，用于目赤翳障，烂弦风眼，溃疡不敛，皮肤湿疮。

附　注：①《中华人民共和国药典》1990年版收载。②功效相似的有**水锌矿 Hydrozincitum**，分布于湖南、广西、四川、云南。

**锡石**

**Cassiteritum**

产于岩浆作用后期的气液或高温热液矿床中。分布于江西、湖南、广东、广西、贵州、云南。

矿物(锡)：有毒。用于疔肿。　由锡石炼出的金属物(锡)：甘，寒。有毒。解毒。用于恶毒风疮。

**软锰矿**

**Pyrolusitum**

产于不同地质年代的浅海胶体沉积矿床中。分布于山西、陕西、青海、山东、湖北、广东、广西、四川。

矿物(无名异)：甘，平。去瘀止痛，消肿生肌。用于跌打损伤，痈疽肿毒。

**方铅矿**

**Galenitum**

产于热液矿床中，常与闪锌矿共生。分布于东北及甘肃、福建、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。

炼出的金属(铅)：甘，寒。有毒。镇逆，坠痰，杀虫，解毒。用于痰气壅逆，上盛下虚，气短喘急，噎膈反胃，癥瘕，瘰疬，疔毒，恶疮。　用铅制成的四氧化三铅(铅丹)：辛、咸，寒。有毒。解毒，生肌，坠痰镇惊。用于痈疽，溃疡，金疮出血，口疮，目翳，汤火灼伤，惊痫癫狂，疟疾，痢疾，吐逆反胃。　用铅加工制成的碱式碳酸铅(铅粉)：甘、辛，寒。有毒。消积，杀虫，解毒，生肌。用于疳积，下痢，虫积腹痛，症瘕，疟疾，疥癣，口疮，丹毒，烫伤。　用铅加工制成的醋酸铅(铅霜)：甘、酸，寒。有毒。坠痰，镇惊，止衄，敛疮。用于惊痫，热痰，鼻衄，喉痹，牙疳，口疮，溃疡。　铅在铁器中熬制而成的黑灰(铅灰)：用于瘰疬，虫积。　用铅粗制的氧化铅(密陀僧)：咸、辛，平。有毒。消积杀虫，收敛防腐，坠痰镇惊。用于痔疮，肿毒，溃疡，湿疹，狐臭，创伤，久痢，惊痫。

## 11. 古动物化石类

**古脊椎动物化石**

**Fossil paleovertebrales**

为古代哺乳动物如象类、犀牛类、三趾马类等动物化石。分布于华北及陕西、青海、山东、安徽、河南、湖北、广西、四川、云南。

骨骼化石(龙骨)：甘、涩，平。镇惊安神，敛汗固精，止血涩肠，生肌敛疮。用于癫狂，征忡健忘，失眠多梦，自汗盗汗，遗精淋浊，吐衄便血，崩漏带下，泻痢脱肛，溃疡久不收口。　牙齿化石(龙齿)：涩，凉。镇惊安神，除烦热。用于惊痫癫狂，烦热不安，失眠多梦。　角骨化石(龙角)：甘，平。用于惊痫癫狂，身热，腹坚及热泄。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**古腕足类动物化石**

**Fossil paleobrachiopod**

为古代腕足类石燕子科动物中华弓石燕及近缘动物的化石。分布于山西、甘肃、江西、湖北、湖南、广西、四川。

化石(石燕)：咸，凉。除湿热，利小便，退目翳。用于淋证，小便不通，带下病，尿血，肠风痔漏，眼目障翳。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**古节肢动物化石**

**Fossil paleoarthropod**

为古代节肢动物石蟹及其他近缘动物化石。分布于台湾、海南、四川、贵州。

化石(石蟹)：咸，寒。清肝明目，消肿解毒。用于目赤，翳膜遮睛，喉痹，痈肿，漆疮。

**古石鳖科动物化石**

**Fossil paleotrionychidae**

为古代石鳖科动物化石。产于贵州。

化石(石鳖)：甘，凉。用于淋疾血证。

## 12. 其他矿物类

**自然硫**

**Sulphur**

产于火山作用形成的矿床和沉积岩层中。分布于山西、陕西、山东、江苏、台湾、河南、湖北、湖南、广东、四川。

自然硫矿冶炼物(硫黄)：酸，热。有毒。壮阳，杀虫。用于阳痿，虚寒泻痢，大便冷秘；外用于湿疹，疥癣，癞疮。　与雄黄经升华制成的砷硫化合物(小灵丹)：散寒止痛。用于脾虚久泻，胃寒腹痛，妇女血寒，行经腹痛，肾寒疝气。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**硇砂**

**Sal-Ammoniac**

产于火山地带或煤层中，为火山喷气凝华物或煤层地下失火逸散之气体凝华产物。分布于甘肃、青海、新疆。

晶体(白硇砂)：咸、苦、辛，温。有毒。消积软坚，破瘀散结。用于症瘕痃癖，噎膈反胃，痰饮，喉痹，积痢，经闭，疔疮，痈肿恶疮。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**松科植物树脂化石**

**Fossil pinaceae resim**

产于褐煤、粘土、沉积岩和冲积土壤中。多属第三纪湖泊，河流相沉积物和陆源成因的沉积物。分布于辽宁、陕西、福建、河南、湖北、广西、贵州、云南。

化石(琥珀)：甘，平。镇惊安神，散瘀止血，利水通淋。用于惊风癫痫，惊悸失眠，血淋血尿，小便不通，痈疽疮毒，跌打创伤。

附　注：《中华人民共和国药典》1990 年版收载。

**石油**

**Petraleum**

低级动、植物在地层由细菌作用，经过复杂的生化作用变化而成。通常聚集在有孔隙及裂缝的岩石中。分布于黑龙江、辽宁、河北、陕西、甘肃、宁夏、山东、河南、湖北、及沿海海洋大陆架。

原油(石脑油)：辛，苦。有毒。用于小儿惊风，恶疮。

**麦饭石**

**Maifanitum**

产于火山岩、次火山岩及其蚀变岩石。分布于黑龙江、辽宁、天津、内蒙古、河南、湖北。

复矿岩(麦饭石)：甘，温。用于一切痈疽发背，食欲不振，肾虚，贫血，月经失调。

**矿泉水**

**Aquae minerale**

来自于地下水源矿脉，露出地表成泉为矿泉水。分布于黑龙江、辽宁、内蒙古、陕西、湖北、广东、广西、四川、云南、西藏。

泉水(矿泉水)：用于胃溃疡，心血管病，风湿，皮肤病及癌症。

# 植、动、矿物中名索引*

## 检 字 表


【一画】 一

【二画】 二丁十七人八儿九丫了刀刁

【三画】 三千工土寸下万大上小口山千川个及广弓卫子女飞叉马

【四画】 王开井天无元云木支五不太犬友戈车牙巨互匹瓦切止少水日月中内贝见风凤丹午牛丰手毛长升片化反爪介仓公分勾勾乌六文方心火斗巴孔书双

【五画】 玉打扒巧正甘艾节古可石布龙平东卡北田甲叶叫叩史凸凹四生矢失禾丘代仙仪白瓜丛令印皮冬鸟包市玄宁穴闪兰半头汇汉永司尼辽边奶发对台加圣矛母丝

【六画】 动吉老地扣扩托扫扬芋芨芍芒芝耳亚朴西百列有灰夹尖劣当光吐吕吊虫早曲团回同网肉刚帆朱舌竹乔优伏似仰仿伊伪华向自血后舟企会合企伞肌肋色多各朵杂安守闭问过达衣齐交关羊并米灯壮冰决江污池汝兴祁许寻异阳防阴如买羽观驯红纤约

【七画】 寿麦弄玛韧抚扶拒扯折报护拟扭走汞贡壳赤坛块芜苇苣芸芙芫苋劳荫芮花芥芹苍芬灰芒芦芳苏芭芯杜杉杓杨杠杠极李杏克学巫求豆束更两辰矶丽来医步怀坚卤肖吴呆足串吻里旱围岗钉针牡乱秃秀何伸伯伶低伽佛皂余佘含邻谷肝肚肠饭龟角条卵狄延远还连近返迎亨辛库庐疗间羌灶冻冷汤沉沟汶沅沙沦诃补君灵层尾陆陀阿陇附张孜忍劲鸠鸡纳纵纺纽驱驳驴

【八画】 青环玫武拔抹拐抽抱拉披坡坭顶苦苯茂苹苜苘英苞苓苎范茄苔茅茎其枝枫构枪杭松林板杯画直刺枣雨矿郁奇奈鸢轮软转卧欧非齿歧卓虎咖虺鸣明果昂昙具图岩岭帐帕罗败钗垂秉知牧牦刮委和秆岳版使侧佩依货怪建送肾阜爬金舍斧乳采念郎肿肢股肥胀周饰鱼忽狗狐变京夜奕刻育充宝定宜空帘卷籽逆单房净河浅法油泡沿泥泽沼波帚居屁屈陌降陕函虱参绉线细贯驼

【九画】 韭春毒珊珍珀玻玳城挺挂挖指挪垫革荆荚荞茸草荧荤茴茜茯茬茗茼茶荠茫荡药荨荩荫荔荜莓莎莠莲莴莱莽莺莫获莹莪莨莩莪莲莴莱莽莺莫获莹莪莨莩莪莲莴莱莽莺莫获莹莪莨莩莪

【十三画】 瑞琵摄鼓塌嫔赖禁墓蓝涌蓬蓄高蒙裔嫩蒙蓟蘸楼楠楝榉榆椭椴槐椿楔楸樗福楹赖麦面零感碎碗硼辐道虞嗜照暗暧溅瞎路跳蜈蛾锋鲩蝉蜕蝤置蛹蜀蜕锯铺饰锥锡矮雏貉稠稗穆新简催微腹腺腾解鲇鲅轴鲍鲈鲩鲌鲇鲫鼠雏鹑鹌鹏鹑意慈滇满溪滨滩福裸褐裾群嫁叠缢缠缝

【十四画】 静瑶碧墙嘉赫蔷蔓鼙鼻龈瘴蕉蓼榈格榛椎槟槛寒酸碱碟磁豁蛋翡雌截颗蜘蜡鳊鳍鲞鳏鳄舞管算箸僧鼻魁膜膀傻鲜鲟鲳鲅鲑鲑鲑鲜獐豪麂瘦辣韶赛寨蜜察粽漆漂滴漾漏肇翠熊缩缫骡

【十五画】 鞍鼾撒撑赭鞑嫉鼻意戴蕉蕊城榜樊榭槽横豌震醉飘弊嘱暴蝗蝙蝼蝎蜡蝙蝤蜍蝶蝶蝴蝗蜻蝠蝌蝰墨稻稷穆德箭膝鲫鲋鲤鲢鲛鲩鲫鳘鹤鹇鹊鹉瘤额潮澳潺澜缅缝

【十六画】 髭燕鹋薯蕗薄薯蘑膊颈颃橙橄橘橡橐霍豢冀踏蹄嘴螃黔镜篱篮篌懦衡膨獭褶鲳鲛鳃鲶鲸鲳鲷鲸鲭鲱鹦鹋磨魔瘰樱凝龄窿糙糖壁

【十七画】 鳆藏黄菜蘑檀檫霞霜礁蟥螯蟋螺穗篦簇繁爵鳊鳃鳜鳆鳍鳇鳎鳐鳙鳊鳘鳄编鳇蠢盼麋橱霄翼鹳鹘鹪骤

【十八画】 藤檩臘蕉鞭鼍蟛蟠蟪镰馥翻鳎鳑鳐蟹鼬鹏鹭鹰

【十九画】 蘑藜藻蘑攀檫蹊蟾鹘鳒鳗鳙鲸鳓鳊鳓鳑爆

【二十画】 囊醴酱鼍鳐蠓鳜鳙鳝鳞鼯麒糯灌

【二十一画】 露霸薛鳢鳎魔麝赣

【二十二画】 囊鹳蠊镶

【二十三画以上】 鬻鱳鬣鱳

## 一 画

一文钱 389
一年蓬 1293
一把伞南星 1470
一把香 756
一花无柱兰 1517
一串红 1104
一担柴 733
一担柴属 733
一枝黄花 1342
一枝黄花属 1342
一点血秋海棠 781
一点红 1292
一点红属 1292
一品红 630
一球悬铃木 458
一掌参 1554

## 二 画

二叉仙茅 17
二叶午鹤草 1388
二叶舌唇兰 1556
二叶红门兰 1552
二叶红薯 1028
二叶独蒜兰 1558
二叶梅花草 482
二叶獐牙菜 954
二列叶柃 415
二列委陵菜 515
二色五味子 276
二色补血草 924
二色香青 1244
二色党参 1228
二色棘豆 591
二花羽叶枝子花 1064
二形卷柏 73
二角菱 801
二苞黄精 1394
二齿香科科 1113
二齿稠螽 1614
二歧乌头高 1144
二歧银莲花 314
二郎山报春 919
二型叶沙参 7222
二型革盖菌 29
二柱繁缕 249
二翅六道木 1199
二斑布氏参 1637
二增羊耳蒜 1546
丁子香 803
丁公藤 1027
丁公藤属 1027
丁香杜鹃 892
丁香花 1025
丁香茄 943
丁香蓼 822
丁香蓼属 822
丁癸草 609
丁癸草属 609
丁座草 1196
丁座草属 1196
丁蚓 1581
丁蚓属 1581
十大功劳 369
十大功劳属 368
十万错 1165
十万错属 1165
十字花科 446
十字苔草 1487
十齿花 694
十齿花属 694
十楼山矾 931
七小叶崖爬藤 726
七爪龙 1028
七叶一枝花 1390
七叶灯台莲 1473
七叶赤飑 792
七叶树 680
七叶树科 679
七叶树属 679
七叶蓼 1413
七丝鲈 1653
七里明 1267
七层楼 988
七姐妹 526
七指蕨 78
七指蕨科 78
七指蕨属 78
七星莲 767
七筋姑 1374
七筋姑属 1374
七鳃鳗科 1643
七鳃鳗属 1643
人心果 926
人血草 444
人血草属 444
人字果 340
人字果属 339
人参 842
人参娃儿藤 988
人参属 842
人面子 667
人面子属 667
八仙过海 1475
八仙草 995
八角 281
八角枫 824
八角枫科 824
八角枫属 824
八角科 279
八角金盘 839
八角金盘属 839
八角盘 365
八角莲属 364
八角属 279
八宝 463
八宝茶 699
八哥 1737
八哥属 1737
儿茶 545
九子母属 667
九节 1013
九节龙 904
九节属 1013
九龙盘 1372
九头狮子草 1171
九头狮子草属 1171
九州鳉 1671
九来龙 1027
九里香 649
九里香属 649
九层塔 70
九味一枝蒿 1056
九牯牛 228
九香虫 1618
九香虫属 1618
九翅豆薯 1507
九斑刺鲀 1692
九管血 900
丫蕊花 1402
丫蕊花属 1402
了哥王 757
刀叶石斛 1536
刀豆 557
刀豆属 557
刀鲚 1653
刁海龙 1673

## 三 画

三七 843
三七草 1300
三七草属 1300
三小叶人字果 340
三小叶山豆根 573
三小叶翠雀花 339
三叉耳蕨 120
三叉苦 647
三叉蕨 122
三叉蕨科 121
三叉蕨属 122
三开瓢 772
三巨瘤丽蚌 1584
三分七 1116
三分三 1116
三分丹 988
三叶马先蒿 1144
三叶木通 371
三叶木藍 581
三叶乌蔹莓 723
三叶白蔹 721
三叶赤飑 792
三叶豆薯 1505
三叶罗伞 838
三叶委陵菜 516
三叶爬山虎 725
三叶金锦香 811
三叶荚蒾 1214
三叶香草 915
三叶悬钩子 531
三叶崖爬藤 726
三叶梨头尖 1482
三叶紫菀 431
三叶鼠尾草 1105
三叶蝴蝶花豆 563
三叶漆 671
三叶漆属 671
三叶蹄蹩 1748
三白草 388
三白草科 387
三白草属 388
三头水蜈蚣 1495
三头灯心草 1426
三对节 1049
三台花 1049
三芒草属 1435
三列海胆属 1640
三尖杉 154
三尖杉科 154
三尖杉属 154
三尖栝楼 796
三出假瘤蕨 134
三出翠雀花 334
三舌尾药千里光 1347

三色拟迷孔菌 29
三色堇 770
三羽新月蕨 106
三花马蓝 1175
三花龙胆 950
三花连蕊茶 414
三花枪刀药 1170
三花莸 1046
三花悬钩子 536
三角叶风毛菊 1328
三角叶冷水花 204
三角叶驴蹄草 320
三角叶苧麻 207
三角叶堇菜 770
三角叶党参 1229
三角叶黄连 333
三角叶薯蓣 1412
三角叶蟹甲草 1289
三角叶蛙 1585
三角叶 1631
三角槭 672
三角藻 11
三角瓣花属 1013
三枝九叶草 366
三刺鸟角 575
三刺鱼科 1691
三刺鱼属 1691
三轮草 1491
三齿马野豌豆 605
三果大通翠雀花 338
三股筋香 291
三宝木属 640
三姬妹 1066
三线闭壳龟 1700
三指雪莲花 1330
三点金草 570
三带壮蜗牛 1580
三品一枝花 1423
三星龙胆 1619
三脉山黧豆 582
三脉钝叶黄芩 1109
三脉梅花草 484
三脉紫菀 1258
三疣梭子蟹 1605
三籽两型豆 548
三椏乌药 290
三索锦蛇 1708
三翅水毛花 1497
三翅铁角蕨 109
三蜂燕鳐 1671
三球悬铃木 458
三趾鹑科 1726
三趾鹑属 1726
三港雨蛙 1697
三棱枝杭子梢 557
三棱虾脊兰 1524
三棘骨螺 1575
三裂八角枫 825
三裂叶白头婆 1296
三裂叶绢蒿 1338
三裂叶野葛 597
三裂绣线菊 543
三裂蛇葡萄 721
三裂紫菀 439
三裂碱毛蕨 340
三幅柴胡 356
三稔蒟 619
三蕊草 814
三褶虾脊兰 1524
三穗苔草 1487
千花豆 574
千花豆属 574
千朽菌科 26
干旱毛蕨 106
千香柏 149
千型两栖蓼 220
千酪菌属 35
工布乌头 305
土丁桂 1027
土丁桂属 1027
土人参 237
土人参属 237
土木香 1304
土牛膝 257
土贝母 394
土田七属 1513
土白蚁属 1612
土瓜狼毒 630
土灰虹 1631
土肉桂 285
土庄绣线菊 542
土坛树 825
土钉虫 1591
土钉虫属 1591
土连翘 1003
土连翘属 1003
土沉香 752
土沉香属 752
土荆芥 254
土茯苓(红菉鲜) 1396
土密树 623
土密树属 622
土密藤 622
土蜂科 1633
土蜂属 1633
土圈儿 548
土圈儿属 548
寸金草 1061
下田菊 1240
下田菊属 1240
下江忍冬 1204
下延三叉蕨 122
下延古当归 851
下延沙皮蕨 121
下齿细螯寄居蟹 1604
万丈深 1284
万年青 1394
万年青属 1394
万年松 238
万年藓 64
万年藓科 64
万年藓属 64
万寿竹 1376
万寿竹属 1376
万寿菊 1347
万寿菊属 1347
万带兰 1560
万带兰属 1560
大八角 279
大丁香 1311
大丁香属 1311
大刀(二点)蝗螂 1612
大三叶升麻 321
大口鲇 1668
大山雀 1742
大山黧豆 581
大千岁藟 730
大千年健 1476
大子买麻藤 157
大王乌先蒿 1147
大天葵 346
大天鹅 1718
大牙斑鲆 1689
大瓦韦 129
大见血飞 554
大风子 763
大风子科 762
大风子属 763
大乌泡 533
大心翼果 708
大火草 316
大孔集毛菌 29
大节竹 1447
大节竹属 1447
大石花菜 34
大叶山柰 1512
大叶山柳 881
大叶山蚂蝗 569
大叶山楝 659
大叶千里光属 1279
大叶子 473
大叶子属 473
大叶马兜铃 395
大叶马蹄香 400
大叶井口边草 91
大叶云实 555
大叶车前 1198
大叶凤仙花 683
大叶牛奶菜 983
大叶勾儿茶 709
大叶乌蔹莓 723
大叶火烧兰 1537
大叶火筒树 732
大叶火焰草 469
大叶石上莲 1189
大叶石龙尾 1136
大叶石头花 242
大叶石岩枫 635
大叶龙角 764
大叶仙茅 1409
大叶白纸扇 1009
大叶白麻 961
大叶冬青 689
大叶地不容 382
大叶朴 179
大叶百两金 901
大叶肉托果 670
大叶合欢 565
大叶过路黄 914
大叶红河鹅掌柴 845
大叶苎麻 192
大叶构兰 1530
大叶杨 163
大叶冷水花 203
大叶补血草 924
大叶附地菜 1040
大叶青芙叶 830
大叶刺黄柏 368
大叶刺篱木 763
大叶金牛 664
大叶金腰 475
大叶鱼骨木 991
大叶卷柏 73
大叶沿阶草 1390

大叶贯众 115
大叶柘 177
大叶茜草 1017
大叶茶 414
大叶南苏 1480
大叶胡枝子 583
大叶胡颓子 760
大叶厚朴 267
大叶骨碎补 124
大叶钩藤 1020
大叶香港四照花 828
大叶桉 285
大叶桉 803
大叶柴胡 853
大叶铁线蓬 326
大叶臭花椒 655
大叶拿身草 569
大叶唐松草 348
大叶宽等荸荠 1191
大叶酒饼簕 642
大叶海桐 492
大叶栲 935
大叶黄檗木 990
大叶黑藤 981
大叶蛇葡萄 722
大叶银背藤 1024
大叶假鹰爪 271
大叶落新妇 473
大叶斑鸠菊 1354
大叶紫珠 1043
大叶紫堇 436
大叶蒲公英 1349
大叶荛 390
大叶碎米荠 450
大叶睡莲 386
大叶锣 1184
大叶腹水草 1159
大叶新木姜子 297
大叶溲疏 482
大叶蔷薇 526
大叶酸藤子 907
大叶算盘子 632
大叶囊吾 1317
大叶藓 63
大叶藓属 62
大叶熊巴掌 813
大叶樟叶越橘 897
大叶醉鱼草 1130
大叶糙苏 1097
大叶藤 384
大叶藤黄 420
大叶藤蕨 384
大叶藻 1363
大叶藻属 1363
大叶鳞毛蕨 117
大叶甲 1621
大白花地榆 537
大白花杜鹃 891
大白刺 615
大白药 983
大白桩菇 37
大白蜡 1714
大头三裂叶绢蒿 1338
大头豆芫菁 1621
大头青蒿 1250
大头典竹 1441
大头金蝇 1632
大头狗母鱼 1655
大头狗母鱼属 1655
大头茶 417
大头茶属 417
大头菜 447
大头续断 1219
大头囊吾 1316
大头鲟 1672
大托叶耳草 1002
大芒萁 84
大耳叶风毛菊 1331
大耳猬 1746
大百合 1373
大百合属 1373
大灰藓 66
大尖囊兰 1546
大当归 849
大团囊虫草 20
大团囊菌 20
大竹蝗 1589
大竹鼠 1756
大血藤 371
大血藤科 371
大血藤属 371
大华丽螺旋 1633
大全叶山芹 871
大羽贯众 115
大羽铁角蕨 108
大羽藓 65
大羽鳞毛蕨 118
大观音座莲 81
大红泡 531
大麦 1446
大麦属 1446
大拟鼻花马先蒿 1147
大苇莺 1740
大花八角 281
大花小檗 359
大花万寿竹 1377
大花川梨 522
大花飞蛾藤 1031
大花马齿苋 236
大花无柱兰 1517
大花五味子 276
大花五桠果 401
大花水蓑衣 1169
大花毛建草 1064
大花双参 1222
大花石上莲 1196
大花龙芽草 496
大花田菁 598
大花白及 1520
大花半边莲 1236
大花对叶兰 1548
大花羊耳蒜 1546
大花红景天 406
大花花锚 953
大花杓兰 1531
大花还亮草 334
大花忍冬 1203
大花鸡肉参 1162
大花青藤 299
大花刺参 1220
大花软枝黄蝉 959
大花金挖耳 1273
大花金钱豹 1227
大花帘子藤 968
大花卷丹 1386
大花韭 1366
大花荆芥 1093
大花胡麻草 1133
大花胡颓子 759
大花柳叶菜 821
大花枇杷 507
大花锥子 998
大花独蒜兰 1557
大花美人蕉 1515
大花活血丹 1073
大花神香草 1075
大花扁蕾 952
大花兔唇花 1082
大花荷包牡丹 438
大花党参 1230
大花铁线莲 324
大花益母草 1084
大花绣球藤 329
大花黄杨 705
大花银莲花 316
大花兜被兰 1550
大花剪秋罗 243
大花斑叶兰 1540
大花萱草 1383
大花菟丝子 1026
大花酢浆草 610
大花紫薇 798
大花溲疏 477
大花蓝盆花 1221
大花蒿 1254
大花蕨藜 616
大花睡莲 386
大花蓼 226
大花蝇子草 247
大花漆 671
大花糙苏 1097
大花藤 986
大花藤属 986
大芦 1453
大杜鹃 1731
大杓鹬 1728
大豆 576
大豆属 576
大豆蕨 1512
大豆蕨属 1512
大丽花 1285
大丽花属 1285
大步甲 1619
大吴风草 1296
大吴风草属 1296
大足蝠 1747
大秃马勃 50
大条彩丽金龟 1624
大连湾牡蛎 1583
大序腺距兰 1526
大序醉鱼草 1130
大沙叶 1013
大沙叶属 1012
大灵猫 1764
大灵猫属 1764
大尾摇 1035
大纽子花 972
大青 1047
大青弹涂鱼 1685
大青属 1046
大青薯 1411
大苞水竹叶 1428
大苞叶猪屎豆 564
大苞苔草属 1177

大苞姜 1508
大苞姜属 1508
大苞鸭跖草 1427
大苞黄精 1394
大苞寄生 215
大苞寄生属 215
大枝绣球 480
大画眉草 1443
大刺茶藨 485
大胡蜂 1634
大齿山芹 870
大明山常山 478
大明竹属 1454
大果人面子 668
大果卫矛 698
大果飞蛾藤 1031
大果水竹叶 1429
大果巴戟 1007
大果冬青 689
大果玄参 1152
大果花楸 539
大果冷水花 204
大果沙枣 758
大果忍冬 1202
大果咖啡 993
大果树参 838
大果圆柏 153
大果琉璃草 1034
大果榉 182
大果榆 182
大果俞藤 731
大果微花藤 707
大果椅树 656
大果嘴签 712
大罗伞树 902
大狗尾草 1457
大泷六线鱼 1688
大油芒 1458
大油芒属 1458
大孢硬皮马勃 52
大参 842
大参属 840
大英藤 609
大英藤属 609
大茜草 1016
大草履虫 1565
大药猴牙菜 957
大树蛙 1698
大鸨 1728
大冠远志 664
大须鲸 1758
大剑叶山芝麻 749
大独脚金 1153
大籽鱼木 446
大籽猕猴桃 407
大籽筋骨草 1058
大籽蒿 1257
大籽猿牙菜 956
大扁头蟋 1615
大珠母贝 1582
大株粗茎红景天 467
大翅色木槭 674
大翅蓟 1321
大翅蓟属 1321
大唇血见愁 1114
大唇羊耳蒜 1546
大通风毛菊 1330
大通翠雀花 338
大狼把草 1265
大狼毒 629
大宽萼苣苔 1191
大海蛇藤 711
大理土千年健 897
大理山梗菜 1235
大理百合 1386
大理青兰 1065
大理苔草 1489
大理罗汉松 153
大理茜草 1016
大理南星 1470
大理秋海棠 781
大理鹿蹄草 883
大理裂腹鱼 1665
大理藜芦 1401
大黄 231
大黄芩 1106
大黄鱼 1678
大黄芪 1069
大黄栀子 999
大黄属 231
大黄蝠 1747
大黄囊吾 1315
大黄檗 357
大野芋 1475
大野豌豆 606
大眼青鳞鱼 1652
大眼鲷科 1676
大眼鲷属 1676
大眼鳊 1689
大眼鳊属 1689
大眼鳎 1676
大蛞蝓 1579
大银鱼 1654
大寄居蟹 1603
大猪屎豆 564
大麻 184
大麻叶乌头 302
大麻叶泽兰 1295
大麻药 571
大麻哈鱼 1653
大麻哈鱼属 1653
大麻属 184
大盖球子草 1392
大渡乌头 306
大弹涂鱼 1684
大弹涂鱼属 1684
大斑芫菁 1622
大斑花败酱 1216
大斑花鳉 1667
大斑螯 1622
大弯委陵菜 516
大弯鸟耳草 1135
大弯党参 1230
大弯黄瑞木 410
大弯葵 740
大弯葵属 740
大戟 629
大戟科 618
大戟属 625
大棕蝠 1747
大鼠 1720
大喙雀藤 1461
大黑沙椤 88
大黑鳃角金龟 1623
大蒜芥属 457
大蓑蛾 1627
大蓑蛾属 1627
大蝉草 1616
大锥香茶菜 1079
大腹圆蛛 1596
大鼠耳蝠 1747
大蜣螂 1623
大蜻蜓 1609
大蝉草 1616
大管 649
大管乌头亚属 1142
大管鼻蝠 1747
大膜盖蕨 125
大膜盖蕨属 125
大鲵 1694
大鲵属 1694
大漂 1478
大漂属 1478
大蕉 1500
大鳃鳍虾 1603
大蝎子草 198
大箭叶蓼 229
大嘴乌鸦 1738
大蹄蝠 1748
大鳍鳐 1664
大壁虎 1704
大藤紫金龙 438
大鳞鲃 1696
大鳞属 1610
大鳞泥鳅 1667
大鳞副泥鳅 1667
上林崖爬藤 728
上思厚壳树 1035
上思粗叶木 1006
小二仙草 823
小二仙草科 823
小二仙草属 823
小八角莲 364
小刀蛏 1589
小刀螳螂 1611
小三叶碎米荠 450
小三脉叶耳蕨 119
小寸金黄 913
小大黄 232
小口小金发藓 67
小山兰 1553
小山飘风 469
小马齿苋 237
小马勃 51
小天仙子 1119
小天鹅 1718
小无心菜 238
小云雀 1735
小木通 322
小五彩苏 1062
小牛肝菌 43
小牛肝菌属 43
小长颈蟋属 1615
小爪水獭 1762
小公鱼属 1652
小勾儿茶 711
小勾儿茶属 711
小玉竹 1393
小甘菊 1272
小甘菊属 1272
小石花菜 14
小石积属 513
小石藓 61
小石藓属 61

小龙虱 1619
小叶八仙草 995
小叶九节 1014
小叶三点金草 569
小叶大戟 628
小叶女贞 940
小叶马蹄香 400
小叶云实 555
小叶五月茶 620
小叶乌药 287
小叶六道木 1199
小叶书带蕨 100
小叶平枝栒子 503
小叶石梓 1050
小叶石楠 514
小叶白点兰 1560
小叶半枫荷 462
小叶地不容 383
小叶地笋 1086
小叶灰毛蒌 1045
小叶吊石苣苔 1188
小叶买麻藤 157
小叶杜鹃 894
小叶冷水花 203
小叶忍冬 1203 1205
小叶青冈 173
小叶青荚叶 830
小叶爬岩香 389
小叶金露梅 518
小叶珍珠花 897
小叶茶藨 486
小叶荆 1054
小叶栎 176
小叶柳 165
小叶鸦鹊饭 1042
小叶墨宿菜 916
小叶扁担杆 735
小叶榔 168
小叶栒子 504
小叶唇柱苣苔 1182
小叶蚊母树 459
小叶海金沙 85
小叶梣 934
小叶黄花稔 744
小叶黄杨 705
小叶蕨萁 1392
小叶野决明 601
小叶眼子菜 1362
小叶眼树莲 980
小叶假糙苏 1096
小叶密花远志 665
小叶寄树兰 1558
小叶猪殃殃 997
小叶猕猴桃 407
小叶鹿蹄草 883
小叶葛藟 730
小叶葡萄 731
小叶韩草信 1108
小叶鹅掌柴 846
小叶紫椴 736
小叶黑面神 622
小叶黑柴胡 855
小叶楼梯草 197
小叶榄 658
小叶锦鸡儿 559
小叶鼠李 716
小叶榕 186
小白及 1519
小白花地榆 538
小白蜡 307
小白额雁 1717
小丛红景天 466
小皮伞属 38
小包脚菇属 41
小头凉喉茶 1000
小头海蛇 1710
小头蓼 226
小地黄连 660
小百合 1386
小舌唇兰 1557
小舌菊 1320
小舌菊属 1320
小舌紫菀 1260
小乔木紫金牛 899
小伞虎耳草 488
小羊耳蒜 1546
小羊肚菌 23
小米空木 543
小米空木属 543
小米草 1134
小米草属 1134
小米辣 1118
小灯心草 1424
小决明 561
小阴地蕨属 78
小羽藓属 65
小红花寄生 213
小红参 1018
小红菊 1285
小红隐翅虫 1620
小麦 1459
小麦属 1459
小报春 920
小赤车 201
小赤麻 194
小芸木 649
小芸木属 649
小花人字果 339
小花八角 280
小花八角枫 825
小花下田菊 1240
小花山萝 1502
小花山桃草 821
小花五味子 277
小花五桠果 401
小花凤仙花 684
小花火烧兰 1537
小花龙芽草 496
小花龙血树 1405
小花地不容 382
小花地笋 1086
小花托里贝母 1378
小花百合 1386
小花吊兰 1374
小花灯心草 1424
小花红花荷 462
小花报春茜 1007
小花扭柄花 1398
小花苣苔 1183
小花苣苔属 1183
小花花椒 654
小花旱麦瓶草 247
小花远志 662
小花忍冬 1205
小花青藤 300
小花鸢尾 1422
小花金挖耳 1274
小花角茴香 446
小花荆芥 1092
小花草玉梅 316
小花荠苎 1090
小花柳叶菜 821
小花香槐 563
小花鬼针草 1265
小花盾叶薯蓣 1415
小花姜花 154
小花扁担杆 734
小花党参 1230
小花琉璃草 1034
小花黄堇 434
小花棣木 829
小花清风藤 683
小花葱 1023
小花藜豆 591
小花紫草 1037
小花紫菀 1259
小花阔蕊兰 1554
小花溲疏 478
小花蜘蛛抱蛋 1372
小花蜻蜓兰 1560
小花楼斗菜 318
小花磨盘草 739
小花糖芥 452
小杜鹃 1731
小杉兰 69
小杉藻 16
小针裂叶绢蒿 1338
小谷精草 1433
小连翘 422
小冻绿树 715
小沙丁鱼属 1652
小灵猫 1764
小鸡爪槭 675
小鸡油菌 26
小骏骨 1168
小青杨 163
小顶冰花 1382
小顶柄灰包 49
小苜蓿 586
小苞瓦松 465
小苞沟酸浆 1141
小茄 915
小枝青冈 176
小构树 184
小画眉草 1444
小齿铁线莲 332
小齿锥花 1073
小果丫蕊花 1402
小果山龙眼 207
小果山菠萝 1483
小果卫矛 698
小果白刺 615
小果冬青 689
小果红莓苔子 888
小果皂荚 575
小果咖啡 993
小果南烛 887
小果香椿 661
小果唐松草 350
小果菘蓝 453
小果野葡萄 729
小果黑三棱 1484
小果短柱茶 413
小果短梗五加 834

小果微花藤 708
小果蔷薇 524
小果塔 186
小金发藓属 67
小金盏花 1271
小金莲花 353
小金梅草属 1410
小鱼仙草 1091
小孢柄灰包 49
小弧斑姬蛙 1699
小囵芋 652
小鸦鹊 1731
小带鱼 1682
小香蒲 1485
小香薷 1089
小须鲸 1757
小亮苞薹 1254
小美牛肝菌 43
小扁豆 665
小怒江红山茶 413
小盏侧金花 312
小根蒜 1366
小核草履虫 1565
小柴胡 855
小缺齿鳗 1746
小皱螺 1618
小家鼠 1757
小窃衣 879
小球子草 1392
小球花高 1255
小球藻 4
小球藻科 4
小球藻属 4
小黄皮 645
小黄花菜 1383
小黄鱼 1679
小黄枸 757
小黄紫堇 433
小黄耆 1393
小楝木 829
小野芝麻 1072
小野芝麻属 1072
小眼虹 1649
小距凤仙 685
小距紫堇 427
小蛇苔 68
小婆婆纳 1157
小绿石豆兰 1520
小绿刺 445
小巢菜 606
小斑叶兰 1541
小葫芦 788
小等飞蛾藤 1030
小紫金牛 900
小黑三棱 1484
小蓝柴 579
小蓝雪花 923
小蓬 256
小蓬属 256
小蓬草 1280
小蓑衣藤 325
小槐花 568
小蜂斗草 814
小蝉草 1616
小新塔花 1116
小滨菊 1314
小滨菊属 1314
小鲈鲤 1663
小萝 225
小酸浆 1125
小蜡 940
小膜盖蕨属 123
小腾粟 443
小鲵科 1694
小鲵属 1694
小鹿 1773
小漆树 671
小稻蝗 1614
小缬草 1219
小嘴乌鸦 1738
小礁膜 5
小螳螂属 1611
小蟋蟀属 1614
小穗柳 165
小檗美登木 701
小檗科 354
小檗属 354
小鹏鹛 1713
小雪莲草 1377
小藜 255
小藜芦 1401
小露兜 1483
口蘑 40
口蘑科 36
口蘑属 40
山一笼鸡 1169
山一笼鸡属 1169
山土瓜 1029
山小桔 648
山小桔属 648
山飞蓬 1294
山马兰 1309
山木通 324
山木蟹 280
山丹 1386
山牛蒡 1347
山牛蒡属 1347
山毛蕨 61
山毛蕨属 61
山乌桕 638
山文竹 1369
山玉兰 265
山莺属 858
山石榴 1015
山龙眼科 207
山龙眼属 207
山东肿足蕨 103
山东银莲花 314
山白前 977
山兰 1553
山兰属 1553
山地水东哥 409
山地乌头 307
山地虎耳草 489
山地麻蜥 1705
山芝麻 748
山芝麻属 748
山尖子 1270
山光杜鹃 894
山竹子属 419
山竹岩黄芪 578
山血丹 904
山合欢 547
山羊 1775
山羊角树 762
山羊角树属 762
山羊属 1775
山麦冬 1387
山麦冬属 1386
山壳骨属 1172
山芹 871
山芹属 870
山杜英 733
山杨 163
山杨柳 165
山李子 762
山豆根属 573
山杏 498
山里红 505
山牡荆 1055
山冷水花 202
山鸡椒 292
山苦荬 1307
山矾 933
山矾科 930
山矾属 930
山鸢尾 1421
山岩黄芪 577
山岭麻黄 157
山罗花 1140
山罗花属 1140
山油柑 642
山油麻 180
山珊瑚 1539
山珊瑚属 1539
山荆子 511
山茴香 856
山茴香属 856
山茱萸 830
山茱萸科 826
山茱萸属 830
山茶 412
山茶科 410
山茶属 411
山胡椒 289
山胡椒属 287
山柳科 881
山柳菊 1303
山柳菊属 1303
山柳属 881
山柑 648
山柑属 209 444
山柑算盘子 633
山柑藤 209
山柚子科 209
山柰 1512
山柰属 1512
山牵牛 1176
山牵牛属 1176
山鸦属 1739
山蚂蚱 247
山蚂蝗属 568
山香 1075
山香圆属 704
山香属 1074
山姜 1503
山姜属 1501
山涧草属 1439
山珠南星 1474
山莓 530
山莓草 538
山莓草属 538
山莴苣 1310
山莴苣属 1310

山荷叶 363
山荷叶属 363
山黄芩 1116
山黄芩属 1116
山桂花 942
山桂花属 762
山豇 641
山桐子 764
山桐子属 764
山桃 497
山桃草属 821
山核桃 159
山核桃属 159
山烙铁头 1712
山黄皮 1014
山黄皮属 1014
山黄菊 1247
山黄菊属 1247
山萝过路黄 915
山菠菜 1099
山苣 1375
山苣属 1375
山梗菜 1235
山梅花 484
山梅花属 484
山桔树 648
山雀科 1742
山雀属 1742
山野火绒草 1312
山野豌豆 605
山鲶虫 1631
山猫眼宝贝 1574
山猪菜 1030
山麻杆 619
山麻杆属 619
山麻黄属 180
山麻雀 1744
山绿豆 608
山绿柴 714
山斑鸠 1730
山蚕科 1608
山蚕属 1608
山葛薯 1412
山葡萄 729
山苇藤 1416
山椒子 273
山棘豆 591
山酢浆草 610
山紫锤草 1236
山蛭科 1595
山蛭属 1595
山黑豆属 571
山瑞鳖 1702
山茼 389
山鸢 1249
山楠 298
山楝 659
山楝属 659
山槐叶柃 928
山槐科 925
山楂 505
山楂属 504
山蝉 1616
山鹑属 1725
山慈菇 400
山溪鲵属 1694
山萝属 220
山腊梅 281
山飘风 470
山樱 500
山蝠 1747
山薯 1413
山檀 290
山橙 966
山橙属 966
山樱叶泡花树 682
山鳝旗菊 1355
山黧豆 582
千文眼 650
千日红 261
千日红属 261
千斤拔 574
千斤拔属 574
千叶狗娃花 1302
千头艾纳香 1268
千年不烂心 1125
千年健 1476
千年健属 1476
千里光 1335
千里光属 1335
千里香 650
千里香杜鹃 895
千层塔 69
千张纸属 1163
千岩莲 436
千金子 1448
千金子属 1448
千金榆 169
千金藤 382
千金藤属 379
千屈菜 799
千屈菜科 798
千屈菜属 799
千根草 630
千解草 1052
千解草属 1052
千瓣红石榴 806
川八角 280
川八角莲 365
川山橙 966
川木香 1289
川木香属 1289
川贝母 1379
川牛膝 261
川甘浦公英 1349
川甘翠雀花 338
川东紫堇 426
川东獐牙菜 955
川北细辛 398
川白苞芹 868
川芎 866
川西小黄菊 1326
川西乌兜铃 395
川西云杉 145
川西风毛菊 1328
川西火绒草 1314
川西吊石苣苔 1188
川西吴萸 646
川西岩黄芪 578
川西栎 176
川西鼎菜 765
川西黄鹌菜 1357
川西淫羊藿 366
川西蓝钟花 1233
川西鼠兔 1751
川西獐牙菜 956
川百合 1386
川赤芍 402
川赤瓟 791
川拟水龙骨 134
川杜若 1430
川郁金 1510
川明参 857
川明参属 857
川钓樟 290
川泡桐 1142
川泽泻 1358
川陕风毛菊 1331
川陕金莲花 353
川陕鹅耳枥 169
川南乌兜铃 393
川南珠蚌 1585
川素馨 938
川莓 536
川桂 285 287
川党参 1231
川麸杨 670
川黄檀木 410
川鄂山茱萸 830
川鄂乌头 305
川鄂爬山虎 725
川鄂金丝桃 424
川鄂党参 1229
川鄂黄芪 437
川鄂淫羊藿 366
川鄂粗筒苣苔 1179
川鄂獐耳细辛 341
川鄂蒹吾 1319
川梨 522
川康栒子 502
川溲疏 478
川续断 1219
川续断科 1219
川续断属 1219
川粤新樟 296
川楝 660
川滇土大黄 233
川滇山梗 176
川滇小檗 358
川滇女蒿 1303
川滇马铃苣苔 1190
川滇无患子 678
川滇木兰 267
川滇玉凤花 1543
川滇还阳参 1284
川滇角盘兰 1545
川滇变豆菜 876
川滇细辛 399
川滇香薷 1070
川滇楤木 166
川滇柴胡 851
川滇盘果菊 1324
川滇淫羊藿 365
川滇鼠李 715
川滇蔷薇 528
川滇蜡树 939
川滇槲蕨 133
川滇蒹吾 1317
川楝 171
川黔千金榆 169
川黔翠雀花 335
川藏沙参 1224
川藏香茶菜 1079
川藏蒲公英 1349

川蔓寄生 1195
个蕊 973
及己 392
广布马先蒿 1146
广布红门兰 1551
广布柳叶菜 820
广布野豌豆 605
广东十大功劳 369
广东万年青 1465
广东万年青属 1465
广东大青 1048
广东石豆兰 1521
广东石斛 1536
广东冬青 689
广东丝瓜 788
广东地构叶 640
广东西番莲 773
广东相思子 544
广东酒饼簕 642
广东蛇葡萄 720
广东崖豆藤 587
广东紫珠 1043
广叶星蕨 132
广场苔草 1489
广西九里香 650
广西大叶藤 384
广西大青 1047
广西马兜铃 395
广西毛冬青 690
广西火绳树 747
广西玉叶金花 1009
广西艾麻 199
广西石蒜 1408
广西石楠 514
广西地不容 382
广西芒毛苣苔 1177
广西同心结 967
广西华千里光 1341
广西过路黄 911
广西羊角楠 959
广西观音座莲 81
广西来江藤 1132
广西鸡矢藤 1012
广西刺茶 702
广西狗牙花 964
广西砂仁 1506
广西香花藤 958
广西姜花 1511
广西美登木 701
广西莪术 1509
广西海桐 493
广西锡锤草 1237
广西密花树 909
广西清明花 962
广西斑鸠菊 1353
广西落檐 1480
广西紫荆 562
广西紫麻 200
广西蜘蛛抱蛋 1372
广西猪屎床 1166
广州山柑 444
广州蛇根草 1011
广防己 394
广防风 1071
广防风属 1071
广花耳草 999
广序臭草 1449
广金钱草 570
广寄生 214
广腹螳螂 1611
广藿香(藿香) 1099
弓头燕鳐 1671
弓果藤 988
弓果藤属 988
弓弦藤 1461
弓斑东方鲀 1692
卫氏大风子 763
卫矛 694
卫矛科 691
卫矛属 694
子宫草 1111
子宫草属 1111
子陵栉鳚虎鱼 1684
子楝树 802
子楝树属 802
女贞 940
女贞属 939
女娄菜 245
女萎 322
女菀 1352
女菀属 1352
女高属 1303
飞龙掌血 652
飞龙掌血属 652
飞扬草 627
飞机草 1296
飞鱼科 1671
飞海蛾鱼 1693
飞蓬 1293
飞蓬属 1293
飞蛾槭 674
飞蛾藤 1031
飞蛾藤属 1030
飞凤 1754
飞廉 1272
飞廉属 1272
飞蝶属 1703
飞蝗属 1613
飞燕草 333
飞燕草属 333
叉子圆柏 153
叉分蓼 224
叉叶蓝 477
叉尾斗鱼 1685
叉枝老鹳草 612
叉枝远志 663
叉枝蒿 1045
叉枝鸦葱 1334
叉枝藻属 16
叉歧繁缕 249
叉柱兰属 1575
叉柱岩菖蒲 1399
叉唇角盘兰 1545
叉唇虾脊兰 1523
叉犀金龟属 1623
叉蕊薯蓣 1412
马 1768
马干铃栝楼 795
马大头属 1609
马口鱼 1663
马口鱼属 1663
马山地不容 382
马毛小皮伞 38
马氏珍珠贝 1582
马比木 708
马甲子 713
马甲子属 713
马尔康柴胡 854
马兰 1309
马兰属 1309
马兰藤 979
马兰藤属 979
马耳山乌头 303
马耳山五味子 279
马先蒿属 1142
马来斑鲆 1689
马来亚熊 1761
马利筋 973
马利筋属 973
马肠囊蓟 1415
马尿泡 1124
马尿泡属 1124
马尾杉 71
马尾杉属 70
马尾松 146
马尾树 178
马尾树科 178
马尾树属 178
马尾柴胡 854
马尾藻科 11
马尾藻属 11
马鸡属 1723
马松子 749
马松子属 749
马齿毛兰 1539
马齿苋 236
马齿苋科 236
马齿苋属 236
马金长子 945
马河山黄芪 550
马线叶菝葜 1396
马勃科 49
马勃属 51
马面鲀科 1691
马科 1768
马莲鞍 987
马莲鞍属 987
马铃苣苔属 1189
马铃薯 1128
马钱科 944
马钱属 945
马唐 1442
马唐属 1442
马桑 666
马桑科 666
马桑绣球 479
马桑属 666
马银花 894
马铜铃 786
马陵儿 797
马陵儿属 797
马兜铃 394
马兜铃科 393
马兜铃属 393
马鹿 1772
马盖麻 1403
马蛋果 763
马蛋果属 763
马棘 580
马粪海胆 1640
马粪海胆属 1640
乌属 1768
乌蓝 1173
乌蓝属 1173

马蜂科 1633
马蜂属 1633
马菌 1420
马棕榈 445
马鲅科 1674
马鲛属 1682
马缨丹 1050
马缨丹属 1050
马缨杜鹃 891
马鞍叶羊蹄甲 552
马鞍纹天竺葵 615
马鞍属 585
马醉木 888
马醉木属 888
马蹄大戟 627
马蹄芹 860
马蹄芹属 860
马蹄金 1026
马蹄金属 1026
马蹄参 829
马蹄参属 829
马蹄香 401
马蹄香属 401
马蹄荷 460
马蹄荷属 460
马蹄黄 540
马蹄黄属 540
马蹄梨头尖 1482
马蹄螺科 1571
马鬃蛇 1703
马鞭草 1053
马鞭草叶马先蒿 1148
马鞭草科 1040
马鞭草属 1053
马鹞 1773

## 四 画

王不留行 251
王不留行属 251
王瓜 793
王锦蛇 1707
开口箭 1400
开口箭属 1400
开唇兰属 1518
井冈山栝楼 794
井底泥 1791
井栏边草 92
天山大黄 232
天山千里光 1337
天山云杉 145
天山龙胆 949
天山报春 921
天山花椒 540
天山鸢尾 1420
天山侧金盏花 313
天山桤 166
天山桦 169
天山堇菜 770
天山柴胡 855
天山海罂粟 439
天山新塔花 1116
天山鼠曲草 1299
天山罂粟 443
天山翠雀花 338
天山樱桃 501
天山囊吾 1317
天门冬 1369
天门冬属 1369
天女木兰 267
天牛科 1626
天目木兰 264
天目木姜子 291
天目贝母 1380
天目地黄 1150
天目瑞香 754
天目槭 675
天仙子属 1119
天仙果 186
天仙藤 377
天仙藤属 377
天兰韭 1365
天师栗 680
天名精 1272
天名精属 1272
天全凤仙花 686
天荞菜属 1035
天竺桂 285
天竺葵 615
天竺葵属 614
天南星科 1465
天南星属 1468
天胡荽 864
天胡荽属 864
天星藤 981
天星藤属 981
天香藤 546
天津丽蚌 1584
天蚕蛾科 1628
天料木属 763
天麻 1539
天麻属 1539
天葵 346
天葵属 346
天鹅属 1718
天蓝沙参 1222
天蓝苜蓿 586
天蓝变豆菜 876
天莲子 1117
天莲子属 1117
无毛大籽筋骨草 1058
无毛山尖子 1270
无毛山里红 505
无毛千屈菜 799
无毛川梨 522
无毛牛尾蒿 1251
无毛毛叶石楠 514
无毛龙眼睛 637
无毛粟里山胡椒 289
无毛画眉草 1444
无毛粉花绣线菊 541
无毛粉条儿菜 1363
无毛绣球 477
无毛黄芪 551
无毛崖爬藤 727
无毛短梗冬青 689
无毛翅斗苣苔 1184
无叶假木贼 251
无芒山涧草 1439
无芒稗 1443
无肋马尾藻 11
无壳侧鳃属 1577
无花果 186
无忧花属 598
无尾尖龙胆 949
无尾果 502
无尾果属 502
无苞杓兰 1530
无茎芥 455
无茎栓果菊 1311
无刺十大功劳 370
无刺枣 719
无刺菠萝 1396
无刺曼陀罗 1119
无齿齿果草 665
无齿柑手蠹 1606
无备平鲉 1687
无柱兰 1517
无柱兰属 1517
无柄山柑 445
无柄卫矛 699
无柄五层龙 704
无柄沙参 1225
无柄果钩藤 1021
无柄金丝桃 421
无柄垂子买麻藤 157
无冠克什米尔紫堇 428
无冠金钩如意草 436
无根藤 283
无根藤属 283
无翅果秋海棠 778
无翅秋海棠 778
无脊椎动物 1565
无粉报春 919
无梗五加 833
无梗假桂钓樟 291
无梗越橘 897
无患子 679
无患子科 676
无患子属 678
无距花属 815
无距宾川乌头 303
无距耧斗菜 317
无银粉背蕨 94
无斑红百合 1385
无斑雨蛙 1696
无粤野豌豆 603
无锡杜拉蚓 1593
无腺白叶莓 533
无腺灰白毛莓 536
无腺络石 971
无脉樊榄 1340
无毛毛建草 1064
无蹼壁虎 1704
无瓣蔊菜 456
元江锥 173
元宝草 423
元宝槭 675
云山八角枫 825
云广粗叶木 1006
云木香属 1264
云生毛茛 345
云台南星 1470
云杉属 144
云纹石斑鱼 1675
云和新木姜子 297
云实 554
云实属 554
云南七叶树 680
云南八角 281
云南八角莲 364
云南九节 1014
云南丫蕊花 1402
云南小膜盖蕨 123
云南山楂 506

云南卫矛 700
云南叉柱兰 1525
云南马先蒿 1148
云南马钱 945
云南马兜铃 398
云南无忧草 598
云南风车子 817
云南长蒴苣苔 1185
云南勾儿茶 710
云南双盾木 1199
云南甘草 576
云南石仙桃 1556
云南石莲 472
云南龙胆 952
云南龙眼独活 837
云南白杨 164
云南白蜡树 935
云南冬青 691
云南地不容 383
云南地桃花 746
云南白部 1402
云南光唇鱼 1658
云南羊角拗 970
云南羊蹄甲 553
云南阴地蕨 77
云南观音座莲 82
云南红豆杉 156
云南红景天 468
云南报春 923
云南苏铁 141
云南杜鹃 896
云南杨梅 158
云南皂荚 575
云南含笑 270
云南近溪蟹 1606
云南沙参 1223
云南沙棘 761
云南鸡矢藤 1012
云南鸡血藤 275
云南青牛胆 385
云南松 147
云南齿唇兰 1551
云南虎耳草 489
云南金丝桃 423
云南金合欢 545
云南油杉 143
云南泡花树 682
云南沼兰 1549
云南草蔻 1501
云南枸杞 1120
云南冠唇花 1089
云南钩毛藤 1004
云南钩藤 1021
云南秋海棠 781
云南兔儿风 1243
云南独蒜兰 1558
云南娃儿藤 989
云南杉桧 506
云南蔓菜 771
云南柴胡 856
云南铁角蕨(小凤尾草) 107
云南铁线莲 332
云南黄花木 594
云南黄芪 551
云南黄连 334
云南黄柏 651
云南黄素馨 937
云南萝芙木 969
云南雪花构 754
云南野山茶 413
云南野豇豆 607
云南崖爬藤 728
云南银莲花 314
云南假木荷 884
云南盘龙 1660
云南旌节花 772
云南滑风藤 683
云南斑种草 1032
云南葛藤 597
云南裂腹鱼 1664
云南鹅耳枥 170
云南紫草 1037
云南紫珠 1045
云南紫菀 1263
云南薯 1239
云南锦鸡儿 558
云南腹水草 1159
云南鼠尾草 1105
云南鼠刺 481
云南蓑龙胆 947
云南椴树 156
云南猪 1755
云南獐牙菜 955
云南翠雀花 339
云南樟树 459
云南藏木 965
云南樟 285
云南繁缕 250
云南鼹鼠 1754
云树 419
云贵粗叶木 1005
云贵鹅耳枥 170
云桂虎刺 993
云豹 1765
云豹属 1765
云雀 1735
云雀属 1735
云斑天牛 1625
云斑车蝗 1613
云雾龙胆 948
云雾苔草 1488
云仙杜鹃 892
木子花 715
木本猪毛菜 256
木叶鳖属 1690
木瓜 373 501
木瓜红 928
木瓜红属 928
木瓜属 501
木兰科 264
木兰寄生 214
木兰属 264
木半夏 760
木奶果 621
木奶果属 621
木地肤 255
木耳 24
木耳科 24
木耳菜 1300
木耳属 24
木竹子 420
木防己 375
木防己属 375
木芙蓉 741
木豆 555
木豆属 555
木里报春 918
木里秋葵 738
木层孔菌属 32
木虱草 1493
木香 1264
木香花 523
木香薷 1070
木姜子 293
木姜子属 291
木莲 268
木莲属 268
木荷 418
木荷属 417
木莓 536
木贼 77
木贼状荸荠 1492
木贼科 76
木贼麻黄 156
木贼属 77
木通 371
木通七叶莲 374
木通马兜铃 396
木通科 371
木通属 371
木曼陀罗 1117
木曼陀罗属 1117
木麻黄 158
木麻黄科 158
木麻黄属 158
木棉 746
木棉科 746
木棉属 746
木紫珠 1041
木犀科 933
木犀属 941
木犀榄属 941
木榄 815
木榄属 815
木蜂科 1635
木蜂属 1635
木蝴蝶 1163
木蜡树 672
木槿 742
木槿属 741
木薯 636
木薯属 636
木蹄层孔菌 34
木藤蓼 221
木贼芦属 887
木鳖子 789
支柱蓼 229
五匹青 876
五月艾 1252
五月茶 620
五月茶属 620
五风藤 372
五爪金龙 1028
五节芒 1449
五叶山小橘 649
五叶赤飑 792
五叶铁线莲 330
五叶槐 600
五叶薯蓣 1415
五加 832
五加科 831
五加属 831
五角海星属 1638

五角枫楼 795
五层龙 704
五层龙属 704
五刺金鱼藻 387
五味子 276
五味子科 275
五味子属 276
五岭龙胆 949
五岭细辛 401
五柱红砂 775
五香藤 278
五脉绿绒蒿 442
五脉槲寄生 216
五极果 401
五极果科 401
五极果属 401
五倍子蚜 1617
五彩芋 1474
五彩芋属 1474
五彩苏 1062
五棱散尾鬼笔 47
五雄白珠 886
五裂茶藨 487
五裂黄连 333
五裂槭 675
五蕊柳 165
五蕊寄生 211
五蕊寄生属 211
五瓣子楸树 802
不完全地衣类 59
不育红 1081
太平花 485
太平洋鳘 227
太平洋褶柔鱼 1589
太平莓 534
太白山紫穗报春 920
太白贝母 1381
太白乌头 311
太白花楸 540
太白杜鹃 894
太白韭 1367
太白美花草 319
太白柴胡 852
太白棱子芹 874
太白藜 230
太行花 543
太行花属 543
太行铁线莲 327
太行菊 1322
太行菊属 1322
太阳海星科 1638
太阳海星属 1638
太湖新银鱼 1654
犬问荆 77
犬科 1759
犬属 1759
犬蝠 1747
犬蝠属 1747
友水龙骨 135
戈壁天门冬 1370
车里乌饭 946
车角竹 1437
车轴草属 603
车前 1197
车前科 1197
车前紫草 1039
车前紫草属 1038
车前属 1197
车前蕨科 99
车前蕨属 99
车索藤 723
车桑子 677
车桑子属 677
牙棘茄鱼 1694
牙鲆科 1689
牙鲆属 1689
牙蕨属 121
巨大鞘丝藻 3
巨多孔菌 33
巨苞岩乌头 308
巨首楔鲆 1585
巨紫茎 430
巨藻 10
巨藻科 10
巨藻属 10
互叶金腰 474
匹菊属 1326
互叶醉鱼草 1129
互卷黄精 1393
瓦山栲 172
瓦山鼠尾草 1101
瓦韦 130
瓦韦属 129
瓦氏马尾藻 11
瓦氏黄颡鱼 1669
瓦松 464
瓦松属 464
切尾拟鳃 1669
止血马唐 1442
止血丹 1301
止血扇菇 38
止泻木 965
止泻木属 965
少牙斑鲆 1689
少毛牛膝 258
少毛甘露子 1111
少毛炮仗花 895
少毛复叶葡萄 730
少叶黄杞 160
少年红 899
少花马蓝 1174
少花风毛菊 1332
少花龙葵 1127
少花老挝蒲桃 806
少花米口袋 577
少花红柴胡 855
少花拉拉藤 997
少花荠苎 1091
少花柏拉木 808
少花冠唇花 1090
少花虾脊兰 1522
少花美登木 702
少花桂 286
少花孪荠 1492
少花海桐 494
少花堇菜 766
少花粉条儿菜 1364
少花膜骨藤 985
少刺辽宁棘木 836
少果昊黄 647
少药八角 280
少脉雀梅藤 717
少脉椴 737
少棘蜈蚣 1607
少蕊败酱 1216
少穗飘拂草 1494
少瓣秋海棠 781
少鳞燕鳐 1671
少鳞鳐 1681
少鳞鳐 1676
水飞蓟 1341
水飞蓟属 1341
水马齿科 1055
水马齿属 1055
水云母 1790
水车前 1361
水车前属 1360
水牛 1774
水牛属 1774
水毛花 1497
水玉簪 1423
水玉簪科 1423
水玉簪属 1423
水甘草 961
水甘草属 961
水龙 822
水龙骨 135
水龙骨科 125
水龙骨属 135
水东哥 409
水东哥属 409
水田白 945
水田雪莲花 1331
水田碎米荠 449
水生酸模 232
水仙 1409
水仙属 1409
水边千斤拔 574
水丝麻 199
水丝麻属 199
水丝梨 462
水丝梨属 462
水芋 1474
水芋属 1474
水曲柳 934
水团花 990
水团花属 990
水同木 187
水竹 1453
水竹叶 1430
水竹叶属 1428
水竹草属 1431
水红木 1209
水麦冬 1361
水麦冬科 1361
水麦冬属 1361
水苋菜 798
水苋菜属 798
水芹 869
水芹属 869
水苎麻 193
水苏 1112
水苏属 1111
水杉 149
水杉属 149
水忍冬 1201
水青冈 174
水青冈属 174
水苦荬 1158
水茄 1128
水松 149
水松属 149
水虎尾 1066
水龟 1619

水金凤 685
水珍珠菜 1098
水芒草 1136
水芒草属 1136
水柏枝 775
水柏枝属 774
水柳仔 633
水柳仔属 633
水栀子 999
水香薷 1069
水鬼蕉 1407
水鬼蕉属 1407
水珠草 820
水莎草 1494
水莎草属 1494
水枸子 504
水翁 802
水翁属 802
水烛 1485
水黄皮 596
水黄皮属 596
水蛇麻 185
水蛇麻属 185
水麻 195
水麻属 195
水鹿 1772
水绵属 7
水绿矾 1182
水塔花 1426
水塔花属 1426
水葫芦苗 340
水葫芦苗属 340
水葱 1497
水棉花 315
水棘针 1058
水棘针属 1058
水朝阳旋覆花 1305
水晶兰 882
水晶兰属 882
水黑云母片岩 1990
水锌矿 1792
水筛属 1360
水湿柳叶菜 821
水蓑衣属 1169
水榆花椒 538
水蜈蚣 1495
水蜈蚣属 1495
水锦树 1022
水锦树属 1022
水鼠耳蕨 1747
水蔓青 1156
水煮草 1435
水煮草属 1435
水蓼 225
水蜡树 940
水蜡烛 1066
水蜡烛属 1066
水蕨 98
水蕨科 98
水蕨属 98
水鳃纲 1566
水鳃科 1566
水鳅 1762
水鳅属 1762
水繁缕叶龙胆 951
水鳖 1360
水鳖科 1360
水鳖属 1360
水鳖藓 110
水鳖藓属 110
日本七叶树 680
日本七鳃鳗 1643
日本小檗 361
日本山蛭 1595
日本女贞 939
日本马蜂 1633
日本马蓝 1174
日本车前 1198
日本方头鱼 1676
日本双蝴蝶 957
日本石磺海牛 1578
日本对虾 1601
日本吉丁虫 1621
日本杜拉蛸 1594
日本医蛭 1594
日本皂荚 575
日本辛夷 266
日本沙蚕 1592
日本灶鸟 1613
日本苔草 1487
日本枪乌贼 1590
日本金腰 475
日本鱼怪 1599
日本狗筋蔓 240
日本沼虾 1602
日本细焦掌贝 1574
日本柳杉 149
日本栉水虱 1599
日本星杆藻 12
日本看麦娘 1434
日本扁鲨 1647
日本厚朴 266
日本槭木 166
日本海马 1673
日本海鳃 1589
日本球马陆 1607
日本黄脊蝗 1614
日本常山 650
日本蛇根草 1011
日本蛇菰 218
日本鹿蹄草 883
日本续断 1219
日本散血丹 1122
日本景天 469
日本紫珠 1042
日本鲟 1605
日本绒螯蟹 1606
日本锯鲨 1647
日本椎树 156
日本蝠鲼 1650
日本燕鳐 1649
日本罂粟 1414
日本镜蛤 1587
日本鲽 1653
日本螣 1681
日本笠藤壶 1598
日本鳐 1671
月月红 902
月月青 481
月见草 822
月见草属 822
月叶西番莲 772
月光花 1025
月光花属 1025
月光菌 36
月季花 524
月桂 287 942
月桂属 287
月腹刺鲀 1692
月腺大戟 626
月鳢 1686
中日金星蕨 105
中平树 634
中白鹭 1715
中亚卫矛 699
中亚天仙子 1119
中亚苦荬 1248
中亚泽芹 879
中亚薹草 1435
中亚兔耳草 1135
中亚秦艽 948
中亚鸽 1730
中亚紫菀木 1263
中亚锦鸡儿 553
中亚滨藜 251
中亚酸模 232
中华三叶委陵菜 517
中华小公鱼 1653
中华卫矛 695
中华马蜂(华黄蜂) 1634
中华天胡荽 864
中华木蜂 1635
中华水龙骨 135
中华水芹 870
中华水绵树 1022
中华双扇蕨 125
中华石龙尾 1136
中华石杉 69
中华石楠 513
中华石蝴蝶 1191
中华东蚁蛉 1626
中华白及 1519
中华老鹳草 614
中华地桃花 746
中华耳蕨 120
中华竹鼠 1755
中华观音座莲 82
中华花葱 1023
中华花蜘 1667
中华杜英 732
中华豆莞菁 1621
中华里白 84
中华沙参 1225
中华纹胸鼬 1670
中华青牛胆 385
中华青荚叶 829
中华青鳞鱼 1652
中华抱茎蓼 221
中华苔草 1487
中华金腰 476
中华鱼怪 1599
中华卷柏 75
中华茜草 1015
中华胡枝子 582
中华柳 164
中华秋沙鸭 1718
中华秋海棠 781
中华须鳗 1657
中华剑蕨 139
中华孩儿草 1172
中华绒螯蟹 1606
中华真地鳖 1611
中华圆田螺 1573
中华倒刺鲃 1665

中华海鲂 1670
中华绣线菊 540
中华绣线梅 512
中华黄花稔 744
中华野独活 273
中华崖豆藤 588
中华猕猴桃 405
中华淡竹叶 1448
中华鸣囊蓼 95
中华蚓虹 1631
中华鹅掌柴 844
中华短肠蕨 100
中华根 736
中华锥花 1073
中华鲟 1650
中华贯众床 1166
中华蜜蜂 1635
中华槭 675
中华槲蕨 138
中华稻蝗 1614
中华蹄盖蕨 102
中华蟾螂 1612
中华蟋蟀 1614
中华鼢鼠 1756
中华鳞鲍 1664
中华鳖 1702
中肋石花菜 14
中杜鹃 1731
中甸长果婆婆纳 1155
中甸灯台报春 919
中甸黄芩 1107
中间骨牌蕨 128
中间假瘤蕨 134
中间锦鸡儿 558
中拉泥炭藓 60
中果咖啡 993
中国小鲵 1694
中国马先蒿 1145
中国水蛇 1708
中国石蒜 1408
中国龙虾 1602
中国龙胆 948
中国仙女蛤 1587
中国白丝草 1373
中国尖鳞蚌 1584
中国沙棘 761
中国枪乌贼 1590
中国林蛙 1697
中国雨蛙 1696
中国树花 59
中国卵穿鱼 1137
中国骨碎补 124
中国鲂 1649
中国急流水虱 1599
中国圆田螺 1572
中国绣球 479
中国野菰 1194
中国宿苞豆 598
中国旌节花 771
中国蛤蜊 1587
中国鲎 1595
中国静灰珠菌 50
中国蕨科 93
中国壁虎 1704
中国鲳 1683
中国攀鲈 1695
中国繁缕 249
中歇酱 1216
中南鱼藤 568
中轴萝 224
中菊头蝠 1748
中麻黄 156
内折香茶菜 1077
内枝藻科 14
内蒙古紫草 1032
内蒙古肉苁蓉 1195
贝叶多孔菌 33
贝叶越橘 896
贝叶棕 1462
贝叶棕属 1462
贝加尔唐松草 347
贝加尔野豌豆 606
贝加尔假曲草 1298
贝母兰 1527
贝母兰属 1526
贝母属 1378
贝壳状革耳 38
贝状木层孔菌 32
贝血封喉 183
贝血封喉属 183
贝血清 1547
贝肿消 1072
贝霉黄 1267
风车子 816
风车子属 816
风车草 1489 1061
风毛菊 1330
风毛菊属 1327
风花菜 456
风吹楠 274
风吹楠属 274
风轮菜 1060
风轮菜属 1060
风铃草属 1226
风湿木 968
风箱树 992
风箱属 992
凤丫蕨 99
凤丫蕨属 98
凤仙花 684
凤仙花科 683
凤仙花属 683
凤头鹦鹉 1712
凤尾兰 1406
凤尾竹 1437
凤尾菜 17
凤尾蕨 93
凤尾蕨科 90
凤 蕨属 90
凤眼莲 1416
凤眼莲属 1416
凤梨科 1426
凤梨属 1426
凤蝶科 1630
凤蝶属 1630
凤鲚 1653
丹东玄参 1151
丹顶鹤 1726
丹参 1102
丹桂 942
午时花 749
午时花属 749
午鹤草属 1388
牛心番荔枝 270
牛毛毡 1492
牛毛藓科 61
牛毛藓属 61
牛矢果 942
牛白藤 1001
牛皮叶 55
牛皮叶科 54
牛皮叶属 55
牛皮茶 890
牛皮消 976
牛皮消蓼 223
牛奶子 761
牛奶菜 984
牛奶菜属 983
牛纠吴黄 648
牛耳朵 1180
牛耳枫 641
牛至 1094
牛至属 1094
牛舌草属 1031
牛肝菌科 43
牛肝菌属 43
牛角瓜 974
牛角瓜属 974
牛角藓 65
牛角藓属 65
牛角藤 967
牛尾七 231
牛尾草 1080
牛尾菜 1397
牛尾蒿 1251
牛茄子 1128
牛鞅草 1429
牛齿兰 1518
牛齿兰属 1518
牛姆瓜 372
牛背鹭 1714
牛背鹭属 1714
牛科 1773
牛扁 301
牛栓藤 544
牛栓藤科 543
牛栓藤属 544
牛眼马钱 945
牛排菌科 27
牛排菌属 27
牛筋果 657
牛筋果属 657
牛筋草 1443
牛筋藤 191
牛筋藤属 191
牛粪蛱蝶 1623
牛属 1773
牛蒡 1247
牛蒡叶囊吾 1317
牛蒡属 1247
牛叠肚 530
牛鼻栓 460
牛鼻栓属 460
牛鼻菊属 1297
牛蒜 375
牛膝 258
牛膝属 257
牛漆姑草属 248
牛膝乌蓝 1174
牛蹄豆 595
丰花草 991
丰花草属 991
丰满凤仙花 685
手参 1541

手参属 1541
毛八角枫 825
毛八角莲 364
毛九节 1014
毛三桠杭子梢 556
毛三裂蛇葡萄 721
毛大丁草 1298
毛大狼毒 629
毛小芸木 649
毛山鸡椒 292
毛山荆子 511
毛山猪菜 1029
毛山蒿 390
毛山楂 505
毛马齿苋 236
毛子草 1161
毛云实 554
毛木半夏 758
毛木耳 24
毛木防己 375
毛木通 323
毛木蓝 580
毛车前 1198
毛车藤 961
毛车藤属 961
毛水苏 1111
毛水蓼 225
毛凤仙花 684
毛牛纠吴萸 648
毛长花菟花 757
毛乌蔹莓 723
毛玉叶金花 1009
毛叶丁香 943
毛叶丁香罗勒 1094
毛叶小蜡 941
毛叶小檗 359
毛叶卫矛 695
毛叶无翅秋海棠 778
毛叶木瓜 501
毛叶木姜子 293
毛叶五匹青 816
毛叶五味子 278
毛叶勾儿茶 710
毛叶乌头 306
毛叶甘菊 1286
毛叶石楠 514
毛四叶藻 996
毛叶老鸦树 1042
毛叶扬子铁线莲 325
毛叶地笋 1086
毛叶芋兰 1551
毛叶耳蕨 221
毛叶吊钟花 885
毛叶合欢 547
毛叶红毛五加 832
毛叶花椒 653
毛叶杏 498
毛叶怀槐 585
毛叶鸡蛋参 1229
毛叶青冈 173
毛叶板凳果 706
毛叶刺楸 840
毛叶轮环藤 376
毛叶欧李 499
毛叶肾蕨 123
毛叶草赤芍 403
毛叶南烛 888
毛叶威灵仙 323
毛叶钝果寄生 214
毛叶香茶菜 1077
毛叶度量草 945
毛叶粉背蕨 94
毛叶绣线梅 512
毛叶黄杞 160
毛叶雪下红 905
毛叶雀梅藤 718
毛叶崖爬藤 727
毛叶插田泡 530
毛叶假鹰爪 271
毛叶硬齿猕猴桃 405
毛叶腹水草 1159
毛叶腰骨藤 965
毛叶蔷薇 526
毛叶蝴蝶草 1153
毛叶翼核果 718
毛叶藤仲 963
毛叶藜芦 1401
毛白杨 164
毛白前 978
毛冬青 690
毛兰属 1538
毛头牛蒡 1247
毛头鬼伞 42
毛头雪莲花 1329
毛发唐松草 352
毛地钱 68
毛地钱属 68
毛地黄 1134
毛地黄属 1134
毛地黄鼠尾草 1101
毛芋头薯蓣 1414
毛耳飞廉 1754
毛白介 1386
毛当归 849
毛竹 1453
毛竹叶花椒 653
毛竹属 1453
毛华菊 1287
毛肋杜鹃 889
毛过山龙 1479
毛衣鱼 1605
毛红柳 776
毛红荚蒾 670
毛扭藓 64
毛扭藓属 64
毛芽厚朴 278
毛芽椴 737
毛花毛地黄 1134
毛花连蕊茶 412
毛花忍冬 1206
毛花尧花 758
毛花点草 199
毛花雪花构 754
毛花猕猴桃 406
毛花瑞香 755
毛花瑞香属 755
毛杜仲藤 967
毛豹兰 1531
毛杨梅 158
毛两面针 655
毛足铁线蕨 96
毛谷精草 1432
毛角芫荽 1621
毛角豆芫荽 1621
毛连菜 1324
毛连菜属 1323
毛序粗柄铁线莲 324
毛尾叶巴豆 624
毛鸡矢藤 1012
毛青藤 379
毛拉拉藤 996
毛苦荬菜 1307
毛苦荬 1123
毛茄 1125
毛枝连蕊茶 414
毛枝柞木 765
毛枝蛇葡萄 722
毛枝崖爬藤 727
毛枝紫菀 1259
毛枝榆 180
毛杭子梢 556
毛刺壳花椒 654
毛刺花椒 652
毛刺溲麻 737
毛刺锦鸡儿 560
毛郁金 1510
毛果一枝黄花 1342
毛果川赤芍 404
毛果巴豆 624
毛果甘青乌头 311
毛果吉林乌头 305
毛果扬子铁线莲 325
毛果芍药 403
毛果杜鹃 895
毛果旱榆 181
毛果鱼藤 568
毛果珍珠茅 1499
毛果南烛 887
毛果报棋 712
毛果扁担杆 735
毛果桐 634
毛果堇菜 766
毛果铁线莲 329
毛果银莲花 313
毛果婆婆纳 1155
毛果蓬子菜 998
毛果楼梯草 197
毛果锡叶藤 402
毛罗勒 1094
毛使君子 817
毛建草 1065
毛金丝桃 422
毛金竹 1454
毛肤石鳌属 1570
毛鱼藤 567
毛狗骨柴 1020
毛狐臭柴 1052
毛泡桐 1141
毛细齿崖爬藤 728
毛革盖菌 28
毛荚决明 560
毛药花 1059
毛药花属 807 1059
毛药忍冬 1205
毛药藤 970
毛药藤属 970
毛莨 345
毛莨叶报春 919
毛莨状金莲花 353
毛莨科 301
毛莨铁线莲 330
毛莨属 344
毛柱铁线莲 328
毛相思子 544

毛柄钉灰包 49
毛柄短肠蕨 100
毛柄锦香草 812
毛柳兰 818
毛胡椒 389
毛轴红门兰 1552
毛轴芽蕨 121
毛轴莎草 1491
毛轴碎米蕨 94
毛轴蕨 90
毛冠菊属 1321
毛钩藤 1020
毛毡草 1267
毛重楼 1391
毛脉三叶爬山虎 725
毛脉小檗 357
毛脉川赤芍 404
毛脉附地菜 1040
毛脉金粟兰 391
毛脉南酸枣 667
毛脉柳叶菜 820
毛脉翅果菊 1325
毛脉崖爬藤 728
毛脉鼠刺 482
毛脉嘉赐树 762
毛脉蓼 223
毛脉酸模 233
毛狭叶崖爬藤 727
毛姜花 1512
毛绞股蓝 785
毛莲蒿 1258
毛柱 283
毛根杜仲 698
毛核木 1201
毛核木属 1207
毛梗木 167
毛唇贝母兰 1527
毛唇芋兰 1550
毛唇独蒜兰 1557
毛圆刺蝽马陆 1608
毛铁冬青 691
毛胶薯蓣 1415
毛狼毒大戟 29
毛豹皮樟 291
毛球乌勃属 51
毛球兰 983
毛排钱草 593
毛接骨木 1207
毛黄肉楠 283
毛黄连花 918
毛黄栌 667
毛蓄 811
毛菊苣 1276
毛梗小果冬青 689
毛梗川黔翠雀花 335
毛梗豨莶 1340
毛柃 829
毛野丁香 1006
毛野扁豆 572
毛曼陀罗 1119
毛钳 1580
毛蛇藤 711
毛银柴 620
毛脚沙鸡 1729
毛脚沙鸡属 1729
毛脚燕 1735
毛脚燕属 1735
毛麻楝 659
毛盖干酪菌 35
毛萼山珊瑚 1539
毛萼山梗菜 1235
毛萼忍冬 1206
毛萼香茶菜 1076
毛萼莓 530
毛萼铁线莲 320
毛萼鞘蕊花 1062
毛葡萄 730
毛萼玉凤花 1542
毛萼芳 451
毛裂蜂斗菜 1323
毛喉杜鹃 890
毛喉鞘蕊花 1062
毛黑壳楠 289
毛筒玉竹 1393
毛颊马先蒿 1145
毛瑞香 754
毛蕊 390
毛蜂头草 814
毛蜂窝菌 31
毛葙苞豆 599
毛蓼 221
毛槠 170
毛酸浆 1125
毛舞花姜 1510
毛漆树 672
毛鼠刺 482
毛翠雀花 338
毛蕨属 106
毛蕊山柑 445
毛蕊老鹳草 612
毛蕊花 1154
毛蕊花属 1154
毛蕊杜鹃 895
毛蕊郁金香 1400
毛蕊卷耳 240
毛蕊铁线莲 327
毛蕊猕猴桃 408
毛樱桃 501
毛鞘茅香 1446
毛嘴签 711
毛穗香薷 1068
毛穗赖草 1448
毛穗藜芦 1401
毛臂形草 1438
毛藤日本薯蓣 1414
毛鳞山姜 1504
毛瓣山梗菜 1235
毛瓣无患子 679
毛瓣毛蕊花 1154
毛瓣豹兰 1530
毛瓣绿绒蒿 442
毛麝香 1131
毛麝香属 1131
长小苞黄芪 549
长子柳叶菜 821
长瓦韦 1430
长毛山矾 931
长毛风毛菊 1329
长毛对虾 1601
长毛赤飑 793
长毛荛花 1621
长毛远志 665
长毛细辛 400
长毛柃 415
长毛香科科 1113
长毛黄芪 737
长毛野丁香 1006
长毛韩信草 1108
长毛紫珠 1044
长毛筋骨草 1056
长节耳草 1002
长节珠 967
长节珠属 967
长叶二裂委陵菜 515
长叶山兰 1553
长叶山竹子 420
长叶女贞 939
长叶马兜铃 393
长叶天名精 1273
长叶木兰 266
长叶车前 1198
长叶水麻 195
长叶风毛菊 1331
长叶风尾草 92
长叶毛花忍冬 1206
长叶火绒草 1314
长叶龙船花 1004
长叶冬青 688
长叶头蕊兰 1525
长叶地榆 537
长叶百蕊草 211
长叶吊灯花 974
长叶竹根七 1375
长叶赤飑 792
长叶苎麻 193
长叶冻绿 714
长叶纽子果 905
长叶茅膏菜 425
长叶轮钟草 1227
长叶实蕨 122
长叶珊瑚 826
长叶茜草 1016
长叶南烛 888
长叶胡颓子 758
长叶柞木 765
长叶香草 915
长叶香茶菜 1080
长叶兔儿风 1242
长叶排钱草 594
长叶黄杨 705
长叶蛇王藤 773
长叶猕猴桃 406
长叶鹿蹄草 882
长叶绿绒蒿 442
长叶紫珠 1043
长叶阔苞菊 1324
长叶莲子菜 997
长叶慈姑 1358
长叶榧树 156
长叶酸藤子 905
长叶碱毛茛 340
长叶蕨 359
长叶螺序草 1019
长叶蝽渚刺 359
长生铁角蕨 108
长白山龙胆 949
长白山露吾 1316
长白老鹳草 613
长白旱麦瓶草 247
长白沙参 1224
长白岩黄芪 579
长白金莲花 353
长白鱼鳞云杉 144
长白狗舌草 1351

长白柴胡 853
长白棘豆 591
长白瑞香 754
长冬草 326
长地胆 1622
长托桟蓼 1396
长芒苔草 1487
长耳南星 1469
长耳鹎 1732
长耳蝠 1747
长尖叶蔷薇 526
长尖莎草 1490
长竹蛏 1589
长舌果蝠 1748
长伞红柴胡 855
长江蹲盖鲛 101
长羽叶萝卜 456
长阳十大功劳 370
长形水绵 7
长花马先蒿 1145
长花白蒿草 211
长花延胡索 435
长花豆蔻 1506
长花胡麻草 1133
长花厚壳树 1034
长花党参 1232
长花铁线莲 331
长花滇紫草 1038
长足胡蜂属 1633
长吻角鲨 1647
长吻沙蚕 1592
长吻海蛇 1710
长吻鮠 1669
长吻鼹 1746
长牡蛎 1583
长体鳚 1657
长体鳚属 1657
长角大戟 630
长角天蚕蛾属 1629
长条蛇鳚 1655
长序山芝麻 748
长序冷水花 203
长序荆 1054
长序砂仁 1507
长序链珠藤 960
长序缬草 1218
长尾毛蕊茶 411
长尾旱獭 1753
长尾复叶耳蕨 113
长尾食虾蝠 1632
长尾粗叶木 1005
长尾雉属 1725
长尾鼠耳蝠 1747
长苞羊耳蒜 1547
长苞谷精草 1432
长苞香蒲 1484
长苞铁杉 148
长苞球子草 1392
长苞菖蒲 1465
长茎飞蓬 1294
长茎马先蒿 1144
长茎羊耳蒜 1548
长茎还阳参 1284
长茎冷水花 202
长茎金耳环 400
长茎沿阶草 1389
长茎虾脊兰 1523
长松萝 59
长松藻 7
长刺卫矛 700
长刺楤木 837
长刺酸模 233
长齿乌头 306
长齿百里香 1115
长果水苦荬 1155
长果丛菔 457
长果栝楼 795
长果雪胆 786
长果婆婆纳 1155
长春花 962
长春花属 962
长春蒲公英 1349
长荚油麻藤 589
长药隔重楼 1391
长药蜘蛛抱蛋 1372
长柱小檗 359
长柱灯心草 1425
长柱杜鹃 890
长柱沙参 1225
长杜虎皮楠 641
长柱垂头菊 1283
长柱金丝桃 422
长柱唐松草 350
长柱鹿药 1395
长柱紫茎 418
长柄山茶 412
长柄山蚂蝗 595
长柄山蚂蝗属 595
长柄山姜 1503
长柄车前 1198
长柄车前蕨 99
长柄石柑 1478
长柄冬青 688
长柄瓜馥木 272
长柄赤车 201
长柄豆薯 1506
长柄冷水花 201
长柄秋海棠 781
长柄唐松草 350
长柄绣球 479
长柄野扁豆 571
长柄野扇花 707
长柄紫珠 1043
长柄鼠李 716
长柄蕨萁 86
长砗磲 1586
长轴瑞香 753
长冠鼠尾草 1104
长钩刺蒴麻 737
长须黄颡鱼 1669
长须鲸 1758
长须霞水母 1566
长突仙人掌 262
长突耳草 1001
长前胡 872
长柔毛委陵菜 517
长药八宝 463
长根静灰球菌 49
长翅稻蝗 1614
长圆叶大戟 626
长圆叶艾纳香 1268
长圆果菝蓝 453
长圆楼梯草 196
长朔母草 1137
长海胆科 1639
长菱形藻 12
长梗大花漆 672
长梗大果冬青 689
长梗风毛菊 1328
长梗石柑 1478
长梗白花蛇舌草 1001
长梗玄参 1151
长梗百蕊草 210
长梗刚毛五加 834
长梗过路黄 915
长梗杠果 668
长梗刺果卫矛 694
长梗郁李 500
长梗罗伞 838
长梗金腰 475
长梗线蕨 126
长梗细蝇子草 246
长梗韭 1366
长梗美登木 701
长梗扁桃 497
长梗绞股蓝 785
长梗秦艽 951
长梗黄花稔 744
长梗黄精 1393
长梗喉毛花 947
长梗薯 224
长梗蜘蛛抱蛋 1372
长距玉凤花 1542
长距石斛 1535
长距忍冬 1200
长距虾脊兰 1523
长蛇鳚 1654
长脚黄蜂 1634
长盖铁线蕨 97
长颈蟋 1615
长绵鳚 1681
长绵鳚属 1681
长萼石竹 241
长萼鸡眼草 581
长萼栝楼 795
长萼堇菜 768
长萼野百合 565
长萼野海棠 808
长萼鹿角藤 963
长萼糙苏 1097
长棘鳚 1679
长裂打碗花 1025
长裂叶慈姑 1359
长裂葛萝槭 673
长紫菜 12
长喙钱牛儿苗 611
长喙唐松草 349
长筒石蒜 1408
长筒兴山蜡树 939
长筒漏斗苣苔 1184
长筒瞿麦 241
长蒴苣苔属 1184
长蒴黄麻 734
长蛸 1591
长鼠妇 1600
长管大青 104
长管香茶菜 107
长蕊万寿竹 1376
长蕊石头花 242
长蕊地榆 537
长蕊杜鹃 895
长蕊珍珠草 915
长蕊斑种草 1032
长蕊斑种草属 1032

长颜鱼鳅 1613
长螺旋圆田螺 1573
长穗小檗 357
长穗花 815
长穗花属 815
长穗柽柳 776
长穗兔儿风 1242
长穗樟 168
长穗猫尾草 604
长穗腹水草 1159
长鳊 1679
长臂虾科 1602
长臂虾属 1602
长臂猿科 1750
长臂猿属 1750
长翼凤仙花 685
长翼蝠 1747
长絮寥 226
长鳍银鱼 1654
长薄鳅 1667
长萼马铃苣苔 1189
长瓣金花树 808
长瓣金莲花 353
长瓣铁线莲 328
长瓣慈姑 1359
长瓣蜘蛛抱蛋 1372
长鳞红景天 466
长鳞鳅 1703
升麻 321
升麻属 320
片鳞鹅骨 40
片髓灯心草 1425
化州柚 643
化香树 161
化香树属 161
反苞毛兰 1538
反枝苋 259
反萼银莲花 316
反瓣虾脊兰 1523
爪虎儿草 490
爪哇白豆蔻 1506
爪哇屁步甲 1619
爪哇唐松草 349
介蕨 102
介蕨属 102
仓鼠科 1756
公鸡馒头蟹 1604
分叉露兜 1483
分枝列当 1195
分枝感应草 610
勾斑裸胸鳝 1656
勾儿茶 710
勾儿茶属 709
乌口树 1019
乌口树属 1019
乌云伞 364
乌毛蕨 111
乌毛蕨科 111
乌毛蕨属 111
乌头 302
乌头叶蛇葡萄 720
乌头属 301
乌奴龙胆 951
乌芝属 28
乌苏贝母 1379
乌苏里拟鲿 1669
乌苏里瓦韦 131
乌苏里风毛菊 1333
乌苏里圆田螺 1573
乌苏里鼠李 714
乌苏里酸模 234
乌材 926
乌饭树 896
乌龟 1699
乌龟属 1699
乌拉尔棱子芹 875
乌蛤贝母 1378
乌泡子 534
乌韭 89
乌柿 926
乌鸦果 897
乌骨鸡 1724
乌姜 1514
乌药 287
乌桕 639
乌桕属 638
乌翅真鲨 1646
乌鸫 1741
乌贼科 1590
乌贼属 1590
乌梢蛇 1709
乌梢蛇属 1709
乌紫堇 429
乌游蛇 1708
乌塘鳢 1683
乌塘鳢属 1683
乌榄 658
乌藓莓 723
乌藓莓属 722
乌蕨属 89
乌黑 805
乌蝠 1677
乌鳢科 1677
乌鳢属 1677
乌檀属 1010
乌蔹莓 768
乌鳢 1686
乌鳢科 1686
乌鳢属 1686
六月雪 1018
六月雪属 1018
六叶龙胆 949
六叶葎 995
六耳铃 1268
六角莲 364
六齿卷耳 240
六线鱼科 1688
六线鱼属 1688
六指马鲛 1674
六盘山鸡爪大黄 232
六棱菊 1310
六棱菊属 1310
六斑刺鲀 1692
六道木 1198
六道木属 1198
六鳃鲨科 1643
文鸟科 1744
文竹 1371
文县重楼 1390
文昌鱼科 1641
文昌鱼属 1641
文冠果 679
文冠果属 679
文殊兰 1406
文殊兰属 1406
文蛤 1587
方叶五月茶 620
方头鱼科 1676
方头鱼属 1676
方形环棱螺 1572
方茎耳草 1002
方茎假卫矛 702
方枝守宫木 639
方枝柏 152
方铅矿 1792
方斑东风螺 1576
方榄 658
方解石 1785
方蟹科 1606
心叶大百合 394
心叶小花苣苔 1183
心叶山黧豆 571
心叶风毛菊 1328
长叶石蚕 1060
心叶石蚕属 1060
心叶赤飑 791
心叶青藤 299
心叶单花红丝线 1120
心叶荆芥 1092
心叶秋海棠 780
心叶兔儿风 1241
心叶栝楼 793
心叶堇菜 770
心叶黄花稔 744
心叶野海棠 808
心叶猕猴桃 404
心叶紫金牛 903
心叶稷 1451
心籽绞股蓝 784
心脏叶瓶尔小草 80
心萼薯 1023
心萼薯属 1023
心翅果属 708
火红杜鹃 894
火把花 702 1063
火把花属 1063
火枪乌贼 1590
火炬树 670
火绒草 1313
火绒草属 1311
火殃簕 625
火炭母 222
火索麻 748
火烧兰属 1537
火烧花 1162
火烧花属 1162
火麻树 195
火麻树属 195
火绳树 747
火绳树属 747
火斑鸠 1730
火葱 1365
火棘 521
火棘属 521
火筒树 732
火筒树科 732
火筒树属 732
火焰兰 1558
火焰兰属 1558
火焰花 1171
火焰花属 1171
火焰草 471
火媒草 1321
斗鱼科 1685

斗鱼属 1685
斗蟋 1615
巴山冷杉 142
巴山松 146
巴山蓮楼 1390
巴山铁线蓮 327
巴山槌子 156
巴山蕙吾 1315
巴天酸模 234
巴氏拉土蛛 1596
巴东十大功劳 368
巴东小檗 357
巴东木莲 268
巴东过路黄 916
巴东羊角芹 847
巴东荚蒾 1210
巴东胡颓子 759
巴东醉鱼草 1129
巴西沙蠋 1593
巴尔鲁克贝母 1378
巴豆 625
巴豆属 624
巴豆藤 564
巴豆藤属 564
巴戟天 1008
巴戟天属 1007
巴塘报春 918
巴唐紫菀 1260
巴蜗牛科 1580
巴蜗牛属 1580
巴鲤 1694
孔石莼 6
孔雀石 1783
孔雀草 1347
孔雀属 1724
孔雀稗 1443
孔鳐虎鱼 1685
孔鳐 1648
书带蕨 100
书带蕨科 100
书带蕨属 100
双子叶植物纲 158
双叉犀金龟 1623
双片苣苔 1185
双片苣苔属 1185
双叶细辛 398
双耳南星 1465
双团棘胸蛙 1697
双舌华蟹甲草 1339
双全白环蛇 1708
双色树发 58
双色蹄鳊 1748
双花耳草 1000
双花尾药千里光 1346
双花堇菜 765
双花鞘花 212
双吻前口蝠鳊 1650
双环菇 41
双孢蘑菇 41
双参 1221
双参属 1221
双线血蛤 1588
双线嗜粘液蛞蝓 1579
双星藻科 7
双盾木 1199
双盾木属 1199
双籽棕 1463
双籽藤属 1463
双神经纲 1570
双核冬青 688
双扇蕨科 125
双扇蕨属 125
双盖蕨 102
双盖蕨属 102
双斑东方鲀 1691
双斑绵蛇 1708
双斑燕魟 1649
双蜂驼 1770
双蝴蝶 957
双蝴蝶属 957
双蕊野扇花 706
双鳖鲨科 1646
双鳖鲨属 1646
双穗飘拂草 1493

## 五 画

玉凤花属 1542
玉龙乌头 310
玉叶金花 1009
玉叶金花属 1008
玉兰 265
玉竹 1393
玉米黑粉菌 24
玉足海参 1637
玉柏石松 72
玉带海雕 1720
玉铃花 929
玉斑锦蛇 1708
玉蝉花 1419
玉蜀黍 1459
玉蜀黍属 1459
玉蕊 807
玉蕊科 807
玉蕊属 807
玉簪 1384
玉簪叶韭 1365
玉簪属 1384
玉髓 1790
打破碗 526
打破碗花花 315
打碗花 1025
打碗花属 1025
扒地蜈科 989
巧茶 262
巧茶属 691
巧家崖爬藤 727
正鸡纳树 992
正蚓科 1594
甘川铁线莲 322
甘川紫菀 1262
甘平十大功劳 369
甘西鼠尾草 1103
甘孜沙参 1223
甘青乌头 311
甘青老鹳草 613
甘青报春 923
甘青青兰 1065
甘青虎耳草 490
甘青铁线莲 331
甘青蒿 1257
甘青鼠李 716
甘松 1215
甘松属 1215
甘肃丫蕊花 1402
甘肃山麦冬 1387
甘肃山楂 505
甘肃小檗 359
甘肃马先蒿 1143
甘肃天门冬 1370
甘肃贝母 1380
甘肃柽柳 776
甘肃蚤缀 238
甘肃黄芩 1106
甘肃棘豆 592
甘肃瑞香 755
甘肃楼斗菜 318
甘肃鼢鼠 1756
甘草 576
甘草属 576
甘菊 1286
甘野菊 1286
甘葛藤 597
甘紫菜 13
甘遂 628
甘蒙柽柳 776
甘蔗 1456
甘蔗属 1455
甘蓝 447
甘薯属 1028
甘露子 1112
艾氏活额寄居蟹 1604
艾叶火绒草 1312
艾纳香 1267
艾纳香属 1266
艾麻 199
艾麻属 198
艾蒿 1249
艾鼬 1762
节毛飞廉 1272
节节红 1267
节节草 77
节节菜 800
节节菜属 799
节瓜 782
节江蓠 17
节肢动物门 1595
节肢蕨 125
节肢蕨属 125
节根黄精 1393
节蚤 227
节螺螺 1571
节鞭山姜 1502
古山龙 374
古山龙属 374
古氏魟 1649
古巴萝芙木 968
古节肢动物化石 1793
古石鳖科动物化石 1793
古动物化石类 1792
古当归属 851
古柯 618
古柯科 618
古柯属 618
古钩藤 975
古脊椎动物化石 1792
古腕足类动物化石 1793
可可 751
可可属 751
可乐果属 747
石丁香 1004
石丁香属 1003
石上莲 1189
石刁柏 1371
石山巴豆 624

石山苣苔 1191
石山苣苔属 1191
石山花椒 653
石山豆腐柴 1051
石山吴萸 646
石山细梗香草 912
石韦 136
石韦属 135
石牛风子 817
石龙子 1705
石龙子科 1705
石龙子属 1705
石龙芮 345
石龙尾 1136
石龙尾属 1136
石生虎耳草 490
石生鸡蛋参 1094
石生齿缘草 1035
石生铁角蕨 109
石生黄杨 705
石生黄连 434
石生悬钩子 535
石生越橘 898
石生紫菀 1261
石生蓼 225
石生蚋子草 248
石生繁缕 250
石仙桃 1555
石仙桃属 1555
石头花 242
石地钱 68
石地钱属 68
石耳 56
石耳科 56
石耳属 56
石灰岩 1785
石竹 241
石竹科 237
石竹属 241
石血 971
石防风 872
石花 1183
石花菜 13
石花菜科 13
石花菜属 13
石杉科 69
石杉属 69
石豆兰属 1520
石沙参 1224
石英 1789
石松 72
石松科 71
石松属 72
石虎 647
石果鹤虱 1036
石岩报春 919
石油 1794
石油菜 202
石珊瑚 1569
石荠苎 1091
石荠苎属 1090
石柑子 1478
石柑属 1478
石胡荽 1275
石胡荽属 1275
石香薷 1291
石首鱼科 1677
石屏无患子 679
石盐 1787
石莲 472
石莲叶点地梅 910
石莲属 472
石蒜 6
石蒜科 5
石蒜属 6
石栗 619
石栗属 619
石斛唐松草 351
石笔海胆 1640
石笔海胆属 1640
石海椒 617
石海椒属 617
石蒿蒲 1465
石萝藦 985
石萝藦属 985
石梅衣 58
石梓 1050
石梓属 1050
石斛 1535
石斛属 1531
石斑木 523
石斑木属 523
石斑鱼属 1675
石椒草 643
石椒草属 643
石蒜 1408
石蒜科 1406
石蒜属 1407
石楠 514
石楠属 513
石蜈蚣草 1110
石蛾 1627
石蛾科 1627
石蛾属 1627
石蝉草 388
石蚺科 1680
石榴 806
石榴科 806
石榴属 806
石榕树 185
石蜘蛛 1477
石膏 1784
石蕨 138
石蕨属 138
石蒜 55
石蒜科 55
石蒜属 55
石蝴蝶属 1191
石磺 1578
石磺科 1578
石磺海牛科 1578
石磺海牛属 1578
石磺属 1578
布氏新对虾 1601
布氏鲳斯 1613
布目蛤属 1587
布纹藤壶 1598
布郎耳蕨 118
布郎卷柏 73
龙女花 267
龙牙花 573
龙爪茅 1441
龙爪茅属 1441
龙爪柳 165
龙爪槐 600
龙头节肢蕨 125
龙头兰 1554
龙头鱼 1655
龙头鱼科 1655
龙头鱼属 1655
龙头草 1087
龙头草属 1086
龙师草 1492
龙吐珠 1049
龙舌兰 1403
龙舌兰科 1403
龙舌兰属 1403
龙竹 1441
龙血树 1404
龙血树属 1404
龙州半蒴苣苔 1187
龙州线蕨 126
龙州野靛棵 1170
龙州鹅掌柴 845
龙江风毛菊 1327
龙角属 764
龙芽草 496
龙芽草属 495
龙虾科 1602
龙虾属 1602
龙骨马尾杉 70
龙须菜 1371
龙须藤 552
龙虱科 1619
龙虱属 1619
龙胆 950
龙胆科 946
龙胆属 948
龙珠 1129
龙珠果 773
龙珠属 1129
龙脑香科 410
龙脑香属 410
龙脑薄荷 1088
龙常草 1442
龙常草属 1442
龙眼 676
龙眼独活 836
龙眼属 676
龙眼睛 637
龙船花 1004
龙船花属 1004
龙船草 1093
龙船草属 1093
龙脷叶 639
龙葵 1126
龙棕 1464
龙蒿 1250
龙蜥属 1703
平车前 1197
平贝母 1381
平甲虫 1600
平甲虫科 1600
平伏褐层孔菌 34
平伐清风藤 682
平肋书带蕨 100
平坝铁线莲 323
平枝栒子 503
平卧苦荬菜 1308
平卧轴藜 252
平卧鼠曲草 1299
平珠蕨属 63
平胸龟 1699
平胸龟科 1699

平胸龟属 1699
平颏海蛇 1710
平滑苦菜菜 1308
平滑南肺衣 54
平滑钩藤 1020
平滑鲍 1687
平截独活 863
平鳍鳅科 1668
平鳞钝头蛇 1708
东川银莲草 1103
东贝母 1381
东风草 1268
东风菜 1288
东风菜属 1283
东风螺属 1576
东方水绵树 1022
东方风毛菊 1332
东方古柯 618
东方后片蝽 1611
东方纤孔菌 32
东方沙枣 758
东方狗脊蕨 112
东方珊瑚枝 56
东方荚果蕨 110
东方草莓 509
东方香蒲 1485
东方栓齿 35
东方铁线莲 329
东方铃蟾 1695
东方黄花稔 745
东方野扇花 707
东方野豌豆 606
东方婆罗门参 1351
东方鲀属 1691
东方荠 1255
东方蝙蝠 1695 1746
东北七鳃鳗 1643
东北土当归 835
东北大戟 629
东北山蚂蝗 569
东北天南星 1468
东北乌头 305
东北玉簪 1384
东北石杉 69
东北田螺 1573
东北丝裂蒿 1248
东北百合 1386
东北多足蕨 135
东北羊角芹 847
东北红豆杉 155
东北杏 498
东北牡蒿 1254
东北延胡索 427
东北刺人参 841
东北虎耳草 1489
东北金鱼藻 387
东北茶藨 486
东北鸦葱 1334
东北点地梅 910
东北看麦娘 1435
东北兔 1752
东北扁果草 341
东北槭木 167
东北扁核木 519
东北堇菜 771
东北菱 801
东北蛇葡萄 720
东北猪殃殃 996
东北蛔蒿 1338
东北澳蔬 478
东北蒲公英 1349
东北雷公藤 703
东北鼠曲草 1299
东北鼠李 714
东北鼠兔 1751
东北蝲蛄 1603
东北薄荷 1088
东北鼢鼠 1756
东亚小金发藓 67
东亚飞蝗 1613
东亚单孔舌鳎 1690
东亚钳蝎 1595
东亚唐松草 350
东亚唐棣 496
东亚蜉蝣 1613
东亚紫茉莉 235
东当归 847
东京槭杨 162
东京银背藤 1024
东毒菌 280
东南大黑鳃金龟 1624
东南长蒴苣苔 1185
东南佛甲草 468
东南金粟兰 392
东南葡萄 729
东蚁岭科 1626
东俄芹属 879
东陵苔草 1489
东野豌 1194
东紫苏 1067
东紫菀 427
东源四照花 828
卡拉黄堇 428
北山羊 1775
北马兜铃 394
北太领航鲸 1759
北水苦荬 1155
北乌头 306
北方山溪鲵 1694
北方老鹳草 612
北方红门兰 1552
北方拉拉藤 995
北方枸杞 1120
北方雪层杜鹃 894
北方铜鱼 1659
北方獐牙菜 955
北艾 1258
北玄参 1152
北亚列当 1196
北亚槭学 513
北江绣花 757
北红升麻 473
北红尾鸲 1741
北沙参属 861
北国壁钱 1596
北鱼黄草 1029
北京花楸 539
北京虎耳草 490
北京柴胡 852
北京铁角蕨 108
北草蜴 1705
北枳椇 712
北重楼 1391
北美独行菜 454
北美鹅掌柴 264
北柴胡 852
北流圆唇苣苔 1186
北陵鸢尾 1422
北桑寄生 212
北黄花菜 1383
北野豌豆 606
北悬钩子 529
北清香藤 937
北涪紫金牛 899
北葱 1367
北棕蝠 1747
北紫堇 435
北锦葵 743
北酸脚杆 810
北疆风铃草 1227
田中游草 1448
田头格柄笔头菌 47
田头菇 42
田头菇属 42
田皂角 546
田鸡属 1727
田基黄 1300
田基黄属 1300
田菁 598
田青属 598
田野毛茛 344
田麻 733
田麻属 733
田旋花 1026
田葛缕子 856
田葱 1423
田葱科 1423
田葱属 1423
田紫草 1036
田螺科 1572
田螺属 1573
田繁缕 777
田繁缕属 777
甲壳纲 1598
叶下花 1242
叶下珠 637
叶下珠属 636
叶子花属 235
叶片牡蛎 1583
叶头过路黄 917
叶序芒麻 192
叶状铁钉菜 8
叶苞过路黄 914
叶底红 813
叶底珠 640
叶底珠属 640
叶萼山矾 932
叶猴科 1749
叶猴属 1749
叶穗香茶菜 1079
叫姑鱼属 1678
叩甲科 1620
史氏鲟 1650
史氏蝲蛄 1603
凸孔阔蕊兰 1554
凸壳肌蛤 1580
凸脉越橘 898
凸脉猕猴桃 404
凸额马先蒿 1143
凸瓣苣苔 1177
凹甲陆龟 1701
凹叶木兰 267
凹叶佛甲草 469
凹叶厚朴 264

四叶旌节花 772
四叶瑞香 755
四头苋 259
四舌兰 1526
四舌兰属 1526
四顶藻属 18
四线蛤蜊 1587
四脉马兜铃 395
四脉柃 416
四脉紫金牛 899
四萼木蓝 789
四萼清风藤 682
四裂毛麝香 1131
四螺属 1571
四瓣梅花草 483
四川丁香 943
四川山矾 932
四川山胡椒 290
四川千金藤 388
四川马先蒿 1148
四川天名精 1274
四川木姜子 393
四川木莲 268
四川长柄山蚂蝗 596
四川玉凤花 1543
四川冬青 691
四川报春 922
四川杜鹃 895
四川牡丹 404
四川沟酸浆 1141
四川轮环藤 376
四川虎刺 994
四川波罗花 1161
四川虾脊兰 1524
四川粘萼女娄菜 248
四川鹿蹄草 882
四川旌节花 772
四川清风藤 683
四川婆婆纳 1155
四川溪羊藿 367
四川蜡瓣花 459
四川樱 501
四子马兰 1175
四子海桐 495
四爪陆龟 1701
四方骨 272
四方麻 1158
四方蒿 1066
四孔草 1428
四叶乌先蒿 1143
四叶萝芙木 969
四叶藻 996
四芒苞景天 471
四声杜鹃 1731
四角柃 417
四角菱 801
四角蛤蜊 1587
四角蒲桃 806
四轮香 1074
四轮香属 1074
四齿四棱草 1053
四齿蚤缀 239
四季秋海棠 781
四孢蘑菇 41
四指马钹 1674
四指马钹属 1674
四籽野豌豆 607
四萼猕猴桃 408
四棱草 1052
四棱草属 1052
四棱猪屎豆 565
四棱瓢拂草 1494
四裂无柱兰 1517
四裂红景天 466
四裂花黄芩 1110
四裂算盘子 632
四照花 828
四数獐牙菜 956
四蕊鳐 675
矢车菊 1275
矢车菊属 1275
矢族叶蟹甲草 1271
失衡丽蚌 1584
禾本科 1433
禾叶山麦冬 1386
禾叶贝母兰 1527
禾叶风毛菊 1329
禾叶毛兰 1538
禾叶竹叶兰 1518
禾叶繁缕 249
禾生指梗菌 19
禾兰鸦葱 1335
禾秆蹄盖蕨 102
禾串土密树 622
丘地老鹤草 612
代儿茶 570
代儿茶属 570
代代花 643
仙人球 262
仙人掌 263
仙人掌科 262
仙人掌属 263
仙人掌绵腹衣 58
仙人鞭 263
仙人鞭属 263
仙巴掌 263
仙白草 1263
仙茅 1410
仙茅科 1409
仙茅属 1469
仙菜科 17
仙菜属 17
仙鹤草属 67
仪花 585
仪花属 585
白丁香 943
白丁蚬 1581
白八角莲 364
白八宝 463
白山杉 1512
白山蒿 1253
白山楼斗菜 317
白山罂粟 443
白口藤 40
白子菜 1300
白千层 804
白千层属 804
白及 1520
白及属 1519
白马骨 1018
白云母 1789
白云花 863
白木乌桕 638
白木层孔菌 33
白木通 372
白车轴草 603
白五味子 277
白毛长叶紫珠 1043
白毛乌头 311
白毛羊胡子草 1492
白毛黄荆 1054
白毛鸢兔子 1330
白毛紫珠 1041
白长春花 963
白心球花报春 918
白玉草 248
白术 1264
白甲鱼 1666
白兰 268
白叶大血藤 276
白叶瓜馥木 272
白叶莓 532
白叶蒿 1254
白叶藤 975
白叶藤属 975
白皮乌口树 1019
白皮沙拐枣 219
白皮松 145
白皮柯 174
白皮锦鸡儿 558
白头树属 658
白头翁 343
白头翁属 343
白头婆 1295
白头蟹甲草 1270
白丝草属 1373
白耳菜 483
白石榴 806
白舌紫菀 1260
白多孔菌 33
白杆 145
白芷 848
白花小白及 1519
白花凤仙花 684
白花丹 925
白花丹参 1103
白花丹科 923
白花丹属 925
白花长瓣铁线莲 328
白花甘肃马先蒿 1143
白花龙 929
白花龙船花 1004
白花东北堇菜 768
白花老鹳草 611
白花地胆草 1292
白花托里贝母 1378
白花灰毛槐树 600
白花夹竹桃 966
白花全叶青兰 1065
白花合景天 465
白花灯笼 1047
白花异叶苣苔 1193
白花苋 258
白花苋属 258
白花谷蓼 819
白花延龄草 1400
白花驴蹄草 320
白花苦灯笼 1019
白花枝子花 1064
白花刺参 1220
白花油麻藤 589
白花泡桐 1142
白花细叶益母草 1084
白花菟花 756

白花树萝卜 883
白花歪头菜 607
白花点地梅 910
白花鬼针草 1266
白花前胡 872
白花洋紫荆 553
白花堇菜 769
白花益母草 1083
白花菜 445
白花菜科 444
白花菜属 444
白花曼钩子 533
白花蛇舌草 1001
白花银背藤 1024
白花假秦艽 1097
白花假糙苏 1095
白花鹿蹄草 883
白花酢浆草 610
白花硬尖神香草 1075
白花鹅掌柴 845
白花蛛毛苣苔 1190
白花裕民贝母 1379
白花湖北木兰 266
白花蒲公英 1349
白花蓬子菜 998
白花碎米荠 449
白花酸藤果 906
白花蔓菜 1084
白豆蔻 1506
白饭树 640
白条纹龙胆 948
白条草蜴 1705
白条锦蛇 1708
白辛树 928
白辛树属 928
白尾鹞 1720
白尾鹞 1746
白秃马勃 50
白英 1126
白苞芹 868
白苞芹属 868
白苞南星 1469
白苞筋骨草 1057
白苞蒿 1253
白苞裸蕨 387
白茅 1446
白茅属 1446
白茎绢蒿 1338
白枪杆 935
白刺 615
白刺花 599
白刺属 615
白刺锦鸡儿 558
白齿泥炭藓 60
白齿藓科 64
白齿藓属 64
白果佛甲草 470
白果堇菜 771
白底辐肛参 1637
白油树 804
白屈菜 426
白屈菜属 426
白姑鱼 1678
白线薯 379
白草 1451
白药谷精草 1433
白垩 1785
白栎 176
白柳 164
白背大丁草 1297
白背牛尾草 1397
白背叶 634
白背叶下花 1242
白背叶木瓜 373
白背叶楸木 835
白背苇谷草 1323
白背青荚叶 830
白背桐 635
白背钻地风 491
白背铁线蕨 97
白背铁箍散 277
白背绣球 479
白背黄花稔 745
白背鹅掌柴 845
白背啄木鸟 1735
白背算盘子 633
白冠长尾雉 1725
白星花金龟 1624
白点兰属 1560
白蚁科 1612
白香草木樨 586
白香薷 1071
白鬼笔 47
白脉犁头尖 1480
白亮独活 862
白前 977
白喜鸟 976
白绒草 1084
白珠树 885
白珠树属 885
白桩菇 37
白桩菇属 37
白桦木 183
白桐树属 623
白桦 168
白唇竹叶青 1711
白唇鹿 1772
白莲蒿 1256
白透骨消 1072
白脊藤蕨 1598
白胸翠鹃 1734
白粉蝶 1630
白粉藤 724
白粉藤属 724
白酒草 1280
白酒草属 1280
白接骨 1165
白接骨属 1165
白黄侧耳 39
白桉桉 1194
白草蒲 1396
白菜 448
白眼潜鸭 1716
白野槁树 292
白梨 521
白麻 961
白婆婆纳 1156
白颈长尾雉 1725
白颈环毛蚓 1593
白颈鸦 1738
白绿叶 761
白斑乌贼 1590
白斑角鲨 1647
白斑星鲨 1645
白弯委陵菜 515
白弯素馨 936
白棕口蘑 40
白棘三列海胆 1640
白鹃梅 508
白鹃梅属 508
白番红花 1417
白鹇 1724
白鹇鹇 1713
白喉乌头 306
白短鲫 1686
白缘蒲公英 1350
白缘鲛 1670
白瑞香 754
白鼓钉 244
白鼓钉属 244
白蓝翠雀花 334
白腹锦鸡 1722
白腰杓鹬 1728
白腰草鹬 1728
白鲢 1571
白颖苔草 1489
白薇 722
白蝶兰属 1554
白蝴蝶花 1420
白蜡蚧 1617
白蜡蚧属 1617
白鲟 1651
白鲟属 1651
白鲜 646
白鲜属 646
白僵菌 53
白僵菌属 53
白鹤灵芝 1172
白鹤灵芝属 1172
白鹤藤 1023
白鹤藤属 1023
白鹇鸽 1736
白额雁 1717
白薯莨 1414
白薇 976
白蔷 531
白檀 932
白穗花 1398
白穗花属 1398
白箭 834
白暨豚 1758
白暨豚属 1758
白臀鹿 1772
白藤 1461
白鹭 1715
白鹭属 1714
白雪紫花地丁 771
白鹇 1715
瓜子金 664
瓜木 825
瓜叶乌头 305
瓜叶栝楼 793
瓜叶菊 1277
瓜叶菊属 1277
瓜螺 1577
瓜螺属 1577
瓜馥木 272
瓜馥木属 271
丛毛羊胡子草 1492
丛生羊角蒜 1546
丛生盏形珊瑚 1568
丛生腺毛卷耳 240
丛生蜘蛛抱蛋 1372
丛花南蛇藤 693

丛枝角茴 1162
丛枝蓼 222
丛腹 458
丛腹属 457
丛梗孢科 53
丛蓍科 61
令箭荷花 263
令箭荷花属 263
印支钩藤 1020
印度大风子 763
印度枣 718
印度狗肝菜 1167
印度草木樨 586
印度独活 862
印度黄檀 567
印度蛇菰 217
印度犀 1769
印缅钗子股 1549
皮氏叫姑鱼 1678
皮氏菊头蝠 1748
皮果衣 54
皮果衣科 54
皮果衣属 54
冬瓜 782
冬瓜属 782
冬虫夏草 21
冬青 690
冬青卫矛 697
冬青科 687
冬青属 687
冬桃 733
冬菇 36
冬菇属 36
冬葵 742
鸟舌兰 1519
鸟舌兰属 1519
鸟足毛茛 344
鸟足兰 1559
鸟足兰属 1559
鸟纲 1712
鸟巢菌科 52
包疮叶 907
包唇马先蒿 1144
包被鸡皮衣 57
市蜜 255
玄参 1152
玄参科 1131
玄参属 1151
宁波木蓝 579
宁波溲疏 477
宁波滑蜥 1705
宁夏贝母 1381
宁夏沙参 1225
宁夏枸杞 1120
穴果木 993
穴果木属 993
穴兔属 1752
闪光党参 1320
闪蚬 1586
兰叶大戟 626
兰考泡桐 1142
兰耳草 1428
兰耳草属 1428
兰花山药 1366
兰花卷鞘鸢尾 1421
兰花蕉 1501
兰花蕉属 1501
兰果土茯苓 1396
兰岩参属 1276
兰科 1517
兰属 1528
半月形铁线蕨 98
半叶马尾藻 11
半叶趾虎 1705
半边月 1214
半边莲 1233
半边莲属 1233
半边旗 93
半边蝶 483
半扭卷马先蒿 1147
半岛鳞毛蕨 117
半环扁尾海蛇 1710
半枝莲 1107
半枫荷 462
半枫荷属 462
半枝毛兰 1538
半夏瓦十大功劳 370
半夏 1477
半夏属 1477
半圆盖阴石蕨 124
半常绿白杜树 695
半滑舌鳎 1690
半蒴苣苔 1186
半蒴苣苔属 1186
头九节属 992
头花龙胆 948
头花杜鹃 890
头花杯苋 261
头花韭 1366
头花黄杨 705
头花银背藤 1024
头花蓼 222
头序毛花 756
头序榄木 836
头状四照花 827
头状乌马勃 50
头状蓼 220
头状穗莎草 1490
头索动物门 1641
头蕊兰属 1524
汇螺科 1574
汉水扁尾薄鳅 1667
汉城细辛 399
永宁独活 863
司氏鲛 1670
尼泊尔十大功劳 370
尼泊尔天名精 1274
尼泊尔水东哥 409
尼泊尔双蝴蝶 957
尼泊尔老鹳草 613
尼泊尔沟酸浆 1141
尼泊尔鸢尾 1419
尼泊尔香青 1246
尼泊尔榄木 167
尼泊尔常春藤 839
尼泊尔绿绒蒿 442
尼泊尔鼠李 716
尼泊尔酸模 233
辽东栎 177
辽东槭木 167
辽东蒲公英 1349
辽东蒿 1252
辽宁丁香 944
辽宁山楂 506
辽宁堇菜 769
辽宁椴木 836
辽吉侧金盏花 313
辽细辛 399
辽藁本 867
边荚鱼藤 568
边紫菜 13
边缘鳞盖蕨 89
奶果猕猴桃 405
发光假蜜环菌 36
发冷藤 385
发菜 3
对马耳蕨 121
对节刺 717
对叶大戟 630
对叶元胡 432
对叶兰 1548
对叶百部 1403
对叶豹兰 1530
对叶榕 187
对生耳蕨 119
对虾 1601
对虾科 1601
对虾属 1601
对萼猕猴桃 408
台东荚蒾 1214
台北艾纳香 1267
台闽苞苔属 1193
台闽苞苔 1193
台琼海桐 494
台湾大囊蛾 1627
台湾小檗 359
台湾千金藤 382
台湾开口箭 1401
台湾车前蕨 99
台湾林鳗 511
台湾泡桐 1142
台湾油胡芦 1614
台湾细圆藤 379
台湾相思 545
台湾枇杷 507
台湾秋海棠 781
台湾盆距兰 1539
台湾桂竹 1453
台湾翅果菊 1325
台湾黄堇 427
台湾黄蜂 1634
台湾榕 187
台湾鳞蛄 1615
加拿大一枝黄花 1342
加拿大杨 163
圣地红景天 467
圣罗勒 1094
圣蕨 104
圣蕨属 104
矛叶荩草 1435
矛形楔蛏 1585
矛状耳蕨 119
矛尾鲬虎鱼 1684
矛尾翻车鲀 1693
毋草 1138
毋草属 1137
毋菊 1319
毋菊属 1319
丝毛飞廉 1272
丝毛栝楼 796
丝毛蓝刺头 1291
丝石竹属 242
丝叶旱麦瓶草 247
丝叶苦卖菜 1307

丝叶球柱草 1486
丝兰属 1406
丝瓜 788
丝瓜属 788
丝光褐林蚁 1632
丝茎婆婆纳 1158
丝果大戟 630
丝注龙胆 949
丝带蕨 127
丝带蕨属 127
丝铁线莲 324
丝棉树 695
丝裂沙参 1222
丝穗金粟兰 391
丝藻科 5
丝藻属 5
丝瓣剪秋罗 243

## 六 画

动蕊花 1081
动蕊花属 1081
吉丁虫科 1621
吉乃木多轮贝母 1378
吉龙草 1067
吉沙南星 1470
吉林乌头 305
吉林蔓菜 470
吉祥草 1394
吉祥草属 1394
老牛筋 238
老瓜头 978
老虎刺 596
老虎刺属 596
老虎须 988
老虎楝 662
老鸦柿 927
老鸦糊 1042
老鸦瓣 1400
老鸦铃 929
老鼠芳 1458
老鼠矢 933
老鼠簕 1164
老鼠簕属 1164
老鹳草 614
老鹳草属 611
地丁草 427
地八角 549
地木耳 3
地不容 381
地瓜 189
地皮消 1171
地皮消属 1171
地耳草 422
地耳蕨 121
地耳蕨属 121
地衣植物门 54
地花细辛 399
地杨桃 639
地杨桃属 639
地杨梅 1426
地杨梅属 1426
地枫皮 279
地构叶 640
地构叶属 640
地果草 769
地肤 256
地肤属 255
地宝兰 1540
地宝兰属 1540
地刷子 71
地茶 59
地茶科 59
地茶属 59
地柏 74
地柑 1478
地星科 51
地星属 51
地盆草 1107
地胆 1622
地胆草 1292
地胆草属 1292
地桃花 745
地鳖属 1742
地钱 68
地钱科 68
地钱属 68
地蚕 1111
地笋 1086
地笋属 1086
地浆 1791
地海椒 1117
地海椒属 1117
地涌金莲 1501
地涌金莲属 1501
地黄 1150
地黄连 661
地黄连属 660
地黄属 1150
地蒸 810
地菇科 23
地菇属 23
地绒鼠尾草 1104
地榆 979
地椒 1115
地榆 537
地榆属 537
地锦 627
地蔷薇 502
地蔷薇属 502
地檀香 885
地鳖属 1611
扣匹 274
扩展女贞 939
托叶龙芽草 495
托叶楼梯草 197
托克逊蒲公英 1350
托里贝母 1378
托里阿魏 861
托柄菝葜 1396
扫尾豪猪 1755
扫帚沙参 1225
扫帚岩须 884
扫帚菜 256
扬子小连翘 422
扬子毛茛 346
扬子铁线莲 325
芋 1475
芋兰 1550
芋兰属 1550
芋根江篱 17
芋属 1474
芨芨草 1433
芨芨草属 1433
芍药 402
芍药科 402
芍药属 402
芒 1449
芒毛苣苔 1177
芒毛苣苔属 1177
芒尖苔草 1487
芒刺复叶耳蕨 113
芒萁 84
芒萁属 84
芒硝 1788
芒属 1449
芝麻菜 452
芝麻菜属 452
耳叶马兜铃 397
耳叶风毛菊 1331
耳叶凤仙花 685
耳叶杜鹃 889
耳叶苔科 67
耳叶苔属 67
耳叶金毛裸蕨 99
耳叶珍珠菜 911
耳叶柃 415
耳叶猕猴桃 406
耳叶紫菀 1260
耳叶蚕 226
耳叶蟹甲草 1269
耳羽岩蕨 111
耳形瘤足蕨 83
耳状人字果 339
耳钩草 768
耳草 999
耳草属 999
耳柄过路黄 916
耳基木苋菜 798
耳菱 801
耳鲍 1570
耳蕨属 118
耳翼蟹甲草 1270
亚大苔草 1486
亚东乌头 310
亚肉座菌属 21
亚欧唐松草 350
亚砖红沿丝伞 42
亚香棒虫草 20
亚洲玉米螟 1628
亚洲石梓 1050
亚洲地椒 1115
亚洲岩风 866
亚洲树发 58
亚洲阔耳蝠 1747
亚洲象 1768
亚洲薯 1238
亚绒盖乳菇 45
亚菊属 1243
亚麻 617
亚麻叶千屈菜 799
亚麻车前 1198
亚麻科 617
亚麻属 617
朴树 179
朴属 178
西川红景天 466
西风芹属 878
西双版纳粗糙 155
西北栒子 504
西归芹 878
西归芹属 878
西瓜 783
西瓜属 783
西伯利亚杏 499

西伯利亚紫菀 736
西伯利亚刺柏 151
西伯利亚耧斗菜 317
西伯利亚接骨木 1207
西伯利亚铁线莲 331
西伯利亚乌头 301
西伯利亚滨藜 252
西伯利亚远志 664
西伯利亚败酱 1217
西伯利亚蓼 229
西府海棠 511
西南三角瓣花 1013
西南山梗花 1235
西南卫矛 697
西南马先蒿 1145
西南木荷 418
西南五月茶 620
西南水芹 869
西南水苏 1112
西南风铃草 1226
西南凤尾蕨 93
西南手参 1542
西南毛茛 344
西南文殊兰 1407
西南石蒜 136
西南叶下珠 637
西南羽叶参 844
西南红山茶 413
西南旱蕨 96
西南牡蒿 1255
西南远志 663
西南冷水花 203
西南附地菜 1040
西南忍冬 1200
西南拉拉藤 996
西南杭子梢 556
西南齿唇兰 1551
西南虎刺 994
西南委陵菜 517
西南沿阶草 1389
西南草莓 509
西南胡麻草 1133
西南香槠 1014
西南鬼灯檠 487
西南桃叶卫矛 697
西南栒子 503
西南铁角蕨 108
西南铁线莲 336
西南唐松草 348
西南绣球 479
西南荛花 1396
西南银莲花 314
西南郁头尖 1482
西南假耳草 1010
西南野木瓜 373
西南粗叶木 1005
西南粗糠树 1034
西南落新妇 473
西南萱草 1383
西南槐树 600
西南鼠耳蝠 1747
西南葡包豆 599
西南猪牙菜 954
西施舌 1587
西洋参 843
西洋茜草 1018
西榛 167
西域旌节花 722
西康花椒 539
西葫芦 784
西番莲 772
西番莲科 772
西番莲属 772
西蜀榆 181
西藏大黄 232
西藏中麻黄 156
西藏马先蒿 1146
西藏天门冬 1371
西藏木瓜 501
西藏车前 1198
西藏牛皮消 978
西藏玉凤花 1544
西藏列当 1195
西藏吊灯花 975
西藏扭连钱 1098
西藏花椒 656
西藏沙棘 761
西藏延胡索 1400
西藏青荚叶 830
西藏茜草 1017
西藏苎麻 207
西藏点地梅 910
西藏洼瓣花 1388
西藏扁芒菊 1355
西藏秦艽 949
西藏桃叶珊瑚 826
西藏鸭首马先蒿 1142
西藏猫乳 713
西藏犏牛儿苗 611
西藏麻黄 157
西藏棱子芹 874
西藏藁倒牛 611
西藏蟾蜍 1696
西疆蒲公英 1348
百日青 154
百日菊 1357
百日菊属 1357
百叶蔷薇 524
百合 1385
百合花杜鹃 892
百合科 1363
百合属 1385
百花山柴胡 852
百花杜鹃 893
百花锦蛇 1708
百两金 901
百步回阳 630
百足藤 1479
百里香 1115
百里香属 1114
百灵科 1735
百齿卫矛 695
百金花 946
百金花属 946
百脉根 584
百脉根属 584
百部 1402
百部科 1402
百部属 1402
百能藏 1266
百能藏属 1266
百球藨草 1498
百眼藤 1008
百蕊草 210
百蕊草属 210
列当 1195
列当科 1194
列当属 1195
有色金属化合物 1791
有尾水蕲 1360
有柄马尾杉 70
有柄水苦荬 1155
有柄石韦 137
有柄金丝桃 423
有柄观音座莲 81
灰毛大青 1046
灰毛川木香 1289
灰毛风毛菊 1329
灰毛风铃草 1226
灰毛乌蔹梅 723
灰毛白鹤藤 1024
灰毛牡荆 1053
灰毛岩风 865
灰毛泡 533
灰毛菀 1045
灰毛党参 1228
灰毛浆果藤 660
灰毛桑寄生 215
灰毛黄芩 1106
灰毛赛软紫菀 1261
灰毛蛇葡萄 720
灰毛婆婆纳 1155
灰毛蓝钟花 1233
灰毛槐树 600
灰毛糙苏 452
灰巴蜗牛 1580
灰叶 602
灰叶延胡索 430
灰叶堇菜 766
灰叶属 602
灰白毛莓 536
灰白侧耳 39
灰白益母草 1084
灰头小鼯鼠 1754
灰头鹀 1742
灰头鹚 1745
灰头鹦鹉 1730
灰色五味子 276
灰色紫金牛 902
灰旱獭 1753
灰沙燕 1736
灰尾兔 1752
灰苍鸢 1256
灰枝紫菀 1262
灰岩皱叶报春 920
灰岩黄芩 1106
灰罗勒 1093
灰背老鹳草 614
灰背铁线蕨 97
灰背清风藤 682
灰背椋 736
灰星鲨 1646
灰毡毛忍冬 1203
灰莲蒿 1256
灰莉 944
灰莉属 944
灰枸子 502
灰胸竹鸡 1722
灰胸木蜂 1635
灰球菌属 49
灰葛苞科 48
灰葛苞属 48
灰颈鼠兔 1751
灰绿水芒麻 193

灰绿龙胆 952
灰绿黄堇 427
灰绿藜 254
灰喉鸟 1737
灰蛀 1717
灰黑滨珊瑚 1568
灰链游蛇 1708
灰蓟 1277
灰鹅 1160
灰腹绿锦蛇 1708
灰鼠兔 1751
灰鼠蛇 1709
灰藓科 66
灰藓属 66
灰鹤 1727
灰鞘粉条儿菜 1363
灰薄荷 1088
灰鲸 1757
灰鲸科 1757
灰鲸属 1757
夹竹桃 966
夹竹桃叶素馨 936
夹竹桃科 958
夹竹桃属 966
夹江紫金牛 903
尖刀蛭 1589
尖山橙 966
尖子木 812
尖子木属 812
尖叶小檗 354
尖叶川黄瑞木 410
尖叶木 1022
尖叶木属 1022
尖叶五匹青 876
尖叶牛尾菜 1397
尖叶长柄山蚂蝗 595
尖叶乌蔹莓 723
尖叶头状四照花 827
尖叶丝石竹 242
尖叶苔草 1487
尖叶金丝桃 421
尖叶泥炭藓 60
尖叶菜蕨 485
尖叶铁仔 908
尖叶唐松草 347
尖叶黄杨 705
尖叶眼树莲 980
尖叶假龙胆 952
尖叶匍灯藓 63
尖叶清风藤 683
尖叶栎 187
尖叶漆 671
尖叶藁本 866
尖头叶藜 253
尖头红鲌 1660
尖头瓶尔小草 79
尖头银鱼 1654
尖头斜齿鲨 1646
尖头燕鳐 1671
尖舌苔苔 1192
尖舌苔苔属 1192
尖吻蛇鲻 1657
尖吻假三刺鲀 1691
尖吻鲭 1711
尖连蕊茶 412
尖尾凤 1043
尖尾芋 1466
尖顶地星 52
尖顶羊肚菌 23
尖苞柊叶 1516
尖枝瑚菌 26
尖齿凤了蕨 98
尖齿耳蕨 118
尖齿豆腐柴 1051
尖齿臭茉莉 1048
尖齿锯鳐 1648
尖果沙枣 758
尖细金线蕨 1594
尖药花 1165
尖药花属 1165
尖脊蚌属 1584
尖海龙 1673
尖被藜芦 1401
尖基木藜芦 887
尖距紫堇 435
尖萼山黄皮 1014
尖萼毛柃 414
尖弯鱼黄草 1029
尖萼厚皮香 418
尖弯紫珠 1043
尖萼楼斗菜 318
尖棘海盘车 1639
尖喙隔距兰 1526
尖附陇带马唐 1608
尖槐藤 985
尖槐藤属 985
尖嘴林鳐 511
尖嘴虹 1649
尖嘴扁颌针鱼 1670
尖瓣花 1237
尖瓣花属 1237
尖瓣雪灵芝 238
尖瑞香 753
尖舌兰属 1546
劣味乳菌 44
当归 850
当归属 847
当归藤 906
光千金藤 381
光石韦 136
光叶丁公藤 1027
光叶山刺玫 525
光叶山矾 932
光叶山姜 1503
光叶山黄麻 180
光叶山楂 505
光叶子花 235
光叶乌桕树 585
光叶云南草蔻 1501
光叶风毛菊 1327
光叶毛果枳椇 712
光叶巴豆 624
光叶石楠 514
光叶白头树 658
光叶地不容 381
光叶闭鞘姜 1509
光叶决明 560
光叶红豆 590
光叶泡花树 681
光叶铺墓菜 767
光叶兔儿风 1241
光叶绞股蓝 785
光叶墓菜 771
光叶党参 1228
光叶蚊子草 508
光叶铁仔 908
光叶海桐 492
光叶绣线菊 541
光叶蕨藜 1395
光叶蛇葡萄 722
光叶密花豆 601
光叶粗糠树 1035
光叶紫珠 1043
光叶蔷薇 528
光叶蝴蝶草 1154
光叶槭 674
光叶懒蒜 138
光叶黎蒴 1413
光头稗 1443
光华柳叶菜 820
光里白 84
光苞蒲公英 1348
光茎茜草 1018
光枝勾儿茶 710
光刺乳实球 262
光果大戟 629
光果风毛菊 1330
光果甘草 576
光果田麻 734
光果姜 1514
光果藜 1046
光果宽叶独行菜 454
光果婆婆纳 1157
光果翠雀花 337
光泡洞 1142
光泽黄颡鱼 1669
光梔子皮 764
光柄菇科 41
光柄筒冠花 1111
光轴苎叶蓝 389
光轴野燕麦 1436
光肺衣 54
光洁水绵 7
光虹 1649
光亮瘤蕨 132
光前胡 871
光素馨 938
光核桃 497
光唇鱼属 1658
光润金线蕨 1594
光梗丝石竹 242
光萼小蜡 940
光萼血见愁 1114
光萼青兰 1064
光萼茅膏菜 425
光萼斑叶兰 1540
光棘球海胆 1641
光硬皮马勃 52
光桴野燕麦 1436
光滑米口袋 577
光鳞水蜈蚣 1495
吐根 992
吐烟花 201
吐鲁番锦鸡儿 560
吕宋荚蒾 1211
吊山桃 986
吊石苣苔 1188
吊石苣苔属 1188
吊兰 1374
吊兰属 1374
吊丝竹 1442
吊竹梅 1431
吊灯花 975
吊灯花属 974

吊灯扶桑 741
吊罗山萝芙木 969
吊钟花属 884
吊球草 1074
虫豆 552
虫豆属 552
虫纹东方鲀 1691
虫实属 255
虫盾属 20
虫草蝠蛾 1627
虫鳎 1690
虫鳎属 1657
早开堇菜 771
早熟禾 1454
早熟禾属 1454
曲毛短柄乌头 302
曲毛簪珠草 819
曲江远志 664
曲花紫堇 428
曲尾鲟科 61
曲尾鲟属 61
曲苞芋 1476
曲苞芋属 1476
曲枝天门冬 1371
曲枝委陵菜 519
曲枝假蓝 1174
曲柄铁线莲 331
曲柄蕨属 61
曲轴石斛 1533
曲轴海金沙 85
曲轴黑三棱 1484
曲浒苔 6
曲连 785
曲萼绣线菊 541
曲霉科 19
团水虱科 1599
团叶槲蕨 138
团叶鳞始蕨 89
团头鲂 1662
团羽铁线蕨 96
团花山矾 931
团花龙船花 1004
团花杜鹃 889
团花属 990
团花锦蛇 1708
团核黄褐孔菌 36
团球火绒草 1313
团扇叶秋海棠 780
团集刚毛藻 7
团聚姜 1515
回回苏 1096
同心结属 967
同花母菊 1319
同齿樟味藜 253
同型巴蜗牛 1580
同形鳞毛蕨 118
同钟花 1233
同钟花属 1233
同瓣凤仙花 685
网叶山胡椒 289
网纹马勃 51
网纹石斑鱼 1675
网纹东方鲀 1692
网纹唐松草 351
网纹海兔 1577
网纹裸胸鳝 1656
网脉小檗 360
网脉山龙眼 208
网脉肉托果 671
网脉崖爬藤 728
网脉猕猴桃 406
网脉旋蒴苣苔 1178
网脉葡萄 731
网脉酸藤子 906
网脉蜜茎 1315
网肺衣 54
网球花 1407
网球花属 1407
网眼瓦韦 129
肉叶茜草 1016
肉叶鹅观花 1062
肉托竹柏 154
肉托果属 670
肉色土圈儿 548
肉色杯伞 36
肉花卫矛 695
肉苁蓉 1194
肉苁蓉属 1194
肉豆蔻 274
肉豆蔻科 274
肉豆蔻属 274
肉刺树花 59
肉齿菌属 27
肉果草 1135
肉果草属 1135
肉质伏石蕨 127
肉珊瑚 986
肉珊瑚属 986
肉荚云实 554
肉桂 285
肉根马先蒿 1147
肉根毛茛 345
肉座壳属 22
肉座菌科 21
肉球菌属 21
肉穗草 813
肉穗草属 813
刚毛山牵牛 1176
刚毛五加 834
刚毛白簕 834
刚毛地檀香 885
刚毛尖子木 812
刚毛忍冬 1202
刚毛香茶菜 1077
刚毛海榄蜞 1566
刚毛黄蜀葵 738
刚毛藻科 6
刚毛藻属 6
帆蚌属 1585
朱兰 1558
朱兰属 1558
朱红苞苔 1179
朱红苞苔属 1179
朱红栓菌 34
朱顶红 1407
朱顶红属 1407
朱砂根 901
朱砂藤 978
朱蕉 1101
朱栾 643
朱缨花 556
朱缨花属 556
朱蕉 1404
朱蕉属 1404
朱槿 741
舌叶苔草 1487
舌状蜈蚣藻 15
舌唇兰 1556
舌唇兰属 1556
舌喙兰 1544
舌喙兰属 1544
舌蕨科 123
舌蕨属 123
舌鳎科 1690
舌鳎属 1690
舌瓣鼠尾草 1102
竹小肉座菌 21
竹木蜂 1635
竹节参 842
竹节草 1427 1439
竹节树 815
竹节树属 815
竹节秋海棠 780
竹节前胡 871
竹节蓼 220
竹节蓼属 220
竹叶山姜 1501
竹叶子 1431
竹叶兰属 1518
竹叶吉祥草 1431
竹叶吉祥草属 1431
竹叶西风芹 878
竹叶花椒 653
竹叶青 1712
竹叶柴胡 854
竹叶眼子菜 1362
竹叶椒 298
竹叶蕉 1516
竹叶蕉属 1516
竹生肉球菌 21
竹芋 1516
竹芋科 1516
竹芋属 1516
竹鸡属 1722
竹林消 978
竹林黄芩 1106
竹荪 47
竹荪属 47
竹柏 153
竹根七 1375
竹根七属 1375
竹黄 22
竹黄属 22
竹蛏科 1588
竹蛏属 1589
竹筴鱼 1677
竹筴鱼属 1677
竹鼠科 1755
竹鼠属 1755
乔木茜草 651
乔氏风鳉 1671
乔松 146
优越虎耳草 488
伏毛芒麻 193
伏毛直序乌头 309
伏毛铁棒锤 304
伏毛假地豆 569
伏石蕨 128
伏石蕨属 127
伏生石豆兰 1521
伏地卷柏 75
伏果圆柱菌 27
伏美石花菜 14
似原吸虫 1668

似原吸鳞蕨 1668
似鲍 1663
似鲍蕨 1663
似鳞 1661
仰鼻猴属 1750
仿荣 733
伊氏鼠耳蕨 1747
伊宁小檗 358
伊吹堇菜 771
伊朗蒿 1255
伊犁贝母 1380
伊犁郁金香 1400
伊犁岩风 865
伊犁鸦葱 1334
伊犁绢蒿 1338
伪泥胡菜 1339
华三芒草 1435
华山松 147
华山矾 931
华山姜 1502
华千里光属 1341
华千金榆 169
华马先蒿 1140
华马钱 945
华木兰 266
华木槿 742
华水苏 1111
华中山柳 881
华中山楂 506
华中马先蒿 1144
华中五味子 279
华中介蕨 102
华中冬青 687
华中前胡 871
华中栝楼 796
华中铁角蕨 109
华中铁线莲 330
华中悬钩子 530
华中婆婆纳 1156
华中碎米荠 450
华凤仙 684
华火绒草 1314
华东山柳 881
华东木犀 942
华东木蓝 579
华东阴地蕨 78
华东杏叶沙参 1223
华东唐松草 349
华东瓶蕨 87
华东瓦葵 1398
华东野核桃 160
华东蓝刺头 1290
华东椴 736
华东膜蕨 86
华东瘤足蕨 83
华东蹄盖蕨 101
华东薰草 1498
华北大黑鳃金龟 1623
华北卫矛 695
华北风毛菊 1331
华北乌头 310
华北石韦 136
华北白前 977
华北忍冬 1205
华北珍珠梅 538
华北粉背蕨 94
华北绣线菊 541
华北葡萄 729
华北蓝盆花 1221
华北獐牙菜 957
华北耧斗菜 318
华北鳞毛蕨 1615
华北蹄盖蕨 101
华北鹭盆子 532
华白珠 886
华西小石积 513
华西小檗 361
华西龙头草 1086
华西红门兰 1552
华西忍冬 1206
华西枫杨 161
华西雨蛙 1697
华赤胫散 229
华丽马先蒿 1148
华丽龙胆 951
华商麻 739
华岩扇 880
华空木 543
华茶藨 486
华南十大功劳 369
华南大黑鳃金龟 1624
华南马尾杉 70
华南云实 554
华南五针松 146
华南毛蕨 104
华南龙胆 950
华南半蒴苣苔 1186
华南舌蕨 123
华南苏铁 141
华南吴萸 646
华南皂荚 575
华南谷精草 1433
华南远志 663
华南忍冬 1200
华南画眉草 1444
华南夜来香 987
华南实蕨 122
华南胡椒 390
华南省藤 1461
华南兔 1752
华南桂 283
华南桦 168
华南缺齿鳞 1746
华南黄杨 705
华南蚱蝉 1616
华南猕猴桃 406
华南喜花草 1168
华南落新妇 472
华南紫萁 83
华南逼迫子 622
华南蒲桃 805
华南鳞盖蕨 88
华虹 1631
华钩藤 1021
华重楼 1391
华忽布花 190
华素馨 938
华夏子陵树 802
华脊鳃金龟 1624
华桑 191
华黄芪 549
华萝藦 984
华野葵 743
华麻花头 1339
华紫珠 1041
华瑞香 755
华蒲公英 1350
华蜗牛 1580
华绣伞枫 840
华腺萼木 1009
华鼠尾草 1101
华溪蟹科 1606
华溪蟹属 1606
华榛 170
华馨粟 443
华鲮 1665
华鲮属 1665
华鳔 1664
华蟹甲草属 1339
向日葵 1301
向日葵属 1301
自然金 1791
自然银 1791
自然硫 1793
血见愁 1114
血见愁老鹳草 612
血水草 439
血水草属 439
血叶兰 1548
血叶兰属 1548
血当归 1346
血红小檗 361
血红牛肝菌 43
血红栓菌 35
血红菇 46
血苋 261
血苋属 261
血苔 223
血盆草 1101
血桐属 634
血散薯 380
血满草 1206
后片鳞属 1611
舟曲贝母 1380
舟形无齿蚌 1584
全叶山芹 870
全叶马兰 1309
全叶马先蒿 1145
全叶半蒴苣苔 1187
全叶延胡索 434
全叶青兰 1064
全叶榕 188
全秃海桐 494
全唇尖舌苣苔 1192
全唇花 1074
全唇花属 1074
全裂马先蒿 1144
全缘凤尾蕨 92
全缘火棘 521
全缘叶栾树 677
全缘叶绿绒蒿 442
全缘叶紫珠 1042
全缘叶蓝刺头 1291
全缘叶醉鱼草 1130
全缘灯台莲 1473
全缘红菇 46
全缘贯众 114
全缘金粟兰 391
全缘兔耳草 1135
全缘栝楼 795
全缘栒子 503
全缘囊吾 1317
会东藤 981
合丝肖蒲葵 1384

合欢 547
合欢属 546
合果含笑属 270
合柱兰 1536
合柱兰属 1536
合柱金莲木 410
合柱金莲木属 410
合柄铁线莲 323
合轴荚蒾 1214
合萌属 546
合景天属 465
合掌消 975
合鳃鱼科 1675
合囊鹿药 1395
企鹅珍珠贝 1582
伞形科 847
伞形绣球 479
伞形梅笠草 882
伞形紫金牛 900
伞花马钱 946
伞花石豆兰 1521
伞花冬青 689
伞花老鹳草 614
伞花杜若 1430
伞花绢毛菊 1344
伞花繁缕 250
伞房贝母兰 1526
伞房花耳草 1000
伞房花赤胫散 229
伞房荚蒾 1208
伞珍珠 903
伞菌状灰菇包 48
肌海葵属 1567
肌蛤属 1580
肋毛藤属 121
肋果沙棘 761
肋柱花属 954
色木槭 674
多水高岭石 1790
多毛小蜡 940
多毛西风芹 878
多毛沙参 1225
多毛纲 1592
多毛隐翅虫 1620
多孔菌科 28
多孔菌属 33
多叶勾儿茶 710
多叶花椒 655
多叶虎耳草 489
多叶唐松草 348
多叶隐子草 1439
多叶斑叶兰 1540
多叶紫菀 433
多叶锦鸡儿 558
多头风毛菊 1332
多头苦荬菜 1308
多汁乳菇 45
多舌飞蓬 1294
多年拟层孔菌 30
多伞北柴胡 852
多伞阿魏 861
多羽节肢蕨 125
多羽贯众 114
多羽新月蕨 106
多花山壳骨 1172
多花山矾 933
多花山姜 1504
多花木蓝 579
多花毛叶灯油藤 693
多花勾儿茶 709
多花瓜馥木 272
多花兰 1529
多花地杨梅 1426
多花亚菊 1243
多花灯心草 1425
多花杜鹃 890
多花附地菜 1040
多花青藤 299
多花杭子梢 557
多花泡花树 681
多花沿阶草 1390
多花胡枝子 583
多花柽柳 776
多花素馨 938
多花桉 803
多花脆兰 1517
多花黄芪 550
多花野牡丹 810
多花落新妇 473
多花清风藤 683
多花溲疏 477
多花筋骨草 1058
多花蔷 1255
多花醉鱼草 1130
多足蕨 135
多足蕨属 135
多序岩黄芪 578
多序楼梯草 196
多层石蒜 56
多苞斑种草 1033
多茎委陵菜 518
多茎葛藟 221
多茎野豌豆 606
多茎景天 470
多茎鼠曲草 1299
多花苓菊 1309
多枝千屈菜 799
多枝柳叶菜 821
多枝柽柳 776
多枝香薷 1067
多枝点地梅草 351
多枝黄芪 551
多枝婆婆纳 1156
多枝紫金牛 904
多枝雾水葛 205
多刺天门冬 1370
多刺绿绒蒿 441
多刺锦鸡儿 559
多轮贝母 1378
多齿马先蒿 1143
多齿蛇鳞 1655
多齿蹄盖蕨 101
多歧沙参 1222
多果鸡爪草 319
多变鲍 1571
多卷须栝楼 796
多荚草 244
多荚草属 244
多星韭 1368
多脉四照花 828
多脉冬青 690
多脉羊蹄甲 553
多脉茵芋 652
多脉猫乳 713
多脉紫金牛 903
多脉榆 181
多脉酸藤子 905
多疣悬鼩 64
多疣壁虎 1704
多须公 1295
多根乌头 305
多根硬皮马勃 53
多被银莲花 316
多棱角螺 1572
多棱角螺属 1572
多榔菊 1290
多榔菊属 1290
多棘海盘车 1639
多棘蜈蚣 1607
多裂乌头 308
多裂东北延胡索 427
多裂叶荆芥 1106
多裂委陵菜 518
多裂独活 962
多裂骆驼蓬 616
多裂荷青花 440
多裂翅果菊 1325
多裂黄檀 567
多裂蒲公英 1348
多鳃曲尾鲽 61
多腺悬钩子 534
多蕊木 847
多蕊木属 847
多蕊红茴香 280
多蕊金丝桃 422
多蕊蛇菰 218
多蕊商陆 234
多瘤丽蚌 1584
多穗金粟兰 392
多穗柯 175
多穗蓼 228
多鳞瓦韦 130
多鳞耳蕨 120
多鳞铲颌鱼 1666
多鳞鳙 1676
多鳞鳞毛蕨 115
各葱 1368
朵花椒 653
杂交景天 469
杂色龙虾 1602
杂色竹荪 47
杂色蛤仔 1587
杂色鲍 1570
杂种车轴草 603
杂配藜 254
安氏高原鳅 1667
安龙香科科 1113
安络小皮伞 38
安息香科 928
安息香属 929
安息香猕猴桃 408
安徽小檗 355
安徽贝母 1378
安徽石蒜 1407
安徽杜鹃 889
安徽槭 672
安徽繁缕 249
守宫木 639
守宫木属 639
闭壳龟属 1700
闭花木 624
闭花木属 624
闭鞘姜 1539
闭鞘姜属 1539

阿胶 76
阿胶属 76
过山枫 692
过山蕨 110
过山蕨属 110
过江藤 1050
过江藤属 1050
过路黄 912
过路惊 809
达氏鲟 1650
达乌尔猬 1746
达乌里芯巴 1133
达乌里秦艽 948
达呼尔鼠兔 1751
达呼里胡枝子 583
达呼里黄芪 550
衣鱼 1609
衣鱼科 1609
衣鱼属 1609
衣藻科 4
衣藻属 4
齐口裂腹鱼 1665
齐氏鲃 1649
交让木 641
交连假瘤蕨 133
关公须 1102
关苍术 1264
羊毛绒球蟹 1604
羊奶 1229
羊耳菊 1304
羊耳蒜 1547
羊耳蒜属 1546
羊舌树 931
羊红膻 874
羊肚菌 23
羊肚菌科 23
羊肚菌属 23
羊角子草 976
羊角天麻 667
羊角芹属 847
羊角拗 970
羊角拗属 970
羊角棉 959
羊角藤 1008
羊齿天门冬 1370
羊草 1448
羊胡子草属 1492
羊栖菜 11
羊眼花 1306
羊脆木 493
羊鲍 1571
羊蹄蝠 893
羊踏 233
羊踏甲 553
羊蹄甲属 552
并头黄芩 1110
并齿蕨 62
并齿蕨属 62
米口袋属 577
米贝母 1379
米心水青冈 174
米仔兰 659
米仔兰属 659
米团花 1085
米团花属 1085
米念芭 618
米面翁 209
米面翁属 209
米楮蚜 1617
米碎花 415
米槁 286
灯心草 1424
灯心草科 1424
灯心草属 1424
灯台树 827
灯台莲 1473
灯油藤 693
灯笼花 884 1174
灯笼果 1123
灯笼草 72
灯笼草属 72
灯蛾科 1629
灯蛾属 1629
壮伟环毛蚓 1593
壮观垂头菊 1283
冰川茶藨 486
冰岛衣 57
冰岛衣属 57
冰草 1434
冰草属 1434
冰明属 560
江户布目蛤 1587
江西巴蜗牛 1580
江西堇菜 768
江西囊瓣芹 876
江苏石蒜 1408
江苏虻 1631
江孜乌头 307
江南山柳 881
江南山梗菜 1234
江南马先蒿 1144
江南地不容 381
江南灯心草 1425
江南牡丹草 367
江南卷柏 74
江南油杉 143
江南星蕨 131
江南楠木 167
江南散血丹 1122
江珧科 1582
江珧属 1582
江豚 1759
江豚属 1759
江篱 17
江篱科 17
江篱属 17
江鳗 1762
江鳕 1672
江雪属 1672
污毛粗叶木 1005
池鹭 1714
池鹭属 1714
汝兰 383
兴山五味子 276
兴山榆 180
兴山蜡树 939
兴安天门冬 1370
兴安毛连菜 1323
兴安毛莨 345
兴安升麻 320
兴安石竹 241
兴安白头翁 343
兴安老鹳草 613
兴安虫实 255
兴安杜鹃 891
兴安旱麦瓶草 247
兴安独活 862
兴安柴胡 855
兴安圆柏 152
兴安益母草 1084
兴安蛇床 858
兴安鹿药 1395
兴安蒲公英 1348
兴安薄荷 1088
兴安藜芦 1401
兴凯鱊 1664
兴宝百合 1386
祁州漏芦属 1345
祁阳细辛 400
祁连山乌头 303
祁连风毛菊 1332
祁连垂头菊 1282
祁连圆柏 152
许氏梨头鳐 1648
寻骨风 396
寻常海绵纲 1565
异木患 676
异木患属 676
异毛环毛蚓 1593
异叶山绿豆 569
异叶马兜铃 395
异叶天南星 1471
异叶节节菜 799
异叶地笋 1086
异叶亚菊 1244
异叶吊石苣苔 1188
异叶赤瓟 791
异叶苣苔属 1191
异叶花椒 654
异叶泽兰 1295
异叶抱树莲 127
异叶虎耳草 488
异叶爬山虎 725
异叶金腰 476
异叶茴芹 873
异叶柳叶菜 821
异叶香薷 1069
异叶海桐 493
异叶黄鹌菜 1356
异叶蛇葡萄 721
异叶梁王茶 841
异叶紫菀 1259
异叶楼梯草 196
异叶鼠李 715
异叶蔓荆 1055
异叶蓼 224
异叶榕 187
异叶翅新 1411
异叶蓁吾 1361
异叶鳞始蕨 89
异色来江藤 1132
异色海盘车 1639
异色黄芩 1107
异色猕猴桃 405
异色溲疏 477
异色蓼本 867
色形木 807
异形木属 807
异形水绵 7
异形莎草 1490
异块茎碧凤 1412
异花谷精草 1432
异足索沙蚕 1592
异纹裸胸鳝 1656

异龄蒲公英 1348
异刺鹤虱 1036
异果崖豆藤 587
异味南五味子 275
异齿红景天 466
异茴忍冬 1203
异药花 809
异药花属 809
异药沿阶草 1389
异株百里香 1115
异株荨麻 206
异唇蚓属 1594
异被赤车 200
异野芝麻 1074
异野芝麻属 1074
异裂苣苔 1192
异裂苣苔属 1192
异腹胡蜂科 1633
异蕊芥属 451
异蕊草 1399
异蕊草属 1399
异穗苔草 1487
异穗卷柏 74
异瓣郁金香 1400
阳春砂仁 1508
阳起石 1783
阳荷 1515
阳桃 609
阳桃属 609
阳遂足科 1639
阳遂足属 1639
防己科 374
防己叶菝葜 1397
防风 877
防风属 877
防城金花茶 412
阴山乌头 304
阴山胡枝子 583
阴山蒲公英 1350
阴风轮 1061
阴石蕨 124
阴石蕨属 124
阴生沿阶草 1390
阴地芒麻 194
阴地冷水花 204
阴地堇菜 771
阴地蒿 1257
阴地蕨 79
阴地蕨科 78
阴地蕨属 78
阴行草 1152
阴行草属 1152
阴郁马先蒿 1145
阴茎 831
阴茎属 831
阴香 284
阴湿小檗 358
如意草 768
买麻藤 157
买麻藤科 157
买麻藤属 157
羽叶丁香 943
羽叶山黄麻 180
羽叶长柄山蚂蝗 595
羽叶白头树 658
羽叶枝子花 1064
羽叶金合欢 545
羽叶参 844
羽叶参属 843
羽叶点地梅 918
羽叶点地梅属 918
羽叶鬼灯檠 487
羽叶鬼针草 1265
羽叶蛇葡萄 721
羽叶婆婆纳 1157
羽叶楸 1164
羽叶楸属 1164
羽叶穗花报春 921
羽衣草 496
羽衣草属 496
羽苞藁本 866
羽珊菌属 26
羽脉野扇花 706
羽萼木 1062
羽萼木属 1062
羽裂小花苣苔 1183
羽裂风毛菊 1328
羽裂金腰 105
羽裂华蟹甲草 1340
羽裂星蕨 131
羽裂盾蕨 132
羽裂唇柱苣苔 1182
羽裂粘冠草 1320
羽藓科 65
羽藓属 65
观音草 1171
观音座莲科 80
观音座莲属 80
驯鹿 1772
红丁香 943
红三叶爬山虎 725
红大戟 1005
红小铁冬桔虾 1617
红口榧螺 1576
红千层 802
红千层属 802
红门兰属 1551
红孑仔 622
红马蹄草 864
红木 774
红木通 327
红木科 774
红木属 774
红车轴草 603
红毛七 363
红毛七属 363
红毛五加 832
红毛丹 678
红毛毛叶金花 1009
红毛叶兔儿风 1241
红毛竹叶子 1431
红毛花椒 540
红毛虎耳草 490
红毛雪兔子 1332
红毛野海棠 809
红毛悬钩子 534
红毛菜科 12
红毛鹅掌柴 846
红甘蔗 1456
红叶木姜子 294
红叶黄芦 667
红叶辣汁树 285
红叶藤 544
红叶藤属 544
红叶藜 255
红叶藓科 18
红白鼯鼠 1754
红皮云杉 144
红皮柳 165
红冬蛇菰 217
红头石蕊 55
红汁乳菇 45
红丝线 1119
红丝线属 1119
红耳鼠兔 1751
红曲 19
红曲霉属 19
红肋绣眼鸟 1743
红舌狗舌草 1351
红血藤 601
红色新月蕨 106
红拟层孔菌 30
红壳砂仁 1505
红芽大戟属 1005
红芽木 419
红花 1274
红花三宝木 640
红花木莲 268
红花木犀榄 941
红花五味子 278
红花升麻 473
红花龙胆 950
红花忍冬 1204
红花青藤 300
红花岩黄芪 578
红花岩梅 880
红花夜豆菜 877
红花茜草 1017
红花茶藨 486
红花树萝卜 883
红花除虫菊 1326
红花荷 461
红花荷属 461
红花槭木 461
红花粉叶报春 919
红花琉璃草 1034
红花寄生 213
红花鹿蹄草 882
红花属 1274
红花绿绒蒿 442
红花越橘 899
红花溪荪兰 1526
红花锦鸡儿 559
红花翅蛾贝母 1378
红杜仲藤 967
红杉 144
红豆杉 155
红豆杉科 153
红豆杉属 155
红豆树 590
红豆树属 590
红豆薯 1502
红角鸮 1732
红条毛肤石鳖 1570
红尾鸲属 1741
红尾副鳃 1667
红纹马先蒿 1147
红茉莉 936
红茄苳 816
红茎黄芩 1110
红茎猕猴桃 408
红枝柴 681
红枫荷 184
红松 146

红直獠牙菜 955
红轮狗舌草 1350
红明樱蛤 1588
红果火筒树 732
红果山胡椒 288
红果类叶升麻 312
红果黄肉楠 282
红果黄鹤菜 1356
红果萝芙木 969
红河鹅掌柴 845
红泡刺藤 534
红波罗花 1161
红珊瑚属 1569
红荚蒾 1209
红草果 1508
红茴香 280
红药 1181
红柳叶牛膝 258
红柄木犀 941
红柄牛肝菌 43
红树科 815
红树属 816
红厚壳 419
红厚壳属 419
红砂 775
红砂属 775
红背马兰 1174
红背叶 619
红背兔儿风 1243
红背桂花 631
红点锦蛇 1708
红点黎明蟹 1604
红冠姜 1515
红星梭子蟹 1605
红骨草 1138
红莓苔子 888
红莓苔子属 888
红根草 1104
红根南星 1469
红柊 167
红柴胡 855
红狼牙鳜虎鱼 1685
红粉白珠 885
红凉伞 901
红海绵毛藻 3
红娘子属 1616
红娘鱼属 1688
红球姜 1515
红麸杨 670
红菱 800
红菇科 44
红菇属 45
红梗蒲公英 1348
红蛋珊瑚 636
红蛋珊瑚属 636
红翎菊科 16
红脚丽金龟 1624
红脚鹬 1728
红淡比 414
红淡比属 414
纤维鳞毛蕨 118
红弯月见草 823
红葱 1418
红葱属 1418
红棕杜鹃 895
红棕子 828
红颊长吻松鼠 1752
红颊拟层孔菌 30
红紫珠 1044
红紫桂竹香 450
红景天属 465
红瑞木 827
红椿 661
红椿子 662
红楠 295
红楣 411
红楣属 411
红雾水葛 205
红腹石耳 56
红腹锦鸡 1722
红腺悬钩子 536
红鲈属 1660
红蓼 227
红鲭 1609
红鲭属 1609
红蕉 1500
红散地发 813
红嘴山鸦 1739
红嘴鸥 1729
红鳍东方鲀 1692
红鳍鲌 1659
红螺花螈 1695
红螺 1576
红螺属 1575
红藤属 1462
红藤萝 224
红鳞口蘑 40
红鳞水毛花 1497
红鳞扁沙 1496
纤毛纲 1565
纤孔菌属 31
纤叶钗子股 1549
纤花千里光 1336
纤花耳草 1002
纤花雪胆 394
纤花鸡 1250
纤枝野丁香 1006
纤齿卫矛 696
纤杆珍珠茅 1499
纤细大叶藻 1363
纤细老鹳草 613
纤细兔儿风 1241
纤细通泉草 1139
纤细黄堇 430
纤细雀梅藤 717
纤细假糙苏 1095
纤细薯蓣 1413
纤柄香草 913
纤冠藤 981
纤冠藤属 981
纤铁矿 1782
纤梗青牛胆 384
纤维石膏 1785
纤维鳞毛蕨 118
纤裂乌头属 1148
约大戟 627
约安山蚕 1608
约安巨马陆 1608

## 七 画

寿带鸟 1741
寿带属 1741
麦氏偏顶蛤 1581
麦仙翁 237
麦仙翁属 237
麦冬 1389
麦李 500
麦饭石 1794
麦角 20
麦角菌科 20
麦角菌属 20
麦瓶草 246
麦散黑粉菌 24
麦穗石豆兰 1521
麦穗鱼 1663
麦穗鱼属 1663
弄岗乌兜铃 396
弄螺科 1630
玛纳斯益母草 1084
玛瑙螺科 1578
玛瑙螺属 1578
豌荚红豆 590
抚芎 866
扶芳藤 696
扶郎花属 1297
拒斧螳螂 1611
拉根菜 484
拉根菜属 484
折叶薹草 1383
折苞斑鸠菊 1354
折枝天门冬 1369
折瓣珍珠菜 917
报春花 921
报春花科 909
报春花属 918
报春茜 1007
报春茜属 1009
报春黄石斛 1535
护耳草 982
拟飞角属 1671
拟瓦韦 130
拟水龙骨属 134
拟毛毡草 1269
拟玉龙乌头 308
拟目乌贼 1590
拟白花蒲公英 1350
拟地皮消 1170
拟地皮消属 1170
拟地鸦属 1739
拟百里香 1115
拟尖头红鲌 1660
拟灯心草 1425
拟步甲科 1625
拟卵叶银莲花 315
拟层孔菌属 29
拟刺红珠 354
拟枣贝 1574
拟枣贝属 1574
拟金茅 1445
拟金茅属 1445
拟复盆子 532
拟蚬壳花椒 654
拟臭黄菇 46
拟高粱 1457
拟海龙 1673
拟球蟹甲草 1269
拟黄花乌头 301
拟鼻花马先蒿 1147
拟漆姑草 248
拟漆姑草属 248
拟楼斗菜 342
拟楼斗菜属 342
拟鲿属 1669
拟蟹守螺属 1574

扭瓦韦 129
扭曲水绵 7
扭肚藤 936
扭连钱 1098
扭连钱属 1098
扭柄花 1398
扭柄花属 1398
扭蚌 1584
扭盔马先蒿 1143
扭鞘香茅 1440
扭鳌香属 1085
走马胎 902
走茎龙头草 1087
走茎灯心草 1424
汞 1788
汞化合物类 1788
贡山三尖杉 154
贡山党参 1229
贡山梅花草 483
贡山蓟 1277
贡嘎乌头 306
壳斗科 171
壳状江菇 46
赤才 677
赤才属 677
赤小豆 608
赤予爱胜蚓 1594
赤车使者 201
赤车属 200
赤苍藤 208
赤苍藤属 208
赤杨叶 928
赤杨叶属 928
赤豆 607
赤卒属 1610
赤纹土蜂 1633
赤松 147
赤狐 1761
赤胫散 229
赤鹿 791
赤鹿属 791
赤桉 802
赤磨石豆兰 1520
赤铁矿 1781
赤胸啄木鸟 1735
赤眼鳟 1666
赤眼鳟属 1666
赤虹 1648
赤麻 194
赤麻鸭 1718
赤颈鸭 1716
赤颈鹤 1713
赤链蛇 1707
赤楠 805
赤腹松鼠 1752
赤腹松鼠属 1752
赤鼻棱鳃 1653
赤腰 1773
赤壁草 476
赤壁草属 476
坛紫菜 13
块节凤仙花 686
块茎马兜铃 397
块根芍药 402
块根垂头菊 1282
块根紫金牛 900
块根糙苏 1097
块蓟 1279
芜菁 448
苇叶獐牙菜 956
苇谷草 1322
苇谷草属 1322
苇鹀属 1715
苇莺属 1740
芭叶报春 922
芭蕉菜 1343
芸苔属 447
芸香 651
芸香叶唐松草 351
芸香草 1440
芸香料 642
芸香属 651
芙兰草 1494
芙兰草属 1494
芙蓉菊 1284
芙蓉菊属 1284
芫花 753
芫荽 859
芫荽属 859
芫菁还阳参 1284
芫菁科 1621
苋 260
苋科 257
苋属 259
茵草 1438
茵草属 1438
芮氏刻肋海胆 1640
花天蚕蛾科 1628
花叶丁香 943
花叶山姜 1505
花叶开唇兰 1518
花叶竹芋 1516
花叶冷水花 202
花叶尾花细辛 398
花叶秋海棠 778
花叶重楼 1392
花叶假杜鹃 1166
花叶薹长春花 972
花生大蟋 1615
花生叶芫菁 1621
花白竹鼠 1756
花皮胶藤 963
花皮胶藤属 963
花头鹦鹉 1730
花朱顶红 1407
花红 511
花龟 1700
花龟科 1700
花尾榛鸡 1721
花苜蓿 604
花刺参 1636
花佩菊 1296
花佩菊属 1296
花金丝桃 422
花金龟科 1624
花南星 1472
花柱草 1238
花柱草科 1238
花柱草属 1238
花面狸 1764
花面狸属 1764
花背蟾蜍 1696
花点草 199
花点虹 1649
花点草属 199
花点鲷 1652
花冠棺样蚜 1617
花脉紫金牛 903
花臭蛙 1698
花姬蛙 1698
花葱 1023
花葱科 1023
花葱属 1023
花菱草 439
花菱草属 439
花蚰蜓 1607
花蚰蜓属 1607
花脸鸭 1716
花斑蛇鲻 1655
花斑裸胸鲋 1656
花斑裸鲤 1661
花葶乌头 309
花葶驴蹄草 320
花草苔草 1487
花椒 653
花椒凤蝶 1631
花椒属 653
花椒簕 655
花棒 578
花槐蓝 580
花楸树 539
花楸猕猴桃 408
花楸属 538
花榈木 590
花锚 953
花锚属 953
花鲈 1675
花鲈属 1675
花鼠 1753
花鼠属 1753
花鹛栉孔扇贝 1582
花葡 1359
花葡科 1359
花葡属 1359
花旗杆 451
花旗杆属 451
花鳉 1661
花鳗鲡 1655
苏叶蒲公英 1348
苏菜 448
苏蓝 447
芹叶龙眼独活 835
芹叶铁线莲 321
芹属 851
苍山乌头 303
苍山红百合 1385
苍山冷杉 142
苍山香茶菜 1076
苍山越橘 897
苍山醉鱼草 1130
苍山蠹吾 1318
苍术 1264
苍术属 1263
苍白秋钩风 377
苍耳 1354
苍耳属 1355
苍蝇网 425
苍鹭 1713
苍鹰 1719
芬芳安息香 929
茨实 385
茨实属 385
芒叶蓟 390
芒麻 193

苎麻属 192
芦竹 1436
芦竹属 1436
芦苇 1452
芦苇十大功劳 368
芦苇属 1452
芦荟 1368
芦荟属 1368
芳香石豆兰 1520
芳香怀牛 36
苏门白酒草 1281
苏门羚 1776
苏木 555
苏木蓝 579
苏丹可乐果 747
苏合香 461
苏州荠苎 1092
苏铁 141
苏铁科 141
苏铁属 141
苏铁蕨 111
苏铁蕨属 111
芭蕉 1500
芭蕉科 1499
芭蕉属 1500
芯芭属 1133
杜牛膝 1174
杜父鱼科 1689
杜仲 183
杜仲科 183
杜仲属 183
杜仲藤 967
杜仲藤属 967
杜若 1430
杜若属 1430
杜英科 732
杜英属 732
杜茎山 907
杜茎山属 907
杜松 150
杜虹花 1042
杜香 887
杜香属 886
杜根藤 1166
杜根藤属 1166
杜梨 521
杜鹃 895
杜鹃兰 1528
杜鹃兰属 1528
杜鹃花科 883
杜鹃花属 888
杜鹃科 1731
杜鹃属 1731
杜楝 662
杜楝属 662
杜衡 399
杉木 149
杉木属 149
杉叶藻 824
杉叶藻科 824
杉叶藻属 824
杉松 142
杉科 148
杉藻科 15
杉藻属 16
杓兰 1530
杓兰属 1530
杓鹬属 1728
杨叶木姜子 293
杨叶风毛菊 1332
杨枫属 161
杨柳科 162
杨梅 159
杨梅山蚊母树 460
杨梅科 158
杨梅黄杨 705
杨梅属 158
杨属 162
杞果 668
杞果属 668
杠板归 228
杠柳 985
杠柳属 985
极小蒲公英 1350
极北鳐 1712
极丽马先蒿 1144
李 520
李叶绣线菊 542
李属 520
杏 498
杏叶沙参 1223
杏叶茴芹 873
杏李 520
杏香兔儿风 1241
杏属 498
克氏海马 1673
克洛伦囊吾 1316
宇艾大戟 629
巫山胡颓子 761
巫山柳 165
巫山淫羊藿 367
求米草 1450
求米草属 1450
豆小翅芫菁 1621
豆马勃属 52
豆叶九里香 649
豆叶霸王 616
豆列当 1195
豆列当属 1195
豆芫菁 1621
豆芫菁属 1621
豆角 608
豆齿鳗属 1657
豆茶决明 561
豆点裸胸鳝 1656
豆科 544
豆粉蝶属 1630
豆梨 521
豆雁 1717
豆腐柴 1051
豆腐柴属 1051
豆薯 592
豆薯属 592
豆瓣菜 455
豆瓣菜属 455
豆瓣绿 389
束毛藻属 3
束伞亚菊 1243
束花石斛 1532
束花报春 920
束花蓝钟花 1233
束序芒麻 194
吏里山胡椒 289
两广线叶腐床 1172
两广梭楼 796
两广铁线莲 323
两广猕猴桃 407
两广锡兰莲 342
两广瘤足蕨 83
两头蛇属 1707
两似蟹甲草 1269
两色瓦韦 129
两色乌头 301
两色帚菊 1323
两色金鸡菊 1281
两色清风藤 683
两色鳞毛蕨 116
两角蒲公英 1348
两歧飘拂草 1493
两面针 655
两面刺 1277
两型豆属 548
两栖纲 1694
两栖蓼 220
两裂婆婆纳 1155
两粤黄檀 566
辰砂 1788
矶花科 1569
矶花属 1569
矶沙蚕科 1592
丽山蛩 1608
丽文蛤 1587
丽江山荆子 512
丽江山莨菪 1116
丽江马铃苣苔 1190
丽江木姜子 291
丽江乌头 304
丽江耳蕨 119
丽江舌唇兰 1557
丽江连翘 934
丽江柃 416
丽江柴胡 855
丽江黄芩 1108
丽江麻黄 157
丽江鹿药 1395
丽江紫堇 429
丽江獐牙菜 955
丽江糙苏 1097
丽江蘗木 866
丽花报春 922
丽医蛭 1594
丽秀贼 673
丽纹龙蜥 1703
丽纹游蛇 1708
丽金龟科 1624
丽金龟属 1624
丽斑芫菁 1622
丽斑麻蜥 1705
丽弯熊巴掌 813
丽蝇科 1632
丽藻属 8
来凤唇柱苣苔 1181
来江藤 1132
来江藤属 1132
医蛭科 1594
医蛭属 1594
步甲科 1619
怀槐 585
坚杆火绒草 1313
坚齿螺科 1579
坚挺柴胡 853
坚螺属 1579
卤地菊 1355
肖鸢属 1423

肖鸢尾属 1423
肖菔蒿 1584
肖菔蒿属 1384
吴兴铁线莲 326
吴茱萸 647
吴茱萸叶五加 832
吴茱萸属 646
呆白菜 1154
呆白菜属 1154
呆寄居蟹 1604
足头纲 1589
芯茎毛兰 1538
串果藤 373
串果藤属 373
串珠石斛 1533
串珠耳叶苔 67
串珠老鹳草 614
串铃草 1097
串球盘革菌 25
吻兰 1528
吻兰属 1528
吻沙蚕科 1592
吻沙蚕属 1592
里白 84
里白科 84
里白属 84
里海阿魏 861
里海旋覆花 1304
旱田草 1139
旱生卷柏 76
旱芹 851
旱金莲 615
旱金莲科 615
旱金莲属 615
旱柳 164
旱独 181
旱蕨属 96
旱獭属 1753
围涎树 595
围涎树属 595
岗松 801
岗松属 801
岗柃 416
钉灰包属 48
钉柱委陵菜 519
针毛蕨 105
针毛蕨属 105
针乌贼 1590
针层孔菌 32
针尾鸭 1716
针刺悬钩子 535
针齿铁仔 908
针海绵属 1565
针筒架 1112
牡丹 403
牡丹叶当归 849
牡丹草 367
牡丹草属 367
牡竹 1442
牡竹属 1441
牡荆 1054
牡荆属 1053
牡蛎科 1583
牡蛎属 1583
牡蒿 1252
乱草 1444
秃小耳柃 415
秃马勃属 50
秃毛冬青 690
秃叶黄皮树 651
秃果华千里光 1341
秃金锦香 812
秃房茶 412
秃疮花 438
秃疮花属 438
秃鼻乌鸦 1738
秃鹭 1719
秃鹭属 1719
秃糯米椒 736
秀丽水柏枝 774
秀丽长臂虾 1602
秀丽火把花 1063
秀丽拟枣贝 1574
秀丽兔儿风 1241
秀丽莓 529
秀丽海桐 495
秀丽黄蛭 1594
秀丽野海棠 808
秀丽槭木 836
秀丽鼠刺 481
秀苞败酱 1217
秀雅杜鹃 891
何氏鳐 1648
何首乌 227
伸长冷地卫矛 696
伯乐树 675
伯乐树科 675
伯乐树属 675
伶鼬榧螺 1576
低海龙 1673
低矮华北乌头 310
伽蓝菜 464
伽蓝菜属 464
佛手 644
佛手瓜 790
佛手瓜属 790
佛甲草 470
佛耳丽蚌 1584
佛光草 1104
佛肚竹苔属 1179
佛肚树 633
皂荚 575
皂荚属 575
皂柳 166
余甘子 636
余山羊奶子 758
含笑花 269
含笑属 268
含羞草 589
含羞草属 589
含羞草叶黄檀 567
含羞草决明 561
邻近风轮菜 1060
谷木 811
谷木属 811
谷地翠雀花 336
谷蓼 819
谷精草 1432
谷精草科 1432
谷精草属 1432
肝色牛排菌 27
肚脐蚜 1617
肠游苔 6
饭包草 1427
龟足 1598
龟足属 1598
龟科 1699
角叉菜 15
角叉菜属 15
角木叶鳃 1690
角叶鞘柄木 831
角闪石石棉 1784
角花乌蔹莓 722
角花胡颓子 759
角状耳蕨 118
角果木 186
角果木属 816
角茴香 440
角茴香属 440
角珊瑚 1568
角珊瑚科 1568
角珊瑚属 1568
角翅卫矛 696
角鳃鲸 1732
角海龙科 1638
角盘兰 1545
角盘兰属 1544
角盖 1161
角蒿属 1161
角鲨科 1647
角鲨属 1647
角鲹山溪鲵 1694
角螺属 1576
角瓣翠雀花 335
刨花润楠 295
条叶车前 1198
条叶龙胆 950
条叶百合 1386
条叶角盘兰 1544
条叶岩风 865
条叶唇柱苣苔 1181
条叶银莲花 317
条叶楼梯草 197
条叶榕 188
条纹口蘑 40
条纹凤尾蕨 91
条纹东方鲀 1692
条纹龙胆 951
条纹斑竹鲨 1644
条前苔 5
条斑紫草 13
条裂虎耳草 489
条裂紫堇 432
条穗苔草 1488
条鳎属 1690
卵心叶虎儿草 489
卵叶马兜铃 396
卵叶水芹 869
卵叶贝母兰 1527
卵叶火炭母 222
卵叶半边莲 1236
卵叶报春 921
卵叶羌活 868
卵叶韭 1367
卵叶荚蒾 1212
卵叶茜草 1017
卵叶兔儿风 1242
卵叶扁蓄 953
卵叶柄楼 795
卵叶银莲花 313
卵叶梨果寄生 213
卵叶鹿蹄草 883
卵叶紫菀 1259
卵叶蜘蛛抱蛋 1373

卵叶蝴蝶兰 215
卵叶鹅绒藤 89
卵形尖嘴蚌 1584
卵果古祥草 1394
卵果海桐 494
卵果蔷薇 525
卵果蕨属 105
卵盘鹅观 1036
卵萼花锚 953
卵穗李荠 1492
卵瓣还亮草 334
卵瓣雪灵芝 238
狄氏旁蛤 1588
延叶珍珠菜 913
延安小檗 360
延羽卵果蕨 105
延胡索 437
延龄耳草 1002
延龄草 1400
延龄草属 1400
远东大胡蜂 1634
远志 665
远志木蓝 580
远志科 662
远志黄堇 433
远志属 662
远海梭子蟹 1605
还羊参 1283
还阳参属 1283
还亮草 334
连药沿阶草 1388
连香树 300
连香树科 300
连香树属 300
连翘 934
连翘叶黄芩 1108
连翘属 934
近无氏飞蝗藤 1031
近江牡蛎 1583
近胡蜂 1634
近缘婆罗门参 1351
返顾马先蒿 1146
迎红杜鹃 894
迎春花 937
亨氏马尾藻 11
亨氏紫堇 431
亨利原始观音座莲 82
亨美 266
库氏大风子 763
库氏砗磲 1586
库叶红景天 467
库页当归 848
库页悬钩子 535
庐山小檗 362
庐山瓦韦 129
庐山石韦 137
庐山香科科 1113
庐山堇菜 771
庐山黄精 1393
庐山楼梯草 197
庐山藨草 1498
疗齿草 1141
疗齿草属 1141
间型沿阶草 1389
间颅鼠兔 1751
间银鱼属 1654
羌活 869
羌活属 868
羌塘雪兔子 1334
灶马属 1613
灶心土 1791
冻绿 716
冷水七 686
冷水花 203
冷水花属 201
冷地卫矛 696
冷报春 918
冷杉 142
冷杉属 142
冷饭团 275
冷蒿 1251
沥青色乳菇 45
沉香 752
沟牙鼯鼠 1754
沟叩甲虫属 1620
沟角芫菁 1621
沟金针虫 1620
沟树发 58
沟胫天牛科 1625
沟酸浆 1141
沟酸浆属 1140
沟繁缕科 777
沟瓣木属 700
汶川柴胡 856
汶川景天 471
沅陵长蒴苣苔 1185
沙七 231
沙叶铁线莲 328
沙生风毛菊 1327
沙生柽柳 777
沙生槐树 600
沙生蜡菊 1302
沙皮蕨属 121
沙冬青 548
沙冬青属 548
沙丛卷 1195
沙芥 455
沙芥属 455
沙芦草 1434
沙针 210
沙针属 210
沙鸡科 1729
沙拐枣 219
沙拐枣属 219
沙拉真鲨 1646
沙枣 758
沙参 1225
沙参属 1222
沙柳 164
沙带鱼 1682
沙蚕科 1592
沙梨 522
沙棘属 761
沙湾贝母 1378
沙蜥鳢 1683
沙蜥鳢属 1683
沙莲 251
沙莲属 251
沙滩黄芩 1110
沙蜥属 1704
沙蜥 1706
沙蜥属 1706
沙燕科 1736
沙螽科 1613
沙蝎 1593
沙蝎科 1593
沙蝎属 1593
沧江新樟 296
诃子 818
诃子属 817
补血草 924
补血草属 924
补骨脂 596
补骨脂属 596
君子兰 1406
君子兰属 1406
君迁子 927
灵芝 30
灵芝属 30
灵香草 914
灵猫科 1764
层孔菌属 29
尾叶马钱 945
尾叶白珠 885
尾叶冬青 691
尾叶远志 663
尾叶香茶菜 1077
尾叶铁线莲 332
尾叶梾 935
尾叶野木瓜 374
尾叶假耳草 1010
尾叶梁王茶 841
尾叶越橘 897
尾叶紫金牛 900
尾叶黑钩叶 634
尾叶稀子蕨 88
尾尖爬藤榕 189
尾尖荨芹 873
尾花细辛 398
尾鸡木 631
尾孢霉属 53
尾药千里光属 1340
尾索动物纲 1641
尾鱼科 1632
尾裂翠雀花 335
尾穗苋 259
尾囊草 354
尾囊草属 354
尾瓣舌唇兰 1557
陆地棉 740
陆龟科 1700
陆龟属 1700
陀螺果 928
陀螺果属 928
陀螺紫菀 1263
阿月浑子 669
阿尔泰大黄 231
阿尔泰山楂 504
阿尔泰乌先蒿 1143
阿尔泰毛茛 344
阿尔泰芍药 402
阿尔泰百里香 1114
阿尔泰多榔菊 1290
阿尔泰扭藿香 1085
阿尔泰郁金香 1400
阿尔泰金莲花 352
阿尔泰狗娃花 1302
阿尔泰黄蜀葵 443
阿尔泰银莲花 315
阿尔泰婆罗门参 135
阿尔泰葱 1364
阿尔泰鲟 1277
阿尔泰瑞香 753
阿尔泰藜芦 1315

阿地螺科 1577
阿里小檗 359
阿里黄精 1393
阿纹缘贝 1575
阿拉伯婆婆纳 1157
阿拉套婆婆纳 1154
阿拉套锦鸡儿 558
阿拉善马先蒿 1142
阿拉善黄芩 1106
阿拉善锦鸡儿 559
阿育魏 880
阿勒泰贝母 1378
阿勒泰忍冬 1200
阿勒泰黄芪 549
阿穆尔莎草 1489
阿魏属 860
阿魏侧耳 39
陇南贝母 1380
陇蒂马陆属 1608
附地菜 1039
附地菜属 1040
张口杜鹃 889
张氏鱼怪 1599
孜然芹 859
孜然芹属 859
忍冬 1202
忍冬科 1198
忍冬属 1200
劲直阴地蕨 79
鸠鸽科 1729
鸡毛菜 14
鸡毛菜属 14
鸡爪草 319
鸡爪草属 319
鸡爪海星 1638
鸡爪海星属 1638
鸡爪槭 675
鸡爪筋 1015
鸡心草 483
鸡心藤 724
鸡矢藤 1012
鸡矢藤属 1012
鸡仔木 990
鸡皮 646
鸡皮衣科 57
鸡皮衣属 57
鸡肉参 1161
鸡血藤 588
鸡纵菌 39
鸡纳树 992
鸡油菌 26
鸡油菌科 26
鸡油菌属 26
鸡树条 1212
鸡柏紫藤 759
鸡冠子花 1145
鸡冠花 260
鸡冠菜 16
鸡冠菜属 16
鸡冠棱子芹 874
鸡骨香 624
鸡骨柴 1068
鸡骨常山 960
鸡骨常山属 959
鸡娃草 924
鸡娃草属 924
鸡粱 191
鸡眼草 581
鸡眼草属 581
鸡眼梅花草 484
鸡脚参 1095
鸡脚参属 1094
鸡麻 523
鸡麻属 523
鸡蛋花 967
鸡蛋花属 967
鸡蛋果 773
鸡蛋参 1228
鸡腰参 1228
鸡腿堂菜 765
纳氏鼠耳蕨 1747
纵肋人字果 339
纵条肌海葵 1567
纵带鲍 1669
纵带鲽鳎 1680
纺织娘 1612
纺织娘属 1612
纽子花属 972
纽子果 905
驱虫斑鸠菊 1352
驳骨丹 1129
驳骨草属 1168
驴 1768
驴欺口 1291
驴蹄草 320
驴蹄草属 320

## 八 画

青冈属 173
青牛胆 384
青牛胆属 384
青甘马先蒿 1143
青甘韭 1367
青甘锦鸡儿 559
青石爬鳅 1670
青石斑鱼 1675
青叶胆 956
青龙藤 974
青皮木 209
青皮竹 1437
青皮象耳豆 572
青兰 1065
青兰属 1064
青头潜鸭 1716
青扦 145
青灰叶下珠 637
青灰海蛇 1710
青江藤 692
青杨 163
青杨梅 158
青杞 1127
青杆竹 1437
青岛文昌鱼 1642
青岛老鹤草 614
青岛百合 1386
青环海蛇 1710
青鱼 1662
青鱼属 1662
青城细辛 401
青荚叶 830
青荚叶属 830
青香茅 1440
青兔儿风 1243
青洋参 978
青钱柳 159
青钱柳属 159
青海大戟 628
青海云杉 144
青海当归 848
青海沙蜥 1704
青海茄参 1121
青海刺参 1220
青海黄芪 551
青海棱子芹 875
青海湖裸鲤 1661
青海囊吾 1318
青款杨 670
青菜 448
青蒲 1482
青蛇藤 985
青脚鹬 1729
青弹涂鱼 1685
青弹涂鱼属 1685
青绿岩草 1488
青葙 260
青葙属 260
青椒 653
青蛤 1586
青蛤属 1586
青鹏 1250
青榨槭 673
青篱柴 618
青篱柴属 618
青藏龙胆 948
青藏虎耳草 489
青藏金莲花 353
青藏狗娃花 1302
青藏雪灵芝 239
青檀 179
青檀属 179
青蒿 379
青藤仔 938
青藤属 299、379
青蟹属 1605
青鳃 1764
青鳞 1681
青鳞属 1681
青鳞鱼 1652
青鳞鱼属 1652
环口螺科 1572
环口螺属 1572
环毛属 1593
环节动物门 1592
环纹货贝 1575
环纹海蛇 1710
环纹鲋 1605
环带丽蚌 1584
环蛇属 1709
环颈雉 1725
环棱螺属 1572
环裂松萝 58
玫红山黧豆 582
玫瑰 527
玫瑰石斛 1532
玫瑰石蒜 1408
玫瑰茄 741
武冈繁缕 250
拔毒散 745
抹香鲸 1758
抹香鲸科 1758
抹香鲸属 1758
拐芹 849
抽葶党参 1231
抽葶藁木 867

抱白莲 128
抱茎苦卖菜 1308
抱茎卷瓣兰 1525
抱茎柳叶菜 820
抱茎独行菜 454
抱茎蓼 220
抱茎獐牙菜 956
抱树莲 127
抱树莲属 127
拉士蛛属 1596
拉毛果 1219
拉拉藤属 995
拉萨小檗 357
拉萨翠雀花 337
披针毛蕨 344
披针叶寸金草 1061
披针叶卫矛 697
披针叶五味子 277
披针叶风毛菊 1330
披针叶吊石苣苔 1188
披针叶舌蕨 123
披针叶荚蒾 1211
披针叶胡颓子 759
披针叶钩藤 1020
披针叶铁线莲 327
披针叶黄华 602
披针叶堇菜葛 944
披针苔草 1488
披针骨牌蕨 128
披针新月蕨 106
披碱草属 20
坡油甘 599
坡油甘属 599
婆参 1543
匏竹 1437
顶头乌蓝 1173
顶羊肚菌 23
顶冰花 1382
顶冰花属 1382
顶羽菊 1239
顶羽菊属 1239
顶花杜茎山 907
顶序锥花 1074
顶果膜蕨 86
苦丁茶冬青 689
苦口蘑 40
苦山杏 1512
苦马豆 601
苦马豆属 601
苦木科 656
苦木属 657
苦瓜 788
苦瓜属 788
苦皮藤 692
苦玄参 1149
苦玄参属 1149
苦竹 1454
苦苣苔 1183
苦苣苔科 1177
苦苣苔属 1183
苦荬菜 1343
苦荬菜属 1343
苦荞 448
苦豆子 599
苦远志 1109
苦楝木 935
苦郎树 1047
苦郎藤 724
苦参 600
苦草 1361
苦草属 1361
苦荞麦 219
苦茶槭 673
苦菜菜 1215
苦菜菜属 1306
苦树 657
苦绳 980
苦槛蓝 1197
苦槛蓝科 1197
苦槛蓝属 1197
苦荫 1123
苦楮 173
苦皱果 1201
茉莉花 938
茂汶过路黄 917
茂汶羊肚菜 365
茂盆矮杨梅 158
苹毛丽金龟 1624
苹果 512
苹果形槲栎 506
苹果属 511
苹婆 751
苹婆属 750
苹斑芫菁 1622
苜蓿属 585
苘麻 739
苘麻叶扁担杆 734
苘麻属 739
英氏鲀 1674
莒子蒿 1459
苞叶马兜铃 393
苞叶木 711
苞叶木属 711
苞叶风毛菊 1332
苞叶兰属 1520
苞叶景天 468
苞叶藤 1024
苞叶藤属 1024
苞舌兰 1559
苞舌兰属 1559
苞芽报春 920
苞序草虎 452
苓菊属 1308
莴笋松 1031
莴笋属 1031
茄 1126
茄叶斑鸠菊 1354
茄参 1121
茄参属 1121
茄科 1116
茄属 1124
苔纲 67
苔垢菜 4
苔草属 1486
苔藓动物门 1636
苔藓状蚕缀 1307
苔藓植物门 60
茅瓜 790
茅瓜属 790
茅香 1446
茅香属 1446
茅莓 534
茅栗 172
茅膏菜 425
茅膏菜科 425
茅膏菜属 425
茎叶草花 1111
茎红算盘子 633
茎花来江藤 1132
其他矿物类 1193
枝杆微皮伞 38
枝实属 623
枝翅珠子木 636
枫杨 162
枫香树 461
枫香树属 461
枸皮菟花 757
枸树 184
枸树属 184
枸棘 185
枪刀药 1169
枪刀药属 1169
枪乌贼科 1590
枪乌贼属 1590
枪花药 1169
杭子梢 556
杭子梢属 556
杭白芷 848
杭州荠苎 1091
杭州榆 181
松下兰 882
松下兰属 882
松口蘑 40
松木层孔菌 33
松风草 643
松毛火绒草 1312
松节藻科 18
松石蕊 55
松叶耳草 1002
松叶西风芹 878
松叶百合 1386
松叶鸡蛋参 1229
松叶蕨 78
松叶蕨科 78
松叶蕨属 78
松生拟层孔菌 30
松江鲈 1689
松江鲈属 1689
松鸡科 1721
松林风毛菊 1332
松林蓼 228
松柏钝果寄生 214
松鸦 1738
松鸦属 1738
松科 142
松科植物树脂化石 1794
松萝科 58
松萝属 58
松雀鹰 1719
松塔牛肝菌科 44
松属 145
松蒿 1148
松蒿属 1148
松鼠 1753
松鼠状纤孔菌 32
松鼠科 1752
松鼠属 1753
松潘风毛菊 1333
松潘乌头 310
松潘棱子芹 874
松藻科 7
松藻属 7
林大戟 628
林氏海蕉 1639

林生风毛菊 1333
林生顶冰花 1382
林生沿阶草 1390
林生杠果 668
林生假福王草 1322
林地乌头 307
林地鼠曲草 1299
林当归 850
林间荆 77
林夜鹰 1733
林茜草 1017
林荫千里光 1336
林泽兰 1296
林麝 1773
板栗 171
板凳果 706
板凳果属 706
杯叶西番莲 773
杯苋 261
杯苋属 261
杯茎蛇菰 218
杯柄铁线莲 332
杯柄菇属 37
杯菊 1285
杯菊属 1285
杯萼海桑 806
画眉草 1444
画眉草属 1443
画笔南星 1472
直立山梗菜 1234
直立百部 1403
直立鸡蛋参 1229
直立角茴香 440
直立黄芪 549
直立婆婆纳 1155
直花贝母 1378
直吻骨螺 1575
直角荚蒾 1210
直序乌头 308
直茎点地梅 909
直茎黄堇 436
直茎蒿 1251
直刺变豆菜 877
直齿荆芥 1092
直根天葵 346
直梗华千里光 1341
直梗高山唐松草 347
直萼黄芩 1109
直酢浆草 611
直缘乌头 311
直锥象 1626
直穗小檗 356
直穗山姜 1503
直瓣苣苔 1177
直瓣苣苔属 1177
刺人参属 841
刺儿瓜 782
刺儿菜 1279
刺山柑 445
刺子莞 1496
刺子莞属 1496
刺天茄 1125
刺木通 573
刺五加 823
刺毛杜鹃 890
刺毛越橘 898
刺叶小檗 361
刺叶卫矛 695
刺叶耳蕨 118
刺叶冬青 687
刺叶栎 177
刺叶柄棘豆 591
刺叶点地梅 910
刺叶桂樱 510
刺叶锦鸡儿 557
刺瓜 977
刺芋 1476
刺芋属 1476
刺芒龙胆 948
刺尖前胡 871
刺异叶花椒 654
刺壳花椒 654
刺苋 259
刺花椒 652
刺芹 860
刺芹属 860
刺苍耳 1356
刺沙蓬 257
刺红珠 356
刺玫蔷薇 524
刺苞菜蓟 1285
刺苞南蛇藤 692
刺苞斑鸠菊 1354
刺松藻 7
刺齿凤尾蕨 91
刺齿核子花 1064
刺齿泥花草 1138
刺齿贯众 114
刺齿唇柱苣苔 1182
刺齿假瘤蕨 133
刺果卫矛 694
刺果毛茛 345
刺果甘草 577
刺果苏木 554
刺果茶藨 487
刺果峨参 850
刺果紫玉兰 273
刺果藤 747
刺果藤属 747
刺疙瘩 1321
刺孢多孔菌属 28
刺参 1636
刺参科 1636
刺参属 1220 1636
刺茶 702
刺柏 150
刺柏属 150
刺柄观音座莲 81
刺柄南星 1469
刺钟藤壶 1598
刺冠海龙 1673
刺桐 573
刺桐属 573
刺通草 846
刺通草属 846
刺梨 486
刺海马 1673
刺黄花 360
刺黄连 369
刺黄藤 668
刺旋花 1026
刺续断 1220
刺黑珠 361
刺萼悬钩子 529
刺榴莓 729
刺鲀科 1692
刺鲀属 1692
刺猬 1745
刺蒴麻 737
刺蒴麻属 737
刺榆 179
刺榆属 179
刺楸属 1464
刺槐 598
刺槐属 598
刺楸 840
刺楸属 840
刺蛾科 1628
刺鼠李 714
刺蔷薇 523
刺藜 229
刺蕊草 1099
刺蕊草属 1098
刺楞 656
刺鳅虎鱼属 1684
刺额短刺鲀 1692
刺篱木 762
刺篱木属 762
刺鲳 1683
刺藤子 717
刺蓼 254
枣 718
枣铁楷蚜 1617
枣椰子 1464
枣属 718
雨久花 1417
雨久花科 1416
雨久花属 1416
雨蛙科 1696
雨蛙属 1696
雨燕科 1733
雨燕属 1733
矿泉水 1794
郁李 500
郁李仁 500
郁金香属 1400
奇异南星 1469
奇形风毛菊 1329
奇特猪殃殃 997
奇蒿 1249
奈氏鲂 1649
鸢 1721
鸢尾 1422
鸢尾叶风毛菊 1333
鸢尾兰 1551
鸢尾兰属 1551
鸢尾科 1417
鸢尾属 1418
鸢属 1721
轮叶八宝 463
轮叶马先蒿 1146
轮叶木婆子 294
轮叶贝母 1380
轮叶节节菜 800
轮叶过路黄 915
轮叶沙参 1225
轮叶委陵菜 516
轮叶黄精 1394
轮叶棘豆 591
轮叶蒲桃 805
轮伞五加 835
轮环藤 376
轮环藤属 376
轮藻科 8

轮藻属 8
软毛虫实 255
软玉 1784
软石蕊 55
软丝藻 5
软体动物门 1570
软条七蔷薇 525
软刺卫矛 694
软刺蹄盖蕨 102
软枣猕猴桃 404
软骨鱼纲 1643
软骨草 1360
软骨草属 1360
软骨藻属 18
软紫草 1032
软紫草属 1032
软紫矿 1792
转子莲 329
卧孔菌属 33
卧生水松枝 775
欧氏维齿鲨 1644
欧白英 1125
欧白芥 457
欧白芥属 457
欧地笋 1086
欧亚尖车菊 1275
欧亚列当 1196
欧亚绣线菊 542
欧亚旋覆花 1304
欧百合 1386
欧当归 865
欧当归属 865
欧李 500
欧泽芹 878
欧香豌豆 582
欧活血丹 1073
欧洲七叶树 680
欧洲千里光 1337
欧洲玉米螟 1628
欧洲白桦 177
欧洲白榆 181
欧洲刺柏 150
欧洲英蒾 1212
欧洲甜樱桃 499
欧洲菟丝子 1026
欧洲鳞毛蕨 116
欧夏至草 1086
欧夏至草属 1086
欧鼠李 715
非洲龙血树 1405
非洲蝼蛄 1615
非洲戴星草 1344
齿牙毛蕨 104
齿爪鳃角金龟属 1623
齿叶水蜡烛 1066
齿叶东北南星 1468
齿叶冠石斛 1189
齿叶赤飑 791
齿叶等麻 206
齿叶扁核木 520
齿叶费菜 470
齿叶茧皮 645
齿叶蓍 1238
齿叶矮冷水花 203
齿叶赛葵蓍 1124
齿叶薹草 1315
齿叶鳞花草 1170
齿头鳞毛蕨 117
齿苞筋骨草 1057
齿苞茜草 429
齿果草 665
齿果草属 665
齿果酸模 233
齿翅蓼 223
齿唇兰属 1551
齿瞿野丹参 1105
齿菌科 27
齿缘苦荬菜 1307
齿缘草属 1035
齿萼凤仙花 685
齿鳞报春 921
齿裂东北延胡索 427
齿锐凤仙花 683
齿裂华千里光 1341
齿缘吊钟花 885
齿瓣石豆兰 1521
齿瓣石斛 1533
齿瓣延胡索 434
歧伞香茶菜 1078
歧伞獐牙菜 955
歧生蒿 1252 1258[A]
歧裂灰包 49
歧裂灰包属 49
卓巴百合 1386
虎 1766
虎皮楠 642
虎皮楠科 641
虎皮楠属 641
虎头兰 1529
虎耳草 490
虎耳草科 472
虎耳草属 488
虎舌兰属 1538
虎舌红 903
虎杖 223
虎尾兰 1405
虎尾兰属 1405
虎尾草 1439
虎尾草属 1439
虎尾铁角蕨 107
虎纹蛙 1698
虎刺 993
虎刺属 993
虎刺楤木 835
虎斑乌贼 1590
虎斑地鸠 1742
虎斑步甲 1619
虎斑宝贝 1574
虎斑游蛇 1708
虎斑鳊 1679
虎掌 1477
虎掌菌 25
虎鲀 1687
虎榛子 171
虎榛子属 171
虎嵩科 1644
虎鲨属 1644
虎鲸 1759
虎鲸属 1759
咖啡黄葵 738
咖啡属 993
龟蜡科 1619
龟蜡属 1619
鸣螽属 1612
明矾石 1786
明党参 857
明党参属 857
明樱蛤属 1588
果马蜂 1634
果香菊 1276
果香菊属 1276
昂天莲 747
昂天莲属 747
昙花 262
昙花属 262
具芒碎米莎草 1491
具柄冬青 690
具柄重楼 1390
具梗糙苏 1097
具鳞水柏枝 775
图纹布氏参 1637
岩风 865
岩风属 865
岩凤尾蕨 91
岩介属 451
岩乌头 308
岩生千里光 1337
岩生远志 664
岩生忍冬 1204
岩生南星 1473
岩生香薷 1070
岩白菜 474
岩白菜属 474
岩白翠 1139
岩穴大叶千里光 1279
岩羊 1777
岩羊属 1777
岩芥 451
岩松鼠 1752
岩败酱 1216
岩参 391
岩参属 1276
岩茴香 867
岩荫苦荬菜 1306
岩柏 926
岩须 884
岩须属 884
岩莲 437
岩扇属 880
岩黄莲 436
岩黄堇 434
岩黄蓍属 577
岩菖蒲 1399
岩菖蒲属 1399
岩梅科 880
岩梅属 880
岩匙 880
岩匙属 880
岩鸽 1729
岩椒 654
岩蒿 1256
岩蕨科 111
岩蕨属 111
岩鹭 1715
岩蓼草 1107
岭南山竹子 420
岭南花椒 653
岭南杜鹃 893
岭南来江藤 1132
岭南铁角蕨 109
岭南楝树 656
岭萝麦 1015
岷江冷杉 142
岷江蓝雪花 924

瑶里龙胆 950
瑶米尔蓼 1315
瑶里紫堇 431
罗氏沼虾 1602
罗氏海盘车 1639
罗布麻 961
罗布麻属 961
罗田玉兰 266
罗汉松 153
罗汉松科 153
罗汉松属 153
罗汉果 790
罗汉果属 790
罗伞 838
罗伞树 904
罗伞属 837
罗甸沟瓣木 700
罗纹鸭 1716
罗河石斛 1535
罗星草 946
罗盆草 471
罗脉冬青 690
罗浮冬青 690
罗浮柿 927
罗浮槭 673
罗勒 1094
罗勒属 1093
罗氏底 786
罗蒙常山 478
败酱 1216
败酱科 1215
败酱属 1215
败走无距花 815
钗子股 1549
钗子股属 1549
垂子买麻藤 157
垂叶榕 186
垂头菊属 1282
垂丝卫矛 699
垂丝海棠 511
垂丝紫荆 562
垂花龙胆 948
垂花青兰 1065
垂花香草 916
垂花地状报春 918
垂枝泡花树 681
垂枝柏 152
垂枝榕 168
垂果大蒜芥 457
垂果南芥 447
垂柳 164
垂珠花 929
垂笑君子兰 1406
垂穗莎草 1491
秉氏环毛蚓 1593
秉前环毛蚓 1593
知风草 1444
知母 1369
知母属 1369
牧地香豌豆 582
牧根果属 1226
牦牛 1773
刮金板 626
委夜蛾属 1630
委陵菜 515
委陵菜属 515
委陵菊 1287
和丰贝母 1378
和兰属花 1516
和合草 665
和尚菜 1239
和尚菜属 1239
秆野螟属 1628
岳桦 168
版纳木蓝 581
使君子 817
使君子科 816
使君子属 817
侧耳属 39
侧条真鲨 1646
侧纹岩松鼠 1752
侧茎垂头菊 1283
侧金盏花 312
侧金盏花属 312
侧柏 151
侧柏属 151
侧蕊 1250
侧鳃海牛科 1577
佩兰 1295
依兰 271
依兰属 271
货贝 1575
货贝属 1575
怪参属 1636
建兰 1528
建泽泻 1358
建始槭 674
迭裂苋菜 429
迭鞘石斛 1533
肾子藤 378
肾子藤属 378
肾叶山蓼 220
肾叶天胡荽 864
肾叶打碗花 1025
肾叶白头翁 343
肾叶金腰 475
肾叶鹿蹄草 882
肾茶 1060
肾茶属 1060
肾唇虾脊兰 1522
肾盖铁线蕨 97
肾弯金腰 475
肾蕨 123
肾蕨科 123
肾蕨属 123
鼻康阿魏 861
爬山虎 725
爬山虎属 725
爬行纲 1699
爬拉殃 995
爬岩红 1158
爬树龙 1479
爬被鳃金龟 1674
爬墙风 722
爬藤榕 189
金口蝾螺 1571
金山马兜铃 395
金山当归 850
金凤花 555
金凤藤 980
金凤藤属 980
金毛耳草 1000
金毛狗 97
金毛狗属 87
金毛柯 174
金毛铁线莲 323
金毛裸蕨 99
金毛裸蕨属 99
金爪儿 914
金乌贼 1590
金石斛 1537
金石斛属 1537
金甲豆 593
金叶羊蹄甲 552
金叶含笑 269
金叶柃 415
金叶树 925
金叶树属 925
金仙草 1325
金瓜 784
金瓜核 980
金兰 1524
金边龙舌兰 1403
金边虎尾兰 1406
金边桑 619
金发草 1455
金发草属 1454
金发藓 67
金发藓科 67
金发藓属 67
金丝马尾连 349
金丝吊金龟 380
金丝李 420
金丝条马尾杉 70
金丝蝴 57
金丝草 1454
金丝带 57
金丝桃 423
金丝桃叶绣线菊 541
金丝桃属 420
金丝猴 1750
金丝属 57
金丝燕属 1733
金吉丁属 1621
金耳 25
金耳石斛 1534
金耳环 400
金光菊 1327
金光菊属 1327
金合欢 545
金合欢属 545
金色干朽菌 27
金色小沙丁鱼 1652
金色狗尾草 1457
金灯藤 1026
金红菇 46
金花小檗 362
金花忍冬 1200
金花茶 411
金花树 808
金针菜 1382
金佛山兰 1559
金佛山兰属 1559
金佛山荚蒾 1208
金佛山铁线莲 325
金佛山鹿药 1395
金龟子科 1623
金龟草 320
金沙绢毛菊 1343
金鸡纳树 992
金鸡纳属 992
金鸡菊属 1281
金环蛇 1709

金耳侧耳 39
金枪鱼科 1682
金钗凤尾蕨 92
金鱼 1131 1658
金鱼草 1131
金鱼藻 387
金鱼藻科 387
金鱼藻属 387
金线蛙 1698
金线鲃 1665
草线鲃属 1665
金挖耳 1273
金草 999
金荞麦 219
金柑 648
金柑属 648
金苷枇杷 894
金冠鳞毛蕨 116
金星草 133
金星蕨 105
金星蕨科 104
金星蕨属 105
金钮扣 1345
金钮扣属 1344
金钟花 739 934
金钟藤 1028
金钩如意草 436
金须茅属 1439
金脉鸢尾 1419
金疮小草 1057
金桔 648
金珠柳 907
金盏苣苔属 1187
金盏花属 1271
金盏菊 1271
金盏银盘 1265
金莲叶黄花木 594
金莲花 353
金莲花属 352
金翅雀 1744
金翅属 1744
金钱松 148
金钱松属 148
金钱鱼 1680
金钱鱼科 1680
金钱鱼属 1680
金钱草 218
金钱草属 218
金钱豹 1227
金钱豹属 1227
金钱满 1465
金铁锁 244
金铁锁属 244
金粉蕨属 95
金球黄堇 428
金黄侧金盏花 312
金黄柴胡 851
金银忍冬 1203
金银莲花 958
金猫 1766
金猫属 1766
金粟兰 392
金粟兰科 391
金粟兰属 391
金缕梅 460
金缕梅科 459
金缕梅属 460
金锦香 811
金锦香属 811
金腺荚 1045
金腰 474
金腰属 474
金腰箭 1345
金腰箭属 1345
金腰燕 1735
金鹏 1719
金慈菇 1482
金蝇属 1632
金樱子 526
金翼黄芪 550
金露梅 517
舍蜩 1632
斧文蛤 1587
斧翅沙齐 455
斧蛤科 1588
斧蛤属 1588
乳儿绳 971
乳牛肝菌属 44
乳毛费菜 468
乳凹青荚叶 830
乳白石蒜 1407
乳白香青 1245
乳头百合 1386
乳豆 575
乳豆属 575
乳菇 1126
乳香 657
乳香鱼科 1676
乳香属 657
乳突果 973
乳突果属 973
乳突拟耧斗菜 342
乳突棘木 829
乳浆大戟 626
乳菊 1320
乳菊属 1320
乳菇属 44
乳源杜鹃 893
采色豆马勃 52
念珠冷水花 203
念珠根黄芩 1106
念珠藻科 3
念珠藻属 3
郎伞木 901
肿足蕨 103
肿足蕨科 103
肿足蕨属 103
肿柄菊 1351
肿柄菊属 1351
肢口纲 1595
股鳞蝾螈 1705
肥牛草 1181
肥肉草 809
肥皂荚 577
肥皂荚属 577
肥皂草 245
肥皂草属 245
肥荚红豆 590
肥螈 1695
肥螈属 1695
肥肚圆田螺 1573
胀果甘草 576
胀果芹 872
胀果芹属 872
胀萼蓝钟花 1233
腐毛悬钩子 529
周氏棓花蚜 1617
周氏新对虾 1601
周裂秋海棠 779
饰纹姬蛙 1699
鱼子兰 391
鱼木属 446
鱼尾葵 1461
鱼尾葵属 1461
鱼尾榕蛙 1585
鱼怪属 1599
鱼骨木 991
鱼骨木属 991
鱼眼草 1287
鱼眼草属 1287
鱼黄草属 1028
鱼藤 568
鱼藤属 567
忽地笑 1407
忽折百蕊草 211
狗牙花 964
狗牙花属 964
狗牙根 1441
狗牙根属 1441
狗爪豆 589
狗母鱼科 1654
狗舌草 1351
狗舌草属 1350
狗舌紫菀 1262
狗肝菜 1167
狗肝菜属 1167
狗尾红 619
狗尾草 1457
狗尾草属 1457
狗枣猕猴桃 406
狗骨柴 1019
狗骨柴属 1019
狗娃花 1303
狗娃花属 1302
狗脊蕨 112
狗脊蕨属 112
狗筋蔓 240
狗筋蔓属 240
狗獾 1763
狗獾属 1763
狐尾藻 220
狐尾藻 824
狐尾藻棘豆 592
狐尾藻属 823
狐臭柴 1051
狐属 1761
狐蝠科 1747
变叶胡椒 389
变叶树参 839
变叶美登木 701
变叶裸 189
变色马兜铃 397
变色树蜥 1703
变异铁角蕨 109
变异鳞毛蕨 118
变色白前 976
变红风毛菊 1329
变豆菜 876
变豆菜属 876
变侧异腹胡蜂 1633
变态广叶黄精 1393
变绿小檗 362
变绿红菇 46
变黑红菇 46

京黄芩 1109
京梨猕猴桃 405
夜光蝾螺 1571
夜合花 265
夜花 941
夜花属 941
夜花藤 377
夜花藤属 377
夜来香 988
夜来香属 987
夜香牛 1353
夜香树 1118
夜香树属 1118
夜蔓怀柄菇 37
夜蛾科 1630
夜鹰科 1732
夜鹰属 1732
奕州卷柏 74
刻孔海胆 1640
刻叶紫堇 431
刻肋海胆科 1640
刻肋海胆属 1640
刻纹蚬 1586
刻裂丽蚌 1584
膏叶藻科 16
疙瘩七 842
宝贝科 1574
宝贝属 1574
宝石石斑鱼 1675
宝兴卫矛 700
宝兴乌兜铃 396
宝兴耳蕨 119
宝兴报春 919
宝兴苔草 1487
宝兴茶藨 487
宝兴栒子 504
宝兴铁角蕨 108
宝兴越橘 898
宝兴歌鹅 1742
宝剑草 769
宝珠草 1377
宝铎草 1377
宝盖草 1083
宝蕨科 122
宝蕨属 122
定心散观音座莲 81
定心藻 708
定心藻属 708
宜昌木姜子 292
宜昌木蓝 579
宜昌东俄芹 879
宜昌百合 1386
宜昌荚蒾 1209
宜昌胡颓子 759
宜昌润楠 294
宜昌悬钩子 532
宜昌蛇葡 217
宜昌楼梯草 196
宜昌橙 644
空心泡 535
空心柴胡 853
空茎乌头 301
空茎驴蹄草 320
帘子藤 968
帘子藤属 968
帘蛤科 1586
卷丹 1385
卷毛耳草 1001
卷心菜 448
卷边班菇 42
卷丝苣苔 1184
卷蛇鳖科 1600
卷耳 239
卷耳属 239
卷折馒头蟹 1604
卷茎蓼 223
卷柏 73
卷柏科 73
卷柏属 73
卷萼兜兰 1553
卷鹊尾 1421
卷瓣兰属 1525
卷纹紫蕨 430
逆向落 228
单子叶植物纲 1357
单子麻黄 157
单毛刺蒴麻 737
单叶山柳 881
单叶升参 1103
单叶升麻 319
单叶地黄连 661
单叶牡荆 1055
单叶细辛 400
单叶厚唇兰 1537
单叶铁线莲 326
单叶梅花草 483
单叶淫羊藿 367
单叶新月蕨 106
单头华千里光 1341
单耳柃 417
单色革盖菌 28
单色蝴蝶草 1153
单芽狗脊蕨 113
单花小檗 355
单花山竹子 420
单花红丝线 1120
单花赤芍 404
单花鸢尾 1422
单花金腰 476
单花券属 455
单花鹿药草 1141
单花翠雀花 335
单体蕊黄芪 551
单苞鸢尾 1418
单孢卷柏 75
单籽犁头尖 1481
单球芹 862
单球芹属 862
单盖铁线莲 97
单瘤皱叶酸模 233
单穗水蜈蚣 1495
单穗升麻 321
单穗石松 72
单穗鱼尾葵 1461
单瓣白木香 524
单瓣李叶绣线菊 542
单瓣狗牙花 964
单瓣黄刺玫 528
单瓣滇山茶 413
房县槭 673
净花菰腺忍冬 1202
河口观音座莲 81
河无齿蚌 1584
河北白喉乌头 306
河北环毛蚓 1593
河北梨 522
河鸟 1739
河谷南星 1472
河南唐松草 349
河南鼠尾草 1101
河南翠雀 337
河虾科 1603
河蝇 1586
河朔荛花 756
河狸 1755
河狸科 1755
河狸属 1755
河滩冬青 689
浅裂齿堇菜 769
浅裂相异石韦 136
浅裂绣毛苣 535
浅裂剪秋罗 243
浅缝骨螺 1575
法氏角鲨 1647
法罗海 862
油芒 1442
油芒属 1442
油杉 144
油杉属 143
油松 147
油茶 412
油茶离瓣寄生 211
油树 410
油柿 927
油点草 1399
油点草属 1399
油桐 641
油桐属 641
油菜 447
油麻藤属 589
油棕 1463
油棕属 1463
油鲽 1674
油渣果 787
油渣果属 787
油鲨 1662
油橄榄 941
泡叶栒子 502
泡花树 680
泡花树属 680
泡沙参 1224
泡泡叶越橘 896
泡桐属 1141
泡囊草 1124
泡囊草属 1123
沿阶草 1388
沿阶草属 1338
沿沟草 1438
沿沟草属 1438
泥东风螺 1576
泥花草 1138
泥胡菜 1302
泥胡菜属 1302
泥炭藓 60
泥炭藓科 60
泥炭藓属 60
泥蚶 1580
泥蛾 1667
泥蛾属 1667
泥螺 1577
泥螺属 1577
泽兰属 1295
泽芹 879
泽芹属 878

泽泻 1358
泽泻虾脊兰 1522
泽泻科 1357
泽泻属 1357
泽珍珠菜 912
泽蛙 1697
泽蕨 63
泽蕨属 63
泽漆 626
沼生水马齿 1055
沼生水苏 1112
沼生田头菇 42
沼生苦荬菜 1343
沼生念珠藻 3
沼生蒲公英 1350
沼生蔊菜 457
沼兰 1549
沼兰属 1549
沼地乌先蕨 1146
沼沙参 1225
沼委陵菜属 502
沼委陵菜 502
沼泽繁缕 250
沼虾属 1602
沼猪殃殃 997
沼蛙 1697
波氏石韦 136
波氏吻鳗虎鱼 1684
波叶大黄 231
波叶山蚂蝗 570
波叶仙鹤草 67
波叶异木患 676
波叶青牛胆 384
波叶梵天花 746
波叶葡萄 730
波纹龙虾 1602
波纹裸胸鳝 1656
波翅豆薯 1507
波鸭跖草 1428
波密小檗 357
波棱瓜 787
波棱瓜属 787
波登他柴 17
波缘大参 841
波缘冷水花 202
波缘假瘤蕨 133
波缘樟木 837
带枝唐松草 352
带枝鼠李 716
带菊属 1323
居间寸金草 1061
屁甲属 1619
屈鸡头 445
陌上菜 1138
降龙草 1187
降香黄檀 567
降真香 642
陕西小檗 361
陕西卫矛 699
陕西乌头 310
陕西耳蕨 120
陕西蓼蓼 1213
陕西假瘤蕨 134
陕西猕猴桃 404
函馆锉石鳚 1570
虱婆卓 70
参三七 843
参环毛蚓 1593
参薯 1411
绡刚毛藻 6
绡灼兰 1530
绡紫菜 12
线叶丁香蓼 822
线叶土山瓜 1029
线叶山尖子 1270
线叶卫矛 698
线叶东北延胡索 427
线叶龙胆 948
线叶丛菔 457
线叶齿瓣延胡索 434
线叶垂头菊 1283
线叶香青 1246
线叶柄果海桐 494
线叶唇柱苣苔 1181
线叶柴胡 852
线叶菊 1297
线叶菊属 1297
线叶旋覆花 1305
线叶猪屎豆 565
线叶筋骨草 1057
线叶蓟 1278
线叶锦鸡儿 559
线舌垂头菊 1283
线羽贯众 115
线纹香茶菜 1078
线枝蒲桃 804
线柱苣苔 1192
线柱苣苔属 1192
线萼山梗菜 1234
线萼金花树 807
线裂老鹳草 614
线裂铁角蕨 107
线蕨 126
线蕨属 125
线鳞耳蕨 120
细子麻黄 157
细子蔊菜 456
细叉梅花草 483
细风轮菜 1061
细毛火烧兰 1538
细毛石花菜 14
细毛刺蒴 221
细长竹蜡 1589
细石蕊 55
细叶小羽藓 65
细叶小檗 360
细叶云南松 148
细叶水团花 990
细叶水芹 869
细叶乌头 306
细叶乌蔹莓 723
细叶石仙桃 1555
细叶石斛 1534
细叶石斑木 523
细叶白头翁 344
细叶地榆 538
细叶亚菊 1243
细叶百脉根 584
细叶谷木 811
细叶沙参 1224
细叶苦荬菜 1308
细叶鸢尾 1422
细叶卷柏 74
细叶泥炭藓 60
细叶凤花 757
细叶砂引草 1037
细叶桉 803
细叶蚊子草 508
细叶益母草 1084
细叶绣线菊 542
细叶黄乌头 301
细叶黄堇 432
细叶黄鹤菜 1356
细叶野牡丹 810
细叶婆婆纳 1156
细叶景天 469
细叶鼠曲草 1299
细叶藁本 867
细竹蒿草 1429
细灯心草 1425
细红背叶 1292
细花丁香蓼 822
细花百部 1402
细花泡花树 681
细花迭裂黄堇 432
细花线纹香茶菜 1078
细花虾脊兰 1523
细花紫堇 432
细花滇紫草 1038
细体拟鲿 1669
细角螺 1576
细辛 399
细辛属 398
细苞虫实 255
细茎双蝴蝶 957
细茎石斛 1535
细茎有柄柴胡 854
细茎黄芪 551
细茎黄鹤菜 1356
细茎蘘吾 1316
细枝木半夏 760
细枝茶藨 487
细枝柃 416
细枝绣线菊 542
细刺五加 834
细齿山芝麻 748
细齿叶柃木 416
细齿异野芝麻 1074
细齿金线蛙 1594
细齿金盏藤 328
细齿草木樨 586
细齿崖爬藤 728
细齿锥花 1073
细果角茴香 440
细果野菱 801
细罗伞 899
细秆蚤缀 1497
细秆藨草 1498
细柱西番莲 773
细柱柳 164
细柄凤仙花 685
细柄书带蕨 100
细柄百两金 901
细柄买麻藤 157
细柄针筒菜 1112
细柄蘑菇 1416
细砂仁 1507
细轴凤花 757
细点牛肝菌 43
细毡毛忍冬 1205
细须翠雀花 338
细脉小檗 356
细根茎黄精 1394
细根姜 1514

细根菖蒲 1465
细圆藤 378
细圆藤属 378
细胸金针虫 1621
细脆蛇蜥 1706
细弱梅子 503
细梗十大功劳 369
细梗荞麦 219
细梗胡枝子 584
细梗香草 912
细梗蔷薇 525
细野麻 192
细距楼斗菜 317
细斑裸胸鳝 1656
细弯沙参 1222
细弯茶 413
细弯扁蕾 952
细棉花 1063
细裂叶松蒿 1149
细裂叶莲蒿 1252
细裂蒲公英 1349
细辐射枝藨草 1498
细锥香茶菜 1076
细绳子草 248
细雕刻肋海胆 1640
细穗支柱蓼 230
细穗玄参 1151
细穗玄参属 1151
细穗金足草 1175
细穗柳 777
细穗密花香薷 1068
细穗腹水草 1158
细穗蒌 254
细叶金丝桃 423
贯众 114
贯众叶溪边蕨 107
贯众属 114
贯筋藤 980
驼绒藜 253
驼绒藜属 253

## 九 画

韭莲 1409
韭菜 1368
春云实 555
春兰 1529
春花胡枝子 583
春榆 181
毒瓜 784
毒瓜属 784
毒伞 41
毒红菇 46
毒芹 858
毒芹属 858
毒参 859
毒参属 859
毒砂 1789
毒根斑鸠菊 1353
毒隐翅虫属 1620
毒棘海胆科 1640
毒鲉科 1687
毒鼠子 752
毒鼠子科 752
毒鼠子属 752
毒绳山磨 40
珊瑚 1569
珊瑚水虱科 1599
珊瑚冬青 688
珊瑚朴 179
珊瑚虫草 21
珊瑚苔苔 1183
珊瑚苔苔属 1183
珊瑚豆 1127
珊瑚状猴头菌 27
珊瑚纲 1567
珊瑚枝科 56
珊瑚枝属 56
珊瑚树 1212
珊瑚姜 1514
珊瑚菌科 26
珊瑚菜 861
珊瑚樱 1127
珊瑚藻 15
珊瑚藻科 15
珊瑚藻属 15
珍珠贝科 1582
珍珠枫 1041
珍珠荚蒾 1210
珍珠草 245
珍珠茅属 1499
珍珠莲 189
珍珠蚌科 1584
珍珠蚌属 1584
珍珠绣线菊 543
珍珠菜 913
珍珠菜属 911
珍珠梅 538
珍珠梅属 538
珍珠鹿蹄草 882
珍珠麒麟菜 16
珀氏长吻松鼠 1752
玻甲鱼 1672
玻甲鱼科 1672
玻甲鱼属 1672
玻璃海鞘 1641
玻璃海鞘科 1641
玻璃海鞘属 1641
玳瑁 1701
玳瑁属 1701
城口东俄芹 879
城口蹄蹶 87
挺茎风金丝桃 421
挂金灯 1122
挖耳草 1196
指叶毛兰 1538
指印石斑鱼 1675
指状凤尾蕨 91
指梗霜霉属 19
挪挪果 762
挪威鼠曲草 1294
垫状山岭麻黄 157
垫状女蒿 1304
垫状卷柏 75
垫状点地梅 911
革叶卫矛 698
革叶马兜铃 397
革叶耳蕨 119
革叶茜草 1016
革叶莛花 756
革叶茴芹 873
革叶茶藨 486
革叶兔耳草 1135
革叶猕猴桃 408
革叶粗筒苣苔 1179
革叶蓼 223
革耳属 38
革质红菇 45
革菌科 25
革菌属 25
革盖菌属 28
革鲀科 1691
革裥菌属 32
荆三棱 1498
荆芥 1092
荆芥属 1092
荆条 1054
荚果蕨 111
荚果蕨属 110
荚蒾 1209
荚蒾卫矛 700
荚蒾叶越橘 898
荚蒾属 1208
荚囊族 112
荚囊蹶属 112
黄草 1015
黄芪科 990
黄草属 1015
黄毛槐蓝 580
黄果鹤鸽花 662
黄一品红 627
草山木蓝 580
草木樨 587
草木樨属 586
草木樨状黄芪 550
草玉梅 316
草本三对节 1049
草本威灵仙 1159
草龙 822
草地风毛菊 1327
草地乌头 311
草地早熟禾 1454
草地婆罗门参 1352
草芍药 403
草血竭 227
草问荆 77
草苁蓉 1194
草苁蓉属 1194
草豆蔻 1503
草甸千里光 1336
草甸风毛菊 1333
草甸红门兰 1552
草甸碎米荠 450
草沉香 631
草果 1507
草果药 1511
草鱼 1659
草鱼属 1659
草泽泻 1358
草珊瑚 393
草珊瑚属 393
草胡椒 388
草胡椒属 388
草兔 1751
草莓 509
草莓车轴草 603
草莓海菊蛤 1583
草莓属 509
草原石头花 242
草原老鹳草 613
草原旱獭 1753
草原黄鼠 1753
草原鹞 1720
草原糙苏 1097
草原鼢鼠 1756

[illegible]铜 1238
[illegible]海棠科 1237
[illegible]海棠属 1238
[illegible]绣球 474
[illegible]绣球属 474
[illegible]黄堇 435
[illegible]鱼 41
[illegible]寮黄 150
[illegible]绿龙蜥 1703
[illegible]绵 740
[illegible]游蛇 1708
[illegible]瑞香 755
[illegible]鞘叶 654
草履虫科 1565
草履虫属 1565
草绵科 1628
[illegible]莓 1714
[illegible]石 1786
[illegible]花 756
[illegible]花属 756
[illegible]卢属 873
[illegible]茴蒜 344
茴香 861
茴香砂仁 1501
茴香砂仁属 1501
茴香属 861
[illegible]芋 652
[illegible]芋属 651
[illegible]陈蒿 1249
伏苓 33
[illegible]麦 219
荞麦叶大百合 1373
394
荞麦地鼠尾 1103
荞麦属 219
[illegible]菊 1368
[illegible]蕉 1276
[illegible]蕉属 1276
茶 413
茶条木 676
茶条木属 676
茶条槭 673
茶果冬青 687
[illegible]麦蓬 1213
茶茱萸科 707
[illegible]褐红菇 46
茶藨子属 485
[illegible] 449
[illegible]兰 1091
[illegible]蓿 1226
[illegible]属 449
[illegible]茎 1491
[illegible]汉和参 1637
[illegible]水苏 1059
[illegible]水苏属 1059
[illegible]乌檀 1010
[illegible]百合 1386
[illegible]用牛舌草 1031
[illegible]用白前 979
[illegible]用阴地蕨 79
[illegible]用拟层孔菌 29
[illegible]用狗牙花 964
[illegible]用香杜茎谷 1181
[illegible]用萝芙木 969
[illegible]蜀葵 740
[illegible]鼠李 714
[illegible]麻 206
[illegible]麻叶巴豆 625
[illegible]麻叶龙头草 1087
[illegible]麻科 192
[illegible]麻属 206
[illegible]草 1435
[illegible]草属 1435
[illegible]生蛇根草 1012
[illegible]生鼠尾草 1105
[illegible]枝 678
[illegible]枝草 1103
[illegible]枝属 678
[illegible]枝螺属 1575
[illegible]蝽 1618
[illegible]菱 390
[illegible]荷 1598
[illegible]荷科 1598
[illegible]荷属 1598
[illegible]菜 958
[illegible]菜属 958
南山花 1013
南山藤 981
南山藤属 980
南川升麻 321
南川百合 1386
南川附地菜 1040
南川泽兰 1296
南川冠唇花 1090
南川紫珠 1041
南川景天 471
南川鼠尾草 1103
南天竹 370
南天竹属 370
南五味子 275
南五味子属 275
南丹参 1103
南方山荷叶 363
南方六道木 1198
南方红豆杉 155
南方油葫芦 1614
南方荚蒾 1210
南方菟丝子 1026
南方紫金牛 903
南方紫萁 83
南方糙苏 1098
南方露珠草 819
南玉带 1371
南艾蒿 1258
南瓜 783
南瓜属 783
南亚松 146
南亚新木姜子 297
南江藤 1140
南芥属 446
南赤飑 792
南牡蒿 1251
南苜蓿 585
南国壁钱 1596
南岭山矾 931
南岭柞木 764
南岭黄檀 566
南岭野靛棵 1170
南非茉莉 1047
南京椴 736
南茼蒿 1276
南洋楹 546
南烛 887
南烛属 887
南黄紫堇 429
南蛇棒 1469
南蛇藤 693
南蛇藤属 692
南紫薇 799
南粤马兜铃 395
南酸枣 666
南酸枣属 666
南漳斑鸠菊 1353
南蝠 1747
南鹤虱 860
南疆荆芥 1092
南疆新塔花 1116
胡兀鹫 1720
胡兀鹫属 1720
胡杨 163
胡枝子 582
胡枝子属 582
胡桃 161
胡桃科 159
胡桃属 160
胡桃楸 160
胡黄连 1149
胡黄连属 1149
胡萝卜 860
胡萝卜属 860
胡麻 1176
胡麻草 1133
胡麻草属 1133
胡麻科 1176
胡麻属 1176
胡椒 390
胡椒科 388
胡椒属 389
胡蜂科 1634
胡蜂属 1634
胡颓子 760
胡颓子科 758
胡颓子属 758
胡鲇 1668
胡鲇科 1668
胡鲇属 1668
柱毛独行菜 454
柱状田头菇 42
柱果木槿 815
柱果铁线莲 332
柱果绿绒蒿 442
柱果猕猴桃 405
柱穗山姜 1504
柃木 416
柃木属 414
相手蟹属 1606
相似石韦 137
相似虾脊兰 1524
相异石韦 136
相思子 544
相思子属 544
树生杜鹃 891
树皮生卧孔菌 34
树皮丝马勃 51
树头芭蕉 1500
树头菜 446
树发 58
树发属 58
树丝马勃属 51
树舌 30
树花属 59
树形杜鹃 889
树枝软骨藻 18
树参 838

树参属 838
树萝卜属 883
树棉 740
树蛙科 1698
树蛙属 1698
树番茄 1118
树番茄属 1118
树锦鸡儿 557
树蜥属 1703
柏木 150
柏木属 149
柏豆木 807
柏拉木属 807
柏科 149
柏桉藻科 13
柄叶罗伞 838
柄叶雪莲花
柄叶槲蕨 139
柄果 175
柳叶大花卫矛 696
柳叶山柳菊 1303
柳叶卫矛 697
柳叶天料木 763
柳叶风毛菊 1328
柳叶牛膝 258
柳叶白前 977
柳叶亚菊 1244
柳叶红茎黄芩 1110
柳叶豆梨 521
柳叶忍冬 1203
柳叶刺蓼 222
柳叶虎刺 994
柳叶钝果寄生 214
柳叶香橼 1015
柳叶剑蕨 139
柳叶鬼针草 1265
柳叶桉 803
柳叶梅子 504
柳叶润楠 295
柳叶绣球 480
柳叶黄肉楠 282
柳叶菜 820
柳叶菜科 818
柳叶菜属 820
柳叶榕 935
柳叶假木荷 884
柳叶蔗节花 772
柳叶旋覆花 1306
柳叶斑鸠菊 1354
柳叶紫珠 1041
柳叶蒿 1252
柳叶腺李 714
柳叶蜡梅 282
柳叶箬 1447
柳叶箬属 1447
柳叶蕨 65
柳叶蕨科 65
柳叶蕨属 65
柳叶赛爵床 1167
柳兰 818
柳兰属 818
柳杉 148
柳杉属 148
柳珊瑚科 1569
柳穿鱼属 1137
柳属 164
枇杷 507
枇杷叶珊瑚 826
枇杷叶紫珠 1042
枇杷海葵科 1568
枇杷属 507
栀子 998
栀子皮 764
栀子皮属 764
栀子属 998
栀花紫鬘 937
枸杞 1120
枸杞属 1120
枸骨 688
枸桔 651
枸橼 644
柑马蜂 1634
柑桔属 643
柚 643
柚木 1053
柚木属 1053
柿 927
柿科 926
柿属 926
柿寄生 216
柄叶羊耳蒜 1547
柄灰包 49
柄灰包科 48
柄灰包属 49
柄条蜡瓣 36
柄果花椒 655
柄果海桐 494
柄果槲寄生 216
柄炭角菌 22
柄笠头菌属 47
栉水虱科 1599
栉水虱属 1599
枯孔扇贝 1582
枯孔扇贝属 1582
枯叶蛾 1321
枯叶蛾属 1321
枯江珧 1582
枯盲环毛蚓 1593
枯棘骨螺 1575
枯裂齿唇延胡索 434
枯鳐虎鱼属 1684
柞木 765
柞木属 764
柞蚕 176
柞蚕 1628
柽柳 776
柽柳科 774
柽柳属 776
枳椇 712
枳椇属 712
枳属 651
柯 175
柯氏胞孔苔虫 1636
柯属 174
柊叶 1516
柊叶属 1516
柊树 942
柠条锦鸡儿 558
柠檬 644
柠檬桉 803
柠檬清风藤 683
枹栎 176
柘树 185
柘树属 185
柘麻 185
栅藻科 5
栅藻属 5
勃氏舟形甲 1580
歪叶秋海棠 778
歪头菜 607
哥兰叶 692
哥纳香属 272
咸宁短柱茶 414
咸鱼头 623
咸虾花 1354
咸水柳 166
威灵仙 323
威廉环毛蚓 1593
厚斗柯 174
厚叶川木香 1289
厚叶石楠 513
厚叶白花酸藤果 906
厚叶冷水花 204
厚叶包芽报春 920
厚叶岩白菜 474
厚叶沿阶草 1389
厚叶贯众 115
厚叶香草 913
厚叶美花草 319
厚叶美登木 702
厚叶紫菀 938
厚叶梅子 503
厚叶铁角蕨 107
厚叶铁线莲 324
厚叶旋蒴苣苔 1178
厚叶清香桂 707
厚叶银柳 481
厚叶簇盘子 632
厚叶鳞毛蕨 117
厚皮树 668
厚皮树属 668
厚皮香 418
厚皮香八角 281
厚皮香属 418
厚皮菜 253
厚朴 266
厚壳树 1035
厚壳树属 1034
厚壳贻贝 1581
厚环乳牛肝菌 44
厚果崖石藤 588
厚绒荚蒾 1210
厚唇兰属 1537
厚唇裸重唇鱼 1661
厚圆果海桐 495
厚喙菊属 1290
厚瓣玉凤花 1542
砂贝母 1380
砂仁属 1505
砂引草属 1037
砂地苔草 1489
砂珍棘豆 592
砂钻苔草 1488
砂海螂 1589
砂蓝刺头 1290
砖礓科 1586
砖礓属 1586
砖子苗 1486
砖子苗属 1496
牵牛 1030
牵牛属 1030
轴灰包 48
轴灰包科 48
轴灰包属 48

细黑粉菌属 23
细辛 252
细辛属 252
鸦科 1737
鸦胆子 656
鸦胆子属 656
鸦葱 1334
鸦葱属 1334
鸦鹃属 1731
鸦跖花 342
鸦跖花属 342
鸦属 1737
鸦椿卫矛 696
鸭科 1729
鸭鸽 1730
鸭属 1729
鸭科 1743
鸭属 1743
鸭科 1728
鸭属 1728
背肛海兔属 1577
背角无齿蚌 1585
背条水龟 1619
背斑燕鳐 1671
背鳍异唇鲃 1594
背褶酒蚌 1584
点地黄精 1393
点地梅 911
点地梅属 909
点头冷水花 202
点柄乳牛肝菌 44
点柄黄红菇 46
点带石斑鱼 1675
点斑海鸽 1730
点地落叶梅 917
点腺过路黄 912
带岭乌头 306
带鱼 1682
带鱼科 1682
带鱼属 1682
带纹条鳎 1690
带蝶螺 1571
星毛槐天牛属 1625
省沽油 703
省沽油科 703
省沽油属 703
省藤 1461
省藤属 1461
冠果草 1358
冠萼花 1090
冠萼花属 1089
冠海马 1673
冠海龙 1673
冠鱼狗 1733
冠盖绣球 479
冠盖藤 485
冠盖藤属 485
冠鳞谷精草 1432
哇畔莎草 1490
哈氏刻肋海胆 1640
哈尔蒂木层孔菌 33
哈那鲨属 1643
哈拉布拉贝母 1378
咬人狗火麻树 198
咬人荨麻 207
咬齿牡蛎 1583
响叶杨 162
响铃豆 564
响铃金锦香 812
星天牛 1625
星天牛属 1625
星毛羊奶子 760
星毛委陵菜 515
星毛金锦香 812
星毛冠盖藤 485
星毛唐松草 347
星毛蕨 623
星毛蕨属 623
星毛粟米草 235
星毛鹅掌柴 845
星毛蕨 104
星毛蕨属 104
星叶草 321
星叶草属 321
星头啄木鸟 1734
星虫动物门 1591
星虫纲 1591
星虫科 1591
星虫属 1591
星舌紫菀 1260
星花灯心草 1424
星花金龟属 1624
星花粉条儿菜 1364
星花蒜 1365
星状风毛菊 1333
星果草 318
星果草属 318
星点东方鲀 1691
星黄海葵 1567
星宿菜 914
星鳐 131
星鳐属 131
星鲨属 1645
星鳗 1656
星鳗属 1656
显子草 1452
显子草属 1452
显孔崖爬藤 726
显脉小檗 359
显苞过路黄 917
显齿蛇葡萄 721
显柱乌头 310
显柱南蛇藤 694
显脉木兰寄生 214
显脉石蝴蝶 1191
显脉拉拉藤 996
显脉委陵菜 518
显脉荚蒾 1212
显脉柳叶菜 821
显脉香茶菜 1079
显脉旋覆花 1305
显脉猕猴桃 408
显脉獐牙菜 956
昭通唐松草 349
昭通滇紫草 1038
昆仑锦鸡儿 558
昆布 10
昆布属 10
昆虫纲 1609
昆明小檗 357
昆明沙参 1225
昆明杯冠藤 979
昆明裂腹鱼 1665
禺毛茛 344
思茅山梗菜 1234
思茅山橙 966
思茅玉兰 266
思茅豆腐柴 1052
思茅松 146
思茅食用秋海棠 779
思茅独活 863
思茅铁线莲 330
思茅清明花 962
思茅藤 964
思茅藤属 964
胃叶线蕨 126
虾子花 800
虾子花属 800
虾衣草 1168
虾衣草属 1168
虾须草 1339
虾须草属 1339
虾脊兰 1522
虾脊兰属 1522
虾鲇 1603
虾鲇科 1603
虾鲇属 1603
蚂蚁花 812
蚂蝗七 1180
蚁卜 1632
蚁蛉科 1626
蚁䴕 1734
蚁䴕属 1734
蚁巢伞属 39
蚁蛉 1626
蚁属 1632
蚁蜻蛉 1626
虹科 1631
虹鳞肋毛蕨 121
贵州八角莲 364
贵州小檗 355
贵州天名精 1273
贵州毛玲 416
贵州龙胆 949
贵州半蒴苣苔 1186
贵州报春 921
贵州芙蓉 741
贵州连蕊茶 412
贵州金丝桃 422
贵州狗牙花 964
贵州泡花树 681
贵州香花藤 959
贵州娃儿藤 989
贵州柴胡 853
贵州萍蓬草 386
贵州鼠李 715
贵州鼠尾草 1100
贵州裸实 701
贵州獐牙菜 956
贵州醉魂藤 982
贵州蘘荷 1317
贵阳鸭跖草 882
炭角菌科 22
炭角菌属 22
贻贝 1581
贻贝科 1580
贻贝属 1581
贴生石韦 135
骨缘当归 848
骨牌蕨 128
骨牌蕨属 128
骨碎补 124
骨碎补科 123
骨碎补属 124

骨螺科 1575
骨螺属 1575
钩毛草属 1004
钩毛茜草 1017
钩毛紫珠 1044
钩吻 944
钩序唇柱苣苔 1181
钩状石斛 1531
钩状雀梅藤 717
钩状千斤拔 1297
钩距虾脊兰 1523
钩距黄堇 431
钩萼草 1093
钩萼草属 1093
钩棘骨螺 1575
钩锥 173
钩腺大戟 630
钩凝菜 17
钩藤 1021
钩藤属 1020
钝叶土牛膝 257
钝叶山罗花 1140
钝叶千里光 1337
钝叶川梨 522
钝叶木姜子 294
钝叶瓦松 465
钝叶金合欢 545
钝叶草 1458
钝叶草属 1458
钝叶柃 417
钝叶桂 284
钝叶鼠芩 1109
钝叶楼梯草 197
钝叶蔷薇 528
钝叶酸模 233
钝头瓶尔小草 80
钝头蛇 1708
钝头鼠爬藤 727
钝头鮠科 1670
钝形凹顶藻 18
钝尾两头蛇 1707
钝果寄生属 213
钝苞一枝黄花 1342
钝齿红紫珠 1044
钝齿冬青叶 830
钝齿铁线莲 322
钝齿银莲花 315
钝绿翠青蛇 1708
钝萼附地菜 1039
钝萼铁线莲 329
钢青褐层孔菌 34
铀化合物类 1787
钿子瓜 797
钟花草 1167
钟花草属 1167
钟花蓼 222
钟乳石 1785
钟冠唇柱苣苔 1182
钟萼白头翁 343
钟萼草 1137
钟萼草属 1137
钙化合物类 1784
钙生鹅冠草 1455
钙芒硝 1785
钙板金藻科 11
钙板金藻属 11
钜蚓科 1593
矩叶山蚂蝗 570
矩叶卫予 698
矩叶鼠刺 481
矩圆叶柃木 828
矩圆线蕨 126
看麦娘 1434
看麦娘属 1434
毡毛马兰 1310
毡毛风毛菊 1334
毡毛石韦 136
毡盖木耳 25
牯岭凤仙花 684
牯岭勾儿茶 710
牯岭东俄芹 879
牯岭蛇葡萄 720
牯岭藜芦 1401
香子兰 1561
香子兰属 1561
香子含笑 269
香水月季 526
香毛唐松草 348
香叶子 289
香叶天竺葵 614
香叶树 288
香瓜属 783
香皮树 681
香冬青 691
香丝草 1280
香亚环乳菇 45
香合欢 547
香美木 209
香美木属 208
香芸火绒草 1313
香花羊耳蒜 1547
香花青兰 1064
香花虾脊兰 1523
香花球兰 983
香花崖豆藤 587
香花藤属 958
香芹 865
香杨 163
香豆蔻 1507
香附子 1491
香青 1246
香青兰 1065
香青属 1244
香茅 1440
香茅属 1440
香果兰 1561
香果树 994
香果树属 994
香乳菇 45
香鱼 1654
香鱼科 1654
香鱼属 1654
香茶菜 1075
香茶菜属 1075
香柏 152
香面叶 288
香科科 1114
香科科属 1113
香姜 1502
香桂 286
香根芹 870
香根芹属 870
香榧 168
香巢菜 768
香圆 645
香粉叶 290
香菇 37
香菇属 37
香雪兰 1418
香雪兰属 1418
香港马兜铃 397
香港双蝴蝶 957
香港四照花 828
香港瓜馥木 272
香港远志 663
香港黄檀 566
香港葱臭木 660
香港算盘子 632
香港鹰爪花 270
香蒲科 1484
香蒲属 1484
香榧 1014
香槐 563
香槐属 563
香椿 661
香椿属 661
香蜂花 1087
香筒草属 1081
香蕉 1500
香蕉弄蝶 1630
香蕉弄蝶属 1630
香橙 644
香豌豆属 581
香薷 1067
香薷状香筒草 1081
香薷属 1066
香螺 1576
香螺 1763
香藜 254
秋子梨 522
秋分草 1327
秋分草属 1327
秋华柳 166
秋牡丹 315
秋沙鸭属 1718
秋英 1281
秋英属 1281
秋枫 621
秋海棠苦菜菜 1308
秋海棠 779
秋海棠科 778
秋海棠属 778
秋葡萄 731
秋葵属 737
秋鹅观草 1455
秋鼠曲草 1299
重叶黄精 1393
重羽菊 1288
重羽菊属 1288
重阳木 621
重阳木属 621
重齿毛当归 850
重齿玄参 1151
重冠紫菀 1260
重唇石斛 1534
重圆齿香薷 1067
重楼属 1390
重瓣臭茉莉 1048
重瓣木芙蓉 741
重瓣白花石榴 807
重瓣托里贝母 1378
重瓣朱槿 741
重瓣伊犁贝母 1380
重瓣栀子 998

重瓣棣棠花 510
重瓣额敏贝母 1378
复毛胡椒 390
复双斑黄蜘 1631
复叶耳蕨属 113
复叶葡萄 730
复羽叶栾树 677
复齿鼯鼠 1754
复齿鼯鼠属 1754
复盆子 532
复瓦黄龙眼 278
鸟嘴越橘 898
鸟檀香 669
绿江枳椇 712
绿山乌头 307
临桂香草 915
临桂绣球 479
鬼伞属 41
鬼灯檠 487
鬼灯檠属 487
鬼吹箫 1199
鬼吹箫属 1199
鬼针草 1266
鬼针草属 1265
鬼笔状钉灰色 48
鬼笔科 47
鬼笔属 47
鬼舶 1687
鬼舶属 1687
鬼箭玉凤花 1542
鬼箭郁鸡儿 558
泉七 1480
泉七属 1485
泉水鱼 1664
盾叶半夏 1477
盾叶冷水花 203
盾叶秋海棠 778
盾叶莓 524
盾叶铁线莲 328
盾叶唐松草 349
盾叶粗筒苣苔 1179
盾叶薯蓣 1416
盾状藓藻 7
盾柄草 1039
盾果草属 1039
盾蕨 132
盾蕨属 132
待雪草 823
须花苹雀花 336
须苞石竹 241
须药藤 987
须药藤属 987
须腹蕨属 48
须鼠耳蝠 1747
细蕊铁线莲 330
细鲨科 1644
须鲸科 1757
须鲸属 1757
须鳐属 1657
须瓣开口箭 1400
叙永小檗 358
剑叶山芝麻 749
剑叶开口箭 1401
剑叶凤尾蕨 92
剑叶龙血树 1405
剑叶耳草 1001
剑叶朱蕉 1404
剑叶金鸡菊 1281
剑叶鸭葱 1334
剑叶虾脊兰 1522
剑叶铁角蕨 107
剑叶紫金牛 902
剑状矛蚌 1585
剑麻 1404
剑蕨科 139
剑蕨属 139
俞藤 731
俞藤属 731
食用土当归 835
食用獐鳞菜 16
食盐 1787
食虾蝇科 1632
食蟹豆齿鳗 1657
盆架树 972
盆架树属 972
盆距兰属 1539
胆矾 1783
脉叶虎皮楠 642
脉耳草 1000
脉红螺 1575
脉花党参 1230
肺衣 54
肺衣属 54
胫毛豆兜唇 1621
胎生狗脊蕨 112
胎生铁角蕨 108
胖大海 751
胞孔苔虫属 1636
胞孔苔虫科 1636
匍生沟酸浆 1141
匍茎通泉草 1139
匍茎萝 226
匍枝马尾藻 11
匍枝酢江藤黄 157
匍枝委陵菜 516
匍枝筋骨草 1057
匍匐水柏枝 775
匍匐忍冬 1201
匍匐苦荬菜 1308
匍匐委陵菜 518
匍匐消芥 446
匍匐堇菜 769
匍匐球子草 1392
匍匐酸藤子 906
蚀菱蟹属 1604
蚀盖伞粉褶 96
饼干镜蛤 1587
兔儿风属 1241
兔儿伞 1346
兔儿伞属 1346
兔儿尾苗 1157
兔耳风花蟹甲草 1269
兔耳兰 1529
兔耳草 1135
兔耳草属 1135
兔尾草 604
兔尾草属 604
兔科 1751
兔唇花属 1082
兔属 1751
狭长花沙参 1222
狭长苞灵芝 31
狭叶小漆树 671
狭叶山胡椒 288
狭叶山姜 1503
狭叶山黄麻 180
狭叶山梗菜 1234
狭叶山野豌豆 605
狭叶马兰 1309
狭叶木蓝 268
狭叶瓦韦 129
狭叶水蓼 225
狭叶凤尾蕨 92
狭叶牛姆瓜 373
狭叶巴戟 1007
狭叶龙舌兰 1404
狭叶母草 1137
狭叶竹节参 842
狭叶米口袋 577
狭叶红紫珠 1044
狭叶红景天 467
狭叶阴香 284
狭叶花椒 656
狭叶补香 896
狭叶牡蒿 1248
狭叶沙参 1223
狭叶附地菜 1040
狭叶鸢尾兰 1551
狭叶虎皮楠 641
狭叶金丝桃 420
狭叶金粟兰 391
狭叶沿阶草 1390
狭叶珍珠菜 917
狭叶荆芥 1093
狭叶茜草 1016
狭叶草原丝石竹 242
狭叶荨麻 206
狭叶南五味子 275
狭叶栀子 999
狭叶鸦葱 1335
狭叶香茶菜 1076
狭叶香港远志 663
狭叶重楼 1391
狭叶鱼儿风 1243
狭叶姜黄 1509
狭叶孩儿参 245
狭叶夏枯草 1100
狭叶瓶尔小草 80
狭叶海金子 493
狭叶海金沙 85
狭叶海桐 493
狭叶绣线菊 541
狭叶黄精 1394
狭叶野大豆 576
狭叶崖爬藤 727
狭叶落地梅 916
狭叶紫金牛 902
狭叶黑三棱 1484
狭叶短毛独活 863
狭叶蓬菜蔓 944
狭叶楼梯草 196
狭叶碎米树 802
狭叶槭伞枫 840
狭叶锦鸡儿 559
狭叶獠牙菜 954
狭叶藤五加 833
狭叶藜芦 1401
狭叶糯米团 198
狭叶露珠草 819
狭舌毛冠菊 1323
狭序唐松草 347
狭纹虎鲨 1644
狭颈鳞毛蕨 117
狭果茶藨 487

狭齿斑种草 1033
狭包紫菀 1261
狭苞鸢尾 1316
狭齿水苏 1112
狭果藻科 8
狭冠长蒴苣苔 1185
狭翅铁角蕨 109
狭翅蝗螂 1612
狭基线纹香茶菜 1078
狭基巢蕨 110
狭盔高乌头 310
狭距紫堇 432
狭眼凤尾蕨 91
狭绿叶线蕨 126
狭萼白透骨消 1072
狭萼鬼吹箫 1199
狭裂太行铁线莲 327
狭德舌唇兰 1557
狭穗景天 462
狭穗阔蕊兰 1554
狭瓣虎耳草 489
狭瓣粉条儿菜 1364
独一味 1082
独一味属 1082
独山瓜馥木 271
独山香草 913
独龙小檗 361
独叶草 341
独叶草属 341
独行千里 444
独行菜 453
独行菜属 453
独花兰 1525
独花兰属 1525
独角仙 1623
独角莲 1481
独尾草 1377
独尾草属 1377
独籽藤 693
独活 863
独活属 862
独根草 482
独根草属 482
独脚金 1153
独脚金属 1153
独蒜兰 1557
独蒜兰属 1557
狮子尾 1479
急流水虱属 1599
盈江南星 1472
弯曲碎米荠 449
弯花紫菀 429
弯花筋骨草 1056
弯茎还阳参 1283
弯刺蔷薇 524
弯齿盾果草 1039
弯果杜鹃 890
弯柱丽松草 352
弯梗拉拉藤 997
弯距凤仙花 686
弯颈象属 1626
弯喙乌头 302
弯喙慈姑 1358
弯管花 992
弯管花属 992
弯蕊开口箭 1401
挛花蟛蜞菊 1355
亮毛杜鹃 893
亮叶小蜡 941
亮叶中南鱼藤 568
亮叶冬青 691
亮叶蛋漆树 595
亮叶忍冬 1203
亮叶茉莉 938
亮叶桦 168
亮叶黄瑞木 411
亮叶雀梅藤 717
亮叶崖豆藤 587
亮绿苔草 1487
度量草属 945
庭藤 579
疣吻沙蚕 1592
疣吻沙蚕属 1592
疣尾蜥虎 1705
疣枝小檗 362
疣果豆蔻 1507
疣果冷水花 205
疣草 1429
疣荔枝螺 1575
疣柄南星 1471
疣柄魔芋 1467
疣螈属 1695
疣鼻天鹅 1718
宣威乌头 307
突节老鹳草 612
突吻鱼属 1666
突背蛛龟 1623
突脉金丝桃 423
突隔梅花草 483
突厥益母草 1084
穿山甲 1750
穿山甲科 1750
穿山甲属 1750
穿心草 946
穿心草属 946
穿心莲 1165
穿心莲属 1165
穿心莲子蕨 1208
穿心藤 1468
穿龙薯蓣 1414
穿叶眼子菜 1362
穿鞘花 1427
穿鞘花属 1427
穿鞘菠萝 1397
窃衣 880
窃衣属 879
穹隆苔草 1488
闽江扁尾藻 1667
闽浙马尾松 70
闽粤千里光 1337
闽赣长蒴苣苔 1185
闽赣葡萄 729
姜 1514
姜三七 1513
姜花 1511
姜花属 1511
姜状三七 843
姜味草 1089
姜味草属 1089
姜科 1501
姜黄 1510
姜黄属 1509
姜属 1513
美人蕉 1516
美人蕉科 1515
美人蕉属 1515
美小膜盖蕨 123
美山矾 931
美山姜 1502
美头火绒草 1312
美观马先蒿 1144
美观复叶耳蕨 114
美观糙苏 1097
美形金钮扣 1344
美花风毛菊 1333
美花石斛 1534
美花米饭花 887
美花兔尾草 604
美花草属 319
美花铁线莲 330
美丽小檗 354
美丽马尾杉 71
美丽马酔木 688
美丽贝母 1378
美丽乌头 308
美丽芍药 403
美丽列当 1195
美丽芙蓉 741
美丽枝胡菌 26
美丽岩黄芪 578
美丽金丝桃 421
美丽茶藨 486
美丽胡枝子 583
美丽秋海棠 778
美丽复叶耳蕨 113
美丽桐 1159
美丽桐属 1159
美丽通泉草 1140
美丽唐松草 351
美丽崖豆藤 588
美丽猕猴桃 407
美丽蓝钟花 1233
美丽獐牙菜 954
美丽鳞毛蕨 117
美味牛肝菌 43
美味红菇 46
美味猕猴桃 405
美果九节 1013
美国山核桃 159
美国凌霄 1160
美饰悬钩子 536
美冠兰 1539
美冠兰属 1539
美脉藁木 866
美洲大蠊 1610
美洲商陆 234
美洲绿柳 935
美洲葡萄 730
美容杜鹃 890
美登木 701
美登木属 701
美繁蕊 427
美蔷薇 524
美穗草 1158
类乌齐乌头 306
类北葱 1367
类叶升麻 312
类叶升麻属 312
类头状花序薯草 1498
类芦 1450
类芦属 1450
类钩藤 1021
类鸭趾草凤仙花 684
前胡 872

前胡属 871
前颌间银鱼 1654
首阳小檗 356
总花扁核木 520
总花蓝钟花 1232
总序香茶菜 1079
总序菊 1278
总状土木香 1306
总状山矾 930
总状丛菔 458
总状绿绒蒿 441
总状蕨溪 7
总梗女贞 940
总梗委陵菜 518
炮仗竹 1150
炮仗竹属 1150
炮仗花 1163
炮仗花属 1163
泡囊花属 1388
洁河香菇 37
洁蚓螈属 1623
洒金珊瑚 826
洪雅犁头尖 1481
洱源土桔梗 246
洱源蚌子草 247
洱源香花草 1103
浓紫龙眼独活 835
独斑扁蝙虎 1597
活血丹 1072
活血丹属 1072
洞穴丽蛛 1584
洛氏鲟 1663
洛氏鱼属 1756
洋虫 1625
洋虫属 1625
洋吊钟 464
洋芋 520
洋金花 1119
洋须水蛭属 1566
洋铁酸模 234
洋常春藤 839
洋梨 521
洋葱 1365
洋紫荆 553
沃斯乌龟 638
染用卫矛 700
神仙对座草 628
神农架风仙花 685
神农架唇柱苣苔 1183
神农梢鳃虎鱼 1684
神香草 1075
神香草属 1075
神黄豆 560
扁平蛛网海胆 1641
扁叶刺芹 860
扁头哈那鲨 1643
扁竹兰 1419
扁江篱 17
扁形鸢尾 1422
扁杆藨草 1498
扁豆 571
扁豆属 571
扁尾海蛇属 1710
扁担杆 734
扁担杆属 734
扁担藤 727
扁茎马兜铃 393
扁茎灯心草 1424
扁茎黄芪 550
扁枝石松 71
扁枝石松属 71
扁枝槲寄生 216
扁刺蔷薇 527
扁蒴藤 173
扁刺蔷薇 528
扁果草属 341
扁柄黄堇 433
扁轴木 593
扁轴木属 593
扁济苔 6
扁莎属 1496
扁桃 497 668
扁核木 520
扁核木属 519
扁盘鹅掌柴 845
扁颌针鱼属 1670
扁鲨科 1647
扁鲨属 1647
扁穗冰拂草 1493
扁蓄 952
扁蓄属 952
扁穗莎草 1490
屏山小檗 360
屏边三七 843
屏边黄芩 1106
眉豆 608
眉溪属 4
迷肉苁蓉 1195
迷果芹 879
迷果芹属 879
迷路草蛛 1597
费菜 468
费菜属 468
费赖斯鬼伞 42
孩儿参 245
孩儿参属 244
孩儿草 1173
孩儿草属 1172
除虫菊 1326
娃儿藤 989
娃儿藤属 988
姥鲨 1644
姥鲨科 1644
姥鲨属 1644
姚蚓 1631
怒江红山茶 413
怒江冷水花 204
怒江枇杷 508
贺兰山南芥 446
贺兰山翠雀花 334
蚤草 1326
蚤草属 1326
蚤缀 239
蚤缀属 238
柔毛小檗 360
柔毛山矾 932
柔毛山黑石 571
柔毛女贞 939
柔毛五加 832
柔毛水杨梅 510
柔毛艾纳香 1268
柔毛龙眼独活 836
柔毛地鼠尾 1103
柔毛蔷草 1016
柔毛鸦胆子 657
柔毛秋海棠 780
柔毛葛菜 769
柔毛蛇葡萄 721
柔毛崖爬藤 726
柔毛淫羊藿 366
柔毛绣球 480
柔毛喜阴虫 1600
柔毛紫花堇菜 768
柔软石韦 137
柔垂缘草 1218
柔鱼科 1589
柔斑种草 1033
绒毛山蚂蝗 570
绒毛干屈菜 799
绒毛无患子 679
绒毛石楠 514
绒毛叶黄花木 594
绒毛阴地蕨 78
绒毛羽叶参 844
绒毛河子 818
绒毛杭子梢 556
绒毛木蓝 261
绒毛钩藤 288
绒毛胡枝子 584
绒毛粉背蕨 94
绒毛润楠 295
绒毛野桐 635
绒毛葡萄 731
绒毛紫薇 799
绒毛蔓星草 1344
绒叶斑叶兰 1541
绒仙人球 263
绒白乳菇 45
绒拟革盖菌 29
绒柄松塔牛肝菌 44
绒背蓟 1279
绒球蠹属 1604
绒紫堇 82
绒螯蟹属 1606
绢壮飘拂草 1494
结香 755
结香属 755
络石 971
络石属 970
络石藤 970
络新妇 1597
绞股蓝 785
绞股蓝属 784
经甫树蛙 1698
绳车轴草 603
骆驼刺 547
骆驼刺属 547
骆驼科 1770
骆驼属 1770
骆驼蓬 616
骆驼蓬属 616
骆驼蒿 616
骆驼蹄草 616


## 十 画


艳山姜 1505
艳丽瓜唇兰 1518
秦巴北鲵 1694
秦艽 948
秦皮连翘 934
秦岭小檗 356
秦岭北玄参 1152
秦岭白蜡树 934

秦岭当归 850
秦岭冷杉 142
秦岭沙参 1225
秦岭附地菜 1040
秦岭雨蛙 1697
秦岭岩白菜 474
秦岭柴胡 853
秦岭党参 1232
秦岭铁线莲 329
秦岭藁 1256
秦岭翠雀花 336
秦岭耧斗菜 317
秦岭藤 973
秦岭藤属 973
秦山前胡 872
秦国杠果 668
素花党参 1231
素馨花 937
素馨属 936
珠子木 636
珠子木属 636
珠子参 842
珠子草 637
珠母贝属 1582
珠仔树 932
珠母贝 1582
珠母珍珠蚌 1584
珠光香青 1245
珠芽艾麻 198
珠芽佩天 468
珠芽蓼 230
珠形无齿蚌 1584
珠带拟蟹守螺 1574
珠蚌属 1585
珠海龙 1673
珠颈斑鸠 1730
珠蕨科 63
珙桐科 826
珙桐属 826
珠梅 826
拔秧泡 531
都丽菊 1294
都丽菊属 1294
盐水 1787
盐生车前 1198
盐生肉苁蓉 1195
盐生草 255
盐生草属 255
盐地风毛菊 1332
盐角草 256
盐角草属 256
盐肤木 669
盐肤木属 669
盐津木莲 268
盐卤 1787
盐蒿 1252
盐源双蝴蝶 957
壶蕨科 62
起绒飘拂草 1493
赶山鞭 421
换锦花 1408
热河黄精 1393
热带灵芝 31
葛若 1119
莲 386
莲子草 259
莲子草属 258
莲叶点地梅 910
莲叶秋海棠 780
莲叶桐 299
莲叶桐科 299
莲叶桐属 299
莲叶蓼吾 1317
莲状绢毛菊 1344
莲座叶通泉草 1139
莲座叶紫金牛 904
莲座革菌 25
莲座蚁 1277
莲属 386
莲蕊藤 378
莲蕊藤属 378
荸荠 1491
荸荠属 1491
庄芒决明 561
蔚萝 847
蔚萝属 847
蔚参蓼 1248
莴苣 1310
莴苣属 1310
莴笋花 1509
莪术 1509
莰 1046
莰状黄芩 1107
莰属 1045
荷叶铁线蕨 98
荷包山桂花 662
荷包牡丹 438
荷包牡丹属 438
荷包藤 426
荷包藤属 426
荷花玉兰 266
荷青花 439
荷青花属 439
荷苞地不容 380
荷秋藤 983
荷莲豆草 242
荷莲豆属 242
莓叶委陵菜 516
莓叶铁线莲 331
莲子蕨 1208
莲子蕨属 1208
荻 1449
莠竹属 1449
莠狗尾草 1457
莜麦 1436
莎车柽柳 777
莎草科 1486
莎草属 1489
莎草蕨 85
莎草蕨科 85
莎草蕨属 85
菟菜 385
菟菜属 385
索氏蝗蝻 1612
索沙蚕属 1592
索蚰蜓 1607
真五角海星 1638
真海豚 1758
真海豚属 1758
真蛸 1591
真蕨 62
真蕨科 62
真蕨属 62
真鲷 1679
真鲷属 1679
真鲨科 1646
真鲨属 1646
真燕鳐 1672
真燕鳐属 1672
桔 644
桔红山楂 505
桔草 1440
桔黄醫粟 443
桔梗 1236
桔梗科 1222
桔梗属 1236
根口水母科 1567
栝楼 794
栝楼属 793
桉叶悬钩子 530
桉属 802
桩菇科 42
桩菇属 42
桂木 183
桂木属 183
桂苦绣球 481
桂皮斑鲆 1689
桂皮紫菜 82
桂竹 1453
桂竹香 450
桂竹香属 450
桂华鲛 1665
桂花 942
桂枝素馨 937
桂林唇柱苣苔 1180
桂林槭 674
桂南木莲 265
桂南地不容 382
桂枝术 1509
桂樱属 510
桂黔吊石苣苔 1188
桐叶千金藤 381
桐棉 745
桐棉属 745
桃 497
桃儿七 370
桃儿七属 370
桃叶卫矛 697
桃叶杜鹃 889
桃叶珊瑚 826
桃叶珊瑚属 826
桃叶鸦葱 1335
桃叶蓼 228
桃色珊瑚 1569
桃红牛肝菌 43
桃红颈天牛 1626
桃金娘 804
桃金娘科 801
桃金娘属 804
桃属 497
桃褐天牛 1626
核子木 702
核子木属 702
核盘菌 22
核盘菌科 22
核盘菌属 22
桦木科 166
桦木属 167
桦叶荚蒾 1208
桦叶葡萄 729
桦革裥菌 32
桦滴孔菌 33
桤木 166
桤木属 166 1194

短叶黄花稔 744
格梾 507
格梾属 506
栓叶安息香 930
栓皮栎 178
栓果菊属 1311
栓翅卫矛 699
栓翅爬山虎 725
栓菌属 34
栅子属 502
梔药竹 416
梔脉黄精 1393
梔姜 801
梔部 1460
梔部属 1460
梔叶金发藓 67
梔岛衣 57
梔仁滑蜥 1705
梔春火麻树 195
梔 172
梔果 172
果毛纯实寄生 213
栗色黄鹂 1737
栗色鼠尾草 1103
栗苷鸦 1715
栗豆藤 543
栗豆藤属 543
栗柄凤尾蕨 93
栗柄金粉蕨 95
栗寄生 212
栗寄生属 212
栗属 171
豇豆 608
豇豆树 1163
豇豆属 607
翅子瓜 797
翅子瓜属 797
翅子罗汉果 790
翅子树 750
翅子树属 750
翅子藤科 704
翅风毛菊 1327
翅叶木 1163
翅叶木属 1163
翅托叶野百合 564
翅序火筒树 732
翅茎白粉藤 724
翅茎吊石苣苔 1189
翅茎灯心草 1424
翅茎草属 1149
翅茎蜂斗菜 814
翅果耳草 1002
翅果菊 1324
翅果菊属 1323
翅果麻 742
翅果麻属 742
翅果藤 985
翅果藤属 985
翅荚决明 560
翅荚香槐 563
翅柃 415
翅轴蹄盖蕨 101
翅梗石斛 1536
翅萼石斛 1532
翅藻科 10
夏天无 429
夏至草 1082
夏至草属 1082
夏赤蜻 1610
夏枯草 1100
夏枯草属 1099
夏侧金盏花 312
夏蜡梅 281
夏蜡梅属 281
夏飘拂草 1493
砾玄参 1152
砾地毛茛 345
破布木 1033
破布木属 1033
破布叶 735
破布叶属 735
破铜钱 864
砷化物合类 1788
砷华 1789
唇形科 1056
唇足纲 1607
唇兜石斛 1532
唇萼苣苔 1193
唇萼苣苔属 1193
唇柱苣苔属 1180
唇香草 1116
唇鲛属 1665
唇鳃 1661
原生动物门 1565
原尾蜥虎 1704
原鸡 1723
原鸡属 1723
原始观音座莲属 82
原索动物门 1641
原鸽 1730
原羚属 1777
原鳃属 1670
原麝 1773
匿芒草草 1435
柴达木风毛菊 1331
柴胡 851
柴胡属 851
柴首 851
柴桂 286
柴黄姜 1414
紧穗篇蓄 221
党参 1230
党参属 1228
鸭儿芹 859
鸭儿芹属 859
鸭巴前胡 849
鸭公树 297
鸭舌草 1417
鸭科 1716
鸭脚茶 809
鸭跖草 1427
鸭跖草科 1427
鸭跖草属 1427
鸭属 1716
鸭嘴花 1164
鸭嘴花属 1164
鸦属 1741
鸳鸯 1731
鸳鸯科 1713
鸳鸯属 1713
鸱鸮科 1731
鸳鸯 1716
鸳鸯属 1716
鸳鸯茉莉 1117
鹌乳纲 1745
蚌壳蕨科 87
蚌科 1584
蚬壳花椒 654
蚬科 1586
蚬属 1586
蚧科 1617
蚊子草 508
蚊子草属 508
蚊母草 1157
蚊母树 459
蚊母树属 459
蚍黎勒 818
峦岗唇柱苣苔 1181
峨蛤小檗 357
峨参 850
峨参属 850
峨屏草 491
峨屏草属 491
峨眉山虹 1631
峨眉飞蛾槭 674
峨眉开口箭 1401
峨眉五味子 277
峨眉贝母 1380
峨眉风轮菜 1061
峨眉风仙花 686
峨眉牛皮消 977
峨眉牛蹄细辛 399
峨眉手参 1542
峨眉勾儿茶 710
峨眉双蝴蝶 957
峨眉石杉 69
峨眉耳蕨 120
峨眉当归 849
峨眉过路黄 916
峨眉观音座莲 81
峨眉报春 919
峨眉附地菜 1040
峨眉忍冬 1205
峨眉青荚叶 830
峨眉金线兰 1518
峨眉韭 1366
峨眉细圆藤 379
峨眉冠唇花 1090
峨眉香科科 1113
峨眉姜 1514
峨眉桃叶珊瑚 826
峨眉唐松草 350
峨眉海桐 494
峨眉黄肉楠 282
峨眉黄芩 1109
峨眉雪胆 786
峨眉野连 333
峨眉越橘 898
峨眉紫楠 298
峨眉蔷 1251
峨眉橄 736
峨眉鼠尾草 1103
峨眉蔷薇 527
峨眉蜡瓣花 459
峨眉蜘蛛抱蛋 1373
峨眉舞花姜 1510
峨眉獐牙菜 955
峨眉翠雀花 337
峨眉繁缕 250
峨眉藜芦 1401
圆口纲 1643
圆马陆科 1608
圆田螺属 1572
圆叶小堇菜 769

圆叶乌头 309
圆叶乌桕 639
圆叶乌蔹莓 724
圆叶节节菜 800
圆叶石豆兰 1521
圆叶西番莲 773
圆叶牡鹃 894 896
圆叶佛甲草 469
圆叶茅膏菜 426
圆叶南蛇藤 693
圆叶牵牛 1030
圆叶娃儿藤 989
圆叶榉 169
圆叶财发椿 293
圆叶野扁豆 572
圆叶锦葵 743
圆叶鼠李 715
圆叶舞草 563
圆叶薄荷 1088
圆头蒿 1257
圆头楔蚌 1585
圆耳紫菀 1262
圆舌粘冠草 1320
圆吻鮈 1666
圆角仿鲿 1617
圆尾斗鱼 1685
圆顶珠蚌 1585
圆苞地花 28
圆苞紫菀 1261
圆茎翅茎草 1149
圆枝卷柏 75
圆刺蛸马陆属 1608
圆齿火麻树 195
圆齿狗娃花 1303
圆果三角叶酸藤 1412
圆果化香树 161
圆果甘草 576
圆果冷水花 204
圆果罗伞 901
圆果雀稗 1451
圆柱石仙桃 1556
圆柱钗子股 1549
圆柱柳叶菜 821
圆柱根老鹳草 612
圆柏 151
圆柏属 151
圆背角无齿蚌 1584
圆冠榆 181
圆唇苣苔 1186
圆唇苣苔属 1186
圆鸵鳉 1682
圆盖阴石蕨 124
圆萼刺参 1220
圆紫菜 13
圆蛛科 1596
圆蛛属 1596
圆锥山蚂蝗 569
圆锥乌头 306
圆锥石头花 243
圆锥茶河魏 861
圆锥蔓花 757
圆锥南芥 447
圆锥柯 175
圆锥铁线莲 331
圆锥绣球 480
圆锥醉鱼草 1131
圆滑番荔枝 270
圆鳞属 1677
圆穗蓼 226
圆瓣姜花 1511
圆瓣冷水花 201
钱贯草 1198
铁 1781
铁刀木 561
铁力木 424
铁力木属 424
铁马鞭 584 713
铁化合物类 1781
铁仔 908
铁仔属 908
铁冬青 691
铁包金 710
铁扫帚 579
铁芒萁 84
铁灯兔儿风 1242
铁苋菜 618
铁苋菜属 618
铁梗花蚜 1617
铁杉 148
铁杉灵芝 31
铁杉属 148
铁坚油杉 143
铁钉菜 8
铁钉菜科 8
铁钉菜属 8
铁角蕨 109
铁角蕨科 107
铁角蕨属 107
铁青树科 208
铁钓竿 1159
铁线子属 926
铁线莲 324
铁线莲属 321
铁线蕨 96
铁线蕨科 96
铁线蕨属 96
铁草鞋 983
铁轴草 1114
铁尿米 991
铁破锣属 319
铁海棠 629
铁梗报春 922
铁棒锤 308
铁筷子 340
铁筷子属 340
铃了香属 1060
铁箍散 278
铁藤 376
铃兰 1375
铃兰属 1375
铃铃香青 1245
铃铛子 1116
铃蟾属 1695
铅色水蛇 1708
铅色东方鲀 1691
铅色灰球菌 49
钳蛤科 1581
钳蝎科 1595
钳蝎属 1595
钻天杨 164
钻天柳 162
钻天柳属 162
钻地风 491
钻地风属 491
钻形紫菀 1262
钻顶羽瓣菌 26
钻等唇柱苣苔 1182
铆钉菇 43
铆钉菇科 43
铆钉菇属 43
钵水母纲 1566
钾化合物类 1786
缺顶杜鹃 891
缺苞香蒲 1485
缺齿鳊羽贯众 114
缺齿鳞 1746
缺齿鳞属 1746
缺瓣重楼 1390
透石膏 1784
透闪石 1783
透茎冷水花 204
透明鸢根草 1011
透明鳞荸荠 1492
透骨草 1197
透骨草科 1197
透骨草属 1197
通天连 989
通奶草 627
通光散 964
通城虎 394
通俗环毛蚓 1593
通泉草 1139
通泉草属 1139
通脉丹 989
通脱木 846
通脱木属 846
积雪草 857
积雪草属 857
逍遥馒头蟹 1604
秧鸡科 1727
秧鸡属 1727
秤钩风 377
秤钩风属 377
秤仟树 908
蚕豆 606
蚕豆属 605
蚕茧草 225
蚕属 1629
笋兰 1560
笋兰属 1560
笋螺螺 1574
笔龙胆 952
笔罗子 681
笔管草 77 1334
笔管榕 190
倒心叶珊瑚 827
倒地铃 676
倒地铃属 676
倒吊笔 972
倒吊笔属 972
倒卵叶山龙眼 207
倒卵叶伏石蕨 128
倒卵叶黄肉楠 282
倒卵叶黄花稔 744
倒卵叶野木瓜 373
倒卵叶旌节花 772
倒卵叶紫麻 200
倒披针叶红景天 468
倒披针叶萝芙木 969
倒苞半耳蒜 1547
倒刺鲃 1665
倒刺鲃属 1665
倒挂树萝卜 884
倒挂铁角蕨 108

倒挂藤 635
倒根蕨 227
倒提壶 1033
倾卧兔耳草 1135
候氏猬 1746
倍蛋蚓 1617
倍蛋蚓 1617
俯垂马先蒿 1142
徐长卿 978
悦人杜鹃 891
悦目黄金珠 1597
臭红菇 46
臭牡丹 1046
臭冷杉 143
臭阿魏 861
臭茉莉 1048
臭英蓼 1209
臭草 1449
臭草属 1449
臭茶藨 486
臭蚤草 1326
臭党参 1229
臭黄荆 1051
臭菘 1480
臭菘属 1480
臭常山属 650
臭蒿 1252
臭椿 656
臭辣吴萸 647
臭檀吴萸 647
射干 1417
射干属 1417
射毛悬竹 1435
射线裂谷蚌 1585
射脉菌 26
射脉菌属 26
拿嘎尾药千里光 1346
拳参 221
脊条虾蛄 1603
脊尾白虾 1602
脊突苔虫 1636
脊蛇属 1706
脊椎动物门 1643
脊椎动物 1643
豹 1766
豹皮樟 291
豹灯蛾 1609
豹纹东方鲀 1692
豹纹鲨 1645
豹纹鲨属 1645
豹药藤 977
豹猞 1765
豹猫 1766
豺 1760
豺属 1760
胶勺 25
胶东卫矛 697
胶皮枫香树 461
胶质干朽菌 27
胶质鼠尾草 1101
胶须藻科 4
胶蚧科 1618
胶蚧属 1618
脆兰属 1517
脆江篱 17
脆杆藻科 11
脆针海绵 1565
脆轮藻 8
脆果山姜 1503
脆蛇蜥 1706
脆蛇蜥属 1706
脉痣草 1095
脉痣草属 1095
腿木 973
腻脂花 921
饿蚂蝗 570
猬藻科 1196
猬藻属 1196
狼 1760
狼牙委陵菜 516
狼牙鳜虎鱼属 1685
狼爪瓦松 464
狼把草 1266
狼尾花 911
狼尾草 1451
狼尾草属 1451
狼毒 756
狼毒大戟 629
狼毒属 756
狼紫草 1037
狼紫草属 1037
留兰香 1088
皱木耳 25
皱叶冬青 689
皱叶安息香 930
皱叶忍冬 1204
皱叶委陵菜 515
皱叶狗尾草 1457
皱叶荚蒾 1213
皱叶香茶菜 1080
皱叶铁线莲 332
皱叶海桐 492
皱叶黄杨 705
皱叶雀梅藤 717
皱叶鹿蹄草 882
皱叶酸模 233
皱叶醉鱼草 1129
皱皮木瓜 501
皱皮鼠李 716
皱边石杉 69
皱红螺 1576
皱花细辛 399
皱纹盘鲍 1571
皱纹嗜粘液蛞蝓 1579
皱苞苔草 1487
皱果赤瓟 791
皱果苋 260
皱果鸡血藤 588
皱果蛇莓 507
皱面草 1085
皱波黄堇 428
皱脉灰叶南蛇藤 692
皱疤坚螺 1579
皱唇鲨 1646
皱唇鲨科 1645
皱梅衣 57
皱盖乌芝 28
皱稃雀稗 1451
皱褶栓菌 35
座头鲸 1758
唐古红景天 465
唐古拉翠雀花 338
唐古特大黄 232
唐古特忍冬 1205
唐古特轮叶马先蒿 1146
唐松草 347
唐松草属 347
唐菖蒲 1418
唐菖蒲属 1418
唐棣属 496
疼腿树 208
离舌蒿吾 1319
离根草 1237
离根香属 1237
离瓣寄生 211
离瓣寄生属 211
劳杞木 816
高大沟酸浆 1141
高大兔耳草 1135
高大翅果菊 1324
高大鹿药 1395
高山丁香花 1402
高山三尖杉 154
高山大黄 251
高山大戟 630
高山木姜子 291
高山瓦韦 129
高山贝母 1379
高山乌头 306
高山石竹 241
高山龙胆 948
高山地榆 537
高山芹 858
高山芹属 858
高山豆 603
高山豆属 603
高山沙参 1223
高山松 146
高山韭 1368
高山柏 152
高山栎 177
高山柳叶菜 820
高山点地梅 910
高山扁枝石松 71
高山唐松草 347
高山粉条儿菜 136
高山贡华 602
高山紫菀 1260
高山蓝盆花 1221
高山薯 1238
高山锥 172
高山鼠兔 1751
高山榕 186
高山蔷薇 1413
高山翠雀 241
高山露珠草 819
高乌头 309
高丛珍珠梅 538
高地鼯鼠 1754
高网膜籽 1003
高杆蓼草 1486
高体鳞鲛 1664
高良姜 1504
高环柄菇 37
高顶鳞皮蚌 1585
高泉藨 486
高枝小米草 1134
高岭石 1790
高秆珍珠茅 1499
高盆樱桃 499
高原山鹑 1725
高原天名精 1273
高原毛茛 346
高原鸢尾 1419

高原酒草 1015
高原苎麻 206
高原南星 1472
高原香薷 1068
高原松草 348
高原早头尖 1481
高原蝇 1711
高原轮 246
高原山景天 471
高原千金藤 383
高原鼠耳蝠 1747
高粱条螈 1628
高粱泡 533
高粱黑粉菌 23
高粱属 1457
高斑叶兰 1540
高超马先蒿 1143
高寒露珠草 819
高鼻羚羊 1778
高鼻羚羊属 1778
高穗报春花 923
高树 678
高树属 677
宽口光唇鱼 1658
宽叶水柏枝 775
宽叶石防风 872
宽叶白花堇菜 768
宽叶母草 1138
宽叶吊石苣苔 1189
宽叶红门兰 1552
宽叶谷精草 1433
宽叶羌活 868
宽叶苔草 1489
宽叶金粟兰 391
宽叶金锦香 811
宽叶乳浆大戟 626
宽叶油点草 1399
宽叶韭 1366
宽叶毒芹 858
宽叶荨麻 206
宽叶柳兰 818
宽叶香蒲 1485
宽叶重楼 1391
宽叶独行菜 454
宽叶秦岭藤 973
宽叶雀节花 771
宽叶粗榧 155
宽叶紫茉 83
宽叶楼梯草 197
宽叶谁花 1073
宽叶腹水草 1158
宽叶鼠曲草 1298
宽叶黄乌头 309
宽叶蔓茎蝇子草 247
宽叶缬草 1218
宽边观音座莲 81
宽伞紫菀 1259
宽羽线蕨 127
宽芹叶铁线莲 322
宽吻海豚 1758
宽体舌鳎 1690
宽体金线蛭 1594
宽卵叶山蚂蝗 569 595
宽纹虎鲨 1644
宽苞十大功劳 368
宽苞水柏枝 774
宽苞棘豆 592
宽苞翠雀花 337
宽刺蔷薇 527
宽齿青兰 1064
宽果丛蕨 457
宽果紫堇 431
宽线叶蒙古糖芥 453
宽药青藤 299
宽药隔玉凤花 1543
宽柄铁线莲 329
宽带蕨 134
宽带蕨属 134
宽翅香青 1245
宽唇角盘兰 1544
宽唇神香草 1075
宽萼珠毛苣苔 1191
宽萼翠雀花 338
宽戟囊吾 1317
宽裂龙蒿 1250
宽附陇带马陆 1608
宽管花 1071
宽管花属 1071
宽褶蘑 40
宽鳍鱲 1666
宽穗兔儿风 1242
宽瓣金莲花 352
宽瓣重楼 1391
家马蜂 1634
家犬 1759
家白蚁 1612
家白蚁属 1612
家鸡 1723
家兔 1752
家独行菜 454
家鸭 1716
家蚕 1629
条蚕蛾属 1629
家隅珠 1597
家鸽 1729
家猫 1765
家猪 1770
家鹅 1717
家蝇 1632
家蝇属 1632
家蝠 1747
家燕 1736
家薄荷 1088
窄叶大戟 626
窄叶半枫荷 750
窄叶尾花细辛 398
窄叶败酱 1215
窄叶泽泻 1357
窄叶南蛇藤 693
窄叶柃 417
窄叶蚊母树 460
窄叶野豌豆 605
窄叶紫珠 1042
窄叶蓝盆花 1221
窄叶聚花海桐 492
窄叶酸模 234
窄头鳢吾 1318
窄竹叶柴胡 854
窄体舌鳎 1690
窄序岩豆树 587
窄基红褐柃 417
窄萼凤仙花 686
窄附陇带马陆 1608
窄瓣鹿药 1395
瓶尔小草 80
瓶尔小草科 79
瓶尔小草属 79
瓶蕨 86
瓶蕨属 86
粉口兰 1553
粉口兰属 1553
粉末牛肝菌属 44
粉叶玉凤花 1543
粉叶小檗 360
粉叶玉簪 1384
粉叶羊蹄甲 552
粉叶轮环藤 376
粉叶沿阶草 1390
粉叶柿 927
粉叶栒子 503
粉叶黄花草莓 509
粉叶新木姜子 296
粉白杜鹃 892
粉团 1212
粉团蔷薇 526
粉防己 383
粉红动蕊花 1081
粉红花裕民贝母 1379
粉红杜鹃 892
粉花月见草 823
粉花实息香 930
粉花栝楼 796
粉花绣球菊 541
粉杆红石蕊 55
粉条儿菜属 1363
粉条儿菜 1364
粉苹婆 751
粉枝莓 529
粉杯红石蕊 55
粉刺锦鸡儿 559
粉质马兜铃 397
粉单竹 1437
粉树花 59
粉背南蛇藤 692
粉背黄栌 667
粉背溲疏 477
粉背蕨 94
粉背蕨属 93
粉背薯蓣 1412
粉迷孔菌 29
粉黄袋梅衣 58
粉菝葜 1397
粉绿垂果南芥 447
粉绿钻地风 491
粉绿藤 378
粉绿藤属 378
粉斑梅衣 58
粉缘铁线莲 325
粉椴 736
粉蝶科 1630
粉瘤菌 19
粉瘤菌属 19
粉藤果 724
粉蠹科 1622
粉蠹属 1622
益母草 1083
益母草属 1083
益智 1504
烙铁头 1712
烙铁头属 1711
烟叶长蒴苣苔 1180
烟台腹蛤 1588
烟台翠雀花 335
烟台瓢拂草 1494

烟色红菇 46
烟色烟筒菌 28
烟草 1121
烟黄色纤孔菌 32
烟草属 1121
烟筒花 1162
烟筒花属 1162
烟管头草 1273
烟管鱼科 1672
烟管鱼属 1672
烟管羌活 1214
烟管菌属 28
烟筒蓟 1278
浆果乌柏 638
浆果苋 260
浆果苋属 260
浆果苔草 1486
浆果楝 659
浆果楝属 659
凌云南星 1472
凌云重楼 1390
凌霄花 1160
准噶尔大戟 629
准噶尔山楂 506
准噶尔马先蒿 1143
准噶尔毛蕊花 1154
准噶尔乌头 310
准噶尔沙枣 758
准噶尔阿魏 861
准噶尔鸢尾 1421
准噶尔岩黄芪 976
准噶尔金莲花 353
准噶尔鸦葱 1335
准噶尔前胡 871
准噶尔铁线莲 331
准噶尔蝇子草 247
准噶尔葶苈 1318
溃缓菊 1271
溃缓菊属 1271
凉山马兜铃 395
凉山开口箭 1401
凉山乌头 306
凉山虫草 20
凉山悬钩子 531
凉山银莲花 315
凉粉草 1089
凉粉草属 1089
凉喉茶 1002
酒饼簕 642
酒饼簕属 642
浙山蚕 1609
浙贝母 1381
浙江七叶树 680
浙江虎耳草 912
浙江红山茶 411
浙江铃子香 1060
浙江蛇麻 198
浙江槐蓝 579
浙江木姜子 296
浙江獐牙菜 956
浙皖丹参 1103
海皖粗筒苔草 1179
涡螺科 1577
海人草 18
浙人草属 18
海门冬 13
海门冬属 13
海马属 1673
海月 1583
海月水母 1566
海月水母属 1566
海月哈科 1583
海月属 1583
海风藤 390
海龙科 1673
海龙属 1673
海仙人掌 1569
海仙人掌属 1569
海边乌兜铃 397
海芋 1466
海芋属 1466
海州香薷 1070
海州常山 1049
海红豆 546
海红豆属 546
海芙蓉 924
海杞果 963
海杞果属 963
海底水虱属 1599
海龟 1701
海龟科 1701
海龟属 1701
海岛轮环藤 376
海岛延胡索 434
海岛棉 740
海枫藤 983
海金子 493
海金沙 85
海金沙科 85
海金沙属 85
海乳草 911
海乳草属 911
海狗 1767
海狗属 1767
海参纲 1636
海参科 1636
海参属 1637
海韭菜 1361
海南三七 1512
海南大风子 763
海南马兜铃 394
海南五针松 146
海南风吹楠 274
海南叶下珠 637
海南冬青 687
海南地不容 381
海南地黄连 660
海南吊石苣苔 1188
海南买麻藤 157
海南杜仲藤 967
海南牡蒿 1253
海南冷水花 204
海南鸡血藤 583
海南苹婆 751
海南坡鹿 1772
海南茄 1127
海南狗牙花 964
海南卷柏 75
海南鼠子 752
海南菝葜 1210
海南草珊瑚 393
海南栀子 998
海南砂仁 1506
海南香花藤 959
海南海金沙 85
海南黄瑞木 411
海南萝芙木 969
海南野扇花 707
海南崖爬藤 726
海南假砂仁 1506
海南粗榧 155
海南深红鸡脚参 1094
海南链珠藤 960
海南越桐 1047
海南蒟 389
海南新樟 296
海南银李 715
海南檀 566
海南翼核果 178
海柏 15
海柏属 15
海鸥 1729
海带 9
海带科 9
海带属 9
海星纲 1637
海胆纲 1639
海兔科 1577
海狮科 1767
海莲 815
海桐叶白英 1127
海桐 495
海桐花科 492
海桐属花 492
海通 1048
海豹科 1767
海桑 806
海桑科 806
海桑属 806
海芋 14
海芋科 14
海芋属 14
海菜花 1360
海菊蛤科 1583
海菊蛤属 1583
海蛇科 1710
海盘车科 1639
海盘车属 1639
海豚科 1758
海康山壳骨 1172
海绵动物门 1565
海葵科 1567
海棠花 512
海蒌子 11
海蜇 1567
海蜇属 1567
海蒿子 11
海榄雌 1040
海榄雌属 1040
海葛菜 4
海葛菜属 4
海蛾鱼 1693
海蛾鱼科 1693
海蛾鱼属 1693
海鮎 1670
海鮎科 1670
海鮎属 1670
海鹏属 1720
海滨车前 1198
海滨藜 252
海榄螺属 1566
海罂粟 439
海罂粟属 439
海螺科 1589

海螵属 1589
海漆 631
海漆属 631
海蕴 8
海蕴属 8
海螵 1710
海螵虱 1710
海燕 1638
海燕科 1638
海燕属 1638
海蝉螂 1601
海蝉螂科 1601
海蝉螂属 1601
海鳃科 1569
海鳗 1656
海鳗科 1656
海鳗属 1656
海鳝科 1656
浮石 1786
浮叶眼子菜 1362
浮萍 1483
浮萍科 1482
浮萍属 1482
仔雕秃乌龄 50
流石风铃草 1226
流苏子 993
流苏子属 993
流苏贝母兰 1527
流苏石斛 1533
流苏龙胆 950
流苏金石斛 1537
流苏树 933
流苏树属 933
流苏虾脊兰 1522
流苏瓣缘黄堇 430
润肺草 974
润肺草属 974
润楠属 294
涩荠 454
涩荠属 454
疳苔 6
疳苔属 5
朗县虎耳草 488
弱小火绒草 1314
展开乌尾杉 71
展毛川鄂乌头 305
展毛乌头 306
展毛地椒 1115
展毛黄草乌 311
展毛野牡丹 810
展毛银莲花 314
展毛鹅掌草 314
展毛短柄乌头 302
展毛翠雀 337
展花乌头 302
展苞灯心草 1426
展枝玉叶金花 1008
展枝过路黄 912
展枝沙参 1222
展枝假木贼 251
展枝唐松草 352
展枝斑鸠菊 1353
展喙乌头 306
展穗砖子苗 1496
扇贝科 1582
扇叶虎耳草 488
扇叶铁线蕨 97
扇形阴地蕨 79
扇形叉枝藻 16
扇苞黄堇 434
扇脉杓兰 1531
扇唇舌喙兰 1544
扇唇羊耳蒜 1548
扇菇属 38
扇蕨 132
扇蕨属 132
被子植物门 158
调料九里香 649
调羹树 208
腰水暗罗 273
陶氏太阳海星 1638
陷脉鼠李 714
陷胸兄弟 1621
勐龙链珠藤 960
姬苗属 945
姬蛙科 1698
姬蛙属 1698
姬啄木鸟 1735
姬蕨 90
姬蕨科 90
姬蕨属 90
姬蠊科 1610
姬蠊属 1610
桑 191
桑天牛 1625
桑科 183
桑寄生 215
桑寄生科 211
桑寄生属 212
桑属 191
绢毛山梅花 485
绢毛乌铃苣苔 1190
绢毛木姜子 294
绢毛石花 1184
绢毛油麻菊 589
绢毛匍匐委陵菜 519
绢毛高翠雀花 336
绢毛绣线菊 543
绢毛菊 1343
绢毛菊属 1343
绢毛蔷薇 527
绢毛蓼 226
绢丝丽蝗 1584
绢蒿属 1339
绢蝶 1631
绢蝶科 1631
绢蝶属 1631
绢藓科 66
绢藓属 66
绣毛金腰 475
绣线菊 542
绣线菊属 540
绣线梅 512
绣线梅属 512
绣球防风 1084
绣球防风属 1084
绣球花 480
绣球荚蒾 1211
绣球茜草 994
绣球茜属 994
绣球绣线菊 540
绣球菌 26
绣球属 479
绣球藤 328
绣眼鸟科 1743
绣眼鸟属 1743
绥阳雪里见 1473

## 十一 画

球子蕨属 1392
球子蕨科 110
球乌毡科 1607
球乌毡属 1607
球兰 982
球兰属 982
球衣藻 4
球花马蓝 1175
球花风毛菊 1329
球花毛麝香 1131
球花豆 593
球花豆属 593
球花党参 1231
球花蒿 1257
球序卷耳 240
球序香蒲 1486
球序鹅掌柴 844
球果赤飑 791
球果牧根草 1226
球果黄堇 433
球果紫堇 435
球果藤 374
球果藤属 374
球药隔重楼 1390
球柱草 1486
球柱草属 1486
球核荚蒾 1213
球海胆科 1640
球菊 1293
球菊属 1293
球蕊五味子 278
球穗山姜 1505
球穗千斤拔 574
球穗花椒 539
球穗香薷 1070
球穗扁莎草 1496
琉璃草 1034
琉璃草属 1033
琉璃繁缕 909
琉璃繁缕属 909
排骨灵 271
排香草 1059
排香草属 1059
排钱草属 593
排钱树 594
探春花 936
接骨木 1207
接骨木属 1206
接骨草 1207
堇叶山梅花 485
堇叶延胡索 434
堇菜 770
堇菜科 765
堇菜属 765
堇紫珊瑚菌 26
勒花椒 653
基及树 1033
基及树属 1033
基心叶冷水花 202
基叶人字果 339
黄七大功劳 368
黄三七 346
黄三七属 346
黄土大戟 628
黄土钙质结核 1786

黄口荔枝螺 1575
黄山木兰 264
黄山五叶参 844
黄山乌头 302
黄山花椒 539
黄山松 147
黄山药 1415
黄山梅 482
黄山梅属 482
黄山溲疏 477
黄山紫荆 562
黄山槭 177
黄山鳞毛蕨 117
黄巨虹 1631
黄瓦韦 129
黄水枝 491
黄水枝属 491
黄水金钩如意 437
黄凤蝶 1630
黄牛 1773
黄牛木 419
黄牛木属 419
黄牛毛蘚 61
黄牛奶树 932
黄毛三叶爬山虎 725
黄毛五月茶 620
黄毛冬青 688
黄毛豆腐柴 1051
黄毛金钟藤 1029
黄毛猕猴桃 405
黄毛粗叶木 1006
黄毛棘豆 592
黄毛楝木 836
黄毛榕 186
黄毛藁吾 1319
黄丹木姜子 292
黄长春花 963
黄长筒石蒜 1408
黄甘草 576
黄龙尾 496
黄龙船花 1004
黄叶儿 565
黄叶耳草 1003
黄白火绒草 1314
黄白卧孔菌 34
黄瓜 783
黄皮 646
黄皮小檗 363
黄皮树 650
黄皮绿金竹 1454
黄皮属 645
黄边大龙虱 1619
黄边胡蜂 1634
黄叶地不容 383
黄兰 269
黄肉楠属 282
黄色蝴蝶草 1153
黄羊 1777
黄花花 753
黄花大包姜 1508
黄花小二仙草 823
黄花小百合 1386
黄花马铃苣苔 1190
黄花木 594
黄花木香 523
黄花木属 594
黄花瓦松 465
黄花乌头 303
黄花石豆兰 1521
黄花石斛 1533
黄花白及 1519
黄花白头翁 344
黄花列当 1196
黄花夹竹桃 962
黄花夹竹桃属 962
黄花尖萼漏斗菜 318
黄花红百合 1385
黄花红妙 776
黄花豹兰 1530
黄花岛衣 57
黄花补血草 924
黄花鸢尾 1423
黄花岩黄芪 578
黄花委陵菜 516
黄花油点草 1399
黄花草 446
黄花草莓 509
黄花香 421
黄花香茶菜 1080
黄花美人蕉 1515
黄花夏至草 1082
黄花鸭跖柴胡 852
黄花铁线莲 326
黄花倒水莲 663
黄花狸藻 1196
黄花粉叶报春 920
黄花烟草 1121
黄花堇菜 771
黄花菜 1382
黄花假升鹊 1166
黄花兜兰 1553
黄花蒿 1248
黄花稔 744
黄花稔属 744
黄花凤尾草 1103
黄芩 1106
黄芩属 1106
黄芦木 354
黄杨 705
黄杨叶芒毛苣苔 1177
黄杨科 704
黄杨属 704
黄杞 160
黄杞属 160
黄牡丹 402
黄连 333
黄连木 669
黄连木属 669
黄连花 913
黄连属 333
黄尾鲴 1666
黄纹石龙子 1705
黄苞南星 1471
黄茅 1445
黄茅属 1445
黄卢闪 173
黄枝珊瑚 26
黄刺条 558
黄刺玫 528
黄刺蛾 1628
黄刺蛾属 1628
黄枝小檗 363
黄果茄 1129
黄果枸杞 1120
黄果悬钩子 536
黄金凤 686
黄金间碧竹 1438
黄金蛛科 1597
黄金蛛属 1597
黄鱼属 1678
黄卷岛衣 57
黄河裸裂尻鱼 1664
黄波罗花 1161
黄帚藁吾 1319
黄孢红菇 46
黄姑鱼 1678
黄姑鱼属 1678
黄细心 235
黄细心属 235
黄荆 1054
黄草乌 311
黄柏 650
黄柏属 650
黄芦属 667
黄背勾儿茶 709
黄背草 1459
黄背越橘 897
黄虹属 1631
黄香草木樨 586
黄秋英 1281
黄盾华丽螺蠃 1633
黄盆花 1221
黄脉九节 1014
黄脉花椒 540
黄鸡 1649
黄独 1411
黄姜花 1511
黄秦艽 958
黄秦艽属 958
黄素馨 936
黄珠子草 638
黄桐 625
黄桐属 625
黄唇鱼 1677
黄唇鱼属 1677
黄铁矿 1781
黄脊竹蝗 1613
黄胸木蜂 1635
黄胸鹀 1745
黄胸鼠 1756
黄粉末牛肝菌 44
黄海葵 1567
黄海葵属 1567
黄球花 1173
黄球花属 1173
黄萤 1620
黄雀 1744
黄雀属 1774
黄常山属 478
黄眼草科 1432
黄眼草属 1432
黄脚三趾鹑 1726
黄麻 734
黄麻属 734
黄斑胡蜂 1634
黄球小檗 356
黄斑海蜇 1567
黄斑蓝子鱼 1681
黄斑竹根模叶藜 225
黄斑鲷 1679
黄葛树 190
黄堇 433
黄类 738
黄鹂科 1736

黄鹅属 1736
黄喉水龟 1699
黄紫堇 432
黄喉鸦 1745
黄蛞蝓 1579
黄链蛇 1707
黄筒花 1196
黄筒花属 1196
黄缘闭壳龟 1700
黄绿花颗鳃贝母 1378
黄瑞木 411
黄瑞木属 410
黄槐 561
黄腊烤 173
老鼠草 1307
黄蝉 959
黄蝉兰 1529
黄蝉属 959
黄蜀葵 738
黄腹鼬 1764
黄腺大青 1048
黄腺香青 1244
黄鲷 1683
黄鼠李 715
黄鼠属 1753
黄鹌菜 1356
黄鹌菜属 1356
黄褐口蘑 40
黄褐毛忍冬 1201
黄褐孔菌属 35
黄褐丽金龟 1624
黄褐香青 1246
黄蔷薇 525
黄蜻 1610
黄蜻属 1610
黄管秦艽 950
黄鲷 1680
黄鲷属 1680
黄鲛鳐 1693
黄鲛鳐属 1693
黄精 1393
黄精叶钩吻 1402
黄精叶钩吻属 1402
黄精属 1392
黄缨菊 1356
黄缨菊属 1356
黄檀 742
黄楦 286
黄鳅 1653
黄鳅属 1653
黄瘤孢 53
黄檀乌铃芭芭 1189
黄嘴角鸮 1732
黄鳍刺鳅虎鱼 1684
黄鳍鲷 1679
黄鳃 1674
黄颡鱼 1669
黄颡鱼属 1669
黄檀 566
黄檀属 566
黄藤 1463
黄鳝 1764
黄瓣梅花草 483
黄鳞 1675
黄鳞属 1675
黄囊孔菌 31
菱叶西番莲 774
菱叶茴芹 874
菱叶崖爬藤 728
叶钩樟 290
菱红菇 46
菱形藻科 12
菱形藻属 12
菱角 801
菱科 800
菱锌矿 1792
菱属 800
菱蟹科 1604
菠萝 1396
菠萝叶铁线莲 328
菠萝属 1395
菇蓝 453
菇盖属 453
菊柊 764
菊柊属 764
薪黄 458
薪黄属 458
菽麻 565
菌类植物门 19
菖蒲 1465
菖蒲属 1465
萝卜 455
萝卜根老鹳草 613
萝卜属 455
萝芙木 969
萝芙木属 968
萝藦 984
萝藦科 973
萝藦属 984
萤火虫 1620
萤科 1620
萤蔺 1497
萤蔺属 1497
菲岛算盘子 632
菲律宾蛤仔 1587
萌条香青 1246
菜木香 1289
菜瓜 783
菜头肾 1175
菜花烙铁头 1711
菜豆 593
菜豆树 593 1163
菜豆树属 1163
菜粉蝶属 1630
菜蓟 1285
菜蓟属 1285
菜椒 1118
菊叶乌先蕨 1143
菊叶委陵菜 519
菊叶香藜 254
菊头蝠科 1748
菊头蝠属 1748
菊羊 1301
菊芭 1276
菊芭属 1276
菊花 1287
菊花参 951
菊状千里光 1336
菊科 1238
菊属 1285
菊黄东方鲀 1691
菊蒿 1347
菊蒿属 1347
姜叶 389
萎软紫菀 1261
菠萝 1426
菠萝蜜 183
菠菜 257
菠菜属 257
菅草 1459
菅草属 1459
菩虹 1631
菩提树 189
菹草 1361
萍蓬草 386
萍蓬草属 386
菰 1460
菰黑粉菌 24
菰黑粉菌科 24
菰黑粉菌属 24
菰属 1460
菰腺忍冬 1202
萨氏角鲨 1647
萨氏蝙蝠 1747
梭子果属 925
梭子鳐科 1605
梭子鳐属 1605
梭果玉蕊 807
梭果花 807
梭果黄芪 550
梭罗树 750
梭罗树属 750
梭梭 1194
梭梭大列当 1196
梭鲈 1674
梗花龙头草 1086
梗花雀梅藤 717
梭梭 87
梭梭科 87
梭梭属 87
梯牧草 1452
梯牧草属 1452
棟木属 827
梅 499
梅叶冬青 687
梅叶猕猴桃 407
梅衣 58
梅衣科 57
梅衣属 57
梅花参 1636
梅花草 484
梅花草属 482
梅花鹿 1771
梅花鲨 1645
梅花鲨属 1645
梅笠草 881
梅笠草属 881
梅童鱼属 1678
梓木草 1037
梓叶槭 672
梓树 1161
梓树属 1160
梳唇石斛 1535
梳帽卷瓣兰 1525
梯 934
梯叶槭 674
梯属 934
梢木 461
梢木属 461
梧桐 748
梧桐科 747
梧桐属 748
梵天花 746
梵天花属 745

[illegible] 1667
雪下红 904
雪山林 706
雪山点地梅 910
雪山冠尾草 1103
雪白委陵菜 518
雪白睡莲 386
雪地茶 59
雪里见 1472
雪岑杉 145
雪鸟花 57
雪鸡属 1726
雪松 143
雪松属 143
雪岭杉 145
雪柳 933
雪柳属 933
雪香兰 392
雪香兰属 392
雪胆 786
雪胆属 786
雪兔 1752
雪莲花 1329
雪豹 1767
雪豹属 1767
鞍甲科 1620
鞍甲属 1620
鞍虫 1620
鞘砂 1793
硕大马先蒿 1145
硕苞蔷薇 524
硅化合物类 1789
硬地榆 537
氪子 787
氪瓜 787
盔形珊瑚属 1568
盘状黄芩 1108
盘螺科 1576
竖毛楔天牛属 1625
堂皇海菊蛤 1583
雀儿舌头 634
雀石蕊 56
雀舌豆 571
雀舌草 248
雀舌黄杨 704
雀麦 1438
雀麦属 1438
雀科 1744
雀梅藤 718
雀梅藤属 717
雀鹏珠属 573
雀斑党参 1232
雀稗 1451
雀稗属 1451
雀瓢 979
雀鹰 1719
常山 478
常春卫矛 697
常春木 841
常春木属 841
常春油麻藤 590
常春藤 839
常春藤属 839
常绿山龙眼 208
常绿卫矛 700
常绿夹竹桃 1213
野丁香属 1006
野八角 279
野大豆 576
野山楂 504
野马 1769
野木瓜属 373
野凤仙花 686
野丹参 1105
野火球 603
野甘草 1151
野甘草属 1151
野艾蒿 1253
野古草 1436
野古草属 1436
野生苹婆 751
野生革耳 38
野生紫苏 10
野老鹳草 612
野地钟萼草 1137
野芋 1474
野芝麻 1083
野芝麻属 1082
野亚麻 617
野西瓜苗 742
野百合 565 1385
野灯心草 1425
野决明 603
野决明属 602
野花椒 655
野苏子 1068 1147
野牡丹 810
野牡丹科 807
野牡丹属 810
野鸡黄 1107
野驴 1768
野古树 581
野拔子 1070
野茉莉 929
野苜蓿 585
野猫 1125
野鸢尾 1419
野草果 1506
野草香 1067
野草莓 509
野荷蔻 1281
野荷蔻属 1281
野胡萝卜 860
野胡麻 1134
野胡麻属 1134
野柿 927
野姜 1513
野独活 273
野独活属 273
野葛荳 1310
野桂花 942
野桐 635
野桐属 634
野核桃 160
野豇豆 607
野鸦椿 703
野鸦椿属 703
野扁豆属 571
野海茄 1125
野海棠属 808
野扇花 707
野扇花属 706
野黄桂 285
野菊 1286
野菱 801
野菰 1194
野菰属 1194
野梧桐 635
野猪 1769
野猪属 1769
野葱 1366
野葵 743
野棉花 317
野蚣蝓 1579
野黍 1445
野黍属 1445
野蓟 1278
野罂粟 1278
野雉尾 95
野慈姑 1359
野滨藜 252
野蔷薇 526
野槟榔 444
野漆 672
野焦 1500
野豌豆 606
野靛棵属 1170
野燕麦 1436
野螟科 1628
野磨芋 1467
野蘑菇 41
悬竹属 1435
悬钩子属 528 1199
悬铃木 458
悬铃木科 458
悬铃木属 458
悬铃叶苎麻 193
悬藓属 64
啄木鸟科 1734
啸鹟属 1741
啤酒花 190
鄂尔多斯小檗 355
鄂西十大功劳 368
鄂西玄参 1151
鄂西沙参 1223
鄂西卷耳 240
鄂西香茶菜 1007
鄂西黄精 1393
鄂西粗筒苣苔 1179
鄂西清风藤 682
鄂西鼠尾草 1102
鄂西蜡瓣花 459
鄂报春 921
鄂赤瓟 792
匙叶小檗 362
匙叶五加 833
匙叶甘松 1215
匙叶龙胆 951
匙叶伽蓝菜 464
匙叶草 953
匙叶草属 953
匙叶蒌蒿菜 425
匙叶鼠曲草 1299
匙叶翼首花 1221
匙吻鲟科 1651
匙苞姜 1514
匙苞黄堇 435
匙萼金丝桃 424
匙萼柏拉木 808
匙羹藤 981
匙羹藤属 981
曼氏无针乌贼 1593
曼陀罗属 1119
眼子菜 1362

眼子菜科 1361
眼子菜属 1361
眼树莲 980
眼树莲属 980
眼球贝 1574
眼球贝属 1574
眼斑水龟 1699
眼斑芫荽 1622
眼镜王蛇 1710
眼镜蛇 1710
眼镜蛇科 1709
眼镜蛇属 1710
距短刺鲀 1692
趾叶栝楼 795
距花万寿竹 1376
距花山姜 1502
距唇石斛 1534
距药黄精 1393
距镰英苜蓿 585
鲗敌荔枝螺 1575
鲗菜 6
鲋蛉科 1615
鲋蛉属 1615
龙土藤 773
蛇目布氏参 1637
龙瓜 793
蛇舌兰 1536
蛇舌兰属 1536
蛇含委陵菜 517
蛇床 853
蛇床属 858
蛇尾纲 1639
蛇纹石大理岩 1786
蛇纹石石棉 1784
蛇苔 68
蛇苔科 68
蛇苔属 68
蛇枪头 1467
蛇果黄堇 433
蛇泡藤 530
蛇胆草 989
蛇首眼球贝 1574
蛇莲 786
蛇莓 507
蛇莓属 507
蛇根木 969
蛇根草 1011
蛇根草属 1011
蛇菰科 217
蛇菰属 217
蛇婆子 752
蛇婆子属 752
蛇葡萄 722
蛇葡萄属 720
蛇蜥科 1706
蛇鳗属 1654
蛇藤 711
蛇藤属 711
蛇鳚科 1657
蛇鳚属 1657
蛇蝉 1615
蛇蝉属 1615
蛇蜢属 1613
蛇蜓科 1607
蛆形无齿蚌 1584
蛆科 1580
蛆属 1580
蛙草蟆属 1628
蛤蟆 1616
崖花子 495
崖花海桐 495
崖豆藤 587
崖角藤 1479
崖柏属 153
崖爬藤 727
崖爬藤属 726
崖姜蕨 139
崖姜蕨属 139
崖藤 374
崖藤属 374
崇澍蕨 112
崇澍蕨属 112
圈药南星 1470
银木 286
银木荷 417
银毛球属 262
银叶巴豆 624
银叶杜茎山 907
银叶柯子 817
银叶委陵菜 517
银叶树 749
银叶树属 749
银白杨 162
银兰 1524
银边卫矛 697
银边吊兰 1374
银边翠 628
银丝芥 448
银丝草 1027
银耳 25
银耳科 25
银耳属 25
银灰旋花 1026
银合欢 584
银合欢属 584
银州柴胡 856
银花苋 261
银杏 141
银杏科 141
银杏属 141
银环蛇 1709
银果牛奶子 759
银鱼科 1654
银线草 392
银南星 1469
银鸥 1729
银背藤 1024
银冠海葵科 1567
银莲花 313
银莲花属 313
银桦 207
银桦属 207
银柴 620
银柴胡 249
银柴属 620
银胶菊 1322
银胶菊属 1322
银粉背蕨 93
银梅草属 477
银鲛科 1650
银鲛属 1650
银薇 798
银鲳 1683
银鲴 1666
银露梅 517
铜 1783
铜牛皮 754
铜毛紫云菜 1173
铜化合物类 1782
铜鱼属 1659
铜钱白珠 886
铜钱细辛 398
铜钱树 713
铜陵黄花贝母 1380
铜绣环棱螺 1572
铜绿乳牛肝菌 44
铜绿异丽金龟 1624
铜锣七 381
铜锤玉带草 1236
铜锤玉带草属 1236
铜锤草 610
铜藻 11
铰剪藤 982
铰剪藤属 982
铠茗荷科 1598
矮狼把草 1266
矮牛儿苗 611
矮牛儿苗科 611
矮牛儿苗属 611
甜叶菊 1345
甜叶菊属 1345
甜瓜 783
甜根子草 1456
甜菜 252
甜菜属 252
甜麻 734
甜槠 172
犁头尖 1481
犁头尖属 1480
犁爪足黄蜂 1634
犁叶白珠 886
犁叶悬钩子 535
犁头鳐科 1648
犁头鳐属 1648
犁形马勃 51
犁形环棱螺 1572
犁原楣柠 506
犁果仙人掌 263
犁果寄生 213
犁果寄生属 213
犁果榕 188
犁属 521
犁萌油柄蕈 61
笠盔盖科 1598
笠藤壳属 1598
偃松 147
偏叶白齿蕈 64
偏花马兜铃 396
偏花叶报春 922
偏花黄芩 1110
偏顶蛤 1581
偏翅龙胆 950
偏翅唐松草 348
偏穗姜 1512
偏穗姜属 1512
偏瓣花 813
偏瓣花属 813
假大白菜 46
假大青蓝 580
假山龙眼属 208
假卫矛属 702
假叉枝鸦葱 1335
假马齿苋 1132
假马齿苋属 1132

假马鞭草 1053
假马鞭草属 1053
假木豆 567
假木豆属 567
假木荷 884
假木荷属 884
假木贼属 251
假木通 987
假水生龙胆 950
假水晶兰属 881
假水晶兰 881
假贝母 782
假贝母属 782
假毛蕨属 106
假升麻 499
假升麻属 499
假双盖蕨 103
假双盖蕨属 103
假龙胆属 952
假羊边蓬 1234
假丝菌属 19
假地豆 569
假地枫皮 279
假地蓝 565
假耳草 1010
假耳草属 1010
假白合 1388
假百合属 1388
假附支草 909
假红芽大戟 1005
假牡鹃 1166
假牡鹃属 1166
假连翘 1049
假连翘属 1049
假含笑 270
假苹婆 751
假苜蓿 565
假虎刺 962
假虎刺属 962
假细锥香茶菜 1076
假柑木姜子 293
假参包叶 625
假参包叶属 625
假烟叶树 1128
假香野豌豆 606
假俭草 1444
假活血草 1110
假秦艽 1096
假柿皮树 287
假柿钓樟 291
假紫龙树属 708
假通草 837
假益智 1504
假海桐 709
假海桐属 709
假黄皮 645
假密环菌 36
假密环菌属 36
假婆婆纳 923
假婆婆纳属 923
假朝天罐 811
假蒟 389
假楼梯草 199
假楼梯草属 199
假睛东方鲀 1692
假鹊肾树 192
假鹊肾树属 192
假福王草 1322
假福王草属 1322
假槟榔 1460
假槟榔属 1460
假酸浆 1121
假酸浆属 1121
假稻 1447
假稻属 1447
假瘤蕨属 133
假薄荷 1088
假蹄盖蕨 101
假蹄盖蕨属 101
假糙苏 1095
假糙苏属 1095
假鹰爪 271
假鹰爪属 271
假猿猪刺 361
假齿酸藤子 907
袋果草 1236
袋果草属 1236
袋鳔膜 5
宿苞豆属 598
宿根亚麻 617
宿根画眉草 1444
密子豆 597
密子豆属 597
密毛山梗菜 1234
密毛龙虾 1602
密毛白莲蒿 1256
密毛老鹳草 612
密毛红丝线 1120
密毛苎麻 194
密毛奇蒿 1249
密毛蚂蝗七 1180
密毛梧桐 797
密毛桃叶珊瑚 827
密毛堇菜 767
密毛紫菀 1263
密节竹 1438
密节坡油甘 599
密叶飞蓬 1294
密叶苔草 1488
密叶绢蓑 66
密叶蒲公英 1348
密生波罗花 1161
密花山矾 931
密花小根蒜 1366
密花千里光 1336
密花艾纳香 1267
密花石豆兰 1521
密花石斛 1533
密花舌唇兰 1556
密花羊蹄甲 553
密花豆 601
密花豆属 601
密花远志 665
密花尾药千里光 1346
密花轮环藤 376
密花岩风 865
密花荆芥 1092
密花胡颓子 758
密花树 909
密花树属 909
密花柽柳 776
密花虾脊兰 1522
密花香薷 1067
密花姜花 1511
密花美登木 701
密花孩儿草 1173
密花紫菀 936
密花柴胡 852
密花假卫矛 702
密花滇紫草 1038
密花翠雀花 336
密花藤属 379
密序大黄 231
密纹薄芝 31
密苞山姜 1502
密枝圆柏 151
密刺蔷薇 528
密齿天门冬 1370
密齿降龙草 1187
密柑草 637
密点麻蜥 1705
密脉小连翘 424
密脉木 1009
密脉木属 1006
密脉海桐 492
密脉鹅掌柴 846
密纹斓虎 1704
密球兰麻 192
密粘褶菌 31
密集木层孔菌 32
密蒙花 1131
密褶红菇 45
密穗砖子苗 1496
密穗紫堇 430
密鳞耳蕨 120
密鳞牡蛎 1583
密鳞紫金牛 901
寄生藤 209
寄生藤属 209
寄居蟹科 1603
寄居蟹属 1603
寄树兰属 1558
盘叶忍冬 1206
盘叶罗伞 837
盘舌蟾科 1695
盘羊 1776
盘花垂头菊 1282
盘果菊属 1324
盘鲍属 1660
船盔乌头 307
舵鲣属 1682
盒子草 781
盒子草属 781
盒果藤 1030
盒果藤属 1030
斜方复叶耳蕨 113
斜叶黄檀 567
斜叶榕 189
斜生栅藻 5
斜齿鲨属 1646
斜带髭鲷 1680
斜脉暗罗 273
斜基粗叶木 1006
斜弯草 1085
斜弯草属 1085
斜翼 735
斜翼属 735
斜鳞蛇 1708
鸽属 1729
鸽鹑属 1732
领春木 300
领春木科 300
领春木属 300
领航鲸科 1759

鸲鹆鹛 1732
彩石鳞鲛 1664
彩绒革盖菌 29
爱地草 999
爱地草属 999
爱胜属 1594
貉毛银叶委陵菜 517
貉皮乌蔹 51
闇灯蕈属 63
闇枝毛良 345
鼠科 1648
鼠属 1648
猫儿子 372
猫儿子属 372
猫儿刺 690
猫儿菊 1239
猫儿菊属 1239
猫爪草 346
猫耳朵 1178
猫耳湖鸡儿 559
猫尾射 604
猫乳 713
猫乳舌 713
猫科 1765
猫属 1765
猫鲨科 1645
猪毛草 1497
猪毛菜 256
猪毛菜属 256
猪毛蒿 1256
猪仔笠 573
猪耳蛛鲷 1584
猪耳掌 263
猪肚木 991
猪齿鱼属 1680
猪苓 33
猪殃殃 995
猪科 1769
猪屎豆 565
猪屎豆属 564
猪笼草 424
猪笼草科 424
猪笼草属 424
猪鬃灵芝蕨 90
猪獐 1762
猪獐属 1762
猞猁 1765
猞猁属 1765
猕猴 1749
猕猴桃科 404
猕猴桃属 404
猕猴桃藤山柳 409
猕猴属 1749
兜兰 1554
兜兰属 1553
兜被兰 1550
兜被兰属 1550
麻山黄 180
麻天牛 1625
麻叶豆腐柴 1052
麻叶荨麻 206
麻叶冠唇花 1090
麻叶绣线菊 540
麻叶蟛蜞菊 1355
麻竹 1441
麻花艽 948
麻花头 1339
麻花头属 1339
麻栎 175
麻疯树 633
麻疯树属 633
麻果坡巢蕨 110
麻鸭属 1718
麻黄科 156
麻黄属 156
麻雀 1744
麻雀属 1744
麻梨 522
麻楝 659
麻楝属 659
麻蜥属 1705
鹿角杜鹃 892
鹿角草 1298
鹿角草属 1298
鹿角海萝 14
鹿角菜 10
鹿角菜属 10
鹿角藤 963
鹿角藤属 963
鹿茸草 1141
鹿茸草属 1141
鹿草 1345
鹿药 1395
鹿药属 1395
鹿科 1771
鹿葱 1409
鹿属 1771
鹿蹄草 882
鹿蹄草科 881
鹿蹄草属 882
鹿蹄叶吾 1316
鹿藿 598
鹿藿属 598
康氏小公鱼 1652
康古鲸科 1656
康定五加 833
康定贝母 1379
康定乌头 311
康定玉竹 1393
康定冬青 688
康定柃木 829
康定棱子芹 875
康定筋母草 1056
康定翠雀花 338
康藏荆芥 1093
望江南 561
望春花 265
旌节花科 771
旌节花属 771
旋马陆属 1608
旋叶香青 1244
旋花茄 1128
旋花科 1023
旋花属 1026
旋果蚊子草 508
旋覆花 1305
旋覆花属 1304
旋蒴苣苔属 1178
旋蒴苣苔 1178
旋鳞莎草 1491
商陆 234
商陆科 234
商陆属 234
羚牛 1774
羚牛属 1774
断肠草 433
断肠草属 944
断线舌鳎 1690
断线蕨 126
粒花冠小月螺 1571
粗毛水锦树 1022
粗毛火炭母 222
粗毛甘草 576
粗毛黄堇 435
粗毛滨羊蓍 365
粗毛黄褐孔菌 35
粗毛硬革菌 26
粗毛锦鸡儿 558
粗毛鳞盖蕨 89
粗叶木 1005
粗叶木属 1005
粗叶水锦树 1022
粗叶卡花草 991
粗叶地桃花 746
粗叶耳草 1003
粗叶卷柏 76
粗叶泥炭藓 60
粗叶悬钩子 529
粗叶榕 187
粗皮口蘑 40
粗皮松萝 59
粗皮蛙 1698
粗丝木 707
粗丝木属 707
粗壮小鸢尾 1421
粗壮口蘑 40
粗壮女娄菜 246
粗壮水毛花 1497
粗壮唐松草 351
粗壮绣球 480
粗江蓠 17
粗花乌头 303
粗吻海龙 1673
粗茎乌头 303
粗茎红景天 467
粗茎返顾马先蒿 1147
粗茎软骨藻 18
粗茎秦艽 948
粗茎棱子芹 874
粗齿天名精 1274
粗齿角叶鞘柄木 831
粗齿冷水花 204
粗齿兔儿风 1241
粗齿铁线莲 322
粗齿黏冠 118
粗柄羊肚菌 23
粗柄杜若 1430
粗柄铁线莲 324
粗钝海盘车 1639
粗脉紫金牛 900
粗根龙胆 948
粗根老鹳草 612
粗根鸢尾 1422
粗根苎麻 206
粗唇鮈 1666
粗野马先蒿 1144
粗棕竹 1464
粗喙秋海棠 779
粗筒苣苔 1179
粗榧 154
粗糙凤尾蕨 91
粗糙蚀骨蟹 1604
粗糙独活 863
粗糙盔形珊瑚 1568

粘乳蓬子菜 998
粘蛇莓 217
粗糠树 1035
黏糠柴 635
粘山药 1413
粘毛白酒草 1281
粘贝母兰 1528
粘毛山芝麻 749
粘毛母草 1139
粘毛香青 1244
粘毛黄花稔 745
粘毛黄芩 1106
粘毛蓼 1254
粘毛鼠尾草 1104
粘毛蓼 230
粘冠草属 1320
粘唐松草 352
粘盖牛肝菌 44
粘皮蛞蝓属 1579
粘萼蝇子草 248
粘褶菌属 31
剪刀股 1307
剪股颖 1434
剪股颖属 1434
剪秋罗 243
剪秋罗属 243
剪夏罗 243
清风藤 682
清风藤科 680
清风藤猕猴桃 405
清风藤属 682
清明花 962
清明花属 962
清香木 669
清香木姜子 292
渐尖毛蕨 104
渐尖叶独活 862
鸿雁 1717
溪山含笑 269
深山堇菜 770
深山露松草 352
深山蟹甲草 1270
深红老鼠 951
深红鸭嘴 1335
深红鬼笔 47
深圆齿堇菜 766
深黄小檗 355
深绿卷柏 74
深裂千里光 1337
深裂叶羊蹄甲 553
深裂叶地笋 1068
深裂竹根七 1376
深裂刺榆 840
深裂鸭儿芹 859
深裂绣毛莓 535
深紫水盖 579
深紫续断 1219
深紫糙苏 1096
渔游蛇 1708
淫羊藿 365
淫羊藿属 365
渡鸦 1737
淡水豚属 1758
淡灰海蛇 1710
淡竹 1453
淡竹叶 1448
淡竹叶属 1448
淡红忍冬 1200
淡黄木层孔菌 32
淡黄花百合 1386
淡黄荚蒾 1211
淡黄香青 1245
淡黄香薷 1069
淡紫红菇 46
淡腹雪鸡 1726
梁子菜 1293
梁王茶属 841
婆罗门参属 1351
婆婆针 1265
婆婆纳 1156
婆婆纳属 1154
裕民贝母 1379
裙带菜 10
裙带菜属 10
隐子草属 1439
隐孔菌 29
隐孔菌属 29
隐丝藻科 15
隐序南星 1474
隐纹花松鼠 1752
隐板石鳖科 1570
隐轴蛇鸻 217
隐匿景天 469
隐翅虫科 1620
隐棒花 1475
隐棒花属 1475
隐蕊杜鹃 892
隐鳃鲵科 1694
隐瓣蝇子草 246
隐囊蕨属 95
隆头鱼科 1680
隆肛蛙 1697
隆纹黑蛋巢菌 53
隆林美登木 702
隆狄冷水花 202
弹刀子菜 1140
弹涂鱼 1684
弹涂鱼科 1684
弹涂鱼属 1684
弹裂碎米荠 449
蛋白核小球藻 4
蛋肚倍蚜 1617
蛋铁棓蚜 1617
颈大牛属 1626
颈槽游蛇 1708
续断菊 1343
绳藻 9
绳藻科 9
绳藻属 9
绯胸鹦鹉 1730
绯鼠耳蝠 1747
绵二七 573
绵毛风毛菊 1330
绵毛长蒴苣苔 1185
绵毛金腰 475
绵毛益母草 1084
绵毛雪莲 1328
绵毛雪莲花 1331
绵毛猕猴桃 406
绵毛鹿茸草 1141
绵毛葡萄 730
绵毛鞭模叶蓼 225
绵毛囊苔 1319
绵毛鳞毛蕨 116
绵羊 1775
绵羊属 1776
绵枣儿 1395
绵枣儿属 1395
绵参 1071
绵参属 1071
绵柯 175
绵蚜科 1617
绵草藓 1415
绵腹衣属 58
绵穗苏 1063
绵穗苏属 1063
绵鳚科 1681
维氏假瘤蛛 134
绶草 1559
绶草属 1559
绿山蛩 1608
绿孔雀 1724
绿玉树 631
绿叶五味子 279
绿叶甘橿 289
绿叶线蕨 126
绿叶胡枝子 582
绿叶胡颓子 761
绿头鸭 1716
绿边芦苇 1622
绿竹 1441
绿竹属 1441
绿赤车 201
绿芫菁 1621
绿芫菁属 1621
绿花石蕊 472
绿花百合 1386
绿花杓兰 1531
绿花桃叶珊瑚 826
绿花崖豆藤 587
绿花杓蕊兰 1554
绿豆 608
绿茎多轮贝母 1378
绿茎还阳参 1284
绿茎棚寄生 216
绿刺参 1636
绿爬山虎 725
绿泥石化云母碳酸盐片岩 1791
绿树发 58
绿杆三尖杉 154
绿背白脉细辛 398
绿背雏花 631
绿绒蒿 441
绿绒蒿属 441
绿核菌属 21
绿翅鸭 1716
绿梅花草 483
绿啄木鸟属 1734
绿萼水珠草 820
绿蟾蜍 1618
绿鳍马面鲀 1691
绿鳍鱼 1688
绿鳍鱼属 1688
绿穗苋 259
绿鹭 1714
绿鹭属 1714
绿蟌蜍 1696
骑士章海星 1638
巢猴山牵牛 1176
巢蕨 110
巢蕨属 110

## 十二画


斑飞蜥 1703
斑节对虾 1601
斑叶兰属 1540
斑叶杓兰 1531
斑叶盈江南星 1472
斑叶脊柱苣苔 1182
斑叶堇菜 770
斑叶野木瓜 373
斑叶鹤顶兰 1555
斑头鱼 1688
斑头鱼属 1688
斑头秋沙鸭 1718
斑头鸺鹠 1732
斑头雁 1717
斑地锦 628
斑竹鲨属 1644
斑胸山鸡 1727
斑衣蜡蝉 1616
斑壳蓉属 1622
斑花败酱 1216
斑花黄堇 428
斑条鳐 1664
斑条裸胸鳝 1656
斑鸠菊 1353
斑鸠菊属 1352
斑鸠属 1730
斑纹蜉 1605
斑茅 1456
斑鱼狗 1733
斑点马鲛 1682
斑点虎耳草 489
斑点裸胸鳝 1656
斑种草 1032
斑种草属 1032
斑籽 621
斑籽属 621
斑翅山鹑 1725
斑唇马先蒿 1145
斑唇贝母兰 1527
斑唇卷瓣兰 1525
斑鳢 1742
斑海马 1673
斑海豹 1767
斑海豹属 1767
斑铜矿 1782
斑羚 1776
斑羚属 1776
斑绿豆粉蝶 1630
斑啄木鸟 1735
斑裙头红 814
斑腿树蛙 1698
斑蝥属 1689
斑褶孔菌 30
斑嘴鸭鹎 1713
斑嘴鸭 1716
斑鲭鲀 1687
斑鳍燕鳐 1671
斑鳢 1676
斑鳖 1651
斑瓣虎耳草 490
斑鳐 1648
斑鳢 1686
斑鳐 1671
琼花 1211
琼枝 16
琼越线蕨 125
琼楠 283
琼楠属 283
琴叶过路黄 916
琴叶球兰 983
琴叶紫菀 1261
琴叶榕 188
琴唇万带兰 1561
雹 1702
雹属 1702
塔衣瓦松 464
塔花山梗菜 1235
塔里木柽柳 777
塔城贝母 1378
堪察加景天 470
款冬 1352
款冬属 1352
喜山柳叶菜 821
喜山重楼 1391
喜山葶苈 452
喜山蠵蜥 1703
喜马拉亚百蕊草 211
喜马拉雅旱獭 1753
喜马拉雅虎耳草 488
喜马拉雅蝇子草 247
喜马拉雅沙参 1223
喜马拉雅垂头菊 1282
喜马拉雅鼯 1773
喜阴虫属 1600
喜阴悬钩子 533
喜花草 1168
喜花草属 1168
喜旱莲子草 258
喜冷红景天 465
喜树 825
喜树属 825
喜盐鸟鸡 1420
喜斑鸠菊 1352
喜湿龙胆 949
喜鹊 1739
喜鹊苣苔属 1190
越南万年青 1466
越南山矾 931
越南石韦 137
越南叶下珠 636
越南安息香 930
越南枝实 623
越南轮环藤 377
越南葛藤 597
越南榆 182
越南槐 600
越南嘴蚕 712
越桔叶忍冬 1204
越秀川木香 1289
越橄 658
越橘 899
越橘属 896
提灯藓科 63
插田泡 530
插柚柴属 941
搜山虎 1116
散生千里光 1336
散生荆 76
散血丹属 1122
散血芹 875
散花紫金牛 900
散序地杨梅 1426
散尾葵 1462
散尾葵属 1462
散枝水蓼 225
散沫花 799
散沫花属 799
散斑竹根七 1375
散微籽 621
散瘀草 1058
聒聒 1612
葫卢巴 604
葫卢巴属 604
葫芦 787
葫芦叶马兜铃 394
葫芦茶 601
葫芦茶属 601
葫芦科 781
葫芦属 787
葫芦藓 62
葫芦藓科 62
葫芦藓属 62
粉末香薷 1068
粉翅藤 816
粉翅藤属 816
葛氏鹎嘴鹛 1683
葛枣猕猴桃 407
葛萝槭 673
葛属 597
葛缕子 857
葛缕子属 856
葛蟲 729
葛藟 597
葡生蝇子草 247
葡酒红菇 46
葡萄 731
葡萄叶秋海棠 779
葡萄叶猕猴桃 409
葡萄状枝瑚菌 26
葡萄科 719
葡萄属 728
落叶松 144
落叶松属 144
落地生根 462
落地生根属 462
落地金钱 1542
落地梅 916
落花生 549
落花生属 549
落梗黄芪 433
落葵 237
落葵科 237
落葵属 237
落葵薯 237
落葵薯属 237
落新妇 472
落新妇属 472
落猩红 691
落檐属 1480
落瓣油茶 412
蒐丝子 1026
蒐丝子属 1026
葵花大蓟 1279
葱 1365
葱叶兰 1550
葱叶兰属 1550
葱状灯心草 1424
葱草 14
葱莲 1409
葱莲属 1409
葱臭木属 660
葱属 1364

薄叶蛇葡萄 721
薄草 190
薄草属 190
萱草 1383
萱草属 1382
萱藻 9
萱藻科 9
萱藻属 9
草房 452
草房鸭 451
草花鼠尾草 1103
草菊 1275
草菊属 1275
蓑蕉 1257
篇蓄 221
戟叶火绒草 1313
戟叶艾纳香 1268
戟叶白粉藤 724
戟叶蓼菜 765
戟叶悬钩子 532
戟叶蓼 230
韩信草 1108
朝天委陵菜 519
朝天椒 1118
朝天罐 812
朝鲜马鲛 1682
朝鲜艾蒿 1249
朝鲜白头翁 343
朝鲜苍术 1263
朝鲜英蒾 1211
朝鲜南星 1468
朝鲜铁线莲 327
朝鲜淫羊藿 366
朝鲜柊木 828
朝鲜崖柏 153
朝鲜婆婆纳 1157
朝鲜落新妇 473
朝鲜越橘 897
朝鲜萱草 1383
朝鲜紫菀 736
朝鲜鼠李 714
朝鲜蝴蛄 1603
朝鲜鳞带石蜈 1570
博落回 440
博落回属 440
棋子豆属 566
棱子芹 874
棱子芹属 874
棱孔菌 29
棱皮龟 1702
棱皮龟科 1702
棱皮龟属 1702
棱枝冬青 687
棱果刺通草 847
棱果海桐 495
棱果蝎子草 198
棱砂贝母 1379
棱萼母草 1138
棱鳞 1674
椤木石楠 514
棕三趾鹑 1726
棕叶狗尾草 1457
棕竹 1464
棕竹属 1464
棕色鳃金龟 1624
棕果蝠 1747
棕树七 1487
棕耙叶 1373
棕胸竹鸡 1722
棕斑腹刺鲀 1692
棕黑锦蛇 1708
棕榈 1464
棕榈科 1460
棕榈属 1464
棕啄木鸟 1735
棕胸啄木鸟 1735
棕熊 1761
棕鳞瓦韦 130
棕鳞耳蕨 120
棕鼯鼠 1754
椎实螺科 1578
椎实螺属 1578
棉毛天名精 1274
棉毛茛 345
棉团铁线莲 326
棉属 740
棉蝗 1613
棣棠花 510
棣棠花属 510
槲寄生 212
槲叶风仙 684
槲叶万带兰 1561
槲叶蝴蝶兰 1551
槌头草 1455
槌头草属 1455
槌丝黄精 1393
棒柄花 623
棒柄花属 623
棒锤瓜 789
棒锤瓜属 789
棒锥螺 1573
椋子 829
椋鸟科 1737
椋鸟属 1737
椰子 1462
椰子属 1462
榔榆 182
楮头红 814
椭果绿绒蒿 441
椭圆叶蔗节花 771
椭圆叶越橘 898
椭圆丽蚌 1585
椭圆齿果草 665
椭圆悬钩子 531
棘皮动物门 1636
棘头梅童鱼 1678
棘豆属 591
棘茄鱼 1693
棘茄鱼属 1693
棘茎楤木 836
棘刺牡蛎 1583
棘网蛛 1596
棘胸蛙 1697
棘海星科 1638
棘腹蛙 1697
棘鲀 1687
棘鲀属 1687
酢浆草 610
酢浆草科 609
酢浆草属 610
粟 1457
粟米草 236
粟米草科 235
粟米草属 235
粟麻属 755
粟黑粉菌 23
粟褐苔草 1487
粟鳞贝母兰 1527
雅丽千金藤 381
雅江报春 920
雅江点地梅 911
雅致多孔菌 33
雅致针毛蕨 105
雅致雾仔菊 205
厦门文昌鱼 1641
雁虹 1631
雅属 1717
硬毛马甲子 713
硬毛双花堇菜 766
硬毛白珠 886
硬毛草胡椒 388
硬毛香堇 771
硬毛夏枯草 1100
硬毛兜兰 1555
硬毛棘豆 592
硬毛鼠尾草 1104
硬石膏 1784
硬叶吊兰 1374
硬叶蓝刺头 1291
硬田头菇 42
硬皮马勃科 52
硬皮马勃属 52
硬尖叶蚤缀 238
硬尖刺筋板 631
硬尖神香草 1075
硬壳层孔菌 29
硬阿魏 860
硬齿小檗 355
硬果苔草 1487
硬质早熟禾 1454
硬草 1456
硬草属 1456
硬柄小皮伞 35
硬骨鱼纲 1650
硬骨凌霄属 1164
硬骨凌霄 1164
硬骨藤 379
硬核刺楸 573
硬笋革菌 25
硫色干酪菌 35
硝石 1786
确山野豌豆 606
裂片石蒜 6
裂叶马兰 1309
裂叶乌尾蕨 11
裂叶毛茛 730
裂叶地黄 1150
裂叶荆芥 1105
裂叶荆芥属 1105
裂叶威灵仙 329
裂叶星星草 318
裂叶秋海棠 780
裂叶独活 863
裂叶堇菜 767
裂叶蒿 1257
裂叶榆 181
裂叶榕 187
裂叶罂粟 444
裂叶罂粟属 444
裂叶翼首花 1220
裂瓜属 789
裂芽肺衣 54
裂序楼梯草 197
裂顶柄灰包 49

裂苞艾纳香 1268
裂果卫矛 695
裂果金花 1018
裂果金花属 1018
裂果薯 1410
裂果薯属 1410
裂树花 59
裂唇角盘兰 1544
裂唇虎舌兰 1538
裂唇苇叶兔耳草 1135
裂萼蔓龙胆 947
裂缘梅衣 58
裂腹鱼属 1664
裂褶层孔菌 34
裂蹄木层孔菌 33
裂褶菌 39
裂褶菌属 39
裂瓣玉凤花 1543
雄黄 1788
雄黄兰 1417
雄黄兰属 1417
鸭嘴 1745
鹅毛玉凤花 1543
鹅耳枥 170
鹅耳枥属 169
鹅观草 1455
鹅观草属 1455
鹅肠菜 9 244
鹅肠菜属 9 244
鹅肠繁缕 250
鹅首马先蒿 1143
鹅绒藤 976
鹅绒藤属 975
鹅掌金星草 133
鹅掌草 314
鹅掌柴 846
鹅掌柴属 844
鹅掌楸 264
鹅掌楸属 264
鹅掌藤 844
鹅喉羚 1777
鹅膏科 40
鹅膏属 40
鸭属 1724
鹳鹆科 1713
鹳鹆属 1713
翘嘴红鲌 1660
翘鳞肉齿菌 27
紫丁香 943
紫丁香菇 37
紫八宝 463
紫万年青 1430
紫云英 551
紫云英属 549
紫云蛤科 1588
紫云蛤属 1588
紫月季花 524
紫丹 1039
紫丹属 1039
紫毛华千里光 1341
紫毛香茶菜 1076
紫毛蕊花 1154
紫乌头 304
紫玉盘 273
紫玉盘属 273
紫石房蛤 1587
紫石蛾 1627
紫叶兔耳草 1135
紫叶美人蕉 1516
紫叶苋菜 771
紫地榆 614
紫芋 1475
紫竹 1449
紫芝 30
紫灰锦蛇 1708
紫舌厚喙菊 1290
紫竹 1453
紫伞芹 868
紫伞芹属 868
紫色东方鼠 1692
紫色秃马勃 50
紫红花红百合 1385
紫红假龙胆 952
紫红獐牙菜 957
紫红蘑菇 41
紫花大叶柴胡 854
紫花卫矛 699
紫花牛姆瓜 372
紫花丹 925
紫花地丁 770
紫花合掌消 975
紫花羊耳蒜 1547
紫花异叶青兰 1064
紫花苜蓿 1187
紫花苜蓿属 1187
紫花杜鹃 888
紫花含笑 269
紫花金龟草 320
紫花金盏苜蓿 1187
紫花香薷 1066
紫花前胡 848
紫花络石 970
紫花堇菜 767
紫花鸭跖柴胡 852
紫花党参 1231
紫花铁线莲 325
紫花高乌头 304
紫花浙皖丹参 1103
紫花黄华 602
紫花野丹参 1105
紫花野菊 1287
紫花鹿药 1395
紫花景天 463
紫花皖鄂丹参 1103
紫花蒲公英 1349
紫花碎米荠 450
紫花醉鱼草 1130
紫苏 1096 1069
紫苏草 1136
紫苏属 1096
紫茉莉 235
紫茉莉科 235
紫茉莉属 235
紫茵蒿 586
紫苞风毛菊 1329 1331
紫苞石柑 1478
紫茎 418
紫茎京黄芩 1109
紫茎柽柳 776
紫茎独活 849
紫茎属 418
紫茎藤 724
紫刺卫矛 695
紫果云杉 145
紫果猕猴桃 404
紫金牛 902
紫金牛科 899
紫金牛属 899
紫金龙 438
紫金龙属 438
紫金莲 923
紫荆 562
紫荆木 925
紫荆木属 925
紫荆属 562
紫草 1036
紫单花红丝线 1120
紫草科 1031
紫草属 1036
紫药红英藤 1209
紫柄假瘤蕨 133
紫背千里光 1337
紫背天葵 779 1301
紫背金盘 1057△ 1058
紫背菜 1300
紫背鹿衔草 882
紫背鹿蹄草 1429 882△
紫背凤尾草 1100
紫点杓兰 1531
紫点堇菜 767
紫脉紫金牛 904
紫珠属 1041
紫堇 430
紫堇叶唐松草 349
紫堇状马先蒿 1143
紫堇属 426
紫胶蚧 1618
紫海胆 1639
紫海胆属 1639
紫茸 83
紫茸科 82
紫茸属 82
紫菜属 12
紫苑 1262
紫苑木属 1263
紫苑属 1258
紫萍 1482
紫萍属 1482
紫啸鸫 1743
紫麻 200
紫麻属 200
紫弹树 178
紫斑风铃草 1227
紫斑牡丹 403
紫斑海菊蛤 1583
紫戚科 1160
紫蔵属 1160
紫萼 1384
紫萼路边青 510
紫萼蝴蝶草 1154
紫晶蜡蘑 36
紫筒草 1039
紫筒草属 1039
紫貂 1763
紫楠 298
紫椴 735
紫椴栓菌 35
紫腺牡荆 892
紫褐生肝菌 43
紫蛱蝶 1624
紫薇 791
紫薇属 798
紫薇锦 1667
紫榴 596

紫檀属 596
紫堇槐 548
紫穗槐属 548
紫藤 609
紫藤属 609
紫铜石斛 1535
紫露草 1431
紫露草属 1431
掌叶大黄 232
掌叶红头翁 343
掌叶报春 919
掌叶肖兰 1064
掌叶鱼黄草 1030
掌叶线蕨 126
掌叶铁线蕨 98
掌叶悬钩子 533
掌叶梁王茶 841
掌叶蓼吾 1317
掌叶覆盆子 530
掌头白头翁 343
掌状三叉蕨 122
掌距瓜叶乌头 305
掌裂叶秋海棠 780
掌裂蛇葡萄 720
掌裂蟹甲草 1270
阔口真鲨 1646
阔叶十大功劳 368
阔叶八角枫 825
阔叶下田菊 1240
阔叶山麦冬 1387
阔叶风车子 817
阔叶石韦 136
阔叶四叶藻 996
阔叶瓜馥木 272
阔叶金合欢 545
阔叶沼兰 1549
阔叶娃儿藤 988
阔叶蓼菜 766
阔叶假排草 917
阔叶猕猴桃 407
阔叶清风藤 683
阔叶紫菀 798
阔叶腊莲绣球 480
阔叶短葶山麦冬 1387
阔叶梁五加 834
阔叶箭竹 1447
阔叶蝇毛蕨 115
阔耳蝠 1747
阔羽贯众 115
阔苞菊 1324
阔苞菊属 1324
阔荚合欢 547
阔柱柳叶菜 821
阔柱黄杨 705
阔胸金龟子 1624
阔弯蓼菜 767
阔蕊兰属 1554
阔鳞鳞毛蕨 116
晶体鬼伞 42
量天尺 262
量天尺属 262
量湿地尾 51
景天点地梅 909
景天科 462
景天属 462
景东千金藤 380
景东香草 915
景东翅子树 750
猥烈含笑 269
晚红玉 1405
晚红玉属 1405
晚花绣球藤 329
喉毛花 947
喉毛花属 946
喀什膜果麻黄 156
喀西茄 1126
喀西茄子苗 1496
喙赤鹳 791
喙花姜 1513
喙花姜属 1513
喙果鸡血藤 588
喙果绞股蓝 785
喙果黑面神 622
喙荚云实 555
喙柱牛奶菜 984
喙核桃 159
喙核桃属 159
喇叭杜鹃 892
喇叭唇石斛 1534
鼎湖山胡椒 288
鼎湖耳草 1001
蛀科 1697
蛀属 1697
蛛毛苣苔属 1190
蛛毛蟹甲草 1271
蛛丝毛车前 1198
蛛丝毛兰耳草 1428
蛛网海胆科 1641
蛛网海胆属 1641
蛛形纲 1595
蛭科 1609
蛭石 1790
蛭石片岩 1790
蛭纲 1594
蛤蜊科 1587
蛤蜊属 1587
蛤蟆菌 40
蜗属 1605
蜗牛 1338
蜈蚣科 1579
蜈蚣属 1579
蛟蜻蛉 1626
蝴儿瓜 789
蝴儿瓜属 789
蝴贝科 1571
黑三棱 1484
黑三棱科 1484
黑三棱属 1484
黑云母片岩 1790
黑水亚麻 617
黑水鸡 1727
黑水鸡属 1727
黑水银莲花 313
黑水罂粟 443
黑水翠雀花 337
黑水缬草 1217
黑毛石斛 1536
黑长臂猿 1750
黑心虎耳草 489
黑心蕨 95
黑心蕨属 95
黑节草 1532
黑龙江当归 848
黑龙江列当 1196
黑龙江林蛙 1697
黑龙江草蜥 1705
黑龙江香科科 1114
黑龙江黄芩 1110
黑龙江野豌豆 605
黑龙骨 985
黑叶接骨草 1168
黑叶菝葜 1398
黑叶猴 1749
黑凹螺 1571
黑白鼯鼠 1754
黑印真鲨 1646
黑皮插柚柴 941
黑头剑蛇 1708
黑头海蛇 1710
黑头蜡嘴雀 1745
黑老虎 275
黑耳叶柴胡 855
黑红菇 46
黑麦属 29
黑壳楠 289
黑豆芜菁 1621
黑足金粉蕨 95
黑足鳞毛蕨 116
黑角珊瑚 1568
黑沙蒿 1255
黑尾舌鳎 1690
黑尾吻鳗 1656
黑尾胡蜂 1634
黑尾鲛 1670
黑尾蜡嘴雀 1745
黑顶卷柏 75
黑松 147
黑枕黄鹂 1736
黑枕绿啄木鸟 1734
黑刺李 520
黑刺蒺草 1099
黑环蜡梨 443
黑虎耳草 488
黑果土当归 837
黑果小檗 358
黑果山姜 1504
黑果荚蒾 1211
黑果枸杞 1120
黑果栾子 503
黑果越橘 898
黑怪参 1636
黑乳海参 1637
黑姑鱼 1678
黑线银鲛 1650
黑草 1133
黑草属 1133
黑养麦蛤 1581
黑南星 1473
黑柃 416
黑面神 621
黑面神属 621
黑点裸胸鳝 1656
黑钩叶属 634
黑香种草 342
黑种草 342
黑种草属 342
黑眉锦蛇 1708
黑绒金龟 1624
黑珠芽蓼蓣 1414
黑莎草 1494
黑莎草属 1494
黑根须腹菌 48
黑桦 168
黑翅土白蚁 1612

黑翅红娘子 1616
黑唇鼠兔 1751
黑柴胡 855
黑脊蛇 1706
黑皱鳃金龟 1624
黑家鼠 1757
黑粉菌科 23
黑粉菌属 23
黑桑 191
黑沙蒿属 88
黑眶蟾蜍 1696
黑弹朴 178
黑蛋巢菌属 52
黑颈长尾雉 1725
黑颈鹤 1727
黑绿东方鲀 1691
黑斑原鮡 1670
黑斑蛙 1698
黑萼棘豆 592
黑棕子 829
黑鹏 1724
黑紫藜芦 1401
黑蒿 1140
黑蒿属 1140
黑榆 181
黑隐珍珠菜 915
黑鲷 1679
黑鲈鳎 1693
黑鹿 1772
黑漆乌芝 28
黑熊 1761
黑熊属 1761
黑蕊猕猴桃 405
黑樱桃 500
黑鳖墓螅 1748
黑嘴蒲桃 805
黑鲸基齿鲨 1646
黑鲳髭鲷 1680
黑鲨鲸 1664
黑穗石蒜 55
黑穗画眉草 1444
黑鳃兔头鲀 1692
黑鳃梅童鱼 1678
黑藻 1360
黑藻属 1360
黑蔓藤 987
黑鳗藤属 987
黑鳞耳蕨 119
黑鳞香青 1244
黑鳞假瘤蕨 133
黑露脊鲸 1757
黑露脊鲸属 1757
黑鳚 1773
链荚豆 547
链荚豆属 547
链珠藤 960
链珠藤属 960
链蛇属 1707
锈毛千斤藤 574
锈毛乌蔹莓 723
锈毛白蜡树 935
锈毛羽叶参 843
锈毛吴茱萸叶五加 832
锈毛忍冬 1201
锈毛肖藤 300
锈毛罗伞 837
锈毛鱼藤 568
锈毛钝果寄生 214
锈毛络石 971
锈毛莓 535
锈毛铁线莲 327
锈毛梨果寄生 213
锈毛棱子果 925
锈毛旋覆花 1305
锈叶木姜子 297
锈凹螺 1571
锈色蛛毛苣苔 1191
锈链游蛇 1708
锁阳 824
锁阳科 824
锁阳属 824
锉石鳖科 1570
锉石鳖属 1570
锐叶茴芹 873
锐尖山香圆 704
锐尖楼梯草 196
锐果鸢尾 1420
锐裂荷青花 440
铺地青兰 1064
铺地草 630
铺地黍 1451
铺地蝙蝠草 562
短小蛇根草 1011
短毛金线草 218
短毛柽柳 777
短毛柳叶菜 821
短毛独活 863
短毛堇菜 766
短毛黄花蒲菜 767
短毛裂叶堇菜 767
短毛熊巴掌 813
短片蕨本 866
短叶决明 560
短叶赤车 200
短叶罗汉松 153
短叶茳芏 1490
短叶绢蒿 1338
短叶假木贼 251
短叶锦鸡儿 557
短叶蹄盖蕨 101
短头唇柱苣苔 1180
短舌匹菊 1326
短舌紫菀 1262
短伞大叶柴胡 853
短花台湾水锦树 1022
短吻三刺鲀 1691
短吻三线舌鳎 1690
短吻红舌鳎 1690
短吻角鲨 1647
短体副鳀 1667
短肠蕨属 100
短角冷水花 201
短序双籽棕 1463
短序吊灯花 974
短序荚蒾 1208
短序歪头菜 607
短序梧楼 793
短序琼楠 283
短序越橘 896
短序鹅掌柴 844
短序蒲桃 805
短序算珠豆 604
短尾大眼鲷 1676
短尾拟鲹 1669
短尾细辛 398
短尾突吻鳎 1656
短尾铁线莲 323
短尾越橘 896
短尾猴 1749
短纹楔形藻 12
短苞斑叶兰 1540
短茎古当归 851
短茎秋海棠 779
短茎柴胡 855
短刺虎刺 994
短刺变豆菜 877
短刺鲀属 1692
短嘴金丝燕 1733
短果茴芹 873
短药野木瓜 373
短药沿阶草 1388
短药蒲桃 805
短柱八角 279
短柱对叶兰 1548
短柱杜鹃 889
短柱肖菝葜 1384
短柱侧金盏花 312
短柱柃 415
短柱络石 971
短柱狼毒大戟 629
短柱鹿蹄草 882
短柄小檗 355
短柄山桂花 762
短柄五加 831
短柄乌头 301
短柄赤飑 793
短柄忍冬 1204
短柄抱茎 177
短柄苹婆 750
短柄垂子买麻藤 157
短柄南星 1469
短柄粉条儿菜 1364
短柄雪胆 786
短柄野芝麻 1082
短柄野海棠 809
短柄紫珠 1041
短柄椴梨 513
短冠东风菜 1288
短冠刺蕊草 1099
短冠草 1152
短冠草属 1152
短星火绒草 1312
短须颌须鮈 1661
短脉杜鹃 890
短翅红娘子 1616
短翅芜菁属 1622
短梗八角 280
短梗大参 840
短梗天门冬 1370
短梗水曲柳 935
短梗百蕊草 210
短梗南蛇藤 693
短梗胡枝子 583
短梗重楼 1391
短梗菝葜 1397
短梗幌伞枫 839
短莎箭头唐松草 351
短距凤仙花 684
短距手参 1541
短距舌喙兰 1544
短距苞叶兰 1520
短距翠雀花 336
短裙竹荪 47
短颈东北蓼 901

短冷仪花 585
短弯齿木 991
短弯齿木属 991
短叶海桐 492
短叶黄连 333
短叶蛇头草 814
短叶飞蓬 1293
短叶仙茅 1409
短裂玉叶金花 1008
短裂羽叶枝子花 1064
短筒苣苔 1178
短筒苣苔属 1178
短筒兔耳草 1135
短颌鲚 1653
短茴 390
短辐水芹 869
短蛸 1591
短腺小米草 1134
短旋螺 1573
短蕊车前紫草 1038
短蕊万寿竹 1376
短鲃 1686
短鲃属 1686
短褶矛蚌 1584
短躯红娘鱼 1688
短鳍拟飞鱼 1671
短鳍近红鲌 1659
短檐苣苔 1193
短檐苣苔属 1193
短穗鱼尾葵 1461
短穗柽柳 777
短腺兔耳草 1135
短穗铁菜 618
短穗旌节花 771
短翼岩黄芪 578
短翼菊头蝠 1748
短瓣七叶一枝花 1391
短柱石竹属 239
短瓣花 239
短瓣金莲花 353
短瓣茶 1239
氯铜矿 1782
黍斑眼球贝 1574
稀子蕨 88
稀子蕨科 88
稀子蕨属 88
稀花蓼 224
稀褶乳菇 45
筋骨草 1056
筋骨草属 1056
筋藤 960
筒花耳口鲃 1400
筒细茅 1455
筒轴茅属 1455
筒瓦花 1111
筒瓦花属 1111
筒鞘蛇葡 217
筒鳞兰 1518
筒鳞兰属 1518
等叶花葶乌头 309
等边浅蛤 1587
等臂马先蒿 1144
筛石蕊 55
愉悦蓼 225
皖鄂丹参 1103
皖赣小檗 355
粤瓦书 130
舒脉环毛蚓 1593
颌针鱼科 1670
颌须鮈属 1660
番木瓜 777
番木瓜科 777
番木瓜属 777
番石榴 804
番石榴属 804
番红花 1418
番红花属 1417
番杏 236
番杏科 236
番杏属 236
番茉莉属 1117
番茄 1121
番茄属 1121
番荔枝 270
番荔枝科 270
番荔枝属 270
番樱桃属 803
番薯 1028
貂属 1763
腋生五味子 276
腋花勾儿茶 709
腋花粗柄花 1398
腋花蓼 228
腔肠动物门 1566
腔齿海底水虱 1599
腽蛤属 1581
腊肠树 560
腊莲绣球 480
鱊科 1691
鲈科 1674
鲈属 1674
鲔 1662
鲔属 1662
鲋鲫科 1688
鲁氏菊头蝠 1748
象牙参 1513
象牙参属 1513
象甲(象虫)科 1626
象头马先蒿 1148
象头花 1471
象耳豆 572
象耳豆属 572
象南星 1470
象科 1768
象鼻 1768
象蒲 1485
象腿焦 1499
象腿蕉属 1499
猬状仙人掌属 262
猬科 1745
猬属 1745
猴头菌 27
猴头菌属 27
猴欢喜 733
猴欢喜属 733
猴科 1749
猴樟 284
敦化乌头 303
粽叶芦 1057
寒兰 1529
寒地平珠蚌 63
寒鸦 1738
寒莓 529
粪生黑蛋巢菌 52
粪伞科 42
粪金龟 1624
粪金龟科 1624
粪金龟属 1624
粪鬼伞 42
粪堆粪金龟 1624
粪箕笃 382
普氏原羚 1777
普氏蹄蝠 1748
普吉藤 974
普陀南星 1473
普洱茶 414
普通小鳔 362
普通水绵 7
普通凤了蕨 98
普通仙人掌 263
普通夜鹰 1732
普通鸭 1743
普通秋沙鸭 1718
普通洼线蕨 97
普通秧鸡 1727
普通鸳 1719
普通翠鸟 1733
普通蝙蝠 1747
普通燕鸥 1729
普渡大胡麻 864
装饰卷柏 73
湖瓜草 1495
湖瓜草属 1495
湖北山楂 505
湖北木兰 267
湖北贝母 1379
湖北地黄 1150
湖北百合 1386
湖北麦冬 1387
湖北花楸 539
湖北杜茎山 907
湖北沙参 1225
湖北附地菜 1040
湖北环毛蚓 1593
湖北枫杨 161
湖北络石 971
湖北圆吻鲴 1666
湖北海棠 511
湖北黄精 1393
湖北旋覆花 1305
湖北葡萄 731
湖北裂瓜 789
湖北紫荆 562
湖北檫木 837
湖北鼠李 716
湖北鼠尾草 1102
湖北蝇子草 247
湖北算盘子 633
湖北繁缕 249
湖针海绵 1565
湖南连蒲 421
湖南香薷 1069
湖南犁头尖 1482
湖南淫羊藿 1482
湖螺 1573
湘华鲮 1665
湘南 298
湘南星 1471
湘桂马铃苣苔 1190
湘粉栝楼 794
湘赣鳅 1251
湿生火绒草 1312
湿生苦荬菜 1343
湿生金锦香 812

湿生扁蕾 953
湿生鼠曲草 1300
湿地蔺灯藓 63
湿地蒿 1258
滑石 1783
滑石片岩 1784
滑叶山姜 1505
滑叶花椒 654
滑叶藤 324
滑桃树 640
滑桃树属 640
滑鼠蛇 1708
温州长蒴苣苔 1184
温郁金 1510
游蛇 1708
游蛇科 1706
游藤卫矛 700
溲疏 478
溲疏属 477
溏丹 1385
溪公鼠尾草 1102
道孚虎耳草 489
遍地金 424
隔山香 870
隔山消 979
隔距兰属 1526
犀金龟科 1623
犀科 1769
犀属 1769
强壮观音座莲 82
疏毛女娄菜 246
疏毛老鹳草 613
疏毛吴茱萸 647
疏毛绒草 1085
疏毛翅茎草 1149
疏毛圆锥乌头 306
疏毛绣线菊 542
疏毛磨芋 1467
疏叶当归 849
疏叶卷柏 75
疏叶香根芹 870
疏叶总梗委陵菜 518
疏叶委陵菜 518
疏叶崖豆藤 588
疏头过路黄 917
疏羽半边旗 91
疏羽鳞毛蕨 117
疏花卫矛 698
疏花车前 1198
疏花石斛 1534
疏花仙茅 1410
疏花刺果卫矛 694
疏花穿心莲 1165
疏花美登木 701
疏花粉条儿菜 1363
疏花蛇葡萄 218
疏花婆婆纳 1156
疏花蔷薇 526
疏花酸藤子 906
疏花槭 674
疏序黄荆 1054
疏苞火绒草 1312
疏苞高原香薷 1068
疏松卷柏 74
疏齿银莲花 316
疏果石丁香 1003
疏脉半蒴苣苔 1186
疏棘角孔海胆 1640
缅甸陆龟 1700
缅甸树参 838
缅甸绞股蓝 784
缅茄 546
缅茄属 546
缘毛鸟足兰 1559
缘毛卷耳 240
缘毛紫菀 1262
缘花党参 1232
缘纹边漏斗蛛 1597
缘管浒苔 6
骚扰黄虻 1631

## 十三 画

瑞丽黄芩 1106
瑞香 754
瑞香科 752
瑞香属 753
瑞香绿草 1217
琵琶泽泻 1357
琵嘴鸭 1716
摄龟属 1700
鼓槌石斛 1532
塌棵菜 448
塘谷耳黄芪 551
塘虱角 1052
塘鳢科 1683
越桐 1048
蒜 1367
蒜叶婆罗门参 1351
蒜头百合 1386
墓头回 1215
蓝丁香 943
蓝子鱼科 1681
蓝子鱼属 1681
蓝无壳侧鳃 1577
蓝玉簪龙胆 949
蓝叶藤 984
蓝白龙胆 949
蓝花子 456
蓝花凤仙花 684
蓝花老鹳草 612
蓝花参 1237
蓝花参属 1237
蓝花绿绒蒿 441
蓝花荆芥 1092
蓝花棘豆 591
蓝尾石龙子 1705
蓝刺头属 1290
蓝刺鹤虱 1036
蓝果小檗 362
蓝果树 825
蓝果树科 825
蓝果树属 825
蓝果蛇葡萄 720
蓝侧金盏花 312
蓝树 972
蓝点马鲛 1682
蓝钟花 1233
蓝钟花属 1232
蓝香草 1045
蓝盆花 1221
蓝盆花属 1221
蓝桉 803
蓝堇草 341
蓝堇草属 341
蓝圆鲹 1677
蓝胸秧鸡 1728
蓝海龙 1673
蓝黄红菇 46
蓝雪花 923
蓝雪花属 923
蓝雀花 593
蓝雀花属 593
蓝铜矿 1182
蓝猪耳 1153
蓝猪齿鱼 1680
蓝斑背肛海兔 1577
蓝萼香茶菜 1077
蓝锭果 1200
蓝翡翠 1734
蓝翠雀花 335
蓝鲸 1758
蒲儿根 1342
蒲公英 1349
蒲公英风毛菊 1333
蒲公英属 1348
蒲公幌 1297
蒲公幌属 1297
蒲桃 805
蒲桃属 804
蒲葵 1463
蒲葵属 1463
莲子菜 997
蓬菜葛 944
蓬菜葛属 944
蓬蘽 532
蒈 1239
蒈状亚菊 1243
蒈属 1238
蒿叶猪毛菜 256
蒿草属 1195△ 1248
蒺藜 616
蒺藜科 615
蒺藜属 616
蓑衣鹤属 1726
蓑羽鹤 1726
蓑鲉科 1627
蒴莲 772
蒴莲属 772
蒙古口蘑 40
蒙古乌蓝 1309
蒙古石竹 241
蒙古白头翁 343
蒙古红鲌 1660
蒙古苍耳 1355
蒙古芯芭 1133
蒙古岩黄芪 578
蒙古胡黄连 1634
蒙古荚蒾 1212
蒙古柞 177
蒙古柳 165
蒙古鸦葱 1334
蒙古香蒲 1485
蒙古扁桃 497
蒙古莸 1045
蒙古堇菜 771
蒙古绣线菊 542
蒙古黄芪 551
蒙古堇爬藤 726
蒙古蒿 1254
蒙自十大功劳 369
蒙自木蓝 580
蒙自木芹 869
蒙自长蒴苣苔 1185
蒙自吊石苣苔 1188

蒙自清藤 300
蒙自草胡椒 388
蒙自桦 167
蒙自栒子 503
蒙自黄花木 594
蒙自猕猴桃 406
蒙桑 191
蒙菊 1286
蒙锐石 1791
蒙椴 736
蒙疆苓菊 1308
蓟 1278
蓟属 1277
蓟罂粟 426
蓟罂粟属 426
蓬梗花 1198
蟾柱算盘子 633
楼梯草 196
楼梯草属 195
楼燕 1733
楠属 298
楠藤 1008
楝 660
楝叶吴茱萸 647
楝科 659
楝属 660
桦树 182
桦树属 182
榆 182
榆干侧耳 39
榆中贝母 1380
榆叶梅 498
榆拟层孔菌 30
榆科 178
榆钱菠菜 252
榆属 180
榄仁树 818
榄仁树属 817
榄李 817
榄李属 817
榄绿粗叶木 1006
橄叶独活 863
橄树 737
橄树科 733
橄树属 735
槐叶蘋 140
槐叶蘋科 140
槐叶蘋属 140
槐树 600
槐属 599
槐蓝 581
槐蓝属 579
椿叶花椒 653
槚叶茶 486
槚叶南蛇藤 693
槚叶菊 1287
槚形丽蚌 1584
槚形藻属 11
槚蚌属 1585
榔子 512
榔树 1160
槲木 835
槲木属 835
槟柠 506
槟柠属 506
榴树 546
赖草 1448
赖草属 1448
雾水葛 205
雾水葛属 205
雾冰藜 253
雾冰藜属 253
雷丸 33
雷氏七鳃鳗 1643
雷公莲 1468
雷公莲属 702 1468
雷公桔 445
雷公藤 702
雷公藤属 702
雷打果 966
雷波乌头 308
零余虎耳草 488
感应草 610
感应草属 610
碎米荠 449
碎米荠属 449
碎米莎草 1490
碎米桠 1079
碎米蕨 94
碎米蕨叶马先蒿 1142
碎米蕨叶黄堇 428
碎米蕨属 94
碗花草 1176
碗蕨 88
碗蕨科 88
碗蕨属 88
碰砂 1787
辐毛鬼伞 42
辐状肋柱花 954
辐射刺芙蓉 741
鲨科 1595
鲨属 1595
鹰龙人 443
嗜粘液蛞蝓科 1579
照山白 893
暗色孢科 53
暗色菇类 1397
暗花金挖耳 1274
暗纹东方鲀 1691
暗罗 273
暗罗属 273
暗消藤 987
暗绿绣眼鸟 1743
暗绿紫堇 432
暗绿蒿 1249
暗紫贝母 1381
暗紫耧斗菜 317
暗黑鳃金龟 1623
暗腹梅衣 58
暗腹雪鸡 1726
暗褐飘拂草 1493
暗鳞鳞毛蕨 116
暖地大叶蕨 62
睡莲 386
睡莲科 385
睡莲属 386
睡菜 958
睡菜科 958
睡菜属 958
腱毛杜鹃 890
腺毛茶藨 486
腺萼凤仙花 684
路氏双髻鲨 1646
路边青 509
路边青属 509
路南凤仙花 684
跳八丈 622
跳蛛科 1597
蜈蚣兰 1526
蜈蚣草 93
蜈蚣草属 1444
蜈蚣科 1607
蜈蚣属 1607
蜈蚣藻 15
蜈蚣藻属 15
峨眉蕨 103
峨眉蕨属 103
蛾蝉属 1616
蛾螺科 1576
蜂斗草 814
蜂斗草属 814
蜂斗菜 1323
蜂斗菜属 1323
蜂房叶山胡椒 289
蜂巢草 1084
蜂猴 1749
蜂猴科 1749
蜂窝菌属 31
蜣螂 1623
蝉花 21
蝉科 1615
蝉翼藤 666
蝉翼藤属 666
蜕叶金腰 475
蛸科 1591
蛸属 1591
蛹虫草 20
置疑小檗 357
蜀五加 834
蜀西香青 1246
蜀侧金盏花 313
蜀葵 740
蜀葵叶蟹苹 1411
蜀葵属 740
蜀黍 1453
幌伞枫 840
幌伞枫属 839
幌菊 1134
幌菊属 1134
锴那蒿 1250
锤头双髻鲨 1647
锦地罗 425
锦鸡儿 559
锦鸡儿属 557 1195
锦鸡属 1722
锦带花 1214
锦带花属 1214
锦香草 812
锦香草属 812
锦绣龙虾 1602
锦绣苋 258
锦蛇属 1707
锦葵 743
锦葵叶华千里光 1341
锦葵科 737
锦葵属 742
锥 172
锥叶柴胡 851
锥花小檗 354
锥花莸 1046
锥花黄堇 436
锥花属 1073
锥花绿绒蒿 442
锥花囊吾 1318

浦东蛛毛苣苔 1191
锥齿鲨科 1604
锥齿鲨属 1604
锥梁 172
锥属 172
锥螺科 1573
锥螺属 1573
锡石 1792
锡叶藤 402
锡叶藤属 402
锡生藤 375
锡生藤属 375
锡兰双盘蕨 102
锡兰肉桂 287
锡兰莲属 342
锡兰榕 1443
锡兰橄榄 733
锡金报春 922
锡金岩黄芪 578
锡嘴雀 1744
锡嘴雀属 1744
锯叶竹节树 815
锯叶变豆菜 877
锯叶峨眉黄芩 1109
锯尾鳜虎 1705
锯齿长臂虾 1602
锯齿华溪蟹 1606
锯齿溪蟹 1605
锯缘青蟹 1605
锯缘摄龟 1700
锯鲨科 1647
锯鲨属 1647
锯鳐科 1648
锯鳐属 1648
矮大黄 231
矮小山麦冬 1387
矮小石松 71
矮小青海马先蒿 1146
矮小孩儿参 245
矮小猫眼草 476
矮山芝麻 749
矮山姜 1504
矮卫矛 698
矮火绒草 1313
矮石斛 1532
矮血龙树 1405
矮龙胆 951
矮生紫背金盘 1058
矮丛风毛菊 1328
矮牡丹 404
矮冷水花 203
矮茎囊瓣芹 875
矮齿楼梯草 195
矮金莲花 353
矮垂头菊 1282
矮泽芹 857
矮泽芹属 857
矮砂仁 1508
矮美花 1511
矮美丽风毛菊 1333
矮素馨 937
矮麻黄 157
矮萱草 1383
矮紫盛尾 1421
矮紫金牛 902
矮茜 1253
矮慈菇 1358
雅科 1722
雅属 1725
豁 1760
豁属 1760
糊李 513
糊李属 513
种 1443
种属 1443
穗属 1443
穗穗沙草 1490
新木姜子 296
新木姜子属 296
新月蕨属 106
新风轮 1059
新风轮属 1059
新对虾属 1601
新银鱼属 1654
新塔花 1115
新塔花属 1115
新源贝母 1379
新樟 296
新樟属 295
新疆五针松 147
新疆贝母 1380
新疆方枝柏 152
新疆芍药 403
新疆白合 1386
新疆报春 921
新疆杨 163
新疆远志 663
新疆冷杉 143
新疆沙冬青 548
新疆沙参 1224
新疆阿魏 861
新疆忍冬 1205
新疆柳叶菜 821
新疆棉穿鱼 1137
新疆枸杞 1120
新疆香堇 768
新疆秦艽 949
新疆桃 497
新疆柴胡 853
新疆党参 1228
新疆海罂粟 439
新疆茜精 1393
新疆野豌豆 607
新疆梨 522
新疆落叶松 144
新疆锦鸡儿 558
新疆鼠尾草 1104
新疆缬草 1218
筒骨海绵科 1565
催吐萝芙木 970
催吐鲫鱼藤 986
催乳藤 982
微毛山矾 933
微毛布惊 1055
微毛血见愁 1114
微毛柃 416
微毛筋骨草 1056
微孔草 1037
微孔草属 1037
微红楔蚌 1585
微花藤 708
微花藤属 707
微齿眼子菜 1362
微柱麻 194
微柱麻属 194
微绿三角麻 193
微斑唇柱苣苔 1182
微糙紫菀 1259
腹水草 1159
腹水草属 1158
腹足纲 1570
腹刺鲀属 1692
腹菌科 48
腺毛马蓝 1174
腺毛水竹叶 1429
腺毛异蕊芥 451
腺毛阴行草 1152
腺毛茎翠雀花 337
腺毛委陵菜 518
腺毛泡花树 681
腺毛莓 528
腺毛高粱泡 533
腺毛剪秋罗 243
腺毛黑种草 342
腺毛翠雀花 336
腺叶桂樱 510
腺叶绢毛蔷薇 527
腺叶蔷薇 525
腺花香茶菜 1075
腺茉莉 1046
腺齿越橘 898
腺齿蔷薇 523
腺果杜鹃 891
腺果蔷薇 525
腺药珍珠花 917
腺点油瓜 787
腺梗豨莶 1340
腺粒委陵菜 517
腺萼马银花 889
腺萼木属 1009
腺鼠刺 481
腰果 666
腰果小檗 358
腰果属 666
腰骨藤 965
腰骨藤属 965
腾冲卫矛 699
解氏珠贝母 1582
鲇 1668
鲇科 1668
鲇属 1668
鲅科 1682
鲀科 1687
鲀属 1687
鲍科 1570
鲍属 1570
鲈塘鳢属 1683
鲈鲤 1663
鲈鲤属 1663
鲩属 1670
鲂 1659
鲂属 1659
鲌 1682
鲌科 1682
鲫 1686
鲫科 1686
鲫属 1686
鼠曲风毛菊 1329
鼠曲草 1298
鼠曲草属 1298
鼠妇 1600
鼠妇草 1443
鼠妇虫 1600
鼠李 714

鼠李科 709
鼠李属 713
鼠尾草 1102
鼠尾草属 1100
鼠尾香薷 1069
鼠尾粟 1458
鼠尾粟属 1458
鼠尾藻 11
鼠刺 481
鼠刺属 481
鼠兔科 1751
鼠兔属 1751
鼠科 1756
鼠海豚 1759
鼠海豚科 1759
鼠海豚属 1759
鼠蛇属 1709
鼠属 1756
鼠掌老鹳草 613
鼠鞭火绒草 1313
雏菊 1264
雏菊属 1264
鹊色黄鹂 1737
鹊肾树 192
鹊肾树属 192
鹊鸲 1740
鹊鸲属 1740
鹊属 1739
鹌鹑 1722
鹂鹎 1731
鹂鹎属 1731
鹂属 1719
鹑属 1722
意大利蜂 1635
慈竹 1437
慈菇 1359
慈菇属 1358
滇丁香 1007
滇丁香属 1007
滇山茶 413
滇川唐松草 348
滇川银莲花 314
滇川翠雀花 336
滇水金凤 687
滇中堇菜 771
滇龙胆草 950
滇北球花报春 919
滇白珠 886
滇边南蛇藤 693
滇芎 873
滇芎尾 873
滇朴 179
滇西山楂 505
滇西倒提壶 1034
滇白合 1385
滇肉桂 22
滇羊耳蒜 1548
滇池海棠 512
滇芹 878
滇芹属 878
滇牡丹 402
滇青冈 174
滇苦菜 1324
滇杭子梢 557
滇刺枣 719
滇刺黄连 370
滇虎榛 171
滇岩黄芪 578
滇韭 1366
滇南九节 1013
滇南大叶千里光 1279
滇南山杨 163
滇南山梅花 484
滇南天门冬 1371
滇南乌头 301
滇南杭子梢 556
滇南冠唇花 1090
滇南美登木 701
滇星蕨 131
滇美花崖豆藤 589
滇结香 755
滇桂 696
滇桂冬青 687
滇桂豆腐柴 1051
滇桂岩豆藤 587
滇桂蛇根草 1011
滇桂喜鹊芭苔 1190
滇润楠 295
滇海水仙花 922
滇黄芩 1106
滇菊精 1393
滇菜豆树 1164
滇野山茶 413
滇常山 1049
滇紫云菜 1175
滇紫金牛 905
滇紫草 1038
滇紫草属 1038
滇象牙参 1513
滇缅七叶树 679
滇缅斑鸠菊 1354
滇瑞香 753
滇榄 658
滇楸 1160
滇新樟 259
滇楹 171
滇黔地黄连 661
滇黔金腰 476
滇黔黄檀 567
滇磨芋 1467
滇藏五味子 277
滇藏玉兰 265
滇藏冷地卫矛 696
滇藏钓樟 290
滇藏苎麻 207
滇藏钝果寄生 215
滇藏海桐 493
滇鳔冠花 1167
满山红 893
满山香 278
满天星 1012
满江红 140
满江红科 140
满江红属 140
满树星 687
溪边凤尾蕨 92
溪边桑勒草 814
溪边蕨属 107
溪荪 1421
溪畔落新妇 473
溪黄草 1080
溪蟹 1606
溪蟹科 1605
溪蟹属 1605
滨木蓝 580
滨珊瑚科 1568
滨珊瑚属 1568
滨盐肤木 670
滨海牡蒿 1254
滨海前胡 871
滨螺科 1573
滨螺属 1573
滨藜属 251
濉栖阳遂足 1639
福州柿 926
福贡崖爬藤 726
福建后棱蛇 1708
福建过路黄 914
福建观音座莲 80
福建细辛 399
福建轮环藤 376
福建胡颓子 760
福建柏 150
福建柏属 150
福建野鸭椿 703
福建岸爬藤 726
福建假卫矛 702
福建颈斑蛇 1708
福建蔓龙胆 947
福建薯蓣 1413
福参 849
裸子植物门 141
裸子蕨科 98
裸麦 1446
裸芸香 651
裸芸香属 651
裸花水竹叶 1429
裸花紫珠 1044
裸体方格星虫 1591
裸茎金腰 476
裸茎碎米荠 450
裸茎囊瓣芹 875
裸果胡椒 390
裸珊瑚枝 56
裸柱草 1169
裸柱草属 1169
裸柱菊 1342
裸柱菊属 1342
裸重唇鱼属 1661
裸唇纲 1636
裸胸鲀 1687
裸胸鳝属 1656
裸苑 1320
裸苑属 1320
裸裂尻鱼属 1664
裸蒴 387
裸蒴属 387
裸鲤属 1661
裸鳍虫蠖 1657
裸瓣瓜属 784
褐马蜂 1634
褐云玛瑙螺 1578
褐牙鲆 1689
褐毛风毛菊 1332
褐毛毛连菜 1324
褐毛甘西鼠尾草 1103
褐毛垂头菊 1282
褐毛铁线莲 325
褐毛紫菀 1261
褐毛藁吾 1315
褐毛豌豆 589
褐孔菌属 30
褐叶线蕨 127
褐色观音座莲 80

褐色微蝗 1614
褐豆孔齿蛾 34
褐纹梳爪叩头虫 1621
褐环乳牛肝菌 44
褐顶赤蜻 1610
褐苞薯蓣 1415
褐柄灰色 49
褐背拟地鸦 1739
褐背金丝燕 1733
褐带环口螺 1572
褐虻 1631
褐翅红娘子 1616
褐翅鸦鹃 1731
褐唇贝母兰 1527
褐圆孔牛肝菌 43
褐铁矿 1781
褐家鼠 1757
褐粉蝨 1622
褐葛缕 1687
褐梨 522
褐盖肉齿菌 27
褐黏褶菌 31
褐斑三线舌鳎 1690
褐紫褶孔齿 31
褐黑口蘑 40
褐蓝子鱼 1681
褐鞘滨阶草 1389
褐粉孢猴桃 407
群虎草 977
嫁蛾 1571
裂瓣银莲花 315
缅江篱 17
缅茄麻花头 1339
缅蛏 1588
缅蛏属 1588
缠绕党参 1231
缝线海桐 494

## 十四 画

静水椎实螺 1578
静灰珠蜗属 49
静蝠 1679
瑶山谷精草 1433
瑶山南星 1474
碧冬茄 1122
碧冬茄属 1122
碧江壳毛杜鹃 893
墙草 200
墙草属 200
嘉兰 1382
嘉兰属 1382
嘉陵鲇须鮠 1660
嘉赐树 762
嘉赐树属 762
赫氏球石藻 11
蔷薇海星 1638
蔷薇科 495
蔷薇属 523
蔓九节 1013
蔓三七草 1301
蔓长春花属 972
蔓乌头 311
蔓龙胆属 747
蔓生马先蒿 1143
蔓生百部 1402
蔓生莠竹 1449
蔓出卷柏 73
蔓赤车 201
蔓茎葫芦茶 601
蔓性千斤拔 574
蔓荆 1055
蔓草虫豆 552
蔓胡颓子 759
蔓假繁缕 244
蔓剪草 976
蔓蕨科 64
蔓藦 728
蔷委夜蛾 1630
蓖麻 638
蓖麻蚕 1629
蓖麻属 638
蔊菜 456
蔊菜叶马先蒿 1146
蔊菜属 456
蕨茅 1445
蕨茅属 1445
蔓子补 1306
蔓叶远志 664
蔓叶眼子菜 1362
蔓科 218
蔓属 220
蔓蓝 230
榷莲 747
榷莲属 74
榕叶冬青 688
榕叶葡萄 729
榕树 188
榕属 185
榛 170
榛叶黄花稔 745
榛鸡属 1721
榛属 170
榧树 156
榧树属 156
榧螺科 1576
榧螺属 1576
槟榔 1460
槟榔青 671
槟榔青属 671
槟榔属 1460
槜藤子 572
槜藤子仁 572
槜藤子属 572
聚石斛 1534
聚叶花莺乌头 309
聚叶沙参 1226
聚叶虎耳草 488
聚伞白花耳草 1000
聚花风铃草 1227
聚花过路黄 913
聚花英蒾 1210
聚花草 1428
聚花草属 1428
聚花海桐 494
聚齿马先蒿 1145
聚锥水东哥 409
酸叶胶藤 963
酸豆 602
酸豆属 602
酸枣 719
酸味子 620
酸浆 1122
酸浆属 1122
酸脚杆属 810
酸藤 719
酸藤属 719
酸模 232
酸模叶蓼 225
酸模芒 1439
酸模芒属 1439
酸模属 232
酸橙 643
酸藤子 905
酸藤子属 905
碱地肤 256
碱韭 1367
碱黄鹤菜 1357
碱蓬 257
碱蓬属 257
碱蒿 1248
碟花开口箭 1401
磁铁矿 1781
磐 1340
磐草 1340
磐属 1340
蜚蠊科 1610
翡翠贻贝 1581
翡翠属 1734
雌黄 1784
雌雄麻黄 157
截叶胡枝子 583
截叶栎楼 797
截萼枸杞 1120
截萼鼠尾草 1100
截裂翅子树 750
颗粒梨头鳚 1648
蜘蛛抱蛋 1372 1373
蜘蛛抱蛋属 1372
蜘蛛香 1218
蜘蛛蟹科 1604
蜡烛树 939
蜡皮蜥 1704
蜡皮蜥属 1704
蜡烛草 1452
蜡菊属 1302
蜡梅 282
蜡梅科 281
蜡梅属 281
蜡蝉科 1616
蜡蝉属 1616
蜡瓣妇科 1600
蜡嘴雀属 1745
蜡瓣花 459
蜡瓣花属 459
螺帖属 (1603)
蝇子草 246
蝇子草属 245
蝇虫夹 255
蝇虎属 1597
蝇科 1632
蜻蜓 1609
蜻蜓兰 1560
蜻蜓兰属 1560
蜻属 1609
蜥蜴科 1705
螺藻科 1633
鹀 1721
鹀属 1721
鼯鼠 443
鼯鼠科 426
鼯鼠属 443
镁化合物类 1783
舞花姜 1510

舞花姜属 1150
舞草 564
舞草属 563
管叶槽舌兰 1545
管兰香 393
管形鸡油菌 26
管花马兜铃 397
管花肉苁蓉 1195
管花青皮木 208
管花秦艽 949
管花党参 1232
管花鹿药 1395
管角螺 1576
管茎过路黄 914
管神党参 1228
管海马 1673
管游苔 6
管萼山豆根 574
算珠豆 605
算珠豆属 604
算盘子 632
算盘子属 632
箬竹 1447
箬竹属 1447
僧帽水母 1566
僧帽水母科 1566
僧帽水母属 1566
鼻白蚁科 1612
魁蚶 1580
魁蛤 1580
魁蒿 1255
魁蓟 1278
膜叶刺蕊草 1099
膜叶芥草 1017
膜叶星蕨 131
膜叶钩藤 1020
膜边肋毛蕨 121
膜边獐牙菜 956
膜苞鸢尾 1421
膜苞垂头菊 1283
膜果麻黄 156
膜荚黄芪 550
膜稃草 1446
膜稃草属 1446
膜喙川木香 1289
膜蕨科 86
膜蕨属 86
膜蕨囊群片 876
膀胱果 703
膀胱岩蕨 111
馒头蟹科 1604
馒头蟹属 1604
鳎科 60
鳎属 1653
鲟科 1650
鲟属 1650
鲳科 1675
鲳属 1663
鲛鳐科 1693
鲑贝苇盖菊 29
鲑点石斑鱼 1675
鲑科 1653
鲦科 1670
鲦属 1669
鲜黄小檗 356
鲜黄连 367
鲜黄连属 367
獐 1772
獐牙菜 955
獐牙菜属 954
獐毛 1434
獐毛属 1434
獐耳细辛 341
獐耳细辛属 341
獐鹿 1772
獐猪 1755
獐猪科 1755
獐猪属 1755
麂属 1772
瘦房兰 1545
瘦房兰属 1545
瘦柄红石蕊 55
瘤子草 1297
瘤乳菇 45
瘤根 447
瘤根属 447
瘤椒 1118
瘤椒属 1118
瘤蕨 224
瘤蕨铁线蕨 332
瘤薄荷 1088
瘤子 678
瘤子属 678
赛山梅 929
赛北紫菀 431
赛莨菪 1124
赛莨菪属 1124
赛葵 743
赛葵属 743
赛湿丹 1385
寡毛一枝黄花 1342
寡毛纲 1593
寡盖扁担杆 735
蜜腺吴萸 647
蜜蜂花 1087
蜜蜂花属 1087
蜜蜂科 1635
蜜蜂属 1635
察瓦龙乌头 302
察隅紫堇 437
粽叶芦 1459
粽叶芦属 1459
漆 672
漆大姑 632
漆姑草 245
漆姑草属 245
漆树科 666
漆属 671
漆蜡蘑 36
漂白土 1791
滴水珠 1477
滴孔菌属 33
蒙薄牛奶菜 984
漏斗网蛛属 1597
漏斗网蛛科 1597
漏斗形杯伞 36
漏斗苣苔 1177
漏斗苣苔属 1184
漏斗泡囊草 1123
漏斗瓶蕨 87
漏芦 1345
蓼灰鱼藤 568
翠云草 76
翠鸟科 1733
翠鸟属 1733
翠青蛇 1707
翠枝柽柳 776
翠鸽 1271
翠菊属 1271
翠雀 336
翠雀叶蟹甲草 1269
翠雀属 334
熊耳草 1240
熊科 1761
熊胆草 1280
熊猴 1749
缩头水虱科 1599
缩茎韩信草 1108
缩砂密 1508
缩硬乌头 309
缫丝花 527
骡 1769

## 十五 画

楼斗菜 318
楼斗菜属 317
髯毛蚕缀 238
髯毛缘草 1217
撒尔维亚 1103
撑篙竹 1437
播娘蒿 451
赭色海底柏 1569
鞋靴狗娃花 1303
鞋靴桑 191
蕨 90
蕨叶人字果 339
蕨叶铁线莲 331
蕨叶蓼木 867
蕨科 90
蕨类植物门 69
蕨属 79
蕨菜 90
蕨麻 515
蕨属 90
蕨藻科 7
蕨藻属 7
蘑树 459
蘑树属 459
蕙兰 1528
藏叶秋海棠 780
藏菜 387
藏菜属 387
焦芋 1515
蕊木属 965
蕊被忍冬 1201
蕊帽忍冬 1204
碱叶草 482
碱叶草属 482
碱叶秋海棠 779
碱叶蚊子草 508
碱树科 672
碱海星科 1637
碱属 672
樟 284
樟子松 147
樟叶越橘 897
樟叶鹅掌柴 846
樟味藜 253
樟味藜属 253
樟科 282
樟属 283
樗树属 656
樱叶乌蔹莓 723

樱草 922
樱桃 500
樱桃李 520
樱桃属 499
樱桃椒 1118
樱蛤科 1588
槲叶雪莲花 1333
槲栎 175
槲寄生 216
槲寄生属 215
槲蕨 138
槲蕨科 138
槲蕨属 138
槽舌兰 1545
槽舌兰属 1545
槽茎银花 1037
横纹东方鲀 1691
横纹金蛛 1597
横带鼠鲨 1680
豌豆 594
豌豆七 466
豌豆属 594
歌天雷 627
歌马草 1433
醉鱼草 1130
醉鱼草科 1129
醉鱼草属 1129
醉心含笑 269
醉魂藤 982
醉魂藤属 982
醉蝶花 446
氨基草属 1493
鳄兽 1446
鳄穆兔耳草 1135
鳖马丁香 943
虾科 1613
虾蛄属 1627
蜈蚣科 1650
蜈蚣属 1650
蜈蚣虾科 1603
蜈蚣虾属 1603
蜈蚣科 1615
蜈蚣属 1615
蜘子草属 198
蜡科 1618
蝙蝠鱼科 1693
蝙蝠草 562 1270
蝙蝠草属 562
蝙蝠科 1746
蝙蝠属 1746
蝙蝠葛 378
蝙蝠葛属 378
蝙蝠蛾科 1627
蝴蝶双珠花 1213
蝴蝶花 1420
蝴蝶草属 1153
蝴蝶藤 774
蝶兰 1555
蝶兰属 1555
蝶豆属 563
蝶须 1247
蝶须属 1247
蝶螈科 1695
蝶螈属 1695
蝶螺 1571
蝶螺科 1571
蝶螺属 1571
蝮蛇 1711
蝮属 1711
蝽科 1706
蝾螈 1706
蝾螈草 1187
蝾属 1706
蝾科 1711
蝾属 1711
蝗菊 1321
蝗菊属 1321
蝰虫 1705
蟛兰 1529
墨汁鬼伞 41
墨吉对虾 1601
墨角藻科 10
墨灰离褶伞 38
稻 1450
稻壳孢 53
稻绿核菌 21
稻绿蝽 1618
稻属 1450
稻槎菜 1311
稻槎菜属 1311
稻蝗属 1614
稷 1450
稷属 1450
穆穗莎草 1490
德国小蠹 1610
德国鸢尾 1420
德夜蛾属 1633
德钦乌头 307
箭叶大油芒 1458
箭叶开口箭 1410
箭叶水苏 1089
箭叶水苏属 1089
箭叶雨久花 1416
箭叶垂头菊 1283
箭叶秋葵 739
箭叶海芋 1466
箭叶蓼 229
箭叶囊吾 1318
箭头羊角拗 970
箭头唐松草 351
箭竹 1445
箭竹属 21 1445
箭杆风 1505
箭杆柯 175
箭根薯 1411
箭根薯科 1410
箭根薯属 1410
膝曲乌蔹莓 722
膝沟藻 12
膝沟藻科 12
膝沟藻属 12
膝瓣乌头 304
鲫 1658
鲫血胆 908
鲫鱼藤 986
鲫鱼藤属 986
鲫属 1658
鲋 1652
鲋属 1652
鲤 1659
鲤科 1658
鲤属 1659
鲂 1662
鲂属 1662
鲎 1674
鲍 1678
鲍属 1678
鲔 1688
鲔科 1688
鲔属 1688
瘤毛獐牙菜 955
瘤皮孔酸藤子 906
瘤足蕨科 83
瘤足蕨属 83
瘤茎楼梯草 196
瘤枝波花藤 708
瘤索棚寄生 217
瘤孢地菇 23
瘤孢属 53
瘤冠苔科 68
瘤绵腹衣 58
瘤蕨属 132
额河千里光 1335
额敏贝母 1378
潮风草 976
潮虫科 1600
澳洲大螯 1610
澳洲茄 1124
澳洲鲍 1571
豬槁木姜子 292
缬草 1218
缬草属 1217
缘脐珍珠菜 914

## 十六 画

鲢脉蛾 674
鲟鳇属 1680
燕山雪 1608
燕麦 1436
燕麦属 20 1436
燕尾鲷 1683
燕科 1735
燕鸻科 1649
燕鸻属 1649
燕鸥 1735
鲬鳚属 1671
鞘山芎 858
鞘丝藻属 3
鞘花 212
鞘花属 212
鞘尾蝠科 1748
鞘尾蝠属 1748
鞘柄木 831
鞘柄木属 831
鞘柄菝葜 1398
鞘蕊花属 1062
薯蓣 1412
薯蓣 1414
薯蓣科 1411
薯蓣属 1411
薄蕨 86

蘑菇属 86
薄片变豆菜 877
薄片镜蛤 1587
薄片山矾 930
薄叶冬青 688
薄叶阴地蕨 78
薄叶红厚壳 419
薄叶鸡屎参 1229
薄叶卫矛 320
薄叶委陵菜 515
薄叶乌桕 73
薄叶羊蹄 1224
薄叶冬青 1245
薄叶杨梅 797
薄叶唇柱苣苔 1182
薄叶润楠 294
薄叶黄芩 1106
薄叶假耳草 1010
薄叶蝶豆 592
薄叶蓝刺头 1291
薄叶碎米荠 95
薄叶鼠李 716
薄叶囊瓣芹 875
薄皮纤孔菌 31
薄网蕨 65
薄网蕨属 65
薄果茶 453
薄果茶属 453
薄层猴欢喜 733
薄柱草 1011
薄柱草属 1011
薄荷 1087
薄荷属 1087
薄翅螳螂 1612
薄雪火绒草 1313
薄萼海桐 493
薄鳃草 243
薄鳃草属 243
薄鳅属 1667
薄嘴苇莺菜 800
薯豆 1440
薯豆属 1440
薤菜 1028
薜荔 188
薯 139
薯科 139
薯属 139
颠茄 1117
颠茄属 1117
橙 645
橙斗 25
橙色斑尾草 1100
橙花瑞香 753
橙点石斑鱼 1675
橙萼长风花 1543
橙盖鹅膏 40
橄绿阳霍 861
橄榄 657
橄榄科 657
橄榄属 657
橘褐天牛 1626
橡皮针层孔菌 33
檫吾 1318
檫吾属 1315
霍山石斛 1533
藁菜 1084
冀地整 1611
踏郎 578
蹄盖蕨科 100
蹄盖蕨属 101
蹄蝠科 1748
蹄蝠属 1748
嘴签 711
嘴签属 711
蟒蟹七 1471
蟒蟹甲 1098
黔川乌头 302
黔西报春 918
黔岩苣苔 1192
黔岩苣苔属 1192
黔岭淫羊藿 366
黔生大苞寄生 215
黔杜悬钩子 531
黔滇木蓝 579
鹀藏属 118
镜子苔草 1488
镜山草 203
簕打碗花 1025
簕边耳柄褶菌 31
簕拦肭 1029
篮子藻 17
篌竹 1453
儒艮 1767
儒艮科 1767
儒艮属 1767
衡山金丝桃 421
衡州乌药 375
膨胀丽藻 8
膨囊苔草 1487
獭猴科 1749
褐片蛤 1583
褐纹冠蛤 1585
褐纹鬼伞 42
褐条鱼属 1589
鲳科 1683
鲳属 1683
鲅 1659
鲅属 1659
鲋鱼 1656
鳃科 1677
鲸鲨 1645
鲸鲨科 1645
鲸鲨属 1645
鳊 1674
鳊科 1674
鳊鱼 1674
鲷 1679
鲷属 1679
鲸 1662
鲸属 1662
鲱科 1682
鲑 1651
鲑科 1651
鲑属 1651
鹦哥花藤 590
鹦鹉科 1730
鹦鹉属 1730
鹧鸪 1723
鹧鸪花 662
鹧鸪花属 662
鹧鸪菜 18
鹧鸪菜属 18
鹧鸪属 1723
磨芋 1467
磨芋属 1467
磨盘草 739
麝 1771
麝属 1771
癞蛤蟆属 1695
癣花香茶菜 1079
瘿椒树 704
瘿椒树属 704
凝花菜 14
凝花菜科 14
凝花菜属 14
凝菜属 17
瀑岛山龙眼 208
豫豫桂 803
糙毛五加 833
糙毛羽叶参 844
糙毛猕猴桃 406
糙叶千里光 1336
糙叶五加 833
糙叶水苎麻 193
糙叶长节耳草 1003
糙叶火焰花 1171
糙叶羽叶参 844
糙叶败酱 1216
糙叶树 178
糙叶树属 178
糙叶香青 1245
糙叶秋海棠 778
糙叶铁梗报春 922
糙叶黄芪 551
糙叶斑鸠菊 1352
糙叶藤五加 833
糟皮倒耳 39
糟皮牌 169
糟红景天 467
糙苏 1097
糙苏属 1096
糙枝金丝桃 422
糙果芹属 880
糙果紫堇 437
糙果蜘蛛抱蛋 1372
糙草 1032
糙草属 1032
糙点栝楼 794
糙海参 1637
糖芥 452
糖芥细毛菊 1344
糖芥属 452
糖茶藨 486
糖胶树 959
糖棕 1461
糖棕属 1461
壁虎科 1704
壁虎属 1704
壁钱科 1596
壁钱属 1596


## 十七 画


戴氏红鲌 1660
戴氏拉玉珠 1596
戴星草 1344
戴星草属 1344
戴胜 1734
戴胜科 1734
戴胜属 1734
藏丁香 1007
藏乌鸡 1723
藏边大黄 231
藏报春 922
藏沙蒿 1258

藏刺榛 170
藏狐 1761
藏波罗花 1162
藏滇舌唇兰 1556
藏南党参 1231
藏南藤乌头 303
藏报花 1280
藏报花属 1280
藏原羚 1777
藏羚 1777
藏羚属 1777
藏黑果小檗 358
藏象牙参 1513
藏鼠兔 1751
藏蓝青 1318
薰衣草 1083
薰衣草科 1083
薰倒牛 611
薰倒牛属 611
藁本 867
藁本属 866
鲜生马先蒿 1145
薛状马先蒿 1146
薛状景天 471
檀香 210
檀香科 209
檀香属 210
檀梨 210
檀梨属 210
檑子栎 176
覆水毋科 1566
覆水毋属 1566
霜霉科 19
礁膜 5
礁膜科 5
礁膜属 5
蟾螂科 1611
蟾螂铁打 1479
蟾蜍 1596
蟾蜍属 1596
蟋蟀科 1614
蟋蟀属 1614
螺序草 1019
穗花马先蒿 1146
穗花玄参 1152
穗花杉 155
穗花杉属 155
穗花荆芥 1092
穗花香科科 1113
穗花粉条儿菜 1364
穗花蛇菰 218
穗花婆婆纳 1155
穗序鹅掌柴 844
穗状狐尾藻 823
穗状香薷 1070
鹭子三尖杉 155
鹭齿苏铁 141
鹭齿眼子菜 1362
簇毛木层孔菌 32
簇叶新木姜子 297
簇生委陵菜 519
簇生卷耳 239
簇生沿丝伞 42
簇生柴胡 852
簇生榆 1118
簇花茅水草 236
簇花清风藤 682
簇花蒲桃 805
繁花锦鸡儿 558
繁缕 250
繁缕虎耳草 490
繁缕属 248
繁穗苋 259
爵床 1172
爵床科 1164
爵床属 1172
鳊科 1679
鳊属 1679
鳃金龟科 1623
鳃科 1667
鳃科 1649
鳃属 1649
鳃科 1652
鳃属 1653
鳂科 1669
鳄属 1661
鳟属 1664
鳞科 1690
鳄形短体鳗 1657
鳄梨 297
鳄梨属 297
鳄嘴花 1167
鳄嘴花属 1167
鳜虎鱼科 1684
鳕 1662
鳢 1650
鳢属 1650
鳖斯科 1612
鹆鼠科 1756
麋鹿 1772
麋鹿属 1772
糠椽 736
鼎形草属 1438
鼠叶山牵羊 1176
翼红娘虫 1688
翼茎羊耳菊 1306
翼果苔草 1487
翼齿六棱菊 1310
翼柄翅果菊 1325
翼柄紫菀 1259
翼百花属 1220
翼核果 718
翼核果属 718
翼蛇莲 786
翼萼凤仙花 686
翼萼蓼 954
翼萼蓼属 954
翼蕊 224
蘑草 1452
蘑草属 1452
鹩哥 1737
鹩哥属 1737
鹬科 1728
鹬属 1728
鹰尖栎稀草 196

## 十八 画

藤山柳属 409
藤五加 833
藤长苗 1025
藤石松 72
藤石松属 72
藤血竭 1462
藤状火把花 1063
藤金合欢 545
藤枸 184
藤壶科 1598
藤壶属 1598
藤黄 420
藤黄科 419
藤黄檀 566
藤少 609
藤麻 205
藤麻属 205
藤紫珠 1044
藤槐 554
藤槐属 554
藤漆 668
藤漆属 668
檫木 299
檫木属 299
臆科 1681
臆属 1681
蘸草 1497
蘸草属 1498
蘸寄生 1195
蘸寄生属 1195
鞭打绣球 1135
鞭打绣球属 1135
鞭叶耳蕨 119
鞭叶铁线蕨 96
鞭杖藻科 4
鞭柱唐松草 351
鞭檐梨头尖 1481
鞭麦 241
蟛蜞菊 1355
蟛蜞菊属 1355
蟠桃 498
蟠蛤 1616
蟠蛤属 1616
镰片假毛蕨 106
镰叶耧斗花 1081
镰叶西番莲 774
镰叶虾脊兰 1523
镰叶扁担杆 735
镰叶铁角蕨 107
镰叶黄柏 651
镰叶瘤足蕨 83
镰羽贯众 114
镰形棘豆 591
镰翅羊角蒜 1546
镰萼喉毛花 946
馥芳艾纳花 1266
馥郁滇丁花 1007
翻车鲀 1693
翻车鲀科 1693
翻车鲀属 1693
翻白叶树 750
翻白草 516
翻白蚊子草 508
翻白繁缕 249
鳎科 1690
鳑鲏属 1664
鳐科 1648
鳐属 1648
蟹马陆科 1608
蟹爪兰 264
蟹爪兰属 264
蟹甲草属 1269
鲥科 1762
鲥属 1762 1763
鲥鱼花 1072
鲥鱼花属 1072
鲥獭 1763

[illegible]科 1712
[illegible]属 1712
鹭花 1713
鹭宫草 1377
鹭宫草属 1377
鹭鸟 1713
鹭爪风 1021
鹰爪花 270
鹰爪花属 270
鹰爪枫 372
鹰爪枫属 372
鹰爪虾蛄对虾 1601
鹰科 1719
鹰属 1719
鹰鹃 1721
鹰鹃属 1721
鹰嘴豆 563
鹰嘴豆属 563

## 十九 画

鹿含 1056
鹿香科 1240
鹿角菜属 1240
鹿角草 1056
鹿茸 254
鹿药 1401
鹿药属 1401
鹿科 251
鹿属 253
獐牙菜 947
獐牙菜属 947
獐类植物 3
蘑菇科 41
蘑菇属 41
攀生刺果卫矛 694
攀竹藤 989
攀茎钩藤 1021
攀倒甑 1217
攀雀 1743
攀雀科 1743
攀雀属 1743
攀援子门冬 1369
攀援胡颓子 760
攀援星蕨 131
檫檬 644
攫逊壁虎 1704
蟾蜍草 1179
蟾蜍科 1696
蟾蜍属 1696
鹳鹆 1740
鹳鹆科 1740
鹳鹆属 1740
鳄冠花属 1167
鳃鱼 1668
鳃鱼科 1668
鳃鱼属 1668
鳃鳅虎鱼科 1685
鳃鱼 1655
鳃鱼科 1655
鳃鱼属 1655
鳄科 1672
鳄属 1672
鳔属 1651
鳜鱼 1652
鳜属 1652
鳞 1658
鳞藻属 1658
鳞藻科 3
鳞毛蕨松草 350
鳞鲃科 1580
炉仗花 895

## 二十 画

藕荷 1514
[illegible]肠 1291
[illegible]肠属 1291
[illegible]科 1702
[illegible]属 1702
[illegible]鳍科 1611
[illegible] 1712
[illegible]科 1712
[illegible]属 1712
[illegible]鳅科 1657
[illegible]猪刺 358
[illegible] 1676
[illegible]属 1676
[illegible]属 1676
[illegible]藤 961
[illegible]藤属 961
[illegible]毛蕨科 113
[illegible]毛蕨属 115
[illegible]片水麻 195
[illegible]叶龙胆 950
[illegible]叶鲃 66
[illegible]叶鲃属 66
[illegible]花草 1170
[illegible]花草属 1170
[illegible]果菜 765
[illegible]果变豆菜 877
[illegible]始蕨 89
[illegible]始蕨科 89
[illegible]始蕨属 89
[illegible]砖藻 1586
[illegible]鸡鸾鱼 1672
[illegible]海底柏 1569
[illegible]盖红菇 46
[illegible]盖蕨属 88
[illegible]斑莢蒾 1213
[illegible]鼠科 1754
[illegible]鼠属 1754
[illegible]叶 1475
[illegible]叶属 1475
[illegible]菜 16
[illegible]菜属 16
[illegible]团 198
[illegible]团属 198
[illegible]条 1198
[illegible]粒 736
[illegible]箱 1450
[illegible]木小甘菊 1272

## 二十一 画

[illegible]珠珍珠菜 912
[illegible]珠草 819
[illegible]珠草属 819
[illegible]珠香茶菜 1077
[illegible]齿鲸科 1757
[illegible]兜草 1483
[illegible]兜树 1483
[illegible]兜树科 1483
[illegible]兜树属 1483
[illegible]蕊乌头 304
[illegible]蕊滇紫草 1038
[illegible]王 617
[illegible]王属 616
[illegible]王鲃 629
[illegible]雷鸟萝芙木 968
[illegible]肠 1291
[illegible]肠属 1291
[illegible] 1660
[illegible]属 1660
[illegible]小肝菌 43
[illegible]香石竹 241
[illegible]香百合 1386
[illegible]香草 1115
[illegible]科 1773
[illegible]鸭 1717
[illegible]鸭属 1717
[illegible]属 1773
[illegible]鼠 1756
[illegible]鼠属 1756
[illegible]鳃 1746
[illegible]头鱼头 304

## 二十二 画

[illegible]黄精 1392
[illegible]托羊蹄甲 553
[illegible]翠雀花 335
[illegible]翠雀花 337
[illegible]颚虎 1456
[illegible]颚虎属 1456
[illegible][illegible]芹 875
鹘科 1715
鹘属 1715
[illegible]色 1701
[illegible]的鸟 1701
[illegible]边海星 1637
[illegible]边海星属 1637
[illegible]点石斑鱼 1675

## 二十三画以上

[illegible]刺属 1458
[illegible]脊属 1776
[illegible]蜥科 1703
[illegible]蜥属 1703
鳞科 1671
[illegible]属 1671
[illegible]属 1746
[illegible]鼠科 1746
[illegible]属 1656

# 拉丁学名索引*


## A

Abelia R. Br. 1198
biflora Turcz. 1198
chinensis R. Br. 1198
dielsii (Graebn.) Rehd. 1198
engleriana (Graebn.) Rehd. 1198
*graebneriana* Rehd. 1198
macrotera (Graebn. et Buchw.) Rehd. 1199
parvifolia Hemsl. 1199
zanderii (Graebn.) Rehd. 1198
Abelmoschus Medic. 737
crinitus Wall. 738
esculentus (L.) Moench 738
*esquirolii* (Lèvl.) S. Y. Hu 739
manihot (L.) Medic. 738
var. pungens (Roxb.) Hochr. 738
moschatus Medic. 738
mulinensis Feng 738
sagittifolius (Kurz) Merr. 739
Abies Mill. 142
chensiensis Van Tiegh. 142
*chinensis* Franch. 148
delavayi Franch. 142
fabri (Mast.) Craib 142
fargesii Franch. 142
faxoniana Rehd. et Wils. 142
*gmelini* Rupr. 144
holophylla Maxim 142
nephrolepis (Trautv.) Maxim. 143
sibirica Ledeb. 143
var. *nephrolepis* Trautv. 143
*sutchuenensis* (Franch.) Rehd. et Wils. 142
*Abildgaardia fusca* Nees 1493
Ablennes Jordan et Fordice 1670
anastomella (Cuvier et Valenciennes) 1671
Abrus Adans. 544
*cantoniensis* Hance 544
fruticulosus Wall.ex Wight et Arn. 544
mollis Hance 544
precatorius L. 544
Abutilon Mill. 739
indicum (L.) Sweet 739
var. forrestii (S. Y. Hu) Feng 739
sinense Oliv. 739
striatum Dickson 739
theophrasti Medic. 739
Acacia Mill. 545
catechu (L.) Willd. 545
var. wallichiana (DC.) P. C. Huang 545
confusa Merr. 545
delavayi Franch. 545
farnesiana (L.) Willd. 545
magaladens Desv. 545
mollis Wall. 547
pennata (L.) Willd. 545
sinuata (Lour.) Merr. 545
yunnanensis Franch. 545
Acalypha L. 618
australis L. 618
brachystachys Horan. 618
*godseffiana* Mast var. *marginata* Hort. 619
hispida Burm. f. 619
wilkesiana Muell. -Arg. 619
var. *marginata* Hort. 619
Acampe Lindl. 1517
*mutiflora* (Lindl.) Lindl. 1517
rigida (Buch. -Ham. ex J. E. Smith.) P. F. Hunt 1517
Acanthaceae 1164
Acanthochiton Herrmannsen 1570
rubrolineatus (Lischke) 1570
*Acanthocodium fragile* Sur. 7
Acanthogobius Gill 1684
flavimanus (Temminck et Schlegel) 1684
*Acanthopale dalzielii* W. W Smith 1174
Acanthopanax Miq. 832
brachypus Harms 832
evodiaefolius Franch. 832
var. ferrugineus W. W. Smith 832
giraldii Harms 832
var. *hispidus* Hoo 832
var. nodiflorus (Dunn) Li 833
var. pilosulus Rehd. 832
var. pubescens (Pamp.) Li 832
var. villosulus (Harms) Li
gracilistylus W. W. Smith 832
henryi (Oliv.) Harms 833
lasiogyne Harms 833
leucorrhizus (Oliv.) Harms 833
var. angustifoliatus (Hoo) Shang 833
var. fulvescens Harms et Rehd. 833
*obovatus* Hoo 832
rehderianus Harms 833
senticosus (Rupr. et Maxim.) Harms 833
var. *subinermis* (Regel) Kitag. 833
sessiliflorus (Rupr. et Maxim.) Seem. 834
var. parviceps Rehd. 834
setchuenensis Harms et Diels 834
var. latifoliatus Hoo 834


* 拉丁学名索引编者：张馨

setosus (Li) Shang 834
setulosus Franch. 834
simonii Schneid. 834
var. longipedicellatus Hoo 834
trifoliatus (L.) Merr. 834
var. *setosus* Li 834
verticillatus Hoo 835
Acanthus L. 1164
ilicifolius L. 1164
Accipiter Brisson 1719
gentilis (Linnaeus) 1719
nisus (Linnaeus) 1719
virgatus (Temminck) 1719
Accipitridae 1719
Acer L. 672
anhweiense Fang et Fang f. 672
barbinerve Maxim. 674
buergerianum Miq. 672
catalpifolium Rehd. 673
davidii Franch. 673
elegantulum Fang et P. L. Chiu 673
fabri Hance 673
franchetii Pax 673
ginnala Maxim. 673
subsp. theiferum (Fang) Fang 673
grosseri Pax 673
var. hersii (Rehd.) Rehd. 673
henryi Pax 674
kweilinense Fang et Fang f. 674
laevigatum Wall. 674
laxiflorum Pax 674
mono Maxim. 674
var. macropterum Fang 674
negundo L. 674
oblongum Wall. ex DC. 674
var. omeiense Fang et Soong 674
oliverianum Pax 675
palmatum Thunb. 675
var. thunbergii Pax 675
*septemlobum* Thunb. 840
sinense Pax 67.
sinopurpurascens Cheng 675
tetramerum Pax 675
*theiferum* Fang 673
truncatum Bunge 675
Aceraceae 672
*Aceranthus sagittatus* Sieb. et Zucc. 366
*Aceriphyllum rossii* Engl. 482
Achalinus Peters 1706
spinalis Peters 1706
Achasma Griff. 1501
yunnanense T. L. Wu et Senjen 1501
Achatina Lamarck 1578
fulica (Ferussac) 1578
Achatinidae 1578
Acheilognathus chankaensis Dybowski 1664
macropterus (Bleeker) 1664
taeianalis (Günther) 1664
Achillea L. 1238
acuminata (Ledeb.) Sch. -Bip. 1238
alpina L. 1238
asiatica Serg. 1238
millefolium L. 1239
ptarmicoides Maxim. 1239
*sibirica* Ledeb. 1238
wilsoniana Heimerl ex Hand. -Mazz. 1239
Achnatherum Beauv. 1433
inebrians (Hance) Keng 1433
splendens (Trin.) Nevski 1433
*Achras zapota* L. 926
*Achudemia japonica* Maxim. 202
Achyranthes L. 257
aspera L. 257
var. indica L. 257
bidentata Bl. 258
var. japonica Miq. 258
var. *longifolia* Makino 258
*corymbosa* L. 244
longifolia (Makino) Makino 258
f. rubra Ho 258
*prostrata* L. 261
*sanguinolenta* L. 258
*tomentosa* Roth 261
Achyrophorus Scop. 1239
ciliatus (Thunb.) Sch. -Bip. 1239
*Acianthus petiolatus* D. Don 1547
*Acilepis squarrosa* D. Don 1354
Acipenser Linnaeus 1650
dabryanus Dumeril 1650
schrencki Brandt 1650
sinensis Gray 1650
Acipenseridae 1650
*Aclisia subumbellata* C. B. Clarke 1430
Aconitum L. 301
alboviolaceum Kom. 301
anthoroileum DC. 301
apetalum (Huth) B. Fedtsch. 301
austroyunnanense W. T. Wang 301
barbatum Pers. 301
var. hispidum DC. 301
var. puberulum Ledeb. 301
birobidshanicum Worosch. 306
brachypodum Diels 301
var. crispulum W. T. Wang 302
var. laxiflorum Fletcher et Lauener 302
*bullatifolium* Lévl. 307
campylorrhynchum Hand. -Mazz. 302
cannabifolium Franch. ex Finet et Gagnep. 302
carmichaeli Debx. 302
var. hwangshnicum W. T. Wang et Hsiao 302
var. pubescens W. T. Wang et Hsiao 306
var. tripartitum W. T. Wang 306
var. truppelianum (Ulbr.) W. T. Wang et Hsiao 306

cavaleriei Lévl. et Vant. 302
changianum W. T. Wang 302
chasmanthum Staps 303
chilienshanicum W. T. Wang 303
contortum Finet et Gagnep. 303
coreanum (Lévl.) Rapaics 303
crassicaule W. T. Wang 303
crassiflorum Hand. -Mazz. 303
delavayi Franch. 303
var. *coreanum* Lévl. 303
duclouxii Lévl.
var. ecalcaratum Fletcher et Lauener 303
dunhuaense S. H. Li 303
elwesii Stapf 304
episcopale Lévl. 304
excelsum Reichb. 304
ferox Wall. var. naviculare Brühl 307
finetianum Hand. -Mazz. 304
flavum Hand. -Mazz. 304
var. galeatum W. T. Wang 304
forrestii Stapf 304
franchetii Finet et Gagnep. 306
geniculatum Fletcher et Lauener 304
gymnandrum Maxim. 304
hemsleyanum Pritz. 305
var. circinatum W. T. Wang 305
henryi Pritz. 305
var. villosum W. T. Wang 305
jaluense Kom. f. glabrescens (Nakai) Kitag. 305
var. glabrescens Nakai 305
*jeholense* Nakai et Kitag. 310
*juncundum* Diels 309
karakolicum Rapaics 305
kirinense Nakai 305
var. australe W. T. Wang 305
kongboense Lauener 305
kusnezoffii Reichb. 306
leiwuqiense W. T. Wang 306
leucostomum Worosch. 306
var. hopeiense W. T. Wang 306
liangshanidii W. T. Wang 306
liljestrandii Hand. -Mazz. 306
lonchodontum Hand. -Mazz. 306
ludlowii Exell 307
lycoctonum L. subsp. genuinum Korsh. f. umbrosum Korsh. 311
macrorhynchum Turcz. 306
*manshuricum* Nakai 305
monanthum Nakai 306
monticola Steinb. 307
nagarum Stapf 307
var. heterotrichum Fletcher et Lauener 307
var. lasiandrum W. T. Wang 307
*napellus* L. var. *sessiliflorum* Finet et Gagnep. 309
naviculare (Brühl.) Stapf 307
nemorum M. Pop. 307
novoluridum Munz 306
*ochranthum* C. A. Mey. 301
ouvrardianum Hand. -Mazz. 307
paniculigerum Nakai 306
var. wulingense (Nakai) W. T. Wang 306
pendulum Busch 308
polyschistum Hand. -Mazz. 308
pseudohuiliense Chang ex W. T. Wang 308
pseudostapfianum W. T. Wang 308
pulchellum Hand. -Mazz. 308
racemulosum Franch. 308
var. grandibracteolatum W. T. Wang 308
richardsonianum Lauener 308
var. pseudosessiliforum (Lauener) W. T. Wang 309
rotundifolium Kar. et Kir. 309
var. *tanguticum* Maxim. 311
scaposum Franch. 309
var. hupehanum Rapaics 309
var. vaginatum(Pritz.) Rapaics 309
sczukinii Turcz. 309
sessiliflorum (Finet et Gagnep.) Hand.-Mazz. 309
shensiense W. T. Wang 310
sibiricum Poir. 301
sinomontanum Nakai 309
var. angustius W. T. Wang 310
soongaricum Stapf 310
var. angustius W. T. Wang 310
var. jeholense (Nakai et Kitag.) W. T. Wang 310
spicatum Stapf 310
stapfianum Hand. -Mazz. 310
*subroculatum* Hand. -Mazz. 307
sungpanense Hand. -Mazz. 310
*szechenyianum* Gay 308
taipaicum Hand. -Mazz. 311
tanguticum (Maxim.) Stapf. 311
var. trichocarpum Hand. -Mazz. 311
tatsienense Finet et Gagnep. 311
transsectum Diels 311
umbrosum (Korsh.) Kom. 311
*vaginatum* Pritz. 309
villosum Reichb. 311
vilmorinianum Kom. 311
var. *altifidum* W. T. Wang 304
var. patentipilum W. T. Wang 311
volubile Pall. ex Koelle 311
*Aconogonon molle* (D. Don) Hara 226
var. *rude* (Meissn.) Hara 228
*peregrinatoris* (Pauls.) Hara 228
*polystachya* (Wall. ex Meisan.) M. Kral 228
*sibiricum* (Laxm.) Hara 229
Acorus L. 1465
calamus L. 1465
var. verus L. 1465
gramineus Soland. 1465

rumphianus S. Y. Hu 1465
tatarinowii Schott 1465
Acrida Linnaeus 1613
*chinensis* (Westwood) 1613
cinerea (Thunberg) 1613
Acrididae 1613
Acridotheres Vieillot 1737
cristatellus (Linnaeus) 1737
Acrocephalus Naumann 1740
arundinaceus Linnaeus 1740
Acrossocheilus Oshima 1658
monticola (Günther) 1658
yunnanensis (Regan) 1658
Acronychia J. R. et G. Forst. 642
pedunculata (L.) Miq. 642
Acroptilon Cass. 1239
repens (L.) DC. 1239
*Acrostichum heteroclitum* Presl 122
*linguum* Thunb. 137
*punctatum* L. 132
*thalictroides* L. 98
*yoshinagae* Yatabe 123
Actaea L. 312
asiatica Hara 312
erythrocarpa Fisch. 312
Actinidiaceae 404
Actinidia Lindl. 404
arguta (Sieb. et Zucc.) Planch. ex Miq. 404
var. cordifolia (Miq.) Bean 404
var. giraldii (Diels) Vorosh. 404
var. nervosa C. F. Liang 404
var. purpurea (Rehd.) C. F. Liang 405
*asymmetrica* F. Chun 406
callosa Lindl. 408
var. *coriacea* Finet et Gagnep. 408
var. discolor C. F. Liang 405
var. henryi Maxim. 405
var. strigillosa C. F. Liang 405
carnosifolia C. Y. Wu var. glaucescens C. F. Liang 405
chinensis Planch. 405
cylindrica C. F. Liang 405
var. reticulata C. F. Liang 406
deliciosa (A. Chev.) C. F. Liang et A. R. Ferguson 405
eriantha Benth. 406
fulvicoma Hance 405
f. hirsuta (Finet et Gagnep.) C. F. Liang 406
var. *hirsuta* Finet et Gagnep. 406
var. lanata (Hemsl.) C. F. Liang 406
glaucophylla F. Chun 406
var. asymmetrica (F. Chun) C. F. Liang 406
hemsleyana Dunn 406
henryi Dunn 406
kolomikta (Rupr. et Maxim.) Plach. 407
*lanata* Hemsl. 406
lanceolata Dunn 407
latifolia (Gardn. et Champ.) Merr. 407
liangguangensis C. F. Liang 407
macrosperma C. F. Liang 407
var. mumoides C. F. Liang 407
melananda Franch. 405
var. subconcolor C. F. Liang 407
melliana Hand.-Mazz. 407
polygama (Sieb. et Zucc.) Maxim. 407
*purpurea* Rehd. 405
rubricaulis Dunn 408
var. coriacea (Finet et Gagnep.) C. F. Liang 408
sabiaefolia Dunn 405
sorbifolia C. F. Liang 408
styracifolia C. F. Liang 408
tetramera Maxim. 408
trichogyna Franch. 408
valvata Dunn 408
venosa Rehd. 409
vitifolia C. Y. Wu 409
Actiniidae 1567
Actinodaphne Nees 282
chinensis Nees var. oblongifolia Nees 293
cupularis (Hemsl.) Gamble 282
*lancifolia* (Sieb. et Zucc.) Meissn. var. *sinensis* Allen 291
lecomtei Allen 282
obovata (Nees) Bl. 282
omeiensis (Liou) Allen 282
pilosa (Lour.) Merr. 283
*reticulata* Meissn. var. *omeiensis* Liou 282
Actinolitum 1783
Actinopyga mauritiana (Quoy et Gaimard) 1637
*Actinospora dahurica* Turcz. 321
Actinostemma Griff. 781
*biglandulosum* Hemsl. 782
tenerum Griff. 781
Acuticosta Simpson 1584
chinensis (Lea) 1584
ovata Simpson 1584
Adelostemma Hook. f. 973
gracilimum (Wall. ex Wight) Hook. f. 973
Adenanthera L. 546
*falcataria* L. 546
*microsperma* Teijsm. et Binnend. 546
pavonina L. var. microsperma (Teijsm. et Binnend.) Nielsen 546
*triphysa* Dennst. 656
Adenia Forsk. 772
cardiophylla (Mast.) Engl. 772
chevalieri Gagnep. 772
Adenocaulon Hook. 1239
*adhaerascens* Maxim. 1239
himalaicum Edgew. 1239
Adenophora Fisch. 1222
*alpina* Nannf. 1223
*argyi* Lévl. 1225

*axilliflora* Borb. 1225
biformifolia Y. Z. Zhao 1222
*bulleyana* Diels 1224
capillaris Hemsl. 1222
subsp. leptosepala (Diels) Hong 1222
coeletis Diels 1222
*confusa* Nannf. 1225
*diplodonta* Diels 1224
divaricata Franch. et Sav. 1222
elata Nannf. 1222
gmelinii (Spreng.) Fisch. 1223
*gracilis* Nannf. 1224
himalayana Feer 1223
subsp. alpina (Nannf.) Hong 1223
hubeiensis Hong 1223
hunanensis Nannf. 1223
subsp. huadungensis Hong 1223
jasionifolia Franch. 1223
khasiana (Hook. f. et Thoms.) Coll. et Hemsl. 1224
*leptosepala* Diels 1222
liliifolia (L.) Bess. 1224
liliifolioides Pax et Hoffm. 1224
longipedicellata Hong 1225
*longisepala* Tsoong 1222
ningxianensis Hong 1225
palustris Kom. 1225
paniculata Nannf. 1224
pereskiifolia (Fisch. ex Roem. et Schult.) G. Don 1224
petiolata Pax et Hoffm. 1225
polyantha Nakai 1224
potaninii Korsh. 1224
*pubescens* Hemsl. 1225
remotiflora (Sieb. et Zucc.) Miq. 1224
*rotundifolia* Lévl. 1225
rupincola Hemsl. 1225
*scabridula Nannf.* 1224
sinensis A. DC. 1225
var. *pilosa* A. DC. 1225
stenanthina (Ledeb.) Kitag. 1225
stenophylla Hemsl. 1225
stricta Miq. 1225
subsp. confusa (Nannf.) Hong 1225
subsp. sessilifolia Hong 1225
tetraphylla (Thunb.) Fisch. 1226
trachelioides Maxim. 1226
*tsinlingensis* Pax et Hoffm. 1223
*urceolata* C. Y. Wu 1222
*verticillata* Fisch. 1226
wawreana Zahlbr. 1222
wilsonii Nannf. 1226
*Adenosacme longifolia* Wall. var. *sinensis* Hemsl. 1009
Adenosma R. Br. 1131
*affinis* Griff. 1173
glutinosum (L.) Druce 1131
var. *caeruleum* (R. Br.) Tsoong 1131
indianum (Lour.) Merr. 1131
retusilobum Tsoong et Chin 1131
Adenostemma J. R. e G. Forst. 1240
*latifolia* D. Don 1240
lavenia (L.) O. Kuntze 1240
var. *elatum* (D. Don) Kitam.) 1240
var. latifolium (D. Don) Hand. -Mazz. 1240
var. parviflorum (Bl.) Hochreut 1240
Adhatoda Mill. 1164
*chinensis* Benth. 1166
*vasculosa* Nees 1710
vensica Nees 1164
ventricosa (Wall.) Nees 1768
Adiantaceae 96
Adiantum L. 96
bonatianum Brause 96
capillus-junonis Rupr. 96
capillus-veneris L. 96
caudatum L. 97
*chusana* L. 89
davidii Franch. 97
edgeworthii Hook. 97
erythochlamys Diels 97
fimbriatum Christ 97
flabellulatum L. 97
monochlamys Eaton 97
myriosorum Baker 97
pedatum L. 98
philippense L. 98
reniforme L. var. sinense Y. X. Lin 98
*repens* L. f. 124
Adina Salisb. 990
*cochinchinensis* Lour. 1014
pilulifera (Lam.) Franch. ex Drake 990
racemosa (Sieb. et Zucc.) Miq. 990
rubella Hance 990
Adinandra Jack. 410
*acutifolia* Hand. -Mazz. 410
bockiana Pritzl. ex Diels 410
var. acutifolia (Hand. -Mazz.) Kobuski 410
glischroloma Hand. -Mazz. var. macrosepala (Metc.) Kobuski 410
hainanensis Hayata 411
*macrosepala* Metc. 411
millettii (Hook. et Arn.) Benth. 411
nitida Merr. ex Li 411
*Adinobotrys filipes* Dunn 609
Adlumia Raf. 426
asiatica Ohwi 426
*cirrhosa* (non. Raf.) Kom. 426
Adonis L. 312
aestivalis L. 312
var. parviflora M. Bieb. 312
amurensis Regel et Radde 312
brevistyla Franch. 312
chrysocyatha Hook. f. et Thoms. 312

coerulea Maxim. 312
*davidii* Franch. 312
pseudoamurensis W. T. Wang 313
sutchuenensis Franch. 313
tianschanica (Adolf) Lipsch. 313
Aechmanthera Nees 1165
tomentosa (Wall.) Nees 1165
*Aechis rigida* Buch. -Ham. ex J. E. Smith 1517
Aegineria L. 1194
indica L. 1194
orientale L. 1194
sinensis G. Beck 1194
*Aegilops exaltata* L. 1455
*Aegiphila laevigata* Juss. 967
Aegopodium L. 847
alpestre Ledeb. 847
henryi Diels 847
Aegypius Savigny 1719
monachus (Linnaeus) 1719
Aeluropus Trin. 1434
littoralis Parl. var. sinensis Debeaux 1434
Aeretes melanopterus Milne-Edwards 1754
*Acrides ampullaceum* Roxb. 1519
*decumbens* Griff. 1546
*paniculatum* Ker-Gawl. 1526
Aerobrydium Fleisch. 64
filamentosum (Hook.) Fleisch. 64
Aerva Forsk. 258
sanguinolenta (L.) Bl. 258
Aeschna melanictera Selys 1609
Aeschnidae 1609
Aeschynanthus Jack 1177
acuminatus Wall. 1177
austroyunnanensis W. T. Wang var. guangxiensis (Chun) W. T. Wang 1177
buxifolius Hemsl. 1177
*guanxiensis* Chun 1177
Aeschynomene L. 546
*cannabina* Retz. 598
*grandifolora* L. 598
indica L. 546
Aesculus L. 679
assamica Griff. 679
*chekiangensis* Hu et Fang 680
chinensis Bunge 680
var. chekiangensis (Hu et Fang) Fang 680
hippocastanum L. 680
turbinata Bl. 680
wangii Hu ex Fang 680
wilsonii Rehd. 680
Afzelia Smith 546
xylocarpa (Kurz) Craib 546
Agama Daudin 1703
himalayana (Steindachner) 1703
Agamidae 1703
Aganosma G. Don 958
kwangsiensis Tsiang 959
navaillei (Lévl.) Tsiang 959
schlechteriana Lèvl. 959
Agapetes D. Don ex G. Don 883
*bullata* Dop 896
hosseana Diels 883
mannii Hemsl. 883
pensilis Airy-Shaw 884
*yunnanensis* Franch. 883
Agaricaceae 41
Agaricus L. ex Fr. 41
*agglutinatus* Berk. et Curt. 40
arvensis Schaeff. ex Fr. 41
*atramentarius* Bull. 41
*betulinus* L. 32
campestris L. ex Fr. 41
*comatus* Muell. 42
*conchatus* Bull. ex Fr. 38
*foetens* Pers. 46
*integra* L. 46
*involutus* Botsch. 42
isporus (Lange) Sing. 41
*lepideus* Fr. 37
*melleus* Vahl. ex Fr. 36
*oreades* Bolt. 38
*ostreatus* Jacq. ex Fr. 39
*piperatus* L. ex Fr. 45
placomyces Peck 41
subrutilescens (Peck) Hotson et Stuntz 41
*vellerius* Fr. 45
*velutipes* Curt. 36
*virescens* Schaeff. 46
*volvaceus* Bull. 41
Agastache Clayt. 1056
rugosa (Fisch. et Mey.) O. Kuntze 1056
*Agathotes nervosa* G. Don 956
Agavaceae 1403
Agave L. 1403
americana L. 1403
var. variegata Nichols. 1403
*angustifolia* Haw. 1404
cantula Roxb. 1403
rigida Mill. 1404
sisilana Perr. ex Engelm. 1404
Agelaea Soland. ex Planch. 543
trinervis (Llanos) Merr. 544
Agelena Walckenaer 1597
labyrinthica Clerck 1597
limbata Thorell 1597
Agelenidae 1597
Ageratum L. 1240
conyzoides L. 1240
houstonianum Mill. 1240
Agkistrodon Beauvois 1711
acutus (Güenther) 1711
halys (Pallas) 1711
strauchii Bedriaga 1711
Aglaia Lour. 659
odorata Lour. 659

*polystachya* Wall. 659
Aglaonema Schott 1465
modestum Schott ex Engl. 1466
pierreanum Engl. 1466
Agrammus Günther 1688
agrammus (Temminck et Schlegel) 1688
Agrimonia L. 495
*asiatica* Juzep. 496
coreana Nakai 496
eupatoria L. subsp. asiatica (Juzep.) Skalicky 496
nipponica Koidz. var. occidentalis Skalicky 496
pilosa Ledeb. 496
var. nepalensis (D. Don) Nakai 496
Agriolimax agrestis (Linnaeus) 1579
Agriophyllum Bieb. 251
*arenarium* Bieb. 251
pungens (Vahl.) Link ex A. Diedrich 251
*squarrosum* (L.) Moq. 251
Agriotes fusicollis Miwa 1621
Agristemma L. 237
githago L. 238
Agrocybe Fayod 42
cylindracea (Fr.) Maire 42
dura (Bolt. et Fr.) Sing. 42
paludosa (Lange) Kühn. et Romagn. 42
praecox (Pers. ex Fr.) Fayod 42
Agropyron Gaertn. 1434
cristatum (L.) Gaertn. 1434
mongolicum Keng 1434
Agrostis L. 1434
*fertilis* Steud. 1458
matsumurae Hack. ex Honda 1434
*maxima* Roxb. 1459
*puberum* L.
Agrypnus politus Candeze 1621
*Agyneria puberum* L. 632
*Aidia cochinchinensis* Lour.
*wallichii* (Hook. f.) Yamazaki 1015
Ailanthus Desf. 656
altissima (Mill.) Swingle 656
var. sutchuenensis (Dode) Rehd. et Wils. 656
*glandulosa* Desf. 656
*malabarica* Hack. ex Honda 656
triphysa (Dennst.) Alston 656
vilmoriniana Dode 656
Ainsliaea DC. 1241
bonatii Beauvd. 1241
*cordiophylla* Franch. 1241
elegans Hemsl. 1241
var. strigosa Mattf. 1241
fragrans Champ. 1241
glabra Hemsl. 1241
gracilis Franch. 1241
grossedentata Franch. 1241
henryi Diels 1242
lancifolia Franch. 1242
latifolia (D. Don) Sch. -Bip. 1242
var. obovata (Franch.) Griers. et Lauen. 1242
macroclinidoides Hayata 1242
pertyoides Franch. 1242
var. alba-tementosa Beauverd 1242
*pteropoda* DC. var. *obovata* Franch. 1242
rubrifolia Franch. 1243
rubrinervis Chang 1243
*spicata* Vant. 1242
*triflora* (Buch. -Ham.) Druce 1242
walkeri Hook. f. 1243
yunnanensis Franch. 1243
*Aira aquatica* L. 1439
*indica* L. 1456
Aix Boie 1716
galericulata (Linnaeus) 1716
Aizoaceae 236
Ajania Poljak. 1243
achilloides (Turcz.) Poljak. ex Grubov. 1243
myriantha (Franch.) Ling et Shih 1243
parviflora (Grun.) Ling 1243
salicifolia (Matt.) Poljak. 1244
tenuifolia (Jacq.) Tzvel. 1243
variifolium (Chang) Tzvel. 1244
Ajuga L. 1056
bracteosa Wall. ex Benth. 1056
camphylantha Diels 1056
campylanthoides C. Y. Wu et C. Chen 1056
ciliata Bunge 1056
var. glabrecens Hemsl. 1056
var. hirta C. Y. Wu et C. Chen 1056
decumbens Thunb. 1057
forrestii Diels 1057
*genevensis* L. var. *pallescens* Maxim. 1058
linearifolia Pamp. 1057
lobata D. Don 1057
lupulina Maxim. 1057
var. major Diels 1057
macrosperma Wall. ex Benth. 1058
var. thomsonii (Maxim.) Hook. f. 1058
multiflora Bunge 1058
nipponensis Makino 1058
var. pallescens (Maxim.) C. Y. Wu et C. Chen 1058
pantantha Hand. -Mazz. 1058
*thomsonii* Maxim.
Akebia Decne. 371
*lobata* Decne. var. *australis* Diels 372
quinata (Thunb.) Decne. 371
trifoliata (Thunb.) Koidz. 371
var. australis (Diels) Rehd. 372
Alangiaceae 824
Alangium Lam. 824
chinense (Lour.) Harms 824
faberi Oliv. 825
var. platyphyllum Chun et How 825

kurzii Craib 825
var. handelii (Schnarf) Fang 825
platanifolium (Sieb. et Zucc.) Harms 825
var. trilobum (Miq.) Ohwi 825
salviifolium (L. f.) Wanger. 825
*Alaria pinnatifida* Harv. 10
Alariaceae 10
Alauda Linnaeus 1735
arvensis Linnaeus 1735
gulgula Franklin 1735
Alaudidae 1735
Albertisia Becc. 374
laurifolia Yammoto 374
*perryana* H. L. Li 374
Albizia Durazz 546
chinensis (Osbeck) Merr. 546
corniculata (Lour.) Druce 546
*falcata* (L.) Baker 546
falcataria (L.) Fosberg 546
julibrissin Durazz. 547
kalkora (Roxb.) Prain 547
lebbeck (L.) Benth. 547
mollis (Willd.) Boiv. 547
odoratissima (L. f.) Benth. 547
*turgida* (Merr.) Merr. 566
*Alcea indica* Burm. f. 741
*rosea* L. 740
Alcedinidae 1733
Alcedo Linnaeus 1733
atthis (Linnaeus) 1733
Alces alces Linnaeus 1772
Alchemilla L. 496
japonica Nakai et Hara 496
Alchornea Sw. 619
davidii Franch. 619
*rufescens* Franch. 625
rugosa (Lour.) Muell. -Arg. 619
trewioides (Benth.) Muell. -Arg. 619
Alectoria Ach. 58
asiatica DR. 58
bicolor (Ehrh.) Nyl. 58
jubata (L.) Ach. 58
sulcata Nyl 58
virens Tayl. 58
*Alectra arvensis* (Benth.) Merr. 1140
Aletris L. 1363
alpestris Diels 1363
cinerascens Wang et Tang 1363
*cochinchinensis* Lour. 1405
glabra Bur. et Franch. 1363
laxiflora Bur. et Franch. 1363
pauciflora (Klotz.) Franch. 1364
var. khasiana (Hook. f.) Wang et Tang 1314
scopulorum Dunn 1364
spicata (Thunb.) Franch. 1364
stelliflora Hand. -Mazz. 1364
stenoloba Franch. 1364
Aleurites J. R. et G. Forst. 619
*fordi* Hemsl. 641
moluccana (L.) Willd. 619
Aleuritopteris Fée 93
argentea (Gmel.) Fée 93
var. obscura (Christ) Ching 94
kuhnii (Milae) Ching 94
pseudofarinosa Ching et S. K. Wu 94
squamosa (Hope et C. H. Wright) Ching 94
subvillosa (Hook.) Ching 94
Aleurodiscus amorphus (Pers.) Rabenh. 25
*Alexitoxicon amplexicaule* (Sieb. et Zucc.) Pobed. 975
atratum (Bunge) Pobed. 975
Algae 3
Alhagi Gagnebin 547
pseudoalhagi Desv. 547
Alisma L. 1357
angustifolium Roth 1357
canaliculatum A. Braun et Bouche 1357
gramineum Gmel. 1358
orientale (Sam.) Juzep. 1358
*plantago-aquatica* L. var. *orientale* Sam. 1358
Alismataceae 1357
Alissonotum impressicolle Arrow 1623
Allantodia R. Br. 100
chinensis (Baker) Ching 100
dilatata (Bl.) Ching 100
*Allardia glabra* Decne. 1355
Allemanda L. 959
cathartica L. var. hendersonii (Bull. ex Dombr.) Baill. et Raff. 959
*hendersonii* Bull. ex Dombr. 959
neriifolia Hook. 959
Alligator Cuvier 1712
sinensis Fauvel 1712
Allium Li 1364
altaicum Pall. 1364
ascalonicum L. 1365
cepa L. 1365
chinensis G. Don 1365
coeruleum Pall. 1366
cyaneum Regel 1365
decipiens Fisch. 1365
fistulosum L. 1365
funckiaefolium Hand. -Mazz. 1365
glomeratum Prokh. 1366
grayi Regel 1366
hookeri Thwaites 1366
macranthum Baker 1366
macrostemon Bunge 1366
var. uralense (Franch.) Airy-Shaw 1366
mairei Lévl. 1366
neriniflorum Baker 1366
omeiense Z. Y. Zhu 1366
ovalifolium Hand. -Mazz. 1367
polyrhizum Turcz. ex Regel 1367
prattii C. H. Wright ex Forb. et Hemsl. 1367

var. *ellipticum* Wang et Tang 1367
var. *latifoliatum* Wang et Tang 1367
przewalskianum Regel 1367
sativum L. 1367
schoenoprasoides Regel 1367
schoenoprasum L. 1367
sikkimense Baker 1368
tuberosum Rottl. ex Spreng. 1368
victorialis L. 1368
wallichii Kunth 1368
Allolobophora Eisen 1594
caliginose (Ant. Duges) 1594
Allomorphia Bl. 807
balansae Cogn. 807
*caudata* H. L. Li 815
*cavaleriei* Lévl. et Vant. 812
*pauciflora* Benth. 808
Allomyrina Arrow 1623
dichotoma (Linnaeus) 1623
Allophylus L. 676
caudatus Radlk. 676
viridis Radlk. 676
Alniphyllum Matsum. 928
fortunei (Hemsl.) Makino 928
f. *hypoglaucum* C. Y. Wu 928
Alnus Mill. 166
cremastogyne Burk. 166
ferdinandi-coburgii Schneid. 166
*fruticosa* Rupr. var. *mandshurica* Coll. ex Schneid. 167
japonica (Thunb.) Steud. 166
lananta Duthie ex Bean 167
mandshurica (Callier) Hand. -Mazz. 167
nepalensis D. Don 167
sibirica Fisch. ex Turcz. 167
*tinctoria* Sarg. 167
trabeculosa Hand. -Mazz. 167
Alocasia (Schott) G. Don 1466
cucullata (Lour.) Schott 1466
longiloba Miq. 1466
macrorrhiza (L.) Schott 1466
Aloë L. 1368
*barbadensis* Mill. var. *chinensis* Haw. 1368
vera L. var. chinensis (Haw.) Berg 1368
Alopecurus L. 1434
aequalis Sobol. 1434
japonicus Steud. 1434
mandshuricus Litw. 1435
Alpinia L. 1501
bambusifolia C. F. Liang et D. Fang 1501
blepharocalyx K. Schum. 1501
var. glabrior (Hand. -Mazz.) T. L. Wu 1501
brevis T. L. Wu et Senjen 1502
calcarata Rosc. 1502
chinensis (Retz.) Rosc. 1502
conchigera Griff. 1502
coriandriodora D. Fang 1502
densibracteata T. L. Wu et Senjen 1502
formosana K. Schum. 1502
galanga (L.) Willd. 1502
globosa Horan. 1503
graminifolia D. Fang et G. Y. Lo 1503
henryi K. Schum. 1503
intermedia Gagnep. 1503
japonica (Thunb.) Miq. 1503
katsumadai Hayata 1503
kwangsiensis T. L. Wu et Senjen 1503
maclurei Merr. 1504
malaccensis (Burm. f.) Rosc. 1504
nigra (Gaertn.) Burtt 1504
officinarum Hance 1504
oxyphylla Miq. 1504
pinnanensis T. L. Wu et Senjen 1504
polyantha D. Fang 1504
psilogyna D. Fang 1505
pumila Hook. f. 1505
stachyoides Hance 1505
strobiliformis T. L. Wu et Senjen 1505
tonkinensis Gagnep. 1505
zerumbet (Pers.) Burtt. et Smith 1505
*Alsine media* L. 250
*Alsomitra graciflora* Harms 786
Alsophila R. Br. 87
*gigantea* Wall. 88
spinulosa (Wall. ex Hook.) Tryon 87
Alstonia R. Br. 959
guangxiensis D. Fang et X. X. Chen 959
mairei Lévl. 959
scholaris (L.) R. Br. 959
yunnanensis Diels 960
Alternanthera Forsk. 258
bettzickiana (Regel) Nichols 258
philoxeroides (Mart.) Griseb. 258
sessilis (L.) DC. 259
Althaea L. 740
officinalis L. 740
rosea (L.) Cavan. 740
Altingia Noronha 459
chinensis (Champ.) Oliv. 459
yunnanensis Rehd. et Wils. 459
Alunitum 1786
Aluteridae 1691
Alysicarpus Neck ex Desv. 547
vaginalis (L.) DC. 547
Alyxia Banks ex R. Br. 960
hainanensis Merr. et Chun 960
levinei Merr. 960
menglungensis Tsiang et P. T. Li 960
sinensis Champ. ex Benth. 960
yunkuniana Tsiang 960
Amalocalyx Pierre 961
yunnanensis Tsiang 961
Amanita Pers. 40
agglutinata (Berk. et Curt.) Sing. 40
caesaria (Scop. ex Fr.) Pers. ex Schw. 40

muscaria (L. ex Fr.) Pers. ex Gray 40
phalloides (Vaill. ex Fr.) Secr. 41
Amanitaceae 40
*Amanitopsis volvata* Sacc. 40
Amaranthaceae 257
Amaranthus L. 259
*ascendes* Loisel. 259
caudatus L. 259
*gangeticus* L. 260
hybridus L. 259
lividus L. 259
*mangostanus* L. 260
paniculatus L. 259
retroflexus L. 259
spinosus L. 260
tricolor L. 260
viridis L. 260
Amaryllidaceae 1406
*Amaryllis aurea* L'Hérit. 140
*candida* Lindl. 1409
*radiata* L'Hérit. 1408
*rutilum* Ker-Gawl. 1407
*vittata* L'Hérit. 1408
Amauroderma (Pat.) Murr. 28
roderma (Berk.) Pat. 28
rude (Berk.) Pat. 28
Amblycipitidae 1670
Amblystegiaceae 65
Amblystegium B. S. G. 65
serpens (Hedw.) B. S. G. 65
*Ambora toxicaria* Pers. 183
*Ambrina botrys* Moq. 254
Ambroma L. f 747
augusta (L.) L. f. 747
*Ambulia aromatica* Lam. 1136
Amelanchier Medik. 496
asiatica (Sieb. et Zucc.) Endl. 496
*racemosa* Lindl. 508
Amentotaxus Pilger 155
argotaenia (Hance) Pilger 155
*Amesia mairei* (Schltr.) Hu 1537
*Amethystanthus macrophyllus* Migo 1078
Amethystea L. 1058
caerulea L. 1059
Amischotolype Hassk. 1427
hispida (Less. et A. Rich) Hong 1427
Amitostigma Schltr. 1517
basifoliatum (Finet) Schltr. 1517
*chinensis* (Rolfe) Schltr. 1517
gracile (Bl.) Schltr. 1517
monanthum (Finet) Schltr. 1517
pinguiculum (Reichb. f. et S. Moore) Schltr. 1517
Ammannia L. 798
arenaria H. B. K. 798
*auriculata* Willd.) 798
baccifera L. 798
*pentandra* Roxb. 800
rotundifolia Buch. -Ham. ex Roxb. 800
Ammopitanthus Cheng f. 548
mongolicus (Maxim.) Cheng f. 548
nanus (Pop.) Cheng f. 548
Amomum Roxb. 1505
aurantiacum H. T. Tsai et S. W. Zhao 1505
austrosinense D. Fang 1505
chinense Chun ex T. L. Wu 1506
compactum Soland. ex Maton 1506
dolichanthum D. Fang 1506
*globosa* Lour. 1503
hongtsaoko C. F. Liang et D. Fang 1508
koenigii J. F. Gmel. 1506
kravanh Pierre ex Gagnep. 1506
kwangsiense D. Fang et X. X. Chen 1506
longiligulare T. L. Wu 1506
longipetiplatum Merr. 1507
maximum Roxb. 1507
microcarpum C. F. Liang et D. Fang 1507
mioga Thunb. 1514
muricarpum Elmer 1507
odontocarpum D. Fang 1507
*roseum* Roxb. 1514
subulatum Roxb. 1507
thyrsoideum Gagnep. 1507
tsao-ko Crevost et Lemarie 1507
villosum Lour. 1508
var. nanum H. T. Tsai et S. W. Zhao 1508
var. xanthioides (Wall. ex Baker) T. L. Wu et Senjen 1508
*xanthioides* Wall. ex Baker 1508
*zedoaria* Christm. 1514
*zerumbet* L. 1515
Amorpha L. 548
fruticosa L. 548
Amorphophallus Bl. 1467
dunnii Tutcher 1467
*kerrii* N. E. Br. 1467
*konjac* K. Koch 1467
mellii Engl. 1467
rivieri Durieu 1467
sinensis Belval 1467
variabilis Bl. 1467
virosus N. E. Br. 1467
yunnanensis Engl. 1467
Ampelocalamus S. L. Chen, G. Y. Sheng et T. H. Wen 1435
actinotrichus (Merr. et Chun) S. L. Chen, G. Y. Sheng et T. H. Wen 1435
Ampelocissus Planch. 719
artemisiaefolia Planch. 719
Ampelopsis Michx. 720
aconitifolia Bunge 720
var. glabra Diels et Gilg 720
f. *glabra* (Diels et Gilg) Kitag. 720
bodinieri (Lévl. et Vant.) Rehd. 720
var. cinerea (Gagnep.) Rehd. 720

brevipedunculata (Maxim.) Trautv. 720
var. kulingensis Rehd. 720
var. *maximowiczii* (Regel) Rehd. 721
cantoniensis (Hook. et Arn.) Planch. 720
var. *grossedentata* Hand. -Mazz. 721
chaffanjonii (Lévl.) Rehd. 721
delavayana (Franch.) Planch. ex Franch. 721
var. gentiliana (Lévl. et Vant.) Hand. -Mazz. 721
var. mollissima C. Y. Wu 721
grossedentata (Hand. -Mazz.) W. T. Wang 721
*heterophyllus* Bl. 725
*himalayana* Royle 725
humulifolia Bunge 721
var. heterophylla (Thunb.) K. Koch 721
f. triscta (Nakai) Kitag. 721
japonica (Thunb.) Makino 722
megalophylla Diels et Gilg 722
var. puberula W. T. Wang 722
mirabilis Diels et Gilg 722
sinica (Miq.) W. T. Wang 722
var. hancei (Planch.) W. T. Wang 722
*tricuspidata* Sieb. et Zucc. 726
Ampelopteris Kunze 104
prolifera (Retz.) Copel 104
*Ampelygonum molle* (D. Don) Roberty et Vantier 226
*perfoliatum* (L.) Roberty et Vantier 228
Amphibia 1694
Amphicarpaea Ell. 548
*edgeworthii* Benth var. *trisperma* (Baker et Jacks.) Ohwi 548
trisperma Baker et Jacks. 548
*Amphicome arguta* Royle 1161
Amphineura 1570
*Amphirhapis albescens* DC. 1260
Amphiura Forbes 1639
v. dicola Matsumoto 1639
Amphiuridae 1639
Amsonia Walt. 961
sinensis Tsiang et P. T. Li 961
Amydrium Schott 1468
hainanense (Ting et Wu ex H. Li) H. Li 1468
sinense (Engl.) H. Li 1468
Amygdalus L. 497
communis L. 497
davidiana (Carr.) C. de Vos ex Henry 497
ferganensis (Kost. et Rejb.) Yü et Lu 497
mira (Koehne) Yü et Lu 497
mongolica (Maxim.) Ricker 497
pedunculata Pall. 497
persica L. 497
triloba (Lindl.) Ricker 498
vulgaris Mill. var. compressa Loud. 498
*Amyris dentata* Willd. 645
Anabasis L. 251
aphylla L. 251
brevifolia C. A. Mey. 251
*glomerata* Bieb. 255
truncata (Schrenk) Bunge 251
Anacardiaceae 666
Anacardium L. 666
occidentale L. 666
*Anagallidium dichotomum* (L.) Griseb. 955
Anagallis L. 909
arvensis L. 909
*Anagalloides procumbens* Krock 1138
*Anamtia stolonifera* Koidz. 908
Ananas Mill. 1426
comosus (L.) Merr. 1426
Anaphalis DC. 1244
*adnata* Wall. ex DC. 1298
aureopunctata Lingelsh. et Borza. 1244
var. atrata Hand. -Mazz. 1244
bicolor (Franch.) Diels 1244
bulleyana (J. F. Jeffrey) Chang 1244
contorta (D. Don) Hook. f. 1244
var. pellucida (Franch.) Ling 1245
flavescens Hand. -Mazz. 1245
gracilis Hand. -Mazz. var. aspera Hand. -Mazz. 1245
hancockii Maxim. 1245
lactea Maxim. 1245
latialata Ling et Y. L. Chen 1245
margaritacea (L.) Benth. et Hook. f. 1245
var. cinnamomea (DC.) Herd. ex Maxim. 1246
var. japonica (Sch. -Bip.) Makino 1246
nepelensis (Sareng.) Hand. -Mazz. 1246
*pterocaula* Maxim. var. *surculosa* Hand. Mazz. 1246
sinica Hance 1246
souliei Diels 1246
surculosa (Hand. -Mazz.) Hand. -Mazz. 1246
Anas Linnaeus 1716
acuta Linnaeus 1716
clypeata Linnaeus 1716
crecca Linnaeus 1716
falcata Georgi 1716
formosa Georgi 1716
penelope Linnaeus 1716
platyrhynchos Linnaeus 1716
platyrhynchos domestica (Linnaeus) 1716
poecilorhyncha Forster 1716
Anatidae 1716
Anax Leach 1609
parthenope Selyx 1609
Ancherythroculter wangi (Tchang) 1659
Anchoviella Fowler 1652
chinensis (Gunther) 1653
commersonii (Lacepede) 1653
Anchusa L. 1031
officinalis L. 1031
*sexatile* Pall. 1039

*sikkimensis* C. B. Clarke 1037
*spinocarpos* Forssk 1036
*tenellum* Hornem. 1033
Ancylostemon Craib 1177
convexus Craib 1177
*lancifolius* (Franch.) Burtt 1187
saxatilis (Hemsl.) Craib 1177
*Andrachne chinensis* Bunge 634
*esquirolii* Lèvl. 634
*fruticosa* L. 622
*Andreoskia dentata* Bunge 451
Andrias Tschudi 1694
davidianus (Blanchard) 1694
Andrographis Wall. 1165
laxiflora (Bl.) Lindau 1165
paniculata (Burm. f.) Nees 1165
*Andromeda elliptica* Sieb. et Zucc. 887
*fastigiata* Wall. 884
*formosa* Wall. 888
*lanceolata* Wall. 888
*ovalifolia* Wall. 887
*villosa* Wall. 888
*Andropogon aciculatus* Retz. 1439
*binatum* Retz. 1445
*caesius* Nees 1440
*citratus* DC. 1440
*contortus* L. 1445
*corulifera* Thunb. 1442
*crinitum* Thunb. 1455
*distans* Nees ex Steud. 1440
*dulce* Burm. f. 1492
*goeringii* Steud. 1440
*lanceolatus* Roxb. 1436
*propinquum* Kunth 1457
Androsace L. 909
*aizoon* Duby
var. *integra* Franch. 910
alchemilloides Franch. 909
bulleyana Forr. 909
erecta Maxim. 909
filiformis Retz. 910
*gmelinii* Gaertn. 910
gmelinii (Gaertn.) Roem. et Schult. 910
henyi Oliv. 910
incana Lam. 910
integra (Maxim.) Hand. -Mazz. 910
mariae Kanitz. var. tibetica (Maxim.) Hand. -Mazz. 910
septentrionalis L. 910
spinulifera (Franch.) R. Kunth 910
*strigillosa* Franch. var. *spinulifera* Franch. 910
tapete Maxim. 911
umbellata (Lour.) Merr. 911
yargonensis Petitm. 911
*Aneilema angustifolium* N. E. Br. 1429
*bracteatum* (C. B. Clarke) O. Kuntze 1428
*divergens* C. B. Clarke 1429
*herbaceum* var. *divergens* C. B. Clarke 1429
*keisak* Hassk. 1429
*loriforme* Hassk. 1429
*loureirii* Hance 1429
*nudiflora* (L.) R. Br. 1429
var. *bracteatum* C. B. Clarke 1428
*simplex* (Vahl) Kunth 1429
*triquetra* Wall. 1430
Anemarrhena Bunge 1369
asphodeloides Bunge 1369
Anemone L. 313
altaica Fisch. ex C. A. Mey. 313
amurensis (Korsch.) Kom. 313
baicalensis Turcz. 313
begoniifolia Lévl. et Vant. 313
*begoniifolioides* W. T. Wang 315
cathayensis Kitag. 313
*cernua* Thunb. 343
*chinensis* Bunge 343
chosenicola Ohwi var. schantungensis (Hand. -Mazz.) Tamura 314
*dahurica* Franch. ex DC. 343
davidii Franch. 314
delavayi Franch. 314
demissa Hook. f. et Thoms. 314
var. yunnanensis Franch. 314
dichotoma L. 314
flaccida Fr. Schmidt 314
var. hirtella W. T. Wang 314
var. hofengensis Wuzhi 315
*geum* Lévl. 315
*henryi* Oliv. 341
howllii J. F. Jerrey. et W. W. Smith. 315
hupehensis Lem. 315
f. alba W. T. Wang 315
var. japonica (Thunb.) Bowles. et Stearn 315
imbricata Maxim. 315
*japonica* (Thunb.) Sieb. et Zucc. 315
liangshanica W. T. Wang 315
*nemorsa* L. subsp. *amurensis* Korsch. 313
obtusiloba D. Don 315
subsp. ovalifolia Brühl. 316
subsp. *sruliifolia* (Hook. f. et Thoms.) Brühl var. *linearis* Brühl 317
*ovalifolia* (Bruhl.) Hand. -Mazz. 316
*patens* L. 343
raddeana Regel 316
reflexa Steph. 316
rivularis Buch. -Ham. ex DC. 316
var. *burbulata* Turcz. ex Fedts. 316
var. flore-mino Maxim. 316
*schantungensis* Hand. -Mazz. 314
silvestris L. 316
tomentosa (Maxim.) Péi 316
trullifolia Hook. f. et Thoms. var. linearis (Brühl) Hand. -Mazz. 317

vitifolia (Buch. -Ham.)Péi 317
var. *tomentosa* (Maxim.) Finet et Gagnep. 316
*Anerincleistus caudatum* Diels 815
Anethum L. 847
graveolens L. 847
*Aneurolepidium dasystachys* (Trin.) Nevski 1448
Angelica L. 847
acutiloba (Sieb. et Zucc.) Kitag. 848
amurensis Schischk. 848
anomala Lallem. 848
*apaensis* Shan et Yuan 862
*brevicaulis* (Rupr.)B. Fedtsch. 851
cartilagino-marginata (Makino) Nakai
var. foliosa ruan et shan 848
chinghaiensis Shan 848
*citriodora* Hance 870
dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook.
cv. Qibaizhi 848
cv. Hangbaizhi 848
var. *formosana* (Boiss.) Shan et Yuan 848
dencursiva (Miq.) Franch. et Sav. 848
f. albiflora (Maxim.) Nakai 849
*erythrocarpa* Wolff 849
*formosana* Boiss. 848
*mongolica* Franch. 870
gigas Nakai 849
*grosseserata* Maxim. 870
*jaluana* Nakai 848
laxifoliata Diels 849
*miqueliana* Maxim. 871
morii Hayata 849
omeiensis Shan et Yuan 849
paeoniaefolia Shan et Yuan 849
polymorpha Maxim. 849
var. *sinensis* Oliv. 850
porphyrocaulis Nakai et Kitag. 849
pubescens Maxim. 849
f. biserrata Shan et Yuan 850
*saxatile* Turcz. 858
silvestris L. 850
sinensis (Oliv.) Diels 850
*tenuissima* Nakai 867
tsinlingensis K. T. Fu 850
valida Diels 850
*Angelocarpa brevicaulis* Rupr. 851
Angiopteridaceae 80
Angiopteris Hoffm. 80
baolia Ching 80
fokiensis Hieron 80
hokonensis Ching 81
kwangsiensis Ching 81
late-marginata Ching 81
magna Ching 81
muralis Ching 81
officinalis Ching 81
omeiensis Ching 81
petiolulata Ching 82
robusta Ching 82
sinica Ching 82
yunnanensis Hieron 82
Angiospermae 158
Anguidae 1706
Anguilla Shaw 1655
japonica Temminck et Schlegel 1655
marmorata Quoy et Gaimard 1655
Anguillidae 1655
Angulyagra Rao 1572
polyzonata (Frauenfeld) 1572
Anhydritum 1784
Aniseia Choisy 1023
biflora (L.) Choisy 1023
Anisochilus Wall. 1059
carnosus (L.) Wall. 1059
Anisodus Link et Otto 1116
acutangulus C. Y. Wu et C. Chen ex C. Chen et C. L. Chen 1116
var. breviflorus C. Y. Wu et C. Chen 1116
*fischerianus* Pascher 1116
luridus Link et Otto 1116
var. fischerianus (Pascher) C. Y. Wu et C. Chen 1116
mairei (Levl.) C. Y. Wu et C. Chen 1116
tanguticus (Maxim.) Pascher 1116
*Anisomeles* indica (L.) O. Kuntze 1071
*ovata* R. Br. 1071
Anisopappus Hook.et Arn. 1247
chinensis (L.) Hook. et Arn. 1247
*Anisopetalon careyanum* Hook. 1521
Anna Pellegr. 1177
ophiorrhizoides (Hemsl.) Burtt. et Davidson 1178
Annamocarpa A. Chev. 159
sinensis (Dode) Leroy 159
Annelida 1592
Anneslea Wall. 411
fragrans Wall. 411
Annona L. 270
glabra L. 270
*hexapetalus* L. f. 270
reticulata L. 270
squamosa L. 270
Annonaceae 270
Anodendron A. DC. 961
affine (Hook. et Arn.) Druce 961
Anodonta arcaeformis(Heude) 1584
euscaphys (Heude) 1584
fluminea (Heude) 1584
globosula (Heude) 1584
woodiana pacifica (Heude) 1584
woodiano woodiano (Lea) 1585
Anoectochilus Bl. 1518
emeinsis K. Y. Lang 1518

moulmeinensis (Parish et Reichb. f.) Seidenf. 1518
roxburghii (Wall.) Lindl. 1518
Anomala Samouelle 1624
corpulenta Motschulsky 1624
cupripes Hope 1624
exoleta Faldermann 1624
Anoplophora Hope 1625
chinensis (Forster) 1625
*Anotis chrysotricha* Palib. 1000
*hirsuta* (L. f.) Boerl. 1010
*ingrata* Wall. ex Hook. f. 1010
*urophylla* (Wall.) Benth. et Hook. f. 1010
*wightiana* (Wall. ex Wight et Arn.) Hook. f. 1010
Anredera Juss. 237
cordifolia (Tenore) van Steen 237
Anser Brisson 1717
albifrons (Scopoli) 1717
anser (Linnaeus) 1717
cygnoides (Linnaeus) 1717
cygnoides orientalis (Linnaeus) 1717
erythropus (Linnaeus) 1717
fabalis (Latham) 1717
indicus (Latham) 1717
Antennaria Gaertn. 1247
*cinnamomea* DC. 1246
*contorta* D. Don 1244
dioica (L.) Gaertn. 1247
*japonica* Sch. -Bip. 1246
*nana* Hook. f. et Thoms. 1314
Antenoron Raf. 218
filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier 218
neofoliforme (Nakai) Hara 218
*Anthemis nobilis* L. 1276
Anthenea Gray 1638
pentagonula (Lamack) 1638
Antheraea Hübner 1628
pernyi (Guerin-Meneville) 1628
*Anthericum comosum* Thunb. 1374
*Anisherus rubra* Lour. 1013
*Anthistiria caudata* Nees 1459
*japonica* Willd. 1459
*sortilis* Presl 1440
*villosa* Poir. 1459
Anthocephalus A. Rich. 990
chinensis (Lam.) A. Rich ex Walp. 990
Anthocidaris Luetken 1639
crassispina (A. Agassiz) 1639
Anthogonium Wall. ex Lindl. 1518
gracile Wall. ex Lindl. 1518
*corydaloides* Schltr. 1518
Anthopleura Duchassaing et Michelotti 1567
stella (Verrill) 1567
xanthogrammica (Brandt) 1567
*Anthostyrax tonkinensis* Pierre 930
Anthozoa 1567
Anthriscus (Pers.) Hoffm. 850
*aemula* (Woron.) Schischk. 850
nemorsa (M. Bieb.) Spreng. 850
sylvestris (L.) Hoffm. 850
Anthropoides Vieillot 1726
virgo (Linnaeus) 1726
Antiaris Leschen. 183
toxicaria (Pers.) Leschen. 183
Antidesma Bl. 620
acidum Retz. 620
bunius (L.) Spreng. 620
fordii Hemsl. 620
ghaesembilla Gaertn. 620
japonicum Sieb. et Zucc. 620
*scandens* Lour. 190
venosum E. Mey. ex Tul. 620
Antiotrema Hand. -Mazz. 1032
dunnianum (Diels) Hand. -Mazz. 1032
Antipathes Pallas 1568
Antipathidae 1568
Antirrhinum L. 1131
majus L. 1131
Antrophyaceae 99
Antrophyum Kauld. 99
formosanum Hieron. 99
obovatum Baker 99
Anzia Stizenb. 58
opuntiella Müll. 58
ornata (A. Z.) Asal. 58
Aonyx cinerea Illiger 1762
*Aperula formosana* Nakai 292
Aphanamixis Bl 659
grandifolia Bl. 659
polystachya (Wall.) R. N. Parker 659
Aphananthe Planch. 178
aspera (Bl.) Planch. 178
*Aphanochilus flavus* Benth. 1068
Apidae 1635
Apios Moench. 548
carnea (Wall.) Benth. ex Baker 548
fortunei Maxim. 549
Apis Linnaeus 1635
cerana Fabricius 1635
mellifera Linnaeus 1635
Apium L. 851
graveolens L. 851
*Aplotaxis deltoides* DC. 1328
*fastuosa* Decne. 1329
*gnaphaloides* Royle 1329
*lappa* Decne. 1264
*obvallata* DC. 1332
Apludà L. 1435
mutica L. 1435
Aplysia pulmonica Gould 1577
Aplysiidae 1577
Apocynaceae 958
Apocynum L. 961
*frutescens* L. 965
*mucronatum* Blanco 987

juventas Lour. 987
venetum L. 961
Apodidae 1733
Aporosa Bl. 620
*chinensis* (Champ.) Merr. 620
*dioica* (Roxb.) Muell. -Arg. 620
octandra (Buch. -Ham. ex D. Don) A. R. Vickery 620
villosa (Lindl.) Baill. 620
Appendicula Bl. 1518
*bifaria* Lindl. ex Benth. 1518
cornuta Bl. 1518
Apriona germari (Hope) 1625
Apus scopoli 1733
apus (Linnaeus) 1733
Aquae minerale 1794
Aquifoliaceae 687
Aquila Brisson 1719
chrysaetos (Linnaeus) 1719
Aquilaria Lam. 752
agallocha Roxb. 752
*grandiflora* Benth. 752
sinensis (Lour.) Gilg 752
Aquilegia L. 317
*anemonoides* Willd. 342
atrovinosa M. Pop. ex Gamajun. 317
ecalcarata Maxim. 317
f. semicalcarata (Schipcz.) Hand.-Mazz. 317
incurvata Hsiao 317
japonica Nakai et Hara 318
oxysepala Trautv. et Mey. 318
var. kansuensis Brühl 318
f. pallidiflora (Nakai) Kitag. 318
parviflora Ledeb. 318
sibirica Lam. 317
viridiflora Pall. 318
yabeana Kitag. 318
Arabis L. 446
alaschanica Maxim. 446
flagellosa Miq. 446
*glandulosus* Kar. et Kir. 451
paniculata Franch. 447
pendula L. 447
var. *hypoglauca* Franch. 447
Araceae 1465
Arachis L. 549
hypogaea L. 549
Arachniodes Bl. 113
amoena (Ching) Ching 113
aristata (Forst.) Tindale 113
exilis (Hance) Ching 113
rhomboidea (Wall. et Mett.) Ching 113
simplicior (Makino) Ohwi 113
speciosa (Don) Ching 114
Arachnoidea 1641
*Arachnoides Klein* 1641
placenta (Linnaeus) 1641
Arachnoididae 1595
Araiostegia Cop. 123
pulchra (Don) Cop. 123
yunnanensis (Christ) Cop. 123
Araliaceae 832
Aralia L. 835
apioides Hand.-Mazz. 835
armata (Wall.) Seem. 835
atropurpurea Franch. 835
chinensis L. 835
var. nuda Nakai 835
continentalis Kitag. 835
cordata Thunb. 836
dasyphylla Miq. 836
decaisneana Hance 836
*dispermus* Bl. 840
*dumetorum* Hand.-Mazz. 837
echinocaulis Hand.-Mazz. 836
elagans C. N.Ho 836
elata (Miq.) Seem. 836
f. subinermis Y. C. Chu 836
fargesii Franch. 836
*glomerulata* Bl. 838
henryi Harms 837
hupenensis Hoo 837
*japonica* Thunb. 839
*mandshurica* Maxim. 836
melanocarpa (Lévl.) Lauener 837
*octophylla* Lour. 846
*papyrifera* Hook. 846
*quinquefolia* Decne. et Planch. var. angustifolia Burk. 842
var. *major* Burk. 842
spinifolia Merr. 837
undulata Hand.-Mazz. 837
*wilsonii* Harms 844
yunnanensis Franch. 837
Aranea Linnaeus 1596
angulopictus Schenkel 1596
ventricosa (L. Koch) 1596
Araneidae 1596
Arca *granosa* Linnaeus 1580
*inflata* Reeve 1580
*subcrenata* Lischke 1580
Arcangelisia Becc. 374
gusanlung H. S. Lo 374
loureiri (Pierre) Diels 374
Archangelica Hoffm. 851
brevicaulis (Rupr.) Rchb. 851
decurrens Ledeb. 851
Archangiopteris Christ et Gies. 82
henryi Christ 82
Archiphysalis Kuang 1117
sinensis (Hemsl.) Kuang 1117
Archontophoenix Wendl. et Drude 1460
alexandrae Wendl. et Drude 1460
Arcidae 1580
Arconaia lanceolata (Lea) 1584

Arctia Schrank 1629
caja phaeosoma Butler 1629
Arctiidae 1629
Arctium L. 1247
lappa L. 1247
tomentosum Mill. 1247
Arctonyx F. Cuvier 1762
collaris F. Cuvier 1762
Ardea Linnaeus 1713
cinerea Linnaeus 1713
purpurea Linnaeus 1714
Ardeidae 1713
Ardeola Boie 1714
bacchus (Bonaparte) 1714
Ardisia Swartz 899
affinis Hemsl. 899
alyxiaefolia Tsiang ex C. Chen 899
arborescens Wall. ex A. DC. 899
*austroasiatica* Walker 903
beibeinensis Z. Y. Zhu 899
brevicaulis Diels 900
brunnescens Walker 899
caudata Hemsl. 900
chinensis Benth 900
conspersa Walker 900
corymbifera Mez 900
var. tuberifera C. Chen in ined. 900
crassinervosa Walker 900
crenata Sims 901
f. hortensi (Migo) W. Z. Fang et K. Yao 901
crispa (Thunb.) A. DC. 901
var. amplifolia Walker 901
var. dielsii (Lèvl.) Walker 901
densilepidotula Merr. 901
depressa C. B. Clarke 901
*dielsii* Lévl. 901
elegans Andr. 902
ensifolia Walker 902
faberi Hemsl. 902
filiformis Walker 902
fordii Hemsl. 902
gigantifolia Stapf 902
hanceana Mez 902
humilis Vahl 902
japonica (Thunb.) Bl. 903
jiajiangensis Z. Y. Zhu 903
maclurei Merr. 903
maculosa Mez 903
mamillata Hance 903
neriifolia Wall. 903
nervosa Walker 903
perreticulata C. Chen 903
primulaefolia Gardn. et Champ. 904
punctata Lindl. 904
pusilla A. DC. 904
quinquegona Bl. 904
sieboldii Miq. 904
*triflora* Hemsl. 900
velutina Pitard 904
villosa Roxb. 904
var. ambovestita Walker 905
virens Kurz 905
var. annamensis Pitard. 905
yunnanensis Mez 905
Ardisiaceae 899
Areca L. 1460
cathecu L. 1460
Arenaria L. 238
barbata Franch. 238
forrestii Diels 238
juncea Bieb. 238
var. abreviata Kitag. 238
kansuensis Maxim. 238
var. ovatipetala Y. W. Tsui et L. H. Chou 238
var. oxypetala Y W. Tsui et L. H. Chou 238
lapanshanensis Y. W. Tsui 239
musciformis Wall. 239
quadridentata (Maxim.) Williams 239
roborowskii Maxim. 239
serpyllifolia L. 239
Arenga Labill. 1460
pinnata (Wurmb.) Merr. 1460
Arenicola Lamarck 1593
brasiliensis (Nonoto) 1593
cristata Stimpson 1593
Arenicolidae 1593
*Arethusa sinensis* Rolfe 1519
Argemone L. 426
mexicana L. 426
Argentum Natura 1791
Argiope Eudes-Deslongchan 1597
amoena L. Koch 1597
bruennichii (Scopoli) 1597
Argiopidae 1597
Argyreia Lour. 1023
acuta Lour. 1024
capitata (Vahl) Arn. ex Choisy 1024
obtusifolia Lour. 1024
osyrensis (Roth) Choisy var. cinerea Haud -Mazz. 1024
pierreana Boiss. 1024
seguinii (Lévl.) Vant. ex Lévl. 1024
wallichii Choisy 1024
Argyrosomus argentatus (Houttuyn) 1678
nibe (Jordan et Thompson) 1678
*Argyrothamnea cantoniensis* Hance 640
Ariidae 1670
Arisaema Mart. 1468
amurense Maxim. 1468
var. serratum Nakai 1468
angustatum Franch. et Sav. var. peninsulae (Nakai) Nakai 1468
asperatum N. E. Br. 1469

auriculatum Buchet 1469
bathycolem Hand. -Mazz. 1469
biauriculatum W. W. Smith ex Hand. -Mazz. 1469
brevipes Engl. 1469
calcareum H. Li 1469
candidissimum W. W. Smith 1469
*consanguineum* Schott 1470
decipiens Schott 1469
delavayi Buchet 1470
du-bois-reymondiae Engl. 1470
elephas Buchet 1470
var. jishaense H. Li et A. M. Li 1470
erubescens (Wall.) Schott 1470
exappendiculatum Hara 1470
fargesii Buchet 1471
flavum (Forsk.) Schott 1471
franchetianum Engl. 1471
griffithii Schott var. verrucosum (Schott) Hara 1471
heterophyllum Bl. 1471
hunanense Hand. -Mazz. 1471
inkiangense H. Li 1472
var. maculatum H. Li 1472
intermedium Bl. 1472
lingyunense H. Li 1472
lobatum Engl. 1472
penicillatum N. E. Br. 1472
*peninsulae* Nakai 1468
prazeri Hook. f. 1472
rhizomatum C. E. C. Fisch. 1473
var. nudum C. E. C. Fisch. 1473
rhombiforme Buchet 1473
ringens (Thunb.) Schott 1473
saxatile Buchet 1473
*sazensoo* (Buerg.) Makino var. *serretum* Makino 1473
sikokianum Franch. et Sav. 1473
var. henryianum (Engl.) H. Li 1473
var. serratum (Makino) Hand. -Mazz. 1473
sinii Krause 1474
*ternatum* (Thunb.) Schott. 1477
*thunbergii* Bl. var. *heterophyllum* (Bl.) Engl. 1471
*verrucosum* Schott 1471
wardii Marq. et Shaw 1474
yunnanense Buchet 1474
Aristichthys Oshima 1658
nobilis (Richardson) 1658
Aristida L. 1435
chinensis Munro 1435
Aristolochia L. 393
austroszechuanica Chien et C. Y. Cheng 393
*cannabarina* C. Y. Cheng et J. L. Wu 397
eathcartii Hook. f. 393
championii Merr. et Chun 393
chlamydophylla C. Y. Wu ex S. M. Hwang 393
*cinnabarina* C. Y. Cheng et J. L. Wu 397
compressocaulis Z. L. Yang 393
contorta Bunge 394
cucurbitoides C. F. Liang 394
debilis Sieb. et Zucc. 394
fangchi Y. C. Wu 394
fordiana Hemsl. 394
hainanensis Merr. 394
*heterophylla* Hemsl. 395
howii Merr. et Chun 395
impressinervis C. F. Liang 395
jinshanensis Z. L. Yang et S. X. Tan 395
kaempferi Willd. 395
f. heterophylla (Hemsl.) S. M. Hwang 395
f. thibetica (Franch.) S. M. Hwang 395
kwangsiensis Chun et How ex C. F. Liang 396
liangshanensis Z. L. Yang 396
longgongensis C. F. Liang 396
*mairei* Lévl. 974
mandshuriensis Kom. 396
*mollis* Dunn 395
mollissima Hance 396
moupinensis Franch. 396
obliqua S. M. Hwang 396
ovatifolia S. M. Hwang 396
scytophylla S. M. Hwang et D. L. Chen 397
*shimadai* Hayata 395
tagala Champ. 397
*thibetica* Franch. 395
thwaitesii Hook. f. 397
transsecta (Chatt.) C. Y. Wu ex S. M. Hwang 397
tuberosa C. F. Liang et S. M. Hwang 397
tubiflora Dunn 397
versicolor S. M. Hwang 397
westlandii Hemsl. 397
yunnanensis Franch. 398
Aristolochiaceae 393
Arius Cuvier et Valenciennes 1670
Sinensis (Lacepede) 1670
thalassinus (Rüppell) 1670
Armadillidae 1600
Armadillidum Latreille 1600
vulgara (Latreille) 1600
Armeniaca Mill. 498
holosericea (Batal.) Kost. 498
mandshurica (Maxim.) Skn. 498
mume Sieb. 499
sibirica (L.) Lam. 499
vulgaris Lam. 498
ver. ansu (Maxim.) Yü et Lu 498
*Armillaria matsutake* S. Ito et Imai 40
Armillariella (Karst.) Karst. 36
mellea (Vahl. ex Fr.) Karst. 36

tabescens (Scop. ex Fr.) Sing. 36
Armoracia Gaertn., B. Mey. et Scherb. 447
rusticana (Lam.) Gaertn., B. Mey. et Scherb. 447
Arnebia Forsk. 1032
euchroma (Boyle) Johnst. 1032
guttata Bunge 1032
*Arnica ciliata* Thunb. 1239
*japonica* L. f. 1301
*japonica* Thunb. 1316
*piloselloides* L. 1298
Aromia Linnaeus 1626
bungii (Faldermann) 1626
*Aronia asiatica* Sieb. et Zucc. 496
*Arracacia delavayi* Franch. 873
Arsenolitum 1789
Arsenopyritum 1789
Artabotrys R. Br. 270
hexapetalus (L. f.) Bhandari 270
hongkoensis Hance 271
Artemisia L. 1248
absinthium L. 1248
*achilloides* Turcz. 1243
adamsii Bess. 1248
*amoena* Poljak. 1338
anethifolia Weber 1248
anethoides Mattf. 1248
angustissima Nakai 1248
annua L. 1248
anomala S. Moore 1249
var. tomentella Hand.-Mazz. 1249
*apiacea* Hance 1250
var. *schochii* (Mattf.) Hand.-Mazz. 1250
argyi Lévl. et Vant. 1249
var. gracilis Pamp. 1249
atrovirens Hand.-Mazz. 1249
brachyloba Franch. 1249
*brevifolia* Wall. ex DC. 1338
capillaris Thunb. 1249
caruifolia Buch.-Ham. 1250
var. schochii (Mattf.) Pamp. 1250
*chinensis* L. 1284
*cina* Berg. ex Poljak. 1338
conaensis Ling et Y. R. Ling 1250
demissa Krasch. 1250
deversa Diels 1250
dracunculus L. 1250
var. turkestanica Krasch. 1250
dubia Wall. ex Bess. 1251
var. subdigitata (Mattf.) Y. R. Ling 1251
edgeworthii Balakr. 1251
emeiensis Y. R. Ling 1251
eriopoda Bunge 1251
*feddei* Lévl. et Vant. 1253
*finita* Kitag. 1338
frigida Willd. 1251
gilvescens Miq. 1251
gmelinii Web. ex Stechm. 1252
halodendron Turcz. ex Bess. 1252
hedinii Ostenf. 1252
igniaria Maxim. 1252
indica Willd. 1252
integrifolia L. 1252
japonica Thunb. 1252
var. hainanensis Y. R. Ling 1253
β. mandshurica Kom. 1254
*juncea* Kar. et Kir. 1338
keiskeana Miq. 1253
lactiflora Wall. ex DC. 1253
lagocephala Fisch. ex Bess. 1253
lancea Vant. 1253
lavandulaefolia DC. 1253
leucophylla (Turcz. ex Bess.) C. B. Clarke 1254
littoricola Kitam. 1254
macrocephala Jacq. ex Bess. 1254
*maderaspatana* L. 1300
maireí Lévl. 1254
mandshurica (Kom.) Kom. 1254
*matricarioides* Bess. 1319
mattfeldii Pamp. 1254
*messerschmidtina* Bess. 1256
*minima* L. 1275
mongolica (Fisch. ex Bess.) Nakai 1254
moorcroftiana Wall. ex DC. 1255
myriantha Wall. ex Bess. 1255
ordosica Krasch. 1255
orientali-hengduangensis Ling et Y. R. Ling 1255
parviflora Buch.-Ham. ex Roxb. 1255
*pectinata* Pall. 1321
persica Boiss. 1255
princeps Pamp. 1255
qinlingensis Ling et Y. R. Ling 1256
roxburghiana Bess. 1256
var. *orientalis* Pamp. 1255
rupestris L. 1256
sacrorum Ledeb. 1256
var. incana (Bess.). Y. R. Ling 1256
var. messerschmidtina (Bess.) Y. R. Ling 1256
*schochii* Mattf. 1250
scoparia Waldst. et Kit. 1256
selengensis Turcz. ex Bess. 1257
*sibirica* (L.) Maxim. 1297
sieversiana Willd. 1257
smithii Mattf. 1257
sphaerocephala Krasch. 1257
*subdigitata* (Mattf.) Y. R. Ling 1251
stricta Edgew. 1251
sylvatica Pamp. 1257
tanacetifolia L. 1257
tangutica Pamp. 1257
*terrae alebae* Krasch. 1338
tournefortiana Reichb. 1258
*transiliensis* Poljak. 1338

verbenacea (Kom.) Kitag. 1252
verlotorum Lamotte 1258
vestita Wall. ex Bess. 1258
vulgaris L. 1258
var. *indica* Maxim. 1252
var. *leucophylla* Turcz. ex Bess. 1254
var. *mongolica* Fisch. ex Bess. 1254
wellbyi Hemsl. et Pers. 1258
Arthraxon Beauv. 1435
hispidus (Thunb.) Makino 1435
var. *cantrasiaticus* Honda 1435
var. *cryptatherus* (Hack.) Honda 1435
lanceolatus (Roxb.) Hochst. 1436
Arthromeris J. Smith 125
lehmanni (Mett.) Ching 125
lungtauensis Ching 125
mairei (Brause) Ching 125
Arthropoda 1595
*Arthrostemma paniculatum* D. Don 812
Artocarpus J. R. et G. Forst. 183
heterophyllus Lam. 183
hypargyraea Hance 183
lingnanensis Merr. 183
styracifolius Pierre 184
*Arum bicolor* Ait. 1474
*colocasia* L. 1475
*cucullatum* Lour. 1466
*divaricatum* L. 1481
*erubescens* Wall. 1470
*esculenta* L. 1475
*flagelliforme* Lodd. 1481
*flavum* Forsk. 1471
*macrorrhizum* L. 1466
*odorum* Roxb. 1466
*ringens* Thunb. 1473
*ternatum* Thunb. 1477
*trilobatum* L. 1482
Aruncus (L.) Schaeff. 499
sylvester Kostel. 499
Arundina Bl. 1518
*chinensis* Bl. 1519
graminifolia (D. Don) Hochr. 1519
*Arundinaria actinotricha* Merr. et Chun 1435
*amara* Keng 1454
*latifolia* Keng 1447
Arundinella Raddi 1436
*anomala* Steud. 1436
hirta (Thunb.) C. Tanaka 1436
Arundo L. 1436
*australis* Cav. 1452
donax L. 1436
*karka* Retz. 1453
*reynaudiana* Kunth 1450
Asarum L. 398
caudigerellum C. Y. Cheng et C. S. Yang 398
caudigerum Hance 398
var. cardiophyllum (Franch.) C. Y. Cheng et C. S. Yang 398
f. leoptophyllum (Hayata) C. Y. Cheng et C. S. Yang 398
caulescens Maxim. 398
chinense Franch. 398
f. fargesii (Franch.) C. Y. Cheng et C. S. Yang 398
debile Franch. 398
delavayi Franch. 399
var. omeiense C. Y. Cheng et C. S. Yang 399
crispulatum C. Y. Cheng et C. S. Yang 399
forbesii Maxim. 399
fukienense C. Y. Cheng et C. S. Yang 399
geophilum Hemsl. 399
heterotropoides Fr. Schmidt var. mandshuricum (Maxim.) Kitag. 399
himalaicum Hook. f. et Thoms. ex Klotzsch. 400
ichangense C. Y. Cheng et C. S. Yang 400
insigne Diels 400
longerhizomatosum C. F. Liang et C. S. Yang 400
*longipedunculatum* O. C. Schmidt 400
magnificum Tsiang ex C. Y. Cheng 400
maximum Hemsl. 400
pulchellum Hemsl. 400
sagittarioides C. F. Liang 400
sieboldii Miq. 399
var. *mandshuricum* Maxim. 399
var. seoulense Nakai 399
f. seoulense (Nakai) C. Y. Cheng et C. S. Yang 399
splendens (Mackawa) C. Y. Cheng et C. S. Yang 401
wulingense C. F. Liang 401
Asbestos borblendum 1784
serpentinum 1784
Asclepiadaceae 973
Asclepias L. 973
*acida* Roxb. 980
*annularis* Roxb. 981
*carnosa* L. f. 981
*cordata* Burm. f. 968
curassavica L. 973
*gigantea* L. 974
*paniculatum* Bunge 978
*pulchellum* Roxb. 986
*tenacissima* Roxb. 984
*tingens* Roxb. 981
*vincetoxicum* L. 979
*volubilis* L. f. 981
Ascocentrum Smuhltr. et J. J. Smith 1519
ampullaceum (Roxb.) Schltr. 1519
Asellidae 1599
Aselliscus wheeleri (Osgood) 1748
Asellus Geoffroy 1599
nipponensis Nichols 1600

Asio flammeus (Pontoppidan) 1732
*Aspalathus arborescens* Amm. 557
*Asparaglopsis setacea* Kunth 1371
Asparagopsis Mont. 13
taxiformis (Delile) Collins et Herv. 13
Asparagus L. 1369
acicularis Wang et S. C. Chen 1369
angulofractus Iljin 1369
brachyphyllus Turcz. 1369
cochinchinensis (Lour.) Merr. 1369
dauricus Fisch. ex Link 1370
filicinus Buch.-Ham. ex D. Don 1370
gobicus Ivan. ex Grubov 1370
*graminifolius* L. 1387
kansuensis Wang et Tang 1370
lycopodineus Wall. ex Baker 1370
meioclados Lévl. 1370
myriacanthus Wang et S. C. Chen 1370
officinalis L. 1371
oligoclonus Maxim. 1371
schoberioides Kunth 1371
setaceus (Kunth) Jessop 1371
subscandens Wang et S. C. Chen 1371
tibeticus Wang et S. C. Chen 1371
trichophyllus Bunge 1372
Asperugo L. 1032
procumbens L. 1032
*Asperula hoffmeisteri* Klotzsch 995
Aspidiaceae 121
Aspidistra Ker-Gawl. 1372
caepitosa Péi 1372
dolichanthera X. X. Chen 1372
elatior Bl. 1372
longipedunculata D. Fang 1372
longipetala S. Z. Huang 1372
lurida Ker-Gawl. 1372
minutiflora Stapf 1372
muricata How ex K. Y. Lang 1372
omeiensis Z. Y. Zhu 1373
retusa K. Y. Lang et S. Z. Huang 1372
sichuanensis K. Y. Lang et S. Z. Zhu 1373
typica Baill. 1373
zongbayi K. Y. Lang et Z. Y. Zhu 1373
Aspidium *aridum* D. Don 104
*aristatum* var. *simplicior* Makino 114
*blinii* Lévl. 117
*braunii* Spenn. 117
*caryotideum* Wall. 114
*championii* Benth. 116
*craspedodorum* Maxim. 119
*cycadium* Franch. et Sav. 116
*decurrens* Presl 122
*deltodon* Baker 119
*exile* Hance 114
*falcatum* (L. f.) Presl var. *macrophyllum* Makino 115
*glanduligera* Kunze 105
*labordei* Christ 117
*nipponica* Franch. et Sav. 105
*polyblepharum* Röm. 120
*rhomboideum* Wall. ex Mett. 114
*speciosum* D. Don 114
*sqarrosum* D. Don 120
*tripteron* Kunze 121
*tsus-simense* Hook. 121
Aspidocarpa Hook. f. et Thoms. 374
uvifera Hook. f. et Thoms. 375
*Aspidoteris hypoglaucum* Lévl. 703
Aspleniaceae 107
Asplenium L. 107
*acrostichoides* Sw. 103
*antrophyoides* Christ 110
*boryanum* Willd. 102
*chinense* Baker 100
coenobiale Hance 107
*donianum* Mett. 102
ensiforme Wall. ex Hook. et Grev. 107
exguum Bedd. var. yunnanense (Franch.) Ching 107
falcatum Lam. 107
griffithianum Hook. 107
incisum Thunb. 107
*japonica* (Thunb.) Bedd. 101
*lanceum* Thunb. 103
monpinense Franch. 108
*nidus* L. 110
normale D. Don 108
pekinense Hance 108
planicaule Wall. 108
praemosum Sw. 108
prolongatum Hook. 108
pseudolaseritiifolium Ching 108
sampsonii Hance 109
sarelii Hook. 109
saxicola Ros. 109
*setosum* Wall. 120
trichomanes L. 109
tripteropus Nakai 109
varians Wall. ex Hook. et Grev. 109
wrightii Eaton ex Hook. 109
*yokoscens* Franch. et Sav. 102
*yunnanense* Franch. 107
*zeylanicum* Hook. 102
Aspongopus Laporte 1618
chinensis Dallas 1618
Astacidae 1603
Aster L. 1258
ageratoides Turcz. 1259
var. heterophyllus Maxim. 1259
var. lasiocladus (Hayata) Hand.-Mazz. 1259
var. laticorymbus (Vant.) Hand.-Mazz. 1259
var. micranthus Ling 1259
var. oophyllus Ling 1259
var. scaberulus (Miq.) Ling 1259

alatipes Hemsl. 1260
albescens (DC.) Hand.-Mazz. 1260
alpinus L. 1260
*altaicus* Willd. 1302
var. millefolius Vant. 1302
*annuus* L. 1293
asteroides O. Kuntze 1260
auriculatus Franch. 1260
baccharoides (Benth.) Steetz. 1260
batangensis Bur. et Franch. 1260
*boweri* Hemsl. 1302
*breviscapus* Vant. 1294
*chinensis* L. 1271
*crenatifolius* Hand.-Mazz. 1303
diplostephioides (DC.) C. B. Clarke 1260
farreri W. W. Smith et J. F. Jeffrey 1261
*fastigiata* Fisch. 1352
flaccidus Bunge 1261
f. griseo-barbatus Griers. 1261
fuscescens Bur. et Franch. 1261
*hispidus* Thunb. 1303
*incisa* Fisch. 1309
*indicus* L. 1309
*komarovii* Lévl. 1288
*lasiocladus* Hayata 1259
*laticorymbus* Vant. 1259
maackii Regel 1261
*marchandii* Lévl. 1288
*mongolica* Franch. 1309
oreophilus Franch. 1261
panduratus Nees ex Walp. 1261
*piccolii* Hook. f. 1320
polithamnus Diels 1262
*radiatus* Wall. 1294
sampsonii (Hance) Hemsl. 1262
*scaber* Thunb. 1288
*scaberulus* Miq. 1259
senecioides Franch. 1262
smithianus Hand.-Mazz. 1262
souliei Franch. 1262
sphaerotus Ling 1262
subulatus Michx. 1262
tataricus L. f. 1263
turbinatus S. Moore 1263
var. chekiangensis C. Ling 1263
*vellereus* Franch. 1305
vestitus Franch. 1263
yunnanensis Franch. 1263
Asterias Linnaeus 1639
amurensis Lutken 1639
argonanta Djakonov 1639
rollestoni Bell 1639
versicolor Sladen 1639
Asteriidae 1638
Asterina Nardo 1638
pectinifera Müller et Troschel 1638
limboonkengi G. A. Smith 1639
Asterinidae 1639
*Asterionella japonica* Bl. 12
*Astrocephalus cochinchinensis* Spreng. 1292
Asteroidea 1637
*Asteromoea integrifolia* (Turcz.) Loes. 1309
*indica* (L.) Bl. var. *stenolepis* Hand.-Mazz. 1309
*mongolica* (Franch.) Kitam. 1309
*shimadai* Kitam. 1310
Asteropyrum Drumm. et Hutch. 318
cavaleriei (Lévl. et Vant.) Drumm. et Hutch. 318
peltatum (Franch.) Drumm. et Hutch. 318
Asterothamnus Novopokr. 1263
centrali-asiaticus Novopokr. 1263
Astibe Buch.-Ham. 472
austrosinensis Hand.-Mazz. 472
*chinensis* (Maxim.) Franch. et Sav. 472
var. *davidii* Franch. 473
davidii (Franch.) Henry 473
grandis Stapf et Wils. 473
koreana Nakai 473
myriantha Diels 473
rivularis Buch.-Ham. 473
rubra Hook. f. et Thoms. ex Hook. 473
thunbergii Miq. 473
Astilboides (Hemsl.) Engl. 473
tabularis (Hemsl.) Engl. 473
*Astraeus hygrometricum* (Pers.) Morg. 52
Astragalus L. 549
adsurgens Pall. 549
alatavicus Kar. 549
balfourianus Simpson 549
bhotanensis Baker 549
chinensis L. 549
chrysopterus Bunge 550
*coerulea* Pall. 591
complanatus R. Br. ex Bunge 550
dahuricus (Pall.) DC. 550
ernestii Comber 550
floridus Benth. ex Bunge 550
*leptophylla* Pall. 592
mahoschanicus Hand.-Mazz. 550
melilotoides Pall. 550
membranaceus (Fisch.) Bunge 550
miniatus Bunge 551
monadelphus Bunge 551
mongholicus Bunge 551
polycladus Bur. et Franch. 551
scaberrimus Bunge 551
severzovii Bunge 551
sinicus L. 551
tanguticus Batal. 551
tongolensis Ulbr. 551
yunnanensis Franch. 551
Astroconger Jordan et Hubbs 1656
myriaster (Brevoort) 1656
Astropectinidae 1637
Asyneuma Griseb. et Schenk 1226

chinensis Hong 1226
Asystasis Bl. 1165
*chelonoides* Nees 1165
*chinensis* S. Moore 1165
gangetica (L.) T. Anders. 1165
Asystasiella Lindau 1165
chinensis (S. Moore) E. Hossain 1165
*Asyticia pauciflorus* Nees 1167
Atacamitum 1782
Atalantia Corr. 642
buxifolia (Poir.) Oliv. 642
kerrii (Swingle) Huang 642
kwangtungensis Merr. 642
*Athamanta condensata* L. 865
*sibirica* L. 866
Atherurus macrourus (Linnaeus) 1755
Athetis Huebner 1630
morosa (Lederer) 1630
Atvidae 1577
Athyriaceae 100
Athyriopsis Ching 101
japonica (Thunb.) Ching 101
Athyrium Roth 101
brevifrons Nakai 101
delavayi Christ 101
*goringianum* (Kunze) Moore 101
iseanum Rosent. 101
multidentatum (Boell) Ching 101
nipponicum (Mett.) Hance 101
*nipponicum* Mett 101
*okuboanum* Makino 102
pachyphlebium C. Chr. 101
sinense Rupr. 102
strigillosum Moore 102
yokoscens (Franch. et Sav.) Christ. 102
Atractomorpha lata (Motschulsky) 1613
*Atractylis coreana* Nakai 1263
*chinensis* Koidz. 1264
*lancea* Thunb. 1264
*macrocephala* (Koidz.) Hand.-Mazz. 1264
Atractylodes DC. 1263
coreana (Nakai) Kitam. 1263
japonica Koidz. ex Kitam. 1264
lancea (Thunb.) DC. 1264
macrocephala Koidz. 1264
*Atragene sibirica* L. 331
Atrichum P. Beauv. 67
undulatum (Hedw.) Beauv. 67
Atriplex L. 251
centralasiatica Iljin 251
fera (L.) Bunge 252
hortensis L. 252
maximoviczıana Makino 252
sibirica L. 252
Atropa L. 1117
belladonna L. 1117
*physaloides* L. 1121
Atropanthe Pascher 1117
sinensis (hemsl.) Pascher 1117
Atylosia Wight et Arn. 552
mollis (Willd.) Benth. 552
scarabaeoides (L.) Benth. 552
Atylotus Osten-Sacken 1631
bivittateinus Takahashi 1631
miser(Szilady) 1631
*Aubletia ramosissimum* Lour. 713
Aucklandia Falc. 1264
lappa Decne. 1264
Aucuba Thunb. 826
chinensis Benth. 826
f. *obcordata* Rehd. 827
subsp. omeiensis (Fang) Fang et Soong 826
chlorascens F. T. Wang 826
eriobotryaefolia F. T. Wang 826
himalaica Hook. f. et Thoms. 826
var. dolichophylla Fang et Soong 826
var. pilossima Soong 827
japonica Thunb. var. variegata Dombr. 826
obcordata (Rehd.) Fu 827
*Aulasia falcatum* Lour. 649
*Aulisconema* aspera Hua 1375
*pernyi* Hua 1376
Aurelia Thomson 1565
aurita Lamarck 1565
Auricularia Bull. ex Mera f. 24
auricula (L. ex Hook.) Underw. 24
delicata (Fr.) P. Henn. 25
mesenterica (Dicks.) Pers. 25
polytricha (Mont.) Sacc. 24
Auriculariaceae 24
Auripigmentum 1789
Aurum Natura 1791
Auxis Cuvier 1682
tapeinosoma (Bleeker) 1682
Avena L. 1436
chinensis (Fisch. ex Roem. et Schult.) Metzg. 1436
fatua L. 1436
var. glabrata Peterm. 1436
var. mollis Keng 1436
*nuda* L. var. *chinensis* Fisch. ex Roem. et Schult. 1436
sativa L. 1436
Averrhoa L. 609
carambola L. 609
Aves 1712
Avicennia L. 1040
marina(Forsk.) Vierh. 1040
Axyris L. 252
amaranthoides L. 252
prostrata L. 252
Aythya baeri (Radde) 1716
nyroca (Guldenstadt) 1716
*Azalea mollis* Bl. 893
*mucronatum* Bl. 894

Azolla Lam. 140
imbricata (Roxb.) Nakai 140
Azollaceae 140
Azuritum 1782

## B

Babylonia Schlueter 1576
areolata (Lamarck) 1576
lutosa (Lamarck). 1576
Baccaurea Lour. 621
ramiflora Lour. 621
*Baccharis indica* L. 1324
Bacopa Aubl. 1132
monnieri (L.) Wettst. 1132
*Boehmeria argentea* Wall. 907
*indica* Roxb. 907
*ramentacea* Roxb. 907
Baeckea L. 801
frutescens L. 801
Bagridae 1669
Bahaba Herre 1677
flavolabiata (Lin) 1677
Balaenidae 1757
Balaenoptera Lacepede 1757
acutorostata Lacepede 1757
borealis Lesson 1758
musculus (Linnaeus) 1758
physalus (Linnaeus) 1758
Balaenopteridae 1757
Balanidae 1598
Balanophora Forst. et Forst. f. 217
crytocaudex S. Y. Chang et Tan 217
dioica R. Br. ex Royle 217
harlandii Hook. f. 217
henryi Hemsl. 217
indica (Arn.) Griff. 217
involucrata Hook. f. 217
japonica Makino 218
laxiflora Hemsl. 218
polyandra Griff. 218
spicata Hayata 218
subcupularis Tan 218
Balanophoraceae 217
Balanus Da Costa 1598
albicostatus Pilsbry 1598
*amphitrite albicostatus* Pilsbry 1598
*amphitrite communis* Darwin 1598
reticulatus Utinomi 1598
*tintinnabulum volcano* Pilsbry 1598
volcano Pilsbry 1598
Baliospermum Bl. 621
*effusum* Pax et Hoffm. 621
montanum (Willd.) Muell.-Arg. 621
*Ballota suaveolens* L. 1075
Balsaminaceae 683
Bambusa Schreb. 1437
chungii McClure 1437
dissemulator McClure 1437
emeiensis Chia et H. .L Fung 1437
glaucescens (Willd.) Sieb. ex Munro cv. fernleaf (Young) Young 1437
*nigra* Lodd 1453
oldhamii Munro 1441
pervariabilis McClure 1437
sinospinosa McClure 1437
*strictus* Roxb. 1442
*tessellata* Munro 1447
textilis McClure 1437
tuldoides Munro 1437
ventricosa McClure 1438
vulgaris Schrad. ex Wendland var. vittata (A. et C. Riviere) Gamble 1438
Bambusicola Gould 1722
fytchii Anderson 1722
thoracica (Temminck) 1722
Bangiaceae 12
*Banksea speciosa* Koen. 1509
*Baphicanthus cusia* (Nees) Bremek. 1175
*Baptisia nepalensis* Hook. 594
Barbastella darjielingensis Dobson 1747
leucomelas (Cretzschmar) 1747
Barbella Fleisch. 64
pendula (Sull.) Fleisch. 64
*Barkhausis flexuosa* DC. 1284
Barleria L. 1166
cristata L. 1166
luoulina Lindl. 1166
prionitis L. 1166
*Barnardia scilloides* Lindl. 1395
Barringtonia J. R. et Forst. 807
fusicarpa Hu 807
racemosa (L.) Spreng. 807
*yunnanensis* Hu 807
Barthea Hook. f. 807
barthei (Hance) Krass. 807
*Bartramia oederi* Brid. 63
Bartramiaceae 63
Basella L. 237
alba L. 237
*rubra* L. 237
Basellaceae 237
Bassia All. 253
dasyphylla (Fisch. et Mey.) O. Kuntze 253
Batocera horsfieldi (Hope) 1625
Batrachuperus Boulenger 1694
pinchonii (David) 1694
tibetanus Schmidt 1694
Battarraea Pers. 48
phalloides (Dicks.) Fr. 48
stevenii (Libosch.) Fr. 49
Bauhinia L. 552
aurea Lévl. 552
brachycarpa Wall. ex Benth. 552
*candida* Roxb. 553
*championi* (Benth.) Benth. 552
corymbosa Roxb. ex DC. 553

*faberi* Oliv. 552
*genuflexa* Craib 553
glauca (Wall. ex Benth.) Benth. 552
subsp. pernervosa (L. Chen) T. Chen 553
subsp. tenuiflora (Watt. ex C. B. Clarke) K. et S. S. Larsen 553
*paraglauca* Tang et Weng 552
*pernervosa* L. Chen 553
purpurea L. 553
*tenuiflora* Watt. ex C. B. Clarke 553
touranensis Gagnep. 553
variegata L. 553
var. *alboflava* De Wit 553
var. candida (Roxb.) Viogt 553
yunnanensis Franch. 553
Beaumontia Wall. 962
grandiflora Wall. 962
*indecora* Baill. 972
murtonii Craib 962
pitardii Tsiang 962
Beauveria Vuill. 53
bassiana (Bals.) Vuill. 53
Beckmannia Host 1438
syzigachne (Steud.) Fern. 1438
Beesia Balf. f. et W. W. Smith 319
calthaefolia (Maxim.) Ulbr. 319
Begonia L. 778
acetosella Craib 778
var. hirtifolia Irmsch. 778
aptera Bl. 778
asperifolia Irmsch. 778
augustinii Hemsl. 778
calophylla Irmsch. 778
cathayana Hemsl. 778
cavaleriei Lévl. 779
circumlobata Hance 779
crassirostris Irmsch. 779
digyna Irmsch. 779
edulis Lèvl. 779
var. henryi Lèvl. 779
evansiana Andr. 779
fimbristipulata Hance 779
handelii Irmsch. 780
henryi Hemsl. 780
labordei Lèvl. 780
*laciniata* Roxb. 780
leprosa Hance 780
limprichtii Irmsch. 780
maculata Raddi 780
nymphaefolia Yü 780
palmata D. Don 780
pedatifida Lévl. 780
semperflorens Link et Otto 781
sinensis A. DC. 781
smithiana Yü 781
taiwaniana Hayata 781
taliensis Gagnep. 781
wangii Yü 781
wilsonii Gagnep. 781
yunnanensis Lévl. 781
Begoniaceae 778
Beilschmiedia Nees 283
brevipaniculata Allen 283
intermedia Allen 283
Belamcanda Adans. 1417
chinensis (L.) DC. 1417
Bellamya Jousseaume 1572
aeruginosa (Reeve) 1572
purificata (Heude) 1572
quadrata (Benson) 1572
Belligobio nummife 1661
Bellis L. 1264
perennis L. 1265
Belomys pearsoni (Grav) 1754
Belonidae 1670
Belontiidae 1685
*Beloperone guttata* Brandegee 1168
Benincasa Savi 782
hispida (Thunb.) Cogn. 782
var. chieh-qua How 782
Bennettiodendron Merr. 762
brevipes Merr. 762
*Benzion glauca* Sieb. et Zucc. 289
Berberidaceae 354
Berberis L. 354
acuminata Franch. 354
aggragata Schneid. 354
ambrozyana Schneid. 354
amoena Dunn 354
amurensis Rupr. 354
anhweiensis Ahrendt 355
atrocarpa Schneid. 355
*bealei* Fort. 368
bergmannia Schneid. 355
brachypoda Maxim. 355
candidula Schneid. 355
caroli Schneid. 355
var. *hoanghensis* Schneid. 362
cavaleriei Lévl. 355
chingii Cheng 355
chrysosphaera Mulligan 356
circumserrata (Schneid.) Schneid. 356
dasystachya Maxim. 356
*diaphanus* Maxim. 356
var. *circumserrata* Schneid. 356
dictyoneura Schneid. 356
dictyophylla Franch. 356
dielsiana Fedde 356
dolichobotrys Fedde 357
dubia Schneid. 357
ferdinandi-coburgii Schneid. 357
francisci-ferdinandi Schneid. 357
*gagnephinii* Schneid. var. *lanceifolia* Ahrendt 362
*ganpinensis* Lévl. 369
gilgiana Fedde 357

giraldii Hesse 357
gyalaica Ahrendt 357
hemsleyana Ahrendt 357
henryana Schneid. 358
heteropoda Schrenk. 358
hobsonii Ahrendt 358
hsuynensis Hsiao et Sung 358
humido-umbrosa Ahrendt 358
ignorata Schneid. 358
iliensis Popov 358
jamesiana Forrest et W. W. Smith 358
johannis Ahrendt 358
julianae Schneid. 359
var. oblongifolia Ahrendt 359
kansuensis Schneid. 359
kawakamii Hayata 359
lempergiana Ahrendt 359
ludlowii Ahrendt 359
mitifolia Stapf 359
morrisinensis Hayata 359
orittepha Schneid. 359
pingshanensis Sung et Hsiao 360
poiretii Schneid. 360
polyantha Hemsl. 360
pruinosa Franch. 360
pubescens Pamp. 360
purdormii Schneid. 360
reticulata Byhouwer 360
sanguinea Franch. 361
sargentiana Schneid. 361
shensiana Ahrendt 361
sibirica Pall. 361
silva-taroncana Schneid. 361
soulieana Schneid. 361
*stenophylla* Hance 361
taronensis Ahrendt 361
thunbergi DC. 362
veitchii Schneid. 362
vernae Schneid. 362
verruculosa Hemsl. et Wils. 362
virescens Hook. f. et Thoms. 362
virgetorum Schneid. 362
vulgaris L. 362
wilsonae Hemsl. et Wils. 362
xanthoclada Schneid. 363
xanthophloea Ahrendt 363
Berchemia Neck. 709
edgeworthii Laws. 709
flavescens (Wall.) Brongn. 709
floribunda (Wall.) Brongn. 709
var. *megalophylla* Schneid. 709
giraldiana Schneid. 709
huana Rehd. 709
*hypochrysa* Schneid. 709
kulingensis Schneid. 710
lineata (L.) DC. 710
omeiensis Fang ex Y. L. Chen 710
polyphylla Wall ex. Laws. 710
var. leiocIada Hand.-Mazz. 710
var. trichophylla Hand.-Mazz. 710
*Pycnantha* Schneid. 710
*racemosa* Sieb. et Zucc. 709
sinica Schneid. 710
yunnanensis Franch. 710
Berchemiella Nakai 711
wilsonii (Schneid.) Nakai 711
Bergenia Moench 474
crassifolia (L.) Fritsch 474
purpurascens (Hook. f. et Thoms.) Engl. 474
scopulosa T. P. Wang 474
*Bergera integerrima* Buch.-Ham. 649
*koenigii* L. 649
Bergia L. 777
ammannioides Roxb. 777
Berneuxia Decne. 880
thibetica Decne. 880
*yunnanensis* Li 880
Beta L. 252
vulgaris L. 252
var. cicla L. 253
Betonica L. 1059
*laevigata* D. Don 1093
officinalis L. 1059
Betula L. 167
albo-sinensis Burk. 167
alnoides Buch.-Ham. ex D. Don 167
alnoides Buch.-Ham. ex D. Don var. pyrifolia Franch. 167
austro-sinensis Chun ex P. C. Li 168
cylindrostachya Lindl. 168
dahurica Pall. 168
ermanii Cham. 168
insignis Franch. 168
*japonica* Thunb. 166
luminifera H. Winkl. 168
microphylla Bunge 168
pendula Roth. 168
platyphylla Suk. 168
var. *mandshurica* (Regel) Hara 168
rotundifolia Spach 169
tianschanica Rupr. 169
utilis D. Don 169
Betulaceae 166
Bidens L. 1265
bipinnata L. 1265
biternata (Lour.) Merr. et Sherff. 1265
cernua L. 1265
frondosa L 1265
maximowicziana Oett. 1265
parviflora Willd. 1265
pilosa L. 1266
var. *minor* (Bl.) Sherff. 1266
var. radiata Sch. Bip. 1266
*repens* D. Don 1266
tripartita L. 1266
var. repens (D. Don) Sherff. 1266

Biebersteinia Steph. ex Fisch. 611
heterostemon Maxim. 611
*Biermannia decumbens* (Griff.) Tang et Wang ex Merr. et Metc. 1546
*Bignonia capensis* Thunb. 1164
*ghorta* Buch.-Ham. ex G. Don 1163
*grandiflora* Thunb. 1160
*indica* L. 1163
*tomentosa* Thunb. 1142
*venusta* Ker 1163
Bignoniaceae 1160
Billbergia Thunb. 1426
pyramidalis Lindl. 1427
Biondia Schltr. 973
chinensis Schltr. 973
hemsleyana (Warb.) Tsiang 974
henryi (Warb. ex Schltr. et Diels) Tsiang et P. T. Li 974
Biophytum DC. 610
apodiscias (Turcz.) Edgew. et Hook. f. 610
esquirolii Lévl. 610
sensitivum (L.) DC. 610
Biotite schist. 1790
Bischofia Bl. 621
javanica Bl. 621
polycarpa (Lévl.) Airy-Shaw 621
*Bistorta amplexicoule* (D. Don) Greene 221
*chinensis* H. Gross 227
*emodi* (Meissn.) V. Petrov
*macrophylla* (D. Don) Sojak 226
*pacifica* Kom. 227
*suffulta* (Maxim.) Greene ex H. Gross 230
*vivipara* (L.) S. F. Fray 230
*vulgaris* Hill ex H. Gross 222
Bittenn 1787
Bixa L. 774
orellana L. 774
Bixaceae 774
Bjerkandera Karst. 28
fumosa (Pers. ex Fr.) Karst. 28
Bladhia *chinensis* Nakai 900
*crispa* Thunb. 900
*glabra* Thunb. 393
*japonica* Thunb. 903
Blainvillea Cass. 1266
acmella (L.) Philipson 1266
Blastus Lour. 807
apricus (Hand.-Mazz.) H. L. Li 807
var. longiflorus (Hand. Mazz.) C. Chen 808
cavaleriei Lévl. et Vant. 808
cochinchinensis Lour. 808
dunnianus Lévl. 808
*longiflorus* Hand.-Mazz. 808
pauciflorus (Benth.) Guillaum. 808
*spathulicalyx* Hand.-Mazz. var. *apricus* Hand.-Mazz. 807
Blattela Caudell 1610
germanica (Linnaeus) 1611
Blattidae 1610
Blechnaceae 111
Blechnum L. 111
*eburneum* Christ 112
*japonicum* L. f. 112
orientale L. 111
*stenopterum* Hance 84
*Bletia dubia* D. Don 1539
*formosana* Hayata 1519
*gebina* Lindl. 1519
*graminifolia* D. Don 1519
*masuca* D. Don 1523
*woodfordii* Hook. 1555
Bletilla Reichb. f. 1519
*foliosa* (King et Pantl.) Wang et Tang 1519
formosana (Hayata) Schltr. 1519
var. limprichtii Schltr. 1519
ochracea Schltr. 1519
*scopulorum* (W. W. Smith) Schltr. 1558
siensis (Rolfe) Schltr. 1519
striata (Thunb.) Reichb. f. 1520
var. gebina (Lindl.) Reichb. 1520
*szechuanica* Schltr. ex Limpr. 1519
*yunnanensis* Schltr. ex Limpr. 1519
Blinkworthia Choisy 1024
convoloides Prain 1024
*discostigma* Hand.-Mazz. 1024
Blumea DC. 1266
aromatica DC. 1266
balsamifera (L.) DC. 1267
var. *microcephala* Kitam. 1267
*barbata* DC. var. *sericans* Kurz 1269
clarkei Hook. f. 1267
densifora DC. 1267
fistulosa (Soxb.) Kurz 1267
formosana Kitam. 1267
*glomerata* DC. 1267
hieracifolia (D. Don) DC. 1267
*hongkongensis* Lévl. et Vant. 1267
lacera (Burm. f.) DC. 1267
laciniata (Roxb.) DC. 1268
lanceolaria (Roxb.) Druce 1268
*leptophylla* Hayata 1266
martiniana Vant. 1268
megacephala (Randeria) Chang et Y. Q. Tseng 1268
mollis (D. Don) Merr. 1268
*myriocephala* DC. 1268
oblongifolia Kitam. 1269
*onnaensis* Hayata 1268
*pterodonta* DC. 1311
*riparia* (Bl.) DC. var. *megacephala* Randeria 1268
sagittata Gagnep. 1268
sericans (Kurz) Hook. f. 1269
*subcapitata* DC. 1267
*wightiana* DC. 1268
Blyxa Noronha 1360

echinosperma (C. B. Clarke) Hook. f. 1360
*Bobua confusa* (Brand.) Kanehira et Sasaki 931
*wikstroemifolia* (Hayata) Kanehira et Sasaki 931
*Bocconia cordata* Willd. 440
*microcarpa* Maxim. 441
Boea Comm. ex Lam. 1178
*birmanica* Craib 1193
clarkeanus Hemsl. 1178
crassifolia Hemsl. 1178
dictyoneura Hance 1178
hygrometrica Hance 1178
*rufescens* Franch. 1191
*swinhoii* (Bunge) R. Br. 1191
Boehmeria Jacq. 192
*canescens* Wedd. 193
clidemioides Miq. var. diffusa (Wedd.) Hand.-Mazz. 192
var. umbrosa Hand.-Mazz. 194
*diffusa* Wedd. 192
densiglomerata W. T. Wang 192
gracilis C. H. Wright 192
*grandifolia* Wedd. 192
*japonica* Miq. 192
longispica Steud. 192
*macrophylla* D. Don. 193
macrophylla Hornem. 193
var. canescens (Wedd.) Long 193
var. scabrella (Roxb.) Long 193
*martinii* Lévl. 203
*nipononivea* Koidz. 193
pendulifera Wedd. ex Long 193
nivea (L.) Gaud. 193
var. nipononivea (Koidz.) W. T. Wang 193
var. viridula Yamamoto 193
*plasanifolia* Franch. et Sav. 193
var. *silvestrii* Pamp. 194
*platyphylla* D. Don
var. *canescens* (Wedd.) Wedd. 193
var. *scabrella* (Roxb.) Wedd. 194
var. *tomentosa* (Wedd.) Wedd. 194
var. *tricuspis* Hance 193
*scabrella* (Roxb.) Gaud.
siamensis Craib 194
silvestrii (Pamp.) W. T. Wang 194
spicata (Thunb.) Thunb. 194
tomentosa Wedd. 194
tricuspis (Hance) Makino 193
umbrosa (Hand.-Mazz.) W. T. Wang 194
Boeica C. B Clarke 1178
porosa C. B. Clarke 1178
*tonkinensis* (Kraenzl.) Burtt 1178
Boenninghausenia Reichb. 643
albiflora (Hook.) Reichb. 643
sessilicarpa Lévl. 643
Boerhavia L. 235
diffusa L. 235
Bohadschia argus Jaeger 1637
bivittata (Mitsukuri) 1637
marmorata Laeger 1637
Boidae 1706
Bolbitiaceae 42
Bolbitidaceae 122
Bolbitis Schott 122
heteroclita (Presl) Ching 122
subcordata (Cop.) Ching 122
Bolbostemma Franquet 782
biglandulosum (Hemsl.) Franquet 782
paniculatum (Maxim.) Franquet 782
Boleophthalmus Cuvier et Valenciennes 1684
pectinirostris (Linnaeus) 1684
Boletaceae 43
Boletinus Kalchbr. 43
cavipes (Opat.) Kalchbr. 43
Boletus Dill. ex Fr. 43
*betulinus* Bull. 33
*cuticularis* Bull. 31
edulis Bull. ex Fr. 43
*elegans* Bull. 33
erythropus Pers. ex Fr. 43
*fomentarius* L. 34
*granulatus* Fr. 44
*igniarius* L. 32
*luteus* L. ex Fr. 44
pulverulentus Opat. 43
regius Krombh. 43
rubellus Krombh. 43
satanas Len 43
speciosus Forst. 43
violaceafuscus Chiu 43
*Boltonia lautureana* Debx. 1309
Bombacaceae 746
Bombax L. 746
ceiba L. 746
*malabaricum* DC. 746
Bombina Oken 1695
orientalis (Boulenger) 1696
Bombycidae 1629
Bombyx Pliny 1629
mori Linnaeus 1629
Bondarzewia Sing. 28
montana (Quel.) Sing. 28
Bonnemaisoniaceae 13
*Boottia acuminata* Gagnep. 1360
Boraginaceae 1031
Borassus L. 1461
*caudatus* Lour. 1463
flabellifer L. 1461
Borax 1787
Bornitum 1782
Borreria G. F. Mey. 991
articularis Williams 991
pusilla (Wall.) DC. 991
*stricta* (L. f.) K. Schum. 991

Bos Linnaeus 1773
grunniens Linnaeus 1773
taurus domesticus Gmeiln 1773
Boschniakia C. A. Mey. 1194
*glabra* C. A. Mey. 1194
*himalaica* Hook. f. et Thoms. 1196
rossica (Cham. et Schlecht.) Fedtsch. et Flerov 1194
Bostrichthys Duméril 1683
sinensis (Lacepede) 1683
Bostrychanthera Benth. 1059
deflexa Benth. 1059
Boswellia Roxb. ex Colebr. 657
carterii Birdw
Bothriospermum Bunge 1032
asperugoides Sieb. et Zucc.
chinense Bunge 1032
hispidissimum Hand.-Mazz. 1033
kusnezowii Bunge 1033
secundum Maxim. 1033
tenellum (Hornem.) Fisch. et Mey. 1033
var. asperugoides (Sieb. et Zucc.) Maxim. 1033
Botrychiaceae 78
Botrychium Sw. 78
daucifolium Wall. 78
var. *japonicum* Prantl 78
japonicum (Prantl) Underw. 78
lanuginosum Wall. 78
lunaria (L.) Sw. 79
officinale Ching 79
strictum Underw. 79
ternatum (Thunb.) Sw. 79
virginianum (L.) Sw. 79
yunnanense Ching 79
*Botryopleuron axillare* (Sieb. et Zucc.) Hemsl. 1158
*longispicatum* Merr. 1159
*plukenetii* Yamazaki 1159
*yunnanensis* W. W. Smith 1159
Bougainvillea Comm. ex Juss. 235
glabra Choisy 235
*Boussingaultia gracilis* Miers var. *pseudabasellaides* Bailey 237
Bovidae 1773
Bovista Pers. 49
plumbea Pers. 49
Bovistella Morg. 49
radicata (Dur. et Mont.) Pat. 49
sinensis Lloyd 50
Boweingia Champ. ex Benth. 554
callicarpa Champ. ex Benth. 554
*insignis* Hook. 112
*Boymia rutaecarpa* Juss. 647
Brachiaria Griseb. 1438
villosa (Lam.) A. Camus 1438
Brachycorythis Lindl. 1520
galeandra (Reichb. f.) Summerh. 1520
Brachysomophis crocodilinus (Bennett) 1675
Brachystelma R. Br. 974
edule Coll. et Hemsl. 974
Brachystemma D. Don 239
calycinum D. Don 239
Brachyteme Hook. f. 991
wallichii Hook. f. 991
Brachytrichia Zanard. 4
quoyi (C. Ag.) Born. et Flah. 4
Brachytrupes portentosus Lichtenstein 1615
Bradybaena Beck 1580
kiangsiensis (Martens) 1580
rivida (Benson) 1580
similaria (Ferussae) 1580
Bradybaenidae 1580
Brainea J. Smith 111
insignis (Hook.) J. Smith 112
*Bramia monnieri* (L.) Pennell 1132
Branchiostegidae 1676
Branchiostegus Rafinesque 1676
japonicus (Houttuyn) 1676
Branchiostoma Banks 1641
belcheri (Gray) 1641
belcheri tsing-taoensis Tchang et Koo 1642
Branchiostomidae 1641
Brandisia Hook. f. et Thoms. 1132
cauliflora Tsoong et Lu 1132
discolor Hook. f. et Thoms. 1132
hancei Hook. f. 1132
kwangsiensis Li 1132
swinglei Merr. 1132
Brasenia Schreb. 385
schreberi J. F. Gmel. 385
Brassaiopsis Decne. et Planch. 837
ciliata Dunn 837
fatsioides Harms 837
ferruginea (Li) Hoo ex Hoo et Tseng 838
glomerulata (Bl.) Regel 838
var. *coriacea* (W. W. Smith) Li 838
var. longipedicellata Li 838
quercifolia Hook. 838
tripteris (Lévl.) Rehd. 838
Brassica L. 447
*alba* (L.) Boiss. 457
alboglabra Bailey 447
campestris L. 447
var. *oleifera* DC. 447
caulorapa (DC.) Jacq. 447
chinensis L. 448
integrifolia (West) O. E. Schulz 448
juncea (L.) Czern. et Coss. 448
var. multisecta Bailey 448
napobrassica Mill. 448
*napus* L. var. *chinensis* (L.) O. E. Schulz 448
narinosa Bailey 448
oleracea L. var. capitata L. 448
var. *caulorapa* DC. 447
pekinensis Rupr. 448

rapa L. 448
Bredia Bl. 808
amoena Diels 808
*cordata* H. L. Li 808
esquirolii (Lévl.) Lauener var. cordata (H. L. Li) C. Chen 808
*jordii* (Hance) Diels 813
longiloba (Hand.-Mazz.) Diels 809
*longirradiosa* C. Chen 813
quadrangularis Cogn. 809
sessilifolia H. L. Li 809
sinensis (Diels) H. L. Li 809
tuberculata (Guill.) Diels 809
Bretschneidera Hemsl. 675
sinensis Hemsl. 675
Bretschneideraceae 675
Breynia J. R. et G. Forst. 621
fruticosa (L.) Hook. f. 622
hyposauropus Croiz. 622
*patens* (Roxb.) Benth. 622
retusa (Dennst.) Alston 622
rostrata Merr. 622
vitis-idaea (Burm. f.) C. E. C. Fisch. 622
Bridelia Willd. 622
fordii Hemsl. 622
*henryana* Jabl. 623
*hirsutum* Roxb. 632
insulana Hance 622
*lanceolarium* Roxb. 632
*monoica* (Lour.) Merr. 632
*philippinense* Cav. 632
stipularia (L.) Bl. 622
tomentosa Bl. 623
Briggsia Craib 1179
amabilis (Diels) Craib 1170
chienii Chun 1179
*fritschii* (Levl. at Vant.) Craib 1179
longipes (Hemsl.) Craib 1179
mibieri (Franch.) Craib 1179
rosthornii (Diels) Burtt 1179
speciosa (Hemsl.) Craib 1179
stewardii Chun 1179
*Bromelia comosa* L. 1426
Bromeliaceae 1426
Bromus L. 1438
*cristatus* L. 1434
japonicus Thunb. 1438
Broussonetia L'Hérit. 184
kaempferi Sieb. et Zucc. 184
kazinoki Sieb. et Zucc. 184
papyrifera (L.) Vent. 184
Brucea J. K. Mill. 656
javanica (L.) Merr. 656
mollis Wall. 657
Brugmansia Pers. 1117
arborea (L.) Steud. 1117
Brunfelsia L. 1117
acuminata Benth. 1118
Bryaceae 62
Bryguiera Lamk. 815
cylindrica (L.) Bl. 815
gymnorrhiza (L.) Savigny 815
sexangula (Lour.) Poir. 815
*Bryocles ventricosa* Salisb. 1384
*Bryoma amplexicaulis* Lam. 790
*Bryonia cucumeroides* Ser. 793
*maysorensis* Wight et Arn. 797
*palmatus* L. 784
*pedunculosa* Ser. 787
Bryophyllum Salisb. 462
pinnatum (L. f.) Oken 462
Bryophyta 60
Bryozoa 1636
Bryum Dill. 62
argenteum Hedw. 62
Bubalus Smith 1774
bubalis Linnaeus 1774
Bubo Dumeril 1731
bubo (Linnaeus) 1731
*Bubon buchtormensis* Fisch. 865
Bubulcus Bonaparte 1714
ibis (Linnaeus) 1714
Buccinidae 1576
Buchnera L. 1133
*asiatica* L. 1153
*cruciata* Buch.-Ham. 1133
*mosmia* Ham. ex Benth. 1153
*Bucklandia populnea* R. Br. 460
Buckleya Torr. 209
*henryi* Diels 209
lanceolata (Sieb. et Zucc.) Miq. 209
Buddleja L. 1129
albiflora Hemsl. 1129
alternifolia Maxim. 1129
asiatica Lour. 1129
crispa Benth. 1129
var. *grandiflora* (Marq.) S. Y. Bao 1130
davidii Franch. 1130
*duclouxii* Marq. 1130
fallowiana Balf. f. et W. W. Smith 1130
var. *alba* Sabourin 1130
*farreri* Balf. f. et W. W. Smith 1129
forrestii Diels 1130
*giraldii* Diels 1129
*gynandra* Marq. 1131
heliophilla W. W. Smith 1130
*hemsleyana* Koehne 1129
*henryi* Rehd. et Wils. 1130
lindleyana Fort. et Lindl. 1130
macrostachya Benth. 1130
myriantha Diels 1130
officinalis Maxim. 1131
paniculata Wall. 1131
*subherbacea* Koehne 1130
*tibetica* W. W. Smith 1129

*variabilis* Hemsl. 1130
Buddlejaceae 1129
Budorcas Hodgson 1774
taxicolor Hodgson 1774
*Buettneria aspera* Colebr. 747
Bufo Laurenti 1696
bufo Cantor 1696
melanostictus Schneider 1696
raddei Strauch 1696
tibetanus Zarevski 1696
viridis Laurenti 1696
Bufonidae 1696
*Buglossoidea arvensis* (L.) Johnston 1036
Bulbophyllum Thou. 1520
affine Lindl. 6520
ambrosia (Hance) Schltr. 1520
*amplifolium* (Bolfe) Balakr. et Chowdhury 1525
andersonii (Hook. f.) J. J. Smith 1525
calodictyon Schltr. 1520
careyanum (Hook.) Spreng. 1521
drymoglossum Maxim. 1521
flaviflorum Seidenf. 1521
kwangtungense Schltr. 1521
levinei Schltr. 1521
odoratissimum (Smith) Lindl. 1521
reptans (Lindl.) Lindl. 1521
shweliense W. W. Smith 1521
Bulbostylis Kunth 1486
barbata (Rottb.) Kunth 1486
densa (Wall.) Haud.-Mazz. 1486
Bullacta Bergh 1577
exarata (Philippi) 1577
Bungarus Daudin 1709
fasciatus (Schneider) 1709
multicinctus Blyth 1709
*Bunias cornuta* L.
Bupleurum L. 851
angustissimum (Franch.) Kitag. 852
aureum Fisch. 851
bicaule Helm. 851
candollei Wall. ex DC. 851
chaishou Shan et Sheh 852
chinense DC. 852
f. chiliosciadium (Wolff) Shan et Y. Li 852
var. *komarovianum* (Lincz.) Liou et Huang 853
f. octoradiata (Bunge) Shan et Sheh 852
f. pekinense (Franch.) Shan et Y. Li 852
f. vanheurckii (Muell.-Arg.) Shan et Y. Li 852
commelynoideum de Boiss. 852
var. flaviflorum Shan et Y. Li 852
condensatum Shan et Y. Li 852
*dauricum* Fisch. et Mey. 855
densiflorum Rupr. 852
dielsianum Wolff 852
exaltatum Marsch.-Bieb. 853
*falcatum* L. var. *bicaule* Wolff 851
subsp. *marginatum* (Wall.) Wolff 854
var. *stenophyllum* Wolff 854
komarovianum Lincz. 853
kweichowense Shan 853
longicaule Wall. ex DC. var. franchetii de Boiss. 853
var. giraldii Wolff 853
var. strictum C. B. Clarke 853
*longifolium* var. *aureum* (Fisch.) Wolff 851
longiradiatum Turcz. 853
var. breviradiatum Fr. Schmidt 854
var. *genuinum* Wolff 854
var. porphyranthum Shan et Y. Li 854
malconense Shan et Y. Li 854
marginatum Wall. ex DC. 854
var. stenophyllum (Wolff) Shan et Y. Li 854
microcephalum Diels 854
petiolulatum Franch. var. tenerum Shan et Y. Li 854
pusillum Krylov 855
rockii Wolff 855
*sachalinense* Fr. Schmidt 854
scorzonerifolium Willd. 855
f. longiadiarum Shan et Y. Li 855
f. pauciflorum Shan et Y. Li 855
sibiricum Vet 855
smithii Wolff 855
var. auriculata Shan et Y. Li 855
var. parvifolium Shan et Y. Li 855
tenue Buch.- Ham. ex D. Don 855
tianschanicum Freyn 856
triradiatum Adams ex Hoffm. 856
wenchuanense Shan et Y. Li 856
yinchowense Shan et Y. Li 856
yunnanense Franch. 856
Buprestidae 1621
Burmannia L. 1423
coelestis D. Don 1423
disticha L. 1423
Burmanniaceae 1423
Burseraceae 657
Buteo Lacepede 1719
buteo (Linnaeus) 1720
himilasius Temminck et Schlegel 1720
Buthidae 1595
Buthus Leach 1595
martensii Karsch 1595
Butomaceae 1359
Butomus L. 1359
umbellatus L. 1359
Butorides Blyth 1714
striatus (Linnaeus) 1714
Buxaceae 704
Buxus L. 704

bodinieri Lévl. 704
cephalantha Lévl. et Vant. 705
harlandii Hance 705
henryi Mayr. 705
latistyla Gagnep. 705
megistophylla Lévl. 705
*microphylla* Sieb. et Zucc. var. *aemulans* Rehd. et Wils. 706
var. *sinica* Rehd. et Wils. 705
myrica Lévl. 705
rugulosa Hatusima 705
subsp. prostrata (W. W. Smith)M. Cheng 705
subsp. rupicola (W. W. Smith) Hatusima 705
sinica (Rehd. et Wils.) M. Cheng 705
subsp. aemulans (Rehd. et Wils.) M. Cheng 705
var. parvifolia M. Cheng 705
Byttneria Loefl. 747
aspera Colebr 747

## C

Cacalia L. 1269
*aconitifolia* Bunge 1346
ainsliaeflora (Franch.) Hand.-Mazz. 1269
ambigua L. 1269
auriculata DC. 1269
*bicolor* Willd. 1300
bulbiferoides Hand.-Mazz. 1269
*cusimbua* D. Don 1300
*davidii* (Franch.) Hand.-Mazz. 1340
delphiniphyllus (Maxim.) Mattf. 1269
deltophylla (Maxim.) Mattf. 1269
farfarefolia Sieb. et Zucc. subsp. petasitoides (Lévl.) H. Koyama 1270
*graciliflorus* Wall. 1336
hastata L. 1270
var. glabra Ledeb. 1270
subsp. lancifolia (Franch.) H. Koyama 1270
leucocephala (Franch.) Hand.-Mazz. 1270
otopteryx Hand.-Mazz. 1270
palmatisecta (J. F. Jeffrey) Hand.-Mazz. 1270
*procumbens* Lour. 1301
profundorum (Dunn) Hand.-Mazz. 1270
roborowskii (Maxim.) Ling 1271
rubescens (S. Moore) Matsuda 1271
*sonchifolia* L. 1292
*tangutica* (Maxim.) Hand.-Mazz. 1340
*volubilis* Bl. 1279
*xanthotricha* Gruning 1319
*Cachrys sibirica* Steph. ex Spreng. 872
Cactaceae 262
*Cactus dillenii* Ker-Gawl. 263
*monacantha* Willd. 263
Caesalpinia L. 554
*aestivalis* Chun et How 596
bonduc (L.) Roxb. 554
crista L. 554
cucullata Roxb. 554
decapetala (Roth) Alston 554
var. pubescens (Tang et Wang) P. H. Huang 554
digyna Rotller 554
magnifoliolata Metc. 555
millettii Hook. et Arn. 555
minax Hance 555
*nuga* Ait. 554
pulcherrima (L.) Sw. 555
sappan L. 555
*sepiaria* Roxb. 554
*szechuenensis* Craib 554
vernalis Champ. 555
Cairina Fleming 1717
moschata Linnaeus 1717
Cajanus DC. 555
cajan (L.) Huth 555
*flavus* DC. 555
Caladium Vent. 1474
bicolor (Ait.) Vent. 1474
*cucullatum* Pers. 1466
*giganteum* Bl. ex Hassk. 1475
*pumilum* D. Don 1476
Calamaria Boie 1707
septentrionalis Boulenger 1707
Calamintha Mill. 1059
*barosma* W. W. Smith 1089
*chinensis* Benth. 1060
var. *megalantha* Diels 1061
*clinopodium* Benth. var. *urticifolia* Hance 1061
*confinis* Hance 1060
debilis (Bunge) Benth. 1059
*esquirolii* Lévl. 1062
*gracilis* Benth. 1061
*megalantha* (Diels) Hand. -Mazz. 1061
*polycephalum* Vaniot 1061
Calamus L. 1461
macrorrhynchus Burret 1461
*margaritae* Hance 1463
platyacanthoides Merr. 1461
rhabdocladus Burret 1461
var. globulosus S. Y. Chen et S. T. Pei 1461
tetradactylus Hance 1461
Calanthe R. Br. 1522
alismifolia Lindl. 1522
*amoena* W. W. Smith 1523
*brachychila* Gagnep. 1523
brevicorna (Lindl. ex Wall.) Lindl. 1522
*buccinifera* Rolfe 1522
*cheriana* Hand. -Mazz. 1522
*coelogyniformis* Kranzl. 1522
davidii Franch. 1522

delavayi Finet 1522
densiflora Lindl. 1522
discolor Lindl. 1522
*ensifolia* Rolfe 1522
*esquirolei* Schltr. 1522
fimbriata Franch. 1522
graciliflora Hayata 1523
gracilis Lindl. 1523
*hamata* Hand. -Mazz. 1523
hancockii Rolfe 1523
*lamellosa* Rolfe 1522
mannii Hook. f. 1523
masuca (D. Don) Lindl. ex Wall. 1523
*megalopha* Franch. 1524
*nigropuncticulata* Fukuyama 1522
odora Griff. 1523
puberula Wall. ex Lindl. 1523
*pusilla* Finet 1523
reflexa Maxim. 1523
similis Schltr. 1524
tricarinata Wall. ex Lindl. 1524
triplicata (Willemet) Ames 1524
*undulata* Schltr. 1524
whiteana King et Prantl. 1524
*yunnanensis* Rolfe 1522
Calappa Waber 1604
gallus (Herbst) 1604
lophos (Herbst) 1604
philargius (Linnaeus)
Calappidae 1604
Calathodes Hook. f. et Thoms. 319
oxycarpa Sprague 319
polycarpa Ohwi 319
Calcareoboea C. Y. Wu 1179
coccinea C. Y. Wu et H. W. Li 1179
Calcareous loess nodule 1786
Calcitum 1785
Calendula L. 1271
arvensis L. 1271
officinalis L. 1271
*Calimeris tataricus* Lindl. 1303
*Calispermum rude* (Hand. -Mazz.) Nakai 906
*scandens* Lour. 906
Calla L. 1474
*calyptrata* Roxb. 1486
*occulta* Lour. 1476
palustris L. 1474
Calliandra Benth. 556
haematocephala Hassk. 556
Callianthemum C. A. Mey. 319
alatavicum Freyn 319
taipaicum W. T. Wang 319
*Calliaspidia guttata* (Brandegee) Bremek. 1168
Callicarpa L. 1041
arborea Roxb. 1041
bodinieri Lévl. 1041
var. *giraldiana* (Hesse) Rehd. ex Li 1042
var. iteophylla C. Y. Wu 1041
var. *lyi* (Lévl.) Rehd. 1042
var. rosthornii (Diels) Rehd. 1041
brevipes (Benth.) Hance 1041
*cana* L. 1041
candicans (Burm. f.) Hochr. 1041
cathayana H. T. Chang 1041
dichotoma (Lour.) K. Koch 1042
formosana Rolfe 1042
var. *chinensis* Péi 1044
*giraldiana* Hesse 1042
giraldii Hesse ex Rehd. 1042
var. lyi (Lévl.) C. Y. Wu 1042
integerrima Champ. 1042
japonica Thunb. 1042
var. angustata Rehd. 1042
f. *glabra* Péi 1042
kochiana Makino 1042
kwangtungensis Chun 1043
lingii Merr. 1043
lobo-apiculata Metc. 1043
longifolia Lamk. 1043
var. *brevipes* Benth. 1041
var. floccosa Schauer 1043
var. rosthornii Diels 1041
*longifolia* Lam. var. *rosthornii* Diels 1041
var. *brevipes* Benth. 1041
var. *longissima* Hemsl. 1043
*longiloba* Merr. 1042
*longipes* Dunn 1043
*longissima* (Hemsl.) Merr. 1043
*loureiri* Hook. et Arn. 1042
*lyi* Lévl. 1042
macrophylla Vahl 1043
*membranacea* H. T. Chang 1042
nudiflora Hook. et Arn. 1044
peichieniana Chun et S. T. Chen 1044
peii H. T. Chang 1044
pilosissima Maxim. 1044
var. *henryi* Yamamoto 1044
rubella Lindl. 1044
f. angustata Péi 1044
f. crenata Péi 1044
*seguinii* Lévl. 1041
yunnanensis W. Z. Fang 1044
Calligonum L. 219
leucocladum (Schrenk) Bunge 219
mongolicum Turcz. 219
*Calliopsis tinctoria* (Nutt.) DC. 1281
Calliphoridae 1632
*Callispidia guttata* (Brandegee) Bremek. 1168
Callista chinensis (Holten) 1587
Callistemon R. Br. 802
rigidus R. Br. 802
Callistephus Cass. 1271
chinensis (L.) Nees 1271
Callitrichaceae 1055
Callitriche L. 1055

palustris L. 1055
Callorhinus Gray 1767
ursinus (Linnaeus) 1767
Callosciurus Gray 1752
erythraeus (Pallas) 1752
Caloglossa J. Ag. 18
leprieurii (Mont.) J. Ag. 18
Calogyne R. Br. 1237
Pilosa R. Br. 1237
Calonyction Choisy 1025
aculeatum (L.) House 1025
muricatum (L.) G. Don 1025
Calophanoides Ridl. 1166
chinensis (Benth.) C. Y. Wu et H. S. Lo 1166
kwangsiensis H. S. Lo 1166
quadrifaria (Wall.) Ridl. 1166
salicifolia (T. Anders.) Bremek. 1167
Calophyllum L. 419
inophyllum L. 419
membranaceum Garbn. et Champ. 419
*Calorhabdos brunoniana* Benth. 1158
*cauloptera* Hance 1158
*latifolia* Hemsl 1158
*stenostachys* Hemsl. 1158
Calotes Rafinesque 1703
versicolor (Daudin) 1703
Calothrix C. Ag. 4
crustacea Thuret 4
Calotropis R. Br. 974
gigantea (L.) Dryand. ex Ait. f. 974
Caltha L. 320
*fistulosa* Schipcz. 320
nathans Pall. 320
palustris L. 320
var. barthei Hance 320
var. membranacea Turcz. 320
var. sibirica Regel 320
scaposa Hook. f. et Thoms. 320
Calvatia Fr. 50
caelata (Bull. ex DC.) Morg. 50
candida (Rostk.) Hollos 50
craniiformis (Schw.) Fr. 50
gigantea (Batsch ex Pers.) Lloyd 50
lilacina (Mont.et Berk.) Lloyd 50
Calycanthaceae 281
Calycanthus L. 281
chinensis Cheng et S. Y. Chang 281
*praecox* L. 282
Calycopteris Lam. 816
floribunda (Roxb.) Lam. 816
*Calysphyrum flordum* Bunge 1214
Calystegia R. Br. 1025
hederacea Wall. ex Roxb. 1025
*japonica* Choisy 1025
pellita (Ledeb.) G. Don 1025
sepium (L.) R. Br. 1025
var. japonica (Choisy) Makino 1025
soldanella (L.) R. Br. 1825
Camaena Albers 1579
cicatricosa (Müller) 1579
Camaenidae 1579
Cambaroides Faxon 1603
dauricus (Pallas) 1603
schrenckii (Kessler) 1603
similis (Koelbel) 1603
Camchaya Gagnep. 1271
loloana Kerr. 1271
Camelidae 1770
Camellia L. 411
*axillaris* Roxb. 417
caudata Wall. 411
chekiangoleosa Hu 411
chrysantha (Hu) Tuyama 412
var. phaeopabisperma Chang 412
confusa Craib 413
costei Lévl. 412
cuspidata Wight 412
fraterna Hance 412
gymnogyna H. T. Chang 412
japonica L. 412
kissi Wall. 412
longipedicellata (Hu) H. T. Chang 412
oleifera Abel 413
var. *confusa* (Craib) Sealy 413
parvisepala H T. Chang 413
pitardii Coh. Stuart 413
f. cavalerieana (Lévl.) Sealy 413
var. yunnanica Sealy 413
reticulata Lindl. 413
f. simplex Sealy 413
saluenensis Stapf ex Bean 413
f. minor Sealy 413
sinensis (L.) O. Kuntze 413
var. assamica (Mast.) Kitamura 414
f. macrophylla (Sieb.) Kitamura 414
triantha H. T. Chang 414
trichoclada (Rehd.) Chien 414
weiningensis Y. K. Li 414
*Camelliopsis costei* (Lévl.) V. Krecz. 412
Camelus Linnaeus 1770
bactrianus Linnaeus 1770
Campanulaceae 1222
Campanula L. 1226
*aprica* Nannf. 1226
cana Wall. 1226
*carnosa* Wall. 1236
*cephalotus* Nakai 1227
colorata Wall. 1226
crenulata Franch. 1227
glomerata L. 1227
subsp. cephalotus (Nakai) Hong 1227
*gmelinii* Spreng. 1223
*grandiflora* Jacq. 1236
*khasiana* Hook. f. et Thoms. 1224
*lancifolia* Roxb. 1228

*liliifolia* L. 1224
*marginata* Thunb. 1237
*microcarpa* C. Y. Wu 1226
*pereskiifolia* Fisch. ex Roem. et Schult. 1224
punctata Lam. 1227
*purpurea* Spreng. 1231
*remotiflora* Sieb. et Zucc. 1224
*stenanthina* Ledeb. 1225
*tetraphylla* Thunb. 1226
Campanumoea Bl. 1227
javanica Bl. 1227
subsp. japonica (Makino) Hong 1227
var. *japonica* Makino 1227
*lanceolata* Sieb. et Zucc. 1229
lancifolia (Roxb.) Merr. 1228
*pilosa* Franch. 1230
Camphorosma L. 253
monspeliaca L. 253
subsp. lessingii (Litv.) Allen 253
*Campium subcordatum* Cop. 122
Campsis Lour. 1160
*forrunei* Seem. 1142
grandiflora (Thunb.) Loisel. ex K. Schumann 1160
radicans (L.) Seem. 1160
Camptoserus Link 110
sibiricus Rupr. 110
Camptotheca Decne. 825
acuminata Decne. 825
Campylaephora J. Ag. 17
hypnaeoides J. Ag. 17
*Campylandra wattii* C. B. Clarke 1401
Campylopus Brid. 61
fragilis (Brid.) B. S. G. var. pyriformis (Schultz.) Agstr. 61
Campylotropis Bunge 556
bonatiana (Pamp.) Schindl. 556
delavayi (Franch.) Schindl. 556
harmsii Schindl. 556
hirtella (Franch.) Schindl. 556
macrocarpa (Bunge) Rehd. 556
pinetorum (Kurz) Schindl. subsp. velutina (Dunn) Ohashi 556
polyantha (Franch.) Schindl. 557
trigonclada (Franch.) Schindl. 557
yunnanensis (Franch.) Schindl. 557
*Campylus sinensis* Lour. 385
Cananga (DC.) Hook. f. et Thoms. 271
odorata (Lamk.) Hook. f. et Thoms. 271
Canarium L. 657
album (Lour.) Raeusch. 658
*austro-sinensis* Huang 658
bengalense Roxb. 658
parvum Leenh. 658
pimela Leenh. 658
strictum Roxb. 658
tonkinense Engl. 658
Canavalia DC. 557
ensiformis (L.) DC. 557
gladiata (Jacq.) DC. 557
Cancrinia Kar. et Kir. 1272
discoidea (Ledeb.) Pojark. 1272
maximoviczii C. Winkl. 1272
Canidae 1759
Canis Linnaeus 1759
familiaris Linnaeus 1759
lupus Linnaeus 1760
Canna L. 1515
edulis Ker-Gawl. 1515
flaccida Salisb. 1515
generalis Bailey 1515
indica L. 1516
palans Rosc. 1516
warscewiczii A. Dietr. 1516
Cannabis L. 184
sativa L. 184
Cannaceae 1515
Canscora Lam. 946
lucidissima (Lévl. et Vant.) Hand. -Mazz. 946
melastomacea Hand. -Mazz. 946
Cantharellaceae 26
Cantharellus Adans. ex Fr. 26
cibarius Fr. 26
minor Peck 26
tubaeformis Fr. 26
Canthium Lam. 991
dicoccum (Gaertn.) Teysm. et Binn. 991
*dubium* Lindl. 1019
*henryi* Lévl. 993
horridum Bl. 991
*labordei* Lévl. 994
parvifolium Roxb. 991
simile Merr. 992
*Capitularia amurocraca* Flk. 55
Capparidaceae 444
Capparis L. 444
acutifolia Sweet 444
*bodinieri* Lévl. 444
cantoniensis Lour. 444
*cerasifolia* A. Gray 445
chingiana B. S. Sun 444
*koi* Merr. et Chun 445
masaikai Lévl. 445
membranifolia Kurz 445
pubiflora DC. 445
spinosa L. 445
subsessilis B. S. Sun 445
urophylla F. Chun 445
versicolor Griff. 445
Capra Linnaeus 1775
hircus Linnaeus 1775
ibex Linnaeus 1775
Capreolus Gray 1771
capreolus Linnaeus 1771

Capricornis Ogilby 1776
sumatraensis (Bechstein) 1776
Caprifoliaceae 1198
*Caprifolium macranthum* D. Don 1203
Caprimulgidae 1732
Caprimulgus Linnaeus 1732
affinis Horsfield 1733
indicus Latham 1732
Capsella Medik. 449
bursa-pastoris (L.) Medik. 449
Capsicum L. 1118
annuum L. 1118
var. cerasiforme Irish 1118
var. conoides (Mill.) Irish 1118
var. fasciculatum (Sturt.) Irish 1118
var. grossum (L.) Sendt. 1118
*anomalum* Franch. et Sav. 1129
*conoides* Mill. 1118
*fasciculatum* Sturt. 1118
frutescens L. 1118
var. *longum* Bailey 1118
*grossum* L. 1118
Carabidae 1619
Carabus (Coptolabrus) smaragdinus Fischer 1619
Caragana Fabr. 557
acanthophylla Kom. 557
arborescens (Amm.) Lam. 557
brevifolia Kom. 557
camilli-schneideri Kom. 558
dasyphylla Pojark. 558
franchetiana Kom. 558
*frutescens* K. Koch var. *turfanensis* Krassn. 560
frutex (L.) K. Koch 558
intermedia Kuang et H. C. Fu 558
jubata (Pall.) Poir. 558
korshinskii Kom. 558
laeta Kom. 558
leucophloea Pojark. 558
leucospina Kom. 558
maximowicziana Kom. 558
microphylla Lam. 559
pleiphylla (Regel.) Pojark. 558
polourensis Franch. 558
pruinosa Kom. 559
przewalskii Pojark. 559
pygmaea (L.) DC. 559
roborowiskyi Kom. 559
rosea Turcz. ex Maxim. 559
sinica (Buchoz) Rehd. 559
spinosa DC. 559
stenophylla Pojark. 559
tangutica Kom. 559
tibetica Kom. 560
tragacanthoides (Pall.) Poir. 559
turfanensis (Krassn.) Krassn. 560
Carallia Roxb. 815
brachiata (Lour.) Merr. 815
*diphopetala* Hand.-Mazz. 816
lanceaefolia Roxb. 816
longipes Chun ex Ko 816
Carangidae 1677
Carassius Jarocki 1658
auratus (Linnaeus) 1658
auratus domestic Linnaeus 1658
Carcharhinidae 1646
Carcharhinus Blainville 1646
latistomus Fang et Wang 1646
melanopterus (Quoy et Gaimard) 1646
menisorrah (Müller et Henle) 1646
pleurotaenia (Bleeker) 1646
sorrah (Müller et Henle) 1646
Carcharias Rafinesque 1644
owstoni Garman 1644
Carchariidae 1644
Cardamine L. 449
denudata O. E. Schulz 450
flexuosa With. 449
hirsuta L. 449
impatiens L. 449
leucantha (Tausch) O. E. Schulz 449
lyrata Bunge 449
macrophylla Willd. 450
pratensis L. 450
scaposa Franch. 450
tangutorum O. E. Schulz 450
trifoliolata Hook. f. et Thoms. 450
urbaniana O. E. Schulz 450
Cardiandra Sieb. et Zucc. 474
*alternifolia* Sieb. et Zucc. var. *moellendorffii* Engl. 474
moellendorffii (Hance) Migo 474
*sinensis* Hemsl. 474
Cardiocrinum (Endl.) Lindl. 1373
cathayanum (Wils.) Stearn 1373
giganteum (Wall.) Makino 1373
*Cardiopteris platycarpa* Gagnep. 708
Cardiospermum L. 676
halicacabum L. 676
var. *microcarpum* (Kunth) Bl. 676
Cardioteucris C. Y. Wu 1060
cordifolia C. Y. Wu 1060
Carduelis Brisson 1744
sinica (Linnaeus) 1744
spinus (Linnaeus) 1744
Carduus L. emend. Gaertn. 1272
acanthoides L. 1272
*colorasus* Tamamsch. 1272
crispus L. 1272
*leucophylla* Turcz. 1321
lineare Thunb. 1278
*marianus* L. 1341
nutans L. 1272
*songaricus* (C. Winkl.) Tamamsch. 1272
Caretta Rafinesque 1701

caretta olivacea (Eschscholtz) 1701
Carex L. 1486
alta Boott 1486
baccans Nees 1486
brownii Tuck. 1486
brunnea Thunb. 1487
chinensis Retz. 1487
chungii C. P. Wang 1487
cruciata Wahlenb. 1487
davidii Franch. 1487
densefimbriata Wang et Tang 1487
doniana Spreng. 1487
finitima Boott 1487
gibba Wahlenb 1488
hancockiana Maxim. 1487
heterostachya Bunge 1487
japonica Thunb. 1487
kobomugi Ohwi 1488
lanceolata Boott 1488
lehmannii Drejei 1487
leucochlora Bunge 1488
ligulata Nees ex Wight 1487
maubertiana Boott 1488
moupinensis Franch. 1487
nemostachys Steud. 1488
neurocarpa Maxim. 1487
nubigena D. Don 1488
phacota Spreng. 1488
*remota* L. subsp. *alta* (Boott) Kukenth. 1486
rigescens (Franch.) V. Krecz. 1489
rubro-brunnea C. B. Clarke var. taliensis (Franch.) Kukenth. 1489
satsumensis Franch. et Sav. 1489
scaposa C. B. Clarke 1487
sclerocarpa Franch. 1487
*shichiseitensis* Hayata 1488
siderosticta Hance 1489
spatiosa Boott 1489
*stenophylla* Wahlb. var. *rigescens* Franch. 1489
tangiana Ohwi 1489
tristachya Thunb. 1487
Carica L. 777
papaya L. 778
Caricaceae 777
Carissa L. 962
spinarum L. 962
Carlesia Dunn 856
sinensis Dunn 856
Carmona Cav. 1033
microphylla (Lam.) Don 1033
*Carparia crustacea* L. 1138
Carpesium L. 1272
abrotanoides L. 1272
cernuum L. 1273
α. *lanatum* Hook. f. et Thoms. ex C. B. Clarke 1274
divaricatum Sieb. et Zucc. 1273
*eximum* Winkl. 1273
faberi Winkl. 1273
*kweichowense* Chang 1273
lipskyi Winkl. 1273
longifolium Chen et C. M. Hu 1273
macrocephalum Franch. et Sav. 1273
manshuricum Kitam. 1274
minus Hemsl. 1274
nepalense Less. 1274
var. lanatum (Hook. f. et Thoms. ex C. B. Clarke) Kitam. 1274
szechuanense Chen et C. M. Hu 1274
trachelifolium Less. 1274
triste Maxim. 1274
Carpinus L. 169
cordata Bl. 169
var. chinensis Franch. 169
fangiana Hu 169
fargesiana H. Winkl. 170
monbeigiana Hand. -Mazz. 170
pubescens Burk. 170
turczaninowii Hance 170
Carrierea Franch. 762
calycina Franch. 762
Carthamus L. 1274
tinctorius L. 1274
Carum L. 856
buriaticum Turcz. 856
carvi L. 857
*caudatum* Franch. 873
*coriaceum* Franch. 873
*trichomanifolium* Franch. 876
Carya Nutt. 159
cathayensis Sarg. 159
illinoinensis (Wangenh.) K. Koch 159
*sinensis* Dode 159
Caryophyllaceae 237
Caryopteris Bunge 1045
aureoglandulosa (Vant.) C. Y. Wu 1045
divaricata (Sieb. et Zucc.) Maxim 1045
*esquirolii* Lévl. 1099
forrestii Diels 1045
var. minor Pei et S. L. Chen et C. Y. Wu 1045
incana (Thunb.) Miq. 1045
mongholica Bunge 1045
nepetaefolia (Benth.) Maxim. 1046
*ningpoensis* Hemsl. 1063
paniculata C. B. Clarke 1046
tangutica Maxim 1046
terniflora Maxim. 1046
Caryota L. 1461
mitis Lour. 1461
monostachya Becc. 1461
ochlandra Hance 1462
Cascabela Rafin. 962
thevetia (L.) Lippold 962

Casearia Jacq. 762
glomerata Roxb. 762
f. pubinervis How et Ko 762
Casjera Gmel. 209
rheedii Gmel. 209
Cassia L. 560
agnes (de Wit) Brenan 560
alata L. 560
fistula L. 560
floribunda Cav. 560
hirsuta L. 560
*javanica* L. var. *indo-chinensis* Gagnep. 560
var. *agnes* de Wit 560
leschenaultiana DC. 560
mimosoides L. 561
var. *wallichiana* DC. 560
nomame (Sieb.) Kitag. 561
occidentalis L. 561
siamea Lam. 561
sophera L. 561
*suffruticosa* Koen. ex Roth 561
surattensis Burm. f. 561
tora L. 561
Cassiope D. Don 884
fastigiata (Wall.) D. Don 884
*mairei* Lévl. 884
selaginoides Hook. f. et Thoms. 884
Cassiteritum 1792
Cassytha L. 283
filiformis L. 283
Castanea Mill. 171
henryi (Skan) Rehd. et Wils. 172
indica Roxb. 173
mollissima Bl. 171
seguinii Dode 172
*Castanola srinervis* Llanos 544
Castanopsis Spach 172
ceratacantha Rehd. et Wils. 172
chinensis Hance 172
delavayi Franch. 172
eyrei (Champ.) Tutch. 172
fargesii Franch. 172
*henryi* Skan 172
indica (Roxb.) A. DC. 173
orthacantha Franch. 173
platycantha Rehd. et Wils. 173
sclerophylla (Lindl.) Schott 173
tibetana Hance 173
Castor Linnaeus 1755
fiber Linnaeus 1755
Castoridae 1755
Casuarina Adans. 158
equisetifolia Forst. 158
Casuarinaceae 158
Catabrosa Beauv. 1438
aquatica (L.) Beauv. 1439
Catalpa Scop. 1160
bungei C. A. Mey. 1160
*duclouxii* Dode 1160
fargesii Bureau 1160
f. duclouxii (Dode) Gilmour 1160
ovata G. Don 1161
Catha Benth. 691
*diversifolius* Hemsl. 701
edulis Forssk. 691
*Cathcartia integrifolia* Maxim. 441
*lancifolia* Franch. 442
Cathaica fasciola (Draparnaud) 1580
Catharanthus G. Don 962
roseus (L.) G. Don 962
cv. Albus 963
cv. Flavus 963
Catharsius Hope 1623
molossus (Linnaeus) 1623
*Caturus scandens* Lour. 191
*Caucalis japonica* Houtt. 879
Caulerpa Lamx. 7
racemosa (Forssk.) Web. v. Bos. 7
var. peltata Lam. 7
Caulerpaceae 7
Caulokaempferia K. Larsen 1508
coenobialis (Hance) K. Larsen 1508
yunnanensis (Gagnep.) R. M. Smith 1508
Caulophyllum Michx. 363
robustum Maxim. 363
Cavea W. W. Smith et J. Small 1275
tanguensis (Drumm.) W. W. Smith et J. Small 1275
Cavernularia Valenciennes 1569
habereri Moroff 1569
Cayratia Juss. 722
corniculata (Benth.) Gagnep. 722
geniculata (Bl.) Gagnep. 722
japonica (Thunb.) Gagnep. 723
var. canescens W. T. Wang 723
var. ferruginea W. T. Wang 723
var. pubifolia Merr. et Chun 723
mollis (Wall.) C. Y. Wu 723
oligocarpa (Lévl et Vant.) Gagnep 723
var. glabra (Gagnep.) Rehd. 723
pseudotrifolia W. T. Wang 723
tenuifolia (Wight et Arn.) Gagnep. 723
trifolia (L.) Domin. 723
var. quinquefolioła W. T. Wang 724
*Ceanothus arborescens* Mill. 711
*nepalensis* Wall. 716
Cearaceae 8
*Cedrela microcarpa* C. DC. 661
*sinensis* A. Juss. 661
Cedrus Trew 143
deodara (Roxb.) G. Don 143
Celastraceae 691
Celastrus L. 692
aculeatus Merr. 692
*alatus* Thunb. 694

angulatus Maxim. 692
cavaleriei Levl.
flagellaris Rupr. 692
gemmatus Loes. 692
glaucophyllus Rehd. et Wils. var. rugosus (Rehd. et Wils.) C. Y. Cheng et T. C. Kao 692
hindsii Benth. 692
hookeri Prain. 693
hypoleucus (Oliv.) Warb. 692
kusanoi Hayata 693
monospermus Roxb. 693
*multiflorus* Roxb. 693
oblanceifolius Wang et Tsoong 693
orbiculatus Thunb. 693
var. cancatus (Rehd. et Wils.) Wuzhi 693
paniculatus Willd. 693
subsp. multiflorus (Roxb.) D. Hou 693
rosthorniannus Loes. 693
var. loeseneri (Rehd. et Wils.) C.Y. Wu 693
*rugosus* Rehd. et Wils. 691
stylosus Wall. 694
subsp. *glaber* D. Hou 694
*suaveolens* Lévl. 691
Cellana Adams 1571
toreuma (Reeve) 1571
Celleporidae 1636
Celleporina Gray 1636
costazia (Audouin) 1636
Celosia L. 260
argentea L. 260
var. *cristata* (L.) O. Kuntze 260
cristata L. 260
Celtis L. 178
biondii Pamp. 178
bungeana Bl. 178
julianae Schneid. 179
koraiensis Nakai 179
*labilis* Schneid. 179
*orientalis* L. 180
*sinensis* Pers. 179
tetrandra Roxb. 179
subsp. sinensis (Pers.) Y. C. Tang 179
*Cenchrus lappacea* L. 1439
*Cenocentrum* Gagnep. 740
tonkinense Gagnep. 740
*Cenomyce stellaris* Opiz 56
Centaurea L. 1275
*benedicta* L. 1280
cyanus L. 1275
*repens* L. 1239
ruthenica Lam. 1275
Centaurium Hill. 946
*meyeri* (Bunge) Druce 946
pulchellum (Swartz) Druce var. altaicum (Griseb.) Kitag. et Hara 946
*ruthenicum* (Lam.) C. Koch 1275
Centella L. 857
asiatica (L.) Urban 857
Centipeda Lour. 1275
minima (L.) A. Br. et Aschers 1275
Centotheca Desv. 1439
lappacea (L.) Desv. 1439
Centranthera R. Br. 1133
cochinchinensis (Lour.) Merr. 1133
var. longiflora (Merr.) Tsoong 1133
var. nepalensis (D. Don) Merr. 1133
grandiflora Benth. 1133
*nepalensis* D. Don 1133
Centriscidae 1672
Centriscus Linnaeus 1672
scutatus Linnaeus 1673
Centropus Illiger 1731
sinensis (Stephens) 1731
toulou (P. L. S. Müller) 1731
Ceordaceae 9
Cephaelis Sw. 992
ipecacuatha (Brotero) A. Rich. 992
*siamica* Craib 1013
Cephalanthera Rich. 1524
*ensifolia* Rich. 1525
erecta (Thunb.) Bl. 1524
var. *szechuanica* Schltr. 1524
falcata (Thunb.) Lindl. 1524
longifolia (L.) Fritsch 1525
*szechuanica* Schltr. 1524
*Cephalantheropsis gracilis* (Lindl.) S. Y. Hu 1523
Cephalanthus L. 992
*chinensis* Lam. 990
occidentalis L. 992
*pilulifera* Lam. 990
Cephalochordata 1641
Cephalopoda 1589
Cephalotaxaceae 154
Cephalotaxus Sieb. et Zucc. ex Endl. 154
*drupacea* Sieb. et Zucc. var. *sinensis* Rehd. et Wils. 154
fortunei Hook. f. 154
var. alpina Li 154
var. concolor Franch. 154
hainanensis Li 155
lanceolata K. M. Feng 154
mannii Hook. f. 155
oliveri Mast. 155
sinensis (Rehd. et Wils.) Li 154
var. latifolia Cheng et L. K. Fu 155
Ceracris kiangsu Tsai 1613
Cerambycidae 1626
Ceramiaceae 17
Ceramium Roth 17
boydenii Gepp 17
kondoi Yendo 17
Cerastium L. 239

*aquaticum* L. 244
arvense L. 239
caespitosum Gilib. 240
var. glandulosum Wirtgen 240
cerastoides (L.) Britt. 240
furcatum Cham. et Schlecht. 240
glomeratum Thuill. 240
*oxalidiflorum* Makino 240
pauciflorum Stev. ex Ser. var. oxalidiflorum (Makino) Ohwi 240
*viscosum* L. 240
wilsonii Takeda 240
Cerasus Mill. 499
avium (L.) Moench 499
cerasoides (D. Don) Sok. 499
dictyoneura (Diels) Yü 499
glandulasa (Thunb.) Lois. 500
humilis (Bunge) Sok. 500
japonica (Thunb.) Lois. 500
var. nakaii (Lévl.) Yü et Li 500
maximowiczii (Rupr.) Kom. 500
pseudocerasus (Lindl.) G. Don 500
serrulata (Lindl.) G. Don 500
szechuanica (Batal.) Yü et Li 501
tianshanica Pojark. 501
tomentosa (Thunb.) Wall. 501
Ceratoides (Tourn.) Gagnebin 253
latens (J. F.Gmel.) Reveal et Holmgren 253
Ceratophyllaceae 387
Ceratophyllum L. 387
demersum L. 387
manshuricum (Miki) Kitag. 387
oryzetorum Kom. 387
Ceratopteris Brongn. 98
thalictroides (L.) Brongn. 98
Ceratostigma Bunge 923
minus Stapf ex Prain 923
plumbaginoides Bunge 923
willmottianum Stapf 924
Cerbera L. 963
manghas L. 963
*peruviana* Pers. 962
*thevetia* L. 962
Cercidiphyllaceae 300
Cercidiphyllum Sieb. et Zucc. 300
japonicum Sieb. et Zucc. 300
Cercis L. 562
chinensis Bunge 562
chingii Chun 562
chuniana Metcalf 562
glabra Pamp. 562
racemosa Oliv. 562
*yunnanensis* Hu et Cheng 562
Cercopithesidae 1749
Cercospora Fres. 53
oryzae Miyake 53
*Cereus oxypetalus* DC. 262
*serpentinum* Lag. 263
*tricostatus* Gossel. 262
*undatus* Haw 262
Ceriops How et Ho 816
tagal (Perr.) C. B. Rob. 816
Cerithidea Swainson 1574
cingulata (Gmelin) 1574
Ceropegia L. 974
christenseniana Hand.-Mazz. 974
dolichophylla Schltr. 974
mairei (Lévl.) H. Huber 974
pubescens Wall. 975
trichantha Hemsl. 975
Cervidae 1771
Cervus Linnaeus 1771
albirostris Przewalski 1772
elaphus Linnaeus 1772
eldi M'clelland 1772
macneilli Lydekker 1772
nippon Temminck 1771
unicolor Kerr 1772
Ceryle lugubris (Temminck) 1733
rudis (Linnaeus) 1733
Cestrum L. 1118
nocturnum L. 1118
Cetoniidae 1624
Cetorhinidae 1644
Cetorhinus Blainville 1644
maximus (Gunner) 1644
Cetraria Ach. 57
cucullata (Bell.) Ach. 57
islandica (L.) Ach. 57
juniperina (L.) Ach. 57
nivalis (L.) Ach. 57
pinastri (Scop.) Rchl. 57
Chaehomeles Lindl. 501
cathayensis (Hemsl.) Schneid. 501
*lagenaria* (Loisel.) Koidz. 501
sinensis (Thouin) Koehne 501
speciosa (Sweet) Nakai 501
thibetica Yü 501
*Chaerophyllum aristatum* Thunb. 870
*gracile* Bess. 879
*nemorosum* M. Bieb. 850
*sylvestre* L. 850
Chaeturichthys stigmatias Richardson 1684
*Chailletia longipetala* Turcz. 752
Chalcanthitum 1783
Chalcas paniculata L. 650
Chalcedony 1790
Chalcophora Solier 1621
japonica chinensis Schauffuss 1621
Chamabainia Wight 194
cuspidata Wight 194
*Chamaebuxus arillata* Hassk. 662
Chamaenerion Seguier 818
angustifolium (L.) Scop. 818
f. pubescens (Hausskn.) Kitag. 81

latifolium (L.) Scop. 838
Chamaerhodos Bunge 502
erecta (L.) Bunge 502
*Chamacropi excelsa* Thunb. 1464
*fortunei* Hook. f. 1464
*Chamaesaracha heterophyllum* Hemsl. 1122
*japonica* Franch. et Sav. 1122
*sinensis* Hemsl. 1117
Chamaemelum Mill. 1276
nobile (L.) All. 1276
Chamaesium Wolff 857
paradoxum Wolff 857
*Championella japonica* (Thunb.) Bremek. 1174
*oligantha* (Miq.) Bremek. 1174
*sarcorrhiza* C. Ling 1175
Changium Wolff 857
smyrnioides Wolff 857
Changnienia Chien 1525
amoena Chien 1525
Channa Scopoli 1686
asiatica (Linnaeus) 1686
maculata (Lacepede) 1686
Chara Vaill. ex L. 8
fragilis Desv. 8
Characeae 8
Charybdis de Haan 1605
annulata (Fabricius) 1605
cruciata (Herbst) 1605
japonica (A. Milne-Edwards) 1605
Chassalia Comm. ex Poir. 992
curviflora (Wall.) Thw. 992
*Chavica puberula* Benth. 390
Chaydaia Pitard 711
*crenulata* Hand.-Mazz. 711
rubrinervis (Lévl.) C. Y. Wu ex Y. L. Chen 711
*wilsonii* Schneid. 711
*Cheilanthes argentes* O. Kuntze var. *obscura* Christ 94
*chusana* Hook. 94
*contigua* Wall. 95
*kuhnii* Milde 94
*mysuriensis* Wall. 94
Cheilosoria Trev. 94
chusana (Hook.) Ching et Shing 94
mysuriensis (Wall.) Ching et Shing 94
tenuifolia (Burm.) Trev. 95
Cheilotheca Hook. f. 881
macrocarpa (H. Andr.) Y. L. Chou 881
Cheiranthus L. 450
cheiri L. 450
roseus Maxim. 450
Cheirostylis Bl. 1525
yunnanensis Rolfe 1525
Chelidonichthys Kaup 1688
kumu (Lesson et Garnot) 1688
Chelidonium L. 426
*japonicum* Thunb. 439
*lasiocarpium* Oliv. 444
majus L. 426
Chelonia Latreille 1701
mydas (Linnaeus) 1701
Cheloniidae 1701
Chelonopsis Miq. 1060
chekiangensis C. Y. Wu 1060
Chenopodiaceae 251
Chenopodium L. 253
acuminatum Willd. 253
album L. 254
ambrosiodes L. 254
aristatum L. 254
botrys L. 254
foetidum Schrad. 254
glaucum L. 254
gracilispicum Kung 254
hybridum L. 254
rubrum L. 255
scoparia L. 256
serotinum L. 255
urbicum L. 255
Chieniopteris Ching 112
harlandii (Hook.) Ching 112
*Chienodoxa serrodonta* Sun 1053
Chikusichloa Koidz. 1439
mutica Keng 1439
*Chiliandra obovatum* Griff. 1192
Chilomycterus Bibron 1692
echinatus (Gronow) 1692
orbicularis (Bloch) 1692
Chilopoda 1607
Chiloscyllium Muller et Henle 1644
plagiosum (Bennett) 1644
Chimaera Linnaeus 1650
phantasma Jordan et Snyder 1650
Chimaeridae 1650
Chimaphila Pursh. 881
*fukuyamai* Masam. 882
japonica Miq. 882
umbellata (L.) Barton. 882
Chimonanthus Lindl. 281
nitens Oliv. 281
praecox (L.) Link 282
salicifolius S. Y. Hu 282
*Chinchona excelsa* Roxb. 1003
Chinemys Smith 1699
reevesii (Gray) 1699
Chionanthus L. 933
*ramiflorum* Roxb. 941
retusus Lindl. et Part. 933
Chionographis Maxim. 1373
chinensis Krause 1373
Chirita Buch.-Ham. ex D. Don 1180
brachystigma W. T. Wang 1180
*cortusifolia* Hance 1184
eburnea Hance 1180

*fauriei* Franch. 1180
fimbrisepala Hand. -Mazz. 1180
var. mollis W. T. Wang 1180
*guangxiensis* S. Z. Huang 1192
guilinensis W. T. Wang 1180
hamosa R. Br. 1181
hedyotidea (Chun) W. T. Wang 1181
heterotricha Merr. 1180
laifengensis W. T. Wang 1181
linearifolia W. T. Wang 1181
longgangensis W. T. Wang 1181
var. hongyao S. Z. Huang 1181
*macrosiphon* Hance 1184
medica D. Fang ex W. T. Wang 1181
minutimaculata D. Fang et W. T. Wang 1182
*obtusa* C. B. Clarke 1186
ophiopogoides D. Fang et W. T. Wang 1181
parvifolia W. T. Wang 1182
pinnatifida (Hand. -Mazz.) Burtt 1182
pumila D. Don 1182
*shennungjiaensis* W. T. Wang 1183
spinulosa D. Fang et W. T. Wang 1182
subulatisepala W. T. Wang 1182
swinglei (Merr.) W. T. Wang 1182
tenuifolia W. T. Wang 1182
tenuituba (W. T. Wang) W. T. Wang 1183
Chiritopsis W. T. Wang 1183
bipinnatifida W. T. Wang 1183
cordifolia D. Fang et W. T. Wang 1183
repanda W. T. Wang 1183
*Chisocheton hongkongensis* Hutch. 660
*Chlamydoboea sinensis* (Oliv.) Stapf 1191
Chlamydomonadaceae 4
Chlamydomonas Ehrh. 4
globosa Snow. 4
Chlamys Beneden 1582
ferreri (Jones et Preston) 1582
pica (Reeve) 1582
Chloranthaceae 391
Chloranthus Swartz 391
angustifolius Oliv. 391
elatior Link 391
fortunei (A. Gray) Solms 391
var. *holostegius* Hand.-Mazz. 391
*hainanensis* Péi 393
henryi Hemsl. 391
holostegius (Hand. -Mazz.) Péi et Shan 391
var. trichoneurus K. F. Wu 391
japonicus Sieb. 392
multistachys Péi 392
oldhami Solms-Laub. 392
serratus (Thunb.) Roem. et Schult. 392
spicatus (Thunb.) Makino 392
*Chlorea cladonioides* Nyl. 57
Chlorella Beij. 4
pyrenoidosa Chick. 4
vulgaris Beij. 4
Chlorellaceae 4
Chloris Swartz 1439
virgata Swartz 1439
Chloritified mica Carbonacite 1791
Chlorophytum Ker-Gawl. 1374
capense (L.) O. Kuntze 1374
var. variegatum Hort. 1374
comosum (Thunb.) Baker 1374
laxum R. Br. 1374
Chlorostoma Swainson 1571
nigerrima (Gmelin) 1571
rusticum (Gmelin) 1571
Choerodon Bleeker 1680
azurio (Jordan et Snyder) 1680
Choerospondias Burtt et Hill 666
axillaris (Roxb.) Burtt et Hill 666
var. pubinervis (Rehd. et Wils.) Burtt et Hill 667
Chondracris rosea (De Geer) 1613
Chondria Ag. 18
armata (Kiitz.) Okam. 18
crassicaulis Harv. 18
Chondrichthyes 1643
Chondrus Stackh. 15
ocellatus Holm. 15
Chonemorpha G. Don 963
eriodtylis Pitard 963
megacalyx Pierre 963
valvata Chatt. 963
Chorda Stackh. 9
filum (L.) Lamx. 9
*lomentaria* Lyngb. 9
Chordaceae 9
Chorthippus brunneus (Thunb.) 1614
Chosenia Nakai 162
arbutifolia (Pall.) A. Skv. 162
Christia Moench 562
obcordata (Poir.) Bahn. f. 562
vespertilionis (L.) Bahn. f. 562
Chrozophora Neck. ex A. Juss. 623
sabulosa Kar. et Kir. 623
Chrysalidocarpus H. Wendl. 1462
lutescens H. Wendl. 1462
Chrysanthemum L. 1276
*chanetii* Lévl. 1285
*cinerariifolium* (Trev.) Vis. 1326
*coccineum* Willd. 1326
coronarium L. 1276
var. *spatiosum* Bailey 1276
*delavayi* (Franch. et W. W. Smith) Hand. -Mazz. 1303
*indicum* L. 1286
*kennedyi* (Dunn) Kitam. 1304
*lavandulifolium* (Fisch. ex Trautv.) Makino 1286
var. *tomentellum* Hand. -Mazz. 1286
*ledebourianum* Ling 1172

*linearе* Matsum. 1315
*mongolicum* Ling 1286
*morifolium* Ramat. 1287
*naktongense* Nakai 1287
*parviflorum* Grun. 1243
*potentilloides* Hand. -Mazz. 1287
segetum L. 1276
*sinense* Sabine var. *vestitum* Hemsl. 1287
*taihangense* Ling 1322
*tartarinense* Bur. et Franch. 1326
*vartifolia* Chang 1244
*zawadskii* Herb. 1287
*Chrysobaphus roxburghii* Wall. 1518
Chrysolophus J. E. Gray 1722
amherstiae (Leadbeater) 1722
pictus (Linnaeus) 1722
Chrysomyia Robineau-Desvoidy 1632
megacephala (Fabricius) 1632
Chrysophyllum L. 925
lanceolatum (Bl.) A. DC. var. stellatocarpon Van Royen 925
Chrysopogon Trin. 1439
aciculatus (Retz.) Trin. 1439
Chrysops sinensis Walker 1631
Chrysosplenium L. 474
alternifolium L. 474
var. sibiricum Ser. ex DC. 475
axillare Maxim. 475
*cavaleriei* Lévl. et Vant. 476
davidianum Decne. ex Maxim. 475
delavayi Franch. 475
griffithii Hook. f. et Thoms. 475
henryi Franch. 475
japonicum (Maxim.) Makino 475
*β. japonicum* Maxim. 475
lanuginosum Hook. f. et Thoms. 475
macrophyllum Oliv. 475
nepalense D. Don var. cavaleriei (Lévl. et Vant) Hara 476
nudicaule Bunge 476
pseudofauriei Lévl. 476
pumium Franch. 476
sinicum Maxim. 476
uniflorum Maxim. 476
Chuanminshen Shen et Shan 857
violaceum Shen et Shan 858
Chukrasia A. Juss. 659
tabularis A. Juss. 659
var. velutina (Wall.) King 659
Cibotium Kaulf. 87
barometz (L.) J. Smith 87
Cicadidae 1615
Cicer L. 563
arietinum L. 563
Cicerbita Wall. 1276
cyanea (D. Don) Beauverd 1276
Cichorium L. 1276
glandulosum Boiss. et Huet 1276
intybus L. 1276
Ciconia Brisson 1715
ciconia (Linnaeus) 1715
Ciconiidae 1715
Cicuta L. 858
virosa L. 858
var. latisecta Celak. 858
Ciliata 1565
Cimicifuga L. 320
acerina (Sieb. et Zucc.) Tanaka 320
f. purpurea Hsiao 320
*calthaefolia* Maxim. 319
dahurica (Turcz.) Maxim. 321
foetida L. 321
heracleifolia Kom. 321
nanchuenensis Hsiao 321
simplex Wormsk. 321
Cinchona L. 992
*gratissima* Wall. 1007
ledgeriana Moens 992
officinalis L. 992
succirubra Pav. 992
Cinclidae 1739
Cinclus Borkhausen 1739
cinclus (Linnaeus) 1739
pallasii Temminek 1740
Cineraria L. 1277
cruenta Mass. ex L. Hérit. 1277
*fischeri* Ledeb. 1315
*macrophylla* Ledeb. 1317
*mongolica* Turcz. 1317
thyrsoidea Ledeb. 1318
Cinnabaris 1788
Cinnamomum Trew. 283
*albiflorum* Nees var. *tonkinensis* Lec. 287
appelianum Schewe 283
*argenteum* Gamble 286
austro-sinense H. T. Chang 283
bejolghota (Buch. -Ham.) Sweet 284
bodinieri Lévl. 284
burmannii (C. G. et Th. Nees) Bl. 284
var. *abgustifolium* (Hemsl.) Allen 284
var. *angustifolium* (Hemsl.) Allen 284
f. henryeanum (Nees) H. W. Li 284
camphora (L.) Presl. 284
cassia Presl. 285
*caudatum* Nees 295
*chekiangense* Nakai 286
*chingii* Metc. 286
*delavayi* Lec. 296
var. *mekongense* Hand. -Mazz. 296
*fargesii* Lec. 296
glanduliferum (Wall.) Nees 285
*heyneanum* Nees 284
*hupehanum* Gamble 284
iners Reinw. ex Bl. 285
japonicum Sieb. 285
jensenianum Hand. -Mazz. 285

kwangtungense Merr. 285
mairei Lévl. 285
migao H. W. Li 286
*obtusifolium* (Roxb.) Nees 284
osmophloeum Kanehira 286
parthenoxylum (Jack) Nees 286
pauciflorum Nees 286
*pedunculatum* Nees 286
porrectum (Roxb.) Kosterm. 286
*randaiense* Hayata 286
septentrionale Hand.-Mazz. 286
subavenium Miq. 286
tamala (Buch.-Ham.) Th. G. et Fr. Nees 286
tonkinense (Lec.) A Chev. 287
wilsonii Gamble 287
zeylanicum Bl. 287
Ciona Fleming 1641
intestinalis Linnaeus 1641
Cionidae 1641
Cipadessa Bl. 659
baccifera (Roth) Miq. 659
var. *sinensis* Rehd. et Wils. 660
cinerascens (Pell.) Hand.-Mazz. 660
*fruticosa* Bl. var. *cinerascens* Pell. 660
Cipangopaludina Hanniba 1572
cathayensis (Heude) 1573
chinensis (Gray) 1572
longispira (Heude) 1573
ussuriensis (Gerstfeldt) 1573
ventricosa (Heude) 1573
Circaea L. 819
alpina L. 819
subsp. angustifolia (Hand.-Mazz.) Boufford 819
var. *caulescens* Kom. 819
var. *imaicola* Asch. et Mag. 819
subsp. micrantha (Skvortsov) Boufford 819
cordata Royle 819
erubescens Franch. et Sav. 819
hybrida Hand.-Mazz. 819
*imaicola* (Asch. et Magn.) Hand.-Mazz.
var. *mairei* (Lévl.) Hand.-Mazz. 819
*lutetiana* L. f. *quadrisulcata* Maxim. 820
*maximowiczii* (Lévl.) Hara var. *ciridicalyx* Hara 820
mollis Sieb. et Zucc. 819
ovata (Honda) Boufford 819
quadrisulcata (Maxim.) Franch. et Sav. 820
var. *ovata* Honda 819
f. viridicalyx (Hara) Kitag. 820
Circaester Maxim. 321
agrestis Maxim. 321
Circus Lacepede 1720
cyaneus (Linnaeus) 1720
macrourus (Gmelin) 1720
Cirrhimuraena Kaup 1657
chinensis Kaup 1657
Cirrhinus (Cuvier) Oken 1659
molitorella (Cuvier et Valenciennes) 1659
Cirrhopetalum Lindl. 1525
amplifolium Rolfe 1525
andersonii Hook. f. 1525
*henryi* Rolfe 1525
miniatum Rolfe 1525
Cirsium Mill. 1277
*belingshanicum* Petrak ex Hand.-Mazz. 1278
*bodinieri* (Vant.) Lévl. 1278
*bolocephalum* Petrak ex Hand.-Mazz. 1277
*botryoides* Petrak ex Hand.-Mazz. 1277
*chienii* Chang 1278
chlorolepis Petrak ex Hand.-Mazz. 1277
eriophoroides (Hook. f.) Petrak 1277
esculentum (Sievers) C. A. Mey. 1277
griseum Lévl. 1277
incanum (S. G. Gmel.) Fisch. ex DC. 1277
japonicum Fisch. ex DC. 1278
var. *ussuriensis* (Regel) Kitam. 1278
leo Nakai et Kitag. 1278
lineare (Thunb.) Sch.-Bip. 1278
var. *pallidum* (Kitam.) Ling 1278
*lyrata* Bunge 1302
maackii Maxim. 1278
*pendulum* Fisch. ex DC. 1278
*pinnatibracteatum* Ling 1278
racemiforme Ling et Shih 1278
salicifolium (Kitag.) Shih 1279
*segetum* Bunge 1279
setosum (Willd.) MB. 1279
souliei (Franch.) Mattf. 1279
*viridifolium* (Hand.-Mazz.) Shih 1279
vlassovianum Fisch. ex DC. 1279
var. *salicifolium* Kitag. 1279
Cissampelopsis (DC.) Miq. 1279
spelaecicola (Vant.) C. Jeffrey et Y. L. Chen 1279
volubilis (Bl.) Miq. 1279
Cissampelos L. 375
*barbata* Wall. 376
*glabra* Roxb. 381
*hernandifolia* Willd. 381
*hirsuta* Buch.-Ham. ex DC. 375
*hypoglauca* Schauer 376
*insularis* Makino 376
*nepalensis* Rhodes 375
pareira L. var. hirsuta (Buch.-Ham. ex DC.) Forman 375
*sagittata* Buch.-Ham. ex Wall. 378
Cissus L. 724
assamica (Laws.) Craib 724
*brevipedunculata* Maxim. 720
*cantoniensis* Hook. et Arn. 720
*discolor* Bl. 724
*geniculata* Bl. 722
glaberrima Planch. 724

hastata (Miq.) Planch. 724
hexangularis Thorel ex Planch. 724
javana DC. 724
kerrii Craib 724
*modecoides* Planch. var. *kerrii* Craib 724
var. *subintegro* Gagnep. 724
*pteroclada* Hayata 724
repens Lam. 725
*serrulatum* Roxb. 728
*umbellosa* Lour. 946
Cistanche Hoffmgg. et Link. 1194
ambigua (Bunge) G. Beck 1195
deserticola Y. C. Ma 1194
mongonica G. Beck 1195
salsa (C. A. Mey.) G. Beck 1195
sinensis G. Beck 1195
tubulosa (Schenk) Wight. 1195
Citellus Oken 1753
dauricus Brandt 1753
Citrullus Neck. 783
lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai 783
Citrus L. 643
aurantium L. 643
var. amara Engl. 643
var. decumana Bonar. 643
var. *grandis* L. 643
var. *sinensis* L. 645
*buxifolia* Poir. 642
grandis (L.) Osbeck 643
grandis (L.) Osbeck "tomentosa" 644
ichangensis Swing 644
*japonica* Thunb. 648
junos Tanaka 644
limon (L.) Burm. f. 644
limonia Osbeck 644
*margarita* Lour. 648
medica L. 644
*β. imon* L. 644
var. sarcodactylis (Noot.) Swingle 644
reticulata Blanco 645
*sarcodactylis* Noot. 644
sinensis (L.) Osbeck 645
*trifoliata* L. 651
wilsonii Tanaka 645
*Cladodes rugosa* Lour. 619
Cladogynos Zipp. ex Span 623
orientalis Zipp. var. tonkinensis Gagnep. 623
Cladonia Hill 55
aggregata (Sw.) Ach. 55
amaurocraea (Flk.) Schauer 55
bacillaris (Ach.) Nyl. 55
fallax Abbayes 55
floerkeana (Fr.) Flk. 55
gracilis (L.) Willd. 55
macilenta Hoffm. 55
mitis Sandst. 55
pleurota (Flk.) Schauer 55
rangiferina (L.) Web. 55
stellaria (Opiz) Pouzar et Vezda 56
verticillata Hoffm. 56
Cladoniaceae 55
Cladophora Kutz. 6
crispata (Roth) Kutz. 6
glomerata (L.) Kutz. 7
Cladophoraceae 6
Cladostachys D. Don 260
frutescens D. Don 260
Cladrastis Raf. 563
platycarpa (Maxim.) Makino 563
sinensis Hemsl. 563
wilsonii Takeda 563
Claoxylon A. Juss. 623
indicum (Reinw. ex Bl.) Hassk. 623
*polot* (Burm. f.) Merr. 623
Clarias Scopoli 1668
batrachus (Linnaeus) 1668
Clariidae 1668
Clausena Burm. f. 645
dentata (Willd.) Roem. 645
dunniana Lévl. 645
emarginata Huang 645
excavata Burm. f. 645
*kwangsiensis* Huang 650
lansium (Lour.) Skeels 646
lenis Drake 646
Clavacipitaceae 20
*Clavaria sobolifera* Hill. 21
zollingeri Lévl. 26
Clavariaceae 26
Claviceps Tul. 20
*microcephala* (Wall.) Tul. 20
purpurea (Fr.) Tul. 20
Cleidion Bl. 623
brevipetiolatum Pax et Hoffm. 623
Cleisostoma Bl. 1526
hongkongense (Rolfe) Garay 1526
paniculatum (Ker-Gawl.) Garay 1526
rostratum (Lindl.) Garay 1526
scolopendrifolium (Makino) Garay 1526
Cleistanthus Hook. f. ex Planch. 624
sumatranus (Miq.) Muell.-Arg. 624
tonkinensis Jabl. 624
Cleistocalyx Bl. 802
operculatus (Roxb.) Merr. et Perry 802
Cleistogenes Keng 1439
polyphylla Keng 1439
Clematis L. 321
aethusaefolia Turcz. 322
var. latisecta Maxim. 322
akebioides (Maxim.) Hort. ex Veitch. 322
*angustifolia* Jacq. var. *tchefouensis* Debeaux 326
apiifolia DC. 322
var. obtusidentata Rehd. et Wils. 322
argentilucida (Lévl. et Vant.) W. T. Wang

322
armandii Franch. 322
var. *biondana* (Pavol.) Rehd. 322
brevicaudata DC. 323
var. *listocarpa* Rehd. et Wils. 325
var. *subsericea* Rehd. et Wils. 325
var. *tenuisepala* Maxim. 325
buchananiana DC. 323
var. *trullifera* Franch. 332
chinensis Osbeck 323
f. vestita Rehd. 323
chingii W. T. Wang 323
chrysocoma Franch. 323
clarkeana Lévl. et Vant. 323
connata DC. 323
courtoisii Hand. -Mazz. 324
crassifolia Benth. 324
crassipes Chun et How 324
var. pubipes W. T. Wang 324
fasciculiflora Franch. 324
filamentosa Dunn 324
finetiana Lévl. et Vant. 324
florida Thunb. 324
fusca Turcz. 325
var. violacea Maxim. 325
ganpiniana (Lévl. et Vant.) Tamura 325
var. subericea (Rehd. et Wils.) C. T. Ting 325
var. tenuisepala (Maxim.) C. T. Ting 325
glauca Willd. 325
*gouriana* Roxb. ex DC. 325
var. finetii Rehd. et Wils. 329
*grata* Wall. var. *grandidentata* Rehd. et Wils. 322
gratopsis W. T. Wang 325
hancockiana Maxim. 326
henryi Oliv. 326
heracleifolia DC. 326
hexapetala Pall. 326
var. tchefouensis (Debeaux) S. Y. Hu 326
huchouensis Tamura 326
intricata Bunge 326
kerriana Drumm. et Craib 327
kirilowii Maxim. 327
var. chanetii (Lévl.) Hand. -Mazz. 327
var. pashanensis M. C. Chang 327
koreana Kom. 327
lancifolia Bur. et Franch. 327
lasiandra Maxim. 327
leschenaultiana DC. 327
var. denticulata Merr. 328
loureiriana DC. 328
var. peltata W. T. Wang 328
var. *subpeltata* (Wall.) Hand. -Mazz. 328
macropetala Ledeb. 328
var. albiflora (Maxim.) Hand. -Mazz. 328
*mandshurica* Rupr. 332
*maximowicziana* Franch. et Sav. 331
meyeniana Walp. 328
var. granulata Finet et Gagnep. 328
montana Buch. -Ham. ex DC. 328
var. grandiflora Hook. 329
var. wilsonii Sprague 329
obscura Maxim. 329
*obtusidentata* (Rehd. et Wils.) Hj. Eichler 322
orientalis L. 329
var. *akebioides* Maxim. 322
var. *tangutica* Maxim. 331
otophora Franch. ex Finet et Gagnep. 329
*paniculata* Thunb. 331
parviloba Gardn. et Champ. 329
patens Morr. et Decne. 329
peterae Hand. -Mazz. 329
var. trichocarpa W. T. Wang 329
pogonandra Maxim. 330
potaninii Maxim. 330
pseudootophora M. Y. Fang 330
pseudopogonandra Finet et Gagnep. 330
quinquefoliolata Hutch. 330
ranunculoides Franch. 330
var. pterantha (Dunn) M. Y. Fang 330
rehderiana Craib 331
repens Finet et Gagnep. 331
rubifolia Wright 331
sibirica (L.) Mill. 331
songarica Bunge 331
var. asplenifolia (Schrenk) Trautv. 331
tangutica (Maxim.) Korsh. 331
ternifola DC. 331
var. mandshurica (Rupr.) Ohwi 332
*trifoliata* Thunb. 371
trullifera (Franch.) Finet et Gagnep. 332
uncinata Champ. 332
var. coriacea Pamp. 332
urophylla Franch. 332
var. obtusiuscula Schneid. 332
*vitalba* L. var. *argentilucida* Lévl. et Vant. 322
var. *ganpiniana* Lévl. et Vant. 325
yunnanensis Franch. 332
Clematoclethra Maxim. 409
*actinidioides* Maxim. 409
var. *populifolia* C. F. Liang et Y. C. Chen 409
scandens (Franch.) Maxim. subsp. actinidioides (Maxim.) Y. C. Tang et Q. Y. Xiang 409
Clemmys bealei (Gray) 1699
mutica (Cantor) 1699
Cleome (L.) DC. 445
gynandra L. 445
spinosa Jacq. 446

viscosa L. 446
Clerodendranthus Kudo 1060
spicatus (Thunb.) C. Y. Wu ex H. W. Li 1060
Clerodendrum L. 1046
bungei Steud. 1046
canescens Wall. 1046
colebrookianum Walp. 1047
cyrtophyllum Turcz. 1047
var. kwangsiense S. L. Chen et T. D. Zhuang 1047
*divaricatum* Sieb. et Zucc. 1045
fortunatum L. 1047
*fragrans* Hort. ex Vent. 1048
hainanense Hand. -Mazz. 1047
henryi Péi 1047
indicum (L.) O. Kuntze 1047
inerme (L.) Gaerth. 1047
japonicum (Thunb.) Sweet 1048
var. *album* Péi 1048
kwangtungense Hand. -Mazz. 1048
lindleyi Decne. ex Planch. 1048
luteopunctatum Péi et S. L. Chen 1048
mandarinorum Diels 1048
philippinum Schauer 1048
var. simplex Moldenke 1048
serratum (L.) Moon 1049
var. amplexifolium Moldenke 1049
var. herbaceum (Roxb.) C. Y. Wu 1049
*spicatum* Thunb. 1060
thomsonae Balf. 1049
trichotomum Thunb. 1049
var. *fargesii* (Dode) Rehd. 1049
yunnanense Hu ex Hand. -Mazz. 1049
Clethra Gronov. ex L. 881
barbinervis Sieb. et Zucc. 881
cavaleriei Lévl. 881
fargesii Franch. 881
kaipoensis Lèvl. 881
monostachya Rehd. et Wils. 881
Clethraceae 881
Cleyera Thunb. 414
*gymnanthera* Wight et Arn. 418
japonica Thunb. 414
*millettii* Hook. et Arn. 411
Clibanarius infraspinatus Hilgendorf 1604
Climaciaceae 64
Climacium Web. et Mohr 64
dendroides (Hedw.) Web. et Mohr 64
Clinacanthus Nees 1167
*burmanni* Nees 1167
nutans (Burm. f.) Lindau 1167
Clinopodium L. 1060
chinensis (Benth.) O. Kuntze 1060
confine (Hance) O. Kuntze 1060
gracile (Benth.) Matsum. 1061
megalanthum (Diels) C. Y. Wu et Hsuan 1061
var. intermedium C. Y. Wu et Hsuan 1061
var. lancifolium C. Y. Wu et Hsuan 1061
omeiense C. Y. Wu et Hsuan 1061
polycephalum (Vaniot) C. Y. Wu et Hsuan ex H. W. Li 1061
urticifolium (Hance) C. Y. Wu et Hsuan 1061
Clintonia Raf. 1374
udensis Trautv. et Mey. 1374
Clitocybe
fragrans (Sow. ex Fr.) Quél. 36
geotropa (Bull. ex Fr.) Quél. 36
*gigantea* (Sow. ex Fr.) Quél. 37
infundibuliformis (Schaeff. ex Fr.) Quél. 36
*rabescens* (Scop. ex Fr.) Bres. 36
Clitoria L. 563
mariana L. 563
Clivia Lindl. 1406
miniata Regel 1406
nobilis Lindl. 1406
Clupanodon Lacépéde 1651
punctatus (Temminck et Schlegel) 1651
Clupea Linnaeus 1651
harengus pallasi Cuvier et Valenciennes 1651
Clupeidae 1651
*Clutia stipularis* L. 622
Cnicus L. 1280
benedictus L. 1280
*carthamoides* Willd. 1345
*eriophoroides* Hook. f. 1277
*esculentus* Sievers 1278
*pendulus* (Fisch. ex DC.) Maxim. 1277
*souliei* Franch. 1279
*uniflorus* L. 1345
Cnidium Cuss. 858
dahuricum (Jacq.) Turcz. ex Fisch. et Mey. 858
*jeholense* Nakai et Kitag. 867
monnieri (L.) Cuss. 858
Cnidocampa Dyar 1628
flavescens Walker 1628
Cobitidae 1667
Cobitis macrostigma Dabry 1667
sinensis Sauvage 1667
Coccidae 1617
Coccolithaceae 11
Coccolithus Schwarz 11
huxleyi (Lohm.) Kamptner 11
*Coccoloba platyclada* F. Muell. ex Hook. 220
Coccothraustes Brisson 1744
coccothraustes (Linnaeus) 1744
Cocculus DC. 375
*affinis* Oliv. 377

*diversifolius* Miq. var. *cinereum* Diels 379
*forsteri* DC. 381
*glaucescens* Bl. 377
laurifolius DC. 375
*lenissimus* Gagnep. 375
*mokiangensis* Lien 375
*mollis* Wall. ex Hook. f. et Thoms. 375
orbiculatus (L.) DC. 375
var. mollis (Wall. ex Hook. f. et Thoms.) Hara 375
*trilobus* (Thunb.) DC. 375
Cochlearia L. 451
officinalis L. 451
*rusticana* Lam. 447
*scapiflorum* Hook. f. et Thoms. 455
Cochlidiidae 1628
Cocos L. 1462
nucifera L. 1462
Codariocalyx Hassk. 563
gyroides (Roxb. ex Link) Hassk. 564
motorius (Houtt.) Ohashi 564
Codiaceae 7
Codium Stackh. 7
cylindricum Holm. 7
fragile (Sur.) Horiot 7
Codonacanthus Ness 1167
*acuminatus* Ness 1167
pauciflorus (Ness) Ness 1167
Codonopsis Wall. 1228
bicolor Nannf. 1228
*bulleyana Forrest ex Diels* 1228
canescens Nannf. 1228
cardiophylla Diels 1228
clematidea (Schrenk) C. B. Clarke 1228
convolvulacea Kurz 1228
var. forrestii (Diels) Ballard 1228
var. hirsuta (Hand.-Mazz.) Nannf. 1229
var. limprichtii (Lingelsh. et Borza) Anthony 1229
var. pinifolia (Hand.-Mazz.) Nannf. 1229
var. vinciflora (Kom.) L. T. Shen 1229
deltoides Chipp 1229
foetens Hook. f. et Thoms. 1229
*forrestii* Diels 1228
gombalana C. Y. Wu 1229
*handeliana* Nannf. 1230
henryi Oliv. 1229
lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv. 1229
*limprichtii* Lingelsh et Borza var. *hirsuta* Hand.-Mazz. 1229
*macrantha* Nannf. 1230
macrocalyx Diels 1230
micrantha Chipp 1230
*modesta* Nannf. 1231
*mollis* Chipp 1232
nervosa (Chipp) Nannf. 1230
var. macrantha (Nannf.) L. T. Shen 1230
*ovata* Benth. var. *nervosa* Chipp 1230
pilosula (Franch.) Nannf. 1230
var. handeliana (Nannf.) L. T. Shen 1230
var. modesta (Nannf.) L. T. Shen 1231
var. volubilis (Nannf.) L. T. Shen 1231
purpurea (Spreng.) Wall. 1231
subglobosa W. W. Smith 1231
subscaposa Kom. 1231
subsimplex Hook. f. et Thoms. 1231
tangshen Oliv. 1231
thalictrifolia Wall. var. mollis (Chipp) L. T. Shen 1232
tsinlingensis Pax et Hoffm. 1232
tubulosa Kom. 1232
ussuriensis (Rupr. et Maxim.) Hemsl. 1232
*vinciflora* Kom. 1229
viridiflora Maxim. 1232
*volubilis* Nannf. 1231
Coeleterata 1566
Coeloglossum Hartm. 1526
viride (L.) Hartm. 1526
Coelogyne Lindl. 1526
*bulbocodioides* Franch 1557
*coronaria* Lindl. 1538
corymbosa Lindl. 1526
cristata Lindl. 1527
fimbriata Lindl. 1527
flaccida Lindl. 1527
graminifolia Parish et Reichb. f. 1527
*grandiflora* Rolfe 1557
*hookeriana* Lindl 1557
*mandarinorum* Kranzl. 1545
occultata Hook. f. 1527
ovalis Lindl. 1527
punctulata Lindl. 1527
sanderae Kranzl. 1527
viscosa Reichb. f. 1528
*yunnanensis* Rolfe 1557
Coelopleurum Ledeb. 858
*alpium* Kitag. 858
saxatile (Turcz.) Drude 858
Coelospermum Bl. 993
kanehirae Merr. 993
Coffea L. 993
arabica L. 993
canephora Pierre 993
liberica Bull. ex Hiern 993
*tetrandra* Roxb. 1013
Coilia Gray 1653
brachygnathus Kreyenberg et Pappenheim 1653
ectenes Jordan et Seale 1653
grayii Richardson 1653
mystus (Linnaeus) 1653
Coix L. 1440
lacryma-jobi L. var. mayuen (Roman.) Stapf

Cola Schott et Endl. 747
acutminata Schott et Endl. 747
Colebrookea Smith 1062
oppositifolia Smith 1062
Coleus Lour. 1062
*blumei* Benth. 1062
carnosifolius (Hemsl.) Dunn 1062
esquirolii (Lévl.) Dunn 1062
forkohlii (Willd.) Briq. 1062
*macrathus* Merr. var. *crispipilus* Merr. 1062
scutellarioides (L.) Benth. 1062
var. crispipilus (Merr.) H. Keng 1062
*wulfenioides* Diels 1094
Colias Fabricius 1630
erata Esper 1630
Collabium Bl. 1528
chinense (Rolfe) Tang et Wang 1528
Collichthys Günther 1678
lucidus (Richardson) 1678
niveatus Jordan et Starks 1678
Collocalia G. R. Gray 1733
brevirostris (McClelland) 1733
inapina Thayer et Bangs 1733
*Collybia albuminosa* (Berk.) Petch 39
*velutipes* (Curt. ex Fr.) Quél. 36
*Collyris minor* Vahl 980
Colobidae 1749
Colocasia Schott 1474
antiquorum Schott 1475
*cucullatum* (Lour.) Schott 1466
esculenta (L.) Schott 1475
var. *antiquorum* (Schott) Hubb. et Rehd. 1475
gigantea (Bl.) Hook. f. 1475
tonoimo Nakai 1475
Colona Cav. 733
floribunda Craib. 733
Colquhounia Wall. 1063
coccinea Wall. var. mollis (Schlecht.) Prain 1063
elegans Wall. 1063
var. tenuiflora (Hook. f.) Prain 1063
*mollis* Schlecht. 1063
sequinii Vaniot. 1063
*tenuiflora* Hook. f. 1063
Coltricia schweinitzii (Fr.) Cunn. 29
Colubridae 1706
Colubrina Rich. ex Brongn. 711
arborescens (Mill.) Sarg. 711
asiatica (L.) Brongn. 711
pubescens Kurz. 711
taxensis Grag. 711
Columba Linnaeus 1729
eversmanni Bonaparte 1730
hodgsonii Vigors 1730
livia Gmelin 1730
livia domestica (Linnaeus) 1729
oenas yarkandensis Buturlin 1730
rupestris Pallas 1729
*Columbia floribunda* (Wall.) Kurz 733
Columbidae 1729
*Columnea chinensis* Osbeck 1136
Coluria R. Br. 502
longifolia Maxim. 502
Colysis Presl 125
bonii Ching 126
digitata (Baker) Ching 126
elliptica (Thunb.) Ching 126
hemionitidea (Wall.) Presl 126
hemitoma (Hance) Ching 126
henryi (Baker) Ching 126
léveillei (Christ.) Ching 126
f. angusta (C. Chr.) Ching 126
longipedunculata Ching et Y. X. Ling 126
morsei Ching 127
pothifolia (Don) Presl 127
wrightii (Hook.) Ching 127
Comanthosphace S. Moore 1063
ningpoensis (Hemsl.) Hand.-Mazz. 1063
Comarum L. 502
palustre L. 502
Comastoma (Wettst.) Toyokuni 946
falcayum (Turcz.) Toyokuni 947
pedunculatum (Royle ex D. Don) Holub 947
pulmonarium (Turcz.) Toyokuni 947
Combretaceae 816
Combretum Loefl. 816
alfredii Hance 817
latifolium Bl. 817
wallichii DC. 817
yunnanense Exell 817
Commelina L. 1427
benghalensis L. 1427
*cristata* L. 1428
communis L. 1427
diffusa Burm. f. 1427
paludosa Bl. 1428
*simplex* Vahl 1429
*undiflora* L. 1429
undulata R. Br. 1428
Commelinaceae 1427
*Compium subcordatum* Cop. 122
Compositae 1238
*Compsoa maculata* D. Don 1399
Conandron Sieb. et Zucc. 1183
ramondioides Sieb. et Zucc. 1183
*Conferva flacca* Dillwyn 5
*simplex* Wulf. 18
Congridae 1656
Coniogramme Fée 98
affinis (Wall.) Hieron. 98
intermedia Hieron. 99
japonica (Thunb.) Diels 99
Coniselinum Fisch. ex Hoffm. 858

vaginatum (Spreng.) Thell. 858
Conium L. 859
maculatum L. 859
Connaraceae 543
Connarus L. 544
*microphyllus* Hook. et Arn. 544
paniculatus Roxb. 544
Conocephalaceae 68
Conocephalum Weber 68
conicum (L.) Dum. 68
supradecompositum (Lindb.) Steph. 68
Convallaria L. 1375
*bifolia* L. 1388
*fruticosa* L. 1404
*japonica* L. f. 1389
*keiskei* miq. 1375
majalis L. 1375
*odorata* Mill. 1393
*spicata* Thunb. 1387
*verticillata* L. 1393
Convolvulaceae 1023
Convolvulus L. 1026
*aculeatus* L. 1025
*alsinoides* L. 1027
ammannii Desr. 1026
arvensis L. 1026
*batatas* L. 1028
*biflorus* L. 1023
*cairica* L. 1028
*capitatus* Vahl 1024
*chinensis* Ker-Gawl. 1026
*hastata* Desr. 1029
*hirtus* L. 1029
*muricatus* L. 1025
*nil* L. 1030
*pellita* Ledeb. 1025
*pennatus* Desr. 1031
*pes-caprae* L. 1028
*septum* L. 1025
*sibirica* L. 1029
*soldanella* L. 1025
tragacanthoides Turcz. 1026
*turpethum* L. 1030
*vitifolia* Burm. f. 1030
Conyza Less. 1280
*anthelmintic* L. 1352
*balsamifera* L. 1267
*blanda* Wall 1352
blinii Lévl. 1280
bonariensis (L.) Cronq. 1280
canadensis (L.) Cronq. 1280
*cappa* Buch.-Ham. 1304
*cinerea* L. 1353
*dunniana* Lévl. 1280
*fistulosa* Roxb. 1267
japonica (Thunb.) Less. 1280
*lacera* Burm. f. 1267
*laciniata* Roxb. 1268
*lanceolaria* Roxb. 1268
leucantha (D. Don) Ludlow et Raven 1280
*patula* Dryand. 1354
*pyrifolia* Lamk. 1320
*saligna* Wall. 1354
*salsoloides* Turcz. 1306
sumayrensis (Retz.) Walker 1281
*volkameriaefolia* Wall. 1354
Coprinus Pers. ex Gray 41
atramentarius (Bull.) Fr. 41
comatus (Muell. ex Fr.) Gray 42
friesii Quél. 42
micaceus (Bull.) Fr. 42
plicatilis (Curt. ex Fr.) Fr. 42
radicans (Desm.) Fr. 42
sterquilinus Quél. 42
Copsychus Wagler 1740
saularis (Linnaeus) 1740
Coptis Salisb. 333
chinensis Franch. 333
var. brevisepala W. T. Wang et Hsiao 333
var. *omeiensis* Chen 333
deltoidea C. Y. Cheng 333
omeiensis (Chen) C. Y. Cheng 333
quinquesecta W. T. Wang 333
teeta Wall. 334
*teetoides* C. Y. Cheng 334
Coptosapelta Korth. 993
diffusa (Champ. ex Benth.) Van Steenis 993
Coptotermes Wasmann 1612
formosanus Shiraki 1612
Corallanidae 1599
Corallina L. 15
officinalis L. 15
Corallinaceae 15
Corallium Marsigli 1569
elatius Ridley 1569
japonicum Kishinouye 1569
konojoi Kishinouye 1569
Corallodiscus Batal. 1183
cordatulus (Craib) Burtt 1183
flabellatrs (Franch.) Burtt 1184
kingianus (Craib) Burtt 1184
sericeus (Craib) Burtt 1184
*Corallorrhiza foliosa* Lindl. 1553
*patens* Lindl. 1553
Corbicula Megerle 1586
fluminea (Müller) 1586
largillierti (Philippi) 1586
nitens (Philippi) 1586
Corbiculidae 1586
Corchoropsis Sieb. et Zucc. 733
psilocarpa Harms et Loes. 734
tomentosa (Thunb.) Makino 734
Corchorus L. 734
*acutangulus* Lam. 734
aestuans L. 734

capsularis L. 734
olitorius L. 734
*scandens* Thunb. 523
*tomentosa* Thunb. 734
Cordia L. 1033
dichotoma Forst. f. 1033
*thyrsiflora* Sieb. et Zucc. 1035
Cordyceps (Fr.) Link 20
cicadae Sching 20
hawkesii Gray 20
liangshanensis Zang, Hu et Liu 20
martialis Spegnep. 21
militaris (L.) Link 20
ophioglossoides (Ehrenb.) Link 20
sinensis (Berk.) Sacc. 21
sobolifera (Hill.) Berk. et Fr. 21
Cordyline Comm. ex Juss. 1404
fruticosa (L.) A. Cheval. 1404
stricta Endl. 1494
Coreius Jordan et Starks 1659
septentrionalis (Nichols) 1659
Coreopsis L. 1281
*biternata* Lour. 1265
lanceolata L. 1281
tinctoria Nutt. 1281
Coriandrum L. 859
sativum L. 859
Coriariaceae 666
Coriaria L. 666
nepalensis Wall. 666
*sinica* Maxim. 666
Coriolopsis occidentalis (Kl.) Murr. 29
Coriolus Quél. 28
biformis (Kl. ex Fr.) Pat. 29
consors (Berk.) Imaz. 29
hirsutus (Wulf. ex Fr.) Quél. 28
unicolor (Bull. ex Fr.) Pat. 28
versicolor (L. ex Fr.) Quél. 29
Corispermum L. 255
chinganicum Iljin 255
declinatum Steph. ex Steven 255
puberulum Iljin 255
*pungens* Vahl 251
stenolepis Kitag. 255
Cornaceae 826
Cornus L. 827
alba L. 827
capitata Wall. 827
subsp. angustata (Chun) Q. Y. Xiang 827
*chinensis* Wanger. 831
controvoersa Hemsl. 827
coreana Wanger. 828
hemsleyi Schneid. et Wanger. 828
hongkongensis Hemsl. 828
subsp. gigantea (Hand.-Mazz.) Q. Y. Xiang 828
var. *gigantea* Hand.-Mazz. 828
kousa Hance 828
var. *angustata* Chun 827
subsp. chinensis (Osborn.) Q. Y. Xiang 828
var. *chinensis* Osborn. 828
macrophylla Wall. 829
multinervosa (Pojark.) Q. Y. Xiang 828
oblonga Wall. 828
*officinalis* Sieb. et Zucc. 830
papilliosa Fang et W. K. Hu 829
parviflora Chien 829
paucinervis Hance 829
poliophylla Schneid. et Wanger. 829
schindleri Wanger. 829
walteri Wanger. 829
*Cornutia quinata* Lour. 1054
Corvidae 1737
Corvus Linnaeus 1737
corax (Linnaeus) 1737
corone (Linnaeus) 1738
frugilegus Linnaeus 1738
macrorhynchus Wagler 1738
monedula Linnaeus 1738
torquatus Lesson 1738
Corydalis Vent. 426
acuminata Franch. 426
adrienii Prain 427
adunca Maxim. 427
*amabilis* Migo 429
ambigua Cham. et Schltd. 427
var. *amurensis* Maxim. 427
f. dentata Y. H. Chou 427
f. lineariloba (Sieb. et Zucc.) Kitag. 427
f. multifida Y. H. Chou 427
f. *rotundiloba* (Maxim.) Kitag. 427
appendiculata Hand.-Mazz. 427
balansae Prain 427
*boweri* Hemsl. 432
bungeana Turcz. 427
buschii Nakai 427
cashmeriana Royle var. ecristata Prain 428
cheilanthifolia Hemsl. 428
chrysosphaera Marq. et Airy-Shaw 428
clarkei Prain 428
conspersa Maxim. 428
crispa Prain 428
curviflora Maxim. 428
var. rosthornii Fedde 429
var. *smithii* Fedde 429
dasyptera Maxim. 429
var. tenuiflora C. Y. Wu et T. Y. Shu 429
davidii Franch. 429
decumbens (Thunb.) Pers. 429
delavayi Franch. 429
densispica C. Y. Wu 430
denticulato-bracteata Fedde 430

edulis Maxim. 430
esquirolii Lévl. 430
fimbripetala Ladlow 430
*formosana* Hayata 427
gigantea Trautv. et Merr. 430
glaucescens Regel 430
*gracilis* Franch. non Ledeb. 430
gracillima C. Y. Wu 430
hamata Franch. 431
hemidicentra Hand.-Mazz. 431
hendersomii Hemsl. 431
heterocarpa Sieb. et Zucc. 431
*humosa* Migo 434
impatiens (Pall.) Fisch. 431
incisa (Thunb.) Pers. 431
kingii Prain 431
kokeana Hand.-Mazz. 432
ledebouriana Kar. et Kir. 432
linearioides Maxim. 432
*longiflora* (Wall.) Pers. 435
meifolia Wall. 432
melanochlora Maxim. 432
mucronifera Maxim. 432
napuligera C. Y. Wu 432
ochotensis Turcz. 432
var. raddeana (Regel) Nakai 433
ophiocarpa Hook. f. et Thoms. 433
pachypoda (Franch.) Hand.-Mazz. 433
pallida (Thunb.) Pers. 433
var. speciosa (Maxim.) Kom. 433
platycarpa Makino 431
polygalina Hook f. et Thoms. 433
polyphylla Hand.-Mazz. 433
pterygopetala Hand.-Mazz. 434
*quadriflora* Hand.-Mazz. 437
racemosa (Thunb.) Pers. 434
remota Fisch. et Maxim. 434
f. fumariaefolia Maxim. 434
f. haitaoensis (Y. H. Chou et C. Q. Xu) C. Y. Wu 434
f. linearifloba Maxim. 434
f. pectinata Kom. 434
repens Mandl. et Muhldorf. 434
rheinbabenia Fedde 434
saxicola Bunting 434
var. pasuiflora C. Y. Wu et T. Y. Shu 435
scaberula Maxim. 435
schanginii (Pall.) B. Fedtsch. 435
sheareris S. Moore 435
sibirica (L. f.) Pers. 435
spathulata Prain ex Craib 435
*speciosa* Maxim. 435
*stenantha* Franch. 436
straminea Maxim. 435
stricta Steph. 436
*suaveolens* Hance 435
taliensis Franch. 436
var. ecristata Hand.-Mazz. 436
*tashiroi* Maxim. 427
tenulifolia Franch. 436
thalictrifolia Franch. 436
thyrsiflora Prain 436
*tibetica* Hook. f. var. *pachypoda* Franch. 433
tomentella Franch. 436
trachycarpa Maxim. 437
trifoliata Franch. 437
*trifoliolata* Franch. 437
tsayulensis C. Y. Wu et H. Chung 437
*turtschaninovii* Bess. f. yanhusuo Y. H. Chou et C. C. Hsu 437
*wilfordi* Regel 431
wilsonii N. E. Br. 437
wumungensis C. Y. Wu 437
yanhusuo W. T. Wang 437
yunnanensis Franch. 437
Corydiidae 1611
Corylopsis Sieb. et Zucc. 459
henryi Hemsl. 459
multiflora Hance 459
sinensis Hemsl. 459
*wilsonii* Hemsl. 459
willmottiae Rehd. et Wils. 459
Corylus L. 170
chinensis Franch. 170
ferox Wall. var. thibetica (Batal.) Franch. 170
heterophylla Fisch. ex Trautv. 170
var. szechuenensis Franch. 171
*mandshurica* Maxim. 170
*thibetica* Batal. 170
yunnanensis A. Camus 171
Corypha L. 1462
umbraculifera L. 1462
Corythoichthys crenulatus (Weber) 1673
fasciatus (Gray) 1673
*Cosbaea coccinea* Lem. 275
Coscinasterias acutispina (Stimpson) 1639
Cosmos Cav. 1281
bipinnata Cav. 1281
sulphureus Cav. 1281
Cosnolida (DC.) Opiz 333
ajacis (L.) Schur. 333
Costazia aculeata Canu et Bassler 1636
Costus L. 1509
*lacerus* Gagnep. 1509
speciosus (Koen.) Smith 1509
tonkenensis Gagnep. 1509
*zerumbet* Pers. 1505
Cotinus (Tourn.) Mill. 667
coggygria Scop. var. cinerea Engl. 667
var. glaucophylla C. Y. Wu 667
var. pubescens Engl. 667
Cotoneaster Medik 502
acutifolius Turcz. 502

ambiguus Rehd. et Wils. 502
bullatus Boiss. 502
coriaceus Franch. 503
franchetii Boiss. 503
glaucophyllus Franch. 503
gracilis Rehd. et Wils. 503
harrovianus Wils. 503
horizontalis Decne. 503
var. perpusillus Schneid. 503
integerrimus Medic. 503
melanocarpus Lodd. 503
microphyllus Wall. ex Lindl. 504
moupinensis Franch. 504
multiflorus Bunge 504
salicifolius Franch. 504
zabelii Schneid. 504
Cottidae 1689
*Cottonia championi* Lindl. 1536
Coturnix Bonnaterre 1722
coturnix (Linnaeus) 1722
*Cotyledon fimbriata* Turcz. 464
*laciniata* L. 464
*malacophylla* Pall. 465
*spathulata* (DC.) Poir. 464
*spinosa* L. 465
*Cracca purpurea* L. 602
Craibiodendron W. W. Smith 884
henryi W. W. Smith 884
*shanicum* W. W. Smith 884
stellatum (Pier.) W. W. Smith 884
yunnanense W. W. Smith 884
Crambidae 1628
Craspedolobium Harms 564
schochii Harms 564
Craspidaster Sladen 1637
hesperus (Müller et Troschel) 1637
Crassocethalum Moench 1281
crepidioides (Benth.) S. Moore 1281
Crassulaceae 462
*Crasula indica* Decne. 472
*pennata* L. f. 462
*yunnanensis* Franch. 472
Crataegus L. 504
*alnifolia* Sieb. et Zucc. 538
altaica (Loud.) Lange 504
aurantia Pojark. 505
cuneata Sieb. et Zucc. 504
dahurica Schneid. 505
*glabra* Thunb. 514
hupehensis Sarg. 505
*indica* L. 523
kansuensis Wils. 505
maximowiczii Schneid. 505
oresbia W. W. Smith 505
pinnatifida Bunge 505
var. major N. E. Br. 505
var. psilosa Schneid. 505
*purpurea* Bosc. ex DC. var. *altaica* Loud. 504
sanguinea Pall. 506
scabrifolia (Franch.) Rehd. 506
songarica K. Koch 506
*villosa* Thunb. 514
wilsonii Sarg. 506
Crateva L. 446
trifoliata (Roxb.) Sun var. macrosperma Hwang 446
unilocularis Buch.-Ham. 446
Cratoneuron (Sull.) Spruc. 65
filicinum (Hedw.) Spruc. 65
Cratoxylum Bl. 419
cochinchinense (Lour.) Bl. 419
formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel 419
*ligustrinum* (Spach) Bl. 419
Crawfurdia Wall. 947
campanulacea Wall. et Griff. ex C. B. Clarke 947
*chinensis* Migo 957
coerulea Hand.-Mazz. 957
crawfurdioides (Marq.) H. Smith 947
var. *macrophylla* Marq. 947
*forrestii* H. Smith 947
*japonica* Sieb. et Zucc. 957
pricei (Marq.) H. Smith 947
*pterygocalyx* Hemsl. 954
*volubilis* (Maxim.) Makino 954
Cremanthodium Benth. 1282
brunneo-pilosum S. W. Liu 1282
decaisnei C. B. Clarke 1282
discoideum Maxim. 1282
subsp. *ramosum* Ling 1282
ellisii (Hook. f.) S. W. Liu 1282
var. ramosum (Ling) Ling et S. W. Liu 1282
*hookeri* C. B. Clarke 1316
humile Maxim. 1282
lineare Maxim. 1282
nobile (Franch.) Diels ex Lévl. 1283
*plantagineum* Maxim. var. *ellisii* Hook. f. 1282
pleruocaule (Franch.) Good. 1283
rhodocephalum Diels 1283
sagittifolium Ling et Y. L. Chen ex S. W. Liu 1283
stenactinum Diels ex Limpr. 1283
stenoglossum Ling et S. W. Liu 1283
Cremastra Lindl. 1528
appendiculata (D. Don) Makino 1528
Crepis L. 1283
crocea (Lamk.) Babc. 1283
*elongata* Babc. 1284
flexuosa (DC.) Benth. et Hook. f. 1284
*gillii* S. Moore 1343
var. *erysimoides* Hand.-Mazz. 1344
*hookeriana* C. B. Clarke 1344

lignea (Vant.) Babc. 1284
napifera (Franch.) Babc. 1284
phoenix Dunn 1284
*pratii* Babc. 1357
rigescens Diels 1284
*rosularis* Diels 1344
*stenoma* Turcz. 1357
tibetica Babc. 1284
*trichocarpa* Franch. 1343
*turczaninowii* C. A. Mey. ex Turcz. 1283
*umbellu* Franch. 1344
Creta 1785
Cricetidae 1756
Crinum L. 1406
asiaticum L. var. sinicum (Roxb. ex Herb.) Baker 1406
latifolium L. 1407
*sinicum* Roxb. ex Herb. 1406
Cristaria plicata (Leach) 1585
Crocodidae 1712
Crocosmia Planch. 1417
crocosmiflora (Nichols.) N. E. Br. 1417
Crocothemis Brauer 1609
servilia Drury 1609
Crocus L. 1417
alatavicus Regel et Sem. 1417
sativus L. 1418
Croomia Torr. ex Torr. et Gray 1402
japonica Miq. 1402
Crossoptilon Hodgson 1723
*crossoptilon* (Hodgson) 1723
Crossostephium Less. 1284
*artemisioides* Less. 1284
chinense (L.) Makino 1284
Crotalaria L. 564
alata Buch.-Ham. 564
albida Heyne ex Roth 564
assamica Benth. 564
bracteata Rixb. 564
carlycina Schrank 565
cytisoides Roxb. ex DC. 565
*ferruginea* Grah. ex Benth 565
juncea L. 565
linifolia L. f. 565
var. *stenophylla* (Vog.) C. Y. Yang 565
*macrophylla* Willd. 574
medicaginea Lam. 565
*mucronata* Desv. 565
pallida Ait. 565
sessiliflora L. 565
*szemoensis* Gagnep. 565
tetragona Andr. 565
Croton L. 624
cascarilloides Raeusch. 624
caudatus Geisel. var. tomentosus Hook. f. 624
*cavaleriei* Gagnep. 624
crassifolius Geisel 624
*euryphyllus* W. W. Smith 624
*japonicum* Thunb. 635
lachnocarpus Benth. 624
laevigatus Vahl. 624
*paniculatus* Lam. 635
*philippinensis* Lam. 635
*sebiferum* L. 639
tiglium L. 625
tuberculata Bunge 640
urticifolius Y. T. Chang et Q. T. Chen 625
Cruciferae 446
Crustaceae 1598
Cryptobranchidae 1694
Cryptocoryne Fisch. ex Wydler 1475
sinensis Merr. 1475
*spiralis* Fisch. ex Wydler 1475
yunnanensis H. Li 1475
Cryptolepis R. Br. 975
buchananii Roem. et Schult. 975
sinensis (Lour.) Merr. 975
Cryptomeria D. Don 148
fortunie Hooibrenk ex Otto et Dietr. 148
japonica (L. f.) D. Don 148
Cryptonemiaceae 15
Cryptoplacidae 1570
Cryptoporus (Peck) Hubb. 29
volvatus (Peck) Shear. 29
Cryptotaenia DC. 859
japonica Hassk. 859
f. dissecta (Yabe) Hara 859
*Cryptotaeniopsis botrychioides* Dunn 875
*leptophylla* Dunn 875
*nudicaulis* H. Boiss. 875
*vulgaris* Dunn 876
Cryptothelea Duncan 1627
formosicola Strand 1627
pryeri (Leech) 1627
Cryptotympana Stal 1615
atrata (Fabricius) 1615
mandarina Distant 1616
*pustulata* (Fabricius) 1615
Ctenitis C. Chr. 121
clarker (Baker) Ching 121
rhodolepis (Clarke) Ching 121
Ctenizidae 1596
Ctenogobius Gill 1684
cliffordpopei (Nichols) 1684
giurinus (Rutter) 1684
shennongensis Yang et Xie 1684
Ctenolepisma villosa (Fabricius) 1609
Ctenopharyngodon Steindachnre 1659
idellus (Cuvier et Valenciennes) 1659
*Cucholzia philoxeroides* Mart. 258
Cucubalus L. 240
baccifer L. 240
var. japonicus Miq. 240
Cuculidae 1731
Cuculus Linnaeus 1731

canorus Linnaeus 1731
micropterus Gould 1731
poliocephalus Latham 1731
saturatus Blyth 1731
Cucumis L. 783
*acutangula* L. 788
*conomon* Thunb. 783
*maderaspatanus* L. 789
melo L. 783
var. conomon (Thunb.) Makino 783
sativus L. 783
Cucurbita L. 783
*hispida* Thunb. 782
moschata (Duch. ex Lam.) Duch. et Poir. 784
pepo L. 784
var. *moschata* Duch. ex Lam. 784
*siceraria* Molina 787
Cucurbitaceae 781
Cudrania Trec. 185
cochinchinensis (Lour.) Kudo et Masam. 185
fruticosa Wight 185
tricuspidata (Carr.) Bur. 185
Cultellus attenuatus Dunker 1589
scalprum (Gould) 1589
Culter Basilewsky 1659
alburnus Basilewsky 1659
erythropterus Basilewsky 1659
Cuminum L. 859
cyminum L. 859
Cuneopsis Simpson 1585
capitata (Heude) 1585
celtiformis (Heude) 1585
heudei (Heude) 1585
pisciculus (Heude) 1585
rufecens (Heude) 1585
Cunninghamia R. Br. 149
lanceolata (Lamb.) Hook. 149
Cuon Hodgson 1760
alpinus Pallas 1760
Cuora Gray 1700
flavomarginata (Gray) 1700
trifasciata (Bell) 1700
*Cupia mollissima* Hook. et Arn. 1019
Cupressaceae 149
Cupressus L. 149
duclouxiana Hickel 150
funebris Endl. 150
*hodginsii* Dunn 150
Cuprum 1783
Curculigo Gaertn. 1409
breviscapa S. C. Chen 1409
capitulata (Lour.) O. Kuntze 1410
gracilis (Wall. ex Kurz) Hook. f. 1410
orchioides Gaertn. 1410
Curculionidae 1626
Curcuma L. 1509
aeruginosa Roxb. 1509
angustifolia Roxb. 1509
aromatica Salisb. 1510
cv. Wenyujin 1510
*domestica* Valet 1510
kwangsiensis S. G. Lee et C. F. Liang 1509
longa L. 1510
sichuanensis X. X. Chen 1510
wenyujin Y. H. Chen et C. Ling 1510
Cuscuta L. 1026
austriatis R. Br. 1026
chinensis Lam. 1026
europaea L. 1026
japonica Choisy 1026
reflexa Roxb. 1026
Cyananthus Wall. ex Benth. 1232
argenteus Marq. 1232
dolichosceles Marq. 1233
fasciculatus Marq. 1233
formosus Diels 1233
hookeri C. B. Clarke 1233
incanus Hook. f. et Thoms. 1233
inflatus Hook. f. et Thoms. 1233
Cyanea Agassiz 1566
*arctica* Linnaeus 1567
Capillata (Linnaeus) 1567
Cyaneidae 1566
Cyanotis D. Don 1428
arachnoides C. B. Clarke 1428
cristata (L.) D. Don 1428
vaga (Lour.) J. A. et J. H. Schult 1428
*Cyathea gigantea* (Wall.) Holtt. 88
*spinulosa* Wall. ex Hook. 87
Cyathaceae 87
Cyathocline Cass. 1285
*lyrata* Cass. 1285
purpurea (Buch.-Ham. ex D. Don) O. Kuntze 1285
Cyathula Bl. 261
capitata Miq. 261
officinalis Kuan 261
prostrata (L.) Bl. 261
tomentosa (Roth) Miq. 261
Cyathus Hall. ex Pers. 52
stercoreus (Schw.) de Toni 52
striatus Willd. ex Pers. 53
Cybiidae 1682
Cybister Curtis 1619
japonicus Sharp 1619
tripunctatus orientalis Gschwendtner 1619
Cycadaceae 141
Cycas L. 141
pectinata Griff. 141
revoluta Thunb. 141
rumphii Miq. 141
siamensis Miq. 141
Cyclea Arnott ex Wight 376
barbata (Wall.) Miers 376

glacillima Diels 376
*hainanensis* Merr. 376
hypoglauca (Schauer) Diels 376
insularis (Makino) Hatusima 376
*migoana* Yamam. 376
polypetala Dunn 376
racemosa Oliv. 376
sutchuenensis Gagnep. 376
tonkinensis Gagnep. 377
Cyclemys Bell 1700
mouhotii Gray 1700
Cyclina Deshayes 1586
sinensis (Gmelin) 1586
Cyclobalanopsis Oerst. 173
delavayi (Franch.) Schott 173
*glaucoides* Schott 174
kerrii (Craib) Hu 173
myrsinaefolia (Bl.) Oerst. 173
Cyclocarya Iljin 159
pallurus (Batal.) Iljin 159
Cyclopelte parva Distant 1618
Cyclophoridae 1572
Cyclophorus Montfort 1572
martensianus Moellendorff 1572
Cyclosorus Link 104
acuminatus (Houtt.) Nakai et H. Ito 104
aridus (D. Don) Tagawa 104
dentatus (Forsk.) Ching 104
*parasiticus* (L.) Farwell 104
*Cyclostegia strobilifera* Benth. 1070
Cyclostomata 1643
Cydonia Mill. 506
*cathayensis* Hemsl. 501
lagenaria Loisel. 501
oblonga Mill. 506
var. maliformis Schneid. 506
var. pyriformis Rehd. 506
*sinensis* Thouin 501
*speciosa* Sweet 501
Cygnus Bechstein 1718
columbianus (Ord) 1718
*cygnus* (Linnaeus) 1718
olor (Gmelin) 1718
Cylindrokelupha Kosterm. 566
turgida (Merr.) T. L. Wu 566
*Cylobalanopsis myrsinaefolis* (Bl.) Oerst. 174
Cymbaria L. 1133
dahurica L. 1133
mongolica Maxim. 1133
Cymbidium Sw. 1528
*appendiculata* D. Don 1528
*chinense* Heynh. 1529
ensifolium (L.) Sw. 1528
faberi Rolfe 1528
floribundum Lindl. 1529
*giganteum* Wall. ex Lindl. 1529
*goeringii* (Reichb. f.) Reichb. f. 1529
hookerianum Reichb. f. 1529
*iridifolium* Roxb. 1551
iridioides D. Don 1529
kanran Makino 1529
lancifolium Hook. 1529
pendulum (Roxb.) Sw. 1529
sinense (Andr.) Willd. 1529
*yunnanense* Schltr. 1529
Cymbium de Costa 1577
melo (Solander) 1577
Cymbopogon Spreng. 1440
caesius (Nees) Stapf 1440
citratus (DC.) Stapf 1440
distans (Nees ex Steud.) W. Wats. 1440
goeringii (Steud.) A. Camus 1440
tortilis (Presl) A. Camus 1440
*Cymopteris littoralis* A. Gray 861
Cymothoidae 1599
Cynanchum L. 975
amplexicaule (Sieb. et Zucc.) Hemsl. 975
var. castaneum Makino 975
ascyrifolium (Franch. et Sav.) Matsum. 976
atratum Bunge 976
auriculatum Royle ex Wight 976
bungei Decne. 976
cathayense Tsiang et Zhang 976
chekiangense M. Cheng 976
chinense R. Br. 976
corymbosum Wight 977
decipiens Schneid. 977
fordii Hemsl. 977
forrestii Schltr. 977
giraldii Schltr. 977
glaucescens (Decne.) Hand.-Mazz. 977
*gracillimum* Wall. ex Wight 973
hancockianum (Maxim.) Iljin 977
*henryi* Warb. ex Schltr. et Diels 974
inamoenum (Maxim.) Loes. 978
komarovii Iljin 978
mooreanum Hemsl. 978
officinale (Hemsl.) Tsiang et Zhang ex Tsiang et P. T. Li 978
otophyllum Schneid. 978
paniculatum (Bunge) Kitag. 978
*pubescens* Bunge 976
saccatum W. T. Wang ex Tsiang et P. T. Li 978
*sibiricum* Willd. 979
stauntonii (Decne.) Schltr. ex Lévl. 977
thesioides (Freyn) K. Schum. 979
var. australe (Maxim.) Tsiang et P. T. Li 979
versicolor Bunge 976
vincetoxicum (L.) Pers. 979
Wallichii Wight 979
wilfordii (Maxim.) Hemsl. 979
*yunnanensis* Lévl. 1012
Cynara L. 1285
cardunculus L. 1285

scolymus L. 1265
*Cynactonum pedicellatum* Gmel. 945
*wilfordii* Maxim. 979
Cynodon Rich. 1441
dactylon (L.) Persl. 1441
Cynoglossidae 1690
Cynoglossum L. 1033
amabile Stapf et Drumm. 1033
var. pauciglochidatum Y. L. Liu 1034
divaricatum Steph. 1034
*dunnianum* Diels 1032
lanceolatum Forsk. 1034
*micranthum* Desf. 1034
officinale L. 1034
zeylanicum (Lehm.) Brand 1034
*zeylanicum* (Vahl) Thunb. ex Lehm. 1034
Cynoglossus Hamilton 1690
abbreviatus (Gray) 1690
gracilis Günther 1690
*interruptus* Günther 1690
itinus (Snyder) 1690
joyneri Günther 1690
melampetalus (Richardson) 1690
robustus Günther 1690
semilaevis Günther 1690
trigrammus Günther 1690
Cynomoriaceae 824
Cynomorium L. 824
songaricum Rupr. 824
Cynops Tschudi 1695
orientalis (David) 1695
Cynopterus Cuvier 1747
sphinx (Vahl) 1747
*Cynosurus aegyptiacus* L. 1441
*coracanus* L. 1443
*indicus* L. 1443
Cyperaceae 1486
Cyperus L. 1489
alternifolius L. subsp. flabelliformis (Rottb.) Kukenth. 1489
amuricus Mixim. 1489
*compactus* Retz. 1496
compressus L. 1490
cuspidatus Kunth 1490
difformis L. 1490
eleusinoides Kunth 1490
*flabelliformis* Rottb. 1489
*globosus* All. 1496
glomeratus L. 1490
haspan L. 1490
iria L. 1490
malaccensis Lam. 1491
var. brevifolius Boeckl. 1490
michelianus (L.) Link 1491
microiria Steud. 1491
nutans Vahl 1491
orthostachyus Franch. et Sav. 1491
pilosus Vahl 1491
rotundus L. 1491
*sanguinolentus* Vahl 1496
*serotinus* Rottb. 1494
Cyphomandra Sendt. 1118
betacea Sendt. 1119
Cypraea Linnaeus 1574
lynx (Linnaeus) 1574
tigris Linnaeus 1574
Cypraeidae 1574
Cyprinidae 1658
Cyprinus Linnaeus 1659
carpio Linnaeus 1660
Cypripedium L. 1530
*appletonianum* Gower 1553
bardolphianum W. W. Smith et Farrer 1530
calceolus L. 1530
*chinense* Franch. 1531
*concolor* Parsh et Batem. 1554
corrugatum Franch. 1530
debile Reichb. f. 1530
*ebracteatum* Rolfe 1530
fargesii Franch. 1530
fasciculatum Franch. 1530
flavum P. F. Hunt et Summerh. 1530
franchetii Wils. 1531
guttatum Sw. 1531
henryi Rolfe 1531
japonicum Thunb. 1531
*luteum* Franch. 1530
macranthum Sw. 1531
margaritaceum Franch. 1531
var. *fargesii* (Franch.) Pritz. 1530
*nutans* Schltr. 1530
*parishii* Reichb. f. 1554
*tibeticum* King ex Rolfe 1531
*wilsoni* Rolfe 1530
Cypselurus Lowe 1671
arcticeps (Günther) 1671
bahiensis (Ranzani) 1671
oligolepis (Bleeker) 1671
oxycephalus (Bleeker) 1671
spilopterus (Cuvier et Valenciennes) 1671
starksi Abe 1671
Cyrtomium Presl 114
balansae (Christ) C. Chr. 114
f. edentatum Ching 114
caryotideum (Wall.) Presl 114
falcatum (L. f.) Presl 114
fortunei J. Smith 114
f. polypterum (Diels) Ching 114
macrophyllum (Makino) Tagawa 115
f. muticum (Christ) Ching et Shing 115
*muticum* Christ 115
pachyphyllum (Ros.) C. Chr. 115
urophyllum Ching 115
yamamotoi Tagawa 115
*Cyrtosia lindleyana* Hook. f. et Reichb. f. 1539

Cyrtotrachelus Schoenherr 1626
longimanus Fabricius 1626
Cystacanthus T. Anders 1167
yunnanensis W. W. Smith 1167
*Cytisus cajan* L. 555
*pinnata* L. 596

## D

Dactylicapnos Wall. 438
scandens (D. Don) Hutch. 438
torulosa (Hook. f. et Thoms.) Hutch. 438
Dactyloctenium Willd. 1441
aegyptium (L.) Beauv. 1441
Daedalea biennis (Bull.) Fr. 29
Daedaleopsis fricolor (Fr.) Bond. et Sing. 29
Daemonorops Bl. ex Schult. f. 1462
draco Bl. 1462
margaritae (Hance) Becc. 1463
Cahlia Cav. 1285
pinnata Cav. 1285
Dalbergia L. f. 566
balansae Prain 566
benthami Prain 566
hainanensis Merr. et Chun 566
hancei Benth. 566
hupeana Hance 566
*marginata* Roxb. 568
millettii Benth. 566
mimosoides Franch. 567
odorifera T. Chen 567
pinnata (Lour.) Prain 567
rimosa Roxb. 567
sisso Roxb. 567
yunnanensis (Nakai) Koidz. 567
Daldorfia Rathbun 1604
horrida (Linnaeus) 1604
Damnacanthus Gaertn. f. 993
*formosanus* (Nakai) Koidz. 993
henryi (Lévl.) H. S. Lo 993
indicus Gaertn. f. 993
var. *formosanus* Nakai 993
labordei (Lévl.) H. S. Lo 994
officinarum Huang 994
subspinosus Hand.-Mazz. 994
tsaii Hu 994
Daphne L. 753
acutiloba Rehd. 753
altaica Pall. 753
aurantica Diels 753
*cannabina* Lour. ex Wall. 754
championii Benth. 753
feddei Lévl. 753
*gardneri* Wall. 755
genkwa Sieb. et Zucc. 753
giraldii Nitsche 753
grueningiana Winkl. 754
*indica* L. 757
koreana Nakai 754
odora Thunb. 754
var. atrocaulis Rehd. 754
var. kiusiana Keissler 754
papyracea Wall. ex Steud. 754
var. crassiusula Rehd. 754
var. duclouxii Lecomte 754
retusa Hemsl. 755
rosmariniifolia Rehd. 755
*szechuanica* Windl. 755
tangutica Maxim. 755
*wilsonii* Rehd. 755
*Daphnidium elongata* Nees 292
Daphniphyllum Bl. 641
angustifolium Hutch. 641
calycinum Benth. 641
*glaucescens* Bl. var. *oldhami* Hemsl. 642
longistylum S. S. Chien 641
macropodum Miq. 641
oldhami (Hemsl.) Rosenth. 642
paxianum Rosenth. 642
Daphniphyllaceae 641
*Daphnium caudatum* Nees 288
*Dasillipe pasquieri* Dubard 926
*Dasiphora davurica* (Nestl.) Kom. et Klob.-Alis. 517
*fruticosa* (L.) Pydb. 517
*parvifolia* (Fisch.) Juzep. 517
Dasyatidae 1648
Dasyatis Rafinesque 1648
akajei (Müller et Henle) 1649
bennetti (Müller et Henle) 1649
gerrardi (Gray) 1649
kuhlii (Müller et Henle) 1649
laevigatus Chu 1649
microphthalmus Chen 1649
navarrae (Steindachner) 1649
sinensis (Steindachner) 1649
uarnak (Forskal) 1649
zugei (Muller et Henle) 1649
Datura L. 1119
*arborea* L. 1117
*fastuosa* L. 1119
*inermis* Jacq. 1119
innoxia Mill. 1119
metel L. 1119
stramonium L. 1119
*tatula* L. 1119
Daucus L. 860
carota L. 860
var. sativa DC. 860
Davallia Smith. 124
divaricata Bl. 124
*immersa* Wall. 125
mariesii Moore ex Baker 124
*platylepis* Baker 124
*pulchra* D. Don 123
sinensis (Christ) Ching 124
*solida* (Forst.) Sw. var. *sinensis* Christ 124

*yunnanensis* Christ 123
Davalliaceae 123
Davidia Baill. 820
involucrata Baill. 826
Davidiaceae 826
Debregeasia Gaud. 195
longifolia (Burm. f.) Wedd. 195
orientalis C. J. Chen 195
squamata King 195
Decaisnea Hook. f. et Thoms. 372
fragesii Franch. 372
Decapterus Bleeker 1677
maruadsi (Temminck et Schlegel) 1677
Decaspermum J. R. et G. Forst. 802
esquirolii (Lévl.) Chang et Miau 802
fruticosum J. R. et G. Forst. 802
var. khasianum (Duthie) C. Y. Wu 802
gracilentum (Hance) Merr. et Perry 802
Decumaria L. 476
sinensis Oliv. 476
Deinanthe Maxim. 477
caerulea Stapf 477
Delavaya Franch. 676
toxocarpa Franch. 676
*yunnanensis* Franch. 676
Delesseriaceae 18
Delichon Horsfield et Moore 1735
urbica (Linnaeus) 1735
Delphinidae 1758
Delphinium L. 333
*ajacis* L. 333
albocoeruleum Maxim. 334
var. przewalskii (Huth) W. T. Wang 334
anthriscifolium Hance 334
var. calleryi (Franch.) Finet et Gagnep. 334
var. majus Pamp. 334
biternatum Huth 334
bonvalotii Franch. 335
var. eriostylum (Lévl.) W. T. Wang 335
brunonianum Royle 335
caeruleum Jacq. ex Camb. 335
*calleryi* Franch. 334
candelabrum Ostenf. var. monanthum (Hand.-Mazz.) W. T. Wang 335
caudatolobum W. T. Wang 335
ceratophorum Franch. 335
chefoense Franch. 335
davidii Franch. 336
delavayi Franch. 336
var. pogonanthum (Hand.-Mazz.) W. T. Wang 336
densiflorum Duthie ex Huth 336
elatum L. var. sericeum W. T. Wang 336
*eriostylum* Lévl. 335
forrestii Diels 336
giraldii Diels 336
grandiflorum L. 336
var. glandulosum W. T. Wang 336
var. leiocarpum W. T. Wang 337
gyalanum Marq. et Shaw 337
hirticaule Franch. var. mollipes W. T. Wang 337
honanense W. T. Wang 337
kamaonense Huth var. glabrescens (W. T. Wang) W. T. Wang 337
*leptopogon* Hand.-Mazz. 338
maackianum Regel 337
*monanthum* Hand.-Mazz. 335
nangchienense W. T. Wang 337
omeiense W. T. Wang 337
*pogonanthum* Hand.-Mazz. 336
potaninii Huth 337
*przewalskii* Huth 334
*pseudograndiflorum* W. T. Wang var. *glabrescens* W. T. Wang 337
pseudopulcherrimum W. T. Wang 338
pylzowii Maxim. 338
var. trigynum W. T. Wang 338
siwanense Franch. var. leptopogon (Hand.-Mazz.) W. T. Wang 338
souliei Franch. 338
tangkulaense W. T. Wang 338
tatsienense Franch. 338
tianshanicum W. T. Wang 338
trichophorum Franch. 338
trifoliolatum Finet et Gagnep. 339
yunnanense Franch. 339
Delphinus Linnaeus 1758
delphis Linnaeus 1758
Delta Saalmueller 1633
campaniformis gracilis (Saussure) 1633
petiolata (Fabricius) 1633
Dematiaceae 53
*Democrites serissoides* DC. 1019
Demospongiae 1656
Dendranthema (DC.) Des Moul. 1285
*boreale* (Makino) Ling 1286
chanetii (Lévl.) Shih 1285
*erubescens* (Stapf) Tzvel. 1285
indicum (L.) Des Moul. 1286
lavandulifolium (Fisch. ex Trautv.) Ling et Shih 1286
var. seticuspe (Maxim.) Shih 1286
var. tomentellum (Hand.-Mazz.) Ling et Shih 1286
mongolicum (Ling) Tzvel. 1286
morifolium (Ramat.) Tzvel. 1287
naktongense (Nakai) Tzvel. 1287
potentilloides (Hand.-Mazz.) Shih 1287
vestitum (Hemsl.) Ling 1287
zawadskii (Herb.) Tzvel. 1287
*Dendrobenthamia angustata* (Chun) Fang 827
*capitata* (Wall.) Hutch. 827

*hongkongensis* (Hemsl.) Hutch. 828
*japonica* (A. DC.) Fang 828
Dendrobium Sw. 1531
aduncum Wall. ex Lindl 1532
var. *faulhaberianum* (Schltr.) Tang et Wang 1532
*aggregatum* Roxb. 1534
aphyllum (Roxb.) Fisch. 1532
bellatulum Rolfe 1532
*bulleyi* Rolfe 1535
candidum Wall. ex Lindl. 1532
cariniferum Reichb. f. 1532
chrysanthum Wall. ex Lindl. 1532
chrysotoxum Lindl. 1532
*clavatum* Wall. ex Lindl. 1533
var. *aurantiacum* (Reichb. f.) Tang et Wang 1533
crepidatum Lindl. ex Paxt. 1532
denneanum Kerr. 1533
densiflorum Lindl. ex Wall. 1533
devonianum Paxt. 1533
*evaginatum* Gagnep. 1534
falconeri Hook. 1533
*fargesii* Finet 1537
*faulhaberianum* Schltr. 1532
fimbriatum Hook. 1533
*fimbriatum* (Bl.) Lindl. 1537
var. *bimaculosum* Tang et Wang 1534
var. *gibsonii* (Lindl.) Finet ex Gagnep. 1533
var. *oculatum* Hook. 1533
gibsonii Lindl. 1533
hancockii Rolfe 1534
henryi Schltr. 1534
hercoglossum Reichb. f. 1534
hookerianum Lindl. 1534
huoshanense C. Z. Tang et S. J. Cheng 1533
jenkinsii Wall. ex Lindl. 1534
*kosepangii* Tso 1536
*kwangtungense* Tso 1536
linawianum Reichb. f. 1534
*lindleyi* Steud. var. *majus* (Rolfe) S. Y. Hu 1534
lituiflorum Lindl. 1534
loddigesii Rolfe 1535
var. *album* Tang et Wang 1535
loohohense Tang et Wang 1535
*lonchophyllum* Hook. f. 1537
longicornum Lindl. 1535
moniliforme (L.) Sw. 1535
nobile Lindl. 1535
*nutans* Presl 1540
*officinale* Kitamura et Migo 1532
parishii Reichb. f. 1535
primulinum Lindl. 1535
strongylanthum Reichb. f. 1535
*suavissimum* Reichb. f. 1532
terminale Parish et Reichb. f. 1536
tosaense Makino 1533
trigonopus Reichb. f. 1536
*velutinum* Rolfe 1536
*wangii* Tso 1534
williamsonii Day et Reichb. f. 1536
wilsonii Rolfe 1536
Dendrocalamopsis (Chia et Fung) Keng f. 1441
beecheyana (Munro) Keng f. var. pubescens (P. F. Li) Keng f. 1441
oldhamii (Munro) Keng f. 1441
Dendrocalamus Nees 1441
giganteus Munro 1441
latiflorus Munro 1442
minor (McClure) Chia et Fung 1442
strictus (Roxb.) Nees 1442
Dendrocnide Miq. 195
meyeniana (Walp.) Chew 195
f. subglabra (Hayata) Chew 195
sinuata (Bl.) Chew 195
urentissima (Gagnep.) Chew 195
Dendrocopos canicapillus (Blyth) 1734
cathpharius (Blyth) 1735
hyperythrus (Vigors) 1735
leucotos (Bechstein) 1735
major (Linnaeus) 1735
Dendrolobium Benth. 567
triangulare (Retz.) Schindl. 567
Dendropanax Decne. et Planch. 838
burmaricus Merr. 838
dentiger (Harms) Merr. 838
*ferrugineus* Li 838
*listeri* King 841
macrocarpus C. N. Ho 838
proteus (Champ.) Benth. 839
Dendrophthoe Mart. 211
pentandra (L.) Miq. 211
Dendrotrophe Miq. 209
frutescens (Champ.) Danser 209
Dennstaedtia Bernh. 88
scabra (Wall. ex Hook.) S. Moore 88
Dennstaedtiaceae 88
*Dentaria leucantha* Tausch 449
Dermatocarpaceae 54
Dermatocarpon Th. Fr. 54
miniatum (L.) Mann. 54
Dermochelyidae 1702
Dermochelys Blainville 1702
coriacea (Linnaeus) 1702
Derris Lour. 567
elliptica (Wall.) Benth. 567
eriocarpa How 568
ferruginea Benth. 568
fordii Oliv. 568
var. lucida How 568
hancei Hemsl. 568
marginata (Roxb.) Benth. 568
*pinnata* Lour. 568

trifoliata Lour. 568
Descurainia Webb et Berth. 451
sophia (L.) Schur. 451
Desmodium Desv. 568
caudatum (Thunb.) DC. 568
*elegans* (Lour.) Benth. 593
elegans DC. 569
*esquirolii* Lévl. 569
fallax Schindl. 569
var. mandshuricum (Maxim.) Nakai 569
*formosum* Vog. 583
gangeticum (L.) DC. 569
*gyrans* (L. f.) DC. 564
*gyrcides* (Roxb. ex Link) DC. 564
heterocarpum (L.) DC. 569
var. strigosum Van Meeuwen 569
heterophyllum (Willd.) DC. 569
laxiflorum DC. 569
*longipes* Craib 594
microphyllum (Thunb.) DC. 569
multiflorum DC. 570
oblongum Wall. ex Benth 570
*oldhami* Oliv. 595
*oxyphyllum* DC. 596
*podocarpum* DC. 595
*pseudotriquetrum* DC. 602
*pulchellum* (L.) Benth. 594
sequax Wall. 570
*sinuatum* (Miq.) Bl. 570
styracifolium (Osbeck.) Merr. 570
*szechuenense* (Craib) Schindl. 596
triflorum (L.) DC. 570
*triquetrum* (L.) DC. 601
velutinum (Willd.) DC. 570
Desmos Lour. 271
chinensis Lour. 271
dumosus(Roxb.) Saff. 271
grandifolius (Finet et Gagnep.) C. Y. Wu ex P. T. Li 271
*Desmotrichum fimbriatum* Bl. 1537
*Desmovia tetragonoides* Pall. 236
Deutzia Thunb. 477
amurensis (Regel) Airy-Shaw 478
discolor Hemsl. 477
glabrata Kom. 477
glauca Cheng 477
grandiflora Bunge 477
hypoglauca Rehd. 477
micrantha Engl. 477
ningpoensis Rehd. 477
parviflora Bunge 478
scabra Thunb. 478
setchuenensis Franch. 478
Diadumenidae 1567
*Dialium coromandelica* Houtt. 668
Dianella Lam. 1375
ensifolia (L.) DC. 1375
*mairei* Lévl. 1402
*Dianthera japonica* Thunb. 1171
Dianthus L. 241
*amurensis* Jacq. 241
barbatus L. 241
caryophyllus L. 241
chinensis L. 241
var. morii (Nakai) Y. C. Chu 241
longicalyx Miq. 241
superbus L. 241
var. longicalycinus (Maxim.) Williams 241
var. speciosus Reichb. 241
versicolor Fisch. ex Link var. subulifolius (Kitag.) Y. C. Chu 241
Diapensia L. 880
purpurea Diels 880
Diapensiaceae 880
Diarrhena Beauv. 1442
manshurica Maxim. 1442
Diarthron Turcz. 755
linifolium Turcz. 755
*Diatoma brachiata* Lour. 815
*Diatraea venosata* Walker 1628
*Dicalix cochinchinensis* Lour. 931
*decorus* (Hance) Migo 931
*wikstromiifolia* (Hayata) Migo 933
Dicentra Benth. 438
macrantha Oliv. 438
spectabilis (L.) Lam. 438
*Diceros montanus* Bl. 1138
Dichapetalaceae 752
Dichapetalus Thou. 752
gelonioides (Roxb.) Engl. 752
longipetalum (Turcz.) Engl. 752
*Dichiloboea birmanica* (Craib) Stapf 1193
Dichocarpum W. T. Wang et Hsiao 339
adiantifolium (Hook. f. et Thoms) W. T. Wang et Hsiao 339
auriculatum (Franch.) W. T. Wang et Hsiao 339
basilare W. T. Wang et Hsiao 339
dalzielii (Drumm. et Hutch.) W. T. Wang et Hsiao 339
fargesii (Franch.) W. T. Wang et Hsiao 339
*franchetii* (Finet et Gagnep.) W. T. Wang et Hsiao 339
sutchuenense (Franch.) W. T. Wang et Hsiao 340
trifoliolatum W. T. Wang et Hsiao 340
Dichondra J. R. et G. Forst. 1026
repens Forst. 1027
Dichroa Lour. 478
damingshanensis Y. C. Wu 478
febrifuga Lour. 478
yaoshanensis Y. C. Wu 478
Dichrocephala L'Hérit. ex DC. 1287

auriculata (Thunb.) Druce 1287
beathamii C. B. Clarke 1288
*badinieri* Vant. 1288
chrysanthemifolia DC. 1288
*integrifolia* (L. f.) O. Kuntze 1287
*latifolia* (Lam.) DC. ex Wight 1287
*leveillei* Vant. 1320
Dichrostachys (DC.) Wight et Arn. 570
cinerea (L.) Wight et Arn. 570
Dickinsia Franch. 860
hydrocotyloides Franch. 860
Dicksoniaceae 87
*Dicksonia scabra* Wall. ex Hook. 88
Dicliptera Juss. 1167
bupleuroides Nees 1167
chinensis (L.) Nees 1168
*japonica* (Thunb.) Makino 1171
*Diclytra scandens* D. Don 438
*torulosa* Hook. f. et Thoms. 438
Dicotyledoneae 158
Dicranaceae 61
Dicranopteris Bernh. 84
ampla Ching et Chiu 84
linearis (Burm.) Underw. 84
var. dichotoma (Thunb.) Holtt 84
Dicranostigma Hook. f. et Thoms. 438
leptopodum (Maxim.) Fedde 438
Dicranum Hedw. 61
majus Turn. 61
Dictamnus L. 646
dasycarpus Turcz. 646
Dictyocline Moore 104
griffithii Moore 104
wilfordii (Hook.) J. Smith 105
Dictyophora Desv. 47
duplicata (Bosc) Fisch. 47
indusiata (Vent. ex Pers.) Fisch. 47
multicolor Berk. et Br. 47
Didissandra C. B. Clarke 1184
*amabilis* Diels 1179
*cordatifolia* Craib 1183
*flabellata* (Franch.) Craib 1184
*kingianus* Craib 1184
*lancifolia* Franch. 1187
*longipes* Hemsl. 1179
macrosiphon (Hance) W. T. Wang 1184
*mihieri* Franch. 1179
*rosthornii* Diels 1179
*saxatilis* Hemsl. 1177
*sericeus* Craib 1184
sesquifolia C. B. Clarke 1184
sinica (Chun) W. T. Wang 1184
*speciosa* Hemsl. 1179
Didymocarpus Wall. 1184
auricula S. Moore 1186
*clarkei* Lévl. 1186
cortusifolius (Hance) Lévl. 1184
*fimbrisepalus* (Hand.-Mazz.) Hand.-Mazz. 1180
*griffithii* Wight 1187
hancei Hemsl. 1185
*hedyotidea* Chun 1181
heucherifolius Hand.-Mazz. 1185
*martinii* Lévl. et Vant. 1191
mengtze W. W. Smith 1185
niveolanosus D. Fang et W. T. Wang 1185
*pinnatifidus* Hand.-Mazz. 1181
*sericeus* Lévl. 1190
stenanthos C. B. Clarke 1185
*swinglei* Merr. 1181
yuanlingensis W. T. Wang 1185
yuannensis (Franch.) W. W. Smith 1185
Didymosperma Wendl. et Drude 1463
caudatum (Lour.) Wendl. et Drude 1463
var. tonkinensis Becc. 1463
*tonkinensis* (Becc.) Becc. ex Gagnep. 1463
Didymostigma W. T. Wang 1185
obtusa (C. B. Clarke) W. T. Wang 1186
*Diervilla japonica* DC. var. *sinica* Rehd. 1214
Diestrammena Brunner 1613
*japonica* Blatchley 1613
Digenea C. Ag. 18
simplex (Wulf.) C. Ag. 18
Digitalis L. 1134
*cochinchinensis* Lour. 1133
lanata Ehrh. 1134
purpurea L. 1134
Digitaria Haller 1442
*glutinosa* Gaertn 1150
ischaemum (Schreb.) Schreb. 1442
sanguinalis (L.) Scop. 1442
Dillenia L. 401
*hainanensis* Merr. 401
indica L. 401
pentagyna Roxb. 401
turbinata Finet et Gagnep. 401
Dilleniaceae 401
Dimocarpus Lour. 676
longan Lour. 676
*Dimorphanthus elatus* Miq. 836
Dimorphostemon Kitag. 451
glandulosus (Kar. et Kir.) V. Golubk. 451
Dinodon Dumeril et Bibron 1707
flavozonatum Pope 1707
rufozonatum (Cantor) 1707
Diodon Linnaeus 1692
holacanthus Linnaeus 1692
novemmaculatus Cuvier 1692
Diodontidae 1692
Diogenes edwardsii (de Haan) 1604
Dioscorea L. 1411
alata L. 1411
althaeoides R. Knuth 1411
*batatas* Decne. 1414
benthamii Prain et Burkill 1411
biformifolia Péi et C. T. Ting 1411

*biserialis* Prain et Burkill 1415
bulbifera L. 1411
chingii Prain et Burkill 1412
cirrhosa Lour. 1412
var. cylindrica C. T. Ting et M. C. Chang 1412
collettii Hook. f. 1412
var. hypoglauca (Palibin) Péi et C. T. Ting 1412
deltoides Wall. ex Griseb. 1412
var. orbiculata Prain et Burkill 1412
esquirolii Prain et Burkill 1413
*fargesii* Franch. 1414
fordii Prain et Burkill 1413
futschauensis Uline ex Kunth 1413
glabra Roxb. 1413
gracillima Miq. 1413
hemsleyi Prain et Burkill 1413
henryi (Prain et Burkill) C. T. Ting 1413
hispida Dennst. 1414
*hypoglauca* Palib. 1412
japonica Thunb. 1414
var. pilifera C. T. Ting et M. C. Chang 1414
kamoonensis Kunth 1414
var. *henryi* Prain et Burkill 1413
melanophyma Prain et Burkill 1414
nipponica Makino 1414
subsp. rosthornii (Prain et Burkill) C. T. Ting 1414
oppositita Thunb. 1414
panthaica Prain et Burkill 1415
parviflora C. T. Ting 1415
pentaphylla L. 1415
persimilis Prain et Burkill 1415
septeloba Thunb. 1415
simulans Prain et Burkill 1415
subcalva Prain et Burkill 1415
tenuipes Franch. et Sav. 1416
tokoro Makino 1416
zingiberensis C. H. Wright 1416
Dioscoreaceae 1411
Diospyros L. 926
cathayensis A. N. Steward 926
var. foochowensis (Metc. et Chen) S. Lee 926
dumetorum W. W. Smith 926
eriantha Champ. ex Benth. 926
*foochowensis* Metc. et Chen 926
glaucifolia Metc. 927
var. *pubescens* Ling 927
kaki Thunb. 927
var. silvestris Makino 927
lotus L. 927
*mollifolia* Rehd. et Wils. 926
morrisiana Hance 927
oleifera Cheng 927
rhombifolia Hemsl. 928
siderophylla H. L. Li 928
*sinensis* Hemsl. 927
Dipelta Maxim. 1199
floribunda Maxim. 1199
*ventricosa* Hemsl. 1199
yunnanensis Franch. 1199
Dipentodon Dunn 694
sinicus Dunn 694
Diphasiastrum Holub 71
alpinum (L.) Holub 71
*anceps* (Wall.) Ching 71
complanatum (L.) Holub 71
var. anceps (Wall.) Aschers. 71
veitchii (Christ.) Holub 71
Diphylleia Michx. 363
grayi Fr. Schmidt 363
sinensis Li 363
Diplazium Sw. 102
donianum (Mett.) Trad. -Blot 102
*dilatata* Bl. 100
zeylanicum (Hook.) Moore 102
Diplazoptilon Ling 1288
picridifolium (Hand. -Mazz.) Ling 1288
Diploclisia Miers 377
affinis (Oliv.) Diels 377
*chinensis* Merr. 377
glaucescens (Bl.) Diels 377
Diplocyclos (Endl.) Post. et O. Kuntze 784
palmatus (L.) C. Jeffrey 784
*Diplolepis ovata* Lindl. 989
Diplomeris D. Don 1536
*chinensis* Rolfe 1517
*monantha* Tang et Wang 1536
pulchella D. Don 1536
Diplopanax Hand. -Mazz. 829
stachyanthus Hand. -Mazz. 829
*Diplopappus baccharoides* Benth. 1260
*Diplophragma tetrangulare* Korth. 1002
Diplopoda 1607
Diploprora Hook. f. 1536
championi (Lindl.) Hook. f. 1536
Diplopterygium (Diels) Nakai 84
chinensis (Ros.) Devol 84
glaucum (Thunb. ex Houtt.) Nakai 84
laevissima (Christ) Nakai 84
*Diplospora fruticosa* Hemsl. 1020
*Diplycosia semi-infera* C. B. Clarke 886
Dipsacaceae 1219
Dipsacus L. 1219
*asper* Wall. 1219
asperoides C. Y. Cheng et T. M. Ai 1219
atropurpurcus C. Y. Cheng et Z.T. Yin 1219
chinensis Batal. 1219
japonicus Miq. 1219
sativa (L.) Honck. 1219
Dipteridaceae 125
Dipteris Reinw. 125

chinensis Christ 125
Dipterocarpaceae 410
Dipterocarpus Gaertn. f. 410
turinatus Gaertn. f. 410
*Dipterospermum persoonatum* Hassk. 1164
Dischidanhus Tsiang 979
urceolatus (Decne.) Tsiang 979
Dischidia R. Br. 980
australis Tsiang et P. T. Li 980
chinensis Champ. ex Benth. 980
esquirolii (Lévl.) Tsiang 980
Discocleidion (Mull. -Arg.) Pax et Hoffm. 625
rufescens (Franch.) Pax et Hoffm. 625
Discoglossidae 1695
Discogobio Lin 1660
yunnanensis (Regan) 1660
Disporopsis Hance 1375
aspera (Hua) Engl. ex Krause 1375
fuscopicta Hance 1375
longifolia Craib 1376
*pernyi* (Hua) Diels 1376
Disporum Salisb. 1376
bodinieri (Lévl. et Vant.) Wang et Tang 1376
brachystemon Wang et Tang 1376
calacratum D. Don 1376
cantoniense (Lour.) Merr. 1376
megalanthum Wang et Tang 1377
sessile D. Don 1377
viridescens (Maxim.) Nakai 1377
*Dissochaeta barthei* Hance 807
*Dissolaena verticillata* Lour. 969
Distoechodon hupeinesis Yin 1666
tumirostris Peters 1666
*Distorta emodi* (Meissn.) V. Petrov. 224
Distylium Sieb. et Zucc. 459
buxifolium (Hance) Merr. 459
dunnianum Lévl. 460
myricoides Hemsl. 460
racemosum Sieb. et Zucc. 460
*stricatum* Hemsl. 459
Ditrichaceae 61
Ditrichum Hamp. 61
pallidum (Hedw.) Hamp. 61
Diuranthera Hemsl. 1377
major Hemsl. 1377
minor (C. H. Wright) Hemsl. 1377
*Dobinea Buch.* -Ham. ex D. Don 667
delavayi (Baill.) Baill. 667
Doclea Leach 1604
cvis (herbst) 1604
Docynia Decne. 506
delavayi (Franch.) Schneid. 507
indica (Wall.) Decne. 507
Dodartia L. 1134
orientalis L. 1134
*Dodonaea Mill.* 677
viscosa (L.) Jacq. 677
Doellingeria Nees 1288
marchandii (Lévl.) Ling 1288
scaber (Thunb.) Nees 1288
Dolichopetalum Tsiang 980
kwangsiense Tsiang 980
Dolichos L. 571
*catjang* Burm. f. 608
*erosus* L. 592
*gladiata* Jacq. 557
lablab L. 571
*lobatus* Willd. 597
*monianus* Lour. 597
*phaseoloides* Roxb. 597
*scorabaeoides* L. 552
*sesquipedalis* L. 608
tenuicaulis (Baker) Craib 571
*umbellata* Thunb. 608
*unguiculata* L. 608
Dolomiaea DC. 1289
berardioidea (Franch.) Shih 1289
denticulata (Ling) Shih 1289
edulis (Franch.) Shih 1289
*forrestii* (Diels) Shih 1289
souliei (Franch.) Shih 1289
var. mirabilis (Anth.) Shih 1289
Donacidae 1588
Donax Linnaeus 1588
dysoni Deshayes 1588
Donax Lour. 1516
canniformis (Forst.) Schum. 1516
Dontostemon Andrz. ex Ledeb. 451
dentatus (Bunge) Ledeb. 451
*Doraena japonica* Thunb. 907
*Dorcoceras hygrometrica* Bunge 1178
Doronicum L. 1290
altaicum Pall. 1290
stenoglossum Maxim. 1290
*wightii* DC. 1337
*Dorius perlarius* Lour. 908
Doryopteris J. Smith 95
concolor (Langsd. et Fisch.) Kuhn 95
Dosinia (Lamellidosinia) laminata (Reeve) 1587
(Phacosoma) biscocta (Reeve) 1587
(Phacosoma) japonica (Reeve) 1587
Draba L. 451
eriopoda Turcz. 452
ladyginii Pohle 452
nemorosa L. 452
oreades Schrenk 452
Dracaena Vand. ex L. 1404
angustifolia Roxb. 1404
cambodiana Pierre ex Gagnep. 1405
cochinchinensis (Lour.) S. C. Chen 1405
dreco L. 1405
*ensifolia* L. 1375
terniflora Roxb. 1405
Draco Linnaeus 1703

maculatus (Gray) 1703
Dracocephalum L. 1064
argunense Fisch. ex Link 1064
*biondianum* Diels 1072
bipinnatum Rupr. 1064
var. biflorum C. Y. Wu ex W. T. Wang 1064
var. brevilobum C. Y. Wu et W. T. Wang 1064
*cochinchinense* Lour. 1093
diversifolium Rupr. 1064
*fargesii* Lévl. 1086
grandiflorum L. 1064
*henryi* Hemsl. 1087
heterophyllum Benth. 1064
imberbe Bunge 1064
integrifolium Bunge 1064
var. albiflorum G. J. Liou 1065
moldavica L. 1065
nutans L. 1065
origanoides steph. ex Willd. 1064
palmatoides C. Y. Wu et W. T. Wang 1064
paulsenii Briq. 1064
peregrinum L. 1064
*radicans* Vaniot 1087
rupestre Hance 1065
ruyschiana L. 1065
taliense Forrest ex W. W. Smith 1065
tanguticum Maxim. 1065
thymiflorum L. 1064
*urticifolia* Miq. 1087
var. *pedunculata* Hemsl. 1087
*Dracontium foetidum* L. 1480
*spinosum* L. 1476
Dracontomelon Bl. 667
duperreanum Pierre 667
macrocarpum H. L. Li 668
Drawida gisti (Michaelsen) 1593
japonicus (Michaelsen) 1594
Dregea E. Mey. 980
*corrugata* Schneid. 980
sinensis Hemsl. 980
var. corrugata (Schneid.) Tsiang et P. T. Li 980
volubilis (L. f.) Benth. ex Hook. f. 981
Drejerella Lindau 1168
guttata (Brandegee) Bremek. 1168
Dremomys pernyi (Milne-Edwards) 1752
rufigenis (Blanford) 1752
Drosera L. 425
burmannii Vahl 425
indica L. 425
*lunata* Buch. -Ham. ex DC. 425
*makinoi* Masamune 425
peltata Smith var. glabrata Y. Z. Ruan 425
var. lunata (Buch. -Ham. ex DC.) C. B. Clarke 425
var. multisepala Y. Z. Ruan 425
rotundifolia L. 425
spathulata Labill. 425
*umbellata* Lour. 911
Droseraceae 425
Drymaria Willd. 242
cordata (L.) Willd. 242
Drymoglossum Presl 127
heterophyllum (C. Chr.) Ching 127
*microphyllum* (Presl) C. Chr. 128
piloselloides (L.) Presl 127
Drymotaenium Makino 127
miyoshianum (Makino) Makino 127
*Dryopteris elegans* Koidz. 105
Drynaria J. Smith 138
baronii (Christ) Diels 138
bonii Christ 138
delavayi Christ 138
fortunei (O. Kuntze) J. Smith 138
*fortunei* Moore 131
propinqua (Wall.) J. Smith 138
quercifolia (L.) J. Smith 139
Drynariaceae 138
Dryoathyrium Ching 102
boryanum (Willd.) Ching 102
okuboanum (Makino) Ching 102
Dryopteridaceae 113
Dryopteris Adans. 115
austriaca (Jacq.) Waynar ex Schinz et Thell. 115
barbigera (Moore) Kunze 115
bissetiana (Baker) C. Chr. 116
championii (Benth.) C. Chr. ex Ching 116
chrysochoma (Christ) C. Chr. 116
crassirhizoma Nakai 116
cycadina (Franch. et Sav.) C. Chr. 116
filix-mas (L.) Schott 116
var. *giraldii* Christ 117
fuscipes C. Chr. 116
*hwangshanensis* Ching 117
laborder (Christ) C. Chr. 117
lacera (Thunb.) Kunze 117
laeta (Kom.) C. Chr. 117
var. giraldii (Christ) Ching 117
*lakhimpurensis* Ros. 106
lepidopoda Hayata 117
marginata (Wall.) Christ 117
paleacea (Sw.) C. Chr. 118
peninsulae Kitag. 117
sinofibrillosa Ching 118
*stegnogramma* (Bl.) C. Chr. var. *cyrtomioides* C. Chr. 107
uniformis Makino 118
varia (L.) Kunze 118
*Dsmunda pilosa* Wall. 82
*Dubrenilia peploides* Gaud. 203
Dubyaea DC. 1290
atropurpures (Franch.) Stebb. 1290
Duchesnea J. E. Smith 507

chrysantha (Zoll. et Mor.) Miq. 507
indica (Andr.) Focke 507
Dugong Lacepede 1767
dugon Muller 1767
Dugongidae 1767
Dumasia L. 571
cordifolia Benth. ex Baker 571
forrestii Diels 571
villosa DC. 571
Dumortiera Nees 68
hirsuta (Sw.) Reinw., Bl. et Nees 68
Dunbaria Wight et Arn. 571
podocarpa Kurz 572
rotundifolia (Lour.) Merr. 572
villosa (Thunb.) Makino, 572
Dunnia Tutch. 994
sinensis Tutch. 994
Duranta L. 1049
repens L. 1050
Durio Adans. 747
zibethinus Murr. 747
Dynastidae 1623
Dynoides Barnard 1599
dentisinus Shen 1599
Dysophylla El-Gazzar et Watson ex Airy-shaw 1066
*auricularia* (L.) Bl. 1099
*benthamiana* Hance 1066
var. *intermedia* C. Y. Wu et Hsuan 1066
*communis* Coll. et Hemsl. 1067
*ianthina* Maxim. ex Kanitz 1068
sampsonii Hance 1066
stellata (Lour.) Benth. 1066
var. intermedia (C. Y. Wu et Hsuan) C. Y. Wu et H. W. Li 1066
yatabeana Makino 1066
Dysosma Woods. 364
aurantiocaulis (Hand. -Mazz.) Hu 364
chengii (Chien) Chen 364
difformis (Hemsl. et Wils.) T. H. Wang ex Ying 364
hispida (Hao) Chun 364
lichuanensis Z. Cheng 364
majorensis (Gagnep.) Ying 364
pleiantha (Hance) Woods. 364
veitchii (Hemsl. et Wils.) Fu et Ying 365
versipellis (Hance) M. Cheng ex Ying 365
Dysoxylum Bl. 660
hongkongense (Tutch.) Merr. 660
Dytiscidae 1619

## E

Earthmud 1791
Ebenaceae 926
Eberhardtia Lecomte 925
aurata (Pierre ex Dubard) Lecomte 925
Eccoilopus Steud. 1442
cotulifer (Thunb.) A. Camus 1442
Ecdysanthera Hook. et Arn. 963
*linearicarpum* Pierre 967
rosea Hook. et Arn. 963
utilis Hayata et Kawakami 963
Echelidae 1657
Echeneidae 1686
Echeneiformes
Echeneis Linnaeus 1686
naucrates (Linnaeus) 1686
Echinasteridae 1638
*Echinocarpus hemsleyana* Ito 733
*sinensis* Hance 733
Echinochloa Beauv. 1443
colonum (L.) Link 1443
crusgalli (L.) Beauv. 1443
var. cruspavonis (H. B. K.) Hitch. 1443
var. mitis (Pursh) Peterm. 1443
var. zelayensis (H. B. K.) Hitch. 1443
Echinodermata 1636
Echinoidea 1639
Echinometridae 1639
*Echinopanax elatus* Nakai 841
Echinops L. 1290
*dahuricus* Fisch. 1291
gmelini Turcz. 1290
grijsii Hance 1290
integrifolius Kar. et Kir. 1291
latifolius Tausch 1291
nannus Bunge 1291
ritro L. 1291
tricholepis Schrenk 1291
*turczaninovii* Ledeb. ex Turcz. 1290
Echinopsis Zucc. 262
multiplex Zucc. 262
*Echinospermum consanguinea* Fisch. et Mey. 1036
*heteracantha* Ledeb. 1036
*Echites scholaris* L. 959
Ecklonia Hornem. 10
kurome Okam. 10
Eclipta L. 1291
*alba* (L.) Hassk. 1292
prostrata (L.) L. 1292
Edgeworthia Meissn. 755
chrysantha Lindl. 755
gardneri (Wall.) Meissn. 755
*papyrifera* Sieb. et Zucc. 755
Egretta Forster 1714
alba (Linnaeus) 1715
garzetta (Linnaeus) 1715
intermedia (Wagler) 1715
sacra (Gmelin) 1715
Ehretia L. 1034
*acuminata* R. Br. var. *obovata* (Lindl.) Johnston 1035
corylifolia C. H. Wright 1034

*dicksoni* Hance 1035
longiflora Champ. 1035
macrophylla Wall. ex Roxb. 1035
var. glabrescens (Nakai) Y. L. Liu 1035
*microphylla* Lam. 1035
thyrsiflora (Sieb. et Zucc.) Nakai 1035
tsangii Johnston 1035
Eichhornia Kunth 1416
crassipes (Mart.) Solms 1416
Eisenia Malm 1594
foetida (Savigny) 1594
Elaeagnaceae 758
Elaeagnus L. 758
angustifolia L. 758
var. orientalis (L.) O. Kuntze 758
argyi Lévl. 758
bockii Diels 758
conferta Roxb. 758
courtoisii Belval 758
*cuprea* Rehd. 759
difficilis Serv. 759
glabra Thunb. 759
gonyanthes Benth. 759
henryi Warb. 759
lanceolata Warb. 759
loureirii Champ. 759
macrantha Rehd. 759
macrophylla Thunb. 760
magna (Serv.) Rehd. 759
moorcroftii Wall. ex Schlecht. 758
multiflora Thunb. 760
var. *crispa* (Thunb.) Maxim. 760
var. tenuipes C. Y. Chang 760
oldhami Maxim. 760
oxycarpa wall. ex Schlecht. 758
pungens Thunb. 760
sarmentosa Rehd. 760
soongarica (Bernh. ex Schlecht.) Schlecht. 758
stellipila Rehd. 760
umbellata Thunb. 761
subsp. *magna* Serv. 759
viridis Serv. 761
var. delavayi Lecomte 761
wushanensis C. Y. Chang 761
Elaeis Jacq. 1463
guineensis Jacq. 1463
Elaeocarpaceae 732
Elaeocarpus L. 732
chinensis (Gardn. et Champ.) Hook. f. 732
duclouxii Gagnep. 733
serratus Benth. 733
syvestris (Lour.) Poir. 733
*Elaeodendron fortunei* Turcz. 696
Elaphe Fitzinger 1707
bimaculata Schmidt 1708
carinata (Güenther) 1707
davidi (Sauvage) 1708
dione (Pallas) 1708
frenata (Gray) 1708
mandarina (Cantor) 1708
moellendorffi (Boettger) 1708
porphyracea (Cantor) 1708
radiata (Schlegel) 1708
rufodorsata (Cantor) 1708
schrenckii (Strauch) 1708
taeniura Cope 1708
Elaphoglossaceae 123
Elaphoglossum Schott 123
lancifolium Ching 123
yoshinagae (Yatabe) Makino 123
Elaphurus Milne-Edwards 1772
davidianus Milne-Edwards 1772
Elapidae 1709
Elateridae 1620
Elatinaceae 777
Elatostema Forst. 195
*bodinieri* (Lévl.) Hand. -Mazz. 196
brachyodontum (Hand. -Mazz.) W. T. Wang 196
*ficoides* Wedd. var. *brachyodontum* Hand. -Mazz. 196
herbaceifolium Hayata 196
ichangese H. Schröter 196
involucratum Franch. et Sav. 196
lineolatum Wight. var. majus Wedd. 196
macintyrei Dunn 196
monandrum (D. Don) Hara 196
myrtillus (Lévl.) Hand. -Mazz. 196
oblongifolium Fu ex W. T. Wang 196
obtusum Wedd. 197
parvum (Bl.) Miq. 197
platyphyllum Wedd. 197
schizocephallum W. T. Wang 197
*sessile* Forst. var. *cuspidatum* (Wight) Wedd. 196
stewardii Merr. 197
stiplosum Hand. -Mazz. 197
*stracheyanum* Wedd. 197
sublineare W. T. Wang 197
*surculosum* Wight 196
tricocarpum Hand. -Mazz. 197
*umbellatum* (Sieb. et Zucc.) Bl. var. *majus* Maxim. 196
Eleocharis R. Br. 1491
dulcis (Burm. f.) Trin. ex Henschel 1492
equisetina L. et Presl 1492
ovata (Roth) Roem. et Schult. 1492
pauciflora (Lightf.) Link 1492
pellucida Presl 1492
tetraquetra Nees 1492
*tuberosa* Schult. 1492
yokoscensis (Franch. et Sav.) Tang et Wang 1492

Eleotridae 1683
Elephantidae 1768
Elephantopus L. 1292
*bodinieri* Gagnep. 1292
scaber L. 1292
tomentosus L. 1292
Elephas Linnaeus 1768
maximus Linnaeus 1768
Eleusine Gaertn. 1443
coracana (L.) Gaertn. 1443
indica (L.) Gaertn. 1443
Eleutherine Herb. 1418
*amaricana* Merr. ex Heyne 1418
plicata Herb. 1418
*Eleutherococcus henryi* Oliv. 833
*leucorrhizus* Oliv. 833
*melanocarpo* Lévl. 837
Eleutheronema Bleeker 1674
tetradactylum (Shaw) 1674
*Elichrysum nepalensis* Spreng. 1246
Ellisiophyllum Maxim. 1134
pinnatum (Wall.)Makino 1134
Ellochelon vaigiensis (Quoy et Gaimard) 1674
Elopichthys Bleeker 1660
bambusa (Richardson) 1660
Elsholtzia Willd. 1066
argyi Lévl. 1066
blanda Benth. 1066
bodinieri Vaniot 1067
*calycocarpa* Diels 1068
ciliata (Thunb.) Hyland. 1067
var. duplicato-crenata C. Y. Wu et S. C. Huang 1067
var. ramosa (Nakai) C. Y. Wu et H. W. Li 1067
communis (Coll. et Hemsl.) Diels 1067
*cristata* Willd. 1067
f. *saxatilis* Kom. 1070
cypriani (Pavol.) S. Chow ex Hsu 1067
densa Benth. 1067
var. calycocarpa (Diels) C. Y. Wu et S. C. Huang 1068
var. ianthina (Maxim. ex Kanitz) C. Y. Wu et S. C. Huang 1068
eriostachya Benth. 1068
feddei Lévl. 1068
f. remotibracteata C. Y. Wu et S. C. Huang 1068
flava (Benth.) Benth. 1068
fruticosa (D. Don) Rehd. 1069
*haichowensis* Sun ex C. H. Hu 1070
heterophylla Diels 1069
hunanensis Hand.-Mazz. 1069
*ianthina* (Maxim. ex Kanitz) Dunn 1068
kachinensis Prain 1069
longidentata Schneid.
*lungtangensis* Sun ex C. H. Hu 1070
luteola Diels 1069
myosurus Dunn 1069
penduliflora W. W. Smith 1069
rugulosa Hemsl. 1070
saxatilis (Kom.) Nakai ex Kitag. 1070
souliei Lévl. 1070
splendens Nakai ex Mackawa 1070
stachyoides (Link) C. Y. Wu 1070
stauntonii Benth. 1070
strobilifera (Benth.) Benth. 1070
winitiana Craib 1071
Emballonuridae 1748
Embelia Burm. f. 905
laeta (L.) Mez 905
longifolia (Benth.) Hemsl. 905
*nagushia* D. Don var. *subcoriacea* C. B. Clarke 907
oblongifolia Hemsl. 906
parviflora Wall. ex A. DC. 906
pauciflora Diels 906
procumbens Hemsl. 906
ribes Burm. f. 906
var. pachyphylla Chun ex C. Y. Wu et C. Chen 906
*rubrinervis* Lévl. 711
rudis Hand.-Mazz. 906
scandens (Lour.) Mez 906
subcoriacea (C. B. Clarke) Mez 907
vestita Roxb. 907
Emberiza Linnaeus 1775
aureola Pallas 1775
elegans Temminck 1775
spodocephala Pallas 1775
Emilia Cass. 1292
prenanthoides DC. 1292
sonchifolia (L.) Moench 1292
Emmenopterys Oliv. 994
henryi Oliv. 994
Emydidae 1669
Enchelyopus Gronow 1681
elongatus Kner 1681
Endarachne J. Ag. 9
binghamiae J. Ag. 9
Endocladiaceae 14
Endospermum Benth. 625
chinense Benth. 625
Engelhardia Leschen. ex Bl. 160
*chrysolepis* Hance 160
colebrookiana Lindl. ex Wall. 160
fenzelii Merr. 160
roxburghiana Wall. 160
Englerpmyces P. Henn. 21
goetzii P. Henn. 21
Engraulidae 1652
Engraulis Cuvier 1653
japonicus Temminck et Schlegel 1653
Enhydris chinensis (Gray) 1708
plumbea Boie 1708
Enkianthus Lour. 884

chinensis Franch. 885
deflexus (Griff.) Schneid. 885
var. *variegatus* Forrest 885
*himalaicum* Hook. f. et Thoms. 885
var. *chinensis* (Franch.) Diels 885
*leveilleanus* Craib 885
*quinqueflorus* Lour. var. *serrulatus* Wils. 885
serrulatus (Wils.) Schneid. 885
Ensete Bruce ex Horan. 1499
glaucum (Roxb.) Cheesm. 1499
Entada Adans. 572
phaseoloides (L.) Merr. 572
*scandens* (L.) Benth. 572
Entechinus doriae (Boulenger) 1708
mojor (Güenther) 1707
Enterolobium Mart. 572
contortisiliquum (Vell.) Morong 572
cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 572
Enteromorpha (Link) Ag. 5
clathrata (Roth) Grev. 5
compressa (L.) Grev. 6
flexuosa (Wulf.) J. Ag. 6
intestinalis (L.) Grev. 6
linza (L.) J. Ag. 6
prolifera (C. Muell.) J. Ag. 6
tubulosa Kutz. 6
Entodon C. Muell. 66
compressus (Hedw.) C. Muell. 66
Entodontaceae 66
Eomecon Hance 439
chionantha Hance 439
Eonycteris spelaea Dobson 1748
Eophona Gould 1745
migratoria Hartert 1745
personata (Temminck et Schlegel) 1745
Eopsetta grigorjewi (Herzenstein) 1690
Epaltes Cass. 1293
australis Less. 1293
Ephedra Tourn. ex L. 156
equisetina Bunge 156
fedtshenkoae Pauls. 157
gerardiana Wall. 157
var. congesta C. Y. Cheng 157
intermedia Schrenk ex Mey. 156
var. tibetica Stapf 156
likiangensis Florin
f. mairei Florin 157
minuta Florin 157
monosperma Gmel. ex Mey. 157
przewalskii Stapf 156
var. kaschgarica (Fedtsch. et Bobr.) C. Y. Cheng 156
regeliana Florin 157
saxatilis Royle ex Florin 157
sinica Stapf 156
Ephedraceae 156
Ephemerantha P. F. Hunt et Summerh. 1537
fimbriata (Bl.) P.F. Hunt et Summerh. 1537
lonchophylla (Hook. f.) P. F. Hunt et Summerh. 1537
Epicauta Radtenbacher 1621
apicipenni Tan 1621
aptera (Kaszab) 1621
chinensis Laporte 1621
gorhami Marseul 1621
hirticornis Haag-Rutenberg 1621
impressicornis Pic 1621
megalocephala Gebler 1621
taishoensis Lewis 1621
tentusi (Kaszab) 1621
tibialis Waterhouse 1621
ruficeps Illigor 1621
waterhousei Haag-Rutenberg 1621
Epidendrum *ensifolium* L. 1528
*moniliforme* L. 1535
*myosurus* Forst. f. 1551
*pendulum* Roxb. 1529
*sinense* Andr. 1529
Epigeneium Gagnep. 1537
fargesii (Finet) Gagnep. 1537
Epigynum Wight 964
auritum (Schneid) Tsiang et P. T. Li 964
Epilobium L. 820
adnatum Griseb. 820
alpinum L. 820
amurense Hausskn. 820
*angustifolium* L. 818
var. *pubescens* Hausskn. 818
brevifolium D. Don subsp. trichoneurum (Hausskn.) Raven. 820
cephalostigma Hausskn. 820
cylindricum D. Don 821
fastigiato-ramosum Nakai 821
*himalayanense* Hausskn. 821
hirsutum L. 820
*latifolium* L. 818
minutiflorum Hausskn. 821
nervosum Boiss. et Buhe 821
palustre L. 821
parviflorum Schreb 821
platystigmatosum C. B. Robins 821
propinquum Hausskn. 821
pyritchophum Franch. et Sav. 821
royleanum Hausskn. 821
*tianschanicum* Pavl. 821
*trichaneurum* Hausskn. 820
velutinum Nevski 821
wallichianum Hausskn. 821
Epimedium L. 365
acuminatum Franch. 365
brevicornum Maxim. 365
davidii Franch. 365
var. *hunanense* Hand. -Mazz. 366
elongatum Kom. 366
fargesii Franch. 366

nunanense (Hand.-Mazz.) Hand.-Mazz. 366
*komarovi* Lévl. 365
koreanum Nakai 366
leptorrhizum Stearn 366
membranaceum K. Mey. 365
platypetalum K. Mey. 365
pubescens Maxim. 366
*rotundatum* Hao 365
sagittatum (Sieb. et Zucc.) Maxim. 366
simplicifolium T. S. Ying 367
sutchuense Franch. 367
wushanense T. S. Ying 367
Epimeredi Adans. 1071
indica (L.) Rothm. 1071
Epinephelus Bloch 1675
amblycephalus (Bleeker) 1675
areolatus (Forskal) 1675
awoara (Temminck et Schlegel) 1675
bleekeri (Vaillant et Bocourt) 1675
chlorostigma (Cuvier et Valenciennes) 1675
fario (Thunberg) 1675
malabaricus (Bloch et Schneider) 1675
megachir (Richardson) 1675
moara (Temminck et Schlegel) 1675
Epipactis Zinn. 1537
helleborine (L.) Crantz 1537
mairei Schltr. 1537
papillosa Franch. 1538
*setschuanica* Ames et Schltr. 1537
Epiphyllum Haw. 262
oxypetalum (DC.) Haw. 262
*truncatum* Haw. 264
Epipogium Gmel. et Borkh. 1538
aphyllum Sw. 1538
*Epipremnopsis hainaensis* Ting et Wu ex H. Li 1468
*sinensis* (Engl.) H. Li 1468
Epipremnum Schott 1475
pinnatum (L.) Engl. 1475
Eptesicus nilssoni Keyserling et Blasius 1747
serotinus (Schreber) 1747
Equidae 1768
Equisetaceae 76
Equisetum L. 76
arvense L. 76
*debile* Roxb. 77
diffusum D. Don 76
*hiemale* L. 77
palustre L. 77
pratense Ehrh. 77
*ramosissimum* Desf. 77
sylvaticum L. 77
Equus Linnaeus 1768
asinus Linnaeus 1768
asinus × Equus caballus 1769
caballus Linnaeus 1768
hemionus Pallas 1768
przewalskii Poliakov 1769
Eragrostis Beauv. 1443
atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. 1443
cilianensis (All.) Link ex Vign.-Lut. 1443
ferruginea (Thunb.) Beauv. 1444
*megastachya* Link 1443
nevinii Hance 1444
nigra Nees ex Steud. 1444
perennans Keng 1444
pilosa (L.) Beauv. 1444
var. imberbis Franch. 1444
poaeoides Beauv. 1444
tenella (L.) Beauv. ex Roem. et Schult. 1444
Eranthemum L. 1168
austrosinensis H. S. Lo 1168
*nervosum* (Vahl) R. Br. 1168
*polyanthum* C. B. Clarke 1172
pulchellum Andr. 1168
Erechtites Raf. 1293
hieracifolia (L.) Raf. ex DC. 1293
Eremias Wiegmann 1705
argus Peters 1705
brenchleyi Guenther 1705
multiocellata (Guenther) 1705
Eremochloa Büese 1444
ophiuroides (Munro) Hack. 1444
Eremurus M. Bieb. 1377
chinensis O. Fedtsch. 1377
Eretmochelys Fitzinger 1701
imbricata (Linnaeus) 1701
Eria Lindl. 1538
*ambrosia* Hance 1520
corneri Reichb. f. 1538
coronaria (Lindl.) Reichb. f. 1538
excavata Lindl. 1538
graminifolia Lindl. 1538
pannea Lindl. 1538
szetschuanica Schltr. 1539
*Erianthera laxiflora* Bl. 1165
Erianthus Michx. 1445
rufipius (Steud.) Griseb. 1445
Ericaceae 883
*Ericala loureirii* G. Don 950
Ericerus Chavannes 1617
pela (Chavannes) 1617
Erigeron L. 1293
acer L. 1293
*alasum* D. Don 1310
annuus (L.) Pers. 1293
*bonariensis* L. 1280
breviscapus (Vant.) Hand.-Mazz. 1294
*canadensis* L. 1280
*consanguineus* Kitam. 1294
*crispus* Pourr. 1280
*dielsii* Lévl. 1294
elongatus Ledeb. 1294
*Heterophyllus* Muhl. ex Willd. 1293

*hieracifolia* D. Don 1167
*japonicum* Thunb. 1280
*kamtschaticus* DC. var. *hirsuta* Ling 1293
komarovii Botsch. 1294
*leucantha* D. Don 1280
*linifolius* Willd. 1280
*mollis* D. Don 1268
multifolius Hand. -Mazz. 1294
multiradiatus (Lindl.) Benth. 1294
var. *platyphyllus* Franch. ex Lévl. 1294
*sumatrensis* Retz. 1280
Erinaceidae 1745
Erinaceus Linnaeus 1745
*europaeus* Linnaeus 1746
hughi Thomas 1746
Eriobotrya Lindl. 507
cavaleriei (Lévl.) Rehd. 507
deflexa (Hemsl.) Nakai 507
japonica (Thunb.) Lindl. 507
salwinensis Hand. -Mazz. 508
Eriocaulaceae 1432
Eriocaulon L. 1432
*alpestre* Hook. f. et Thoms. var. *robustius* Maxim. 1433
australe R. Br. 1432
buergerianum Koern. 1432
critatum Mart. var. mackii Hook. f. 1432
decemflorum Maxim. 1432
heteroanthum Benth. 1432
luzulifolium Mart. 1433
robustius (Maxim.) Makino 1433
sexangulare L. 1433
sieboldianum Sieb. et Zucc. ex Steud. 1433
*wallichianum* Mart. 1433
yaoshanense Ruhl. 1433
Eriochier de Haan 1606
japonicus de Haan 1606
sinensis H. Milne Edwards 1606
Eriochloa Kunth 1445
villosa (Thunb.) Kunth 1445
Erioglossum Bl. 677
rubiginosum (Roxb.) Bl. 677
Eriolaena DC. 747
kwangsiensis Hand. -Mazz. 747
*malvacea* (Lévl.) Hand. -Mazz. 748
spectabilis (DC.) Planch. ex Mast. 748
Erionota Mabille 1630
thrax (Linnaeus) 1630
Eriophorum L. 1492
comosum (Wall.) Nees 1492
vaginatum L. 1492
Eriophyton Benth. 1071
wallichii Benth. 1071
Eriosema G. Don. 573
chinense Vog. 573
himalaicum Ohashi 573
Erisolena Bl. 755
*composita* (L. f.) Van Tieghem 755
*involucrata* (Wall.) Van Tieghem 755
Eristalis Latreille 1632
tenax (Linnaeus) 1632
Eritrichium Schrad. 1035
*microcarpum* A. DC. 1040
rupestre (Pall.) Bunge 1035
Erodium L' Hérit. 611
hoefftianum Mey. 611
stephanianum Willd. 611
tibetanum Edgew. 611
Erosaria Troschel 1574
caputserpentis (Linnaeus) 1574
erosa (Linnaeus) 1574
miliaris (Gmelin) 1574
Erronea Troschel 1574
errones (Linnaeus) 1574
pulchella (Swainson) 1574
Eruca Mill. 452
sativa Mill. 452
Ervatamia (A. DC.) Stapf 964
divaricata (L.) Burk. 964
cv. Gouyahua 964
hainanensis Tsiang 964
kwangsiensis Tsiang 964
kweichowensis Tsiang 964
officinalis Tsiang 965
*Ervum hirsutum* L. 606
*tetraspermum* L. 607
Erycibe Roxb. 1027
elliptilimba Merr. et Chun 1027
obtusifolia Benth. 1027
schmidtii Craib 1027
Eryngium L. 860
foetidum L. 860
planum L. 860
Erysimum L. 452
*altaicum* C. A. Mey. 453
*amerensis* Kitag. subsp. *bunge* Kitag. 452
bungei (Kitag.) Kitag. 452
cheiranthoides L. 452
diffusum Ehrh. 453
flavum (Georgi) Bobrov 453
*Erythraea meyeri* Bunge 946
*ramosissima* var. *altaica* Griseb. 946
Erythrina L. 573
arborescens Roxb. 573
corallodendron L. 573
var. *orientalis* L. 573
lithosperum Bl. ex Miq. 573
orientalis (L.) Murr. 573
*variegata* L. var. *orientalis* (L.) Merr. 573
*Erythrochaeta dentata* A. Gray 1315
*Erythrochilus indicum* Reinw. ex Bl. 623
Erythroculter Berg 1660
dabryi (Bleeker) 1660
ilishaeformis (Bleeker) 1660
mongolicus (Basilewsky) 1660
oxycephaloides (Kreyenbery et Pappenheim)

1660
oxycephalus (Bleeker) 1660
Erythropalum Bl. 208
scandens Bl. 208
*Erythrospermum hypoleucum* Oliv. 692
*Erythrostaphyle vitiginea* Hance 708
Erythroxylum P. Br. 618
coca Lam. 618
kunthianum (Wall.) Kurz. 618
Erythroxylaceae 618
Eryx Daudin 1706
miliaris (Pallas) 1706
Eschrichtiidae 1757
Eschrichtius Gray 1757
gibbosus (Erxleben) 1757
Eschscholzia Cham. 439
californica Cham. 439
*Etaeria moulmeinensis* Parish et Reichb. f. 1518
Ethulia L. 1294
*angustifolia* Bojer ex DC. 1294
*auriculata* Thunb. 1287
conyzoides L. 1294
*Euaraliopsis ciliata* (Dunn) Hutch. 837
*fatsioides* (Harms) Hutch. 837
*ferruginea* (Li) Hoo et Tseng 838
Eubalaena Gray 1757
glacialis (Borowski) 1757
Eucalyptus L'Hérit. 802
camaldulensis Dehnh. 802
citriodora Hook. f. 803
exserta F. Muell. 803
globulus Labill. 803
polyanthemos Schaue 803
robusta smith 803
tereticornis Smith 803
viminalis Labill. 803
Eucheuma J. Ag. 16
edule Kütz. 16
gelatinae (Esper) J. Ag. 16
muricatum (Gmel.) Web. v. Bos. 16
okamurai Yamada 16
Euchiloglanis davidi (Sauvage) 1670
Euchresta Benn. 573
*tenuifolia* Hemsl. 585
trifoliolata Merr. 573
tubulosa Dunn 574
Eucommia Oliv. 183
ulmoides Oliv. 183
Eucommiaceae 183
Eugenia L. 803
*aromatica* Baill. 803
*bullockii* Hance 805
caryophyllata Thunb. 803
*esquirolii* Lévl. 802
*fruticosa* Roxb. 805
*gracilentum* Hance 802
*grijsii* Hance 805
*jambos* L. 805
*laosensis* Gagnep. var. *quocensis* Gagnep. 806
*operculatus* Roxb. 802
Euhadra moreletiana (Heude) 1580
Eulaliopsis Honda 1445
binata (Retz.) C. E. Hubb. 1445
Eulophia R. Br. ex Lindl. 1539
*campestris* Lindl. 1539
dubia (D. Don) Hochr. 1539
*faberi* Rolfe 1539
*sinensis* Miq. 1539
Eumeces Wiegmann 1705
chinensis (Gray) 1705
elegans Boulenger 1705
xanthi Guenther 1705
Eumenidae 1633
Eunicidae 1592
Euonymus L. 694
acanthocarpus Franch. 694
var. longipes (Loes.) Blakel. 694
var. scandens (Loes.) Blakel. 694
var. sutchuanensis Franch. ex Loes. 694
aculeatus Hemsl. 694
alatus (Thunb.) Sieb. 694
augustatus Sprague 695
aquifolius Loes. et Rehd. 695
bungeanus Maxim. 695
var semipersistens (Rehd.) Schneid. 695
carnosus Hemsl. 695
centidens Lévl. 695
chinensis Lindl. 695
var. *microcarpus* Oliv. 698
cornutus Hemsl. 696
dielsianus Loes. 695
*europaea* L. var. *hamiltoniana* Maxim. 697
euscaphis Hand. -Mazz. 696
*decorus* W. W. Smith 700
fedei Lévl. 700
fortunei (Turcz.) Hand. -Mazz. 696
var. elongatus Cowan 696
frigidus Wall. 696
var. wardii (W. W. Smith) Blakel. 696
giraldii Loes. 696
grandiflorus Wall. 696
var. salicifolius Stapf et Ballard 696
hamiltonianus Wall. 697
f. koehneanus (Loes.) Blakel. 697
f. lanceifolius (Loes.) C. Y. Cheng 697
var. yedoensis (Koch.) Blakel. 697
hederaceus Champ. ex Benth. 697
japonicus L. 697
var. albo-marginata T. Moore ex Rehd. 697
kiautschovicus Loes. 697
*lanceifolius* Loes. 697

*lawsonii* Clarke var. *salicifolius* (Loes.) Blakel. 697
laxiflorus Champ. 698
leclerii Lévl. 698
linearifolia Franch. 698
maackii Rupr. 695
microcarpus (Oliv.) Sprague 698
mupinensis Loes. et Rehd. 700
myrianthus Hemsl. 698
nanus Bieb. 698
oblogifolius Loes. et Rehd. 698
orgyalis W. W. Smith 698
oxyphylla Miq. 699
phellomanus Loes. 699
porphyreus Loes. 699
przewalskii Maxim. 699
*radicans* Sieb. 696
sacrosancta Koidz. 695
*salicifolia* Loes. 697
schensianus Maxim. 699
semenovii Kegel et Hard. 699
subsessilis Sprague 699
tengyuehensis W. W. Smith 699
*thesifolium* Wall. var. *scandens* Loes. 694
tingens Wall. 700
vagans Wall. 700
viburnoides Prain 700
virens C. Y. Wu 700
wilsonii Sprague 700
*yedoensis* Koch. 697
yunnanensis Franch. 700
Eupatorium L. 1295
*asperum* Roxb. 1352
*caespitosum* Miq. 1295
cannabinum L. 1295
chinense L. 1295
var. *simplicifolium* (Makino) Kitam. 1295
*crenatifolium* Hand. -Mazz. 1295
fortunei Turcz. 1295
var. *triparticum* (Makino) Nakai 1296
heterophyllum DC. 1295
japonicum Thunb. 1295
var. triparticum Makino 1296
*kirilowii* Turcz. 1296
lindleyanum DC. 1296
var. *trifoliatum* Makino 1296
nanchuanense Ling et Shih 1296
*nudiflorum* wall. 1295
odoratum L. 1296
*rebaudianum* Bertoni 1345
*reevesii* Wall. 1295
*stoechadosmum* Hance 1295
*wallichii* DC. 1295
var. *heterophyllum* (DC.) Diels 1295
Euphorbia L. 625
antiquorum L. 625
chrysocoma Lévl. et Vant. 626
var. glaucophylla Lévl. et Vant. 626
cyanophylla Lévl. 626
ebracteolata Hayata 626
*erythraea* Hemsl. 627
esula L. 626
var. cyparissioides Boiss. 626
var. latifolia Ledeb. 626
*fischeriana* Steud. 629
henryi Hemsl. 626
helioscopia L. 626
*heterophylla* L. 627
hippocrepica Hemsl. 627
hirta L. 627
humifusa Willd. 627
var. *pilosa* Thell. 627
hylonoma Hand. -Mazz. 627
hypericifolia L. 627
*indica* Lam. 627
jolkini Boiss. 627
*kaleniczenkii* Czern. ex Trautv. 626
kansui Liou ex S. B. Ho 628
koziovii Prokh. 628
lathyris L. 628
*longan* (Lour.) Steud. 676
*lucidissima* Lévl. et Vant. 946
lucorum Rupr. 628
*lunulata* Bunge 626
luticola Hand. -Mazz. 628
maculata L. 628
mandshurica Maxim. 629
marginata Pursh. 628
*megistopoda* Diels 630
microphylla Heyne 629
milii Ch. des Moul. 629
nematocypha Hand. -Mazz. 629
var. induta Hand. -Mazz. 629
neriifolia L. 629
pallasii Turcz. 629
f. pilosa (Regel) Kitag. 629
var. przewar alskii (Prokh.) Y. C. Chu 629
pekinensis Rupr. 629
peplus L. 629
prolifera Buch. -Ham. ex D. Don 630
prostrata Ait. 630
pulcherrima Willd. ex Klotzsch. 630
rothiana Spreng. 630
serico carpa Hand. -Mazz. 630
sessiliflora Roxb. 630
sieboldiana Morr. et Decne. 630
soongarica Boiss. 629
subsp. lamprocarpa (Prokh.) Prokh. 629
sororia Schrenk 630
stracheyi Boiss. 630
thymifolia L. 631
tirucalli L. 631
*tithymaloides* L. 636

Euphorbiaceae 618
Euphrasia L. 1134
*maximowiczii* Wettst 1134
var. *simplex* Freyn 1134
pectinata Ten. 1134
subsp. simplex (Freyn) Hong 1134
regelii Wettst. 1134
*serotina* Lam. 1141
*tatarica* Fisch. ex Spreng. 1134
Eupolyphaga Chopard 1611
sinensis (Walker) 1611
Euptelea Sieb. et Zucc. 300
pleiospermum Hook. f. et Thoms. 300
Eupteleaceae 300
Euroleon Esben-Petersen 1626
sinicus (Navas) 1626
Euroscaptor Milne-Edwards 1746
longirostris Milne-Edwards 1746
*Eurotia ceratoides* (L.) C. A. Mey. 253
Eurotiaceae 19
Eurya Thunb. 414
acutisepala Hu et L. K. Ling 415
alata Kobuski 415
aurea (Lévl.) Hu et L. K. Ling 415
auriformis H. T. Chang 415
brevistyla Kobuski 415
chinensis R. Br. 415
ciliata Merr. 415
distchophylla Hemsl. 415
distichs Chun 415
groffii Merr. 416
handel-mazzettii H. T. Chang 416
hebeclados L. K. Ling 416
impressinervis Kobuski 416
japonica Thunb. 416
kweichowensis Hu et L. K. Ling 416
loquaiana Dunn 416
macartheyi Champ. 416
muricata Dunn 416
nitida Korth. 416
obtusifolia H. T. Chang 417
*patentipila* Chun 415
rubiginosa Chang var. attenuata Chang 417
stenophylla Merr. 417
terragonoclada Merr. et Chun 417
weissiae Chun 417
Euryale Salisb. ex DC. 385
ferox Salisb. 385
Eurysolen Prain 1071
gracilis Prain 1071
*Eurythalia pedunculata* Royle ex D. Don 947
Euscaphis Sieb. et Zucc. 703
fukienensis P. S. Hsu 703
*konishii* Hayata 703
japonica (Thunb.) Dippel 703
Evodia J. R. et G. Forst. 646
austrosinensis Hand. -Mazz. 646
baberi Rehd. et Wils. 646
*bodinieri* Dode 647
calcicola Huang 646
daniellii (Benn.) Hemsl. 647
fargesii Dode 647
lenticellata Huang 647
lepta (Spreng.) Merr. 647
meliaefolia (Hance) Benth. 647
rutaecarpa (Juss.) Benth 647
var. bodiniei (Dode) Huang 647
f. meionocarpa (Hand. -Mazz.) Huang 647
var. officinalis (Dode) Huang 647
trichotoma (Lour.) Pierre 648
var. pubescens Huang 648
Evolvulus L. 1027
alsinoides (L.) L. 1027
var. decumbens (R. Br.) V. Oostr. 1027
*decumbens* R. Br. 1027
*hederaceus* Burm. f. 1092
*Evonymus chinensis* Lour. 784
Exacum L. 947
tetragonum Roxb. 948
Exbucklandia R. W. Br. 460
populnea (R. Br.) R. W. Br. 460
Excoecaria L. 631
acerifolia F. Didrich 631
agallocha L. 631
var. cuspidata Muell. -Arg. 631
cochinchinensis Lour. 631
var. viridis (Pax et Hoffm.) Merr. 631
venenata S. Lee et F. N. Wei 631
Exochorda Lindl. 508
*grandiflora* Lindl. 508
racemosa (Lindl.) Rehd. 508
Exocoetidae 1671

## F

Faberja Hemsl. 1296
sinensis Hemsl. 1296
Fagaceae 171
*Fagara avicennae* Lam. 653
*nitidum* Roxb. 655
Fagopyrum Mill. 219
*cymosum* (Trev.) Meissn. 219
dibotrys (D. Don) Hara 219
esculentum Moench 219
gracilipes (Hemsl.) Damm. 219
tataricum (L.) Gaertn. 219
Fagraea Thunb. 944
ceilanica Thunb. 944
Fagus L. 174
engleriana Seem. 174
longipetiolata Seem. 174
*Fallopia aubertii* (L. Henry) Holub 221
*multiflora* (Thunb.) Haraldson 227

Farfugium Lindl. 1296
japonicum (L.) Kitam. 1296
Fargesia Franch. 1445
spathacea Franch. 1445
Fatoua Gaud. 185
*pilosa* Gaud. 185
villosa (Thunb.) Nakai 185
Fatsia Decne. et Planch. 839
japonica (Thunb.) Decne. et Planch. 839
Favolus alveolaris (Bosc ex Fr.) Quél. 29
*Fedia intermedia* (Vahl) Horn. 1216
*rupestris* (Pall.) Juss. var. *intermedia* Vahl 1216
Felidae 1765
Felis Linnaeus 1765
bengalensis Kerr 1765
Catus Linnaeus 1765
Ferrum 1781
Ferula L. 860
bungeana Kitag. 860
caspica Marsh.-Bieb. 861
conocaula Korov. 861
ferulaeides (Steud.) Korov. 861
fukanensis K. M. Shen 861
krylovii Korov. 861
olivacea (Diels) Wolff ex Hand.-Mazz. 861
sinkiangensis K. M. Shen 861
songorica Pall. ex Spreng. 861
teterrima Kar. et Kir. 861
Fibraurea Lour. 377
recisa Pierre 377
Fibroferrium 1782
*Ficaria glacialis* Fisch. 342
Ficus L. 185
abelii Miq. 185
altissima Bl. 186
beecheyana Hook. et Arn. 186
benjamina L. 186
carica L. 186
*comata* Hand.-Mazz. 186
concinna Miq. 186
*erecta* Thunb. var. *beecheyana* (Hook. et Arn.) Hook. et Arn. 186
formosana Maxim. 187
*fovealata* Wall. var. *henryi* King 189
fulva Reinw. 186
*gasperiniana* Miq. var. *laceratifolia* (Lévl. et Vant.) Corner 187
var. viridescens (Lévl. et Vant.) Corner 186
*gibbosa* Bl. 189
harlandi Benth. 187
henryi Warb. 187
heteromorpha Hemsl. 187
hirta Vahl 187
hispida L. f. 187
*impressa* Champ. ex Benth. 189
laceratifolia Lévl. et Vant. 187
*lacrymens* Lévl. 189
*martinii* Lévl. et Vant. 189
microcarpa L. f. 188
pandurata Hance 188
var. angustifolia Cheng 188
var. holophylla Migo 188
*parvifolia* Miq. 186
pumila L. 188
*pyrifolia* Burm. f. 522
pyriformis Hook. et Arn. 188
religiosa L. 189
sarmentosa Buch.-Ham. ex J. E. Smith var. henryi (King) Corner 189
var. impressa (Champ.) Corner 189
var. lacrymens (Lévl.) Corner 189
*simplicissima* Lour. var. *hirta* (Vahl) Migo 187
*stenophylla* Hemsl. 188
*taiwanensis* Maxim. 187
tictoria Forst. f. var. gibbosa (Bl.) Corner 189
tikoua Bur. 189
variolosa Lindl. 190
virens Ait. 190
var. aublanceolata (Miq.) Corner 190
*wightiana* Wall. ex Benth. 190
*Filago leontopodioides* Willd. 1313
Filifolium Kitam. 1297
sibiricum (L.) Kitam. 1297
Filipendula Adans. 508
angustiloba (Turcz.) Maxim. 508
intermedia (Glehn) Juzep. 508
palmata (Pall.) Maxim. 508
var. glabra Ledeb. ex Kom. 508
purpurea Maxim. 508
ulmaria (L.) Maxim. 508
Fimbristylis Vahl 1493
aestivalis (Retz.) Vahl 1493
bisumbellata (Forssk.) Bubani 1493
complanata (Retz.) Link 1493
dichotoma(L.) Vahl 1493
dipsacea (Rottb.) Benth. 1493
fusca (Nees) Benth. 1493
*kagiensis* Hayata 1494
miliacea (L.) Vahl 1493
rigidula Nees 1494
schoenoides (Retz.) Vahl 1494
stauntoni Debeaux et Franch. 1494
subbispicata Nees et Meyen 1493
tetragona R. Br. 1494
Firmiana Marsili 748
platanifolia (L. f.) Marsili 748
*simplex* (L.) W. F. Wight 748
Fissistigma Griff. 271
bracteolatum Chatt. 271
cavaleriei (Lévl.) Rehd. 272
glaucescens (Hance) Merr. 272

oldhamii (Hemsl.) Merr. 272
var. longistipitatum Tsiang 272
polyanthum (Hook. f. et Thoms.) Merr. 272
uonicum (Dunn) Merr. 272
Fistularia Linnaeus 1672
petimba Lacepede 1672
*Fistulariidae* 1672
Fistulina Bull. ex Fr. 27
hepatica (Schaeff.) Fr. 28
Fistulinaceae 27
Flacourtia Comm. ex L'Hérit. 762
indica (Burm. f.) Merr. 762
montana Gray. 762
*parvifolia* Merr. 762
ramontchii L'Hérit. 762
rukam Zoll. et Mor. 763
Flacourtiaceae 762
*Flagellaria repens* Lour. 1479
Flammulina Karst. 36
velutipes (Curt. ex Fr.) Sing. 36
Flemingia Roxb. 574
ferruginea Wall. ex Benth. 574
fluminalis C. B. Clarke ex Prain 574
*grandiflora* Roxb. ex Rottler 1176
macrophylla (Willd.) Merr. 574
philippinensis Merr. et Rolfe 574
strobilifera (L.) Ait. 574
Floraphis choui Xiang 1617
meitanensis Tsai et Tang 1617
Floscopa Lour. 1428
scandens Lour. 1428
*Flueggea dracaenoides* Baker 1389
*virosa* (Roxb. ex Will.) Baill. 640
Fluoritum 1786
Foeniculum Mill. 861
vulgare Mill. 861
Fokienia Henry et Thomas 150
hodginsii (Dunn) Henry et Thomas 150
Fomes (Fr.) Gill. 29
*adamantinus* (Berk.) Cke. 34
*applanatum* (Pers. ex Wall.) Gill. 30
*densus* Lloyd 32
*fomentarius* (Fr.) Kichx 34
hornodermus Mont. 29
*officinalis* (Vill. ex Fr.) Fauil. 29
*torulosus* (Pers.) Lloyd 32
*ulmarius* (Fr.) Gill. 30
Fomitopsis Karst. 29
annosa (Fr.) Karst. 30
cytisina (Bekk.) Bond. et Sing. 30
officinalis (Vill. ex Fr.) Bond. et Sing. 29
pinicola (Sw. ex Fr.) Karsk. 30
rosea (Alb. et Schw. ex Fr.) Karsk. 30
ulmaria (Sow ex Fr.) Bond. et Sing. 30
Fontanesia Labill. 933
fortunei Carr. 933
Fordia Hemsl. 574
cauliflora Hemsl. 574
Fordiophyton Stapf 809
*cavaleriei* (Lévl.) Guill. 813
faberi Stapf 809
fordii (Oliv.) Krasser 809
*gracile* Hand. -Mazz. var. *longilobum* Hand. -Mazz. 809
*tuberculatum* Guill. 809
Formica Linnaeus 1632
fusca Linnaeus 1632
Formicidae 1632
Formio Whitley 1677
niger (Bloch) 1677
Formionidae 1677
*Forrestia hispida* Less. et A. Rich. 1427
Forsythia Vahl 934
*giraldiana* Lingelsh. 934
likiangensis Ching et Feng ex P. Y. Bai 934
suspensa (Thunb.) Vahl 934
viridissima Lingelsh. 934
Fortunearia Rehd. et Wils. 460
sinensis Rehd. et Wils 460
Fortunella Swingle 648
hindsii (Champ.) Swingle 648
japonica (Thunb.) Swingle 648
margarita (Lour.) Swingle 648
Fossil paleoarthropod 1792
paleobrachiopod 1793
paleotrionychidae 1793
paleoarthropod 1793
pinaceae resim 1794
Fragaria L. 509
ananassa Duch. 509
*chrysantha* Zoll. et Mor. 509
*filipendula* Hemsl. 519
*grandiflora* Ehrh. 509
*indica* Andr. 509
*mairei* Lévl. 509
moupinensis (Franch.) Gardn. 509
nilgerrensis Schlecht. ex Gay
var. mairei (Lévl.) Hand. -Mazz. 509
orientalis Lozinsk. 509
vesca L. 509
*Fragilariaceae* 12
Francolinus Stephens 1723
pintadeanus (Scopoli) 1723
*Frangula crenata* (Sieb. et Zucc.) Miq. 714
Fraxinus L. 934
bungeana DC. 934
chinensis Roxb. 934
var. *acuminata* Lingelsh. 935
var. *rhynchophylla* (Hance) Hemsl. 935
*fallax* Lingelsh. 935
var. *stylosa* (Lingelsh.) Chu et J. L. Wu 935
ferruginea Lingelsh. 935

floribunda Wall. subsp. insularis (Hemsl.) S. S. Sun 935
*insularis* Hemsl. 935
*lanceolata* Borkh 935
lingelsheinii Rehd. 935
malacophylla Hemsl. 935
mandshurica Rupr. 934
var. brevipedicella S. Z. Qu et T. C. Chui 935
medicinalis S. S. Sun 935
obovata Bl. 935
paxiana Lingelsh. 934
pennsylvanica Marsh. var. lanceolata (Borkh) Sarg. 935
*retusa* Champ. 935
stylosa Lingelsh. 935
Freesia Klatt 1418
refracta Klatt 1418
*Friesia chinensis* Gardn. et Champ. 732
Fringillidae 1744
Fritillaria L. 1378
amoena C. Y. Yan et Z. Y. Wan 1378
anhuiensis S. C. Chen et S. F. Yin 1378
borensis Q. Z. Zhang et Y. M. Lu 1378
*cantoniense* Lour. 1376
cirrhosa D. Don 1379
var. ecirrhosa Franch. 1379
f. *glabra* P. Y. Li 1379
davidii Franch. 1379
delavayi Franch. 1379
ferganensis A. Los 1378
fusca Turtill 1379
gansuensis S. Y. Chen 1380
halabulanica X. Z. Duan et X. J. Zheng 1378
heboksarensis X. Z. Duan et X. J. Zheng 1378
hupehensis Hsiao et K. C. Hsiao 1379
karelinii (Fisch.) Baker 1380
maximowiczii Freyn 1380
*meleagris* L. 1378
meleagroides Patrin ex Schult. 1378
var. flavovirens X. Z. Daun et X. J. Zheng 1378
var. floreplena X. Z. Duan et X. J. Zheng 1378
var. rhodanthus X. Z. Daun et X. J. Zheng 1378
monantha Migo 1380
var. tonglingensis S. C. Chen et S. F. Yin 1380
olgae Vved. 1378
omeiensis S. C. Chen 1380
pallidiflora Schrenk 1380
var. floreplena X. Z. Duan et X. J. Zheng 1380
przewalskii Maxim. 1380
shawanensis X. Z. Duan et X. J. Zheng 1378
tachangensis X. Z. Duan et X. J. Zheng 1378
taipaiensis P. Y. Li 1381
var. ningxiaensis Y. K. Yang 1381
var. zhuoquensis S. C. Chen et G. D. Yu 1380
thunbergii Miq. 1381
var. chekiagensis Hsiao et K. C. Hsia 1381
tortifolia X. Z. Duan et X. J. Zheng 1378
var. albiflora X. Z. Duan et X. J. Zheng 1378
var. floreplena X. Z. Duan et X. J. Zheng 1378
var. parviflora X. Z. Duan et X. J. Zheng 1378
unibracteata Hsiao et K. C. Hsia 1381
ussuriensis Maxim. 1381
verticillata Willd. 1378
var. jimunaica X. Z. Duan et X. J. Zheng 1378
var. *thunbergii* (Miq.) Baker 1381
var. viridicaulinus X. Z. Duan et X. J. Zheng 1378
walujewii Regel 1380
wusunica X. Z. Duan et X. J. Zheng 1379
xinyuanensis Y. K. Yang et J. K. Wu 1379
yuminesis X. Z. Duan 1379
var. albifora X. Z. Duan et X. J. Zheng 1379
var. roseiflora X. Z. Duan et X. J. Zheng 1379
yuzhongensis G. D. Yu et Y. S. Zhou 1380
Frullania Raddi 67
tamarisci (L.) Dum. subsp. monilata (Reinw., Bl. et Nees) Kami 67
Frullaniaceae 67
Fucaceae 10
*Fucus filicinus* Wulf. 15
*filium* L. 9
*gelatinus* Esper 16
*horneri* Turn. 11
*muricatus* Gmel. 16
*pallidum* Turn. 11
*verrucosa* Huds. 17
Fugu Abe 1691
alboplumbeus (Richardson) 1691
basilevskianus (Basilewsky) 1691
bimaculatus (Richardson) 1691
flavidus Li, Wang et Wang 1691
niphobles (Jordan et Snyder) 1691
oblongus (Bloch) 1691
obscurus (Abe) 1692
ocellatus (osbeck) 1692
pardalis (Temminck et Schlegél) 1692
porphyreus (Temminck et Schlegel) 1692
pseudommus (Chu) 1692

reticularis Tian, Cheng et Wang 1692
rubripes (Temminck et Schlegel) 1692
vermicularis (Temminck et Schlegel) 1691
xanthopterus (Temminck et Schlegel) 1692
Fuirena Rottb. 1494
umbellata Rottb. 1494
Fulgoridae 1616
Fullers earth 1791
*Fumaria decumbens* Thunb. 429
*incisa* Thunb. 431
*pallida* Thunb. 433
*racemosa* Thunb. 434
*schanginii* Pall. 435
*spectabilis* L. 438
Funaria Hedw. 62
hygrometrica Hedw 62
Funariaceae 62
Fungi 19
Fuscoporia Murr. 30
punctata (Fr.) Cunn. 30

## G

Gadidae 1672
Gadus Linnaeus 1672
macrocephalus Tilesius. 1672
Gagea Salisb. 1382
filiformis (Ledeb.) Kunth 1382
biensis Pasch. 1382
lutea (L.) Ker-Gawl. 1382
Gahnia J. R. et G. Forst. 1494
tristis Nees 1494
Galactia P. Br. 575
elliptifoliola Merr. 575
Galaxea Oken 1568
aspera Quelch 1568
fascicularis (Linnaeus) 1568
Galenitum 1792
Galeobdolon Adans. 1072
chinense (Benth.) C. Y. Wu 1072
Galeodidae 1576
Galeola Lour. 1539
faberi Rolfe 1539
lindleyana (Hook. f. et Thoms.) Reichb. f. 1539
Galeopsis L. 1072
bifida Boenn. 1072
Galinsoga Ruiz et Pav. 1297
parviflora Cav. 1297
Galium L. 994
*agreste* Wall. var. *echinospermum* Wallr. 994
aparine L. var. echinospermum (Wallr.) Cuf. 994
var. tenerum (Gren. et Godr.) Reichb. 995
argyi Lévl. et Vand. 1015
asperifolium Wall. 995
var. sikkimense (Gandoger) Cuf. 995
asperuloides Edgew. var. hoffmeisteri (Klotzsch) Hand. -Mazz. 995
subsp. *hoffmeisteri* (Klotzsch) Hara et Gould 955
boreale L. 996
bungei Steud. 996
var. punduanoides Cuf. 996
var. trachyspermum (A. Gray) Cuf. 996
elegans Wall. ex Roxb. 996
var. velutinum Cuf. 996
*hachyspermum* A. Gray kinuta Nakai et Hara 996
manshuricum Kitag. 996
*mollugo* L. subsp. *asperifolium* (Wall.) Kitam. 995
paradoxum Maxim. 997
pauciflorum Bunge 997
*sikkimense* Gandoger 995
*spurium* L. var. *echinospermum* (Wallr.) Hayek 995
*trachyspermum* A. Gray 996
tricorne Stokes 997
trifidum L. 997
uliginosum L. 997
verum L. 997
var. asiaticum Nakai 997
var. lacteum Maxim. 998
var. trachycarpum DC. 998
var. trachyphyllum Wall. 998
Gallinula Brisson 1727
chloropus (Linnaeus) 1727
Gallus Brisson 1723
gallus (Linnaeus) 1723
gallus domesticus Brisson 1723
gallus nigrosceus Brisson 1723
Gampsocleis Fieber 1612
buergeri de Haan 1613
gratiosa Brunner- Wattenwyl 1613
Ganoderma Karst. 30
applanatum (Pers. ex Wall.) Pat. 30
boniense Pat. 31
*japonicum* sensu Teng 30
lucidum (Leyss. ex Fr.) Karst. 30
sinense Zhao, Xu et Zhang 30
tenue Zhao, Xu et Zhang 31
tropicum (Jungh.) Bres. 31
tsugae Murr. 31
Garcinia L. 419
cowa Roxb. 419
banburyi Hook. f. 420
multiflora Champ. 420
oblongifolia Champ. ex Benth. 420
oligantha Merr. 420
paucinervis Chun et How 420
schefferi Pien 420
*tinctoria* (DC.) W. F. Wight 420
xanthochymus Hook. f. ex T. Andres. 420

Gardenia Ellis 998
*hainanensis* Merr. 998
jasminoides Ellis 998
var. fortuniana Lindl. 998
var. grandiflora Nakai 998
var. radicans (Thunb.) Makino 999
*radicans* Thunb. 999
sootepensis Hutch. 999
*spinosa* Thunb. 1015
stenophylla Merr. 999
Gardneria Wall. 944
angustifolia Wall. 944
*glabra* Wall. ex D. Don 944
lanceolata Rehd. et Wils. 944
*multiflora* Makino 944
Garrulus Brisson 1738
glandarius (Linnaeus) 1738
Garuga Roxb. 658
pierrei Guill. 658
pinnata Roxb. 658
*Gastonia palmata* Roxb. 847
Gastrana yantaiensis (Crosse et Debeaux) 1588
Gastrimargus marmoratus (Thunberg) 1613
Gastrochilus D. Don 1539
formosanus (Hayata) Schltr. 1539
Gastrodia R. Br. 1539
elata Bl. 1540
var. *gracilis* Pamp. 1540
*mairei* Schltr. 1540
Gastrophysus Müller 1692
lunaris (Bloch et Schneider) 1692
spadiceus (Richardson) 1692
Gastropoda 1570
Gaultheria Kalm ex L. 885
caudata Stapf 885
*crenulata* Kurz 886
cumingiana Vidal 885
forrestii Diels 885
var. setigera C. Y. Wu et T. Z. Hsu 885
griffithiana Wight 885
hookeri C. B. Clarke 885
leucocarpa Bl. var. crenulata (Kurz) T. Z. Hsu 886
var. hirsuta (D. Fang et N. K. Liang) T. Z. Hsu 886
nummularioides D. Don 886
var. *elliptica* Rehd. et Wils. 886
pyrolaefolia Hook. f. ex C. B. Clarke 886
semi-infera (C. B. Clarke) Airy-Shaw 886
sinensis Anth. 886
var. *major* Airy-Shaw 886
*stapfiana* Airy-Shaw 885
*veitchiana* Craib 885
*yunnanensis* (Franch.) Rehd. 886
var. *hirsuta* D. Fang et N. K. Liang 886
Gaura L. 821
*chinensis* Lour. 823
parviflora Douglas 821
Gazella subgutturosa Guldenstaedt 1777
*Geaster triplex* Jungh. 52
Geastraceae 51
Geastrum Pers. 51
hygrometricum Pers. 52
triplex (Jungh.) Fisch. 52
Geblera Andrz. ex Bess. 1297
tenuifolia Kitag. 1297
Gekko Linnaeus 1704
chinensis Gray 1704
gecko (Linnaeus) 1704
japonicus (Dumeril et Bibron) 1704
subpalmatus Gunther 1704
swinhonis Guenther 1704
Gekkonidae 1704
Gelidiaceae 13
Gelidiella Feldm. 14
acerosa (Forssk.) Feldm. et Hamel 14
Gelidiellaceae 14
Gelidium Lamx. 13
amansii Lamour. 13
crinale (Turn.) Lamour. 14
diviricatum Martens 14
japonicum (Harv.) Okam. 14
pacificum Okam. 14
pulchellum Kütz. 14
Gelsemium Juss. 944
elegans (Gardn. et Champ.) Benth. 944
Gendarussa Nees 1168
ventricosa (Wall.) Nees 1168
vulgaris Nees 1168
*Gentiosporum axillare* Benth. 1087
Gentiana L. 948
*acuta* Michx. 952
algida Pall. 948
*amarella* L. var. *fastigiata* Ling 952
*arenaria* Maxim. 952
aristata Maxim. 948
*barbata* Fröel. 952
burkillii H. Smith 948
callistantha Diels et Gilg 948
cephalantha Franch. ex Hemsl. 948
chinensis Kusnez. 948
crassicaulis Duthie ex Burk. 948
*crawfurdioides* Marq. 947
dahurica Fisch. 948
davidii Franch. 949
*detonsa* Rottb. var. *ovato-deltoidea* Burk. 953
var. *paludosa* Hook. f. 953
ecaudata Marq. 949
esquirolii Lévl. 949
*falcata* Turcz. 947
farreri Balf. f. 948
filistyla Balf. f. et Forrest ex Marq. 949
futtereri Diels et Gilg 948

*grandis* H. smith 952
helophila Balf. f. et Forrest ex Marq. 949
hexaphylla Maxim. et Kusnez. 949
jamesii Hemsl. 949
kaufmanniana Regel et Schmalh. 948
leucomelaena Maxim. 950
loureirii (D. Don) Griseb. 950
macrophylla Pall. 948
manshurica Kitag. 950
nubigena Edgew. 948
nutans Bunge 948
officinalis H. Smith 950
panthaica Prain et Burk. 950
*pricei* Marq. 947
pseudo-aquatica Kusnez. 950
pudica Maxim. 950
*pulmonaria* Turcz. 947
purdomii Marq. 950
rhodantha Franch. ex Hemsl. 950
rigescens Franch. ex Hemsl. 950
rubicunda Franch. 951
var. *somolifolia* (Franch.) Marq. 951
samolifolia Franch. 951
sarcorrhiza Ling et Ma ex T. N. Ho 951
scabra Bunge 950
scandens Lour. 1012
sino-ornata Balf. f. 951
siphonantha Maxim. ex Kusnez. 949
spathulifolia Maxim. ex Kusnez. 951
squarrosa Ledeb. 950
straminea Maxim. 948
striata Maxim. 951
*tenuissima* Hāyata 952
tianschanica Rupr. 949
tibetica King ex Hook. f. 949
trifiora Pall. 950
urnula H. Smith f. pallida Marq. 951
veitchiorum Hemsl. 949
*volubile* D. Don. 958
waltonii Burk. 951
f. *nana* Hsiao et K. C. Hsia 951
walujewii Regel. et Schmalh. 949
wardii W. W. Smith 951
yokusaii Burk. 952
yunnanensis Franch. 952
zolliogeri Fassett 952
Gentianaceae 946
Gentianella Moench. 952
acuta (Michx.) Hulten 952
arenaria (Maxim.) T. N. Ho 952
*falcata* (Turcz.) H. Smith 947
*grandis* H. Smith 952
*paludosa* (Hook. f.) H. Smith 953
*scabromarginata* H. Smith 953
*Gentianodes davidii* (Franch.) A. Löve et D. Löve 949
*filistyla* (Balf. f. et Forrest) A. Löve et D. Löve 949
*yunnanensis* (Franch.) A. Löve et D. Löve 952
Gentianopsis Ma 952
barbata (Froel.) Ma 952
*var. ovato-deltoidea* (Burk.) Ma 953
var. stenocalyx H. W. Li ex T. N. Ho 952
grandis (H. Smith) Ma 952
paludosa (Hook. f.) Ma 953
var. ovato-deltoidea (Burk.) Ma ex T. N. Ho 953
*scabromarginata* (H. Smith) Ma 953
Geodorum G. Jacks. 1540
nutans (Presl) Ames 1540
Geophila D. Don 999
herbacea (L.) O. Kuntze 999
*Georchis biflora* Lindl. 1540
*foliosa* Lindl. 1540
Geotrupes Latreille 1624
auratus (Motschulsky) 1624
laevistriatus Motschulsky 1624
stercorarius Linnaeus 1624
Geotrupidae 1624
Geraniaceae 611
Geranium L. 611
albiflorum Ledeb. 611
carolinianum L. 612
collinum Steph. ex Willd. 612
dahuricum DC. 612
divaricatum Ehrh. 612
erianthum DC. 612
eriostemon Fisch. 612
forrestii Stapf 612
henryi R. Kunth 612
hispidissimum (Franch.) R. Kunth 612
japonicum Franch. et Sav. 612
maximowiczii Regel et Maack 613
napuligerum Franch. 613
nepalense Sweet 613
paishanense Y. L. Chang 613
pratense L. 613
pseudosibiricum J. Mayer 612
pylzowianum Maxim. 613
rectum Trautv. 613
robertianum L. 613
sibiricum L. 613
sinense R. Kunth 614
soboliferum Kom. 614
*stapfianum* Hand. -Mazz. 612
strictipes R. Kunth 614
*strigosum* Franch. var. *hispidissimum* Franch. 612
transversale (Kar. et Kir.) Vved. 614
tsingtauense Yabe 614
umbelliforme Franch. 614
wilfordii Maxim. 614
wlassowianum Fisch. ex Link 614
*Gerardia glutinosum* L. 1131

*japonica* Thunb. 1148
Gerbera L. ex Cass. 1297
anandria (L.) Sch. -Bip. 1311
delavayi Franch. 1297
*hederifolia* Dunn 1342
*henryi* Dunn 1297
nivea Sch. -Bip. 1298
*piloselloides* (L.) Cass. 1298
*uncinata* Beauved 1297
Gerridae 1619
Gerris Fabricius 1619
(Aquarius) paludum (Fabricius) 1619
Gesneriaceae 1177
*Gesonia floribunda* Roxb. 816
Geum L. 509
aleppicum Jacq. 509
japonicum Thunb. var. chinense F. Bolle 510
*rivale* L. 510
Gigartina Stackh. 16
intermedia Sur. 16
Gigartinaceae 15
*Gilibertia dentiger* Harms ex Diels 838
Ginkgo L. 141
biloba L. 141
Ginkgoaceae 141
Girardiana Gaud. 198
chingiana Chien 198
cuspidata Wedd. subsp. grammata C. J. Chen 198
diversifolia (Link) Fries 198
*palmata* (Forsk.) Gaud. 198
Gladiolus L. 1418
gandavensis Van Houtt. 1418
Glauberitum 1785
Glaucidium Boie 1732
brodiei (Burtou) 1732
cuculoides (Vigors) 1732
Glaucium Mill. 439
elegans Fisch. et Mey. 439
fimbrilligerum Kar. et Kir. 439
*leptopodum* Maxim. 438
*refractum* Stev. ex DC. 444
squamigerum Kar. et Kir. 439
Glaux L. 911
maritima L. 911
Gleadovia Gamble et Prain 1195
lepoensis Hu 1195
ruborum Gamble et Prain 1195
Glechoma L. 1072
biondiana (Diels) C.Y. Wu et C. Chen 1072
var. angustituba C. Y. Wu et C. Chen 1072
var. glabrescens C. Y. Wu et C. Chen 1072
hederacea L. 1073
var. *longituba* Nakai 1072
longituba (Nakai) Kupr. 1072
sinograndis C Y. Wu 1073
*tibetica* Jacq. ex Benth. 1098
Gleditsia L. 575
australis Hemsl. 575
*delavayi* Franch. 575
fera (Lour.) Merr. 575
japonica Miq. 575
var. delavayi (Franch.)L. C. Li 575
*melanacantha* Tang et Wang 575
*officinalis* Hemsl. 575
sinensis Lam. 575
triacanthos L. 575
Glehnia F. Schmidt 861
littoralis (A. Gray) F. Schmidt ex Miq. 861
Gleicheniaceae 84
*Glinus lotoides* L. 235
Globba L. 1510
barthei Gagnep. 1510
*japonica* Thunb. 1503
omeiensis Z. Y. Zhu 1510
racemosa Smith 1510
Globicephala macrorhyncha Gray 1759
Globicephalidae 1759
Glochidion J. R. et G. Forst. 632
assamicum (Muell. -Arg.) Hook. f. 632
*dasyphyllum* K. Koch 632
eriocarpum Champ. ex Benth. 632
*fargifolium* Miq 633
hirsutum (Koxb.) Voigt 632
hongkonginse Muell. -Arg. 632
lanceolarium (Roxb.) Voigt 632
philippinense (Cav.) Benth. 632
puberum (L.) Hutch. 632
ramiflorum J. R. et G. Forst 633
sphaerogynum (Muell. -Arg.) Kurz 633
wilsonii Hutch 633
wrightis Benth. 633
zeylanicum A. Juss 633
Gloeophyllum Karst 31
saepiarium (Wulf. ex Fr.) Karst. 31
subferrugineum (Berk.) Bond.et Sing. 31
trabeum (Pers. ex Fr.) Murr. 31
Gloiopeltis J. Ag. 14
furcata (Post. et Rupr.) J. Ag. 14
tenax (Turn.) J. Ag. 14
Glomeridae 1607
Glomeris Latreille 1607
nipponica Kishida 1607
Gloriosa L. 1382
superba L 1382
*Glossocomia ussuriensis* Rupr. et Maxim 1232
Glossogyne Cass. 1298
tenuifolia Cass. 1298
*Glossostylis arvense* Benth. 1140
Glycera Lamarck 1592
chirori Izuka 1592
Glyceridae 1592

Glycine Willd. 576
max (L.) Merr. 576
*mollis* Willd. 552
*sinensis* Sims. 609
soja Sieb. et Zucc. 576
f. lanceolata (Skv.) P. Y. Fu et Y. A. Chen 576
*villosa* Thunb. 572
Glycosmis Correa 648
arborea (Roxb.) DC. 649
*citrifolia* (Willd.) Lindl. 649
cochinchinensis (Lour.) Pierre 648
parviflora (Sims) Little 649
Glycyrrhiza L. 576
aspera Pall. 576
glabra L. 576
inflata Bat. 576
korshinskyi G. Hrig. 576
pallidiflora Maxim. 577
squamulosa Franch. 576
uralensis Fisch. 576
yunnanensis Cheng f. et L. K. Tai 576
Glyptopetalum Thw. 700
fedderi (Lévl.) D. Hou 700
Glyptosternum McClelland 1670
maculatum (Regan) 1670
Glyptostrobus Endl. 149
pensilis (Staunt.) Koch 149
Glyptothorax sinense (Regan) 1670
Gmelina L. 1050
asiatica L. 1050
var. typica Lamb. et Bakb 1050
chinensis Benth. 1050
delavayana P. Dop 1050
*indica* Burm. f. 762
*monzana* W. W. Smith 1050
*speciosissima* D. Don 1159
Gmophina veneriformis (Lamarck) 1587
Gnaphalium L. 1298
adnatum (Wall. ex DC.) Kitam. 1298
affine D. Don 1298
*andersonii* (C. B. Clarke) Franch. 1312
*arenarium* L. 1302
*artemisiifolium* Lévl. 1312
baicalense Kirp 1298
*bicolor* Franch. 1244
*confertum* Benth. 1299
*dedekensii* Bur. et Franch. 1313
*dioica* L. 1247
*formosanum* Hayata 1298
hypoleucum DC. 1299
japonicum Thunb. 1299
kasachstanicum Kirp. 1299
*leontopodium* L. *v. calocephalum* Franch. 1312
mandshuricum Kirp. 1299
*margaritacea* L. 1245
*multiceps* DC. 1298
norvegicum Gunn. 1299
*pellucidum* Franch. 1245
pensylvanicum Willd. 1299
polycanlon Pers. 1299
supinum L. 1299
sylvaticum L. 1299
tranzschelii Kirp. 1300
Gnathagnus Gill 1681
elongatus (Temminck et Schlegel) 1681
Gnathopogon Bleeker 1660
herzensteini (Günther) 1661
imberbis (Sauvage et Dabry) 1661
Gnetaceae 157
Gnetum L. 157
gracilipes C. Y. Cheng 157
hainanensis C. Y. Cheng 157
montanum Markgr. 157
f. megalacarpum Markgr. 157
parvifolium (Warb.) C. Y. Cheng ex Chun 157
pendulum C. Y. Cheng 157
f. intermedium C. Y. Cheng 157
f. subsessile C. Y. Cheng 157
Gobiidae 1684
*Goldfussia cusia* Nees 1173
*penstemonoides* Nees 1175
*psilostachys* (C. B. Clarke ex W. W. Smith) Bremek. 1175
Gomphandra Wall. ex Lindl. 707
*hainanensis* Merr. 707
tetrandra (Wall. et Roxb.) Sleum. 707
Gomphidiaceae 43
Gomphidicus Fr. 43
viscidus (L.) Fr. 43
*Gomphopetalum maximowiczii* F. Schmidt ex Maxim. 870
Gomphostemma Wall. ex Benth. 1073
chinense Oliv. 1073
*insuave* Hance 1090
latifolium C. Y. Wu 1073
leptodon Dunn. 1073
microdon Dunn 1073
sulcatum C. Y. Wu 1073
wallichii Franch. 1074
Gomphrena L. 261
celosioides Mart. 261
globosa L. 261
Gonatanthus Klotzsch 1476
pumilus (D. Don) Engl. et Krause 1476
Gongronema (Endl.) Decne. 981
*hemsleyana* Warb. 974
nepalense (Wall.) Decne. 981
Goniasteridae 1638
*Gonocarpus micranthus* Thunb. 823
Goniothalamus (Bl.) Hook. f. et Thoms. 272
donnaiensis Finet et Gagnep. 272
Gonostegia Turcz. 198
hirta (Bl.) Miq. 19

pentandra (Roxb.) Miq. var. hypericifolia (Bl.) Masamune 198
Gonyaulaceae 12
Gonyaulax Diesing 12
catenella Whedon 12
Goodeniaceae 1237
Goodyera R. Br. 1540
biflora (Lindl.) Hook. f. 1540
brachystegia Hand. -Mazz. 1540
*discolor* Ker-Gawl. 1548
foliosa (Lindl.) Benth. ex Hook. f. 1540
henryi Rolfe 1540
*kwangtungensis* Tso 1541
*marginata* Lindl. 1541
procera (Ker-Gawl.) Hook. 1540
repens (L.) R. Br. 1541
var. *marginata* (Lindl.) Tang et Wang 1541
schlechtendaliana Reichb. f 1541
*secundiflora* Lindl. 1541
velutina Maxim. 1541
Gordonia Ellis 417
axillaris (Roxb. ex Ker-Gawl.) Dietr. 417
Gorgonidae 1569
*Gossompinus malabarica* (DC.) Merr. 746
Gossypium L. 740
arboreum L. 740
barbadense L. 740
herbaceum L. 740
hirsutum L. 740
Gouania Jacq. 711
javanica Miq 711
leptostachya DC. 712
var. macrocarpa Pitard. 712
var. tonkinensis Pitard. 712
*Gouffeia holosteoides* C. A. Mey. 243
Gracilaria Grev. 17
articulata C. F. Chang et B. M. Xia 17
blodgettii Harv. 17
bursa-pastoris (Gmel.) Silva. 17
eucheumoides Harv. 17
gigas Harv. 17
salicornia (C. Ag.) Dawson 17
textorii (Sur.) De-Toni 17
verrucosa (Huds.) Rapenf. 17
Gracilariaceae 17
Gracula Linnaeus 1737
religiosa Linnaeus 1737
Gramineae 1433
*Grammitis affinis* Wall. 98
*vestita* Wall. 99
Grangea Adans. 1300
maderaspatana (L ) Poir. 1300
Graphistemma Champ. ex Benth. et Hook. f. 981
pictum (Champ.) Benth. et Hook. f. ex Maxim. 981
Grapsidae 1606
Grateloupia C. Ag. 15
filicina (Wulf.) C. Ag. 15
livida (Harv.) Yamada 15
*Gratiola ciliata* Colsm. 1138
*ruellioides* Colsm. 1138
*viscosa* Hornem. 1138
Grevillea R Br. 207
rotusta A. Cunn. 207
Grewia L. 734
abutilifolia Vent. ex Juss 734
biloba G. Don 734
var. microphylla (Maxim.) Hand. -Mazz. 735
var. parviflora (Bunge) Hand. -Mazz. 734
eriocarpa Juss. 735
falcata C. T. Wu ex Cheng 735
oligandra Pierre 735
*parviflora* Bunge 734
*salvifolia* L. f. 825
*Grifola umbellata* (Pers.) Pilát 33
Grimaldiaceae 68
*Grossularia burejensis* (F. Schmidt) Berg. 486
Gruidae 1726
Grus Brisson 1726
grus (Linnaeus) 1727
japanensis (P. L. S. Muller) 1727
nigricollis (Przewalski) 1727
Gryllidae 1614
Gryllotalpa Latreille 1615
africana Palisot de Beauvois 1615
formosana Shiraki 1615
unispina Saussure 1615
Gryllotalpidae 1615
Gryllulus Uvarov 1614
chinensis (Weber) 1614
Gryllus Latreille 1614
miratus Burmeister 1614
testaceus Walker 1614
Gueldenstaedtia Fisch. 577
*diversifolia* Maxim. 603
*himalaica* Baker 603
maritima Maxim. 577
*multiflora* Bunge 577
stenophylla Bunge 577
verna (Georgi) Boiss 577
*Guilandia bonduc* L. 554
Gumnostachyum Nees 1169
kwangsiense H. S. Lo 1169
*sanguinolentum* (Vahl) T. Anders. 1169
Guttiferae 419
Gulzlaffia Hance 1169
aprica Hance 1169
*dielsiana* (W. W. Smith) S. Moore 1169
Gymnadenia R. Br. 1541
*camptoceras* (Rolfe) Schltr. 1550
conopsea (L.) R. Br 1541
crassinervis Finet 1541

var. *elatior* Tang et Wang 1541
emeiensis K. Y. Lang 1542
orchidis Lindl 1542
*pinguicula* Reichb. f. et S. Moore 1517
*Gymnaster piccolii* (Hook. f.) Kitam. 1320
Gymnema R. Br. 981
*alterniflorum* Merr. 981
longiretinaculatum Tsiang 981
*nepalensis* Wall. 981
sylvestre (Retz.) Schult. 981
tingens (Roxb.) Spreng. 981
Gymnocladus L. 577
chinensis Baill. 577
Gymnocypris Gunther 1661
eckloni Herzenstein 1661
przewalskii (Kessler) 1661
Gymnodiptychus Herzenstein 1661
pachycheilus Herzenstein 1661
Gymnogongrus Martius 16
flabelliformis Harv. 16
*Gymnogramme digisata* Baker 126
*henryi* Baker 126
*salicifolia* Makino 139
*vastita* Hook. var. *auriculata* Franch. 99
*wrightii* Hook. 127
Gymnolaemata 1636
Gymnopetalum Arn. 784
chinense (Lour.) Merr. 784
Gymnopteris Bernh. 99
bipinnata Christ var. auriculata (Franch.) Ching 99
*decurrens* Hook. 121
vestita (Wall.) Underw. 99
Gymnospermae 141
Gymnosphaera Bl. 88
gigantea (Wall. ex Hook.) J. Smith 88
*Gymnosporia berberoides* W. W. Smith 701
*diversicolor* (Hemsl.) Maxim. 701
*esquirolii* Lévl. 701
*variabilis* Loes. 702
*Gymnosxyles anthemifolia* Juss. 1343
Gymnotheca Decne. 387
chinensis Decne. 387
involucrata Péi 387
Gymnothorax Bloch 1656
favagineus Bloch et Schneider 1656
fimbriatus (Bennett) 1656
melanospilus (Bleeker) 1656
meleagris (Shaw) 1656
pictus (Ahl) 1656
punctatofasciatus Bleecker 1656
reevesi (Richardson) 1656
reticularis Bloch 1656
richardsoni Bleeker 1656
undulatus (Lacepede) 1656
Gymnura van Hasselet 1649
bimaculata (Norman) 1649
japonica (Temminck et Schlegel) 1649
Gymnuridae 1649
*Gynandropsis gynandra* (L.) Briq. 445
Gynocardia R. Br. 763
odorata R. Br. 763
Gynostachyum Nees 1169
kwangsiensis H. S. Lo 1169
*sanguinolentum* (Vahl) T. Anders. 1169
Gynostemma Bl. 784
burmanicum King ex Chakr. 784
cardiospermum Cogn. ex Oliv. 784
*integrifoliola* Cogn. 789
laxum (Wall.) Cogn. 785
longipes C. Y. Wu ex S. K. Chen 785
*pedata* Bl. var. *pubescens* Gagnep. 785
pentaphyllum (Thunb.) Makino 785
pubescens (Gagnep.) C. Y. Wu ex C. Y. Wu et S. K. Chen 785
yixinginse (Z. P. Wang et Q. Z. Xie) C. Y. Wu et S. K Chen 785
Gynura Cass. 1300
bicolor (Willd.) DC. 1300
*bodinieri* Lévl. 1301
*crepidioides* Benth. 1281
cusimbua (D. Don) S. Moore 1300
divaricata (L.)DC. 1300
japonica (L. f.) Juel 1301
procumbens (Lour.) Merr. 1301
pseudo-china (L.) DC. 1301
sagittata DC. 1301
Gypaetus Storr 1720
barbatus (Linnaeus) 1720
Gypsophylla L. 242
acutifolia Fisch. 242
var. gmelini Regel 242
davurica Turcz. ex Fenzl 242
var. angustifolia Fenzl 242
licentiana Hand. -Mazz. 242
oldhamiana Miq 242
pacifica Kom. 242
paniculata L. 243
Gypsum 1784
fibrosum 1785
Gyrinidae 1620
Gyrinus Linnaeus 1620
curtus Motschulsky 1620
Gyrocheilos W. T. Wang 1180
chorisipalum W. T. Wang 1186
var. synsepalum W. T. Wang 1186
Gyrophana lacrymans (Wulf.) Pat. 27
*Gyrophora esculenta* Miyoshi 56
*hypococcinea* Jatta 56
Gyroporus castaneus (Bull. ex Fr.) Quél. 43

## H

Habenaria Willd. 1542
*acuifera* Wall. ex Lindl. 1543
aitchisoni Reichb. f. 1542
buchneroides Schltr. 1542

*bulleyi* Rolfe 1544
*camptoceras* Rolfe 1550
*chlorantha* Bab. 1556
ciliolaris (L.) Kränzl. 1542
*clavigera* (Lindl.) Dandy 1556
davidii Franch. 1542
delavayi Finet 1542
dentata (Sw.) Schltr. 1543
*diceras* Schltr. 1542
glaucifolia Bur. et Franch. 1543
*goodyeroides* D. Don 1555
limprichtii Schltr. 1543
linguella Lindl 1543
mairei Schltr. 1543
*monophylla* Coll. et Hemsl. 1552
petelotii Gagnep. 1543
*pseudodenticulata* Hand. -Mazz. 1543
rhodocheila Hance 1543
*stenostachya* (Lindl.) Benth. 1557
szechuenica Schltr. 1543
tibetica Schltr. 1544
*viride* (L.) Hartm. var. *bracteatum* (Willd.) Richter 1526
Haemadipsa Tennent 1595
japonica Whitman 1595
Haemadipsidae 1595
Haemanthus L. 1407
multiflorus Martyn 1407
*Haemaria discolor* (Ker-Gawl.) Lindl. 1548
Haemopis gracilis Moore 1594
Hagenomyia micans (Mac Lachlan) 1626
Halaelurus Gill 1645
burgeri (Müller et Henle) 1645
Halcyon Swainson 1734
pileata (Boddaert) 1734
smyrnensis (Linnaeus) 1734
Halenia Borkh. 953
corniculata (L.) Cornaz 953
elliptica D. Don 953
var. grandiflora Hemsl. 953
*sibirica* Borkn. 953
Halerpestes Greene 340
*cymbalaria* auct. non (Pursh) Greene 340
ruthenica (Jacq.) Ovcz. 340
sarmentosa (Adams.) Kom. 340
tricuspis (Maxim.) Hand. -Mazz. 340
*Halesia fortunei* Hemsl. 928
Haliaeetus Savigny 1720
leucogaster (Gmelin) 1720
Halicmetus reticulatus Smith et Redcliffe 1694
Halieutaea Cuvier et Valenciennes 1693
stellata (Vahl) 1693
Haliotidae 1570
Haliotis Linnaeus 1570
asinina Linnaeus 1571
discus hannai hannai Ino 1571
diversicolor Reeve 1570
laevigata Donovan 1571
ovina Gmelin 1571
ruber Leach 1571
varia Linnaeus 1571
Haliplanella Verrill 1567
luciae (Verrill) 1568
Halitum 1787
Halloysitum 1790
Halodeima Pearson 1636
atra (Jaeger) 1637
Halogeton C. A. Mey. 255
glomeratus (Bieb.) C. A. Mey. 255
Haloragidaceae 823
Haloragis J. R. et G. Forst. 823
chinensis (Lour.) Merr. 823
micrantha (Thunb.) R. Br. ex Sieb. et Zucc. 823
Hamamelidaceae 459
Hamamelis L. 460
mollis Oliv. 460
*Hancea sinensis* Hemsl. 1074
Hanceola Kudo 1074
sinensis (Hemsl.) Kudo 1074
Hapalogenys Richardson 1680
kishinouyei Smith et Pope 1680
mucronatus (Eydoux et Souleyet) 1680
nigripinnis (Temminck et Schlegel) 1680
nitens (Richardson) 1680
Haplocladium (C. Muell.) C. Muell. 65
microphyllum (Hedw.) Brokh. 65
Haploscleridae 1565
Haplosphaera Hand. -Mazz. 862
Phaea Hand.-Mazz. 862
Harengula Cuvier et Valenciennes 1652
nymphaea (Richardson) 1652
ovalis (Bennett) 1652
zunasi (Bleeker) 1652
Harpodon Lesueur 1655
nehereus (Hamilton) 1655
Harpodontidae 1655
Harrisonia R. Br. 657
perforata (Blanco) Merr. 657
Hedera L. 839
helix L. 839
*leschenaultii* Wight et Arn. 844
nepalensis K. Koch 839
var. sinensis (Tobl.) Rehd. 839
*pastea* Champ. 839
*sensicosa* Rupr. et Maxim. 833
*undulatus* Wall. 841
Hedychium Koen. 1511
brevicaule D. Fang 1511
coronarium Koen. 1511
densiflorum Wall. 1511
flavum Roxb. 1511
forrestii Diels 1511
kwangsiense T. L. Wu et Senjen 1511
sino-aureum Stapf 1511
spicatum Buch. -Ham. ex Smith 1511

villosum Wall. 1512
Hedyosmum Swartz 392
orientale Merr. et Chun 392
Hedyotis L. 999
acutangula Champ. 999
ampliflora Hance 999
auricularia L. 1000
biflora (L.) Lam. 1000
capitellata Wall. ex G. Don 1000
capituligera Hance 1000
chrysotricha (Palib.) Merr. 1000
corymbosa (L.) Lam. 1000
costata Roxb. 1000
diffusa Willd. 1001
var. longipes Nakai 1001
effusa Hance 1001
hedyotidea (DC.) Merr. 1001
*hispida* Retz. 1003
*ingrata* Wall. 1010
lancea Thunb. 1001
longiexserta Merr. et Metc. 1001
mellii Tutch. 1001
paridifolia Dunn 1002
pinifolia Wall. ex G. Don 1002
platystipula Merr. 1002
pterita Bl. 1002
scandens Roxb. 1002
tenelliflora Bl. 1002
tetrangularis (Korth.) Merr. 1002
uncinella Hook. et Arn. 1002
var. scabrida Franch. 1003
*urophylla* Wall. 1010
verticillata (L.) Lam. 1003
*wightiana* Wall. ex Wight et Arn. 1010
xanthochroa Hance 1005
Hedysarum L. 577
alpinum L. 577
brachypterum Bunge 578
*caudatum* Thunb. 568
citrinum Baker 578
*crinitum* L. 604
*elegans* Lour. 593
fruticosum Pall. 578
*gangeticum* L. 569
*gyroides* Roxb. ex Link 564
*heterocarpum* L. 569
*heterophyllum* Willd. 569
laeve Maxim. 578
limitaneum Hand.-Mazz. 578
*lagopodioides* L. 604
limprichtii Ulbr. 578
*lutescens* Poir 597
*microphyllum* Thunb. 569
mongolicum Turcz. 578
*motorium* Houtt. 564
multijugum Maxim. 578
*obcordata* Poir. 562
*pilosum* Thunb. 584
polybotrys Hand.-Mazz. 578
*pulchellum* L. 594
scoparium Fisch. et Mey. 578
sikkimense Benth. ex Baker 578
songoricum Bong. 578
*striatum* Thunb. 581
*strobiliferum* L. 574
*styracifolium* Osbeck 570
*tomentosa* Thunb. 584
*triangulare* Retz. 567
*triflorum* L. 570
*triquetrum* L. 601
tuberosum Fedtsch. var. speciosum Hand.-Mazz. 578
ussuriense Schischk. et Kom. 579
*velutinum* Willd. 570
*vespertilionis* L. 562
*vaginale* L. 547
*virgata* Thunb. 584
Helarctos malayanus Raffles 1761
Helianthus L. 1301
annuus L. 1301
tuberosus L. 1301
Helichrysum L. 1302
arenarium (L.) Moench 1302
Helicia Lour. 207
cochinchinensis Lour. 207
*lobata* Merr. 208
nilagirica Bedd. 208
obovatifolia Merr. et Chun 207
reticulata W. T. Wang 208
*terminalis* Kurz 208
tsaii W. T. Wang 208
Heliciopsis Sleum. 208
lobata (Merr.) Sleum. 208
terminalis (Kurz) Sleum. 208
Helicteres L. 748
angustifolia L. 748
elongata Wall. 748
glabriuscula Wall. 748
isora L. 749
lanceolata DC. 749
var. megaphylla Hsue 749
plebeja Kurz 749
viscida Bl. 749
Heliotropium L. 1035
indicum L. 1035
Helixanthera Lour. 211
parasitica Lour. 211
sampsonii (Hance) Danser 212
Helleborus L. 340
thibetanus Franch. 340
Helminthostachys Kaulfuss 78
zeylanica (L.) Hook. 78
Helminthostachyaceae 78
*Helminostis prolifera* Retz. 104
Helwingia Willd. 830
chinensis Batal. 830

f. megaphylla Fang 830
var. crenata (Lingelsh. et Limpr.) Fang 830
var. microphylla Fang et Soong 830
himalaica Hook. f. et Thoms. ex C. B. Clarke 830
var. parvifolia Li 830
japonica (Thunb.) Dietr. 830
var. hypoleuca Hemsl. ex Rehd. 830
var. papillosa Fang et Soong 830
omeiensis (Fang) Hara et Kuros 830
Hematitum 1781
Hemerocallis L. 1382
aurantiaca Baker 1382
citrina Baroni 1382
coreana Nakai 1383
*flava* L. var. *minor* (Mill.) M. Hotta 1383
forrestii Diels 1383
fulva (L.) L. 1383
var. minor (Mill.) M. Hotta 1383
lilioasphodelus L. 1383
β. *fulva* L. 1383
middendrofii Trautv. et Mey. 1383
minor Mill. 1383
nana Forrest et W. W. Smith 1383
*plantaginea* Lam. 1384
plicata Stapf 1383
Hemibarbus Bleeker 1661
labeo (Pallas) 1661
maculatus Bleeker 1661
Hemiboea C. B. Clarke 1186
cavaleriei Lévl. 1186
var. paucinevis W. T. Wang et Z. Y. Li 1186
follicularis C. B. Clarke 1186
henryi C. B. Clarke 1186
integra C. Y. Wu 1187
longzhouensis W. T. Wang et Z. Y. Li 1187
subacaulis Hand.-Mazz. 1187
subcapitata C. B. Clarke 1187
var. denticulata W. T. Wang et Z. N. Li 1187
Hemicentrotus (A. Agassiz) 1640
pulcherrimus (A. Agassiz) 1641
Hemiculter Bleeker 1661
bleekeri Warpachowsky 1662
leucisculus (Basilewsky) 1661
Hemidactylus bowringii (Gray) 1704
brookii Gray 1705
frenatus Schlegel 1705
garnotii Dumeril et Bibron 1705
Hemiechinus auritus Gmelin 1746
dauricus Sundevall 1746
Hemifusus Swainson 1576
ternatanus (Gmelin) 1576
tuba (Gmelin) 1576
Hemigramma Christ 121
decurrens (Hook.) Cop. 121
*Hemigraphis chinensis* (Nees) T. Anders. 1173
Hemionitidaceae 98
*Hemionitis japonica* Thunb. 99
*pothifolia* Don 127
*wilfordii* Hook. 105
Hemiphragma Wall. 1135
heterophyllum Wall. 1135
Hemiphyllodactylus yunnanensis (Boulenger) 1705
Hemipilia Lindl. 1544
*corfolia* Lindl. var. *subflabellata* Finet 1544
cruciata Finet 1544
flabellata Bur. et Franch. 1544
var. *grandiflora* Finet 1544
limprichtii Schltr. ex Limpr. 1544
Hemiptelea Planch. 179
davidii (Hance) Planch. 179
Hemiramphidae 1671
Hemiramphus Cuvier 1671
far (Forskal) 1671
georgii (Valenciennes) 1671
kurumeus Jordan et Starke 1671
sajori (Temminck et Schlegel) 1671
Hemisalanx Regan 1654
prognathus Regan 1654
Hemistepta Bunge 1302
lyrata (Bunge) Bunge 1302
Hemsleya Cogn. 785
amabilis Diels 785
chinensis Cogn. ex Forb. et Hemsl. 786
delavayi (Gagnep.) C. Jeffrey ex C. Y. Wu et C. L. Chen 786
dipteriga Kuang et A. M. Lu 786
dolichocarpa W. J. Chang 786
*elongata* (Merr.) Cogn. 789
graciliflora (Harms) Cogn. 786
*henryi* Cogn. 789
macrosperma C. Y. Wu ex C. Y. Wu et C. L. Chen 786
omeiensis L. T. Shen et W. J. Chang 786
sphaerocarpa Kuang et A. M. Lu 786
*Hemslowia frutescens* Champ. ex Benth. 209
Henricia Gray 1638
leviuscula (Stimpson) 1638
Hepalicae 67
Hepatica Mill. 341
*asiatica* Nakai 341
henryi (Oliv.) Steward 341
nobilis Schreber var. asiatica (Nakai) Hara 341
*yamatutai* Nakai 341
Hepialidae 1627
Hepialus Fabricius 1627
armoricanus (Oberthur) 1627
*Heptaca latifolia* Gardn. et Champ. 407

*Heptapleurum bodinieri* Lévl. 844
*delavayi* Franch. 844
*hoi* Dunn 845
*hypoleucum* Kurz 845
*khasianum* C. B. Clarke 845
*tripteris* Lévl. 838
Heracleum L. 862
acuminatum Franch. 862
apaensis (Shan et Yuan) Shan et T. S. Wang 862
barmanicum Kurz 862
candicans Wall. ex DC. 862
dissectifolium K. T. Fu 862
dissectum Ledeb. 862
hemsleyanum Diels 863
henryi Wolff 863
millefolium Diels 863
moellendorffii Hance 863
var. subbipinnatum (Franch.) Kitag. 863
*morifolium* Wolff 863
rapula Franch. 863
scabridum Franch. 863
tillifolium Wolff 863
vicinum de Boiss. 863
yungningense Hand. -Mazz. 864
Hericium Pers. ex Gray 27
coralloides (Scop. ex Fr.) Pers. 27
erinaceus (Bull. ex Fr.) Pers. 27
Heritiera Dryand. 749
*chinensis* Retz. 1502
littoralis Dryand. 749
Herminium L. 1544
alaschanicum Maxim. 1544
*altigenum* Schltr. 1544
*angustifolium* Benth. var. *souliei* Finet et W. W. Smith 1545
bulleyi (Rolfe) Tang et Wang 1544
*coeloceras* (Finet) Schltr. 1554
*forcepi* (Finet) Schltr. 1554
*forrestii* Schltr. 1544
josephii Reichb. f. 1544
lanceum (Thunb.) Vuijk 1545
*longicruris* (C. H. Wright) Tang et Wang 1545
monorchis (L.) R. Br. 1545
souliei Rolfe 1545
*tanguticum* (Maxim.) Rolfe 1545
Hernandia L. 299
ovigera L. 299
*sonora* L. 299
Hernandiaceae 299
*Herpestis rugosa* Roth 1136
Herpetospermum Wall. 787
*caudigerum* Wall. 787
pedunculosum (Ser.) C. B. Clarke 787
Hesperiidae 1630
*Hesperis africana* L. 454
*flava* Georgi 453
Heterlamium C. Y. Wu 1074
debile (Hemsl.) C. Y. Wu 1074
var. cardiophyllum (Hemsl.) C. Y. Wu 1074
Heterocentrotus Brandt 1640
mammillatus (Linnaeus) 1640
*Heterochaeta asteroides* DC. 1260
*diplostephioides* DC. 1260
Heterodontidae 1644
Heterodontus Blainville 1644
japonicus Dumeril 1644
zebra (Gray) 1644
Heteropanax Seem. 839
brevipedicellatus Li 839
chinensis (Dunn) Li 840
fragrans (Roxb.) Seem. 840
var. attenuatus C. B. Clarke 840
var. *chinensis* Dunn 840
Heteropappus Less. 1302
altaicus (Willd.) Novopokr. 1302
var. millefolius (Vant.) W. Wang 1302
boweri (Hemsl.) Griers. 1302
crenatifolius (Hand. -Mazz.) Griers. 1303
hispidus (Thunb.) Less. 1303
*samponii* Hance 1262
tataricus (Lindl.) Tamamsch. 1303
Heteropogon Pers. 1445
contortus (L.) Beauv. ex Roem et Schult. 1445
Heterosmilax Kunth 1384
japonica Kunth 1384
var. gaudichaudiana (Kunth) Wang et Tang 1384
yunnanensis Gagnep. 1384
*Heterostalis diversifolium* (Wall. ex Schott) Schott 1481
Heterostemma Wight et Arn. ex Wight 982
alatum Wight 982
esquirolii (Lévl.) Tsiang 982
oblongifolium Cost. 982
*Heterotropa splendens* Mackawa 401
Hexagonia Poll. ex Fr. 31
apiaria (Pers.) Fr. 31
*koenigii* Berk. 31
Hexagrammidae 1688
Hexagrammos Tilesius 1688
atakii Jordan et Starks 1688
Hexanchidae 1643
*Heynea trijuga* Roxb. ex Sims 662
*velutina* How et Chen 662
Hibiscus L. 741
*cancellatus* Roxb. 738
*crinitus* (Wall.) G. Don 738
*esculentus* L. 738
indica (Burm.) f. Hochr. 741
labordei Lévl. 741
*manihot* L. 738
mutabilis L. 741

f. plenus (Andr.) S. Y. Hu 741
*populneus* L. 745
*pungens* Roxb. 738
radiatus Cav 741
rosa-sinensis L. 741
var. rubroplenus Sweet 741
var. *schizopetalus* Mast. 742
sabdariffa L. 741
*sagittifolius* Kurz 739
schizopetalus (Mast.) Hook. f. 742
sinosyriacus Bailey 742
syriacus L. 742
tiliaceus L. 742
trionum L. 742
*Hicriopteris chinensis* (Ros.) Ching 84
*glauca* (Thunb.) Ching 84
laevissima (Christ) Ching 84
Hieracium L. 1303
*croceum* Lamk. 1283
krameri Franch. et Sav. 1303
umbellatum L. 1303
Hierochloe R. Br. 1446
odorata (L.) Beauv. 1446
var. pubescens Krylov 1446
Hierodula patellifera (Serville) 1612
saussurei Kirby 1612
Hippeastrum Herb. 1407
rutillum (Ker-Gawl.) Herb. 1407
vittatum(L'Hérit.) Herb. 1407
Hippo ampus Rafinesque 1673
coronatus Temminck et Schlegel 1673
histrix Kaup 1673
japonicus Kaup 1673
kelloggi Jordan et Snyder 1673
kuda Bleeker 1673
trimaculatus Leach 1673
Hippocastanaceae 679
Hippochaete Milde 77
debilis (Roxb.) Ching 77
hiemale (L.) Borher 77
ramosissima (Desf.) Böerner 77
Hippocrateaceae 704
Hippolytia Pojark. 1303
delavayi (Franch. et W. W. Smith) Shih 1303
kennedyi (Dunn) Ling 1304
Hippophae L. 761
neurocarpa S. W. Liu et T. N. He 761
rhamnoides L. subsp. sinensis Rousi 761
subsp. yunnanensis Rousi 761
thibetana Schlecht. 761
Hipposideridae 1748
Hipposideros Gary 1748
armiger (Hodgson) 1748
bicolor (Temminck) 1748
pratti Thomas 1748
Hippuridaceae 824
Hippuris L. 824
vulgaris L. 824
*Hiptage cavaleriei* Lévl. 507
*Hirneola polytricha* Ment. 24
Hirschioporus flavus (Kl.) Teng 31
fusco-violaceus (Schrad. ex Fr.) Donk 31
Hirudidae 1594
Hirudinea 1594
Hirudo Linnaeus 1594
nipponica (Whitman) 1594
pulchra Song 1594
Hirundinidae 1735
Hirundo Linnaeus 1735
daurica Linnaeus 1735
rustica Linnaeus 1736
*Hisingera racemosa* Sieb. et Zucc. 765
Hodgsonia Hook. f. et Thoms. 787
macrocarpa (Bl.) Cogn. 787
var. capnicarpa (Ridl.) Tsai 787
Holarrhena R. Br. 965
antidysenterica Wall. ex A. DC. 965
Holboellia Wall. 372
angustifolia Wall. 373
coriacea Diels 372
*cuneata* Oliv. 371
fargesii Reaub. 372
grandiflora Reaub. 372
latifolia Wall. 373
Holcoglossum Schltr. 1545
kimballianum (Reichb. f.) Gray 1545
quasipinifolium (Hayata) Schltr. 1545
*Holcus odoratus* L. 1446
Holocheila (Kudo) S. Chow 1074
longipedunculata S. Chow 1074
Holostemma R. Br. 982
annulare (Roxb.) K. Schum. 982
*pictum* Champ. 981
Holothuria Linnaeus 1637
leucospilota (Brandt) 1637
nobilis (Selenka) 1637
scabra Jaeger 1637
vagabunda Selenka 1637
Holothuriidae 1636
Holothurioidea 1636
Holotrichia Hope 1623
diomphalia (Bates) 1623
oblita (Faldermann) 1623
parallela (Motschulsky) 1623
sauteri Moser 1624
sinensis Hope 1624
titanis Reitter 1624
Homalium Jacq. 763
sabiaefolium How et Ko 763
*Homalocladium platycladum* (F. Muell. ex Hook.) L. H. Bailey 220
Homalomena Schott 1476
*calyptratum* (Roxb.) Kunth. 1480
gigantea Engl. 1476
occulta (Lour.) Schott 1476
Homalopteridae 1668

*Homoceltis asper* Bl. 178
Homocodon Hong 1233
brevipes (Hemsl.) Hong 1233
Homoiodoridae 1578
Homoiodoris Bergh 1578
japonica Bergh 1578
Homonoia Lour. 633
riparia Lour. 633
Homstedtia Retz. 1512
hainanensis T. L. Wu et Senjen 1512
Hoplosebastes Schmidt 1687
armatus (Cuvier et Valenciennes) 1687
Hordeum L. 1446
vulgare L. 1446
var. nudum Hook. f. 1446
Hornstedtia Retz. 1512
hainanensis T. L. Wu et Senjen 1512
Horsfieldia Willd. 274
glabra (Bl.) Warb. 274
hainanensis Merr. 274
Hosta Tratt. 1384
ensata Mackawa 1384
plantaginea (Lam.) Aschers. 1384
sieboldiana Engl. 1384
ventricosa (Salisb.) Stearn 1384
*Hotea chinensis* Maxim. 472
*Hottonia sessiliflora* Vahl 1136
Houttuynia Thunb. 387
cordata Thunb. 387
Hovenia Thunb. 712
acerba Lindl. 712
var. kiukiangensis (Hu et Cheng) C. Y. Wu ex C. Y. Chen 712
dulcis Thunb. 712
*robusta* Nakai et Kimura 712
trichocarpa Chun et Tsiang 712
var. robusta (Nakai et Kimura) Y. L. Chen et P. K. Chou 712
Hoya R. Br. 982
carnosa (L. f.) R. Br. 982
*esquirolii* Lévl. 980
fungii Merr. 982
lancilimba Merr. 983
lyi Lévl. 983
pandurata Tsiang 983
pottsii Traill. 983
villosa Cost. 985
Huechys Amyot et Serville 1616
philaemata (Fabricius) 1616
sanguinea (De Geer) 1616
thoracica Distant 1616
Humata Cav. 124
platylepis (Baker) Ching 124
repens (L. f.) Diels 124
tyermannii Moore 124
Humulus L. 190
*cordifolia* Miq. 190
*japonicus* Sieb. et Zucc. 190
lupulus L. 190
var. cordifolia (Miq.) Maxim. 190
scandens (Lour.) Merr. 190
*Hwolirion montana* (Damm.) Wang et Tang ex P. C. Kou 1388
Huperzia Bernh. 69
chinensis (Christ) Ching 69
crispata (Ching) Ching 69
emeiensis(Ching et H. S. Hung) Ching et H. S. Hung 69
miyoshiana (Makino) Ching 69
selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. 69
serrata (Thunb.) Trevis. 69
f. intermedia (Nakai) Ching 70
f. longipetiolata (Spreng) Ching 70
Huperziaceae 69
Huso Brandt 1650
dauricus (Georgi) 1651
Hydaticus bowringi Clark 1619
Hydnaceae 27
Hydnocarpus Gaertn. 763
alpina Wight 763
anthelminticus Pierre et Laness 763
hainanensis (Merr.) Sleum. 763
kurzii Warburg 763
*merrillianus* Li 764
wightiana Bl. 763
*Hydnum coralloides* Scop. ex Fr. 27
*erinaceus* Bull. ex Fr. 27
*fuligineo-album* Fr. 27
*imbricatum* L. ex Fr. 27
Hydrangea L. 479
angustipetala Hayata 479
anomala D. Don 479
aspera D. Don 479
subsp. *strigosa* (Rehd.) McClin. 480
chinensis Maxim. 479
davidii Franch. 479
hypoglauca Rehd. 479
linkweiensis Chun 479
longipis Franch. 479
var. *rosthornii* (Diels) W. T. Wang 480
macrophylla (Thunb.) Ser. ex DC. f. hortesia Wils. 480
*moellendorffii* Hance 474
paniculata Sieb. 480
robusta Hook. f. et Thoms. 480
*rosthornii* Diels 480
stenophylla Merr. et Chun 480
strigosa Rehd. 480
var. macrophylla Rehd. 480
*umbellata* Rehd. 479
villosa Rehd. 480
xanthoneura Diels 481
Hydrargyrum 1788
Hydridae 1566
Hydrilla Rich. 1360
verticillata (L. f.) Rich. 1360

Hydrobiotite Schist 1790
Hydrocharitaceae 1360
Hydrocharis L. 1360
*asiatica* L. 1360
dubia (Bl.) Backer 1360
Hydrocotyle L. 864
*asiatica* L. 857
*batrachium* Hance 864
chinensis (Dunn) Craib 864
handelii Wolff 864
*javanica* Thunb. var. *chinensis* Dunn ex Shan et S. L. Liou 864
nepalensis Hook. 864
*rotundifolia* Roxb. 864
*sibthorpoides* Lam. 864
var. batrachium (Hance) Hand.-Mazz. ex Shan 864
wilfordi Maxim. 864
Hydromica 1790
Hydrophiidae 1710
Hydrophis caerulescens (Shaw) 1710
cyanocinctus Daudin 1710
fasciatus atriceps Guenther 1710
melanocephalus (Gray) 1710
ornatus (Gray) 1710
Hydropotes Swinhoe 1772
inermis Swinhoe 1772
*Hydrotrophius echinosperma* C. B. Clarke 1360
Hydrozincitum 1792
Hydrozoa 1566
Hygrophila R. Br. 1169
*megalantha* Merr. 1169
salicifolia (Vahl) Nees var. megalantha (Merr.) H. S. Lo 1169
Hyla Laurenti 1696
annectans (Jerdon) 1697
arborea immaculata Boettger 1696
chinensis Guenther 1696
*japonica* Guenther 1696
sanchiangensis Pope 1697
tsinlingensis Liu et Hu 1697
Hylidae 1696
Hylobates Illiger 1750
concolor (Harlan) 1750
Hylobatidae 1750
Hylocereus (Berger) Britt. et Rose 262
nudatus (Haw.) Britt. et Rose 262
Hylomecon Maxim. 439
japonica (Thunb.) Prantl et Kundig 439
var. dissecta (Franch. et Sav.) Fedde 440
var. subincisa Fedde 440
*vernalis* Maxim. 439
Hylopetes alboniger Hodgson 1754
Hylotelephium H. Ohba 462
angustum (Maxim.) H. Ohba 462
erythrostictum (Miq.) H. Ohba 463
mingjinianum (S. H. Fu) H. Ohba 463
pallescens (Freyn) H. Ohba 463
purpureum (L.) S. H. Fu 463
spectabile (Bor.) H. Ohba 463
verticillatum (L.) H. Ohba 463
Hymenachne Beauv. 1446
assamica (Hook. f.) Hitchc. 1446
pseudointerrupta C. Muell. 1446
Hymenocallis Salisb. 1407
*americana* Roem. 1407
littoralis (Jacq.) Salisb. 1407
Hymenodictyon Wall. 1003
excelsum (Roxb.) Wall. 1003
flaccidum Wall. 1003
Hymenogastraceae 48
Hymenolobus Nutt. 453
procumbens (L.) Nutt. 453
Hymenophyllaceae 86
Hymenophyllum Smith 86
barbatum (v. d. B.) Baker. 86
khasyanum Hook. et Baker 86
*osmundoides* v. d. B. 86
Hymenopogon Wall. 1003
oligocarpus Li 1003
parasiticus Wall. var. longiflorus How 1004
Hynobiidae 1694
Hynobius Tschudi 1694
chinensis Güenther 1694
Hyoscyamus L. 1119
*agrestis* Kit. ex Schult. 1119
bohemicus F. W. Schmidt 1119
niger L. 1119
*physaloides* L. 1124
pusillus L. 1119
*Hypaelytrum microcephala* R. Br. 1495
Hypecoum L. 440
chinensis Franch. 440
erectum L. 440
leptocarpum Hook. f. et Thoms. 440
parviflorum Kar. et Kir. 440
Hypericum L. 420
acmosepalum N. Robson 421
augustini N. Robson 421
ascyron L. 421
attenuatum Choisy 421
beanii N. Robson 421
bellum Li 421
*bodinieri* Lévl. et Vant. 424
*chinensis* L. 423
*cochinchinense* Lour. 419
*delavayi* R. Keller 424
elodeoides Choisy 421
elongatum Ledeb. 421
erectum Thunb. 422
faberi R. Keller 422
hengshanensis W. T. Wang 421
hirsutum L. 422
hookerianum Wight et Arn. 422
kouytchouensis Lévl. 422

japonicum Thunb. 422
longistylum Oliv. 422
mouanthemum Hook. f. et Thoms. 422
monogynum L. 423
patulum Thunb. 423
*patulum* Thunb. var. *henryi* Veitch. ex Bean 421
perforatum L. 423
petiolulatum Hook. f. et Thoms. 423
subsp. yunnanensis (Franch.) N. Robson 423
przewalskii Maxim. 423
sampsonii Hance 423
scabrum L. 422
seniawinii Maxim. 424
-ralum Buch. -Ham. ex D. Don 424
wightianum Wall. ex Wight et Arn. 424
wilsonii N. Robson 424
*yunnanense* Franch. 423
Hypnaceae 66
Hypnum Hedw. 66
*cymbifolium* Doz. et Molk. 65
*filicinum* Hedw. 65
*microphyllum* Hedw. 65
plumaeforme Wils. 66
*riparium* L. ex Hedw 66
*serpens* L. ex Hedw. 65
Hypocreaceae 21
Hypocrella Sacc. 21
bambusae (Berk et Br.) Sacc. 21
Hypodematiaceae 103
Hypodematium Kunze 103
crenatum (Forsk.) Kuhn. 103
sinense Iwatsuki 103
Hypoestes Soland ex R. Br. 1169
poilanei R. Br. 1169
purpurea (L.) R. Br. 1169
*sinica* Miq. 1169
triflora (Forssk.) Roem et Schult. 1170
Hypolepidaceae 90
Hypolepis Bernh. 90
punctata (Thunb.) Mett. 90
Hypophthalmichthys Bleeker 1662
molitrix (Cuvier et Valenciennes) 1662
Hypopitys Hill 882
monotropa L. 882
*Hypoporum pergracilis* Nees 1499
Hypoprion atripinnis Chu 1646
Hypoxidaceae 1409
Hypoxis L. 1410
aurea Lour. 1410
*spicata* Thunb. 1364
Hypselectris swinhonis (Günther) 1683
Hypserpa Miers 377
nitida Miers 377
Hyptis Jacq. 1074
rhomboidea Mart. et Gal. 1075
*stachyodes* Link 1070
suaveolens (L.) Poit. 1075
Hyriopsis Conrad 1585
cumingii (Lea) 1585
Hyssopus L. 1075
ambiguus (Trautv.) Iljin 1075
cuspidatus Boiss. 1075
var. albiflorus C. Y. Wu et H. W. Li 1075
latilabiatus C. Y. Wu et H. W. Li 1075
*lophanthoides* Buch. -Ham. ex D. Don 1078
macranthus Boiss. 1075
*officinalis* L. var. *ambiguus* Trautv. 1075
Hystricidae 1755
Hystrix Linnaeus 1755
hodgsoni (Gray) 1755
yunnanensis Anderson 1755

## I

Ia io Thomas 1747
Icacinaceae 707
Ichnocarpus R. Br. 965
frutescens (L.) Ait. 965
f. pubescens Markger. 965
oliganthus Tsiang 965
Ichthyoxenus Zimmer 1599
japonensis Richardson 1599
sinensis Shen 1599
tchangi Yu 1599
Idesia Maxim. 764
*polycarpa* Maxim. 764
Ilex L. 687
aculeolata Nakai 687
angulata Merr. et Chun 687
asprella (Hook. et Arn.) Champ. ex Benth. 687
bioritsensis Hayata 687
centrochinensis S. Y. Hu 687
*corallina* Franch. 688
var.pubescens S. Y. Hu 688
cornuta Lindl. 688
dasyphylla Merr. 688
dipyrena Wall. 688
dolichopoda Merr. et Chun 688
ficoidea Hemsl. 688
fragilis Hook. f. 688
franchetiana Loes. 688
georgei Comb. 688
godajam (Colebr.) Wall. 689
hainanensis Merr. 687
*heterophylla* G. Don 942
hylonoma Hu et Tang var. glabra S. Y. Hu 689
japonica Thunb. 369
kudingcha C. J. Tseng 689
kwangtungensis Merr. 689
latifolia Thunb. 689
lepta Spreng. 647
lohfauensis Merr. 690

macrocarpa Oliv. 689
var. longipendunculata S. Y. Hu 689
metabaptista Loes. ex Diels 689
micrococca Maxim. 689
f. pilosa S. Y. Hu 689
var. *polyneura* Hand.-Mazz. 690
pedunculosa Miq. 690
pernyi Franch. 690
perryana S. Y. Hu 689
polyneura (Hand.-Mazz.) S. Y. Hu 690
pubescens Hook. et Arn. 690
f. glaber Chang 690
var. kwangsiensis Hand.-Mazz. 690
purpurea Hassak. 690
racemosa Oliv. 702
rotunda Thunb. 691
var. microcarpa (Lindl. et Paxt.) S. Y. Hu 691
serrata Thunb. 691
stewardia S. Y. Liu 687
suaveolens (Levl.) Loes. 691
szechwanensis Loes. 691
theicarpa Hand.-Mazz. 687
*triflora* Bl.var. *viridis* (Champ. ex Benth.) Loes. 691
viridis Champ. ex Benth. 691
wilsonii Loes. 691
yunnanensis Franch. 691
Ilisha Richardson 1652
elongata (Bennett) 1652
*Illecebrum sessile* L. 259
Illiciaceae 279
Illicium L. 279
brevistylum A. C. Smith 279
difengpi K. I. B. et K. I. M. 279
dunnianum Tutcher 279
fargesii Finet et Gagnep. 280
henryi Diels 280
var. multistamineum A. C. Smith 280
jiadifengpi B. N. Chang 279
lanceolatum A. C. Smith 280
macranthum A. C. Smith 281
majus Hook. f. et Thoms. 279
micranthum Dunn 280
oligandrum Merr. et Chun 280
pachyphyllum A. C. Smith 280
religiosum Sieb. et Zucc. 280
simonsii Maxim. 281
ternstroemioides A. C. Smith 281
verum Hook. f. 281
*yunnanense* (Franch.) Franch. ex Finet et Gagnep. 281
Illigera Bl. 299
celebica Miq. 299
cordata Dunn var. mollisima (W. W. Smith) Kubitzki 299
*dunniana* Lévl. 300
grandiflora W. W. Smith et J. F. Jeffrey 299
henryi W. W. Smith 300
*mollisima* W. W. Smith 299
parviflora Dunn 300
*rhodantha* Hance 300
var. dunniana (Levl.) Kubitzki 300
*Ilysanthes serrata* (Roxb.) Urban 1138
Impatiens L. 683
apalophylla Hook. f. 683
arguta Hook. f. et Thoms. 683
var. *bulleyana* Hook. f. 683
balsamina L. 684
blepharosepala Pritz. ex Diels 684
brachycentra Kar. et Kir. 684
chinensis L. 684
*claviger* Hook. f. 684
commellinoides Hand.-Mazz. 684
cyanatha Hook. f. 684
davidii Franch. 684
delavayi Franch. 685
dicentra Franch. 685
henryi Pritz. et Diels 685
holocentra Hand.-Mazz. 685
lasiophyton Hook. f. 684
leptocaulon Hook. f. 685
longialata Pritz. ex Diels 685
loulanensis Hook. f. 684
microcentra Hand.-Mazz. 685
noli-tangere L. 685
obesa Hook. f. 685
omeiana Hook. f. 686
parviflora DC. 684
pinfanensis Hook. f. 686
pritzelii Hook. f. var. hupehensis Hook. f. 686
pterosepala Pritz. ex Diels 686
recurvicornis Maxim. 686
*siculifer* Hook. f. 686
stenosepala Pritz. ex Diels 686
textori Miq. 686
tienchuanensis Y. L. Chen 686
uliginosa Franch. 687
wilsonii Hook. f. 684
Imperata Cyrillo 1446
cylindrica (L.) Beauv. var. major (Nees) C. E. Hubb. ex C. E. Hubb. et Vaughan. 1447
*koenigii* (Retz.) Beauv. var. *major* Nees 1447
saccharifiora Maxim. 1449
Incarvillea Juss. 1161
arguta (Royle) Royle 1161
beresowskii Batal. 1161
compacta Maxim. 1161
var. *grandiflora* Wehrhahn 1162
delavayi Bur. et Franch. 1161
lutea Bur. et Franch. 1161
mairei (Levl.) Griers. 1161
var. grandiflora (Wehrhahn) Griers. 1162

sinensis Lam. 1162
subsp. variabilis (Batal.) Griers. 1162
*variabilis* Batal. 1162
younghusbandii Sprague 1162
indigofera L. 579
amblyantha Craib 579
atropurpurea Buch.-Ham. 579
bungeana Steud. 579
carlesii Craib 579
cooperi Craib 579
decora Lindl. 579
var. ichangensis (Craib) Y. Y. Fang et C. Z. Zheng 579
esquirolii Lévl. 580
fortunei Craib 579
galegoides DC. 580
hancockii Craib 580
hirsuta L. 580
kirilowii Maxim. ex Palib. 580
litoralis Chun et T. Chen 580
mentzeana Craib 580
neopolygaloides Hu ex Wang et Tang 580
parkesii Craib 579
potaninii Craib. 579
pseudotinctoria Matsum. 580
*rotundifolia* Lour. 572
stachyoides Lindl. 580
suffruticosa Mill. 581
teysmannii Miq. 581
tinctoria L. 581
trifoliata L. 581
Indocalamus Nakai 1447
latifolius (Keng) McClure 1447
tessellatus (Munro) Keng f. 1447
Indosasa McClure 1447
crassiflora McClure 1447
*Inga clypearia* Jack. 595
*timoriana* A. DC. 593
Inimicus Jordan et Starks 1687
japonicus (Cuvier et Valenciennes) 1687
Inonotus Karst. emend. Imaz. 31
cuticularis (Bull. ex Fr.) Karst. 31
orientalis (Lloyd) Teng 32
sciurinus Imaz. 32
tabacinus (Mont.) Karst. 32
Inula L. 1304
ammiphila Bunge 1306
britanica L. 1304
cappa (Buch.-Ham.) DC. 1304
caspica Bl. 1304
*caspica* Ledeb. 1304
*chrysantha* Diels 1325
helenium L. 1304
helianthus-aquatica C. Y. Wu et Ling 1305
subsp. *hupehensis* Ling 1305
hookeri C. B. Clarke 1305
hupehensis (Ling) Ling 1305
indica L. 1322
var. *hypoleuca* Hand.-Mazz. 1323
japonica Thunb. 1305
linariaefolia Turcz. 1305
nervosa Wall. 1305
hupehensis (Ling) Ling 1305
*prostrata* Gilib. 1326
pterocaula Franch. 1306
racemosa Hook.f. 1306
rhizocephala Schrenk 1306
salicina L. 1306
subsp. *asiatica* (Kitam.) Kitag. 1306
salsoloides (Turcz.) Ostenf. 1306
*serrata* Bur. et Franch. 1305
Insecta 1609
Invertebrates 1565
*Involucraria lepiniana* Naud. 795
*wallichiana* Ser. 797
Iodes Bl. 707
balansae Gagnep. 707
cirrhosa Turcz. 708
seguini (Lévl.) Rehd. 708
vitiginea (Hance) Hemsl. 708
*Ioxoste hirtipes* Migo var. *lanuginosa* Migo 291
Ipomoea L. 1028
aquatica Forsk. 1028
batatas (L.) Lam. 1028
*boisiana* Gagnep. 1028
var. *fulvopilosa* Gagnep. 1029
cairica (L.) Sweet 1028
digitata L. 1028
*hungaiensis* Lingelsh. et Borza 1029
var. *linifolia* C. C. Huang ex C. Y. Wu et H. W.Li 1029
*kadsura* Choisy 390
pes-caprae (L.) Sweet 1028
*sinensis* (Desr.) Choisy 1023
Iresine R. Br 261
herbstii Hook. f. ex Lindl. 261
Iridaceae 1417
Iris L. 1418
anguifuga Y. T. Zhao ex X.J. Xue 1419
chrysographes Dykes 1419
collettii Hook. f. 1419
confusa Sealy 1419
decora Wall. 1419
dichotoma Pall. 1419
ensata Thunb. 1419
germanica L. 1420
goniocarpa Baker 1420
*grijsii* Maxim. 1422
halophila Pall. 1420
var. sogdiana (Bunge) Grubov 1420
japonica Thunb. 1420
f. pallescens P. L. Chiu et Y. T. Zhao 1420
*kaempferi* Sieb. 1419
lactea Pall. var. chinensis (Fisch.) Koidz. 1420

loczyi Kanitz 1421
*pallasii* Fisch. var. *chinensis* Fisch. 1420
potaninii Maxim. 1421
var. ionantha Y. T. Zhao 1421
proantha Diels var. valida (Chien) Y. T. Zhao 1421
*pseudorossii* Chien var. *valida* Chien 1421
ruthenica Ker-Gawl. var. nana Maxim. 1421
sanguinea Dunn ex Horn. 1421
scariosa Willd. ex Link 1421
setosa Pall. ex Link 1421
*sogdiana* Bunge 1420
songarica Schrenk 1421
speculatrix Hance 1422
tectorum Maxim. 1422
tenuifolia Pall. 1422
tigridia Bunge 1422
typhifolia Kitag. 1422
uniflora Pall. ex Link 1422
wattii Baker ex Hook. f. 1422
wilsonii C. H. Wright 1423
Isachne R.Br. 1447
glonosa (Thunb.) O.Kuntze 1447
Isatis L. 453
indigotica Fort. 453
minima Bunge 453
oblobgata DC. 453
*Ischaemum ophiuroides* Munro 1444
Ischnochiton Gray 1570
hakodadensis Pilsbry 1570
Ischnochitonidae 1570
Ischnogyne Schltr. 1545
mandarinorum (Kranzl.) Schltr. 1545
Ishige Yendo 8
foliacea Okam 8
okamurae Yendo 8
Ishigeaceae 8
Isodon (Schrad. ex Benth.) Kudo 1075
adenanthus (Diels) Kudo 1075
amethystoides (Benth.) C. Y. Wu et Hsuan 1075
angustifolius (Dunn) Kudo 1076
bulleyanus (Diels) Kudo 1076
coetsoides (C. Y. Wu) Hara 1076
coetsus (Buch.-Ham. ex D. Don) Kudo 1076
enanderianus (Hand. -Mazz.) Hara 1076
eriocalyx (Dunn) Kudo 1076
excisus (Maxim.) Kudo 1077
*glaucocalyx* (Maxim.) Kudo 1078
henryi (Hemsl.) Kudo 1077
hispidus (Benth.) Murata 1077
inflexus (Thunb.) Kudo 1077
irroratus (Forrest ex Diels) Kudo 1077
japonicus (Burm.) Hara 1077
var. glaucocalyx (Maxim.) Hara 1078
longitubus (Miq.) Kudo 1078
lophanthoides (Buch. -Ham. ex D. Don) Hara 1078
var. gerardianus (Benth.) Hara 1078
var. graciliflorus (Benth.) Hara 1078
macrophyllus (Migo) Hara 1078
megathyrsus (Diels) C. Y. Wu et Hsuan 1079
nerbosus (Hemsl.) Kudo 1079
phyllostachys (Diels) Kudo 1079
pseudo-irrorata (C. Y. Wu) Hara 1079
*pubescens* (Hemsl.) C. Y. Wu et Hsuan 1080
racemosus (Hemsl.) Hara 1079
rosthornii (Diels) Kudo 1079
rubescens (Hemsl.) Hara 1079
rugosus (Wall.) Codd. 1080
sculoneata (Vaniot) Kudo 1080
serra (Maxim.) Kudo 1080
stracheyi (Benth. ex Hook. f.) Kudo 1080
ternifolius (D. Don) Kudo 1080
yunnanensis (Hand.-Mazz.) Hara 1081
Isometrum Craib 1187
lancifolium (Franch.) K. Y. Pan 1187
Isopyrum L. 341
*adoxoides* DC. 346
*auriculatum* Franch. 339
*cavaleriei* Levl. et Vant. 318
*dalzielii* Drumm. et Hutch. 339
*fargesii* Franch. 339
*franchetii* Finet et Gagnep. 339
*fumarioides* L. 341
*henryi* Oliv. 354
manshuricum Kom. 341
*microphylla* Royle 343
*peltatum* Franch. 318
*suichuenense* Franch. 340
*vaginatum* Maxim. 346
*Isotrema transsectum* Chatt. 397
Itea L. 481
amoena Chun 481
cariacea C. Y. Wu 481
chinensis Hook. et Arn. 481
var. oblonga (Hand.-Mazz.) C.Y.Wu 481
glutinosa Hand.-Mazz. 481
ilicifolia Oliv. 481
indochinensis Merr. 482
macrophylla Wall. 482
*oblonga* Hand. -Mazz. 481
pubinervia H. T. Chang 482
yunnanensis Franch. 481
*Ithyphallus rugulosus* Fisch. 47
Itoa Hemsl. 764
orientalis Hemsl. 764
var. glabrescens C. Y. Wu 764
Ixeris Cass. 1306
chelidonifolia Stebb. var. saxatilis (Baranov) Zhu et C.J. Guo 1306
chinensis (Thunb.) Nakai 1307
var. graminifolia (Ledeb.) H.C.Fu 1307
subsp. versicolor (Fisch.) Kitam. 1307
debilis A. Gray 1307
dentata (Thunb.) Nakai 1307

denticulata (Houtt.) Stebb 1307
subsp. pubescens Stebb. 1307
gracilis (DC.) Stebb. 1308
humifusa (Dunn) Stebb. 1308
*japonica* Nakai 1307
laevigata (Bl.) Sch.-Bip. 1308
polycephala Cass. 1308
repens A. Gray 1308
*saxatilis* Baranov. 1306
sonchifolia (Bunge) Hance 1308
var. serotina (Maxim.) Kitag. 1308
*Ixia chinensis* L. 1417
*crocata* Thunb.
Ixobrychus Billberg 1715
cinnamomeus (Gmelin) 1715
Ixora L. 1004
cephalophora Merr. 1004
chinensis Lam. 1004
coccinea L. var. lutea Corner 1004
henryi Lévl. 1004
nienkui Merr. et Chun 1004

## J

*Jambolifera pedunculata* L. 642
Japalura Gray 1703
flaviceps Barbour et Dunn 1703
polygonata (Hallowell) 1703
splendida Barbour et Dunn 1703
Jasminum L. 936
albicalyx Kobuski 936
amplexicaule Buch.-Ham. ex G. Don 936
beesianum Forrest et Diels 936
coarctatum Roxb. 936
duclouxii (Levl.) Rehd. 936
floridum Bunge 936
subsp. giraldii (Diels) Miao 936
*giraldii* Diels 936
grandiflorum L. 937
*heterophyllum* var. *glabricymosum* W. W. Smith 938
humile L. 937
var. siderophyllum (Lévl.) Kobuski 937
lanceolarium Roxb. 937
laurifolium Roxb. 937
*mairei* Lévl. var. *siderophyllum* Lévl. 937
mesnyi Hance 937
nervosum Lour. 937
nudiflorum Lindl. 937
officinale L. 938
f. *grandiflorum* (L.) Kobuski 937
pentancurum Hand.-Mazz. 938
polyanthum Franch. 938
sambac (L.) Ait. 938
sequinii Lévl. 938
sinense Hemsl. 938
subhumile W. W. Smith var. glabricymosum (W. W. Smith) Miao ex P. Y. Bai 938
urophyllum Hemsl. 938
*violascens* Lingelsh. 936
Jatropha L. 633
curcas L. 633
*moluccana* L. 619
*montana* Willd. 621
podagrica Hook. 633
Jeffersonia Berton 367
dubia (Maxim.) Benth. et Hook. f. 367
Johnius Bloch 1678
belengerii (Cuvier et Valenciennes) 1678
Juglandaceae 159
Juglans L. 160
cathayensis Dode 160
var. formosana (Hayata) A. M. Lu et R. H. Chang 160
*formosana* Hayata 160
illinoinensis Wangenh. 159
mandshurica Maxim. 160
regia L. 161
Juncaceae 1424
Juncaginaceae 1361
Juncellus (Griseb.) C.B. Clarke 1494
serotinus (Rottb.) C.B. Clarke 1494
Juncus L. 1424
alatus Franch. et Sav. 1424
allioides Franch. 1424
amplifolius A. Camus 1424
articulatus L. 1424
bufonius L. 1424
compressus Jacq. 1424
var. *gracillimus* Buchen. 1425
diastrophanthus Buchen. 1424
effusus L. 1424
inflexus L. 1425
*glaucus* Ehrh. ex Sibth. 1425
gracillimus (Buchen.) V. Krecz. et Gontsch. 1425
*lampocarpus* Ehrh. ex Hoffm. 1424
leschenaultii Gay 1425
modicus N. E. Br. 1425
*multiflora* Retz. 1426
przewalskii Buchen. 1425
setchuensis Buchen. 1425
var. effusoides Buchen. 1425
thomsonii Buchen. 1426
triceps Rostk. 1426
*Jungermannia moniliata* Reinw., Bl. et Nees. 68
Juniperus L. 150
*chinensis* L. 151
communis L. 150
*convallium* Rehd. et Wils. 151
*davurica* Pall. 152
formosana Hayata 150
*pseudosabina* Fisch. et Mey. 152
recurva Buch.-Ham. 152
rigida Sieb. et Zucc. 150
*saltuaria* Rehd. et Wils. 152
sibirica Burgsd. 151

*squamata* Buch.-Ham. 152
var. *forgesii* Cheng f. et L. K. Fu 152
var. *wilsonii* Rehd. 152
Jurinea Cass. 1308
*forrestii* Diels 1289
*mirabilis* Anth. 1289
mongolica Maxim. 1308
multifolia (L.) B. Fedtsch. 1309
*picridifolium* Hand.-Mazz. 1288
*souliei* Franch. 1289
*Jussiaea adscendens* L. 822
*hyssopifolia* G. Don 822
*linifolia* Vahl. 822
*prostrata* (Roxb.) Lévl. 822
*repens* L. 822
*suffruticosa* L. 822
*Justicia adhatoda* L. 1164
*baphica* Spreng. 1171
*chinensis* L. 1168
*curviflorus* Wall. 1171
*gangetica* L. 1165
*gendarussa* Burm. f. 1168
*leptostachya* Hemsl. 1170
*nasuta* L. 1172
*nutans* Burm. f. 1167
*paniculata* Burm. f. 1165
*pectinata* L. 1173
*procumbens* L. 1172
*purpurea* L. 1169
*quadrifolia* Wall. 1166
*salicifolia* T. Andres. 1167
*triflora* Forssk. 1170
*ventricosa* Wall. 1168
*vitellinus* Roxb. 1171
*yunnanensis* C. B. Clarke 1166
Jynx Linnaeus 1734
torquilla Linnaeus 1734

## K

Kaburagia ensigallis (Tsai et Tang) 1617
ovatirhusicola Xiang 1617
ovogallis (Tsai et Tang) 1617
rhusicola Takagi 1617
Kadsura Juss. 275
angustifolia A. C. Smith 275
*chinensis* Turcz. 276
coccinea (Lem.) A. C. Smith 275
*grandiflora* Wall. 277
heteroclita (Roxb.) Craib 275
interior A. C. Smith 275
longepedunculata Finet et Gagnep. 275
oblongifolia Merr. 276
*peltigera* Rehd. et Wils. 275
polysperma Yang 276
Kaempferia L. 1512
galanga L. 1512
larifolia (Dunn) Y. H. Chen 1512
*involucrata* King ex Bak. 1513
marginata Carey 1512
f. alba Y. H. Chen 1512
rotunda L. 1512
*yunnanensis* Gagnep. 1508
Kalanchoe Adans. 464
laciniata (L.) DC. 464
spathulata DC. 464
*verticillata* Elliot 464
Kalimeris Cass. 1309
incisa (Fisch.) DC. 1309
indica (L.) Sch.-Bip. 1309
var. stenopis (Hand.-Mazz.) Kitam. 1309
integrifolia Turcz. ex DC. 1309
lautureana (Debx.) Kitam. 1309
mongolica (Franch.) Kitam. 1309
shimadae (Kitam.) Kitam. 1310
Kalopanax Miq. 840
septemlobus (Thunb.) Koidz. 840
var. magnificus (Zabel) Hand.-Mazz. 840
var. maximowiczii (V. Houtte) Hand.-Mazz. 840
Keiskea Miq. 1081
elsholtzioides Merr. 1081
Kelloggia Torr. 1004
chinensis Franch. 1004
Kerria DC. 510
japonica (L.) DC. 510
f. plenilora (Witte) Rehd. 510
Keteleeria Carr. 143
cyclolepis Flous 143
davidiana (Bertr.) Beissn. 143
evelyniana Mast. 143
*fabri* Mast. 142
fortunei (Murr.) Carr. 144
Kingdium P. F. Hunt 1546
decumbens (Griff.) P. F. Hunt 1546
Kingdonia Balf. f. et W. W. Smith 341
uniflora Balf. f. et W. W. Smith 341
Kinostemon Kudo 1081
alborubrum (Hemsl.) C. Y. Wu et S. Chow 1081
*bidentatum* (Hemsl.) Kudo 1113
ornatum (Hemsl.) Kudo 1081
f. falcatum C. Y. Wu 1081
Kirengeshoma Yatabe 482
palmata Yatabe 482
Knoxia L. 1005
corymbosa Willd. 1005
valerianoides Thorel ex Pitard 1005
Kochia Roth 255
*dasyphylla* Fisch. et Mey. 253
prostrata (L.) Schrad. 255
scoparia (L.) Schrad 256
var. sieversiana (Pall.) Ulbr. ex Aschers. et Graebn. 256
f. trichophila (Hort. ex Tribune) Sching et Thell. 256
*suffruticulosa* Less. 255

Koelreuteria Laxm. 677
bipinnata Franch. 677
var. integrifolia (Merr.) T. Chen 678
*integrifolia* Merr. 678
paniculata Laxm. 678
Kopsia Bl. 965
officinalis Tsiang et P. T. Li 965
Korthalsella Van Tiegh. 212
japonica (Thunb.) Engl. 212
*opuntia* (Thunb.) Merr. 212
*Kroscheninikovia davidii* Franch. 245
*heterophylla* Miq. 245
*latens* J. F. Gmel. 253
*sylvatica* Maxim. 245
Kronopolites Attems 1608
acuminatus biagrilectus Hoffman 1608
svenhedini (Verhoeff) 1608
swirhoei (Pocock) 1608
Kummerowia Schindl. 581
stipulacea (Maxim.) Makino 581
striata (Thunb.) Schindl. 581
Kydia Roxb. 742
calycina Roxb. 742
Kyllinga Rottb. 1495
brevifolia Rottb. 1495
var. leiolepis (Franch. et Sav.) Hara 1495
calycina Roxb.
cororata (L.) Dauce 1495
*monocephala* Rottb. 1495
nemoralis (J. R. et G. Forst.) Dandy ex Hutch. et Dalziel 1495
*sumatrensis* Retz. 1496
triceps Rottb. 1495

## L

Labiatae 1056
Labridae 1680
Laccaria amethystea (Bull. ex Fr.) Murr. 36
laccata (Scop. ex Fr.) Berk. et Br. 36
proxina (Boud.) Pat. 36
Laccifer Oken 1618
lacca (Kerr) 1618
Lacciferidae 1618
Lacertidae 1705
Lactariidae 1676
Lactarius DC. ex Gray 44
camphoratus (Bull.) Fr. 45
hatsudake Tanake 45
hygrophoroides Berk. et Curt. 45
insulsus Fr. 45
picinus Fr. 45
piperatus (L. ex Fr.) Gray 45
subvellereus Peck 45
subzonarius Hongo 45
vellereus (Fr.) Fr. 45
volemus Fr. 45
Lactuca L. 1310
*atropurpurea* Franch. 1290
*chinensis* (Thunb.) Makino 1307
*diversifolia* auct. non Vant. 1322
*elata* Hemsl. 1325
*erythrocarpa* Vant. 1356
*formosana* Maxim. 1325
*gracilis* DC. 1308
*humifusa* Dunn 1308
*indica* L. 1325
*lignea* Vant. 1284
*napifera* Franch. 1284
*polycephala* (Cass.) Benth. 1308
*raddeana* Maxim. 1325
var. *elata* (Hemsl.) Kitam. 1325
sativa L. 1310
serriola Torner 1310
*sibirica* (L.) Benth. ex Maxim. 1310
*sororia* Miq. 1322
*tatarica* (L.) C. A. Mey. 1320
*triangulata* Maxim. 1325
*Laetiporus sulphureus* (Bull. ex Fr.) Bond. et Sing. 35
Laganiaceae 944
Lagarosiphon Harv. 1360
alternifolius (Roxb.) Druce 1360
Lagedium Sojak 1310
sibiricum (L.) Sojak 1310
Lagenaria Ser. 787
*microcarpa* Naud. 788
siceraria (Molina) Standl. 787
var. depressa (Ser.) Hara 787
var. hispida (Thunb.) Hara 788
var. microcarpa (Naud.) Hara 788
*vulgaris* Ser. *Y. depressa* Ser. 787
Lagerstroemia L. 798
indica L. 798
f. alba (Nichols.) Rehd. 798
f. latifolia Koehne 798
speciosa (L.) Pers. 798
subcostata Koehne 799
tomentosa Presl 799
Laggera Sch.-Bip. ex Hochst. 1310
alata (D. Don) Sch.-Bip. ex Oliv. 1310
pterodonta (DC.) Benth. 1311
Lagocephalus inermis (Temminck et Schlegel) 1692
Lagochilus Bunge 1082
grandiflorus C. Y. Wu et Hsuan 1082
Lagopsis (Bunge ex Benth.) Bunge 1082
flava Kar. et Kir. 1082
supina (Steph. ex Willd.) Ik.-Gal. ex Knorr. 1082
*Lagoseris Versicolor* Fisch. ex Link 1307
Lagotis Gaertn. 1135
alutacea W. W. Smith 1135
var. rockii (Li) Tsoong 1135
brachystachya Maxim. 1135
brevituba Maxim. 1135
clarkei Hook. f. 1135

decumbens Rupr. 1135
glauca Gaertn. 1135
integra W. W. Smith 1135
integrifolia (Willd.) Schischk.ex Vikul. 1135
kunawurensis (Royle et Choisy) Rupr. 1135
praecox W. W. Smith 1135
*rockii* Li 1135
spectabilis Kurz 1135
Lamellibranchia 1580
Lamiidae 1625
Laminaria Lamx. 9
japonica Aresch. 9
Laminariaceae 9
Lamiophlomis Kudo 1082
rotata (Benth.) Kudo 1082
Lamium L. 1082
album L. 1082
var. *barbatum* (Sieb. et Zucc.) Franch. 1083
amplexicaule L. 1083
barbatum Sieb. et Zucc. 1083
*chinense* Benth. 1072
*cornata* Vaniot 1096
*kouyangense* Vaniot 1112
Lampetra Gray 1643
japonica (Martens) 1643
morii (Berg) 1643
reissneri (Dybowsky) 1643
Lamprotula bazini (Heude) 1584
caveata (Heude) 1584
fibrosa (Heude) 1584
gottschei (Von Martens) 1585
leai (Gray) 1584
mansuyi (Dautzenberg et Fischer) 1584
polysticta (Heude) 1584
rochechouarti (Heude) 1584
scripta (Heude) 1584
tientsinensis (Crosse et Debeaux) 1584
tortuosa (Lea) 1584
triclava (Heude) 1584
zonata (Heude) 1584
Lampteromyces japonicus (Kawam.) Sing. 36
Lampyridae 1620
Lancea Hook. f. et Thoms. 1135
tibitica Hook. f. et Thoms. 1136
Lanceolaria gladiola (Heude) 1585
grayana (Lea) 1584
*Langermannia candida* Rostk. 50
*Langsdorffia indica* Arn. 217
Lannea A. Rich. 668
coromandelica (Houtt.) Merr. 668
*grandis* (Dunst.) Engl. 668
Lantana L. 1050
camara L. 1050
Lapemis hardwickii (Gray) 1710
Laportea Gaud. 198
bulbifera (Sieb. et Zucc.) Wedd. 198
macrostachya (Maxim.) Ohwi 199
*sinensis* C. H. Wright 198
*urentissima* Gagnep. 195
violacea Gagnep. 199
*Laportia urentissima* Gagnep. 195
Lappula V. Wolf. 1036
consanguinea (Fisch. et Mey.) Gürke 1036
*echinata* Gilib. 1036
heteracantha (Ledeb.) Gürke 1036
myosotis V. Wolff 1036
redowskii (Hormem.) Greene 1036
spinocarpos (Forsk.) Aschers. et O. Kuntze 1036
Lapsana L. 1311
apogonoides Maxim. 1311
Lardizabalaceae 371
Laridae 1729
Larix Mill. 144
*amabilis* Nelson 148
*dahurica* Turcz. 144
gmelini (Rupr.) Rupr. 144
potaninii Batal. 144
sibirica Ledeb. 144
Larus Linnaeus 1729
argentatus Pontoppidan 1729
canus Linnaeus 1729
ridibundus Linnaeus 1729
Lasia Lour. 1476
*aculeata* Lour. 1476
spinosa (Lour.) Thwait. 1476
*Lasianthera tetrandra* Wall. et Roxb. 707
Lasianthus Jack. 1005
acuminatissimus Merr. 1005
biermanni King ex Hook. f. 1005
chinensis Benth. 1005
hartii Franch. 1005
henryi Hutch. 1005
koi Merr. et Chun 1006
lancilimbus Merr. 1006
longicaudus Hook. f. 1006
tsangii Merr. ex Li 1006
wallichii Wight 1006
Lasiosphaera Reich. 51
fenzlii Reich. 51
*Lastrea barbigera* Moore 116
*falciloba* Hook. 106
*Latania chinensis* Jacq. 1463
Lateolabrax Bleeker 1675
japonicus (Cuvier et Valenciennes) 1675
Lathyrus L. 581
davidii Hance 582
komarovii Ohwi 582
palustris L. 582
subsp. pilosus (Cham.) Hulten 582
pratensis L. 582
quinquenervius (Miq.) Litv. ex Kom. 582
tuberosus L. 582
Laticauda Laurenti 1710
semifasciat (Reinwardt) 1710

Latouchea Franch. 953
fokiensis Franch. 954
Latouchia Pocock 1596
davidi (Simon) 1596
pavlovi Schenkel 1596
Launaea Cass. 1311
acaulis (Roxb.) Babc. ex Kerr 1311
Lauraceae 282
Laurencia Lamx. 18
obtusa (Hudson) Lamx. 18
Laurocerasus Tourn. ex Duh. 510
phaeosticta (Hance) Schneid. 510
spinulosa (Sieb. et Zucc.) Schneid. 510
Laurus L. 287
*aggregata* Sims 287
*bejolghota* Buch.-Ham. 284
*burmannii* C. G. et Th. Nees 284
*camphora* L. 284
*cubeba* Lour. 292
*glandulifera* Wall. 285
*glauca* Thunb. 931
nobilis L. 287
*pilosa* Lour. 283
*porrectum* Roxb. 286
*tamala* Buch.-Ham. 286
Lavandula L. 1083
angustifolia Mill. 1083
*carnosa* L. 1059
*spica* L. 1083
*Lavenia parviflora* Bl. 1240
Lawsonia L. 799
inermis L. 799
Lecanthus Wedd. 199
peduncularis (Royle) Wedd. 199
Lecythidaceae 807
*Ledebouriella divaricata* (Turcz.) Hiroe 877
Ledum L. 886
palustre L. var. angustum N. Busch 886
var. dilatum Wahl. 887
Leea L. 732
crispa L. 732
guineensis G. Don 732
indica (Burm. f) Merr. 732
macrophylla Roxb. ex Hornem. 732
Leeaceae 732
Leersia Soland. ex Swartz 1447
japonica Makino 1447
oryzoides (L.) Swartz 1448
Leguminosae 544
Leibnitzia Cass. 1311
anandria (L.) Nakai 1311
Leiocassis Bleeker 1669
argentivittatus (Regan) 1669
crassilabris Günther 1669
longirostris Günther 1669
Leiognathidae 1679
Leiognathus Lacépéde 1679
bindus (Cuvier et Valenciennes) 1679
elongatus (Günther) 1679
fasciatus Lacepede 1679
insidiator (Bloch) 1679
ruconius (Hamilton) 1679
Leiolepis Dumeril et Bibron 1704
belliana rubritaeniata Mertens 1704
*Leiopyxis sumatrana* Miq. 624
Lemmaphyllum Presl 127
carnosum Presl 127
microphyllum Presl 128
var. obovatum (Harv.) C. Chr. 128
Lemna L. 1482
minor L. 1482
*polyrrhiza* L. 1483
Lemnaceae 1482
*Lens phascoloides* L. 572
Lentibulariaceae 1196
Lentinus Fr. 37
edodes (Berk.) Sing. 37
lepideus Fr. 37
Lenzites Fr. et Donk. 32
betulina (L.) Fr. 32
*palisoti* Fr. 35
*subferruginea* Berk. 31
Leontica L. 367
interta Pall. 367
kiangnanensis P. L. Chiu 367
*robustrum* (Maxim.) Diels 363
*Leontodon bessarabicum* Horn. 1348
*dissectum* Ledeb. 1348
*leucanthum* Ledeb. 1349
Leontopodium R. Br. ex Cass. 1311
albo-griseum Hand.-Mazz. 1311
*alpinus* Cass. α. *campestre* Ledeb. 1312
var. *pusillum* Beauv. 1314
andersonii C. B. Clarke 1312
artemisifolium (Lévl.) Beauv. 1312
brachyactis Gandog. 1312
calocephalum (Franch.) Beauv. 1312
var. depaupeiatum Ling 1312
var. uliginosum Beauv. 1312
campestre (Ledeb.) Hand.-Mazz. 1312
congobatum (Turcz.) Hand.-Mazz. 1313
dedekensii (Bur. et Franch.) Beauv. 1313
forrestianum Hand.-Mazz. 1313
franchetii Beauv. 1313
haplophylloides Hand.-Mazz. 1313
japonica Miq. 1313
leontopodioides (Willd.) Beauv. 1313
longifolium Ling 1314
nanum (Hook. f. et Thoms.) Hand.-Mazz. 1314
ochroleucum Beauv. 1314
pusillum (Beauv.) Hand.-Mazz. 1314
*sibiricum* Cass. 1314
var. *conglobatum* Turcz. 1313
sinense Hemsl. 1314
wilsonii Beauv. 1314

Leonurus L. 1083
*artemisia* (Lour.) S. Y. Hu 1083
glaucescens Bunge 1084
*heterophyllus* Sweet 1083
japonicus Houtt. 1083
var. albiflorus (Migo) S. Y. Hu 1083
*javanicus* Bl. 1095
macranthus Maxim. 1084
manacencus G. J. Liou 1084
panzerioides M. Pop. 1084
pseudomacranthus Kitag. 1084
*f. leucanthus* Kitag. 1084
sibiricus L. 1084
f. albiflorus (Nakai et Kitag.) C. Y. Wu et H. W. Li 1084
var. *albiflorus* Migo 1083
*supinus* Steph. ex Willd. 1082
tataricus L. 1084
turkestanicus V. Krecz. et Kupr. 1084
Lepadidae 1598
Lepas Linnaeus 1598
anatifera Linnaeus 1598
Leperidae 1751
Lepidagathis Willd. 1170
fasciculata Nees 1170
incurva Buch.-Ham. ex D. Don 1170
*hyalina* Nees 1170
Lepidium L. 453
apetalum Willd. 453
latifolium L. 454
var. affine C. A. Mey. 454
perfoliatum L. 454
*procumbens* L. 453
ruderale L. 454
sativum L. 454
virginicum L. 454
Lepidodesma languilati (Heude) 1585
Lepidogrammitis Ching 128
diversa (Ros.) Ching 128
drymoglossoides (Baker) Ching 128
intermedia Ching 128
rostrata (Bedd.) Ching 128
Lepidotrigla Günther 1688
alata (Houttuyn) 1688
micropterus Günther 1688
Lepidozona koreanica (Adams et Reeve) 1570
Lepiota (Pers. ex Fr.) Gray 37
lusoina (Fr.) Sing. 37
nuda (Bull. ex Fr.) Cooke 37
*procera* (Scop. ex Fr.) Gray 37
Lepisma Linnaeus 1609
saccharina Linnaeus 1609
Lepismatidae 1609
Lepisorus (J. Smith) Ching 129
angustus Ching 129
asterolepis (Baker) Ching 129
bicolor (Takeda) Ching 129
clathratus (Clarke) Ching 129
contortus (Christ) Ching 129
eilophyllus(Diels) Ching 129
*excavatus* Bory. var. *scolopendrius* (Don) Ching 130
lewisii (Baker) Ching 129
macrosphaerus (Baker) Ching 130
obscure-venulosus (Hayata) Ching 130
oligolepidus (Baker) Ching 130
pseudonudus Ching 130
scolopendrius (Ham. ex Don) Mehra et Bir 130
thunbergianus (Kaulf.) Ching 130
tosaensis (Makino) H. Ito 130
ussuriensis(Regel et Maack) Ching 131
*waltonii* (Ching) Ching 134
Leporidae 1751
Leptobotia Bleeker 1667
elongata (Bleeker) 1667
taeniops (Sauvagé) 1667
tientaiensis compressicauda (Nichols) 1667
tientaiensis hansuiensis Fang et Hsu 1667
Leptochloa Beauv. 1448
chinensis (L.) Nees 1448
*Leptocinium barbatum* v. d. B. 86
Leptodermis Wall. 1006
pilosa Diels 1006
*schneideri* H. Winkl. 1006
tomentella H. Winkl. 1006
Leptodictyum (Schimp.) Warnst. 66
riparium (L. ex Hedw.) Warnst. 66
Leptomischus Drake 1007
*parviflorus* H. S. Lo 1007
primuloides Drake 1007
Leptopus Decne. 634
chinensis (Bunge) Pojark. 634
esquirolii (Lévl.) Pojark. 634
Leptopyrum Reichb. 341
fumarioides (L.) Reichb. 341
Leptosiphonium F. Muell. 1170
venustum (Hance) E. Hossain 1170
*Leptostegia lucida* D. Don 96
Lepus Linnaeus 1751
capensis Linnaeus 1751
mandschuricus Radde 1752
oiostolus Hodgson 1752
sinensis Gray 1752
timidus Linnaeus 1752
Lepyrodiclis Fenzl 243
holosteoides (C. A. Mey.) Fenzl ex Fisch. et Mey. 243
*quadridentata* Maxim. 239
*Leskea compresta* Hedw. 66
*dendroides* Hedw. 64
Lespedeza Michx. 582
bicolor Turcz. 582
*bonatiana* Pamp. 556
*buergeri* Miq. 582
chinensis G. Don 582

cuneata (Dum.-Cours.) G. Don 583
cyrtobotrya Miq. 583
dahurica (Laxm.) Schindl. 583
davidii Franch. 583
*delavayi* Franch. 556
dunni Schindl. 583
*eriocarpa* DC. var. *polyantha* Franch. 557
floribunda Bunge 583
formosa (Vog.) Koehne 583
*hirtella* Franch. 556
inschanica (Maxim.) Schindl. 583
*juncea* Pers. var. *inschanica* Maxim. 583
*macrocarpa* Bunge 556
pilosa (Thunb.) Sieb. et Zucc. 584
*sericea* Miq. 583
*stipulacea* Maxim. 581
tomentosa (Thunb.) Sieb. ex Maxim. 584
*trigonoclada* Franch. 557
*velutina* Dunn 556
virgata (Thunb.) DC. 584
*yunnanensis* Franch. 557
Lessoniaceae 10
Lethariella Krog. 57
cladonioides (Nyl.) Krog. 57
zahlbruckneri (DR.) Krog. 57
*Lesxiomia seguinii* Lévl. 1024
Leucaena Benth. 584
*glauca* (L.) Benth. 584
leucocephala (Willd.) de Wit 584
Leucanthemella Tzvel. 1314
linearis (Matsum.) Tzvel. 1315
Leucas R. Br. 1084
aspera (Willd.) Link 1084
ciliata Benth. 1084
mollissima Wall. 1084
var. chinensis Benth. 1085
zeylanica (L.) R. Br. 1085
Leucodon Schwaegr. 64
secundus (Harv.) Mitt. 64
Leucodontaceae 64
*Leucoium capitulata* Lour. 1410
Leucopaxillus Bours. 37
candidus (Bers.) Sing. 37
giganteus (Sow. ex Fr.) Sing. 37
Leucosceptrum Smith 1085
canum Smith 1085
Leucostegia Presl 125
immersa (Wall.) Presl 125
Leucothoë D. Don 887
griffithiana C. B. Clarke 887
Levisticum Hill. 865
officinalis Koch 865
Leycesteria Wall. 1199
formosa Wall. 1199
var. *glandulosissima* Airy-Shaw 1200
var. stenosepala Rehd. 1200
Leymus Hochst. 1448
chinensis (Trin.) Tzvel. 1448
pabosanus (Claus) Pilger 1448
secalinus (Georgi) Tzvel. 1448
*Liatris lasifolia* D. Don 1242
Libanotis Hill 865
huchtormensis (Fisch.) DC 865
condensata (L.) Crantz 865
iliensis (Lipsky) Korov. 865
lancifolia K. T. Fu 865
seseloides (Fisch. et Mey. ex Turcz.) Turcz. 865
sibirica (L.) C. A. Mey. 866
spodotrichoma K. T. Fu 865
Libellulidae 1609
*Lichen aggregatus* Swartz 55
*islandicus* L. 57
*miniatus* L. 54
*rangiferinus* L. 55
*saxatilis* L. 58
*subuliformis* Ehrh. 59
*vermicularis* Swartz 59
Lichenes 54
Lichenes Imperfecti 59
Licmophora Ag. 12
abbreviata Ag. 12
Ligia Weber 1601
exotica (Roux) 1601
Ligiidae 1601
Ligularia Cass. 1315
achyrotricha (Diels) Ling 1315
alpigena Pojark. 1315
altaica DC. 1315
dentata (A. Gray) Hara 1315
dictyoneura (A. Gray) Hara 1315
dictyoneura (Franch.) Hand.-Mazz. 1315
duciformis (C. Winkl.) Hand.-Mazz. 1315
fargesii (Franch.) Diels 1315
fischeri (Ledeb.) Turcz. 1315
heterophylla Chang 1316
hodgsonii Hook. 1316
hookeri (C. B. Clarke) Hand.-Mazz. 1316
intermedia Nakai 1316
jamesii (Hemsl.) Kom. 1316
japonica (Thunb.) Less. 1316
*kaempferi* (DC.) Sieb. et Zucc. 1296
knorringana Pojark. 1316
lapathifolia (Franch.) Hand.-Mazz. 1317
latihastata (W. W. Smith) Hand.-Mazz. 1317
leveillei (Vant.) Hand.-Mazz. 1317
limprichtii (Diels) Hand.-Mazz. 1317
macrophylla (Ledeb.) DC. 1317
mongolica (Turcz.) DC. 1317
narynensis (Winkl.) O. et B. Fedtsch. 1317
nelumbifolia (Bur. et Franch.) Hand.-Mazz. 1317
przewalskii (Maxim.) Diels 1318
purdomii (Turrill) Chitt. 1318
rumicifolia (Drumm.) S. W. Liu 1318
sagitta (Maxim.) Mattf. 1318

sibirica (L.) Cass. 1318
songarica (Fisch.) Ling 1318
stenocephala (Maxim.) Matsum. et Koidz. 1318
thyrsoidea (Ledeb.) DC. 1318
tsangchanensis (Franch.) Hand.-Mazz. 1318
veitchiana (Hemsl.) Greenm. 1319
vellerea (Franch.) Hand.-Mazz. 1319
virgaurea (Maxim.) Mattf. 1319
wilsoniana (Hemsl.) Greenm. 1319
xanthotricha (Gruning) Ling 1319
*Ligusticopsis pteridophylla* (Franch.) Leute 867
Ligusticum L. 866
acuminatum Franch. 866
*acutilobum* Sieb. et Zucc. 848
brachylobum Franch. 866
calophlebium Wolff 866
chuanxiong Hort. 866
cv. fuxiong 866
daucoides (Franch.) Franch. 866
delavayi Franch. 866
discolor Ledeb. 867
jeholense (Nakai et Kitag.) Nakai et Kitag. 867
*pseudomodestum* Wolff 867
pteridophyllum Franch. 867
scapiforme Wolff 867
*seselоides* Fisch. et Mey. ex Turcz. 865
sinense Oliv. 867
tachiroei (Franch. et Sav.) Hiroe et Constance 867
tenuissimum (Nakai) Kitag. 867
*vaginatum* Spreng. 858
Ligustrum L. 939
acutissimum Koehne 939
compactum (Wall. ex DC.) Hook. f. et Thoms. ex Brand. 939
*coryanum* W. W. Smith 940
delavayanum Hariot 939
expansum Rehd. 939
henryi Hemsl. 939
var. longitubum P. S. Hsu 939
japonicum Thunb. 939
var. pubescens Koidz. 939
lucidum Ait. f. 940
*myrianthum* Diels 940
obtusifolium Sieb. et Zucc. 940
pedunculare Rehd. 940
quihoui Carr. 940
sinense Lour. 940
var. coryanum (W. W. Smith) Hand.-Mazz. 940
var. myrianthum (Diels) Hook. f. 940
var. nitidun Rehd. 941
var. stauntonii Rehd. 941
*suspensus* Thunb. ex Juél 934
Liliaceae 1363
Lilium L. 1385
bakerianum Coll. et Hemsl. 1385
var. aureum Grove et Cotton 1385
var. delavayi (Franch.) Wils. 1385
var. rubrum Grove et Stearn 1385
var. yunnanense (Franch.) Sealy ex Woodc. et Stearn 1385
brownii F. E. Br. ex Miellez. 1385
var. microflora An 1386
var. viridulum Baker 1385
callosum Sieb. et Zucc. 1386
*cathayanum* Wils. 1373
cernuum Kom. 1386
concolor Salisb. 1385
var. partheneion Baker 1385
dauricum Ker-Gawl. 1386
davidii Duch. 1386
distichum Nakai 1386
duchartrei Franch. 1386
fargesii Franch. 1386
*giganteum* Wall. 1373
henryi Baker 1386
lancifolium Thunb. 1386
leichtlinii Hook. f. var. maximowiczii (Regel) Baker 1386
leucanthum (Baker) Baker 1386
longiflorum Thunb. 1386
martagon L. 1386
var. pilosiusculum Freyn 1386
nanum Klotz. et Garcke 1386
var. flavidum (Rendle) Sealy 1386
papilliferum Franch. 1386
peciosum Thunb. var. gloriosoides Baker 1386
pumilum DC. 1386
rosthornii Diels 1386
sempervivoideum Lévl. 1386
sulphureum Baker 1386
taliense Franch. 1386
tsingtauense Gilg 1386
wardii Stapf ex Stearn 1386
*Limacia sagittata* Oliv. 384
Limacidae 1579
Limaciopsis Engl. 378
valida (Diels) H. S. Lo 378
Limax Linnaeus 1579
flavus (Linnaeus) 1579
maximus Linnaeus 1579
Limestonum 1785
*Limnanthemum indicum* (L.) Griseb. 958
*peltatum* Gmel. 958
*Limnochloa caduciflora* Turcz. 1460
Limnogonus fossarum (Fabricius) 1619
Limnophila R. Br. 1136
aromatica (Lam.) Merr. 1136
chinensis (Osbesk) Merr. 1136
rugosa (Roth) Merr. 1136
sessiliflora (Vahl) Bl. 1136
*Limodorum aphyllum* Roxb. 1532
*flavum* Bl. 1555

*striatum* Thunb. 1520
*tonkervilliae* Dryand 1555
*Limonia parviflora* Sims 649
Limonitum 1781
Limonium Mill. 24
aureum (L.) Hill. ex O. Kuntze 924
bicolor (Bunge) O. Kuntze 924
gmelinii (Willd.) O. Kuntze 924
sinense (Girard) O. Kuntze 924
wrightii (Hance) O. Kuntze 924
Limosella L. 1136
aquatica L. 1136
Linaceae 617
Linaria Mill. 1137
*acutiloba* Fisch. ex Rchb. 1137
vulgaris Mill. subsp. acutiloba (Fisch. ex Rchb.) Hong 1137
subsp. sinensis (Bebeaux) Hong 1137
var. *sinensis* Bebeaux 1137
Lindenbergia Lehm. 1137
philippensis (Cham.) Benth. 1137
ruderalis (Vahl) O. Kuntze 1137
Lindera Thunb. 287
aggregata (Sims.) Kosterm. 287
var. playfairii (Hemsl.) H. P. Tsui 287
angustifolia Cheng 288
caudata (Nees) Hook. f. 288
*cercifolia* Hemsl. 290
chunii Merr. 288
communis Hemsl. 288
*dictyophlla* Allen 289
erythrocarpa Makino 288
floribunda (Allen) H. P. Tsui 288
foveolata H. W. Li 289
fragrans Oliv. 289
fruticosa Hemsl. 289
*gambleana* Allen var. *floribunda* Allen 288
glauca (Sieb.et Zucc.) Bl. 289
*heterophylla* Meissn. 290
kariensis W. W. Smith 289
f. glabrescens H. W. Li 289
magaphylla Hemsl. 289
f. touyunensis (Lévl.) Rehd. 289
metcalfiana Allen var. dityophylla (Allen) H. P. Tsui 289
obtusiloba Bl. 290
var. heterophylla (Meissn.) H. P. Tsui 290
*populifolia* Hemsl. 293
pulcherrima (Wall.) Benth. var. attenuata Allen 290
var. hemsleyana (Diels) H. P. Tsui 290
reflexa Hemsl. 290
setchuenensis Gamble 290
*strychnifolia* (Sieb. et Zucc.) F. Vill. 287
var. *hemsleyana* Diels 290
supracostata Lec. 290
thomsonii Allen 291
tonkinensis Lec. 291
var. subsessilis H. W. Li 291
*tsumu* Hemsl. 299
*umbellata* Bl. 288
Lindernia All. 1137
anagallis (Burm. f.) Pennell 1137
angustifolia (Benth.) Wettst. 1137
antipoda (L.) Alston 1138
ciliata (Colsm.) Pennell 1138
*cordifolia* (Colsm.) Merr. 1137
crustacea (L.) F. Muell 1138
*japonica* Thunb. 1139
montana (Bl.) Koord. 1138
nummularifolia (D. Don) Wettst. 1138
oblonga (Benth.) Merr. et Chun 1138
procumbens (Krock.) Philcox 1138
ruellioides (Colsm.) Pennell 1139
viscosa (Hornem.) Merr. 1139
Lindsaea Dry. 89
heterophylla Dry. 89
intertextum (Ching) Ching 89
odorata Roxb. 89
orbiculata (Lam.) Mett. 89
Lindsaeaceae 89
*Lingnaria affinis* (Rendle) Keng f. 1437
*chungii* (McClure) McClure 1437
*Linnaea dielsii* Graebn. 1198
*engleriana* Graebn. 1198
*macrotera* Graebn. et Bunchw. 1199
Linociera Sw. ex Schreb. 941
ramiflora (Roxb.) Wall. 941
Linum L. 617
amurense Alenf. 617
perenne L. 617
stelleroides Planch. 617
usitatissimum L. 617
Liobagrus Hilgendorf 1670
marginatus (Günther) 1670
nigricauda Regan 1670
styani Regan 1670
Liparis Rich. 1546
bootanensis Griff. 1546
caespitosa (Thouars) Lindl. 1546
cathcartii Hook. f. 1546
*cucullata* Chien 1546
distans C. B. Clarke 1546
dunnii Rolfe 1546
fargesii Finet 1547
inaperta Finet 1547
japonica (Miq.) Maxim. 1547
*macrantha* Rolfe ex Hemsl. 1547
*malleiformis* W. W. Smith 1548
nervosa (Thunb.) Lindl. 1547
nigra Seidenf. 1547
odorata (Willd.) Lindl. 1547
olivacea Lindl. ex Wall. 1547
*pauliana* Hand.-Mazz. 1546

petiolata (D. Don) P. F. Hunt et Summerh. 1547
*plicata* Franch. et Sav. 1546
stricklandiana Reichb. f. 1548
tschangii Schltr. 1548
viridiflora (Bl.) Lindl. 1548
*yunnanensis* Rolfe 1546
Lipocarpha R. Br. 1495
*chinensis* (Osbeck) Tang et Wang 1495
microcephala (R. Br.) Kunth 1495
Lipotes Miller 1758
vexillifer Miller 1758
*Lippia nodiflora* (L.) Rich. 1050
Liquidambar L. 461
*chinensis* Champ. 459
formosana Hance 461
orietalis Mill. 461
styraciflua L. 461
Liriodendron L. 264
chinense (Hemsl.) Sarg. 264
*coco* Lour. 265
*figo* Lour. 269
tulipifera L. 264
var. *chinensis* Hemsl. 264
Liriope Lour. 1386
graminifolia (L.) Baker 1387
kansuensis (Batal.) C. H. Wright 1387
minor (Maxim.) Makino 1387
muscari (Decne.) Bailey var. communis (Maxim.) P. C. Hsu et L. C. Li 1387
platyphylla Wang et Tang 1387
spicata (Thunb.) Lour. 1387
var. prolifera Y. T. Ma 1387
Listera R. br. 1548
grandiflora Rolfe 1548
*major* Nakai 1548
mucronata Panigrohi et J. J. Wood 1548
puberula Maxim. 1548
Litchi Sonn. 678
chinensis Sonn. 678
Lithocarpus Bl. 174
chrysocomus Chun et Tsiang 174
dealbatus (Hook. f. et Thoms.) Rehd. 174
elizabethae (Tutch.)Rehd. 174
glaber (Thunb.) Nakai 175
henryi (Seem.) Rehd. et Wils. 175
paniculatus Hand.-Mazz. 175
polystachyus (Wall.) Rehd. 175
viridis Rehd. et Wils. 175
Lithospermum L. 1036
arvense L. 1036
erythrorrhizon Sieb. et Zucc. 1036
*euchromon* Royle 1032
hancokinaum Oliv. 1037
officinale L. 1037
zollingeri DC. 1037
Litsea Lam. 291
*aurata* Hayata 296
auriculata Chien et Cheng 291
*brideliifolia* Hayata 292
chunii Cheng 291
var. likiangensis Yang et P. H. Huang 291
*confertifolia* Hemsl. 297
coreana Lévl. var. lanuginosa (Migo) Yang et P. H. Huang 291
var. sinensis (Allen) Yang et P. H. Huang 291
cubeba (Lour.) Pers. 292
var. formosana (Nakai) Yang et P. H. Huang 292
*cupularis* Hemsl. 282
elongata (Wall. ex Nees) Benth. et Hook. f. 292
euosma W. W. Smith 292
*fruticosa* (Hemsl.) Gamble 289
glutinosa (Lour.) C. B. Clarke 292
var. brideliifolia (Hayata) Merr. 292
ichangensis Gamble 293
*mollifolia* Chun 293
mollis Hemsl. 293
monopetala (Roxb.) Pers. 293
moupinensis Lec. var. szechuanica (Allen) Yang et P. H. Huang 293
*obovata* Nees 282
*playfairii* Hemsl. 288
populifolia (Hemsl.) Gamble 293
pungens Hemsl. 293
rotundifolia Hemsl. 293
var. oblongifolia (Nees) Allen 293
rubescens Lec. 294
f. *wanchuanensis* Yang 294
sericea (Nees) Hook. f. 294
*szechuanica* Allen 293
veitchiana Gamble 293
verticillata Hance 293
*zeylanica* Nees 297
Littorina Ferussac 1573
brevicula (Philippi) 1573
Littorinidae 1573
Liua shihi (Liu) 1694
Livistona R. Br. 1463
chinensis (Jacq.) R. Br. 1463
Liza carinatus (Cuvier et Valenciennes) 1674
haematocheila (Temminck et Schlegel) 1674
Lloydella subpileata (Berk. et Curt.) Hohn. et Litsch. 25
Lloydia Salisb. 1388
*monsana* (Dummer) P. C. Kuo 1388
tibetica Baker ex Oliv. 1388
Lobaria Schreb. 54
isidiosa (Mull-Arg.) Vain 54
kurokawae Yoshim. 54
meridionalis Vain var. subplana (Asch.) Yoshim. 54
pulmonaria (L.) Hoffm. 54

setigera Trev. 54
Lobelia L. 1233
chinensis Lour. 1234
*chinensis* Hance 1234
clavata E. Wimm. 1234
colorata Wall. 1234
var. baculus E. Wimm. 1234
davidii Franch. 1234
*erecta* Hook. f. et Thoms. 1234
erectiuscula Hara 1234
hancei Hara 1234
*handelii* E. Wimm. 1235
*hybrida* C. Y. Wu 1235
*lobbiana* Hook. f. et Thoms. 1236
melliana E. Wimm. 1234
*montana* Reinw. et Bl. 1236
*nummularia* Lam. 1237
pleotricha Diels 1235
var. handelii (E. Wimm.) C. Y. Wu 1235
pyramidalis Wall. 1235
*radicans* Thunb. 1234
sequinii Lévl. et Vant. 1235
sessilifolia Lamb. 1235
*succulenta* Bl. 1236
var. *lobbiana* (Hook. f. et Thoms.) E. Wimm. 1236
taliensis Diels 1235
*wallichiana* Hook. f. et Thoms. 1235
zeylanica L. 1236
var. lobbiana (Hook. f. et Thoms.) Lian 1236
Locusta Linnaeus 1613
migratoria manilensis (Meyen) 1613
Loganiaceae 944
Loliginidae 1590
Loligo Schneider 1590
beka Sasaki 1590
chinensis Gray 1590
*formosana* Sasaki 1590
japonica Hoyle 1590
Lomatogonium A. Br. 954
ritatum (L.) Fries ex Nym. 954
Lonicera L. 1200
acuminata Wall. 1200
*altaica* Pall. 1200
bournei Hemsl. 1200
caerulea L. var. altaica Pall. 1200
var. edulis Turcz. ex Hemsl. 1200
calcarata Hemsl. 1200
chrysantha Turcz. 1200
confusa (Sweet) DC. 1201
crassifolia Batal. 1201
*cylindriflora* Hand.-Mazz. 1205
dasystyla Rehd. 1201
*deflexicalyx* Batal. 1206
ferruginea Rehd. 1201
fragrantissima Lindl. et Paxt. subsp. standishii (Carr.) Hsu et H. J. Wang 1201
fulbotomemtosa Hsu et S. C. Cheng 1201
*fulva* Merr. 1201
gynochlamydea Hemsl. 1201
*henryi* Hemsl. 1200
var. *trichosepala* Rehd. 1206
hildebrandiana Coll. et Hemsl. 1202
hispida Pall. ex Roem. et Schult. 1202
*hopeiensis* Chien 1205
hypoglauca Miq. 1202
subsp. nudiflora Hsu et H. J. Wang 1202
japonica Thunb. 1202
lanceolata Wall. 1203
ligustrina Wall. subsp. yunnanensis (Franch.) Hsu et H. J. Wang 1203
*β. yunnanensis* Franch. 1203
maackii (Rupr.) Maxim. 1203
*f. podocarpa* Franch. ex Rehd. 1203
macrantha (D. Don) Spreng. 1203
var. heterotricha Hsu et H. J. Wang 1203
macranthoides Hand.-Mazz. 1203
microphylla Willd. ex Roem. et Schult. 1203
modesta Rehd. 1204
*mongolica* Pall. 1212
myrtillus Hook. f. et Thoms. 1204
*obscura* Hemsl. 1200
pampaninii Lévl. 1204
pileata Oliv. 1204
f. *yunnanensis* (Franch.) Rehd. 1203
*pseudoproterantha* Pamp. 1201
*reticulata* Champ. 1204
*rhododendroides* Graebn. 1201
rhytidophylla Hand.-Mazz. 1204
rupicola Hook. f. et Thoms. 1204
var. syringantha(Maxim.) Zabel 1204
serreana Hand.-Mazz. 1205
*shensiensis* (Rehd.) Rehd. 1205
similis Hemsl. 1205
var. *delavayi* (Franch.) Rehd. 1205
var. omeiensis Hsu et H. J. Wang 1205
*standishii* Carr. 1201
*syringantha* Maxim. 1204
var. *wolfii* Rehd. 1204
tangutica Maxim. 1205
tatarica L. 1205
var. micrantha Trautv. 1205
tatarinowii Maxim. 1205
*tatsiensis* Franch. 1206
*thibetica* Bur. et Franch. 1204
tragophylla Hemsl. 1206
trichosantha Bur. et Franch. 1206
var. *xerocalyx* (Diels) Hsu et H. J. Wang 1206
trichosepala (Rehd.) Hsu 1206
webbiana Wall. ex DC. 1206
*xerocalyx* Diels 1206
Lophanthus Adans. 1085
*cyprieni* Pavol. 1067

krylovii Lipsky 1085
*rugosus* Fisch. et Mey. 1055
Lophatherum Brongn. 1448
gracile Brongn. 1448
sinense Rendle 1448
Lophiidae 1693
Lophiomus setigerus (Vahl) 1693
Lophius Linnaeus 1693
litulon (Jordan) 1693
*Lophotocarpus guyanensis* M. Mich. var. *lappula* (D. Don) Buchen 1358
*Lophura armata* Kütz. 18
Lophura Fleming 1724
leucomelana (Latham) 1724
nycthemera (Linnaeus) 1724
Loranthaceae 211
Loranthus Jacq. 212
*balansae* Lecomte 213
*bibracteolatus* Hance 212
*caloreas* Diels 214
*chinensis* DC. 214
*chingii* Cheng 213
*cochinchinensis* Lour. 212
delavayi Van Tiegh. 212
*delavayi* (Van Tiegh.) Engl. 214
*esquirolii* Lévl. 215
*ferruginea* Jack 213
levinea Merr. 214
*limprichtii* Grünmg 214
*maclurei* Merr. 215
*nigrans* Hance 215
*parasitica* (L.) Merr. 213
pentandrus L. 211
*pentapetalus* Roxb. 211
*philippensis* Cham. et Schlecht. 213
*samptoni* Hance 212
*suichuenensis* Lecomte 215
tanakae Franch. et Sav. 212
*thibetensis* Lecomte 215
Lorisidae 1749
Loropetalum R. Br. 461
chinense (R. Br.) Oliv. 461
var. rubrum Yieh 461
Lota Oken 1672
lota (Linnaeus) 1672
Lotus L. 584
corniculatus L. 584
tenuis Kit. 584
*Lourea obcordata* (Poir.) Desv. 562
*vespertilionis* (L. f.) Desv. 562
Loxoblemmus doenitzi Stein 1615
Loxocalyx Hemsl. 1085
urticifolius Hemsl. 1085
Loxogrammaceae 139
Loxogramme (Bl.) Presl 139
chinensis Ching 139
salicifolia (Makino) Makino 139
Loxostigma C. B. Clarke 1187
griffithii (Wight) C. B. Clarke 1187
Luciobrama Bleeker 1662
macricephlus (Lacepede) 1662
Luciola Laporte 1620
terminalis E. Ol. 1620
vitticollis Kies. 1620
Luculia Sweet 1007
gratissima (Wall.) Sweet 1007
intermedia Hutch. 1007
pinceana Hook. f. 1007
Ludisia A. Rich. 1548
discolor (Ker-Gawl.) A. Rich. 1548
Ludwigia L. 822
adscendens (L.) Hara 822
*caryophylla* (Lam.) Merr. et Metc. 822
*epilobioides* Maxim. 822
hyssopifolia (G. Don) Exell 822
octovalvis (Jacq.) Roven 822
perennis L. 822
prostrata Roxb. 822
Luffa L. 788
acutangula (L.) Roxb. 788
*cordifolia* Bl. 791
cylindrica (L.) Roem. 788
Luisia Gaud. 1549
hancockii Rolfe 1549
morsei Rolfe 1549
teres Bl. 1549
zeylanica Lindl. 1549
Lumbricidae 1594
Lumbriconeis Orsted 1592
heteropoda Marenzeller 1592
Lumnitzera Willd. 817
racemosa Willd. 817
Lunathyrium Koidz. 103
acrostichoides (Sw.) Ching 103
Lunella coronata granulata (Gwelin) 1571
Lutra Brisson 1762
lutra Linnaeus 1762
perspicillata Geoffroy 1762
Luzula DC. 1426
*campestris* (L.) DC.
var. *capitata* Miq. 1426
var. *multiflorus* (Retz.) C. B. Clarke 1426
capitata (Miq.) Miq. ex Kom. 1426
*chinensis* N. E. Br. 1426
effusa Buchen. 1426
multiflora (Retz.) Lej. 1426
Lychnis L. 243
cognata Maxim. 243
coronata Thunb. 243
*delavayi* (Franch.) Diels 246
fulgens Fisch. 243
glandulosa Maxim. 243
senno Sieb. et Zucc. 243
wilfordii (Regel.) Maxim. 243
Lycianthes (Dunal) Hassl. 1119

biflora (Lour.)Bitter 1120
var. subtusochracea Bitter 1120
lysimachioides (Wall.) Bitter 1120
var. cordifolia C. Y. Wu et S. C. Huang 1120
var. purpuriflora C. Y. Wu et S. C. Huang 1120
Lycium L. 1120
barbarum L. 1120
var. auranticarpum K. F. Ching 1120
chinense Mill. 1120
var. potaninii (Pojark.) A. M. Lu 1120
dasystemum Pojark. 1120
*foetidum* L. f. 1018
*japonicum* Thunb. 1018
*potaninii* Pojark. 1120
ruthenicum Murr. 1120
truncatum Y. C. Wang 1120
*turcomanicum* Turcz. ex Boiss. 1120
yunnanensis Kuang et A. M. Lu 1120
Lycodon fasciatus (Anderson) 1708
Lycogala Mich. ex Adans. 19
epidendrum (L.) Fr. 19
Lycogalaceae 19
Lycoperdaceae 49
Lycoperdon Pers. 51
*coelatum* Bull. 50
*epidendrum* L. 19
*giganteum* Batsch ex Pers. 50
perlatum Pers. 51
pusillum Batsch ex Pers. 51
pyriforme Schaeff. ex Pers. 51
Lycopersicon Mill. 1121
esculentum Mill. 1121
Lycopodiaceae 71
Lycopodiastrum Holub 72
casuarinoides (Spring) Holub 72
Lycopodium L. 72
*alpinum* L. 71
annotinum L. 72
*carinatum* Desv. 70
*casuarinoides* Spring 72
cernuum L. 73
*chinensis* Christ 69
*complanatum* L. 71
*crispatum* Ching 69
*delicatula* Desv. 73
*emeiense* Ching et H. S. Hung 69
*fargesii* Herter 70
*fordii* Baker 70
*involvens* Swartz 74
japonicum Thunb. 72
miyoshianum Makino 69
*nudum* L. 78
obscurum L. 72
*phlegmarium* L. 71
*pulcherrimum* Wall. 71
*pulvinatum* Hook. et Grev. 75
*sanguinolentum* L. 75
*selago* L. 69
*serratum* Thunb. 69
f. *intermedia* Nakai 70
*sinense* Desv. 75
*squarrosum* Forst. 71
*uncinatum* Desv. 76
*veitchii* Christ 71
Lycopsis L. 1037
orientalis L. 1037
Lycopus L. 1086
coreanus Lévl. 1086
*dianthera* Buch.-Ham. 1091
europaeus L. 1086
var. exaltatus (L. f.) Hook. f. 1086
*exaltatus* L. f. 1086
lucidus Turcz. 1086
var. hirtus Regel. 1086
var. maackianus Maxim. 1086
*maackianus* (Maxim.) Makino 1086
parviflorus Maxim. 1086
Lycoris Herb. 1407
albiflora Koidz. 1407
anhuiensis Y. Hsu et Q. J. Fan 1407
aurea (L'Hérit.) Herb. 1408
chinensis Traub 1408
guangxiensis Y. Hsu et Q. J. Fan 1408
houdyshelii Traub. 1408
longituba Y. Hsu et Q. J. Fan 1408
var. *flava* Y. Hsu et S. L. Huang 1408
radiata (L'Hérit.) Herb. 1408
rosea Traub et Moldenke 1408
sprengeri Comes ex Baker 1408
squamigera Maxim. 1409
Lycorma Stal 1616
delicatula White 1617
Lyctidae 1622
Lyctus Fabricius 1622
brunneus (Stephens) 1622
Lygodiaceae 85
Lygodium Sw. 85
conforme C. Chr. 85
flexuosum (L.) Sw. 85
japonicum (Thunb.) Sw. 85
microstachyum Desv. 85
scandens (L.) Sw. 86
Lygosoma boulengeri (Van Denburgh) 1705
indicum (Gray) 1705
Lymnaea Lamarck 1578
stagnalis (Linnaeus) 1578
Lymnaeidae 1578
Lyngbya Ag. 3
majuscula Harv. 3
Lynx Kerr 1765
lynx Linnaeus 1765
Lyonia Nutt. 887
compta (W. W. Smith et J. F. Jeffrey) Hand.-Mazz. 887

*formosa* (Wall.) Hand.-Mazz. 888
ovalifolia (Wall.) Drude 887
var. elliptica (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz. 887
var. hebecarpa (Franch. ex Hemsl.) Chun 887
var. lanceolata (Wall.) Hand.-Mazz. 888
villosa (Wall.) Hand.-Mazz. 888
Lyophyllum semitale (Fr.) Kuhner 38
Lysidice Hance 585
revicalyx Z. Wei 585
rhodostegia Hance 585
Lysimachia L. 911
alfredii Hance 911
auriculata Hemsl. 911
barystachys Bunge 911
brittenii R. Kunth 912
candida Lindl. 912
capillipes Hemsl. 912
var. cavaleriei (Lévl.) Hand.-Mazz. 912
chekiangensis C. Y. Wu 912
christinae Hance 912
circaeoides Hemsl. 912
clethroides Duby 913
congestiflora Hemsl. 913
crassifolia C. Z. Gao et D. Fang 913
davurica Ledeb. 913
decurrens Forst. f. 913
deltoides Wight var. cinerascens Franch. 913
dushanensis Chen et C. M. Hu 913
filipes C. Z. Gao et D. Fang 914
fistulosa Hand.-Mazz. 914
foenum-graecum Hance 914
fordiana Oliv. 914
fortunei Maxim. 914
*franchetii* R. Kunth 914
fukienensis Hand.-Mazz. 914
glanduliflora Hanelt. 914
grammica Hance 914
hemsleyana Maxim. 912
hemsleyi Franch. 914
heterogenea Klatt 915
insignis Hemsl. 915
japonica Thunb. 915
jingdongensis Chen et C. M. Hu 915
klattiana Hance 915
lancifolia Craib 915
linguiensis C. Z. Gao 915
lobeliodes Wall. 915
longipes Hemsl. 915
melampyroides R. Kunth 916
*monnieri* L. 1132
nutantiflora Chen et C. M. Hu 916
omeiensis Hemsl. 916
ophelides Hemsl. 916
otophora C. Y. Wu ex Wu et Li 916
paridiformis Franch. 916
var. stenophylla Franch. 916
parvifolia Franch. ex Hemsl. 916
patungensis Hand.-Mazz. 917
pentapetala Hand.-Mazz. 917
phyllocephala Hand.-Mazz. 917
pseudo-henryi Pamp. 917
punctatilimba C. Y. Wu et Li 917
reflexiloba Hand.-Mazz. 917
rubiginosa Hemsl. 917
sikokiana Miq.
subsp. petelotii (Merr.)C. M. Hu 917
stellarioides Hand.-Mazz. 917
stenosepala Hemsl. 918
vulgaris L. 918
var. *davurica* (Ledeb.) R. Kunth 913
Lysionotus D. Don 1188
aeschynanthoides W. T. Wang 1188
*australis* C. Y. Wu ex H. W. Li 1189
*brachycarpus* Rehd. 1188
carnosus Hemsl. 1188
hainanensis Merr. et Chun 1188
heterophyllus Franch. 1188
microphyllus W. T. Wang 1188
*ophiorrhizoides* Hemsl. 1078
pauciflorus Maxim. 1188
var. *lancifolius* W. T. Wang 1189
var. latifolius W. T. Wang 1189
serratus D. Don 1189
var. pterocaulis C. Y. Wu 1189
wilsonii Rehd. 1188
Lysurus Fr. mokusin (L. ex Pers.) Fr. 47
Lythraceae 798
Lythrum L. 799
*fruticosa* L. 800
linifolium Kar. et Kir. 799
salicaria L. 799
var. glabrus Ledeb. 799
var. tomentosa DC. 799
virgatum L. 799
Lytta Fabricius 1621
caraganae Pallas 1622
suturella Motschulsky 1622

## M

Maackia Rupr. 585
amurensis Rupr. et Maxim. 585
var. buegeri (Maxim.) Schneid. 585
tenuifolia (Hemsl.) Hand.-Mazz. 585
Macaca Lacepede 1749
assamensis M'clelland 1749
mulatta Zimmermann 1749
thibetana Milne-Edwards 1749
Macaranga Thou. 634
denticulata (Bl.) Muell.-Arg. 634
henryi (Pax et Hoffm.) Rehd. 634
Machilus Nees 294
*bracteata* (Lec.) Kosterm. 295
*faberi* Hemsl. 298
ichangensis Rehd. et Wils. 294

leptophylla Hand.-Mazz. 294
microcarpa Hemsl. 295
pauhci Kanehira 295
salicina Hance 295
*sheareri* Hemsl. 298
thunbergii Sieb. et Zucc. 295
velutina Champ. 295
yunnanensis Lec. 295
var. *dicloxii* Lec. 295
Macleya R. Br. 440
cordata (Willd.) R. Br. 440
microcarpa (Maxim.) Fedde 440
*Maclura cochinchinensis* (Lour.) Corner 185
*tricuspidata* Carr. 185
Macrobrachium Bate 1602
nipponense (de Haan) 1602
rosenbergi (de Man) 1602
Macrocarpium Nakai 830
chinensis (Wanger.) Hutch. 831
officinalis (Sieb. et Zucc.) Nakai 830
Macrocystis C. Ag. 10
pyrifera (L.) C. Ag. 10
Macropanax Miq. 840
dispermus (Bl.) O. Kuntze 840
*oreophilus* Miq. 840
rosthornii (Harms) C. Y. Wu ex Hoo 840
undulatus (Wall.) Seem. 841
Macropodus Lacépéde 1685
chinensis (Bloch) 1685
operculanis (Linnaeus) 1685
Macrosolen (Bl.) Reichb. 212
bibracteolatus (Hance) Danser 212
cochinchinensis (Lour.) Van Tiegh. 212
Macrothelypteris (H. Ito) Ching 105
oligophlebia (Baker) Ching 105
var. elegans (Koidz.) Ching 105
*Macrotomia euchroma* (Royle) Paulsen 1032
Macrura Van Hasselt 1652
kelee (Cuvier) 1652
reevesii (Richardson) 1652
Mactra Linnaeus 1587
antiquata Spengler 1587
chinensis (Philippi) 1587
quadrangularis Deshayes 1587
sulcataria Deshayes 1587
*veneriformis* Deshayes 1587
Mactridae 1587
Madhuca J.F. Gmel. 925
pasquieri (Durard) Lam. 926
*subquincuncialis* Lam. et Kerocl 926
Maesa Forsk. 907
argentea (Wall.) A. DC. 907
balansae Mez 907
hupehensis Rehd. 907
indica (Roxb.) A. DC. 907
japonica (Thunb.) Mor. ex Zoll. 907
montana A. DC. 908
perlaria (Lour.) Merr. 908
ramentacea (Roxb.) A. DC. 908
Magnetitum 1781
Magnolia L. 264
amoena Cheng 264
*bailloni* Pierre 270
biloba (Rehd. et Wils.) Cheng 265
biondii Pamp. 265
camphillii Hook. f. et Thoms. 265
chingii Dandy 265
coco (Lour.) DC. 265
cylindrica Wils. 264
delavayi Franch. 265
denudata Desr. 265
*denugata* Rehd. et Wils. var. *elongata* Rehd. et Wils. 267
var. *purpurascens* (Maxim.) Rehd. et Wils. 267
*emarginata* Cheng 267
*fargesii* (Finet et Gagnep.) Cheng 265
grandiflora L. 266
henryi Dunn 266
*hepiapeat* (Buchoz.) Dandy 265
kobus DC. 266
liliflora Desr 266
*mollicomata* W. W Smith 265
*nicholsoniana* Rehd. et Wils. 267
obovata Thunb. 266
officinalis Rehd. et Wils. 266
var. *biloba* Rehd. et Wils. 265
var. pubescens C. Y. Deng 278
paenetalauma Dandy 267
*parviflora* Sieb et Zucc. var. *wilsonii* Finet et Gagnep. 267
pilocarpa Z. Z. Zhao et Z. W. Xie 266
*pumila* Andr. 265
*quinquepeta* (Buchoz) Dandy 266
rostrata W. W. Smith 267
sargentiana Rehd. et Wils. 267
sieboldii K. Koch 267
sinensis (Rehd. et Wils.) Stapf 266
sprengeri Pamp. 267
var. elongata (Rehd. et Wils.) Stapf 266
*taliensis* W. W. Smith 267
*tenuicarpella* Chang 267
wilsonii (Finet et Gagnep.) Rehd. 267
f. taliensis (W. W. Smith) Rehd. 267
Magnoliaceae 264
Mahonia L. 368
bealei (Fort.) Carr. 368
bodinieri Gagnep. 368
calamicaulis Sprague et Fisch. 368
*confusa* Sprague 369
decipiens Schneid. 368
eurybracteata Takeda 368
fargesii Takeda 368
flavida Schneid. 368
fordii Schneid. 369
fortunei (Lindl.) Fedde 369

ganpinensis (Lévl.) Fedde 369
gracilipes (Oliv.) Fedde 369
var. ebruinosa Ying 369
hancockiana Takeda 369
japonica (Thunb.) DC. 369
mairei Takeda 370
napaulensis DC. 370
shenii Chen 370
sheridaniana Schneid. 370
subimbricata Chun et F. Chun 370
Maianthemum Weber 1388
bifolium (L.) F. W. Schmidt 1388
Maifanitum 1794
Majidae 1604
Malachitum 1783
Malachium Fries 244
aquaticum (L.) Fries 244
Malaisia Blanco 191
scandens (Lour.) Planch. 191
Malaxis Sw. 1549
*caespitosa* Thouars 1546
*caispitosa* Thouars 1546
*caulescens* (Lindl.) Reichb. f. 1551
*iridifolium* (Roxb.) Reichb. f. 1551
latifolia Smith 1549
monophyllos (L.) Swartz 1549
*odorata* Willd. 1547
*viridiflora* Bl. 1548
yunnanensis (Schltr.) Tang et Wang 1549
Malcolmia R. Br. 454
africana (L.) R. Br. 454
Malleus Lamarck 1581
albus Lamarck 1581
malleus (Linnaeus) 1581
Mallotus Lour. 634
apelta (Lour.) Muell. -Arg. 634
barbatus (Wall.) Muell. -Arg. 634
*chrysocarpus* Pamp. 635
*henryi* Pax et Hoffm. 634
japonicus (Thunb.) Muell. -Arg. 635
var. floccosus (Muell. -Arg) S. M. Hwang 635
var. ochraceo-albidus (Muell. -Arg.) S. M. Hwang 635
*nepalensis* Muell. -Arg. 635
var. *ochraceo-albidus* Muell. -Arg. 635
paniculatus (Lam.) Muell. -Arg. 635
philippinensis (Lam.) Muell. -Arg. 635
repandus (Willd.) Muell. -Arg. var. chrysocarpus (Pamp.) S. M. Hwang 635
var. megaphyllus Croiz. 635
*tenuifolius* Pax 635
Malus Mill. 511
asiatica Nakai 511
baccata (L.) Borkh. 511
doumeri (Boiss.) Cheval. 511
*formosana* (Kaw. et Koidz.) Kaw. et Koidz. 511
halliana Koehne 511
hupehensis (Pamp.) Rehd. 511
mandshurica (Maxim.) Kom. 511
melliana (Hand. -Mazz.) Rehd. 511
micromalus Makino 511
prunifolia (Willd.) Borkh. 512
pumila Mill. 512
rockii Rehd. 512
spectabilis (Ait.) Borkh. 512
yunnanensis (Franch.) Schneid. 512
Malva A. Gray 742
*chinensis* Mill. 743
*coromandeliana* L. 744
crispa L. 743
*mauritiana* L. var. *sinensis* (Cav.) DC. 743
mohileviensis Downar. 743
neglecta Wall 743
rotundifolia L. 743
sinensis Cav. 743
verticillata L. 743
var. chinensis (Mill.) S. Y. Hu 743
Malvaceae 737
Malvastrum A. Gray 743
coromandelianum (L.) Garcke 744
Mammalia 1745
Mammillaria Haw. 262
longimamma P. DC. 262
var. sphaerica (A. Dietr.) K. Brang 262
rhodantha Link. 263
Mananthes Bremek. 1170
leptostachya (Hemsl.) H. S. Lo 1170
vascelosa (Nees) Bremek. 1170
Mandragora L. 1121
caulescens C. B. Clarke 1121
chinghaiensis Kuang et A. M. Lu 1121
Mangifera L. 668
*austro-yunnanensis* Hu 668
indica L. 668
longipes Griff. 668
persiciformis C. Y. Wu et T. L. Ming 668
*pinnata* L. f. 671
siamensis Warb. 668
sylvatica Roxb. 668
Manglietia Bl. 268
duclouxii Finet et Gagnep. 268
fordiana Oliv. 268
insignes (Wall.) Bl. 268
patungensis Hu 268
szechuanica Hu 268
yuyanensis Law 268
Manidae 1750
Manihot Mill. 636
esculenta Crantz 636
Manilkara Adans. 926
subquincuncialis Lam. et Kerpel
zapota (L.) van Royen 926
Manis Linnaeus 1750
pentadactyla Linnaeus 1750

Mannagittaea H. Smith 1195
labiata H. Smith 1195
Manta birostris (Walbaum) 1650
Mantidae 1611
Mantis religiosa (Linnaeus) 1612
*Manulea indicana* Lour. 1131
Maoutia Wedd. 199
puya (Wall.) Wedd. 199
*Mappia denticulata* Bl. 634
*pittosporoides* Oliv. 708
Mappianthus Hand.-Mazz. 708
iodoies Hand.-Mazz. 708
Maranta L. 1516
arundinacea L. 1516
bicolor Ker-Gawl. 1516
*galanga* L. 1502
*malaccensis* Burm. f. 1504
Marantaceae 1516
Marasmiellus ramealis (Baill. ex Fr.) Sing. 38
Marasmius Fr. 38
androsaceus (L. ex Fr.) Fries 38
equicrinis Muell. 38
oreades (Bolt. ex Fr.) Fr. 38
*Marcanthus cochinchinensis* Lour. 589
Marchantia L. 68
*conica* L. 68
*hemisphaeria* L. 68
polymorpha L. 68
Marchantiaceae 68
Margaritana Schumacher 1584
dahurica (Middendorff) 1584
Margaritanidae 1584
Mariscus Gaertn. 1496
compactus (Retz.) Druce 1496
sumatrensis (Retz.) T. Koyama 1496
var. evolutior (C. B. Clarke) C. Y. Wu 1496
var. khasianus (C. B. Clarke) C. Y. Wu 1496
*Marlea platanifolia* Sieb. et Zucc. 825
var. *trilobum* Miq. 825
Marmota Blumenbach 1753
baibacina Brandt 1753
bobak (Muller) 1753
caudata (Jacquemont) 1753
himalayana (Hodgson) 1753
Marrubium L. 1086
*incisum* Benth. 1082
vulgare L. 1086
Marsdenia R. Br. 983
griffithii Hook. f. 983
koi Tsiang 983
officinalis Tsiang et P. T. Li 983
oreophila W. W. Smith 984
sinensis Hemsl. 984
tenacissima (Roxb.) Moon 984
tinctoria R. Br. 984
*urceolatus* Decne. 979
yanngpiensis Tsiang et P. T. Li 984
Marsilea L. 139
*nutans* L. 140
quadrifolia L. 139
Marsileaceae 139
Martela Pinel 1762
eversmanni Lesson 1762
Martes Pinel 1763
flavigula Boddaert 1764
zibellina Linnaeus 1763
Martianus Fairmaire 1625
dermestoides Chevrolat 1625
Mastigocladaceae 4
Masturus lanceolatus (Lienard) 1693
Matricaria L. 1319
*chamomilla* L. 1319
*coronaria* (L.) Desr. 1276
*discoidea* DC. 1319
matricarioides (Less.) Porter ex Britt. 1319
*parthenium* L. 1326
recutita L. 1319
Matteuccia Todoro 110
orientalis (Hook.) Trev. 111
struthiopteris (L.) Todoro 111
Matuta lunaris (Forskal) 1604
Mauritia arabica(Linnaeus) 1575
*Maxillaria goerngii* Reichb. 1529
Mayodendron Kurz 1162
igneum (Kurz) Kurz 1162
Maytenus Molina 701
austroyunnanensis S. J. Pei et Y. H. Li 701
berberoides (W. W. Smith) C. Y. Cheng 701
confertiflora J. Y. Luo et X. X. Chen 701
diversifolius (Hemsl.) Hou 701
esquirolii (Lévl.) C. Y. Cheng 701
gracilira S. J. Pei et Y. H. Li 701
guangxiensis C. Y. Cheng et W. L. Sha 701
hookeri Loes. 701
var. longiradiata S. J. Pei 701
lunglinensis C. Y. Cheng et W. L. Sha 702
oliganthus C. Y. Cheng et W. L. Sha 702
orbiculata C. Y. Wu ex S. J. Pei et Y. H. Li 702
variabilis (Loes.) C. Y. Cheng 702
f. inermis C. Y. Cheng et W. L. Sha 702
Mazus Lour. 1139
gracilis Hemsl. 1139
japonicus (Thunb.) O. Kuntze 1139
lecomtei Bonati 1139
miquelii Makino 1139
omeiensis Li 1139
*pinnatus* Wall. 1134
pulachellus Hemsl. 1140
*rugosus* Lour. 1139
stachydifolius (Turcz.) Maxim. 1140
Mecodium Presl. 86
badium (Hook. et Grev.) Cop. 86

osmundoides (v. d. B) Ching 86
Meconopsis Vig. 441
chelidonifolia Bur. et Franch. 441
henrici Bur. et Franch. 441
horridula Hook. f. et Thoms. 441
var. racemosa (Maxim.) Prain 441
integrifolia (Maxim.) Franch. 441
var. uniflora C. Y. Wu et H. Chuang 442
lancifolia (Franch.) Franch. 442
nepalensis DC. 442
oliveriana Franch. et Prain 442
paniculata (D. Don) Prain 442
punicea Maxim. 442
quinliplinervia Regel 442
*racemosa* Maxim. 441
torquata Prain 442
Mecopoda Audinet-Seryville 1612
elongata (Linnaeus) 1612
Medicago L. 585
archiducis-nicolai G. Sirjaev. 585
falcata L. 585
hispida Gaertn. 585
lupulina L. 586
minima (L.) Bartalini 586
*polymorpha* L. var. *minima* L. 586
sativa L. 586
*Medicia elegans* Gardn. et Champ. 944
Medinilla Gaud 810
radicans (Vaniot) C. Y. Wu 810
*septentrionalis* (W. W. Smith) H. L. Li 810
Mechania Britt. 1086
fargesii (Lévl.) C. Y. Wu 1086
var. pedunculata (Hemsl.) C. Y. Wu 1087
var. radicans (Vaniot) C. Y. Wu 1087
henryi (Hemsl.) Sun ex C. Y. Wu 1087
urticifolia (Miq.) Makino 1087
Megalobrama Dybowsky 1662
amblycephala Yih 1662
terminalis (Richardson) 1662
Megascolecidae 1593
Meitanaphis elongallis Tsai et Tang 1617
microgallis Xiang 1617
Melaleuca L. 804
leucadendron L. 804
quinquenervia S. T. Blake 804
Melampyrum L. 1140
*obtusifolium* Bonati 1140
roseum Maxim. 1140
var. obtusifolium (Bonati) Hong 1140
*Melandrium apetalum* (L.) Fenzl var. *himalayense* Rohrb. 247
*apricum* (Turcz.) Rohrb. 246
*brachypetalum* (Horn.) Fenzl 247
*delavayi* (Franch.)Hand. -Mazz. 246
*firmum* (Sieb. et Zucc.) Rohrb. 246
*grandiflorum* (Franch.) Y. W. Tsui 247
*lankongense* (Franch.) Hand. -Mazz. 247
*tatarinowii* (Regel) Y. W. Tsui 248
*viscidulum* Williams 248
*viscidulum* (Franch.) F. N. Williams var. *szechuanense* (Williams) Hand. -Mazz. 248
Melanosciadium de Boiss. 868
pimpinelloideum de Boiss. 868
Melanotus caudex Lewis 1621
Melanteritum 1782
*Melanthium cochinchinensis* Lour. 1369
Melaphis Walsh 1617
chinensis (Bell) 1617
peitan Tsai et Tang 1617
Melasma Berg. 1140
arvense (Benth.) Hand. -Mazz. 1140
Melastoma L. 810
affine D. Don 810
candidum D. Don 810
dodecandrum Lour. 810
intermedium Dunn 810
normale D. Don 810
*polyanthum* Bl. 810
sanguineum Sims 811
*septemnervium* Lour. 810
Melastomataceae 807
Meles Brisson 1763
meles Linnaeus 1763
Melia L. 660
azedarach L. 660
*bauifera* Roth 659
toosendan Sieb. et Zucc. 660
Meliaceae 659
Melica L. 1449
onoei Franch. et Sav. 1449
scabrosa Trin. 1449
Melilotus Mill. 586
alba Medic ex Desr. 586
dentata (Waldst. et Kit.) Pers. 586
indica (L.) All. 586
officinalis (L.) Desr. 586
suaveolens Ledeb. 587
Meliosma Bl. 680
*buchananifolia* Merr. 682
cuneifolia Franch. 680
var. glabriuscula Cufod. 681
flexuosa Pamp. 681
fordii Hemsl. 681
henryi Diels 681
myriantha Sieb. et Zucc. 681
oldhami Miq. 681
var. glandulifera Cufod. 681
parviflora Lec. 681
rigida Sieb. et Zucc. 681
*simplicifolia* (Roxb.) Walp. subsp. *yunnanensis* (Franch.) Beus. 682
*sinensis* Nakai 681
thorelii Lec. 682
yunnanensis Franch. 682
Melissa L. 1087

axillaris (Benth.) Bakh. f. 1087
officinalis L. 1087
*parviflora* Benth. 1087
Melitodes Verrill 1569
ochracea (Linnaeus) 1569
squamata Nutting 1569
Melitodidae 1569
Melliodendron Hand. -Mazz. 928
jifungense Hu 928
*wangianum* Hu 928
xylocarpum Hand. -Mazz. 928
Melochia L. 749
corchorifolia L. 749
*cordata* Burm. f. 744
Melodinus J. R. et G. Forst. 966
*duclouxii* Lévl. 936
*dunnii* Lévl. 971
fusiformis Champ. ex Benth. 966
hemsleyanus Diels 966
henryi Craib 966
suaveolens Champ. ex Benth. 966
yunnanensis Tsiang et P. T. Li 966
*Melodorum chloroneum* Hand. -Mazz. 272
*glaucescens* Hance 272
*oldhamii* Hemsl. 272
*polyanthum* Hook. f. et Thoms. 272
*wonicum* Dunn 272
Meloe Linnaeus 1622
coarctatus Motschulsky 1622
violaceus (Linnaeus) 1622
Melogale moschata Gray 1763
Meloidae 1621
Melolonthidae 1623
Melothria heterophylla (Lour.) Cogn. 790
*indica* Lour. 797
*maysorensis* (Wight et Arn.) Chang 797
Memecylon L. 811
ligustrifolium Champ. 811
scutellatum (Lour.) Hook. et Arn. 811
Menemerus Simon 1597
confusus (Böes et Str.) 1597
*Meniscium simplex* Hook. 106
*triphyllum* Sw. 106
Menispermaceae 374
Menispermum L. 378
*acutum* Thunb. 379
crispum L. 384
dauricum DC. 378
*glaucum* Lam. 379
*orbiculatum* L. 375
Mentha L. 1087
*arvensis* L. subsp. *haplocalyx* Briq. var. *sachalinensis* Briq. 1088
var. malinvaudi (Lévl.) C. Y. Wu et H. W. Li 1088
asiatica Boiss. 1088
*auricularis* L. 1098
*cablin* Blanco 1099
dahurica Fisch. ex Benth. 1088
haplocalyx Briq. 1088
var. piperascens (Malinvaud) C. Y. Wu et H. W. Li 1088
piperita L. 1088
rotundifolia (L.) Huds. 1088
sachalinensis (Briq.) Kudo 1088
spicata L. 1088
*γ. rotundifolia* L. 1088
*stellata* Lour. 1066
vagans Boiss. 1088
*viridis* L. 1088
Menyanthaceae 958
Menyanthes (Tourn.) L. 958
*indica* L. 958
trifoliata L. 958
Meretrix lamarckii Deshayes 1587
lusoria Rumphius 1587
meretrix (Linnaeus) 1587
Mergus Linnaeus 1718
albellum (Linnaeus) 1718
merganser Linnaeus 1718
squamatus Gould 1718
Meristotheca J. Ag. 16
papulosa (Mont.) J. Ag. 16
Merostomata 1595
Merremia Dennst. 1028
boisiana (Gagnep.) v. Ooststr. 1028
var. fulvopilosa (Gagnep.) v. Ooststr. 1029
*decurrens* (Hand. -Mazz.) Kiu 1029
hederacea (Burm. f.) Hall. f. 1029
hirta (L.) Merr. 1029
hungaiensis (Lingelsh. et Borza) R. C. Fang 1029
var. linifolia (C. C. Huang ex C. Y. Wu et H. W. Li) R. C. Fang 1029
sibirica (L.) Hall. f. 1029
tridentata (L.) Hall. f. subsp. hastata (Desr.) v. Ooststr. 1029
umbellata (L.) Hall. f. subsp. orientalis (Hall. f.) v. Ooststr. 1030
var. *orientalis* Hall. f. 1030
vitifolia (Burm. f.) Hall. f. 1031
Merrilliopanax Li 841
*chinensis* Li 841
listeri (King) Li 841
Meruliaceae 26
Merulius aurcus Fr. 27
tremellosus Schrad. ex Fr. 27
*Mesogloea decipiens* Sur. 8
Mesona Bl. 1089
chinensis Benth. 1089
*Mespilus japonica* Thunb. 507
Messerschmidia L. ex Hebenstr. 1037
sibirica L. var. angustior (DC.) W. T. Wang 1037
subsp. *angustior* (DC.) Kitag. 1037

Mesua L. 424
ferrea L. 424
*Metabotrya meliaefolia* Hance 647
Metapenaeus Wood-Mason et Alcock 1601
bukentoadi Kubo 1601
joyneri (Miers) 1601
Metaplexis R. Br. 984
hemsleyana Oliv. 984
japonica (Thunb.) Makino 984
Metariaceae 64
Metasequoia Miki ex Hu et Cheng 149
glyptostroboides Hu et Cheng 149
Metastachydium Airy-Shaw 1089
sagittatum (Regel) C. Y. Wu et H. W. Li 1089
*Meteorium pedulum* Sull. 64
Meteriaceae 64
*Mezoneuron cucullatum* (Roxb.) Wight et Arn. 554
Michelia L. 268
alba DC. 268
champaca L. 269
chapensis Dandy 269
crassipes Law 269
figo (Lour.) Spreng. 269
foveolata Merr. ex Dandy 269
hedyosperma Law 269
macclutei Dandy 269
maudiae Dunn 269
*tsoi* Dandy 269
yunnanensis Franch. 270
Microcephalophis gracilis (Shaw) 1710
*Microchlaena spectabilis* DC. 748
Microcos L. 735
paniculata L. 735
Microglossa DC. 1320
pyrifolia (Lamk.) O. Kuntze 1320
*volubilis* DC. 1320
Microhyla Tschudi 1698
heymonsi Vogt 1699
ornata (Dumeril et Bibron) 1699
pulchra (Ballowell) 1698
Microhylidae 1698
Microlepia Presl 88
hancei Prantl 88
marginata (Houtt.) C. Chr. 89
strigosa (Thunb.) Presl 89
*Micromeles alnifolia* (Sieb. et Zucc.) Koehne 538
*folgneri* Schneid. 539
Micromelum Bl. 649
falcatum (Lour.) Tanaka 649
integerrimum (Buch. -Ham.) Wight 649
var. mollissimum Tanaka 649
Micromeria Benth. 1089
barosma (W. W. Smith) Hand. -Mazz. 1089
biflora (Buch. -Ham. ex D. Don) Benth. 1089
*Microrhamnus fraguloides* Maxim. 713
Microsorium Link 131
buergerianum (Miq.) Ching 131
dilatatum (Bedd.) Sledge 131
fortunei (Moore) Ching 131
hymenodes (Kuntze) Ching 131
membranaceum (D. Don) Ching 131
punctatum (L.) Cop. 132
steerei (Harr.) Ching 132
Microstegium Nees 1449
gratum (Hack.) A. Camus 1449
*Microstylis japonica* Miq. 1547
*latifolia* (Smith) J. J. Smith 1549
*yunnanensis* Schltr. 1549
*yunnanensis* (Schltr.) Tang et Wang 1549
Microtis R. Br. 1550
uniflora Reichb. f. 1550
Microtoena Prain 1089
delavayi Prain 1089
insuavis (Hance) Prain ex Dunn 1090
omeiensis C. Y. Wu et Hsuan ex Hsuan 1090
patchouli (C. B. Clarke ex Hook. f.) C. Y. Wu et Hsuan ex Hsuan 1090
pauciflora C. Y. Wu ex Hsuan 1090
prainiana Diels 1090
urticifolia Hemsl. 1090
Microtropis Wall. ex Meissn. 702
*confertiflora* Merr. et Freem. 702
fokienensis Dunn 702
gracilipes Merr. et Metc. 702
tetragona Merr. et Freem. 702
Microula Benth 1037
sikkimensis (C. B. Clarke) Hemsl. 1037
Miichthys Linnaeus 1678
miiuy (Basilewsky) 1678
*Milium globosum* Thunb. 1447
Miliusa Lesch. ex DC. 273
chunii W. T. Wang 273
sinensis Finet et Gagnep. 273
Millettia Wight et Arn. 587
bonatiana Pamp. 587
championi Benth. 587
dielsiana Harms 587
var. heterocarpa (Chun et T. Chen) Z. Wei 587
fordii Dunn 587
*lasiopetala* (Hayata) Merr. 588
leptobotrya Dunn 587
nitida Benth 587
oosperma Dunn 588
pachycarpa Benth. 588
pachyloba Drake 588
pulchra (Colebr.) Kurz 588
var. chinensis Dunn 588
var. *yunnanensis* (Pamp.) Dunn 589
reticulata Benth. 588
speciosa Champ. 588
tsui Metc. 589
yunnanensis Pamp. 589
Millingtonia L. f. 1162

hortensis L. f. 1162
Milvus Lacepeda 1721
korschum (Gmelin) 1721
Mimela costata (Hope) 1624
Mimosa L. 589
*catechu* L. f. 545
*chinensis* Osbeck 546
*cinerea* L. 570
*concinna* Willd. 545
*contortisiliquum* Vell. 572
*corniculata* Lour. 546
*cyclocarpa* Jacq. 572
*duclitr* Roxb. 595
*fera* Lour. 575
*kalkora* Roxb. 547
*lebbeck* L. 547
*leucocephala* Lam. 584
*adoratissima* L. f. 547
*pennata* L. 545
pudica L. 589
*scandens* L. 572
*sinuata* Lour. 545
*teucocephala* Lam. 584
Mimulus L. 1140
bodinieri Vant. 1141
bracteosa Tsoong 1141
*nepalensis* Benth. 1141
var. *platyphyllus* Franch. 1140
Szechuanensis Pai 1141
tenellus Bunge 1141
var. nepalensis (Benth.) Hong 1141
var. platyphyllus Franch. 1140
var. procerus (Grant) Hand-Mazz. 1141
*violacea* Azaola ex Blanco 1154
Miniopterus schreibersi (Kuhl) 1747
Minous monodactylus (Bloch et Schneider) 1687
Mirabilis L. 235
himalaica (Edgew.) Heim. 235
jalapa L. 235
Mirabilitum 1788
Miscanthus Anderss. 1449
floridulus (Labill.) Warb. ex Schum. et Lauterb. 1449
*purpurascens* Anderss. 1450
sacchariflorus (Maxim.) Benth. ex Hook. f. 1449
sinensis Anderss. 1449
var. purpurascens (Anderss.) Matsum. 1450
Misgurnus Lacepede 1667
anguillicaudatus (Cantor) 1667
mizolepis (Günther) 1667
Mitella Oken 1598
mitella (Linnaeus) 1598
*Mitostigma gracile* Bl. 1517
Mitrasacme Labill. 945
pygmaea R. Br. 945
Mitreola L. 945
pedicellata (Gmel.) Benth. 945
*Mitrosicyos paniculatus* Maxim. 782
Miyamayomena Kitam. 1320
piccolii (Hook. f.) Kitam. 1320
Mniaceae 63
*Mnium cuspidatum* Hedw. 63
*fontanum* Hedw. 63
*giganteum* Schwaegr. 62
*roseum* Hedw. 63
*Moacurra gelonioidea* Roxb. 752
Mobula Rafinesque 1650
japonica (Muller et Henle) 1650
Mobulidae 1650
*Modecca cardiophylla* Mast. 772
Modiolus metcalfei Hanley 1581
modious Linnaeus 1581
Moerella Fischer 1588
rutila (Dunker) 1588
Mogera Pomel 1746
latouchei Thomas 1746
robusta Nehring 1746
wogura Temminck 1746
Mola Koelreuter 1693
mola (Linnaeus) 1693
Molidae 1693
*Molineria gracilis* (Wall. ex Kurz) Kurz 1410
Molluginaceae 235
Mollugo L. 235
lotoides (L.) O. Kuntze 235
oppositifolia L. 236
pentaphylla L. 236
Mollusca 1570
Momordica L. 788
charantia L. 788
cochinchinensis (Lour.) Spreng. 789
*cylindrica* L. 788
*grosvenorii* Swingle 790
*lanatus* Thunb. 783
*macrophylla* Cogn. 789
subangulata Bl. 789
Monachosoraceae 88
Monachosorum Kunze 88
flagellare (Maxim.) Hayata 88
henryi Christ 88
Monascus van. Tiegh. 19
purpureus Went. 19
Monetaria Troschel 1575
annulus (Linnaeus) 1575
moneta (Linnaeus) 1575
Moniliaceae 53
Monochasma Maxim. 1141
monantha Hemsl. 1141
savatieri Franch. ex Maxim. 1141
sheareri Maxim. ex Franch. 1141
Monochoria Presl 1416
hastata (L.) Solms 1416
korsakowii Regel et Maack 1417
vaginalis (Burm. f.) Presl 1417

Monocotyledoneae 1357
*Monolophus coenobialis* Hance 1508
*yunnanensis* T. L. Wu et Senjen 1508
Monopterus Lacépéde 1675
ablus (Zuiew) 1675
Monostroma Thuret 5
angicava Kiellm. 5
nitidum wittr. 5
zestericola Tilden 5
Monostromaceae 5
Montmorillonitum 1791
Monotropa L. 882
uniflora L. 882
*Monotropastrum lingchuanense* K. F. Wu 881
*macrocarpum* H. Andr. 881
Moraceae 183
Moraea Mill. 1423
iridioides L. 1423
Morchella Dill. ex Pers. 23
angusticeps Peck. 23
conica Pers. 23
crassipes (Vent.) Pers. 23
deliciosa Fr. 23
esculenta (L.) Pers. 23
Morchellaceae 23
*Morelia rubra* Lour. 159
Morina L. 1220
*alba* Hand. -Mazz. 1220
*betonicoides* Benth. 1220
*bulleyana* Forr. et Diels 1220
chinensis (Batal.) Diels 1220
*delavayi* Franch. 1220
kokonorica Hao 1220
nepalensis D. Don 1220
var. alba (Hand.-Mazz.) Y. C. Tang 1220
var. delavayi (Franch.) C. H. Hsing 1220
*parviflora* Kar. et Kir. var. *chinensis* Batal. 1220
Morinda L. 1007
angustifolia Roxb. 1007
cochinchinensis DC. 1007
officinalis How 1008
parvifolia Bartl. ex DC. 1008
umbellata L. 1008
Morus L. 191
alba L. 191
var. tatarica (Pall.) Ser. 191
australis Poir. 191
cathayana Poir. 191
mongolica Schneid. 191
nigra L. 191
*papyrifera* L. 184
Moschidae 1773
Moschus Linnaeus 1773
berezovskii Flerov 1773
chrysogaster Hodgson 1773
fuscus Li 1773
moschiferus Linnaeus 1773
sifanicus Buchner 1773
Mosla (Benth.) Buch. -Ham. ex Maxim. 1091
cavaleriei Lévl. 1091
chinensis Maxim. 1091
dianthera (Buch. -Ham.) Maxim. 1091
grosseserrata Maxim. 1091
hangchowensis Matsuda 1091
pauciflora (C.Y. Wu) C. Y. Wu et H. W. Li 1091
scabra (Thunb.) C. Y. Wu et H. W. Li 1091
soochowensis Matsuda 1092
Motacilla Linnaeus 1736
alba Linnaeus 1736
Motacillidae 1736
Mucuna Adans. 589
birdwoodiana Tutch. 589
castanea Merr. 589
championi Benth. 589
cochinchinensis (Lour.) A. Chevol. 589
macrocarpa Wall. 589
sempervirens Hemsl. 590
wangii Hu 590
Muelhenbeckia Meissn. 220
platycladum (F. Muell. ex Hook.) Meisen. 220
Mugil Linnaeus 1674
cephalus Linnaeus 1674
engeli (Bleeker) 1674
soiuy Basilewsky 1674
Mugilidae 1674
Mukdenia Koidz. 482
rossii (Engl.) Koidz. 482
Mukia Arn. 789
maderaspatana (L.) M.J. Roem. 789
Mulgedium Cass. 1320
tataricum (L.) DC. 1320
*Munchausia speciosa* L. 798
Munronia Wight 660
delavayi Franch. 660
hainanensis How et T. Chen 660
henryi Harms 661
sinica Diels 661
unifoliolata Oliv. 661
Muntiacus Rafinesque 1772
crinifrons Sclater 1772
muntjak (Zimmermann) 1773
roevesi Ogilby 1773
Muraenesocidae 1656
Muraenesox McClelland 1656
cinereus (Forskal) 1656
Muraenichys Bleeker 1657
gymnopterus Bleeker 1657
Muraenidae 1656
Murdannia Royle 1428
bracteata (C. B. Clarke) O. Kuntze ex J. K. Morton 1428
divergens (C.B. Clarke) Bruckn. 1429

keisak (Hassk.) Hand.-Mazz. 1429
loriformis (Hassk.) Rolla Rao et Kammathy 1429
loureirii (Hance) Rolla Rao et Kammathy 1429
macrocarpa Hong 1429
nudiflora (L.) Brenan 1429
simplex (Vahl) Brenan 1429
triquetra (Wall.) Bruckn. 1430
Murex Linnaeus 1575
aduncospinosus Beck 1575
rectirostris Sowerby 1575
ternispina lamarck 1575
trapa Roding 1575
triremis(Perry) 1575
*Muricia cochinchinensis* Lour. 789
Muricidae 1575
Muridae 1756
Murina leucogaster Milne-Edwards 1747
Murraya Koenig ex L. 649
euchrestifolia Hayata 649
exotica L. 649
koenigii (L.) Spreng. 649
kwangsiensis (Huang) Huang 650
paniculata (L.) Jack. 650
tetramera Huang 650
Mus musculus Linnaeus 1757
Musa L. 1550
balbisiana Colla 1550
basjoo Sieb. et Zucc. 1550
coccinea Andr. 1550
*glauca* Roxb. 1550
*lasiocarpa* Fr. 1551
nana Lour. 1550
sapientum L. 1550
wilsonii Tutch. 1550
Musaceae 1499
Musca Linnaeus 1632
domestica domestica Linnaeus 1632
domestica vicina Macquart 1632
Musci 60
Muscicapidae 1740
Muscidae 1632
Muscovitum 1789
Musculus Bolten 1580
senhousei (Benson) 1580
Musella (Franch.) C. Y. Wu ex H. W. Li 1551
lasiocarpa (Franch.) C. Y. Wu ex H. W. Li 1551
Mussaenda L. 1008
breviloba S. Moore 1008
*dehiscens* Craib 1018
divaricata Hutch. 1008
erosa Champ. 1008
esquirolii Lévl. 1009
hirsutula Miq. 1009
hossei Craib 1009
kwangsiensis Li 1009
pubescens Ait. f. 1009
Mustela Linnaeus 1763
altaica Pallas 1763
kathiah Hodgson 1764
sibirica Pallas 1764
Mustelidae 1762
Mustelus Linck 1645
griseus Pietschmann 1646
manazo Bleeker 1645
Mya Linnaeus 1589
arenaria japonica Linnaeus 1589
japonica Jay 1589
Mycenastrum Desv. 51
corium (Guers.) Desv. 51
Mycetia Reinw. 1009
sinensis (Hemsl.) Craib 1009
Myidae 1589
Myiophoneus Temminck 1741
caeruleus (Scopoli) 1741
Mylabris Fabricius 1622
calida Pallas 1622
cichorii (Linnaeus) 1622
phalerata Pallas 1622
sidae Fabricius 1622
speciosa Pallas 1622
Myliobatidae 1649
Myliobatis Cuvier 1649
tobijei Bleeker 1649
Mylopharyngodon Peters 1662
piceus (Richardson) 1662
Myoporaceae 1197
Myoporum Banks et Soland. ex Forst.f. 1197
bontioides (Sieb. et Zucc.) A. Gray 1197
*Myosotis peduncularis* Trev. 1040
*rupestre* Pall. 1035
*zeylanica* Lehm. 1034
Myospalax Laxmann 1756
aspalax (Pallas) 1756
fontanieri Milne-Edwards 1756
psilurus (Milne-Edwards) 1756
rothschildi Thomas 1756
smithi Thomas 1756
Myotis altarius Thomas 1747
blythi (Thomas) 1747
daubentoni (Kuhl) 1747
formosus Hodgson 1747
ikonnikovi Ognev 1747
langecaudatus Ogner 1747
myotis (Borkhausen) 1747
mystacinus Kuhl 1747
nathereri Kuhl 1747
rickettia Thomas 1747
sitigoensis (Horsfield) 1747
Myriactis Less. 1320
delavayi Gagnep. 1320
nepalensis Less. 1320
Myrica L. 158
adenophora Hance 158

esculenta Buch.-Ham. 158
nagi Thunb. 154
nana Cheval. 158
var. luxuriana Cheval. 158
octandra Buch.-Ham. ex D. Don 620
rubra (Lour.) Sieb. et Zucc. 159
Myricaceae 158
Myricaria Desv. 774
alopecuroides Schrenk 774
bracteata Royle 774
elegans Royle 775
germanica (L.) Desv. 775
*kedinii* Paulsen 775
paniculata P. Y. Chang et Y. J. Chang 775
platyphylla Maxim. 775
prostrata Benth. et Hook. f. 775
rosea W. W. Smith 775
squamosa Desv. 775
*Myriogyne minuta* Less. 1275
*Myrioneuron* R. Br. 1009
faberi Hemsl. 1009
Myriophyllum L. 823
spicatum L. 823
verticillatum L. 824
Myriopteron Griff. 985
extensum (Wight.) Schum. 985
Myristica Gronov. 274
fragrans Houtt. 274
*glabra* Bl. 274
Myristicaceae 274
Myrmeleon formicarius Linnaeus 1626
Myrmeleontidae 1626
*Myrobalanus bellirica* Gaertn. 818
Myrsine L. 908
africana L. 908
var. acuminata C.Y. Wu et C. Chen 908
*buxifolia* Hance 459
*neriifolia* Sieb. et Zucc. 909
semiserrata Wall. 908
stolonifera (Koidz.) Walker 908
Myrtaceae 801
*Myrtus chinensis* Lour. 931
*cumini* L. 885
*laurina* Retz. 932
*leucadendra* L. 804
*tomentosa* Ait. 804
Mytilidae 1580
Mytilus Linnaeus 1581
coruscus Grold 1581
edulis Linnaeus 1581

## N

Nadezhdiella aurea Gressitt 1626
cantori (Hope) 1626
Naematoloma fasciculare (Huds. ex Fr.) Karst. 42
sublateritium (Fr.) Karst. 42
Naemorhedus Smith 1776
gotal Hardwicke 1776
Naja Laurenti 1710
naja (Linnaeus) 1710
Nandina Thunb. 370
domestica Thunb. 370
Nannoglottis Maxim. 1321
gynura (C. Winkl.) Ling et Y. L. Chen 1321
Nanocnide Bl. 199
japonica Bl. 199
lobata Wedd. 200
*pilosa* Migo 200
Nanophyton Less. 256
erinaceum (Pall.) Bunge 256
Naravelia DC. 342
pilulifera Hance 342
Narcissus L. 1409
tazetta L. var. chinensis Roem. 1409
*Nardosmia japonica* Sieb. et Zucc. 1323
Nardostachys DC. 1215
chinensis Batal. 1215
*grandiflora* DC. 1215
jatamansi (D. Don) DC. 1215
Nasturtium R. Br. 455
*globosum* Turcz. 456
*indicum* (L.) DC. 456
*montanum* Wall. 456
officinale R. Br. 455
Natrix craspedogaster (Boulenger) 1708
natrix (Linnaeus) 1708
nuchalis (Boulenger) 1708
optata Hu et Zhao 1708
percarinata (Boulenger) 1708
stolata (Linnaeus) 1708
tigrina (Boie) 1708
vibakari (Boie) 1708
Nauclea L. 1010
officinalis Pierre ex Pitard 1010
*racemosa* Sieb. et Zucc. 990
*rhynchophylla* Miq. 1021
*scandens* Simth 1021
*sessilifructus* Dietr. 1021
*sinensis* Oliv. 1021
Navodon Whitley 1691
septentrionalis (Günther) 1691
Neanotis W. H. Lewis 1010
hirsuta (L. f.) W. H. Lewis 1010
ingrata (Wall. ex Hook. f.) W. H. Lewis 1010
urophylla (Wall. ex Wight et Arn.) W. H. Lewis 1010
wightiana (Wall. ex Wight et Arn.) W. H. Lewis 1010
Neillia D. Don 512
ribesioides Rehd. 512
sinensis Oliv. 512
thyrsiflora D. Don 512
Nelumbo Adans. 386
nucifera Gaertn. 386

Nemacystus Derb. et Sol. 8
decipiens (Sur.) Kuckuck 8
*Nemastoma livida* Harv. 15
Neoalsomitra Hutch. 789
integrifoliola (Cogn.) Hutch. 789
Neocheiropteris Christ 132
palmatopedata (Baker) Christ 132
*waltonii* Ching 134
Neocinnamomum Liou 295
caudatum (Nees) Merr. 295
delavayi (Lec.) Liou 296
var. *pauciflorum* Y. C. Yang 296
fargesii (Lec.) Kosterm. 296
*hainanianum* Allen 296
lecomtei Liou 296
mekongense (Hand. -Mazz.) Kosterm. 296
*parvifolium* (Lec.) Liou 296
*poilanei* Liou 295
Neofelis Gray 1765
nebulosa Griffith 1765
Neolepisorus Ching 132
deltoidea (Baker) Ching 132
ovatus (Bedd.) Ching 132
Neolitsea Merr. 296
aurata (Hayata) Koidz. 296
var. chekiangensis (Nakai) Yang et P. H. Huang 296
var. glauca Yang 296
var. paraciculata (Nakai) Yang et P. H. Huang 297
cambodiana Lec. 297
chekiangensis Nakai 296
*chinensis* (Gamble) Chun 297
chuii Merr. 297
confertifolia (Hemsl.) Merr. 297
*ferruginea* Merr. 297
levinei Merr. 297
*paraciculata* Nakai 297
zeylanica (Nees) Merr. 297
Neopallasia Poljak. 1321
pectinata (Pall.) Poljak. 1321
*yannanensis* (Pamp.) Y. R. Ling 1321
Neophocaena Palmer 1759
phocaenoides (G. Cuvier) 1759
Neosalanx Wakiya et Takahasi 1654
taihuensis Chen 1654
*Neottia procera* Wall. ex Ker-Gawl. 1540
*sinensis* Pers. 1559
Neottianthe Schltr. 1550
camptoceras (Rolfe) Schltr. 1550
cucullata (L.) Schltr. 1550
Neottopteris J. Smith 110
antrophyoides (Christ) Ching 110
marlipoense Ching 110
nidus (L.) J. Smith 110
Nepenthaceae 424
Nepenthes L. 424
mirabilis (Lour.) Druce 424
Nepeta L. 1092
cataria L. 1092
coerulescens Maxim. 1092
*complanata* Dunn 1098
densiflora kar. et Kir. 1092
fedtschenkoi Pojark. 1092
fordii Hemsl. 1092
*incana* Thunb. 1045
*indica* L. 1071
laevigata (D. Don) Hand.-Mazz. 1093
*maltifida* L. 1106
micrantha Bunge 1092
pannonica L. 1092
prattii Lévl. 1093
sibirica L. 1093
souliei Lévl. 1093
*tenuifolia* Benth. 1105
Nephelaphyllum chinense Rolfe 1528
Nephelium L. 678
chryseum Bl. 678
lappaceum L. 678
*litchi* Camb. 678
Nephila clavata (L. Koch) 1597
Nephritum 1784
*Nephrodium bissetianum* Baker 116
*clarker* Baker 121
*laetum* Kom. 118
*rhodolepis* C. B. Clarke 121
Nephrolepidaceae 123
Nephrolepis Schott 123
auriculata (L.) Trim. 123
hirsutula (Forst.) Presl 123
Neptunea cumingi Crosse 1576
Nereidae 1592
Nereis japonica Izuka 1592
Nerium L. 966
*divaricatum* L. 964
indicum Mill. 966
cv. Paihua 966
*tomentosum* Roxb. 973
Nertera Banks et Soland. 1011
sinensis Hemsl. 1011
Nervilia Comm. ex Gaud. 1550
aragoana Gaud. 1550
*flabelliformis* (Lindl.) Tang et Wang 1550
fordii (Hance) Schltr. 1550
plicata (Andr.) Schltr. 1551
*tibetensis* Rolfe 1550
Neuronia regina (Mac Lachlan) 1627
*Neustanthus pedunculoris* Grah. ex Benth. 597
Neyraudia Hook. f. 1450
reynaudiana (Kunth) Keng ex Hitchc. 1450
Nezara Amyot et Serville 1618
viridula (Linnaeus) 1618
Nibea Jordan et Thompson 1678
albiflora (Richardson) 1678
Nicandra Adans. 1121
physaloides (L.) Gaertn. 1121

Nicotiana L. 1121
rustica L. 1121
tabacum L. 1121
Nidulariaceae 52
Nigella L. 342
damascena L. 342
glandulifera Freyn et Sint. 342
sativa L. 342
*serratus* Thunb. 392
*Nigrina spicata* Thunb. 392
*Nintooa confusa* Sweet 1021
*Niphobolus angustissimum*(Baker) Gies. 138
*davidii* Baker 136
*fortunei* O. Kuntze 138
*martinii* Christ 138
*mollis* O. Kuntze 137
*tonkinensis* Gies. 137
Nitella Ag. 8
expansa T. F. Allen 8
Nitraria L. 615
roborowskii Kom. 615
sibirica Pall. 615
tangutorum Bobr. 615
Nitrum 1786
Nitzschiaceae 12
Nitzschia Hass. 12
longissima (Bréb.) Ralfs 12
Noctuidae 1630
Nopalxochia Britt. et Rose 263
ackermanii Kunth 263
Norsca patula (Thunb.) J. O. Voigt 423
Nosema Praja 1093
cochinchinensis (Lour.) Merr. 1093
Nostocaeae 3
Nostoc Vauch. 3
commune Vauch. 3
flagelliforme Born. et Flah. 3
paludosum Kulz. 3
quoyi C. Ag. 4
Notarchus Cuvier 1577
leachii cirrosus Stimpson 1577
Nothapodytes Bl. 708
pittosporoides (Oliv.) Sleum. 708
Notholaena R. Br. 95
chinensis Baker 95
Notholirion Wall. ex Boiss. 1388
bulbuliferum (Lingelsh.) Stearn 1388
Nothopanax Miq. 841
davidii (Franch.) Harms ex Diels 841
delavayi (Franch.) Harms ex Diels 841
var. longicaudatus Feng 841
*latifolius* Hand.-Mazz. 841
*rosthornii* Harms ex Diels 840
Nothosmyrnium Miq. 868
japonicum Miq. 868
var. sutchenense H. Boiss. 868
Notochacte Benth. 1093
hamosa Benth. 1093
Notopterygium H. Boiss. 868
forbesii H. Boiss. 868
var. oviforme (Shan) H. T. Chang 868
incisum Ting ex H.T. Chang 869
*oviforme* Shan 868
Notorhynchus Ayres 1643
platycephalus (Tenore) 1643
Numenius Brisson 1728
arquata Linnaeus 1728
madagascariensis (Linnaeus) 1728
Nuphar Sibth. et Smith 386
bornetii Lévl. et Vant. 386
pumilum (Timm.) DC. 386
Nurudea sinica Tsai et Tang 1617
Nurudeopsis shiraii (Matsumura) 1617
Nyctaginaceae 235
Nyctalus noctula (Schreber) 1747
Nyctanthes L. 941
arbor-tristis L. 941
*sambac* L. 938
Nyctereutes Temminck 1760
procyonoides Gray 1760
Nycticebus Geoffray 1749
coucang Boddaert 1749
Nyctocereus Britt. et Rose 263
serpentinus (Lag.) Britt. et Rose 263
Nymphaeaceae 385
Nymphaea L. 386
candida Presl 386
*lutea* L. var. *pumilum* Timm. 386
*pumila* (Timm.) Hoffm. 386
tetragona Georgi 386
var. crassifolia (Hand. -Mazz.) Y. C. Chu 386
Nymphoides Seguier 958
indica (L.) O. Kuntze 958
peltatum (Gmel.) O. Kuntze 958
Nyssaceae 825
Nyssa L. 825
sinensis Oliv. 825

## O

Oberonia Lindl. 1551
caulescens Lindl. 1551
iridifolia (Roxb.) Lindl. 1551
myosurus (Forst. f.) Lindl. 1551
Ocadia Gray 1700
sinensis (Gray) 1700
Ochnaceae 410
Ochotona Link 1751
alpina Pallas 1751
cansus (Lyon) 1751
curzoniae (Hodgson) 1751
daurica Pallas 1751
erythrotis Buchner 1751
forresti (Thomas) 1751
gloveri Thomas 1751
hyperborea Pallas 1751

toylei (Ogilby) 1751
thibetana Milne-Edwards 1751
Ochotonidae 1751
*Ochranthe argusa* Lindl. 704
Ocimum L. 1093
acuta Thunb. 1096
americanum L. 1093
*aureoglandulosum* Vant. 1045
basilicum L. 1094
var. pilosum (Willd.) Benth. 1094
*crispa* Thunb. 1096
*frutescent* L. 1096
gratissimum L. var. suave (Willd.) Hook. f. 1094
*inflexus* Thunb. 1077
sanctum L. 1094
*scabra* Thunb. 1091
*scutellarioidet* L. 1062
*Octomeria excavata* Wall. ex Lindl. 1538
Octopodidae 1591
Octopus Lamarck 1591
ocellatus Gray 1591
variabilis (Sasaki) 1591
vulgaris Cuvier 1591
Oculinidae 1568
Odontamblyopus Bleeker 1685
rubicundus (Hamilton) 1685
Odontites Ludwig. 1141
serotina (Lam.) L. 1141
Odontobutis Bleeker 1583
obscur (Temminck et Schlegel) 1683
Odontochilus Bl. 1551
elwesii C. B. Clarke 1651
yunnanensis Rolfe 1551
Odontotermes Holmgren 1612
formosanus (Shiraki) 1612
Oenanthe L. 869
benghalensis Benth. et Hook. f. 869
dielsii H. Boiss. 869
var. stenophylla H. Boiss. 869
javanica (Bl.) DC. 869
rivularis Dunn 869
rosthornii Diels 869
sinensis Diels 870
*stolonifera* (Roxb.) Wall. ex DC. 869
Oenopopelia tranquebarica(Harmann) 1730
Oenothera L. 822
biennis L. 823
erythrosepala Borb. 823
*ectovalvis* Jacq. 822
rosea L. Hérit. ex Ait. 823
stricta Ledeb. ex Link 823
Ogcocephalidae 1693
Olacaceae 208
*Oldenlandia acutangula* (Champ.) O. Kuntze 999
*ampliflora* (Hance) O. Kuntze 999
*auricularia* (L.) F. Muell. 1000
*biflora* L. 1000
*capitellata* (Wall. ex G. Don) O. Kuntze 1000
*capituligera* (Hance) O. Kuntze 1000
*chrysotricha* (Palib.) Chun 1000
*corymbosa* L. 1000
*costata* (Roxb.) Schum. 1000
*diffusa* (Willd.) Roxb. 1001
*hedyotidea* (DC.) Hand.-Mazz. 1001
*hirsuta* L. f. 1010
*hispida* (Retz.) Benth. 1003
*lancea* (Thunb.) O. Kuntze 1001
*mellii* (Tutch.) Dunn 1001
*paridifolia* (Dunn) Chun 1002
*pinifolia* (Wall. ex G. Don) Schum. 1002
*platystipula* (Merr .) Chun 1002
*pterita* (Bl.) Miq. 1002
*scandens* (Roxb.) K. Schum. 1002
*tenelliflora* (Bl.) O. Kuntze 1002
*tetrangularis* (Korth.) Merr. 1002
*uncinella* Hook. et Arn. 1002
var. *scabrida* (Franch.) Hand. -Mazz. 1003
*verticillata* L. 1003
*xanthochroa* (Hance) O. Kuntze 1003
Olea L. 941
*compactum* Wall. ex DC. 939
europaea L. 941
*fragrans* Thunb. 942
rosea Graebn. 941
Oleaceae 933
Olgaea Iljin 1321
*echinantha* Ling 1321
leucophylla (Turcz.) Iljin 1321
var. *aggregata* Ling 1321
lomonsowii (Trautv.) Iljin 1321
tangutica Iljin 1321
Oligochaeta 1593
Oliva Bruguiere 1576
miniacea (Roding) 1576
mustellina Lamarck 1576
Olividae 1576
*Omalotheca supinum* (L.) Cass. 1299
*Omithogalum filiforme* Ledeb. 1382
*luteum* L. 1382
*Ommastrephes* sloani pacificus Pfeffer 1589
Ommastrephidae 1589
*Omphalodes cavaleriei* Lévl. 1040
*moupinensis* Franch. 1038
Onagraceae 818
*Onagra biennis* (L.) Scop. 823
Oncidiidae 1578
Oncidium Agassiz 1578
verruculatum Cuvier 1578
Oncorhynchus Suckley 1653
keta (Walbaum) 1653
Oncotympana maculaticollis (Motschulsky) 1616
Ondatra Link 1756
zibethica Linnaeus 1756

Oniscidae 1600
Onocleaceae 110
Onopordum L. 1321
acanthium L. 1322
*delteides* Ait. 1347
Onosma L. 1038
cingulatum W. W. Smith et J. E. Jeffrey 1038
confertum W. W. Smith 1038
exsertum Hemsl. 1038
*forrestii* W. W. Smith 1038
hookeri C. B. Clarke 1038
var. *intermedium* (Stapf) Johnston 1038
var. longiflorum Duthie 1038
*longiflorum* Duthie 1038
paniculatum Bur. et Franch. 1038
var. *hirsutistylum* Lingelsh. 1038
Onthophagus vacca Linnaeus 1623
Onychium Kaulf. 95
contiguum (Wall.) Hope 95
japonicum (Thunb.) Kunze 95
lucidum (D. Don) Spreng 96
tenuifrons Ching 96
Operculina S. Manso 1030
turpethum (L.) Manso 1030
*Ophalia lapidescens* Schroet 33
*Ophelia bimaculata* Sieb. et Zucc. 955
*macrosperma* C. B. Clarke 956
*pulchella* D. Don 954
Ophicalcitum 1786
Ophichthyidae 1657
Ophichthys Ahl 1657
apicalis (Bennett) 1657
Ophiocephalidae 1686
Ophiocephalus Cantor 1686
argus Cantor 1686
Ophioglossaceae 79
Ophioglossum L. 79
*flexuosum* L. 85
*japonicum* Thunb. 85
pedunculosum Desv. 80
petiolatum Hook. 80
reticulatum L. 80
*scandens* L. 85
thermale Kom. 80
vulgatum L. 80
*zeylanicum* Houtt. 122
Ophiophagus hannah (Canton) 1710
Ophiopogon Ker-Gawl. 1388
bockianus Diels 1388
var. angustifoliatus Wang et Tang 1388
bodinieri Lévl. 1388
chingii Wang et Tang 1389
var. glaucifolius Wang et Dai 1390
corifolium Wang et Dai 1389
dracaenoides (Baker) Hook. f. 1389
heterandrus Wang et Dai 1389
intermedius D. Don 1389
japonicus (L. f.) Ker-Gawl. 1389
*kansuensis* Batal. 1387
latifolius Rodrig. 1390
mairei Lévl. 1389
*spicatus* Ker-Gawl. var. *communis* Maxim. 1387
var. *minor* Maxim. 1387
stenophyllus (Merr.) Rodrig. 1390
sylvicola Wang et Tang 1390
tonkinensis Rodrig. 1390
umbraticola Hance 1390
*Ophioxylon serpentinum* L. 969
Ophisaurus Daudin 1706
gracilis (Gray) 1706
harti Boulenger 1706
*Ophispermum sinensis* Lour. 752
Ophiuroidea 1639
*Ophrys lancea* Thunb. 1545
*monophyllos* L. 1549
*monorchis* L. 1545
*nervosa* Thunb. 1547
Opiliaceae 209
Opiorrhiza L. 1011
cantoniensis Hance 1011
japonica Bl. 1011
mungos L. 1011
pellucida Lévl. 1011
pumila Champ. ex Benth. 1011
succirubra King ex Hook. f. 1011
umbricola W. W. Smith 1012
Opisthopappus Shih 1322
taihangensis (Ling) Shih 1322
Opisthoplatia Brunner Von Wattenwyl 1611
orientalis (Burmeister) 1611
Opisthotropis maxwelli Boulenger 1708
Oplismenus Beauv. 1450
undulatifolius (Arduino) Roem. et Schult. 1450
Oplopanax Miq. 841
elatus Nakai 841
Opsariichthys Bleeker 1663
bidens Günther 1663
Opuntia Mill. 263
brassiliensis (Willd.) Haw. 263
dillenii (Ker-Gawl.) Haw. 263
ficus-indica Mill. 263
monacantha (Willd.) Haw. 263
vulgaris Mill. 263
Orchidaceae 1517
Orchidantha N. E. Br. 1501
chinensis T. L. Wu 1501
Orchis L. 1551
chusua D. Don 1552
*ciliolaris* L. 1542
*conopsea* L. 1541
*cucullata* L. 1550
*delavayi* Schltr. 1552
*dentata* Sw. 1543

diantha Schltr. 1552
*giraldiana* Kraenzl. 1552
*japonica* Thunb. 1556
latifolia L. 1552
var. angustata Maxim. 1552
limprichtii Schltr. 1552
monophylla (Coll. et Hemsl.) Rolfe 1552
*pauciflora* Fisch. ex Lindl. 1552
*paxiana* Schltr. 1552
roborowskii Maxim. 1552
*salina* Turcz. ex Lindl. 1552
*spathulata* (Lindl.) Reichb. f. ex Benth. 1552
*susannae* L. 1554
*szechenyiana* Reichb. f. ex Kanitz 1552
*triplicata* Willemet 1524
Orcinus Fitzinder 1759
orca (Linnaeus) 1759
Oreas Brid. 61
martiana (Hopp. et Hornsch.) Brid. 61
Orectolobidae 1644
Oreocharis Benth. 1189
aurantiaca Franch. 1189
auricula (S. Moore) C. B. Clarke 1189
benthamii C. B. Clarke 1189
var. reticulata Dunn 1189
flavida Merr. 1190
*fokienensis* Franch. 1190
forrestii (Diels) Skan 1190
henryana Oliv. 1190
maximowiczii C. B. Clarke 1190
sericea (Lévl.) Lévl. 1190
*tonkinensis* Kraenzl. 1178
xiangguiensis W. T. Wang et K. Y. Pan 1190
Oreocnide Miq. 200
frutescens (Thunb.) Miq. 200
kwangsiensis Hand. -Mazz. 200
obovata (C. H. Wright) Merr. 200
Oreorchis Lindl. 1553
fargesii Finet 1553
foliosa (Lindl.) Lindl. 1553
patens (Lindl.) Lindl. 1553
Oresitrophe Bunge 482
rupifraga Bunge 482
Origanum L. 1094
vulgare L. 1094
Oriolidae 1736
Oriolus Linnaeus 1736
chinensis Linnaeus 1736
mellianus Stresemann 1737
traillii (Vigors) 1737
*Orithya edulis* Miq. 1400
*Oritrephes septentrionalis* W. W. Smith 810
Orixa Thunb. 650
japonica Thunb. 650
Ormosia Jacks. 590
fordiana Oliv. 590
glaberrima C. Y. Wu 590
henryi Prain 590
hosiei Hemsl. et Wils. 590
indurata L. Chen 590
Ornithoboea Parish ex C. B. Clarke 1190
wildeana Craib 1190
Orobanchaceae 1194
Orobanche L. 1195
aegyptiaca Pers. 1195
*alsatica* Kirschl. 1195
*ammophila* C. A. Mey. 1195
amoena C. A. Mey. 1195
amurensis Kom. 1196
bungeana G. Beck 1196
coerulescens Steph. 1195
f. koshinskyi (Novopokr.) Ma 1196
cumana Wallr. 1196
pycnostachya Hance 1196
*Orobus ramuliflorus* Maxim. 606
*Orontium japonicum* Thunb. 1394
Orostachys (DC.) Fisch. 464
cartilagineus A. Bor. 464
chanetii (Lévl.) Berger 464
erubescens (Maxim.) Ohwi 464
fimbriatus (Turcz.) Berger 464
malacophyllus (Pall.) Fisch. 465
*spinosus* (L.) C.A. Mey. 465
thyrsiflorus Fisch. 465
Oroxylum Vent. 1163
indicum (L.) Vent. 1163
*Orthodon cavaleriei* (Lévl.) Kudo 1091
*chinensis* (Maxim.) Kudo 1091
*dianterus* (Buch. -Ham.) Hand.-Mazz. 1091
*grosseserratus* (Maxim.) Kudo 1091
*pauciflorus* C. Y. Wu 1091
*scabra* (Thunb.) Hand. -Mazz. 1092
*soochowensis* (Matsuda) C. Y. Wu 1092
Orthosphon Benth. 1094
*debilis* Hemsl. 1074
marmoritis (Hance) Dunn 1094
rubicundus (D. Don) Benth. var. hainanensis Sun ex C.Y. Wu 1094
wulfenioides (Diels) Hand. -Mazz. 1095
var. *foliosus* Peter-Stib. 1095
Oryctolagus Lilljeborg 1752
cuniculus domesticus (Gmelin) 1752
Oryza L. 1450
sativa L. 1450
var. glutinosa Matsum. 1450
Osbeckia L. 811
chinensis L. 811
var. angustifolia (D. Don) C. Y. Wu et C. Chen 811
crinita Benth. 811
mairei Craib 811
nepalensis Hook. f. 812
opipara C. Y. Wu et C. Chen 812
paludosa Craib 812
pulchra Geddes 812
rostrata D. Don 812

sikkimensis Craib 812
Oscillatoriaceae 3
Osmanthus Lour. 941
armatus Diels 942
cooperi Hemsl. 942
delavayi Franch. 942
fragrans (Thunb.) Lour. 942
f. aurantiacus (Makino) P.S. Green 942
heterophyllus (G. Don) P. S. Green 942
marginatum (Champ. ex Benth.) Hemsl. 942
matsumuranus Hayata 942
*yunnanensis* (Franch.) P. S. Green 942
Osmorhiza Rafin. 870
aristata (Thunb.) Makino et Yabe 870
var. laxa (Royle) Const. et Shan 870
*laxa* Royle 870
Osmunda L. 82
asiatica (Fernald) Ohwi 82
*cinnamomea* L. var. *asiatica* Fernald 82
var. fokiense Copel. 83
claytomiana L. var. pilosa (Wall.) Ching 82
japonica Thunb. 83
javanica Bl. 83
*lunaria* L. 79
*struthiopteris* L. 111
*ternata* Thunb. 79
vachellii Hook. 83
*virginiana* L. 79
*zeylanica* L. 78
Osmundaceae 82
Osteichthyes 1650
Osteomeles Lindl. 513
schwerinae Schneid. 513
Ostericum Hoffm. 870
citriodorum (Hance) Shan et Yuan 870
grosseserratum (Maxim.) Kitag. 870
maximowiczii (F. Schmidt et Maxim.) Kitag. 870
var. australe (Kom.) Kitag. 871
sieboldi (Miq.) Nakai 871
Ostrea Linnaeus 1583
denselamellosa Lischke 1583
echinata Quoy et Gaimard 1583
folium Linnaeus 1583
gigas Thunberg 1583
mordax Gould 1583
plicatula Gmelin 1583
rivularis Gould 1583
talienwhanensis Crosse 1583
Ostreidae 1583
Ostrinia Hubner 1628
furnacalis Guenee 1628
nubilalis (Hubner) 1628
Ostryopsis Decne. 171
davidiana Decne. 171
nobilis Balf. f. et W. W. Smith 171
Osyris L. 210
*japonica* Thunb 830
wightiana Wall. ex wight 210
*Otanthera fordii* Hance 813
Otariidae 1767
*Othonna sibirica* L. 1318
Otidae 1728
Otis Linnaeus 1728
tarda Linnaeus 1728
Ottelia Pers. 1360
acuminata (Gagnep.) Dandy 1360
alismoides (L.) Pers. 1361
Otus Pennant 1732
scops (Linnaeus) 1732
spilocephalus (Blyth) 1732
Ovis Linnaeus 1776
ammon Linnaeus 1776
aries Linnaeus 1775
Oxalidaceae 609
Oxalis L. 610
acetosella L. 610
bowiei Lindl. 610
corniculata L. 610
corymbosa DC. 610
griffithii Edgew. et Hook. f. 610
*martiana* Zucc. 610
*sensitivum* L. 610
stricta L. 611
Oxya Seryville 1614
bidentata Willemse 1614
chinensis (Thunberg) 1614
hyla intricata (Stal) 1614
velox (Fabricius) 1614
*Oxybaphus himalaica* Edgew. 235
*Oxyceros sinensis* Lour. 1015
Oxycoccus Hill. 888
microcarpus Turcz. ex Rupr. 888
quadripetalus Gilib. 888
Oxygraphis Bunge 342
glacialis (Fisch.) Bunge 342
Oxyria Hill. 220
digyna (L.) Hill. 220
oxyspora DC. 812
*cavaleriei* Lévl. 812
paniculata (D. Don) DC. 812
vagans (Roxb.) Wall. 812
Oxystelma R. Br. 985
esculentum (L.f.) R. Br. 985
Oxytropis DC. 591
aciphylla Ledeb. 591
anertii Nakai ex Kitag. 591
bicolor Bunge 591
chiliophylla Rolfe 591
coerulea (Pall.) DC. 591
falcata Bunge 591
glabra DC. 591
hailarensis Kitag. 591
hirta Bunge 592
kansuensis Bunge 592
latibracteata Jurtz. 592

leptophylla (Pall.) DC. 592
melanocalyx Bunge 592
myriophylla (Pall.) DC. 592
ochrocephala Bunge 592
psammocharis Hance 592

## P

Pachygone Miers 378
sinica Diels 378
*valida* Diels 378
Pachyrhizus Rich. ex DC. 592
erosus (L.) Urban 592
Pachysandra Michx. 706
axillaris Franch. 706
var. stylosa (Dunn) M. Cheng 706
*stylosa* Dunn 706
terminalis Sieb. et Zucc. 706
Pachystoma Bl. 1553
pubescens Bl. 1553
*senile* (Lindl.) Reichb. f. 1553
Pachytriton Boulenger 1695
brevipes (Sauvage) 1695
Padus Mill. 513
*asiatica* Kom. 513
brachypoda (Batal.) Schneid. 513
racemosa (Lam.) Gilib. 513
var. asiatica (Kom.) Yü et Ku 513
Paederia L. 1012
pertomentosa Merr. ex Li 1012
scandens (Lour.) Merr. 1012
var. tomentosa (Bl.) Hand.-Mazz. 1012
*tomentosa* Bl. 1012
yunnanensis (Lévl.) Rehd. 1012
*Paederosa axillaris* Sieb. et Zucc. 1159
*villosula* Miq. 1159
Paederus Fabricius 1620
densipennis Bernhauer 1620
idae Curtis 1620
Paeonia L. 402
anomala L. 402
var. intermedia (C. A. Mey. ex Ledeb.) O. et B. Fedtsch. 402
delavayi Franch. 402
var. lutea (Delav. ex Franch.) Finet et Gagnep. 402
intermedia C. A. Mey. ex Ledeb. 402
lactiflora Pall. 402
var. trichocarpa (Bunge) Sternb. 403
*lutea* Delav. ex Franch. 402
mairei Lévl. 403
*moutan* Sims 403
obovata Maxim. 403
var. willmottiae (Stapf) Sternb. 403
*papaveracea* Andr. 403
sinjiangensis K. Y. Pan 403
suffruticosa Andr. 403
var. papaveracea (Andr.) Kerner. 403
var. spontanea Rehd. 404
szechuanica Fang 404
*trichocarpa* Bunge 403
veitchii Lynch 404
var. leiocarpa W. T. Wang ex S. H. Wang 404
var. uniflora K. Y. Pan 404
var. woodwardii (Stapf ex Cox) Sternb. 404
Paeoniaceae 402
Pagrosomus Gill 1679
major (Temminck et Schlegel) 1679
Paguma Gray 1764
larvata Hamilton-Smith 1764
Paguridae 1603
Pagurus Fabricius 1603
ochotensis Brandt 1603
samuelis (Stimpson) 1604
*Pahudia xylocarpa* Kurz 546
Palaemon Weber 1602
carinicauda Holthuis 1602
modestus (Heller) 1602
serrifer (Stimpson) 1602
Palaemonidae 1602
Palhinhaea Franco et Vasc. 72
cernua (L.) Franco et Vasc. 73
Palinuridae 1602
Paliurus Tourn. ex Mill. 713
hemsleyanus Rehd. 713
hirsutus Hemsl. 713
*perforatus* Blanco 657
ramosissimus (Lour.) Poir. 713
Palmadusta gracilis japonica Schilder 1575
Palmae 1460
*Palura chinensis* Nakai var. *pilosa* Nakai 932
Panax L. 842
*armatum* Wall. 835
*bipinnatifidus* Seem. 842
*davidii* Franch. 841
*delavayi* Franch. 841
*fragrans* Roxb. 840
ginseng C. A. May. 842
japonicus C. A. Mey. 842
var. angustifolius (Burk.) Cheng et Chu 842
var. bipinnatifidus (Seem.) C. Y. Wu et Feng ex C. Chow 842
var. major (Burk.) C. Y. Wu et K. M Feng 842
notoginseng (Burk.) F. H. Chen ex C. Chow 843
pseudo-ginseng Wall. 843
var. *japonicus* (C. A. Mey.) Hoo et Tseng 842
var. *notogiseng* (Burk.) Hoo et Tseng 843
*quinquefolia* Decne. et Planch. var. *angustifolia* Burk. 842
quinquefolium L. 843

*schinseng* Nees 842
*sessiliflorum* Rupr. et Maxim. 834
stipuleanatus Tsai et Feng ex C. Chow 843
zingberensis C. Y. Wu ex C. Chow 843
*Pancovia delavayi* Franch. 679
*Pancratium littoralis* Jacq. 1407
Pandanaceae 1483
Pandanus L. f. 1483
austrosinensis T. L. Wu 1483
furcatus Roxb. 1483
gressitii B. C. Stone 1483
tectorius Soland. 1483
tonkinensis Martelli 1483
Pandion Savigny 1721
haliaetus Linnaeus 1721
Panellus Karst. 38
stypticus (Bull. ex Fr.) Karst 38
Panicum L. 1450
alopecuroides L. 1451
*assamicum* Hook. f. 1446
*colonum* L. 1443
crusgalli L. 1443
dactylon L. 1441
*geniculatum* Lam. 1457
*glaucum* L. 1457
*ischaemum* Schreb. 1442
*italicum* L. 1457
miliaceum L. 1450
notatum Retz. 1451
*palmifolium* Koenig 1457
*pilicatum* Lam. 1457
repens L. 1451
*sanguinale* L. 1442
*undulatifolium* Arduino 1450
*villosum* Lam. 1438
*viride* L. 1457
Pantala Hagen 1610
flavescens Fabricius 1610
Panthera Oken 1766
pardus Linnaeus 1766
tigris Linnaeus 1766
Pantholops Hodgson 1777
hodgsoni (Abel) 1777
Panulirus Gray 1602
homarus (Linnaeus) 1602
ornatus (Fabricius) 1602
penicillatus (Olvier) 1602
stimpsoni Holthuis 1602
versicolor (Fabricius) 1602
Panus Fr. 38
conchatus (Bull. ex Fr.) Fr. 38
*pticus* Fr.
rudis Fr. 38
*stypticus* Fr. 38
*torulosus* (Pers.) Fr. 38
Panzeria J. Sojak 1095
alaschanica Kupr. 1095
Papaver L. 443
croceum Ledeb. 443
nudicaule L. 443
subsp. amurense N. Busch 443
subsp. rularo-aurantiacum (DC.) Fedde var. chinense (Regel) Fedde 443
*paniculata* D. Don 442
pavoninum Schrenk 443
paseudocanescens M. Pop. 443
pseudo-radicatum Kitag. 443
rhoeas L. 443
somniferum L. 443
tenellum A. Tolm. 443
tianschanicum M. Pop. 443
Papaveraceae 426
Paphiopedilum Pfitz. 1553
appletonianum (Gower) Pfitz. 1553
barbigerum Tang et Wang 1553
concolor (Parish et Batem.) Pfitz. 1554
parishii (Reichb. f.) Pfitz. 1554
Papilio Linnaeus 1630
machaon Linnaeus 1631
xuthus Linnaeus 1631
Papilionidae 1630
Parabaena Miers 378
sagittata (Wall.) Miers 378
Parabarium Pierre 967
chunianum Tsiang 967
hainanense Tsiang 967
huaitingii Chun et Tsiang 967
linearicarpum (Pierre) Pichon 967
micranthum (A. DC.) Pierre 967
Paraboea (C. B. Clarke) Ridl. 1190
martinii (Lévl.) Burtt 1191
rufescens (Franch.) Burtt 1191
sinensis (Oliv.) Burtt 1191
f. macra (Stapf) C. Y. Wu 1191
f. macrophylla (Stapf) C. Y. Wu 1191
swinhoi (Hance) Burtt 1191
Parabramis pekienensis (Basilewsky) 1662
Paracobitis Bleeker 1667
potanini (Günther) 1667
varigatus (Sauvage et Dabry) 1667
*Paradisea bulbuliferum* Lingelsh. 1388
*minor* C. H. Wright 1377
Paradoxosomatidae 1608
Paralichthyidae 1689
Paralichthys Girard 1689
olivaceus (Temminck et Schlegel) 1689
Parameciidae 1565
Paramecium Hill 1565
caudatum Ehrenberg 1565
multimicronucleatum Pawers et Mitchell 1565
Parameria Benth. 967
laevigata (Juss.) Moldenke 967
Paramesotriton Chang 1695
chinensis (Gray) 1695
Paramichelia Hu 270

bailonii (Pierre) Hu 270
Paramisgurnus dabiyanus Sauvage 1667
Paraphlomis Prain 1095
albiflora (Hemsl.) Hand.-Mazz. 1095
gracilis Kudo 1095
javanica (Bl.) Prain 1095
var. coronata (Vaniot) C. Y. Wu et H. W. Li 1096
*rugosa* (Benth.) Prain 1095
var. *coronata* (Vaniot) C. Y. Wu 1096
Parapolybia Saussure 1633
varia (Fabricius) 1633
Paraprenanthes Chang 1322
sororia (Miq.) Chang 1322
sylvicola Shih 1322
Paraprotomyzon Pellegrin et Fang 1668
multifasciatus Pellegrin et Fang 1668
Paraquilegia Drumm. et Hutch. 342
anemonoides (Willd.) Engl. ex Ulbr. 342
microphylla (Royle) Drumm. et Hutch. 343
Pararuellia Bremek.et Nannenga-Bremek. 1171
delvayana (Baill.) E. Hossain 1171
*drymophila* (Diels) C. Y. Wu 1171
Parascaptor leucura Blyth 1746
Paratenodera angustipennis Saussure 1612
Parathelypteris (H. Ito) Ching 105
glanduligera (O. Kuntze) Ching 105
nipponica (Franch. et Sav.) Ching 105
*Paratropia venulosa* Wight et Arn. 846
Pareas boulegeri (Angel) 1708
chinensis Barbour 1708
Parexocoetus Bleeker 1671
brachypterus (Richardson) 1671
Parietaria L. 200
micrantha Ledeb. 200
*microphylla* L. 203
*zeylanica* L. 205
Paridae 1742
Paris L. 1390
bashaensis Wang et Tang 1390
*chinensis* Franch. 1391
cronquistii (Takht.) H. Li 1390
fargesii Franch. 1390
var. petiolata (Baker ex C. H. Wright) Wang et Tang 1390
*formosana* Hayata
polyphylla Smith 1390
var. apetala (Hand.-Mazz.) H. Li 1391
var. appendiculata Hara 1391
var. brevipetala Y. K. Yang 1391
var. chinensis (Franch.) Hara 1391
var. latifolia Wang et Chang 1391
var. *pubescens* Hand.-Mazz. 1391
var. stenophylla Franch. 1391
var. thibetica (Franch.) Hara 1391
var. wallichii Hara 1391
var. yunnanensis (Franch.) Hand.-Mazz. 1391
pubescens (Hand.-Mazz.) Wang et Tang 1391
verticillata M. Bieb. 1391
violacea Lévl. 1392
wenxianensis Z. X. Peng et R. N. Zhao 1390
*yunnanensis* Franch. 1391
Parkeriaceae 98
Parkia R. Br. 593
*roxburghii* G. Don 593
timoriana (A. DC.) Merr 593
Parkinsonia L. 593
aculeata L. 593
Parmelia Ach. 57
borreri (Sm.) Turn 58
caperata Ach. 58
hypotrypella Asal. 58
pseudolivetorum Asal. 58
saxatilis (L.) Ach. 58
tinctina Mah. et Gillet 58
tinctoria Despr. 58
Parmeliaceae 57
Parnassia L. 482
bifolia Nekras 482
*crassifolia* Franch. 483
davidii Franch. 483
delavayi Franch. 483
var. *brevistyla* Briq. 483
farreri W. E. Evans 483
foliosa Hook. f. et Thoms. 483
laxmannii Pall. ex Schult. 483
lutea Batal. 483
*myaorensis* Heyne 483
oreophila Hance 484
palustris L. 484
trinervis Drude 484
var. viridiflora (Batal.) Hand.-Mazz. 483
wightiana Wall. 484
Parnassiidae 1631
Parnassius Latreille 1631
imperator Oberthür 1631
Parochetus Buch.-Ham. 593
*communis* Buch.-Ham. ex D. Don 593
*parrya eurycarpa* Maxim. 457
*linearifolia* W. W. Smith 458
*platycarpa* Hook. f. et Thoms. 458
Parsonsia R. Br. 967
goniostemon Hand.-Mazz. 967
Parthenium L. 1322
hysterophorus L. 1322
Parthenocissus Planch. 725
*austro-orientalis* Metcalf 731
henryana (Hemsl.) Diels et Gilg 725
heterophyllus (Bl.) Merr. 725
himalayana (Royle) Planch. 725
var. chinensis Gagnep. 725
var. rubrifolia (Lévl. et Vant.) Gagnep. 725

var. vestita Hand.-Mazz. 725
laetivirens Rehd. 725
suberosa Hand.-Mazz. 725
*thomsonii* (Laws.) Planch. 732
tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch. 726
Parthenopidae 1604
Parus Linnaeus 1742
major Linnaeus 1742
*Parvatia chinensis* Franch. 373
Paspalum L. 1451
orbiculare G. Forst. 1451
scrobiculatum L. 1451
thunbergii Kunth ex Steud. 1451
*villosum* Thunb. 1445
Passer Brisson 1744
monanus (Linnaeus) 1744
rutilans (Temminck) 1744
Passiflora L. 772
altebilobata Hemsl. 772
*cochinchinensis* Spreng. 774
coerulea L. 772
cupiformis Mast. 773
edulis Sims 773
foetida L. 773
gracilis Jacq. ex Link 773
henryi Hemsl. 773
kwangtungensis Merr. 773
moluccana Reinw. ex Bl. var. glaberrima (Gagnep.) Willd. 773
var. teysmanniana (Miq.) Willd. 774
*octandra* Gagnep. var. *glaberrima* Gagnep. 773
papilio Li 774
rhombiformis S. Y. Bao 774
wilsonii Hemsl. 774
Passifloraceae 772
Patanga japonica (I. Bolivear) 1614
Patellidae 1571
Patrinia Juss. 1215
*angustifolia* Hemsl. 1215
heterophylla Bunge 1215
subsp. angustifolia (Hemsl.) H. J. Wang 1215
intermedia (Vahl) Roem. et Schult. 1216
*jatamansi* D. Don 1215
monandra C. B. Clarke 1216
punctiflora Hsu et H. J. Wang 1216
var. robusta Hsu et H. J. Wang 1216
rupestris (Pall.) Juss. 1216
subsp. scabra (Bunge) H. J. Wang 1216
scabiosaefolia Fisch. ex Trev. 1217
var. *hispida* (Bunge) Franch. 1217
*scabra* Bunge 1216
sibirica (L.) Juss. 1217
speciosa Hand.-Mazz. 1217
villosa (Thunb.) Juss. 1217
Pauldopia Van Steenis 1163
ghorta (Buch.-Ham. ex G. Don) Van Steenis 1163
*Paullinia asiatica* L. 652
Paulownia Sieb. et Zucc. 1141
elongata S. Y. Hu 1142
fargesii Franch. 1142
fortunei (Seem.) Hemsl. 1142
kawakamii Ito 1142
tomentosa (Thunb.) Steud. 1142
var. tsinlingensis (Pai) Gong Tong 1142
Pavetta L. 1012
arenosa Lour. 1013
hongkongensis Bremek. 1012
Pavo Linnaeus 1724
muticus (Linnaeus) 1724
Paxillaceae 42
Paxillus Fr. 42
involutus (Batsch) Fr. 42
Pectelis Raf. 1554
susannae (L.) Raf. 1554
Pectinidae 1582
Pedaliaceae 1176
Pedicularis L. 1142
alaschanica Maxim. 1142
altaica Steph. ex Stev. 1143
anas Maxim. var. tibetica Bonati 1142
cernua Bonati 1142
cheilanthifolia Schrenk 1142
chenocephala Diels 1143
chinensis Maxim. 1145
comptoniaefolia Franch. ex Maxim. 1143
corydaloides Hand.-Mazz. 1443
cranolopha Maxim. 1143
*crassicaulis* Vaniot ex Bonati 1147
davidii Franch. 1143
decora Franch. 1144
decorissima Diels 1144
dichotoma Bonati 1144
dissecta (Bonati) Pennell et Li 1144
dunniana Bonati 1144
elwesii Hook. f. 1144
fargesii Franch. 1144
grandiflora Fisch. 1147
henryi Maxim. 1144
ingens Maxim. 1145
integrifolia Hook. f. 1145
kansuensis Maxim. 1143
f. albiflora Li 1143
subsp. kokonorica Tsoong 1143
*karoi* Freyn 1146
*labellata* Jacq. 1147
labordei Vant. et Bonati 1145
lasiophrys Maxim. 1145
longicaulis Franch. ex Maxim. 1144
longiflora Rudolph 1145
var. tubiformis (Klotzsch) Tsoong 1145
macrosiphon Franch. 1142
mandshurica Maxim. 1145
*microphyton* Bur. et Franch. 1146

muscicola Maxim. 1145
muscoides Li 1146
nasturtiifolia Franch. 1146
oederi Vahl 1146
var. sinensis (Maxim.) Hurus. 1146
oliveriana Prain 1146
palustris L. subsp. karoi (Freyn) Tsoong 1146
*petrmenginii* Bonati var. *dissecta* Bonati 1144
phaceliaefolia Franch. 1143
polyodonta Li 1143
princeps Bur. et Franch. 1143
przewalskii Maxim.
subsp. microphyton (Bur. et Franch.) Tsoong 1146
resupinata L. 1146
subsp. crassicaulis (Vaniot ex Bonati) Tsoong 1147
rex C. B. Clarke ex Maxim. 1147
rhinanthoides Schrenk ex Fisch. ex Mey. 1147
subsp. labellata (Jacq.) Tsoong 1147
roborowskii Maxim. 1145
roylei Maxim. 1147
rudis Maxim. 1144
semitorta Maxim. 1147
songarica Schrenk 1143
spicata Pall. 1146
striata Pall 1147
superta Franch. ex Maxim. 1148
szetschuanica Maxim. 1148
*tangutica* Bonati 1146
tenuisecta Franch. ex Maxim. 1148
ternata Maxim. 1144
tristis L. 1145
*subiformis* Klotzsch 1145
*vagans* Hemsl. 1043
verpenaefolia Franch. ex Maxim. 1148
*versicolor* Wahlend. var. *sinensis* Maxim. 1146
verticillata L. 1146
subsp. tangutica (Bonati) Tsoong 1146
vialii Franch. ex Forb.et Hemsl. 1148
yunnanensis Franch. ex Maxim. 1148
Pedilanthus Neck. et Poit. 636
tithymaloides (L.) Poit. 636
Pegaeophyton Hayek et Hand.-Mazz. 455
scapiflorum (Hook. f. et Thoms.) Marq. et Shaw 455
Peganum L. 616
haimala L. 616
var. multisecta Maxim. 616
nigellastrum Bunge 616
Pegasidae 1693
Pegasus Linnaeus 1693
laternarius Cuvier 1693
volitans Cuvier 1693
Pegia Colebr. 668
nitida Colobr. 668
sarmentosa (Lecte.) Hand.-Mazz. 668
Pelamis platurus (Linnaeus) 1710
Pelargonium L'Hérit. 614
graveolens L'Hérit. 615
hortorum Bailey 615
zonale Ait. 615
Pelecanidae 1713
Pelecanus Linnaeus 1713
onocrotalus Linnaeus 1715
philippensis Gmelin 1713
Peliosathes Andr. 1392
macrostegia Hance 1392
*minor* Yamamoto 1392
ophiopogonoides Wang et Tang 1392
sinica Wang et Tang 1392
teta Andr. 1392
Pellaea Link 96
smithii C. Chr. 96
Pellionia Gaud. 200
brevifolia Benth. 200
heteroloba Wedd. 200
minima Makino 201
*myrtillus* Lévl. 196
radicans (Sieb.et Zucc.) Wedd. 201
repens (Lour.) Merr. 201
scabra Benth. 201
tsoongii Merr 201
viridis C. H. Wright 201
Pelochelys Gray 1702
bibroni (Owen) 1702
Pelteobagrus Bleeker 1669
eupogon (Boulenger) 1669
fulvidraco (Richardson) 1669
nitidus Sauvage et Dabry 1669
vachelli (Richardson) 1669
Pelvetia Decne. 10
siliquosa Tseng et C. F. Chang 10
Pemphigidae 1617
Penaeidae 1601
Penaeus Fabricius 1601
japonicus Bata 1601
merguiensis de Man 1601
monodon Fabricus 1601
orientalis Kishinouye 1601
penicillatus Alcock 1601
Pennatulidae 1569
Pennisetum Rich. 1451
alópecuroides (L.) Spreng. 1451
flaccidum Griseb. 1451
*Pentacaelium bontioides* Sieb. et Zucc. 1197
Pentanema Cass. 1322
indicum (L.) Ling 1322
var. hypoleucum (Hand.-Mazz.) Ling 1323
Pentapanax Seem. 843
henryi Harms. 843

var. hwangshanensis Chneg 644
leschenaultii (Wight et Arn.) Seem. 844
plumosus (Li) Shang 844
tomentosus Hoo et Tseng 844
wilsonii (Harms) Shang 844
Pentapetes L. 749
*acerifolium* L. 750
phoenicea L. 749
Pentasachme Wall. ex Wight 985
championii Benth 985
*esquirolii* Lévl. 982
*glaucescens* Decne. 977
Pentatomidae 1618
*Pentatropis officinalis* Hemsl. 978
Penthorum L. 484
chinense Pursh 484
Pentodon patruelis Frivaldszky 1624
Peperomia Ruiz et Pavon 388
cavaleriei C. DC. 388
dindygulensis Miq. 388
heyneana Miq. 388
pellucida (L.) Kunth 388
tetraphylla (Forst. f.) Hook. et Arn. 388
*Peplis indica* Willd. 800
Peracarpa Hook. f. et Thoms. 1236
carnosa (Wall.) Hook. f. et Thoms. 1236
*Perantha forrestii* Craib 1189
Percottus Dybowski 1683
glehni Dybowski 1684
Percocypris Chu 1663
grahami (Regan) 1663
pingi (Tchang) 1663
Perdix Brisson 1725
dauuricae (Pallas) 1725
hodgsoniae (Hodgson) 1725
*Pergularis divaricata* Lour. 970
*japonica* Thunb. 984
*sinensis* Lour. 975
Pericampylus Miers 378
formosanus Diels 379
glaucus (Lam.) Merr. 379
omeiensis Lien 379
*Perilepta dyerianus* (Mast.) Bremek. 1174
Perilla L. 1096
frutescens (L.) Britt 1096
var. acuta (Thunb.) Kudo 1096
var. *auriculatodentata* C. Y. Wu et Hsuan ex H. W. Li 1069
var. *crispa* (Thunb.) Hand.-Mazz. 1096
*fruticosa* D. Don 1069
Periophthalmidae 1684
Periophthalmus Bloch et Schneider 1684
cantonensis (Osbeck) 1684
Periplaneta Imms 1610
americana (Linnaeus) 1610
australasiae (Fabricius) 1610
Periploca L. 985
calophylla (Wight) Falc. 985
var. *forrestii* (Schltr.) Browicz 985
*esculentum* L. f. 985
forrestii Schltr. 985
*khasianum* Benth. 987
sepium Bunge 986
*sylvestris* Retz. 981
Peripterygium Hassk. 708
platycarpum (Gagnep.) Sleum. 708
Peristrophe Nees 1171
baphica (Spreng.) Bremek. 1171
japonica (Thunb.) Yamazaki 1171
Peristylus Bl. 1554
affinis (D. Don) Seidenf. 1554
coeloceras Finet 1554
densus (Lindl.) Santap. et Kapad. 1554
forceps Finet 1554
goodyeroides (D. Don) Lindl. 1555
*monanthus* Finet 1517
*sampsoni* Hance 1554
*tetralobus* Finet f. *basifoliatus* Finet 1517
Perna Dillwyn 1581
viridis Linnaeus 1581
Peronosporaceae 19
Perrottetia H. B. K. 702
racemosa (Oliv.) Loes. 702
Persea Mill. 297
americana Mill. 297
*nanmu* Oliv. 298
*pauhoi* (Kanehira) Kosterm. 295
*Persica davideana* Carr. 497
*Persicaria alata* (Buch.-Ham. ex D. Don) Nakai 220
*amphibia* (L.) S. F. Gray 220
*caespitosa* (Bl.) Nakai 222
*capitata* (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross 222
*chinensis* (L.) H. Gross 222
*conspicua* (Nakai) Nakai 226
*distitiflorum* (Hemsl.) H. Gross 224
*divaricata* (L.) H. Gross 224
*excurrens* (Steward) Koidz. 224
*flaccida* (Meissn.) H. Gross ex Loes. 224
*hydropiper* (L.) Spach 225
*japonica* (Meissn.) H. Gross ex Nakai 225
*jucunda* (Meissn.) Migo 225
*lapathifolia* (L.) S. F. Gray 225
*longiseta* (De Bruyn) Kitag. 226
*minor* (Huds.) Opiz 225
*nodosa* (Pers.) Opiz 227
*orientalis* (L.) Spach 227
*perfoliata* (L.) H. Gross 228
*pinetorum* (Hemsl.) H. Gross 228
*polystachya* (Wall. ex Meissn.) H. Gross 228
*rudis* (Meissn.) H. Gross 228
*runcinata* (Buch.-Ham.) H. Gross 229
*senticosa* (Meissn.) Nakai ex H. Gross 229
*sibirica* (Laxm.) H. Gross 229

*sieboldii* (Meissn.) Ohwi 229
*thunbergii* (Sieb. et Zucc.) H. Gross 230
*tinctoria* (Ait.) Spach 230
*viscosa* (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross ex Nakai 230
*vulgaris* Webb. et Moq. 228
Pertusariaceae 57
Pertusaria DC. 57
velata (Turn.) Nyl. 57
Pertya Sch.-Bip. 1323
discolor Rehd. 1323
*Perularia fuscenscens* (L.) Lindl. 1560
*ussuriensis* (Maxim.) Schltr. 1560
Petasites Mill. 1323
japonicus (Sieb. et Zucc.) F. Schmidt 1323
tricholobus Franch. 1323
Petaurista Link 1754
alborufus Milne-Edwards 1754
eleganus Muller 1754
petaurista (Pallas) 1754
xanthotis (milne-Edwards) 1754
yunanensis Anderson 1754
Petauristidae 1754
Petraleum 1794
Petrocodon Hance 1191
dealbatus Hance 1191
*longistylus* Kraenzl. 1191
Petrocosmea Oliv. 1191
nervosa Craib 1191
sinensis Oliv. 1192
Petromyzonidae 1643
Petunia Juss. 1122
hybrida Vilm. 1122
Peucedanum L. 871
*decursivum* (Miq.) Maxim. 848
*deltoideum* Makino ex Yabe 872
dielsianum Fedde ex Wolff 871
elegans Kom. 871
japonicum Thunb. 871
medicum Dunn 871
var. gracile Dunn 871
morissonii Bess. 871
*olivaceum* Diels 861
praeruptorum Dunn 872
*sieboldi* Miq. 871
terebinthaceum (Fisch.) Fisch. ex Trevir. 872
var. deltoidum Makino 872
turgeniifolium Wolff 872
wawrae (Wolff) Su 872
*Phaca dahurica* Pall. 550
*membranaceus* Fisch. 550
*myriophylla* Pall. 592
Phacellanthus Sieb. et Zucc. 1196
tubiflorus Sieb. et Zucc. 1196
Phaenosperma Munro ex Benth. 1452
globosa Munro ex Benth. 1452
Phaius Lour. 1555
*albus* Lindl. 1560
flavus (Bl.) Lindl. 1555
tankervilliae (L'Hérit.) Bl. 1555
*woodfordii* (Hook.) Merr. 1555
Phalacrocoracidae 1713
Phalacrocorax Brisson 1713
carbo Linnaeus 1713
Phalaenopsis Bl. 1555
wilsonii Rolfe 1555
Phalaris L. 1452
arundinacea L. 1452
*hispida* Thunb. 1435
*oryzoides* L. 1448
Phallaceae 47
Phallus Mich. ex Pers. 47
impudicus L. ex Pers. 47
rubicundus (Bosc.) Fr. 47
*Phanera championii* Benth. 552
*glauca* Wall. ex Benth. 552
Phanerophlebiopsis Ching 118
blinii (Lévl.) Ching 118
Pharbitis Choisy 1030
nil (L.) Voigt 1030
purpurea (L.) Voigt 1030
*Pharnaceum suffruticosum* Pall. 640
Phaseolus L. 593
*angularis* Wight 608
*calcaratus* Roxb. 608
lunatus L. 593
*max* L. 576
*minimus* Roxb. 608
*radiatus* L. 608
*sublobatus* Roxb. var. *tenuicaulis* Grah. 571
*vexillatus* L. 607
vulgaris L. 593
Phasianidae 1722
Phasianus Linnaeus 1725
colchicus Linnaeus 1725
Phegopteris Fée 105
decunsive-pinnata (Van Hall.) Fée 105
Phellinus Quél. 32
conchatus (Pers. ex Fr.) Quél. 32
densus (Lloyd) Teng 32
gilvus (Schwein.) Pat. 32
hartigii (Allesch. et Schnabl.) Imaz. 33
igniarius (L. ex Fr.) Quél. 32
lamensis (Murr.) Teng 33
linteus (Berk. et Curt.) Teng 33
pini (Thore ex Fr.) Ames. 33
*rimosus* (Berk.) Pilát 34
setulosus (Lloyd) Imaz. 33
torulosus (Pers.) Bourd. et Galz. 32
Phellodendron Rupr. 650
amurense Rupr. 650
chinense Schneid. 650
var. falcatum Huang 651
var. glabriusculum Schneid. 651

var. yunnanense Huang 651
Phellorinia Berk. 49
inquinans Berk. 49
Pheretima Kinberg 1593
aspergillum (Perrier) 1593
califonica (Kinberg) 1593
carnosa (Goto et Hatni) 1593
diffringens (Boird) 1593
guillemi (Michaelsen) 1593
hupeiensis (Michaelsen) 1593
pectinifera (Michaelsen) 1593
praepinguis Gates 1593
robusta (E. Perrier) 1593
schmarde (Horst) 1593
tschiliensis (Mich.) 1593
vulgaris (Chen) 1593
Pheropsophus Solier 1619
javanus (Dejean) 1619
jessoensis Morawitz 1619
Philadelphus L. 484
henryi Koehne 484
incanus Koehne 484
pekinensis Rupr. 485
sericanthus Koehne 485
tenuifolius Rupr. 485
Philomycidae 1579
Philonotis Brid. 63
fontana (Hedw.) Brid. 63
Philosamia Grote 1629
cynthia ricina Donovan 1629
Philoscia Latreille 1600
villosa Jackson 1600
Philydraceae 1423
Philydrum Banks 1423
lanuginosum Banks 1423
Phiolomycus 1579
bilineatus (Benson) 1579
rugulosus Chen et Gao 1579
Phlebia Fr. 26
radiata Fr. 26
*Phlebochiton sarmentosa* Lecte. 668
Phlegmariurus (Herter) Holub. 70
carinatus (Desv.) Ching 70
fargesii (Herter) Ching 70
fordii (Baker) Ching 70
hamiltonii (Spreng.) Löve et Löve var.
petiolatus (C. B. Clarke) Ching 70
mingchegense Ching 70
phlegmaria (L.) Holub 71
pulcherrimus (Wall.) Löve et Löve 71
squarrosus (Forst.) Löve et Löve 71
Phleum L. 1452
paniculatum Huds. 1452
pratense L. 1452
Phlogacanthus Nees 1171
curviflorus (Wall.) Nees 1171
vitellinus (Roxb.) T. Anders. 1171
Phlogiotis helvelloides DC. ex Fr. 25
Phlojodicarpus Turcz. 872
sibiricus (Steph. ex Spreng.) K.-Pol. 872
Phlomis L. 1096
*albiflora* Hemsl. 1095
*aspera* Willd. 1084
atropurpurea Dunn 1096
betonicoides Diels 1096
f. alba C. Y. Wu 1097
likiangensis C. Y. Wu 1097
longicalyx C. Y. Wu 1097
maximowiczii Regel 1097
megalantha Diels 1097
mongolica Turcz 1097
ornata C. Y. Wu 1097
pedunculata Sun ex C. H. Hu 1097
pratensis Kar. et Kir. 1097
*rotata* Benth. ex Hook. f. 1082
*sagittata* Regel 1089
tuberosa L. 1097
umbrosa Turcz. 1098
var. australis Hemsl. 1098
younghusbandii Mukerj 1098
*zeylanica* L 1085
*Phoberos chinensis* Lour. 764
Phoca Linnaeus 1767
vitulina Linnaeus 1767
Phocidae 1767
Phocoena G. Cuvier 1759
Phocoena (Linnaeus) 1759
Phocoenidae 1759
Phoebe Nees 298
chinensis Chun 298
faberi (Hemsl.) Chun 298
hunanensis Hand.-Mazz. 298
*neurantha* (Hemsl.) Gamble var. *omeiensis*
Yang 298
sheareri (Hemsl.) Gamble 298
var. omeiensis (Yang) N. Chao 298
zhennan S. Lee et F. N. Wei 298
Phoenicurus Forster 1073
auroreus (Pallas) 1073
Phoenix L. 1464
dactylifera L. 1464
Pholidota Lindl. 1555
cantonensis Rolfe 1555
chinensis Lindl. 1555
var. cylindracea Wang et Tang 1556
yunnanensis Rolfe 1556
*Pholiota cylindracea* (Fr.) Gill. 42
Photinia Lindl. 513
beauverdiana Schneid. 513
crassifolia Lévl. 514
davidsoniae Rehd. et Wils. 514
*deflexa* Hemsl. 507
*fortuneana* Maxim. 521
glabra (Thunb.) Maxim. 514
kwangsiensis Li 514
parvifolia (E. Pritz.) Schneid. 514

schneideriana Rehd. 514
serrulata Lindl. 514
villosa (Thunb.) DC. 514
var. sinica Rehd. et Wils. 515
Phoxinus Agassiz 1663
lagowskii Dybowski 1663
Phragmites Trin. 1452
australis (Cav.) Trin. ex Steud. 1452
*communis* Trin. 1452
karka (Retz.) Trin. ex Steud. 1453
Phryganea Linnaeus 1627
japonica Mac Lachlan 1627
Phryganeidae 1627
Phryma L. 1197
leptostachya L. 1197
Phrymataceae 1197
Phrynium Willd. 1516
capitatum Willd. 1516
placentarium (Lour.) Merr. 1517
Phrynocephalus Kuup 1704
vlangalii Strauch 1704
Phtheirpspermum Bunge 1148
japonicum (Thunb.) O. Kuntze 1148
tenuisectum Bur. et Franch. 1149
Phyla Lour. 1050
nodiflora (L.) Greene 1050
Phyllagathis Bl. 812
anisophylla Diels 812
cavaleriei (Lévl. et Vant.) Guillaum. 812
var. tankahkisi (Merr.) C. Y. Wu 813
elattandra Diels 813
fordii (Hance) C. Chen 813
longiradiosa (C. Chen) C. Chen 813
var. pulchella C. Chen 813
*tankahkesi* Merr. 813
*Phyllamphora mirabilis* Lour. 424
Phyllanthodendron Hemsl. 636
anthopotamicus (Hand.-Mazz.) Croiz. 636
dunnianum Lévl. 636
var. *hypoglaucum* Lévl. 636
Phyllanthus L. 636
*anthopotamicum* Hand.-Mazz. 636
*assamicum* Muell.-Arg. 632
cochinchinensis (Lour.) Spreng. 636
emblica L. 636
glaucus Wall. ex Muell.-Arg. 637
hainanensis Merr. 637
*matsumurae* Hayata 637
multiflorus Willd. 637
niruri L. 637
*quadragularis* Willd. 639
*reticulatus* Poir. 637
var. glaber Muell.-Arg. 637
*retusa* Deunst. 622
*simplex* Retz. 638
*sphaerogynum* Muell.-Arg. 633
*starongensis* W. W. Smith 637
urinaria L. 637
ussuriensis Rupr. et Maxim. 637
virgatus Forst. f. 638
*virosus* Roxb. ex Willd. 640
*Phylloboea sinensis* Oliv. 1191
*Phyllodes placentaria* Lour. 1517
*Phyllodesmis delavayi* Van Tiegh. 214
Phyllodium Desv. 593
elegans (Lour.) Desv. 593
longipes (Craib) Schindl. 594
pulchellum (L.) Desv. 594
Phyllodromiidae 1610
*Phyllomphax galeandra* Reichb.f. 1520
Phyllophoraceae 16
Phyllophyton Kudo 1098
complantum (Dunn) Kudo 1098
tibeticum (Jacq. ex Benth.) C. Y. Wu 1098
Phyllostachys Sieb. et Zucc. 1453
bambusoides Sieb. et Zucc. 1453
*congesta* Rendle 1453
glauca McClure 1453
*henonis* Mitf. 1454
heteroclada Oliv. 1453
heteroeycla (Carr.) Mitf. cv. pubescens 1453
makinoi Hayata 1453
nidularia Munro 1453
nigra (Lodd.) Munro 1453
var. henonis (Mitf.) Stapf ex Rendle 1454
viridis (Young) McClure cv. Robert Young 1454
Phymatodes Presl 132
cuspidata (D. Don) Alston 132
griffithiana (Hook.) Ching 133
hastata (Thunb.) Ching 133
intermedia Ching 134
veitchii (Baker) Ching 134
Phymatopsis Smith 133
conjuncta Ching 133
crenatapinnata (C. B. Clarke) Ching 133
ebenipes (Hook.) J. Smith 133
engleri (Luerss.) H. Ito 133
glaucopsis (Franch.) Ching 133
griffithiana (Hook.) J. Smith 133
hastata (Thunb.) Kitag. ex H. Ito 133
intermedia (Ching) Ching 134
shensiensis (Christ) Ching 134
triscta (Baker) Ching 134
veitchii (Baker) H. Ito 134
Physalia Lamarck 1566
physalia utriculus Lamartiniere 1566
Physaliastrum Makino 1122
heterophyllum (Hemsl.) Migo 1122
japonicum (Franch. et Sav.) Honda 1122
Physalidae 1566
Physalis L. 1122
alkekengi L. 1122
var. francheti (Mast.) Makino 1122

angulata L. 1123
var. villosa Bonati 1123
*francheti* Mast. 1122
var. *bunyardii* Makino 1122
minima L. 1123
peruviana L. 1123
pubescens L. 1123
Physcosoma Selenka 1591
similis Chen et Yen 1591
Physeter Linnaeus 1758
catodon Linnaeus 1758
Physeteridae 1758
Physignathus cocincinus Cuvier 1703
*Physkium natans* Lour. 1361
Physochlaina G. Don 1123
infundibularis Kuang 1123
physaloides (L.) G. Don 1124
*Physolychnia gonospermum* Rupr. 246
Physospermopsis Wolff 873
delavayi (Franch.) Wolff 873
Phytolaccaceae 234
Phytolacca L. 234
acinosa Roxb. 234
americana L. 234
polyandra Batal. 234
Pica Brisson 1739
pica (Linnaeus) 1739
Picea Dietr. 144
*balfouriana* Rehd. et Wils. 145
crassifolia Kom. 144
jezoensis Carr. var. komarovii (Vass.) Cheng et L. K. Fu 144
*komarovii* Vass. 144
koraiensis Nakai 144
likiangensis (Franch.) E. Pritz. var. balforiana (Rehd. et Wils) Hillier ex Slavin 145
meyeri Rehd. et Wils. 145
purpurea Mast. 145
schrenkiana Fisch. et Mey. 145
var. tianshanica (Rupr.) Cheng et S. H. Fu 145
wilsonii Mast. 145
Picidae 1734
Picrasma Bl. 657
quassioides (D. Don) Benn. 657
Picria Lour. 1149
fel-terrae Lour. 1149
Picris L. 1323
davurica Fisch. 1323
divaricata Vant. 1324
hieracioides L. subsp. fuscipilosa Hand.-Mazz. 1324
subsp. japonica (Thunb.) Krylov 1324
*japonica* Thunb. 1324
Picrorhiza Royle 1149
asrophulariiflora Pennell 1149
Picumnus innominatus Burton 1735
Picus Linnaeus 1734
canus Gmelin 1734
Pieridae 1630
Pieris D. Don 888
*bodinieri* Lévl. 888
*compta* W. W. Smith et J. F. Jeffrey 887
formosa (Wall.) D. Don 888
*ovalifolia* (Wall.) D. Don 887
var. *elliptica* (Sieb. et Zucc.) Rehd. et Wils. 887
var. *hebecarpa* Franch. ex Hemsl 887
polita W. W. Smith et J. F.Jeffrey 888
Pieris Hübner 1630
rapae (Linnaeus) 1630
Pilea Lindl. 201
angulata (Bl.) Bl. 201
subsp. petiolaris (Sieb. et Zucc.) C. J. Chen 201
aquarum Dunn subsp. brevicornuta (Hayata) C. J. Chen 202
basicordata W. T. Wang ex C. J. Chen 202
*breviconnata* Hayata 202
cardierei Gagnep. et Güill. 202
cavaleriei Lévl. 202
subsp. valida C. J. Chen 202
*crassifolia* Hance 204
*fasiata* Franch. 204
glaberrima (Bl.) Bl. 202
japonica (Maxim.) Hand.-Mazz. 202
lomatogramma Hand.-Mazz. 202
longicaulis Hand.-Mazz. 202
martinii (Lévl.) Hand.-Mazz. 203
melastomoides (Poir.) Weed. 203
microphylla (L.) Liebm. 203
*mongolica* Wedd. 204
monilifera Hand.-Mazz. 203
notata C. H. Wright 203
peltata Hance 203
peperomioides Diels 203
peploides (Gaud.) Hook. et Arn. 203
var. major Wedd. 203
plataniflora C. H. Wright 203
pumila (L.) A. Gray 204
var. hamaoi (Makino) C. J. Chen 204
rotundinucula Hayata 204
salwinensis (Hand.-Mazz.) C. J. Chen 204
scripta (Ham.) Wedd.
sinocrassifolia C. J. Chen 204
sinofasiata C. J. Chen 204
*stipulosa* (Miq.) Miq. 201
swinglei Merr. 204
symmeria Wedd. 204
var. *salwinensis* Hand.-Mazz. 204
tsiangiana Metc. 204
verrucosa Hand.-Mazz. 205
Pileostegia Hook. f. et Thoms. 485
tomentella Hand.-Mazz. 485
viburnoides Hook. f. et Thoms. 485
*Pimela alba* Lour. 658

Pteridophyta 1
Pteridospermae 1
Pteris L. 1
albersii Hance 1
biaurita L. 1
cadieri Christ et Lévl. 1
cretica L. 1
dispar Kunze 1
ensiformis Burm. f. 1
fauriei Hieron. 1
grevilleana Wall. 1
insignis Mett. ex Kuhn 1
multifida Poir. 1
nervosa Thunb. 1
oshimensis Hieron. 1
semipinnata L. 1
setuloso-costulata Ching 1
tremula R. Br. 1
vittata L. 1
wallichiana Agardh 1
Ptilidium Nees 1
Ptilium Kaulf. 1
Pueraria DC. 1
lobata (Willd.) Ohwi 1
Pulsatilla Adans. 1
Punctum Morse 1
Punicaceae 1
Punica L. 1
granatum L. 1
Pupillidae 1
Pupisoma Lowe 1
Pupoidea 1
Purpuradina Pilat 1
Pycnoporus Karst. 1
cinnabarinus (Jacq. ex Fr.) Karst. 1
Pyrenaria Blume 1
Pyrenocarpa Nyl. 1
Pyrenocollema Wallr. 1
Pyrenodesmia Trev. 1
Pyrenopsis Nyl. 1
Pyrenula Ach. 1
Pyrethrum Zinn 1
Pyrola L. 1
Pyrolaceae 1
Pyrrhocoracidae 1
Pyrrhocorax Tunstall 1
Pyrrhocoridae 1
Pyrrhocoroidea 1
Pyrrhula Brisson 1
Pyrrhulauda Blyth 1
Pyrrhulauda Blyth 1
Pyrus L. 1
betulaefolia Bunge 1
calleryana Decne. 1
communis L. 1
hopeiensis Li 1
pashia Buch.-Ham. ex D. Don 1
phaeocarpa Rehd. 1
serrulata Rehd. 1
ussuriensis Maxim. 1
Quadrula Rafinesque 1
Quercus L. 1
acutissima Carr. 1
aliena Blume 1
aliena Blume var. acuteserrata Maxim. ex Wenz. 1
aliena Blume var. pekinensis (Rehd.) Rehd. 1
arbutifolia Hance 1
baronii Skan 1
chenii Nakai 1
chungii Metc. 1
dentata Thunb. 1
fabri Hance 1
fargesii Franch. 1
fleuryi Hickel et A. Camus 1
glandulifera Blume 1
glauca Thunb. 1
griffithii Hook. f. et Thoms. ex Miq. 1
kerrii Craib 1
kingiana Craib 1
lamellosa Smith 1
leucotrichophora A. Camus 1
liaotungensis Koidz. 1
lineata Blume 1
lodicosa Franch. 1
mongolica Fisch. ex Ledeb. 1
myrsinaefolia Blume 1
oxyodon Miq. 1
pannosa Hook. f. et Thoms. ex Miq. 1
phillyraeoides A. Gray 1
pseudoglauca Hemsl. 1
rehderiana Hand.-Mazz. 1
robur L. 1
semecarpifolia Smith 1
serrata Thunb. 1
spinosa David ex Franch. 1
variabilis Blume 1
Quiscalus Vieillot 1
Rabdosia Hamilton 1
Rabdosiella Kudo 1
Radix Angelicae Dahuricae 1
Radix Angelicae Pubescentis 1
Radix Angelicae Sinensis 1
Radix Astragali 1
Radix Bupleuri 1
Radix Codonopsis 1
Radix Gentianae Macrophyllae 1
Radix Glycyrrhizae 1
Radix Ledebouriellae 1
Radix Notoptervgii 1
Radix Paeoniae Alba 1
Radix Paeoniae Rubra 1
Radix Peucedani 1
Radix Platycodi 1
Radix Rehmanniae 1
Radix Saposhnikoviae 1
Radix Scrophulariae 1
Radix Stemonae 1
Radix Trichosanthis 1
Radix Tripterygii Wilfordii 1
Radix Valerianae 1
Radix Vincetoxici 1
Rafinesquina Hall et Clarke 1
Rallidae 1
Rallus L. 1
Ramalina Ach. 1
Ramalinaceae 1
Ramaria Fr. 1
Ranunculaceae 1
Ranunculus L. 1
Rapa Tournefort 1
Raphanus L. 1
Rapidonia Pilat 1
Rapistrum Crantz 1
Rattus Fischer 1
Rauvolfia L. 1
Ravenelia Berk. 1
Recurvirostra L. 1
Recurvirostridae 1
Regulus Cuvier 1
Remiz Kaup 1
Remizidae 1
Rhabdia Lamarck 1
Rhabdocline Syd. 1
Rhabdostigma Hallier f. 1
Rhacophorus Kuhl et Van Hasselt 1
Rhamnaceae 1
Rhamnus L. 1
Rhaphidophora Hassk. 1
Rhaphidophyllum H. Wendl. et Drude 1
Rhaphiolepis Lindl. 1
Rhaphis Ait. 1
Rhinanthus L. 1
Rhinolophidae 1
Rhinolophus Lacépède 1
Rhinopithecus Milne-Edwards 1
Rhinoptilus Lesson 1
Rhizophoraceae 1
Rhizophora L. 1
Rhodiola L. 1
Rhodobryum Schimp. 1
Rhodocodon Baker 1
Rhodocortex Pilat 1
Rhodoleia Champ. ex Hook. f. 1
Rhodoleiaceae 1
Rhodomyrtus (Tourn.) Rehd. 1
Rhodophyllum Decne. 1
Rhodoplax Salvadori 1
Rhodoplax Salvadori 1
Rhodoplax Salvadori

*turgida* Merr. 566
Pittosporaceae 492
Pittosporopsis Craib 709
kerrii Craib 709
Pittosporum Banks ex. Solanol 492
adaphmphylloides Hu et Wang 492
*baileyanum* Gowda 492
balansae DC. 492
var. angustifolium Gagnep. 492
brevicalyx (Oliv.) Gagnep. 492
*cavaleriei* Lévl. 493
*confertum* Merr. et Chun 492
crispulum Gagnep. 492
densinervatum H. T. Chang et Yan 492
*formosanum* Hayata 494
var. *hainanense* Gagnep 494
glabratum Lindl. 492
var. neriifolium Rehd. et Wils. 493
heterophyllum Franch. 493
illicioides Makino 493
var. stenophyllum P. L. Chio 493
kerri Craib 493
kobuskianum Gowda 493
kwangsiense H. T. Chang et Yan 493
leptosepalum Gowda 493
napaulense (DC.) Rehd. et Wils. 493
omiense H. T. Chang et Yan 494
ovoideum Gowda 494
parvicapsulare H. T. Chang et Yan 494
pauciflorum Hook. et Arn. 494
var. *brevicalyx* Oliv. 492
pentandrum (Blanco) Merr. var. hainanense (Gagnep.) Li 494
perglabratum H. T. Chang et Yan 494
perryanum Gowda 494
podocarpum Gagnep. 494
var. angustatum Gowda 495
pulchrum Gagnep. 495
rehderianum Gowda 495
sahnianum Gowda 495
*tetraspermum* senes Gowda 495
tobira Ait 495
tonkinense Gagnep. 495
trigonocarpum Lévl. 495
truncatum Pritz. 495
*yunnanensis* Franch. 942
*Pityrosperma accrinum* Sieb. et Zucc. 320
Placuna Solander 1583
placenta (Linnaeus) 1583
Placunidae 1583
Plagiogyria Mett. 83
distinctissima Ching 83
japonica Nakai 83
liankwangensis Ching 83
stenoptera (Hance) Diels 84
Plagiogyriaceae 83
Plagiomnium T. Kop. 63
acutum (Lindl.) T. Kop 63
cuspidatum (Hedw.) T. Kop. 63
Plagiopetalum Rehd. 813
esquirolii (Lévl.) Rehd. 813
Plagiopholis styani (Boulenger) 1708
Plagiopteron Griff. 735
*chinensis* X. X. Chen 735
suaveolens Griff. 735
Phagiopus Brid. 63
oederi (Brid.) Limpr. 63
*Plagiorhegme dubia* Maxim. 367
*Plagiospermum sinense* Oliv. 519
Plagiostachys Ridl. 1512
austrosinensis T. L. Wu et Senjen 1513
*Planchonella aurata* Pierre ex Dubard 925
*Planera davidii* Hance 179
Plantaginaceae 1197
Plantago L. 1197
arachnoides Schrenk. 1198
asiatica L. 1197
axachoides Schrenk. 1198
camtschatica Link 1198
cornutia Gouan. 1198
depressa Willd. 1197
erosa Wall. 1198
formosana Tateishi et Masamune 1198
hostifolia Nakai et Kitag. 1198
japonica Franch. et Sav. 1198
jeholensis Koidz. 1198
lessingii Fisch. et Mey. 1198
major L. 1198
maritima L. var. salsa (Pall.) Pilger 1198
psyllium L. 1198
tibetica (Ait.) Willd. 1198
Platanaceae 458
Platanistidae 1758
Platanthera Rich. 1556
chlorantha Cust. ex Reichb. f. 1556
clavigera Lindl. 1556
hologlottis Maxim. 1556
*interrupta* Maxim. 1557
japonica (Thunb.) Lindl. 1556
likiangensis Tang et Wang 1557
mandarinorum Reichb. f. 1557
minor (Miq.) Reichb. f. 1557
*orchidis* Lindl. 1542
stenostachya Lindl. 1557
*stipuloides* Lindl. var. *ussuriensis* Regel et Maack 1560
Platanus L. 458
acerifolia (Ait.) Willd. 458
occidentalis L. 458
orientalis L. 458
Platycarya Sieb.et Zucc. 161
longipes Wu 161
strobiacea Sieb. et Zucc. 161
Platycephalidae 1688
Platycephalus Bloch 1688

indicus (Linnaeus) 1689
Platycladus Spach 151
orientalis (L.) Franco 151
Platycodon A. DC. 1236
grandiflorus (Jacq.) A. DC. 1236
Platygyria Ching et S. K. Wu 134
waltonii (Ching) Ching et S. K. Wu 134
Platypleura Amyot et Serville 1616
kaempferi (Fabricius) 1616
Platysternidae 1699
Platysternon Gray 1699
megacephalum Gray 1699
Plecoglossidae 1654
Plecoglossus Temminck et Schlegel 1654
altivelis Temminck et Schlegel 1654
Plecotus auritus Linnaeus 1747
*Plectranthus adenanthus* Diels 1075
*amethystoides* Benth. 1075
*angustifolius* Dunn 1076
*bulleyanus* Diels 1076
*cardiophyllum* Hemsl. 1074
*carnosifolius* Hemsl 1062
*coetsus* Buch.-Ham. ex D Don 1076
*enanderianus* Hand.-Mazz. 1076
*eriocalyx* Dunn 1076
*excisus* Maxim. 1077
*forskohlii* Willd. 1062
*gerardianus* Benth. 1078
*glaucocalyx* Maxim. 1078
*graciliflora* Benth. 1078
*henryi* Hemsl. 1077
*hispidus* Benth. 1077
*inflexus* (Thunb.) Vahl ex Benth. 1077
*irroratus* Forrest ex Diels 1077
*longitubus* Miq. 1078
*macranthus* Hook. f. 1111
*marmoritis* Hance 1094
*megathyrsus* Diels 1079
*nervosus* Hemsl. 1079
*nudipes* Hemsl. 1111
*oreophilus* Diels 1111
var. *elongatus* Hand.-Mazz. 1111
*patchouli* C. B. Clarke ex Hook. f. 1090
*phyllostachys* Diels 1079
*racemosus* Hemsl. 1079
*rosthornii* Diels 1079
*rubescens* Hemsl. 1079
*rugosus* Wall. 1080
*sculponeatus* Vaniot 1080
*serrus* Maxim. 1080
*stracheyi* Benth. ex Hook. f. 1080
*striatus* Benth. 1078
*ternifolius* D. Don 1080
*yunnanensis* Hand.-Mazz. 1081
Pleioblastus Nakai 1454
amarus (Keng) Keng f. 1454
Pleione D. Don 1557
bulbocodioides (Franch.) Rolfe 1557
*chiwuana* Tang et Wang 1558
grandiflora (Rolfe) Rolfe 1557
hookeriana (Lindl.) J. W. Moore 1557
scopulorum W. W. Smith 1558
yunnanensis (Rolfe) Rolfe 1558
*Pleomele angustifolia* (Roxb.) N. E. Br. 1405
cambodiana (Gagnep.) Merr. et Chun 1405
*cochinchinensis* (Lour.) Merr. et Gagnep. 1405
*terniflora* (Roxb.) Merr. 1405
Pleonomus Menetries 1620
canaliculatus Faldermann 1620
*Pleopeltis dilatata* Bedd. 131
*ovata* Bedd. 132
*rostrata* Bedd. 128
*thunbergiana* Kaulf. 130
*ussuriensis* Regel et Maack 131
Pleurobranchaea Meckel 1577
novaezealandiae Cheeseman 1577
Pleurobranchidae 1577
Pleuronectidae 1690
Pleuronichthys Girard 1690
cornutus (Temminck et Schlegel) 1690
*Pleuropterus cillinerve* Nakai 223
*cuspidatus* (Sieb. et Zucc.) H. Gross 223
*multiflorus* (Thunb.) Turcz. ex Nakai 227
Pleurospermum Hoffm. 874
camtschaticum Hoffm. 874
crassicaule Wolff 874
cristatum H. Boiss. 874
franchetianum Hemsl. 874
giraldii Diels 874
hookeri C. B. Clarke var. thomsonii C. B. Clarke 875
prattii Wolff 875
szechenyii Kanitz 875
uralense Hoffm. 875
Pleurotus (Fr.) Quèl. 39
citrinopileatus Sing. 39
cornucopiae (Paul. ex Pers.) Roll. 39
ferulae Lanzi 39
ostreatus (Jacq. ex Fr.) Quél. 39
spodolencus Fr. 39
ulmarius (Bull. ex Fr.) Quél. 39
Ploceidae 1744
Plotosidae 1668
Plotosus Lacepede 1668
anguillaris (Bloch) 1669
Pluchea Cass. 1324
*bulleyana* J. F. Jeffrey 1244
eupatorioides Kurz 1324
indica (L.) Less. 1324
Plumbagella Spach 924
micrantha (Ledeb.) Spach 924
Plumbaginaceae 923
Plumbago L. 925
indica L. 925
*micrantha* Ledeb. 924

*spinosa* Hao 924
zeylanica L. 925
Plumeria L. 967
rubra L. cv. Acutifolia 968
Plumularia Lamarck 1566
setacea (Ellis) 1566
Pluteaceae 41
Pneumatophorus Jordan et Gilbert 1682
japonicus (Houttuyn)
Poa L. 1454
annua L. 1454
*atrovirens* Desf. 1443
*chinensis* L. 1448
*ciliatensis* All. 1443
*ferruginea* Thunb. 1444
*hirta* Thunb. 1436
*pilosa* L. 1444
pratensis L. 1454
sphondylodes Trin. ex Bunge 1454
*tenella* L. 1444
Poacynum hendersonii (Hook.f.) Woods. 961
pictum (Schrenk) Baill. 961
Podaxaceae 48
Podaxis Desv. 48
pistillaris (L. ex Pers.) Fr. 48
Podiceps Latham 1712
cristatus (Linnaeus) 1713
grisegena (Boddaert) 1713
ruficollis (Pallas) 1713
Podicipedidae 1712
Podocarpaceae 153
Podocarpium (Benth.) Yang et P. H. Huang 595
oldhami (Oliv.) Yang et P. H. Huang 595
podocarpum (DC.) Yang et P. H. Huang 595
var. fallax (Schindl.) Yang et P. H. Huang 595
var. oxyphyllum (DC.) Yang 595
var. szechuenense (Craib) Yang et P. H. Huang 596
Podocarpus L'Hérit. ex Pers. 153
*argotaenia* Hance 155
forrestii Craib et W. W. Smith 153
macrophyllus (Thunb.) D. Don 153
var. maki (Sieb.) Endl. 153
nagi (Thunb.) Zoll. et Mor. ex Zoll. 154
neriifolius D. Don 154
wallichiana Presl. 154
*Podoon delavayi* Baill. 667
*Podophyllum auranliocaule* Hand.-Mazz. 364
*chengii* Chien 364
*difforme* Hemsl. et Wils. 364
*emodii* Wall. ex Royle 370
*hexandrum* Rolfe 370
*hispidum* Hao 364
*majorensis* Gagnep. 364
*pleianthum* Hance 364
*triangula* Hand.-Mazz. 364
*veitchii* Hemsl. et Wils. 365
*versipelle* Hance 365
*Podospermum laciniatum* var. *songarica* Kar. et Kir. 1335
Podostroma Karst. 22
yunnanensis M. Zan 22
*Poephagus grunniens* (Linnaeus) 1773
Pogonatherum Beauv. 1454
crinitum (Thunb.) Kunth 1455
paniceum (Lam.) Hack. 1455
Pogonatum P. Beauv. 67
inflexum (Lindl.) Lac. 67
microstemum (Schwaegr.) Brid. 67
Pogonia Juss. 1558
*fordii* Hance 1550
japonica Reichb. f. 1558
*kungii* Tang et Wang 1558
*yunnanensis* Finet 1558
Pogostemon Desf. 1098
auricularius (L.) Hassk. 1098
brevicorollus Sun ex C. H. Hu 1099
cablin (Blanco) Benth. 1099
esquirolii (Lévl.) C. Y. Wu et Y. C. Huang 1099
glaber Benth. 1099
nigrescens Dunn 1099
*Poinciana pulcherrima* L. 555
Polemoniaceae 1023
Polemonium L. 1023
*chinense* (Brand) Brand 1023
coeruleum L. 1023
var. chinense Brand 1023
liniflorum Vass. 1023
Polianthes L. 1405
tuberosa L. 1405
Polistes Latreille 1633
chinensis Fabricius 1634
confusa (Smith) 1634
formosanus Sonan 1634
hebraeus Fabricius 1634
jadwigae Dalla Torre 1634
japonicus Saussure 1634
jokahamae Radoszkowski 1634
mandarinus Saussure 1634
olivaceous (De Geer) 1634
Polistidae 1633
Pollia Thunb. 1430
hasskarii Rolla Rao 1430
japonica Thunb. 1430
omeiensis Hong 1430
subumbellata (C. B. Clarke) C. B. Clarke 1430
*Pollinia grata* Hack. 1449
Polyalthia Bl. 273
nemoralis A. DC. 273
plagioneura Diels 273
suberosa (Roxb.) Thw. 273

Polybiidae 1633
Polycarpaea Lam. 244
corymbosa (L.) Lam. 244
Polycarpon Loefl. ex L. 244
indicum (Retz.) Merr. 244
Polychaeta 1592
*Polychroa repens* Lour. 201
*Polycnemum erinaceum* Pall. 256
Polygala L. 662
arillata Buch.-Ham. 662
arvensis Willd. 663
*aureocauda* Dunn 663
caudata Rehd. et Wils. 663
*chinensis* L. 663
crotalarioides Buch.-Ham. 663
fallax Hemsl. 663
furcata Royle 663
glomerata Lour. 663
hongkongensis Hemsl. 663
var. stenophylla (Hayata) Migo 663
hybrida DC. 663
japonica Houtt. 664
*kinii* Courtois 663
koi Merr. 664
latouchei Franch. 664
*mariesii* Hemsl. 665
persicaraefolia DC. 664
saxicola Dunn 664
sibirica L. 664
var. megalopha Franch. 664
subopposita S. K. Chen 665
tatarinowii Regel 665
*telephioides* Willd. 663
tenuifolia Wllid. 665
tricornis Gagnep. 665
var. obcordata C. Y. Wu et S. K. Chen 665
*triphylla* Royle 665
wattersii Hance 665
Polygalaceae 662
Polygonaceae 218
Polygonatum Mill. 1392
acuminatifolium Kom. 1394
alternicirrhosum Hand.-Mazz. 1393
arisanense Hayata 1393
cathcartii Baker 1393
cirrhifolium (Wall.) Royle 1393
curvistylum Hua 1393
cyrtonema Hua 1392
filipes Merr. 1393
franchetii Hua 1393
gracile P. Y. Li 1394
humile Fisch. ex Maxim. 1393
inflatum Kom. 1393
involucratum (Franch. et Sav.) Maxim. 1394
kingianum Coll. et Hemsl. 1393
lasianthum Maxim. 1393
var. commutatum (A. Dietr.) Baker 1393
macropodum Turcz. 1393
megaphyllum P. Y. Li 1394
*multiflorum* All. var. *longifolium* Merr. 1392
nodosum Hua 1393
odoratum (Mill.) Druce 1393
*officinale* All. 1393
pratii Baker 1393
punctatum Royle ex Kunth 1393
roseum (Ledeb.) Kunth 1393
sibiricum Delar. ex Redoute 1394
stenophyllum Maxim. 1394
tessellatum Wang et Tang 1393
uncinatum Diels 1393
verticillatum (L.) All. 1394
zanlanscianense Pamp. 1393
Polygonum L. 220
alatum Buch.-Ham. ex D. Don 220
alopecuroides Turcz. 220
amphibium L. 220
var. terrestre Leyss. 220
amplexicaule D. Don 221
var. sinense Forb. et Hemsl. 221
attenuatum V. Petr. ex Kom. 221
aubertii (L.) Henry 221
aviculare L. 221
var. rigidum (Skv). H. C. Fu 221
var. vegetum Ledeb. 221
barbatum L. 221
subsp. *gracile* Danser 221
var. gracile (Danser) Steward 221
bistora L. 221
bungeanum Turcz. 222
caespitosum Bl. 222
campanulatum Hook. f. 222
capitatum Buch.-Ham. ex D. Don 222
chinense L. 222
var. hispidum Hook. f. 222
f. ovalifolium Meissn. 222
cillinerve (Nakai) Ohwi 223
convolvulus L. 223
coriaceum Sam. 223
cuspidatum Sieb. et Zucc. 223
*cymosum* Trev. 219
cynanchoides Hemsl. 223
dentato-alatum F. Schmidt ex Maxim. 223
denticulatum Huang 223
dissitiflorum Hemsl. 224
divaricatum L. 224
*dumetorum* L. 223
emodi Meissn. 224
excurrens Steward 224
fagopyrum L. 219
*filiforme* Thunb. 218
flaccidum Meissn. 224
giraldii Damm. 224
*gracilipes* Hems L. 219

*griffithi* Hook. f. 224
heterophyllum Lindm. 224
hydropiper L. 225
var. angustifolia (A. Br.) Kitag. 225
var. diffusa Kitag. 225
var. *flaccidum* (Meissn.) Ateward 224
var. hispidum (Hook. f.) Steward 225
japonicum Meissn. 225
var. *conspicuum* Nakai 226
jucundum Meissn. 225
lapathifolium L. 225
var. salicifolium Sibth. 225
var. xanthophyllum Kung 225
lapidosum Kitag. 226
longisetum De Bruyn 226
macranthum Meissn. 226
macrophyllum D. Don 226
mandshuriense V. Petr. 226
microcephalum D. Don 226
minus Huds. 225
molle D. Don 226
var. *rude* (Meissn.) A. J. Li 228
multiflorum Thunb. 227
var. *cillinerve* (Nakai) Steward 223
muricatum Meissn. 226
*neofiliforme* Nakai 218
*nepalense* Meissn. 220
nodosum Pers. 227
ochotense V. Petrov. ex Kom. 227
orientale L. 227
pacificum V. Petrov. ex Kom. 227
paleaceum Wall. 227
perfoliatum L. 228
periginatoris Pauls. 228
persicaria L. 228
pinetorum Hemsl. 228
plebeium R. Br. 228
polystachyum Wall. ex Meissn. 228
rude Meissn. 228
runcinatum Buch. Ham. 229
var. corymbosum Huang 229
var. sinense-Hemsl. 229
sagittifolium Lévl. et Vant. 229
senticosum (Meissn.) Franch. et Sav. 229
sibiricum Laxm. 229
sieboldii Meissn. 229
*sphaerostachyum* Meissn. 226
*strigosum* R. Br. var. *muricatum* (Meisn.) Steward 226
suffultum Maxim. 230
var. pergracile (Hemsl.) Sam. 230
taipaishanense Kung 230
*tataricum* L. 219
thunbergii Sieb. et Zucc. 230
tinctorium Ait. 230
viscosum Buch.-Ham. ex D. Don 230
viviparum L. 230
Polynemidae 1674
Polynemus **sextarius** Bloch et Schneider 1674
Polyodontidae 1651
polyopes J. Ag. 15
polyideoides Okam. 15
Polyphaga plancyi Bolivar 1611
Polypodiaceae 125
Polypodiastrum Ching 134
dielsianum (C. Chr.) Ching 134
Polypodiodes Ching 135
amoena (Wall. et Mett.) Ching 135
nipponica (Mett.) Ching 135
pseudoamoenum (Ching) Ching 135
Polypodium L. 135
*acuminatum* Houtt. 103
*adnascens* Sw. 136
*amoena* Wall. ex Mett. 135
*aristatum* Forst 113
assimile Baker 136
f. lobata (Wu) Ching 136
*asterolepis* Baker 129
*auriculatum* L. 123
*austriaca* Jacq. 115
*barometz* L. 87
baronii Christ 138
bonii (Christ) Ching 136
*buergerianum* Miq. 131
*clathratum* C. B. Clarke 129
*clavata* Christ 136
*contortum* Christ 129
coronans Wall. 139
crenatopinnatum C. B. Clarke 133
*crenatum* Forsk. 103
*cuspidatum* D. Don 132
*decursive-pinnata* Hall. 105
*delsianum* C. Chr. 134
*deltoideum* Baker 132
*dentatum* Forsk. 103
*dichotomum* Thunb. 84
*dielsianum* C. Chr. 134
*diversum* Ros. 128
*drakeanum* Franch. 136
*drymoglossoides* Baker 128
*eilophyllus* Diels 129
*elliptica* Thunb. 126
*englerı* Luerss. 133
*excavatum* var. *bicolor* Takeda 129
*falcatum* L. f. 114
*filix-mas* L. 116
*flage-llare* Maxim. 88
*glaucum* Thunb. ex Houtt. 84
*griffithianum* Hook. 133
*hastatum* Thunb. 133
*hemionitideum* Wall. 126
*hirsutulum* Forst 123
*hymenoides* Kunze 131
*lacera* Thunb. 117
*lehmanni* Mett. 125
*lewitii* Baker 129

*lineare* Burm. 84
*lungtauensis* Ching 125
*macrosphaerum* Baker 130
*mairei* Brause 125
*marginatum* Houtt. 89
membranaceum D. Don 131
*nipponicum* Mett. 135
*obscure-venulosum* Hayata 130
*oligolepidum* Baker 130
*palmatopedatum* Baker 132
*parasiticum* L. 103
*penangianum* Hook. 106
petiolosum Christ 137
propinquum Wall. 138
*pseudomoenum* Ching 135
*punctatum* Thunb. 90
*quercifolium* L. 139
*sheareri* Baker 137
*shensiensis* Christ 134
*steerei* Harr. 132
*subtriphyllum* Hook. et Arn. 122
*triseciun* Baker 134
*varia* L. 118
*veitchii* Baker 134
virginianum L. 135
vulgare L. 135
Polypogon Desf. 1455
fugax Nees ex Steud. 1455
*higegoweri* Steud. 1455
Polyporaceae 28
Polyporus (Mich.) Fr. et Fr. 33
albicans (Imaz.) Teng 33
*betulinus* Bull. ex Fr 33
*cinnabarina* Jacq. 34
*corrugatus* Pers. 35
*cuticularis* (Bull.) Fr. 31
elegans (Bull.) Fr. 33
frondosus (Dicks.) Fr. 33
giganteus (Pers.) Fr. 33
hirsutus (Wulf.) Fr. 28
*hispidus* Bull. ex Fr. 35
*lucidus* Leyss. ex Fr. 30
*montanus* (Quél.) Ferry 28
mylittae Cooke et Mass. 33
*rimosus* Berk. 34
*sulphureus* Fr. 35
umbellatus (Pers.) Fr. 33
vittatus Berk. 35
*volvatus* Peck 29
*Polyspora axillaris* (Roxb.) Sweet 417
Polystichum Roth 118
acanthophyllum (Franch.) Christ 118
acutidens Christ 118
alcicorne (Baker) Diels 118
*balansae* Christ 114
braunii (Spenner) Fée 118
craspedosorum (Maxim.) Diels 119
deltodon (Baker) Diels 119
*falcatum* (L. f.) Presl var. *polypterum* Diels 114
hancockii (Hance) Diels 119
lichiangense (C. H. Wright) Ching 119
lonchitis (L.) Roth 119
makinoi Tagawa 119
moupinense (Franch.) Bedd. 119
neolobatum Nakai 120
omeiense C. Chr. 120
*pachyphyllum* Ros. 116
polyblepharum (Rom.) Presl 120
*prescotianum* (Wall.) Moore var. *sinense* Christ 120
setiferum (Forsk.) Moore ex Woynar 120
setosum (Wall.) Schott 120
shensiense Christ 120
sinense Christ 120
squarrosum (D. Don) Fée 120
tripteron (O. Kuntze) Presl 121
tsus-simense (Hook.) J. Smith 121
*Polystictus orientalis* Yasuda 35
*sanguineus* Fr. 35
*unicolor* (Bull. ex Fr.) Lloyd. 28
*versicolor* (L.) Fr. 29
Polytrichaceae 67
Polytrichum Hedw. 67
commune L. ex Hedw. 67
junipernum Willd. ex Hedw. 67
Pomadasyidae 1680
Pomatosace L. 918
filicula Maxim. 918
Poncirus Raf. 651
trifoliata (L.) Raf. 651
*Ponerorchis limprichtii* (Schltr.) Soó 1552
*hui* (Tang et Wang) Soó 1552
*monophylla* (Coll. et Hemsl.) Soó 1552
Pongamia Vent. 596
*elliptica* Wall. 567
pinnata (L.) Merr. 596
*Pontederia crassipes* Mart. 1416
*dubia* Bl. 1360
*hastata* L. 1416
*vaginalis* Burm. f. 1416
Pontederiaceae 1416
Populus L. 162
adenopoda Maxim. 162
alba L. 162
var. *pyramidalis* Bunge 163
*bolleana* Lauche 163
*bonati* Lévl. 163
canadensis Moench 163
cathayana Rehd. 163
davidiana Dode 163
*diversifolia* Schrenk. 163
duclouxiana Dode var. bonati (Lévl.) C. Wang et Tang 163
euphratica Oliv. 163
*italica* Moench 164

koreana Rehd. 163
lasiocarpa Oliv. 163
nigra L. var. italica (Moench) Koehne 164
pseudo-simonii Kitag. 163
tomentosa Carr. 164
yunnanensis Dode 164
Porana Burm. f. 1030
*delavayi* Gagnep. et Courch. 1031
mairei Gagnep. et Courch. 1030
*megalantha* Merr. 1031
racemosa Roxb. 1031
sinensis Hemsl. 1031
var. delavayi (Gagnep. et Courch.) Rehd. 1031
spectabilis Kurz var. megalantha (Merr.) How 1031
Porcellio Latreille 1600
elongata Shen 1600
scaber Latreille 1600
Porcellionidae 1600
Poria Pers. ex Gray 33
cocos (Schwein.) Wolff 34
corticola (Fr.) Cooke 34
subacida (Peck.) Sacc 34
Porites Guettard 1568
nigrescens Dana 1568
Poritidae 1568
Porphyra C. Ag. 12
crispata Kjellm. 12
dentata Kjellm. 13
*dichotoma* Lour 1042
haitanensis T. J. Chang et B. F. Zheng 13
marginata Tseng et T. J. Chang 14
suborbiculata Kjellm. 13
tenera T. J. Chaug 13
yezoensis Ueda 13
*Porphyroscias decursiva Miq.* 848
Portulaca L. 236
grandiflora Hook. 236
oleracea L. 236
*paniculata* Jacq. 237
pilosa L. 236
quadrifida L. 237
Portulacaceae 236
Portunidae 1605
Portunus Weber 1605
pelagicus (Linnaeus) 1605
sanguinolentus (Herbst) 1605
trituberculatus (Miers) 1605
Porzana Vieillot 1727
paykullii (Ljungh) 1727
Potamididae 1574
Potamogeton L. 1361
*amblyophyllus* C. A. Mey. 1362
crispus L. 1361
cristatus Regel et Maack 1362
distinctus Benn. 1362
maackianus Benn. 1362
malaianus Miq. 1362
*morongii* A. Benn. 1362
natans L. 1362
pectinatus L. 1362
perfoliatus L. 1362
polygonifolius Pourr. 1363
Potamogetonaceae 1361
Potamon Savigny 1605
denticulatum (H. Milne-Edwards) 1605
spinescens (Calman) 1606
yunnanense Kemp 1606
Potamonidae 1605
Potentilla L. 515
acaulis L. 515
ancistrifolia Bunge 515
var. dickinsii (Franch. et Sav.) Koidz. 516
anserina L. 515
*asiatica* (Wolff) Juzep. 516
betonicifolia Poir. 515
bifurca L. 515
var. major Ledeb. 515
chinensis Ser. 515
chrysantha Trev. 516
conferta Bunge 516
cryptotaeniae Maxim. 516
discolor Bunge 516
flagellaris Willd. ex Schlecht. 516
fragarioides L. 516
freyniana Borum. 516
var. sinica Migo 517
fruticosa L. 517
fulgens Wall. ex Hook. 517
glabra Lodd. 517
granulosa Yü et Li 517
griffithii Hook. f. var. velutina Card. 517
kleiniana Wight et Arn. 517
leuconota D. Don 517
var. brachyphyllaria Card. 518
*leucophylla* Pall. 515
longifolia Willd. ex Schlecht. 518
*moupinensis* Franch. 509
multicaulis Bunge 518
multifida L. 518
nervosa Juzep. 518
nivea L. 518
*paradoxa* Nutt. ex Torr. et Gray 519
parvifolia Fisch. 518
peduncularis D. Don 518
var. elongata Yü et Li 518
reptans L. 519
var. sericophylla Franch. 519
saundersiana Royle 519
supina L. 519
tanacetifolia Willd. ex Schlecht. 519
turfosa Hand.-Mazz. 519
verticillaris Steph. ex Willd. 516
*viscosa* Dunn ex Lehm. 518

yokusaiana Makino 519
*Poterium filiforme* Hook. f. 537
Pothos L. 1478
cathcartii Schott 1478
chinensis (Raf.) Merr. 1478
var. lotienensis C. Y. Wu et H. Li 1478
*decursiva* Roxb. 1479
kerrii Bucher ex Gagnep. 1478
*peepla* Roxb. 1480
pilulifer Bucher ex Gagnep. 1478
*pinnata* L. 1475
repens (Lour.) Druce 1479
scandens L. 1479
Potosia Mulsant 1624
(Liocola) brevitarsis (Lewis) 1625
Pottiaceae 61
Pottsia Hook. et Arn. 968
*cantonensis* Hook. et Arn. 968
grandiflora Markgr. 968
laxiflora (Bl.) O. Kuntze 968
*Pourtniaea parvifolia* Pritz 514
*Pouteria aurata* (Pierre ex Dubard) Baehni 925
Pouzolzia Gaud. 205
elegans Wedd. 205
*ovalis* Miq. 205
sanguinea (Bl.) Merr. 205
*viminea* (Wall.) Wedd. 205
zeylanica (L.) Benn. 205
var. microphylla (Wedd.) W. T. Wang 205
Praescutata Wall 1710
viperina (Schmidt) 1710
Pratia Gaud. 1236
*begoniifolia* (Wall.) Lindl. 1237
montana (Reinw. ex Bl.) Hassk. 1236
nummularia (Lam.) A. Br. et Aschers. 1237
wollastonii S. Moore 1237
Premna L. 1051
acutata W. W. Smith 1051
*bodinieri* Lévl. 1052
confinis Péi et S. L. Chen ex C. Y. Wu 1051
crassa Hand.-Mazz. 1051
fulva Craib 1051
*herbacea* Roxb. 1052
ligustroides Hemsl. 1051
*longipila* Péi 1051
microphylla Turcz. 1051
var. *glabra* Nakai 1051
péii Chun ex H. T. Chang 1044
puberula Pamp. 1051
var. bodinieri (Lévl.) C. Y. Wu et S. Y. Bao 1052
*subcordata* Nakai 1051
sunyiensis Pei 1052
szemaoensis Pei 1052
urticifolia Rehd. 1052
Prenanthus L. 1324
*acaulis Roxb.* 1311
*chinensis* Thunb. 1307
*denticulata* Houtt. 1307
henryi Dunn 1324
*japonica* L. 1357
*laciniata* Houtt. 1325
*laevigata* Bl. 1308
*sonchifolia* Bunge 1307
Presbytis Escholtz 1749
francoisi Pousargues 1749
Priacanthidae 1676
Priacanthus Oken 1676
macracanthus Cuvier et Valenciennes 1676
*Pridania poilanei* Gagnep. 379
Primula L. 918
algida Adams 918
atrodentata W. W. Smith 918
bathangensis Petitm. 918
borejo-calljantha Balf. f. et Forr. 918
cavaleriei Petitm. 918
cernua Franch. 919
*cheniana* Fang 919
chungensis Balf. f. et Ward 919
cicutariifolia Pax 919
denticulata W. W. Smith subsp. sinodenticulata (Balf. f. et Forr.) W. W. Smith 919
dryadifolia Franch. 919
efarinosa Pax 819
epilosa Craib 919
faberi Oliv. 919
farinosa L. 920
fasciculata Balf. f. et Ward 920
flava Maxim. 920
forbesii Franch. 920
forrestii Balf. f. 920
gemmifera Batal. 920
var. amoena Chen 920
giraldiana Pax 920
involucrata Wall. subsp. yargongensis (Petitm.) W. W. Smith 920
kweichouensis W. W. Smith 921
malacoides Franch. 921
maximowiczii Regel 921
moupinensis Franch. 919
*muliensis* Hand.-Mazz. 918
nivalis Pall. var. farinosa Schrenk 921
var. *turkestanica* Haage et Schmidf 921
nutans Geogi 921
obconica Hance 921
subsp. *sino-listeri* (Balf. f.) W. W. Smith 922
odontocalyx (Franch.) Pax 921
ovalifolia Franch. 921
palmata Hand.-Mazz. 919
*petiolaris* Wall. var. *odontocalyx* Franch. 921

pinnatifida Franch. 922
pseudodenticulata Pax 922
pulchella Franch. 922
*pulchelloides* Word 922
*ranunculoides* Chen 919
var. *minor* Chen 919
secundiflora Franch. 992
*sibirica* Jacq. 921
sieboldii E. Morr. 922
sikkinensis Hook. 922
sinensis Sabine ex Lindl. 922
*sinodenticulata* Balf. f. et Forr. 919
sino-listerii Balf. f. 922
var. aspera W. W. Smith et Fletch. 922
sonchifolia Franch. 922
*szechuanica* Pax 722
tangutica Duthie 923
viali Delav. ex Franch. 923
*yargongensis* Petitm. 920
yunnanensis Franch. 923
Primulaceae 909
*Prinos asprella* Hook. et Arn. 687
*godajam* Colebr. ex Wall. 689
Prinsepia Royle 519
sinensis (Oliv.) Kom. 519
uniflora Batal. 520
var. serrata Rehd. 520
utilis Royle 520
*Priotropis cytisoides* (Roxb. ex DC.) Wight et Arn. 565
Prismatomeris Thw. 1013
henryi (Lévl.) Rehd. 1013
*labordei* (Lévl) Merr. 994
tetrandra (Roxb.) K. Schum. 1013
Pristidae 1648
Pristiophoridae 1647
Pristiophorus Müller et Henle 1647
japonicus Günther 1647
Pristis Linck 1648
cuspidatus Latham 1648
Proagopertha lucidula (Faldermann) 1624
Procapra Hodgson 1777
gutturosa Pallas 1777
picticaudata Hodgson 1777
przewalskii Buchner 1777
Proceras Bojer 1628
venosatum (Walker) 1628
Procris Comm. ex Juss. 205
*laevigata* Bl.
*monandra* D. Don 196
*parvum* Bl. 197
*pedunculoris* Royle 199
*radians* Sieb. et Zucc. 201
wightiana Wall. ex Wedd. 205
Profelis Severtzov 1766
temmincki Vigors et Horsfield 1766
Prognichthys Breder 1672
agoo (Temminck et Schlegel) 1672
*Pronephrium* Presl. 106
lakhimpurense (Ros.) Holtt. 106
nudatum (Roxb.) Holtt. 106
penangianum (Hook.) Holtt. 106
simplex (Hook.) Holtt. 106
triphyllum (Sw.) Holtt 106
Proteaceae 207
Protochordata 1641
Protosalanx hyalocranius (Abbott) 1654
Prototbaca Dall 1587
jedoensis (Lischke) 1587
Protozoa 1565
Prunella L. 1099
asiatica Nakai 1099
hispida Benth. 1100
*lanceolata* Barton 1100
vulgaris L. 1100
var. lanceolata (Barton) Fernald 1100
Prunus L. 520
amygdalus Batsch 497
*armeniaca* L. 498
var. *ansu* Maxim. 498
var. *holosericea* Batal. 498
var. *mandshurica* Maxim. 498
*aviumL.* 499
*brachypoda* Batal. 513
*cerasifera* Ehrh. 520
*cerasoides* D. Don 499
*communis* Fritsch. 497
*davidiana* (Carr.) Franch. 497
*dictyoneura* Diels 499
domestica L. 520
*ferganensis* Kost. et Reib 497
*glandulosa* Thunb. 500
*humilis* Bunge 500
*japonica* Thunb. 500
*kolomikta* Rupr. et Maxim. 407
*mandshurica* (Maxim.) Koehne 498
*maximowiczii* Rupr. 500
*mira* Koehne 497
mongolica Maxim. 497
*mume* (Sieb.) Sieb. et Zucc. 499
nakaii Lévl. 500
*padus* L. 513
*paniculata* Thunb. 932
*pedunculata* (Pall.) Maxim. 497
*persica* (L.) Batsch 497
var. *compressa* (Loud.) Bean 498
*pseudocerasus* Lindl. 500
*racemosa* Lam. 513
salicina Lindl. 520
*serrulata* Lindl. 500
*sibirica* L. 499
simonii Carr. 520
spinosa L. 520
*spinulosa* Sieb. et Zucc. 510
*szechuanica* Batal. 501
tianshanica (Pojark.) Yü et Li 501

*tomentosa* Thunb. 501
*trilobe* Lindl. 498
Przewalskia Maxim. 1124
tangutica Maxim. 1124
Psammobiidae 1588
Psammosilene W. C. Wu et C. Y. Wu 244
tunicoides W. C. Wu et C. Y. Wu 244
Psenopsis anomala (Temminck et Schlegel) 1683
Psephurus Günther 1651
gladius (Martens) 1651
Pseuderanthemum Radlk. 1172
baikangense C. Y. Wu et H. S. Lo 1172
polyanthum (C. B. Clarke) Merr. 1172
Pseudobagrus Bleeker 1669
brevicaudatus (Wu) 1669
pratti (Günther) 1669
truncatus (Regan) 1669
ussuriensis (Dybowski) 1669
Pseudochirita W. T. Wang 1192
guangxiensis (S. Z. Huang) W. T. Wang 1192
Pseudocyclosorus Ching 106
falcilobus (Hook.) Ching 106
Pseudodrynaria C. Chr. 139
coronans (Wall.) Ching 139
Pseudogobio Bleeker 1663
vaillanti (Sauvage) 1663
Pseudois Hodgson 1777
nayaus (Hodgson) 1777
Pseudolarix Gord. 148
amabilis (Nelson) Rehd. 148
*kaempferi* (Lindl.) Gord. 148
Pseudopodoces Zarudny et Loudon 1739
humilis (Hume) 1739
Pseudorasbora Bleeker 1663
parva (Temminck et Schlegel) 1663
Pseudorhombus Bleeker 1689
arsius (Hamilton) 1689
cinnamomeus (Temminck et Schlegel) 1689
malayanus Bleeker 1689
oligodon (Bleeker) 1689
Pseudosciaena Bleeker 1678
crocea (Richardson) 1678
polyactis Bleeker 1679
Pseudosedum (Boiss.) Berger 465
affine (Schrenk) Berger 465
Pseudostellaria Pax 244
davidii (Franch.) Pax 245
heterophylla (Miq.) Pax 245
maximowicziana (Franch. et Sav.) Pax 245
sylvatica (Maxim.) Pax ex Pax et Hoffm. 245
Pseudostreblus Bur. 192
indica Bur. 192
Pseudotriacanthus strigilifer (Cantor) 1691
*Pseudotsuga davidiana* Bertr. 143
Pseudoxenodon macrops (Blyth) 1708
Psidium L. 804
guajava L. 804
Psilopeganum Hemsl. 651
sinensis Hemsl. 651
Psilotaceae 78
Psilotum Sw. 78
nudum (L.) Griseb. 78
Psittacidae 1730
Psittacula Cuvier 1730
alexandri (Linnaeus) 1730
cyanocephala (Linnaeus) 1730
himalayana (Lesson) 1730
Psoralea L. 596
corylifolia L. 596
Psychidae 1627
Psychotria L. 1013
calocarpa Kurz 1013
*curviflora* Wall. 992
henryi Lévl. 1013
rubra (Lour.) Poir. 1013
serpens L. 1013
siamica (Craib) Hutch. 1014
straminea Hutch. 1014
tutcheri Dunn 1014
yunnanensis Hutch. 1014
*Psydrax dicocca* Gaertn. 991
*Ptarmica acuminata* Ledeb. 1238
*Ptelea viscosa* L. 677
*Pteracanthus forrestii* (Diels) C. Y. Wu 1174
Pteria penguin (Roding) 1582
Pteridaceae 90
Pteridium Scop. 90
aquilinum (L.) Kuhn var. latiusculum (Desv.) Underw. ex Heller 90
excelsum (Bl.) Ching 90
revolutum (Bl.) Nakai 90
Pteridrys C. Chr. et Ching 121
australis Ching 121
Pteridiaceae 90
Pteridophyta 68
Pteriidae 1582
Pteris L. 90
actiniopteroides Christ 91
*argentea* Gmél. 93
biaurita L. 91
cadieri Christ 91
*concolor* Langsd. et Fisch. 95
cretica L. 91
var. laeta (Wall.) C. Chr. et Tard-Blot 91
var. *nervosa* (Thunb.) Ching et S. H. Wu 93
dactylina Hook. 91
deltodon Baker 91
dispar O. Kuntze 91
dissitifolia Baker 92
ensiformis Burm. 92
excelsa Gaud. 92
fauriei Hieron. 92
henryi Christ 92
insignis Mett. ex Kuhn 92

*lacta* Wall. 91
*latiuscula* Desv. 90
longifolia L. 92
multifida Poir. 92
nervosa Thunb. 93
*piloselloides* L. 127
plumbea Christ 93
*revolutum* Bl. 90
semipinnata L. 93
vittata L. 93
wallichiana Agardh. 93
Pternopetalum Franch. 875
botrychioides (Dunn) Hand.-Mazz. 875
*brevium* (Shan et Pu) K. T. Fu 875
kiangsiense (Wolff) Hand.-Mazz. 876
leptophyllum (Dunn) Hand. -Mazz. 875
longicaule Shen var. humile Shan et Pu 875
nudicaule (H. Boiss.) Hand.-Mazz. 875
trichomanifolium (Franch.) Hand.-Mazz. 876
vulgare (Dunn) Hand. -Mazz. 876
var. acuminatum C. Y. Wu 876
var. strigosum Shan et Pu 876
Pterocarpus Jacq. 596
indicus Willd. 596
Pterocarya Kunth 161
hupehensis Skan 161
insignis Rehd. et Wils. 161
*paliurus* Batal. 159
stenoptera C. DC. 162
var. *tonkinensis* Franch. 162
tonkinensis (Franch.) Dode 162
Pteroceltis Maxim. 179
tatarinowii Maxim. 179
Pterocephalus Adans. 1220
bretschneideri (Batal.) Pritz. 1220
hookeri (C. B. Clarke) Hoeck 1221
Pterocladia J. Ag. 14
tenuis Okam. 14
Pteroclididae 1729
Pterocypsela Shih 1324
elata (Hemsl.) Shih 1325
formosana (Maxim.) Shih 1325
indica (L.) Shih 1325
laciniata (Houtt.) Shih 1325
raddeana (Maxim.) Shih 1325
triangulata (Maxim.) Shih 1325
Pterolobium R. Br. ex Wright et Arn. 596
punctatum Hemsl. 596
Pteromys volans Linnaeus 1754
Pteropidae 1747
Pterula Fr. 26
umbrinella Bres. 26
*Ptilopteris hancockii* Hance 119
Pterospermum Schreber 750
acerifolium (L.) Willd. 750
heterophyllum Hance 750
kingtungense C. Y. Wu ex Hsue 750
lanceaefolium Roxb. 750
truncatalobatum Gagnep. 750
Pterostyrax Sieb. et Zucc. 928
*leveillei* (Fedde ex Lévl.) Chun 928
psilophyllus Diels ex Perkins 928
Pterygiella Oliv. 1149
cylindrica Tsoong 1149
duclouxii Franch. 1149
Pterygocalyx Maxim. 954
volubilis Maxim. 954
Ptyas Fitzinger 1709
korros (Schlegel) 1709
mucosus (Linnaeus) 1708
*Puccinellia kengiana* Ohwi 1457
Pueraria DC. 597
lobata (Willd.) Ohwi 597
montana (Lour.) Merr. 597
peduncularis Grah. ex Benth. 597
phaseoloides (Roxb.) Benth. 597
thomsonii Benth. 597
*yunnanensis* Franch. 597
Pugionium Gaertn. 455
cornutum (L.) Gaertn. 455
dolabratum Maxim. 455
Pulicaria Gaertn. 1325
chrysantha (Diels) Ling 1325
insignis Drumm. ex Dunn 1326
prostrata (Gilib.) Aschers. 1326
*vulgaris* Gaertn. 1326
Pulsatilla Mill. 343
ambigua Turcz. ex E. Pritz. 343
campanella Fisch. ex Regel et Tiling 343
cernua (Thunb.) Bercht. et Opiz. 343
chinensis (Bunge) Regel 343
dahurica (Fisch.) Spreng. 343
*koreana* Nakai ex Mor. 343
patens (L.) Mill. 343
var. multifida (E. Pritz.) S. H. Li et Y. H. Huang 343
sukaczevii Juz. 344
turczaninovii Krylov et Ser. 344
Pulveroboletus Murr. 44
ravenelii (Berk. et Curt.) Murr. 44
Pumex 1786
Punica L. 806
granatum L. 806
var. pleuiflora Hayne. 806
cv. albescens DC. 806
cv. multiplex Sweet 807
Punicaceae 806
Purpura Deshayes 1575
clavigera Küster 1575
grakata Jonas 1575
luteostoma (Holten) 1575
Pycnarrhena Miers ex Hook. f. et Thoms. 379
poilanei (Gagnep.) Forman 379
Pycnospora R. Br. 597
lutescens (Poir.) Schindl. 597

*Pycnostelma paniculatum* K. Schum. 978
Pycreus Beauv. 1496
globosus (All.) Reichb. 1496
sanguinolentus (Vahl.) Nees 1496
*Pygeum phaeosticta* Hance 510
Pygmaeopremna Merr. 1052
herbacea (Roxb.) Moldenke 1052
Pyracantha Roem. 521
atalantioides (Hance) Stapf 521
fortuneana (Maxim.) Li 521
Pyraustidae 1628
Pyretherum Zinn. 1326
cinerariifolium Trev. 1326
coccineum (Willd.) Worosch. 1326
*discoideum* Ledeb. 1272
*lavandulifolium* Fisch. ex Trautv. 1286
parthenium (L.) Smith 1326
*seticuspe* Maxim. 1286
tatsiensnse (Bur. et Franch.) Ling ex Shih 1326
Pyritum 1781
Pyrola L. 882
atropurpurea Franch. 882
calliantha H. Andr. 882
corbier Lévl. 883
decorata Andr. 883
var. alba (Andr.) Y. L. Chou 883
elegantala Andr. 882
forrestiana Andr. 883
*kandeliana* Andr. 883
incarnata Fisch. 882
japonica Klenze ex Alef. 883
media Sw. 883
minor L. 882
oreodoxa Andr. 883
renifolia Maxim. 882
*rotundifolia* L. subsp. *chinensis* Andr. 882
rugosa Andr. 882
sororia Andr. 882
szechuanica Andr. 882
Pyrolaceae 881
Pyrolusitum 1792
Pyropolyorus Murr. 34
adamantinus (Berk.) Teng 34
fomentarius (L. ex Fr.) Teng 34
megregori (Bres.) Teng 34
rimosus (Berk.) Teng 34
Pyrostegia C. Presl 1163
venusta (Ker) Miers 1163
*venusta* Baill. 1163
Pyrrhocorax Tunstall 1739
pyrrhocorax (Linnaeus) 1739
Pyrrosia Mirbel 135
adnascens (Sw.) Ching 136
assimilis (Baker) Ching 136
f. lobata (Wu) Ching 136
bonii (Christ) Ching 136
clavata (Baker) Ching 136
davidii (Baker) Ching 136
drakeana (Franch.) Ching 136
gralla (Gies.) Ching 136
inaequalis (Christ) Ching 136
lingua (Thunb.) Farw. 137
martinii (Christ) Ching 137
mollis (O. Kuntze) Ching 137
pekinensis (C. Chr.) Ching petiolosa (Christ) Ching 137
sheareri (Baker) Ching 137
similis Ching 137
tonkinensis (Gies.) Ching 137
Pyrularis Michx. 210
edulis (Wall.) A. DC. 210
Pyrus L. 521
*baccata* L. 511
betulaefolia Bunge 521
bretschneideri Rehd. 521
calleryana Decne. 521
var. lanceolata Rehd. 521
communis L. var. sativa (DC.) DC. 521
*discolor* Maxim. 539
hopeiensis Yü 522
*indica* Wall. 507
pashia Buch.-Ham. ex D. Don 522
var. grandiflora Card. 522
var. kumaoni Stapf 522
var. obtusata Card. 522
phaeocarpa Rehd. 522
*pohuashanensis* Hance 539
*prunifolia* Willd. 512
pyrifolia (Burm. f.) Nakai 522
*sativa* DC. 521
*scabrifolia* Franch. 506
serrulata Rehd. 522
sinkiangensis Yü 522
*spectablis* Ait. 512
ussuriensis Maxim. 522
*yunnanensis* Franch. 512
Python Daudin 1706
molurus (Linnaeus) 1706

## Q

*Quadriala lanceolata* Sieb. et Zucc. 209
Quamoclit Mill. 1031
pennata (Desr.) Bojer 1031
Quartz 1789
Quercifilix Cop. 121
zeylanica (Houtt.) Cop. 122
Quercus L. 175
acutissima Carr. 175
aliena Bl. 175
baronii Skan 176
chenii Nakai 176
*chinensis* Bunge 178
ciliaris Huang et Y. T. Chang 176
*dealbatus* Hook. f. et Thoms. 174
*delavayi* Franch. 174

dentata Thunb. 176
elizabethae Tutch. 174
*eyrei* Champ. 172
fabri Hance 176
franchetii Skan 176
gilliana Rehd. et Wils. 176
*glaber* Thunb. 175
glandulifera Bl. 176
var. brevipetiolata Nakai 177
griffithii Hook. f. et Thoms. 177
*henryi* Seem.
*indica* Drake 173
*kerrii* Craib 174
liaotungensis Koidz. 177
mongolica Fisch. ex Turcz. 177
*myrsinaefolis* Bl. 174
*polystachyus* Wall. 175
robur L. 177
*schottkyana* Rehd. et Wils. 174
*sclerophylla* Lindl. 173
semicarpifolia Smith 177
spinosa David. 177
stewardii Rehd. 177
variabilis Bl. 178
*Quinaria lansium* Lour. 646
Quisqualis L. 817
indica L. 817
var. villosa C. B. Clarke 817

## R

*Rabdosia adenantha* (Diels) Hara 1075
*amethystoides* (Benth.) Hara 1075
*angustifolia* (Dunn) Hara 1076
*bulleyana* (Diels) Hara 1076
*coetsa* (Buch.-Ham. ex D. Don) Hara 1076
*coetsoides* C. Y. Wu 1076
*enanderiana* (Hand.-Mazz.) Hara 1076
*eriocalyx* (Dunn) Hara 1076
*excisa* (Maxim.) Hara 1077
*henryi* (Hemsl.) Hara 1077
*hispida* (Benth.) Hara 1077
*inflexa* (Thunb.) Hara 1077
*irrorata* (Forrest ex Diels) Hara 1077
*japonica* (Burm. f.) Hara 1077
var. *glaucocalyx* Maxim. 1078
*longituba* (Miq.) Hara 1078
*lophanthoides* (Buch.-Ham. ex D. Don) Hara 1078
var. *gerardianus* (Benth.) Hara 1078
var. *graciliflora* (Benth.) Hara 1078
*macrophylla* (Migo) C. Y. Wu et H. W. Li 1078
*megathyrsa* (Diels) Hara 1079
*menthoides* (Benth.) C. Y Wu et H. W. Li 1076
*nervosa* (Hemsl.) C. Y. Wu et H. W. Li 1079
*oresbia* (W. W. Smith) Hara
*phyllostachys* (Diels) Hara 1079
*pseudo-irrorata* C. Y. Wu 1079
*racemosa* (Hemsl.) Hara 1079
*rosthornii* (Diels) Hara 1079
*rubescens* (Hemsl.) Hara 1079
*rugosa* (Wall.) Hara 1080
*sculponeata* (Vaniot) Hara 1080
*serra* (Maxim.) Hara 1080
*stracheyi* (Benth. ex Hook. f.) Hara 1080
*ternifolia* (D. Don) Hara 1080
*yunnanensis* (Hand.-Mazz.) Hara 1081
Radermachera Zoll. et Mor. 1163
pentandra Hemsl. 1163
sinica (Hance) Hemsl. 1163
*yunnanensis* C. Y. Wu et W. C. Yin 1164
Raja Linnaeus 1648
hollandi Jordan et Richardson 1648
kenojei Müller et Henle 1648
porosa Günther 1648
*Rajania hexaphylla* Thunb. 374
*quinata Thunb.* 371
Rajidae 1648
Rallidae 1727
Rallus Linnaeus 1727
aquaticus Linnaeus 1727
striatus Linnaeus 1728
Ramalina Ach. 59
farinacea (L.) Ach. 59
minuscula Nyl. 59
roesleri (Hochst.) Nyl. 59
sinensis Jatta 59
Ramaria apiculata (Fr.) Donk 26
botrytis (Pers.) Ricken 26
flava (Schaeff. ex Fr.) Quél. 26
formosa (Pers. ex Fr.) Quél 26
Rana Linnaeus 1697
amurensis Boulenger 1697
boulengeri Guenther 1697
chensinensis David 1697
guentheri Boulenger 1697
limnocharis Boie 1697
nigromaculata Hallowell 1698
phrynoides Boulenger 1697
plancyi Lataste 1698
quadranus Liu, Hu et Yang 1697
rugosa (Schlegel) 1698
schmackeri Bottger 1698
spinosa David 1697
tigrina rugulosa (Wiegmann) 1698
Randia L. 1014
canthioides Champ. 1014
cochinchinensis (Lour.) Merr. 1014
henryi Pritz. 1014
oxyodonta Drake 1015
salicifolia Li 1015
sinensis (Lour.) Schult. 1015
spinosa (Thunb.) Poir. 1015
wallichii Hook. f. 1015

Rangifer tarandus Linnaeus 1772
Ranidae 1697
Ranodon tsinpaensis Liu et Hu 1694
Ranunculaceae 301
Ranunculus L. 344
*affinis* var. *tanguticus* Maxim. 346
altaicus Laxm. 344
amurensis Kom. 344
arvensis L. 344
brotherusii Freyn 344
cantoniensis DC. 344
chinensis Bunge 344
ficariifolius Lévl. et Vant. 344
glareosus Hand.-Mazz. 345
japonicus Thunb. 345
var. smirnovii (Ovcz.) L. Liou 345
*longicaulis* C. A. Mey. var. *nephelogenes* (Edgew.) L. Liou 345
membranaceus Royle 345
muricatus L. 345
nephelogenes Edgew. 345
polii Franch. 345
repens L. 345
*ruthenicus* Jacq. 340
*sarmentosus* Adans. 340
sceleratus L. 346
sieboldii Miq. 346
tanguticus (Maxim.) Ovcz. 346
ternatus Thunb. 346
*tricuspis* Maxim. 340
Rapana Schumacher 1575
bezoar (Linnaeus) 1576
thomasiana Crosse 1576
venosa (Valenciennes) 1575
Rapanea Aubl. 909
*aurea* Lévl. 415
kwangsiensis Walker 909
neriifolia (Sieb. et Zucc.) Mez 909
var. *yunnanensis* Walker 909
Raphanus L. 455
sativus L. 456
var. longipinnatus Bailey 456
var. raphanistroides Makino 456
*Raphiocarpus sinicus* Chun 1184
*Raphiolepis* Lindl. 523
*indica* (L.) Lindl. 523
*lanceolata* Hu 523
Raphistemma Wall. 986
pulchellum (Roxb.) Wall. 986
Rattus Fischer von waldheim 1756
flavipectus (Milne-Edwards) 1756
norvegicus Barkenhout 1757
rattus Linnaeus 1757
Rauvolfia L. 968
cubana A. DC. 968
latifrons Tsiang 968
perakensis King et Gamble 968
serpentina (L.) Benth. ex Kurz 969
tetraphylla L. 969
tiaolushanensis Tsiang 969
verticillata (Lour.) Baill. 969
var. hainanensis Tsiang 969
var. oblanceolata Tsiang 969
var. officinalis Tsiang 969
f. rubrocarpa H. T. Chamg 969
vomitoria Afzel. ex Spreng. 970
yunnanensis Tsiang 969
*Razumovia longiflora* Merr. 1133
Realgar 1788
Reaumuria L. 775
kaschgarica Rupr. 775
soogorica (Pall.) Maxim. 775
trigyna Maxim. 776
Reboulia Raddi 68
hemisphaerica (L.) Raddi 68
Reevesia Lindl. 750
pubescens Mast. 750
Rehdea Roth 1394
japonica (Thunb.) Roth 1394
Rehderodendron Hu 928
macrocarpum Hu 929
*mapienense* Hu 929
Rehmannia Libosch. ex Fisch. et Mey. 1150
chingii Li 1150
glutinosa (Gaertn.) Libosch. et Hsiao 1150
f. *huechingense* (Chao et Shih) Fisch. et Mey. 1150
*oldhamii* Hemsl. 1193
piasezkii Maxim. 1150
*rupestris* Hemsl.
*Reichardia decapetala* Roth 554
Reineckia Kunth 1394
carnea (Andr.) Kunth 1394
ovata Z. Y. Zhu et Z. R. Chen 1394
Reinwardtia Dumort. 617
indica Dumort. 617
*sinensis* Hemsl. 618
Remiz Jarocki 1743
pendulinus (Linaeus) 1743
Remizidae 1743
Remora Forster 1686
albescens (Temminck et Schlegel) 1686
remora (Linnaeus) 1686
Renanthera Lour. 1558
coccinea Lour. 1558
Reptilia 1699
Reticulariaceae 19
*Reynoutria multiflora* (Thunb.) Moldenke 227
Rhacophoridae 1698
Rhacophorus Kuhl et Van Hasselt 1698
chenfui Liu 1698
dennysi Blanford 1698
leucomystax (Gravenhorst) 1698
Rhagadotarsus kraeplini (Breddin) 1619
Rhamnaceae 709
Rhamnella Miq. 713

fraguloides (Maxim.) Weberb. 713
gilgitica Mansf. et Melch. 713
martinii (Lévl.) Schneid. 713
Rhamnus L. 713
aurea Heppl. 713
bodinieri Lévl. 714
brachypoda C. Y. Wu ex Y. L. Chen 714
carthartica L. 714
crenata Sieb. et Zucc. 714
davurica Pall. 714
var. nipponica Makino 714
dumetorum Schneid. 714
erythroxylon Pall. 714
esquirolii Lévl. 715
var. glabrata Y. L. Chen et P. K. Chou 715
fragula L. 715
fulvo-tincta Metcalf 715
gilgiana Heppl. 715
globosa Bunge 715
hainanensis Merr. et Chun 715
heterophylla Oliv. 715
hupehensis Schneid. 716
koraiensis Schneid. 714
leptophylla Schneid. 716
*fineata* L. 710
longipes Merr. et Chun 716
*martinii* Lévl. 713
nepalensis (Wall.) Laws. 716
parvifolia Bunge 716
rosthornii Prizt. 715
rugulosa Hemsl. 716
tangutica J. Vass. 716
*thea* Osbeck 718
utilis Decne. 716
virgata Roxb. 716
*vitis-idaea* Burm. f. 622
yoshinoi Makino 714
*Rhomphocarya integrifoliolata* Kuang 159
Rhapnidophora Hassk. 1479
decursiva (Roxb.) Schott 1479
hongkongensis Schott 1479
hookeri Schott 1479
peepla (Roxb.) Schott 1480
Rhapis L. f. 1464
excelsa (Thunb.) Henry ex Rehd. 1464
robusta Burret 1464
*Rhaponticum* carthamoides (Willd.) Iljin. 1345
*uniflorum* (L.) DC. 1345
Rheum L. 231
altaicum A. Los. 231
compactum L. 231
delavayi Franch. 231
emodi Wall. 231
forrestii Diels 231
franzenbachii Münt. 231
nanum Siewers 231
nobile Hook. f. et Thoms. 231
officinale Baill. 231
palmatum L. 232
pumilum Maxim. 232
tanguticum Maxim. et Balf. 232
var. liupanshanense C. Y. Cheng et T. C. Kao 232
tibeticum Maxim. 232
wittrockii Lundstr. 232
Rhinacanthus Nees 1172
*communis* Nees 1172
nasutus (L.) Kurz 1172
Rhincodon Smith 1644
typus Smith 1644
Rhincodontidae 1644
Rhinobatidae 1648
Rhinobatos Linck 1648
schlegelii Müller et Henle 1648
Rhinocerotidae 1769
Rhinoceros Herrmannsen 1769
unicornis Linnaeus 1769
Rhinolophidae 1748
Rhinolophus Lacepede 1748
affinis Horsfield 1784
cornutsu Temminck 1748
ferrumequinum (Schreber) 1748
lepidus Blythi 1748
pearsoni Horsfield 1748
rouxi Temminck 1748
Rhinopithecus Milne-Edward 1750
roxellanae (Milne-Edwards) 1750
Rhinotermitidae 1612
Rhizomyidae 1755
Rhizomys Gray 1755
pruinosus Blyth 1756
sinensis Gray 1755
sumatrensis (Rattles) 1756
Rhizophoraceae 815
Rhizophora L. 816
*caseolaris* L. 806
*gymnorrhiza* (L.) Savigny 815
mucronata Poir. 816
*zagal* Rerr. 816
Rhizopogon Fr. 48
piceus Berk. et Curt. 48
Rhizostomatidae 1567
Rhodeus Agassiz 1664
lighti (Wu) 1664
ocellatus (Kner) 1664
sinensis Günther 1664
Rhodiola L. 465
algida (Ledeb.) Fisch. et Mey. var. jenisseense (Maxim.) S. H. Fu 465
var. tangutica (Maxim.) S. H. Fu 465
alsia (Frōd.) S. H. Fu 466
*coccinea* (Royle) A. Bor. 467
*crenulata* (Hook. f. et Thoms.) H. Ohba 466
dumulosa (Franch.) S. H. Fu 466

euryphylla (Fröd.) S. H. Fu 466
fastigiata (Hook. f. et Thoms.) S. H. Fu 466
gelida Schrenk 466
henryi (Diels) S. H. Fu 466
heterodonta (Hook. f. et Thoms.) A. Bor. 466
kirilowii (Regel) Maxim. 467
*longicaulis* (Praeg.) S. H. Fu 467
quadrifida (Pall.) Fisch. et Mey. 467
sachalinensis A. Bor. 467
sacra (Prain ex Hamet) S. H. Fu 467
scabrida (Franch.) S. H. Fu 467
wallichiana (Hook.) S. H. Fu 467
var. cholaensis (Praeg.) S. H. Fu 467
yunnanensis (Franch.) S. H. Fu 468
var. oblanceolata (Fröd.) S. H. Fu 468
Rhodobryum (Schimp.) Hamp. 62
giganteum (Scheaegr.) Par. 62
roseum (Hedw.) Limpr. 63
Rhododendron L. 888
amsiae Rehd.et Wils. 888
anhweiense Wils. 889
annae Franch. 889
anthosphaerum Diels 889
arboreum Smith 889
subsp. *delavayi* (Franch.) Chamber. 891
augustinii Hemsl. 889
subsp. chasmanthum (Diels) Cullen 889
auriculatum Hemsl. 889
bachii Lévl. 889
brachyanthum Franch. 889
brevinerve Ckun et Fang 890
calophytum Franch. 890
campylocarpum Hook. f. 890
capitatum Maxim. 890
cavaleriei Lévl. 890
cephalanthum Franch. 890
championae Hook. 890
*chasmanthum* Diels 889
chrysanthum Pall. 890
ciliatum Hook. f. 890
*ciliicalyx* Franch. subsp. *lyi* (Lévl.) R. C. Fang 891
concinuum Hemsl. 891
dahuricum L. 891
davidii Franch. 891
decorum Franch. 891
delavayi Franch. 891
var. peramoenum (Balf. f. et Forrest) T. L. Ming 891
dendrocharis Franch. 891
*desquamatum* Balf. f. et Forrest 895
*discolor* Franch. 892
emarginatum Hemsl. et Wils. 891
fargesii Franch. 892
farrerae Tate 892
fortunei Lindl. 892
subsp. discolor (Franch.) Chamberlain 892
hypoglaucum Hemsl. 892
intricatum Franch. 892
latoucheae Franch. 892
leei Fang 892
liliforum Lévl. 892
lingii Chun 893
*lyi* Lévl. 891
mariae Hance 893
mariesii Hemsl. et Wils. 893
micranthum Turcz. 893
microphyton Franch. 893
var. trichanthum A. L. Chang ex R. C. Fang 893
molle G. Don 893
mucronatum (Bl.) G. Don 894
mucronulatum Turcz. 894
neriiflorum Franch. 894
nivale Hook. f. subsp. boreale M. N. Philipson et W. R. Philipson 894
orbiculare Decne. 894
oreodoxa Franch. 894
ovatum Planee. 894
parvifolium Adams 894
przewalskii Maxim. 894
*puniceum* Roxb. 889
purdomii Rehd. et Wils. 895
*rigidum* Franch. 896
rubiginosum Franch. 895
sanguinea (Bull.) Franch. seniavinii Maxim. 895
simsii Planch. 895
spinuliferum Franch. 895
var. glabrescens K. M. Feng et R. C. Fang 895
stamineum Franch. 895
sutchuenense Franch. 895
thymifolium Maxim. 895
websteranum Rehd. et Wils. 895
williamsianum Rehd. et Wils. 896
*windsorii* Nutt. 889
yunnanense Franch. 896
Rhodoleia Champ. ex Hook. f. 461
championii Hook. f. 461
parvipetala Tong 462
Rhodomelaceae 18
Rhodomyrtus (DC.) Reichb. 804
tomentosa (Ait.) Hassk. 804
*Rhodora deflexus* Griff. 885
Rhodotypos Sieb. et Zucc. 523
scandens (Thunb.) Makino 523
Rhoeo Hance 1430
discolor (L'Hérit) Hance 1431
Rhoiptelea Diels et Hand.-Mazz. 178
chiliantha Diels et Hand.-Mazz. 178

Rhoipteleaceae 178
Rhopilema Haeckel 1567
esculenta Kishinouye 1567
hispidum Vanhoeffan 1567
Rhus (Tourn) L. 669
*acuminata* DC. 671
chinensis Mill. 669
var. roxburghii (DC.) Rehd. 670
*delavayi* Franch. 671
*javanica* L. 656
*paniculata* Wall. 671
potaninii Maxim. 670
punjabensis Stewart var. pilosa Engl. 670
var. sinica (Diels) Rehd. et Wils. 670
*semialata* Murr. var. *roxburghii* DC. 670
*sinica* Diels 670
*succedanea* L. 672
typhina L. 670
*verniciflua* Stokes 672
wilsonii Hemsl. 670
Rhynchanthus Hook. f. 1513
beesianus W. W. Smith 1513
Rhynchoconger ectenurus (Jordan et Richardson) 1656
Rhynchocymba sivicola (Matsubara et Ochial) 1656
Rhynchoglossum Bl. 1192
obliquum Bl. 1192
var. hologlossum (Hayata) W. T. Wang 1192
Rhynchosia Lour. 598
volubilis Lour. 598
Rhynchospermum Reinw. ex Bl. 1327
*jasminoides* Lindl. 971
verticillatum Reinw. 1327
Rhynchospora Vahl. 1496
rubra (Lour.) Makino 1496
Rhynchotechum Bl. 1192
*latifolium* Hook. f. et Thoms. 1192
obovatum (Griff.) Burtt 1192
Ribes L. 485
acuminatum Wall. 485
alpestre Wall. ex Decne. 485
altissimum Turcz. 486
atropurpureum C. A. Mey. 486
burejense F. Schmidt 486
davidii Franch. 486
diacanthum Pall. 486
*emodes* Rehd. 486
fasciculatum Sieb. et Zucc. var. chinense Maxim. 486
glaciale Wall. 486
graveolens Bunge 486
henryi Franch. 486
heterotrichum C. A. Mey. 486
himalense Royle 486
mandshuricum (Maxim.) Kom. 486
maximowiczii Batal. 487
meyeri Maxim. 487
moupinense Franch. 487
*multiflorum* Kitag. *v. mandshuricum* Maxim. 486
pulchellum Turcz. 486
stenocarpum Maxim. 487
tenue Jancz. 487
Ricinus L. 638
*apelta* Lour. 634
communis L. 638
*Ricotia cantoniensis* Lour. 456
Riparia Forster 1736
riparia (Linnaeus) 1736
Rivulariaceae 4
Robinia L. 598
*jubata* Pall. 558
pseudoacacia L. 598
*sinica* Buc'hoz 559
Robiquetia Gaud. 1558
succisa (Lindl.) Tang et Wang 1558
Rodgersia A. Gray 487
aesculifolia Batal. 487
pinnata Franch. 487
sambucifolia Hemsl. 487
Roegneria C. Koch 1455
*calcicola* Keng 1455
kamoji Ohwi 1455
seritian Keng 1455
Roemeria Medik. 444
refracta (Stev. ex DC.) DC. 444
*Roezlera forrestii* Diels 1190
*yunnanensis* Franch. 1185
Rorippa Scop. 456
cantoniensis (Lour.) Ohwi 456
dubia (Pers.) Hara 456
globosa (Turcz.) Hayek 456
indica (L.) Hiern 456
islandica (Oed.) Borb 457
*montana* (Wall.) Small. 456
*nastartium-aquaticum* (L.) Hayek 455
*palustris* (Leyss.) Bess. 457
Rosa L. 523
aciculatis Regel 523
albertii Regel 523
banksiae Ait. 523
f. lutea (Lindl.) Rehd. 523
var. normalis Regel 524
beggeriana Schrenk 524
bella Rehd. et Wils. 524
bracteata Wendl. 524
centifolia L. 524
chinensis Jacq. 524
var. semperflorens (Curtis) Koehne 524
cymosa Tratt. 524
davurica Pall. 524
var. glabra Liou 525
fedtschenkoana Regel 525
*gigantea* Crep. 526

graciliflora Rehd. et Wils. 525
helenae Rehd. et Wils. 525
henryi Boulenger 525
hugonis Hemsl. 525
*indica* L. var. *odorata* Andr. 526
kokanica Regel ex Juzep. 525
laevigata Michx. 526
laxa Retz. 526
longicuspis Bertol. 526
macrophylla Lindl. 526
maritei Lévl. 526
*microcarpa* Lindl. 524
multiflora Thunb. 526
var. carnea Thory. 526
var. cathayensis Rehd. et Wils. 526
odorata (Andr.) Sweet 526
var. gigantea (Crep.) Rehd. et Wils. 526
omeiensis Rolfe 527
f. pteracantha Rehd. et Wils. 527
platyacantha Schrenk 527
roxburghii Tratt. 527
rugosa Thunb. 527
sericea Lindl. 527
f. glandulosa Yü et Ku 527
sertata Rolfe 528
soulieana Crep. 528
spinosissima L. 528
sweginzowii Koehne 528
wichuraiana Crep. 528
xanthina Lindl. 528
f. normalis Rehd. et Wils. 528
Rosaceae 495
Rosaster symbolicus Sladen 1638
Roscoea Smith 1513
*intermedia* Gagnep. 1513
purpurea Smith 1513
tibetica Batal. 1513
yunnanensis Loes. 1513
Rostellularia Reichb. 1172
linearifolia Bremek. subsp. liangkwangensis H. S. Lo 1172
procumbens (L.) Nees 1172
Rotala L. 799
diversifolia Koehne 800
indica (Willd.) Koehne 800
mexicana Cham. et Schlecht. 800
pentandra (Roxb.) Blatt. et Hallb. 800
rotundifolia (Buch.-Ham. ex Roxb.) Koehne 800
Rottboellia L. f. 1455
exaltata L. f. 1455
*Rottlera barbatus* Wall. 634
Rourea Aubl. 544
microphylla (Hook. et Arn.) Planch. 544
*minor* (Gaertn.) Leenh. subsp. *microphlla* (Hook. et Arn.) J. Vidl 544
Rousettus leschenaulti Desmarest 1747
*Roxburghia japonica* Bl. 1402
*sessillifolia* Miq. 1403
Rubia L. 1015
argyi (Lévl. et Vant.) Hara et Lauener 1015
chinensis Regel. et Maack 1015
cordifolia L. 1015
var. coriacea Z. Y. Zhang 1016
var. herbacea Chun et How 1016
var. *longifolia* Hand.-Mazz. 1016
var. *membranacea* Franch. 1016
var. mollis Chun et How 1016
var. stenophylla Franch. 1016
*ikimensis* Kurz. var. *yunnanensis* Franch. 1017
lanceolata Hayata 1016
magna Hsiao 1016
mandersii Coll. et Hemsl. 1016
membranacea (Franch.) Diels 1016
oncotricha Hand.-Mazz. 1016
ovatifolia Z. Y. Zhang 1016
podantha Diels 1016
schumanniana Pritz. 1016
sylvatica Nakai 1016
tibetica Hook. f. 1017
tinctorum L. 1017
wallichiana Decne. 1017
yunnanensis (Franch.) Diels 1017
Rubiaceae 990
Rubus L. 528
adenophorus Rolfe 528
alceaefolius Poir. 529
alexeterius Focke 529
amabilis Focke 529
amphidasys Focke ex Diels 529
arcticus L. 529
biflorus Buch.-Ham. ex Smith 529
buergeri Miq. 529
chingii Hu 530
chroosepalus Focke 530
cochinchinensis Tratt. 530
cockburnianus Hemsl. 530
corchorifolius L. 530
coreanus Miq. 530
var. tomentosus Card. 530
crataegifolius Bunge 530
delavayi Franch. 531
doyonensis Hand.-Mazz. 531
ellipticus Smith 351
f. *obcordatus* Franch. 531
var. obcordatus (Franch.) Focke 531
eucalyptus Focke 531
eustephanus Focke ex Diels 531
feddei Lévl. et Vant. 531
fockeanus Kurz 531
*foliolosus* D. Don 534
hastifolius Lévl. et Vant. 532
hirsutus Thunb. 532

ichangensis Hemsl. et O. Kuntze 532
idaeopsis Focke 532
idaeus L. 532
var. borealisinensis Yü et Lu 532
innominatus S. Moore 532
var. kuntzeanus (Hemsl.) Bailey 533
irenaeus Focke 533
*japonicus* Bl. 510
*kuntzeanus* Hemsl. 533
lambertianus Ser. 533
var. glandulosus Card. 533
leucanthus Hance 533
*loropetalus* Franch. 531
malifslius Focke 533
*mallodes* Focke 533
mesogaeus Focke 533
multibracteatus Lévl. et Vant. 533
niveus Thunb. 534
pacificus Hance 534
parkeri Hance 534
parvifolius L. 534
peltatus Maxim. 534
phoenicolasius Maxim. 534
pinfaensis Lévl. et Vant. 534
pirifolus Smith 535
pungens Camb. 535
reflexus Ker 535
var. hui (Diels) Mect. 535
var. lanceolobus Mect. 535
rosaefolius Smith 535
rufolanatus H. T. Chang 532
sachalinensis Lévl. 535
saxatilis L. 535
setchuenensis Bureau et Franch. 536
subornatus Focke 536
sumatranus Miq. 536
swinhoei Hance 536
tephrodes Hance 536
var. ampliflorus (Lévl. et Vaut.) Hand.-Mazz. 536
trianthus Focke 536
xanthoneurus Focke ex Diels 536
Rudbeckia L. 1327
laciniata L. 1327
Ruditapes philippinarum (Adamas et Reeve) 1587
*Ruellia anagallis* Burm. f. 1137
*antipoda* L. 1138
*chinensis* Nees 1173
*delavayana* Baill. 1171
*salicifolia* Vahl
*secluse* S. Moore 1170
*serrasperma* Champ. ex Benth. 1175
*tomentosa* Wall. 1165
*venusta* Hance 1170
Rumex L. 232
acetosa L. 232
aquaticus L. 232
chalepensis Mill. 232
crispus L. 233
var. unicallosus Potern. 233
dentatus L. 233
*digynus* L. 220
gmelini Turcz. 233
hastatus D. Don 233
japonica Houtt. 233
*madaio* Makino 234
maritimus L. 233
nepalensis Spreng. 233
obtusifolius L. 234
patientia L. 234
var. callosus Fr. Schmidt 234
stenophyllus Ledeb. 234
var. usuriensis (A. Los.) Kitag. 234
*Rumohra amoena* Ching 113
Rungia Nees 1172
chinensis Benth. 1172
densiflora H. S. Lo 1173
pectinata (L.) Nees. 1173
Russelia Jacq. 1150
equisetiformis Schlecht. et Cham. 1150
Russula (Pers.ex Fr.) Gray 45
adusta (Pers.) Fr. 46
alutacea (Pers.) Fr. 45
aurata (With.) Fr. 46
crustosa Perk. 46
cyanoxanthus (Schaeff.) Fr. 46
delica Fr. 46
densifolia (Scr.) Gill. 45
emetica (Schaeff. ex Fr.) Pers. ex Gray 46
foetens (Pers.) Fr. 46
integra (L.) Fr. 46
laurocerasi Mez. 46
lepida Fr. 46
lilacea Quél. 46
nigricans (Bull.) Fr. 46
pseudodelica Lange 46
rubescens Beardslee 46
sanguinea (Bull.) Franch. 46
senecia Imai 46
sororia Franch. 46
vesca Franch. 46
vinasa Lindbl. 46
virescens (Schaeff.) Fr. 46
xerampelina (Schaeff. ex Secr.) Fr. 46
Russulaceae 44
Ruta L. 651
*albiflora* Hook. 643
graveolens L. 651
Rutaceae 642
Rutelidae 1624

## S

Sabia Colebr. 682
*brevipetiolata* L. Chen 682
c ampanulata Wall. ex Roxb. subsp. ritchieae

(Rehd. et Wils.) Y. F. Wu 682
dielsii Lévl. 682
discolor Dunn 682
emarginata Lec. 682
facciculata Lec. ex L. Chen 682
japonica Maxim. 682
limoniacea Wall. 683
parviflora Wall. ex Roxb. 683
schumanniana Diels 683
subsp. pluriflora (Rehd. et Wils.) Y. F. Wu 683
subsp. pluriflora (Rehd. et Wils.) Y. F. Wu var. bicolor (L. Chen) Y. F. Wu 683
swinhoei Hemsl. ex Forb. et Hemsl. 683
yunnanensis Franch. 683
subsp. latifolia (Rehd. et Wils.) Y. F. Wu 683
Sabiaceae 680
Sabina Mill. 151
chinensis (L.) Ant. 151
convallium (Rehd. et Wils.) Cheng et W. T. Wang 151
davurica (Pall.) Ant. 152
pingii (Cheng ex Ferre) Cheng et W. T. Wang var. wilsonii (Rehd.) Cheng et L. K. Fu 152
przewalskii Kom. 152
pseudosabina (Fisch. et Mey.) Cheng et W. T. Wang 152
recurva (Buch.-Ham.) Ant. 152
saltuaria (Rehd. et Wils.) Cheng et W. T. Wang 152
squamata (Buch.-Ham.) Ant. 152
tibetica Kom. 153
vulgaris Ant. 153
Saccharum L. 1456
arundinaceum Retz. 1456
*floridulum* Labill. 1449
officinarum L. 1456
*paniceum* Lam. 1455
*rufipirum* Steud. 1445
sinense Roxb. 1456
spontaneum L. 1456
Sacciolepis Nash 1456
indica (L.) A. Chase 1456
**Saccolabium formosanum* Hayata 1539
*quasipinifolium* Hayata 1545
Sagreetia Brongn. 717
gracilis J. R. Drumm. et Sprague 717
hamosa (Wall.) Brongn. 717
henryi J. R. Drumm. et Sprague 717
lucida Merr. 717
melliana Hand.-Mazz. 717
paucicostata Maxim. 717
pycnophylla Schneid. 717
rugosa Hance 717
thea (Osbeck) Johnston 718
var. tomentosa (Schneid.) Y. L. Chen et P. K. Chou 718
*theezans* (L.) Brongn. 718
var. *tomentosa* Schneid. 718
Sagina L. 245
japonica (Swartz) Ohwi 245
var. parviflora (Burtt-Davy) C. Y. Wu 245
Sagittaria L. 1358
aginashi Makino 1358
guyanensis Kunth subsp. lappula (D. Don) Bogin 1358
*lappula* D. Don 1358
latifolia Willd. 1358
pygmaea Miq. 1358
sagittifolia L.
var. *angustifolia* Sieb. 1359
var. *edulis* Sieb. et Miq. 1359
subsp. *leucopetala* Hartog 1359
var. longiloba Turcz. 1359
*sinensis* Sims 1359
trifolia L. 1359
var. angustifolia (Sieb.) Kitag. 1359
var. edulis (Sieb. ex Miq.) Ohwi 1359
f. *longiloba* (Turcz.) Makino 1359
var. *sinensis* (Sims) Makino 1359
*Saguerus pinnatus* Wurmb. 1460
Saiga Gray 1778
tatarica Linnaeus 1778
Sal communis 1787
Salacia L. 704
prinoides (Willd.) DC. 704
sesseliflora Hand.-Mazz. 704
Salamandridae 1695
Sal-Ammoniac 1793
Salangidae 1654
Salanx acuticeps Regan 1654
longianalis (Regan) 1654
Salicaceae 16
Salicornia L. 256
europaea L. 256
Salinus 1787
Salix L. 164
alba L. 164
*arbutifolia* Pall. 162
babylonica L. 164
cathayana Diels 164
cheilophila Schneid. 165
fargesii Burk. 165
gracilistyla Miq. 164
guebrianthiana Schneid. 165
hypoleuca Seem. 165
linearistipularis (Franch.) Hao 165
matsudana Koidz. 164
f. tortuosa (Vilm.) Rehd. 165
var. *tortuosa* Vilm. 165
microstachya Turcz. 165
*mongolica* (Franch.) Siuz. 165
pentandra L. 165

*purpurea* L. var. *stipularis* Franch. 165
sinopurpurea C. Wang et C. Y. Yang 166
*tetradenia* Hand.-Mazz. 165
tianschanica Regel 166
variegata Franch. 166
wallichiana Anderss. 166
wilsonii Seem. 166
Salmacis bicolor rarispina L. Agassiz 1640
Salmonidae 1653
Salomonia Lour. 665
cantoniensis Lour. 665
var. edentula (DC.) Gagnep. 665
oblongifolia DC. 666
Salsola L. 256
abrotanoides Bunge 256
arbascula Pall. 256
collina Pall. 256
*prostrata* L. 255
ruthenica Iljin 257
Salticidae 1597
Salvia L. 1100
aerea Lévl. 1100
bowleyana Dunn 1103
campanulata Wall. var. codonantha (Stib.) Stib. 1100
castanea Diels 1103
cavaleriei Lévl. 1100
var. erythrophylla (Hemsl.) Stib. 1100
var. simplicifolia Stib. 1101
*charbonnelii* Lévl. 1103
chinensis Benth. 1101
coccinea L. 1101
*codonantha* Stib. 1100
deserta Shang 1101
digitaloides Diels 1101
evansiana Hand.-Mazz. 1103
var. scaposa Stib. 1103
flava Forrest ex Diels 1103
glutinosa L. 1101
himmelbaurii Stib. 1101
honania Bailey 1101
hupehensis Stib. 1102
japonica Thunb. 1102
var. *erythrophylla* Hemsl. 1100
kiangsiensis C. Y. Wu 1102
kiaometiensis Lévl. 1103
f. pubescens Stib. 1103
lankongensis C. Y. Wu 1103
liguliloba Sun 1102
mairei Lévl. 1103
maximowicziana Hemsl. 1102
mekongensis Stib. 1102
miltiorrhiza Bunge 1102
f. alba C. Y. Wu 1103
var. charbonnelii (Lévl.) C. Y. Wu 1103
nanchuanensis Sun 1103
officinalis L. 1103
omeiana Stib. 1103
paramiltiorrhiza H. W. Li et X. L. Huang 1103
f. purpureo-rubra H. W. Li 1103
plebeia R. Br. 1103
plectranthoides Griff. 1104
prionitis Hance 1104
przewalskii Maxim. 1103
var. mandarinorum (Diels) Stib. 1103
roborowskii Maxim. 1104
scapiformis Hance 1104
var. hirsuta Stib. 1104
sinica Migo 1103
f. purpurea H. W. Li 1103
splendens Ker-Gawl. 1104
substolonifera Stib. 1105
trijuga Diels 1105
umbratica Hance 1105
vasta H. W. Li 1105
var. fimbriata H. W. Li 1105
var. purpurea H. W. Li 1105
yunnanensis C. H. Wright 1150
Salvinia Adans 140
imbricata Roxb. 140
nutans (L.) All. 140
Salviniaceae 140
*Samara lacta* L. 905
*longifolia* Benth. 905
Sambucus L. 1206
adnata Wall. 1206
*buergeriana* Bl. var. *miquelii* Nakai 1207
chinensis Lindl. 1207
*formosana* Nakai 1207
*hookeri* Rehd. 1207
*japonica* Thunb. 703
*javanica* auct. non Reinw. ex Bl. 1207
*mandshurica* Kitag. 1207
sibirica Nakai 1207
*sieboldiana* auct. non Bl. 1207
*tilifolia* Wall. 831
williamsii Hance 1207
var. miquelii (Nakai) Y. C. Tang 1207
Sanguinolaria Lamarck 1588
diphos (Linnaeus) 1588
Sanguisorba L. 537
alpina Bunge 537
filiformis (Hook. f.) Hand.-Mazz. 537
*grandiflora* (Maxim.) Makino 537
*longifolia* Bert. 537
officinalis L. 537
var. longifila (Kitag.) Yü et Li 537
var. longifolia (Bertl) Yü et Li 537
sitchensi C. A. Mey. 537
tenuifolia Fisch. ex Link 538
var. *alba* Trautv. et Mey. 538
Sanicula L. 876
astrantiifolia Wolff ex Kretsch. 876
chinensis Bunge 876

coerulescens Franch. 876
hacquetioides Franch. 877
lamelligera Hance 877
orthacantha S. Moore 877
var. brevispina H. Boiss. 877
rubrifiora Fr. Schmidt 877
serrata Wolff 877
Sansevieria Thunb. 1405
*carnea* Andr. 1394
trifasciata Prain 1406
var. laurentii (N. E. Br.) N. E. Br. 1406
Santalaceae 209
Santalum L. 210
album L. 210
Sapindaceae 676
Sapindus L. 678
delavayi (Franch.) Radlk. 679
mukorossi Gaertn. 679
rarak DC. 679
var. velutinas C. Y. Wu et T. L. Ming 679
*rubiginosus* Roxb. 677
tomentosus Kurz 679
Sapium R. Br. 638
baccatum Roxb. 638
chihsinianum S. Lee 638
discolor (Champ. ex Benth.) Muell.-Arg 638
japonicum (Sieb. et Zucc.) Pax et Hoffm. 638
rotundifolium Hemsl. 639
sabiferum (L.) Roxb. 639
Saponaria L. 245
officinalis L. 245
*segetalis* Neck. 251
Saposhnikovia Schischk. 877
divaricata (Turcz.) Schischk. 877
Sapotaceae 925
Saraca L. 598
*chinensis* Merr. et Chun 598
dives Pierre 598
Sarcandra Gardn. 393
glabra (Thunb.) Nakai 393
hainanensis (Péi) Swamy et Bailey 393
*Sarcanthus hongkongensis* Rolfe 1526
*paniculatum* (Ker-Gawl.) Lindl. 1526
*rostratus* Lindl. 1526
*scolopendrifolius* Makino 1526
*succisus* Lindl. 1558
Sarcocheilichthys Bleeker 1664
nigripinnis (Günther) 1664
sinensis Bleeker 1664
*Sarcochilus japonicus* Miq. 1560
Sarcococca Lindl. 706
hookeriana Baill. 706
var. digyna Franch. 706
longipetiolata M.Cheng 707
orientalis C. Y. Wu ex M. Cheng 707
ruscifolia Stapf 707
vagans Stapf 707
wallichii Stapf 707
Sarcodon Quél. 27
fuligineo-albus (Fr.) Quél. 27
imbricatus (L. ex Fr.) Karst. 27
Sarcopyramis Wall. 813
bodinieri Lévl. et Vant. 814
nepalensis Wall. 814
var. maculata C.Y. Wu ex C.Chen 814
Sarcostemma R. Br. 986
acidum (Roxb.) Voigt 986
*Sarcozygium xanthoxylon* Bunge 617
Sardinella Valenciennes 1652
aurita Valenciennes 1652
Sargassaceae 11
Sargassum (Turn.) C.Ag. 11
enerve C. Ag. 11
fusiforme (Harv.) Setch. 11
hemiphyllum (Turn.) C.Ag. 11
henslowianum C. Ag. 11
horneri (Turn.) C. Ag. 11
kjellmanianum Yendo 11
pallidum (Turn.) C.Ag. 11
polycystum C. Ag. 11
siliquastrum (Turn.) C. Ag. 11
thunbergii (Mert.) O. Kuntze 11
tortile C. Ag. 11
vachellianum Grev. 11
Sargentodoxa Rehd. et Wils. 371
cuneata (Oliv.) Rehd. 371
Sargentodoxaceae 371
Saruma Oliv. 401
henryi Oliv. 401
Sasafras Trew 299
tzumu (Hemsl.) Hemsl. 299
Sasia ochracea Hodgson. 1735
Saturinidae 1628
Satyrium Sw. 1559
ciliatum Lindl. 1559
*henryi* Schltr. 1559
nepalense D. Don 1559
var. ciliatum (Lindl.) Hook.f. 1559
*repens* L. 1541
*viride* L. 1526
Saurauia Willd. 409
napaulensis DC. 409
var. montana C. F. Liang 409
thyrsiflora C. F. Liang 409
tristyla DC. 410
Saurida Cuvier et Valenciennes 1654
elongata (Temminck et Schlegel) 1654
filamentosa Ogilby 1655
tumbil (Bloch et Schneider) 1655
undosquamis (Richardson) 1655
Sauropus Bl. 639
androgynus (L.) Merr. 639
*changianus* S. Y. Hu 639

quadragularis (Willd.) Muell.-Arg. 639
spatulifolius Baill. 639
Saururaceae 387
Saururus L. 388
chinensis (Lour.) Baill. 388
Saussurea DC. 1327
acrophila Diels 1327
alatipes Hemsl. 1327
amara (L.) DC. 1327
amurensis Turcz. 1327
arenaria Maxim. 1328
aster Hemsl. 1328
bodinieri Lévl. 1328
cordifolia Hemsl. 1328
deltoidea (DC.) C.B. Clarke 1328
dolichopoda Diels 1328
dzeurensis Franch. 1328
*edeulis* Franch. 1289
β. *berardioidea* Franch. 1289
eopymaea Hand.-Mazz. 1328
epilobioides Maxim. 1328
var. cana Hand.-Mazz. 1329
eriocephala Franch 1329
erubscens Lipsch. 1329
fastuosa (Decne.) Sch.-Bip. 1329
*forrestii* Diels 1329
globosa Chem 1329
*glomerata* Poir. 1327
gnaphaloiodes (Royle) Ostenf. 1329
*gossypiphora* auct. non D.Don 1330
graminea Dunn 1329
hieracioides Hook. f. 1329
*hypsipeta* Diels 1333
involucrata Kar.et Kir. 1329
iodostegia Hance 1329
japonica (Thunb.) DC. 1330
katochaete Maxim. 1330
lancifolia Hand.-Mazz. 1330
laniceps Hand.-Mazz. 1330
lanuginosa Vant. 1330
*lappa* C. B. Clarke 1264
leiocarpa Hand.-Mazz. 1330
leucoma Diels 1330
licentiana Hand.-Mazz. 1331
longifolia Franch. 1331
*macrota* Franch. 1331
malitiosa Maxim. 1331
medusa Maxim. 1331
mongolica (Franch.) Franch. 1331
neofranchetii Lipsch. 1331
nigrescens Maxim. 1331
obvallata (DC.) Edgew. 1332
var. orientalis Diels 1332
oligantha Franch. 1332
*otophylla* Diels 1331
phaeantha Maxim. 1332
pinetorum Hand.-Mazz. 1332
polycephala Hand.-Mazz. 1332
populifolia Hemsl. 1332
prexima Diels 1332
przewalskii Maxim. 1332
pulchella Fisch. ex DC. 1333
quercifolia W. W. Smith 1333
romuleifolia Franch. 1333
salsa (Pall.) Spreng. 1332
stella Maxim. 1333
sunpangensis Hand.-Mazz. 1333
superba Anthony f. pygmaea Anthony 1333
sylvatica Maxim. 1333
*tanguensis* J. R. Drumm. 1275
*tangutica* Maxim. 1332
taraxacifolia Wall. ex DC. 1333
thoroldii Hemsl. 1333
tridactyla Sch.-Bip. ex Hook.f. 1330
*trullifolia* W. W. Smith 1331
ussuriensis Maxim. 1333
var. *mongolica* Franch. 1331
velutina W.W.Smith 1334
villosa Franch. 1329
wellbgi Hemsl. 1334
Sawara Lacepede 1682
guttatus (Bloch et Schneider) 1682
koreana (Kishinouye) 1682
niphonia (Cuvier et Valeuciennes) 1682
Saxidomus purpuratus (Sowerby) 1587
Saxifraga L. 488
atrata Engl. 488
*brunoniana* Wall ex Sternb. 488
brunonis Wall. ex Ser. 488
cernua L. 488
confertifolia Engl. et Irmsch. 488
diversifolia Wall. 488
egegia Engl. 488
flabellifolia Franch. 488
gemmuligera Engl. 488
laciniata Nakai et Takeda 489
lumpuensis Engl. 489
manchuriensis (Engl.) Kom. 489
melanocentra Franch. 489
mengtzeana Engl. et Irmsch. 489
montana H. Smith 489
nangxianensis J. T. Pan 488
ovatocardata Hand.-Mazz. 489
pallida Wall. f. foliosa Engl. et Irmsch. 489
przewalskii Engl. 489
pseudohirculus Engl. 489
punctata L. 489
var. *manchuriensis* Engl. 489
*purpurascens* Hook. f. et Thoms. 474
rufescens Balf. f 490
rupicola Franch. 490
*sarmentosa* L. 490
sibirica L. var. pekinensis (Maxim.) Engl. et Irmsch. 490
stellariifolia Franch. 490

stolonefera Meerb. 490
*tabularis* Hemsl. 473
takedana Nakai 490
tangutica Engl. 490
unguiculata Engl. 491
Saxifragaceae 472
Saxiglossum Ching 138
angustissimum (Gies.) Ching 138
Scabiosa L. 1221
*bretschneideri* Batal. 1220
comosa Fisch. ex Roem. et Schult. 1221
*hookeri* C. B. Clarke 1221
lapestris Kar. et Kir. 1221
ochroleuca L. 1221
*supera* Grun. 1221
tschiliensis Grun. 1221
var. supera (Grun.) S. Y.Hu 1221
Scaerla L. 1238
sericea Vahl 1238
Scalpellidae 1598
Scapharca broughtnii (Schrenck) 1580
inflata Reeve 1580
suberenata (Lischke) 1580
Scapsipedus Saussure 1615
aspersus (Walker) 1615
micado Saussure 1615
Scaptochirus moschatus Milne-Edwards 1746
Scarabaeidae 1623
Scarabaeus sacer Linnaeus 1623
Scartelaos Swainson 1685
gigas Chu et Wu 1685
viridis (Hamilton) 1685
Scatophagidae 1680
Scatophagus Cuvier et Valenciennes 1680
argus (Linnaeus) 1680
Scenedesmaceae 5
Scenedesmus Mey. 5
obliquus (Turp.) Kutz. 5
*Scepa villosa* Lindl. 620
*Sceptrocnide macrostachya* Maxim. 199
*Sceura marina* Forsk. 1040
Schefflera J.R. et G. Forst. 844
arboricola Hayata 844
bodinieri (Lévl.) Rehd. 844
chinensis (Dunn) Li 844
*cinnamomifoliolata* Shang 846
delavayi (Franch.) Harms ex Diels 844
fukienensis Merr. 846
glomerulata Li 844
hoi (Dunn) Vig. 845
var. macrophylla Li 845
hypoleuca (Kurz) Harms 845
khasiana (C. B. Clarke) Vig. 845
*kwangsiensis* Merr. ex Li 845
leucantha Vig. 845
lociana Grushv et N. Skv. var. megaphylla Shang 845
minutistellata Merr. et Li 845
octophylla (Lour.) Harms 846
parvifoliolata Tseng et Hoo 846
pes-avis Vig. 846
rubriflora Tseng et Hoo 846
venulosa (Wight et Arn.) Harms 846
*yunnanensis* Li 845
Schima Reinw. ex Bl. 417
argentea Pritz. 417
*stellata* Pierre 884
superba Gardn. et Champ. 418
wallichii Choisy 418
Schisandra Michx. 276
axillaris Hook. f. et Thoms. 276
bicolor Cheng 276
chinensis (Trucz.) Baill. 276
var. *rubriflora* Franch. 278
*elongata* Baill. var. *longissima* Dunn 279
glaucescens Diels 276
grandiflora (Wall.) Hook. f. et Thoms. 277
henryi C. B. Clarke 277
var. marginalis A. C. Smith 277
var. yunnanensis A. C. Smith 277
*hypoglauca* Lévl. 277
incarnata Stapf 276
lancifolia (Rehd. et Wils.) A. C. Smith 277
micrantha A. C. Smith 277
neglecta A. C. Smith 277
plena A. C. Smith 278
propinqua (Wall.) Baill. var. intermedia A. C. Smith 278
var. sinensis Oliv. 278
pubescens Hemsl. et Wils. 278
rubriflora (Franch.) Rehd. et Wils. 278
sphaerandra Stapf 278
f. pallida A. C. Smith 278
sphenanthera Rehd. et Wils. 279
var. *lancifolia* Rehd. et Wils. 277
viridis A. C. Smith 279
wilsoniana A. C. Smith 279
Schisandraceae 275
Schismatoglottis Zoll. et Mor. 1480
calyptrata Zoll. et Mor. 1480
Schistodesmus lampreyanus (Baird et Adams) 1585
Schizaea Smith 85
digitata (L.) Sw. 85
Schizaeaceae 85
Schizocapsa Hance 1410
plantaginea Hance 1410
*Schizoloma heterophyllum* (Dry.) J. J. Smith 89
*intertextum* Ching 89
Schizomussaenda Li 1018
dehiscens (Craib) Li 1018
Schizonepta Briq. 1105
multifida (L.) Briq. 1106
tenuifolia (Benth.) Briq. 1105
Schizopepon Maxim. 789

Sinicus Cogn. ex Oliv. 789
Schizophragma Sieb. et Zucc. 491
*glaucescens* (Rehd.) Chun 491
*hydrangeoides* Sieb. et Zucc. var. *integrifolium* Franch. 491
hypoglauca Rehd. 491
f. denticulata (Rehd.) Chun 491
var. glaucescens Rehd. 491
integrifolia Oliv. 491
Schizophyllum Fr. 39
*alnium* Schrot. 39
commune Fr. 39
Schizopygopsis Steindachner 1664
pylzovi Kessler 1664
Schizorhorax Heckel 1664
grahami (Regan) 1665
prenanti (Tchang) 1665
taliensis Regan 1665
yunnanensis Norman 1664
Schnabelia Hand.-Mazz. 1052
oligophylla Hand.-Mazz. 1053
tetrodonta (Sun) C. Y. Wu et C. Chen 1053
*Schoberia glauca* Bunge 257
Schoenoplectus (Reichb.) Palla 1497
grossus (L. f.) Palla 1497
juncoides (Roxb.) Palla 1497
var. hotarui (Ohwi) T. Koyama 1497
mucronatus (L.) Palla 1497
subsp. robustus (Miq.) T. Koyama 1497
var. sanguineus (Tang et Wang) C. Y. Wu 1497
var. trijalatus (Tang et Wang) C. Y. Wu 1497
tabermamontani (C. C. Gmel.) Palla 1497
triqueter (L.) Palla 1497
*Schoenus ruber* Lour. 1496
Schoepfia Schteber 208
chinensis Gardn. et Champ. 208
fragrans Wall. 209
jasminodora Sieb. et Zucc. 209
Sciaenidae 1677
Scilla L. 1395
scilloides (Lindl.) Druce 1395
Scincella huanrenensis Zhao et Huang 1705
modestum (Guenther) 1705
Scincidae 1705
*Scindapsus peepla* Schott 1480
*pinnatus* Schott 1475
*sinensis* Engl. 1468
Scirpus L. 1498
*aestivalis* Retz. 1493
asiaticus Beetle 1498
*barbata* Rottb 1486
*bisumbellatus* Forssk. 1493
*comosum* Wall. 1492
*complanatus* Retz. 1493
*dentus* Wall. 1482
*dichotomus* L. 1493
*dipsaceus* Rottb. 1493
filipes C. B. Clarke 1498
flaviatillis (Torr.) A. Gray 1499
*grossus* L. f. 1497
juncoides Roxb. 1497
karuizawensis Makino 1498
*lushanensis* Ohwi 1498
*maritimus* C. B. Clarke 1499
*michelianus* L. 1491
*miliacea* L. 1493
*mucronatus* L. 1497
*ovata* Roth 1492
planiculmis F. Schmidt 1498
rosthornii Diels 1498
*schoenoides* Retz. 1494
setaceus L. 1498
subcapitatus Thw. 1498
*tabernaemonati* C. L. Gmel. 1497
*triangulatus* Roxb. 1497
*triquter* L. 1497
*validus* Vahl 1497
*wallichii* Nees 1497
yagara Ohwi 1499
*yokoscensis* Franch. et Sav. 1492
Sciuridae 1752
Sciurotamias davidianus (Milne-Edwards) 1752
forresti (Thomas) 1752
Sciurus Linnaeus 1753
vulgaris Linnaeus 1753
Scleria Berg. 1499
*elata* Thw. 1499
*hebecarpa* Nees 1499
laevis Retz. 1499
pergracilis (Nees) Kunth 1499
terrestris (L.) Fassett 1499
Sclerochloa Beauv. 1456
kengiana (Ohwi) Tzvel. 1456
Scleroderma Pers. 52
bovista Fr. 52
cepa Pers. 52
polyrhizum Pers. 52
Sclerodermataceae 52
*Sclerodontium secundum* Harv. 64
Sclerospora Schröt. 19
graminicola (Sacc.) Schmidt 19
*Sclerostylis hindsii* Champ. et Benth. 648
Sclerotinia Fuck. 22
sclerotiorum (Lib.) de Bary 22
Sclerotiniaceae 22
Scobatus granulatus (Cuvier) 1648
Scolia Fabricius 1633
vittifrons Saussure et Sichel 1633
Scoliidae 1633
Scoliodon Müller et Henle 1646
sorrakowah (Cuvier) 1646
Scolopacidae 1728
Scolopendra Linnaeus 1607

subspinipes multidens (Newport) 1607
subspinipes mutilans L. Koch 1607
Scolopendridae 1607
Scolopia Schreb. 764
chinensis (Lour.) Clos 764
Scombridae 1682
Scoparia L. 1151
dulcis L. 1151
Scopolia Jacq. 1124
*breviflorus* C. Y. Wu et C. Chen 1116
carniolicoides C. Y. Wu et C. Chen 1124
var. dentata C. Y. Wu et C. Chen ex C. Chen et C. L. Chen 1116
*meirei* Lévl. 1116
*sinensis* Hemsl. 1116
*tanguticus* Maxim. 1116
Scorpaena Linnaeus 1687
izensis Jordan et Starks 1687
neglecta Temminck et Schlegel 1687
Scorpaenidae 1687
Scorpiones
Scorzonera L. 1334
albicaulis Bunge 1334
austriaca Willd. 1334
subsp. *sinensis* Lipsch. et Krasch. 1335
divaricata Turcz. 1334
var. *foliata* Maxim. 1335
ensifolia MB. 1334
*glabra* Rupr. var. *manshurica* (Nakai) Kitag. 1334
iliensis Krasch. 1334
manshurica Nakai 1334
mongolica Maxim. 1335
pseudo-divaricata Lipsch. 1335
purpurea DC. 1335
radiata Fisch. 1335
*ruprechtiana* Lipsch. et Krasch. 1334
sinensis Lipsch. et Krasch. 1335
songorica (Kar. et Kir.) Lipsch. 1335
tragopogonoides Regel et Schmalh. 1335
Scotophilus heathi (Horsfield) 1747
Scrofella Maxim. 1151
chinensis Maxim. 1151
Scrophulariaceae 1131
Scrophularia L. 1151
buergeriana Miq. 1152
var. tsinglingensis Tsoong 1152
diplodonta Franch. 1151
fargesii Franch. 1151
henryi Hemsl. 1151
incisa Weinm. 1152
kakudensis Franch. 1151
macrocarpa Tsoong 1152
ningpoensis Hemsl. 1150
spicata Franch. 1152
Scurrula L. 213
chingii (Cheng) H. S. Kiu 213
ferruginea (Jack) Danser 213
parasitica L. 213
var. graciliflora (Wall. ex DC.) H.S. Kiu 213
philippensis (Cham. et Schlecht.) G. Don 213
*Scutala scutellata* Lour. 811
Scutellaria L. 1106
alaschanica Tschern. 1106
amoena C. H. Wright 1106
var. cinerea Hand.-Mazz. 1106
baicalensis Georgi 1106
bambusetorum C. Y. Wu 1106
barbata D. Don 1107
caryopteroides Hand.-Mazz. 1107
caudifolia Sun ex C. H. Hu var. obliquifolia C. Y. Wu 1107
chungtiensis C. Y. Wu 1107
discolor Wall. ex Benth. 1107
var. hirta Hand.-Mazz. 1107
forrestii Diels 1106
franchetiana Lévl. 1107
galericulata L. 1108
hypericifolia Lévl. 1108
*ikonnikovii* Juz 1106
indica L. 1108
var. elliptica Sun ex C. H. Hu 1108
var. *japonica* (Morr. et Decne.) Franch. et Sav. f. humilis Makino 1108
f. *parvifolia* Makino 1108
var. parvifolia (Makino) Makino 1108
f. *subacaulis* Sun ex C. H. Hu 1108
var. subacaulis (Sun ex C. H.Hu) C. Y. Wu et C. Chen 1108
*japonica* Burm. f. 1077
*japonica* Franch. et Sav. var. *purpureicaulis* Migo 1109
*japonica* Morr. et Decne. var. *ussuriensis* (Regl) Kudo 1110
likiangensis Diels 1108
moniliorrhiza Kom. 1106
obtusifolia Hemsl. 1109
var. *trinervata* (Vaniot) C. Y. Wu et H. W. Li 1109
omeiensis C. Y. Wu 1109
var. serratifolia C. Y. Wu et S. Chow 1109
orthocalyx Hand.-Mazz. 1109
pekinensis Maxim. 1109
var. purpureicaulis (Migo) C. Y. Wu et H. W. Li 1109
var. ussuriensis (Regel) Hand.-Mazz. 1110
pingbienensis C. Y. Wu et H. W. Li 1106
quadrilobulata Sun ex C. H. Hu 1110
regeliana Nakai var. ikonnikovii (Juz.) C. Y. Wu 1106
rehderiana Diels 1106
*rivularis* Wall. 1107

scordifolia Fisch. ex Schrenk 1110
sessilifolia Hemsl. 1110
shweliensis W. W. Smith 1106
strigillosa Hemsl. 1110
tayloriana Dunn 1110
tenax W. W. Smith var. patentipilosa (Hand.-Mazz.) C. Y. Wu 1106
*trinervata* Vaniot 1109
tuberiferra C. Y. Wu et C. Chen 1110
viscidula Bunge 1106
yunnanensis Lévl. 1110
var. salicifolia Sun ex C. H. Hu 1110
Scutigeridae 1607
Scyliorhinidae 1645
Scylla de Haan 1605
serrata (Forskal) 1605
Scyphozoa 1506
Scytosiphonaceae 9
Scytosiphon C. Ag. 9
lomentarius (Lyngb.) J. Ag. 9
Sebastes Cuvier 1687
inermis Cuvier et Valensiennes 1687
Sebastiania Spreng. 639
chamaelea (L.) Muell.-Arg. 639
Sebastiscus marmoratus (Cuvier et Valencinnes) 1687
*Sebifera glutinosa* Lour. 292
Secamone R. Br. 986
lanceolata Bl. 986
sinica Hand.-Mazz. 986
szechuanensis Tsiang et P. T. Li 986
Sechium P. Br. 790
edule (Jacq.) Swartz 790
Secotiaceae 48
Secotium G. Kuntze 48
agaricoides (Czern.) Hollós 48
Securidaca L. 666
inappendiculata Hassk. 666
Securinega Comm ex Juss. 640
suffruticosa (Pall.) Rehd. 640
virosa (Roxb. ex Will) Pax et Hoffm. 640
Sedum L. 468
aizoon L. 468
subsp. *kamtschaticum* (Fisch.) Fröd. 470
var. scabrum Maxim. 468
*albertii* Regel 465
alfredii Hance 468
var. *bulbiferum* (Makino) Fröd. 468
*algidum* Ledeb. var. *tangusticum* Maxim. 465
*alsium* Fröd. 466
amplibracteatum K. T. Fu 468
*angustum* Maxim. 462
*bracileatum* Diels 468
bulbiferum Makino 468
celatum Fröd. 469
chanetii Lévl. 464
*chrysastrum* Hance 469
*crassipes* Wall. ex Hook. f.et Thoms. var. *cholaense* Praeg. 467
drymarioides Hance 469
var. *genuinum* Hamet 469
var. *stellariaefolium* (Franch.) Hamet 471
*dumulosum* Franch. 466
elatinoides Franch. 469
emarginatrm Migo 469
*erythrostictum* Miq. 463
*euryphyllum* Fröd. 466
*fastigiatum* Hook. f. et Thoms. 466
filipis Hemsl. 469
var. *major* Hemsl. 470
*formosanum* N.E. Br. 468
*gelidum* (Schrenk) Kar. et Kir. 466
*henryi* Diels 466
*heterodontum* Hook. f. et Thoms. 466
hybridum L. 469
japonicum Sieb. ex Miq. 469
kamtschaticum Fisch. 470
*kirilowii* Regel 467
leucocarpum Franch. 470
lineare Thunb. 470
*linearifolium* Royle var. *sacrum* (Prain ex Hamet) Hamet 467
major (Hemsl.) Migo 470
makinoi Maxim. 469
var. *emarginatum* (Migo) S. H. Fu 469
*mekongense* Praeg. 470
middendurffianum Maxim. 470
var. *diffusum* Praeg. 470
*mingjinianum* S. H. Fu 463
multicaule Wall. 470
*obtuso-lineare* Hayata 470
odontophyllum Fröd. 470
*pallescens* Freyn 463
polytrichoides Hemsl. 471
przewalskii Maxim. 471
*pseudo-aizoon* Debeaux 468
purpureum (L.) Schult. 463
*quadrifidum* Pall. 467
roborowiskii Maxim. 471
rostornianum Diels 471
sachalinense (A. Bor.) Vorosh 467
sarmentosum Bunge 471
f. *major* Diels 471
*scabridum* Franch. 467
*silvestrii* Pamp. 469
*spectabile* Bor. 463
*spinosum* (L.) Thunb. 465
var. *thyrsiflorum* (Fisch.) Fröd. 465
stellariaefolium Franch. 471
*telephium* L. var. *purpureum* L. 463
tetractinum Fröd. 471
*verticillatum* L. 463
*wallichianum* Hook. 467

wenchuanense S. H. Fu 472
*wuianum* Hao 469
wulingense (Nakai) Kitag. 466
*yunnanense* Franch. 468
var. *henryi* (Diels) Hamet. 466
*Segnicria asiatica* Lour. 402
Selaginella Beauv. 73
biformis A. Br. 73
bodineiri Hieron. ex Christ 73
braunii Baker 73
compta Hand. -Mazz. 73
davidii Franch. 73
delicatula (Desv.) Alston 73
doederleinii Hieron 74
effusa Alston 74
heterostachys Baker 74
involvens (Sw.) Spring 74
kraussiana A. Br. 74
labordei Hieron 74
moellendorffii Hieron 74
monospora Spring 75
nipponica Franch. et Sav. 75
picta A. Br. ex Baker 75
pulvinata (Hook. et Grev.) Maxim. 75
remotifolia Spring 75
rolandi-principis Alston 75
sanguinolenta (L.) Spring 75
sinensis (Desv.) Spring 75
stauntonina Spring 76
tamariscina (Beauv.) Spring 76
trachyphylla A. Br. 76
uncinata (Desv.) Spring 76
Selaginellaceae 73
Selenarctos Heude 1761
thibetanus G. Cuvier 1761
Selenitum 1784
*Selinum monnieri* L. 858
*terebinthaceum* Fisch. ex Trevir. 872
Semecarpus L. f. 670
gigantifolia Vedal 670
reticulata Lecomte. 671
Semiaquilegia Makino 346
adoxoides (DC.) Makono 346
var. grandis D. Q. Wang 346
dauciformis D. Q. Wang 346
*ecalcarata* (Maxim.) Schipcz. f. *semiecalcarata* Schipcz. 317
Semilabeo Peters 1665
prochilus (Sauvage et Dabry) 1665
Semiliquidambar H. T. Chang 462
cathayensis H. T. Chang 462
var. parvifolia (Chun) H. T. Chang 462
*coriacea* H. T. Chang 462
*Senecio nepaulensis* DC. 493
Senecio L. 1335
*achyrotricha* Diels 1315
*ainsliaeflorus* Franch. 1269
argunensis Turcz. 1335
asperifolius Franch. 1335
cannabifolius Less. 1335
*cappa* Buch. -Ham. ex D. Don 1346
*chrysanthemoides* DC. 1336
*cruentus* DC. 1277
*davidii* Franch. 1340
*delphiniphylla* Lévl. 1269
*deltophylla* Maxim. 1269
*densiflorus* Wall. 1346
*dictyoneura* Franch. 1315
*divaricata* L. 1300
*dryas* Dunn 1341
*duciformis* C. Winkl. 1315
*duclouxii* Dunn 1346
*eriopodus* Cumm. 1341
*erythropappus* Bur. et Franch. 1346
*euosmus* Hand. -Mazz. 1341
exul Hance 1335
faberi Hemsl. 1336
*fargesii* Franch. 1315
*flammeus* Turcz. ex DC. 1350
*globigerus* Chang 1341
*goodianus* Hand. -Mazz. 1342
*graciliflorus* (Wall.) DC. 1336
*gynura* C. Winkl. 1321
*hieraciifolia* L. 1293
*hoi* Dunn 1279
jocobaea L. 1336
*jomesii* Hemsl. 1316
*kirilowii* Turcz. ex DC. 1351
laetus Edgew. 1336
*lapathifolia* Franch. 1317
*latihastatus* Franch. 1317
*leucocephala* Franch. 1270
*leveillei* Vant. 1317
*limprichtii* Diels 1317
*nagensium* C. B. Clarke 1346
narynensis C. Winkl. 1317
*nelumbifolius* Bur. et Franch. 1317
nemorensis L. 1336
*nobile* Franch. 1283
nudicaulis Buch. -Ham. ex D. Don 1337
obtusatus Wall. ex DC. 1337
*oldhamianus* Maxim. 1342
*oryzetorum* Diels 1336
*palmatisectus* J. F. Jeffrey 1270
*petasitoides* Lévl. 1270
*phaeantha* Nakai 1351
*pleopteris* Diels 1336
*pleurocaule* Franch. 1283
*profundorum* Dunn 1270
*przewalskii* Maxim. 1318
*pseudo-china* L. 1301
*purdomii* Turrill 1318
*roborowskii* Maxim. 1271
*rubescens* S. Moore 1271
*ruja* Hand. -Mazz. 1351
rumicifolius Drumm. 1518

*sagitta* Maxim. 1318
*sagittatus* Sch. -Bip. var. *lancifolia* Franch. 1270
scandens Buch. -Ham. ex D. Don 1337
var. incisus Franch. 1337
*sonchifolia* (L.) Moench. 1292
*songaricus* Fisch. 1318
*spelaeicola* (Vant.) Gagnep. 1279
stauntonii DC. 1337
*stenocephalus* Maxim. 1318
*tangutica* Maxim. 1340
*tataricus* L. 1320
thianschanicus Regel 1337
*triligulatus* Buch. -Ham. ex D. Don 1347
*tsangchanensis* Franch. 1318
*veitchianus* Hemsl. 1319
*vellereus* Franch. 1319
*virgaureus* Maxim. 1319
vulgaris L. 1337
wightii (DC.) Benth. ex C. B. Clarke 1337
*wilsonianus* Hemsl. 1319
*winklerianus* Hand.-Mazz. 1341
Sepedonium Link et Fr. 53
chrysospermum (Bull.) Fr. 53
Sepia Linnaeus 1590
andreana Steenstrup 1590
esculenta Hoyle 1590
latimanus Quoy et Gaimard 1590
lycidas Gray 1590
pharaonis Ehrenberg 1590
Sepiella maindroni de Rochebrune 1590
Sepiidae 1590
*Serapias erecta* Thunb. 1524
*falcata* Thunb. 1524
*helleborine* L. 1537
var. *longifolia* L. 1525
*longifolia* (L.) Huds. 1525
Serica orientalis Motschulsky 1624
Sericocalyx Bremek. 1173
chinensis (Nees.) Bremek. 1173
Seriphidium (Bess.) Poljak. 1338
amoenum (Poljak.) Poljak. 1338
brevifolium (Wall. DC.) Ling et Y. R. Ling 1338
cinum (Betg. ex Poljak.) Poljak. 1338
finitum (Kitag) Ling et Y. R. Ling 1338
junceum (Rar. et Kir.) Poljak. 1338
var. macrosciadia (Poljak.) Ling et Y. R. Ling 1338
terrae-aebae (Krasch.) Poljak. 1338
transiliense (Poljak.) Poljak. 1338
Serissa Comm 1018
*foetida* (L. f.) Comm. 1018
japonica (Thunb.) Thunb. 1018
serissoides (DC.) Druce 1019
*serpicula verticillata* L. f. 1360
Serranidae 1675
Serratula L. 1338
*amara* L. 1327
centauroides L. 1339
chinensis S. Moore 1339
coronata L. 1339
*hsinganensis* Kitag. 1339
incanum S. G. Gmel. 1277
*japonica* Thunb. 1330
*komarovii* Iljin 1339
*multiflora* L. 1309
*salsa* Pall. 1332
*setosa* Willd. 1279
strangulata Iljin 1339
Sesamum L. 1176
indicum L. 1176
orientale L. 1176
Sesarma Say 1606
dehaani (H. Milne-Edwards) 1606
Sesbania Scop. 598
cannabina (Retz.) Pers. 598
grandiflora (L.) Pers. 598
Seseli L. 878
*buchtormense* (Fisch.) Koch 865
*condensatum* (L.) Reichb. f. 865
delavayi Franch. 878
*iliense* (Regel et Schmalh.) Lipsky 865
marirei Wolff 878
*seseloides* (Fisch. et Mey. ex Turcz.) Hiroe 865
tachiroei Franch. et Sav. 865
*wawrae* Wolff 872
yunnanense Franch. 878
Seselopsis Schischk. 878
tianschanicum Schischk. 878
Setaria Beauv 1457
faberii Herrm. 1457
genifulata (Lam.) Beauv 1457
glauca (L.) Beauv. 1457
italica (L.) Beauv. 1457
palmifolia (Koen.) Stapf 1457
plicata (Lam.) T. Cooke 1457
viridis (L.) Beauv. 1457
*Sethia kunthianum* Wall. 618
Setipinna Swainson 1653
taty (Cuvier et Valenciennes) 1653
*Severinia bucifolia* Tenore 642
*monophylla* Tanaka 642
Shaft bottom clay 1791
Sheareria S. Moore 1339
nana S. Moore 1339
Shiraia P. Henn. 22
bambusicola P. Henn. 22
Shortia Torr. et Gray 880
sinensis Hemsl. 880
*thibetica* (Decne.) Franch. 880
Shuteria Wight et Arn. 598
*glabrata* Wight et Arn. 599
involucrata (Wall.) Wight et Arn. 599
var. glabrata (Wight et Arn.) Oha-

shi 599
var. villosa (Pamp.) Ohashi 599
pampaniniana Hand. -Mazz. 599
*sinensis* Hemsl. 599
*vestita* (Grah.) Wight et Arn. 599
var. *villosa* Pamp. 599
Sibbaldia L. 538
*aphanopetala* Hand. -Mazz. 538
*erecta* L. 502
procumbens L. var. aphanopetala (Hand. -Mazz.) Yü et Li 538
Sibynophis chinensis (Güenther) 1708
*Sicyos edulis* Jacq. 790
Sida L. 744
acuta Burm. 744
alnifolia L. 744
var. microphylla (Cav.) S. Y. Hu 744
var. obovata (Wall.) S. Y. Hu 744
chinensis Retz. 744
cordifolia L. 744
cordata (Burm. f.) Borss. 744
*indica* L. 739
mysorensis Wight et Arn. 745
*obovata* Wall. 744
orientalis Cav. 745
*retusa* L. 744
rhombifolia L. 745
subcordata Span. 745
szechuensis Matsuda 745
*Sideritis ciliata* Thunb. 1067
Siegesbeckia L. 1340
glabrescens Makino 1340
orientalis L. 1340
f. *glabrescens* Makino 1340
f. *pubescens* Makino 1340
pubescens (Makino) Makino 1340
f. eglandulosa Ling et Hwang 1340
Siganidae 1681
Siganus Forskal 1681
fuscescens (Houttuyn) 1681
oramin (Bloch et Schneider) 1681
Silene L. 245
aprica Turcz. ex Fisch. et Mey. 246
armerin L. 246
conoides L. 246
delavayi Franch. 246
firma Sieb. et Zucc. 246
f. pubescens Makino 246
fortunei Vis. 246
gonosperma (Rupr.) Bocquet 246
gracilicaulis C. L. Tang var. longipedicellata C. L. Tang 246
grandiflora Franch. 247
himalayensis (Rohrb.) Majumdar 247
hupehensis C. L. Tang 247
jenissensis Willd. 247
var. oliganthella (Nakai ex Kitag.) Y. C. Chu 247
f. parviflora (Turcz.) Schischk. 247
f. sentifolia (Turcz., Mey. et Ave-Lall.) Bocquet 247
var. viscifera Y. C. Chu 247
lankongensis Franch. 247
repens Patr. 247
var. latifolia Turcz. 247
songarica (Turcz., Mey. et Ave-Lall.) Bocquet 247
szechuanense Williams 248
tatarinowii Regel 248
tenuis Willd. 248
venosa (Gilib.) Aschers. 248
viscidula Franch. 248
vulgaris (Moench.) Garcke var. commutata (Gusson) Coode et Cullen 248
Siler divaricata (Turcz.) Benth. et Hook. f. 878
Sillago Cuvier 1676
japonica Temminck et Schlegel 1676
sihama (Forskal) 1676
Siluridae 1668
Silurus Linnaeus 1668
asotus Linnaeus 1668
meridionalis Chen 1668
Silybum Gaertn. 1341
marianum (L.) Gaertn. 1341
*Simaba quassioides* D. Don 657
Simarubaceae 656
Simblum Kl. 47
clathroides Kaoam. var. gracile Liou et Hwang 48
Sinacalia H. Robins. et Brettell 1339
davidii (Franch.) Hand. -Mazz. 1340
tangutica (Maxim.) B. Nord. 1340
Sinapis L. 457
alba L. 457
*integrifolia* West 448
*juncea* L. 448
Sindechites Oliv. 970
*esquirolli* Woods. 970
henryi Oliv. 970
Sinephropteris Mickel 110
delavayi (Franch.) Mickel 110
Sinia Diels 410
rhodoleuca Diels 410
Sinilabeo Rendahl 1665
decorus (Peters) 1665
rendahli (Kimura) 1665
tungting (Nichols) 1665
Siniperca Gill 1676
chuatsi (Basilewsky) 1676
kneri Garman 1676
scherzeri Steindachner 1676
*Sinocalamus beecheyanus* (Munro) Mc Clure var. *pubescens* P. F. Li 1441
*gigianteus* (Munro) A. Camus 1441
*latiflorus* (Munro) McClure 1442

*minor* McClure 1442
*oldhamii* (Munro) Mcclure 1441
*Sinocalycanthus chinensis* (Cheng et S. Y. Chang) Cheng et Chang 281
Sinocrassula Berger 472
indica (Decene.)Berger 472
var. viridiflora K. T. Fu 472
yunnanensis (Franch.) Berger 472
Sinocyclocheilus Fang 1665
grahami (Regan) 1665
g. grahami (Regan) 1665
g. tingi Fang 1665
g. yangzongensis Tsu et Chen 1665
Sinodielsia Wolff 878
yunnanensis Wolff 878
Sinofranchetia Hemsl. 373
chinensis (Franch.) Hemsl. 373
Sinojohnstonia Hu 1038
moupinensis (Franch.) W. T. Wang 1038
plantaginea Hu 1039
Sinomenium Diels 379
acutum (Thunb.) Rehd. et Wils. 379
var. cinereum (Diels) Rehd. et Wils. 379
Sinonovacula Prashad 1588
constricta (Lamarck) 1588
Sinopodophyllum Ying 370
*emodii* (Wall.) Ying 371
hexandrum (Royle) Ying 371
Sinopotamidae 1606
Sinopotamon Milne-Edwards 1606
denticulatum (Milne-Edwards) 1606
Sinopteridaceae 93
Sinosenecio B. Nord. 1341
dryas (Dunn) C. Jeffrey et Y. L. Chen 1341
eriopodus (Cumm.) C. Jeffrey et Y. L. Chen 1341
euosmus (Hand.-Mazz.) B. Nord. 1341
globigerus (Chang) B. Nord. 1341
guangxiensis C. Jeffrey et Y. L. Chen 1341
hederifolius (Cumm.) B. Nord. 1342
oldhamianus (Maxim.) B. Nord. 1342
subcoriaceus C. Jeffrey et Y. L. Chen 1341
Siphocarnion Kudo 1111
macranthum (Hook. f.) C. Y. Wu 1111
nudipes (Hemsl.) Kudo 1111
*Siphonanthus indica* L. 1047
Siphonostegia Benth. 1152
chinensis Benth. 1152
laeta S. Moore 1152
Sipuncula 1591
Sipunculida 1591
Sipunculidae 1591
Sipunculus Linnaeus 1591
nudus Linnaeus 1591
Sraitia Merr. 790
grosvenrii (Swingle) C. Jeffrey ex Lu et Z. Y. Zhang 790
siamemsis (Craib) C. Jeffrey ex Zhong et D. Fang 790
*Siraitos chinensis* (Krause) Wang et Tang 1373
Sisoridae 1670
Sisymbrium L. 457
*dubium* Pers. 456
heteromallum C. A. Mey. 457
*indicum* L. 456
*islandica* Oed. 457
*nasturtium-aquaticum* L. 455
*sophia* L. 451
Sitta Linnaeus 1743
euronaea Linnaeus 1743
Sittidae 1743
Sium L. 878
*javanicum* Bl. 869
latifolium L. 878
medicum Fisch. et Mey. 879
suave Walt. 879
Skapanthus C. Y. Wu 1111
oreophilus (Diels) C. Y. Wu et H. W. Li 1111
var. elongatus (Hand.-Mazz.) C. Y. Wu et H. W. Li 1111
Skimmia Thunb. 651
arborescens T. Camble 652
multinervia Huang 652
var. minor Huang 652
reevesiana Fort. 652
Sloanea L. 733
hemsleyana (Ito) Rehd. et Wils. 733
leptocarpa Diels 733
sinensis (Hance) Hemsl. 733
Smilacina Desf. 1395
*alpina* Royle 1374
atropurpurea (Franch.) Wang et Tang 1395
dahurica Turcz. 1395
ginfoshanica Wang et Tang 1395
henryi (Baker) Wang et Tang 1395
japonica A. Gray 1395
lichiangensis (W. W. Smith) W. W. Smith 1395
oleracea (Baker) Hook. f. et Thoms. 1395
paniculata (Baker) Wang et Tang 1395
purpurea Wall. 1395
tubifera Batal. 1395
Smilax L. 1395
arisanensis Hayata 1395
bockii Warb. 1396
china L. 1396
discotis Warb. 1396
ferox Wall. ex Kunth 1396
glabra Roxb. 1396
var. concolor (C. H. Wright) Wang et Tang 1396
glauco-china Warb. 1397
lanceifolia Roxb. var. opaca A. DC. 1397
lunglingensis Wang et Tang 1396

mairei Lévl. 1396
menispermoidea A. DC. 1397
microphylla C. H. Wright 1397
nigresoens Wang et Tang 1398
nipponica Miq. 1397
perfoliata Lour. 1397
riparia A. DC. 1397
var.acuminata (C. H. Wright) Wang et Tang 1397
scobinicaulis C. H. Wright 1398
sieboldii Miq. 1398
stans Maxim. 1398
Smithia Ait.. 599
conferta Smith 599
sensitiva Ait. 599
Smithsonitum 1792
Solanaceae 1116
Solanum L. 1124
*aculeatissimum* Jacq. 1128
aviculare Forst. 1124
*biflorum* Lour. 1120
*capsicastrum* Link. ex Schau 1127
cathayanum C. Y. Wu et S. C. Huang 1125
coagulans Forsk. 1125
*diflorum* Vell. 1127
dulcamara L. 1125
var. *chinensis* Dunal 1125
var. *lyratum* (Thunb.) Sieb. et Zucc. ex Bonati 1126
ferox L. 1125
indicum L. 1125
japonicum Nakai 1125
khasianum C. B. Clarke. 1126
*lycopersicum* L. 1121
lyratum Thunb. 1126
*lysimachioides* Wall. 1120
mammosum L., 1126
melongena L. 1126
var. *esculentum* (Dunal) Nees 1126
nigrum L. 1126
var. *pauciflorum* Liou 1127
photeinocarpum Najamura et Odashima 1127
pittosporifolium Hemsl. 1127
procumbens Lour. 1127
psendo-capsicum L. 1127
var. diflorum (Vell.) Bitter 1127
septemlobum Bunge 1127
spirale Roxb. 1128
surattense Burm. f. 1128
torvum Swartz 1128
tuberosum L. 1128
verbascifolium L. 1128
xanthocarpa Schrad. et Wendl. 1129
Solaster Forbes 1638
dawsoni Verrill 1638
Solasteridae 1638
Solegneathus hardwicki (Gray) 1673
Soleidae 1690
Solen Linnaeus 1589
gouldii Conrad 1589
gracilis Philippi 1589
grandis Dunker 1589
Solena Lour. 790
amplexicaulis (Lam.) Gandhi 790
*heterophylla* Lour. 790
Solenidae 1588
Solidago L. 1342
canadensis L. 1342
*chinensis* Osbeck 1355
*dahurica* Kitag. 1342
decurrens Lour. 1342
pacifica Juz. 1342
*virgaurea* L. 1342
subsp. *coreana* Kitag. 1342
var. dahurica Kitag. 1342
var. *leiocarpa* (Benth.) A. Gray 1342
var. *pubescens* (Wall.) C. B. Clarke 1342
Solieriaceae 16
Soliva Ruiz et Pavon 1342
anthemifolia (Juss.) R. Br. 1343
Solms-Laubachia Muschl. 457
dolichocarpa Y. C. Lan et T. Y. Cheo 457
eurycarpa (Maxim.) Botsch. 457
linearifolia (W. W. Smith) O. E.Schulz. 458
platycarpa (Hook. f. et Thoms.) Botch. 458
pulcherrima Muschl. 458
f. atrichophylla Hand.-Mazz. 458
Sonchus L. 1343
arvensis L. 1343
asper (L.) Hill. 1343
*cyaneus* D. Don 1276
oleraceus L. 1343
var. *asper* L. 1343
palustris L. 1343
*sibirica* L. 1310
uliginosus Bied. 1343
Sonerila Roxb. 814
alata Chun et How ex C. Chen 814
var. triangula C. Chen 814
cantonensis Stapf. 814
var. strigosa C. Chen 814
*esquirolii* Lévl. 813
*fordii* Oliv. 809
laeta Stapf 814
rivularis Cogn. 814
tenera Royle 815
Sonneratia L. f. 806
alba Smith 806
caseolaris (L.) Engl. 806
Sonneratiaceae 806
*Sooja nomamu* Sieb. 561
Sophora L. 599
alopecuroides L. 599
*alpina* Pall. 602

davidii (Franch.) Kom. ex Pavil. 599
flavescens Ait. 600
japonica L. 600
f. oligophylla Franch. 600
var. pendula Loud. 600
*mairei* Pamp. 600
moorcroftiana (Benth.) Benth. ex Baker 600
var. *davidii* Franch. 599
*platycarpa* Maxim. 563
prazeri Prain subsp. mairei (Pamp.) Yakovl. 600
*subprostrata* Chun et T. Chen 600
*tonkinensis* Gagnep. 600
velutina Lindl. 600
var. albescens (Rehd. et Wils.) P. C. Tsoong 601
*Sopliora lupinoides* L. 603
Sopubia Buch.-Ham. ex D. Don 1152
trifida Buch.-Ham. ex D. Don 1152
Sorbaria (Ser. ex DC.) A. Br. 538
arborea Schneid. 538
kirilowii (Regel) Maxim. 538
sorbifolia (L.) A. Br. 538
Sorbus L. 538
alnifolia (Sieb. et Zucc.) K. Koch 538
amabilis Cheng ex Yü 539
discolor (Maxim.) Maxim. 539
folgeri (Schneid.) Rehd. 539
glomerulata Koehne 539
hupehensis Schneid. 539
megalocarpa Rehd. 539
pohuashanensis (Hance) Hedl. 539
prattii Koehne 539
rufopilosa Schneid. 540
tapashana Rupr. 540
tianschanica Rupr. 540
*unguiculata* Koehne 539
xanthoneura Rehd. 540
Sorghum Moench 1457
propinquum (Kunth) Hitchc. 1457
vulgare Pers. 1458
Soroseris Stebb. 1343
gillii (S. Moore) Stebb. 1343
hookeriana (C. B. Clarke) Stebb. 1344
subsp. erysimoides (Hand.-Mazz.) Stebb. 1344
rosularis (Diels) Stebb. 1344
umbrella (Franch.) Stebb. 1344
Soulica Franch. 346
vaginata (Maxim.) Franch. 346
Sparassis crispa (Wulf) Fr. 26
Sparganiaceae 1484
Sparganium L. 1484
fallax Graebn. 1484
microcarpum Celak. 1484
simplex Huds. 1484
stenophyllum Maxim. 1484
stoloniferum Buch.-Ham. 1484
*Sparidae* 1679
Sparus Linnaeus 1679
latus Houttuyn 1679
macrocephalus (Basilewsky) 1679
*Spathium chinensis* Lour. 388
*Spathodea igneum* Kurz 1162
Spathoglottis Bl. 1559
*fortunei* Lindl. 1559
pubescens Lindl. 1559
Spatholirion Ridl. 1431
longifolium (Gagnep.) Dunn 1431
volubile Edgew. 1431
var. khasianum (C. B. Clarke.) Hong 1431
Spatholobus Hassk. 601
harmandii Gagnep. 601
sinensis Chun et T. Chen 601
suberectus Dunn 601
Spenceria Trimen 540
ramalana Trimen 540
Speraskia Baill. 640
cantonensis (Hance) Pax et Hoffm. 640
tuberculata (Bunge) Baill. 640
Spergula japonica Swartz 245
Spergularia (Pers.) J. et C. Presl. 248
salina J. et C. Presl. 248
Sperirantha Baker 1398
gardenii Baill. 1398
*Spermacoce hedyotidea* DC. 1001
*pusilla* Wall. 991
*stricta* L. f. 991
Spermatochnaceae 8
Sphacelotheca de Bary 23
sorghi (Link) Clint. 23
Sphaeranthus L. 1344
africanus L. 1344
*cochinchinensis* Lour. 1344
*hirtus* Willd. 1344
indicus L. 1344
*mollis* Roxb. 1344
senegalensis DC. 1344
*Sphaeria sinensis* Berk. 21
Sphaerobelum Verhoeff 1608
hirsutum (Virhoeff) 1608
*Sphaerocarya edulis* Wall. 210
Sphaeromidae 1599
*Sphaeromorphaea australis* (Less.) Kitam. 1293
Sphaerotheriidae 1608
Sphagnaceae 60
Sphagnum Ehrh. 60
acutifolium Ehrh. 60
girgensohnii Russ. 60
magellanicum Brid. 60
palustre L. 60
squarrosum Crom. 60
var. *teres* Schimp. 60
teres (Schimp.) Angstr. 60
Sphallerocarpus Bess. ex DC. 879

gracilis (Bess.) K.-Pol. 879
Sphenoclea Gaertn. 1237
zeylanica Gaertn. 1237
Sphyraena Bloch et Schneider 1674
pinguis Günther 1674
Sphyraenidae 1674
Sphyrna Rafinesque 1646
lewini (Griffith) 1646
zygaena (Linnaeus) 1647
Sphyrnidae 1646
Spilanthes Jacq. 1344
*acmella* acut. non L. 1345
callimorpha A. H. Moore 1344
paniculata Wall. ex DC. 1345
Spinacia L. 257
*fera* L. 252
oleracea L. 257
Spinibarbus Oshima 1665
denticulatus (Oshima) 1665
sinensis (Bleeker) 1665
Spinifex L. 1458
littoreus (Burm. f.) Merr. 1458
*Spinovitis davidii* Roman. 729
Spiradiclis Bl. 1019
oblanceolata W. L. Sha et X. X. Chen 1019
Spiraea L. 540
*angustiloba* Turcz. 508
blumei G. Don 540
cantoniensis Lour. 540
chinensis Maxim. 541
*collosa* Thunb. var. *glabra* Regel 541
*digitata* Willd. var. *intermedia* Glehn 508
flexuosa Fisch. ex Cambess. 541
*fortunei* Planch. 541
fritschiana Schneid. 541
hypericifolia L. 541
japonica L. f. 541
var. acuminata Franch. 541
var. fortunei (Planch.) Rehd. 541
var. glabra (Regel) Koidz. 541
*kirilowii* Regel 538
media Schmidt 542
miyabei Koidz. var. pilosula Rehd. 542
var. tenuifolia Rehd. 542
mongolica Maxim. 542
myrtilloides Rehd. 542
*palmata* Pall. 508
prunifolia Sieb. et Zucc. 542
pubescens Turcz. 542
runifolia Sieb. et Zucc. var. simpliciflora Nakai 542
salicifolia L. 542
sericea Turcz. 543
thunbergii Sieb. ex Bl. 543
trilobata L. 543
*ulmaria* L. 508
Spiranthus Rich. 1559
sinensis (Pers.) Ames 1559
Spirobolidea 1608
Spiroblus Brandt 1608
joannisi (Brolemann) 1608
Spirobolus Brandt 1608
bungii (Brandt) 1608
exquisitus Karsh 1608
marginatus Brolemann 1609
walkeri Pocock 1609
Spirodela Schleid. 1482
polyrrhiza (L.) Schleid. 1483
Spirogyra Link 7
communis (Hass.) Kütz. 7
intosta Jao 7
longata (Vauch.) Kütz. 7
nitida (Dillw.) Link 7
varians Kütz. 7
Spizaetus Vieillot 1721
nipalensis (Hodgson) 1721
Splachnaceae 62
*Splachum mnioides* Hedw. 62
Spodiopogon Trin. 1458
sagittifolius Rendle 1458
sibiricus Trin. 1458
Spondias L. 671
*axillaris* Roxb. 666
var. *pubinervis* Rehd. et Wils. 667
pinnata (L. f.) Kurz 671
Spondylidae 1583
Spondylus Linnaeus 1583
fragum Reeve 1583
imperialis Chenu 1583
nicobaricus Chemnitz 1583
Spongia 1565
Spongilla Lamarck 1565
fragilis Lecidy 1565
lacustris (Linnaeus) 1565
*Spongiporus montana* Quél. 28
*Sponia angustifolia* Planch. 180
Sporoblus R. Br. 1458
fertilia (Steud.) W. D. Clayt. 1458
*Sportella atalantioides* Hance 521
Spyridia filamentosa (Wulf.) Harv. 17
Squalidae 1647
Squaliobarbus Günther 1666
curriculus (Richardson) 1666
Squalus Linnaeus 1647
acanthias Linnaeus 1647
brevirostris Tanaka 1647
fernandinus Molina 1647
misukurii Linnaeus 1647
suckleyi Molina 1647
Squatina Dumeril 1647
japonica Bleeker 1647
Squatinidae 1647
Squilla Gronovius 1603
costata de Haan 1603
oratoria de Haan 1603
Squillidae 1603

*Stachygynandrum tamariscinum* Beauv. 76
Stachys L. 1111
adulterina Hemsl. 1111
*artermisia* Lour. 1083
baicalensis Fisch. ex Benth. 1111
chinensis Bunge ex Benth. 1111
geobombycis C. Y. Wu 1112
japonica Miq. 1112
kouyangensis (Vaniot) Dunn 1112
*leptopoda* Hayata 1112
oblongifolia Benth. 1112
var. leptopoda (Hayata) C. Y. Wu 1112
*officinalis* (L.) Trev. ex Briq. 1059
palustris L. 1112
pseudophlomis C. Y. Wu 1112
sieboldi Miq. 1113
*Stachyopogon pauciflorus* Klotz. 1364
Stachytarpheta Vahl 1053
jamaicensis (L.) Vahl 1053
Stachyuraceae 771
Stachyurus Sieb. et Zucc. 771
callosus C. Y. Wu 771
chinensis Franch. 771
subsp. brachystachyus (C. Y. Wu et S. K. Chen) Y. C. Tang et Y. L. Cao 771
subsp. latus (Li) Y. C. Tang et Y. L. Cao 771
var. *latus* Li 772
himalaicus Hook. f. et Thoms. ex Benth. 772
obovatus (Rehd.) Li 772
retusus Yang 772
salicifolius Franch. 772
szechuanensis Fang 772
yunnanensis Franch. 772
var. *obovata* Rehd. 772
Stahlianthus O. Kuntze 1513
involucratus (King ex Bak.) Craib 1513
stalactitum 1785
*Stanropsis championi* (Lindl.) Tang et Wang 1536
Stapfipphyton H. L. Li 815
degeneratum C. Chen 815
Staphilinidae 1620
Staphylea L. 703
bumalda DC. 703
holocarpa Hemsl. 730
*indica* Burm. f. 732
Staphyleaceae 703
*Statice aurea* L. 924
*bicolora* Bunge 924
*gmelinii* Willd. 924
*sinensis* Girard. 924
*wrightii* Hance 924
Statilia Stal 1611
maculata (Thunberg) 1611
Stauntonia DC. 373
brachyanthera Hand. -Mazz. 373
cavakerieana Gagnep. 373
chinensis DC. 373
glauca Merr. et Mete. 373
hexaphylla (Thunb.) Decne. 374
f. intermedia Wu 374
f. urophylla Hand. -Mazz. 374
maculata Merr. 373
obovata Hemsl. 373
*Stauranthera stiangiana* Hand. -Mazz. 1193
Stegnogramma Bl. 107
cyrtomioides (C. Chr.) Ching 107
Stegostoma Müller et Henle 1645
fasciatum (Hermann) 1645
*Steleophaga plancyi* (Bolivar) 1611
*Stelis odoratissimum* Smith 1521
Stellaria L. 248
alsine Grimm. 248
anhweiensis Migo 249
bistylata W. Z. Di et Y. Ren 249
*cerastoides* L. 240
chinensis Regel 249
dichotoma L. 249
var. lanceolata Bunge 249
discolor Turcz. 249
*glauca* With. 250
graminea L. 249
*gypsophiloides* Fenzl. 249
henryi Williams 250
media (L.) Cyr. 250
neglecta Weihe 250
omeiensis C. Y. Wu et Y. W. Tsui 250
palustris Ehrh. 250
saxatilis Buch. -Ham. 250
umbellata Turcz. 250
wushanensis Williams var. trientaloides Hand. -Mazz. 250
yunnanensis Franch. 250
Stellaster equestris (Retzius) 1638
Stellera L. 756
chamaejasme L. 756
Stelmatocrypton Baill. 987
khasianum (Benth.) Dittrich 987
Stemmacantha Cass. 1345
carthamoides (Willd.) Dittrich 1345
uniflora (L.) Dittrich 1345
*Stemodia philippnensis* Cham. 1137
*ruderalis* Vahl 1137
Stemona Lour. 1402
japonica (Bl.) Miq. 1402
mairei (Lévl.) Krause 1402
parviflora C. H. Wright 1403
sessilifolia (Miq.) Miq. 1403
tuberosa Lour. 1403
Stemonaceae 1402
*Stenactis multiradiana* Lindl. 1294
*Stenocoelium divaricatum* Turcz. 877
Stenoloma Fée 89

ebusana (L.) Ching 89
Stenopelmatidae 1613
Stenosolenium Turcz. 1039
saxatiles (Pall.) Turcz. 1039
Stenotaphrum Trin. 1458
helferi Munro ex Hook. f. 1458
Stephanandra Sieb. et Zucc. 543
chinensis Hance 543
indica (Thunb.) Zebel. 543
Stephania Lour. 379
brachyandra Diels 380
cepharantha Hayata ex Yamam. 380
chingtungensis H. S. Lo 380
delavayi Diels 380
dicentrinifera H. S. Lo et M. Yang 380
dielsiana Y. C. Wu 380
*discifiora* Hand. -Mazz. 380
dolichopoda Diels 382
elegans Hook. f. et Thoms. 381
epigaea H. S. Lo 381
excentrica H. S. Lo 381
forsteri (DC.) A. Gray 381
glabra (Roxb.) Miers 381
*gracciliflora* Yamam. 380
hainanensis H. S. Lo et Y. Tsoong 380, 381
herbacea Gagnep. 381
hernandifolia (Willd.) Walp. 381
japonica (Thunb.) Miers 382
kuinanensis H. S. Lo et H. M. Yang 382
kwangsiensis H. S. Lo 382
longa Lour. 382
mashanrica H. S. Lo et B. N. Chang 382
micrantha H. S. Lo et H. M. Yang 382
sasakii Hayata ex Yamam. 382
sinica Diels 383
subpeltata H. S. Lo 383
succifera H. S. Lo et Y. Tsoong 380, 383
sutchuenensis H. S. Lo 383
tetrandra S. Moore 383
var. *glabra* Maxim. 380
viridiflavens H. S. Lo et M. Yang 383
yunnanensis H. S. Lo 383
Stephanotis Thou. 987
chunii Tsiang 987
mucronata (Blanco) Merr. 987
Sterculia L. 750
brevissima Hsue 751
euosma W. W. Smith 751
hainanensis Merr. et Chun 751
lanceolata Cav. 751
lychnophora Hance 751
nobilis W. W. Smith 751
var. subspontanea Hsue et S. J. Xu 751
*platanifolia* L. f. 747
Sterculiaceae 747
Stereocaulaceae 56
Stereocaulon Schreb. 56
exutum Nyl. 56
paschale (L.) Hoffm. 56
*Stereodon taxirameus* Mitt. 66
Stereospermum Cham. 1164
persouatum (Hassk.) Chatt. 1164
*sinicum* Hance 1163
Stereum hirsutum (Willd.) Fr. 26
Sterna hirundo Linnaeus 1729
Steudnera C. Koch 1480
colocasiaefolia C. Koch 1480
Stevia Cav. 1345
rebaudiana (Bertoni) Hemsl. 1345
Stewartia L. 418
rostrata Spongb. 418
sinensis Rehd. et Wils. 418
Stichopodidae 1636
Stichopus Brandt 1636
chloronotus (Brandt) 1636
japonicus Selenka 1636
variegatus (Sempeu) 1636
Sticta Schreb. 55
miyschiana Mull. -Arg. 55.
Stictaceae 54
*Stilago bunius* L. 620
*Stillingia discolor* Champ. ex Benth. 638
*japonica* Sieb. et Zucc. 638
Stimpsonia Wright ex A. Gray 923
chamaedryoides Wright ex A. Gray 923
*Stipa inebrians* Hance 1433
*litorea* Burm. f. 1458
*splendens* Trin. 1433
*Stipellaria trewioides* Benth. 619
*Stratiotes alismoides* L. 1361
Streblus Lour. 192
asper Lour. 192
*Streptocarpus clarkeanus* (Hemsl.) Hilliard et Burtt 1178
Streptocaulon Wight et Arn. 987
*calophylla* Wight 985
*extensum* Wight 985
griffithii Hook. f. 987
juventas (Lour.) Merr. 987
*Streptolirion longifolium* Gagnep. 1431
Streptopelia Bonaparte 1730
chinensis (Scopoli) 1730
orientatis (Latham) 1730
Streptopus Michx. 1398
obtusatus Fassett 1398
parviflorus Franch. 1398
simplex D. Don 1398
Striga Lour. 1153
asiatica (L.) O. Kuntze 1153
masuria (Ham. ex Benth.) Benth. 1153
Strigidae 1731
Strobilanthes Bl. 1173
aenobarbus W. W. Smith 1173
affinis (Griff.) Y. C. Tang 1173
*apricus* (Hance) T. Anders. 1169

cusia (Nees) O. Kuntze 1173
dalzielii (W. W. Smith) R. Ben. 1174
*dieltiana* W. W. Smith 1169
dimorphotricous Hance 1174
dyerianus Mast. 1174
forrestii Diels 1174
*grossus* C. B. Clarke 1174
*hygrophiloides* C. B. Clarke ex W. W. Smith 1175
japonicus (Thunb.) Miq. 1174
lamium C. B. Clarke et W. W. Smith 1174
*nemorosus* R. Ben. 1174
oliganthus Miq. 1174
pentstemonides (Nees) T. Anders. 1175
psilostachys C. B. Clarke ex W. W. Smith 1175
sarcorrhiza (C. Ling) H. S. Lo 1175
tetraspermus (Champ. ex Benth.) Druce 1175
triflorus Y. C. Tang 1175
yunnanensis Diels 1175
Strobilomyces Berk. 44
floccopus Karst. 44
Strobilomycetaceae 44
Stromateidae 1683
Stromateoides Bonaparte 1683
argenteus (Euphrasen) 1683
nozawae (Ishikawa) 1683
sinensis (Euphrasen) 1683
Strongylocentrotidae 1640
Strongylocentrotus nudus (A. Agassiz) 1641
Strophanthus DC. 970
divaricatus (Lour.) Hook. et Arn. 970
hispidus DC. 970
wallichii A. DC. 970
Struthiopteris Scop. 112
eburnea (Christ) Ching 112
*orientalis* Hook. 111
Strychnos L. 945
angustiflora Benth. 945
cathayensis Merr. 945
*hainanensis* Merr. et Chun 945
ignatii Bergius 945
nitida G. Don 946
umbellata (Lour.) Merr. 946
wallichiana Steud. ex DC. 945
yunnanensis S. Y. Bao 945
Sturnidae 1734
Sturnus Linnaeus 1737
cineraceus Temminck 1737
Stylidiaceae 1238
Stylidium Sw. ex Willd. 1238
*chinense* Lour. 824
uliginosum Sw. 1238
*Stylocatyna attenuata* Voigt 1019
Stylophorum Nutt. 444
*japonicum* Miq. var. *dissecta* Franch. et Sav. 440
lasiocarpum (Oliv.) Fedde 444
*Styphnolobium japonica* (L.) Schott 600
Styracaceae 928
Styrax L. 929
confusus Hemsl. 929
dasyanthus Perkins. 929
faberi Perkins. 929
*fukienensis* W. W. Smith et C. Jeffrey 929
hemsleyanus Diels 929
*hypoglaucus* Perkins. 930
japonicus Sieb. et Zucc. 929
*levéillei* Fedde 928
obassia Sieb. et Zucc. 929
odoratissimus Champ. 929
roseus Dunn 930
rugosus Kurz 930
suberifolius Hook. et Arn. 930
*subniveus* Merr. et Chun 930
tonkinensis (Pierre) Craib ex Hartm. 930
Styrophyton S. Y. Hu 815
caudatum (Diels) S. Y. Hu 815
Suaeda Forsk. ex Scop. 257
glauca (Bunge) Bunge 257
Suggrundus Whitley 1689
meerdervoorti (Bleeker) 1689
Suidae 1769
Suillus Michx. ex Gray 44
aeruginascens (Secr.) Snell 44
bovinus (L. ex Fr.) O. Kuntze 44
granulatus (L. ex Fr.) O. Kuntze 44
grevillei (Klotzsch) Sing. 44
luteus (L. ex Fr.) Gray 44
Sulphur 1793
Sus Linnaeus 1769
scrofa Linnaeus 1769
scrofa domestica Brisson 1770
Swainsonia Salisb. 601
salsula Tarb. 601
Swertia L. 954
angustifolia Buch.-Ham. ex D. Don 954
var. pulchella (D. Don) Burkl. 954
bifolia Batal. 954
bimaculata (Sieb. et Zucc.) Hook. f. et Thoms. ex C. B. Clarke 955
*corniculata* L. 953
cincta Burkl. 954
*corniculata* L. 953
dechotoma L. 955
davidii Franch. 955
delavayi Franch. 955
diluta(Turcz.) Benth. et Hook. f. 955
emeiensis Ma ex T. N. Ho et S.W. Liu 955
erythrosticta Maxim. 955
franchetiana H. Smith 956
*heteranthа* Ling 954
hickinii Burk. 956

houitchensis Franch. 956
macrosperma (C. B. Clarke) C. B. Clarke 956
marginata Schrenk 956
mileensis T. N. Ho et W. L. Shi 956
mussotii Franch. 956
nervosa (G. Don) Wall. ex C.S. Clarke 956
phragmitiphylla T. N. Ho et S. W. Liu 956
pseudochinensis Hara 955
punicea Hemsl. 957
rotatum L. 954
tetraptera Maxim. 956
tibetica Batal. 957
wolfangiana Gruning 957
yunnanensis Burk. 955
*Swietenia surenii* Bl. 662
Sycopsis Oliv. 462
sinensis Oliv. 462
*Symingtonia populnea* (R. Br.) Steenis 460
Sympetrum Newman 1610
darwinianum Selys 1610
infuscatum Selys 1610
Symphoricarpos Duham. 1207
sinensis Rehd. 1207
Symplocaceae 930
Symplocarpus Salisb. 1480
foetidus (L.) Salisb. 1480
Symplocos Jacq. 930
anomala Brand 930
bottryantha Franch. 930
*caudata* Wall. 933
chinensis (Lour.) Druce 931
chunii Merr. 931
cochinchinensis (Lour.) S. Moore 931
confusa Brand 931
congesta Benth. 931
decora Hance 931
dolichotricha Merr. 931
*eriobotryaefolia* Hayata 933
*ernesti* Dunn 932
*ferruginifolia* Kanehira 931
*formosana* Brand 932
*fulvipes* (C. B. Clarke) Brand 932
glauca (Thunb.) Koidz. 931
glomerata King ex Gamble 932
koshunensis Kanehira 931
lancifolia Sieb. et Zucc. 932
laurina (Retz.) Wall. 932
paniculata (Thunb.) Miq. 932
*paniculata* Wall. 932
phyllocalyx C.B. Clarke 932
pilosa Rehd. 932
racemosa Roxb. 932
ramosissima Wall. ex G. Don 933
setchuensis Brand 932
*siapfiana* Lévl. 933
stellaris Brand 933
sumuntia Buch.-Ham. ex D. Don 933
wikstroemiifolia Hayata 933
Synanceiidae 1687
Synbranchidae 1675
Synedrella Gaertn. 1345
nodiflora (Bunge) Maxim. 1346
Syneilesis Maxim. 1346
aconitifolia (Bunge) Maxim. 1346
Syngnathidae 1673
Syngnathoides biaculeatus (Bloch) 1673
Syngnathus Linnaeus 1673
acus Linnaeus 1673
argyrostictus Kaup 1673
cyanospilus Bleeker 1673
djarong Bleeker 1673
Synodidae 1654
Synotis (C. B. Clarke) C. Jeffrey et Y. L. Chen 1346
cappa (Buch.-Ham. ex D. Don) C. Jeffrey et Y. L. Chen 1346
duclouxii (Dunn) C. Jeffrey et Y. L. Chen 1346
erythropappa (Bur. et Franch.) C. Jeffrey et Y. L. Chen 1346
nagensium (C. B. Clarke) C. Jeffrey et Y. L. Chen 1346
triligulata (Buch.-Ham. ex D. Don) C. Jeffrey et Y. L. Chen 1347
Synurus Iljin 1347
deltoides (Ait.) Nakai 1347
Syringa L. 943
meyeri Schneid. 943
oblata Lindl. 943
var. affinis (L. Henry) Lingelsh. 943
persica L. 943
pinnatifolia Hemsl. 943
pubescens Turcz. 943
reticulata (Bl.) Hara var. mandshurica (Maxim.) Hara 943
*suspensa* Thunb. 943
sweginzowii Koehne et Lingelsh. 943
villosa Vahl 944
wolfi Schneid. 944
Syrmaticus Wagler 1725
ellioti (Swinhoe) 1725
humiae (Hume) 1725
reevesii (J.E. Gray) 1725
Syrphidae 1632
Syrrhaptes Illiger 1729
paradoxus (Pallas) 1729
Syzygium Gaertn. 804
araiocladum Merr. et Perry 804
austrosinense (Merr. et Perry) Chang et Miau 805
brachyantherum Merr. et Perry 805
brachythyrsum Merr. et Perry 805
bullockii (Hance) Merr. et Perry 805
buxifolium Hook. et Arn. 805
var. *austrosinense* Merr. et Perry 805

cumini (L.) Skeels 805
fruticosum (Roxb.) DC. 805
grijsii (Hance) Merr. et Perry 805
jambos (L.) Alston 805
var. quocense (Gagnep.) Chang et Miau 806
*nienkui* Merr. et Perry 806
tetragonum Wall. 806

## T

Tabanidae 1631
Tabanus amaenus Walker 1631
*bivittatus* Matsumura 1631
budda Portschinsky 1631
chrysurus Loew 1631
kiangsuensis Kröber 1631
mandarinus Schiner 1631
omeishanensis Xu 1631
pleskei Kröber 1631
sapporensis (Shiraki) 1631
trigonus Coquillet 1631
yamasakii Ouchi 1631
yao Macuart 1631
Tacca Forst. et G. Forst. 1411
chantrieri Andre 1411
*plantaginea* (Hance) Drenth 1410
Taccaceae 1410
Tachaea Leach 1599
chinensis Thielemann 1599
Tachypleidae 1595
Tachypleus Leach 1595
tridentatus Leach 1595
Tadehagi Ohashi 601
triquetrum (L.) Ohashi 601
subsp. pseudotriquetrum (DC.) Ohashi 602
Tadorna Fleming 1718
ferruginea (Pallas) 1718
Taenioididae 1685
*Taeniris miyoshiena* Makino 127
Tagetes L. 1347
erecta L. 1347
patula L. 1347
Taihangia Yü et Li 543
rupestris Yü et Li 543
Taius Jordan et Thompson 1680
tumifrons (Temminck et Schlegel) 1680
Takydromus amurensis (Peters) 1705
septentrionalis Guenther 1705
wolteri Fischer 1705
Talc Schist 1784
Talinum Adans. 237
paniculatum (Jacq.) Gaertn. 237
Talpidae 1746
Talum 1783
Tamaricaceae 774
Tamarindus L. 602
indica L. 602
Tamarix L. 776.
androssowii Litw. 776
arcenthoides Bunge 776
austromongolica Nakai 776
chinensis Lour. 776
elongata Ledeb. 776
gansuensis H. S. Zhang 776
gracelis Willd. 776
hispida Willd. 776
hohenackeri Bunge 776
*juniperina* Bunge 776
kerelinii Bunge 777
laxa Willd. 777
leptostachys Bunge 777
ramosissima Ledeb. 776
sachunensis P. Y. Zhang et M. T. Liou 777
*soongarica* Pall. 775
taklamakaensis M. T. Liou 777
taremensis P. Y. Zhang et M. T. Liou 777
Tamias Trouessort 1753
sibiricus Laxmann 1753
Tamiops swinhoei (Milne-Edwards) 1752
Tanacetum L. 1347
*delavayi* Franch. et W. W. Smith 1303
kennedyi Dunn 1303
*myrianthum* Franch. 1243
*purpureum* Buch.-Ham. ex D. Don 1285
*salicifolium* Matti. 1244
*sibiricum* L. 1297
vulgare L. 1347
Tanakea Franch. et Sav. 491
omeiensis Nakai 491
Tangtsinia S.C. Chen 1559
nanchuanica S. C. Chen 1559
*Tapanava chinensis* Raf. 1478
Taphozous Oken 1748
melanopogon Temminck 1748
Tapiscia Oliv. 704
sinensis Oliv. 704
Taraktogenos Hassk. 764
annanensis Gagnep. 764
*hainanensis* Merr. 763
*merrilliana* (Li) C. Y. Wu 764
Taraxacum Weber 1348
*asiaticum* Dahlst. 1349
bessarabicum (Horan.) Reichb. 1348
bicorne Dahlst. 1348
brassicaefolium Kitag. 1348
calcareum Koral.
compactum Schischk. 1348
*cuspidatum* Dahlst. 1349
dissectum (Ledeb.) Ledeb. 1348
erythropodium Kitag. 1348
falcilobum Kitag. 1348
heterolipis Nakai et Koidz. ex Kitag. 1348
junpeianum Kitam. 1349
lamprolepis Kitag. 1348
leucanthum (Ledeb.) Ledeb. 1349

liaotungensis Kitag. 1349
lilacinum Krassn ex Schischk. 1349
lugubre Dahlst. 1349
macrocarpum Dahlst. 1349
majus Schischk. 1349
mongolicum Hand.-Mazz. 1349
multisectum Kitag. 1349
ohwianum Kitag. 1350
palustre (Willd.) DC. 1350
perpusillum Schischk. 1350
platypecidum Diels 1350
pseudo-albidum Kitag. 1350
sinica Kitag. 1350
tujuksuensis Qraz. 1350
yinshanicum Z. Xu et H. C. Fu 1350
Tarenna Gaertn. 1019
attenuata (Voigt) Hutch. 1019
depauperata Hutch. 1019
mollissima (Hook. et Arn.) C. B. Rob. 1019
*Tarphochlamys affinis* (Griff.) Bremek. 1173
*Tashiroea sinensis* Diels 809
Taxaceae 155
Taxillus Van Tiegh. 213
balansea (Lecomte) Danser 213
caloreas (Diels) Danser 214
chinensis (DC.) Danser 214
delavayi (Van Tiegh.) Danser 214
levinei (Merr.) H.S. Kiu 214
limprichtii (Grüning) H.S. Kiu 214
var. liquidambaricoides (Hayata) H. S. Kiu 214
nigrans (Hance) Danser 215
sutchuenensis (Lecomte) Danser 215
var. duclouxii (Lecomte) H. S. Kiu 215
thibetensis (Lecomte) Danser 215
Taxiphyllum Fleisch. 66
taxirameum (Mitt.) Fleisch. 66
Taxodiceae 148
Taxus L. 155
*baccata* L. subsp. *cuspidata* Sieb. et Zucc. var. *chinensis* Pilger 155
chinensis (Pilger) Rehd. 155
var. mairei (Limee et Lévl.) Cheng et L. K. Fu 155
cuspidata Sieb. et Zucc. 155
*macrophylla* Thunb. 153
*mairei* (Lemee et Lévl.) S.Y. Hu ex Liu 155
yunnanensis Cheng et L. K. Fu 156
*Tecoma mairei* Lèvl. 1161
Tecomaria Spach 1164
capensis (Thunb.) Spach 1164
Tectaria Cávan 122
decurrens (Presl) Cop. 122
subpedata (Harr.) Ching 122
subtriphylla (Hook. et Arn.) Cop. 122
Tectona L. f. 1053
grandis L. f. 1053
Tegenaus domestica (Clerck) 1597
Tegillarca Iredale 1580
granosa Iredale 1580
*Telanthera bettzickiana* Regel 258
Tellinidae 1588
*Teloxys aristata* Moq. 254
Temnopleuridae 1640
Temnopleurus A. Agassiz 1640
hardwickii (Gray) 1640
reevesii (Gray) 1640
toreumaticus (Leske) 1640
Temnotrema sculptum (A. Agassiz) 1640
Tenebrionidae 1625
Tengia Chun 1192
scopulorum Chun 1192
Tenodera aridifolia (Stoll) 1612
sinensis Saussure 1612
Tephroseris (Reichenb.) Reichenb. 1350
flammea (Turcz. ex DC.) Holub. 1350
kirilowii (Turcz. ex DC.) Holub. 1351
phaeantha (Nakai) C. Jeffrey et Y.L. Chen 1351
rufa (Hand.-Mazz.) B. Nord. 1351
Tephrosia Pers. 602
*pulchra* Colebr. 588
purpurea (L.) Pers. 602
Terfezia Tul. 23
leonis (Tul.) Tul. 23
Terfeziaceae 23
Terminalia L. 817
argyrophylla Pott. et Prain 818
bellirica (Gaertn.) Roxb. 818
catappa L. 818
chebula Retz. 818
var. tomentella (Kurz) C. B. Clarke 818
*tomentella* Kurz 818
Terminthia Bernh. 671
paniculata (Wall. ex C. Don) C. Y. Wu et T. L. Ming 671
Termitidae 1612
Termitomyces Heim 39
albuminosus (Berk.) Heim 39
Ternstroemia Mutis ex L. f. 418
gymnanthera (Wight et Arn.) Sprague 418
luteoflora Hu et L. K. Ling 418
Terpsiphone Gloger 1784
paradisi (Linnaeus) 1784
Terra flava Usta 1791
Tessaratoma papillosa (Drury) 1618
Testudinidae 1700
Testudo Linnaeus 1700
elongata Blyth 1700
horsfieldi Gray 1701
impressa (Guenther) 1701
Tetracera L. 402
asiatica (Lour.) Hoogl. 402
scandens (L.) Merr. 402

Tetraclita Schumacher 1598
japonica Pilsbry 1599
Tetraclitidae 1598
*Tetradium trichotoma* Lour. 648
Tetragonia L. 236
*expansa* Murr. 236
tetragonioides (Pall.) O. Kuntze 236
*Tetranthera monopetala* Roxb. 293
*tericea* Nees 294
Tetraodontidae 1691
Tetraogallus J. E. Gray 1726
himalayensis G. R. Gray 1726
tibetanus (Gould) 1726
Tetraonidae
Tetrapanax K. Koch 846
papyriferus (Hook.) K. Koch 846
Tetraplodon B.S. G. 62
mnioides (Hedw.) B.S.G. 62
Tetrastes Keyserling et Blasius 1721
bonasia (Linnaeus) 1722
Tetrastigma Planch. 726
delavayi Gagnep. 726
f. majus W. T. Wang 726
hainanense Chun et How 726
hemsleyanum Diels et Gilg 726
henryi Gagnep. 726
var. mollifolium W. T. Wang 726
var. puberulum W.T. Wang et Cao 727
hypoglaucum Planch. ex Franch. 727
lenticellatum C.Y. Wu 726
obovatum (Laws.) Gagnep. 727
obtectum (Wall.) Planch. 727
var. glabrum (Lévl. et Vant.) Gagnep. 727
var. pilosum (Lévl. et Vant) Gagnep. 727
var. potentilla (Lévl. et Vant.) Gagnep. 727
var. trichocarpum Gagnep. 727
planicaule (Hook. f.) Gagnep. 727
pubinerve Merr. et Chun 728
retinerium Planch. 728
serrulatum (Roxb.) Planch. 728
var. puberulum W. T. Wang 728
shanglingense W. T. Wang 728
triphyllum (Gagnep.) W. T. Wang 728
yunnanensis Gagnep. 728
var. *triphyllum* Gagnep. 728
Tettigoniidae 1612
Teucrium L. 1113
*alborubrum* Hemsl. 1081
anlungense C. Y. Wu et S. Chow 1113
bidentatum Hemsl. 1113
japonicum Willd 1113
var. *pilosum* Pamp. 1113
nepetaefolia Benth. 1046
nepetoides Lévl. 1114
omeiense Sun ex S. Chow 1113
*ornatum* Hemsl. 1081
pernyi Franch. 1113
pilosum (Pamp.) C. Y. Wu et S. Chow 1113
quadrifarium Buch. -Ham. 1114
simplex Vaniot 1114
ussuriense Kom. 1114
viscidum Bl. 1114
var. leiocalyx C. Y. Wu et S. Chow 1114
var. nepetoides (Lévl.) C.Y. Wu et S. Chow 1114
*Thalia canniformis* Forst. 1516
Thalictrum L. 347
acutifolium (Hand. -Mazz.) Boivin 347
alpinum L. 347
var. elatum Ulbr. 347
*aquilegifolium* L. 347
var. sibiricum Regel et Tiling 347
atriplex Finet et Gagnep. 347
baicalense Turcz. 347
var. megalostigma Boivin 350
cirrhosum Lévl. 347
*clavatum* DC. var. *acutifolium* Hand. -Mazz. 347
cultratum Wall. 348
delavayi Franch. 348
faberi Ulbr. 348
fargesii Franch. ex Finet et Gagnep. 348
finetii Boivin 348
foetidum L. 348
var. *glandulosissimum* Finet et Gagnep. 349
foliolosum DC. 349
fortunei S. Moore 349
glandulosissimum (Finet et Gagnep.) W. T. Wang et S. H. Wang 349
var. chaotungense W. T. Wang et S. H. Wang 349
honanense W. T. Wang et S. H. Wang 349
*hypoleucum* Sieb. et Zucc. 350
ichangense Lecoy. ex Oliv. 349
isopyroides C. A. Mey. 349
javanicum Bl. 349
macrorhynchum Franch. 349
megalostigma (Boivin) W. T. Wang 350
microgynum Lecoy. ex Oliv. 350
minus L. 350
var. hypoleucum (Sieb. et Zucc.) Miq. 350
omeiense W. T. Wang 350
petaloideum L. 350
przewalskii Maxim. 350
ramosum Boivin 351
reniforme Wall. 351
reticulatum Franch. 351
robustum Maxim. 351
rutifolium Hook. f. et Thoms. 351
smithii Boivin 351

simplex L. 351
var. brevipes Hara 351
squamiferum Lecoy. 351
squarrosum Steph. ex Willd. 352
*thunbergii* DC. 350
trichopus Franch. 352
tuberiferum Maxim. 352
uncinulatum Franch. 352
virgatum Hook. f. et Thoms. 352
viscosum C.Y. Wu 352
Thamnolia Ach. 59
subuliformis (Ehrh.) W. Culb. 59
vermicularis (Sw.) Ach. 59
Thamnoliaceae 59
*Thea assamica* Mast. 414
*sinensis* L. 413
var. *macrophylla* Sieb. 414
*trichocloda* Rehd. 414
Theaceae 410
Thelenota ananas (Jaeger) 1636
Thelephora Ehrh. ex Fr. 25
vialis Schw. 25
Thelephoraceae 25
Thelypteridaceae 104
Themeda Forsk. 1459
caudata (Nees) A. Camus 1459
*gigantea* (Cav.) Hack. var. *caudata* (Nees) Keng 1459
japonica (Willd.) Tanaka 1459
*triandra* Forsk. var. *japonica* (Willd.) Makino 1459
villosa (Poir.) Camus 1459
Theobroma L. 751
*angusta* L. 747
cacao L. 751
Theopsis chrysantha Hu 412
Thereuonema sp.
Thereuopoda Verhoeff 1607
Thrissa kammalensis (Bleeker) 1653
Thermopsis R. Br. 602
alpina Ledeb. 602
barbata Benth. 602
chinensis Benth. 602
*laburnifolia* D. Don 594
lanceolata R. Br. 602
lupinoides (L.) Link 603
Thesium L. 210
chinensis Turcz. 210
var. longipedunculata Chu 210
emodi Hendry 210
himalense Royle 211
longiflorum Hand.-Mazz. 211
longifolium Turcz. 211
refractum Mey. 211
Thespesia soland. ex Corr. 745
populnea (L.) Soland. ex Corr. 745
Thladiantha Bunge 791
*calcarata* (Wall.) C.B. Clarke 791
cordifolia (Bl.) Cogn. 791
davidii Franch. 791
dentata Cogn. 791
*dictyocarpa* Hand.-Mazz. 791
dubia Bunge 791
globicarpa A. M. Lu et Z. Y. Zhang 791
*grosvenorii* (Swingle) C. Jeffrey 790
henryi Hemsl. 791
var. verrucosa (Cogn.) A. M. Lu et Z. Y. Zhang 791
*heptadactyla* Cogn. 792
hookeri C.B. Clarke 792
var. heptadactyla (Cogn.) A. M. Lu et Z. Y. Zhang 792
var. palmatifolia Chakr. 792
var. pentadactyla (Cogn.) A. M. Lu et Z. Y. Zhang 792
longifolia Cogn. ex Oliv. 792
nudiflora Hemsl. ex Forb. et Hemsl. 792
oliveri Cogn. ex Mottet 792
*pentadactyla* Cogn. 792
sessilifolia Hand.-Mazz. 793
*siamensis* Craib 790
*trifoliolata* (Cogn.) Merr. 792
*verrucosa* Cogn. 791
villosula Cogn. 793
Thlaspi L. 458
arvense L. 458
*bursa-pastoris* L. 449
Thrixspermum Lour. 1560
japonicum (Miq.) Reichb. f. 1560
*Thryocephalon nemoralis* J. R. et G. Forst. 1495
Thuidiaceae 65
Thuidium B. S. G. 65
cymbifolium (Doz. et Molk.) Doz. et Molk. 65
Thuja L. 153
koraiensis Nakai 153
*orientalis* L. 151
*pensilis* Staunt. 149
Thunbergia Retz. 1176
adenophora W. W. Smith 1176
alata Bojer 1176
fragrans Roxb. 1176
grandiflora (Roxb. ex Rottler) Roxb. 1176
lacei Gamble 1176
Thunia Reichb. f. 1560
alba (Lindl.) Reichb. f. 1560
*marshalliana* Reichb. f. 1560
Thunnidae 1682
Thyestilla Aurivillius 1625
gebleri (Faldermann) 1625
Thymelaeaceae 752
Thymus L. 1114
altaicus Klok. et Shost. 1115
*biflora* Buch.-Ham. ex D. Don 1089
*debilis* Bunge 1059

disjunctus Klok. 1115
marschallianus Willd. 1115
mongolicus (Ronn.) Ronn. 1115
proximus Sarg. 1115
quinquecostatus Celak. 1115
var. asiaticus (Kitag.) C. Y. Wu et Y. C. Huang 1115
var. przewalskii (Kom.) Ronn. 1115
*serpyllum* L. var. *mongolicus* Ronn. 1115
vulgaris L. 1115
Thyrocarpus Hance 1039
glochidiatus Maxim. 1039
sampsonii Hance 1039
Thyrsoidae Kaup 1657
macrurus (Bleeker) 1657
Thysanolaena Nees 1459
maxima (Roxb.) O. Kuntze 1459
*Thysanospermum diffusum* Champ. ex Benth. 993
Thysanotus R. Br. 1399
chinensis Benth. 1399
Tiarella L. 491
polyphylla D. Don 491
Tiberia (All.) H. P. Tsui 603
himalaica (Baker) H. P. Tsui 603
Tibicen Berthold 1616
flammatus (Distant) 1616
Tilia L. 735
amurensis Rupr. 735
f. koreana (Nakai) Y. C. Chu 736
var. sibirica (Fisch. et Bayer) Y. C. Chu 736
var. taquetii (Schneid.) Liou et Li 736
chinensis Maxim. 736
henryana Szyszyl. 736
var. subglabra Engl. 736
japonica Simonk. 736
mandshurica Rupr. et Maxim. 736
miqueliana Maxim. 736
mongolica Maxim. 736
oliveri Szyszyl. 736
var. cineracens Rehd. et Wils. 736
omeiensis Fang 737
paucicostata Maxim. 737
tuan Szyszyl. 737
var. chinensis Rehd. et Wils. 737
Tiliaceae 733
*Tiniaria multiflora* (Thunb.) Hu 227
Tinomiscium Miers ex Hook. f. et Thoms. 384
phytocrenoides Kurz. 384
tonkinensi Gagnep. 384
Tinospora Miers 384
capillipes Gagnep. 384
crispa (L.) Miers 384
*gibbericaulis* Hand.-Mazz. 384
*maslersii* Deils 384
sagittata (Oliv.) Gagnep. 384
var. yunnanensis (S. Y. Hu) H. S. Lo 385
sinensis (Lour.) Merr. 385
thoreli Gagnep. 385
*yunnanensis* S. Y. Hu 385
Tinus affinis (Hemsl.) O. Kuntze 899
Tirpitzia H. Hall. 618
ovoidea Chun et How ex W. L. Sha 618
sinensis (Hemsl.) Hall. f. 618
Titanotrichum Solered. 1193
oldhamii (Hemsl.) Solered. 1193
Tithonia Desf. ex Juss. 1351
divarsifolia A. Gray 1351
*Titimannia stachydifolia* Turcz. 1140
Todarodes Steenstrup 1589
pacificus Steenstrup 1589
Toddalia Juss. 652
asiatica (L.) Lam. 652
Tofieldia Huds. 1399
divergens Bur. et Franch. 1399
thibetica Franch. 1399
Telosma Cov. 987
cathayensis Merr. 987
cordata (Burm. f.) Merr. 988
*Toluifera cochinchinensis* Lour. 648
Tolypanthus (Bl.) Reichb. 215
esquirolii (Lévl.) Lauener 215
maclurei (Merr.) Danser 215
Tongoloa Wolff 879
dunnii (H. Boiss.) Wolff 879
silaifolia (H. Boiss.) Wolff 879
stewardii Wolff 879
*Tonstelea prinoides* Willd. 704
Toona (Endl.) Roem. 661
ciliata Roem. 661
microcarpa (C. DC.) Harms 661
sinensis (A. Juss.) Roem. 661
sureni (Bl.) Merr. 662
Torenia L. 1153
benthamiana Hance 1153
concolor Lindl. 1153
flava Benth.-Ham. 1153
fournieri Linden. 1153
glabra Osbeck 1154
violacea (Azaola) Pennell 1154
Toricellia DC. 831
angulata Oliv. 831
var. intermedia (Harms) Hu 831
*intermedia* Harms 831
tiliifolia (Wall.) DC. 831
Torilis Adans. 879
japonica (Houtt.) DC. 879
scabra (Thunb.) DC. 880
Torreya Arn. 156
fargesii Franch. 156
grandis Fort. ex Lindl. 156
jackii Chun 156
nucifera (L.) Sieb. et Zucc. 156

yunnanensis Cheng et L. K. Fu 156
Tournefortia L. 1039
*argusia* Roem. Schul. var. *agustier* DC. 1037
montana L. 1039
*Tovara virginiana* (L.) Rafin.
var. *filiformis* (Thunb.) Steward. 218
*Tovaria bodinieri* Lévl. et Vant. 1376
Toxicodendron (Tourn.) Mill. 671
acuminatum (DC.) C. Y. Wu et T. L. Ming 671
*altissimum* Mill. 656
delavayi (Franch.) F. A. Barkl. 671
var. angustifolium C. Y. Wu 671
grandiflorum C. Y. Wu et T. L. Ming 672
var. longipes (Franch.) C. Y. Wu et T. L. Ming 672
succedaneum (L.) O. Kuntze 672
sylvesre (Sieb. et Zucc.) O. Kuntze 672
trichocarpum (Miq.) O. Kuntze 672
vernicifluum (Stokes) F. A. Barkl. 672
Toxocarpus Wight et Arn. 988
wightianus Hook. et Arn. 988
Toxopneustidae 1640
Trachelospermum Lem. 970
*auritum* Schneid. 964
axillare Hook. f. 970
brevistylum Hand.-Mazz. 970
cathayanum Schneid. 970
dunnii (Lévl.) Lévl. 970
egandulatum D. Fang 970
gracilipes Hook. f. var. hupehense Tsiang et P. T. Li 970
jasminoides (Lindl.) Lem. 970
var. heterophyllum Tsiang 970
*navaillei* Lévl. 959
Trachidermus Heckel 1689
fasciatus Heckel 1689
Trachinocephalus Gill 1654
myops (Bloch et Schneider) 1654
*Trachomitum venetum* (L.) Woods. 961
Trachurus Rafineque 1677
japonicus (Temminck et Schlegel) 1677
Trachycarpus Wendl. 1464
*dracocephalus* R. C. Ching et Y. C. Hsu 1464
fortunei (Hook. f.) Wendl. 1464
nana Becc. 1464
Trachypenaeus curvirostris (Stimpson) 1601
Trachyrhamphus serratus Temminck et Schlegel 1673
Trachyspermum Link 880
ammi (L.) Sprague 880
Tragescantia L. 1431
virginiana L. 1431
*Tragia chamaelea* L. 639
*scandens* L. 402
Tragopogon L. 1351
altaicus S. Nikit. 1351
marginifolius S. Nikit. 1351
orientalis L. 1351
porrifloius L. 1351
pratensis L. 1352
Trametes Fr. 34
cinnabarina (Jacq.) Fr. 34
var. sanguinea (L. ex Fr.) Pilát 35
corrugata (Pers.) Bres. 35
orientalis (Yasuda) Imaz. 35
palisoti (Fr.) Imaz. 35
Trapa L. 800
bicornis Osbeck 801
bispinosa Roxb. 801
incisa Sieb. et Zucc. 801
japonica Fler. 801
*korshinskyi* Vassil. 801
manshurica Fler. 801
f. komarovi (Skv.) S. H. Li et Y. L. Chang 801
maximowiczii Korsh. 801
potaninii Vassil. 801
pseudonicisa Nakai 801
quadrispinosa Roxb. 801
Trapaceae 800
Trema Lour. 180
angustifolia (Planch.) Bl. 180
cannabina Lour. 180
var. dielsiana (Hand.-Mazz.) C. J. Chen 180
*dielsiana* Hand.-Mazz. 180
levigata Hand.-Mazz. 180
orientalis (L.) Bl. 180
*virgata* Bl. 180
Tremacron Craib 1193
forrestii Craib 1193
Trematodes potanini (Semenov) 1624
tenebrioides (Pallas) 1624
Tremella Dill. ex Fr. 25
*auricula* L. ex Hook. 24
cinnabarina (Mont.) Pat. 25
fuciformis Berk. 25
mesenterica Fries 25
Tremellaceae 25
Tremellodon gelatinosum Fr. 25
Tremolitum 1783
Trevesia Vis. 846
palmata (Roxb.) Vis. 847
var. costata Li 847
Trewia L. 640
nudiflora L. 640
Triacanthidae 1691
Triacanthus (Cuvier) Oken 1691
brevirostris Temminck et Schlegel 1691
*Triaenophora* (Hook. f.) Solereder 1154
rupestris (Hemsl.) Solereder 1154
Triakidae 1645

Triakis scyllium Müller et Henle 1646
Triblemma Ching 103
lancem (Thunb.) Ching 103
*Tribrachia reptans* Lindl. 1521
Tribulus L. 616
cistoides L. 616
terrestris L. 616
Tricalysia A. Rich. 1019
dubia (Lindl.) Ohwi 1019
fruticosa (Hemsl.) Schum. 1020
Tricercandra fortunei A. Gray. 391
Trichilia R. Br. 662
connaroides (Wight et Arn.) Bentv. 662
f. glabra Bentv. 662
sinensis Bentv. 662
Trichiurdae 1682
Trichiurus Linnaeus 1682
haumela (Forskal) 1682
muticus (Gray) 1682
savala (Cuvier et Valenciennes) 1682
Trichloomataceae 36
Trichodesmium Ehrh. 3
erythraeum Ehrh. 3
Tricholoma (Fr.) Quél. 40
acerbum (Bull. ex Fr.) Quél. 40
albo-brunneum (Pers. ex Fr.) Quél. 40
album (Scharff. ex Fr.) Quél. 40
fulvum (DC. ex Fr.) Rea 40
gambosum (Fr.) Gill. 40
matsutake (Ito et Imai) Sing. 40
mongolicum Imai 40
muscarium Kawam. 40
*nudum* Quél. 37
robustum (Alb. et Schw. ex Fr.) Richen 40
ustale (Fr.) Quél. 40
vaccinum (Pers. ex Fr.) Quél. 40
virgatum (Fr.) Gill. 40
Tricholomopsis platyphylla (Pers. ex Fr.) Sing. 40
Trichomanes L. 86
auriculata Bl. 86
*badium* Hook. et Grev. 86
fargesii Christ 87
*japonicum* Thunb. 95
naseana Christ 87
orientalis C. Chr. 87
*strigosa* Thunb. 89
*tenuefolia* Burm. 95
Trichosanthes L. 793
*anguina* L. 793
baviensis Gagnep. 793
*bracteata* (Lam.) Voigh 796
*cavaleriei* Lévl. 793
*chingiana* Hand.-Mazz. 795
cordata Roxb. 793
*crenulata* C. Y. Cheng et Yueh 796
cucumerina L. 793
cucumeroides (Ser.) Maxim. 793
*damiaoshanensis* C. Y. Cheng et Yueh 796
dunniana Lévl. 794
*guizhouensis* C. Y. Cheng et Yueh 796
*himalensis* C. B. Clarke 795
*hupehensis* C. Y. Cheng et Yueh 795
hylonoma Hand.-Mazz. 794
jinggangshanica Yueh 794
kerrii Craib 795
kirilowii Maxim. 794
laceribractea Hayata 795
lepiniana (Naud.) Cogn. 795
*macrocarpa* Bl. 787
*multicirrata* C. Y. Cheng et Yueh 796
*obtusiloba* C. Y. Wu ex C. Y. Cheng et Yueh 794
ovata Cogn. 795
ovigera Bl. 795
pedata Merr. et Chun 795
var. *yunnanensis* C. Y. Cheng et Yueh 795
quinquangulata A. Gray 795
reticulinervis C. Y. Wu et S. K. Chen 796
rosthornii Harms 796
var. muticirrata (C. Y. Cheng et Yueh) S. K. Chen 796
*rostrata* Kitam. 795
*rubriflos* Thorel ex Cayla f. *macrosperma* C. Y. Cheng et Yueh 794
*schizostroma* Hayata 795
sericeifolia C. Y. Cheng et Yueh 796
*sinopunctata* C. Y. Cheng et Yueh 795
*stylopodifera* C. Y. Cheng et Yueh 796
subrosea C. Y. Cheng et Yueh 796
tricuspodata Lour. 796
truncata C. B. Clarke 797
*uniflora* Hao 796
villosa Bl. 797
wallichiana (Ser.) Wight 797
*Trichostomum pallidum* Hedw. 61
*Trichydium* daucoides Franch. 866
Tricyrtis Wall. 1399
*bakeri* Koidz. 1399
latifolia Maxim. 1399
macropoda Miq. 1399
maculata (D. Don) Machride 1399
Tridacna Bruguiere 1586
(Chamestrachea) maxima (Roding) 1586
(Chamestrachea) squamosa Lamack 1586
(Dinodacna) cookiana (Iredale) 1586
Tridacnidae 1586
*Tridesmis pryniflora* Kurz 419
Trifolium L. 603
*duvuricum* Laxm. 583
*dentatum* Waldst. et Kit. 586
fragiferum L. 603
hybridum L. 603
incarnatum L. 603
*indicum* L. 586

lupinaster L. 603
*officinalis* L. 586
pratense L. 603
repens L. 603
Triglidae 1688
Triglochin L. 1361
maritimum L. 1361
palustre L. 1361
Trigonella L. 604
foenum-grecum L. 604
ruthenica L. 604
Trigonostemon Bl. 640
lutescens Y. T. Chang et J. Y. Liang 641
Trigonotis Stev. 1039
amblyosepala Nakai et Kitag. 1039
cavaleriei (Lévl.) Hand.-Mazz. 1040
compressa Johnston 1040
floribunda Johnston 1040
giraldii Brand 1040
laxa Johnston 1040
macrophylla Vant. 1040
microcarpa (DC.) Benth. ex C. B. Clarke 1040
mollis Hemsl. 1040
omeiensis Matsude 1040
peduncularis (Trev.) Benth. 1040
Trillium L. 1400
camtschaticum Pall. 1400
govanianum Wall. 1400
tschonoskii Maxim. 1400
Trimeresurus Lacepede 1711
albolabris Gray 1711
jerdonii Güenther 1711
monticola Güenther 1712
mucrosquamatus (Cantor) 1712
stejnegeri Schmidt 1712
Tringa Linnaeus 1728
nebularia (Gunnerus) 1729
ochropus Linnaeus 1728
totanus (Linnaeus) 1728
Trionychidae 1702
Trionyx Geoffray 1702
sinensis Wiegmann 1702
steindachneri Siebenrock 1702
Triosteum L. 1208
*forgesii* Franch. 1208
himalayanum Wall. 1208
*intermedium* Diels 1208
pinnatifidum Maxim. 1208
Triplophysa anglei (Fang) 1667
Triplostegia Wall. ex DC. 1221
glandulifera Wall. ex DC. 1222
grandiflora Gagnep. 1222
Tripneustes Agassiz 1640
gratilla (Linnaeus) 1640
Tripterospermum Bl. 957
chinense (Migo) H. Smith 957
coeruleum (Hand.-Mazz.) H. Smith 957
cordatum (Marq.) H. Smith 957
filcaule (Hemsl.) H. Smith 957
japonicum (Sieb. et Zucc.) Maxim. 957
nienkui (Marq.) C. J. Wu 957
volubile (D. Don) Hara 958
Tripterygium Hook. f. 702
hypoglaucum (Lévl.) Hutch. 703
regelii Sprague et Takeda 703
wilfordii Hook. f. 703
*Trirostellum cardiosperma* (Cogn. ex Oliv.) Z P. Wang et Q. Z. Xie 784
*yixingense* Z. P. Wang et Q. Z. Xie 785
Trisepalum C. B. Clarke 1193
birmanicum (Craib) Burtt 1193
Triticum L. 1459
aestivum L. 1459
*secalinum* Georgi 1448
*Tritonia crocosmaeflora* Nichols. 1417
Triumfetta L. 737
annua L. 737
bartramia L. 737
pilosa Roth. 737
tomentosa Bojer 737
Trochidae 1571
*Trochostigma argyrea* Sieb. et Zucc. 404
*polygama* Sieb.et Zucc. 407
Troglodytes Vieillot 1740
troglodytes (Linnaeus) 1740
Troglodytidae 1740
Trogopterus Heude 1754
xanthipes Milne-Edwards 1754
Trollius L. 352
altaicus C. A. Mey. 352
asiaticus L. 352
buddae Schipcz. 353
chinensis Bunge 353
dschungaricus Regel 353
farreri Stapf 353
japonicus Miq. 353
ledebouri Reichb. 353
macropetalus F. Schwidt 353
pumilus D. Don 353
var. tanguticus Briihl 353
ranunculoides Hemsl. 354
Tropaeolaceae 615
Tropaeolum L. 615
majus L. 615
Truellum perfoliatum (L.) Sojak 228
Trypauchen vagina (Bloch et Schneider) 1685
Tsuga Carr. 148
chinensis (Franch.) Pritz. 148
longibracteata Cheng 148
*mairei* Lemee et Lévl. 155
Tubocapsicum (Wettst.) Makino 1129
anomalum (Franch. et Sav.) Makino 1129
Tulipa L. 1400
altaica Pall. 1400
dasystemon (Regel) Regel 1400

edulis (Miq.) Baker 1400
heterophylla (Regel) Baker 1400
iliensis Regel 1400
Tulostoma Pers. 49
bonianum Pat. 49
brumale Pers. 49
finkii Lloyd 49
jourdanii Pat. 49
laceratum (Ehrenb.) Fr. 49
Tulostomataceae 48
Tulotis Rafin 1560
asiatica Hara 1560
ussuriensis (Regel et Maack) Hara 1560
Tupidanthus Hook. f. et Thoms. 847
calyptratus Hook. f. et Thoms. 847
Tupistra Ker-Gawl. 1400
chinensis Baker 1400
delavayi Franch. 1400
ensifolia Wang et Tang 1401
fimbriata Hand.-Mazz. 1401
langshanensis Z. Y. Zhu 1401
omeiensis Z. Y. Zhu 1401
tui (Wang et Tang) Wang et Liang 1401
watannabei (Hayata) Wang et Liang 1401
wattii (C. B. Clarke) Hook. f. 1401
Turbinidae 1571
Turbo Linnaeus 1571
articulatus Reeve 1571
chrysostomus Linnaeus 1571
cornutus Solander 1571
marmoratus Linnaeus 1571
petholatus Linnaeus 1571
Turczaninowia DC. 1353
fastigiata (Fisch.) DC. 1353
Turdus Linnaeus 1741
merula Linnaeus 1741
mupinensis Laubmann 1742
naumanni Temminck 1742
rubrocanus G. R. Gray 1742
Turnicidae 1726
Turnix Bonnaterre 1726
suscitator (Gmelin) 1726
tanki Blyth 1726
Turpinia Vent. 704
arguta (Lindl.) Seem. 704
Turraea L. 662
pubescens Hellen. 662
Turritella Wollaston 1573
bacillum Kiener 1573
terebra (Linnaeus) 1574
Turritellidae 1573
Tursiops truncatus (Montagu) 1758
Tussilago L. 1352
*anandria* L. 1311
farfara L. 1352
*japonica* L. 1296
Tylophora R. Br. 988
arenicola Merr. 988
astephanoides Tsiang et P. T. Li 988
atrofolliculata Mitc. 988
floribunda Miq. 988
kerrii Craib. 988
koi Merr. 989
mollissima Wight 989
ovata (Lindl.) Hook. ex Steud. 989
panzhuteuga Z. Y. Zhu 989
renchangii Tsiang 989
secamonoides Tsiang 989
silvestris Tsiang 989
trichophylla Tsiang 989
yunnanensis Schltr. 989
Tylorrhynchus Grube 1592
heterochaetus (Quatrefages) 1592
Tylototriton Anderson 1695
verrucosus Anderson 1695
Typha L. 1484
angustata Bory et Chaub. 1484
angustifolia L. 1485
davidiana Hand.-Mazz. 1485
elephantina Roxb. 1485
latifolia L. 1485
laxmanini Lepech. 1485
minima Funk-Hoppe 1485
orientalia Presl 1485
pallida Pobed. 1486
Typhaceae 1484
Typhonium Schott 1480
albidinerum C. Z. Yang et H. Li 1480
calcicolum C. Y. Wu et H. Li 1481
divaricautm (L.) Decne. 1481
diversifolium Wall. ex Schott 1482
flagelliforme(Lodd.) Bl. 1481
giganteum Engl. 1481
hongyanense Z. Y. Zhu 1481
hunanensis H. Li et Z. Q. Liu 1482
omeiense H. Li 1482
roxburghii Schott 1482
trifoliatum Wang et Lo ex H. Li 1482
trilobatum (L.) Schott 1482
Tyromyces Karst. 35
pubescens (Schum. ex Fr.) Imaz. 35
sulphureus (Bull. ex Fr.) Donk 35

## U

Ulmaceae 178
Ulmaridae 1566
Ulmus L. 180
androssowii Litw. var. virgata (Planch.) Grudz. 180
bergmanniana Schneid. 180
var. lasiophylla Schneid. 181
castaneifolia Hemsl. 181
changii Cheng 181
davidiana Planch. 181
var. japonica (Rehd.) Nakai 181
densa Litw. 181

glaucescens Franch. 181
var. lasiocarpa Rehd. 181
*japonica* Sarg. f. *suberosa* Kitag. 181
laciniata (Trautv.) Mayr 181
laevis Pall. 181
*latiophylla* (Schneid.) Cheng 181
macrocarpa Hance 182
*montana* Hemsl. var. *laciniata* Trautv. 181
*multinervis* Cheng 181
parvifolia Jacq. 182
*propinqua* Koidz. 181
pumila L. 182
var. *pilosa* Rehd. 180
tonkinensis Gagnep. 182
*virgata* Wall. ex Planch. 180
Ulothrix Kutz. 5
flacca (Dillwyu) Thuret 5
Ulotrichaceae 5
Ulva L. 6
conglobata Kjellm. 6
fasiata Delide 6
lactuca L. 6
pertusa Kjellm. 6
Ulvaceae 5
Umbelliferae 847
Umbilicaria Hoffm. 56
esculenta (Miyoshi) Minks 56
hypococcinea (Jatta) Llano 56
Umbilicariaceae 56
Umbilicus affine Schrenk 465
erubescens Maxim. 464
Uncaria Schreb. 1020
hirsuta Havil. 1020
homomalla Miq. 1020
laevigata Wall. ex G. Don 1020
lancifolia Hutch. 1020
macrophylla Wall. 1020
membranifolia How 1021
rhynchophylla (Miq.) Jacks. 1021
rhynchophylloides How 1021
scandens (Smith) Hutch. 1021
sessilifructus Roxb. 1021
*sinensis* (Oliv.) Havil. 1021
wangii How 1021
yunnanensis K. C. Hsia 1022
Uncia Gray 1767
uncia Schreber 1767
Undaria Sur. 10
pinnatifida (Harv.) Sur. 10
Unio douglasiae (Gray) 1585
Unionidae 1584
Unona desmos Dunn var. *grandifolia* Finet et Gagnep. 271
*dumosa* Roxb. 271
Upogebia Leach 1603
*major* (*de* Haan) 1603
Upogebiidae 1603
Upupa Linnaeus 1734
*epops* Linnaeus 1734
Upupidae 1734
Uranoscopidae 1681
*Uranoscopus Linnaeus* 1681
japonicus Houttuyn 1681
oligolepis Bleeker 1681
Uraria Desv. 604
*cordifolia* Wall. 605
crinita (L.) Desv. 604
var. macrostachya (Wall.) Benth. 604
lagopodioides (L.) Desv. 604
*macrostachya* Wall. 604
picta Desv. 604
Urariopsis Schindl. 604
brevissima Yang et P. H. Huang 605
cordifolia (Wall.) Schindl. 605
Urena L. 745
*chenensis* Osbeck 746
lobata L. 745
var. chinensis (Osbeck) S. Y. Hu 746
var. scabriuscula (DC.) Walp. 746
var. yunnanensis S. Y. Hu 746
procumbens L. 746
repanda Roxb. ex J. E. Smith 746
*scabriuscula* DC. 746
Urochordata 1641
Uroctea Dufour 1596
compactilis L. Koch 1596
lesserti Schenkel 1596
*Urocteidae* 1596
Urophyllum Wall. 1022
chinense Merr. et Chun 1022
Urophysa Ulbr. 354
henryi (Oliv.) Ulbr. 354
Ursidae 1761
Ursus arctos Linnaeus 1761
Urticaceae 192
Urtica L. 206
*angulata* Bl. 201
angusitifolia Fisch. ex Hornem. 206
*bulbifera* Sieb. et Zucc. 198
*candicans* Burm. f. 1041
cannabina L. 206
dioica L. 206
*diversifolia* Link. 198
fissa Pritz. 206
*frutescens* Thunb. 200
*glaberrima* Bl. 202
*hirta* Bl. 198
hyperborea Jacq. et Wedd. 206
laetevirens Maxim. 206
subsp. dentata (Hand. -Mazz.) C. J. Chen 206
*longifolia* Burm. f. 195
macrorrhiza Hand. -Mazz. 206
mairei Lévl. 207
*nivea* L. 193

*pumila* L. 204
*puya* Wall. 199
*sanguinea* Bl. 205
*scabrella* Roxb. 193
*sinuata* Bl. 195
*spicata* Thunb. 194
thunbergiana Sieb. et Zucc. 207
tibetica W. T. Wang 207
triangularis Hand.-Mazz. 207
*villosa* Thunb. 185
*Uraparia homomalla* (Miq.) O. Kuntze. 1020
Usnea Wigg. 58
diffracta Vain. 59
longissima Ach. 59
montis-fuji Mot. 59
*zahlbruckneri* Dr. 57
Usneaceae 58
Ustilaginaceae 23
Ustilaginoidea Bref. 21
virens (Cooke) Tak. 21
Ustilago (Pers.) Rouss. 23
crameri Koern 23
*esculenta* P. Henn. 24
maydis (DC.) Corda 24
nuda (Jens.) Rostr. 24
*segetum* var. *nuda* Jens. 24
*zeae* (Schw.) Ung. 24
Utricularia L. 1196
aurea Lour. 1196
bifida L. 1196
Uvaria L. 273
calamistrata Hance 273
*covaleriei* Lévl. 272
grandiflora Roxb. 273
heteroclita Roxb. 275
*macrophylla* Roxb. var. *microcarpa* (Champ. ex Benth.) Finet et Gagnep. 274
microcarpa Champ. ex Benth. 274
*odorata* Lamk. 271
*purpurea* Bl. 273
*suberosa* Roxb. 273
tondinensis Finet et Gagnep. 274
*Uvularia viridescens* Maxim. 1377

## V

Vaccaria V. Wolff 251
segetalis (Neck.) Garcke 251
Vaccinium L. 896
brachybotrys (Franch.) Hand.-Mazz. 896
bracteatum Thunb. 896
bullatum (Dop.) Sleum. 896
carlesii Dunn 896
*chengae* Fang 898
*chinense* Champ 896
conchophyllum Rehd. 896
delavayi Franch. 897
*dunnianum* Wight var. *brachybotrys* Franch. 896
dunalianum Wight 897
var. megaphyllum Sleum. 897
var. urophyllum Rehd. et Wils. 897
fragile Franch. 897
var. mekongense (W. W. Smith) Sleum 897
henryi Hemsl. 897
iteophyllum Hance 897
koreanum Nakai 897
lactum Diels 897
moupinense Franch. 898
myrtillus L. 898
oldhamii Miq. 898
omeiense Fang 898
pseudorobustum Sleum. 898
saxicolum Chun ex Sleum. 898
sikkimense C. B. Clarke 898
*spicatum* (Lour.) Poir. 896
suprocostatum Hand.-Mazz. 898
trichocladum Merr. et Metcalf 898
uliginosum L. 898
urceolatum Hemsl. 899
vitis-idaea L. 899
Valeriana L. 1217
amurensis Smir. ex Kom. 1217
barbulata Diels 1217
daphniflora Hand.-Mazz. 1218
*delavayi* Franch. 1218
fedtschenkoi Conicy 1218
flaccidissima Maxim. 1218
hardwickii Wall 1218
jatamansi Jones 1218
officinalis L. 1218
var. latifolia Miq. 1218
*rupestris* Pall. 1216
*sibirica* L. 1217
*stubendorfi* Kreyer ex Kom. 1218
tangutica Batal. 1219
*villosa* Thunb. 1217
*wallichii* DC. 1218
Valerianaceae 1215
Vallaris Burm. f. 972
indecora (Baill.) Tsiang et P. T. Li 972
*laxiflora* Bl. 968
Vallisneria L. 1361
*alternifolia* Roxb. 1360
natans (Lour.) Hara 1361
Vanda Jones 1560
ameriana Reichb. f. 1560
concolor Bl. ex Lindl. 1561
*kimballianum* Reichb. f. 1545
*multiflora* Lindl. 1517
teres Lindl. 1561
*Vandellia angustifolia* Benth. 1137
*nummularifolia* D. Don 1138
*oblonga* Benth. 1138
*Vandenboschia auriculata* (Bl.) Cop. 86
*fargesii* (Christ) Ching 87

*naseana* (Christ) Ching 87
*orientalis* (C. Chr.) Ching 87
*Vanieria cochinchinensis* Lour. 185
Vanilla Mill. 1561
planifolia Andr. 1561
siamensis Rolfe 1561
Varicorhinus Rüppell 1666
(Scaphesthes) macrolepis (Bleeker) 1666
(Onychostorna) simus (Sauvage et Dabry) 1666
Veneridae 1586
Venerupis (Amygala) variegata (Sowerby) 1587
Ventilago Gaertn. 718
inaequilateralis Merr. et Chun 718
leiocarpa Benth. 718
var. pubescens Y. L. Chen et P. K. Chou 718
Veratrilla (Baill.) Franch. 958
baillonii Franch. 958
Veratrum L. 1401
dahurium (Turcz.) Loes. f. 1401
grandiflorum (Maxim.) Loes. f. 1401
japonicum (Baker) Loes. f. 1401
lobelianum Bernh. 1401
maackii Regel 1401
mengtzeanum Loes. f. 1401
nigrum L. 1401
omeiensis Wang et Tang 1401
oxysepalum Turcz. 1401
*schindleri* Loes. f. 1401
stenophyllum Diels 1401
taliense Loes. f. 1401
Verbascum L. 1154
blattaria L. 1154
phoeniceum L. 1154
songoricum Schrenk ex Fisch. et Mey. 1154
thapsus L. 1154
Verbena L. 1053
*jamaicensis* L. 1053
*nodiflora* L. 1050
officinalis L. 1053
Verbenaceae 1040
*Verbesina acmella* L. 1266
*biflora* L. 1355
*chinensis* L. 1247
*lavenia* L. 1240
*nodiflora* L. 1346
*prostrata* Hook. et Arn. 1355
*prostrata* L. 1292
*urticaefolia* Bl. 1355
Vermiculite Schist 1790
Vermiculitum 1790
Vernicia Lour. 641
fordii (Hemsl.) Airy-Shaw 641
montana Lour. 641
Vernonia Schreb. 1352
*abbreviata* (Wall.) DC. 1353
*andersonii* auct. non C. B. Clarke 1353
anthelmintica (L.) Willd. 1352
aspera (Roxb.) Buch.-Ham. 1352
blanda (Wall.) DC. 1352
*bracteata* Wall. var. *nanicianensis* Pamp. 1353
chingiana Hand.-Mazz. 1353
cinerea (L.) Less. 1353
cumingiana Benth. 1353
esculanta Hemsl. 1353
extensa (Wall.) DC. 1353
*fortunei* Sch.-Bip. 1354
*loloana* Dunn ex Kerr 1171
nanticianensis (Pamp.) Hand.-Mazz. 1353
*papillosa* Franch. 1353
parishii Hook. f. 1354
patula (Dryand.) Merr. 1354
saligna (Wall.) DC. 1354
*speloecicola* Vant. 1279
solanifolia Benth. 1354
spirei Gandog. 1354
squarrosa (D. Don) Less. 1354
*stiboliae* Hand.-Mazz. 1354
volkameriaefolia (Wall.) DC. 1354
Veronica L. 1154
alatavica M. Pop. 1155
anagallis-aquatica L. 1155
anagalloides Guss. 1155
arvensis L. 1155
beccabunga L. 1155
biloba L. 1155
cana Wall. 1155
ciliata Fisch. 1155
subsp. zhongdianensis Hong 1156
*coreana* Nakai 1157
didyma Ten. 1156
eriogyne H. Winkl. 1155
henryi Yamazaki 1156
incana Bl. 1156
javanica Bl. 1156
laxa Benth. 1156
linariifolia Pall. ex Link 1156
subsp. dilatata (Nakai et Kitag.) Hong 1156
var. *dilatata* Nakai et Kitag. 1156
longifolia L. 1157
peregrina L. 1157
persica Poir. 1157
pinnata L. 1157
*polita* Fries 1156
rockii Li 1157
rotunda Nakai var. coreana (Nakai) Yamazaki 1157
serpyllifolia L. 1157
*sibirica* L. 1159
spicata L. 1155
szechuanica Batal. 1155
teucrium L. 1158

undulata Wall. 1158
Veronicastrum Heist. ex Fabr. 1158
axillare (Sieb. et Zucc.) Yamazaki 1158
brunonianum (Benth.) Hong 1158
caulopterum (Hance) Yamazaki 1158
latifolium (Hemsl.) Yamazaki 1158
longispicatum (Merr.) Yamazaki 1159
robustum (Diels) Hong subsp. grandifolium Chin et Hong 1159
sibiricum (L.) Pennell 1159
stenostachyum (Hemsl.) Yamazaki 1158
subsp. plukenetii (Yamazaki) Hong 1159
villosulum (Miq.) Yamazaki 1159
var. glabrum Chin et Hong 1159
yunnanensis (W. W. Smith) Yamazaki 1159
Vertebrates 1643
Vertevrata 1643
Vespa Linnaeus 1634
crabro Linnaeus 1634
ducalis Smith 1634
magnifica Smith 1634
mandarinia Smith 1634
simillima Smith 1634
Vespertilio Thomas 1746
murinus Linnaeus 1747
savii Bonaparte 1747
serotinus Schreber 1747
superans Thomas 1747
Vespertilionidae 1746
Vespidae 1634
Vespula mongolica (Andre) 1634
Viburnum L. 1208
betulifolium Batal. 1208
brachybotryum Hemsl. 1208
bockii Graebn. 1214
*bodinieri* Lévl. 1213
*ceanothoides* C. H. Wright 1210
chinshanense Graebn. 1208
*cordifolium* Wall. et DC. 1212
corymbiflorum Hsu et S. C. Hsu 1209
*crassifolium* Rehd. 1209
cylindricum Buch.-Ham. ex D. Don 1209
dilatatum Thunb. 1209
erosum Thunb. 1209
erubescens Wall. 1209
var. prattii (Graebn.) Rehd. 1209
foetidum Wall. 1209
var. ceanothoides (C. H. Wright) Hand.-Mazz. 1210
var. rectangulatum (Graebn.) Rehds 1210
fordiae Hance 1210
glomeratum Maxim. 1210
hainanense Merr. et Chun 1210
henryi Hemsl. 1210
*ichangensis* Rehd. 1209
inopinatum Craib 1211
*kerceleeri* Carr. 1211
koreanum Nakai 1211
lancifolium Hsu 1211
lutescens Bl. 1211
luzunicum Rolfe 1211
macrocephalum Fort. 1211
f. keteleeri (Carr.) Rehd. 1211
*macrophylla* Thunb. 480
melanocarpum Hsu 1211
mongolicum (Pall.) Rehd. 1212
nervosum D. Don 1212
odoratissimum Ker-Gawl. 1212
opulus L. 1212
var. calvescens (Rehd.) Hara 1212
ovatifolium Rehd. 1212
plicatum Thunb. 1212
f. *tomentosum* (Thunb.) Rehd. 1213
var. tomentosum (Thunb.) Miq. 1213
*prattii* Graebn. 1209
propinquum Hemsl. 1213
punctatum Buch.-Ham. ex D. Don 1213
*rectangulatum* Graebn. 1210
rhytidophyllum Hemsl. 1213
*sargentii* Koehne 1212
var. *calvescens* Rehd. 1212
schensianum Maxim. 1213
sempervirens K. Koch 1213
setigerum Hance 1213
sympodiale Graebn. 1214
taitoense Hayata 1214
ternatum Rehd. 1214
*tomentosum* Thunb. 1213
utile Hemsl. 1214
Vicia L. 605
amoena Fisch. 605
var. oblongifolia Bunge 605
amurensis Oett. 605
angustifolia L. 605
bungei Ohwi 605
cracca L. 605
edentata Wang et Tang 605
faba L. 606
gigantea Bunge 606
hirsuta (L.) S. F. Gray 606
japonica A. Gray 606
kioshanica Baill. 606
multicaulis Ledeb. 606
pseudoorobus Fisch. et C. A. Mey. 606
quinquenervius Miq. 582
ramuliflora (Maxim.) Ohwi 606
f. baicalensis (Turcz.) P. Y. Fu et Y. A. Chen 606
sativa L. 607
var. *angustifolia* (L.) H. T. Ho 605
sikangensis Kung 607
tetrasperma (L.) Schreb. 607
unijuga A. Br. 607
f. albiflora Kitag. 607

var. apoda Maxim. 607
vexillata (L.) A. Rich. 607
var. yunnanensis Franch. 607
*Vicoa auriculata* Cass. 1322
Vigna Savi 607
angularis (Willd.) Ohwi et Ohashi 608
*cylindrica* (L.) Skeels 608
minima (Roxb.) Ohwi et Ohashi 608
radiata (L.) Wilczak 608
*sinensis* (L.) Savi ex Hassk. 608
umbellata (Thunb.) Ohwi et Ohashi 608
unguiculata (L.) Walp. 608
var. catjang (Burm. f) Bertoni 608
var. sesquipedalis (L.) Ohashi 608
Vignadula atrata (Lischke) 1581
*Villebrunea frutescens* (Thunb.) Bl. 200
Vinca L. 972
major L. cv. Variegata 972
*rosea* L. 962
*Vincetoxicum amplexicaule* Sieb. et Zucc. 975
*ascyrifolium* Franch. et Sav. 976
*castaneum* Kitag. 975
inamoenum Maxim. 978
*mongolicum* Maxim. β. *hancockianum* Maxim. 977
*sibiricum* Decne. var. *australe* Maxim. 979
thesioides Freyn 979
Viola L. 765
acuminata Ledeb. 765
*ailsoviana* Kiss 770
*alata* Burgersd. 768
*arcuata* Bl. 768
betonicifolia Smith 765
subsp. *nepalensis* W. Beck. 765
biflora L. 766
var. hirsuta W. Beck. 766
var. platyphylla Delavay ex Franch. 766
*brunneostipulosa* Hand.-Mazz. 767
bulbosa Maxim. 765
*caespitosa* D. Don 765
chaerophylloides (Regel) W. Beck. 766
collina Bess. 766
confusa Champ. 766
cordifolia W. Beck. 771
davidii Franch. 766
delavayi Franch. 766
var. depauporata Diels 767
var. villosa W. Beck. 767
diffusa Ging ex DC. 767
var. glabella H. Boiss. 767
dissecta Ledeb. 767
f. pubescens (Regel) Kitag. 767
dudouxii W. Beck. 767
fargesii H. Boiss. 767
grandisepala W. Beck. 767
grypoceras A. Gray 767
var. pubescens Nakai 768
hamiltoniana D. Don 768
henryi H. Boiss. 771
hirta L. 771
hossei W. Beck. 771
inconspicua Bl. 768
japonica Langsd. 768
kiangsiensis W. Beck. 768
lactiflora Nakai 768
mandshurica W. Beck. 771
f. albiflora P. Y. Fu et Y. C. Teng 768
mirabilis L. 771
mongolica Franch. 771
moupinensis *Franch.* 768
odorata L. 768
oxycentra Turcz. 769
patrinii DC. 769
phalacrocarpa Maxim. 771
philippica Cav. 769
subsp. malesica W. Beck. 769
subsp. *munda* W. Beck. 770
pilosa Bl. 769
*pinnata* L. var. *chaerphylloides* Regel 766
prattii W. Beck. 765
principis H. Boiss. 769
prionantha Bunge 771
rockiana W. Beck. 769
rossii Hemsl. 769
schneideri W. Beck. 769
selkirkii Pursh. 770
*serpens* Wall. ex Ging 769
stewardiana W. Beck. 771
tianshanica Maxim. 770
triangulifolia W. Beck. 770
tricolor L. 770
var. *hortensis* DC. 770
*vaginata* Maxim. 768
variegata Fisch. 770
verecunda A. Gray 770
xanthopetala Nakai 771
yedoensis Makino 770
f. candida Kitag. 771
yezoensis Makino 771
yunnanensis W. Beck. et H. Boiss. 771
yunnanfuensis W. Beck. 771
Violaceae 765
Vipera Laurenti 1712
berus (Linnaeus) 1712
Viperidae 1711
Viscum L. 215
*album* L.subsp. *coloratum* Kom. 215
var. meridianum Danser 215
articulatum Burm. f. 215
corolatum (Kom.) Nakai 215
diospyrosicolum Hayata 215
*japonicum* Thunb. 212
*liquidambaricolum* Hayata 214
monoicum Roxb. ex DC. 215

multinerve (Hayata) Hayata 215
nudum Danser 215
*opuntia* Thunb. 212
*orientale* Willd. var. *multinerve* Hayata 215
ovalifolium DC. 216
Vitaceae 719
Vitex L. 1053
canescens Kurz 1053
*cannabifolia* Sieb. et Zucc. 1054
*chinensis* Mill. 1054
*heterophylla* Roxb. var. *puberula* Lam. 1054
*incisa* Lamk. var. *heterophylla* Franch. 1054
*kweichowensis* Péi 1053
*microphylla* (Hand.-Mazz.) Péi ex C. Y. Wu 1054
negundo L. 1054
f. alba Pei 1054
var. cannabifolia (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz. 1054
var. heterophylla (Franch.) Rehd. 1054
f. laxipaniculata Péi 1054
var. microphylla Hand.-Mazz. 1054
*ovata* Thunb. var. *subtrisecta* O. Kuntze 1054
peduncularis Wall. 1054
quinata (Lour.) Will. 1054
var. puberula (Lam.) Moldenke 1054
trifolia L. 1054
var. simplicifolia Cham. 1054
var. subtrisecta (O. Kuntze) Moldenke 1054
Vitis L. 728
adstricta Hance 728
amurensis Rupr. 729
*assamica* Laws. 724
balanseana Planch. 729
betulifolia Diels et Gilg 729
*bodinieri* Lévl. et Vant. 720
bryoniifolia Bunge 729
*chaffanjonii* Lévl. 721
chunganensis Hu 729
chungii Metcalf 729
*corniculata* Benth. 722
davidii (Roman.) Foëx 729
*delavayana* Franch. 721
ficifolia Bunge 729
flexuosa Thunb. 730
var. malayana Planch. 730
var. parvifolia (Roxb.) Gagnep. 730
*hastata* Miq. 724
*henryana* Hemsl. 725
*heterophylla* Thunb. 721
*japonica* Thunb. 722
labrusca L. 730
lanata Roxb. 730
*obovatum* Laws. 727
*obtectum* Wall. 727
*oligocarpa* Lévl. et Vant. 723
*pentaphylla* Thunb. 785
piasezkii Maxim. 730
var. pagnuccii (Roman.) Rehd. 730
*planicaule* Hook. f. 727
*potentilla* Lévl. et Vant. 727
quinquangularis Rehd. 730
var. lobata Gagnep. 730
rapnanda Voighta 730
retordii Roman. 731
romanetii Roman. 731
*seguini* Lévl. 708
silvestrii Pamp. 731
*sinica* Miq. 722
sinocinerea W. T. Wang 731
*tenuifolia* Wight et Arn. 723
*thomsonii* Laws. 732
*thunbergii* Sieb. et Zucc. var. *adstricta* (Hance) Gagnep. 728
var. *cinerea* Gagnep. 731
*trifolia* L. 723
vinifera L. 731
wilsonae Veitch. 731
Vittaria J. Smith 100
filipes Christ 100
flexuosa Fée 100
fudzinoi Makino 100
modesta Hand.-Mazz. 100
Vittariaceae 100
Viverra Linnaeus 1764
zibetha Linnaeus 1764
Viverricula indica Desmarest 1764
Viverridae 1764
Viviparidae 1572
Viviparus Montfort 1573
auodrafus Benson 1573
chui Yen 1573
*Vladimiria berardioidea* (Franch.) Ling 1289
*denticulata* Ling 1289
*edulis* (Franch.) Ling 1289
f. *caulescene* Ling 1289
*forrestii* (Diels) Ling 1289
*muliensis* Hand.-Mazz. 1289
*soulei* (Franch.) Ling 1289
var. *cinerea* Ling 1289
*Volkameria herbaceum* Roxb. 1049
*inermis* L. 1047
*japonica* Thunb. 1048
*serratum* L. 1049
Volutidae 1577
Volvariella Speg. 41
volvacea (Bull. ex Fr.) Sing. 41
Vulpes Oken 1761
ferrilata Hodgson 1761
vulpes Linnaeus 1761
Vulsellidae 1581

## W

Wahlenbergia Schrad. ex Roth 1237
*brevipes* Hemsl. 1233
*clematidea* Schrenk 1228
marginata (Thunb.) A. DC. 1237
Waldheimia Kar. et Kir. 1355
glabra (Decne.) Regel 1355
Waltheria L. 752
*americana* L. 752
indica L. 752
Wedelia Jacq. 1355
biflora (L.) DC. 1355
chinensis (Osbeck) Merr. 1355
prostrata (Hook. et Arn.) Hemsl. 1355
urticaefolia (Bl.) DC. 1355
wallichii Less. 1355
Weigela Thunb. 1214
florida (Bunge) A. DC. 1214
japonica Thunb. var. sinica (Rehd.) Bailey 1214
Weissia Hedw. 61
controversa Hedw. 62
*martiana* Hopp. et Hornsch. 61
Wendlandia Bartl. ex DC. 1022
*chinensis* Merr. 1022
formosana Cowan subsp. breviflora How 1022
scabra Kurz 1022
tinctoria DC. subsp. barbata Cowan 1022
subsp. orientalis Cowan 1022
uvariifolia Hance 1022
subsp. chinensis (Merr.) Cowan 1022
*Werneria ellisii* Hook. f. 1282
Whitfordiodendron Elm. 609
filipes (Dunn) Dunn 609
Whitmania acranulata (Whitma) 1594
edentula (Whitman) 1594
laevis (Baird) 1594
pigra (Whitman) 1594
Whytockia W. W. Smith 1193
tsingiana (Hand.-Mazz.) A. Weber 1193
Wightia Wall. 1159
speciosissima (D. Don) Merr. 1159
Wikstroemia Endl. 756
alba Hand.-Mazz. 756
canescens Meissn. 756
capitata Rehd. 756
chamaedaphne Meissn. 756
dolichantha Diels 757
var. pubescens Domke. 757
effusa Rehd. 757
indica (L.) C. A. Mey. 757
leptophylla W. W. Smith 757
micrantha Hemsl. 757
monnula Hance 757
nutans Champ. 757
paniculata Li 757
pilosa Cheng 758
scytophylla Diels 756
Winchia A. DC. 972
calophylla A. DC. 972
Wisteria Nutt. 609
*chinensis* DC. 609
sinensis (Sims.) Sweet 609
villosa Rehd. 609
Woodfordia Salisb. 800
fruticosa (L.) Kurz 800
Woodsia R. Br. 111
manchuriensis Hook. 111
polystichoides Eaton. 111
Woodsiaceae 111
Woodwardia Smith 112
*harlandii* Hook. 112
japonica (L. f.) Smith 112
orientalis Sw. 112
var. *prolifera* (Hook. et Arn.) Ching 112
prolifera Hook. et Arn. 112
*radicans* (L.) Smith var. *unigemmata* Makino 113
unigemmata (Makino) Nakai 113
Wrightia R. Br. 972
laevis Hook. f. 972
pubescens R. Br. 972
sikkimensis Gamble 973
tomentosa (Roxb.) Roem. et Schult. 973

## X

Xanthium L. 1355
*japonicum* Widder 1356
mongolicum Kitag. 1356
sibiricum Patrin ex Widder 1356
spinosum L. 1356
*strumarium* L. 1356
Xanthoceras Bunge 679
sorbifolia Bunge 679
Xanthochrous Pat. 35
hispidus (Bull. ex Fr.) Pat. 35
rheades (Pers.) Pat. 36
Xanthopappus C. Winkl. 1356
*multicephalus* Ling 1356
subacaulis C. Winkl. 1356
Xenochrophis piscator (Schneider) 1708
Xenocypris Günther 1666
argentea Günther 1666
davidi Bleeker 1666
*Xolisma compta* (W. W. Smith et J. F. Jeffrey) Rehd. 887
*ovalifolia* (Wall.) Rehd. 887
var. *lanceolata* (Wall.) Rehd. 888
*villosa* (Wall.) Rehd. 888
Xylanche G. Beck 1196
himalaica (Hook. f. et Thoms.) G. Beck 1196
Xylaria Hill ex Grev. 22

*nigripes* (Kl.) Sacc. 22
Xylariaceae 22
Xylocopa Latreille 1635
appendiculata Smith 1635
nasalis Westwood 1635
phalothorax (Lepeletier) 1635
sinensis Smith 1635
Xylocopidae 1635
Xylosma G. Forst. 764
controversum Clos 765
*japonicum* (Walp.) A. Gray 765
longifolium Clos 765
racemosum (Sieb. et Zucc.) Miq. 765
var. pubescens Rehd. et Wils. 765
*Xylosteum maackii* Rupr. 1203
Xylotrupes dichotomus (Linnaeus) 1623
Xyridaceae 1432
Xyris L. 1432
pauciflora Willd. 1432

## Y

Yenia Liou 24
esculenta (P. Henn.) Liou 24
Yeniaceae 24
Ynquania Z. Y. Zhu 831
muchuanensis Z. Y. Zhu 831
Youngia Cass. 1356
erythrocarpa (Vant.) Babc. et Stebb. 1356
heterophylla (Hemsl.) Babc. et Stebb. 1356
japonica (L.) DC. 1357
prattii (Babc.) Stebb. 1357
*serotina* Maxim. 1308
stenoma (Turcz.) Ledeb. 1357
tenuicaulis (Babc. et Stebb.) Czerep. 1356
tenuifolia (Willd.) Babc. et Stebb. 1356
Ypsilandra Franch. 1402
alponia Wang et Tang 1402
cavaleriei Lévl. 1402
kansuensis R. N. Zhao et Z. X. Peng 1402
thibetica Franch. 1402
yunnanensis W. W. Smith et J. E. Jeffrey 1402
Yua C. L. Li 731
austro-orientalis (Metcalf) C. L. Li 731
thomsonii (Laws.) C. L. Li 732
Yucca L. 1406
gloriosa L. 1406

## Z

Zacco Jordan et Evermann 1666
platypus (Temminck et schlegel) 1666
Zanonia L. 797
indica L. 797
*laxa* Wall. 785
*Zanthoxylon connaroides* Wight et Arn. 662
Zanthoxylum L. 652
acanthopodium DC. 652
var. timbor Hook. f. 652
var. *villosum* Huang 652
ailanthoides Sieb. et Zucc. 653
armatum DC. 653
f. ferrugineum (Rehd. et Wils.) Huang 653
austrosinensis Huang 653
avicennae (Lam.) DC. 653
bungeanum Maxim. 653
var. pubescens Huang 653
calcicolum Huang 653
*connaroides* Wight et Arn. 662
*cuspidatum* Champ. 655
*daniellii* Benn. 647
dimorphophyllum Hemsl. 654
var. spinifolium Rehd. et Wils. 654
diasitoides Huang 654
dissitum Hemsl. 654
echinocarpum Hemsl. 654
var. tomentosum Huang 654
esquirolii Lévl. 654
laetum Drake 654
micranthum Hemsl. 654
molle Rehd. 653
multijugum Franch. 655
nitidum (Roxb.) DC. 655
f. fastuosum Huang 655
*planispinum* Sieb. et Zucc. 653
podocarpum Hemsl. 655
rhetsoides Drake 655
scandens Bl. 655
schinifolium Sieb. et Zucc. 653
simulans Hance 655
stenophyllum Hemsl. 656
tibetanum Huang 656
*trijoliatum* L. 834
Zaocys Cope 1709
dhumnades (Cantor) 1709
Zea L. 1459
mays L. 1459
Zebrias Jordan et Snyder 1690
zebra (Bloch) 1690
Zebrina Schnizl. 1431
pendula Schnizl. 1431
Zehneria Endl. 797
indica (Lour.) Keraudren 797
maysorensis (Wight et Arn.) Arn. 797
Zelkova Spach 182
schneideriana Hand.-Mazz. 182
sinica Schneid. 182
Zephyranthis Herb. 1409
candeda (Lindl.) Herb. 1409
grandiflora Lindl. 1409
Zingiber Boehm. 1513
cassumuner Roxb. 1514
cochleariforme D. Fang 1514
*corallinum* Hance 1514
leptorrhizum D. Fang 1514
lingyunense D. Fang 1514

mioga (Thunb.) Rosc. 1514
*nigrum* Gaertn. 1504
nudicarpum D. Fang 1514
*officinale* Rosc. 1514
omeiense Z. Y. Zhu 1515
roseum (Roxb.) Rosc. 1515
striolatum Diels 1515
tuangjuum Z. Y. Zhu 1515
zerumbet (L.) Smith 1515
Zingiberaceae 1501
Zinnia L. 1357
elegans Jacq. 1357
Zizania L. 1460
caduciflora (Turcz.) Hand.-Mazz. 1460
*latifloia* Turcz. 1460
latifolia (Griseb.) Turcz. 24
*terrestris* L. 1499
Ziziphora L. 1115
bungeana Juz. 1115
clinopodioides Lam. 1116
pamiroalaica Juz. ex Nevski 1116
tenuior L. 1116
tomentosa Juz. 1116
Ziziphus Mill. 718
*flavescens* Wall. 709
*floribunda* Wall. 709
*hamosa* Wall. 717
incurva Roxb. 718
jujuba Mill. 718
var. inermis (Bunge) Rehd. 719
var. spinosa (Bunge) Hu ex H. F. Chow 719
mauritiana Lam. 719
*vulgris* Lam. var. *inermis* Bunge 719
var. *spinosa* Bunge 719
Zoarcidae 1681
Zoothera Vigors 1742
dauma (Latham) 1742
Zornia J. F. Gmel. 609
gibbosa Spanoghe 609
Zostera L. 1363
marina L. 1363
minor Roth 1363
Zosteropidae 1743
Zosterops Vigors et Horsfield 1743
erythropleura Swinhoe 1743
japonica Temminck et Schlegel 1743
Zygnemataceae 7
Zygocactus Schum. 264
truncatus (Hav.) Schum. 264
Zygophyllaceae 615
Zygopyllum L. 616
fabago L. 616
oxianum A. Boriss. 617
xanthoxylum (Bunge) Maxim. 617

[General Information]
书名=未命名
作者=BEXP
SS号=
加密地址=
下载位置=http://202.195.214.16/02/diskgyx/gyx05/10/!00001.pdg

书名
版权
前言
目录
３７９．叶猴科　Ｃｏｌｏｂｉｄａｅ
３８０．长臂猿科　Ｈｙｌｏｂａｔｉｄａｅ
３８１．穿山甲科　Ｍａｎｉｄａｅ
３８２．鼠兔科　Ｏｃｈｏｔｏｎｉｄａｅ
３８３．兔科　Ｌｅｐｏｒｉｄａｅ
３８４．松鼠科　Ｓｃｉｕｒｉｄａｅ
３８５．鼹鼠科　Ｐｅｔａｕｒｉｓｔｉｄａｅ
３８６．河狸科　Ｃａｓｔｏｒｉｄａｅ
３８７．豪猪科　Ｈｙｓｔｒｉｃｉｄａｅ
３８８．竹鼠科　Ｒｈｉｚｏｍｙｉｄａｅ
３８９．仓鼠科　Ｃｒｉｃｅｔｉｄａｅ
３９０．鼠科　Ｍｕｒｉｄａｅ
３９１．露脊鲸科　Ｂａｌａｅｎｉｄａｅ
３９２．灰鲸科　Ｅｓｃｈｒｉｃｈｔｉｉｄａｅ
３９３．须鲸科　Ｂａｌａｅｎｏｐｔｅｒｉｄａｅ
３９４．抹香鲸科　Ｐｈｙｓｅｔｅｒｉｄａｅ
３９５．淡水豚科　Ｐｌａｔａｎｉｓｔｉｄａｅ
３９６．海豚科　Ｄｅｌｐｈｉｎｉｄａｅ
３９７．鼠海豚科　Ｐｈｏｃｏｅｎｉｄａｅ
３９８．领航鲸科　Ｇｌｏｂｉｃｅｐｈａｌｉｄａｅ
３９９．犬科　Ｃａｎｉｄａｅ
４００．熊科　Ｕｒｓｉｄａｅ
４０１．鼬科　Ｍｕｓｔｅｌｉｄａｅ
４０２．灵猫科　Ｖｉｖｅｒｒｉｄａｅ
４０３．猫科　Ｆｅｌｉｄａｅ
４０４．海狮科　Ｏｔａｒｉｉｄａｅ
４０５．海豹科　Ｐｈｏｃｉｄａｅ
４０６．儒艮科　Ｄｕｇｏｎｇｉｄａｅ
４０７．象科　Ｅｌｅｐｈａｎｔｉｄａｅ
４０８．马科　Ｅｑｕｉｄａｅ
４０９．犀科　Ｒｈｉｎｏｃｅｒｏｔｉｄａｅ
４１０．猪科　Ｓｕｉｄａｅ
４１１．骆驼科　Ｃａｍｅｌｉｄａｅ
４１２．鹿科　Ｃｅｒｖｉｄａｅ
４１３．麝科　Ｍｏｓｃｈｉｄａｅ
４１４．牛科　Ｂｏｖｉｄａｅ
药用矿物
１．铁化合物类
黄铁矿　Ｐｙｒｉｔｕｍ
磁铁矿　Ｍａｇｎｅｔｉｔｕｍ
褐铁矿　Ｌｉｍｏｎｉｔｕｍ
赤铁矿　Ｈｅｍａｔｉｔｕｍ
铁　Ｆｅｒｒｕｍ
水绿矾　Ｍｅｌａｎｔｅｒｉｔｕｍ
纤铁矾　Ｆｉｂｒｏｆｅｒｒｉｔｕｍ
２．铜化合物类
蓝铜矿　Ａｚｕｒｉｔｕｍ
氯铜矿　Ａｔａｃａｍｉｔｕｍ
斑铜矿　Ｂｏｒｎｉｔｕｍ
铜　Ｃｕｐｒｕｍ
孔雀石　Ｍａｌａｃｈｉｔｕｍ
胆矾　Ｃｈａｌｃａｎｔｈｉｔｕｍ
３．镁化合物类
透闪石　Ｔｒｅｍｏｌｉｔｕｍ
阳起石　Ａｃｔｉｎｏｌｉｔｕｍ
滑石　Ｔａｌｕｍ
滑石片岩　Ｔａｌｃ　ｓｃｈｉｓｔ
角闪石石棉　Ａｓｂｅｓｔｏｓ　ｈｏｒｎｂｌｅｎｄｕｍ
软玉　Ｎｅｐｈｒｉｔｕｍ
４．钙化合物类

石膏　Ｇｙｐｓｕｍ
硬石膏　Ａｎｈｙｄｒｉｔｕｍ
透石膏　Ｓｅｌｅｎｉｔｕｍ
纤维石膏　Ｇｙｐｓｕｍ ｆｉｂｒｏｓｕｍ
钙芒硝　Ｇｌａｕｂｅｒｉｔｕｍ
方解石　Ｃａｌｃｉｔｕｍ
白垩　Ｃｒｅｔａ
石灰岩　Ｌｉｍｅｓｔｏｎｕｍ
钟乳石　Ｓｔａｌａｃｔｉｔｕｍ
浮石　Ｐｕｍｅｘ
荧石　Ｆｌｕｏｒｉｔｕｍ
黄土钙质结核　Ｃａｌｃａｒｅｏｕｓ ｌｏｅｓｓｎｏｄｕｌｅ
蛇纹石大理岩　Ｏｐｈｉｃａｌｃｉｔｕｍ
5．钾化合物类
硝石　Ｎｉｔｒｕｍ
２９７．革鲀科　Ａｌｕｔｅｒｉｄａｅ
２９８．鲀科　Ｔｅｔｒａｏｄｏｎｔｉｄａｅ
２９９．刺鲀科　Ｄｉｏｄｏｎｔｉｄａｅ
３００．翻车鲀科　Ｍｏｌｉｄａｅ
３０１．海蛾鱼科　Ｐｅｇａｓｉｄａｅ
３０２．？科　Ｌｏｐｈｉｉｄａｅ
３０３．蝙蝠鱼科　Ｏｇｃｏｃｅｐｈａｌｉｄａｅ
两栖纲　Ａｍｐｈｉｂｉａ
３０４．小鲵科　Ｈｙｎｏｂｉｉｄａｅ
３０５．隐鳃鲵科　Ｃｒｙｐｔｏｂｒａｎｃｈｉｄａｅ
３０６．蝾螈科　Ｓａｌａｍａｎｄｒｉｄａｅ
３０７．盘舌蟾科　Ｄｉｓｃｏｇｌｏｓｓｉｄａｅ
３０８．蟾蜍科　Ｂｕｆｏｎｉｄａｅ
３０９．雨蛙科　Ｈｙｌｉｄａｅ
３１０．蛙科　Ｒａｎｉｄａｅ
３１１．树蛙科　Ｒｈａｃｏｐｈｏｒｉｄａｅ
３１２．姬蛙科　Ｍｉｃｒｏｈｙｌｉｄａｅ
爬行纲　Ｒｅｐｔｉｌｉａ
３１３．平胸龟科　Ｐｌａｔｙｓｔｅｒｎｉｄａｅ
３１４．龟科　Ｅｍｙｄｉｄａｅ
３１５．陆龟科　Ｔｅｓｔｕｄｉｎｉｄａｅ
３１６．海龟科　Ｃｈｅｌｏｎｉｉｄａｅ
３１７．棱皮龟科　Ｄｅｒｍｏｃｈｅｌｙｉｄａｅ
３１８．鳖科　Ｔｒｉｏｎｙｃｈｉｄａｅ
３１９．鬣蜥科　Ａｇａｍｉｄａｅ
３２０．壁虎科　Ｇｅｋｋｏｎｉｄａｅ
３２１．石龙子科　Ｓｃｉｎｃｉｄａｅ
３２２．蜥蜴科　Ｌａｃｅｒｔｉｄａｅ
３２３．蛇蜥科　Ａｎｇｕｉｄａｅ
３２４．蟒科　Ｂｏｉｄａｅ
３２５．游蛇科　Ｃｏｌｕｂｒｉｄａｅ
３２６．眼镜蛇科　Ｅｌａｐｉｄａｅ
３２７．海蛇科　Ｈｙｄｒｏｐｈｉｉｄａｅ
３２８．蝰科　Ｖｉｐｅｒｉｄａｅ
３２９．鼍（钝吻鳄）科　Ｃｒｏｃｏｄｉｄａｅ
鸟纲　Ａｖｅｓ
３３０．鸊鹈？科　Ｐｏｄｉｃｉｐｅｄｉｄａｅ
３３１．鹈鹕科　Ｐｅｌｅｃａｎｉｄａｅ
３３２．鸬鹚科　Ｐｈａｌａｃｒｏｃｏｒａｃｉｄａｅ
３３３．鹭科　Ａｒｄｅｉｄａｅ
３３４．鹳科　Ｃｉｃｏｎｉｉｄａｅ
３３５．鸭科　Ａｎａｔｉｄａｅ
３３６．鹰科　Ａｃｃｉｐｉｔｒｉｄａｅ
３３７．松鸡科　Ｔｅｔｒａｏｎｉｄａｅ
３３８．雉科　Ｐｈａｓｉａｎｉｄａｅ
３３９．三趾鹑科　Ｔｕｒｎｉｃｉｄａｅ
３４０．鹤科　Ｇｒｕｉｄａｅ
３４１．秧鸡科　Ｒａｌｌｉｄａｅ
３４２．鸨科　Ｏｔｉｄａｅ

343. 鹬科　Scolopacidae
344. 鸥科　Laridae
345. 沙鸡科　Pteroclididae
346. 鸠鸽科　Columbidae
347. 鹦鹉科　Psittacidae
348. 杜鹃科　Cuculidae
349. 鸱鸮科　Strigidae
350. 夜鹰科　Caprimulgidae
351. 雨燕科　Apodidae
352. 翠鸟科　Alcedinidae
353. 戴胜科　Upupidae
354. 啄木鸟科　Picidae
355. 百灵科　Alaudidae
356. 燕科　Hirundinidae
357. 鹡鸰科　Motacillidae
358. 黄鹂科　Oriolidae
359. 椋鸟科　Sturnidae
360. 鸦科　Corvidae
361. 河乌科　Cinclidae
362. 鹪鹩科　Troglodytidae
363. 鹟科　Muscicapidae
364. 山雀科　Paridae
365. ?科　Sittidae
366. 攀雀科　Remizidae
367. 绣眼鸟科　Zosteropidae
368. 文鸟科　Ploceidae
369. 雀科　Fringillidae

哺乳纲　Mammalia

370. 猬科　Erinaceidae
371. 鼹鼠科　Talpidae
372. 蝙蝠科　Vespertilionidae
373. 狐蝠科　Pteropidae
374. 鞘尾蝠科　Emballonuridae
375. 菊头蝠科　Rhinolophidae
376. 蹄蝠科　Hipposideridae
377. 懒猴科　Lorisidae
378. 猴科　Cercopithesidae

213. 扁鲨科　Squatinidae
214. 锯鲨科　Pristiophoridae
215. 锯鳐科　Pristidae
216. 梨头鳐科　Rhinobatidae
217. 鳐科　Rajidae
218. 虹科　Dasyatidae
219. 燕?科　Gymnuridae
220. 鳐科　Myliobatidae
221. 蝠鲼科　Mobulidae
222. 银鲛科　Chimaeridae

硬骨鱼纲　Osteichthyes

223. 鲟科　Acipenseridae
224. 匙吻鲟科　Polyodontidae
225. 鲱科　Clupeidae
226. 鳀科　Engraulidae
227. 鲑科　Salmonidae
228. 香鱼科　Plecoglossidae
229. 银鱼科　Salangidae
230. 狗母鱼科　Synodidae
231. 龙头鱼科　Harpodontidae
232. 鳗鲡科　Anguillidae
233. 康吉鳗科　Congridae
234. 海鳗科　Muraenesocidae
235. 海鳝科　Muraenidae
236. 蠕鳗科　Echelidae
237. 蛇鳗科　Ophichthyidae
238. 鲤科　Cyprinidae

239. 鳅科　Cobitidae
240. 平鳍鳅科　Homalopteridae
241. 鲇科　Siluridae
242. 胡鲇科　Clariidae
243. 鳗鲇科　Plotosidae
244. 鲿科　Bagridae
245. 钝头?科　Amblycipitidae
246. ?科　Sisoridae
247. 海鲇科　Ariidae
248. 颌针鱼科　Belonidae
249. ?科　Hemiramphidae
250. 飞鱼科　Exocoetidae
251. 鳕科　Gadidae
252. 烟管鱼科　Fistulariidae
253. 玻甲鱼科　Centriscidae
254. 海龙科　Syngnathidae
255. ?科　Sphyraenidae
256. 鲻科　Mugilidae
257. 马鲅科　Polynemidae
258. 合鳃鱼科　Synbranchidae
259. ?科　Serranidae
260. 大眼鲷科　Priacanthidae
261. 乳香鱼科　Lactariidae
262. 方头鱼科　Branchiostegidae
263. ?科　Carangidae
264. 乌鲳科　Formionidae
265. 石首鱼科　Sciaenidae
266. 鳀科　Leiognathidae
267. 鲷科　Sparidae
268. 石鲈科　Pomadasyidae
269. 金钱鱼科　Scatophagidae
270. 隆头鱼科　Labridae
271. ?科　Uranoscopidae
272. 绵鳚科　Zoarcidae
273. 蓝子鱼科　Siganidae
274. 带鱼科　Trichiuridae
275. 鲭科　Scombridae
276. 鲅科　Cybiidae
277. 金枪鱼科　Thunnidae
278. 鲳科　Stromateidae
279. 塘鳢科　Eleotridae
280. ?虎鱼科　Gobiidae
281. 弹涂鱼科　Periophthalmidae
282. 鳗?虎鱼科　Taenioididae
283. 斗鱼科　Belontiidae
284. 乌鳢科　Ophiocephalidae
285. ?科　Echeneidae
286. 鲉科　Scorpaenidae
287. 毒鲉科　Synanceiidae
288. 鲂?科　Triglidae
289. 六线鱼科　Hexagrammidae
290. 鲬科　Platycephalidae
291. 杜父鱼科　Cottidae
292. 牙鲆科　Paralichthyidae
293. 鲽科　Pleuronectidae
294. 鳎科　Soleidae
295. 舌鳎科　Cynoglossidae
296. 三刺鲀科　Triacanthidae

143. 叩甲（叩头虫）科　Elateridae
144. 吉丁虫科　Buprestidae
145. 芫菁科　Meloidae
146. 粉蠹科　Lyctidae
147. 金龟子科　Scarabaeidae
148. 犀金龟科　Dynastidae

149. 鳃金龟科　Melolonthidae
150. 粪金龟科　Geotrupidae
151. 丽金龟科　Rutelidae
152. 花金龟科　Cetoniidae
153. 拟步甲科　Tenebrionidae
154. 沟胫天牛科　Lamiidae
155. 天牛科　Cerambycidae
156. 象甲（象虫）科　Curculionidae
157. 蚁蛉科　Myrmeleontidae
158. 石蛾科　Phryganeidae
159. 蝙蝠蛾科　Hepialidae
160. 蓑蛾科　Psychidae
161. 刺蛾科　Cochlidiidae
162. 草螟科　Crambidae
163. 野螟科　Pyraustidea
164. 天蚕蛾科　Saturniidae
165. 家蚕蛾科　Bombycidae
166. 灯蛾科　Arctiidae
167. 夜蛾科　Noctuidae
168. 弄蝶科　Hesperiidae
169. 粉蝶科　Pieridae
170. 凤蝶科　Papilionidae
171. 绢蝶科　Parnassiidae
172. 虻科　Tabanidae
173. 食蚜蝇科　Syrphidae
174. 丽蝇科　Calliphoridae
175. 蝇科　Muscidae
176. 蚁科　Formicidae
177. 土蜂科　Scoliidae
178. 蜾蠃科　Eumenidae
179. 异腹胡蜂科　Polybiidae
180. 马蜂科　Polistidae
181. 胡蜂科　Vespidae
182. 木蜂科　Xylocopidae
183. 蜜蜂科　Apidae

苔藓动物门　Bryozoa

裸唇纲　Gymnolaemata

184. 胞孔苔虫科　Celleporidae

棘皮动物门　Echinodermata

海参纲　Holothurioidea

185. 刺参科　Stichopodidae
186. 海参科　Holothuriidae

海星纲　Asteroidea

187. 槭海星科　Astropectinidae
188. 角海星科　Goniasteridae
189. 太阳海星科　Solasteridae
190. 棘海星科　Echinasteridae
191. 海燕科　Asterinidae
192. 海盘车科　Asteriidae

蛇尾纲　Ophiuroidea

193. 阳遂足科　Amphiuridae

海胆纲　Echinoidea

194. 长海胆科　Echinometridae
195. 毒棘海胆科　Toxopneustidae
196. 刻肋海胆科　Temnopleuridae
197. 球海胆科　Strongylocentrotidae
198. 蛛网海胆科　Arachnoididae

原索动物门　Protochordata

尾索动物纲　Urochordata

199. 玻璃海鞘科　Cionidae

头索动物纲　Cephalochordata

200. 文昌鱼科　Branchiostomidae

脊椎动物　Vertebrates

脊椎动物门　Vertebrata

圆口纲　Cyclostomata
201. 七鳃鳗科　Petromyzonidae
软骨鱼纲　Chondrichthyes
202. 六鳃鲨科　Hexanchidae
203. 虎鲨科　Heterodontidae
204. 锥齿鲨科　Carchariidae
205. 姥鲨科　Cetorhinidae
206. 须鲨科　Orectolobidae
207. 鲸鲨科　Rhincodontidae
208. 猫鲨科　Scyliorhinidae
209. 皱唇鲨科　Triakidae
210. 真鲨科　Carcharhinidae
211. 双髻鲨科　Sphyrnidae
212. 角鲨科　Squalidae
69. 沙蚕科　Nereidae
70. 矶沙蚕科　Eunicidae
71. 吻沙蚕科　Glyceridae
72. 沙蜡科　Arenicolidae
寡毛纲　Oligochaeta
73. 钜蚓科　Megascolecidae
74. 正蚓科　Lumbricidae
蛭纲　Hirudinea
75. 医蛭科　Hirudidae
76. 山蛭科　Haemadipsidae
节肢动物门　Arthropoda
肢口纲　Merosromata
77. 鲎科　Tachypleidae
蛛形纲　Arachnoidea
78. 钳蝎科　Buthidae
79. 螳？科　Ctenizidae
80. 壁钱科　Urocteidae
81. 圆蛛科　Araneidae
82. 黄金蛛科　Argiopidae
83. 漏斗网蛛科　Agelenidae
84. 跳蛛科　Salticidae
甲壳纲　Crustacea
85. 铠茗荷科　Scalpellidae
86. 茗荷科　Lepadidae
87. 藤壶科　Balanidae
88. 笠藤壶科　Tetraclitidae
89. 缩头水虱科　Cymothoidae
90. 珊瑚水虱科　Corallanidae
91. 团水虱科　Sphaeromidae
92. 栉水虱科　Asellidae
93. 平甲虫科（卷地鳖科）Armadillidae
94. 蜡鼠妇科　Porcellionidae
95. 潮虫科　Oniscidae
96. 海蟑螂（海岸水虱）科　Ligiidae
97. 对虾科　Penaeidae
98. 长臂虾科　Palaemonidae
99. 龙虾科　Palinuridae
100. 河虾科　Astacidae
101. 蝼蛄虾科　Upogebiidae
102. 虾蛄科　Squillidae
103. 寄居蟹科　Paguridae
104. 馒头蟹科　Calappidae
105. 蜘蛛蟹科　Majidae
106. 菱蟹科　Parthenopidae
107. 梭子蟹科　Portunidae
108. 溪蟹科　Potamonidae
109. 华溪蟹科　Sinopotamidae
110. 方蟹科　Grapsidae
唇足纲　Chilopoda
111. 蜈蚣科　Scolopendridae

112. 蚰蜒科 Scutigeridae
倍足纲 Diplopoda
113. 球马陆科 Glomeridae
114. 圆马陆科 Paradoxosomatidae
115. 蟠马陆科 Sphaerotheriidae
116. 山蛩科 Spirobolidae
昆虫纲 Insecta
117. 衣鱼科 Lepismatidae
118. 蜓科 Aeschnidae
119. 蜻科 Libellulidae
120. 蜚蠊科 Blattidae
121. 姬蠊科 Phyllodromiidae
122. 螫蠊科 Corydiidae
123. 螳螂科 Mantidae
124. 鼻白蚁科 Rhinotermitidae
125. 白蚁科 Termitidae
126. 螽斯科 Tettigoniidae
127. 沙螽科 Stenopelmatidae
128. 蝗科 Acrididae
129. 蟋蟀科 Gryllidae
130. 蝼蛄科 Gryllotalpidae
131. 蝉科 Cicadidae
132. 蜡蝉科 Fulgoridae
133. 绵蚜科 Pemphigidae
134. 蚧科 Coccidae
135. 胶蚧科 Laccif eridae
136. 蝽科 Pentatomidae
137. 黾蝽科 Gerridae
138. 步甲科 Carabidae
139. 龙虱科 Dytiscidae
140. 豉甲科 Gyrinidae
141. 隐翅虫科 Staphilinidae
142. 萤科 Lampyridae
纤毛纲 Ciliata
1. 草履虫科 Parameciidae
海绵动物门 Spongia
寻常海绵纲 Demospongiae
2. 简骨海绵科 Haploscleridae
腔肠动物门 Coeleterata
水螅纲 Hydrozoa
3. 水螅科 Hydridae
4. 僧帽水母科 Physalidae
钵水母纲Scyphozoa
5. 洋须水母科 Ulmaridae
6. 霞水母科 Cyaneidae
7. 根口水母科 Rhizostomatidae
珊瑚纲Anthozoa
8. 海葵科 Actiniidae
9. 银冠海葵科 Diadumenidae
10. 滨珊瑚科 Poritidae
11. 枇杷海葵科 Oculinidae
12. 角珊瑚科 Antipathidae
13. 矶花科 Melitodidae
14. 柳珊瑚科 Gorgonidae
15. 海鳃科 Pennatulidae
软体动物门 Mollusca
双神经纲 Amphineura
16. 隐板石鳖科 Cryptoplacidae
17. 锉石鳖科 Ischnochitonidae
腹足纲 Gastropoda
18. 鲍科 Haliotidae
19. 帽贝科 Patellidae
20. 马蹄螺科 Trochidae
21. 蝾螺科 Turbinidae

22．环口螺科　Cyclophoridae
23．田螺科　Viviparidae
24．滨螺科　Littorinidae
25．锥螺科　Turritellidae
26．汇螺科　Potamididae
27．宝贝科　Cypraeidae
28．骨螺科　Muricidae
29．蛾螺科　Buccinidae
30．盔螺科　Galeodidae
31．榧螺科　Olividae
32．涡螺科　Volutidae
33．阿地螺科　Atyidae
34．海兔科　Aplysiidae
35．侧鳃海牛科　Pleurobranchidae
36．石磺海牛科　Homoiodoridiidae
37．椎实螺科　Lymnaeidae
38．石磺科　Oncidiidae
39．玛瑙螺科　Achatinidae
40．坚齿螺科　Camaenidae
41．嗜粘液蛞蝓科　Phiolomycidae
42．蛞蝓科　Limacidae
43．巴蜗牛科　Bradybaenidae
瓣鳃纲　Lamellibranchia
44．蚶科　Arcidae
45．贻贝科　Mytilidae
46．钳蛤科　Vulsellidae
47．珍珠贝科　Pteriidae
48．江珧科　Pinnidae
49．扇贝科　Pectinidae
50．海菊蛤科　Spondylidae
51．海月蛤科　Placunidae
52．牡蛎科　Ostreidae
53．珍珠蚌科　Margaritanidae
54．蚌科　Unionidae
55．蚬科　Corbiculidae
56．砗磲科　Tridacnidae
57．帘蛤科　Veneridae
58．蛤蜊科　Mactridae
59．紫云蛤科　Psammobiidae
60．斧蛤科　Donacidae
61．樱蛤科　Tellinidae
62．竹蛏科　Solenidae
63．海螂科　Myidae
头足纲　Cephalopoda
64．柔鱼科　Ommastrephidae
65．枪乌贼科　Loliginidae
66．乌贼科　Sepiidae
67．蛸（章鱼）科　Octopodidae
星虫动物门　Sipuncula
星虫纲　Sipunculida
68．星虫科　Sipunculidae
环节动物门　Annelida
多毛纲　Polychaeta
137．岩梅科　Diapensiaceae
138．山柳科　Clethraceae
139．鹿蹄草科　Pyrolaceae
140．杜鹃花科　Ericaceae
141．紫金牛科　Ardisiaceae
142．报春花科　Primulaceae
143．白花丹科　Plumbaginaceae
144．山榄科　Sapotaceae
145．柿科　Ebenaceae
146．安息香科　Styracaceae
147．山矾科　Symplocaceae

148. 木犀科　Oleaceae
149. 马钱科　Loganiaceae
150. 龙胆科　Gentianaceae
151. 睡菜科　Menyanthaceae
152. 夹竹桃科　Apocynaceae
153. 萝藦科　Asclepiadaceae
154. 茜草科　Rubiaceae
155. 花葱科　Polemoniaceae
156. 旋花科　Convolvulaceae
157. 紫草科　Boraginaceae
158. 马鞭草科　Verbenaceae
159. 水马齿科　Callitrichaceae
160. 唇形科　Labiatae
161. 茄科　Soianaceae
162. 醉鱼草科　Buddlejaceae
163. 玄参科　Scrophulariaceae
164. 紫葳科　Bignoniaceae
165. 爵床科　Acaathaceae
166. 胡麻科　Pedaliaceae
167. 苦苣苔科　Gesneriaceae
168. 列当科　Orobanchaceae
169. 狸藻科　Lentibulariaceae
170. 苦槛蓝科　Myoporaceae
171. 透骨草科　Phrymataceae
172. 车前科　Plantaginaceae
173. 忍冬科　Caprifoliaceae
174. 败酱科　Valerianaceae
175. 川续断科　Dipsacaceae
176. 桔梗科　Campanulaceae
177. 草海桐科　Goodeniaceae
178. 花柱草科　Stylidiaceae
179. 菊科　Compositae

单子叶植物　Monocotyledoneae

180. 泽泻科　Alismataceae
181. 花蔺科　Butomaceae
182. 水鳖科　Hydrocharitaceae
183. 水麦冬科　Juncaginaceae
184. 眼子菜科　Potamogetonaceae
185. 百合科　Liliaceae
186. 百部科　Stemonaceae
187. 龙舌兰科　Agavaceae
188. 石蒜科　Amaryllidaceae
189. 仙茅科　Hypoxidaceae
190. 箭根薯科　Taccaceae
191. 薯蓣科　Dioscoreaceae
192. 雨久花科　Pontederiaceae
193. 鸢尾科　Iridaceae
194. 水玉簪科　Burmanniaceae
195. 田葱科　Philydraceae
196. 灯心草科　Juncaceae
197. 凤梨科　Bromeliaceae
198. 鸭跖草科　Commelinaceae
199. 黄眼草科　Xyridaceae
200. 谷精草科　Eriocaulaceae
201. 禾本科　Gramineae
202. 棕榈科　Palmae
203. 天南星科　Araceae
204. 浮萍科　Lemnaceae
205. 露兜树科　Pandanaceae
206. 黑三棱科　Sparganiaceae
207. 香蒲科　Typhaceae
208. 莎草科　Cyperaceae
209. 芭蕉科　Musaceae
210. 姜科　Zingiberaceae

211. 美人蕉科　Cannaceae
212. 竹芋科　Marantaceae
213. 兰科　Orchidaceae

药用动物

无脊椎动物　Invertebrates

原生动物门　Protozoa

51. 芍药科　Paeoniaceae
52. 猕猴桃科　Actinidiaceae
53. 金莲木科　Ochnaceae
54. 龙脑香科　Dipterocarpaceae
55. 山茶科（茶科）Theaceae
56. 藤黄科（山竹子科）Cuttiferae
57. 猪笼草科　Nepenthaceae
58. 茅膏菜科　Droseraceae
59. 罂粟科　Papaveraceae
60. 白花菜科　Capparidaceae
61. 十字花科　Cruciferae
62. 悬铃木科　Platanaceae
63. 金缕梅科　Hamamelidaceae
64. 景天科　Crassulaceae
65. 虎耳草科　Saxifragaceae
66. 海桐花科　Pittosporaceae
67. 蔷薇科　Rosaceae
68. 牛栓藤科　Connaraceae
69. 豆科　Leguminosae
70. 酢浆草科　Oxalidaceae
71. 牻牛儿苗科　Geraniaceae
72. 旱金莲科　Tropaeolaceae
73. 蒺藜科　Zygophyllaceae
74. 亚麻科　Linaceae
75. 古柯科　Erythroxylaceae
76. 大戟科　Euphorbiaceae
77. 虎皮楠科　Daphniphyllaceae
78. 芸香科　Rutaceae
79. 苦木科　Simaroubaceae
80. 橄榄科　Burseraceae
81. 楝科　Meliaceae
82. 远志科　Polygalaceae
83. 马桑科　Coriariaceae
84. 漆树科　Anacardiaceae
85. 槭树科　Aceraceae
86. 伯乐树科　Bretschneideraceae
87. 无患子科　Sapindaceae
88. 七叶树科　Hippocastanaceae
89. 清风藤科　Sabiaceae
90. 凤仙花科　Balsaminaceae
91. 冬青科　Aquifoliaceae
92. 卫矛科　Celastraceae
93. 省沽油科　Staphyleaceae
94. 翅子藤科　Hippocrateaceae
95. 黄杨科　Buxaceae
96. 茶茱萸科　Icacinaceae
97. 鼠李科　Rhamnaceae
98. 葡萄科　Vitaceae
99. 火筒树科　Leeaceae
100. 杜英科　Elaeocarpaceae
101. 椴树科　Tiliaceae
102. 锦葵科　Malvaceae
103. 木棉科　Bombacaceae
104. 梧桐科　Sterculiaceae
105. 毒鼠子科　Dichapetalaceae
106. 瑞香科　Thymelaeaceae
107. 胡颓子科　Elaeagnaceae
108. 大风子科　Flacourtiaceae

109. 堇菜科　Violaceae
110. 旌节花科　Stachyuraceae
111. 西番莲科　Passifloraceae
112. 红木科　Bixaceae
113. 柽柳科　Tamaricaceae
114. 沟繁缕科　Elatinaceae
115. 番木瓜科　Caricaceae
116. 秋海棠科　Begoniaceae
117. 葫芦科　Cucurbitaceae
118. 千屈菜科　Lythraceae
119. 菱科　Trapaceae
120. 桃金娘科　Myrtaceae
121. 海桑科　Sonneratiaceae
122. 石榴科　Punicaceae
123. 玉蕊科　Lecythidaceae
124. 野牡丹科　Melastomataceae
125. 红树科　Rhizophoraceae
126. 使君子科　Combretaceae
127. 柳叶菜科　Onagraceae
128. 小二仙草科　Haloragidaceae
129. 杉叶藻科　Hippuridaceae
130. 锁阳科　Cynomoriaceae
131. 八角枫科　Alangiaceae
132. 蓝果树科　Nyssaceae
133. 珙桐科　Davidiaceae
134. 山茱萸科　Cornaceae
135. 五加科　Araliaceae
136. 伞形科　Umbelliferae
27. 裸子蕨科　Hemionitidaceae
28. 车前蕨科　Antrophyaceae
29. 书带蕨科　Vittariaceae
30. 蹄盖蕨科　Athyriaceae
31. 肿足蕨科　Hypodematiaceae
32. 金星蕨科　Thelypteridaceae
33. 铁角蕨科　Asplentaceae
34. 球子蕨科　Onocleaceae
35. 岩蕨科　Wood siaceae
36. 乌毛蕨科　Blechnaceae
37. 鳞毛蕨科　Dryopteridaceae
38. 三叉蕨科　Aspidiaceae
39. 实蕨科　Bolbitidaceae
40. 舌蕨科　Elaphoglossaceae
41. 肾蕨科　Nephrolepidaceae
42. 骨碎补科　Davalliaceae
43. 双扇蕨科　Dipteridaceae
44. 水龙骨科　Polypodiaceae
45. 槲蕨科　Drynariaceae
46. 剑蕨科　Loxogrammaceae
47. 蘋科　Marsileaceae
48. 槐叶蘋科　Salviniaceae
49. 满江红科　Azollaceae

裸子植物Gymnospermae

1. 苏铁科　Cycadaceae
2. 银杏科　Ginkgoaceae
3. 松科　Pinaceae
4. 杉科　Taxodiaceae
5. 柏科　Cupressaceae
6. 罗汉松科　Podocarpaceae
7. 三尖杉科　Cephalotaxaceae
8. 红豆杉科　Taxaceae
9. 麻黄科　Ephedraceae
10. 买麻藤科　Gnetaceae

被子植物　Angiospermae

双子叶植物　Dicotyledoneae

1．木麻黄科　Casuarinaceae
2．杨梅科　Myricaceae
3．胡桃科　Juglandaceae
4．杨柳科　Salicaceae
5．桦木科　Betulaceae
6．壳斗科　Fagaceae
7．马尾树科　Rhoipteleaceae
8．榆科　Ulmaceae
9．杜仲科　Eucommiaceae
10．桑科　Moraceae
11．荨麻科　Urticaceae
12．山龙眼科　Proteaceae
13．铁青树科　Olacaceae
14．山柚子科　Opiliaceae
15．檀香科　Santalaceae
16．桑寄生科　Loranthaceae
17．蛇菰科　Balanophoraceae
18．蓼科　Polygonaceae
19．商陆科　Phytolaccaceae
20．紫茉莉科　Nyctaginaceae
21．粟米草科　Molluginaceae
22．番杏科　Aizoaeeae
23．马齿苋科　Portulacaceae
24．落葵科　Basellaceae
25．石竹科　Caryophyllaceae
26．藜科　Chenopodiaceae
27．苋科　Amaranthaceae
28．仙人掌科　Cactaceae
29．木兰科　Magnoliaceae
30．番荔枝科　Annonaceae
31．肉豆蔻科　Myristicaceae
32．五味子科　Schisandraceae
33．八角科Illicisceae
34．蜡梅科　Calycanthaceae
35．樟科　Lauraceae
36．莲叶桐科　Hernandiaceae
37．领春木科　Eupteleaceae
38．连香树科　Cercidiphyllaceae
39．毛茛科　Ranunculaceae
40．小檗科　Berberidaceae
41．大血藤科　Sargentodoxaceae
42．木通科　Lardizabalaceae
43．防己科　Menispermaceae
44．睡莲科　Nymphaeaceae
45．金鱼藻科　Ceratophyllaceae
46．三白草科　Saururaceae
47．胡椒科　Piperaceae
48．金粟兰科　Chloranthaceae
49．马兜铃科　Aristolochiaceae
50．五桠果科　Dilleniaceae

19．牛排菌科　Fistulinaceae
20．多孔菌科　Polyporaceae
21．口蘑科　Tricholomataceae
22．鹅膏科（毒伞科）Amanitaceae
23．光柄菇科　Pluteaceae
24．蘑菇科（伞菌科）Agaricaceae
25．粪伞科　Bolbitiaceae
26．桩菇科　Paxillaceae
27．铆钉菇科　Gomphidiaceae
28．牛肝菌科　Boletaceae
29．松塔牛肝菌科　Strobilomycetaceae
30．红菇科　Russulaceae
31．鬼笔科　Phallaceae
32．腹菌科　Hymenogastraceae

33. 灰菇包科　Secotiaceae
34. 轴灰包科　Podaxaceae
35. 柄灰包科　Tulostomataceae
36. 马勃科　Lycoperdaceae
37. 地星科　Geastraceae
38. 硬皮马勃科　Sclerodermataceae
39. 鸟巢菌科　Nidulariaceae
40. 暗色孢科　Dematiaceae
41. 丛梗孢科　Moniliaceae

地衣植物Lichenes
1. 皮果衣科　Dermatocarpaceae
2. 牛皮叶科　Stictaceae
3. 石蕊科　Cladoniaceae
4. 珊瑚枝科　Stereocaulaceae
5. 石耳科　Umbilicariaceae
6. 鸡皮衣科　Pertusariaceae
7. 梅衣科　Parmeliaceae
8. 松萝科　Usneaceae
9. 地茶科　Thamnoliaceae

苔藓植物　Bryophyta
藓纲　Musci
1. 泥炭藓科　Sphagnaceae
2. 牛毛藓科　Ditrichaceae
3. 曲尾藓科　Dicranaceae
4. 丛藓科　Pottiaceae
5. 葫芦藓科　Funariaceae
6. 壶藓科　Splachnaceae
7. 真藓科　Bryaceae
8. 提灯藓科　Mniaceae
9. 珠藓科　Bartramiaceae
10. 万年藓科　Climaciaceae
11. 白齿藓科　Leucodontaceac
12. 蔓藓科　Meteriaceae
13. 羽藓科　Thuidiaceae
14. 柳叶藓科　Amblystegiaceae
15. 绢藓科　Entodontaceae
16. 灰藓科　Hypnaceae
17. 金发藓科　Polytrichaceae

苔纲　Hepalicae
18. 耳叶苔科　Frullaniaceae
19. 瘤冠苔科　Grimaldiaceae
20. 蛇苔科　Conocephalaceae
21. 地钱科　Marchantiaceae

蕨类植物门　Pteridophyta
1. 石杉科　Huperziaceae
2. 石松科　Lycopodiaceae
3. 卷柏科　Selaginellaceae
4. 木贼科　Equisetaceae
5. 松叶蕨科　Psilotaceae
6. 七指蕨科　Helminthostachyaceae
7. 阴地蕨科　Botrychiaceae
8. 瓶尔小草科　Ophioglossaceae
9. 观音座莲科　Angiopteridaceae
10. 紫萁科　Osmundaceae
11. 瘤足蕨科　Plagiogyriaceae
12. 里白科　Gleicheniaceae
13. 莎草蕨科　Schizaeaceae
14. 海金沙科　Lygodiaceae
15. 膜蕨科　Hymenophyllaceae
16. 蚌壳蕨科　Dicksoniaceae
17. 桫椤科　Cyatheaceae
18. 稀子蕨科　Monachosoraceae
19. 碗蕨科　Dennstaedtiaceae
20. 鳞始蕨科　Lindsaeaceae

21．姬蕨科　Hypolepidaceae
22．蕨科　Pteridiaceae
23．凤尾蕨科　Pteridaceae
24．中国蕨科　Sinopteridaceae
25．铁线蕨科　Adiantaceae
26．水蕨科　Parkeriaceae
目录
序
《中国中药资源丛书》前言
编写说明
药用植物
藻类植物　Algae
1．颤藻科　Oscillatoriaceae
2．念珠藻科　Nostocaceae
3．鞭枝藻科　Mastigocladaceae
4．胶须藻科　Rivulariaceae
5．衣藻科　Chlamydomonadaceae
6．小球藻科　Chlorellaceae
7．栅藻科　Scenedesmaceae
8．丝藻科　Ulotrichaceae
9．礁膜科　Monostromaceae
10．石莼科　Ulvaceae
11．刚毛藻科　Cladophoraceae
12．松藻科　Codiaceae
13．蕨藻科　Caulepaceae
14．双星藻科　Zygnemataceae
15．轮藻科　Characeae
16．狭果藻科（海蕴科）Spermatochna-ceae
17．铁钉菜科　Ishigeaceae
18．萱藻科　Scytosiphonaceae
19．绳藻科　Chordaceae
20．海带科　Laminariaceae
21．巨藻科　Lessoniaceae
22．翅藻科　Alariaceae
23．墨角藻科　Fucaceae
24．马尾藻科　Sargassaceae
25．钙板金藻科（球石藻科）Coccolithaceae
26．脆杆藻科　Fragilariaceae
27．菱形藻科　Nitzschiaceae
28．膝沟藻科　Gonyaulaceae
29．红毛菜科　Bangiaceae
30．柏桉藻科　Bonnemaisoniaceae
31．石花菜科　Gelidiaceae
32．凝花菜科　Gelidiellaceae
33．内枝藻科　Endocladiaceae
34．隐丝藻科　Cryptonemiaceae
35．珊瑚藻科　Corallinaceae
36．杉藻科　Gigartinaceae
37．育叶藻科　Phyllophoraceae
38．红翎菜科　Solieriaceae
39．江蓠科　Gracilariaceae
40．仙菜科　Ceramiaceae
41．红叶藻科　Delesseriaceae
42．松节藻科　Rhodomelaceae
菌类植物　Fungi
1．假丝菌科　Reticulariaceae
2．霜霉科　Peronosporaceae
3．曲霉科　Eurotiaceae
4．麦角菌科　Clavicipitaceae
5．肉座菌科　Nypocreaceae
6．炭角菌科　Xylariaceae
7．核盘菌科　Sclerotiniaceae
8．羊肚菌科　Morchellaceae
9．地菇科　Terfeziaceae

10．黑粉菌科　Ustilaginaceae
11．菰黑粉菌科　Yeniaceae
12．木耳科　Auriculariaceae
13．银耳科　Tremellaceae
14．革菌科　Thelephoraceae
15．珊瑚菌科　Clavariaceae
16．鸡油菌科　Cantharellaceae
17．干朽菌科　Meruliaceae
18．齿菌科　Hydnaceae
明矾石　Alunitum
6．钠化合物类
硼砂　Borax
石盐　Halitum
食盐　Sal communis
盐水　Salinus
盐卤　Bittenn
芒硝　Mirabilitum
7．汞化合物类
汞　Hydrargyrum
辰砂　Cinnabaris
8．砷化合物类
雄黄　Realgar
雌黄　Auripigmentum
砷华　Arsenolitum
毒砂　Arsenopyritum
9．硅化合物类
石英　Quartz
白云母　Muscovitum
蛭石　Vermiculitum
水云母　Hydromica
高岭石　Kaolinitum
多水高岭石　Halloysitum
玉髓　Chalcedony
水黑云母片岩　Hydrobiotite schist
蛭石片岩　Vermiculite schist
黑云母片岩　Biotite schist
绿泥石化云母碳酸盐片岩　Chloritifiedmica carbonacite
蒙脱石　Montmorillonitum
井底泥　Shaft bottom clay
地浆　Earth mud
漂白土　Fullers earth
灶心土　Terra flava usta
10．有色金属化合物类
自然金　Aurum Natura
自然银　Argentum Natura
菱锌矿　Smithsonitum
水锌矿　Hydrozincitum
锡石　Cassiteritum
软锰矿　Pyrolusitum
方铅矿　Galenitum
11．古动物化石类
古脊椎动物化石　Fossil paleo-vertebrales
古腕足类动物化石　Fossil paleobra-chiopod
古节肢动物化石　Fossil paleoarth-ropod
古石鳖科动物化石　Fossil paleo-trionychidae
12．其他矿物类
自然硫　Sulphur
硇砂　Sal-Ammoniac
松科植物树脂化石　Fossil pinaceaeresim
石油　Petraleum
麦饭石　Maifanitum
矿泉水　Aquae minerale
中名索引
拉丁学名索引

# 历代中医书籍大全分享

你好，我是逢原，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com
二、加我 **QQ/微信：2049346637**
三、关注微信公众平台——**逢原中医**，经常有中医文章更新。
四、关注我的**空间**：**http://user.qzone.qq.com/2049346637**

不管哪种方式，看到你的信息我会第一时间回复，尽全力帮您！

加微信可以扫描以下二维码加我！

私人微信号：2049346637

公众平台：逢原中医