中国医学大成

曹炳章 原辑

七 妇科 儿科分册

中国中医药出版社

中国医学大成

（第七册）

原辑 曹炳章

主校 张年顺　王　凯

协校 吴少祯　田思胜　芮立新
孔　立　冯兴中　张林国
李东晓　夏魁周　马居英
马燕东　李　仑　张晓红

中国中医药出版社

·北京·

图书在版编目（CIP）数据

中国医学大成　（7）/张年顺等主校．-北京：中国中医药出版社，1997.10
ISBN 7-80089-655-2

Ⅰ．中…　Ⅱ．张…　Ⅲ．中国医药学-全集　Ⅳ．R2-52

中国版本图书馆 CIP 数据核字（97）第 09112 号

中国中医药出版社出版

发行者：中国中医药出版社
（北京市朝阳区东兴路七号　电话：64151553　邮码：100027）
印刷者：北京市卫顺印刷厂印刷
经销者：新华书店总店北京发行所
开　本：787×1092 毫米　16 开
字　数：1891 千字
印　张：73.875
版　次：1997 年 10 月第 1 版
印　次：1997 年 10 月第 1 次印刷
册　数：2000
书　号：ISBN7-80089-655-2/R・654
定　价：133.00 元

《中国医学大成》整理委员会

学术顾问 （按姓氏笔画为序）

王玉川　史常永　李今庸　李经纬
余瀛鳌　张灿玾　郭霭春　颜正华

主任委员 余　靖

副主任委员 胡国臣　傅　芳　宋志恒　张年顺
田思胜

委　　员 （按姓氏笔划为序）

马居英　孔　立　王　凯　王国辰
田思胜　冯兴中　李东晓　李世华
李振波　李志庸　刘清国　闫志安
芮立新　吴少祯　宋乃光　杨利平
杨金萍　张年顺　张林国　张　琨
胡国臣　赵含森　郭洪耀　夏魁周
高　萍　谭　红　樊正伦　潘桂娟

总 策 划 樊正伦　吴少祯

责任编辑 吴少祯

前　言

曹炳章（1877～1956），字赤电，近代浙江鄞县曹妙乡人，商人曹显卿之子。炳章幼承庭训，学习经商，拜师于绍兴方晓安门下。时年尚少，即志在医，料理业务之余，则诵读医经，焚膏继晷，孜孜不倦。其师见其可造，赠以《内经》、《金匮》及历代医书。自此，益刻苦自励，晨夕研求，历七载而妙悟医理，声誉鹊起。年二十余，应聘任春成及致大药栈经理，兼行医。此时，财力稍裕，则广收医药孤本秘籍，揣摩研读，学术益精。光绪癸卯（1903）年，浙江名医何廉臣，创办《绍兴医药月报》，邀请炳章任编辑，遂得以同业于何氏，并钻研叶、薛、吴、王四家温暑治法，医道乃大行。先后应诊于同善、同义药局，并创办“和剂药局”，日治近百人，皆应手奏效，危险大症，无不药到病除，名望日隆，病家争先延致。上海神州医药总会成立，炳章出任绍兴分会评议，首倡改良药品，并创办医药卫生报，订正丸散方及炮制药物法，以身作则，旨在振兴中医，造福病家。1920年废止中医事起，炳章被公举为绍兴医药学会会长，与裘吉生等代表中医界赴南京请愿，并组织成立中央国医馆，任南京中央国医馆名誉理事。在此期间，他面对海禁开放，西学东渐，中医衰落之情状，应大东书局之请，奋而约集名医，遍览群书，精选中医典籍中的珍本、孤本、抄本，进行整理，共同批校圈注，补阙正谬。历三十年，于万种古籍中，精选出365种，编成巨帙，名曰《中国医学大成》。炳章不仅汇编此书，其自著医书亦甚多，除《霍乱寒热辨证》、《医医病书》、《辨舌指南》刊行外，尚有22种未梓，其手稿仍存。炳章一生致力于中医事业，为中医古籍的保存和普及作出了巨大的贡献。

《中国医学大成》的编纂，在当时倍受中医界的推崇，认为此书是“寿世宝藏，医林巨观”。原书共计365种，分13类，曰医经、药物、诊断、方剂、通治、外感、内科、外科、妇科、儿科、针灸、医案以及痘疹、推拿、疑难杂症等。每书均写有提要，以明此书之来历、内容之要点；每一类之中均按年代先后次序排列，以便考证。可惜此书刊行未半，日本人侵入，印刷被迫中断，仅有136种问世。1990年，上海科学技术出版社与岳麓书社均将曹氏所刊之书影印出版。之后，岳麓书社又将曹氏已列书目而未刊的医书，稍作调整增补，作“续编”影印刊行，完成了曹氏未完成的大业。

《中国医学大成》的编纂对中医事业做出了巨大的贡献。首先，整理保存了大量的中医经典秘籍。是书搜求博采秦汉至清末的海内孤本、珍本、抄本，殆有万余种，约集名医，精校圈点，厘订精选365种。其所选之书，皆医籍中之精华，如医经类有《黄帝内经素问集注》、《黄帝内经灵枢集注》等；本草类有《神农本草经》、《本草衍义》、《雷公炮制药性解》等；伤寒金匮类有《伤寒贯珠集》、《伤寒补例》、《伤寒来苏集》、《金匮要略心典》等；温病类有《温热逢源》、《瘟疫论》等；通治类有《医学心悟》、《周慎斋医书》、《医学源流论》等；医案医话类有《柳州医话》、《吴鞠通医案》等；此外尚有临床各科、生理、病理、诊断等重要书籍。其次，系统完善了中医理论体系。曹氏将其所选医籍分为13类，每一类之中则按朝代先后为序，每一种书之前有提要，简介全书要点，这样，尽管全书博大，但条理清晰、系统连贯，阅一书则遍览历代医论，窥一类则尽知各家学说，中医精论全在此书之中。再次，普及

推广了中医学术理论。当时正值废止中医案起之时，中医学术低迷衰微，此书的出版无疑是一支兴奋剂，使整个中医界振奋起来，叹为观止。不仅如此，就对提高整体中医素质，使之立于不败之地而言，此书同样作出了巨大贡献。凡治医者，非博览存书，无以阐明医术，医术不精，何谈着手成春？然秦汉至今，医书逾万，即使毕生考校，犹恐不能，况且一般人所购医书，版本不良，校勘不精，错误百出，怎能精通医理？此书一出，实为业医之准绳，医门之法律，而被称为“寿世宝藏，医林巨观”。即使现在也同样如此！

鉴于此，在国家中医药管理局的领导下，中国中医药出版社组织有关专家、学者，重新对此书（仅限于曹炳章厘定刊行的136种）进行点校整理出版，以满足广大中医工作者的需要。

此次整理，在尽量维护原书风格的同时，进行了必要地调整，以方便当今读者阅读，几点原则、简述如下：

1. 全书以现代简化字，标点符号横排；

2. 由于版式的变更，原方位词“左”、“右”一律径改为“下”、“上”；

3. 出于今人的用字习惯，原书“已上”、“已下”一律径改为“以上”、“以下”，量词“钟”径改为“盅”；

4. 中药名称除将“黄耆”径改为“黄芪”外，一律不作改动；

5. 凡属书名，一律加书名号，不出注；

6. 如明显系由刊刻，抄写等所致的错误，则径予改正。如“炙甘草”改为“炙甘草”等等；

7. 原书眉批内容，移于相应章节中，前加“眉批”二字，不出注。

限于我们的整理水平，加之时间仓促，书中难免有误，敬请读者批评指正。

整理者

1997年6月

《中国医学大成》总目录

第一册

黄帝内经素问集注 …… （清） 张隐庵
黄帝内经灵枢集注 …… （清） 张隐庵
灵枢识 …… 〔日〕 丹波元简

第二册

伤寒九十论 …… （宋） 许叔微
阴证略例 …… （元） 王好古
伤寒明理论 …… （宋） 成无己
（明） 吴学勉
伤寒兼证析义 …… （清） 张倬
伤寒贯珠集 …… （清） 尤在泾
伤寒六经辨证治法 …… （清） 沈目南
张卿子伤寒论 …… （清） 张卿子
伤寒补例 …… （清） 周学海
伤寒来苏集（附论翼、附翼） …… （清） 柯琴
重刊金匮玉函经二注 …… （宋） 赵以德
（清） 周扬俊
沈注金匮要略 …… （清） 沈目南
金匮要略心典 …… （清） 尤在泾
金匮翼 …… （清） 尤在泾

第三册

脉经 …… （晋） 王叔和
玉函经 …… （唐） 杜光庭
重订太素脉秘诀 …… （明） 张太素
（清） 刘伯祥
脉语 …… （明） 吴昆
医灯续焰 …… （明） 王绍隆
脉说 …… （清） 叶子雨
望诊遵经 …… （清） 汪广庵
重订诊家直诀 …… （清） 周学海
临证验舌法 …… （清） 杨云峰
察舌辨症新法 …… （清） 刘恒瑞
脉学辑要评 …… 〔日〕 丹波元简
针灸甲乙经 …… （晋） 皇甫谧
巢氏病源补养宣导法 …… （隋） 巢元方
（清） 廖平
针灸素难要旨 …… （明） 高武
〔日〕 冈本一抱子

第四册

瘟疫论 …… （明） 吴有性
重订医门普度温疫论 …… （明） 吴有性
（清） 孔以立
（清） 龚绍林
张氏温暑医旨 …… （清） 张畹香
瘟疫明辨 …… （清） 戴天章
温热暑疫全书 …… （清） 周禹载
（清） 薛生白
（清） 吴正功
温证指归 …… （清） 周杓元
温热病指南集 …… （清） 陈平伯
南病别鉴 …… （清） 叶香岩
（清） 薛生白
（清） 薛公望
痧胀玉衡 …… （清） 郭右陶
疟疾论 …… （清） 韩善征
湿温时疫治疗法 …… 绍兴医学会
增订叶评伤暑全书 …… （清） 张凤逵
（清） 叶子雨
伏气解 …… （清） 叶子雨
伏邪新书 …… （清） 刘吉人
伏阴论 …… （清） 田云槎
羊毛瘟论 …… （清） 隋万宁
温热逢源 …… （清） 柳宝诒
随息居霍乱论 …… （清） 王士雄

瘟疫霍乱答问 …… （清） 陈蛰庐
霍乱审证举要 …… （清） 连文冲
鼠疫抉微 …… （清） 余伯陶
增补评注温病条辨 …… （清） 吴鞠通
（清） 王士雄
（清） 叶子雨

第五册

十药神书 …… （元） 葛可久
（元） 葛文久
增订十药神书 …… （清） 周扬俊
（清） 陈修园
（清） 潘霨
痰火点雪 …… （明） 龚居中
慎柔五书 …… （明） 胡慎柔
理虚元鉴 …… （明） 绮石
虚损启微 …… （清） 洪缉庵
何氏虚劳心传 …… （清） 何嗣宗
症因脉治 …… （明） 秦景明
（明） 秦之桢
周慎斋遗书 …… （明） 周慎斋
医原 …… （清） 石寿棠
脉因证治 …… （元） 朱丹溪
韩氏医通 …… （明） 韩懋
医林改错 …… （清） 王清任
医学举要 …… （清） 徐镛

第六册

一草亭目科全书 …… （清） 邓苑
异授眼科 …… （清） 胡芝樵
银海指南 …… （清） 顾锡
口齿类要 …… （明） 薛己
尤氏喉科秘书 …… （清） 尤乘
重订咽喉脉证通论 …… （清） 许槤
喉舌备要秘旨 …… （清） 佚名
包氏喉证家宝 …… （清） 包三镛
重订囊秘喉书 …… （清） 杨龙九
正体类要 …… （明） 薛己
外科证治全生集 …… （清） 王洪绪
外科选要 …… （清） 唐芥洲
外科阨镜 …… （清） 张贞庵
疡科全书 …… （清） 梁柘轩
疡疹法门 …… （清） 李子毅
徐评外科正宗 …… （明） 陈实功
（清） 徐灵胎

第七册

盘珠集胎产证治 …… （清） 施澹宁
（清） 严西亭
（清） 洪缉庵
胎产指南 …… （清） 单南山
重订产孕集 …… （清） 张曜孙
（清） 包兴言
女科切要 …… （清） 吴道源
经效产宝 …… （唐） 昝殷
女科经纶 …… （清） 萧赓六
校注妇人良方 …… （宋） 陈自明
（明） 薛立斋
慈幼新书 …… （明） 程凤雏
原痘要论 …… （清） 袁（佚名）
麻疹备要方论 …… （清） 吴砚丞
活幼心书 …… （元） 曾世荣
幼科直言 …… （清） 孟介石
小儿卫生总微论方 …… 佚名
幼幼集成 …… （清） 陈复正

第八册

眉寿堂方案选存 …… （清） 叶天士
徐批叶天士晚年方案真本 … （清） 叶天士
（清） 徐灵胎
孙文垣医案 …… （明） 孙泰来
（明） 孙文来
三家医案合刻 …… （清） 叶天士
（清） 缪宜亭
（清） 薛生白
张畹香医案 …… （清） 张畹香
程杏轩医案 …… （清） 程杏轩
何澹安医案 …… （清） 何澹安

邵兰荪医案 …… （清） 邵兰荪
吴鞠通医案 …… （清） 吴 瑭
冷庐医话 …… （清） 陆定圃
柳洲医话 …… （清） 魏玉横
竭塘医话 …… （清） 张景燕
先哲医话 …… 〔日〕 浅田惟常
潜斋医话 …… （清） 王士雄
友渔斋医话 …… （清） 黄退庵
对山医话 …… （清） 毛对山
客尘医话 …… （清） 计寿乔

第九册

巢氏诸病源候总论 …… （隋） 巢元方
儒门事亲 …… （金） 张从正
重订灵兰要览 …… （明） 王肯堂
肯堂医论 …… （明） 王肯堂
知医必辨 …… （清） 李冠仙
研经言 …… （清） 莫枚士
医学读书记 …… （清） 尤在泾
读医随笔 …… （清） 周学海
市隐庐医学杂著 …… （清） 王严士
叶选医衡 …… （清） 叶天士
医学源流论 …… （清） 徐大椿
慎疾刍言 …… （清） 徐大椿
医暇卮言 …… （清） 程 林
医学心悟 …… （清） 程国彭

第十册

神农本草经 …… （魏） 吴 普
（清） 孙星衍
（清） 孙冯翼
珍珠囊补遗药性赋 …… （元） 李东垣
（清） 王晋三
雷公炮制药性解 …… （明） 李中梓
…… （清） 王晋三
重刊本草衍义 …… （宋） 寇宗奭
药征 …… 〔日〕 吉益东洞
药征续编 …… 〔日〕 村井 椿
刘涓子鬼遗方 …… （宋） 龚庆宣
医方考 …… （明） 吴鹤皋
圣济总录纂要 …… （清） 程云来

《中国医学大成》（第七册）总目录

盘珠集胎产症治 ……（清）施澹宁　严西亭　洪辑庵同辑（1）

胎产指南 ……（清）单南山著（41）

重订产孕集 ……（清）张曜孙纂辑（清）包兴言增订（103）

女科切要 ……（清）吴道源著（137）

经效产宝 ……（唐）昝殷撰集（187）

女科经纶 ……（清）萧赓六纂著（219）

校注妇人良方 ……（宋）陈自明编辑（明）薛立斋补注（337）

慈幼新书 ……（明）程凤雏辑（547）

原瘄要论 ……（清）袁（佚名）编辑（631）

麻疹备要方论 ……（清）吴砚丞编辑（653）

活幼心书 ……（元）曾世荣撰著（673）

幼科直言 ……（清）孟介石编著（753）

小儿卫生总微论方 ……佚名（817）

幼幼集成 ……（清）陈复正辑订（1007）

盘珠集胎产症治

〔清〕施澹宁　严西亭　洪缉庵　同辑

《盘珠集胎产症治》提要

清·姚江严洁字西亭，又字青莲。施雯字澹宁，又字文澍。洪炜字缉庵，又字霞城。之三人同纂一书，分上中下三卷。上卷列胎前三十四症，中卷列产后六十一症，下卷列补剂方六十三、散剂方三十一、攻剂方十六、涩剂方三十三、热剂方八、和剂方四十四、泻剂方五，胎前备用良方二十五，产后备用良方十八。共列证九十有五，方二百五十三。其分别证候，皆胎前产后所常有。而采用之方，亦因证施治所必验。严、施、洪三氏生平治妇人经验之法，尽在于斯矣。

《盘珠集胎产症治》目录

卷上　胎前

恶阻……（7）
子烦……（7）
子悬……（8）
子肿……（8）
子满……（8）
子气……（8）
子喑……（8）
子痫……（8）
子痓……（9）
子嗽……（9）
子疟……（9）
心腹痛……（9）
腰胁痛……（10）
下血……（11）
尿血……（11）
转胞……（11）
胎气上逼……（11）
躁……（12）
胎动……（12）
胎痛……（12）
孤浆……（12）
吐血……（12）
伤寒……（13）
痢疾……（13）
泄泻……（13）
霍乱……（14）
伤食……（14）
蛊鸣……（14）
堕胎……（14）
胎不长……（14）
鬼胎……（14）
伤胎……（15）
肠覃石瘕……（15）

卷中　产后

难产……（16）
胎衣不下……（16）
血晕……（17）
厥……（17）
恶露不下……（17）
恶露不绝……（17）
血崩不止……（17）
头痛……（18）
心痛……（18）
腹痛……（18）
小腹痛……（19）
肠痈……（19）
腰痛……（19）
胁痛……（19）
遍身痛……（19）
遍身皮赤肉青……（20）
臌胀……（20）
泄泻……（20）
伤食……（20）
呕吐……（20）
霍乱……（21）
恶阻……（21）
喘急……（21）
蝉声……（21）
浮肿……（21）
发热……（22）
乍寒乍热……（22）
汗……（22）
中风……（23）
不语……（23）
舌出不收……（23）
惊悸……（23）
发狂谵语……（24）

发斑 …… (24)
见鬼 …… (24)
烦渴 …… (24)
咳嗽 …… (24)
口鼻黑衄 …… (24)
症疾 …… (24)
泻痢 …… (25)
褥劳 …… (25)
大便不通 …… (25)
小便不通 …… (26)
便血 …… (26)
遗粪 …… (26)
小便不禁 …… (26)
乳汁不行 …… (26)
乳汁涌出 …… (27)
乳痈 …… (27)
乳悬 …… (27)
玉门不闭 …… (27)
产户痛 …… (27)
阴蚀 …… (27)
阴中湿烂 …… (27)
阴脱 …… (27)
阴突 …… (27)
卷下　列方
补方六十三 …… (28)
散方三十一 …… (30)
攻方十六 …… (32)
涩方三十三 …… (32)
热方八 …… (34)
和方四十四 …… (34)
泻方五 …… (36)
胎前备用良方三十五 …… (36)
产后备用良方十八 …… (38)

盘珠集胎产症治　卷上

施雯滑宁
清　姚江　严洁西亭　同纂
烘炜缉庵
鄞县　曹赤电炳章圈校

胎　前

恶　阻

恶心、头眩、恶食、择食是也。

怀娠两月，宜绝医药。妊娠一月，足厥阴脉养之；二月足少阳脉养之，多致恶心、头眩、喜酸，俗为之病儿，非医药所治、治之则愈甚，待其自安可耳。

怀娠一月，不须安胎。胎未成而呕吐，母病也。若注意安胎，便用砂、苓之类，则反伤脾胃，故但当治其母病，则呕逆自止，惟方药有与病相合，而于胎不相宜者，当去之。

中气不运。孕当两三月，因中气多滞，不能运化，不思谷味，闻食即恶心，多阻，宜疏理脾胃，香砂六君子汤。和三。加乌梅亦可。

禀受怯弱。气血不足，转致内郁，郁气上冲于胃则呕逆，血虚而心失所养则烦闷。宜调血散郁为主，参橘饮。和一。甚有虚弱之极，或作寒热往来，倦怠不能自支，此肝肾不足也，须兼补足厥阴与足少阴经。

胃有痰饮。血壅不行，则饮随气上，停滞肝经，故喜酸物，惟金能克木，宜以辛味胜之，砂仁、藿香，自不可少。半夏虽损胎，不妨权用，但不宜多耳。半夏茯苓汤可酌用之。和二。

胃气虚寒。宜温补脾胃，以下其逆气，六君子汤。补一。

肝火冲胃。寅卯时觉少腹有气上冲，此肝火挟冲脉之火上冲也，故心中烦懊热闷，呕逆不止。宜竹茹麦冬汤。寒一。

气郁伤肝。大怒后，肝气挟胎气上逆也，故胸满眩晕而吐逆，宜疏肝，不宜补气。抑青丸可治。散一。

外伤风寒。呕而头晕，亦有兼风寒外袭者。宜于调气之中，加紫苏以散之。虚则可投参苏二味。

上实下虚。恶阻若兼腰痛，谨防胎堕。宜六君合四物去川芎，加川断、杜仲以安之。切勿用升举药，愈升则上愈实而下愈虚，是促其堕矣。补一、补七。

呕吐不受药。津液燥涸，少阴虚火上浮，厥阴郁火上达，少阳伏火上乘，是以呕吐不能受药也。速当救急以治其标，滋阴清燥汤。寒一。

子　烦

烦症有四：肺虚而火乘之，心烦也；停痰积饮，恶闻食气，胸中烦也；但热而烦，虚烦也；气郁不舒，频吐涎沫，胎动不安，子烦也。

心肺虚热。阴既养胎，孤阳独旺，心肺虚热，故烦，宜清心肺。

心惊胆怯。受胎后，血气壅郁，热气上冲心肺，故烦闷不安，心胆俱怯。竹叶安胎饮，犀角散。肾火动，六味地黄丸。和四、寒三、补二。

停痰积饮。气郁不舒，以致呕吐涎沫，剧则胎动，竹叶汤。寒四。麦冬饮。寒五。

津液枯燥。脏腑气虚，营卫不和，致阴阳偏胜，而热入心脾也。知母丸。寒六。知母饮。寒七。

脾肾气虚而火郁。逍遥散加黄芩、砂仁。和五。

胎气上逼。气逆胀闷，清肝饮。散二。

上焦气郁。郁则为火而中气不和。分气饮。和六。

暴渴不止。血欲凝而渴，非疾也，饮五味于汁自愈。

君火乘肺。盛夏君火大行，上乘肺金，以致烦躁胎动不安。宜清心火。

子　悬

胎气不和，上凑心腹，致胀满痞闷，疼痛不安。

浊气上冲而心腹痛。宜疏气舒郁，紫苏饮。散三。

胎热气逆。孕在三月，君相二火养胎，致胎热冲心而痛。紫苏饮。散三。若胎上攻心，不知人事。宜调中和气饮。寒八。

寒饮与气相争。腹有寒气，小腹如扇，恶寒喜热，子宫寒也。附子汤可权用之。热一。然脉果迟细，方无有误。

子　肿

气壅成湿，湿气上行，面目故肿。子肿肿在头面；子满肿在遍体；子气肿在下体。

脾胃气虚。土气不和，不能制水，水气不化，停积于中而溢子外则肿。白术散。和十八。六君子汤。补一。

感犯风寒。紫苏饮去白芍，加防风。散三。

湿痰壅滞。六君子汤。补一。黑山栀一合，米饮下。

血少气滞。加味归脾汤。补三。

子　满

心胸胀满，气不舒展，或至遍身浮肿，喘急不安。

水血相搏。土不克水，水与血相搏，散于四肢，遂致遍身肿满，少腹急而溲不利。鲤鱼汤、泽泻散。和七、泻一。

湿热肿于下部。补中益气汤，加山栀、茯苓。补六。

伤食吐泻。六君子汤，加砂仁、谷芽。补一。

脾虚胃弱。四君子汤加诃子、姜皮。补四。

风邪外袭。紫苏饮，去人参、白芍，加藿香。散三。

子　气

因素有风湿，妊娠三月后，两脚面浮肿，行走艰难，喘闷似水气状，脚指缝黄水出，谓之子气。切勿作水病治，至分娩自消。

中气不得升发。当疏理郁滞，天仙藤散。散五。

下元虚弱而兼风邪。宜生血行气，乌药顺气汤加减用之。散六。

子　喑

舌为心苗，肺主声音，肺肾为于母之脏。心肺肾三脏，皆能致喑。如妊娠九月而喑，则以胞之络脉系肾。少阴之脉贯肾，上系舌本。脉络阻滞，故有言无声。分娩后自然声出，不必治。

心火克肺。宜降少阴之火。

心肾不足。宜补少阴。

痰涎滞络。宜清痰饮。

子　痫

忽然昏冒，不知人事，甚则角弓反张，须臾自醒，良久复作，此由血虚而外邪袭之也。

血燥类中风。宜清热养血，加味羚羊角散。寒九。又忽然昏迷倒地者，乃血气养胎，母

乏精力，以致眩仆。只宜饮食以补之。

水衰火旺。当泻南补北，使肝火平和，六味加归芍。补二。

外感风寒。憎寒壮热、头疼烦闷，宜芎苏散。散七。

伏热在内。怀孕后，多卧热褥，及食热物，或服峻补之剂，致令热伏胎中，旋挟肝脏，风热攻窜，入脑则头晕昏迷。宜服天冬饮子。寒十。

胃中湿痰。有湿痰则血气壅秘，瘫痪不能举动。宜乌药顺气汤，以发其汗。散六。

风火相煽。钩藤汤，加黄芩、栀子、柴胡。痰涌，加竹沥；风盛，加全虫；气血虚，用八珍汤，加钩藤、栀子；烦热多，加钗斛。散八、补五。若无力而抽搐，汗出如油，汗绝也，不治。

胎气伤于热毒。头眩眼花，腮项暴肿成核，痛甚呕吐。若加痰壅，危在顷刻，急投消风散。散十二。

药毒攻胎，上冲心腹。口不能言，项直，自汗，身热，与子痫相似，六脉浮数，十不一生，速用生白扁豆一味，研末，汲井水灌之。

子　淋

气血养胎不及，宣通渗道，遂使膀胱郁热不化而为淋，法当养血为主，兼利小便。

肝经湿热。龙胆泻肝汤。寒十一。

血虚生热。安荣散。补八。

血得热而溢于脬。劳伤经络，热生于内，热盛血溢，故血随溺中出也，宜养血安胎，四苓加阿胶。泻二。

肾虚不能制水。虚则热客于膀胱，地肤子汤。又四物汤，加知、柏、玄参、麦冬、北五味。泻三、补七。

脐腹胀痛。脾胃气虚也，安胎饮加二陈汤。补九、和八。

肺气虚而溲短。补中益气汤，加山药、麦冬。补六。

服渗湿之剂，而益加频数，或涩而不利。四物汤加知母、川柏、怀牛膝、茯苓、甘草。补七。

腿足转筋。左归饮，加当归、菟丝子、制附子。补二十三。

胎压膀胱。六脉细弱，气血俱虚，不能承载其胎也，补中益气汤，升举其胎，则小便自利。若利小便，胎堕而死。补六。

子　嗽

津血养胎，肺乏濡润，兼之郁火上炎，故嗽不止，法当润肺为主。

胃火冲肺。食生冷又食椒、姜，致伤胎气而咳嗽不止，五虎汤。和七。

脾肺气虚，伤于风寒。补中益气汤，加桑皮、杏仁、桔梗。补六。

肺虚不生水，水虚而火炎。宜清金滋水，又当以安胎为要。

阴火克肺。天冬汤。寒十二。

风寒客肺。宁肺饮。寒十三。

嗽血不止。清肺饮。寒二十七。

子　痫

其母素有肝火，遇孕则水养胎元，肝血愈燥，寒热往来，是以不免似痉，实非痉也，或因气血虚损，风寒乘之。风为阳邪，化气为热，寒为阴邪，化气为寒，阴阳并挟，寒热互见。宜大补气血，轻表外邪。若寒热不已，熏蒸其胎，胎必伤矣。

肝枯发火。逍遥散。和五。

化源不足。六味丸。补二。

气虚寒热。六君子汤去半夏，加藿香。补一。

阴阳之气不和。宜和解，小柴胡汤。和十。

心　腹　痛

脏腑既虚，外触风寒，邪正相击，而并子气，随气上下。冲于心则心痛；攻于腹则腹痛；若至久不瘥，冲于胞胎则胎下。

腹痛恶寒，少腹如扇。子宫受寒而不能合，故开而若扇。宜附子汤。热一。

血胀腹痛。此子宫久虚也，不速治则胎堕。杜仲丸。补十。

痛引两胁，小便数，大便滑。宜安胎和气饮。和十一。

微痛连腰，饮食无味。此胎气不安也。宜安胎饮。补九。

痛不可忍，胎动欲落。若初病而身体强健者，可用纹银数两，先煎，后加茅根二斤，煮汁饮之。

气胀刺痛，肠鸣呕逆。此忿怒忧思过度，饮食失节所致，宜木香散。若气郁生火，加清火之味。散九。

胞阻腹痛。血为胞所阻，不能流行。血滞则气亦滞，故腹中痛。宜四物加胶、艾、甘草。挟风则为浊痰。阿胶能去风而澄浊，艾能导血归经。补七。

脾胃气虚，不能承载。安胎饮加升麻、白术，或补中益气汤。补九、补六。

忽然疠痛。此妊娠至五六月有之。大枣十四枚，炒炭，食盐一钱，炒赤，共研，酒下。

顿仆胎动，腹痛下血。四物加胶、艾，不应，用八珍加胶、艾，或再加知母亦可。若抢心短气，腹满作痛，四物加阿胶、砂仁、陈皮、黄芩。补七、补五。

风邪痰饮，交结于心之支络。宜四物合二陈，加藿香、紫苏，或阿胶散加旋覆花，或当归芍药汤，择而用之。补七、和八、补六十三、补十一。

腹痛连髋。宜五加皮散，或五加皮丸。散十、散十一。

皮肤疼痛，筋骨拘急，手足挛拳。此内食生冷，外受风寒，寒冷之气，内外相搏。而胎不安也，宜安胎和气饮。和十一。

筋骨疼痛，四肢不安。因怪梦多惊，或喧呼忪悸，以致胎气不安，故两胁腹胀，连脐急痛，坐卧不宁，气促如喘。速投大圣散。补十二。

腹痛时作，小腹重坠。血虚气陷也。用加味安胎饮。补十三。

宿寒搏血，血凝气滞。宜五灵脂、蒲黄并炒炭，醋调下；或用五君子汤。补十四。

遍身痛，冲心欲死，不能饮食。宜白术、芍药、黄芩。

心下满，气急切痛。赤茯苓、桑白皮、前胡、郁李仁、苏梗、五加皮。

血虚而热。生地二斤捣汁，和酒一升，煎半服。

胎气自痛。宜内补丸。补十五。

胞络虚而风寒搏之，少腹痛甚。紫苏饮加生姜。如气血两虚，八珍汤可加减用之。散三、补五。

气攻左右，小便不利。小柴胡汤加青皮、栀子。和十。

因怒而小腹疼痛，水道重坠。肝火炽盛所致。龙胆泻肝汤，后用四君加升、柴。寒十一、补四。

小腹痛连腰胁。此惊恼所致也，甚则下血不止。宜阿胶、当归、人参、茯苓，加香附、艾，并炒炭，煎服。

腰　胁　痛

血气荫胎，不能养肾，肾虚而腰必痛；或劳力伤肾，致动胞系，痛甚而胞系必脱；又房事不节，胞系伤而痛不止，遂至胎堕者多矣。宜安胎为主。

肾气虚弱。青娥丸加熟地；八珍汤加杜仲、阿胶、艾、砂仁。补十六、补五。

气血滞而不行。缩砂饮、紫苏饮，加桔梗、香附。散十二、散三。

风邪所乘。此必腰痛如折。紫酒或四物汤加桑寄生、防风。补十七、补七。

闪挫而痛。通气散加安胎饮。补十八、补九。

肝火炽盛。小柴胡汤加左金丸。和十、寒十四。

天阴及久坐而痛。湿热也。二妙散加杜

仲、米仁。和四十四。

腰重如带冷物，寒湿也。通气散加川断、杜仲。补十八。

肝脾郁结。归脾汤加柴胡，加左金丸。补十九、寒十四。

下　血

冲任二脉，上为乳汁，下为月水，受胎则月水应断，冲任气虚，不能固摄，血常溢下，名曰胞漏，莫作月水论，久而不止则胎堕。非时而下为胎漏，依期而漏号激经，尿血溺时方有，胞漏血常下而不停。

见红腰痛。六味丸合四君子汤，去甘草，加杜仲、川断、粘米。补二、补四。

荣血有风。荣经为风所胜，故经血动而下也，所下者本非养胎之血，若认作胎漏，服保养胎元之药，是实实矣，胎必堕下。宜服防风丸。散十三。

按月出血点滴为胎漏。此因气血并虚也。宜服补中安胎饮。补二十。

因事而动，以至下血。二地加枳壳炭二、三分。

顿仆动胎，下血不止。安胎饮加阿胶、艾炒炭；如感寒头痛，加莲须。补九。

胎气内热，迫血妄行。凉胎饮。寒十五。

中气下陷。补中益气汤。补六。

脾气虚，不能摄血。归脾饮。补十九。

肝脾郁怒。加味归脾汤，或小柴胡汤。补三、和十。

肝脾风热。加味逍遥散。补二十一。

肝脾湿热。升阳除湿汤。散十四。

风入肠胃。胃风汤。散十五。

胎急不安，下血不止。桑寄生散。和十二。

因惊而气虚，虚则下陷而见血。安胎饮加入参。补九。

血离其位，积于胞宫，为胀为痛。四物重加当归。补七。

下黄汁如胶，或如豆汁。此湿热也。用升阳除湿汤，又用黄芪六两、糯米五合，水五升，煎半分，作两服。散十四。

癥气相妨，亦为漏下。行经之时，血虚而寒气乘之，血遂凝结而成癥，其癥不结于子宫，仍能行经成孕。既孕见血，为之漏下，是癥气为害也。宜下之，桂枝茯苓汤，然方中桃仁一味，恐妨胎，须酌用。若癥在腹中，于胎无害，俟分娩后治之为妥。散十六。

尿　血

胎漏，血自人门出；尿血，血从尿门出。因心经有火，移于小肠，渗入膀胱，溺时而下，不溺则不下也。

形体劳而过食燔炙之物。加味逍遥散。补二十一。

赤带漏下，如猪肝汁。侧柏丸。寒十六。

转　胞

胞即膀胱，以胎渐长大，下逼于胞，胞为胎逼而侧，故名转胞。有因胎陷而致转胞者，有因气不化水，水蓄胞中，胎又从而逼之而致转胞者，其候烦闷汗出，气逆奔迫，水道不通，小腹急痛，宜速治之，急则令孕妇仰卧床上，竖起两足，亦能稍瘥。转胞与子淋相类，但淋则痛而不胀，转胞则胀而不痛，即因胀极而痛，溺孔却不痛也。若淋症则小便点滴，溺孔痛甚如割。

血气虚弱，胎不能举。补中益气汤加减用之，八珍汤加广皮、木香，亦治此症。补五、补六。

脾肺气虚，不能轮泄膀胱。异功散加猪苓、泽泻。补二十二。

热气郁结膀胱，以致津液不利。滋肾丸加丹皮、泽泻。寒十七。

金为火烁，脾土湿热，致溲便不利。清金利水汤加山栀、钗斛。寒十八。

忍尿饱食，房劳气逆，而水不能化，以致转胞。宜治其气，苏香丸。散十七。

胎气上逼

胎动气逆，上逼心肺，以致气寒不转闷

乱喘促，此调养失宜，气血不和也。子悬是胎气不和，此因气血不调，以致胎动不安也。

胎气上逆。紫苏饮。散三。当归芍药汤。补十。

肝火内热。加味逍遥散。补二十一。

胃火上逆。四物汤去川芎，加山栀、黄芩、甘草。补七。

脾气不舒。加味归脾饮。补三。

饮食无味。六君子汤。补一。

脾胃虚寒。五君子汤。补十四。

风邪胜，喘不能卧。参苏饮。和十三。

火动其胎，逆上作喘。黄芩、香附，末，用砂仁煎汤下。

肾气不归元，上乘于肺而作喘。生脉散，都气饮，加阿胶。补二十三、补二十四。

胎气上逼，热痛下血，以致烦闷困笃。葱二十茎，浓煎饮之，胎死即下，未死即安。

脏　躁

因气血养胎，津液不能充润而肺躁也，当补其母。

肺躁欲哭数欠伸。甘草大枣汤。补二十五。八珍汤。补五。淡竹茹汤。寒十九。

寒水攻心而悲泪。五君子汤加砂仁。补十四。

肺受风邪，频致泪下。四物寄生汤。和十四。

胎　动

胎动则腹痛，胎漏无腹痛；胎动宜行气，胎漏宜清热。若手足冷厥，唇口青黑，宜人参、甘草、当归、阿胶、莲须、葱白。

胎动作喘。宜降火，用黄芩、香附末，清汤下。

腹痛下黄汁。黄芪、川芎、粘米煎服。

冲任风寒，以致胎动。当归、川芎、紫苏、生姜，煎服。

元气不足，怠倦不能承载。宜服安胎调气饮，补二十六。如微热腰痛，连进两服。

怒气伤肝。郁结不舒，触动血脉，而胎不能安。宜安胎饮加香附、柴胡、白芍。补九。有火，加栀子、丹皮。

因母病而胎动。但治母病，不必安胎，惟犯胎之药不可入。其余饮酒房劳，触忤仆伤，以致胎动，俱当安胎为主。

胎动下血。葱白煎汤，入阿胶、艾炭，再煎服。又当归、川芎、阿胶、艾、黄芩、甘草，煎服。

胎动腹痛，面青冷汗，气欲绝。此劳动伤胎，宜急治之，钩藤汤。散八。

胎不动不坠，腹冷如冰。血少不能荣养其胎也，宜补血汤。补二十七。

胎　痛

血少不能荣养其胎也。

血衰气滞。宜抑阳助阴，四物汤加香附、紫苏。补七。

小腹重坠。地黄、当归、参、术、陈皮，四君子汤。补四。补中益气汤加归、地。补六。亦治胎胀。

孤　浆

怀孕六七月，暴下浆水斗余，胎亦必从而堕，此元气虚而血伤也。

胎动腹痛，忽下黄汁如胶，或如豆汁。宜黄芪糯米汤。补二十八。

吐　血

气血壅养胎元，六淫七情，皆足以动其血气，气逆而火上乘之，故血溢于口。但火有虚焰、实热之分，治有清火、补水之异。若以寻常治血之法，行血消血，动用四物，胎必堕矣。

火从胎气上升，载血而出。生地、麦冬、白芍、黄芩、阿胶、蒲黄炭、香附炭。

肝经风热。防风、黄芩。

肝经怒火。小柴胡汤去半夏，加山栀、生地，或投加味逍遥散。和十、补二十一。

伤　寒

全以清热安胎为主，然安胎而仍用参、术等味，则邪热固闭，反致胎下。只要随症用药，勿犯胎气，始为合法。

恶寒头痛。邪在表也，宜香苏散。散十八。

若烦渴，则邪在半表半里，黄龙汤。和十五。

发热躁渴，溲赤便闭，或下利赤水。邪在里也，三黄解毒汤。寒二十。

热极斑如锦纹。四物汤去川芎，加黄芩、玄参、知母、大青叶。补七。

壮热百节痛。宜柴胡、葛根、黄芩、山栀、知母、大青。

热结于胃，胸口烦闷。宜凉膈滋阴丸。寒二十一。

汗下后，热不止。宜加味竹叶汤。寒二十二。

病热而呕，不食而烦。宜芦根清胃饮。寒二十四

下后胁热利不止。黄芩汤。寒二十四。

斑赤黑，小便如血，气断如绝，胎落而未落。宜用栀子、黄芩、生地、青黛、葛根、升麻、杏仁、葱白，煎汤速服之。

心惊发热。辰砂安神丸。补二十九。

心气虚不能主血。补心汤。补三十。

胃经火动。犀角地黄汤。寒二十五。

肺受火克。清肺饮。寒二十七。

膏粱积热。加味清胃散。寒二十六。

肾水亏而阴火动。加味六味丸。补五十。

吐衄口禁项强类中风。加味安胎饮。补三十。

口鼻出血。血热冲伤胞络也，治当凉胎为主。衄血汤。寒二十九。

痢　疾

后重不可降气，便脓不得行血，惟顺气和血，佐以导滞消积之味，此治妊娠痢疾之要法也。

腹胀而痛，里急后重。三黄解毒汤加木香、当归。寒二十。

血痢不止。热乘大肠也，黄芩、芍药、甘草。

腹重坠下，元气虚也；胎动不安，内热甚也。补中益气汤加黄芩、白芍。补六

痢下黄水，脾气下陷也。补中益气汤。补六。

黄而兼青，肝木克土也。宜平肝补土，补中益气汤加白芍、青皮。补六。

黄而兼黑，水反侮土也。宜补脾肾。七味丸。补三十一。肉桂有碍于胎，可易肉果、菟丝子。然火盛者亦兼黑色，宜投寒凉之剂。

肠胃虚弱，风邪客之。胃风汤。散十九

赤白脓血不止。黄连汤。寒二十八。

赤白灰色泄痢痛欲死。大宁散。涩一。

腹痛胸满。当归芍药汤。补十一。

肠鸣后重，谷道疼痛。蒙姜黄连丸。补十六。

胎气不和，相火上炎，郁而为热，亦致下利不止，似痢而实非痢也。四物汤加黄芩、白术、生地。补七。

泄　泻

血虚胎元则脾阴虚，不能运化水谷，而为泄泻；又胎系于肾，胎纳肾中之气，则肾阳不克，上蒸脾土，亦致脾虚泄泻。即或间有风、寒、暑、湿之所感者，亦半属于脾肾之亏。

大便虚急。此脾土燥、大肠涩也。宜理脾胃与大肠，川连、干姜、木香、甘草。

呕吐腹痛，手足逆冷。寒水侮土也。六君子汤，补一，去半夏，加补骨脂、益智仁、煨鲜姜。

寒热作呕，肝木侮土也。异功散加柴胡、白芍、生姜。有火，加味逍遥散。补二十二、补二十一。

百节酸疼。因纵意口腹也，归凉节命散。和十七。

脐下阴冷。理中异功散加肉果、木香。热二、补二十二

协热作泻。三黄熟艾汤。寒三十二。

伏暑不消，烦渴泻水。四苓散。泻二。

伤湿泄泻，小便自利。胃苓汤。泻四。

脾肾虚弱。白术散。和十八。

久泻不已。安胎和气饮，加减八珍汤。和十一、补三十二。

气急筋挛骨节痛。平安散、紫苏饮。和十九、散三。

霍　乱

呕吐伤气、泻利伤血，妊娠危症也。急治之。

心腹绞痛，吐痢并作。因五味积而为痰，心情郁而为火，乍感寒热，邪正交争，阴阳相混，故致此病。香苏散加藿香。散十八。回生散。散十九。

心躁腹痛，吐泻并作。六和汤。和二十。

头痛发热。是风邪也。藿香正气散。散二十。

热气郁结，胸中烦躁。芦根、竹茹、葛根、麦冬、知母、人参、葱。

四肢厥逆，脉息虚弱。人参白术散。和二十一。

伤　食

脾胃滞，则水谷不能化精气以养胎，宜善为消导。

腹痛而食不化。二陈汤加砂仁，去半夏；如呕吐，加藿香、砂仁；气滞，加木香。和八。

吞酸嗳腐。二陈汤去半夏，加左金丸。和八、寒十四。

腹满泄泻。异功散加砂仁、木香、谷芽。补二十二。

脾气虚弱。白术、陈皮为末，谷芽汤下。

盅　鸣

儿在胞中，口含脐带上疙瘩，因妊娠举臂攀高，脱于口而不能复含，故作声。令妊妇曲腰就地，如拾物状，使脐带仍入儿口即止。或用鼠窟中土为末，入麝香二厘，酒调下二钱。

堕　胎

三、五、七月多堕胎，以三月属心胞，五月属脾，七月属肺，皆脏脉，脏属阴，阴气易亏，故胎亦易堕，此人皆防之。而一月为胚，形如珠露，胎元未固，又为足厥阴肝脉养之。肝气多郁，肝火易动，或不自谨，胎即消而落矣。一切忿怒劳倦，皆宜慎之。若房事更在所忌。

冲任气虚。宜养脾胃。千金保胎丸。补三十五。六味丸加杜仲、川断、阿胶、北五味。使肾气壮而胎可固，十圣散。补三十四。每月服六帖。

子宫为风冷所乘，致营卫亏弱。八珍汤加桑寄生、防风。补五。

少阳火动。性急者多怒，面色黑而气实，此相火太盛，不能生气化胎；及食气伤精，故致胎堕。四物汤加知母、黄柏、黄芩、麦冬。补七。

阴虚内热。黄芩、阿胶、生地、麦冬、白芍。

胎　不　长

胎儿全赖血气所养，而血气又赖脾胃水谷之精化之也。以健脾扶胃为主。八珍汤加莲肉，忌食鲤鱼、苋菜。补五。

肝气郁怒而气逆，则血不调，血不调则胎无以养而萎。逍遥散。和五。

气血寒而阳不足，则胎不长。左归饮加当归、砂仁、干姜。补三十三。

火邪盛而真阴损，致血热而胎不长。加味逍遥散加黄芩、川连、知母。补二十一。

鬼　胎

腹胀连胸，面色或青或黄，脉涩而短，或不数月而腹大如鼓，形若抱瓮，按之其冷如冰，总缘精神虚弱，妖魅乘虚而入之也；或本妇所愿不遂，发为白淫，流入子宫，结而

为胎，均曰鬼胎。斩鬼丹。攻一。雄黄丸。

伤　胎

惊恐跌仆，中寒中热，毒药毒食，皆致伤胎。胎之生死，脉未可凭。须细心体认，必实见其口舌色青，腹冷口秽，方可用下。

下血不止，胎上冲心，四肢厥冷，闷绝将死。竹茹、蕲艾，煎汁去渣，入阿胶、白蜜服，川芎、当归二味，煎服亦稳。如腹中急痛，血从口出，亦用竹茹等味煎服。七宝丹亦可下胎。散一十二。《千金》神造汤。攻十三。蟹爪一升，阿胶三两，甘草一两。

半产漏下，昏冒瞑目。因血亡而心与胞络之火上乘也。惟养血清火，俾心气清而不昏，肺气清而不瞑，庶为得法，切忌用风药发汗。

经损而血不止。非气虚则血热。气虚，宜阿胶、艾、伏龙肝；血热，宜生地、丹皮、麦冬、茯苓、丹参、当归之类。

肠覃石瘕

肺主卫，卫为气，得热则泄，得寒则涩，寒气客于肠外，与卫气相搏，气不得荣，因有所系，结瘕而内着，恶气乃起，息肉乃生，渐而至大，如怀子状，气病而血未病，故月事不断，应时而下。木香通气散。散二十二。

寒气客于子门，气不通，而月事不下，结硬如石，非大辛热之剂不能消，见睨丸。攻四。

倘有孕，用香附子（醋炒）、桃仁、海粉（醋煮）、白术，为末，面糊丸，服之颇稳。

盘珠集胎产症治　卷中

施雯湾宁
清　姚江　严洁西亭　同纂
洪炜缉庵
鄞县　曹赤电　炳章圈校

产　后

难　产

生产为天地化育之道，本无所难，其有难产者，皆产家张皇自致之耳。能静以待之，儿得转身，自然产下。治法以顺气和血为主，切勿肆用催生药。

心怀恐惧而气结不行，恐则气下，惧则气怯，怯则上焦闭，闭则气还，还则下焦胀，气乃不行。宜服紫苏饮。散三

胞破浆水下而儿不下，速当补气养血，如鱼得水而自顺矣。宜保产万全汤。和二十二，再用浓煎葱汤，洗其产户，令上下之气宣通。

胞中败血壅滞，儿枕破，血裹儿身，致转身不利，急服胜金散。攻五

暑月热气蒸人，有郁冒冲晕之患，生化汤。和二十四。加益元散。寒三十

冬月寒气逼人，经血凝聚而难下，宜生化汤加肉桂、乳香。和二十四

交骨不开，阴气虚也。加味芎归汤。补三十六。开骨膏。和二十三

子趋谷道，焦盐熨之。

横生逆产，此因儿未转身，母即用力逼之，遂致横逆也。或先露手，或先露足，以小针刺儿手足心，用盐擦之，儿痛即缩入，并以盐摩产妇腹。若眼闭心闷欲绝，取顶上发如两指大，用力挽之，眼即开。或以米醋噀之，车前子为末，酒下亦可。又，儿先露手，速令产母仰卧，看生之妇，将儿手推上，徐徐正之，候其身正。煎催生药服之，使儿生下。又三退散可下。攻六

盘肠产，子未下而肠先下，此因产母气血虚弱，因而下脱。当大补气血，兼以升提。参、芪、芎、归，加升麻少许，连服之，自收。若肠干不收，以磨刀水少许温润之。或浓煎黄芪汤，贮漆器内，候弗冷弗热，将肠浸之，令温暖之气上熏则肠自上。或以蓖麻子四十九粒，研烂涂母头顶，待肠收上急洗去；又五倍子、白矾汤浸亦好。子肠与子宫脱下者，同一治法。

胎死腹中，察产母腹胀口青，或舌黑，腹中阴冷重坠，呕恶不宁，秽气上冲，皆子死之证。速当下之，当归、厚朴、陈皮，酒、水各一碗，煎半，入朴硝三五钱，再煎十余沸，服。如在疑似之间，只服芎归汤为稳。

胎衣不下

血入胞中，胞胀而不能下，其症面垢颊赤，寒热盗汗，上连胸腹胀痛，若因气力衰惫不能送出者，胸腹必不胀而痛，总当忍痛，正身俟之，不可任意欠伸，致血上冲心也。

血壅而胞衣不下，失笑散攻七。牛膝散攻八。生化汤和二十四。加牛膝煎汤，送益母丸和二十七。又，牛膝一两，黄葵子一合，煎服即下。

气血虚弱，不能送下，保生无忧散。和二

十五

风冷乘虚而入，胞冷血凝而不下，牛膝散去硝，加桂、附。攻八

血　晕

胎胞既下，气血暴虚，忽而眼黑神昏，不知人事，速投人参、芎、归，以回其气。眼闭口开，面白手冷，六脉微弱，是其验也。若恶露上行，心下满闷，口噤而神脱者，宜破血下血。二者错治，则立毙矣。

恶露上攻，急用失笑散。攻七。米醋炖热，和生韭汁，贮有嘴瓶内，将瓶口包裹，以瓶嘴对鼻孔触之，极效。

败血流入肝经，急饮童便，下生化汤。

瘀血奔心，虚火上炎，童便下益母丸。即济阴丹，和二十七。或童便送鹿角炭，清魂膏。寒二十一

阴血暴亡，心神无所养，而君相二火乘于肺经，则目瞑不省人事，宜四物汤去熟地，加生地、白薇。补七

饮酒血晕，血得酒热而妄行也，川芎、当归、葛根。

使力过多而晕，清魂散。和二十六

气血两虚，痰火上涌，二陈汤加朱砂。和八

虚风血晕，当归、川芎、桃仁、荆芥。

厥

凡产用力过多，劳倦伤脾，孤脏不能注于四旁。心、肝、肺、肾。故足逆冷而厥气上行也。经曰：阳气衰于下，则为寒厥。厥气上升，满脉去形。逆气上行，满于经络，则神气浮越，去身而散矣。此非急以峻补大剂与之，不能举气以归元，回阳而复神。宜重用参、芪，使气血旺而神复，厥症自止。人参生化汤。如无块痛，滋荣益气汤。补三十七、补三十八

恶露不下

养胎余血，溷以浆水为恶露。气血旺者，随产而下，气血衰弱，或挟寒冷，或挟风邪，遂留滞不行。上攻则为血晕，蓄瘀则为儿枕，日久不出，腹痛心痛，遍身发热，五心烦热，骨蒸潮热，时作时止，浑如疟状，块在两胁，动作雷鸣，嘈杂眩晕，食少羸瘦，又与虚弱病相似，慎勿误治，致成血臌等症，宜生化汤合失笑散，补而消之。和二十四、攻七。起枕散亦好。攻九。若恶露流注四肢腰背等处，久必肿起作痛，速用葱熨以散之，内服加参生化汤。如不速治，将所注者，化而为脓，宜用神仙回脓散攻十一。然气血不旺，不可轻用，憎寒恶热，气虚也，十全大补汤。补三十九。日晡潮热，血虚也，四物汤加参、术、丹皮。补七。呕逆，胃气虚也，六君子汤加炒干姜补一。食少体倦，脾虚也，补中益气汤。补六。四肢逆冷，小便频数，肾气虚也，补中益气汤加益智仁。熨法，用葱一把，捣烂为饼，贴患处，衬厚布两三层，以熨斗文火熨之。

恶露不绝

元气不足，劳动伤经血也，或恶血未尽，适挟风冷，而致气血不调；或过服固胎药，产虽下而恶露不去，竟至二三月而点滴不已，皆宜补血顺血、调气通气为主。济阴丹可加味用之。和二十七

气血俱虚而淡红不已，十全大补汤。补三十九

怒火伤肝而血不藏，加味四物汤。补二十八

胃气下陷，不能统血，补中益气汤。补六

脾经郁热，血不归源，加味逍遥散。补二十二

肝气热不能生血，六味丸。补二

脾虚不能摄血，六君子汤。补一

伤冲任之络而不止，加味固阴煎。补二六味丸补二加阿胶、麦冬、北五味。

血崩不止

产妇耗伤气血，经脉未得平复，而或惊

忧恚怒；或劳役损动；或咸酸不节，伤于营冲；或气衰血弱，不能固摄，皆成崩中。若小腹满痛，肝经已坏，为难治也。其余郁热气陷，以致血崩，与恶露不绝同治。

血多色紫，败血也，当去之，留之反作痛，不可以作崩论，生化汤加五灵脂、生蒲黄以破之。和二十四

形脱而汗不止，加参生化汤；渴，加麦冬；泻，加茯苓；两手脉伏，或右手脉绝，加北五味、麦冬；痰，加竹沥、姜汁；惊，加枣仁；食不可进，闻药即吐，胃虚也，宜用参汤送饭锅焦粉，渐渐引开胃口，然后服药。

崩下如牛膜，昏迷倒地，乃受惊而然，朱雄丸。和二十九

恶血重来，如流水不止，昏迷不知人事，此因未满一月，妄行交媾，以致血不归经也。

急用金狗脊散。和三十

日久不止，宜升举大补汤。补四十

血脱妄言妄见，宜升举大补汤，加辰砂少许，以坠其心火。补四十

血崩如涌，口噤目斜，手足搐搦，肝经血耗，风生也。六味丸加荆芥穗。补二

血来紫黑如豆汁色，怒伤肝也。宜加味四物汤。和二十八

血来鲜红，是惊伤心，怒伤肝，劳伤脾，致血不归经也。生化汤和。二十四。加味治之，鲜血来多，再加升麻、白芷各四分。

头　痛

头者，诸阳之会，产后阴虚，阴虚则阳胜，阳气上凑于头，故头痛；又有瘀血之气，上冲于头而痛者。一宜滋阴，一宜去瘀，慎勿误治。

身热恶寒，感冒风寒也。生化汤加莲须。和二十四

中气虚，补中益气汤加蔓荆子少许。补六

气血俱虚，八珍汤。补五

阳气虚，补中益气汤加附子。补六

肾水不生肝木，六味丸加北五味。补二

气滞，芎乌散。散二十四

心　痛

非阳气虚寒，则瘀血上冲。生化汤加肉桂、吴茱萸，可以治寒；失笑散加当归、川芎，可以行血。若指甲青黑，手足冷而过节，此真心痛，不治。又恶血奔心，一丝入于心脏即死。

足纯青心下痛，寒毒攻心也。人参、白术、附子、肉桂、当归，散其下寒而上寒自解。

食冷物而作痛，生化汤加消食之剂。和二十四

感风邪而作痛，生化汤，荆芥、防风、生姜。和二十四

产后厥痛，血虚也。羊肉一斤，煮汁去肉，入当归一两，炒白芍五钱，炙甘草五分，再煎服之。羊肉须取精者

中无血块，绵绵而痛，按之即止，血虚也，宜八珍汤。

腹　痛

实则有恶露不尽，干血瘀积，食伤气滞，虚则有气弱寒阻，血虚空痛，须详审施治。虚者固宜调补气血，而实者亦勿得峻厉克伐。

瘀血上冲，心腹胀满疼痛，牙关紧急，按之愈甚，大便难而小便易，宜失笑散攻七。煎汤下益母丸即济阴丹，和二十七。

干血着于脐下，行气破血之药，投之不愈，知内有干血也，生化汤加炒大黄、炒虻虫。和二十四

胸膈饱胀，恶食吞酸，手不可按，此饮食伤也，二陈汤加山楂、神曲。和八

食消后而痛如故，按之痛止；或加头痛，烦热作渴，恶寒欲呕等症，此中气伤也。宜补脾胃，六君子汤。补一

六脉沉伏，四肢厥冷，内伤饮食，而恶血不行也。宜行血消食，失笑散加山楂、神曲攻七。如无恶血积食，则为虚寒，宜补气暖

胃。

产后六七日，忽然脐腹疼痛，此由呼吸之间，冷气乘虚而入也。宜四顺汤。热三

腹中疗痛，客寒阻逆也，精羊肉煮汁，入当归、生姜煎服。

腹痛欲绝，脉浮弦，风入胞门也，川断一两，防风三钱，煎服。

冲任空虚，肝经血少，脉弦，熟地、吴茱萸、白芍、木瓜、蒺藜。

恶心作呕，六君子汤。补一

泄泻，六君子汤，加炮姜、砂仁、生姜、大枣。补一

腹中块积，生化汤加肉桂、红花。和二十四

六脉滑数，瘀血成痈。生化汤加丹参、丹皮。

肾气虚寒，理阴煎热四。胃关煎。热五

血少而痛，黄雌鸡汤。补四十

小　腹　痛

儿在胞中，食母之血，所余者，结而成块。产时块从儿下则无患。不下，则滞而痛，名曰儿枕痛。黑神散攻十。久而不已，血化为脓。又产后寒气入腹硬筑，脐下刺痛，为寒疝。宜用炒吴茱萸，勿误治。

血化为脓，流注关节，则成骨疽。脉洪而数，是其候也。失治，多为败症，宜急治之。若腹胀大，或转侧作水声，或脓从脐出，与大便出，当用补以托之，然后用神仙回脓散。攻十一

子离其宫，血海陡虚，所以作痛，胞门受伤，必致壅肿，肿未消，因而拒按似块，实非块也，勿得作儿枕治　宜用殿胞煎补四十二。五物煎补四十三。

肠　　痈

怒郁血虚肠风，皆致肠痈。食诸鱼毒物，亦能致痈。食盐炒热熨脐，又箭镞烧红，淬入酒中，饮酒可愈，川芎、当归、甘草、淮牛膝、藁本，为末，酒调下。

腰　　痛

腰者肾之外候，胞胎系于肾，产则劳伤肾气，损动胞络，虚未平复，风冷客之，故令腰痛。三圣散。散二十五

恶露断，腰重痛而下注，两股如锥刺入骨，此血滞经络，必作痈疽。四物汤加延胡。补七

真气虚而邪乘之，当归黄芪汤加桑寄生。补四十四

久痛不已　猪羊肾常食之。

腹胀善噫，诸药皆呕，脾虚也。焦术，米泔煎服。

胁　　痛

膀胱宿有停水，恶露下而不尽，气血与水相激，故令胁肋胀痛。

痛而呕吐，抵圣汤攻十二。非姜桂之辛以行药，势反助其胀矣。

肝经血瘀，四物汤加肉桂、延胡、蒲黄、红花。补七

肝经气虚，四君子汤加当归、白芍。补四

肝经血虚，四物汤加入参、白术。补七

肾水不生肝木，六味丸。补二

肺金盛克肝木，泻白散。散二十六

身热汗出，加参生化汤。和二十四

气血两虚，十全大补汤。补三十九

怒伤于肝，两胁胀痛，吐血寒热，宜八珍汤加柴胡、丹皮。补五

遍　身　痛

产后血气失升降常度，留滞关节，筋脉引急，是以遍身疼痛，甚则腰脊强硬，手足拘挛，身热头痛，切勿作伤寒治之。若认作伤寒，误发其汗，则筋脉动惕，手足厥冷，变生他症矣。趁痛散加桑寄生。和二十一

按之而痛缓，血虚也。四物汤加炮姜、人参、白术。补七

遍身青肿，麦芽一重，牛膝一重，填入瓦罐，盐泥封固，煅赤研末，酒下二钱。治血流诸经极效。

虚劳而指节疼痛，汗出不止。猪肾煮汁，煎当归、人参、黄芪、生姜、韭白、淡豆豉少许，温服。

遍身皮赤两腿肉青

此败血流经也，生化汤加荆芥、肉桂、淮牛膝。和二十四

臌　胀

产妇素弱，临产劳伤，中气多不足，胃虽纳谷，脾不健运。先服生化汤和二十四三、四剂。七日后，即服加参生化汤补五十八。以助其脾气，自无虚满之患。或因便秘而误服大黄；或因多食而过服消导；或因忿怒而误服耗气等药；又或恣饮寒冷，凝滞恶露以致胀者，或补气、或健脾、或暖胃行血，当察其所因以治之。

血　块

因恶露未尽所致。或产后气血虚弱，风冷乘之，搏于脏腑，与血气相结，因而成块。切勿轻用散气行血药。

风冷搏血，生化汤加木香三分，磨冲服。和二十四

冷湿乘虚而致，生化汤加肉桂、白芷、炒姜。

半月外不散，或如肿毒高寸许，身热食减，生化汤加肉桂、蓬术炭，攻补并治。和二十四

肢节肉里结成小核，此血虚筋燥而挛结也。由多用行血破血药以消块，致血不养筋，而筋不舒耳。宜补水以滋肝血，养脾以运中气，八珍汤补五、归脾汤补十九加减治之。

伤　食

产后血气已虚，胃中元气不足，饮食偶有所伤，即不能运化，因成痞闷。

宿食停滞，口干满闷，六君子汤加神曲、山楂。补一

怒后即食，食停而闷，生化汤加消食之剂。和二十四

食消而仍痞，反作痛呕，脾胃伤也。六君子汤补一、咽酸嗳腐，加炮姜；作泻，加升麻。不应用补中益气汤。补六

消导过多，反致满闷，不思谷食，宜长生活命丹。补四十五

呕　吐

气血大亏，脾胃弱而中气不运也，败血乘虚而入，脾受之则不能运化精微而成胀满；胃受之则不能受纳水谷而生吐逆。宜用抵圣散。攻十二

劳伤脏腑，寒邪入于肠胃　加减生化汤。和三十二、七日外，服温胃丁香散。和三十三

噫逆目眩，石莲散。和三十四

饮食伤脾，六君子汤，加砂仁。补一

肠胃气逆，肠胃燥涩而气逆也，宜六君子汤加藿香、砂仁。补

胃气虚寒，六君子汤加炮姜、木香。补一

寒水侮土，益黄散。散二十七

肝木侮脾，六君子汤加升麻、柴胡。补一

命门火衰，八味丸。补四十六

腹痛泄泻手足冷，阳气虚也，附子理中汤。热七

口渴内烦少力，血少汗多，不生津液也。宜生津益液汤。和三十五

吐蛔虫，胃气将绝也。人参、白术、橘子、白薇、肉桂、神曲。

吐脓血，又复发斑，因夏月受暑，未曾发出，至产始发，火毒炽盛，又不能尽发，故见症如此。不得不权用凉剂，人参、当归、川芎、麦冬、荆芥、元参。

大呕大喘，风邪感于太阳也。难治。重用人参，佐以麦冬、当归、白术，少加荆芥、桂枝。

历代中医资料大全分享

你好，我是逢原，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

只需要在下面输入你的邮箱并确认就可以直接下载中医资料：

http://list.qq.com/cgi-bin/qf_invite?id=03157beabc6d50e0b64029a2715966596d94dcac7ed0cfd7

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com

二、加我 **QQ/微信：2049346637**

三、关注微信公众平台——**逢原中医**，经常有中医文章更新。

四、关注我的**空间**：**http://user.qzone.qq.com/2049346637**

免责申明：所有资源均是网上搜集，本人收集整理这些中医资料，仅仅为了方便中医同道中人私下交流学习之用，不为营利，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后 24 小时内删除，任何涉及商业营利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！如果您觉得满意，请购买正版资源。

私人微信号：2049346637

公众平台：逢原中医

呕吐下痢，邪感少阴也。缘肾火衰微，火为寒所驱逐，肾水亦随寒上趋而作呕，所谓真水寒，真阳飞越也，急用补阳之药，入于补阴之中，引火归源，是为要法。宜八味丸加减。补四十六

两胁胀满便血，风邪伤肝也，此犹可救者，因其有便血耳，不然，邪留两胁，反成腹心之病。当归、麦冬、川芎、三七根。

霍　乱

此由劳伤气血，脏腑虚损，食不运化，而邪复乘之，致阴阳升降不顺，清浊乱于肠胃，冷热不调，邪正相搏而然。

血块疼痛未净，生化六和汤。和二十六

血痛已除，藿香温胃散。散二十八

渴而饮水，五苓散。两五

手足逆冷，问无血痛，用附子散。热六

呃　逆

产后气血皆伤，风冷搏于气分，则气逆而上为呃，又脾胃虚冷，因食热物，冷热之气相冲击，使气不顺而呃逆。

胃气虚寒，丁香、干姜、肉桂。

胃中伏热，干柿、竹茹。

脾胃虚热，人参、附子。

中气大虚，阴火上冲，八味丸。补四十六

喘　急

荣卫暴竭，卫气无主，独聚肺中，故令喘急。此为孤阳绝阴，真险候也。大料川芎汤救之，或生脉散合生化汤。补二十三、和二十四

败血入肺，坐不能卧，生化汤合失笑散，或六君子汤合失笑散。和二十四、补一、攻七

污血感寒，桃仁、丹皮、茯苓、干姜、蒌仁、北五味、桂枝、桑皮、紫苏、枳实。

水气凌肺，人参、白术、茯苓、麦冬、苏子。

脾虚生痰，六君子汤加姜汁、竹沥。补一

忧恼作喘，川芎、当归、杏仁、桑皮。

外感作喘，川芎、当归、旋覆花、茯苓、半夏、杏仁、前胡。

气短似喘，生化汤和二十四加人参、沉香

六七日，忽然手足蜷卧，息高气喘，恶心腹痛，此少阴感寒邪，而在内之真阳，为寒气逼越于上焦，上假热而下真寒也。人参、麦冬、肉桂、白术、吴茱萸，煎汤，候其微冷顿服之。若至半月一月外患此症，人参、白术、茯苓、当归、熟地、麦冬、吴茱萸、附子、牛膝，煎服之。皆为难救之症。

七日内外感风寒，鼻塞恶寒，身热头痛，重嗽，宜用加参宁嗽生化汤。痰多，加花粉，或加竹沥、姜汁，冲服；恶寒，毋用麻黄；脚痛，毋用柴胡；火嗽发热，毋用寒凉。总以调理血气为主。和二十七

误食耗气药，致气促绝食，人参生化汤，送饭锅焦粉。补三十七

蝉　声

败血冲遏于心，转入于肺，气与血并结成块，入喉作声，竟似蝉鸣，此症十不救一。

浮　肿

败血乘虚，流入经络，日久化水，故令面黄，四肢浮肿，若作水气治之，便致夭枉宜小、大调经汤和二十八、三十九。血流为水者，下午肿甚，肿处必有血痕，或胁胀刺痛。

咳嗽小便涩，寒水侮土也。宜补脾肺。补中益气汤。补六

气虚，六君子汤补一。四君子汤去甘草，加米仁、炒陈卜子。补四

六脉沉细无力，或咳嗽，或泄泻不止。脾土虚寒，命门火衰也。《金匮》肾气汤补四十七

口渴恶寒，脉沉无力，体虚而有湿热之积也，必上焦满闷，宜补中行气，兼用导水之剂，白术、茯苓、陈皮、木通。

外感风寒，气血滞于经络；或胁腹绞刺，呕吐恶心，宜加味吴茱萸汤。散二十九

气郁作胀，枳实、炒白术。

发　热

产后发热，有伤力，有血虚，有停瘀，有蒸乳，有风寒，有多食，其病不一，状类伤寒。切勿发汗，致成肉瞤筋惕，亡阳谵语，郁冒昏迷等症。

血虚，川芎、当归、人参、姜炭。

气虚，补中益气汤加炒姜。补六

吞酸嗳腐，饱闷恶食，此饮食停滞也。宜四君于汤加砂仁、山楂、神曲。补四

肝虚血燥，阴火内发，宜逍遥散，以清肝火。若用大补，热燥更甚。和五

阴虚阳无所依，浮散于外而为热，四物汤，加炙干姜。补七。加茯苓，使天气降而生阴，亦妙。

失血多汗出，不卧，怔忡惊悸，妄言妄见，加味归脾汤。补三

血虚感风，生化汤加荆芥穗。和二十四

误服寒凉之剂，以致寒气隔阳于外，四君子汤加干姜、肉桂。不应，加附子。补四

肌肤发热，面赤大渴，血脱发燥也。当归补血汤。补四十八

败血攻心，狂言奔走，干荷叶、生地、丹皮、生蒲黄。

胸胁胀痛，腹中痞闷，吐血盗汗，或便血不止，此诸脏虚损也，故有虚寒假热之状。十全大补汤。补三十九

产后潮热有汗，大便不通，毋专论为阳明症；头痛恶寒，毋专论为太阳症；头疼胁痛，毋专论为少阳症。总由血气两虚，阴阳不和而类外感也。加味生化汤，调和荣卫，诸症自退矣。和四十

口燥咽干而渴，毋专论为少阴症；腹满咽干大便实，毋专论为太阴症；烦满四肢冷，毋专论为厥阴症；谵语便秘，毋专论为胃中有燥屎。多因劳倦伤脾，运化稽迟，血枯肠燥，虚症类实病也。加味通幽散。和四十一

乍寒乍热

血闭于阳经，荣卫行之不通则寒；血闭于阴经，荣卫行之不通则热。阳气不足，阴气上入于阳中则恶寒；阴气不足，阳气下陷于阴中则发热。外经为寒邪客之，则荣卫不通而发热。内府为冷物伤之，则荣卫不通而为寒。

阴阳不和，四物汤加减用之，去熟地，加人参、干姜、甘草。补七

阴阳不归其分，阳下陷而阴上冒。八珍汤。补五

元气未复而湿热乘之，补中益气汤。补六

血虚而渴，当归补血汤。补四十八

肝木侮土，致停食而寒热，六君于汤加木香。补

风寒客于经络，川芎、当归、莲须、葱白。

乳孔胀痛，翟麦、通草、连翘、花粉、甘草、青皮、桔梗，煎服。

嗳气满闷，饮食伤也，异功散加山楂、神曲。补二十二

汗

汗本血液，属阴，阴亡阳亦随之而走，故曰：汗多亡阳。又曰：肝，心之液也。血虚，则肾中之阴不能上注于心，故心虚而汗出。又阴虚暴亡，阳气无所归附，则浮散子外，而汗不止。

产毕自汗，块痛未除，先服生化汤，即继服调卫止汗汤。俟汗止，减参、芪以消块痛。和二十四、补四十九

睡中妄言，大便不通，加参生化汤加麻黄根、枣仁、地骨皮。补三十七

汗而泄泻，加参生化汤加麻黄根、肉果、莲子。补三十七

汗多而小便点滴，加参生化汤加麻黄根、麦冬、葛根、北五味。补三十七

汗多亡阴，致筋脉拘急，类于痉症　宜

加味生化汤。和四十

大汗如雨，口渴舌干，发热而躁，此精血干枯，无以养心，阳无阴而不化也。黄芪、当归、桑叶，合生脉散。和二十三

闻响汗出，诸药到口即吐，脾气败也。用人参、附子为末，随液咽下。

昏冒瞑目，此血亡而火炽也。但补其血，《全生》活血汤。补五十一

产后汗出，多因劳倦惊恐所致也。《内经》云：摇体劳苦，汗出于脾；惊而夺精，汗出于心；恐惧，汗出于肝。产妇有此诸因，故不能镇守其液而汗出。宜健脾胃，使水谷之精，灌溉四旁，则五脏冲和而汗自止，归脾汤。补十九

产后血虚，自汗气促，为肺气上浮也，然血去过多，阳为阴逼而汗出不止。宜滋营益气汤补三十八。则血复，产妇所以喜也。

产后真阳不足，上气喘急，手足厥冷，或短气，盗汗自汗。大圣散补十二。如心虚盗汗，或睡中汗出，加味归脾汤补三。气脱自汗，作夺汗论。大汗淋漓，气促肤冷，急以四君子汤补气补四。若阴血下脱，孤阳上越而大汗出，此危候也，急服四君加黄芪、五味子救之。

若自汗，由血虚而外溢也，宜止汗散。补五十二

中　风

发热头痛气喘，面如朱妆，元阳不能自固也。唇青肉冷，目眩神昏，虚极生风也。口眼㖞斜，气血俱虚，不能荣养筋脉也。汗出不止，血虚腠理不密也。角弓反张，血虚体弱，风入诸阳之经也。牙关紧急，口噤不开，血气空虚，风入颔颊口之筋也。筋脉拘急而为瘛；弛纵而为疭。阴血去多，阳火炽盛，肝木枯而筋无所主也。顽痹不仁，羸乏少气，脏腑虚损，风冷客于经络皮肤也。或肝经血燥而挟风热也。总宜大补气血为主，或加荆、防、姜、附、钩藤、天麻一二味亦可，切忌姜、葱并风药，以致不救。

气虚，四君子汤加味用之。补四

血虚，四物汤加味用之。补七

气血两虚，十全大补汤。补三十九

如血痛未除，生化汤加味用之。和二十四

遍身疼痛，手足瘫痪，血虚有风痰，生化汤加姜汁、竹沥。和二十四

阴虚内热，热盛生风，四物用生地加丹皮、麦冬。补七

摇头马鸣，身反折，气如绝，汗如雨，两手摸空，不治。

不　语

心者，君主之官，神明出焉，外应子舌。舌，声之机。产后虚弱，致败血停蓄，上干于心，心窍闭塞，故神志不能明。又心气通于舌，气闭则舌强不语；有热痰迷塞心窍，则不能言；肾之别脉，上入于心，系舌本，虚则不能言；脾之脉是动，病舌本强不能言；大肠之脉散舌下，风热入于大肠则不语。

目闭不语，痰气郁滞也。孤风散，生白矾一钱，热水调下。若瘀血壅滞，琥珀散。

琥珀、花蕊石、郁金、朱砂，研末，童便好酒下一钱。

血气痛上冲于心，生化汤。和二十四

气闭不语，七珍散。散三十

风火，加味逍遥散。补二十一

舌出不收

热壅于心也。丹砂末傅之。暗掷盆盎作堕地声，惊之即收。

惊　悸

血虚心气不足也。心虚而受风邪，遂成惊悸，名曰心风。其状目睛不转，其脉动而弱，宜大补气血。若作风治，速之危矣。

怯然如人将捕之，心血虚也，块痛未除，且服生化汤和二十四。块消痛止，宜加减养荣汤。补九十三

发狂谵语

败血冲心，肝火上炎，痰结于胸，热入血室，皆致谵语颠狂。

神不守舍，八珍汤加茯神、麦冬、枣仁、姜、枣。补五

寒热如疟，昼轻夜妄，热入血室也。琥珀地黄丸加柴胡攻十四。一灵三圣散。攻十五

胁痛便血，肝血虚火上炎也。加味逍遥散。补二十一

因惊悸闷，用辰砂二钱，研细，乳汁调和，另用白颈活地龙一条，入热酒滚二三沸去之，入辰砂，重汤再煮，分三服。

发　斑

败血流入脏腑，充满于肌肤，旁连于四肢，热结留注，转还不得，故发斑。十无一生。

见　鬼

肝藏魂，心藏神。血虚心失所养，肝火上炎，神魂不能守舍，是以妄言见鬼也。

败血停心，烦躁错乱，小、大调经汤加薄荷。和二十八、和三十九

心血虚损，生化汤加枣仁、柏子仁、茯神、麦冬。和二十四

烦　渴

去血多则津液少，故烦躁而发渴。宜滋阴降火，可少加童便。

余血奔心，荷叶散。攻十六

阴虚火动，人参当归汤。补五十四

气虚而渴，生脉散补二十三，加莲子。

血虚而渴，四物汤加花粉、麦冬。补七

头眩脚弱，饮食无味，气血俱虚也，参、地、麦冬、甘草、花粉、糯米、姜、枣，煎服。

咳　嗽

有外邪，有内伤，有瘀血，皆致咳嗽。惟吃盐太早，咳者难治。

恶血流入肺经，面赤发喘，生化汤合失笑散。和二十四、攻七

鼻塞声重，生化汤加杏仁、荆芥。和二十四

阴血虚，四物汤去白芍，加人参、白术。补七头痛，加连须。

肺气不足，四君子汤加当归、川芎。补四

阴水不足，火克肺金，六味丸加麦冬、花粉。补二

肺虚外感风寒，补中益气汤加紫苏、桔梗。补六

胃虚不生肺金，异功散加当归、白芍。补四十九

半月外干嗽，四物汤加诃子皮、茯苓、甘草、阿胶。补七

百日内感风，重嗽汗多，宜加参宁肺生化汤。补五十五

口鼻黑衄

气血大虚，恶血乘虚流入诸经，不能复出，故为衄。五色最忌黑，口鼻属肺胃之部，口鼻间气色现黑，肺胃败矣。又虚火载血上行，不循经度，溢出孔窍，肺胃为热逼，热极反从水化，致口鼻变现黑色，亦危候也。速用童便、淮牛膝、丹皮、泽兰、二地，倍人参大剂救之。止衄之法，取产妇顶心发一缕，红线一缕，系中指节奇验。

疟　疾

半月内外，寒热往来，或昼、或晚、或夜，寒热交作，应期而发，或一日二三度，其证类疟。总由气虚则寒；血虚则热；胃气虚则恶寒；胃气下陷则寒热往来。惟大补气血，其病自退。

污血，生化汤加生蒲黄、干荷叶、泽兰、淮牛膝。和二十四

饮食停滞，六君子汤加山楂、神曲。补一

劳倦伤气，补中益气汤加川芎。补六

气血俱虚，十全大补汤加炮姜。补三十九

元气脱陷，重用人参加附子。

郁怒伤脾，逍遥散。和五

外感风寒，生化汤加荆芥、防风、藿香、生姜。和二十四

泻　痢

恶露不行，渗入大肠，则洞泄不禁，下青、白、黑色，其余非食积则寒湿，再则脾胃弱，肺气虚，皆能致泻。若痢，亦由恶血渗入大肠，积滞而成，谓之产子痢，其病甚危。又久痢身体羸弱，谓之虚羸痢。气不顺而下痢，谓之气痢。又有外感六淫，内伤饮食所致。总当兼气血虚处治之，切不可用治痢常法，以致不救。

恶露未尽而泄泻，生化汤加茯苓。俟恶血尽，然后或消而治之。和二十四　若虚弱不能支持，加人参。

完谷不化，生化汤加茯苓、诃子皮、莲子、生姜；不愈，加人参。和二十四

干渴，胃气虚，不生津液也。生化汤合生脉散。和二十四、二十三

食物不化常噫，生化汤加茯苓、神曲、山楂、砂仁。热八

胁肋膜胀，腹中痛，流注无定处　产未满月，风邪乘虚袭之。留于肓膜，散于腹胁，故腹中阵阵作痛，水谷不化，胀鸣泄泻也。宜调中汤。热八

脾胃虚弱，血块未散，先服生化汤加木香、砂仁、益智仁；血块已除，六君子汤加肉果、益智仁，再加升麻、柴胡，以提胃中清气。

余血不尽，渗入大肠，洞泄不禁，服的奇散，荆芥大者四五穗，于盏内烧炭，不可犯油火，入麝香研末，清汤调下。

年久脾泄不止，参苓莲子饮。补五十七

产后七日内外，患赤白痢，后重频并，最为难治。欲调气行血，推荡痢邪，又虑产后元虚；欲滋荣益气而大补产弱，又虑转助痢邪。若行不损元、补不助邪，惟生化汤减黑姜，加茯苓、木香，为善消恶露，兼行痢积，并治而不悖也。

厥逆躁不得卧，殊难救治。人参、当归、荆芥。

积滞腹痛，人参、当归、白芍、红曲、醋炒升麻、甘草、益母草。如恶露未尽，加乳香、没药、砂仁、阿胶。

渴而不喜冷饮，胃气虚，不生津液也。七味白术散补五十六。如夜间发热，肾水虚，不能润也。六味丸补二。

痢而呕吐，六君子汤加藿香。补一如胃火盛，用活田螺、麝香，捣和掩脐。后用滋阴清胃之剂。

血崩痢不止，加参四物汤。补七

脱肛，气血两虚也。加参生化汤。补五十八

褥　劳

产后虚羸喘乏，乍寒乍热，病如疟状，此气血不充周也。宜大补气血。

肝肾虚弱，口干咳嗽，阴虚火动也。宜六味丸加北五味、麦冬。补二

脾弱血虚，月水不调，八珍汤。补五

脾虚血燥，皮肤搔痒，加味逍遥散。补二十一

虚汗不止，母鸡汤。补五十九

四肢疼痛，外邪感也。石子汤。和四十二

虚寒腹痛，黄雌鸡汤。补四十一

外热内寒，外邪感也。理阴煎加减治之。热四

阳虚内寒，理阴煎、羊肉汤。热四、补六十

大便不通

去血过多，大肠干涸，或兼火燥，总勿用峻利之剂以亡阴，而致便秘愈甚。

血虚生火，四物汤加麻仁补七。加味六味丸补五十

气血俱虚，十全大补汤加肉苁蓉。补三十

九

饮食如常，腹中如鼓，八珍汤加桃仁。补五

胀满欲去不能，结在直肠。宜猪胆汁导之。

小便不通

产后亡血，或又多汗，且劳倦脾伤，不能为胃行其津液，则其生化之气不运，渗泄之令不行，是以上气不行而有咽干燥渴之症，下气不行而有胃肾关闭之候，治当助脾益肺，升降气血，则气血妄行，阴降阳升，自然津液充而小便利。

污血阻滞，瞿麦、蒲黄。

血虚热郁，六味丸、逍遥散。补二、和五

热气客于脬中，茅根汤。寒三十二

腹胀如鼓，闷乱不醒，冷气积于胎前也。用食盐填入脐中，捣葱白为饼，约一指厚，置盐上，用艾火隔葱饼灸之。觉热气入腹内，即时便通。

湿气感于胞络，下阴肿胀，小水点滴不出。此肾虚，膀胱之气亦虚而不能化也。人参、白术、茯苓、肉桂、米仁、熟地、车前子。

血从小便出，热邪搏血，渗入胞中，而成血淋也。白茅根、瞿麦、车前子、通草、鲤鱼，水煎，入石首鱼石，末服。

大小便不通，阴血不足，津液枯燥。宜服牛乳、人乳；或恶血流入小肠，闭塞水道，小便不通；流入大肠，瘀积成块，形如鸡肝，肛门燥结，大便不通，宜服生化汤加桃仁、麻仁、郁李仁、瞿麦等味。和二十四

便　血

心气虚，则小肠不能制而血流；脾气弱，则大肠无移荫而血下。故二便出血，当实之心脾二经。

血气虚而热乘之，故血随小便而出，血热则流，故渗入胞内，用发炭、滑石末、地黄汁调下。

面黄胁胀少食，此肝木乘脾土也。加味逍遥散。补二十一

惊悸不寐，加味归脾汤。补二

大便下血，缘六淫七情，致伤元气。阳络外伤而然也。

肠胃虚弱，六君子汤加升麻、柴胡，若虚寒，去升柴加肉果；如怒动肝火，加当归、白芍，去升麻。

膏粱积热，四物汤加丹皮、山楂。补七

大肠风热，四物汤加荆芥、防风。同上

大肠血热，四物汤加丹皮、槐米。同上

遗　粪

肾虚无约束也，都气饮。补二十四

脾肾不足，补中益气汤。补六

脾肾虚寒，八味丸。补四十六

小便不禁

非肺气虚而不能约制，即肾气竭而虚热移于膀胱也。

气虚不能制，人参、黄芪、桑螵蛸、鹿茸、牡蛎、赤石脂。

脾肾虚寒，七味丸。补三十一

尿脬破损，猪、羊胞煎汤，入人参、黄芪、当归、熟地、陈皮、茯苓、桃仁，于极饥时饮之，然须急治，缓则不能成功也。又补脬饮，用生黄丝绢一尺，煎碎，白牡丹根皮、白及各一钱，俱为末，水一碗，同煮至绢烂如饧，空心顿服。服时不得作声，作声则不效。

膀胱阴虚，补中益气汤加山茱萸、山药、桑螵蛸，以补肺肾，则小便自不淋沥。补六

乳汁不行

乳汁乃气血所化，故入冲任之脉盛，脾胃之气强，则乳汁多而浓，衰弱则淡而少，治宜壮脾胃，滋化源。

气血壅闭不行，宜通草、土瓜根、漏芦以疏之。

血气衰弱不行，宜猪蹄、鲫鱼、生地、当归之类以润之，玉露散补六十二。加味四物汤补六十一。通乳汤和四十三。俱可补血以通乳汁。

乳汁涌出

非气血虚而不摄，则满而流溢。当以人之强弱，乳汁之浓淡，验其虚实也。

肝经血热，加味逍遥散。补二十一

肝经郁怒，加味归脾汤。补三

胀急而痛，漏芦散。散三十

气血虚弱，十全大补汤。补三十九

乳痈

足阳明之脉，从缺盆下乳内廉。足阳明之经，夹脐上行，至胸中而散。其经为邪热攻冲，则血为之击搏，气为之留滞。击搏则痛作，留滞则肿生。此由乳汁壅积，与气相击搏故也。或忿怒所逆，郁闷所遏，厚味所酿，以致厥阴之气不行，故窍不通而汁不得出。治法宜疏厥阴之滞，清阳明之热，青皮、生甘草节、瓜蒌、银花、当归、没药、皂角、橘叶、橘核，少佐以酒，随意消息可也。

乳悬

瘀血上攻，忽然两乳伸长，细小如肠，直过小腹，痛不可忍。用川芎、当归，煎浓汁，不服时，又用此二味烧烟，令病人吸之。使瘀血消而乳自愈。

玉门不闭

元气素弱，失于调养，以致血气不能收摄故也。

气血虚弱，十全大补汤。补三十九

肿胀燃痛，肝经虚热也。加味逍遥散。补二十一

产户痛

起居早，感风邪也，用祛风定痛汤。散四

生地、当归、茯苓、川芎、荆芥、防风、肉桂、大枣。

阴蚀

此因心神烦郁，胃气虚弱，致气血留滞也。当补心养胃，川芎、当归、白芍、地榆，米泔水五升，煎二升，熏洗三夜，又荆芥、薄荷、柏叶，煎汤洗净，后用倍子、青黛、黄丹、水粉，为末掺之，如疮水干燥，用香油调末涂之。

阴中湿烂

多由七情郁火，湿热下注，或肿、或痛、或痒，先以甘草煎浓汤，乘热熏洗；或五倍子、白矾、葱白，煎汤熏洗；或甘菊苗叶，不拘多少，捣烂，以百沸汤淋汁熏洗，挹干，用乌贼骨末炒黄，水粉煅过，炉甘石煅，淬童便，加冰片少许，研细末掺之。

肿痛溃烂，四物汤补七。加栀子、丹皮、胆草、荆芥。或加味逍遥用。补二十一

阴脱

此因分娩损伤胞络也，治宜升补元气，固真阴。

分娩过劳，气陷而脱　加参生化汤散五十八。或归脾汤补三。外用硫黄、海螵蛸、北五味为末傅之。

阴虚滑脱，加味固阴煎。涩二

气虚下陷，补中益气汤补六。或十全大补汤补三十九。

阴突

血虚气陷，不能固摄，阴中突出，如芝如菌，或挺出数寸，谓之阴挺。

血虚阴挺，四物汤补七。冲入煅龙骨末少许，空心连进二服，外用蛇床子五两。

乌梅十四枚。煎汤熏洗。

郁热下坠，加味逍遥散补二十一。或龙胆泻肝汤寒十一。

盘珠集胎产症治　卷下

施雯澹宁
清　姚江　严洁西亭　同纂
洪坞绩毫
鄞县　曹赤电炳章　圈校

列　方

补方六十三

六君子汤一

人参　白术炒　茯苓去皮　炙甘草　广皮　半夏制

半夏辛燥，胎孕三月前、须斟酌用之，不可轻投。茯苓降下，初孕亦当慎用。

六味丸二

熟地　山药　茯苓　山萸肉去核　丹皮　泽泻

加味归脾汤三

人参　白术炒　茯神去皮、木　当归去尾　枣仁去壳，炒　莲肉去心　黄芪蜜炙　远志　木香

远志辛散而上升，不宜多用，四五分足矣。

四君子汤四

人参　白术炒　茯苓　炙甘草

八珍汤五

人参　白术炒　茯苓　炙甘草　熟地　当归　白芍酒炒　川芎

川芎理血中之气，胎前宜酌用。

补中益气汤六

人参　白术炒　炙甘草　当归　广皮　升麻　柴胡

升、柴发散，可用钱许，升提用二三分足矣。

四物汤七

熟地　当归　白芍酒炒　川芎

安荣散八

人参　当归　白芍酒炒　麦冬　钗斛　山栀　通草

安胎饮九

人参　白术炒　炙甘草　生地　当归　广皮　升麻　柴胡　生姜　大枣

气不下陷，勿用升、柴。

杜仲丸十

杜仲姜汁炒　川断酒炒　枣肉蒸

为丸，米饮下。

当归芍药汤十一

当归　白芍酒炒　白术炒　茯苓　泽泻　川芎少许

大圣散十二

人参　黄芪炙　炙甘草　茯苓　当归　川芎　麦冬去心　木香　姜枣

川芎宜酌用

加味安胎饮十三

人参　白术炒　炙甘草　熟地　当归　川芎不宜多用　紫苏四五分　陈皮

如寒，加干姜。

五君子汤十四

人参　白术　炙甘草　广皮　干姜

内补丸十五

熟地　当归

青娥丸十六

杜仲姜汁炒　破故纸盐水炒　核桃去壳

蜜丸。

紫酒十七

大黑豆二合炒　好酒一盏煎服。

通气散十八

破故纸炒　先嚼胡桃。

加味归脾饮十九

人参　白术炒　茯神去皮、木　远志水制多　黄芩　山栀　丹皮　香附　木香

去黄芩、山栀、丹皮、香附，加枣仁、圆眼肉名归脾饮。

补中安胎饮二十

人参　白术　茯苓　炙甘草　熟地　当归　黄芩　紫苏　白芷炒　姜枣

加味逍遥散二十一

白术　茯苓　当归　白芍炒　柴胡　丹皮　黑山栀　熟地

异功散二十二

人参　白术炒　茯苓　炙甘草　广皮

生脉散二十三

人参　麦冬去心　北五味

都气饮二十四

熟地　山药　茯苓　山萸肉　泽泻　丹皮　北五味

甘草大枣汤二十五

小麦　炙甘草　大枣

安胎调气饮二十六

人参　白术炒　炙甘草　熟地　当归　白芍酒炒　川断　杜仲　陈皮　砂仁

补血汤二十七

黄芪炙　当归　川芎

黄芪糯米汤二十八

黄芪六两炙　糯米五合

水六升，煎半，分四服，日三夜一。

辰砂安神丸二十九

生地　当归　柏子仁炒去油　枣仁去壳、炒　茯神去皮、木　竹茹　砂仁

补心汤三十

人参　茯苓　炙甘草　熟地　当归　白芍酒炒　枣仁　麦冬　小麦

七味丸三十一

熟地　山药　茯苓　丹皮　泽泻　山萸肉　肉桂

加味八珍汤三十二

人参　白术　茯苓　炙甘草　熟地　当归　白芍酒炒　肉果面粉裹煨　罂粟壳醋炒

左归饮三十三

熟地　山药　茯苓　山萸肉　杞子　炙甘草

十圣散三十四

人参　黄芪炙　白术炙　砂仁　炙甘草　熟地　白芍炒　当归　川芎　川断　姜枣

千金保胎丸三十五

熟地　当归　阿胶　川断　杜仲　黄芩炒　香附制　砂仁　艾叶炒炭　枣肉

加味芎归汤三十六

当归　川芎　发余炭　鳖甲炙

人参生化汤三十七

人参　当归　川芎　炙甘草　姜炭多则四分　桃仁去皮　枣肉

加附子一片，以回阳止逆，亦可助参、芪之功。若渴，用人参、麦冬、北五味。

滋荣益气汤三十八

人参　白术炒　熟地　当归　川芎　北五味　黄芪炙　陈皮　麦冬去心

有汗，加姜、枣；大便不通，加苁蓉；块痛，加肉桂、益母草；痰，加姜汁、竹沥；泻，加茯苓。

十全大补汤三十九

人参　白术炒　茯苓　炙甘草　熟地　当归　白芍炒　川芎　肉桂　黄芪

升举大补方四十

人参　白术炒　熟地　当归　川芎　黄芪炙　麦冬去心　陈皮　炙甘草　升麻　白芷炒　荆芥

黄雌鸡汤四十一

熟地　当归　白术炒　黄芪炙　肉桂

鸡汁煎服。

殿胞煎四十二

当归　川芎　炙甘草　茯苓　肉桂

五物煎四十三

熟地　当归　白芍炒　川芎　肉桂

当归黄芪汤四十四

当归　黄芪炙　白芍炒

长生活命丹四十五

人参　生姜　莲子去心　麦芽炒

煎汤送饭锅焦粉二匙，渐加至四五匙。

八味丸四十六

熟地　山药　山萸肉　茯苓　丹皮　泽泻　附子　肉桂

金匮肾气汤四十七

熟地　山药　山萸肉　茯苓　丹皮　泽泻　附子　肉桂　怀牛膝　车前子

当归补血汤四十八

当归　黄芪炙　茯苓

调卫止汗汤四十九

人参　黄芪炙　麻黄根　炙甘草　陈皮　当归　桂枝　大枣

桂枝发表，用于止汗之中，不过引参芪以固卫耳，一二分足矣。

加味六味丸五十

熟地　山药　山萸肉去核　茯苓　丹皮　泽泻　麦冬去心　北五味

全生活血汤五十一

黄芪炙　熟地　生地　川柏炒炭　升麻

不应加人参

止汗散五十二

人参　当归　麻黄根　熟地　牡蛎　小麦麸炒　川连炭少许

加减养荣汤五十三

当归　川芎　茯神　枣仁去壳，炒　麦冬去心　人参　圆眼肉　陈皮　炙甘草　生姜　竹茹

人参当归汤五十四

生地　当归　白芍炒　人参　麦冬去心　竹茹　粳米　大枣

加参宁肺生化汤五十五

当归　川芎　人参　炙甘草　橘红　桑皮炒　杏仁　半夏制

虚而多痰，加姜汁、竹沥。

七味白术散五十六

人参　白术炒　茯苓　炙甘草　藿香　木香　干葛

参苓莲子饮五十七

人参　白术炒　茯苓　炙甘草　当归　白芍　山药　陈皮　升麻　莲子　生姜

加参生化汤五十八

当归　川芎　人参　黄芪炙　甘草炙　升麻　白术炒　北五味

母鸡汤五十九

人参　黄芪炙　白术炒　茯苓　牡蛎　麻黄根

黄母鸡汁煎。

羊肉汤六十

当归　川芎　生姜　精羊肉

加味四物汤六十一

熟地　当归　白芍炒　川芎　花粉　木通　猪蹄

以葱洗乳房。

玉露散六十二

人参　茯苓　炙甘草　当归　白芍炒　川芎　桔梗

阿胶散六十三

当归　白术炒　茯苓　阿胶　甘草炙　川芎少许　陈皮　姜　枣

散方三十一

抑肓丸一

柴胡　当归　炙甘草　钩藤　白术炒

清肝饮二

生地　当归　生白芍　柴胡　麦冬去心　苏梗　香附制　青皮炒炭

紫苏饮三

当归　白芍炒　人参　炙甘草　陈皮　砂仁　苏叶　葱白　生姜

祛风定痛汤四

生地　川芎　茯苓　肉桂　荆芥　防风　独活　大枣

天仙藤散五

天仙藤　香附制　陈皮　炙甘草　木瓜　姜皮

乌药顺气汤六

乌药　僵蚕炒　干姜　炙甘草　陈皮　木贼　制香附　白芷　葱

宜加生血活血之品。

芎苏散七

紫苏　川芎不宜多　白芍炒　陈皮　白术炒　炙甘草　麦冬去心

钩藤汤八

钩藤钩　当归　人参　茯神　桑寄生　桔梗

如烦热，加石膏一钱。

木香散九

木香　炙甘草　丁香

淡盐汤下。

五加皮散十

五加皮　阿胶蒲黄炒　杜仲盐水炒　狗脊　白芍炒　防风　羌藁　杏仁去皮　薄荷

五加皮丸十一

五加皮　杜仲炒　狗脊　白芍炒　羌藁　川断　诃子　薄荷

缩砂散十二

砂仁末，米饮下。

防风丸十三

防风　黄芩炒

米饮调下

升阳除湿汤十四

柴胡　升麻　猪苓　泽泻炒　陈皮　炙甘草　炒苍术　炒白术　防风　姜　枣

胃风汤十五

当归　柴胡　升麻　葛根　炙甘草　蔓荆子　藁本　木贼　川柏炒　苍术制　姜　枣

桂枝茯苓汤十六

桂枝　茯苓　丹皮　炒白芍　桃仁炒黑

苏香丸十七

当归　炒白芍　砂仁　炙甘草　黄芩炒　苏梗　木香

香苏散十八

香附制　紫苏　陈皮　炙甘草　砂仁　生姜

阳明加葛根、知母；少阳加柴胡；太阳加防风。

回生散十九

橘红　藿香

淡姜汤下。

藿香正气散二十

藿香　白术炒　茯苓　炙甘草　陈皮　砂仁　桔梗　紫苏　苍术炒　姜　枣

可加木香。

木香通气散二十一

木香　枳壳炒　制厚朴　草果煨　槟榔　陈皮　制附子　穿山甲炙　葱白

七宝丹二十二

人参　炙甘草　当归　白芍炒　川芎　紫苏　生姜　大腹皮醋炒，多则二三分　葱白

消风散二十三

甘菊　荆芥　当归　大豆叶炒　防风　茶叶　羚羊角镑　生石膏二、四分

芎乌散二十四

川芎　乌药

加当归更稳。

三圣散二十五

肉桂　当归　延胡索醋炒

泻白散二十六

地骨皮　杏仁去皮　桑白皮炙

益黄散二十七

陈皮　青皮炒焦　诃子煨　丁香　炙甘草

藿香温胃饮二十八

人参　白术炒　炙甘草　陈皮　藿香　丁香　当归　姜炭　厚朴制　生姜

手足冷加附子。

加味吴茱萸汤二十九

肉桂　当归　吴茱萸泡　干姜　防风　丹皮　赤茯苓　麦冬去心　炙甘草　桔梗　细辛少许　半夏制

七珍散三十

人参　生地　川芎　石菖蒲鲜者佳　防风　细辛　朱砂

薄荷汤下。

漏芦散三十一

漏芦　蛇蜕炙　蒌仁

好酒调下。

攻方十六

斩鬼丹一

川芎　秦艽　柴胡　吴茱萸泡　芫花醋炙　巴戟　巴霜　僵蚕炒

蜜丸酒下，出恶物即愈。

雄黄丸二

雄黄　鬼臼　朱砂　巴霜　獭肝　蜥蜴炙　蜈蚣炙

清汤下，服过前方，既下恶物，即以补元为要。

七宝丹

紫苏　大腹皮　炙甘草　人参　当归　白芍　川芎　生姜　葱白

见眼丸四

附子制　干姜　茴香炒　吴茱萸盐水炒　巴戟　肉桂　莪术醋炒　桃仁炒　延胡索醋炒

胜金散五

盐豉一两　麝香一钱

青布包，烧炭研末，秤锤烧赤，淬酒下。

三蜕散六

蛇蜕炒焦　蝉蜕焙燥　发灰

益母草汤调下。

失笑散七

生蒲黄　五灵脂

牛膝散八

怀牛膝　川芎　生蒲黄　肉桂　朴硝少许

起忧散九

当归　川芎　赤芍　肉桂　丹皮　生蒲黄　五灵脂　没药　延胡索　白芷

黑神散十

黑豆　地黄　当归　赤芍　生蒲黄　炮姜　炙甘草　肉桂研

童便下。

神仙回脓散十一

大黄炒　白芷　木香　沉香　没药　蛤粉　穿山甲炙

每服一丸，重一钱五分，参汤下。

抵圣汤十二

茯苓　炙甘草　陈皮　半夏　人参　赤芍　泽兰　生姜

《千金》神造汤十三

蟹爪一升　阿胶二两　炙甘草一两

琥珀地黄丸十四

琥珀　蒲黄炒　延胡索粘米炒　生地　生姜

生地汁浸生姜渣，生姜汁浸生地渣，蜜丸。

一灵三圣散十五

干荷叶　干地黄　粉丹皮　生蒲黄另研末，以煎三味药汤，调下

荷叶散十六

荷叶　地黄汁　延胡索醋炒

涩方三十三

大宁散一

黑豆三十五粒　罂粟壳半生半熟，二两　甘草半生半炙，二两　生姜

加味固阴煎二

人参　熟地　山药　山萸肉　川断　北五味　当归　菟丝子炒　炙甘草

寒

竹茹麦冬汤一

竹茹三两　麦冬去心，一两　前胡一钱五分　橘皮一钱　芦根三两

煎服，如身热，加地骨皮一两

滋阴清燥汤一

生地　生白芍　麦冬去心　知母炒　茯苓　条芩　葛根　橘红盐汤包　炙甘草　竹茹　灯草

犀角散二

犀角　条芩　麦冬去心　地骨皮　茯苓　竹沥冲　甘草

竹叶汤四

茯苓　麦冬去心　黄芩　竹叶　防风

麦冬汤五

麦冬去心　人参　茯神　生地　黄芩　犀角　炙甘草　莲子

知母丸六

知母炒

为末，枣肉丸。虚者，人参汤送下。

知母饮七

知母　麦冬去心　赤茯苓　黄芩　黄芪炙　甘草炙　桑皮　竹沥

调中和气散八

苏梗　砂仁壳　石膏不可多　知母炒　川柏炒　前胡　百草霜

加味羚羊角散九

羚羊　茯神　当归　杏仁　甘草　麦冬去心　五加皮　米仁　枣仁　防风　川芎少许

有痰，加竹沥、姜汁。

天冬饮子十

天门冬　知母炒　茯苓　白芍　熟地　荆芥　人参　当归　防风　北五味　川芎不宜多　羌活　生姜　菟蔚子不宜多

龙胆泻肝汤十一

人参　天冬　龙胆草酒炒　麦冬去心　川连炒　生甘草　山栀　知母炒　黄芩　柴胡　北五味

天冬汤十二

天冬　紫菀　知母炒　桑皮蜜炙　桔梗　北五味

如嗽血加黄芩、阿胶。

宁肺饮十三

天冬　知母炒　紫苏　桔梗　炙甘草

寒加杏仁、桑皮；多痰加姜汁、竹沥、陈皮；热加黄芩；心不舒畅加百合、川贝；虚加人参、紫菀。

左金丸十四

川连　吴茱萸炒

凉胎饮十五

生地　当归　白芍　甘草　茯苓　钗斛　香附制

侧柏丸十六

侧柏叶　黄芩

蜜丸，清汤下。赤带漏下如猪肝汁，此方可治

滋肾丸十七

知母　川柏　肉桂少许

清金利水汤十八

生地　当归　麦冬去心　花粉　扁豆　知母　泽泻　广皮

淡竹茹汤十九

淡竹茹三四两

煎汁，服一二碗。

三黄解毒汤二十

黄芩炒　黄连炒　黄柏炒　栀子

凉膈滋阴丸二十一

生地　萎仁　枳实炒　大力子

加味竹叶汤二十二

生地　白芍　地骨皮　竹叶　茯苓　人参　浮小麦

芦根清胃饮二十三

葛根　芦根　人参　麦冬去心　知母　竹茹　栀子　葱白

黄芩汤二十四

黄芩　白芍　甘草炙　大枣

犀角地黄汤二十五

犀角　生地　白芍　丹皮

加味清胃散二十六

生地　当归　川连　连翘　青皮炒炭　甘草　炒术

清肺饮二十七

栀子　黄芩　知母　麦冬去心　桑皮　乌梅

黄连汤二十八

川连　侧柏　当归　香附炒　阿胶为末

米饮下。

衄血汤二十九

侧柏叶　蒲黄炒　白芍　黄芪炙

为末，米糊丸，清汤下。

益元散三十

滑石煅　生甘草　辰砂

清魂膏三十一

藕汁　生地汁　童便

酒冲服。

茅根汤三十二

白茅根　瞿麦　车前子　通草　滑石煅　甘草　鲤鱼　石首鱼石研末

三黄熟艾汤三十三

黄芩　黄连　黄柏　艾醋炒

热　方　八

附子汤一

人参　白术炒　茯苓　白芍　附子制

理中汤二

白术炒　炙甘草　干姜

四顺汤三

当归　川芎　白芍炒　炮姜

理阴煎四

熟地　当归　肉桂　炙甘草　干姜

胃关煎五

熟地　山药　白扁豆　白术炒　炙甘草　焦姜

附子散六

人参　白术炒　炙甘草　陈皮　当归　丁香　附子

为末，米饮调下。

附子理中汤七

附子　白术　甘草炙　干姜

调中汤八

甘草炙　附子制　肉桂

和方四十四

参橘饮一

人参　白术炒　甘草炙　橘皮　当归　白芍　藿香　香附制　茯苓

半夏茯苓汤二

人参　白术炒　茯苓　炙甘草　广皮　半夏　白芍炒　旋覆花　桔梗

半夏滚汤洗七次，姜汁炒黄。

半夏动胎，胎初结，虑其辛燥易散也，勿用为稳。然恶阻非半夏不能止，经云：有故无殒。不妨权用一二剂，但不宜多用，五六分至一钱而止。

香砂六君子汤三

人参　白术炒　茯苓　炙甘草　广皮　半夏　木香　砂仁

竹叶安胎饮四

生地　当归　黄芩　麦冬去心　枣仁炒　甘草炙　人参　陈皮　竹叶　竹茹　姜　枣

痰，竹沥冲服。

逍遥散五

白术炒　白茯苓　当归　白芍炒　柴胡　薄荷

分气饮六

香附制　砂仁　白术炒　茯苓　当归　白芍炒　黄芩

鲤鱼汤七

白术　茯苓　当归　白芍炒　鲤鱼一尾

六七两者，煎服

二陈汤八

茯苓　炙甘草　陈皮　半夏制

五虎饮九

杏仁去皮　苏梗　木贼　陈皮　知母炒　北五味　桔梗　甘草炙　石膏不可多用　蒌仁喘者重用

小柴胡汤十

柴胡　黄芩　炙甘草　知母炒　姜　枣　人参

安胎和气饮十一

白术炒　陈皮　白芍炒　诃子煨、去核　甘草炙　木香　陈粳米　生姜

桑寄生散十二

桑寄生　当归　川芎　川断　香附制　阿胶　人参　白术炒　茯苓　甘草炙　生姜

参苏饮十三

紫苏　陈皮　前胡　桔梗　茯苓　炙甘草　葛根　知母炒　砂仁　人参

四物寄生汤十四

熟地　当归　川芎　白芍炒　桑寄生　羌活五六分

黄龙汤十五

柴胡　黄芩　炙甘草　知母炒　人参　姜　枣　红香附

蒙姜黄连丸十六

干姜泡　川连　砂仁　阿胶　白术炒　川芎　乳香去油

为末，盐梅（醋浸、捣）米糊丸，甘草汤调下。

归凉节命散十七

当归　白芍炒　白术炒　白茯苓　炙甘草　麦冬去心　粘米

如有食积，加砂仁、谷芽。

白术散十八

白术炒　防风　牡蛎煅

平安散十九

熟地　甘草炙　陈皮　砂仁　木香　川芎　生姜　煨盐

六和汤二十

人参　茯苓　炙甘草　藿香　杏仁　木瓜　陈皮　砂仁　姜　枣

人参白术散二十一

人参　白术　茯苓　炙甘草　木香　藿香　干葛

保产万全汤二十二

人参　当归　川芎　桃仁　炒姜　炙甘草　怀牛膝　红花酒炒　肉桂　大枣

开骨膏二十三

乳香一两（研）

端午日以猪心血和丸，如鸡豆大，朱砂为衣，每用一丸，酒下。

生化汤二十四

川芎　当归　桃仁　黑姜　炙甘草

保生无忧散二十五

当归　白芍炒　川芎　血余　乳香　木香　炙甘草　枳壳炒焦

清魂散二十六

人参　川芎　荆芥　泽兰　甘草炙

童便下。

济阴丹二十七

益母草连根拔起，阴干取叶，八两，为末，不犯铁器　当归一两　赤芍六钱　广木香五钱

为末，蜜丸如弹子大，每服一丸。有热，童便下；有风，荆芥酒下；如虚弱，参汤下。

加味四物汤二十八

熟地　当归　白芍炒　川芎　白芷　阿胶　蒲黄　小蓟根

砂雄丸二十九

朱砂一钱　雄黄一钱　白茯苓三两

为末，水丸，姜汤下。

金狗脊散三十

川断　地榆炒　川芎　金毛狗脊　熟地　当归　白芍炒　白芷　阿胶蒲黄炒

空心只服一帖。

趁痛散三十一

黄芪炙　白术炒　当归　怀牛膝　肉桂　炙甘草　独活　韭白　生姜

加减生化汤三十二

川芎　当归　甘草炙　砂仁　煨姜

温胃丁香汤三十三

当归　白术　干姜　丁香　人参　陈皮　炙甘草　藿香　前胡　生姜

石莲散三十四

石莲子去皮　白茯苓　丁香

为末，米饮下。

生津益液汤三十五

人参　茯苓　麦冬去心　花粉　炙甘草

竹叶　小麦　大枣

生化六和汤三十六

当归　川芎　炒姜　砂仁　藿香　陈皮　茯苓　生姜

加参宁嗽生化汤三十七

当归　川芎　人参　炙甘草　杏仁去皮　桑皮炙　半夏制　知母炒

小调经汤三十八

当归　赤芍　肉桂　没药去油　琥珀　细辛　麝香

为末，姜酒调下。

大调经汤三十九

茯神　琥珀　大黑豆炒

紫苏汤下。

加味生化汤四十

人参　黄芪炙　当归　川芎　麻黄根　天麻　荆芥　炙甘草　防风　枣仁炒

有痰，加姜汁、竹沥；大便闭，加麻仁。

加味通幽散四十一

川芎　当归　肉苁蓉洗　炙甘草　桃仁　麻仁炒

虚汗，加人参、黄芪、麻黄根；渴，加人参、麦冬、北五味；血块痛，加延胡索、肉桂。

石子汤四十二

猪腰子　当归　白芍炒　晚米　香豉

葱盐煮粥食之。

通乳汤四十三

猪蹄　通草　川芎　穿山甲炙　甘草节

二妙散四十四

川柏炒　苍术炒

泻方五

泽泻散一

泽泻炒　桑皮炒　赤茯苓　通草　炙甘草　生姜　枳壳炭少许

四苓散二

猪苓　泽泻　白术炒　茯苓

地肤子汤三

地肤子　车前子　知母　黄芩　赤茯苓　白芍　炙甘草　升麻炒　枳壳炭少许　通草

胃苓汤四

苍术炒　厚朴制，上二味宜炒焦，不可多用，以伤脾气　陈皮　甘草炙　猪苓　泽泻炒　白术炒　茯苓

五苓散五

猪苓　泽泻　白术炒　茯苓　肉桂少许

胎前备用良方三十五

恶　阻

保生汤一

人参　白术炒　甘草炙　乌梅　香附制　橘红

橘皮竹茹汤二

橘皮　竹茹　半夏制　茯苓

五君子汤三

人参　白术　炙甘草　广皮　煨姜

子　烦

人参散四

人参　黄芩　麦冬去心　犀角　地骨皮　赤茯苓　甘草

当归汤五

当归　人参　阿胶　甘草　葱白连须

黄连散六

黄连末　米饮下。

人参黄芪散七

人参　黄芪　知母　麦冬去心　葛根　茯苓　甘草　竹叶　秦艽

子　气

肾着汤八

白术　茯苓　甘草　杏仁　干姜

防己汤九

防己　桑皮　苏梗　赤茯苓　木香

子　痫

葛根汤十

葛根　人参　甘草　当归　贝母　黄芩　川芎　防风　桂皮二三分是矣

黄蜡膏十一

如牙关紧闭，先将麻油溶化黄蜡搽牙，然后进药。

加味逍遥散十二

白术炒　白茯苓　当归　白芍　柴胡　薄荷　黑山栀　丹皮　生地

子　嗽

百合散十三

紫菀　麦冬去心　桑皮　桔梗　甘草　竹茹　白蜜

参苏饮十四

人参　紫苏　陈皮　前胡　桔梗　茯苓　炙甘草　葛根　知母炒　砂仁

子　疟

加减安胎饮十五

人参　白术炒　当归　黄芩　藿香　紫苏　乌梅　青皮炒炭　红枣　生姜

又方十六

人参　白术　当归　黄芩　柴胡　薄荷　葛根　紫苏　藿香　龟甲　生姜　大枣

呕不思食，难治

心　腹　痛

竹茹丸十七

竹茹一斤　羊脂八两

蜜三两（煎），每服枣核大，三枚。

火龙散十八

生地　木香　砂仁壳炒

又方十九

川楝子根　艾叶盐水炒　小茴炒

腰　胁　痛

大地黄丸二十

熟地　当归　乌梅

蜜丸，治骨髓热痛。

内补汤二十一

生地　当归　川柏　麻仁　乳香　没药　黄芩　木香

归胶饮二十二

阿胶　炙甘草　当归　葱白

气壅攻腰，此可治之。

猪肾丸二十三

猪肾一斤　青盐二钱

蒸熟，焙干，蜜丸，空心服。

胜金散二十四

陈皮　吴茱萸　骨碎补　砂仁　甘草炙

盐汤下二钱。遍身两胁刺痛胀满，此五脏不利，气血虚弱也，惟此方可治。又胃气虚冷，下逼小肠，症若奔豚，大便秘涩，两胁虚鸣，腰痛如山，亦宜此方温中下气。

下　血

阿胶散二十五

阿胶　生地

二黄散二十六

生地　熟地

千金方二十七

生地　一斤

酒煮，绞汁服。

如圣汤二十八

鲤鱼皮　当归　川断　阿胶　竹茹　白芍炒　川芎　甘草炙

子芩丸二十九

条芩炒

为末，每服一钱，以秤锤烧赤，淬酒调下。若脾胃虚者勿服。

又方三十

鸡肝三个

酒煮，带酒食之。

伤　寒

白药子膏二十一

白药子末　鸡子清调摊纸上，如碗大，贴于脐下，干则温润之，恐毒气损胞，以此治之。

又方二十二

井底泥，敷心下，使胎不动。

伤　胎

夺命丸二十三

肉桂　桃仁　丹皮　赤芍　茯苓

淡醋汤下。误服毒食，伤胎下血，以此治之。

三物解毒汤二十四

生甘草　黑豆　竹叶

煎服。

又方二十五

生白扁豆末

米饮下。

古人治伤寒病，邪毒攻胎，致胎死腹中，多用硝石、水银、硇砂之类，使化烂而出，其余伤胎而胎死腹中者，慎勿用之。

产后备用良方十八

难　产

龟壳散一

龟板　当归　川芎　妇人头发烧炭，生长过者佳，汤下

又方二

伏龙肝末

酒下一钱。

又方三

兔毫败笔头一枚烧灰

研藕汁一盏下之。

如神散四

路上草鞋一双取鼻梁，洗净、烧灰

童便酒下三钱。

又方五

榆白皮

煮汁，服二升。

又方六

黄牯牛干粪

涂母腹上立出。

胞衣不下

一方七

陈久莲蓬壳

酒煎服之。或荷叶炒香为末，童便下。

恶露不止

瑞莲散八

莲房　当归　川芎　肉桂　棕榈烧　鲤鱼鳞烧

酒调三钱

心　痛

一方九

荷叶烧研

清汤下。

又方十

桂心研

胆汁丸，酒下一钱。

不　语

一方十一

人参　莲肉　鲜石菖蒲

水煎。

见　鬼

一方十二

益母草汁　地黄汁　童便

略煎五、六沸，入鸡子清调服。

渴

一方十三

莲子中青心生研细末
米饮下二钱。

又方十四
红花子五合炒研
水煎，徐徐呷之，治中风烦渴。

又方十五
炒蒲黄
井水调下二钱。

汗

一方十六
牡蛎粉　小麦麸皮炒

积　聚

一方十七
童便　地黄汁　藕汁　姜汁
共煎浓汁，酒下。血瘕痛无定处。

又方十八
生地　海螵蛸研
酒下。

胎产指南

〔清〕　单南山　著

《胎产指南》提要

清·单南山著。南山不详履贯，丁兰谷谓籍隶绍兴，盖为清初时人。据陈彩盅抄录咸丰丙辰原序原序缺名云：予总角时，闻升槎钱先生胎产为吾浙国手，不知其秘传得之于南山也。其中胎前悉以丹溪安胎饮为主，产后悉以生化汤为主，随症加减，按病论治。症既悉备，论极详明，使读者洞若观火，是诚秘本也。今将其中稍有缺略者，更为增补，仍注增补．不敢混真，其前后次序错乱者，更为移改。如产忌、食物、乡俗十弊、用药十误等条，原本俱载本末八卷内，今类入卷五禁忌药物内，以便查览。是本也，先伯祖素园公，于康熙丙寅年得于荆襄道署。其素园公手录原本，大兄殿扬携游湖海，存亡不得知矣。予叙其巅末，凡我子孙，珍藏熟玩，切不可视为寻常，等灵珠于鱼目，弃琳琅同碱石也。原本撰名失载。丁兰谷辑订单南山胎产症治录，则删改此序，作为兰谷自撰。考兰谷道光九十年间人，录此以待考证。

周　序

胎产一科，存亡系乎呼吸，利病关乎终身，于医道尤为切要，学医者尤不可不讲明而切究之也。先世名医，如朱丹溪、薛立斋诸公论之綦备。然求其操乎至要，简而易从者，则莫若《胎产指南》一书。是书原序云："出自单南山。其人里居、名字，已不可考，昔越郡钱升穉先生，得此秘本，而精于胎产之科，名冠一郡。乾隆癸巳，吾乡伊学曾先生，在宁郡道署，得此书于绍友娄君之手，遂亦以胎产驰名于吾邑。阅历四五十年，以其所经验者笔之于书，示后人当神明于法之中，不容偏执，名曰《女科医案》，凡七卷。然先生奉《指南》为枕中秘，未尝轻以示人，即戚友亦不得而知也。先生殁后，其甥明经蔡益亭先生始得，抄而传之。欧君孔章，少受举业于益亭，悦是书，手为抄录，久欲梓行于世，以广厥传，猝猝未果。今岁秋纂修宗谱，事将告竣，其谱师为天台陈君彩盅，知君欲为是举，益纵恿之，遂嘱陈君付诸剞劂氏，而以伊先生之医案附焉。昔唐晋公致仕家居，尝手抄《集验良方》，梓行于世。宋范文正公亦然，且其言曰：不为良相，愿为良医。夫以二公福世寿民之事业，何可胜道。而乃睠睠焉垂意于医，诚以医虽小道，而其利济于世者为不浅也。欧君虽不敢与二公颉颃上下，而其梓行是书之意，犹二公也。予嘉其意，为述其缘起如此。或曰：凡星相医卜之类，苟有秘本，不宜宣泄。若梓而行之，即不灵验。是说也，殆与儿童之见无异，而适为悭者之所借口，固大方家所窃鄙也。乌足辨哉，乌足辨哉。

时咸丰六年菊月葵圃周丹忱撰

原　序

单南山不知何许人也。予总角时，闻升穗钱先生胎产为吾浙国手，不知其秘传得之于南山也。其中胎前悉以丹溪安胎饮为主，产后悉以生化汤为主，随症加减，按病论治，症既悉备，论极详明，使读者洞如观火，以之救危急、起沉疴，靡不应手取效，如鼓应桴。即不知脉者，对症检方，依法调治，自有径辙可循，不致惘然坐务。实再世之青囊，济世之灵药也。予因多病，博览医书，汗牛充栋，不可胜纪，而胎产一科，简约明允，无出其右，是诚秘本也。今将其中稍有缺略者，更为增补，以便观览。仍注增补，不敢混真。其前后次序错乱者，更为移改，如产忌食物、乡俗十弊、用药十误等条，原本俱载本末八卷内，今类入卷五禁忌药物内，以便查览。是本也，先伯祖素园公于康熙丙寅年，得于荆襄道署，其素园公手录原本，大兄殿扬携游湖海，存亡不得知矣。予叙其巅末，凡我子孙，珍藏熟玩，切不可视为寻常，等灵珠于鱼目，弃琳琅同碱石也。其越裳氏来朝二年，至周迷其归路，周公作指南车赐之，因以还国。今读此本，而病症了然，固无异于指南也，因以名书，其聆之毋忽。原本撰名失载。

时在咸丰丙辰五月哉生明天台鸣山陈彩盎敬录于四明象之西沪欧中宪第

医学入门之法

钱升穉先生秘本

初学医者，须先李士材《医宗必读》，《脉诀》，药性之寒热温凉，入何经络，必须熟记，并看李时珍《本草纲目》，细心体认，脉象药性，无遗义矣。伤寒必须看宋肱《南阳活人书》，并成无己《明理论注解》、《伤寒论杂症》。儿科痘疹，须看万密斋全部，万无一失，诸书不及也。女科胎产秘本之外，更无佳者。《医方集解》，亦不可不看，方知用药之故。其余医书，汗牛充栋，如《灵枢》、《素问》、《东医宝鉴》、王肯堂《准绳》，不可不览，亦不可遍览。若《景岳全书》、《伤寒六书》，时医若不奉为模楷，何以医病？但其中不无偏僻旁见之处，故时医多误。观之须识其偏正，正者师之，偏者弃之，若不别其是非，不特用之有误，观之亦无益也。特识以为初学蹊径，遵而循之，熟而习之，神而明之，虽不能驰名六合，亦可腾誉绍兴，为白眉矣，慎毋忽诸。

《胎产指南》目录

卷首

女科总论 …… (51)
胎产脉候 …… (51)
调经章 …… (51)
不及期而经先行 …… (52)
经过期而后行 …… (52)
一月而经再行 …… (53)
数月而经一行 …… (53)
经行或先或后 …… (53)
经将行腹痛 …… (53)
经水多少 …… (53)
经水紫淡色 …… (54)
经闭不行 …… (54)
石瘕 …… (54)
肠覃 …… (55)
崩漏章 …… (55)
崩 …… (55)
漏 …… (55)
经血妄行 …… (55)
赤白带下 …… (55)
白浊白淫白带辨症 …… (56)
种子章 …… (56)
保胎辑要总论 …… (57)
受胎保护 …… (58)
难产七因 …… (58)

卷一

胎前辨论诸症 …… (59)
保安胎论 …… (59)
胎症名目辨 …… (59)
补母寿子论 …… (60)
补母寿子方 …… (60)
香附等耗气种子方不可服辨 …… (60)
事林广记瘦胎三方不可服辨 …… (60)
衰翁弱女求嗣辨 …… (61)
妇人受胎月令 …… (61)
胎前二十七症医方 …… (61)
增补胎前十症 …… (61)

卷二

辨病胎小产弱症医方 …… (67)
堕胎辨 …… (67)
妊妇失血类风症辨 …… (67)
胎不安毋议落胎救母辨 …… (67)
胎前药物宜忌 …… (68)

卷三

临产须知异症 …… (69)
异症调护法 …… (69)
异症医方 …… (69)
难产调护 …… (70)
增补临产须知 …… (70)
子死腹中辨 …… (70)
盘肠生调治法 …… (70)
产子气绝不啼救法 …… (71)
产后生化汤论服法 …… (71)
凡产论病 …… (71)
产后脉辨 …… (71)
产后之脉贵虚 …… (72)
产脉辨生死之法 …… (72)

卷四

产后诸症 …… (73)
新产危急医方 …… (73)
产后五急症医方 …… (73)
新产十九危症医方 …… (73)

卷五

产后禁忌药物 …… (76)
产妇禁用诸药 …… (76)
产后忌食诸物 …… (76)
乡俗产后十弊 …… (76)
产后用药十误 …… (76)

卷六

产后二十九症医方 …… (78)

卷七上

产后论解三十二症医方 …… (81)

一、论血块 …… (81)
二、论血晕 …… (81)
三、论产后厥症 …… (82)
四、产后血崩 …… (82)
五、产后气短似喘 …… (83)
六、产后妄言妄见 …… (83)
七、产后伤食 …… (84)
八、产后忿怒 …… (84)
九、产后类疟 …… (85)
十、产后类伤寒二阳症 …… (85)
十一、产后类中风 …… (86)
十二、产后汗 …… (86)
十三、产后盗汗 …… (87)
十四、产后口渴或兼小便不利 …… (87)
十五、产后类痉 …… (87)
十六、产后泻 …… (88)
十七、产后完谷不化 …… (88)
十八、产后痢 …… (89)
十九、产后霍乱 …… (89)
二十、产后呕逆不食 …… (89)
二十一、产后水肿有针刺法附卷七 …… (90)
下末篇 …… (90)
二十二、产后怔忡惊悸 …… (90)
二十三、产后骨蒸 …… (90)
二十四、产后心痛 …… (91)
二十五、产后腹痛 …… (91)
二十六、产后小腹痛 …… (91)
二十七、产后遍身疼痛 …… (91)
二十八、产后腰痛 …… (91)
二十九、产后淋 …… (92)
三十、产后小便数 …… (92)
三十一、产妇流注 …… (92)
三十二、产后癫狂 …… (93)

卷七下

增补产后十二症 …… (94)
发热 …… (94)
头痛 …… (94)
腹胀 …… (94)
咳嗽 …… (94)
呃逆 …… (94)
恶露不下 …… (95)
恶露不止 …… (95)
眼见黑花头眩 …… (95)
胁痛 …… (95)
不语 …… (95)
言语含糊 …… (95)
瘛瘲 …… (95)
产后大小便秘下身水肿
狂语诸症医方 …… (95)

卷八

医方类 …… (97)
汤类 …… (97)
生化汤 …… (97)
滋荣易产汤 …… (97)
升举大补汤 …… (97)
滋荣益气复神汤 …… (97)
六和汤 …… (97)
补中益气汤 …… (97)
保真汤 …… (97)
十全大补汤 …… (97)
当归六黄汤 …… (97)
鲤鱼汤 …… (97)
四君子汤 …… (97)
四物汤 …… (97)
二陈汤 …… (97)
麻黄汤 …… (97)
香薷汤 …… (98)
六君子汤 …… (98)
犀角地黄汤 …… (98)
正气汤 …… (98)
甘桔汤 …… (98)
饮类 …… (98)
丹溪安胎饮 …… (98)
安荣饮 …… (98)
宁肺止嗽饮 …… (98)
补母固胎饮 …… (98)
七宝截症饮 …… (98)
十味治症饮 …… (98)
元胡索饮 …… (98)
丸类 …… (98)
六味地黄丸 …… (98)
补阳宿凤丸 …… (98)
先天大造丸 …… (98)
加味益母丸 …… (98)
香连丸 …… (99)

补阴大造丸 …… (99)
柴前梅连丸 …… (99)
安神丸 …… (99)
清气化痰丸 …… (99)
散类 …… (99)
天仙藤散 …… (99)
羚羊角散 …… (99)
失笑散 …… (99)
元胡索散 …… (99)
逍遥散 …… (99)
五皮散 …… (99)
催生如神散 …… (99)
平胃散 …… (99)
方类 …… (99)
丹溪医案大补方 …… (99)
补母寿子方 …… (99)
乳痈方 …… (99)
丹类 …… (99)
煎膏药方丹 …… (99)
捣药方丹 …… (100)

胎产指南　卷首

女科总论

男女均禀天地之气而生，凡外感内伤之症，未尝不同，但女则别有调经、胎前、产后之治，所以别立一科也。男子之血宜静而不宜动，如或动焉，则吐血、衄血、污血之病生矣。女子之血宜动而不宜静，如或静焉，则经闭、血枯之病生矣。总而言之，调经专理气，补心脾为主，盖血非气不行，心生血，脾统血也。胎前专以清热补脾为主，盖热清而胎安，脾健则不堕也。产后专以大补气血，兼行滞为主，盖产后气血大虚，且有瘀滞，虽有诸症，皆以末治，生化汤实为圣方也。知乎此，女科之大要得矣。

胎产脉候

女人于少阴心脉动甚，其胎已结；若按之滑疾不散，胎必三月；但疾不散，五月可别；左疾为男，右疾为女。故《脉诀》云：尺数关滑而寸盛，阳搏阴别而雀跃是也。若胎离经，或一息二至三至，为将产之候。胎前脉宜洪数有力，若沉微者必难产，谓气血已败也。产后脉宜缓小无力，忌实大弦牢者，谓脉与病反，邪气盛也。

调经章

经云：女子二七而天癸至，冲任满盛，月事以时下，乃有子。故得其常候者为无病。苟不及期而经先行，或过期而后行，或一月而经再行，或数月而经一行，或闭而不行，或崩或漏，皆失其常候，不可不调也。调治之法，热则清之，冷则温之，虚则补之，滞则行之，滑则固之，下陷则举之，对症施治，以平为期。如芩、连、栀、柏，清经药也；丁、桂、姜、附，温经药也；参、术、归、芪，补虚药也；川芎、归、附、青皮、元胡，行滞药也；牡蛎、赤石脂、棕榈灰、侧柏叶，固涩药也；升麻、柴胡、荆芥、白芷，升举药也。随症用之，无不效者矣。

妇人经候不调有三：一曰脾虚，二曰冲任损伤，三曰脂痰凝塞，治之不可不审。脾胃虚弱者，经曰：二阳之病发心脾，女子不月。夫二阳者，阳明胃也。胃主受纳五谷，长养血气，灌溉脏腑，流行经络，乃水谷之海，血气之母也，惟忧思虑则伤心，心气受伤，脾气失养，郁结不通，腐化不行，所谓长养灌溉者，失其全矣，故脾胃虚弱，饮食减少，气日渐耗，血日渐少，始有血枯、血闭及血少色淡，过期始行，数月一行之病。

冲任损伤者，经曰：气以煦之，血以濡之。故气行则血行，气止则血止也。女子之性，执拗偏急，忿怒妒忌，以伤肝气。肝为血海，冲任之系。冲任失守，血气妄行也。又褚氏曰：女子血未行，而强合以动其血，他日有难名之病。故女未及二七天癸之期，而男子强与之合；或于月事未断之时，男子纵欲不已，冲任内伤，血海不固。由斯二者，为崩为漏，有一月再行，不及期而行者矣。

脂痰凝塞者，盖妇人之身，内而肠胃开通，无所阻塞，外而经络流利，无所凝滞，则气血和畅，经水应期，惟彼肥硕者，脂膏充满，玄室之户不开；挟痰者，痰涎凝滞，血海之波不流。故有过期而经始行，或数月而经一行，及为滞为带，为经闭，为无子之病。

不及期而经先行

如往性温和，素无他疾者，责其血虚，且有热也。俱用水煎，空心服。

当归一钱　川芎八分　赤芍一钱　生地一钱　知母一钱　地骨皮一钱　麦冬一钱　甘草五分

如性急躁，多怒多妒者，责其血气俱热，且有郁也。

归身一钱　川芎一钱　白芍一钱　生地七分　条芩炒　黄连炒　香附便浸，炒，各一钱　甘草五分

如形疲，素无他疾者，责其血热也，用四物芩连汤主之。

当归一钱，炒　川芎一钱，炒　生地一钱，炒　白芍一钱，炒　黄芩一钱，炒　黄连　黄柏　黄芩各炒等分

用蜜丸，白汤下。

如形疲，素多痰，且有热者，责其冲任内伤也。用：

当归一钱　白芍一钱　熟地一钱　人参一钱　知母一钱　麦冬一钱　川芎一钱　甘草五分

加姜枣水煎，更服地黄丸。

地黄丸　治女子冲任损伤，及胃虚血虚，血枯血闭之症。

熟地八两　山药四两　萸肉四两　白茯苓三两　丹皮三两

蜜丸，空心白汤下。

如曾误服辛热暖宫之药者，责其冲任有伏火也。用：

归身一钱　赤芍一钱　生地一钱　知母一钱　川芎七分　黄柏一钱，炒　木通（去皮）一钱　甘草五分

更服三黄丸和之。

如形肥，多痰多郁者，责其血虚气热也。用：

当归　川芎　生地姜汁炒，各一钱　陈皮五分　半夏五分　白茯苓五分　生甘草五分　条芩一钱　香附一钱，便浸炒　黄连一钱，炒

加姜，水煎服。

经过期而后行

如往性温和，素无痰者，责其血虚少。

八物汤主之，加姜枣。

当归　川芎　生地酒炒　白芍　人参　白术　茯苓　甘草各等分

如性急躁，多怒多妒者，责其气逆血少气，前方加

香附（便浸炒）　青皮等分

水煎，兼服苍莎丸以调之。

苍莎丸　和中开郁。

苍术　香附各三两，便浸一日夜　条芩一两五钱

共为末，汤浸，蒸饼丸。

如形疲，素无他疾者，责其气血俱不足也，十全大补汤主之。

十全大补汤　专治气血两虚，脾胃不足。

人参一钱　黄芪一钱　白术一钱　茯苓一钱　炙草一钱　当归一钱　川芎一钱　白芍一钱　生地一钱　肉桂五分

加姜枣。

如形疲食少，责其脾胃虚弱，气血衰少也。用异功散，加当归川芎汤主之。

人参　茯苓　白术　陈皮　甘草各等分。此五味名异功散

加归、芎、姜、枣，兼服地黄丸。

如形肥及饮食过多之人，责其湿痰壅滞，躯肢迫塞也。六君子加芎归汤主之。

参　术　陈皮　苓　甘　半夏

加川芎、当归、香附各一两，便浸。

兼服苍莎丸。

如素多痰者，责其脾胃虚弱，气血失养也。用参术大补，即**参芪白术散**加芎、归。

人参五钱　白术七钱　茯苓七钱　甘草三钱　陈皮五钱　莲肉七钱　山药一两　砂仁五钱　石菖蒲五钱

加归身七钱　川芎五钱

共为末，用荷叶包米，煮饭为丸，米饮下，兼服地黄丸。

一月而经再行

如性急多怒者，责其伤肝，以动冲任之脉，四物加柴胡汤主之。兼常服补阴丸，以泻冲任之火。

当归　川芎　白芍　生地

加柴胡　人参　条芩　生甘　黄连各等分

水煎。

补阴丸

黄柏炒　知母去皮

等分蜜丸，每服五十丸。

如曾服辛热之药者，用四物汤加黄柏、知母，服三补丸主之。

如曾伤冲任之脉者，用四物汤加人参、知母、麦冬服，及地黄丸主之。

数月而经一行

如疲人责其脾胃弱、气血虚，用十全大补汤及地黄丸主之。

如肥人责其多痰，及气血虚，用六君子加苍莎导痰丸主之。

人参　川芎　白术　半夏各七分　白茯一钱　陈皮一钱　苍术一钱　当归一钱　香附一钱　枳壳一钱

苍莎导痰丸

苍术二两　香附二两　陈皮一两　白茯一两　枳壳一两　半夏一两　南星一两　甘草一两

用生姜自然汁浸饼，为丸，淡姜汤下。

经行或先或后

悉从虚治，**加减八物汤**主之。

人参　白术　茯苓　当归　川芎　甘草　陈皮　白芍　丹皮　丹参　香附

加姜枣。

乌鸡丸　专治妇人脾胃虚弱，冲任损伤，血气不足，经候不调，以致无子者。神验。

用乌骨鸡一只，先以粳米喂养七日，勿令食虫蚁，吊死，去毛杂，以一个为率用。

生地二两　熟地二两　天冬二两　麦冬二两

放鸡肚中，陈酒十碗，砂罐煮烂，取出，再用桑柴火上焙，去药，更将余酒淹尽。焙至焦枯研末，再加杜仲二两（用盐水炒）、人参、炙甘草、苁蓉、故纸（炒）、小茴各一两，炒归身、川芎、白术、丹参、白茯苓各二两，香附四两（醋炒），砂仁一两。共研末，和上药末，酒调面糊为丸。每服五十丸，空心米饮下。

经将行腹痛

凡经水将行，腰胀腹痛者，此气滞血实也。**桃仁四物汤**主之。

归尾　川芎　赤芍　丹皮　香附（醋炒）　胡索各一钱　生地五分　红花五分　桃仁二十一粒，研泥

水煎，入桃仁服。

如疲人责其有火。加黄连一钱　黄芩一钱。

如肥人责其有痰。加枳壳一钱　苍术一钱。

凡经水过多，腹中痛者，此虚中有滞也。**加减八物汤**主之。

人参一钱　白术一钱　白茯一钱　归身一钱　白芍一钱　生地一钱　炙甘五分　木香五分　青皮七分　香附一钱，醋炒

加姜枣。

经水多少

如肥人行经来少者，责其痰碍经隧也。**二陈汤加芎归**主之。

陈皮一钱　白茯一钱　当归一钱　川芎一钱　香附一钱，便浸　枳壳一钱　半夏八分　甘草五分　滑石二钱

如疲人经水来少者，责其血虚也。**四物汤加人参汤**主之。

当归一钱　川芎一钱　白芍一钱　生地一钱　人参一钱　香附一钱　炙甘八分

加姜枣。

凡经水来太多者，不问肥疲，皆属热也。**四物加芩连汤**主之。

当归一钱　白芍一钱　知母一钱　生地一钱　条芩一钱　黄连一钱　川芎五分　黄柏七分

并服三补丸。

经水紫淡色

如紫色者，热也。**四物加香附黄连**主之。

归尾　川芎　赤芍　生地　香附（便浸）　黄连　生甘　丹皮各一钱

如白淡者，虚也。**八物汤**主之。

人参一钱　白术一钱　茯苓一钱　当归一钱　川芎一钱　白芍一钱　熟地一钱　黄芪一钱　香附一钱，便浸炒　炙甘草五分

加姜枣，更常服地黄丸。

以上调经药，并宜于行经时，连进十余服，则经自调矣。丸药宜久服。

经闭不行

妇人经闭不行，其候有三：脾胃损伤，饮食减少，气耗血枯而不行者。当补其脾胃，养其气血，待气血充生，经自行矣。不可妄用通经之剂，致中气益损，阴血益干，便成痨瘵而不可救。故有犹索千金于乞丐，日加棰楚，徒毙其生者矣。一则忧愁思虑，恼怒怨恨，气郁血滞而经不行者。当开郁气、通滞血而经自行。苟用补剂，则气得补而益结，血益凝聚，致成癥瘕胀满，所谓养虎自遗患也。一则躯脂迫塞，痰涎壅塞而经不行者。当行气导痰，使经得行，斯谓之良工矣。

如因脾胃损伤，血枯不行者，**加减补中益气汤**主之。乌鸡丸亦可服

人参二分　白术二分　黄芪七分　柴胡七分　炙甘五分　当归一钱　白芍一钱　川芎一钱　陈皮一钱　神曲五分　麦芽五分

加姜。更服煮参苓术丸，以经行为度。

如因气郁血闭不行者，用**开郁二陈汤**主之。

陈皮一钱　茯苓一钱　苍术一钱　香附一钱　川芎一钱　半夏七分　青皮七分　莪术七分　槟榔七分　甘草五分　木香五分

加姜。更宜服四制香附丸，以经行为度。此丸乃妇人之常药。

四制香附丸

香附一斤，分四制　酒　醋　童便　盐水各浸三日，焙干　天台乌药八两

共末，醋糊为丸，白汤下。

如因痰者，用苍莎导痰丸主之。更服开郁二陈汤，去莪术，加枳壳一钱

有怨期未嫁之女，偏房失宠之妾，及寡妇尼姑，欲动而不能得，遂愤愤而不能得伸，多有经闭之疾，含羞强忍，不欲人知，致成痨瘵之病而不可救。宜用四制香附丸，参术大补丸，攻补兼行，庶或有瘳。此七情之发，无法治之也。

有经闭不行，骨蒸潮热，脉虚者，**增损八物柴胡汤**主之。

人参一钱　白茯苓一钱　当归一钱　白芍一钱　生地一钱　麦冬一钱　知母一钱　柴胡一钱　甘草五分

倘有汗，加地骨皮一钱；无汗，加丹皮一钱，加竹叶。

凡妇人虚有热者，皆可服之。如热太甚，服此不平，加炮姜一钱，神效。

如经闭发热，咽燥唇干，脉实者，**四物凉膈散**主之。

当归一钱　川芎一钱　白芍一钱　生地一钱　黄芩一钱，酒炒　黄连一钱，酒炒　栀子一钱，炒　连翘一钱　桔梗一钱　生甘五分　薄荷五分

加竹叶。凡血实形盛，脉有力者皆可服。

石　瘕

因行经时，寒气自阴户入，客于胞门，以致精血凝聚，月信不行，其腹渐大，如孕子状。妇人壮盛者，半年之后，小水长而消矣；若虚怯者，必成肿病。**温经汤**主之。

归身梢一钱　川芎一钱　赤芍一钱　莪术一钱　人参一钱　牛膝一钱　故纸一钱　小茴一钱　炙甘五分

加姜枣。更宜频服香附丸。

肠　覃

因行经之时，寒气自肛门入，客于大肠，以致经血凝涩，月信虽行而少，其腹渐大如孕，为胎漏状。壮盛妇人，半年以后，便长水消，气盛而除；虚怯者，必成胀病。**桂枝桃仁汤**主之。

桂枝一钱五分　槟榔一钱五分　白芍一钱　生地一钱　枳壳一钱　桃仁二十五粒，去皮尖、研　炙甘五分

加姜枣。更宜服四制香附丸。

崩　漏　章

崩

妇人崩中之病，皆因中气虚，不能摄血，加以积热在里，迫血妄行，故令经血暴下而成崩中。崩久不止，遂成下漏。叔和《脉诀》云：崩中日久为白带、漏下时，多肾水枯也。治有三法：初止血；次清热；后补其虚，未有不痊者也。

凡血崩用五灵脂半生半炒，酒服，能行血止血，治血刺痛。神效。五灵脂不特治血，而兼治风，诚治崩之妙药也。

初止血者，乃急则治其标也。四物汤调**十灰散**止之，血止为度。

藕节　莲蓬　艾叶　棕榈　大小蓟根　侧柏　干姜　油头发　山栀子

以上十味，俱煅存性，研，等分和匀，每服三钱，或用醋煮糯米粉为丸，每服百丸。妇人冲任经虚，风伤营血，以致崩中。风为动物，血崩乃风动之故，必用风药也。

次清热。血既止，宜服清热之剂，用**凉血地黄丸**主之。

生地一钱　当归一钱、酽炒　黄连五分　黄柏五分　知母五分　藁本五分　川芎五分　升麻五分　柴胡七分　羌活七分　防风七分　黄芩四分　生甘四分　细辛四分　荆芥穗四分　蔓荆子四分　红花一分

水煎，如血未止，再吞十灰丸。

血已止，热已除，宜用补中之剂，**加味补中益气汤**主之。

人参一钱　黄芪一钱　白术一钱　陈皮一钱　当归一钱　白芍一钱　熟地一钱　炙甘五分　白茯五分　升麻五分　柴胡五分　益智五分　黄柏五分，炒

加姜枣更宜。早服地黄丸，晚服参术大补丸，以平为期。

漏

凡崩久成漏，连年不休，此中气下陷，下元不固也。宜用前加味补中益气汤，兼服**鹿角霜丸**主之。

鹿角霜一两　柏子仁一两，炒　归身一两　茯神一两　龙骨一两，煅　阿胶蛤粉炒成珠，一两　川芎七分　香附二两，酽炒　炙甘五分　续断一两五钱　共末。山药五两，研

米饮煮糊为丸，每服五十丸，空心温酒下。

经血妄行

如经妄行，或吐血、鼻中血出，或口内血腥，用前四物凉膈散加生韭自然汁服之。

赤白带下

带下之病，妇人皆有之。赤者属热，兼虚兼火治之；白者属湿，兼虚兼痰治之。年久不止者，以补脾胃为主，兼升提。大抵疲人多痰，要知此候，白带灸中极穴七壮，在脐下四寸。极效《古今医鉴》。

赤带用四物汤加芩连，再加升麻丹皮主之。兼服三补丸。白带用**加味六君子汤**主之。

半夏一钱　陈皮一钱　苍术一钱　人参一钱　白术一钱　白茯一钱　炙甘草七分　升麻五分　柴胡五分

加姜。兼服苍莎导痰丸。

带久不止者，专以补虚为主，宜十全大

补汤，去地黄加陈皮、半夏、干姜（炒）。更服参术大补丸，以补脾胃之虚。又服补宫丸，以固下元脱。

补宫丸

鹿角霜　白术　白茯苓　白芍　白芷　牡蛎（煅、童便淬）　山药　龙骨煅　赤石脂等分　干姜减半、炒

醋糊为丸，空心米饮下。

白浊白淫白带辨症

妇人常有白浊、白带之疾，症既不同，治亦各别。白带者，时常流出清冷稠粘，此下元虚之症也，用白带久不止之法治之；白浊者，随小解而来，浑浊如泔，此胃中浊气，渗入膀胱也。**加味二陈汤**主之。

陈皮一钱　半夏一钱　茯苓一钱　白术一钱　苍术一钱　益智仁一钱，盐炒　炙甘五分　升麻七分　柴胡七分

加姜。

遗白带方　酒煮白果三升，去心膜，晒干为末。每服三钱，白汤下。

白淫者，常在小便之后，而来亦不多，此男精不摄，滑而自出，不治自愈。

温经汤方　妇人行经时，连服三帖，亦能成孕。

半夏一钱　陈皮一钱　生地一钱　全归三钱　川芎八分　红花八分　白芍八分　秦艽八分　乌药八分　香附一钱五分　木通三分　青皮七分

加姜。

通经方

牛膝　花粉　木通　三棱　莪术　郁金　威灵仙　连翘　生地　荨麻　香附　芍药　蒺藜　三棱炒　茜草根

去闭方

川芎　续断　桃仁　红花　丹皮　鳖甲　生蒲黄　胡索　瞿麦　苏木　穿山甲

月经不止方

川芎　归身　木贼　地榆　椿白皮　倒挂尘炒　莲房　荆芥穗　侧柏叶　贯仲　乌梅　竹肉　藕节　棕灰　大小蓟根　发灰　栀子

种子章

无男女则乾坤几乎息矣。男子匹配，所以广嗣，厥系非轻，勿谓无赖于人事也。生育者，必阳道强健而不衰，阴癸应候而不愆，阴阳交畅，精血合凝，而胎元易成矣。不然，阳衰不能下应乎阴，阴亏不能上从乎阳，阴阳乖戾，是以无子，虽云天命之有定，抑亦人事之未尽与。故种子者，男则清心寡欲以养其精，女则平心定气以养其血。补之以药饵，济以方术，是谓人事之当尽也。何谓男贵清心寡欲？盖形乐者易盈，志乐者易荡。富贵之人，不知御神，则荡心倾，不知御形，则盈必亏，此清心寡欲为男子第一要紧也。何谓女贵平心定气？盖女子以身事人而性多躁，以色悦人而情多急，稍不如意，即忧思怨怒矣。忧则气结，思则气郁，怒则气逆，怨则气阻。血随气行，气逆血亦逆，此平心定气为女子第一要紧也。药饵维何？男子宜服地黄丸，以补左肾之阴，加杜仲、苁蓉、巴戟、补骨、沉香，以补右肾之阳。女子宜服乌鸡丸，以养其血气，调其经候，斯为得理。若彼桂附丹石，动气耗阳，损血消阴之剂，一切止之。何谓济之以方术？如种子之歌、素女之论是也。女人无子，多因经候不调，药饵之辅，尤不可缓，若不调其经候而与之合，徒用力于无用之地，此调经为女人种子紧要也。

如肥盛妇人，禀受甚厚，及恣于酒食之人，经候不调，不能成胎，谓之躯脂满溢，闭塞子宫，宜行湿燥痰，用苍莎导痰丸、四制香附丸。

如瘦怯性急之人，经水不调，不能成胎，谓之子宫干涩无血，不能摄受精气。宜凉血降火，用地黄三补丸调之。

如素有浊漏带下之人，经水不调，不能成胎，谓之下元虚惫，不能聚血受精。宜补虚涩脱，用乌鸡丸、补宫丸调之。

种子歌云：三十时辰两日半，二十八九君须算；落红满地是佳期，经水过时空霍乱；霍乱之时枉费工，树头木底觅残红；管取放花能结子，何愁丹桂不成丛。此盖言经水未行之时，血海正满，子宫未开，不能受精以成胎。经水既行，则子宫开，血海净，斯能受精矣。然自行经之时，算至三十个时辰，恰两日半，种子当贵其时。故一日二日三日与之交，则多生男；四日五日六日与之交，则多生女；七日之后，子宫复闭，不受胎矣。

妇人阴盾取象子月，若是朔至望，经行不失其候者，结胎易生子多寿。以月光渐生，月轮渐满也。若自望至晦，经行或失其期者，胎虽结，生子多夭。以月光渐消，月廓渐空也，此造化之理，可与得情者道之矣。素女论中，男有三至，女有五至，如男至而女未至，玉体才交，琼浆先吐，虽欲下应乎阴，而阴不从也。如女至而男未至，桃浪先翻，玉露无滴，虽欲上从乎阳，而阳不应也，所以无子。然气至者，亦有先后男女之别，如阳精先至，阴血后参，则精开裹血而成女。阴血先至，阳精后冲，则血开裹精而成男。故卜书云：阴包阳，则桂庭添秀。阳包阴，则桃洞得仙。此之谓也。

何谓男有三至？盖阴痿而不举，肝气未至也；举而不坚，肾气未至也；坚而不热，心气未至也。肝气未至而强合，则伤肝，其精满滴而不射；肾气未至而强合，则伤肾，其精散漫而不粘聚；心气未至而强合，则伤心，其精冷而不热。此男子之所以无子，贵乎清心寡欲，以养肝肾心之气也。

何谓女有五至？盖交戏之时，面赤而热，心气至也。目中涎沥，渐睨视人，肝气至也。娇声低语，口鼻气喘，肺气至也。伸舌吮唇，以身偎人，脾气至也。玉户开张，琼涎流出，肾气至也。五气皆至，而与之合，则情合意美，阳施阴受，有子之道也。

男女无疾，交会应期；三虚四忌，不可不避。三虚者，天地晦冥，日月薄蚀，电雷风雨。晦滋朔望，天之虚也；地震土陷，山崩水溢，地之虚也；忧怒悲恐，醉饱劳倦，人之虚也。犯此三虚，交而不孕，孕而不育，疾病且生，身之灾也。四忌者，一忌本命正冲，甲子庚申，灭没休废之日；二忌大寒大暑，大饱大醉之时；三忌日月星辰，寺观坛场之前，冢墓之处；四忌触忤恼犯，骂詈击搏之事。犯此四者，令人无子，且至夭也。

凡种子者，当应候之时，男服补肾益精之药，女则调其饮食，淡其滋味，避其寒暑，至夜半生气乘旺之时，依上三至五至，三虚四忌行之，自然交而必孕，孕而必成矣。养生书云：行房事切忌子时前，乃阳衰阴盛之候。

保胎辑要总论

凡有妇人即有生育，此造化自然之理，古今之常事。而临产者每抱忧疑，皆由未明此理之故。盖造化原不令人难生，人多不晓调摄，因而难生；造化原不令人逆生，人多慌忙逼迫，因而逆生。难逆两端，关系二命，倘平时不知讲求，则临产必致误事。至稳婆不可不用，亦不可专意听信倚靠，缘彼无书传，无师授，此理全然不知，多执己见，胡做乱为，误人性命。凡为夫君者，宜平时家中讲谈，令妇人习闻，有孕知调摄，临产有主张，不惧怕，不早用力，自无难产逆生之害。以受胎后论，即不能知古人胎教，凡宜禁忌者，亦当省悟。以临产时论，胎至十月，形完气壮，手足必动，子动则母必腹痛，痛急则胞衣必破，子自出胞衣而来，苟不甚耐顺时，见其腹痛半日、一日不产，即为难生，不知自胞衣未破，子未出胞衣，倘用药用符，催其速生，一催之间，多致误事。岂知天地生物，胎卵蠢动，皆自生养，何尝用药用符。故临产切不可慌张，即三五日不产，亦不妨，须

要忍痛安心，任其自然分娩。

受胎保护

受胎后，即宜用布一幅，阔六七寸，长短视人肥瘦，约缚二道，横束腰间，直至临盆方解去。若是试痛，仍不宜解，此有二妙：胎未长成，得此则腰膂有力，些须闪挫，不致动胎，又能常令腹中窄狭，及到解开，则腹中乍宽，转身容易。

胎后睡时，须要两边换睡，不可尽在一边，要使小儿左右利便，手足惯熟，则产时中道而出不难矣。

孕后饮食宜淡泊，不宜肥浓，不宜重浊。宜甘平，不宜辛热。青蔬白饭，亦能养人。若在贫家，颇而不乏，但富贵之家，平日甘肥餍足，抑令崇俭，势所不堪，酌乎其中，胪列如下：

宜食诸物：肚、肺、鸡、鸭、鲞、海参、腐皮、麻油、白菜、菠菱、笋、莲子、熟藕、山药、芡实。诸物总要洁治，多用清汤，吹去浮油，饮之最佳。俱用白煮，忌用油煎。此多为膏粱之人言耳。若藜藿之腹，正宜得肥甘而润之，何淡泊之有？但六七个月后，腐皮麻油二味最佳，不妨日日食之。麻油解毒，腐皮滑胎，且清且补，贫富皆宜，允为上品，积食一二百张，则首生如达矣。或以麻油拌食更妙，不宜熬熟。

忌食诸物：椒、姜、煎炒、野味、猪肝、血、犬肉、蟹、黑鱼。

难产七因

一因安逸：盖妇人怀胎，血以养之，气以护之。宜时常行动，令血气流，胞胎活动。若久坐久卧，血凝气滞则难产。常见田家劳碌之妇其产甚易，可知也。

一因奉养：胎之肥瘦，气通于母，恣食厚味，以致胎肥难产。常见荆布之女容易产，可证也。

一因淫恣：古者妇人有孕，即居别室，不共夫寝。若有孕而犯之，三月以前常知胎产小产，三月以后犯之，一则胞衣太厚而难产，再则子身多浊物而不寿，三则子出胞衣即多疮毒，出痘多细密难起，以致少亡。皆由父母欲火所结，可悲也。

一因忧疑：今人不讲生产之理，或问祸福于鬼神，祷求于卜筮；或闻里中有产厄者，孕妇疑则惧，惧则气怯，故难产。

一因软怯：如少妇初产，神气怯弱，子户未舒，便腰曲不伸，辗转倾侧，儿不得出。又中年妇人，生育既多，血气虚耗，产甚艰难。须胎前服补气养血之药，调理健壮，则临产自无虑矣。

一因怆惶：将产之时，有等愚蠢稳婆，不审正产与转胎，但见腹痛，遂用努力催生，产妇听从，以致横生。

一因虚乏：临产用力太早，及儿欲出无力以送，是以难产。此时宜服人参接力则产矣。

胎产指南　卷一

胎前辨论诸症

保安胎论

凡孕妇脾胃旺而血气充，则胎安而正，产子精神而寿，曷尝用药以调气血安胎耶？若禀不足而气血衰，脾胃弱，饮食少，则虚症百出，孕成数堕，或产子不寿，必资药力以助母安胎寿子也。是以丹溪先生删定安胎饮之良方，治孕妇元气虚弱，胎气不安，饮食不美，或腹痛腰疼，随症加减，以治胎前诸症，后开随症加减二十余方，皆可按方取用。夫血精会凝而成孕，精气蒸胃而呕逆。血少肝虚，如爱酸物；胃气受伤，厌阻饮食。若人素弱呕阻，本方量加橘红；若禀厚吐逆，再加竹沥姜汁。下血不止名胎漏；小腹堕痛名胎痛。胎漏宜凉，须加生、熟地黄；胎痛宜温，少加带壳砂仁。至若仆跌动胎下血，胶艾宜加；怒气胎冲上逆，木香为先。小便短涩成淋沥，乃子淋之症，安荣不应本方宜。小便带血流于脬，是膀胱之热，逍遥入炒山栀。子肿症多面目虚浮，而肢体有水气，全生白术堪医。子烦症则心惊胆怯，而时加烦闷，安胎竹叶无疑。天仙藤散治足指缝出水，病名子气，虚人多加参、术。羚羊角散疗项强筋搐拳挛，病名子痫，痰多加竹沥、参、归。至如脾胃气虚而胎压尿胞，则脐腹胀而小便淋闭，安胎饮服，法宜探吐升提。又如脾虚气弱而转运舒迟，则饮食停滞而腹胀呕吐，安胎力缓，加参，平胃调和。又若胸满、腹胀、便秘、遍身浮肿，名曰胎水之不利，得用鲤鱼汤。若脾胃气虚，佐以四君、五皮。又若胎气上攻，心腹胀满作痛，名曰子悬之候，必用紫苏汤。若食少晡热，兼以加味逍遥。若腹大子满，肥而气壅，束胎难缓，临月欲活血而散滞，达生散宜尝。柴前梅连丸，治骨蒸之劳热。当归六黄汤，疗盗汗之晡热。孕成数堕，因母血弱不能分荫其胎，本方预服，可保满期。生子无气，由母气虚，仅可资荣于己，安胎之方，必须月服。老夫得少妇，须寡欲以候经期；壮阳遇衰阴，必频药以助胎力。其人爱精重施，生于精神有寿。狂阳妄泄，育子清寡无神，此造化必然之理，后人胤嗣当鉴。大抵孕妇素弱，又欲分血气以荫胎，自然虚症百出。是以丹溪先生安胎方以补为主，佐以顺气清凉。参、术、黄芩，乃安胎之圣药；归、芎、怀熟，实补血之良剂；佐以苏叶、陈皮，可为常服方也。夫孕成六月之前，其胎尚未转运，茯苓性降，不宜多用，黄芪肥胎，岂可常加。香附虽胎喘所需，无补虚人反害。砂仁可止呕定痛，多加则动血行胎。历考丹溪安胎之论不过数首，安胎之方不过再四，若能神明加减，则十全八九，诚为后学之准绳也。

胎症名目辨

诸家巧立病名，竹叶汤以治子烦，安荣散以治子淋，天仙藤散以治子气之方，羚羊角散治子痫之病，子肿症用全生白术方，子悬症用紫苏叶方。胎前之症，非止数名，总因孕妇气血亏虚；或有外感致生诸症而胎不安，岂胎有病母之理也。子烦淋肿等症名，乃后人巧立之名，形容胎前之病耳。愚意随症治方，多尊丹溪先生安胎散加减以治，毫无误失。

补母寿子论

凡屡产生子无气，及育而不寿者，以父母气血不足故也。夫人爱精重施，则髓满骨坚，又得血气壮盛之妇为配，生子自精神而有寿。若壮阳弱妇成孕，则母无余血荫胎，必借药补，以培胎元，斯生寿子。又若弱女衰翁，必须异床寡欲，药味助神，算候经期，固精方施，斯乾元资始之本，实坤元资生之源厚也。经曰：因而和之，期为圣度。若不远帷簿，则相火易动，虽不交会，亦暗流损泄多矣。阴平阳秘，精神乃治；阴阳离决，精神乃绝。后立二方，实补先天之不足，孕成后必宜多服，以全胎元，生子必精神有寿，经验极多，故录示人。

补母寿子方

治屡产生子无气，或育而不寿；又补气血虚弱，孕成不安、或得孕数堕。照方每月服十五贴，弱甚者，每日一帖。大益胎而分娩易，又生子精神有寿，经验良方也。

人参一钱，如弱人用二钱　当归二钱　白术二钱　川芎八分　怀生地自焦，二钱　条芩二钱　紫苏四分　陈皮四分　甘草四分

若虚弱人，陈皮去白，再加黄连五分，枣三枚，水煎服。

又加减法，脾胃弱常泄泻，加莲子十枚，带壳砂仁三分，减地黄。多怒而泻，加木香二分。口常燥渴，加麦冬一钱，怔忡惊悸，加枣仁一钱，益智一钱，天员十个。

先天大造丸兼服助胎尤妙

紫河车一具，壮盛头胎者佳，如新鲜者挑去血筋，和酒浆煮烂，入药捣匀　山药一两　人参一两五钱　归身二两五钱　麦冬一两　五味子五钱　黄柏八分，久患阴人不可用　天冬一两　怀生地二两

脾胃弱常泻人，减地黄，用白术一两，各为末，炼蜜丸，先将地黄、麦冬，蒸捣如泥，次下诸药末，又捣千余下，丸如绿豆大，空心清汤下百丸，忌萝卜，不可食。

香附等耗气种子方不可服辨

时人妄立种子方，多用香附为主，大损气血，服久则少力腰疼，及成痼疾绝胎。间有服交加散而偶得子者，因少壮妇多恚怒，服之抑气谐荣，幸中耳，岂可视为良方，珍服图嗣乎。且无子多由少血不能摄充，或屡堕胎损血，及经行作痛，或子宫空虚之故。欲求嗣者，须修补阴大造丸三、四料，以助阴血头胎，功效甚奇。经行久痛人，丸内用牛膝一两、元胡索五钱以调之。得孕屡堕者，成胎后，每月必服丹溪安胎饮十数帖，则可保矣。

补阴大造丸　治血虚气弱人，不能摄充精元成胎、或屡堕胎、及生子不寿者。若孕后虚热盗汗，食少带多，并宜服。

紫河车一具　人参二两　当归二两　天冬一两三钱　北五味五钱　杜仲七钱，姜炒　山药八钱　牛膝酒炒，一两　黄柏盐炒，七钱　怀生地自蒸，二两

合法丸服，俱同先天大造丸。

《事林广记》瘦胎三方不可服辨

时医用枳壳、香附等耗气药，立敛胎易产方，名非无见也。仿古方士进湖阳公主，枳壳瘦胎方义，遂增几味耗气药品，巧立方名，使人信而服之，惑世害人久矣。盖方士因湖阳公主，居养而形厚，食膏粱而胎肥，过期难产，特进此方，亦幸中耳。其胎之损元不寿，不责咎也，常人岂可概服乎。夫孕至九个月，胎形全具，一母之气血荫胎两用，正宜服药补之。母弱者药培于他月，若复耗之，则母救己不赡，奚有余血分荫其胎？是以饿损胎元，日渐伶仃瘦弱，无敛胎易产之效，有亏元损寿之害，其孕母血气亦亏损，多至临盆艰涩，娩后血晕发厥，危疾皆由所致，人不知也。《妇人良方》所载无忧散、保气散、神寝散，俱不可服。

滋荣易产汤凡孕妇至九个月服之有益

人参一钱　川芎一钱　当归三钱　茯苓八分　甘草四分　陈皮五分　大腹皮八分　白术八分　黄芩八分　益母草二钱　怀生地二钱

水煎服。

达生散　孕妇临月服之，活血去滞，虚者加参。又，一方有芎药、人参，尤佳。此方秘本无增入。

大腹皮姜制，一钱五分　甘草一钱五分　葱叶三根　黄杨脑七个

春加川芎、防风；夏加黄芩、五味；秋加泽泻；冬加砂仁或木通。胎动加阿胶；上气加紫苏、地黄；性急加柴胡；口渴加麦冬、黄芩。

衰翁弱女求嗣辨

凡男子八八六十四而天真竭，过数而能生子者，禀原异于常也。女子七七四十九而天癸断，过期而能有孕者，冲脉旺而血气充也。然衰年欲昌嗣续，各有道焉。衰翁必须异床息火，绝无暗满流泄，药味助神真固，以候经期种子，斯乾元资始之本厚也。弱妇成孕，必须月服固胎饮二十余剂，以培衰弱天真，斯坤元资生之源充也。补弱夫弱妇不足，前先天二方及补汤丸，经验极多。

补阳宿凤丸大补年老人

北五味　白术　黄芪　茯苓　炙川芎　甘草　白芍　巴戟　破故纸　山萸肉　天冬　苁蓉　川牛膝　广皮　怀山药　黄柏　知母　杜仲　虎骨以上十九味，各一两　怀生地四两　熟地四两　麦冬四两　人参四两　当归三两　甘枸杞三两

用十年陈线鸡一只，蒸熟去皮油，取肉骨焙燥，合诸药炼蜜丸。气血虚服之甚有益

妇人受胎月令

妇人受胎一月，形如露珠，乃太极动而生阳，天一生水，谓之胫足厥阴，肝脉主之。经水即闭，饮食稍异。二月如桃花瓣，乃太极静而生阳，地二生火，谓之辉足厥阴，胆脉主之。若吐逆减食，名曰恶阻，有孕明矣。或偏嗜一物，乃一脏之虚，如爱酸物乃肝经，只能养胎而虚也。三月如清鼻涕，先成鼻与雌雄二器，乃分男女，手少阴相火所主，胎最易动。四月始受水精，以成血脉，形象具，手足顺成，手少阳脉所至。五月始受火精，筋骨四肢已成，毛发始生，足太阴脉所主。六月始受金精，以成筋，口耳皆成，足阳明脉所主。七月始受木精以成骨，游其魂，能动左手，手太阴脉所主。八月始受土精以成，皮肤九窍皆成，游其魄，能动右手，手阳明脉所主。九月始受石精，百节毕备，三转其身，足少阴脉所主。十月神气备足乃生，足太阳脉所主。惟手少阴太阳所主者，其主之官无为而已。堕胎须防三、五、七月，宜服清热凉血安胎之药。女子阴类也，以血为主，上应太阴，下应海潮，一月一行，故谓之月水、月信、月经。经者，常也；天癸，天一生水也。或先或后，或通或塞，皆病也。复有变常，而古人未言及者，不可不知。有行期只吐血衄血；或眼目出血者，是谓倒经。有三月一行者，是谓季经。有一年一行者，是谓避年。有一生不行而受胎者，是谓暗经。有受胎之后，月月行经而生子者，是谓盛胎。或受胎每月血大下而胎不陨者，是谓漏胎。女子二七天癸至，七七天癸绝，其常也。有女子十二三而生者，其变也，医者亦宜留心也。

胎前二十七症医方

丹溪安胎饮

一、治孕成后胎气不安；或腹微痛；或腰间作痛；或饮食不美，孕至五六个月，并宜服之。

白术二钱　当归二钱　条芩八分　川芎八分　人参一钱　陈皮四分　怀生地二钱，白蒸　紫苏四分　甘草四分　砂仁三分

姜枣引，水煎。

二、孕妇元气不足倦怠，或胎动不安，或身微热减食，并服加味安胎饮，如腰疼腿痛、

必一日二三帖可安。

人参二钱　当归三钱　白术二钱五分　条芩八分　生地二钱，自蒸　陈皮四分　紫苏四分　甘草四分　砂仁三分

烦渴加麦冬一钱，加枣二个。

三、孕成后二三月内，恶阻呕逆，或头眩晕倦怠，宜**加味参橘饮**。

人参一钱　橘红二钱　白术二钱　半夏八分　当归二钱　藿香四分　甘草四分　砂仁三分　竹茹一丸

如肥人，加竹沥一酒杯，姜汁半匙，姜三片，加乌梅半个。

四、孕妇常多怒气，胸腹满闷，或服乌药、香附、砂仁等顺气耗药，反加满闷，宜服此方。

人参二钱　白术二钱　当归二钱　川芎八分　陈皮四分　紫苏四分　甘草三分　条芩八分　木香三分

五、孕妇腹中不时作痛，小腹下堕，多血虚气陷，间有兼寒者，服**加味安胎饮**。

白术二钱　人参二钱　川芎八分　当归二钱　甘草四分　紫苏四分　陈皮四分　怀熟地二钱

如兼寒，加吴茱萸一钱；或干姜、砂仁各五分。姜引。

六、孕妇面目虚浮，四肢有水气，多因脾胃气虚；或久泻所致。宜健脾利水，服**全生白术散**。此症名曰子肿

白术二钱　人参一钱　川芎八分　当归二钱　甘草三分　紫苏四分　陈皮四分　大腹皮七分　茯苓皮一钱

七、胎气上攻心腹，胀满作痛，宜服**顺气安胎散**。此症名曰子悬。

人参二钱　白术二钱　紫苏四分　甘草四分　陈皮四分　砂仁四分　当归二钱　川芎八分　黄芩八分

如有气，加木香二分，磨。姜引。

八、受胎下血不止，或按月来血点滴，名曰胎漏。大多因劳，又因气血虚，有因喜食炙煿热物过多。宜谨房事，服**补中安胎饮**。

白术二钱　当归二钱　人参一钱　甘草三分　熟地一钱　黄芩四分　紫苏四分　白芷四分

又，炒麻根，治漏胎下血。

九、孕妇顿仆动胎，下血不止，宜先服**安胎饮**，一日二三帖，如不止，加阿胶艾安胎饮。

人参二钱　条芩一钱　川芎八分　甘草四分　紫苏四分　陈皮四分　当归二钱　怀熟二钱　陈胶一钱，用蛤粉拌炒成珠，研

姜枣引。

仲景《金匮》胶艾汤　治妊妇下血不止。

归　芎　芍　地　甘草　阿胶　艾叶各等分

用酒水煎服。

十、孕妇心惊胆怯，烦闷不安，名曰子悬，宜**竹叶安胎饮**。

当归二钱　白术二钱　人参一钱　川芎七分　甘草四分　陈皮三分　黄芩八分　枣仁一钱　远志八分　麦冬一钱　竹叶十片　怀生地一钱五分

姜枣引。

若其人烦渴，加竹茹一丸。有痰，加竹沥七分酒盅、姜汁三匙。如虚人，加人参二三钱。如脾胃常泻，减生地、枣仁。

十一、孕妇腿膝发肿，气促满怀不舒，或足指缝出水。盖脾主四肢，脾气虚弱，不能制水而发肿，肺肾少母气滋赖，而气促满闷。诸书名曰水气，治宜服**天仙藤散**。不效，服补中健脾汤。此症名曰子气。

天仙藤洗，略炒。　香附炒，八分　陈皮四分　紫苏四分　甘草三分　乌药七分　木瓜一钱　姜皮二片

如虚人，加人参一钱，白术二钱，当归二钱。若脾气虚弱人，宜服补中益气汤。

十二、孕妇口噤项强，手足挛缩，言语蹇涩，痰涎壅盛，不省人事，可作中风治。治以**羚羊角散**。如无痰，言语如常，但见中风症，多因血燥类风，切不可概作中风类治，误人性命，名曰子痫。

羚羊角一钱　川芎七分　独活八分　枣仁

炒，一钱　五味子八分　防风五分　薏苡仁一钱　当归一钱　茯苓八分　杏仁十粒　木香二分　甘草四分

如虚人，加人参一钱。痰多，加竹沥七分酒盅，姜汁半匙。脾胃虚，加白术一钱五分。姜引。

十三、孕妇小便涩，或成淋沥，名曰子淋。宜**加味安荣饮**。

人参二钱　白术二钱　当归二钱　麦冬二钱　茯苓皮一钱　通草一钱　甘草四分

有痰宜清肺，加黄芩七分。若怒动肝火，宜加柴胡、灯心水煎。

十四、孕妇形体劳苦，或过食炒炙热物，小便带血，宜清膀胱之火，服**加味逍遥散**。

当归二钱　芍药一钱　白术一钱五分　茯苓七分　柴胡四分　丹皮七分　山栀七分　炙甘草四分

十五、孕妇腹脐作胀，或小便淋闭，此由脾胃气虚，胎压尿胞，宜服**安胎饮**。

白术一钱五分　陈皮四分，去皮　甘草四分　人参一钱　川芎八分　当归二钱　生地一钱五分　柴胡四分　半夏六分，姜制　升麻四分

姜引，空心屡服。盐汤探吐，则气升尿下经行，亦一治法也。

十六、孕妇元气壮盛，受胎后尚有血来几次，不妨，乃血盛故也。若不腰腿酸痛，不须服药。若过虑，可服安胎饮。

十七、孕妇胸腹满胀便闭，遍身浮肿，名曰胎水不利。宜服**鲤鱼汤**。

白术五分　当归二钱　芍药二钱　茯苓四分

用鲤鱼一尾，重一二斤，去鳞肠，水煎，加橘皮少许，生姜七片，用水四盏，取汁盏半，加四味药煎七分，如水未尽，再制服。

十八、孕妇咳嗽，属风属寒，宜**定肺止嗽饮**。

天冬二钱　桔梗四分　紫苏四分　知母一钱　甘草四分

寒嗽，加杏仁十枚，桑白皮八分。有痰，加桔红四分，竹沥姜汁。热嗽，加黄芩八分。虚嗽，加紫菀一钱，冬花六分。发喘，夜多嗽，加麻黄八分。虚损咳嗽，瓜蒌一钱，竹沥姜汁。心胸不舒，贝母一钱，百合一钱。

又方，孕妇咳嗽不止，胎不安。

杏仁十粒　桔梗五分　紫菀一钱　甘草四分　天冬二钱　桑白皮八分　竹茹一丸

水煎，入蜜温服。

十九、孕妇咳嗽吐血。

怀生地三钱　知母一钱　紫菀一钱　白术一钱　陈皮四分　甘草四分　麦冬一钱　黄芩八分　天冬二钱　犀角八分　当归二钱

喘，加瓜蒌仁一钱

二十、孕妇霍乱吐泻，心烦腹痛，先服**六和汤**。

半夏七分　陈皮四分　藿香四分　甘草四分　杏仁十粒　竹茹一丸　白扁豆二钱，炒　木瓜一钱　人参一钱　砂仁五分　茯苓八分

姜枣引，水煎。如服之不安，次服安胎饮。

二十一、孕妇疟疾，寒多热少，用安胎饮减陈皮，加：

半夏七分　草果三钱　青皮二钱　人参一钱　白术一钱　当归一钱　乌梅二个　紫苏四分　黄芩一钱　甘草四分　藿香五分

姜引。

二十二、孕妇口干不得卧，用安胎饮加麦冬干葛；或黄连为末，粥饮调下一钱，亦好。

二十三、孕妇壅热，心神烦躁，口干渴，宜**参知散**。

人参一钱　知母一钱　麦冬一钱　栀子仁二钱，炒　甘草五分　条芩五分　蒌仁八分　犀角八分

夏加竹沥姜汁，枣引。

二十四、孕妇热病，呕吐不食，胸中烦躁，宜**葛根汤**。

芦根一钱五分　葛根一钱五分　人参一钱　麦冬一钱　知母一钱　竹茹一丸　栀子一钱，炒　葱白三寸

水煎。

二十五、孕妇热病，斑出赤黑色，小便如血，气急欲绝，胎落。

栀子一钱　黄芩一钱　升麻一钱　青黛一钱　豆豉四十九粒　生地二钱　杏仁十粒　石膏一钱五分　葱白七寸

二十六、孕妇患骨疼痛，不急治则胎落。宜**升青散**。

葛根　石膏　升麻　柴胡　青黛

痰多加竹沥一盏，姜汁一匙。

二十七、孕妇患吐衄血，或因破伤失血，蓦患口噤，项强背直，类中风症，皆因失血之故。宜**安胎饮**。加：

人参一二钱　当归一钱　白术一钱　熟地一钱　陈皮四分　甘草四分　条芩八分　天麻一钱　麦冬一钱　防风一钱　荆芥一钱

以上二十七症孕妇病，若与秘本对，依此开方，万勿有失。

又《活人书》中，治孕妇热病发斑赤黑色者，**栀子大青汤**。

升麻　大青　栀子　杏仁　黄芩

葱白引。

增补胎前十症

伤寒　子满　子鸣　子喑　中暑　中湿　泄泻　痢疾　疮毒　无故哭泣

妊妇伤寒　宜清和为主，各随六经所见表里之症治之，切不可与常病伤寒同治，以致损胎，误母子性命。凡治伤寒，不拘日数，但见恶寒发热，为病在表。用**四味紫苏和胎饮**为主。各随所见之症，加减治之。

紫苏一钱五分　白术一钱五分　条芩一钱五分　甘草一钱

如恶寒头痛，项强腰脊痛，此病在太阳膀胱。加

羌活一钱　防风一钱　川芎一钱　藁本一钱

葱，连根须三根，姜引，盖被取汗。如恶寒不发热，只头痛鼻干，或项强，此病在阳明胃，本方加葛根、白芷、防风等分，葱白三根，淡豆豉一撮，煎服汗解。如寒热往来，头眩或呕，或心下烦，或胸胁满，此病在少阴胆，加柴胡一钱，人参一钱。呕加半夏八分。胸胁满，加枳壳一钱，桔梗一钱。头眩，加川芎一钱，姜引。如发热恶寒，咳嗽甚者，此病在手太阴脾，加人参、干姜（炙）、白芍（酒炒）各一钱，姜枣引。如恶寒蜷卧，发热手足冷，此病在足少阴肾，加独活一钱，熟地一钱，细辛一钱，姜枣引。如恶寒手足厥冷，唇口青，遍身痛，如被杖头顶痛，此病在足厥阴肝，加炒当归一钱，炒吴茱萸一钱，羌活一钱，细辛一钱，葱连须三根。姜枣引。

凡治伤寒不拘日数，但无恶寒头痛，只发热口燥，咽干而渴，此病邪在里。用**黄龙汤**为主。此汤出《活人书》，并治头痛，胁痛，呕逆。

柴胡一钱　黄芩一钱　人参一钱　甘草一钱

如发热口渴，小便不利，此病在手足太阳，小肠膀胱腑病也，加白术一钱五分，猪苓一钱，泽泻一钱，赤苓一钱，木通一钱。如发热大渴，此病在手足阳明胃、大肠也，加知母一钱，石膏二钱，淡竹叶一把，粳米一撮。如大热大渴烦躁，大便不通，此病在足阳明胃府也，去人参，加枳实一钱（炒），大黄一钱（煨），芒硝一钱，姜引，以利水为度。如发热口渴，心烦不得眠，或干呕，此病在足少阳胆，加麦冬、花粉、栀子、枣仁各一钱，竹肉一大丸。如发热而渴，腹中痛自利，此病在足太阴脾，加白术一钱，白芍一钱，阿胶一钱，白茯苓一钱，姜枣引。如发热而渴，自利不止，手足冷，此病在少阴肾，去柴胡，加干姜一钱（炒），赤石脂一钱，白茯苓一钱，砂仁一钱，姜枣引。如发热而渴，痢浓血，手足冷，此病在足厥阴肝，加当归一钱，白芍一钱（酒炒），白术一钱，茯苓一钱，乌梅引。

凡伤寒瘥后，调理失宜，复发热者，此劳复也，用黄龙汤加知母一钱，麦冬一钱，石膏二钱，淡竹叶、粳米引，取汁。如因饮食

失节，复发热者，此食复也，用前四味柴苏和胎饮，加炒枳实，炒黄连，陈皮、神曲（煨），姜枣引。若时行天气传染者，依上法分六经表里治之；或于初病之时，用**败毒散**，加和胎药解之。

人参　羌活　柴胡　茯苓　前胡　甘草　川芎　桔梗　枳壳　黄芩　苏叶　葛根　生姜

葱白引，取汁。

凡伤寒热不解，遍身发斑，赤如锦纹，**加味化斑汤**治之。

人参一钱　知母一钱　石膏二钱　甘草一钱　黄芩一钱　栀子仁一钱　生地一钱　淡竹叶二十片　豆豉半合

水煎服。

妊妇子满　孕妇至七八个月，其胎长大，腹大胀满，逼迫子户，坐卧不安，名曰子满。**束胎饮**主之。

白术一钱五分　黄芩一钱五分　苏叶一钱五分　枳壳一钱五分　大腹皮一钱五分　炙甘三分　带壳砂仁炒、五分

姜引。

妊妇子鸣　孕妇欠身，或向高处取物，子在腹中失脱口中所含胞膂，故啼，曰子鸣。治法令母作男子拜；或豆散在地，令母拾之，子含着不啼。

妊妇子喑　妊至八九个月，忽然声喑不语，名曰子喑。由少阴之脉，下养乎胎，不能上荣于舌之故。俟十月生子后，自能复声，非病也。可服药，勿信庸医妄利。

妊妇中暑　其病发热而渴自汗，精神昏愦，四肢倦怠少气，用**清暑和胎饮**。

炙黄芪一钱　人参一钱　炙甘草一钱　白术一钱　黄芩一钱　黄连一钱　知母一钱　麦冬一钱　北五味十粒

妊孕中湿　或冒雨；或早行感雾露之气；或久居湿地；或大汗出；取冷水洗浴。其症发热骨节痛，身体重，头痛鼻塞，用**黄芩白术汤**。

条芩五钱　白术五钱　苏叶二钱五分　姜五片

妊妇泄泻　凡妊妇泄泻，以补中安胎为主，用四君子汤加白术一钱。如发热而泻为热，加黄芩一钱；不渴为寒，加炮姜五分，乌梅一个；如久泻大渴，加葛根、木香（炒）、干姜、白芍（酒炒）、诃子肉、乌梅引。等分，视症酌。

妊妇痢疾　凡妊妇痢疾，以清热和胎，行气养血为主，黄芩芍药汤主之。切不可用大黄、槟榔，以致堕胎。

当归一钱　白术一钱　黄芩一钱　白芍一钱　黄连一钱　枳壳一钱　茯苓一钱　陈皮一钱　生甘草一钱　木香五分

乌梅引。

妊妇疮毒　病乳痈者，**托里解毒汤**主之。

川芎一钱　当归一钱　白芷一钱　黄芩一钱　连翘一钱　花粉一钱　银花一钱　甘草节一钱　青皮五分　皂刺十个

如背上臀上者，病在阳明，本方去青皮，加升麻一钱，葛根一钱。如胸前两颊生者，病在少阳，本方去白芷，加柴胡一钱，胆草一钱，栀子一钱。如背膊腋下生者，病在太阴，加陈皮，去青皮，又加桔梗一钱，桑白皮一钱，天冬一钱。如在胯下阴旁生者，病在厥阴，本方去白芷，倍加青皮。如手足掌内生者，病在少阴，本方去白芷、青皮、花粉，加黄连一钱，黄柏一钱，木通一钱。

凡痈毒，有九处不可治。

一、伏兔脚背　二、腓腨音肥善，脚肚间。三、背脊中　四、肩俞夹背两旁　五、项对口　六、胸　七、须　八、鬓音宾　九、颐

妊妇无故哭泣　凡孕妇忽然无故悲惨哭泣，状如邪祟，此脏躁症也，**十枣汤**主之。

甘草三两　小麦一升　大枣十枚

水六升，煎三升，去渣。分三服即效，再服**竹叶汤**主之。

人参一钱　麦冬一钱　茯苓一钱　炙甘草一钱　小麦一合　青竹肉一大丸

姜枣引。

此十症，秘本所无，今从万密斋先生女科中摘出，以补未备，俾学者览之，有蹊径之可循，不致茫无畔岸。但古云医不执方，又在学者临症凭脉，神而明之，不可胶柱鼓瑟也。

妇人妊娠，宜常服**当归散**《金匮》

当归　川芎　芍药　黄芩　白术

胎动不安，防其堕者，宜服**杜仲丸**。

杜仲二两，水炒　续断二两，酒洗

共末，煮红枣肉为丸。每服三十丸，米饮下，空心食远服。并服**胡连丸**。

胡连丸安胎圣药也

条芩四两，沉水　白术二两　莲肉去心，二两　砂仁一两，微炒　炙甘一两

共末，另用山药五两，米饮煮糊为丸，米饮下。

胎前有血崩之症，安胎饮加后止崩药治之。

胎产指南　卷二

辨病胎小产弱症医方

堕胎辨俗名小产

丹溪论血不足以荣养其胎而堕胎者，犹枝枯而果落，藤萎而花堕也；其劳怒动火而堕者，犹风撼其木，人折其枝也。二论极是，然未详晰论辨，无惑乎妊妇之不慎戒也。夫妇人冲脉主血海，血旺始成胎；任脉主胞胎，静养则胎安。若怒伤肝，劳伤肾，致二脏失，相火耗血动气，未有能保孕之不漏不堕，娩后尚多崩热之症也。如衰弱人有妊，及曾堕者，必须恪遵胎教，通达事情，如古太任兢兢爱护，坐卧不偏，视听无邪，毋溺专宠，阃事悉委于婢妾，罔怀妒忌，忿懥不留于胸臆。至如食物药饵，一律禁戒无犯。斯火不动而血旺荫孕，形不劳而气完胎固，且生子禀全易养，形端体正。况屡堕损血倍于正产，怒劳致堕，由已自招。禀弱之人，惟知有子自足，毋以小嫌害大，而自取无后之忧也。

补母固胎饮忌食小鲤鱼、苋菜

白术二钱　当归二钱　熟地二钱　陈皮三分　紫苏三分　砂仁二分　甘草三分　人参一钱　条芩八分　智草五分　大枣二枚

妊妇误食苋菜，诸药书此以晓弱妇，欲子寿，必须信方月服。凡妊至四、五、六月内，误食苋菜，或少服苓、术等药，多吃炙煿煎炒动火热物，必堕胎产。如见有别症，凡大黄、芒硝一切金石下气之药，皆宜禁用。万不得已，亦宜斟酌。不用中病即止，勿误人命。不特半夏、牛膝等药宜慎，即茯苓性降亦须慎用。时医不知，故特表而出之。总之，孕妇杂症，必以安胎为主，杂症为佐使矣。

妊妇失血类风症辨

凡孕至四五月，患吐血、衄血，及损伤血，蓦然口噤项强，手足难动履，背如角弓，症类中风，切不可认为真中风而降火化痰方治。宜服安胎饮，以补血为主，以风痰之药佐之，无失。

补血安胎理风汤

川芎二钱　天麻二钱　黄芩二钱　羌活五分　防风五分　荆芥五分　白芍三分　当归三分　人参三分　紫苏四分　甘草四分

附：应验方案

有乐埠沈禹门室，妊六月，因禹病拜斗斋劳，割股失血，蓦然口噤项强及角弓。予用安胎饮加化痰治，稍安。又遇范东蓠极诋予补中风痰误，彼以豁痰降火方，病人服如刺心，弃渣。予复用前方倍参二十帖，母安产儿。

一上虞赵方桥室，妊至五月，患衄血去两升，头晕、口噤、手掉。以安胎饮倍参、当，加川芎、天麻、犀角、生地而愈。

书此以见妊妇杂症必须安胎补血为主也。

胎不安毋议落胎救母辨

妊妇患虚损潮热，骨蒸少力，或崩漏，或少食，皆致孕妇气血不足胎。若月久不能鼓动，或胎不安上攻，或跌扑损胎不动，疑胎死活难辨；或患热病损胎；或因误食动胎药及食苋菜，虽血行胎逼，切不可用落胎之方，妄议去胎救母也。必须补母之气血，力健则胎自然渐动，即其胎死，助血自落，可保两全而无虞也。若攻弱母之胎，胎落而母继殒者多矣。慎之。

妊妇患伤寒，或患疫病，热久皆堕胎，堕后未免增热。因热消阴血，又继产血脱故也。治者慎勿妄论伤寒、疫症未除，误投栀子豉汤、芩、柏等药；或往来寒热，柴胡不可用也；或潮热，大小便秘，承气、五苓等方不可投也。宜频服生化汤，时进两帖，不拘帖数，服至热退停药。如虚脱，形色脱，汗多或渴，二帖后即加生脉散，人参、麦冬以防晕厥危症。且生化汤有川芎性辛散邪，干姜助血药能除阴火大热。其结便秘灼热，多服生化汤，自然津液之累生，二便通利矣。若热用寒剂，反愈虚中气，且血得寒则滞，变症百出，误之甚也。

胎前药物宜忌

牛膝　赤茯苓　大黄　芒硝　半夏　附子　肉桂　南星　巴豆　大戟　芫花　米仁　藜芦　厚朴　槐花　桃仁　丹皮　茅根　瞿麦　三棱　通草　红花　苏木　麦芽　神曲　常山　葵子　干姜　麝香　蠐　牛黄　雄黄　乌豆　天雄　蝉蜕　槟榔　胡索　蒺藜　牵牛　皂荚　干漆　虻虫　水蛭　蠡虫　蛇蜕　蜈蚣　水银　安息香　破故纸　王不留行　淡竹叶根

胎产指南　卷三

临产须知异症

异症调护法　异症医方　难产调护　增补临产须知　凡产论病　产后脉辨

异症调护法

凡产育之难者，皆因坐产太早，用力太过，遂有横生倒产之危。且脐腹疼痛之初，自儿身才转多未顺，且宜慎之。

一、儿身未顺，生路未正，产妇用力一逼，令儿偏生或左倾，虽儿逼门而不成下，但云儿已露顶，非顶也，或左右额角也，用力一逼即下。若是头之后骨逼在谷道，儿露顶未正，当令稳婆熟手急于谷道轻推头正，然后用力一逼儿下。此全在稳婆之良，医药为次也。若胎水未落，痛声开口，危甚。

一、儿先露手足，以盐涂足底，急搔之，并以盐涂母腹上，又以小绢针子儿手足，以针入一二分，以盐擦其上，轻轻送入，儿痛惊转一缩，当即回顺。针刺之法，防儿痛上奔，母命有碍。

异症医方

治横生逆产方

伏龙肝即灶中心土，多年红者佳。

研细末，酒调下一钱。其药儿头戴出妙。

治横生倒产方

蛇蜕一条，全　蚕蜕纸一张，新瓦瓶中，盐泥封固，烧存性

为末，煎乳香汤送一钱，二服即下。

治横倒先露手足方

阿胶炒　滑石　黄蘗子

每服四钱，水煎服。

催生兔脑丸　治生理不顺，横逆难产，神效。

腊月兔脑髓　母丁香一钱，为末　乳香一钱，另研　麝香一分

用兔脑捣为丸，如芡实大，阴干，纸密封，温酒送一丸。男左女右，手握药丸娩下。

霹雳夺命丹　治临产未产时，目翻口噤，面黑唇青，口中吐沫，子母命在须臾。若两脸微红，子死母活，急用此方。

蛇蜕瓶煅　蚕蜕纸烧，一钱　发灰一钱　乳香五分

酒送。

佛手散即归芎汤

当归　川芎

酒水煎。

催生如神散　须候儿顶产门方可服。即黑神散

百草霜即锅底墨　香白芷　滑石等分

研末，芎归汤送二钱。

加味益母丸　妊妇诸症可服。

益母草四两　白术一两　条芩八分

蜜丸弹大，清汤送。孕常服一丸甚好。

多气人，加木香三钱；弱人，安胎饮送化；胸膈不舒畅，加紫苏二钱、陈皮二钱。作细丸亦可。

加参芎归汤　临盆胞水来而交骨不开停产，宜服**大料加参芎归汤**，以助血气旺，自然即开分娩。

川芎四钱　当归一两　人参三四两　甘草一钱　益母草一钱

水煎，连服二三帖。如有合成益母丸，用前四味煎汤送化一丸。如服两三帖后不开，加败龟板一两，醋炙，乱发一团，生育妇发烧灰。

加味生化汤　治子宫不收，产户不闭，交骨不开。

人参二钱　白术一钱　黄芪一钱　川芎一钱　炙草四分　当归二钱　升麻八分

子宫不收，再加半夏八分，北五味十五粒，酸以收之；芍药八分，醋炒，补而升之。以上三症，皆元气不足之甚，娩后患此，必先服生化汤消血块，继服加参生化汤。三症交骨不开，补以开之；子宫不收，补以收之；产门不闭，酸以敛之；胞衣不下，详卷六二十九症第三条。

难产调护俱是临盆七日内诸事

产毕未可上床，令人扶住，从心下轻轻按揉至脐腹间，日五六次，此后虽睡，时时揉之，恶血不滞。

腹中又用小衣服烘热温之，虽暑月不可去单被，腹寒则血块不行，且作痛。

产儿下地，即服生化汤二帖，共三煎，去百病。

儿下若胎衣不下，要善护母下部，冬月用火于被中腹中，用热衣温之。又服生化汤、益母丸诸下胎衣丸。

产母虚甚，须烧砖石秤锤入醋，使气至鼻，以防血晕。

儿下地，即服生化汤一帖。如肚饥甚，可服白粥一盏，不可太饱，过一时又服生化汤。如未欲食，必连服生化汤二帖，共三煎，始吃饭，甚好。

才产不得过与酒，饮酒能散恶血人四肢，老年作痛。且脏气虚，不胜酒力，致神昏。

七日内切不可洗下部，七日外方可洗，就床坐洗，满月后方可梳头洗澡，一百日内不可劳力过度。冬末春初，天色凝寒，宜密闭产室，四围置火，常令暖气和燠，而且下部衣服不可去，俾可免胎寒血结，以致难产停胞也。

催生符 ㄇㄇㄇㄇㄇ　鬼

日向太阳，夜向太阴，祝毕烧灰，用滚水吞之，无不灵效。不可多传人，多传则不灵矣。

增补临产须知万密斋先生女科

产妇以血为主，气为辅，血濡气行，子宫滑溜，生理顺易。子犹鱼也，胞浆犹水也，水行鱼行，水去鱼止，可知产难皆血少气滞之故。**加减五苓散**主之。又名催生如圣散

白术　茯苓　猪苓　泽泻　肉桂　车前　木通　枳壳　槟榔　甘草各一钱　滑石末二钱　灯芯四十九寸

长流水煎。如胞浆干涩者，加川芎、当归尾、生地、香附；如饮食少，中气不足者，加人参。

子死腹中辨

妊妇三、四日不产，胎死腹中，其母唇舌俱红者，母子无事。唇青舌红，母死子活。**唇红舌青，母活子死。唇舌俱青，夺命丹**主之。

蛇蜕全者一条、新瓦上存性　金银箔各七张　大母丁香五钱，另研　男子乱发一钱，烧存性　马鸣蜕一钱，即破故纸，烧　黑铅二钱五分　水银七分，先将铅溶化，入水银急炒，结成沙子，倾出另研　千里马鼻即旧草鞋鼻七个，烧灰

于静室中修合，勿令妇人鸡犬见。各研为末和匀，用猪心血为丸，桐子大。每服二丸，长流水送灌。

盘肠生调治法并医方

产妇临盆，肠先出盘露于外，子随后生，生后而肠不即收，由平日气虚不能敛束，血热易于流动，下元不固，关键不牢，致有此苦。救治之法，于子下衣来之后，令产妇仰卧，先将母肠温水洗净惹带之物，然后托起，轻轻送人，推而上之，令产妇两足夹紧谷道，其肠自收上也。或取草麻四十九粒，去壳捣烂，敷在顶心，待肠收尽，急去之。次也，又用冷水和醋，令人喷面，一喷一收，以渐收

之。又其次也，欲免其苦者，宜于次后无孕时服地黄丸，加五味子一两，桂心一两，以固下元之关键。有孕后多服胡连丸。

胡连丸

白术一两　条芩四两　莲肉二两，去心　砂仁一两，炒　炙甘草一两，研末　山药五两

打糊为丸，米饮下。加人参以补其气，兼服三补丸以凉其血，黄柏、黄连、黄芩（炒）等分，蜜丸，白汤下。于八月之时，再服八物汤加诃子、瞿麦、粟壳，蜜炒，服十余帖，庶可免矣。

产子气绝不啼救法

临产之母护痛倾侧，两足不开，扭夹儿头，气不得伸，故儿闷绝，谓之窘生。救法自胎衣来，勿断脐带，急用小锅烧水，以胎衣置汤中，频用温水洗带，须臾气暖入腹，儿气即回，啼声出矣。若仓卒断其肠，不可救也。

产后生化汤论服法

产后血气暴虚，欲补之，则恐恶露停滞，欲攻之，又恐元气有亏。惟行中带补，化旧生新，方始万全也。世之治产者，往往用四物汤。窃谓地黄性寒滞血，芍药酸寒无补，非治产之良剂也。惟生化一汤，预时制下，候胎衣一破，速煎，俟儿下即服，相继服二、三帖，使下焦血块速化，新血骤长，自无厥晕。且产妇服一帖，精神渐增，二帖阴血顿旺，并去宿瘀，所以有生化之名也。

凡产论病

凡病生于血气之衰、脾胃之虚，而产后气血、脾胃之虚衰尤甚焉。是以丹溪先生论产后，必以大补气血为先，虽有他症，以末治之。此三言已尽医之大旨，若能扩充其方，用药可以无失矣。夫产后忧惊劳倦，气血暴虚，诸症乘虚易入。如有气，无专耗散；有食，无专消导；热不可用芩、连；寒不可用桂、附。寒则血块凝滞，热则新血流崩。至若虚中外感，见三阳表症，似可汗也，在产后而用麻黄，虑有亡阳之患；见三阴里证，似可下也，在产后而用承气，则重亡阴血。耳聋、胁痛，乃肾虚恶露之停，休用柴胡。谵语汗出，乃元弱似邪之症，毋解胃实。厥逆，阳气之衰，虽分寒热，非大补不能回阳而起弱。痉因阴血之亏，毋论刚柔，非滋荣不能舒筋而活络。又如乍寒乍热，发作有期，症类疟也，若以疟治，迁延难愈。神不守舍，言语无论，病似邪也，若以邪治，危亡可待。去血多而大便燥热，肉苁蓉加于生化，非润肠承气之能通。患汗多而小便短涩，六君子倍加参、芪，必生津而津可利。加人参生化频服，能救产后之危，长生活命，屡用可苏绝谷之人。癫疝脱肛，多是气虚下陷，补中益气之方。口噤拳挛，乃因血燥类风，加参生化之剂。产户入风而痛甚，宜服羌活养荣。产门伤冷而不闭，五味倍参生化。怔忡惊悸，生化合定志。似邪恍惚，安神助脾归脾。因气而满闷虚烦，生化汤加木香为佐。因食而嗳酸恶食，六君子入神曲为良。苏木、蓬、棱大能破血，青皮、枳壳散胀消满。一应耗气破血之剂，汗吐攻下之方，止可施于少壮，岂宜用于胎产。大抵新产之后，须问恶露如何。若块痛未消，未可遂加芪术。腹中痛止，补中益气无疑。至若亡阳脱肛，气虚喘促，频进加参生化，是从权也。又有阴亡大热，血崩厥晕，速进生化原方，乃急救也。凡附生死之奇术，须因病以用药。欲俯仰之无愧，用存心以爱物。兹虽未尽产症之详，皆援近治之验为拘，未必无小补云。

产后脉辨

叔和曰：产后寸口洪疾不调者，死；沉微附骨不绝者，生。又曰：沉小滑者生；实大紧弦急者死。

朱丹溪曰：胎前脉宜洪数，既产而脉仍洪数者，死。又曰：胎前脉细小，产后脉洪

大多死。

产后之脉贵虚

《济生产经》曰：胎前之病，其脉贵实；产后之病，其脉贵虚。胎前则顺气安胎；产后则扶虚消瘀。此其要也。

产脉辨生死之法

《脉要》曰：欲产之脉，必见离经，或沉细而滑，夜半觉痛，来朝日中必娩。新产脉缓滑为吉，若实大弦急，近乎无胃，凶危之候。或寸口疾滑不调，恶症立见。惟宜沉细，附骨不绝，虽剧无恙。

胎产指南　卷四

产后诸症

新产危急医方　产后五急症医方　新产十九危症医方

新产危急医方

加参生化汤　治产后危急诸症。此方虽有血块可服。

当归四钱　川芎二钱　干姜四分　桃仁十粒，去皮尖，研　炙甘草五分　人参二三钱

随症缓急。如危症，参加五六钱。分娩儿下，血崩晕去形脱，宜服此方。

原方加减法　娩儿下汗多倦甚，加参三四钱；娩儿下无力送胞，倦怠，宜服此方；胎前患泻、产后倦怠，宜服此方，加参三四钱；汗多，加麻黄根一钱，黄芪一钱，防风五分；足厥冷，加人参四五钱，附子四分；气短促，加人参四钱；渴，加麦冬一钱，五味子十粒；大便实，加肉苁蓉一钱；烦渴，加竹肉一丸；寒渴，加杏仁十粒，桔梗五分；痰，加天花粉八分，竹沥半盅，姜汁少许。

凡产后血块痛，生化汤为主。血块痛散散，痛止也，加参生化汤为主。

产后五急症医方

倍参生化汤　治产后五急症，视症加减用之。

当归五钱　川芎二钱　炮姜四分　桃仁十粒　人参三四钱　炙甘草四分

枣引。

一、娩儿下即昏晕形色脱，倍参生化汤加荆芥五分，参倍至五六钱。

二、产后劳倦形色脱，倍参生化汤，参加至四五钱，黄芪一钱，熟地二钱。如血块痛，二味切不可用，加熟附四分。

三、产后血崩形色脱，倍参生化汤，参加至五钱，荆芥穗四分，炒。如血块散，可服**升举止血复神汤**。

白术二钱　当归二钱　熟地二钱　人参四钱　黄芪一钱　黄连七分　炙甘草四分　升麻四分　陈皮四分　白芷四分　荆芥穗四分　附子三分

枣引，水煎。

四、产后汗多形色脱，倍参生化汤，减炮姜，加麻黄根一钱，枣仁一钱，黄芪一钱，熟地三钱，浮小麦十五粒，防风五分。块痛未消，切不可用地、芪、术三味。

五、产后气短似喘，倍参生化汤加人参三钱，磨沉香二分，陈皮三分，香附三分。

以上五症，兼见杂症，照后加减治法，须以倍参生化汤为主。渴，加麦冬一钱，五味五粒；惊悸，加枣仁三钱，益智一钱；泻，加白茯苓一钱，泽泻八分；大便燥，加肉苁蓉一钱五分；伤饭面，加炒神曲八分；伤肉，加砂仁五分，山楂五粒；小便不禁，加益智六分；寒嗽，加杏仁十粒，桂枝五分；痰，加天花粉八分，橘红一钱；虚嗽，加天冬一钱五分，婆仁八分；气虚瘦，加竹沥半盅，姜汁少许；食少，加白术二钱。

新产十九危症医方

加参生化汤　照后诸症加减法治之。

川芎一钱五分　当归三钱　干姜五分　甘草五分　桃仁五分　加人参二三钱

一、产后劳倦伤脾，不理谷食。

加参生化汤加白术三钱。血块未清，不可妄用。陈皮四分，升麻四分，枣引，水煎。

二、产后头痛身热，自汗倦怠。

加参生化汤加黄芪一钱，麻黄根一钱，地骨皮一钱，白芷四分，防风四分，羌活四分。

三、产后感寒，身热头痛，嗽声重，有痰有汗。

加参生化汤，兼杂症照后开加减治之。嗽，加麦冬一钱，杏仁一钱，花粉一钱，桔梗三分；汗，加麻黄根一钱，地骨皮一钱；如头痛甚，加连须葱头三个。

四、产后先寒后热，或潮热夜热，每日夜时而发，类疟疾有汗。

加参生化汤加软柴胡八分，青皮三分，乌梅二个。汗多，加麻黄根一钱；汗多不至足，加熟地二钱；食少，加黄芪一钱五分，白术一钱五分，陈皮四分。慎不可用常山饮、四兽饮、青皮饮、万安甲子饮。

五、产后妄言妄见。

加参生化汤加枣仁一钱，茯苓一钱，柏子仁一钱，橘红四分，远志肉一钱，麦冬五分。

六、产后足冷发厥，一日三四次。

加参生化汤加白术二钱，熟地一钱，熟附四分。

七、产后身热有汗，大便不通。

加参生化汤加麻黄根一钱，麻仁二钱，地骨皮二钱，肉苁蓉二钱。慎不可用大黄方。

八、产后身热有汗，胁痛，或潮热。

加参生化汤加麻黄根一钱，桂枝七分，黄芪一钱，柴胡七分。胁下痛可按止，加熟地二钱。慎勿用小柴胡汤。

九、产后有汗，大便不通，潮热，睡中妄言。

加参生化汤加麻黄根一钱，枣仁八分，地骨皮八分。

十、产后有汗，小便多。

加参生化汤加麻黄根、麦冬、五味、葛根、黄芪。

十一、产后有汗，泄泻。

加参生化汤加麻黄根，肉果一个，面裹去油，石莲子十个。

十二、产后有汗，泄泻危困。

宜服丹溪医案**大补方**

人参三钱　白术五钱　川芎一钱　当归三钱　芍药一钱　茯苓一钱　泽泻八分　厚朴五分　陈皮四分　紫苏五分　腹皮六分　萝卜子六分　木香七分

十三、产后大便不通，误食大黄方，成臌胀，宜服丹溪医案补方。

十四、产后伤寒，误食耗药，成臌胀，宜服丹溪医案补方。

十五、产后忿怒，误食耗气方，宜服丹溪医案补方。

治产后误下、误消、误耗三症：

人参三钱　白术三钱　川芎一钱　芍药一钱　茯苓一钱　当归三钱　泽泻八分　厚朴五分　紫苏五分　陈皮五分　木香三分　腹皮六分　萝卜子六分，炒

伤饭面，加神曲、麦芽；伤肉，加砂仁、山楂；伤怒气，加磨木香。

大抵产后虚弱误下、误消、误耗，犯虚虚之戒，丹溪大补气血方，屡试屡验。胎前臌胀亦可奇效。

十六、产后伤食痛，或胁痛，误服消导药方，多绝谷食。

独参三钱　姜一片

水煎，调饭锅焦，渐渐引开胃气。此名长生活命饮

十七、产后血崩，日久不止。

宜**升举大补汤**

白术一钱　当归一钱　怀生地二钱，蒸　人参二钱　荆芥五分　陈皮四分　甘草四分　黄柏三钱　川芎一钱　黄芪一钱　麦冬一钱　黄连三钱　防风五分　羌活五分　升麻五分　白芷五分

水煎。

十八、产后子宫不收，产户不闭，脱症。

并宜服倍参生化汤。

十九、产后神昏形脱有汗。

宜服倍参生化汤，内减干姜。忌葱、姜。

以上十九危症，并补气血为主。问无血块痛、恶血清楚，方可服。若恶血块痛，切不可用地、芪、术等补味，慎之！慎之！其骨皮、柴胡、芍药、黄柏、黄连、生地，皆寒凉凝血之物，必须去产日久，问无块痛，方可服。

胎产指南　卷五

产后禁忌药物

产妇禁用诸药　产后忌食诸物　乡俗产后十弊　产后用药十误

产妇禁用诸药

一、产妇气不顺，禁用枳壳、厚朴等耗药。

二、产后伤饮食，禁用枳实、大黄、蓬、棱。

三、产后身热，禁用芩、连、栀、柏。

四、产后七日内，禁用地黄、芍药。

五、产后血块痛，禁用牛膝、蓬、棱、苏木。

六、产后大便不通，禁用大黄、芒硝。

七、不可服济坤丹，要损血气。

八、不可服瘦胎丸，要伤胎。

九、不可用《产宝》峻药方。

产后忌食诸物

一、果忌梨、藕、橘、柑、柿、西瓜，要停血作痛。

二、食忌冷粉、绿豆、冷饭、荞麦，要停血作痛。

三、忌鹅、犬、猪、牛首肉，恐犯诸药，又恐停血块作痛。

四、忌苋菜、生菜、苔菜，停血痛。

五、忌沙糖酒，要损新血。

六、忌独煎山楂汤，损新血。

七、忌多食胡椒、艾、酒，行血致崩。

八、忌生姜酒，宁波俗弊，发汗行血。

九、忌浓茶汁，寒停血块痛。

乡俗产后十弊

一、产毕母令食牛、羊、猪、鹅肉、鸡子、面物，虚人难消化。

二、母食凉粉、绿豆、粥澉汁、荞麦面。

三、母多食胡椒、艾、酒，血块虽得热流通，新血亦不宁，防崩漏。

四、产后宁波俗弊，多用姜数斤以消血块，发热亡血致危。

五、产后母食梨、橘、柑、藕、冷菜，及冷药、冷水，致血块凝结。

六、母食橙、丁、橘、干、枳术、香砂等丸，重损新血。

七、七日内，母劳洗以劳神，母勉强早起，以冒风寒。

八、产后月之内，母多言、劳女工。

九、产后暑月，母用冷水洗手足。

十、产后遇大寒月，用小衣烘热，常温腹内，冷则块痛久，虽药不行。

产后用药十误

一、产后误用耗气顺气等药。胸膈饱闷，虽陈皮不可用至五分。

二、误用消食药，多损胃减饭，甚至不进食，且凝血块。

三、身热，误用芩、连、栀、柏，损胃增热，甚至不进食，且凝血块。

四、三日内未服生化汤以消血块，母轻用人参、芪、术、熟地，致块不消，至危亡。

五、母用地黄，以滞恶露。母独用枳实、枳壳、牛膝以消块。

六、母用大黄、芒硝以通大便，致泄泻成臌胀。

七、母用苏木、三棱、蓬术、牛膝以行

血块，致损新血。

八、俗多用山楂一味煎汁，以攻血块，成危疾而死人，不可不知也。

九、毋服济地丹两三丸，下胞下胎。

十、毋信《产宝百问》及《妇人良方》。

胎产指南　卷六

产后二十九症医方

一、产后血块痛

宜服生化汤，照前开法分两，频服几帖，即时块散痛止，血旺精神，虽少壮产妇无病，多服几帖，补血有益。其产母腹上，用烘衣服暖和，血块易散，虽暑月亦用。益母丸一颗，鹿角灰一钱，失笑散三方，可用一方以行块，不可用苏木、蓬、棱峻药。虽山楂，弱人服之亦有大害。

二、产后去血多，或劳倦昏暗血晕

宜服生化汤数帖，服至产妇有精神，止药。如血晕形色脱或汗多，加人参三四钱在生化汤内，慎不可论恶血抢心，妄投破血药害人。

三、胞衣不下

宜服生化汤，温服几帖，初煎就送益母丸一粒，次煎又送。外用烘热衣服暖产妇腹。慎不可冬月坐夜桶及人身上，守候下胞，严寒多损产妇。必用扶上床被盖，火笼温和，兼服生化汤助血得无失。

四、产后头痛身热恶寒

虽明知感冒风寒，只宜服生化汤，连进二三帖，服至热退痛除止药，且不可预加别药。其川芎、干姜性亦散邪，慎不可用麻黄、柴胡等方，以表汗虚产。如服三四帖后，头痛如故，加连须葱头四五个，或用葱放鲞鱼汤内送饭。

五、产后乍寒乍热，胁痛或颈痛

宜服生化汤二三帖。如未除，再加桂枝七八分以散寒，磨木香一分，切不可认为胁痛伤寒，用柴胡汤表汗虚产。

六、产妇感寒，上攻则心痛，下攻则腹痛，且血块又痛

宜服生化汤，加桂枝五分以散寒定痛。如两帖未止，再加吴茱萸；或干姜二片，加在生化汤内以助血。若独用诸热药以攻寒，其痛虽止，其血未免来多，防有崩晕之患。慎不可用吐、汗诸热性药以虚产。

七、产后身热或夜间热或寒热往来

并不须加减，只宜服生化汤以除热定痛。此重言产后不可汗，总结上三症。

八、产后寒热往来，每日应期发作类疟

宜服生化汤几帖，则寒热自除。如汗多人虚，服卷中补方。慎不可用常山、草果等方以止疟虚产。

九、产后感寒心下痞满

宜服生化汤，加陈皮五分，桔梗五分，白豆蔻五分，磨木香一分。慎不可专用陈皮、桔梗、豆蔻以虚产。

十、产后感风寒咳嗽或身热

宜服生化汤，加杏仁十粒，知母一钱，天冬一钱，甘草四分，桔梗五分。有痰，加橘红四分，花粉八分。如有汗，服卷中补方，不可用散风寒药方。

十一、产后伤食

宜服生化汤，加炒神曲一钱，麦芽五分，以消面饭；加山楂四粒；砂仁五分，以消肉食。如伤寒饭食，加吴茱萸一钱，桂枝五分；伤寒食肋痛，加肉桂七分。切不可专用消食药，以损气血虚产。

十二、产后忿怒心胸满闷

宜服生化汤，加磨木香二分，入药内服。不可用乌药、香附、砂仁、枳壳、枳实、厚朴等，以损元气。

十三、产后大便日久不通

宜服生化汤，加肉从蓉二钱，日服两三帖，助血旺自通。另研芝麻三合，和米一升作粥，三四次食之。慎不可用大黄等方，结燥日久，多用大黄成臌胀，戒之。

十四、产后去血多或汗多，小便涩少或不通

宜服生化汤加生脉散，入参、麦冬以通之，切不可用五苓散以行小便。如服药不通，外用葱熨法，用葱头十个，绵缚，切如指厚，放脐上，以艾火熨之。

十五、产后泄泻

先服生化汤，加茯苓一钱，泽泻七分，石莲子六个。另用糯米一合，煮粥食之。如泄泻形脱昏倦，加参生化汤治之。

十六、产　妇

原本失详

十七、产妇心神失守，妄言妄见，似邪，失血之故

宜生化汤加茯神一钱、枣仁一钱，柏子仁一钱，远志一钱。慎不可为痰火，降散虚产，符尺惊产。如虚汗脱，服卷中补方。

十八、产妇足冷发厥，血块又痛

宜服生化汤，加干姜二三帖，后用卷中补方，慎不可轻用四逆等汤。

十九、产妇痢不分红白

产痢不分红白，宜服生化汤减干姜，加木香三分，连服两三帖，则血块与痢积推荡尽矣，又不损产妇血气。切不可用芩、连寒药，以停血块。

二十、产后血脱大崩

宜频服生化汤，加荆芥一钱。如形色脱，服卷中补方。

二十一、产后霍乱吐痢

多自虚中感寒，宜服生化汤加砂仁、生姜、茯苓、藿香，或六和汤。

二十二、产后遍身痛

多自血虚气滞，服生化汤加韭白二十根，肉桂八分。

二十三、产后起居太早，产户感风寒作痛衣被等亦难近身体

宜服生化汤加桂枝、独活、防风，以散风寒。

产户感风，如生痈毒，时医皆言生痈毒。惟一僧言：产七日内，起居风入产户，风性热，即痛甚，祛风可愈。予羡其明见，不隐其方，勿误生痈疽而服败毒散，服当用**祛风定痛散**。

当归三钱　独活　防风　肉桂各五分　川芎一钱　茯苓一钱　荆芥五分　生地二钱　枣五个

二十四、产后发痈疽

宜生化汤加连翘、花粉各一钱，甘草节八分。如心下恶心、烦闷，用滴乳香一钱，绿

豆粉五钱，和服。切不可用败毒散、大黄等方。

二十五、产妇四肢麻木

血虚甚，宜服生化汤加浮萍；如血脱崩麻木宜服卷中补方。

二十六、产后目痛，昏热赤肿

宜生化汤加荆芥，切不可用洗心散，芩、连、栀、柏等方。

二十七、产后因怒，或偶吐血

宜生化汤减川芎，用当归二钱、去尾，荆芥八分，犀角末八分。慎不可用生地、黄柏等凉药方。

二十八、产后卒然口噤牙颤，手足抽搐类中风

宜生化汤加天麻、羌活、防风，姜引。

二十九、产后烦躁口渴

宜服生化汤及生脉散。

胎产指南　卷七上

产后论解三十二症医方

生化汤　凡孕至七个月，照方预买川芎二两，当归五两，桃仁五钱，炙甘草五钱，干姜五钱。就制下，至胞衣一破，速煎一帖，候儿生下，即服。不问正产半产，俱宜服两帖，消块生血。每帖川芎三钱，当归八钱，甘草五分，干姜四分，桃仁十粒（去皮尖，炒）。水二盅，煎七分，加酒六七匙，稍热服，渣留后帖，并煎两帖，共三煎，要在一时辰内未进食之先，继相频服，则下焦血块速化，新血骤长，自无晕厥。且产妇多服一帖，渐增精神，不厌药之频也。若照常症一日服一帖，岂能挽回将绝之气血也？若胎前素弱虚人，一见危症堕胎，要不拘帖数，服至病退止药。若产妇劳甚，血崩形色脱，加人参三四钱在内，频灌无虞。若汗多气促，亦加人参三、四钱在生化汤内，血块无滞。

一、论血块

妇人病倍于男子，因产之症偏多也。夫产后血块，医家所当先论，毋视为轻而忽之也。因古《局方》偏用苏木、蓬、棱，峻攻块痛，反损破新血，而重虚产妇，俾后学世相授受，信用误人，不知几千年矣。无异于刃之杀人也，故特书列首章，普告事产者，勿视血块症轻，而妄用苏木、蓬、棱，以轻人命也。一应散血方、破血药，虽山楂性缓，不可单用，俱害人性命者也。

生化汤治血块，娩后化旧生新之圣药也。又加益母丸，鹿角灰，就用生化汤送一钱。外用烘热衣服暖和块痛处，虽暑月亦要和暖。大抵产妇劳伤气血，并虚娩子后，无力送胞送块，留滞腹中作痛，甚有气不运而昏迷晕厥，切不可妄论恶血抢心，妄用苏木等散血之剂以杀人也。只频服生化汤几帖，即时块消痛止，神清气复而顿爽，舒畅平安矣。行血如生地、牛膝。败血如三棱、蓬术，俗用山楂、沙糖消块。姜、椒、艾、酒定痛，多致淋、崩、昏晕等症。

二、论血晕

凡分娩之后，眼见黑花，头眩昏晕，不知人事，谓之血晕。其因有三：一因劳倦甚而气竭神昏；二因血大脱而气欲绝；三因痰火乘虚泛上，而神不清，患此三者，皆魂不随神，往来机运而几息也。当急服预煎下生化汤，以行块定痛，化旧生新，即时血生气转，神渐清而心有主，频服二三帖完，其昏乱即定，乃芎归性有化生之功也。若偏信古方，认晕症为恶血抢上迷心，而轻用散血之剂，认谓痰火，而治以降火清凉之方，误之甚也。外以醋韭冲鼻之法，烧漆之方，亦不可缓。医者不可妄论恶血上抢心，而用苏木等以峻攻新血，又不可信用古方，用牡丹夺命之方以败血，而反损人之命也。再叮咛临产之际，必用预煎生化汤，预烧硬石子秤锤，候儿下地，连服两三帖，药共三煎。又产妇枕边用醋韭投锤子瓶之法，决无晕症。又儿生下时，举家不可喜子慢母，产母亦不可顾子忘倦。又不可产讫即卧，或忿怒气逆，皆要血逆致晕，至嘱，附方于后。

加减生化汤　治产后三等血晕。

川芎三钱　当归六钱　干姜四分　桃仁十粒　炙甘草五分　荆芥五分

枣引，水煎。

加减法　劳倦昏而甚，及血崩、气血脱

而晕，并宜速灌生化汤两帖。如形色脱，或汗多而脱，皆用急服一帖，后即加人参三四钱，肉桂四分，决不可疑参为补而缓服。又痰火乘虚泛上而晕，方内加橘红四分，虚甚亦可加参二钱，肥人多痰，再加竹沥七分酒盏，姜汁少许。以上三等晕症，并不可用苏木破血等药，其血块痛甚，兼送益母一法，或送鹿灰，或元胡索，或用独行散。以上消块方，服一方见效，不须易方。

从权救急加参生化汤　治产后形色脱晕，或汗脱晕。

川芎二钱　当归四钱　干姜四分　桃仁十粒　炙甘草四分　人参三钱

水煎服。

血块痛甚，加肉桂七分。渴，加麦冬一钱，五味子十粒。汗多，加麻黄根一钱。如块不痛，加黄芪一钱以止汗。伤饭面，加炒神曲八分，麦芽五分。伤肉，加山楂五分，砂仁四分。人参补而行，芪术补而不行，故产后七日，血块未除，宁用人参，不可用芪、术、地。予见庸医用此，致心腹痛而毙。

三、论产后厥症

凡产用力过多，劳倦伤脾，孤脏不能注于四旁，故足冷而厥气上行焉。经云：阳气衰于下，则为寒厥是也。非急方不能举气以归源，非大补不能回阳而复神，岂钱数归参，照常症一日一帖，所能扶救将绝之气血耶？必用加参生化汤，倍参连服两帖，斯气血旺而神复，厥自止矣。若服药而有渴，另用生脉散，多参以代茶，助津以救脏燥也，此经验之确论，毋得有议焉。虽又有四肢逆冷泻痢，症类伤寒阴症，又难用四逆汤，亦必用倍参生化汤，佐以炙姜，或附子一片，则可回阳止逆，又可以行参、归之功矣。经云：脾，孤脏也，四旁，心、肝、肺、肾也。又云：身体劳苦伤于脾。又云：厥气上行，满脉去形。立二方分先后：

加参生化汤　治新产发厥，块痛未止，不可加芪术。

川芎二钱　当归四钱　干姜四分　甘草四分　人参二钱　桃仁十二粒

水煎，连服二帖。

滋荣益气复神汤　治产后发厥，问无块痛，可服此方。

川芎一钱　白术一钱　黄芪一钱　人参三钱　当归三钱　怀熟地二钱　炙甘四分　麦冬一钱　五味子十粒　陈皮四分　附子五分

水煎。

汗多加麻黄根一钱，枣仁一钱。大便不通，加肉苁蓉二钱。

大抵产后晕厥，二症相类，皆气血并竭，神将去而机几息，仅有一丝之生意耳，若非急方急服，岂能挽回将绝之元气耶。但晕在临盆，急症尤甚，子厥宜并灌生化汤几帖，先补气血之亏，即时块化血旺，而神清晕止，产妇有精神矣。若无汗脱、形脱、气促症见，参芪不须加也。厥症在分娩之后，气血两竭，宜用倍参生化汤，并补气血之亏，止厥以复神焉。又非偏补血分可治愈，要知晕有块痛，芪术未可遂加。厥证问无块痛，芪、术、地黄并用，无疑也。

四、产后血崩

产后血大来，宜审血色之红紫，视形色之虚实。如血多色紫有块，乃当去之败血也。若止留反作痛，不可论崩，如鲜红之血大来，乃是惊伤心不能主，怒伤肝不能藏，劳伤脾不能统血归经耳。当以崩论，先服生化汤几帖，则行中有补，而血宁生旺矣。若崩形脱，或有汗，或气促，宜倍参生化汤以益气，斯阳生而阴血生旺矣，非棕灰之可止者。如产半月后崩，又宜升举大补汤治之。方载八卷中。

生化止崩汤　治产后血崩

川芎一钱　当归二钱，去尾　干姜四分　炙甘草五分　桃仁十粒　荆芥五分，炒

枣引，水煎。

忌姜、椒、热物、生冷。

鲜红血大来，加荆芥穗一钱、炒，白芷五分。血块不痛，形脱，加人参三钱。汗多气促，加人参三四钱。无汗，形不脱，气不促，只多服生化汤，则血自宁，勿言芎归活血助崩，误矣。

滋荣益气止崩汤

川芎一钱　麦冬一钱　黄芪一钱　人参一钱　白术二钱　熟地二钱　当归二钱　白芷四分　荆芥穗四分　陈皮四分　甘草四分　升麻四分　黄连三分

枣引，水煎。

汗多，加麻黄根一钱，浮小麦一撮。大便不通。加肉苁蓉一钱。有热，加磨木香一分。痰，加贝母六分，竹沥姜汁。寒嗽加杏仁一钱，桔梗一钱，知母一钱。惊悸，加枣仁一钱，柏子仁一钱。伤饭面，加神曲一钱，麦芽一钱。伤肉，加山楂一钱，砂仁八分。自热不可用芩、连、柏。大便不通禁大黄。伤食怒气，不可单用消耗无补药。凡年老虚人患崩，宜用升举大补汤。方详八卷中。

五、产后气短似喘

产后阴血暴竭，阳气无所依，独侵于肺，故喘也。此为孤阳绝阴。最为难治。

凡产后血脱，劳伤之甚，气短似喘，无所倚恃，而呼吸息止违常矣。世有妄论痰火，用散气化痰之方，误人致夭多矣。夫肺受脾禀，运气生脉，通水道，顺呼吸，清肃上下，调和荣卫，而为平人之常气也。值产血亡气脱，呼吸短促，言语不相接续，似喘危症，不待诊问自明，不待智者而后知也。

加减生化汤　治分娩儿下，即患气短症。有血块，不加芪、术。

川芎二钱　当归四钱　炙草五分　干姜四分　桃仁十粒　人参二钱

枣引，水煎，连服二三帖，然后可服续气养荣汤。

续气回阳汤　治产后气短促，问无血块痛，宜服此方。

川芎二钱　当归四钱　炙草四分　人参三钱　黄芪一钱　白术二钱　陈皮四分　熟地二钱

如足冷，加熟附五分。汗多，加麻黄根一钱，浮小麦一撮。渴，加麦冬一钱，五味子十粒。大便不通，加肉苁蓉一钱，麻仁一撮。伤饭面，加神曲一钱，麦芽五分。伤肉，加山楂五粒，砂仁五分。又服滋荣益气复神汤。方详八卷中。

六、产后妄言妄见

凡产后妄言妄见，由气血虚而神魂无倚也。夫心藏神主血，而言乃心之声也，心有血而神存，则言不妄发。又肝藏血而藏魂，而目乃肝之窍也，目得血而司视，则瞳瞭视正。若夫产后血气暴竭，致心神失守，言语无伦，肝魂无倚，则瞳瞭妄见。况心为一身之主，目为百脉之宗，虚症见于心目，则十二官各失其职矣。是以视听言动，皆由虚妄，治法当论产期，块痛有无缓急。若娩儿之后，块痛未除，先服生化汤三帖，以化块定痛。服药痛止，即继服加参生化汤；或补中益气汤，加安神定志汤丸调治之也。若产日久，形气血气俱不足，即当大补为主，生养气血，安神定志，服至药力充足，其病全愈。病家毋救速效，医家毋论邪祟，若喷以法水，惊以法尺，多致不救。屡治此病，服药十数帖方效。一妇妄言妄见，服补剂十五帖方见效。丹溪云：虚病犹似邪祟也。又云：欲泄其邪，先补其虚，先调其气，次论诸疾。此古人治虚弱人，有挟外因内之确论，但人不能体认其议用药，反言攻补难同于方，愚人必攻邪尽，方可用补，病家不信难补，此医家治产后虚症，及年老人虚喘，弱人妄言，三症所当用心也。

宁神生化汤　治产后血块痛未止，患妄言症，未可加芪、术。

川芎一钱　当归三钱　炮姜四分　炙草四分　桃仁十二粒　茯神一钱　人参二钱　益智仁一钱，炒　柏子仁一钱　陈皮三分

枣引，水煎服。

滋荣益气复神汤　治产后块痛止，可服此方。

川芎一钱　当归二钱　熟地二钱　炙甘四分　黄芪一钱　白术一钱　人参二钱　茯神一钱　枣仁二钱　柏子仁一钱　益智一钱，炒　陈皮三分　麦冬一钱　五味子十粒　莲子八个　龙眼肉八个

枣引。

大抵产后患崩，曰血脱。短气似喘，曰气脱。妄言妄见，曰神脱。三症虽有阴血气阳之分，其精散神去之促，无异前晕症，治若少缓，亦危症也。若非厚药急方频服，失之夭者多矣。误论气实痰火皆非也。若新产有块痛，并用加参生化汤，行中有补，斯免滞血，血虚之失也。其块痛止，宜升举大补方，少佐以黄连，堕火以治崩脱，宁血归经也。用倍参补中益气汤，少佐以附子、助参以治气脱，摄气归元也。宜滋荣益气复神汤，少佐痰剂以清心火，治神脱，宁君主之官也。余因人妄论气脱、妄言等症，误用气实痰方药，屡夭人年，重复录告，凡遇气胎痰重之症，必当补救，切不可用消散，误人以受夭殃。

七、产后伤食

凡产形体劳倦，脾胃俱伤，胃受食伤，不受谷味。是以新产之后，禁膏粱，远厚味，食粥茹蔬，乃切务也。不善调摄之家，惟虑产妇之虚，以多食有益，厚味为补本，不思食而强与餍足，胃受食伤，不受谷食，脾转输迟，食停否塞，嗳酸恶食。治当扶元为主，温补气血，健助脾胃，养正兼消，审伤何物，佐以消导。斯脾气复而转输散精，滞物行而胃始思谷。夫饮食者，元气之滋味，而产后尤借此以补助也。因劳倦伤脾，不胜甘饫，薄味渐进，运化亦速，再兼服温补之剂，佐以神曲、麦芽，消面饭之伤；山楂、砂仁，消肉食之伤；如伤寒冷之物，吴茱萸、桂枝亦当加也。如此补消并治，无有不安，屡见治重产虚弱，惟知速消伤物，反损真气，益增满闷，一帖不效，又加峻药，一医无功，又更一医，先后方类，轻症增重，致使少食思谷之人反虚，虚而绝不思谷者，十常八九，病家自归数命，医家以为尽技，惜哉。

加味生化汤　治产后血块未消，服此消食。

川芎二钱　当归五钱　干姜四分　炙甘草五分　桃仁十粒

伤面饭，加神曲一钱，麦芽一钱、炒。伤肉，加山楂五粒，砂仁五分。伤寒物胁痛，加吴茱萸一钱，肉桂五分。虚甚，加人参二钱，二服。

健脾消食生化汤　治产后血块痛除，服此方以消食。

川芎一钱　当归三钱　炙甘五分　人参二钱　白术一钱五分　神曲一钱　麦芽五分

伤肉，加山楂五粒，砂仁六分。伤食，不用白术用参。如停寒日久，脾胃虚弱，虽药不运，宜揉按，炒面熨之。

长生活命丹　治伤食人误服消导药多，绝粥几日者，宜服此方。杂症误消耗，绝食亦神效。

人参二钱

水盅半，煎至半盅之数，先用一酒盏之则，送饭锅焦研粉三匙，渐渐加参汤，锅焦引开胃气，煎参汤须用新罐，或铜勺，恐闻药气要呕，观医案信方不诬，人参名长生草，饭锅焦名活命丹，此方曾活数千命，经验极多，故有至三至再之嘱耳。

八、产后忿怒

凡产妇因忿怒气逆，胸膈不舒，血块又痛，宜服生化汤。临服时，磨木香二分在内，则血块自化，怒气自散，并治而不悖也。若轻产重气，偏用香附、乌药、枳壳、香砂之类，以散气行块，则元气反损，满闷益增，此非善治产也。又如怒后即食，胃弱闷停，当

审何物，加山楂、砂仁，以消肉伤；加神曲、麦芽，以消饭伤。若伤寒物作痛，留滞胁腹，加桂枝、吴茱萸在生化汤内，以逐寒定痛，无有不安，慎勿木香槟榔丸，流气饮之方，以散气化食，是虚弱产妇，重虚之祸，有不可胜言者也。

木香生化汤　治产后血块痛未除，又受气，宜服此方。

川芎二钱　当归六钱　干姜四分　炙甘草五分　木香二分　陈皮三分

此方减桃仁而用木香、陈皮。前有减干姜者详之。

健脾化食散气汤　治产后受气伤食，问无血块痛，可服。

白术二钱　当归二钱　川芎一钱　干姜四分　陈皮三分　砂仁七分

如寒停胁下作痛，加桂枝八分。

大抵产后弱妇，受气停食，愈消愈增满闷，必攻补兼行，方化滞进食，但时医所见，知耗气而疑参补，误人多矣。余屡见误服散气消导药，致使少食思谷之人，反绝食日久者，亦用长生活命丹而活甚多。大抵产后忿怒气逆及停食二症，善治者重产而轻怒食，必补气血为主，佐以顺气调气，则怒郁散而元气不损；佐以健脾消导，非惟气顺，则停食亦行，而胃思谷，此治产后怒伤食伤之正法也。若专理气消导，胀不散，停食不行，且损元减食，甚至绝谷不救者多矣，惜哉！

九、产后类疟

凡产后寒热往来，每日应期而发，其症类疟，切不可以疟痰疾方药治之。夫气血虚而寒热交作，元气弱而外邪或侵，虽寒来复栗，汤火不能温，热如燔炙，冰水不能寒，或昼轻夜重，或日晡寒热，虽所见症与疟类同，其方药必当滋荣益气，以退寒热，有汗急当止汗，如麻黄根汤等药。若头有汗而不及手足，乃孤阳绝阴之危症也，当加地黄、当归之剂。如感寒头痛无汗，宜于生化汤内加羌活、防风、莲须、葱头以散之，慎不可作疟治以误人也。柴胡汤、青皮饮、常山、草果等方药，俱不可用。

麻黄根汤

麻黄根　当归　黄芪　炙甘草　人参　桂枝　白术　牡蛎　浮小麦

凡妇人产后，患类疟疾，头有汗，身足无者，偏服参，少血分药，多不救。

滋荣益气扶正汤　治产后寒热有汗，每日午后，应期而发。

川芎一钱　当归二钱　炙草五分　人参二钱　生熟地二钱　黄芪一钱　陈皮四分，去白　麦冬一钱　白术一钱五分　麻黄根一钱五分

夜服六味地黄丸，每服七八十丸，清汤下。

加减养胃汤　治产后寒热往来，头疼无汗，类疟。

川芎一钱　当归三钱　藿香四分　炙草四分　茯苓一钱　苍术一钱　人参一钱五分　半夏八分　橘红四分

姜引。

痰，加竹沥、姜汁、半夏曲。弱人兼服河车丸。

产后久疟，无汗不愈，兼煎白术人参膏，以助药力。

十、产后类伤寒二阳症

产后七日内外，发热头痛恶寒，毋专论为伤寒太阳症；发热头痛胁痛，毋专论为伤寒少阳症。二症皆由气血两虚，阴阳不和，而类外感，治者慎勿轻产，执偏门而用麻黄汤，以治类太阳症。又用柴胡汤，以治类少阳症。盖产妇血脱之后，若重发汗，则虚虚之祸，有不可胜言者也。昔仲景云：亡血家不可发汗。丹溪云：产后不可发表。二先生非谓产妇真无寒之兼也，非谓麻黄、柴胡之不对症也，诚恐后执偏门而轻产，执成方而发表也。虽明知产后真感风寒，其生化汤内芎姜亦能散之。又《内经》云：西北之气，散而寒之；东南

之气，收而温之，所谓同病而异治也。其谓东南方人柔弱，而西北方人刚劲，故治病有异也。虽产后劳虚，治不可分南北，须当重产而用补，少佐以散剂，虽有他症，以末治之，不可不明也。

加味生化汤　治产后三日内，发热头痛。

川芎一钱五分　当归三钱　炙草四分　炮姜四分　桃仁十粒　羌活四分　防风四分

服二帖。

若头痛身热不除，加白芷八分，细辛四分。若头痛如破，加蓬须一钱，葱头五个。虚，加人参二钱。

产后类伤寒，三阴症，潮热有汗，大便不通，毋专论为阳明症；口燥咽干而渴，毋专论为少阴症；腹满液干大便实，毋专论为太阴症；又汗出谵语便秘，毋专论为腹中有燥屎宜下。数症多因劳倦伤脾，运化稽迟，血气枯竭，肠腑燥涸，乃虚症类实，当补之症，治者毋偏门轻产而妄议，主承气汤，以治类三阴之症也。间有少壮之人，患此类症，妄下侥幸无妨，但产后虚弱而复误下，虚虚之祸，不可胜言，屡见妄下成噎，误导反结。又言少血致便不通，而误下泄泻不止者甚多。

养正通幽汤　治产后大便秘，类三阴伤寒症。

川芎一钱五分　当归六钱　炙甘五分　桃仁十五粒　肉苁蓉一钱，酒洗，去甲　陈皮四分　麻仁一钱

汗多便实，加黄芪一钱，麻黄根一钱。口燥渴，加麦冬一钱。腹满液干便实，加麦冬一钱，人参一钱，苁蓉一钱。汗多谵语便实，乃血气并竭神衰，心主失守，宜养荣安神，加茯神一钱，枣仁一钱，远志一钱，柏子仁一钱，白术二钱，人参一钱，黄芪一钱。以上等症，大便燥结，并宜大料、川芎、当归补血，人参可少，芎归非至斤数，难以取效。

大抵产妇虚中伤寒，口伤寒食，外症虽见，头痛发热，或胁痛腰痛，似外感宜汗，犹当重产亡血禁汗，惟宜生化汤中量而加减调治之无失。又如大便结秘，犹当重产，其亡血禁下，惟宜养正助血通滞，极稳当也。

又方**润肠粥**　产后日久，大便不通，用芝麻一升研末，和米二合，煎粥食即通。

十一、产后类中风

产后气血暴竭，百骸少血濡养，率而口噤牙紧，手足筋脉挛缩，类中风，又类痉痫，虽虚火泛上有痰，皆当以末治之，毋执偏门而用治风消痰之方，以重虚产也。盖经脉任血流利，自筋骨强健，而关节清利，今产后无血濡注，致牙紧口噤，手足牵搐，症类痉痫中风也。治当先服生化汤，以生旺新血。如见危症，三帖后即用人参益气，以救血脱也。如有痰有火，少佐橘红、炒芩之剂，竹沥、姜汁亦可加之，黄连黄柏，不可并用，慎之，附方于后。

滋荣活络汤　治产后少血，口噤项强，抽搐类中风症。此方如有血块，不可用地、芪、术。

川芎一钱五分　当归三钱　怀熟地二钱　草果四分　黄芪一钱　茯神一钱　天麻一钱　人参二钱　麦冬一钱　陈皮四分　荆芥四分　防风四分　羌活四分　黄连二分，姜炒

有痰，加半夏曲二钱，竹沥一小酒杯，姜汁少许。有食，加山楂、砂仁以消肉物，神曲、麦芽以消面饭。大便秘，加肉苁蓉一钱五分。渴，加麦冬、葛根。汗，加麻黄根一钱。惊悸，加枣仁一钱。

天麻丸　治产后中风，恍惚语涩，四肢不利。

天麻五钱　防风五钱　茯神一两　川芎七钱　枣仁一两　羌活七钱　人参一两　远志一两　柏子仁一两　山药一两　麦冬一两　细辛四钱　南星曲九钱　半夏曲九钱　当归六两　石菖蒲八钱

蜜丸，朱砂为衣。

十二、产　后　汗

凡分娩时出汗，由劳伤脾，惊伤心，恐

伤肾也。《内经》云：身体劳苦，汗出于脾；惊而夺精，汗出于心；胃所恐惧，汗出于肾。产妇多兼三者而汗出，不须即加敛汗之剂，神宁汗自止息。其血块作痛，芪、术未可遽加。宜服生化汤二三帖后块痛消，即继服加参生化汤，以止虚汗。若分娩后倦甚，濈濈然汗出，形色有脱，乃亡阳脱汗也，又当从权连灌加参生化汤，倍参以救危急，毋据块痛。夫汗乃心之液，荣于内为血，发于外为汗，产妇值亡血之后多汗，由惊劳心伤神虚，不能镇守其液也，治当健脾胃而救水谷之精归脾，益荣卫而引血归源，灌溉四旁，不使妄行，为外汗也。难症虽有自汗盗汗之分，其当归大黄汤，不可治产后之盗汗也。并宜服加参生化汤及加味补中益气二方。若服参芪重剂，而汗多不止，及出头汗而不及腰足，乃危症也。

麻黄根汤　治产后虚汗不止，三日内血块未净，不可加芪、术。

黄芪一钱五分　当归二钱　麻黄根一钱　粉甘草五分　人参二钱　牡蛎五分　桂枝五分　浮小麦一撮　白术一钱

血块痛不加者，以芪、术补而不行也。虚脱汗多手足冷，加熟附一片，干姜四分。渴，加麦冬一钱，五味子十粒。血块不痛，加熟地三钱。恶风寒，加防风五分，桂枝五分。肥白人产后多汗，加竹沥一酒杯，姜汁半匙，以清痰火。

晚服八味地黄丸

山萸肉　山药　茯苓　泽泻　牡丹皮　五味子　黄芪　怀生地

各等分为末，蜜丸。

凡产后虚汗不止，由产亡阴血，而阳气偏盛故也，《内经》云：阳加于阴则发汗，因而遇风变为痉疯者有之。

十三、治产后盗汗

产后睡中出汗，醒来即止。犹盗瞰人睡而上盗，故谓人盗汗，非自汗所同治。当兼用血药品，其当归大黄汤，又非产后盗汗药方也。

止汗散　治产后盗汗。

人参二钱　当归三钱　麻黄根一钱五分　怀熟地三钱　黄连五分，酒炒　浮小麦一撮

又方　牡蛎煅研细末，小麦面炒黄为末，绢袋盛扑之。

十四、产后口渴或兼小便不利

凡产后口燥咽干而渴，或兼小便不利，由产失血，或汗多所致，是无水谷也。夫日用水谷，胃纳而脾肺散之，至精清气，为津为液，其气通心，受火色而方化为血，下行膀胱而为小便，值产亡血，而又多汗，又劳倦伤脾，不能为胃行其津液，则是化生之气不运，渗泄之令不行，是以上无津液流通，而有咽干燥渴之症，下气不升而有胃肾关闭之候，治法必当助脾益气，升补气血，则气化流行，阳升阴降，斯水入经而为血为津，谷入胃而气长脉行，自然津液充而便利调矣。若认咽干口燥为火，而用芩连栀柏以降之；若认小便涩闭为水滞，而用五苓等散以通之，皆非也。必因其劳损而温之益之，因其干燥而濡之行之，度量病情而治之，庶无失也。

生津止渴益水饮　量加车前子一钱。

黄芪一钱　人参三钱　怀生地三钱　麦冬三钱　五味子十粒　当归三钱　茯苓八分　甘草四分　升麻四分　葛根一钱

汗多加麻黄根一钱，枣仁一钱，浮小麦一撮。大小便日久不通，加肉苁蓉一钱五分。渴甚，生脉散代茶不可疑而不用。

生津益液汤　治产后虚弱，口渴少气，汗多内烦，不生津液。

人参一钱　麦冬一钱　茯苓一钱　大枣三枚　竹叶三十片　甘草五分　栝蒌根三钱　荆芥三钱　当归三钱，大热大渴不止加芦根

水煎，神效。

十五、产后类痉

产后汗出多而变类痉症，口噤不开，背

强而直，身反气息如绝，系失血亡汗，感风所致。宜速服加减生化汤，少加风药，阴服则阳自和，血行则风自灭。切不可纯用风药，致血燥益甚，筋失所养，成不治也。

加减生化汤

川芎　当归　麻黄根　桂枝　防风　甘草　羌活　附子　人参　天麻　羚羊角

又方　治产后无汗，类痉中风，筋脉四肢挛急。

川芎　当归　羌活　防风　枣仁

此血虚之故，当重用芎归。

十六、产后泻

产后泄泻，非如杂症，有飧泄、濡泄、洞泄、水谷注下之论，大率属气虚食积有湿也。气积宜补，食积宜消，脾湿宜燥，然恶露未消，骤难峻补。消燥当先服生化汤两三帖，以化生新旧之血，内加茯苓以利小便，俟血化生，然后补气消食，燥湿而分利水道，始无滞涩虚虚之失。若虚甸日外，方论杂症，犹量人虚而治。如痛下清水，腹鸣米饮不化，以寒泄治之。粪色赤黄，肚门痛秘，以热泄治之。有因饮食过多，脾伤成泻，自有嗳气，臭如败卵。又有脾气久虚少食，食下肠鸣腹急，尽下所有之物，方觉快者。其症各异，其治法寒则温之，热则清之，脾伤食积，分利健脾，兼消兼补，以虚为本，斯为善调治者也。

丹溪治产后虚泻，眼昏不识人危症，用

白术三钱　人参七钱　茯苓三钱　附子一钱

水煎。

加减生化汤　治产后血块未消服此方。

川芎二钱　当归四钱　炮姜四分　桃仁十粒　炙草五分　茯苓二钱　莲子八个

健脾利水生化汤　治产后血块已消，服此方。

当归二钱　川芎一钱　干姜四分　茯苓一钱五分　人参二钱　肉果一个，制　白术一钱，泔水浸　陈皮五分　泽泻八分

寒泻加干姜八分。寒痛泻加砂仁八分，干姜四分。热泻加黄连八分酒炒。水泻腹痛，米饮不化，加砂仁、山楂、麦芽。泻有酸腐臭气，加神曲八分，砂仁八分，山楂，麦芽五分。脾气久虚，泻出所食之物，方可快者，以食积论，加山楂、麦芽、神曲、砂仁。脾气弱，元气虚，产劳甚，必大补，佐消食，佐清热，佐祛寒，弱甚形色脱，必用丹溪参苓术附方大补，始可回生也。久泻加升麻。诸泻加莲子十个，次煎取送药。泻水多者，加苍术一钱以燥之。

十七、产后完谷不化

产后完谷不化者，因产劳倦脾伤，而转输稽迟也。夫水谷入胃，必因于脾，方散于肺，而通调水道，乃能布气四脏以养人。今产劳倦脾伤，故失转输之职，致冲和之气不能化，而冷物完出也，病名飧泄，又饮食太过，脾胃受伤，亦致完谷不化，俗呼为水谷痢也。然产方三日内，血块未散，患此脾败胃弱症，未可遽加芪、术，宜服生化汤，加益智、香砂，以少温胃气，俟血块消散，可加人参、芪、术以补气，肉果、木香、砂仁、益智以温胃，柴胡、升麻以引胃中清气，泽泻、陈皮、茯苓，以利水为上策也。

加味生化汤　治产后三日内，完谷不化，胎前人素弱，患此症用。

川芎一钱　当归四钱　炮姜四分　桃仁十粒　益智二钱　茯苓一钱五分

参苓生化汤　治产后血块散，可服此补方。

川芎二钱　当归二钱　炮姜四分　炙甘五分　白芍一钱　益智一钱，炒　茯苓一钱　人参一钱　白术二钱　莲子八个　肉果一个，制

泻水，加泽泻八分，木通八分。

加减法：腹痛，加砂仁八分。渴，加麦冬二钱，五味子十粒。水泻寒，加干姜一钱，木香四分。食积黄色，加神曲二钱，麦芽二钱，以消面食，砂仁二钱，山楂五粒，以消

肉食。若泻痢日久，胃气虚弱，完谷不化，宜温助胃气，六君子汤加木香五分，制肉果一个。

十八、产后痢

产后七日内外，患赤白痢疾，后重频并，为最难治。欲调气行血，而推荡痢邪，则虑产后之元气正虚；欲滋荣益气，而大补虚弱，又恐助痢邪之初盛，其行不损元，补不助邪，惟生化汤减干姜，而代木香、茯苓，则善消恶露，兼行痢积，并行而不悖也。再服加味香连丸，以俟二三日后，现病势加减，可保无虑。若产七日外，有患褐色后重频并虚痢，即当加补无疑。若产妇禀厚，产期以及二十余日，可用生化汤，加芩、连、厚朴、芍药，行积之剂，加味香连丸以治之。

加减生化汤　治产后七日内外患痢。

川芎二钱　当归二钱　炙甘草五分　桃仁十二粒　茯苓一钱　陈皮四分　木香二分，磨

白痢腹痛，加砂仁六分。

清血丸　治红痢神方，产七日内不可用寒性药也。

香连丸　香连为主，加莲肉粉各一半，治噤口痢，赤白痢下绞痛，加行积药。

产三四日后，血块散，痢积少，加减用照后开方治法。方详八卷。

一、产后久泻，元气下陷，大便不禁，肛门如脱，宜服六君子汤，加木香四分，制肉果一个，干姜五分。

二、产后泻痢黄色，乃脾气久虚，宜服补中益气汤，加木香四分，肉果一个（制）。

三、产后伤面食泻痢，宜服加参生化汤，加神曲、麦芽。

四、产后伤肉食泻痢，宜服加参生化汤，加山楂、砂仁。

五、产后胃口虚弱，患痢泻，完谷不化，当温助胃气，宜服六君子丸，加木香、制肉果一个。

六、产后肝脾二气俱虚，泻痢，四肢浮肿，宜服六君子汤加陈皮。

七、产后泻无后重，但日久不止，宜服六君子汤，加肉果、木香。

八、产后赤白痢，脐下气痛，用当归、厚朴、黄连、肉果、甘草。

九、产后痢久，白痢不止，属血虚。宜服四君子汤，加荆芥、人参。

十、产后痢，羸困，心腹绞痛，宜服薤白、石榴皮、当归、黄连、地榆。痢腹痛不止，用温汤蘸熨，暖腹则缓。

十九、产后霍乱

产后霍乱，由劳伤气血，脏腑虚损，不能运化食物；及感风冷所致，阴阳升降不顺，清浊乱于肠胃，冷热不调，邪正相搏，上吐下痢，名曰霍乱也。

生化六和汤　治产后块痛未除，又患霍乱。

川芎二钱　当归四钱　干姜四分　炙甘四分　砂仁六分　陈皮四分　藿香四分　茯苓八分

姜引。

附子方　治产后吐痢霍乱，手足逆冷，问无块痛，服此方。

白术二钱　当归二钱　陈皮四分　干姜四分　丁香四分　甘草四分　人参一钱　附子五分

研细末，粥饮调下二钱。

温中散　治产后霍乱，吐痢不止，无血块痛可服。

人参　白术　当归　厚朴　干姜　茯苓　草豆蔻

姜引。

产后七日外，患霍乱，用六君子汤亦可治之。

二十、产后呕逆不食

人之胃腑，为水谷之海。水谷之精，化生气血，荣润肠腑。产后劳伤脏腑，寒邪易乘入于肠胃，则呕吐气逆而不下食也。如脉弦滑多于伤食而呕，宜与伤食条参看。

加减生化汤　治产后呕吐不食。

川芎一钱二分　当归二钱　干姜四分　炙甘四分　砂仁五分

姜引。

温胃丁香散　治产后七日外，呕逆不食。

当归二钱　白术二钱　干姜四分　丁香四分　陈皮四分　甘草四分　前胡四分　人参二钱　藿香四分

石莲散　治产后咳逆呕吐，心冲目眩。

石莲子一两二钱，去壳　白茯苓一两　丁香五钱

为末，米饮下。

二十一、产后水肿有针刺法附卷七下末篇

产后手足浮肿，皮肤作光莹色，及脾虚不能制水，肾虚不能行水，必大补气血为主，佐以苍术、茯苓、白术补脾。壅满，加半夏、陈皮、木香、香附监之。虚人加人参、木通。有热加麦冬、黄芩以清肺火。

健脾利水补中益气汤　治产后七日外。

人参二钱　白术二钱　茯苓一钱　白芍一钱　陈皮二分　木瓜八分　木通四分　紫苏四分　苍术四分　厚朴四分　大腹皮四分

大便不通，加肉苁蓉一钱，麻仁一钱。如因寒邪，湿气伤表，无汗而肿，宜服姜皮、半夏、苏叶，加于补气血方以表汗。

五皮饮　治产后湿气，客伤脾经，气血凝滞，以致面目虚浮，四肢胀气喘，用五加皮有以桑白皮代之、大腹皮、茯苓皮、生姜皮，水煎服。

二十二、产后怔忡惊悸

产后忧惊劳倦，去血过多，则心中躁动不宁，谓之怔忡。若惕然而惊，心中怯怯，如人将捕之状，谓之惊悸。治此二症，惟调和脾胃补气血，志定神宁，气舒心安，而病愈矣。如分娩后，血块未消，宜服生化汤，补血行块，血旺则怔忡惊悸自平，不必加定安心神之剂。如块消痛止后患此症者，宜服加减养荣汤，加木香，减川芎、麦冬，即归脾汤。

加减养荣汤

川芎一钱　当归二钱　茯神一钱　枣仁二钱　人参一钱　麦冬一钱　白术二钱　远志二钱，去心　黄芪二钱　龙眼肉八个　陈皮四分　甘草四分

姜引。

虚烦，加竹肉一丸。痰，加竹沥姜汁。

养心汤　治产后心血不宁，惊悸不安。

黄芪一钱　当归二钱　茯苓八分　川芎八分　麦冬一钱　人参一钱　甘草四分　远志八分　枣仁一钱　柏子仁一钱　五味子十粒

姜引。

安神丸　与前药兼服。

黄连二钱，酒炒　怀生地二钱　归身五钱　炙草五分

为末，蒸饼糊为丸，如绿豆大，朱砂二钱为衣，每服四十九丸。

二十三、产后骨蒸

产后骨蒸，由失血过多，骨无血阴，以致虚火作炎，骨蒸作热。经云：阴虚发热是也。如血块未净，只服生化汤，视症略为加减，俾阴血旺升，则火自归经矣。如块痛已消，宜服梅连丸。

柴胡梅连丸　即清骨散，作汤服甚效。

柴胡二钱　胡黄连二钱　前胡二钱　乌梅二钱，去核　猪脊髓一条　猪胆一个　葱白十根，长一寸

前四味为末，另将猪髓胆、葱白，同捣成泥，入童便一盅，熬如稀糊，再入药末，共捣为丸，绿豆大，每服三十丸，清汤下。如上隔热多饱服，凡男女骨蒸，俱可服。摘刊方中，此方系汤剂。

加味大造丸　治骨蒸劳热，若服前方，不须服此。

紫河车一具　人参一两　当归一钱　麦冬八分　柴胡六分　怀生二两　山药一两　胡黄连五钱　石斛八分，酒蒸　杞子一两　黄柏八分，

酒蒸

另将麦冬、地黄捣如泥，紫河车制净蒸熟，先另捣，后入诸药末均捣，加蜜为丸。

黄芪八钱　人参一钱　白术二钱　茯苓八分　甘草四分　川芎八分　当归二钱　天冬二钱　麦冬二钱　北五味十粒　白芍二钱　黄柏六分，炒　知母二钱　怀生二钱　怀熟地二钱

枣引，水煎。

二十四、产后心痛

产后心痛，即胃脘痛。以胃脘在心之下，因伤寒气及伤冷物而作痛。因痛近于心，俗呼为心痛。殊不知心为君主之官，生血行气，统驭五脏六腑。血气盛，则泰然安宁；血气不足，怔忡惊悸不安，心岂可痛哉？若真心痛，手足指甲见青黑色，旦发夕死，夕发旦死，昔人论之详矣。治法当散胃中之寒气，消胃中之冷物，必用生化汤中加散寒消食之佐，无有不安。若绵绵痛，可按而止，又问无血块了，则当虚论而加补也。其产后心痛腹痛，二症相同，因寒食上攻于心，则心痛，下攻于腹，则腹痛。此二症治法亦大约略同，俱宜用生化汤，加肉桂、吴茱萸等热药，温散之也。

加味生化汤

川芎二钱　当归三钱　干姜五分　肉桂八分　甘草五分　吴茱萸七分

三帖后，去茱萸。伤寒物，加茱萸、桂枝。伤肉食，加砂仁、山楂。伤饭面加神曲、麦芽。大便不通，加肉苁蓉二钱。

二十五、产后腹痛

产后腹痛，先问血块有无。有血块痛，只服生化汤，调一笑散、鹿角灰散，块消，痛自止矣。若风冷，乘虚入腹作痛，宜服加味生化汤治之。

加味生化汤

川芎二钱　当归四钱　炮姜四分　炙甘四分　桃仁十粒　桂枝一钱五分

痛止即减，不止再加。伤面食，加神曲一钱，麦芽一钱（炒）。伤肉，加山楂五粒，砂仁七分。如血块未消而痛，加一笑散二钱，酒炒元胡二钱，共为末。一笑散即失笑散。

二十六、产后小腹痛

产后虚中，感寒饮冷，其寒下攻，小腹作痛。又有血块作痛者，又有产后血虚，脐下痛者，并宜加减生化汤调治。

加减生化汤

川芎六分　当归二钱　炮姜五分　炙甘四分　桃仁十粒

问有血块痛，本方加元胡散二钱，亦治寒气痛。如血块无，但小腹痛，按而稍止者，属虚，加熟地二钱。

元胡散

肉桂一钱　元胡一钱

为末。

二十七、产后遍身疼痛

产后遍身疼痛，由产后百节开放，血脉流散，气弱则经络间血多凝滞，累日不散。故筋脉急引，骨节不利，甚至腰背不能转侧，手足不能动履，或身热头痛，若误作寒热治而散表出汗，则筋脉力竭，手足厥冷，变病出焉。

趁痛散　治遍身痛。

当归二钱　甘草三分　白术　牛膝　独活　肉桂各八分　葱白八根　黄芪一钱　姜二片

产后虚劳，指节痛颈痛，汗不出，用：

当归　人参　黄芪　生姜　淡豉　薤白　猪肾二个

先将猪肾水煮熟，取汁二盏，煎药八分碗温服。

筋骨乃血所养，产后血虚，亦能作痛。又寒主拘急，或感寒气，皆能作痛，须凭脉症，加减用药为当。

二十八、产后腰痛

产后腰痛，由妇人位系胞腰为肾腑，产

后劳伤，肾气损动胞络；或虚未即平复，而风寒易乘，二者皆致腰痛也。

当归二钱　独活八分　杜心八分　川芎八分　杜仲八分　续断八分　防风八分　桑寄生八分　姜三片

服两帖后，痛未止，属肾虚，服加味大造丸。

加味大造丸　治产后日久，肾虚腰痛。

当归　川芎　熟地　天冬　五味子　杜仲　续断　山药　牛膝　故纸炒　小茴炒　丹皮　胡桃　人参各等分

为丸服。

又败血流入腰肾，痛如锥刺，宜服**复元通气散**。

川芎一钱　当归一钱　小茴一钱　故纸一钱　桂心一钱　元胡索一钱　牛膝一钱　丹皮一钱　木香水磨、五分

甚者，加乳香、没药四五分。

二十九、产后淋

产后患淋，由产虚弱，热客于脬中，内虚则溲数频，热则小便淋涩作痛，名谓之淋。宜服茅根汤。

茅根汤　治产后冷热，肾石诸淋。

白茅根三钱　瞿麦二钱　茯苓二钱　人参一钱　葵子一钱五分　甘草梢五分　滑石二钱　紫贝二个　石首鱼头二个　桃胶一钱五分

姜、灯芯引，空心服。更入鲤鱼齿末五分。

又方　治产后淋，小便痛，又血淋。

白茅根　车前子　瞿麦　冬葵于　通草　鲤鱼鳞一百个

水煎，入鲤鱼齿末服。

又方　用导赤散加减最妙。

三十、产后小便数

产后小便数者，由脬内宿有冷气，因产发初动，冷气入脬，致小便数也，宜用桑螵蛸散。

桑螵蛸散

人参二两　黄芪二两　桑螵蛸二十个　鹿茸九钱　牡蛎五钱　赤石脂五钱

为末，空心粥饮送。每二钱为率

又方　治小便或遗尿。

益智二十个，炒

为末，米饮送下，每一钱。

三十一、产妇流注

产后流注，皆由恶露流滞于腰臂手足关节之处，或漫肿，或结块，久则肿起作痛，肢体倦怠。治法宜葱熨法，方以治外肿，内服参归生化汤，以散滞血无缓也。

参归生化汤

川芎一钱五分　当归三钱　炙甘五分　黄芪一钱五分　肉桂六分　人参二钱　马蹄香二钱

若漫肿微痛，属形气俱不足，最难治。未成脓或已成脓，或不溃，气血虚也，宜服人参汤。憎寒壮热，气虚也，十全大补汤。日晡内热，四物汤加参、术、丹皮。呕逆，属胃气虚，六君子汤加炮姜。食少体倦，脾气虚也，补中益气汤加益智一钱。

葱熨法　葱一握，炙热，捣烂作饼，肿处用厚布两三层，熨斗熨之。

神仙回脓散方在八卷乳痈下。　治产后流注恶露，日久成脓，用此方先导其脓。若人未补，得气血旺，此方又不宜服。方见乳痈阴蚀五疳下。

治阴蚀五疳法　妇人阴户生疮，名曰蜃疮。或痛或痒，如虫行状，脓汁淋漓，阴蚀或尽者，由心肾烦郁，胃气虚弱，致气血涩滞。经曰：诸疮痛痒，皆属心火。治之当补养心胃，外以药洗熏导并治之。

千金疗阴蚀疮洗方

川芎　当归　芍药　地榆　甘草

用水五升，煮二升，去渣熏洗，日三次，夜一次。

又方　蒲黄一两　水银一两

研末掺之。

又方　肥猪肉十斤，煮水浸疮，冷则再易，不过两三次愈。又肉十斤，数斗水煮，水多可换易也。

又方　治疸虫蚀下部及五脏。用东南方向桃树枝三七枝，轻打枝至使散，以绵扎之，又研石硫黄末，将绵缚桃枝捻转之，令末少厚，又截一短竹筒，先纳下部中，以所捻药桃枝热，捻熏之。

又方　虾蟆兔屎，等分研末，敷疮效。

治妇人阴肿　小麦　朴硝　白矾　五倍子　白及

煎汤熏洗。

治妇人阴痒　蛇床子　白矾

煎汤洗。

又方　用牛肝或猪肝三寸，纳入阴户，久则取出之，立愈。

治妇人阴中生疮　杏仁　雄黄　生矾各五钱　麝香二分半

共研末，纳入阴中即愈。

三十二、产后癫狂

产妇多喜多怒，时发癫狂，言语无伦，甚有不顾身体，此皆五志所发为热，火实制金，不能平下，则肝实而多怒也。又发热于中，则属阳明，经谓阳明之厥则癫，又谓服膏粱芳香等则热气剽悍，发为癫狂。大率因痰结于胸中，宜开痰镇心神为主。又神不守舍，狂言妄作，久不愈，如心经蓄热，当清心除热为先。如痰迷心窍，当去痰宁心，宜大吐下则愈。产后身热感风，遍身麻痹，手足牵搐，口喝痰盛，言语无伦，乃痰结胸膈心经蓄热之症，当以归脾砂香等汤。

归脾汤

橘红　胆星　茯神　杏仁　人参　当归　甘草　半夏　枳实　川芎　柏子仁　五味子　白术　圆眼

砂香散

人参　木香　砂仁　黄芪　山药　柏子仁　茯神　远志　枣仁

上为细末，蜜调服。

胎产指南　卷七下

增补产后十二症

发热　头痛　腹胀　咳嗽　呃逆　恶露不下　恶露不止　眼见黑花头眩　胁痛　不语　言语含糊　瘛瘲

发　热

产后发热，非有余之热，乃亡血过多，阴虚则生内热也，其症心胸烦满，吸吸短气，头痛闷乱，瞤时转甚。**人参芎归汤主之**。

当归一钱五分　川芎一钱五分　白芍一钱五分，酒炒　熟地一钱五分　麦冬一钱　干姜一钱

水两杯，先以粳米一撮，淡竹叶十片，煎至一杯，去米叶入药，加枣三个，煎七分服。必加干姜者，因姜能入肺和肺气，入肝引血药生血，然不独用，必与补阳药同此造化之妙，惟天下之神者可以语此。

头　痛

产后头痛，人身之中，气为阳，血为阴，阴阳和畅，斯无病矣。产后去血过多，阴气大亏，阳无所附，头者诸阳之会，邪凑于头，故为头痛。但补其阴血，则阳气得足，病自止矣。**芎归汤**主之。

川芎三钱　当归六钱，酒洗　葱白五钱　莲须　生姜

水煎服之。

又有败血停留子宫，厥阴之位，其脉上贯巅顶，亦能作痛，前汤加生蒲黄二钱，炒黑豆一合，酒水各半煎。

腹　胀

产后腹胀满闷，因败血散于脾胃，脾受之，则不能运化津液而成腹胀。亦有停食而腹胀者，以脉辨之。因于血者，则脉结涩，不恶食。因于食者，脉必弦滑恶食，**平胃散加味**主之。

苍术米泔浸，去皮，炒。　厚朴姜汁炒　陈皮　香附醋炒　人参各二钱　神曲一钱，炒　生姜五分，炒

伤食加山楂、麦芽。腹胀者，未有不喘，**人参定喘汤**主之。

人参　陈皮　杏仁　甘草　木香　苏叶

咳　嗽

产后咳嗽，肺主气，气为动，所以充皮毛，密腠理者也。产后气虚，皮毛不充，腠理不密，肺感风寒，以致咳嗽。其症发热恶寒，鼻塞声重，**旋覆花汤**主之。

旋覆花　赤芍　前胡　半夏　荆芥穗　甘草　白茯苓　五味子　杏仁　桔梗　枳壳等分

姜枣引。

有汗加桂枝。

呃　逆

产后呃逆，气从胃中出，上冲贲门，呃忒作声。有胃气虚寒者，有中气不足者；有冲任之火，直犯清道而上者；有饮水过多，水停而逆者；有大小便秘，下焦不通而气上逆者，皆虚极胃气将绝也。大约产后呃逆，乃胃气虚寒症，多**加味理中汤**主之。

人参一钱　白术一钱　炙甘一钱　炮姜一钱　陈皮一钱　丁香五分　干柿蒂二钱

竹肉引。

有热去丁香。

恶露不下

产后恶露不下，此症有二：或因子宫素冷，停滞不行，必小腹胀满，刺痛无时；或因中气本虚惫，血少气乏，血阻不能尽下，腹必乍痛乍止，痛亦不甚，**加减八珍汤**主之。

人参　茯苓　炙甘草　当归　川芎　元胡索酒炒　香附醋制

姜枣引。

痛无补法，如腹痛者，参宜斟酌。

恶露不止

产后恶露不止，因冲任损伤，气血虚惫，旧血未尽，新血不敛，相并而下。当大补气血，使旧血行而新血生，不可轻用固涩之剂，致败血凝聚，变为癥瘕，成终身大患，十全大补汤主之。

眼见黑花头眩

产后眼见黑花头眩，乃恶露不尽，败血流入肝经，肝开窍于目，故见黑花。诸风振掉，皆属肝木，故作头眩，**清魂散**主之。

人参一钱　泽叶兰一钱　荆芥穗二钱　当归一钱　川芎一钱　炙甘八分　丹皮一钱

胁　痛

产后胁痛，乃败血流入肝经，厥阴之脉循行胁肋，故作痛。**芎归泻肝散**主之。

归尾二钱　川芎二钱　青皮二钱　香附二钱　枳壳二钱　红花二钱　桃仁二钱

水煎。加童便酒各一杯服

乳香膏　治产后腰痛胁痛，不可忍者，皆有败血流入二经，以致作痛。用乳香、没药各五钱，研细，酒醋各一杯，熬膏，布摊贴。

不　语

产后不语，此症败血不尽，停闭心窍，神志不明，故多昏愦。心气通于舌，心气闭，故舌强不语，**七珍散**主之。

人参二钱　石菖蒲二钱　生地二钱　川芎二钱　当归二钱　细辛六分

水煎，调辰砂五分。

言语含糊

产后言语含糊，并治怔忡。凡心主血，血去太多，心血虚弱，舌乃心之苗，其血不能上荣乎舌，萎缩卷短，语之不出也。**加味生脉散**主之。

人参一钱五分　麦冬一钱五分　五味子十五粒　生地一钱　归身一钱　炙甘一钱　石菖蒲一钱　猪心一个，劈开

水煎二盏半，去心入药，煎七分。

若怔忡，加辰砂三分服。

癥　瘕

产后癥瘕，由恶露不尽，脾气虚弱，失其健运之职，故积而成形。积之日久，痰火与血日渐长大，饮食减少，人日羸瘦，时发寒热，以补虚为主，**健脾消积丸**主之。

人参　白术　茯苓　炙甘草　半夏　陈皮　香附　桃仁　五灵脂　浮海石　元胡索　三棱　莪术　郁金

红枣煮熟，去皮核，神曲米饮，打糊为丸。

以上各症，秘本不能尽载，故从万密斋先生女科中摘出，以补未备，但不可胶执汤头，惟在救病者临时细察脉症，详审药性。愚见总宜遵丹溪先生生化汤为主，然后见症加对病之药施治，百发百中，万无一失也。

产后大小便秘下身水肿
狂语诸症医方

产后如患三阴伤寒，大便不通，其人谵语发热，脉沉实者，大柴胡汤，三承气亦宜还用，从权治救。或其人如狂，不至发狂者，蓄血症也。桃仁承气汤主之。因秘本无此二症，故详录之，以为后学之津梁也。

大柴胡汤　治身热不恶寒，反恶热，大便秘。

柴胡一钱五分　黄芩一钱　芍药一钱　半夏八分　大黄七分　枳壳四分

姜枣引。

调胃承气汤　治病人邪在中焦，不恶寒反恶热，谵语便秘呕逆。

大黄六钱，酒洗　芒硝四钱　甘草一钱

水盅半，煎八分，去渣，入硝一沸服。

此下剂稍重者，不用枳朴，恐伤上焦氤氲之气也。用：

大黄六钱，炒　厚朴六钱，炒　枳实二钱，炒

水二盅服。

此下剂之稍重者，不用芒硝，恐伤下焦之血也。

小承气汤　治病人六七日不大便，腹胀满，潮热，狂言而喘，是汤专泻上焦之痞热。

大黄　厚朴　枳实

桃仁承气汤　治病人小腹急，大便秘或黑、小便不利、中焦积血也。

桃仁十粒　肉桂一钱，去皮　甘草一钱　大黄一钱五分　芒硝一钱五分

水二盅，煎一盅，入硝一沸服。

大承气汤　治五六日不大便，腹痛烦渴，少阴口燥，咽干潮热，脉沉实，三焦俱有邪。

大黄五钱　芒硝四钱　厚朴二钱，炒

水二盅，先煎枳，朴至一盅，去渣，入硝煎一沸服。

此下剂之最重者，不可轻用。

产后有恶露久滞，遂化为水，以致发肿，皮肤作光莹色，指掐成窠，宜服五皮饮，并健脾利水，已见前二十一产后水肿中。但下部大肿者，药力率不能到，用银针刺足跗足面孤拐小腿，十数处，流出蓄水，令产妇下部旧棉衣铺垫，时时换易，亦水甚则决之之义。愚以意消息经治有验，故书此以告后学者。

胎产指南　卷八

医　方　类

汤饮丸散方丹

汤　类

生化汤

当归八钱，酒洗　川芎四钱　干姜四分　炙甘五分　桃仁十粒，去皮尖，研

滋荣易产汤

人参一钱　川芎一钱　当归三钱　茯苓八分　炙甘八分　陈皮五分　腹皮八分　白术八分　黄芩八分　怀生二钱　益母草二钱

升举大补汤

白术二钱　当归二钱　怀生二钱　人参二钱　炙甘四分　陈皮四分　川芎一钱　黄芪一钱　麦冬一钱　黄芪三分　黄柏三分　荆芥五分　羌活五分　防风五分　升麻五分　白芷五分

滋荣益气复神汤

川芎一钱　当归二钱　炙甘四分　怀熟三钱　黄芪一钱　人参二钱　白术一钱　枣仁一钱　茯神一钱　柏子仁一钱　益智一钱　陈皮三分　麦冬一钱　五味子十粒　莲子八个　圆眼肉八个

枣引。

六和汤　治伤寒暑，霍乱吐泻，两脚转筋，四肢厥冷。

陈皮四分　藿香四分　甘草四分　半夏三分　杏仁十粒　白扁豆二钱，炒　木瓜一钱　砂仁五分　茯苓八分

姜枣引，水煎。

如虚人，加人参一钱。

又方　无陈皮、竹叶，有香薷、厚朴。若热渴泻，加黄连。

补中益气汤

人参一钱　黄芪一钱五分　甘草一钱　白术一钱　归身五分　柴胡五分　升麻三分　陈皮五分，去白

保真汤

黄芪二钱　当归二钱　天冬二钱　知母二钱　怀生一钱　怀熟二钱　人参一钱　白术一钱　麦冬一钱　白芍一钱　杞子一钱　茯苓八分　川芎八分　甘草四分　五味子十粒　地骨皮四分　黄柏八分

加元枣引。

十全大补汤

人参　肉桂　川芎　当归　熟地　芍药　茯苓　白术　黄芪　炙甘

每服一两，加枣二枚，姜二片，水煎服。

当归六黄汤

当归　黄柏　黄芩　黄连　生地　熟地　黄芪

每服五钱，小儿减半。

鲤鱼汤

白术五分　茯苓四钱　当归三钱　芍药三钱

鲤鱼一尾，重约一二斤，去鳞肠，水煎，加橘皮少许，生姜七片，用水四盏，取汁煎半，加四味药，煎七分，温服。

水肿未消，再制服。

四君子汤

人参　白术　茯苓　甘草

四物汤

当归　川芎　芍药　熟地

二陈汤

半夏　陈皮　白茯苓等分　甘草减半

麻黄汤

桂枝　麻黄根　杏仁　甘草

香薷汤　治伏暑口干咽燥。

厚朴一两　扁豆三两　香薷一两

用水一碗，入酒少许，煎后冷服。

加黄连，名谓**黄连香薷饮**。

六君子汤

即**四君子汤**，加半夏、陈皮。

犀角地黄汤

犀角二钱三分，解心热　生地一两五钱，凉心血　白芍一钱　丹皮二钱二分，二味酸入肝，寒胜热，肝是心母，以术生心酸寒治之。

正气汤　治阴虚有火盗汗。

黄柏一钱，炒　知母一钱，炒

甘桔汤　治少阴咽痛。

甘草一两　桔梗一两

饮　类

丹溪安胎饮

人参二钱　白术二钱　当归二钱　川芎八分　黄芩八分　陈皮三分　怀熟地二分　紫苏四分　甘草四分　砂仁三分

姜枣引。

安荣饮

人参二钱　白术二钱　当归二钱　麦冬一钱　通草一钱　茯苓皮一钱　甘草四分　灯芯五分

宁肺止嗽饮

天冬二钱　桔梗五分　紫苏五分　知母二钱　甘草四分

寒嗽，加桑白皮八分。痰多，加橘红四分，竹沥汁、姜汁。热渴，加黄芩八分。虚嗽，加紫菀一钱，冬花六分。

喘，夜多嗽，加麻黄五分。虚损，嗽，加木瓜一钱。

竹沥姜汁，心胸不舒，加贝母一钱，百合一钱。

补母固胎饮

白术二钱　当归二钱　陈皮五分　紫苏五分　甘草五分　怀熟二钱　人参三钱　条实黄芩八分　砂仁三分　益母草五分

枣引。

七宝截疟饮

常山一钱五分，酒炒　陈皮一钱　厚朴一钱，姜制　草果仁一钱　槟榔一钱　青皮一钱　甘草五分　乌梅一个

姜引

十味治疟饮

白术一钱　半夏一钱　香薷一钱五分　藿香五分　陈皮五分　猪苓八分　泽泻八分　白扁豆八分　柴胡一钱　木通五分

元胡索饮

蓬术　三棱　当归　红花　元胡索　童便酒煎

丸　类

六味地黄丸

熟地八钱　山药四钱　山萸肉四钱　泽泻三钱　茯苓三钱　丹皮三钱

补阳宿凤丸

白术一两　黄芪一两　茯苓一两　川芎一两　五味子一两　大甘草一两　白芍一两　巴戟一两　破故纸一两　萸肉一两　天门冬一两　肉苁蓉一两　川牛膝一两　广皮一两　知母一两　杜仲一两　厚黄柏一两　怀山药一两　虎骨一两　生地二两　熟地二两　麦冬二两　入参二两　当归二两　杞子二两

用十年陈线鸡一只，宰净蒸熟，去皮油，取肉骨焙燥，合诸药，炼蜜为丸。

先天大造丸　治骨蒸痨热。

紫河车一具　人参一两　当归八钱　麦冬八钱　银柴胡六钱　生地二两　胡连五钱　山药一两　石斛八两，酒蒸　杞子一两　黄柏七钱，酒蒸

另将门冬、地黄，先捣如泥，河车蒸熟，亦捣，后入诸药末，均为丸。若焙河车末，炼蜜为丸。

加味益母丸

白术一两　益母草四两　条芩八钱

蜜丸，孕妇诸症并可治之。亦可作大丸，如弹子大，清汤送下。

孕内常服一丸甚好。多气人，加木香三

钱。弱人安胎饮送化。胸膈不舒，加紫苏二钱、陈皮二钱。

香连丸

黄连二十两　吴萸十两，同炒赤色，去吴萸

俱为细末，醋糊丸，梧子大，每二十丸为率。

又一方　加连肉。

补阴大造丸

河车一具　人参一钱五分　归身二两　天冬一两三钱　五味子五钱　山药八钱　杜仲七钱，姜炒　牛膝一两，酒浸　黄柏七钱，盐水炒　熟地二两

柴前梅连丸

柴胡二钱　前胡二钱　胡黄连二钱　乌梅肉二钱　猪脊髓一条　猪胆一个　韭白十根，长一寸

前四味为末，另将脊髓、猪胆、韭白同捣如泥，入童便一盏，熬如稀糊，入叶末，再捣为丸，绿豆大，每服三四十丸，清汤送化。

安神丸即安魂丸　治忧愁思虑，伤心不食。

黄连一两二钱　朱砂一两，水飘　当归五钱　怀生五钱，酒洗　炙甘五钱

清气化痰丸　治痰火通用。

陈皮一两，去白　杏仁一两，去皮尖　枳实一两，面炒　黄芩一两，酒炒　瓜蒌仁一两，去油　胆星一两五钱　制半夏一两五钱

姜汁丸。

散　类

天仙藤散

天仙藤酒略洗　香附六分，炒　陈皮四分　甘草五分　乌药七分　木瓜一钱　紫苏五分　姜皮三分

羚羊角散

独活　羚羊角　枣仁　五加皮　薏米仁　防风　川芎　当归　茯神　杏仁　木香　甘草

失笑散　治血痛。

生蒲黄　五灵脂各等分，研末

醋调服。

元胡索散

肉桂一钱　胡索一钱，酒炒

为末。

逍遥散

当归一钱　白芍一钱　白术一钱五分　茯苓七分　柴胡一钱　丹皮七分　黑山栀七分　炙甘四分

五皮散

茯苓皮　大腹皮　五加皮　地骨皮　生姜皮

催生如神散即黑神散

百草霜即锅底煤　香白芷　滑石等分

芎归汤送下二钱，须儿头已顶产门，方可服。

平胃散　治湿常用。

苍术　陈皮　厚朴　甘草

姜枣引。

方　类

丹溪医案大补方

人参三钱　白术五钱　川芎一钱　当归三钱　芍药一钱　茯苓一钱　泽泻八分　厚朴五分　陈皮四分　紫苏四分　大腹皮六分　萝卜子六分　木香七分

补母寿子方

人参一钱，弱人加至三钱　当归三钱　白术二钱　熟地二钱　川芎八分　条芩一钱　陈皮四分　紫苏四分

虚肥人去白术、甘草四分，加黄连五分。

枣引。

乳痈方即神仙回脓散

蒲公英　天花粉　金银花　连翘　白芷　甘草

若是吹乳，加防风。久破烂，加人参、黄芪。不加引酒水各半煎，饱服。

丹　类

煎膏药方丹　治一切痈疽恶毒诸疮，神

效。

元参五钱　苦参五钱　黄芩五钱　杏仁五钱　白芷五钱　大黄五钱　金银花五钱　天花粉五钱　连翘五钱　归尾一两　赤芍五钱　丹皮五钱　黄芪五钱

每一料，用真麻油一斤，其粉心半斤，将各药挫片，入油浸二宿，文武火煎，以药纯黑色为度，去渣净，然后研细粉心入药，用桃枝不住手搅，滴水成珠不散为度。再加阿魏末一钱，名阿魏膏。

掺药方丹

血竭二钱　阿魏二钱　乳香二钱　没药二钱　龙骨二钱　赤石脂二钱

为末极细，掺膏药内。

《胎产指南》终

跋

《胎产指南》一书，其效如神，余闻之久矣，而医家往往秘而不宣，无从购求。宁海任松云先生，善岐黄术，又心存济人，与余尝谈因果事甚相得。昨偶言及病之险而难治者，莫如胎产为甚，伊即出此书以示。见之如获至宝，亟付梓以公同好云。

光绪丁丑秋仲庐江丁维庚识

重订产孕集

〔清〕　张曜孙　纂辑
包兴言　增订

《重订产孕集》提要

清·张曜孙撰。曜孙字仲远，阳湖人。以名孝廉服官楚北，所至有声。幼精医理，奉母汤太夫人命，著《产孕集》，卷分上下，为类一十三门。上卷列辨孕、养孕、孕宜、孕忌、孕疾，下卷列辨产、产戒、用药、应变、调摄、怀婴、拯危、去疾。条析病状，援据方书，胪列治法，约略已备。包兴言云：因孕疾子痫一症，应变双胎一症，病皆危急，载方较少，续增子痫二方，双胎一方，皆经验有效者，因而补之。又云：仲远生前曾向予言，此集虽已行世，所惜遗漏尚多。今后有暇，续作补遗。因循未果，每以为憾。今集重订刊成，予据所见所闻，博采约收，更作补遗一卷，以续其后。虽症变百出，方难悉赅云。是书刻本有七八种之多，以包氏重订者为足本。

《重订产孕集》序

阳湖张氏仲远，以名孝廉服官楚北，所在有声。幼精医理，奉母汤太夫人命，著《产孕集》。其卷分上下，为类一十三门，条析病状，援据方书，胪列治法，约略已备。兹因孕疾子痫一症，应变双胎一症，病皆危急，载方较少，续增子痫二方，双胎一方，皆经验有效者，因而补之。仲远生前曾向予言：此集虽已行世，所惜遗漏尚多，今后有暇，续作补遗。因循未果，每以为憾。今集重订刊成，子据所见所闻，博采约收，更作补遗，以续其后。虽症变百出，方难悉赅，然事皆已经，则无所可疑。法可互求，则不病于执，由是穷乡僻壤，凡属孕妇婴孩之症，悉可参酌前后各方，按症照治，庶各保其生全，而无苦难夭折之患。藉践前言，或可稍慰良友济世之志也夫。爰书颠末为叙。

同治七年岁次戊辰七月泾县包诚书于湖北省寓

《产孕集》目录序

辨孕第一…… 109
养孕第二…… 110
孕宜第三…… 112
孕忌第四…… 113
孕疾第五…… 114
辨产第六…… 118
产戒第七…… 118
用药第八…… 119
应变第九…… 120
调摄第十…… 122
怀婴第十一…… 123
拯危第十二…… 125
去疾第十三…… 126

凡十三篇，为上下二卷。叙曰：产孕者，天地之大化，生人之本始。而难产之患，自古有之。《左传》庄公寤生，惊姜氏。寤生，即逆产也。然古者持胎教，寡嗜欲，生理顺而难产少。故生民之诗曰：诞弥厥月，先生如达，不坼不副，无灾无害。列女传述文母之胎教，终之曰溲于豕牢而得文王，言生之易也。后世不知胎教，务自纵恣，生理既逆，难产实繁，于是设方法以治之，处汤液以救之。而方药愈备，难产益众，遂有妇媪群起，妄造谬法，剖胎出婴，使无知之赤子，无罪之妇人，撄屠砆之刑，罹锋刃之惨。生人之祸，莫此为甚。夫人命至重也，父子至爱也，而戕贼生命，刳剔人子，旁观不以为非，主者不以为怨。何哉？医无救之之术，不能不望救于妇媪，假令扁仓在左，妇媪在右，则虽至愚，必知所择。故妇媪之杀人，医者之过也。虽然，产孕之事，非医事也。难产之疾，皆自致之，非本然也，故欲汤之沧而扬之，不如勿浔也；欲弦之固而续之，不如勿断也；欲难产之安而药之，不如勿致也。不揣其本而齐其末，不绝于彼而救于此，良吏勿能为治，良医勿能为功。然则欲治难产，先理胎教；欲理胎教，先明礼则。礼教隳废，内仪不修，晏私昵于帷帷，勤惰怠于厥职，以苟适为便，以傲恣为高。盖自搢绅浸于编户，女德日敝，难产日多，竞衰其末，莫知其本，君子之道，造端乎夫妇，记言其不信矣夫。岁在已丑，家君宰馆陶，余随侍官廨，民有疾苦，踵门求治，辄为除之。而难产之患，同于江左，有妇逆生，医者莫救，太孺人闻之，命裹药遣仆，驰往治之，至则死已竟日，以贫故未收。耄姑幼子，号泣于室，强饮之药，旋即苏活。又巨室张氏妇，孕五月，动而漏下，医不知治，十日而陨，血注不止，因而晕绝。余闻药之苏，又治百日乃瘳。其他惨酷，大都相类。由此观之，无辜而死者盖多已。夫杀卵殈夭，先王所禁，况在人类？体仁利物，儒者之事，况在斯民？用是考核原委，该约大旨，著为此书，冀以绝其流弊，豫其常变，穷理之士，或无诮焉。

道光庚寅冬十二月阳湖张曜孙

《重订产孕集》目录

卷上

辨孕第一…… 109
养孕第二…… 110
孕宜第三…… 112
孕忌第四…… 113
孕疾第五…… 114

卷下

辨产第六…… 118
产戒第七…… 118
用药第八…… 119
应变第九…… 120
调摄第十…… 122
怀娶第十一…… 123
拯危第十二…… 125
去疾第十三…… 126

补遗

养孕篇…… 132
孕疾篇…… 132
辨产篇…… 133
产戒篇…… 133
应变篇…… 133
调摄篇…… 134
拯危篇…… 134
去疾篇…… 134

重订产孕集　卷上

一清　阳湖　张曜孙仲远纂辑
泾县　包　诚兴言增订
鄞县　曹赤电炳章校刊

辨孕第一

二气相感，合而生神；两精相搏，聚而成形。阳奇而施，阴偶而承。阳施而静，阴承而动。静则阳凝，动则阴摄。动静互根，形神交倚，而孕以成。易曰：天地絪缊，万物化生，男女构精，万物化醇。故乾坤消息而变万类，日月运行而生寒暑。鸟兽草木昆虫鳞介之属，莫不附阴化阳，因气成质。其生虽不同，而所以生者一也。人为万物之灵，得天地之正，具五德之全，经纬蕃变，与上下参。男禀阳得乾道，女禀阴得坤道。乾主动而生静，坤主静而生动。乾动则阳施，坤静则阴承。阳生静则气化而神生，阴生动则精融而形成。神裕其始，而形要其终。故孕者始于神而终于形，生于阳而成于阴也。凡物生易而成难，未孕之先两气相感，如磁引针，如芥黏珀，适然而合。其动以天，非阴阳离决，气禽精涸者，鲜不凝合，自然生化，绝无人功。既孕之后，积气成形，分别百体，营建脏腑，条理络脉，灌溉筋骨，阅三百余日，乃成为人。日滋月遂，尽取给于母气。苟失其道，或生而不育，形体不具，气血薄弱，寿命夭折，譬之果实之属，风雪侵之，非立见萎落，即不适于口。故未孕之先，无俟人力，既孕之后，半由人功。摄养以安之，药物以助之。调其阴阳以煦之，绝其贼害以固之，祛其疾痛以卫之，皆人力之所为也。古者妇人别立治法，以有月事产孕之异，而产孕尤重。盖产孕者生人之始，而保护又产孕之始也。愚者不察，或误孕为疾，而肆其攻击，或误疾为孕，而养虎贻患，小则伤体，大则伤生，深可悯焉。辨孕之法，《素问》曰：阴搏阳别，谓之有子。又曰：足少阴脉动甚者，妊子也。《脉经》曰：脉滑疾而重，按之散者，胎已三月，脉重按之不散，但疾不滑者，五月也。又曰：三部浮沉正等，按之无绝者，妊也。《千金方论》曰：脉平而虚者，乳子法也。手少阴脉动甚者，妊子也。尺中之脉，按之不绝者，法妊娠也。诸家论脉，其说不一，要不外滑利和平，不偏不弊，所谓身有病而无病脉，身无病而有病脉，为简而易明。经闭吐逆，体怠恶食，而脉反平和，是有病而无病脉也。外无吐逆诸病，体旺如昔，而脉反滑利动疾，是无病而有病脉也。脉象微妙，骤不易知，差之毫厘，谬以千里。善诊者，心领神会，毋事固执，斯为善也。怀妊之候，必病恶阻，苦沈重愦闷，不欲饮食，又不知患所在，头重眩晕，四肢惰懈，不欲执作，喜啖酸咸果实，多卧少起，气逆呕吐，盖由经血既闭，水渍于藏，藏气不宣，血脉不行，故有此候。察其候，合其脉，孕之是非，无所遁矣。若兼有表里诸疾，脉不可辨，则别有验之之法。以雀脑芎藭一两，当归七钱为末，分二服，煮艾汤，或醇酒下之，二三时间，觉腹中脐间微动，即为有孕。或以醋煮艾汤半盏服之，有孕必大痛，无孕则否。妊娠四月，男女可分，脉法左疾为男，右疾为女，左右俱疾为产二子，左手沉实为男，右手浮大为

女，左右俱沉实生二男，左右俱浮大生二女，左尺偏大为男，右尺偏大为女，左右尺俱大为产二子。又法：左尺中浮大者男，右尺中沉细者女。若脉不可知，则有辨法：令人按其腹，加覆杯者，男也，如肘项参差起者，女也。左乳房有核者男也，右乳房有核者女也。孕妇行坐，自后急呼之，左回首者男，右回首者女。盖左右者，阴阳之道路也。阳亲其左，阴亲其右，自然投托，各就其所。气血因之，故脉象应之，盛于左则左疾而大，盛于右则右疾而大。其有异孕，无所归属，则两者皆见。尺中者肾部也，肾主胞门，孕之所在，阳具于左，故浮大，阴具于右，故沉细也。男形常伏，女形常仰，故揣腹可知。乳为阴府，下通胞门，阴盛则结，各就其位，气血偏盛，则身有偏重。视其回首可知者，必慎护其重也。《千金方》又言男子左乳房结核者生男，右乳房结核者生女，妇有孕而验其夫，原其所始，理亦可通，而所以结核之故，终不可解矣。

养孕第二

妊娠一月，名始胚，足厥阴脉养之。其经内属于肝，肝主筋及血，是时血行否涩，毋为力事，必令安静，嗜酸咸，食宜麦，毋食腥辛，若曾孕一月而堕者，宜预服补胎汤以养之。

补胎汤　干地黄一两　白术一两　生姜一两　防风六钱　大麦二合　乌梅三合　细辛三钱　吴茱萸一合

八味以水三升，煮一升，分三服，热而渴者，去吴茱萸、细辛，加栝蒌根三钱，见《千金方》。

二月，名始胥，足少阳脉养之。其经内属于胆，主精，是时精成于胞里。若曾孕二月而堕者，宜预服黄连汤以养之。

黄连汤　黄连三钱　人参三钱　吴茱萸一合五勺　生姜一两　生地黄一两六钱

共五味，以水三升煮一升，分四服，日一。若觉不安，加乌梅三合。见《千金方》。

三月，名始胞，未有定仪，见物而化，手心主脉养之。其经内属于心，当静谧以定心气，食谷宜稻，羹宜鱼。若曾孕三月而堕者，宜预服茯神汤以养之。

茯神汤　茯神　丹参　龙骨各三钱　阿胶　当归　甘草　人参各一两　大枣二十一枚　赤小豆二十一枚

九味，水三升，煮一升，分四服。七日后。更作腰痛者，加桑寄生六钱。见《千金方》。

四月，始受水精，以成血脉，手少阳脉养之。其经内轮于三焦，是时形体已具，当盛其血气，以通耳目而行经络。若曾孕四月而堕者，宜预服菊花汤以养之。

菊花汤　菊花如鸡子大一把　麦门冬三合　大枣十二枚　人参五钱　当归　甘草各六钱　阿胶一两　生姜一两六钱

八味，以水三升，煮半，内清酒一升，并胶，煎服一升，分二服。若受寒者，加麻黄。见《千金方》。

五月，始受火精，以成其气，足太阴脉养之。其经内属于脾，是时四肢皆成，宜适饥饱，其食宜甘，羹宜牛羊，和以茱萸，养气以定五脏。若曾孕五月而堕者，宜预服安中汤以养之。

安中汤　黄芩三钱　当归　芎藭　干地黄　人参各六钱　甘草　芍药各一两　生姜二两　麦门冬三合　五味子一合五勺　大枣三十五枚

十二味，以水二升三合，清酒一升五合，煮取一升，分四服，日三夜一，七日后。更作。见《千金方》。

六月，始受金精，以成其筋，足阳明脉养之。其经内属于胃，主口目，是时口目皆成，身欲微劳，以变腠理，纫筋以养其力，以坚背膂。若曾孕六月而堕者，宜预服麦门冬汤以养之。

麦门冬汤　麦门冬二合　人参　甘草　黄芩各六钱　干地黄一两　阿胶一两三钱　生姜二两　大枣十五枚

八味，以水二升三合，煮减半，内清酒六合，并胶，煎一升，分三服。中间进糜粥。见《千金方》。

七月，始受木精，以成其骨，手太阴脉养之。其经内属于肺，主皮毛，是时皮毛已成。宜劳身动作，以运血气，食谷宜粳稻，避寒就燥，以密腠理，以养骨而坚齿。若曾孕七月而堕者，宜预服葱白汤以养之。

葱白汤　葱白长二寸者十四茎　麦冬二合　旋覆花六勺　黄芩三钱　人参五钱　甘草　当归　黄芪各一两　阿胶一两三钱　生姜二两六钱

十味，水二升六合，煮减半，内清酒一升，及胶，煎一升余，分四服，日一服，温进。见《千金方》。

八月，始受土精，以成肤革，手阳明脉养之。其经内属于大肠，主九窍。是时九窍皆成，无使气极，以密腠理而泽颜色。若曾孕八月而堕者，宜预服芍药汤以养之。

芍药汤　芍药一两三钱　生姜一两三钱　厚朴六钱　甘草　当归　白术　人参各一两　薤白三合

八味，以水一升六合，酒一升，煮一升，分三服，日一。见《千金方》。

九月，始受石精，六府百节，莫不毕具，足少阴脉养之。其经内属于肾，肾主续缕，是时经脉续缕皆成，谷气入胃，毋犯冷湿，饮宜醴，食宜黍，缓带自持，以养毛发，致才力。若曾孕九月而堕者，宜预服猪肾汤以养之。

猪肾汤　猪肾一具　茯苓　桑寄生　干姜　干地黄　芍药各一两　白术一两三钱　附子三钱　大豆一合　麦门冬三合

十味，以水三升，煮肾令熟，去肾，纳诸药，煎取一升，分三服，日一。见《千金方》。

十月，足太阳脉养之。其经内属于膀胱，五藏完备，六腑齐通，纳天地气于丹田，使关节人神皆备，待时而出。宜服滑药以速其生以上本徐之才说。若曾孕十月而不产者，宜预服八物汤。

八物汤　人参三钱　白术三钱　茯苓二钱　甘草一钱　陈皮二钱　芎藭一钱五分　当归三钱　熟地黄三两　白芍一钱五分

共作一服，以水一升，煮四合，日一服。见万病回春。

凡孕十月，三阴三阳，各养三十日，内轮五精，外受五气，惟手少阴太阳不养。心为君主，统摄百脉，下主月水，上为乳汁，手太阳合之，故不专养。天气盛于东南，地气盛于西北，故万物之生，始于东南，而成于西北。养孕之脉，始于足厥阴，东方木，生气之原也。继之以手心主，南方火，长气育之也。继之以足太阴阳明，中央土，化气宣之也。继之以手太阴阳明，西方金，收气坚之也。继之以足少阴太阳，北方水，藏气成之也。天一生水，故始受水精，土载万物，故终受土精。气以顺养，精以逆受，相生无不及，相克无太过。犹之四时递嬗，自春而夏，而长夏，而秋，而冬，而一岁成。五气互生，自木而火而土而金而水，而一人成。其理一也。孕之生也，阴阳相合，气含阴阳，则有清浊。清者浮升而善动，浊者沈浊而善静。动静相交，阳中之阴，沉而下降，阴中之阳，浮而上升，阳之升也。自东而南，阴之降也。自西而北，阳升于东，则魂具而化神；阴降于西，则魄藏而凝精。神化则气生，精凝则质结。故孕一月如露珠，太极也，阴阳之未判者也。二月如花蕊，太极生两仪也，阳升阴降，阴阳之已分者也。三月至五月，形体具而四肢成，阳自东而南，阴自西而北，五神既宅，四维乃张，两仪生四象也。六月以后，筋骨皮毛，九窍百节，无不毕具，阴阳交育，精气旋生，四象生八卦也。八卦生而天道备，十月尽而人道具。所谓万物一太极，一物一

太极也。知孕之所以生，则知所以养之之道矣。凡孕三月，体虚者宜常服滋生汤。

滋生汤　熟地黄三钱　白芍　甘草　芎劳　当归　阿胶各一钱　黄芩六分　砂仁一钱　糯米百粒

或参术养胎饮。

参术养胎饮　人参一钱　白术三钱　茯苓二钱　甘草八分，炙　归身　白芍各一钱五分　阿胶二钱　陈皮八分

体过实者，宜《金匮》当归散。

《金匮》当归散　当归　川芎劳　黄芩　白术　白芍各一两

治为末，每服一钱，白沸汤调下。见《丹溪心法》。

挟寒者，宜加味保胎丸。

加味保胎丸　白术　熟地　阿胶各二两　当归　杜仲各一两五钱　川断　川芎劳各一两　艾五钱

八味，捣末杵枣为丸，每服五十丸。

挟热者，宜黄芩散。

黄芩散　黄芩一钱

捣末，浓煎白术汤调下，日一。见《丹溪心法》。

或芩术汤。

芩术汤　黄芩三钱　白术一钱五分

二味作一服。见《丹溪心法》。

或白术丸。

即前方十倍为丸，如桐子大，日三十丸。见《丹溪心法》。

将产体实而旺者，宜达生散以速之。

达生散　大腹皮二钱　甘草一钱五分　当归　白术　白芍各一钱　人参　陈皮　紫苏　枳壳　砂仁各五分　青葱五寸

十一味，作一剂，孕九月后服之，日一服。体旺者，至产而止。见《丹溪心法》。

凡孕，无论虚实，皆宜服便产方。三四月后，三十日服一剂，八九月，二十日服一剂，将产之月，日一服之。是方制合精良，无可增减。俗传谓宫中十二味，系明嘉靖间太医所作，如法服之，绝无难产之患，真良方也。

便产方　当归一钱五分　芎劳一钱三分　厚朴七分，姜汁炒　枳壳六分，炒　菟丝子二钱，酒洗　艾叶　羌活各五分　贝母一钱　荆芥八分　黄芪七分，蜜炙　白芍一钱二分，炒　甘草五分

水煎随宜服之。见《保产辑要》。

孕宜第三

人有清浊厚薄之异，智愚善恶之殊。揆其所始，皆由祖气。祖气者，先天之气也。气清则善，气浊则恶。清则圣哲，浊则昏愚。然而凶顽之质，亦生圣人；贤哲之嗣，或多昏昧。何也？是岂祖气之有所变易乎？盖生成有消息之理，长养寓补救之方也。凡物阳生而阴成，生人之初，禀气于父母，两气既合，胚胎以凝。自此以往，日滋月遂，至于成人，皆由母气，蕴为五神，发为五气，育为五精，结为五藏，开为五官。气以煦之，血以濡之，得其道则气厚而神清，失其道则气浊而神昏。清则可以反浊，浊则可以害清。自然之理也。譬之稼穑，良莠不同，由于种之美恶，然使土瘠气薄，旸雨不时，灌溉失度，则虽美种，不如莠稗，土沃气厚，燥湿均平，种虽不良，亦必大熟。故祖气者，稼穑之种也，母气者，土气也，气煦血濡者，旸雨也。摄养之道，灌溉之力也。稼穑不能专恃天时，因有灌溉之法；生人不能专恃父气，必有补救之方。调之使均，摄之使平，反昧为哲，易浊为清，精微之道也。子居母腹，以母气为气，以母血为血，母呼亦呼，母吸亦吸。善心生则气血清和而子性醇，恶心生则气血浑浊而子性劣。而母气之清浊善恶，又随时而迁。触物而变，非有一成不易之常。气主于心，心之神，主内而应外，外有所接，则神动而气随之。所接善，则阳气动而为清，所接恶，则阴气动而为浊。故妊子之时，必慎所感，人生而肖万物者，皆母之感而肖化也。古者妇人妊子，

寝不侧，坐不边，立不跸，不食邪味，割不正不食，席不正不坐，目不视邪色，耳不听淫声，则生子端正，才德过人。昔太任有身，能以胎教，乃生文王之圣。君子美之以上本、《列女传》，故旧说谓受孕三月，逐物变化，使妊母常观犀象珠玉宝玩之物，礼乐盘盘俎豆之事，诵诗书箴诫，琴瑟咏歌，欲得贤人长者，论述古今忠孝之事，盛德大业之人，则生子多男，气正而质纯，贤良而寿考，亦不过欲和其心志，绝其嗜欲，使心静于内，虑谧于中，清气充满，浊气自消，即胎教之道也。夫草木之生，其形色臭味，皆秉天理自然之化，而何以迁地则形色皆殊，而技者又有栽种灌溉之法，可以转白为赤，易苦为甘。草木尚然，况人之至灵者乎！至男女之分，定子祖气，非人力所能转移，旧有转女为男之法，如系弓弩弦《千金方》取弓弩弦一枚绛囊盛带左臂或系腰下百日，日后乃去之。佩雄黄《千金方》雄黄一两，绛囊盛带之。置斧床下《千金方》以斧一柄置妊母床下刃向上勿令人知。或验或否，会其适然。然亦可以，祛邪辟恶，以卫阳气，无损子事。若欲服药物以改之，无是理也。妊母常食松子，令子坚实，常食砂仁，可令速产。《达生编》云：常以麻子油和腐皮食，可令滑胎。又云：始觉有妊，以布一幅，横束之，上紧下宽，至临产始去，可令易生。盖使腹中逼窄，胎不上长，乍去则骤宽，产时便利故也。大凡摄养之道，在善调其心气，此非医者所能为。夫生子不善，人之所恶，人之不善，虽由习欲，实本性生。孔子曰：惟上知与下愚不移，推原其故，皆由未生以前，理微而显，事小而大，在智者心知其意而变通之。教子已生之后，莫若于未生之时，以可为者责之人，以不可为者听之天，是亦为人父母者所当究也。

孕忌第四

生人诞育，天理自然，阴阳滋化，本无灾害，而每有孕而不固，固而不育，育而辄夭者，岂生化之理，有所异哉。摄养有乖，逆其滋生之道也。古者妇人有孕，即退居别室，谨持胎教，故弥月而生，无灾无害。今人不然，或有孕而不知，不事养护。其知者，又不知所忌，不慎起居，劳役失宜，举止违理，欲其无患，不亦难乎？夫人有富贵贫贱之异，而诞育则皆同，而产孕之变，多起于富贵之家。人与禽兽，各禀气血以生，而禽兽之生，初无堕落难产之患，岂非嗜欲有多寡之异，生理有顺逆之分乎？

怀孕之后，首忌交合。盖阴气动而外泄，则分其养孕之力，而扰其固孕之权。且火动于内，营血不安，神魂不密，形体劳乏，筋脉震惊，动而漏下，半产难产，生子多疾而夭，淫浊而钝，甚至孕犹未固，辄动而堕之。一再堕后，胞室寒滑，随孕随堕，终身无子而不自知，亦可慨矣。居处动作，最易损伤，起于细微，人所不觉。体候虚羸者，尤宜慎之。毋登高，毋作力，毋疾行，毋侧坐，毋曲腰，毋跛倚，毋高处取物，毋向非常处大小便，毋久立，毋久坐，毋久卧，毋犯寒热，毋冒霜雪露雾，暴雨酷日，烈风疾雷，毋视日月薄蚀，虹霓星变，毋观土木工作，及怪兽异鸟奇诡之物，毋入神庙寺院，睹狰狞险恶之状。一举一动，必谨饬之。五志之发，鲜能和平，而产孕最宜调摄，孕藉母气以生，呼吸相通，喜怒相应，一有偏倚，即至子疾。宜和其心志，毋暴喜，毋过思，毋怒，毋恐，毋悲，毋忧虑，毋郁结，颜无忤色，口无恶声，心无杂念，使血气和平，德性凝定，不特孕安，且生子英贤，无疾而寿矣。其饮食，则以冲和澹泊为正，节厚味，禁腥浊，毋饮醇酒，毋食异味。《千金方》云：食山羊令子多疾，食兔令子缺唇，食犬肉令子无声，食桑椹鸭卵令子侧出心寒，食雀令子性淫，食鳖令子项短，食姜芽令子多指。鸡合糯米食，令子生寸白虫；鸡及干鲤鱼食，令子生疮。食鲜菌令子惊风，食水浆令胎绝。食骡马驴肉无鳞鱼螃蟹，皆令难产，食薏苡苋菜蒜葱麦

芽，皆令堕胎。其药味则宜和平调摄，毋犯金石，毋近毒药，大热大燥，大攻大表，大寒大凉，走窜迅疾泄利之品，咸宜禁止。即需施用，宜详酌而慎处之。凡妊娠起居饮食，惟以和平为上，不可太逸，逸则气滞。不可太劳，劳则气衰。五月以前宜逸，五月以后宜劳。冬毋太温，夏毋太凉，食毋过饱，饮毋过多。养孕之经，不可灸刺，无故不宜服药，调之摄之，务使无偏，则得之矣。

孕疾第五

妊娠诸疾，与常人殊，故治法亦异。子居母腹，藉母气固之，母气不顺子不得安，必有堕落之患。子气既损，母气亦伤，治之者，或仅护胎孕，不敢攻疾，或亟于治疾，不顾子气，致子母交损，大小殒亡。惨烈之祸，于此为甚。《素问》曰：妇人重身，毒之何如？曰：有故无殒，亦无殒也。大积大聚，可犯之也，衰其大半而止。夫大积大聚，病之重者，苟不亟治，立见危迫，故必毒之。使邪去而孕安。然恐药势太过，正气易伤，故衰其大半即止不治。古人立法，动出万全，不可不究也。

怀妊之后，必患恶阻。恶阻者，谓恶心阻其饮食也。由于经脉既闭，脏气不宣，津液停淤，水湿为患，故其候四肢沉重，恶食呕吐，偏嗜一物，头痛眩晕，多卧少起。若面色如故，脉象和平，此不须医，但调其饮食，适其寒温，缓缓可愈。其甚者，大呕吐血，食饮不下，寒热往来，心中愦闷，恶闻食臭，肢节疼痛，疲怠自汗，色萎肢瘦，势若危殆。或施治不善，逆其胎气，致暴作吐下，困顿欲绝，则宜服橘皮茯苓汤。

橘皮茯苓汤

橘皮一钱　茯苓二钱　苏梗八分　归身一钱五分　白芍一钱五分，炒　砂仁五分　生姜捣去汁，三钱　青竹茹八分　炙甘草五分

作一服。

二四服不愈，宜半夏茯苓汤，三五服必愈。

半夏茯苓汤

半夏　茯苓各三钱　干地黄　生姜各二钱五分　橘皮　旋覆花　细辛　人参　芍药　芎劳　桔梗　甘草各一钱七分

十二味，以水三升，煮取一升，分三服。若客热烦渴，去细辛，加前胡知母各一钱七分。若冷痢者，去干地黄加桂心一钱七分。熬服后，忌生冷酷滑油腻等物。见《千金方》。

妊娠伤寒，以安胎为主，无犯胃气，不可妄汗吐下，泄利小便。其候轻者，头痛烦热，宜芎苏饮。

芎苏饮　芎劳　紫苏叶　白芍叶　白术　麦门冬　陈皮　干葛各一钱　甘草五分　生姜三片　葱白三茎

十味，作一服。见《东医宝鉴》。

其者，壮热不解，欲汗之，宜葱白汤。

葱白汤　葱白十茎　生姜六钱

二味，以水一升，煮五合，作二服。见《千金方》。

不解，宜拭身法。

拭身法　麻黄二两六钱　竹叶二合　石膏一升，为末

三味，以水二升六合，煮取一升去滓，冷拭身体，以故布掩头额心胸，燥则易之。见《千金方》。

热病者，宜豆豉汤。

豆豉汤　豆豉二合　葱白一两六钱

二味，以水二升，煮一升，分三服，取汗。见《千金方》。

大烦热。宜葛根汁饮解之。

葛根汁饮　葛根汁六合

分三服，间四刻许。进一服。见《千金方》。

皆须用固孕法，以安其孕。

固孕法：取釜中黄土，水和涂脐，干复涂之。见《千金方》。

又方：滑朴硝　大黄　蛤粉　蓝根等分

贴脐上。见《得效方》。

妊娠烦满闷瞀，谓之子烦。此由痰湿堙郁，热气薰蒸，上焦之气，不得流畅，热郁过甚，则胎动漏下，宜竹沥汤。

竹沥汤　竹沥三合　麦门冬　防风　黄芩　茯苓各一两

五味，以水一升，煮六合，分三服，日一。见《千金方》。

中风口噤，项背强直，筋脉拘挛，发搐不止，痰盛昏迷，或时作时止，名曰子痫，宜四物汤，量加驱风逐饮之药，甚则宜羚羊角汤。

羚羊角汤　羚羊角镑　枣仁　独活　五加皮各一钱二分　防风　薏苡仁　当归　芎藭　茯神　杏仁各七分　甘草　木香各五分　生姜三片

作一服。见《医学正传》。

若因冬月，外感风寒，壅于肺络，内风扇炽，故痰气升逆，昏迷不醒，手足筋脉拘挛，右手脉闭，左手脉数而涩。妊娠已七八月之间，症属子痫，先用开肺气清肝风之品以救之，宜钩藤生地竹沥饮。

钩藤生地竹沥饮　钩藤三钱后入　大生地三钱，酒炙　炒当归三钱　炒白芍二钱　明天麻一钱，煅　川芎一钱五分　川贝母一钱，去心　制半夏一钱五分　苏梗一钱　陈皮八分　川朴七分，姜汁炒　桔梗二钱

竹沥三茶匙冲服，一剂不效，再服一剂。

若服前方，拘挛发搐减轻，痰去人稍明白者，用滋木清热以息风，宜竹茹阿胶汤。

竹茹阿胶汤　青竹茹姜汁浸，二钱　阿胶蛤粉炒，二钱　炒当归三钱　黑山栀八分　大生地四钱　生白芍二钱　川芎一钱　明天麻一钱，煅　石决明三钱，煅　陈皮八分　焦术二钱

上十一味，为一剂。

水肿胀满，谓之子肿，其候或遍身浮壮，或手足拳肿，或肚腹壅大，高过心胸，气逆喘急，甚则损胎，此因水气过甚，正气不化，溢于皮肉，轻者产后即愈，不必施治，甚者宜鲤鱼汤。

鲤鱼汤　鲤鱼一头重一两　白术　生姜各一两六钱　芍药　当归各一两　茯苓一两三钱

六味，以水四升，煮鱼熟，澄清，取二升六合，内药，煎取一升，分三服。见《千金方》。

或苓术汤。

苓术汤　茯苓　白术各一两三钱　黄芩　杏仁各一两　旋覆花三钱

五味，以水二升，煮八合，分三服。见《千金方》。

小水淋痛，谓之子淋，此由下焦气化壅闭不行，故水道不利，郁而为痛，宜葵子散解之。

葵子散　冬葵子　赤茯苓各等分为末，每服二钱，米饮调下。见《金匮要略》。

若便闭不通者，谓之转胞，乃胎气陷下，壅遏过甚，气道梗阻，故水不得通，虚人多有之。宜参术饮。

参术饮　人参　白术　半夏　陈皮　芎藭　当归　芍药　干地黄各一钱　甘草五分　生姜三片

作一剂，服后探吐之。见《丹溪心法》。甚者，宜肾气丸。

肾气丸　熟地八两　山茱萸四两　山药四两　丹皮三两　茯苓三两　泽泻三两　附子一两制　肉桂一两

丸如桐子大，每服十五丸，米饮下。见《金匮要略》。

若遗溺者，白薇散主之。

白薇散　白薇　芍药各等分为末，酒服一钱。见《千金方》。

久嗽不止，谓之子嗽。此外感风寒也，甚则动胎。宜百合汤。

百合汤　百合三钱　紫菀一钱　贝母一钱　白芍一钱五分　当归一钱五分　前胡五分　茯苓二钱　桔梗一钱五分　苏叶五分

九味，作一服。

下痢赤白，谓之子痢。其候腹中疼痛，里

急后重，不得以寻常治法施之。宜薤白饮。

薤白饮　薤白三合　石榴皮　黄连各六钱　阿胶一两　地榆一两，炙

以水二升，煮六合，分三服。见《千金方》。

若注下不止，宜胶艾汤。

胶艾汤　阿胶　艾叶　石榴皮各六钱五分

以水二升，煮六合，分三服。见《千金方》。

若下脓血，宜白术汤。

白术汤　白术　当归　黄芩各三钱

作一服。见《医学正传》。

寒热往来，一日一作，或间日一作。若有定期，谓之子疟，发当夏秋，宜香薷保安汤。

香薷保安汤　香薷八分　柴胡　羌活各五分　陈皮六分　白术二钱　黄芩一钱　炙甘草四分　当归一钱五分　生姜一片　枣二枚

作一服。

在冬春，宜驱邪汤。

驱邪汤　白术　藿香　砂仁　茯苓各一钱　橘红　草果各八分　甘草五分　姜三片

作一服。见《丹溪心法》。

胸满腹胀，气逆上干，谓之子悬。此由中焦气结之故，多得之愤郁惊惶，宜紫苏饮。

紫苏饮　紫苏叶一钱五分　人参　大腹皮　芎藭　陈皮　白芍　当归各一钱　甘草五分　姜三片　葱三茎

作一服。

或葱白汤。

葱白汤　葱白二十茎

以水一升五合，于银石器内，煮取半升，顿服。并食葱。见《妇人良方》。

若心痛者，宜竹皮汤。

竹皮汤　青竹皮三合

以酒六合，煮三两沸，顿服。见《千金方》。

腹痛者，宜芩术汤。

芩术汤　黄芩一两　芍药一两三钱　白术六两

以水二升，煮取一升，分三服。见《千金方》。

腰痛者，大豆酒主之。

大豆酒　大豆三合

以酒三升，煮取六合，顿服。见《千金方》。

妊娠下血，谓之漏胞。甚则崩决不止，阴气不固，热动于内，伤其脉络，故营血内溢，血尽则死，宜地黄饮。

地黄饮　生地黄二两六钱

清酒一升，煮三沸，去滓，频频服之，或入鸡血少许。见《千金方》。

或地黄散。

地黄散　干地黄捣末，酒服三指撮许，三服瘥。见《千金方》。

若胎动不安，腹痛绕脐，腰背皆痛，卒有所下，或叫号口噤，四肢厥冷者，宜艾叶汤。

艾叶汤　艾叶　阿胶　芎藭　当归各一两　甘草六钱

以水二升六合，煮一升，分三服。见《千金方》。

若因交合而动胎者，宜八物胶艾汤。

八物胶艾汤　人参　白术　茯苓各二钱　芎藭一钱五分　当归一钱五分　白芍二钱　干地黄三钱　阿胶二钱　艾叶八分

见《医学入门》。

因饮酒而伤者，宜黄芩汤。

黄芩汤　黄芩　白术　当归　砂仁各一钱

作一服，日二。见《得效方》。

因喜怒而伤者，宜佛手散。

佛手散　当归五钱　川芎藭三钱

作一服。见《丹溪心法》。

因郁闷而伤者，宜葱白汤。见前子悬下。

因劳役而伤者，宜安脉汤。

安脉汤　人参　白术各二钱　当归一钱五

分　阿胶三钱　炙甘草　陈皮各五分　芎藭一钱　兔丝子　黄芪各一钱五分　杜仲二钱

因跌堕而伤者，宜续杜丸。

续杜丸　续断　杜仲各二两

枣肉捣为丸，如梧桐子大，每服五十丸，米饮下。见《医学入门》。

若腰痛损伤，下血不止，宜马通汤。

马通汤　马通汁三合　干地黄　阿胶各一两三钱　当归　艾叶各一两

以水一升六合，煮取八合，内马通汁，及胶合烊，分三服。见《千金方》。

若胎奔上抢心危急之候，宜艾叶地黄汤。

艾叶地黄汤　艾叶一两　阿胶　芎藭　芍药　甘草　当归各六钱　干地黄一两三钱

以水一升六合，煮取一升，内好酒一升，内胶令消，分三服。见《千金方》。

甚者，血从口出，逆不得息，宜蟹爪汤。

蟹爪汤　蟹爪三合　甘草　桂心各三钱　阿胶六钱

以东流水三升，煮一升，内胶分二服。口噤不能服者，格口灌之，药下便活也。生胎即安，死胎即下。见《千金方》。

若因毒药攻胎，胎动欲堕，血逆冲心，闷乱喘促，大汗不止者，宜白扁豆散。以解其毒。

白扁豆散

白扁豆为末，新汲水调下二三钱，口噤者，斡开灌之。见《得效方》。若因高取物，胞系有伤，儿啼腹中，则令妊母曲身，向地抬物，须臾即止。

若腹中作蛊鸣声者，取鼠穴中土嚃之。

八九月喑不能言者，不须治之，产后即愈。

凡胎动，无故而动，及体素羸弱者，乃冲任脉虚，不得固摄，当大补之。腹痛者，宜行其气。损伤者，宜行其血。余各因其所由治之。

未及期而产，谓之半产，即堕胎也。损气耗血，甚于正产，二三月犹轻，六七月为最重，譬之果未熟而强摘之，其根蒂必伤也。故凡半产，当与正产同其调养，而尤加意焉。宜因其所伤而补益之，以善其后。前列诸法，皆可参用。若轻易视之，则一次半产，后遂习以为常，不得谓非失治之过也。半产后，治疾之法，与正产稍异。盖正产恶露多，半产恶露少也。若有腹痛等疾，宜温补之，逐瘀破血之药，用宜审察。若数日后大热而渴，面红眼赤，欲饮凉水，昼夜不息，此大虚也。寒凉下咽，即死不治。宜当归补血汤。

当归补血汤　黄芪一两　当归二钱

水煎，作一服。见《内外伤辨》。

若血崩不止者，宜摄阴汤。

摄阴汤　黄芪五钱　阿胶三钱　归身二钱　白术二钱　甘草二分，炙　棕榈皮一钱，炙　乌贼骨一钱五分，炙　荆芥一钱，炒

其他诸症，并详正产。相时度势，消息用之，未可拘泥为也。

重订产孕集　卷下

清　阳湖　张曜孙仲远纂辑
泾县　包　诚兴言增订
鄞县　曹赤电炳章校刊

辨产第六

孕满十月，待时而生，自然之道，无所勉强。而世俗不察，或未产而强速之，致有横逆之变。推其故，由于未明其理，不辨其候而然。故初觉腹痛，遂谓欲生，稍事迟延，遂谓难产。方药以攻之，非法以扰之，使气昏神乱，子母俱死，富室巨家，其弊尤多。本安也而自危之，本生也而自杀之，可悯也已。辨产之法，《脉经》曰：娠妇月满，则脉离经。离经者，难经所谓一呼三至，曰离经，一呼一至，亦曰离经也。又曰：尺脉转急如切绳转珠者，欲产也。《千金方论》曰：将产者离经，离经者其脉浮。朱彦修曰：离经六至，沉细而滑，按切绳转珠，动疾之象，即一呼三至之义。一呼三至，一吸三至，呼吸定息，脉七至，闰以太息，脉八至，疾之甚也。朱说与《千金方》不同，当以《难经》、《脉经》为正。要之胎动欲产，无论浮沉迟速，皆有动象，无动象者，非正产也。

正产腹痛，必连腰及脐，或牵引脊背，胎气陷下，或目中生火，谷道挺进，浆血下后，腹痛愈紧，乃为欲生。若渐痛渐缓，或乍紧乍慢，即浆血交下，皆非正生。达生编言：试痛正产之辨，误以试痛为正产之害，推勘极精，多可采者。《达生编》云：初觉腹痛，第一忍痛为主，无论为正产，为试痛，痛久自生。更宜养神惜力，以安睡为妙，不可轻易临盆。盖子居母腹，端坐不动，至生时转身向下，妊母安卧，腹中不至逼窄，易于转身。若未及转身，遂使坐草，则婴儿难于转运，复用力以注之，则足先出而成逆产。转身未定，用力逼之，则手先出而为横生。或首骨偏碍而为偏产，种种弊端，皆基于欲速之故。故临盆以缓为正，即使过迟，亦无妨碍也。又曰：孕至八九月，或妊母有火，起居不时，令孕不安，因而作痛，所谓试痛也。但须照常眠食，甚则服安胎药一二剂即止。若误作欲产，遽令坐草，即使勉强能生，母气必损，子亦多夭，犹之剖卵出雏，裂茧取蛹，安望生耶。又曰：腹痛有感寒伤食之候，亦宜辨别。伤食者，当脐而痛，手按转加，或脐旁如有脯起者，不连腰及脊，寒痛多在脐下，绵绵延延，无所增减，得缓少安也。凡此皆极言欲速之害，而归于辨产未明。盖妊母多畏难产而欲速产者，在主者察脉晰理，明辨而调摄之。事常而易变，苟不慎察，戕害生命，亦非俯育之道，慎毋谓闺房琐屑之事，非丈夫所宜知而忽略视之也。

产戒第七

产育顺事，而俗人多扰乱之，致反顺为逆，此虽习俗使然，亦不知之过也。辑产时所当戒者著于篇，使觉者凛焉。

妊母将产，率多疑惧，腹痛紧急，气血下注，神不能安，易于惊惶。初次产育，尤为易忧。而不知者稍有不顺，辄恐惧无主，大事张皇，致妊母心乱神散，气愈而逆。气逆

则血涌，气备则力衰。婴儿之生，虽自能转动，亦藉母气助之。气逆力衰，何以能下？惟宜温慰妊母，使勿惊疑，即有不顺，勿使知觉。俾心定气凝，神安力旺，无论本属顺生，即遇恶候，亦可反逆为顺也。

《千金方论》云：产事虽系秽恶，然不得令死丧污秽之人视之，犯者多致难产。又忌多人瞻视，惟得一二人在室，产后乃可告人。亦以人众则易于惊扰，致妊母心神不定故也。

室中宜适温凉，夏暑过甚，勿掩门户，以器贮新汲水石许，置室中，以辟热气，免致昏晕。天寒宜置火暖之，毋得大炽，令火气熏灼，室中人毋大声，毋多语，毋嗟咨太息，毋讶骇，毋叱咤，毋祈神问卜，宜安静如常。

妊母宜惜力，宜安卧，卧宜正，不可左右，毋摩腹，毋按腰，毋妄动，毋轻坐草，初产及天寒尤忌。美其饮食，频频与之。若虚羸者，不能多食，以糜粥杂人参末饮之。毋乱服方药，毋轻试异术。必辨明正产。胞水以下，交骨不开，或交骨已开而子久不下，择平和之药，稍稍助之。要之产前调摄既善，亦无须此。

接儿老妪，俗谓稳婆，宜预择妥善者用之，盖隐曲之事，非此辈不能为，而愚蠢奸狡之辈，或妄为动作，故事恐吓，戕人性命，以炫己之术，不可不慎。大率以年老为佳，盖年老则历事多而性稍醇也。

产后勿问男女，须收拾既定，然后告人。世有急于求嗣者，堕地得男，而产母暴喜，遂致昏晕。得女则产母不悦，家人又从旁懊恼之，致有郁厥血逆之患，宜豫防也。

大凡产厄，误于张皇者半，误于怠忽者亦半。产育固生人常事，然苟主者不察，而漫然听之，则产母无主而惊疑，为害亦大。往见拘迂者，矫张皇之弊，谓婴儿可以自由，无藉乎人，因闭门安卧，勿令人知，而产母体素羸弱，气血虚少，又性本矫怯，不能忍痛曲腰护之，偏倚妨之，转辗欹仄，致婴儿不得转动，交骨不得开张，气血下注，久无泄路，势必逆而上行，一日之间，而子母俱死。如此者，何啻无故而自杀之哉。此皆不明其理，不究其道，愚而自用，残贼人伦。夫产孕者，生生之本，天理之原，似续攸关，断宜详慎也。

用药第八

产时用药，有二弊焉。方伎之士，多取速效，肆用峻利之药，以炫己之术。其效者，药甫入口，而难产即下，众人骇服，推为神奇。而不知一时便利，子母大伤，至产后发疾，遂至不起。婴儿或坠地不举，或举而辄夭，而又委之天命，归咎后医，日杀生命而人莫之知，深可痛惜。古方如兔脑鼠肾蛇蜕回生诸药，只堪备至急之用，安可妄试？尤有甚者，挟不经之术，无稽之方，转转传布，谬为仙授，乘人之急，以胁人之利，功则归己，过则归人。世俗愦愦，多为所愚，不可譬晓，此一弊也。而矫其弊者，遂谓产孕本无须用药，常变顺逆，悉静而听之于天。斯言诚善，然必自怀妊至临孕，摄养无乖，然后可也。苟或不善，即可反顺为逆，而仍执勿药之说以自愚，是何异未能辟谷，而谓人可勿食耶。此二弊也。且天下亦或有生而难产者，或未孕之先，即有宿疾，或气血羸弱，骨格紧密，脉络坚致，皆令难产。亦藉临时药力以扶助之，但宜斟酌尽善，择平和之命，醇正之法，相不得不用之时而后用之。如加味芎归汤，佛手散，味和而力厚，气平而效速，斯为善也。

加味芎归汤　当归一两　川芎七钱　龟板手大一片，醋炙研　妇人发如鸡卵大一枚，瓦上焙存性

水一升，煎四合服之。见《医学入门》。

佛手散　当归五钱　川芎三钱

作一服。见《丹溪心法》

富贵之家，产后必服人参，而致死者多。矫其弊者，并倡产后无补益之说，而致死者

亦多。盖不明其理，左右皆误。夫产后诸疾，多出于虚，人参非不可用，而用之亦自有法。得其法，益身而却疾；不得其法，致疾而促生。不可不辨。服参之法，在子方坠地，参已入口，一刻之间，过此一刻，便不可服。盖产时气血下注，上中二焦，尽属虚寒，产后气复上行，下焦恶血填凑，血道梗塞，气道亦滞，骤加补中之药，血道未开，气道益阻，遂有恶露不行，瘀血上逆之患。若当儿甫坠地，一刻之间，气血犹未上行，脏腑空虚，脉络困乏，人参入腹，甘温之性，宅中土而运脾精，辅正气而逐恶血，洒播精微，灌溉经脉，气强则行速，脉润则道通，恶露顺下，乳汁通流，焉有他患。且新产之后，百脉皆动而下行，自下而上，瘀浊者去，精华者留，有更新之象。妇人宿疾，多在血内，平时所不能除者，此时可以除之。却病益身，非妄说也。

凡欲服参者，将产时即宜制就，汁宜浓厚，可以一饮而尽。或以人参一二钱研为末，另以钱余煮汁调服亦可，令一人司之，俟儿首既出，即与服之。参尽而儿适堕地，乃为合法。苟失其法，为害非小。而复归咎于参之不可用，岂不谬哉！

产时应变，皆仓卒之际，所有药物，亦宜豫筹，有备无患。不可渴而掘井，斗而铸兵也。

应变第九

产育本顺事，不幸而至于逆，变起仓卒，安危系于片时，亦人生至急之事，极难之治也。应变之术，宜切究焉。凡产之变有五：曰横产，曰逆产，曰偏产，曰碍产，曰盘肠产。

横产者，儿横腹中，手臂先出。治法：令产母仰卧，嘱收生妪，徐徐推儿下身，令直上，以手中指，摩其肩，推上而正之。又以手摩其耳，令头正自生，或以小针刺儿手，入一半分，徐徐送入，不入以盐涂之。

逆产者，儿未转身，两足先出，以盐涂儿足心，针刺如上去；或以爪搔之，并以盐摩母腹，儿得痛痒，惊缩而转，自当回顺。

偏产者，产时儿首偏柱一傍，虽近产门，只露额角，终不得下。治法：令收生妪，以手徐徐正其头，若因脑骨偏柱谷道，当以绵衣炙火令热，裹手于谷道外，徐徐推之。俟正，然后坐草。若产时儿不向产门，直趋谷道者，宜熬盐令热，以绸裹于谷道外熨之。

碍产者，儿首正抵产门，久而不下，此必转身时，脐带攀挂儿项，或肩，当急令安卧，令收生妪，推儿近上，徐徐通手，以中指按儿两肩，理脱之，然后坐草。盖此候最为险恶，慎毋轻易用力。若缠绕于项，复用力以注之，则其缠愈紧，致子死腹中，不可不慎。凡横逆诸产，如法拯救，皆宜内服加味芎归汤，佛手散加味芎归汤见用药篇，佛手散见孕疾篇　以助之。若不能用法，但令静心安卧，服前药一二剂亦效。

盘肠产，子肠先出，儿即随下，或肠随儿下。此由下焦素虚，不得收摄，气血下注，无以固之。或用力太过，一次如此，凡产皆然。宜以温汤润之，温谕产母，勿令惊慌，以好醋半盏，新汲水如醋十之七，调和，骤噀产母面或背，三噀则收，或以磨刀水微润肠，煎磁石汤一盏饮之。或以苎麻子捣敷产母顶心，视收入，速洗去，迟则为害。内宜服补益升提之药，慎护其肠，勿令见风。若遭风侵，多有不能收入者。

产时交骨不开，最为恶候。此由阴气大虚，血液衰少，宜加味芎归汤。方见前。甚者，加肉桂少许。

子死腹中，其候心腹胀闷，重坠异常，产母面赤舌青，指甲皆青，或口出恶臭者是也。若面舌唇口俱青，口沫出者，子母俱死。面青舌赤者，母死子生。宜佛手散方见前　或平胃散。

平胃散　苍术　厚朴姜汁炒　陈皮各三钱　甘草一钱二分

水煎加朴硝一钱化服，其效颇速。

或蟹爪汤。

蟹爪汤　蟹爪一升　甘草一尺　阿胶一两

以东流水三升，煮蟹爪甘草，得一升，去滓，内胶令烊，分二服。见《千金方》。

若双胎，一死一生者，服之能令生者安而死者出。若干燥著脊不能下者，宜葵子汤，脂蜜酒，以滑之。

葵子汤　葵子三合　阿胶一两六钱

以水一升六合，煮六合，顿服。未效，再作一服。见《千金方》。

脂蜜酒　猪脂　白蜜各三合　醇酒六合

合煎取六合，分二服。见妇人良方。按无猪脂，以麻子油易之，亦可。

又治双胎一死一生者，先生一胎，腹中尚有一胎不下，或手先出，将手推入，或足又出，推之不入，生至三日，儿足不动，知胎死。三日中服催生方，葵子汤，加味芎归汤，皆不效，产妇腹不痛，不起阵，房内夏宜凉，冬宜暖，室中一二人，宜寂静，切不可惊慌，不要亲戚来看来问，以安产妇之心，若旁人惊慌，言语张皇，产妇闻之心慌，则生恐惧，必至误事。凡危急之际，更宜安静用药，非土牛膝葵子汤不能下也。

土牛膝冬葵子汤　土牛膝五钱　冬葵子一两

二味，宜买三服，用罐三个盛药煎好。一刻时候，连服三剂，死胎即下。何以要用三剂，一刻时候连服者，若服一剂，产妇腹痛一阵即止，死胎送不下来。连服三剂，腹痛紧而血来猛，产门即开，将死胎送下，胞衣随胎而出矣。因经验用药如此，故注明以救危急之症也。

产时用力太过，水衣早破，浆水尽下，产户干涩，或坐草日久，为风所久，因而肿胀，多致难产。或产时子忽不动，是妊母力乏之故，勿误为死，肆用攻逐。皆宜加味芎归汤。方见前

产时，妊母忽猝然气痿晕绝，目翻口噤，面忽唇青，口沫流出，子母俱殒。若两颧微见红色，子死母生，此至危之候。宜霹雳丹救之。

霹雳丹　蛇蜕一条，蚕退纸，并烧存性各用二钱　男子头发烧灰，路旁左足草鞋烧存性各用一分　乳香五分　黑铅二钱五分　水银七分五厘

铅和水银，入锅中，火上熔化，结如砂子，研治为末，和诸药，以猬猪心血和丸，如梧桐子大，金箔为衣，每用三丸，流水下，或煎化灌之。见《医学入门》。

婴儿既生，胞衣不下，亦多危险。《达生编》云：用力太早，交骨强开，儿甫出而骨即随闭，以致不下，急宜断脐带。以麻线将脐带系紧，又双折之，再系一道，勿令风入，以轻物坠之，但令产母安心定气，稍迟当痿而下，慎勿令收生妪妄用手取，致损及脏腑，因成恶疾。若血流入衣中，为血所胀，致不得下，腹中胀满，上冲心胸，疼痛筋急者，宜佛手散方见前。

若以手按之，痛稍缓者，此气虚也，宜益母汤。

益母汤

益母草一两

酒煎，加童便一杯服之。见《达生编》。

若危者，宜牛膝汤。

牛膝汤

滑石二钱，研末　木通　当归　牛膝　瞿麦各一钱五分　冬葵子二钱

共作一服。见《局方》。

若急上抢心者，或死胎上抢心者，宜用熨法。

熨法：取蚁垤土一升，熬热，囊盛熨心下，令不得上。见《千金方》。

若轻者，以草纸烧烟，熏产母之鼻，令纳气即下，或以发入口作呕，亦佳。

《千金方》载产时禳法，虽未明其理，而颇有效验。并附著以备用。凡欲产，宜脱寻常所著衣，笼灶头及灶口，令至密，即易生。

若逆生者，以手中指取釜底墨画儿足下，作×形，即顺生。或书父名于足心，或以车辖脂如上法书画，若胞衣不下，取夫内衣盖井上，即出。《本草》载临产取赤马皮铺身下，又以海马石燕两手持之，皆令速产云。

凡应变皆以凝神息虑为主。毋得张皇以扰产母，心欲细而定，智欲敏而速，法欲简而捷，药欲峻而安，毋取劫功，毋贻后患。凡遇危急，无不皆然，不特产孕之一端也。

调摄第十

产后调摄，最宜详慎。盖产后气血虚少，络脉空乏，肢节懈怠，腠理开张，皮毛不实，营卫不固，血道易塞，气道易滞，故致疾之易，而去疾之难，莫甚于此。产后致疾，皆起于纤细易忽之间，其源甚微，其发至钜，闺房琐屑之事，主者所不及检，医书所不能详。不识避忌，不知防范，或致疾而终身不愈，或疾作而危在片时。往见一妇，产时至速，不及告人，遂产于地。产后人知，始扶卧于榻。三日后，大热不止，医以为血瘀也，而以桃仁承气投之，数日而死。一时不谨，为害如此，况其大焉者乎？故善调摄者，不使致疾，并可去宿患之疾，不可不知也。

凡产后，产母勿令安卧，宜以高枕倚之。膝宜竖起，勿得伸直。须闭目静神，勿令熟睡。历十二时，乃可安卧，少须八九时，若倦怠者，宜频频呼之，常令欲醒。亦毋高声急语，致使惊恐。盖产后气血上行，若遽令安睡，则气逆而血壅，多致昏晕，必预防之。膝宜竖者，膝伸则筋骨内掩，恐碍恶露也。

婴儿坠地，即取铁秤锤或石子入火烧红，以醋向产母淬之，使气入鼻，不特可以辟秽，且能收敛神气，散解恶血，以杜血晕。或日淬一二次，三日后止，更佳。

室中宜避风，丝毫罅隙，必掩塞之，宜适温凉毋犯寒暑，将寒即衣，骤暖毋易，夏虽大暑，勿得解衣，毋浴，毋以扇招风，宁失过暖，毋失过寒。

产后宜益母草煮汁，和童便服之，或和清酒，日三五服，三日而止，自产之次日始，日服生化汤一剂。

生化汤

川芎一钱　当归五钱炙　甘草五分，炙　干姜五分　桃仁十粒，去皮尖

以水二盏，煎一盏，入清酒一合，温服。

五日而止，瘀未尽者，七日止，大虚者，可加人参少许服之。二三日后，或寒热交作，此骨合也，虚人多有之。但诊无他患，如法服生化汤，勿妄用他药。

十二日后，恶露将尽，气血更新，体虚者，宜服补虚汤。

补虚汤

人参　白术各二钱　当归　川芎　黄芪各二钱　炙甘草　陈皮各八分　干姜五分，炒

八味，作一剂日一服。见《医学入门》。

十数服，有宿疾者，宜服永安汤。

永安汤

人参一钱　熟地三钱　当归三钱　芎藭二钱　阿胶一钱五分　白术二钱　续断一钱五分　桃仁　乌贼骨各一钱　吴茱萸四分

十味，作一服，食前温进，日一。

或泽兰汤。

泽兰汤

泽兰二钱　香附二钱　当归　芎藭各一钱五分　芍药　乌药各一钱　人参一钱　阿胶　黄芪　白术各三钱　红花五分　生姜二钱

作一服，食前温进。

羊肉汤

羊肉十两　黄芪一两　大枣三十枚　茯苓　甘草　当归　麦冬　地黄　芍药各六钱　肉桂心三钱

以水六升，煮羊肉，取三升，内药煎取一升，分三服，温进。见《千金方》。

相疾之轻重，体之偏寒偏热而用之，或十余服，或数十服，可使宿疾尽去，体弱反强。

饮食宜澹泊，毋食盐，犯之令无乳，毋食生冷坚硬一切异物，毋食炙煿煎炒，毋过于肥腻，皆令致疾。十日内毋食猪肉，一月内毋食猪脂，犯之令经络壅塞，凡食肥甘之物，皆宜去油脂，以清淡为上。清本乎阳，可以益神而育精，浊本乎阴，足以致滞而成积。而酸咸之味，凝血阻脉，尤为切忌也。

产后一月，俗谓之满月，二月谓之大满月。此二月内，不宜力役动作，不宜交合，心志宜和，思虑宜绝，悲恐忧郁，大喜大怒，皆不可犯。七情伤人，甚于六气。世有产后羸瘠，谓之蓐劳，多至不治，皆不知调摄之故也。

怀婴第十一

《千金方论》曰：婴儿初生，当即举之，举之稍晚，则令中寒。先浴之，然后断脐。断脐不得以刃，令人隔衣咬断之，以暖气呵之，然后缠结。所留脐带，须令至小儿足趺，短则儿腹中不调，常下痢。若先断脐，然后浴者，则脐中水，令常腹痛。其脐断讫，连脐带中多有虫，宜急拔去之，不尔，则人儿腹成疾。裹儿脐法，椎治白练，令柔软，方四寸，新绵厚半寸，与帛等合之，调其缓急，急则令儿吐。若十许日，儿怒啼，似衣中有刺者，此或脐燥，还刺其腹，当解之，易衣更裹。裹时，闭户下帷，燃火令温暖，仍以温粉粉之，若脐不愈，烧绛帛末粉之。若脐中水，当炙粉絮以熨之，不时治护。

浴儿法，汤须调冷热，冷热失宜，令儿惊。凡儿冬不可久浴，久则伤寒，夏不可久浴，久则伤热。浴儿者，以猪胆汁一枚，取汁投汤中以浴之，终身不患疮疥。儿生三日，宜用桃根汤浴之良。

桃根汤

桃梅李根 各三两

以水三升，煮二十沸，去滓，无根枝亦可。

生男，宜用父故衣裹之，生女，宜用母故衣裹之。皆勿用新帛衣，不可过厚，令伤儿皮肤，害血脉。婴儿始生，宜时见风日。凡天气和暖无风，宜令乳母将儿于日中嬉戏，则血凝气刚，肌肉牢密，堪耐风寒，不致有疾病。

《达生编》云：儿生三日，浴之，俗谓之洗三。如冬寒，切不可洗。然《千金方》谓小儿不浴令毛落，则不浴亦非良法。宜如上法蔽风燃火，下帷而浴之。又云：断脐必以艾蘸油为燃，燎断之，令暖气入腹，常视之，勿令湿，较千金法为佳。南中收生妪断脐，多于连胞衣处断之，并留胞衣少许，先系紧，然后断之。虽脐带稍长，易于妨碍，然可免入风泄气之患，亦可用也。

婴儿甫生，气欲绝，不能啼，以暖水濯之。不啼，以绵絮包裹之，勿断脐，以纸捻蘸油，燃火于脐带下熏之，令暖气人腹，更以热醋汤荡洗脐带，令气回啼哭如常，方可断脐。

若面青身冷口噤者，乃胎寒也，宜僵蚕散急救之。

僵蚕散

白僵蚕　木香　肉桂　陈皮　炙甘草　槟榔各五分

水煎取汁，以帛蘸入儿口中。见《医学入门》。

若因脐缠喉管碍产者，急去其所缠之脐，轻按其背俞及胸口，徐摩其喉管，即气复而啼。

初生有即死者，急看儿口中悬雍，前腭上有泡，如石榴子，以指摘破出血，以帛拭去，以发灰糁之。若令恶血入口中即死。初生撮口不饮乳，名曰马牙，不治则死。马牙之候，儿齿龈有小泡，如粟米状，急以针挑出血，用墨磨薄荷汁，断母发裹手指，蘸擦口中令遍，勿饮乳，一时许即瘥。

初生谷道无孔，不得大便，急用金玉簪，揣其是孔处刺通之，以苏合香少许，作小锭，

纳孔中或以油纸纽之，勿令复合。

若非无孔，而大小便不通者，气胀欲绝，令妇人以温汤漱口，吸咂前后心，并脐下，手足心，共七处，每咂三五次，漱口更咂，取红色为度，须臾自通，不尔则死。或以葱汁乳汁各半调匀，抹儿口中，与乳吮下，亦通。

若小便不通，不欲饮乳者，以葱白一寸，四破之，以乳汁入银石器内煎灌之。

若生鹅口疮者，其候口内白屑遍生，舌上鼻上皆有之，不能吮乳，急以乱发缠指，蘸薄荷汁或井华水拭之，三日当脱。若不脱，可煮荚木汁，令浓，以帛缠箸头拭之。无荚木，栗木亦可，或以白杨枝烧沥涂之。

初生遍体无皮者，以白早米粉扑之，候生皮乃止。若如鱼泡如水晶，碎则水流者，以蜜陀僧为末糁之。

初生患连舌，以爪摘断之。微有血出无害，若血出不止，以发灰傅之。连舌者，舌下有膜，如榴子中隔，连接舌下，令儿言语不转也。

生六七日后，气血收敛成肉，则口舌喉颊清净。若喉里舌上有物，如芦管中盛水状者，或如胀起者，可以绵缠长针，留刃如粟米大，刺决之，令气泄，去青黄汁，日一刺之，不过三刺即愈。著舌下者，名曰重舌，著上腭者，名曰重腭，治如前法。

初生感风，鼻塞不通者，取皂角、草乌等分为末，姜汁调敷囟门，或以姜汁调天南星末敷之。又方：用生姜二片，葱二根，捣烂烘热，贴囟门。

外肾缩入，不得出者，以硫黄、茱萸各五钱，为末，以蒜汁调涂脐腹，仍以蛇床子烧烟熏之。

初生遍体发丹毒，赤肿游走，若入腹即死，名曰赤游，乃胎热也。宜以细针，随赤晕周匝，刺出恶血，仍以芭蕉汁或蚯蚓汁涂之，或以赤小豆末，和鸡卵白涂之亦良。

初生二三日，面目绕鼻左右皆黄，闭目撮口而啼，口中干燥，四肢不得伸缩者，乃血脉不敛也。血气沮败，不成肌肉，故有此候，宜龙胆汤。

龙胆汤

龙胆草　钩藤皮　柴胡　黄芩　桔梗　芍药　茯苓　甘草各八分

以水二合，煮二合，儿生一日至七日，以三勺分三服，八日至十五日，以四勺分三服，十六日至二十日，以六勺分三服，二十日至三十日，以一合分三服，三十日以外，以二合分三服。凡寒热、惊掣、变蒸、不解、客忤、惊痫、食积，皆可服之。见《千金方》。

凡婴儿甫出，先以绵裹指拭口中，及舌上恶血。若啼声发，便入腹中，以成百病。断脐后，宜与甘草汤。

甘草汤　以甘草如手中指一节，打碎，以水六勺，煮取三勺。见《千金方》。

以绵裹沾取与儿吮之，计得一蚬壳许入腹止。儿胸中有恶物者，当快吐之。若不吐，须臾更与，尽之。若不吐，是无恶物，勿更与也。

凡母乳儿，不欲太饱，饱则呕吐，如太饱，则以空乳乳之，自消。夏不去热乱，令儿呕，冬不去寒乳，令儿咳且痢。甫交合即乳，令儿羸瘠，交胫不能行。将乳，当先去宿乳，又用力极挼之，勿令乳急出，令儿噎。若急出，以指按夹之，噎则夺之，令得息，然后乳之。儿若卧乳，母当以臂枕之，令乳与儿平，令儿不噎。欲寐，则夺其乳，恐填塞口鼻，且或致过饱，母卧，毋以口鼻向儿，恐气吹其巅顶。母有热勿乳，犯之令儿变黄。母怒勿乳，犯之令生惊，发疳，上气巅狂。母醉勿乳，犯之令身热腹痛。母新吐下勿乳，犯之令儿虚羸。皆所当慎。

富贵家多置乳妇，而愚蠢之辈不知慎护，不识避忌，寒燠失候，饥饱违理，因而致疾者最多。故善怀婴者，当自乳为善，必欲置乳妇，宜择气血清和，肥白壮盛之妇，毋犯胡臭、瘿瘘、疥疥、痴癞、白秃、疬疡、耳聋、鼽鼻、癫痫之疾。夫乳者，血气之所为

也。儿之性情未定，藉血气以涵养之。苟饮以恶浊之乳，则气血日昏，性情日劣，变清明而为愚蠢，为患实深。又不特致疾之一端也。

大凡婴儿气血薄弱，施治难于常人，小有不慎，即生重疾。愚医不察，拘执谬说，肆用毒药，往往而殇。夫疾作而治之于后，曷若未疾而慎之于先，未生则调之于母，既生则适其饥饱，量其寒温，疾从何生，而烦广设谬方，遍倡邪说耶。集怀婴一篇，有心保赤者，所当览也。

拯危第十二

产后诸疾，危迫者多，顷刻生变，有延医治药所不及者。孙于所谓发于秋毫，广于崙岱也。而世俗治此，恒昧其道，稍有不顺，辄谓不治。治之不善，又不啻下石而杀之。盖能起死而定乱者鲜矣。著拯危一篇，以政惑焉。产后血晕，最为危急。其候儿甫堕地，母即昏绝，不省人事，急令妇女，以膝裹绵软旧衣，曲抵产户，勿令气泄，一人以一手挽头发，一手掩口鼻，俟稍转动，乃可用药。若不醒，以韭菜一把，细切瓶盛之，灌以热醋，以瓶口向产母鼻管熏之，仍以铁石器，火烧淬醋，令室中常得醋气，或以醋噀其面，或以漆器烧之。用药宜辨虚实，虚者，其候昏闷烦乱，卒然晕倒，口张手撒，遗尿鼾声，四支厥冷，寸口脉微细散乱，或伏匿不至，此正气大虚，微阳欲脱，阴离阳决，危在俄顷。救之稍迟，则气不复返，宜清魂散。

清魂散

人参　泽兰各一钱二分　炙甘草一钱　当归　芎劳各二钱　荆芥穗一钱

作一服，水煎，加清酒引。见《妇人良方》。

定气饮

人参　白术　阿胶各二钱　炮姜　熟附子各一钱　大枣五枚　炒粳米一撮

浓煎，分二服，温进。

独参汤。

独参汤

人参四五钱

长流水浓煎厚汁灌之。见《医说》。或加炒米一撮，炮姜一钱尤妙。

六味回阳饮。

六味回阳饮　熟地黄五钱　当归三钱　炮姜二钱　熟附子一钱　肉桂二钱　人参三钱　见《幼幼集成》。

相度用之。实者，心下满急，神昏口噤，腹胀气粗，两手拳握，脉无虚象，乃下血过少，恶露上逆，当破其恶血。宜黑神散。

黑神散　肉桂　当归　白芍　炮姜各二钱　干地黄　炒黑太豆各五钱　见《幼幼集成》。

夺命散救之。

夺命散　没药　血竭各等分，治为末，每用一钱，童便清酒各半，煎数沸服，神效。见《丹溪心法》。

若舌强不语者，败血壅其脉络也，宜四味散。

四味散　当归　延胡索　血竭　没药各一钱，每用二钱，童便或清酒调下。或并煎作汤亦可，见《丹溪心法》。

若见鬼谵妄，言语颠倒，眼见黑花者，宜辨虚实，误者即死。体素虚弱，下血过多，昏迷不省，瞑目无所知，甚则寻衣摸空，错语失神者，虚也。又谓之郁冒，暴亡其血，阳神无所依附，宜安神饮治之。

安神饮

人参　柏子仁去油，各三钱　黄芪　阿胶　当归　茯神各二钱　肉桂　炙甘草各一钱

共作一服。

体素壮实，下血未多，发狂见鬼，面青口噤，角弓反张者，实也。败血干心，乱其神明，宜苏合香丸一钱，童便调服。或夺命散、四味散皆宜方俱见上。

血崩不止，是谓重伤。其候血暴下如注，

急若山崩，故名曰崩。唇青肉冷，汗出目瞑，此由阳气大虚，不得收摄，故直下无制，溃决而不可止。宜朝宗汤。

朝宗汤　归身一两　芎藭　干地黄各五钱　芍药二钱　人参　黄芪　肉桂　炙甘草各二钱

分二服。

补气养血汤。

补气养血汤　人参　黄芪　当归　白术　芍药　阿胶　芎藭各二钱　艾叶　青皮　香附　甘草各五分　熟附子一钱　缩砂仁一钱

共作一服。见《万病回春》。

或摄阴汤治之。若少腹满痛，肝藏已坏，不可治矣。

摄阴汤

熟地黄五钱　人参一钱　黄芪一钱　当归一钱五分　荆芥穗炙　棕榈皮炙　甘草炙、各一钱　熟附子一钱五分

作一服。

衄血者，口鼻血出不止，口鼻起黑色如烟煤，是胃绝也。气血散乱，多不可治，急以绯线一条，并产母顶心发二茎，合系产母手中指节，令极紧，仍用荆芥散治之。

荆芥散　荆芥穗为末，每服二钱　童便调下。口噤开灌之。见《妇人良方》。

产后大喘，乃死候也。此由阳气素衰，所下过多，血竭于下，气留于上，无所依附，独聚肺中，孤阳绝阴，命在呼吸。宜独参汤方见上定气饮方见上，炮姜宜易干姜，六味回阳饮方见上，轻者，小参苏饮。

小参苏饮　浓煎苏木汁，调人参末二钱或三钱，作一服。见《东医宝鉴》。

若血下少而作喘者，其喘不甚，由于瘀血人肺，窒碍气道，宜桃仁汤治之。

桃仁汤　桃仁二钱，炒　杏仁二钱，炒　当归　贝母各一钱　茯苓三钱　干姜　人参各五分

若咳逆不止欲死者，以肉桂五钱、姜汁三合同煮，稍服半合许，以手摩肺俞令热，以余汁涂之，时摩时涂，汁尽即愈。见《妇人良方》。

阴脱者，子宫脱出，或脱出如脱肛者，盖产时努力所致。宜当归黄芪饮。

当归黄芪饮

黄芪三钱酒炒　人参　当归各二钱　升麻五分　甘草八分

上作一服水煎。日二。见《丹溪心法》。

若脱出如线，长三四尺，手触之则痛甚者，宜慎护之，不可令断，断则死。以姜三斤，连皮捣之，清油二斤和炒，以油干为度，以熟绢五尺许，叠数层，承其线，屈曲作圆形，纳户口，以绢袋盛姜温熨之，冷即易。一日夜当人其半，二日当愈，仍内服失笑散助之。

失笑散　五灵脂、蒲黄等分为末，每服二钱，童便或酒调下。见《局方》。

凡产后危症，皆属虚寒恶血为患，仅十之三四，而昧者多以去瘀破血该之。肆用攻伐，复杂寒凉，邪说盛行，古法晦昧，夫血已亡而复破之，阳已衰而复泄之，危如转烛，正救犹恐不及，而尚妄谬为之耶。有识者尚其慎之，毋为邪说所惑也。

去疾第十三

产后治疾，当以温补为主，去瘀次之。《千金方》论曰：妇人产讫，五藏虚羸，惟得将补，不可转泻。若其有病，不须快药，若行快药，转更增虚，就中更虚，向生路远，朱彦修曰：胎前毋滞，产后毋虚。亮哉斯言，不易之法也。而方今医者，用法多殊，阳虚发热，妄用滋降，气逆作喘，谓之痰火，岂未见《千金》诸说耶？朱氏为滋阴降火之祖，而于产后大热亦用干姜，虽说理未明，而用法则合，而宗其说者，并此而背之，可异也已。

《脉经》曰：产后之脉，洪实不调者死，沉微附骨者生。又曰：沉小者生，实大坚强急者死。盖产后当虚，沉小而微，虚寒之象

也。当虚反实，则阴阳相并，气血瞀乱，《素问》所谓气并则无血，故脉象反盛。犹之真藏之脉，多属坚强，绝无生意者也。知脉理则知治法，知治法则知病情矣。

大凡产后诸疾，虚寒者十之六七，瘀滞半之，内伤外感又半之，而总不外温补二法。常有之候，曰恶露不行，曰发热，曰尿血，曰无乳汁，曰头脑心腹腰胁痛，曰呕逆，曰淋沥，曰遗溺，曰泄痢，曰便秘，曰阴肿痛痒，曰交骨不合。其甚者，曰伤寒，曰中风，曰浮肿，曰虚劳。凡此数者，世俗犯之，有终身不愈者，至中风虚劳，多归不治。由古法久废，下士多愚，非必死之症也。

恶露之后，产后下血过少，腹满而胀，痛引少腹，牵掣腰背，宜加味生化汤。

生化汤　加泽兰二钱　延胡一钱五分　益母草三钱

甚者逆抢心胸，手足厥冷，唇干腹大，短气促喘，宜甘草汤。

甘草汤

甘草　芍药　桂心　阿胶各一两　大黄一两三钱

以东流水三升，煮一升，内胶，令烊，分二服。见《千金方》。

若败血不下，成块作痛，俗谓之儿枕痛，乃血瘕也，宜失笑散方见拯危篇、立效散。

立效散　五灵脂为末，每服二钱，温酒调下。见《局方》。

古铁酒。

古铁酒

古铁五钱

火烧令赤，以酒三合，入淬之，温服。见《千金方》。

乌贼骨汤治之。

乌贼骨汤

乌贼骨三钱　桃仁二钱　当归　芎藭　芍药　阿胶各一钱五分　肉桂五分　五灵脂一钱

作一服。

产后发热，其候大热烦躁，昼轻夜重，或谵语神昏，脉虚大者，虚也。宜当归补血汤方见孕疾篇。腹内痛，有块者瘀也，宜生化汤方见调摄篇。感冒者，宜补虚加干姜汤。

补虚汤　加干姜一钱

作一服。见《丹溪心法》。

四物炮姜汤。

四物炮姜汤

芎藭一钱五分　芍药二钱　干地黄三钱　炮姜二钱　当归三钱

若因蒸乳而热者，乳必胀痛，去乳汁即愈。若往来寒热者，宜柴胡汤主之。

柴胡汤

柴胡八钱　黄芩　人参　甘草各一两　生姜六钱　大枣十二枚　半夏三合

以水三升，煮一升五合，分三服。见《千金方》。

新产无乳，其故有二：阳虚阴盛，无以化之，营血不得温升，故不能生乳。体素羸弱者多有之。旧说所谓血虚无乳者，即此候也。宜益阳以化阴温经以通络，宣营汤主之。

宣营汤　当归　黄芪　阿胶各三钱　人参五钱　芎藭　芍药各二钱　川贝母一钱　炮姜一钱　红花　甘草各五分

十味，作一服。

气滞血阻，脉络不通，乳道壅闭，亦无乳，宜猪蹄汤。

猪蹄汤　猪蹄二枚　通草二两

以清酒三升，浸之，加水一升，煮一升。饮之。见《千金方》。《达生编》无通草，加生黄芪一两，当归五钱，白芷五钱，名通脉汤。

或贝母汤主之。

贝母汤

贝母一钱五分　连翘二钱　当归　川芎藭各二钱　桔梗　白芷各一钱　赤芍　川续断各一钱　红花五分

头痛者，血虚也，其候痛连巅顶，掣引脑顶，紧急欲死，厥阴少阳阳明之脉，会于巅络于额，贯于脑，骤亡其血，脉络不安，故震动而痛。宜小补血汤。

小补血汤　川芎劳二钱　党参　荆　阿胶五钱　生姜二钱

即少挟风邪，不可发散，宜一奇散主之。

一奇散　川芎劳　当归各二钱　荆芥穗一钱

作一服。见《东医宝鉴》。

心腹疼痛，多由血瘀气结，挟寒而起，宜芎归理中汤。

芎归理中汤

芎劳一钱五分　当归　党参　白术各二钱　炮姜　枳实各一钱　桃仁一钱五分

若虚羸而腹痛，少气不得息，少腹拘急，牵引腰背，不能饮食者，宜内补当归建中汤。

内补当归建中汤

当归一两二钱　芍药一两六钱　甘草三钱　生姜二两　桂心六钱　大枣十八枚

以水三升，煮一升，分三服。见《千金方》。

腰痛者，下焦虚寒，血滞不行也。宜续断饮。

续断饮　续断三钱　当归　阿胶各二钱　杜仲三钱　桃仁　延胡各一钱五分　肉桂五分

胁痛者，肝虚也。宜四物干姜汤。

四物干姜汤　当归　干地黄　芍药各三钱　川芎劳　干姜各一钱五分　枣五枚

冬月产后脐下痛者，宜羊肉汤。

羊肉汤　羊肉四两　当归　陈皮各二两　生姜一两

水一升，酒五合，煮八合，分三服。见《医学正传》。

呕逆之候，腹胀满闷，食入即吐，此败血瘀阻，胃气不降也。宜抵胜汤。

抵胜汤　赤芍药　半夏　泽兰　人参　陈皮各一钱五分　甘草五分　姜七片

作一服。见《医学正传》。

淋沥遗溺，由于下焦虚寒，或产理不顺，妄用谬法，损伤府络，宜桑螵蛸散。

桑螵蛸散　桑螵蛸十五枚　鹿茸　黄芪各一两五钱　牡蛎　人参　赤石脂　厚朴各一两

治为末，每服一钱，米饮调下。见《东医宝鉴》。

鹿角霜饮。

鹿角霜饮　鹿角霜五钱　熟地黄八钱　党参　黄芪各二钱　韭子一钱　肉桂一钱　兔丝子二钱

损者，宜参术膏。

参术膏　人参　白术　黄芪各二斤

熬膏，每服二钱，米饮下。见《丹溪心法》。

或参术饮，然宜速治，缓则无及矣。

参术饮　人参二钱五分　白术二钱　黄芪一钱五分　陈皮　桃仁　茯苓各一钱　甘草五分

以猪羊脬一个煮汤，入药再煎，去滓，作一服。见《丹溪心法》。

尿血者，血随溺下，渗沥不已，甚则溺孔作痛，宜竹茹汤。

竹茹汤　竹茹六合　人参　芍药　桔梗　芎劳　当归　甘草　桂心各三钱　干地黄一两三钱

以水三升，煮取一升，分三服。见《千金方》。

若渴，或淋而渴者，宜竹叶汤。

竹叶汤　竹叶一升　生姜　半夏各一两　大枣十四枚　小麦二合　甘草　茯苓　人参各三两　麦门冬一两六钱

以水三升，煮竹叶小麦，取二升，内药。煮取九合，分三服。见《千金方》。

产后泄痢，多因脾虚感寒，其候杂下五色，或赤白脓血，日十数行，腹痛困顿。宜芍药汤。

芍药汤　芍药　干地黄各一两六钱　甘草　阿胶　艾叶　当归各六钱

以水二升，煮八合，内胶，分三服。见《千金方》。

甚者，桂蜜汤。

桂蜜汤　桂心　甘草各六钱　干姜六钱　附子三钱　蜜三合　当归一两　赤石脂三两

以水六升，煮一升，内蜜，煮数沸，分三服，日一。见《千金方》。

禹余粮汤。

禹余粮汤

禹余粮五钱　白术　干姜各二钱　党参一两　茯苓三钱　陈皮　川芎藭各一钱　炙甘草　木香各一钱

分二服。久不已者，宜豆麦饮。

豆麦饮　大豆微熬，小麦　蒲黄各三合　吴茱萸一合

以水三升，煮一升，分三服。见《千金方》。

泄泻者，宜安中汤。

安中汤

白术二钱　当归　党参各二钱　炙甘草　陈皮　砂仁　麦芽各一钱　生姜七片　大枣五枚

或补中益气汤。

补中益气汤

黄芪一钱　人参　白术　当归各五分　甘草三分　陈皮　升麻各四分　柴胡五分　姜三片　枣三枚

作一服。见《脾胃论》。

便秘不通，多由津亏之故，或误发其汗，阳泄于外，胃气不降，宜泽府汤。

泽府汤　阿胶　当归　各三钱　桃仁　麻仁各二钱　党参三钱　红花五分

降胃汤

降胃汤　人参　陈皮各一钱

作一服。

阴肿痒痛，木郁下陷也。宜温肝汤。

温肝汤　柴胡　白芍　川芎各一钱　当归　首乌　白术　茯仁各三钱　葱白七枚

外以蛇床子煮汤熏洗之。

交骨不合，阳气大虚也。宜十全大补汤。

十全大补汤　人参　茯苓　白术各二钱　干地黄　黄芪　当归各三钱　白芍、川芎各一钱五分　肉桂一钱　甘草五分

或加味芎归汤方见前

产后伤寒，治法与产前同，产前宜安胎，产后宜补血，小柴胡汤主之。

小柴胡汤　柴胡三钱　黄芩一钱　人参　半夏各一钱　甘草五分　姜三片　枣二枚

作一服。见《医学入门》。

若因伤寒时疾，热入血室者，宜小柴胡加桃仁五灵脂汤。小柴胡汤加桃仁、五灵脂各一钱

或柴胡地黄汤。

柴胡地黄汤　柴胡　地黄各一钱　人参　半夏　黄芩各二钱　甘草五分　姜三片　枣二枚

作一服。见《得效方》。

热渴者，熟地黄汤。

熟地黄汤　栝蒌根三钱　人参　麦门冬各一钱五分　熟地黄一钱　甘草五分　糯米百粒　姜三片

见《得效方》。

人参当归饮治之。

人参当归饮　人参　熟地黄　当归　白芍药　麦门冬各一钱　桂皮五分　青竹叶十片　粳米一合　姜三片　枣二枚

见《医学入门》。

中风之候，舌寒唇急，手指振动，甚则牙关紧急，手足瘛疭，背项强直，一身皆重，或痛或痒，呕逆直视，角弓反张，名曰蓐风。此因虚气冷湿，及劳伤所为。《千金方》论曰：凡产后诸风，不得用毒药，不得发汗，特忌吐利，犯之必死。盖阳虚阴惫之候，中气未定，乙木不得温升，郁而生风，播煽脏腑，外则风冷袭之，束其皮腠，表气壅遏，激烈愈增，内外交煽，津液消亡，筋脉挛缩，故手足瘛疭，牙关紧急，项背强直，角弓反张，诸症作焉。较之寻常中风之候，其甚十倍，治亦如之，非可忽略为也。《千金》大豆紫汤。

大豆紫汤　大豆二升　清酒三升

以铁钙猛火炒豆焦，令烟出，以酒沃之，去豆，服三合，一日尽之。见《千金方》。

独活汤　独活五两三钱　大豆二升　旧酒

三升

以渍独活再宿，若急用，微火煮令减一升，另炒大豆焦，以此沃之，去豆，分五服，日三夜二。见《千金方》。

华陀愈风散。

华陀愈风散　荆芥炒为末，每服二钱　豆淋酒调下。见《得效方》。按豆淋酒，即上大豆紫汤，每服一合。

海藏防风当归散。

防风当归散　防风　当归　芎藭　熟地黄各二钱五分

作一服。见《东医宝鉴》。

皆精当可用。若中柔风者，举体疼痛，自汗出，宜独活当归汤。

独活当归汤　独活二两六钱　当归一两三钱

以酒二升六合，煮取一升三合，分四服。见《千金方》。

若夏秋，宜用浴法。

浴法　盐一升六合　鸡毛一把，烧作灰

以水三斗三升，煮盐作汤，内鸡毛灰浴之。见《千金方》。

产后浮肿，乃大虚也。脾恃中气以运阴阳，中气者阳气也。产后亡血，阳气大虚，脾无所恃，失转运之正，水气停蓄，津液阻梗，木郁于左，无升达之力；金逆于右，无下行之路。气位于上，水位于下，肺不降则水上逆，肝不升则气下陷。上逆则肿头目，下陷则肿肚腹。四肢者，诸阳之本，脾之所属也。血亡阳散，失所依附，渔于四末，而水湿随之，无所泄越，故壅阻而为肿。前人论此，谓恶血流入四肢，夫恶血瘀滞，能为痿痹，而不为浮肿，浅小之见，无足深辨。前人诸方，精者绝少，宜驭中汤。

驭中汤

黄芪　人参　白术各五钱　茯苓　当归各三钱　炙甘草一钱　陈皮一钱　苡仁一两　肉桂一钱　生姜三钱　大枣十二枚

作一服。

小肾气汤。

小肾气汤　熟地黄　当归　人参各三钱　泽泻一钱五分　白术五钱　熟附子二钱　肉桂一钱　茯苓三钱

作一服。

若因中风而肿者，宜大豆酒治之。

大豆酒　大豆一升

以水八升，煮取一升半，去豆更煎减半升，内白术二两六钱　附子一两制，独活一两，生姜二两六钱，添水三升，煮二升，内好酒一升六合，再煎，取一升五合，分五服。见《千金方》。

产后虚劳，名曰蓐劳。其候乍起乍卧，饮食不化，时作咳嗽，目昏头痛，口渴盗汗，寒热往来，喘乏自汗，少气惊悸。此由摄养不善，内伤七情，阳陷阴逆，升降倒置，脏腑交病，表里均亏，误用寒凉，即死不治。宜羊肉汤。

羊肉汤　羊肉一斤，去脂　当归　桂心　甘草各六钱　芎藭一两　芍药　生姜各一两三钱　干地黄一两六钱

以水五升，先煮羊肉，取二升三合，内药，煮取一升，分三服。见《千金方》。

猪肾汤。

猪肾汤　猪肾一具，去脂四破之　香豉用绵裹　白粳米　葱白各三钱

以水一斗，煮取二升，任意服之。见《千金方》。或加当归、人参各六钱。　见《广济方》。

羊肉黄芪汤。

羊肉黄芪汤　羊肉十两　黄芪一两　大枣三十枚　茯苓　甘草　当归　桂心　麦门冬　干地黄　芍药各六钱

以水六升，煮羊肉，取三升，内诸药，共煮六合，分三服，一日尽。见《千金方》。

鹿肉汤。

鹿肉汤　鹿肉一斤五两　干地黄　甘草　芎藭　黄芪　芍药　麦门冬　茯苓各六钱　人参　当归　生姜各三钱　半夏三合　大枣

二十枚

以水八升，煮肉取四升，内药，取一升六合，分四服。见《千金方》。

当归芍药汤，消息治之。

当归芍药汤　当归一两二钱　芍药　人参　桂心　生姜　干地黄　甘草各三钱　大枣二十枚

以水二升，煮取一升，分三服。见《千金方》。

若流汗不止者，宜鲤鱼汤。

鲤鱼汤　鲤鱼十两　豉葱各三合　干姜　桂心各六钱

以水三升煮鱼，取二升内药，煎六合，去滓，分二服。见《千金方》。

虚烦者，人参汤。

人参汤　人参　当归　麦冬　干地黄　桂心各三钱　大枣二十枚　粳米三合　芍药一两三钱　淡竹叶一升

以水四升，先煎竹叶及米，取二升六合，内药，煮一升，分三服。见《千金方》

甘竹茹汤。

甘竹茹汤　甘竹茹三合　人参三钱　茯苓　甘草各六钱　黄芩一两

水二升，煮六合，分三服。见《千金方》。

兼见大热者，宜知母汤。

知母汤　知母一两　芍药　黄芩各六钱　桂心　甘草各三钱

水二升煮八合，分三服。见《千金方》。

胸中逆气者，宜薤白汤主之。

薤白汤　薤白　半夏　甘草　人参　知母各六钱　石膏一两六钱　栝蒌根一两　麦门冬一合五勺

以水四升，煮取一升三合，分五服。见《千金方》。

若因交合过早，劳损下血者，宜熟地黄汤。

熟地黄汤

熟地黄一钱五分　当归　蟹爪　鹿角胶　男子裩裆烧存性，各一钱　茯龙肝七分　白茯苓　芍药各五分　桂心　甘草各二分五厘

作一服。见《医学正传》。

凡此诸候，皆常见之疾，达其理，通其法，无有不瘳。外此则有跌仆损伤，一切非常异候，皆不具著。明其大旨，推广而贯通之，亦可无所窒滞矣。

产孕集　补遗

汪县　包　诚兴言纂辑
鄞县　曹赤电炳章圈点

养孕篇

凡孕三四月，体气素虚者，宜服保孕丸、固胎散以养之。

千金保孕丸　杜仲八两，糯米煎汤拌匀炒断丝　川续断三两

二味为细末，以淮山药五两，煮烂作糊为丸，米饮下。忌酒醋。

丹溪固胎散　熟地五钱　归身一钱　人参一钱　炒白芍一钱　白术一钱五分，土炒　川芎五分　陈皮一钱　条芩五分　甘草二分　川连少许　黄柏少许　桑寄生二钱，酒炒　糯米七十粒

水二盏，作一剂。下血加阿胶三钱，胎气痛加砂仁八分

孕疾篇

若患恶阻，大呕吐血，食饮不下，寒热往来，肢节疼痛，疲倦自汗，恶闻食臭，势甚危殆，服橘皮茯苓汤、半夏茯苓汤，不效，或兼外感咳嗽而呛吐血者，宜前苏半夏柏叶饮，止呛止血，服二三剂，自能饮食矣。

前苏半夏柏叶饮　前胡八分　苏叶一钱五分　制半夏一钱五分　侧柏叶一钱五分　阿胶二钱，蒲黄炒　川贝母一钱五分　桔梗一钱五分　当归一钱五分，炒　茯苓三钱　紫菀一钱　甘草五分　陈皮一钱

生姜捣去汁，用渣一钱，淡竹叶十片，水二盏，煎服。

治妊娠伤寒，头痛壮热，肢节烦疼，石膏大青汤。

石膏大青汤　石膏二钱　大青二钱　黄芩一钱　葱白四茎　前胡一钱　知母一钱，炒　栀子仁一钱

七味，水煎，去滓温服。此方既可散邪，又能安胎。见《医通》。

若体虚者，妊娠心烦，热郁不解，闷瞀气结，口破舌干，起卧不安。宜加味竹叶汤。

加味竹叶汤　白茯苓二钱　麦冬三钱，去心　黄芩一钱　人参一钱　粳米一撮　竹叶二十片

水煎空腹热服。肥人加半夏一钱制　生姜二片　见《医通》。

孕妇有水从阴户出不止者，用《千金》鲤鱼汤，加肉桂、人参。

千金鲤鱼汤　加肉桂五分　人参一钱

鲤鱼汤，见孕疾篇。

治妊娠腹痛，不能行动者，通气散。

通气散

破故纸不拘多少，瓦上焙令香。

上为末，嚼胡桃肉半个，空心，黄酒服二钱。

治气血两虚，下血不止，胎动欲下。宜万密斋胶艾汤、桑寄生汤、河间二黄散、丹溪条芩汤，皆可选用。

胶艾汤　阿胶三钱，蒲黄炒　艾二钱　川芎一钱　甘草八分　当归一钱五分　白芍二钱，炒　熟地二钱

水酒各一盏，煎服。

桑寄生汤　桑寄生三钱，酒炒　川断二　熟地三钱　人参二钱　白术二钱　艾一钱　川芎一钱　当归三钱　作一服。

河间二黄散

生地黄　黄芩等分，煎服。

丹溪条芩汤

条芩三钱　白术一两　砂仁　阿胶各三钱

上为末，每服三钱，艾汤下，治血热漏下。

治妊娠忽下黄汁如膏，或如豆汁，胎动腹痛。用黄芪一两　川芎一钱　糯米一合，煎服。见《医通》。

妊娠跌仆，凝血作痛，欲服活血药则恐伤胎，不服药则伤不去，治之当辨胎之死生。如无别症，只用黑糖熬枯，入红酒童便调服，细嚼连皮胡桃肉过口，死胎当下，生胎能全，其痛即止。若伤去而胎气未安，宜紫苏饮加砂仁童便。若跌仆伤疼痛，红肿不能行动者，宜七星散外敷之。

紫苏饮

紫苏　当归　白芍炒　川芎各一钱　人参一钱　陈皮八分　甘草五分　大腹皮一钱　生姜三片　葱白四茎　加砂仁八分，研

童便和服。

七星散　川乌三钱　草乌三钱　桂枝　当归　甘松　紫荆皮各五钱　细辛二钱

上七味研细末，加飞面一两五钱，用高粱烧酒调和，隔水炖热，敷伤处，轻者一次即愈。重者两次，痛止肿消。

若因劳碌胎动血崩者，宜生熟地汤。

生熟地汤

生地酒炒　大熟地各三钱　人参　当归　白芍各二钱，炒　阿胶蒲黄炒　枣仁各三钱，炒　艾八分　川断一钱五分　桑寄生五钱，酒炒　棕榈皮一钱，炙　杜仲三钱，姜汁炒断丝

黄酒一杯，和服。

辨产篇

凡胎未足十月，忽然腹痛，或作或止，或痛不甚者，名曰弄胎。或腹虽痛甚而腰不甚痛者，或胎高未陷者，或谷道未挺进者，或水浆未破者，或浆水虽出而腹不痛者，皆属气虚，并非正产之候。惟宜独参汤助之，慎勿妄投药饵，致产母惊恐而妄乱用力。直待子逼产门，腰重极痛，眼中如火，谷道挺进时，方可用力。兼服催生药，如《千金方》用阿胶三两，车前一两，滑石一两，为末，饮方寸匕，不下，少顷再服。此药临时服之，不可先服。

产戒篇

临蓐饮食宜调，不可不食，受饥，使母无力，尤不可过食太饱，使儿气不能运，多致子母受伤，因而产后发热泄泻，中脘结痛，皆缘饮食所伤。即汤水亦宜少用，往往有膀胱破损，良由引饮过多，尿脬胀满所致。种种危候，尤忌饮酒，每致血逆上奔，急与热童便压之，然多有不救者。

应变篇

产妇或不顺理，以致胎逆不下，即用苎麻子十四粒，朱砂雄黄各五分，蛇蜕一尺烧灰，麝香一字为末，将水和作一丸，先用川椒汤洗脐中，置药于内，再用纸数重覆盖，以帛系之，胎下，下即去药，切勿迟缓。见《医通》。

若冬月胎死坚硬，腹中觉冷，用香桂散，加乌头，及黑神散、琥珀黑龙丹，皆可应用。

香桂散　肉桂三钱　麝香三分　生川乌三钱

酒煎，和滓服。

黑神散　见前拯危篇。

琥珀黑龙丹

五灵脂酒浸澄去砂　当归　川芎　地黄　良姜各三两

五味入阳城罐内，盐泥封固，炭火煅通红，去火候冷，研细，入下项药。

琥珀百草霜　硫黄　花蕊石煅　乳香各

三钱

五味研细，同前药和匀，米醋和丸，如弹子大，临服将丸以炭火煅红，投入生姜汁内，浸碎研化，以无灰酒入麝香少许，不时频服一口，加童便尤宜。

胞衣不下，古法用蛇蜕一条，香油灯上烧研，入麝香为末，童便调服，或加蕲艾阿胶苏木各一钱，麦芽末打糊为丸，名乌金丸，童便服之。兼治难产死胎不出，单方用苘麻子肉，研涂产母右脚心，胞衣下，急洗去，缓则肠亦出矣。

调摄篇

产后九禁：一禁卧，二禁酒，三禁浴，四禁寒，五禁汗，六禁下，七禁利小便，八禁寒凉，九禁起动作劳。

拯危篇

产后血晕，最为危急，无暇延医，即问收生婆产妇下血多少。如下血太多，阳脱阴离，危在顷刻，药煎不及，用人参三五钱，口嚼喂之，随即用清魂散、六味回阳饮以救之，迟则不及矣。曾见一妇入头生，素常娇养，体弱不能忍痛，腹稍痛，张皇坐草，而痛不连腰，以为正产，至四五日而胎不下，祈神服药，至六日胎下，产妇上床而卧，卒然晕倒，四肢厥冷而气绝矣。

败血上冲有三，或歌或舞，怒骂谈笑，口咬拳打，病如颠狂者，此败血冲心，多死不治。《医通》用花蕊石散最捷，琥珀黑龙丹亦效。症属极危，非用峻厉之药，不能起死回生，切勿因系石品弃之。

花蕊石散

花蕊石五两　硫黄二两

二味研末，入阳城罐内，盐泥封固，煅一伏时，研如面，每用二钱，童便调服。见《医通》。琥珀黑龙丹　见前。

若冲胃者，用平胃散加姜桂。若冲肺者，面赤呕逆欲死，用参苏饮，甚者加芒硝荡涤之。

平胃散

苍术四两，米泔浸，再用麻油拌炒黄　厚朴二两，去皮，姜汁炒　陈皮三两，炮去浮白　甘草二两，炙

四味为散，每服四五钱，加肉桂五分，去皮　炮姜五分，水煎温服。

参苏饮

人参五钱　苏木五钱

加芒硝三钱水煎，入童便热服，大便溏泄者禁用。见《医通》。

去疾篇

或因小儿鼻孔吹乳，名曰乳吹，致乳肿胀而痛。用锡茶壶一把，去盖，将乳塞在茶壶内，叫入吸茶壶嘴，用力吸久，其乳汁吸出，即肿消不痛矣。

治乳吹结核肿痛，轻者用生鹿角尖酒磨二钱，煎服，即消重者肿硬，恐成乳痈，用蚤休三钱，大贝母三钱，研末，黄糖拌药末，黄酒调下三钱，盖被取汗可消。外用油梳烘热熨乳亦可消。

产后呃逆者，胃寒所生，因受风冷搏气逆上，乃胃气虚寒之极，宜理中汤加丁香末，应者急投参附，迟则不救。

理中汤　人参三钱　白术三钱，土炒　干姜三钱　甘草三钱　加丁香八分，分三服。

产妇尿胞损破致病淋沥者，法当峻补，用天然黄丝二两，白芨三钱，人参三钱，水煎。至丝烂如饧服，勿作声，作声则泄气无效，名补胞饮。又方：用参、芪、术、草四味熬膏，猪羊胞煎汤，饥时调服，月余胞长淋止。

《金匮》云：少阴脉滑而数者，阴中生疮。阴中蚀疮烂者，狼牙汤洗之。狼牙草市中少有之物，非狼毒也。

又方：治阴痒痛甚者，苦参、蛇床子各一两，煎汤洗之，颇效，能去湿热也。外用

柳花散搽患处。

柳花散 黄柏末五钱 青黛八分 肉桂五分，去皮 冰片一分 共研细末，搽患处。

产后麻木者，症因去血过多，气无所附，是以遍身手足俱麻，木枯风动，贼伤脾土，是以少腹大痛，头晕欲死，此非恶露凝滞，乃中虚气血亏损之故。宜六君子汤加归、芪、肉桂，再服十全大补汤加阿胶、鹿角胶，其病则安。

六君子汤

人参 白术土炒 茯苓各二钱 甘草炙 半夏制 陈皮各一钱 生姜三片 大枣三枚

加当归三钱 黄芪二钱，炙 肉桂一钱，去皮

十全大补汤 见前去疾篇加阿胶三钱，鹿角胶三钱，蒲黄炒

女科切要

〔清〕　吴道源　著

《女科切要》提要

清·吴本立纂辑。本立字道源，海虞人。是书乾隆癸巳刻成，先生究心岐黄术，历数十年。上采前贤之著述，旁录时人之议论，穷源竟委，巨细无遗。先成《痢证汇参》一书，风行海内，已采入本集第六类中。复念女病难医，将平时所辑前哲要语，分门别类，汇集一书，其第一卷列调经。第二卷列血崩、便浊、白淫、淋带、血膨、血癖、经准不孕。卷三列广嗣、受孕、脉法、十月胎形、论妊娠调护法、小产、正产、安胎。卷四列妊娠诸病。卷五列临产诸病。卷六、七、八皆列产后诸病，及绝产不育、妇女杂症等类。皆本实验，方全法备，简明切要，苟能将此书熟读揣摩，然后临证治病，不难著手成春也。

自　序

古云：宁医十男子，莫医一妇人。诚以女病倍于男子，而更多不可名言之隐也。其居富贵之地者，更面藏帐帏，臂盖绮纨，医者望闻既难，切脉亦无从仔细，故女科益难从事焉。余幼殚精举业，亦究心岐黄，缘历试不遇，遂以方药应世，数十年来，穷源竟委，上采前贤之著述，旁录时人之议论，成《痢症汇参》一书。既为四方君子称评，劝授梓人，兹复念女病难医，即平日所辑前哲要语，分门别类，汇为一帙，颜曰《女科切要》。质诸二三同志，俱云语简而明。此书一出，将临症者，俱可唾手取验，而至难医者，从此不难，亟当传世，以为普济之资，因不揣固陋，勉付剞劂云。

时乾隆癸巳小春梅溪吴道源题年七十有五

《女科切要》目录

卷一

调经门…… 143
经水先期而来…… 144
经水过期而来…… 145
经行腹痛…… 145
血风…… 146

卷二

血崩…… 147
便浊…… 148
白淫…… 149
淋证…… 149
白带…… 150
血瞖…… 150
血癖…… 151
经准不孕…… 151
热入血室…… 151

卷三

广嗣论…… 153
胎前门…… 154
受妊脉法 …… 154
男女脉法 …… 154
双胎脉法 …… 155
死胎脉法 …… 155
鬼胎脉法 …… 155
逐月胎形论…… 155
妊娠调护法…… 156
小产…… 157
安胎…… 157

卷四

妊娠中风…… 159
妊娠伤寒…… 159
妊娠跌仆…… 159
妊娠心腹痛…… 160
胁肋痛…… 160
子肿…… 160
胎漏…… 160
胎前杂症…… 161

卷五

难产…… 163
临产…… 163
儿捧母心 …… 164
胞衣不下 …… 164
交骨不开 …… 164
难产缩胎法…… 165
娄氏十产论…… 165

卷六

产后门…… 168
产后血晕…… 169
败血冲心…… 169
产后郁冒…… 169
产后如狂喘满…… 169
血虚发热…… 170
气血大损病…… 170
产后脉法…… 171
产后劳复…… 171
产后胞衣不下…… 171
努力伤胎…… 171
胞衣先破…… 172

卷七

产后虚渴…… 173
产后浮肿…… 173
产后发热…… 173
初产作乳…… 173
产后风痓…… 174
产后怔忡…… 174
产后中风…… 174
血晕气脱…… 174
产后阴虚…… 175

产后疟疾…… 175
产后伤风…… 175
产后泄泻…… 175
产后心腹痛…… 175
产后咳嗽…… 176
产后脚气…… 176
产后遍身疼痛…… 176
产后气喘…… 176
产后呃忒…… 177
产后呕吐…… 177
产后吞酸…… 177
产后不语…… 177
产后头痛…… 177
产后胞损…… 177
产后小便不利…… 178
产后衄血…… 178
卷八
产后无乳…… 179
产后崩淋带下…… 179
产后阴脱…… 179
产后玉门肿痛…… 180
产后肠痛…… 180
产后阴痒…… 180
产后下血成片…… 180
产后尿胞坠下…… 180
绝产不育…… 180
产妇乳裂…… 181
产后阴户翻出…… 181
附妇人杂病诸方…… 181
附妇人修饰…… 183

女科切要　卷一

清　海虞　吴道源本立纂辑
鄞县　曹赤电炳章圈点

调　经　门

经闭为女人病者，盖因女子以血为主也。使其经脉调和，往来有准，有以应水道潮汐之期，旧血既尽，新血复生，有以合造化盈亏之数，则周身百脉，无不融液而和畅。夫何病之有？设或闭焉，则新血滞而不流，旧血凝而日积，诸病丛生。凡血癖血风，与夫热入血室之证，多自此而始矣。然要其经闭之由，必有所因，或月事适至之时，因渴饮水，并食生冷之物，及坐冷水中洗浴，寒气内入，血即凝滞，遂令经闭。又或因堕胎多产而伤其血，或因久患潮热而销其血，或因久发盗汗而耗其血，或脾胃不和，饮食减少，而不能生血。凡此类，皆能令人经闭。其肥白妇人，经闭而不通者，必是湿痰与脂膜壅塞之故也。宜以枳实为君，佐以苍术、半夏、香附、乌药、厚朴、牛膝、桃仁之类，则湿痰去而脂膜开，其经自通矣。黑瘦之妇经闭者，血枯气滞也，治宜补血理气，君以归身、白芍、人参、广皮、香附之类，或因堕胎多产而伤其血，或久患潮热而销其血者，不可用行血之剂，宜以四物为主，佐以木香、香附、厚朴、甘草之类，兼调其气，久而自通矣。有因感暴怒而经闭者，治宜开郁活血，君以郁金，佐以官桂、香附、木香、桃仁、牛膝之类，煮酒煎服，或因食生冷而经闭者，君以官桂，佐以干姜、木香、厚朴、香附、红花、归尾之类。因坐冷水而经闭者，君以附子，佐以官桂、木香、山楂、桃仁、当归、干姜、川芎之类。室女及笄而天癸不至，而饮食如常者，只是气血未足，人间往往有之，必服药疗其杂病，时至，经自流通。亦有年长大而经竟不来者，仍能受孕，名曰暗经。每月至期，必作腰痛，此前人之所未发也。有至期而经水不行，上逆而呕血者，名曰倒经，治宜当归大黄汤。有室女经水既通，而至期复又不来者，必须视其有证无证，验其似疾非疾。若而色不改，饮食如常，身无内热，名曰歇经，非疾也，乃血不足也。若面黄肌瘦内热，是为童痨，诊其肝脉，弦出寸口上鱼际，非药所能治也，急与之成婚，则阴阳和，自然经行而疾去矣，否则十死八九。亦有气血不足者，必面黄肌瘦，常带微热，虽歇几年，服药亦可通之，但不可用破血刚猛之药，如虻虫、山甲、三棱、蓬术之类。只宜用补血生血之药，以四物、归脾加减可也。至寡妇尼姑经闭，乃因有怀不遂，法当开郁而理其经为妥。

大凡妇人经闭，气不调和，因而血不流转故也。故调经须以理气为先，亦有血海虚寒，小腹冷痛者是，宜服大温经汤。有气血虚损者，外发潮热，头痛昏重，肢体倦怠，五心烦热，心忡面赤，口燥神焦，腰背酸疼，盗汗出者是也，宜服丹皮散。有气血凝滞，腹中结块，腰腿重疼者是也，宜服通经六合汤。或红花当归散，以逐其瘀，通其经络也。亦有胃气不调者，貌本壮实，饮食渐减者是也。盖胃气不调，亦能令人经水不通，当以异功散、逍遥散之类间服。一以消食健脾，使饮食加而元气复。一以和其气血，使气血调而

经自行矣。凡妇人女子骨蒸潮热痰嗽，经水不行，诊其脉七八至，视其骨肉消瘦，必死之症，不必用药。大抵男子与妇人同。

四物汤

熟地　当归　白芍　川芎

水煎服。

归脾汤

人参　白术土炒　枣仁　茯神　黄芪钱半　当归　远志一钱　木香　炙草五分　龙眼肉

姜枣煎服。

大温经汤

鹿茸　香附　沉香　白术　陈皮　熟地　当归　白芍　川芎　吴茱萸　小茴　茯苓　元胡　人参　甘草

丹皮散

丹皮　肉桂　归尾　元胡　牛膝　赤芍　三棱　蓬术

水煎服。

通经六合汤

熟地　白芍　当归　川芎　半夏　茯苓　益母　贝母　白术　知母　橘红

水煎服。

红花当归散

当归　红花　桃仁　元胡　川芎　小茴　郁金

水煎服。

如圣散　治崩漏不止。

棕灰　姜灰　乌梅各五钱

水煎服。

逍遥散　解郁调经。

当归　白芍　茯苓　白术　甘草　柴胡　薄荷　丹皮　山栀

化气丸

大凡女子，禀性偏执，若欲治病，先戒性急，或因怒气，或因忧郁，忧郁生痰，怒气伤血，或为疼痛，或为淋疾。淋有五种，变为五色。若欲无病，经水要正。月应乎天，水应乎地，一月一来，如期潮信。怀孕安胎，坐草理顺，经或不准，前后当讯。参前属热，落后属寒。热当清凉，寒宜助温。血热血虚，或清或补。有孕得疾，先保其胎，次调其疾，宜无后灾。延及产后，畴能救哉。新产之后，医法有余，先去恶露，后当补虚。补虚太早，秽不能除，恶心气喘，泻利汗珠，此为四恶。扁鹊难医，症见一恶，病亦难起，小心医治，免死而已。十月怀胎，一朝坐草，瓜熟蒂落，慎勿起早。无知妇女，昏愚妪老，非理催逼，反成烦恼。叮咛戒尔，守此正道。孕妇之脉，坚强最妙，细而微濡，命恐难保。新产之脉，沉迟细小，倘遇洪大，其症必倒。败血冲心，语言乱道，或笑或歌，佛名神号，痰犯心包，同是状貌。败血攻心，始终烦恼，龙齿参归，十神汤效。痰犯心包，昏而有觉，重加芩连，导痰汤较。或夹疾病，先慎风寒，炙煿油腻，万勿加餐，病久危困，先喻其难。医为仁术，细审病端。子悬子冒，子烦子痫，治各有条，不容遗漏。已经怀孕，月水仍来，血有余也，名曰胎漏。生子不实，腹中有块，血气之郁，温血益气，削除其积。元气若虚，且从姑息，虚弱之证，自汗骨蒸，参芪胡连，治之量情，神仙妙术，起死回生。悉心体之，用无不灵。

经水先期而来

室女妇人经事先期而来，其故有二：有热甚者，有气血多而伤血海者。血热者腹多不痛，乃火也，身必热，其色必紫，其脉必洪，宜凉血地黄汤。虚热者逍遥散，或补中益气加黄柏、知母，或四物加陈皮、香附、黄柏、知母，醋糊丸服。如腹中冷痛，禁用寒凉，而用五积散。若泻者，先理脾胃，咳嗽者，逍遥散加川贝。若气血多而伤血海者，其腹必痛，以补血行气为主，亦慎用凉药，宜归附丸及霍香正气散。若妇人四十外，月经或二三日一至者，日久必成淋症。王肯堂曰：月事先期而来，血热必带紫色，或先或后，血色淡而稠粘者，痰也。将来而先腰腹痛者，血

海空虚而气不收摄也。或止或来无定期者，因气不调，故血亦随之为行止也。或一月两至、或数日一至，乃气虚而血热也。或经年之后，累数日而不能止者，乃血海脱滑，兼有火以动之也。既止之后，隔两三日而复见微血者，以旧血未尽，为新生之血所催，故不能容而复出也。明理者观之，即可以施治矣。

经水过期而来

凡妇人女子，月事过期而来，其说有三：有血虚者，有血寒者，有湿滞者。血虚腹不痛，身微热，然亦有腹痛者，乃空痛也。宜服生气补血之药，八物汤加香附。血寒者，归附丸。以脉辨之，若浮大而无力，微濡芤细，皆虚也，沉迟弦紧，皆寒也。王肯堂云：经水过期而至，血虚也，其色必淡，治宜补血为主，以四物加香附、艾叶、五味、麦冬之类，倍加当归、熟地。血淡而稠粘者，以化痰为主，二陈汤加香附、生姜、砂仁。如经水将来而腰腹痛者，以行气为主，宜君以木香，佐以枳壳、香附，同四物煎服。如经水止而复腰腹痛者，以补血为主，君以熟地，佐以归、芎、参、术、芎、苓、香附、陈皮、甘草之类。或一月两至，数日一至者，以补血凉血为主，宜八物汤加黄连、山栀、龟板、炒蒲黄之类。或止或来无定期者，以调气为主，君以香附，佐以陈皮、乌药、砂仁、艾叶之类，与四物同煎服。经数日不止者，以凉血为主，君以炒黑山栀，佐以炒蒲黄、地榆炭、牡蛎、侧柏、香附之类。经正后，过二三四日复见微血者，以四物汤为主，加香附、陈皮、甘草之类煎服。然此不足为病，即不服药，亦无害也。

八物汤

熟地　白芍　川芎　当归　白术　人参　广皮　半夏

五积散

白芷　陈皮　厚朴　当归　苍术　麻黄　川芎　白芍　官桂　桔梗　甘草

水煎服。

二陈汤

半夏　茯苓　陈皮　甘草

水煎服。

醋煎散

赤芍　乌梅　甘草　香附　三棱　莲术　官桂

加醋半杯，水煎。血多加当归、红花、青皮。

艾煎丸

白芍　熟地　艾叶　川芎　当归　人参　石菖蒲

各等分为末，醋糊丸。

归附丸

当归　附子

逍遥散见调经

经行腹痛

妇人经水适行，小腹作痛者，气血涩滞也。用四乌汤。经行而腹痛者，或属虚寒，然气亦能作痛，恐有血瘀气滞，不必骤补，先用四物加陈皮、香附，次用八物汤加香附。如泻者，先止其泻，而痛自止矣。有每遇经行，辄头痛心忡，饮食减少，肌肤不润泽者，宜加减吴茱萸汤。亦有冲任虚衰，小腹有寒，月水过期，不能受孕者，大温经汤主之。有经水过而作痛者，血虚有寒也，法当温经养血，宜四物加桃仁、香附、肉桂。有经行著气，心腹腰胁疼痛者，血瘀气滞也，当顺气消瘀，青皮、归、芎、桃仁、红花、川芎、乌药，水煎服。有经水过期而来作痛者，血虚有热也，宜生血清热，四物加桃仁、香附、丹皮、甘草、元胡。有经水行后而作痛者，气血虚而空痛也，法当调养气血，宜八珍汤加姜枣。有经水过多，久不止而腹痛者，乃脾经血虚也，治宜补血健脾，四物加白术、茯苓、木香、厚朴、香附、陈皮、干姜、甘草，水煎。

血　风

血风者，经水逆行，上攻于脑，头目旋闷，不省人事，甚至满头满面，皆发赤斑者，此因经水适临，感冒风邪所致。盖风善行而数变，其势易上而难下，经水为风邪所激，以故倒流而上行也。血风乃血证中之最急者，宜以四物为主，加山栀、桃仁、红花、荆芥、防风、天麻、薄荷、白术之类。其所以用白术者，以其能去面上游风，及利腰脐间血故也。

四乌汤

乌药　当归　三棱　文术　赤芍　红花　桃仁　官桂　益母　香附

吴茱萸汤

吴萸　人参　大枣　老姜

八珍汤

熟地　白芍　川芎　当归　人参　白术　茯苓　甘草

八物汤见经水过期

大温经汤见调经

四物汤

熟地　白芍　当归　川芎

女科切要　卷二

清　海虞　吴道源本立纂辑
鄞县　曹赤电炳章圈点

血　崩

崩淋之病，相似而实不同，崩者如土之崩，其势大下而不禁，乃血热而兼气虚，不能收摄也。淋者如水淋漓，艰涩而不通快，乃内郁热而气亦滞也。然崩则纯血，淋则有赤白沙石之异，赤者属血，白者属气，沙石者，气血之尤浊者也。治此病者，惟调其气血，清其内热而已。

郑文康曰：妇人暴崩下血，此因肾水阴虚，不镇制胞络相火，故血走而崩也，凉血地黄汤主之。然此症多起子内伤，若小腹不痛，只宜此药，或八物汤加芩连。若痛者，先宜大剂四物汤，归身、白芍、川芎倍之，加醋制香附。若用补药，宜补宫汤加芩连。又血崩证有二说：瘀血也，空痛也。瘀血者，体必作寒热；空痛者，不作寒热也。瘀血则当去，空痛则当补。亦有血海虚寒，外乘风冷，搏结不散，血气成块而得之，宜神仙聚宝丹。又有血气损而得之者，凝聚成块，七癥八瘕，上则气逆呕吐，下则泻痢五血，宜内炙散。血崩之人，如服煎药不效者，火也，三黄汤主之，去大黄，加黄柏。如妇人血崩不止，乃冲任虚弱，脏腑虚冷所致也。亦有小腹急痛，兼下赤白带，宜加减吴萸汤，或艾煎丸。若去血过多，气血不足，四肢倦怠，宜增损四物汤。盖妇人血漏血脱，则宜固气，此古圣之心法也。先补胃气，以助生发之源，诸甘药为之先务，益胃升阳汤是也。此药人皆认以为补气，殊不知甘能生血，此亦阳生阴长之理也。又人身以谷为宝，药料须视其食之多寡而轻重之，毋令药气胜于谷气乃妙耳。如腹痛，加乌药三分，官桂少许。口渴者，加葛根三分。如妇人年老血崩，八物汤加芩连。此一时急救之药也，必先顾其胃气为妙，如血崩，服煎剂不止，易用散子之药，如棕灰锅底墨，炒黑山栀、槐花、侧柏、人参、黄芪、甘草之类为末，童便送下。若以为丸更妙，或用小蓟汁、藕汁调服。经曰：带下血崩，脉多浮动虚迟者生，实数者重。诀曰：生地合蒲黄，黄芩黄柏凉，人参兼五味，解毒细煎汤，水煮空心服，崩中带下良。暴者属血热，宜养血清火，治宜温清散。血崩月久属虚寒，又宜温补，宜益母汤。其寸口脉弦而大，弦则为减，大则为芤，减则为寒，芤则为虚，寒虚相搏，此名曰革。

温清散

归身　熟地　白芍　黄连　黄芩　川芎　山栀炒　黄柏盐炒，各一钱

水煎服。

益母汤　凉血补血。

熟地　陈皮　香附　阿胶　益母草　白术　蒲黄　甘草　黄芩各一钱

水煎，空心服。

五灰散　凉血止血。

莲房灰　黄绢灰　血余　百草霜　棕灰　白茅

为末，蜜丸，米饮下。

张三锡曰：崩有五种，青崩如蓝色，黄崩如烂瓜，赤崩如绛泽，白崩如涕液，黑崩如瘀血。崩漏不止，四物加炒白术、参、芪、

香附、炒地榆、炒蒲黄、椋灰、升麻、血余，水煎。头昏项强者，四物汤加柴胡、防风。虚冷清泻者，四物汤加官桂、附子、姜、枣，水煎。胃虚呕吐者，四物加人参、白术。虚烦不眠者，四物加人参、淡竹叶。发寒热者，四物加柴胡。崩中漏下五色者，用赤石脂禹余粮汤。

槐芩散　治崩中不止

炒槐米三两　黄芩二两

炒研为末，每服五钱，露霄酒调服。

赤石脂禹余粮汤

赤石脂煅　禹余粮煅　牡蛎煅　乌贼骨去甲　伏龙肝　上肉桂各等分

为细末，酒调服。

鬼柴散　专治妇女血崩。

地栗每岁用一个，烧灰存性研服，温酒送下。

补宫汤　治血崩，身发寒热。

熟地　白芍　阿胶　地榆　艾叶　川芎　归身

水煎服。

又方亦名补宫汤　治崩淋，冲任虚损。

赤石脂　地榆　归身　艾叶　甘草　石菖蒲　白芍　川芎　蒲黄炒　熟地　小蓟

水煎，冲热酒半杯服。

益胃升阳汤

人参　白术　黄芪　当归　陈皮　黄芩　升麻　柴胡　甘草　神曲　姜　枣

水煎服。

三黄汤

黄芩　黄连　黄柏盐水炒

百补汤　治血淋。

大熟地　当归　川芎　白芍　阿胶　新会皮　地榆炒炭

水煎服。

便　浊

妇人便浊，或赤如血，或白如泔，不痛者是，痛则淋矣，属湿热，分虚实而治。肥白之妇，脉沉滑，胸膈不利，小便白浊，属湿痰，宜燥中之湿。如面色不泽，身倦无力者，属气虚，宜补气。黑瘦之妇，脉洪数，五心烦热，颊赤唇干，小便赤浊，或白，属相火，宜滋阴。肝脉弦数有力，火盛者，龙胆泻肝汤。治法分渗清热，燥湿健脾，滋阴降火，实下固阳。

浊气下流，为赤白浊。赤者，升、柴、二术、二陈最妙。白者，黄柏、当归、知母、白芍。丹溪谓二术二陈，能使大便润而小便长。如两尺脉沉弱，白浊频数，凝白如油，光彩不定，漩脚澄下，凝如膏糊，古方悉指为阳虚，亦有虚而挟相火者，不可不辨，宜草薢分清饮，专主阳虚白浊。《内经》曰：中气不足，小便为之色变，必先补气升举之，而后分其脏腑气血赤白虚实治之。有邪热者泻热，虚者补虚。设使肾气虚甚，或火热亢极者，则不宜纯用凉药，必反佐治之。要在权衡轻重而已。赤者，热伤血，宜滋阴。白者，湿热伤气，又宜燥湿。白浊不止，宜服珍珠粉丸，用之屡验。气虚，四君子汤，血虚。四物汤，气血两虚，八珍汤下珍珠粉丸。

珍珠粉丸

椿皮炒黄　黄柏盐水炒　青黛　蛤粉　滑石　珍珠

等分为末，神曲糊丸。无火者，加炮姜。方用椿皮、黄柏，能燥湿清热，青黛能解郁热，蛤粉咸寒引下，滑石利窍，珍珠宁神定志。

如上盛下虚，心火上炎，口苦燥渴，五心烦热，小便赤涩，或下白浊，宜清心莲子饮。

清心莲子饮

石莲子即建莲中择有黑壳者　人参　赤苓　麦冬　黄芪　地骨皮　黄芩　车前子　生甘草

白浊经年不愈者，形神衰瘦，心神不安，当作心虚治，珍珠粉丸合定志丸间服。

定志丸

远志　石菖蒲各二两　人参　白茯苓各三两

共为末，蜜丸，朱砂为衣，每服七丸，空心米汤下。

龙胆泻肝汤

胆草　黄芩　山栀　泽泻　木通　车前　当归　生地　柴胡　甘草

萆薢分清饮

智仁　萆薢　石菖蒲　乌药等分　茯苓　甘草　飞滑石

加盐少许。

分清饮

芡实　茯苓　黄蜡

蜜丸，如桐子大，每服百丸，淡盐汤下。

二术二陈汤

白术　苍术　广皮　半夏　茯苓　甘草　升麻　柴胡

水煎服。

白　浮

经曰：思虑无穷，所愿不遂，意淫妄想，入房不能，带脉不引，则为白浮。夫肾脏以慳用事，志意内治，则精全而涩。若眠思梦想，欲淫不能，则淫泆不守，辄随溲便而下也。尼姑寡妇，最多此症。

白浮责于阳虚，当益火之源，鹿茸、肉苁蓉、人参之类，治宜内补丸。要在临症斟酌有火无火而用之，庶无误矣。

内补丸

鹿茸　丝子　沙蒺藜　紫菀茸　黄芪　肉桂　桑螵蛸　肉苁蓉　附子制　茯神　白蒺藜

上为末蜜丸，如绿豆大，每服二十丸，食远酒服。有火者忌用。宜服清心莲子饮。见便浊

妇人之白带、白淋、白浮、白浊，其形相似，病实不同。有虚、实、寒、湿、郁、火，不可混治。前贤议论，通作湿热，不无偏僻。细考《内经》，治法不一。白淋者，淋沥而不止也，多起于郁，大抵虚寒者居多，小腹不痛，亦有去多空痛者，俱用养荣汤加香附，补宫汤亦可。若用热剂，艾煎丸加白芍。痛者，四乌汤加白芍、归身。亦有白淋，久则渐变黄色者，此将成血淋也，艾煎丸、归附丸皆可服。又有变为沙淋者，溺器中下沉白积一层如沙，小便出时涩痛者是也。白淋、赤淋而无沙者，须分其气血而治之。白带者，妇人之常病，俗云十妇九带，甚者腰痛如折，头晕眼花，腰间重滞不断，此是气虚。治宜内补汤加续断，或养荣汤，再以车前草阴干煅灰，频频服之，其效甚捷，屡验。若五色带下，紫金丸主之。白淫乃思想无穷，有欲不遂，一时放白，寡妇尼姑，此疾居多，乃郁火也，治宜开郁降火，越鞠丸加郁金、胆草。白浊甚者，膀胱积热，浑浊如脓，不治必生痈，宜服莲子清心饮。

莲子清心饮见白浊　艾煎丸见经水过期　内补丸见白淫　四乌汤见血风　补宫汤见血崩

越鞠丸

香附　山栀　半夏　神曲　川芎　郁金　胆草

人参养荣汤　治脾肺气虚，荣血不足。

人参　当归　熟地　白术　黄芪　茯苓　远志　白芍　五味　广皮　肉桂　甘草

加姜枣，水煎服。

淋　证

经曰：白者属气，赤者属血。但有气血之分，而无寒热之辨。凡治此者，皆云湿热。然乎否乎？今之治白淋者，不分寒热，多用芩连，亦一偏之见耳。妇人之疾，寒多热少，故用养荣汤治白淋而效，以其有桂也。艾煎丸服一二料而即愈，亦此义也。总在临证时审白而治之。至赤淋，则为热证，不服热药，内补艾煎禁用，宜服八味加芩连，而香附尤

不可少，此女科之圣药也。张景岳论崩淋之证甚悉，已载在血崩一条。其云治此病者，惟调其气血，清其内热最允。又血淋者，月水三五一至，积数月而止者是也。若腹痛，四乌汤，恐有瘀血，未可止也，去多不痛，善饮食者，八物汤加芩连。如饮食少进，用内补汤去参可也。或补中益气加黄柏。凡治血淋，审其小腹痛与不痛，脾胃之实与不实，如小腹不痛，脾胃实也，可用八物汤加芩连。脾胃不实者禁用，宜补宫汤。大抵淋证，先以治脾为主。

养荣汤见白浊　四乌汤见血风　八物汤见经水过期

补中益气汤

黄芪　白术　人参　陈皮　归身　升麻　柴胡　甘草

白　带

妇人带下一证，从腰间带脉而来，故名曰带。虽有赤白二色，终属肾虚。其病与淋相似，然淋之所下者多散而薄，必觉腥气臭秽，带之所下者多滑，稠粘无腥秽之气，以此为辨耳。《保命集》曰：赤者热入小肠，白者热入大肠。原其本，皆湿热结于脉。故津液涌溢，是为赤白带下，本不病结，缘五经脉虚结热，屈滞于带，故脐下痛，阴中绵绵而下也。《内经》云：任脉为病，男子内结七疝，女子带下瘕瘕。王注云：任脉自胞上过，带脉贯于脐上，故男子内结七疝，女子带下崩中。带脉起于季胁、章门，似束带状，今湿热冤结不散，故为病也。经曰：脾传于肾，名曰疝瘕。小肠冤结而痛出白，名曰蛊，所以为带下冤结也。冤、屈也，屈滞而病热不散。先以十枣汤下之，后服苦练丸，再以大元胡索散调之。热去湿除，病自愈矣。赵仁安问用升提之法，更以二陈加白术、苍术，健脾燥湿，亦是一法。诊妇人漏下赤白，日去血数升，其脉急疾者死，迟者生。如赤白带不止，脉小虚滑者生，大紧实数者死。罗先生所用十枣汤、神佑丸、玉烛散之类，虚者不可峻攻，实者亦当酌用。血虚，加减四物，气虚，参、术陈皮补之，甚者固肠丸。相火动者，加黄柏，滑者，加龙骨、赤石脂，滞者、加葵花，性燥者，加黄连，冬月少加桂附，惟在临证时随机应变。丹溪治赤白带下，与梦遗同法。肥人有带，多是湿痰，用海石二陈，加南星、黄柏、青黛、川芎。瘦人带下，俱是郁热，宜香附、砂仁、黄柏、青黛。如结痰白带，以小胃丹，半饥半饱时，津液下数丸，候郁积行，即服补药调理。

苦楝丸

苦楝子打碎酒浸　茴香炒　当归

等分为末，酒糊丸，每服三十丸，空心酒下。如腰痛，四物羌活防风汤下。

十枣汤

芫花炒黑　甘遂　大戟各等分

加大枣十枚。

小胃丹

芫花醋拌一宿，瓦器炒黑，不可焦　甘遂水浸半月，煮晒干　制大黄各一两半　大戟水煮一时水洗晒干、五钱　黄柏炒、三两

共为末，白术膏丸，如龙子大，临卧时津液吞下。

神佑丸

甘遂　芫花　大戟各一两，醋炒　大黄　白丑　青皮　陈皮　木香　槟榔各五钱　轻粉一钱

水法丸。

血　瘕

妇人血瘕之证，虽有因于气食而成者，然成于血者居多焉。若成于气食，腹虽胀而经不闭，成于血者，其经必闭也。妇人血恒有余，故每月见其血而不以为病，若闭而不通，则日积充满。其始发之时，小腹先胀，久则上连中脘，紧胀如鼓，青筋绽露，而血瘕之

证成矣。其有因产后恶血不下，逆而上升，渗入肌肤，充满于中宫，甚至上腾于面，而成充色者，是必死之证也。

血　癖

又有癖块一证，虽因痰与血食三者而成。然成于血者居多，因痰与食而成块者，虽成而不碍其经水。成于血者，亦有经虽来不时而断也，此必经水既来之候，尚有旧血未尽。或偶感于寒气，或触于怒气，留滞于两胁小腹之间，则成血癖也。有经水月久不行，腹胁有块作痛，是经血作癥瘕，法当调经止痛，桃仁、厚朴、当归、红花、香附、元胡、肉桂、丹皮、乳香、木香、牛膝、小茴、砂仁之类。有经行腹痛，麻痹头疼寒热，乃触经感冒也，宜加减五积散。若经行时遍身疼痛，手足麻痹，寒热目眩，照前方去干姜，加羌活、独活、白芷、当归、官桂、麻黄、川芎、白芍、陈皮、苍术之类。又有经水不调，小腹时痛，赤白带下，乃子宫虚寒，治宜艾附暖宫丸。亦有行时气血虚弱，血海寒冷，经水不调，心腹疼痛，带下如鱼脑，或如泔，错杂不分，信期淋漓不止，而黄肌瘦，四肢无力，头晕眼花者，宜补经汤。

艾附暖宫丸

艾叶　香附四制　元胡　熟地　甘草

共为末，醋糊丸，如桐子大，每服八十丸，米汤下。

补经汤

人参　白术　川芎　香附　当归　熟地　元胡　肉桂　吴萸　砂仁　茯神　沉香　阿胶　黄芪　小茴　陈皮　白芍

水煎服。

经准不孕

妇人月信准而不受胎者，其故有三：有因痰闭子宫者，有因气食生冷者，有因男子阳伤易泄者。如痰闭子宫者，其妇必肥白，经来腹不痛，宜导痰汤，或人参半夏丸之类，或二陈合四物汤。如气食生冷所致者，其腹多痛，宜温之，千金吉祥丸之类，如咳嗽，又不宜服，以四物加陈皮、香附、山楂。如气作泻，用枳实丸。如男子精寒易泄，不能受孕者，与妇无干，只宜男子服药。或谓经水正而子宫寒者，万无是理也。盖子宫若寒，经水必过期矣。或又云：子宫寒者，因产时阴户着寒所致，第产后阴户着寒，产妇即便不语，岂能语者，尚谓着寒乎。

薛古蒙曰：妇人经行不正，每不受胎，然参前而受胎者亦有之，其血热故也。女科书云：先期为血热，后期为血气，第有参前落后互兼者。何也？大抵妇人性执，多恼着气，则气不调矣。夫气为血之母，气乱则经期亦乱矣。故调经以理气为先，宜以归附丸、四物丸之类。又有冲任寒损，胎孕不成，或成而后多堕者，诜诜丸主之。

诜诜丸

干姜　白术　丹皮　元胡　肉桂　泽兰　熟地　川芎　白芍　当归　石斛

上为末，醋糊丸，煮酒送下。

导痰汤

半夏　南星　橘红　枳实　茯苓　人参　菖蒲　竹茹　甘草

加姜煎。

《千金》吉祥丸

天麻煨，一两　川芎　肉桂　丹皮　熟地　白术　柳絮　五味　茯苓　兔丝子　覆盆　枳实　桃花片各一两

上为末蜜丸，如豆大，每服五丸，空心，煮酒送下。

热入血室

妇人感冒，发热恶寒，经水适来，得之七八日，热除脉迟，身凉，胸胁满，谵语，此为热入血室。当刺期门，随其实而泻之。

凡发热恶寒七八日，热除脉迟身凉，当自愈矣。今反胸胁满如结胸状，谵语，此因经水适来，血海正开，热邪乘虚入于厥阴藏血之室。肝主魂，热邪内扰神明，是以胸满谵语，如见鬼状，故刺期门厥阴所注之腧，泻其热以外泄。

妇人感冒七八日，续发寒热，发作有时，经水适断者，此为热入血室。其血必结，故使如疟状，或昼明夜甚，谵语如见鬼状，无犯胃气，及上中二焦，必自愈。

上条言脉迟身凉，但刺期门，此条言七八日，续发寒热，发作有时，经水适断，血室未闭，其血必结，忌用苦寒凝滞之药。今有大坝吕天祥媳，经水适断，医以大剂黄连投之，少腹结块而殒。

妇人热入血室，但头汗出，仲景以小柴胡汤和之，家秘倍加柴芩，重加归芍，其功最专，再加丹皮、地骨皮，则身热易退。

热入血室发热，昼静夜甚者，亦有虚实不同。血虚发热者，皆因营血不足，如阴虚内热之证，脉必细数，宜补血凉血。血热发热，邪热入于血分，脉必数大，不必补血，归芍柴胡汤或导赤各半汤之类。

导赤各半汤　病后心下不硬，腹不满，二便如常，身无热，神昏不语，或独语，目赤口干，不饮水，与食则咽，不与不思，形如醉人。

黄连　黄芩　犀角　知母　滑石　麦冬　人参　茯神　甘草

加灯心姜枣煎。

女科切要　卷三

清　海虞　吴道源本立纂辑
鄞县　曹赤电炳章圈点

广　嗣　论

夫阴阳交媾，当经尽之后，无有不成胎者。惟男气不足，女血虚寒，故二气不交，徒施不聚。世之无子者，曾不问自己脏腑之亏，但以涩清壮阳之剂，误为生子之良方，伤天地之和，即或有孕者，无非热药偶成，因贻毒于子女，故虽得而不实也。医之上工，因人无子，著论立方，男以补肾为要，女以调经为先，而又参之补气行气之说。究其盈亏，审而治之，夫然后一举可孕，天下之男无不父，女无不母矣。余考之上古男子三十而娶，女子二十而嫁，故所生子多寿。今人未满十六岁而御女，女子未满十四岁而嫁婿，阴气早泄，未全而伤，未实而动，所以今人不如古人寿。设或用药，不可混治，必察实男子所亏，女人经候，或有崩漏带下，必难受孕，男子不育，必有阳脱痿弱，精冷而清淡，或阳痿不射，故女以调经为先，男以补肾为主也。服药之后，又宜清心寡欲，使我之本原先壮，然后识日之奇偶，施之而不孕者，未之有也。

褚澄氏曰：男女交合，阴血先至，阳精后冲而成男，阳精先泄，阴血后冲而成女，此一说也。东垣云：经水才断一二日，血海始净，交合者成男，四五日后，血脉已旺，交合者成女。此又一说也。顾或有经始断而交合生女，经久断而交合生男者，亦有三四五日以交合无孕，八九日以后，交合有孕者，独何欤？《俞子本选·广嗣要略》云：实阳能入虚阴，实阴不能受虚阳，即东垣之见也。又谓阳微不能射阴，弱阴不能摄阳，信斯言也。世有尪羸之夫，怯弱之妇，屡屡受胎，虽欲止而不止者。亦有壮年精力过人，乃艰于育嗣者，独何欤？丹溪论治妇人，以经水为主，然富贵之家，侍妾已多，其中宁无月水当期者乎？已经前夫频频生育，娶之以图其易者，顾亦不能得胎，更遣与他人，转盼生男矣，岂不能受孕于此，而能受孕于彼乎？愚以为父母之生于，如天之生物，《易》曰：坤道其顺乎，承天而时行，夫知地之生物，不过顺承乎天，则知母之生子，亦不过顺承乎父而已。知母之顺承乎父，则种子者当以男子为主，男子为主，而交媾之时，又以百脉齐到为善。交媾而百脉齐到，虽老弱易泄，亦可以成胎。若交媾而百脉参差，虽少壮康宁难泄，亦不能成胎，妇人所构之血，固由于百脉合聚，较之男子之精，不能无轻重之分也。若男女之辨，又不以精血先后为拘，不以月经尽几日为拘，不以夜半前后交媾为拘，只以男女精血，各由百脉齐到者别胜负耳。是故精之百脉齐到，有以胜乎血，则成男矣；血之百脉齐到，有以胜乎精，则成女矣。至有产而不育者，有育而不能寿者，有寿而黄耆无疆者，则亦以精之坚脆，分为修短耳。世人不察精之坚脆，而定于禀受之初，此论其常也。有少年斫丧而夭者，此论其变也。乃以不育转付之儿，以寿夭专诿之数，不甚谬乎！

宋遂真先生曰：男女交合，有丢泄前后之分。男曰泄，女曰丢。盖妇人月事已净，其乐欲之时，绸缪之候，气蒸而热，昏而若闷，

有不可明言之状，此的候也。交接之候，意合情浓，相持不舍，则百脉齐到而成胎矣。若男情已淡，女意未休，则男先泄而成女，如女先丢，而男后泄者，则成男矣。则知男女各有精，非独男也。《易》曰：男女媾精，万物化生，而交合之后，即以宗筋验其有血无血立见矣，则知男女各有精也明矣。盖月水初净，新血始生，藏而不露，故交合之后，毫无血痕也。经云：阴精所奉其人寿，阳精所降其人夭。信斯言也。苟能清心寡欲，待时而动，亦何所求而不得子欤！

巢氏论妇人妊孕，一月怀胎似露珠，名曰胎胚，足厥阴脉养之。二月大如桃花痕，名曰始膏，足少阳脉养之。三月始分男共女，名曰始胎，手心经脉养之。四月形像俱分明，始受水精，以行血脉，手少阳脉养之。五月五脏俱生足，始受火精以成其气，足太阴脉养之。六月方才六腑成，始受金精以成其筋，足阳明经养之。七月发生通关窍，始受木精以成其骨，手太阴脉养之。八月动手游其魂，始受土精以成其肤革，手阳明经养之。十月受孕足，方生脏腑关节，人神俱备矣。

女科地黄丸　治妇人经水不调。

熟地四两　山萸二两　山药二两　丹皮两半　茯苓两半　艾叶五钱，醋炒　香附三两，童便制炒　阿胶一两

共为末，蜜丸滚汤下。

正元丹　调经种子。

香附一斤，用新艾三两，先以醋同煮一宿，分开，制：醋、童便、盐山栀汤各制四两　阿胶一两，蛤粉炒　枳壳两半，炒半生半　生地　熟地　归身　白芍　川芎　茯苓各四两　琥珀二两

共为末，醋糊丸，每日早晨，空心淡盐汤送下。

千金种子丸　令人多子，并治虚损梦遗。

沙蒺藜四两　白莲须四两　萸肉三两　芡实四两　覆盆二两　龙骨五钱，火煅

共为末，蜜丸，空心淡盐汤下，忌房事一月。

聚精丸

鱼胶一斤，蛤粉炒成珠　沙蒺藜半斤，马乳浸二宿，如无马乳以牛乳代之，蒸一炷香

上为末，蜜丸，如桐子大，每服八十丸。空心温酒下。

五子衍宗丸　添精补髓。

枸杞子　菟丝子各八两　五味子一两　覆盆子四两，酒洗　车前子一两

上为末，蜜丸，空心淡盐汤送下。

壮阳丸　治阳痿气馁不振，老年无子，此药允宜。

肉苁蓉　仙茅　蛇床子　山药　五味子　补骨脂　茯神　紫霄花　杜仲　韭菜子　雄鸡肝　鳖肝　海狗肾如无海狗肾以黄狗肾代之

上药共为末，先将鸡肝、鳖肝用盐酒椒蒸熟，捣烂，和前药晒干，再将前末药磨细，用酒拌山药末，醋调糊为丸，空心淡盐汤下百丸。如阳痿精冷，加肉桂、附子、石燕各一两。

金锁思仙丹　治男子欲劳过度，精神不继。

莲蕊　莲子　芡实各等分　茯神二两

共为末，用金樱子一斤，去毛煎膏为丸，每服三十丸，空心淡盐汤送下。服过一月后，即不走泄，遇种子期，用车前子汤送下。

胎前门

受妊脉法

两尺脉微而带数，两寸浮大两关滑；身中无热脉亦洪，此是妇女胎脉法。

男女脉法

左手滑大而疾男，右手滑大而疾女；更参乳核孰先生，右女左男信无差。

双胎脉法

双胎脉法问如何，两手俱洪断不诬；欲识是男并是女，纵横详见叔和歌。

死胎脉法

脉来沉细腹腰疼，胎伏多寒冷是冰；再看舌色青纹起，胎死何须问鬼神。

鬼胎脉法

脉来乱点如风雨，忽去移时又复来；此是夜叉人不识，即时诊断勿疑猜。

逐月胎形论

初月胎形似珠露，未入宫罗在昆户；犹如秉烛在风前，风急此时难庇护。

初月胎形，如草上珠露，未有宫罗也。在昆户之所，未入腹内也。其形欲聚欲散，未得坚强也。如月信报之，当时头晕恶心，不喜饮食，六脉浮紧者是也。多有畏羞隐讳，而医者不识，作歇经者亦有之，宜服安胎和气饮。或病后受胎，或禀气虚，服罢胎散。

安胎和气饮

白芍　木香　益智仁　砂仁　香附　紫苏　甘草

加葱，水煎服。

罢胎散

当归　川芎　白芍　砂仁　甘草　枳壳

二月胎形北极中，如花初绽蕊珠红；分枝未入宫罗内，气受阴阳血脉同。

二月胎形，受血近阴，在母北极之中，阴户内六寸是也。其胎入腹，未有衣裹，或负重触伤胎气，必致头晕目眩，恶心呕吐，不思饮食，宜服保胎和气饮。

藿香　厚朴　广皮　枳壳　砂仁　黄芩　桔梗　苍术　小茴　紫苏

三月胎形似血英，有宫血室未砉砉；母憎饮食诸般爱，苦辣酸咸并纳成。

三月胎形，与二月相等，不问虚弱，胎气不和，恶心呕吐，兼秋风时气，寒热头疼，悉照前安胎和气饮加减。如寒热不退，加柴胡、黄芩。咳嗽加杏仁。喘急加沉香。

四月胎形入宫室，在母脐胯内相过；兔獐热物诸般忌，免儿唇缺及疯痲。

四月胎形，入宫罗之室，河车衣裹，渐至丹田。忌食一切毒物。如无鳞鱼鳖之类，以免贻毒小儿。如身体疲倦，气急发热，饮食无味，嗜卧头晕，四肢酸软，宜服活胎和气饮。

陈皮　香附　砂仁　小茴　苏叶　厚朴　苍术　枳壳　甘草

五月胎形男女分，四肢胞稳不须忧；男酸女淡思餐味，此定阴阳造化云。

五月胎形，男女已定，令胞母前行，使人后唤之，左回头是男，右回头是女。男思酸，女思淡。已入宫室之内，其胎安稳。胎母喜嗜卧，饮食无味，肚腹胀闷，宜服瘦胎饮。

当归　益母草　砂仁　益智仁　枳壳　香附　白芍

水煎服。

六月胎形在腹游，左手男胎似线抽；女魂右手轻摇动，却在脐中渐渐浮。

六月胎形，男动于左，女动于右，在母脐中，渐渐浮动。若胎母虚弱，用瘦胎饮，使胎气调和，易于产育。

七月胎形身觉邪，男将左手动拿拿；女能右手时时动，行步艰难母叹嗟。

七月胎形，男向左胁动，女向右胁动，胎重如石，行步艰难，脾胃虚弱，气急上冲胸膈，以致腹满喘咳，卒然头晕，勿以中风治之，此乃胎气热邪不安，否则令儿冲心，名曰子悬，宜服知母安胎饮。

知母　苏叶　黄芩　香附　枳壳　滑石　甘草　益母草

水煎服。

八月胎形具备身，毛发生长定精神；穷

思饮食吞难下，困弱忧愁眩闷因。

八月胎形，毛发俱生胎母心闷烦躁，味美不甘，胎气因弱，以致脾胃不和，宜服和气平胃散。

和气平胃散　治胎气不和，热毒泻痢。

苍术　厚朴　陈皮　升麻　柴胡　白芍　地榆　肉果　泽泻

水煎服。

九月胎形重若山，七情开窍一般般；每夜一升三合血，待时生育暂时难。

九月胎形，眼有光，鼻有气，耳闻强，口知味，身舒缩，人道俱全，出世将转身大动，胎母左右胁知觉，宜服保胎如圣散。

保胎如圣散　治产忽然腹痛，先行其水，婴儿降下，忽误吞热物伤胎者。

当归　红花　益智　白芍　益母草　甘草

如儿不下，取鲤鱼一尾，同药再煎，入醋一杯，服乌金丸。

乌金丸

阿胶四两　艾叶二两　谷芽二两　麦芽二两　蛇壳一条　五味一两

上为末，醋糊丸，如弹子大，每服一丸。

十月胎形已完足，四肢罅缝骨精开；坐产即宜加谨慎，莫教儿下客气来。

十月胎形完足，中肢罅缝俱开，至期产下，莫令久卧地下，莫被贼风吹犯。急令包裹，满月之后，始得平安，宜服活水无忧散。因儿未下，恐稳婆动手。

活水无忧散

急性子　当归　益母　紫苏　艾叶　秦艽　陈皮　肉桂　枳壳　白芍　生地　鲤鱼一条

水煎，加醋一杯，服乌金丸。如儿死腹中不下，急取无根水再煎服，此急救之法。

妊娠调护法

《保元论》云：妇人妊娠，常令乐意，运动气血，安养胎元，早当绝欲，节调饮食，内远七情，外避六淫。性宜静而不宜躁，体宜动而不宜逸。味宜凉而不宜热，食宜暖而不宜寒。毋久立久坐，毋久行久卧。又宜却除一切肥甘，以及煎炒炙煿，油腻辛辣，水果鱼鳖、兔鸽牛马之肉，以及鳗鱼鳅鳝无鳞等鱼，一切避忌，便无胎漏下血、子肿子痫子悬等症，以及横生逆产、胎伤腹中之患，生后亦无胎热胎寒、胎肥胎怯，以及胎惊胎毒之证遗累小儿。前贤胎教云：妇人妊娠，寝不侧，坐不偏，立不跸，不食异味，目不视恶色，耳不听淫声，口不出恶言。非义之物不取，非理之财不收，宜听诵读诗书，讲论致知格物道理，则生子形容端正，才器过人。尝见禀性温良之妇，有妊而少啫欲，生子少病而痘疮亦稀，此其验也。《指掌诀》云：胎前众集要须知，恶险当从痰火推，胎上凑心胸胀满，子悬芩术炒山栀。妊娠下血名胎漏，血热而成或气虚，胎动芎归与胶艾，安胎顺气勿教迟。子淋须觅安荣散，胎水还当用鲤鱼，肿满遍身如水气，但煎防己自宽舒。足跌浮肿身无恙，皱脚安胎大腹皮，五月以来烦躁甚，子烦知母麦冬医。妊娠腹疼分虚实，寒热温清可辨之。子痫急服羚羊角，儿晕芎归荆芥奇。泻痢苍砂加二白，热须芩术信为宜。风寒感冒参苏饮，不解黄龙汤勿疑。胸满本方加枳壳，热而无汗葛根驱。里热甚时罩胎散，热极谵语五苓施。脉迟四逆理中治，热泄柴芩半夏除。汗吐下温须仔细，安胎为主勿差池。清脾疗疟须除半，四兽驱邪更补脾。痢疾香连丸有验，胃风主痢补其虚。伤风咳嗽芎苏饮，半贝杏芩桑白皮，秘结不通麻子饮，小水不利麦冬葵。怔忡恍忽心惊悸，气闷喧呼大圣祛。心痛火龙汤可定，腰疼痛气更难知。达生散可将胎束，欲服须当九月时。又云：孕妇之脉，阴搏子下，阳别于上，血气调和，有子之象。手足少阴，其脉动甚，尺按不绝，此为有孕。少阴属心，心主血脉，肾为胞门，脉应于尺，或尺脉微，关滑尺数，

往来流利，脉微带数，身中无热，脉带洪滑，当诘月事，仔细参酌。妇人似病而无邪脉，是孕非病，所以不应。欲别男女，左右取之。左疾为男，右疾为女，沉实在左，浮大在右，右女左男，可以预剖。离经六至，沉细而滑，阵痛连腰，胎即时脱。半产漏下，革脉主之。弱即血耗，立见倾危。琐言识之，概可类推。

大凡妇人妊娠，贵乎冲任脉旺，元气充足，饮食如常，身体壮健，色泽不衰，而无杂病相侵，则十月满足，分娩定然无虞。若气血不充，冲任之脉虚弱，经必愆期，而不受孕。即使得孕，胞门子户虚寒，受胎终归不实。李南宫曰：胎前诸病，惟当顺气安胎。若外感四时之气，或内伤七情，以成他病，治法与男子无异，当以各证类求之。动胎之药，切不可用。

《圣济总录》云：安胎有二法，有因母病以致胎动者，但治其母，胎自安。若胎气不固，触动以致母病者，宜安胎而母自愈矣。

先师天锡陈先生曰：妊娠之妇，身体康健，饮食如常，可保平安，勿生顾虑，勿妄服药，勿过饮酒，勿举重登高，勿多睡卧，闲则步于庭，勿犯房事，扰乱子宫不安，难免产子艰难，且生后多子胎疾，慎之慎之。

凡孕妇堕胎有二故：一为跌仆负重轧伤，一为气血不足，盖腰膝系胎之处，如瓜果之蒂，花卉之根，不得露不长，受热亦易伤。故一月厥阴用事，脏腑不能输精于肝，而致疏泄者有之。二月少阳用事，脏腑不能输精于胆，而致萎瘁者有之。三月手心经脉用事，脏腑不能输精于心，而致朽腐者有之。四五七月堕者，莫不皆然。是故安胎之法，当视其虚实寒热而药之，则无不安矣。

小　产

小产者，言非大产，在四五六月之间而堕者，所谓半产是也。若二三月，人像未全，还是血块。苟有所伤而堕者，非曰堕胎，二者皆属根蒂不固，冲任经虚，须分是火是寒治之。有火者清之，白术、黄芩之属，而益以养血也。寒者温之，胶艾、桂附之属，而加六味。然桂附辛热，尚宜酌用，切勿轻投，实者清之，虚者补之，尤当顾脾胃以生新血。盖胃为水谷之海，脾为万物之母，人身之有脾胃，犹万物之有土也。有土乃生金，金生水，水生木，木生火，故培土而五行有相生之妙，扶脾胃而五脏有递受之益，在孕妇永保无虞，何有堕胎小产之虞哉？

宋遂真先生曰：前哲云，初受胎而即堕者，肝血虚也。胎以血为本，肝脏虚则生发之机困，如春初多冷，草木不芽可知也。治宜益肝血，胎斯固矣。二月堕者亦然。实者反是。三月堕者，心血虚也。胎以血为根本，心脏虚则长茂之气消。如夏初天气暴寒，而花果不实可知也。治宜养心补血，胎斯固矣。四月堕者亦然。五六七八月而堕者，责在气血之并虚也。盖气为血之卫，血为气之配，气不能卫血则血无所统，血不能配气则气无所归。儿在母腹中，所赖母之气血充和耳，苟有所伤，安所赖乎？是以调气先必养血，盖血尤须补气，养血而血不生，补血之源，肾水是也。补气而气不足，补气之根，命门火也。故五六月间而有堕胎者，六味去丹皮加人参、麦冬、杜仲、续断为要药。寒痛者加附子少许，百无一失也。有胎乱动而不休者，胎热也，不可用燥热之剂。此外胎动者，或因冲任经虚，或因七情六欲，或因过服热药，须各审清病源而治之，如四五月间，心中昏闷，四肢沉重，不能移动，恶闻谷食，喜吞酸味，胎动不安，安胎饮主之，或紫苏饮加半夏、茯苓、枳壳。

安　胎

安胎饮　治孕妇三四月，胎动不安。

熟地　当归　茯苓　甘草　川芎　白术　半夏　阿胶　地榆　白芍

加姜三片，水煎服。

紫苏饮

紫苏　陈皮　当归　白芍　川芎　人参　甘草　腹皮

安胎和气饮又名达生散

白术　陈皮　白芍　木香　陈仓米

姜水煎。

胶艾汤　治半产下血。

阿胶　川芎　当归　艾叶　甘草　白芍　熟地　炮姜

安荣散　治子淋。

人参　当归　通草　滑石　麦冬各二钱　灯草五钱　甘草五分

为末，每服二钱。

麻子润肠汤　治风结血结。

麻子　当归　桃仁　羌活　大黄

香连丸

黄连吴萸汤拌炒　木香晒干，研

末之，醋糊为丸。

五苓散

猪苓　茯苓　白术　泽泻　肉桂

加灯心煎。

四逆汤

附子　干姜　甘草

腹痛加白芍。

理中汤

白术　人参　干姜　甘草

鲤鱼汤

当归钱半　白术　白芍各一钱　茯苓钱半　赤小豆八分　木通八分　车前八分　鲤鱼一条

七情汤

肉桂　陈皮　人参　甘草

二白丸　治淋带。

石灰一两　茯苓二两

为末，用荞麦面鸡子清，调糊为丸，每服三十丸，空心，白滚汤下。

化气汤

砂仁　香附　广皮　苏梗　川芎　枳壳

胃风汤

人参　白术　茯苓　当归　川芎　白芍　肉桂

加粟米百粒。

清脾饮

青皮　厚朴　柴胡　黄芩　半夏　茯苓　白术　甘草　草果

羚羊角散　治子痫风痉。

羚羊角　独活　枣仁　茄皮　米仁　防风　当归　杏仁　茯苓　木香　甘草　姜

四兽饮

半夏　人参　茯苓　白术　橘红　乌梅　草果　甘草　生姜

火龙汤　治孕妇心痛，因寒邪犯胃。

蕲艾盐水炒，五钱　茴香五钱，炒　川楝子五钱，炒

上药为二剂，水煎服。

黄龙汤　治孕妇新产伤寒。

柴胡二钱　黄芩一钱半　人参一钱　甘草五分

姜三片，水煎服。

防己饮　治足胫肿痛。

防己　木通　槟榔　生地　川芎　白术　苍术　黄柏　犀角　甘草

半夏茯苓汤　治恶阻呕吐心烦，恶闻食气，多卧。

半夏一两二钱　赤苓　熟地　陈皮　白芍　人参　川芎　桔梗　旋覆　甘草

《千金方》无旋覆花，有细辛、苏叶。上药共为粗末，姜七片，水煎服。

验胎方　经水不行，疑似未明者。

川芎为末，每服一钱试之，艾叶汤调服。觉腹中微痛，则有孕矣。

《大全方》论半夏动胎不用，仲景用之，取其辛以散结气，泻逆气，故恶阻用之，而非专为痰设也。娄全善治妊娠恶阻，累用半夏，未尝动胎，而郑氏专门女科亦尝用之。经云有故无殒者是也，不必拘泥。

女科切要　卷四

清　海虞　吴道源本立纂辑
鄞县　曹赤电炳章圈点

妊娠中风

【妊娠中风歌】中风恶候告君知，眼合肝兮手撒脾，心绝口开肺鼻鼾，肾家将绝定遗尿。

妊娠手足搐搦，忽然不省人事，角弓反张，状如中风者，子痫也。宜服砂仁汤。倘胎前无故卒然闷到在地，或有不识，误以中风断之，谬矣，此儿晕也，名曰子悬。须以安胎调气治之，紫苏饮加砂仁、川贝、茯神。虽至将产，仍服紫苏饮为妙。有胎前发喘，乃胎不安而冒风也，用带须葱白廿茎，煎汤服之，即愈。盖葱能发散，而又安胎也。若因伤食而喘者，紫苏饮冲入童便，加砂仁煎服，舍此无别药也。若胎气不和，凑上心腹，以致胸膈饱闷，喘急疼痛，此子悬也，宜紫苏饮。此药有安胎止堕之功。如胎前偏正头风，川芎调茶服主之。妊娠感冒四时风寒，霍乱吐泻者，藿香正气散主之。凡胎前伤暑，与霍乱治法同。如胎前疟疾，惟养荣汤一方。孕妇发呃气逆者，用紫苏饮。亦有胎死腹中，以致气侵上而呃者，下死胎而呃自止矣，不可不知。孕妇伤食，以紫苏饮加神曲、查肉、砂仁、麦芽。如兼吐泻，用养胃汤。有孕无故悲泣不止，如有鬼物以凭之，此名脏躁，非大枣汤不愈。有妊娠忽然耳聋昏聩者，气血不足也，用十全大补汤。目赤肿者，四物汤加黄连。遍身拘急，痛无定处，夜不得卧，眼花昏黑者，胎气使然，宜服紫苏饮。

妊娠伤寒

【妊娠伤寒歌】伤寒头痛连百节，气急冲心溺如血，身热发点紫黑青，壮热不止致胎灭。呕恶不止与心烦，腰背项强脑痛裂，六七日来烧腹中，小便不通大便结。妊娠染表症伤寒者，当用带须葱头汤服之，出汗即愈，不可轻用发表药。若误用之，其胎必堕，且母命难保，戒之慎之。胎前瘟疫，与伤寒同，孕妇伤寒咳嗽，宜二陈加薄荷、白术、川贝。泄泻者，胃苓汤去参，俟脾胃实后治嗽可也，即参苏饮亦可服。盖风药最易动胎，反为不美，故胎前伤寒，身热咳嗽者，惟以带须葱白煎汤服之，大能安胎顺气。若胎不安，煎砂仁汤服，汗多，服参苏饮。干呕，紫苏饮去参加茯苓。吐血，止血丸，或二陈加黄柏、知母、楂炭、白术。如气血两虚，八物加黄柏、知母。

妊娠跌仆

【妊娠跌仆歌】怀胎跌仆无轻重，遂致伤胎在腹中。已损包胎血上逆，冲心闷痛母魂倾。

妊娠跌仆，或受伤重者，服活血药，又恐伤胎，不服则伤不能去，当何法以治之？曰：必先辨其胎之死生。如腹冷舌青者，子死也，以香桂散下之。若未甚分明，以佛手散探之。如胎伤者，立即堕下，胎无恙者，其痛立止。但痛止之后，尤须视伤之轻重。下药轻者，童便酒入活血药饮之，血活则伤去，随以紫苏饮加童便、砂仁，缓缓服之；重者只治其伤，

勿顾其胎也。血行胎下，母命保矣。服紫苏饮加枳壳、童便、砂仁尤妙。有孕妇胎前衄血，产后多不吉，血以养胎，不宜走泄故也。服紫苏饮加黄芩自愈。更有口中见血及大便下血者尤忌。

妊娠心腹痛

【叔和心腹急痛歌】心腹急痛面目青，冷汗气促命必倾；下血不止胎冲上，心腹冷闷定伤身。

妊娠腹痛而见血者，名曰胎漏，至产即愈，生子不实也。紫苏饮加陈皮、砂仁。若胃口痛甚，用指迷汤或养胃汤。亦有孕痈者，何以辨之？服安胎饮，消食理气之药，俱不效，但脐近下处肿痛发光者，即腹痈也。因孕妇生之，名之曰孕痈，宜十补托里散，此药补而不碍胎，其次千金托里散亦可。有脐下冷痛腹胀，小便频数，大便滑泄，缘正气虚弱，过食生冷所致，宜安胎饮加枳壳，及和气之药。如小腹痛，须察其脉，若可安，紫苏饮安之，不能安，则用活血行气之药。其内伤甚者下之，若血结不下，必腹中疼痛，服金屑散。或宿食炫癖，气血瘀痛，葱白散主之。一切血痛，肉炙散、白术煎。腰痛甚者，肾虚也，其胎多堕，宜急服安胎饮以固其胎。复不寒，紫苏饮可加黄芩。若胎不时转动，如腰腹痛者，亦宜安胎饮。

胁　肋　痛

孕妇胁痛甚者，其说有三：或因哭泣，或因忿痛，或因内伤。如内伤者，现有胎。不可用行伤药，只宜童便酒，或紫苏饮加白芍、当归、砂仁、人参童便煎服，亦足以固胎。或曰，胁痛非芥子不能达，柴胡、枳壳亦可用。如背痛者，气滞而不运也，宜紫苏饮。妊娠口干烦闷，不得卧者，名曰子烦，紫苏饮主之。又有口舌生疮，咽喉肿痛者，切不可用防风通圣散，有孕妇未产而乳汁先下者，名曰乳泣，生子多不育。有儿在母腹中啼哭，不须服药，用黄豆打番，招孕妇细细拾之，其哭自止。

子　肿

【子肿危殆歌】子肿伤肝唇定黑，缺盆平也必心伤；背平伤肺脾脐凸，脚背平时肾病深。

妊娠浮肿，其说有二。盖胎前患水肿者少，而患胎气者多，乃气病也，名曰子肿。紫苏饮主之。若小便不利腹胀者，水肿也。紫苏饮加泽泻、车前、白术治之。三焦无病者，加山栀、黄芩利小便甚捷。如孕妇浮肿，上半身者宜发汗，下半身者宜利小便，上下俱肿，汗利兼施，服药肿退而脱身者，不必再药。

凡妇人怀孕，宜别室安睡，常使身心清净，不得再犯房事。夜睡须左右转换，使小儿左舒右安，肢体活动，临产自然快便，生子亦聪明少疾。昔有一医宿店，值店妇生产，数日不下，下体甚冷，急以椒、橘、茱萸、干姜、良姜等煎浓汤熏洗脐腹产门等处，气温血行而遂产。

胎　漏

【胎漏歌】血下如同月水来，漏干胞血必伤胎。胎伤妊娠须忧虑，急赐灵丹救得回。只缘欲火房劳损，非是寻常虚漏胎。

盖胎之漏者，必有因而来，或误吞动胎物，被热毒所侵，或房劳而伤损，损轻则漏亦轻，损重则漏亦重，血尽而胎死。或因母病而胎动者，病治而胎自安。或胎不坚固而母病者，胎安而母自愈矣。又有值经期而见血，每月一至，名曰漏胎，宜服安胎饮，或紫苏饮加黄芩、白术、阿胶、砂仁，自然无事。亦有伤胎气而下血不止，宜夺命丹。胎

未损者，服之可安，已损者，服之即下。

胎前杂证

孕妇卒然不语，名曰哑胎，不须服药，产则能言矣。盖声出于肾，胞络贯肾，故不能言也。经曰：九月而瘖，十月当复便是。妊娠谵语，用四物汤，倍加白芍、当归、去生地，合二陈加山楂、薄荷、姜汁治之。

孕妇舌青者，子死腹中也，用麝香五分，肉桂三分，为末，煮酒调服。如双胎一生一死，亦宜此方。因母患症熏蒸其胎，致儿灼死，死儿着冷，不能自出，或用黑神散之类，以暖其胎，胎自下矣。

孕妇小便频数，名曰子淋，服内补汤立效，小便不通者，乃胎下坠而压膀胱，名曰转胞，宜补中益气加车前。有内伤者，乃血郁不去，今之便痛是也。

妊娠大便秘结，乃血枯气闭也，四物汤加枳壳、桃仁。孕妇水泻，宜分别而治之。忌理中五积散。因有干姜、玉桂也。伤食泻者，养胃汤加消食药。有伤生冷而泻者，亦用养胃汤加木香。火泻者，香薷饮，夏月暴注下迫者是也。暑泻者，胃苓汤加香薷。气虚作泻者，肠鸣而不痛，水谷不化者是也，补中益气汤或四君子汤。胎前血泻，胃苓汤加木香、砂仁，或紫苏饮加神曲、泽泻、黄连。胃口发饱，夹痰呕逆者，忌用参连。胎前产后痢，载《痢证汇参》，故不赘。

怀孕五六个月，或七八月，胎忽乱动，两三日间或痛，或有水下，但腰不甚痛，是胎未离经，名弄胎，又曰试胎。胎水有无俱不妨，但直身坐卧行立，不可惊忧逼迫，以致误事。二者俱非正产，必因触犯所致。凡孕妇五六个月，或三四个月，常要紧束其身，勿令胎放肆，又不可饮酒常沐浴。

《达生编》云：小产当慎，三五月而堕者，谓之小产。此因脏腑损伤，胞系腐烂，以致堕胎。此比之大产更甚。大产瓜熟蒂落，本无足虑，尚有多少艰难，何况损伤胞系而堕乎？轻视小产，每致殒命。须倍加将息，宜服补血养气去瘀生新之药。世有服落胎之药者，害莫大焉，此乃产稳婆所为，医者断无此事也。

催生之说，自古相传，然瓜熟蒂落，何必催也。催之非但无益，转或有害。有用兔脑丸者，有用千年益者，有用催生石者，有急性子者，有笔头灰者，有草麻子捣烂涂足心者，用之多有不验，徒增繁扰，噫，平时失于调护，任意行房，以致难产，频以催之，又何济乎？此愚夫愚妇之所为也。

儿在母腹，男女有别。男子负阳背阴，女子负阴背阳。在腹中亦然，男向于内，双手倾捧母心，女向于外，居母心下，两手自捧头面，而背母足居下。至临盆时，倒转而顺出矣。若产母侧卧，致儿倒运不转，即有横生逆产之患。故坐草切不可太早，须再三令人扶掖运动，方免前祸。不知此理，徒归产母之气血不足，岂不误哉！然亦有卧而产者，必令仰卧平正，使产门虚而不碍可也。卧而能产，惟血气充实者能之，若不坐不卧，无故顿住而难涩也。力可委罪于气血不足耳。医者宜鉴诸。

孕妇临产之月，胞水未破而血先下者，此乃胎伤，非产也。宜八物汤与安胎饮治之。若胞水已破，此欲产也，用紫苏饮以生其血。滑胎之药，须胞水破，痛阵急，十月满足者，方可服。若胞水未破，腹痛未甚者，虽十月满足，恐未坐草，只服安胎饮或紫苏饮，白芍换赤芍，当归用尾，去人参，加姜葱水煎，入童便一杯，忌用桃仁活血之药。胞水已破，儿即堕地，谓之铺蓐，生产最快利。如胞水已破，儿不下者，谓之试水，此产反迟。有停一二日而产，有服安胎饮而水止痛定，至五六日而方产者，切不可于破水时，即用稳婆动手，令胎妇费力痛苦，多致受累。胎累日不下者，宜先气血助其胞水，佛手散或紫苏饮。临蓐先放红水，致儿干搁，与行船无水

同，宜紫苏饮以生其气血。如临蓐腰腹俱痛，不可用稳婆轻易探候，即胞水已破，腰痛已极，止当令孕妇扶掖走动，则生育自然顺也。至于横生逆产之患，皆因先动手故也。其脐带系于命门，儿将育时，两手洗荡，使脐带脱落，然后得出，安得不痛？即所谓瓜熟蒂落是也。

女科切要　卷五

清　海虞　吴道源本立纂辑
鄞县　曹赤电炳章圈点

难　产

【难产生死歌】欲产之妇脉离经，沉细而滑腹又疼，定知半夜应分娩，脉法由来载《内经》。大凡临产应如此，产妇安然切勿惊。身重寒热痛频频，唇甲之色黑复青，子死腹中从此验。舌青冰冷母归阴。而赤舌青须细看，母活子死定分明。唇口俱青白沫出，子母俱亡自可凭。面青舌赤沫又出，母死子生定知真。临症过来俱应验，方知前哲不虚陈。

难产之症，宜服童便，磨神仙聚宝丹服之。或有不顺者，用草麻子肉十四粒，朱砂雄黄各五分，蛇壳尺许烧灰，加麝香一分，共为末，将水和作一丸，用川椒汤淋产妇脐内，次将丸药纳脐中，用绵纸数层覆其上，再用阔布缚住，待胎下即去其药。推肠生者，若肠不收，用新汲水入醋少许，三喷其面，即自缩而上矣。若肠下时，须用温汤洗湿，米筛盛之。若沾染尘垢，及着干物，即不肯上，且粘住断绝，而母命不保矣。又法：将产妇顶心发分开，用草麻子肉捣烂，敷子颠顶，将肠温水养之，其肠即收，则母命全矣。又有横生逆产，手足先出者，用细针连刺儿手足，将盐擦其刺处，即便缩上，俗谓讨盐生也。

有头胎生，曾二三个月随堕，嗣后第二三胎，仍前复堕，名曰滑胎，不可复安矣。必须于有胎之后，曾有正产一次，后无此患矣。

按紫苏饮一药，能治临产惊恐气怯，累日不下，乃妊娠之要剂也。

壬午年间，曾有某室怀孕，十月满足，忽然腹中大痛，即唤稳婆守候，稳婆欲图大望，假意探胎消息，将指摘破胞衣，水流不止，胞水流干，胎元干搁，不能转运，日夜无眠，痛亦不已，约四五日矣。邀余往视，诊其脉，六脉离经，或曰六脉已散，命将危矣。余察其舌色鲜红，毫无青色，谓曰不妨，将临盆矣。或曰胞浆已干，有何生理？答曰：古有急开支河之法，即大剂四物人参，加入车前五钱，柞枝一两，煎汤代水煎服。房中稳婆三个，议论纷纷，或欲早用钩割，以全母命。余曰：各人不可动手，瓜熟蒂落，可保子母两全。服过药后，少顷，腹中大痛，唤人扶掖走动，儿即堕地。今已十二岁矣。

临　产

【临产歌】临产之时勿易看，蓦然气凑目珠翻。唇青口噤流涎沫，子母双双入死关。舌色鲜红唇面黑，子存母死片时间。面红舌黑儿难保，佛手仍须夺命丹。横逆催生龙蜕散，滑胎可救漏胎干。死胎欲下芎归饮，更捣草麻脚底摊。血入胞中时胀闷，上冲心胃死何难。朴硝散共红花酒，夺命神丹逐下安。产下血逆成血晕，清魂急灌命须还。血由一倒心无主，目暗神昏汗雨漫。气随血脱多难救，桂附参耆大剂堪。血冲心闷成狂妄，喘促蒲黄不等闲。儿枕痛知缘恶露，当归失笑效非凡。忽然口噤言颠倒，见鬼原非风与寒。败血上冲心血耗，妙香散共黑龙丹。

夫妇人临产，死生反掌，若善于救治者，实可以起死回生。稍不急救，多致夭枉。救

之不得其法，药之不能应手，亦莫全其生也。将产努力过多，儿转未速，以致胎落于胯，不能育者，有因子横子逆而难产者，有体肥脂厚，平素逸而难产者，有子壮大而难产者，有年长遣嫁，交骨不开而难产者，有胞水先破，胞内干涩而难产者，有胎死腹中而不下者，其腹冷舌黑可验。有胞中积水，其腹大异常，脉息细弱，名曰胞水。时医不识，疑为双胎，临产必去水斗余，方产。其儿手足，必然软短残疾，盖水渍其胎故也。医者识此，早用去水之药，儿斯无恙矣。有儿下地，去血太多，产下即死者。有血奔上而昏晕者，有子下而胞不下者，有败血灌满胞中者。如胞不下，须行去胞血，则自下也。有因稳婆取胞，误伤内脏，轻则带疾，重则伤命，慎之慎之。大抵贫贱妇人生育极易者，以其劳役，胎气流动故也。富贵之家，厚养安逸，身体肥壮，每难生育也。

《脉经》曰：临产六至，脉号离经，或沉细滑，若无即生。浮大难产，寒热又频，此时急候，急于色征。面颊唇舌，忌黑与青，面赤母活，子命必倾。若胎在腹，子母归真。

临产之时，切不可喧闹，选一善熟稳婆，或得力使女，无使挥霍慌张，致令产妇惊恐，宜食软饭稀粥。若腹中痛，且令扶行，或痛或止，名曰弄胎，不可使稳婆手探，尤不可屈腰卧眠。如连引腰痛，眼前如见火光，此是儿转运，须扶掖徐行。起若艰难，即持物立住，须臾直至腰腹相引，难以行立，然后坐草，切勿太早，恐儿在腹，难以转动。及胞水先破，子道干涩，皆主难产。若心中热闷，将生鸡子一枚，打破吞服。抱腰之人，不可倾斜，则儿自然顺下。若临事仓皇，用力失宜，随有难产之患。小儿已出，勿令便睡，宜闭目而坐，少顷，方扶上床，仰卧立膝，勿令熟睡，宜频唤醒。切不可以得男为喜，喜则伤心，恐生红汗之症。亦不可以得女为忧，忧则致败血攻心之患。房中常以醋烟熏之，以防晕闷血升。数日之外，不可勉强下床，一月之外，莫犯房事，谨之慎之。

妊娠临产，有儿湊心不下者，其儿手必捧母心，多致母子俱亡，必用药引入心分，解开儿手，方得产下。盖儿手捏物最紧，药气一到，其手自软，故口解开。有产后胞衣不下，不可视以为细故而忽之，多有升至心而死者，不可不知。

儿捧母心

儿捧母心者，急用猪心血，调乳香五钱，煮酒送下，儿手遂开。如胞衣不下，用花蕊石一两，硫黄四两，入罐，盐泥固济，煅过为末，童便酒调一钱，即下。胞衣未下时，产妇将己发推入口中，似欲作呕势，胞衣即下矣。

有胞水放干，儿不肯下者，急以大剂四物，加车前一二合，流水煎，频频服之，儿即随水而下。此急开支河法也。虚者加人参。

胞衣不下

《准绳》云：胞衣不下，用瓦油盏烘热，仰放产妇脐上，令男人以脚抵住油盏，其胞即下，乃乡村之法，果验。

交骨不开

交骨不开，有因元气素弱，胎前失于调养，以致气血不能运达而然，用加味芎归汤加柞树枝一两，大剂服之，外以麻油调滑石末，涂入产门，交骨渐开。

达生散即紫苏饮　胎前之妙剂，催生之良方。

大腹皮三钱　人参　紫苏　陈皮　归身各五分　白术　白芍各一钱　炙草二钱

加黄杨头七个，枳壳、砂仁五分，青葱五茎，水煎服。此方补中行滞能下死胎

胃苓汤

苍术　厚朴　广皮　白术　茯苓各一钱半　猪苓一钱　甘草六分　官桂五分　姜一片，水煎。

生。

四曰冻产，乃冬月寒冷，产母经血得冷则凝，以至儿不能生下，此害最深。若冬月生者，下部切不可脱棉衣，并不可坐卧寒处，当满房着火，常有暖气，令产母背身向火，令脐下腿膝间尝暖，血得热则流行，儿便易生，名曰冻产。

五曰热产，时当夏令，威焰酷烈，产妇要温凉得所，亦不恣意取凉，伤损胎气，又不可房中人多，热气逼袭产母，使产母血沸，发热头疼面赤，昏昏如醉，乃至人事不省，此名热产。

六曰横产，儿先露手，或先露臂，此由产母未当用力，而先用力故也，儿身未顺，用力一逼，遂致身横，不能生下，当令产母安然仰卧，然后推儿，徐徐先推其手，令人直上，渐渐逼身，以中指摩其肩，推上而正之，或以指攀其耳而正之，必须产母仰卧，以便推儿正之，候其儿身正，煎催生药一盏服之，方可用力，令儿下生，此名横产。

七曰倒产，产母胎气不足，关键不牢，用力太早，致令儿不能回转，便直下先露儿足，当令产母仰卧，令稳婆推其足，渐渐入内，不可令产母用分毫力，亦不得令其惊恐，务必安慰，使儿自顺，名曰倒产。

八曰偏产，儿身未正，产母用力一逼，致令儿偏柱左腿，或偏柱右腿，故头先露偏柱一半，不能生下，当令产母仰卧，次令看生之妇，轻轻推儿近上，以手正儿头，令看生之人，以绵烘热，裹手于谷道外旁，轻轻推儿头端正，便令产母用力一送，儿即下也，此名偏产。

九曰碍产，儿身已顺而露正顶，不能生下。盖因儿身回转，脐带攀其肩，因此露顶，而不能生下。当令产母仰卧，令看生之妇，轻轻推上，徐徐引手，以中指按儿肩下，拨其肚带，仍须候儿身正顺，方令产母用力一送，儿即生下，此名碍产。

愚按：大凡横产、倒产、偏产、碍产四法，若非稳婆精良妙手，不可依用此法，恐恣其愚蠢，以伤人命也。今世之倒产者，往往随其倒足生下，名曰踏莲花生，并无后患，子母双全，不必依前条推足上法亦可。如碍产者，往往肚带有缠在儿头顶上，而儿头自出在产户外，稳婆以指拨其肚带，从儿头顶过下之者。又有肚带缠住头顶一匝，而儿与胞衣一齐同下者，倘漫用前法推入产门，转恐误事也。

十曰坐产，言欲临产时，高处系一手巾，令产母以手攀之，轻轻屈足坐定，令儿生下，非坐在物上也，此名坐产。

昔有赵都运恭人，每产则大肠先出，然后则产，产后则大肠仍露，甚为苦之，名曰盘肠生。医不能疗，偶在建昌，得一良法，而可收之。用醋半盏，新汲冷水七分调匀，喂产母面，每喂一收缩，三喂收尽，是良法也。

产母肠不收，用香油五斤，煎热盛盆，候温坐油盆上，约坐至半时，以皂角末次入鼻中，嚏作立收。《斗门方》　又法：用半夏末搐鼻中，则肠立收上。又纸捻蘸香油点灯吹灭，以烟熏产母鼻中，肠亦立上。

丹溪曰：胎前毋滞，产后毋虚，产后一切皆不可发表，产后不可早用白芍，以其酸寒，克伐生发之气故也。大凡产后，不可食物过多，恐成积滞。若未满月，不可强起离床，不宜多言喜笑，及惊恐忧惶，悲思怒恼，不宜久坐久立，及作针工，恐满月之后，即成虚劳，并油腻鱼肉之类，皆不可犯。凡产后百日之外，方可交合，不尔，百病滋长，慎之。凡妇人患风气脐下虚冷，莫不皆早行房之故也。

或曰：新产之妇，好血已亏，污血或留，彼黑神散非要药乎？

答曰：至哉坤元，万物资生，理之常也。初产之妇，好血未必尽亏，污血未必尽积，脏腑未必寒。何以药为？饮食起居，勤加保护，何病之有？诚有污血体怯而寒，与之几剂，亦自简便。或有他病，当求病起何因，病在何

经，对症投剂，何用杂药乱投，诚有性急形瘦易怒火多者，夏月坐蓐，时行火令，姜桂皆为禁药。至于保护之法，尤为悖理。肉汁发阴经之火，易成内伤之病，先定有训戒，何胡为羊鸡浓汁作糜，而又服当归丸、四顺理中丸之类，虽是补药，并是偏热。若脏腑无寒，何处消受，若夫儿子初生，母腹顿宽，思食鸡子，而不思鸡子难化，辗转生病，每见产母无疾者，却去黑神丹，不可与鸡子肉食，且与之白粥干菜，间以少些白鲞，半月方与别物，大能养胃却疾。彼富贵之家，骄恣之妇，卒有白带头风气痛，膈满痰逆口干，经事不调等症，皆是阳盛阴虚之病。天生血气，本自和平，又乌知其有此等谬迷，有以兆之耶？

女科切要　卷六

清　海虞　吴道源本立纂辑
鄞县　曹赤电炳章圈点

产　后　门

妇人产后，如无他症，不必服药，三日之内，但以荆芥炭、益母草、砂糖煎汤，频频与饮，使恶露下尽，自无血晕腹疼之患。切不可饮酒及鸡子牛羊猪肉之类。须以白粥干菜调理，或松江淡鲞蒸熟食之。半月方可食鲜肉，渐渐加增，才免阳盛阴虚之患。若去血过多，恶露未净，或伤饮食，或感风寒，或夹气恼，或三日蒸乳，皆能发热增寒，身疼腹痛，当以意消息，不可偏执而用药也。丹溪云：产后以大补气血为主，虽有杂症，以末治之。产后不可发表，又不可早用白芍，以其酸寒，恐伐生气也。慎之。

凡妇人产后，阴血虚，阳无所附而浮散于外，故多发热。治宜四物补阴血，而炮干姜之辛温从治，收其浮散，使归于阴。然产后脾胃俱虚，多有过服饮食所伤，滞而发热者，误作血虚则不效矣。如遇产后发热，须审问何物所伤，有食无食，胸膈可有饱闷，如恶食泄泻，只作伤食治。若发热而饮食自调者，方用补血药，产后血晕，因虚火引血上行，渐觉昏晕，急以鹿角烧灰，出火毒研极细末，煮酒童便调和灌下即醒，行血最快。

又法用铁秤锤，炭火烧红，以醋淬之，令产妇鼻嗅之即醒。

郑良栋曰：新产血晕，不省人事，大类中风，切不可遽以中风治之，急服琥珀丸即愈。如儿以下地，一时血晕，昏昏不醒，速扶起抱住，勿令卧下，快与童便灌之。如不醒，再以烧红炭投醋中，使醋气透入产妇鼻，内，即苏，因症用法，无不应效。

产后子已在蓐，切不可使之即卧，须扶坐片时可也。因初产之妇，血气未定，恐其血乘虚而上逆，慎之。

新产饮酒大忌，乃第一证，但服童便为妙，他药苦寒，虽属降下之品，却能凝滞败血。且产后即发热，切不可服凉药，以其伐生气而血凝也。若童便乃人身之元气所成，名曰还元丹，惟能降火，盖以入补人之义。新产饮食最难克化，如赤豆、沙鸡、鸭蛋之类，盖新产暴大下血，脾胃甚弱，最易成病。

新产之脉缓滑结，实大弦紧鬼来侵，若得重沉小者活，忽觉坚牢命不存。寸口涩疾不调死，沉细附骨不绝生。请看此候分明记，常须念此向心经。

新生胞衣不下，血晕不醒，腹中刺痛，败血攻心，或眼闭口噤，或谵语狂言，困顿垂死者，以琥珀黑龙丹，灌之立效，或黑神丹亦可。

产妇败血，有冲胃冲心之辨，不可混治。冲心，颠狂作乱是也。冲胃者，饱闷呕恶是也。二者俱属危症，用药不可不速，迟则不救。

王肯堂曰：产后败血，有冲胃、冲心、冲肺，三者皆属危症，用药不可不速。冲胃则呕，冲肺则喘，冲心则发狂跳跃，急令两人扶住，急宜童便、降香、沉香、当归，煎汤灌下，其恶血自下行，新血各归经，即时安宁矣。

皇甫中曰：产后败血停蓄，上干于心，心

气闭塞，故舌强不能言语者，八珍散。产后内因痰气郁滞，闭目不能语，用明矾一钱为末，白滚汤冲服。

产后去血过多，晕闷不醒者，芎归汤。产后虚火引血上行，血迷血闷，晕昏不知人，清魂散。如不醒，以韭菜一二斤捣烂，入壶中，沸醋倾入壶内，覆壶盖，以壶嘴放鼻闻熏之，即苏。或干漆烧烟，令产妇嗜烟，如不醒，急掐其人中，提顶心头发，灌之以童便姜汁，自然苏醒。

黑龙丹　治产后一切血证，及胞衣不下，危急之症。

当归二钱　五灵脂二钱　川芎二钱　熟地二钱　良姜二钱

上药一两，以沙盒盛赤石脂，以纸包盐泥封固，炭火煅令通红，火候冷取开，看成黑色，研细入后药。

百草霜五两　硫黄钱半　乳香钱半　花蕊石一钱　琥珀屑一两

后药与前药研极细，以醋糊为丸，如弹子大，每服一丸，炭火煅令通红，投入老姜自然汁与童便，入酒漉出，烘干研细，只以此酒下。

清魂散　治血迷血晕，昏迷不省。

泽兰一两　人参一两　**荆芥**四两　炙甘草八分

每服二钱，热汤温酒各半盏调服。

产后血晕

问曰：新产妇人有三病：一者病痉，二者病郁冒，三者大便秘结。何谓也？

师曰：新产血虚，多汗出喜风，故令病痉。亡血复汗寒多，故令郁冒。亡津液则胃燥，故大便难。

产后血晕者，气血暴虚，未得安静，血随气上，迷乱心神，故眼前生花，甚者令人闷绝，不知人事，口噤神昏气冷，宜服清魂散即苏。

荆芥散　治产后血晕，精神昏昧。

荆芥一两三钱　桃仁五钱，炒

为末，滚汤下三钱，如喘，加杏仁、甘草各三钱。

败血冲心

娄氏曰：产后下血多而晕者，但昏闷烦乱而已，当补血。下血少而晕者，乃恶露不下，上抢于心，则心下满急，神昏口噤，绝不知人，当破血行血。

丹溪曰：妇人产后血晕，此乃虚火载血妄行，渐觉昏迷，以鹿角煅灰出火毒，研极细末，用童便煮酒灌下即醒，此物行血极妙。

独行散　治产后血晕，昏迷不醒，冲心闷绝，五灵脂四钱，一半炒，一半生，共研极细末，温酒调下二钱，即苏。

产后郁冒

仲景曰：产后郁冒，其脉微弱，不能食，大便反坚，但头汗出。所以然者，血虚而厥，厥而必冒，冒家欲解，必大汗出，以血处下厥，孤阳上出，故但头汗出。所以产妇汗出者，亡阴血虚，阳气独盛，故当汗出，阴阳乃复。大便坚，呕而不食者，小柴胡汤和之。

产后如狂喘满

产后血抢心闷如狂，喘满欲绝者，蒲黄散。恶露不尽，心腹痛，黑神散。亚露不尽，儿枕痛，当归失笑散。产后忽然口噤，语言颠倒，如见鬼状，此败血攻心，非风寒邪祟也，妙香散，或用黑龙丹，煅过酒调下。

蒲黄散　治恶露不快，血上抢心等症。

干荷叶二钱半　甘草二钱半　**丹皮**二钱半　元胡二钱半　生地三钱半

挫作二剂，水煎，入蜜少许温服。

黑神散　治恶露不尽，胞衣不下，腹痛

不止。

黑豆炒，半升　熟地四两　当归四两　肉桂四两　干姜炒，四两　生蒲黄四两　炙甘草四两　炒白芍四两

共为末，每服二钱，童便各半盏调服。

当归失笑散　治产后心腹绞痛欲死，及儿枕作疼。

当归五钱　炒蒲黄五钱　五灵脂五钱

共为末，每服二钱，醋调熬成膏子，白滚汤下。

炒香散

麝香一钱，研　远志肉一两，去心　黄芪一两　人参五钱　茯苓一两　茯神一两　桔梗五钱　甘草五钱　木香二钱，煨　朱砂三钱　淮山药姜汁炒，一两

共为末，每服二钱，开水调服。

滑胎散　治坐草太早，努力过多，以致难产。

滑石六钱　冬葵子五钱　甘草二钱

为末，每服二钱，酒下。

神应散　治横生逆产，胞浆先破，此药如鱼得水。

白芷一两　百草霜一两

为末，童便酒调下三钱。

牛膝汤　治胞衣不下，脐腹坚痛，服此烂下。

牛膝四两　瞿麦四两　当归三两　通草六两　滑石八两　葵子五两

水九升，煎至三升，三次服。

黄芪汤　治产后去血过多，自汗不止。

炙黄芪二钱　白术一钱，炒　防风一钱　熟地二钱　牡蛎钱半，研煅　茯苓一钱　麦冬五分　甘草五分

大枣二枚，水煎服。

茯神散　治产后心虚，怔忡不定，神思不清。

人参一钱　茯神八分　甘草一钱　山药一钱　当归一钱　肉桂五分　远志肉一钱　生姜五钱　大枣二枚，水煎服。

当归羊肉汤　治产后寒热自汗，肢体疼痛，名曰蓐劳，诸药无效者。

当归七钱　人参七钱　黄芪一两　生姜五钱

羊肉一斤，煮汁五大碗，入药煎四碗，作六服。

腹痛下血，胃虚呕逆，砂仁二钱，炒研末，酒调下，或佛手散。

血虚发热

【产后血虚发热歌】产下婴儿血气空，丝毫触犯便伤营，倏然致疾如山重，不与寻常一样同。去血过多因发热，炮姜参术与川芎。阴伤作热心烦闷，自汗黄芪可奏功。恶心呕逆伤脾胃，抵圣汤医腹胁膨。归芪止汗除身热，不愈当归取效崇。风中愈风汤立验，茯神散子治怔忡。诸风痿痹筋搐搦，时世名医认血风。乍见鬼神由血耗，调经散服起疲癃。中风口噤牙关闭，拘挛身张似角弓。此是血虚筋痿疯，举轻古拜配归芎。产后经来因适断，感于异症在其中。手牵足搐牙关紧，昏胃柴胡视听聪。阴虚发热增寒证，昼日清明夜觉凶，加增四物神功大，一服能令病脱躬。胞中误损成淋症，参术煎膏溲自通。浮肿必须分水道，忧思郁结在宽胸。痢初化滞香连芍，积久须当用胃风。初感寒邪微发表，热邪不解用黄龙。燥烦实热芩连理，渴甚人参白虎从。热泄柴苓除半夏，便难议与大柴攻。汗多表弱宜行桂，里弱中虚用理中。发表内攻须带补，勿行猛浪内伤营。小便淋漓行时痛，但用茅根可治癃。泄泻胃苓汤可用，寒加肉果桂姜同。若因热泻并肠垢，姜炒黄连佐木通。

气血大损病

夫产后气血大损，即易产力壮者，尚有

感疾为终身之患，产母不可恃健，不行保重，劳碌以损其营，多食以伤其胃。外感六淫之邪，内受七情之气，为患莫测。古云：产后勿犯丝毫，感病重于山岳。信夫。或恶露未净而发热作疼，真元不复而瘛顿为劳，比比皆然也。故产后诸疾，先以大补气血，纵有他疾，以末治之。或欲祛邪，必兼补剂，殊为切当。若以峻剂攻之，再损气血，危可立待。或恶露当去者，亦须急去，故生新温养为主，斯得其正也。

举轻古拜散　治产后中风。

荆芥炒燥

为末，每服二钱，豆淋汤调服。

产后脉法

《脉经》曰：妇人新生乳子，脉沉滑小者生，实大弦急者死。又曰：妇人生产之后，寸口脉弦疾不调者死，沉细附骨不绝者生。妇人产后，因中风伤寒发病，喘鸣而肩息，脉实而浮缓者生，小紧者死。

丹溪曰：胎前脉细小，产后脉洪大，皆死症也。又曰：产前当洪数，既产而洪数如故，安得不死？《脉经》曰：产后缓滑沉细皆宜，实大坚牢涩疾俱危。

产后薄劳

妇人新产后自汗，肢体酸疼，虚眩无力者，名曰薄劳。当归羊肉汤。产后气血大亏，失于调理，自汗发热虚羸，饮食不化，时咳发渴者，人参鳖甲散。发寒热，石子汤。

郑良栋曰：产后薄劳虚损，头痛气短，小腹胀痛而寒热者，增损柴胡汤主之。

叶盛公曰：产后薄劳，缘生产久坐多语，运动用力，致头目四肢疼痛，寒热如疟，宜白茯苓散。

人参鳖甲散　治产后薄劳，寒热如疟。

鳖甲炙，一两　人参五钱　肉桂五钱　桑寄生五钱　当归五钱　茯苓五钱　白术五钱　大熟地五钱　桃仁五钱　麦冬五钱　续断五钱　牛膝一两五钱　黄芪炙，一两

共为末，猪肾一对去膜，生姜一片，水二盏，枣三枚，煎至一盏，入前末药二钱，葱白三寸，乌梅半个，荆芥五穗，再煎数沸，去渣，空心服。

石子汤　治产后虚羸寒热，自汗气促等症。

猪腰子一对，去膜，竹刀切碎　香薷二两　葱白一两　白芍二两

上药分作两贴，每用水三升半，匀三服。

白茯苓散

茯苓一两　当归　川芎　白芍　肉桂　黄芪　人参各五钱　熟地一两

先以水二盏，煮猪肾，再加姜二片，枣三枚，入药五钱，去渣，温三服。

增损柴胡汤

柴胡　半夏　人参　川芎　橘红　甘草

水煎服。

抵圣汤　治产后恶露不行，败血入子脾胃。

赤芍一钱　半夏一钱　泽兰一钱　陈皮一钱　人参一钱　甘草七分

姜三片，水煎服。

产后胞衣不下

产后胞衣不下，为血入胞中，上冲心胸，气血胀闷，不出欲死。必须逐其血，用红花、茜草酒煎服，或朴硝散，甚则夺命丹。如再不下，脐坚胀急痛欲死者，牛膝汤。

努力伤胎

妊娠努力，跌仆伤胎，腰腹疼痛，或胎上抢心去血，胶艾丸或从高坠下，或努力被重物所压，触伤胎气，腹痛下血，胃虚呕逆，砂仁二钱，炒为末，酒调下，或佛手散。

胞衣先破

胞衣先破之由有二：或因母体素弱，气血两虚，胞衣故薄，儿身转动，随触而破。有因儿未转动，坐草或早，用力过多，以致胞破。如已破久，则血水干，产路遂涩，儿难下也。急用大剂加味芎归汤，加熟蜜一两助气，而兼润滑，自当儿即顺下。

娄全善曰：胞衣不下，惟花蕊散取效独妙。若乡居药肆，仓卒无之，今采得胡氏一法甚妙。产讫，胞衣不下，稍久则血流胞中，为血所胀，上冲心胸，喘急疼痛，必致危笃。若有此患，宜急断脐带，以少物系带必用力牢固系之，然后截断，使其子血不流入胞中，则胞衣自当痿缩而下，纵淹延数日，亦不能有害。惟以产母心怀安泰，终自可下，累试有验。

花蕊散　治产后败血不尽，血迷血晕，恶阻，败血奔心。

胎死腹中，胞衣不下，至死者，但心头稍缓，急以童便调一钱服之，取下恶血或如猪肝，产妇从此可无血气血风之症矣。如膈上有血，亦化为黄水，即口中吐出，或从小便下也。

牛膝汤

牛膝　瞿麦各四两　当归三两　通草六两　滑石八两　葵子五两

上药㕮咀为末，以水九升，煎至三升，分为三服。

女科切要　卷七

清　海虞　吴道源本立纂辑
鄞县　曹赤电炳章圈点

产后虚渴

产后血热心烦口燥者，凉血饮。虚烦而渴者，生脉散。盖产后虚渴，气少脚弱，头目眩晕，饮食无味，熟地黄汤，或四物加麦冬、花粉。

凉血饮　治产后虚烦发渴。

黄芩二钱，酒炒　赤芍二钱　川芎二钱　甘草一钱　荆芥二钱　花粉二钱　生地二钱　麦冬二钱

上药分作二服，每服加竹叶七片，灯心二十茎，水煎。

生脉散　生津止渴。

人参　麦冬　五味

水煎服。

熟地黄汤

人参四钱　甘草一钱　花粉六钱　麦冬三钱　熟地五钱

分作二服，元米一撮，姜枣煎服。

产后浮肿

产后败血停蓄五脏，循经流入四肢化为水，因成虚浮肿者，调经散。产后气血大虚，肢体浮肿者，不可通利其水，宜大补气血，四君子汤加苍术。

调经散

当归一两　赤芍两　肉桂一两　没药一钱　琥珀一钱　麝香五分　细辛五分　炙甘草二钱

共为细末，每服五分，入姜汁少许，酒调下。

产后发热

薛古愚曰：产后发热，因去血过多则血虚，血虚则阴虚，阴虚则生内热，心胸闷烦，气短头疼眩乱，骨节酸疼，晡时转甚，与大病后虚烦闷相类者，宜人参当归散主之。如血虚生热而自汗者，逍遥散。若产后脐下发热，非熟地不能治。若产后发热不已，必用炒黑干姜，详见丹溪治产后日晡发热转甚，非柴胡不能治。若外皮热而内不热者，及两足觉冷者，此胃风也，宜芎苏饮。

产后寒热，恶露未净，停住胞络而发热者，仍以行血为主，小腹痛者是也。轻则四乌汤，重则醋炙散。或以吐泻，五积散。有食，加消导药。恶露净者，小腹不痛是也。若产后因下血过多，而忽发寒热者，此因营卫虚损，阴阳不和也，宜加减四物汤。

初产作乳

初产有作乳者，有产下而不育乳汁者，膨上俱致发热，但此症与恶露未净停胞络而发热者相似而实不同，宜细细辨之。小腹痛者，恶露停蓄也，不宜服加减四物汤。若小腹不痛者，阴阳不和也，宜服之。若往来寒热，小柴胡汤主之。寒热而盗汗如雨者，麦煎散主之。

皇甫中曰：产后血虚发热，头痛自汗，心

烦气短者，人参当归散。产后阴虚气血不足而发热，日轻夜重而恶寒者，四物汤加炮姜。微热，加茯苓。产后蒸乳发热者，用四物加黄芪、人参、白术、花粉。

人参当归汤

熟地一两　人参一两　当归一两　麦冬一两　肉桂一两　白芍一钱，炒

每服五钱，加姜、竹叶煎服。

产后风痓

产后诸风，痓弱筋挛无力者，血风汤。产后气弱汗多，风搏之而成痉，口噤，角弓反张，脊强，汗出不止者，难治，大圣散加川芎、黄芪。

血风汤

秦艽一钱　羌活一钱　防风七分　白芍一钱，酒炒　大熟地二钱　白芷八分　川芎一钱　白术一钱，炒　归身一钱半　炙黄芪钱半　茯苓一钱　半夏一钱

水煎服。

产后怔忡

大圣散　治产后因惊而发心神不定，怔忡恍惚。

川芎一两　黄芪一两，蜜炙　当归一两　木香一两　人参一两　甘草一两　茯神一两　麦冬一两

上药挫为末，每服七钱，姜三片，水二盏，煎至八分，空心服。

产后血少，怔忡恍惚惊悸，睡不安宁者，益荣汤，或养心汤、宁志丸。产后心恍惚者，茯苓散。

益荣汤

当归钱半　黄芪一钱，炙　远志一钱　枣仁一钱，炒　柏子仁一钱，炒　茯神一钱　人参一钱　白芍八分，炒　甘草三分，炒　紫石英八分

姜三片，水煎服。

养心汤　治产后心虚血少，恍惚惊悸不安。

黄芪五钱　茯神五钱　远志肉五钱　当归五钱　人参二钱　半夏曲　川芎各五钱　枣仁二钱半，炒　肉桂二钱半　五味二钱　柏子仁二钱　甘草四钱，炙

上为粗末，每服三钱，加姜三片，水煎服。

茯苓散

人参一钱　甘草一钱　山药一钱　当归一钱　远志肉一钱　茯苓一钱　桂心一钱　麦冬一钱

大枣三枚，水煎服。

产后中风

产后中风，口噤，不省人事，牙关口闭，手足瘛疭者，举轻古拜散。产后血大亏损，经络空虚，劳碌太早，风邪乘虚而入者，小续命汤，或愈风汤。中风角弓反张，涎潮涌出，大豆子汤。

小续命汤

麻黄一钱　人参一钱　黄芩一钱　白芍一钱，炒　川芎一钱　甘草八分　杏仁二十四粒　防己一钱　肉桂七分　附子一钱，制

水煎服。

大豆子汤

大黑豆一升，炒令焦黑，候烟起，以好酒二升沃之，入瓶内水贮听用

每用此酒半升，入独活五钱，同煎十沸温服。

血晕气脱

产后血晕与气脱，宜分别治之。

血晕是实证，逐瘀为主，此因恶露不行，恶血冲心，而心下满急，神昏口噤，不省人事者，切勿放倒，急与生化汤、失笑丹，或佛手散。

气脱是虚证，补正为主，此因平素虚弱，临产用力劳伤，去血过多，亦致昏晕不醒。微虚者，少烦即苏。大虚者，血竭即死。但察其面白口开自汗，手足冷厥，六脉微极，是气脱症也。生死判于顷刻，勿令散倒，令旁人挽住头发，急与大剂参归附子等回其阳，或增损四物汤，煎浓，徐徐灌之，但能下咽即可得生。若误认血晕，而以行血药投之，益速其毙也，治宜细心详究。

产后阴虚

产后阴虚血耗，四物汤加炮姜，产后去血过多，阴虚而致内热烦懊，呼吸气短，头痛闷乱，骨节烦疼，人参当归散，阴虚发热者，小柴胡汤，去半夏，加花粉。

人参当归散

人参一两　当归一两　肉桂一两　熟地一两

每服五钱，加竹叶、生姜煎服。

小柴胡汤

人参　半夏　黄芩　柴胡　甘草

加姜水煎。

产后疟疾

产后疟疾，宜分别施治，有寒热相兼，有热多寒少，草果饮子，或青皮饮，寒多，养胃汤，或四兽饮之类。

草果饮

草果一钱　川芎一钱　紫苏一钱　白芷一钱　良姜七分　甘草八分　陈皮八分　青皮一钱

水煎。

四兽饮

人参一钱　白术一钱，炒　陈皮一钱二分　茯苓一钱二分　甘草五分　草果八分　乌梅三个　半夏六分

加姜枣，水煎服。

胜金丹

常山四两，酒蒸　尖槟榔一两

共为末，醋糊丸。未发时，先吞三十丸，至五更再吞十五丸，温酒送下，丸如菀豆大。发时切不可服。

养胃汤见胎前

产后伤风

产后血气大亏，纵有寒，不可大发汗，芎归汤加人参、苏叶、葛根微汗之。故郑氏只用带须葱煎汤服。如热不止，黄龙汤加芎、归。大热不得已，加知母、黄连。可攻可温者，临时斟酌，不可妄投峻剂，耗损真元也，慎之。

产后泄泻

产后泄泻，小便不利而泻，此阴阳不分之故，宜胃苓汤，腹痛是食积，宜加消食药。恶露不行，宜行血。若外感风寒而内伤饮食者，宜养胃汤。恶露已净，不必活血，如未净，加归尾、桃仁之类。如久泻不止，养胃汤，加肉桂、肉果。如挟寒腹痛肠鸣，小水清白不浊，口不渴，加肉果炒白芍。如热泻，肠垢口渴，时痛时泻，火也，宜姜炒黄连、木通。或泻或不泻，或多或少者，痰也。肯堂云：产后泻利，不可混治，以补脾为主，如白术茯苓神曲甘草陈皮之类，兼以消食理气之剂。

君苓汤

白术二钱，炒　茯苓二钱　猪苓一钱　泽泻一钱

水煎服。

胃苓汤即君苓汤加平胃散

产后心腹痛

产后败血凝聚，气上冲心作痛，大岩蜜汤，七情相干，血与气并心痛，元胡索汤。败血攻心腹痛，失笑散。寒邪腹痛，理中汤

大岩蜜汤　治气上冲心。

当归一钱　独活一钱　干姜一钱　熟地一钱　甘草五分　北细辛七分　吴萸一钱　肉桂一钱　远志一钱　白芍一钱

水煎服。

元胡索汤　治心腹痛。

元胡一钱　当归一钱　白芍一钱，炒　厚朴一钱，姜炒　文术一钱，煨　三棱一钱，煨　川楝子一钱　木香一钱　川芎一钱二分　桔梗一钱二分　槟榔一钱　黄芩八分　甘草七分

水煎服。

失笑散　治胃脘痛。

蒲黄　五灵脂

产后咳嗽

产后咳嗽而恶露未尽、二陈、四物加活血药。已净，知母茯苓汤。或发热，八物加黄柏、知母少许。或伤风咳嗽而痰多者，其治法载伤风条下。有恶露上攻，肺经受邪咳嗽，二母散。血风感寒热湿气，咳嗽痰涎，坐卧不安，四阴煎。有外感者，参苏饮。

二母散　治恶露上攻而嗽。

知母一两　贝母一两　人参八钱　茯苓八钱　桃仁十九粒，研　杏仁十四粒，研

每服七钱，煎至八分，细细呷下。

四阴煎　保肺清金。

生地三钱　麦冬二钱　白芍二钱　百合二钱　沙参二钱　生甘草一钱　茯苓钱半

水煎服。夜热盗汗，加地骨皮。痰多，加川贝。

产后郁冒，由胃弱不实，多汗故也。血虚必厥，厥必郁冒，白薇汤。产后三疾，郁冒则多汗，汗多则大便秘结，此皆去血过多，难以药治，苏麻粥主之。

白薇汤　治汗多。

白薇三钱　当归三钱　人参钱半　甘草七分

水煎服。

苏麻粥　润肠。

苏子、麻仁不拘多少，研烂取汁，煮粥食之。

产后脚气

产后热闷，气上冲逆，转为脚气，小续命汤去麻黄、石膏、附子。由平素感受风寒暑湿燥火之气，因产后血气不足，遂袭于足经，因乘虚而发者，独活寄生汤。

独活寄生汤

独活一钱　桑寄生八分　杜仲一钱　牛膝一钱　细辛七分　秦艽一钱　白茯苓一钱　白芍一钱，酒炒　肉桂六分　川芎八分　防风七分　人参八分　炙甘草七分　熟地一钱　当归一钱

共为粗末，水煎服。

产后遍身疼痛

产后遍身疼痛，因早劳动行走，致气血升降失常，留滞于关节间，筋脉牵引，或手足拘挛，不能伸屈，故遍身肢节作疼，宜趁痛散。恶露不净，流于遍身肢节，腰脚关节等处作痛，宜如神汤。

趁痛散　治败血流经。

当归一钱　肉桂八分　白术一钱，炒　牛膝一钱　黄芪一钱　独活八分　薤白一钱　寄生一钱

姜三片，水煎服。

如神汤　治肢节疼痛。

厚朴一钱，炒　半夏六分　枳壳七分，炒　白芍八分，炒　木香六分　肉桂六分　陈皮六分　茯苓六分　人参六分　甘草五分　苍术一钱，炒　茴香一钱，炒　香附七分，醋炒　桔梗八分　干姜六分　川芎七分　当归一钱　白芷八分　木瓜六分　桃仁八分

水煎服。

产后气喘

产后气喘，由营血暴竭，气无所主，触

发于肺，故至喘急也。此孤阳绝阴，难以治疗，十死一生之证也。若败血停滞，上逆于肺作喘者，夺命丹主之。郑氏谓产后发喘，最为危险。经曰：诸喘皆凶。然此亦当视其有痰无痰，痰之多少，以断其吉凶。若痰壅盛而喘，痰声必大作，此痰犯肺金，肺不宁也。法当豁痰，其喘自定，其喘犹可救，旋覆花汤主之。恶露未尽者，加生姜自然汁，及行血消食药。已净而小腹不痛者，加片芩服之。若不咳而喘者，此谓肺火所迫，乃真喘也。证多不治，不必下药。

产后呃忒

产后发呃，此症不宜见之，新产须辨症施治。如恶露未净者，多是血迷上冲所致，当服行血之药。已净而呃者，多因受寒也，法当顺气调脾，如紫苏饮之类。

产后呕吐

产后呕恶，胃气不化也，恶露未行者，二陈、四物加减活血药。若已行者，不必活血，若胸满而呕逆者，食也，宜消导之。如饮食入胃而即呕者，火也。纳谷少顷呕出者。胃寒也，宜白蔻、丁香之类治之。

产后吞酸

产后吞酸者少见，或因病久脾胃虚弱，致有此患耳。如恶露净后，二陈汤或四物汤，加姜汁炒黄连、吴茱萸之类。

产后不语

产后噤口不语，乃败血裹迷心窍所致，不须恐怖，但服八珍散，一月自安。亦有痰迷心窍者，二陈、四物，加竹沥姜汁甚妙。如产后着风不语，小续命汤主之，加姜汁，其法最稳而取效亦速。

产后头痛

产后头痛，有气血虚弱、痰厥、着寒着风之不同，不可一例而施治。气血虚弱者，四物汤。痰厥者二陈汤。着寒着风者，芎苏饮，随症加减。有产后感于异症，手足牵搐，咬牙头痛昏冒，先服四物，后服秦艽丸。

芎苏饮

川芎　苏叶　枳壳　前胡　葛根　木香　桔梗　甘草　陈皮　半夏

姜三片，水煎服。

秦艽丸

川芎　当归　秦艽　荆芥

共为末，醋糊丸，每服四钱。

产后胞损

产后胞损，血水淋漓，茅根汤。败血不止，淋漓不休，乌金散。血不止，久而四肢乏力沉困，牡蛎散。或产时稳婆误损其尿胞，以致日夜淋漓者，参术膏主之。

茅根汤

茅根二钱　瞿麦钱半　葵子二钱　茯苓钱半　人参一钱　蒲黄一钱　桃胶一钱　滑石钱半　半夏三分　石膏一钱　紫贝一个，烧

灯心、姜水煎服。

乌金散

麒麟竭一两　百草霜一两　元胡一两　当归一两　男发灰一两　鲤鱼鳞一两　肉桂一两　赤芍一两　松墨醋浮煅，一两

为末每服二钱，空心酒下。

牡蛎散

牡蛎粉二钱　川芎一钱　茯苓一钱　熟地一钱　龙骨二钱　续断一钱　当归一钱　艾叶一钱，酒炒　人参一钱　五味十粒　地榆一钱　甘草五分

姜三片，大枣二枚，水煎服。

参术膏

人参一斤，白术一斤，煎成膏子，每用三钱，白汤下。

产后小便不利

产后小水不通，四物汤去生地，加赤苓、木通。又法：用炒盐一撮，麝香少许拌匀，填产妇脐内，外以葱头十余茎，缚作一束，切片如饼子样、须手指厚，先将盐麝二物纳脐中，后将葱饼加于其上，用艾炷与葱饼一样大灸之，待热气入腹方止，其小便自通矣。

有大小便俱闭而恶露不行者，服行血药，恶露已净，用四物汤，黄芩、山栀、枳壳、木通、赤苓之类。如恶露不行，大便泻而小便闭者，但可服五苓散，加行血药，如赤芍、红花、元胡索等类，不可服胃苓汤，盖苍术、厚朴能止血故也。

产后衄血

产后气消血败，营卫不理散乱，流入诸经，不得还元，故口鼻黑气起。及变鼻衄，因产后虚极，变为此症，则胃绝肺败，多至不救。用犀角地黄汤，或可挽回百一。

犀角　生地　白芍　丹皮　水煎服。

女科切要　卷八

清　海虞　吴道源本立纂辑
鄞县　曹赤电炳章圈点

产后无乳

娄氏曰：累经产而无乳汁者，亡津液故也，须服滋补之药以动之。若虽有乳汁，而又不甚多者，须服通经之药以动之，仍羹臛引之。盖妇人之乳，资于冲脉，与胃经通故也。大抵妇人素有疾，在冲任经者，乳汁少而其色带黄，所食之子，怯弱多病。又曰：乳汁不行，有气血盛而壅闭不行者，有气血弱涩而不行者。虚当补之，实当疏之。疏用通草、漏芦、土瓜之类，补用虫乳粉、猪蹄、鲫鱼之属。

云台立效方

元米半合　萬苣子半合　生甘草五钱

上煎汁一升，去渣分作三服，乳汁立下。

涌泉散　治妇人乳汁绝少。

瞿麦穗　麦冬　龙骨　山甲炙　王不留行

上为细末，每服一钱，热酒调下，后服猪蹄汤，再用油木梳子左右乳上，各梳二三十梳，每日三服。

胎前乳汁自出者，谓之乳泣，又名乳注。生子多不育，产后乳汁自出，盖是体虚，宜服补药以止之。亦有乳多急痛而出者，温帛熨之，漏芦散亦可。

漏芦散

漏芦二钱半　蛇壳一条　瓜蒌十只

为末，酒调服二钱。

产后崩淋带下

产后崩淋，及赤白带下者，皆因七情内伤，或下元虚弱。王叔和曰：始病血崩，久则血少亡阳，故白滑之物，下流不止，是本经血海先枯，津液消亡于涸，不能交养筋骨。用药之法，须以本部行经药，为引为使，用辛甘油腻之物，润其枯涸，而滋益津液，以大辛热之药，裨补阳道，生其血脉，以寒苦之物泻其肺，以人参补之，微苦湿药佐之，以治此症之大法也。

崩中者，由脏腑伤损冲任二脉，气虚血虚之故，此二脉为经里之海，气血之行，外循经络，内荣脏腑，腑因冲任二脉之气伤虚极，不能约制厥经之血，故忽然而下，谓之崩中暴下，治当大补气血之药，举养脾胃，微加提镇坠下心火之药，宜补心泻火汤，血自止矣。凡淋带之症，俱是痰积流下，渗入膀胱而成也，治宜升提，以提其气下陷，用二陈加二术。肥人多湿痰，加半夏、南星、炒黄柏、川芎、椿皮、青黛。瘦人多火，加黄柏、椿皮、海石、滑石、蛤粉。赤白兼下，加炒蔓荆子末，酒调下二钱。

产后阴脱

娄全善曰：产后阴脱者，因产时努力太过，以致阴脱，状若脱肛，阴户挺出，逼近肿痛，举重房劳，皆能致此。清水续续，小便淋漓，用硫黄、乌贼骨各五钱，五味一分

为末，敷患处。兼服参、芪、归、草、升麻等补药自愈。

丹溪治一妇人，三十余岁生女，二日后，产户一物如手帕，下有帕尖。因思之，此由胎前劳乏伤气，或肝痿致此，却喜血不甚虚，其时岁暮天寒，恐冷干坏了，急与参、芪一钱，白术五分，当归一钱半　升麻五分，三贴，连服之即上，得汗遍身乃安。但下而沾席处，干者落一片，盖脂膜也。食进能眠，诊其脉皆涩，左略弦，视其形却实，与白术、白芍各五分，陈皮一钱，姜一片，连三四服遂安。

又一妇人产子后，阴户中有一物，如合钵状，有两歧。其夫求治，予思之，此子宫也。必气血虚弱而下坠也，遂用升麻、黄芪大料二服与之。半日后，其夫复来曰，服二贴后，觉一声响，视之，已收阴户讫。但因经宿干着席破一块，如掌心大粘席，其妻在家，哭泣自伤，恐损破，不能复生。予思之，此非肠胃，乃糟粕也，何骇之有？肌肉破，尚可复完，若气血充盛，可以生满，遂用四物汤加人参，与百贴。三年后，始复生子。

产后玉门肿痛

凡产后阴肿，下脱内出，玉门不闭，用石灰一升，炒极热，汤二升，投灰中，俟温冷澄清，坐水中以浸玉门，斯须平复如故。

产后玉门肿痛，用海螵蛸去甲，研细末，用鸡子壳调涂，其肿立消。

产后玉门不敛，此气血不足也，宜补中益气汤，倍加升麻。

产后胁痛

产后胁痛，仍顽痰瘀血也。左痛为痰，右痛为血，宜补中益气汤。顽痰在左，加白芥子。瘀血在右胁，加枳壳、柴胡。

产后阴痒

产后阴痒，或肿痛，此湿热也，宜药汤熏洗。

荆芥　白芷　白矾　川椒　杏仁　桔梗　细辛

煎汤熏洗。

亦有产后阴痒，用蛇床子一两，白矾二钱，煎汤频洗，其痒自止。

产后下血成片

产后忽然下血成片，如崩状，此因气血大虚，脾胃又弱，以致气血攻于脾胃，胃气不顺，则成此症，此营卫衰败也，当和血理气，服四物止经汤。

熟地　白芍　当归　川芎　柏叶　茯苓　香附　阿胶　蒲黄　白术　枣仁　陈皮　人参　甘草

产后尿胞坠下

产后偶取重物，致尿胞坠落在外不收，此气弱血冷，移取重物，努力而致伤脏，因而坠下不收。或三四月，或半年一载，不能还原者，宜服收阴散。

人参　白术　甘草　肉桂　枳壳　升麻　吴萸　沉香

加四物汤。

绝产不育

产妇生育艰难，意欲断产，非细事也。或因生产不顺，每育则钩割。或因不正，或娼尼等，不愿孕育而欲绝胎者，每以毒药断之。殊不知产育虽断，而其受病更深也，智者鉴诸。

三白丸　治妇人不生子。

白芨　白敛　白茯苓　秦艽　厚朴　当归　吴萸　人参　肉桂　乳香各四钱

为末蜜丸，如桐子大，每服三十丸，空心酒下。

产妇乳裂

产妇乳裂，流脂疼痛，用秋冬绷拆茄子，瓦上煅灰，白蜜调敷。

产后阴户翻出

产后阴户翻出肿痛，用石灰煎汤，先熏后洗。

产后脱发

产后脱发，用申姜二两、蔷薇根一两，煎汤刷之，即不脱矣。

附妇人杂病诸方

眉毛脱落

硫黄一两，研细末，醋调涂眉间，眉毛渐出。

又方

用白芥子三钱，半夏三钱为末，生姜汁调搽即出。

女人赤鼻

枇杷叶五钱去毛，山栀四钱，苦参五钱，苍术五钱，米泔浸，共为末，每服一钱五分，白滚汤下，其赤渐退。

女白癜疯

白附子五钱，雄黄五钱，共为末，姜汁调白芥蒂蘸药擦之，其疯渐退。

女人面上赤疵

常以银扁烘热，日日揩之，久久自化。

女人发鬓堕落

桑皮一两，柏叶一两，水煎七八沸，去渣频洗。

妇女头发黄赤

用生柏叶末一升，猪脂一斤，搀烂和丸如弹子大。每用以布包一丸，投米泔中化开沐之，其发渐黑。

妇女齿疏

用芦甘石、寒水石等分，研细，每早擦之，忌用牙刷，久久自密。

女人手裂

用白果嚼烂，夜夜涂之甚妙。

女人时流清涕

用荜拨研末，吹之即止。

女人脚拆

用生羊腿骨内水，将鸡羽蘸之润开拆处，久久自合，永不再发。

女人汗癍

硫黄、雄黄、蜜陀僧、白附子、铅粉、滑石、光粉各等分为末，先将皂荚煮烂，擦后用药末唾津和涂之。

妇人乳癣

痒不可忍，用铜碌、轻粉为末，菜油调敷，其痒渐止。

女人鼻渊

用藕节、川芎各等分，炒研为末，每服二钱，米饮调下。

女人脑漏不止

用胎发一两，将丝绵包煅存性，加入冰片、麝香、辛夷，共为末，吹入鼻中，七八次即愈。

手足绷裂洗方

麻黄五钱　当归五钱　苦参一两　蛇床子五钱　芜荑一两　灵仙八钱　防风五钱　荆芥五钱　皂荚一两　豨莶一两

煎汤熏洗。

鸡眼疼痛

雄鸡肝一具，竹片剖露，入百草霜拌匀，湿草纸煨熟食之，鸡眼软而自脱。

女人鹅掌疯

芜荑一两，五倍子一两，共为末，醋调敷，七日不可下水，听其自脱，二次全愈。

老妇齿败口臭

用川芎含口中，即不臭。

解颐脱臼不止

用生南星为末，姜汁调敷两颊叉，一夜即止。

女金丹　治妇人诸病。

金华香附十五两，分作五宗，每宗如法五制。

三两蓬术艾叶各一两半，米泔浸　三两元胡川芎各一两半，煎汤浸　三两三棱、柴胡各一两半，醋浸　三两红花一两半，乌梅三十枚，盐水浸　三两当归三两，煎汤浸

春浸五日，夏浸三日，秋浸七日，冬浸十日，晒干为末，晚米饭为丸，如桐子大，临卧酒下。如腹痛，加槟榔、青皮各一两半。

保产神方

当归　川芎各一钱半　厚朴七分　枳壳三分，炒　黄芩八分　艾叶八分　丝子一钱半，炒　川贝一钱　羌活五分　荆芥八分　白芍一钱二分　甘草五分

孕妇六七个月即可服，加姜三片，水煎。

女子腋臭

用蚶子壳一对，将蜘蛛一个填入，扎紧，瓦上煅，加雄黄七分，生矾七分，硫黄五分，密陀僧一钱，俱煅存性，研细末，隔夜更衣，次早先将滚水洗，待干，即本人自便调擦立验。

又方

用青木香二两，醋浸夹于腋下，湿者，研末掺之。

脱骨汤　女子缠足少痛。

杏仁二钱　桑皮四钱　朴硝五钱　乳香一钱

水煎，置足于汤，熏洗十余次，缠则不痛也。

换肌散　治妇女疮疥久不愈，肌肤粗裂。

土茯苓　银花　荆芥　熟地　制首乌

共为末，蜜丸。

大内疮药方

大风子肉二两　冰片三分　麝香三分　细辛二钱　白芷二钱　滑石五钱　安息香五钱　芸香二钱　苏合油二钱　川椒二钱

共为细末，以油核桃肉三两，捣和为丸，浴后擦之。

阴　吹

仲景曰：阴吹者，胃气泄，阴吹而正喧。此谷气之实气，从溺处而泄也。治宜膏发煎。

猪膏八两　乱发鸡子大三枝

上二味和一处煎之，发消药成服之，病从小便出。

交　肠

仲景曰：交肠，乃大小便易位而出也。此因醉饱房劳，或大怒气乱，真脏气乖，不循常度，泌别失职之所致也。治宜五苓散，或四物汤，加海金沙、木香、槟榔、木通、桃

仁之类。

阴 疝

张子和曰：妇人脾胃虚寒，气滞不行，攻刺心腹，痛连胸胁，或因瘀血作痛，状如黄瓜，在小腹两旁横骨端纹中。孰谓妇人无疝乎？治宜蟠葱散、桃仁当归汤。

蟠葱散

青皮一两五钱　钓皮　砂仁　各一两　三棱　槟榔各一两　干姜　肉桂各五钱　元胡七钱五分　苍术五钱　甘草一两

上为二剂，姜枣葱煎热服。脐下冷痛，加吴萸、茴香。

桃仁当归汤

桃仁二钱　归尾　元胡各一钱半　川芎　生地　赤芍炒　吴萸　青皮醋炒，一钱　丹皮八分

姜三片，水煎，食前服。

化气丸　治经行腹痛。

香附　青皮　陈皮　砂仁　木香　川芎　茴香

上为末，曲糊丸。

异功散　调理脾胃。

人参　白术　茯苓　甘草　陈皮

水煎服。

附妇人修饰

粉滓面皯

炉甘石二两　白敛十二两

为细末，鸡子清夜涂旦洗，能白。

口香辟臭

白蔻仁二钱　北细辛二钱

为末，睡时含之。

唐天后泽面法治妇女粉刺黑斑

五月五日，收带根益母草紫花者，晒干烧灰，以商陆根捣自然汁，加好醋和搜灰作饼，炭火煅过收之，半年方可入面擦之。能润肌去滞。苏颂曰：唐天后炼益母草泽面，五月五日，采益母根苗具者，勿令着土晒干，捣烂以面水和成丸，如鸡子大，再晒干，仍作一炉，四旁开窍，上下置火，安药中央，大火烧一炊久，即去大火，留小火养之，勿令火绝，经一伏时出之，瓷器中研极细无声，收用，如澡豆法，日用一方寸，每灰十两，加水飞滑石一两，胭脂一两，研匀用之，一月之后，面如美玉。

太真红玉膏名女人面脂

轻粉一两　杏仁去皮，一两　滑石水飞，一两　冰片一分　麝香少许

上为细末，蒸过，入冰麝再研，以鸡子清调匀，洗面后涂之。旬日，肤若凝脂。

悦泽面容

冬瓜仁五两，去壳　桃花四两　白杨皮二两

为末，米饮服方寸匕，日三服。欲白，倍加冬瓜仁。欲红，倍加桃花。服三十日，面白如玉，五十日后，手足皆白。一方：用陈皮，去白杨皮，此宫中尝服之剂。

面生皯瘡

王瓜根捣汁，浆水和匀，入冰片少许，入夜洗面涂药，百日后，肌肤柔嫩，皯瘡全除。

玉容散　治妇女面无光彩，颜色白面不润泽。

香芷五分　肥皂一两　细辛钱半　甘松二钱半　荆芥五钱　木贼三钱　白丁香二钱　杏仁三钱　花粉五钱　蕤仁五钱　藿香叶三钱　天虫五钱　山柰钱半　陀僧五钱　元明粉三钱　轻粉二钱　硫黄一钱　铅粉一两　苏合油五钱，后入　冰片一钱

上药共为细末，临睡吐津调匀，擦面过夜，次日清早，用煮酒一杯，冲热水洗去，再拍玉容粉。

玉容香粉

白果洛一升，去壳打汁　杏洛一两，去皮打汁　上甘石一两，水飞研　滑石水飞，三两　元寸二分　苏合油五钱　冰片四分　上铅粉一两去铅

药研极细末，用泉水漂去黄水，后入冰片、麝香、苏合油，加珍珠末五分，再以胭脂水调和收贮，临用加白蜜少许，旬日之后，面白如脂，夫妇不相识也。

妇人面黑粉滓

白石脂二两　白敛十二两　山奈一两

共为细末，鸡子清调敷，夜涂旦洗，渣去面白。

女人雀斑

异授雀斑方

用头生鸡子一个，打破顶，去黄留白，加大丹砂一两研细，填入鸡卵内，上用绵纸封固，贮哺鸡肚下哺之，待鸡雏出取，先将肥皂打除面上油，后用前鸡子清涂之，其斑渐去。一月之后，白玉无瑕。此方贵妃常用，乃西王母枕中方也。宝之。

又方

肥皂四两，去核　甘松一钱　山奈一钱　细辛一钱　白芷一钱　丁香一钱　鹰粪五钱

上为末，枣肉为丸，洗面后用药擦之，其雀斑渐除。再以玉容香粉拍之，则白而嫩亮，光彩射人。

又方

鹰粪五钱　山楂五钱　蜜陀僧五钱

为细末，将乳汁调和，夜睡擦之，一月后雀斑尽除。加苏合四钱更妙，清早洗去。久服身香

桂心　冬瓜仁　松树皮

为末，枣肉为丸，久服遍身香气透鼻。

洗面擦药

樱桃皮　雀卵　紫背浮萍　牙皂　白梅肉

研细和匀，日日洗面擦之，肌肤渐嫩。

玉容肥皂

白元米一升　肥皂去皮核，四两　天花粉八两　滑石三两　胡桃肉八两　粉葛三两　白丁香一两　真粉三两　橄榄四十个，去核　北细辛二两　牙皂八两　枣肉四两

苍耳草捣汁，同元米饭和捣为丸，如弹子大，洗面后擦之。

四精膏治妇人身涩不滑

人乳　象精　白蜜　藕汁

各等分熬膏，加苏合油调匀，浴后满身涂之。一月之内，遍体嫩滑香润，此宫中日用之方也。

面脂手膏

羊乳三斤，羊胰子三副，捣和，每夜洗面涂之，清早洗去。一月之后，手嫩面泽。

面体黧黑

羚羊胫骨一条为末，鸡子清调敷，以米泔水洗之，夜涂旦洗，三日如素。

面粗皮皯

胰子五具　芜青子二两　杏仁一两　花粉一两

醇酒浸之，夜涂旦洗，每日用之，老者返少，少者嫩白。

令面光泽

母猪蹄一具，煮汁如膏，夜涂旦洗，妇老渐嫩如少。

女人面上瘢痕

白蒺藜一两　山栀一两

为末，醋调，夜涂旦洗，疤痕渐脱。

面黑令白

冬瓜一个，用竹刀去皮切片，勿经铁器，酒一升半，煮烂去渣，熬成膏，夜涂旦洗，肌肤渐白。

《女科切要》终

经效产宝

〔唐〕 咎 殷 撰集

《经效产宝》提要

唐节度随军昝殷著，相国白敏中家藏善本。《产育宝庆方》四库提要云：《唐书·艺文志》有《昝殷产宝》一卷，始别列一门。今其书不传云。是书在清季中叶已不可得，其珍贵可知。婺源张君金城，近从日本购得影刻唐节度随军昝殷撰《经效产宝》三卷，后附续编一卷。书中薯蓣作薯药，避唐讳而不避宋讳，其为北宋本无疑。日人于中国医药旧籍，考察甚精，近如影刻北宋本《千金方》，元大德本《千金翼方》。其版皆由国人购回，现存苏州。《产宝》一书，有光绪七年归安凌嘉乐序，张氏影刻。其原书本无序目，今补抄目录于下，俾便稽考。其续编、濮阳李师圣、郭稽中产论，在九页后面，十页上面空白，原缺第十二论，麻仁丸末；第十三论全缺；十四论缺论方药味，存煎服法。炳章从《产育宝庆方》抄补，以成完书。其卷上，列妊娠安胎方论第一，凡十一方；妊娠食诸物忌方论第二，凡五方；益气滑胎令易产方论第三，凡一方；妊娠恶阻呕吐不食方论第四，凡四方；胎动不安方论第五，凡十八方；妊娠漏胞下血方论第六，凡五方；妊娠心腹腰痛方论第七，凡十一方；妊娠热病防损胎方论第八，凡五方；妊娠患淋小便不利方论第九，凡二方；妊娠下痢黄水赤白方论第十，凡七方；妊娠水气身肿腹胀方论第十一，凡四方；妊娠《千金》易产方论第十二，凡六方；治难产诸疾方论第十三，凡十二方；难产死生方论第十四，凡八方；难产令易产方论第十五，凡七方；胎死胞衣不出方论第十六，凡十八方。其卷中，列产后心惊中风方论第十七，凡七方；产后余血奔心烦闷方论第十八，凡十五方；产后渴不止方论第十九，凡二方；产后淋病诸方论第二十，凡六方；产后虚羸下痢方论第二十一，凡三方；产后腰痛羸瘦补益玉门不闭方论第二十二，凡六方；产后中风方论第二十三，凡十五方；产后余血上抢心痛方论第二十四，凡六方；产后汗不止方论第二十五，凡五方；产后冷热痢方论第二十六，凡二方；产后虚羸方论第二十七，凡三方；产后烦渴方论第二十八，凡二方；产后烦闷虚热方论第二十九，凡六方；产后血瘕方论第三十，凡四方；产后余疾痢脓血方论第三十一，凡八方；产后小便赤方论第三十二，凡二方。其卷下，列产后小便遗血方论第三十三，凡四方；产后大小便不通方论第三十四，凡四方；产后寒热方论第三十五，凡四方；产后咳嗽方论第三十六，凡三方；产后气痢方论第三十七，凡六方；产后血晕闷绝方论第三十八，凡十方；产后乳无汁方论第三十九，凡五方；产后乳结痈方论第四十，凡十九方；产后乳汁自出方论第四十一，凡三方。其续编列周颐传授济急方论，凡四方；濮阳李师圣施郭稽中论二十一证，凡十六方；产后十八论，凡九方。先述证论，后列方治。言简意赅，方多经验，为产科之宝筏，题曰《经效产宝》，洵不诬也。

序

婺源张君金城，近购得日本所刻，唐节度随军曾殷撰集《经效产宝》书版，随以印本示余。余读其书，凡上、中、下三卷，后附续编一卷。书中薯蓣作薯药，避唐讳而不避宋讳；复考《新唐书·艺文志》，有博士曾商著《心鉴》五卷，或即斯人，避殷作商，其为北宋本无疑。日本邦人，于医家旧籍，考察最精。近如北宋本《千金方》，元大德本《千金翼方》，显于沪上；影宋本《外台秘要》，购自粤东。今得是书，唐贤撰述，并可宝贵，余家虽习医，苦于搜藏无多，兹就所见，书诸卷端。至若方药之合宜，在乎明哲者取择焉。

光绪七年春正月归安凌德书于尚素轩

《经效产宝》目录

卷上

妊娠安胎方论第一凡十一道 …… 193
妊娠食诸物忌方论第二凡五道 …… 193
益气滑胎令易产方论第三凡一道 …… 194
妊娠恶阻呕吐不食方论第四凡四道 …… 194
胎动不安方论第五凡十八道 …… 194
妊娠漏胞下血方论第六凡五道 …… 195
妊娠心腹腰痛方论第七凡十一道 …… 195
妊娠伤寒热病防损胎方论第八凡五道 …… 196
妊娠患淋小便不利方论第九凡二道 …… 196
妊娠下痢黄水赤白方论第十凡七道 …… 197
治妊娠水气身肿腹胀方论第十一凡四道 …… 197
妊娠《千金》易产方论第十二凡六道 …… 197
治产难诸疾方论第十三凡十二道 …… 198
难产死生方论第十四凡八道 …… 198
难产令易产方论第十五凡七道 …… 199
胎死胞衣不出方论第十六凡十八道 …… 199

卷中

产后心惊中风方论第十七凡七道 …… 201
产后余血奔心烦闷方论第十八凡十五道 …… 201
产后渴不止方论第十九凡二道 …… 202
产后淋病诸方论第二十凡六道 …… 202
产后虚羸下痢方论第二十一凡三道 …… 203
产后腰痛羸瘦补益玉门不闭方论第二十二凡七道 …… 203
产后中风方论第二十三凡十五道 …… 204
产后余血上抢心痛方论第二十四凡六道 …… 205
产后汗不止方论第二十五凡五道 …… 205
产后冷热痢方论第二十六凡二道 …… 206
产后虚羸方论第二十七凡三道 …… 206
产后烦渴方论第二十八凡二道 …… 206
产后烦闷虚热方论第二十九凡六道 …… 206
产后血痕方论第三十凡四道 …… 207
产后余疾痢脓血方论第三十一凡八道 …… 207
产后小便赤方论第三十二凡二道 …… 207

卷下

产后小便淋血方论第三十三凡四道 …… 209
产后大小便不通方论第三十四凡四道 …… 209
产后寒热方论第三十五凡四道 …… 209
产后咳嗽方论第三十六凡三道 …… 210
产后气烟方论第三十七凡六道 …… 210
产后血晕闷绝方论第三十八凡十道 …… 210
产后乳无汁方论第三十九凡五道 …… 211
产后乳结痈方论第四十凡十九道 …… 211
产后乳汁自出方论第四十一凡三道 …… 212

续编

周颐传授济急方论凡四道 …… 213
濮阳李师圣施郭稽中论三十一证凡十六道 …… 213
产后十八论凡九道 …… 217

经效产宝　卷上

唐　节度随军　昝　殷　撰集
相　　国　白敏中家藏善本
郑　　县　曹赤电炳章圈点

妊娠安胎方论第一凡十一道

疗妊娠三四个月，腹痛，时时下血。

续断八分　艾叶六分，炒　当归六分　竹茹四分　干地黄六分　阿胶四分，炙　鸡苏四分

上以水一升，煎取六合，去滓，空心再服，隔日更服。

治妊娠六七个月，忽胎动下血，肠痛不可忍。

芎藭八分　桑寄生四分　当归十二分

上以水一升半，煎取八合，下清酒半升，同煎取九合，分作三服。如人行五六里，再温服。

治妊娠下血，时时漏血，血尽子死。

生地黄汁二合　清酒二合

上相和，煎三四沸，空腹分温，温服。

治妊娠心头烦懑，两胁胀，不下食。

槟榔二个　人参四分　柴胡五分　枳壳四分，炙　肉豆蔻二分　生姜二分　桑寄生四分

上以水二升，煎取六合，分温三服。

治妊娠身伤寒，头痛壮热，肢节烦痛。

前胡六分　石膏十二分　大青四分　子苓五分　知母四分　山栀四分　葱白七茎　甜竹茹三分

上水二升，煎取八合，食后分温三服。

治妊娠胎动腰痛及下血，安胎。

当归四分　芎藭四分　葱白二七茎　艾叶二分　茅根六分　鹿角胶六分，炙为末

上水二升，煎取八合，空心热吃三服。

治妊娠损动，安胎。

鲤鱼一斤　粳米一升

上作臛食之佳。

治妊娠呕吐不食，兼吐痰水。

生芦根十分　橘皮四分　生姜六分　槟榔二分

上以水二升，煎取七合，空腹热服。

治妊娠胁满腹胀，心胸烦，见饭即吐，渐加羸瘦。

赤茯苓四分　前胡四分　小半夏四分，汤洗　生姜二分　白术一分　大腹子五个　麦门冬六分，去心　槟榔五枚　紫苏四分

上水二升，煎取八合，空心分温三服。

治妊娠常苦烦闷，此是子烦，宜服此方。

茯苓八分　防风六分　知母六分　竹沥二合，温用　生门冬十二分

上水二升，煎取七合，下竹沥，食后作两服。

治妊娠胎动不安。烦闷。

当归四分　芎藭三分　阿胶二分，炙临时入　葱白十四茎　豉八合　桑寄生四分

上水二升，煎取八合，下阿胶，空腹分两服。

妊娠食诸物忌方论第二凡五道

食鸡肉与糯米共食，令子生白虫。

食鲤鱼及鸡子，令子多疳。

食羊肝，令子多厄。

食鸭子，令子倒生。

食兔肉犬肉，令子缺唇无音声。

益气滑胎令易产方论第三凡一道

润胎益气，令子易生，诃子丸。

槟榔八分　芎藭二分　吴茱萸二分　诃子皮二分，熬

上为细末，炼蜜为丸，如绿豆大，空心酒下十九丸、二十丸，自七八个月，服至分解。

妊娠恶阻呕吐不食方论第四凡四道

论曰：夫阻病之候，心中溃溃，头旋眼眩，四肢沉重懈怠，恶闻食气，好吃酸咸果实，多卧少起，三月四月多呕逆，肢节不得自举者，以此治之。

人参八分　厚朴六分，炙　茯苓十三分　葛根八分　白术十二分　橘皮六分　生姜十一分，切

上水七升，煮二合，分温三服，忌桃李醋等物。

治妊娠三四月，呕吐，恶闻食气。

橘皮　青竹茹　生姜　茯苓　白术各二两

上水六升，煎二升，分温三服，忌同前。

治妊娠葡病，心中溃闷，见食呕吐，憎闻食气，肢节烦疼，身体沉重，多卧嗜睡黄瘦方。

人参八分　橘皮八分　茯苓十二分　生姜十二分　甘草十二分　大枣十二枚　生麦门冬子二十分，去心

上水五升，煎取二升，分温三服，忌菘菜醋等。

凡妊娠恶食者，以所思食，任意食之，必愈。

胎动不安方论第五凡十八道

论曰：安胎有二法，因母病以动胎，但疗母疾，其胎自安。又缘胎有不坚，故致动以病母，但疗胎则母瘥。其理甚效，不可违也。胎不动，不知子死生者，但看母唇口青者，儿死母活。口中青沫出者，子母俱死。口舌赤青沫者，母死子活也。

疗胎数落而不结实，或冷或热。

甘草二两　黄芪　人参　白术　芎藭　干地黄　吴茱萸各二两

上为末，空腹酒调二钱，忌菘菜醋等物。

治胎动不安。

好银煮取水

上煮葱白，作羹食之佳。

治胎动下血，心腹绞痛，儿在腹死活未分，服此药死即下，活即安，极妙。

当归二两　芎藭六两

上水四升，酒三升，煮取三升，为三服。

治妊娠三二月及七八月，胎动不安，或腰肚痛，有血下。

芎藭　当归各四两　艾叶二两　甘草二两　阿胶二两，炙

上水五升，煮取二升，分温三服古方无艾叶。

治妊娠抢心，下血不止，腰腹痛不可忍。

上银一斤，水一斗，煎取七升　芎藭四两　当归四两　阿胶二两　生地黄五两

上以前银水煮取二升，分三服。

治妊娠无故胎动不安，腹内绞痛。

葱白切，一升　阿胶二两，炙　当归四两　川芎四两　桑寄生

上取银水七升，煮药取二升半，分三服。

治妊娠五六月，胎犹不安，不常处。

白术二两　厚朴二两　旋覆花一两　黄芩二两　茯苓三两　生姜二两　枳壳二两　芍药二两，炙令黄色

上以水七升，煮取二升半，食后分温五服。

治胎动不安。

熟艾二两　葱白切，一升　阿胶二两，炙

上水四升，煮取一升半，分温两服。

又方

芎劳二两　葱白切，一升

上水七升，煮取二升半，分温三服。

治妊娠冷热，腹内不调，致胎不安。

当归三两　干姜三两　芎劳四两　艾叶二两

上水四升，煎取二升，分为四服。

治妊娠经八九个月，或胎动不安，因用力劳乏，心腹痛，面目青，冷汗出，气息欲绝，由劳动惊胎之所致也。

钩藤二两　茯神二两　人参二两　当归二两　桔梗二两　寄生一两

上水五升，煎取二升，分为三服，忌猪肉菘菜。若烦热加石膏五两，临月加桂心二两。

治妊娠因夫所动困绝。

上取竹沥，饮一升，立愈。

疗妊娠被惊恼，胎向下不安，小腹痛连腰。下血。

当归　芎劳各八分　阿胶六分，炙　人参六分　艾叶四分　大枣十二枚　茯苓十分

上水四升，煮取二升，分为三服。

治堕胎忽倒地，举动擎促损腹中不安，及子死腹中不出。

芎劳一两

上为末，服寸匕，须臾三服，立出。

治胎动冲心，烦闷欲死，安胎止痛。

甘草炙　当归　芎劳　人参　阿胶各二两　葱白切，一升

上以水七升，煎取二升，分为三服。

疗妊娠忽黄汁下如胶，或如小豆汁。

粳米五升　黄芪五两

上以水七升，煎取二升，分为四服。

治妊娠胎动欲落，肚痛不可忍。

上银一斤　茅根去黑皮切，二升

上以水九升，煮银取二升，入清酒一升，同煎茅根取二升，分为三服，立安。

疗妊娠腹内冷痛，忽胎动。

薤白切，一升　当归四两

上以水五升，煎取二升，作三服。

妊娠漏胞下血方论第六凡五道

疗漏胎下血不止，胞干即死，宜急治之。

生地黄汁一升　酒五合

上同煎三五沸，分三服，频吃瘥。

治妊娠下血不止，血尽子死。

生干地黄为细末

上酒服方寸匕，日三服，夜一服，即愈。

治妊娠下血不止，及腹内冷者。

生地黄　干姜

上两味等分，同煎服。

治妊娠无故，卒下血不绝

阿胶二两，炙

上清酒一升半，煎取一升，顿服。

又方

生地黄八两

上捣碎，以酒浸，绞去滓，分两服，以止为度。

疗妊娠下血如月信来，若胞干则损子伤母。

干地黄五两　干姜五两

上以水六升，煎取二升，下蜜少许，更煎两沸，分二服。

妊娠心腹腰痛方论第七凡十一道

治妊娠三三月，腹痛腰痛。

当归三两　阿胶炙　甘草各二两　葱白切，一升

上水七升，煮取二升，分三服。忌猪肉菘菜醋等物。

治妊娠三五月已来，忽心腹绞痛。

大枣十四枚，烧令焦

上取小便调服之。

治妊娠心腹痛不可忍。

盐一斤，烧令赤

上以两指取一撮，酒调服之。

治妊娠遍身痛，或冲心欲死，不能饮食。

白术五两　黄芩二两　芍药四两，炙令黄

上以水六升，煮取二升半，为三服，缘胎有水致痛，兼易产。

治妊娠卒心痛，气欲绝。

芎藭　当归　茯苓各二两　厚朴二两，炙

上水六升，煎取二升，分为两服。忌食如前。

治妊娠腰背痛，反覆不得。

鹿角一枚，长五六寸，烧令赤，酒中淬冷又烧之，更淬，以角碎为度

上取酒饮之，作散服，鹿角亦得。

疗妊娠先患冷气，忽冲心腹，痛如刀刺。

芎藭　人参　茯苓　吴茱萸　桔梗　当归各二两　厚朴炙　芍药炙，各二两

上水九升，煎取三升，分三服，气下即瘥。

治妊娠患腹痛，并胎动不安。

葱白切，一升　人参　厚朴炙　阿胶炙　芎藭各二两　当归二两

上水七升，煎取三升，分作三服。

治妊娠疼痛不可忍，或连胯痛。先服此散

杜仲四两　五加皮　阿胶炙　狗脊　防风　川芎　细辛　芍药各二两　蕤蘼二两　杏仁八十枚，去尖

上水九升，煮取二升，去滓，下胶，作三服。

治妊娠三两月，腰痛不可忍者。先服前散后服此丸。

续断　杜仲各十分　芎藭三两　独活三两　狗脊　五加皮　蕤蘼　芍药　薯蓣　诃子以上各八两

上为末，蜜和为丸，梧桐子大，空心，酒下四十九丸，日再服。

治触动胎，以致腰痛背痛。

杜仲　五加皮　当归　芍药炙　芎藭　人参　蕤蘼各三两

上以水七升，煎取二升半，分温三服。

妊娠伤寒热病防损胎方论第八凡五道

论曰：非即之气，伤折妊妇，热毒之气，侵损胞胎，遂有堕胎漏血，俱害子母之命。

治妊娠伤寒，骨节疼痛，壮热。不急治，则胎落。

葱白切，一升　前胡　葛根　石膏各十分　青黛八分　升麻八分　栀子仁十二分

上以水七升，煮取二升半，分三服。

治妊娠头痛壮热，呕吐不下食，心烦热。

青竹茹　葛根　知母各三两　芦根一升　生麦门冬四两，去心

上水七升，煎取二升，分三服。

治妊娠时气头痛，腰背强，壮热。

升麻　黛青　前胡　黄芩　山栀各二两　葛根三两　石膏八分

上水五升，煎取三升半，分为三服。

治妊娠妇六七月，伤寒热入腹，大小便秘结不通，蒸热。

前胡十分　大黄　石膏各二十分　栀子仁十枚　知母　黄芩　伏苓　生姜各八分

上水八升，煎取二升半，后下大黄，更煎三五沸，分作三服。

治妊娠伤寒，苦热不止，身上斑出，忽赤忽黑，小便如赤血，气欲绝，胎欲落。

栀子仁　升麻各四两　黛青二两　石膏八两，碎　葱白切，一升　生地黄二十分　黄芩三两

上水九升，煎取三升，作三服，忌热物。

妊娠患淋小便不利方论第九凡二道

治妊娠患淋，小便涩不利，小腹水道热痛。

冬葵子一升　芍药二两，炙　黄芩　茯苓　车钱子各三两

上以水七升，煎取二升，分温三服。

妊娠下痢黄水赤白方论第十凡七道

论曰：妊娠下痢，皆因误食生冷肥腻，冷即色白，热即黄赤，气不和，赤白相兼，攒刺疼痛，脾胃不调之所致也。

治妊娠患痢脓血，状如鱼髓，小腹绞痛难忍。

薤白切，一升　地榆　醋榴皮　黄连各三两　阿胶二两，炙

上水七升，煎取二升半，分三服，忌生冷肥腻。

治妊娠痢白脓，腹内冷。

干姜四两　赤石脂六两　粳米一升，炒令黄色

上水七升，煎取二升，分三服，忌如前。

疗妊娠腹痛，下痢不止。

黄连　石榴皮　当归各三两　阿胶二两炙　艾一两半

上水六升，煎至二升，分为三服。忌如前。

疗妊娠下痢，腹内痛，脓血不止。

黄连八分　厚朴炙　阿胶炙　当归各六分　艾叶　黄柏各四分　干姜五分

上为末，空心，米饮调下一匙，日进三服。

疗妊娠膝下刺痛，大便白，昼夜三五十行。

根黄厚者，涂蜜炙令焦　大蒜炮令烂熟

上大蒜去皮，研如膏，和根黄末为丸，如梧桐子大，空心粥饮下三十丸，日进三服妙。

疗妊娠痢，黄水不绝。

厚朴三两，炙　黄连二两　豆蔻五枚，连皮

上水二升，煮取一升，频服。忌如前。

治妊娠忽被惊奔走，堕胎。下血不止兼痛。

干地黄四两　当归　艾叶各二两　阿胶炙　芎藭各三两

上水七升，煮取二升半，分作三服。痛加杜仲、五加皮各三两。

治妊娠水气身肿腹胀方论第十一凡四道

论曰：脏气本弱，因产重虚，土不克水，血散入四肢，遂致腹胀，手足面目皆浮肿，小便秘涩。

治妊娠身肿有水气，心腹胀满，小便少。

茯苓四两　杏仁去尖　槟榔仁三两　旋覆花　郁李仁各一两

上水六升，煮取二升，分温温服，小便通即瘥。

治妊娠四肢皮肉拘急及肿。

桑白皮切，二升　樟桂根一两　赤小豆一升

上水一斗二升，煮二味，取七升，下小豆，煮令熟，先食豆，候渴即饮其汁，小便利即瘥。

治妊娠遍身洪肿方。

葶苈子十分　白术二十分　茯苓二两　桑白皮二两　郁李仁八分

上水六升，煎取二升，作两服，小便利即瘥。

又方

泽泻二两　葶苈子三两　白术六两　枳壳炙　茯苓各六两

上制度服，食如前。

妊娠《千金》易产方论第十二凡六道

论曰：夫妇人特将产至重者，胞衣也。凡胞衣不出者，世谓之息胞。由产时用力过度，已产而体已疲顿，不能更用气，经停之间，而外冷气乘之，则血涩逆否，故令胞衣不出，则不得断脐浴沐，冷气伤儿则成病也。

旧方胞衣不损儿者，依法截脐，而以物系其带一头，所有产时看生人，不用意谨护，而率挽胞系断其胞，上掩心而夭命也。凡欲产时，必先脱常所着衣裳，以笼灶神验。

胞衣不出方

灶下土 一大寸，研碎

上用好醋调令相和，纳于脐中，续取生甘草汤三四合服。

又方

槐子十四枚　蒲黄 一合

上酒煎温服，须臾未效，更进一服。

又方

生地黄汁五合　生姜汁半大合

上煎三四沸，顿服之。

又方

槐子槐枝，切 一升，最好　瞿麦八分　牛膝八分　通草十二分　白榆切，一大升　冬麻仁一大升，研

上水五升，煎二大升，去滓，下麻仁，分三服。

小品颜服散，令易产，母疾病，未生一月已前，预服，过三十日，行步不觉儿生。

甘草八分　粳米一合　大豆黄炒　黄芩　干姜　桂心　吴茱萸　冬麻仁研如泥，各二分

上为末，空腹暖酒，服方寸匕。忌生冷肥腻。

又易产方

飞生鸟 一只，烧　槐子十四枚　故箭羽十四片，烧

上为末，蜜为丸，大觉痛，服三十丸，未产，须臾再服之。

治产难诸疾方论第十三凡十二道

易产方

榆白皮十四分　通草十二分　葵子三合　滑石　瞿麦各八分

上水二升，煎取八合，分温三服。

又方

羚羊角一枚，烧刮取末

上以酒调方寸匕服。

又方

滑石八分　葵子 一合　榆皮十二分　牛膝六分

上水一升八合，煎取六合，再服。

又方

含醋噀面，咒即噀之。

又方

吞槐子七枚，即下。

又方

吞鸡子白两枚，即产。

又方

两手各把一石燕，立产。

又方

兔皮和毛烧灰研

上以酒调两钱匕即产，衣不下，服之即下。

又方

大麻根 二茎

上水一升，煎取半升，顿服立产，衣不下，服之即下。

又方

弓弩弦烧灰

上为末，酒调方寸匕，服之即下。

又方

铜弩牙

上烧赤，投于醋三合内，良久顿服，立产。

又方

麝香 一钱

上研水调服之，立产。

难产死生方论第十四凡八道

疗胎死腹中不出，母气欲绝。

水银 二两

上顿吞之，儿立出。

治产横倒不出。

上令夫唾口中二七遍，立出。

疗产经数日不出，或子死腹。

瞿麦六两　通草三两　桂心三两　榆白皮切，一升

上水九升，煎取三升，分三服。

又方

瞿麦

上水煮取浓汁，服之佳。

疗子死腹中不出。

伏龙肝为末，三钱

上酒调服之，土当儿顶上戴出妙。

又方

朱砂一两

上水煎数沸，然后取酒和服之。

又方

水银二两

上水煮二三十沸，服之立产。

滑胎易产。

白蜜　苦酒　猪脂各一升

上相和，煎三四沸，临腹痛时，以热酒调下三四钱匕，不过五六服即出。

难产令易产方论第十五凡七道

论曰：夫产难者，内宜用药，外宜用法。盖多门救疗，以取其安也。

疗产难坐草数日，困乏不能生，此为母先有病，经络俱闭所然。

赤小豆二升　胶三升

右水九升，煎令熟，去豆内胶，烊令清服之，须臾更一服。

又方

上令夫从外含水，吐着产妇口中，即出。

疗难产，疑胎在腹已死。

当归四分　芎藭六分

上水六升，煎取二升，分作两服，便安胎，死即出，酒煎亦得，神验。

治难产困乏腹痛，有所见，儿及衣不出。

蒺藜子四两　贝母四两

上为末，每服一匙，酒调服之，时再服，以出为度。熟水调下，亦得。

治难产。

箭一只，烧为末

上以水调服之。

又方

鳖甲烧为末

上服方寸匕立出，未生更服。

治疗落胎腹痛。

芍药　当归　牛膝　瞿麦各五分　桂心　芎藭各四分

上以水一升七合，煎取八合，空心温服。

胎死胞衣不出方论第十六凡十八道

疗妊娠经五六月，胎死腹中，或胞衣不出。

生地黄五两　牛膝　朴硝各八分　桂心　芎藭　大黄各六分　蒲黄五分

上水二升，煎取八合，入蒲黄，空心作二服。

疗子死腹中不出。

雄鸡粪二十一枚

上水二升，煎取五合，以米作粥食，胎即出。

治妊娠经六七月，子死腹中不出。

黑豆三合

上醋一升，煎取八合，空心，分温三服。

治子死腹中，母闷绝。

水银十二分

上取井底土，如鸡子黄，水研服之。

又方

赤小豆

上生吞七枚出，若是女，即二七枚出。

经效理胎衣不出令烂。

牛膝　瞿麦各四两　滑石研，八分　当归二两　通草六两　葵子一升

上方五升，煎取二升，分三服温服。

又方

灶突土三撮

上和暖水服之。

崔氏治胎胞不出。

大豆一升

上苦酒五升，煮取三升，分为三服。

又方

上吞鸡子两三只，解发刺喉中令呕。若因热，以水煮蝼蛄一枚，三四沸，泻口中汁下，即出。

又方

大麦　小麦　小豆

上等分相和，煮取浓汁，饮之出。

又方

赤朱一两

上研为粉，以苦酒和服之，即出。

又方

皂荚

上为末，着鼻中一两度，自出。

疗胞衣久不出，腹满即杀人，服此方即烂。

桂心　牛膝　通草各三两　滑石二两　葵子一升　瞿麦四两

上水九升，煎取三升，分三服，甚效。

又方

瞿麦四两　桂心三两　通草三两　牛膝五两　葵子一升

上水三升，煎取一升半，分为三服。

又方

真珠一两

上研细，苦酒调服之。

又方

洗儿水

上取半碗，服之即出。

治胞衣不出。

牛膝八两　葵子二升

上水七升，煮取三升，分三服。

胎衣半出半不出，或子死腹中，着脊不下，数日不产，血气上冲。

牛膝六两　葵子一升　榆白皮四两　地黄汁八合

上水九升，煎取三升，分三服即出。

经效产宝　卷中

唐　节度随军　咎　殷撰集
鄞　　县　曹赤电炳章圈点

产后心惊中风方论第十七凡七道

论曰：产后心闷气绝，眼张口噤，通身强直，腰背反偃，状如痫疾，心忪惊悸，言语错乱，皆是宿有风毒。因产心气虚弱，风因产发成风痓。

防风　当归　茯苓　汉防己　麻黄去节，各八分　秦艽　人参　芎藭　独活　白鲜皮　甘草炙　白薇各六分　石膏十二分　竹沥二升

上水七升，先煮麻黄掠去沫，下诸药，入竹沥，煎取二升半，去滓，三服。忌菘菜猪肉生冷。

疗产后狂语，志意不定，精神昏乱，心气虚，风邪所致。

茯苓　干地黄各十二分　远志十分　白薇　龙齿各十分　甘草炙　人参　防风　独活各八分

上以银一大斤，水一斗五升，煎取七升，下诸药，煎取三升，分温三服。忌如前。

疗产后心虚，忪悸不定，乱语谬说，精神恍惚不定，当由心虚所致。

人参　甘草炙　芍药　当归　生姜各八分　远志　茯苓各十分　桂心六分　门冬去心　大枣各十二分

上水八升，煎取三升，去滓，分温三服。

疗产后心气虚损，卒惊强语，或歌哭嗔笑，性气不定。

上银一斤　桂心　甘草各六分　细辛四分　人参　生姜　远志　茯神各八分　生地黄十分　龙骨一分　大枣一枚

上水八升，煮银取一升半，入诸药煎，分三服，温温进。

疗产后多虚弱羸瘦，苦大汗痢，皆至于死，此重虚故。若患中风谬语，昏闷不知人者。

人参　茯苓　羌活　桂心　大枣　远志各十分　竹沥一升半

上水六升，煮取三升，下竹沥，更煎取二升，分为三服。

疗产后身忽痉，口噤面青，手脚强急。

上竹沥二升，饮之，最佳。

疗产后恶寒壮热，一夜三五度发恶语，口中疮生，时时干呕，困乏欲绝。

人参　独活　白鲜皮　葛根　防风　青竹茹　远志各六分　茯神八分　白敛十分　玄参十二分　竹沥二升半

上银一斤，水一斗五升，煎取七升，下诸药，重煎取三升，分温三服。忌鱼酒面等物。

产后余血奔心烦闷方论第十八凡十五道

论曰：余血奔心，盖是分娩不了解，便与童子小便并扞心下，及卧太早，兼食不相宜之物所致。但能依方疗之，无不痊可。

疗产后心中虚热烦闷，气欲绝。

大枣十二分　茯苓十二分　生姜八分　甘草五分　竹沥一升　人参六分，发热方用　粳米若食小加三合　生麦门冬二十分

上水六升，煎取三升，方入竹沥，更煎

取两分，分温三服。

疗产后余血不尽奔冲，心烦闷腹痛。

生地黄　芎藭各二两　枳壳炒　芍药各二两

上捣筛为末，酒服方寸匕，日进二服。

又方

生藕研汁

上饮二升，甚效。

又方

清酒一升　生地黄汁一升

上相和，煎一沸，分为两服。

疗产后腹内块痛不止。

芎藭　当归　芍药　干姜各二两

上捣罗为末，酒调方寸匕，日三服。

疗产后下血不尽，腹内坚痛不可忍。

当归　芍药　桂心各三两　桃仁一百二十枚

上水六升，煮取二升，分温二服。如未瘥，加大黄三两

疗产后血结下不尽，腹绞痛不止。

大黄别浸　当归　干地黄各十分　芎藭　芍药　桂心各八分　甘草炙　黄芩各六分　桃仁四十九枚

上水七升，煮取二升半，下大黄，更煎三沸，分为三服。

疗先患冷气，因产后发腹痛。

芎藭　桂心　当归　茱萸　茯苓　芍药　甘草各六分　桃仁十分，去尖

上水七升，煮取二升，分三服。

治产后心腹切痛，不能食，乏气忽热。

当归　芎藭　黄芩　人参　甘草　芍药　防风　生姜各三分　桃仁八十枚

上水七升，煮取二升，下大黄，更煎三沸，分作三服。

疗产后血不尽，腹中除痛无计。

青木香　当归　牛膝　芎藭　黄芪　芍药各八分　大黄十三分，浸　芒硝十二分

上水七升，煎取二升，后下大黄，更煎三沸，分三服。

疗产后血下不止，虚羸迫死。

蒲黄二两

上水二升，煎取八合，顿服。

疗产后血泄不止，无禁度。

干地黄末

上酒服匙头，日三四服。

疗产后余血攻心，或下血不止，心闷面青，冷气欲绝。

羊血

上以一盏顿服。如不定，更服立效。

疗气痛欲死。

槐鸡半两

上为末，用酒浓煎，顿服立愈。

疗产后余血作痛兼块者。

桂心　姜黄

上等分为末，酒服方寸匕，血下尽妙。

产后渴不止方论第十九凡二道

疗产后渴不止，饮水，小便数多。

上瓜根　栝蒌根　人参　甘草　牡蛎粉各二两　大枣十二枚

上水九升，煮取三升，分温三服。

疗产后大渴不止。

芦根切，一升　栝蒌三两　人参　甘草　茯苓各三两　大枣十二枚　生麦门冬四两

上水九升，煮取三升，分为三服，顿服，四剂即瘥。忌菘菜。

产后淋病诸方论第二十凡六道

论曰：产后患淋，因虚损后有热气客于胞中，内虚则起数，热则小便涩痛，故谓之淋又有因产损血气，血气虚则挟热，热抟于血，血即流渗于胞中，故血随小便出为血淋者，如雨之淋也。

疗产后淋病，小便涩痛，或血淋者。

瞿麦　黄芩　冬葵子各二两　通草三两　大枣十二枚

上水七升，煮取二升半，分作两服。

疗产后血淋。

车前子　瞿麦各四两　黄芩三两　郁金一两，末

上水六升，煮取二升，下郁金末，分三服。

《广济》疗产后卒患淋，小便涩痛及血淋。

冬葵子三合　石苇二两，炙去毛　通草　黄芩　滑石　茯苓各三两

上水二升，煎取一升，下滑石，空心服。

《集验》疗产后患淋，小便痛。

石苇炙去毛　黄芩各二两　通草　芍药　甘草　冬葵子各三两　榆白皮五合

上水二升，煎取一升，空心温温服。

《经效》疗产后气淋热淋。

贝齿两枚，烧作末　葵子二两　石膏五两　阳石末，三两

上水二升，煎取一升，下两般末，空心服。

疗产后淋，小便痛及血淋。

黄芩五两　瞿麦二两　车前子二两　通草三两　冬葵子二合　鲤鱼齿一百枚，为末

上水二升，煎取一升，入齿末，空心分两服。

产后虚羸下痢方论第二十一凡三道

论曰：产后本虚患痢，更加羸弱，饮食不进，便痢无常，赤白不定。盖因饮食伤于生冷之所致。

疗产后虚羸，下痢脓血腹痛。

黄连　芍药　甘草　当归　干姜　人参各八分　艾叶三分

上水七升，煮取二升，分为三服。忌猪鹿肉。

疗产后痢不禁止，困乏气欲绝，无问赤白水谷。

黄连　厚朴各三两　芍药　黄柏各二两

上水六升，煮取二升，分为二服。

疗产后痢赤白，心腹绞痛羸困。

地榆　石榴皮　黄连各三两　当归二两　薤白切，一升

上水七升，煮取二升半，分为三服。

产后腰痛羸瘦补益玉门不闭方论第二十二

疗产后少气，困乏虚烦。

人参十二分　甘草　桂心　茯苓　芍药各八分　生地黄　生麦门冬各十二分

上水九升，煮取三升，分温三服。

疗产后喘乏气羸，腹内绞痛，自汗出。

黄芪　人参　茯苓　甘草　当归　芎藭　五味子　白术各八分　泽兰叶　橘皮各六分　诃子　麦门冬各十二分　桂心　干地黄各十二分

上捣罗为散，炼蜜和丸，如梧桐子大，空心酒下三十丸，日再服。

疗产后风虚，羸弱劳瘦，不生肌肉。

黄芪　当归　芍药　人参各二两　桂心　甘草炙　芎藭　生姜各八分　大枣十二枚

上水七升，煮取三升，分温三服。

疗产后虚劳，骨节疼痛，头疼汗不出。

当归　人参　生姜各二分　黄芪三两　豉五合　粳米三合　猪肾一对，切　薤白切，三合

上水一斗五升，先煮猪肾取六升，后下诸药，煎至二升，分为三服。

又方

猪肾一对

上人葱豉作臛，如常食之。

疗产后大虚，心腹急痛，血气上抢心，气息乏补益方。

黄芪　白术　当归　甘草炙　人参各二两　生姜四两　白羊肉

上水一斗九升，煮肉取五升，后下诸药，更煎取三升，为三服。

疗产后阴肿，下脱肉出，玉门不闭。

石灰一斤，炒令色黄

上水二升，投灰中，停冷澄清，重烧以浸玉门，斯须平复如故。

产后中风方论
第二十三凡十五道

论曰：产后中风，由产伤动血气，劳损脏腑，未平复起，早劳动，气虚而风邪气乘之，故中风。风邪冷气，客于皮肤经络，但疼痹羸乏，不任少气，若又筋脉挟寒则挛急喎僻，挟温则弛纵缓弱。若入诸脏，恍惚惊悸，随其所伤脏腑经络而生病。

疗产后中风口噤，不任小大，独活汤。

独活四分　干姜六分　甘草二分　生姜六分

上水二大升，煎取一大升，分为两服。

《小品》大豆汤，主产后中风困笃，或背强口噤，或但烦躁，或头身皆重，或身痒，剧者呕吐直视，此皆虚冷中风，宜饵此。

大豆三升，炒令极熟

上以铜器盛清酒五升沃之，密封良久，去豆分为三服，服了覆衣取微汗，身才润即愈，产后皆宜服。一则防风，二乃消血。

张文仲疗产后中风受寒，遍身冷直，口噤不识人等方。

白术四两

上酒三升，煎取一升，顿服之效。

《千金》鸡粪酒，疗产后中风，及男子诸中风，并产后百疾神效方。

乌鸡粪三升　大豆二升

上先炒豆令声绝，次炒鸡粪令黄，以酒一升，先淋鸡粪，取汁淋大豆，每服一升，重者凡四五日，服之极妙。

《经效》疗产后风虚头痛，语言时僻。

干葛　防风　茯苓　麦门冬各八分　芍药　黄芩各六分　犀角四分　甘草三分，炙

上水二升，煎取七合，分为两服。

疗产后中风心忪悸，或志意不定恍惚，言语错乱方。

人参六分　茯神　麦门冬　羚羊角各八分　黄芩　白鲜皮　甘草各四两　石膏十二分　淡竹沥两大合

上水二大升，煎取七合，下竹沥分为三服。

疗产后中风，身背拘急如束，并渴。

芎藭　芍药　羌活　羚羊角　酸枣仁各四两　桑白皮六分　防风五分

上水四升，煎取二升，分温三服。

疗产后中风，四肢拘束，筋节掣痛，不得转侧，角弓反张。

麻黄八分，去节　生姜　桂心　白术各四分　防风　芍药各六分　芎藭五分　甜竹沥二合

上水三升，先煎麻黄掠去沫，下诸药，煎取七合，方下竹沥，更煎三沸，食后分三服，取微汗为度。

疗产后中风，血气不散，邪气入脏，狂言妄语，精神错乱，腰痛骨疼。

麻黄　茯神各八分　防风　白鲜皮各六分　杏仁　当归　桂心各四分　芍药　独活各五分

上水二升五合，煎取九合，空腹热服。

疗产后中风，身体疼痛，四肢痿弱不遂，羌活汤。

羌活　芍药　黄芪各六分　干葛　麻黄　干地黄各八分　甘草　桂心各四分

上水二升，先煎麻黄去沫，后下诸药，取八合，食后热服，覆衣出汗，愈。

疗产后中风，烦渴。

红花子五合，微熬研碎

上水一升，煎一匙头，取七合，徐徐呷之。

疗产后中风口噤，四肢顽痹不仁，或如角弓张。

羌活　防风各三两　大豆一升，炒令皮拆

上酒五升，先浸两味，经宿，将炒豆热投酒中，搅匀，密封一日，以汤煮瓶良久，服八合，覆衣取汗急速，且以豆淋，服羌活、防风亦佳。

疗产后中风，腰背强直，时时反张，名风痉。

防风　葛根　芎劳　干地黄各八分　麻黄去节　甘草　桂心　独活　汉防己各六两　杏仁五枚，去尖

上水八升，煮麻黄去沫，后下诸药，煎取三升，分温三服。

疗产后中风口噤，溃闷不能言，身体痉直。

羌活　防风　秦艽　桂心　甘草　葛根各三分　生姜八分　附子一只，炮　杏仁八十枚，去尖　麻黄十分，去节

上水九升，先煮麻黄去沫，后下诸药，取二升，分为三服。

疗产后中风口噤，拘急困笃，腰背强直时反张。

大豆一升，炒令声绝

上清酒六升投之，煮三四沸，去滓饮之，令微醉，如汗出瘥，切勿触风。如已成风者，加鸡粪白和豆炒，同吃，兼饮竹沥佳。

产后余血上抢心痛方论第二十四凡六道

论曰：夫产后血上抢心，由产后气虚挟宿冷，冷抟于血，则凝结不消，气逆上者，则血随上冲挛而心痛也。凡产后余血不尽，得冷则结，与气相抟则痛困。重遇于寒，血结尤甚。

干地黄　当归　独活　吴茱萸　芍药　干姜　甘草各三两　细辛一两

上水三升，煎取一升，空心分三服。忌生冷。

《经效》疗产后气虚，冷抟于血，血气结滞，上冲心满胀，当归汤。

当归　桂心　芎劳　橘皮　生姜　吴茱萸各二两　芍药三两

上水三升，煮取一升。空心服。

《千金》治产后内虚，寒气入腹，腹中绞痛，下赤白痢，妄言见鬼，羊肉汤。

甘草炙　当归　芍药各一两　肥羊肉一斤，去脂

上水六升，先煮肉取二升，去肉入诸药，更煎取一升，分作两服。

《千金翼》茱萸酒，论心腹内外痛。

吴茱萸十二分

上酒二大升，煎取一升，空心分两服。

《必效》疗腹中绞刺痛方。

羌活二大两

上酒二升，煎取一升，去滓，分为两服。

《千金》治产后渴少气。

麦门冬　淡竹叶各十二分　大枣七枚　生姜　甘草　人参各六分　小麦五合

上水二升半，煎取一大升，去滓分两服。

产后汗不止方论第二十五凡五道

论曰：产后汗不止，夫汗由阴虚而得，又加之里虚表实，阳气发于外，故汗出为阴虚，是令汗出，为阴气虚弱未平复也。凡产后皆血气虚，故多汗，因遇风邪，则变为疾也。

《千金》治产后风虚，汗出不止，小便难，四肢微急，难以屈伸。

大枣十二枚　附子　桂心各四两　芍药八分　生姜六分

上水三升，煎取七合，空腹分为两服。忌猪肉冷水生葱等物。

《经效》疗产后汗不止。

黄芪十二分　白术　牡蛎　茯苓　防风　干地黄　麦门冬各八分　大枣七枚

上水二升，煎取七合，空心分为两服。

《千金》治产后余疾，腹中绞痛，不下食，瘦乏。

当归　黄芪　芍药各六分　干地黄　白术各八分　桂心　甘草各四分　大枣十四枚

上水二升，煎取八合，空心作两大服。忌生葱。

产后冷热痢方论第二十六凡二道

疗产后漏血不止，续命汤。

白蜜 匙头　生姜 一片

上同煎，候蜜色赤，投童子小便一升，去姜，更煎两沸，分为三服，顿服之。

《广济》治产后腹痛气胀，胁下闷，不下食，兼微痢。

茯苓　人参　当归　甘草各六分　生姜　陈橘皮各四分　厚朴八分，炙

上水二升，煎取七合，空心分为两服。忌如前。

产后虚羸方论第二十七凡三道

论曰：产后虚羸者，因产损伤脏腑，劳侵气血，轻者将养满日即瘥，重者日月虽满，气血犹不调和，故患虚羸也。

《广济》治产后风虚冷气，腹肚不调，补益悦泽。

泽兰　桂心　远志　厚朴炙　石斛　白芷　续断　防风　干姜各一分　芍药　白术　柏子仁　黄芪各四分　甘草　当归各五分　赤石脂　干地黄各六分　人参三分

上捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，空心酒下五十丸。忌如前。

桃仁煎，疗产后百病，及诸气，补益悦泽。

桃仁一千二百枚，去皮尖，炒熟研如膏

上酒一斗五升，研滤三四遍，如作麦粥法，以极细为佳。内长颈小瓶中，密封头。内汤中，煮一日一夜，使瓶口常出汤上，勿令没，熟后以酒服一合，日再服。

千金增减泽兰丸，疗产后百病，治血补虚劳。

泽兰　防风　甘草　当归　芍药各七分　干姜　麦门冬各八分　附子　白术　白芷　桂心　细辛各四分　柏子仁　干地黄　石斛各六分　人参　牛膝各五分　厚朴　藁本各一分

上为末，蜜丸，梧桐子大，空心酒下二十丸。忌如前。

产后烦渴方论第二十八

凡二道

论曰：产后烦渴，夫产水血俱下，脏腑燥，津液不足，宿挟虚热者，燥甚故渴也。《经效》理产后血气心烦渴。

紫葛二大两

上水二升，煎取一升，去滓，呷之效。

《集验》疗产后心烦渴。

瓜蒌根　人参　甘草炙，各六分　麦门冬二分　大枣七枚　生地黄十二分

上水二大升，煎取八合，食后分为两服。

产后烦闷虚热方论第二十九凡六道

论曰：产后烦闷虚热，夫产即脏腑劳伤，血气伤而风邪乘之，传于血，使气不宣，而瘀浊则生热，或肢节烦疼口干，但因生热，其烦闷由产后血气虚弱未复，而气逆乘之，故烦闷也。其气故令胁满，妨不下食。

生地黄汁一升　当归一两半　清酒五升　生姜汁二合　童子小便二升

上相和合煎三四沸，分温四服，中间药消进食，食消更进药。

《经效》理血气烦闷，胁肋胀满及痛。

芍药　蒲黄　延胡索各四分　当归六分　荷叶蒂三枚，炙

上水二升，煎七合，后入蒲黄，空心服两服。

又方

生藕

上取汁，煎两沸，饮两服效。

《集验》疗产后血气烦闷。

酒二合　生地黄汁一升

上相和，煎一两沸，分为两服，立效。

《千金》疗产后血气喘，心烦闷不解。

淡竹叶　麦门冬　小麦　茯苓各二分　甘草　生姜各一两　大枣七枚　心悸加人参二两　食少加粳米二合

上水二升，煎取七合，食后分为两服。

疗产后血下不尽，烦闷腹痛。

羚羊角镑火上烧作胶，二两，古方烧作灰　芍药二两，炒黄　枳壳二两，炒令焦黄色

上捣罗为散，水调方寸匕，服之。

产后血瘕方论第三十凡四道

论曰：产后血断，由新产之后，有血气相抟，谓之瘕。瘕者，假也，谓其痛浮走无定。缘内宿有冷血气，不治，至产血下即少，故成此疾。

童子小便三升　生藕汁一大升　地黄汁一升　生姜汁三升

上先煎三味，合三分，减二次，下姜汁，慢火煎如稀饧，每取一合，暖酒调服。

疗血瘕痛，脐下胀。不下食。

当归八分　桂心　芍药　蒲黄　麟竭各六分　延胡索四分

上为散，空心温酒调下两钱匕。

《千金》疗血瘕。

干地黄一两　乌贼鱼骨二两

上为散，空腹温酒下两钱匕。

又方

铁秤锤烧赤

上以酒一升淬之，分为两服。

产后余疾痢脓血方论第三十一凡八道

论曰：产后余病，由产劳伤脏腑不足，日月未满，起早劳动，虚损不补，为所伤冷气，力瘦乏。若风冷入于胃，胃伤虚冷，则血即变白脓，脓血相杂，冷热不调，为滞痢也。

深师方。

黄连六两　乌梅三两　干姜二两

上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，空心米饮下三十丸。忌如前。

《广济》疗产后赤白痢，脐腹绞痛。

当归　黄连各八两　艾叶　地榆　甘草炙　龙骨　厚朴　黄芩　干姜各六两

上水二大升，煎取七合，空心分两服。

《经效》疗产后赤白痢，脐下气痛。

厚朴八分　当归　枳壳　诃子各六分　甘草五分　肉豆蔻五枚　薤切，三合

上水一升，煎取九合，空心分为三服。

张文仲疗产后赤白痢，腹中绞痛。

黄连　阿胶炙　蒲黄各一两　栀子仁　当归　黄芩

上为散，空腹米饮下方寸匕，日两服。

《救急》疗产后赤白痢，腹中绞痛。

芍药　阿胶　艾叶各二两　干地黄　甘草　当归各三两

上水二升，煎取八合，空心分两服。

《心效》疗产后赤白痢，腹中绞痛，不下食。

当归　石榴皮　地榆各二两　白芰荷　黄连各十二两　黄柏一分　犀角四两　黄芩　枳壳　甘草　升麻各六分　茜根八分　粳米三合　薤白切，一升

上为末蜜丸，如梧桐子大，空心米饮下三十丸。

疗产后血痢，小便不通，脐腹痛。

生马齿菜

上捣取汁三大合，煎一沸，下蜜一合调，顿服。

《千金》疗产后水痢，霍乱下痢无度。

白石脂　干姜各十二分

上为散，面粥为丸，梧桐子大，空心米饮下三十丸。

产后小便赤方论第三十二凡二道

论曰：产后小便数，此由胞内宿有冷，因

产后冷发动，冷气入腹，虚弱不能制，其小便即数。有遗尿者，由产用气，伤于膀胱，而冷气入于胞，胞囊决漏，不禁小便，故令遗失。多因产难之所致。

《广济》疗产后小便不禁。

鸡屎烧作灰

上研细，空腹酒服方寸匕。

《千金翼》疗产后小便数及遗尿。

桑螵蛸二十枚，炒　鹿茸炙　黄芪各三两　赤石脂　厚朴炙　牡蛎各二两

上捣罗为末，空心米饮调下方寸匕。忌冷茶毒等物。

经效产宝　卷下

唐　节度随军　翁　殷撰集
鄞　　县　曹赤电炳章圈点

产后小便遗血方论
第三十三凡四道

疗产后大小便利血。

车前子　黄芩　蒲黄　干地黄　牡蛎　芍药各六分

上为散，空心，米饮服方寸匕。忌面蒜。

崔氏疗产后血气渗入大小肠。

车前草汁，一升　蜜一大合

上相和，煎取一沸，分为两服。

又小便利血。

乱发烧灰研如粉

上米饮服方寸匕。

《古今经验》疗产后劳伤热，大小便赤涩。

鸡苏一分　通草十分　冬葵子三合　芍药　滑石　芒硝各八分　生地黄十二分

上水三升，煮取八合，下芒硝，空心分三服。

产后大小便不通方论
第三十四凡四道

论曰：产后大小便不通，肠胃本挟于热，因产大小便血俱下，津液竭燥，肠胃痞涩，热气结于肠胃，故不通也。

《集验》疗产后津液竭燥，大小便不通。

芍药　大黄　枳壳　麻仁研各二两

上为末，炼蜜和丸，梧桐子大，空心，熟水下二十丸，渐加之，以利为度。

《经效》疗大便不通，热气结于肠胃。

大黄二两　芒硝一两

上水一大升，煎取六合，下芒硝，空心，作两服。

《古今录验》疗产后大便不通。

黄芩　芒硝各六分　大黄　芍药　杏仁去皮尖、研如膏，各八分

上为末，蜜丸，梧桐子大，空心，煎水下十五丸，渐加，以利为度。

《千金》疗产后热结，大便不通。

蜜五合，火煎令强，以水投中，良久取出

上捻如拇指大，长二寸，内下部即通。

产后寒热方论
第三十五凡四道

论曰：产后寒热，因产劳伤血气，使阴阳不和，反相乘克，阳胜则热，阴胜则寒，阴阳相激，故发寒热。又产余血亦令入寒热，其腹时痛则是也。

疗产后虚弱喘乏，作寒热，状如疟，名为蓐劳。

猪肾一具，切去膜　豉五合，绵裹　白粱二合　葱白切，一升　人参　当归各一两

上水二升，煎取八合，分为两服。

《经效》疗产后虚烦头痛，气短欲死，心乱不解。

淡竹茹　干姜各八分　甘草六分　麦门冬子，三合　小麦二合　石膏十二分

上水二升，煎取八合，食后分为两服。

疗产后虚热烦痛。

干地黄　牡蛎　茯苓各八分　芍药十二分　黄芩　桂心各六分

上水二升，煎取一升，分为两服。

产后咳嗽方论第三十六凡三道

论曰：喘嗽肺脏微寒，即成喘嗽。又因产后气虚，风寒伤于肺，故令咳嗽。

《集验》疗产后风伤寒，咳嗽多痰，唾粘。

甘草　桔梗各六分　款冬花四分　生麦门冬　生地黄各十二分　葱白一握　豉二合，旧方不入葱白与豉

上水二升，煎取八合，食后，良久两服。

《经效》疗咳嗽多痰，唾粘气急。

前胡　五味子　紫菀　贝母各六分　桑白皮　茯苓各八分　淡竹叶二十片

上水二升，煎取八合，食后分为两服。

疗产后咳嗽气喘。

百部根　桔梗各六分　桑白皮十二分　干百合　赤茯苓各八分

上水二升，煎取七合，食后，分两服。

产后气痢方论第三十七凡六道

论曰：妊娠之时，脾胃气挟于冷，大肠气虚，因产后转加虚损，或误食生冷酒面，便成痢疾，赤白气不和，赤黄胃热，或青色极冷也。

疗产后气痢不止。

青木香三分　诃子皮八分，酥炙令黄

上为散，空心，米饮调方寸匕，服之。

疗产后赤白痢疾。

黄连八分　阿胶炙，六分　赤茯苓　当归　黄柏各四分　干姜二分

上为末蜜丸，如梧桐子大，空心，粥饮二十丸。

疗产后水痢。

枳壳四分　厚朴炙　茯苓　黄连各六分　当归三分

上水一升，煎取八合，空心，分为三服。

又方

黄连六分　乌梅肉五分　石榴皮　当归　赤石脂各四分　干姜二分

上为末蜜丸，梧桐子大，空心，米饮下三十丸。

疗产后下痢，赤白有血。

赤石脂　黄连　地榆各六分　当归四分　干姜　甘草各三分　厚朴十二分　薤白七茎

上水二升，煎取八合，空心，分两服。

疗产后血痢不止。

臭椿根六分

上为末，水和丸，如枣核大，面裹作饨混。每度煮二七个，热吞之。

产后血晕闷绝方论第三十八凡十道

论曰：产后血晕者，其状心烦，气欲绝是也。亦有用心过多而晕，亦有下血极少亦晕。若下血多晕者，但烦而已。下血少而气逆者，则血随气上撩，心下满急。此二者，难并为晕，而状候各异，当问其产妇血下多少即知。须速投方药，若不急疗，即危其命也。凡晕者，热血气乘虚奔逆上所致也。但才分解了，烧秤锤江石令赤，置器中，向产母床前帐里投醋淬之，得醋气可除血晕之法也。十日内时时作，此法不妨晕者，如日月之有晕也。

《经效》产后虚闷，汗出不识人。

鸡子三个

上打破吞之便醒，不醒者，可灌童子小便，入腹即醒。若久不醒，忽时时发者，此为有风，因产血暴风虚风行脉中。若虚去血多者，尤甚也。产后血气暴虚，汗出。

淡竹叶

上煎汤三合，微温服之，须臾再服。

又方

马齿菜研取汁，三大合，如无用干者亦得

上煎一沸，投蜜一匙，令匀，顿服。

《广济》疗产后血晕，心闷不识人，神言鬼语，气息欲绝。

芍药　甘草各一两　生地黄汁，一升　丹参四分　生姜汁　蜜各一合

上水二升，煎取八合，下地黄、姜、蜜汁，分两服。

疗产后恶露不多，下腹绞痛。

大黄八分　牛膝六分　芍药　蒲黄各四分　牡丹皮　当归各二分

上为末，空心暖酒，服方寸匕。

《救急》疗产后血不尽，疼闷心痛。

荷叶炒令香

上为散，煎水调方寸匕，服。

疗初平安血气烦闷。

童子小便五合　生地黄汁三合

上煎三沸，温再服。

疗产后血晕心闷。

蒲黄四分　紫葛　芍药各八分　红蓝花十二分

上水二升，煎取七合，入生地黄汁二合，更煎三五沸，每服三合。

产后血晕，心闷乱恍惚如见鬼。

生益母草汁三合，根亦得　地黄汁二合　小便一合　鸡子三枚，取清

上煎三四沸，后入鸡子清，匀搅，作一服。

产后血晕，狂语不识人，狂乱。

童子小便五合　地黄汁一合　赤马通七枚　红雪八分

上以上二味，浸马通绞去滓，下红雪，温两服。

产后乳无汁方论第三十九凡五道

论曰：气血虚弱，经络不调所致也。乳汁勿投于地，虫蚁食之，令乳无汗，可沃东壁七佳。

疗产后乳无汁。

土瓜根　漏芦各二两　甘草二两　通草四两

上水八升，煎取两升，分温三服。忌如常法。

又方

土瓜根

上为末，酒调两钱匕，日进二三服效。

又方

母猪蹄二枚，切　通草六两

上以绵裹，煮作羹食之，最好。

又方

漏芦　通草　土瓜根各三两　甘草　桂心各一两

上为散，饮服方寸匕，日进三服。

又方

栝楼末

七以井花水，服方寸匕，日二服，夜流出。

产后乳结痈方论第四十凡十九道

论曰：产后宜裂去乳汁，不宜蓄积，不出恶汁，内引瘀热，则结硬坚肿，牵急疼痛，或渴思饮，其奶手近不得。若成脓者名妬乳，乃急于痈，宜服连翘汤，利下热毒，外以赤小豆末，水调涂之，便愈。忽数，担去乳汁，忽小孩手勾动之，忽大人含水嘬之，得汁吐之，其汁状如脓。若产后不曾乳儿，蓄积乳汁，亦结成痈。

疗产后妬乳并痈。

连翘子　升麻　芒硝各十分　玄参　芍药　白敛　汉防己　夜干各八分　大黄十二分　甘草六分　杏仁八十枚，去尖

上水九升，煎取三升，下大黄，次下硝，分三服。

又方

上熟捣敷肿上，日三度易之，并叶煎汁饮之，亦佳。食之亦得，妬乳及痈并差。

又方

地黄

上取汁，涂熟即差。

疗乳肿

上以马溺涂之，立愈。

疗妇人发乳，丈夫发背，烂生脓血后，虚成气疾。

黄芪　地黄　麦门冬　升麻　人参　茯苓各三两　当归　芍药　远志　甘草各一两　大枣十枚

上水二升，煮取一升，分温两服。

疗乳头裂破。

上以丁香为末，傅之立愈。

疗妬乳及痈。

葵茎及子

上捣筛为散，服方寸匕即愈。

又方

鸡屎

上为末，服方寸匕，须臾三服愈。

又方

皂荚十条

上以酒一升，揉取汁，硝石半两，煎成膏傅之。

疗诸痈不散，已成脓，惧针，令自决破下。

上取白鸡内翅，及第一翎各一茎，烧末服之，即决。

又方

取雄雀粪白者研涂上，干即易之。

疗乳痈初得令消。

赤小豆　莽草

上等分为末，苦酒和傅之愈。

疗发背乳痈，四肢虚热大渴。

竹叶切，二升，以水一斗二升，煮取九升　生地黄六两　黄芩　芍药　人参　知母　甘草各二两　升麻　黄芪　麦门冬　栝楼各三两　大枣十二枚

上以竹叶汁煮取三升，渴则饮之。

疗乳肿方。

升麻　白敛　大黄各三两　黄芩　芒硝各二两

上水二升，煎取一升，下硝，分为两服，后以绵缊药贴肿上，日夜勿停即瘥。

又方

黄柏一分，末　鸡子白

上调和匀涂之，干则易，立愈。

又方

苎根

可捣敷之愈。

又方

鹿角

上于石上磨取浊汁涂上，干即易之。

又方

鹿角

上烧作灰，以酒调涂之，立愈。

又方

粢米粉炒令黑

上以鸡子白和如泥，以涂帛上贴之，穿帛作穴，以泄痈毒气，易之效。

产后乳汁自出方论第四十一凡三道

论曰：产后乳汁自出，盖是身虚所致，宜服补药以止之。若乳多温满急痛者，温熨之。

疗乳痈始作。

大黄　梗实各三两　芍药六分　马蹄炙，六分

经效产宝　续编

周颐传授济急方论凡四道

颐尝见人传经效诸方，自曾修合，实有大功，遂编于卷末，普用传授，以济急难。

治产后血晕，血气及滞血不散，便成癥瘕兼泻，面色黄肿，呕逆恶心，头痛目眩，口吐清水，四肢羸弱，五脏虚怯，常日睡多，吃食减少，渐觉羸瘦，年久变为劳疾，如此所患，偏宜服饵胜金丸。

泽兰四两　当归　芍药　芜荑　甘草　芎藭各六分　干姜　桂心各三分半　石膏　桔梗　细辛　茱萸　柏子仁　防风　厚朴　乌头　白薇　枳壳　南椒　金钗石斛　石龠　蒲黄　茯苓各三分　白术　白芷　人参　藁本　青木香各一分

上二十八味，并州土分两无差，杵罗为末，炼蜜为丸，弹子大，有所患，热酒研一丸，入口便愈，大忌腥腻、热面、豉汁、生葱、冷水、果子等，若死胎不下，胎衣在腹，并以炒盐酒研服，未退再服。

治产后诸疾，圣散子。

泽兰九分　石膏八分，如粉　芎藭　当归　芜荑　芍药　甘草各七分　干姜　桂心各五分　细辛　卷柏去土　柏子仁　茱萸　防风去芦头　南椒出汗　厚朴姜汁炙　茯苓各四分　白芷　白术　人参　丹参　藁本　五味子　黄芪各三分　乌头炮　白薇各二分

上捣罗为散，以新瓦器密封，无令失气，每服以热酒调下两钱匕，忌如常。

神效治产后一切疾，黑散子。

鲤鱼皮三两，烧灰　芍药　蒲黄各二两　当归　没药　桂心　好墨　卷柏　青木香　麝香各一两　铁墨半两　丈夫发灰，半两

上一十二味，捣罗为散，以新瓷器盛，密封勿令失气，每产后以好酒调下一钱匕。如血晕冲心，下血不尽，脐下攒刺疼痛不可忍，块血癥疾甚，日加两服，不拘时候服，忌冷物、果子、粘食。

《神效》疗妊娠十个月内不安，至临分解时，并宜服此，保生丸。

金钗石斛　贝母去心　黄芩　明净石膏细研如粉　桂心　乌头卷　秦椒去目，炒　蜀椒去目，炒　甘草炙　糯米炒，以上各二两

上并须州上者，如法修合为散，炼蜜丸如弹子大，或有妊娠诸疾，吃食减少及心喘疾痛，面目萎黄，身体羸瘦，四肢无力，手脚浮肿，胎脏不安，并以枣汤研一丸服；气痛，酒研一丸，空心服之；忌腥腻、果子、粘食、杂物、冷肉等。

濮阳李师圣施郭稽中论

二十一证方十六道

第一论

热病死胎腹中者，如何？

答曰：母患热疾，至六七日，以致脏腑热极，蒸煮其胎，是以致死。缘儿死身冷，不能自出，但服黑神散暖其胎，须臾胎气温暖，儿即自出，何以知其死？看产妇舌色青者是其验。宜以黑神散主之。

雄黑豆小者是，炒去黑皮，用二两　当归　芍药　甘草炙　干姜　蒲黄用安石器纳，炒赤色　肉桂　熟地黄温水洗

上等分，焙干为末，每服二钱，空心温酒调下。若三十岁以上，生产少者，不用桂、

姜，却以炒生姜、红花各二两。

第二论

胎衣不下者如何？

答曰：母生子了，血流入衣中，为血所胀，遂不能下。若治之稍缓，则满腹中，上冲心胸，疼痛喘急，难治。但服夺命丹，速去衣中血，血散胀消，胎衣自下，而无所患矣。夺命丹。

附子半两，炮、去皮脐　牡丹皮一两　干漆一分，研碎、炒令烟出

上为末，用验醋一升，大黄末一两，熬成膏，和药丸如绿豆大，温酒送下五七丸。不计时候。

第三论

难产者如何？

答曰：胎侧则成形块者，呼为儿枕。子欲生时，枕破败血裹其子，故难产。但服胜金散治之。逐其败血，儿即自出。若横生、逆生皆治之。

麝香一钱　盐豉一两，用旧青布、布裹，火烧令通红，急以乳锤研为细末。

上为末，取秤锤烧红，以酒淬之，每服调一钱。

第四论

闷绝不知人事者，如何？

答曰：产后血气暴虚，未得安静，血随气上攻，迷乱心神，眼前生花，极甚者令人闷绝，不知人事、口噤、神昏气冷，医者不识，呼为暗风。若如此治之，必难愈，宜服清魂散。

泽兰叶一分　人参一钱　芎半两　荆芥穗一两　甘草二分，炙

上为末，每服一钱，热汤半盏，入温酒半盏，调匀急灌之，药下便愈。

第五论

口干痞闷者如何？

答曰：产宫胃太虚，血气未定，食面太早，胃不能消化，面毒结聚于胃脘，上熏胸中，是以口干烦渴，心下痞闷，医者不识，认为胸膈壅滞，以药下之，万不能一，但服眼儿现丸。

姜黄　京三棱炮　毕澄茄　人参　陈皮去白　高良姜　蓬莪术

上等分为末，用细切萝卜，慢火煮令烂，研细，将余汁煮面糊为丸。绿豆大，每服十丸，萝卜汤下，不拘时候。

第六论

产后乍寒乍热如何？

答曰：阴阳不和，败血不散，皆作乍寒乍热。产后血气虚损，阴阳不和，阴胜则乍寒，阳胜则乍热，阴阳相乘则或热；若因产劳伤脏腑，血弱不能宽越，故败血不散，入肺即热，入脾即寒，医人若作寒疟疾治之则谬矣。阴阳不和，宜服增减四物汤。败血不散，宜服夺命丹。

又问：二者何以别之？

答曰：时有刺痛者，败血也；但寒热无他证者，阴阳不和也。增减四物汤。

当归　芍药　芎　人参　干姜炮裂，各二两　甘草四两，炙

上为末，每服二钱，水一盏，生姜五片，同煎至六分，去滓，微热服，不计时候。

第七论

产后四肢虚肿者如何？

答曰：产后败血乘虚，停积于五脏，循经流入四肢，留淫入深，回还不得，腐坏如水，故令四肢面目浮肿，医者不辨，作气治之，凡水气多用导水药，极虚之。夫产后既虚，又以药虚之，是重虚也，但服调经散，血行肿消，则病自愈。

没药一钱，研　琥珀一钱，研　桂去粗皮，半钱　芍药一钱　当归一钱　麝半钱　细辛半钱

上为末，每服半钱，生姜汁、温酒各少

许，调匀服之。

第八论

产后不语者如何？

答曰：人心有七孔三毛，产后血流气弱，多致停积，败血闭于心窍，神志不能明了，又心气通于舌，心气闭则舌亦强矣，故令不语，但服七珍散。

人参　石菖蒲　川芎　熟地黄各一两　细辛一钱　防风半两　朱砂半两，研

上为末，每服一钱，薄荷汤调下，不拘时候。

第九论

产后乍见鬼神者如何？

答曰：心主身之血脉，因产伤耗血脉，心气则虚，血停积，上干于心，受触激，遂生烦躁，坐卧不安，乍见鬼神，言语颠错，医者不识，呼为风邪，如此治之，必不能愈，但服调经散，加生龙脑一捻，得睡即安。调经散方在第七论中。

第十论

产后腹痛又泻痢者如何？

答曰：产后肠胃虚怯，寒邪易侵，若未满月，饮冷当风，则寒邪乘虚进袭，留于胸腹，散于腹胁，故腹痛作阵，或如锥刀所刺，流入大肠，水谷不化，洞泄肠鸣，或下赤白，腹胁填胀，或走痛不定，急服调中汤立愈。医者若以为积滞取之，则祸不旋踵矣。

高良姜　当归　桂去皮　芍药　附子炮，去皮脐　川芎各一两　甘草半两，炙

上为粗末，每服三钱，水三盏，煎至一盏，去滓，热服。

第十一论

产后遍身疼痛者如何？

答曰：产后百节开张，血脉流走，遇气弱则经络分肉之间，血多留滞，累日不散，则骨节不利，筋脉引急，故腰背转侧不得，手足摇动不得，更身热疼痛，医者以为伤寒治之，若出汗则筋脉动惕，手足厥冷，变生他病，但服趁痛丸，以墨涂之。

牛膝　当归　桂去皮　白术　黄芪各半两　薤白一分　独活半两　生姜半两　甘草一钱，炙

上为粗末，每服半两，水五盏，煎至二盏，去滓，热服一盏。

第十二论

产后大便秘涩者如何？

答曰：产卧水血俱下，肠胃虚竭，津液不足，故大便秘涩，若过五六日，腹中闷痛者，乃有燥粪在脏腑，以其干涩，不能出耳，宜服麻仁丸更以津润之。若误以为热而投寒药，则阳消阴长，变动百生，性命危矣。麻仁丸。

麻仁研　枳壳炒　人参各一两　大黄半两

上为末，炼蜜丸，桐子大，空心，每服二十丸。服时温酒米饮任下，未愈，渐加丸数，不可太过。

第十三论

产后口鼻黑气起及鼻衄如何？

答曰：阳明者，经络之海，起于鼻交颊中，还出挟口，交人中之左右，是盖因夫产后气消血散，荣卫不理，散乱入诸经络，回还不得，致令口鼻黑气起及变鼻衄，此缘产后诸虚热变生此疾，不可治也，名曰脾绝肺散。

第十四论

喉中气急喘者如何？

答曰：荣者血也，卫者气也，荣行脉中，卫行脉外，相随上下，谓之荣卫，因产后下血过多，荣卫暴竭，气无所主，独聚于肺中，故令喘也，此名孤阳绝阴，为难治。若恶露不快，败血停凝，上熏于肺，亦令喘急，可

服夺命丹。方见前第二论中。

第十五论

产后中风者如何？

答曰：产后五七日内，强力下床，或一月之内，伤于房室，或怀忧悲怒，扰荡泄和气，或因着灸、惊惕脏腑。得疾之初，眼涩口噤，肌肉相搐，腰脊筋急强直者，不可治。此乃人作，非偶尔中风所得也。

第十六论

产后心痛者始何？

答曰：心者，血脉之主。人有挟宿寒，因产大虚，寒搏于心，血凝滞不得消散，其气逆上，冲击于心经，故心痛。宜以大岩蜜汤，治寒则去，血脉温则经络通，心痛自止，若误以为有所伤治之，则虚极而寒益甚矣。心络寒甚，传心之正经，则变成心痛者，朝发则夕死是。药不可轻用也。

干地黄　当归　独活　吴茱萸　芍药　干姜炮　甘草炙，各一两　细辛半两　桂一两，去粗皮　少草一两，远志叶是也

上为粗末，每服半两，用水三大盏，煎取一盏，去滓，微热。

第十七论

产后热闷气上转为脚气者，如何？

答曰：产后卧血虚生热，复因春夏取凉过多，地之蒸湿，因足履之，所以着成脚气。其状热闷掣废，惊悸心烦，呕吐气上，皆其候也，服小续命汤三两剂，必愈。若误以败血药攻之，则血去而病益增矣。

人参　黄芩　官桂去皮　白术　防己　麻黄去节　川芎　芍药　甘草各一两　生姜五两　防风两半　附子一枚，去皮

上为末，每服半两，用水五盏，煎去滓，温服。

第十八论

产后出汗多而变痉风，如何？

答曰：产后血虚，内理不蜜，故多汗。因遇风邪搏之，则变痉风也。痉者，口噤不开，背强而直，如发痫状，摇头马鸣，身反折，须臾十发，息如绝，宜速干开口，灌小续命汤。稍暖即出汗如雨，手拭不及者，不治。

第十九论

产后下血过多，虚极热生风，如何？

答曰：妇人以荣血为主，因产血下太多，气无所主，唇青肉冷、汗出、目瞑、神昏，命在须臾，此皆虚热非风也。可服济危上丹，若以风药治之，则误人矣。

乳香研　石灵脂　留黄研　陈皮去白　桑寄生　真阿胶炙，洋，炒成末子　太阴玄精石研

上将上四件，同研匀，石器纳微火上炒动，勿令焦着，炒了再研细，后入余药，末用地黄汁煮糊为丸，绿豆大，每服酒下二十丸，当归酒尤佳。

第二十论

产后血崩者何？

答曰：产卧伤耗，经络未得平复，而劳役损动，致血暴崩下，淋漓不止，或因咸酸不节，伤蠹营卫，气衰血弱，亦变崩中，若小腹满痛，肝经已坏，为难治，急服固经丸以止之。

艾叶　补骨脂炒　木贼草　赤石脂各半两　附子三枚，炮，去皮脐

上为末，陈米饮和丸，桐子大，食前温酒下二十丸，米饮亦得。

第二十一论

产后腹胀闷满呕吐不定者何？

答曰：血散于脾胃，脾受之不能运化精微而成腹胀，胃受之则不得受纳水谷而生吐逆，医者不识，若以寻常治胀止吐药疗之，病与药不相干，转更伤动正气，疾愈难治，但服抵胜汤必瘥。

赤芍药　半夏汤洗七次　人参　陈皮各二钱　泽兰二钱　甘草炙，一钱　生姜半两

上为粗末，水二盏，煎至一盏，去滓，微热服，分为三服。

产后十八论方凡九道

一曰：产后因热病，胎死腹内者如何？

答曰：盖因母患热病，经六七月间，脏腑热，遂煮其胎热，是致死，故知之。缘死即身热痛，只因沫出，爪甲指黑，四肢逆冷，但服乌金散，其胎即下。

二曰：产难者如何？

答曰：盖其胎以或成形，为食实物后，十月足日，食有余，遂有成块，呼为儿枕，欲生时块破，遂血裹其子，故难产。但服乌金散，解其败血，即自生。或横生、逆生不下，并宜服之。

三曰：产后衣不下者，如何？

答曰：母生子了，产后血入衣中，被血所胀，故当难下，但服乌金散，去其衣中血即下。如带断亦同。

四曰：血晕者如何？

答曰：产后三日，起坐不得，眼前生花，即运走五脏，流入汗血，医人不识，呼为暗风，但可服乌金散。

五曰：口干心闷者，如何？

答曰：产后七日已来，血气未尽，盖为母食面，结盛心上，是以烦躁干渴，医人不识，将谓胸膈不利，壅滞所致，乌金散立效。

六曰：乍寒乍热者，如何？

答曰：产后虚羸，败血人于肺脏，即热即寒，医人不识，呼为疟疾，误矣。宜服乌金散立效。

七曰：产后虚肿者，如何？

答曰：血败于五脏，流入四肢，即还不得，遂成脓血，医人不识，呼为水气、血气，何以知之？若水气喘而小肠涩，血气伤而四肢寒，但服乌金散，姜酒调下，须臾服朱砂丸，令泻下毒物即愈。

八曰：乍见鬼神者，如何？

答曰：败血流入于心，心不受触，遂被心热，极燥三两日，言语颠狂，医人不识，呼为风邪，太误。宜服乌金散疗之。

九曰：产后月内不语，如何？

答曰：人心有孔，孔内有毛，产后败血闭毛，故不语也。宜服乌金散。

十曰：腹内疼痛兼泻痢者，如何？

答曰：产后未满月，饮冷水，与血相聚，大肠水谷不化，或腹胀痛，急服乌金散，更加服气药、止泻药。

十一曰：产后遍身疼痛者，如何？

答曰：产后百节开张，败血走流诸处，留停日久，不散结聚，成此疼痛，宜服乌金散有效。

十二曰：产后血崩者如何？

答曰：产后败血恶露自下未止间，早先治之，及食咸酸之物，遍体无血色，腹痛难治，肝家欲发寒热作闷，宜服乌金散，须臾服朱砂丸。

十三曰：产后血气不通，咳嗽者，如何？

答曰：产后咳嗽，多以食热面壅结，或热病，或有气块，发时冲心痛，气急咳嗽，四肢寒热，心闷口干，或时烦躁，睡多惊悸，气虚，肢体无力，宜服乌金散。

十四曰：产后乍寒乍热、心痛，月候不来，如何？

答曰：败血冲心，痛绕脐腹，面色无彩，纵然得效，暂时痊安，不过三两日又发，服乌金散大效。

十五曰：产后腹胀满，呕逆不定者，如何？

答曰：败血停于脾胃，食充胃，胃充气，既不安即吐逆，冲腹胀，急服乌金散，次服朱砂丸，三两日；炒生姜一钱，醋汤下七丸，立效。

十六曰：产后口鼻黑气及鼻衄者，如何？

答曰：败血入脏腑，头目却还不得，口

干舌焦，鼻黑起，是产后变作此候，名曰败肺，此不可治疗。

十七曰：产后喉中气喘急者，如何？

答曰：产后败血不尽，冷恶死血上冲心，过于心即转于喉，喉中即喘，医人不识，认作风涎，十死不治。

十八曰：产后中风者，如何？

答曰：产后七日，无故下床；一月之内，伤于房室；或因着热，有惊脏腑，风中之物，眼涩腰疼，似角弓之反张，牙关闭，急宜治之，亦非风疾所致也。

乌金散

干地黄熟水浸　肉桂去皮　蒲黄纸裹，炒，以上各二两　黑豆炒尽烟、为炭、秤二两　当归洗　芍药　甘草炙　白姜炮，以上各一两

上为末，空心，日午夜中，热酒下两钱匕。忌生冷一切毒物。

朱砂丸

治产后因寒瘀积，结成诸疾。

黑附子炮去皮脐，半两　肉桂半两，去皮　白姜半两，炒　川巴豆一钱，醋浸，煮去皮，研。

上细研，面糊为丸，麻子大，每服三丸至五丸，冷茶下，服之取泻为度。

治产后胎衣不下。

鸡子白一个　滑石末二钱

上滩头急流水，调下立出。

治孕妇伤寒。

柴胡　前胡　川芎　川当归　地黄　人参　芍药　粉草

上等分为末，每服两钱，枣四枚，姜钱三片，同煎服。要出汗加葱。

治孕妇伤寒涎嗽。

知母　杏仁去皮尖，炒　天门冬去心　桑白皮

上等分为粗末，煎，去滓服。

治妇人带下黄者正方

茅花　掘，炒　棕榈炭二十　嫩莲叶二个　甘草节

上为末。

《经效产宝》终

女科经纶

〔清〕 萧赓六 纂著

《女科经纶》提要

清·萧壎撰，壎字赓六，又号慎斋，携李人。先生先辑《医学经纶》，援古证今，凡杂症得一百六十有三，采搜诸贤名论，七千余则有奇，而妇人月经诸症不与焉。盖以妇人之病，如月经胎产、崩淋带下，均属重要，是以别立标名，曰《女科经纶》。凡一切内外虚实寒热，分别条述，俾学者知所研摩。其卷一，列月经门，一百另九条；卷二，列嗣育门，六十一条；卷三，列胎前证，八十三条；卷四，列胎前证，八十条；卷五，列产后证，一百九条；卷六，列产后证，一百二十一条；卷七，列崩漏证，五十一条，带下证三十四条；卷八，列热入血室十条，血分水分证十一条，咽中证二条，癥瘕痃癖证十二条，乳证十四条，前阴诸证十九条，夜梦鬼交三条。原文义理隐晦处，及余义未尽处，经慎斋先生加按阐发之。搜集先圣后贤之论，一经一纬，汇而成编，苟有志斯道者，以是编为准绳，可以无憾矣。先生尚著有《伤寒经纶》十卷，书系抄本，购求不得，不知落于谁氏之手矣。

序

两仪定位，阴阳肇分，天地即以阴阳化生万物。故经云：阴阳者，天地之道，万物之纲纪，变化之父母，而男女其阴阳之始也。圣人以六经垂教万世，《易》始乾坤，《诗》首关雎，《书》传厘降，《礼》著内则，《春秋》载王姬。盖以夫妇为人道之造端，而妇人乃孳育化原之本，是以操调燮之术者，不可不于妇人之病为独重也。白寇宗奭谓宁医十男子，莫医一妇人。以妇人病，四诊有所不能尽，而其所患者，多隐曲不可述。如月经胎产、至崩淋带下，俱属鄙琐，难以言示。然而妇人之病，唯兹诸症为最要。故著书者，于兹尤不可不亟讲也。

余纂辑《医学经纶》，博极群书，兼综条贯。凡杂症得一百六十有三，采摭名贤之论七千条有奇，而妇人月经诸症不与焉。诚以妇人之病，莫重于月经胎产、崩淋带下，是以别立标名，曰《女科经纶》。凡一切内外虚实寒热，各有条序，按之略方名，详治论，俾学者知所从事，其于妇人病，庶毋患治疗之倍难于男子也。司马子长称扁鹊过赵，闻邯郸贵妇人病带下，即为带下医。夫妇人病，不止于带下。而扁鹊所过，随以其名闻诸侯间。知古人留心于妇人病，盖慎且重也。今之医者，非如扁鹊遇长桑君，授上池神术。舍昔圣昔贤之论，而欲冀为洞垣之见，不其难哉。苟有志斯，其以斯编为规矩焉，绳墨焉，可也。

康熙甲子岁孟秋七月槜李棘人萧埙赓六氏漫识

《女科经纶》目录

卷一

月经门 …… 225

卷二

嗣育门 …… 241

卷三

胎前证 上 …… 252

卷四

胎前证 下 …… 263

卷五

产后证 上 …… 276

卷六

产后证 下 …… 293

卷七

崩带门 …… 308

带下证 …… 315

卷八

杂证门 …… 322

热入血室证 …… 322

血分水分证 …… 324

咽中证 …… 326

瘫痪痉痹证 …… 326

乳证 …… 329

前阴诸证 …… 331

夜梦鬼交 …… 334

女科经纶 卷一

携李 萧 埙寒六纂著
鄞县 曹赤电炳章圈校

月 经 门

经论女子月事属太冲脉盛

《素问》曰：女子七岁，肾气盛，齿更发长，二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时而下，故能有子。

经论女子血海属于少阴一经

《灵枢》曰：冲脉起于胞中，出于气街，前行于胸，伏行于背，上出颃颡，渗灌诸阳，下入于足，注诸络，为十二经脉之海，其出入皆少阴经以行，故为血海。

经论女子经水温寒与天地相应

《素问》曰：天地温和，则经水安静。天寒地冻，则经水凝泣。天暑地热，则经水沸溢。卒风暴起，则经水波涌而陇起。邪之入于脉也，寒则血凝泣，天暑则气淖泽，虚邪因而入客，亦如经水之得风也。

慎斋按：以上经论三条，序女子月事，始本太冲脉盛，而冲脉则起胞中，即为血海，此经水之原也。但经水得寒则凝，得热则行，尝与天地寒暑之气相应，而调经者可以知所务矣。

女子月事本血室以时而下论

王太仆曰：冲为血海，诸经朝会，男子则运而行之，女子则停而止之，谓之血室。经云，任脉通、冲脉盛，男既运行，女既停止。运行者，无积而不满，动也。停止者，有积而能满，静也。不满者，阳也，气也。能满者，阴也，血也。故满者以时而溢，谓之信。男子以气运，故阳气应日而一举。女子以血满，故阴血应月而一下。

女子月经本任冲二脉血海有余论

马玄台曰：任冲二脉，奇经八脉之二也。经云任主胞胎，冲为血海。今二脉俱通，月事而下。《灵枢》云：冲脉、任脉，皆起于胞中。又云：冲脉为血之海。又云：血海有余。按：血海之海，虽曰既行而空，至七日后而渐满，如月之盈亏相似。当知血海之有余，以十二经皆然，非特血海之满也，故始得以行耳。

女子月事本任督二脉血海之满论

程扶生曰：任脉者，起于中极之下，以上毛际，循腹里，上关元，至咽喉，属阴脉之海。任者，妊也。此入生养之始，故曰任脉。中极之下，长强之上，此奇经之一脉也。督脉者，起于下极之腧，并于脊里，上至风府，入脑上巅，循额，至鼻柱，属阳脉之海。督之言都也，是入阳脉之都纲也。人脉比于水，故云阳之海，此奇经之一脉也。任脉主任一身之阴血，太冲属阳明，为血之海。故谷气盛则血海满，而月事以时下也。

妇人月水本于四经论

齐仲甫曰：妇人月水，本于四经。二者冲任，二者手太阳小肠，手少阴心。然冲为

血海，任主胞胎，二者相资，故令有子。小肠经属腑，主表为阳；少阴经为脏，主里属阴。此二经，在上为乳汁，在下为月水。

潘斋按：以上四条，序女子月经本于血至，血至即血海，而其脉则属冲任督三脉。心与小肠二经，为月水之源也。

女子天癸之至名月信论

陈良甫曰：经云女子二七而天癸至，天谓天真之气，癸谓壬癸之水，壬为阳水，癸为阴水，女子阴类，冲为血海，任主胞胎，二脉流通，经血渐盈，应时而下，天真气降，故曰天癸，常以三旬一见，以象月盈则亏，不失其期，故名曰月信。

女子月经非天癸之辨论

马玄台曰：经云，女子二七天癸至，天癸者，阴精也。肾属水，癸亦属水。由先天之气蓄极而生，故谓阴精为天癸。王冰以月事为天癸者，非也。男女之精，皆可以天癸称。今王注以女子之天癸为血，则男子之天癸亦为血耶？男女当交媾之时，各有精，而行经之际方有其血，未闻交媾时可以血言也。至云精开裹血，血开裹精者亦非。《灵枢》云：两神相抟，合而成形，常先身生，是谓精者是也。但女子之精，以二七而至，而其月事，亦与此时同其候也。

潘斋按：以上二条，序女子之月水即为天癸，又辨天癸不可以月信名也。

男女精血本五味之秀实论

褚侍中曰：饮食五味，养髓骨肌肤毛发。男子为阳，阳中必有阴，阴中之数八，故一八而阳精升，二八而阳精溢。女子为阴，阴中必有阳，阳中之数七，故一七而阴血升，二七而阴血溢，皆饮食五味之实秀也。

妇人经血属心脾所统论

薛立斋曰：经云：饮食入胃，游溢精气，上输于脾，脾气散精，上归于肺，通调水道，下输膀胱，水精四布，五经并行。东垣所谓脾为生化之源，心统诸经之血，诚哉是言也。心脾平和，则经候如常。苟或七情内伤，六淫外侵，饮食失节，起居不时，脾胃虚损，心火妄动，则月经不调矣。大抵血生于脾土，故云脾统血。凡血病当用苦甘之药，以助阳气而生阴血也。

妇人经血生于水谷之精气论

薛立斋曰：血者，水谷之精气也，和调五脏，洒陈六腑。在男子则化为精，在妇人则上为乳汁，下为月水。故虽心主血，肝藏血，亦皆统摄于脾。补脾和胃，血自生矣。凡经行之际，禁用苦寒辛散之药，饮食亦然。

妇人月水与乳俱脾胃所生论

程若水曰：妇人经水与乳，俱由脾胃所生。《经脉别论》云：食气入胃，其清纯津液之气归于心，入于脉，变赤而为血。血有余，则注于冲任而为经水。经水者，阴水也。阴必从阳，故其色赤，禀火之色也。冲为血海，任主胞胎。若男子媾精，阴阳和合而成孕，则其血皆移蓄于胎矣。胎既产，则胃中清纯津液之气，归于肺，朝于脉，流入乳房，变白为乳，是禀肺金之色也。或儿不自哺，则阳明之窍不通，其胃中津液，仍归于脉，变赤而复为月水矣。

潘斋按：以上四条，序妇人经血，由于饮食五味，水谷之精气所化，此调经必先于扶脾保胃为要也。

女子经不调由合之非时论

褚侍中曰：女人天癸既至，逾十年无男子合，则不调。未逾十年，思男子合，亦不调。不调则旧血不出，新血误行。或溃而入骨，或变而为肿，或虽合而难子，合多则沥枯虚人，产乳众则血枯杀人。观其精血，思过半矣。

经不调由阴阳盛衰所致论

王子亨曰：经者，常候也。谓候其一身之阴阳盛衰，知其安危，故每月一至。太过不及，皆为不调。阳太过则先期而至，阴不及则后时而来。其有乍多乍少，断绝不行，崩漏不止，皆由阴阳盛衰所致。

经候不调有阴阳相胜论

许叔微曰：妇人病，多是月经乍多乍少，或前或后，时发疼痛。医者一例呼为经病，不辨阴胜阳，阳胜阴，所以服药少效。盖阴气乘阳，则胞寒气冷，血不运行，经所谓天寒地冻，水凝成冰，故令乍少而在月后。若阳气乘阴，则血流散溢，经所谓天暑地热，经水沸腾，故令乍多而在月前。当别其阴阳，调其血气，使不相乖，以平为期也。

经不调属风冷乘虚客胞中论

陈良甫曰：妇人月水不调，由风冷乘虚，客于胞中，伤冲任之脉，以损手太阳、手少阴之经也。盖冲任之脉，起于胞中，人将息顺理，则血气调和，六淫不能为害。若劳伤血气，则风冷乘之，脾胃一伤，饮食渐少，荣卫日衰，肌肤黄瘦，皆由冲任劳损。故凡遇经行，最宜谨慎，否则与产后证相类。

月水不调属风冷之邪搏血论

王子亨曰：妇人月水不调者，由劳伤气血，致体虚，风冷之气乘之也。冲任之脉，皆起于胞内，为经络之海。手太阳小肠、手少阴心二经为表里，主上为乳汁，下为月水。若冷热调和，则冲任气盛，太阳少阴所生之血宣流，依时而下。若寒温乖适，经脉则虚，如有风冷，虚则乘之，邪传于血，或寒或温，寒则血结，温则血消，故月水乍多乍少，为不调也。

月经不调属忧思郁怒所致论

方约之曰：妇人以血为海。妇人从于人，凡事不得专行。每多忧思忿怒，郁气居多。书云：气行则血行，气止则血止。忧思过度则气结，气结则血亦结。又云：气顺则血顺，气逆则血逆。忿怒过度则气逆，气逆则血亦逆。气血结逆于脏腑经络，而经乃是乎不调矣。

良齐按：以上六条，序妇人经水不调之由也。妇人以血用事，故病莫先于调经。而经之所以不调者，或本于合非其时，或属于阴阳相胜，或感于风冷外邪，或伤于忧思郁怒，皆足以致经候不调之故，此病机之不可不察者也。

经水不调有先后多少之分

戴复庵曰：妇人每月经水应期而下，不使有余，犹太阴之缺，其有或先或后，或多或少，或欲来先病，或遇来而断续，皆谓之不调，和气饮加香附。

经行先期后期有血热血虚之分

朱丹溪曰：经水先期而至者，血热也，四物加芩、连、香附。后期而至者，血虚也，芎、归、参、术加二陈。

薛立斋按：先期而至，有因脾经血燥，宜加味逍遥散。有因肝经郁滞，宜归脾汤。有因肝经怒火，宜加味小柴胡汤。有因血分有热，宜加味四物汤。有因劳役火动，宜补中汤。如过期而至，有因脾经血虚，宜人参养荣汤。有因肝经血少，宜六味丸。盖血生于脾，故云脾统血。凡血病当用甘苦之剂，以助阳气而生血也。

月经过期不及期为有火无火论

赵养葵曰：经水如不及期而来者，有火也，宜以六味丸滋水，则火自平矣。如不及期而来多者，本方加海螵蛸、柴胡、白芍。如半月或十日而来，且绵延不止，此属气虚，用

补中汤。如过期而来者，火衰也，本方加艾叶。如迟而色淡者，本方加桂。此其大略也。其间亦有不及期而无火者，有过期而有火者，多寡不同，不可拘于一定。当察脉之迟数，视原之虚实强弱，但以滋水为主，随证加减。凡紫与黑色者，多属火旺之甚。亦有虚寒而紫黑者，不可不察脉审证。若淡白，则无火明矣。

月经紫黑属热非寒论

朱丹溪曰：经水者，阴血也。阴必从阳，故其色红，原火色。血为气之配，气热则热，气寒则寒，气滞则滞。为气之配，因气而行。见有成块者，气之凝也。将行而痛者，气之滞也。来后作痛者，气血俱虚也。错经妄行者，气之乱也。色淡者，虚而有水混之也。紫者，气之热也。黑者，热甚也。今人见紫黑成块作痛，率指为风冷乘之，用温热剂，祸不旋踵。经云：亢则害，承乃制。热甚必兼水化，故热则紫，甚则黑也。且妇人性多忿郁，嗜欲倍加，脏腑厥阳之火，无日不有，非热而何？若以风冷，必须外感，即或有之，亦千百而一二也。

经黑属风寒外乘当辨脉证

叶氏曰：血黑属热，丹溪之论善矣。然有风寒外乘者，十中尝见一二。盖寒主收引，小腹必常冷痛，经行时，或手足厥冷，唇青面白，尺迟或微而虚，或大而无力。热则尺洪数，或实有力，参之脉证为的。

《准绳》按：冷证外邪初感，入经必痛，或不痛者，久则郁而变热。且血寒则凝，既行而紫黑，故非寒也。

经水辨色有气虚血热痰多之分

朱丹溪曰：经水不调，而水色淡白者，气虚也，宜参、术、归、芎、黄芪、香附之属。经水过期而紫黑成块者，血热而实也，必作痛，宜四物加黄连、香附。经水过多而淡色者，痰多也，二陈加芎、归。

薛立斋按：经水过期而至，有因脾经血虚者，宜人参养荣汤。有因肝经血少者，宜六味丸。有因气虚血弱者，宜八珍汤。

经水辨色用药之法

李氏曰：心主血，故以色红为正，虽不对期，而色正者易调。其色紫者，风也，四物加荆、防、白芷。黑者热甚也，四物加芩、连、香附。淡白者虚也，有挟痰停水以混之，芎归汤加参、芪、白芍、香附。有痰者，二陈加芎、归。如烟尘水，如屋漏水者，二陈加秦艽、防风、苍术。如豆汁者，四物加芩、连。或带黄混浊者，湿痰也。成块作片色不变者，气滞也，四物加香附、胡索、枳壳、陈皮。色变紫黑者，血热也。

愼斋按：以上七条，序经水有先期过期之候，有属热属寒之分，有色黑色淡之辨，凡此皆经候不调之所属也。

经论月水来腹痛属子门有寒

《甲乙经》曰：女子胞中瘕，子门有寒，引髓髀，水道主之。

经行腹痛属风冷客于胞络

陈良甫曰：经来腹痛，由风冷客于胞络冲任，或伤手太阳、手少阴二经，用温经汤加桂枝、桃仁。若忧思气郁而血滞，用桂枝桃仁汤、地黄通经丸。若血结成块，用万病丸。

经行腹痛属寒湿抟子冲任

滑伯仁曰：有经行前脐腹绞痛如刺，寒热交作，下如黑豆汁，两尺沉涩，余皆弦急，此由下焦寒湿之邪，抟于冲任。冲为血海，任主胞胎，为妇人之血室。经事来，邪与血争，故作疗痛。寒湿生浊，下如豆汁，宜治下焦，以辛散苦温血药治之。

经行腹痛属于血涩

王海藏曰：经事欲行，脐腹绞痛者，血涩也，宜八物汤加木香、槟榔、胡索、苦楝。

经行腹痛属于气滞

朱丹溪曰：经将行腹痛，属气之滞，用香附、青皮、桃仁、胡索、黄连，又用抑气散、四物加胡索、丹皮、条芩。又曰：经将来，腹中阵痛，乍作乍止者，血热气实也，四物加黄连、丹皮。

经行腹痛宜调气

戴元礼曰：经事来而腹痛，不来腹亦痛，皆血之不调故也。欲调其血，先调其气，四物加香附、吴茱，或和气饮加吴茱。痛甚者，加玄胡索汤。

经行体痛属于血气不足

《产宝百问》曰：经水者，行气血，通阴阳，以荣于身者也。气血盛，阴阳和，则形体通。或外亏卫气之充养，内乏荣血之灌溉，血气不足，故经候欲行，而身体先痛也，趁痛散主之。

经水过后腹痛属于气血两虚

朱丹溪曰：经水过后作痛，是气血俱虚也，宜八珍汤。亦有虚中有热，经后亦作痛，宜逍遥散。亦有经行过后，腹中绵绵走痛者，是血行而气滞未尽行也，四物加木香。

《准绳》按：经后腹痛为虚，明甚。若脉不数，证不显热，未可断其为热也，八珍为宜。有热，方以逍遥散主之。

滇斋按：以上八条，序经行腹痛，有寒热虚实之分也。主于风冷寒湿者，经文与良甫、伯仁之论是也。主于血涩气滞者，海藏、丹溪之论是也。若经行后腹痛，是有虚无实，有寒无热矣。而丹溪则又兼热与气滞论病机，不可不审。

经行潮热有内伤外感虚实之分

李氏曰：经行潮热有时，为内伤，属于虚。潮热无时，为外感，属于实。虚者大温经汤，实者四物加柴、芩。

经行客热属于体虚外热之加

《大全良方》曰：经行客热者，因体虚而将温过度，外热加之，非脏腑自生，故云客热。其状上焦胸膈之间，虚热、口燥、心烦，手足壮热是也。

经行后发热目暗属血虚

《女科撮要》曰：有经后发热倦怠，两目如帛蔽。夫脾为诸阴之首，目为血脉之宗。此脾伤而五脏皆为失所，不能归于目也。用补中汤、归脾汤，专主脾胃而愈。凡发久者，阳气亦自病，须调补之。

滇斋按：以上三条，序经行有潮热、客热、发热之证也。经行潮热、客热，兼虚实论。若经后发热，则是血脉空虚，阴虚不足，为有虚而无实也。

经行泄泻属于脾虚多湿

汪石山曰：有妇人经行，必先泻二三日，然后经下，诊其脉皆濡弱，此脾虚也。脾主血，属湿，经水将动，脾血先已流注血海，然后下流为经。脾血既亏，则虚而不能运行其湿，以参苓白术散服之，月余而经行不泻矣。

经行白带属阳虚陷下

缪仲淳曰：有月水过多，白带时下，日轻夜重，泄泻无时，亦属下多亡阴，宜作血虚论治，服四物益甚，始悟此病正合仲景阳生阴长之法。夫经水多，白带时下，又兼泄泻，皆由阳虚陷下而然，命曰阳脱是也。日轻夜重，盖日阳旺，而得健运之职，故血亦无凝滞之患，故日轻。夜则阴旺，而阳不得其任，失其健运之常，血亦随滞，故夜重。以

参、术助阳之药服之，

[续]按：以上二条，序经行有泄泻、白带之兼证也。经行中兼见之证不一，而腹痛、发热、泄泻、白带四证，则常有之。四证见其一，皆足以致经候不调之病，故以此序于月经不调之后。但月经不调，而不加意审治，势必渐至于不月而经闭，有血枯之候。故即以女子不月、经闭、血枯诸论集于下，此序书之原委也，读者不可不知。

经论女子月事不来属于胞脉闭

《素问》[1]：月事不来者，胞脉闭也。胞脉者，属心而络于胞中。今气上迫肺，心气不得下通，故月事不来也。

经论女子不月属二阳之病

《素问》曰：二阳之病，发于心脾，有不得隐曲，女子不月，其传为风消，为息奔者，死不治。

[续]按：以上经论二条，序女子不月，一属于胞脉之闭，一属于二阳之病也。

女子不月属心脾病宜治心火养脾血

张洁古[1]：女子月事不来者，先泻心火，血自下也。经云：二阳之病发心脾，有不得隐曲，故女子不月，其传为风消。太仆注曰：大肠、胃热也，心脾受之。心主血，心病则血不流；脾主味，脾病则味不化，味不化则精不足，故其病不能隐曲。脾土已亏，则风邪胜而气愈消。又经云：月事不来者，胞脉闭也。胞脉属于心，络于胞中。今气上迫肺，心气不得下通，故月事不来。先服降心火之剂，后服五补丸、卫生汤，治脾以养其血。

女子不月属肠胃病及于心脾论

王安道曰：二阳，足阳明与手阳明脉也。肠胃有病，心脾受之。发于心脾，犹言延及心脾也。虽然，脾胃为合，胃病而及脾，理固宜矣。大肠与心，本非合也，以大肠而及心，何哉？盖胃为受纳之府，大肠为传化之府。食入于胃，浊气归心，饮入于胃，输精于脾者，以胃之能纳、大肠之能化耳。肠胃既病，则不能受，不能化，心脾何所资？心脾既无所资，则无以运化而生精血。故肠胃有病，心脾受之，则男子为少精，女子为不月。心脾总男女言之，至隐曲不月，方主女子说。

女子不月属胃病不能运化水谷论

马玄台曰：二阳者，足阳明胃脉也，为仓廪之官，主纳水谷，乃不能纳受者何也？此病由心脾所发耳。正以女子有不得隐曲之事，郁之于心，故心不能生血，血不能养脾。始焉胃有所受，脾不能运化，而继则渐不能纳受，故胃病发于心脾也。由是水谷衰少，无以化精微之气，而血脉遂枯，月事不能时下矣。王注谓肠胃为病，心脾受之。何以谓心脾受肠胃之病，又以心血不流，为女子不月；脾味不化，为男女少精。岂女子无关于脾，而男子无关于心乎？况此节专为女子而发，未论及男子少精之义，学者详推之。

女子不月属胃无生化之原论

张景岳曰：二阳，阳明也，为胃与大肠二经。然大小肠皆属于胃，胃与心，子母也。人之情欲，本以伤心，母伤则害及其子。胃与脾，表里也。人之劳倦，本以伤脾，脏病则连于腑。故凡内而伤精，外而伤形，皆能病及于胃。此二阳之病，所以发于心脾也。不得隐曲，阳道病也。夫胃为水谷气血之海，主化荣卫而润宗筋。阴阳总宗筋之会，会于气街，而阳明为之长。然则精血下行，生化之本，唯阳明为最。今化源既病，则阳道外衰，故为不得隐曲。其在女子，当为不月也。

女子不月属心脾少血论

李太素曰：经云二阳之病发心脾，二阳指阳明经胃与大肠也。此经乃水谷传化之地，

而心与脾实系之。盖胃之下口通于小肠上口，胃不病，而小肠传化，则心气流通，而邪不归心。大肠不病而传化，则饮食运行而脾不劳力。今二阳既病，则传化不行，心脾乌得不病？故曰病发心脾则精血不充。盖精、血，一物也，主于心而生于脾。在男子言精不言血，故曰少精而不得隐曲。在女子言血不言精，故曰少血而不月。此心脾受病而然，是月经不调之一端也。

女子不月属气郁不畅论

武叔卿曰：洁古云泻心火，养脾血，是从本文之义也，愚谓当从隐曲推解。人有隐情曲意，难以舒其衷，则气郁而不畅，不畅则心气不开，脾气不化，水谷日少，不能变化气血，以入二阳之血海。血海无余，所以不月也。传为风消者，阳明主肌肉，血不足则肌肉不荣，有不消瘦乎？风之名，火之化也。故当根不得隐曲上看，乃有本。

女子不月属心脾胃三经受病论

李士材曰：阳明为二阳，胃伤而心脾受病者何也？脾与胃为夫妇，夫伤则妻亦不利。心与胃为子母，子伤则母亦不免。不得隐曲，阳事病也。胃为水谷气血之海，化荣卫而润宗筋。厥论曰：前阴者，宗筋之所聚，太阴阳明之所合。痿论曰：阴阳总宗筋之会，而阳明为之长。故胃病则阳事衰也。女子不月者，心主血，脾统血，胃为血气之海，三经病而血闭矣。

慎斋按：以上八条，序女子不月证也。女子不月，自《内经》论二阳之病发心脾，因集洁古以下诸家之论，以发明其经旨。大约均主脾胃立论，独叔卿一条，作气郁解，与诸家有异。

妇人经闭属虚积冷结气

《金匮要略》曰：妇人之病，因虚积冷结气，为证经水断绝，至有历年，血寒积结胞门，寒伤经络，三十六病，千变万端。

妇人经闭属风冷客于胞门

齐仲甫曰：妇人月事不来，此因风冷客于胞门，或醉以入房，或因风堕坠惊恐，皆令不通。《病源》云：血得温则宣通，得寒则凝泣。若月水不来，因冷于胃府，或醉入房，则内气耗损，劳伤肝经，或吐衄脱血，使血枯于中也。

妇人月水不通属津液减耗

王子亨曰：妇人月水不通，病本于胃，胃气虚不能消化水谷，使津液不生血气故也。又云，醉以入房，则内气竭绝伤肝，使月水衰少。所以尔者，肝藏血，劳伤过度，血气枯竭于内也。又先吐血，及吐血下血，谓之脱血，名曰血枯，亦月水不来。所以尔者，津液减耗故也。但益津液，其经自下。

慎斋按：以上三条，序妇人经闭，属于积寒风冷，凝泣其血，而月水为之不通也。

妇人经闭属火热有上中下三焦之分

李东垣曰：经闭不行有三，妇人脾胃久虚，形体羸弱，气血俱衰，以致经水断绝，或因劳心，心火上行，月事不来，胞脉闭也。胞脉属心，络胞中，气上迫肺，心气不得下通，故不来。宜安心补血泻火，则经自行。此上焦心肺有热而经不行也。或病中消，胃热善饥渐瘦，津液不生。夫经者，血脉津液所化。津液既绝，为热所烁，肌肉渐瘦，时见燥渴，血海枯竭，名曰血枯经绝，宜泻胃之燥热，补益气血，则经自行。此中焦胃有热结而经不行也。或心包络脉洪数，躁作时见，大便闭，小便难，而经水闭绝。此血海干枯，宜调血脉，除胞络中火邪，则经自行。此下焦胞脉热结而经不行也。

娄全善按：洁古、东垣治妇人血枯经闭之法，皆主于补血泻火。补血用四物之属。泻火，东垣分上中下三焦。如火在上，则得于劳心，治以芩、连及三和之类。火在中，则

善食消渴，治以调胃承气之类。火在下，则大小便难，治以玉烛之类。玉烛、四物与调胃承气是也。二和、四物与凉膈是也。

《济阴纲目》按：东垣之论，当有四证。如胃热、胞络热、劳心热三证，皆有余，宜泻火养血是矣。所言脾胃久虚，致经水断绝一证，又当补脾胃为主，岂得舍而勿论。盖水入于经，其血乃生，谷入于胃，脉道乃行。水去荣散，谷消卫亡，况脾统诸经之血，而以久虚之脾胃，致气血俱衰者，可不为之补益乎？即此以分虚实，明是四证无疑。全善乃遗补虚之一证，何也？

慎斋按：经闭主于泻心火，论本洁古。而东垣则以热结分上中下三焦，是月水不下，专以火热为病，药用玉烛、三和为例。夫此方治劳心，心火上行，致胞脉闭塞，月事不来，是实热也。若心虚而热收于内，与心虚而上衰者，二方又未可妄用也。大约妇人经闭，由于阴虚火旺，日渐煎熬，津液干涸，以致血枯经闭，当从越养葵滋水补肝之法，纯用三和、玉烛味未尽善。若东垣三证，首言脾胃久虚一段，已见经水断流，俱从脾胃受病。《济阴纲目》议全善之失，尤为有见。

慎斋按：以上一条，序妇人经闭属火邪热结，而经不行也。夫经闭有寒有热，《金匮》三条，主于风冷积寒，东垣、洁古主于火热实结，是皆指有余之客邪为病也。但寒热二证，宜分内伤外感处治。如心火不下降，而三焦热结，此是血衰火旺，阴不足以配阳，故心气不通，热结三焦，而经不下，当益阴滋水，以培化源，若用硝、黄、芩、连则失矣。如积冷血寒，凝结胞门，冲任脉寒，而血泣不下，是风冷客邪，乘虚袭入，宜温经散寒，以大辛热之药，导血下行，后用养荣之剂为当也。

妇人经闭属积痰碍滞

朱丹溪曰：有妇人病疟，饮食少，经脉不行，诊其脉，两手并无。时寒月，以虚寒治之，四物加附子、吴茱、神曲丸与之。予思处方殊未当，次早再求诊视，见其起居如常，并无倦怠，惊曰：前药误矣。经不行者，非无血也，为痰所碍而不行也。无脉者，非血衰少而脉绝也，积痰生热，结伏而脉不见尔。当作实热治之，用三花神佑丸，六脉俱出。

妇人经闭属痰塞胞门

朱丹溪曰：有积痰下流于胞门，闭塞不行，用厚朴二陈汤。又有痰多占住血海，因而不下者，痰多血虚，南星、二术、黄连、川芎末丸。有肥人脂满者，导痰汤加川芎、黄连，不用地黄，泥膈故也。

妇人经闭属污血凝滞胞门

娄全善曰：妇人经闭，有污血凝滞胞门，小腹疼痛，有热有寒。如热而经闭者，罗谦甫血极膏，一味大黄为末，醋熬成膏，治妇人干血气，大便利一二行，经血自下，是妇人之仙药也。仲景抵当汤，亦主妇人经水不利。《千金》桃仁煎，治血积月水不行。若寒结污血而不下，云岐红花当归散，治妇人室女经候不行，或积瘀血，腰腹疼痛。

慎斋按：以上三条，序妇人经闭属于积痰污血，而致经水之不行，是有余之实邪为病也，宜导痰逐瘀为主。

女子不月为血滞属心气不通

《内照经》曰：女子不月，血滞病也。原其本，则得之心气不通。故不治其血，而治其心可也。

月事不来属胞脉闭心气不下通

朱丹溪曰：经云气上迫肺，则心气不得下通，而月事不来。经云月事不来者，胞脉闭也。

妇人经闭本执着属于血虚气结

《医录补遗》曰：妇人血海满则行，然妇人性情执着，比之男子十倍，虽有虚证宜补，亦当以执着为虑，况月闭一证，大半属血虚气结。

妇人经闭属于肝劳血伤

骆龙吉曰：经云有病胸胁支满，妨于食，病至则先闻腥臊臭，出清液，先吐血，四肢清，目眩，时时前后血，病名曰血枯。此年少时，因大脱血，或醉而入房，亏损肾肝。盖肝藏血，受天一之气，以为滋荣，其经上贯膈，布胁肋。若脱血失精，肝气已伤，肝血枯涸不荣，而胸胁满。妨于食，则肝病传脾，而闻腥臊臭，出清液。若以肝病而肺乘之，则吐血。四肢清，目眩，时时前后血出，皆肝血伤之证也。

妇人经闭属心血亏肾水涸论

虞天民曰：妇人百病，皆自心生。如五志之火一起，则心火亦从而燔灼。经闭不通之证，先因心事不足，心血亏耗，故乏血以归肝，而出纳之用已竭。经曰，母能令子虚，是以脾不磨而食少，所谓二阳之病发心脾者，此也。因食少，故肺气亦失所养。而气滞不行，则无以滋肾阴。况月水全赖肾水施化，肾水既乏，则经水日以干涸，或先或后，淋漓无时。若不早治，渐至闭塞不通，而必为劳极之证，不易治也。

妇人经闭属于心事不足思虑伤脾论

徐春甫曰：心属阳而主血，脾裹血以行气。若月经不通，未必不由心事不足，思虑伤脾，有所劳倦，谷气不输，肺金失养，肾水无滋，经血枯涸，以致三五不调，渐致闭绝。虚损内热，骨蒸劳瘵之证作，而率难以治。唯养心则血生，脾健则气布，二者和则气畅血行，而调经之要至矣。

妇人经闭宜审脾胃论

王节斋曰：妇人女子，经脉不行，多有脾胃损伤而致，不可便作经闭死血，轻用通经破血药。凡遇此证，须审其脾胃何如。若因饮食劳倦，损伤脾胃，少食泄泻疼痛。或因误服汗下攻克药，伤其中气，以致血少不行，只用健脾胃药。脾旺则生血，而经自行。又有饮食积滞，致损脾胃，亦宜消积补脾。若果脾胃无病，有血块凝滞，方用行血通经之剂。

慎斋按：以上七条，序妇人经闭属于内伤不足之病也。经闭有心气不通，有血虚气结，有肝伤肾竭脾伤，皆足致经闭。此为内伤虚证，而与前条风冷寒凝，火邪热结，积痰污血为病者，有余不足，各自不同也。

妇人经闭有血滞血枯之分

李氏曰：妇人以血为主，天真气降，壬癸水合，肾气全盛，血脉流行，尝以三旬一见，以象月盈则亏，故曰月经。经行与产后一般，若其时有余血一点未净，或被风寒湿热暴邪，或内伤生冷，七情郁结，为痰为瘀，凝积于中，曰血滞。或经止后，用力太过，入房太甚，及服食燥热，以致火动，则邪气盛而津液衰，曰血枯。

妇人经闭血滞血枯有诸变证

陈良甫曰：经后被惊，则血气错乱妄行，逆于上则从口鼻出，逆于身则血水相抟，变为水肿。恚怒则气血逆于腰腿心腹，背胁手足之间重痛，经行则发，过期则止。怒极伤肝，则有眩晕、呕血、瘰疬、血风、疮疡等病，加之经血渗漏，遂成窍血生疮，淋漓不断。湿热相抟，为崩带，血结于内，变癥瘕。凡此变证百出，不过血滞与血枯而已。重则经闭不通，轻则经水不调，不止虚与热二者也。

行是，性机巧，行迟，性鱼钝。通行则阴阳　　弱参之。

经闭血滞血枯有虚热痰气之四证

叶以潜曰：血滞血枯，不越虚热痰气四证而已。血滞亦有虚热，血枯亦有虚热。故滞者不宜过于宣通，通后又须养血益阴，使津血流通。血枯亦不可峻行补益，恐本主无力，而辛热之剂反燥精血矣。

经闭血枯与血隔之证不同

张景岳曰：肝病血伤证与血隔相似，皆经闭不通之候。然枯之与隔，有如冰炭。枯者竭也，血虚极矣。隔者，隔阻也。血本不虚，而或气或寒，或积，有所逆也。隔者，病发于暂，其证或痛或实，通之则行而愈。若枯者，其来也渐，冲任内竭，其证无形。夫血既枯矣，宜补养阴气，使血自充。如用桃、红、硝、黄、棱、蓬、反加克伐，则枯者愈枯，毙可立俟也。

经闭血滞宜破血枯宜补论

陈良甫曰：血滞经闭宜破者，原因饮食毒热，或暴怒凝瘀积痰，直须大黄、干漆之类推陈致新，俾旧血消而新血生也。若气旺血枯，起于劳役忧思，自宜温和滋补。或兼有痰火湿热，尤宜清之凉之。每以肉桂为佐者，热则血行也。但不可纯用峻药，以亏阴道。调和饮食，自然血气流通。苟不务充养气血，唯以毒药攻之，是求千金于乞丐，必死而后已也。

慎斋按：以上五条，序妇人经闭有血滞血枯二证之辨也。血滞为有余，有余者宜泻，即前条《金匮》以下，所论风冷火热，积痰污血，所感而成也。血枯者，为不足，不足者宜补，即前条《内照》以下，所论心气不足，血虚肝伤，脾衰肾涸，以渐而致也。滞与枯之因，不外此数端，而调经者，可以类通之矣。

室女经来复断为避年

王叔和曰：有妇人将一女子，年十五来诊，言十四时，经水自下，今经反断，何也？师曰：若是妇人亲女，必夫人年十四时，亦以经水下，所以断，此为避年，后当自下。此真气犹怯，禀赋素弱而然也。宜固其元真之气，使水升火降，则五脏自和，而经脉自通矣。

室女月水不通属任脉为风寒所抟

《圣济总录》曰：女子二七天癸至，任脉通，月事以时下。若禀受不足，或任脉为风寒所抟，致令风气凝结，不能应时而下，经久不治，则致劳疾。不可行破血猛性之药，宜通心气，行荣卫，滑经络。

室女经脉断续为血脉未充

戴复庵曰：有少女经脉已行一二次，复至一二年又不行，或有四季一行，或有三五复至，此本血脉柔弱未充，故经脉断续。宜顺气养血，气血旺自通，勿攻之。

室女经闭成劳属于积想过度

寇宗奭曰：人生以气血为本，人病未有不先伤气血者。若室女童男积想过度，多致劳损。男子则神色消散，女子则月水先闭。盖忧愁思虑，则心伤而血竭。且心病则不能养脾，故不嗜食。脾虚则金亏，故发嗽。肾水绝则木气不荣，而四肢干痿，故多怒。不可用青蒿、虻虫等凉血行血，宜柏子仁丸、泽兰汤，益阴血以制虚火也。

室女经闭成劳属于饮食不节

《产宝》曰：经脉不通日久，此非细事，实为重病。若是室女，初因贪食酸咸之物，遂致血脉干涸，变成劳疾。

室女经闭为死候

危氏曰：女子二七天癸至，七七天癸竭

行早，性机巧。行迟，性鲁钝。通行则阴阳和合，始能有子。若年十四至二十岁不行，命如风烛，朝不保暮，有病发则死。间有不死，百无一二，亦一生多病。然有四季行，有一年一次者，或一生不循经度而行者，晚年有癖疾则难治。

慎斋按：以上六条，是序室女经闭之证也。室女经闭，与妇人经闭不同。室女经闭，非先天元气弱，血气未充，即是欲男子不得，所愿不遂，思虑伤心，郁抑伤肝，以致月水闭而成病。故凡寡妇师尼犯经闭者，当与此同法，惜前人未之论及也。

妇人天癸过期不止属血有余

许叔微曰：妇人天癸已过期，经脉不匀，或三月四月不至，或一月再至，腰腹疼痛。经云七损八益，谓女子七数尽，而经不依时者，血有余也，不可止之，但令得依时，不腰痛为善，宜服当归散。

妇人经水当止不止属邪气攻冲

《产宝百问》曰：男子生于寅，寅属木，阳中有阴，故男子得八数。女子生于申，申属金，阴中有阳，故女子得七数。男以气为主，八八则卦数已尽，尽则阳精痿。女以血为主，七七则卦数已终，终则经水绝，冲任虚衰，天癸绝而地道不通，而无子。或劳伤过度，喜怒不时，经脉衰微之际，又为邪气攻冲，则当止不止而复下。

妇人年过期经行属败血

李时珍曰：妇人年过五十，而经行不止者，作败血论。又妇人四十九后，天癸当止不止，每月却行，或过多，用条芩二两，醋浸七日，炙干，又浸七次，为末，醋丸，空心温酒下，名芩心丸。

慎斋按：以上三条，序妇人天癸过期，而有经行之病也。一主于有余，一主于邪伤，一主于败血，败血即属崩漏，当以人之禀赋强弱参之。

妇人月水不断属冲任气虚

《圣济总录》曰：女人以冲任二经，为经脉之海。手太阳小肠之经，与手少阴心经，此二经相为表里，主下为月水。若劳伤经脉，则冲任气虚，冲任既虚，则不能制其气血，故令月事来而不断也。

妇人月水不断属外邪客于胞内

陈良甫曰：妇人月水不断，淋漓腹痛，或因劳损气血而伤冲任，或因经行而合阴阳，以致外邪客于胞内，滞于血海故也。若气虚不能摄血，但养元气，病邪自愈。攻其邪，则元气反伤矣。

慎斋按：以上二条，序妇人月水宜止而不止也。妇人经行，每月一至，如潮之来，故曰月信。若每月既至，或三日，或四五日即应止。而淋漓不断，非冲任气虚，不能约制，为内伤不足，即劳伤气血，外邪客胞，而外感有余。有余不足，当参以人之强弱也。

妇人经水清血为居经

王叔和曰：妇人年五十所，一朝而清血，二三日不止，何以治之？师曰：此妇人前绝生，经水不止，今反清血，此为居经，不须治，当自止。经水下常五日者，五日愈。

妇人经水三月一来名居经

王叔和曰：脉微，血气俱虚，年少者，亡血也。乳子下利为可，否者此为居经，三月一来。师曰：寸口脉微而涩，微则卫气不足，涩则血气无余。卫不足，其息短，其形躁。血不足，其形逆，荣卫俱虚，语言谬戾。趺阳脉浮而涩，涩则胃气虚，虚则短气，咽燥而口苦。胃气涩则失液。少阴脉微而迟，微则无精，迟则阴中寒，涩则血不来，此为居经，三月一来。

妇人月水行期有不一候

李时珍曰：女子，阴类也，以血为主。其血上应太阴，下应海潮。月有盈亏，潮有朝夕，月事一行，与之相符，故谓之月水、月信、月经。经者，常也。天癸者，天一生水也。邪术家谓之红铅，谬名也。女人之经，一月一行，其常也。或先或后，或通或塞，其病也。有行期只吐血衄血，或眼耳出血，是谓倒经逆行。有三月一行者，是谓居经。有一年一行，是谓避年。有一生不行而受胎者，是谓暗经。有受胎之后，月月行经而产子者，是谓胎盛，俗名垢胎。有受胎数月，血忽大下，而胎不陨者，是谓漏胎。此虽以气血有余不足言，而亦异常矣。

慎斋按：以上三条，序妇人经行不一也。妇人经水，一月一行，其常也。而外则有居经、有避年、有倒经、有暗经、有垢胎、有漏胎之证，凡此皆经候不调之故也。

妇人月水不通有因诸证所致

《仁济总录》曰：妇人月水不通，所致不一，有气不化、血微不通。有先期太过、后期不通。有大病后、热燥不通。有凝寒结滞不通，有积聚气结不通，有心气抑滞不通。凡此所受不同，治之亦异。女人假血为本，以气为用。血气稽留，则涩而不行。其为病，或寒或热，或脐腹坚痛，或肌肉消瘦，久不治，则为劳瘵之证。

妇人月水不调成病

《产宝方》曰：大率治病，先论其所主。男子调其气，女子调其血。气血，人之神也，不可不谨调护之。然妇人以血为本，气血宣行，其神自清。所谓血室不蓄，则气血凝结，而木火相刑。月水如期，谓之月信。其血不来，则因风热伤于经血。故血不通，或外感风寒，内受邪热，脾胃虚弱，不能饮食。食既不充，营卫抑遏，肌肤黄燥，面无光泽，时发寒热，腹胀作痛，难于子息，子藏冷热，久而劳损，必挟带下，便多淋沥，忽致崩漏，经云腹中如块，忽聚忽散，其病为癥。血涸不流，而传腹胀，时作寒热，此乃成瘕。或先后期，虽通而或多或少，究病之原，盖本于此。

妇人月经不行成诸病

叶以潜曰：妇人经病，内因忧思忿怒，郁结不行，外因饮冷形寒，恶露凝滞，此不调不通，作痛发热所由也。治者调其气而破其血，开其郁而补其虚，凉血清热。治血病，以行气为先，香附之类是也。热则流通，寒则坚凝，须以热药为佐，肉桂是也。又有月经不行，四肢发肿者，属瘀血渗入脾经也，宜辛温以导之。又有月经上行口鼻者，是火载血上，气之乱也，四物加栀子、黄连、丹皮、犀角。

慎斋按：以上三条，序妇人经不行致病也。妇人有因病而致经不调者，有因经不调而致诸病者，当宜分别详审处治。

妇人经来行房成癫疾

王叔和曰：问曰，妇人病如癫疾，郁冒，一日二十余发。师脉之，反言带下，皆如师言，其脉何类，何以别之？师曰：寸口脉濡而紧，濡则阳气微，紧则荣中寒。阳微，卫气虚，血竭凝寒，阴阳不和，邪气合于荣卫。疾起年少时，经来以合房室，移时过度，精感命门开，经下血则虚，百脉皆张，中极感阳动，微风激成寒，因虚合于荣卫。冷积于丹田，发动上冲，奔在胸膈，津液掩口，涎唾溢出胃，状如厥气冲，髀里热。粗医名为癫，灸之，因大剧。

妇人月水行房病伏梁

陈藏器曰：一犯月水行房，精血相射，入于任脉，留于胞中，以致小腹结病，病如伏梁，水溺频涩，是名积精。妇人闺房有三禁，

此其一也。

妇人经来交合成经漏

《原病集》曰：有妇人月经来时，交合阴阳，致伤血络，多成经漏淋漓，俗云血沙淋是也。治常调和血气，使脏腑和平，经自止矣。

慎斋按：以上三条，序妇人经行而交合，致有赤白、伏梁、经漏之三证也。凡妇人经行，血海净尽而交合，则精凝血聚，可以成胎。若经适来，而不禁房室，则败血不出，恶精相射，致有诸证。此人之最易犯者，医者审察病机，不可不晓。

慎斋按：以上自褚侍中"合之非时"一论至此，其条序分十七段，皆属经候不调之故，以下始言治调经之大法。

调经莫先于去病论

李氏曰：妇人月水循环，纤痾不作而有子。若兼潮热腹痛，重则咳嗽汗呕，或泻，有潮汗，则血愈消耗。有汗咳呕，则气从上行，泻则津偏于后，痛则积结于中，是以必先去病，而后可以滋血调经。就中潮热疼痛，尤为妇人常病。盖血滞积人骨髓，便为骨蒸。血滞积瘀，与日生新血相持，则为疼痛。血枯不能滋养百骸，则蒸热于内。血枯，胞络火盛，或挟痰气食积，寒冷则为疼痛。凡此诸病，皆阻经候不调，必先去其病，而后可以调经也。

经候不调不通有分因详证治病之法论

方氏曰：妇人经病，有月候不调者，有月候不通者。然不调不通中，有兼疼痛者，有兼发热者，此分而为四也。细详之，不调中，有趱前者，有退后者。趱前为热，退后为虚。不通中，有血枯者，有血滞者。血滞宜破，血枯宜补也。疼痛中，有常时作痛者，有经前经后作痛者。常时与经前为血积，经后为血虚也。发热中，有常时发热者，有经行发热者。常时为血虚有积，经行为血虚而有热也。是四者之中，又分为八矣。人之气血周流，忽有忧思忿怒，则郁结不行。经前产后，忽遇饮冷形寒，则恶露不尽。此经候不调不通，作痛发热，所由作也。大抵气行血行，气止血止。故治血病，以行气为先，香附之类是也。热则流通，寒则凝塞，故治血病，以热药为佐，肉桂之类是也。

慎斋按：妇人有先病而后致经不调者，有因经不调而生诸病者。如先因病而后经不调，当先治病，病去则经自调。若因经不调而后生病，当先调经，经调则病自除。李氏一论，可谓调经之要。然偏而不全，予故补其未尽之旨。若方氏分因详证，诚得统论调经大法。

调经先以顺气为主论

《济生方》曰：经云百病皆生于气。有七气、有九气。喜怒忧思悲恐惊，七气也。益之以寒热，为九气。气之为病，男子妇人皆有之，唯妇人之气为尤甚。盖人身血随气行，气一滞，则血为气并。或月事不调，心腹作痛；或月事将行，预先作痛；或月事已行，淋沥不断；或作寒热，或为癥瘕；或疼痛连腰胁，或引背膂，上下攻刺，吐逆不食，肌肉消瘦。非特不能受孕，久不治，转为劳瘵者多。是皆气之为病也。故调经养血，莫先以顺气为主。

调经养血莫先于调气论

汪石山曰：妇人属阴，以血为本。但人肖天地，阴常不足，妇人加乳哺月经之耗，是以妇人血病者多。夫月经者，津液血脉所成。荣卫和，经候自然应期。如月之盈亏，不失常度，故曰月经。荣气血一忤，则或先或后，多寡不匀，或闭绝不行而百病生，必须分因而治。如真水亏败，阳火内炽，血海枯竭，经绝不通者，宜补养阴血，则经自行。如寒客胞门，子户凝泣，血不通，为癥瘕之候者，宜散寒逐瘀，则经自行。但血乃气之配，

其升降寒热虚实，一从乎气。是以气热则血热而色紫，气寒则血寒而色凝，气升而血逆而上出，气陷则血随而下崩。此调经莫先于养血，养血莫先于调气也。

调经以开郁行气为主论

方约之曰：妇人以血用事，气行则无病。故古人治妇人病，多用香附、砂仁、木香、青皮、枳壳者，行气故也。凡妇人病，多是气血郁结，故治以开郁行气为主。郁开气行，而月候自调，诸病自瘳矣。

调经不可专耗其气论

叶以潜曰：女子经候不调，多主耗气益血之说。但血为气配，气热则热，气寒则寒，气升则升，气降则降，气行则行，气滞则滞。如果郁火气盛于血，而致经不调者，方可单用香附丸、抑气散加木香、槟榔，以开郁行气。若气乱则调，气冷则温，气虚则补，男女一般。阳生则阴长，气衰则血亦弱，岂可专耗其气。但其间有夫妇不和，婢妾志不得伸，常有郁气而致经水不调，又当审顺逆以治之而已。

调经不可耗气宜养心实脾论

罗周彦曰：妇人得阴柔之体，以血为本。阴血如水之行地，阳气若风之旋天。故风行则水动，阳畅则血调，此自然之理也。考古方耗气以调其经。夫太冲者，气也。任脉者，血也。气升则升，气降则降，血随气行。若独耗其气，血无所施。正气既虚，邪气必胜，而百病生焉，经安得调乎。况心生血，脾统之，胃为卫之元，养其心则血生，实其脾则血足。气胜则血行，安可独耗其气，此调经之至要也。行经之时，当戒暴怒，怒则损其冲任。远房室，多欲则伤其血海。一有抑郁，宿血必停，走于腰胁，注于腿膝，遇新血相持，则疼痛不已。散于四肢，则麻木不仁。入于血室，则寒热不定。皆四气七情之所致也。

滇斋按：以上五条，序调经之法，莫先于顺气开郁。而顺气开郁，则又戒不可专耗其气。当以实脾养心，为调经之要法也。经云百病皆生于气，而于妇人为尤甚。妇人之病，先于经候不调。但妇人以血用事，经水虽属血病，若竟从血分求疗，未得病机之要者也。若从气分求责，而调经知所本矣。

调经不可误药当养气益血论

初虞世曰：女子十四天癸至，任脉通，月事以时下。其来不可过与不及，多与少，反此皆谓之病。不行尤甚，百病生焉。血既不能滋养百体，则发落面黄身羸。血虚则发热，而水不足则燥气燔。燥气燔则金受邪，金受邪则肺家嗽，嗽则咳血吐血之病成矣。医见经不行，用虻虫、水蛭行血药，见热则用除热诸寒药，经水枯竭，无以滋养，其能行乎。但服养气益血诸药，天癸自行也。又有一种妇人盛实，月经瘀闭，利之则行，自有证候。

调经以滋水为主不须补血论

赵养葵曰：或问，论调经以滋水为主，不须补血，何也？曰：经云女子二七而肾气盛，齿更发长，天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下。夫者，天一之真。癸者，壬癸之水。月者，水之精。以一月而盈，盈则溢。女人经水，一月以时而下，能有子。不以时下，或过期，或不及，皆为病，病则不能有子，所以必须调经，调经必须滋水为主。又问曰：同一红色，非血而何？曰：女人系胞之所，而养经之处，养之一月而行，行则虚矣。以时交感，以虚而受。人若有孕，此水即以养胎，不月矣。一生子，此水即化为乳而不月。乳之色白也，何谓血乎。至四十九而天癸绝，其所绝者，天癸水也。其流行之血，不见其亏，故不须四物汤补血，必以六味丸滋水。滋水必兼补血，补血兼不得滋水，何也？盖血乃后天饮食入胃，游溢精气而成，以为流行之用。若经水乃冲任所主，人身中有奇经八脉，

俱属肾经无形之脉。其冲任者，奇经之二，其脉起胞中，为经脉之海，与手太阳、手少阴为表里，上为乳汁，下为月水。女人独禀此水，以为生生之源。与男子二八之精同类，从天一之源而来，精则一月而满，满则溢，似血而实非血也。

调经滋水必兼养火论

赵养葵曰：冲任起于胞中，男子藏精，女子系胞。其间又恃一点命门之火，为之主宰。火旺则红，火衰则淡，火太旺则紫，火太衰则白。所以滋水更当养火。其有干涸不通者，虽曰火盛之极，亦不宜以苦寒之药降火。只宜大补其水，从天一之源以养之使满，满则溢。万无有毒药可通之理，此调经之法类如此。

慎斋按：以上三条，序调经莫如养血，而养血莫如滋水养火。此赵氏《邯郸遗稿》独发前人所未发也。

调经以大补脾胃为主论

陈良甫曰：妇人以血为主，脾胃虚弱，不能饮食，荣卫不足，月经不行，寒热腹痛，或崩带证，皆脾胃不足所生病。故妇人月水不通，或因劳役过度，或因失血，伤损肝脾，但滋化源，其经自通。若小便不利，苦头眩，腰背痛，足寒时痛，久久血结于内，变为癥瘕。若血水相并，脾胃虚弱，壅滞不通，变为水肿。若脾气衰弱，不能制水，水渍肌肉，变为肿满。当益其津液，大补脾胃为主。

调经必审脾气生化之源论

武叔卿曰：脾气化液而生血，即水入于经，其血乃生之意。此荣出中焦也，故曰生化之源。心统血者，脾气化液，入心而变为血。故虽心之所主，亦赖脾气化生。此妇人经血不调，必审脾气化生之源，而健脾为调经之要也。

调经宜补养脾胃为先论

何松斋曰：乾道成男，坤道成女。女以坤道用事，故治妇人，以阴血为主。女子二七天癸至，阴气盛，盛则溢泄，此自然之理也。若阴性旺，则不及二七而至，弱则逾二七而至。凡治此证，当察脾胃何如。如女子月事不调，因脾胃伤损，不能生血所致，须以补养脾胃为先。脾旺则能统血，而经自行。切不可遽用攻克之剂，伤其中气，则愈不调矣。

慎斋按：以上三条，序调经以补养脾胃为大法也。赵养葵二条，调经主于滋水，是补先天真一之源也。陈良甫以下三条，调经主于补土，是培后天元气之本也。固肾扶脾，此为调经要道，学者审之。

治女子经脉不行有三法

杨仁斋曰：女子经脉不行有三，一则血气盛实，经络遏闭，其脉滑实，治当通经疏利；一则风冷外伤，七情内贼，以致经络痹滞，其脉浮涩，治之当解风散冷，去瘀涤热；一则形体憔悴，经络涸竭，其脉虚弱，治当滋养气血。

慎斋按：以上一条，序调经之法，兼有余不足，外感内伤处治。

女子经行宜谨

陈良甫曰：女子二七而天癸至，经血渐盈，应时而下，名曰月信。若遇经行，最宜谨慎，否则与产后证相类。若被惊怒劳役，则血气错乱，经脉不行，多致劳瘵等证。若逆于头面肢体之间，则重痛不宁。若怒气伤肝，则头晕胁痛，呕血瘰疬。若经血内渗，则窍穴淋沥。凡此六淫外侵，变证百出，犯时微若秋毫，成患重于泰山，可不畏哉。

女子病临医宜自说

孙真人曰：凡女子十四以上，则有月事。

月事来时，得风冷湿热，四时之病相协者，皆自说之。不尔，与治误相触，动更增困，处方者亦应问之。

看妇人病先问经期

寇宗奭曰：凡看妇人病，入门先问经期。

妇人室女诸病须问经事

彭用光曰：凡妇人室女病伤寒，及诸寒热气滞，须问经事若何。

治病妇当先问娠

张戴人曰：凡治病妇，当先问娠，不可仓猝。凡看妇人病脉，不可纯用破气行血之药，恐有娠在疑似间也。

治妇人病令宽思虑

葛仙翁曰：凡治妇人诸病，兼治忧虑，令宽其思虑，则病无不愈。

慎斋按：以上六条，序女子经行宜谨，不可轻忽，以致成病。而并治医者治妇人之病，不可不问经事缓急为要也。若其事虽可不言，医者略而不问，势必处以重方，而致其误，可不戒哉。

妇人之病源难疗

《千金方》曰：妇人之病，比之男子十倍难疗。经言妇人者，众阴所聚，常与湿居，十四以上，阴气浮溢，百想经心，内伤五脏，月水去留，前后交互，瘀血停凝，中道断绝，其中伤堕，不可具论。或便利于恭厕之上，风从下入，便成十二痫疾。妇人所以别立方也。然女人嗜欲多于丈夫，感病倍于男子，加以爱憎嫉妒，所以为病根深，疗之难瘥也。

慎斋按：以上一条，序妇人病之难疗也。

妇人月水不利之脉

《脉经》曰：尺脉滑，血气实，妇人经脉不利。尺脉来而断绝者，月水不利。寸关如故，尺脉绝不至者，月水不利，当患少腹痛。肝脉沉，月水不利，主腰腹痛。

女科经纶　卷二

携李　萧　埭赓六纂著
鄞县　曹赤电炳章圈校

嗣育门

经论男女有子本于肾气之盛实

《素问》曰：女子七岁，肾气盛，齿更发长，二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子。七七任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子。丈夫八岁，肾气实，齿更发长，二八肾气盛，天癸至，精气溢泻，阴阳和，故能有子。八八则齿发去，五脏皆衰，筋骨懈惰，天癸尽矣。故发鬓白，身怯，行步不正而无子。

慎斋按：以上经论一条，序男女有子，本于天癸至，而肾气盛实之候也。昔人论种子，必先调经。故妇人调经一门之后，即继以嗣育之道。若《良方》与《济阴纲目》序调经经闭证后，搜编入妇人血崩带下，与中风诸疾，未免次不伦矣。

合男女必当其年欲阴阳之完实

褚澄曰：合男女必当其年，男虽十六而精通，必三十而娶。女虽十四而天癸至，必二十而嫁。皆欲阴阳完实，然后交而孕，孕而育，育而为子坚壮强寿。今未笄之女，天癸始至，已近男色，阴气早泄，未完而伤，未实而动，是以交而不孕，孕而不育，育而子脆不寿。

求子在阴阳之形气寓论

《圣济经》曰：天地者，形之大也。阴阳者，气之大也。唯形与气，相资而立，未始偏废。男女媾精，万物化生，天地阴阳之形气寓焉。语七八之数，七，少阳也；八，少阴也，相感而流通。故女子二七天癸至，男子二八而精通，则以阴阳交合而兆始故也。

求子须知先天之气论

胡孝曰：男女交媾，其凝结成胎者，虽不离精血，犹为后天滓质之物，而一点先天之气萌于情欲之感者，妙合于其间。朱子所谓慕子有子之初，《悟真篇》所谓生身受气初者是也。医之上工，因人无子，语男则主于精，语女则主于血。著论立方，男子以补肾为要，女子以调经为先。又参以补气行气之说，察其脉络，究其盈亏，审而治之，然后一举可孕也。

求子之脉贵和平论

陈楚良曰：人身气血，各有虚实寒热之异，唯察脉可知。舍脉而独言药者，妄也。脉不宜太过而数，数则为热。不宜不及而迟，迟则为寒。不宜太有力而实，实者正气虚，而火邪乘之以实也。治法当散郁以伐其邪，邪去而后正可补。不宜太无力而虚，虚乃气血虚也。治法当补其气血。又有女子气多血少，寒热不调，月水违期，皆当诊脉，而以活法治之，务使夫妇之脉和平有力，交合有期，不妄用药，乃能生子也。

慎斋按：以上四条，序嗣育之道，必阴阳完实，形气相资，兆始于先天有生之初，而再诊以脉之和平，始可有子也。

种子必保养心肾二脏论

王宇泰曰：严冬之后，必有阳春。是知天地之间，不收敛则不能发生，自然之理也。今人既昧收藏之理，纵欲竭精，以耗真气。及其无子，既云血冷，又谓精寒，燥热之剂投而真阴益耗矣，安得而有子。大抵无子之故，不独在女，亦多由男。房劳过度，施泄过多，精清如水，或冷如冰，及思虑无穷，皆难有子。盖心主神，有所思则心驰于外，致君火伤而不能降。肾主智，有所劳则智乱于中，俾肾亏而不能升，上下不交，水火不媾，而能生育者，无有也。

种子有聚精之道五论

袁了凡曰：聚精之道，一曰寡欲，二曰节劳，三曰息怒，四曰戒酒，五曰慎味。肾为精之府，凡男女交接，必扰其肾。肾动则精血随之而流，外虽不泄，精已离宫。未能坚忍者，必有真精数点，随阳痿而溢出，此其验也，故贵乎寡欲。精成于血，不独房室之交，损吾之精。凡日用损血之事，皆当深戒。如目劳于视，则血于视耗。耳劳于听，则血以听耗。心劳于思，血以思耗。随事节之，则血得其养，而与日俱积矣，故贵乎节劳。主闭藏者，肾也。司疏泄者，肝也。二脏皆有相火，其系上属于心。心，君火也。怒则伤肝而相火动，动则疏泄用事，闭藏不得其职，虽不交合，亦暗流潜耗矣，故贵乎息怒。人身之血，各归其舍则常凝，酒能动血。人饮酒则面赤，手足俱红，是扰其血也。血气既衰之人，数月无房事，精始厚而可用。使一夜大醉，精随薄矣，故宜戒酒。经云，精不足，补之以味。浓郁之味，不能生精，唯恬淡者，能补精耳。盖万物皆有真味，调和胜，真味衰矣。不论腥素，淡煮得法，自有一段冲和恬淡之气，益人肠胃。《洪范》论味，而曰稼穑作甘。世物唯五谷得味之正，但能淡食谷味，最能养精。如煮粥饭中，有厚汁滚作一团者，此米之精液所聚，食之最能生精，故宜慎味。

种子之道有四

王宇泰曰：种子之道有四，一曰择地，地者，母血是也；二曰养种，种者，父精是也；三曰乘时，时者，精血交感之会是也；四曰投虚，虚者，去旧生新之初是也。

种子必知絪缊之时候

袁了凡曰：天地生物，必有絪缊之时，万物化生，必有乐育之候。猫犬至微，将受娠也，其雌必狂呼而奔跳，以絪缊乐育之气触之，不能自止耳。此天然之节候，生化之真机也。凡妇人一月经行一度，必有一日絪缊之候，于一时辰间，气蒸而热，昏而闷，有欲交接不可忍之状，此的候也。此时逆而取之，则成丹；顺而施之，则成胎矣。

[illegible]

妇人无子属冲任不足肾气虚寒

《圣济总录》曰：妇人所以无子，由冲任不足，肾气虚寒故也。《内经》谓：女子二七天癸至，任脉通，太冲脉盛，阴阳和，故能有子。若冲任不足，肾气虚寒，不能系胞，故令无子。亦有本于夫病妇疾者，当原所因调之。

妇人不孕属风寒袭于子宫

缪仲淳曰：女子系胞于肾及心胞络，皆阴脏也。虚则风寒乘袭子宫，则绝孕无子，非得温暖药，则无以去风寒而资化育之妙。唯用辛温剂，加引经，至下焦，走肾及心胞，散风寒，暖子宫为要也。

妇人不孕属冲任伏热真阴不足

朱丹溪曰：妇人久无子者，冲任脉中伏热也。夫不孕由于血少，血少则热，其原必起于真阴不足。真阴不足，则阳胜而内热，内热则荣血枯，故不孕。益阴除热，则血旺易孕矣。《脉诀》曰：血旺易胎，气旺难孕是也。

妇人不孕属阴虚火旺不能摄精血

缪仲淳曰：女子血海虚寒而不孕者，诚用暖药。但妇人不孕，亦有阴虚火旺，不能摄受精血，又不可纯用辛温药矣。

妇人不孕属血少不能摄精

朱丹溪曰：人之育胎，阳精之施也，阴血能摄之，精成其子，血成其胞，胎孕乃成。今妇人无子，率由血少不足以摄精也。血少固非一端，然欲得子者，必须补其精血，使无亏欠，乃可成胎孕。若泛用秦桂丸之剂，熏灼脏腑，血气沸腾，祸不旋踵矣。又曰：瘦弱妇人，性躁多火，经水不调，不能成胎。以子宫干涩无血，不能摄受精血故也。益水养阴，宜大五补丸、增损三才丸加减，以养血主之。东垣有六味丸，补妇人阴血不足无子，服之能胎孕。

妇人不孕戒服秦桂丸热药论

朱丹溪曰：无子之因，多起于妇人。医者不求其因起于何处，遍阅古方，唯秦桂丸，用温热药，人甘受燔灼之祸而不悔，何也？或曰春气温和，则万物发生，冬气寒冽，则万物消陨，非秦桂温热，何以得子脏温暖成胎？予曰：妇人和平，则乐有子。和则气血匀，平则阴阳不争。今服此药，经血必紫黑，渐成衰少。始则饮食渐进，久则口苦而干，阴阳不平，血气不和，病反蜂起，以秦桂丸耗损真阴故也，戒之。

按：秦桂丸为妇人子宫虚寒积冷不孕者设。若血虚火旺，真阴不足，不能摄精者服之，则阴血反耗，而燥热助邪矣。

陈斋按：以上六条，皆妇人不孕，有虚寒、伏热、肾虚、血少，为不足之病也。

妇人不孕属于实痰

张子和曰：有妇人年三十四，梦与鬼交，及见神堂阴司、舟楫桥梁，如此二十五年，竟无妊娠。此阳火盛于上，阴水盛于下。见鬼神者，阴之灵。神堂者，阴之所。舟楫桥梁，水之用。两手寸脉皆沉而伏，知胸中有实痰也。凡三涌、三泄、三汗，不旬日而无梦，一月而有娠。

妇人不孕属脂膜闭塞子宫

朱丹溪曰：妇人肥盛者，多不能孕育。以身中有脂膜闭塞子宫，致经事不行。瘦弱妇人不能孕育，以子宫无血，精气不聚故也。肥人无子，宜先服二陈汤，四物去生地，加香附，久服之。丸更妙。

妇人不孕属湿痰闭子宫

朱丹溪曰：肥盛妇人，禀受甚厚，恣于酒食，经水不调，不能成孕，以躯脂满溢，湿痰闭塞子宫故也。宜燥湿、去痰、行气，二陈加木香、二术、香附、芎、归，或导痰汤。

妇人不孕属于积血

陈良甫曰：妇人有全不产育，及二三十年断绝者，荡胞汤主之，日三服，夜一服，温覆汗，必下积血及冷赤脓如豆汁，力弱大困者，一二服止。

妇人不孕分肥瘦有痰与火之别

何松庵曰：有肥白妇人不能成胎者，或痰滞血海，子宫虚冷，不能摄精，尺脉沉滑而迟者，当温其子宫，补中气，消痰为主。有瘦弱妇人不能成胎者，或内热多火，子宫血枯，不能凝精，尺脉洪数而浮者，当滋阴降火，顺气养血为主。

潘斋按：以上五条，总妇人不孕，有受饮、瘀血、湿痰，为妨孕有余之病也。

妇人不孕病情不一论

薛立斋曰：妇人不孕，亦有六淫七情之邪伤冲任。或宿疾淹留，传遗脏腑，或子宫虚冷，或气旺血衰，或血中伏热。又有脾胃虚损，不能荣养冲任。更当审男子形质何如。有肾虚精弱，不能融育成胎。有禀赋原弱，气血虚损。有嗜欲无度，阴精衰惫。各当求原而治。至大要，则当审男女尺脉。若右尺脉细，或虚大无力，用八味丸。左尺洪大，按之无力，用六味丸。两尺俱微细，或浮大，用十补丸。若误用辛热燥血，不唯无益，反受其害矣。

潘斋按：以上一条，总不孕之理，兼男女病情而论之也。

成胎以精血先后分男女

《褚氏遗书》曰：男女之合，二情交畅，阴血先至，阳精后充，血开裹精，精入为骨，而男形成。阳精先入，阴血后参，精开裹血，血入居本，而女形成。

成胎以左右阴阳之气动分男女

《圣济经》曰：天之德，地之气，阴阳至和，流薄一体。因气而左动则属阳，阳资之则成男。因气而右动则属阴，阴资之则成女。《易》称乾道成男，坤道成女。此男女之别也。

成胎以日数精血之胜分男女

李东垣曰：经水断后一二日，血海始净，精胜其血，感者成男。四五日后，血脉已旺，精不胜血，感者成女。至六七日后，虽交感亦不成胎。

成胎以子宫之左右分男女

朱丹溪曰：《易》云：乾道成男，坤道成女。夫乾坤，阴阳之性情也。左右，阴阳之道路也。男女，阴阳之仪象也。父精母血，因感而会。精之泄，阳之施也。血能摄精，精成其骨。此万物之资始于乾元也。血之行也，精不能摄血成其胞，此万物之资生于坤元也。阴阳交媾，胚胎始凝。胎所居，名曰子宫。一系在下，上有两歧，一达于左，一达于右。精胜其血，则阳为之主，受气于左子宫，而男形成。精不胜血，则阴为之主，受气于右子宫，而女形成。孕成而始化胞也。

成胎以先天之阴阳相胜分男女

马玄台曰：男子先天之气，方父母媾精时，阴气不胜其阳则成男。凡医书谓阴血先至，阳精后冲，纵气来乘，血开裹精，阴外阳内则成男，其义亦渺。大约阴气不胜其阳，则为男。女子先天之气，方父母交媾时，阳气不胜其阴，则为女。凡医书谓阳精先入，阴血后参，横气来助，精开裹血，阴内阳外则成女，其义亦渺。大约阳气不胜其阴，则为女。

成胎以百脉齐到分男女

程鸣谦曰：信褚氏之言，则人有精先泄而生男，精后泄而生女者，何欤？信东垣之言，则有经始断，交合生女，经久断交合生男。亦有四五日以前交合无孕，八九日以后交合有孕者，何欤？俞子木又谓：微阳不能射阴，弱阴不能摄阳。信斯言也。世有尪羸之夫，怯弱之妇，屡屡受胎。而血气方刚，精力过人者，往往有终身不育，竟至乏嗣，独何欤？丹溪论治，专以妇人经水为主。然富贵之家，侍妾亦多，其中宁无月水如期者？又有经前夫频育，而娶此以图易，则不受胎。岂能受于此，而不能受于彼耶？大抵父母生子，如天地生物。《易》曰，坤道其顺乎承天而时行。知地之生物，不过顺承乎天，则知母之生子，亦不过顺承乎父而已。知母之顺承乎父，则种子者果以妇人为主乎，以男子为主乎？若主男子，则不拘老少强弱，康宁病患，

精之易泄难泄，只以交感之时，百脉齐到为善耳。若男女之辨，不以精血先后为拘，不以经尽几日为拘，不以夜半前后交感为拘，不以父母强弱为拘，只以精血各由百脉齐到者别胜负耳。故精之百脉齐到胜乎血，则成男。血之百脉齐到胜乎精，则成女矣。

受胎总论

李东璧曰：《易》云，一阴一阳之谓道。男女媾精，万物化生。乾道成男，坤道成女。此盖言男女生生之机，亦阴阳造化之良能也。齐·褚澄言血先至裹精则生男，精先至裹血则生女。阴阳均至，非男非女之身。精血散分，骈胎品胎之兆。《道藏》言：月水亡后一三五日成男，二四六日成女。东垣言：血海始净一二日成男，三四五成女。《圣济经》言：因气而左动，阳资之则成男；因气而右动，阴资之则成女。丹溪乃非褚氏而是东垣，主《圣济》左右之说立论，归于子宫左右之系，其说可谓悉矣。窃谓褚氏未可非也，东垣亦未尽是也。盖褚氏以精血之先后言，《道藏》以日数之奇偶言，东垣以女血之盈亏言，《圣济》、丹溪以子宫之左右言。各执一见，会而通之，理自得矣。夫独男独女之胎，可以日数论。骈胎品胎之感，亦可以日数论乎？稽之史载，一产三子四子，有半男半女，或男多女少，男少女多，则一三五日为男，二四六日为女之说，岂其然哉。岂有一日受男，而二日复受女之理乎？此褚氏、《圣济》、丹溪主精血、子宫左右之论为有见。而《道藏》、东垣日数之论为可疑矣。叔和《脉经》以脉之左右浮沉，辨猥生之男女；高阳《脉诀》，以脉之纵横逆顺，别骈品之胎形，恐亦臆度之见，而非确论也。

慎斋按：以上七条，序受胎辨男女之分，有不同之论也。经云，左右者，阴阳之道路。男女者，阴阳之仪象。故阴阳和，而万物生。夫妇合，而男女形。可见男女之生，未有不本于阴阳之理者也。故褚澄以精血先后分男女，东垣以日数奇偶分男女，鸣谦以百脉齐到分男女，皆为理之未确。故丹溪议褚李二公之论为未融，而以《易》道之乾元资始，坤元资生为据，娄全善所以叹为造极精微，发前人未发是矣。若子宫分左右，而以两歧辨男女，夫子宫为命门，女子系胞，形如合钵，何尝两歧，而分左右则是有两子宫，此说为凿空无据。《圣济》是论左右阴阳之气分男女，未尝以子宫有左右之分也。况男女交媾时，均有其精，何尝有血。褚氏、东垣、丹溪，俱以精血混言，几见男女媾精，而妇人以血施也。前贤之论多谬，僭辨之。

双胎属精气之有余

朱丹溪曰：或问双胎者何也？曰：精气有余，歧而分之，血因分而摄之故也。若男女同孕者，刚日阳时，柔日阴时，感则阴阳混杂，不属左，不属右，受气于两歧之间也。亦有三胎四胎五胎六胎者，犹是而已。

成胎有二男二女属精血之盛

《人镜经》曰：精气盛，则成二男。血气盛，则成二女。精血皆盛，则成一男一女。或精血散分，则成男胎。或精血混杂，则成非男非女。男不可为父，女不可为母。皆非纯气，或感邪祟鬼怪之渗气，则成异类矣。

不成男女为阴阳驳气所乘

朱丹溪曰：或问有男不可为父，女不可为母，与男子之兼形者，若何分之？曰：男不可为父，得阳道之亏者也。女不可为母，得阴道之塞者也。兼形者，由阴为驳气所乘，为状不一。有女兼男形者，又有下为女体，上具男之全形者，此又驳之甚也。或曰：驳气所乘，独见于阴，而所成之形，又若是不同耶？曰：阴体虚，驳气易乘。驳气所乘，阴阳相混，无所为主，不可属左，不可属右，受气于两歧之间，随所得驳气之轻重而成形，故所兼之形有不同也。

慎斋按：以上三条，序受孕有双胎之异，有不成男女之形，此皆阴阳变常，驳气所感，理之所不可稽者也。

妊娠时月分经养胎之始

巢元方曰：妊娠一月，名胚胎，足厥阴脉养之。二月名始胥，足少阳脉养之。三月名始胎，手心主脉养之。当此时，血不流行，形象始化。四月始受水精，以成血脉，手少阳脉养之。五月始受火精，以成气，足太阴脉养之。六月始受金精，以成筋，足阳明脉养之。七月始受木精，以成骨，手太阴脉养之。八月始受土精，以成肤革，手阳明脉养之。九月始受石精，以成毛发，足少阴脉养之。十月，五脏六腑、关节、人神皆备。其大略也。

十二经脉养胎以五行分四时

陈良甫曰：推巢氏所论，妊娠脉养之理，若厥阴肝脉，足少阳胆脉，为一脏腑之经。四时之令，必始于春木。故十二经之养始于肝，所以养胎在一月二月。手心主心胞络脉、手少阳三焦脉，属火而夏旺，所以养胎在三月四月。手少阴、手太阳，乃心脉也，君主之官。足太阴脾脉、足阳明胃脉，属土而旺长夏，所以养胎在五月六月。手太阴肺脉、手阳明大肠脉，属金而旺秋，所以养胎在七月八月。足少阴肾脉、足太阳膀胱脉，属水而旺冬，所以在腹中，受足诸脏之气脉所养，然后待时而生。此论微奥有至理，世有明者，未有过于巢氏之论矣。

十月养胎始于足厥阴肝木

《圣济经》曰：原四时之化始于木，十二经之养始于肝。滋肝之经，足厥阴之脉也。自厥阴次之，至于太阳，自一月积之，至于十月，五月相生之气，天地相合之数，举在于是。然手少阴、太阳之经，无所专养者，以君主之官，无为而已。是皆母之真气，所赖以养形者也。

慎斋按：以上三条，序受胎之始，分十二经脉以养胎也。人自受胎于胞门，则手足十二经脉，其气血周流，俱以拥养胎元。岂有逐月分经，某经养某月之胎之理。马玄台已驳之矣。但在巢氏一月二月，是论受胎之月数，犹为近理也。至良甫所论，是以年岁之一月二月，而以五行分四时论也。夫人受胎，不拘时月。必欲以木火土金水，配定某月养胎，则受胎在正月二月者，犹可以木配之也。若在四五六月者，何以配之，不经甚矣，当俟正之。

胎疾宜治

《圣济经》曰：或者以妊娠毋治，有伤胎破血之论。岂知邪气暴戾，正气衰微，苟执方无权，纵而勿药，则母将羸弱，子安能保。上古圣人谓重身毒之，有故无殒，衰其大半而止。盖药之性味，本以疗疾，诚能处以中庸，与疾适当，且知半而止之，亦何疑于攻治哉。

疗母安胎二法不同

王海藏曰：安胎之法有二，如母病以致动胎者，但疗母则胎自安。或胎气不固，或有触动，以致母病者，宜安胎则母自愈。

慎斋按：以上二条，序胎疾不可不疗。而疗之之法，则当分母病、胎病，以处治也。

胎前用药从厥阴经治法有三禁论

张洁古曰：妇人童幼，天癸未行属少阴，天癸既行属厥阴，天癸既绝属太阴。治胎产病从厥阴者，是祖气生化之原也。厥阴与少阳为表里，故治法无犯胃气，及上中二焦，谓之三禁。不可汗、不可下、不可利小便。若发汗，则同伤寒下早证。利大便，则脉数而动于脾。利小便，则内亡津液，而胃中枯燥。用药能不犯三禁，则荣卫和而寒热止。

胎前以清热养血为主论

王海藏曰：胎前气血和平，则百病不生。若气旺而热，热则耗气血而胎不安，当清热养血为主。若起居饮食，调养得宜，绝嗜欲，安养胎气，虽感别证，总以安胎为主。

胎前清热养血宜兼顺气为主论

朱丹溪曰：胎前当清热养血为主，白术、黄芩为安胎之圣药。俗医不知不敢用，反谓温热剂可以养胎。不知胎前最宜清热，令血循经不妄行，故能养胎。黄芩安胎，为上中二焦药，使降火下行。益母草活血行气，有补阴之功。胎前无滞，产后无虚，以行气中有补也。胎至三月四月忽腹痛，唯砂仁、木香能安胎治痛行气。八九月必须顺气，用枳壳、紫苏之属。但气虚者，宜补气以行滞，用参、术、陈皮、归、芎、甘草，加腹皮。气实者，耗气以抑阳，用芩、术、陈皮、甘草，加枳壳。如将临月，胎热以三补丸加香附、白芍，或地黄膏，血虚者四物。若瘦弱人，勿用芎药，以其伐肝也。

胎前三禁以养血健脾清热疏气为主论

汪石山曰：徐之才与巢元方，有十月养胎用药之法，当逐月详其所属之经，气血虚实，而用是经之药，虚则补之，壅者疏之，热则凉之，寒者温之，不可汗下，及利小便。盖胎元必赖气血以养，若汗则亡阳伤气，下则亡阴伤血，利小便则伤精液。是以三者，皆在所忌。凡胎前病，总以养血、健脾、清热、疏气为主。

慎斋按：十月分经养胎之说，创自巢元方《病源论》。夫巢氏为隋代名医，张子和叹其谬立名色。故云支派之分，自巢氏始。《病源》之失，亦自巢氏始。即如受胎，始于命门子户，人身十二经气血，俱禽聚以养胎元，岂有某经养某月胎之理。而陈良甫附会其说，以五行分配四时，安养胎法，尤无理甚矣。若徐之才，又因元方、良甫之谬，而以十月分配某月见某证，则用某药立方主治，分列条下。夫孕妇胎前，病邪百出，岂有限于某月必见某证，执用某方以治之，不但胶柱鼓瑟，直是齐东之语，荒诞不稽者也。故存巢陈二论，删去徐氏十条，以正《妇人良方》讹以传讹之失。汪石山见理甚明，亦从而称述之，何欤？

胎前清热养血宜开郁为主论

汪石山曰：妊娠必须清热调血，使血循经，以养其胎。故丹溪用黄芩、白术，为安胎圣药。盖胎之成，由母之气血畜聚以养之，气血既聚则易郁。是以先哲多用黄芩清热，香附开郁也。

胎前不宜服耗气热药论

徐春甫曰：世医安胎，多用艾、附、砂仁热补，为害尤甚。不知血气清和，无火煎烁，则胎安而固。气虚则提不住，血热则溢妄行，胎欲不堕，得乎？香附虽云快气开郁，多用则损正气。砂仁快脾气，多用亦耗真气。况香燥之品，气血两伤，求以安胎，适以损胎矣。

慎斋按：香附、木香、砂仁，世医谓安胎必用。不知此三味性温而辛，久服反致耗气助火。虽曰胎前须顺气，但药性有偏胜，宜兼清热，如黄芩、知母之属为当。若胎气虚寒者，又不在此例也。

胎前体盛不宜补气论

喻嘉言曰：地之体本重，然得天气以包举之，则生机不息。若重阴沍寒之区，天日之光不显，则物生实罕。人之体，肌肉丰盛，乃血之荣旺。但血旺易至气衰，久而弥觉其偏也。夫气与血，两相维而不可偏。气为主则血流，血为主则气反不流，非气之衰也，气不流，有似乎衰耳。故一切补气药皆不可用，而耗气之药反有可施。缘气得补则愈锢，不

若耗之，以助其流动，久之血仍归其统握中矣。湖阳公主体肥难产，南山道士进瘦胎方，而产得顺利。盖肥满之躯，胎处其中，全无空隙。以故伤胎之药，止能耗其外之气，而不能耗其内之真气，此用药之妙也。

慎斋按：胎前宜顺气，气顺则不滞。枳壳散、束胎饮，本为气实肥盛，安佚郁闷者立法耳。若气体虚弱，元气不足，或虚气胀满，或虚寒腹痛，必须参、术大补。岂谓胎前必用耗气药乎，宜合春甫一条兼看为得。

安胎用黄芩白术论

方约之曰：妇人有娠则碍脾，运化迟而生湿，湿生热。丹溪先生用黄芩、白术为安胎之圣药。盖白术健脾燥湿，条芩清热故也。但娠妇赖血养胎，方内四物去川芎，佐之为尤备耳。

辨安胎用黄芩白术论

张飞畴曰：古人用黄芩安胎，是因子气过热不宁，故用苦寒以安之。脾为一身之津梁，主内外诸气，而胎息运化之机，全赖脾土，故用白术以助之。然唯形瘦血热，营行过疾，胎常上逼，过动不安者为相宜。若形盛气衰，胎常下坠者，非人参举之不安。形实气盛，胎常不运者，非香、砂耗之不安。血虚火旺，腹常急痛者，非归、芍养之不安。体肥痰盛，呕逆眩晕者，非半、苓豁之不安。此皆治母气之偏胜也。若因风寒所伤而胎不安，则桂枝汤、香苏散、葱白香豉汤，凉所宜用。伏邪时气，尤宜急下。此即安胎之要诀。下药中，独芒硝切不可犯。若有客犯而用白术，使热邪留恋不解，反足伤胎矣。

安胎宜固肾不必用黄芩白术论

赵养葵曰：或问白术、黄芩，安胎之圣药，此二味，恐胎前必不可缺乎？曰：未必然也。胎茎之系于脾，犹蒂之系于梁也。若栋柱不固，栋梁必挠。所以安胎先固两肾，使肾中和暖，始脾有生气，何必定以白术、黄芩为安胎耶。凡腹中有热，胎不安，固用凉药。腹中有寒，胎亦不安，必用温药，此常法也。殊不知两肾中，其水火之原，冲任之根，胎元之所系甚要，非白术、黄芩之所安也。如肾中无水，胎不安，用六味地黄壮水。肾中无火，用八味地黄益火。故调经当用杜仲、续断、阿胶、艾叶、当归、五味，出入于六味、八味汤中为捷径。总之，一以贯之也。此诸书之所不及，余特表而出之。

胎前用抑阳助阴方论

许学士曰：妇人妊娠，唯在抑阳助阴。然胎前药，最恶群队。若阴阳交错，别生他病。唯南山道士枳壳散，所以抑阳。四物汤，所以助阴。但枳壳散少寒，单服之，恐有胎寒腹痛之患。以内补丸佐之，则阳不至强，阴不至弱，阴阳调而胎孕安。此前人未尝论及也。

娄全善曰：观许学士论枳壳、四物、内补三方，入皆用之，何如？大率妊妇唯在抑阳助阴。经云：阴搏阳别，谓之有子。盖关前为阳，关后为阴，尺中之脉，按之搏手不绝者，妊也。妇人平居，阳气微盛，无他病。及妊子，则经闭以养胎。若阳气盛搏之，则经脉妄行，胎始不固，故贵抑阳助阴。但枳壳散少寒，内补丸佐之，则阴阳调和，而胎气自安矣。

胎前用达生散论

朱丹溪曰：世之难产者，往往见于郁闷安佚之人，富贵豢养之家。若贫贱辛苦者，无有也。方书止有瘦胎饮一论，其方为湖阳公主设也，实非极至之言。彼湖阳公主，奉养太过，其气必实，耗其气，使之和平，故易产。此南山道士进瘦胎、枳壳散，抑阳降气，为众方之冠，温隐居加木香、当归佐之。若形肥人，知其气必虚，久坐知其气不运，而气愈弱，儿在胞胎，因母气不能自运，故难

产。当补其母之气，则儿健易产矣。遂于《大全方》紫苏饮，加参、术补气药，随母形色禀性，参时加减，名曰达生散，人参、白术、白芍、当归、腹皮、紫苏、陈皮、甘草，加枳壳、砂仁。

慎斋按：以上五条，序胎前用方之大略也。胎前用药，清热养血为主。而清热养血之后，唯以补脾为要，此培后天元气之本也。若养葵则不用芩、术，而以地黄饮加杜、续以补肾。夫胎系于肾，肾固则胎自安，此补脾不如补肾之要妙也。许学士内补丸已启其端，赵氏从而发明之，可谓扶安胎之秘旨矣。

胎前调理之法

《女科集略》曰：女之肾脏系于胎，是母之真气，子所赖也。受妊之后，宜令镇静，则血气安和。须内达七情，外薄五味，大冷大热之物，皆在所禁。使雾露风邪，不得乘间而入。亦不得交合阴阳，触动欲火。务谨节饮食，若食兔缺唇，食犬无声，食杂鱼致疮癣。心气大惊而癫疾，肾气不足而解颅，脾气不和而羸瘦，心气虚乏而神不足。儿从母气，不可不慎也。苟无胎动胎痛，泻痢风寒外邪，不可轻易服药。

孕妇起居所忌

《便产须知》曰：勿乱服药，勿过饮酒，勿妄针灸，勿向非常地便，勿举重登高涉险，勿恣欲行房。心有大惊，犯之难产，子必癫痫。勿多睡卧，时时行步。勿劳力过度，使肾气不足，生子解颅。衣毋太温，食毋太饱。若脾胃不和，荣卫虚怯，子必羸瘦多病。如犯修造动土，犯其土气，令子破形殒命。刀犯者形必伤，泥犯者窍必塞，打击者色青暗，系缚者相拘挛。若有此等，验如影响，切宜避之。

慎斋按：以上二条，序胎前调理避忌之法也。

经论怀子无邪脉

《素问》曰：何以知怀子之且生？曰：身有病而无邪脉也。

马玄台曰：身有病者，经闭也。无邪脉者，尺中之脉和匀也。妇人怀妊一月，则阴阳之精尚未变化。二月则精气正变，其气熏蒸，冲胃而为恶阻。至三四月，则恶阻少止，脉甚滑疾。盖男女正成形质，其气尚未定也。至五六月已后，形质已定，男女既分。及八九十月，其脉平和如无娠。然非医者深明脉理，病者确明其故，难以诊而知也。《脉诀》云：滑疾不散胎三月，但疾不散五月母。至六月后，则疾速亦无矣。然亦有始终洪数不变者，其气甚盛，不可一例拘也。故帝问怀子将生者，何以知之，正此意耳。伯言身虽有经闭之病，而无经闭之脉。彼经闭之脉，尺中来而断绝，或按之全无者是也。此则脉体平和匀静，乃无病脉，至八月九月十月而然，正怀于将生之候耳。

经论妊脉属足少阴一经

《素何》曰：妇人足少阴脉动甚者，妊子也。又曰：阴搏阳别，谓之有子。

王太仆曰：足少阴，肾脉也。动者，如豆厥厥动摇也。阴，尺中也。搏，谓搏触于手也。尺脉搏击，与寸脉殊别，则有孕之兆也。

经论妊脉尺中按之不绝

《难经》曰：女子以肾系胞，三部浮沉正等，按之不绝者，有妊也。

王叔和曰：妇人三部脉浮沉，以手按之不绝者，孕子也。妊娠初时，寸微，呼吸五至而尺数也。脉滑疾，重以手按之散者，胎已三月也。脉重手按之不散，但疾不滑者，五月也。此即阴搏阳别之义。言尺脉滑数，寸脉微小，而尺与寸脉别者，孕脉也。

诊胎脉属心肾二经

齐仲甫曰：经云，阴搏阳别，谓之有子。此乃气血调和，阳施阴化也。叔和云：脉平而虚，乳子法也。诊其脉，左少阴动甚者，妊子也。夫手少阴，心脉也，心主血。足少阴，肾脉也，肾为胞门子户。大抵少阴经左手属心，左足属肾。下主乎尺，尺中按之不绝者，有妊也。

诊胎脉在手足少阴二经

潘硕甫曰：女人以血为本，血旺是为本足，气旺则血反衰。故女人以血胜气者为贵。少阴动甚者，手少阴之脉也。心主血，动甚则血旺，血旺易胎，故云有子，即《内经》所谓妇人手少阴脉动甚，妊子是也。尺脉者，左尺足少阴肾之脉也。肾为天一之水，主子宫以系胞，孕胎之根蒂也。滑利则不枯涩，有替替含物之象，故妊娠。即经所谓阴搏阳别，谓之有子。叔和所谓尺中之脉，按之不绝，同义也。即此滑利之脉，应指疾而不散。滑为血液，疾而不散，乃血液敛结之象，是为有胎三月。若但疾而不散，是从虚渐实，血液坚凝，转成形体，故不滑，此妊娠五月之脉也。

胎孕脉诀

崔紫虚曰：阴搏于下，阳别于上，血气和调，有子之象。手之少阴，其脉动甚，尺按不绝，此为有孕。少阴属心，心主血脉。肾为胞门，脉应于尺。或寸脉微，关滑尺数，往来流利，如雀之啄。或诊三部，浮沉一止，或平而虚。当问月水，妇人有病而无邪脉，此孕非病，所以不月。

慎斋按：以上六条，序妇人胎孕之脉也。《内经·平人气象论》云：妇人手少阴脉动甚者，妊子。又《阴阳别论》云：阴搏阳别，谓之有子。此二语原兼心与肾二经并论也。手少阴主心，心生血，妇人以血养胎，故血旺则易孕。始受胎时，精与血凝聚不散，故心脉厥厥而动也。阴搏者，太仆注，尺中也。尺脉搏手，搏即动甚之义。足少阴属肾，肾主精，女子以系胞，而子宫在焉。精射胞门，则子宫之气，裹血绲绲，故应手而搏击于阳脉之上。《内经》原两明其义，自全元起改手少阴为足少阴，后人遂有议太仆注手少阴之误。有从全本不从王本之说，岂知王注阴搏之阴谓尺中，则知心与肾原兼诊之，而妊孕可推也。予初读《内经》，颇惑此句为难解，必经文两句合看始明。今得仲甫、硕甫二论，更了如也，因附辨之。

辨男女以左右之脉

王叔和曰：妇人妊娠四月，欲知男女法，左疾为男，右疾为女，俱疾为生二子。又曰：左脉尺内偏大为男，右尺内偏大为女，左右俱大产二子。大者，如实状也。即阴搏阳别之义。尺脉实大，与寸脉殊别，但分男左女右也。又曰：左脉沉实为男，右脉浮大为女。

辨男女以左右阴阳虚实论

张景岳曰：以左右分阴阳，则左为阳右为阴。以尺寸分阴阳，则寸为阳尺为阴。以脉体分阴阳，则鼓搏沉实为阳，虚弱浮涩为阴。诸阳实者为男，诸阴虚者为女，庶为一定之论。

辨男女以左右气血论

娄全善曰：按丹溪云，男受胎在左子宫，女受胎在右子宫。推之于脉，其义亦然。如胎在左，则气血护胎而盛于左，故脉亦从之而左疾，为男。左大为男也。胎在右，则气血护胎而盛于右，故脉亦从之而右疾，为女。右大为女也。亦犹经云：阴搏阳别，谓之有子。言受胎处，脐腹之下，气血护胎，而盛于下。故阴之尺脉，鼓搏有力，与阳之寸脉殊别也。

慎斋按：《难经》云：肾有两，左为肾，

右为命门。命门，男子藏精，女子系胞。则知命门即胞门，而子宫属焉。肾有左右之分，而子宫无左右之分。今丹溪云，男受胎在左子宫，女受胎在右子宫，是妇人胞门有两子宫矣。甚为凿空无据。今全善以丹溪之言为证，但云气血护胎而盛子左，则为男；气血护胎而盛于右，则为女，乃可。若云盛于左子宫为男，盛于右子宫为女，犹为附会之谬。假如妇人有品胎骈胎，则子宫亦有累累耶。

辨男女以左右之疾胜

潘硕甫曰：《举要》云：男女之别，以左右取。左疾为男，右疾为女。沉实在左，浮大在右，左男右女，可以预剖。盖左脉疾胜于右，是为男孕。以男属阳居左，胎气盅于阳，故左胜。右脉疾胜于左，是为女孕。以女属阴居右，胎气盅于阴，故右胜也。又更视其腹如箕为女胎，腹如釜为男胎。盖男女孕于胞中，女面母腹，则足膝抵腹，下大上小，故如箕。男面背母，则背脊抵腹，其形正员，故如釜也。又胎有男女，则成有迟速。男动在三月，阳性早也。女动在五月，阴性迟也。

辨刘王论男女脉法之同

杨仁斋曰：叔和以左手太阳浮大为男，右手太阴沉细为女。元宾以右手浮大为女，左手沉实为男。较是二说，不无牴牾。然即《脉经》本旨而详之，又有若异而实同者。经曰：左手沉实为男，右手浮大为女。又曰：左右手俱浮大者，生二女；俱沉实者，生二男。元宾之所主者此也。经曰：左手尺中浮大者男，右手尺中沉细者女。又曰：尺脉俱浮产二男，尺脉俱沉产二女。叔和之所主者此也。何者沉细之说与沉实之义不同，右尺浮大之说与右手浮大亦异？欲知男女之法，大抵沉实者为男，沉细者为女。右尺浮大者，固知其女；左尺浮大者，大抵皆男。沉细为女，沉实为男，即所谓诸阳为男，诸阴为女是也。左尺浮大为男，右尺浮大为女，即所谓左疾为男，右疾为女是也。元宾言其详，盖合左右两手而别阴阳。叔和言其略，特不过《脉经》论尺脉之义，尚何有异同之辨哉。

慎斋按：以上五条，序辨男女之脉也。男女之脉，自叔和而下，纷纷聚讼，益为支离。即明如丹溪，而以左右子宫分男女，更有以左大顺男，右大顺女。此左右以医者为言，犹属不解。前条唯景岳、硕甫二说，为得其正也。

女科经纶　卷三

携李　萧　壎赓六纂著
鄞县　曹赤电炳章阅校

胎前证　上

妊娠恶阻有绝之之法

《金匮要略》曰：妇人得平脉，阴脉小弱，其人渴，不能食，无寒热，名妊娠。于法六十日当有此证。设有医者治逆，却一月，加吐下者，则绝之。

娄全善曰：恶阻者，谓呕吐恶心，头眩恶食，择食是也。绝之者，谓绝止医治，候其自安也。予尝治一二妊妇恶阻，病呕吐，愈治愈逆。因思仲景绝之之旨，遂停药月余，自安。真大哉，圣人之言也。

徐忠可曰：期有未满六十日，则胎未成，又加吐利。因医误治，则脾胃实有受伤处，但当断绝病根为主，不得泥安胎之说，而狐疑致误也，故曰绝之。

妊娠恶阻属经血闭塞脏气不宣

巢元方曰：妊娠恶阻者，心中愦闷，头眩，四肢懈惰，恶闻食气，欲啖咸酸果实，多睡少起，世言恶食，又云恶阻是也。三四月以上，不自胜举。此由妇人本元虚羸，血气不足，肾气又弱，兼当风饮冷，心下有痰水挟之。娠后经血闭塞，水渍于脏，脏气不宣，故心烦愦闷，气逆呕吐。血脉不通，经络瘀涩，则四肢沉重。挟风则头目眩，又不知患之所在。脉理和平，即是有胎也。

妊娠恶阻属五味不化中气壅实

《圣济总录》曰：妇人所食谷味，化为血气，下为月水。凡妊娠之初，月水乍聚，一月为膜，二月为胚，三月为胎，成则男女上食于母，口如鸟。在膜胚之时，血气未用，五味不化，中气壅实，所以脾胃不思谷味，闻见于物，即恶心有阻也。

妊娠恶阻属气血积聚内郁攻胃

朱丹溪曰：凡孕二三月间，呕逆不食，或心烦闷。此乃气血积聚，以养胎元，精血内郁，秽腐之气上攻于胃，是以呕逆不能纳食。血既养胎，心失所荣，是以心虚烦闷。法当调血散郁，用参、术、甘草补中气，橘红、紫苏、木香、生姜，散郁气，茯苓、麦冬、黄芩、竹茹，清热解烦，名参橘饮。

妊娠恶阻属胃气虚弱中脘停痰

陈良甫曰：妊娠恶阻病，《产宝》谓之子病，巢氏《病源》谓之恶阻。由胃气怯弱，中脘停痰，脉息和顺，但肢体沉重，头眩，择食，唯嗜酸咸。甚者寒热呕吐，胸膈烦闷，半夏茯苓丸主之。

妊娠恶阻属痰饮血壅停滞肝经

戴复庵曰：恶阻者，妇人有孕，恶心，阻其饮食是也。胎前恶阻，见食呕吐，喜酸物，多卧少起，俗名病鬼。盖其人宿有痰饮，血壅遏而不行，故饮随气上，停滞肝经。肝之味酸，则必喜啖酸物，金克木，以辛胜之，小

半夏茯苓汤或二陈汤。

妊娠呕吐属于寒

《金匮要略》曰：妊娠吐呕不止，干姜人参半夏丸主之。

徐忠可曰：诸呕吐酸，皆属于火。此言胃气不清，暂作呕吐也。若妊娠呕吐不止，则因寒而吐，上出为呕，不止则虚矣。故以半夏治呕，干姜治寒，人参补虚，而以生姜糊、半夏，以下其所逆之气。

妊娠呕吐恶阻勿作寒治

《大全》曰：妇人经候不调，或不行，身无病似病，脉滑大，而六脉俱匀，是孕妇脉也。精神如故，恶闻食气，或但嗜一物，或大吐，或时吐清水，此名恶阻，勿作寒病治之，宜服人参、白术、甘草、香附、乌药、丁香、生姜、橘红，保生汤。

按：妊娠呕吐，《金匮》主于寒，《大全》论勿作寒治，是矣。其用药则多辛热，何也？

妊娠呕吐属肝挟冲脉之火冲上

罗太无曰：有孕妇三月，呕吐痰并饮食，每寅卯时作，作时觉少腹有气上冲，然后膈满而吐，此肝脉挟冲脉之火冲上也。用沉香磨水化抱龙丸，一服膈宽，气不上，吐止。

妊娠呕吐属怒气伤肝

朱丹溪曰：有妊二月，呕吐眩晕，脉之左弦而弱，此恶阻。因怒气所激，肝气伤，又挟胎气上逆，参、术补之，大非所宜，以茯苓半夏汤下抑青丸。

妊娠呕吐恶阻属少阳之火上冲胃口

赵养葵曰：恶阻多在三个月之时，相火化胎之候，壮火食气，上冲胃口，食入即呕吐，少阴肾水既养胎，少阴之火益炽，须用清肝滋肾汤，即六味饮加柴胡、白芍。先用逍遥散止呕，再用调经滋肾汤加杜、续。呕甚者，加川连、吴茱妙。

胎前恶阻呕吐用半夏论

陈良甫曰：《千金方》有半夏茯苓汤、茯苓丸，专治恶阻。此二方，比来少有服者，以半夏能动胎，胎初结，虑其辛燥易散故也。须姜汁炒，以制毒。凡恶阻，非半夏不能止，是有故无殒也。

娄全善曰：《大全方》谓半夏动胎不用，今观仲景用人参半夏干姜丸，罗谦甫用半夏茯苓汤，朱丹溪用二陈加减，并治胎前恶阻，痰逆呕吐，心烦，头眩，恶食，俱效，独不知此乎？予治恶阻，用之未尝动胎。正经云有故无殒是也。

薛立斋曰：半夏乃健脾气，化痰滞主药。脾胃虚弱呕吐，或痰涎壅滞，饮食少，胎不安，必用半夏茯苓汤，倍加白术，安胎健脾，予尝用验也。

恶阻呕吐用药大法

薛立斋曰：妊娠若饮食不甘，或欲呕吐，用六君子加紫苏、枳壳。若恶阻，呕吐，头眩，体倦，用参橘饮，未应，用六君子汤。若恶阻，呕吐不食，亦用参橘散。或饮食停滞，腹胀呕吐，此是脾胃虚弱，不能消化，用六君子汤不应，用平胃散加参、苓。

慎斋按：以上一十三条，序胎前有恶阻呕吐之证也。凡妇人妊孕，其始证先见于恶阻。而恶阻，自《金匮》有绝之法而下，病机盖非一端。巢元方以下，主于气凝血聚。陈良甫以下，主于停痰积饮。若仲景《金匮》以寒治，太无、养葵作火论，于恶阻病机，可谓详悉。但胎前无寒，产后无热，此常法也。故恶阻呕吐，大抵寒者少，热者多。总属血壅胎元，脏气不能宣通，停痰积饮，郁热壅滞，变而为火，有热无寒，致生诸证。故丹溪、立斋论治，每以枳壳、紫苏、苏梗、木香、砂仁，为降气顺气之法，所谓胎前须顺

气者此也。

妊娠子烦属君相二火

陈良甫曰：妊娠烦闷者，以四月受少阴君火以养精，六月受少阳相火以养气。若母心惊胆虚，多有是证。

李太素曰：烦者，心中烦乱不安也。由受胎后，血热于心，心气不清，故人郁闷撩乱不宁。因妊娠而烦，故曰子烦，非子在腹中烦也。古云：四月受少阴君火以养精，六月受少阳相火以养气，故烦。夫烦多属火，今胎受君相之火，岂有母烦之理。况母既以二火养胎，则火泻矣，又何烦之有？若曰母虚而烦，则当每月皆然，何独于四月六月而虚且烦，亦不拘于四月六月也，似说不通。

妊娠子烦属于热

齐仲甫曰：妊娠烦闷有四证，有心中烦、胸中烦，有子烦，诸属于热。若脏虚而热气乘心，令人烦者，名虚烦。若积痰饮，呕吐痰沫者，名胸中烦。或血积停饮，寒热相抟，致胎气不安，谓子烦，用犀角散、竹沥汤之类。

妊娠子烦属心肺虚热痰积于胸

单养贤曰：是心肺虚热，或痰积于胸。若三月而烦者，但热而已。若痰饮而烦者，吐涎恶食，烦躁不安也。大凡妊娠，既停痰积饮，又寒热相抟，气郁不舒，或烦躁，或呕吐涎沫，剧则胎动不安，均为子烦也。

妊娠子烦属胎元壅郁热气上冲

朱丹溪曰：子烦由胎元壅郁，热气上冲。以致烦闷，法当清热疏郁，以安胎，犀角散主之。

妊娠子烦分证用药之法

薛立斋曰：前证若因内热，用竹叶汤。气滞用紫苏饮。痰滞用二陈加条芩、枳壳。气郁用分气饮加川芎。脾胃虚弱，用六君子，加紫苏、山栀。

妊娠烦躁属热乘心脾津液枯燥

陈良甫曰：妊娠烦躁口干者，足太阴脾经，其气通于口，手少阴心经，其气通于舌，若脏腑气虚，荣卫不和，致阴阳隔绝，热乘心脾，津液枯燥，故心烦口燥。与子烦大同小异，宜知母丸。

妊娠烦躁口干用药之法

薛立斋曰：前证若胃经实火，用竹叶石膏汤；若胃经虚热，用人参黄芪散；若胃经气虚，用补中汤；若肺经虚热，用紫苏饮；若肝经火动，用加味逍遥散；若脾气郁结，用加味归脾汤；若肾经火动，用加味地黄丸。

妊娠暴渴为血凝病

《大全》曰：有孕妇暴渴，唯饮五味汁。名医耿隅诊其脉曰：此血欲凝，非疾也。已而果孕。然古方有血欲凝而渴饮五味之证，不可不知。

慎斋按：以上九条，序胎前有子烦、烦躁、口干、血渴之证也。妊娠烦躁，本属肺肾二经有火。仲景云：火入于肺则烦，入于肾则躁。胎系于肾，肾水养其胎元。则元气弱，不足以滋肾中之火，火上烁肺，肺受火刑，变为烦躁，此金亏水涸之候。法当滋其化源，清金保肺，壮水滋肾为主。良甫以君相二火论于烦，《产宝》以停痰积饮论子烦，未悉病机之要。若丹溪，以子烦为气血壅聚胎元，热气上冲为病，亦是大概言之耳。

妊娠子悬属胎热上冲

陈良甫曰：妊娠至四五月来，君相二火养胎。平素有热，故胎热气逆，上凑心胸，胀满痞闷，名曰子悬。法当补气血，疏壅滞，用严氏紫苏饮，加山栀、条芩之类。紫苏、陈皮和气，大腹敛气宽中，芎、归、参、芍养

血补气，甘草缓急，加生姜、葱白，名产宝方。

妊娠子悬属浊气举胎上凑

何松庵曰：《本事方》云，紫苏饮治妊娠胎气不和，怀胎近上，胀满疼痛，名子悬。子悬者，浊气举胎上凑也。胎热气逆，心胃胀满，此证挟气者居多。疏气舒郁，非紫苏、腹皮、川芎、陈皮，无以流气；非归、芍，无以养血，气血既利，而胎自降。然邪之所凑，其人必虚，故以人参、甘草补之。

妊娠子悬属寒冷与气相争

陈良甫曰：妊娠心腹胀满者，由腹内素有寒气，致令停饮，与气相争，故令心腹胀满也。

妊娠子悬属命门火衰腹寒就暖

赵养葵曰：有胎从心腹凑上者，名曰子悬。此命门火衰，胎在腹中寒冷，不得已，上就心火之温暖，须理中汤，不应，八味丸作汤。

慎斋按：以上四条，序胎前心腹胀满，有子悬之证也。胎气上逼心胸，正以气血壅郁胎元，郁久则热。故良甫主于胎热气逆，松庵主于浊气举胎，是以火热立论为当。若《大全》以寒气冷饮，养葵以命门火衰论子悬证，必以人之壮弱，脉之迟数为凭。如禀厚质壮，脉来洪数，而心腹胀满者，此子悬之属火热为病也。如脾胃素虚，脉来迟细，而心腹胀满者，此子悬之属虚寒为患也，则百不失一矣。

慎斋按：命门为男子藏精，女子系胞之所。胎孕受于命门，命门之火，即是元气养胎，故有日长之势。譬如果实，生于春而结于夏，夏月热盛，则果实渐长，至秋冬肃杀，则果实黄殒而落。胎在母腹，若命门火衰，势必堕殒，岂有上就心火而为子悬之证。至云不得已三字，尤属可嗤。若必以桂附八味丸治子悬，夫桂附为堕胎药，恐火未必益，而胎反可虞，明者辨之。

妊娠子满属胎中水血相抟

陈良甫曰：凡妊娠无使气极，若心静气和，则胎气安稳。若中风寒邪气，及有触犯，则随邪生病。如妊娠经血壅闭养胎，忽然虚肿，是胎中挟水，水血相抟。脾胃恶湿，主身之肌肉，湿溃气弱，则肌肉虚，水气流溢，故令身肿满。然其由，或因泄泻下痢，脏腑虚滑，耗损脾胃。或因寒热疟疾，烦渴引饮太过，湿溃脾胃，皆使头面手足浮肿。然水清于胞，儿未成形，则胎多损坏。

妊娠子满属脾虚停水

齐仲甫曰：妊娠以经血养胎，或挟水气，水血相抟，以致体肿。皆由脾胃虚，而脏腑之间，宿有停水所挟，谓之子满。若水停不去，浸渍其胎，则令胎坏。如脉浮腹满兼喘者，胎未坏也。

妊娠浮肿属脾胃气虚经血壅闭

《圣济总录》曰：脾候肌肉，土气和则能制水，水自传化，无有停积。若妊娠脾胃气虚，经血壅闭，则水饮不化，湿气淫溢，外攻形体，内注胞胎。怀妊之始，肿满必伤胎气，如临月而脚微肿，利其小便，病自愈。

妊娠子满属脾虚有湿清浊不分

何松庵曰：妊娠三月后，肿满如水气者，俗呼为琉璃胎是也。古方一主子湿，大率脾虚者多。脾虚不运，则清浊不分，须以补脾兼分利。若夜肿日消，是血虚，宜健脾兼养血主之。

妊娠胎水属胞中蓄水

陈良甫曰：妇人胎孕至五六个月，腹大异常，胸腹胀满，手足面目浮肿，气逆不安，此由胞中蓄水，名曰胎水。不早治，生子手

足软短有疾，或胎死腹中，用《千金》鲤鱼汤治其水。

妊娠胎水属气壅成湿

陈良甫曰：胎气壅塞成湿，致身体、胁腹浮肿，喘急气促，小便涩。法当疏壅气，行水湿，泽泻散主之。

《济阴纲目》按：子满在五六月以后，比子气与子肿不同。盖胎大则腹满，满则气浮，遍身肿，邪无所挟，但一泻气利水则愈。

妊娠有水气

《金匮要略》曰：妊娠有水气，身重，小便不利，洒淅恶寒，起即头眩，葵子茯苓散主之。

徐忠可曰：有水气者，虽未大肿胀，经脉中之水道已不利，卫气挟水，不能条畅，则周身之气为水滞，故身重。水已通调而顺行，逆则小便不利矣。恶寒者，卫气不行也。头眩者，内有水气，厥阳之火逆阴气而上蒸，则所见皆眩矣。

妊娠浮肿胀满分证用药之法

薛立斋曰：前证若胸满腹胀，小便不通，遍身浮肿，《千金》鲤鱼汤。脾胃虚弱，佐以四君子。若面目虚浮，肢体如水气，全生白术散，未应，六君子汤。若脾虚湿热，下部作肿，补中汤加茯苓。若饮食失节，呕吐泄泻，六君子汤。若腿足发肿，喘闷不宁，或指缝出水，天仙藤散。若脾肺气滞，加味归脾汤，佐加味逍遥散。

慎斋按：以上八条，序胎前肿胀有子满之证也。子满有水血相持，有停水受湿，有经血壅闭，有清浊不分。总因脾土虚，不能制水所致。故立斋治法，不外健脾渗湿，顺气安胎为主。若《济阴》云，但一泻气利水则愈，此谬论也。必兼立斋用药，乃为求本之要。至良甫以下三条，虽有胎水之名，其证实与子满异名同证也。

妊娠脚肿名子气属冲任有血风

《产孕集》曰：妊娠自三月成胎后，两足自脚面渐肿，行步艰难，以至喘闷，饮食不美，似水气状，脚指间有黄水出者，谓之子气，直至分娩方消。此由妇人素有风气，或冲任经有血风，未可妄投汤药。亦虑将产之际，有不测之忧，故不可不治于未产之前也。

妊娠脚肿属风寒湿冷

陈无择曰：凡妇人宿有风寒湿冷，妊娠多脚肿，俗呼为皱脚。

妊娠脚肿属脾衰血化成水

陈良甫曰：妊娠两脚浮肿，名曰脆脚。因脾衰不能制水，血化成水所致，全生白术散主之。

妊娠胫肿属中气壅郁

朱丹溪曰：妊娠两足胫肿至膝，甚则足指间出水。此由中气聚养胎元，壅郁不得升发，法当疏郁滞，天仙藤散主之。

妊娠脚肿属脾经养胎病

何松庵曰：孕妇六七月间，两足浮肿，足太阴脾经养胎也。脾主四肢，此时胎已坠下，故肿见于两足，分娩后即愈。

妊娠脚肿不可作水治伤真气

齐仲甫曰：妊娠脚肿，非水气比。至八九月，胫及腿俱肿，不可以水病治之，反伤真气。有此者，必易产，因胞脏中水血俱多，不致燥胎故也。若初妊即肿者，是水气过多，儿未成体，则胎必坏。

妊娠脚肿主男胎之验

《名医录》曰：宋少主与徐文伯微行，学针法。文伯见一妊妇足肿不能行，少主脉之曰：此女形也。文伯诊之曰：此男胎也，在

左则胎黑色。少主怒，欲破之，文伯恻然曰：臣请针之。胎遂堕，男形而色黑。此妊娠足肿之说也。

《济阴纲目》按：子肿与子气相类，然子气在下体，子肿在头面。若子满，大都在五六月已后，比子气与子肿不同。盖胎大则腹满，满则气浮遍身浮肿也。

慎斋按：以上九条，序胎前有子气脚肿之证也。妊娠有遍身、胸腹头面、四肢浮肿者，曰子满。有止两足胫肿，渐至腿膝者，曰子气。子气即子肿也。要皆本于脾虚，中气不运，以致水谷湿热之气，浸渍肌肉，流溢四肢。此《大全》以下三论，为见本之治。若《产乳》、《三因》，是兼外邪论矣。

妊娠腹痛属子脏寒

《金匮要略》曰：妇人怀妊六七月，脉弦，发热，其胎愈胀，腹痛恶寒者，少腹如扇。所以然者，子脏开故也，当以附子汤温其脏。

徐忠可曰：六七月胃肺养胎，而气为寒所滞，故胎愈胀。寒在内，腹痛恶寒。然恶寒有属表者，此连腹痛，则知寒伤内矣。少腹如扇，阵阵作冷，若或扇之，此状恶寒之异也。且独在少腹，因子脏受寒不能合，故少腹独甚。开者，不敛也。子脏即子宫。附子能人肾，温下焦，故宜附子汤温其经。

妊娠心腹痛属宿冷风寒

《大全》曰：妊娠心腹痛，或宿有冷疼，或新触风寒，皆因脏虚而致发动也。邪正相击，而并于气，随气上下，上冲于心则心痛，下攻于腹则腹痛。妊娠痛，邪正二气交攻于内。若不差，痛冲胞胎，必致动胎，甚则伤堕。

妊娠心腹痛属痰饮与脏气相抟

陈良甫曰：妊娠心腹疼痛，多是风寒湿冷痰饮，与脏气相击，故令腹痛攻不已，则致胎动。

妊娠胸腹刺痛属忿怒忧思

《大全》曰：妊娠四五月后，每常胸腹间气刺满痛，或肠鸣，以致呕逆减食。此由忿怒忧思过度，饮食失节所致。蔡元度宠人有子，夫人怒欲逐之，遂成此病，医官王师复处以木香散，莪术、木香、丁香、甘草，盐汤下，三服而愈。

方约之按：此方所言，妇人忿怒忧思过度，以致胸腹间气刺满痛，此言良是。盖妇人上有舅姑丈夫，事触物忤，不能自决，忧思忿怒，沉郁于中。故丹溪云：气郁便是火，火载胎上，荣卫不通，则胸腹间胀满痛作矣。

慎斋按：以上四条，序胎前腹痛，有风寒客邪，痰饮七情，为有余之病也。

妊娠腹痛属胞阻

《金匮要略》曰：假令妊娠腹中痛，为胞阻，胶艾汤主之。

徐忠可按：胞阻者，阻其欲行之血，而气不相顺也，四物汤养阴补血。血妄行，必挟风而为痰浊。胶以骤皮为主，能去风。以济水煎成，能澄浊。艾性温而善行，能导血归经。甘草和之，使四物不偏于阴，此三味之力也。

妊娠腹痛属脾胃气虚

薛立斋曰：胎或作胀，或腹作痛，此是脾胃气虚，不能承载，用安胎饮加升麻、白术，不应，用补中汤。

妊娠腹痛属血虚

《金匮要略》曰：妇人怀胎，腹中疗痛，当归芍药散主之。又，妇人腹中痛，小建中汤主之。

妊娠胎痛用地黄当归汤倍熟地

刘宗厚曰：洁古地黄当归汤，治妇人有孕胎痛。胎痛，丹溪以血虚治之，故四物去

川芎，倍加熟地，此心法也。

薛立斋按：妊娠腹中不时作痛，或小腹重坠，名胎痛，用当归地黄汤，即内补丸，不应，加参、术、陈皮，或因脾气虚，四君加归、地。

慎斋按：以上四条，序胎前腹痛，有气阻、气虚、血虚，为不足病也。胎有脾胃气虚而腹痛者，用补气调气之法。有阴亏血虚而腹痛者，用补血温经之法。与前条风寒痰饮之证迥别，临证审之。

妊娠顿仆胎伤腹痛用药之法

薛立斋曰：顿仆胎动，腹痛下血，用胶艾汤，未应，用八珍汤加胶、艾。若顿仆胎伤，下血腹痛，用佛手散。未应，八珍汤下知母丸。

胎动不安腹痛辨男女生死之法

王叔和曰：妇人有胎腹痛，其人不安。若胎病不动，欲知生死，令人摸之，如覆杯者男，如肘颈参差起者女也。冷者为死，温者为生。

慎斋按：以上二条，序胎前腹痛，有顿仆伤胎而胎动不安，致有腹痛之证，此非不内外因。一辨用药治法，一辨生死之法也。

妊娠心痛属风邪痰饮

《大全》曰：妊娠心痛，乃风邪痰饮交结，伤心支络，乍安乍作。若伤子脏，则胎动而血下。

慎斋按：以上一条，序胎前有心痛之证也。心痛不止，风邪痰饮，为外感有余病。妊娠心气虚而血少，亦足致此。《大全》论，不过举其一端耳。

妊娠腰痛属风冷乘虚

《大全》曰：肾主腰足，因劳伤损动其经，虚则风冷乘之。腰痛不止，多动胎气。妇人肾以系胞，妊娠腰痛，甚则胎堕。故妊娠腰痛，最为紧要。若闪挫气不行腰痛者，通气散。肾虚者，青娥不老丸。总以固胎为主。

妊娠腰痛属血热血滞

汪石山曰：有妇人怀娠八月，尝病腰痛，不能转侧，大便燥结，医用人参等补剂，痛益加，用硝黄通利之药，燥结虽行，而痛如故。诊之脉稍洪近快，曰：此血热血滞也，宜四物加木香、乳、没、黄柏、火麻仁。五帖痛减，燥结润，复加发热面赤，或时恶寒，前方去乳、没，加柴、芩。二帖寒热除，而腰痛复作，此血已利矣，前方加人参，服之安。

妊娠腰痛有劳力房事之分

何松庵曰：腰者肾之府，足少阴之所留注。妊娠腰痛，多属劳力。盖胞系于肾，劳力任重，致伤胞系，则腰必痛，甚则胞系欲脱，多致小产。宜安胎为主，胎安而痛自愈。若素享安逸而腰痛，必房事不节，致伤胞系也。若脉缓，遇天阴，或久坐而痛者，湿热也。腰重如带物而冷者，寒湿也。脉大而痛不已者，肾虚也。脉涩而日轻夜重者，气血凝滞也。脉浮者，为风邪所乘。脉实者，闪挫也。若临月腰痛，胞欲脱肾，将产之候也。

妊娠腰痛分证用药之法

薛立斋曰：前证若外邪所伤，用独活寄生汤。劳伤血气，八珍汤加杜仲、砂仁、胶、艾。脾肾不足，前药内加白术、骨脂。气血郁滞，紫苏饮加枳、桔。肝火动，小柴胡汤加白术、枳壳、山栀。肝脾郁结，归脾汤加柴胡、枳壳。

慎斋按：以上四条，序胎前有腰痛之证也。妊娠腰痛，有外感有内伤。《大全》主于风冷，石山主于血滞，此客邪有余病也。

正宗以劳力房事论妊娠腰痛，则又悉病机之要矣。

妊娠小腹痛属风寒相抟

《大全》曰：妊娠小腹痛，由胞络虚，风寒相抟，痛甚亦令胎动。

慎斋按：以上一条，序胎前有小腹痛之证也。小腹为足厥阴肝经部分，是经或阴血不足，或郁怒气滞，皆足致小腹痛之证。况胎系于肾，肾肝同病。《大全》论风寒相抟，止就外邪一端言之耳。

妊娠经来为激经属阳微不足

王叔和曰：妇人月经下，但为微少，师脉之，反言有躯，其后审然，其脉何类？师曰：寸口脉，阴阳俱平，荣卫调和，按之则滑，浮之则轻，阳明少阴，各如经法，身反洒淅，不欲食，头痛心乱，呕吐，呼则微数，吸则不惊，阳多气溢，阴滑气盛，滑则多实，六经养成，所以月见。阴见阳精，汁凝胞散。散者损堕。设复阳盛，双妊二胎。今阳不足，故令激经也。

妊娠经来属血盛有余

娄全善曰：妊娠经来不多，饮食精神如故，六脉和缓，滑大无病者，血盛有余也。儿大能饮，自不来矣。

慎斋按：以上二条，序胎前经来，有有余不足之分也。胎前下血，则名漏胎。妊娠经来，则名激经。漏胎则无时而下，激经则有时而至。叔和主于阳微不足，全善主于血盛有余，当以人禀之强弱参之。

妊娠胎漏下血为癥病

《金匮要略》曰：妇人宿有癥病，经断未及三月，漏下不止，胎动在脐上者，为癥痼害。妊娠六月动者，前三月经水利时，胎也。下血者，后断三月衄也。所以血不止者，其癥不去故也。当下其癥，桂枝茯苓丸主之。

徐忠可曰：妇人行经时，遇冷则血留而为癥。癥者，有形可征。然癥病女人恒有，或不在子宫，则行经受胎，经断即是孕矣。未及三月，将三月也。既孕而见血，谓之漏下。未及三月，漏下不止，则养胎之血伤，故胎动。假使胎在脐下，则直欲落矣。今在脐上，是每月凑集之新血，因癥气相妨而为漏下，实非胎病，故曰癥痼害。痼者，宿疾也。害者，累之也。至六月胎动，此宜动之时，但较前三月，经水利时，胎动下血，则已断血，三月不行，复血不止，是前之漏下，新血去而癥反坚牢不去，故须下之为安。药用桂枝茯苓汤者，桂、芍，一阴一阳，茯苓、丹皮，一气一血，调其寒温，扶其正气；桃仁破恶血，消癥瘕，不嫌伤胎者，有病病当之也。且癥之初，必因于寒，桂能化气，消其本寒。癥之成，必挟湿热为窠囊，茯苓清湿气，丹皮清血热，芍药敛肝血而扶脾，使能统血，养正即所以去邪也。

妊娠胎漏下血属荣经有风

《产孕集》曰：有妊妇月信不绝，而胎不损，向产科熊宗古，答曰：妇人血盛气衰，其人必肥。既娠后，月信常来而胎不动。若便以漏胎治之，则胎必堕。若不作漏胎治，其胎未必堕。今推宗古之言，诚有旨也。巢氏云：妇人经闭不利，别无所苦，是谓有子。以经血蓄之养胎，壅为乳汁也。有子后，蓄以养胎矣，岂可复散动耶。所以然者，有妊而月信每至，亦未必因血盛也。妇人荣经有风，则经血喜动，以风胜故也。荣经既为风所胜，则所下者，非养胎之血。若作漏胎治，必服保养补胎药，胎本不损，强以药滋之，是实实也，其胎终堕宜矣。若医者知荣经有风之理，专以一药治风，经信可止，或不服药，胎亦无恙。然亦有胎本不固，因房室不节，先漏而后堕者，须作漏胎治，又不可不审也。

按：肝经有风，致血得风而流散不归经，以一味防风丸。若肝经有热，致血妄行，条芩炒焦为末，酒下。

妊娠胎漏下血属房室惊触劳力毒食

《产宝百问》曰：妊娠成形，胎息未实，或因房室惊触，劳力过度，伤动胞胎，或因食毒物，致令子宫虚滑，经血淋沥。若不急治，败血凑心，子母难保。

妊娠胎漏下血属冲任气虚

陈良甫曰：妊娠漏胎，谓妊娠数月，而经水时下也。此由冲任脉虚，不能约制手太阳少阴之经血故也。冲任之脉，为经络之海，起于胞内，手太阳小肠脉，手少阴心脉，二经相为表里，上为乳汁，下为月水。有娠之人，经水所以断者，壅之养胎也。冲任气虚，则胞内泄，不能制其经血，故月水时下，名胞漏，血尽则毙。又有因劳役喜怒，哀乐不节，饮食生冷，触冒风寒，遂致胎动，若母有宿疾，子脏为风冷所乘，气血失度，使胎不安，故令下血也。

妊娠胎漏下血属血热脾虚不摄

朱丹溪曰：胎漏多因于血热，然有气虚血少者，故《良方》论有下血服凉血药，而下血益甚，食少体倦，此脾气虚而不能摄血也。

妊娠胎漏黄水属肝脾病

《大全》曰：妊娠忽然下黄汁如胶，或如豆汁，胎动腹痛。

薛立斋按，前证肝脾湿热，用升阳除湿汤。若肝脾风热，加味逍遥散。肝脾郁怒，加味归脾汤。脾胃气虚，钱氏白术散。若脾气下陷，补中汤。肝经风热，防风黄芩丸。风入肠胃，用胃风汤。

妊娠胎漏下血分证用药之法

薛立斋曰：妊娠下血不止，名胎漏。血虚用二黄散，血去多用八珍汤，未应，用补中汤。若因事而动，下血，用枳壳汤加生熟地，未应，或作痛，更加当归。血不止，八珍汤加胶、艾。若因怒气，用小柴胡汤。若因风热，一味防风丸。若因血热，一味子芩丸。若脾气虚弱，六君子汤。中气下陷，补中汤。若气血盛而下血者，乃儿饮少也，不必服药。《千金方》治妊娠下血不止，名曰漏胎，血尽子死，方用生地八两，清酒捣汁，服之无时，能多服佳。

慎斋按：以上七条，序胎前有胎漏下血之证也。妊娠胎漏，《金匮》主于癥病痼害，巢氏主于荣经有风，是属有余客邪为病也。若《产宝》以下，《大全》、丹溪主于气虚血虚，是属为伤不足为病也。观立斋用药一条，已分有余不足证治矣。

妊娠尿血属热渗入脬

《大全》曰：娠妇劳伤经络，有热在内，热乘于血，血得热则流溢，渗入于脬，故令尿血。

胎漏下血与妊娠尿血不同之辨

李氏曰：胎漏自人门下血，尿血自尿门下血。妊娠尿血，属胞热者多，四物加山栀、发灰。又方，阿胶、熟地。

慎斋按：以上二条，序胎前尿血之证也。尿血易混于胎漏，得李氏一辨，已见分晰。但胎漏有无时频出，尿血是热入膀胱，本心经有火，移小肠，渗入膀胱，溺时则下，不溺则不下，即是小便溺血，但属妊娠为异耳。

妊娠小便淋属肾虚膀胱热

《产宝百问》曰：肾者作强之官，技巧出焉，与膀胱为表里，男子藏精，女子系胞。妊娠小便淋者，肾虚而膀胱有热也。肾虚不能制水，则小便数。客热膀胱，则水道涩而数，淋漓不宣，名曰子淋，地肤子汤主之。

妊娠小便涩宜养血导郁

陈良甫曰：孕妇小便涩少，由气血聚养

胎元，不及敷荣渗道，遂使膀胱郁热，法当养血以荣渗道，利小便以导郁热，用归、芍调血，人参补气，麦冬清肺，以滋肾水之源，滑石、通草利小便，以清郁滞，名安荣散。方内有滑石，乃重剂，恐致堕胎，若临月极妙。若在七八月前，宜去此味，加石斛、山栀尤稳。

妊娠子淋须分二证

万密斋曰：子淋之病，须分二证。一则妊母自病，一则子为母病。然妊母自病，又分二证：或服食辛热，因生内热者；或自汗自利，津液燥者。其子为母病，亦分二证：或胎气热壅者，或胎形迫塞者。证既不同，治亦有别。大抵热则清之，燥则润之，壅则通之，塞则行之，此治之之法也。

妊娠淋涩分经用药之法

薛立斋曰：妊娠小便涩少淋沥，用安荣散。若肝经湿热，用龙胆泻肝汤。若肝经虚热，用加味逍遥散。若服燥剂而小便频数，或不利，用生地、茯苓、牛膝、黄柏、知母、芎、归、甘草。或频数而色黄，用四物加知、柏、五味、麦冬、元参。若肺气虚而短少，用补中汤加山药、麦冬。若热结膀胱而不利，用五淋散。若脾肺燥不能生化，宜黄芩清肺饮。若膀胱阴虚，阳无所生，用滋肾丸。若膀胱阳虚，阴无所化，用肾气丸。

慎斋按：以上四条，序胎前有小便淋涩之证也。淋有五，丹溪一主于热，若妊娠淋病。《产宝》、《良方》以虚热郁热，属之膀胱。立斋则又推原肝经有湿热、虚热之别。正以膀胱为藏溺之器，而出溺之窍，则为足厥阴部分。故欲清膀胱之热者，必兼疏厥阴之气也。

经论转胞之证

《甲乙经》曰：胞转不得溺，少腹满，关元主之。又曰：小便难，水胀，溺出少，胞转，曲骨主之。

转胞病为胞系了戾宜利小便

《金匮要略》曰：妇人病，饮食如故，烦热不得卧，而反依息者何也？师曰：此名转胞，不得溺也。以胞系了戾，故致此病。但利小便则愈，宜肾气丸主之。

转胞病属饱食用力因合阴阳所致

《圣济总录》曰：胞受水液，气不转行，则小肠满胀，或饱食用力，或因合阴阳，令胞屈辟，小便不下，遂致胞转。其候水道不通，小腹急痛，烦闷汗出，气逆奔迫，甚至于死，名曰胞转，宜速治之。

转胞病属忍尿疾走饱食入房所致

杨仁斋曰：有胞系转戾不通，不可不辨。

胞转证候，脐下急痛，小便不通。凡强忍小便，或尿急疾走，或饱食忍尿，或忍尿入房，使水气上逆，气逼于胞，故屈戾而不得舒张也，胞落即殂。

转胞病属强忍房事所致当治气

王海藏曰：转胞小便，非小肠、膀胱、厥阴受病。盖因强忍房事，或过忍小便，以致此疾。非利药所能利，法当治其气则愈，以沉香木香汤主之。

转胞病属饱食气伤胎系

朱丹溪曰：有妇妊孕九月，转胞小便不出，下急，脚肿，不堪活。诊脉右涩，左稍和，此饱食气伤，胎系弱，不能自举而下坠，压着膀胱，偏在一边，气急为其所闭，故水窍不能出。转胞之病，大率如此。方用参、术、陈皮、炙草、归、芍、半夏、生姜，补血养血，气血既旺，胎系自举，则不下坠，方有安之理。顿饮之，控喉令吐药，如是四服，小便通，下皆黑水。再服腹皮、枳壳、砂仁、青葱二十剂，以防产而安。

转胞有四证所致宜举其胎

朱丹溪曰：转胞病，胎妇素受弱者，忧闷多者，性急躁者，食厚味者，大率有之。古方皆用滑利疏导药，鲜有效。因思胞为胎所压，展在一边，胞系了戾不通耳。胎若举起，悬在中央，胞系得疏，水道自行。然胎之坠下，必有其由也。

转胞病胖为热所迫

徐春甫曰：转胞病，由胖为热所迫，或忍小便，俱令水气迫于胞，屈辟不得充畅。外水应入不得入，内溲应出不得出，内外壅滞，胀满不通，故为转胖。其状小腹急痛，不得小便，甚者致死。

转胞病属血少气多有饮

朱丹溪曰：有妊妇患此，脉之两手似涩，重取则弦，此得之忧患。涩为血少气多，弦为有饮。血少则胞弱而不能自举，气多有饮，则中焦不清而隘胞，胞知所避而就下，故坠。以四物加参、术、半夏、陈皮、生姜，空心饮之，随以指探吐药汁，少顷又与，如是八帖而安。此法果为的确否，恐偶中耳。后有数人历效，未知果何如也。

转胞病属血气虚弱不能上载其胎

朱丹溪曰：有妊娠七八月，小便不通。百医不能利，转急胀，诊之脉细弱。此血气虚弱，不能上载其胎，故胎重坠下，压住膀胱下口，因此溺不得出。若服补药，升扶胎起，则自下，因药力未至，愈加急满，遂令老妇用香油涂手，自产户托起其胎，溺出如注，胀急顿解。以大剂参、芪服之，三日后，胎渐起，小便如故。

转胞病属中气虚怯宜用升举

赵养葵曰：有妊妇转胞，不得小便，由中气虚怯，不能举胎，胎压其胞，胞系了戾，小便不通。以补气加升举之药，令下窍通，补中汤加减是也。

转胞与子淋有痛不痛两证不同

《证治要诀》曰：转胞之说，诸论有之，以胎渐长，且近下，逼迫于胞，胞为所逼而侧，故名转胞。胞即膀胱也。然子淋与转胞相类。但小便频数，点滴而痛者，为子淋。频数出少不痛者，为转胞，间有微痛，终与子淋不同。并宜生料五积散、五苓散加阿胶。

滇斋按：以上十二条，序胎前有转胞之证也。妊娠转胞，《甲乙》、《金匮》二条是详转胞证候也。而病机所属，则有虚实之分。仁斋以下四条，主于忍尿、饱食、房事、肾热，此实邪为病也。丹溪以下三条，主于血少气虚，此不足为病也。胎前转胞，大抵因气虚血少，血少则胎无以养，气弱则胎不能举，因下坠而压于膀胱，胞为之转，而溺不出。备观丹溪所论，虽有忧闷、性躁、厚味诸因，其立方处治，自探吐、推托二法外，唯以补气补血为主。故立斋云：此证悉如丹溪治法为当。推广言之，又有脾肺气虚，不能下输膀胱者；有气热郁结膀胱，津液不利者；有金为火烁，脾土湿热甚而不利者，当详审施治也。

女科经纶　卷四

携李　萧　埙赓六纂著
鄞县　曹赤电炳章圈校

胎前证　下

经论妊娠舌喑属胞之络脉绝

《素问》曰：人有重身，九月而喑，此何为也？曰：胞之络脉绝也。曰：何以言之？曰：胞络者，系于肾，少阴之脉贯肾，系舌本，故不能言。曰：治之奈何？曰：无治也，当十月复。

妊娠不语名子喑不须药

《大全》曰：孕妇不语，非病也，间有如此者，不须服药，临产月，但服保生丸、四物汤之类，产下便语得，亦自然之理，非药之功也。医者不说与人，临月以寻常药服之，产后能语，以为医之功，岂其功也哉。博陵医之神者，曰郝翁士，有一妇人妊喑，嘿不能言。郝曰：儿胎大经壅，儿生经行则言矣，不可毒以药。

薛立斋曰：《内经》穷理之言，人有患此，当调摄以需之，不必惊畏而泛用药也。

妊娠子喑以降心火清肺金为治

张子和曰：妇人重身，九月而喑者，是脬之络脉不相接也。经曰无治，虽有此论，可煎玉烛散二两，放冷，入蜜少许，时呷之，则心火下降，而肺金自清，故能作声也。

妊娠子喑治当补心肾

马玄台曰：经云，妇人重身，九月而喑者，胞之络脉绝也，无治，当十月复。方论人之受孕，一月肝经养胎，二月胆经养胎，三月心经养胎、四月小肠经养胎，五月脾经养胎，六月胃经养胎，七月肺经养胎，八月大肠经养胎，九月肾经养胎，十月膀胱经养胎。先阴经而后阳经，始于木终于水，以五行之相生言也。然以理推之，手足十二经之脉，昼夜流行无间，无日无时而不共养胎气也，必无分经养胎之理。今曰九月而喑，时至九月，儿体已长，胞络、宫之络脉，系于肾经者，阻绝不通，故间有之。盖肾经之脉，下贯于肾，上系舌本，脉道阻绝，则不能言，故至十月分娩后自能言，不必治，治之当补心肾为宜。《大奇论》以胞精不足者，善言为死，不言为生。此可验九月而喑，非胞精之不足，故十月而复也。

张嶙璜按：喑谓有言而无声，故经曰不能言。此不能二字，非绝然不语之谓。凡人之音，生于喉咙，发于舌本。因胎气肥大，阻肾上行之经。以肾之脉，入肺中，循喉咙，系舌本。喉者，肺之部，肺主声音。其人切切私语，心虽有言，而人不能听，故曰喑。肺肾，子母之脏，故云不必治。若夫全解作不语，则为心病，以心主发声为言也，与子喑了不相干。若子和有降心火之说，玄台有补心肾之言。如果肾之脉络绝，而上干心，则其病不治，岂有产后自复之理乎。故经云胞之络脉绝，此绝字当作阻字解。

慎斋按：以上四条，序胎前有子喑之证也。妊娠不语，遵《内经》之旨，固无治法，故《大全》而下，后人不敢强立方论。独子

和以降心火为治，玄台以补心肾立法，则以脑之络络，属手足少阴二经故也。生产后不语，属败血之入心。中风舌喑，属痰涎之滞络。则胎前子喑，亦必有所感。更当详证参治，以补张马二公之未尽。若子喑用玉烛散，似属无理。

妊娠中风宜养血以安胎为主

薛立斋曰：按《机要》云，风本为热，热胜则风动，宜静胜其躁，是养血也。治法宜少汗，亦宜少下。多汗则虚卫，多下则损荣。虽有汗下之戒，而有中腑中脏之分。中腑者，多着四肢，则脉浮恶寒，拘急不仁。中脏者，多着九窍，则唇缓失音，耳聋鼻塞，目瞀便秘。中腑者宜汗，中脏者宜下，表里已和，宜治在经，当以大药养之。妊娠患之，亦当以此施治，佐安胎之药为主，勿过用治中风药。

妊娠风痉为子痫属体虚受风

陈良甫曰：妊娠体虚受风，伤足太阳经络，复遇风寒相抟，则口噤背强，甚则腰反张，名曰痉。其候冒闷不识人，须臾自醒，良久复作，谓之风痉，一名子痫。

子痫分诸证用药之法

薛立斋曰：前证若心肝风热，用钩藤汤。肝脾血虚，加味逍遥散。肝脾郁怒，加味归脾汤。气逆痰滞，紫苏饮。肝火风热，钩藤汤。脾郁痰滞，二陈加竹沥、姜汁。

妊娠瘛疭属心肝二经风火相炽

薛立斋曰：瘛者，筋脉急而缩。疭者，筋脉缓而伸。一伸一缩，手足相引搐搦，此证多属风。盖风主摇动。骆龙吉云：心主脉，肝主筋。心属火，肝属木。火主热，木主风。风火相炽，则为瘛疭。治法，若因风热，钩藤汤加栀、柴、芩、术，以平肝木，降心火，养气血；若风痰上涌，加半夏、南星、竹沥；若风邪急搐，加全蝎、天虫；若气血亏损，八珍汤加钩藤、山栀；若无力抽搐，戴眼反折，汗出如油者，肝绝也，不治。

慎斋按：以上四条，序胎前有中风证，而风痉、子痫、瘛疭，其类及也。中风证多因，治法亦不一。立斋以洁古一论，为妊娠中风，治法唯静胜其躁，养血为主，斯为疗胎前中风之要。夫胎之赖以养者血也，血虚则易于感邪，血行风自灭。丹溪于胎前，唯清热养血为主，立斋祖之，引《机要》一条为证论，诚有本矣。

慎斋再按：胎前中风，此正河间所谓将息失宜。肾水衰而心火旺，肝无所养，是非外中风邪，急当滋其化源，泻南补北，壮水制火，则肝木自平，胎气可安。恐养血犹属第二义也。

妊娠感寒咳嗽为子嗽

陈自明曰：肺内主气，外司皮毛，皮毛不密，寒邪乘之，入射于肺则咳嗽。夫五脏六腑俱受气于肺，各以其时感于寒而为病。秋则肺受之，冬则肾受之，春则肝受之，夏则心受之，长夏则脾受之。嗽不已则传于腑。妊娠而嗽，谓之子嗽。久嗽不已，则伤胎。

妊娠咳嗽属肺燥郁热

朱丹溪曰：胎前咳嗽，由津血聚养胎元，肺乏濡润，又兼郁火上炎所致。法当润肺为主，天冬汤主之。

妊娠咳嗽分证用药之法

薛立斋曰：前证若秋间风邪伤肺，金沸草散；夏间火邪克金，人参平肺散；冬间寒邪伤肺，人参败毒散；春间风邪伤肺，参苏饮。若脾肺气虚，六君子加归、芎、桔梗。肾火上炎，六味丸加五味。脾胃气虚，为风寒所伤，补中汤加桑皮、杏仁、桔梗。若血虚，四物加桑皮、杏仁，桔梗。盖肺属辛金，生于己土，嗽久不已，多因脾虚不能生肺气，腠理不密，致外邪复感。或因肺虚不能生水，致

阴火上炎。治法，当壮土金，生肾水，以安胎为要。

慎斋按：以上三条，序胎前有咳嗽证也。咳嗽属肺病，《大全》主于外感寒邪，丹溪主于内伤肺燥。若立斋则分四时所感，五脏均受，有风寒火之不同，外感内伤之各别。虽不专属胎前咳嗽论，而治法无殊，总兼安胎为主也。

妊娠伤寒以清热安胎为主

万密斋曰：妊娠伤寒，专以清热安胎为主。或汗或下，各随五脏表里所见脉证主治，勿犯胎气。

妊娠伤寒不可犯胎

吴蒙斋曰：妊娠伤寒，六经治例皆同，但要安胎为主，凡药中有犯胎者，不可用也。如藿香正气散、十味芎苏散、参苏饮、小柴胡汤之类，有半夏能犯胎，如用，须去之。如桂、附、硝、黄等药，皆动胎，凡用必须斟酌。大抵妊娠伤寒，合用汤剂，必加黄芩、白术，能安胎，或与此二味煎汤与之。如妊妇素禀弱者，药中四物汤佐之，不可缺。如用小柴胡，去半夏，加白术，合四物汤用之。可以保胎除热，其效如神。余仿此用之则妙矣。

慎斋按：白术、黄芩，为安胎之圣药，此丹溪之妙论也。丹溪以胎前须清热，故用黄芩。胎前须健脾燥湿，故用白术。若妊娠伤寒，为三阳经病，如头痛恶寒发热，白术可遽用之乎？而谓其保胎除热，是关门赶贼矣。

妊娠伤寒用六合汤法

《医垒元戎》曰：胎前病，唯当安胎顺气。若外感四气，内伤七情，以成他病，治法与男子无异，当子各证类中求之。但胎前病动胎之药，切须详审。当以四物汤、加减六合汤。

慎斋按：以上三条，序胎前有伤寒证也。伤寒六经传变，妇人与男子无殊。唯妊妇患此，其用药汗下温之中，当以保胎为主。其一切犯胎之药，当酌之，不可云有故无殒而毒药乱投，以致伤胎夭枉也。

妊娠疟疾寒热属气血虚损所致

《产宝百问》曰：疟者，寒热之疾，皆因于风寒也。风为阳邪，化气而为热。寒为阴邪，化气而为寒。阴阳相反，邪正更作。或阴并于阳，则阴实阳虚。若阳并于阴，则阳实阴虚。或先伤于风，后伤于寒，则先热后寒。或先伤于寒后伤于风，则先寒后热。作止有时，故名为疟。经云：夏伤于暑，秋必病疟。此因暑气所伤也。若妊娠寒热，皆因气血虚损，风寒乘之，致阴阳并挟，寒热互见。经云：阳微恶寒，阴弱发热。此皆虚之所致，不因暑气所作。若寒热不已，熏蒸其胎，胎必伤，人参羌活汤主之。

妊娠疟疾用药以安胎为主

何松庵曰：妊娠病疟，寒热俱作。气为阳，阳虚则恶寒。血为阴，阴虚则发热。盖怀胎最怕寒战，筋骨皆振，易动其胎。用药者，必以安胎为首务。盖脾胃虚弱，饮食停滞。或为暑邪所感，六君子加桔梗、苍术、藿香。若外邪多，饮食少，藿香正气散。外邪少，饮食多，人参养胃汤去半夏。热多寒少者，清脾饮去半夏。虚者用四兽饮、四君子加陈皮、半夏、草果、大枣。若久不愈，六君子为主，佐以安胎药。

妊娠即疟属肝虚血燥

赵养葵曰：有患胎疟者，一遇有胎，疟病即发。此人素有肝火，遇有孕则水养胎元，肝虚血燥，寒热往来，似疟非疟也。以逍遥散清肝火，养肝血，兼六味丸，以滋化源。

慎斋按：以上三条，序胎前有疟疾证也。妊娠疟疾，或有风寒暑热之邪，或有气血虚损之候，寒热交作，颔战股栗，百节振摇，堕胎最易。故古人用药，先以安胎为急。但邪

不去，则胎亦未必安。故安胎莫先于去邪。而去邪如莺心、草果、槟榔、厚朴、麻、桂、大黄，又未可浪投。唯发表之中兼补气，清热之中兼养血为当耳。

妊娠痢疾属饮食生冷

陈良甫曰：妊娠饮食生冷，脾胃不能克化，致令心腹疼痛。若血分病，则色赤；气分病则色白。血气俱病，则赤白相杂。若热乘大肠，血虚受患，则成血痢矣。

妊娠痢疾属相火上炎

壶仙翁曰：有妇妊娠，病痢不止，诊其脉虚而滑，两关若涩。此由胎气不和，相火上炎而有热，似痢实非痢也。用黄芩、白术以安胎，四物、生地以调血，数剂而安。

妊娠痢疾属下元气虚

薛立斋曰：有妇妊娠久痢，用消导理气之剂，腹内重坠，胎气不安。又用阿胶、艾叶之类不应，此腹重坠，下元气虚也。胎动不安，内热盛也。用补中汤而安，又用六君子汤全愈。

妊娠下利黄水属脾亏气陷

薛立斋曰：妊娠痢下黄水，乃脾土亏损，真气下陷也，当升补中气。若黄而兼青，乃肝木克脾土，宜平肝补脾。若黄而兼白，乃子令母虚，须补脾肺。若黄而兼黑，是水反侮土，必温补脾肾。若黄而兼赤，乃心母益子，但补中益气汤。若肠胃虚弱，风邪客之，用胃风汤。或脾气不安，急补脾胃自安。凡安胎之药，当临病制宜，不必拘用阿胶、艾叶之类。

慎斋按：以上四条，序胎前有痢疾证也。胎前痢，亦有暑邪湿热外感致病，不可专主饮食生冷为患。但妊娠痢疾，本于脾胃不和，因而气血受病。气伤则白，血伤则赤，若守河间之法降气，后重自除，行血便脓自止。不知胎前之气果可降乎？气降则胎下坠。胎前之血果可行乎？血行则胎必堕。莫若多用木香以调气，多用当归以养血。此二药，乃为胎前痢疾妙剂。再以四物倍白术、黄芩。丹溪所谓先托住正气，以固其胎，而后顺气和血，佐以消积导滞，此治妊痢之要法也。

妊娠霍乱属饮食风冷

《大全》曰：饮食过度，触冒风冷，阴阳不和，清浊相干，谓之霍乱。其间，或先吐，或腹痛吐痢，是因于热也。若头痛体疼，发热，是挟风邪也。若风折皮肤，则气不宣通，风热上冲为头痛。若风入肠胃，则泄痢呕吐，甚则手足逆冷，此阳气暴竭，谓之四逆。妊娠患之，多致伤胎。

立斋按：前证若因内伤饮食，外感风寒，用藿香正气散。若因饮食停滞，用平胃散。若果脾胃顿伤，阳气虚寒，手足逆冷者，须用温补之剂。治当详审。毋使动胎也。

妊娠霍乱吐利邪气易伤胎元

万密斋曰：霍乱者，阳明胃经之病名也。因乎日五味肥酿，腐积成痰，七情郁结，气盛为火，停蓄胃中，乍因寒热之感，邪正交争，阴阳相混，故令心腹绞痛，吐痢并作，挥霍变乱。如邪在上胃脘，则当心而痛，其吐多。邪在下胃脘，则当脐而痛，其利多。邪在中脘，其腹中痛，吐痢俱多。吐多则伤气，利多则伤血。血气受伤，不能护养其胎，邪气鼓击胎元，母未有不殒者。此危证，不可不亟治，宜香苏散加藿香叶主之。

慎斋按：以上二条，序胎前有霍乱证也。妊娠霍乱，吐痢绞痛，最易伤胎。故胎前霍乱，宜辨饮食生冷，暑湿风寒四气之感，随其邪之所凑治之，而以保胎为主也。

妊娠泄泻见证用药治法

《大全》曰：妊娠泄泻，或青或白，水谷不化，腹痛肠鸣，谓之洞泄。水谷不化，喜

饮呕逆，谓之协热下利。并以五苓散利小便，次以黄连阿胶丸，或三黄熟艾汤以安之。若泻黄有沫，肠鸣腹痛，脉沉紧数，用戊己丸和之。嗳腐不食，胃脉沉紧，感应丸下之，后调和脾胃。若风冷，水谷不化，如豆汁，用胃风汤。寒冷，脐下阴冷，洞泄，用理中汤、治中汤。伏暑烦渴，泻水，用四苓散。伤湿泄泻，小便自利，用不换金正气散、胃苓汤。此四证之大略也。

慎斋按：泄泻之证多因，有内外之合邪，有虚实之不同。况胎前泄泻，尤宜审因详证。岂四证足以尽之乎？抑四证可执定数方以施治乎？

妊娠泄泻分因用药之法

薛立斋曰：泄泻，若米食所伤，六君子加谷芽；面食所伤，六君子加麦芽；肉食所伤，六君子加山楂。若兼寒热作呕，乃肝木侮脾土，六君子加柴胡、生姜。兼呕吐腹痛，手足逆冷，乃寒水侮土，六君子加姜、桂。不应，钱氏益黄散。若元气下陷，发热作渴，肢体倦怠，补中汤。若泄泻色黄，乃脾土真色，六君子加木香、肉果。若作呕不食，腹痛恶寒，乃脾土虚寒，六君子加木香、姜、桂。若泻在五更侵晨，饮食少思，乃脾肾虚弱，五更服四神丸，日间服白术散。如不应，或愈而复作，或饮食少思，急用八味丸，补命门火，以生脾土为善。

慎斋按：以上二条，序胎前有泄泻证也。妊娠泄泻，必原其由。大抵不外脾肾二脏虚者居多。夫血统于脾，血壅胎元，则脾阴虚而食不运化，水谷难消而作泻。胎系于肾，肾气弱，命门火衰，胎窃其气以拥护，而肾间之阳不能上蒸脾土，则为泻。此妊娠泄泻之由也。虽其间不无风寒暑湿之外感，饮食生冷之内伤，而属于脾肾有亏者，其本也。《大全》漫序四证，为妊娠泄泻大略，已属草率无理。立斋又以大概泄泻证候，分配某证用某药为治，此胶柱鼓瑟，印定后人眼目，予不能无议者也。

妊娠伤食属于饮食不节

《大全》曰：经云：饮食自倍，肠胃乃伤。又云：阴之所生，本在五味，阴之五宫，伤在五味。若妊娠饮食不节，生冷毒物，恣性食啖，致伤脾胃。故妊娠伤食，最难用药，唯木香丸、白术散二方最稳。

妊娠伤食分证用药之法

薛立斋曰：东垣云：脾胃之气壮，则过时而不饥，多食而不伤。盖胃主司纳，脾主消化，五脏之本也。食倍而伤者，脾气虚而不化也。若投以峻剂，则脾胃复伤，而胎亦损。当审所因调治。若饮食停滞，或腹痛，平胃散。呕吐恶心，加枳壳、砂仁。吞酸嗳腐，加黄连、吴茱。腹满泄泻，六君子汤。停肉食，加山楂；面食，加麦芽、卜子；糯食，加白酒曲；米食，加谷芽；鱼腥伤，倍陈皮；伤辛热之物，加黄连；伤生冷之物，加砂仁、木香。大凡脾胃虚弱，饮食难化，以白术、陈皮为末，神曲丸最稳，枳壳丸可暂用，枳实峻厉，能耗真气，治者慎之。

慎斋按：以上二条，序胎前有伤食证也。妊娠伤食，多由脾胃虚弱，不能运化。况胎以脾胃为主，脾胃强，则胎系如悬盎而不坠。若伤食不化，则脾困而胎不能固。故凡消食导滞，先以补脾健胃为主，则饮食自化。一切峻厉克伐之药，未可浪投，以伤胎气。观立斋一条，得其本矣。

妊娠吐血属脏腑有伤气逆于上

《大全》曰：妊娠吐血者，皆由脏腑有伤。凡忧思惊怒，皆伤脏腑，气逆于上，血随而溢，心闷满烦，久而不已，多致堕胎。

妊娠吐血分证用药之法

薛立斋曰：妊娠吐血，若肝经怒火，先用小柴胡、山栀、生地，次用四物、加味逍

遥散；若肝经风热者，防风子芩丸；心经有热者，朱砂安神丸；心气不足者，补心汤；思虑伤心者，妙香散；胃经有火者，犀角地黄汤；宿粱积热者，加味清胃散；肺经有火者，黄芩清肺饮；气不摄血，用补中汤；肾经虚火者，加味六味丸。

慎斋按：以上二条，序胎前有吐血证也。吐血证，或七情内伤，或六淫外感，皆足致失血之患。而妊娠吐血，一主火热者，正以气血聾养胎元，或有所感，则气逆而火上乘，此立斋分证，独主火论也。但火有虚实之分，实火当清热以养血，虚火当滋阴以补水，则胎安而可固。若执以寻常治血之法，用行血消血之剂，胎必堕，而祸不旋踵矣。

妊娠喘息属肺隘气争

《产宝百问》曰：胎前喘息，皆由荣卫之气流行失度。气经于脏，脏不能受，诸气上并于肺，肺隘而气争，故令喘。其始得之，或因恐坠则精却，却则上焦闭而气不行，则留于肝，肝乘于肺，此喘出于肝也。或因惊恐，惊则心无所依，神无所归，气乱于中，心乘于肺，此喘出于心也。或因堕水跌仆，肾气暴动，伤而不通，气留于肾，肾气上乘于肺，此喘出于肾也。或因饱食过伤，动作用力，谷气不行，脾气逆肺，此喘出于脾也。诸脏相乘为喘，名各不同。

妊娠胎逆作喘属于火

朱丹溪曰：妊娠因火动胎，逆上作喘，急则用条芩、香附为末，水调服。

妊娠作喘属毒药伤胎

吕沧洲曰：有妇胎死于腹，病喘不得卧，医以风邪伤肺治之。诊其脉，气口盛人迎一倍，左关弦动而疾，两尺俱短而离经，因曰：病盖得之毒药动血，以致胎死不下，奔迫而上冲，非风寒作喘也。大剂芎归汤，加催生药服之，夜半果下一死胎而喘止。其夫曰：病妄诚有怀，以室人见嫉，故药去之，众所不知也。

慎斋按：以上三条，序胎前有喘证也。《内经》论喘属于肺经为病。若妊娠气喘，有乍感风寒而不得卧者，客邪胜也。发散自愈，参苏饮主之，三拗汤在所斟酌。若脾虚四肢无力，肺虚不任风寒，肾虚腰酸，短气不能步，猝然气喘不息。此脾肺素亏，母虚子亦虚，肾气不归元而上乘于肺也。生脉散、补中汤去升、柴，加沉香、补骨主之。《产宝》一条，是泛论喘证，有五脏相乘，非论胎前病也。丹溪火动作喘，此胎前最多，至于毒药伤胎病喘，时俗往往有之，病机之不可不察者也。

妇人无故悲伤属于脏躁

张仲景曰：妇人脏躁，悲伤欲哭，象如神灵所作，数欠伸，甘草小麦大枣汤主之。

妇人脏燥悲伤治验

许学士曰：有一妇人，数次无故悲泣不止，或谓有祟，祈禳请祷备至，终不应，予忆《金匮》有此证，急治药，尽剂而愈。古人识病制方，种种妙绝如此。

妊妇脏燥悲伤治验

陈良甫曰：记管先生治一妊娠四五月，脏燥悲伤，遇昼则惨戚泪下，如有所凭，与仲景大枣汤而愈。

妊妇悲哀烦躁证用药法

薛立斋曰：有一妊妇，悲哀烦躁，其夫询之，云我无故，但欲自悲耳。用仲景方，又用淡竹茹汤，佐八珍汤。但前证或因寒水攻心，或肺有风邪者，宜审察治之。

慎斋按：以上四条，序脏燥悲伤证。仲景、学士二条，是概病机也。良甫、立斋二条，方主妊娠见证。无故悲伤属肺病。脏燥者，肺之脏燥也。胎前气血聾养胎元，则津

液不能充润，而肺为之燥。肺燥当补母，故甘草、大枣以补脾。若立寄汤八珍汤，补养气血，真佐前人未尽。

妊娠腹内盅鸣

《大全》曰：孕妇腹内盅鸣，用鼠窟前后土为细末，研麝香，酒调下立愈。

妊娠腹内儿哭

《产宝》曰：腹中脐带上疙瘩，儿含口中，因妊妇登高举臂，脱出儿口，以此作声，令妊妇曲腰就地，如拾物状，仍入儿口即止。又云，孕妇腹中儿哭，治法亦用空房中鼠穴土，同川黄连浓煎汁饮之，即止。

慎斋按：孕妇腹内盅鸣，即是儿哭证同类，故《大全》治法亦无异。立斋云：黄连性寒，麝香开窍。当酌用，究竟此作何证。凡病能有《灵》、《素》不载，而后人以意治之，不可深解者，此类是也。

妊娠胎动腹痛诸因

《产宝百问》曰：胎动腹痛，其理不一，缘饮食冷热，动风毒物，或因交接动摇骨节，伤犯胞胎。其候多呕，气不调和。或服热药太过，气血相干，急服顺气安胎药。不然，变成胎漏难安矣。

妊娠胎动不安由冲任经虚诸因所感

陈良甫曰：妊娠胎动不安者，由冲任经虚，受胎不实也。有饮酒房室过度，损动不安。有忤触伤仆，而动不安。有怒气伤肝，或郁结不舒，触动血脉不安。有过服暖药，并犯禁之药，动而不安。有因母病而胎动者，但治母病，其胎自安。有因胎不坚固，动及母病者，但当安胎，其母自愈。

妊娠胎动不安辨子母死生之法

《大全》曰：妊娠胎动，或饮食起居，或冲任风寒，或跌仆击触，或怒伤肝火，或脾气虚弱，当各推因治之。轻者转动不安，重者必致伤堕。若面赤舌青，是儿死也。面青舌赤吐沫，是母死也。唇口色青，两边沫出，是子母俱死，须察治之。

慎斋按：以上三条，序妊娠有胎动不安证也。妊娠胎动不安，必有其由，《产宝》二条，原其因也。《良方》三条，是验胎动有死生之法也。

妊娠胎动与胎漏之辨

《女科正宗》曰：胎动与胎漏皆下血，胎动则腹痛，胎漏无腹痛。故胎动宜行气，胎漏宜清热。盖缘子宫久虚，致令坠胎，其危同于风烛，非正产可比，急以杜仲丸预服。

妊娠坠仆伤胎

《大全》曰：妊娠惊胎者，乃怀娠将满，胎神已具。坠仆伤胎，甚至下血不醒。若欲验子母安否，当参前论治之。

妊娠热病伤胎

陈良甫曰：凡妊娠患热病，脏腑熏灼，其胎致死，身冷而胎不自出，服黑神散暖其胎，气温即自下。药用附子、桂心、干姜、当归、生地、白芍、黑豆。

妊娠挟病伤胎

《大全》曰：妊娠羸瘦，或挟疾病，脏腑虚损，气血枯竭，既不能养胎，致伤胎气不固，终不能安者，可下之，免害妊妇。

慎斋按：既云脏腑虚损，气血枯竭，而遽云下之，以免害妊妇，独不顾披枝伤根之患乎？

妊娠筑磕伤胎

《大全》曰：妊娠五七日，因事筑磕着胎，或子死腹中，恶露以下，疼痛不止，口噤欲绝，用神妙佛手散探之。若不损则痛止，子母俱安。若损胎，立便逐下。又名芎藭汤。又

云此药治伤胎去血，多神效。

妊娠毒药伤胎见证不可作中风治

《捷径方》曰：治毒药攻胎，药毒冲上，外证牙关紧急，口不能言，两手强直握拳，自汗，身微热，与胎前中风相似。但其脉浮而软，十死一生，医多不识。若作中风治之，必死。用白扁豆二两，生，去皮为末，汲新水调下即效。

妊娠毒食伤胎

《捷径方》曰：妊妇或食毒物，或误服草药，伤动胎气，下血不止，胎尚未损，服之可安，已死，服之可下。用桂、桃仁、丹皮、赤芍、茯苓，名夺命丸，淡醋汤下，丹溪亦称其妙。

慎斋按：以上七条，序胎前有伤胎证也。妊娠怀胎，或饮食不慎，起居不时，则有伤胎之患。而胎之伤也不一，有惊恐坠仆，有热病诸疾，有筑磕、毒药、毒食种种，均足致胎之伤。此非脉之可凭，必须医者数问。以悉其情，而后可以审证施治也。

子死腹中分寒热用药下法论

《圣济总录》曰：胞衣未下，急于胎之未生。子死腹中，危于胎之未下。盖胞衣未下，子与母气通其呼吸。若子死腹中，胞脏气寒，胎血凝沍，气不升降，古方多以行血顺气药，及硝石、水银、硇砂之类。若胎已死，躯形已冷，血凝气聚，复以至寒之药下之，不唯无益，而害母命者多矣。古人用药，深于用意。子死之理有二端，用药寒温，各从其宜。有妊娠胎漏，血尽子死者。坠堕颠仆，有内伤子死者，有久病胎萎子死者。以附子汤进三服，使胞脏温暖，凝血流动。盖附子能破寒气、堕胎，此用温药之意也。有因伤寒热病温疟之类，胎受邪热毒气，内外交攻，因致胎死，留于胞脏。古人虑胎受毒气必胀大，故用朴硝、水银、硇砂之药。不唯使胎不长，又能使胎化烂，副以行血顺气之药，死胎即下也。

妊娠胎病宜下

陈良甫曰：人之胃气壮实，冲任荣和，则胎得其所，如鱼处渊。若气血虚弱，无以滋养，其胎终不能成，宜下之，以免其祸。

妊娠死胎用牛膝

《证治要诀》曰：有胎漏不止，欲因其势，遂下之，唯佛手散。可安即安，不可安即下，顺其自然。医者检方，用牛膝一两，酒煎服。谓牛膝补下部药，用之何害？服之未下，又进桂香散，血遂暴下如决，煎独参汤未成而卒。或问，牛膝补药而能堕胎，何也？曰：生则宣而熟者补，故破血之与填精，如箭锋相射，岂独牛膝哉。鹿角亦堕胎破血，煎为白胶则安胎止血。因其熟而信其生，此之谓粗工，著以为世戒

慎斋按：以上三条，序胎伤用下，恐有误下之戒也。妊娠胎伤宜下，下法最宜谨，不可轻议。如胎死腹中，必先验舌青、腹冷、口秽的确，方可用下，亦必先固妊妇本元，补气养血，而后下之。若偶有不安，未能详审，遽用峻厉攻伐，岂能免不测之祸，此《要诀》云顺其自然四字最妙。立斋亦云，胎果不能安者，方可议下，慎之慎之，前贤之垂戒深矣。

妊娠堕胎分月数调养

巢元方曰：妊娠受胎在腹，七日一变。今妇人堕胎，在三月五月七月者多，在二月四月六月者少。脏阴而腑阳，三月属心，五月属脾，七月属肺，皆在五脏之脉，阴常易亏，故多堕耳。如在三月曾堕，后受孕至三月亦堕，以心脉受伤也，先须调心。五月七月亦然，唯一月堕胎，人皆不知也。一月属肝，怒则多堕，洗下体则窍开亦堕。一次既堕，肝脉受伤，下次亦堕。今之无子者，大半是一

月堕胎，非尽不受孕也。故凡初交后，最宜将息，勿复交接，以扰子宫。勿令劳怒，勿举重，勿洗浴，又多服养肝平气药，则胎固矣。

妊娠堕胎属中冲脉伤

孙《千金》曰：凡女人受孕，经三月而堕者，虽气血不足，乃中冲脉有伤。中冲脉即阳明胃经供应，胎孕至此时，必须节饮食，绝欲戒怒，庶免堕胎之患。

妊娠堕胎属心包脉虚

潘硕甫曰：巢氏论诸经脉养胎，各三十日，而十二经中，独心与小肠不养胎，何也？心为牡脏，小肠为腑，主生血而合脉，经曰脏真通于心，心藏血脉之气也。有孕则经脉不通，许学士所谓闭经以养胎是也。是知胎以血为本，始终皆在于心，自不当以输养分次第矣。三月之时，心包络养胎。《灵枢》云心包主脉，若分气及胎，脉必虚代。经云心合脉，盖心与包虽分二经，其实原属一脏故也。若至期，当养之经，虚实不调，则胎不安，甚则下血而堕矣。

妊娠堕胎属风冷乘子宫

齐仲甫曰：妇人血气调和，胎气乃安。若血气亏损，子宫为风冷所乘，致荣亏卫弱，不能荣养其胎而堕。假令妊娠三月，当手心主包络养之。如不善摄生，伤其经，则胎必堕，后有娠，至其时复堕。如妊娠腰常痛，须防堕胎。腰为肾府，女子以系胞故也。

妊娠胎堕属血虚内热

朱丹溪曰：阳施阴化，胎孕乃成。血气虚损，不足以荣其胎，则自堕。譬如枝枯则果落，藤萎则花坠。或劳怒伤情，内火便动，亦能堕胎。正如风撼其树，人折其枝也。火能消物，造化自然。《病源》乃谓风冷伤子脏而堕，此未得病情者也。有孕妇至三四月必堕，其脉左手大而无力，重取则涩，知血少也。止补中气，使血自荣。以白术浓煎，下黄芩末，数十剂而安。因思胎堕于内热而虚者为多。曰热曰虚，当分轻重。盖孕至三月，上属相火，所以易堕。不然，黄芩、熟艾、阿胶何为安胎妙药耶。

妊娠堕胎属性躁少阳火动

汪石山曰：有妇性躁急，常患堕胎已七八。诊其脉皆柔软无力，两尺虽浮而弱，不任循按。此因堕胎太多，气血耗甚，胎无滋养，故频堕也。譬之水涸而禾枯，土削而木倒。况三月五月，正属少阳火动之时，加以性躁而急，故堕多在三五七月也。宜大补阴汤，去桂加芩、柏，蜜丸服之。

妊娠胎堕属相火伤精

朱丹溪曰：有妇经住，或成形未具，其胎必堕。察其性急多怒，色黑气实，此相火太盛，不能生气化胎，反食气伤精故也。

妊娠胎堕属子宫真气不全

朱丹溪曰：有妇经住三月后，尺脉或涩，或微弱，其妇却无病，知是子宫真气不全。故阳不施，阴不化，精血虽凝，终不成形，至产血块，或产血胞也。唯脉洪盛者，胎不堕。

妊娠胎堕之因有五由气血虚不能荣养胎元

王海藏曰：堕胎皆由气血虚损，不能荣养胎元而堕。或七情太甚，内火发动，火能消物而堕，或过伤劳役饥饱，动胎而堕。或过于房事，触动其胎而堕。或劳力跌扑闪挫，伤动其胎而堕。或大怒悲哀，伤动心肝之血而堕。然小产重于大产，由于胎脏损伤，胞系腐烂故也。治宜补虚生肌肉，养脏气，生新血，去瘀血为主。或素有堕胎之患者，宜按证治之。

妊娠堕胎先补脾胃

王节斋曰：妇人堕胎，多在三五七月。除跌扑损伤外，若前次三月而堕，则下次亦必如期而堕。故于产后，须多服养气血之剂，以固胎元而补其虚。如养胎全在脾胃，譬犹盎悬于梁，梁软则盎下坠，折则堕矣。故白术为补脾安胎之要药也。若因气者，多加砂仁，少佐木香以行气。

慎斋按：以上十条，序胎前有堕胎证也。妊娠堕胎，有客邪外伤而堕者，有气血虚弱而堕者，有劳力房事动火而堕者，前条已备病机之要。而保胎之法，节斋之论，在养脾胃其本也。莫若《千金》保胎丸，用白术、黄芩、熟地、当归、杜仲、续断、阿胶、香附、益母、川芎、陈皮、砂仁、艾叶、枣肉为一方为最妙。赵养葵得其意，以六味丸加杜仲、续断、阿胶、五味，急滋肾水，以固胎元。正以胎系于肾，肾气壮则胎固而可安。此正补脾不如补肾之要妙也。

堕胎后有下血不止血凝不出二证

齐仲甫曰：血寒则凝，血温则散。若堕胎损经，其血不止，或不出。一则因热而行，一则气虚不敛。泻血多者，必烦闷而死。或因风冷堕胎，血冷相搏，气虚血逆上，则血结不出，抢上攻心，则烦闷而死，当温经逐寒，其血自行。若血淋沥不止，是冲任气虚，不能约制故也，宜胶艾汤，加伏龙肝散。

堕胎后下血不止宜补胃气

陈良甫曰：堕胎后复损经脉，下血不止，甚则烦闷至死，皆以调补胃气为主。

慎斋按：以上二条，序堕胎之后，有下血不止，有血凝不出二证也。堕胎而血出过多不止者，经脉损而冲任之气虚而不摄，是不足病也，法当大补气血以固其脱。堕胎而血凝不行作痛者，外邪乘而败浊之血闭而不流，是有余病也，法当导瘀消蓄，以温其经。不特堕胎为然也，即产后见此证，亦宜以此治之。

半产属冲任气虚胎元不固

武叔卿曰：妊娠日月未足，胎气未全而产者，谓之半产。盖由妊妇冲任气虚，不能滋养胎元，胎气不固，或颠扑闪坠，致气血损动，或因热病温疟之类。仲景谓虚寒相抟，此名为革，妇人则半产漏下是也。

小产由于欲动火扰

《产宝百问》曰：驴马有孕，壮者近身则蹄之，名为护胎，所以绝无小产。人之胎系胞中，气血养之。静则神藏，欲火一动，则精神走泄，火扰于中，则胎堕矣。种玉者，知欲而不知忌，可不慎哉。

戴景元曰：妇人觉有娠，男即不宜与接。若不忌，主半产。盖女与男接，欲动情胜，亦必有所输泄，而子宫不闭，固多致半产。女科书俱无此论，可谓发前人未发。

小产有三因之感戒服热药

《便产须知》曰：半产俗呼为小产，或二月四月、或五月六月，皆为半产，以男女成形故也。或因忧恐悲哀暴怒，或因劳力打扑损动，或因触冒风寒暑热，大忌黑神散热药，转生他病，宜玉烛散、和经汤之类。盖小产不可轻视，将养十倍于正产可也。

慎斋按：妊娠有三因之感，黑神散固在所忌，而玉烛散亦未便可服也。

妇人半产误用寒药损治宜活血升举论

李东垣曰：妇人分娩，半产漏下，昏冒不省，瞑目无知，此因阴血暴亡。有形血去之后，则心神无所养。心与包络者，君火相火也。得血则安，亡血则危。火上炽，故令人昏冒。火乘肺，故瞑目。不省人事，是阴血暴亡，不能镇抚也。血已亏损，医反用滑石、甘草、石膏，辛甘大寒之药，泻气中之

热，是血亏泻气，二者俱伤，反成不足虚劳病。夫昏迷不省者，上焦心肺之热也。为无形之热，而用寒凉之药驱令下行，岂不知上焦之病，悉属于表，乃阴证也，汗之则愈。今反下之，暴亏气血，生命岂能久长。又不知《内经》有云，病气不足，宜补不宜泻。瞑目合眼之病，悉属于阴，宜汗不宜下。又不知伤寒郁冒，得汗则愈，是禁寒凉药也。分娩半产，本气不病，是暴去有形之血，亡血则补血，又何疑焉。补血则神昌，血下降亡，当补而升举之，心得血则能养而神不昏。血暴降下，是秋冬之令太旺，今举而升之，以助其阳，则目张而神不昏迷矣。今立方，生熟地四物，加红花、细辛、蔓荆、羌、防、升、柴、葛根、藁本、甘草，补血养血，生血益阳，以补手足厥阴之不足，名全生活血汤。

慎斋按：东垣先生之论至妙，但半产病昏迷不省，谓上焦心肺表病，而曰汗之则愈，引伤寒郁冒证，以得汗为愈，作半产证治法，岂不知亡血家不可发汗之义。且立方风药倍多于血药，且云升举其阳之意，又不用一味气药，以益血之脱，是不能无疑于此论也，俟正之。

小产用药之法

薛立斋曰：小产重于大产，大产如栗熟自脱。小产如生采，破其皮壳，断其根蒂也。但人轻忽致死者多，治法宜补形气，生新血，去瘀血。若未足月，痛而欲产，芎归补中汤倍加知母止之。若产而血不止，人参黄芪汤补之。若产而心腹痛，芎归汤主之。胎气弱而小产者，八珍汤固之。

慎斋按：以上五条，序胎前有半产证也。妊娠半产，非七情六淫，劳役房室，则无是患。故用药与正产无殊，总不外丹溪大补气血为主一论也。然堕胎与半产证有别，如一月二月三月四月，胎未成形而下者，名曰堕胎。至五月六月七月八月，胎已成形而下者，名曰半产。堕胎总属妊妇气血虚弱，冲任经虚，以致胎元不固，故《千金》保胎丸一方最妙，芎归养荣以六味倍加杜、续、五味、阿胶，为安胎之圣药。此传心之秘典也。

妇人怀胎有未足月而产有过期而不产

《妇人良方》曰：妇人怀胎，有七月八月而产者，有至九月十月而产者，有经一年二年，乃至四年而后产者，各依法治之。

娄全善曰：先期欲产者，凉血安胎。过期不产者，补血行滞。

妊妇胎孕迟速论

陈天民曰：或问，娠妇有按月行经，而胎自长者，有三五个月间，其血大下而胎不堕者，或及期而分娩、或逾月而始生，其理何与？曰：按月行经，而胎日长者，名曰盛胎。其妇血气充盛，养胎之外，其血有余故也。有数月之胎，而血大下，谓之漏胎。因事触胎，动其妊脉，故血下而不伤子宫也。然虽孕中失血，胎虽不堕，气血亦亏，多致逾月不产。曾见有十二三月，或十七八月，或二十四五个月生者，往往有之。俱是气血不足，胚胎难长故耳。凡十月之后未产者，当服大补气血之药，以培养之，庶无分娩之患也。

慎斋按：妊娠十月而产，其常也。其有逾者，如唐尧之与汉昭是也。若云二年四年，则怪诞不经矣。尚得谓胎孕乎？虞花溪又从而附会之，无稽之言，勿听可也。

妇人胎孕变常记

李时珍曰：女子二七天癸至，七七天癸绝，其常也。有女年十二、十三而生子，如褚记室所载，平江苏达卿之女，年十二受孕。有妇人年五十、六十而生子，如《辽史》所载，亟普妻，年六十，生二男一女。此又异常之尤，学医者宜留心焉。

慎斋按：以上三条，序胎孕育产，有迟速变异之证也。

妊娠胎萎燥属于所禀怯弱

《圣济总录》曰：人受气于有生，十二经脉迭相滋养。凡胎处胞中，或有萎燥者，由孕妇所禀怯弱，不足自周。阴阳血气偏胜，非冷即热，胞胎失于滋养，所以萎燥不长也。唯宜滋母血气，则胎从而有养矣。

妊娠胎气不长属脾胃饮食减少

《圣济总录》曰：妊娠将理无方，脾胃饮食减少，不能行荣卫，化精微，养冲任，故令胎脏内弱，子气不足，生化稍亏。巢元方谓母病疗母，则胎安是也。若使脾胃和而能食饮，水谷化而运气血，何虑胎气不长也。

慎斋按：以上二条，序妊娠有胎萎不长证也。妊娠以十二经脉养胎，全赖气血以充养胎元。而气血之旺，唯以脾胃水谷之气化精微，而生血气。虽有宿疾失调，总以健脾扶胃，为长养胎元之本，此《圣济》一条，为知要也。

鬼胎属于荣卫虚损精神衰弱

《妇人良方》曰：人之脏腑调和，则血气充实，风邪鬼魅，不能干之。若荣卫虚损，精神衰弱，妖魅鬼精，得入于脏，状如怀娠，故曰鬼胎也。

鬼胎属女人之思想所结

虞天民曰：或问，妇人怀鬼胎者何欤？曰：昼之所思，为夜之所见。凡男女之性淫而虚者，肝肾相火无时不起，故劳怯人多梦与鬼交。所谓鬼胎者，伪胎也，非实有鬼神交接成胎也。古方有云，思想无穷，所愿不遂，为白淫。白浊流于子宫，结为鬼胎。本妇自己之血液淫精结聚成块，胸腹胀满，俨若胎孕耳，非伪胎而何？滑伯仁《医验》有杨天成女，薄暮游庙，庙庑见一黄衣神，觉心动，是夕梦与交，腹渐大如孕，邀伯仁诊之，曰：此鬼胎也。女道其故，遂与破血堕胎之药，下如蝌蚪鱼目者二升许，遂安。此非遇神交乎？曰：有是事，实无是理。岂有土木为形，能与人交而有精成胎耶？此非神之惑于女，乃女之惑于神耳。度此女必年长无夫，正所谓思想无穷，所愿不遂也。

鬼胎属元气不足以补元气为主

薛立斋曰：鬼胎证，因七情相干，脾肺亏损，气血虚弱，行失常道，冲任违乖致之。乃元气不足，病气有余也。若见经候不调，就行调补。庶免此证。治法，以补元气为主，佐以雄黄丸、斩鬼丹之类行散之。

鬼胎属郁怒伤肝脾所致

薛立斋曰：一妇人经闭八月，肚腹渐大，面色或青或黄，用胎证药不应。诊视之，面青脉涩，寒热往来，肝经血病也。面黄腹大，少食倦体，脾经血病也。此郁怒伤脾肝之证，非胎也。不信，仍用治胎散，不验，用加味归脾、逍遥二药愈。

慎斋按：以上四条，序孕妇有鬼胎之证也。

妇人肠覃似孕属气病论

罗谦甫曰：有女子月事不下，腹如怀子状，医者不知《内经》有肠覃、石瘕之病名，而疑为妊孕。经云：肠覃者，寒气客于肠外，与卫气相抟，气不得荣，因有所系，瘕而内着，恶气乃起，息肉乃生。其始生，大如鸡卵，稍以益大，至其大如怀子状，久则离岁，按之则坚，推之则移，月事以时下，此其候也。夫肠者，大肠也。覃者，延也。大肠以传导为事，肺之腑也。肺主卫，卫为气，得热则泄，得寒则泣。今寒客大肠，故卫气不荣，有所系止，而结瘕在内贴着，延久不已，是名肠覃。气散则清，气聚则浊，结为瘕聚。所以恶气发起，息肉乃生，小渐益大，至期而鼓，其腹如怀子状。此气病而血未病，故月事不断，应时而下，本非胎孕，可以此为

验辨，木香通气散主之。

妇人石瘕似孕属血病论

罗谦甫曰：经云石瘕生于胞中，寒气客于子门，子门闭塞，气不得通，恶血当泻不泻，衃以留止，日以益大，状如怀子，月事不以时下，皆生于女子，可导而下。夫膀胱为津液之府，气化则能出。今寒客子门，则气塞不通，血壅不流，衃以留止，结硬如石，是名石瘕。此先气病而后血病，故月事不来，可宣导而下，非大辛热之剂不能已，可服见睍丸、和血通经汤。

妇人畜血似孕宜大下法

《折肱漫录》曰：予媳申氏，多郁怒，忽患不月，腹渐大，疑有妊，医视之，亦以为妊也。十余月勿产，诸证渐见，疑之。医者亦疑为畜血，欲下之，以体弱不胜，可暗消，久用行血调血药，不敢用下血药，竟至不起。后阅盛启东治东宫妃一案，大悔悼。永乐中，东宫妃张氏，经不通者十余月，众医以为胎也。胀愈甚，上命启东诊，一一如见方，皆破血之剂，服药下血数斗而疾平。予媳病正与此合。当十月外，既确知非妊，宜大胆下之，可得生，惜医无胆，不亦伤乎。

滇斋按：以上三条，序胎孕有肠覃、石瘕、蓄血之疑证也。前条鬼胎，本之荣卫虚弱，精神恍惚，则妖魅鬼邪，得乘虚感人脏腑。故立斋一以补元气为主。若《内经》肠覃、石瘕，一犯大肠为气病，一犯子门为血病，几与鬼胎相似。鬼胎与妊孕，在疑似间，非医者有洞垣之见，往往误治。故附畜血一案，以为宜下之法。但下法必见证不疑者始可与议此也。

女科经纶　卷五

搢李　萧　琫赛六纂著
鄞县　曹赤电炳章圈校

产后证　上

临产将息之法

《妇人良方》曰：妊娠至临月，当安神定虑，时常步履，不可多睡饱食，过饮酒醴杂药。欲产时，不可多人喧哄怆惶。若见浆水，腰间痛甚，是胎已离经，方用药催生坐草，不可早服催生药早坐草，慎之。

临产调护用药之法

薛立斋曰：欲产时，觉腹内转动，即当正身仰卧，待儿转身向下，时作痛，试捏产母手中指中节或本节跳动，方临盆即产。若初觉，不可仰卧，以待转胞。或未产而水频下，此胞衣已破，血水先干，必有逆生难产之患。若胞衣破，不得分娩，用保生无忧散，以固其血。如血已耗损，八珍汤加益母草浓煎，时饮之。凡孕妇上腹痛，未产也。连腰痛者，将产也。肾候于腰，胞系于肾故也。凡孕有生息不顺，宜嘱稳婆只说未产。或遇双胎，只说胞衣。恐惊则气散，愈难生息。大抵难产，多患郁闷、安佚富贵之家。治法虽云胎前顺气，产后补血，不可专执。若脾胃不实，气血不充，宜预调补之。

临产预备必用之药

《妇人良方》曰：花蕊石散，为血入胞衣，胀大不能下，或恶露上攻。佛手散治血虚危证，加味芎归汤入龟板，治交骨不开。蓖麻子治胎衣不下，失笑散治恶露腹痛，不省人事。醋油调滑石，涂入产门，为滑胎之圣药。清魂散，治血晕诸证。平胃散、朴硝、水银，为腐化死胎之剂。皆为临产时紧要之药也。若气血虚损，以八珍、十全汤加减。

临产腹痛宜辨弄胎试胎二候

《便产须知》曰：临月或腹痛，或作或止，或一二月三五日，胎水已来，腹痛无已时，名曰弄胎，非当产也。又有一月前，忽然腹痛，如欲便生，名曰试胎，非当产也。凡腹痛，胎水来与不来，俱不妨事，但当宽心候时。若果当生，痛极不已，腰间重胀，谷道挺并，浆水淋下，其儿遂生。盖产自有时，如果熟香飘，瓜熟蒂落是也。

慎斋按：以上四条，总临产时有将息调护之法，有预备必用之药。若弄胎试胎一条，亦临产或有之事，不可怆惶卤莽，反致有害也。

难产由于安逸气滞

《大全良方》曰：妇人以血为主，唯气顺则血和，胎安则产顺。今富贵之家，过于安逸，以致气滞而胎不转。或为交合，使精血聚于胞中，皆致难产也。

难产由于恐惧气结

许叔微曰：有产累日不下，服催生药不验，此必坐草太早，心惧而气结不行也。经云，恐则气下，恐则精怯，怯则上焦闭，闭则气还，还则下焦胀，气乃不行，得紫苏饮

一服便产。

难产由于胞中败血壅滞

郭稽中曰：难产者，因儿转身，将儿枕血破碎，与胞中败血壅滞，儿身不能便利，是以难产，急服胜金散，消其血，则儿易生矣。

难产由于胞破血干

陈无择曰：难产多因儿未转顺，坐草太早，或努力太过，以致胞衣破而血水干，产路滞而儿难下，宜先服催生如神散，以固其血。

难产由于妊孕房事不谨

虞天民曰：或问，丹溪所谓难产之妇，多是八九个月内，不能谨慎，以致气血虚故也。其旨何与？曰：妇人有娠，不宜与丈夫同寝。今人未谙此理，至八九月内，犹有房室。夫情欲一动，气血随耗。胎孕全赖气血培养，气血既亏，则胎息羸弱，日月既足，即欲分娩，拆胞求路而出。胞破之后，胞中浆水沛然下流，胎息强健者，即翻随浆而下，此为易产。胎息倦弱者，转头迟慢，不能随浆而出，胞浆既干，污血闭塞生路，子无所向，遂致横生逆产。急服催生药，逐去恶血，道路通达，庶速产也。

慎斋按：以上五条，序临产时有难产之患也。难产之由，在平时则有安逸气滞，有心恐气结，有房室不谨。在将产则有败血壅滞，有胎浆干涸。大要不外此数证。

治难产胞浆干令通上下之气

《大全》曰：胞浆先破，恶水来多，胎干不得下，先与四物，补养气血，次煎浓葱汤，令稳婆洗产户，令气上下通畅。更用酥油滑石涂产门，次服神妙乳砂丹；或蒺于如圣散。

治难产以顺气和血为主

《女科正宗》曰：难产有因母气血盛，胎肥而难产者。有因母气弱，血枯涩而难产者。悉是平时不善调摄，或七八月犯房室，致污浊凝滞，不得顺生。大法以顺气和血为主。如浆干不下者，滋润为主。污血阻滞者，逐瘀为主。如坐草用力早，胞水干者，滑胎散、神应散，连进大剂，如鱼得水自顺矣。

治产难子死腹中有下法

陈良甫曰：产难，子死腹中者，多因惊动太早，或触犯禁忌，致令产难。胞浆已破，无血养胎，枯涸而死故也。须验产母之舌，若舌青黑者，其胎已死，当下之，平胃散加朴硝。

薛立斋曰：若胎死，服朴硝，下秽水，肢体倦怠，气息奄奄，急用四君子为主，佐以四物，加姜、桂调补之。

慎斋按：以上三条，序治难产之大法也。难产治法，或开滑子宫，或通上下之气，或滋养气血，当随机应变。若胎死腹中，唯有下法。下后，当从立斋之论为要，不可不知。

交骨不开产门不闭子宫不收三证

薛立斋曰：三者皆由元气素弱，胎前失于调理，致气血不能运而然。交骨不开者，阴血虚也，佛手散加龟板。产门不闭者，气血虚也，十全大补汤加五味子收之。子宫不收者，补中益气加醋炒白芍、五味。如初产肿胀，痛而不闭者，加味逍遥散。若肝既消而不闭者，补中汤加半夏、茯苓，以健脾，使元气复而诸疾自愈。切忌寒凉之剂。又曰：交骨不开者，阴气虚也。龟为至阴，板则交错相解，故用之。又有开骨膏，明乳香一两，五月五日研细，猪血为丸，如鸡豆大，朱砂为衣，加味佛手散送下。

单养贤曰：产后见此三证，总服生化汤。如交骨不开，加龟板一枚。

盘　肠　生

《便产须知》曰：盘肠生者，临产子肠先

出，然后产子则肠不收，名曰盘肠产。稳婆以醋水各半盏，默喷产妇之面，肠即收上。又古方用蓖麻子仁二四十九粒，研涂产母头顶，肠即收上，急洗去。其肠若干不收，以磨刀水少许湿润之。若以水喷面，恐惊则气散，愈难收也。肠干者，浓煎黄芪汤，浸其肠于漆盆中，温暖熏之即上。

李太素按：盘肠生，是必母气血虚弱，因而下脱。当用补气补血之药，兼以升提，则肠自收矣。大剂参、芪、芎、归，加升麻。

慎斋按：以上二条，序交骨不开，盘肠生，是难产中之危证也。难产不止此二证，横逆产生，在乎妙手，其用药亦不外后条诸法。

寒月冻产宜暖

杨子建曰：冻产者，冬月天冷，产母经血得冷则凝，致儿不能下，此害最深。故冬月产者，下部不可脱去棉衣，并不可坐卧寒处，使满房围炉，常有暖气，令产母背身向火，脐下腿膝间常暖。血得热则散，儿易生也。

夏月热产宜凉

杨子建曰：热产者，盛夏之月，产妇要温凉得所。不可恣意取凉，伤损胎气。不可人多，热气逼袭，产母心烦，热血沸腾，有郁冒冲晕之患。

慎斋按：杨子建有十产论，俱不可不知。但八条悉属产母与稳婆之事，故不尽录。其冻产热产二条，唯在医者用药调护，因节取之。予谓古方临产用药最多。丹溪云：只用佛手散最稳当，又效捷。后读单养贤《产宝新书》有生化汤一方，为产后加减，今当以二方为主。如寒月冻产，多加肉桂、乳香。夏月热产，多加芒硝、益元散，均用童便半盏冲入。人参，量产妇元气虚实，多寡加之可也。

催生药宜助气血为主

杨子建曰：催生者，言欲产时，儿头至产门，方服药催之。或经日久，产母困倦难生，宜服药以助血气，令儿速生也。

催生大法

《大全》曰：大法，滑以流通滞涩，苦以驱逐闭塞，香以开窍逐血。气滞者行气，胞浆先破血干者，固血。

慎斋按：《大全》云：滑以流通滞涩者，如车前、滑石、凤仙子、葵子、麻油、香油、白蜜、牛乳、猪脂之属，皆滑剂也。苦以驱逐闭塞者，如牡丹、干姜、赤芍、穿山、朴硝、大黄之属，皆苦剂也。香以开窍者，如乳香、麝香、白芷、肉桂之属，皆香剂也。气滞，则香附、枳壳、陈皮、乌药、青皮，皆顺气之剂也。血干，则当归、川芎、益母、红花、丹参之属，皆固血之剂也。

催生用药诸方

《女科正宗》曰：催生多用滑利迅速之药，古方有兔脑、蛇蜕、笔尖、牙、急性子之类，皆一时妙用，唯佛手散为至当不易，至如手握石燕，足贴蓖麻，子道干涩则用葵子、榆白皮、猪脂、葱油、蜜、牛乳以润之。天寒风冷，使气血凝滞，则用乳香、麝香之类，以香能开窍逐污也。

慎斋按：以上三条，序催生用药之大略也。催生，古方甚多，有不甚稳者，概删之。

产后脉

叔和曰：产后寸口洪疾不调者死，沉微附骨不绝者生。又曰：沉小滑者生，实大坚弦急者死。

朱丹溪曰：胎前脉当洪数，既产而脉仍洪数者死。又曰：胎前脉细小，产后脉洪大者多死。

产后之脉贵虚

《济生产经》曰：胎前之病，其脉贵实，产后之病，其脉贵虚。胎前则顺气安胎，产后则扶虚消瘀，此其要也。

产脉辨生死之法

《脉要》曰：欲产之脉，必见离经，或沉细而滑，夜半觉痛，来朝日中必娩。新产之脉，缓滑为吉。若实大弦急，近乎无胃，凶危之候。或寸口涩疾不调，恶证之见。唯宜沉细附骨不绝，虽剧无恙。

潘硕甫曰：临产气血动荡，胎胞迸裂，与常经离异，必有水先下，俗谓之胞浆，养胎之液也，水下则胞裂而产。及已产，气血两虚，脉宜缓滑。缓则舒徐，不因气夺而急促。滑则流利，不因血去而枯涩，均吉兆也。若实大弦牢，非产后气血两虚所宜。实为邪实，大为邪进，弦为阴敛，宣布不能。牢为坚着，皆相逆之脉也。

慎斋按：以上三条，序新产之脉，有吉凶之别也。《妇人良方》自临产将息一条至此，序难产催生诸药。立斋云：产难既明，须知产后疾病。因遵《良方》之次，序产后诸证于下。

新产下有调理之法

《大全》曰：凡产毕，饮热童便一盏。不得便卧，宜闭目而坐。须臾上床，宜仰坐，不宜侧坐。宜竖膝，不宜伸足。高倚床头，厚铺褥褥，遮围四壁，使无孔隙，免致贼风。以醋涂鼻，或用醋炭，更烧漆器。频以手从心擗至脐下，以防血晕血逆，如此三日。不问腹痛不痛，以童便和酒，温服五七次。酒虽行血，亦不可多。恐引血入四肢，能令血晕。宜频食白粥，渐食羊肉、猪蹄少许。仍慎言语七情寒暑，梳头洗足，以百日为度。若气血素弱者，不计月日，否则患手足腰腿酸痛等证，名曰蓐劳，最难治疗。初产时，不可问是男是女，恐因言语而泄气，或以爱憎而动气，皆能致病。不可独宿，恐致虚惊。不可刮舌，恐伤心气。不可刷齿，恐致血逆。须气血平复，方可治事，犯时微若秋毫，成病重如山岳，可不戒哉。

慎斋按：以上一条，序新产下调理之法。古人垂戒周详，后人守此调护，安有产后诸疾。总在人事宜慎，非医者所有事也。

新产妇人有三病

张仲景曰：问，新产妇人有三病，一者病痉，二者病郁冒，三者大便难，何谓也？师曰：新产血虚，多汗出，喜中风，故令病痉。亡血复汗，寒多，故令郁冒。亡津液，胃燥，故大便难。

产后十二癥病

《千金方》曰：妇人产后十二癥病。带下无子，皆是风冷寒气，或产后未满百日，胞络恶血未尽，便利手慎过，及久坐寒湿入胞里，结在小腹，牢痛积聚，小如鸡子，大者如拳，按之跳手隐隐然，或如虫啮，或如针刺，气时抢心，两胁支满，不能食，食饮不消。

产后十八证

《大全》曰：产后十八证。一曰因热病胎死腹中。二曰难产。三曰胞衣不下。四曰血晕。五曰口干心闷。六曰乍寒乍热。七曰虚痛。八曰乍见鬼神。九曰月内不语。十曰腹痛泄泻。十一曰遍身疼痛。十二曰血崩。十三曰血气不通、咳嗽。十四曰寒热心痛、月候不来。十五曰腹胀满，呕逆。十六曰口鼻黑气及鼻衄。十七曰喉中气喘急。上二证俱不治，十八曰中风。

产后危证有三冲三急

张飞畴曰：产后诸证，非行血则邪不去，即诸虚证，亦须血行，其气乃复。第行之有

方，不可过峻。凡产后危证，莫如三冲三急。三冲者，败血冲肺、冲心、冲胃也。三急者，新产之呕吐、泄泻、多汗也。其用药则有三禁，佛手散，以川芎能发汗也；禁四物汤，以地黄能作泻也；禁小柴胡汤，以黄芩能阻恶露也。然皆产后常法，没有风寒发热喘胀，下痢，危急证候，亦将守此，致令坐毙乎？古人未尝不用汗下，不用寒凉。而暴病势紧，不得不猛治者，下手稍软，畏缩逡巡，去生便远。唯病气久衰者，非但不可峻攻，亦不可峻补，必缓剂轻剂，以俟胃气之复耳。

产后诸证其源有三

方约之曰：产后之证多端，其源有三，曰血虚火动，曰败血妄行，曰饮食过伤，何以明之？气属阳，血属阴，产后去血过多，血虚火动，为烦躁发热之类，一也；虚火上载，败血妄行，为头晕腹痛之类，二也；经云：少火生气，壮火食气。东垣云：火为元气之贼。产后火伤元气，脾胃虚弱，若饮食过伤，为痞满泄泻之类，三也。治法，血虚火动则补之，败血妄行则散之，饮食过伤则消之。但人元气有虚实，疾病有浅深，治疗有难易，又不可一概论也。

慎斋按：以上五条，序妇人新产后有诸证之变现也。产后见证多端，仲景下三条，其大略也。约之一条尤切要，而产后犯之者众。但云壮火食气，产后火伤元气，致脾胃虚弱，饮食过伤为痞泻证。夫产后之火，虚乎实乎？况痞满泄泻，亦不专主壮火为害也，立论不能无弊。

产后戒食汤

孙真人曰：产后七日内，恶血未尽，不可服汤，候脐下块散，乃进羊肉汤。有痛甚者，不在此例，候二三日消息，可服泽兰丸。

产后戒饮酒

《产宝》曰：才产不得与酒，缘酒引血进入四肢。产母脏腑方虚，不禁酒力，热酒入腹，必致昏闷，不可多饮。时呷少许，可以避风邪，养气血，下恶露，行乳汁也。

产后戒服童便

《胎产须知》曰：新产后，童便不宜乱服。《大全》云产毕可饮热童便一盏，即一热字，或与药同服，或与酒同服，童便有益阴降火之功，无寒凉凝瘀之患，则童便不宜单服明矣。况童便必择清白无臭味者佳，若黄浊不堪，则气既混杂，味亦腥羶。此时产母气血已虚，胃气甚薄，饮之必致呕恶泄泻，非徒无益，而反害之。

产后戒食鸡子伙盐

朱丹溪曰：初产之妇，将护之法，不可失宜。肉汁发阴经之火，易成内伤，先哲具有训戒，何以羊鸡浓汁作糜服之乎？若儿初产，母腹顿宽，便啖鸡子，且吃伙盐，不思鸡子难化，伙盐发热。必须却去伙盐诸肉食，与白粥将理，以鲞鱼淡者食之，半月后，方与少肉，鸡子豁开淡煮，大能养胃却疾也。

产后戒早行房

孙千金曰：凡产后满百日，乃可会合，不尔至死，虚羸百疾滋长，慎之。凡妇人患风气，脐下虚冷，莫不由早行房故也。

慎斋按：以上五条，序产后有饮食起居之戒也。新产调理，已载《大全》一条之内，而饮食之不节，起居之不慎，此五者犹所易犯，故再序以示人节戒之意。

产后病戒用发表一切不可用风药

朱丹溪曰：产后一切病，皆不可发表。产后病多是血虚，故不可用风药发表出汗。

产后戒服黑神散热药论

张子和曰：妇人产余之疾，皆是败血恶物，发作寒热，脐腹撮痛，食饮稍减，医者

不察，谓产后气血俱虚，便用温热之剂，养血补虚，止作寒治，举世皆然。岂知妇人之孕，如天地孕物，物以阴阳和合而后生，人亦阴阳和合而后孕。偏阴偏阳，岂有孕乎？此与禾黍瓜果之属何异？水旱不时，则华之与实俱萎落矣。此又与孕而不育者何异？七月立秋后十八日，寸草不结者，天寒故也。妇人妊娠终十月，无难而生，反谓之寒，何不察理之甚也。窃譬之治砖者，炎火在下，以水沃窑之巅，遂成砖矣。砖既出窑，窑顿寒耶。世俗竟传黑神散治产后十八证，非徒不愈，经脉闭涸，前后淋闭，呕吐痰嗽，凡百热证生矣。若此误死者，不可胜计。曷若四物与凉膈散对停，大作汤剂下之，利以数行，恶物俱尽，后服甘淡之剂自愈。

慎斋按：子和以产后不可服热药，而以治砖为喻。夫砖未出窑，其热为实热，砖既出窑，则热为虚热矣。胎在腹，当用清热养血。胎既产，恶露行而气血虚。虚则生寒，黑神散固不可多服久服，而任以凉膈散大黄、连翘之苦寒，则误矣。矫枉之论，殊未尽善。

产后戒服黑神散致病论

朱丹溪曰：或问初产之妇，好血已亏，污血或留，彼黑神散非要药乎？答曰：至哉坤元，万物资生，理之常也。初产之妇，好血未必亏，污血未必积，脏腑未必寒，何以药为。饮食起居，勤加调护，何病之有。诚有污血体怯而寒，服之或可。若有他病，当求病起何因，病在何经。气病治气，血病治血，寒者温之，热者清之，凝者行之，虚者补之，血多者止之，何用海制此方，例令服饵，不恤无病生病。彼黑神散用干姜、当归之温热，黑豆之甘，熟地之厚，以补血之虚。佐以炒蒲黄，防出血之多。芍药之酸寒，有收有散，为四药之助。肉桂大辛热，以行滞血。和以甘草之缓。其取用似乎精密，然驱逐与补益，似难同方施治。设有性急者，形瘦者，本有怒火者，夏月坐蓐者，时在火令，姜、桂皆为禁药，虽是补剂，并有偏胜，脏腑无寒，何处消受。必教却去黑神散。彼富贵之家，骄恣之妇，卒有白带、头风、气痛、膈满、痰逆、口干，经事不调，发秃体倦，皆是阳盛阴虚之候。天生气血，本自和平，曰盛曰虚，又乌知非此等迷谬，有以兆之耶。

张嵲璜按：产妇有禀质瘦热，素有郁火积热，多产冲任血枯脉涩，一经产后，儿枕作痛，粗工胶执古方，妄投肉桂，祸不旋踵。故必严寒冻产，风冷乘虚，血瘀不行，方投肉桂，以通行血脉也。

产后戒服五积散论

朱丹溪曰：《局方》五积散，言治产后余血作痛。方中以苍术为君，麻黄为臣，厚朴、枳壳为佐。虽有芍药、当归之补血，仅及苍术三分之一。且方中言妇人血气不调，心腹撮痛，闭而不行，并宜服之，何不思产后之妇，有何实耶？血气未充，似难发汗，借曰推陈致新，药性温和，岂可借用麻黄之散，附以苍术、枳壳，虚而又虚，祸不旋踵矣。

产后用白芍药宜制炒论

虞天民曰：问妇人产后诸疾，古方多用四物汤加减，而丹溪独谓芍药酸寒，伐生发之气，禁而不用，何欤？曰：新产之妇，血气俱虚，但存秋冬肃杀之令，少春夏生发之气。故产后诸病，多不利于寒凉之剂，大宜温热之药，以助资始资生之化源也。先哲制四物汤，以芎归之辛温，佐以地芍之寒，是寒温适中，为妇人诸疾妙剂。若用于产后，必取白芍药，以酒重复制炒，去其酸寒之性，但存生血活血之能，胡不可用也。后人传写既久，脱去制炒注文。丹溪虑俗医卤莽，不制而用之，故特举其为害之由，以戒之耳。

产后宜用芍药论

张景岳曰：按丹溪云，芍药酸寒，大伐发生之气，产后忌之。此亦言之过也。夫芍

药之寒，不过于生血药中，稍觉其清耳，非若芩连辈之大苦大寒也。使芍药犹忌如此，则他之更寒者，犹为不可用矣。予每见产家过慎，或因太暖，或因年力方壮，饮食药饵，大补过度，以致产后动火，病热极多。若尽以产后为虚，必须皆补，岂尽善哉。且芍药性清，微酸而收，最宜于阴气散失之证，岂不为产后要药乎。不可不解也。

产后戒不可遽用参芪

单养贤曰：凡产后服生化汤加人参，须血崩血晕、形色俱脱者加之。若无虚脱形证，不可加。若有血块痛甚不移处，止加红花、肉桂，切不可用参、芪、术补气，夭人命也。

慎斋按：以上七条，序产后有用药之戒也。产后病，误治者多，用药之际，不可不详慎。

新产后先消瘀血为第一义

叶以潜曰：《良方》云：产后以去败血为先，血滞不快，乃成诸病。夫产后元气既亏，运行失度，不免瘀血停留。治者必先逐瘀，瘀消然后方可行补，此第一义也。今人一见产后有内虚证，遽用参、芪甘温之剂，以致瘀血攻心而死，慎之。

慎斋按：以上一条，序产后有先消瘀之治也。产后证虚者固多，而虚中见实，莫如瘀血停滞一证为吃紧，此条最宜留意。

产后不可作诸虚不足治

张子和曰：产后慎不可作诸虚不足治之，必变作骨蒸寒热，饮食不入，肌肤瘦削，经水不行。经曰：寒则衰饮食，热则消肌肉。人病瘦削，皆粗工以药消烁之故也。呜呼！人之死者，岂为命乎。

慎斋按：产后证，虚者多实者少，子和以为慎不可作诸虚不足治，是必以攻伐峻厉为法矣。产后而亦可任汗吐下之三法乎。赵嗣真叹子和之书，其词直，其义明，顾其一，不顾其二，知言哉。

产后以大补气血为主

朱丹溪曰：产后有病，先固气血，故产后以大补气血为主，虽有杂证，以末治之。

汪石山曰：产后百日之内，纵有杂证，必遵丹溪之法，以末治之，当大补气血为主，不可攻击，此正论也。

产后先补气血兼用消散

陈良甫曰：产后元气大脱，新血未生，概以大补气血为主。如恶露未尽，补药中入行血药。如感冒风寒停滞，亦须先补，然后发散消导，勿得泛用峻厉伤气血之药。

产后去邪必兼补剂

何松庵曰：产后气血大损，诸事必须保重，切不可恃健劳碌，致内伤外感六淫七情诸证，为患莫测。故产后证，先以大补气血为主。虽有他证，以末治之。或欲去邪，必兼补剂为当，不宜专用峻厉，再损血气。

慎斋按：以上四条，序治产后有攻补之法也。子和之论，专主攻邪。丹溪之论，专主补虚。两家之法，各自有见，而丹溪之说为长。故必合《良方》、正宗二说以参之，乃攸当也。

辨丹溪主末二字即标本论

虞天民曰：或问产后证，丹溪云当大补气血为主，虽有杂证，以末治之。又云产后中风，切不可作中风治，用风药。然则产后不问诸证，悉宜大补气血乎。曰：详主末二字，其义自明。虚而无他证者，合宜大补气血自愈。或因虚而感冒风寒者，补气血药带驱风之剂。或因脾虚而食伤太阴者，补气血药，加消导之剂。或因瘀血恶露未尽而恶寒发热者，必先逐去瘀血，然后大补。经曰：有本而标之者，有标而本之者。又曰：急则治标，缓则治本。丹溪主末二字，即标本之

意也。

产后攻补二法辨疑论

叶以潜曰：或问产后气血大虚，纵有杂证，以末治。又谓产后须以去恶露为主。二者孰是？不知古人之言，各有攸当。假如产后去血过多，有血晕之状，脉必弦浮大散。乃阴血既亡，阳无所依。宜大剂芎、归，加熟附、干姜，顿服补虚。或有滞血作痛，兼用行血药。此大补为本，他证为末也。若产后三四日，余瘀卒止，腰腹疼痛，渐生潮热咳嗽，脉洪实而数，乃是败血停积，上冲心肺，恶露与血相持，留结不行，非用行血破气以消瘀，何以得安。若徒知当补不当泻，病必益剧。故产后虽为不足，亦有有余之证，不当泥产后无热，胎前无虚之说。如胎前恶阻，少食腹胀，二便清滑，经水时下，胎动不安，不用温补，何以起病？非胎前亦有虚乎？如产后伤寒热病，烦渴秘结，不用苦寒，何以解利？非产后亦有热乎？今人但见产后，六脉浮洪弦紧，便说有热，不知产后脉与别病脉不同。产后洪大，是气血耗散，内无存蓄，故显是脉。如用凉剂，杀人反掌，不可不知也。

[illegible]按：以上二条，序产后群攻补之法也。产后用药攻补，最难调剂，虚则补，实则攻，其定法也。唯虚证而兼实邪，在产后见之者甚多。丹溪之论，专为世医不顾产后大虚，唯务攻邪者立诫也。岂知守丹溪之法，亦不无峻补之害，此广天民、叶以潜两论所宜急玩也。

产后误药成病论

单养贤曰：丹溪先生云：产后当大补气血为主，虽有他证，以末治之。恐人用消耗之剂，以虚其虚也。予见世医，但知伤食当消，气满当顺，恶露当攻。不顾产虚，遽下消耗。不知产妇服消耗药，胃气反伤，满闷益增，气亦不降，郁积既久，遂成肿胀危证，谁之咎哉？予于伤食气满证，微加消导于补中汤内，则脾强而所伤食气消散，助血行气，气行而恶露自行矣。又于误用消食耗气下药，以致绝谷日久者，先用人参汤、送锅焦粉，引开胃口，以救绝谷，然后渐加补脾药，助以消导。又于误用消耗等药成胀满者，仍用大补气血之剂，不致天枉。后之学者，须遵丹溪方案，毋私心自用，以夭人命也。

产后诸证不可误治论

单养贤曰：凡病起于气血之衰，脾胃之弱，至产后而虚又甚焉。故丹溪论产后当大补，已尽医产之旨。若能扩充用药，治产可无过矣。产后气血暴虚，诸证乘虚易袭。如有气不行毋专耗气。有食不消，毋专消导。有热不可用芩连，有寒不可用桂附。用寒凉则血块停滞，用辛热则新血崩流。至若虚中外感，见三阳表证，似可汗也。在产后而用麻黄，虑有亡阳之误。见三阴里证，似可下也。在产后而用承气，恐致竭阴之患。耳聋胁痛，乃肾虚恶露之停，休用柴胡。谵语汗出，乃元弱似邪之证，毋加宣导。厥由阳气之衰，难分寒热，非大补不能回阳而起弱。痉因阴血之损，毋论刚柔，非滋阴不能活络而舒经。有如午寒午热，发作有期，证类疟疾，若以疟论，病甚难痊。神不守舍，言语无伦，病似邪侵，如以邪论，危亡可待。去血多而大便燥结，苁蓉加于生地，莫投润下之汤。汗出甚而小便短涩，六君倍用参芪，更加生津之剂。人参生化汤频灌，可救产后之虚危。长生活命丹屡用，能苏绝谷之人。脱肛久泻，多是血虚下陷，补中益气正宜。口噤筋挛，乃因血燥类风，加人参、生地为最。产户人风而痛甚，服宜羌活养荣方。玉门伤冷而不闭，先须床、菟、茱、硫。因气而满闷中虚，生化汤加木香为佐。因食而嗳酸恶食，六君子加神曲为良。苏木、棱、蓬，大能破血。青皮、壳、实，最恶虚中。一切耗气破血之剂，汗吐下之策，可施少壮之人，岂宜胎产之妇

大抵新产之妇，先问恶露何如，块痛未除，不可遽加参术。腹疼若止，补中益气无疑。至若汗出亡阳，气虚喘促，频用加参生化汤，固是从权。如因大热阴虚，血崩厥晕，速煎生化原方，乃为救急，言虽未能尽证，大略如斯而已。

慎斋按：以上二条，序产后用药之失，而有误治之戒也。

产后证先调脾胃

《妇人良方》曰：新产之后虽无疾，宜将息，调理脾胃，进美饮食，则脏腑易平复，气血自然和调，百疾不生也。加味四君子汤、四顺理中丸，百日之内，宜常服之。

产后服生化汤论

《产宝新书》曰：产后气血暴虚，理当大补，但恶露未尽，用补恐致滞血，唯生化汤行中有补，能生又能化，真万全之剂也。如四物汤，产后误人多矣。地黄性滞，白芍酸寒伐生气，生化汤除此二味，加以温中行血之剂。如产后儿枕作痛，世多用消块散血之剂，然后议补。又有消与补混施，不知旧血虽当消化，新血亦当生养。若专攻旧，则新血转伤。世以回生丹治产，用攻血块，下胞衣，落死胎。虽见速效，其元气未免亏损。生化汤，因药性功用而立名也。产后血块当消，而新血亦当生。若专用消，则新血不生。专用生，则旧血反滞。考诸药性，多芎、归、桃仁三味，善攻旧血，骤生新血，佐以黑姜、炙草，引三味入于肺肝，生血利气。五味共方，行中有补，实产后圣药也。

产妇胞衣一破，速煎一帖，候儿头下地即服，不拘半产正产。虽平安，少壮妇无恙者，俱宜服一二帖，以消血块而生新血，自无血晕之患。若胎前素弱，至产后见危证，不厌频服，病退即止。若照常日服一帖，岂能扶将绝之气血也。如血块痛，加肉桂三分、红花三分、益母草五钱。如产后劳甚血崩，形色虚脱，加人参三四钱。如汗出气促，人参倍加。

慎斋按：生化汤一方，载之《产宝新书》，凡产后一切证，俱以是方为加减，颇稳当可法，故录之。与《妇人良方》所载，用加味四君子、四顺理中，一治产证，一治脾胃，可并参之。

产后胞衣不下属冷乘血涩

《大全》曰：儿产出，胞衣不落，谓之息胞。由初产时用力，儿出体已疲惫，不复能用力，产胞经停之间，外冷乘之，则血道涩，故胞衣不出，急以药治之，庶不妨害于儿。所奈胞系连脐带，胞不下，即不得以时断脐浴洗，冷气伤儿成病。旧法胞衣不出恐损儿，依法截脐而已。

产后胞衣不下属血入胞中

郭稽中曰：胎衣不下者何？曰：母生子讫，流血入衣中，衣为血所胀，故不得下。治稍缓，胀满腹中，上冲心胸，疼痛喘急者难治。服夺命丹，逐去衣中之血，血散胀消，胞衣自下。牛膝汤亦效。

产后胞衣不下有虚实之分

薛立斋曰：胞衣不下有二，有因恶露入衣，胀而不能出；有因元气亏损，虚而不能出。恶露流入衣中者，腹必胀痛，用夺命丹，或失笑散，以消瘀血，缓则不救。元气虚弱，不能送下者，腹中不胀痛，用保生无忧散，以固元气。

产后胞衣不下急断脐带法

《宝庆方》曰：妇人百病，莫甚于生产。产科之难，临产莫重于催生。既产莫甚于胞衣不下，唯有花蕊石散一药，最为紧要。更有一法，产讫胞衣不下，停久，非特产母疲倦，又血流胞中，必致危笃。宜急断脐带，以物系坠，使血不潮入胞中，则胞衣自萎缩而

下。只要产母安心，以物系坠之时，宜用心先系，然后截断，不尔，胞上掩心而死，慎之。

慎斋按：以上四条，序产后有胞衣不下之证也。胞衣不下，有冷乘血凝，有血流衣胀，有元气虚脱三证，当分因用药急治。如冬天严寒，风冷乘虚而入，胞冷血凝而不下，则当用夺命丹、牛膝散、桂附热药以下之。如血入胞衣胀满，恶露不下，则当用失笑散、花蕊石散，逐血消瘀药以下之。若元气弱，气血亏损不能下，则当用无忧散、生化汤以温补之。寒热虚实之际，不可不详审施治也。

产后血晕属败血流入肝血热逆上

《大全》曰：产后血晕者，由败血流入肝经，眼生黑花，头目眩晕，不能起坐，昏闷不省人事，谓之血晕。此血热乘虚，逆上凑心，故昏迷不省，气闭欲绝也，服童便最好。

产后血晕属瘀血奔心虚火炎上

陈良甫曰：产后瘀血奔心，因分娩后，不饮童便，以致虚火炎上也。用鹿角烧灰，童便调下即醒，此物行血极效。又用五灵脂，半生半熟，名独行散。又用返魂丹，即益母丸也。

产后血晕属恶露乘虚上攻

《家居医录》曰：产后元气亏损，恶露乘虚上攻，眼花头晕，或心下满闷，神昏口噤，或痰壅盛急，用失笑散主之。若血下多而晕，或神昏烦乱，大剂芎归汤补之，加童便。

慎斋按：以上三条，序产后血晕之属有余也。败血入肝，恶露上攻，此瘀血为患，当用行血逐瘀之药。

产后血晕属阴血暴亡心虚火炎

李东垣曰：妇人分娩，昏冒瞑目，因阴血暴亡，心神无所养。心与包络，君火相火也。得血则安，亡血则危。火上炽，故令人昏冒。火乘肺，故瞑目，不省人事。是阴血暴亡，不能镇抚也。经云，病气不足，宜补不宜泻。瞑目合眼，病悉属阴。暴去有形之血，则火上炽，但补其血，则神自安，心得血则能养，而神不昏迷矣。

产后血晕属血随气上

郭稽中曰：产后血晕者何？曰：产后气血暴虚，未得安静，血随气上，迷乱心神，故眼前生花，或闷绝不省，口噤神脱，但服清魂散即醒。

产后血晕属虚火载血上升腹中空虚所致

朱丹溪曰：妇人产后血晕，乃虚火载血，渐渐上晕也。又崔氏云：凡晕皆是虚热，血气奔送，腹中空虚所致。

慎斋按：以上三条，序产后血晕之属于不足也。阴血暴亡，虚火上升，皆由腹中空虚所致，当用补血滋阴降火之药。但滋阴不可用地、芍，降火不可用苦寒。

产后血晕分下血多少治法

陈良甫曰：产后血晕，其由有三，有使力过多而晕，有下血多而晕，有下血少而晕。其晕虽同，治之则异。如下血多而晕者，但昏闷烦乱，当以补血清心药。如下血少而晕者，多恶露不下，上抢于心，心下满急，神昏不省，当以破血行血药。

按：下血多而晕，名为血脱，当大剂人参，可以回阳，何云补血又加清心。若下血少而晕，非血滞即属血竭，未便以破血行血为妄投也。良甫晰证最明，治法尤未尽善。

产后血晕用醋漆法

崔氏曰：产妇分娩讫；将秤锤或黄石子入炭中，烧令通赤，置器中，于床前以醋沃之，可除血晕，时作为佳。或先取醋醑，以涂口鼻，仍置醋于旁，淬火炭，使闻其气。又一法，烧干漆，令烟熏产母之面即醒。如无

干漆，旧漆器烧烟亦妙。

愚斋按：以上二条，序产后血晕分血之多少，而生后立也。产后血晕，总属阴血暴亡，虚火上炎所致。夫心主血，肝藏血，肝虚则魂无所附而目晕，心虚则神不守而火乘。东垣、丹溪已悉病机之要，若良甫又分血下多少为治。如云恶露不下，上抢心而晕，此在壮实妇人新产下，恒有此患，当用行血破血之剂。若气血虚弱人，血脱过多，当大补气血为主，如大剂芎归汤、生化汤，加人参服之可也。

产后恶露不下属风冷乘虚抟血

《大全》曰：恶露不下，由产后脏腑劳伤，气血虚损，或胞络挟于宿冷，或产后当风取凉，风冷乘虚而抟于血，壅滞不宣，积蓄在内，故不下也。

立斋按：前证若恶露不下，用失笑散；气滞血凝，用花蕊石散。

愚斋按：以上一条，序产后恶露不下之证也。彭用光有云：凡看产后病，须问恶露多少有无。此要语也。夫新产恶露，属养胎余血，杂浊浆水。儿既产，如气血旺者，恶露随之而下。如气血弱者，阻碍小腹为病。上攻则为血晕闷绝，蓄瘀则为儿枕痛、心腹痛、癥瘕积聚，四肢肿满、血蛊诸证。《大全》以风冷乘虚，抟血不宣所致。此在秋冬寒月，多有犯之。但《大全》既云风冷抟血矣，何疗主酒日：恶露不下，方中独加芍药、知母，《产济方》内更用大黄、芍药、生地汁。夫以寒药治瘀凝之血，有是理乎？《准绳》独首载之，不可解。

产后恶露不绝属虚损脏腑挟冷

《大全》曰：产后恶露不绝，由产后伤于经血，虚损不足，或分娩之时，恶血不尽，在于腹中，脏腑挟于宿冷，致气血不调，故令恶露淋漓不绝也。

产后恶露不止属血滞不化

戴复庵曰：妇人服固胎药太多，或正产，或半产，胎虽下而恶血不去，或经二三月，恶露犹点滴不尽。此非败血之比，正缘当来，有固经药在内，致血滞不化。药宜顺血通气，不宜蓄血闭气也。

产后恶露不绝属肝脾经病

薛立斋曰：前证若肝气热，不能生血，六味丸。若肝气虚不能藏血，逍遥散。若脾气虚，不能摄血，六君子汤。胃气下陷，不能统血，补中汤。若脾经郁热，血不归源，加味归脾汤。若脾经怒火，血妄行，加味四物汤。若气血两虚，十全大补汤。若肝经风邪，其血沸腾，一味防风丸。

愚斋按：以上三条，序产后有恶露不绝之证也。妇人产下，其血不止，大约一月为期。如不及一月而止者，气血虚也。如逾一月二月，而淋漓不绝，非气虚不能摄血，即立斋所论肝脾二经有亏。《大全》云经血虚损不足是矣。又主于脏腑挟宿冷所致。夫血得热则行，得冷则凝，岂恶露不绝，反为寒冷致病之理。立斋以为肝脾郁热怒火，此诚善悉病机者也。但产后血脱，当用益气升提之法。如《千金方》治恶露不绝，经月半岁，用一味升麻，酒煎服，正是此意。至下多亡阴，则有寒无热，姜、桂亦所宜用。临证审之。

产后头痛属阳实阴虚

《大全》曰：头者，诸阳之会也。产后五脏皆虚，胃气亏弱，饮食不充，谷气尚乏，令虚热；阳气不守，上凑于头，阳实阴虚，则令头痛。又有产后败血头痛，不可不知。

薛立斋曰：前证若中气虚，补中汤加蔓荆。若血虚，四物加参、术。气血俱虚，八珍汤。若风寒所伤，补中汤倍加川芎。

产后头痛属风寒用生化汤

单养贤曰：产后头痛，身热恶寒，虽是感冒风寒，只宜服生化汤一二服，慎不可用柴胡、麻黄等药，以表虚。其汗剂中川芎、干姜，其味辛温，亦能散邪退热。如头痛不解，加连须、葱白三枚。

慎斋按：以上二条，序产后有头痛之证也。头痛有三阳三阴经之分，属风寒外感者居多。若产后头痛，虽有风寒，而本之血虚者，其病源也。唯大剂芎、归养血，血行则风自灭。若立斋以补中汤倍川芎，此是治气虚头痛为宜。至污血头痛，产后恒有，若用黑龙丹下蝗虫子，此又病机之不可测者矣。

产后心痛属虚寒血凝不散

《产宝百问》曰：心者血之主，产后虚寒，血凝不散，气逆上冲于心，以温热治之，寒去则血脉温而经脉通，大岩蜜汤主之，四物去川芎，加独活、吴茱、干姜、细辛、桂心、甘草。

产后心痛属阴亏火冲包络

《大全》曰：产后心痛，为阴血亏损，随火上冲心络，名曰心包络痛，宜大岩蜜汤治之。若寒伤心经，名曰真心痛，无药可救。

产后心痛属寒气上攻

单养贤曰：产后寒气上攻则心痛，下攻则腹痛，兼血块者，宜服生化汤加桂。未止，加吴茱、姜三片助血。若独用诸热药攻寒，其痛难止，其血未免来多，以虚产母也。

产后心痛属血虚

薛立斋曰：前证若阳气虚寒，岩蜜汤温之。瘀血上冲，失笑散行之。血既散而痛仍作，八珍汤补之。大凡心腹作痛，以手按之不痛，此血虚也，须用补养之剂。

慎斋按：以上四条，序产后有心痛之证也。心痛在产后，非血虚火逆，即寒凝伤血，《产宝》所岩蜜汤，治虚寒血疾，则得矣。若《大全》火冲心包络，而亦用岩蜜汤治之，已热药从治之意，能无助邪为患。至有产后余血心痛，亦属恶露不尽。如陈无择评大岩蜜汤下云，产后心痛，虽非产蓐常疾，痛或有九，未必便是血痛。设是岩蜜汤，岂可用熟地泥血，安能去痛。以此汤治血痛，不若失笑散更捷。予谓产后心痛，属血者多，亦有寒热虚实不同。若云未必便是血痛，则非矣。

产后腹痛属腹有干血

《金匮要略》曰：产后腹痛，法当以枳实芍药散。假令不愈，此为腹中有干血着脐下，宜下瘀血汤主之。

产后腹痛属余血壅滞

《大全》曰：产后恶血，虽常通行，或因外感五邪，内伤七气，致令骤然而止，余血壅滞，所下不尽，故令腹痛，当审因治之。

产后腹痛属伤食裹血

王节斋曰：假如产妇数朝内、或饮食如常，忽作腹痛，六脉沉伏，四肢厥冷，此恶露不尽，伤食裹血，而脉不起也，不可误认为气血两虚，用大补剂，须用消导行血之药。

产后腹痛属气弱阻寒

《金匮要略》曰：产后腹中疗痛，当归生姜羊肉汤主之。注曰：疗痛者，缓缓痛也。概属客寒相阻，故以当归通血分之滞，生姜行气分之寒。君以羊肉者，所谓形不足，补以味。羊肉补气，疗疼属气弱，故宜之。

产后腹痛属冷气乘虚入产门

寇宗奭曰：妇人产当寒月，寒气入产门，脐下胀满，手不得犯，此寒疝也。医将治以抵当汤，谓有瘀血也。予教之曰：非其治也，可服仲景羊肉汤。又产后六七日，忽然脐腹

痛，皆由呼吸之间，使冷气乘虚而入，宜服当归建中汤、四顺理中丸。

慎斋按：产后有下血过多、冲任空虚，肝经血少而腹痛，脉弦者，以熟地、山茱为主，加白芍药、木瓜、蒺藜一剂。有难产久坐，风入胞门，而腹痛欲绝，脉浮而弦，续断一两、防风五钱，服之立愈。一虚一实，不可不辨。

产后腹痛分证用药法

《家居医录》曰：产后腹痛，恶露既去而仍痛，四神散调补之，不应，八珍汤。若痛而恶心，或欲作呕，六君子汤。若痛而泄泻，六君子汤送四神丸。若胸膈饱闷，或恶食吞酸，或腹痛，手不可按，此是饮食所伤，用二陈加白术、山楂消导之。若食既消而仍痛，或按之不痛，或更加头痛，烦热作渴，恶寒欲呕等证，此是中气被伤，宜补脾胃为主。若发热腹痛，按之痛甚，不恶食，吞酸，此是瘀血停滞，失笑散消之。若止是发热头痛，或兼腹痛，按之却不痛，此是血虚，用四物加炮姜、参、术，以补之。

产后血块腹痛戒用峻厉药

《产宝新书》曰：产后血块痛，用生化汤加肉桂、红花，块散痛止。慎不可用苏木、三棱、蓬术等峻利之药。虽山楂行气行血，亦不易多服，恐虚产母也。

慎斋按：以上七条，序产后有腹痛之证也。产后腹痛有虚实之分，实者有恶露不尽，有干血瘀滞，有食伤衰血。虚者有气弱寒阻，有血虚空痛。自当审因施治。在虚者固宜补气补血，而实者亦未可以峻厉克伐，重虚其虚也。

产后小腹痛属恶露凝结

《产宝百问》曰：产后小腹痛，由恶露凝结，或外寒抟之。若久而不散，必成血瘕，月水不调。

产后小腹痛属血滞名儿枕痛

《大全》曰：儿枕者，由母胎中宿有血块，因产时其血破败，与儿俱下则无患。若产妇脏腑风冷，使血凝滞在小腹，不能流通，令结聚疼痛，名曰儿枕痛。胎以食母之血，十月满足，余血结成块，俗呼为儿枕。欲产时，血块先动，败血裹其子，是以难产。

产后小腹痛属瘀血停滞有骨疽证

薛立斋曰：有产妇小腹作痛，服行气破血药不效，脉洪数，此瘀血内溃为脓也。大抵此证，因荣卫不调，瘀血停滞，宜急治之。缓则腐化为脓，最难治疗。若流注关节，则患骨疽，失治多为败证。脉数而洪，已有脓，迟紧乃瘀血也，下之愈。若腹胀大，转侧作水声，或脓从脐出，或从大便出，宜蜡矾丸、太乙膏，或瓜子仁汤，下脓而愈。

产后脐下痛作恶露不尽论

单养贤曰：产后脐下痛，在七日内未曾服药者，当作恶露不尽论。如按而痛止者属虚，加味生化汤。

慎斋按：以上四条，序产后有小腹痛之证也。产后小腹痛，非恶露瘀蓄，即风寒乘袭。小腹为足厥阴部分，藏血之所。儿产后，一有不慎，则风寒乘虚，与恶血凝结，即有儿枕痛之名。若瘀血溃脓，亦不早治之故也，临证宜虑及之。

产后腰痛属血滞经络

《大全》曰：产后恶露方行，忽然渐止，断绝不来，腰中重痛，下注两股，痛如锥刺入骨，此由血滞经络。不即通之，必作痈疽，宜桃仁汤、五香连翘汤。

慎斋按：产后恶露不行，血滞经络，而作痈疽，必是血气大虚，荣卫不调所致，必八珍、十全可疗，用桃仁、五香则谬矣。

产后腰痛属劳伤肾气风冷乘虚

《大全》曰：肾主腰脚，产后腰痛者，肾为胞胎所系，产则劳伤肾气，损动胞络，虚未平复，风冷客之，冷气乘腰，故令腰痛。若寒冷邪气，连滞背脊，痛久未已，后忽有娠，必致损动，盖胞络属肾，肾主腰故也。

产后腰痛属真气虚

薛立斋曰：前证真气虚，邪乘之，用当归黄芪汤，或十全汤为主，佐以寄生汤，不应，十全汤加附子。

慎斋按：以上三条，序产后有腰痛之证也。胞胎系于肾，腰者肾之外候，产后劳伤肾气，损动胞络，属虚者居多，虽有风冷滞血，亦必兼补真气为要，立斋一条，抉其旨矣。

产后胁痛属气与水相激

《大全》曰：产后两胁胀满气痛，由膀胱宿有停水，因产后恶露下不尽，水壅，瘀与气相抟，积在膀胱，故令胁肋胀满，气与水相激，故令痛也。

产后胁痛分证用药之法

薛立斋云：此证若肝经血瘀，玄胡索散。若肝经气虚，四君子加柴胡、青皮。若肝经血虚，四物加参、术、柴胡。若肾水不足，不能生肝，六味丸。若肺金势盛，克制肝木，泻白散，仍参前证治之。此证苟非用姜、桂辛温，助脾肺以行药，不唯无以施功，而反助其胀矣。

慎斋按：以上二条，序产后有胁痛之证也。胁者肝之部分，肝藏血，产后恶露不尽，与去血过多，均足以致胁痛，未必属于水气相激。必参立斋一条，始攸当尔。

产后遍身疼痛属血气失其常度

郭稽中曰：产后遍身疼痛者何？曰：因产走动气血，升降失其常度，留滞关节，筋脉引急，是以遍身疼痛，甚则腰背强硬，不能俯仰，手足拘挛，不能屈伸。或身热头痛，不可作他病，但服趁痛散，循流血气，使筋脉舒畅，疼痛自止。

陈无择曰：趁痛散不特治产后气弱血滞，兼能治太阳经感风头痛，腰背疼，自汗发热。若感寒伤食，忧恐惊怒，皆致身疼，发热头痛，况有蓐劳，诸证尤甚，趁痛散皆不能疗。不若五积散入醋煎用，却不妨。

立斋按：五积散治产后身痛，兼感寒伤食。若气虚血弱人，似非所宜。如手按而痛，是血瘀滞也，用四物，炮姜、桃仁、红花、泽兰，补散之。按而痛稍缓者，血虚也，四物加参、术、炮姜，补养之。

慎斋按：以上一条，序产后有遍身疼痛证也。产后百节开张，血脉流散。曰遍身，则自筋骨皮肉，手足，胁腹腰背，无处不痛。《大全》以为血滞经络，似属有余。然去血过多，虚而风寒袭之，亦为疼痛。故趁痛散为的对药，无择乃云不能疗，不若五积散，殊未确也。

产后血块筑痛属风冷凝血

杨仁斋曰：此因产后赶血未尽所致。世俗收生，多就踏板赶血。不思生产时，已坐草近地，产毕，脏腑空虚，又近地赶血，冷湿风邪，乘虚而入，使败血凝为血块，是谓母血冲筑硬痛。治法，以不换金正气散，加辣桂、蓬术、干姜、川芎、白芷，热服，散其冷湿风邪，从二便出。

产后积聚属气血为风冷所抟

陈良甫曰：积者，阴气也，五脏所生；聚者，阳气也，六腑所成。然积为阴，阴性沉伏，故痛不离其部。聚为阳，阳性浮动，故痛无常处。皆由产后气血虚弱，风冷所乘，搏于脏腑，与血气相结，故成积聚癥块也。

产后腹痛属风冷搏血

《大全》曰：新产后有血与气相搏而痛者，谓之瘕。瘕者，假也，谓其痛浮假无定处也。此由风有风冷，血气不调，至产，血下少，故致此病。不急治，多成积结，妨害月水。

产后寒气入腹名寒疝

《妇人良方》曰：产后寒气入腹，硬筑，脐下刺痛，此名曰寒疝，当用炒吴茱萸。若误认为恶露不尽，小腹蓄血，则谬矣。

产后有血损筋挛之证

薛立斋曰：有产妇腹中有一物，时痛不止，以为血瘕，用行血破气药，两胁肚腹尤甚，支节间各结小核，隐于肉里，以为鬼子，方用下虫药。夫肝藏血而养诸筋，此肝血虚损，筋涸而挛结耳。肢节胸项，皆属肝胆部分。养其脾土，补水以滋肝血，则筋自舒，八珍汤、逍遥散、归脾汤加减治之。

产后气血壅结宜固元气

薛立斋曰：凡真气亏损，则邪气乘之，况产得此，尤当固元气为主。若求旦夕之效而攻邪，则速其危矣。如寒邪乘客，气血壅结，此因气病而血病也，当补养胃气，调和月经，宽缓静养为善。

慎斋按：以上六条，序产后有血块积聚，瘕疝筋挛诸证也。产后恶血不尽，气血虚而风寒乘袭，则血凝气滞，遂为血块瘕疝等证。若用破血耗气之剂，以攻有形之邪，祸不旋踵。故以立斋固元气一条序后，示人戒木之道也。

产后口干痞闷属面毒聚胃

郭稽中曰：问产后口干痞闷者何？答曰：产后荣卫太虚，血气未定，食面太早，胃不能消化，面毒结聚于胃，上熏胸中，是以口干燥渴，心下痞闷。医者不识，认为胸膈壅滞，以药下之，万不得已，但服见睍丸则愈。

陈无择曰：产后口干痞闷，未必只因食面，或产母内虑忧烦，外伤燥热，饮食甘肥，使口干痞闷，当随所因调之可也。

产后伤食停滞分证用药法

薛立斋曰：前证若宿食停滞，六君子加枳实、神曲，若因肉食，加山楂，若因鱼鲊，加陈皮，其物既消而仍痞，或反作痛作呕，此脾胃受伤，六君子，或嗳酸嗳腐，加炮姜。作泻加升麻，不应，佐四神丸，或间用补中汤。

慎斋按：以上二条，序产后有伤食之证也。产后气血二虚，胃中元气甚弱，凡饮食俱有宿伤，必须补气，而食自消，或不止而自去。宜北方以面为食，南方风俗，土瓠瓜瓠之类，可食者多，产妇脾虚，伤之者多，此儒中医此为主也。故每见新产妇食白粥，并或食鸡子，正以虚人易致停滞故耳。

产后腹胀呕吐属败血入脾胃

郭稽中曰：产后腹胀满闷，呕吐不定者何？曰：败血散于脾胃，脾受之则不能运化精微而成腹胀，胃受之则不能受纳水谷而生吐逆，医者不识，若以寻常治胀止吐药，病与药不相干，转伤动正气，疾愈难治，但服抵圣汤则愈。

产后腹胀呕吐属饮食伤脾胃

薛立斋曰：前证若败血伤脾胃，宜用前方。若饮食停脾，宜六君子加厚朴。若饮食伤胃，宜六君子汤。大抵损其脾者，当节饮食为善。

慎斋按：以上二条，序产后有腹胀呕吐之证也。产后腹胀呕吐，未有不因脾胃虚弱所致。郭论则主于败血，薛论则主于伤食。食与血均属有余证，攻补合宜，是在临证之工耳。

产后呕吐属肠胃燥涩气逆

《大全》曰：胃为水谷之海，水谷之精，以为血气，荣润脏腑。因产则脏腑伤动，有时而气独盛，气乘肠胃，肠胃燥涩，其气则逆，故呕逆不下食。

产后呕逆属恶露不下

郭稽中曰：胃受水谷，脾主运化，生血生气，内濡脏腑。因产暴虚，恶露不下，败血乘虚，散于脾胃。脾受之为腹胀，胃受之为呕吐。亦有恶露过多，气无所生，聚于脾胃。脾受之，亦为腹胀。胃受之，亦为吐逆也。

产后呕吐属脾胃病分证用药

薛立斋曰：产后呕吐，因饮食过多者，六君子加楂、曲。兼劳役者，补中汤。因饮食停滞者，人参养胃汤。脾胃气虚者，六君子。胃气虚寒者，加炮姜、木香。寒水侮土者，益黄散。肝木侮土者，六君子加升、柴。命门火衰，不能生土者，八味丸。呕吐泄泻，手足俱冷，或肚腹作痛，乃阳气虚寒，急用附子理中。

愚斋按：以上三条，产产后有呕吐之证也。呕吐为中焦病，产后气血大亏，则中气不运，为饮食所伤，而呕吐者多。若《大全》主于燥涩气逆，稽中主于恶露不下。此在新产三四朝内，庸有之，病机不可不审。

产后呃逆属脾虚聚冷胃中伏寒

《大全》曰：肺主气，五脏六腑俱禀于气。产后气血伤，脏腑皆损。风冷袭于气，则气逆上。又脾虚聚冷，胃中伏寒，因食热物，冷热之气相为冲击，使气厥不顺，则为呃逆。脾主中焦，为三焦之关，五脏之仓廪，贮积水谷。若阴阳气虚，使荣卫之气厥逆，致生斯病。经云：呃噫者，胃寒所生，服药无效，灸期门穴三壮必愈。

产后呃逆分证用药法

薛立斋曰：前证属胃气虚寒之恶候。如用丁香散未应，急投参附汤，亦有生者。若产后呃逆，有寒热虚实之不同。如寒者，丁香、姜、桂。热者，宜干柿、竹茹。虚者，宜人参、附子。实者，宜香附、橘皮。误施则有噬脐之悔。

愚斋按：以上二条，产产后有呃逆之证也。经云：病深者，其声吵。吵即呃逆也。诸病见之为恶候，况产后犯此。有虚无实，有寒无热矣。立斋必兼热实论，昧谬。若古方治产后痰逆，又兼败血攻停胃逆，用丁香豆蔻散，煎桃仁、吴茱汤下之。病机又不可不知。

产后气喘属败血停凝上熏于肺

郭稽中曰：产后恶露不快，败血停凝，上熏于肺，亦令喘急，但服夺命丹，血去而喘自定。又产后败血冲心，胸满上喘，命在须臾，服血竭散，或参苏饮。治产后血入于肺，面黑发喘欲死，人参一两，苏木二两。

产后发喘属污血感寒

娄全善曰：产后喘者多死，有产二月，洗浴即气喘，坐不得卧者，五月恶风，得暖稍缓，用丹皮、桃仁、桂枝、茯苓、干姜、枳实、厚朴、桑皮、紫苏、五味、括蒌煎服，即卧，其痰如失，作污血感寒治也。

产后气喘属孤阳绝阴

郭稽中曰：产后喉中气急喘促者何？答曰：荣者，血也；卫者，气也。荣行脉中，卫行脉外，相随上下，谓之荣卫。因产所下过多，荣血暴竭，卫气无主，独聚肺中，故令喘。此名孤阳绝阴，为难治。

产后发喘不可误药

单养贤曰：产后发喘气促，此第一危证

也。世每以痰火实证治之，讹以传讹，当以人参生化汤加减。人多疑参能助喘不用，致不救者多矣。加芎、归在内，万无有失。有用参加陈皮监制，反致耗散，切不可信。

慎斋按：以上四条，序产后有发喘之证也。产后发喘，有虚实之分。败血入肺，污血感寒，此属于实也。参苏饮、夺命丹、血竭散，下之而愈。若去血过多，荣血暴竭，卫气无主，孤阳上浮，此血脱而气不归元也。非大剂人参生脉散，与生化汤加桂、附莫疗。误以风痰污血为治，是速之毙矣。观立斋治产后喘急，谓脾肺气弱，用六君子。中气虚寒，用补中汤加姜、桂。更有阳气虚脱，喘促自汗，手足俱冷，以参附汤大剂服之。论诚知本也。

女科经纶　卷六

携李　萧　壎赓六纂著
鄞县　曹赤电炳章圈校

产后证　下

产后浮肿属败血停积不可作水气治

《产宝百问》曰：产后四肢浮肿，由败血乘虚停积，循经流入四肢，留淫日深，腐坏如水，故令面黄，四肢浮肿。医人不识，便作水气治之。凡治水，多用导水药。极虚人产后既虚，又以药虚之，是谓重虚，多致夭枉，服小调经散，血行肿消则愈。

产后浮肿属血与气搏留滞经络

陈无择曰：产后浮肿多端，有自怀妊肿至产后不退。亦有产后失于将理，外感寒暑风湿，内则喜怒忧惊，血与气搏，留滞经络，气分血分，不可不辨，当随脉证治之，宜得其情。小调经散治血分固效，但力浅难凭，不若吴茱萸汤、枳术汤、夺魂散、大调经散、皆要药也。

产后浮肿属风邪搏气

陈良甫曰：产后劳伤血气，腠理虚，为风邪所乘，邪搏于气，不得宣越，令虚肿轻浮，是邪搏于气，气肿也。若皮肤如熟李状，则变水肿。气肿者，发汗即愈。水肿者，利小便即差。

慎斋按：产后虚肿，多属气血虚而脾胃弱，荣卫不运所致。若云发汗利小便，是重竭津液，而益虚其虚矣。岂产后肿，竟作外邪有余证治乎。

产后浮肿属体虚有湿热

朱丹溪曰：产后浮肿，小便少，口渴，恶寒，无力，脉沉，此体虚而有湿热之积，必上焦满闷，宜补中导水行气可也。方用白术、陈皮、茯苓、川芎、木通。

产后浮肿属虚大补气血

朱丹溪曰：产后肿，必用大补气血为主，少佐苍术、茯苓，使水自利。

产后浮肿分证治法

薛立斋曰：前证若寒水侮土，宜养脾肺。若气虚浮肿，宜益脾胃。若水气浮肿，宜补中气。又曰：产后浮肿，或兼喘咳，脉沉细无力，此命门火衰，脾土虚寒，八味丸主之。

慎斋按：以上六条，序产后有浮肿之证也。浮肿虽有风寒湿热，外邪之感，若产后则属气血虚，而脾土不运，肺气不输者多。故《产宝》以下四条，主客邪有余论；而丹溪、立斋，唯以补气血，扶脾土为要也。

产后外感风寒发热不可作伤寒治

李氏曰：产后外感，离床太早，或换衣袭风，冷入下部，令人寒热似疟，头疼不止。血虚者，芎归汤加人参、柴、葛。气虚者，补中汤加防风、干姜。切不可以伤寒法治之。

产后头痛发热不可作外伤感冒治

《大全》曰：凡产后头痛发热，不可便作外伤感冒治。此等多是血虚，或是败血作梗，

宜以和平之剂必效，如玉露散，或四物加柴胡。若便以小柴胡、竹叶石膏之类，不救者多矣。

产后诸发热状类伤寒不可发汗

吴蒙斋曰：新产后伤寒，不可轻易发汗。产时有伤力发热，有去血过多发热，有恶露不去发热，有三日蒸乳发热，有早起劳动、饮食停滞发热。状类伤寒，要在仔细详辨，切不可便发汗。大抵产后，大血空虚，汗之则变筋惕肉瞤，或郁冒昏迷，或搐搦，或便秘，其害非轻。凡有发热，宜与四物为君，加柴胡、人参、炮姜最效。盖干姜辛热，能引血药入血分，气药入气分，且能去恶生新，有阳生阴长之道。以热治热，深合《内经》之旨。

慎斋按：以上三条，序产后有外感发热之证也。产后发热，状类伤寒，虽有外感，禁用发表。唯以养血为主，佐以散风寒之剂。如生化汤、芎归汤，倍加川芎、葱白。若吴氏论发热数种，又当分因治之。如恶露未尽，腹痛未除，形壮脉实，五七朝内不见虚证，人参尚宜斟酌。如有虚证，必以桃仁与人参同用为当。

产后伤食发热宜下

《金匮要略》曰：产后病解能食，七八日更发热，此为胃实，大承气汤主之。

徐注曰：此条言大虚之后有实证，即当以实治，故谓病解能食，则经络脏腑之气俱平，无产后本病可疑。至七八日更发热，不恶寒，又无表证可疑。明是食复之象，故曰胃实，大承气峻逐之，恐因循致虚也。

产后伤食发热类伤寒

《证治要决》曰：弥月俗名满肚，多有恣意食物，致伤食发热，有类伤寒食复证，宜先用红丸子一二服，却进小柴胡汤，此论盖有所本。

产后伤食发热不可作血虚治

王节斋曰：产后脾胃大虚，多有过服饮食伤滞发热者，误作血虚则不效。故凡遇产后发热，须问服何饮食，有无伤积饱闷，恶食泄泻等证，只作伤食治之。若发热而饮食调者，方用补血正法。

产后伤食发热分证用药

薛立斋曰：前证若胸膈饱闷，嗳腐恶食，或吞酸吐泻，发热，此为饮食停滞，宜四君子加厚朴、楂、曲。若胸膈闷满，食少发热，或食难化，此为脾气虚弱，宜四君子加炮姜。若用峻厉之剂，复伤元气，则谬矣。

慎斋按：以上四条，序产后有伤食发热之证也。产后发热有六证，一曰血虚发热，二曰劳力发热，三曰瘀血发热，四曰风寒发热，五曰伤食发热，六曰蒸乳发热。须分有余不足治法，如血虚、劳力为不足，瘀血、伤食、风寒、蒸乳，为不足中之有余。不足者固宜大补气血，而不足中之有余，亦不可以务末而忘本也。《金匮》胃实一证，虽下亦当酌量。

产后发热属肝虚血燥

赵养葵曰：如胎前原有阴火证，至产后去血过多，必大发热，烦躁汗出等证。若依前法，大补气血，其证必甚，当用逍遥散以清肝火，养肝血。因去血既多，肝虚血燥之故，不可泥子气血虚之论也。

产后发热属阴虚生内热

朱丹溪曰：产后发热，此热非有余之热，乃阴虚生内热耳，以补阴药大剂服之。必用干姜者何也？曰：干姜能入肺利气，入肝经引血药生血。然不可独用，与补阴药同用，此造化自然之妙。

娄全善曰：产后发热，多属虚寒，唯干姜加入补阴药中神效，此丹溪之法也。

产后发热属阴虚阳浮于外

王节斋曰：妇人产后阴虚，阳无所依，浮散于外，故发热。用四物汤补血，以炙干姜之苦温从治，收其浮散，以归于阴也。

产后发热属血脱阳无所附

薛立斋曰：新产妇人，阴血暴亡，阳无所附而外热，四物加炮姜、补阴以配阳。若误服寒凉克伐之剂而外热，此为寒气格阳于外，四君子加姜、桂，不应，急加附子。若肌肤发热，面赤，大渴引饮，此血脱发燥也，当归补血汤。

产后阴虚发热宜补气

赵养葵曰：产后大失血，阴血暴亡，必大发热，名阴虚发热。此阴字，正谓气血之阴。若以凉药正治必毙，正所谓证象白虎，误服白虎必死。此时偏不用四物，有形之物，不能速化几希之气。急用独参汤，或当归补血汤，使无形生出有形来。阳生阴长之妙，不可不知也。

产后发热不可作火治误用寒凉

薛立斋曰：产后虚烦发热，乃阳随阴散，气血俱虚，故恶寒发热。若误作火证，投以凉剂，祸在反掌。

论丹溪治产后发热用方之法

武叔卿曰：丹溪治产后发热，以芎、归、四君子加黄芪。不用芍、地者，以新产后用血脱益气之法，不宜敛降凉血，以伐生气也。热甚者，加干姜。若产后阴血弱发热，四物加茯苓，热甚加炮姜。此方全不用气药，是血虚气不虚也。加茯苓者，使大气降而阴自生，阴生则热自退。热甚加炒干姜者，不从阳引阴，亦可从阴引阳，微乎微乎。

慎斋按：以上七条，序产后有发热之证也。产后发热，有风寒，有伤食，有瘀血，有蒸乳而外，大抵属阴血虚，而阳浮外。故当以辛温从治，戒用寒凉。若肝虚血燥，则宜补血。逍遥散清火，亦宜慎用。阴血大脱，又当益气，毋用补血。此又用药之权衡也。

产后乍寒乍热属败血不散

郭稽中曰：产后乍寒乍热者何？答曰：阴阳不和，败血不散，能令乍寒乍热也。产后血气虚损，阴阳不和，阴胜则乍寒，阳胜则乍热，阴阳相乘，则或寒或热。产因劳伤脏腑，血弱不得宣越，故令败血不散。入于肺则热，入于脾则寒。医人误作疟治，则谬矣。阴阳不和，宜增损四物汤。败血不散，宜夺命丹。又问二者何以别之？曰：时有刺痛者，败血也。但寒热无他证者，阴阳不和也。

产后败血不散寒热为闭阴闭阳

陈无择曰：产后乍寒乍热，荣卫不和，难以轻议。若败血不散，岂止脾肺二脏。大抵一阴闭一阳，即作寒热。阴胜故寒，阳胜故热。只可云败血循经流入，闭诸阴则寒，闭诸阳则热，血气与卫气解则休，遇再会而复作，大调经散，入醋煎佳。

产后败血闭阴闭阳之辨

武叔卿曰：闭阴闭阳之说，率难理解。败血闭阴则寒，闭阳则热，而有休解会作之时，则似疟矣。若瘀血，为有形之物，闭则壅矣，安有解会之所。愚谓血闭于阳经，荣卫行之不通则寒；血闭于阴经，荣卫行之不通则热，故必瘀通而寒热自已。又，就大调经散而言，行瘀于内也；五积散，行瘀于外也。又，外经或为寒客则肺病，肺病而荣卫不通则热；内脏或为冷物所伤则脾病，脾病而荣卫不通则寒。故所用之方，一主里，一主表，亦或内外俱瘀，则寒热并作，二药又均不可废。

产后阴阳不足寒热用药不同

薛立斋曰：按良甫云，此由气血虚损，阴

阳不和，宜四物加减。若败血不散，腹内作痛，宜夺命丹。夫阳气不足，阴气上入阳中而恶寒者，补中汤。若阴气不足，阳气下陷，阴中发热者，六味丸。若气血不足，恶寒发热者，八珍汤。

慎斋按：以上五条，序产后有寒热往来之证也。寒热往来，为少阳经病。产后见之，明属阴阳两虚，荣卫不和之候，当遵丹溪大补气血为治，非小柴胡可例也。若云败血不散为寒热，郭稽中有入肺入脾之论，陈无择有闭阴闭阳之议，两说均不能无疑。夫败血瘀滞，岂有或入肺或入脾之理，况寒热何独专于脾肺，其心肾肝独不可为寒热乎？败血闭阴为寒，便不能闭阳为热；闭阳为热，便不能闭阴为寒。岂有既闭阴复闭阳，得谓之败血不散乎？立言之谬，恐有惑于后人。总之，败血为病，乃生寒热，本于荣卫不通，阴阳乖格之故，武叔卿始得其旨。

产后虚汗不止属阴气虚

《大全》曰：产后虚汗不止者，由阴气虚而阳气加之。里虚，阳气独发于外，故汗出。血为阴，产则伤血，是为阴气虚。气为阳，其气实者，阳加于阴，故令汗出。阴气虚弱不复者，汗出不止，因遇风则变痉。纵不成痉，亦虚乏短气，身体柴瘦，唇口干燥，久则经水断绝，由津液竭故也。

产后虚汗有亡阳之患

单养贤曰：产后虚汗，经曰：阳气者，精则养神，柔则养筋。产后既亡血，而又汗多，乃为亡阳。汗本血液，属阴，阴亡，阳亦随之而走，故曰亡阳。产后亡血多汗，阴阳两虚，极危证也。故用药与他证不同，慎之。方用参、芪、白术、麻黄根、防风、桂枝。

产妇头汗属血虚孤阳上出

《金匮要略》曰：产妇郁冒，其脉微弱，但头汗出。所以然者，血虚而厥，厥而必冒，冒家欲解，必大汗出。以血虚下厥，孤阳上出，故头汗出。所以产妇喜汗出者，亡阴血虚，阳气独盛，故当汗出，阴阳乃复。

徐忠可曰：产妇郁冒，虚多邪少，故脉微弱，中气虚也。内虚，一身之阴阳不和，故身无汗，但头汗出。所以头汗出者何？血虚下厥，则下之阴气尽，而阳为孤阳，阳孤则上出而头汗矣。然既头汗，仍喜其汗出而解者何？盖阴不亡，则血未大虚，唯产妇血去过多而亡阴，则阳为孤阳，自阴较之，阳为独盛，所以喜其汗。损阳就阴，则阴阳平，故曰乃复。

产妇头汗属虚热熏蒸

王海藏曰：产妇头汗出，至颈而还，额上偏多。盖额为六阳之会，由虚热熏蒸而出也。

慎斋按：以上四条，序产后有汗出之证，也。经云：夺血者无汗。汗与血类，产后去血过多，则阴不维阳，阴虚而阳无所附，周身汗出不止，此为阴阳两虚，有亡阳之患，为危证。若身无汗，但头有汗，头为诸阳之会，阴血暴亡，孤阳上越，阴虽虚，而阳气尚为有余，此时阴不胜阳，故头汗，额上偏多，心火上浮，逼阳于外，急补其阴，而入以敛阳之药，则病自复。故产妇又喜其头汗出也。

产后中风属于虚

《金匮要略》曰：产后中风发热，面正赤，喘而头痛，竹叶汤主之。

徐忠可曰：中风，发热头痛，表邪也。然面正赤，所谓面若朱妆，乃真阳上浮，加之以喘，气高不下也。明是产后大虚，元阳不能自固，又杂以表邪，自宜攻补兼施。故以桂、甘、防、葛、桔梗、姜、枣，清在上之邪，竹叶清胆府之热，而以参、附培元气，返其欲脱之阳也。

产后中风属劳损脏腑气虚邪入

《大全》曰：产后中风，由产时伤动血气，劳损脏腑，未曾平复，起早劳动，致气虚而风邪乘之，冷气客于皮肤经络，但疼痹羸乏不任，少气。大凡筋脉挟寒则挛急，喎僻，挟温则纵缓虚弱。若入诸脏，恍惚惊悸，随其所伤脏腑经络，而生病焉。

产后中风属劳伤所致

郭稽中曰：产后中风者何？答曰：产后五七日内，强力下床，或一月之内，伤于房室，或怀忧怒，扰荡冲和，或因食生硬，伤动脏腑。得病之初，眼涩口噤，肌肉瞤搐，渐至腰脊，筋急强直者，不可治。此乃入作，非偶尔中风所得也。

产后中风属下血过多虚极生风

《大全》曰：产后下血过多，虚极生风者何？答曰：妇人以荣血为主，因产血下太多，气无所主，唇青肉冷，汗出，目眩神昏，命在须臾，此虚极生风也。若以风药治之，则误矣。

产后中风宜大补不可作风治

朱丹溪曰：产后中风，口眼㖞斜，必用大补气血，然后治痰。当以左右手脉，分气血多少以治，切不可作中风治，用小续命汤，发表治风之药。

产后中风当补元气为主

薛立斋曰：产后中风，果外邪所属，形气不足，病气有余，当补元气为主，稍佐治病之药。若强力不休，月内入房，形气俱不足，当纯补元气，多有复苏者。若误投风药，是促其危也。前证若心脾血气俱虚，十全汤，不应，加附子、钩藤。若肝经血虚，逍遥散加钩藤。经云：脾之荣在唇，心之液为汗。若心脾二脏虚极，急用参附救之。

慎斋按：以上六条，序产后有中风之证也。中风有真中、类中，有火有气有痰，中脏中腑中血脉之不一。若产后中风，总属血虚而动伤脏腑所致。即有外邪，以大补为主。遵丹溪、立斋之法，为不易也。若舍此而以中风为治，用愈风、续命之类，速之毙矣。戒之。

产后血虚中风病痉

《金匮要略》曰：新产妇人有三病，一者病痉，何谓也？曰：新产血虚，多汗出，喜中风，故令病痉。

产后血虚汗多遇风变痉

郭稽中曰：产后血虚，腠理不密，故多汗。因遇风邪袭之，则变痉。痉者，口噤开，背强而直，如发痫状，摇头马鸣，身反折，气息如绝，汗出如雨，两手撗空者，不可治。

产后痉属亡血过多筋无所养

薛立斋曰：产后发痉，因去血过多，元气亏损，或外邪相袭，致牙关紧急，四肢痉强，或腰背反张，肢体抽搐。若有汗不恶寒，曰柔痉。无汗恶寒，曰刚痉。然产后患之，由亡血过多，筋无所养而致。大补气血，多保无虞。若攻风邪，死无疑矣。

产后病痉属阴虚内热生风

缪仲淳曰：产后血虚，角弓反张，病名曰痉。痉者，劲也。去血过多，阴气暴虚，阴虚生内热，热极生风，故外现风证。其实阴血不足，无以养筋所致。足厥阴肝经大虚之候，宜益阴补血，清热则愈。

产后成痉不可同伤寒例治

薛立斋曰：仲景云，伤寒有汗为柔痉，用桂枝汤。无汗为刚痉，用麻黄汤。产后得此，血气俱虚。败证不可与伤寒例看，丹溪云，产后当大补气血为主，多服参、芪、附子。中

风乃虚极之象，固其本元，诸病自退。

产后变证不可轻用发表

娄全善曰：小续命、大豆紫汤、举卿古拜散，俱太阳厥阴药也。如邪实而脉来浮弦有力者固宜，但产后气血大虚人，不宜轻发其表，但用防风当归散治之为妙。

用续命汤辨

武叔卿曰：寒主收引，风寒在太阳经，项背强直者，太阳筋病也，诸方皆主续命，从仲景论也。郭氏不问产后虚实，邪之有无，概宗之，似乎一偏。至薛氏，又以产后亡血过多，非十全大补不可，又一见也。及《夷坚志》，按以大豆紫汤、独活汤而愈，又主于风矣。是续命亦不为妄也。但本方有麻黄、附子，气血两虚人，不可轻用。而郭氏论又有速灌之说，稍缓即汗出如雨，反不以麻黄为忌，何语之切也。二说似不可废，临证之际详之。

慎斋按：以上八条，序产后有痉证也。产后成痉，大抵血虚所致。故《金匮》以下四条，均主于亡血过多，当从立斋、仲淳治例。后二条，辨不可用续命汤，致有误治之失，以示戒也。

产后口噤属血气虚风乘三阳经

《大全》曰：产后中风口噤，是血气虚而风人颔颊口之筋也。手三阳之筋结于颔，产则劳损脏腑，伤于筋脉，风乘之，则三阳之筋脉偏虚，得风冷则急，故令口噤。

产后角弓反张属体虚受风

《大全》曰：产后角弓反张，是体虚受风，风入诸阳之经也。人之阴阳经络，周环于身，风邪乘虚，入诸阳之经，则腰背反折，挛急如角弓状。

产后角弓反张属虚象宜固气血

薛立斋曰：前证因气血耗损，腠理不密，汗出过多，患此乃虚象也，宜固气血为主。此证乃气血虚极，宜大剂参、芪、归、术、肉桂培养之，不应，加附子，倍人参，名参附汤。犹未应，乃药力未能及，宜多用之。

产后痿疯属阴虚火炽筋无所养

薛立斋曰：痿者，筋脉拘急也。疯者，筋脉弛纵也。经云：肝主筋藏血。肝气为阳为火，肝血为阴为水。产后阴血去多，阳火炽盛，筋无所养而然。治法以八珍汤加丹皮、钩藤，以生阴血，则阳火退而诸证愈。不应，用四君子、芎、归、丹皮、钩藤补脾土。盖血生于至阴，至阴者，脾土也。此证若肢体恶寒，脉微细者，此为真状。若脉浮大，发热烦渴，此为假象，唯当固本为善。若无力抽搐，戴眼反折，汗出如珠者，不治。

产后拘挛属气血不足

《大全》曰：产后中风，筋脉四肢挛急者，气血不足，脏腑俱虚。月内未满，起早劳动，动伤脏腑，虚损未复，为风所乘，风邪冷气，客于皮肤经络，令人顽痹不仁，羸乏少气，风气入于筋脉，挟寒则挛急也。

产后拘挛属肝经风热血燥

薛立斋曰：肝属木主筋，若肝经风热血燥，用加味逍遥散，不应，六味丸以补肾水。经云：风客淫气，精乃亡，邪伤肝也。

慎斋按：以上五条，序产后有口噤、角弓、痿疯，拘挛诸证也。诸证为中风内见证，虽有口噤、角弓异名，总以产后气血大虚所致。故一切风药，概不可用。唯遵丹溪、立斋之论治，为产后中风病之要道也。

产后不语属败血入心

郭稽中曰：产后不语者何？答曰：人心

有七孔三毛。心者，君主之官，神明出焉，外应于舌，舌者声之机。产后虚弱，多致败血停蓄，上干于心，心窍闭塞，神志不能明了。又心气通于舌，心气闭则舌强不语，但服七珍散。

产后不语属胃湿热痰迷心

武叔卿曰：产后不语，有临产服药与汤过多，胃湿使然。又有热痰迷于心不语，导痰汤。

产后不语属热血热痰迷塞心窍

方约之曰：产后不语，有热血迷塞心窍者，有热痰迷塞心窍者，前方七珍散治热血，孤凤散治热痰。肥人多是热痰，瘦人多是热血。

产后不语分证用药

薛立斋曰：经云，大肠之脉散舌下。又云：脾之脉，是动病舌本强，不能言。又云：肾之别脉，上入于心，系舌本，虚则不能言。前证若心肾气虚，用七珍散。肾虚风热，地黄饮。大肠风热，加味逍遥散加防风、白芷。脾经风热，秦艽升麻汤。肝经风热，柴胡清肝散加防风、白芷。脾气郁结，加味归脾汤加升麻。肝木太过，小柴胡加钩藤。脾受木侮，加白芷、升麻、钩藤。肝脾血虚，佛手散。脾气虚，四君子汤。气血俱虚，八珍汤。不应，独参汤加附子，补其气而生血。若竟用血药，则误矣。

慎斋按：以上四条，序产后有不语之证也。产后不语，稽中主于败血迷心，《济阴》主于胃湿热痰，此皆论病之属有余也。产后去血过多，阴火上乘，郁冒心神为不语，此证之属虚者为多，而败血热痰，亦间有之。至论胃湿使然，则迂矣。若立斋又兼肝脾风热用药，多以防、芷、升、柴为发散，似未切中病机也。

产后惊悸属心气虚风邪抟心

《大全》曰：产后脏虚，心神惊悸者，体虚心气不足，心经为风邪所乘。或恐惧忧迫，令心气受于风邪，邪抟于心，则惊不自安，惊不已，则悸动不定。其状目睛不转，不能动，诊其脉动而弱者，惊悸也。

产后惊悸属心血虚

薛立斋曰：人所主者心，心所主者血，心血虚，神气不守，惊悸所由来也，当补血气为主。

产后恍惚属荣卫不足风邪所乘

《大全》曰：产后中风恍惚者，由心主血，血气通于荣卫脏腑，遍循经络。产则血气俱伤，五脏俱虚，荣卫不足，即为风邪所乘，令心神恍惚不定。

产后恍惚不可作风治

薛立斋曰：产后恍惚证，当大补血气为主，佐后方为善。盖风为虚极之假象，固其本元，诸病自退，若专治其风，则速其危矣。

慎斋按：以上四条，序产后有惊悸恍惚之证也。《济阴纲目》云：不语至惊悸恍惚诸证，有谓气虚血虚，有谓败血入心，有谓风邪所乘，一皆名为心风。然此风从何来，当从何治，前人亦未之悉，但言治痰治风。丹溪、立斋，则以大补气血为主，各有所见，在临证酌用之。愚谓产后不语一证，有败血、有湿、有热痰、有风热，一主实邪外感为病，而不及于虚，此亦前人立论之失。若惊悸恍惚，自是血虚，心气不足所致。《大全》必言风邪抟心，致有斯证，其言甚戾。立斋以为但固本原，毋专治风，有功来学不小。

产后发狂属败血冲心

《大全》曰：产后因惊，败血冲心，昏闷发狂，如见鬼祟，宜《局方》大圣泽兰散，加

辰砂、枣仁汤下之。

立斋按：此乃血虚，神不守舍，非补养元气不可。

产后发狂属肝虚火炎

缪仲淳曰：有产后六朝发狂，持刀杀人，此阴血暴崩，肝虚火炎故也。用泽兰、归、地、牛膝、茯神、远志、枣仁，加童便。

产后乍见鬼神属败血停心

《大全》曰：心主身之血脉，因产伤耗血脉，心气虚，则败血停积，上干于心，心不受触，遂致心中烦躁，卧起不安，乍见鬼神，言语错乱。医人不识，呼为风邪，如此治必不愈。但服调经散，加龙脑，得睡即安。

产后乍见鬼神属血虚邪淫

郭稽中曰：产后乍见鬼神者何？曰：肝藏血，心主血。因产去耗其血，劳动肝心，败血奔冲，邪淫于心，所以乍见鬼神，言语颠倒，非风邪也。但服调经散、黑龙丹。

产后乍见鬼神属心脾血少

薛立斋曰：产后乍见鬼神，若败血停滞，用调经散；若心血虚损，用柏子仁散。此证皆心脾血少所致。但调补脾胃之气，则痰清而神自安。若果系鬼祟所附，即灸鬼穴可愈。其或不起，多因豁痰降火攻伐之过也。

慎斋按：以上五条，序产后有发狂见鬼之证也。夫心所主者血也，心生血，肝藏血。产后阴血暴亡，则心失所养，肝火得以上炎。肝藏魂，心藏神，血虚则神魂不守，有发狂见鬼诸证。此皆虚火上乘之病，立斋但主补虚，而未之论及。缪仲淳一条，乃发前人未发。

产后妄言见邪不可作痰火论

单养贤曰：产后失血，心神失守，妄言见邪，宜服生化汤，加茯神、枣仁、远志。慎不可作痰火论，用消痰降火药，信师巫以惊产母。

产后狂言谵语分五证治

《大全》曰：产后语言颠倒，或狂言谵语，如见鬼神，其源不一。辨证治之。一则因产后心虚，败血停积，上干于心，而狂言独语者，当在乍见鬼神条求之。二则产后脏虚，心神惊悸，志意不安，言语错乱，不自知觉，神思不安者，当在惊悸条求之。三则有宿风毒，因产心虚气弱，腰背强直，或歌哭嗔笑，言语乱道，当作风痉治，在心惊中风条求之。四则产后多因败血迷乱心经，言语颠狂，或晕闷，当于血晕中求之。五则产后感冒风寒，恶露断然不行，憎寒发热如疟，昼日明了，暮则谵语，如见鬼状，当作热入血室治之，宜琥珀地黄丸及四物汤。以上诸证，大抵产后首当逐败生新，然后仔细详疾，不可妄立名色，自生新意。加减方药，大宜对证，依古法施治，未有不安者也。

薛立斋按：前证当固胃气为主，佐以见证之药。若一于攻痰，则误矣。

产后虚烦属余血奔心

《大全》曰：产后余血奔心，以致虚烦。盖因分娩后，不与童便，并扦心下，及卧太早，兼食不相宜之物所致。

产后虚烦戒服竹叶石膏汤

陈无择曰：寻常治诸虚烦热，以竹叶石膏汤、温胆汤。不知产后与寻常不同，如石膏等药，不宜轻用，用之必死。

产后渴属于血虚

《集验方》曰：产后血渴，血渴者，血虚而渴也。方用人参、麦冬、生地、甘草、瓜蒌。又，产后心烦发渴，宜清心莲子饮。

产后心烦血渴分证用药

薛立斋曰：前证若由血过多，虚火上炎，用童便入四物，加白术、麦冬、丹皮。若胃气虚有热，竹叶黄芪汤。若血虚发热，八物加麦冬、五味。若血脱烦躁，用当归补血汤。胃气弱，补中汤、七味白术散。

慎斋按：以上四条，序产后有虚烦血渴之证也。血为周身津液，产后去血过多，阴虚火旺，则有烦躁，有发渴证，宜大剂滋阴降火消瘀，加童便为主。《济阴纲目》云：产后血虚，气无所附，逆而为火，火上逆而瘀血随之，则心烦发躁。童便，浊阴也，味苦寒而咸，性就下，降火消瘀，所谓浊阴出下窍是也。二证并用之为妙。若仲景二物黄芩汤，有黄芩、苦参，又有竹茹、石膏，治产妇中虚烦乱，四肢苦烦热诸证，未敢信也，当以《三因》之论为主。

产后口鼻黑衄属胃绝肺败

郭稽中曰：产后口鼻黑气起，及鼻衄者何？答曰：阳明者，经脉之海，起于鼻，交颏中，还出颊口，交人中，左之右，右之左。产后气血虚散，荣卫不和，散乱入于诸经，却还不得，故令口鼻黑气起，及变鼻衄。此缘产后虚热，变生此证。胃绝肺败，不可治。《病机》云：产后见衄者，不可治。

产后鼻衄为气脱血死证

薛立斋曰：胃脉挟口，绕承浆，鼻准属脾土，鼻孔属肺金，此胃虚肺损，为气脱血死之证，急用二味参苏饮加附子，亦有得生者。

慎斋按：以上二条，序产后有鼻衄之证也。鼻衄本非死证，产后犯此，或恶露不下，虚火载血上行，溢出鼻窍，不循经度，肺胃已受火热，故黑气变现于鼻口，此热极反兼水化也，故曰肺胃败绝，为不可治。立斋参苏饮加附子，似未稳。莫若大盖童便，加牛膝、丹皮、泽兰、生熟地，倍人参服之。

产后咳嗽属肺经感邪

《大全》曰：肺主气，因产后血虚，肺经一感微邪，便成咳嗽。或风热，或寒湿，皆令人咳嗽。若产后吃盐太早，咳嗽者难治。

产后咳嗽属食面壅纳

郭稽中曰：产后血气不通，咳嗽者何？答曰：产后咳嗽，多因食热面壅纳，或热病，或有气块，发时冲心痛，气急咳嗽，四肢寒热。

产后咳嗽属恶露上攻瘀血入肺

陈良甫曰：产后伤风咳嗽，是恶露上攻，流入肺经，或面赤，发喘欲死，急用二味参苏饮。又，李氏曰：产后咳嗽，多是瘀血入肺。知母饮治产后恶露流入肺经，咳嗽。

《济阴》按：知母、贝母，凉药也，岂可治恶露上攻。人参补气药也，岂可治流入肺经之嗽。即加桃仁、杏仁以泻肺导瘀，亦不可妄用。

产后咳嗽属胃气不足

薛立斋曰：产后咳嗽，悉胃气不足。胃为五脏之本，胃气一虚，五脏失所，百病生焉。患者多谓腠理不密所致，不知肺属辛金，生于己土，亦因土虚不能生金，腠理不密，外邪所感，其阴火上炎，宜壮土金生肾水，制火为善，若径治咳嗽则误矣。

产后咳嗽分证用药

薛立斋曰：产后咳嗽，或因阴血耗损，或因肺气亏伤，或阴火上炎，或风寒所感，治法不一。若阴血虚者，芎、归、熟地、参、术。肺气伤者，四君子加芎、归、桔梗。阴火上炎者，六味地黄加参、术。风寒感者，补中汤加桔梗、紫苏。

慎斋按：以上五条，序产后有咳嗽之证也。产后咳嗽，有外邪，有内伤，有瘀血，不

外三因之感。其本则以气血虚，而胃气不足所致。夫咳嗽为肺金病，土虚不能生金，致有咳嗽之候。虽有外邪、伤食、恶露诸证，必顾母为要。此立斋之论，为知本也。

产后寒热属败血不可作疟治

郭稽中曰：产后乍寒乍热，多是败血为害，或附阳不和。若概作疟治，则误矣。

娄全善曰：产后疟疾，多由污血挟寒热而作。大法，宜柴胡四物汤调之。热多者，草果饮子。寒多者，生熟饮子。

产后疟疾属阴阳两虚不可用柴胡汤

《产宝新书》曰：产后类疟分二证，产后半月内外，寒热往来，或午后日晡夜间发热，或一日两三度，其发有期，其证类疟。由气血并竭，阳虚寒作，阴虚发热也。慎母以疟治，虽小柴胡汤，不可轻用。唯调补气血，寒热自除。仲景云，伤寒往来寒热，一日二三度发。此阴阳俱虚，不可更发汗，更吐，更下，其意亦同。

产后疟疾属气血虚宜补胃气为主

薛立斋曰：产后疟疾，总以补胃气为主，佐草果饮之类。若胃气稍充，以草果饮为主，佐以补胃药。盖气虚则寒，血虚则热，胃气虚则恶寒，胃气下陷，则寒热交作。当大补气血，其病自退。若误用清脾截疟之类，多致不起。

慎斋按：以上三条，序产后有疟疾之证也。疟病在夏秋之交，本风寒暑湿四气之感。而产后之疟，虽有外邪，当从气血两虚为治。阳虚外感，阴虚内热，阴阳两虚则寒热交作，故宜大补气血为主。若郭氏以败血为害，固当消瘀，亦必兼补气血始善。故一切治疟诸方，如小柴、清脾、截疟、四兽之属，概不可施。况草果饮有川芎、白芷、紫苏、柴胡、青皮、良姜之发表耗气。立斋以补胃气立论，洵得治疟之本。若以草果饮为主佐则失矣，不能无对。

产后痢疾属内外诸伤

《大全》曰：产后痢疾，由产劳伤，脏腑不足，月月未满，虚乏未复，或劳动太早，或误食生冷，行起太早，外伤风冷，乘虚入于肠胃。误食生冷难化之物，伤于脾胃，皆令泄泻，其则变痢。若血渗大肠，则为血痢，难治，世谓之产子痢。产后本虚，又加久痢，愈见疲弱，谓之虚羸下痢。又有产后气不顺，下痢赤白，谓之气痢。治法，热则凉之，冷则温之，冷热相持则调之，滑则涩之，虚者补之。若产妇不能宽解，须当顺气，未有不安者也。

产后下痢属风冷乘虚

郭稽中曰：产后腹痛，及泻痢者何？答曰：产后肠胃虚怯，寒邪易侵。若未满月，饮冷当风，乘虚袭留于肓膜，散于腹胁，故腹痛作阵，或如刀刺。流入大肠，水谷不化，洞泻肠鸣，或下赤白，胠胁膜胀，或痛走不定，急服调中汤立愈。若以为积滞取之，祸不旋踵，谨之。

产后痢疾作渴属津液内竭

《产宝百问》曰：产后下痢作渴者，水谷之精，化为血气津液，以养脏腑，脏腑虚燥，故痢而渴。若引饮则难止，反溢水气。脾胃既虚，不能克水，水自流溢，浸渍皮肤，则令人肿。但止其渴，痢自瘥。

薛立斋曰：产后痢作渴，渴而不喜冷饮，属胃气虚，不能生津液也，七味白术散。如夜间发热口渴者，肾水弱而不能润也，六味丸佐益气汤，以滋化源。

产后痢分证用药

薛立斋曰：产后痢，或因饮食伤损脾土，脾土虚不能消食，当审治之。若米食所伤，六君子加谷芽。面食伤，加麦芽、莱菔子。肉

食伤，加山楂、神曲。兼呕吐，加藿香。若久不愈，或非饮食所伤，乃属肾气亏损，必用四神、六味、八味丸补肾。若用分利导水之剂，是虚其虚也。

产后滞下不可用下药

缪仲淳曰：凡产后痢，积滞虽多，腹痛虽极，不可用大黄等药行之，致伤胃气，遂不可救。但用人参、归、芍、红曲、醋炒升麻，倍加甘草与益母草、滑石足矣。若恶露未尽，兼用乳香、没药、砂仁、阿胶，自愈。

慎斋按：以上五条，序产后有痢疾之证也。痢本于外感六淫，内伤饮食所致。若产后，当兼气血虚处治，故不可用治痢常法，而以调补脾胃为要也。又按：产后痢属气血大虚，不可治痢，唯补气血，以大剂人参、当归主之。

产后蓐劳属风冷抟于气血

《大全》曰：产后蓐劳，由生产日浅，血气虚弱，饮食未平，不满百日，将养失所，风冷客之，抟于气血，不能温于肌肤，使虚乏劳倦，乍卧乍起，颜容惟悴，食饮不消，风冷邪气感于肺，肺受微寒，故咳嗽口干，遂觉头昏，百节疼痛，荣卫受风邪，流注脏腑，须臾频发，时有盗汗，寒热如疟，背膊烦闷，四肢不举，沉重着床，此蓐劳之候也。

产后蓐劳属忧劳思虑所致

陈良甫曰：妇人因产理不顺，疲极筋力，忧劳思虑，致令虚羸喘乏，寒热如疟，头痛自汗，肢体倦怠，咳嗽痰逆，腹中绞刺，名曰蓐劳。

产后蓐劳属亏损血气所致

《产宝百问》曰：产后虚羸，渐成蓐劳，皆由产下亏损血气所致。须慎起居，节饮食，调养百日，庶保无疾。若中年及难产者，毋论日期，必须调养平复，方可动作，否则气血复伤，虚羸之证作矣。

产后蓐劳当补脾胃养正气为主

薛立斋曰：蓐劳当扶养正气为主，多因脾胃虚弱，饮食减少，致诸经疲惫，当补脾胃，饮食一进，精气生化，诸脏有所赖，其病自愈。

慎斋按：以上四条，序产后有蓐劳之证也。蓐劳之成，因产后气血虚损，不慎起居，或感风冷外邪，或伤七情忧虑，以致动作不时，将养失宜，遂成蓐劳之候。此《产宝》以调养为训，立斋以养正为先也。

产后血崩属劳役惊怒所致

郭稽中曰：产后血崩者何？曰：因产后所下过多，血气暴虚，未得平复，或因劳役，或因惊怒，致血暴崩。又有荣卫素伤，气衰血弱，亦变崩中。若小腹满痛，此肝经已坏，为难治，俱宜固经丸止之。若小腹胀满，此为内有瘀血，未可止之，必致淋沥。

产后血崩属酸咸不节以伤荣卫

陈良甫曰：产后伤耗经脉，未得平复，劳役损动，致血暴崩。或因酸咸不节，以伤荣卫，亦变崩中。

产后血崩属脏气不平

陈无择曰：血崩不是轻病，况产后有此，是谓重伤，恐不止酸咸不节所致。多因惊忧恚怒，脏气不平，或产后服断血药早，致恶血不消，郁满作坚，亦或崩中，固经丸自难责效，不若大料煮芎归汤加芍药，随证治之。

产后血崩分证用药

薛立斋曰：前证若血滞，小腹胀满，用失笑散。肝火血妄行，加味逍遥散。脾郁不统血，加味归脾汤。脾虚不摄血，补中汤。厚味积热伤血，清胃散加槐花。风热相抟伤血，四君子加防风、枳壳。

慎斋按：以上四条，序产后有血崩之证也。产后已亡血，而又有虚证，似非轻病，多属阴气脱所致。稽中主于劳役惊怒，是本内伤七情为病。若良甫以酸或不节，无择以血药断早，均非病机之要。予谓产后下多亡阴，须用仲景法。血脱益气，纯用血药无济也。观《薛氏医案》有妇人血崩如涌，以六君子加黑姜而愈，得其旨矣。

产后便秘属亡津液胃燥

《金匮要略》曰：新产妇人有三病，三者大便难，何谓也？曰：亡津液胃燥，故大便难。

产后便难属内亡津液

《圣济总录》曰：大肠者，传导之官，变化出焉。产后津液减耗，胃中枯燥，润养不足，糟粕壅滞，故令大便难，或致不通。盖新产之人喜病者，由去血过多，内亡津液故也。

产后便秘属血虚火燥

薛立斋曰：产后大便不通，因去血过多，大肠干涸，或血虚火燥，不可计日期，饮食数多，用药通润之，必待胀满，觉胀自欲去，不能去，乃结在直肠，宜胆导之。若服苦寒药通之，反伤中焦元气，或愈难通，或通而泻不止，必成败证。若血虚火燥，加味逍遥散。气血俱虚八珍汤，慎不可用麻仁、杏仁、枳壳之类。

产后便秘属津液不足不可服寒药

郭稽中曰：产后大便秘涩者何？答曰：产后水血俱下，肠胃虚竭，津液不足，是以大便秘涩不通。若过五六日闷胀者，此燥屎在脏腑，干涩未能出耳，宜麻仁丸以润之。若误以为有热，投寒药，则阳消阴长，变证百出矣。

产后秘结属血少肠燥不可用峻利药

单养贤曰：产后大便日久不通，因血少肠燥故也。宜多服生化汤，则血旺气顺，传化如常，自无燥涩之患。切不可用硝、黄峻利之剂，以亡阴血，致中气虚而便秘愈甚，遂成胀满者有之。

产后便秘戒轻用大黄

陈无择曰：产后不得利，利者百无一生。去血过多，脏燥，大便秘涩，固当滑之，大黄似难轻用，唯葱涎调腊茶为丸，复以腊茶下之。

慎斋按：以上六条，序产后有大便秘结之证也。产后水血俱下，则大肠燥涩，便闭不通，《金匮》、《圣济》均主津液内亡，立斋主血虚火燥，自是元气内乏受病，故戒不可以苦寒峻利，再伤气血，渐致不救也。

产后小便不通属内积冷气

《产孕集》曰：产后小便不通，腹胀如鼓，闷乱不醒。盖缘未产前，内积冷气，遂致产时尿胞运动，用盐于脐中填平，用葱白捣一指厚，安盐上，以艾柱饼上灸之，觉热气入腹内，即时便通，神验。

产后淋属热客胞中

《大全》曰：产后诸淋，因产有热气客脬中。内虚则频数，热则小便涩痛，故谓之淋。

产后淋属热邪搏血渗入胞中

《大全》曰：有因产损，气虚挟热，热邪搏血，流渗胞中，血流小便而出，则为血淋。

产后淋治法宜量虚实

陈无择曰：治诸产前后淋，其法不同，产前当安胎，产后当去血。如冷、热、膏、石、气淋等，为治则一，但量虚实用之。瞿麦、蒲黄是产后要药，唯当寻究所因，则不失机要

矣。

慎斋按：以上四条，序产后有小便不通，淋秘之证也。《三因》云：产前当安胎，产后当去血。此二语为吃紧。如产前淋，或由气虚不化，当用参、芪补气安胎，不可过用渗利。产后淋，或由污血阻滞，当以瞿麦、蒲黄为要药。若血虚热郁，当用六味丸、逍遥散，补阴养血，滋其化源，佐以导血药可也。

产后二便不通属津液燥竭

《大全》曰：产后大小便不通，肠胃本挟热，因产水血俱下，津液燥竭，肠胃痞涩，热气结于肠胃，故令大小便不通。有妇产下，患二便不通，饮牛乳而通，人乳尤善。

产后小便数属气虚不制

《大全》曰：产后小便数者，气虚不能制也。

产后小便不禁属脾肾虚

薛立斋曰：产后遗尿，肾气不固也，五味子丸主之。若脾肾虚弱，用还少丹，仍以补中汤为主。虚寒加肉果、补骨，或四神丸。若脾肾虚寒，用八味丸、四神丸佐之。

产后小便不禁属产伤膀胱

陈良甫曰：妇人产理不顺，致伤膀胱，遗尿无时。

产后小便淋沥属损破尿脬

朱丹溪曰：有收生不谨，损破产妇尿脬，致病淋沥，用猪羊胞煎汤入药，参、芪为君，归、地为佐，桃仁、陈皮、茯苓为使，于极饥时饮之，令气血骤长，其胞自完，稍缓亦难成功也。

产后小便淋沥分证用药

薛立斋曰：稳婆不慎，致胞损而小便淋沥者，八珍汤补气血。若因膀胱气虚，小便频数，当补脾肺。若膀胱阴虚，小便淋沥，须补肺肾，方用补中汤，加山茱、山药为主，佐以桑螵蛸散。

慎斋按：以上六条，序产后小便有数，有不禁遗尿，有淋沥之证也。经云，肾主二便，开窍二阴，小便不禁，淋沥，前阴病也。产后气血大虚，有伤脏腑，非肺气虚而不能约制，为遗尿，为不禁，即肾气竭，而多有虚热移于膀胱，为沥为淋。总以补养气血，加升提固涩之剂为主。若用渗利疏导，是重虚也，戒之。

产后小便出血属热乘胞内

《大全》曰：产后小便出血，因血气虚而热乘之，血得热则流散，渗于胞内，故血随小便出。有产妇尿血，面黄胁胀，少食，此肝木乘脾土也。用加味逍遥散、补中汤，兼服而愈。

产后大便出血分诸证用药

薛立斋曰：产后便血，或饮食起居，或六淫七情，致元气亏损，阳络外伤。治法，若因膏粱积热，加味清胃散；因醇酒湿毒，葛花解醒汤；怒动肝火，六君子加芎、归、芍药、柴胡；因郁结伤脾，加味归脾汤；思虑伤心，妙香散；大肠风热，四物加柏叶、荆、防、枳壳、槐花；大肠血热，四物加芩、连；肠胃虚弱，六君子加升、柴；肠胃虚寒，六君子加肉果、木香；因元气下陷，补中汤加茯苓、半夏；胃气虚弱，六君子加升麻；血虚，四物加升麻；气血虚，八珍加升、柴温补。

慎斋按：以上二条，序产后有二便下血之证也。产后既亡血，而大小二便复有下血之患，此非寻常火热，渗于膀胱，归于大肠，可例治也。非血虚即气脱。心主血，脾统血。心气虚则小肠不能制而血流，脾气弱则大肠无移荫而血下。故二便出血，当责之心脾二经为病。若《大全》竟以热论，立斋一条，分

因杂出，详证配方，未免胶柱，似难责效。立斋之书，补元阴元阳，动以益化源立论，开发后人，有功医学不少。但每证辄以方配，某病用某方，似欲后人按图索骥，刻舟求剑矣。善读立斋之书者，不知以予言为河汉否也。

产后发痈疽不可用治毒药

《产宝新书》曰：产后发痈疽，宜生化汤加连翘、金银花、甘草、乳香、绿豆粉和服，不可用大黄等药，并败毒散之类。

慎斋按：新产妇人，或在十朝十五朝之后，忽发痈肿于四肢、胸腹间，或是败血不尽，或是气血虚弱，荣气不从，逆于肉理，发为痈毒。如败血瘀滞经络者，当补血行血，导瘀疏气为主。如气血虚弱，荣卫运迟，成壅肿者，当补气活血为主。切不可从毒治，用寒凉清火解毒药，只用大补，如十全、八珍之属，以固本元。扶胃气，气壮血流，其毒自解。若欲攻毒，势必溃烂，不能收功矣。

产后月水不调属风邪冷热客经络

《大全》曰：产后月水不调，由产伤动血气，虚损未复，风邪冷热之气，客于经络，乍冷乍热，冷则血结，热则血消，故令血或多或少，或在月前，或在月后，名不调也。

产后月水不调属风冷伤经

《大全》曰：产伤动血气，虚损未复，为风冷所伤，血得冷则凝结，故风冷伤于经，血结胞络之间，令月水不通。凡血结，月水不通，则成血瘕。水血相并，复遇脾胃衰弱，肌肉虚者，为水肿。

产后月水不通不必药

陈良甫曰：妇人冲任之脉，为经络之海，皆起胞内。手太阳小肠，手少阴心，此二经上为乳汁，下为月水。若产后月水不通，新产后劳伤气血，或去血过多，乳汁自然不通。若乳子半岁或一岁之内，月经不行，此常候，非病也。若半岁而行，或四五个月便行，是少壮血盛之人。若产后一二年，月经不通，无疾苦，亦不必服药。或劳伤气血，冲任脉虚，气血衰少不行，但服健脾胃，资气血之药，自然通行。以药通之，为害滋大。

慎斋按：以上三条，序产后有月水不调、不通之证也。月水不行，为妇人要病。至产后不行，又不可以病言也。《大全》二条，均主风冷邪伤，专以外感为病，亦属偏论。夫产后月水不调，不通，有因于产动劳伤脏气，血虚弱者；有因于怀子自乳，血脉上为乳汁者；有因脾胃气虚，饮食少进者。不止风邪冷热之感也。良甫一条，甚悉病机。至云但服健脾胃，资气血药，不必通经，尤见探本之论。

产后乳汁不行属亡津液

《大全》曰：妇人乳汁，气血所化，不行者，由气血虚弱，经络不调所致。或谓产后必有乳，乳虽胀而产后暮作者，此年少之人，初经产乳，有风热，须服清利之药则乳行。若累经产而无乳者，亡津液故也。须服滋益之药助之。若有乳不甚多者，须服通经之药，仍以羹腥引之。盖妇人之乳，资以冲脉与胃经通故也。有屡经产而乳汁常多者，亦妇人血气不衰使然。若妇人素有疾在冲任经者，乳汁少而色黄，生子亦怯弱多疾。

产妇乳汁不行有二

陈无择曰：产妇有二种乳汁不行，有气血盛而壅闭不行；有血气少弱，涩而不行。虚当补之，盛当疏之。盛者，当用通草、漏芦、土瓜根。虚者，用炼虫乳粉、猪蹄、鲫鱼之属。

产妇乳汁不行宜壮脾胃以资化源

薛立斋曰：前证若气血虚弱，不能生化者，宜壮脾胃。怒动肝火，乳肿汁出者，宜清肝火。乳汁乃气血所化，在上为乳，在下

为经。若屡产无乳、或大便涩滞者、亡津液也。当滋化源，冲任之脉盛，脾胃之气壮，则乳汁多而浓；衰则淡而少，所乳之子，亦弱而多病。

产后乳自出属胃气虚

《大全》曰：产后乳汁自出，胃气虚也，宜补药以止之。若未产而乳自出者，谓之乳泣，生子多不育。若产妇劳役，乳汁涌下，此阳气虚而厥也，独参汤补之。

乳房肿胀用麦芽

薛立斋曰：凡妇人气血方盛，乳房作胀，或无儿饮，痛胀寒热，用麦芽二三两炒熟，水煎服之立消。其耗散血气如此，何脾胃虚弱，饮食不消方中多用之？一云，麦芽最消肾。若气血虚，而乳汁自出者，宜十全大补汤。

产后乳痈属邪热攻阳明血搏气滞

《圣济总录》曰：产后冲任不足，气血俱虚，其热潜行入足阳明之脉。直行者，从缺盆下乳内廉，下挟脐，入气街中。冲脉者，起于气街。盖足阳明之经，挟脐上行，至胸中而散。其经为邪热攻冲，则血为之击搏，气为之留滞。击搏则痛作，留滞则肿生。产后多有此疾，由乳汁壅积，与气相击搏故也。

慎斋按：以上六条，序产妇有乳汁不行之证也。妇人以血用事，上为乳汁，下为月水。而血之所化，则本于脾胃饮食之精微，运行而为乳为经。产后脾胃之气旺，则血旺而乳多。脾胃之气衰，则血减而乳少。此立斋治乳汁，以壮脾胃、滋化源为要也。若不顾脾胃以补气血，徒从事于通乳之剂，是犹求千金于乞丐而不可得矣。

产后阴脱属产劳太过所致

陈《三因》曰：妇人趣产劳力，努力太过，致阴下脱，及阴下挺出，逼迫肿痛，举重房劳，皆能发作，清水续续，小便淋漓，硫黄、乌贼骨、五味子为末，掺之。

产后玉门不闭属气血不能收摄

陈良甫曰：产门不闭，由元气素弱，胎前失子调养，以致血气不能收摄故也，十全大补汤。有初产阴户肿胀，或燋痛不闭，加味逍遥散。若肿不闭者，补中汤加五味子，切忌寒凉之药。

产门不闭肿痛分证用药

薛立斋曰：玉门不闭，气血虚弱也，十全大补汤。肿胀燋痛，肝经虚热也，加味逍遥散。

慎斋按：以上三条，序产后有阴脱、不闭之二证也。产后一切证，总以气血大虚为治，况阴挺下脱，玉门不闭乎。故丹溪、立斋医案，有产户下一物如手帕者，有下一物如合钵，有二歧者，有出肉线一条者，有子宫损落一片者。凡此皆气虚血脱，故子户胞门，见证种种。其立方处治，不过参、芪、归、地，加以升提收涩，临证之工，可以神明之矣。

女科经纶　卷七

携李　萧　壎赓六纂著
鄞县　曹赤电炳章圈校

崩　带　门

经论血崩属悲哀阳气内动

《素问》曰：悲哀太甚，则胞络绝，胞络绝则阳气内动，发为心下崩、数溲血。

经论血崩属悲哀热气在中

《素问》曰：悲哀太过，则心系急，肺布叶举，而上焦不通，热气在中，故血走而崩也。

经论血崩属阴虚阳搏

《素问》曰：阴虚阳搏，谓之崩。

经论血溢属劳力伤肠胃络脉

《灵枢》曰：猝然饮食，则肠满。起居不节，用力过度，则络脉伤。阴络伤则血内溢，血内溢则后血。肠胃之络伤，则血溢于外。

慎斋按：以上经论三条，序妇人血崩之属内伤为病也。血崩有得之悲哀者，此七情伤心之崩也。有得之劳力者，此内伤劳倦之崩也。

经论血崩属于热

《运气》曰：少阴司天，热淫所胜，民病血泄。少阳在泉，火淫所胜，民病便血。岁金不及，炎火乃行，民病下血。

《纲目》曰：是火炎助心，血盛而血下也。

经论血崩属于寒

《运气》曰：太阴司天，寒淫所胜，血变于中，民病血泄。太阳之胜，血脉凝泣，感为血泄。阳明司天之气，民病便血，治以诸热。

《纲目》曰：是寒攻心，血虚而下血也。

经论血崩属于风

《运气》曰：少阳司天之政、初之气，风盛乃摇、候乃大温，民病血崩。

慎斋按：以上经论三条，序妇人血崩之属火热风寒，外感为病也。血崩固属内伤不足证，而火热风寒客邪之感，亦间有之。但血崩为妇人前阴病，属于内因。《运气》血泄、便血，是言大肠下血，属于外因，《纲目》列之血崩证内，则误矣。序书之讹，在于全善且然，而况下此乎？故存以俟正之。

《金匮》论血崩属三焦绝经

张仲景曰：寸口脉微而缓，微者卫气疏，疏则其肤空，缓者胃弱不实，则谷消而水化。谷入于胃，脉道乃行，水入于经，其血乃成。荣盛则其肤必疏，三焦绝经，名曰血崩。

《金匮》论崩漏属虚寒相搏

张仲景曰：寸口脉弦而大，弦则为减，大则为芤。减则为寒，芤则为虚，虚寒相搏，此名曰革，妇人则半产漏下。

慎斋按：以上《金匮》二条，序妇人崩漏本于三焦绝经，而芤减之脉，为虚寒相搏

之病也。

崩漏属败血脓积

王海藏曰：或因胎产，或因酒色，前后脱血，带漏不已。先由子脏，俱入赤肠，滓液恶秽，前行太过，滓粪燥结，后滞不通，此胎肠俱病，治宜推去败血脓积，益血致新也。心所不生，脾所不裹，肝所不藏，此三焦经绝也。宿虽为病，亦有浅深新久，治亦从轻重之。

血崩有瘀属恶血未尽

戴元礼曰：血大至曰崩，或清或浊，或纯下瘀血，势不可止。有崩甚腹痛，人多疑恶血未尽。又见血色瘀黑，愈信恶血之说，不敢止截。大凡血之为患，欲出未出之际，停在腹中，即成瘀血，以瘀为恶，又焉知瘀之不为虚冷乎。瘀而腹痛，血行则痛止。崩而腹痛，血住则痛止。芎归汤加姜、附，止其血而痛自止。

血崩属涎郁胸膈

朱丹溪曰：有涎郁胸中，清气不升，故经脉壅遏而降下。非开涎，不足以行气。非气升，则血不能归隧道。此论血泄之义甚明。盖以开胸膈间之浊涎，则清气升，清气升则血归隧道而不崩矣。其证或腹满如孕，或脐腹疼痛，或血结成片，或血出则快，止则闷，或脐上动。治宜开结痰，行滞气，消污血。

慎斋按：以上三条，序血崩之属污血痰涎，实邪为病也。凡病先明虚实寒热，如崩漏证，有虚有实，有寒有热。虚者主于血虚气虚，阴虚阳虚。实者主于污瘀恶血，痰涎郁滞。虚则为寒为冷，实则为火为热。此证之不可不先辨者也。

崩漏属冲任血虚不能约制

《圣济总录》曰：妇人崩漏病，经血淋沥不断是也。冲任之脉，所至有时。若非时而下，犹器之津泄，故名曰漏下，盖由血虚气衰，不能约制，又有瘀血在内，因冷热不调，使血败，其色或赤如豆汁，黄如烂瓜，黑如虾，青如蓝，血如脓，五色随五脏，虚损而漏应焉。

崩下属冲任气虚不能制

朱丹溪曰、崩下，由脏腑伤损，冲任二脉血气俱虚故也。二脉为经脉之海，血气之行，外循经络，内荣脏腑。若劳伤过极，冲任气虚，不能约制经血，故忽然而下，谓之崩中暴下。治当大补气血，升举脾胃之气，微加镇坠心火之药以治心，补阴泻阳而崩自止。东垣有治法，但不言热，其主在寒，学者宜细思之。

血崩属阳虚不足

赵养葵曰：血崩之疾，当分阴阳而治。气血，人身之阴阳也。阳主升，阴主降。阳根阴，阴根阳。一升一降，循经而行，无崩漏也。若阳有余，则升者胜，血出上窍。阳不足，则降者胜，血出下窍。总之，血随阳气而升降。阳气者风也，风能上升，然必须东方之温，风始能升，故用助风益气汤。凡气虚不能摄血而崩者，其人必面白，尺脉虚大，食饮无味，久病者有之。

慎斋按：以上三条，序血崩之属血虚气虚、阳虚不足也。血崩本为血病，而有阳气之虚者，血脱气亦脱也。阴阳相维，互为其根。阴血大下，阳不能维固，当以无形之气，生有形之血也。

血崩属热为阳脉有余病

张子和曰：妇人天癸尽，本不当下血，血得热而流散，非寒也。女子血崩，多因大悲哭甚，则肺叶布，心系为之急，血不禁而下崩。经曰，阴虚阳搏谓之崩。阴脉不足，阳脉有余，数则内崩，血下流。世有以虚损治之，莫有知其非者，可服大剂黄连解毒汤。

血崩属阳乘于阴为阳邪有余病

许学士曰：崩中多用止血及补血药，不效，以霹雷酒治之。此阳乘于阴，所谓天暑地热，经水沸溢是也。经云：阴虚者，尺脉虚浮。阳搏者，寸脉弦急也。是为阴血不足，阳邪有余，故为失血内崩证。用奇效四物加胶、艾，再入黄芩。医曰：心主血，血得热则行，得寒则止。故漏下属热兼虚者，四物加黄连。凡妇人感热，血脉妄行，病曰热崩，以抑气散倍加生地。

血崩属热不可作寒论

王海藏曰：妇人血崩，来如潮涌，明是热势妄行，岂可作寒论。治宜清补兼升提，不可骤止。

经血暴崩属火热为喜怒惊恐所致

张子和曰：妇人经血，终于七七之数，数外暴下，经曰火主暴速，亦因暴喜暴怒，忧急惊恐所致然也。慎不可作冷病治之，用峻热之药则死。可用黄连解毒汤，以清于上，更用莲房壳灰、棕灰，以渗于下，后用四物加胡索散，凉血和经之药。

血崩属阴虚火逼妄行关心肾二经

马玄台曰：经云，阴虚阳搏谓之崩。盖尺脉既虚，虚则血已损，寸脉搏击，虚火愈炽，谓之曰崩，由火逼而妄行也。妇人血崩，是从胞络宫来，血久下行，已为熟径，则本宫血乏，十二经之血，皆从此渗漏矣。然胞络下系于肾，上通于心。故此证实关心肾二经，宜有阴虚阳搏之脉也。东垣用十二经引经之药，使血归十二经，然后用黑药止之。若徒用黑药，不先服领血归经药，病亦难愈也。

血崩属真阴虚不能镇守包络相火

张洁古曰：崩者，倏然暴下也；漏者，淋漓不断也。将息失宜，劳役过度，喜怒不常，大伤于肝，肝为血府，伤则不藏血，而为崩中漏下。或悲思忧恐太甚，阳气内动，真阴虚，不能镇守包络相火，故血走而崩，宜养血安神为主。或因脾胃气虚下陷，肾与相火相合，湿热下迫而致，宜调脾养血为主。或大小新产，遽触房事，皆作崩漏。或经水未绝，欲炽而伤血海，亦致崩漏，皆宜养血镇守为上。

崩漏属脾胃虚火乘心包

李东垣曰：女子漏下恶血，或暴崩不止，多下水浆之物。皆由饮食不节，或劳伤形体，或心气不足，致令心火乘脾，脾土受邪。夫脾土滋荣周身者也，心生血，血主脉，二者受邪，病皆在脉。脉，血之府也。心，脉之神也。心不主令，包络代之。心系者，包络命门之脉也，主月事生孕。因脾胃虚，而心包乘之，故漏下血水不止，当除湿去热，用升阳除湿汤。此药乃从权衡之法，以风药胜湿，为胃气下陷而迫于下，以救其血之暴崩也。若病愈，经血恶物已尽，主病虽除，后必须以黄芪、人参、甘草、当归之类，数服以补之。若经血恶物下之不绝，尤宜救根本，当益脾胃，退心火之亢甚，是治其根蒂也。

崩漏属心火亢甚肝实不纳血

虞天民曰：妇人崩漏不止，先因心火亢甚，于是血脉泛溢，以致肝实而不纳血，出纳之道遂废。经曰，子能令母实，是肝肾之相火，挟心火之势，从而相煽，所以月水错经妄行无时而泛溢也。若不早治，渐而崩中，甚则为血枯发热劳极证，不可治矣。

慎斋按：以上八条，序崩漏之属火热为病也。血崩漏下，《内经》、《运气》均主于火，然火亦有虚实之分。唯子和、学士、海藏三家，则以阳邪有余立论，故有不可作寒冷治法之说。至洁古、东垣，虽言包络相火，心火乘脾，而曰真阴虚、曰脾胃虚，则又不可纯以火热为治矣。玄台、天民亦从张、李，以

发明其未尽。临是证者，毋竟从火治，必兼洁古、东垣之论，为不易也。

血崩属寒在下焦

陈良甫曰：妇人冲任二脉，为经脉之海，外循经络，内荣脏腑。若阴阳和平，则经下依时。如劳伤不能约制，忽然暴下，甚则昏闷。若寸脉微迟，为寒在上焦，则吐血衄血。尺脉微迟，为寒在下焦，则崩血便血，法当调补脾胃为主。

崩漏日久化寒主升举论

李东垣曰：圣人治病，必本四时升降浮沉之理。经漏不止，是前阴之气血以下脱。水泻不止，是后阴之气血又下陷。后阴者，主有形之物。前阴者，精气之门户。前后二阴俱下，是病人周身之气，常行秋冬之令，主肃杀收藏。人身中阳气升浮，谷气上行，则阳生阴长，春夏是也。既病则周身气血皆不生长，谷气不升，前虽属热，下焦久脱，已化为寒，久沉久降，寒湿大胜，当急救之。泻寒以热，除湿以燥，大升大举，以助生长，补养气血，不致偏枯。圣人立治法云：湿气大胜，以所胜助之，用风木上升是也。经云，风胜湿，是以所胜平之，当和调胃气而滋元气。如不止，用风药以胜湿，此之谓也。

血崩服寒药变寒用热治法

薛立斋曰：有妇人患崩，过服寒药，脾胃久虚，中病未已，寒病复起，烦渴引饮，粒米不进，昏愦时作，脉洪大，按之微弱。此无根之火，内虚寒而外假热也。十全大补加附子，崩减，日服八味丸，愈。又有久患崩，服四物凉血剂，或作或止，有主降火。如腹痛，手足俱冷，此脾胃虚寒所致，先用附子理中汤，次用济生归脾、补中益气二汤，崩顿愈。若泥痛无补法，则误矣。

慎斋按：以上三条，序血崩之属虚寒为病也。血崩属火热致病者多，崩中日久，则热变为寒。亦有服寒凉过甚，中寒内生者，东垣、立斋之案治，不可不留意也。崩漏有实有虚，有热有寒，寒热虚实之辨明，而治法可以不忒矣。

崩漏有五色之分

王叔和曰：五崩何等类？师曰：白崩者形如涕，赤崩者形如绛，黄崩者形如烂瓜，青崩者形如蓝色，黑崩者形如衃血。

崩有阴阳以五色分五脏属虚冷所致

齐仲甫曰：受热而色赤者，谓之阳崩。受冷而色白者，谓之阴崩。五脏皆虚，五色随崩俱下。一脏虚，随脏见色而下。其色白如涕，知肺脏之虚冷也。其色青如蓝，知肝脏之虚冷也。其色黄如烂瓜，知脾脏之虚冷也。其色赤如绛，知心脏之虚冷也。其色黑形如肝血，知肾脏之虚冷也。五脏俱虚，五色相杂，谓之五崩。

崩漏有阴证阳证之分

龚云林曰：崩漏之证，有阴阳。若妇人年五十后，经止数年，忽然又行，兼腹痛，或身热口渴者曰崩，此阴证也。若妇人年三十四十后，经行三十日，涌暴不止者曰漏，此阳证也。

慎斋按：以上二条，序崩漏有阴阳、五色、五脏之见证也。

血崩心痛名杀血心痛

陈良甫曰：妇人血崩心痛，名曰杀血心痛，由心脾血虚也。若小产去血过多而心痛者，亦虚也。用乌贼骨炒末，醋汤下失笑散。

血崩心痛属血虚心无所养

薛立斋曰：血崩兼心痛者，心主血，去血过多，心无所养，以致作痛，十全汤倍参、术多服。如瘀血不行者，失笑散。阴血耗散者，乌贼丸收敛之。

慎斋按：以上二条，序血崩有兼心痛之证也。

治崩漏先调其气

许叔微曰：治下血不止，成五色崩漏，香附是妇人仙药，醋炒为末，久服为佳。又曰：女人以气血为主，不知因气不先理，然后血脉不顺，即生崩带诸证。抑气散、异香四神散，大有奥理。

慎斋按：香附味辛气温，能行十二经八脉，为血中耗气之药。妇人虚寒，气郁不舒，用之固宜。若阴虚血热，有口干燥渴，骨蒸，五心烦热等证，而必谓妇人之仙药以用之，未免抱薪救火矣。慎之。

崩与漏有分证治法

李太素曰：崩为急证，漏为缓病。崩必是大怒伤肝，冲动血海，或火盛之极，血热沸腾而然。漏则房劳过度，伤损冲任二脉，气虚不能约制经血，或其人平素多火，血不能安，故不时漏泄。崩宜理气、降火、升提，漏宜滋阴、养气、养血，或兼制火。

治血崩有初中末之三法

方约之曰：血属阴，静则循经荣内，动则错经妄行。故七情过极，则五志亢甚，经血暴下，久而不止，谓之崩中。治法，初用止血，以塞其流；中用清热凉血，以澄其源；末用补血，以复其旧。若止塞其流，不澄其源，则滔天之势不能遏。若止澄其源，而不复其旧，则孤阳之浮无以上，不可不审也。

慎斋按：治崩之法，有消逐污血，有寒凉降火，有收涩固脱，有大升大举，有扶脾健胃，有补气补血，有温暖下焦，种种不一。方氏三法，分初中末，有倒行逆施之弊。予谓中法当为初法，初法当为末法，末法当为中法，庶无差治也。

治崩漏宜调脾胃为主

薛立斋曰：人以脾胃为本，纳五谷，化精微。清者入荣，浊者入卫，阴阳得此，是谓荣卫。人得土以养百骸，失土则枯四肢。东垣以饮食自伤，医多妄下，清气下陷，浊气不降，乃生胪胀。所以胃脘之阳，不能升举其气，陷入中焦，当用补中汤，使浊气得降，不治自安。若因饱食后致崩漏，是伤脾气，下陷于肾，与相火相合，湿热下迫所致。宜甘温之剂，调补脾胃，则血自归经。若误用寒凉，损伤胃气，则不能摄血归经。东垣曰：凡下血证，须用四君子汤收功，厥有旨哉。此皆从脾胃本源病治，不可不知也。

慎斋按：以上四条，序治崩漏之大略也。

妇人血崩服四物汤问

王海藏曰：妇人月事不至，是为胞闭，为血不足，宜服四物汤。妇人崩者，是为血有余，亦服四物汤何也？曰：妇人月事不至者，内损其原，不能生血，故胞闭不通，是血不足，宜服四物汤，是益原和血之药也。崩中者，是血多也。暴损其原，是火逼妄行，洞渴为根，亦宜四物汤，乃润燥益原之药也。

崩漏属虚热用药之法

朱丹溪曰：崩漏有虚有热，虚则下溜，热则宣通，气虚血虚，皆以四物加参、芪。因劳力者加升麻，热加黄芩，寒加干姜。又曰：漏下乃热而虚，四物加黄连。崩过多者，先用五灵一服。紫色成块者，血热也，四物加柴胡、黄连，后用四物加黑姜。急则治标，用白芷汤下百草霜。

崩漏分诸证用药之法

薛立斋曰：经云，阴虚阳搏，谓之崩。又云，阳络伤，血外溢，阴络伤，血内溢。又云，脾统血，肝藏血。其为患，因脾胃虚损，不能摄血归经。或因肝经有火，血得热而下

行。或因肝经有风，血得风而妄行。或因怒动肝火，血热沸腾。或因脾经郁热，血不归经。或因悲哀太过，胞络伤而下崩。治疗之法，脾胃虚弱者，六君子加芎、归、柴胡。脾胃虚陷者，补中汤加白芍、山栀。肝经血热者，四物汤加柴胡、山栀、苍术。肝经风热者，加味逍遥散，或小柴胡加山栀、白芍、丹皮。若怒动肝火，亦用前药。脾经郁火者，归脾汤加山栀、柴胡、丹皮。悲伤胞络者，四君子加升、柴、山栀。故丹溪、东垣云，凡下血证，须四君子收功，斯言厥有旨也。若大去血后，毋以脉诊，急用独参汤。其发热潮热，咳嗽脉数，乃元气虚弱，假热之脉也，尤当用人参。此等证，无不由脾胃先损，故脉洪大，察其中有胃气，受补则可救。设用寒凉，复伤脾胃生气，反不能摄血归源，是速其危也。

血崩用药有三治

《医垒元戎》曰：女子经病血崩，久而成枯者，宜涩之益之。血闭久而成竭者，宜益之破之。破血有三治，始则四物入红花，调黄芪、肉桂；次则四物入红花，调鲮鲤甲、桃仁、桂、蚖便，和酒煎服；末则四物入红花，调易老没药散。

慎斋按：以上四条，序治血崩用药之大法也。

血热崩漏用荆芥四物汤论

武叔卿曰：血藏于肝，肝气不升，则热追于下，故血不能藏而崩也。况厥阴之经环阴器，廷孔、前阴皆属之。荆芥升肝气，香附理肝气，条芩除内热，四物养血凉血，故能收功也。

血热崩漏用河间生地黄散论

武叔卿曰：河间生地黄散，治经漏不止，脉虚洪，经水紫黑。夫脉虚洪者，气不足也。紫黑者，热之甚也。黄芪所以补气，气盛则生火，天冬、地骨以清气中之火。熟地所以生血，血生而不凉。尤虑妄行，故以生地、黄连凉心，芍药、甘草缓肝益脾，柴胡升举，枸杞、地黄，又肝肾同归者也。

热崩用凉血地黄汤论

武叔卿曰：凉血地黄汤，治妇人血崩不止，肾水阴虚，镇守包络相火，血走而崩。夫阴者，从阳而亟起也。血属阴，阴不自升。故诸经之血，必随诸经之气而后升。若气有所陷，则热迫血而内崩矣，故用黄柏以清下焦胞络之火。心者，火之主也。故以生地、黄连，治火之原；知母、黄芩，滋水之母；归尾破瘀，红花生血，所谓去故生新也。川芎行血海之余，蔓荆凉诸经之血，升、柴、防、羌、藁本、细辛诸风药，皆所以升诸经之气也。诸经气行，则阴血不得不随之而起矣，故曰从阳亟起也，有是证者法之。

慎斋按：血崩不止，则去血过多矣。方中风药，大半不敌生地一味，独不虑风药燥血乎。虽云升举，而血之耗者已多，用方者酌之。

虚寒崩漏用丁香胶艾汤论

武叔卿曰：丁香胶艾汤，治妇人崩漏不止。盖心气不足，劳役及饮食不节，其脉两尺俱弦紧而洪，按之无力。其证自觉脐下如冰，求厚衣被以御寒，白带白滑之物虽多，间下如屋漏水下，时有鲜血不多，右尺脉时微洪。屋漏水暴下者，是弦急脉，为寒多。洪脉时见，乃热少。合而言之，急弦者，北方寒水多也。洪脉时出者，命门胞络之火也。黑物多，赤物少，合成屋漏水之状也。以四物汤加丁香、阿胶、生艾。

虚寒崩下用鹿茸丸论

武叔卿曰：鹿茸丸治经候过多，其色瘀黑，甚者崩下，吸吸少气，脐腹冷极，则汗如雨，两尺脉微小，由冲任虚衰，为风冷客

胞中，气不能固，可灸关元百壮。夫丹溪以紫黑为热，此言瘀黑者，乃下焦气寒血凝而黑，各有治法。然女子气海在上，血海在下，故下焦温而后气升血行。如鹿茸以血成形，由气而长，血随气上而成角，故入血分以生升。又以附子、艾叶佐而温之，以赤石脂、禹余粮镇而固之，柏叶清之，归、地、续断补之，诚下元虚寒之全方也。不加人参，岂无意焉，而灸关元之意可想矣。

虚寒崩漏用伏龙肝散论

武叔卿曰：伏龙肝散，治劳伤冲任脉虚，非时崩下，或如豆汁，或成血片，或五色相杂，或赤白相兼，脐腹冷痛，经久未止，令人黄瘦，口干，饮食减少，四肢无力，虚烦惊悸。夫五色者，五脏之色，崩久则五脏气陷，血不能化，故五色见焉。盖血生于气，而化于中焦，气生于下元，而培于脾胃。如脐腹疼痛者，下元气寒也，以艾叶温之。黄瘦食减无力者，中焦之寒也，以干姜暖之。伏龙肝有火土相生之妙，君以川芎，有扶肝行浊之能，肉桂、甘草和荣卫而通调血脉，麦冬、熟地益金水而治虚烦口干，石脂、当归补血以固脱。通之、涩之、温之、濡之，诚治久脱脏寒之良方也。

劳伤崩漏用当归芍药汤论

武叔卿曰：当归芍药汤，治妇人经脉漏下不止，其色鲜红，先因劳役，脾胃虚弱，气短气逆，自汗不止，身热闷乱，恶见饮食，四肢倦怠，大便时溏。东垣制此方一服后，诸证悉去。大抵因劳役下血，若拘血热之说，用四物加黄芩则不愈矣。盖血虚须兼补气，譬之血犹水也，气犹堤也，堤坚则水不横决，气固则血不妄行，自然之理也。黄芪最多，白术次之，四物兼生熟地，以陈皮、甘草、柴胡佐之。俗医不达此理，专用凉药，不知凉药伤胃，服久则正气愈弱，血安得固，故特表而出之。

气陷崩漏用益胃升阳汤论

武叔卿曰：东垣云，血脱益气，古法也。先补胃气，以助生长，故曰阳生阴长。诸甘药为之先务，举世皆以为补气，殊不知甘能生血，此阳生阴长之理也，故先理胃气。人之一身，内谷为宝，补中益气方加神曲、黄芩，名益胃升阳汤，以起妇人崩血之属气下陷者。

火郁崩漏用升阳除湿汤论

武叔卿曰：升阳除湿汤，治女子漏下恶血，或暴崩不止。夫土陷则湿，故怠惰嗜卧。木郁则热，故气上冲。缓为湿之微，弦为木之象，郁而不伸则热，此心火乘脾也。脉之洪大者，火在下也。胞络为相火，寄于命门，为多血之经。病从火，心火以藏德为神，相火听命于心。三焦主气，胞络主血，故血分之火专主胞络，气分之火专主三焦。郁则火不得遂炎上之性，迫于血分，故阴络伤也。方以苍术、升麻，发太阳阳明之湿；柴胡、防风，达厥阴少阳之木；羌活、藁本，以升举少阴太阳下部之郁，所谓下者举之也。但升散之物，过则耗气而伤金，故又以黄芪保肺，当归引血，使各有所归。甘草和气，蔓荆凉血。此四种者，又制亢害之法也。

气虚崩漏用断下汤论

武叔卿曰：断下汤治冲任气虚，崩中漏下，脐腹痛，渐减饮食，四肢无力。此胶艾四物之变例也。彼有芍药，此有人参、干姜、艾。大概血虚而不敛者，宜芍药酸寒以收之。气脱而不温者，宜参、姜、乌贼之类，温补而涩之。阿胶者，益金水，以成收藏之用也。阳虚则寒，阴虚则热，故以此主之。而腹痛一证，人皆以为瘀血者多，此以为漏不止者，服熟附丸，正元礼所谓崩而腹痛者，崩止而痛除也。

血瘀崩漏用五灵脂

武叔卿曰：五灵脂散，治血崩不止，不拘多少，炒令烟尽，研末，加当归酒，或童便调下三钱，一名抽刀散，治产后恶血，心腹痛不可忍，其效如神，真救急之良方也。人家不可不备。并治蛇、蝎、蜈蚣咬，涂伤处立愈。

崩漏丸论

《济阴纲目》曰：气血，人身之阴阳也。阳主升，阴主降。阳根乎阴，阴根乎阳。一动一静，互为其根，则一升一降，循经而行，无崩漏之患。若阳有余，则升者胜，血从上窍而出；阳不足，则降者胜，血从下窍而出。是丸也，肉桂、人参、芪、术、甘草，壮阳益气之品也；二活、柴、防、藁、细、川芎，升阳举经之品也；归、地、白芍、桃仁、红花，滋阴入血之品也。壮阳则气不虚，举经则血不陷，滋阴则血不燥，如是则血为气之守，气为血之卫，血荣于中，气卫于外，升降上下，一循乎经，胡自而崩哉。

崩漏用灰药主治

《医学纲目》曰：气陷者，用升气药灰止之，如夏枯草、荆芥之类。血热者，凉血药灰止之，如槐花、黄芩之类。气滞者，用行气药灰止之，如醋炒黑香附之类。血污者，炒熟失笑散之类。血寒者，用热药灰，如桂心、干姜之类。血脱者，用涩药，如白矾、百草霜、棕灰之类。

慎斋按：以上十三条，序治崩漏用药之方论也。《济阴纲目》载方立论，不止于此，数方详说，简要切用，故采录之。

崩漏之脉

《脉诀举要》曰：崩漏下血，脉迟小虚滑者生，疾急大实紧数者死。尺寸虚者漏血，脉浮者死不治。

带下证

经论带下属任脉为病

《素问》曰：任脉为病，男子内结七疝，女子带下瘕聚。

王注曰：任脉起于胞中，上过带脉，贯于脐上，起于季胁章门，似束带状，故曰带下。

经论带下属小肠冤结

《素问》曰：脾传之肾，名曰疝瘕。小肠冤结而痛，出白，名曰白蠹，出白溲。又曰，少腹冤热，溲出白液。

经论带下属思想无穷所致

《素问》曰：思想无穷，所愿不得，意淫于外，入房太甚，发为白淫。

王注曰：白淫者，白物淫衍如精状。男子因溲而下，女子阴中绵绵下也。

慎斋按：以上经论三条，序带下为任脉、小肠经之病。而其因，或得之思想、入房所致也。经文白蠹、白液、白淫，即是男子白浊之属。妇人带下，亦属白物。王太仆以为阴中绵绵下，即是白带之物也。若思想无穷，入房太甚，乃梦遗证也，与带下证有别。因前贤论带下，必引经文数条为证，故载之。

考妇人带下属任脉之病

刘河间曰：带下者，任脉之病也。经云，任脉者，起于中极之下，以上毛际，循腹里，上关元，至喉咽，上颐循面。任脉自胞上过带脉，贯脐上，其病所发，正在过带脉之分，淋沥，故曰带。

慎斋按：以上一条，序带病本于任脉之考也。

带下属于风冷入脬

《圣惠方》曰：妇人带下者，由劳神过度，损动经血，致令身虚，受于风冷，风冷入于脬络，搏其血之所成也。

带下属风邪乘虚入于脬中

巢元方曰：任脉为经之海，任之为病，女子则为带下。手太阳为小肠经，手少阴为心经。心为脏主里，小肠为腑主表。二经之血，在妇人上为乳汁，下为月水，冲任所统也。冲任脉起于脬内，阴阳过度，则伤脬络，故风邪乘虚，入于脬中，损冲任之经，伤太阳少阳之血，致令脬络之间，秽与血相兼带而下，冷则白，热则赤。

带下属风冷伤于胞络

严用和曰：妇人赤白带下，此由劳伤冲任，风冷据于胞络，妇人平居，血欲常多，气欲常少，而疾不生。或气倍于血，气倍生寒，血不化赤，遂成白带。若气平血少，血少生热，血不化红，遂成赤带。寒热交并，赤白俱下，其脉右尺浮，浮为阳，阳绝者无子。若足冷带下，轻则漏下，甚则崩中，皆心不荣血，肝不藏血所致。

带下出于风冷停宿

杨仁斋曰：带之为患，由于风冷停宿，宜桂、干姜、细辛、白芷，先与散其寒邪，然后为封固，用二术、人参以补气。

带下属下元虚冷

戴复庵曰：赤白带下，皆因七情内伤，或下元虚冷，感非一端。大率下白带多，间有下赤带者，并宜顺气散，吞镇灵丹，佐艾附丸。带下不止，成尪羸者，四物加牡蛎，下固肠丸。

带下属虚寒精气蕴积而成

李氏曰：带下有虚寒，带腥臭者，因小水淋沥不已，或崩中暴下，或产后去血过多，以致阴亏阳竭，荣气不升，经脉凝泣，卫气下陷，精气累滞下焦，蕴积而成，白滑如涕，下流腥臭者，黄芪建中汤去桂，加当归。

慎斋按：以上六条，序妇人带下属风冷寒邪为病也。妇人带下，不止风冷邪干。自《圣惠方》以风冷入脬络立论，巢氏以下诸家，遂无异议。岂知病邪之感不一，故以张子和湿热之论序后，当令湿热诸论参治，庶无偏失也。

室女带下有三病所致

《产宝百问》曰：未嫁女子有三病，何也？曰：女子一病经水初下，阴中必热，或当风卧，或乘凉饮冷；二病太冲脉盛则内热，以冷水浇洗之；三病或见丹下惊怖，或因郁怒悲哀之气击搏。三者一有所犯，后必有带下之疾。

妇人带下分三证所感俱属风冷客邪

娄全善曰：未嫁之女，月经初下，止而即浴以冷水，或热而当风，此室女病带下之由也。有家之妇，阴阳过多，即伤胞络，风邪乘虚而入，胞络触冷，遂成秽液，与血水相混而下也。产后带下，由亡血过多则气脱，伤动胞络，玉门未闭，外风袭体虚，风冷乘之，冷与热搏，则成液而下。

慎斋按：以上二条，序室女与妇人带下之病，所感有三证之分，不外风冷客邪之伤也。

带下属湿热冤郁不可主风冷论

张子和曰：妇人带下，《圣惠方》与巢氏二家之说皆非也。夫治病，当先识经络。人身大经有十二，奇经有八脉。十二经与八脉，通身往来，经络共二十道，上下流走环周，昼

夜不息。然此十二经上下周流者，止十九道耳。唯带脉起少腹季胁之端，乃章门穴也。环周一身，络腰而过，如束带之于身。《难经》云，带之为病，溶溶如坐水中。冲任者，是经脉之海也，循腹胁，夹脐旁，传流于气冲，属于带脉，络于督脉。督脉者，起于关元穴。任脉者，女子养胎孕之所。督脉乃是督领妇人经脉之海也。冲任督三脉，同起而异行，一源而三歧，皆络于带脉。冲任督三脉，皆统于篡户，循阴器，行廷孔、溺孔上端。冲任督三脉，以带脉束之。因余经上下往来，遗热于带脉之间，客热所郁，热者血也，血积多日不流，从金之化而为白，乘少腹冤热，白物满溢，随溲而下，绵绵不绝，是为白带。多不痛，或有痛者，因壅碍而成也。经曰，少腹冤热，溲出白液，冤者屈滞也，病非本经，为他经冤郁而成此疾。皆从湿热治之。遗热于小肠，从金化而为白，与治痢同法。赤白痢，乃邪热传于大肠。赤白带，邪热传于小肠。故治二证，不可骤用峻热药燥之，燥之则内水涸，内水涸则必烦渴，烦渴则小便不利，则足肿面浮，渐至不起。治法：先以导水、禹功泻之，次以淡剂降心火，益肾水，下小溲，利水道，则愈矣。

带下属任脉湿热郁结不可用辛热治

刘河间曰：带下，由下部任脉湿热甚，津液溢而为带下也。如以火炼金，热极反兼水化。如六月热极，则物反出液而湿润，林木流津。故肝热甚则出泣，心热则出汗，脾热则出涎，肺热则出涕，肾热则出唾。犹煎汤热甚则沸溢，及热气熏蒸于物而生津也。俗医治白带用辛热药，病微者或令郁结开通，流湿润燥，重者反加病剧。莫若以辛苦寒药，按法治之，使微甚者，得郁结开通，湿去燥除而愈也。

带下属任脉经虚湿热冤结

张洁古曰：带下证，皆任脉经虚也。赤者热入小肠，白者热入大肠，原其本，皆湿热结于任脉，故津液涌溢，为赤白带下。本不病结，缘任经脉虚，结热滞于带脉，故脐下痛，阴中绵绵而下，此湿热冤结不散为病也。先以十枣汤下之，后服苦楝丸、大延胡索散，热去湿除，病自愈矣。

带下属浊水热乘太阳经

张戴人曰：有病白带如水，窈漏中绵绵不绝，臭秽不可近，诸医皆云积冷，以阳起石、硫黄、姜、附燥补之，污水转多。此带本浊水，热乘太阳经，寒水不禁故也。经云，少腹冤热，溲出白液。带病溶溶然若在水中，故治带必从湿热，治宜逐水利小便。夫水自高而趋下，宜先绝其上源，乃涌痰二三升，次用寒凉之剂。

带下属中焦湿热浊气渗入膀胱

罗周彦曰：带下者，荣卫滞气所成也。皆因喜怒忧思，产育房劳，伤其荣卫，或素有湿热，使浊气渗入膀胱，故秽白之物，如涕而下流不止，面色无光，腰腿酸疼，精神短少。世徒知中焦之虚寒，不知中焦之湿热，反用燥热温补之剂，偏助心火，心火既盛，阴血渐烁。譬如猪脂，烹之则熔，冷则凝。中焦湿热，淫气不清，则为白带。所以火升水降，则上热下寒，下焦虚冷，凝结浊物。若热气熏蒸，则为腥腐之气，安得独言虚寒乎。法当清上实下，清浊自分；理脾养血，湿热自解也。

带下属湿热郁下焦带脉

汪石山曰：带证色有赤白之分，病有气血之异，与痢相似，尽由中气亏败，运动失常，致湿热郁结于下焦带脉之分，渗流而下，故名带下。治先清湿为主，必须却厚味，以防湿热之气。故丹溪论赤白带下，由七情内伤，使下元虚惫，致湿热痰积，乘虚下流。叔和谓崩中日久为白带。崩中日久者，下元虚

愈之意。治法：罗太无谓十枣汤、神佑丸、玉烛散皆可用。但虚弱者，不可峻攻，丹溪用升提法，真妙谛也。

慎斋按：以上六条，序带下之属湿热为病也。带下自《圣惠》、元方以下，主于风冷之邪，子和非之，断为湿热冤郁，不可作风冷治。故河间、洁古，均从湿热立论。但湿热有主于任脉经虚者，有主于热乘太阳者，有主于中焦浊气者，有主于下焦郁滞者。无非明湿热下乘，有各经不同。总不若子和据经考证带脉受病原委，为详悉也。

带下属瘀血在于少腹

张仲景曰：问妇人年五十，病下利，数十日不止，暮即发热，少腹里急，腹满，手掌烦热，唇口干燥，何也？师曰：此病属带下。何以故？曾经半产，瘀血在少腹不去，何以知之？其证唇口干燥，故知之，当以温经主之。

带下属肠中有脓血败浊

王叔和曰：妇人带下，肠中有脓，为荣卫相干，血为败浊，有可下不可下之异。

《准绳》按：带下，有败脓淋沥不已，腥秽之甚，遂至脐腹冷痛，此盖败脓所致。用白芷一两，单叶红蜀葵根二两，白芍药、白矾各五钱，为末，蜡丸米饮，候脓尽，以补药佐之。

带下属胃中湿痰渗入膀胱

朱丹溪曰：赤属血，白属气、属痰，俱是胃中痰积流下，渗入膀胱，宜用升举，无人知此。肥人多属湿痰，瘦人带病少，如有，属热痰，用半夏、南星、苍术、海石、炒黄柏、青黛、川芎、椿树皮之属。

《济阴纲目》按：立斋云，不可拘肥人多痰，瘦人多火，轻用燥湿泻火之法。夫肥痰瘦火之说，为丹溪认病总诀，何尝教人泥定一方。虽不可轻治，而火湿终莫能逃。若以稳当之言，犹不可轻治，则洁古之十枣，子和之吐下，太无之神佑、玉烛，与小胃丹之类，可轻用欤？

慎斋按：以上三条，序带下之属瘀血、败脓、湿痰为病也。带下有风冷、有湿热，是外感有余之病。有瘀血、有败脓、有湿痰，是内伤有余之病。病机不一，不可不审。

带下属血海枯津液内竭

李东垣曰：有病白带，常下漏、久服诸药不止。诊得心包尺脉微，下流不止。叔和曰：崩中日久为白带，漏下时多骨水枯。崩中者，始病血崩，久则血少，复亡其阳，故白滑之物，下流不止。是本经血海将枯，津液复亡，枯干不能滋养筋骨，以本部行经药为引使，以大辛甘油腻之药，润其枯燥，滋养精液。以大辛热气味之药，补其阳道，生其血脉。以苦寒之药，泻肺而救上热。气伤者，以人参补之，以苦温之药为佐，名补经固真汤。

带下属脾虚气陷

缪仲淳曰：妇人多忧思郁怒，损伤心脾，肺火时发，血走不归经，此多患赤白带也。白带多是脾虚，肝气郁则脾受伤，脾伤则湿土之气下陷，是脾精不守，不能输为荣血，而下白滑之物，皆由肝木郁于地中使然，法当开提肝气，补助脾元。盖以白带多属气虚，故健脾补气要法也。若有带下如米泔水，腥秽臭者，湿热胜也。亦有脾胃气虚，不能约制其水，而湿痰下坠者，宜二术、茯苓、芩、柏、车前主之，佐以升提。若带下如鸡子清者，脾肾虚极也。面色必不华，足胫必浮，腰腿必酸，宜五味子、八味丸，间用开脾养心之剂，如归脾汤之类。阴虚有火，宜六味丸，如菟丝、五味、车前、黄柏。叔和云，崩中日久为白带，漏下时多骨水枯。言崩久气血虚耗，白滑之物下不止耳。此证虽有气血寒热之分，总属气虚下陷。

带下属于下焦肾气虚损

赵养葵曰：女人带下之疾，带者，奇经八脉之一也，腰脐间围身一周，如束带焉。八脉俱属肾经，人身带脉，统摄一身无形之水。下焦肾气损虚，带脉漏下，白为气虚，赤为有火，治法俱以补肾为主。白者多，赤者少，有脾虚者，六君子加升麻；有气虚者，补中汤；肝虚者，逍遥散兼六味丸。

赤带属心肝二火阴血渐虚

缪仲淳曰：赤带多因心肝二火，时炽不已，久而阴血渐虚，中气渐损，遂下赤带，治宜养心为主，兼和肝缓中，凉血清气。赤带久不止则血虚，宜胶艾四物汤，加便煅牡蛎粉、枣仁、麦冬。

慎斋按：以上四条，序带下属于血枯、脾虚、肾虚为病也。带证自外邪风冷湿热，内伤瘀血、湿痰，皆有余之病。若东垣，以血海将枯，津液复亡，是原其病在血虚也。仲淳以脾精不守，元气下陷，是原其病在气虚也。养葵更推原带脉为病，下焦肾气虚损所致，尤为探本之要。此吴梅坡以十六味保元汤、六龙固本丸，治妇人带下证，盖有自来矣。

治带下同治湿之法

张子和曰：赤白痢者，是邪热传于大肠，下广肠，出赤白也。带下者，传于小肠，入脬经，下赤白也。据此二证，皆可同治湿之法治之。

治带下有先攻后补之法

娄全善曰：洁古治带下，少腹冤结而痛者，先以十枣汤下之，次服苦楝丸、大延胡散，是先攻后补法也。丹溪治结痰白带，先于半饥时，津下小胃丹十余粒，至郁积行，用白术、四物诸药补之，亦先攻后补法也。

治带下用药之法

朱丹溪曰：赤白带，罗先生法，或十枣汤、神佑丸，或玉烛散，皆可用。但虚者不可峻攻，实者可行也。血虚加减四物，气虚以参、术、陈皮间用之。赤属血，白属气。主治以燥湿为先，甚者固肠丸。若有相火动者，诸药中加炒黄柏，滑脱加龙骨、赤石脂。妇人带下，与男子梦遗同治之。

治带下分寒热用药之法

方约之曰：带脉总束诸脉，使不妄行，如人束带而前垂也。妇人多郁怒伤肝，肝属木，脾属土。肝邪乘脾，则土受伤而有湿，湿生热，热则流通，故滑浊之物渗入膀胱，从小便而出。古人作湿寒，用辛温药则非矣。丹溪作湿热，用苦寒药为是。不知用苦寒正治也，用辛温从治也。如湿热怫郁于内，腹痛带下，非辛温从治，能开散之乎？若少腹不痛，止下赤白带者，虽有湿热，而气不郁结，用苦寒治之为当也。

治带下分诸因有虚实之法

刘宗厚曰：带证多本阴虚阳竭，荣气不升，经脉凝泣，卫气下陷，精气累滞下焦奇经之分，蕴积而成。其病或醉饱房劳，服燥剂所致。亦有湿痰流注下焦，或肾肝阴淫之湿胜，或因惊恐而木乘土位，浊液下流，或思想无穷而为筋瘘，或余经湿热屈滞少腹而下。是皆气血虚损，荣卫之精气累滞而成也。前人立论，已尽病机，治无定法。如戴人以带下得两手俱滑大有力，上用宣去痰饮，下以导水丸泄热去湿，继以淡剂渗之，此泻实法也。若诸脉微细，或沉紧而涩，按之空虚，或洪大而涩，按之无力，正元气不足，阴虚中寒，东垣有补阳调经之剂。丹溪治湿痰下注，用海石、南星、半夏之类，并加升提之法。或发中兼补，补中兼利，燥中兼升发，润中益气兼收涩。其例不一，正以病机有轻重

浅深之异耳。

治带下属卫胃俱虚以固卫厚脾为主

杨仁斋曰：下崩出血不止，谓之崩中；秽液常流，谓之带下。崩中失血，多因冲任虚损，荣卫受伤得之。冷带杂下，多因下焦不固，内挟风冷得之，是固然矣。然崩中者，投以芎、归、香附、诸黑药之属，则血暂止而终不止。带下者，投以熟艾、禹粮、桑螵、牡蛎之类，则带暂歇而终不歇，何哉？经曰：卫者，所以温分肉，充皮肤，肥腠理，司开合。卫气若虚，则分肉不温，皮肤不充，腠理不肥，而开合失其司矣。况胃为血海，水液会焉。胃者，中央之土，又主肌肉而约血水。卫气与胃气俱虚，则肌弱而肤空，血与水不能约制，是以休作无时，不暂停也。然则封之止之，可不加意于固卫厚脾之剂乎？此桂枝附子汤，以之固卫，人参、白术、茯苓、草果、丁香、木香，以之厚脾，二者俱不可缺，使气血自循故道，不专收涩以劫夺之也。

治带下不可作湿痰治以补养固本为主

吴梅坡曰：妇女下赤白而不甚稠者，曰白淫，与男子白浊同系于相火，如龙雷之抗而不澄清也。属足少阴、足太阴，治当清补为主。如有滑白稠粘者，谓之带下，属心包手厥阴、少阳。即如男子自遗之精，其如沙石之淋，原乎心包，系乎脊，络于带脉，通于任脉，下抵涌泉，上至泥丸，治宜血肉之剂以培之。此穷源探本之论，时人皆泥于常套，作流痰治，以牡蛎、龙骨、地榆、胶、艾之类涩之，和以四物，加以升提。殊不知根本损伤，以致腐败而来。彼寒滞不清之物，则益加其滞。升提不正之气，则愈增其郁。唯以六龙固本丸、十六味保元汤主之。证属于虚，宜当补养。其他书以痰以湿，俗谓内脏冷。又云，白属气，赤属血，皆泛而不切之言也。明于斯道者，必有神悟焉。十六味保元汤，治赤白带下。骨碎补、贯众，去毛三钱；杜仲、小茴香，盐酒炒一钱五分；人参二钱，黄芪一钱，巴戟二钱，当归一钱，石斛七分，升麻七分，山药一钱，生草六分，独活一钱，茯苓七分，莲须一钱，黄柏八分，圆肉三枚。六龙固本丸，山药四两，巴戟肉四两，小茱萸四两，川练子二两，小茴香一两，补骨脂二两，青盐三钱，汤拌人参二两，莲肉二两，黄芪二两，川芎一两，木瓜一两。

治带下以壮脾胃升阳气为主

薛立斋曰：徐用诚云，带下白属气，赤属血。东垣云，血崩久则亡阳，故白滑之物下流，未必全拘于带脉。窃谓前证，或因六淫七情，或因醉饱房劳，或因膏粱厚味，或燥剂所致，脾胃亏损，阳气下陷，或湿痰下注，瘀积而成，故言带也。凡此皆当壮脾胃升阳为主，佐以各经见证之药。色青属肝，小柴胡加山栀、防风。湿热壅滞，小便赤涩，龙胆泻肝汤。肝血不足，或燥热风热，六味丸。色赤属心，小柴胡加黄连、山栀、当归。思虑过伤，妙香散。色白属肺，补中汤加山栀。色黄属脾，六君子加山栀、柴胡；不应，用归脾汤。色黑属肾，六味丸。气血俱虚，八珍汤。阳气下陷，补中汤。湿痰下注，补中加茯苓、半夏、苍术、黄柏。气虚痰饮下注，四七汤送六味丸。不可拘肥人多痰，瘦人多火，而以燥湿泻火之药轻治之也。

慎斋按：以上七条，序治带下之大法也。带下有寒冷湿热虚实之不同，故诸家治法，有攻下温补之不一。如子和、太无、洁古，用攻下之法也。丹溪、约之、宗厚，用攻补兼施之法也。至杨仁斋、薛立斋，以厚脾壮胃立论，与东垣、仲淳之旨，为共贯矣。吴梅坡以补肾固本为治，与养葵之旨，有先得矣。此皆探本穷源之学，与张、刘之燥湿清热，丹溪之消痰升涩，又有标本内外之殊。读者当会通之。

带下伤五脏有五色之分

《妇人良方》曰：妇人带下，其名有五，因经行产后，风邪入胞门，传于脏腑而致之。若伤足厥阴肝经，色如青泥。伤手少阴心经，色如红津。伤手太阴肺经，形如白涕。伤足厥阴脾经，黄如烂瓜。伤足少阴肾经，黑如虾血。人有带脉，横于腰间，如束带之状，病生于此，故名为带。

女科经纶　卷八

携李　萧　堙赓六纂著
鄞县　曹赤电炳章圈校

杂　证　门

热入血室证

妇人热入血室如疟状

《金匮要略》曰：妇人中风七八日，续来寒热，发作有时，经水适断，此为热入血室，其血必结，故使如疟 状，发作有时，小柴胡汤主之。

徐注曰：妇人热入血室有四，热入血室必谵语，此则不谵语，但如疟状，谓伤寒男女皆有之，而妇人有独异，故首曰妇人中风，即伤寒中所主桂枝汤之风证也。七八日，则表邪已解，复有寒热，故曰续来。然不长热，故曰有时，问其经水，则已来而适断，明是余热未尽，乘虚入之，则余血必结，故寒热有时。然非太阳传入少阳此，因结血之热致有此病，故曰使如症状。虽非传入少阳，而药仍用小柴胡者，盖血室之气，肝主之，肝与胆为表里，胆因肝受邪，而病如疟。非他药所宜，故主和表里，谓上焦之气和，而瘀结之血将自行也。若峻攻之如抵当汤证，则犯少阳之禁矣。

按：以上一条，是言经行未尽而适断，虽有结血，未为全实，小柴胡加当归、丹皮、生地以凉之。

妇人热入血室治无犯胃气

《金匮要略》曰：妇人伤寒发热，经水适来，昼日明了，暮则谵语，如见鬼状，此为热入血室，治之无犯胃气及上二焦，必自愈也。

徐注曰：此言热入血室，不必血结，初即抟邪为患，曰伤寒，即所谓无汗恶寒也。曰发热，病之初也。曰经水适来，是经水初行时也。邪盛则经气亦盛，适相值，寒邪必伤营，故汗与血抟，血属阴主夜，故昼则热虽发而明了，暮则入阴分，邪挟阴气而为谵语。如见鬼状者，谵之甚也。此为热入血室者，言血室虽在内，表邪实未尝犯胃及上二焦，故治法亦唯和表邪，略兼清血室之热足矣。误以为客邪入内攻之，则所伤实多，故曰无犯胃气及上二焦，必自愈也。

按：此条是言经行不断，则热不留结，勿谓谵语，误用硝、黄。犯其胃气，刺动荣血，犯其中焦，柴胡和解，犯其上焦。但不妄犯，热随血散，自愈也。

妇人热入血室当刺期门

《金匮要略》曰：妇人中风，发热恶寒，经水适来，得七八日，热除脉迟，身凉，胸胁满，如结胸状，谵语者，此为热入血室也。当刺期门，随其实而取之。

徐注曰：此言经与病值，不即为患，病解后，反抟邪在胸胁作楚，谓中风病。虽稍异于前之伤寒，然发热恶寒，经水适来，与前之邪盛经亦盛无二。后七八日，热除脉迟，身凉，是经在病中行而不碍也。却七八日后，反胸胁满，如结胸状，谵语，是入血室之热，不窜于经，而结于肝之府，故脉所过处为满，

甚则如结胸状，阴火盛则谵语也。然胸胁虽满，非少阳表邪。虽如结胸，非太阳表邪入里。虽谵语，非胃实。故曰此热入血室，亦见不可误攻胃及上二焦，当刺期门。期门，肝之分也。此肝实病，泻其实而取之。

按：此条言适来即断，血结在里为实证，故刺期门以泻之。不善刺者，小柴胡去人参，加桃仁、丹皮、归尾、山甲以行之。

热入血室谵语头汗出当刺期门

《金匮要略》曰：阳明病，下血谵语者，此为热入血室，但头汗出，当刺期门，随其实而泻之，濈然汗出者愈。

徐注曰：此言阳明病亦有热入血室，但下血、头汗出不同耳。阳明病，即头痛鼻干，不眠是也。假如转入阳明之腑，必有汗、谵语等，为可下证。何缘下血、谵语，故知为热入血室。然阳明宣通身有汗，此血中有热而血耗，耗则下虚而厥，身为燥阴所闭，故无汗。唯头则阴不能入，而阳仍通，故汗。此病亦由肝实，不当责阳明，故亦刺期门，而曰随其实而泻之。濈者，通身微微似汗也。汗则肝不强而阴阳平，故愈。

妇人热入血室治宜化痰除热

《金匮要略》曰：妇人中风，发热恶寒，经水适来，昼则明了，暮则谵语，如见鬼状，发作有时，此名热入血室。医者不晓，以刚剂与之，遂致胸膈不利，涎潮上脘，昏冒不知，当先化其痰，后除其热。

慎斋按：以上五条，序《金匮》论妇人伤寒有热入血室之一证也。第一条详热入血室证候，下四条言治法也。

慎斋按：妇人热入血室，因经水适来，寒邪乘虚袭入，热血必结，故有谵语见鬼之证。仲景第一条用小柴胡汤，以寒热如疟状，故用之也。以下四条，但云刺期门，随实泻之，化痰、除热三法，原以血结于中而用泻法也。可笑庸工不解仲景全文，一遇热入血室证，即以小柴胡汤一方为主剂，不大谬耶？故凡遇热入血室，当导血下行，以清热，不可误执小柴胡方为戾也。

妇人热入血室解

成无己曰：室者，屋室也，谓可停止处。人之血室，荣血停止之所，为经脉留会之处，即冲脉也。冲脉者，奇经八脉之一，起于肾，下络气街，并足阳明，挟脐上行，至胸中而散。太仆曰：冲为血海，言诸经之血，朝会于此。男子运而行之，女子上为乳汁，下为月水。经言任脉通，太冲脉盛，月事以时下是也。伤寒之邪，妇人则随经而入，男子由阳明而传。以冲脉与少阴之络起于肾，女子感邪，太阳随经，便入冲之经，并足阳明，男子阳明内热，方得入冲脉。得热血必妄行，在男子则下血谵语，在妇人则月水适来。阳明病，下血谵语，此为热入血室。盖言男子，不止谓妇人也。妇人伤寒，经水适来适断，经气既虚，宫室不闭，邪得乘虚而入，有治而愈，有不治而愈。如妇人发热恶寒，经水适来，得之七八日，热除脉迟，身凉，胸胁下如结胸状，谵语，此为热入血室，当刺期门，随其实而泻之。又妇人中风七八日，续得寒热，发作有时，经水适断，此为热入血室，其血必结，故为疟状，发作有时，小柴胡汤主之。二者须治而愈。妇人伤寒发热，经水适来，昼则明了，夜则谵语，如见鬼状，此为热入血室，无犯胃气及上中二焦，必自愈，是不须治而愈。夫谵语为病邪之甚，何反不须治而愈？盖结胸谵语，是邪气留结胸胁而不去，必刺期门，随其实而泻之。寒热如疟，发作有时，是血结不行，须小柴胡散之。二者既有留邪，必散之可愈。若发热，经水适来，昼日明了，暮则谵语，此经水适来，以里无留邪，但不妄犯，热随血散必自愈。经云，血自下，下者愈。故无犯胃气及上二焦必自愈。所谓妄犯者，谓恐以谵语为阳明内实攻之，犯其胃气也。此无胸胁之邪，刺期门，恐犯中

焦也。此无血结，与小柴胡，恐犯上焦也。盖小柴胡解散，则动卫气，卫出上焦，动卫气是犯上焦矣。刺期门则动荣气，荣出中焦，动荣气，是犯中焦矣。《脉经》曰：无犯胃气及上中二焦，岂谓药而不谓针耶？

热入血室成结胸证论

许叔微曰：或问热入血室，何为成结胸？曰：邪气传入经络，与正气相搏，上下流通，遇经水适来适断，邪气乘虚入于血室，血为邪所迫，上入肝经，脉受邪则谵语见鬼，复入膻中，则血结于胸矣。何以言之，妇人平居，水养木，方未受孕则为月水，既孕则蓄以养胎，已产上壅为乳，皆血也。今邪逐血并，归于肝经，聚于膻中，结于乳下，故手触之则痛，非药可及，当刺期门也。

热入血室属肝脏邪客

武叔卿曰：小柴胡汤，治太阳传经病。盖脏血适来，则血室虚，邪气乘虚入，而为越经证。然血室与胃腑，有气血之分，故谵语有昼夜之别。曰如见鬼者，以肝脏邪客而魂不安，本神自病也。用小柴胡解表里之邪，用地黄凉血中之热。没有不愈，又有刺期门法。其加桃仁、红花，与承气、抵当等汤者，各因其微甚而泻之也。

产后热入血室治法

杨仁斋曰：凡大小产，热入血室，小柴胡汤力所不及者，于内加五灵脂，乃以黄连、赤茯苓佐之。盖心主血，黄连、茯苓皆清心凉血之剂，所以收功也。若疏利血毒，则《活人书》桃仁承气有余勇矣。

热入血室男子亦有

张路玉曰：冲为血海，即是血室。冲脉得热，则逼血下行，男子亦有是证，不独妇人也。

慎斋按：以上五条，序妇人伤寒有热入血室之证也。血室即血海，冲任之脉所系，为藏精受胎之所。因妇人血海有余，遇经行之期，而犯伤寒之邪，则热邪乘血室之虚，袭入而与血相搏。夫肝藏魂，血室虚，则肝无所依。肝受热邪，则为谵语，为见鬼，肝之魂不能安也。故治法，唯有清热行血，甚则桃仁承气，微则生地、丹皮、桃仁、红花、赤芍、五灵脂、甘草、木通、丹参，可以通治之，不可拘执小柴胡汤，为治伤寒热入血室之定例也。夫小柴胡方，为伤寒传少阳，和解表里之药，必欲用之于热入血室之证。岂知柴胡发表，黄芩退热，半夏行痰，为血家所忌。人参补气助邪，非血热所宜。今人一遇热入血室之证，便用小柴胡汤定法，曰我遵仲景书也。岂知仲景第一条云，妇人中风，寒热发作有时，如疟状，明属少阳经证，故曰小柴胡汤主之。则小柴胡汤，原为少阳经设也。至后四条，但云必自愈，云当刺期门，又云随其实而泻之。实者，热血结于胸也。泻之者，泻其实邪也。并无小柴胡汤主之一语，则知小柴胡汤，只因妇人伤寒，有续寒热如疟状之证，故以之治少阳如疟之病，而本非治热入血室之证也。今人不玩仲景前后原文，漫谓妇人热入血室，动辄用小柴胡主之，岂不大可嗤耶。故凡妇人病热入血室，有续得寒热，发作有时，如疟状者，小柴胡汤可用也。亦必加桃仁、丹皮、五灵脂，以行其血。如热入血室，而无有寒热如疟之证，则小柴胡汤断不可用也。举世懵懵，特表而出之。

血分水分证

妇人血分水分证

《金匮要略》曰：问病有血分水分，何也？师曰：经水前断，后病水，名曰血分，此病为难治。先病水，后断经水，名曰水分，此病易治。何以故？去水其经自下也。

妇人血分属寒湿伤其冲任

《圣济总录》曰：血分者，经水通之际，因寒湿伤其冲任，气壅不行，播在皮肤，邪气相搏，经血分而为水，发为附肿，故曰血分。《脉经》曰：经水前断，后病水者，名曰血分，久不治，积成水肿，即难治。

妇人水分属水气上溢皮肤

《圣济总录》曰：水分者，以水气上溢皮肤，散于四肢，发为附肿。盖肾者，胃之关，关门不利，故聚水而从其类也。此病与血分相似，治药有先后耳。

妇人血分水分属脾肺虚冷

汪石山曰：凡经先断，而后病水，少阴脉沉而滑，沉则在里，滑则为实，沉滑相搏，血结胞门，为血分，难治。若先病水，而后病经断，少阳脉牢，少阴脉细，男子小便不利，妇人经水不通，经通则为血，不利则为水，名水分，易治。此因脾肺虚冷，不能通调水道，下输膀胱，渗泄之令不行，生化之气不运。东垣云，水饮留积，若土在雨中则为泥，得和气暖日，水湿去而万物自生长，用加减肾气丸、归脾汤、六君子加木香、炮姜、肉桂。

妇人血分水分所化有别

陈良甫曰：妇人经水不通，则水化为血，血不通则复化为水。故先因经水断绝，后四肢浮肿，小便不通，名曰血分，是血化为水也，宜椒仁丸。若先因小便不通，后身面浮肿，致经水不通，名曰水分，是水化为血也，宜葶苈丸。经脉不通而化为水，流走四肢悉肿满，亦名血分，其证与水证相类，实非水也，用人参丸。

张嶙璜按：先浮肿而后经水不通，明系土虚不能制水，经虚则血不能生，故经止。若水化为血等语，真堪捧腹。

妇人血分辨证用药法

李氏曰：经水断而后肿，名曰血分，乃瘀血化水，闭塞胞水，此水肿难治，但当调其经，则水自消，用小调经散、葶苈丸加丹皮、牛膝、红花。若先浮肿而后经水不通，名曰水分，乃脾不能制，血与水并，肌肉为之虚肿，红矾丸、肾气丸加泽泻、防己、葶苈、木通。

血分水分以补元气为主

薛立斋曰：妇人血分水分证，或因饮食失节，或因六淫七情失宜，以致脾胃亏损，不能生发，气血乖违失常，致形气不足，邪塞隧道，必用椒仁、葶苈二丸，以宣导其邪，佐以补元气之药，庶真气不复伤也。

谨斋按：以上七条，序妇人有血分、水分之证也。妇人以血用事，而月信其最要也。故曰入门看妇人病，先问经期，经期之先后、多寡、枯闭，即可以断妇病之浅深轻重。如血分之病，在经水先断，而后头面四肢肿满，此血不运行，气壅不化。法当通经调血，血行而肿自消。若先四肢肿满，后经水断绝，此直是水肿病耳，何必名以水分，与血分同出条例耶，此古人分证立名之多惑也。

妇人血分病不可作水治

《证治要诀》曰：有经事不通，血人四肢，化为水，遂成肿满，非独产后为然，名曰血分。误作水治，其害不小，宜调经散。

妇人血分属气壅不能化血

武叔卿曰：气者水之母，血者气所化。非气无以生血，非血无以养气。若经水不通，则血病气亦病。岂有水不通而能化血乎。血不通面化水者，乃是气壅不能化血而成水也。观桃仁丸，可见矣。

妇人血分用药从血上求治

《妇人良方》曰：妇人血分，如夺命丹、黑神散，皆为要药。血分一证，大小产后多有之。唯胎前脚肿不同，产后则皆败血所致，当于血上求之。

椒仁丸治血分

《妇人良方》曰：先因经水断绝，后至四肢浮肿，小便不通，血化为水，名曰血分。椒仁丸药虽峻利，所用不多。若畏而不服，有养病害身之患。尝治虚弱人，亦未有误也。

《济阴》按：血既化为水，则以利水为先，而行血温血，开结破气，又不可少。然非峻利气悍之物不可，故又佐以大毒之药。

慎斋按：以上四条，序治血分用药之大法也。夫血分属妇人经水不通而致，必是六淫外侵，七情内伤，以致脾胃虚衰，不能运化精微。故血壅不流，气不能化，法当补脾健胃，扶养气血，佐以温经行血之剂可也。椒仁丸，有斑蝥、砒信、甘遂、芫花、黑丑、蚖青，群队大毒之药以攻之，祸有不可胜言者。《大全》乃曰：治虚弱人未见有误，是何言欤。

咽　中　证

妇人咽中如有炙脔病

《金匮要略》曰：妇人咽中如有炙脔，半夏厚朴汤主之。

徐忠可曰：此条即所谓寒伤经络，凝坚在上也。炙脔，譬如干肉也。《千金》所谓咽中帖帖，如有炙肉，吐之不出，吞之不下，状如有炙脔，数语甚明切。此病不因肠胃，故不碍饮食二便。不因表邪，故无骨痛寒热，乃气为积寒所伤，不与血和，血中之气溢而浮于咽中，得水湿之气而凝结难移。妇人血分受寒，多积冷结气，最易得此病，男子亦间有之。药用半夏厚朴汤，乃二陈汤去陈皮、甘草，加厚朴、紫苏、生姜也。半夏降逆，厚朴兼散结，故主之。生姜、茯苓，宣至高之滞，而下其湿。苏叶味辛气香，色紫性温，能入阴和血，兼归气于血，夏天暑伤心阴，能下暑郁。而炙脔者用之，则气与血和，不复上浮也。

论曰：余治王小乙，咽中每噎塞，嗽不出，以半夏厚朴汤投之即愈。后每复发。细问之云，夜中灯下，每见晕如团，五色，背脊内间酸。其人又壮盛，知夏初因受寒，阴气不足，而肝反郁热，甚则结寒微动，挟肾气上冲，咽喉塞噎也。即于此方加大剂枸杞、菊花、丹皮、肉桂，晕乃渐除，咽中亦愈，故曰男子间有之，信不诬也。

妇人咽中如梅核证

《产宝百问》曰：喉咙有咽门，二者各有所司。喉咙者，空虚也。肺之系，气之道，络肺应天，故属天气所生。有九节，以通九脏之气，所以谓之嗌。或阴阳之气，痰结咽喉，膈塞噎状若梅核，妨碍饮食，久而不愈，即成翻胃，或胸膈痰结，与气相抟，上逆咽喉之间作聚，状如炙肉之证也。以半夏厚朴汤，治妇人喜怒悲思、忧恐惊怖之气，结成痰涎，状如破絮，或如梅核，在咽喉，咯不出，咽不下，此七情所为。或中脘痞满，气不舒快。或痰涎壅盛，上气喘急。或因痰饮中滞，呕逆恶心。

慎斋按：以上二条，序妇人有咽中炙脔梅核之证也。徐注主寒冷气，《产宝》主七情痰结。一属外感，一属内伤，当兼参之。

癥瘕痃癖证

妇人癥瘕痃痞形状总考

《证治准绳》曰：《大全良方》分痃癖、诸气、疝瘕、腹中瘀血癥、痞食癥，凡七门。痃者，在腹内，近脐左右，各有一条，筋脉急痛，大者如臂，次者如指，因气而成，如弦之状，故名曰痃。癖者，僻在两胁之间，有

时而痛，故名曰癖。疝者，痛也。瘕者，假也。其结聚浮假而痛，推移乃动也。八瘕者，黄瘕、青瘕、燥瘕、血瘕、脂瘕、狐瘕、蛇瘕、鳖瘕。积在腹内，或肠胃之间，与脏气结抟坚牢，虽推之不移，名曰癥，言其病形可征验也。气壅塞为痞，言其气痞塞不宣畅也。饮食成块，坚而不移，名曰食癥。瘀血成块，坚而不移，名曰血癥。若腹中瘀血，则积而未坚，未至于成块者也。大抵推之不动为癥，推之动为瘕也。至疝与痃癖，则与痛俱，痛即现，不痛即隐。在脐左右为痃，在两肋间为癖。在小腹，牵引腰胁为疝。恐学者一时难了，未免淆乱，故总叙条析之。

妇人八瘕属血脉精气不调所生

巢元方曰：八瘕者，皆胞胎生产，月水往来，血脉精气不调所生也。肾为阴，主开闭，左为胞门，右为子户，主月水、生子之道。胞门子户，主精血神气出入，合于中黄玉门四边，主持关元，禁闭子精。脐下三寸，名曰关元，主藏魂魄。妇人之胞，三焦之府，常所从止。若妇人经脉俞络合调，月水以时来至，能生子而无病。如经络荣卫继绝不通，邪气便得往来，入合于脏。若生血未尽而合阴阳，即令血脉挛急，小腹重急，支满胸胁，四肢酸痛，饮食不调，结牢恶血不除，月水不时，因生积聚，如怀胎状，阴中肿，内生风，小便不利，若痛如淋状，久不复生子。

慎斋按：《巢氏病源》论妇人八瘕，不外新产、月水之后，感寒湿风冷，凝泣血脉，留滞经络，闭塞隧道而成也。乃强分黄瘕、青瘕、燥瘕、血瘕、脂瘕、狐瘕、蛇瘕、鳖瘕之名，以惑世诬名，宜其为张戴人所斥也。夫瘕者假也，不过假人身之气血，加以食积痰饮，胶结成形。《内经》止有石瘕，生于胞中一证，何尝有为黄为青之名色耶？既有八瘕之证，医者亦难辨其是狐是蛇是鳖也，因删之。《妇人良方》中，但存八瘕之名，而不载条目，最有见。

妇人八瘕属外邪乘合阴阳所致

《妇人良方》曰：妇人脏腑调和，经脉循环，月水以时，故能生子无病。若乘外邪而合阴阳，则小腹胸胁腰背，相引而痛，月事不调，阴中肿胀，小便淋沥而色黄黑，则瘕生矣。八瘕者，黄、青、燥、血、脂、狐、蛇、鳖是也，《千金》、《外台》，言之详矣。

薛立斋按：经云气主煦之，血主濡之。若血不流，则凝而为瘕。瘕者，中虽硬而忽聚忽散。多因六淫七情，饮食起居，动伤脏腑而成，当与痃癖诸证治同，慎不可复伤元气。

妇人癥瘕属脾胃亏损邪正相抟

《大全》曰：妇人癥瘕，由饮食失节，脾胃亏损，邪正相抟，积于腹中，牢固不动，有可征验，故名曰癥。气道壅塞，故名曰瘕。得冷则发，冷入子脏则不孕，入胞络则月水不通。

薛立斋按：此证若脾胃虚弱，六君子加芎、归。若肝脾虚弱，补中汤及归脾汤。若肝火郁滞，佐以芦荟、地黄二丸，外贴阿魏膏。患者须慎七情六淫，饮食起居。治者不时审察病机而药之，庶几有效。

妇人食癥属经行不忌生冷所致

《大全》曰：妇人食癥，由脏腑虚弱，经行不忌生冷之物，不能消化，与脏气相持，结聚成块，日渐生长，牢固不安，谓之食癥，或劳伤元气所致。陈无择云：经不行者，宜先导之，然后固元气为主。

薛立斋曰：证若形气虚弱，须先调补脾胃为主，佐以消导。若形气充实，当先疏导为主，佐以补脾胃。若气壅血滞而不行者，宜乌药散散而行之。若脾气虚而血不行者，四君子、芎、归，补而行之。若脾气郁而血不行者，归脾汤解而行之。若肝脾血燥而血不行者，加味逍遥散，清而行之。大抵食积痞块证为有形。邪气胜则实，真气夺则虚，当

养正避邪，而积自除。虽云坚者削之，客者除之，胃气未虚，或可少用，若病久虚乏，不宜轻用。

妇人血癖属风冷饮食与血气相结

《大全》曰：妇人寒热失节，脏腑气虚，风冷在内，饮食不消，与血气相结，渐生块，不移动，皆因血气劳伤，月水往来，经络痞塞，恶血不除，久而不差，心腹两胁苦痛，碍于饮食，肌肤消瘦。问：癖一也，何以知是血癖？曰：血外证瞀闷、烦躁、惊狂、痰呕、汗多、骨蒸、肢冷。其蓄在下焦者，必脐下结急，外热内痛，尺脉洪而数，桃仁、灵脂、生地、牛膝、大黄、甘草去之。

薛立斋按：此证多兼七情亏损，五脏气血乖违而致。气主呴之，血主濡之。脾统血，肝藏血。故郁结伤脾，恚怒伤肝者多患之。腹胁作痛，正肝脾二经证。洁古云：养正积自除。东垣云：人以胃气为本，治法当主固元气，佐以攻伐之剂，必需之岁月。若期速效，投以峻剂反致有误也。

妇人疝瘕属风冷入腹与血相结

《大全》曰：妇人疝瘕，由饮食不节，寒温不调，气血劳伤，脏腑虚弱，风冷入腹，与血相结而生。妇人之病，有异于丈夫者，或因产后血虚受寒，或因经水往来，取冷过度，非独因饮食失节，多挟血气所成也。其脉弦急者生，虚弱小者死。尺脉涩而浮牢，为血实气虚，其发腹痛，逆气上行，此为胞中有恶血，久则结成血瘕。

妇人痃癖属血之所为

《大全》曰：痃癖二者，皆阴阳不和，经络痞膈，饮食停滞，不得宣流，邪冷之气，抟结不散，得冷则发作疼痛。夫痃癖癖瘕，血气块硬，发作则痛，甚则欲死，究而言之，皆血之所为也。

薛立斋按：前证因饮食起居，七情失宜，亏损脏腑，气血乖违，阴络受伤，循行失度所致。罗谦甫云，养正邪自除，必先调养，荣卫充实，若不消散，方可议下。但除不以渐，必有颠覆之害。若不守禁忌，未有能愈者也。

妇人精聚癖瘕皆属血病

王宇泰曰：古方有五积六聚七癖八瘕之名。五脏之气积，名曰积，故曰积有五。六腑之气聚，名曰聚，故聚有六。若七癖八瘕，则妇人居多。七者火数，属心，血生于心。八者木数，属肝，血归于肝。虽曰强分，理似不混。夫癖者坚也，坚者难破。瘕者假也，假物成形。古人将妇人病为痼疾，以蛟龙等为生瘕，然亦不必如此执泥。妇人癖瘕并属血，龙蛇鱼鳖、肉发虱瘕等事，皆出偶然。但饮食间误中之，留聚脏腑，假血而成，自有活性。亦犹永徽中，僧病暗者，腹中有一物，其状如鱼，即生瘕也。与夫宿血停凝，结为痞块，虽内之所感不同，治法当以类相从。所谓医者，意也。如以败梳治虱瘕，铜屑治龙瘕，曲蘖治米瘕，石灰治酒瘕，如此等类，学者可以理解也。

薛立斋按：方书有五积六聚七癖八瘕之名。五积六聚，出自越人《难经》，有心肝脾肺肾五脏之积，而无有六聚。以聚为气病，积为血病也，故东垣有五积丸治法。若《巢氏病源论》载七癖八瘕，但有八瘕名证，而无七癖病形，其他方书亦不散见。岂以癖为气病，瘕为血病，故无可考耶？宇泰先生云，不必执泥，事出偶然，可谓善会古人之书者也。然事之或有者，毋尽信，亦不可不信。如慈溪王节斋先生，尊信丹溪之书，日服补阴丸无间者数十年。内有龟甲，制之不善，大下小赤色龟数十而死。此即八瘕之类，有感而生者也，宁独病在妇人耶。

治癥瘕兼消痰癖

武叔卿曰：瘕一癥二，曰血曰食，而不及痰饮，何也？盖瘕气之中，未尝无饮。而

血癥食癥之内，未尝无痰，则痰食血，未有不因气病而后形病。故消积之中，兼行气消痰消瘀之药为是。

治癥瘕不同峻攻以伤元气

李氏曰：善治癥瘕者，调其气而破其血，消其食而豁其痰，衰其大半而止，不可猛攻，以伤元气。宁扶脾胃正气，待其自化。凡攻击之药，病重病受之，病轻则胃气受伤矣。或云，待块消尽而后补养，则胃气之存也几希。

治癥瘕积聚以行气为主

武叔卿曰：癥瘕积聚，并起于气，故有气积气聚之说。然谓瘕属血病者，气聚而后血凝也。其夹食夹痰，又各随所积而变见矣。夫痰与血食，皆赖气以行化。故气行物生，气病物病。此百病所以皆生于气，破血消痰消食之剂，必用气药者，以此也。

慎斋按：以上三条，序治痞癖癥瘕之大法也。夫痞癖癥瘕，不外气之所聚，血之所凝。故治法不过破血行气，《济阴》又推广痰食瘀血，兼以行气为主也。《内经》有石瘕、肠覃二证，前已载之"胎前鬼胎证"，故兹不复赘。

乳　证

妇人之乳属肺肝二经

《医暇卮言》曰：女人产育哺养以乳，乳之体，居经络气血之间也。盖自寅时始，于手太阴肺经，出于云门穴，穴在乳上，阴阳继续，以行周十二经，至丑时归于足厥阴肝经，入于期门穴，穴在乳下，出于上，入于下，肺领气，肝藏血，乳正居于其间也。

慎斋按：以上一条，序原妇人乳汁之所自出，属肺肝二经气血之化也。

乳痈属阳明经热为风邪所客

《圣济总录》曰：足阳明之脉，自缺盆下于乳。又冲脉者，起于气街，并足阳明经，夹脐上行，至胸中而散。妇人以冲任为本，若失于将理，冲任不和，阳明经热，或为风邪所客，则气壅不散，结聚乳间，或硬或肿，疼痛有核，皮肤燠肿，寒热往来，谓之乳痈。风多则硬肿色白，热多则燠肿色赤。不治，血不流通，气为壅滞，或乳内津液相抟，腐化为脓，宜速下乳汁，导其壅塞，散其风热，则病可愈。

乳痈属风热结薄血脉凝注

张子和曰：乳痈发痛者，亦生于心也。俗乎曰吹乳是也。吹者，风也。风热结薄于乳房之间，血脉凝注，久而不散，溃腐为脓也。

慎斋按：以上二条，序乳痈属于风热外邪为病也。

乳痈属胆胃二经热毒气血壅滞

《妇人良方》曰：经云乳头属足厥阴肝经，乳房属足阳明胃经。若乳房忽然壅肿痛，结核色赤，数日之外，燠痛胀溃，稠脓涌出，此属胆胃热毒，气血壅滞，名曰乳痈，为易治。

《家居医录》按：乳痈初起，肿痛发于肌表，肉色燠赤，或发寒热，或头痛烦渴，用人参败毒散、神效瓜蒌散、加味逍遥散治之，自消散。若脓成溃窍，稠脓涌出，脓尽自愈。若气血虚弱，或误用败毒，久不收敛，脓清脉大，则难治。

薛立斋又按：乳痈治法，初起寒热燠痛，即发表散邪，疏肝清胃为主。或不作脓，脓成不溃，宜用托里。或肌肉不生，脓水清稀，宜补脾胃。或脓出反痛，恶寒发热，宜补气血。或肿燠作痛，晡热，宜补阴血。或饮食少，反作呕，宜补胃气，切不可用克伐，复伤脾胃也。

乳痈属忿怒郁闷阳明血热沸腾

朱丹溪曰：经云，乳房属足阳明胃经所经，乳头属足厥阴肝经所属。妇人不知调养，

忿怒所逆，郁闷所遇，厚味所酿，以致厥阴之气不行，故窍不得通，而汁不出。阳明之血沸腾，热甚化脓。治法：青皮疏厥阴之滞气，石膏清阳明之血热，生草节行污浊之血，消肿导毒，瓜蒌仁、没药、青橘叶、角刺、金银、当归、酒佐之，加艾灸二三十壮于痛处，甚效，切不可用刀针，必致危困。

乳痈属饮食厚味胃火上蒸乳房

李氏曰：妇人之乳，男子之肾，皆性命之根也。有饮食厚味、郁怒，以致胃火上蒸乳房，则乳汁化为浊脓。肝经气滞，乳头窍塞不通，致令结核不散，痛不可忍。初起宜隔蒜灸之，切忌刀针。能饮者，一醉膏加当归，两服即效。

慎斋按：以上三条，序乳痈属七情、饮食、热毒内伤为病也。

乳痈属儿口气吹所致

《大全》曰：产后吹乳者，因儿吃奶之际，忽自睡着，为儿口气所吹，令乳汁不通，蓄积在内，遂成肿硬，壅闭乳道，伤结疼痛。亦有不痒不痛，肿硬如石者，总名曰吹乳。若不急治，肿甚成脓，连服皂角散、瓜蒌散，敷以南星散，更以手揉之则散。

乳痈属乳子口气燃热所吹

朱丹溪曰：妇人有所乳之子，膈有滞痰，口气燃热，含乳而睡，热气吹入乳房，凝滞不散，遂生结核。若初起时忍痛揉软，吮乳汁透，即可消散。失此不治，必成痈肿。

慎斋按：以上二条，序乳痈属儿之口气所吹，为不内外因病也。妇人乳痈，亦不外三端，一者外感风热，客于阳明一经；二者郁怒厚味，伤于肝胃；三者儿口吹气，热壅不散，皆足致乳痈之病也。

治乳痈不宜用凉药

薛立斋曰：妇人乳痈，多因小儿断乳后，不能回化。又有妇人乳多，孩提少饮，积滞凝结。又有经候不调，逆行失道。又有邪气内郁，结成痈肿。初发时切不宜用凉药，盖乳本血化，不能漏泄，遂结实肿，其性清寒，又加凉药，则阴烂宜也。唯凉药用之既破之后则佳，如初发时，宜用南星、姜汁敷之，可以内消。更加草乌一味，能破恶血逐块，遇冷即消，遇热即溃。更加乳香、没药以定痛，内用瓜蒌仁、十宣散、通顺散间服之。

妇人乳痈有可治不可治

孙真人曰：凡女人多患乳痈，年四十以下，治之多瘥，年五十以上，慎勿治之，治之多死，不治自得终天年。

慎斋按：以上二条，序治乳痈戒用凉药，并示人以可治不可治之法也。

乳岩属忧怒抑郁肝脾气逆

朱丹溪曰：妇人有忧怒抑郁，朝夕积累，脾气消阻，肝气横逆，遂成隐核如棋子，不痛不痒，数年而发，名曰奶岩，以疮形似岩穴也，不可治。

乳岩属肝脾郁怒气血亏损所致

薛立斋曰：乳岩乃七情所伤，肝经血气枯槁之证，不赤不痛，内有小核，积之岁月渐大，内溃深烂，为难治。因肝脾郁怒，气血亏损故也。治法：燃痛寒热初起，即发表散邪，疏肝清胃为主，宜益气养荣汤、加味逍遥散，可以内消。若用行气破血，则速其亡矣。

乳岩属郁气有用药法

武叔卿曰：乳岩之病，大都生于郁气。盖肝主怒，其性条达。郁而不舒，则屈其挺然之质。乳头属厥阴，其气与痰，时积累而成结核。兹以风药从其性，气药行其滞，参、芪、归、芍补气血，枳实、乌药、木通疏利壅积，柴、防、苏叶表散，白芷腐脓通荣卫，槟榔

通滞下行，宜桂行和血脉。且曰木得桂而枯，为伐肝之要药。

慎斋按：以上三条，序乳岩之证也。病虽均在乳，而有痈与岩之分。痈轻而岩重，痈之来也骤，而岩之成也渐，故治痈易而治岩难。大抵痈属外感之风热，内伤之厚味，儿吮俱多；岩本于七情郁怒，脏气不平，肝脾亏损。故治岩之法，与治痈微有不同，一宜补少而泻多，一宜泻少而补多也。

乳证治法总论

薛立斋曰：太凡乳证，若恚怒，宜疏肝清热；煽痛寒热，宜发表散邪；肿煽痛甚，宜清肝消毒，并隔蒜灸；不作脓，或脓不溃，补气血为主；不收敛，或脓稀，补脾胃为主；脓出反痛，或发寒热，补气血为主；或晡热内热，补血为主；若饮食少思，或作呕吐，补胃为主；饮食难化，或作泄泻，补脾为主；劳碌肿痛，补气血为主；怒气肿痛，养肝血为主；儿口所吹，须吮通揉散；若成痈，治以前法。若乳岩属肝脾二脏郁怒，气血亏损。故初起小核结于乳内，肉色如故，五心发热，肢体倦瘦，月经不调，加味归脾汤、加味逍遥散、神效瓜蒌散，多服自消。若迁延日久渐大，岩色赤，出水，腐溃深洞，用前归脾汤等药可延岁月。若误攻伐，则危殆矣。

慎斋按：以上一条，序治乳痈乳岩之大法也。世医治乳痈乳岩，不过寒凉清火，破气消瘀。岂知病之成也，原于肝胃亏损，荣卫不能运行所致。唯立斋惓惓于扶持脾胃，补气养血为主，戒人不可诛伐太过，以致夭枉，垂训之意深矣。

前阴诸证

妇人阴肿属风邪乘阴与血相搏

陈良甫曰：妇人阴肿，是虚损受风邪所为。胞络虚而风邪客之，风气乘于阴，与血气相搏，令气痞塞，腠理壅闭不泄越，故令肿。

妇人阴肿属房劳伤损

徐春甫曰：阴肿有因房劳过度，伤损阴户致肿，宜节欲调治。有欲胜而热甚生虫，以致肿痒甚者，皆宜戒房室，速治之。有邪气渐盛，致阴户溃烂不收，失于早治也。

薛立斋按：前证若气血虚弱，补中汤举而补之；肝经湿热，龙胆泻肝汤渗而清之。又有肝脾郁怒，元气下陷，湿热壅滞，朝用归脾汤加升、柴，解郁结，补脾气，夕用加味逍遥散，清肝火，生肝血，除湿热。

慎斋按：以上二条，序妇人阴户肿，有风邪之外感，有房劳之内伤也。阴肿病，《大全》主于风邪入客，春甫主于劳伤房事，立斋推原于肝经湿热所致，此为病机之要。

妇人阴中痛名小户嫁痛

《千金方》曰：妇人小户嫁痛连日，方用甘草、生姜、白芍、桂心，酒煮温服。又方，疗嫁痛，一味牛膝，或一味大黄，酒煮服。又，乌贼鱼骨烧末，酒吞之，外用青盐炒热，布裹熨之。

妇人阴中肿痛属肝经湿热

《良方》论曰：妇人或肝经湿热下注，或郁怒伤损肝脾。外证或两拗小腹肿痛，或玉门煽肿作痛，或寒热往来，憎寒壮热。内证或小便滞涩，或腹内急痛，或小腹痞闷。若两拗小腹肿痛，肝经湿热壅滞也，用龙胆泻肝汤。玉门肿胀，肝火血虚也，加味逍遥散，及龙胆泻肝汤加木香。若概投散血攻毒之剂，则误甚矣。

李氏按：阴户两旁肿痛，手足不能舒伸者，用四物汤加乳香末捣饼，纳阴中立效。又阴肿痛极，便秘欲死，四物加柴胡、丹皮、山栀、胆草。如时常阴肿者，四物加藁本、防风。若肿痛不闭者，逍遥散加丹皮、山栀。

慎斋按：以上二条，序妇人阴中肿痛之

证也。尤宜阅经环阴器，妇人阴户为肝经之分，是经血虚火燥，则为肿为痛，痛者火也。实则泻其子，龙胆泻肝汤，加味逍遥散，虽为本经的对之药，不若大剂导赤散加黄连，以泻肝之子，而以六味饮滋化源，以补其母之胜也。

妇人阴痒属脏虚虫蚀

陈良甫曰：妇人阴痒，是虫蚀所为。三虫在肠胃之间，因脏虚，三虫动作，蚀于阴内，其虫作热，微者为痒，重者乃痛也。

妇人阴痒属欲事不遂积成湿热

徐春甫曰：妇人阴痒，多属虫蚀所为，始因湿热不已，故生三虫在肠胃间，其虫蚀阴户中作痒，甚则痒痛不已，溃烂肿深。在室女寡妇尼姑，多因欲事不遂，思想所淫，以致气血凝于阴间，积成湿热，久而不散，遂成三虫，故有此疾。亦有房室过伤，以致热壅，故作肿痒内痛，外为便毒，莫不由欲事伤损所致。

薛立斋按：前证属肝经所化，当用龙胆泻肝汤、逍遥散，以主其内外，以桃仁研膏，和雄黄末，和鸡肝研饼，纳阴中，以制其虫，仍用清肝解郁之药。此证有郁怒伤肝脾所致，肢体倦怠，阴中闷痒，小便赤涩者，归脾汤加山栀、柴胡、丹皮。有肝脾气虚，湿热下注，阴内痛痒，不时出水，食少体倦者，归脾汤加山栀、白芍、甘草、丹皮。

李氏按：阴中生虫蜚如小蛆者，乃湿热甚而心气又郁，气血凝滞而生，宜藿香养胃汤、补心汤、硫鲤丸，外用艾煎汁，调雄黄末烧熏之。又以蛇床子煎汤频洗，同梓树皮焙末，入枯矾、麝香少许，敷之立效。

慎斋按：以上二条，序妇人有阴痒生虫之证也。然阴属风木之脏，木朽则蠹生，肝经血少，津液枯竭，致气血不能荣运，则壅郁生湿，湿生热，热生虫，理所必然。故治法不外渗湿清热，外以杀虫为治。然其本元，又当滋养肝血、补助脾土，益阴燥湿也。至春宫论致事不遂所致，亦病情之不可不察者也。

妇人阴冷属风冷客于子脏

陈良甫曰：妇人阴中冷，因劳伤子脏，风冷客之。

薛立斋按：阴冷有肝经有湿热，外乘风冷所致。若小便涩滞，或小腹痞痛，龙胆泻肝汤。又有妇人阴中寒冷，小便澄清，腹中亦冷，饮食少思，大便不实，下元虚冷，治以八味丸愈。八味治血弱不能荣养脏腑，津液枯涩，风寒客于子脏，以致阴冷，有效。

慎斋按：以上一条，序妇人有阴冷之证也。阴中冷，非外邪风冷客于子脏，即气衰血虚，脏腑虚寒，以致肝经失养，阴户为之寒冷也。立斋必欲断为肝经湿热，外乘风冷所致，岂有客邪之气，加于湿热之病，而变为阴冷耶？论属未当。

妇人阴挺下脱有三证所致

《大全》曰：妇人阴挺下脱，或因胞络伤损，或因子脏虚冷，或因分娩用力所致。

薛立斋按：阴挺下脱，当升补元气为主。若肝脾郁结，气虚下陷，补中汤。若肝火湿热，小便赤涩，龙胆汤。

妇人阴挺属肝火湿热脾虚下陷

薛立斋曰：有妇人阴中突出如菌，四围肿痛，小便数，晡热，似痒似痛，小便重坠，此肝火湿热而肿痛，脾虚下陷而重坠也。先以补中汤加山栀、茯苓、车前、青皮，以清肝火，升脾气，更以加味归脾汤，调理脾郁，外以生猪油和藜芦末涂之而收。

妇人阴挺属热药房事意淫不遂所致

《大全》曰：妇人阴中生一物，挺出五寸许，牵引腰腹膨痛，至不思饮食，皆因多服热药及煎熨，或犯非理房事，兼意淫不遂，名

阴挺，三柴丸、一捻金丸主之。

慎斋按：以上三条，序妇人有阴挺之证也。阴挺者，阴器中挺出一物，即立斋所谓舒出如蛇如菌，如鸡冠状是也。夫妇人阴器，为足厥阴经部分，而冲任督三脉所系胞门子户在焉。其所挺之物，大约子脏肠癀之属，非湿热脾虚下陷，即是热药房事所致，此病机之属于隐曲者。在医者，似难以诊候施之者，立斋之书，每多载之，真有不可臆度者矣。

妇人阴吹属胃气下泄

《金匮要略》曰：胃气下泄，阴吹而正喧，此谷气之实也，膏发煎导之。

李时珍按：妇人胃气下泄，阴吹甚喧，宜猪膏煎乱发化服，病从小便而出。

程云来曰：经曰，胃满则肠虚，肠满则胃虚，更虚更实，则气得上下。今胃中谷气实，则肠胃虚，虚则气不得上下，而肾又不能为胃关，其气但走胞门而出于阴户。膏发煎者，导小便药也。使其气以化小便，则不为阴吹之证矣。

慎斋按：妇人阴吹证，仲景以为谷气实，胃气下泄所致。此之病机有不可解，云来注云，胃实肠虚，气走胞门，亦是随仲景之文而诠之也。夫人谷气，胃中何尝一日不实，而见阴吹之证者，未之尝闻。千百年之书，其阙疑可也。予甲寅岁，游峡石，有友吴禹仲来询云，此镇有一富翁室女，病阴户中时簌簌有声，如后阴之转矢气状，遍访医者不晓，此何病也？予曰：此阴吹证也，仲景之书有之。禹仲因叹予读书之博。

妇人阴蚀疮属心烦胃弱气血凝滞

《大全》曰：妇人阴蚀疮，凡妇人少阴脉数而滑，阴中必生疮，名曰蜃疮。若痛或痒，如虫行状，淋沥脓汁，亦有阴蚀几尽者，此皆由心神烦郁，胃气虚弱，致气血凝滞耳。故经云，诸痛痒疮，皆属于心。又云，阳明主肌肉，痛痒皆属于心，治当补心养胃，外以熏洗坐导治之。

薛立斋曰：妇人阴中生疮，乃七情郁火伤损、肝脾湿热下注。其外证有阴中舒出如蛇，俗呼阴挺，有翻突如饼，俗呼阴菌，亦有如鸡冠花，亦有生诸虫，亦有肿痛湿痒，溃烂出水，胀闷脱坠者。其内证，口干内热，倦体，经候不调，或饮食无味，晡热，胸膈不利，小腹痞胀，赤白带下，小水淋涩。其治法：肿痛者，四物汤加柴胡、山栀、丹皮、胆草。湿痒者，归脾汤加山栀、丹皮、柴胡。涩淋者，龙胆汤加白术、丹皮。溃腐者，加味逍遥散。肿闷脱坠者，补中汤加山栀、丹皮，佐以外治之法。

妇人阴中生疮属虫动侵蚀

陈良甫曰：阴疮者，由三虫或九虫动作侵蚀所为也。诸虫在人肠胃之间，脏腑调和，血气充实，不能为害。若劳伤经络，肠胃虚损，则动作侵蚀于阴经者，或痒或痛，重则生疮。

妇人疳疮属月事行房浊流阴道

《千金方》曰：妇人疳疮，因月后便行房，致湛浊伏流阴道，生疳疮瘙痒。先用葱椒汤频洗，后服赤石脂、龙骨、黑牵牛、菟丝子、黄芪、沙苑蒺藜之属。又治妇人阴疮、与男子妒精同方，用黄丹、枯矾、扁蓄、藁本、硫黄、白蛇皮、荆芥、蛇床为末，葱汤洗后掺之。

慎斋按：以上三条，序妇人有阴疮之证也。妇人阴中生疮，属于湿热之邪下流肾肝。阴器为肝肾之部，二经虚，则湿热下陷，而生疳蜃诸疮矣。若月事行房，败精与浊血凝滞成疮者，此又人事之不谨，当以清火消浊为治也。

妇人疰痃属肝经湿热下注

《妇人良方》曰：妇人疰痃，或肝经湿热下注，或郁怒伤损肝脾。其外证，或两拗小

腹肿痛，或玉门烦肿作痛，或寒热往来，憎寒壮热。其内证，或小便涩滞，或腹内急痛，或小腹痞闷，上攻两胁，或睛热重坠。若两拗小腹肿痛，肝经湿热壅滞也，龙胆泻肝汤。玉门肿胀，肝火血虚也，加味逍遥散，及龙胆汤加木香。若概投散血攻毒之剂，则误矣。

妇人足跟疮肿属足三阴虚热所致

《妇人良方》曰：妇人足跟足指肿痛，足心发热，皆因胎产经行，失于调摄亏损，足三阴虚热所致。若肿痛或出脓，用六味丸为主，佐以八珍汤。胃虚懒食，佐以六君子汤。寒热内热，佐以逍遥散。睛热益甚，头目不清，佐以补中益气汤。大凡发热、睛热，内热、自汗、盗汗等证，皆阴虚假热也。故丹溪谓火起九泉、阴虚之极也。足跟乃督脉发源之所，肾经所过之地，若不求其属，泛用寒凉则误矣。然男子酒色过度者，多患此证。

妇人臁疮属肝脾湿热下注

《家居医录》曰：妇人两臁生疮，或因胎产饮食失宜，伤损脾胃；或忧思郁怒，亏损肝脾，以致湿热下注，或外邪所侵。外臁属足三阳，可治。内臁属足三阴，难治。若初起发肿赤痛，属湿毒所乘，人参败毒散，或槟苏败毒散。若漫肿作痛，或不肿不痛，属脾虚湿热下注，补中益气汤，或八珍汤。若脓水淋漓，体倦少食，内热口干，属脾气虚弱，补中汤加茯苓、酒芍。若午后发热体倦，属血虚，前汤加川芎、熟地，或六味丸。若肢体畏寒，饮食少思，属脾肾虚寒，八味丸。大抵色赤属热毒，易治。色黯属虚寒，难治。设误用攻伐，复伤胃气，则难疗矣。

妇人血风疮属风热郁火血燥

《家居医录》曰：妇人血风疮，因肝脾二经，风热郁火血燥所致。其外证，身发疙瘩，或如丹毒，痒痛不常，搔破成疮，脓水淋漓。其内证，月经无定，小便不调，夜热内热，自汗盗汗，恶寒憎热，肢倦体怠，饮食不甘。若发热发痛，乃肝经风热血燥，当归饮加柴胡、山栀。若体倦食少，口干潮热，乃肝脾郁火伤血，加味逍遥散。若疙瘩痛痒，寒热往来，乃肝经风热伤血，柴胡、山栀、黄连。若不寐、盗汗，内热睛热，乃脾经血虚，归脾汤。兼寒热，加山栀、熟地。如愈后身起白屑，搔则肌肤如帛所隔，此气血虚，不能荣于腠理也，十全大补汤。若用风药，复伤阴血，反致他证。

慎斋按：以上序妇人有疙瘩、足疮、臁疮、血风诸证也。诸证总归湿热，责之肝脾损者居多。故立斋论治，一以补养气血为主，此治病求本之要道也。

妇人足指痛如焚属湿毒留滞经络

《产宝百问》曰：妇人脚十指如热油煎者，此由荣卫气虚，湿毒之气留滞经络，上攻心则心痛，下攻脚则脚痛，其脚指如焚。亦脚气之类，经云热厥者是也。

慎斋按：妇人足十指如热油煎，方书但云脚气之类，方用换腿丸、万灵散、活血丹，从脚气治法，殊未尽善。夫诸阳气起于四肢，足之三阳三阴，俱起足指之端。其热如油煎者，荣卫亏损，阴衰火旺之极，足三阴三阳经受伤故也，岂但云脚气而已。法当大剂滋水益阴，乃可救其燎原之焚耳。

夜梦鬼交

妇人梦与鬼交通属气血虚衰

《大全》曰：人禀五行秀气而生，承五脏神气而养，阴阳调和，脏腑强盛，邪魅安得干之。若摄理失节，血气虚衰，则鬼邪干正，隐蔽而不欲见人，时独言笑，忽时悲泣，是其候也。脉迟伏，或如鸟啄，或绵绵而来，不知度数，面色不改，亦其候也。

妇人夜梦鬼交属于脏虚

《产宝百问》曰：人有五脏，有七神。脏气盛则神强，外邪鬼魅不能干犯。若摄理失节，血气虚衰，鬼邪侵伤，故妇人多与鬼魅交通。其状不欲见人，如有对忤是也。设令宫中人与寡妇，曾夜梦交通，邪气怀惑，久作癥瘕，或成鬼胎。

妇人与鬼交属七情亏损神无所护

薛立斋曰：前证多由七情亏损心血，神无所护而然，用安神定志等药，正气复而神自安。若脉来乍大乍小，乍短乍长，亦是鬼祟，灸鬼哭穴，以患人两手拇指相并，用线扎紧，当合缝处，半肉半甲间，灸七壮。果是邪祟，病者即乞求免灸，云我自去矣。

慎斋按：以上三条，序妇人有梦与鬼交之证也。夫人之五脏，各有所藏，心藏神，肝藏魂，肺藏魄，脾藏意，肾藏精与志。心之血虚，则神无所依。肝之血虚，则魂无所附。肺之气虚，则魄无所归。脾肾二脏虚，则意与志恍惚而不能主。神明之官一失，而魂魄已离其体，夜梦鬼邪乘虚，而慌慌若有所见者，即我之魂魄也。岂真有所谓鬼邪祟魅，与之交感者哉。立斋断以为七情亏损心血，神无所护而然，真发病情之秘者矣。若《准绳》、《纲目》所载，交接出血，阳道违理，伤丈夫诸证，事近隐曲亵鄙，在病者与医者，似难诊疗，概删之。

《女科经纶》终

校注妇人良方

〔宋〕　陈自明　编辑
〔明〕　薛　己　补注

《校注妇人良方》提要

宋·陈自明编。自明字良父，临川人，官建府医学教授。是编凡分十门，调经、众疾、求嗣、胎教、妊娠、坐月、产难、产后等，每门数十证，总二百六十余论，论后附方案。妇人专科，始自唐昝殷《产宝》，其后有李师圣之《产育宝庆集方》，陆子正之《胎产经验方》，大抵卷帙简略，流传甚少。自明采摭诸家，提纲挈领，于妇科证治，始稍稍阐明。明《薛己医案》，曾以己意删改，附入治验，自为一书，各论有陈无择、熊慥峰二先生评论治法，删繁就简，并入本论，原书各方，有合大剂者，今减作小方，庶得临症损益，量病加减，其有常用者，悉仍其旧。其一十二卷，首论妊娠所禁之法，当为遵守，其所用之药，不可轻率。其补遗第二十四卷，各卷已备不录，今补茧唇等一十四症方论，足成其卷。薛氏之用白芍，多用酒拌炒，因白芍之性味酸寒，产后用之于 大补、八珍等汤内，以酒拌炒用无妨，凡属脾胃虚寒虚弱面色萎黄者，亦宜酒拌炒用之。是编刻于勤有书堂，为明之原本，前有嘉熙元年自序，今重刻之。

序

病一也，而妇人为难；医一也，而识病为难。夫病多始于七情。邃古之初，性静情逸，精神纯畅，每治于未病之先，治之以不治也，以故药不试，而跻上寿者比比。迨乎后世，恣情纵欲，精神耗而元气索，病道日多，而医效日鲜。况妇人女子之性，阴浊胜而阳明微，喜怒哀乐，发而中节者寡，其为病常浮于男子什九。欲诊问以识所因，亦诚难矣。吴郡立斋薛君，雅好岐黄《素》、《难》之书，每为人治病，察色辨脉，变药立方，增除横出，优游容与，俟其自然，不示功，不计程，期在必起，时精绝技，医者不能及，尤旁通外科、女科之术，间取临川陈良甫所著《妇人良方》篇帙，为之补注，附以治验，示余读之，见其发挥经络，揆度阴阳，网罗百病。凡妇人症最人所难识者，彬彬可睹。盖薛君生平精力不暇妄费，坐卧行住，须臾不离。呜呼！斯亦观其深矣，业医者当自得之。

秀水石山沈谐撰

《校注妇人良方》目录

卷一

调经门 …… 345
月经序论 …… 345
精血篇论 …… 345
产宝方序论 …… 346
王子亨方论 …… 346
月水不调方论 …… 347
月经不通方论 …… 348
养生必用论病 …… 349
室女月水不通方论 …… 349
室女经闭成劳方论 …… 349
血枯方论 …… 350
月水不利方论 …… 351
月水行止腹痛方论 …… 351
月水不断方论 …… 351
杀血心痛方论 …… 352
暴崩下血不止方论 …… 352
带下方论 …… 353
崩中漏血生死脉方论 …… 354
白浊白淫方论 …… 355
夭癸过期方论 …… 356
血分水分肿满方论 …… 356

卷二

众疾门 …… 358
产宝方论 …… 358
博济方论 …… 358
寇宗奭论 …… 358
通用方序论 …… 358

卷三

中风诸症方论 …… 360
中风角弓反张方论 …… 365
中风口噤方论 …… 366
中风不语方论 …… 366
风痹手足不遂方论 …… 368
中风自汗方论 …… 369
筋脉瘛疭方论 …… 369
妇人颤振方论 …… 370
风寒臂痛方论 …… 371
贼风偏枯方论 …… 372
偏风口喎方论 …… 372
妇人怔忡惊悸方论 …… 373
失血过多心神不安方论 …… 374
风邪癫狂方论 …… 375
飞尸血厥方论 …… 375

卷四

血风肢体骨节疼痛方论 …… 377
血风白虎历节走痛方论 …… 378
血风瘾疹瘙痒方论 …… 379
虚风头目眩晕方论 …… 379
血风头痛方论 …… 381
颈项强痛方论 …… 382
腰痛方论 …… 383
腰脚疼痛方论 …… 384
风邪脚气方论 …… 384

卷五

劳瘵各症方论 …… 387
二十四种蒸病论 …… 387
骨蒸劳方论 …… 389
血风劳气方论 …… 392
冷劳方论 …… 393

卷六

热劳方论 …… 394
客热方论 …… 395
寒热方论 …… 395
寡妇寒热如疟方论 …… 396
恶寒方论 …… 396
血风烦闷方论 …… 397
血风攻脾不食方论 …… 397
梦与鬼交方论 …… 398
伤寒伤风方论 …… 398
热入血室方论 …… 399
咳嗽方论 …… 399
咳嗽用温药方论 …… 401

劳嗽方论 …… 402
喘满方论 …… 403
风痰积饮咳嗽方论 …… 404
心胸嘈杂方论 …… 405
卷七
呕吐方论 …… 406
霍乱方论 …… 407
翻胃吐食方论 …… 409
血膈方论 …… 410
鼻血方论 …… 411
吐血方论 …… 412
痃癖诸气方论 …… 413
疝瘕方论 …… 414
八瘕方论 …… 415
腹中瘀血方论 …… 415
癥瘕方论 …… 416
食癥方论 …… 416
积年血癥方论 …… 417
血气心痛方论 …… 417
血气心腹疼痛方论 …… 417
血气小腹痛方论 …… 418
两胁胀痛方论 …… 418
心腹胀满方论 …… 419
卷八
小便淋沥不通方论 …… 421
转脬小便不利方论 …… 422
小便数方论 …… 422
遗尿失禁方论 …… 423
小便出血方论 …… 424
大便不通方论 …… 425
老弱风人便秘戒用利药方论 …… 425
泄痢秘结方论 …… 426
泄泻方论 …… 427
协热下利方论 …… 428
滞下方论 …… 429
痢后呕哕方论 …… 431
大便下血方论 …… 432
痔瘘方论 …… 432
脱肛方论 …… 433
阴肿方论 …… 433
阴痒方论 …… 434
阴冷方论 …… 434
阴挺下脱方论 …… 434
阴中生疮方论 …… 435
交接伤丈夫头痛方 …… 435
交接辄出血痛方 …… 435
交接他物所伤方 …… 436
小户嫁痛方 …… 436
卷九
求嗣门 …… 437
陈无择求子论 …… 437
褚尚书求男论 …… 437
无子论 …… 438
《千金翼》求子方论 …… 438
交会禁忌 …… 438
男子受胎时日法 …… 438
推支干旺相日法 …… 438
推每月宿日法 …… 438
求子服药须知 …… 438
温隐居求嗣保生篇 …… 440
卷十
胎教门 …… 442
妊娠总论 …… 442
受形论 …… 442
受形篇 …… 443
论胎教 …… 443
孕元立本章 …… 443
凝形殊禀章 …… 444
气质生成章 …… 445
转女为男法 …… 446
卷十一
候胎门 …… 447
脉例 …… 447
诊妇人有妊歌 …… 447
验胎法 …… 448
胎杀避忌产前将护法 …… 448
食忌论 …… 449
孕妇药忌歌 …… 449
卷十二
妊娠疾病门 …… 450
随月服药将息法 …… 450
恶阻方论 …… 453
痰逆不食方论 …… 454
胎动不安方论 …… 454
漏胎下血方论 …… 455

卒然下血方论…… 455
惊胎及僵仆方论…… 456
胎上逼方论…… 456
下如豆汁胎动腹痛方…… 457
误服毒药胎动方…… 457
心痛方论…… 458
心腹痛方论…… 458
中恶方论…… 459
腰腹背痛方论…… 459
小腹痛方论…… 459
心腹胀满方论…… 460

卷十三

数堕胎方论…… 461
胎不长方论…… 461
胎动不安当下方论…… 462
堕胎后血下方论…… 462
未足月欲产方论…… 462
断产方论…… 463
咳嗽方论…… 463
吐血衄血方论…… 464
子烦方论…… 464
烦躁口干方论…… 465

卷十四

中风方论…… 466
风痉方论…… 466
癫疾方论…… 467
鬼胎方论…… 467
伤寒方论…… 467
时气方论…… 468
热病方论…… 469
伤寒热病防损胎方论…… 469
热病胎死腹中方论…… 469
疟疾方论…… 470
霍乱方论…… 471

卷十五

泄泻方论…… 473
下痢黄水方论…… 473
大小便不通方论…… 474
小便不通方论…… 475
子淋方论…… 475
遗尿方论…… 476
尿血方论…… 476
胎水肿满方论…… 477
腹内盅鸣方论…… 478
龚彦德孕痈方…… 478
不语论…… 478
伤食方论…… 478
脏躁悲伤方论…… 479

卷十六

坐月门…… 480
《产宝方》周遵序…… 480
将护孕妇论…… 480
滑胎例…… 480
月空方位例…… 481
逐月安产藏衣忌向方位…… 481
推妇人行年法…… 482
体玄子借地法…… 484
禁草法…… 484
禁水法…… 484
入月预备药物…… 484
催生灵符…… 485

卷十七

产难门…… 486
产难论…… 486
杨子建十产论…… 486
催生方论…… 487
交骨不开产门不闭方论…… 488
郭稽中产难方论…… 489
产难子死腹中方论…… 489
产难生死诀…… 489

卷十八

产后门…… 491
产后将护法…… 491
产后调理法…… 491
产后通用方…… 491
胞衣不出方论…… 491
产后血晕方论…… 492
产后颠狂方论…… 493
产后狂言谵语方论…… 493
产后不语方论…… 493

卷十九

乍见鬼神方论…… 495
心神惊悸方论…… 495
中风心惊方论…… 496

中风恍惚方论…… 496
虚极生风方论…… 496
虚汗不止方论…… 497
冒闷汗出方论…… 498
汗多变痉方论…… 498
口噤腰背反张方论…… 499
中风方论…… 499
四肢筋挛方论…… 499
痫疯方论…… 500
脚气方论…… 500

卷二十

遍身疼痛方论…… 502
腰痛方论…… 502
恶露不绝方论…… 503
恶露不下方论…… 503
恶露上攻心痛方论…… 503
恶露腹痛方论…… 504
儿枕腹痛方论…… 504
小腹痛方论…… 504
寒疝腹痛方论…… 505
两胁胀痛方论…… 505
积聚癥块方论…… 506
血瘕方论…… 506
瘀血奔心烦闷方论…… 506
虚烦发热方论…… 506

卷二十一

口干痞闷方论…… 508
血渴方论…… 508
乍寒乍热方论…… 509
疟疾方论…… 509
劳劳方论…… 510
虚羸方论…… 510
风虚冷劳方论…… 510
腹胀呕吐方论…… 511
呕逆不食方论…… 511
霍乱方论…… 512

卷二十二

寒热方论…… 513
头痛方论…… 513
咳嗽方论…… 514
喉中气急促喘方论…… 514
口鼻黑鼻衄方论…… 515
咳噫方论…… 515
血崩方论…… 515
月水不调方论…… 516
月水不通方论…… 516
四肢浮肿方论…… 516
腹痛泻利方论…… 517
赤白痢方论…… 517

卷二十三

痢疾作渴方论…… 519
大便秘涩方论…… 519
大小便不通方论…… 520
遗粪方论…… 520
诸淋方论…… 520
小便频数方论…… 521
小便不禁方论…… 521
小便出血方论…… 521
阴脱玉门不闭方论…… 522
阴蚀疳方论…… 523
乳少或止方论…… 523
乳出方论…… 523
吹乳方论…… 523
妒乳方论…… 524

卷二十四　补遗

疮疡门…… 525
茧唇方论…… 525
耳眩痛方论…… 528
瘰疬方论…… 529
结核方论…… 531
流注方论…… 533
血风疮论…… 535
赤白游风方论…… 536
疮疥方论…… 537
鹤膝风方论…… 539
下注臁疮方论…… 539
足跟疮肿方论…… 541
肺痈方论…… 542
肠痈方论…… 543
乳痈乳岩方论…… 544

校注妇人良方　卷一

宋　临川　陈自明良甫编辑
明　古吴　薛　己立斋补注
　　鄞县　曹赤电炳章圈校

调经门 凡医妇人先须调经，故以为首

月经序论第一

岐伯曰：女子七岁，肾气盛，齿更，发长，二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下。天谓天真之气，癸谓壬癸之水，故云天癸也。然冲为血海，任主胞胎，二脉流通，经血渐盈，应时而下，常以三旬一见，以像月盈则亏也。若遇经行，最宜谨慎，否则与产后症相类。若被惊怒劳役，则血气杂乱，经脉不行，多致劳瘵等疾。若逆于头而肢体之间，则重痛不宁。若怒气伤肝，则头晕胁痛呕血，而瘰疬痈疡。若经血内渗，则窍穴淋沥无已。凡此六淫外侵，而变症百出，犯时微若秋毫，成患重如山岳，可不畏哉。

愚按：血者，水谷之精气也，和调五脏，洒陈六腑，在男子则化为精，在妇人上为乳汁，下为血海，故虽心主血，肝藏血，亦皆统摄于脾，补脾和胃，血自生矣。凡经行之际，禁用苦寒辛散之药，饮食亦然。诗云：妇人和平，则乐有子。和则阴阳不乖，平则气血不争，故经云平和之气，三旬一见，可不慎欤。

精血篇论第二 齐大夫精澄遗书

饮食五味，养骨髓肌肉毛发。男子为阳，阳中必有阴，阴中之数八，故一八而阳精升，二八而阳精溢。女子为阴，阴中必有阳，阳中之数七，故一七而阴血升，二七而阴血溢。皆饮食五味之实秀也。方其升也，智虑开明，齿牙更始，发黄者黑，筋弱者强。暨其溢也，凡充身体手足耳目之余，虽针芥之历，无有不下。凡子形肖父母者，以其精血，尝于父母之身，无所不历也，是以父一肢废，则子一肢不肖其父，母一目亏，则子一目不肖其母。然雌鸟牝兽，无天癸而成胎何也？鸟兽精血往来尾间也。精未通而御女以通其精，则五体有不满之处，异日有难状之疾。阴已痿而思色以降其精，则精不出而内败，小便涩而为淋。精已耗而复竭之，则大小便牵痛，愈痛则愈便，愈便则愈痛。女人天癸既至，逾十年无男子合则不调，未逾十年思男子合亦不调，不调则旧血不出，新血误行，或溃而入骨，或变而为肿，后虽合而难子，合多则沥枯。虚人产众，则血枯杀人，观其精血，思过半矣。

愚按：丹溪先生云：人受天地之气以生，天之阳气为气，地之阴气为血，故气常有余，血常不足。夫人之生也，男子十六岁而精通，女子十四岁而经行，故古人必待三十、二十而后嫁娶，可见阴气之难成，而养之必欲其固也。经曰：年至四十，阴气自半，而起居衰矣。夫阴气之成，止供给得三十年之运用，况男子六十四岁而精绝，女子四十九岁而经断。夫肾乃阴中之阴也，主闭藏者。肝乃阴中之阳也，主疏泄者。然而二脏皆有相火，其系上属于心，心火一动，则相火翕然而从之。所以丹溪先生只是教人收心养性，其旨深矣。

天地以五行更迭衰旺，而成四时，人之五脏六腑，亦应之而衰旺。如四月属巳，五月属午，为火大旺，火为肺金之夫，火旺则金衰。六月属未，为土大旺，土为肾水之夫，土旺则水衰，况肾水尝藉肺金为母，以补其不足。古人于夏月必独宿而淡味，兢兢业业，保养金水二脏，正嫌火土之旺尔。经又曰：冬藏精者，春不病温。十月属亥，十一月属子，正火气潜藏，必养其本然之真阴，以助来春生发之气，则春末夏初，无头痛、脚软、食少、体热、注夏之病矣。窃谓人之少有老态，不耐寒暑，不胜劳役，四时迭病，皆因气血方长，而劳心亏损，或精血未满，而早斫丧，故见其症，难以名状。若左尺脉虚弱，或细数，是左肾之真阴不足也，用六味丸。右尺脉迟软，或沉细而数欲绝，是命门之相火不足也，用八味丸。至于两尺微弱，是阴阳俱虚，用十补丸。此皆滋其化源也，不可轻用黄柏、知母之类。设或六淫外侵而见诸症，亦因其气内虚而外邪凑袭，尤宜用前药。

附　治　验男子阴痿精耗，治验见《内科摘要》

一妇人年三十有七，早孀居，两腿骨作痛，晡热体倦，月经不调，或发寒热，数年矣。一日颈项两侧结核，两胁胀痛，此系肝经郁火而成也。先用小柴胡汤，合四物数剂，肝症顿愈。又用加味逍遥散加泽兰、乳香、没药，三十剂血症渐痊，再用加味归脾等药，年余而安。

一孀妇两腿作痛，或用除湿化痰等药，遍身作痛而无定处，余曰此血症也，不信，乃服流气饮之类而殁。

一放出宫人，年四十余，臀腿内股作痛，晡热口干，月经不调，此系肝经血少，不能养经络而然也，宜用加味逍遥散加泽兰叶，五十余剂，诸症稍缓。又以归脾汤，兼服二百余剂而痊。

一放出宫人，臀腿肿痛，内热晡热，恶寒体倦，咳嗽胸痞，月经过期而少，彼以为气毒流注，服清热理气之剂，益甚。余曰：此乃肝经瘀血停留所致，盖肝经上贯膈，布胁肋，循喉咙，下循胭内廉，绕阴器，抵少腹。主治之法，但当补其所不胜，而制其所胜。补者脾也，制者肝也。经曰：虚则补之，实则泻之。此定法也，彼不信，仍服前药，遂致不起。

附　方

六味丸　八味丸二方见二十四卷第十一论
十补丸　小柴胡汤方见二十四卷第二论　**四物汤**方见二十四卷第六论　**加味逍遥散　加味归脾汤**二方见二十四卷第四论

产宝方序论第三

大率治病，先论其所主。男子调其气，女子调其血。气血者，人之神也。然妇人以血为基本，苟能谨于调护，则血气宣行，其神自清，月水如期，血凝成孕。若脾胃虚弱，不能饮食，荣卫不足，月经不行，肌肤黄燥，面无光泽，寒热腹痛，难于子息，或带下崩漏，血不流行，则成瘕症。

愚按：前症若妇人脾胃久虚，以致气血俱衰，遂而月经不行，宜补其胃气，滋其化源。或患中消胃热，津液不生，而致血海干涸，宜清胃补脾，其经自行矣。经曰：胃者卫之源，脾者荣之本。《针经》曰：荣出中焦，卫出上焦，卫不足，益之必以辛，荣不足，补之必以甘，甘辛相合，脾胃健而荣卫生，是以气血俱旺也。或因劳心，虚火妄动，月经错行，宜安心补血泻火，此东垣先生治法也。

王子亨方论第四

论曰：经者常候也。谓候其一身之阴阳愆伏，知其安危，故每月一至，太过不及，皆为不调。阳太过则先期而至，阴不及则后时而来，其有乍多乍少，断绝不行，崩漏不止，皆由阴阳衰盛所致。

愚按：经云脾统血，肝藏血，此症多因

恚怒伤肝，郁结伤脾所致，当从二经为主，而参以前论治之。

月水不调方论第五

妇人月水不调，由风邪乘虚客于胞中，而伤冲任之脉，损手太阳少阴之经。盖冲任之脉，皆起于胞中，为经络之海，与手太阳小肠、手少阴心经为表里，上为乳汁，下为月水。然月水乃经络之余，苟能调摄得宜，则经应以时矣。

愚按：经曰：饮食入胃，游溢精气，上输于脾，脾气散精，上归于肺，通调水道，下输膀胱，水精四布，五经并行。东垣先生所谓脾为生化之源，心统诸经之血，诚哉是言也。窃谓心脾平和，则经候如常。苟或七情内伤，六淫外侵，饮食失节，起居失宜，脾胃虚损，心火妄动，则月经不调矣。又丹溪先生云，先期而至者，血热也。后期而至者，血虚也。愚所谓先期而至者，有因脾经血燥，有因脾经郁火，有因肝经怒火，有因血分有热，有因劳役火动。过期而至者，有因脾经血虚，有因肝经血少，有因气虚血弱。主治之法，脾经血燥者，加味逍遥散；脾经郁火者，归脾汤；肝经怒火者，加味小柴胡汤；血分有热者，加味四物汤；劳役火动者，补中益气汤；脾经血虚者，人参养荣汤；肝经血少者，六味地黄丸；气虚血弱者，八珍汤。盖血生于脾土，故云脾统血。凡血病当用苦甘之剂，以助阳气而生阴血也。

附　治　验

一妇人发热口干，月经不调，两腿无力，或用祛风渗湿之剂，腿痛体倦，二膝浮肿，经事不通，余作足三阴经，血虚火燥，名鹤膝风，用六味、八味二丸，兼服两月，形体渐健，饮食渐进，膝肿渐消，半载而痊。

一妇人月事未期而至，发热自汗，或用清热止汗之剂，作渴头眩，手掉身麻，余曰，此肝经血虚火动，火为阳，阳盛则生风，用柴胡、炒芩、连、山栀、归、芍、生地、丹皮各一钱，参、芪、苓、术各一钱，川芎七分，甘草五分，二剂汗止，更用补中益气汤而愈。

一妇人经行劳役，忽然昏愦，面赤吐痰。余曰：此乃去血过多，阳无所附故耳。急饮童便碗许，神思渐爽，更用参、芪各五钱，芎、归各三钱，玄参、柴胡、山栀、炙草各一钱，一剂。又用逍遥散加五味、麦门，二剂，如此月余渐愈，但体倦而黄，又以十全大补加五味、麦门治之而愈。

一妇人性善怒，产后唇肿内热，或用清热败毒散，唇口肿胀，日晡热甚，月水不调，再用降火化痰，遂令食少作呕，大便不实，唇出血水，又用理气消导，胸膈痞满，头目不清，唇肿经闭，又用清胃行血，肢体倦怠，发热烦躁，涎水涌出，又欲用通经之剂。余曰：病本七情，肝脾亏损，又数行攻伐，故元气之益虚耳，法当补阴益阳。遂以济生归脾汤、加味逍遥散、补中益气汤调治，元气渐复，诸症悉愈。

姜黄散　治瘀血凝滞，肚腹刺痛，或腹胀发热，口干等症。

姜黄　当归酒拌，各二钱　蓬术醋炒　红花　桂心　川芎　玄胡索炒　牡丹皮各五分

上水酒各一半煎服。

醋附丸　治元脏虚冷，月候不调，头晕少食，浑身寒热，腹中急痛，赤白带下，心冲气闷，血中虚寒，胎气不固，用醋煮香附半斤，焙为末，醋糊丸桐子大，每服三四十丸，米饮下。

愚按：前症若元脏虚寒，手足厥冷，用八味丸；手足发热，用六味丸；气血不足，用八珍汤；中气不足，用补中益气汤；脾气不足，用六君子汤；脾气郁结，用归脾汤。若例用香散之剂，恐阳气燥而阴血渐衰也。

附　方

加味逍遥散　八珍汤　归脾汤三方见二十

四卷第四论　**加味小柴胡汤**方见二十四卷第二论
加味四物汤　**六君子汤**　**补中益气汤**三方见二十四卷第六论　**人参养荣汤**方见二十四卷第三论
八味丸　**六味丸**二方见二十四卷第十一论

月经不通方论第六

妇人月水不通，或因醉饱入房，或因劳役过度，或因吐血失血，伤损肝脾，但滋其化源，其经自通。若小便不利，若头晕痛，腰背作痛，足寒时痛，久而血结于内，变为癥瘕；若血水相并，脾胃虚弱，壅滞不通，变为水肿；若脾气衰弱，不能制水，水渍肌肉，变为肿满，当益其津液，大补脾胃，方可保生。

愚按：经水阴血也，属冲任二脉，上为乳汁，下为月水，其为患有因脾虚而不能生血者，有因脾郁而血不行者，有因胃火而血消烁者，有因脾胃损而血少者，有因劳伤心而血少者，有因怒伤肝而血少者，有因肾水不能生肝而血少者，有因肺气虚不能行血者。治疗之法，若脾虚而不行者，调而补之；脾郁而不行者，解而补之；胃火而不行者，清而补之；脾胃损而不行者，温而补之；劳伤心血而不行者，逸而补之；怒伤肝而不行者，和而补之；肺气虚而不行者，补脾胃；肾虚而不行者，补脾肺。经云：损其肺者益其气；损其心者调其荣卫；损其脾者调其饮食，适其寒温；损其肝者缓其中；损其肾者益其精。皆当审而治之。

附　治　验

一妇人停食，饱闷发热，或用人参养胃汤，益甚，再用木香槟榔丸，泄泻吐痰，腹中成块，饮食少思，又用二陈、黄连、厚朴之类，前症益甚，腹胀不食，月经不至。余以为胃气亏损，用补中益气加茯苓、半夏，三十余剂，脾胃健而诸症愈，又二十余剂而经自行。

一妇人饮食后，或腹胀，或吞酸，彼服枳术丸，吞酸益甚，饮食日少，胸膈痞满，腿内酸痛，畏见风寒。又服养胃汤一剂，腿内作痛。又二剂，腿膝浮肿，月经不行。余谓郁结所伤，脾虚湿热下注，侵晨用四君、二陈、芎、归、芍后，以前汤送越鞠丸，饮食渐进，诸症渐愈。又用归脾、八珍二汤，兼服两月余而经行。

一妇人性耽多虑，月经不行，胸满少食，或作胀，或吞酸。余以为中气虚寒，用补中益气加砂仁、香附、煨姜，二剂胸膈和而饮食进，更以六君子加芎、归、贝母、桔梗、生姜、大枣数剂，脾胃健而经自调矣。

一妇人素有胃火，或用清胃饮而安，后因劳役燥渴内热，肌肉消瘦，月经不行。余谓此胃火消烁阴血，用逍遥散加丹皮、炒栀以清胃热，用八珍汤加茯苓、远志以养脾血，而经自行矣。

一妇人久患疟，形体怯弱，内热晡热，自汗盗汗，饮食少思，月事不行，或用通经丸，虚症悉具。余曰此因虚而致疟，因疟以闭经也，用补中益气及六味地黄丸各百余剂，疟愈而经自行。

一妇人久患疟，疟作则经不行，形虚脉大，头痛懒食，大便泄泻，小便淋沥，口干唇裂，内热腹膨。盖内久疟正气已虚，阴火独旺，用补中益气汤治之寻愈，惟不时头痛，乃加蔓荆子而痛止，又兼用六味地黄丸而经行。

一妇人因劳耳鸣，头痛体倦，此元气不足，用补中益气加麦门、五味而痊。三年后得子，因饮食劳倦，前症益甚，月经不行，晡热内热，自汗盗汗，用六味地黄丸、补中益气汤顿愈。

一妇人胃气素弱，为哭母吐血咳嗽，发热盗汗，经水三月不行。余以为悲则伤肺，思则伤脾，遂朝服补中益气加桔梗、贝母、知母，夕用归脾汤送地黄丸而愈。

一病妇少寐，经水两月余一至，误服通经丸，展转无寐，午前恶寒，午后发热。余

以为思虑亏损脾血，用归脾汤作丸，午前以六君送下，午后以逍遥散送下，两月余得寐，半载经行如期，年余而疮愈。余详见各门。

附　方

补中益气汤　四君子汤　六君子汤三方见二十四卷第六论　**二陈汤**方见二十四卷第五论　**越鞠丸**方见六卷第七论　**归脾汤　逍遥散　八珍汤**三方见二十四卷第四论　**清胃散**方见二十四卷首论　**六味丸**方见二十四卷第十一论

养生必用论病第七

初虞世云：女子十四，天癸至，任脉通，月事以时，于是有子。天癸者，物之自然。月者，以月至。经者，有常也。其来过与不及，皆谓之病。若荣血亏损，不能滋养百骸，则发落面黄，羸瘦燥热，燥气盛则金受邪，金受邪则为咳为嗽，为肺痈为肺痿必矣。但助胃壮气，则荣血生而经自行。须慎饮食，调七情，保神气，庶可得生。若暴怒气逆，经闭不行，当用行气破血之剂。

愚按：刘宗厚先生云：荣者水谷之精，和调于五脏，洒陈于六腑，乃能入于脉也，源源而来，化生于脾，总统于心，藏受于肝，宣布于肺，施泄于肾，灌溉一身，目得之而能视，耳得之而能听，手得之而能握，足得之而能步，脏得之而能液，腑得之而能气。注之于脉，少则涩，充则实，常以饮食滋养，则阳生阴长，变化而为血。诸经恃此，则百脉长养，耗竭则百脉空虚，可不慎哉。若阴气一伤，变症百出，妄行于上则吐衄，衰涸于下则癃闭，血渗肠间则为肠风，阴虚阳搏则为崩中，湿蒸热瘀则为带下，热极腐化则为脓血，火极似水则血紫黑，热胜于阴发为疮疡，湿滞于血则为痛痒瘾疹，蓄之在上则善忘，蓄之在下则善狂。

琥珀散　治心膈迷闷，肚腹撮痛，月信不调等疾。

乌药二两　当归酒制一两　蓬术醋制一两

上为末，每服二钱，温酒调。

万病丸　治月经瘀闭，脐腹作痛，及产后癥瘕等病。

干漆炒，烟出青白为度　牛膝酒浸、焙各一两

上为末，生地黄汁一升，砂器慢火熬膏，丸桐子大，每服二十丸，空心米饮下，仍参前论主之。

红花当归散　治经候不行，腰胯重痛，小腹坚硬。

红花　当归尾酒拌　紫葳　牛膝酒制　甘草炙　苏木各二钱　白芷　桂心各一钱半　赤芍药炒，一两　刘寄奴去根，五钱

上为末，每服三钱，温酒调。

室女月水不通方论第八

论曰：夫冲任之脉，起于胞内，为经脉之海。手太阳小肠、手少阴心，二经为表里。女子二七而天癸至，肾气全盛，冲任流通，经血既盈，应时而下，否则不通也。

愚按：前症若禀阴血不足，用四物、参、苓；怒伤肝血，用加味逍遥散；郁结伤脾，用加味归脾汤；肝火拂郁，用加味小柴胡汤；胃经积热，用加味清胃散。余当参考前论。

附　方

四物汤方见二十四卷第六论　**加味逍遥散　加味归脾汤**二方见二十四卷第四论　**加味小柴胡汤**方见二十四卷第二论　**加味清胃散**方见二十四卷首论

室女经闭成劳方论第九

寇宗奭曰：夫人之生，以气血为本。人之病，未有不先伤其气血者。若室女童男，积想在心，思虑过度，多致劳损，男子则神色消散，女子则月水先闭。盖忧愁思虑则伤心，而血逆竭，神色先散，月水先闭，且心病则不能养脾，故不嗜食。脾虚则金亏，故发嗽。肾水绝则木气不荣，而四肢干痿，故多怒，鬓发焦，筋骨痿。若五脏传遍则死。自能改易

心志，用药扶持，庶可保生。切不可用青蒿、虻虫等凉血行血，宜用柏子仁丸、泽兰汤，益阴血，制虚火。

愚按：经云：五谷入于胃，其糟粕、津液、宗气分为三队，故宗气积于胸中，出于喉咙，以贯心肺，而行呼吸。荣气者，秘其津液，注之于脉，化以为血，以荣四肢，内养五脏六腑，若服苦寒之剂，复伤胃气，必致不起。

附　治　验

一室女年十七，病久不愈，天癸未通，发热咳嗽，饮食少思，欲用通经丸。余曰：此盖因禀气不足，阴血未充故耳，但养气血，益津液，其经自行。彼惑于速效，仍用之。余曰：非其治也，此乃慓悍之剂，大助阳火，阴血得之则妄行，脾胃得之则愈虚。后果经血妄行，饮食愈少，遂致不救。

柏子仁丸

柏子仁炒别研　牛膝酒制　卷柏各半两　泽兰叶一两

上为末，蜜丸桐子大，每服三十丸，空心米饮下。

泽兰汤

泽兰叶二钱　当归　芍药炒，各一钱　甘草炙，五分

用水煎服。

劫劳散　治劳嗽发热盗汗，体瘦，唾中有红，或成肺痿。

白芍药炒，二钱　黄芪炒　甘草炒　人参　五味子炒　当归　半夏姜制　白茯苓　熟地黄自制　阿胶炒，各五分

上姜、枣水煎，日三服。乡人杨元鼎女及笄，病此甚危，百药无效，偶遇名医，得此方，服三十余剂，遂愈不发。

血枯方论第十出骆龙吉方

腹中论曰：有病胸胁支满，妨于食，食至则先闻腥臊，口出清液，四肢痛，目眩，时时前后血、病名曰血枯。此年少时，因大脱血，或醉而入房，亏损肾肝。盖肝藏血，受天一之气以为滋荣，其经上贯膈，布胁肋。若脱血失精，肝气已伤。肝血枯涸不荣，而胸胁满，妨于食，则肝病传脾，而闻腥臊，口出清液。若以肝病而肺乘之，则脱血，四肢痛，目眩，时时前后血出。皆肝病血伤之症也。

愚按：前症若饮食起居失宜，而脾胃虚损，当滋化源，而佐以乌贼丸等药。若因脾土虚寒，而不能生血，宜补命门火。若服燥药，郁火内作，而津液消烁，宜清热养血。若脾胃亏损而气血虚，宜补中益气。若胃热消中而血液耗损，宜清脾胃之火。若大便秘涩，小便清利，而经不行，宜清胞络之火。若劳伤心火，血涸而经不行，宜补心养血。仍参看前第三论主治。

附　治　验

一妇人久患血崩，肢体消瘦，饮食到口则闻腥臊，口出清液，每食少许，腹中作胀，此血枯之症，肺肝脾胃亏损之患，用八珍汤、乌贼骨丸，兼服两月而经行，百余剂而安。

乌贼鱼骨丸

乌贼鱼骨去甲，四两　茴茹一两

上为末，以雀卵丸，小豆大，每服五丸，加至十丸，鲍鱼煎汤下，以饭压之。

熟地黄汤　治大脱血，或醉入房，月事不行，以致前症。

熟地黄自制　泽兰叶　白茯苓　人参　五味子杵炒　附子炮　禹余粮制　当归酒制，各五分

上为末，每服三钱，水煎，空心服。

附　方

八珍汤方见二十四卷第四论

茯苓补心汤　治妇人心气虚耗，不能主血，又不能制乎肺，金气得以乘乎肝木。肝既亏损，则血不能藏，渐致精血枯涸，月事

不调。此方专补心元之虚，抑其肺气，调和荣卫，滋养血脉。

前方参苏饮内，除木香，与四物汤对匀和，每服四钱，以姜枣煎温服。此方常进，用以治宫娥多效。

月水不利方论第十一

妇人月水不利者，由劳伤气血，体虚而风寒客于胞内，伤于冲任之脉故也。若寸脉弦，关脉沉，是肝病也，兼主腹痛，孔窍生疮。尺脉滑，血气实，经络不利，或尺脉绝不至，兼主小腹引腰痛，气攻胸膈也。

愚按：前症属肝胆二经，盖肝胆相为表里，多因恚怒所伤，若本经风热用补肝散，若血虚用四物加酸枣仁，若肾水不足用六味丸，若患诸疮疡治见第八卷、第二十四卷。

牛膝散　治月水不利，脐腹作痛，或小腹引腰，气攻胸膈。

牛膝酒制　桂心　赤芍药炒　桃仁去皮尖　玄胡索炒　当归酒浸　牡丹皮各一两　木香三钱

上为末，每服一钱，温酒调下。或每服三五钱，水煎。

附　方

补肝散方见七卷第十七论　**四物汤**方见二十四卷第六论　**六味丸**方见二十四卷第十一论

月水行止腹痛方论第十二

妇人经来腹痛，由风冷客于胞络冲任，或伤手太阳、少阴经，用温经汤、桂枝桃仁汤。若忧思气郁而血滞，用桂枝桃仁汤、地黄通经丸。若血积而成块，用万病丸。

愚按：前症若风寒伤脾者，六君加炮姜，思虑伤血者，四物加参、术；思虑伤气者，归脾加柴、栀；郁怒伤血者，归脾、逍遥兼服。余参前后论治之。

附　治　验

一妇人经行腹痛，食则呕吐，肢体倦怠，发热作渴。此乃素禀气血不足，用八珍汤二十余剂而愈。后生子，二年而经不行，前症仍作，服八珍汤、逍遥散百余剂方愈。

地黄通经丸　治月经不行，或产后恶露，脐腹作痛。

熟地黄自制，四两　虻虫去头翅炒　水蛭糯米同炒黄，去糯米　桃仁去皮尖，各十枚

上为末，蜜丸桐子大，每服五七丸，空心温酒下。

万病丸方见前

温经汤　治寒气客于血室，以致血气凝滞，脐腹作痛，其脉沉紧。

当归　川芎　芍药　桂心　蓬术醋炒　牡丹皮各五分　人参　牛膝　甘草炒，各一钱

上水煎服。

桂枝桃仁汤　治经脉顿然不行，腹中作痛，或上攻心胁欲死，或因经脉不行，渐成积块，脐下如覆杯。

桂枝　芍药　生地黄各二钱　桃仁七枚，去皮尖　甘草一钱

上姜水煎。

若因七情郁结，血随气滞者，宜服此汤；如不效，用地黄通经丸；已成血块者，用万病丸。方见前

愚按：前症若肝经怒气，用加味逍遥散；若肝经血虚，用四物、参、术、柴胡、牡丹皮；若肝经血热，用四物、牡丹皮；若肝肾虚火，用六味地黄丸；若肝脾血虚，用八珍加牡丹皮；若肝脾郁怒，用加味归脾汤；若气虚血弱，用补中益气汤；若脾不能摄血，用六君子加川芎、当归；若肝虚不能藏血，用补肝散。

附　方

六君子汤　**四物汤**二方见二十四卷第六论　**归脾汤**　**逍遥散**　**八珍汤**三方见二十四卷第四论

月水不断方论第十三

妇人月水不断，淋沥腹痛，或因劳损气

血而伤冲任，或因经行而合阴阳，以致外邪客于胞内，滞于血海故也。但调养元气，而病邪自愈，若攻其邪则元气反伤矣。

愚按：前症若郁结伤脾、用归脾汤；恚怒伤肝，逍遥散；肝火妄动，加味四物汤；脾气虚弱，六君子汤；元气下陷，补中益气汤；热伤元气，前汤加五味、麦门、炒黑黄柏。

附　治　验

一儒者钱思习子室，年三十余，无嗣，月经淋沥无期，夫妇异处几年矣。思习欲为娶妾，以谋诸余。余意此郁怒伤肝，脾虚火动，而血不归经，乃肝不能藏，脾不能摄也，当清肝火，补脾气。遂与具加味归脾、逍遥二药四剂，送至其家，仍告其姑曰：服此病自愈，而当受胎。妾可无娶也。果病愈，次年生子。

一妇人性急，每怒则太阳耳项喉齿胸乳作痛，则胸满吞酸，吐泻少食，经行不止，此皆肝火之症，肝自病则外症见，土受克则内症作。余先以四物加白术、茯苓、柴胡、炒栀、炒龙胆，清肺养血，次用四君加柴胡、芍药、神曲、吴茱萸、炒黄连以培土制肺，渐愈，惟月经不止，是血分有热，脾气尚虚，以逍遥散倍用白术、茯苓、陈皮，又以补中益气加酒炒芍药，兼服而安。

一妇人多怒，经行旬余方止，后淋沥无期，肌体倦瘦，口干内热，盗汗如洗，日晡热甚，皆由肝脾亏损，无以生发元气，用参、芪、归、术、茯神、远志、枣仁、麦门、五味、丹皮、龙眼肉、炙草、柴胡、升麻，治之获痊。

一妇人怀抱不舒，腹胀少寐，饮食素少，痰涎上涌，月经频数。余曰：脾统血而主涎，此郁闷伤脾，不能摄血归源耳，用补中益气、济生归脾而愈。

附　方

归脾汤　**逍遥散**二方见二十四卷第四论　**加味四物汤**　**四君子汤**　**六君子汤**　**补中益气汤**四方见二十四卷第六论

妇人杀血心痛方论第十四

妇人血崩而心痛甚，名曰杀血心痛，由心脾血虚也。若小产去血过多而心痛甚者亦然，用乌贼鱼骨炒为末，醋汤调下，失笑散亦效。

愚按：前症若阴血耗散，用乌贼丸收敛之；若瘀血不散，用失笑散行散之；若心血虚弱，用芎归汤补养之；若郁结伤血，用归脾汤调补之。

附　治　验

一妇人血崩兼心痛三年矣，诸药不应，每痛甚、虚症悉具，而色痿黄。余曰：心主血，盖由去血过多，心无所养，以致作痛，宜用十全大补汤，参、术倍之，三十余剂稍愈，百余剂全愈。

附　方

失笑散方见二十卷第五论　**芎归汤**方见十七卷第四论　**归脾汤**　**十全大补汤**二方见二十四卷第四论

暴崩下血不止方论第十五

妇人冲任二脉，为经脉之海，外循经络，内荣脏腑。若阴阳和平，经下依时；若劳伤不能约制，则忽然暴下，甚则昏闷；若寸脉微迟，为寒在上焦，则吐血、衄血；尺脉微迟，为寒在下焦，则崩血便血。大抵数小为顺，洪大为逆，大法当调补脾胃为主。

愚按：经云：阴虚阳搏谓之崩。又云：阳络伤则血外溢，阴络伤则血内溢。又云：脾统血，肝藏血。治法：前症因脾胃亏损，不能摄血归源，用六君加芎、归、柴胡；若肝经之火而血下行，用奇效四物汤，或四物加柴、栀、芩、术；若肝经风热而血妄行，用加味逍遥散，或小柴胡、栀、芩、丹皮；若

怒动肝火而血沸腾，亦用前药；若脾经郁结而血不归经，用归脾加柴、栀、丹皮；若悲伤胞络而血下崩，用四君加柴、栀、升麻。故东垣先生云：凡下血症，须用四君子以收功。厥有旨哉。若大吐血，毋以脉论，当急用独参汤救之。若潮热咳嗽脉数，乃元气虚弱，假热之脉，尤当用人参温补。此等症候，无不由脾胃先损，故脉洪大，察其有胃气，能受补则可救，苟用寒凉止血之药，复伤脾胃，反不能摄血归源，是速其危也。

附 治 验

大尹王大成之内，久患崩，自服四物止血之剂，或作或辍，因怒发热，其血不止，服前药不应，乃主降火，更加胁腹大痛，手足俱冷。余曰：此脾胃虚寒所致，先用附子理中汤，体热痛止。又用济生归脾、补中益气二汤，崩血顿愈。若泥痛无补法，则误矣。

锦衣杨永兴之内，患前症，过服寒凉之剂，其症益甚，更加肚腹痞闷，饮食不入，发热烦躁，脉洪大而虚。余曰：此脾经气血虚而发躁也，当急用八珍汤加炮姜以温补之，缓则不救。彼不信，乃服止血降火之剂，虚症蜂起，始信余言，缓不及治矣。

一妇人面黄或赤，觉腰间或脐下作痛，四肢困倦，烦热不安，经行即发寒热，两胁如束，血涌如崩，此脾胃亏损，元气下陷，与相火湿热所致，用补中益气加防风、芍药、炒黑黄柏，间以归脾汤调补，而血始归经。

一妇人因怒，崩血久不已，面青黄而或赤，此肝木制脾土而血虚，用小柴胡合四物，清肝火，生肝血，又用归脾、补中二汤，益脾气生肝血而瘥。此症若因肝经风热而血不宁者，防风为丸，以兼症之药煎送。或肝经火动而血不宁者，炒条芩为丸，以兼症之药煎送。若瘀血为患，用五灵脂为末，烧铁器淬酒调服，无不效者。

奇效四物汤 治肝经虚热，血沸腾而崩久不止。

当归酒拌 熟地黄自制 白芍药 川芎 阿胶炒 艾叶炒 黄芩炒，各等分

上每服四钱，水煎。

治血崩血瘕，或经行产后心腹胁痛，五灵脂炒烟尽为末，每服一钱，温酒调，或用三钱，水、酒、童便煎服。

治风热血崩，荆芥穗灯火烧焦为末，每服三钱，童便调。

独圣散 治肝经有风血崩，用防风去叉芦为末，每服二钱，空心食前，酒煮白面，清饮调下，极验。

神应散 治血虚内热，血不归源而崩，用桂心烧存性为末，每服一二钱，米饮调下。

又方 陈槐花一两，百草霜半两，为末，每服一二钱，烧红秤锤焠酒下。

附 方

四君子汤 六君子汤 补中益气汤 四物汤四方见二十四卷第六论 **归脾汤 加味逍遥散 八珍汤**三方见二十四卷第四论 **小柴胡汤**方见二十四卷第二论 **独参汤**方见三卷第十三论 **附子理中汤**方见二十卷第八论

带下方论第十六

妇人带下，其名有五，因经行产后，风邪入胞门，传于脏腑而致之。若伤足厥阴肝经，色如青泥；伤手少阴心经，色如红津；伤手太阴肺经，色如白涕；伤足太阴脾经，黄如烂瓜；伤足少阴肾经，黑如衄血。人有带脉横于腰间，如束带之状，病生于此，故名为带。

愚按：徐用诚先生云：前症白属气，而赤属血。东垣先生云：血崩久则亡阳，故白滑之物下流，未必全拘于带脉，亦有湿痰流注下焦，或肾肝阴淫之湿胜，或因惊恐而木乘土位，浊液下流，或思慕为筋痿。戴人以六脉滑大有力，用宣导之法，此泻其实也。东垣以脉微细沉紧，或洪大而虚，用补阳调经，乃兼责其虚也。丹溪用海石、南星、椿根皮

之类，乃治其湿痰也。窃谓前症，皆当壮脾胃，升阳气为主，佐以各经见症之药。色青者属肝，用小柴胡加山栀、防风。湿热壅滞，小便赤涩，用龙胆泻肝汤。肝血不足，或燥热风热，用六味丸。色赤者属心，用小柴胡加黄连、山栀、当归。思虑过伤，用妙香散等药。色白者属肺，用补中益气加山栀。色黄者属脾，用六君子加山栀、柴胡，不应，用归脾汤。色黑者属肾，用六味丸。气血俱虚，八珍汤。阳气下陷，补中益气汤。湿痰下注，前汤加茯苓、半夏、苍术、黄柏。气虚痰饮下注，四七汤送六味丸，不可拘肥人多痰，瘦人多火，而以燥湿泻火之药轻治之也。

附　治　验

一孀妇腹胀胁痛，内热晡热，月经不调，肢体酸麻，不时吐痰。或用清气化痰，喉间不利，带下青黄，腹胁膨胀。又用行气之剂，胸膈不利，肢体酸麻，此乃郁怒伤损肝脾。朝用归脾汤，以解脾郁，生脾气；夕用加味逍遥散，以生肝血，清肝火。百余剂而愈。

一妇人久疟兼带，发热，口干体倦，用七味白术散加麦门、五味，大剂煎与恣饮，再发稍可，乃用补中益气加茯苓、半夏，十余剂而愈。

一妇人头晕吐痰，胸满气喘，得食稍缓，苦于白带，二十余年矣，诸药不应，此气虚而痰饮也，痰饮愈而带自愈。遂朝用六君子汤，夕用六味地黄丸，不月而验。

一妇人耳鸣胸痞，内热口干，喉中若有一核，吞吐不利，月经不调，兼之带下。余以为肝脾郁结，用归脾汤加半夏、山栀、升麻、柴胡，间以四七汤下白丸子而愈。

一妇人吞酸饱满，食少便泄，月经不调，服清气化痰丸，两膝渐肿，寒热往来，带下黄白，面痿体倦，此脾胃俱虚，湿痰下注，用补中益气，倍用参、术，加茯苓、半夏、炮姜而愈。

一妇人带下，四肢无力。余曰：四肢者土也，此脾胃虚弱，湿痰下注，以补中益气、济生归脾二药治之而愈。

一妇人带下黄白，怒则胸膈不利，饮食少思，或用消导利气之药，痰喘胸满，大便下血。余曰：此因脾气亏损，不能摄血归源，用补中益气加茯苓、半夏、炮姜四剂，诸症顿减，又用八珍加柴胡、山栀而痊。

附　方

小柴胡汤方见二十四卷第二论　**龙胆泻肝汤**方见二十四卷第八论　**六味丸**方见二十四卷第十一论　**妙香散**方见三卷第十三论　**补中益气汤**　**六君子汤**二方见二十四卷第六论　**归脾汤**　**八珍汤**　**加味逍遥散**二方见二十四卷第六论　**七味白术散**方见二十一卷第二论　**四七汤**方见十二卷第七论　**白丸子**方见三卷第四论

崩中漏血生死脉方论第十七

妇人崩中漏下之症，已见前论，按其寸口脉弦而大，弦则为紧，大则为芤，紧则为寒，芤则为虚，虚寒相搏，其脉为革，妇人半产漏下，赤白不止。脉小虚滑者生，脉大紧实数者死；又脉急疾者死，迟者生。又云：尺寸脉虚者漏血，脉浮者俱不治。

愚按：前症阐《内经》微旨，济无穷天机，须固胃为善，盖胃为五脏之本源，人身之根蒂，所用治法，当参前后论。

附　治　验

一妇人年将七十，素有肝脾之症，每作则饮食不进，或胸膈不利，或中脘作痛，或大便作泻，或小便不利。余用逍遥散加山栀、茯神、远志、木香而愈。后忧女孀居，不时吐紫血，其病每作，先倦怠而后发热。经曰：积忧伤肺，积思伤脾。肺脾受伤，致是令子母俱病，不能摄血归经而致前症，遂以前药加炒黑黄连三分，吴茱萸二分，顿愈。复因怒吐赤血甚多，躁渴垂死，此血脱也，法当补气，乃用人参一两，苓、术、当归各三钱，

陈皮、炮黑干姜各二钱，炙草、木香各一钱，一剂顿止。

一妇人年六十有四，久郁怒，头痛寒热，春间乳内肿痛，服流气饮之类益甚，不时有血如经行。又因大惊恐，饮食不进，夜寐不宁，此因高年去血过多，至春无以生发肝木，血虚火燥，所以至晚阴旺则发热。经云：肝藏魂。魂无所附，故不能寐，先以逍遥散加酒炒黑龙胆草一钱，山栀一钱五分，二剂肿痛顿退，又二剂而全消，再用归脾汤加炒栀、贝母，诸症悉愈。

表弟方健甫内，五十岁，辛丑患血崩，诸药罔效。壬寅八月，身热体痛，头晕涕出，吐痰少食，众作火治，展转发热，绝粒数日。余诊之曰：脾胃久虚，过服寒药，中病未已，寒病复起。遂用八味丸料一服，翌早遂索粥数匙。再服食倍，热减痛止，乃服八味丸而愈。癸卯秋，因劳役忧怒，甲辰夏病复作，胸饱发热，脊痛腰疼，神气怫郁，或作内伤，或作中暑，崩血便血，烦渴引饮，粒米不进，昏愦时作，脉洪大，按之微弱，此无根之火，内虚寒而外假热也。以十全大补加附子一剂，遂食粥三四匙，崩血渐减，日服八味丸，始得全愈。备见《女科撮要》

柏叶散　治元气虚弱，崩中漏血，年久不愈，亦治白带。

柏叶炒　续断酒炒　川芎　当归　生地黄　鳖甲炙　龟甲炙　禹余粮各一两五钱　阿胶炒　赤石脂煅　牡蛎煅　地榆　艾叶炒　鹿茸炙，各五钱

上为末，每服二钱，粥饮调下。

地黄丸　治足三阴亏损，经行数日不止，或兼带下，无子。

熟地黄自制　山茱萸肉　芜荑仁各一两　干姜三钱，炮　白芍药微炒　代赭石各一两　白僵蚕炒　厚朴姜制，各三钱

上为末，蜜丸桐子大，每服五十丸，空心温酒下，日三服。许学士云：凡妇人有白带，多致不产育，宜速治之。故扁鹊过邯郸，闻妇人有此病，遂自鸣带下医以就治之。

白芷散　治下元虚弱，赤白带下，或经行不止等症。

白芷一两　海螵蛸一枚，烧　胎发一团，煅　上为末，每服二钱，温酒调下。

附　方

东垣益胃升阳汤　治血脱当益其气，盖先补胃气，以助生发之气，故曰阳生阴长。诸甘药为之先务，举世皆以为补气，殊不知甘能生血，此阳生阴长之理。故先理胃气，则血归于脾矣，故曰脾统血。

东垣升麻除湿汤　二方见二十卷第九论

东垣升阳益胃汤　治肺脾胃虚，怠惰嗜卧，四肢不收，身体沉重，口干，食无味，大便不调，小便频数，食少，食不消，洒淅恶寒，而或微热，崩带不止。方见三卷第十三论

十全大补汤　**逍遥散**　**归脾汤**三方见二十四卷第四论　**八味丸**方见二十四卷第十一论

妇人白浊白淫方论第十八

妇人小便白浊白淫，由心肾不交，水火不济，用金锁正元丹。若心虚而致，用平补正心丹、降心丹、威喜丸。若思虑伤脾，用四七汤，吞白丸子，更以乌沉汤加茯苓、益智。

愚按：前症若元气下陷，用补中益气汤；脾胃亏损，六君加升麻、柴胡；脾经郁结，归脾加黄柏、山栀；肝经怒火，龙胆泻肝汤，虚则用加味逍遥散。宜与带下参看主治。

附　治　验

一妇人善怒，或小腹痞闷，或寒热往来，或小便频数，时下白淫，药久不愈，面青口苦。余以为积愤而不能发散所致，用龙胆泻肝汤而愈，用加味逍遥散、八珍汤而安。

锁精丸　治下元虚弱，小便白浊，或白带淋漓，小便频数。

破故纸炒　青盐　白茯苓去皮　五味子

炒，等分

上为末，酒糊丸桐子大，每服三十丸，盐汤或酒下。

固精丸　治胞气虚寒，小便白浊，或小便无度等症。

牡蛎煅　菟丝子酒浸蒸炒　韭子炒　龙骨煅　五味子炒　白茯苓去皮　桑螵蛸酒炙　白石脂煅，各等分

上为末，酒糊丸桐子大，每服七十丸，空心盐汤下。

附　方

补中益气汤　**六君子汤**二方见二十四卷第六论　**归脾汤**方见二十四卷第四论　**龙胆泻肝汤**方见二十四卷第八论

妇人天癸过期方论第十九

许学士云：妇人经脉过期不及，腰腹疼痛，或七七数尽而月经下者，宜用当归散治之。

愚按：前症若肝肾虚热，用当归散；肝血虚热，四物加柴、栀、丹皮；肝火内动，小柴胡加山栀、丹皮；肝火血燥，加味逍遥散；脾经郁火，加味归脾汤；肝脾郁火，归脾、逍遥兼服；肝肾亏损，归脾、六味兼服；仍与前后月经不调治验同用。

附　治　验

一妇人年五十，内热晡热，经水两三月一至，此血虚有热，用逍遥加山茱萸治之而愈。后有痰作渴，或小便不调，或头晕白带，用六味丸而安。

当归散

当归酒洗　川芎　白芍药　黄芩　白术炒，各半两　山茱萸肉一两半

上为末，每服二钱，酒调，日三服。气虚去芩加桂心一两。

附　方

四物汤方见二十四卷第六论　**小柴胡汤**方见二十四卷第二论　**加味逍遥散**　**加味归脾汤**二方见二十卷第四论　**六味丸**方见二十四卷第十一论

妇人血分水分肿满方论第二十

妇人经水不通，则化为血；血不通，则复化为水。故先因经水断绝，后至四肢浮肿，致小便不通，名曰血分，宜用椒仁丸。若先因小便不通，后身面浮肿，致经水不通，名曰水分，宜用葶苈丸。经脉不通而化为水，流走四肢，悉皆肿满，亦名血分，其症与水症相类，实非水也，用人参丸。

愚按：前症或因饮食起居失养，或因六淫七情失宜，以致脾胃虚损，不能生发统摄，气血乖违，行失常道。若先因经水断绝，后至四肢浮肿，小便不通，血化为水，名曰血分，宜用椒仁丸治之；若先小便不利，后至身面浮肿，经水不通，水化为血，名曰水分，宜用葶苈丸治之。此属形气不足，邪淫隧道，必用此药以宣导其邪，而佐以补辅元气之剂，庶使药力有所仗而行，则邪自不能容，而真气亦不至于复伤矣。大凡月水不通，凝结于内，久而变为血瘕，血水相并，亦为水肿。

附　治　验

一妇人月经不调，晡热内热，饮食少思，肌体消瘦，小便频数，或用济阴丸，月经不行，四肢浮肿，小便不通。余曰：此血分也，朝用椒仁丸，夕用归脾汤渐愈。服人参丸两月而愈。仍专用归脾汤，五十余剂面平。

一妇人面目浮肿，月经不通，此水分也。朝用葶苈丸，夕用归脾汤，渐愈。更用人参丸兼服而全愈。

一妇人素性急，先因饮食难化，月水不调，或用理气化痰药，反肚腹膨胀，大便泄泻，又加乌药、蓬术，肚腹肿胀，小便不利，加猪苓、泽泻，痰喘气急，手足厥冷，头面肢体肿胀，指按成窟，脉沉细，右寸尤甚。余曰：此脾肺虚冷，不能通调水道，下输膀胱，渗泄之令不行，生化之气不运。东垣云：水

饮留积，若土在雨中，则为泥矣，得和气暖日，水湿去而阳化，自然万物生长。喜其脉相应，遂与金匮加减肾气丸料服之，小便即通，数剂肿胀消半，四肢渐温，自能转侧。又与六君加木香、肉桂、炮姜，治之全愈。后不戒七情，不调饮食，顿作泄泻，仍用前药，加附子五分而安。

椒仁丸　治血分

椒仁　甘遂　续随仁　附子炮　郁李仁　黑牵牛炒　五灵脂去石　当归　吴茱萸　玄胡索　芫花酒炒　石膏各二钱　信砒　胆矾各一钱　斑蝥糯米炒　芫青各三十个，糯米炒黄去头足

上为末，面糊丸绿豆大，每服十丸，陈皮汤送下。

人参丸　治月经不利，血化为水，流走四肢，悉皆肿满。

人参　当归　大黄蒸熟切焙　桂心　瞿麦穗　赤芍药　白茯苓各三两　葶苈炒，别研一两

上为末，炼蜜丸桐子大，每服十五丸，空心米饮下。

葶苈丸　治水分。

甜葶苈炒，别研，五钱　续随仁五钱，别研　干漆末一两

上用枣肉丸桐子大，每服七丸，煎扁竹汤下。如大便利，减续随子、葶苈各一钱，加白术半两。

小调经散　治经水失道，流入四肢浮肿。方见产后四肢浮肿

附　方

归脾汤方见二十四卷第四论　**《金匮》加减肾气丸**方见二十二卷第十论　**六君子汤**方见二十四卷第六论

校注妇人良方　卷二

宋　临川　陈自明良甫编辑
明　古吴　薛　己立斋补注
　　鄞县　曹赤电炳章圈校

众疾门 经脉不调众疾生焉故以次之

产宝方论第一

古人治妇人，别著方论者，以其胎妊生产崩伤之异，况郁怒倍于男子，若不审其虚实而治之，多致夭枉。

愚按：前说诚为精确。谚云：宁治十男子，莫治一妇人；宁治十妇人，莫治一小儿。义可见矣。

博济方论第二

夫人将摄顺理，则气血调和，六淫不能为害；若劳伤血气，则风冷乘之，脾胃一伤，饮食渐少，荣卫日衰，肌肤黄燥，面无光泽。若人大肠则下利，若入关元则绝嗣。故妇人病有三十六种，皆由冲任劳损而致。盖冲任之脉，为十二经之会海，其病皆见于少阴太阳之经，当於此候之。

愚按：前论精密，学者当从此类推之。

寇宗奭论第三

妇人虽有别科，然亦有不能尽圣人之法。岐伯曰：凡病察其形气相得则易治，形气相失则难治。又曰：诊病之道，观人勇怯，骨肉皮肤，能知其情，以为诊法。今富贵之家，身处帷幔，出手诊候，不能尽望闻问切之情，率尔投药，乌可尽其术乎？况医者质问谆谆，病家遂谓业术不精而不信，岂能使药之奏效耶？丹溪云：凡人之形，长不及短，大不及小，肥不及瘦。人之色，白不及黑，嫩不及苍，厚不及薄。而况肥人湿多，瘦人火多，白者肺气虚，黑者肾气足，形色既殊，脏腑亦异，外证虽同，治法迥别。所以肥人责脉浮，瘦人责脉沉，躁人疑脉缓，缓人疑脉躁，以其不可概观也。若夫病势危急，必须察色以观其外，诊脉以知其内，医之道，庶乎不至于有误矣。

府库徐道夫母，胃脘当心痛极，右寸关俱无，左虽有，微而欲绝，手足厥冷。余以上部无脉，不吐为不治。然察其眼胞上下青黯，此脾虚肝木所胜，以参、术、茯苓、陈皮、甘草补中益气，以木香和胃气行肝气，以吴茱萸散脾胃之寒，止心腹之痛，遂急与一剂，连服二次，再进诸病悉愈。

通用方序论第四

夫通用方者，盖产前后皆可用也。或一方治诸症，不可入于专门，当通变而施治，乌可泥也。

加减四物汤　治血虚月经不调，腰腹作痛，崩中漏下，半产，产后恶露内停，或去血过多而痛。方见第八卷十三论

愚按：血虚之症，若肝脾血燥，用加味逍遥散。肝火血燥，用八珍汤加山栀、牡丹皮。肝经风热血燥，用六味地黄丸。肝脾血燥血虚，用四物、柴胡、山栀。肝经气血虚弱，用四君、芎、归、熟地。肾水涸而肝血虚，用六味地黄丸。金克木而肝血虚，与心

火亢而肝血虚，亦用前丸。若气虚而血弱，用补心汤。胃气陷而血虚，用补中益气汤。脾气弱而血虚，用六君子汤。脾气郁而血虚，用加味归脾汤。大凡血虚之症，或气虚血弱，或阳气脱陷，或大失血，以致发热烦渴等症，必用四君、归、芪。或独参甘温之剂，使阳旺则阴生，其病自愈。若用寒凉降火，乃速其危也。

交加散　治经脉不调，腹中撮痛，或结聚癥瘕，产后中风。

生地黄一斤，取汁　生姜十二两，取汁

上以地黄汁炒姜渣，姜汁炒地黄渣，干为末，每服三钱，温酒调下。加芍药、玄胡索、当归、蒲黄、桂心各一两，没药、红花各五钱，尤效。

补中丸　治气血俱虚诸症，即八珍汤为丸。方见二十四卷第四论

附　方

加味归脾汤　**加味逍遥散**　**八珍汤**三方见二十四卷第四论　**六味丸**方见二十四卷第十一论　**四物汤**　**四君子汤**　**六君子汤**　**补中益气汤**四方见二十卷第六论　**独参汤**方见三卷第十三论

校注妇人良方　卷三

宋　临川　陈自明良甫编辑
明　古吴　薛　己立斋补注
鄞县　曹赤电炳章圈校

妇人中风诸症方论第一

夫中风者，因内虚而中之也。盖风为四时八方之气，常以冬至之日，自坎而起。从其乡来者，主长养万物，否则名为虚风，贼害万物。从背而入，或中腑，或中脏，或中血脉经络，其症或肢体不遂，或手足偏枯，或痰涎壅塞，或口眼歪斜，或牙关紧急，或腰背反张。若眼开口闭，涎流失音者，难治；如眼闭口开，鼾睡遗尿者死。中风中气，皆用苏合香丸。中气用三生饮，若作风治，百无一生。

愚按：中风者，即《内经》所谓偏枯、风痱、风懿、风痹是也，而有中腑、中脏、中血脉之分焉。夫中腑者为在表，中脏者为在里，中血脉者为在中。在表者宜微汗，在里者宜微下，在中者宜调荣。中腑者多着四肢，如手足拘急不仁，恶风寒。此数者病浅，皆易治，用加减续命汤之类。中脏者多滞九窍。如眼瞽者，中于肝；舌不能言者，中于心；唇缓便秘者，中于脾；鼻塞者，中于肺；耳聋者，中于肾。此数者病深，多难治。中血脉者，外无六经之证，内无便溺之阻。肢不能举，口不能言，用大秦艽汤主之。中腑者，多兼中脏，如左关脉浮弦，面目青，左胁偏痛，筋脉拘急，目瞤，头目眩，手足不收，坐踞不得，此中胆兼中肝也，用犀角散之类。如左寸脉浮洪，面舌赤，汗多恶风，心神颠倒，言语蹇涩，舌强口干，忪悸恍惚，此中小肠兼中心也，用麻黄散之类。如右关脉浮缓，或浮大，面唇黄，汗多恶风，口喎语涩，身重，怠惰嗜卧，肌肤不仁，皮肉瞤动，腹膨不食，此中胃兼中脾也，用防风散之类。如右寸脉浮涩而短，面色白，鼻流清涕多喘，胸中冒闷短气，自汗声嘶，四肢痿弱，此中大肠兼中肺也，用五味子汤之类。如左尺脉浮滑，面目黧黑，腰脊痛引小腹，不能俯仰，两耳虚鸣，骨节疼痛，足痿善恐，此中膀胱兼中肾也，用独活散之类。此皆言真中风也，而有气血之分焉。盖气虚而中者，由元气虚而贼风袭之，则右手足不仁，用六君子汤加钩藤、姜汁、竹沥；血虚而中者，由阴血虚而贼风袭之，则左手足不仁，用四物汤加钩藤、竹沥、姜汁；气血俱虚而中者，则左右手足皆不仁也，用八珍汤加钩藤、姜汁、竹沥。其与中风相类者，则有中寒、中湿、中火、中气、食厥、劳伤、房劳等症。如中于寒者，谓冬月卒中寒气，昏冒口噤，肢挛恶寒，脉浮紧，用麻黄桂枝理中汤之类。中于暑者，谓夏月卒冒炎暑，昏冒瘈厥，吐泻喘满，用十味香薷饮之类。中于湿者，丹溪所谓东南之人，多因湿土生痰，痰生热，热生风也，用清燥汤之类，加竹沥、姜汁。中于火者，河间所谓非肝木之风内中，六淫之邪外侵，良由五志过极，火盛水衰，热气怫郁，昏冒而卒仆也，用六味丸、四君子、独参汤之类。内有恚怒伤肝，火动上炎者，用柴胡汤之类。中于气者，七情过极，气厥昏冒，或牙关紧急，用苏合香丸之类，误作风治者死。食厥者，过于饮食，胃气自伤，不能运化，故昏冒也，用

六君子加木香。劳伤者，过于劳役，耗损元气，脾胃虚衰，不任风寒，故昏冒也，用补中益气汤。房劳者，因肾虚精耗，气不归源，故昏冒也，用六味丸。此皆类中风者也。夫《内经》主于风，河间主于火，东垣主于气，丹溪主于湿，余之斯论，僭补前人之阙也。若夫地之南北，人之虚实，固有不同，其男子女人，大略相似，当与后论参看通变治之。

附治验

靳阁老夫人，先胸胁胀痛，后四肢不收，自汗如水，小便自遗，大便不实，口紧目瞤，饮食颇进，十余日矣。或以为中脏，公甚忧。余曰：非也，若风既中脏，真气既脱，恶症既见，祸在反掌，焉能延之。乃候其色，面目俱赤，而面或青。诊其脉，左三部洪数，惟肝尤甚。余曰：胸乳胀痛，肝经血虚，肝气否塞也。四肢不收，肝经血虚，不能养筋也。自汗不止，肝经风热，津液妄泄也。小便自遗，肝经热甚，阴挺失脏也。大便不实，肝木炽盛，克脾土也。遂用犀角散四剂，诸症顿愈。又用加味逍遥散，调理面安。后因郁怒，前症复作，兼发热呕吐，饮食少思，月经不止，此木盛克土，而脾不能摄血也，用加味归脾汤为主，佐以加味逍遥散，调补肝脾之气，清和肝脾之血而愈。后每遇怒，或睡中手足抽搐，复用前药即愈。

大参朱云溪母，于九月内忽仆地痰涎，不省人事，唇口㖞斜，左目紧小，或用痰血之剂，其势稍缓。至次年四月初，其病复作，仍用前药，势亦渐缓。至六月终，病乃大作，小便自遗，或谓风中于脏，以为不治。余诊之：左关弦洪而数，此属肝火血燥也，遂用六味丸加五味、麦门、芎、归，一剂而饮食顿进，小便顿调，随用补中益气加茯苓、山栀、钩藤、丹皮面安。至十月，复以伤食腹痛作泻，左目仍小，两关尺脉弦洪鼓指，余以六君加木香、吴茱、升麻、柴胡，一剂而痛泻俱缓，复以六君加肉果、故纸一剂，诸脉顿平，痛泻俱止。余谓左关弦洪，由肝火血燥，故左目紧小；右关弦洪，由肝邪乘脾，故唇口㖞斜；腹痛作泻，二尺鼓指，由元气下陷。设以目紧口㖞，误作风中，投以风药。以腹痛泄泻，误作积滞，投以峻剂。复耗元气，为害甚矣。后以阳虚恶寒，围火过热，致痰喘，误服寒剂而卒。

一妇人因怒仆地，语言蹇涩，口眼㖞斜，四肢拘急，汗出遗尿，六脉洪大，肝脉尤甚，皆由肝火炽盛。盖肝主小便，因热甚而自遗也，用加味逍遥散加钩藤，及六味丸寻愈。

一老妇两臂不遂，语言蹇涩，服祛风之药，反致筋挛骨痛。余谓此肝火血虚所致，用八珍汤补气血，用地黄丸补肾水，佐以排风汤，年余而愈。

一妇人经行，口眼歪斜，痰涎壅盛，此血虚而肝火动，用加味逍遥散加牡丹皮治之寻愈。后因饮食停滞，口吐痰涎，此脾气虚，不能摄涎归经也，用六君子二十余剂而安。

一妇人因怒，口眼歪斜，痰涎上涌，口噤发搐，此脾肺气虚而肝木旺，用六君子加木香、钩藤、柴胡治之，渐愈。又用加味归脾汤，调理而安。

一产妇勤于女工，忽仆地，牙关紧急，痰喘气粗，四肢不遂，此气血虚而发痉，朝用补中益气汤加茯苓、半夏，夕用八珍汤加半夏，各三十余剂，不应，此气血之未复，药之未及也，仍用前二汤，又五十余剂寻愈。

一妇人素有内热，月经不调，经行后四肢不能伸，卧床半载，或用风湿痰火之剂，不效。其脉浮缓，按之则涩，名曰瘫症，属风寒所乘，用加味逍遥散加肉桂、防风，四剂顿愈，更以八珍汤调理两月余而痊。

一妇人素经行后期，因劳怒四肢不能屈，名曰疯症，此血虚而风热所乘，先用八珍汤加钩藤、柴胡渐愈，更佐以加味逍遥散，调理面痊。

一妇人四肢挛屈，烦痛自汗，小便短少，畏见风寒，脉浮弦缓，此气血虚而风寒湿热

相搏，先用东垣清燥汤渐愈，再用加味逍遥散及八珍汤加牡丹皮而痊。

一妇人素有火，忽然昏聩，癫疯抽搐，善伸数欠，四肢筋挛，痰涎上升，此肺金燥甚，血液衰少而然也，用清燥汤、六味丸，兼服寻愈。

一妇人肢节作痛，不能转侧，恶见风寒，自汗盗汗，小便短少，虽夏亦不去衣，其脉浮紧，此风寒客于太阳经，用甘草附子汤，一剂而瘥。

一妇人因怒发搐，呕吐痰涎，口噤昏愦，气口脉大于人迎，此气滞而食厥，用平胃散加茯苓、半夏、木香治之而苏，更以六君子加木香渐愈，乃去木香，又二十余剂而痊。

一妇人元气素虚，劳则体麻发热，痰气上攻，或用乌药顺气散、祛风化痰丸之类，肢体痿软，痰涎自出，面色痿黄，形体倦怠，而脾肺二脉虚甚，此气虚而类风，朝用补中益气汤，夕用十全大补汤渐愈，又用加味归脾汤调理寻愈。

一妇人体肥胖，头目眩晕，肢体麻木，腿足痿软，自汗身重，其脉滑数，按之沉缓，此湿热乘虚也，用清燥、羌活二汤渐愈，更佐以加味逍遥散全愈。

一妇人口眼歪斜，四肢拘急，痰涎不利而恶风寒，其脉浮紧，此风寒客于手足阳明二经，先用省风汤二剂，后用秦艽升麻汤而愈。

一妇人素性急，患肝风之症，常服搜风顺气丸、秦艽汤之类，后大怒吐血，唇口牵紧，小便频数，或时自遗。余以为肝火旺而血妄行，遂用小柴胡汤加山栀、牡丹皮渐愈。五年之后，又大怒吐血，误服降火祛风化痰之剂，大便频数，胸满少食。用清气化痰之剂，呕而不食，头晕口干，不时吐痰。用导痰降火之类，痰出如涌，四肢常冷。余曰：呕而不食，胃气虚弱也。头晕口干，中气不能上升也。痰出如涌，脾气不能摄涎也。四肢逆冷，脾气不能运行也。用补中益气加茯苓、半夏治之，诸症渐愈，又用加味归脾汤，兼服而安。

鸿胪王继之室人，素有痫症，遇劳役怒气则发，良久自省。一日因饮食劳役失宜，发而半日方省，不能言语，或以为风中于脏，用祛风化痰顺气之剂，及牛黄清心丸，病益甚，六脉浮大，两寸虚而不及本部，且进饮食。余曰：此脾胃之气伤也，若风中于脏，祸在反掌。彼不信，仍用风药，后果卒。

妇人吐痰头晕，肢体麻木见第四卷

娠妇发搐似中风见第十四卷

产后发痉似中风见第十九卷

男子诸症《见内科摘要》

排风汤　治风邪入脏，狂言妄语。

白鲜皮　白术　白芍药炒　桂心　川芎　当归　防风　杏仁去皮尖，炒　甘草各二两　白茯苓　麻黄去节　独活各二两

三生饮　治卒中不省，口眼㖞斜，痰壅喉响，无问外感内伤，痰涎食厥，气虚眩晕，但六脉沉，悉有神效。

生南星　生乌头去皮尖　生附子各半两，去皮　木香一钱

上每服半两，姜水煎。不省人事，以细辛、皂角末少许吹鼻中，得嚏进药。气盛只用南星五钱，生姜十四片，煎饮之，名星姜饮。

愚按：三生饮乃行经络治寒痰之良药，斩关夺旗之神剂，每服必用人参两许，驱其外邪，而补其真气，否则不惟无益，适以取败，观先哲用芪附、术附等汤，其义可见。

加减小续命汤　治中风半身不遂，口眼㖞斜，手足战掉，语言蹇涩，神思昏乱，筋挛骨痛，或脚气缓弱，阴晦复作。

麻黄去节根　防己　人参　黄芩炒　桂心　甘草炒　白芍药　川芎　杏仁各一两　附子炮，半两　防风一两半

上每服五钱，姜枣水煎。精神恍惚，加茯苓、远志。有热，去附子，加芍药。心烦，加犀角半两。骨冷痛，加桂附。呕逆腹胀，加

人参、半夏一两。躁闷便涩，去附子，加芍药一两，竹沥一合。脏寒下利，去防已、黄芩，加附子、白术一两。自汗，去麻黄、杏仁，加白术一两。脚弱，加牛膝、石斛一两。身痛，加秦艽一两。腰痛，加桃仁、杜仲半两。失音，加杏仁一两。

小引风汤

防风　独活　细辛　川芎　五味子炸炒　白茯苓　人参　白芍药焙　白术炒　甘草等分

上每服五钱，姜三片，杏仁五个，水煎服。加麻黄、苁蓉、附子、当归、羚羊角等分，即大引风汤也。

《必效》竹沥汤　治中风痰涎壅盛，言语蹇滞，四肢缓纵。

秦艽　防风　独活　附子炮，各一钱

上以水二盏，煎半盏，入生地汁、淡竹沥各半盏，再煎四五沸，作四服，病既去，以他药调治，未愈再服，最效。

星香汤　治中风痰盛，服热药不得者。

南星　木香等分

上每服四钱，姜十片，水煎。

星附汤　治中风痰涎上攻，六脉沉伏，不知人事。

附子生用　南星生用，各一两　木香半两

上每服四钱，姜水煎。寒甚，加天雄、川乌，多灸关元、丹田二穴。

附　方

三化汤　治中风，外有六经之形症，先以加减续命汤治。内有便溺之阻隔者，此方主之。

厚朴姜汁炒　大黄酒蒸　枳实麸炒　羌活各八两

上每服一两，水煎。

秦艽汤　治中风外无六经之形症，内无便溺之阻隔，乃血弱不能养子筋，手足不能运，口强不能言，宜养血而筋自荣也。

秦艽　石膏各二两　甘草炒　川芎　当归　芍药炒　羌活　独活　防风　黄芩炒　白芷　生地黄　熟地黄自制　白茯苓　白术各一两　细辛半两

上每服一两，水煎。阴雨，加生姜七片。春夏，加知母一两。

省风汤　治中风口噤，口眼㖞斜，筋脉挛急，抽掣疼痛，风热痰实。

防风　南星生用，各四两　半夏水浸洗，生用　黄芩炒　甘草生用，各二两

上每服五钱，水煎。

大八风汤方见后

烧竹沥法　用新竹截尺许，作两片，用两砖对立，竹仰砖上，中以火烧之，两头沥自出。取荆沥亦然。

乌药顺气散　治风气骨节疼痛，遍身顽麻，手足瘫痪，言语蹇涩，宜先疏气道，后随证投药。

麻黄去节　乌药　陈皮去白　川芎　白芷　桔梗　枳壳去穰，麸炒　甘草炒，各一两　干姜炮，半两　僵蚕炒，一两

上每服五钱，姜水煎。头痛，加葱白。有汗，加薄荷。

八味顺气散

白术　白茯苓　青皮　白芷　陈皮炒　乌药　人参各一两　甘草炙，半两

上每服五钱，水煎。

导痰汤

半夏　南星　茯苓　陈皮炒　枳实炒　甘草炒

上姜水煎服。

参苏饮　治痰积中脘，晕眩嘈杂，怔忡哕逆，或痰停关节，手足瘫曳，口眼㖞斜，半身不遂，呕吐恶心，头疼发热。

人参　紫苏叶　半夏　茯苓　干葛　前胡各二钱　甘草炙　木香　陈皮炒　枳壳制　桔梗各半两

上每服一两，姜水煎。腹痛，加芍药。

附子理中汤　治中寒不语，四肢强直。昔有武士守边，大雪出帐盼瞻，忽然晕倒；又

马观文之内，厥逆恶寒腹痛，服此悉愈。方见十二卷第八论

牛黄清心丸方见后

秦艽升麻汤　治风寒客于手足阳明经，口眼㖞斜，恶见风寒，四肢拘急，其脉浮紧。

秦艽二钱　升麻　干葛　甘草　芍药炒　人参各半两　防风　桂枝各三钱

上每剂一两，连须葱白二茎，水煎服。

犀角散　治肝脏中风，筋脉拘挛，手足不收，坐踞不得，胸背强直，胁肋胀满，面赤心烦，言语蹇涩，或风邪流注四肢，上攻头面作痛，口眼㖞斜，脚膝痛乏。

犀角屑二钱　石膏　羚羊角　羌活各一钱　人参　甘菊花　独活　黄芩炒　天麻　枳壳去穰，麸炒　当归　黄芪　芎藭　白术　酸枣仁炒　防风　白芷各五分　甘草五分

上水姜煎。

薏苡仁散　治肝脏中风。

薏苡仁　麻黄去节，各一钱半　防风　附子炮去皮脐　川芎　柏子仁　桂心　枳壳麸炒　石膏　细辛　独活　羚羊角各一钱

上姜水煎服。

射干汤　治肝经受病，多汗恶风，善悲嗌干。目下青黄，可治，急灸肝腧百壮。一黄一白，不可治。

射干　芍药各二钱半　薏苡仁三钱　桂心五分　牡蛎　石膏各二钱

上作一剂水煎服。

茯神散　治同前，或四肢沉重，精神不安。或痰气不利，茯神去木　羌活　麻黄去节　龙齿另研赤芍药　甘草炙各一钱　蔓荆子　薏苡仁　麦门冬去心　人参去芦　防风去芦　犀角屑各二分

上水姜煎。

远志汤　治症同前，或偃卧不侧，闷乱冒绝。若唇色正赤，可治，急灸心腧百壮。若青黄不定，面色暗暗战栗动者，不可治。

远志去心，二钱半　人参　石菖蒲　羌活　细辛　麻黄去根，各半两　赤芍药　白术各一两

上为末，每服二钱，煎小麦汤调，日二服。

防风散　治脾脏中风，多汗恶风，身体怠惰，四肢不能动，色微黄，不嗜食，舌强语涩，口㖞斜僻，肌肤不仁，腹膨心烦，翕翕发热，神思如醉，其脉浮缓，胸满痰涎，志意昏浊。

独活一钱半　防风　茯神去木　人参　附子炮去皮脐　前胡　沙参　半夏汤洗七次　黄芪炒　旋覆花　羚羊角镑末　甘草炙，各一钱

上水姜煎。

白术汤　治症同前，或腹满身黄，呕吐酸水，急灸脾腧百壮。目下及手足青者，不可治；口角两边黄者，可治。

白术　厚朴姜制　防风各二钱　附子炮去皮脐　橘红　白藓皮　五加皮各一钱

上水姜煎。

细辛散　治症同前，或肉热，肌肤淫淫如虫行，或汗大泄，皮肤不泽，唇鼻黄色。

细辛　白术　独活　附子炮去皮脐　肉桂　防风各一钱　厚朴姜制　麻黄　枳实麸炒　甘草炒，各一钱五分

上水煎。

防风麻黄散　治症同前，或志意恍惚，肢体沉重。

防风　麻黄去节　人参　川芎　附子炮去皮脐　桂心　黄芪炒　赤茯苓　酸枣仁炒　白术　独活　桑白皮炒　羚羊角镑末，各一钱　甘草炒，五分

上水煎服。

五味子汤　治肺脏中风，胸满短气，冒闷汗出，嘘吸颤掉，声嘶体重，四肢痿弱，其脉浮，昼瘥夜甚，偃卧冒闷。其鼻两边下至口，上至眉，其色白者，急灸肺腧百壮。若色黄，其肺伤而为血矣。撮空拈衣摸床者，必死。

五味子炸炒　杏仁炒，去皮尖　桂心各一钱　防风去芦　甘草炙　赤芍药　川芎各二钱　川椒三分

上水煎服。

独活细辛散　治症同前。或头痛项强，背痛鼻干，心闷语蹇，胸中少气，四肢疼痛。

独活　细辛　附子炮去皮脐　甘菊花　麻黄去声　白芷　五味子杵炒　紫苑茸　赤茯苓　肉桂　白术　川芎　桑白皮　杏仁麸炒去皮　防风各一钱　甘草炙，半钱

上水煎服。

独活散　治肾脏中风，腰疼不得俯仰，或偏枯耳鸣，语声浑浊，面色浮肿，骨节酸疼，精神昏愦，喜怒好忘，而肌色黧黑，身体沉重，发汗恶风，隐曲不利，或两脚冷痹，头昏耳聋，语音浑浊。宜用此。

独活　附子炮去皮脐　当归酒洗　防风　天麻　桂心各一钱　川芎　甘菊花　枳壳麸炒　山茱萸取肉　黄芪炒　丹参　牛膝酒浸　萆薢酒浸　甘草炙　细辛　菖蒲　白术各五分

上水煎服。

萆薢散　治症同前。或脊骨促痛，不能行立，肌肤黑色，两胁赤黄如饼者，可治，急灸肾腧百壮；齿黄发槁，面如土色者，不可治。

萆薢酒浸　狗脊　杜仲炒，去丝　白茯苓去皮，各一两　何首乌　天雄去皮脐，炮　泽泻各半两

上为末，每服二钱，米饮调下。

吴茱萸丸　治症同前。或恶风多汗，面色浮肿，腰膝疼痛，形色憔悴。

吴茱萸　细辛　白茯苓　独活　木香　山茱萸取肉　牛膝酒浸　石斛　萆薢酒浸，各半两　附子炮去皮脐　芎劳各二钱

上为末，酒糊丸桐子大，每服二十丸，空心盐汤下，日二服。

黄芪丸　治症同前，或麻痹肿痛，少气，肢体乏力。

黄芪炒　川椒炒　茴香炒　川乌头去皮脐　狼毒　防风　川楝子肉　黑附子炮去皮脐　白蒺藜炒　地龙去土炒　赤小豆各等分

上为末，酒糊丸桐子大，每服二三十丸，温酒下，日二服。

四君子汤　**六君子汤**　**补中益气汤**　**四物汤**四方见二十四卷第六论　**十全大补汤**　**八珍汤**　**加味归脾汤**　**加味逍遥散**四方见二十四卷第四论　**理中汤**方见二十卷第八论　**清暑益气汤**　**十味香薷饮**二方见本卷第三论　**东垣清燥汤**方见四卷第二论　**六味丸**方见二十四卷第十一论　**独参汤**方见本卷第十三论　**小柴胡汤**方见二十四卷第二论　**苏合香丸**方见后　**羌活汤**方见后　**甘草附子汤**方见后　**平胃散**方见十一卷第十八论

妇人中风角弓反张方论第二

论曰：妇人气虚，风入诸阳之经，或产后血虚，汗出中风，体强口噤，腰背反张，名为发痉。因太阳经先伤风，复感寒而致，如发痫状，但脉沉迟弦细，无汗恶寒，名刚痉。有汗不恶寒，名柔痉。无汗者，葛根汤、小续命汤；有汗者，去麻黄加葛根。

愚按：仲景先生云：太阳病发汗太多致痉，风病下之则痉。《三因方》云：气血内虚，风寒湿热所中则痉。以风能散气，故有汗而不恶寒曰柔痉。寒能涩血，故无汗而恶寒曰刚痉。非专于风湿。因内虚发汗亡血，筋无所荣而然，乃虚象也。窃谓伤寒汗下过度与产妇溃疡等病，及因克伐之剂，伤损气血而变。若金衰木旺，先用泻青丸，后用异功散。肾水虚，用六味丸。肝火旺，先用加味小柴胡汤，次用加味四物汤。发热，用加味逍遥散。若木侮脾土，用补中益气加芍药、山栀，脾经郁结用加味归脾汤，脾土湿热用大承气汤。大凡病后气血虚弱，用参术浓煎，佐以姜汁竹沥，时时用之。如不应，用十全大补汤。更不应，急加附子，或用参附汤，缓则不救。仍与后治验参看。

附　治　验

一妇人脾胃虚弱，忽痰壅气喘，头摇目瞀，手扬足掷，难以候脉。视其面，黄中见青，此肝木乘脾土，用六君加柴胡、升麻治之而苏，更以补中益气加半夏、茯苓而痊。

葛根汤　治刚痉无汗恶风。

葛根一钱　麻黄去根节　僵蚕炒，各三分　桂枝　粉草炒　芍药各五分　大枣三个

上水煎，出汗为度。凡产后麻黄宜斟酌用

附术汤　治手足逆冷，筋脉拘急，汗出项强，口噤痰涌。

附子炮　白术　独活各五分　川芎　肉桂各三分

上枣水煎服。

桂心白术汤　治阴痉手足厥冷，筋脉拘急，汗出不止。

白术　桂心　附子炮　防风　川芎　甘草各等分

上每服五钱，姜枣水煎。

八物白术散　治阴痉手足厥冷，筋急脉拘而无汗者。

白术　麻黄去根节　茯苓　五味子拌炒　羌活各半两　附子炮　桂心各一钱　良姜一钱

上每服四钱，姜水煎。凡用麻黄宜斟酌不可过多

附　方

通关散　治卒然牙关紧急，腰背反张，药不得咽。

细辛　薄荷叶　牙皂角各等分

上为末，每用少许吹鼻内，候得喷嚏，随进汤药。

泻青丸方见二十四卷第三论　**异功散**方见二十三卷第三论　**六味丸**方见二十四卷第十六论　**加味小柴胡汤**方见二十四卷第二论　**补中益气汤**　**加味四物汤**二方见二十四卷第六论　**加味逍遥散**　**十全大补汤**　**加味归脾汤**三方见二十四卷第四论　**大承气汤**方见后　**参附汤**方见十二卷第三论

妇人中风口噤方论第三

夫中风口噤，乃体虚受风，入于颔颊。盖手三阳之经，结于颔颊，上夹于口，风邪乘之则筋挛，故牙关急而口噤也。

愚按：前症若风邪客于手足阳明经，口眼㖞斜，用秦艽升麻汤。若风热伤气，用省风汤，当与后方同用。

附　治　验

一妇人因怒，经事淋沥，半月方竭，遇怒其经即至，甚则口噤筋挛，鼻衄头痛，痰痉搐搦，瞳子上视，此肝火炽甚，以小柴胡汤加熟地黄、山栀、钩藤治之，后不复发。

一妇人素阴虚，患遍身搔痒，误服祛风之药，口噤抽搐，肝脉洪数。余曰：肝血为阴为水，肝气为阳为火，此乃肝经血虚火盛耳，宜助阴血抑肝火，用四物、麦门、五味、柴胡、山栀、生草，热搐顿止。又以八珍、黄芪、麦门、五味、钩藤、炙草，调理而痊。

天南星散　治中风口噤，四肢拘急，或痰气上壅。

天南星姜汁炒黄　白附子炮　黑附子炮　乌蛇肉酒炙　全蝎炒，等分

上为末，每服半钱，姜汁温酒调灌。

走马散　治中风口噤，四肢强直。

黑附子炮　天麻各半两　桂心　石膏　麻黄去根节　蝎梢炒　川乌炮去皮尖　南星炮，各一钱　麝香一分，另研

上为末，每服三分，豆淋酒调灌。

附　方

秦艽升麻汤　**省风汤**二方见本卷第一论　**小柴胡汤**方见二十四卷第二论　**四物汤**方见二十四卷第六论　**八珍汤**方见二十四卷第四论

妇人中风不语方论第四

巢氏云：脾脉络胃夹咽，连舌本，散舌下，心之别脉，系舌本。若心脾受邪，则舌强不能言。然喉咙者，气之上下也。会厌者，声之户。舌者，声之机。唇者，声之扇。若风寒客于会厌，故卒然而瘖。经云：醉卧当风，使人发瘖。

愚按：前症若因痰迷心窍，当清心火。若因湿痰舌强，当清脾热。若因风热，牙关紧急，当清肝火。若因风痰塞喉，当导痰涎。若因虚火上炎，当壮水之主。若因气虚厥逆，当益火

之源。若因肾虚舌瘖而不语，当补肾气。

附　治　验

一妇人因怒仆地，痰涌不语，灌牛黄清心丸，稍苏，用神仙解语丹加山栀、柴胡、桔梗渐愈，又用六君、柴胡、山栀、枳壳而痊。

一妇人忽然不语半年矣，诸药不应，两尺浮数，先用六味丸料加肉桂，数剂稍愈。乃以地黄饮子，三十余剂而痊。男子多有此症，亦用此药治之。

神仙解语丹　治心脾受风，言语蹇涩，痰唾溢盛。

白附子炮　石菖蒲去毛　远志去心，甘草水煮十沸　天麻　全蝎　羌活　南星牛胆酿，如无只炮，各一两　木香半两

上为末，面糊丸桐子大，每服二三十丸，薄荷汤下。

防风汤　石斛一两半，酒炒　生地黄　杜仲去皮切，姜汁炒　丹参各一两一钱　防风　川芎　麦门冬去心　桂心　独活

上每服五钱，枣水煎。

竹沥汤　治风中肝脾，四肢不遂，舌强语滞，或痰涎上涌。

威灵仙　附子炮　苦梗　蔓荆子　防风　枳壳去穰，麸炒　川芎　当归各等分

上每服四钱，姜水煎，入竹沥半盏，日四服。忌饮茶。

三黄独活汤　治中风手足拘挛，半身不遂，失音不语。

麻黄去根节　黄芪半两　黄芩七钱　独活一两

上每服四钱，水煎，取汗为效。

小省风汤　治中风瘫痪，口眼㖞斜，口噤不语，手足顽麻。

防风　南星汤泡，各三两　甘草炙，一两

上每服四钱，姜十片，水煎。

秦艽升麻汤方见本卷第一论

愈风汤　治诸风肢体麻木，手足不遂，不能动履等症。

天麻　牛膝同酒浸，焙干　虎胫另研细　玄参各六两　杜仲七两　羌活十四两　当归　熟地黄自制　生地黄各一斤　独活五两　肉桂三两

上为末，炼蜜丸桐子大，常服五七十丸。病甚，至百丸。空心、食前温酒或白汤下。

地黄饮子　治肾虚弱，舌喑不能言，足废不能行。

熟地黄自制　巴戟去心　山茱萸去核　石斛　肉苁蓉酒浸焙　附子炮　五味子炒　白茯苓　石菖蒲　远志　桂心　麦门冬去心，各等分

上每服三钱，入薄荷少许姜枣水煎服。

牛黄清心丸　治诸风瘈疭，语言蹇涩，健忘恍惚，头目眩晕，胸中烦郁，痰塞喘嗽，精神昏愦，或寻常风痰咳嗽，或伤寒阳症，汗下不解，发热烦渴，其效如神。

牛黄一两二钱　麝香　龙脑三味分研　羚羊角镑末，各一两　当归酒洗　防风　黄芩　白术　麦门冬去心　白芍药各一两半　柴胡　桔梗　白茯苓　杏仁去皮尖　芎劳　肉桂　大豆黄卷　阿胶各一两七钱　蒲黄　人参去芦　神曲各二两半　雄黄另研，八钱　甘草五两　白敛七钱半　干姜七钱半　犀角镑末，二两　干山姜七两　金箔一千三百片内四百片为衣　大枣一百枚，蒸熟去皮核，研烂成膏

上各另为末，炼蜜与枣膏丸，每两作十丸，用金箔为衣，每服一丸，温水化下。

苏合香丸　治气中，痰气上攻，牙关紧急，不省人事，或卒暴气逆心痛，鬼魅恶气，及一切气滞等症。

沉香　麝香　诃子肉　丁香　青木香　安息香　香附　荜拨　白术　白檀　薰陆香　苏合油　龙脑另研，各一两　朱砂另研　乌犀角镑末

上为末，用安息香并炼蜜丸桐子大，温水化服四丸，每两作十丸，熔黄蜡包裹为善。

青州白丸子　治半身不遂，口眼㖞斜，痰涎壅塞，手足顽麻。

半夏七两，水洗过生用　川乌头半两，去皮脐，生用　南星二两，生用　白附子二两，生用

上为末，用绢袋盛之，水浸一日，如急用以糊丸桐子大。每服十丸，姜汤下。

瓜蒂散

瓜蒂二钱　赤小豆五分

上为末，每夜于鼻内嗑之，取下黄水，内服凉剂。

六君子汤方见二十四卷第六论

妇人风痹手足不随方论第五

夫妇人风痹，手足不随，或肌肤疼痛，或肢体麻木。盖诸阳之经，皆起於手足，循行肢体，因气虚风邪所客而为患也。

愚按：经云：邪之所凑，其气必虚。前症若风邪淫旺，或怒动肝火，血燥筋挛，用加味逍遥散。脾肺气虚，肌肤不仁，手足麻木，用三痹汤。若肾水亏损，不能滋养筋骨，或肝脾血虚，而筋痿痹，用六味丸。服燥药而筋挛者，用四物、生甘草。气血俱虚，用八珍汤，何《医林集要》等方。新刊《丹溪心法》附录云：若人大拇指麻木不仁，或手足少力，或肌肉微掣，三年内必有大风之症，宜先服八风汤、天麻丸、防风通圣散以预防之。殊不知河间云：风者病之末也。所以中风有瘫痪者，非谓肝木之风内中，亦非六淫风邪外袭，良由五志过极，心火炽盛，肾水虚衰，卒倒无知也。治当以固元气为要，若遽服八风等药，则反伤元气，适足以招风取中。仍参本卷首论主治。

附　治　验

一妇人因怒，吐痰胸满，服二陈顺气化痰之剂，半身不遂，内热口干，形气殊倦。余视之，乃肝火炽盛而侮脾土也，用逍遥散、补中益气汤、六味地黄丸，喜其慎疾，年余而愈。

一孀妇胸胁胀痛，内热晡热，月经不调，肢体酸麻，不时吐痰。或用清气化痰药，喉间不利，白带腹胀。又用清热理气药，胸膈不宽，肢体时麻。余曰：此本郁怒伤肝脾，前药伤甚耳。朝用归脾汤以解郁结生脾气，夕用加味逍遥散以生肝血清肝火，百余剂而愈。后因怒肢体复麻，用补中益气加山栀、茯苓、半夏而痊。后复怒病再作，月经如注，脉浮洪而数，此肝火伤脾，不能摄血所致也，用六君、芎、归、炮姜，一剂而血止，用补中益气汤加炮姜、茯苓、半夏，一剂而胃醒，更用归脾汤、逍遥散，调理而痊。

一妇人头晕吐痰，用化痰理气药，肢体或麻，服祛风化痰药，肢体常麻。手足或冷或热，此脾土虚而不能生肺金，用补中益气加茯苓、半夏、炮姜二十余剂，脾气渐复，诸症稍愈，更用加味逍遥散三十余剂而愈。后因怒吐痰，自服清气化痰丸，饮食不进，吐痰甚多，胸胁胀满，余用六君子倍加参、术，少加木香，数剂而安。

三痹汤　治血气凝滞手足拘挛，风痹等疾。

续断酒浸炒　杜仲去皮切、姜汁炒　防风　桂心　细辛　人参　白茯苓　当归　白芍药炒　黄芪炒　牛膝酒浸炒　甘草炒，各五分　秦艽　生地黄　川芎　独活各三分

姜水煎服。

五痹汤　治风寒湿气，客留肌体，手足缓弱，麻痹不仁。

片姜黄　羌活　白术　防己各一钱　甘草炙，五分

上姜水煎服。

东垣羌活汤　治湿热身重，或眩晕麻木，小便赤涩，下部痿软，不能行履。

羌活　防风　柴胡各一钱　藁本　独活　茯苓　泽泻　猪苓　黄芪炒　甘草炙　陈皮　黄柏酒炒黑　黄连炒　苍术　升麻　川芎各五分

上水煎服。

甘草附子汤　治风湿相搏，骨节烦疼，不时抽痛，不能伸屈，抑之则痛剧，汗出短气，小便不利，恶风不欲去衣，或微肿痛。

甘草炙，一两　附子一枚重一两三四钱方是，炮去皮尖，不真不效　白术炒，一两　桂枝二两

上每服五钱，水煎。

八珍汤　治肝脾气血俱虚，不能养筋，以致筋挛骨痛，或不能行履，或发热晡热，寒热往来等症。

加味逍遥散　治肝经风热，血燥筋挛，肢体不遂，内热晡热等症。

归脾汤三方见二十四卷第四论　**六味丸**方见二十四卷第十六论　**四物汤**　**补中益气汤**　**六君子汤**三方见二十四卷第六论

妇人中风自汗方论第六

上方续命、排风、越痹等汤，皆用麻黄，取其发汗而散风邪也。然而无汗者为宜，若自汗者用之，则津液转脱反为大害。故仲景云：中风自汗，用桂枝汤。发搐，口眼瞤动，遍身出汗，用独活汤、续命煮散，以复荣卫而却风邪。

愚按：前症若腠理不固而自汗者，用桂枝汤，或防风白术牡蛎汤。若过服风药而自汗者，用白术防风汤。若阳气虚弱而自汗者，用芪附汤。若兼盗汗，用补中益气汤送六味丸。如不应，用当归六黄汤。

独活汤　治风虚昏愦，手足瘛疭发热，及中风自汗等症。

独活　羌活　人参　防风　当归　细辛　茯神去木　半夏　桂心　白薇　远志去心　菖蒲　川芎各五分

上姜水煎服。

续命煮散　治风气昏愦，四肢无力，口眼瞤动，或时搐搦，或津液不足，渴饮热汤，及产后中风自汗等症。

防风　独活　当归　人参　细辛　葛根　芍药炒　川芎　甘草炒　熟地黄自制　半夏　远志去心　荆芥穗各半两　桂心七钱半

上每服五七钱，姜水煎，汗不止加牡蛎粉五分。

防风白术牡蛎散　治中风气虚，腠理不密，自汗不止等症。

白术炒　牡蛎煅　防风等分

上为末，每服二三钱，米饮下，日三服。如不止服黄芪建中汤。

附　方

柴胡桂枝汤　治伤风发热自汗，或鼻鸣干呕，或痰气上攻等症。

桂枝二钱　黄芩炒　人参　白芍药炒，各钱半　甘草炙　半夏姜制　生姜各一钱　柴胡四钱　大枣二枚

上作一剂，水煎服。

白术防风汤　治服表药过多而自汗者。

白术炒　黄芪炒，各二两　防风一两

上每服五七钱，水煎温服，未应倍之。

芪附汤方见十九卷第六论　**补中益气汤**方见二十四卷第六论　**六味丸**方见二十四卷第十一论　**当归六黄汤**方见十九卷第六论

妇人筋脉瘛疭方论第七新附

《医学纲目》云：瘛者筋脉急也。疭者筋脉缓也。急则引而缩，缓则纵而伸，或缩或伸，动而不止者，名曰瘛疭，俗谓之发搐是也。凡癫痫、风痉、破伤风三症，皆能瘛疭，但癫痫则仆地不省，风痉瘛疭则角弓反张，破伤风瘛疭则有疮口。窃谓瘛者，属肝经风热血燥，或肝火妄动血伤。疭者，属肝经血气不足，或肝火汗多亡血，以致手足伸缩不已，抽搐不利。若因风热血燥，用羚羊角散加钩藤钩、山栀，若肝火妄动用加味四物汤加钩藤钩、山栀，若肝经血气不足用八珍汤加钩藤钩、山栀，若肝火亡血用加味逍遥散加钩藤钩、山栀，如不应，须用六味丸以补肾水生肝木为主，佐以前剂治之。若其脉长弦者，是肝之本脉也，则易治。其脉短涩者，是肺金克肝木也，则难治。其面色青中见黑者，是水生木也，当自愈。青中见白者，是金克木也，必难愈。

附治验方药

一妇人素口苦，月经不调，或寒热，妊娠五月，两臂或拘急，或缓纵，此肝火伤血所致也，用四物加柴胡、山栀、丹皮、钩藤钩治之而愈。

一妊妇因怒寒热，颈项动掉，四肢抽搐，此肝火血虚风热，用加味逍遥加钩藤钩，数剂而痊。

附　方

羚羊角散方见十四卷第二论　**加味四物汤**方见二十四卷第六论　**八珍汤**　**加味逍遥散**二方见二十四卷第四论　**六味丸**方见二十四卷第十一论

妇人颤振方论第八新附

黄帝曰：人之颤者，何气使然？岐伯曰：胃气不实则诸脉虚，诸脉虚则筋脉懈堕，筋脉懈堕则行阴，用力不复故为颤，因其所在补分肉间。《医学纲目》云：颤振与瘛疭相类，瘛疭则手足牵引，而或伸或屈，颤振则但颤动而不伸屈也。胃虚有痰，用参、术以补气，茯苓、半夏以行痰。如实热积滞，用张子和三法。

愚谓颤振者，掉眩也。《易》曰：鼓万物者，莫疾乎风。鼓之为言动也。大抵掉眩，乃风木之摇运也。诸风掉眩，皆属于肝。治法若肝木实热，用泻青丸。肝木虚热，用六味丸。肺金克肝木，用泻白散。肝木虚弱，用逍遥散加参、术、钩藤钩。脾血虚弱，用六君子加芎、归、钩藤钩。胃气虚弱，用补中益气汤加钩藤钩。若产后颤振，乃气血亏损，虚火益盛而生风也，切不可以风为论，必当大补，斯无误矣。

附治验方药

一妇人性善怒发热，经水非过期则不及，肢体倦怠，饮食少思而颤振，余以为脾气不足，肝经血少而火盛也。午前以调中益气汤加茯苓、贝母送六味丸，午后以逍遥散送六味丸，两月余而愈。

一妇人身颤振，口妄言，诸药不效，余以为郁怒所致，询其故，盖为素嫌其夫，而含怒久矣，投以小柴胡汤稍可，又用加味归脾汤而愈。

附　方

海藏愈风汤　治产后一切失血过多，及汗后中风搐搦。方见十九卷第十二论

交加散　治瘛疭，或颤振，或产后不省人事，口吐痰涎。

当归　荆芥穗等分

上为细末，每服三钱，水一盏，酒少许，煎至七分，灌下咽，即有生理。

增损柴胡汤　治产后或经适断，致手足牵搐，咬牙昏冒异症。

柴胡八钱　黄芩炒，四钱　半夏炮，三钱　石膏四钱　知母二钱　黄芪炒，五钱　甘草炙，二钱

上为粗末，每服半两，姜五片，枣四枚，水煎温服。

《本事》青盐丸　治肝肾虚损，腰膝无力，颤振躄曳。

茴香末，二两　菟丝子末，四两　干山药末，二两　青盐一两

上先将菟丝子洗涤，无灰酒浸，晒七日，冬天近火煨炙干，另为细末，和匀，酒糊丸梧子大，每服五七十丸，温酒或盐汤下。常服壮筋力，进饮食。一妇人素患足躄曳，久服此药，履地如故。

《本事》星附散　治中风能言，而手足躄曳、脉虚浮而数。

天南星　半夏二味薄切片，姜汁浸透　黑附子　白附子炮　川乌炮　白僵蚕炒　没药　人参　白茯苓各等分

上为粗末，每服二钱，酒水各一盏，同煎至八分，去滓，热进三二服，汗出即瘥。在桐庐有患此症，用前药三服得汗，手足即能举物。

《三因》独活散　治气虚感风，或惊恐相乘，肝胆受邪，使上气不守正位，致头招摇，手足颤掉，渐成目昏。

独活　地骨皮　细辛　芎藭　菊花甘味者　防风去叉　甘草炙，等分

上为粗末，每服三钱，水盏半，煎至一盏，去滓，煎取清汁六分，入竹沥少许，再煎一二沸，食后温饮，日二服。

世传茯苓丸　治手臂抽牵，或战掉不能举物，服此药立愈。又治臂痛如神。方见后并

注兼治之法。

附　方

补中益气汤方见二十四卷第六论　**六味丸**方见二十四卷第十一论　**加味归脾汤**　**逍遥散**二方见二十四卷第四论　**小柴胡汤**方见二十四卷第二论

妇人风寒臂痛方论第九

妇人臂痛，或筋脉挛急，遇寒则剧者，由肝气虚弱，风寒客于经络，故其脉紧细，宜用柏子仁丸、舒筋汤。若臂痛而不能举，或痛无定处，此脾虚，邪气相搏，中脘伏痰，故其脉沉细如此，宜用茯苓丸控涎丹主之。

愚按：前症若肝血虚，用加味逍遥散。中气虚，用补中益气汤。血气俱虚，用八珍汤。风热血燥，用秦艽地黄汤。脾肾虚寒，用柏子仁丸。脾胃实热，用茯苓丸。水不能生木，用六味丸、逍遥散。怒动肝火用小柴胡加川芎、当归。眩晕晡热，用四物、柴、栀、丹皮。晡热月经不调，用加味逍遥散。食少体倦，无寐盗汗，用加味归脾汤。

附　治　验

先太宜人遍身作痛，筋骨尤甚，不能屈伸，口干目赤，头眩痰壅，胸膈不利，小便赤短，夜间殊甚，遍身作痒如虫行，此属肝肾气虚而热也，用六味地黄丸料加山栀、柴胡而愈。

柏子仁丸

柏子仁一两　熟地黄自制，二两　茯苓　枳壳去穰麸炒　覆盆子炒　五味子杵炒　附子炮　石斛酒蒸炒　鹿茸酥炙　酸枣仁炒　桂心　沉香　黄芪各一两，蜜水炙。一方等分

上为末，炼蜜丸桐子大。每服三十丸，空心温酒下。

舒筋汤　治风寒所伤，肩臂作痛，及腰下作痛，又名五痹汤。

片姜黄一钱　甘草炒　羌活各三分　白术　海桐皮　当归　赤芍药各五分

上水煎服。

茯苓丸　治脾气虚弱，痰邪相搏，停伏中脘，以致臂内筋脉挛急而痛。

茯苓二两　半夏姜制，二两　枳壳半两，制　风化朴硝一两

上为末，姜汁糊丸桐子大，每服二十丸，食后姜汤下。

控涎丹　凡人忽胸背手足头项腰胯牵痛不定，或头痛昏倦，痰唾稠粘，喉中锯声，手脚重痹，此痰涎伏于胸膈也，宜此治之。

甘遂去心　大戟去皮　真白芥子各等分

上为末，糊丸桐子大。临卧姜汤下五七丸，痰盛服十丸。

白芥子散　治臂痛牵引背脾，或辍或作。由荣卫循行失度，痰滞经络，或似瘫痪。

真白芥子　木鳖子各三两，麸炒　没药另研　桂心　木香各半两

上为末，每服一钱，温酒下。

愚按：前三方脾气虚弱者，必佐以六君子汤。中气虚弱者，必佐以补中益气汤。血虚者，必佐以八珍汤。脾气郁滞者，必佐以归脾汤。肝经怒气者，必佐以逍遥散。若专用前方治之，胃气虚弱，病气益甚，不可不谨。

流气饮　治七情气滞，胸胁闷痞，咽喉不利，呕喘面浮，二便不调，或气攻肩背，胁肋作痛，或脚气喘急，腹胀便闭，元气充实者，宜用此药慎之。

紫苏叶　黄芪炒　青皮去白　当归　半夏姜制　乌药　芍药炒　茯苓　桔梗　防风各五钱　川芎　陈皮各七钱五分　枳实麸炒　木香二钱五分　甘草炙，五分　大腹子一两，姜制

上每服半两，姜枣水煎服。

交加散方见前

四物汤　治血滞中风血虚，手足不遂。如臂痛，加红花煎。方见前

交加散加木瓜、牛膝，治冷痹肩臂作痛即人参败毒和五积散。

乌药顺气散加羌活、木瓜，治外邪气滞，筋骨作痛，或痰气不利。

附　方

秦艽地黄汤　治肝胆经风热血燥，肩臂疼痛，或筋脉引急，或时牵痛，其内症发热，或寒热晡热，月经不调，或肢体酸痛等症。

秦艽　熟地黄自制　当归各一钱　川芎　芍药　牡丹皮　白术　茯苓各一钱半　钩藤钩一钱　柴胡　甘草炙，各二分

水煎服。

逍遥散　加味逍遥散　加味归脾汤　八珍汤四方见二十四卷第四论　**六味丸**方见二十四卷第十一论　**小柴胡汤**方见二十四卷第二论　**四物汤　补中益气汤**二方见二十四卷第六论

妇人贼风偏枯方论第十

论曰：贼风偏枯，其状半身不遂，肌肉枯瘦，骨间作痛。经云：汗出偏枯，如树木一枝，津液不到则枯槁，被风所害。古人有云：医风先医血，血行风自灭，治法当用大八风汤、增损茵芋酒、续断汤以养其血，则风自祛矣。

愚按：医风先医血，此论得之，大抵此症多因胎前产后，失于调养，以致精血干涸，肝木枯槁，治法当滋其化源。考之生气通天论曰：风客淫气，精乃亡，邪伤肝也。阴阳象大论曰：风气通于肝，风搏则热盛，热盛则水干，水干则气不荣，故精乃亡。此风病之所由作也。

附　治　验

一妇人性善怒，常自汗，月经先期，余以为肝火血热，不信，乃泛用降火之剂，反致月经过期，复因劳怒，口噤呻吟，肢体不遂，六脉洪大，面目赤色，用八珍、麦门、五味、山栀、丹皮，数剂渐愈，兼用逍遥散、六味丸各三十余剂全愈。

大八风汤　治中风偏枯，失音不语，时复恍惚，或昏愦发热。

当归　杏仁去皮尖，麸炒黄　甘草炒　桂心　干姜炮，各二两　五味子炒　升麻各二两　川乌炮，去皮尖　黄芩炒　芍药炒　独活　防风　川芎　麻黄去节　秦艽　石斛去根，酒浸　茯神去木　石膏　黄芪炒　紫菀各一两　大豆三两，去皮尖　人参一两

上每服五钱，水煎服。

续断汤

当归三两　陈皮　芍药炒　细辛各一两　生地黄二两　续断酒浸，炒

上每服五七钱，水煎。脏寒下痢加熟附子一两。

《全生》虎骨散　治半身不遂，肌肉干瘦。忌用麻黄发汗，恐津液枯竭，惟当润筋养血消风。

当归二两　赤芍药　续断酒浸，炒　白术蕲本　虎骨炙，各五两　乌蛇肉炙，半两

上为末，每服二钱，酒调。骨痛加生地一两，自利加天雄半两。

虎胫骨酒　治中风偏枯，四肢不随，一切风痹，筋脉挛拳。

石斛　石楠叶　防风　虎胫骨炙　当归　茵芋叶　杜仲炒　牛膝酒浸，炒　续断酒浸，炒　芎藭　巴戟去心　狗脊各一两

上以绢囊盛药，用酒一斗，浸十日，每服一盏，温饮。

附　方

八珍汤　逍遥散二方见二十四卷第四论　**六味丸**方见二十四卷第十一论

妇人偏风口喎方论第十一

论曰：偏风口喎者，因体虚受风，而入足阳明胃经。盖足阳明之经，上夹於于口，风乘之，其筋偏急故也。

愚按：前症当参本卷首论治之。

附　治　验方药与前诸治验参看

一妇人怀抱郁结，筋挛骨痛，喉间似有一核，服乌药顺气等药，口眼歪斜，臂难伸举，痰涎愈多，内热晡热，食少体倦。余以为郁火伤脾，血燥生风，用加味归脾汤二十剂，形体渐

健，饮食渐进。又用加味逍遥散十余剂，痰热少退，喉核少消。更用升阳益胃汤数剂，诸症渐愈，但臂不能伸，此肝经血少而筋挛耳，用六味地黄丸以滋肾水生肝血而愈。

附　方

升阳益胃汤　治脾胃虚弱，肢体怠惰，或体重节痛，口舌干渴，饮食无味，大便不调，小便频数，饮食不消，兼见肺病，洒淅恶寒，凄惨不乐，乃阳气不和也。

羌活　独活　防风各五钱　柴胡　白术　茯苓渴者不用　泽泻各三钱　人参　黄连炒　陈皮各四钱

上每服三五钱，姜枣水煎，早温服。如小便愈而病益加，是不宜利小便也，当少减茯苓、泽泻。

加味归脾汤　**加味逍遥散**二方见二十四卷第四论　**六味丸**方见二十四卷第十一论

妇人怔忡惊悸方论第十二

夫心藏神，为诸脏之主，血气调和，则心神安静。若劳伤心血，外邪乘袭，则心神惊悸恍惚，忧惧不安，用排风汤治之。

愚按：丹溪先生云：惊悸者血虚，用朱砂安神丸；痰迷心窍，用定志丸；怔忡者，属火属痰；思虑便动者，属虚；时作时止者，火动也。假如病因惊而致，惊则神出其舍，痰乘而入矣。盖人之所主者心，心之所养者血，心血一虚，神气不守，此惊悸之所由作也，治当调养心血，和平心气而已。金氏妇暑月赴筵，因坐次失序，自愧成疾，言语失伦，两脉弦数。余曰：当补脾导痰清热。不信，以数巫者，喷水咒之而死。或谓病既无邪，以邪治之，何至于死。余曰：暑月赴筵，外受蒸热，辛辣适口，内伤郁热，而况旧有积痰，加之愧闷，其痰愈盛。又惊以法尺，益惊其神，而气血不宁，喷以注水，闭其肌肤，而汗不得泄，内燔则阴既消而阳不能独立，不死何待。故滑伯仁先生云：若胆气虚寒，用茯神汤；胆气实热，用酸枣仁丸；心气虚热，用定志膏、茯苓补心汤；心气实热，用朱砂安神丸、茯苓散。

附　治　验

文学归云桥内，月事不及期，忽崩血昏愦，发热不寐。或谓血热妄行，投以寒剂，益甚。或谓胎成受伤，投以止血亦不效。余曰：此脾气虚弱，无以统摄故耳，法当补脾而血自止。用补中益气加炮姜，不数剂而效，惟终夜少寐惊悸，别服八物汤，不效。余曰：杂矣。乃与归脾汤加炮姜以补心脾，遂如初。

一妇人劳则心跳怔忡，寒热往来，用归脾汤为主，佐以八珍汤，诸症渐愈。又用加味逍遥散、宁志丸而安。后复作，服归脾、定志二药即愈。

一妇人患惊悸怔忡，日晡发热，月经过期，饮食少思，用八珍汤加远志、山药、酸枣仁，三十余剂渐愈，佐以归脾汤全愈。后因劳发热，食少体倦，用补中益气汤。又因怒，适月经去血不止，前症复作，先以加味逍遥散，热退经止，又用养心汤治之而痊。

一妇人惊悸怔忡无寐，自汗盗汗，饮食不甘，怠惰嗜卧，用归脾汤而愈。至年余，怀抱郁结，患前症，兼衄血便血，仍用前汤而愈。

茯神散　治五脏气血虚弱，惊悸怔忡，宜用此安神定志。

茯神去木　人参　龙齿方研　独活　酸枣仁炒，各三钱　防风　远志去心　桂心　细辛　白薇炒，各三钱　干姜炮，各三两

上为末，每服四五钱，水煎服，或蜜为丸服。

茯苓补心汤　治心气不足，善悲愁怒，衄血面黄，五心烦热，或咽喉痛，舌本作强。

茯苓四两　桂心　甘草炒，各三两　紫石英煅　人参各一两　大枣二十枚　麦门冬去心，三两　赤小豆二十四粒

上水七升，煎二升半，分三服。

茯神汤　治胆气虚冷，头痛目眩，心神恐畏，不能独处，胸中烦闷。

茯神去木　酸枣仁炒　黄芪炒　柏子仁炒　白芍药炒　五味子杵炒，各一两　桂心　熟地黄自制　人参　甘草炒，各半两

上每服五钱，姜水煎。

酸枣仁丸　治胆气实热，不得睡卧，神思不安，惊悸怔忡。

茯神去木　酸枣仁炒　远志去心　柏子仁炒　防风各一两　枳壳麸炒，半两　生地黄杵膏，半两青竹茹二钱五分

上为末，炼蜜丸桐子大，每服七八十丸，滚汤下。

定志丸　治神虚心怯，所患同前，或语言鬼怪，喜笑惊悸。

人参　茯苓各一两五钱　菖蒲　远志去心，各一两

上为末，蜜丸，如前服。

养心汤　治心血虚，惊悸怔忡不宁，或盗汗无寐，发热烦躁。

黄芪炒　白茯苓　茯神去木　半夏曲　当归酒拌　川芎各半两　辣桂去皮　柏子仁　酸枣仁炒　五味子杵炒　人参各三钱　甘草炙，四钱

上每服三五钱，姜枣水煎。

朱砂安神丸　治心经血虚头晕，心神惊悸等症。

朱砂飞过，五钱　黄连酒洗，六钱　甘草炙，五分　生地黄　当归各一钱五分

上为末，饭糊为丸，每服十五丸。如一二服不应，当服归脾汤补之。

《治要》茯苓散　治心经实热，口干烦渴，眠卧不安，或心神恍惚。

麦门冬　茯神各一两半　通草　升麻各一两二钱半　赤石脂一两七钱五分　知母一两　大枣十二枚　紫菀　桂心各七钱五分　淡竹茹五钱

每服一两，水煎。

补中益气汤方见二十四卷第六论　**归脾汤**　**八珍汤**　**加味逍遥散**三方见二十四卷第十论　**宁志丸**方见后

妇人失血心神不安方第十三原无论

窃谓前症若脾肝郁热，用加味逍遥散；脾肝郁结，用加味归脾汤；脾胃虚弱，气血不足，用八珍汤、十全大补汤；脾肺虚弱，气血不足，用补中益气汤、六君子汤；痰气郁滞，用六君、桔梗、贝母。如不应，审系气虚，但补脾胃，如不应，用独参汤。如恶寒发热，属气血俱虚；内热晡热，属血虚；作渴面赤，是血脱烦躁；皆宜甘苦之剂，以补阳气而生阴血。经云：血脱补气。若用寒凉之剂以降火则误矣，仍审所属之因而治之。

宁志膏　治失血心神不安，言语失常，不得安睡等症。

辰砂另研　酸枣仁炒　人参　白茯苓　琥珀另研，各五分　滴乳香一钱，研

上为末，每服一钱，煎枣汤，空心调下。

附　方

妙香散　治心气不足，精神恍惚。虚烦少睡盗汗等症。

甘草炒，五钱　远志去心炒，一两　辰砂别研，二钱　麝香一钱，另研　山药姜汁炙，一两　人参五钱　木香煨二钱五分　茯苓　茯神去木　黄芪各一两　桔梗五钱

上为末，每服二钱，温酒调。

茯神汤方见前

温胆汤　治胆虚痰热，惊悸不眠。

半夏　竹茹　枳实麸炒，各一两　陈皮　生姜四两　甘草炒，三两

上每服一两，水煎。

半夏汤　治胆腑实热，精神恍惚，寒热泄泻，或寝汗憎风，善太息。

半夏一钱五分　黄芩一钱　远志一钱　生地黄二钱　秫米一合　酸枣仁炒，三钱　缩砂一钱五分

上长流水煎服。

独参汤　治元气虚弱，恶寒发热；或作渴烦躁，痰喘气促，或气虚卒中，不语口噤；或痰

涎上涌，手足逆冷；或难产产后，不省喘急。用好人参二两，或三四两，炮姜五钱，一剂水煎，徐徐服。盖人参性寒，故姜佐之，如不应，急加炮附子。

加味逍遥散　**加味归脾汤**　**八珍汤**　**十全大补汤**四方见二十四卷第四论　**补中益气汤**　**六君子汤**二方见二十四卷第六论

妇人风邪颠狂方论第十四

妇人颠狂，由血气虚而风邪所乘，若邪并于阴则发狂，邪并于阳则发颠。夫颠者卒发而意不乐，直视仆地，吐涌涎沫，口喎目急，手足撩戾，无所知觉，良久而苏。狂者，少卧不饥，自高贤，自辩智，自贵倨，妄笑歌乐，妄行不休。《素问》云：阳厥狂怒，饮以铁落。狂怒出于肝，肝属木，铁落金也，以金制木之意。

一妇人眼见鬼物，言语失当，循衣直视，或作心病治之，无效，投养正丹二服，煎乳香，送三生饮立痊。养正丹三生饮方见本卷第一论

愚按：前症刘宗厚先生云：有在母腹中受惊者，或有闻大惊而得者，盖惊则神不守舍，舍空则痰涎归之，或饮食失节，胃气有伤，痰停胸膈而作，当寻火寻痰固元气。若顽痰胶固上膈，必先用吐法。若在肠胃，亦须下之。

窃谓此症若因元气虚弱，或痰盛发热等，皆是虚象。如慢惊症无风可祛，无痰可逐，但补脾胃，生气健旺，神智自清，痰涎自化。若误用辛散祛逐脑麝之剂，必为败症。

附　治　验

一妇人素清苦，因惊而癫，或用风痰等药愈甚，余用参、芪、归、术浓煎，佐以姜汁、竹沥三斤余，方愈。仍参十八、十九卷狂言谵语乍见鬼神方

防风茯神散　治风颠啼泣歌笑，或心神恐惧，或语言失常。

防风　茯神去木　独活　人参　远志去心　龙齿　菖蒲去毛　石膏　牡蛎煅，各一两　秦艽　禹余粮煅　桂心各五钱　甘草炒，三分　蛇蜕一条，炙

上每服五钱，水煎服。

排风汤

牛黄清心丸　治诸风缓纵不随，言语蹇涩，痰涎壅盛，怔忡健忘，或发癫狂。二方见本卷首论

妇人飞尸血厥方论第十五

夫飞尸者，游走皮肤，穿行脏腑，每发刺痛，变作无常。遁尸者，附骨入肉，攻通血脉，见尸丧，闻哀哭便发。风尸者，淫濯四肢，痛而昏沉，得风雪便作。沉尸者，缠骨结脏，内肿心胁，发而绞痛，遇寒冷便作。注尸者，举身沉重，精神错杂，时觉昏愦，每至节气便作，并宜苏合香丸治之。

愚按：丹溪云：凡人忽手足逆冷，肌肤起如米粒，头面青黑，精神恍惚，或错言妄误，或牙关紧急，或昏寐仆倒，吊死问丧，入庙登墓，多有此病，先以苏合香丸灌之，次服调气散、平胃散。《玉机微义》云：卒厥飞尸，客忤鬼击，口噤，用麻黄汤。寒厥表热里寒，则下利清谷，食入则吐，脉沉，手足冷，用四逆汤。热厥腹满，身重难转，面垢，谵语遗溺，手足厥冷，自汗，脉沉滑，用白虎汤。若人身忽然不动，目闭口噤，恶闻声音，眩冒，顷时方寤。此由出汗过多，气并于血，阳独上而不下，气壅塞而不行耳，气过血还，阴阳复通，移时方寤，名曰郁冒，亦名血厥，宜服白薇汤、仓公散。

附　治　验

锦衣杨永兴，举家避雷，有仆沉醉失避者，既而神思昏昧，遍身青伤，急煎金银藤汤灌之，即愈。

一妇人忽昏愦发谵语，自云为前谋赖某人银两，某神责我，将你起解，往城隍理问，两脚踝膝臀处皆青肿，痛不可忍，口称苦楚，次日方苏，痛尚不止，用金银藤两许，水煎服即愈。

一妇人入古墓患前症，以紫金锭灌之即苏。通政余子华、太常汪用之，皆因往吊而卒

死丧家，想即是症。

苏合香丸方见本卷第四论

白薇汤

白薇　当归各一两　人参　甘草一钱

上每服五钱，水煎。

仓公散　治卒中鬼击，心腹如刺，下血不省，及卧魇啮脚指不觉，并诸毒等症。

皂荚　黎芦　雄黄研　矾石煅研，各等分

上每用少许，吹入鼻中，未嚏再吹，以得嚏为度。

内鼻散　治尸厥脉动，静而若死，用石菖蒲末吹鼻中，仍以桂尖安于舌上。苏合香丸亦可

硫黄散　治尸厥不省，四肢逆冷，腹中如雷鸣，或痰气不降。

焰硝半两　硫黄一两，各另为细末

上每服三分，酒调灌之，良久再服即苏。

附　方

麻黄汤　治寒厥或伤寒，恶风发热，身疼无汗者。

麻黄六钱　桂枝四钱　甘草炙，二钱　杏仁二十一枚，炒

上作一剂，水煎服。

调气散　治气厥不省，或痰气上壅，及治气滞胸膈不利。

白豆蔻　丁香　檀香　水香各二钱　藿香　甘草炙，各六钱　砂仁四钱

上为末，每服二钱，入盐少许，沸汤调下。

四逆汤　白虎汤二方见七卷第二论

神仙追毒丸又名紫金锭，又名太乙丹，又名神仙解毒万病丸　能解一切毒，或狐狸、莽草、毒菌、河鲀、疫死牛马肉毒，或蛇犬恶虫所伤，及鬼怪恶疮等毒，或二广断肠草蛇毒化菌等毒。

文蛤即五倍子，杵破洗焙为末，三两　山茨菇去皮净末，二两　麝香二钱，另研　千金子一名续随子，去壳研去油，一两　红牙大戟去芦为末，一两半

上用糯米浓饮，和作四十粒，用井华水，或薄荷汤磨服，利一两次，用粥止之。修合须端午、七夕、重阳，或天德、月德日，于净室焚香修制，效验不能具述，宜珍藏之。凡人居家出入，不可无此药。岭外有妇与旅合阴以定年，药置食中，且戒之曰予几时来，果从其言，彼复以药解之，可无恙。若过期不往，必死。若遇此毒，及前一应诸毒，服前药一粒，或吐或下即愈。昔有女子劳瘵为尸虫所噬，磨服一粒，吐下小虫，更服苏合香丸遂愈。若菌蕈、菰子，砒石，时行瘟疫，山岚瘴气，自缢溺水，打折伤死，瘀血内滞，心头微温，用姜汤磨灌一粒可苏。其急喉闭，缠喉风，脾肿赤眼，痈疽发背诸疮，汤火所伤，用东流水磨涂并服。颠邪鬼气鬼胎，暖酒磨服。余谓喉闭以下诸症，果能灼见，形病俱实，乃可用之。

校注妇人良方　卷四

宋　临川　陈自明良甫编辑
明　古吴　薛　己立斋补注
鄞县　曹赤电炳章圈校

妇人血风肢体骨节疼痛方论第一

妇人血风，由气血不足，腠理不密，风冷乘之，以致邪正相搏，故骨节疼痛，肢体发热，口舌咽干。

愚按：东垣先生云：饮食失节，脾胃虚弱，乃血所生病，故口中津液不行。若火热来乘土位，故肢体发热作渴，若肝经血热，用四物、羌活、黄芩、黄柏。肝经血虚，用逍遥散、山栀、川芎。风湿兼痰，用四物、南星、半夏、羌活、苍术。风湿伤脾，用羌活胜湿汤。暑湿伤气，用清燥汤。气郁肝脾，用四君、木香、枳壳、槟榔。胃气受伤，用补中益气汤。瘀血流注，用四物、桃仁、红花。骨痛筋挛，用当归、没药。倦怠无力，用补中益气、羌活、川芎。

附　治　验

一妇人自汗盗汗，发热晡热，体倦少食，月经不调，吐痰甚多。二年后，遍身作痛，阴雨益甚。此气虚而风寒所乘，用小续命汤，疼痛顿止。用补中益气、加味归脾三十余剂，诸症悉愈。

一妇人月经不调，且素有痛风，过劳必作，用众手重按，痛稍止，此气血俱虚，用十全大补加独活而痛痊，用六味丸、逍遥散而经调。

一妇人肢体作痛，面色痿黄，时或赤白，发热恶寒，吐泻食少，腹痛胁胀，月经不时，或如崩漏，或痰盛喘嗽，头目眩痛，或五心烦热，口渴饮汤，或健忘惊悸，盗汗无寐等症，卧床年许，悉属肝脾亏损，气血不足所致，用十全大补、加味归脾，兼服月余诸症悉痊。

芎藭散

川芎一钱　赤茯苓　赤芍药　酸枣仁炒　桂心　当归酒洗　木香　牛膝酒洗　羌活　枳壳炒　甘草各三分

上水煎服。

羚羊角散　治血气身体疼痛，手足无力。

羚羊角镑　酸枣仁炒　生地黄　槟榔各一两半　五加皮　防风　赤芍药　当归酒洗　骨碎补炒　海桐皮　川芎各五钱　甘草三钱

上为末，每服二钱，温酒调下。

通灵丸　治血风手足疼痛，不可忍者。

白附子　僵蚕各一两，炒去丝　全蝎半两，炒　麝香一字

上为末，炼蜜丸桐子大，每服十丸，温酒下，日三服。

当归没药丸　治血风肢体刺痛，筋挛骨痹，或手足麻木。

当归　五灵脂各一两，炒　没药半两

上为末，醋糊丸桐子大，每服三十丸，姜汤下。

虎骨散　治血风走痛，或打扑作痛。

虎骨酥炙　败龟板酥炙　当归酒洗　桂心　牛膝酒洗　漏芦　地龙去土　威灵仙　玄胡索炒　自然铜制等分

上为末，每服二钱，热酒调下。

附　方

羌活胜湿汤　治头痛脊痛，腰似折，项似拔。

羌活　独活各一钱　藁本　防风　甘草炙，各半钱　蔓荆子　川芎各二分

上水煎服。如身重腰沉沉然，是湿热也，加黄柏一钱，附子半钱，白术二钱。

东垣清燥汤方见后　**四物汤**　**补中益气汤**　**四君子汤**三方见二十四卷第六论　**小续命汤**方见十九卷第八论　**逍遥散**　**加味归脾汤**　**十全大补汤**三方见二十四卷第四论　**六味丸**方见二十四卷第十一论

妇人血风白虎历节走痃方论第二

妇人血风，白虎历节，由体虚风邪乘之，随血而行，或淫溢皮肤，或卒然掣痛走痃，如虎啮者，加减小续命汤主之。

愚按：东垣云：若人身体沉重，走痃疼痛，此湿热相搏，或风热郁而不得伸，附着于有形也。是症多因饮食起居失节，或因七情劳役失宜，脾胃亏损，腠理不密，外邪所侵，以致内热晡热，自汗盗汗，或经候不调，饮食不甘。治法：湿热肿痛者，清燥汤；兼痰，佐以二陈汤；肝火作痛者，加味逍遥散；脾郁作痛者，加味归脾汤；血虚作痛者，四物汤；气虚作痛者，四君子汤；气血俱虚者，八珍汤；俱加羌活、川芎。月经先期而痛者，加味逍遥散；头眩倦怠而痛者，补中益气汤。大抵按之痛甚者病气实，按之痛缓者元气虚，劳役而痛者亦元气虚也，饮食失宜而痛者脾气虚也，恼怒而痛者肝火盛也，若昼轻而夜重者血分病也。与前兼用

附　治　验

一妇人历节，发热作渴，饮食少思，月经过期，其脉举之洪大，按之微细，用附子八物，四剂而痛止，用加味逍遥而元气复，用六味丸而月经调。

一妇人体肥胖，素有热，月经先期，患痛风，下体微肿，痛甚则小便频数，身重脉缓，此风湿血虚而有热，用羌活胜湿汤二剂，肿痛渐愈。用清燥汤数剂，小便渐清。用加味逍遥散，内热渐愈。又为饮食停滞，发热仍痛，面目浮肿，用六君加柴胡、升麻而愈。又因怒气，小腹痞闷，寒热呕吐，用前药加山栀、木香而安，惟小腹下坠，似欲去后，此脾气下陷，用补中益气而愈。后因劳役怒气，作呕吐痰，遍身肿痛，经行寒热，此肝木侮脾土，用六君加柴胡、山栀，肿痛呕吐悉退，后用补中益气而安。

一妇人饮食少思，畏风寒，患痛风，呕吐寒热，脉弦紧，用附子八物而四肢痛愈，用独活、寄生而腰痛渐痊，惟两膝肿痛，用大防风汤而痛渐愈，用归脾、逍遥而元气复。

漏芦散　治走痃疼痛。

漏芦　当归酒洗　牛膝各三钱　桂心　地龙去土　防风　羌活　白芷　没药　甜瓜子各半两　虎胫骨　败龟板各炙酥，一两

上为末，每服二钱，热酒调下。

四生丸　治骨节作痛，或浑身麻痹。

白僵蚕炒去丝　地龙去土　白附子　五灵脂　草乌去皮尖，各等分

上为末，米糊丸桐子大，每服二十丸，茶清送下，酒调服亦可。

麝香丸　治历节诸风走痛，或如虫行。

大川乌三个，去皮尖，生用　全蝎二十一个　黑豆二十一粒　地龙去土，五钱　麝香一字

上为末，米糊丸绿豆大，每服十丸，温酒下。许学士云：予得此方，凡历节及不测疼痛，一二服便瘥。治一贵妇，遍身走痛，夜如虫啮。三服而愈。

附子八物汤　治历节痛如锤锻。

附子炮　干姜炮　芍药炒　茯苓　人参　甘草　桂心各五分　白术一钱五分

上水煎服。一方去桂，用熟地黄二钱。

独活寄生汤方见后　**小续命汤**方见后

一妇人两踝作痛，上行膝髀肩肘，痛如

锤锻，至夜尤剧，六脉皆紧，一剂而愈。又邓安人，夏月患此，人迎脉虚，此因暑而得，用酒蒸黄连丸，一服亦安。

附　方

东垣清燥汤　治元气虚，湿热乘之，遍身酸软，或肺金受邪，绝寒水生化之源，肾无所养，小便赤少，大便不调，腿腰痿软，或口干作渴，体重麻木，头目眩晕，饮食少思，或自汗盗汗，肢体倦怠，胸满气促。

黄芪一钱五分　五味子九粒，杵炒　黄连炒　神曲炒　猪苓　柴胡　甘草炙，五分　苍术　白术炒　麦门冬去皮　陈皮炒　生地黄　泽泻各五分　白茯苓　人参　当归酒洗　升麻各三分　黄柏酒拌，一分

上水煎服。

二陈汤方见二十四卷第五论　**八珍汤**　**加味逍遥散**　**加味归脾汤**三方见二十四卷第四论　**四物汤**　**四君子汤**　**六君子汤**　**补中益气汤**四方见二十四卷第六论　**六味丸**方见二十四卷第十一论　**羌活胜湿汤**方见前　**大防风汤**方见二十四卷第九论

妇人血风瘾疹瘙痒方论第三

妇人瘙痒瘾疹，五心烦热，乃血风攻注，用人参荆芥散、消风散、逍遥散。大抵因体虚风寒相搏，赤属血分，白属气分也。经云：汗出见湿，乃生痤痱。凡人汗出不可露卧沐浴，使人身振寒热，致生风疹也。

愚按：前症有身发疙瘩，或如丹毒，痒痛不常，或脓水淋漓，发热烦渴，或头目昏眩，日晡益甚，或寒热发热，月经不调，皆肝经风热血燥，用加味逍遥散为主，佐以四君、芎、归。若忿怒身发疙瘩，痛疼寒热，乃肝火血燥，用加味小柴胡汤。气血俱虚，八珍加柴胡、丹皮。若夜间发热，作渴谵语，乃热入血室，用小柴胡加生地。血虚，四物合小柴胡，后用加味逍遥散调理。若郁结食少体倦，内热晡热，乃脾经血燥，用加味归脾汤。寒热，加山栀、熟地。若游走瘙痒，乃血风走注，用何首乌散。血虚，逍遥散。风热，消风散。若专用风药，复伤阴血，必致筋挛等症。

附　治　验

一妇人身发疙瘩，或如丹毒，痒痛不常，搔碎成疮，脓水淋漓，发热烦渴，头目眩晕，日晡益甚，此血虚内热之症，以当归饮加柴胡、山栀治之而愈。

一妇人患前症，肢体疼痛，头目不清，自汗盗汗，月水不调，肚腹作痛，食少倦怠，先用人参荆芥散，后用逍遥散，治之而痊。

一妇人因忿怒，身发疙瘩，憎寒发热，余谓肝火，用小柴胡汤加山栀、黄连治之而愈。后口苦胁痛，小便淋漓，复用前药全愈。

一妇人患前症发热，夜间谵语，此血分有热，以小柴胡汤加生地治之而安。后用四物汤加柴胡、山栀、丹皮而热退，又用逍遥散全愈。

一室女十四岁，天癸未至，身发赤斑痒痛，左关脉弦数，此因肝火血热，以小柴胡汤加山栀、生地、丹皮治之而愈。若因怒而致者，亦宜治以前药。治验余见二十四卷血风门

何首乌散　治皮肤瘙痒游走无定。

何首乌　防风　白蒺藜炒　枳壳麸炒　天麻　僵蚕　胡麻炒　苍耳子　蔓荆子各一钱　茵陈五分

上水煎服。

附　方

四物汤　**四君子汤**二方见二十四卷第六论　**加味小柴胡汤**　**小柴胡汤**二方见二十四卷第二论　**八珍汤**　**加味归脾汤**　**加味逍遥散**　**逍遥散**四方见二十四卷第四论　**消风散**方见二十四卷第七论　**当归饮**方见二十四卷第六论　**人参荆芥散**方见五卷第三论

妇人虚风头目眩晕方论第四

妇人头眩，由气虚风人于脑，循脉引于

目系，目系急而然也，邪甚则必癫。《素问》云：头痛癫疾，下虚上实，过在足少阴巨阳，甚则入肾，徇蒙招摇，目眩耳聋；下实上虚，过在足少阳厥阴，甚则在肝。下虚者肾虚也。故肾厥则头痛，上虚者肝虚也，故肝虚则晕。徇蒙者，如以物蒙其首，招摇不定，目眩耳聋，皆晕之状。故肝厥头痛不同也。

愚按：丹溪先生云：眩者言其黑运旋转，其状目闭眼昏，身转耳聋，如立舟船之上，起则欲倒。盖虚极乘寒得之，亦不可一途而取轨也。若风则有汗，寒则掣痛，暑则热闷，湿则重滞，此四气乘虚而眩运也。若郁结生痰而眩晕者，此七情虚火上逆也。若淫欲过度而眩晕者，此肾虚气不归源也。若吐衄漏崩而眩晕，此肝虚不能摄血也。有早起眩晕，须臾自定者，元气虚也，正元饮下黑锡丹。伤湿头运，用肾着汤加川芎；有痰，用青州白丸子。头风，风热也，久则目昏。偏头风，相火也，久则目紧便涩。皆宜出血以开表之。窃谓前症肝虚头晕，用钩藤散。肾虚头晕，六味丸。头晕吐痰，养正丹，不应，八味丸。血虚，四物、参、芩、白术，不应，当归补血汤。气虚，四君、归芪，不应，益气汤。肝木实，泻青丸，虚，用地黄丸，不应，川芎散。脾气虚，二陈、参、术、柴胡、升麻，不应，益气汤加茯苓、半夏。脾胃有痰，半夏白术天麻汤。风痰上壅，四神散。发热恶寒，八物汤。七情气逆，四七汤。伤湿而晕，除湿汤。

附　治　验

一妇人素头晕，不时而作，月经迟而少，此中气虚弱，不能上升而头晕，不能下化而经少，用补中益气汤而愈。后因劳仆地，月经如涌，此劳伤火动，用前汤加五味子，一剂而愈。前症虽云气无所附，实因脾气亏损耳。

一妇人内热口干，劳则头晕，吐痰带下。详见六卷第十六论。

养正丹　治虚风头眩，吐涎不已，盖此药升降阴阳，补接真气，非止头眩而已。

黑铅　水银　硫黄研　朱砂各一两，研

上用砂器熔铅，下水银搅匀，离火少时，入硫砂再搅，候冷为末，饭丸绿豆大，每服三十丸，空心、食前枣汤下。

钩藤散　治肝厥头晕。

钩藤钩　陈皮炒　半夏姜制　麦门冬去心　茯苓　茯神去木　人参去芦　甘菊花　防风各一钱　甘草炙，三分　石膏煨，二钱

上姜水煎。

川芎散　治肝肾虚风，头目眩晕，或头痛耳鸣，目系紧急。

小川芎　山药　白茯神　甘菊花野菊不用　人参各半两　山茱萸肉一两

七为末，每服二钱，酒调，日三服。

三五七散　治八风五痹，肢体不仁，或风寒入脑，头痛目旋，耳内蝉鸣。

附子炮　细辛各三两　山茱萸　干姜炮开，各五两　防风　山药炒，各七两

上为末，每服二钱，温酒调。

四神散　治血风眩晕，头痛寒热唾痰。

菊花　当归酒洗　旋覆花去梗叶　荆芥穗各一钱

上葱白三寸，茶末一钱，水煎。

附方　治血风头旋，或不知人事，用喝起草嫩心阴干为末，酒服二钱，其功甚效。即前苍耳散。

治头旋如天动地转，名曰心眩，胆矾一两细研，用面饼剂一个拌匀，勒如骰子大，瓦上焙干，每服一骰为末，灯心、竹茹煎汤调下，此去痰之法，当审而用之。

附　方

正元饮　治下元虚败，痰气上涌，头目眩晕，脏腑滑泄，时或自汗，手足逆冷，霍乱转筋等症。

红豆炒，二钱　人参去芦，二两　附子炮，去皮尖，一两　茯苓　甘草炙，各一两　肉桂五钱

川芎　山药姜汁炒　乌药　干葛各一两　白术二两　干姜炮，二钱　黄芪炙，一两半

上每服三钱，姜枣水入盐少许，煎送黑锡丹。

黑锡丹　治真阳虚败，痰气壅塞，心火炎炽，或赤白带下等症。

肉桂　沉香　附子炮去皮脐　葫芦巴酒浸炒　破故纸炒　茴香炒　肉豆蔻面裹炒　阳起石研，水飞　金铃子蒸去皮核　木香各一两　硫黄　黑锡去灰，各二两

上将黑锡、硫黄入铫内，炼结砂子，倾出地上，去火毒，研细，余药为末和匀，再研至黑光色，酒糊丸桐子大，阴干入布袋擦令光润，每服四十丸。

肾着汤方见十五卷第八论　**青州白丸子**方见三卷第四论　**六味丸**　**八味丸**二方见二十四卷第十一论　**当归补血汤**方见十九卷第六论　**四物汤**　**四君子汤**　**补中益气汤**三方见二十四卷第六论　**二陈汤**方见二十四卷第五论　**泻青丸**方见二十四卷第三论　**八物汤**方见二十四卷第四论　**四七汤**方见十二卷第七论　**除湿汤**即肾着汤加川芎　**半夏白术天麻汤**方见四卷第五论

妇人血风头痛方论第五

许学士云：妇人患头风者，十居其半，每发必掉眩，如在车船之上，盖因肝经血虚，而风邪袭之尔，用川芎当归散。若头痛连齿，时发时止，连年不已，此风中脑，谓之厥逆头痛，宜白附子散，及灸曲鬓穴，在耳掩前正尖上，灸七壮，左痛灸左，右痛灸右。

愚按：东垣云：足太阳头痛，脉浮紧，恶风寒，川芎、羌活、独活、麻黄为主。手少阳经头痛，脉弦细，往来寒热，柴胡为主。足阳明头痛，身热，目疼鼻干，恶寒发热，脉浮缓而长，升麻汤，或石膏、白芷为主。手太阳头痛，有痰体重，或腹痛，为痰癖，脉沉缓，苍术、半夏、南星为主。足少阴经头痛，足寒气逆，为寒厥，脉沉细，麻黄附子细辛汤为主。足厥阴头项痛，或吐涎沫，厥冷，脉浮缓，吴茱萸汤主之。诸血虚头痛，当归、川芎为主。诸气虚头痛，人参、黄芪为主。气血俱虚头痛，调中益气，少加川芎、蔓荆、细辛。偏头痛，半夏白术天麻汤。厥逆头痛，羌活附子汤。如湿气在头者，以苦吐之，不可执方而治。若脉杂乱而病见不一，且补胃为主。

附　治　验

一妇人因劳耳鸣，头痛体倦，用补中益气加麦门、五味而痊。三年后得子，因饮食劳倦，前症益甚，月经不调，晡热内热，自汗盗汗，用六味地黄丸、补中益气汤顿愈。经云：头痛耳鸣，九窍不利，肠胃之所生也。故脾胃一虚，耳目九窍皆为之病。

一妇人两眉棱痛，后及太阳，面青善怒，此肝经风热之症，用选奇汤合逍遥散加山栀、天麻、黄芪、半夏、黄芩而愈。此症失治，多致伤目，或两耳出脓则危矣。头痛手掉身麻，见一卷第五论。

川芎当归散

川芎一钱　当归酒拌　羌活　旋覆花　细辛　蔓荆子　防风　石膏煅　藁本　荆芥穗　半夏曲　生地黄　甘草炙，各五分

上姜水煎。

白附子散　治风邪风痰，头痛连齿，不时举发，或连年不愈。

麻黄不去根节　乌头炮去皮　南星炮，各半两　白附子炮，一两　全蝎炒，五枚　辰砂　麝香　白姜炮，各一钱

上为末，酒调服三分，卧少时。

川芎茶调散　治诸风上攻，头目昏重，偏正头痛。

薄荷八两　川芎　荆芥各四两　羌活　白芷　防风　甘草炙，各二两　细辛一两

上为末，每服二钱，食后茶清调。

如圣饼子加细辛，其效甚速。若头痛筋挛，骨重少气，哕噫腹满，咳嗽烦冤，其脉举之则弦，按之石坚，由肾气不足而逆上，谓之肾厥头痛，宜玉真丸、硫黄丸。

硫黄丸　治头风不问新久，服此除根，屡用屡效。

硫黄二两　硝石一两

上为末，滴水丸指顶大，每服一丸，空心，细嚼茶清下。

一方，用生莱菔汁，仰卧注两鼻，数年之患一注即愈。

一方，治风邪入脑，患头痛不可忍，不问年岁。

硝石　人中白　脑子等分

上为末，用一字，吹入鼻中。

都梁丸　治产前产后，风邪所伤，头痛头晕。方见后

附　方

调中益气汤　治气血俱虚而头痛。

芍药三分　升麻二分　黄芪一钱　甘草五分　五味子七粒　当归　白术　人参各三分　柴胡　橘皮各二分

上水煎。

半夏白术天麻汤

半夏一钱半　白术　神曲炒，各一钱　天麻　黄芪　人参　苍术　陈皮　泽泻　茯苓各五分　干姜三分　黄柏酒制，二分　大麦蘖一钱半

上每服半两，水煎。

羌活附子汤

麻黄　黑附子炮　白芷　白僵蚕　黄柏各三分　羌活　苍术各五分　防风　甘草　升麻各五分　黄芪五分

上水煎服。

选奇汤　治风热上壅，眉棱骨痛，或头目眩晕。

羌活　防风各三钱　甘草二钱，夏生冬炒　黄芩酒制，冬去之

上每服三钱，水煎，时时服。

昇柴葛汤　**升麻汤**　**麻黄附子细辛汤**三方见六卷第十二论　**补中益气汤**方见二十四卷第六论　**六味丸**方见二十四卷第十四论　**逍遥散**方见二十四卷第四论

颈项强痛方论第六

夫颈项属足太阳膀胱足少阴肾，二经相为表里，若感风寒湿气，则发热恶寒，颈项强急，腰背反张，瘛疭口噤，脉沉迟弦细。新产血虚出汗，多患此症。若因鼾睡失枕而致，用三五七散、追风散。若风邪所伤，用都梁丸、木瓜煎。

愚按：东垣云：肩背痛不可回顾，此手太阳气郁而不行，以风药散之。窃谓前症若因肝木自旺用泻青丸，精血不足六味丸，风热淫肝加味逍遥散，怒动肝火加味小柴胡汤，肝经血虚加味四物汤，肾不能生肝六味丸，膀胱气滞羌活胜湿汤。大抵肝火旺，则肝血虚而筋燥，颈项强急，或腰背反张，或四肢拳挛，或颈项等处结核。

附　治　验

一妇人耳内或耳后项侧作痛，寒热口苦，月经不调，此肝胆经火，兼伤脾胃，用四君加柴胡、升麻、黄芪、芍药而愈。后因劳役怒气，呕吐胁胀，用六君子汤加山栀、柴胡而安。

一妇人因怒，寒热作渴，左目紧小，头颈动掉，四肢抽搐，遍身疼痛，此血虚肝热则生风也，用加味逍遥加钩藤钩数剂，诸症渐愈，又用八珍汤而痊。

追风散　治风邪所乘，头目眩痛，口眼歪斜，牙关紧急，或百节疼痛，鼻塞声重，项背拘急，皮肤瘙痒，面若虫行。

川乌炮去皮脐尖　白僵蚕炒去丝　防风　石膏煅　川芎　荆芥穗　甘草炙，各一两　羌活　天南星　地龙去土　白附子炮　全蝎去尾，钱半　白芷各半两　没药研　草乌炮，去皮脐尖　乳香研　雄黄研，各一钱

上为末，每服五分，用茶清少许，食后临卧调下。

都梁丸　治诸风项背不利，头目眩晕，脑门作痛，或产前产后伤风，头目昏重，血风

头痛，用白芷末蜜丸弹子大，每服一丸，细嚼，荆芥煎汤下。

木瓜煎

木瓜不犯铁器一个，取盖去穰　没药二两，研　乳香一两，研

上以木瓜去核，入二药，仍盖合之，饭上蒸烂，研成膏，每服三匙，生地黄汁半盏，无灰酒和服。有人患此，自午发至夜方止。余曰：此是少阴经症，发必先从足起。盖足少阴之筋，自足大指起至头，筋者肝之合也，日中至夜，天之阳，阳中之阴。又曰：阳中之阴，肺也，自离至兑，阴旺阳弱之时，故灵宝毕法云：离至乾，肾气绝而肝气弱，肝肾二脏，受阴气，故发于是时。予受此方，三服而愈。

附　方

泻青丸方见二十四卷第三论　**羌活胜湿汤**方见前　**六味丸**方见二十四卷第十一论　**八珍汤**　**加味逍遥散**二方见二十四卷第四论　**加味小柴胡汤**方见二十四卷第二论　**加味四物汤**　**四君子汤**二方见二十四卷第六论

妇人腰痛方论第七

夫肾主于腰，若妇人腰痛，由肾气虚弱，外感六气，内伤七情，皆能致之。如因风邪所乘，用小续命汤加桃仁、杜仲。如因寒湿所伤，五积散。肾经虚弱，青娥丸。如因气血凝滞，用牵牛、茴香之类。

愚按：陈无择先生云：若形体虚羸，面色黧黑，腿足痿软，不能行立，此失志所为也，腹急胁胀，目视眩眩，宗筋弛纵，白淫下注，此郁结所为也。肌肉不仁，饮食不化，肠胃胀满，闭塞腰胁，此忧思所为也。皆属内因。若腰冷作痛，身重不渴，小便自利，饮食如故，因劳汗出，腰痿胁痛，或坠堕血滞，或房劳精竭，皆属不内外因也。窃谓前症失志，肾虚热者，六味丸。肾虚寒者，八味丸。郁怒伤肝，实用龙胆泻肝汤，虚用六味丸、补肝散。忧虑伤脾者，归脾汤、逍遥散。肾着者，寒则木附汤，虚则肾着汤。腰膝痛者，寄生汤、养肾散。瘀血滞者，如神汤、舒筋汤。房劳腰痛者，青娥丸、十补丸。

附　治　验

一妇人腰痛三年矣，每痛必面青，头晕目紧，余以为肝脾气虚，用补肝散而愈。三年后，因劳役，患头痛兼恶心，用补中益气汤加茯苓、半夏、蔓荆子而愈。

一妇人苦腰痛，数年不愈，余用白术一味，大剂服，不三月而痊。乃胃气虚闭之症，故用白术也。

如神汤　治男妇腰痛。

延胡索　当归　桂心等分

上为末，每服二钱，温酒调，甚者，不过数服。

独活寄生汤　治足三阴虚，风湿所侵，脚膝历节作痛。

独活　桑寄生　续断酒炒　杜仲姜汁炒　细辛　牛膝酒拌炒　秦艽　茯苓　白芍药炒　桂心　川芎　防风　人参　熟地黄自制　当归　粉草炙，各五分

上水煎。

舒筋散　治风寒伤肾膂作痛，或闪挫气滞。血瘀亦良。

玄胡索炒　杜仲姜汁炒　官桂去皮　羌活　芍药等分

上为末，每服二钱，酒调。

又方，橘核炒木香，研酒下。

附　方

《济生》术附汤　治寒湿伤肾，腰重冷痛，小便自利，或手足逆冷。

附子炮　白术各一两　杜仲姜炒，半两

上每服四钱，姜水煎。

《三因》肾着汤　治肾虚为病，身重腰冷，如水洗状，不渴而小便自利，饮食如故，腰以下冷痛，如带数千钱。

茯苓　白术各四两　干姜炮　甘草炙，各二两

上每服四钱，水煎，空心服。

青娥丸　治肾虚腰痛，或外邪所侵，腰腿或筋骨作痛。

胡桃仁二十枚　蒜研膏，四两　破故纸酒浸炒，八两　杜仲去皮，姜汁浸炒，一斤

上为末，蒜膏丸桐子大，每服五十丸，空心醋汤下。蒜不用亦可。

六味丸　十补丸　八味丸三方见二十四卷第十一论　龙胆泻肝汤方见二十四卷第六论　补肝散方见七卷第十七论　养肾散方见后　归脾汤　逍遥散三方见二十四卷第四论

妇人腰脚疼痛方论第八

肾主于腰脚，女人胞络系焉。若劳伤肾气，风冷客于脉络，故腰脚作痛也。治当补元气为主，佐以祛邪之剂。

愚按：前症若真阳衰败，寒邪乘袭，手足俱冷，头痛恶寒，或呕吐腹痛等症，宜用本方。若气血虚弱，寒邪所感，恶寒发热，头痛作渴，或呕吐腹痛等症，宜用五积散。若元气虚弱，湿热所伤，两胫肿痛，寒热身疼，或呕吐不食等症，宜用槟苏败毒散。若元气虚弱，脾胃弱，寒热呕吐，发热头痛，喘渴体倦等症，宜用补中益气汤。若足三阴精血亏损，阴火内动，内热晡热，作渴痰甚，小便频数等症，宜用六味地黄丸。若足三阴阳气虚败，恶寒发热，手足俱冷，吐痰不食，二便滑数等症，宜用八味地黄丸。

附　治　验

一妇人先腰胯作痛，后两腿亦痛，余以为足三阴虚寒，外邪所伤，用小续命汤及独活寄生汤，或作或止，所用饮食极热，腹中方快。余曰：邪气去而元气虚寒也。诊其脉果沉细，用养肾散渐愈，又用十补丸而痊。

一妇人所患同前，但发热作渴，喜冷饮食，脉洪数，按之迟涩。余以为血虚有热，用羚羊角散，去槟榔，加白术、茯苓数剂，更用加味逍遥散而痊。

一妇人患前症时，或腿膝作痛，脉浮数，按之迟缓，此元气虚而风湿所乘，用独活寄生汤顿愈，又用八珍汤而安。

一妇人因怒患前症，寒热往来，口苦不食，晡热内热，余以为肝火血虚，先用小柴胡、山栀顿愈，又用加味逍遥散而瘳。

一妇人患前症，寒热头痛，殊类伤寒，此寒邪之症，用槟苏败毒散而安，又用补中益气调补而愈。

骨碎补散　治阳气虚弱，外寒所侵，腰脚疼痛，腹胁拘急。

骨碎补炒　萆薢酒炒　牛膝酒炒　桃仁去皮尖　海桐皮　当归酒拌　桂心　槟榔各五分　赤芍药炒　附子炮　川芎　枳壳麸炒、各二分

姜枣水煎。

养肾散　治肾经虚弱，风寒所侵，以致腰脚疼痛，不能步履。

苍术一两　干蝎三钱　天麻　草乌头炮去皮尖　黑附子炮去皮脐，各二钱

上为末，每服一钱，酒调服。麻痹少时随愈。孕妇勿服。此治风寒伤肾膀胱虚寒之良药，用之得宜，殊有神效。

附　方

五积散方见后　**槟苏败毒散**方见二十四卷第十论　**补中益气汤**方见二十四卷第六论　**十补丸**　**六味丸**　**八味丸**三方见二十四卷第十一论　**小续命汤**方见前　**独活寄生汤**方见前　**羚羊角散**方见前　**加味逍遥散**　**八珍汤**二方见二十四卷第四论　**小柴胡汤**方见二十四卷第二论

妇人风邪脚气方论第九

妇人脚气，乃肝脾肾三经，或胞络气虚，为风毒所搏而患。盖胞络属于肾，主于腰脚，三经络脉起于足中指，若风邪客於足，从下而上，动于气，故名脚气。皆由六淫七情，或产后，或经行风毒相搏。其症或头痛身热，肢

节作痛，或大便秘结，小便不利，或脚膝缓弱，足胫肿满，或腰膝枯细，忪悸呕逆，或小腹不仁，举体转筋，或胸满气急，遍体酸痛，用香苏散加槟榔、生姜。若寒中三阳必冷，用小续命汤。若暑中三阴必热，用小续命汤去附子。大躁者，紫雪最良，无紫雪以百合、薄荷煎冷水调服。大便秘，用脾约丸、麻仁丸、三和散。补药淋洗，皆大禁也。

愚按：严用和先生云：前症初患不觉，因风邪乃发，先从脚起，或缓弱痹痛，不能行履，或两胫肿满，或足膝细小，或心中怔忡，或小腹不仁，或举体转筋，或见食作呕，或胸满气急，遍体酸痛。其脉浮而弦者因于风，濡而弱者因于湿，洪而数者因于热，迟而涩者因于寒。男子由于肾气亏损，女子血海虚弱，用八味丸。若饮食停滞，臀腿酸胀，浮肿作痛，此脾气下陷，用六君子少加柴胡、升麻，不应，须用八味丸。若发热口渴，月经不调，两腿无力，此足三阴血虚火燥，用六味、八味二丸兼服，前症西方之人多患之，因素食乳酪，脾胃壅滞，胫足肿满。至于南方亦有，因膏粱厚味，湿热下注而患者，故古人谓之壅疾。所用之方，多疏通发散之剂，然感于房劳过度，亏损三阴，治法又当以固本为主，故六物附子为元气虚弱、寒邪内侵之圣药。所属各经等方附后。

附　治　验

一妇人两膝赤痛，寒热口苦，呕吐懒食，面色青黄或赤，此肝木乘脾土，用小柴胡汤加山栀、升麻、茯苓，二剂顿愈。又用六君子汤加柴胡、山栀全愈。

一妇人饮食劳役，两膝兼腿疼痛，或时寒热，余以为脾虚湿热下陷，用补中益气汤加山栀、茯苓、半夏，治之而痊。后复作，用六君子汤加柴胡、山栀、全愈。

一妇人经行后，寒热晡热，两腿作痛，此肝经血虚也，用加味逍遥散加山栀治之而愈。后因劳，日晡内热，或用以四物、黄柏、知母之类，前症益甚，更加食少作泻，余以为元气下陷，前药复伤，后用六君子汤加补骨脂二剂，调补脾胃，而泻止食进，又用补中益气汤升举元气而痊。

大腹皮散　治脚气肢节烦疼，心神壅闷，或头晕喘嗽不食。

大腹皮　紫苏　木通　桑白皮炒　羌活　荆芥　赤芍药炒　青皮　木瓜不犯铁器　独活各五分　枳壳麸炒、一钱

上姜葱水煎。

半夏散　治脚气上攻，心腹胀满，饮食不下，呕吐不止。

半夏姜制　陈皮　人参　大腹皮　桂心各二分　槟榔一钱　赤茯苓　紫苏各五分

上姜水煎。

桑白皮饮　治两脚浮肿，小便赤涩，腹胁胀满，或喘嗽痰涌，呕吐不食。

桑白皮炒　郁李仁去皮　赤茯苓各一钱　木香　防己酒拌　大腹皮　紫苏子炒　木通去节　槟榔　青皮各五分

上姜水煎。

附　方

大黄左经汤　治四气乘注足阳明经，以致臁腿作痛，或足胫赤肿，呕吐不食，大小便秘结，或恶食喘急，自汗等症。

细辛　茯苓　羌活　大黄煨　甘草炙　前胡　枳壳麸炒　厚朴姜制　黄芩炒　杏仁去皮尖，等分

上每服五钱，姜枣水煎。

麻黄左经汤　治风寒暑湿，乘注足太阳经，以致腰足挛痹，肢节重痛，或憎寒发热，无汗恶寒，或自汗恶风头痛。

麻黄　干葛　细辛　白术　茯苓　防己酒拌　桂枝　羌活　甘草炙　防风

上每服半两，姜枣水煎服。

半夏左经汤　治足少阳经，为风寒暑湿乘注，以致恶寒发热，腰腿疼痛，或头目眩晕，呕吐不食，或热闷心烦，腿痹不随。

半夏　干葛　细辛　白术　麦门冬去心　茯苓　桂枝　防风　干姜炮　黄芩炒　小草炙　甘草　柴胡

上每服半两，姜枣水煎。热闷加竹沥，喘急加杏仁、桑白皮。

六物附子汤　治四气乘于足太阴经，以致骨节烦疼，四肢拘急，自汗短气，小便不利，或手足浮肿。

附子炮　桂　防己各四钱　甘草炙，二钱　白术　茯苓各二钱

上每服半两，姜水煎。

换腿丸　治足三阴经，为风寒暑湿之气所乘，发为挛痹缓纵，或上攻胸背，下注脚膝，疼痛发热，行步艰难。

薏苡仁　南星　石楠叶　石斛　槟榔　革薢酒拌　川牛膝酒浸　羌活　防风　木瓜各四两　黄芪炒　当归酒拌　天麻　续断酒炒，各一两

上为末，酒糊丸如桐子大，每服五十丸，盐汤下。

五积散　治风寒所伤，以致脚气疼痛，或寒热拘急，呕吐不食等症。

当归酒拌　芍药炒　川芎　炮姜　人参　茯苓　陈皮　桔梗炒　厚朴姜炒　白芷　苍术　半夏姜制　肉桂　麻黄　甘草炒，各五分

上姜枣水煎。

当归拈痛汤　治湿热为病，肢节类疼，肩背沉重，胸膈不利，或兼遍身作疼，足胫肿痛不可忍者，或湿热流注下部，疮疡赤肿。

羌活　人参　苦参酒制　升麻　干葛　苍术各一钱　甘草炒　黄芩酒炒　当归　茵陈酒制，各五分　防风　知母酒炒　泽泻　猪苓　白术各四分

上水煎服。

紫苏子汤　治脚气上攻，阴阳交错，清浊不分，上重下虚，中满喘急，呕吐自汗，无复纪律。

紫苏子微炒　半夏姜制　前胡　厚朴姜制　当归酒拌　甘草炙，各二两　桂心　陈皮

上每四钱，入姜枣煎服。

还少丹方见二十三卷第四论　**六味丸　八味丸**二方见二十四卷第十一论　**小柴胡汤**方见二十四卷第二论　**加味逍遥散**方见二十四卷第四论　**六君子汤　补中益气汤**方见二十四卷第六论

校注妇人良方　卷五

宋　临川　陈自明良甫编辑
明　古吴　薛　己立斋补注
　　鄞县　曹赤电炳章圈校

妇人劳瘵各症方论第一

夫骨蒸殗殢，复连尸症、劳症、虫症、毒症、热症、冷症、食症、鬼症，症者注也，自上注下，与前人相似，故曰症。其变有二十二种，或三十六种，或九十九种，令人沉沉默默，寒热盗汗，梦与鬼交，遗泄白浊，或腹中有块，或脑后两边有结核，咳嗽脓血，下利羸瘦，死而传症，甚至灭门。更有蜚尸、遁尸、寒尸、丧尸、尸注，谓之五尸。人为其症者，不自知所苦，虽有狸骨、獭肝、天灵盖等方，未尝见效，唯崔氏灸法，早用有济。若寒热自汗，面白目干，口苦，神昏善恐，不能独卧，传在肝也。若寒热面黑，鼻燥善忘，大便秘泻，口舌生疮，传在心也。若寒热面青唇黄，舌本硬强，言语不出，饮食无味，羸瘦吐涎，传在脾也。若寒热面赤鼻白，干燥毛折，咯嗽喘急，吐涎脓血，传在肺也。若寒热面黄耳焦，脚脐酸痛，小便白浊，遗沥腹痛，传在肾也。

愚按：前症诚然有之，故葛仙翁用獭肝一具，阴干杵末，水下方寸匕，日三服，未愈再作。宋宣和间一法师，善考讯鬼怪，时一妇以疾投状，既而如有鬼祟所附。曰：非我为患，乃病人命自衰尔，渠今已成虫食肺，故令吐血声嘶。又屡掠问彼所畏何物，云以獭爪为末，酒服之，则去矣。患家如其言得愈。獭爪即獭肝之类欤。《玄珠》云：虫瘵多有兄弟互相传染，甚至绝户，此乃冤牵相缠及风水所致，虽有符文法水下虫之方，然虫去而人亦亡。若能平素保养，亦可免矣。窃究《养生微旨》云：益气补肺，益精滋肾，皆资其化源也。盖人之精血常不足，加之数夺其真，资化失常，则胃气不固，精气滑脱，不能上接阳气，故头重或痛，气弱而食少，元气下陷，脉即微弱，外散欲绝而虚洪，或见损脉，此实元气不足之所致，非有外感贼邪之病也。

附　治　验

一妇人素勤苦，因丧子，饮食少思，忽吐血甚多而自止，此后每劳则吐数口，瘵症已具，形体甚倦，午前以补中益气，午后以归脾汤送地黄丸而愈。

一女子患前症，反其唇视有白点，此虫蚀肺也。余云：急寻獭肝治之。不信，果咳脓而殁。后闻其兄弟三人，皆夭于此症。大凡夕嗽当视其两唇，若上唇有点虫蚀上部，下唇有点虫蚀下部。

二十四种蒸病论新附

所谓劳蒸者，毛折发焦，肌肤甲错，其蒸在皮。外热内寒，身振肉瞤，其蒸在肉。发焦鼻衄，或复尿血，其蒸在血。身热烦躁，痛如针刺，其蒸在脉。爪甲焦枯，眼昏胁痛，其蒸在髓。头眩热闷，涎浊眵泪，其蒸在脑。男子失精，女子白淫，其蒸在玉房。乍寒乍热，中脘烦闷，其蒸在三焦。小便赤黄，凝浊如膏，其蒸在膀胱。大便秘泄，腹中雷鸣，其蒸在小肠。大腹隐痛，口舌干疼，其蒸在大肠。口鼻干燥，腹胀自汗，睡卧不安，其蒸在胃。口舌耳聋，两胁下痛，其蒸在胆。里急后重，肛门秘涩，其蒸在

广肠。小腹疗痛，筋脉纵缓，阳器自强，其蒸在宗筋。眩晕下泪，躁怒不常，其蒸在肝。舌黑气短，烦闷洒淅，其蒸在心。唇干口疮，胸腹胀闷，畏寒不食，其蒸在脾。咳嗽喘满，咯痰吐血，声嘶音哑，其蒸在肺。耳轮焦枯，脚气酸痛，其蒸在肾。情想不宁，精物时下，其蒸在右肾。心膈噎塞，攻击疼痛，俛仰烦冤，其蒸在膈。此症虫多啮心肺，治当绝其根也。

愚按：《医林集要》云：前症若蒸肺，用天麦门冬、桔梗、紫菀、乌梅肉。若蒸皮，石膏、桑白皮。若蒸气，喘促鼻干，身热不安，人参、黄芩、栀子。若蒸大肠，大黄、芒硝。若蒸心，黄连、生地黄、当归。若蒸脉、蒸血，皆用生地黄、当归、童子小便。若蒸小肠，赤茯苓、木通、生地黄。若蒸脾，芍药、木瓜、苦参。若蒸肉，芍药。若蒸胃，石膏、粳米、大黄、芒硝、干葛。若蒸胆，柴胡、瓜蒌。若蒸三焦，石膏、竹叶。若蒸肝，川芎、当归、前胡。若蒸筋，川芎、当归。若蒸肾，生地黄、石膏、知母、寒水石、藁本。若蒸脑，生地黄、防风。若蒸髓，天门冬、当归、生地黄。若蒸骨，鳖甲、地骨皮、当归、牡丹皮、生地黄。若蒸玉房，知母、黄柏、当归、芍药。若蒸脬，泽泻、茯苓、生地黄、沉香、滑石。若蒸膀胱，泽泻、滑石。凡此诸蒸虚劳热病，食肉与油腻房劳饮酒而成者，久蒸不除，变为疳症即死。亦有疟病久而不愈，以致咳嗽失治，渐成骨蒸劳瘵之症，当推标本而治之。

崔氏灸骨蒸劳瘵，用细绳一条，男左女右，从足大拇指头齐量起，从脚板底当脚跟中心，向后引绳，循脚肚贴肉，直上至曲臂中横纹截断，又令患人解发分两边，见头缝自囟门平分至脑后，乃平身正坐，取前所截绳，一头从鼻端齐引绳向上直循头缝至脑后贴肉垂下，循脊骨，引绳向下，至绳尽处，当脊骨以黑点记此黑点不是灸穴。别取一绳，令患人合口，将绳按于口上，两头至吻，却吊起绳中心至鼻端根下，如人字样，齐两吻截断，将此绳展直于前在脊骨上黑点处，取中横量，勿令高下，於绳两头以白圈记之此是灸穴初灸七壮累灸至百壮，此名患门穴，初灸此讫。次令其人半身正坐，稍缩臂膊，取一绳绕项向前双垂，与鸠尾齐鸠尾是心歧骨，无是歧骨者，胸前两歧骨间量取一寸即是鸠尾也。即截断，却背翻绳头向项后，以绳中停取心正，令当喉咙结骨上第二次墨点处，揸中横量绳两头以白圈记之此是灸穴，初灸七壮，累灸至百壮。又将第二次量口绳折中，当脊直上下竖停中心，在第二次墨记上下，绳头尽处，以白圈记之。此是灸穴，初灸七壮，累灸百壮。此纵横四方凡四穴，是名曰四花穴，初灸各七壮，若疮愈，其疾未效，依法复灸，故云累灸至百壮。凡灸时可用灸足三里以泻其火为好。若妇人缠足短小，难为量，只取脊肓腧灸之，在第四椎下两傍各三寸是穴。次灸四花穴，道轩用此法灸之，无有不效者。

神仙秘法　取劳虫须先择良日，焚香祷祝，令病人面向福德方服，神效。

青桑枝　杨柳枝　梅枝　桃枝俱向东者各七茎　葱白七茎　青蒿一握，如无以子代　阿魏一钱　真安息香一钱

上用童便一升半，煎一升，入阿魏，再煮数沸，入朱砂半两，小槟榔半两，麝香半钱，五更并天明各进一服，下白虫尚可治，以淡粥补之。用药调理三五月再服，以除病根。如虫黑，已入肾，不可救矣。

治心胸痛引两胁，昏闷声浊，热壅鼻衄，或痰喘发热。

桑白皮炒　枳壳面炒　木通　子芩炒　生地黄　白芍药　甘草各五分

用水煎服。

温金散　治肺嗽恶寒，发热唾痰，皮毛焦燥。

甘草炒　黄芩炒　桑白皮炒　防风各一两　杏仁二十七粒，制　人参　茯苓各半两　麦门冬二钱

上前五味，用米泔浸一宿，晒干，入人参等三味，每服三钱，入蜡一豆大，水煎。

桔梗饮子　治心气不足，解倦溢血，或喘嗽痰甚。

桔梗炒　甘草炒　黄芪炒　人参　麦门冬各一钱　青皮三分

用水煎服。

治咽喉痛

百药煎去黑皮　硼砂　甘草　生白矾等分

上为末，每服一二钱，食后用米饮调，细呷咽之。

含化丸　治肺间邪气，胸中积血作痛，失音痰喘。

蛤蚧一只，去足炙　诃子去核　阿胶　麦门冬去心　细辛　甘草炒　生地黄各半两

上为末，蜜丸芡实大，食后含化一丸。

河车丸　治一切劳瘵虚损骨蒸等疾。

紫河车一具，初生男胎者尤良，洗净杵烂。本草云人肉治瘵病，胞衣主劳损面黯皮黑诸疾瘦悴　白茯苓半两　人参一两　干山药二两

上为末，面糊和，入河车，加三末丸梧子大，每服三五十丸，空心米饮下。嗽甚，五味子汤下。

补肺汤　治劳嗽五脏亏损，晡热发热，盗汗自汗，唾痰喘嗽。

桑白皮炒　熟地黄各一钱　人参　紫菀　黄芪炒　五味子炒，各五分

用水煎，入蜜少许，食后服。

葬正膏　治传尸出汗，取虫辟邪。

鳖甲一两醋炒　青蒿一握　淡豆豉三七粒　葱白两茎　安息香一分，研　桃柳桑枝各七茎　天灵盖用匕豆大一片，酥炙　桃仁四十九个，去皮尖，双仁

上隔夜，以水一升，浸至五更，煎至半升，入童便半升，煎取四合。调槟榔、麝香末各一分，日高时顿服，以衣覆十指，汗出如藕丝，泻下如虫状，甚者旬日再服。

阿胶丸　治劳嗽出血咯血，发热晡热，口渴盗汗。

阿胶炒　生地黄　卷柏叶　山药炒　大蓟根　五味子杵炒　鸡苏各一两　柏子仁炒　人参　防风　麦门冬去心，半两

上为末，炼蜜丸弹子大，每服一丸，细嚼，麦门冬煎汤下。

四君子汤加秦艽、黄蜡，水煎服尤妙，治劳嗽咯血。

神授散　治传尸虫，用川椒二斤去核并合口者，炒为末，每服四钱，面糊丸。空心米饮下，服尽见效。

苏合香丸　治传尸骨蒸，劳瘵疰忤，鬼气心痛。方见三卷第四论

附　方

四君子汤方见二十四卷第五论　**补中益气汤**方见二十四卷第六论　**归脾汤**方见二十四卷第四论　**六味地黄丸**方见二十四卷第十一论

妇人骨蒸劳方论第二

夫骨蒸劳，由积热附于骨而名也，亦曰传尸殗殜，复连无辜，其名不一。此病皆由脾胃亏损所致，其形羸瘦，腹胀泄泻，肢体无力。传于心肾则盗汗不止，腰膝冷痛，梦鬼交侵，小便赤黄。传于心则心神忪悸，喜怒不时，颊唇赤色，乍寒乍热。传于肺则胸满短气，咳嗽吐痰，皮肤甲错。传于肝则两目昏暗，胁下妨痛，闭户忿怒。五脏既病，则难治疗。

愚按：前症多因经行胎产，或饮食起居七情，而伤肝脾之所致。又或失于调摄，或过于攻伐而成。东垣先生云：发热之症，肺热者轻手乃得，微按全无，日西犹甚，乃皮毛之热，其症喘嗽寒热，轻者用泻白散，重者凉膈散、白虎汤、地骨皮散。心热者，微按之，皮肤之下，肌肉之上，轻手乃得，微按至皮毛则热少，加力按之则全不热，是热在血脉也。日中太甚，其症烦心心痛，掌中热而哕，用黄连泻心汤、导赤散、朱砂安神丸。脾热者，轻手扪之不热，重手按至筋骨又不热，不轻不重，在轻重之间，此热在肌肉，遇夜犹甚，其证怠惰嗜卧，四肢不收，无气以动，用泻黄散。肝热者，按之肌肉之下，至骨之上，寅卯时犹甚，四肢满闷，便难转筋，多怒多惊，筋痿不能起于床，用泻青丸、柴胡饮。肾热者，轻手重按俱不热，加重手按至骨分，其热蒸手如火，其症骨蒸如虫蚀，困热不能起于床，用滋肾丸。此治实热之法

也。窃谓肺经虚热者用人参补肺汤，脾气虚而不能生肺者用六君子汤，脾热遗于肺者用三黄丸，心经虚热者用补心汤，命门火衰不能生土者用八味丸，肝虚不能生心者用补肝散，肾克心者用附子理中汤，脾经虚热者用人参黄芪散，土克水者用承气汤，脾不能培肝者用六君子汤，元气下陷及金不能生水者俱用补中益气汤，肺克肝及肾经虚热与肾不能生肝者俱用六味丸。

附　治　验

一妇人发热晡热，盗汗自汗，殊畏风寒，饮食少思，或腹胀吞酸，或大便不实，此脾胃不足，诸经亏损，朝用补中益气，夕用八珍汤，倍用参、苓、白术，各二十余剂，诸症渐愈。因丧母哀伤，患盗汗便血，用加味归脾汤，数剂而止。仍用前二药，又五十余剂，寻愈，月经两月而至。适因怒去血过多，发热作渴，肢体酸倦，头目晕痛，用逍遥散、加味归脾汤二药调补而痊。

一妇人盗汗自汗，遍身酸疼，五心发热，夜间益甚，或咳嗽咽干，或盗汗自汗，月经两三月一至，用加味逍遥散、六味地黄丸兼服，临卧又服陈术丸，三月余，诸症悉愈，其经乃两月一至，又服两月而痊。陈术丸即陈皮白术为丸

一妇人患前症，食少倦怠，肌肉消瘦，日晡发热，至夜益甚，月水过期，渐至不通，时发渴躁，误用通经之剂，热倦愈重，饮食愈少，余用八珍汤加升麻、丹皮、山栀、柴胡治之，热渐退，又用八珍、丹皮、软柴胡调理而愈。

一妇人饮食少思，胸膈不利，或胸中作痛，或大便作泻，或小便不利，用逍遥散加山栀、茯神、远志、木香而愈。后因怒寒热往来，倦怠烦热，以前药加炒黑黄连三分顿愈，用八珍汤调理而愈。后因怒吐血躁渴，用人参五钱，苓、术、当归各三钱，陈皮、甘草各一钱，治之而愈。

一妇人胸胁作痛，内热晡热，月经不调，余谓郁怒伤损肝脾，朝用归脾汤以解郁结，生脾气，夕用加味逍遥散以生肝血，清肝火，半载而愈。后因饮食失调，兼有怒气，月经如注，脉浮洪而数，用六君子加芎、归、炮姜，一剂而血止，用补中益气加炮姜、茯苓、半夏治之而元气复，又用归脾汤、逍遥散调理而康。

一妇人内热口干，头晕吐痰，带下体倦，饮食少思，余谓脾气虚弱而不能生肺金，用补中益气汤加茯苓、半夏，脾气渐复，饮食渐进，诸症渐退，再用加味逍遥散治之寻愈。

一妇人腹胀胁痛，内热晡热，月经不调，不时吐痰，或用化痰行气之剂，胸膈不利，余谓脾气郁结，肝经血虚，朝用归脾汤，夕用加味逍遥散，百余剂而诸症渐愈。又因饮食停滞，或用峻补之剂，口干体倦，余用七味白术散、补中益气加茯苓、半夏，中气渐愈，又以补中益气及八珍汤兼服而痊。

一妇人患前症将愈，因怒胸膈不利，饮食少思，服消导利气之药，大便下血，余曰：此脾气复损，不能摄血归源，用补中益气加茯苓、半夏、炮姜血止，用八珍加柴胡、炒栀热退，用八珍汤、逍遥散而痊。

一妇人肌体倦瘦，口干内热，盗汗如洗，日晡热甚，用参、芪、归、术、茯神、远志、枣仁、麦门、五味、丹皮、龙眼肉、炙草、柴胡、升麻治之获痊。后因丧子，怀抱不舒，腹胀少寝，饮食少思，痰涎上涌，月经频数，余谓怒闷伤脾，不能摄血制涎归源耳，用补中益气、济生归脾渐愈，又用八珍汤调理而痊。

一妇人发热口干，月经不调，肢体无力，腿痛体倦，二膝浮肿，余作足三阴经血虚，用六味丸、逍遥散，兼服两月，形体渐健，饮食渐进，肢体渐消而痊。

一妇人日晡益甚，月水不调，饮食少思，大便不实，胸膈痞满，头目不清，肢体倦怠，发热烦躁，余谓七情肝脾亏损之症，用济生归脾汤、加味逍遥散、补中益气汤调治，元气渐复而愈。

一妇人月经不调，晡热内热，饮食少思，肌体消瘦，小便频数，或用清热生血之剂，月

经不行，四肢浮肿，小便淋沥，余朝用金匮加减肾气丸，夕用归脾汤渐愈。又用八珍汤，两月而愈。

一妇人胸胁膨满，小腹闷坠，内热晡热、饮食不甘，体倦面黄，日晡则赤，洒淅恶寒，此脾肺气虚，先用六君子加川芎、当归，诸症渐愈，又用补中益气加茯苓、半夏，诸症全愈。后饮食失节，劳怒恶寒发热，不食，用加味小柴胡一剂而热退，用逍遥散、归脾汤调理而康。

天灵盖散　治骨蒸四肢无力，晡热颊赤，食少心烦。

天灵盖酥炙　安息香　地骨皮　当归　山栀仁　人参　贝母去心　黄芪　桃仁去皮尖，双仁麸炒黄　槟榔各一两　鳖甲醋炙　柴胡　生地黄　赤茯苓　麦门冬　阿魏

上每服五钱，桃柳枝各七寸，姜五片，葱白五寸，童便煎。

愚按：《医学纲目》云：柴胡《本经》并无一字治劳热，今治劳方鲜有不用者，误世多矣。凡此症乃真脏亏损而虚热，王海藏先生云：苟无实热而用柴胡，不死何待。盖柴胡乃肝胆之药，虽能升胃气下陷，每剂不过分许，而可多用哉。产后气血虚热，尤宜禁忌。

獭肝丸　治骨蒸劳热，或渐热发热，体瘦烦疼，不欲饮食。

獭肝一具　鳖甲醋炙　柴胡各一两半　朱砂另研　升麻　天灵盖酥炙　犀角锉　桃仁去皮尖、双仁麦炒黄　栀子仁炒　地骨皮　知母各一两　黄芪炒　甘草炒，各五钱　麝香一钱，研

上为末，炼蜜丸桐子大，每服三十丸，空心食。

治肝脏中风，心神烦热，言语蹇涩，不得安卧。

竹沥　荆沥　葛根　生姜汁　白蜜各一合

上和匀频服之。

麻黄散　治心脏中风，多汗恶风，善怒，心神颠倒，言语蹇涩，舌强口干，面赤头痛，翕翕发热，胸背拘急，手心热甚，偃卧不侧，忪悸恍惚，或寒颤，心惊悸，口喎，冒昧好笑。

麻黄去节　白术　防风　川芎　甘草炙　汉防己　当归　人参各一钱　羌活　远志去心　茯神去木，各一钱半　升麻八分　桂心半钱

上水姜煎，入竹沥半盏，再煎一二沸。

茯神散　治同前，或四肢沉重，精神不安，或痰气不利。

茯神去木　羌活　麻黄去节　龙齿另研　赤芍药　甘草炙，各二钱　蔓荆子　薏苡仁　麦门冬去心　人参去芦　防风去芦　犀角屑各七分半

上姜水煎服。

十全大补汤　治气血虚热，加柴胡、地骨皮、秦艽。

秦艽散　治五心烦热颊赤。

逍遥散　治血虚五心烦热，肢体疼痛，头目昏重，心忪颊赤，口燥咽干，发热盗汗，减食嗜卧，月水不调，脐腹胀痛，寒热如疟，痰嗽潮热，肌体羸瘦，渐成骨蒸。方见二十四卷第四论

枳壳散　治妇人手足烦热，盗汗肌瘁，经候不调，烦倦，心胸满闷，状如劳气。

枳壳去穰，麸炒，一两　半夏曲　赤芍药各一两　柴胡　黄芩炒，各一两半

上为末，每服三钱，姜枣水煎服。

华佗解劳生肌，进食，活血养心，石膏每服水和钱许，甚验。

青蒿散　治体倦虚疼劳热，九月采青蒿去梗，用童子小便浸三日，晒为末，每服二钱，乌梅一个，煎汤调服。

清心莲子饮、参苏饮加黄芩、麦门冬，并治五心烦热，手足热甚。

附　方

加味小柴胡汤方见二十四卷第二论

柴胡饮　治肌热积热，或汗后余热，脉洪实弦数。

柴胡　人参　黄芩　芍药　甘草　当归

大黄煨，各二钱半

用姜水煎服。

泻白散　治肺脏气实，心胸壅闷，咳嗽烦喘，大便不利。

桔梗炒　地骨皮　甘草炙　瓜蒌仁　升麻　半夏姜制　桑白皮炒　杏仁去皮尖，等分

上每服四钱，姜水煎。

导赤散　治心虚蕴热，小便赤涩，或成淋沥，口舌生疮等症。

生地黄　木通　甘草等分

上每服三钱，竹叶水煎。

泻黄散　治脾热口臭，咽干，或口舌生疮，发热作渴。

石膏　防风　藿香等分　甘草　山栀子炒

上每服三钱，水煎。

凉膈散　治上焦积热，烦躁作渴，头目昏赜，咽喉肿痛，便溺赤涩，语言谵妄等症。

大黄　朴硝　甘草各二两　连翘四两　栀子仁炒　黄芩炒　薄荷叶各一两

上为末，每服二三钱，竹叶七片，水煎温服。

白虎汤　治胃热作渴，暑热尤效。又治热厥腹满，身难转侧，面垢谵语，遗溺，手足厥冷，自汗，脉沉滑，大便泄泻，清水无度。

知母　石膏各二钱　粳米半合

上水煎服。

附子理中汤　治脾胃虚寒，手足厥冷，饮食不入，或腹鸣切痛，呕逆吐泻。方见二十卷第八论

朱砂安神丸方见三第卷十论　**地骨皮散**方见六卷第三论　**黄连泻心汤**单用黄连为末，每服二钱白汤调下　**泻青丸**方见二十四卷第三论　**承气汤**方见七卷第十论　**滋肾丸**方见八卷第一论　**人参补肺汤**方见二十四卷第十二论　**补中益气汤**　**六君子汤**二方见二十四卷第六论　**三黄汤**方见八卷第八论　**补心汤**方见三卷第十二论　**六味丸**　**八味丸**方见二十四卷第十七论　**补肝散**方见七卷第十七论　**人参黄芪汤**方见十三卷第十论　**加味归脾汤**　**八珍汤**　**加味逍遥散**　**逍遥散**　**归脾汤**五方见二十四卷第十四论　**七味白术散**方见二十卷第二论

《**金匮**》**加减肾气丸**方见二十一卷第十论

妇人血风劳气方论第三

妇人血风劳症，因气血素虚，或产后劳伤，外邪所乘，或内有宿冷，以致腹中疼痛，四肢酸倦，发热自汗，月水不调，面黄肌瘦，当调补肝脾气血为主。

愚按：东垣云：喜怒不节，起居不时，有所劳伤，皆损其气，气衰则火旺，火旺则乘其脾土，脾主四肢，故困热懒言，动作喘乏，表热自汗，心烦不安，当病之时，宜安心静坐，存养其气，以甘寒泻其热气，以酸味收其散气，以甘温补其中气。经言劳者温之，损者温之。《要略》云：平人脉大为劳，以黄芪建中汤治之。

附　治　验

一妇人劳则足跟热痛，余以为足三阴血虚，用圣愈汤而痊。后遍身搔痒，误服风药，发热抽搐，肝脉洪数，此肝家血虚，火盛而生风，以天竺、胆星为丸，用四物、麦门、五味、芩、连、炙草、山栀、柴胡煎送而愈。

一妇人素清苦，勤于女工，因感风邪，自用表散之剂，反朝寒暮热，自汗盗汗，形气虚甚，其脉或浮洪，或微细，其面或青白，或痿黄，此邪去而气血愈虚也，用十全大补汤，三十余剂渐愈。又用加味逍遥散，兼治半载而痊。

人参荆芥散　治遍身疼痛，头昏目涩，心忪烦倦，寒热盗汗，颊赤口干，痰嗽胸满，月水不调，腹痛癖块。

荆芥　人参　生地黄　柴胡　鳖甲醋炙　酸枣仁炒　枳壳麸炒　羚羊角镑　白术各七分　川芎　当归酒拌　桂心　防风　甘草各五分

上姜水煎，日二服。

地黄煎　治血虚心忪发热。

生地黄　熟地黄自制，等分

上用姜汁和水拌杵丸桐子大，每服五十丸，空心白汤下，日三服。若脏腑虚寒，早间先服八味丸一服。

愚按：前方肝脾血虚发热，内热晡热，盗汗作渴，体倦，筋骨疼痛，筋脉拘挛，血虚发躁，虚热生痰咳嗽之良剂。若因肝脾肾精血，躁热生痰，胸膈痞满，喘咳作渴，及一切虚火症，必用六味丸为主。

乞力伽散　治血虚肌热，或脾虚蒸热，或内热寒热。

白术　白茯苓　白芍药炒，各一钱　甘草炒，五分

上姜枣水煎。

附　方

黄芪建中汤方见二十卷第四论　**圣愈汤**方见二十四卷第九论　**四物汤**方见二十四卷第六论　**六味丸**　**加味逍遥散**二方见二十四卷第四论　**六君子汤**　**补中益气汤**二方见二十四卷第六论　**归脾汤**　**十全大补汤**二方见二十四卷第四论　**人参养荣汤**方见二十四卷第三论　**八味丸**方见二十四卷第十一论

妇人冷劳方论第四

妇人冷劳，属血气不足，脏腑虚寒，以致脐下冷痛，手足时寒，月经失常，饮食不消，或时呕吐，恶寒发热，骨节酸疼，肌肤羸瘦，面色痿黄也。

愚按：前症有内外真寒，然有内外真热，亦有内真热而外假寒者，又有内真寒而外假热者。若饮食难化，大便不实，肠鸣腹痛，饮食畏寒，手足逆冷，面黄呕吐，畏见风寒，此内外真寒之症也，宜用附子理中汤以回阳，八味地黄丸以壮火。若饮食如常，大便坚实，胸腹痞胀，饮食喜冷，手足烦热，面赤呕吐，不畏风寒，此内外真热之症也，宜用黄连解毒汤以清热，六味丸以壮水。若饮食如常，大便坚实，胸腹痞胀，饮食喜寒，手足逆冷，面黄呕吐，畏见风寒，此内真热而外假寒也，亦用解毒汤、六味丸。若饮食少思，大便不实，吞酸嗳气，胸腹痞满，手足逆冷，面赤呕吐，畏见风寒，此内真寒而外假热也，亦用附子理中汤与八味丸。当求其属而治之。经曰：益火之源以消阴翳，壮水之主以制阳光。使不知真水火之不足，泛以寒热药治之，则旧疾不去，新病复生矣。夫所谓属者犹主也，谓心肾也。求其属也者，言水火不足，而求之于心肾也。火之源者，阳气之根，即心是也。水之主者，阴气之根，即肾是也。非谓火为心，源为肝，水为肾，主为肺也。大抵寒亦抑心，热亦强肾，在治者审之。

附治验方药

一妇人食少作呕，口吐痰涎，面黄腹痛，月经不调，手足逆冷，余谓此内外俱寒之症，遂以六君加附子、木香治之而愈。

先太宜人，忽呕吐酸水，内热作渴，饮食不进，惟喜冷水，面色青赤，投之以药，入口即吐，此内外真热之症。积十余日，以黄连一味，煎汤饮之，徐加白术、茯苓，仍加陈皮、当归、炙草，至月余，始进米饮稀粥，调理而愈。

一妇人内热作渴，大便秘结，畏恶风寒，手足逆冷，余以为内真热而外假寒，先用黄连解毒汤，后用六味丸而愈。

一大方室赵氏，初患痰喘热渴，医以降火散气治之，肌日削而气日索，延至甲辰，木旺痰盛，身热口腐，腹胀神昏，绝食几死。先生诊之云：此乃虚热无火，投以壮水生土之剂，随服随愈。

八味丸　**六味丸**二方见二十四卷第十一论　**附子理中汤**方见二十四卷第八论　**黄连解毒汤**方见六卷第十一论　**六君子汤**方见二十四卷第六论

校注妇人良方　卷六

宋　临川　陈自明良甫编辑
明　古吴　薛　己立斋补注
鄞县　曹赤电炳章圈校

妇人热劳方论第一

妇人热劳，由心肺壅热，伤于气血，以致心神烦躁，颊赤头疼，眼涩唇干，口舌生疮，神思昏倦，四肢壮热，食饮无味，肢体酸疼，心怔盗汗，肌肤日瘦，或寒热往来，当审其所因，调补气血，其病自愈矣。

愚按：前症乃壮火食气，虚火煎熬真阴之所致也。王大仆云：如大寒而甚，热之不热，是无火也。热来复去，昼见夜伏，夜发昼止，是无火也，当治其心。如大热而甚，寒之不寒，是无水也；热动复止，倏忽往来，时动时止，是无水也，当助其肾。心盛则生热，肾盛则生寒，肾虚则寒动于中，心虚则热收于内。窃谓前症若肝脾血虚，用四物、参、术。肝脾郁怒，小柴胡合四物汤。脾胃气虚，补中益气汤。肝脾血虚，加味逍遥散。肝经风热，加味小柴胡汤。心经血虚，天王补心丹。肺经气虚，人参补肺汤。肝经血虚，加味四物汤。大抵午前热属气分，用清心莲子饮，午后热属血分，用四物、参、术、丹皮。热从左边起，肝火也，实则四物、龙胆、山栀，虚则四物、参、术、黄芪。热从脐下起，阴火也，四物、参、术、黄柏、知母，酒拌炒黑，五味、麦门、肉桂，如不应，急用加减八味丸。不时而热，或无定处，或从脚心起，此无根虚火也，用加减八味丸，及十全大补汤加麦门、五味主之。

附　治　验

一妇人经行不调，饮食少思，日晡热甚，余以为肝脾气血俱虚，用十全大补加山茱、山药、丹皮、麦门、五味而愈。次年秋，寒热如疟，仍用前药而愈。

一妇人生育多胎，月经不调，两足发热，年余，其身亦热，劳则足酸痛，又年许，唇肿裂痛，又半年，唇裂见血，形体瘦倦，饮食无味，月水不行，此气血俱衰之症，彼误用通经丸等药，复伤气血，遂致不起，惜哉。

黄芪散　治发热羸瘦，心躁口干，不欲饮食，或盗汗晡热。

人参　黄芩炒焦　当归各三钱　柴胡五分　黄芪炒　地骨皮　白茯苓　麦门冬去心　生地黄　白芍药炒，各一钱　甘草炒，三分

上水姜煎。

猪肚丸　治热劳羸瘦。

柴胡　赤茯苓　人参　黄芪各一两　黄连炒，二两　地骨皮　木香各五钱　桃仁去皮尖　鳖甲各一两

上为末，用嫩猪肚一枚，入药缝合，蒸熟研烂，丸桐子大，每服三五十丸，食前米饮下，日二服。

附　方

清心莲子饮　治热在气分，口干，小便白浊，夜间安静，昼则发热。又治口舌生疮，或口苦咽干，烦躁作渴，小便赤涩，下淋不止，或茎中作痛。

黄芩炒　麦门冬去心　地骨皮　车前子炒　甘草各一钱半　石莲肉　茯苓　黄芪炒　柴胡去苗　人参各一钱

上每服五钱。水煎。

补中益气汤　加味四物散　四物汤三方见二十四卷第六论　**加味小柴胡汤　小柴胡汤**二方见二十四卷第二论　**十全大补汤　加味逍遥散**二方见二十四卷第四论

天王补心丹　宁心保神，益血固精，壮力强志，令人不忘，清三焦，化痰涎，祛烦热，除惊悸，疗咽干，育养心神。

人参去芦　茯苓　玄参　丹参　桔梗　远志各五钱　当归酒浸　五味　麦门冬去心　天门冬　柏子仁　酸枣仁炒，各一两　生地黄四两

上为末，炼蜜丸桐子大，用朱砂为衣，每服二三十丸，临卧竹叶煎汤送下。一方多石菖蒲、熟地黄、杜仲、百部、茯神、甘草。此方内天麦门冬、玄参、生地，虽能降火生血化痰，然其性沉寒，损伤脾胃，克伐生气。若人饮食少思，大便不实者，不宜用。

人参补肺汤方见二十四卷第十二论　**加减八味丸**方见二十四卷第十一论

妇人客热方论第二

妇人客热，由元气虚而外热乘之，以致口燥心烦，四肢壮热，肌肉消瘦，治法当审其因而调补之。

愚按：前症若客邪所侵，用补中益气加川芎、防风，肝虚血少六味地黄丸，胃火饮冷钱氏泻黄散，胃虚饮汤七味白术散，潮热时热八珍汤，晡热内热逍遥散，发热体倦补中益气汤，恚怒发热小柴胡汤，郁怒发热加味归脾汤，寅卯酉戌时热升阳益胃汤。

附　治　验

一妇人素有胃火，服清胃散而安，后因劳役，燥渴内热，肌肉消瘦，月经不行，此胃火消烁阴血，用逍遥散加丹皮、炒栀以清胃热，用八珍汤加茯神、远志以养脾血，元气充足，而经自行矣。

麦门冬散　治四肢倦痛，烦闷不食，或寒热往来。

麦门冬去心　柴胡　赤茯苓　羚羊角镑　赤芍药　桑白皮炒　黄芪炒，各四分　生地黄　甘草炒，各三分

上姜水煎。

附　方

补中益气汤方见二十四卷第六论　**六味丸**方见二十四卷第十一论　**泻黄散**方见五卷第三论　**七味白术散**方见二十卷第二论　**加味归脾汤　逍遥散**二方见二十四卷第四论　**小柴胡汤**方见二十四卷第二论　**升阳益胃汤**见三卷第九论　**清胃散**见二十四卷首论

妇人寒热方论第三

经曰：阳不足则先寒后热，阴不足则先热后寒，皆由劳伤气血，阴阳不调，寒热如症也，当分气血虚实而治之。

愚按：前症若寸口脉微，名曰阳不足，则阴气上入于阳中，用补中益气汤。若尺部脉弱，名曰阴不足，则阳气下陷入阴中，用益阴肾气丸。若因气血俱虚，用八珍汤。若因怒动肝火，用小柴胡汤。若阴阳俱不足，则气血不归其本部，以致寒热交争也。

附　治　验

一妇人年六十有四，久郁怒，头痛寒热，春间乳内时痛，服流气饮之类益甚，时有血如经行，又大惊恐，饮食不进，夜寐不宁，两乳肿胀，两胁痛，午后色赤。余以为肝脾郁怒火躁，先以逍遥散，加酒炒黑龙胆一钱，山栀一钱五分，服二剂，肿痛顿愈，又二剂全愈，再用归脾汤加炒栀、贝母，诸症悉愈。

地骨皮散　治血风气虚，时作寒热，或晡热内热。

柴胡　地骨皮各一两　桑白皮炒　枳壳面炒　前胡　黄芪炒，各五分　白茯苓　五加皮

人参　甘草　桂心　白芍药各三分，炒

用姜水煎服。

柴胡散　治寒热体痛，口干心烦，饮食少思，肌体消瘦。

柴胡　黄芪炒　赤茯苓　白术各一钱　人参　地骨皮　枳壳面炒　生地黄　苦梗　桑白皮炒　赤芍药各三分　鳖甲炙，二钱　麦门冬去心一钱　甘草三分

用姜水煎服。

益阴肾气丸　治诸脏亏损，发热晡热、潮热盗汗；或寒热往来，五心烦热，或口干作渴，月经不调；或筋骨疲倦，饮食少思，或头目不清，痰气上壅，咳嗽晡甚，胸膈痞闷；或小便赤数，两足热痛；或脚足痿软，肢体作痛等症。此壮水之主，以制阳光之剂也。

泽泻　茯苓　牡丹皮　生地酒拌杵膏　山药　茱萸肉　当归　五味子炒杵　熟地自制杵膏

上为末，入二膏，加炼蜜，丸桐子大，朱砂为衣，每服五十丸，空心淡盐汤下。

补中益气汤方见二十四卷第六论　**六味丸**方见二十四卷第十一论　**小柴胡汤**方见二十四卷第二论　**八珍汤**　**逍遥散**　**归脾汤**三方见二十四卷第四论

寡妇寒热如疟方论第四

仓公传与褚氏论，皆云师尼寡妇，独阴无阳，欲心萌而不遂，是以怏怏成病，以致乍寒乍热，而类疟状，久则为劳，又有经闭白淫，痰逆头风，膈气痞闷，面黑瘦瘠等证，皆寡妇之病。诊其脉，独肝脉弦出寸口而上鱼际，皆血盛而致。经云：男子精盛则思室，女人血盛则怀胎，观其精血，思过半矣。

愚按：前症若肝脉弦出鱼际，用生地黄丸。血虚，佐以四物汤。若兼怒动肝火而寒热，佐以加味逍遥散。若亏损肝经而寒热，佐以八珍汤。若亏损元气而寒热，佐以补中益气汤。若郁伤脾气而寒热，佐以济生归脾汤。

附　治　验

一寡妇不时寒热，脉上鱼际，此血盛之症，用小柴胡汤加生地黄治之而愈。但畏风寒，此脾胃气虚，用加味归脾、补中益气二汤，兼服而止。

一妇人因夫久出经商，发寒热，月经旬日方止，服降火凉血药，内热益甚，自汗盗汗，月经频数。余曰：内热自汗，乃脾气虚弱也；月经频数，乃血不归脾也。用归脾汤、六味丸而愈。

一室女寒热，肝脉弦长而出寸口，用小柴胡汤加生地、乌梅治之而愈，既嫁而诸症悉痊。

一室女久患寒热，月经失期，以小柴胡汤加生地治之少愈，更以生地黄丸而痊。

生地黄丸　许学士云：有一师尼恶风体倦，乍寒乍热，面赤心烦，大小柴胡汤杂进，其病益剧。予诊视之曰：三部脉无寒邪，但肝脉弦长而上鱼际，服此丸而愈。

柴胡　秦艽　黄芩各半两　生地黄一两，酒湿杵膏　赤芍药一两

上为末，炼蜜丸桐子大，每服三十丸，乌梅汤下，日三服。

附　方

补中益气汤　**四物汤**二方见二十四卷第六论　**加味逍遥散**　**八珍汤**　**加味归脾汤**　**归脾汤**四方见二十四卷第四论　**小柴胡汤**方见二十四卷第二论　**六味丸**方见二十四卷第十一论

妇人恶寒方论第五

妇人恶寒，有阴阳二证。发热而恶寒者，发于阳也。无热而恶寒者，发于阴也。发于阳者，脉浮数，宜解表。发于阴者，脉沉细，宜温里。凡恶寒不可过覆衣被，及近火热，若寒热相搏，令人寒甚。若寒气入腹，血气结聚，最难治疗。

愚按：前症若怠惰嗜卧，洒淅恶寒，乃

阳不能伸发，用升阳益胃汤。若劳伤形气而恶寒，乃无阳以护卫，用补中益气汤。若饮食伤脾胃而恶寒，乃元气虚损，用六君子汤。若加烦躁妄言，或欲饮水，仍进前剂，但加姜、桂。若体倦烦渴，头痛自汗，用补中益气加五味、麦门。东垣云：昼则发热恶寒，是阴气上溢于阳分也。夜中恶寒，是阴血自旺于阴分也。海藏云：六月大热之气，反得大寒之症，当舍时从症，治以姜、桂之类。丹溪云：久病恶寒，乃痰郁于脾，抑遏阳气，不得外泄，治当解郁。

附　方

升阳益胃汤方见三卷第九论　**补中益气汤**　**六君子汤**二方见二十四卷第六论

妇人血风烦闷方论第六

妇人血风烦闷，由劳伤气虚，而风邪乘之，血气不和，以致肢节热疼，口干不卧而烦闷也，当调补元气为主。

愚按：前症多属肝脾血虚发热，当参照前寒热方论主治。

赤芍药散　治烦闷不食，体倦头眩，身体疼痛等症。

赤芍药酒炒　白茯苓各一钱　甘草炒　柴胡各五分

上姜枣水煎。

妇人血风攻脾不食方论第七

夫脾为中州，意智之脏也，诸经皆赖其养，与胃为表里。胃主司纳，脾主腐化，若劳伤真气，外邪乘之，诸症生焉。

愚按：经云：胃乃脾之刚，脾乃胃之柔，伤胃则脾无所禀受，伤脾则不能为胃运化，是以脾胃为之表里，藉饮食以滋养百脉者也。窃谓前症若饮食所伤，六君子汤。劳役所伤，补中益气汤。风寒所伤，用人参理中汤。木旺乘土，六君加柴胡。呕吐腹痛，或大便不实，前汤加木香。胸膈虚痞，或肚腹不利，六君子汤。郁怒伤损肝脾，归脾汤。命门火衰，八味丸。仍审诸经错杂之症而治之。假如不能食而肌肉削，乃脾胃经本病。右关脉缓而弱。乃脾胃之本脉。若见弦紧，或四肢满闷，淋漓，便难，转筋，此肝之脾胃病也。若兼洪大，或肌热烦热面赤，此心之脾胃病也。若兼浮涩，或气短而喘急，咳嗽痰盛，此肺之脾胃病也。若兼沉细，或善恐善欠，此肾之脾胃病也。各当于本经药中，加兼症之药，此东垣先生之治法也。

附治验方药

一妇人停食饱闷，或用人参养胃汤、木香槟榔丸，而泄泻吐痰，腹中成块，又与二陈、黄连、厚朴，反加腹胀不食。余以为脾胃气虚，不能消磨，用补中益气加茯苓、半夏，五十余剂，脾胃健而诸症痊。

一妇人饮食每用碗许，若稍加，非大便不实，必吞酸嗳腐。或用二陈、黄连、枳实，反加内热作呕。余曰：此本虚寒中。不信，仍作火治，虚症悉至，月经不止。余用六君加炮姜、木香数剂，诸症渐退。又以补中益气加炮姜、木香、茯苓、半夏，数剂全愈。后因饮食劳倦，兼以怒气饮食顿少，元气顿怯，仍用前药，更加发热，脉洪大，按之而虚，两尺如无，此命门火衰，用补中益气加姜、桂及八味丸兼服，两月余，诸症寻愈。此症若因中气虚弱，用人参理中汤，或六君子加木香、炮姜，不应，用左金丸或越鞠丸。虚寒，加附子理中汤。无有不愈。

一妇人饮食后，或腹胀，或吞酸，自服枳术丸，饮食日少，胸膈痞满，腿内酸痛，畏见风寒，或用养胃汤，腿痛浮肿益甚，月经不行。余以为郁结所伤，脾寒湿热下注，侵晨用四君、芎、归、二陈，午后以前汤送越鞠丸，诸症渐愈。又用归脾、八珍，二汤兼服，两月余而经行。

一妇人胸满少食，或腹胀吞酸，或经候不调，此中气虚而不能施化也，用补中益气

加砂仁、香附、煨姜而饮食进，更以六君、芎、归、贝母、桔梗而经自调。

一妇人年二十余，忽不进食，日饮清茶水果，三年余矣。余谓脾气郁结，用归脾汤加吴茱萸四剂，遂饮食如常。若人脾肾虚而不饮食，当以四神丸治之。

一妇人不进饮食二年矣，日饮清茶果品之类，肝脾二脉弦浮，按之微而结滞。余谓肝脾气郁，用六君、木香、吴茱，下痰积甚多，饮食顿进，形体始瘦，卧床月余，仍服六君之类而康。

越鞠丸　治郁伤气滞，以致胸膈痞闷，或肚腹膨胀，或咽喉不清，或痰气不爽，或饮食少思，或吞酸嗳腐，宜用此药清之。若人脾胃虚弱，用六君子汤为主。大凡中气虚弱，变症百出，难以名状，但用四君补其脾胃，元气渐复，诸症自退。若用治病之药，则误矣。

香附　苍术炒　川芎　栀子炒　神曲炒　山楂各等分

上为末，用神曲糊丸绿豆大，每服六七十丸，食远白汤送下。

四君子汤　六君子汤　补中益气汤三方见二十四卷第六论　**八味丸**方见二十四卷第十一论　**人参养胃汤**方见七卷六论　**二陈汤**方见二十四卷第五论　**人**　**左金丸**方见七卷第十七论　**人参理中汤　附子理中汤**二方见二十卷第六论　**归脾汤　八珍汤**二方见二十四卷第四论　**二神丸　四神丸**二方见八卷第八论

妇人梦与鬼交方论第八

人禀五行秀气而生，承五脏神气而养，若调理失节，血气虚甚，则鬼邪干其正，隐避而不欲见人，时独言笑，或时悲泣，是其候也。脉息迟伏，或如鸟啄，或绵绵而来不知度数，面颜不变，亦其候也。

愚按：前症多由七情亏损心血，神无所护而然也，宜用安神定志等药，则正气复而神自安。若脉来乍大乍小，乍短乍长，亦为鬼祟也，宜灸鬼哭穴。以患人两手拇指相并，用线紧扎，当合缝处半肉半甲间均灸灸七壮，若果是邪祟病者则乞求免灸，云我自去矣。

茯神散　治妄有所见，言语杂乱，时或昏昧痰热。

茯神　两半，炒　茯苓　人参　石菖蒲各一钱　赤小豆五分

上水煎服。

桃仁丸　治与鬼魅交通。

辰砂另研　槟榔　当归　桃仁各二钱　水银　钱，寒肉一个研令星尽　麝香　阿魏面裹煨　沉香各半两

上为末，炼蜜丸桐子大，每服十丸，空心桃仁汤下。

辟瘟丹

虎头骨二两　朱砂　雄黄　雌黄　鬼臼　皂荚　芜荑仁　鬼箭羽　藜芦各一两

上为末，炼蜜丸弹子大，黛盛一丸，男左女右系臂上，及用一丸当病人户前烧之，一切邪鬼不敢近。

妙香散　治心气不足，精神恍惚，梦与鬼交，语言错乱，先服此以补气血，镇心安神，然后以前方治之。方见三卷第十二论

妇人伤寒伤风方论第九

伤寒之症，若气口脉紧盛，即下之。人迎紧盛，即汗之。左关浮紧，亦当发其汗。若犯胃热，谵语喜忘，小腹满，小便自利，用抵当汤。胃实谵语，用承气汤。脉紧无汗名伤寒。脉缓有汗为伤风。热病脉洪大为中暑，用香薷饮；脉细弱为中暍，用白虎汤；胃实用承气汤。伤寒先服黄龙汤，不分男女，但妊娠用药宜清凉，不可轻用桂枝、半夏、桃仁、朴硝等类。凡用药病稍退则止，不可尽剂，此为大法。

愚按：前症当宗仲景先生治法，但胎前产后须以安胎补益为主，须临症审之。

黄龙汤　即小柴胡汤去半夏。

桂枝红花汤　治伤寒发热，口燥舌干，经脉不来。

桂枝　芍药　甘草炙、各一钱　红花二钱

上姜枣水煎服，良久再进，汗出可解。

黄芩芍药汤　治妇人内热，口燥咽干，腹满不食。

黄芩炒　芍药酒炒　白术　熟地黄自制、各一钱

上水煎，寒加生姜。

当归汤　治伤寒喘急烦躁，或战而作寒，此阴阳俱虚，不可下，宜服此药。

柴胡一钱　白术炒、七分　人参　甘草炒　赤芍药　当归各五分　五味子杵炒　木通各三分

上用水姜枣煎。

泻心三黄汤　治伤寒六七日，内有燥屎，大便秘结，谵语目赤，毒气闭塞。

大黄煨　黄芩炒　黄连炒、各一钱

上水煎服，取微利。如目赤睛疼，加赤茯苓、竹叶。

烧裩散　治女子病新瘥与男子交者，名曰阴易。其证则里急胯痛，头重不举，目中生花，或头面烘热，耳中蝉鸣，胸中烦闷，甚者百节解散。用男子旧裩裆，着左腹者，剪取一块烧灰，每日三服，白汤下。男子病，则以女人者。如不应，用参附汤。

妇人热入血室方论第十

妇人伤寒伤风发热，经水适来，昼则安静，暮则谵语，有如疟状，此为热入血室，治者无犯胃气及上二焦，宜服小柴胡汤。若脉迟身凉，当刺期门穴，下针病入五吸，停针良久，徐徐出针。凡针期门穴，必泻勿补，肥人二寸，瘦入寸半也。

愚按：前症若因劳役，或怒气发热，适遇经行，而患前症者，亦用小柴胡加生地黄治之。血虚，用四物加柴胡。若病既愈而热未已，或元气素弱，并用补中益气汤。脾气素郁，用济生归脾汤。血气素虚，用十全大补汤。

附　治　验

一妇人经行，感冒风邪，昼则安静，夜则谵语，此热入血室也。用小柴胡加生地黄治之。顿安。但内热头晕，用补中益气加蔓荆子而愈。后因怒恼，寒热谵语，胸腹胀痛，小便频数，月经先期，此肝火血热妄行，用加味逍遥加生地黄而愈。

一妇人因怒，寒热头痛，谵言妄语，至夜益甚，月经暴至，此怒动肝火，用加味逍遥散加生地黄治之，神思顿清，又用补中益气汤而痊。

一妇人经行，感冒谵语，或用发散寒凉之剂，前症益甚，月经不止，肚腹作痛，呕吐不食，痰涎自出，此热入血室，而寒复伤胃也，用香砂六君及归脾而痊。

干姜柴胡汤　治妇人伤寒，经脉方来，热入血室，寒热如疟，或狂言见鬼。

柴胡一钱　桂枝三分　栝蒌根五分　牡蛎煅　干姜炮　甘草炙、各三分

上水煎，汗出而愈。

海蛤散　治妇人伤寒，血结胸膈，宜服此药，及针期门穴。

海蛤　滑石煅、水飞　甘草各二分　芒硝一两

上为末，每服二钱，用鸡子清调下，小肠通利，其结血自散，更用桂枝红花汤，发其汗则愈。方见前

附　方

小柴胡汤方见二十四卷第二论　**四物汤**　**香砂六君子汤**　**补中益气汤**三方见二十四卷第六论　**归脾汤**　**十全大补汤**　**加味逍遥散**三方见二十四卷第四论

妇人咳嗽方论第十一

大肺为四脏之华盖，内统诸经之气，外司腠理皮毛，若外邪入于肺中，故令咳嗽，当以脉息辨之，浮而弦者起于风，濡而弱者起

于湿，洪而数者起于热，迟而涩者起于寒。风者散之，湿者燥之，热者凉之，寒者温之，虚者补之。

愚按：丹溪云：春是木气上升，夏是火气炎上，秋是湿热伤肺，冬是风寒外来。当发散、行痰、开腠理，用二陈汤加麻黄、桔梗、杏仁。痰饮，随症加药。劳嗽，宜四物加竹沥、姜汁。干咳嗽，难治。此症乃痰郁火邪也，用苦梗开之。夏用补阴降火，不已则成劳。上半日多嗽者，胃火也，用贝母、石膏。午后嗽者，阴虚也，用四物加炒黑黄柏、知母。黄昏嗽者，火气浮于肺也，用五味子、五倍子。五更嗽者，饮食之火流于肺也，以贝母、软石膏。肺胀而嗽，或左或右不得眠，此痰挟瘀血气滞而病，宜养血疏肝清痰，用四物加桃仁、诃子、青皮、竹沥之类。嗽而胁下痛，宜疏肝气以青皮。挟痰实者，白芥子之类。血碍气作嗽者，桃仁、大黄。姜汁丸服。治嗽多用生姜，以其辛散故也。痰因火动，逆上作嗽者，先治火，次治痰，以知母止嗽清肺，滋阴降火。夜嗽用清阴分之剂，若嗽多，用粟壳，不必疑，但要去病根，此乃收敛药也。窃谓前症，午前嗽属胃火盛，用竹叶石膏汤。胃气虚，用补中益气加炒山栀。午后嗽，属阴血虚，用四物、黄柏、知母二味酒拌炒黑。肾水虚，用六味地黄丸。黄昏嗽，用四物、五味、麦门，并前丸。五更嗽，用六君子。不得眠及两胁下痛，用六味地黄、补中益气。若因气虚，腠理不密，六淫所侵，当祛外邪而实脾土。若因心火太过，当伐肝木而滋肺金。若因肺金气虚，当补脾土而生肺气。若因肾水亏损，虚火炎上，当补肺肾以滋化源。大抵风邪胃火，此实热为患，易治。惟肺肾亏损，此真脏为患，最难调治。

附　治　验

一妇人素勤苦，冬初咳嗽发热，吐血盗汗，遍身作痛，或寒热往来，用化痰降火之药，口噤筋挛，此血本虚而药复损之耳。余用八味丸为主，佐以补中益气、麦门、五味、山药，年余而愈。

一妇人咳嗽发热，呕吐痰涎，日夜约五六碗，喘咳胸痞，燥渴不食，崩血如涌，此脾土虚寒，用八味丸及附子理中汤而愈。余见女科撮要

一妇人不得于姑，患嗽，胸膈不利，饮食无味，此脾肺俱伤，痰郁于中也，先用归脾汤加山栀、抚芎、贝母、桔梗，诸症渐愈，后以六君加芎、归、桔梗，间服全愈。

一妇人咳嗽，早间吐痰甚多，夜间喘急不寐，余谓早间多痰，乃脾虚饮食所化，夜间喘急，乃肺虚阴火上冲，用补中益气加麦门、五味而愈。

一妇人患咳嗽，胁痛发热，日晡益甚。余曰：此肝脾虚热而伤肺也。用加味逍遥散加熟地治之而愈。后因怒气劳役，前症仍作，兼太阳痛，或寒热往来，或咳嗽遗尿，此肺气虚而尿脬失制也，仍用前散及地黄丸而瘥。

一妇人久咳嗽，面色痿黄，或时眩白，肢体倦怠，饮食少思，稍多则泻，此脾土虚而不能生肺金，朝用补中益气汤，夕用六君子汤为主，间佐以八珍汤，三月余渐愈。后感寒邪喘嗽，胸腹作胀，饮食不入，四肢逆冷，此中气尚虚，不能充皮毛、肥腠理、司开阖之所致也，遂用六君加生姜、桔梗而愈。

附　方

法制清气化痰丸　顺气快脾，化痰消食。

半夏　南星去皮尖　白矾　皂角　干姜各四两

先将白矾等三味，用水五碗，煎取水三碗，却入半夏二味，浸二日再煮，至半夏、南星无白点为度，晒干。

陈皮丸

陈皮　青皮　紫苏子炒　萝卜子炒，另研　杏仁去皮尖，炒研　葛根　神曲炒　麦蘖炒　山楂子　香附子

上为末，蒸饼丸，桐子大，每服五七十

丸，临卧茶汤任下。

茯苓汤　治胸中有痰饮吐水，心胸虚满，不能进食。

茯苓　人参　白术炒，各三两　枳实炒，一两　橘皮二两半　生姜四两

上用水六升，煮取二升，分三服。

加减小柴胡汤　治咳嗽寒热往来。

柴胡　半夏　黄芩炒，各一钱　甘草炒　干姜炮，各五分　五味子炒杵三分

用水煎服。

黄连解毒汤　治一切实火喘咳，脉洪大，或狂言烦躁，口干饮冷，喘急鄂声，目睛赤痛。

黄连　黄芩　栀子　黄柏各二钱

用水煎服。

栀子仁汤　治喘咳发热潮热，发狂烦躁，面赤咽痛。

栀子仁　赤芍药　大青　知母各一钱　升麻　黄芩　石膏　甘草　杏仁各二钱　柴胡二钱半　豆豉百粒

用水煎服。

麦门冬汤　治火热乘肺，咳嗽有血、胸胁胀满，五心烦热。

麦门冬去心　桑白皮炒　生地黄各一钱　半夏　紫菀　桔梗　淡竹叶　麻黄各十分　五味子杵　甘草各五分

上姜水煎服。

二陈汤方见二十四卷第六论　**竹叶石膏汤**方见十三卷第十论　**补中益气汤**　**四物汤**　**六君子汤**三方见二十四卷第六论　**六味丸**　**八味丸**二方见二十四卷第十一论　**附子理中汤**方见二十卷第八论　**归脾汤**　**加味逍遥散**　**八珍汤**三方见二十卷第四论

咳嗽用温药方论第十二初虞世

经曰：微寒为嗽，寒甚为肠澼。古人立方，多用干姜、桂心、细辛之属。若热在上焦而嗽，虚则为肺痿，实则为肺痈。或因气血不足，或因酒色厚味，或因重亡津液，燥气焚金，故脉数发热，咳嗽脓血，宜辛温建中之属，若用柴胡、鳖甲、门冬、葶苈等药则误矣。

愚按：丹溪云：阴分嗽者，多属阴虚肺胀，不得眠者难治。肺痿专主补气，养血清金。肺气有余者，宜泻之，以桑白皮为主，半夏、茯苓佐之，泻其有余，补其不足。肺燥者，当润之。属热者，桔梗、大力子、知母、鸡子清。声哑者属寒，细辛、半夏、生姜。肺虚者，人参、阿胶为主。阴不足者，六味地黄为要药，或知母茯苓汤。阴虚气喘，四物加陈皮、甘草，以降其气，补其阴。窃谓前症，嗽而鼻塞声重，风邪伤肺也，用参苏饮。面赤喘嗽，火克肺也，人参平肺散。寒热交作，肝气不和也，四君加知母、柴胡、桔梗。咳喘短气，肺虚也，人参补肺汤。体倦少食，脾虚也，参术补脾汤。口干咽燥，虚火上炎也，六味丸。大凡发热喘嗽，或咳唾脓血，饮食不入，急补脾肺，滋肾水，多有得生者。脉浮大而面色赤者，皆难治。脉浮短涩者可疗。

参苏散　治外感风寒，咳嗽气逆，血蕴上焦，发热气促，或咳血衄血，或痰嗽不止。加黄芩、山栀，名加味参苏饮。

人参　紫苏叶去梗　半夏姜汁拌炒　茯苓　陈皮　桔梗　葛根　前胡　枳壳麸炒，各一钱　甘草炙，五分

上姜水煎服。

金沸草散　治肺经受风，头目昏疼，咳嗽声重，涕唾稠粘。

荆芥穗七分　前胡　麻黄　旋覆花各七分　甘草炙　赤芍药　半夏各五分

用姜枣水煎服。

定喘汤　治痰喘胸满，坐卧不安，声重鼻塞头昏。

半夏曲　明阿胶炒　甘草炒，各五分　罂粟壳一钱，制　五味子杵炒　桑白皮炒　麻黄去节　人参各三分

上姜三片，乌梅半个，水煎临卧服。

金不换正气散　治肺胃虚弱，咳嗽不已，

喘满涎盛。

罂粟壳一钱，制　杏仁制　甘草　枳壳各五分

上生姜、乌梅水煎。

《录验》橘皮汤　治肺伤冷湿咳嗽，喉中作声，上气头痛。

陈皮　紫菀　麻黄去根　杏仁制　当归各一钱　桂心　甘草炒　黄芩各五分，炒

用水煎服。

华盖散　治肺感寒邪，咳嗽声重，胸膈烦满，头目昏眩。

苏子炒　陈皮　赤茯苓　桑白皮炒　麻黄各一钱　甘草五分

用姜水煎服。

《千金》五味子汤　治咳嗽皮肤干燥，唾中有血，胸胁疼痛。

五味子炸炒　桔梗炒　紫菀　甘草炒　续断各一钱　竹茹三钱　赤小豆一撮　生地黄　桑白皮各半两

上水煎服。

知母茯苓汤　治咳嗽不已，往来寒热，自汗喘促，或肺痿。

知母　茯苓各一两　五味子炸　人参　薄荷　半夏　柴胡　白术　款花　桔梗　麦门冬去心　黄芩炒，各半两　川芎　阿胶　甘草炙，各三钱

上每服一两，姜水煎。

小青龙汤　治肺感寒。咳嗽喘息加杏仁煎，有汗去麻黄、细辛。发热头疼，脉沉细，或呕或咳，或利或噎，或小便不利，小腹满胀，喘嗽之圣药。

泻白汤　桔梗汤　人参平肺散　人参补肺散　参术补肺汤五方见二十四卷十二论　**六味丸**方见二十四卷第十一论　**四物汤　四君子汤**二方见二十四卷第六论

劳嗽方论第十三

经曰：感于寒，微则为咳，甚则为泄。盖肺主气，合于皮毛，邪伤皮毛，则咳为肺病，传于各脏，以时受邪，肺为嫩脏，邪易伤而难治。其嗽有肺、心、脾、肾、肝、风、寒、支、饮、胆之十种。亦有劳嗽者，华佗谓之虫嗽，孙真人谓之注嗽，此因酒色过度，劳伤肺经，重者咯唾脓血，轻者时发时瘥。或先呕血而后嗽，或先咳嗽而吐血，此又挟邪传痃，孙真人用通气丸。梦与鬼交，用四满丸、蛤蚧、天灵盖、桃柳枝、安息香之类。若肺中有虫，入喉痒嗽，须以药含化，其虫即死，嗽即止。

愚按：仲景先生云：咳而两胁痛，不能转侧，两胠满，属于肝脏。用小柴胡汤。咳而呕苦水，属胆腑，黄芩半夏生姜汤。咳而喉中如梗状，甚则咽肿喉闭，属心脏，桔梗汤。咳而大便失气，属小肠腑，芍药甘草汤。咳而右胠痛，阴引肩背，甚则不可动，动则咳剧，属脾脏，升麻汤。咳而呕，呕甚则出长虫，属胃腑，乌梅丸。咳而喘息有声，甚则唾血，属肺脏，升麻汤。咳而失屎，属大肠腑，麻黄附子细辛汤。咳而遗溺，属膀胱，茯苓半夏汤。咳而不止，三焦受之，其状腹满，不食，涕唾，面目浮肿，气逆，异功散。用之对证，其效如神。仍参五卷看。

附　治　验

一妇人患前证，晡热内热，寒热往来，作渴盗汗，小便频数，其经两三月一行，此肝脾气血虚损，用八珍汤、六味丸各六十余剂，诸症渐愈。其经两月一行，仍用前二药，间以加味逍遥散，各三十余剂。后恚怒适经行，去血过多，诸症悉至，饮食少思，腹肿气促，用十全大补汤，数剂渐愈。仍用前药，调补渐愈，复因丧子，胸腹不利，食少内热，盗汗便血无寐，用加味归脾汤，仍兼前药而愈。

一妇人患前症，不时发热，或时寒热，或用清热之剂，其热益甚，盗汗口干，两足如炙，遍身皆热，昏愦如醉，良久，热止方苏，或晡热，至旦方止，此阴血虚而阳气弱也。余朝用六味丸料，夕用十全大补汤，月馀诸症

稍愈，更兼以补中益气汤，两月馀而愈。

孙师四满丸　治上气嗽、饮嗽、燥嗽、冷嗽、邪嗽，谓之五嗽。

干姜炮　桂心　蹢躅花　芎劳　紫菀各二两　芫花根皮二分　蜈蚣一条，去头足，炙　细辛甘草炙　鬼督邮　人参　半夏泡，各一两

上为末，炼蜜丸大豆许，每服五丸，米饮下，日三服，未应，加至七八丸。

温金散　治劳嗽喘闷，咯痰中有血。方见前劳瘵类

阿胶丸　治劳嗽并嗽血咯血。方见前劳瘵类下补遗

团鱼丸　治骨蒸劳嗽，累效。

贝母　前胡　知母　杏仁　柴胡各等分　生团鱼二个

上药与鱼同煮熟，取肉连汁食之。将药焙干为末，用骨更煮汁一盏，和药丸梧子大，每服二十丸，煎黄芪六一汤，空心送下，病既安，仍服黄芪六一汤调理。

附　方

地骨皮散

知母炒　柴胡　甘草炒　人参　地骨皮　茯苓　半夏姜制，各一钱

用姜水煎服。

海藏紫菀散　治咳中有血，虚劳肺痿。

人参　紫菀　知母炒　贝母　桔梗炒　茯苓　阿胶炒，各一钱　五味子杵，三分　甘草炙，五分

用姜水煎服。

参术调中汤　泻热补气，止嗽定喘，和脾胃，进饮食。

黄芪四分　桑白皮五分　人参　炙甘草　青皮　白茯苓各三分　五味子杵，五分　白术三分　地骨皮　麦门冬　陈皮各五分

用水煎服。

二陈汤　治脾胃虚弱，中脘停痰，或呕吐恶心，或头目不清，饮食少思。方见二十四卷第五论

异功散方见二十四卷第五论　**六味丸**方见二十四卷第十一论　**八珍汤**　**加味逍遥散**　**十全大补汤**　**加味归脾散**四方见二十四卷第四论　**补中益气汤**方见二十四卷第六论

喘满方论第十四

岐伯曰：夜行则喘出于肾，淫气病肺。有所堕恐，喘出于肝，淫气害脾。有所惊恐，喘出于肺，淫气伤心。度水跌仆，喘出于肾与骨。皆因外邪所感而致。太阳病，则脉浮无汗而喘，用麻黄汤。阳明病，则汗出腹满，喘而潮热，承气汤。表邪未解，喘促汗出，葛根黄芩汤。微喘，桂枝厚朴杏仁汤。汗出而喘，麻黄杏于甘草石膏汤。表邪未解，小青龙汤去麻黄加杏仁。感寒伏热而喘，九宝汤。气郁痰盛喘促，四七汤。涎多而喘，千缗汤。不得卧而喘，神秘汤。寒热喘咳，枣膏丸。上气喘促，神授汤。上盛下弱，吞黑锡丹。若四肢逆冷，脉息沉细，或寸大尺小，胸胀冷汗，大便频数，上气喘促，此虚极挟寒之阴症，急用返阴丹。

愚按：东垣云：肺金受邪，由脾胃虚弱，不能生肺，乃所生受病，故咳嗽气短，气上皮毛，不能御寒，精神少而渴。情惨不药，皆阳气不足，阴气有余也。治法若肺气虚弱，用四君、枳壳、半夏。脾虚不能生肺，补中益气汤。七情气结，四七汤。脾经郁结，归脾汤。脾气虚弱，人参补肺散。肺经火盛，人参平肺散。肾水败浊，六味丸。真阳虚损八味丸。或兼小便不利，为害尤速，非二丸不能救。仍与前十一、十二论互用。

附　治　验

一妇人伤风寒作喘，或用表散，愈而复患，仍用前药，其症益甚，饮食少思，胸腹不利，此因脾肺气虚也，予先用六君子汤加桔梗渐愈，又用补中益气汤全愈。

一妇人患前症，属命门火虚，不能生脾土，用补中益气汤、八味地黄丸而痊。后复

患，其喘益甚，用前药不应，遂用黑锡丹二服喘止，仍用前二药，而诸症痊。凡属邪气有余者，其症易识，治效亦速。其属元气不足者，变症不一，效非可以旦夕期也。

神秘汤　治水气乘肺作喘，或支饮喘满，痰嗽不食。

陈皮去白　紫苏叶　人参　桑白皮　生姜各一钱

上水煎服。

千缗汤

半夏七枚，炮制　皂角去皮尖弦，一寸　甘草炙，一寸　生姜如指大

上姜水煎服。

枣膏丸　治息贲在右胁下，大如杯，令人洒淅寒热喘咳。

甜葶苈　陈皮　苦梗各等分

上为末，煮枣肉丸桐子大，每服数丸，白汤下。

许学士云：余常停饮水积，食已必嗽渐喘，觉肺系急，服此良验。

神授汤　治上气喘急不得卧。

橘红　桔梗　紫苏　人参各一钱　五味子炸炒，三分

上姜水煎服。

九宝汤　治伏热咳嗽喘急，虚劳自汗者不可服。

薄荷　紫苏　大腹皮洗　甘草炒　杏仁去皮尖　陈皮各一钱

用姜十片，乌梅一个，水煎。

四磨汤　治七情郁结，上气喘急满闷，痰涎上涌。

人参　槟榔　沉香　乌药

上四味，各浓磨，白沸汤少许温服。

五味子汤　治咳嗽，皮肤干燥，睡中有血，胸胁疼痛。

五味子炸炒　桔梗炒　紫菀　甘草炒　续断各五钱　竹茹一钱　赤小豆一撮　生地黄二钱　桑白皮二钱

上水煎服。

附　方

六君子汤　**四君子汤**　**补中益气汤**三方见二十四卷第六论　**四七汤**方见十一卷第七论　**归脾汤**方见二十四卷第四论　**人参补脾散**　**人参平肺散**二方见二十四卷第十二论　**六味丸**　**八味丸**二方见二十四卷第十一论　**黑锡丹**方见四卷第四论

妇人风痰积饮咳嗽方论第十五

妇人脾胃虚弱，风邪外侵，以致痰滞咳嗽，眼昏头眩。经云：九窍不利，肠胃之所生也。无择云：凡属风热，三生饮、化痰丸。属寒冷，金沸草散。属暑热，消暑丸。属气郁，四七汤。在上，瓜蒂散吐之。在下，控涎丹利之。仍观人之勇怯，脉之虚实。

愚按：前症若肝经恚怒，用小柴胡汤。肝经风热，用钩藤散。肝肾气虚，用川芎散。脾经郁结，用济生归脾汤。郁怒伤肝脾，用加味逍遥散。脾虚痰逆，用白术半夏天麻汤。脾气虚弱，用六君子益气汤。肺气郁滞，用二陈、贝母、桔梗。阴亏水泛，六味地黄。肾虚阴火，加减八味丸。肾虚火不归源，八味地黄丸。仍与前按互相用之。

附　治　验

一妇人内热口干，劳则头晕，吐痰带下，或用化痰理气药，前症益盛，肢体或麻。又用祛风化痰药，肢体常麻，手足或冷或热。此脾土不能生肺金也。余用补中益气加茯苓、半夏、炮姜，二十余剂渐愈。又用加味逍遥散，三十余剂全愈。后因怒，吐痰胸痞，或用清气化痰丸，食少痰甚，胸胁胀满，脉或浮大，或微细，余以六君倍用参、术，少加木香而康。

一妇人咳嗽胁痛，或用清肺化痰降火等剂，久不愈，更加内热晡热，苦两胁或小腹内热，其咳益甚，小便自遗。余曰：此属肝经血虚火动。用六味丸加五味子，滋肾水以生肝血，用补中益气生脾土以滋肺金而寻愈。

旋覆花汤　治风痰呕逆，饮食不下，头目昏闷等症。

旋覆花　枇杷叶　川芎　细辛　赤茯苓各一钱　前胡一钱五分

用水姜枣煎。

大半夏汤　治痰饮，脾胃不和，咳嗽呕吐，饮食不入。

半夏　白茯苓　生姜各一钱

上姜水煎服。胃痞加陈皮，如不应，四七汤亦善。

导痰汤　治痰涎壅盛，胸膈痞塞，或咳嗽恶心，饮食少思。

半夏四钱　南星　枳实麸炒　茯苓　橘红各一钱　甘草五分

上姜十片，水煎。

附　方

川芎散　治肝肾气虚，头风眩运。

小川芎　山药　白茯苓　甘菊花　人参各五钱　山茱萸肉一两

上每服一两，食前空心水煎服。或为末，酒调，日三服。

小柴胡汤方见二十四卷第二论　**钩藤散**方见四卷第四论　**归脾汤**　**加味逍遥散**二方见二十四卷第五论　**白术半夏天麻汤**方见四卷第五论　**六君子汤**　**补中益气汤**二方见二十四卷第六论　**二陈汤**方见二十四卷第五论　**六味丸**　**加减八味丸**　**八味丸**三方见二十四卷第十一论

妇人心胸嘈杂方论第十六

妇人嘈杂，此脾胃郁火，痰滞血液泪汗而成，用猪血炒食之，乃以血导血，而使之归源尔，旋覆花汤尤善。

愚按：前症若因食郁，用六君、山楂、山栀。若因胃热，用二陈汤、炒芩、连。若因六郁，用越鞠丸。若因气滞，用四七汤、桔梗、枳壳。大抵此症属病气元气俱不足，须用六君为主，少佐以治痰之药。若以火治之，必变吞酸中满。

附　治　验

一妇人饮食少思，胸中嘈杂，头晕吐痰，此中气虚而有热，用六君子汤加炒黑山栀、桔梗而愈。后因劳碌，头晕发热，吐痰不食，用补中益气加半夏、茯苓、天麻而痊。

一妇人中脘嘈杂，口中辛辣，或咳嗽吐痰发喘，面色或白或赤，此脾气虚而肺中伏火也，用六君子加山栀、桔梗、柴胡及炒黑片芩治之寻愈。

一妇人嘈杂吞酸，饮食少思，大便不实，此脾气虚寒而下陷，用补中益气汤加茯苓、半夏、炮姜渐愈，又常服人参理中丸则安。

一妇人饮食后，嘈杂吞酸，此食郁为痰，用六君子汤、送越鞠丸渐愈，又用加味归脾汤而痊。后因怒，两胁胀痛，中脘作酸，用四君汤送左金丸渐安，仍用六君子汤送越鞠丸而瘥。

旋覆花汤　治脾胃虚寒，中脘停痰，汪洋嘈杂，肠鸣多睡，呕吐不食，胁肋胀痛，脉沉迟弦细。

旋覆花　细辛　橘红　桂心　入参　甘草炒　桔梗　白芍药　半夏五分　赤茯苓各三分

上姜水煎服。

余治妇人心胸嘈杂，用茯苓补心汤治之而愈。方见前

附　方

补中益气汤　**四君子汤**　**六君子汤**三方见二十四卷第六论　**二陈汤**方见二十四卷第五论　**越鞠丸**方见前第七论　**四七汤**方见十卷第七论　**归脾汤**方见二十四卷第四论　**人参理中汤**方见二十卷第八论

校注妇人良方　卷七

宋　临川　陈自明良甫编辑
明　古吴　薛　己立斋补注
鄞县　曹赤电炳章圈校

妇人呕吐方论第一

妇人呕吐，良由脾胃不调，外邪乘之，或胃中虚冷，或胃口有热，或中脘停痰，或胃经血弱。治法胃冷者，丁香散、理中丸。胃热者，小柴胡汤、竹茹汤。胃虚者，藿香正气散。停痰者，半夏茯苓汤、二陈汤。血虚者，十全大补汤加陈皮、半夏、藿香。

愚按：东垣先生云：前症内有故寒与新谷俱入于胃，新故真邪相攻，气并相逆，复出于胃，故为哕，补手太阴，泻足少阴。又云：胃因气逆为哕。夫呕吐哕者，俱属于胃，以其气血多少为异耳。如呕者，阳明也，阳明多血多气，故有声有物，血气俱病也。仲景云：呕多虽有阳明症，慎不可下。孙真人云：呕家多服生姜，为呕家之圣药也。气逆者，必散之，故以生姜为主。吐者，太阳也，太阳多血少气，故有物无声，为血病也。有食入则吐，以橘皮去白主之。哕者，少阳也，多气少血，故有声无物，乃气病也，以姜制半夏为主。若脾胃虚弱，寒邪所客，饮食所伤者，用六君子、丁香、藿香、生姜之类。若胃中有热，膈上有痰，用二陈、山栀、黄连、生姜。若久病胃虚，呕而不纳谷者，用生姜、参、术、黄芪、香附之类。亦有痰膈中焦，食不得下者，有气逆而呕者，有气郁于胃口，有食滞于心肺之分而复出者，有胃口有火与痰而呕者。若注船大吐渴饮水者，冲童便饮之最妙。前论云：血不归源而呕，用十全大补汤。诚发前人之未发，愚常用屡效。此论与王安道先生《澜回集》所论少异，仍宜参看之

附　治　验

太守阳山之内，素善怒，胸膈不利，吐痰甚多，吞酸嗳腐，饮食少思，手足发热数年矣，所服非芩、连、枳实，必槟、苏、厚朴，左关弦洪，右关弦数。此肝火血燥，木乘土位，朝用六味地黄丸，以滋养肝木，夕用六君、归、芍，以调补脾土而愈。乙巳夏，因大怒，吞酸嗳腐，胸腹胀满，或用二陈、石膏治之，吐涎如涌，外热如灼，脉洪大，按之如无。余曰：此脾胃亏损，虚阳发越于外，脾败而涎泛出也。用六君加姜、桂一盅，即睡觉而诸症如失，又数剂而康。

先太宜人饮食后，闻外言忤意，呕吐酸水，内热作渴，惟饮冷水，气口脉大而无伦，面色青赤，此肝脾郁火。投之以药，入口即吐，第三日吐宿食，第七日吐酸黄水，十一日吐苦水，脉亦洪大，仍喜饮冷。以黄连煎汤，冷饮少许，至二十日加白术、茯苓，二十五日加陈皮，二十七日加当归、炙草，至六十日始进米饮半盏，渐进薄粥，调理即痊。

一妇人食后因怒，患症呕吐，用藿香正气散而愈。后复怒吐痰，狂言热炽，胸胁胀痛，手按少得，脉大无伦，按之微细，此属肝脾二经血虚。以加味逍遥散加熟地、川芎二剂，脉症顿退，再用十全大补汤而安矣。府痒沈姬文母，患脾虚中满，痰嗽发热，又食湿面冷茶，吞酸呕吐绝食，误服芩、连、青皮等药，益加寒热，口干流涎不收，闻食则

呕，数日矣，迎治。余曰：脾主涎，此脾虚不能约制也。欲用人参安胃散，惑于众论，以为胃经实火宿食治之，病日增剧。忽思冬瓜，食如指甲一块，顿发呕吐酸水不止，乃服前药愈剧。复邀视之，则神脱脉绝濒死矣，惟目睛尚动。余曰：寒淫于内，治以辛热，然药不能下矣。急用盐艾、附子炒热熨脐腹，以散寒回阳，又以口气补接母口之气，又以附子作饼，热贴脐间，时许神气少生，以参、术、附子为末，仍以是药加陈皮煎膏为丸如粟米大，人五七粒于口，随津液咽下，即不呕。二日后，加至十粒，诸病少退，其涎不止。五日后，渐服前剂一二匙，胃气少复，乃思粥饮。后投以参、术等药，温补脾胃，五十余剂而愈。

丁香散　治脾胃气弱呕吐，水谷不入。

丁香　白术　缩砂　草果各三钱　人参一两　当归　白豆蔻　藿香　甘草各半两，炒　橘皮三分　神曲炒　诃子各半两

上为末，每服二钱，姜枣汤调。

竹茹汤　治胃热呕吐。

干葛二钱　半夏姜制，三钱　甘草五分　竹茹一弹子大

上姜枣水煎服。

许学士先生云：胃热者，手足心热也。政和中，一宗人病伤寒，得汗身凉。数日，忽呕吐，药食不下，用丁香、藿香、滑石等药，下咽即吐。余曰：此正汗后余热留胃脘，正宜竹茹汤。用之即愈。

许仁则半夏丸　治胃冷呕逆不食。

半夏洗去骨一斤　小麦面一斤

上水和丸如弹子大，水煮熟，初服三四丸，二服加至十四五丸，旋煮间服。

七味人参丸　服前丸不应，可服此药。

人参　白术各五两　厚朴姜制　细辛各四两　生姜　橘皮三两　桂心一两

上为末，炼蜜丸桐子大，米饮下十丸，渐加至二十丸。

青金丸　治呕吐不已。

硫黄三钱　水银一钱

上入铫内，慢火化，以木片拨炒成砂，研至黑，不见白星，姜汁糊丸绿豆大，每服二三十丸，米饮下。

附　方

人参安胃散　治脾胃虚热，呕吐泄泻，或饮食不入。

人参一钱　黄芪炒，二钱　生甘草　炙甘草各五分　白芍药七分　白茯苓四分　陈皮三分　黄连炒，二分

上水煎服。

六君子汤方见二十四卷第六论　**加味逍遥散**　**十全大补汤**二方见二十四卷第四论　**六味丸**方见二十四卷第十一论　**藿香正气散**方见二十四卷第九论

妇人霍乱方论第二

论曰：呕吐而利者，名霍乱也。因肠胃虚弱，饮食过度，触冒风冷，清浊相干所致。或先腹痛而吐，或先吐而痛，或吐利并作，当分寒热而治之。饮冷者，五苓散。饮汤者，理中丸。四肢逆冷，脉微细者，用通脉四逆汤加猪胆汁。中暑霍乱，烦渴饮冷，转筋者，用香薷散。脉浮洪者易治，微迟者难治。

愚按：贾元良先生云：暑者相火行令也，夏月人感之，自口齿而入，伤心胞络之经。其症头疼口干，面垢自汗，倦怠少气，或背寒恶热，甚者迷闷不省，或霍乱吐利，呕痰腹痛，或下血发黄生斑等症。治法清心火利小便为主。若自汗热甚，用白虎汤。若头疼恶寒，用十味香薷散。泄泻烦渴，饮水吐逆，用五苓散。热甚烦渴，用益元散清之。若表解里热甚者，用黄连解毒汤。脉微下利，作渴喜温，或厥冷不省人事，宜竹叶石膏汤，加熟附半枚冷饮，次以来复丹、五苓散治之。故东垣云：脾胃虚弱，遇夏月淫雨，身重短气，甚则四肢痿软，脚软眼黑，当滋肺气，以补水之源，是以五月常服五味子、人参、麦门

冬之剂，为热伤元气故耳，丹溪所谓夏月伏阴在内也。盖人之腹属地，巳月六阳尽出于地之上矣，是人之阳气亦浮于肌表，散于皮毛，而腹中之阳虚矣。又加以凉台水馆，大扇风车，寒泉水果，冰凉之物，自内及外，不用温热，病所由生。陈无择云：凡中暍切不得用冷药，惟用温养，得冷即死。道途无汤，即以热土熨脐中，溺以热尿即苏，概可见矣。《内经》曰：脉虚身热，得之伤暑。《难经》云：伤暑得之为正邪，火自病也，当恶臭，其病身热而烦，心痛，其脉浮大而散。《伤寒论》曰：太阳中暍者，身热疼痛而脉微弱，或发热恶寒而脉微细乳迟。大抵寒伤形，热伤气，盖伤气而不伤形，则气消而脉虚弱，故先哲立法，夏月宜补，良有以也。前症若内有所积，外有所感，用二陈汤加减治之，或萝卜子捣碎，服而吐之，若饮米汤即死云云，同前论。若转筋不住，男子以手挽阴，女子以手牵乳近两边，此《千金》妙法也。干霍乱不得升降，死在须臾，当以盐汤吐之，后以二陈汤加川芎、苍术、防风、白芷，姜煎服。若登圊而不通，加枳壳。若食瓜果饮冷，乘风霍乱，用六和汤，倍加藿香。凡中暑而亡者，皆因元气虚弱而暑热乘之，以致泄泻，阳气暴脱，实为阴寒之症，宜急补其阳，庶得保生，缓则不救。其他执为暑热，投以寒药，鲜不误事。愚故以回阳固本之方，继之于后。

附　治　验

进士李通甫之内，冬间开衣箱，其内衣裳乃夏月所晒者，开时觉暑气所侵，良久患霍乱，足指足跟俱转筋甚恶，自分必死，用香薷饮一剂，急煎下咽即愈。

加减理中丸　治肚腹疼痛，手足逆冷，饮食不入等症。

人参　白术　干姜　甘草各等分

上为末，炼蜜杵匀，每两作五丸，每服一丸，白汤化下。呕吐加枳壳，泄泻加干姜，吐泻干呕加半夏，体冷微汗腹寒加炮附子，水煎服。

四顺附子汤　治霍乱吐利腹痛，手足厥冷，脉微绝。方见八卷十一论

四逆汤加猪胆汁，名四逆猪胆汁汤。

甘草三两　干姜三两　附子一枚，生

上每服五钱，水煎，入猪胆汁半合，作二服。

香薷散　治吐利腹疼，发热头痛，或霍乱转筋拘急。

香薷二钱　白扁豆　厚朴姜制　茯苓各一钱

上水煎冷服，连进二三剂。加黄连，名黄连香薷饮。

附　方

十味香薷散　治伏暑身体倦怠，头痛恶寒，或吐泻等症。

香薷一两　人参　陈皮　白术炒　茯苓　黄芪炒　木瓜不犯铁器　厚朴姜制　扁豆　甘草炒，各半两

上每服一两，水煎。

清暑益气汤　治长夏湿热所蒸，四肢困倦，精神短少，懒于动作，胸满气促，支节作疼，或气高而喘，身热而烦，心下膨闷，小便黄数，大便溏频，或泻利作渴，不思饮食，自汗体重。

黄芪炒　苍术　升麻各一钱　人参　白术　神曲炒　陈皮各五分　甘草炙　黄柏炒　麦门冬去心　当归各三钱　葛根二分　五味子九粒，炒杵　泽泻五分　青皮二分

上水煎服。

白虎汤　治胃热作渴，暑热尤效。又治热厥腹满，身难转侧，面垢谵语，不时遗溺，手足厥冷，自汗脉沉滑。

知母　石膏各二钱　粳米半合

上水煎服。

人参白虎汤　治暑热发渴，脉虚等症。

人参一钱五分　知母二钱　石膏半两　甘草一钱

上入粳米一合，水煎服。

人参益气汤　治暑热伤气，四肢困倦，嗜卧少食，两手指麻木。

黄芪炒，八钱　甘草七钱，内炙二钱　人参半两　升麻一钱　白芍药炒，三钱　五味百四十个，杵炒　柴胡二钱五分

上㕮咀，分作四服。

大顺散　治冒暑伏热，引饮过多，脾胃受湿，水谷不分，清浊相干，阴阳气逆，霍乱呕吐，脏腑不调。

甘草炒　干姜炮　杏仁去皮尖炒　桂去皮

上为末，每服二三钱，汤点服。

消暑丸　治伤暑发热头疼，或呕吐泄泻，二便不分。

半夏　甘草炒　茯苓各半斤

上为末，生姜汁和丸桐子大，每五十丸，水下。《易简方》：姜汁、好醋煮半夏末，作糊丸服。

姜附汤　治霍乱转筋，手足厥冷，汗出呕逆，腹痛脉欲绝者。

干姜炮一两　附子一个，生用

上为末，每服五钱，水煎服。

通脉四逆汤　治霍乱恶寒，腹痛身冷，自汗，脉沉微如欲绝。

吴茱萸二两，炒　附子炮，一两　桂心　通草　细辛　白芍药炒　甘草炙，各半两　当归三钱

上每服四钱，水酒生姜煎，如不应，更加倍服之，以效为度。

半夏解毒汤　治一切暑热毒，五心烦躁，口舌咽干。

黄柏炒　黄芩炒　山栀子炒　半夏等分

上每服五钱，水煎。

六和汤　治冒暑伏热，烦闷，霍乱转筋，吐泻，寒热交作，头目昏痛，嗜卧倦怠，小便赤涩，不问胎产并服之。

缩砂　半夏汤炮七次　杏仁去皮尖　人参　甘草炙，各一两　赤茯苓　藿香　木瓜各二两　白扁豆姜汁略炒　香薷　厚朴姜制，各四两

上每服一两，姜枣水煎服。

六一散　治中暑身热，小便不利，或发热体痛，口干作渴。

滑石六两　甘草微炒，一两

上为末，每服三钱，加蜜少许，汤水任下。

二陈汤方见二十四卷第五论　**来复丹**　**五苓散**二方见二十一卷第十论　**竹叶石膏汤**方见十三卷第十论

妇人翻胃吐食方论第三论新增

愚按：病机云：前症有三，曰气积寒也，皆从三焦论之。上焦吐者，从于气。气者，天之阳也。其脉浮而洪，食已暴吐，渴欲饮水，大便燥结，气上冲胸发痛，其治法当降气和中。中焦吐者，从于积，有阴有阳，食与气相假为积而痛，其脉浮而匿，其症或先痛而后吐，或吐而后作痛，治法当以小毒药去其积，槟榔、木香行其气。下焦吐者，从于寒，地之道也，其脉沉而迟，其症朝食暮吐，暮食朝吐，小便清，大便秘而不通，治法当以毒药通其闭塞，温其寒气，大便渐通，复以中焦药和之，不令大便秘结而自愈也。王太仆曰：食不得入，是有火也；食入反出，是无火也。又发明曰：噎者六腑之所主，阳也，气也；塞者五脏之所主，阴也，血也。二者皆由阴中伏火而作也。刘宗厚先生曰：若三焦传化失常所致，主于气也，若血亏胃脘干槁所致，因于血也，塞犹填塞不通之义，故发明有治幽门不通，噎塞不便，通幽汤例。盖阳无阴不能通化，阴之失位而阳伏其中，传化不变，而反上行矣。故前症或由饮食起居，七情亏损脾胃，痰饮停滞，中气不运，当以补中益气汤为主。若郁结伤脾，用归脾汤加枳壳、桔梗。若恚怒伤肝，用小柴胡加栀、芩、参、术。脾气虚弱，用六君加山栀、枳壳。气血俱虚，用八珍汤加山栀、半夏。若用行气之药，胸膈痞闷，用六君、芎、归之类。若过用香燥之剂，而大便结燥，用四物、参、术

之类。若饮食不能入，用六君、山栀、吴茱萸、制黄连。若食入而反出，用六君、炮姜、白豆蔻、黄连、制吴茱萸。若痰滞而食反出，用六君、枳壳、桔梗。若饮食少思，大便不实，胸膈痞闷，吞酸嗳腐，食反不化，是为脾胃虚寒，用东垣固真丸，或八味丸。若发热烦热，身恶风寒，腹畏热食，或手足俱冷，胸满腹胀，是内真寒外假热，用神效附子丸或八味丸。大凡呕吐善食，喜饮冷水，是为有火。呕吐少食，喜饮热汤，是为无火。当审其因而治之。

附　治　验

一妇人患前症，胸腹痞闷，得去后，或泄气稍宽。余曰：此属脾气郁结而虚弱也，当调补为善。不信，乃别用二陈、枳实、黄连之类，不应，又用香燥破气，前症益甚，形气愈虚。余用加味归脾汤调治，半载而痊。

一妇人患前症，胸腹胀闷，或小腹不利，或时作痛，小便涩滞。余曰：此肝火血虚也，清肝火，生肝血，养脾土，生肺金。以余言为迂，别服利气化痰等剂，前症益剧，虚症蜂起。余用加味逍遥散、加味归脾汤兼服寻愈。

一妇人患吐，痰甚多，手足常冷，饮食少思。余曰：此肝脾郁怒，兼命门火衰。不信，另服化痰利气之剂，胸腹愈胀，又服峻利疏导之剂。余曰：非其治也，必变脾虚发肿之症，急服金匮加减肾气丸，庶有可救。仍不信，反服沉香化气等丸，果发肿而殁。

白垩散　治虚热翻胃，用白垩土一斤，米醋一斤，煅土赤，入醋内，再煅再入，以醋干为度。取土一两，入炮姜一钱为末，每服一钱，米饮下。甚者二钱，须服四两有效。

治实热翻胃，用黄连五钱，生姜汁浸炒，山楂三钱，保和丸三钱，同为末，糊丸麻子大，胭脂为衣，每服六十丸，煎人参汤入竹沥下之。

太仓丸　治胃弱翻胃。

肉豆蔻　砂仁各二两　丁香一两　陈仓米一升，炒

上为末，姜汁糊丸，桐子大，每服六七十丸，姜汤下。

青金丹　每服三十丸，生姜陈皮煎汤送下。方见前呕吐类

附　方

东垣补真丸

肉苁蓉酒浸焙　葫芦巴炒　附子炮去皮　阳起石煅　肉豆蔻面煮煨　菟丝子净洗酒浸蒸　川乌炮去皮　沉香　五味子各五钱　鹿茸酒浸炒　巴戟去心　蛤乳粉各一两

上为末，用羊腰子两对，治如食法，葱椒酒煮捣烂，入酒糊丸如桐子大，每服七十丸，空心米饮、盐汤任下。

神效附子丸　治脾肾虚寒呕吐，或翻胃膈噎，用黑附子重一两四五钱，端正底平尖圆一枚，灰火炮皮裂，入生姜自然汁内，浸润晒干，再炮，再入汁浸润，仍晒再炮，用尽姜汁半碗为度。却去皮脐为末，以人参煎膏，丸黍米大，每服数丸，津唾咽下。胃气稍复，饮食稍进，投以温补之剂。

六君子汤　补中益气汤　四物汤三方见二十四卷第六论　**归脾汤　加味归脾汤　八珍汤　加味逍遥散**四方见二十四卷第四论　**八味丸**方见二十四卷第十一论　**二陈汤**方见二十四卷第五论　**《金匮》加减肾气丸**方见二十二卷第十论

妇人血膈方论第四

愚按：前症若气逆而血滞，用流气饮。若恚怒而血逆，用小柴胡、山栀、丹皮。血虚用四物、参、术、柴胡、山栀、丹皮。若郁结而血伤，用加味归脾，兼加味逍遥散。脾虚不能生血，用六君、归、芎。胃虚不能生血，用益气汤。若肝虚而不能藏血，用补肝散，如不应，兼以六味丸。若因脾肺虚，用补中益气汤，如不应，用六君加芎、归。

附　治　验

一妇人患前症，胸膈痞闷。余曰：此属脾经血虚。遂用四君、芎、归，调补脾气，寻愈。又因怒兼两胁痞闷，头目不清，月经旬余未竭，用加味逍遥散加钩藤治之，复瘥。

一妇人患前症，胸膈作痛，面清目劄，小便频数，或时寒热，此肝气滞而血凝，先用失笑散二服痛止，又用加味逍遥散而愈。

一妇人所患同前，泛用行气破血之剂，以致不起。

神功散　治血滞，胸腹作痛。

五灵脂炒，一两　莪术　桂心　芸薹子炒，各半两

上每服二钱，酒水煎。

附　方

流气饮方见三卷第七论　**小柴胡汤**方见二十四卷第二论　**加味归脾汤**　**加味逍遥散**二方见二十四卷第四论　**四物汤**　**补中益气汤**　**四君子汤**　**六君子汤**四方见二十四卷第六论　**补肝汤**方见本卷第十七论　**六味丸**方见二十四卷第十一论　**失笑散**方见二十卷第五论

制吴茱萸、黄连法：用二味等分，用热汤拌湿和匀，重汤顿煮，使气相通，同炒焦，各拣出听用。

妇人鼻血方论第五

妇人气血调和，则循环经络，若劳伤元气，阴虚火动，气逆于肺，则血随鼻而衄，产后尤不可治。陈无择曰：亦有因怒气而得者。赵恭人鼻衄，先用苏合香丸四粒，次用五苓散，浓煎白茅花汤调服即止，又用芎归汤调理而安。一富男鼻血，六脉洪数，讯之云，曾服丹药，遂用芩、连、大黄为末，水调服之而解。

愚按：前症若热郁于胃经，用犀角地黄汤。若伏暑于内，用黄连香薷饮。若大怒血蓄于上，用小柴胡汤。若脾损不能摄血归源，用归脾汤，大凡杂症见血，多因阴分郁热，或内有所伤，皆属五志所动。经曰：诸见血，身热脉大者，难治，是火邪胜也；身凉脉静者，易治，是正气复也。仍与后症同用。

附　治　验

一妇人经素不调，因怒衄血，此肝火炽盛，用加味小柴胡加红花，二剂血止，又用加味逍遥散、八珍汤兼服，三十余剂，经行如期。

一妇人郁结而患前症，用加味归脾汤，其血渐止，饮食渐进。用加味逍遥散，元气渐复，寒热渐止。后因怒乃衄，寒热往来，用小柴胡汤加芎、归、丹皮而愈。

一妇人因劳衄血，服凉血之剂，更致便血，或以血下为顺，仍用治血。余曰：此因脾气下陷而血从之，当升补脾气，庶使血归其经。不信，果血益甚，余朝用补中益气汤，夕用加味 归 脾汤而愈。此症用寒凉止血，不补脾肺，而死者多矣。

刺薊散　治血热鼻衄。

刺薊　生地黄各二钱　桑耳　乱发灰　艾叶炒、各一钱　蒲黄五分

上水煎服。

犀角地黄汤方见后

又方　用白茅根汁一合，饮之即止。

又方　用生葱心塞鼻中，血即止。若刀斧所伤，用之血亦止。

四物汤加侧柏、生地黄，治虚热吐血甚效。若脾经血虚，须用四君加芎、归。若脾经结郁，须用归脾汤。若肝肾亏损，须用六味丸。若气血俱虚，须用十全大补汤。

附　方

《济生》犀角地黄汤　治热郁不解，泛行经络，或流肠胃，随气涌泄，以致衄血吐血，或为便血，并皆治之。

犀角镑，如无升麻代　生地黄　白芍药　牡丹皮各等分

上每服四五钱，水煎。若实热炽甚，加炒黄芩。若去血过多，或脾肺之气亏损，不能摄血归源者，急用四君子汤。怀抱郁结者，用归脾汤。

枇杷叶散　治暑毒攻心，衄血呕血，或吐泻作渴。

香薷二钱　厚朴姜制．一钱半　甘草炙　麦门冬去心　木瓜不见铁器　白茅根各一钱　枇杷叶　陈皮　丁香各半钱

上每服三五钱，姜水煎。

黄连香薷饮　治伏暑衄血便血，不拘四时。方见本卷第一论

小柴胡汤　加味小柴胡汤二方见二十四卷第二论　**归脾汤　加味逍遥散　八珍汤　加味归脾汤**四方见二十四卷第四论　**补中益气汤**方见二十四卷第六论

妇人吐血方论第六

妇人吐血者，因脏腑伤损所致，夫气血外行于经络，内荣于脏腑，若六淫七情，饮食起居，有所损伤，行失常道，逆则吐血也。

愚按：前症若脾经郁热，用犀角地黄汤。脾胃伏暑，用黄连香薷饮。心脾郁热，用生地黄汤。心气耗损，用茯苓补心汤。脾气劳伤，用鸡苏散。思虑伤脾，用归脾汤。暴怒肝火，用加味小柴胡汤。久怒肝伤，六味地黄丸。脾肺虚热，用麦门冬饮。肝肾虚热，用六味地黄丸。气血俱虚，用十全大补汤。经云：肺朝百脉之气，肝统诸经之血。必用甘温之剂，补其阳气，使血各归其经。如大吐血病，毋论其脉，急用独参汤救之。若潮热咳嗽而脉数者，元气虚而假热之脉也，皆由脾胃先损，须用人参之类。本草云：人参治脾胃不足，补中温中，泻脾肺中火。东垣先生云：脾胃虚者，心血亢甚而乘土位。肺气受邪，须用黄芪最多，人参、甘草次之。脾胃一虚，肺气先绝，故用黄芪以益皮毛而闭腠理，尝治气血虚弱，用十全大补最善。若用寒凉止血，胃气反伤，尤不致祸。

附　治　验

一老妇每作先饮食不进，或胸膈不利，或中脘作痛，或大便作泻，或小便不利。余以为肝脾之症，用逍遥散加山栀、茯神、远志、木香而愈。后郁结吐紫血，每作先倦怠烦热，以前药加炒黑黄连三分、吴茱萸二分顿愈。后因怒吐赤血甚多，燥渴垂死，此血脱也，法当补气，乃用人参一两，苍术、当归各三钱，陈皮、炮黑干姜各一钱，炙甘草、木香各一钱，一剂顿止。又用加味归脾汤，调理而痊。

一女子怀抱素郁，胸满食少，吐血面赤，用六味丸及归脾加山栀、贝母、芍药而愈。

一妇人为哭母，吐血咳嗽，发热盗汗，经水不行。此悲伤肺，思伤脾，朝服补中益气加桔梗、贝母、知母，夕用归脾汤送六味丸而愈。

柔脾汤　治虚热吐血衄血汗出。

甘草炒　白芍药炒　黄芪各半两　熟地黄自制，一两五钱

上每服五钱，水酒煎。

一妇人月经不利，忽妄行呕血，察其形脉如常，用四生丸即安。一女子饱食负重而吐血，用前汤及青饼子而愈。世治吐血，并用竹茹、地黄、藕汁，亦不可拘泥。如阳乘于阴，血得热则流散，经水沸溢，理宜凉解，大黄、犀角之类。如阴乘于阳，所谓天寒地冻，水凝成冰，须用温散，干姜、肉桂之类。

四生丸　治乘阳于阴，以致吐血衄血。

生荷叶　生艾叶　生柏叶　生地黄各等分

上研丸鸡子大，每服一丸，水煎服。陈自华云：先公尝游灵石寺，主僧留饭设桌，一僧见桌不稳，急俯稳之，举首即呕血，明年到寺，问旧呕血者何如？主僧言：服得四生丸遂愈。自得此方，屡次有效。愚意前症，乃内热暴患，用之即效。若人病久，本元不足，须补脾以滋化源，否则虚火上炎，金反受克，获生鲜矣。

犀角地黄汤方见前

姜草汤　治阴乘于阳，寒而呕血。

甘草炒　干姜各一钱

上水煎服，理中汤亦效。

花蕊石散　治瘀血积于内，以致大小便不通，或血畜于上，而吐不止。一妇人苦吐血，百药不效，童便酒调，不数服而愈。方见胞衣不下

如圣散　治吐血不已。每服二钱，米饮下。方见十七卷催生

附　方

《济生》鸡苏散　治劳伤肺经，唾中有血，咽喉不利。

鸡苏叶　黄芪炒　生地黄　阿胶炒　贝母　白茅根各一钱　桔梗炒　麦门冬去心　蒲黄炒　甘草炒，各五分

上姜水煎服。

生地黄散　治郁热衄血，咯血吐血，阴虚而不能愈者。

枸杞子　柴胡　黄连炒　地骨皮　天门冬　白芍药炒　甘草炒　黄芩炒　黄芪炒　生地黄　熟地黄自制，各五分

上水煎。下血加地榆。

《三因》茯苓补心汤　治面色黄瘁，五心烦热，咳嗽吐血。

半夏　茯苓　紫苏　前胡　人参　枳壳麸炒　桔梗炒　甘草炒　干葛各五分　当归一钱　川芎　陈皮　白芍药各一钱　熟地黄自制，一钱五分

上姜枣水煎服。

麦门冬饮子　治气虚吐血，或气虚不能摄血者。

五味子杵，十粒　麦门冬去心　黄芪炒，各一钱　当归身　人参　生地黄各钱半

上水煎服。

十全大补汤　治胃气虚弱，吐血衄血，便血不止，以致外症恶寒发热，自汗盗汗，食少体倦；或寒热作渴，头疼眩晕，面似中风；或气血俱虚，胸腹胁痛；或骨节作痛，经候不调；或寒热往来，发热晡热；或五心发热，咽干舌燥；或痰嗽喘促，胸膈虚痞；或呕吐泄泻，手足冷热等症。

归脾汤　**加味逍遥散**二方见二十四卷第四论　**加味小柴胡汤**方见二十四卷第二论　**六味丸**　**八味丸**二方见二十四卷第十一论　**独参汤**方见三卷第十一论　**补中益气汤**方见二十四卷第六论　**黄连香薷饮**　**枇杷叶散**二方见本卷前

妇人痃癖诸气方论第七

妇人痃癖，因元气虚弱而邪气积聚，盖痃者在腹内，近脐左右，有筋脉急痛，如臂如指如弦之状。癖者僻，在两胁之间，有时而痛。皆阴阳不和，经络痞膈，饮食停滞，冷气固结而成也。

愚按：前症因饮食起居，七情失宜，亏损脏腑，气血并违，阴络受伤，循行失度所致。罗谦甫先生曰：养正邪自除。必先调养，使荣卫充实。若不消散，方可议下，但除之不以渐，则必有颠覆之害。若不守禁忌，纵嗜欲，其有不丧身者鲜矣。

附　治　验

一妇人内热作渴，饮食少思，腹内初如鸡卵，渐大四寸许，经水三月一至，肢体消瘦，齿颊似疮，脉洪数而虚，左关尤甚，此肝脾郁结之症，外贴阿魏膏，午前用补中益气汤，午后用加味归脾汤，两月许，肝火少退，脾土少健，午前以补中益气下六味丸，午后以逍遥散下归脾丸，又月余，日用芦荟丸二服，空心以逍遥散下，日晡以归脾汤下。喜其谨疾调理，年余而愈。

一妇人腹内一块不时上攻，或作痛有声，或吞酸痞闷，月经不调，小便不利，二年余矣。面色青黄，余以为肝脾气滞，以六君加芎、归、柴胡、炒连、木香、吴茱，各少许，二剂，却与归脾汤下芦荟丸，三月余，肝脾和而诸症退。又与调中益气加茯苓、丹皮，中

气健而经自调。

一妇人性多郁善怒，勤于女工，小腹内结一块，或作痛，或痞闷，月经不调，常服伐肝之剂，内热寒热，胸膈不利，饮食不甘，形体日瘦，牙龈蚀烂，此脾土不能生肺金，肺金不能生肾水，肾水不能生肝木，当滋化源，用补中益气、六味地黄，至仲春而愈。

松江太守何恭人，性善怒，腹结一块，年余，上腭蚀透，血气虚极，时季冬，肝脉洪数，按之弦紧，或用伐肝木清胃火之药。余曰：真气虚而邪气实也，恐伐肝木至春不能发生耳。用八珍汤以生气血，用地黄丸以滋肾水，肝脉顿退。因大怒，耳内出血，肝脉仍大，烦热作渴，此无根之火也，仍以前药加肉桂二剂，脉敛热退。复因大怒，果卒于季冬辛巳日，乃金克木故也。

一妇人经候过期，发热倦怠，或用四物、黄连之类，反两月一度，且少而成块。又用峻药通之，两目如帛所蔽。余曰：脾为诸阴之首，目为血脉之宗，此脾伤五脏皆为失所，不能归于目也。遂用补中益气、济生归脾二汤，专主脾胃，年余而愈。

麝香丸　治痃癖冷气，心腹作痛。

麝香二钱，另研　五灵脂炒　阿魏五钱，面裹煨令面熟　桃仁　三棱各二两，醋制　芫花醋炒　槟榔各一两　莪茂醋制　桂心　没药　木香　当归各半两

上为末，饭丸桐子大，每服十丸，淡醋汤下。

方治痃癖神效，以猪肝一具，重十余两，用巴豆仁五十枚，入肝内，用酽醋三碗，慢火熬干研烂，量入三棱末，丸桐子大，每服五丸，食前酒下。

罗安人每经行，脐腹痛甚，以桃仁桂枝汤一剂而瘥。方见一卷第十二论

方治经来腹先痛，用局方七气汤送来复丹、局方积气丸。痃癖癥瘕，诸气亦效。

附　方

芦荟丸　治痃癖肌肉消瘦，发热潮热，饮食少思，口干作渴，或肝疳食积，口鼻生疮，牙龈蚀烂等症。

芦荟　胡黄连　黄连炒焦　木香　白芜荑炒　青皮各五钱　当归　茯苓　陈皮各一两五钱　甘草炒，七钱

上为末，米糊丸桐子大，每服七八十丸，米汤下。

阿魏膏　治一切痞块，更服胡连丸。

羌活　独活　玄参　官桂　赤芍药　穿山甲　大黄　白芷　天麻各五钱　红花四钱　生地黄五钱　两头尖五钱　木鳖十枚，去壳　乱发一团如鸡子大　槐柳桃枝各三钱

上用香油二斤四两，煎黑去柤，入发煎发化，仍去柤，徐下黄丹，煎软硬得中，入芒硝、阿魏、苏合油、乳香、没药各五钱，麝香三钱，调匀，即成膏矣，摊贴患处，内服丸药。黄丹须用真正者效，凡贴膏药。先用朴硝，随患处铺半指厚，以纸盖，用熨斗熨良久，如硝耗，再加熨之二时许，方贴膏药。若是肝积，加芦荟末同熨。

六君子汤　补中益气汤二方见二十四卷第六论　八珍汤　加味归脾汤　归脾汤　逍遥散四方见二十四卷第四论　六味丸方见二十四卷第十一论　调中益气汤方见四卷第五论

妇人疝瘕方论第八

妇人疝瘕之病，由饮食不调，血气劳伤，或胎产经行，风冷相搏所致。盖疝者痛也，瘕者假也，脉弦急者生，虚弱者死。尺脉涩浮牢，为血实气虚，腹痛逆气上行，此为胞中有恶血，久则结成瘕也。

愚按：子和先生云：遗溺闭癃，阴痿脬痹，精滑白淫，皆男子之疝也。若血涸月事不行，行后小腹有块，或时动移，前阴突出，后阴痔核，皆女子之疝也。但女子不谓之疝而谓之瘕。

附　治　验

一妇人小腹痞胀，小便时下，白带，小水淋沥，此肝经湿热下注，用龙胆泻肝汤而愈。

一妇人小腹胀痛，小水不利，或胸乳作痛，或胁肋作胀，或气逆心动，余以为火而血伤脾，用四物柴胡汤下，或玄胡、紫木香而愈。

一妇人小腹痞闷，小便不利，内热，体倦懒食，用八珍汤加柴胡、山栀、龙胆草治之而安。

干漆散　治疝瘕胁肋疼痛。

干漆炒令烟尽　木香　芫花醋炒　赤芍药　桂心　当归　川芎　琥珀各半两　大黄二两，炒　牛膝一两　桃仁去皮尖，一两另研　麝香一钱

上为末，每服一钱，温酒调下。

熏葱散　治前症属寒气不散，疼痛甚效。方见二十四卷第八论

附　方

《宝鉴》蒺藜汤　治阴疝小腹作痛，小便不利，手足逆冷，或胁腹闷痛。

蒺藜去刺　附子炮　栀子去皮，各半两

上为末，每三钱，水煎，食前温服。

丹溪定痛散　治寒疝疼痛速效。

枳壳十五个　山栀子炒　唐球子　吴茱萸炒　荔枝核炮，各等分

上为末，用长流水调下一二钱，空心服。

三因失笑散　治小肠疝气痛，或血气肚腹作痛。方见二十卷第五论

龙胆泻肝汤方见二十四卷第八论　**四物汤**方见二十四卷第六论　**八珍汤**方见二十四卷第四论

妇人八瘕方论第九

妇人脏腑调和，经脉循环，则月水以时，故能生子而无病。若乘外邪而合阴阳，则小腹胸胁腰背相引而痛，月事不调，阴中肿胀，小便淋疠，面色黄黑，则瘕生矣。八瘕者，黄、青、燥、血、脂、狐、蛇、鳖是也。《千金》《外台》言之详矣。

愚按：经曰：气主煦之，血主濡之。若血不流，则凝而为瘕也。瘕者中虽硬而忽聚忽散，多因六淫七情，饮食起居，动伤脏腑而成，当与痃癖诸症治同，慎不可复伤元气。

桃仁煎　治血瘕。

桃仁　大黄炒，各一两　虻虫半两，炒黑　朴硝

上为末，以醇醋一盅，石器中煮三分，下煎三味，不住手搅，煎至可丸，下朴硝，丸桐子大，不吃晚食，五更初温酒下五丸，日午下秽物，如未见再服，仍以调气血药补之。向在毗陵，一妇人小便不通，脐腹胀甚。予诊之曰：此血瘕也。用前药一服，腹痛，下血块血水即愈。此药猛烈大峻，气血虚者，斟酌与之。

大硝石丸　治七癥八瘕，当用此药去之，不令人困。

硝石三两　大黄四钱　人参一钱　甘草八分

上为末，苦酒一升，石器中，先入大黄煎膏，入余药，丸梧子大，每服三十丸，米饮下，三日一服，宜下赤物。

妇人腹中瘀血方论第十

妇人腹中瘀血者，由月经闭积，或产后余血未尽，或风寒滞瘀，久而不消，则为积聚癥瘕矣。

愚按：前症若郁结伤脾，用加味归脾汤。若恚怒伤肝，用加味逍遥散。若产后恶露，用失笑散。若肝脾亏损，用六君、柴胡，以补元气为主。胃气虚弱，用益气汤加茯苓、半夏为主。大凡腹中作痛，畏手按者，此内有瘀血。若形体如常，属病气元气俱实，用桃仁承气汤直下之。若痛而肢体倦怠，饮食少思，此脾胃受伤，属病气有余，元气不足，用当归 散调和之。若痛而喜手按腹，形体倦怠，饮食少思，此元气病气俱不足，用六君、炮

姜、芎、归纯补之。若痛而大便不实，饮食难化，此脾胃虚寒，用六君、炮姜、肉果温补之。若痛而作呕少食，此脾胃虚弱，用六君、炮姜、藿香。若痛而呕吐不食，泄泻，用六君加姜、桂。若兼手足逆冷自汗，更加附子。此症多有因攻伐而致者。

附　治　验

妇人耳下肿赤，寒热口苦，月经不调，小腹内一块，此肝火气滞而血凝也，用小柴胡加山栀、川芎、丹皮治之，诸症悉退。

妇人久患腹痛，去瘀血方止，而复大痛，诸药不纳。予以为脾胃之气虚寒，用参、术、炮姜，丸如黍，每用数粒，津咽下，后以二味浓煎，渐呷而愈。

桃仁丸　治瘀血不利，月水不调，发热作渴，心腹满急，或肚腹中作痛。

桃仁　大黄炒，各二两　虻虫炒，去翅足　水蛭炒焦，各四十枚

上为末，炼蜜丸桐子大，每服五六丸。空心热酒下。

附　方

桃仁承气汤　治瘀血小腹急痛，大便不利，或谵语口干，漱水不咽，遍身黄色，小便自利，或血结胸中，手不敢近腹，或寒热昏迷，其人如狂。

桃仁半两　大黄炒，二两　甘草二钱　肉桂一钱

上姜水煎，发日五更服。

附　方

加味归脾汤　治瘀血已去，或脾经失血，小腹作痛，无寐，发热盗汗，或脾伤不能摄血，或心脾伤痛，嗜卧少食，或忧思伤脾，血虚发热，或肢体肿痛，大便不调，或经候不准，晡热内热。

加味逍遥散方见二十四卷第四论　**失笑散**方见二十卷第五论　**六君子汤**　**补中益气汤**二方见二十四卷第六论　**当归散**方见后卷第五论　**小柴胡汤**方见二十四卷第二论

妇人癥瘕方论第十一

妇人癥瘕，由饮食失节，脾胃亏损，邪正相搏，积于腹中，牢固不动，故名曰癥。得冷则作痛，冷入子藏则不孕，入胞络则月水不通。

愚按：前症若脾胃虚弱，用六君子加芎、归。若肝脾虚弱，用补中益气及归脾汤。若肝火郁滞，佐以芦荟、地黄二丸，外贴阿魏膏。患者须慎七情六淫，饮食起居。治者不时审察病机而药之，庶几有效。

附　方

穿山甲散　治癥瘕瘀血，心腹作痛。

穿山甲灰煨炒　鳖甲醋炙　赤芍药　大黄炒　干漆炒令烟尽　桂心各一两　川芎　芫花醋炙　当归尾各半两　麝香一钱

上为末，每服一钱，酒调下。

六君子汤　**补中益气汤**二方见二十四卷第六论　**归脾汤**方见二十四卷第四论　**六味地黄丸**方见二十四卷第十二论　**芦荟丸**　**阿魏膏**二方见本卷第七论

妇人食癥方论第十二

妇人食癥，由脏腑虚弱，经行不忌生冷饮食，或劳伤元气所致。陈无择云：经不行者，宜先导之，然后固元气为主。

愚按：前症若形气虚弱，须先调补脾胃为主，而佐以消导。若形气充实，当先疏导为主，而佐以补脾胃。若气壅血滞而不行者，宜用乌药散，散而行之。若脾气虚而血不行者，宜用四君、芎、归，补而行之。若脾气郁而血不行者，宜用归脾汤，解而行之。若肝脾血燥而不行者，宜用加味逍遥散，清而行之。大抵食积痞块之症为有形，盖邪气胜则实，真气夺则虚，当养正辟邪，而积自除矣。虽然，坚者削之，客者除之，胃气未虚，或可少用。若病久虚乏者，不宜轻用。

乌药散方见后

妇人积年血癥方论第十三

妇人积年血癥，由寒温失节，脾胃虚弱，月经不通，相结盘牢，久则腹胁苦痛，宜用三棱煎主之。

愚按：前症多兼七情亏损，五脏气血乖违而致。盖气主煦之，血主濡之，脾统血，肝藏血，故郁结伤脾，恚怒伤肝者，多患之。腹胁作痛，正属肝脾二经症也。窃谓罗谦甫先生云：养正积自除。东垣先生云：人以胃气为本，治法宜固元气为主，而佐以攻伐之剂，当以岁月求之。若欲速效，投以峻剂，反致有误。右七症方药，当互相参用。

附　方

三棱煎　治血癥血瘕，食积痰滞。

莪术醋浸炒　三棱各三两　青皮去白　半夏　麦芽炒，各一两

上用好醋一盅，煮干焙为末，醋糊丸桐子大，每服三四十丸，淡醋汤下。痰积姜汤下。

妇人血气心痛方论第十四

妇人血气心痛，由脏腑虚弱，风冷所乘。盖心为诸脏之主，若心受伤，名真心痛，朝发夕死，夕发旦死。若心络伤，故痛发乍轻乍甚，而成斯症也。

愚按：前症若寒邪所伤，温散之。饮食停滞，消导之。肝火妄动，辛平之。脾气郁结，和解之。仍与后六症方药同用。

附　治　验

一妇人久患心痛，饮食少思，诸药到口即吐。予以为脾土虚弱，用白术一味，同黄土炒去土，每服一两，以米泔煎浓，徐服少许，数日后自能大饮。用三斤余而安。

上舍陈履学长子室，素怯弱，产后患疥疮，年余不愈。因执丧旬月，每欲眩仆。一日感气，忽患心脾高肿作疼，手不可按，而呕吐不止，六脉微细，或见其形实，误认诸痛．不可补气，乃用青皮、木香、五味、吴茱萸等药而愈。继复患疟且堕胎，又投理气行血之药，病虽失，元气转脱，再投参芪补剂，不应矣，六脉如丝欲绝。迎予至，诊之曰：形虽实而脉虚极，反用理气之剂，损其真气故也。连投参、芪、归、术、附子、姜、桂二剂，间用八味丸，五日寝食渐安，六脉全复。此症若心脾疼痛时，即服此等药，疟亦不作矣。

附　方

乌药散　治血气壅滞，心腹作痛。

乌药　莪茂醋浸炒　桂心　当归　桃仁　青皮　木香各等分

上为末，每服二钱，热酒调下。

灵苑方　用玄胡、灵脂为末，每服一钱，沸汤下，日三服。

八味丸方见二十四卷第十一论

妇人血气心腹疼痛方论第十五

妇人血气心腹疼痛，由脏腑虚弱，风邪乘之，真邪相搏，随气上下，故心腹作痛也。

愚按：前症若气滞血瘀，用没药散。劳伤元气，用益气汤。肝脾郁结，用四七汤。怒动肝火，用小柴胡汤。肝脾血虚，用四物汤。脾肺气虚，用四君子汤。中气虚弱，用补中益气汤。气血俱虚，用八珍汤。

附　治　验

一妇人每怒心腹作痛，久而不愈，此肝火伤脾气也，用炒山栀一两，生姜五片，煎服而痛止，更以二陈加山栀、桔梗，乃不发。

一妇人怀抱郁结，不时心腹作痛，诸药不应，用归脾汤倍加炒山栀而愈。

陈湖陆小村母，久患心腹疼痛，每作必胸满呕吐，手足俱冷，面赤唇麻，咽干舌燥，寒热不时，月余竟夕不安，其脉洪大，众以

痰火治之，屡止屡作。追乙巳春，发频而甚，仍用前药反剧，此寒凉损真之故，内真寒而外假热也，且脉息洪弦而有怪状，乃脾气亏损，肝木乘之而然，当温补胃气。遂用补中益气汤加半夏、茯苓、吴茱萸、木香，一服熟寐彻晓，洪脉顿敛，怪脉顿除，诸症释然。

附　方

琥珀散　治气滞心腹撮痛，或月经不行，小便疼痛。

乌药　莪茂醋浸炒，各二两　当归一两

上为末，每服二钱，温酒调下。

蠲痛散　治血气刺痛。

荔枝核烧存性，半两　香附子一两

上为末，每服二钱，盐酒送下。

蒲蒲丸　治血积心脾作疼。男六德续添

九节蒲六两　吴茱萸炒　香附子各四两

上为末，醋调神曲糊丸桐子大，每四五十丸，淡姜汤调下。

没药散　治血气不行，心腹作痛，或行注疼痛，或月经不调，发热晡热，并宜用之。

红花　没药　当归　玄胡索炒，各等分

上为末，每服二钱，童便酒调下。

木香枳术丸　破滞气。消饮食。开胃进食。消化痰涎。

木香　枳实炒，一两　白术炒，二两

上为末。每服五钱。姜枣水煎服。

木香化滞汤　治脾胃虚弱，饮食停滞，腹胀作痛，或心下痞满，不思饮食。若忧怒饮食而致者，尤宜用之。

木香　红花各三钱　橘皮　当归梢各二钱　柴胡四钱　草豆蔻　甘草各半两　半夏一两　枳实炒，二钱

上每服三五钱，姜水煎服。

补中益气汤　**四君子汤**　**四物汤**二方见二十四卷第六论　**四七汤**方见十一卷第七论　**小柴胡汤**方见二十四卷第二论　**八珍汤**　**归脾汤**二方见二十四卷第四论　**二陈汤**方见二十四卷第五论

妇人血气小腹痛方论第十六

妇人小腹疼痛，由胞络受冷，搏于血气，结于小腹，因虚发动故痛也。

愚按：前症若气寒血结，用威灵仙散。气滞血凝，用当归散。肝经血虚，用四物汤加参、术、柴胡。肝经湿热，用龙胆泻肝汤。肝脾气虚，用六君子汤加柴胡、芍药。肝脾虚寒，用六君子汤加柴胡、肉桂；若兼呕吐加木香；四肢逆冷再加炮姜。

附　治　验

通府张孟威云：其妹小腹痛，用附子理中汤，附子服过八十余枚，此乃沉寒痼冷之甚，不多有者。

附　方

威灵仙散　凡冷气滞血，小腹疼痛，或经行遇怒，腹胀痛，宜用之。

威灵仙一两　当归　没药　木香　桂心各半两

上为末，每服一钱，热酒调下。

当归散　凡血积小腹疼痛，或因气逆，月经不行，肚腹作痛。

当归炒　赤芍药　刘寄生　没药　枳壳麸炒　玄胡索炒，各等分

上为末，每服一钱，热酒调下。

四物汤　**六君子汤**二方见二十四卷第六论　**龙胆泻肝汤**方见二十四卷第八论　**附子理中汤**方见二十一卷第九论

妇人两胁胀痛方论第十七

妇人两胁胀痛，因肝脾虚弱，气血不调，风冷客于胞络，相搏壅塞痛也。

愚按：东垣先生云：胸腹作痛，口苦舌干，寒热往来，发呕发吐，四肢满闷，淋漓便难，腹中急痛，此肝木之妄行也。窃谓前症，若暴怒伤血，用小柴胡、芎、归、山栀。气虚，用四物、参、术、柴、栀。若久怒伤

气，用六君、芎、归、山栀。若气血俱虚，用六味地黄丸。若经行腹痛，寒热晡热，或月经不调，发热痰咳，少食嗜卧，体痛，用八珍、柴胡、丹皮。若胁胀发热，口渴唾痰，或小便淋沥，颈项结核，或盗汗便血，诸血失音，用六味丸。若两胁作胀，视物不明，或筋脉拘急，面色青，小腹痛，或小便不调，用补肝散。若概用香燥之剂，反伤清和之气，则血无所生，诸症作焉。丹溪先生云：右胁痛，用推气散、小龙荟丸、当归龙荟丸、控涎丹、抑青丸、十枣汤，皆病气元气俱实之剂，用者审之。

附　治　验

一妇人性急，吐血发热，两胁胀痛，日晡益甚，此怒气伤肝，气血俱虚也。朝用逍遥散，倍加炒黑山栀、黄柏、贝母、桔梗、麦门冬，夕以归脾汤，送地黄丸而愈。

一孀妇内热晡热，肢体酸麻，不时吐痰，或用清气化痰药，喉间不利，白带腹胀，用行气散血药，胸膈不利，肢体时麻，此郁怒伤肝脾而药益甚也。予则朝用归脾，以解脾郁生脾气，夕用加味逍遥散，以清肝火生肝血，百余剂而愈。后因怒，饮食日少，肢体时麻，此乃肝火侮土，用补中益气加山栀、茯苓、半夏而痊。又饮食失调，兼有怒气，肢体麻甚，月经如注，脉浮洪而数，此脾受肝伤，不能统血而致崩，肝气亏损阴血而脉大，继用六君加芎、归、炮姜而血崩止，又用补中益气加炮姜、茯苓、半夏而元气复，更用归脾汤、逍遥散调理而康。

附　方

威灵仙散　治冷气血滞，两胁作痛。方见前

人参紫荆皮散　治心腹刺痛，胸膈饱满，不进饮食。

紫荆皮　苍术　石菖蒲各一两　香附子二两　人参半两　木香二钱

上为末，米糊丸桐子大，每服三十丸，食后姜汤下。

左金丸一名四金丸　治肝火胸腹胀痛，或发寒热，或头目作痛，或大便不实，或小便淋秘，或小腹疼痛，及一切肝火之症。

黄连炒，六两　吴茱萸一两，汤煮片时用

上为末，粥丸，白米陈皮汤下。

当归龙荟丸　治肝经实火，胸胁胀痛，或大便秘结，小便涩滞，凡属肝经实火者宜用之。

当归　龙胆草炒焦　栀子仁炒　黄连炒　黄芩炒，各一两　大黄炒　芦荟　青黛各五钱　木香一钱五分　麝香另研，五分

上为末，用神曲糊丸桐子大，每服二十丸，姜汤下。

补肝散　治肝脾二经气血亏损，胁胀作痛，或胁胀头晕，寒热发热，或遍身作痛，经候不调。

山茱萸肉　当归　五味子炒杵　山药　黄芪炒　川芎　木瓜各半两　熟地黄自制　白术炒各一钱　独活　酸枣仁炒，各四两

上为末，每服五钱，枣水煎服。

小柴胡汤方见二十四卷第二论　**四物汤**　**补中益气汤**　**六君子汤**三方见二十四卷第六论　**六味丸**方见二十四卷第十一论　**八珍汤**　**逍遥散**　**归脾汤**　**加味逍遥散**四方见二十四卷第四论

妇人心腹胀满方论第十八

妇人心腹胀满，由心脾虚损，邪气乘之，此足少阴肾经之脉，起于足小指，贯肾络膀胱，入肝肺，出络于心，若邪搏三经并结于脾，脾虚则心腹胀满矣。

愚按：前症脾胃虚痞，用六君子汤。脾胃虚寒者，用人参理中汤。郁结气滞者，用归脾汤。肝侮脾土，用六君加柴、芍。脾气壅滞，用平胃散。肺气壅滞，用紫苏饮。宿食壅滞，用养胃汤。脾血虚痞，用四物加参术。上六症当互相参用，仍与六卷第七论同用

附　治　验呕吐心腹痛见七卷第一论

一妇人胸膈不利，饮食少思，腹胀吞酸，或用疏利之药，反致中满不食，予以为脾土虚而肝木胜，用补中益气汤加砂仁、香附、煨姜，又以六君子加芎、归、桔梗而愈。

吴江史玄乍母，久病之后遇事拂意，忽胸腹胀满，面目微肿，两腿重滞，气逆上升，言语喘促，所服皆清气之剂，不效。予曰：此脾肺虚寒也。先用六君子汤一剂，病势顿减，后用补中益气加茯苓、半夏、干姜二剂，形体顿安。后以七情失调，夜间腹胀，乃以十全大补加木香治之而痊。

附　方

白术散　治脾胃气滞，心腹胀满，不欲饮食。

白术炒　草果　诃子　茯苓　槟榔　桂心各五分　陈皮　厚朴姜炒　人参各一钱　甘草炒，三分

上姜枣水煎服。

愚按：前方治胸膈气滞、饮食内停之良剂。若脾血虚者，须用四物、参、术。脾气虚者，须用四君、芎、归。

补遗：治心腹胀满，予尝独用厚朴姜汁炒，每服五钱，姜七片，水煎温服，不拘时候，间服沉香降气汤，得效。此病气元气壅实之治法也。

附　方

平胃散　治脾气壅滞，胸腹不利，或饮食不进停滞呕吐。

苍术　厚朴姜炒　陈皮各一钱五分　甘草炙，五分

姜枣水煎服。

人参养胃汤　治脾气壅滞，胸膈不利，或饮食壅滞，胸腹胀闷，或兼外感风寒，头痛呕吐等症方见二十卷第九论

四物汤　**六君子汤**　**补中益气汤**三方见二十四卷第八论　**人参理中汤**方见二十卷第八论　**紫苏饮**方见十二卷第八论　**十全大补汤**　**归脾汤**二方见二十四卷第四论　**调中益气汤**方见四卷第九论

校注妇人良方　卷八

宋　临川　陈自明良甫编辑
明　古吴　薛　己立斋补注
鄞县　曹赤电炳章圈校

妇人小便淋沥不通方论第一

妇人淋沥，由肾虚而膀胱热也，盖膀胱与肾为表里，主于水，行于脬者，为小便也。若肾虚则小便频数，膀胱热则小便淋沥，甚则不通，腹胀喘急，当速治之。

愚按：前症若膀胱热结，用五淋散。若脾肺虚热，用补中益气汤加山药、五味、麦冬。若脾经郁热，用加味归脾汤。若肺经郁火，用黄芩清肺饮。若肝经湿热，用龙胆泻肝汤。血虚，用加味逍遥散。阴虚，用六味丸加柴胡、山栀。大抵不渴而不利者，热在下焦血分也，用滋肾丸。渴而不利者，热在气分也，用清肺饮。尺脉数而无力者，阴火盛而阳不能化也，用六味丸、滋肾丸为主。尺脉浮而无力者，阳气虚而阴不能生也，用加减八味丸、滋肾丸为主。

附　治　验

一妇人素有前患，内热体倦，余以为肝火血少，脾气虚弱，用八珍、逍遥二散，兼服月余而小便利，又用八珍汤而气血复。

一妇人患前症，面青胁胀，诸药不应，予以为肝经气滞而血伤，用山栀、川芎煎服而愈。

一妇人小便不利，小腹并水道秘闷，或时腹胁胀痛，余以为肝火，用加味逍遥散加龙胆草四剂稍愈，乃去胆草，佐以八珍散加炒黑山栀，兼服而瘥。

石韦汤　治小便实热，气滞淋沥。

石韦　黄芩炒　木通　榆白皮　葵子　瞿麦　甘草各五分

上姜水煎服。

鸡苏散　治血热淋沥。

鸡苏叶　木通各二两　生地黄　滑石各三两　刺蓟根一两

上每服半两，淡竹叶三七片，水煎。

桃仁煎　治血瘕小便如淋，脐腹胀痛。方见血瘕门第七卷第九论

火府丹　治心经积热，小便涩及五淋。加甘草名导赤散

生地黄二两，杵膏　木通为末　黄芩炒，各一两

上加蜜丸桐子大，每服三十丸，木通煎汤下。

许学士云：一卒病渴，日饮水斗许，不食者三月，心中烦闷，时已十月，余谓心经有热伏，与火府丹数服，越二日来谢云：当日三服渴止，又三服饮食如故。此本治淋。用以治渴，可谓通变也。

一方牛膝一合，水煎，入麝香少许服之。鄞县耿武尉梦得，其内患淋，下砂石剥剥有声，甚为苦楚，一服而愈。

附　方

滋肾丸　治热在血分，不渴，而小便不利、或肾虚足热，腿膝无力，不能履地。又下焦阴虚，小便不利，肚腹肿胀，或皮肤胀裂，眼睛突出。此神剂也。

知母酒炒　黄柏酒炒，各二两　肉桂二钱

上各另为末，水丸桐子大，每服二百丸，空心百滚汤下。

黄芩分清饮　治肺热小便不利，宜用此药清之。

黄芩炒　山栀炒，各一钱

上水煎服不利，加盐豉二十粒。

五淋散　治膀胱有热，水道不通，淋沥不出，或尿血如豆汁，或成砂石，或如膏汁，或热沸便血。

赤茯苓　钱五分　赤芍药　山栀各一钱　当归　甘草各一钱五分

上入灯心，水煎服。

补中益气汤方见二十四卷第六论　**八珍汤**　**加味归脾汤**　**加味逍遥散**三方见二十四卷第四论　**龙胆泻肝汤**方见二十四卷第八论　**加减八味丸**　**六味丸**二方见二十四卷第十一论

妇人转脬小便不利方论第二

妇人转脬，或内热传搏于胞，或忍小便气逆于内，以致小腹急痛，不得小便，甚者至死。

愚按：前症不问男女，孕妇转脬，小便不利，命在反掌，非八味丸不能救。余参前后论主治。

附　治　验余见第十五卷

一妇人小便淋沥，小腹胀闷，胸满喘急，诸药不应，余视为转脬之症，用八味丸一服，小便如涌而出。

一妇人因郁怒，小便滴涩，渐至小腹肿胀，痰咳喘促，余用八味丸煎服，小便即利而瘥。

一妇人素善怒，小便淋沥不利，月经不调半载矣。或两胁胀闷，或小腹作痛，或寒热往来，或胸乳作痛，或咽喉噎塞，或两脚筋挛，或肢节结核，面色青黄不泽，形气日瘦，左关弦洪，右关弦数，此郁怒伤肝脾，血虚气滞为患，朝用加味归脾汤以补脾气，解脾郁，祛肝火；夕用滋肾丸、生肝散滋肾水以生肝血、抑肝火，舒筋膜。兼服月余而愈。

滋肾生肝饮

山药　山茱萸肉，各一钱　熟地黄自制，二钱　泽泻　茯苓　牡丹皮各七分　五味子炸炒，五分　柴胡二分　白术　当归　甘草三分

上水煎服。

葱白汤　治气滞小便不通，腹胀欲死。

橘皮二两　葵子一两　葱白一茎

上水煎，分三服。

八味丸　治脬转小便不通，殊有神效，但世所不用，以致误人多矣。方见二十四卷第十一论

滑石散　治脬转小便数日不通。

滑石一两　寒水石二两　葵子一合

上为末，以水一斗，煮至五升，时服一升即利。

又方

乱发烧灰　葵子　车前子各等分

上为末，每服二钱，酒调服。

石韦汤　治转脬小便不通。方见前

治强忍小便，致脬转尿不利，困笃欲死。

滑石二两　乱发灰一两

上为末，每服三钱，桃白皮一斤，细切熟杵，入水三盏，绞取汁调服。《千金翼》用杏仁二十粒去尖皮，麸炒黄嚼细，水送下立通。

一方，皂角为末，吹鼻内取嚏。

妇人小便数方论第三

小便乃肾与膀胱主之，盖肾气通于阴，若二经虚而热乘之，则小便涩滞，虚则频数也。

愚按：前症若肝经火动，用逍遥散加龙胆草、车前子。膀胱火动，六味丸加麦门、五味。肝肾湿热，龙胆泻肝汤。郁伤肝脾，加味逍遥散、加味归脾汤。肝脾肺气虚，补中益气加麦门、五味。肝经血虚，加味逍遥散。肾气虚败，鹿茸散，如不应，用八味丸。

附　治　验

一妇人患前症，小便频数，日晡热甚，此

肝脾血虚，气滞而兼湿热也，用加味逍遥散加车前子而愈。

一妇人患前症，发热烦躁，面目赤色，脉洪大而虚，余谓此血虚发躁，用当归补血汤数剂而痊。

一妇人久患前症，泥属于火，杂用寒凉止血之剂，虚症悉具。余曰：此脾胃亏损而诸经病也，当补中气为主。遂以六君子、补中二汤，兼服两月余寻愈。

桑螵蛸散　治肾气虚寒，小便数少，或时频数，或夜间尤数。

桑螵蛸二十枚，炒　鹿茸炙　牡蛎煅　甘草炒，二两　黄芪炒

上为末，每服二三钱，食前空心用姜汤调下，日二服。

缩泉丸　治脬气虚寒，小便频数，或遗尿不止，小儿尤效。

乌药　益智仁等分

上为末，酒煎山药末为糊丸桐子大，每服七十丸，盐酒或米饮下。

鹿茸散　治肾气虚寒，便溺数甚，或夜间频数遗溺。

鹿茸炙　乌贼鱼骨　桑寄生　当归　龙骨煅，各二两　白芍药炒　附子炮，各三钱　桑螵蛸炙，各五钱

上为末，每服二钱，空心并食前用温酒调下，作丸服亦可。凡用附子，重一两三四钱，底平顶圆，周围有瓣者方是。

附　方

当归补血汤　**八味丸**　**六味丸**　**加减八味丸**四方见二十四卷第十一论　**逍遥散**　**加味逍遥散**　**加味归脾汤**三方见二十四卷第四论　**六君子汤**　**补中益气汤**二方见二十四卷第六论

妇人遗尿失禁方论第四

经云：膀胱不利为癃，不约为遗溺。乃心肾之气，失其常度也，故有水道涩而遗者，有失禁而不知自遗者，亦有生产伤膀胱不时而遗者，有脬寒脏冷遗而不知者。

愚按：《内经》曰：胞移热于膀胱，则癃溺血。膀胱不利为癃，不约为遗溺。注曰：膀胱为津液之府，水注由之。然足三焦脉实，约下焦而不通，则不得小便。足三焦脉虚不约下焦，则遗溺也。《灵枢经》曰：足三焦者，太阳之别也，并太阳之正，入络膀胱，约下焦，实则闭癃，虚则遗溺。窃谓前症，若肝肾虚热，挺孔痿痹，用六味丸，如不应，用加减八味丸。阳气虚惫，膀胱积冷用鹿茸丸，如不应，用八味丸。若脾气虚弱，不能禁止，用补中益气汤加山药、山茱、五味。若肺气虚寒，前汤加桂、附。此症属虚热者多，真寒者少，治宜审察。

附　治　验附小便遗溺

一妇人小便自遗，或时不利，日晡益甚，此肝热阴挺不能约制，用六味丸料加白术，酒炒黑黄柏七分，知母五分，数剂诸症悉愈。若误用分利之剂，愈损真阴，必致不起。

一老妇患前症，恶寒体倦，四肢逆冷，余以为阳气虚，先用补中益气加附子三剂，不应，遂以参附汤四剂稍应，仍以前药而安。附子计用四枚，人参三斤许。

一妇人病愈后，小便出屎，此阴阳失于传送，名大小肠交也，先用五苓散二剂而愈，又用补中益气而安。

鹿茸丸　治阳气虚寒，小便白浊，滑数不禁，或脐腹阴冷，大便不实。

鹿茸炙　椒红　桂心　附子炮　牡蛎煅　补骨脂炒　石斛　肉苁蓉酒浸　鸡胵胫炙　沉香各一两　桑螵蛸炙，二钱

上为末，酒糊丸桐子大，每服三十丸，空心温酒下。

秘元丹　治阳气虚，小便不禁，或夜多小便频数。

白龙骨煅，三两　诃子十个，去核　缩砂去皮，一两

上为末，糯粥丸桐子大，每服五十丸，空

心盐酒下。

又方　鹿角镑炒为末，每服三五钱，空心热酒调下。

又方　鸡胜胫炙为末，每服二三钱，空心，酒调下，日二三服。

又方　桑螵蛸、茯神、远志、菖蒲、人参、当归、龙骨、龟板为末，卧时人参汤下三钱。

又方　桑螵蛸酒炒为末，每服二钱，空心姜汤调下。

附　方

六君子汤　补中益气汤二方见二十四卷第六论　**六味丸　加减八味丸　八味丸**三方见二十四卷第十一论　**参附汤**方见十九卷第六论　**五苓散**方见二十卷第九论

妇人小便出血方论第五

心主于血，通行经络，循环脏腑，若得寒则凝涩，得热则妄行，失其常道则溢渗于脬，则小便出血也。

愚按：前症肝经血热者，加味逍遥散。怒气血伤者，加味逍遥散调送2发灰。若肝经风热者，加味逍遥散送子芩丸。气血俱虚者，八珍汤送发灰。膏粱积热者，清胃散加槐花、甘草。风热伤胃者，四君子加防风、枳壳。胃气不能摄血者，补中益气汤。郁结伤脾，不能摄血者，济生归脾汤。

附　治　验

一妇人尿血，因怒寒热，或头疼或胁胀，此脾血虚而肝火盛，用加味逍遥散而血胀止，补中益气加蔓荆子而头痛痊。后郁怒腹痛尿血，仍用前散加龙胆草，并归脾汤治之，将愈，又因饮食所伤，复作心忡不宁，彻夜不寐，仍用前汤而痊。

一妇人尿血，面黄体倦，饮食不甘，晡热作渴，此脾胃气虚，不能摄血归经，用补中益气以补胃气，用归脾汤以解郁结。更用加味逍遥散以调养肝血而痊。

一妇人小便出血，服四物、蒲黄之类，更加发热吐痰，加芩、连之类又饮食少思，虚症蜂起，肝脉弦而数，脾脉弦而缓。此因肝经风热，为沉阴之剂，脾伤不能统摄其血，发生诸脏而然也。予用补中益气汤、六味地黄丸而痊。

鹿茸散　治劳损尿血，发热内热，或寒热往来，口干作渴。

鹿茸炙　当归　熟地黄自制　葵子炒　蒲黄炒　续断酒炒，各等分

上为末，每服二钱，酒调，日三服。

发灰散　治起居所伤，小便尿血，或忍尿脬转，脐下急痛，小便不通。又治肺疽心衄，内崩吐血，舌上出血，用乱发烧灰。本草云能疗崩血，通关隔，利水道，破癥瘕痈肿狐疝刺痛痓杂疮，疗脬转，通大小便，止咳嗽鼻衄

上每服二钱，以米醋汤调服。

生地黄散　治血热，小便出血。

生地黄二钱　黄芩炒，五钱　阿胶炒　柏叶炒，各　钱

水煎服。

当归散　治血分有热，小便出血，或时尿血。

当归　羚羊角镑　赤芍药各半钱　生地黄　刺蓟叶各一钱

上水煎服。

又方　治血分有热，用生地黄杵取汁，每用一小盏，日三服。

又方　治血分有热，小便尿血，用炒蒲黄末，每服二钱，温酒调下，滚汤亦下。

又方　肾虚，鹿角胶二两，炙黄为末，作二服，长流水调。

附　方

八珍散　加味逍遥散　归脾汤三方见二十四卷第四论　**子芩丸**方见十二卷第六论　**清胃散**方见二十四卷第一论　**四君子汤　补中益气汤**二方见二十四卷第六论

妇人大便不通方论第六

夫大便不通者，由脏腑不调，寒热之气结于肠胃，或经水过多，内亡津液，宜用三脘散，或四物加青皮，或七宣丸、麻仁丸，选而用之。

愚按：前症或大肠津液干涸，或血虚火烁，不可计其日期，饮食数多，必待腹满胀，自欲去而不能者，乃用猪胆汁润之，若妄服苦寒辛散之剂，元气愈伤，或通而不止，或成中痞之症。大抵血虚火燥，用加味逍遥散。气血俱虚，用八珍汤。燥药伤血，用四物、连翘、甘草。克伐伤气，用四君、川芎、当归。内热作渴，饮汤脉实，用竹叶黄芪汤。内热作渴，饮冷脉涩，用四物送润肠丸。肝胆克脾土，而不能输送，用小柴胡加山栀、郁李仁。肠胃气虚而不能传送，用补中益气加芍药、厚朴。积热而秘结，用清胃散加芍药。其有热燥风燥，阳结阴结，皆不宜损中气，治者审之。

附　治　验

一妇人痰喘内热，大便不通，两月不痢，脉洪大，重按微细，此属肝肺肾亏损，朝用六味丸，夕用逍遥散，各三十馀剂，计所进饮食百余碗，腹始痞闷，正前所谓血虚火烁也。以猪胆汁导而通之，用十全大补汤调理而安。

附　方

通神散　治大便实热不通，其证心腹胀痛，手不得近，心胸烦闷，而欲饮食者。

大黄炒　芒硝　槟榔　桃仁汴　郁李仁汤浸去皮酒炒，各一两

上为末，每服二钱，粥饮调。

大麻仁丸　治肠胃风结，大便常秘，而欲饮食者。

大麻仁别研如膏　大黄炒，各二两　槟榔　木香　枳壳麸炒，各一两

上为末，入麻仁，炼蜜丸桐子大，每服二十丸，温水下。

皂角丸　治大肠经有风，大便秘结而不坚实者。

皂角炙，去子　枳壳麸炒，等分

上为末，炼蜜丸桐子大，每服七十丸，空心米饮下。

苏麻粥　顺气滑肠，用紫苏子、麻子仁，水研取汁，煮粥食之。

润肠丸　治伏火风热，大肠干燥。若因失血，或因肾虚，当滋肾水，最忌此丸。

麻子仁　桃仁去皮尖另研，各一两　羌活　当归尾　大黄煨　皂角仁　秦艽各五钱

上另研为末，炼蜜丸，每服五十丸，空心白汤送下。如直肠干涩，用猪胆汁导之，亦忌前药。

附　方

加味逍遥散　**八珍汤**二方见二十四卷第四论　**补中益气汤**　**四物汤**　**四君子汤**三方见二十四卷第六论　**竹叶石膏汤**方见二十四卷第三论　**小柴胡汤**方见二十四卷第三论　**清胃散**方见二十四卷第二论　**疮科竹叶黄芪汤**方见二十四卷第四论

妇人老弱风人便秘戒用利药方论第七

初虞世云：肺主气，肺气不降，则大肠不能传送，宜用杏仁、枳壳、诃子等药。若老弱风人，津液短少，大便秘涩，用胡麻、杏仁、麻仁、阿胶、皂角之类。每见用驶利之药，大便虽通，精血复伤，反致他病。一男子，病风淫未疾，或用驶药利之，患肺痿，咯脓血，至大便不通而死，惜哉。

愚按：前症若胃强脾弱，津液不得四布，但输膀胱，小便数而大便难者，用脾约丸。若阴血枯槁，内火燔灼，脾肺失传，大便秘而小便数者，用润肠丸。此丸若用之于热甚气实，与西北禀厚者，无有不效。若用于东南

及虚热而气血不足者，则脾愈弱而肠愈燥，反致虚痞矣。此朱垣先生之治法也。其搜风顺气丸，中州及西北人用之多效，东南人用之无不致害。

附　治　验

一老妇大便欲去而难去，又不坚实，腹内或如故或作胀，两关尺脉浮大，余以为肠胃气血虚弱，每服十全大补汤加肉苁蓉，去后始快，若间二三日不服，腹内仍胀，大便仍难。

搜风顺气丸　治痔漏肠风，风热闭结，元气充实者。

车前子一两五钱　大麻子微炒　大黄五钱，半生半熟　牛膝酒浸　郁李仁汤泡　菟丝子酒浸蒸晒为末　枳壳麸炒　山药二钱

上为末，炼蜜丸桐子大，每服二十丸，空心白汤送下。

子和脾约丸

麻仁一两二钱半　枳壳麸炒　厚朴姜制　芍药各一两　大黄四两，蒸　杏仁去皮尖炒，一两二钱

上为末，入杏仁膏，炼蜜丸桐子大，每服二三十丸，空心用滚汤送下，内杏仁研烂。

妇人泄痢秘结方论第八

经云：春伤于风，夏必飧泄。盖木刑土也，土不能渗泄，则木气胜，故津液燥而秘，不可专以风治。张氏母，年七十，患痢频数，腰脚拘挛，百方不愈，用蒺藜、酸枣仁治之即愈。黄鲁直苦秘结，亦用前药而愈。故受症有不同也。

愚按：前症若因足三阴亏损，发热作渴，胸膈不利，饮食善消，面带阳色，脉洪而虚，肢体倦怠者，用补中益气汤、六味地黄丸。脾肺气虚，补中益气汤。脾经郁结，用加味归脾汤。气血俱虚者，八珍加肉苁蓉。肾经津液不足者，六味地黄丸。胃火消铄津液，竹叶黄芪汤。肝木侮脾土，小柴胡加山栀、郁李仁、枳壳。膏粱积热，清胃散加山栀、郁李仁、枳壳。若燥在直肠，用猪胆导之。

附　治　验

一老妇大便月余不通，痰喘内热，不得就枕，脉洪大，重按细微，朝用六味丸，夕用逍遥散，各五十余剂，计进饮食百余碗，小腹始闷。此火燥而消铄也，以猪胆汁润之，用十全大补而安。后仍不通，用八珍倍加肉苁蓉，常服而通。

治风人大便或秘

皂荚子二百粒，破作两片，慢火炒燥，入酥枣十，又炒燥，又入酥至焦黑为度

七为末，蜜丸桐子大，每服三十丸，煎蒺藜酸枣仁汤，空心下，良久未利再服，渐加至百丸，以通为度。

蒺藜汤　用蒺藜炒杵去刺三两，酸枣仁炒香一两，每用五钱，水一盏，煎七分，去滓，送下前丸。

大五柔丸　治脏气不调，大便难利，或为秘结坚硬。

大黄饭上蒸熇末　枳壳去穰麸炒　白芍药炒为末　葶苈炒为末　牛脂熬油　苁蓉酒浸，熇各一两　桃仁去皮尖，研，百枚　杏仁去皮尖，四十枚研，炒黄别杵

上和匀，炼蜜丸桐子大，米饮下三十，日三服，以利为度。

二仁丸　安康郡太守苦风秘，予处此方，用之甚效。

杏仁去皮尖，面炒黄　麻仁别研　枳壳去穰，麸炒为末　诃子炒去核，为末

上用炼蜜丸桐子大，每服二三十丸，温水下，未利增之。

蜜导法　用好蜜四五两，石器中微火熬，不住手搅，候可丸，以蛤粉涂手，捏如指长三寸许，入大孔内，以手掩良久即通，未通再作。文潞公泄利，求速效，用石脂、龙骨等药，便秘累日甚苦。余告曰：此燥粪在直肠，药所不及，请以蜜导之，下结粪四五十枚而愈。

通气散　治虚人忧怒，以致伤肺与大肠，不能传送。

陈皮　苏叶　枳壳面炒　木通各一钱

上水煎服。

皂角丸、苏麻粥亦佳。见前

附　方

补中益气丸方见二十四卷第六论　**六味丸**方见二十四卷第十一论　**加味归脾汤**　**八珍汤**　**逍遥散**　**加味逍遥散**　**十全大补汤**五方见二十四卷第四论　**竹叶黄芪汤**方见二十四卷第二论　**小柴胡汤**方见二十四卷第二论　**清胃散**方见二十四卷首论

妇人泄泻方论第九

论曰：泄泻之症，因肠胃虚冷而邪气乘之。经云：春伤于风，夏必飧泄。盖风伤肝，肝木旺而克脾土，属外因也。若七情不平，脏气受伤，属内因也。若饮食生冷伤脾，属不内外因也。大法寒者温之，热者凉之，滑者涩之，湿者燥之。

愚按：前症若生冷所伤，用六君、木香、砂仁。辛热所伤，用二陈、炒连、山栀。面食所伤，用六君、神曲。米食所伤，用六君、谷蘖。饮食不时而伤，用四君子汤。饮食过多而伤，用六君子汤。饮食停滞，人参养胃汤。脾气虚弱者，六君、升麻、柴胡。脾气虚寒，六君、木香、炮姜。肝木乘脾者，六君、柴胡、芍药。肝火克脾者，六君、芍药、山栀。中气虚而下陷者，补中益气汤。郁结伤脾者，《济生》归脾汤。肾气虚者，五味子散。脾气虚者，二神丸。脾肾虚者，四神丸。命门火衰者，八味丸。真阳虚败者，固真丸。仍与滞下方参用。

附　治　验

侍御沈东江之内，停食腹痛作泻，以六君加木香、炮姜而愈。后复作，传为肾泄，用四神丸而安。

侍御徐南湖子室，泻属肾经，不信余言，专主渗泄，以致不起。

一妇人年逾五十，不食夜饭，五更作泻，二十年矣。后患痢，午前用香连丸，午后用二神丸，各二服而痢止，又用二神丸数服，而食夜饭，不月而形体如故。

吴江史玄年母，素有血疾，殆将二纪，平居泄泻，饮食少思，面黄中满，夏月尤甚，治血之药，无虑数百剂，未尝少减。余以为脾肾虚损，用补中益气汤送二神丸，复用十全大补汤煎送前丸，食进便实，病势顿退。若泥中满忌参、术，痰痞忌熟地，便泄忌当归，皆致误事。

桂香丸　治虚寒滑泄腹痛，或呕吐不食，手足逆冷。

附子炮　肉豆蔻炮　丁香　桂心　白茯苓各一两　木香炮　白干姜炮，各两半

上为末，米糊丸桐子大，每服五十丸，空心米饮下。

胃苓散　治脾胃所伤，吐泻不止，水谷不分。即五苓散合平胃散。

上每服五七钱，用姜枣水煎，空心服，仍节饮食。

木香散　治脏腑虚寒，下泄米谷，口舌生疮，或呕吐不食。

木香煨　破故纸炒，各一两　良姜　缩砂炒　厚朴制各二钱　赤芍药炒　橘红　桂心　白术各半两　胡椒　吴茱萸炮，各一钱　肉豆蔻煨　槟榔一钱

上为末，每服三钱，用猪肝四两，批薄，以药掺拌，量人水醋盐葱姜，煮干，空心顿食。或丸桐子大，每服百丸，粥饮下，日三服。

府傅赵宦人，患泄泻，诸药无效。诊之曰：此肝肾虚也，服前散而愈。经曰：泄痢前后不止，肾虚也。又曰：诸厥固泄，皆属于下。下谓下焦肝肾之气也，门户束要，肝之气也，肝气厥而上行，故下焦不能禁固而泄痢。肾为胃关，门户不安，故仓廪不藏也。

香连丸　治痢疾，并水泻暑泻腹痛，不

问赤白，神效。

黄连净，二十两　吴茱萸去枝梗，十两

上先将二味用热水拌和，入磁器内，置热汤顿一日，同炒至黄连紫黄色，去茱，用连为末，每末四两，入木香末一两，淡醋米饮为丸桐子大，每服二三十丸，滚汤下。久痢中气下陷者，用补中益气汤下。中气虚者，用四君子下。中气虚寒者，加姜、桂。

三黄丸　治热痢腹痛，或口舌生疮，咽喉齿痛，及一切虚火之症。

黄芩　黄连　黄柏各炒等分

上各另为末，米糊丸桐子大，每服七八十丸，白汤下。

芍药汤　治热痢便血后重。经曰：溲而便脓血，此气行而血止也。行血则便脓自愈，调气则后重自除。

芍药炒，一两　当归　黄连炒，各半两　槟榔　木香　甘草炒，各二钱　桂二钱五分　黄芩炒，五钱

上每服半两，水煎，如不减加大黄。此症多有因中气虚弱，脾气郁结者，治当审察。

二神丸加五味二两，吴茱萸四两，名四神丸　治脾肾虚弱，侵晨五更作泻，或全不思食，或食而不化，大便不实，神效。

破故纸四两，炒　肉豆蔻二两，生用

上为末，用大红枣四十九枚，生姜四两切碎，同枣用水煮熟，去姜枣，和药丸桐子大，每服五十丸，空心盐汤下。

五味子散　治肾经虚弱，大便不实，或夜间或五更泄泻。

五味子炒，二两　吴茱萸半两

上为末，每服二钱，空心米饮调下，其效如神。米糊为丸，亦可。

白术芍药汤　治脾经受湿，水泄注下，体重腹满，形体倦怠，不欲饮食，或暴泄无数，水谷不分。

白术炒　芍药炒，各二钱　甘草炒，一钱

上水煎服。

茯苓汤　治湿热泄泻，或饮食伤泻。

白术炒　茯苓各五钱

上用水煎，食前服。一方有芍药等分，名白术散。

渗湿汤　治寒湿所伤，身重腰冷，如坐水中。或小便秘涩，大便溏泄，此症多因坐卧湿地。或阴雨所袭而致。

苍术炒　白术　甘草炒，各一两　干姜　茯苓各二两　陈皮一两　丁香各二钱半

上每服四五钱，枣水煎。

防风芍药汤　治飧泄身热，脉弦腹痛及头痛。

防风　芍药炒　黄芩炒，各二钱

用水煎服。

六君子汤　**四君子汤**　**补中益气汤**三方见二十四卷第六论　**人参养胃汤**方见七卷第十论　**十全大补汤**　《**济生**》**归脾汤**二方见二十四卷第四论　**八味丸**方见二十四卷第十一论　**东垣补真丸**方见七卷第三论

妇人协热下痢方论第十

论曰：下痢赤黄，米谷不化，作渴呕逆，小便不利，心胸烦躁，脉虚大而数。此胃经虚热，津液不分，并于大肠所致。先用五苓散，次用玉粉丹、四味阿胶丸主之。

愚按：前症若胃气虚弱，用补中益气汤。肝木侮脾土，用六君子汤。郁结伤脾土，用归脾汤。命门火衰，用八味地黄丸。余参各论主之。

附　治　验

一妇人五月间患痢，日夜无度，小腹坠痛，发热恶寒。余以为脾气虚弱，用六君子汤送香连丸，二服渐愈。仍以前汤送四神丸，四服全愈。至七月终，怠惰嗜卧，四肢不收，体重节痛，口舌干燥，饮食无味，大便不实，小便频数，洒淅恶寒，凄惨不乐，此脾肾虚而阳气不伸也，用升阳益胃汤而痊。

玉粉丹

蛤粉　硫黄等分

上为末，米糊丸桐子大，每服五十丸，用米饮下。

四味阿胶丸

黄连炒　赤茯苓二两　芍药炒，三两　阿胶炒燥一两

上为末，以醋丸桐子大，每服三十丸，食前米饮下。

附　方

补中益气汤　六君子汤二方见二十四卷第六论　**归脾汤**方见二十四卷第四论　**八味丸**方见二十四卷第十一论

妇人滞下方论第十一

经云：春伤于风，夏生飧泄。盖风喜伤肝，然春时肝木反克脾土，以致滞下赤白，里急后重，先服神术散，次用五苓散之类。烦渴腹痛，小便赤涩，脉洪数为热，用白头翁汤之类。脉虚弱为伏暑，用香薷散之类。如风邪下血，用胃风汤。腹痛呕逆，手足俱冷，六脉微细，为脏腑虚寒，急服四顺附子汤，灸气海、丹田二穴。久痢肠滑，用理中汤加肉果、诃子，或十全大补汤加木香、肉果之属。若一方一郡所患相类者，乃属疫症。

愚按：东垣云：太阴经受湿，水泻变脓血。脾传于肾者，谓之贼邪，难愈。先痢而后泻者，谓之微邪，易痊。若厥阴经下痢，脉沉微，手足厥逆，用麻黄小续命汤汗之，若身冷自汗，小便自利，脉微呕吐，用浆水散温之。若脉疾身动，下迫声响，用白术芍药汤。脉沉身静，饮食不入，用姜附汤。身体沉重，四肢不举，用术附汤。窃谓前症，若饮食停滞，用六君子汤，以补脾胃，消饮食。若胃气下流，用补中益气汤，以补脾肾升元气。若风伤肠胃，宜用神术散，以补脾胃，解外邪。若痰积中焦，宜用六神丸，以补脾胃，化痰滞。大凡脾胃虚弱，宜补中气，调饮食。

附　治　验

一老妇食后，因怒患痢，里急后重，肛门脱下，此脾气下陷，用大剂六君加附子、肉蔻、煨木香各一钱，吴茱五分，骨脂、五味各一钱五分，二剂诸症悉退，惟小腹胀闷，此肝气滞于脾也，与调中益气加附子、木香五分，四剂而愈。后口内觉咸，此肾虚水泛，与六味地黄丸，二剂顿愈。又以饮食失宜，大便不实，四肢逆冷，此脾胃复伤，与六君加附子五分，及八味丸而愈。

先太宜人，仲夏患痢腹痛，去后无度，烦渴饮汤，手按腹痛稍止，脉鼓指而有力，此真气虚而邪气实也，急用人参五钱，白术、茯苓各三钱，陈皮、炙草、附子、升麻各一钱，服之即睡觉而索食，脉症顿退，再剂而安。此取症不取脉也，其时同患是症，服痢药者，俱致不起，惜哉。

神术散　治春伤于风，夏生飧泄，或伤风头痛，顶背拘急，鼻流清涕。

苍术炒，二钱　藁本　川芎各一钱　羌活　粉草炒一钱五分　细辛五分

上用姜水煎服，欲发汗加葱头。

四顺附子汤

生附子去皮脐　白干姜炒　甘草炒　人参各一两

上每服四五钱，水煎，吐泻腹痛加肉桂半两，小便不利，加茯苓半两。若体寒自汗，手足逆冷，六脉虚弱，背寒面垢，或面如涂油，齿干烦闷，躁渴引饮，此为伏暑，宜用小柴胡汤、五苓散、酒蒸黄连丸。

加减参附汤　治寒痢阳气脱陷，呕吐不食，手足俱冷。

大附子炮　大人参各一钱　丁香十五粒

上用姜十片，米一撮，水一盅，煎服，如不应，再加之。

治噤口痢甚妙，石莲肉为末，每服二钱，陈米饮调下。

又方　干山药半生半炒黄为末，不拘时，用米饮调下。

附　方

胃风汤　治风冷乘虚，客于肠胃，以致

水谷不化，泄泻注下，或肠胃湿毒，下如豆汁，或下瘀血。

人参　白茯苓　芎藭　肉桂　当归　白芍药炒　白术炒，各等分

上每服三二钱，入粟米数粒，水煎，空心食前热服。

水煮木香丸　治久痢里急后重，日夜无度，其效如神。

罂粟壳去穰，三两　青皮去白，二两四钱　甘草炒，二两四钱　诃子炮去核，八两　当归　木香各六两

上为末，炼蜜丸弹子大，每服一丸，水煎化，空心服。

戊己丸　治胃经受热，泄痢不止，或饮食不入，腹痛不止。

黄连炒　吴茱萸去梗炒　白芍药各五两

上为末，面糊丸桐子大，每服三十丸，米饮食前下。

真人养脏汤　治下痢赤白，里急后重，腹痛脱肛。

粟壳蜜炙，二两六钱　人参六钱　白术六钱　肉桂八钱　当归六钱　诃子皮一两二钱　木香煨，二两四钱　肉豆蔻面煨，半两　白芍药炒，一两　甘草炒，一两八钱

上每服四钱，用水煎。脏寒加附子一两。

升阳除湿防风汤　如大便闭塞，或里急后重，数至圊而不能便，或有白脓，或兼下血，此郁结而不通也，以此汤举其阳，则阴气自降矣。慎勿利之。

苍术米泔浸，四钱　防风二钱　白术炒　白茯苓　白芍药炒，各一钱

先将苍术用水一盅半，煎至一盅，内诸药，同煎至八分，食前热服。夫饮食入胃，其气上升，输精心肺，然后下降。若脾胃有伤，不能上升，下流肾肝而成泄利。法宜升补中气，不可疏下，此东垣发前人所未论也。

调中益气汤　夫脉弦洪缓而沉，按之中下不得一涩。其证四肢满闭，肢节烦疼，难以屈伸，身体沉重，烦心不安，忽肥忽瘦，四肢懒倦，口失滋味，大小便清利而数。或上饮下便，或大便涩滞，夏月飧泄。或便后见血，或下白脓，胸满短气，咽膈不通，嗜睡无力，饮食少思。方见四卷第五论

麻黄续命汤

防风　杏仁去皮尖，各二两　麻黄去节，二两　人参　黄芩炒　甘草炙　芍药　防己　肉桂各一两　附子炮去皮脐，五钱

上每服半两，用姜水煎。

白术芍药汤　治太阴脾经受湿，水泄注下，体重微满，困弱无力，不欲饮食，或暴泄无数，水谷不化，宜此汤和之。

白术　芍药炒，各一两　甘草炒，五钱

每服一两。水煎。

浆水散　治暴利如水，周身汗出，一身尽冷，脉微而弱，气短难言，甚者吐血。此为恶病，急用此药，缓则不救。

半夏一两，炮洗　附子半两，炮　干姜一作干生姜　肉桂　甘草炙，各五钱　良姜二钱五分

上为末，每服三五钱，浆水煎，和滓热服，不应，加之。

姜附汤　治霍乱转筋，手足厥冷，或吐逆身冷，脉微急，用此药救之。

干姜一两　附子一两，生用

每服半两水煎。

术附汤　治下痢脾气脱陷，肢体不动，汗出身冷，气短喘急，或呕吐不食等症，须急用之。

白术　生附子须用好者

上为末，每服五钱，姜枣水煎，和滓服。如不应，倍用之。

六神丸　治食积赤白痢疾，或腹痛不食，或久而不止。

神曲为糊　麦芽炒　茯苓　枳壳面炒　木香煨　黄连炒赤，各等分

上为末，用神曲糊丸桐子大，每服五十丸，白汤送下。

香连丸方见前　六君子汤　补中益气汤二方见二十四卷第六论　五苓散方见二十一卷第十论

六味丸　八味丸二方见二十四卷第十一论

妇人痢后呕哕方论第十二

滞下咳逆呕逆，古人谓之哕，此胃气虚寒之危症也，用橘皮干姜汤、半夏生姜汤、丁香柿蒂汤。热证欬逆，用小柴胡汤、橘皮竹茹汤。尝治一痢咳逆，脉沉弱，投退阴散两服而愈。又一痢后咳逆灸期门穴二壮而愈。其穴在第六卷

愚按：东垣云：如泄痢而呕者，胃气不利也，上焦不和，用生姜橘皮汤。中焦不和，用芎、归、桂、苓。下焦不和而寒，治以轻剂，热甚而治以重剂。亦有胃火上冲而呕者，有积滞而呕者，有阴虚而呕者。丹溪云：下痢吃逆，自下冲上，属火之象，古方悉以胃弱言之，殊不知胃弱者，脾阴弱也，故久病变之，乃胃弱脾寒之危症。用半夏一两，生姜半两，或理中汤加枳壳、茯苓、半夏，不效，更加丁香、柿蒂各十枚。胃热咳逆，用橘皮竹茹汤。别病忽然而致，半夏茯苓汤加枳实、半夏，木香调气散最佳。

附　治　验

一妇人痢后呕哕，服降火化痰等剂愈甚，脉洪大，按之虚细，作渴饮汤，诸药到口即呕。余以为脾胃虚寒，不能司纳，以参、术、炮姜末各一钱，以饭作丸，米饮不时，过三五粒，至三两许，闻药不呕，乃以六君加炮姜，三十余剂而安。

一妇人患前症，饮食少思，胸腹膨胀，大便不实，所见之症，悉属虚寒假热。遂朝用补中益气汤加炮姜、木香，夕用六君子送四神丸，渐愈。又用八味丸料，煎送四神丸而痊。

一妇人因怒呕哕，时或昏愦，口噤，或时举体肉动，其面色或青或赤。余以为肝火炽盛，脾土受侮，用小柴胡汤加山栀、钩藤治之，渐愈。又用加味归脾、逍遥二药，调理而痊。

橘皮干姜汤　治胃寒呕哕不食，或吐痰腹痛兼泻。

橘皮　通草　干姜　桂心　甘草炒，一钱　人参各一钱

上水煎服。

橘皮竹茹汤　治哕逆。

橘皮二钱　竹茹　甘草炒　人参　半夏各一钱

上姜枣水煎。

猪苓汤　治咳而呕渴。心烦不得眠。

猪苓　赤茯苓　泽泻　阿胶炒　滑石各一钱

上水煎服。

半夏汤　治哕欲死。

半夏一两　生姜切，二两

用水煎为二服。

丁香柿蒂汤　治咳逆。

丁香十粒　柿蒂十五个

用水煎，热服。

生姜橘皮汤　治呕哕，手足厥冷。

橘皮一钱　生姜四钱

用水煎服。

退阴散　治阴毒伤寒，手足逆冷，或咳逆不止，脉沉细，头痛腰重，急进三服。若伤冷，每服一字，入正元散内同煎，入盐一捻。

干姜炮　川乌炒，各等分

每服一钱，盐一捻，水煎。

仓廪汤　治痢疾心烦，手足温，头痛，此热毒上冲，宜用此汤，即败毒散，每服四五钱，入陈仓米百粒，姜五片，枣一枚，煎。若脉微弱，或胸腹虚胀，手足厥冷，或因服罂粟、乌梅过多，以致作呕者，宜用山药半生半炒为末，米饮调下，日二三服。

附　方

木香调气散　治气滞呕吐，或胸膈不利，心腹刺痛，饮食不思。

木香　白豆蔻　丁香　檀香各二两　藿

香　甘草炒，各六两　砂仁四两

上为末，每服一钱，白汤调服。

半夏茯苓汤方见十二卷第三论　**补中益气汤**　**竹叶石膏汤**　**六君子汤**三方见二十四卷第六论　**八味丸**方见二十四卷第十一论

妇人大便下血方论第十三

妇人脏腑损伤，风邪所入，以致大便下血，或如豆汁，或腹中作痛。若粪后下血，其来远。粪前下血，其来近。远近者，言病在上下也。若面无血色，时寒时热，脉浮弱，按之如丝者，是前症也。

愚按：前症或饮食起居，或六淫七情失宜，以致元气亏损，阳络外伤。若膏粱积热，加味清胃散。怒气伤肝，六君、柴、芍、芎、归。郁结伤脾，加味归脾汤。脾气虚弱，六君子汤。思虑伤心，妙香散。大肠风热，四物、侧柏、荆防、枳壳。大肠血热，四物、丹皮、柴胡。中气下陷，补中益气、茯苓、半夏。心脾不能摄血，必补脾肺之源，举下陷之气。

附　治　验

一妇人下血不已，面色痿黄，四肢畏冷，此中气下陷，用补中益气汤送四神丸，数服而愈。

光禄张淑人，下血烦躁，作渴，大便重坠，后去稍缓，用三黄汤加大黄至四两方应。后用三黄汤，又二十余剂而愈。此等元气，百中一二。韩地官之内，脾胃素弱，因饮食停滞，服克伐之剂，自汗身冷，气短喘急，腹痛便血，或用诸补剂，皆不应，余用人参、炮附子各五钱，二剂稍应。却用六君子，每剂加炮附子三钱，四剂渐安。又用前汤每加附子一钱，数剂乃瘥。

一妇人因怒胸痞，饮食少思，服消导利气之药，痰喘胸满，大便下血，余用补中益气加茯苓、半夏、炮姜四剂，诸症顿愈，又用八珍加柴胡、炒栀全愈。

一妇人瘀血腹痛，便血。见前。

加减四物汤　治肠风下血。

侧百叶炒　荆芥　槐花炒　甘草炒，各五分　枳壳炒炒　生地黄　当归　川芎各一钱

上姜水煎。

肠风黑神散　治肠风下血，腹疼后重，或肛门脱出。

败棕烧　木馒头烧　乌梅去核　粉草炙，各一钱

上水煎服。

愚按：前二症若病久中气虚弱者，必用培补脾胃为主。

地榆汤　阴结便血。骆龙吉方

地榆四两　甘草炒，一两半　缩砂仁四十七粒

上每服三钱，水煎。

防风如神散　治风热气滞，粪后下血。

防风　枳壳麸炒，各等分

上每服三钱，水煎。

愚按：前二症若胃气虚，不能统血而下，用四君。中气下陷，用补中益气汤。脾气郁结，用归脾汤。气血虚弱，用八珍汤。气血虚寒，用十全大补汤。

治久下血成片，用头发烧灰，每服一二钱，水调下。

妙香散　治心气下血，温酒调下。

附　方

加味清胃散方见二十四卷第六论　**四君子汤**　**六君子汤**　**四物汤**　**补中益气汤**四方见二十四卷第六论　**八珍汤**　**加味归脾汤**二方见二十四卷第四论　**二神丸**　**四神丸**　**三黄丸**三方见前第八论

妇人痔瘘方论第十四

妇人痔瘘，因郁怒风热，厚味膏粱所致。其名有五，肛边如乳出脓者，为牝痔。肿胀出血者，为牡痔。痒痛者，为脉痔。肿核者，为肠痔。登厕出血者，为血痔。治宜审之。

愚按：前症妇人多因胎产经行，饮食起

居，六淫七情，失调所致。男子多因醉饱入房，筋脉横弛，精气脱泄，热毒乘虚而患。或入房强固其精，不乘火势而侮金。或炙煿厚味，阴虚湿热。宜凉血润燥疏风。溃后，当养元气，补阴精，不愈，即成痔漏。有串臀、串阴、穿肠者。其肠头肿块者，湿热也，作痛者，风也。便燥者，火也。溃脓者，热胜血也。大便作痛者，润燥除湿。肛门坠痛者，泻水导湿。小便涩滞者，清肝导湿。经云：因而饱食，筋脉横解，肠澼为痔。症属肝肾不足，故用加味地黄及六味丸。有效，慎勿数毒药，及服寒凉之剂。

鳖甲散　治五种痔漏，脓血淋漓，或肿痛，坚硬下坠。

鳖甲　露蜂房　蛇蜕　猬皮　猪后悬蹄五味烧存性，各二钱　麝香一分

上为末，每服一钱，空心生地黄煎汤调下，更傅之。

又方　热痛，用寒水石、朴硝为末，以津调搽。

附　方

六味丸方见二十四卷第十一论　**加味地黄丸**方见二十四卷第六论

妇人脱肛方论第十五

夫脱肛者，大肠之候也。大肠虚寒，其气下陷，则肛门翻出。或因产努力，其肛亦然也。

愚按：前症若大肠湿热，用升阳除湿汤。若血热，用四物、条芩、槐花。血虚，用四物、白术、茯苓。兼痔痛，用四物、槐花、黄连、升麻。中风虚弱，用补中益气、芍药、白术。中气虚寒，加半夏、炮姜、五味。肾虚，用六味丸。虚寒，用八味丸。夫肺与大肠为表里，肛者大肠之门，肺实热则秘结，肺虚寒则脱出，肾主大便，故肺肾虚者，多有此症。

附　治　验

一妇人脱肛，用补中益气、加味归脾各百余剂而愈。后因分娩复脱，仍以前药各二百余剂始愈。

姚和众以铁粉傅之良。《圣惠方》亦治阴脱阴肿

《集验方》以生铁三斤，水一斛，煮至五升，取水洗，日二次。

一方用五倍子煎汤洗，以赤石脂末掺上托入。或脱长者，以两床相并，中空尺许，以磁瓶盛汤，令病人仰卧，浸瓶中，逐日易之，收尽为度。

附　方

升阳除湿汤　自下而上者，引而竭之。

升麻　柴胡　防风　神曲炒　泽泻　猪苓各半两　苍术一两　陈皮　甘草　大麦蘖各三钱

上每服五钱，水煎空心服。胃寒肠鸣，加益智仁、半夏各半钱，姜枣同煎。

四物汤　**补中益气汤**二方见二十四卷第六论　**六味丸**　**八味丸**二方见二十四卷第十一论

妇人阴肿方论第十六

妇人阴肿，因胞络素虚，风邪客之，乘于阴部，血气相搏故也。

愚按：前症若气血虚弱，用补中益气汤，举而补之。肝经湿热，用龙胆泻肝汤，渗而清之。若阴肿阴痒，阴冷阴挺，当与后论互相参看。

附　治　验

一妇人阴中肿闷，小便涩滞，两胁作肿，内热睡热，月经不调，时或寒热，此因肝脾郁怒、元气下陷，湿热壅滞，朝用归脾汤加柴胡、升麻，解郁结，补脾气，升元气，夕用加味逍遥散，清肝火，生肝血，除湿热，各数剂，诸症悉愈。又用四君、芎、归、丹皮

调补肝脾而经水如期。

菖蒲散　治月水涩滞，阴间肿痛。

菖蒲　当归各一两　秦艽二两

上每服五钱，入葱白水煎。

白矾散　治阴肿坚痛。

白矾半两　甘草半钱　大黄一两

上为末，水和，用枣大绵裹，内阴中，日两换，以愈为度。

附　方

补中益气汤方见二十四卷第六论　**龙胆泻肝汤**方见二十四卷第八论

妇人阴痒方论第十七

妇人阴痒，为三虫在肠胃之间，因脏虚而蚀阴中，微则为痒，甚则为痛也。

愚按：前症属肝经所化，当用龙胆泻肝汤、逍遥散以主其内，外以桃仁研膏，和雄黄末或鸡肝，纳阴中，以制其虫。

附　治　验

一妇人胸膈不利，内热作渴，饮食不甘，肢体倦怠，阴中闷痒，小便赤涩，此郁怒伤肝脾所致，用归脾汤加山栀而愈。复因怒，患处并小腹胀痛，用小柴胡加山栀、芎、归、芍药痛止，用逍遥散加山栀而愈。又因劳役，患处肿胀，小便仍涩，用补中益气加山栀、茯苓、丹皮而痊。

一妇人阴内痛痒，不时出水，食少体倦，此肝脾气虚，湿热下注，用归脾汤加丹皮、山栀、芍药、柴胡、生草主之而安。

一妇人阴内痛痒，内热倦怠，饮食少思，此肝脾郁怒，元气亏损，湿热所致，用参、芪、归、术、陈皮、柴胡、炒栀、车前、升麻、芍药、丹皮、茯苓而痊。若阴中有虫痒痛，亦属肝木，以桃仁、雄黄研，纳阴中以杀之，仍用清肝解郁之药，有以鸡肝纳之者，乃取虫之法也。

又方，捣新桃叶，绵裹纳阴中，日三两易。

龙胆泻肝汤方见二十四卷第八论　**逍遥散**方见二十四卷第四论

妇人阴冷方论第十八

妇人阴冷，因劳伤子脏，风冷客之，用五加皮、干姜、丹参、蛇床子、熟地黄、杜仲各二两，蛎乳粉四两，天门冬一两，地骨皮二两，酒十五升，渍二宿，每服一盏，空心食前饮之。

愚按：前症属肝经内有湿热，外乘风冷所致。若小便涩滞，或小腹痞痛，用龙胆泻肝汤。若内热寒热，或经候不调，用加味逍遥散。若寒热体倦，饮食少思，用加味四君子。若郁怒发热，少寐懒食，用加味归脾汤。

附　治　验

一妇人阴中寒冷，小便黄涩，内热寒热，口苦胁胀，此因肝经湿热，用龙胆汤祛利湿热，用加味逍遥散调血气而安。

一妇人所患同前，更寒热呕吐，两股肿痛，先用小柴胡加山栀一剂，寒热呕吐顿止，次用龙胆泻肝汤一剂肿痛顿消。

一妇人阴中寒冷，小便澄清，腹中亦冷，饮食少思，大便不实，下元虚寒，治以八味丸月馀，饮食渐加，大便渐实，又月余，诸症悉愈。

八味丸　治血弱不能荣养脏腑，津液枯涩，风寒客于子脏，以致阴冷。

愚按：此丸果系肝脾肾虚，殊有神效。

附　方

小柴胡汤方见二十四卷第二论　**龙胆泻肝汤**方见二十四卷第八论　**加味逍遥散**　**加味归脾汤**二方见二十四卷第四论　**加味四君子汤**方见二十四卷第六论

妇人阴挺下脱方论第十九

妇人阴挺下脱，或因胞络伤损，或因子

脏虚冷，或因分娩用力所致。

愚按：前症当升补元气为主。若肝脾郁结，气虚下陷，用补中益气汤。若肝火湿热，小便涩滞，用龙胆泻肝汤。

附　治　验

一妇人阴中突出如菌，四围肿痛，小便频数，内热晡热，似痒似痛，小便重坠，此肝脾郁结。盖肝火湿热而肿痛，脾虚下陷而重坠也。先以补中益气加山栀、茯苓、车前子、青皮以清肝火升脾气，更以加味归脾汤调理脾郁，外以生猪脂和藜芦末，涂之而收。

一妇人阴中挺出五寸许，闷痛重坠，水出淋漓，小便涩滞。夕与龙胆泻肝汤，分利湿热；朝与补中益气汤，升补脾气。诸症渐愈。再与归脾汤加山栀、茯苓、川芎、黄柏，间服调理而愈。后因劳役，或怒气，下部湿痒、小水不利，仍用前药即愈。

又方　治前症用麻子仁研涂顶中，自吸入即洗去。

附　方

补中益气汤方见二十四卷第六论　**龙胆泻肝汤**方见二十四卷第八论　**归脾汤**　**加味归脾汤**方见二十四卷第四论

妇人阴中生疮方论第二十

窃谓前症乃七情郁火，伤损肝脾，湿热下注，其外症阴中出如蛇如菌，或如鸡冠状，或生虫湿痒，或溃烂出水，或肿闷坠痛，其内症体倦内热，经候不调，或饮食无味，晡热发热，或胸胁不利，小便痞胀，或赤白带下，小水淋涩。其治法肿痛者，四物汤加柴、栀、丹皮、胆草。湿痒者，归脾汤加柴、栀、丹皮。淋涩者，龙胆泻肝汤、白术、丹皮。溃腐者，逍遥散、山栀、川芎。肿闷坠痛者，补中益气汤、山栀、丹皮。佐以外治之法。

一妇人溃腐，脓水淋漓，肿痛寒热，小便赤涩，内热作渴，肢体倦怠，胸胁不利，饮食少思。余以为肝脾亏损，用补中益气内柴胡、升麻各用一钱，加茯苓一钱，山栀二钱，数剂少愈。又与归脾汤加山栀、川芎、茯苓，二十余剂，诸症悉退。惟内热尚在，再与逍遥散，倍用山栀而愈。

一妇人素性急，阴内痛，小便赤涩，怒而益甚，或发热，或寒热，此肝经湿热所致，用芎、归、炒栀、柴胡、苓、术、丹皮、泽泻、炒芍、车前、炒连、生草，数剂渐愈，又去黄连、泽泻，又数剂全愈。

附　方

四物汤　**补中益气汤**二方见二十四卷第六论　**逍遥散**　**归脾汤**二方见二十四卷第四论　**龙胆泻肝汤**方见二十四卷第八论　**小柴胡汤**方见二十四卷第二论

妇人交接伤丈夫头痛方第二十一

愚按：前症当用补中益气、六味地黄，以滋化源为主。

来复丹　交接相伤，四肢沉重，头痛昏晕，米饮下。

上每服五十丸。方见二十五卷第十论

附　方

补中益气汤方见二十四卷第六论　**六味丸**方见二十四卷第十一论

女人交接辄血出痛方第二十二

一妇人每交接出血作痛，此肝火动脾而不能摄血，用补中益气、济生归脾二汤而愈。若出血过多而见他症，但用前药调补肝脾。

《千金》疗交接血出：

桂心　伏龙肝各等分

上为末，酒服钱许。

附　方

补中益气汤方见二十四卷第六论　**济生归脾汤**方见二十四卷第四论

妇人交接他物所伤方第二十三

一妇人交接出血作痛，发热口渴欲呕，或用寒凉之药，前症益甚，不时作呕，饮食少思，形体日瘦。余曰：症属肝火，而药复伤脾所致也。先用六君加山栀、柴胡，脾胃健而诸症愈．又用加味逍遥散而形气复。

一妇人阴肿下坠，闷痛出水，胸腹不利，小便频数，内热晡热，口苦耳鸣，此肝脾火症，用小柴胡加车前、胆草、苓、术、升麻，一剂稍愈。又用加味逍遥加升麻，数剂渐愈。乃以加味归脾加升麻、柴胡，并补中益气加山栀，数剂顿愈。仍用加味逍遥、加味归脾二药调理全愈。

一妇人患前症热痛，或用寒凉败毒药，饮食不入，时欲作呕，小腹重坠。余谓此脾胃复损，元气下陷。先用补中益气加炮姜，二剂重坠渐愈。又加茯苓、半夏，二十余剂而愈。乃以归脾汤少加柴胡、升麻，并六味地黄丸而康。

又方　割鸡冠血涂之。以赤石脂末掺之，五倍子末亦良。

附　方

六君子汤　**补中益气汤**二方见二十四卷第六论　**加味逍遥散**　**加味归脾汤**　**归脾汤**二方见二十四卷第四论　**六味丸**方见二十四卷第十一论

妇人小户嫁痛方第二十四

愚按：前症当从二十一论互相主治。

《千金方》疗小户嫁痛：

甘草　生姜各五分　白芍药四分　桂心二分

上以酒二升，煎三四沸服。

又方　海螵蛸烧为末，酒服方寸匕，日三服。

又方　小麦、甘草等分，煎汤洗甚效。

校注妇人良方　卷九

宋　临川　陈自明良甫编辑
明　古吴　薛　己立斋补注
　　鄞县　曹赤电炳章圈校

求嗣门疾病既无，须知求嗣，故以次之

陈无择求子论第一

有夫妇，必有父子。婚姻之后，必求嗣续。故古人谓不孝有三，无后为大者。言嗣续之至重也。凡欲求子，当先察夫妇有无劳伤痼疾，而依方调治，使内外和平，则有子矣

愚按：丹溪先生云：人之育胎者，阳精之施也。阴血能摄之，精成其子，血成其胞，胎孕乃成。今妇人无子者，率由血少不足以摄精也。血之少也，因非一端，然欲得子者。必须补其精血，使无亏欠，乃可以成胎孕。若泛用桑桂丸之剂，熏炙脏腑，血气沸腾，祸不旋踵矣。窃谓妇人之不孕，亦有因六淫七情之邪，有伤冲任，或宿疾淹留，传遗脏腑，或子宫虚冷，或气旺血衰，或血中伏热。又有脾胃虚损，不能营养冲任。审此，更当察其男子之形气虚实何如。有肾虚精弱，不能融育成胎者。有禀赋微弱，气血虚损者。有嗜欲无度，阴精衰惫者。各当求其源而治之。至于大要，则当审男女之尺脉。若左尺微细，或虚大无力者，用八味丸。左尺洪大，按之无力者，用六味丸。两尺俱微细，或浮大者，用十补丸。又巢氏谓夫妻年命克制，坟墓不利者，理或有之。若误用辛热燥血，不惟无益，反受其害。今以素不生育，病愈后而得子者附子下。

附　治　验余见《医学纲目》求嗣部

一妇人月经淋沥，愈而生子。见一卷月水不断

一人患阳气虚寒，愈而生子。见五卷冷劳第四症

一妇人患结核，愈而生子。见一十四卷结核类第三症

一妇人禀弱，经行腹痛而生子。见一卷经行腹痛

一妇人素虚弱，患鹤膝风，愈而生子。见二十四卷膝风

一妇人患瘰疬，愈而生子。见二十四卷瘰疬第一症

一妇人患茧唇，愈而生子。见二十四卷瘰疬第一症

褚尚书求男论第二

建平孝王妃姬，皆丽，无子，择民家未笄女子入御，又无子。问曰：求男有道乎？澄对曰：合男女必当其年，男虽十六而精通，必三十而娶，女虽十四而天癸至，必二十而嫁。皆欲阴阳完实，然后交而孕，孕而育，育而子坚壮强寿。今未笄之女，天癸始至，已近男色，阴气早泄，未完而伤，未实而动，是以交而不孕，孕而不育，而子脆不寿，此王之所以无子也。然妇人有所产皆女者，有所产皆男者，人王诚能访求多男妇人至宫府，有男之道也。王曰：善。未再期，生六男。夫老阳遇少阴，老阴遇少阳，亦有子之道也。

无子论第三

夫无子者，其因有三：一坟墓风水不利，二夫妇年命相克，三夫妇疾病。坟墓不利，年命相克，此非药力可致。若夫妇疾病，必须药饵。然妇人无子，或劳伤血气，或月经闭涩，或崩漏带下。右尺浮则为阳绝，或尺微涩，或少阴脉浮紧，或尺寸俱微弱者，皆致绝产。若调摄失宜，饮食失节，乘风袭冷，结于子脏，亦令无子也。

《千金翼》求子方论第四

论曰：妇人之居幽闺，类多血气不调，胎妊生产崩伤之异，比之男子，十倍难疗。其或七情失宜，或饮食无度，或胎疮未愈而遽合，或登厕风入阴户，便成瘤疾。若欲求子，交感之时，必天日晴明，神思清爽，气血谐和，与天德福德相合。夫妇本命，五行相生，并本命帝旺而生者，则寿而贤，否则不可得也。

交会禁忌第五

凡求子宜吉良日交会，当忌丙丁及弦望晦朔，大风雨雾，寒暑，雷电霹雳，天地昏冥，日月无光，虹蜺地动，日月薄蚀及日月火光，星辰神庙，井灶圊厕，冢墓死柩之傍。若交会受胎，多损父母，生子残疾夭枉，愚顽不孝。若交会如法，则生子福德智慧，验如影响，可不慎哉。

男子受胎时日法第六

凡男女受胎，皆以妇人经绝，一日三日五日为男，仍遇月宿在贵宿日，若以经绝后二日四日六日泻精者皆女，过六日皆不成胎。又遇旺相日尤吉，半夜入房生子者，贤明贵寿，余时皆凶。

推支干旺相日法第七

春甲乙，夏丙丁，秋庚辛，冬壬癸。春寅卯。夏巳午，秋申酉，冬亥子。

推每月宿日第八

正月　初一、初六、初九、初十、十一、十二、十四、二十、二十一、二十四日。

二月　初四、初七、初八、初九、初十、十二、十四、十九、二十二、二十七日。

三月　初一、初六、初七、初八、初十、十七、二十、二十五日。

四月　初三、初四、初五、初六、初八、初十、十五、十八、二十二、二十八日。

五月　初一、初二、初三、初四、初五、初六、初十、十二、十三、十五、十六、二十、二十五、二十八、二十九、三十日。

六月　初一、初三、初十、十三、十八、二十二、二十六、二十七、二十八、二十九日。

七月　初一、十一、十六、二十一、二十四、二十五、二十六、二十七、二十九日。

八月　初五、初八、十三、十八、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六日。

九月　初三、初六、十一、十六、十七、二十、二十一、二十二、二十四日。

十月　初一、初四、初九、十四、十七、十八、十九、二十、二十二、二十九日。

十一月　初一、初六、十一、十四、十五、十六、十七、十九、二十六、二十九日。

十二月　初四、初九、十二、十三、十四、十五、十七、二十四、二十七日。

若春合甲寅、乙卯，夏合丙午、丁巳，秋合庚申、辛酉，冬合壬子、癸亥，与上月宿日合者佳。

求子服药须知第九

论曰：夫人求子服药，须知次第，男服七子散，女服荡胞汤、紫石英门冬丸及坐导药，则无不效矣。

七子散　主丈夫气虚。精气衰少无子。

牡荆子　五味子　菟丝子　车前子　蔊实子　山药　石斛　熟地黄　杜仲　鹿茸　远志各八分　附子炮　蛇床子　川芎各六分　山茱萸　天雄各五分　桂心一钱　白茯苓　牛膝　人参　黄芪各二分　巴戟一钱二分　苁蓉七分　盐乳粉八分

上为末，每服钱许，日二服，酒调。一方加覆盆子二钱。

庆云散　主丈夫阳气不足，不能施化。

覆盆子　五味子各一升　菟丝子一升　白术炒　石斛各三两　麦门冬　天雄各九两　紫石英二两　桑寄生四两

上为末，食后酒服钱许，日三服，或米饮调冷，去桑寄生加细辛四两，阳事少去石斛加槟榔十五个。

荡胞汤　治妇人全不产育。

朴硝　牡丹皮　当归　大黄蒸一饭久　桃仁各三两　细辛　厚朴　苦梗　赤芍药　人参　茯苓　桂心　甘草　牛膝　陈皮各二两　附子炮，一两半　虹虫炒焦去翅足　水蛭炒，各十枚

坐导药　治妇人全不产，及断续，更服荡胞汤。

皂角去皮，一两　吴茱萸　当归　大黄　晋矾枯　戎盐　川椒各二两　五味子　细辛　干姜各三两

一方无茱萸，有蓼蒿、苦瓠各三分。

上为末，以绢袋盛，如指状入阴中。如欲小便去之，一日仍易之。如子宫有冷水，天阴则痛，须候下尽而止药。每日早晚，用苦菜煎汤熏洗，着药后一日，服紫石英丸。

紫石英丸

紫石英　天门冬各三两　紫葳　牡蒙各二两　粉草一两半　桂心　川芎　卷柏　乌头炮熟地黄干　辛夷仁　禹余粮煅醋淬　当归　石斛各三两　乌贼骨　牛膝　薯蓣各六分　桑寄生　人参　牡丹皮　干姜　厚朴　续断　食茱萸　细辛各五分　柏子仁一两

上为末，蜜丸桐子大，每服二十丸，温酒下。

续嗣降生丹　治妇人五脏虚损，子宫寒冷。不能成孕。

当归　桂心　龙齿　乌药　益智　杜仲　石菖蒲　吴茱萸各一两半　茯神　牛膝　秦艽　细辛　桔梗　半夏　防风　白芍药各三钱　干姜一两，半生半炒　附子重一两者作一脐，入朱砂一钱，湿面裹煨为末　川椒二两，焙　牡蛎二两，童便浸四十九日，却用硫黄末一两醋调涂，用纸裹之，米醋浸湿，盐泥固济，用炭煅赤

上为末，用糯米糊丸桐子大，每服三十丸至百丸。空心淡醋、温酒、盐汤任下，日二服。及治男子精寒不固，阳事衰弱，白浊梦泄，妇人寒热，诸虚百损，盗汗气短。预服此药者，无不感应。

愚按：前五方多慓悍之味，治当审察病因，不可轻用。秦桂养真，白薇、茱萸、地黄、紫石英、阳起石、暖宫济阴丹，汤药数方，尤为慓悍，不可轻服，未敢悉录。

窦禹钧夜梦其亡祖父谓之曰：汝缘无子，又且不寿，宜修善行。自是佩服乃训。复梦祖父谓曰：汝名挂天曹，以有阴德，特延算三纪，勅锡五子。悉皆荣显。

张庆司狱，惟务方便，年五十始生子亨，有一道人丐子门，谓庆曰：汝本无嗣，今闻婴儿声，非若子乎。庆曰：偶得一子。道人曰：信乎。阴德未易量，尔之积累善事，非一朝一夕，今不但有嗣，又喜子孙文学之贵，宜善保之，后果如其言。

冯商，其妻每劝置妾，商娶一女，已成，闻其父因官纲运欠折，鬻女以偿之，商恻然不忍犯，更益以资装，送还其父，明年生冯京，后登状元。

马默未有嗣，知登州日，奏活沙门岛，罪人不致枉死。一日，梦中见符使挟一男女，乘空来其前，呼曰：尔本无嗣，以活人数多，上帝特赐男女各一。言讫不见，果如其言。

时邦美之父，老而无子，置一妾，对暗室悲泣。问之乃曰：父卒于官，鬻妾欲办丧

耳。时遂携金偕往其家，殡葬而归，未几，生邦美，后举进士，官至吏部。

袁韶父为郡吏，年五旬，置一妾，乃宦家女也，父殁家贫，鬻而归葬，袁知其故，即送还，更以囊资益之，明年生韶，既长，为参知政事。

冯涓之父无子，置一妾，闻其父丧官所，无力归葬，故鬻此女。即日访其母而归之，且厚资助，夜梦一羽衣曰：天赐尔子，庆流涓涓，明年生一子，因名曰涓，既长及第。人之无嗣，或因丈夫阳气之不足，不能施化。或因妇人阴血衰惫，百疾攻之。以致然也。故先贤立方垂训，以启后人。或者用计百端，妾媵无数，及皓首终身，不能如其意者，是皆心行有亏，非命也。苟能革心之非，所行向善，积德累功，施恩布惠，则上天之报施，自然庆流后裔，此温隐居求嗣篇所由作也。予尝读圣朝为善阴骘书，因览窦禹钧等数人所履，皆言此事，历历可鉴，谨录附赘于此，以为求嗣者劝戒之一助云尔。

温隐居求嗣保生篇第十

昔东京焦公，三世无嫡嗣，为商旅，游玩名山，寻访至人，问其因，至京都，遇一老僧，声清而神朗，谈论甚异。焦怪而问之曰：贫家三世无嫡嗣奈何？僧曰：无嗣者有三，一祖宗无德，自身无行；二夫妻年命，恐犯禁忌；三精神不守，妻妾血寒。焦公曰：血寒有何法术？愿闻一言。僧曰：先修德，后修身，三年之后，到台山当授异方。说毕，忽不见。焦一遵其言，后赴五台，见一行童，手持一书，言曰：老师传语大夫，功成行满，赐方药名续嗣降生丹，依方服之，当生富贵之子。焦员外子生子不肖，亦赴五台见行童曰：老师昨日见员外，何必来问我，但依尔父所行，愚者自贤。焦曰：愚岂能贤乎。行童曰：昔窦氏五子，皆不全形，后行恩布德，悉登科第。焦氏拜谢而归，奉行雕板，印施方书，不及二十年，子孙数人皆贵显。后人收得此行状及方，受持行用，求药者获其子孙，皆有德行。余躬受此方，不敢缄默，并录篇论，以告诸贤，庶不致异方湮没耳。

正统间，合肥人罗某，年六十无子，因连坐谪保安州为民，将至居庸，解者逃回，罗赴关自告。或者曰：放流绝域，人所不堪，今解者既去，君可无往也。罗曰：吾罪本为人所累，使予归，复以此累人，吾不忍也，且国皇法，不可轻逭。遂至州，夜有二盗，疑其有所携，乃穿穴以取之。其妻觉，预置沸汤，俟其入则沃之。既穴，二人将入，罗起谕之，乃去。次日罗至市，忽有二人俯伏道旁，罗问之，乃夜穿穴者也。二人曰：吾辈相戏，几被伤殒，赖公晓谕，二命得生，公所赐也。后罗凡出外，二人必为之守护。未几，罗妻卒，妾生一子，任延安守，一女适隆庆卫指挥使王钦。

礼部尚书沈立斋云：有二老，一有子而富，一无子而贫，居址相邻，因各居高冈，其上有茔墓，二老欲掘墓开窑以取利，贫者以告其妻。妻曰：冈后有墓开以为窑，不惟烧损地脉，坏人风水，且近坟穴，不可为也。遂已之。富者并凶，见尸则焚之，后见骸骨甚多，悉弃于水，因致巨富，乃起岑楼，以蓄财物，每夜翁之眷属，皆居于上，去其梯，以示贼不能犯。不意贼有刘六者，卒然昼至，家属不及登楼者，则投井而死。其登楼者，被焚而死。人以为焚尸于火，弃尸于水之报也。其贫者后致巨富，生一子，益其家业云。

弘治间，京师有黄刚者，因无子，每岁夏秋，修合痢疾药施之。忽邻里于静夜闻人言黄公积善久矣，送以一嗣，后果有子。

弘治间，有张某，自太医院恩生仕至县尹，老而无子，在县笃于惜民，已而升为郡守。民深感其惠，在郡生子，亦德政之所致也。

正德间，夏诚，字纯夫，吴江县人，锦衣卫籍。中顺天府乡试，任武城县尹，爱民甚笃，因忤上司，遂归老子家。旧民到京者，

怀其德惠；怜其清苦，莫不以财帛助之，垂老得子。后有继其政者甚丰敛，县民子中途劫之，子女皆被其害。

黄善贫而无子，佣工为业。富民倪五，命其开窑取土，因锄土见尸棺，以旧土掩之，乃从远地担土而归，后倪贫而黄富。亦开窑，倪亦佣工子黄家，黄甚惜之，与之共食。倪因患时疮，为人憎，遂投水而死。黄闻之，遂收其尸而殡之，遂有子，且继其富，作善降祥。信不诬矣。窃闻之书曰：惠迪吉，从逆凶，惟影响。又曰：作善降祥，作恶降殃，子之有无，自王室至于庶民，亦在乎阴德，而岂可专泥于药哉。

校注妇人良方　卷十

宋　临川　陈自明良甫编辑
明　古吴　薛　己立斋补注
　　鄞县　曹炳章圈校

胎教门求嗣已明须知胎教故以次之

妊娠总论第一

巢氏病源论：妊娠一月，名始胚，足厥阴脉养之。二月名始膏，足少阳脉养之。三月名始胎，手心主脉养之。当此之时，血不流行，形象始化，未有定仪，因感而变，欲子端正庄严、常口谈正言，身行正事。欲生男，宜佩弦，执弓矢。欲生女，宜佩韦，施环佩。欲子美好，宜佩白玉。欲子贤能，宜看诗书。是谓外象而内感者也。四月始受水精，以成其血脉，手少阳脉养之。五月始受火精，以成其气，足太阴脉养之。六月始受金精，以成其筋，足阳明脉养之。七月始受木精，以成其骨，手太阴脉养之。八月始受土精，以成肤革，手阳明脉养之。九月始受石精，以成毛发，足少阴脉养之。十月五脏六腑，关节人神皆备。此其大略也。又五脏论：有称看漥者，论一月如珠露，二月如桃花；三月男女分，四月形象具，五月筋骨成，六月毛发生，七月游其魂，儿能动左手，八月游其魄，儿能动右手，九月三动身，十月受气足。更有《颅囟经》云：一月为胎胞精血凝也；二月为胎形成胚也；三月阳神为三魂，四月阴灵为七魄，五月五行分五脏也；六月六律定六腑也，七月精开窍通光明也；八月元神具降真灵也；九月宫室罗布以定生人也。十月受气足万象成也。今推究数说，如五脏论者，类皆浅鄙，妄诧其名。至于三藏佛书，且涉怪诞，漫不可考。今按《颅囟经》三卷云：中古巫方所撰。其巢氏论妊娠，至三月始胎之时，欲谈正言，行正事，佩弦韦，执弓矢，施环佩，佩白玉，读诗书之类，岂非胎教之理乎。尝试推巢氏所论云，妊娠脉养之理，足厥阴肝脉也，足少阳胆脉也，为一脏腑之经，余皆如此，且四时之令必始于春木，故十二经之养始于肝，所以养胎在一月二月。手心主心胞络脉也，手少阳三焦脉也，属火而夏旺，所以养胎在三月四月。手少阴，乃心脉也，以君上之官，无为而尊也。足太阴脾脉也，足阳明胃脉也，属土而旺长夏，所以养胎在五月六月。手太阴肺脉也，手阳明大肠脉也，属金而旺秋，所以养胎在七月八月。足少阴肾脉也，属水而旺冬，所以养胎在九月。又况母之肾脏，系于胎，是母之真气子之所赖也。至十月，儿于母腹之中，受足诸脏气脉所养，然后待时而生。此论奥微而有至理，世更有明之者，亦未有过于巢氏之论矣，余因述其说。

受形论第二

巢氏论曰：阳施阴化，精气有余，两胎有俱男俱女者。《道藏经》云：妇人月信止后，一日三日五日，值男女旺相日，阳日阳时交合，有孕多男。若男女禀受皆壮则男子，一或怯弱则少子。《颅囟经》云：阳盛发阴，当孕成男。六脉诸经，皆举其阴。又云：三阳所会则生男，三阴所会则生女。葛仙翁《肘

后方》云：男从父气，女从母气。《圣济经》云：天之德，地之气，阴阳之至和，流薄于一体。因气而左动则属阳，阳资之则成男。因气而右动则属阴，阴资之则成女。《易》称乾道成男，坤道成女。此男女之别也。凡妊娠有疾，投以汤药，衰其太半而已。使病去母安，胎亦无损矣。

愚按：东垣、丹溪云：经水断后一二日，血海始净，精胜其血，感者成男。四五日后，血脉已旺，精不胜血，感者成女。盖父精母血，因感而会，精之施也。血能摄精，故成子。此万物资始于乾元也，血之行也。精不能摄，故成女，此万物资生于坤元也。阴阳交媾，胚胎始凝。所藏之处，名曰子宫，一系在下，上有两歧，一达于左，一达于右。精胜其血，则阳为之主，受气于左子宫而男形成。精不胜血，则阴为之主，受气于右子宫，而女形成。此二先生之确论也。若夫妊娠，药饵宜禁，当参本门考之。

受形篇第三

褚氏云：男女之合，二精交畅，阴血先至，阳精后冲，血开裹精，精入为骨，而男形成矣。阳精先入，阴血后参，精开裹血，血入为本，而女形成矣。阳气聚面，故男子面重，溺死者必伏。阴气聚背，故女子背重，溺死者必仰。走兽溺死，仰伏皆然。阴阳均至，非男非女之身，精血散分，骈胎品胎之兆。父少母老，产女必羸。母壮父衰，生男必弱。古之良工，首察乎此。气受偏瘁，与之补之，补羸女则养血壮脾，补弱男则壮脾节色，羸女宜及时而嫁，弱男宜待壮而婚。此疾外所务之本，不可不察。

论胎教第四 马益卿先生

论曰：胎教产图之书，不可谓之迂面不加信，然亦不可狎犯之。方今俚俗之家，与不正之属，将息避忌，略不如仪。或药毒不消，或产于风露，无产厄而子母均安者，亦幸有之。若保胎之法，须多方豫养，方无后患。如邻家有所兴修，亦或犯其胎气，令儿破形殒命。如刀犯者形必伤，泥犯者窍必塞，打击者色青黯，系缚者相拘挛。如此等验，有如指掌，不可不慎也。

孕元立本章第五

有太初，有太始，混沌一判。既见气矣，故曰太初。既立形矣，故曰太始。气初形始，天地相因，生生化化，品物彰矣。故曰大哉乾元，万物资始，至哉坤元，万物资生。

吴澄注云：混沌未判，则气形俱泯。混沌既判，则气形已分。既见气矣，是为太初。既立形矣，是为太始。太初者，凡有气之所本，故天得之以统元气。太始者，凡有形之所本，故地得之以统元形。天地交泰，相因为气形，生生者得所以生，化化者得所以化，品物流行，而形色名声彰矣。大哉乾元，太初之所寓也，故以万物之资始为言。至哉坤元，太始之所寓也，故以万物资生为言。惟万物资始资生于乾坤，故乾元则兆象至坤元，然后形无不成。

有生之初虽阳，予之正育而充之，必阴为之主。

薛左丞注阴阳离合论曰：天覆地载，万物方生。未出地者，命曰阴处，名曰阴中之阴。出地者，命曰阴中之阳，阳予之正，阴为之主。王冰谓阳施正气，万物方生，阴为之主，群形乃立。字说始而生之者天地也，育而充之者人也。

因形移易，日改月化，坤道之代终也。

列子周穆篇尹文先生曰：因形移易，谓之化。庄子曰：予方篇混元曰：消息盈虚，一晦一明，日改月化，日有所为，而莫见其功。易坤卦文言曰：地道无成而代有终也。地之承天，其无成而有终也，岂迫于不得已耶。盖道之所在，万物失之则死，得之则生。有生之类，听命于此，故无成而代有终者。以道言之也。

谓之妊，阳既受始，阴壬之也。壬子谓之妊，字说。

壬，一阳也，二阴也。阳既受始，阴壬之而谓之妊。解曰：壬，阳水之子也，位在亥子之间。阴至亥极矣，阳复受胎而谓之妊，于壬至于然后生。

谓之胞，巳为正阳，阴包之也。

巳，正阳也，而阴能包之，阴与阳更用事故也。巳者孟夏之月，于卦为乾，纯阳用事，故诗谓之正月。正月者，正阳之月也，阴方用事，而为物之主，则虽正阳，亦在所包而退听焉。

谓之坯，未成为器，犹云坯也。

《说文》：瓦未烧者谓之坯，胚妇孕一月也。《字说》：坯未成为器，犹坯也。

谓之胎，既食于母，为口以也。

《说文》：胎妇孕二月也。《字说》：元胎既食于母，为口以焉。

若娠则以时动也。

《字说》：女娠以时动。

若怀则以身依之也。

《字说》：心所怀，则身依焉，目隶焉。

天之德，地之气，阴阳之至和，相与流薄于一体。

《灵枢经》曰：天之在我者德，地之在我者气，德流气薄而生者也。

唯能顺时数，谨人事，勿动而伤，则育之道得矣。

自一月积之至于十月，所谓时数也。保卫辅翼，防闲忌慎，适其宜，所谓人事也。

观四序之运，生长收藏，代出万物，仪则咸备。而天地之气，未始或亏者，盖阴阳相养以相济也。

阴阳离合论曰：天覆地载，万物方生。阳予之正，阴为之主，故因春生，因夏长，因秋收，因冬藏，失常则天地四塞。《庄子·天地篇》曰：流动而生物，物生成理，谓之形。形体保神，各有仪则，谓之性者。曾不知此，乃欲拂自然之理，谬为求息之术，方且推生死于五行，薪补养于药石，以伪胜真，以人助天，虽或有子，孕而不育，育而不寿者众矣。昔人论年老有子者，男不过尽八八，女不过尽七七，则知气血在人，固自有量，夫岂能逃阴阳之至数哉。

《天真论》帝曰：有其年已老而有子者何也？岐伯曰：此其天寿过度，气脉常通，而肾气有余也。此虽有子，男不过尽八八，女不过尽七七，而天地之精气皆竭矣。注：虽老而生子，子寿亦不能过天癸之数。

凝形殊禀章第六

天地者，形之大也。阴阳者，气之大也。惟形与气相资而立，未始偏废。

庄子则阳篇太公调曰：天地者，形之大者也。阴阳者，气之大者也。气以形载，形以气充，惟气与形两者相待，故曰相资而立，未始偏废。

男女媾精，万物化生，天地阴阳之形气寓焉。

系辞曰：天地絪缊，万物化醇，男女媾精，万物化生。

语七八之数，七，少阳也。八，少阴也。相感而流通，故女子二七天癸至，男子二八而精通，则以阴阳交合而兆始故也。

岐伯曰：女子二七而天癸至，任脉通，冲脉盛，月事以时下，故能有子。男子二八肾气盛，精气溢泻，阴阳和，故能有子。传曰：女子十四有为人母之道，四十九绝生育之理。男子十六有为人父之道，六十四绝阳化之理。

语九十之数，九，老阳也。十，老阴也。相包而赋形，故阴穷于十，男能围之。阳穷于九，女能方之。则以阴阳相生而成终故也。

《字说》：阴穷于十，围之者男。阳穷于九，方之者女。九有变也，女足以方之。十无变也，男足以围之。解曰：男有室，所以围阴于外。女有家，所以方阳于内。《易》曰：妇人之吉，从一而终也。夫子制义，从妇凶也。围，圆也，君道也，夫道也。圆则可以

制义而行。方，仁也，臣道也，妇道也，方则从一而已。男从圆与规，从夫同意，女从仁与臣，从仁同意。

元气孕毓，皆始于子。自子推之，男左旋，积岁三十而至巳。女右旋，积岁二十而至巳。巳为正阳，阴实从之，自巳怀壬。男左旋，十月而生于寅。女右旋，十月而生于申，申为三阴，寅为三阳，而生育之时著矣。其禀赋也，体有刚柔，脉有强弱，气有多寡，血有盛衰，皆一定而不易也。

十九难曰：男生于寅，寅为木，阳也。女子生于申，申为金，阴也。杨氏注云：元气起于子，人之所生也。男从子，左行三十。女从子，右行二十，俱至于巳，为夫妇怀妊也。古者男子三十，女年二十，然后行嫁娶，十月而生者。男从巳左行，至寅为十月，故男行年起于丙寅。女从巳右行，至申为十月，故女行年起于壬申。

以至分野异域，则所产有多寡之宜，吉事有祥，则所梦各应其类。是故荆杨薄壤多女，雍冀厚壤多男，熊罴为男子之祥，蛇虺为女子之祥，是皆理之可推也。

周官职方也，扬州其民，三男五女。荆州其民，一男二女。雍州其民，三男二女。冀州其民，五男三女。诗斯干篇名，吉梦维何。维熊维罴，维虺维蛇。大人占之，维熊维罴。男子之祥。维虺维蛇，女子之祥。

胎化之法，有所谓转女为男者，亦皆理之自然。如食牝鸡，取阳精之全于天产者，带雄黄取阳精之全于地产者。

《千金方》转女为男，丹参丸，用东门上雄鸡头。又方，取雄黄一两，络囊盛带之。本草丹雄鸡，补虚温中，通神杀毒，其肝补肾，其冠血益阳。雄黄人佩之，鬼神不能近，毒物不能伤。

操弓矢；藉斧斤，取刚物之见于人事者，气类潜通，造化密移，必于三月兆形之先。盖方仪则未具，阳可以胜阴，变女为男理固然也。

巢氏论云：妊娠三月，始胎形，象始化，未有定仪，见物而变，欲得男者操弓矢，食雄鸡。

气质生成章第七

具天地之性，集万物之灵，阴阳平均，气质完备，咸其自尔。然而奇偶异数，有衍有耗，刚柔异用，或强或羸，血荣气卫，不能逃于消息盈虚之理，则禀气之初，讵可一概论耶。是以附赘垂疣，骈拇枝指，侏儒跛躄，形气所赋者有如此者。然则胚胎造化之始，精移气变之后，保卫辅翼，固有道矣。

孝经云：天地之性人为贵。书泰誓曰：惟人万物之灵。

天有五气，各有所凑，地有五味，各有所入，所凑有节适，所入有度量，凡所畏忌，悉知戒慎，资物为养者，理固然也，故寝兴以时，出处以节。

六节藏象论曰：天食人以五气，地食人以五味。王冰云：天以五气食人者，臊气凑肝，焦气凑心，香气凑脾，腥气凑肺，腐气凑肾。地以五味食人者，酸味入肝，苦味入心，甘味入脾，辛味入肺，咸味入肾也。

可以高明，可以周密，使雾露风邪，不得投间而入。因时为养者，理宜然也。故必调喜怒，寡嗜欲。

《礼记·月令》：仲夏之月，可以居高明，可以处台榭。脉要精微论云：冬日在骨，蛰虫周密，君子居室，夏则顺阳，在上故可以高明，冬则顺阳气之伏藏，故可以周密。

作劳不妄，而气血从之，皆所以保摄妊娠，使诸邪不得干焉。

天真论岐伯曰：上古之人，其知道者，不妄作劳，故能形与神俱，而尽终其天年。通天论曰：圣人陈阴阳，筋脉和同，骨体坚固，气血皆从。

苟为不然，方授受之时，一失调养，则内不足以为中之守，外不足以为身之强，气形弗克，而疾疢因之。

张仲曰：五脏者，中之守也，得守者生，失守者死。又曰：五脏者，身之强也，得强则生，失强则死。

若食兔唇缺，食犬无声，食杂鱼而生疮癣之属，皆以食物不戒之过也。

孙真人养胎法云：妊娠食兔肉令子缺唇，食犬肉令子无音声，食于鲤鱼令子恶寒解。导法方宜论云：食之使人热中。注云：鱼发疮。

心气大惊而癫疾。

奇病论帝曰：人生而病癫疾者何？岐伯曰：名为胎病，此得之在腹中时，其母有所大惊，气上不下，精气并居，故令子发为癫疾也。

肾气不足而解颅。

巢氏云：解颅者，言小儿年虽长，而囟门不合，头缝开解，是皆由肾气不成故也。肾主骨髓，而脑为髓海，肾气不成，则脑髓不足，不能成，故头颅开解。

脾胃不和而羸瘦。

巢氏曰：夫羸瘦不生肌肤，皆为脾胃不和，不能饮食，故血气衰微，不能荣于肌肤也。凡小儿在胎而遇寒，或生而伏热，皆令儿不能食，故羸瘦也。

心气虚乏，而神不足，皆由气血不调之故也。诚能推而达之，使邪气无所乘，兹乃生育相待而成者。

《病源》云：肺主气，心主脉，而血气通矣，脏腑循行经络，产则血气伤损，脏腑不足，而心现领诸脏，使其劳伤不足，则令惊悸忧惚，是心气虚也。

故曰：天不人，不因人。

法言云：天不人，不因人，不天不成。

转女为男法第八

一妇人怀娠未满三月，男女未定，形象未成，故药饵方术，可以转令生男者，理或有之。其法以斧置妊娠床下，系刃向下，勿令人知。恐勿信，试令鸡抱卵时，依此置窠下，一窠尽出雄者。又自初觉有娠，取弓弩弦缚妇人腰下，满百日去之，此紫宫玉女秘法也。又妊娠三月已前，以雄鸡尾尖上长毛三茎，潜安妇人卧席下，又取夫发及手足甲，潜安卧席下，俱勿令知之。又妊娠才满三月，要男者以雄黄半两，衣中带之，要女者以雌黄带之。以上诸法，试之良有验也。

校注妇人良方　卷十一

宋　临川　陈自明良素编辑
明　古吴　薛　己立斋补注
鄞县　曹赤电炳章圈校

候　胎　门

脉例第一

王子亨云：若妊娠，其脉三部俱滑大而疾。在左则男，在右则女。经云：阴搏阳别，谓之有子。搏者近也，阴脉逼近于下，阳脉则出于上，阳中见阳，乃知阳施阴化，法当有子。又少阴脉动甚者，妊子也。手少阴属心，足少阴属肾，心主血，肾主精，精血交会，投识于其间，则有娠。又三部脉浮沉正等，无病者，有妊也。余病如《脉经》说。左手尺脉浮洪者，为男胎也。右手尺部浮洪者，为女胎也。两手尺部俱洪者，为两男。俱沉实者，为两女。又云：中指一跳一止者，一月胎。二跳二止者，二月胎也。

诊妇人有妊歌第二

肝为血兮肺为气，血为荣兮气为卫，阴阳配偶不参差，两藏通和皆类例，血衰气旺定无妊，血旺气衰应有体。

肝藏血，为荣属阴。肺主气，为卫属阳。阴阳配偶者，是夫妇匹配，偶合媾精，乃有子也。若血少气盛，则无娠孕。若血盛气少，则有孕也。

寸微关滑尺带数，流利往来并雀啄，小儿之脉已见形，数月怀胎犹未觉。

寸脉微，关脉滑，尺脉带数，及流利雀啄，皆是经脉闭塞不行成胎。以上之脉，皆是血多气少之脉，是怀小儿之脉，已见形状也。

左疾为男右为女，流利相通速来去，两手关脉大相应，已形亦在前通语。

左手脉疾为怀男，右手脉疾为怀女。及两脉流行，滑利相通，疾速来去，是或两手关脉洪大相应，是其胎已有形状也。

左脉带纵两个男。

纵者，夫行乘妻，水行乘火，金行乘木，即克贼脉也，名曰纵。见在左手，则怀两个男儿也。

上手带横一双女。

横者，妻乘夫也，是火行乘水，木行乘金，即所胜脉也，名曰横。见于右手，则怀一双女儿也。

左手脉逆生三男。

逆者，子乘母也，是水行乘金，火行乘木，即己生脉也，名曰逆。见于左手，则怀三个男儿也。

上手脉顺还三女。

顺者，母乘子也，是金行乘水，木行乘火，即生己之脉也，名曰顺。见于右手，则怀三个女儿也。

寸关尺部皆相应，一男一女分形证。

寸关尺部，脉大小迟疾相应者，是怀一男一女形证之脉也。谓关前为阳，关后为阴，阴阳脉相应，故怀一男一女也。

有时子死母身存，或即母亡存子命。

此二句之文是辨子母存亡之法。

往来三部通流利，滑数相参皆替替，阳

实阴虚脉得明，遍满胸膛皆逆气。

若寸关尺三部，通行流利，皆替替有力而滑数，皆是阳实阴虚之脉，主妊妇逆气遍满胸膛而不顺也。

左手太阳浮大男。

左手寸口为太阳，其脉浮大，则是怀男子。

上手太阴沉细女。

上手寸口为太阴，其脉沉细，是怀女脉也。

诸阳为男诸阴女，指下分明长记取。

诸阳脉皆为男，即为大疾数滑实之类也，当怀男子。诸阴脉三，即沉细之类是，当怀女子。

三部沉正等无绝，尺内不止真胎妇。

寸关尺三部脉沉浮正真齐等，举按无绝断，及尺内举按不止住者，真的怀胎妇也。

夫乘妻兮纵气雾。

经云：纵者，夫乘妻也。水行乘火，金行乘木，即鬼贼脉也。纵气雾者露也。又上下也。谓夫之阳气，乘妻之阴气，二气上下相逐，如雾润结子也。

妻乘夫兮横气助。

横者，妻乘夫也，见前注。谓两傍横气相佐助也。

子乘母兮逆气参。

逆者，子乘母也。谓子气犯母气，相乘逆行之气相参合也。

母乘子兮顺气护。

是母气乘于子气为顺，气相护卫也。凡胎聚纵横逆顺四气以荣养，方以成形也。

小儿日足胎成聚，身热脉乱无所苦。

妇人怀小儿五个月，是以数足，胎成就而结聚也。必母身体壮热，当见脉息躁乱，非病苦之症。谓五月胎已成，受火精以成气，故身热脉乱，是无病也。

汗中不食吐逆时，精神结备其中住。

谓妊胎受五行精气以成形，禀二经以荣其母。怀妊至五月，其胎虽成，其气未备，故胎气未安，上冲心胸，则汗出不食吐逆，名曰恶阻，俗呼诜饭，唯思酸辛之味，以调胎气也。

滑疾不散三月胎。

妊娠三月名始胎，此是未有定仪，心惟脉养之，故脉见滑疾流利，为少气多血、不散为血气盛，则始结为胎也。

但疾不散五月母。

其脉但疾数而不散者，是五个月怀胎之母也。

弦紧牢强滑利安，沉细而微归泉路。

孕妇之脉，宜弦紧牢强滑利，为安吉之脉。若沉细而微，谓脉与形不相应，故云死也。前文虽云太阴沉细；又云诸阴为女，其说似有相违，谓三部脉皆不沉细及微，故不同也。

愚按：前论与《脉诀》所云不同，观者当自推之。

验胎法第三

妇人经脉不行，已经三月，欲验有胎，川芎生为末，空心浓煎，艾汤调下二钱，腹内微动，则有胎也。

胎杀避忌产前将护法第四

一受孕之后，切宜避忌胎杀所游。如经云：刀犯者形必伤，泥犯者窍必塞，打击者色青黯，系缚者相拘挛，甚至母殒，祸如反掌。

月游胎杀

立春在房床。惊蛰在户单扇。清明在门双扇。立夏在灶。芒种在母身。小暑在灶。立秋在碓。按经本云在正北方子云。白露在厕前。寒露在门。立冬在户及厨。大雪在炉及灶。小寒在房母身。

十干日游胎杀

甲巳日占门，乙庚日占碓磨，丙辛日占

井灶。丁壬日占厨解，戊癸日占米仓。

十二支日游胎杀

子丑日占中堂，寅卯辰酉日占灶，巳午日占门，未申日占篱下，戌亥日占房。

六甲旬游胎杀

甲子旬游窗碓，甲戌旬游正厅，甲申旬游中庭，甲午旬游房内，甲辰旬游房中。甲寅旬游□□。

太史局日游胎杀

每遇癸巳、甲午、乙未、丙申、丁酉五日，在房内北。庚子、辛丑、壬寅三日，在房内南。癸卯一日，在房内西。甲辰、乙巳、丙午、丁未四日，在房内东。六戊六巳日，在房内中。余日在外无占。

凡游在房内，不宜于方位上安床帐及扫舍，皆凶。

又有小儿杀及本年三杀，及产母身黄定命，皆不可犯。凡妊娠之后，将此贴于房内，常照见之，切不可穿凿修掘，移钉系篱壁，重物展压之类，犯之重则胎死腹中，母亦不利，轻则子受其殃，成人之后，必定破形拳挛，跛缩瘖哑，犯之极验。

食忌论第五

一受孕之后，切宜忌不可食之物，非惟有感动胎气之戒，然于物理，亦有厌忌者。设或不能戒忌，非特延月难产，亦能令儿破形母损，可不戒哉。

食鸡肉糯米合食，令子生寸白虫。

食羊肝，令子生多厄。

食鲤鱼鲙及鸡子，令儿成疳多疮。

食犬肉，令子无声音。

食兔肉，令子唇缺。

食鳖肉，令子项短及损胎。

食鸭子共桑椹同食，令子倒生心寒。

食螃蟹，令子横生。

食雀肉，合豆酱食之，令子面生黑点黑子。

食豆酱合藿香食之，坠胎，食水浆绝产。

食雀肉，令子不耻多淫。

食山羊肉，令子多病。

食生姜，令子多指生疮。

食虾蟆蝉鱼，令儿瘖哑。

食驴骡马肉，延月难产。

如此之类，无不验者，则知圣人胎教之法矣。

孕妇药忌歌第六

蚖蝒水蛭地胆虫，鸟头附子配天雄，蹶蹋野葛蝼蛄类，鸟喙侧子及虹虫，牛黄水银并巴豆，大戟蛇蜕及蜈蚣，牛膝藜芦并薏苡，金石锡粉及雌雄，牙硝芒硝牡丹桂，蜥蜴飞生及蜚虫，代赭蚱蝉胡粉麝，芫花薇御草三棱，槐子牵牛并皂角，桃仁蛴螬和茅根，梫根硇砂与干漆。

亭长波流菵草中，瞿麦蓟茹蟹爪甲，猬皮赤箭赤头红，马刀石蚕衣鱼等，半夏南星通草同，干姜蒜鸡及鸡子，驴肉兔肉不须供，切须妇人产前忌，此歌宜记在心胸。

校注妇人良方　卷十二

宋　临川　陈自明良甫编辑
明　古吴　薛　己立斋补注
鄞县　曹赤电炳章鉴校

妊娠疾病门胎后已明须知妊娠疾病故以次之

妊娠诸病忌毒药，余当对症依法治之。

妊娠随月服药将息法第一

《千金》云：妊娠一月，名始胚。饮食精熟，酸美受御，宜食大麦。毋食腥辛，是谓才正。是月足厥阴脉养，不可针灸其经。此经内属于肝，肝主筋血，一月之内，血行否涩，不为力事，寝必安静，毋令恐畏。况一月阴阳新合为胎，寒多为痛，热多卒惊，举重腰痛，腹满胞急，卒有所下，当预安之，宜服乌雄鸡汤。

乌雄鸡汤方

乌雄鸡一只，治如食法　吴茱萸一两　茯苓　阿胶各二两，炒　生姜　甘草各一两　人参　芎药　白术各一　麦门冬一合　心

上以水一斗二升，煮鸡取汁六升，下药，煮取三升，内酒三升并胶等，取汁三升分三服。

补胎汤　若曾伤一月胎者，当预服此药。

细辛一两　防风二两　乌梅一升吴茱萸　生地黄　白术各一两　大麦五合　生姜四两

上以水七升，煮取汁二升半，分三服。寒多倍细辛、茱萸，热多去细辛、茱萸，加栝蒌根二两，有所思去大麦，加柏子仁三合。一方有人参一两，忌生菜、芜荑、桃、李、雀肉等物。

妊娠二月，足少阳脉养，不可针灸其经。此经内属于胆，胆主精，是时儿精成于胞里，当谨护勿惊动。况二月始阴阳踈经，有寒不成，有热即萎。卒中风寒，有所动摇，心满，脐下急急，腰背强痛，卒有所下，乍寒乍热，艾叶汤主之。

艾叶汤方

丹参　当归　人参　麻黄去节　艾叶　阿胶炙，各二两　甘草一两，炙　大枣十二枚，擘　生姜六两

上以酒三升，水一斗，内药煮减半，去滓内胶，煎取二升，分三服。忌海藻、菘菜。

黄连汤　若曾伤二月胎者，当预服此药。

黄连　人参各一两　吴茱萸五合　生地黄九两　生姜三两

上以醋浆七升，煮取三升，分四服，日三夜一，每十日作一剂。若觉不安，加乌梅一升。加乌梅者，不用浆，直用水。忌猪肉、[illegible]　麦门冬　[illegible]加当归半两。

妊娠三月，名始胎。当此之时，未有定仪，见物而化，欲生男者操弓矢，欲生女者弄珠玑，欲子美数视璧玉，欲子贤良端正清虚，是谓外象而内感者也。是月手心主脉养，不可针灸其经。此经内属于心，毋悲哀思虑惊动。盖三月为定形，有寒则大便清，有热则小便难，不赤即黄。卒惊恐忧愁，瞋悲喜顿仆，动于经脉，腹满，绕脐苦痛，腰背痛，卒有所下。宜服雄鸡汤。

雄鸡汤方

雄鸡一只，治如食法　甘草炙　茯苓　人参　阿胶各二两，炒　黄芩　白术各一两　芎药四

两　大枣十二枚，擘　生姜一两，切　麦门冬去心五合

上以水一斗五升，煮鸡减半，内药，煮取一半，入清酒三升并胶，再煎取三升，分三服，日饮尽。忌海藻、菘菜、酢物、桃、李、雀肉等。一方有当归、川芎二两，无黄芩、生姜。

茯神汤　若曾伤三月胎者，当预服此药。

茯神　丹参　龙骨各一两　阿胶炒　当归　甘草炙　人参各二两　赤小豆　大枣十二枚，擘

上酢浆一斗，煮取三升，分四服。七日后，服一剂。腰痛加桑寄生二两。深师方有薤白二两，麻子一升。忌同前。

妊娠四月，以受水精，始成血脉。其食稻粳，其羹鱼雁，是谓成血气，以通耳目而行经络。是月手少阳脉养，不可针灸其经。此经内输三焦，其时儿六腑顺成，当静形体，和心志，节饮食。盖四月为离经，有寒，心下温温欲呕，胸满不食，小便如淋，脐下苦急。卒中风寒，头项强痛，寒热；或惊动身躯，腰背腹痛，或时胎上，胸烦不安，卒有所下，宜服菊花汤主之。

菊花汤方

菊花如鸡子大一枚　麦门冬去心，一升　麻黄去节　阿胶炙，各二两　生姜五两　甘草炙　当归　半夏洗，各二两　人参一两五铢　大枣十二枚，擘

上以水八升，煮减一半，内清酒三升并阿胶，煎取三升，分三服，温卧，当汗，以粉扑之，护风寒四五日。忌食如前。

调中汤

芍药四两　甘草炙　芎藭　续断各一两　柴胡　李根白皮　白术各三两　乌梅一升　当归一两五铢　生姜四两　厚朴炙　枳实炙，各二两

上以水一斗，煮取二升，分四服，日三夜一，八日再服一剂。一方有半夏二两。忌海藻、菘菜、桃、李、雀肉。

妊娠五月，始受火精，以成其气，晏起沐浴浣衣，居处必厚其衣裳，朝吸天光，以避寒殃，其食稻麦，其羹牛羊，和茱萸调以五味，是谓养气，以定五脏。是月足太阴脉养，不可针灸其经。此经内输于脾，其时儿四肢成，无大饥，无甚饱，无食干燥，无自灸热，无大劳倦。盖五月毛发初生，有热苦头眩，心乱呕吐；有寒则腹满痛，小便数。卒有恐怖，四肢疼痛寒热，胎动无常处，腹痛顿欲仆，卒有所下。宜服阿胶汤。又名旋覆花汤主之。

阿胶汤方

阿胶四两，炙　人参一两　生姜六两　吴茱萸七合　当归　旋覆花　芍药　甘草炙　黄芩各二两　麦门冬去心，一升

上以水九升，煮取一半，内清酒三升并阿胶，微火煎取三升半，分四服，日三夜一。先食后服，便愈。不差，更服。忌海藻、菘菜。

安中汤　若曾伤五月胎者，当预服此方。

甘草炙　芍药各三两　当归　人参　生地黄　芎藭各二两　五味子五合　麦门冬去心，一升　大枣三十五枚，擘　生姜六两　大麻仁五合　黄芩一两

上以水七升，清酒五升，煮取三升半，分四服，日三夜一，七日再服一剂。忌如前。

安胎当归汤　若妊娠五月，举动愕胎不安。小腹痛引腰络，小便下血。

当归　阿胶炙　芎藭　人参各一两　大枣十二枚　艾一把

上以酒水各三升，煮至三升，去滓，内胶令烊，分三服。一方有甘草，无参、枣。

妊娠六月，始受金精以成筋，身欲微劳，无得静处，出游于野，数观走犬走马，食忌鸷鸟猛兽之肉，是谓变腠理纫筋，以养其力，以坚背膂。是月足阳明脉养，不可针灸其经。此经内属于胃，主其口目。盖六月之时，儿口目皆成，调五味，食甘美，毋大饱，六月卒有所动不安，寒热往来，腹内胀满，体肿惊怖，忽有所下，腹痛如欲产，手足烦疼，宜服麦门冬汤。

麦门冬汤方

麦门冬去心，一升　甘草炙　人参各一两　生地黄三两　黄芩二两　阿胶炒，四两　生姜六两　大枣十五枚，擘

上以水七升，煮减半，清酒二升并胶，煎取三升，分三服，如人行三四里；进糜粥。忌海藻、菘菜、芜荑。

柴胡汤　若曾伤六月胎者，当预服之。

柴胡四两　白术　芍药一方作紫葳　甘草炙，各二两　麦门冬三两，去心　苁蓉一两　芎藭二两　生地黄五两　生姜六两　大枣三十枚，擘

上以水一斗，煮取三升，分四服，日三夜一，仍进糜粥，七日更服一剂。忌海藻、菘菜、芜荑、桃、李、雀肉等。一方有黄芩二两。

旋覆花汤亦名阻病　《集验》疗妊娠六七月，胎不安常处。

旋覆花一两　厚朴制　白术　枳壳　黄芩炒　茯苓各三两　半夏炒，一方无　芍药　生姜各二两

上以水一斗，煮取二升半，先食分五服，日三夜二。忌羊肉、饧、醋、桃李、雀肉等。《千金》同。

妊娠七月，始受水精以成骨。劳身摇肢，无使定止，动作屈伸，以运血气。自此后，居处必节饮食，避寒暑，食粳稻，以密腠理，是谓养骨而坚齿。是月手太阴脉养，不可针灸其经。此经内属于肺，主皮毛。是时儿皮毛已成，无大言，无号哭，无薄衣，无洗浴，无寒饮。若忽惊恐，摇动腹痛，卒有所下，手足厥阴脉，若伤寒烦热，腹满短气，常苦颈项腰背强，宜服葱白汤。

葱白汤

葱白十五枚　半夏细切炒　人参一两五钱　生姜八两　甘草炒　当归　黄芪炒，各三两　阿胶炒，四两　黄芩一两　旋覆花一把　麦门冬去心一升

上以水八升，煮减半，内清酒三升并胶，煎取四升，温服一升，日三夜一，温卧当汗出，无汗加麻黄二两，秋勿强汗。忌羊肉、饧、海藻、菘菜等。

杏仁汤　若曾伤七月胎者，当预服。

杏仁去仁皮尖，碎　甘草　蛎乳研　麦门冬去心　吴茱萸各一升　五味子　粳米各五合　紫菀一两

上以水八升，煮取三升半，分四服，日三夜一，七日服一剂。忌海藻、菘菜。

妊娠八月，始受土精，以成肤革。和心静息，无使气极，是谓周密腠理，光泽颜色。是月手阳明脉养，不可针灸其经。此经内属于大肠，大肠主九窍。是时儿九窍皆成，无食燥物，无辄失食，无忍大气。若中风寒，有所犯触，身体尽痛，乍寒乍热，胎动不安，苦头眩痛，绕脐下寒，时时小便，白如米汁，或青或黄，或寒慄，腰背苦冷痛，而目视茫茫，宜服芍药汤。

芍药汤方

芍药四钱　人参　当归　甘草炙，各二两　白术一两　厚朴二两，制　薤白切，一升　生姜切，四两

上以水五升，酒四升，煮取三升，分四服，日三夜一。忌海藻、菘菜、桃、李、雀肉等类。

葵子汤　若曾伤八月胎者，当预服。

甘草炙　柴胡　白术各二两　厚朴姜制炒　芍药　葵子二升　生姜六两　大枣二十枚，擘

上以水九升，煮取三升，分四服，日三夜一，服一剂。忌猪肉、冷水、芜荑、桃、李、雀肉、酢物等类。

妊娠九月，始受石精，以成皮毛，六腑百节，莫不毕备。饮醴食甘，缓带自持而待之，是谓养毛发，多才力。是月足少阴脉所养，不可针灸其经。此经内属于肾，肾主续缕皆成，无处温冷，无着灸衣。若卒下痢腹满，悬急上冲，腰背痛不可转侧，短气，宜服半夏汤。

半夏汤方

半夏泡炒，五合　麦门冬去心，五合　干姜炮，

一两　当归　吴茱萸　阿胶炙，各三两　大枣十二枚，擘

上以水九升，煮取三升，去渣内蜜八合，微火温分四服，痢即止。忌生血物饧。

猪肾汤　若曾伤九月胎者，当须服。

猪肾一具　茯苓　桑寄生　干姜炮　生地黄　芎藭各三两　白术　麦门冬一升，去心　附子大者一枚，炮

上以水一斗，煮猪肾熟去之，内诸药，煎三升半，分四服，日三夜一，十日更一剂。忌猪肉、芜荑、桃、李、雀肉、酢物。

妊娠十月，五脏俱备，六腑通纳天地气于丹田，故使关节人事皆备，但俟时而生。

愚按：妊娠所禁之法，皆传自上古，当永为遵守，其方药用须斟酌。

芎藭补中汤　治怀孕血气不能荣养，以致半产。予尝治一妊娠，不足月而损坠，服此药遂安。

干姜煨　阿胶炒　五味子　芎藭各五分　黄芪炒　当归　白芍药　杜仲炒　白术各一钱　木香　人参　甘草炙，各五分

上水煎服。

妊娠恶阻方论第二

妊娠恶阻病，《产宝》谓之子病，《巢氏病源》谓之恶阻。由胃气怯弱，中脘停痰，脉息和顺，但肢体沉重，头眩择食，惟嗜酸咸，甚者寒热呕吐，胸膈烦满，半夏茯苓丸主之。

愚按：前症若中脘停痰，用二陈汤加枳壳。若饮食停滞，用六君子加枳壳。若脾胃虚弱，用异功散。若胃气不足，用人参橘皮汤，兼气恼加枳壳，胸膈痞闷再加苏梗，胁痛再加柴胡。若饮食少思，用六君子加紫苏、枳壳。头晕体倦，用六君子汤。若脾胃虚弱，呕吐不食，用半夏茯苓汤。盖半夏乃健脾气化痰滞之主药也，脾胃虚弱而呕吐，或痰涎壅滞，饮食少思，胎不安，必用茯苓半夏汤倍加白术。然半夏、白术、茯苓、陈皮、砂仁，善能安胎气，健脾胃，予常用验矣。

附　治　验

一妊娠呕吐恶食，体倦嗜卧，此胃气虚而恶阻也，用人参橘皮汤，二剂渐愈，又用六君加紫苏，二剂而安。

一妊娠吞酸恶心，时欲作呕，此因脾胃虚而饮食停滞，用六君加枳壳、香附治之而愈。

一妊娠停食腹满，呕吐吞酸，作泻不食，余以为饮食停滞，兼肝木伤脾土，用六君子汤以健脾胃，加苍术、厚朴以消饮食，吴茱萸所制黄连以清肝火，诸症悉愈。又以六君加砂仁调理而脾土乃安。

白术汤　治胃虚恶阻，吐水，甚至十余日粥浆不入。

白术炒，一钱　人参五分　丁香　甘草炒，各二分

姜水煎服。

人参橘皮汤　治阻病呕吐痰水，饮食少思，肢体倦怠。

人参　橘红　白术炒　麦门冬去心　白茯苓各一钱　厚朴制　甘草各五分

上加竹茹、姜水煎服。

保生汤　治妊娠恶阻，少食呕吐，或兼吐泻作渴。

人参一钱　甘草炒　白术炒　香附　乌梅　橘红各五分

上姜水煎服。

安胎饮　治体倦恶食，或胎动腹痛，或下血发热。

甘草炒　茯苓　当归　熟地黄自制　川芎　白术炒　黄芪炒　白芍药炒　半夏汤泡　阿胶切炒　地榆各五分

上姜水煎服。

又方　缩砂仁为末，每服二钱，姜汤或米饮调下。

附　方

二陈汤方见二十四卷第五论　**六君子汤**方见

二十四卷第六论　**异功散**方见二十三卷第三论　**半夏茯苓汤**方见后

妊娠痰逆不食方论第三

妊娠呕逆者，乃水饮停积为痰，轻者妨食呕逆，甚者腹痛伤胎，皆由胃气不健，或风冷外乘所致也。

愚按：前症因食停滞，用半夏茯苓汤加枳壳。兼气恼，更加柴胡。因痰壅滞，用半夏茯苓汤加白术。因风寒外伤，用参苏饮。饮食腹胀，用香砂六君子汤。寒热呕吐，人参养胃汤。

附　治　验

一妊妇呕吐胁胀，或寒热往来，面色青黄，此木旺而克脾土，用六君子加柴胡、桔梗、枳壳而安。

一妊妇呕吐酸水，胸满不食，此脾土虚而肝木所侮，用六君子加芍药而愈，又用四君子加枳壳、桔梗而安。

一妊妇胸腹膨胀，吐痰不食，此脾胃虚而饮食为痰，用半夏茯苓汤渐愈。又用六君子加枳壳、苏梗、桔梗，而饮食如常。后因恚怒，胁胀不食，吐痰恶心，用半夏茯苓汤加柴胡、山栀而愈。

半夏茯苓汤　治妊娠脾胃虚弱，饮食不化。呕吐不止。

半夏炮，炒黄　陈皮各一钱　白茯苓二钱　砂仁炒，一钱　甘草炒，五分

上用姜、枣、乌梅水煎服，一二剂后用茯苓丸。一方加藿香。

茯苓丸　治妊娠烦闷头晕，闻食吐逆，或胸腹痞闷。

赤茯苓　人参　桂心　干姜炮　半夏炮洗炒黄　橘红各一两　白术炒　葛根　甘草炒　枳壳麸炒，各二两

上为末，蜜丸桐子大，每服五十丸，米饮下，日三服。

四七汤方见十一卷第七论

附　方

参苏饮方见六卷第十三论　**六君子汤**　**四君子汤**　**香砂六君子汤**三方见二十四卷第六论　**人参养胃汤**方见八卷第十八论

胎动不安方论第四

妊娠胎动，或饮食起居，或冲任风寒，或跌仆击触，或怒伤肝火，或脾气虚弱，当各推其因而治之。若因母病而胎动，但治其母。若因胎动而母病，唯当安其胎。轻者转动不安，重者必致伤坠。若面赤舌青，是儿死也。面青舌赤吐沫，是母死也。唇口色青，两边沫出，是子母俱死也。察而治之。

愚按：前症胎气郁滞者，用紫苏饮。脾气虚弱者，六君子汤加苏、壳。郁结伤脾者，归脾汤加柴、栀。郁怒伤肝脾者，四七汤加芎、归。怒动肝火者，加味小柴胡汤。若胎已死，急用平胃散加朴硝腐化之。

附　治　验

一妊妇内热晡热，或兼寒热，饮食少思，其胎或下坠，或上攻，此肝经血虚而火动耳，先用加味逍遥散数剂，次用六君子加柴胡、枳壳，各数剂而愈。

一妊妇因怒寒热，胸胁胀痛，呕吐不食，状如伤寒，此怒动肝火，脾气受伤也，用六君子加柴胡、山栀、枳壳、牡丹皮而愈。但内热口干，用四君子加芎、归、升麻、柴胡而安。

钩藤汤　治妊娠胎动腹痛，面青冷汗，气欲绝者。

钩藤钩　当归　**茯神**去木　人参各一钱　苦梗一钱五分　桑寄生一钱

上水煎服。烦热，加石膏。

黄芪汤　治气虚胎动，腹痛下水。

糯米一合　黄芪炒　川芎各一两

上水煎，分三服。

顺气饮子　产前服之安胎。

紫苏叶　木香炒　人参　草豆蔻　茯苓各一两　甘草炒，五钱　大腹子一两，气弱不用

上每服三钱，苎根三寸，糯米少许，水煎服。

安胎寄生汤　治妊娠下血，或胎不安，或腰腹作痛。

桑寄生　白术各五分　茯苓四分　甘草一钱

上水煎服。

又方　好银煮取水，入葱白作羹食之。

又方　川芎二两，葱白五两，水三碗，煮二碗半，分三服。

四物汤加熟艾、阿胶、茯苓。或芎劳补中汤、杜仲丸，皆效。方并见前。

附　方

紫苏饮方见十二卷第八论　**六君子汤**　**四君子汤**二方见二十四卷第六论　**加味小柴胡汤**方见二十四卷第二论　**平胃散**方见七卷第十八论　**加味逍遥散**　**归脾汤**二方见二十四卷第四论

妊娠漏胎下血方论第五

妊娠经水时下，此由冲任气虚，不能约制。盖心小肠二经，相为表里，上为乳汁，下为月水，故妊娠经水，壅之以养胎，蓄之以为乳。若经水时下，名曰胞漏，血尽则毙矣。

愚按：前症若因风热，用防风黄芩丸。若因血热，用加味逍遥散。若因血虚，用二黄散。若因血去太多，用八珍汤，未应，补中益气汤。若因肝火，用柴胡山栀散。若因脾火，用加味归脾汤。若因事下血作痛，用八珍汤加阿胶、熟艾。若因脾胃虚弱，用补中益气汤加五味子。若因脾胃虚陷，用前汤，倍用升麻、柴胡。若晡热内热，宜用逍遥散。

附治验方药

一妊妇下血，服凉血之药，下血益甚，食少体倦，此脾气虚而不能摄血，余用补中益气汤而愈。后因怒而寒热，其血仍下，此肝火旺而血沸腾，用加味逍遥散血止，用补中益气汤而安。

一妊妇下血，发热作渴，食少体倦，属脾气虚而肝火所侮，用四君子加柴胡、山栀血止。因怒复作，用六君加柴胡、山栀、升麻而安。

二黄散　治胎漏下血，或内热晡热，或头痛头晕，或烦躁作渴，或胁肋胀痛等症。

生地黄　熟地黄自制

上为末，每服三钱，煎白术枳壳汤调下。二黄须杵膏为丸，庶药不枯槁而有力也。

防风黄芩丸方见后　**加味归脾汤**　**加味逍遥散**　**八珍汤**三方见二十四卷第四论　**四君子汤**　**补中益气汤**　**六君子汤**三方见二十四卷第六论　**柴胡山栀散**方见二十四卷第三论

妊娠卒然下血方论第六

妊娠下血，因冷热不调，七情失宜，气血不和所致。若伤于胎，则痛而下血，甚则胎堕矣。

愚按：前症若因气怒，用小柴胡汤。若因风热，用一味防风丸。若因血热，用一味子芩丸。若因脾气虚弱，用六君子汤。若因中气下陷，用补中益气汤。若气虚而下血者，乃因儿小饮少也，不必服药。

附　治　验

一妊娠六月，每怒下血，甚至寒热头痛，胁胀腹疼，作呕少食。余谓寒热头痛，乃肝火上冲。胁胀腹痛，乃肝气不行。作呕少食，乃肝侮脾胃。小便下血，乃肝火血热。用小柴胡加芍药、炒黑山栀、茯苓、白术而愈。

一妊娠六月，体倦食少，劳役下血，用六君加当归、熟地、升麻、柴胡而愈。

安胎散　治卒然腰痛下血。

熟地黄自制　艾叶　白芍药　川芎　黄芪炒　阿胶炒　当归　甘草炒　地榆各五分

上姜枣水煎服。或加杜仲、续断。

附　方

子芩丸　治肝经有热妄行，用细条黄芩炒为末，每服一钱，以秤锤烧赤，淬酒热调服。若脾胃虚，不宜用。

防风丸　治肝经有风，以致血得风而流散不归经。用防风为末，每服一钱，白汤调服。

防风黄芩丸　治肝经有风热致血崩，便血尿血，用条芩炒焦，防风等分为末，酒糊丸桐子大，每服三五十丸，食远或食前，米饮或温酒送下。

小柴胡汤方见二十四卷第二论　**六君子汤**　**补中益气汤**二方见二十四卷第六论

妊娠惊胎及僵仆方论第七

妊娠惊胎者，乃怀妊将满，胎神已具，坠仆伤胎，甚至下血不醒，若欲验其子母安否，当参第四论治之。

愚按：前症若因怒跌仆，或手足抽搐，用钩藤汤。若因气滞，用紫苏饮。若因脾胃气虚，用六君子加苏梗。若郁结伤脾，用归脾汤。若郁怒伤肝脾，用四七汤加芎、归。若去血过多，用佛手散，如不应，胶艾汤。气血虚，八珍加胶、艾。

神妙佛手散　治胎痛服之即安，胎损服之立下。即芎归汤

当归　川芎各五钱

上水酒煎。血崩昏晕，用水煎服。

治妊娠从高坠下，腹痛下血。

生地黄　益母草各二钱　当归　黄芪炒，各一钱

上水煎服。

胶艾汤　治妊娠顿仆，胎动不安，腰腹疼痛，或胎上抢，或去血腹痛。

阿胶一两，炙　熟艾叶数茎

上以水三碗，煮取二碗，分三服。

又方　川芎末二钱，酒下二三服，胎生即安，胎死即下。

又方　失所胎动，或子烦，饮竹沥一升立愈。

又方　缩砂和皮砂为末，每服二钱，米饮下，腹热即安。

秦艽汤方见前

安胎散　治顿仆胎动，腰腹痛。方见前

附　方

四七汤　治七情郁结成痰，或如梅核，鲠于喉间。或中脘停痰气痞，或痰壅气喘，或痰饮中脘，呕逆恶心。

紫苏叶　厚朴姜制　茯苓各一钱　半夏姜制，一钱五分

上姜枣水煎。白浊，送青州白丸子极妙。

加味四物汤　治症同前。

又方　治寒邪所犯，心腹作痛。

桂枝　芍药炒　半夏各一钱　茯苓　厚朴姜制　枳壳麸炒　甘草炒，各五分　人参　紫苏各一钱

上姜枣水煎服。

钩藤汤方见前　**紫苏饮**方见后　**六君子汤**方见二十四卷第六论　**归脾汤**　**八珍汤**二方见二十四卷第四论

妊娠胎上逼方论第八

妊娠将养如法，则血气调和，胎得其所，而产亦易，否则胎动气逆，临产亦难，甚至危矣。

愚按：前症若气逆胎上，用紫苏饮。饮食不甘，兼以四君子。若内热晡热，兼以逍遥散。若胃火所致，用四君、黄芩、枳壳、柴栀。若脾郁所致，用归脾汤加柴、栀、枳壳。

附　治　验

一妊妇每因恚怒，其胎上逼，左关脉弦洪，乃肝火内动，用小柴胡加茯苓、枳壳、山栀而愈。但体倦不食，用六君子调养脾土，加柴胡、枳壳，调和肝气乃瘥。

一妊妇胎上逼，胸满嗳气，饮食少思，此

脾气郁滞，用紫苏饮顿安，又用四君子加枳壳、柴胡、山栀而瘥。

紫苏饮　治子悬腹痛，或临产惊恐气结，连日不下，或大小便不利。

当归　甘草炒　大腹皮黑豆煎水泡　人参　川芎　橘皮　白芍药炒，各五分　紫苏一钱

上姜葱水煎

一孕妇累日不产，催药不验，此坐草太早，心怀畏惧，气结而血不行也，用前饮一服便产。

一妇人孕七月，上冲腹痛，面不赤，舌不青，乃子悬也，亦用前饮而胎母俱安。

当归汤　治胎动烦躁，或生理不顺，唇口青黑，手足厥冷。

当归　人参　阿胶炒　甘草炒，各一钱　连根葱白一握

上水四碗，煎四味，至半去滓，下葱，煎至一碗，分二服。

大圣散　治妊娠忪悸梦惊，心腹胀满，连脐急痛。

白茯苓　川芎　麦门冬去心　黄芪炒　当归各一钱　人参　甘草炙　木香各五分

上姜水煎服。

又方　治胎上逼，热痛下血，或烦闷困笃，用葱二十茎，水浓煮饮，胎未死即安，胎已死即下，未效再服。若唇口青黑，手足厥冷，须佐以当归汤。

白术汤　治遍身痛，或冲心痛欲死。方见后

附　方

四君子汤　**六君子汤**二方见二十四卷第六论　**逍遥散**　**归脾汤**二方见二十四卷第四论　**小柴胡汤**方见二十四卷第二论

妊娠下如豆汁胎动腹痛方第九无论

愚按：前症肝脾湿热，用升阳除湿汤。肝脾风热，用加味逍遥散。肝脾郁怒，用加味归脾汤。脾胃气虚，用钱氏白术散。若脾气下陷，用补中益气汤。肝经风热，用防风黄芩丸。风入肠胃，用胃风汤。

附　治　验

一妊妇因怒，胸膈不利，饮食少思，服消导顺气之剂，脾胃愈弱，饮食愈少，大便不实，且无度，久而便黄水，或带白。视其面色，黄中隐白。余曰：黄色脾虚也，白色肺虚也。朝以补中益气汤升补胃气，夕以六君子培补脾气而愈。

治妊娠忽然下如豆汁等物，或胎动腹痛：

糯米五升　黄芪炒，六两

上水煎，分四服。

《补遗》用野苎根二两，好银三五两，或金银首饰，水酒各半煎服。

附　方

胃风汤　治风邪乘虚，客于肠胃，水谷不化，泄泻下注，腹胁虚满，肠鸣作痛，及肠胃虚热，下如豆汁，或痢血日夜无度。方见第八卷第十论

东垣升阳除湿汤　治妇人女子漏下恶血，月事不调，或暴崩不止，多下水浆之物，皆由饮食失节，或劳伤形体，或素患心气不足，因饮食劳倦，致令心火乘脾，其脉缓而弦急，按之洪大，皆脾土受邪也。

柴胡　羌活　苍术　黄芪炒，各一钱五分　防风　甘草炙　升麻　藁本各一钱　蔓荆子七分　独活　当归各五分

上水煎，食前服。

加味逍遥散　**加味归脾汤**二方见二十四卷第四论　**防风黄芩丸**方见前　**补中益气汤**　**六君子汤**二方见二十四卷第六论　**钱氏白术散**方见二十四卷第二论

妊娠误服毒药胎动方第十无论

愚按：前症若因毒药，用甘草、黑豆、淡竹叶。若因顿仆，用阿胶散，未应，煎送知母丸。若因顿仆，下血腹痛，用佛手散，未

应，用八珍汤送知母丸。血出过多，用八珍汤斤许，益母草四两，水煎，徐徐与服。若胎死，以朴硝或平胃散下之。

夺命丹　治小产或误服毒药，唇口爪青黑，其胎已死。

牡丹皮　白茯苓　桂心　赤芍药各为末　桃仁去皮尖，研如泥

上等分，蜜丸弹子大，每服一丸，酣汤速进两丸，立出。

阿胶散　治妊娠跌仆，或毒药致胎不安。

熟地黄二钱自制　白芍药　艾叶　当归　黄芪炒　甘草炒　阿胶炒，各一钱

上姜枣水煎服。

药毒胎动，甘草、乌豆、淡竹叶等分，用水浓煎服。

附　方

知母丸又名一母丸，方见十三卷第九论

佛手散方见前

八珍汤方见二十四卷第四论

平胃散方见八卷第十八论

妊娠心痛方论第十一

妊娠心痛，乃风邪痰饮交结。若伤心正经，为真心痛，朝发夕死，夕发旦死。若伤心支络，则乍安乍作。若伤于子藏，则胎动而下血。

愚按：前症若饮食所伤，用平胃散加枳壳、山楂。若因错杂诸邪，当审其因而治之。

附　治　验

一妊妇心痛，烦热作渴，用白术散即愈。后因停食，其痛仍作，胸腹膨满，按之则痛，此因饮食停滞，用人参养胃汤。按之不痛，乃脾胃受伤，以六君子补之而愈。

一妊妇心腹作痛，胸胁作胀，吞酸不食，此肝脾气滞，用二陈、山楂、山栀、青皮、木香而愈。又因怒仍痛，胎动不食，面色青黄，肝脉弦紧，脾脉弦长，此肝乘其土，用六君子汤加升麻、柴胡、木香而愈。

治妊娠妇卒心痛，气欲绝：

川芎　当归　茯苓　厚朴制，各一钱

用水煎服。

白术汤　治妊娠内热心痛。

白术四钱　赤芍药三钱　黄芩二钱，炒

上水煎。忌桃、李、雀肉。

《雷公炮炙论》云：心痛欲死，急觅延胡。

又方　青竹茹一升，酒二升，煮一升，分二服。

又方　破鸡子一枚，调酒服之。

紫苏饮方见前

附　方

人参养胃汤　**平胃散**二方见七卷第十八论　**二陈汤**方见二十四卷第五论　**六君子汤**方见二十四卷第六论

妊娠心腹痛方论第十二

妊娠心腹痛，或宿有冷疾，或新触风寒，或痰饮相搏，若痛伤胞络，必致动胎，甚则伤坠。

愚按：前症若风寒痰饮，用金沸草散。气郁滞，加香附、川芎。若饮食停滞，加君加紫苏、枳壳。若怒动肝火，用前药更柴胡、山栀。若郁结伤脾，用归脾汤加枳壳、山栀。

附　治　验

一妊妇心腹作痛，吐痰恶心，胎气上攻，饮食少思，此脾虚气滞而为痰，用六君子加柴胡、枳壳，诸症渐退，饮食渐进，又用四君子加枳壳、山栀、桔梗而安。后因怒，两胁气胀，中脘作痛，恶寒呕吐，用六君加柴胡、升麻、木香，一剂而愈。

当归芍药汤　治妊娠心腹急痛，或去血过多而眩晕。

白芍药炒　当归　茯苓　白术炒　泽泻各二钱　川芎二钱

上水煎服。

阿胶散　治胎动腹痛。

白茯苓　白术炒　川芎　阿胶各一钱，炒　当归　陈皮各一钱　甘草炒，三分

上水姜枣煎服。

治胎动腹痛欲落：上等银一斤，茅根二斤，去黑皮，水五碗，煮取三碗，入清酒一碗，并茅根，煎数沸，徐徐服，立安。金银首饰亦可。

附　方

金沸草散方见六卷第十二论　**紫苏饮**方见前　**二君子汤**　**六君子汤**二方见二十四卷第六论　**归脾汤**方见二十四卷第四论

妊娠中恶方论第十三

妊娠若忽然心痛，闷绝欲死者，谓之中恶，盖因气血不足，精神衰弱，故邪毒得以中之也。

愚按：前症当调补正气为善，用金银藤一味，煎汤饮之。

又方　治前症。

生地黄二钱　枳壳一钱　木香三分

上酒煎服。

又方

桔梗一两，姜半两。水煎服。

又方　妊娠腹痛，或吐血衄血，熟艾如拳大，煮汁服。

又方　用盐一盏，水调服，以冷水噀之，吐出即安。

又方　灶心土为末，每服二钱，白汤调。

妊娠腰腹背痛方论第十四

肾主腰足，因劳役伤损其经，以致风冷之，腰腹相引而痛。盖妇人肾以系胞，妊娠痛甚。则胎堕也。

愚按：前症若外邪所伤，用独活寄生汤。劳伤元气，用八珍、杜仲、砂仁、胶艾。脾肾不足，以前药加白术、补骨脂。气血郁滞，用紫苏饮加桔梗、枳壳。肝火所动，用小柴胡汤加白术、枳壳、山栀。肝脾郁结，用归脾汤加柴胡、枳壳。

附　治　验

一妊妇颈项强直，腰背作痛，此膀胱经风邪所致，用拔萃羌活汤，一剂而愈，又用独活寄生汤及八珍汤，以祛邪固本而痊。

通气散　治肾虚腰痛神妙。

破故纸炒为末，空心每服二钱，嚼核桃肉半个，以温酒下。

杜仲丸　治妊娠腰背痛。

杜仲炒，续断酒浸，等分为末，煮枣肉丸桐子大，每服七十丸，酒下，米饮亦可。

胶艾汤　治腰腹疼痛，胎动欲落，即前妊娠下血补遗内安胎散。

附　方

独活寄生汤方见四卷第七论　**八珍汤**　**归脾汤**二方见二十四卷见四论　**紫苏饮**方见前　**小柴胡汤**方见二十四卷第二论　**羌活胜湿汤**方见四卷第一论

妊娠小腹痛方论第十五

妊娠小腹痛，由胞络虚，风寒相搏，痛甚亦令胎动也。

愚按：前症若风寒所搏，用紫苏饮加生姜。气血虚，用八珍汤。脾气虚，用六君子汤。中气虚，用补中益气汤。若腹胀痛，用安胎饮加升麻、白术，不应，兼补中益气汤。

附治验方药

一妊妇小腹作痛，其胎不安，气攻左右，或时逆上，小便不利，用小柴胡汤加青皮、山栀，清肝火而愈。后因怒，小腹胀满，小便不利，水道重坠，胎仍不安，此亦肝木炽盛所致，用龙胆泻肝汤一剂，诸症顿愈，乃以四君子加柴胡、升麻，以培脾土而安。

紫苏饮方见前　**八珍汤**方见二十四卷第四论

四君子汤　六君子汤　补中益气汤二方见二十四卷第六论　**安胎饮**方见前　**小柴胡汤**方见二十四卷第七论　**龙胆泻肝汤**方见二十四卷第八论

妊娠心腹胀满方论第十六

夫妊娠心腹胀满者，由脾胃虚寒，复因冷饮相搏所致也。

愚按：前症若外感风寒，内伤饮食，用藿香正气散。若食伤脾胃，用六君子汤。若阳气壅滞，用紫苏饮。

附　治　验

一妊妇饮食停滞，心腹胀满，或用人参养胃汤加青皮、山楂、枳壳，其胀益甚，其胎上攻，恶心不食，右关脉浮大，按之则弦，此脾土不足，肝木所侮，余用六君子加柴胡、升麻而愈。后小腹痞闷，用补中益气汤，升举脾气乃瘥。

下气汤　治心腹两胁胀闷，饮食少思，四肢无力。

羌活　赤芍药炒　甘草炒　槟榔　青皮　大腹皮　陈皮　赤茯苓　半夏姜制　桑白皮炒，各五分　桂心一分　紫苏茎一钱

上水煎服。

《局方》枳壳散、保风散、紫苏饮、藿香正气散，皆良。

附　方

六君子汤　补中益气汤二方见二十四卷第六论　**人参养胃汤**方见七卷第十八论

校注妇人良方　卷十三

宋　临川　陈自明良甫编辑
明　古吴　薛　己立斋补注
　　鄞县　曹赤电炳章圈校

妊娠数堕胎方论第一

夫胎乃阳施阴化，荣卫调和，经养完全，十月而产。若血气虚损，不能养胎，所以数堕也。凡妊妇腰痛多堕胎。

愚按：丹溪先生曰：阳施阴化，胎孕乃成。血气虚乏，不能荣养，其胎则坠，譬如枝枯则果落，藤瘦则花坠。尝治贾氏妇，每有孕，至三月前后必坠。诊其脉，左右大而无力，重则涩，知其血虚也，补其中气，使血自荣。时正初夏，教以浓煎白术汤，下黄芩末二钱，与数十帖，得保而生。因而思之，堕于内热而虚者，于理为多，曰热曰虚。盖孕至三月，上属相火，所以易堕，不然，何以黄芩、熟艾、阿胶等为安胎之妙如此也。大抵治法，须审某月属某经，育养而药之。

附　治　验

一妊妇五月，服剪红丸而胎堕，及腹胀痛，乃服破血之剂，痛益甚，手不敢近。予曰：此峻药重伤脾胃也，用八珍倍加参、芪、半夏、乳香、没药，二剂而痛止，数剂而安。

吴江库史万湖仲子室，年二十余，疫疾堕胎时咳，服清肺解表之药，喘急不寐，予以为脾土虚而不能生肺金，药复损而益甚也，先与补中益气加茯苓、半夏、五味、炮姜，四剂渐愈，后往视之，用八珍加五味及十全大补汤而愈。

一方，鲤鱼二斤者一尾，粳米一升，用盐酱煮食甚善，月食三次。

妊娠胎不长方论第二

夫妊娠胎不长者，因有宿疾，或因失调，以致脏腑衰损，气血虚弱，而胎不长也。当治其疾，益其气血，则胎自长矣。

愚按：前症更当察其经络，审其所因而治之。

附　治　验

一妊妇胎六月，体倦懒食，面黄晡热，而胎不长，因劳欲坠，此脾气不足也，用八珍汤倍加参、术、茯苓，三十余剂，脾胃渐健，胎安而长矣。

一妊妇因怒，寒热往来，内热晡热，胁痛呕吐，胎至八月而不长，此因肝脾郁怒所致。用六君加柴胡、山栀、枳壳、紫苏、桔梗，病愈而胎亦长矣。

黄芪汤　治妊娠不长，更安胎和气。

黄芪炒　白术炒　陈皮　麦门冬去心　白茯苓　前胡　人参各五分　川芎　甘草炒，三分

上姜枣水煎服。

又验方：用鲤鱼长尺许，如食法，饮其汁，其胎渐大而长矣。

与劳补中汤、杜仲丸。治气虚而胎坠。

附　方

十全大补汤　八珍汤二方见二十卷第四论

补中益气汤方见二十四卷第六论

附　方

六君子汤方见二十四卷第六论　**八珍汤**方见二十四卷第四论

妊娠胎动不安当下方论第三

夫人以胃壮实，冲任荣和，则胎得所，如鱼处渊，若气血虚弱，无以滋养，其胎终不能成也，宜下之，以免其祸。

愚按：前症宜用第十二卷十四方论主之。其胎果不能安者，方可议下。慎之慎之。

附　治　验

鸿胪张淑人，痢疾后胎动，心神不安，肢体殊倦，用八珍散二十余剂渐愈。因劳，加烦热头痛，以大剂补中益气汤，加蔓荆子治之，热痛顿止，仍用前散，又五十余剂而安，其后生产甚易。

桂心散　治妊娠因病胎不能安者，可下之。

桂心　瓜蒌　牛膝　瞿麦各五分　当归一钱

用水煎。

又方　牛膝一两，酒一盅，煎七分，作二服。

《小品方》用麦蘖一升，擂碎，水二升，煮一升，服之神效。观麦蘖能损气破血如此，脾胃虚弱，饮食不化者，不宜用明矣。

文仲取鸡子一枚，盐三钱，服之立下。

佛手散　服之，胎死者即下，生者亦安。方见十二卷第七论

附　方

八珍散方见二十四卷第四论　**补中益气汤**方见二十四卷第六论

妊娠堕胎后血下方论第四

堕胎后复损经脉而下血不止，甚则烦闷至死，皆以调补胃气为主。

愚按：前症若肝经血热，用四物、参、术、山栀。肝经风热，用防风黄芩丸。肝经怒火，用加味逍遥散。脾经气虚，用四君、归、地。脾经郁滞，用加味归脾汤。气滞不和，用紫苏饮。胃气下陷，用补中益气汤。

附　治　验

一妊妇堕胎昏愦，不时吐痰，自用养血化痰之剂，昏愦不省，自汗发搐，痰涎涌出，彼以为中风，欲用祛风化痰。予曰：此属脾气虚寒所致，用十全大补汤加炮姜，二十余剂寻愈。

治妊娠损动，下血腹痛。

阿胶一两，炒　艾叶半两

水一大盏煎。

治堕胎下血烦满，寒热狂闷，镑鹿角炒为末，每服三钱，水调下，日三服，或家鸡翎烧为末，每服二钱，温酒下，良久再服，以效为度。

附　方

四物汤　**补中益气汤**二方见二十四卷第六论　**紫苏饮**方见十二卷第八论　**防风黄芩丸**方见十二卷第六论　**加味逍遥散**　**加味归脾汤**　**十全大补汤**三方见二十四卷第四论

妊娠未足月欲产方论第五

妊娠未足月，而痛如欲产，或应产而难，或为子烦，用知母一味，蜜丸桐子大，粥饮服之。或槐子、蒲黄等分为丸，酒服。或蒲黄水调钱许，并效。

愚按：小产重于大产，盖大产如瓜熟自脱，小产如生采，断其根蒂，岂不重哉，而人轻忽，死于是者多矣。大抵治法，宜补形气，生新血，去瘀血为主。若未足月，痛而欲产，用芎归补中汤倍加知母止之。产而血不止，人参黄芪汤补之。产而心腹痛，当归川芎汤主之。元气弱而欲产，八珍汤固之。出血过多而发热，圣愈汤治之。若汗不止，

昏愦喘咳，急用独参汤。若发热烦躁，或肉瞤筋惕，用八珍汤。大渴面赤，脉洪而虚者，用当归补血汤。身热面赤，脉沉而微者，用四君、姜附，以回其阳可也。

附治验方药

一妊妇八月，胎欲坠如产，卧久少安，日晡益甚，此气血虚弱，朝用补中益气汤加茯苓、半夏随愈，更以八珍汤调理而安。

当归川芎汤　治小产后瘀血，心腹疼痛，或发热恶寒。

当归　川芎　熟地黄自制　白芍药炒　玄胡索炒　红花　香附　青皮炒　泽兰　牡丹皮　桃仁

上水煎，人童便、酒各小半盏服。

若以手按腹愈痛，此瘀血为患，宜用此药或失笑散消之。若按之不痛，此是血虚，宜用四物、参、苓、白术。若痛而作呕，此是胃虚，宜用六君子。若痛而作泻，此是脾虚，宜六君子送二神丸。

芎归补中汤　治气血虚而欲产。

艾叶代姜　阿胶炒　川芎　五味子杵炒　黄芪炙　当归　白术炒　芍药炒　人参　杜仲炒，各一钱　甘草炙，五分

上每服五钱，水煎服。

若脾气虚弱，须用补中益气汤。若气虚而有火，宜用安胎饮。

人参黄芪汤　治小产气虚，血下不止。

人参　黄芪炒　当归炒　白术炒　白芍药炒　艾叶各一钱　阿胶炒，二钱

上作一剂，水煎服。

当归散　治产后气血虚弱，恶露内停，增寒发热，宜服此药。

当归　白芍药炒　川芎　黄芩炒，各一两　白术五钱

上为细末，温童便调下二钱。

圣愈汤方见二十四卷第九论　**独参汤**方见三卷第十三论　**当归补血汤**　**八珍汤**二方见二十四卷第四论　**补中益气汤**方见二十四卷第六论

断产方论第六

易曰：天地之大德曰生。然妇人有临产艰难，或生育不已，而欲断之，故录验方，以备所用。若服水银、虻虫、水蛭之类，不惟孕不复怀，且祸在反掌。

愚按：前症用蚕故纸尺许烧灰为末，产后酒服之，血虚者，终不复孕。大抵断产之剂，多用峻厉，往往有不起者，是则产之害，未若断产之害也。吾闻阁老张罗峰、太常李恒齐，俱因服断产之剂，自谓形体俱怯，遇劳必病。有由然矣。

《千金》断产：用油煎水银，一口方息，空心服枣大一丸，永断其孕，且不损人。

《千金》去胎：大曲五升，清酒一斗，煮二沸，去滓，分五服，隔宿勿食，旦再服，其胎如糜，母无所苦。千金不传。

四物汤　每服五钱，加芸薹子二撮，子经行后，空心温服。

妊娠咳嗽方论第七

夫肺内主气，外司皮毛，皮毛不密，寒邪乘之则咳嗽。秋则肺受之，冬则肾受之，春则肝受之，夏则心受之。其嗽不已，乃传子腑。妊娠病久不已，则伤胎也。

愚按：前症若秋间风邪伤肺，用金沸草散。夏间火邪克金，用人参平肺散。冬间寒邪伤肺，用人参败毒散。春间风邪伤肺，用参苏饮。若肺脾气虚，用六君、芎、归、桔梗。若血虚，四物、桑皮、杏仁、桔梗。肾火上炎，用六味丸加五味子煎服。脾胃气虚，风寒所伤，则补中益气加桑皮、杏仁、桔梗。盖肺属辛金，生于己土，嗽久不愈者，多因脾土虚而不能生肺气，而腠理不密，以致外邪复感，或因肺气虚不能生水，以致阴火上炎所致。治法当壮土金，生肾水为善。诸脏腑嗽，见六卷第十一等论。

附　治　验

一妊娠气喘痰甚，诸药不效，素有带下，始于目下浮两月余其面亦然，此气虚而有痰饮也，用六味丸料数剂而愈。

一妊妇嗽则便自出，此肺气不足，肾气亏损，不能司摄，用补中益气汤以培土金，六味丸加五味以生肾气而愈。

一妊妇咳嗽，其痰上涌，日五六碗许，诸药不应，予以为此水泛为痰，用六味丸料及四君子汤各一剂稍愈，数剂而安。

一妊妇因怒，咳嗽吐痰，两胁作痛，此肝火伤肺金，以小柴胡汤加山栀、枳壳、白术、茯苓治之而愈。但欲作呕，此肝侮脾也，用六君子加柴胡、升麻而痊。

桔梗散　治风寒咳嗽，喘急不食。

天门冬去心　赤茯苓各一钱　桑白皮　桔梗炒　紫苏各五分　麻黄去节，二分　贝母　人参　甘草炒

上姜水煎。

马兜铃散　治咳嗽气喘。

马兜铃　苦梗　人参　甘草　贝母各五分　陈皮去白　紫苏　桑白皮　大腹皮黑豆浸洗，各一钱　五味子五分

上姜水煎。

百合散　治咳嗽胸膈烦闷。

川百合　紫菀　麦门冬　苦梗　桑白皮各五分　甘草三分　竹茹二分

上姜水煎。

治妊娠伤寒，涎多咳嗽。

知母　杏仁　天门冬　桑白皮各五分

用姜水煎服。

旋覆花汤　感冒喘嗽，胸满痰盛。方见二十二卷第四论

华盖散　治症同上，或项背拘急，鼻塞头眩，时发寒热。方见六卷第十二论

参苏饮加杏仁、五味子，治症同上。

附　方

金沸草散方见六卷第十二论　**人参平肺散**方见二十四卷第十二论　**人参败毒散**方见二十四卷第十论　**补中益气汤**　**四君子汤**　**六君子汤**三方见二十四卷第六论**六味丸**方见二十四卷第十一论　**小柴胡汤**方见二十四卷第二论

妊娠吐血衄血方论第八

妊娠吐血，由七情脏腑所伤，气逆于上，致血上溢不止，心闷甚者多死，或坠胎也，宜用局方必胜散。

愚按：前症若肝经怒火，先用小柴胡、山栀、生地，次用前药合四物，后用加味逍遥散。肝经风热，防风子芩丸。心经有热，朱砂安神丸。心气不足，补心汤。思虑伤心，妙香散。胃经有火，犀角地黄汤。膏粱积热，加味清胃散。郁结伤脾，加味归脾汤。肺经有火，黄芩清肺饮。因气郁滞，紫苏饮子。气不摄血，用补中益气汤。肾经虚火，加味六味丸。仍以七卷第五论互用。

附治验方药

一妊娠因怒吐血，两胁胀痛，小便淋涩，此怒而血蓄于上，随火出也，用小柴胡合四物，四剂血止，用六君子、安胎饮，调理而安。

紫苏饮　治妊娠失调，胎气不安，上攻作痛，或逆气失血。方见十二卷第八论　若肝脾气血虚而有火不安，宜兼逍遥散。若脾气虚弱而不安，宜用四君、芎、归。

小柴胡汤方见二十四卷第二论　**四物汤**　**补中益气汤**　**六君子汤**三方见二十四卷第六论　**加味逍遥散**　**加味归脾汤**二方见二十四卷第四论　**防风子芩丸**方见十二卷第六论　**朱砂安神丸**方见三卷第十论　**养心汤**方见三卷第十论　**妙香散**方见三卷第十一论　**安胎饮**方见十二卷第一论　**犀角地黄汤**方见七卷第六论　**加味清胃散**方见二十四卷第一论　**黄芩清肺饮**方见八卷第一论　**加味六味丸**方见二十四卷第十一论

妊娠子烦方论第九

论曰：妊娠苦烦闷者，以四月受少阴君

火以养精，六月受少阳相火以养气。若母心惊胆寒，多有是症。《产宝》云：是心肺虚热，或痰积于胸。若三月而烦者，但热而已。若痰饮而烦者，吐涎恶食。大凡停痰积饮，寒热相搏，吐甚则胎动不安。

愚按：前症若因内热，用竹叶汤。气滞，用紫苏饮。痰滞，用二陈、白术、黄芩、枳壳。气郁，用分气饮加川芎。脾胃虚弱，用六君、紫苏、山栀。

附　治　验

一妊妇烦热，吐痰恶食，恶心头晕，此乃脾虚风痰为患，用半夏白术天麻汤以补元气，祛风邪，数剂渐愈，惟头晕未痊，乃用补中益气汤加蔓荆子，以升补阳气而愈。

竹叶汤　治子烦。

防风　黄芩炒　麦门冬各一钱　白茯苓一钱

上竹叶数片，水煎服。

人参散　治热乘心脾，烦热干渴。

人参　麦门冬　赤茯苓　地骨皮　干葛　黄芩炒　犀角镑，各一钱　甘草五分上水煎。

竹茹汤　治妊娠烦躁，或胎不安，淡竹茹一两，水煎服之。

益母丸　知母炒为末，枣肉丸弹子大，每服一丸，人参煎汤下。

附　方

分气饮　治脾胃虚弱，气血不和，胸膈不利，或痰气喘嗽，饮食少思。

陈皮　茯苓　半夏炒　桔梗　大腹皮　紫苏梗　枳壳麸炒　白术炒　山栀炒，各一钱　甘草炙，五分

上姜水煎服。

紫苏饮方见二十四卷第八论　**二陈汤**方见二十四卷第五论　**六君子汤**　**补中益气汤**二方见二十四卷第六论

妊娠烦躁口干方论第十

足太阴脾之经，其气通于口。手少阴心之经，其气通于舌。若脏腑不调，气血不和，以致内热乘于心脾，津液消烁，故心烦口干也。与子烦大同小异，宜用益母丸。

愚按：前症若胃经实火，用竹叶石膏汤。若胃经虚热，用人参黄芪散。若胃经气虚，用补中益气汤。若肺经虚热，用紫苏饮。若肝经火动，用加味逍遥散。若脾气郁结，用加味归脾汤。若肾经火动，加味地黄丸。

附　治　验

一妊妇烦热，兼咽间作痛，用知母散加山栀，以清肺经而愈。后内热咳嗽，小便自遗，用补中益气加麦门、山栀以补肺气、滋肾水而痊。

知母散　治烦躁闷乱口干。

知母　麦门冬　黄芪炒　子芩炒　赤茯苓各一钱　甘草

上水煎，入竹沥一合，更煎二沸而服。

人参黄芪散　治身热烦躁口干。

人参　黄芪炒　葛根　秦艽　赤茯苓　麦门冬各一钱　知母　甘草五分

上姜三片，竹叶二七片，水煎。

《补遗》：人参白术散、黄芪六一汤皆良。

附　方

竹叶石膏汤

石膏一钱　半夏一钱五分　甘草　人参各一钱　麦门冬　竹叶各五分

上姜水煎服。

补中益气汤方见二十四卷第六论　**紫苏饮**方见十二卷第八论　**加味逍遥散**　**加味归脾汤**二方见二十四卷第四论　**加味地黄丸**方见二十四卷第十一论

校注妇人良方　卷十四

宋　临川　陈自明良甫编辑
明　古吴　薛　己立斋补注
鄞县　曹赤电炳章圈校

中风类

妊娠中风方论第一

论曰：四时八方之气为风也，常以冬至之日候之。若从其乡来者，长养万物，否则名为虚邪，贼害万物。体虚中之，客于皮肤则顽痹不仁，入于筋脉则挛急㖞僻。若兼湿热，则弛纵痿软。若入脏腑，气随所伤经络，而为诸病。妊娠中之，必须早治，庶免堕胎之患。

愚按：《病机机要》云：风木为热，热胜则风动，宜以静胜其躁，是亦养血也。治法须少汗，亦宜少下，多汗则虚其卫，多下则损其荣。虽有汗下之形，而有中脏中腑之分。中腑者，多着四肢，则脉浮恶寒，拘急不仁。中脏者，多着九窍，则唇缓失音，耳聋鼻塞目瞀，便秘。中腑者宜汗之，中脏者宜下之。表里已和，宜治在经，当以大药养之。此中风之要法，妊妇患之，亦当以此法治之，而佐以安胎之药。仍参三卷首论主治。

防风散　治妊娠中风，卒倒口噤肢强，或痰气上升。

防风　桑寄生　葛根各五分　家菊花　细辛　防己　秦艽　羚羊角镑　当归　桂心　茯神　甘草各三分

上水煎，入竹沥半合服。

白术酒　治妊娠中风，口噤不语。

白术一两半　独活一两　黑豆一合，炒

上酒煎，分四服，灌之得汗即愈。

补遗：治妊娠中风，排风汤、续命汤、参苏汤。加羌活、风引汤，皆可选用。方见第三卷

妊娠风痉方论第二

论曰：妊娠体虚受风，而伤足太阳经，遇风寒相搏，则口噤背强，甚则腰反张，名之曰痉。须臾自醒，良久复作，又名子痫子冒。当审察其因而治之。

愚按：前症若心肝风热，用钩藤汤。肝脾血虚，加味逍遥散。肝脾郁怒，加味归脾汤。气逆痰滞，紫苏饮。肝火风热，钩藤散。脾虚痰滞，二陈、姜汁、竹沥。若兼症相杂，当参照子烦门。

附　治　验

一妊妇出汗口噤，腰背反张，时作时止，此怒动肝火也，用加味逍遥散渐愈，又用钩藤散而止，更以四君加钩藤、山栀、柴胡而安。

一妊妇因怒，忽仆地良久而苏，吐痰发搐，口噤项强，用羚羊角散渐愈，更用钩藤散始痊，又用归脾汤而安。

羚羊角散　治妊娠冒闷，角弓反张，名曰子痫风痉。

羚羊角镑　独活　酸枣仁炒　五加皮　薏苡仁炒　防风　当归酒浸　川芎　杏仁去皮尖　茯神去木，各五分　木香　甘草炙，各二分

上姜水煎。

附　方

钩藤汤方见十二卷第四论　**加味逍遥散**

加味归脾汤二方见二十四卷第四论　**紫苏饮**方见十二卷第八论　**钩藤散**方见四卷第四论　**二陈汤**方见二十四卷第五论　**四君子汤**方见二十四卷第六论

妊娠瘛疭方论第三新附

窃谓瘛者，筋脉急而缩也。疭者，筋脉缓而伸也。一缩一伸，手足相引，搐搦不已，大抵与婴孩发搐相似，谓之瘛疭也。此症多属风，盖风主摇动。骆龙吉云：心主脉，肝主筋，心属火，肝属木，火主热，木主风，风火相炽，则为瘛疭也。治法若因风热，用钩藤汤加柴胡、山栀、黄芩、白术，以平肝木，降心火，养气血。若风痰上涌，加竹沥、南星、半夏。若风邪急搐，加全蝎、僵蚕。亏损气血，用八珍汤加钩藤、山栀为主。若无力抽搐，戴眼反折，汗出如珠者，肝气绝也。皆不治。

附治验方药

一妊妇四肢不能伸，服祛风燥血之剂，遗屎痰甚，四肢抽搐。余谓肝火血燥，用八珍汤加炒黑黄芩为主，佐以钩藤汤而安。后因怒，前症复作，小便下血，寒热少寐，饮食少思，用钩藤散加山栀、柴胡而血止，用加味逍遥散，寒热退而得寐。用六君子汤加芍药、钩藤，饮食进而渐安。

八珍汤方见二十四卷第四论　**六君子汤**方见二十四卷第六论

妊鬼胎方论第四

夫人脏腑调和，则血气充实，精神健旺。若荣卫虚损，精神衰弱，妖魅之精乘之，亦如怀妊之状，故曰鬼胎也。

愚按：前症因七情脾肺亏损，气血虚弱，行失常道，冲任乖违而致之者，乃元气不足，病气有余也。若见经候不调，就行调补，庶无是症，治法以补元气为主，而佐以雄黄丸之类行散。若脾经郁结气逆者，用加味归脾汤调补之。若脾虚血不足者，用六君、芎、归培养之。肝火血耗者，用加味逍遥散滋抑之。肝脾郁怒者，用加味归脾、逍遥二药兼服。肾肝虚弱者，用六味地黄丸。

附　治　验

一妇人经闭八月，肚腹渐大，面色或青或黄，用胎症之药不应。余诊视之曰：面青脉涩，寒热往来，肝经血病也。面黄腹大，少食体倦，脾经血病也。此郁怒伤脾肝之症，非胎也。不信，仍用治胎散之类，不验。余用加味归脾、逍遥二药，各二十余剂，诸症稍愈。彼欲速效，别服通经丸，一服下血昏愦，自汗恶寒，手足俱冷，呕吐不食。余用人参、炮姜，二剂，前症渐愈。又用十全大补汤，五十余剂而安。

雄黄丸　治鬼胎瘀血腹痛。

雄黄　鬼臼去毛　莽草　丹砂细研　巴豆去油皮　獭肝炙黄，各半两　蜥蜴一枚，炙黄　蜈蚣一条炙黄

上为末，蜜丸桐子大，每服二丸，空心温酒下，日二服，或下如蛇虫之类，其病乃除。

治鬼胎，及血气痛不可忍：

斑蝥去头翅足制　延胡索炒，各等分

上为末，以温酒调下半钱，以下秽物为度。

附　方

加味归脾汤　加味逍遥散　十全大补汤三方见二十四卷第四论　**六君子汤**方见二十四卷第六论　**六味丸**方见二十四卷第十一论

妊娠伤寒方论第五

夫时令严寒，体虚所伤，即成伤寒。轻者洒淅恶寒，翕翕发热，微咳鼻塞，数日而愈。重者头疼体痛，寒热交作，久而不愈者，多致伤胎也。

愚按：前症为害匪轻，当审经络表里而治之，不可轻忽。

加减四物汤　治妊妇腹痛，或月事不调，胎气不安，产后血块，或亡血过多，或恶露不下。

当归　川芎　白芍药炒　熟地黄各一两

上每服四五钱，水煎，日二三服。下血，加艾叶、阿胶。虚热口干，加括蒌根、麦门冬。恶血腹痛，加当归、芍药。血崩血淋，加熟地、蒲黄。因热生风，加川芎、柴胡。头晕项强，加柴胡、黄芩。大便秘结，加大黄、桃仁。呕吐恶心，加白术、人参。虚烦不眠，加竹叶、人参。烦躁大渴，加知母、石膏。水停吐逆，加猪苓、茯苓。虚烦伤寒，加人参、柴胡、防风。

阿胶散　治时气，先服此以安胎，却以主药间服。

阿胶炙　白术炒　桑寄生　人参　白茯苓

上为末，等分，每服一钱，用糯米饮调下，日三服。

前胡汤　治伤寒头痛壮热，肢节烦疼。

石膏一钱　前胡　甜竹茹　栀子炒　黄芩炒　大青　知母各五钱

上用葱白水煎服。

苏木汤　治伤寒时行，洒淅寒振，或兼哕者。

赤芍药　橘红　黄芩炒　黄连　甘草　苏木各五分

上用水煎服，汗出即瘥。如胎不安，兼服阿胶汤。

黄龙汤　治妊妇寒热头疼，嘿嘿不食，胁痛呕痰，及产后伤风，热入胞宫，寒热如疟，或经水适来，劳复热不解散。

柴胡二钱　黄芩炒　人参　甘草各一钱

用水煎服。

柴胡石膏汤　治头痛恶寒。身热拘急口干。

柴胡二钱　甘草一钱　石膏二钱

用姜水煎服。气虚加人参。

枳实散　治伤寒四日至六日，腹胀少食，腰疼体重。

枳实炒，二钱　陈皮一钱　麦门冬一钱半

用生姜、葱白水煎服。

旋覆花汤　治伤寒头目旋疼，壮热心躁。

旋覆花　赤芍药　甘草各五分　前胡　石膏各一钱　白术　人参　麻黄去根节　黄芩各三分

上用姜水煎服。

麦门冬汤　治伤寒壮热，呕逆头疼，胎气不安。

人参　石膏各一钱半　前胡　黄芩各五分　麦门冬　葛根各一钱

上姜、枣、竹茹一分，用水煎服。

栀子大青汤　治发斑变黑，尿便血。

升麻　栀子各一钱　大青　杏仁　黄芩各三分

上用葱白三寸，水煎服。

白术汤　治伤寒烦热，头痛胎动，或时吐逆不食。

白术　橘红　麦门冬　人参　前胡　赤茯苓　川芎　甘草　半夏各五分

上用生姜、竹茹一分，水煎服。

良方白术散　治伤寒。

白术　黄芩炒，各二钱

上用姜枣水煎服。若四肢厥逆，阴症也，不可用。

芎苏散　治外感风寒，壮热头疼，心胸烦闷。

紫苏叶　川芎　白术　白芍药　麦门冬去心　陈皮　干葛各五分　甘草炙，三分

上用生姜、葱白水煎。

参苏饮去木香　治证同前方见六卷第十二论

妊娠时气方论第六

论曰：四季之间，非其时而有其气，谓春寒夏冷，秋热冬暖之不正也。所感者不拘长少，其症相类，故云时气。妊娠患之，重者多致伤胎。

愚按：前症与前伤寒互相主治。

秦艽散　治时气五六日不得汗，口干饮水，狂言呕逆。

秦艽　柴胡各五分　石膏一钱　犀角镑　赤茯苓　前胡　甘草　葛根　升麻　黄芩各四分

上用淡竹茹一分，水煎服。

葛根饮子　治时气烦热口干头痛。

干葛　麻黄去节根，各半两　石膏一两　豉一合　白米半合　栀子二十粒　葱白二茎

上用水煎，分三服，汗出为效。

消热饮子　治时气六七日，大小便不利。

芒硝一两，细研　葵子二两

上如前煎服，以利为效。芒硝即朴硝

人参败毒散方见二十四卷第十论

妊娠热病方论第七

冬时触冒严寒即病，为伤寒，藏于肌骨，夏至发为暑病，即热症也。妊娠患之，多致堕胎。热病与中暑相似，但热病者脉实，中暑者脉虚。治当审察，不可概施。

愚按：此症与前后三症同治。

治妊娠热病头痛，呕吐烦闷。

人参一方无　竹茹　葛根各一两　芦根二两　知母三两　麦门冬去心，一两半

上每服四钱，连根葱白三寸水煎。

栀子仁饮　治热病发斑黑色，小便如血，气喘急，胎欲落。

栀子　升麻　石膏　生地黄各二钱　黄芩　大青各一两

上每服半两，葱白七寸，豉四十九粒，水煎。

大黄饮　治热病六七日，大小便秘涩。

大黄微炒　石膏各一两　知母　前胡　赤茯苓各三分　栀子　甘草　黄芩各半两

上每服五钱，生地黄一分，煎服。

又方　伏龙肝细研，每服一钱，水调下。外用水调涂脐下

又方　葛根煮汁，时服一盏。

补遗芦根汤　治热病头疼，心烦呕吐。

知母四两　青竹茹三两

上每服五钱，生芦根一握，糯米一撮，水煎。

栀子五物汤　治妊妇伤寒，壮热头痛。

栀子　前胡　知母各二两　黄芩一两　石膏四两

上每服五钱，用水煎服。

升麻六物汤　治伤寒斑黑溺血。

升麻　栀子各二两　大青　杏仁　黄芩

上每服五钱，葱头水煎。

妊娠伤寒热病防损胎方论第八

论曰：非节之气，伤于妊娠，热毒侵损胞胎，若不早治，多致堕胎漏血，则子母之命亦不能全矣。

愚按：前症当分察六经为主，而参于前后方论。

治妊娠伤寒身痛壮热：

葱白切，一升　前胡　葛根　石膏各十分　青黛六分　升麻八分　栀子十二个

上用水煎，分三服。

治妊娠伤寒大小便秘结。

前胡十分　大黄　石膏各二十分　栀子仁十枚　知母　黄芩　茯苓　生姜各八分

上用水煎，分三服。

治妊娠伤寒，发斑忽黑，小便如血，胎欲落：

栀子　升麻各四两　青黛二两　生地黄二十枚　石膏八两　黄芩三两　葱白切一升

上用水煎，分三服。忌热物。

又用井中泥涂心下，干则易。二方出本事再录有效

补遗治妊娠热病，先以白术散安胎。方见前

妊娠热病胎死腹中方论第九

论曰：热病以致胎死不能出者，但服黑神散，胎自下矣。

愚按：陈无择先生曰：前症当视产母，若

面赤舌青，知其子死。面青舌赤，知母死子生。唇青吐沫，子母俱死。若双胎，或一死一活，用黑神散。窃谓前症，宜补助产母，使其胎自下。黑神散，恐其大热，不宜轻用。果一胎已死者，用平胃散、朴硝、水银下之，最为稳当，庶不错伤生者。平胃散方见后

黑神散又名乌金散灵苑方名肉桂散

桂心　当归　芍药　甘草炙　干姜炒　生地黄各一两　黑豆炒，去皮，二两　附子炮去皮脐，半两

上为末，每服二钱，空心用温酒调下。

补遗胎死用红花酒煮汁，饮二三碗。

又方　伏龙肝为末，温酒调下二钱，白汤亦可。

又方　朴硝末，童子小便和热酒调下三钱立出。

妊娠疟疾方论第十

论曰：妊娠病疟，乃夏伤于暑，客于皮肤，至秋而发，阳盛则热，阴盛则寒，阴阳相杂，寒热俱作。其发晏者，由风邪客于风府，循膂而下卫气，至一日一夜常大会于风府，故发日晏，其发早者。卫气之行风府，日下一节，二十一日下至尾骶，二十二日入脊内，上注于俠卫之脉，其行九日，出缺盆。其气既止，故发更早。其间日发者，风邪内搏五脏，横连募原，其道远，其气深，其行迟，不能日作也，妊娠而发，多伤于胎。

愚按：前症因脾胃虚弱，饮食停滞，或外邪所感，或郁怒伤脾，或暑邪所伏。审系饮食停滞，用六君子加桔梗、苍术、藿香。外邪多而饮食少，用藿香正气散。外邪少而饮食多。用人参养胃汤。劳伤元气，用补中益气汤。若郁怒所伤，用小柴胡兼归脾汤。若木侮土，久而不愈，用六君子为主，佐以安胎药。乃参三阴三阳经而治之。

附　治　验

一妇人因怒发疟，举发无期，久而不已，胸腹不利，饮食少思，吞酸吐痰，用六君子加柴胡、山栀，二十余剂寻愈，但晡热少食，又用四君子加柴胡升麻为主，佐以逍遥散而痊。

一妊娠疟久不已，嗳气下气，胸腹膨胀，食少欲呕，便血少痒，此属肝脾郁怒，用归脾汤加柴胡、山栀渐愈，又用六君子汤加柴胡、山栀、升麻而愈。

一妊妇患疟已愈，但寒热少食，头痛，晡热内热，此脾虚血弱也，用补中益气汤加蔓荆子，头痛顿止，又用六君子汤加芎、归饮食顿进，再用逍遥散加参、术而寒热愈。

七宝散　治疟疾一日一发，或一日两发。或间日一发。

常山　厚朴姜制　青皮　陈皮并去白　甘草炒　槟榔　草果等分

上每服半两，酒水各一碗，煎至一盏，去渣，露一宿，发时面东温服，良久再服。一妊妇先寒后热，六脉浮紧，用前散一剂而愈。

人参养胃汤　治妊娠疟疾，寒多热少，或但寒不热，头痛恶心，身痛，面色青白，脉弦迟者，又有驱邪散，治证亦同。方见七卷第十八论

清脾汤　治妊妇疟疾，寒少热多，或但热不寒，口苦舌干，大便秘涩，不进饮食，脉弦数者。

青皮　厚朴姜制　白术炒　草果　茯苓　半夏炒　黄芩　柴胡　甘草炙各五分

上用姜水煎。

附　方

交加散　治食疟神效。

肉豆蔻二枚，一生一煨　草豆蔻二个，一生一煨　甘草二钱，半炒半生　厚朴二钱，半炒半生　生姜一两，半生，半煨

上用姜水煎，发日五更服。

仲景白虎加桂枝汤　治温疟。

知母六钱　桂枝　黄芩各一钱　栝楼根二钱　甘草炙　牡蛎　干姜各一钱

上用水煎服，汗出即愈。此少阳经药也。

桂枝羌活汤 治疟处暑以前，头痛脉浮，恶风有汗。

桂枝 羌活 防风 甘草各一钱五分

上水煎，发服。吐加半夏曲。

麻黄羌活汤 治症如前，但恶寒无汗。

麻黄去节 羌活 防风 甘草各半两

上如前服，加法同二方。太阳经药也。

白芷汤 治疟身热目痛，热多寒少，脉长。先以大柴胡下之，微利为度。余热不尽，当服此汤。

白芷一两 知母一两七钱 石膏四两

上粗末，依前服。阳明经药也。

桂枝芍药汤 治疟寒热不论先后，此太阳阳明合病，寒热作则必战。经曰：热甚而动也，发热则必汗泄。经曰：汗出不愈，知内热也，乃阳盛阴虚之证，此汤主之，否则久而传于阴经矣。

桂五分 黄芪 知母 石膏 芍药各二钱

上粗末，水煎。此太阳、阳明经药也。

桂枝黄芩汤 如服前药，转甚，三阳合病也，宜此和之。

柴胡一钱五分 黄芩 人参 甘草各八分 半夏 石膏 知母各五分

上每粗末，依前服。如外邪已解而内未已，再服下药。从卯至午发，大柴胡下之。从午至酉发，邪气在内也，大承气下之。从酉至子发，或至寅发，邪气在血也，桃仁承气汤下之。微利后，更以小柴胡汤彻其邪气。按此太阳、阳明、少阳经药也。以上诸方，并系发风寒暑热之气，自外而入，中于三阳之经者也。

桂枝石膏汤 治疟疾隔日，先寒后热，寒少热多。

桂枝五钱 石膏一两五钱 知母一两五钱 黄芩一两

上分三服，水煎此。太阳、阳明经药也。隔日发者，邪气所舍深者也。

麻黄黄芩汤 治疟发如前症而夜发者。

麻黄一两，去节 甘草炙，三钱 黄芩五分 桂二钱 桃仁三十个，去皮尖

上依前服。桃仁味苦甘辛，肝者血之海，血骤则肝气燥，经所谓肝苦急，急食甘以缓之，故桃仁散血缓肝，谓邪气深远而入血，故夜发，乃阴经有邪。此汤发散血中风寒，治风暑深入阴分，乃血受病，邪气所舍尤深者也。麻黄、桂枝、桃仁等，乃太阳经血药，非三阴经药也。

附 方

四君子汤 **六君子汤** **补中益气汤**三方见二十四卷第六论 **藿香正气散**方见二十一卷第十论 **人参养胃汤**方见七卷第十八论 **小柴胡汤**方见二十四卷第二论 **逍遥散** **加味归脾汤**二方见二十四卷第四论

妊娠霍乱方论第十一

夫饮食过度，触冒风冷，阴阳不和，清浊相干，谓之霍乱。其间或先吐，或腹痛吐利，是因于热也。若头痛体疼发热，是挟风邪也。若风折皮肤，则气不宣通，而风热上冲为头痛。若风入肠胃，则泄利呕吐，甚则手足逆冷，此阳气暴竭，谓之四逆，妊娠患之，多致伤胎也。

愚按：前症若因内伤饮食，外感风寒，用藿香正气散。若因饮食停滞，用平胃散。果脾胃顿伤，阳气虚寒，手足逆冷者，须用温补之剂。治当详审，毋使动胎也。

附 治 验

一妊妇霍乱已止，但不进饮食，口内味酸，泛行消导宽中。余曰：此胃气伤而虚热也，当用四君子汤。彼不信，乃服人参养胃汤。呕吐酸水，其胎不安，是药复伤也，仍与四君子汤，俾煎熟，令患者先嗅药气，不作呕则呷少许，恐复呕则胎为钓动也。如是旬余而愈。

人参散 治脾胃虚寒，霍乱吐泻，心烦

腹痛，饮食不入。

人参　厚朴姜制　橘红各一钱　当归　干姜炮　甘草炙，各五分

上用枣水煎服。

人参白术散　治脾胃虚弱吐泻，或吐泻作渴不食。

白术　茯苓　**人参**　甘草炒　木香　藿香各五分　干葛一钱

上用水煎服。吐甚加生姜汁频饮之。

缩脾饮　解伏热，除烦渴，消暑毒，止吐泻，宜凉冷频服。

草果仁四两　乌梅肉二两　甘草炒，二两半

上每服半两，用姜十片，水煎。

木瓜煎　治吐泻转筋闷绝。

吴茱萸汤炮，七次　生姜切，各一分　**木瓜**木刀切，两半

上每服一三钱，用水煎。

治霍乱，其效神速。一方有黄连无扁豆。仍与第二论通用。妊妇霍乱腹痛，四肢冷逆，自汗脉细，理中汤治之。伤食，加陈皮。寒甚脉欲绝，阴症悉具，加炮附子。方见二十卷

竹茹汤　治霍乱热渴脉数。见七卷呕吐门

附　方

藿香正气散方见二十一卷第十论　**平胃散**方见七卷第十八论　**四君子汤**方见二十四卷第六论　**人参养胃汤**方见七卷第十八论　**五苓散**方见二十卷第十论　**理中丸**方见二十卷第八论　**香薷饮**方见七卷第二论

校注妇人良方　卷十五

宋　临川　陈自明良甫编辑
明　古吴　薛　己立斋补注
　　鄞县　曹赤电炳章圈校

妊娠泄泻方论第一

论曰：妊娠泄泻，或青或白，水谷不化，腹痛肠鸣，谓之洞泄。水谷不化，喜饮呕逆，谓之协热下利。并以五苓散利小便，次以黄连阿胶丸或三黄熟艾汤以安之。若泻黄有沫，肠鸣腹痛，脉沉紧数，用戊己丸和之。嗳腐不食，胃脉沉紧，用感应丸下之，后调和脾胃。若风冷水谷不化，如豆汁，用胃风汤。寒冷脐下阴冷动泄，用理中汤、治中汤。伏暑心烦渴泻水，用四苓散。伤湿泄泻，小便自利，用不换金正气散、胃苓汤。此四证之大略也。仍参第八卷第八论主之。

愚按：米食所伤，用六君加谷蘗。面食所伤，用六君加麦细。肉食所伤，用六君加山楂。若兼寒热作，乃肝木侮脾土，用六君加柴胡、生姜。兼呕吐腹痛，手足逆冷，乃寒水侮土，六君加姜、桂，不应，用钱氏益黄散。若元气下陷，发热作渴，肢体倦怠，用补中益气汤。若泄泻色黄，乃脾土之真色，用六君加木香、肉果。若作呕不食，腹痛恶寒，乃脾土虚寒，用六君加木香、姜、桂。若泻在五更侵晨，饮食少思，乃脾胃虚弱，五更服四神丸，日间服白术散，如不应，或愈而复作，或饮食少思，急用八味丸，补命门火。以生脾土为善。

附　治　验

边太常侧室，妊娠泄泻，自用枳、术、黄连之类，腹闷吐痰，发热恶寒，饮食到口即欲作呕，强匙许，即吞酸不快，欲用祛痰理气。余曰：此因脾胃伤而痰滞中脘，若治痰气，复伤脾胃矣。遂以参、术、炮姜为末，丸如黍粒，不时含咽三五丸，渐加至三日后，日进六君子汤而寻愈。

进士王缴征之内，怀妊泄泻，恶食作呕。余曰：脾气伤也。其君忧之，强进米饮。余谓：饮亦能伤胃，且不必强，俟脾胃醒，宿滞自化，饮食自进。不信，别用人参养胃汤饮之，吐水酸苦，又欲投降火寒药。余曰：若然，则胃气益伤也。经云：损其脾胃者，调其饮食，适其寒温。后不药果愈。

厚朴丸　治洞泄寒中。

干姜炒　厚朴去皮，等分

上水拌炒为末，水糊丸梧子大，每服五十丸，米饮下。

草果散　治虚寒泄泻腹痛无度。

厚朴姜汁拌炒，二两　肉豆蔻十个，面煨　草豆蔻十个，煨

上每服三钱，用姜水煎。

附　方

附子理中汤方见二十卷第八论　**理中丸**　**五苓散**二方见二十卷第十论　**六君子汤**　**补中益气汤**二方见二十四卷第六论　**钱氏益黄散**方见二十一卷第九论　**四神丸**方见八卷第八论　**七味白术散**方见二十一卷第二论　**八味丸**方见第二十四卷第十一论

妊娠下痢黄水方论第二

论曰：妊娠饮食生冷，脾胃不能克化，致

令心腹疼痛。若血分病则色赤，气分病则色白，血气俱病则色赤白相杂。若热乘大肠，血虚受病，则成血痢也。

愚按：治痢之法，当参前篇。其下黄水，乃脾土亏损，真色下陷也，当补益中气。若黄而兼青，乃肝木克脾土，宜平肝补脾。若黄而兼白，乃子令母虚，须补脾胃。若黄而兼黑，是水反侮土矣，必温补脾胃。若黄而兼赤，乃心母益子，但补中益气。若肠胃虚弱，风邪客，用胃风汤。或胎气不安，急补脾胃而自安矣。凡安胎之药，当临病制宜，不必拘用阿胶、艾叶之类。

附　治　验

地官胡成甫之内，妊娠久痢，自用消导理气之剂，腹内重坠，胎气不安，又用阿胶、艾叶之类，不应。余曰：腹重坠下，元气虚也；胎动不安，内热盛也。遂用补中益气面安，又用六君子汤全愈：

治妊娠利黄水

厚朴姜汁炙，二两　黄连二两　肉豆蔻五个连皮

上用水煎，徐徐服。忌如前。以上六方并出《产宝》

治妊娠热痢：

黄连一升　黄檗一升　栀子仁二十枚

上用每服五钱，水煎，呕加橘皮、生姜。

治妊娠下痢腹痛，小便涩滞：

糯米一合　当归炒　黄芪各一两

上用水煎，分四服。

治临产下痢，用栀子炒为末，每服二钱，白汤调，甚效。

附　方

胃风汤方见二十卷第九论　**补中益气汤**方见二十四卷第六论

妊娠大小便不通方论第三

夫妊娠大小便不通，由脏腑之热所致。若大肠热，则大便不通。小肠热，则小便不利。大小肠俱热，更推其因而药之。

愚按：前症若大肠血燥，用四物汤加条芩、桃仁。大肠气滞，用紫苏饮加杏仁、条芩。肠胃气虚，用六君子加紫苏、杏仁。肝脾蕴热，用龙胆泻肝汤。心肝虚热，用加味逍遥散加车前子。

附　治　验

亚卿李浦汀侧室，妊娠大小便不利，或用降火理气之剂，元气反虚，肝脉弦急，脾脉迟滞。见其面色青黄不泽，余曰：此郁怒所致也。用加味归脾汤为主，佐以加味逍遥散而安。

主政王天成之内，妊娠痢疾愈后，二便不通，其家世医，自用清热之剂，未效。余诊其脉，浮大而涩，此气血虚也，朝用八珍汤加桃仁、杏仁，夕用加味逍遥散加车前子而瘥。

当归散　治妊娠因怒，肚腹胀痛，四肢浮肿，气急作喘，大便难，小便涩，产门肿。

当归五分　赤茯苓　枳壳面炒　白芍药　川芎各一钱　白姜炮　木香煨　粉草各三分

上用姜水煎，气弱枳壳减半，大便秘加密同煎。

治妊娠大小便不通，腹胁痞闷，不思饮食。

大黄炒　木通　槟榔各一两　枳壳面炒，三分　诃梨勒四个，去核，半生半煨　大腹子三枚

上为末，用童便一盏，葱白二寸，煎六分，调服二钱。

初虞世治妊娠风气。大便秘涩。

枳壳三两，麸炒　防风二两　甘草炙，一两

上为末，每服一二钱，空心用白滚汤调，日三服。

《小品》治妊娠小便不利，气急，服猪苓散。不瘥，用甘遂为末，蜜和服豆许，微利之。未利再服，利后仍服猪苓散。

猪苓散　治妊娠小便涩痛及胎水，猪苓

去皮为末，白汤调下钱许，加至二钱，日三夜二服。

又方　车前子一两，大黄半两，炒为末，每服三钱，蜜汤调。

附　方

四物汤　**六君子汤**二方见二十四卷第六论　**紫苏汤**方见二十四卷第八论　**龙胆泻肝汤**方见二十四卷第八论　**加味逍遥散**　**加味归脾汤**　**八珍汤**三方见二十四卷第四论

妊娠小便不通方论第四

夫妊娠小便不通，为小肠有热，传子脬而不通耳。若兼心肺气滞，则致喘急。陈无择云：妊娠胎满逼胞，多致小便不利。若心肾气虚，清浊相干，而为诸淋。若胞系了戾，小便不通，名曰转胞。若胎满尿出，名曰遗尿。

愚按：丹溪先生：转脬小便闭，多因胎妇虚弱，忧闷性躁，食味厚。古方用滑利消导药鲜效。若脬为胎所坠而不通，但升举其胎，胞系疏而小便自行。若脐腹作胀而小便淋闭，此脾胃气虚；胎压尿胞，四物、二陈、参、术，空心服，后探吐数次自安。窃谓前症，亦有脾肺气虚，而不能下输膀胱者。亦有气热郁结，膀胱津液不利者。亦有金为火烁，脾土湿热甚而不利者。更当详审施治。

附　治　验

司徒李杏冈仲子室，孕五月，小便不利，诸药不应。余曰：非八味丸不能救。不信，别用分利之药，肚腹肿胀，以致不起。

儒者王文远室，患此小腹肿胀，几至于殆，用八味丸一服，小便滴沥，再以前丸之料，加车前子，一剂即利，肚腹顿宛而安。

八味丸　治妇人饮食如故，烦热不得卧，反倚息。因脬系了戾，不得溺，名转脬，但利小便则愈。盖此药有茯苓故也，缓则不救。方见二十四卷第十一论

《古今录验》：妊娠小便难，饮食如故：

当归　贝母去心，炒　苦参各三两　滑石半两

上为末，炼蜜丸小豆大，每服二三十丸，米饮下。

治妊娠小便不通，脐下妨闷，心神烦乱：

葵子研　榆柏皮切，各一两　葱白七茎

上水煎，分三服。

《古今录验》：妊娠不得小便，杏仁去皮尖，炒黄捣丸，灯心汤吞七粒。

又方　滑石末，水和，涂脐下。

又方　用车前草汁，调滑石末，涂脐周围四寸，热易之。

又方　捣杏仁，入滑石末，饭丸小豆大，每服二十丸，白汤下。

又方　用紫菀为丸，井花水调下二钱。

葵子散　治妊娠小便不利，身重恶寒，眩晕及水肿，用葵子五两，赤茯苓五两，为末，每服二钱，米饮调。

附　方

四物汤方见二十四卷第六论　**二陈汤**方见二十四卷第五论

妊娠子淋方论第五

妊娠小便淋者，乃肾与膀胱虚热，不能制水。然妊娠胞系于肾，肾间虚热而成斯症，甚者心烦闷乱，名曰子淋也。

愚按：前症若颈项筋挛，语涩痰甚，用羚羊角散。若小便涩少淋沥，用安荣散。若肝经湿热。用龙胆泻肝汤。若肝经虚热，用加味逍遥散。腿足转筋而小便不利，急用八味丸，缓则不救。若服燥剂而小便频数，或不利，用生地黄、茯苓、牛膝、黄柏、知母、萆薢、甘草。若频数而色黄，用四物，加黄柏、知母、五味、麦门、玄参。若肺气虚而短少，用补中益气加山药、麦门。若阴挺痿痹而频数，用地黄丸。若热结膀胱而不利，用五淋散。若脾肺燥不能化生，宜黄芩清肺饮。

若膀胱阴虚，阳无所生，用滋肾丸。若膀胱阳虚，阴无所化，用肾气丸。

附　治　验

一妇人每怒，发热胁胀，小便淋涩，如遇经行，旬余未已，受胎三月，因怒前症复作，朝用加味逍遥散，夕用安胎饮，各二剂而安。五月又怒，复下血如经行，四日未止，仍用前药而愈。

一妊娠饮食后因恼怒，寒热呕吐，头痛恶寒，胸腹胀痛，大便不实，其面青色，小便频数，时或有血，服安胎止血之剂益甚。余曰：寒热呕吐而腹胀，此肝木克脾土而元气伤也。大便不实而面青，此饮食伤脾，兼肝侮土也。小便数而有血，此肝热传胞，而兼瘀也。用六君子加枳壳、紫苏、山栀，二剂脾胃顿醒。用加味逍遥散加枳壳、紫苏，二剂小便顿清。后节饮食，调理而安。

地肤大黄汤　治子淋。

大黄　地肤草各三两　知母　黄芩炒　猪苓　赤芍药　通草　升麻　枳实炒　甘草各二两

上每服四五钱，水煎服。

安荣散　治子淋甚妙。

麦门冬去心　通草　滑石　当归　灯心　甘草　人参　细辛各五分

上水煎服。

治小便淋痛，心烦闷乱：

瞿麦穗　赤茯苓　桑白皮　木通　葵子各一钱　黄芩炒　芍药　枳壳　车前子炒，各五分

上水煎服。

治子淋小便涩痛：

冬葵子　滑石　木通各等分

上每服四五钱，葱白七寸，水煎。

猪苓散　疗子淋小便涩痛。方见本卷第三论

附　方

羚羊角散方见四卷首论　**龙胆泻肝汤**方见二十四卷第八论　**加味逍遥散**　**四物汤**二方见二十四卷第七论　**肾气丸**即六味丸　**六味丸**　**八味丸**三方见二十四卷第十一论　**六君子汤**　**补中益气汤**二方见二十四卷第六论　**五淋散**　**滋肾丸**　**黄芩清肺饮**三方见八卷第一论　**安胎饮**方见十三卷第二论

妊娠遗尿方论第六

妊娠尿出不知，用白薇芍药为末，酒调下。或白矾、牡蛎为末。酒调二钱。或鸡毛灰末，酒服一匕。或炙桑螵蛸、益智子仁为末，米饮下。

愚按：前症若脬中有热，宜用加味逍遥散。若脾肺气虚，宜用补中益气汤加益智。若肝肾阴虚，宜用六味丸。

附　治　验

一妊娠遗尿内热，肝脉洪数，按之微热，或两太阳作痛，胁肋作胀，余以为肝火血虚，用加味逍遥散、六味地黄丸寻愈。后又寒热，或发热，或恚怒，前症仍作，用八珍汤、逍遥散兼服，以清肝火、养肝血而痊。

附　方

加味逍遥散　**八珍汤**：方见二十四卷第四论　**补中益气汤**方见二十四卷第六论　**六味地黄丸**方见二十四卷第十一论

妊娠尿血方论第七

妊娠尿血，内热乘于血分，以致血热流渗于脬，名子淋。用葵子一升，研细，水五升，煮二升，分三服。或生艾叶一斤，酒五升，煮一升，分三服。亦治落产后下血。

愚按：前症因怒动火者，宜小柴胡加山栀。因劳动火者，宜补中益气汤。若因厚味积热，宜用加味清胃散。若因肝经血热，宜用加味逍遥散。若因脾气下陷，补中益气汤。若因脾虚血热，宜用加味逍遥散。

附　治　验

一妊妇因怒尿血，内热作渴，寒热往来，胸乳间作胀，饮食少思，肝脉弦弱。此肝经血虚而热也，用加味逍遥散、六味地黄丸，兼服渐愈。又用八珍汤加柴胡、丹皮、山栀而痊。

续断汤　治妊娠下血及尿血。

当归　生地黄各一两　续断半两　赤芍药五钱

上为末，每服二钱，空心用葱白煎汤调下。

治妊娠尿血：

阿胶炒为末，四两　熟地黄用生者四两，酒拌蒸熟杵膏

上和丸桐子大，每服七八十丸，空心粥饮下。

五淋散去桂加阿胶炒同为粗末　每四钱，用车前子、白茅根，水煎温服。

又方　白茅根浓煎汤，吞酒蒸黄连丸。

附　方

小柴胡汤方见二十四卷第二论　**补中益气汤**方见二十四卷第六论　**加味清胃散**方见二十四卷第一论　**加味逍遥散**　方见二十四卷第四论　**加味归脾汤**方见二十四卷第四论

妊娠胎水肿满方论第八

《产乳集》云：妊娠三月，足肿至腿出水，饮食不甘，似水肿，谓之子气。至分娩方消者，此脾胃气虚，或冲任经有血风。《名医录》云：宋少主元徽，与徐文伯徵行学针法，文伯见一妊娠足肿，脉之。少主曰：此女形也。文伯曰：此鬼胎也，在左而黑。遂用针，胎下果然。亦有脾虚，水气流溢，或因泻痢，脏腑虚寒，或因疟疾饮水，脾虚湿渍，或因水渍于胞，不能分利，皆致腿足肚腹肿症也。

愚按：前症若胸满腹胀，小便不通，遍身浮肿，用鲤鱼汤。脾胃虚弱，佐以四君子。若面目虚浮，肢体如水气，用全生白术散。如未应，用六君子汤。脾虚湿热，下部作肿，用补中益气加茯苓。若饮食失宜，呕吐泄泻，用六君子汤。若腿足发肿，喘闷不安，或指缝出水，用天仙藤散，虚胃脾弱，兼四君子汤，如未应，用补中益气汤。若脾肺气滞，用加味归脾汤，佐以加味逍遥散。

附　治　验

一妊娠每胎至五月，肢体倦怠，饮食无味，先两足肿，渐至遍身，后及头面，此是脾肺气虚，朝用补中益气，夕用六君子加苏梗而愈。凡治妊娠，毋泥月数，但见某经症，即用本药为善。

天仙藤散　治妇人有水气而成胎，以致两腿足浮肿。

天仙藤洗略炒　香附子炒　陈皮　甘草　乌药软白者辣者良，各五分

上每服五钱，生姜、木瓜、苏叶各三片，水煎，日三服。

泽泻散　治妊娠遍身浮肿，上气喘急，大便不通，小便赤涩。

泽泻　桑白皮炒　木通　枳壳麸炒　槟榔　赤茯苓各五分

上姜水煎服。

千金鲤鱼汤　治妊娠腹大，胎间有水气。

白术五两　茯苓四两　当归　芍药各三两

上先以小鲤鱼一头，如食法煮取汁，每汁二盏，入药五钱，姜七片，橘皮少许，煎七分，空心服。

肾着汤　治妊娠腰脚肿。

茯苓　白术各八分　干姜炮　甘草各一钱　杏仁五分

上水煎服。

五皮散　治胎水肿满。

大腹皮　桑白皮炒　生姜皮　茯苓皮　橘皮各一钱　木香三分

上水煎服。

治妊娠脚浮肿，因脾衰血化成水，用生

料平胃散，姜枣水煎服。或为末，用苏叶汤调下，每服二钱。

全生白术散　治妊娠面目浮虚，四肢肿如水气，名曰胎气，又曰胎肿。

白术一两　生姜皮　大腹皮　陈皮　白茯苓各半两

上各为末，每服二钱，米饮下。

附　方

四君子汤　六君子汤　补中益气汤三方见二十四卷第六论　**加味归脾汤**　方见二十四卷第四论　**加味逍遥散**方见二十四卷第四论

妊娠腹内盅鸣方论第九

治孕妇腹内鸣，用鼠窟中土为末，入麝香，酒调下三钱，立愈。或黄连浓煎汁，毋常呷之。

愚按：《产宝》云：小儿在腹中哭，其治法亦用空房中鼠穴土，或黄连浓煎饮之，立愈，想即是症。又云脐带上疙瘩，儿含口中，因妊娠登高举臂，脱出儿口，以此作声，令妊妇屈腰就地，如拾物，仍入儿口即止。然黄连性寒，麝香开窍，当酌量用之。

龚彦德孕痫方第十

治孕痫，用乌药五钱，水一盅，煎七分，入牛皮胶一两，煎化温服，或薏苡仁煮汁饮之。

愚按：孕痫即是腹内患痫，如前法不应，宜用牡丹皮散，或加薏苡仁汤。治验见二十四卷

妊娠不语论第十一

孕妇不语，不须服药，临产月但服保生丸、四物汤，产下便语。黄帝问曰：人有重身，九月而喑，何也？岐伯对曰：胞络系于肾，肾脉贯系舌本，故不能言，十月分娩后，自为之言也。

愚按：前症果《内经》穷理之言，人有患此，当调摄以需之，不必惊畏，而泛用药也。

妊娠伤食方论第十二

经曰：饮食自倍，肠胃乃伤。又云：阴之所生，本在五味，阴之五宫，伤在五味，故妊娠伤食，最难调治者。

愚按：东垣先生云：脾胃之气壮，则过时而不饥，多食而不伤。盖胃主司纳，脾主消化，五脏之本也。然食倍而伤者，乃脾气虚而不化也。若投以峻剂，则脾胃复伤，而胎亦损矣。当审其所因而调治之。若饮食停滞，或肚腹作痛，用平胃散。呕吐恶心，加枳壳、砂仁。吞酸嗳腐，加黄连三分，吴茱萸二分。腹满泄泻，用六君子汤。停滞肉食，倍加山楂。停滞面食，倍加麦蘖。停滞糯食，用白酒曲末一味。米食停滞，倍加谷蘖。鱼腥所伤，倍加陈皮。伤辛热之物，加黄连。伤生冷之物，加砂仁、木香；如不应，更加肉豆蔻、补骨脂；再不应，用四神丸。若脾气下陷，用补中益气汤。凡嗳觉药气，且戒药饵、节饮食。经云：损其脾者，调其饮食，适其寒温。大凡脾胃虚弱，饮食难化，以白术、陈皮为末，等分，陈曲糊丸，常服最善。枳术丸，但可暂用，枳实峻厉，能耗真气，治者慎之。

附　治　验

一妊娠因停食，服枳术丸，胸腹不利，饮食不少，更服消导宽中之剂，其胎下坠。余谓此脾气虚而不能承载也，用补中益气及六君子汤，中气渐健，其胎渐安。又用八珍汤加柴胡、升麻，调理而痊。

木香丸　治妊娠脾胃虚弱，饮食不消，肚腹膨胀，或呕吐泄泻。

木香二钱　白术炒　人参　白茯苓各等分

上为末，面糊丸绿豆大，每服三十丸，熟水下。

白术散　治妊娠脾胃虚弱，气不调和，饮食易伤。

白术炒　紫苏各一两　人参　白芷各三钱　炒　川芎　诃子皮　青皮各半两　甘草炒，一钱

上每服二钱，姜水煎。

附　方

平胃散方见七卷第十八论　**补中益气汤　六君子汤**二方见二十四卷第六论　**四神丸**方见八卷第八论　**八珍汤**方见二十四卷第八论

妊娠脏躁悲伤方论第十三

许学士云：一妇无故，数次悲泣，是为脏燥，用大枣汤而愈。又程虎卿内，妊娠五月，惨戚悲伤，亦投大枣汤而愈。

愚按：前症或因寒水攻心，或肺有风邪者，治当审察。

附　治　验

一妊妇无故自悲，用大枣汤二剂而愈。后复患，又用前汤，佐以四君子加山栀而安。

一妊妇悲哀烦躁，其夫询之云：我无故，但自欲悲耳。用淡竹茹汤为主，佐以八珍汤而安。

大枣汤

甘草三两　小麦三两　大枣十枚

上水六盅，煎三盅，分三服。亦补脾气。

淡竹茹汤　治妊妇心虚惊悸，脏躁悲伤，或作虚烦。

麦门冬去心　小麦　半夏汤炮，各一钱五分　人参　白茯苓各一钱　甘草五分

上姜枣并竹茹少许，水煎。

治胎脏躁悲哭，用红枣烧存性，米饮调下。

附　方

四君子汤方见二十四卷第六论　**八珍汤**方见二十四卷第四论

校注妇人良方　卷十六

宋　临川　陈自明良甫编辑
明　古吴　薛　己立斋补注
　　鄞县　曹赤电炳章圈校

坐月门妊娠疾病既明须知坐月避忌故以次之

《产宝方》周颐序第一

颐闻至灵者人，最重者命。人皆知命之重，而不知养命之方，以至年未衰迈，疾病攻夺，仓卒寻医，多致有误。况妇人病，惟产难为急，子母命悬片时，故产二三胎者，脏腑未衰，血气未减，疾病易治。若产育过多，复自乳子，血气已伤，尤难治。若产后血气未复，胃气益伤，诸症蜂起。此古人所以专著产乳方论。余故编采产宝等方，兼拾昝氏之遗，作为论说，粹为一编，刊行于世，以救危急云。时丁巳岁。秋八月。吉日。周颐谨序。

将护孕妇论第二

凡妊娠至临月，当安神定虑，时常步履，不可多睡饱食，过饮酒醴杂药。宜先贴产图。依位密铺床帐，预请老练稳婆，备办汤药器物。迨产时，不可多人喧哄怆惶，但用老妇二人扶行，及凭物站立。若见浆水，腰腹痛甚，是胎离其经。令产母仰卧，令儿转身，头向产门，用药催生坐草。若心烦，用水调服白蜜一匙。觉饥，吃糜粥少许，勿令饥渴，恐乏其力。不可强服催药，早于坐草。慎之。

愚按：前论慎守之。此先哲好生之德，防患于未萌者也，仁哉。

滑胎例第三

凡妊娠十月，宜用滑胎汤。

滑胎枳壳散　令胎瘦产易。昔湖阳公主，每产累日不下，南山道人进此方。

商州枳壳麸炒。二两　粉草炒一两

上为末，每服二钱，空心沸汤调。日三服。凡孕六七月宜服之。温隐居加当归、广木香各等分。

易产兼治诸疾。下气宽膈。

枳壳麸炒，五两　甘草一两半　香附子炒去毛二两

上为末。每服二钱。用白汤调服。

内补丸　治妊娠妇人，冲任脉虚，补血安胎。

熟地黄二两用生地酒拌蒸熟杵膏　当归一两炒为末

上为末，和丸梧子大，每服三四十丸，温酒或滚汤下。许学士云：大率妊娠，唯在抑阳助阴。然胎前药，唯恶群队，阴阳错杂，别生他病。唯枳壳散所以抑阳，四物汤所以助阴尔。然枳壳散，其味多寒。若单服，恐致胎寒腹痛。更以内补丸佐之，则阳不致强，阴不致弱，阴阳调和，有益胎嗣。此前人未尝论及也。

易产滑胎。车前子为末。或酒或饮服寸匙。诗云：芣苢能令妇人乐有子矣。陆机注云：治妇人产难。愚详孔子序诗云。乐然而生。易于生育，即此谓也。

神寝丸　临月服之神效。蕲州施少卿方蕲州徐大丞传

通明乳香半两另研　枳壳麸炒。一两

上为末。炼蜜丸梧子大。每服三十丸。空心温酒下。

榆白皮散　治妊娠滑胎易生。

榆白皮　甘草各二两　葵子一两

上为末。每服五钱。水煎。

孕及九月将产，猪肚一具，煮烂，徐徐自食尽易生。

保气散　治宽气进食，瘦胎易产。或居处失宜，顿仆胎动。若胎痛胎漏，兼服佛手散。见通用方

香附四两　山药二两　砂仁一两　木香四两　粉草一两　益智　紫苏叶各半两

上为末。每服二钱。白汤调下。

神寝丸、枳壳散。见前。此三药，入月宜常服。

保产无忧散　治妊妇身居安逸，口厌甘肥，忧乐不常，食物不节，致胞胎肥厚，根蒂坚牢。入月服之，则易生矣。

当归　川芎　白芍药　枳壳麸炒　乳香各三钱　木香　甘草　血余即发灰以猪心血和之各一钱半

上为末，每三钱，水煎，日二服。神效。

月空方位例第四

出《太平圣惠方》《外台秘要》同

正月　三月　五月　七月　九月　十一月　在丙壬

二月　四月　六月　八月　十月　十二月　在甲庚

逐月安产藏衣忌向方位第五

凡安产藏衣方位，并于卧阁内分布。太平圣惠云：凡妊妇初入月时，便写产图一本，以朱书某月某日，空贴在某位。如正月在丙壬，可于壬位安产妇床帐，丙位藏衣之类，贴产房北壁。若值闰月，只看节气用之。又云：每月产图，有雷公招摇，运鬼力士，天狗轩辕，大时咸池，丰隆吴时，白虎大夫，天候狂虎。凡此十三神，并从月建易其位，所谓月空者。按内经云：月廓空无写。王冰注云：论月轮中空日也。即非十三神之数。今太平圣惠方以六阳月在丙壬，以六阴月在甲庚，正如外台所言：正月十一月在丙壬，二月十二月在甲庚之类。其理一也。但外台言之详，圣惠言之简。今人多从其简。或云：凡逐月安产藏衣，并向月德月空方位。所有十二神杀，并从节气更换。若交次月节，便次月用书产图者，非也。假如正月十四日立春，若妊妇十三日乳卧，岂可作去年十二月用？必依月分用之，乃是。若依节气更换，则天德月德，所在差矣。然月空与任，谓之中天空颇相类。议者以为天空者，非十三神之数。盖课中有天乙贵人，其位无可与对者，故此空是谓天空。值此神百事不宜，止宜安产床帐藏衣之类耳。集圣历云：天德正月在丁，二月在坤，三月在壬，四月在辛，五月在乾，六月在甲，七月在癸，八月在艮，九月在丙，十月在乙，十一月在巽，十二月在天。



又堪舆历：有游年白虎杀神，在太岁后一辰。如太岁卯，则白虎在寅。余仿此推之。若产及藏衣犯之，则子母皆不利。

王子亨云：难产逆生论称犯一切神，固有是理。然亦有自然难产，儿自然逆生者，及

有产肠俱下者，产已则复如故。此非疾病所致，气血所主。天下之理，盖有不可穷诘者，亦宜知之。

安产藏衣十三神吉凶方位

安产	藏衣	运鬼	雷公	招摇	轩辕	咸池	丰隆	天狗	狂虎	天候	大夫	白虎
吉方	吉方	力士		大时		吴时						
正月	壬丙艮寅	寅卯辰	辰辰午	申酉戌								
二月	坤甲庚乾亥	卯子丑	未巳酉	巳戌亥								
三月	丙壬坤申	辰酉戌	戌午子	寅亥子								
四月	甲庚巽巳	巳午未	丑未酉	亥子丑								
五月	丙壬艮寅	午卯辰	辰申子	申丑寅								
六月	庚甲乾亥	未子丑	未酉卯	巳寅卯								
七月	丙壬坤申	申申子酉	戌戌戌	子寅卯	辰							
八月	艮艮甲巽	巳酉酉午	戌丑亥	卯亥辰	巳							
九月	丙壬艮寅	戌卯辰	辰子午	申巳午								
十月	庚甲乾亥	亥子丑	未丑卯	巳午未								
十一月	壬艮丙坤	申子酉	戌戌寅	午寅未	申							
十二月	庚甲巽巳	丑午未	丑卯酉	亥申酉								

推妇人行年法第六

生气方　产妇宜向之坐卧，及产帐向之。开门大吉。

反支方　遇此日即铺灰土，用牛皮或马驴皮讫，铺草，勿令恶血污地吉。

祸害月　不得于其上产，又不得向之。二便避之大吉。

绝命方　不得于其上产，又不得向之。大小便避之吉。

悬尸日　遇此日产，不得攀绳。宜悬马辔攀之大吉。

闭肚方　临月至满日，并不得向之大小便，及弃不净之水。谨之吉。

八庄方　产帐不得向之，开门。忌之大吉。

生气方	反支方	祸害月	绝命方	悬尸日	闭肚方	八庄方	产宜方	宜卧方

十三岁行年在庚申。坤正七月。离巽辰戌日。

在正西偏北辛。在正东偏北甲。黄色衣西南首。西南方黄衣师看产。

十四岁行年在己未。离二八月。坤兑卯酉日。

在正北偏西壬。在正北偏东癸。赤色衣正南首。正南方赤衣师看产。

十五岁行年在戊午。艮三九月。乾艮丑未日。

在正东偏北甲。在正北偏西壬。黑色衣正北首。正北方黑衣师看产。

十六岁行年在丁巳。震四十月。艮乾丑未日。

在正东偏北甲。在正西偏北辛。青色衣正东首。正东方青衣师看产。

十七岁行年在丙辰。艮五十一月。震艮子午日。

在正东偏南己。在正西偏南庚。黄色衣东北首。东北方黄衣师看产。

十八岁行年在乙卯。乾六十二月。坎震巳亥日。

在正南偏东丙。在正南偏西丁。白色衣西北首。西北方白衣师看产。

十九岁行年在甲寅。兑正七月。巽离辰戌日。

在正南偏西丁。在正南偏东丙。白色衣正西首。正西方白衣师看产。

二十岁行年在癸丑。巽二八月。兑坤卯酉日。

在正西偏南庚。在正东偏南乙。青色衣东南首。东南方青衣师看产。

二十一岁行年在壬子。坤三九月。离巽寅申日。

在正西偏北辛。在正东偏北甲。黄色衣西南首。西南方黄衣师看产。

二十二岁行年在辛亥。离四十月。坤兑丑未日。

在正北偏西壬。在正北偏东癸。赤色衣正南首。正南方赤衣师看产。

二十三岁行年在庚戌。坎五十一月。乾艮子午日。

在正北偏东癸。在正北偏西壬。黑色衣正北首。正北方黑衣师看产。

二十四岁行年在己酉。震六十二月。艮乾巳亥日。

在正东偏北甲。在正西偏北辛。青色衣正东首。正东方青衣师看产。

二十五岁行年在戊申。艮正七月。震坎辰戌日。

在正东偏南乙。在正西偏南庚。黄色衣东北首。东北方黄衣师看产。

二十六岁行年在丁未。乾二八月。坎震卯酉日。

在正南偏东丙。在正南偏西丁。白色衣西北首。西北方白衣师看产。

二十七岁行年在丙午。兑三九月。巽离寅申日。

在正南偏西丁。在正南偏东丙。白色衣正西首。正西方白衣师看产。

二十八岁行年在乙巳。巽四十月。兑坤丑未日。

在正西偏南庚。在正东偏北乙。青色衣东南首。东南方青衣师看产。

二十九岁行年在甲辰。坤五十一月：离巽子午日。

在正西偏北辛。在正东偏南甲。黄色衣西南首。西南方黄衣师看产。

三十岁行年在癸卯。离六十二月。坤兑巳亥日。

在正北偏西壬。在正北偏东癸。赤色衣正南首。正南方赤衣师看产。

三十一岁行年在壬寅。坎正七月。乾艮辰戌日。

在正北偏东癸。在正北偏西壬。黑色衣正北首。正北方黑衣师看产。

三十二岁行年在辛丑。震二八月。艮乾卯酉日。

在正东偏北甲。在正西偏北辛。青色衣正东首。正东方青衣师看产。

三十三岁行年在庚子。艮三九月。震坎寅申日。

在正东偏南乙。在正西偏南庚。黄色衣东北首。东北方黄衣师看产。

三十四岁行年在己亥。乾四十月。坎震丑未日。

在正南偏东丙。在正南偏西丁。白色衣西北首。西北方白衣师看产。

三十五岁行年在戊戌。兑五十一月。巽离子午日。

在正南偏西丁。在正南偏东丙。白色衣正西首。正西方白衣师看产。

三十六岁行年在丁酉。巽六十二月。兑坤巳亥日。

在正西偏南庚。在正东偏南乙。青色衣东南首。东南方青衣师看产。

三十七岁行年在丙申。坤正七月。离巽辰戌日。

在正西偏北辛。在正东偏北甲。黄色衣西南首。西南方黄衣师看产。

三十八岁行年在乙未。离二八月。坤兑卯酉日。

在正北偏西壬。在正北偏东癸。赤色衣正南首。正南方赤衣师看产。

三十九岁行年在甲午。坎三九月。乾艮寅申日。

在正北偏东癸。在正北偏西壬。黑色衣正北首。正北方黑衣师看产。

四十岁行年在癸巳。震四十月。艮乾丑未日。

在正东偏北甲。在正西偏北辛。青色衣正东首。正东方青衣师看产。

四十一岁行年在壬辰。艮五十一月。震坎子午日。

在正东偏南乙。在正西偏南庚。黄色衣东北首。东北方黄衣师看产。

四十二岁行年在辛卯。乾六十二月。坎震巳亥日。

在正南偏东丙。在正南偏西丁。白色衣西北首。西北方白衣师看产。

四十三岁行年在庚寅。兑正七月。巽离辰戌

日。

在正南偏西丁。在正南偏东丙。白色衣正西首。正西方白衣师看产。

四十四岁行年在己丑。巽二八月。兑坤卯酉日。

在正西偏南庚。在正东偏南乙。青色衣东南首。东南方青衣师看产。

四十五岁行年在戊子。坤三九月。离巽寅申日。

在正西偏北辛。在正东偏北甲。黄色衣西南首。西南方黄衣师看产。

四十六岁行年在丁亥。离四十月。坤兑丑未日。

在正北偏西壬。在正北偏东癸。赤色衣正南首。正南方赤衣师看产。

四十七岁行年在丙戌。坎五十一月。乾艮子午日。

在正北偏东癸。在正北偏西壬。黑色衣正北首。正北方黑衣师看产。

四十八岁行年在乙酉。震六十二月。艮乾巳亥日。

在正东偏北甲。在正西偏北辛。青色衣正东首。正东方青衣师看产。

四十九岁行年在甲申。艮正七月。震坎辰戌日。

在正东偏南乙。在正西偏南庚。黄色衣东北首。东北方黄衣师看产。坐产时更用后法。

体玄子借地法第七

东借十步，西借十步。南借十步，北借十步。上借十步，下借十步。

壁方之中，四隅各借十步，安产借地。或有污秽，或有东海神王，或有西海神王，或有南海神王，或有北海神王，或有日游将军，白虎夫人，远去十丈。轩辕招摇，举高十丈。天符地轴，入地十丈，令地空闲。产妇某氏，安居无所妨碍，无所畏忌，诸神拥护，百邪速去。急急如律令敕。以上借地法于入月一日朱书一本贴产妇房内墙壁上更不须避忌神杀也

禁草法第八铺草及毡褥讫即咒曰

铁铁汤汤，非公所当。是王一言得之铜，一言得之铁，母子相生俱簸铁，急急如律令。

禁水法第九欲产时贮水咒曰

南无三宝水。

水在井中为井水，水在河中为河水，水在器中为净水，水在法中为真水。自知非真莫当真水。

以净持浊，以正治邪。日游月杀，五土将军。青龙白虎，朱雀玄武。招摇天狗，轩辕女妓。天吞地吞，悬尸闭肚。六甲禁讳，十二神王。土符伏神，各安所在。不得动静，不得忌干。若有动静，若有忌干。施以神咒，当摄汝形。

阿佉尼阿毗罗莫多梨娑地梨娑诃。

入月预备药物第十

愚按：前所预备内，佛手、保气、枳壳、榆皮、黑神、大圣、蕊石七散、神寝保生、理中三九、催生黑虎二丹，及催生神符，又葵子、生地黄、羌活、竹茹、乌梅、雌雄石燕、甘草、海马、衔铁、大枣、陈皮、姜、钱、黑豆、白蜜、无灰酒、童子小便、酸醋白米汤、瓶、锅、铫、断脐线、剪之类，可谓周恤之至矣。内花蕊石散，为血入胞衣，胀大不能下，或恶露上攻，不能苏醒。佛手散，治血虚之危症。加味芎归汤，治交骨不开。蓖麻子，治胞不能上下。失笑散，治恶露腹痛，不省人事。蜡油调滑石涂入产门，为滑胎之药。清魂散，治血晕等症。平胃散、朴硝、水银。为腐化死胎之剂。八珍汤，补血气虚损。上诸方皆为紧要之药，必不可缺。其断脐带，先用线近脐扎紧，吊裹咬断。如天气风寒，或难产，母子劳伤元气者，先扎脐带，以油纸捻烧断。此又为回生起死之要法也。故治者，当审其宜，不可概信而用之。

催生灵符第十一

灵符宜以水飞朱砂书之，贴于房内北壁上。至坐蓐之时，将符以针扎就盏内化之，温水调服。

治难产及横生逆产，胞衣不下。灵符见后。出《圣惠方》，《局方》同



不安稳，朱书贴产妇处北壁上。

觉不安稳书贴枕上。

横生，朱砂书此符，以顺水吞下。



此四符，入月一日，墨书鞋底上，仍密安产妇席褥下，勿令人知。

此三符，遇辛难以墨书吞之。

此四符，遇胞衣不出，以朱书吞。

谨按前所著方论，图向符诀一帙，自夫人泛视之，以为迂远。然艰于得子者，互相质问，则惟此书为要，屡试有明验也。余每观其护孕之方，极为曲当；易产之药，悉有根据。至于图向之趋避，吉凶所关；符诀之玄微，神妙显用，其诚有得于诸先哲者乎？不然，王太仆诸公，深於奥理者也，岂谬论耶？则是书也，诚妊娠良方；家户之所当珍藏考究者。使合此而施治，于妊妇鲜不有误矣，观者勿以为迂远云。

校注妇人良方　卷十七

宋　临川　陈自明良甫编辑
明　古吴　薛　己立斋补注
　　鄞县　曹赤电炳章圈校

产　难　门

产难论第一

妇人以血为主，惟气顺则血和，胎安则产顺。今富贵之家，过于安逸，以致气滞而胎不转动。或为交合，使精血聚于胞中，皆致产难。若腹或痛或止，名曰弄胎。稳婆不悟，入手试水，致胞破浆干，儿难转身，亦难生矣。凡产直候痛极，儿逼产门，方可坐草。时当盛暑，倘或血运血溢，当饮清水解之。冬末春初，产室用火和暖下部，衣服尤当温厚，方免胎寒血结。若临月洗头濯足，亦致产难。

愚按：丹溪先生曰：余族妹苦于难产，遇胎则驱之，予甚悯焉。盖其形肥而勤女工。形肥则气虚，久坐则气不运，而儿在胞胎，因亦不能自运耳。当补其母之气，则儿健易产。故后有孕，至五六月，遂以紫苏饮加补气药，与之数十贴而产甚快。大要在随母之禀性。若胎胞破早，血水先干，或难产劳伤气血者，煎八珍汤，或十全大补汤加益母草，不时与服，以协济之。或以黄芪数斤，芎、归四五斤许，大釜水煎，药气氤氲满室，使产妇口鼻俱受其气。脐带以油纸捻烧断，补接其阳气。稳婆须择老练者，当先施惠，预说与知，倘有生息不顺，只说是未产。或是双胎，只说胎衣未下，恐惊则气散，愈难生息。

附　治　验

荆妇孟冬分娩艰难，劳伤元气，产子已死，用油纸捻烧断脐带，藉其气以暖之。俄顷忽作声。此儿后无伤食作泻之症，可见前法之功不诬。世用刀器断脐带，子母致危者，竟不知其由矣。且稳婆又喜平日常施小惠，得其用心，兼以安慰母怀，故无虞耳。一稳婆云：我止有一女。正分娩时，适当巡街侍御行牌取我视其室分娩。女因惊吓，未产而死。后见侍御更以威颜分付，迨视产母，胎虽顺而头偏在一边，以致难产。因畏其威，不敢施手，由是其母子俱不能救。

紫苏饮方见十二卷第八论　**十全大补汤**
八珍汤二方见二十四卷第四论

杨子建十产论第二

凡生产，先知此十症，庶免子母之命折于无辜也。世之收生者，少有精良妙手，多致倾命。予因伤痛而备言之。

一曰正产

正产者，言怀胎十月，阴阳气足，忽然作阵疼痛，胎至谷道，浆破血下，儿即正产。

二曰伤产

伤产者，言怀胎未足月，有所伤动，以致忽然脐腹疼痛，或服催药过早，或产母努力太早，逼儿错路，不能正生。凡分娩须待儿身转顺，头到产门，努力一送，儿即正生。

三曰催生

催生者，言欲产时儿头至产门，方服药催之。或经日久，产母困倦难生，宜服药以助其血气，令儿速生。

四曰冻产

冻产者，言天气寒冷，产母血气迟滞，儿不能速生。故衣裳宜厚，产室宜暖，背心宜温和，庶儿易生。

五曰热产

热产者，言盛暑之月，产妇当温凉得宜。热甚，产母则头疼，面赤昏晕。若产室人众，热气蒸逼，亦致前患，名曰血晕。若夏月风凉阴雨，亦当谨避。

六曰横产

横产者，言儿方转身，产母用力逼之故也。凡产母当令安然仰卧，稳婆先推儿身顺直，头对产门，以中指探其肩，不令脐带羁扳，方用药催之。继以产母努力，儿即生。

七曰倒产

倒产者，言儿未能转身，产母努力故也。当令产母仰卧、稳婆推入，候儿自顺。若良久不生，令稳婆手入产户一边，拨儿转顺，近产门却服催药，并努力即下。

八曰偏产

偏产者，言儿回身未顺生路，产母怒力逼儿，头偏一边，产虽露顶，非也，乃额角耳。当令产母仰卧，稳婆轻手正其头向产门，却令产母努力，子即下。若儿顶后骨，偏挂谷道露额，令稳婆以绵衣炙暖，裹手于谷道外傍，轻手推正，令产母努力，儿即生。

九曰碍产

碍产者，言儿身已顺，门路已正，儿头已露，因儿转身，脐带绊其肩，以致不能生。令产母仰卧，稳婆轻推儿向上，以中指按儿肩，脱脐带，仍令儿身正顺，产母努力，儿即生。

十曰坐产

坐产者，言儿之欲生，当从高处牢系手巾一条，令产母以手攥之，轻轻屈坐，令儿生下。不可坐，砥碍儿生路。

十一曰盘肠产

赵都运恭人，每临产则子肠先出，然后产子，其肠不收，名曰盘肠。稳婆以醋水各半盏，默然喂产妇面背才收，不可不知。

愚按：前症古方以蓖麻子仁四十九粒，研涂产母头顶，肠收上即洗去。其肠若干，以磨刀水少许温润之，以用磁石煎汤服之，即收上。磁石须阴阳家用有验者。若以水喂母面背，恐惊则气散。

治盘肠产：以半夏为末，搐鼻中，肠自上。

又方大纸捻以麻油润，灯吹灭，以烟熏产妇鼻中，肠即上。

又方：肠出，盛以洁净漆器，浓煎黄芪汤浸之，肠即上。

催生方论第三

五行论命，以年月日时、支干五行相生相值，以推其贵贱，其间最切要者时也。得其时则终身富贵，失其时则一世贫贱。然则命禀于有生之初，岂可催乎！世之催生之说，盖为产难而设也。

今开历验数方于后。

催生柞木饮子　治产难或胎烂腹中腹闷。其效如神。

生柞木一尺锉　甘草大者五寸锉五段

上用水三盅，纸封罐口，煎一盅半。候胎顺产门，徐徐温服，即时分娩，更无诸苦。切不可早于坐草，及稳婆下手催逼。

催生如神散　治逆产横生，其功甚大。

百草霜　白芷不见火各为末等分

上每服三钱，至胎顺产门以童便米醋和如膏，加沸汤调下。或童便酒煎，进二服。然血得黑则止。此药大能固血，又免血干，甚妙。

如圣散。用黄蜀葵花焙为末，热汤调下二钱。若漏血，胎胞干涩难产，并进三服即产。如无花，用葵子末半两吞调温酒服，尤妙。若打扑胎死，红花酒调下。

顺生丹　治症同上。

兔脑髓去皮膜研如膏　明乳香一两细研　母丁香末一两　麝香一钱研细

上以兔脑髓丸鸡头大，阴干，每服一丸，温水下。男左女右，手握出。兔脑腊月者尤佳。

又方。通明乳香一块，如枣子大，为末。腰痛时用冷水醋少许调服，扶立，令两手拿石燕二个，念医灵药圣三遍，行数步，坐草便生，更无痛楚。神效。

愚按：前法观之似迂远，用者云甚验。

治产不顺。

蛇蜕一条全者　蚕蜕纸一张无则一方

上入新瓦瓶内，盐泥固济，存性为末，煎榆白皮汤下一钱。三服。觉痛便生。

又方。用伏龙肝研末，每服一钱，酒调下。儿头戴土而下。

又方。吞槐子十四粒即下。

又方。当归为末，酒调一钱服，良久再服。

一方。用鱼胶一尺许，新瓦上煅灰，陈醋调服立下。

又方：大朱砂于端午日晒起，以百日为度，研为细末，用腊月兔脑髓丸绿豆大。欲产时，粥饮下一丸，良久便生。其药男左女右。手中握出。晒朱砂，不得着雨。

又方：腊月兔头煅为末，葱白煎汤，调二钱，立生。或腊月兔血，纸袋盛挂，当风处阴干为末，煎乳香汤调下二钱。或兔皮和毛烧为末，酒调下二钱，即下。如胎衣未下再服。

神妙乳砂丹：用明乳香为末。以猪心血丸桐子大，朱砂为衣，阴干。每服二丸，嚼碎冷酒下。良久未生再服。难产以莲叶蒂七个，水煎化服二丸，良久未生再服。胞浆先干，胎不得下，急服大料四物汤，滋其血气。并浓煎葱汤熏洗产户。更用油烛涂产户内，却服前药。胎死不下，用朴硝五钱，滚汤调下，或平胃散一服。胞衣未下，酒水服一丸。横逆不顺，先用如神散。方见前产门不开，用加味芎归汤，仍服二丸。须月初上辰日修合。盐涂儿足底，急强摩之即产。

急应方：好墨新汲水浓磨服之，墨水裹儿出。又方：清油同蜜等分，入滚汤少许调服。或油煎一盏服之。或路傍破草鞋一双，取鼻络小耳绳烧灰，酒调服。

交骨不开产门不闭方论第四新附

窃谓交骨不开，产门不闭，皆由元气素弱，胎前失於调摄，以致血气不能运达而然也。交骨不开，阴气虚也，用加味芎归汤、补中益气汤。产门不闭，气血虚也，用十全大补汤。

附　治　验

地官李孟卿娶三十五岁女为继室，妊娠虑其难产，索加味芎归汤四剂备用。果产门不开，止服一剂，顿然分娩。

上舍怀德之室，产门不开，两日未生。服前药一剂，即时而产。怀德传服此方，用者无有不验。

一妇人分娩最易，至四十妊娠下血甚多，产门不开。与前汤一剂，又以无忧散斤许，煎熟，时时饮之，以助其血而产。

一产妇阴门不闭，发热恶寒，用十全大补加五味子，数剂而寒热退。又用补中益气加五味子，数剂而阴户敛。若初产肿胀，或煞痛而不闭者，用加味逍遥散。若肿既消而

不闭者，用补中益气汤。切忌寒凉之剂。

一妇人脾胃素弱，兼有肝火，产后阴门肿痛，寒热作渴，呕吐不食，敷大黄等药，服驱利之剂，肿及于臀，虚症蜂起。此真气虚也。先用六君子以固脾胃，乃以补中益气汤升举而消。

一产妇失治，肿溃不已，形体消瘦，饮食少思，朝寒暮热，自汗盗汗，半年矣。余用补中益气加茯苓、半夏以健脾胃，脓水渐少，饮食渐进。用归脾汤以解脾郁，共五十余剂，元气复而疮亦愈矣。

一产妇阴门不闭，小便淋沥，腹内一物攻动，胁下或胀或痛。用加味逍遥散加车前子而愈。

一妇人子宫肿大，二日方入，损落一片，殊类猪肝，面黄体倦，饮食无味，内热晡热，自汗盗汗，用十全大补汤，二十余剂。诸症悉愈，仍复生育。

加味芎归汤　治交骨不开，不能生产。

川芎　当归各一两　自死龟板一个酥炙　妇人头发一捏烧存性

上为散，每服五钱，水煎服。约人行五里，即生。如胎死亦下。灼过龟板亦可。

附　方

十全大补汤方见二十四卷第四论　**补中益气汤**方见二十四卷第六论

郭稽中产难方论第五

论曰。产难者，因儿转身，将儿枕血块破碎，与胞中败血壅滞，儿身不能便利，是以难产。急服胜金散，消散其血，使儿自易生。陈无择云：多因儿未转身，坐草太早，或努力太过，以致胞衣破而血水干，产路涩，而儿难下。宜先服催生如神散，以固其血。设或逆生横产，当用前法针刺之。

胜金散

麝香末一钱　豆豉一两

上每服一钱，用秤锤烧赤淬酒下。催生如神。散亦可用。

产难子死腹中方论第六

产难子死腹中，多因惊动太早，或触犯禁忌，其血先下，胎干涸而然也。须验产母舌。若青黑，其胎死矣。当下之。故产室坐卧须顺四时方向，并遵五行避忌则吉。

附　治　验

一稳婆之女，勤苦负动，妊娠腹中阴冷重坠，口中甚秽。余意其胎已死，令视其舌青黑。与朴硝半两许服之，化下秽水而安。

一妇人胎死，服朴硝下秽水，肢体倦怠，气息奄奄。用四君子为主，佐以四物、姜、桂，调补而愈。

又方：水银半两，桂末一钱，作一服。温酒调下。粥饮亦可。

又方：以利斧煅赤，置酒中，待温饮之。其子便下。

又方：用锡粉、水银各一钱，枣肉丸，大豆许，水吞下，立出。

又方：朴硝三钱，温童便调下。猫犬牛畜用之皆验。

又方：平胃散五钱，酒水各一盏，煎至一盏。投朴硝五钱，再煎三五沸温服。其胎即化水而出。

《宝庆方》云：凡欲断脐带，先以系物坠下，后可断之。否则胞衣上，即冲心而死。

附　方

四君子汤　四物汤二方见二十四卷第六论

产难生死诀第七

欲产之妇脉离经。

《难经》云：一呼三至曰离经，此是阳加于阴一倍也。一呼一至，亦曰离经，此是阴加阳四倍也。注云：经者常也。胃脉离常络之处，周即言之。一呼脉再至，一吸脉再至，曰脾和之脉。故一呼脉行三寸，一吸脉行三

寸。呼吸定息，脉行六寸。一日一夜，一万三千五百息，脉行八百一十丈，乃于一周。复从始之，经再行。今一呼脉三至，一吸脉三至。呼吸定息，脉行九寸。一日一夜，脉行通计一千二百一十五丈，过于平脉之数。不在所起之经再起，故曰离经。若一呼一至，脉行寸半。一吸一至，脉行寸半。呼吸定息，脉行三寸。一日一夜，通计脉行得四百单五丈，乃谓一周，是不及平脉之数。周而复始，亦不在所起之经再起，亦曰离经也。

沉细而滑也同名。

临产之妇，脉见沉细而滑者，乃肾脏本脉之形。然肾系胞胎，见此脉者，亦与离经之脉同名也。

夜半觉痛应分诞，来日日午定知生。

若妊妇夜半时觉腹痛，定知来日午时当分娩也。《圣惠方》云：夜半子时觉腹痛，来日午时必定生产。谓子午相半正半日观数也。

身重体热寒又频。舌下之脉黑复青。反舌下冷子当死。腹中须遣子归冥。

凡妊妇身有沉重者，胃气绝也。又体热寒栗头并者，正气衰，阴气盛也。若舌卷下，脉青黑色者，及舌反卷上，冰冷不温者，子母俱死之候。

面赤舌青细寻看，母活子死定应难。

凡妊妇面色赤，是荣气流通，母活之候。舌上青色，是妊脉络绝，胎死之候。

唇口俱青沫又出，子母俱死总高判。

若妊妇唇口俱青色者，荣卫气绝也。又口中吐出痰沫者，是脾胃之气俱绝。此是子母俱死之候也。

面青舌青沫出频，母死子活是知真。不信若能看应验，寻之贤哲不虚陈。

凡妊妇面与舌皆青色，又吐痰沫者，是产妇荣卫俱绝，胎气冲上之候。此是子活母死之候，产下子母必死也。此古哲应验之文，不虚妄陈其说也。

新产之脉缓滑吉，实大弦急死来侵。

凡妇人新产之后，其脉来缓滑者，为气血通利调和，是生活安吉之兆也。若见牢大弦急之脉则凶，必死之脉也。

若得沉重小者吉，忽若坚牢命不停。

若产妇诊得沉重微小者，此是形虚相应，故云吉兆之脉。忽然诊得坚硬牢实之脉，是脉盛形衰相反，性命不可停留，必死也。

寸口涩疾不调死。

若产后寸口脉涩疾，大小不调匀者，此是血气衰绝之脉，故云死也。

沉细附骨不绝生。

若重手按之，乃得其脉沉细，附着子骨。不断绝有力者，此生活之兆也。

审看此候分明记，长须念此向心经。

凡为医者，宜随时审取，言分明记于心胸也。

愚按：前论与《脉诀刊误》所云不同。观者审之。

校注妇人良方　卷十八

宋　临川　陈自明良甫编辑
明　古吴　薛　己立斋补注
　　鄞县　曹赤电炳章圈校

产后门产难既明须知产后疾病故以次之

产后将护法第一

妇人产毕，饮热童便一盏，闭目少坐，上床倚高，立膝仰卧，不时唤醒，及以醋涂鼻。或用醋炭及烧漆器，更以手从心擦至脐下，使恶露不滞。如此三日，以防血晕血逆。酒虽行血，亦不可多，恐引血入四肢，目光昏晕。宜频食白粥少许。一月之后，宜食羊肉、猪蹄少许。仍慎言语，七情寒暑，梳头洗足，以百日为度。若气血素弱者，不计日月，否则患手足腰腿酸痛等症，名曰蓐劳，最难治疗。初产时，不可问是男女，恐因言语而泄气，或以爱憎而动气，皆能致病。不可独宿，恐致虚惊。不可刮舌，恐伤心气。不可刷齿，恐致血逆。须血气平复，方可治事。犯时微若秋毫，成病重如山岳。可不戒哉。

产后调理法第二

产后将息如法，脏腑调和，庶无诸疾苦。须先服黑神散、四物汤、四顺理中丸、七宝散。若壮热头痛，此乳脉将行，用玉露散。头目不清，是血晕，用清魂散。粥食不美，是胃气虚，用四顺理中丸。

愚按：丹溪先生云：肉汁发阴经之火，易成内伤之病。当归丸、当归建中汤、四顺理中丸，虽滋补，悉犯桂、附、干姜僭热之剂，脏腑无寒，何处消受。若夫儿之初产，母腹顿宽，便啖鸡子火盐，不思鸡子难化，火盐发热，展转为病。医者不识，妄指他病，率尔用药，宁不误人。余每见产妇之无病者，皆不用黑神散与鸡子火盐诸般肉食，每白粥调理，间以些小石首鱼，干淡食之。至半月以后少食。虽鸡子亦豁开煮之，方能养胃却痰。彼富贵之家，娇姿之妇，率有白带头风，气痛膈满，痰逆口干，经事不调，发脱体热。皆因失子调理所致也。

产后通用方第三

愚按：前方即产后诸症各门，自有方论主治，故不再录。

胞衣不出方论第四

郭稽中曰：胎衣不下者，因气力疲惫，不能努出。或血入衣中，胀大而不能下，以致心胸胀痛喘急，速服夺命丹，血散胀消，其衣自下。牛膝散亦效。

愚按：前症若出而气虚不能入，用补中益气汤。或蓖麻子仁一两，研涂母头顶心，即上。若胎衣不下，用蓖麻子仁，涂右脚心，胎衣下，急洗之，缓则胎衣仍入。益母丸亦效。若胎衣未下，若欲断脐带，须先以少物系坠。然后断之。

附　治　验

一妇人胞衣不出，胸腹胀痛，手不敢近。用滚酒下失笑散一剂，恶露胎衣并下。

一产妇胎衣不出，腹作痛，手按痛稍缓，

此气虚而不能送出也，用无忧散而下。前症常询诸稳婆云：宜服益母草丸，或就以产妇头发，入口作呕，胎衣自出。其胎衣不出者，必死。授与前法甚效。

夺命丹

附子半两，炮　牡丹皮一两　干漆一钱，炒烟尽大黄末，一两

上为末，醋煎大黄成膏，丸桐子大，汤酒吞五七丸。

花蕊石散　治产后败血不尽，血迷血晕，腹中胎衣不下至死。心头暖者，急用一服，化水即出，其效如神。

花蕊石一斤　上色硫黄四两

上和匀。先用纸泥封固，瓦罐一个，入二药。仍封固，阴干。如急用以焙笼内炙干，用炭煅赤，去火。次日取出细研。每服一钱，童便热酒下。

牛膝散　治胎衣不出，腹中胀痛。急服此药，腐化而下。缓则不救。

牛膝　川芎　朴硝　蒲黄各三两　当归一两五钱　桂心五钱

上每服五钱，姜三片，生地黄一钱，水煎。

附　方

补中益气汤方见二十四卷第六论　**失笑散**方见十六卷第五论　**无忧散**方见十六卷第三论　**益母草丸**方见十三卷第九论

又方：用灶下土三四钱，好醋调和，纳脐中。续煎生甘草汤半盏，或以醋汤饮之，即出。

又方：用苎麻子仁研烂，涂足心。下即洗去。

又方：用红花一两，酒煮浓汁服。

又方：用鹿角镑三钱为末，煮葱白汤调服。

又方：取产母鞋底炙热，熨小腹上下二七次。

又方：用浸苎水浓煮。温饮二碗立下。

又方：用皂角棘烧为末，每服一钱，温酒下。

产后血晕方论第五

产后血晕，乃血入肝经，甚至眼花胸闷。用黑神散主之。下血过多，用清魂散补之。或以醋汤细饮，或预烧秤锤，以醋沃之，或酽醋涂口鼻，或烧漆器熏之，使产母鼻吸其气。庶无此患。

愚按：前症若恶露上行，用失笑散。血下过多，芎归汤。若过劳所伤，补中益气汤。气血虚极，用清魂散。大凡产后口眼㖞斜等症，当大补气血为主，而兼以治痰。若脾胃虚弱，用六君子汤。苟于七月之前，服安胎饮。至八九月间，加大腹皮、黄杨头。元气虚弱，八珍汤。临产，用无忧散，则无前患。

附　治　验

一妇八月胎下坠或动，面黄体倦，饮食少思。此脾气虚弱。用补中益气汤倍白术，加苏梗、三十余剂而安。产后眩晕，胸满咳嗽，用四物加茯苓、半夏、桔梗而愈。

一妊妇因产饮酒，恶露甚多，患血晕，口出酒气。此血得酒热而妄行，虚而作晕也。以佛手散加煨甘葛二钱，一剂而痊。酒性慓悍。八月及产后不宜饮，恐致前症。产室人众，气热喧嚷，亦致此症。

夺命丹　治血晕腹痛。没药、血竭末等分，每服二钱．热童便、热酒下。

牡丹皮散　治产后恶露闷绝。

牡丹皮　芒硝　大黄蒸各一两　冬瓜仁三七粒去皮尖

上每五钱，水煎服。

清魂散　治产后气血暴损，虚火妄动，血随火上，以致心神昏乱，口噤眼花，甚至闷绝而苏。

泽兰叶　人参各一钱　荆芥三钱　川芎二钱

上各另为末，和匀，每服一二钱，热汤

调下。

当归芍药汤方见十二卷第十二论

一方：五灵脂末，半生半炒，每服二钱。温酒灌入喉即愈。

一方：荆芥为末，童便调。

一方：神曲末，每服二钱，热水调。

一方：韭菜切入瓶内，注热醋，以瓶口对鼻，气入即醒。

一方：用红花末五钱，酒调服。

一方：半夏为末，丸豆大，入鼻中即宜。亦疗五绝。

一方：赤小豆为末，东流水和服钱许。不瘥，再服。

佛手散　治产后去血，眩晕欲绝。方见十二卷第七论。

又方：松烟墨二钱，烧赤，窖灭为末。温酒调半匕。京墨亦可。或烧漆器，取烟薰之。

附　方

失笑散方见二十卷第五论　**补中益气汤**　**六君子汤**　**四物汤**三方见二十四卷第六论　**安胎饮**方见十二卷第二论　**无忧散**方见十六卷第二论

产后颠狂方论第六

产后颠狂，乃败血上冲，用大圣泽兰散加砂仁末三分，煎酸枣仁汤调下。或朱砂二钱，研细，以乳汁调和，入紫项活地龙一条，滚二三沸去之，入酒。再用重汤煮温，分三服。

愚按：前症乃血虚神不守舍，非补养元气不可。仍参后各门互用。

附　治　验

一产妇患前症，或用大泽兰汤而愈。后又怔忡妄言，其痰甚多，用茯苓散补其心虚顿愈。又用八珍散，加远志、茯神，养其气血而安。

一产妇亦患此，用化痰安神等药，病益甚，神思消烁。余以为心脾血气不足，用大剂参、术、芎、归、茯神、酸枣仁，四斤余而安，乃以归脾汤五十余剂而愈。

附　方

隐居泽兰汤方见二十卷第六论　**茯苓散**方见十九卷第三论　**八珍散**　**归脾汤**二方见二十四卷第四论

产后狂言谵语方论第七

产后狂言谵语，乃心血虚也，用朱砂末酒调下。龙虎丹参丸、琥珀地黄丸亦可。如惊悸歌哭颠狂等症，当参十九等卷治之。

愚按：前症当固胃气为主，而佐以见症之药为善。若一于攻痰，则误矣。

附　治　验

一产妇形体甚倦，时发谵语，用柏子仁散稍愈。又用加味归脾汤而愈。又因怒，仍狂言胁痛，小便下血。用加味逍遥散，以清肝火、养肝血顿瘥。又佐以加味归脾汤而安。

治败血上冲，发热狂走，脉虚大者：

干荷叶　生地黄　牡丹皮等分

上浓煎汤，调生蒲黄二钱。服之即止。

妙香散　治产后语言错乱，用生地、当归煎汤。调服立效。

附　方

小柴胡汤方见二十四卷第二论　**柏子仁散**方见十九卷首论　**加味归脾汤**方见二十卷第四论

产后不语方论第八

产后不语，因心气虚而不能通于舌，则舌强不能言语者，宜服七珍散。余当推其所因而治之可也。

愚按：经云：大肠之脉，散舌下。又云：脾之脉，是动则病舌本强，不能言。又云：肾之别脉，上入于心，系舌本，虚则不能言。窃谓前症，若心肾气虚，用八珍散。肾虚风热，地黄饮。大肠风热，加味逍遥散加防风、白

芷。脾经风热，秦艽升麻汤。肝经风热，柴胡清肝散加防风、白芷。脾气郁结，加味归脾汤加升麻。肝木太过，小柴胡加钩藤钩。脾受肝侮，六君加升麻、白芷、钩藤钩。肝脾血虚，用佛手散。脾气虚，以四君子。气血俱虚，八珍汤。如不应，用独参汤。更不应，急加附子，补其气而生其血。若竟用血药，则误矣。

附　治　验

一产妇不语，用七珍散而愈。后复不语，内热晡热，肢体倦怠，饮食不进，用加味归脾汤为主，佐以七珍散而愈。后因怒，不语口噤，腰背反张，手足发搐，或小便见血，面色或青或黄，或时兼赤。余曰：面青，肝之本色也。黄者，脾气虚也。赤者，心血虚也。用八珍汤加钩藤，佐茯苓、远志渐愈。又用加味归脾汤而痊。

七珍散

人参　石菖蒲　生地黄　川芎各一两　细辛一钱　防风　辰砂别研各半两

上为末，每服一钱，薄荷汤调。

胡氏孤凤散　治产后闭目不语，用生白矾末，每服一钱。热水调下。

治产后不语。

人参　石莲肉不去心　石菖蒲等分

上每服五钱。水煎。

附　方

地黄饮方见三卷第四论　**加味逍遥散**　**加味归脾汤**　**八珍汤**三方见二十四卷第四论　**秦艽升麻汤**方见三卷第一论　**清肝散**方见二十四卷第三论　**小柴胡汤**方见二十四卷第二论　**六君子汤**　**四君子汤**二方见二十四卷第六论　**佛手散**方见十二卷第七论　**独参汤**方见三卷第十三论

校注妇人良方　卷十九

宋　临川　陈自明南良编辑
明　古吴　薛　己立斋补注
鄞县　曹赤电炳章圈校

产后乍见鬼神方论第一

产后如见鬼神，或言语谵妄，皆由血气亏损，阴虚发热，或瘀血停滞，以致心神烦躁而然也。宜以调经散治之。

愚按：前症若败血停滞，用调经散。若血虚发热，用八珍加炮姜。若心血虚损，用柏子仁散。大抵此证，皆心脾血少所致，但调补胃气，则痰清而神自安矣。若果系鬼祟所附，即灸鬼哭穴可愈。其或不起者，多因豁痰降火，攻伐之过也。仍参第三卷产后谵语乍见鬼神方论

附　治　验

一产妇患前症，或用调经散，愈而复作。仍复前散，益甚，痰涎上涌，朝寒暮热。余朝用八珍散，夕用加味归脾汤，各五十余剂而愈。

调经散　治血虚经闭，心神烦躁，浑身疼痛，或时见怪。

没药　琥珀并细研　桂心各一钱　芍药炒　当归各一分　细辛半钱　麝香少许

上为末，每服半钱，姜汁、温酒各少许调，服下即愈。

柏子仁散　治产后元气虚弱，瘀血停滞，狂言乱语。

柏子仁　远志　人参　桑寄生　防风　琥珀另研　当归炒　生地黄焙　甘草炒等分

上用白羊心一个，水三盏，煮清汁七分，入药五钱，煎服。

附　方

八珍汤　加味归脾汤二方见二十四卷第四论

鬼哭穴见六卷第八论

产后心神惊悸方论第二

产后心神惊悸恐惧，或目睛不转，口不能言，乃心气虚而六淫内侵。诊其脉动而弱者惊悸也。动则为惊，弱则为悸矣。

愚按：人之所主者心，心之所主者血。心血一虚，神气不守，此惊悸所由作也。当补血气为主。仍参三卷第十论

附　治　验

一产妇患前症二度，服琥珀地黄丸、局方妙香散，随效。再患服之，其症益甚。而脉浮大，按之如无，发热恶寒。此血气俱虚。余用十全大补加味归脾二汤，各百余剂而愈。后愚惊恐劳怒复作，仍复前药而安。

琥珀地黄丸　治产后恶露未尽，胸腹作痛，或小便不利。

琥珀另研　延胡索糯米同炒赤去米　当归各一两　蒲黄四两炒香　生地黄研取汁留滓　生姜各二斤研取汁、留滓，生姜汁用银石器内炒地黄，滓以地黄汁炒，生姜滓焙干为末

上为末，炼蜜丸如弹子大，每服一丸，当归煎汤化下。

治血虚惊悸少寐，及产后败血停留，少腹作痛等证：

辰砂另研　琥珀　没药并研细　当归为末

等分

上为末，每服二钱。空心日午三次用白汤调下。

产后惊悸乱语，精神不定，用好朱砂为细末。酒调服钱许。

附　方

《局方》妙香散方见三卷第十三论　**茯苓补心汤**方见三卷第十论　**十全大补汤**　**加味归脾汤**二方见二十四卷第四论

产后中风心惊方论第三

产后眼张口噤，肢体强直，腰背反偃，言语错乱如痫者，此气虚风邪所伤而成痉也。

愚按：仲景先生云：有汗为柔痉，用桂枝汤。无汗为刚痉，用麻黄汤。然产后得此，血气俱虚之败症也，不可与伤寒例看。丹溪先生云：产后当大补气血为主，可用十全大补汤以补元气。如不应，急加附子。更不应，是药力弗逮，仍用参附汤多服。余尝治大虚之症，参芪数斤附子数枚方应。

附　治　验

一产妇患此，不省人事，言语妄甚，恶风寒，喜热饮，形气倦怠，脉虚浮无力。余谓血气虚寒，用十全大补汤二十余剂，不应。又二十余剂稍缓。乃渐加附子至一钱，服数剂。诸症灭一二。又二十余剂，十退三四。乃去附子五分，数剂诸症顿退而安。后又发，仍服前药加附子三五分而愈。

茯苓散　治产后心虚忪悸，言语错乱，健忘少睡，或自汗盗汗。

人参　甘草炒　芍药炒黄　当归　生姜各八分　远志去心　茯苓各一钱　桂心六分　麦门冬去心五分　大枣二枚

上水煎服。

抱胆丸　治产后遇惊发狂，或遇经行发狂。

水银二两　黑铅二两五钱　朱砂一两细研　乳香一两，另研

上将黑铅入铫内火熔，下水银，结成砂子。下朱砂乳末，乘热用柳木槌研匀。丸鸡头子大。每服一丸，空心薄荷汤下。得睡忽惊，觉来即安。妙香散亦善。

附　方

妙香散方见三卷第十三论　**十全大补汤**方见二十四卷第四论　**参附汤**方见后第六论

产后中风恍惚方论第四

产后恍惚，因元气俱虚，心经血少。或外邪所侵，以致心神恍惚，怔忡不宁。

愚按：前症当大补血气为主，而佐以后方为善。盖风乃虚极之假象也，固其本源，诸病自退。若专治风，则速其危矣。

附　治　验

一产妇患前症，盗汗自汗，发热晡热，面色黄白，四肢畏冷，此气血俱虚。用八珍汤不应。更用十全大补加味归脾二汤始应。后因劳怒，发厥昏愦，左目牵紧，两唇抽动，小便自遗。余为肝火炽盛，用十全大补加钩藤、山栀而安。再用十全大补汤、辰砂远志丸而愈。

辰砂远志丸　治产后中风惊狂，起卧不安，或痰涎上涌。

石菖蒲　远志去骨同甘草煮　人参　茯神去木　辰砂各二钱　川芎　山药　铁粉　麦门冬去心　细辛　天麻　半夏汤泡　南星　白附子各一两

上为末，姜汁糊丸绿豆大，别以朱砂为衣。每服三十丸。临卧姜汤调下。

附　方

八珍汤　**十全大补汤**　**加味归脾汤**三方见二十四卷第四论

产后虚极生风方论第五

产后生风，因去血过多，气无所主，以

致唇青肉冷汗出，目眩神昏。急服济危上丹。若投以风药，则误甚矣。

愚按：前症若心脾气血俱虚，用十全大补汤。如不应，加附子、钩藤钩。若肝经血虚，用逍遥散加钩藤。经云：脾之荣在唇，心之液为汗。若心脾二脏虚极。急用参附汤救之。

附　治　验

一妇人患前症，或用诸补剂，四肢逆冷。自汗泄泻，肠鸣腹痛。余以阳气虚寒，用六君子、姜、附，各加至五钱，不应。以参、附各一两始应。良久不服，仍肠鸣腹痛。后灸关元穴百余壮，及服十全大补汤方效。

济危上丹

乳香研　五灵脂　硫黄　玄精石同研极细　阿胶　卷柏　桑寄生　陈皮等分

上将上四味入石器内，微火炒，再研入余末，用生地黄汁丸桐子大。每服二十丸，食前温酒或当归酒下。

当归建中汤　治产后腹痛拘急，痛连腰背，自汗少食。

当归　桂心各三两　白芍药六两、炒焦黄　甘草炙，一两

上每服五钱，姜、枣水煎，入饴糖一匙服。如未应，加之。

附　方

香附汤方见本卷后　**十全大补汤**　**逍遥散**二方见二十四卷第四论　**六君子汤**方见二十四卷第六论

独参汤　治一切失血，恶寒发热，作渴烦躁。或口噤痰鸣，自汗盗汗。或气虚脉脱，手足逆冷。盖血生于气，故血脱补气，阳生阴长之理也。方见三卷第十四论

产后虚汗不止方论第六

产后汗不止者，皆由阳气频虚，腠理不密，而津液妄泄也。若遇风则变痉纵，虚乏短气，则身体消瘦，唇口干燥，久则经水断绝，由津液竭故也。

愚按：前症属血气俱虚，急用十全大补汤。如不应，用参附、芪附等汤。若汗多亡阳发痉，尤当用前药。王海藏先生云：头汗出至颈而还，额上偏多，盖额为六阳之所会也，由虚热薰蒸而出。窃谓：前症当以部位分之。额左属肝，额上属肺，鼻属脾，颐属肾，颏属心。治者审之。仍参三卷第六论

附　治　验

一产妇略闻音响，其汗如水而昏愦。诸药到口即呕。余以为脾气虚败，用参、附末为细丸。时含三五粒，随液咽下，乃渐加之到钱许。却服参附汤而痊。

一产妇盗汗不止，遂致废寐，神思疲甚。口干引饮。余谓血虚有热，用当归补血汤以代茶。又以当归六黄汤内黄芩、连、柏炒，更倍加大人参、五味子，二剂而愈。

麻黄根汤　治产后虚汗不止，身热发渴。惊悸不安。

当归　黄芪炒　麻黄根　牡蛎煅为粉　人参　甘草炒、等分

上每服四钱。水煎。

一方：治产后自汗盗汗，胃气虚弱。服别药则呕吐不能入。

当归　黄芪各一两　麻黄根二两

上每服三钱。水煎。

治产后气脱，汗不止，小便短少，四肢难以屈伸：

甘草炙，一两　附子炮，五钱　桂心　芍药炒各两半

上每服三钱，姜、枣水煎服。虚甚更加，以效为度。

止汗散

牡蛎为末，半两　小麦麸八两，炒黄为细末

上每服三五钱，用猪肉汁调。

人参汤　治产后诸虚不足，发热盗汗，内热晡热等症。

人参　当归等分

上为末，以猪腰子一枚切片，水二盅，糯米半合，葱白二根，煮取汁八分，入药三钱，煎服。

附　方

当归六黄汤　治气血虚热，盗汗不止。不应，加人参、白术。心血不足加酸枣仁炒。

当归　熟地黄自制　黄芪炒各二钱　生地黄　黄柏炒黑　黄芩炒黑　黄连炒黑。各一钱

上水煎服。

参附汤　治阳气虚寒，自汗恶寒，或手足逆冷，大便自利，或脐腹疼痛，呃逆不食，或汗多发痉等症。

人参一两　附子炮、五钱

作一服。姜、枣水煎，徐徐服。去人参加黄芪，名芪附汤。

当归补血汤　治肌热躁热，目赤面红，烦渴引饮，昼夜不息，脉洪大而虚，重按全无者。

当归三钱　黄芪炙，一两

上水煎服。

十全大补汤方见二十四卷第六论

芪附汤　治阳气虚脱，恶寒自汗，或口噤痰涌，四肢逆冷，或吐泻腹痛，饮食不入，及一切虚寒等症。

黄芪一两　附子炮，五钱

上作一剂，姜、枣水煎服。如不应，倍加附子，方得全济。

产后冒闷汗出方论第七

产后忽冒闷汗出者，因阴血亏损，阳气郁暴故也。急吞鸡子三枚。未醒饮童便。或时复发，宜服竹沥五合。

愚按：前症属大虚，宜固元气为主。其汗不止，必变柔痉。朱垣先生云：妇人分娩，及半产漏下，昏冒目瞑，盖因血暴亡而火上炽，但补其血则神自昌。若常时血下，当补而升举其气。阳得血而神安，则目明矣。今立一方，以补手足厥阴之血，兼益阳气，名曰全生活血汤。

全生活血汤　治发热自汗盗汗。目眩眩。四肢无力，口干头晕，行步欹侧。

生地黄炒　柴胡　熟地黄　当归各一钱　川芎　藁本各一钱半　防风　羌活　独活　葛根　甘草炒，各一钱　蔓荆子　细辛各五分　升麻　芍药炒，各二钱　红花三分

上每服五钱，水煎热服。

产后汗多变痉方论第八

产后汗多变痉，因气血虚损，肉理不密，风邪所乘。其形口噤，背强如痫，或摇头马嘶，不时举发，气息如绝。宜速灌小续命汤。若汗出如雨，手拭不及者，不治。

愚按：前症因去血过多，元气亏极，或外邪相搏，以致牙关紧急，四肢痉强。或阴火内动，或腰背反张，肢体抽搐。若有汗而不恶寒者，曰柔痉。若无汗而恶寒者，曰刚痉。出血过多，筋无所养，故伤寒汗下过多，溃疡脓血大泄多患之，乃败症也。急以十全大补汤治之。如不应，急加附子，多有复苏者。亦有六淫七情所致者。治法见第三卷第三论。

附　治　验

一产妇牙关紧急，腰背反张，四肢抽搐，两目连劄，此去血过多，元气亏损，阴火炽盛。用十全大补加炮姜，一剂而苏，数剂而安。

余在吴江史万湖第时，将入更，闻喧嚷。询云家人妇产后出直厨，忽仆而死。余意其劳伤血气而发痉也，急用十全大补加附子煎滚。令人正其面，开其口灌之，久不能下。令侧其面而出之，换以热药。如此五次，方得下咽，遂苏。

小续命汤　治刚痉，或脚气痹弱，不能转舒，行步欹侧，或口眼㖞斜，牙关紧急，角弓反张。

麻黄　桂心　甘草各半两　防风三两　芍药炒　白术炒　人参　川芎　附子炮　防己酒拌　黄芩炒各等分

上每服五钱，水煎，入姜汁少许温服。若自汗为柔痉，去麻黄。有热去附子，减桂一半。盛冬初春，去黄芩。

十全大补汤方见二十四卷第四论

产后口噤腰背反张方论第九

产后口噤，由血气虚而风邪乘于手三阳经也。盖手三阳之筋，循结于颔。得风冷则筋急，故致口噤。腰背挛急，角弓反张者，是风邪入于诸阳之经也。

愚按：前症因血气耗损，腠理不密，汗出过多而患之者，乃虚象也。宜固气血为主，佐以本方。丹溪云：产后当大补气血为先，虽有他症，以末治之。如恶寒发热等症，乃气血虚甚之极也。宜大剂参、芪、归、术、肉桂以培养之。如不应，急用炮附子。再不应用人参一两，炮附子二三钱，名参附汤。仍犹未应，乃药力未能及也，宜多用之。

愈风散　治前症用荆芥略焙为末，每服三钱，豆淋酒下，童便亦可。其效如神。牙紧，灌口鼻。

清顺散　又名交解散。方见第二卷第五论

治妇人产后不省人事，吐涎瘈疭：

当归　荆芥穗等分

上每服三钱，水一盏，酒少许煎，灌下咽即苏。

愚按：前症如有未应者急用大补气血为主。

产后中风，白鲜皮一两，或共独活三两，酒水煎服。

张仲文用白术四两，以酒煎顿服。

小续命汤　治产后口噤，角弓反张。见前

产后中风方论第十

产后中风，或血气未复，风寒所感，以致筋挛拘急，口眼㖞斜，或肢体缓弱，入脏则恍惚惊悸。郭稽中云：产后强力下床，或误入房，或忧怒内伤脏腑。陈无择曰：当以脉辨而治之。若努力下床，月内人房，忧怒着艾，非中风类，乃薛劳火邪之症也。

愚按：前症果外邪所属，形气不足，病气有余，当补元气为主，稍佐以治病之药。若强力下床，月内入房，属形气病气俱不足，当纯补元气，多有复苏者。若误投风药，乃促其危也。仍参照第三卷诸论主之。

治产后身背拘急，妄言发热，四肢拘挛，不时惊悸：

川芎　羌活　羚羊角屑　酸枣仁炒　芍药炒黄、各四两　桑白皮六分　防风五分

上水煎，分三服。

治产后中风，唇青鼻黑，用小续命汤，连进三服即愈。

产后中风烦渴，用红花子五合炒研。水煎，徐呷之。

独活寄生汤　治前症亦良。仍与第三卷中风类通看。方见后

产后四肢筋挛方论第十一

产后中风，筋脉挛急，乃血气俱虚。或风邪客于皮肤，则顽痹羸乏。若入于筋脉，则四肢挛急。皆由大经空虚，风寒乘虚而渐入也。

愚按：肝属木而主筋。前症若肝经风热血燥，用加味逍遥散。如不应，当用六味地黄丸以补肾水。经云：风客淫气精乃亡。邪伤肝也。仍参第三卷诸论主之。

附　治　验

一产妇筋挛臂软，肌肉掣动，此气血俱虚而自热也，用十全大补汤而安。

一产妇手麻。服愈风丹遍身皆麻，神思倦怠。余谓气血虚弱，用十全大补汤加炮姜，数剂渐愈。去姜又数剂，及逍遥散而痊。

治产后气血不足，风邪所袭，肢节挛痛，背项强直：

防风一两　赤芍药炒　桂心各半两　羚羊角　川芎　羌活　当归　酸枣仁炒　牛蒡子炒各三钱

上每服四钱，水酒煎。

愚按：前方如未应，当用八珍汤。更不应，用十全大补汤。

加味逍遥散　**十全大补汤**二方见二十四卷第四论　**六味地黄丸**方见三十四卷第十一论

产后瘛疭方论第十二新附

窃谓：瘛者，筋脉拘急也。疭者，筋脉张纵也。经云：肝主筋而藏血。盖肝气为阳为火，肝血为阴为水。前症因产后阴血去多。阳火炽盛，筋无所养而然耳。故痈疽脓水过多，金疮出血过甚，则阳随阴散，亦多致此。治法当用八珍散加丹皮、钩藤，以生阴血，则阳火自退，诸症自愈。如不应，当用四君、芎、归、丹皮、钩藤以补脾土。盖血生于至阴，至阴者。脾土也。故小儿吐泻之后，脾胃亏损，亦多患之，乃虚象也。无风可逐，无痰可消。若属阳气脱陷者用补中益气加姜、桂，阳气虚败者用十全大补加桂、附，亦有复生者。此等症候，若肢体恶寒，脉微细者，此为真状。若脉浮大，发热烦渴，此为假象。惟当固本为善。若无力抽搐，戴眼反折，汗出如珠流者，皆不治。

附　治　验

一产妇因劳两臂不能屈，服苏合香丸，肢体痿软，汗出如水。余谓前药辛香，耗散真气，腠理虚而津液妄泄也。先用十全大补汤加五味子，补实腠理，收敛真气，汗顿止。又佐以四君子，调补元气渐愈。用逍遥散、大补汤调理而痊。

一产妇先胸胁乳内胀痛，后因怒口噤吐痰，臂不能伸，小便自遗，左三部脉弦。余谓此肝经血虚，而风火所致，不能养筋。先用加味逍遥散治之，臂能屈伸。又以补肝散、六味丸，诸症悉愈。

一妇人发瘛遗尿，自汗面赤，或时面青，饮食如故，肝脉弦紧。余曰：此肝经血热风热，名瘛也。肝主小便，其色青，入心则赤。法当滋阴血，清肝火。遂用加味逍遥散，不数剂而诸症悉安。

附　方

海藏愈风汤　一名举乡古拜散，治一切失血，筋脉紧急，产后盗汗产后搐搦。

荆芥为末

上先以炒大豆黄卷，以酒沃之，去黄卷取清汁，调前末三五钱，和滓饮之。轻者一服，重者二三服，中病即止，其效如神。气虚者忌服。一方用童便调下。《本事方》云：此药委有奇效神灵之功。大抵产室无风为佳，不可衣被帐褥太暖。太暖即汗出，汗出则腠理开，易于中风，便昏冒。一妇人产后遮太密，更生旺火，睡久及醒，则昏昏如醉，不省人事。用此药佐以交加散，服之即睡，睡中必以左手搔头，觉必醒矣。良久果验。

交加散　治瘛疭或颤振，不省人事，口吐痰涎。

当归　荆芥穗等分

上为细末，每服二钱，水一盏，酒少许，煎至七分。灌下神效。

增补柴胡汤　治产后或经适断，致手足牵搐，咬牙昏冒异症。

柴胡八钱　黄芩炒，四钱　人参　半夏各一钱　石膏四钱　知母二钱　黄芪炒，五钱　甘草炙二钱

上为粗末，每服半两，姜五片，枣四枚，水煎温服。

四君子汤　**补中益气汤**二方见二十四卷第六论

产后脚气方论第十三

论曰：产后脚气，因元气内虚，六淫外侵所致。其状发热昏闷，搐掣惊悸，心烦呕吐气上。用小续命汤治之。若以为败血攻之

则误矣。

愚按：前症当补气血为主，佐以小续命汤、寄生汤。如不应，用大防风。仍参第四卷九论主之。以上十一症，诚似小儿慢惊风，无风可逐，无痰可清。但专补元气，庶保其生。

附　治　验

一产妇患前症，或用独活寄生汤而痊。后复作，服之其汗如水，更加口噤吐痰。余用十全大补汤，培养血气，渐愈。后饮食日少，肌体日瘦，吐痰如涌。此命门火衰，脾土虚寒。用八味丸及加味归脾汤，诸症渐退，肌肉渐生。

独活寄生汤　治风邪内攻，两胫肿痛，或缓纵挛痹等症。方见四卷第七论

小续命汤方见前　**大防风汤**方见二十四卷第九论　**十全大补汤**　**加味归脾汤**二方见二十四卷第四论　**八味丸**方见十五卷第十一论

校注妇人良方　卷二十

宋　临川　陈自明良甫编辑
明　古吴　薛　己立斋补注
　　鄞县　曹赤电炳章圈校

产后遍身疼痛方论第一

产后遍身疼痛者，由气虚百节开张，血流骨节，以致肢体沉重不利，筋脉引急，发热头痛。宜用趁痛散治之。陈无择云：若兼感寒伤食宜用五积散。若误作伤寒发汗，则筋脉抽搐，手足厥冷，则变为痉。当大补气血为主。

愚按：前症若以手按而痛益甚，是血瘀滞也，用四物、炮姜、红花、桃仁、泽兰补而散之。若按而痛稍缓，此是血虚也，用四物、炮姜、人参、白术补而养之。

附　治　验

一产妇身腹作痛，发热不食，烦躁不寐，盗汗胁痛。服解散祛血之药，不时昏愦，六脉洪大如无。用补中益气加炮姜、半夏，一剂顿退二三，四剂寝食甘美。但背强而痛，用八珍散、大补汤，调理而安。

一产妇遍身头项作痛，恶寒拘急，脉浮紧。此风寒之症也。用五积散一剂，汗出而愈。但倦怠发热，此邪气去而真气虚也，用八珍汤调补而痊。

趁痛散　治产后骨节疼痛，发热头重，四肢不举。

牛膝酒炒　甘草炒　薤白各一两　当归　桂心　白术炒　黄芪炒　独活　生姜各半两

上每服半两，水煎。

五积散方见四卷第九论

附　方

四物汤　补中益气汤二方见二十四卷第六论

八珍汤　十全大补汤二方见二十四卷第四论

产后腰痛方论第二

肾主腰脚，产后腰痛者，盖肾为胎胞所系。此因产劳伤肾气，以致风冷客之。若连背脊，痛久未已，后遇有娠，必至损动。

愚按：前症真气虚邪乘之者，用当归黄芪汤或十全大补为主，佐以寄生汤。如不应，须十全大补加附子。

附　治　验

一产妇腰痛腹胀善噫，诸药皆呕。余以为脾虚血弱，用白术一味炒黄，每剂一两，米泔煎，时饮匙许。四剂后渐安。服百余剂而愈。

治产后风邪头眩，腰痛不可转侧，四肢沉重，行步艰难：

独活　川芎　芍叶炒黄　桂心　续断　桑寄生　生姜各六分　当归　防风各八分

上水煎服。

如神汤　即生料五积散加桃仁。逐败血去风湿，产后恶露不尽，腰重痛，或两股痛如锥刺，宜服桃仁汤。若作痈，用五香连翘汤。

桃仁汤　治产后恶露不尽，腹中作痛，或流注腿股作痛，急用此汤治之。如未应，多变作痈，须用五香连翘汤。

桃仁去皮尖　生地黄　苏木各半两　虻虫去足翅炒　水蛭炒各三十个

上每服五钱，姜水煎，空心热服，以恶露下为度。

五香连翘汤

木香　丁香　沉香　乳香　麝香　升麻　独活　桑寄生　连翘　木通各二两

上每服五钱，水煎，入竹沥少许服。

当归黄芪汤　治腰痛不可转侧，或汗出壮热气短。

黄芪炒　芍药炒各二两　当归三两

每服四钱，水煎。

附　方

十全大补汤　治症同前。又治自汗盗汗；或内热晡热。潮热发热；或口干作渴。喉痛舌裂；或胸乳膨胀。胁肋作痛；或脐腹阴冷。二便不调；或头颈时痛。眩晕目花；或心神不宁。恍惚不寐；或形容不充。肢体作痛；或鼻吸气冷。急趋气促；或因饮食劳役；起居失宜；或更有一切虚热之症。但服此药，补其根本，诸症悉退。方见二十四卷第四论

独活寄生汤方见四卷第七论

产后恶露不绝方论第三

产后恶露不绝，因伤经血，或内有冷气，而脏腑不调故也。

愚按：前症若肝气热而不能主血，用六味地黄丸。若肝气虚而不能藏血，用逍遥散。若脾气虚而不能摄血，用六君子汤。胃气下陷而不能统血，用补中益气汤。若脾经郁热而血不归源，用加味归脾汤。若肝经怒火而血妄行，用加味四物汤。若气血俱虚，用十全大补汤。若肝经风邪而血沸腾，用一味防风丸。

附　治　验

一产妇恶露淋沥，体倦面黄，食少恶寒，昼夜不寐，惊悸汗出。此脾经虚热。用加味归脾汤而痊。后因怒胁胀，作呕少食。用六君加柴胡治之而痊。

一方：用蒲黄二两，水煎顿服。

一方：贯众醋蘸炙干为末，每服二钱，米饮调下。

返魂丹一名益母草丸　治产后恶露不绝，及胎前产后诸症。益母草四五月采取阴干用叶及子。子名茺蔚子。不许犯器铁　为末，炼蜜丸弹子大，每服一丸，细嚼，米饮下。临产腹痛，或胎动不安，或漏血，当归汤化下。死胎，或胎衣不出，或牙关紧急，或血晕血热烦闷，如见鬼神，并童子小便，入酒少许化下。恶露腹痛，或淋沥，或月水不调，当归酒化下。

附　方

六味丸方见二十四卷第十一论　**加味逍遥散**　**加味归脾汤**　**十全大补汤**　三方见二十四卷第四论　**补中益气汤**　**六君子汤**　**加味四物汤**　三方见二十四卷第六论　**一味防风丸**方见十二卷第六论

产后恶露不下方论第四

产后恶露不下，因脏腑劳伤，气血虚损，或风冷相搏所致。

愚按：前症若恶露不下，用失笑散。若气滞血凝，用花蕊石散。若因去血过多而烦热不止，宜参第七论主治。

附　治　验方药

一产妇患前症，服峻厉之剂，恶露随下。久而昏愦，以手护其腹。余曰：此脾气复伤作痛，故用手护也。以人参理中汤加肉桂二剂，补之而愈。

失笑散方见后　**人参理中汤**方见后　**花蕊石散**方见十八卷第四论　**返魂丹**方见前

产后恶露上攻心痛方论第五

产后心痛，为阴血亏损，随火上冲心络，名曰心胞络痛，宜大岩蜜汤治之。若寒伤心

经，名曰真心痛，朝发夕死，夕发朝死，无药可救。

愚按：前症若阳气虚寒，用岩蜜汤温之。瘀血上冲，用失笑散散之。血既散而痛仍作，用八珍汤补之。大凡肚腹作痛，以手按之，却不痛，此血虚也，须用补养之剂。

附　治　验

一产妇患前症，昏愦口噤，冷汗不止，手足厥逆。用六君子加附子一钱，以回其阳。二剂顿苏。又以十全大补汤。养其血气而安。

一产妇患前症，手不敢近腹。用失笑散一服，下瘀血而愈。次日复痛，亦用前药而安。

一产妇患前症，用大黄等药，其血虽下。复患头痛，发热恶寒。次日昏愦，自以两手坚护其腹，不得诊脉。视其面色青白，余为脾气虚寒而痛也。用六君子汤加姜、桂而痛止。又用八珍汤加姜、桂调理而安。

大岩蜜汤　治产后阳气虚寒，心腹作痛，不食呕吐，四肢厥逆。

生地黄　当归　独活　吴茱萸　芍药炒　干姜炒　甘草炒　桂心　小草各一两　细辛半两

上每服半两，水煎。

失笑散　治产后恶血上攻，心腹作痛，或牙关紧急，一服可愈。

五灵脂　蒲黄各一钱

用醋水煎。一味五灵脂尤妙。

六君子汤方见二十四卷第六论　**十全大补汤**　**八珍汤**二方见二十四卷第四论

产后恶露腹痛方论第六

产后腹痛，或因外感五邪，内伤六淫；或瘀血壅滞所致。当审其因而治之。

愚按：前症若瘀血内停，用失笑散；风寒外感，用五积散。

附　治　验

一妇产后小腹痛甚，牙关紧急，此瘀血内停。灌以失笑散，下血而苏。又用四物加炮姜、白术、陈皮而愈。

一妇人经水来比常度过多不止，遂服涩药止之，致腹作痛，此乃气血凝滞也。用失笑散二服而愈。

隐居泽兰汤　治产后恶露腹痛，或胸满少气。

泽兰　生地黄　当归　芍药炒　生姜各一钱　甘草炒五分　大枣四个

用水煎服。

四物汤方见二十四卷第六论　**五积散**方见第四卷第九论　**失笑散**方见前

产后儿枕腹痛方论第七

产后儿枕者，乃母胎中宿血也。或因风冷凝滞于小腹而作痛。

愚按：前症若宿血作痛，失笑散行之。既散而仍痛，四神散调之。若恶心作呕，此属气虚，用六君子健其胃气。若发热头痛，或腹痛按而不痛，此属血虚，用四物、炮姜、参、术补其脾气。

附　治　验

一产妇患前症，或用驱逐之剂，昏愦口噤，手足发搐。此血气虚极之变症也，用八珍汤加炮姜二钱，四剂未应。又以十全大补汤加炮姜一钱，二剂而苏。

一方：用山楂浓煎汁，入砂糖少许，再煎热服。

失笑散方见前　**四神散**方见第四卷第四论　**六君子汤**　**四物汤**二方见二十四卷第六论　**八珍汤**　**十全大补汤**二方见二十四卷第四论

产后小腹痛方论第八

产后小腹作痛，由恶露凝结，或外寒相搏。若久而不散，必成血瘕而月水不调。

愚按：前症若因气滞，用延胡索散。若因外寒，用五积散。若因怒气，用四物加木香、柴胡。若因血虚，用四物、参、术、炮

姜。若因阳气虚弱用四君、当归、炮姜。若因脾虚血弱用六君、当归、炮姜治之。

附　治　验

一产妇患前症，或作呕，或昏愦。此脾气虚寒。用人参理中汤渐愈。又以补中益气汤加茯苓、半夏全愈。后复作痛而兼喘，仍用补中益气汤培补脾肺而瘥。

延胡索散　治产后恶血凝滞，脐下作痛，或作寒热。

延胡索　桂心各半两　当归一两

上为末，每服二钱，食前用热酒调下。失笑散尤效。

当归养血丸　治产后瘀血心腹胀痛，或腰脚疼痛。

当归　赤芍药　牡丹皮　延胡索炒各二两　桂心一两

上为末，炼蜜丸桐子大，每服三四十丸，温酒下。

附　方

人参理中汤　治阳气虚弱，小腹作痛，或脾胃虚弱，饮食少思，或去后无度，或呕吐腹痛，或饮食难化，胸膈不利。加附子名附子理中汤

人参　白术　干姜炮　甘草炙，各等分

上每服五七钱，或一两。水煎服。

五积散方见四卷第九论　**四物汤**　**四君子汤**　**补中益气汤**三方见二十四卷第六论

产后寒疝腹痛方论第九

产后脐腹作痛，乃冷气乘虚也，用当归建中汤治之。陈无择云：若产当寒月，人门脐下胀痛，手不可近者。用羊肉汤治之。

愚按：前症若脾胃虚弱，寒邪所侵，用蟠葱散。若肝经湿热，小便不利，用龙胆泻肝汤。仍参前论，恐有瘀血为患。

附　治　验

一产妇小腹作痛，小便不利，内热睡热，形体倦怠。余用加味逍遥散，以清肝火，生肝血；用补中益气汤，补脾胃，升阳气而痊。

羊肉汤　治产妇脾虚寒邪所乘，以致腹痛，或头眩胁脐急痛。

精羊肉四两　当归　川芎各半两　生姜一两

上以水十盏，煎至四盏，分四次空心服。

蟠葱散　**龙胆泻肝汤**二方见二十四卷第八论

加味逍遥散　**补中益气汤**二方见二十四卷第四论

产后两胁胀痛方论第十

产后两胁胀痛，因恶露不尽，或肝经血虚，或肝经气滞，当分而治之。

愚按：前症若肝经血瘀，用玄胡索散。若肝经气滞，用四君、青皮、柴胡。若肝经血虚，用四物、参、术、柴胡。气血俱虚，用八珍、柴胡。若肾水不足，不能生肝，用六味丸。若肺金势盛，克制肝木，用泻白散。仍参照前各论主之。

附　治　验

一产妇因怒，两胁胀痛，吐血甚多，发热恶寒，胸腹胀痛。余以为气血俱虚，用八珍加柴胡、丹皮、炮姜而血顿止。又用十全大补汤而寒热渐退。此症苟非用姜、桂辛温助脾肺以行药势，不惟无以施其功，而反助其胀耳。

经效方　治产后肝经气滞不平，胁肋腹痛，或寒热往来，内热睡热。

当归一钱五分　芍药炒　苦楝炒　槟榔　枳壳麸炒，各八分　桂心　青木香　柴胡各六分

上水煎服。

当归散　治产后阴血虚弱，或气滞血凝，以致发热腹痛，或腹胁胀满。以当归、干姜等分，每服三钱，水煎。

抵圣汤　治血滞腹痛，或腹闷满，呕吐不食。方见后卷第八论

四君子汤　**四物汤**二方见二十四卷第六论

八珍汤方见二十四卷第四论　**六味丸**方见二十四卷第十一论　**泻白散**方见五卷第一论　**玄胡索散**方见前

产后积聚癥块方论第十一

夫积者，阴气也，五脏所生。聚者，阳气也，六腑所成。然积为阴，阴性沉伏，故痛不离其部。聚为阳，阳性浮动，故痛无常处。皆由饮食不节，起居失宜，产后血气虚弱，风冷所乘，搏于脏腑耳。

愚按：前症乃真气亏损，邪气乘之。况产后得之，尤当固元气为主。若求旦夕之效，而攻其邪，则速其危矣。当参前六七论，及七卷痃癖诸论治之。

附治验方药

一产妇腹中似有一鳖，或时作痛而转动，按之不痛，面色痿黄，痛则皎白，脉浮而涩。余谓此肝气虚而血弱也。不信。乃行破血行气，痛益甚，转动无常。又认以为血鳖，专用破血祛逐之药，痛攻两胁，肚腹尤甚，益信为鳖确。服下虫等药，去血甚多，形气愈虚，肢节间各结小核，隐于肉里。以为鳖子畏药，而走于外。余云：肝藏血而养诸筋，此因肝血复损，筋涸而挛结耳。盖肢节胸项，皆属肝胆部分，养其脾土，补金水，以滋肝血，则筋自舒。遂用八珍汤、逍遥散、归脾汤加减调治而愈。

一妇月经不调，两拘肿胀，小便涩滞，腹中一块作痛，或上攻胁腹，或下攻小腹，发热晡热，恶寒，肌肤消瘦，饮食无味，殊类瘵症，久而不愈。余谓肝脾血气亏损，用八珍汤、逍遥散、归脾汤，随症互服而愈。

逍遥散　八珍汤　归脾汤三方见二十四卷第四论

产后血瘕方论第十二

产后瘀血，与气相搏，名曰瘕，谓其痛而无定处。此因夙有风冷而成，轻则否涩，重则不通。

愚按：前症乃寒邪乘客，气血壅结。此因气病而血病也。常补养胃气，调和月经，宽缓静养为善。难经云：任脉之病，男子为七疝，女子为瘕聚。当参前后各论治之。

治血瘕作痛，脐下胀满，或月经不行，发热体倦：

当归八分　桂心　芍药炒　血竭　蒲黄炒各六分　延胡索炒四分

上为末，每服二钱，空心酒调下。

葛氏方　治症同前，用桂心为末，每服一钱，空心酒调下。

产后瘀血奔心烦闷方论第十三

产后瘀血奔心，盖因分娩后，不饮童便，以致虚火上炎所致。宜用后方主之。

愚按：前症当与前第五论同治。

金黄散　治恶血上冲，肚腹作痛，或发热作渴。

延胡索　蒲黄各一钱　桂心二分

上为末，酒调服。

一方：用炒蒲黄，每服三钱，水煎服。失笑散亦佳。

产后虚烦发热方论第十四原无论

窃谓：前症乃阳随阴散，气血俱虚。若恶寒发热，烦躁作渴，急用十全大补汤。若热愈甚，急加桂、附。若作渴面赤，宜用当归补血汤。若误认为火症，投以凉剂，祸在反掌。王太仆先生云：如太寒而甚，热之不热，是无火也。热来复去，昼见夜伏，夜发昼止不时而热，是无火也，当治其心。如大热而甚，寒之不寒，是无水也。热动复止，攸忽往来，时动时止，是无水也，当助其肾。故心盛则生热，肾盛则生寒；肾虚则寒动于中。心虚则热收于内。又热不胜寒，是无火也；寒不胜热，是无水也。治法前症无水者，六味丸；无火者，八味丸；气血俱虚者，八珍汤与十全大补汤。

附　治　验

大尹俞君之内，产后发热晡热，吐血便血，兼盗汗，小便频数，胸胁胀痛，肚腹痞闷。余曰：此诸脏虚损也，症当固本为善。自恃知医用降火之剂，更加泻利，肠鸣呕吐，不食腹痛，足冷，始信余言。诊其脉，或浮洪，或沉细，或如无。其面或青黄或赤白。此虚寒假热之状。时虽仲夏，当舍时从症。先用六君子加炮姜、肉桂，数剂胃气渐复，诸症渐退。更佐以十全大补汤，半载全愈。

儒者杨敬之内人，所患同前，但唾痰涎。或用温补化痰之剂，不应，面色黧黑，两尺浮大，按之微细。此因命门火虚，不能生脾土，脾土不能生诸脏而为患也。用八味丸补土之母而痊。

人参当归汤　治产后虚烦，短气烦闷。

人参　当归　麦门冬　桂心　生地黄各二钱　大枣四枚　粳米一合　淡竹叶二钱　芍药炒黄，一钱

上水煎服。

蒲黄散　治症同上。方见前儿枕病。

四物汤，加茯神、远志。治产后虚烦。十全大补汤丸效。

六味丸　八味丸二方见二十四卷第十一论　**八珍汤　十全大补汤**二方见二十四卷第四论　**六君子汤**方见二十四卷第六论

校注妇人良方　卷二十一

宋　临川　陈自明良甫编辑
明　古吴　薛　己立斋补注
　　鄞县　曹赤电炯章圈校

产后口干痞闷方论第一

论曰：产后口干痞闷，因食米面干饭太早，脾胃不能消化，热郁所致。慎不可下，但服见睍丸则愈。无择云：若内积忧烦，外伤燥热，宜四物汤去地黄，加人参、乌梅可愈。

愚按：前症若宿食停滞，用六君、枳实、神曲。若因肉食所致，更加山楂。若因鱼鲊之类，再加陈皮。其物既消而仍痞，或反作痛作呕，此脾胃受伤，用六君子汤。或咽酸嗳腐，加炮姜；作泻，更加升麻；如不应，佐以四神丸，或间用补中益气汤。

附　治　验

一妇人食角黍烦渴，痞闷腹痛，大便欲去不去。服消导等药，不应，饮食日减，肌体日瘦，半年矣。余谓此食积为患，用大酒曲炒为末，温酒调服二钱。俄间腹鸣，良久仍下粽而愈。

一妇人食鱼鲊腹痛患痢，诸药不应。用陈皮、白术等分为末，以陈皮汤送下，数服而愈。

见睍丸

姜黄炒　三棱醋炒　莪澄茄　陈皮　良姜　人参　莪茂酒炒各等分

上为末，用萝卜汁糊丸桐子大，每服三十丸，白汤下。

产后心烦发渴，宜清心莲子饮。方见六卷首论

附　方

六君子汤　补中益气汤二方见二十卷第六论

四神丸方见八卷第八论

产后血渴方论第二

窃谓：前症若出血过多，虚火上炎，用童子小便，或四物、白术、麦门、丹皮。若胃气虚而有热，用竹叶归芪汤。若血虚发热用八珍加麦门、五味。若血脱发热烦躁，用当归补血汤。若胃气虚弱，用补中益气汤，或七味白术散。

附　治　验

一产妇患前症，朝寒暮热，肚腹作痛，以手按之不痛。余以为血气俱虚，用八珍之类治之。彼反行逐血，更加发热烦躁。余用当归补血汤，热躁渐止；用八珍、麦门、五味，气血渐复。

附　方

七味白术散　治中气虚弱，津液短少，口干作渴，或因吐泻所致。

人参　白术炒　木香　白茯苓　甘草炒　藿香　干葛各一钱

上水煎服。

竹叶归芪汤　治胃气虚热，口干作渴，恶冷饮食者。

竹叶一钱五分　当归一钱　黄芪二钱　白术　人参各一钱　甘草炒五分　麦门冬去心七分

上水煎服。

四物汤　**补中益气汤**二方见二十四卷第六论　**八珍汤**方见二十四卷第四论　**当归补血汤**方见二十四卷第十一论

产后乍寒乍热方论第三

产后乍寒乍热，由血气虚损，阴阳不和。若阴胜则乍寒，阳胜则乍热。宜用增损四物汤。若因败血不散，腹内作痛，宜用夺命丹，后用增损四物汤，随病加减。无择云：败血流闭诸阴则寒，流闭诸阳则热，用大调经散、五积散。

愚按：前症若因阳气不足，阴气上入于阳中而恶寒者，用补中益气汤。若因阴气不足，阳气下陷于阴中而发热者，用六味地黄丸。若气血不足而恶寒发热者，用八珍汤。若病后寒热倦怠者，用补中益气汤。若肌热大渴，目赤面红者，用当归补血汤。

附　治　验

一产妇恶寒发热。余以为血气虚寒，用十全大补加炮姜而寒热愈，用补中益气而肢体安。又食后犯怒，恶寒发热，抽搐咬牙，面色青中隐黄，此肝木侮脾土，饮食停滞。用六君子加木香，一剂而安。

一产妇恶寒发热，余以为气血俱虚，不信。反用小柴胡汤，致汗出谵语，烦热作渴，肢体抽搐。余用十全大补二剂，益甚，脉洪大，重按如无，此药力不能及。乃加附子四剂稍缓，数剂而安。

增损四物汤

人参　当归　芍药炒　川芎　干姜炒各一两　甘草四钱

上每服四钱，水姜煎。

大调经散　治产后恶露未消，寒热自汗，或肚腹作痛。

大豆一两炒去皮　茯神一两　真琥珀一钱

上为末，每服二钱，空心浓煎，乌豆紫苏汤调下。

附　方

六君子汤　**补中益气汤**二方见二十四卷第六论　**当归补血汤**方见二十四卷第十一论　**八珍汤**　**十全大补汤**二方见二十四卷第四论　**六味地黄丸**方见二十四卷第十一论

产后疟疾方论第四

郭稽中云：产后乍寒乍热者，多是败血为害，或阴阳不和。若概作疟疾治之误矣。陈无择曰：产后寒热，或一二日，或二三日一发，或先寒后热，或先热后寒，或寒多热少。或热多寒少，或纯寒纯热者，皆是疟疾。最难治疗。可用草果饮、主熟饮、四兽饮，选用之。

愚按：前症当与第十四卷第九论参看用药，以补胃气为主，佐以草果饮之类。若胃气稍充，以草果饮为主，佐以补胃之剂。大抵产后疟疾，因脾胃虚弱，饮食停滞，或外邪所感，或郁怒伤脾，或暑邪所伏。审系饮食，用六君加桔梗、苍术、藿香。如外邪多而饮食少，用藿香正气散。如外邪少饮食多，用人参养胃汤。劳役所伤，用补中益气汤。气血虚弱，用十全大补加炮姜。中气虚寒，用六君加姜、桂。元气脱陷，急加附子。盖气虚则寒，血虚则热，胃虚则恶寒，胃气下陷，则寒热交作。或吐泻不食，腹痛烦渴，发热谵语。或手足逆冷，寒战如栗。虽见百症，但温补脾胃，其病自退。若误用清脾饮之类非宜。

附　治　验

一产妇患疟，发热作渴，胸膈胀满，遍身作痛，三日不食，咽酸嗳气。此是饮食所伤，脾胃不能消化。用六君加神曲、山查，四剂而不作酸。乃去神曲、山查，又数剂而饮食进。其大便不通，至三十五日。计进饮食七十余碗，腹始闷。令用猪胆汁导而通之，其粪自不甚燥。

一产妇患症久不愈，百病蜂起，其脉或洪大，或微细，或弦紧，或沉伏，难以名状。用六君加炮姜，二十余剂，脉症稍得。又用参、术煎膏，佐以归脾汤，百余剂而瘥。

一产妇朝寒暮热，或不时寒热，久不愈。用六君子、补中益气，兼服百余剂而寻愈。产后疟疾心腹痛。见小产。

产后蓐劳方论第五阙文

愚按：蓐劳姜产后虚弱，元气不复所致。故寒热食少，头目四肢腹痛。若脾虚而不能生血者，用六君子汤加当归。若脾肺气虚而咳嗽口干，用补中益气，加麦门、五味。若因中气虚而口干头晕，用补中益气，加蔓荆子。若肝经血虚而肢体作痛，用四物、参、术。若因肝肾虚弱，而自汗盗汗寒热往来者，用六味丸加五味子。若因脾虚血弱，肚腹作痛，月经不调，用八珍汤，倍加白术。若因脾虚血燥，皮肤瘙痒，用加味逍遥散。大抵此症，多因脾胃虚弱，饮食减少，以致诸经疲惫而作。当补脾胃，饮食一进，精气生化，诸脏有所倚赖，其病自愈矣。仍照虚烦发热方论主治。

增损柴胡汤　治产后虚弱，寒热如疟，食少腹胀。

柴胡　人参　甘草炒　半夏炒　陈皮　川芎　白芍药炒，各等分

上每服五钱，水姜、枣煎，日二服。

白茯苓散　治产后蓐劳，头目四肢疼痛，寒热如疟。

白茯苓一两　当归　川芎　桂心　白芍药炒　黄芪炒　人参各半两　熟地黄半两自制

上先以水三盏，入猪肾一双，姜、枣各三事，煎二盏去之，入前药半两，煎一盏服。

猪腰子粥　治产后蓐劳发热，用猪腰子一枚，去膜切片，用盐酒拌。先用粳米一合。入葱椒煮粥，盐醋和。将腰子铺碗底，以热粥盖之。如作盏生状。空心服。

黄芪建中汤　治产后诸虚不足，发热或恶寒腹痛。

黄芪炒　肉桂各一两　白芍药炒二两　甘草炒七钱

上每服五钱，用姜、枣、水煎，日三二服。虚甚须加附子。

附　方

六君子汤　**补中益气汤**　**四物汤**三方见二十四卷第六论　**六味丸**方见二十四卷第十一论　**八珍汤**　**加味逍遥散**二方见二十卷第四论

产后虚羸方论第六

产宝云：产后虚羸者，皆系产后亏损血气所致。须当慎起居，节饮食，六淫七情，调养百日，庶保无疾。若中年及难产者，毋论日期，必须调养平复，方可治事。否则气血复伤，虚羸之症作。

愚按：前症产伤气血者，用八珍汤。饮食伤胃者，用四君子汤。停食伤脾者，用六君子汤。劳伤元气者，用补中益气汤。若嗳气觉有药味者，此药复伤胃也，但用四君子汤，徐徐少饮，以调脾胃。若胃气一健，血气自生，诸症自愈矣。

黄雌鸡汤　治产后虚羸腹痛。

小黄雌鸡一只去头足翅羽肠肚细切　当归　白术炒　熟地黄自制　桂心　黄芪炒各半两

上先以水七盅，煮鸡至三盅，每用汁一盅，药四钱煎，日二服。

十全大补汤　治产后气血未复，形体虚弱，发热恶寒等症。方见二十四卷第四论

产后风虚冷劳方论第七

产后气血劳伤，脏腑虚弱，若风冷乘之。血气愈虚，形气羸损，风冷入脏，令人无子，谓之风虚冷劳也。

愚按：前症若血气虚弱，用八珍汤。血气虚寒，用十全大补汤。胃气虚弱，用补中益气汤。脾气虚弱，用六君子汤。命门火衰，用八味丸。肝脾血虚，用加味逍遥散。肝脾

郁怒，用加味归脾汤。

产宝方　治产后虚羸不生肌肉。

黄芪炒　当归　芍药炒　人参各三钱　桂心　甘草炒　川芎　生姜各四钱　大枣十一枚

上水煎。分三服。

又方：猪肾一双，煮入葱豉作臛。如常食之。

产后腹胀呕吐方论第八

产后腹胀满闷呕吐者，因败血散于脾胃，不能运化而致。宜用抵圣汤治之。

愚按：前症若败血散于肠胃，宜用前方。若饮食停于脾，宜用六君、厚朴。若饮食伤于胃，宜用六君子汤。大凡损其脾者，当节其饮食为善。

附　治　验

一产妇患前症，或用抵当汤，败血以下，前症益甚，小腹重坠，似欲去后。余谓此脾气虚而下陷，用补中益气汤加炮姜温补脾气，重坠如失。又用六君子汤而安。

抵圣汤

赤芍药　半夏　泽兰叶　人参　陈皮　甘草炒，各一钱

上用生姜焙干半两。水煎。

愚按：前方最宜用之。

附　方

六君子汤　补中益气汤二方见二十四卷第六论

产后呕逆不食方论第九

经云：胃为水谷之海，以养脏腑。因产后胃气虚弱，饮食所伤，必致呕逆，故不食也。

愚按：前症若因饮食过时，用四君子汤。饮食过多，用六君子汤。饮食过时而兼劳役，用补中益气。若因饮食停滞，用人参养胃汤。脾胃气虚，用六君子汤。胃气虚寒，加炮姜、木香。寒水侮土，用益黄散。肝木侮脾土，用六君、升麻、柴胡。命门火衰不能生土，用八味丸。呕吐泄泻，手足俱冷，或肚腹作痛，乃阳气虚寒，急用附子理中汤，多有生者。

附　治　验

一产妇朝吐痰，夜发热，昼夜无寐。或用清痰降火，肌体日瘦，饮食日少，前症愈甚。余曰：早间吐痰，脾气虚也；夜间发热。肝血虚也；昼夜无寐，脾血耗也。遂用六君子汤、加味逍遥散、加味归脾汤，以次调补而痊。

开胃散　治产后胃虚呕吐。胸满不食。

诃子肉两半　人参一两　甘草炒半两

每服五钱，姜、水煎。

治产后胃虚呕逆：

橘红一两　半夏　甘草炒各半两　藿香二两

每服五钱，姜、水煎。

治产后呕逆不食：

白术五钱　姜六钱

水煎徐徐温服。

石莲散　治产后胃寒咳逆，呕吐不食，或腹作胀。

石莲肉两半　白茯苓一两　丁香五钱

上为末，每服二钱，不拘时用姜汤或米饮调下，日三服。

附　方

钱氏益黄散　治脾土虚寒，水反来侮，以致呕吐不食，或肚腹作痛，或大便不实，手足逆冷等症。

陈皮　青皮　诃子肉　甘草炙　丁香二钱

上为粗末，每服四钱，水煎服。

人参养胃汤　治外感风寒，内伤饮食，寒热头疼，或作疟疾。

半夏　厚朴制　橘红八分　藿香叶　草果　茯苓　人参五分　甘草炙三分　苍术一钱

上姜七片，乌梅一个，水煎服。

四君子汤　**补中益气汤**方见二十四卷第六论　**八味丸**方见二十四卷第十一论　**附子理中汤**方见二十卷第八论　**加味逍遥散**　**加味归脾汤**方见二十四卷第四论

产后霍乱方论第十

产后霍乱，因脏腑虚损，饮食不消，触冒风冷所致。若热而饮水者，四苓散；寒而不饮水者，理中丸；虚冷者，加附子。来复丹尤妙。

愚按：此症当与后卷第十一论互相主治。

附　治　验

一产妇停食霍乱，用藿香正气散之类已愈。后胸腹膨胀，饮食稍过即呕吐，或作泄泻。余谓此脾胃俱虚，用六君子汤加木香治之渐愈。后因饮食失调，兼恚怒，患霍乱，胸腹大痛，手足逆冷，用附子散，又用八味丸，以补土母而康。设泥痛无补法而用辛散，或用平补之剂，必致不起。

一产妇吐泻咽酸，面目浮肿。此脾气虚寒。先用六君加炮姜为主，佐以越鞠丸而咽酸愈。又用补中益气加茯苓、半夏，而脾胃康。

白术散　治脾胃伤，吐泻腹痛，烦渴，手足逆冷，或大便不实。

白术　橘红　麦门冬去心　人参　干姜炮各一两　甘草半两

上每服四钱、姜、水煎。

附子散　治脾胃虚寒，吐泻腹痛，手足逆冷，或自汗口噤。

附子炮　白术炒　当归　吴茱萸　丁香　橘红　甘草炒各半两

上为末，每服二钱，粥饮调。若脾胃虚，用参苓白术散。

附　方

藿香正气散　治外感风寒，内停饮食，头疼寒热，或霍乱泄泻，或作疟疾。

藿香一钱五分　桔梗炒　大腹皮　紫苏　茯苓　白芷　半夏曲　陈皮　白术炒　厚朴制各一钱　甘草炙、五分

上姜枣，水煎，热服。

五苓散

白术炒　猪苓各一钱　桂三分　泽泻二钱五分　茯苓一钱

上水煎服。

理中丸　治脾胃虚寒，呕吐泄泻，饮食少思，肚腹膨胀。

人参　白术炒　干姜炮　甘草炙各一钱

上为末，米糊丸，弹子大，每服一丸，嚼细，白汤下。

来复丹　治伏暑泄泻，身热脉弱，其效如神。仓卒间须用此药。

硝石一两，同硫黄火上微炒，用柳条搅，结砂子，不可火大　太阴玄精石研　舶上硫黄各一两　五灵脂去砂石　青皮　陈皮各二两

上为末，醋糊丸，小豆大，每服三十丸。空心，米饮下。

《易简方》云：硝石性寒，佐以陈皮，其性疏快。硫黄性寒味涩，若作暖药以止泻，误矣。盖由啖食生冷，或冒暑热之气，中脘闭结，挥霍变乱，非此药不能通利三焦，分理阴阳，其功甚速。

六君子汤方见二十四卷第六论　**八味丸**方见二十四卷第十一论

校注妇人良方　卷二十二

宋　临川　陈自明良甫编辑
明　古吴　薛　己立斋补注
鄞县　曹赤电炳章圈校

产后寒热方论第一

产后发热，头痛身疼，虽如伤寒时气、虽当用麻黄，亦不可轻易。如早起劳动，为寒所伤，则渐渐恶寒，翕翕发热，头项肩背骨节皆痛，至七八日乃差。若大便坚，作呕不能食，用小柴胡汤，加生姜、地黄主之。

愚按：《病机要》云：治胎产之病，从厥阴经论之，无犯胃气，及上中二焦，为之三禁，不可汗，不可下，不可利小便。发汗者，同伤寒下之早证：利大便，则脉数而已动于脾，利小便，则内亡津液、胃中枯燥。制药之法，能不犯三禁，则荣卫自和而寒热止矣。

人参当归散　治去血过多，内热短气，头痛闷乱，骨节作痛，或虚烦咽燥。

人参　当归　生地黄　桂心　白芍药　麦门冬去心，各一两

上粳米一合，竹叶十片，水二盅，煎一盅去之，入药五钱，枣二枚，煎服。虚甚，用熟地黄。

小柴胡汤　治伤风四肢烦热头疼。若头不疼而作烦，二物黄芩汤。方见二十四卷第二论

二物黄芩汤

黄芩半两　苦参半两　生地黄二两

上每服四钱，水煎。

增损柴胡汤　治虚弱寒热，少食腹胀等症。方见前。

竹叶防风汤　治产后伤风发热，而赤气喘头痛。

淡竹叶半把　防风　人参　桂枝　桔梗　甘草各半两　葛根一两半

上每服五钱，姜枣水煎，汗出项强，加附子，呕，加半夏。

治恶露不尽，昼则明了，暮则谵语，寒热如见鬼，此热入血室，用柴胡地黄汤，或四物加柴胡。方见六卷第十五论

产后头痛方论第二

夫头者，诸阳之会也。产后胃气虚弱，饮食少思，阳气微弱，不能上升，故头痛。若因败血所致，则黑龙丹言之甚详。

愚按：前症若中气虚，用补中益气汤加蔓荆子；若血虚用四物加参、术；血气俱虚用八珍汤；若因风寒所伤，用补中益气汤加川芎。

附　治　验

一产妇患头痛，日用补中益气汤，不缺已三年矣，稍劳则恶寒内热，为阳气虚，以前汤加附子一钱，数剂不发。

一妇人产后头痛面青二年矣，日服四物等药。余谓肾水不能生肝木而血虚。用六味丸加五味子。两月而痊。

芎附散　治气虚头痛，用大附子一枚，去皮脐切四片，拌酽醋一碗，炙附醋尽，同川芎一两为末，每服二钱，清茶调服。

治血虚头疼，当归、川芎，每服五钱，水煎。

产后头痛，都梁丸亦可治。方见四卷第六论

附　方

补中益气汤　**四物汤**二方见二十四卷第六论　**八珍汤**方见二十四卷第四论　**六味丸**方见二十四卷第十一论

产后咳嗽方论第三

夫肺主于气，产后肺气虚，故外邪感而咳嗽所由作也。若食盐醯之类而致者，难治；若因面积滞而致者，服黑神散、五积散可愈。

愚按：前症若阴血虚，四物汤加参、术、陈皮、桔梗。肺气虚，四君加芎、归、桔梗。阴火上炎，六味地黄丸加参、术。风寒所感，补中益气汤加桔梗、紫苏。若瘀血入肺发喘兼口鼻起黑，或鼻出血，急用二味参苏饮，亦有得生者。然而所患，悉因胃气不足。盖胃为五脏之根本，胃气一虚，五脏失所，百病生焉。经云：肺属辛金，生于巳土，脾土既虚。不能生金，则腠理不密，外邪易感矣。治当壮土金，生肾水，以制火为善。

附　治　验

一产妇朝吐痰，夜发热，无寐。泥用清痰降火之药，肌体日瘦，饮食日少。余曰：早间吐痰，脾气虚也；夜间发热，肝血虚也；昼夜无寐，脾无耗也。遂用六君子汤、加味逍遥散、加味归脾汤，以次调补。不月而痊。

一产妇咳嗽，见风则喘急恶寒，头痛自汗，口禁痰盛。余为脾肺气虚，腠理不密。用补中益气加肉桂，数剂而安。

一产妇咳嗽声重，鼻塞流涕，此风寒所感。余用参苏饮，一盅顿愈。与补中益气加桔梗、茯苓、半夏，一剂将痊。又与六君、黄芪，以实腠理全愈。

一产妇咳嗽痰盛，面赤口干，内热晡热，彻昼无时，此阴火上炎，余用补中益气汤、六味地黄丸而愈。

一产妇咳而胸满不食。涕唾，面肿气逆。此病在胃而关于肺。用异功散而愈。

知母散　治恶露上攻，咳嗽不已。

知母　贝母　白茯苓　人参各半两　桃仁　杏仁并生去皮尖，各一两

上每服五钱，水煎。

治风寒咳嗽：

甘草　桔梗各六分　款冬花四分　麦门冬　生地黄各一钱二分　葱白一握

用水煎服。

旋覆花汤　治咳嗽最良。方见下有汗者去麻黄

附　方

异功散　治脾胃虚弱，饮食少思，或久患咳嗽，或腹满不食，面浮气逆等症。

人参　白术炒　甘草炒　茯苓　陈皮各一钱

用姜枣水煎。

六君子汤　**四物汤**　**四君子汤**　**补中益气汤**四方见二十四卷第六论**六味丸**方见二十四卷第十一论　**二味参苏饮**方见后　**参苏饮**方见六卷第十一论

产后喉中气急喘促方论第四

产后喉中气急喘促，因荣血暴竭，卫气无主，独聚于肺，名曰孤阳，最为难治。若因败血停凝，服夺命丹。若因荣血暴绝，服芎蒡汤。若因风寒所伤，服旋覆花汤。若因气郁结，服小调经散。若因伤饮食，服见睍丸。

愚按：前症若脾肺气虚弱，用六君、桔梗。若兼外邪，更加紫苏。若中气虚寒，用补中益气加炮姜、肉桂。若阳气虚脱，更加附子。若瘀血入肺，急用二味参苏饮。

附　治　验

一产妇喘促自汗，手足俱冷，常以手护脐腹，此阳气虚脱，用参附汤四剂而愈。

二味参苏饮　治产后血入于肺，面黑发喘欲死者。

人参 一两　苏木二两

用水煎顿服。

旋覆花汤　治伤风寒暑湿，喘嗽太盛，坐卧不宁。

旋覆花　赤芍药　前胡　半夏曲　荆芥穗　甘草　茯苓　五味子　杏仁　麻黄各等分

上每服四钱，姜枣水煎。有汗者莫服

五味子汤　治产后喘促，脉伏而厥。

五味子炒杵　人参　杏仁各二钱　麦门冬去心　陈皮各一钱

上姜三片，枣二枚，水煎服。

芎蒡汤　方见后

附　方

六君子汤　补中益气汤二方见二十四卷第六论**参附汤**方见十八卷第六论

产后口鼻黑鼻衄方论第五

产后口鼻起黑气及鼻衄者，盖阳明经脉之海，起于鼻，交颏中，远出颊口，交人中，左之右，右之左。此产后气虚，荣血散乱，胃绝肺败之症也。急取绯线一条，并产妇顶心发两条，紧系中指节，更无药可疗。

愚按：胃脉颊口绕承浆，盖鼻准属脾土，鼻孔属肺金，诚胃虚肺损，气脱血死之症，急用二味参苏饮加附子五钱，亦有得生者。方见前

产后咳噫方论第六

夫肺主于气而禀于胃，盖产后脾胃伤损，风冷所搏，故咳噫也，急灸期门三壮，必愈。此穴乃胃之大络。方见六卷第十五论

愚按：前症属胃气虚寒之恶候，如用后方未应，急投参附汤，亦有复生者。方见十八卷第六论

丁香散　治心烦咳噫。

丁香　白豆蔻各半两　伏龙肝一两

上为末，煎桃仁吴茱萸汤，每服一钱调下。

羌活散　治咳逆。

羌活　附子炮　茴香炒，各半两　木香　白姜炮，各一钱

上为末，每服二钱，水一盏，盐一捻，煎服。

一方，用桂心五钱，姜汁三合，水煎服。

产后血崩方论第七

产后血崩，因经脉未复而劳伤，或食酸咸之味，若小腹满痛，肝经已伤，最为难治，急服固经丸主之。

愚按：前症若血滞小腹胀满，用失笑散。血少小腹虚痞，芎蒡汤。肝火血妄行，加味逍遥散。脾郁不统血，加味归脾汤。脾气虚不摄血，补中益气汤。厚味积热伤血，清胃散加槐花。风热相搏伤血，四君子、防风、枳壳。

附　治　验

一产妇血崩，小腹胀痛，用破气行血之剂，其崩如涌，四肢不收，恶寒呕吐，大便频泻。余用六君炮黑姜，四剂稍愈，又十全大补，三十余剂而痊。

一产妇血崩，因怒其血如涌，仆地口禁目斜，手足抽搐，此肝经血耗生风，余用六味丸料一剂，诸症悉退，但食少晡热，佐以四君、柴胡、牡丹皮而愈。

固经丸

艾叶　赤石脂煅　补骨脂炒　木贼各半两　附子一个，炮

上为末，饭丸桐子大，每服二十丸，温酒或米饮下。

芎蒡汤

芎蒡　当归　芍药各等分

上每服五钱，水煎。

附　方

失笑散方见二十卷第五论　**十全大补汤**

加味逍遥散　**加味归脾汤**方见二十四卷第四论　**补中益气汤**　**六君子汤**　**四君子汤**三方见二十四卷第六论　**清胃散**方见二十四卷首论　**六味丸**方见二十四卷第十一论

产后月水不调方论第八

产后月水不调，由血气虚损，风邪所客，邪正相搏，以致经候失期，或多或少，而不得其平也。

愚按：前症或过期而作痛者，气血俱虚也，八珍加柴胡、丹皮。不及期而来，血热也，四物、山栀、柴胡。将来而作痛，血实也，四物加桃仁、红花。过期而来者，血虚也，四物加参、术。紫黑成块者，血热也，四物加炒栀、炒连、丹皮。作痛而色淡者，痰多也，四物合二陈。治当临症制宜。

附　治　验

一产妇月经不调，内热燥渴，服寒凉之剂，其血如崩，腹胀寒热，作呕少食，用六君子二十余剂，诸病悉愈，以加味逍遥散，调理而安。

琥珀散　治经脉不调，饮食少思，日渐消瘦。

琥珀　牛膝　生地黄　当归各半两　桃仁　赤芍药各半两

上每服五钱，水姜服。

附　方

八珍汤　**加味逍遥散**二方见二十四卷第四论　**四物汤**　**六君子汤**二方见二十四卷第六论　**二陈汤**方见二十四卷第五论

产后月水不通方论第九

产后乳子周岁而经不行，是其常也。若半岁而经行，此血有余也。若一二岁不行而无疾，不必服药。若肢体倦怠，食少内热，是血少也，宜健脾胃。若以药通之则误矣。

愚按：前症脾胃虚弱，用六君子汤。若兼郁火伤津，用归脾汤加丹皮、山栀。若怒火伤血，宜用四物合小柴胡。气血俱虚，用八珍、牡丹皮。仍参前论主之。

附治验方药

一产妇月经年余不通，内热晡热，服分气丸，经行不止，恶寒作渴，食少倦怠，胸满气壅，朝用加味逍遥散，夕用四君子汤，月许诸症稍愈，佐以八珍汤，兼服两月而愈。

六君子汤　**四物汤**　**四君子汤**三方见二十四卷第六论　**归脾汤**　**加味逍遥散**　**八珍汤**三方见二十四卷第四论　**小柴胡汤**方见二十四卷第二论

产后四肢浮肿方论第十

产后四肢浮肿者，乃败血乘虚流注，宜用小调经散。陈无择云：若风邪所乘于气分，皮肤肿而浮虚，乃气也。若皮肤肿如熟李，乃水也。盖气肿者宜发汗，水肿者宜利小便。

愚按：前症若寒水侮土，伤损脾肺。若气虚浮肿，宜益脾胃。若水气浮肿，宜补中气。当参第一卷水分血分主治。

附　治　验

一产妇饮食少思，服消导之剂，四肢浮肿，余谓中气不足，朝用补中益气汤，夕用六君子汤而愈。后因怒腹胀，误服沉香化气丸，泄泻不止，饮食不进，小便不利，肚腹四肢浮肿，用金匮加减肾气丸而愈。

一产妇泄泻，四肢面目浮肿，喘促恶寒，余谓脾肺虚寒，用六君子、姜、桂而泄泻愈，又补中益气而脾胃健。

小调经散

没药　琥珀　桂心　芍药　当归各一钱

上为末，每服半钱，姜汁温酒调。

大调经散　最治肿满喘急烦渴，小便不利。方见二十一卷第一论

汉防己散　治水肿。

汉防己　猪苓　枳壳面炒　桑白皮各一两　商陆　甘草各二钱

上每服四钱，水煎。

治血虚气肿水肿：

泽兰叶　防己等分

上为末，每服二钱，温酒调下，醋汤亦可。

金匮加减肾气丸　治脾肾虚寒，腰重脚肿，湿饮留积，小便不利，或肚腹肿胀，四肢浮肿，气喘痰甚，或已成水症，其效如神。

白茯苓三两　附子半两　肉桂　川牛膝　泽泻　车前子　山茱萸　山药　牡丹各一两　熟地黄四两，捣碎，酒拌杵膏

上为末，和地黄膏，炼蜜丸桐子大，每服七八十丸，空心米饮下。

附　方

补中益气汤　六君子汤二方见二十四卷第六论

产后腹痛泻利方论第十一

产后腹痛泻利，因肠胃虚怯，寒邪乘袭，或水谷不化，洞泄肠鸣，兼手足逆冷，用补中汤治之。陈无择云：若六淫七情而致者，当因所感而治之。

愚按：前症若胸膈饱胀，或恶食吞酸，此饮食停滞，用六君、枳实、山楂以消导。若食既消而仍痛，更或头痛热渴，恶寒欲呕，此中气被伤，用补中益气、半夏、茯苓，以健脾胃。

附　治　验

一产妇腹痛发热恶食，余以为饮食伤脾，彼反服破血之剂，加寒热头痛，呕吐涎沫。用化痰理气，四肢逆冷，泄泻下坠。余用六君加炮姜、肉桂、木香，再用补中益气汤而愈。

一产妇腹痛后重，去痢无度，形体倦怠，饮食不甘，唇肿盗汗，竟夜不寐，此脾经虚热之症，用当归六黄汤内黄芩、连、柏炒黑，一剂汗止，乃用归脾八珍，兼服而愈。

补中汤

良姜　当归　桂心　芍药　附子炮　川芎各一两　甘草炒，五钱

上每服三钱，水煎服。

附　方

六君子汤　补中益气汤二方见二十四卷第六论　**当归六黄丸**方见十九卷第六论　**归脾汤　八珍汤**二方见二十四卷第四论

产后赤白痢方论第十二

产后痢疾，因饮食六淫七情，伤于脾胃，或血渗大肠，皆为难治。若饮食不进，谓之虚痢。气宇不顺，谓之气痢。治法热则凉之，冷则温之，冷热相搏则温凉调之，滑者涩之，虚者补之，水谷不分者分利之，性情执滞者和顺之，未有不安者也。

愚按：前症白属气分，而赤属血分也。若米食所伤，用六君加谷蘖。若面食所伤，用六君加麦蘖。若肉食所伤，用六君加山楂、神曲。凡兼呕吐，俱加藿香。若兼咽酸或呕吐，用前药送越鞠丸。若肝木克脾土，用六君加柴胡、炮姜。若寒水反来侮土，用钱氏益黄散。若久泻或元气下陷，兼补中益气汤，以升发阳气。若泻痢色黄，乃脾土真气，宜加木香、肉豆蔻。若属脾土虚寒，用六君加木香、姜、桂。若脾肾虚寒用补中益气，及四神丸。若属命门火衰而脾土虚寒，用八味丸以补土母。若小便涩滞，肢体渐肿，或兼喘咳，用金匮肾气丸，以补脾肾，利水道。若胃气虚弱而四肢浮肿，须补胃为主。若久而不愈，是肾气亏损也，必用四神、六味、八味三药，以补足三阴。若用分利导水之剂，是虚其虚也。

一产妇泄痢腹痛年余，形体骨立，内热晡热，自汗盗汗，口舌糜烂，日吐痰三碗许，脉洪大，重按全无。此命门火衰脾土虚寒，而不能摄痰归源，用八味丸补火以主土，用补中益气汤兼补肺金而痊。

一产妇食鸡子，腹中作痛，面色青黄，服

平胃、二陈，更下痢腹胀，用流气饮子，又小腹一块，不时上攻，饮食愈少。此脾胃虚寒，肝木克侮所致，用补中益气加木香、吴茱渐愈，又用八珍大补，兼服调理寻愈。

五味子散　治产后泄泻，或肾泄在侵晨五更作泻，饮食不进，或大便不实，不时去后，为丸尤效。

五味子炒，三两　吴茱萸炒，五钱

上为末，每服二钱，白汤调。

四神丸　治脾胃虚弱，大便不实，饮食不思。

二神丸　**六君子汤**　三方见八卷第二论　**补中益气汤**方见二十四卷第六论　**香连丸**方见八卷第八论　**六味丸**　**八味丸**二方见二十四卷第十一论　**金匮肾气丸**方见前　**八珍汤**方见二十四卷第四论

校注妇人良方　卷二十三

宋　临川　陈自明良甫编辑
明　古吴　薛　己立斋补注
鄞县　曹赤电炳章圈校

产后痢疾作渴方论第一

产后下痢作渴者，乃内亡津液、或胃气虚不能生津液。但止其渴，痢自差。

愚按：前症若渴而不止喜冷饮，属胃气虚不能生津液，宜用七味白术散。夜间发热口渴，属肾水弱而不能润，宜用六味丸，并佐以益气汤，以滋化源。

附治验方药

一产妇泻痢，发热作渴，吐痰，肌体消瘦，饮食少思，或胸膈痞满，或小腹胀坠年余矣，余以为脾肾之泻，朝用二神丸，夕用六君子，二月余而痊。

一产妇患前症，形体倦怠，饮食不进，与死为邻，此脾胃极虚也，用四神丸、十全大补汤数剂而愈。

附　方

七味白术散方见三十一卷第二论　**六味丸**方见二十四卷第十一论　**补中益气汤**　**六君子汤**二方见二十四卷第六论　**十全大补汤**方见二十四卷第四论　**四神丸**　**二神丸**二方见八卷第八论

产后大便秘涩方论第二

产后大便秘涩，因肠胃虚弱，津液不足也，若腹闷胀，宜服麻仁丸润之，若用苦寒药通则促其危矣。

愚按：前症若计其日期，饮食数多，即用药通之，祸在反掌之间，必待腹满觉胀，欲去不能者，乃结在直肠，宜用猪胆汁润之。若服苦寒疏通，反伤中气，通而不止，或成痞症。若去血过多用十全大补，血虚火燥用加味四物，气血俱虚用八珍汤。虽数日不通，饮食如常，腹中如故，仍用八珍加桃仁、杏仁治之。若泥其日期，饮食数多而通之，则误矣。

附　治　验

一产妇大便七日不通，饮食如常，腹中如故，此腹未满也。用八珍加桃杏二仁，至二十一日，腹满欲去，用猪胆汁润去而安。

一产妇大便不通，或用通利之药，中脘胀痛，饮食甚少。又用蜜导之，大便不禁，吃逆不食。余以为脾肾复伤，用六君加吴茱、肉果、骨脂、五味数剂，喜其年壮而愈，不然，多致不起。

一产妇大便秘结，小腹胀痛，用大黄等药，致吐泻不食，腹痛胸痞，余用六君子加木香、炮姜治之而愈。一妇人大便秘涩，诸药不应，苦不可言，令饮人乳而安。

麻仁丸

大麻仁研如泥　枳壳　人参各四分　大黄二分

上为末，入麻仁，炼蜜丸桐子大，每服二十丸，空心温酒下。未通，渐加，不可过服。

阿胶枳壳丸　治产后大便秘涩，以阿胶、枳壳二味，等分为末，蜜丸桐子大。滑石末为衣，温水下二十丸，如或未通再服。

附　方

十全大补汤　八珍汤二方见二十四卷第四论　**加味四物汤**方见二十四卷第六论

产后大小便不通方论第三

产后大小便不通，因肠胃虚弱，津液燥竭故也。

愚按：前症宜参前后论及八卷八论主治。

附　治　验

一产妇大小便不通，诸药不应，将危矣。令饮牛乳，一日稍通，三日而痊。人乳尤善。

桃花散　治膀胱积滞血涩，大小便秘。

桃仁　葵子　滑石　槟榔等分

上为末，每服二钱，空心葱白汤调下。

通气散　治产后大小便不通。方见八卷第八论

产后遗粪方论第四

产后遗粪，取故燕窠中草烧为末，或枯矾、牡蛎，或白敛、芍药各等分为末，俱用酒调服，或用固肠丸亦可。

愚按：前症若脾肾虚弱，用还少丹，仍以补中益气汤为主。虚寒，加肉豆蔻、补骨脂，或四神丸。若脾肾虚寒，用八味丸，兼四神丸，仍佐以前二方。

附　治　验小便出屎方药附

一产妇大便不实，饮食少思，五更或侵晨遗屎，此中气虚寒，脾肾不足，用补中益气送四神丸而痊。

一产妇小便出粪，名大小肠交，乃气血俱虚，失行常道，先用六君子汤二剂，又用五苓散二剂而痊。循常肠交，亦可用。

附　方

还少丹　治脾肾虚寒，饮食少思，发热盗汗，遗精白浊，又治真气亏损，肌体瘦弱等症。

肉苁蓉　远志去心　茴香　巴戟　干山药　枸杞子　熟地黄　石菖蒲　山茱萸去核　牛膝　杜仲去皮，姜制　楮实子　五味子　白茯苓各二两

上各另为末，用枣肉百枚，并炼蜜丸桐子大，每服五七十丸，空心温酒或盐汤下，日三服。

补中益气汤　六君子汤二方见二十四卷第六论　**四神丸**方见八卷第八论　**八味丸**方见二十四卷第十一论　**五苓散**方见二十一卷第十论

产后诸淋方论第五

产后诸淋，因热客于脬，虚则频数，热则涩痛，气虚兼热，血入胞中，则血随小便出，而为血淋也。

愚按：前症若膀胱虚热，用六味丸。若阴虚而阳无以化，用滋阴肾气丸。盖土生金，金生水，当滋化源。仍参第八卷小便淋沥频数类。

附　治　验

一产妇小水淋沥，或时自出，用分利降火之剂，二年不愈。余以为脾肾之气虚，用补中益气汤、六味地黄丸而痊。

滑石散　治热淋。

滑石五分研　通草　车前子　葵子各等分

上为末，以浆水调服。

治小肠有热，小便涩痛，或为血淋：

瞿麦　黄芩　冬葵子各二两　通草二两　大枣十二枚

七以水七升，煎二升半，分二服。

治脾气不利，小便不通，桔红为末，每服二钱，空心温酒下。

治肺气不利，小便不通，杏仁十四枚，去皮尖炒食之。

治脾转小便不利，滑石一钱半，寒水石一钱，水煎服。

附　方

六味丸方见二十四卷第十一论　**滋阴肾气丸**　**补中益气汤**二方见二十四卷第六论

产后小便频数方论第六

产后小便数者，乃气虚不能制故也。

愚按：前症若因稳婆不慎，以致胞损而小便淋沥者，用八珍汤以补气血。若因膀胱气虚而小便频数，当补脾肺。若膀胱阴虚而小便淋沥，须补肺肾。仍参第八卷小便频数诸类。

附　治　验

一产妇小便频数，时忽寒战，乃属脾肺虚弱，用补中益气加山茱、山药为主，佐以桑螵蛸散而愈。后患发热肺热，盗汗自汗，月水不调，用加味逍遥散而安。

一产妇患前症，吐痰发热，日晡作渴，此膀胱阴虚，用补中益气汤，佐以六味丸而愈。又患痢后小便频数，手足俱冷，属阳气虚寒，用前汤及八味丸而瘳。

桑螵蛸散　治阳气虚弱，小便频数，或为遗尿。

桑螵蛸三十个，炒　鹿茸酥炒　黄芪各三两　牡蛎煅　人参　厚朴　赤石脂各二两

上为末，每服二钱，空心粥饮调下。

又方。用益智仁为末，米饮下。

附　方

八珍汤　**加味逍遥散**二方见二十四卷第四论　**补中益气汤**方见二十四卷第六论　**六味丸**　**八味丸**二方见二十四卷第十一论

产后小便不禁方论第七

广济治产后小便不禁，用鸡尾烧灰。《千金翼》用白薇、芍药为末，俱用温酒下，日三服。或桑螵蛸半两，龙骨一两，为末，每服二钱，粥饮调下。

愚按：前症若脾肺阳虚，用补中益气汤。若肝肾阴虚，用六味地黄丸。若肝肾之气虚寒，用八味地黄丸。

附　治　验

一产妇小便不禁，二年不愈，面色或青赤，或黄白，此肝脾气血虚热，用加味逍遥散为主渐愈，佐以六味丸而痊。后因怒小便自遗，大便不实。左目顿紧，面色顿赤，仍用前散，佐以六君子汤，以清肝火，生肝血，培脾上面瘳。

补脬饮　治胞破小便淋沥。

生绢黄色者一尺　白牡丹用根并皮　白芨各一钱

上水一碗，煎至绢烂，温服。服后忌言语，否则无效。

鸡内金散　治气虚溺床，用雄鸡肫胵并肠烧为末，温酒调服。

附　方

补中益气汤　**六君子汤**二方见二十四卷第六论　**六味丸**　**八味丸**二方见二十四卷第十一论　**加味逍遥散**方见二十四卷第四论

产后小便出血方论第八

产后小便出血者，因虚热血渗于脬也。以乳发洗净，烧为末，米饮调服。或滑石末一钱，生地黄汁调下。

愚按：前症若膏粱积热，用加味清胃散。醇酒湿毒，葛根解醒汤。怒动肝火，加味小柴胡汤。郁结伤脾，加味归脾汤。思虑伤心，妙香散。大肠风热，四物、侧柏、槐花。大肠血热，四物、炒连、槐花。肠胃虚弱，六君、升麻、柴胡。元气下陷，补中益气、茯苓、半夏。胃气虚弱，六君、升麻。血虚，四物升麻。气血俱虚，八珍、柴胡、升麻。大凡元气虚弱而发热者，皆内真寒而外假热也，但用六君，或补中益气加炮姜，温补脾气，诸症悉退。若四肢畏冷，急加附子。

附治验方药大便下血附

一产妇尿血面黄，胁胀少食，此肝木乘脾土也，用加味逍遥、补中益气，兼服而愈。后为怀抱不乐，食少体倦，惊悸无寐而仍作，用加味归脾汤、二十余剂。将愈，惑于众论，服犀角地黄汤，诸症复作，仍服前汤而愈。

一产妇粪后下血，食少体倦，此脾气虚热，用补中益气加吴茱炒黄连五分，四剂顿愈，用归脾汤而痊。

一妇人怒则便血，寒热口苦，或胸胁胀痛，或小腹痞闷，此肝木乘脾土，用六君、柴胡、山栀而愈，用补中益气、加味逍遥而不复作。

一妇人久下血在粪前，属脾气虚寒，用补中益气加连炒吴茱一钱，数剂稍缓，乃加生吴茱五分，数剂而愈。黄连炒吴茱黄法见七卷第五论

一产妇大便后血，口干饮汤，胸胁膨满，小腹闷坠，内热晡热，食少体倦，日晡面赤，酒渐恶寒，此脾肺气虚，先用六君加干姜、木香渐愈，用补中益气将愈，用归脾汤全愈。后劳役兼怒，发热血崩，夜间谵语，此热入血室，用加味小柴胡二剂而热退，用补中益气一剂而血止，用逍遥散、归脾汤调理而安。

葛花解醒汤　治酒积上下，外消其湿。

白豆蔻　砂仁　葛花各五分　木香五分　青皮三钱　陈皮　白茯苓　猪苓　人参各一钱半　白术　神曲　泽泻　生干姜各二钱

上为末，每服五钱，白汤调下。

加味清胃散方见二十四卷首论　**加味小柴胡汤**方见二十四卷第二论　**加味归脾汤**　**归脾汤**　**八珍汤**　**逍遥散**　**加味逍遥散**五方见二十四卷第四论　**妙香散**方见六卷第八论　**四物汤**　**六君子汤**　**补中益气汤**三方见二十四卷第六论

产后阴脱玉门不闭方论第九

产后阴脱，玉门不闭，因坐产努力，举动房劳所致，或脱肛阴挺，逼迫肿痛，小便淋。

愚按：玉门不闭，气血虚弱也，用十全大补汤。肿胀燃痛，肝经虚热也，加味逍遥散。若因忧怒，肝脾气血伤也，加味归脾汤。若因暴怒，肝火血伤也，龙胆泻肝汤。仍参第八卷末诸论。

附　治　验

一产妇玉门不闭，发热恶寒，用十全大补加五味子，数剂而寒热退。用补中益气加五味子，数剂而玉门闭。

一妇人脾胃素弱，兼有肝火，产后玉门肿痛，寒热作渴，呕吐不食，外敷大黄等药，内用驱利之剂，肿及于臀，诸症蜂起。此真气虚而邪气盛也，先用六君子以固肠胃，次用补中益气以补阳气，不数剂而全愈。

一产妇患此失治，肿溃不已，形体消瘦，饮食少思，朝寒暮热，自汗盗汗半年矣。用补中益气加茯苓、半夏，脓水渐少，饮食渐进，用归脾汤共五十余剂而愈。

一产妇玉门不闭，小便淋沥，腹内一块，攻走胁下，或胀或痛，用加味逍遥散加车前子而愈。

一妇人子宫肿大，二日方入，损落一片，殊类猪肝，面黄体倦，饮食无味，内热晡热，自汗盗汗，用十全大补汤，二十余剂，诸症悉愈，仍复生育。

硫黄散　治产后阳气虚寒。

硫黄　乌贼骨各半两　五味子五钱

上为末，搽患处，日三易。

一方：蛇床子一升，炒热，帛裹熨患处。亦治阴痛。

一方：子宫脱出，以苘麻子仁十四枚，研涂顶心，入即洗去。

附　方

十全大补汤　**加味逍遥散**　**加味归脾汤**　**归脾汤**四方见二十四卷第四论　**龙胆泻肝汤**方见二十四卷第八论　**补中益气汤**　**六君子汤**二方

见二十四卷第六论

妇人阴蚀疳方论第十

妇人少阴脉数而滑者，阴中有疮，名曰慝。或痛或痒，如虫行状，脓水淋沥，亦有阴蚀几尽者，皆由心神烦郁，脾胃虚弱，气血流滞耳，内当补心养胃，外以药傅洗乃可。

愚按：前症乃肝脾郁结之症，木旺生虫耳，宜解郁清肝。备见八卷阴中生疮类。

附　治　验

一产妇素有肝火患此，内溃痒痛，食少热渴，小水淋沥，用加味逍遥散、加味归脾汤兼服，间以芦荟丸，外以鹤虱草，煎洗而愈。

治疳虫蚀下部，用蒲黄研匀傅入内。

平胃散，加贯众末二钱，以熟猪肝拌药，内阴中。

附　方

加味归脾汤　**加味逍遥散**二方见二十四卷第四论　**芦荟丸**方见七卷第七论

产后乳少或止方论第十一

妇人乳汁，乃气血所化，若元气虚弱，则乳汁短少。初产乳房燀胀，此乳未通。若怒气乳出，此肝经风热。若累产无乳，此内亡津液。盖乳汁资于冲任，若妇人疾在冲任，乳少而色黄者。生子则怯弱而多疾。

愚按：前症若气血虚弱而不能化生，宜壮脾胃。怒动肝胆而乳肿汁出，宜清肝火。夫乳汁乃气血所化，在上为乳，在下为经，若屡产无乳，或大便涩滞，当滋化源。

附　治　验

一产妇因乳少服药通之，致乳房肿胀，发热作渴，余谓血气虚，以玉露散补之而愈。

涌泉散　能下乳。忌食姜、椒、辛辣饮食。

王不留行　瞿麦　麦门冬　龙骨各二钱

上用猪蹄汁一碗，酒一杯，煎服，以木梳于乳上梳下。

冷气血虚，虫乳粉每服二钱，煎漏芦汤调。

附　方

玉露散　治乳脉不行，身体壮热，头目昏痛，大便涩滞等症。

人参　白茯苓　桔梗炒　芍药各一钱　甘草炙，六分

上水煎服。

产后乳出方论第十二

产后乳汁自出，乃胃气虚，宜服补药止之。若乳多满痛，用温帛熨之。未产而乳自出，谓之乳泣，生子多不育。

愚按：前症气血俱虚，用十全大补汤。肝经血热，用加味逍遥散。肝经怒火，用四物、参、术、柴、栀。肝脾郁怒，用加味归脾汤。

附　治　验

一产妇劳役，忽乳汁如涌，昏昧吐痰，此阳气虚而厥也，灌以独参汤而苏，更以十全大补汤数剂而安。若妇人气血方盛，乳房作胀，或无儿饮胀痛，增寒发热，用麦芽二三两炒熟，水煎服，立消。其耗散血气如此，何脾胃虚弱、饮食不消方中多用之？

十全大补汤　**加味逍遥散**　**加味归脾汤**三方见二十四卷第四论　**独参汤**方见三卷第十一论　**四物汤**方见二十四卷第六论

产后吹乳方论第十三

产后吹乳，因儿饮口气所吹，令乳汁不通，壅结肿痛，不急治多成痈，速服栝蒌散，及敷南星，更以手揉散之。

愚按：前症用药，切不可损其气血。治验见二十四卷。

栝蒌散　乳香二钱，栝蒌一个，酒煎服。

用南星温汤调涂。

一方，用陈皮一两，甘草一钱，水煎服。

产妇妒乳方论第十四

妒乳，因儿未能饮，余乳蓄结，以致肿痛，且不吮通之，必致成痈。若乳头生疮浸淫，名妒乳，宜赤龙皮汤、天麻汤、飞乌膏、飞乌散，傅以黄连胡粉散。

愚按：乳盛或无子饮乳，以致肿痛，炒大麦芽煎服，其乳即散。若成疮，当从乳痈类治。若皮肤浸淫成疮，当用本方。

治乳初肿痛内消方。用

瓜蒌量　粉草一寸　生姜一块，半生半炒

酒二碗，煎服，顿去败乳，再服即愈。

赤龙皮汤　槲皮三升，水一斗，煮五升，温洗之。

麻草汤　以天麻草五升，水煎洗之。此草叶若麻叶，冬生夏花，赤如鼠尾，花亦洗浸淫湿痒阴蚀等疮。

飞乌散　用烧朱，砂作水银上黑烟各要粉者三两，枯矾一两傅之。诸热浸淫，丈夫阴蚀痒湿，小儿头疮疳蚀疮等。

黄连胡粉膏治症同前

黄连二两、末　胡粉一钱　水银一两，同研令消散

上皮裹熟，授和合傅之。

一方：乳头裂破，秋茄子裂开者，阴干，烧存性，水调涂之。

校注妇人良方　卷二十四补遗

临川　陈自明良甫编辑
古吴　薛　己立斋补注
鄞县　曹赤电炳章圈校

疮　疡　门

妇人茧唇方论

第一诸骨木梗等咽见《口齿类要》

内经云：脾气开于口。又云：脾之荣在唇。盖燥则干，热则裂，风则瞤，寒则揭。若肿起白皮，皱裂如蚕茧，名曰茧唇。有肿重出如茧者，有本细末大如茧如瘤者。其因或胎产经行而阴血损，或七情动火而荣血亏，或心火传授脾经，或厚味积热伤脾。大要审本症，察兼症，补肾水，生脾血，则燥自润，火自除，风自散，肿自消。若患者忽略，治者不察，内用清热消毒之药，外用追蚀线结之法，反为败症，慎哉。

附　治　验

一妇人怀抱久郁，或时胃口嘈辣，胸膈不利，月水不调，晡热食少，体倦唇肿，已年余矣。此脾经郁火伤血，用归脾汤加姜汁炒黄连、山栀，少佐吴茱萸，嘈辣顿去，饮食稍进。乃去黄连，加贝母、远志，胸膈通利，饮食如常。又用加味逍遥散、归脾汤，间服百余剂，月水调而唇立愈。

一妇人怀抱久郁，患茧唇，杂治消痰降火，虚症悉具，盗汗如雨。余谓此气血虚而有热也，用当归六黄汤内黄芩、连、柏俱炒黑，二剂而盗汗顿止。仍用归脾汤、八珍散兼服，元气渐复。更以逍遥散、归脾汤，间服百余剂，而唇亦瘥。

一妇人唇裂内热二年矣，每作服寒凉之剂，时出血水，益增他症。此胃火伤血，而药伤元气也，余用加味清胃散而愈。后因怒，唇口肿胀，寒热作呕，此属肝木乘脾土，用小柴胡加山栀、茯苓、桔梗，诸症顿愈。复以加味逍遥散，调补元气而愈。

一妇人因怒唇肿，内热体倦。用化痰药，食少作呕，大便不实，唇出血水；用理气消导，胸膈痞满，头目不清，唇肿经闭；用清胃行血，肢体愈倦，发热烦躁，涎水涌出。余曰：此七情伤肝脾，屡用攻伐，反致他症。遂用济生归脾汤，食进便实涎止；用加味逍遥散，肿消热退体健。后因怒寒热耳痛，胸膈胀闷，唇燃肿甚，此怒动肝火而伤血，用四物合小柴胡，加山栀顿愈。又因怒胸乳作胀，肚腹作痛，呕吐酸涎，饮食不入，小水不通，此怒动肝木而克脾土也，用补中益气加川芎、芍药而愈。又劳役怒气，饮食失节，发热喘渴，体倦不食，下血如崩，唇肿炽甚，此为肝经有火不能藏血，脾经气虚不能摄血，用补中益气加炒黑山栀、芍药、丹皮而愈。

一妇人月经不调，两足发热，至年余而身亦热，劳则足腿酸疼。又年余，唇肿裂痛。又半年，唇裂出血，形体瘦倦，饮食无味，月水不通，唇下肿如黑枣。余曰：此肝脾血虚火症也。彼不信，用通经药而殁。

一妇人忿怒而唇肿，或用消毒之药，唇胀出血年余矣。余曰：此肝木克脾土而血伤也，须养脾胃滋化源为主。彼执用前药，状

如翻花瘤而殁。

一妇人口苦胁胀，此肝火之症也，用小柴胡加山栀、黄连少愈，更以四君子加芎药、当归、柴胡调补脾胃而痊。

一妇人每怒口苦，发热晡热，此肝火盛而血伤也，以小柴胡合四物二剂，以清火而生血，更以四物加柴胡、白术、茯苓、丹皮，生血健脾而愈。

一妇人每怒则口苦兼辣，胸痛胁胀，乳内或时如刺，此肝肺之火也，用小柴胡加山栀、青皮、芎、归、桑皮而安。后又劳怒，口复苦，经水顿至，此属内火动，血得热而妄行，用四物加炒芩、炒栀、胆草，一剂而血止，更以加味逍遥散而元气复。

一妇人因怒齿痛，寒热作呕，用清胃等药益甚。余以为此肝火伤胃、寒药复伤故也，用六君子加芎药、柴胡、山栀而愈。

一妇人胃中嘈辣，甚则热痛，后患齿疼，此胃中痰火也，用二陈加芩、连下越鞠丸而瘳。

一妇人发热齿痛，日晡益甚，月水不调，此脾经血虚，用逍遥散加升麻寻愈。后因怒复痛，仍以前药加川芎而痊。

一妇人因怒，牙疼寒热，此肝火侮脾土，用小柴胡加芎、归、芩、术、山栀而疼痛止，用加味逍遥散而寒热退。

一妇人每产后齿龈皆动，逾日乃止，此气血虚而火动也。后复怀妊临月，余付十全大补汤二剂，令产后煎服，其齿不动如故。

一妇人善怒，舌痛烦热，或用降火化痰药，前症益甚，两胁作胀，又服流气饮，肚腹亦胀，经行不止。此肝虚不能藏血，脾虚不能摄血，而前药复伤也，用加味归脾汤加五味子而愈。

一妇人冬患脑疽，肿痛热渴，脉洪数实，此膀胱湿热上壅，用清热消毒散溃而愈。次年，其舌肿大，遍身患紫疔如葡萄，手足尤多，各刺出黑血，此脾胃积热毒也，服夺命丹七粒，出臭汗，疮热益甚，又便秘二日，与大黄、芩、连各三钱，升麻、白芷、山栀、薄荷、连翘各二钱，生草一钱，水煎三五沸，服之大小便出臭血甚多，下体疔稍退，乃入犀角汁再服，舌本及齿缝出臭血，诸毒乃消，更与犀角地黄汤而愈。

一妇人善怒，舌本强，手臂麻，此肝木克脾土，治以六君子加柴胡、芎药而愈。

一妇人产后喉痛，服清热等剂痛益甚，此膀胱经血虚也。盖膀胱之内，脉上行至喉而远，用八珍汤加牡丹皮、柴胡、酒炒黑黄柏，二剂而愈。

一妇人喉间作痛旬余，突肿如赤梅状，二月后而肿，遍身筋骨作痛，余以为此时行杨梅疮也，先以草薢汤数剂而平，更以四物加草薢、黄芪，二十余剂，诸症悉退。

附　方　药

清胃散　治醇酒厚味，唇齿作痛，或齿龈溃烂，或连头面，颈项作痛。

黄连炒，一钱五分　生地黄　牡丹皮　当归各一钱　升麻二钱

上水煎服。实热便秘加大黄。

加味清胃散　即前方加犀角、连翘、甘草。

凉膈散　治积热烦渴，面赤内热，头昏咽痛，便溺赤涩，狂言谵妄，睡卧不安。

大黄　朴硝　甘草各一钱　连翘二钱　栀子　黄芩　薄荷各一钱

上水煎服。

补黄散　治脾胃虚热，口舌生疮，畏冷饮食。

人参　白术炒，各一钱　白芍药炒黄　陈皮　甘草炒，各五分

上姜枣，水煎服。

四顺清凉饮加山栀、牛蒡子名加味清凉饮　治脏腑实热秘结，口舌生疮。

当归　赤芍　甘草　大黄各一钱

用水煎服。

人参安胃散　治服峻剂损脾胃，口舌生

疮。

人参一钱　黄芪炒，二钱　生甘草　炙甘草各五分　白芍药七分　白茯苓一钱　黄连炒，五分

上水煎服。

温中丸　即人参理中丸　治中气虚热，口舌生疮，不喜饮冷，肢体倦怠，饮食少思。

人参　甘草炒　白术炒各等分

上为末，姜汁糊丸桐子大，每服五十丸，白汤下。

柳华散　治热毒口疮。

黄柏炒　蒲黄　青黛真正者　人中白煅等分

为末敷之。

四物汤　治血热口舌生疮，或牙龈肿溃，或日晡发热，烦躁不安。方见本卷第六论

加味四物汤即四物汤加丹皮、柴胡、山栀

当归补血汤　治气血俱虚，口舌生疮，热渴引饮，目赤面红，其脉洪大而虚，重按全无。方见本卷第十一论

四物二连汤　治血热口舌生疮，或夜发寒热。

当归　熟地黄　白芍药炒　川芎　黄连炒　胡黄连各一钱

上水煎服。

清咽利膈汤　治积热咽喉肿痛，痰涎壅盛，烦躁饮冷，大便秘结。

金银花　防风　荆芥　薄荷　桔梗炒　黄芩炒　黄连炒　山栀炒　连翘各一钱　玄参　大黄煨　朴硝　牛蒡子研　甘草各七分

上水煎服。

龙麝聚圣丹　治心脾客热，咽喉肿痛，或成痈不消，或舌本肿胀，口舌生疮，或诸物骨鲠。

川芎　生地黄　犀角镑　羚羊角镑　琥珀　玄参　连翘各五钱　人参　赤茯苓　马牙硝　片脑　麝香各二钱　桔梗　升麻　铅白霜各五钱　朱砂　牛黄各一钱　南硼砂一两　金箔五十片

上各另为末，和匀蜜丸龙眼大，金箔为衣，薄荷汤化下，或噙咽之。

《拔萃》**桔梗汤**　治热肿喉痹。

桔梗炒　甘草　连翘　山栀炒　薄荷　黄芩各一钱

上竹叶水煎服。

甘桔汤　治咽喉肿痛。

甘草六钱　桔梗三钱

用水煎服。

解毒雄黄丸　治缠喉风肿闭，或卒倒死，牙关紧急。

雄黄一钱　郁金一钱　巴豆十四粒，去油壳

上为末，醋糊丸绿豆大，用热茶送下七丸，吐顽痰立苏。

夺命丹　治喉闭，或疔毒，或麻木，或呕吐，重者昏愦。若疔毒牙关紧急，用三五丸为末，水调灌下，诚有夺命之功。

蟾酥干者酒化　轻粉各五分　枯白矾　寒水石煅　铜绿　乳香　没药　麝香各一钱　朱砂三钱　蜗牛二十个，另研，如无亦效

上为末，用蜗牛或酒糊为丸如绿豆大，每服一二丸，温酒或葱汤下。

换肌消毒散　治时疮，不拘初起溃烂。一名单解汤

土茯苓五钱　当归　白芷　皂角刺炒　薏苡仁各一钱半　白鲜皮　木瓜不犯铁器　金银花　木通各一钱　甘草五分

上水煎服。

七味白术散一名钱氏白术散　治中气虚热，口舌生疮，不喜饮冷，或吐泻口干。方见二十卷第二论

四君子汤　治脾胃虚热，唇口生疮，食少作呕，大便不实。若肝木乘脾土所致，加柴胡、芍药。方见本卷第六论

六君子汤方见本卷第六论　**二陈汤**方见本卷第五论　**越鞠丸**方见六卷第七论　**补中益气汤**方见本卷第十论　**清热消毒散**方见本卷第五论　**犀角地黄汤**方见本卷第二论　**当归六黄汤**方见十九卷第六论　**逍遥散**　**八珍汤**　**归脾汤**　**十全大补汤**四方见本卷第四论　**小柴胡汤**方见本卷第二论

妇人耳聆痛方论第二

耳疮属手少阳三焦，或足厥阴肝经，血虚风热，或怒动肝火而致。若发热燃痛，属三焦厥阴风热，用柴胡清肝散。若内热痒痛或胀痛，属肝火伤血，用栀子清肝散。若寒热作痛，或作呕吐，属肝火伤脾，用益脾清肝散。若口干足热，为肝肾阴虚，用益阴肾气丸。若月经先期，为血热，用加味逍遥散。过期为血虚，用八珍汤。食少体倦，为郁火，用加味归脾汤。恶寒发热，肢体倦怠，为气血俱虚，用十全大补汤。慎不可专治其外，复伤气血也。

附　治　验

一妇人耳内外肿痛，胸胁不利，寒热往来，小便不调，余以为肝火伤血，先用龙胆泻肝汤四剂，诸症顿退，又用加味逍遥散而愈。又因怒复作，用小柴胡汤而痊。

一妇人经行后，因劳怒发寒热，耳作痛。余以经行为血虚，用八珍汤加柴胡；怒气为肝火，用加味逍遥散；劳役为气伤，用补中益气汤加山栀而愈。

一妇人素郁怒，耳内作痛，肿燃寒热，面色青黄，经行则变赤，余用加味归脾汤、加味逍遥散而愈。

一妇人怀抱素郁，因怒耳作肿痛，经行不止，寒热发热，面色青赤，肝脉弦数，余以为久郁伤脾，暴怒伤肝，先用加味小柴胡汤，随用加味逍遥散而痊。

一妇人因怒发热，每经行两耳出脓，两太阳作痛，胸胁乳房胀痛，或寒热往来，或小便频数，或小腹胀闷，皆属肝火血虚。先用栀子清肝散二剂，又用加味逍遥散数剂，诸症悉退，乃以补中益气加五味而痊。

一妇人耳内肿痛出水，寒热口苦，燃连颈项，饮食少思，此肝火甚也，用小柴胡汤加山栀、牡丹皮稍愈，用加味逍遥散渐愈，用八珍汤加柴胡、丹皮、山栀，调补肝脾而全愈。

一妇人耳内外肿痛，胸胁不利，寒热往来，小便不调，此肝经湿热也，用龙胆泻肝汤四剂，诸症顿退，用加味逍遥散而全愈。又因怒复作，用柴胡清肝散而痊。

一妇人耳内不时胀痛，内热口干，劳则头晕，吐痰下带，此肝脾气虚也，朝用补中益气，夕用加味逍遥散而痊。

一孀妇耳内外作痛，不时寒热，脉上鱼际，此血盛之症，用小柴胡加生地以抑其血而愈。又项间结核如贯珠，寒热晡热，用加味归脾汤、加味逍遥散，调补肝脾而愈。

一妇人耳内外或作痛，或赤肿，或寒热，月经旬日而止，潮热内热，自汗盗汗，余以为肝脾气血俱虚而有热，用归脾汤、六味丸而愈。

一妇人性急，或耳内作痛，或耳外赤肿，发热胁胀，日晡益甚，余以为怒气伤肝，气血俱虚，朝用加味逍遥散加黄柏、桔梗，夕用归脾汤送地黄丸而愈。

一孀妇耳内外作痛，或项侧结核，内热晡热，月经不调，吐痰少食，胸膈不利，余以为郁怒伤肝脾，朝用归脾汤，以解脾郁生脾气，夕用加味逍遥散，以清肝火生肝血而愈。

一女子耳下肿赤，寒热口苦，月经不调，小便内结一块，此肝火气滞而血凝也，先用小柴胡加山栀、川芎、丹皮，又用柴胡清肝散而痊。

附治验方药

小柴胡汤　治肝胆经症，寒热往来，晡热潮热，身热，默默不欲饮食，或怒火口苦耳聋，咳嗽发热，胁下作痛，甚者转侧不便，两胁痞闷，或泻利咳嗽，或吐酸食苦水，皆用此药主之。

柴胡一钱　黄芩炒，一钱　人参　半夏各七分　甘草炙，五分

上姜水煎服。

加味小柴胡汤　治肝胆经风热，耳前后肿痛，或结核痈痛，或寒热晡热，或经候不调等症。即小柴胡加山栀、牡丹皮。

益脾清肝散　治肝经之症，寒热体痛，脾胃虚弱。

人参　白术炒　茯苓各一钱　甘草炒，五分　川芎　当归　黄芪各一钱　柴胡五分　牡丹皮七分

上水煎服。

栀子清肝散　治三焦及肝胆经风热，耳内作痒，或生疮出水，或胁肋胸乳作痛，寒热往来。

柴胡　山栀炒　牡丹皮各一钱　茯苓　川芎　芍药　当归　牛蒡子炒，各七分　白术炒　甘草各五分

上水煎服。

柴胡清肝散　治肝胆三焦风热怒火，以致项胸作痛，或头目不清，或耳前后肿痛，或寒热体疼。

柴胡　黄芩炒，五分　人参　山栀炒　川芎各一钱　连翘　桔梗各八分　甘草五分

上水煎服。

犀角地黄汤　治上焦有热，口舌生疮发热，或血妄行，或吐血，或下血。

犀角镑　生地黄　白芍药　黄芩炒　牡丹皮　黄连炒，各一钱

上水煎服。若因怒而患，加柴胡、山栀。

犀角升麻汤　治阳明热风热牙疼，或唇颊肿痛，或手足少阳经风热，连耳作痛。

犀角镑　升麻　防风　羌活各一钱　白附子五分　川芎　白芷　黄芩炒，各七分　甘草五分

上水煎熟，入犀末服。

益阴肾气丸方见六卷第三论

妇人瘰疬方论第三

妇人瘰疬，或因忧思郁怒，或因胎产经行，则肝胆脾肾受伤，以致前症。盖肝伤则血燥，血燥则筋挛，累累如贯珠，多生耳前后胸胁间。若寒热肿痛，乃肝气动而为病，用柴胡栀子散，以清肝火为主，佐以逍遥散以养肝血。若寒热既止而核不消，乃肝经之血亦病矣，宜用加味四物汤，以养肝血为主，佐以柴胡栀子散，以清肝火。若初生如豆，附着于筋，白色不变，内热口干，精神倦怠，久不消溃，乃肝脾亏损，用逍遥散、归脾汤、六味丸，以健脾土、培肝木，切不宜用散坚追毒之剂。故《外台秘要》云：肝肾虚热则生疬矣。《病机》云：瘰疬本系胃梁丹石之毒，因虚劳气郁所致，补形气，调经脉，其疮当自消散。若误下之，先犯病禁经禁矣。若久溃不敛，脉浮大，邪火盛也。面色㿠白，金克木也。皆不治。凡瘰疬赤脉贯瞳子有几条，则几年死，无则可治。

附　治　验

一妇人患前症，久而不愈，或以为木旺之症，不宜于春，预用散肿溃坚汤，肿硬益甚。余以为肝经亏损，用六味地黄丸、补中益气汤，至春而愈。此症若肝经风火自病，元气无亏，可用散坚泻青之剂。若肝自损亏，或水不生木，用地黄丸。若金来克木，须补脾土生肾水。若行攻伐，则脾胃伤而反致木克土矣。

一妇人患之，少寐年余而溃，脓水淋漓，月经或五六十日一至，误服通经丸，展转无寐，午前恶寒，午后发热。余谓思虑伤脾，用归脾汤作丸，午前以六君子送下，午后以逍遥散送下。两月余得寐，半载后经行如期，年余而疮愈。

一妇人溃后发热，烦躁作渴，脉大而虚，此血虚也，以当归补血汤，六剂而寒热退，又以圣愈汤数剂而全愈，更以八珍加贝母、远志而疮敛。

一疬妇面黄体倦，咽酸嗳气，余以为中气虚弱，欲用补中益气汤加茯苓、半夏。不信，反降火利气，胸膈痞满，疬疮肿痛，又散坚利气，嗳气不绝，大便不实，四肢时冷。

余曰：今变中气虚寒矣。用六君子汤加姜、桂，少用升麻、柴胡渐愈，更佐以补中汤寻愈。

一妇人患此嗳气，用降火清胃，食少吞酸，胸膈痞闷。用利气消导，吐痰气促，饮食日少；用清热化痰，大便坚涩，内热身瘦。余曰：吞酸嗳气，脾胃气虚也；胸痞痰喘，脾肺气虚也；大便坚涩，内热日瘦，脾肺血虚也。遂以补中益气加炒黑吴茱萸二分数剂，佐以六味丸，诸症顿退，乃用归脾汤、逍遥散，间服而愈。

一妇人患前症，遍身作痒，脉大而虚，此气血俱虚，不能荣于腠理，以十全大补汤治之而愈。大凡溃后，午前痒作气虚，午后痒作血虚。若作风症治之必死。

一妇人项核肿痛，察其气血俱实，先以必效散一服去之，更以益气养荣汤三十余剂，补之而消。盖此症初起而血气虚弱者，先用前汤，待其气血稍充，乃用必效散以去其毒，仍用补药，无不奏效。若已成脓者，即针而补托之。气血复而核不消者，服散坚之剂。倘不应而气血如故，仍以必效散、养荣汤。又不应，灸肘尖、肩髃二穴，用豆豉饼、琥珀膏自愈。若气血壮实，不用追蚀，亦能自腐。用药以腐之者，使易于收敛耳。若血虚而用追蚀，不惟无益，适以取败。凡不慎饮食七情者，不治。

附　方　药

当归川芎散　治手足少阳经血虚疮症，或风热耳内痒痛，生疮出水，或头目不清，寒热少食，或经水不调，胸膈不利，腹胁痞痛，小便不调。

当归　川芎　柴胡　白术炒　芍药炒，各一钱　牡丹皮　茯苓各八分　蔓荆子　甘草各五分　山栀炒，一钱二分

上水煎服。若肝气不平，寒热往来，加柴胡、地骨皮。肝气实热，加柴胡、黄芩。肝脾气血虚热，加参、芪、熟地。脾虚饮食少思，倍加白术、茯苓。脾虚胸膈不利，加人参、黄芪。脾虚痰滞，胸膈不利，加半夏。肝气不顺，胸膈不利，加木香。肝虚小腹痞满，或时作痛，加熟地。脾血不足，小腹作疼，加肉桂。日晡发热，加熟地。

加味地黄丸　治肝肾阴虚诸症，或耳内痒痛出水，或眼昏痰喘，或热渴便涩等症。

干山药　山茱萸肉　牡丹皮　泽泻　白茯苓　熟地黄自制　生地黄　柴胡　五味子各另为末，等分

上将二地黄酒拌杵膏，加蜜丸桐子大。每服百丸，空心白汤下。如不应，用加减八味丸。

人参养荣汤　治溃疡寒热，四肢倦怠，体瘦少食，面黄气短，不能收敛。大疮愈后，多服之，庶不变他症也。

人参　陈皮　黄芪炒　桂心　当归　白术炒　甘草炙，各一钱　熟地黄自制　五味子炒杵茯苓各七分　白芍药一钱五分　远志去心炒五分

上姜枣，水煎服。

泻青丸　治肝经实火，胁乳作痛，或恶寒发热，大便秘结。

当归　龙胆草炒焦　川芎　山栀炒　大黄炒　羌活　防风各等分

上为末蜜丸，桐子大，每服二四丸，白汤下。若阴血不足，肝火血燥，用四物加山栀、柴胡，或逍遥散加丹皮、山栀。若肾水亏损，不能生肝木而筋挛结核，或肢节拳搐，或似中风，涎痰上涌，用六味丸料煎服。

生地黄丸　治师尼寡妇室女，乍寒乍热，或颈间结核，肝脉弦长，而出鱼际。

赤芍药一两　秦艽　黄芩　硬柴胡各五钱　生地一两，酒拌杵膏

上为末，入地黄膏，加炼蜜少许，丸桐子大，每服三十丸，乌梅煎汤下，日进二服。

连翘饮子　治肝胆经气滞，瘰疬结核，或乳内结核者。

连翘　川芎　瓜蒌仁研　皂角刺炒　橘叶　青皮　甘草节　桃仁各一钱

上水煎服。

散肿溃坚汤　治瘰疬坚硬，气血无亏者宜用。

升麻　连翘　当归尾酒拌　白芍药炒　黄柏酒炒　葛根　三棱酒拌微炒　广术各三分　龙胆草酒炒　桔梗炒　知母酒炒　瓜蒌根　昆布各五分　柴胡四分　甘草炙，二分　黄芩酒炒、四分半

上水煎服。

必效散　治瘰疬，未成者消，已溃者敛。须元气无亏者可服。若孕妇禁饵。

南硼砂二钱五分　轻粉一钱　斑蝥四十枚，去头翅同糯米炒熟去米　麝香五钱　巴豆五粒去壳心膜　白槟榔一个

上为末，每服一钱，五更用滚汤调下。如小水涩滞，或微痛，此疬毒欲下也，进益元散，一服即下。此方斑蝥、巴豆似为峻厉，然用巴豆乃解斑猫之毒，用者勿畏。

益元散

滑石末，六钱　甘草末，一钱

每服一钱，白汤调。

琥珀膏　治颈项或腋下初结小核，渐如连珠，溃而脓水不绝，成漏症者。

琥珀一两　丁香　桂心　朱砂　木香　松香　白芷　防风　当归　木鳖子肉　木通各五钱　麻油二斤

上先用琥珀等六味为末，其余药入油煎焦黑，滤去渣，徐徐入黄丹，再煎，软硬得中，入前末即成膏矣。

针头散　治一切顽疮，内有瘀肉，或疬核不化，疮口不合，宜此药腐之。

赤石脂五分　乳香　白丁香　砒霜生用　黄丹各一钱　轻粉　麝香各五钱　蜈蚣一条，炙干

上为末，搽瘀肉上，其肉自化。若疮口小，用糊和作细条，阴干纴之。凡疮久不合者，内有脓管，必须用之。

逍遥散　**归脾汤**二方见本卷第四论　**柴胡清肝散**　**栀子清肝散**二方见本卷第二论　**补中益气汤**方见本卷第十论　**四物汤**　**加味四物汤**　**六君子汤**三方见本卷第六论　**六味丸**　**当归补血汤**二方见本卷第十一论　**圣愈汤**方见本卷第九论　**益气养荣汤**方见本卷第五论　**灸肩髃、肘尖法**方见本卷末五

妇人结核方论第四

妇人结核，皆因郁怒亏损肝脾，或因胎产经行失于调养，或因暴怒触动胆火。若结于项侧耳前后，或胸胁胁痛，或发寒热，属胆经风热怒火，宜用柴胡清肝散加钩藤、山栀，以养血气清肝火。若结于肉里，其色不变，晡热内热，属肝火血虚，宜用加味逍遥散加龙胆草，以养肝血清肝火。或结于肢节，或累累如贯珠，其色不变，亦肝火血燥而筋挛，宜用柴芍参芩散加钩藤，以养血气，佐以六味丸，以生肾水。若时消时作，此气滞而痰结也，用归脾、六君二汤，以调和脾肺之气，并佐以海藻丸。若溃而核不腐，或肉不生，或脓水清稀，肌寒肉冷，自汗盗汗，寒热内热，面色痿黄，食少体倦，便利不调者，五脏皆虚也，但用补中益气、加味六君子二汤，调补脾胃，以滋诸脏，则各症自退。故经云：形伤则痛，气伤则肿。慎不可轻用行气破血之剂，以复伤也。

附　治　验

一妇人项结核，寒热头痛，胁胀乳痛，内热口苦，小便频数，属肝火血虚，用加味四物而愈，又用加味逍遥散调补肝脾而安。

一妇人经事不调，肢体结核，如橡如豆，不计其数，隐于肉里，其色不变，三年余矣，大按则痛。或投以降火消毒，乃不按自痛，发汗作渴，日晡益甚，经水过期，左关脉数。此肝火血燥也，用清肝益荣汤，六十余剂，诸症已愈，惟项核未消，又以当归龙荟丸数服，及八珍汤加柴胡、山栀，三十余剂而痊。

一妇人久郁怒，胸胁内股外臁各结核，寒热往来，经候不调，胸膈不利，饮食少思，大便不调，左关弦洪，左寸弦数，右关弦紧，右寸弦浮。余谓左关弦洪，肝经热也；左寸弦

数，木生火也；右关弦紧，肝克脾也；右寸弦浮，木侮金也。法当生肝血，遂用加味四物汤而诸症退，用加味逍遥散而经候调，用加味归脾汤而全愈。

一妇人因怒，肢体结核，睡中发搐，左关弦洪。余曰：此为肝火血燥筋挛，当清肝火养元气。遂用加味小柴胡汤、加味逍遥散渐愈，又用八珍汤加牡丹皮、柴胡、山栀、钩藤而愈。

一妇人肢体结核，胸腹痞闷，气泄稍宽，余谓此肝脾郁滞。不信，服降火行气化痰，病愈甚而气愈虚。余用加味逍遥、加味归脾二药，间服半载而痊。

一妇人项间结核，不时寒热，左目紧小，头项振掉，四肢抽搐，此肝火血虚风热也，用加味逍遥加钩藤数剂，诸症渐愈，又用八珍汤调理而痊。

一妇人耳内耳后项侧，结核作痛，寒热口苦，月经不调，此肝胆经火而伤脾胃也，用四君、柴胡、丹皮及六味地黄而愈。

一妇人因怒结核，经行不止，发热，昼安静而夜谵语，此血分有热也，用小柴胡加生地顿安，其核尚在，经候先期，肝脉弦数，此肝火血涸而筋挛也，用加味逍遥加生地，月经如期而核消。

一妇人项臂结核，头痛寒热，乳内时疼，两胁掀痛，余以为肝脾郁火而血燥，先以加味逍遥散，再用加味归脾汤而愈。

一妇人素郁怒，患前症，内热晡热，久而不愈，若面色痿黄则月经过期而少，若面色赤则月经先期而多。余曰：面黄过期，脾经虚弱也；面赤先期，脾虚火动也。朝用补中益气，升举脾土，以益气血；夕用加味逍遥，滋养肝血，以息阴火；复以归脾汤解郁结，半载元气复而痊。又有患前症，因脾虚下陷而发热，乃专治其疮，变瘵而毙。

一女子耳下结核，掀痛寒热，此属肝经风热，用栀子清肝散一剂，诸症悉愈。后因怒，耳后并额两角，作痛寒热，此兼少阳经症，仍以前药加羌活，二剂而瘥。

一妇人项患五核，时常寒热，肝脉弦长而出寸口，此血盛无耦之症也，用小柴胡汤加生地、乌梅治之而愈。

一妇人腹中结块，误认血鳖，服驱逐之药，下血甚多，致肢节间结核。治法见二十卷第十一论

附　方　药

八珍汤　治脾胃伤损，恶寒发热，或烦躁作渴，或因脾胃亏损，脓水清稀，久不能愈等症。即四君、四物二汤相合。方见本卷第二论

十全大补汤　治疮疡胃气虚弱，肿痛不消，或溃而不敛，或自汗盗汗，食少体倦，或寒热作渴，头痛眩晕，或似中风。又治气血俱虚，胸腹胁痛，或作胀满，或骨节作痛，经候不调，或寒热晡热，五心烦热，或吐血咽干，头痛眩晕，眼目昏涩，或痰嗽喘促，胸膈虚痞，或呕吐泄泻，手足冷热。即八珍汤加黄芪、肉桂。

加味逍遥散　治肝脾血虚有热，遍身搔痒，或口燥咽干，发热盗汗，食少嗜卧，小便涩滞等症。又治瘰疬流注，虚热等疮。

甘草炙　当归炒　芍药酒炒　茯苓　白术炒，各一钱　柴胡　牡丹皮　山栀炒，五分

上水煎服。

逍遥散　即前方去丹皮、山栀。

归脾汤　治脾经失血少寐，发热盗汗；或思虑伤脾，不能摄血，以致妄行；或健忘怔忡，惊悸不寐；或心脾伤痛，嗜卧少食；或忧思伤脾，血虚发热；或肢体作痛，大便不调；或经候不准，晡热内热；或瘰疬流注，不能消散溃敛。

人参　白术炒　黄芪炒　白茯苓　龙眼肉　当归　远志　酸枣仁炒，各一钱　木香　甘草炙，各五分

上姜枣水煎服。

加味归脾汤即前方加柴胡、山栀

柴术参苓汤　治肝火血热，遍身瘙痒，或起赤晕，或筋挛结核。

白术炒　人参　茯苓各一钱　柴胡　川芎　山栀　芍药炒　甘草炒，各五分　熟地自制　当归各八分

上水煎服。

柴芍参苓散　治肝胆经部分结核，瘰疬瘤瘿等症。或肝血燥热，脾气虚弱，发热少食。

柴胡　芍药炒　人参　茯苓　白术炒　山栀炒　陈皮　当归各一钱　牡丹皮　甘草各五分

上姜枣水煎服。

清肝益荣汤　治肝胆经风热，血燥筋挛结核，或作瘿子。

柴胡　山栀炒，各五分　当归　川芎　芍药炒，各一钱　熟地黄自制　白术炒　木瓜不犯铁器　茯苓各九分　甘草三分　龙胆草酒拌炒黑，五分　薏苡仁五分

上水煎服。

清热凉血饮　治风热血燥、丹毒等症，大便秘结。

当归　川芎　大黄炒　芍药炒　生地黄各一钱

上水煎服。

神效开结散　消瘿块甚效。

沉香　木香各二钱　橘红四两　珍珠四十九粒，入砂锅内，以盐泥封固，煅赤，取出去火毒用　猪厌肉子四十九枚，用豚猪者，生项间如枣子大

上为末，每服一钱，临卧酒调，徐徐咽下。患小者三五服，大者一剂可愈。切忌酸咸油腻滞气之物，须用除日，子静室修合。

海藻散坚丸　治肝经瘿瘤。

海藻　昆布各二两　小麦四两，醋煮晒干　柴胡二两　龙胆草酒拌炒焦，一两

上为末，炼蜜丸，桐子大，每服二三十丸，临卧白汤送下。噙化咽之尤好。凡患瘰疬，服调治之药，未应，宜佐以前二药。

九味柴胡丸方见本卷第八论　**栀子清肝散**二方见本卷第二论　**柴胡清肝散**方见本卷第三论　**生地黄丸**方见本卷第三论

妇人流注方论第五

妇人流注，或因忧思郁怒，亏损肝脾，或因产后劳役，复伤气血，以致荣气不从，逆于肉里，腠理不密，外邪客之，或湿痰流注，或跌扑血滞，或产后恶露，则气流而注，血注而凝，或生于四肢关节，或流于胸腹腰臀，或结块，或漫肿，皆属虚损。急用葱熨，及益气养荣汤，则未成者自消，已成者自溃。若肿起作痛，起居如常，饮食如故，属病气有余，形气未损者，尚可治。若漫肿微痛，起居倦怠，饮食少思，属形气病气俱不足，最为难治。不作脓，或脓成不溃，气血虚也，用八珍汤。憎寒畏寒，阳气虚也，十全大补汤。晡热内热，阴血虚也，四物加参、术。作呕欲呕，胃气虚也，六君加炮姜。食少体倦，脾气虚也，补中益气加茯苓、半夏。四肢逆冷，小便频数，命门火衰也，八味丸。小便频数，痰盛作渴，肾水亏损也，六味丸。月经先期，不日而止，肝脾虚弱也；月经过期，多日不止，肝脾虚热也；八珍汤加柴胡、丹皮。凡溃而寒凝，疮口不敛者，用豆豉饼祛散之。其溃而有脓，管不敛者，用针头散腐化之。若不补气血，不节饮食，不慎起居，不戒七情，或用寒凉克伐者，俱不治。

附　治　验

一妇人左臂患之，年许不溃，坚硬不痛，脉弱少食，月经过期，日晡发热，劳怒则痛。此形气虚而逆于肉里也，与参、芪、归、术、川芎、芍药、熟地、贝母、远志、香附、桔梗、丹皮、甘草，百余贴而消。

一妇人因暴怒而腰肿一块，或胸膈不利，或走气作痛，此荣气郁滞，与方脉流气饮数剂而止，更以小柴胡对四物加香附、贝母，月余而愈。

一妇人因怒，胁下肿痛，胸膈不利，脉

息沉滞，此荣气郁遏而为肿，用方脉流气饮数剂少愈，以小柴胡对二陈加青皮、桔梗、贝母，数剂顿退，更以小柴胡对四物、二十余剂而痊。

一妇人因闪肭肩肿，遍身作痛，用黑丸子二服而痛止，又用方脉流气饮二剂而肿消，更以二陈对四物加香附、枳壳、桔梗而愈。

一妇人患此，过劳必痛，众手按之痛乃止，属气血俱虚，用十全大补汤、六味丸、逍遥散而痊。

一妇人先肢体作痛，后患流注，发热恶寒，食少胁胀，月经不调。痰盛喘嗽，五心烦热，健忘惊悸，盗汗无寐，悉属肝脾亏损，气血不足，用十全大补、加味归脾兼服，诸症悉痊。

一妇人素头晕，患流注，月经迟少，此属中气虚弱，用补中益气汤而愈。后因劳仆地，月经如涌，此劳伤火动，用前汤加五味子，一剂而愈。

一妇人患前症，用行气化痰等药，胸膈不利，饮食少思，用疏利之药，大便作泄，中满不食。余以为脾胃复伤，用补中益气汤加煨姜，脾胃健，饮食进，又用六君加芎、归，百余剂而愈。

一妇人素郁结，肩臂各肿如覆杯，余以为肝脾亏损，用加味逍遥散百余剂，元气复而肿消。后因劳役怒气，经行不止，服凉血之剂，其血如崩，余以为此因脾气复伤下陷，而血从之，朝用补中益气汤，夕用加味归脾汤而愈。

一妇人怀抱郁结，不时心腹作痛，寒热倦怠，服行气化痰等剂，遍身结核，大小不一二十余枚，诸药不应，余用加味归脾汤而愈。

一妇人腿患筋挛骨痛，诸药不应，脉迟紧，此肝脾气血虚弱，而寒气之变也，用大防风汤二剂顿退，又二剂而安。又一妇患之亦然，先用前药二剂，更服黑丸子而痊。此二患，若不早治，以致内溃，必成败症矣。

一妇人患前症，溃后发热，余以为气血俱虚。彼不信，乃服败毒表散之药，果发大热，竟至不救。夫溃疡虽有表症发热，宜以托里为主，而佐以表散之剂，况于瘰疬流注乎？

附　方　药

仙方活命饮　治一切疮疡，未成者即散，已成者即溃。又止痛消毒之良剂也。

白芷　贝母　防风　赤芍药　当归尾　甘草节　皂角刺炒　穿山甲炙　天花粉　乳香　没药各一钱　金银花　陈皮各二钱

上用酒一大碗，煎五七沸服。

托里消毒散　治疮疽元气虚弱，或行攻伐，不能溃散，服之未成即消，已成即溃，腐肉即去，新肉即生。

人参　黄芪盐水拌炒　当归　川芎　芍药炒　白术　茯苓各一钱　金银花　白芷各七分　甘草五分

上水煎服。

托里散　治疮疡因气血俱虚，不能起发，或腐溃不能收敛，及恶寒发热者。

人参气虚多用之　黄芪炒、各一钱　白术炒　陈皮　当归　熟地黄自制　茯苓　芍药酒炒、各一钱

上水煎服。

益气养荣汤　治怀抱抑郁，瘰疬流注，或四肢患肿，肉色不变，或日晡发热，或溃而不敛。

人参　茯苓　陈皮　贝母　香附　当归酒拌　川芎　黄芪盐水拌炒　熟地黄酒拌　芍药炒、各一钱　甘草炙　桔梗炒、各五分　白术炒、二钱

上姜水煎服。

木香饼　治气滞结肿闪肭，风寒所伤作痛。

木香五钱　生地黄一两

上木香为末，地黄杵膏和匀，量患处大小作饼，置患处，以热熨斗熨之，肿痛悉退。

二陈汤　治中脘停痰，饮食少思，呕逆等症。

陈皮去白　茯苓　半夏各二钱　甘草炙，五分

上水煎服。

方脉流气饮　治恼怒胸膈胀满，或肢体作痛，或结壅肿，血气无亏。方见第三卷第七论等症

隔蒜灸法　治一切疮毒，大痛或不痛，或麻木。如痛者灸至不痛，不痛者灸至痛，其毒随火而散。用大蒜头去皮，切三分厚，安疮头上，用艾壮于蒜上灸之三壮，换蒜复灸，未成者即消，已成者亦杀其大势，不能为害。如疮大，用蒜捣烂摊患处，将艾铺上烧之，蒜败再换，仍服托里之剂。如不痛，或不作脓，不起发者，不治，此气血虚极也。

神效葱熨法　治虚怯人肢体患肿块，或不痛，或作痛，或风袭于经络，肢体疼痛，或四肢筋挛骨痛。又治流注跌扑伤损肿痛。用葱头细切，杵烂，炒热敷患处，冷易之，再熨，肿痛即愈，其效如神。此外补阳气，而运散壅滞之法也。

豆豉饼　治疮疡肿硬不溃，或溃不敛，并一切顽疮恶疮。用江西豆豉为末，唾津和作饼，大如钱，厚如三文，置患处，加艾壮于上灸之，干则易之。若背疮大者，用漱口水和饼覆患处，铺艾于上灸之。如未成者则消，已成者能杀其毒。有不效者，乃气血虚也。为不治。

大防风汤方见本卷第九论　**八珍汤**方见本卷第三论　**十全大补汤**方见本卷第九论　**六君子汤**　**四物汤**二方见本卷第六论　**补中益气汤**方见本卷第十论　**八味丸**　**六味丸**二方见本卷第十一论　**针头散**方见本卷第三论　**小柴胡汤**方见本卷第二论　**黑丸子**一名和血定补丸方见本卷第九论

妇人血风疮论第六

妇人血风疮，因肝脾肺经风热，或郁火血燥所致。其外症或身发疙瘩搔痒，或如丹毒痒痛，或搔破脓水淋漓。其内症月经失常，小便不调，夜热内热，自汗盗汗，恶寒憎寒，肢体倦怠，饮食不甘，寒热往来。若发热作痛，属肝经风热，用当归饮加柴胡、山栀。若寒热作痛，属肝脾郁火，用小柴胡加山栀、黄连。若疙瘩搔痒，属肺经风热，用清热消风散。若经候失常，内热晡热，属肝脾血虚，用加味逍遥散。若肢体倦怠，寒热往来，属肝脾气虚，用加味四君子加柴胡、丹皮。若夜热作渴，或兼谵语，乃血分有热，用小柴胡加生地黄。血虚，用四物合小柴胡。若无寐盗汗，内热晡热，乃脾经血虚，用归脾汤；兼寒热，加山栀。若愈后身起白屑，搔则肌肤如帛所隔，此气血虚不能荣于腠理，用十全大补汤。若用风药以治其外，则阴血复伤，反致他症矣。

附　治　验

一妇人素清苦，四肢患之，误服败毒寒凉，晡热内热，自汗盗汗，月经不行，口干咽燥。余谓四肢者，脾之所主，当调养脾血，其病自愈，遂用归脾汤数剂而愈。

一妇人性躁患之，寒热口苦，胁痛耳鸣，腹胀溺涩，年余矣。此属肝火伤脾，用四君子加柴胡、炒山栀、炒龙胆数剂，更与逍遥散兼服而疮愈，又与六味丸及逍遥散，七十余剂而愈。

一妇人日晡身痒，月余口干，又月余成疮，服祛风治疮之剂，脓水淋漓，午前畏寒，午后发热，殊类风症。余谓此肝火伤脾，外邪所搏，先用补中益气加山栀、钩藤，又以逍遥散加川芎、贝母而愈。

一妇人瘙痒发热，日晡益甚，皮肤赤晕，月经过期。此血虚而有热也，以逍遥散加熟地，热止痒退，更以四物加柴胡、参、芪、炙草、茯苓，调理遂愈。

一妇人怀抱久郁，患前症，脓水淋漓，服连翘消毒散，食少胸痞；服清气化痰汤，作呕吐痰；服清热化痰丸，烦热畏寒，四肢微

热，面目赤色，脉大而无力。余以为脾胃亏损，而虚寒隔阳气于外，遂用六君子汤加炮姜治之，诸症稍愈，饮食顿进。又佐以四物汤，诸症渐愈。又以四君子每味各一钱，四物汤每味各五分，诸症全愈。后因劳瞓热，体倦懒食，小腹痞坠，小便涩滞，自用四物、黄柏、知母，瞓热尤甚，更烦渴眩晕，余以为脾气下陷，用补中益气汤渐愈，乃佐以逍遥散而安。后月经至如崩，前症复作，此脾气伤而不能统血，血虚而阴火动也，仍用补中益气而痊。

一女子十二岁善怒，遍身作痒，用柴胡、川芎、山栀、芍药以清肝火，以生地、当归、黄芩以凉肝血，以白术、茯苓、甘草以健脾土而愈。半年后，遍身起赤痕，或时眩晕，此肝火炽甚，血得热而妄行，是夜果经至。

附　方　药

当归饮　治血热癞疹痒痛，脓水淋漓，发热等症。

当归　白芍药　川芎　生地黄　白蒺藜炒　黄芪各一钱　防风　荆芥　何首乌不见铁器　甘草各五分

上水煎服。

四君子汤　治胃气虚弱，或因克伐以致肿不消散，溃不收敛者，宜用此药调补脾胃，诸症自愈。若误用攻毒，七恶随至。若饮食少思，或食难化，或欲作呕，或大便不实，疮口出血，吐血便血，尤宜用之。凡气血俱虚之症，宜用前汤，但加当归，则脾胃健，饮食进，阴血生。若用四物沉阴，则脾胃复伤，反致他症。若命门火衰而脾土虚寒者，必用八味丸以补土母。

人参　白术　茯苓各二钱　甘草炙，一钱

上姜水煎服。

加味四君子汤　即前方四君子加川芎、当归。

六君子汤　治症同前。即四君子汤加陈皮、半夏各一钱。若中气虚寒假热，误服寒凉克伐，以致四肢发热，口干舌燥呕吐，此因寒气隔阳于外，须更加姜、桂，不应，急加附子。

四物汤　治血虚，或因失血，或因克伐，或因溃后，以致瞓热内热，烦躁不安。若脾虚不能生血者，宜四君加当归，并酒炒白术以补脾土，其血自生。若血虚发热，误服寒凉克伐之剂，以致发热作渴，目红面赤，脉洪大而虚，此血脱烦躁，急用当归补血汤。

当归酒拌，一钱　熟地黄二钱，自制　芍药炒，一钱　川芎二钱

水煎服。

加味四物汤　即四物加柴胡、牡丹皮、山栀。

神效当归膏　治一切疮疡，搔痒疼痛，去腐肉，生新肉，其效如神。如洗拭换膏，必须预备即贴之，新肉畏风故也。如用白蜡尤好。此药生肌止痛，补血续筋，故与新肉相宜。

当归　生地黄　黄蜡各一两　麻油六两

上先将当归、地黄入油煎黑去柤，入蜡溶化，候冷搅匀，即成膏矣。如用白蜡减半

滋阴肾气丸方见六卷第二论　**小柴胡汤**方见本卷第二论　**归脾汤**　**逍遥散**二方见本卷第四论　**六味丸**方见本卷第十一论　**补中益气汤**方见本卷第十论

妇人赤白游风方论第七

妇人赤白游风，属肝经怒火，血燥生风；或脾经郁结，血虚生热；或腠理不密，风邪外袭。其症或疙瘩搔痒，或脓水淋漓。白属气而赤属血，因得风而游行也。若肝经血燥，用柴胡清肝散。肝经怒火，用栀子清肝散。肝经血热，用加味四物汤。肝火血虚，用六味地黄丸。脾经郁热，用加味归脾汤。肝脾血虚风热，用加味逍遥散。若因风邪郁热所致，用荆防败毒散；或专用祛风之剂，肝血愈燥，则血随火化，反为败症矣。

附　治　验

一妇人素清苦，因郁怒患前症，晡热内热，自汗盗汗，月经不行，口干咽燥。余谓此郁气伤脾，乃以归脾汤数剂，诸症稍退，后兼逍遥散，五十余剂而愈。

一妇人患此，性躁寒热，口苦胁痛，耳鸣腹胀溺涩，乃肝脾血虚火旺也，用六君加柴胡、山栀、龙胆数剂，更与逍遥散兼服渐愈，又与六味丸、逍遥散，七十余剂，诸症悉退。

一妇人患前症，误服大麻风药，破而出水，烦渴头晕，诚类风症，六脉洪数，心肝脾为甚。余曰：风自火出，此因怒火，脾胃受邪，血燥而作，非真风症也。与逍遥散、六味丸以清肝火、滋脾土，生肾水而愈。

一妇人患前症，久不愈，食少体倦，此肝脾亏损，阴虚发热也，先用补中益气加川芎、炒栀，元气渐复，更以逍遥散而疮渐愈。

一妇人身如丹毒，搔破脓水淋漓，热渴头晕，日晡益甚，用加味逍遥散而愈。

一妇人患赤游风，晡热痒甚，余用清肝养血之剂，不信，乃服大麻风药，臂痛筋挛，又服化痰顺气之剂，四肢痿弱。又一妇患前症，数用风药、煎汤泡洗，以致腹胀并殁。

一女子赤晕如霞，作痒发热，三加味小柴胡，加生地、连翘、丹皮而愈。大凡女子天癸未至，妇人月经不调，受惊着恼，多有此症。

附　方　药

消风散　治风寒瘾疹痒痛，或脓水淋漓，头皮肿痒。

荆芥穗　甘草炙　陈皮　人参　茯苓　白僵蚕炒　防风　芎劳　藿香　羌活　蝉蜕各一钱　厚朴姜制．五分

上水煎服。

大连翘饮　治风热热毒，或赤白游风，表里皆受患者。

连翘　瞿麦　荆芥　木香　赤芍药　蝉蜕　甘草　防风　柴胡　滑石　山栀炒　黄芩炒　当归各一钱

上水煎服。

当归饮　治风热赤白游风作痒，或搔破脓水淋漓等症。

四物汤　治赤白游风，血虚发热，或晡热，头目不清，或烦躁不寐，或胸胁作痛等症。

六君子汤　治脾气亏损，皮肤瘙痒，或瘾疹不消。三方见本卷第六论

加味小柴胡汤　治肝胆经风热怒火，赤白游风，或寒热往来，晡热潮热身热，或口苦耳聋等症。方见本卷第二论

加味逍遥散　治血虚有热，遍身搔痒，赤白游风，发热晡热等症。

逍遥散　即前方去丹皮、山栀。

归脾汤　治脾经血虚，瘙痒发热，少寐盗汗等症。三方见本卷第四论

荆防败毒散方见本卷第十论

妇人疙瘩方论第八一名便痈，一名便毒，俗名搭子

妇人疙瘩，或肝经湿热下注，或郁怒伤损脾肝。其外症或两拗小腹肿痛，或玉门燋肿作痛，或寒热往来，憎寒壮热。其内症或小便涩滞，或腹内急痛，或小腹痞闷，或上攻两胁，或晡热重坠。若两拗小腹肿痛，肝经湿热壅滞也，用龙胆泻肝汤。玉门肿胀，肝火血虚也，用加味逍遥散及龙胆泻肝汤加木香。若概投散血攻毒之剂，则误甚矣。

附　治　验

一妇人拗中赤肿胀痛，此脓内作，用托里消毒散加柴胡数剂，溃而脓清寒热，乃气血复虚，用托里散而寒热止，用十全大补百余剂而敛。

一妇人腹拗肿痛，寒热口苦，或时带下，此肝经湿热不利也，用龙胆泻肝汤而肿痛消、

用加味逍遥散而寒热退。

一妇人腹拗肿痛，小水不利时，或胸乳作痛，胁腹作胀，此肝火气滞，用四物、柴胡、青皮、玄胡索、木香而愈。

一妇人拗中作痛，小腹痞闷，小便不利，内热体倦，饮食少思，此肝火内动，脾胃受伤也，用加味归脾汤、柴胡清肝散而安。

一妇人拗中肿胀，小腹作痛，服下血之剂，其痛益甚，更吐泻少食，余以为肝脾复伤，用六君子汤加升麻、柴胡而愈。

一妇人两拗肿痛，腹内一块，不时上攻，月经不调，小便不利，余以为肝脾气滞而血伤，以四君加芎、归、柴胡、山栀而愈。后因郁怒，前症复作，兼胸满腹胀盗汗，此肝木甚而伤脾土也，用加味归脾汤，下芦荟丸而痊。

一妇人小腹内或作痛，或痞闷，两拗肿痛，内热寒热，胸膈不利，饮食不甘，形体日瘦，此肝气滞而脾气伤也，朝用补中益气汤，夕用芦荟丸渐愈，更用六味地黄丸全愈。

一妇人两拗肿痛，小腹痞胀，白带时下，寒热往来，小水淋沥。余作肝气滞而血病，用龙胆泻肝汤渐愈，又用加味逍遥散、六味地黄丸全愈。

一妇人患前症，胸胁胀闷，或小水不利，或时腹痛，此肝火气病，先用龙胆泻肝汤以清肝热，又用加味逍遥散以生肝血，六味地黄丸以滋肾水而愈。

一妇人患前症，余以为肝脾郁怒，不信，另服化痰利气之剂，胸腹愈胀，又服峻利疏导之剂，变脾虚发肿而殁。

一妇人患前症，内热作渴，饮食不甘，肢体倦怠，阴中作梗，小便赤涩，此脾经郁结，肝经湿热，用加味归脾汤而愈。后因怒复作，小腹胀痛，用小柴胡加山栀、芎、归痛止，又用加味逍遥散而愈。

一妇人两拗作痛，寒热内热，小便赤涩，胸胁不利，此肝火动而脾气伤也，用补中益气汤加茯苓，数剂少愈，又与加味归脾汤，诸症悉退，再用加味逍遥散而愈。

一妇人小腹痞闷，溺涩内热，体倦懒食，此肝火动而脾血伤也，用八珍加柴胡、山栀、胆草而安。

一妇人阴中如梗，两拗肿痛，寒热不食，小便频数，小腹重坠。余以为肝脾郁怒所致，先以补中益气加茯苓、山栀、车前子、青皮以清肝火，升脾气，更以加味归脾汤调理脾郁而愈。

附　方　药

龙胆泻肝汤　治肝经湿热，两拗肿痛，或腹中疼痛，或小便涩滞等症。

龙胆草酒拌炒黄　泽泻各一钱　车前子炒　木通　生地黄酒拌　当归酒拌　山栀炒　黄芩炒　甘草各五分

上水煎服。

九味柴胡汤　治肝经湿热下注，便毒肿痛，或小腹胁肋结核。凡肝胆经部分，一切疮疡，或风热结核瘰疬。

柴胡　黄芩炒，各一钱　人参　山栀炒　半夏　龙胆草炒焦　当归　芍药炒　甘草各五分

上水煎服。

芦荟丸　治肝气不和，克侮脾胃而患诸症，或三焦肝胆经风热，目生云翳，或疳热瘰疬，耳内生疮，寒热作痛，肌体消瘦，发热作渴，饮食少思，肚腹不调，或牙龈蚀落，颊腮腐烂，下部生疮等症。

芦荟五钱　胡黄连　当归　芍药炒　龙胆草酒浸炒焦　川芎　芜荑各一两　木香　甘草炒，各二钱

上为末，用米糊丸麻子大，每服五十丸，滚汤下。

加味小柴胡汤

小柴胡汤　治肝经下部肿胀，小便不利，或寒热往来，或晡热潮热，或胸胁作痛。方见本卷第三论

加味逍遥散　治肝脾血虚，湿热流注下

部诸症，发热晡热，寒热。

加味归脾汤　治脾肝郁怒，下部诸症，寒热晡热，少食无寐，或经候不调。二方见本卷第四论

补中益气汤　治元气下陷，下部重坠，或晡热寒热，少食体倦，或因过服寒凉之药所致。方见本卷第十论

加味四物汤方见本卷第六论

八珍汤　治气虚寒热晡热，或寒热往来，下部诸症。方见本卷第三论

妇人鹤膝风方论第九

妇人鹤膝风症，因胎产经行失调，或郁怒亏损脾肝，而为外邪所伤。或先腿脚牵痛，或先肢体筋挛，既而膝渐大，腿渐细，如鹤之膝，故名之也。若肿高赤痛者易治，漫肿不赤痛者难治。二三月溃而脓稠者易治，半载后溃而脓清者难治。设用攻伐，已损元气，尤为难治也。大要当固元气为主，而佐以大防风汤。若食少体倦者六君子汤为主，晡热内热者逍遥散为主，寒热往来者八珍汤为主，发热恶寒者十全大补汤为主，少寐惊悸者归脾汤为主，月经过期者补中益气为主，月经先期者加味逍遥散为主。凡溃后当大补脾胃，若脓出反痛或寒热烦渴等症，皆属气血亏损，一于培补，庶保终吉。

附　治　验

一妇人久郁怒，胸胁不利，内热寒热，经候不调，遍身酸痛。余谓胃气亏损，先用补中益气汤加半夏、茯苓，二十余剂，胃气渐醒。又用大防风汤与归脾汤，膝肿渐消。用加味逍遥散、大防风汤而全消。又用八珍汤加牡丹皮，调理气血而安。

一妇人患前症，肿痛寒热，先用大防风汤一剂，又用加味逍遥散四剂，月余肿痛渐退。惑于速效，另服祛风败毒，虚症蜂起，仍用大防风为主，佐以十全大补而消。又服大补汤，两月余而痊。

一妇人患前症，两拗中腿股筋牵作痛，内热寒热，此肝火气滞之症，先用加味小柴胡汤四剂，后以加味逍遥散为主，佐以大防风汤而消。又患痢后，两膝肿痛，寒热往来，用十全大补汤为主，佐以大防风汤而仍消。

一妇人患之，虽溃而肿不消，朝寒暮热，饮食不思，经水三四月一至，此属肝脾气血俱虚也，用补中益气、加味归脾二汤，各三十余剂，肿渐消而寒热止，又佐以大防风，月余而能步履，再月余经行如期，又服六味丸、八珍汤，三月而敛。

附　方　药

大防风汤　治阴虚邪袭，腿膝肿痛等症。

防风　附子炮　牛膝酒浸　白术炒　羌活　人参各一钱　川芎一钱五分　肉桂一钱　黄芪炒、一钱　芍药炒　杜仲去皮姜汁挫炒　甘草炙、各五分　熟地黄自制，一钱五分

上水煎服。

黑丸子一名和血定痛丸　治跌扑坠堕，筋骨疼痛，或瘀血壅肿，或外感风寒，肢体作痛。若流注膝风，初结服之自消。若溃而脓清，与补气血药自敛。孕妇勿服。

百草霜　白芍药各一两　南星　川乌各炮，三钱　白敛　赤小豆各一两六钱　白及　当归骨碎补焙，各八钱　牛膝焙，六钱

上为末，酒糊丸桐子大，每服三十丸，盐汤温酒任下。

圣愈汤　治血虚心烦，睡卧不宁，或五心烦热。

地黄酒拌蒸半日　生地黄酒拌　黄芪炙　人参　川芎　当归各一钱

水煎服。

六味丸方见本卷第十论　**逍遥散**　**加味逍遥散**　**八珍汤**　**十全大补汤**　**归脾汤**五方见本卷第四论　**补中益气汤**方见本卷第十论　**四物汤**　**六君子汤**二方见本卷第六论

妇人下注臁疮方论第十

妇人两臁生疮，或因胎产饮食失宜，伤

损脾胃。或因忧思郁怒，亏损肝脾，以致湿热下注，外邪所搏。外臁属足三阳，可治；内臁属足三阴，难治。若初起发肿赤痛，属湿热所乘，用人参败毒散或槟苏败毒散。若漫肿作痛，或不肿不痛，属脾虚湿热下注，补中益气汤；气血俱虚，八珍汤。若脓水淋漓，体倦少食，内热口干，属脾气虚弱，补中益气加茯苓、酒炒芍药。若午后头目不清，属脾虚阴火，用前汤加熟地、芍药。若午后发热倦怠，属气虚血弱，用前汤加川芎、熟地。若怀抱郁怒，属脾气不舒，用归脾汤加川芎、山栀。若内热体倦，痰涎口疮，属脾肾虚热，用六味丸。若肢体畏寒，饮食少思，属脾肾虚寒，用八味丸。大抵色赤属湿热，易治；色黯属虚寒，难治。设误用攻伐，复伤胃气，多变瘵症。

附　治　验

一妇人两臁生疮，渐至遍身，发热吐痰，口燥咽干，盗汗，心烦足热，小便赤涩，日晡益甚，此肾足三虚阴火也，用加味逍遥散、六味丸而愈。

一妇人患前症，四畔微赤作痛重坠，脓水淋漓，胸膈不利，饮食少思，内热口苦，夜间少寐，此郁结伤脾血也，用归脾汤解郁结生脾血，用补中益气加茯苓、半夏，补脾气除湿热，寻愈。

一妇人久不愈，色赤微热，日晡燃肿，形体虚弱，饮食少思，劳则喘渴，恶寒发热，此为脾虚下陷，用补中益气汤而愈。

一妇人患已三年，色黯肿硬，恶寒发热，饮食少思，形体消瘦，作渴饮汤，饮食稍多，或腹胀，或泄泻，或作呕，或作酸，此脾气虚寒也，用补中益气加干姜五分，五十余剂而愈。

一妇人患此，因步履劳复，恶寒发热，倦怠懒食，而疮出血，此元气虚而不能摄血归经也，用补中益气汤而愈。

一妇人患之，因怒寒热头眩，或耳项脑胁胀痛，或小腹阴道闷坠，或小便频数下血，此属肝火血热，先用小柴胡加炒黑山栀、芎、归、车前，二剂。诸症悉退。又用加味逍遥而愈。后因饮食劳倦，前症复作，疮口出血，用补中益气汤而安。

一妇人患将两月，燃肿赤痛，小便频数，饮食如常，此湿毒甚而气血虚，先用活命饮二剂去其湿毒，又用八珍汤调补气血而愈。

一妇人患此，燃痛，恶寒发热，此湿热乘于足三阳经分，用槟苏败毒散而寒热退，用仙方活命饮而燃痛止，再用补中益气汤而形气健。

附　方　药

人参败毒散　治疮疡燃痛，寒热，或拘急头痛。

人参　羌活　独活　前胡　柴胡　桔梗　枳壳麸炒　茯苓　川芎　甘草各一钱

上水煎服。

槟苏败毒散　即人参败毒散加槟榔、紫苏。

补中益气汤　治元气虚损，或因克伐，恶寒发热，倦怠少食，或不能消散生肌，或兼饮食劳倦，烦热作渴。

黄芪炒　人参　白术炒　甘草炙　当归各一钱　陈皮五分　柴胡　升麻各三分

上姜枣水煎，空心，午前服。

乌沉汤　生气血，补心肾，上损者服之，其效胜大建中汤。

人参　当归　白术炒、各二两　乌药　肉桂去皮　沉香各半两　白茯苓　附子炮去皮尖、各一两

上为末，每服三钱，姜枣水煎，空心服。

金锁正元丹　治真气不足，四肢怠惰，脚膝酸疼，目暗耳鸣，自汗盗汗，一切虚损之症。

五倍子一两　紫巴戟去心，四两　补骨脂酒浸炒、二两半　朱砂七钱，另研　肉苁蓉洗、四两　葫芦巴炒、四两　茯苓去皮、二两　龙骨一两、煅

上为末，酒糊丸桐子大，每服二十丸，空心温酒或盐汤下。

平补镇心丹　治心血不足，时或心忡惊悸，梦如高坠，常服安心肾，益荣卫。

朱砂细研，半两为衣　人参五钱　龙齿一两五钱　白茯苓　五味子炒　车前子炒　茯神　麦门冬去心，作膏　肉桂各一两二钱半　远志去心，甘草，制　天门冬去心作膏　山药制，各一两五钱　酸枣仁去皮尖，二钱半　熟地黄酒蒸，五钱，作膏

上为末，蜜丸桐子大，每服三十丸，空心温酒下。

威喜丸　治小便白浊。

黄蜡四两　白茯苓四两，一块同猪苓，一两，于磁器内煮二十沸，取出晒干，不用猪苓

上以茯苓为末，熔蜡丸弹子大，每服一丸，空心细嚼，津液咽下，小便清利为度。忌食米醋。

小柴胡汤方见本卷第八论　**加味逍遥散**　**八珍汤**　**归脾汤**三方见本卷第四论　**仙方活命散**方见本卷第五论　**六味丸**　**八味丸**二方见本卷第十一论

妇人足跟疮肿方论第十一

妇人足跟足指肿痛，足心发热者，皆因胎产经行，失于调摄，亏损足三阴虚热所致。若肿痛，或出脓，用六味丸为主，佐以八珍汤。胃虚懒食，佐以六君子汤。寒热内热，佐以逍遥散。晡热益甚，头目不消，佐以补中益气汤。痰盛作渴，或口舌生疮，亦用前二药，以滋化源。大凡发热晡热内热，自汗盗汗等症，皆阴虚假热也。故丹溪谓火起九泉，阴虚之极也。盖足跟乃督脉发源之所，肾经所过之地，若不求其属而泛用寒凉，则误甚矣。然俗谓为兔啮疮者，盖猎人被兔咬足跟，久而不敛，气血沥尽，其人必死。男子酒色过度者，多患此症。

附　治　验

一妇人素血虚，因大劳两足发热晡热，月经过期。或用四物、芩、连，饮食少思，胸痞吐痰。用二陈、枳实、黄连，大便不实，吐痰无度，足跟作痛。余曰：足热晡热，月经过期，肝脾血虚也。胸痞吐痰，饮食少思，脾胃气虚也。盖胃为五脏之根本，胃气一虚，诸病悉至。先用补中益气加茯苓、半夏，脾胃渐健，乃佐以六味丸补脾肾，不两月而痊。

一妇人晡候不调，发热晡热，胸膈不利，饮食少思，服清热宽中消导之剂，前症益甚，更兼肢体酸痛，服除湿化痰等药，经候两三月一至，服通经降火之剂，足跟足指作痛，其热如炙。余以为足三阴亏损，用补中益气、六味地黄，两月诸症渐退，又用前汤并八珍汤两月而康。

一妇人足跟患肿，两腿酸软，或赤或白，或痛或痒，后或如无皮，或如皱裂，日晡至夜，胀痛燃热，此属足三阴虚损，用加减八味丸及逍遥散加熟地、川芎，百余剂而愈。

一妇人劳则足跟热痛，余作阴血虚，用八珍而痊。后遍身搔痒，服风药发热抽搐，肝脉洪数，此肝家血虚火盛而生风，以天竺、胆星为丸，用四物、麦门、五味、芩、连、炙草、山栀、柴胡煎送而愈。

一妇人两足发热，足跟作痛，日晡热甚，余谓肾肝血虚，用逍遥散、八味丸五十余剂，诸症悉愈。

附　方　药

当归补血汤　治脾胃损伤，或因服峻剂，致血气俱虚，发渴引饮，目赤面红，昼夜不息，其脉大而虚，重按全无。若误服白虎汤，必死。

黄芪炙，一两　当归二钱，酒制

用水煎服。

六味丸一名六味地黄丸　此壮水制火之剂。夫人之生，以肾为主，人之病多由肾虚而致者。此方乃天一生水之剂，无不可用。若肾虚发热作渴，小便淋秘，痰壅失喑，咳嗽吐血，头目眩晕，眼花耳聋，咽喉燥痛，口舌

疮裂，齿不坚固，腰腿痿软，五脏亏损，自汗盗汗，便血诸血，凡肝经不足之症，尤当用之。盖水能生木故也。此水泛为痰之圣药，血虚发热之神剂。又治肝肾精血不足虚热，不能起床，即八味丸去附子、肉桂。

八味丸　治命门火衰，不能生土，以致脾胃虚寒，而患流注鹤膝等症，不能消溃收敛，或饮食少思，或食而不化，或脐腹疼痛，夜多漩溺。经云：益火之源，以消阴翳。即此方也。

熟地黄自制，八两　山茱萸肉　山药各四两　茯苓　牡丹皮　泽泻各三两　肉桂用三分，厚者去皮取肉分许，方能补肾引虚火归源　附子用一两五钱，重者切四块，用童便浸数日，火煅，切看无白星为度

上为末蜜丸，桐子大，每服七八十丸，滚汤下。

六君子汤方见本卷第六论　**补中益气汤**方见本卷第十论　**八珍汤**　**逍遥散**二方见本卷第四论

妇人肺痈方论第十二

仍参《外科枢要》

妇人肺痈，因外邪内蕴，或七情郁火，误行汗下，重亡津液，以致肺气受伤，而恶风咳嗽，鼻塞项强，胸胁胀满，呼吸不利，吐痰臭浊，脓血腥秽。若咳嗽喘急，寒邪在表也，小青龙汤。咳嗽胸胀，寒邪内壅也，葶苈大枣泻肺汤。胁胀，咳唾腥臭，脓已成也，桔梗汤。咳喘短气，或小便短少，肺气虚也，佐以参芪补肺汤。体倦少食，或喘嗽短气，脾肺虚也，佐以参术补脾汤。作渴饮冷，午前嗽甚，胃火盛也，竹叶石膏汤。作渴内热，午后嗽甚，阴血虚也，六味丸、四物汤。口干饮汤，体倦少食，胃气虚也，补中益气汤加五味、麦门。口干内热，咳唾痰涎，肾水虚也，六味丸、益气汤。黄昏热或嗽甚，阴火炽也，六味丸、四物汤加五味、麦门。五更嗽。或痰甚，脾肺虚也，六君子汤。嗽而不得眠，及两胁痛，肝火血虚也，六味丸、益气汤。大凡前症，因外淫所侵当祛邪而实土，因心火太过当伐木而补金。若肺气虚弱，当补脾土而生肺金。若阴火上炎，当补脾肺以滋肾水。然而发热喘嗽，咳唾脓血，饮食不入，皆脾土不能生肺金，肺金不能生肾水之败症。苟能纯补脾土而生诸藏，多有复生者。若用寒凉，脾胃复伤，则肺金失养，肾水益涸，虚火上炎，薰蒸于肺，吾未见其能生之者。其唾脓血，脉浮大，面色赤者，俱难治。若阴火妄动，或劳嗽吐脓血者，尤难治。若脓自止，脉浮短涩，及始萌者，易治。

附　治　验

一妇人素血虚，发热咳嗽，服痰火之剂后吐脓血，面赤脉数，其势甚危，此脓成而气血虚也，余用八珍汤补元气，桔梗汤治肺痈而愈。

一妇人感冒风寒，或用发表之剂，反咳嗽喘急，饮食少思，胸膈不利，大便不通，右寸关脉浮数，欲用疏通之剂。余曰：此因脾土亏损，不能生肺金，若更利之，复耗津液，必患肺痈矣。不信，仍利之，虚症悉至，后果吐脓。余朝用益气汤，夕用桔梗汤，各数剂，吐脓渐止。又朝仍用前汤，夕用十全大补汤，各五十剂，喜其善调理获愈。

一妇人咳嗽吐痰，胸膈作痛，右寸关浮滑，项下牵强，此脾胃积热之痰，非痈患也，以二陈、山栀、白术、桔梗，治之而痊。

一妇人素血虚，内热时咳，甲辰孟冬两尺浮洪，以脾胃不健，请治。余曰：当防患肺症。丙午孟春，果咳嗽，左右寸脉洪数，肺痈也，脓已成，左寸脉仍洪数，乃心火克肺金，夏令可忧。余用壮水健脾之剂稍愈，彼遽自忽，不事调摄，果殁于夏令。

附　方　药

青龙汤　治肺经受风寒，咳嗽喘急。

半夏汤泡　干姜　细辛　麻黄去节　肉桂　芍药　甘草炙，各一钱　五味子炒，五分　附子炮，五分

上水煎服。

葶苈大枣泻肺汤　治肺痈胸膈胀满，上气喘急，或身面浮肿，鼻塞声重，用葶苈炒黄研末，每服三钱，先用枣十枚，水煎，去枣入药，再煎，食后服。

桔梗汤　治肺痈咳而胸膈隐痛，两胁肿满，咽干口燥，烦闷作渴，浊唾腥臭。

桔梗炒　贝母去心　当归酒拌　瓜蒌仁　枳壳麸炒　薏苡仁微炒　桑白皮炒　甘草节　防己去皮，各一钱　黄芪盐水拌炒　百合蒸，各一钱半　五味子杵炒　甜葶苈炒　地骨皮　知母炒　杏仁各五分

上姜水煎服。

人参补肺汤　治肺痈肾水不足，虚火上炎，咳唾脓血，发热作渴，小便不调。

人参　黄芪炒　白术　茯苓　陈皮　当归各一钱　山茱萸去核　山药各二钱　五味子杵　麦门冬　甘草炙，各七分　熟地黄自制，一钱五分　牡丹皮一钱

上姜水煎服。

参芪补脾汤　治肺症因脾气虚弱，咳唾脓涎，中满不食，宜兼服此药，以补脾土生肺金。

人参　白术各二钱　黄芪炙，二钱半　茯苓　当归　陈皮各一钱　升麻三分　五味子四分杵　炙甘草五分

上姜水煎服。

人参平肺散　治心火克肺金，患肺痿咳嗽喘呕，痰涎壅盛，胸膈痞满，咽嗌不利。

人参　陈皮　青皮　茯苓　天门冬各一钱　知母　地骨皮各四钱　甘草炙，五分　五味子十粒，杵　桑白皮炒，二钱

上姜水煎服。

竹叶石膏汤　治胃火盛而作渴者。

淡竹叶　石膏煅　桔梗炒　木通　薄荷　甘草各二钱

上姜水煎服。

竹叶黄芪汤　治痈疽，气血虚，胃火盛，而作渴。

淡竹叶二钱　黄芪　麦门冬去心当归　川芎　甘草炒　黄芩炒　芍药炒　人参　半夏　石膏煅　生地黄各一钱

上水煎服。

二陈汤方见本卷第五论　**六味丸**方见本卷第十一论　**补中益气汤**方见本卷第十论　**四物汤**　**六君子汤**二方见本卷第六论　**十全大补汤**　**八珍汤**二方见本卷第四论

妇人肠痈方论第十三

妇人肠痈，因经行产后瘀血，或七情饮食所致。其症小便如淋，发热恶风，身皮甲错，腹皮肿急，按之软如肿状，或腹胀大，转侧有水声，或绕脐生疮，或大便出脓。其脉迟紧者，脓未成，用活命饮以解其毒。脉滑数者，脓已成，用云母膏以下其脓。若二年间遍身微肿，大肠与脐出脓，此息积之症也，多致不救。《内经》云：肠痈为病，不可惊，惊则肠断而死。其坐卧转侧，宜徐缓，时尝少饮薄粥，静养调理，庶可保生。

附　治　验

一妇入小腹肿痛，小便如淋，此毒结于内，用神效瓜蒌散二剂少愈，又薏苡仁汤二剂乃痊。

一妇人小腹痛而有块，脉芤而涩，此瘀血为患，以四物加玄胡索、红花、桃仁、牛膝、木香，二剂血下而愈。

一妇人小腹胀痛，大便秘涩，转侧有水声，脉洪数，以梅仁汤一剂，顿下诸血，诸症顿退，以薏苡仁汤二剂而瘥。

一妇人小腹胀痛，小便不利，脉滑数，此脓已成也。服太乙膏五钱，脓下甚多，胀痛顿退。以瓜蒌散、蜡矾丸、托里药而安。

一妇人因经水多，服药止之，致腹作痛，以失笑散二服而瘳，又用加味逍遥散数剂而经调。

一产妇恶露停滞，小腹作痛，服瓜仁汤下瘀血而痊。凡瘀血停滞，急宜行之，缓则

腐化为脓，最为难治。若流注关节，则患骨疽。多为败症。

附　方　药

瓜子仁汤　治产后恶露未尽，经行瘀血停滞，小腹作痛，或成痈患。

薏苡仁四两　桃仁去皮尖　牡丹皮　瓜蒌仁各一两

上每服五七钱，水煎。

败酱散　治脉数，身无热，腹无积聚，按之软濡，此为肠痈，久积阴冷所成。

薏苡仁二两半　附子炮，半两　败酱草一两二钱五分

上每服四钱，水煎，以小便利为度。

牡丹汤　治肠痈腹软而痛，时下脓血。

牡丹皮　人参　天麻　白茯苓　黄芪炒　薏苡仁　桃仁去皮尖　白芷　当归酒炒　川芎各一钱　官桂　甘草炙、各五分　木香二钱

上水煎服。

大黄汤　治肠痈小腹坚肿，按之则痛，肉色如故，或微赤微肿，小便频数，汗出憎寒，脉迟紧，未成脓者，宜服之。

大黄　朴硝各一钱　牡丹皮　瓜蒌仁炒　桃仁去皮尖、各二钱

上水煎服。

梅仁汤　治肠痈壅痛，大便秘结。

梅仁九个，去皮尖　大黄炒　牡丹皮　芒硝各一钱　冬瓜仁研，二钱　犀角镑末，一钱

上水煎，入犀角末服。

神仙太乙膏　治一切痈疽，不问脓之成否，并宜贴之，更作丸服。

玄参　白芷　当归　肉桂　生地黄　赤芍药　大黄各一两　净黄丹十三两

上用麻油二斤，入铜锅内煎黑滤去查，入黄丹十二两，再煎，滴水中捻，软硬得中，即成膏矣。如软更加丹云母膏固效，卒难修合，太乙膏亦可。

神效黄矾丸　最解毒止痛。

白矾末　两，明亮者　黄蜡半两，黄色者熔开，一方用七钱

上和众手丸，桐子大，每服三十丸，滚汤下。如服金石发疽，更用白矾末一两，作三五服，以温酒调下。若遍身生疮如蛇头，服之尤效。此药能解毒气内攻也，须多服方验。亦治蛇咬、熔化乘热，滴伤处，毒即出，痛即止，仍服两许。

失笑散　治产后心腹绞痛，或血迷心窍，不知人事，及寻常腹内瘀血积血作痛。

五灵脂去砂上炒　蒲黄炒、各等分

上为末，每服一二钱，汤酒调。

活命饮方见本卷第五论　**神效瓜蒌散**方见本卷第十四论　**四物汤**方见本卷第六论　**加味逍遥散**方见本卷第四论

乳痈乳岩方论第十四

经云：乳头属足厥阴肝经，乳房属足阳明胃经。若乳房忽壅肿痛，结核色赤，数日之外，脓痛胀溃，稠脓涌出，脓尽而愈。此属肝胃热毒，气血壅滞，名曰乳痈，为易治。若初起内结小核，或如鳖棋子，不赤不痛，积之岁月渐大，巉岩崩破，如熟榴，或内溃深洞，血水滴沥，此属肝脾郁怒，气血亏损，名曰乳岩，为难疗。治法脓痛寒热，宜发表散邪。肿脓痛甚，宜疏肝清胃。或不作脓，脓成不溃，宜用托里。或肌肉不生，脓水清稀，宜补脾胃。或脓出反痛，恶寒发热，宜补气血。或肿脓作痛，晡热内热，宜补阴血。或饮食少思，时作呕吐，宜补胃气。或饮食难化，泄泻腹痛，宜补脾气。或劳碌肿痛，宜补气血。怒气痛肿，宜养肝血。慎不可用克伐之剂，复伤脾胃也。乳岩初患，用益气养荣汤、加味逍遥、加味归脾，可以内消。若用行气破血之剂，则速其亡。

附　治　验

一妇人内热胁胀，两乳不时作痛，口内不时辛辣，若卧而起急，则脐下牵痛。此带脉为患也。用小柴胡加青皮、黄连、山栀，二

剂而痊。

一妇人因怒，两乳肿，兼头痛寒热，此肝经气症也，用人参败毒散二剂，表症已退，用小柴胡加芎、归、枳壳、桔梗，四剂而愈。

一妇人久郁，右乳内肿硬，此肝经血症也，用八珍加远志、贝母、柴胡、青皮及隔蒜灸，兼神效瓜蒌散，两月余而痊。

一妇人先热渴，至夜尤甚，后两乳忽肿，肝脉洪数，乃热入血分，用加味小柴胡汤而愈。

一妇人因怒，左乳作痛发热，因表散太过，肿热殊甚，用益气养荣汤数剂，热止脓成，因不即针，益肿胀热渴，针之脓大泄，仍服前汤，月余而愈。

一妇人因怒，左乳作痛，胸膈不利，此属肝脾气滞，以方脉流气饮加木香、青皮，四剂而安。

一妇人脓清肿硬，面黄少食，内热晡热，自汗盗汗，月经不行，此肝脾气血俱虚也，用十全大补加远志、贝母及补中益气，各三十余剂，外用葱熨法而消。

一妇人脓成胀痛，余欲针之，不从。至数日，针出败脓三四碗许，虚症蜂起，几至危殆，用大补之剂，两月余始愈。

一妇人素弱多郁，患时疫后，脾胃愈虚，饮食愈少，因怒右乳胁红肿，应内作痛，或用炒麸皮熨之，内痛益甚，服加减四物汤，肿势愈大，胸胁背心相引而痛。余谓病后脾弱，怒复伤肝，用八珍加陈皮、黄芪、柴胡、山栀、白芷八剂稍愈，去白芷加青皮、木香、桔梗，又六剂而安。

一妇人左乳内肿如桃，不痛不赤，发热渐瘦，此肝脾郁怒也。用八珍加香附、远志、青皮、柴胡百余剂，又兼神效瓜蒌散三十余剂，脓溃而愈。

一妇人久郁，左乳内结核如杏，三月不消，心脉涩，脾脉大，按之无力，此肝脾气血亏损，以八珍加贝母、远志、香附、柴胡、青皮、桔梗，五十余剂而消。

一妇人禀实性躁，怀抱久郁，左乳内结一核，按之微痛，此皆气血郁滞，以连翘饮十余剂少退，更以八珍加青皮、香附、桔梗、贝母，二十余剂而消。以上皆乳痈

一妇人右乳内结三核，年余不消，朝寒暮热，饮食不甘，此肝脾气血亏损，内服益气养荣汤，外以木香饼熨之，年余血气复而消。

一妇人乳内结核年余，晡热少食，余谓此血气不足，欲用益气养荣汤，彼反服行气之剂，溃出清脓而殁。又一妇乳内结核如栗，亦服前药，大如覆碗，坚硬如石，出血水而殁。以上皆乳岩

附　方　药

神效瓜蒌散　治乳痈及一切痈疽初起，肿痛即消，脓成即清，脓出即愈。

瓜蒌一个，烂研　生粉草　当归酒洗，各半两　乳香　没药各一钱

上用酒煎服，良久再服。若肝经血虚结核，久而不消，佐以四物、柴胡、升麻、白术、茯苓、甘草。若肝脾气血虚弱，佐以四君、芎、归、柴胡、升麻。若忧郁伤脾，气血亏损，佐以归脾汤。

玉露散　治产后乳脉不行，或身体壮热，头目昏痛，大便涩滞等症。

人参　白茯苓　桔梗炒　川芎　白芷　当归　芍药各一钱　甘草五分

灸肩尖肘尖二穴图即肩髃、肘髎

此穴治瘰疬之秘法。盖瘰疬属肝胆二经，故患耳前后项腋之处。男子多因恚怒亏损肝经之血，阴火内作，或不慎起居，耗损筋脉，不能生肝血。妇女多因恚怒伤肝，火动血燥，或郁结伤脾，火动血耗，或患于胸乳间，亦属于前经。此症若因恚怒伤肝，气血壅遏不愈者，宜灸此穴，疏通经络。若因久于郁怒，元气亏损而不愈，当审其所属而调补化源。如取其穴，当以指甲掐两肘两肩四所，以便觉酸麻。方是其穴。男子治验见《外科枢要》，妇人见

《校注妇人良方》，小儿见《保婴撮要》

《校注妇人良方》终

慈幼新书

〔明〕 程凤雏 辑

《慈幼新书》提要

明·程凤雏撰。凤雏字云鹏，湖北江夏人。张希良序云：凤雏受知蒋慎斋先生，称吾楚文章巨子，医事其一端而已。先之以慈幼书者，悯赤子之呼号而莫告也。昔宁都魏丈冰叔谓凤雏之医，神明变化，大似武侯用兵，凤雏闻之曰：武侯吾岂敢，吾师邓禹耳。邓禹有言，吾将百万兵攻城陷阵，未尝妄杀一人，皆能达造化之机者。其卷首，列保产，先明未产保养，以植基础。其卷一，列禀赋、脏、能、脉候、胎症、变蒸。其卷二，列杂症。其卷三、四、五，列痘疮。其卷六，列痘疮备用方。其卷七，列麻疹、丹毒、风毒、惊丹、急惊、慢惊、风痫、发热。卷八，列伤寒。卷九，列感冒、咳嗽、痰喘、疟疾、痢疾、吐泻。卷十，列食积、疳积、腹痛、小便诸血。卷十一，列疮疽杂症。卷十二，列痘家应用药性等类。综观《慈幼》一书，大而胎产痘疹惊痫寒热，细而耳目喉齿，以及疮疖疥癣，广博精微，无一不备，诚保婴之慈航也。考先生又著《慈幼筏》一书，署名程云鹏凤雏辑，后附医案，炳章亦在征求中，谋刊于续集，是书书贾为谋推广销路计，因伪托介宾名，其一二卷上，虽添加张介宾著，以眩惑读者，其次行仍有程云鹏凤雏辑。嗣阅张希良原序，云与云鹏友善，详述其著书缘起，并未涉及介宾一字，且查介宾著书事略，亦无是书之辑，其立方用药，更与景岳派不同。又陆定圃《冷庐医话》，亦称程凤雏作《慈幼筏》，可知实非介宾之著。今书名虽是《慈幼新书》，而著作人遵原文改正为程云鹏凤雏辑，所以昭翔实也。

张　序

士君子立身，为天下之望，虽穷而在下，凡百有作，无一不与天下相维系，故能为天地立心者，斯能为生人立命，如吾友程子凤雏是已。凤雏受知蒋慎斋先生，称吾楚文章巨子，自余司铎江夏时，固心识之矣。后稍稍接见，乃知凤雏非特能文章，其胸中浩荡之气，实将空当世一切之所有，医事其一端已。医亦不一家，而先之以慈幼书者，悯赤子之呼号而莫告也。今天下医学之弊，非庸则妄，庸者卑陋自窒，守一师说而不能变通，妄者私心穿凿，攻补一遍而不能察于微渺。其术不同，而杀人则一也。昔宁都魏丈冰叔，谓凤雏之医，神动变化，大似武侯用兵。凤雏闻之曰：武侯吾岂敢，吾师邓禹耳。邓禹有言，吾将百万兵，攻城陷阵，未尝妄杀一人。夫邓禹、武侯，皆能达造化之机者。余观《慈幼》一书，大而胎产痘疹惊痫寒热，细而耳目喉齿，以及疮疖疥癣，广博精微，无一不具。盖隆中之抱膝，车上之指挥，非异事也。冰叔之言，岂欺我哉。余又闻凤雏从赵照庵吏部，与延陵二五山人，华山半轮道士，讲论大丹，驾鹊桥而交水火，固又尝饮天姥之醍醐矣。今此肘后所传，岂更犹夫人之医籍也哉！凤雏以有为之才，不得有为之地，将以此书鞠育天下之人，其用心良苦，以视一命之士，惠爱不过一隅，则为功倍多。嗟乎！余曩以木天清冷之官，视学全浙，虽夙夜殚心于端士习厚风俗，而环视车下创瘵之颠蹶，而曾无可挽，不若凤雏心力所及，遂可登斯民于仁寿之域。余滋愧矣。

黄安张希良撰

《慈幼新书》目录

卷首

保产 …… 555

卷一

禀赋 …… 561
脏能 …… 561
脉候 …… 562
胎病 …… 562
胎热 …… 562
胎寒 …… 562
胎肥 …… 563
胎怯 …… 563
胎黄 …… 563
胎惊 …… 563
锁肚 …… 563
不啼 …… 563
不乳 …… 564
脐风 …… 564
撮口 …… 564
噤口 …… 564
变蒸 …… 564

卷二

杂症 …… 565
咽喉 …… 565
齿 …… 566
舌 …… 566
口 …… 566
耳 …… 567
目 …… 567
鼻 …… 569
囟 …… 569
颐 …… 569
脐 …… 570
语迟 …… 570
夜啼 …… 570
龟胸 …… 570
龟背 …… 570
鹤节 …… 570
行迟 …… 570
五软 …… 571
五硬 …… 571

卷三

痘疮 …… 572
总诀孕妇痘疮附见 …… 572

卷四

痘疮 …… 578
发热三日诀 …… 578
见点三日诀 …… 579

卷五

痘疮 …… 582
起胀三日诀 …… 582
灌脓二日诀 …… 583
结痂三日诀 …… 584
落痂余毒诀 …… 585

卷六

痘疮 …… 588
备用方 …… 588
清地散花饮 …… 588
玉液春膏饮 …… 588
三豆汤 …… 589
辟秽香 …… 589
九味神功散 …… 589
参麦清补汤 …… 589
木香散 …… 589
异功散 …… 589
内托散 …… 590
参归鹿茸汤 …… 590
清毒活血汤 …… 590
快癍越婢汤 …… 590
回浆散 …… 590
象牙散 …… 590
人参清神汤 …… 590
荆防败毒散 …… 590

白芷升麻汤 …… 590
大连翘饮 …… 590
起顶散 …… 590
清肺汤 …… 590
菊花饮 …… 590
犀角地黄汤 …… 590
甘露饮 …… 590
地黄汤 …… 590
罩胎散 …… 590
救苦丹 …… 591
赛春雷 …… 591
满天秋 …… 591
热见愁 …… 591
千里马 …… 591
一丸春 …… 591
蟾酥丸 …… 591
红炉雪 …… 591
银锁匙 …… 591
豆蔻丸 …… 591
流气饮 …… 591
风卷云 …… 591
碧云散 …… 591
四圣丹 …… 592
立马回疔丹 …… 592
加减鼠粘子汤 …… 592
玉红膏 …… 592
清肌汤 …… 592
胭脂涂方 …… 592
生肌散 …… 592
绵茧散 …… 592
百花膏 …… 592
金华散 …… 592
拔毒膏 …… 592
人牙散 …… 592
独圣散 …… 593
吹口丹 …… 593
三仙散 …… 593
麝矾散 …… 593
麦汤散 …… 593
稀痘方 …… 593
玄兔散 …… 593
仙砂散 …… 593
龙凤膏 …… 593

卷七

麻疹孕妇麻疹附见 …… 594
丹毒 …… 596
风毒 …… 596
惊丹 …… 596
惊 …… 597
痫 …… 599
发热 …… 599

卷八

伤寒大人方论附见 …… 601
麻黄汤 …… 602
桂枝汤 …… 602
小青龙汤 …… 602
大青龙汤 …… 602
惺惺散 …… 602
葛根汤 …… 602
升麻葛根汤 …… 603
小柴胡汤 …… 603
大柴胡汤 …… 603
白虎汤 …… 603
调胃承气汤 …… 603
大承气汤 …… 603
小承气汤 …… 603
桃仁承气汤 …… 603
小建中汤 …… 603
黄芪建中汤 …… 603
理中汤 …… 603
真武汤 …… 603
白通汤 …… 604
麻黄附子细辛汤 …… 604
四逆汤 …… 604
四逆散 …… 604
甘草泻心汤 …… 604
玄参升麻汤 …… 604
阳毒升麻汤 …… 604
桃仁汤 …… 604
黄连犀角汤 …… 604
雄黄锐散 …… 604
牛蒡根汤 …… 604
牡蛎泽泻汤 …… 604
黄龙汤 …… 604

卷九

感冒 …… 605
咳嗽 …… 605
痰 …… 606
疟疾大人方论附见 …… 606
痢疾大人方论附见 …… 607
吐泻 …… 609

卷十

食积 …… 610
疳积 …… 611
腹痛 …… 612
小便 …… 613
血 …… 613
汗 …… 614
痘 …… 614

卷十一

疮疽杂症 …… 615
五福化毒丹 …… 615
加味解毒散 …… 615
九味解毒散 …… 615
复元活血汤 …… 615
恶疮毒肿神方 …… 615
大黄活命丹 …… 615
神效散 …… 615
三七化毒丹 …… 616
洪宝丹 …… 616
没药散 …… 616
白蔹藜散 …… 616
接骨散 …… 616
胜金丹 …… 616
本事内消散 …… 616
乳香定痛散 …… 616
班蝥夺命丹 …… 616
玉珍散 …… 617
降袍散 …… 617
冰黄散 …… 617
豆豉饼 …… 617
神效当归膏 …… 617
铁箍散 …… 617
猪蹄汤 …… 617
敷肿毒方 …… 617
内消散 …… 617
犀角丸 …… 617
软疖方 …… 617
蟾酥丸 …… 617
生肌散 …… 618
玉蟾生肌散 …… 618
漏芦汤 …… 618
偷刀散 …… 618
太乙膏 …… 618
神效千捶膏 …… 618
瘰疬丸方 …… 619
金疮膏药 …… 619
天蛇头方 …… 619
血风疮方 …… 620
肺风疮方 …… 620
疔疮方 …… 620
疳疮方 …… 620
龙胆泻肝汤 …… 620
汤泡疮方 …… 620
臁疮方 …… 620
疥疮一扫光方 …… 621
脓窠疮方 …… 621
肥疮黄水疮方 …… 621
坐板疮方 …… 621
癣疮方 …… 621
耳冻疮方 …… 621
冻疮方 …… 621
头上肥疮方 …… 621
室女阴户外疮方 …… 622
阴户内虫方 …… 622
足指内疮方 …… 622
湿疮方 …… 622
足缝烂湿方 …… 622
通利湿气丸方 …… 622
湿气神应膏 …… 622
大麻疯方 …… 622
鹤膝风方 …… 623
绣球风方 …… 623

卷十二

痘家应用药性杂症附见 …… 624

慈幼新书　卷首

明　江夏　程云鹏凤雏辑
鄞县　曹赤电炳章校

保　产

生产一道，天地自然妙理，不假修为。然诗人以不坼不副，无灾无害美后稷，则自后稷以外，固实有坼副灾害其母者，保产之术，可不讲乎？世风不古，胎教久废，为母者既不能保于平时，身安逸则气血凝滞，奉养厚则脂膜肥满，嗜欲多则胎衣厚而难破。不幸值此，急以回生丹治之。

郑兰皋曰：嗜欲一端为害最重。三月前犯，能动胎小产，三月后犯，使子不寿，慎之慎之。

又曰：出胎时，身多白点，或两足粉白如枯骨，或痘标干涸焦紫，皆此之故。

又曰：饮食最忌炙煿椒辣，及驴马犬兔，蟹鳖鲊鱼，河豚菌子，野雀薏苡茨菰之类。昔人有食兔缺唇，食鳖短项，食鳖横生，食鱼生疮等论，验之良然。

史指臣曰：俗信师巫邪说，转女为男，妄用针灸，或吞符水，或以麝香膏药贴脐，为害匪浅。

少妇初产，神气怯弱，子户未舒。中年妇人，生育既多，血气亏损，二者 须大金丹至宝丸，常服调理。

怀孕六七月，或八九月，偶略曲身，胎忽乱动，三两日间，或痛或止，或有水下，惟腰不甚痛，胎未离经，名曰弄产。又有临产一月前，忽然腰痛，却又不产，此是转胎，名曰试月。胎水有无俱不妨，但直身坐卧行立，即无事。又有伸手高处取物；忽子鸣腹中，但令鞠躬片时即愈。

临产阵痛，有二三日者，有五七日者，气候未至，须听其坐卧如意，不得便令扶坐努力，忧疑气馁，或丸或散，谅虚实消息之。大金丹、回生丹、达生散便产神方

临产有七候，脐腹急痛，腰间重堕，眼中火出，粪门进急，产户肿满，手中指筋脉跳动，胞水或血俱下，方是子出胎时，产母始可用力。如数症未备，即一日二日，切不可强使挣努。又有胞水以下，儿头已到产门，三四日仍不出者，亦唯有调其饮食待之，服大金丹壮之。

临产时饮食减少，即须常服独参汤调理，不可使精力衰乏，若交骨不开，是气血不能运达，须补中益气，加味芎归汤服之。

临产时惊觉太早，血先下而胎元干涸，僵死腹中，唯看产母面舌。面青母伤，舌青子伤，面舌俱青，子母难保。下死胎，亦不必仓皇用力，服回生丹至三丸立下。若一时未备，以平胃散一两，投朴硝五钱，煎三五沸温服，其胎即化水而出，切忌用力，骇伤产母。

产时子有出户之势，转侧差缓，母力一逼，或手或足，横生倒生。又有生路未正，儿头遍拄左右腿畔，名曰偏产。又有偏拄谷道，名曰枕后。凡此宜急扶产妇上床，正身仰卧，厚被覆之，服便产汤临产、预煎，须臾提上，重新转身，儿头正对产门矣，急扶即生。

程克庵曰：俗谓手先出为觅盐，以手得盐而蜷缩也。吴子通云：不论手足先出，急以针尖微刺 手足心内，大约深半米许，用盐

醋泥三味，调匀涂之，轻轻送入产时门户俱正，儿已露顶而不下，此转身时，脐带绊其肩也，扶母仰卧，轻轻推儿向上，以手指轻按儿肩，去其脐带，然后用力送下。

胎衣来迟，气虚弱也，大金丹服之。若血流入衣，胀闷疼痛，宜速服回生丹二三丸，或牛膝汤下之，捷法用滚水磨好陈墨，冲服即下。或令能事稳婆，以手循脐带而上，轻覆衣血，从容俟下亦下。有用苎麻子贴足心，及令产妇含头发作呕者，甚非良法，切须戒之。

产时用力太早，水衣先破，以鱼胶烧过存性，擂细冲酒服之。又有水衣破时，被风所吹，产户肿胀，干涩狭小者，亦从容俟之。又有稳婆蓄意害人，私以指掐破水衣，须要防护。

产时肠先盘出，用净盆盛温水，少入香油养润，待儿并胞衣下时，母略仰卧，自己吸气上升，稳婆香油涂手，徐徐送入。或以阴阳家用过磁石煎汤服之，亦能收上。或浓煎黄芪汤浸之，补中益气汤服之，尤为妙法。又有儿并胞衣下后，膀胱坠出产户者，同前法送入。若稳婆不谨，膀胱扯破者，八珍汤加猪胞三钱，服之可复。

汪宁斋曰：盘肠为中气不足，若初胎见此，下次孕时五六月上多，服补中升提之剂，分娩自无此患。

产毕产门不闭，气血虚也，加味芎归汤、十全大补汤，俱可服。若因胎大，而擦伤产门者，蕲艾、益母草煎汤洗之。

产后血晕，不省人事，用韭菜细切，装入有嘴瓶内，煎滚醋沃之，封扎瓶口，刺二小窍，扶产妇坐定，以瓶窍对鼻孔熏之，令醋气透入，须臾自苏。或进大金丹、清魂散，亦无不效。曩有烧旧漆器法，不宜用之。盖血气未回，秽触必生他病，岂可妄施乃尔。

方公度曰：败血逆上攻心，满急垂绝者，用生姜二十片，盐半斤炒热布包熨之，血下而愈。或韭菜同炒亦妙。又有败血入肺作喘者，人参、苏木等分，煎服自瘥。

产后百脉空虚，洗拭太早，令中风口噤，手足搐搦，角弓反张，或因怒气，发热迷闷，用荆芥穗微焙，当归酒洗各二钱，水盅半，童便黄酒各半盅，煎七分灌之。牙关紧，以簪抉开，或口对口灌，仍捻其鼻，以手摩其喉，使得下咽，即苏。

产后有舌出不能收者，亦妄力所致，以朱砂末傅之，仍令作产子状，片刻自愈。旧法：窗户外潜堆盆盎，掷地使惊而舌入。此与烧漆器、咬头发之意，皆未尽善也。

孕时触损脏气，胞系裂断，忽然胎坠，名曰小产。亏败子宫，较大产为甚，宜倍加调摄，大金丹、至宝丹服之，或芎归补中汤亦可。

大金丹

当归肥白大枝者酒洗净晒干切厚片　白茯苓乳拌晒　白术黄土裹饭上蒸七次去土切片烘　延胡索酒煮透晒干　蕲艾去梗淘净灰尘醋煮　川芎　川藁本去土洗净晒干　丹皮水洗净晒　赤石脂煅　茵陈童便煮　鳖甲醋炙酥　黄芩酒炒　白芷各二两　人参切片饭上蒸　大地黄酒煮烂　益母草取上半截熬膏　香附醋、乳、酒、童便、盐水、泔水六制、各四两　桂心　大粉草酒洗炒　没药透明者，去油，各一两二钱　北五味子去梗净炒，一两　沉香六钱　阿胶蛤粉炒成珠，三两

紫河车一具，盛竹篮内，放长流水中，浸半日，去其秽恶，用黄柏四两，入煨罐内，将河车放黄柏上，酒浸没，炭火煮熟，取起，合各药同捣晒干，磨极细，如飞面。复合益母草膏、烂地黄、阿胶和匀，捣二千杵，如干，渐加炼蜜，丸如弹子大，每重三钱五分，日色中略晒片时收起。

阿胶难得佳者，用龟胶神妙，吴子通传此方，以朱砂为衣，合时勿经妇人手。

临产米汤服一丸，助精神，壮气血，分娩顺利。

产下童便好酒服一丸，神清体健，无崩晕之患，每日服一丸，五日后气血完固，不

生他病。

产后血崩，童便好酒服一丸即止。

产后血晕，当归川芎汤服一丸即醒。

产后风痉，防风汤服一丸即解。

产后儿枕作痛，山查砂糖汤服即止。

产后胞衣不下，黑姜煎汤服即下。

妇人经水不调，艰于子者，每行经后，川芎当归汤日服一丸，过百日即能受孕。

妇人气血不调，情志郁结，受胎后偶有所触，胎动欲落，白汤服一丸，睡半日。其胎即安。每日服一丸，保全足月，分娩无患。

凡妇人诸虚百损，用川芎当归汤，每日服一丸，亦多可复。产后不论何症，俱用童便好酒服之，能保命护身，回生起死，其功不能尽述。

至宝丸

真金华香附一斤四两，择无毛大而净者，童便浸三日，捣碎晒干为末，用马料黑豆数升煮浓汁拌晒三次，复以人乳拌晒一次磨为末，用十二两　熟地黄二两　当归　杜仲盐水炒，各二两　川芎　人参　白茯苓　牡丹皮　延胡索　滴乳香　没药二味瓦上熔去油研　赤石脂细腻粘唇者火煅醋淬，各一两　白术　白芍各一两五钱　鹿角胶北蛎粉炒成珠去粉，四两

方内余药，俱照大金丹制法，蜜丸弹子大，每早空心白汤服一丸，能调经止带，安胎补虚。凡治胎前一切症，从无神妙过此者。

回生丹

锦纹大黄一斤，为末　苏木三两，打碎，河水碗、煎汁三碗　大黑豆三升，水浸去壳，用绢袋盛好，同豆煮熟，去豆留汁，将壳晒干　红花二两，炒黄色，入好酒四碗煎五七滚去渣　米醋陈者，九斤

上件先将大黄末入净锅，下米醋三斤，文火熬之，以长木箸，不住手搅之成膏。

再加醋三斤熬之，如前搅透，又加醋三斤熬之，如前搅透，徐下黑豆汁，再熬，次下苏木汁，次下红花汁，如前搅熬成膏。取起盛瓦盆内，将锅粑产下，同后药磨。

人参二两，减半亦可　当归　川芎俱酒洗　香附　延胡索俱醋炒　苍术米泔浸炒　蒲黄隔纸炒　茯苓　桃仁去皮尖　酒蒸熟地黄各一两　牛膝　地榆　白芍俱酒洗　甘草炙　三棱醋浸透纸裹煨　川羌活　广橘红　马鞭草　五灵脂醋煮化焙干研细　山萸肉酒浸蒸捣烂入药晒，各五钱　木瓜　青皮炒　白术米泔浸炒　秋葵子各二钱　乌药去皮，二两五钱　良姜　木香各四钱　乳香　没药各二钱，瓦上熔去油研　益母草二两

上三十味，并前黑豆壳为末，入石臼内，下大黄膏拌匀，再下熟蜜一斤，共捣千杵为丸，每重二钱七八分，静室阴干，须二十馀日，不可日晒，不可火烘，不可尘染，干后止重二钱有零，熔蜡护之待用。

临产，淡盐汤下一丸，无横生逆产之苦。气血怯弱者，独参汤下之。

产母素患热病，子死腹中，用车前子一钱煎汤服，未下再服二三丸。若因血下太早，致子死者，人参、车前子各一钱煎服。如无参，以陈酒少许，煎车前子汤。

胎衣不下，用炒盐少许，泡汤服一丸至二丸三丸。

产毕血晕，用薄荷汤服。

产后三日，血气未定，远走五藏，奔冲于肝，血晕，起止不得，眼见黑花用滚水服。

产后七日，因食物与血结聚胸中，心闷烦渴，用滚水服。

产后虚羸，血入于心肺，热入于脾胃，寒热往来，似疟非疟，用滚水服。

产后败血走注五脏，转满四肢停留，化为浮肿，渴而四肢觉寒，乃血肿非水肿也，用滚水服。

产后败血为热，中心烦躁，言语颠狂，非风邪也，用滚水服。

产后败血流入心孔，闭塞失音，用甘菊花三分，桔梗二分，煎汤服。

产未满月，误食酸寒坚硬之物，与血相搏，流入大肠，不得克化，泄痢脓血，用山查煎汤服。

产后百节开张，血入经络，停留日久，虚胀酸疼，非湿症也，用苏梗三分煎汤服。

产后月中，饮食不得应时，兼致怒气，馀血流入小肠，闭塞水道，溺血似鸡肝，用木通四分煎汤服。又或流入大肠，闭塞肛门，有瘀血成块如鸡肝者，用广陈皮三分煎汤服。

产后瘀露未净，饮食寒热不得调和，以致崩漏，形如肝色，潮热烦闷，背膊拘急，用白术三分广皮二分煎汤服。

产后血停于脾胃，胀满呕吐，非翻胃也，用陈皮煎汤服。

产后败血入五脏六腑，并走肌肤四肢，面黄口干，鼻中流血，遍身瘀点，危症也。陈酒服。

产后小便涩，大便秘，乍寒乍热，如醉如痴，滚水服。

产后败血为害，一切异症，人所未经，医亦难识，但服此丹一丸至二三丸。无不奇应。胎前以独参汤常服一丸，壮气养胎，滋阴顺产，调和五脏，平理阴阳，最为神妙。

室女经闭，月水不调，白汤服妙。

此丹疏利脏气，较大金丹为速，然寻常服饵，必以至宝为先，此丹殿后，大金间进。又以济二药之奇，自有产科以来，未见如此十全法宝也，吾愿天下有力人，速为诚敬修合，广济群生，皇天决不相负。

兔脑丸

十二月兔脑髓一具，去皮膜研如泥　母丁香二钱五分　乳香　麝香各另研，五分

三香碾细拌匀，兔脑为丸，如芡实大，阴干，油纸裹好，每用时温水下一丸。凡生理不顺，或横或逆皆效。产时男左女右手中握出。

赵照庵曰：鼠肾用银针挑破，滴乳香一钱，为末和丸，如桐子大，朱砂为衣，俟恶露至，好酒送下二丸，同此治效。

备用煎方丸药一时未备者，按候用之。

安胎饮

白术　当归　紫苏　条芩各一钱　川芎八分　白芍七分　砂仁炒　香附各炒，六分　人参　陈皮各五分　炙甘草三分　苎根二钱

翁曙公曰：妇人经水三月不来，疑似之际，用川芎二钱为细末，空心煎艾汤调下方寸七，觉腹中动，则有胎也。脐之下动，则血瘕也。不动者，瘀血凝滞也。

程未能曰：女子胞系于肾，肾气虚，胎不能固，用杜仲一斤，盐水炒断丝为末，黑枣一斤，去皮核捣肉，共为丸，每服三钱，其胎自固。

人参橘皮汤　妊时呕酸恶阻，脾胃虚也。

人参　白术　茯苓　陈皮　厚朴　麦冬　炙甘草　煨生姜

麦门冬汤　妊时心常惊悸，是子烦也。

麦冬　黄芩　茯苓　淡竹叶

天仙藤散　妊时面目四肢浮肿，是子气也。

香附　陈皮　乌药　甘草　天仙藤

羚羊角散　妊时喉中喘急，擒掣露睛，是子痫也。

羚羊角　五加皮　川独活　川芎　苡仁　当归身　酸枣仁　炙甘草　茯神　木香　防风　杏仁

达生散

大腹皮炒　白芍酒炒　紫苏　人参各一钱　甘草炙　陈皮各五分　当归身一钱二分　葱五叶

胎肥加黄杨树梢七个。

春加川芎，夏加黄芩，秋冬加砂仁、枳壳。

程坡士曰：达者，畅茂条达之意。或曰：达音闼，小羊也。诗：诞弥厥月，先生如闼，美后稷之易生。夫马牛羊豕，未有分娩而致厄者，岂天之于人独薄乎？不知皆平时调摄无道，临产着意惊惶，遂致人不如物耳。为丈夫者，幸体此而讲明之。

便产神方

当归一钱五分　川芎　白芍各一钱二分　贝母一钱　兔丝子酒洗，二钱　荆芥八分　厚朴姜汁炒　黄芪蜜炙，各七分　枳壳炒，六分　艾叶　甘草炙　川羌活各五分

胎至九个月一服，产时再服，易于分娩，并可杜血晕、阴脱、无乳、血块痛等症。

又方　产时有横逆枕拄诸症，服此神良。

当归　枳壳　赤芍　贝母　益母草各一钱　车前子八分

好酒、童便同煎。如遇遍身拘挛，加麻黄八分　升麻五分

吴绮园曰：产母平素血少者，临时以当归三钱，川芎二钱，日服一次，名佛手散。甚效。若乡村不能备药，忽遇横生逆产，速以栢树叶煎汁连饮二盅，少顷不动，更进一盅，至四五盅，必能提上转身矣。

催生如神散

百草霜取釜底心者　白芷不见火，各为末，等分

每服三钱，以童便、米醋调和如膏，加沸汤下，或童便、酒煎进二服。薛立斋云：此药大能固血，可免血干。治逆产横生，其功甚大。

黑神丸

官桂　当归　芍药　甘草　炮姜　生地各一两　黑豆炒焦去皮三两

为末，每服三钱，温酒下，治热疾胎死腹中自出。朱丹溪云：胎得暖则下，故用姜桂，冬月更宜。

催生滑胎汤

当归一钱　川芎　枳壳　紫苏　滑石各六分　甘草三分　木通五分　白茯苓七分　大腹皮八分　益母草三钱

无参不能服达生散者，此方亦妙。

平胃散加朴硝方

厚朴　苍术　陈皮各二钱　甘草五分　朴硝五钱

俱用生者，下死胎神妙。

朱紫贵曰：有双胎，一死一生者，取蟹爪煎汤服，能令生者安而死者出。

牛膝汤　治胎衣不下。

牛膝　木通各三钱　当归二钱　滑石四钱　瞿麦一钱　黄葵子一钱五分

张心斋曰：五六个月坠胎，亦有胞衣不下者，牛膝、官桂、川芎、当归、蒲黄、朴硝、生姜服之。

加味芎归汤　治交骨不开，产门不闭。

川芎一钱　当归二钱五分　自死龟板酥炙一钱，灼过亦可　妇人头发烧存性，一钱

补中益气汤　治交骨不开，盘肠不收，膀胱坠出。

黄芪一钱五分　人参　白术各一钱　当归八分陈皮　炙甘草各五分　升麻　柴胡各三分

十全大补汤　治产门不闭。

人参　白术　茯苓　甘草　川芎　当归　熟地　白芍　黄芪　肉桂

除耆桂为八珍汤，治膀胱破损。

玉龙汤　治产后阴挺下坠，产户肿痛。

当归　芎藭　地黄　芍药　龙骨

当归川芎汤　治产后瘀血心疼。

当归　川芎　香附　青皮　生地　赤芍　延胡　桃仁　红花　丹皮　泽泻

煎好，用童便半杯，酒半杯，冲服。

江子眉曰：益母草一两，入童便一碗，水一碗煎服。能去污秽，不致留滞作疼。

王介庭曰：近人于产后多服红糖，为逐瘀暖肠之用，不知产后脾胃虚弱，甘甜作呕，血随上泛，岂不误人。且红糖间有掺人石膏者，误服立见危殆。

产后忌食生冷，惟梨尤甚，虽食少许，即桂附亦不能救。平素喜食生冷者，只藉不防。

清魂散　治产后血晕。

当归二钱　川芎一钱　荆芥七分　泽兰八分　甘草三分　益母草三钱

身热，加麦冬七分。脉细，加人参一钱，童便一盅。

小调经汤　治产后，败血流入四肢，浮肿，名曰产后流注。

没药　琥珀　桂心　赤芍　当归　细辛　麝香

为末，每服二钱，姜汁温酒调下。

车前子汤　治产后尿血。

蒲黄　芍药　黄芩　生地　当归　牡蛎

车前子

黄绢汤　治产伤膀胱，不能小便，渗湿苦楚。

生丝黄绢一尺，剪碎　白丹皮　白茯各一钱

同煎至绢烂如饧，空心顿服，不得作声，神效。

玉露饮　治产后无乳。

人参　茯苓　甘草　芍药　川芎　当归　枳壳　桔梗

又方

当归　川芎　瞿麦　王不留行　穿山甲　麦冬　陈皮

煎熟，冲酒一杯饮之，徐以木梳梳乳数下，乳路自通。

又酒方　治乳少。

生地　熟地　当归　木通　牡蛎各一两　川芎　白芍各五钱　酒十五斤

芎归补中汤　治小产血崩，腹痛晕厥。

人参　黄芪　白术　川芎　当归　白芍　艾绒　阿胶　杜仲　炙甘草　五味子

人参黄芪汤　治气虚小产，血下不止。

阿胶　艾绒　白芍　当归　人参　白术　黄芪　煨姜　大枣

调经种子奇效方附见　大金丹、至宝丸，调经妙药也，然修合不易。此方煎剂，竟有奇功，虽未能十有九效，乃余所见，则效者比比矣。敬为述之。

当归身肥白者，一钱二分　熟大地黄二钱　香附童便浸三日，醋炒　白芍酒炒，各一钱　艾绒去梗净醋炒　真广陈皮各七分　甘草炙　干姜炮黑，各三分　白茯苓　丹皮酒洗　延胡索炒　川芎酒洗，各八分　官桂四分　山萸肉一钱二分

上十四味，依法炮制，加煨姜二片，大枣一枚，水二碗，煎八分，空心服。渣再煎，临卧时服。

每月经至净后，即服此方，一日一剂。服四五剂后，不必再服，旬日内即能成孕。

如经期不调者，每月服五剂，三月后必调经受孕也。

慈幼新书　卷一

明　江夏　程云鹏凤雏辑
鄞县　曹赤电炳章校

禀　赋

儿在母腹中，感受精气，一月胚，二月胎，三月血脉见，四月形体成，五月能动，六月筋骨成，七月毛发生，八月脏腑具，九月谷神入胃，十月百骸备而生。生后六十日，瞳子成，能笑语，始识人。百日任脉生，能反覆。一百八十日，尻骨生，能独立。二百一十日，掌骨成，能匍匐。三百口髌骨成，能独倚。三百六十日为一周，膝骨成，乃能移步。

落地时，身破裂者死，阴囊白者死，阴不起者死，无粪门者死，股间无生肉者死，开口如鸦声者死。

凡周岁之间，颅囟开解，齿发不生，手足挛缩，膝如鹤胫，身羸无肉，或四五岁不能行立，皆胎气不足致之。若夫筋实则多力，骨实则早行，血实则形瘦多发，肉实则少病，精实则伶利多笑语，不畏寒暑，气实则少发而体肥，此皆受胎气之充足，得禀赋之隆厚者也。

吕晚村曰：凡小儿齿迟，语迟，行迟，囟门开大，肾疳等症，皆先天不足，自晬周时，即有虚病肾病，从幼填补，亦多可复。

初生芽儿，藉乳为命，善为乳母者，夏不欲热，热则致吐逆，冬不欲寒，寒则致咳痢。乳时不欲怒，怒则上气颠狂，不欲醉，醉则身热腹痛。母方吐下而乳，则致虚羸。母方积热而乳，则变黄不能食。新房而乳，则瘦瘠交胫不能行。新浴而乳，则发吐伤神。冷热不调，停积胸膈，结为痰饮，遂成壮热。壮热不已，乃作惊痫，儿啼未定，遽以乳哺，气逆不消，因成乳癖。怀孕而乳，致令黄瘦，腹大脚弱，名曰魃病。大抵芽儿或疮或热，或困倦，或口生白糜，或夜啼，或粪色变常，必非无因，病之初来，其溯必甚少，便须根究缘由，随症调治，庶无后患。

胎症列后。

人每于初生时，多向头额前发际穴灸之，取其可以截风路也，此但可行之北方地寒之处，东南脆薄，似乎不宜。

脏　能

心所伏者肾，所敌者肺，所喜者苦，所伤者咸卤。应三变八蒸之脏，和则性情悦乐。疾主惊痫恐悸，谵语狂烦，涎流口角。痘主红癍。

肝所伏者肺，所敌者脾，所喜者酸，所伤者辛辣。应初变六蒸之脏，和则魂魄壮，意智生。疾主风挛搐搦，眼目赤肿疼痛。痘主水疱。

肺所伏者心，所敌者肝，所喜者辣，所伤者苦。应二变七蒸之脏。和则气爽神清魂强。疾主喘满咳嗽，虚痰壅盛。痘主脓疱。

脾所伏者肝，所敌者肾，所喜者甜，所伤者酸酽。应四变九蒸之脏。和则消谷食，美滋味。疾主呕哕疳积，泻痢潮热，不思乳食。痘主结痂。

肾所伏者脾，所敌者心，所喜者咸，所伤者甘甜。应五变十蒸之脏。和则嬉戏笑语

精神。疾主黑齿崩沙，聍耳脓汁。痘主黑陷。

脉　候

左颊者肝之部，应左手关位风木之分。额为心之部，应左手寸口君 火之分。鼻为脾之部，应右手关位湿土之分。右颊为肺之部，应右手寸口燥金之分。颐为肾之部，应左手尺部寒水之分。向有初气二气之说，颇不应，详见余别著脉覆中。

小儿五岁以下，未可诊寸关尺，惟看男左女右虎口。食指一节寅位为风关，脉见易治。第二节卯位为气关，脉见为病深。第三节辰位为命关，脉见为病危。

色紫为热，色红伤寒，色青惊风，色白疳疾，惟黄色隐隐，为常候也。色黑者多危。

脉纹入掌为内钓。纹弯里为风寒。弯外为食积。病重时纹势弯入，犹可挽回，弯外者，万不救 一。

五岁以上，以一指取寸关尺三部，六至为和平，七八至为热，四五至为寒。浮弦为风痛，沉缓为伤食，促为惊，细为冷、单细为疳劳，洪为虫积，浮而迟，潮热者为胃寒。

半岁以下，于眉端发际之间，以名中食三指候之，儿头在左，举右手候，儿头在右。举左手候，食指近发为上，名指近眉为下，中指为中。三指俱热，外感于风，鼻寒咳嗽。三指俱冷，外感于寒，内伤饮食，发热吐泻。食中二指热，主上热下冷。名中二指热，主夹惊。食指热，主食滞。

胎　病

小儿胎病凡二端，在胎时母失爱护，或劳动气血相干，或坐卧饥饱相役，饮酒食肉，冷热相制，恐怖惊悸，血脉相乱，蕴毒于内，损伤胎气，此胎热胎寒，胎肥胎怯，胎惊胎黄诸症，所由作也。又有落地时，浴体拭口，断脐灸囟之不得法，绷袍惊恐，寒温乳哺之乖其宜，此噤口、脐风、锁肚、不乳等症所由生也。黄帝云：吾不能察其幼小，亦唯小儿脏腑娇嫩，血气懦弱，肌体不密，精神未充，而用药消息之难耳。

胎　热

胎热者，生后气急喘满，眼闭或日赤，眼胞浮肿，神困呵欠，呢呢作声，遍体壮热，小便赤，大便涩，时复惊烦，宜至宝丹研服之，木通散与乳母服之。目不开，以二妙散温洗之。不治，则生鹅口、木舌、重舌、紫赤丹瘤。

至宝丹

滑石六两　甘草　木香　陈皮　莪术　三棱各一两　茯神　白术　山药　远志　青皮各两五钱　甘松五钱　益智仁七钱五分　麝香一钱五分

一方，加人参一两。

蜜丸芡实大，朱砂为衣，灯心汤调化服。

此即时下所常用秘方也，不论内伤外感，变蒸寒热，一切治之。予谓此药，唯蒸症相宜，次则郁热伏暑神剂。小儿夏月，宜多服之。补而不滞，泻而不偏，殊有妙用。

木通散　兼治小儿胎热，小府闭，诸疮丹毒，母子同饮。

木通　萹蓄　大黄　甘草　瞿麦　赤茯　滑石　黄芩　薄荷　炒栀子　车前子

补中益气用升、柴天道之方也；此方车、茯、瞿、萹，地道之方也。小儿稚阳气纯，天道完全，故唯此法出入调理。

二妙散　大人翳膜血丝俱治。

文蛤一两　黄柏二钱

煎水熏洗。

胎　寒

胎寒者，百日内口冷腹痛泻白，时发战栗，曲足握拳，昼夜啼哭不已。或口噤不开，昏昏沉睡，治以指迷七气汤。失治，则成慢惊。

指迷七气汤　一切腹痛寒热，多啼不乳等症，皆为阴阳不升降，气道壅塞而作。并宜服之。

陈皮　青皮　藿香　桔梗　莪术　香附　半夏　甘草　肉桂　益智仁　生姜　大枣

凡人身内之气，呼吸出入，无刻不与天道阴阳之气相通，故六淫外袭则感而致病，翕受之理也。内气闭塞，天道不通，升者不升，降者不降，寒热之原也。是方疏利脏气，神应无方，最宜领会。

学者能识阴阳消息，即不用方内药味，吾知其必有合也，愚昧者未可与语。

胎　肥

胎肥者，生下肌肉厚者，遍体血红，满月后渐渐羸瘦，目白，五心烦热，大便难，时时涎溢，浴体法治之。

胎　怯

胎怯者，生下目无精光，肌肉薄，大便白水，身无血色，亦浴体法治之。

浴体法

天麻二钱五分　蝎梢　朱砂各五分　麝香少许　白矾　青黛各二钱　乌蛇肉酒浸焙，三钱

为末，每用三钱，连叶桃枝一握同煎十沸，温热浴之，勿浴背。

胎　黄

胎黄者，生下遍体面目皆黄如金色，或面赤眼闭，身上壮热，大便不通，小便如栀汁，皮肤生疮，不思乳食，啼哭不止，母子同服地黄汤。

地黄汤

生地　赤芍　川芎　当归　花粉　甘草　赤茯　猪苓　茵陈　泽泻

胎　惊

胎惊者，月内温壮，翻眼握拳，噤口咬牙，身腰强直，涎潮呕吐，搐掣惊啼，腮缩囟开，或颊赤，或面青眼合。凡胎风眼合，不可误作慢惊而用温药，只宜解散风邪，利惊化痰调气，贴囟，甚则以朱银丸治之。如初生不能服药，以猪乳汁，调牛黄麝香少许，入咽即愈。

如眉角引搐不已，用大虾蟆一双，活取胆，将人乳调服之，立效。

朱银丸　此方能取胎中蕴受之毒，亦治惊积，须量与之。

水银一钱，燕枣研如泥　南星　全蝎　朱砂各一钱　白附子一钱五分　天浆子　芦荟各五钱　铅霜和水煅研　牛黄各五分　白僵蚕七枚，炒　片脑一字　麝香少许

蜜丸桐子大，薄荷汤食前下。

古方有当用者，不必妄为加减。认症既真，投之立效。不敢用者，不明之罪，用而不明于症，虽用奚为？

锁　肚

锁肚者，胎中热毒壅盛，结于肛门，急令妇人以温水漱口，吸咂儿前后心脐下手足心，共七处，凡四五次。外以轻粉五分，蜜少许，温水化服，以通为度。如更不通，以物透而通之。金簪为上，玉簪次之，须刺入二寸许，纳入苏合香丸，粪出为快。若至一七不通者死，不能通而又不乳者死。

苏合香丸

白术　青木香　乌犀屑　香附　诃梨勒煨去皮　朱砂　白檀香　安息香别为末，无灰酒一升熬膏　沉香　麝香　丁香　荜拨各二两　龙脑　薰陆香　苏合香油入安息香膏内，各一两

古方有三，各不同。

炼蜜和剂，旋丸桐子大。

不　啼

落草不啼，有因难产，项被母夹，有因绞脐，项被脐缠，有因天寒疠气所逼，有因粪门生膜，闭住儿气。病项者，温手摩之，口吸咂之。寒气者，温水浴之，以洁净妇人舌，

吸哑其舌而通之。生膜者，手拍之使破，不破以银簪挑之。

不　乳

出胎三日，不知吮乳，此恶秽入腹。腹满气短，亦由胎中受寒，儿腹疼痛呕吐故也。

《指迷》七气见胎寒调之。

脐　风

脐风者，断脐后，为水湿风冷所乘，入于脐而流于心脾，令肚腹胀满，脐肿多啼，不能吮乳，甚则风搐，指迷汤见胎寒消息之。脐边青黑，撮口不开，为内搐，不治。爪甲黑不治。若因热在胸膛，伸缩努势，亦令脐肿，木通散见胎热消息之。

曰消息者，未可全用本方也。落地贫富不同治，气禀厚薄不同体，天时寒热不同功，医不谙此，岂堪司命。

撮　口

撮口者，气息喘急，啼声不出，或肚上青筋，吊痾内气引痛，此胎气兼风邪入脐。治宜疏利郁结，指迷汤见胎寒去桂，加大黄、钩藤、僵蚕，或参以荆芥穗汤

荆芥穗汤

川黄连　荆芥穗　生地黄　生甘草

大便秘，加大黄。小便少，加木通。

噤　口

噤口者，眼闭口噤，啼声渐小，舌上聚肉，如粟米状，吮乳不得，口吐白沫，大小便不通。遇此先看其上腭有点子，即以指甲轻轻刮破，次服四顺清凉饮，加木香、白蔻仁，利动脏腑，徐以指迷汤见胎寒加减调之。如口噤不能开，用生南星去皮脐为末，加龙脑少许，合和，将指蘸生姜汁调之，擦大牙根上立开。大人中风口噤俱效

四顺清凉饮

当归　白芍　甘草　大黄

三症虽异，其源则一。大抵裹气郁结，闭塞不通，并宜淡豆豉汁与食，取下胎毒，甚者朱银丸见胎惊亦可用之。初生时，用淡豆豉汁，与三五口，不特能下胎毒，复可助养脾气。脐风撮口，不语不乳，灸男左女右涌泉穴，立愈。又法：炙蜈蚣末，入麝少许，猪乳和之饮，口噤立开。或蜘蛛去足及口，炙焦研细，和猪乳饮亦效。更入麝少许，能治牙疳。

穷乡僻壤，药饵难得，故备经验治法，为襁褓中乞命，幸毋忽之。

后卷仿此。

变　蒸

变蒸者，小儿生三十二日为一变，再变为一蒸，总五百七十六日。变蒸方足，凡变蒸身热而脉乱，汗不出，不欲食，甚则烦啼躁渴，轻者五日解，重者八日解。其候与伤寒相似，但变蒸则耳冷，上唇发疱，状如浊珠。若寒邪则腹中痛，啼叫不绝为异大都此乃长养气血，滋荣五脏，不可妄加施治，唯宜秘方至宝丹见胎热常服。若不乳多啼，或寒热间作，阴阳不升降，指迷汤见胎寒消息调之。

钱氏云：一变肾，二变膀胱，三变心，四变小肠，五变肝，六变胆，七变肺，八变大肠，九变脾，十变胃。《宝鉴》云：初变肝，二变肺，三变心，四变脾，五变肾，二说不同，其胶滞则一。夫人当长养气血之时，阴阳变换，五行颠倒，斯理至微，一用后天推测分配，不足见造化之神妙矣。

慈幼新书　卷二

明　江夏　程云鹏凤雏辑
鄞县　曹赤电炳章校

杂　症

咽　喉

咽喉与肺胃相接，为出入枢要，种种之症，与大人不同。大抵由热毒蕴积，致生风痰，壅滞不散，为疮为肿，甚至吐咽不通，治宜桔梗汤，或牛蒡子汤，先去风痰，然后解其热毒，次则以上清丸时时噙化服之亦佳。

肉鹅者，太阳少阴之火，为风寒壅遏，关隘不通，留连发肿，痰涎稠浊，疼痛难堪，用大乌梅一个去核，纳入蜗牛一条，灰火煨透碾末，刺破鹅肿点之，或服清道汤、山豆根汤。先天虚弱火泛者，巴戟汤俱效。

喉癣者，风火郁滞喉间，蒸湿生虫，或疼或痒，干燥枯涸，甚至面红耳热而不可忍，百部汤治之，苡仁汤调之。

牛蒡子汤　治风热上壅，咽喉肿痛，或生乳鹅。

元参　升麻　黄芩　桔梗　木通　甘草　犀角镑　大力子

桔梗汤　咽喉微觉肿痛，声破难语神效。

桔梗　甘草　黄芩　当归　麻黄　桂枝　白僵蚕　马勃

上清丸　咽喉肿痛，痰涎壅塞妙方。

薄荷一斤　川芎　防风各二两　桔梗　砂仁各五钱　甘草四两

蜜丸弹子大，不拘时噙服，卧时更佳。

清道汤

花粉　元参　柴胡　芍药　甘草　麻黄　桔梗　山豆根

陈远公破隘汤即此。

山豆根汤

射干　麦冬　花粉　甘草　元参　山豆根

巴戟汤

熟地　茯苓　巴戟　麦冬　五味子

程汉章曰：少阴之火，直如奔马，非借降泄，何以引而归元？此方加入牛膝、泽泻、山萸尤妙。

百部汤

白微　紫菀　百部　元参　麦冬　甘草　五味子　大力子　白芥子

苡仁汤

熟地　麦冬　苡仁　山萸　桑皮　贝母　生地　甘草

远公曰：服百部汤虫死，服苡仁汤火息，更入肉桂数分，服二剂，不再发。

玉露汤　治初生喉肿。

陈茶叶　川黄连　荆芥穗　薄荷　甘草

吹药方

胆矾　牛黄　冰片　皂角灰各一分　麝五厘

玉锁匙　治风热喉闭，并缠喉风。

硼砂　僵蚕各一钱　焰硝一钱五分　冰片三厘

碾细盛固，临用取出，吹喉中甚效。

京师中一医，持秘方丸药治喉闭，获利其广。惟用拭面肥皂，金箔为衣，偶为翁曙公识破，遇江湖无药处，以此灌之，稠痰尽吐，危症立苏。

咽喉以下十六门，名曰襟症，指孩抱中言也。然余治法，则自初生至少壮，广为设立焉。若夫虚劳相火炽甚，致喉齿耳目等症者，载余医贯别裁中，始不及。

齿

齿者骨之余，骨者肾之络。初生儿有重龈重腭者，骨不敛髓，故颊里生物，与芦择相似，用绵裹针微刺之，令泻血汁，先以淡盐汤洗，次以细辛散频擦之。

齿断，上属足阳明胃，下属手阳明大肠。而其为病也，责胃居多，但所伤有胃血胃气之异。胃血伤者，喜寒而恶热，清胃汤；胃气伤者，喜热而恶寒，益胃汤。

叶锡侯曰：胃病者，口极臭，肾病则否。

小儿卧时，开口当风，吸入风邪，留连不解，令齿缝酸痛，治以胡桐泪汤。胃虚湿热壅盛不得下行，牙齿肿痛，清胃合五苓见口治之。又有牙疳出血，口臭肉烂，芦荟丸见疳治之。

小儿禀赋虚怯，数岁后牙齿时疼，虫疳风吼，九味地黄丸主之。肾气不足，髓脉不充，七八月齿仍不出，或难出而无力嚼物，芎藭散治之。

细辛散　治一切风蛀牙疼，腮颔浮肿。

细辛　荆芥穗各一两　砂仁　革拨　鹤虱　皂角各五钱　白芷　细椒　草乌各二钱

为末，擦患处，有涎吐之，仍用水灌漱。

清胃汤

当归　生地　丹皮　升麻　甘草　连翘　黄连

益胃汤

当归　茯苓　白术　陈皮　黄芪　甘草　防风　升麻

九味地黄丸

生地　山萸　山药　丹皮　茯苓　当归　川芎　史君子　川楝肉

高鼓峰曰：此方直泻厥阴风木，乃肾肝同治之法。缘虫疳为风木之化，有可伐之理。然伐其子则伤其母，故用五者补之。去泽泻者，肾不宜再泄也。

胡桐泪汤

白芷　麦冬　当归　生地　花粉　石膏　细辛　升麻　干葛　胡桐泪

芎藭散

川芎　生地　山药　芍药　当归　甘草

为末。每服二钱，白汤下。

舌

舌者心之窍，脾之脉络所系，心脾壅热上冲，故令舌肿，渐渐胀大，塞满口中，名曰木舌。宜木通散见胎热服之，乌鱼散涂之。又有重舌者，亦心脾蕴热所致，由血气俱盛，附舌根而重生一物，形如舌而略短小，以真蒲黄和黄柏末傅之，或牙硝亦可。

脾脏有热，令舌络微紧，时时舒出，名曰弄舌，切勿用寒药及下之，唯宜泻黄散，甚有饮水者，脾胃虚，津液少也。

生时舌下有膜，如石榴子，或口上腭有疱，不能出声，速用指甲掐破，或苇草割之，血出即活。若血出不止，猪脂调发灰傅之。

乌鱼散

乌鱼骨五钱　蜣螂　蒲黄各二钱五分　白矾五分

鸡子黄调涂舌上，咽津无妨。

青液散　治重舌并口疮。

青黛　朴硝各一钱　龙脑一字

蜜调鹅羽蘸傅。

泻黄散　治弄舌兼治木舌。

藿香叶　炒山栀　石膏　甘草　防风

口

小儿生后，宜勤看口，有口糜者，膀胱移热子小肠，肠膈不便，上为口糜，导赤合五苓治之。

鹅口者，初生白屑满舌，如鹅之口，乃胎热所致，用发缠指上，蘸薄荷自然汁拭之。

如不已，更以粟米煎浓汁拭之，外用煅

过黄丹渗患处。

初生一复时，满口上下牙齿，忽变白色，恍如齿牙，名曰马牙惊，不治。若因将养过温，积热熏蒸于上，发为口疮，宜炒焦干姜，同黄连为末傅之，以木通散见胎热与乳母服。如不愈，更以矾汤浸脚，上半日，以蜜炙黄柏、炒僵蚕末傅之立效。如只口角烂疮，发灰以猪脂调傅即愈。

导赤散

生地　木通　赤茯　麦冬　甘草　灯心

五苓散

猪苓　赤茯　赤芍　白术　肉桂

口糜散　口疮糜烂神效。

黄柏　黄连各一两　雄黄　没药各二钱　片脑五分

为末干掺疮上。

耳

小儿肾气实，其热上冲于耳，使津液壅滞，化为稠脓，或为清汁，亦有沐浴水入耳中，血气凝滞，渐生疳臭，久乃成聋。汤氏有五耳之名，其本则一，宜龙骨散吹之，外服化毒退热之剂。

胆气不舒，风邪乘袭，少火被郁，两耳肿痛，内流清水，久则变为脓血，身发寒热，耳内如沸汤之响，此风火燥干胆汁之候，治宜舒胆汤。

耳中干耵，无脓无水，痛如针刺，久则焚槁成聋矣，速宜平火汤重剂服之，或以柴胡聪耳汤消息调之。

龙骨散

龙骨研　明矾煅，各三钱　黄丹煅，二钱　胭脂一钱　麝香少许，同为末

先捻去脓汁，次用鹅管吹入。

吴遇斋曰：疮在耳外，用雄黄一钱，红枣一枚去核，包黄在内，火煨存性，取黄研细，搽上即愈。疮在耳内，用鱼首石炼存性，碾细，加朱、麝各少许同碾，吹入自愈。

方鹿村曰：耳后脓疮，用柿饼蒂七八个，烧灰，将熄时，以碗覆之，冷定为末，入轻粉一钱，香油调涂即愈。

舒胆汤

当归　白芍　元参　花粉　炒山栀　柴胡　石菖蒲

平火汤

熟地　生地　麦冬　玄参　菖蒲

柴胡聪耳汤

柴胡二钱　连翘四钱　当归　甘草　人参各一钱　虻虫三个，去翅足　水蛭五分　麝香少许，三件另研　生姜一片

各药煎好，去渣入三末，再煎一二沸，食少远，热服。

程庆其曰：有虫入耳中，痛不可忍，极似干耵症，用生姜擦猫鼻，取尿滴耳中即出。

仇芑轩曰：有耵燥暴聋者，用全蝎去毒为末，酒调滴耳中，闻水声即愈。

目

目黑睛属肝，白睛属肺，瞳人属肾，上下胞属脾，大小角属三焦，心者，往来机发之轮，故目内赤者，心家积热上攻，导赤散见口主之。青者肝热，泻青丸主之。黄者脾热，泻黄散见舌主之。有视物不明，不肿、不痛、不赤，无翳膜，或见黑花，无眼光者，是肝肾阴虚，不可服凉药，宜滋阴肾气丸主之。有初生眼闭者，由产母食热物毒物所成，以熊胆少许，蒸水洗之，日七次。如三日不开，与地黄汤服之，乳母与木通散见胎热服之。乳母食热物毒物，令儿眼赤者，消风散加减调之。时气风热，眼昏红肿者，开明汤、冲和汤主之。斗睛，牛黄膏主之。疳眼流脓生眵，龙胆饮子治之。痘毒及无辜疳入眼，羊肝散治之。初生洗拭不净，秽汁浸渍眼眦中，两角赤烂，至长不瘥。又有难产，转侧差迟，血压儿首，灌注入眼，生下不见瞳人，外胞赤肿，上下弦烂，亦宜生地汤服之，四神散洗之，不可服重剂寒凉，致伤脏腑。若因肝气上冲，脑汁大坠，翳膜卷帘，非服补脑还睛

丸不可。

诸不治症　白珠如炙脑髓，翳如梅花蕊，瞳人散乱，青光瞎，白珠脓出，内翳裹睛，血脉胀出，瞳人打破，白翳贯心，乌珠突起。

泻肾丸

龙胆草　栀子仁　大黄　羌活　防风各一钱　当归　川芎各一钱五分

蜜丸，竹叶薄荷汤下。

滋阴肾气丸

熟地三两　山药　归尾　丹皮　北味　柴胡各五钱　茯苓　泽泻各二钱五分　生地酒炒，四两

蜜丸，辰砂为衣，每十丸，空心白汤下。

张迂庵曰：人至中年，肾水衰耗，两目昏花，极宜六味地黄丸加枸杞、甘菊、沙苑蒺藜常服。平素火盛者，入酒炒黄柏一两，火亏者，入肉桂一两。眼昏兼虚热，红肿涩痛者，此丸减少作汤，加枸杞、甘菊，数服自愈，不得妄用风药，致损真元。

生地黄汤

生地　赤芍　归尾　川芎　甘草　花粉　灯心

消风汤

防风　茯苓　蝉蜕　陈皮　厚朴　川芎　羌活　荆芥穗　白僵蚕　藿香叶　甘草

开明汤

羌活　白芷　荆芥　防风　菊花　川芎　生地　黄芩　当归尾　蔓荆子　草决明　薄荷　灯心　生姜

冲和汤　治四时感冒，赤火之眼，极效。

羌活　苍术　防风　白芷　生地　黄芩　川芎　细辛　甘草　生姜　葱白

四神散

铜青　明矾　海螵蛸煎过用，各一钱　硼砂二钱

灯龙果浆为丸，芡实大，每用时水浸化，蒸熟取清水洗拭。

将军冲翳散　洗一切翳障。

文蛤　苦参　升麻　薄荷　防风　荆芥　白芷　川芎　羌活　草决明

十二将军二圣汤

黑面将军十二个　绿圣　白圣各五分，煎洗

程自闲曰：即五倍子白矾铜绿耳，以其功能，得邀品号。

龙胆饮子

青蛤粉五钱　炒黄芩二钱　羌活　龙胆草各二钱　麻黄二钱五分　蛇蜕　谷精草各五分

为末，每服二钱，茶调下。

羊肝散

蜜蒙花三钱　青葙子　决明子　车前子各一钱

羊肝一叶薄批，渗上湿纸裹煨，空心食之。

牛黄膏

牛黄　麝香各五分　白附子炮　肉桂　全蝎　川芎　石膏各一钱　白芷　辰砂飞　藿香叶各二钱

蜜丸，芡实大，薄荷汤研化服。

赛宝万捶膏　治老障红丝贯肉，风火烂弦重翳，如神。

芦甘石一两，打成小块，放银罐内，将火硝拌匀，用火煅红，取出研极细，飞过，复研，以细绝为度　蕤仁一两，去油净　琥珀　珍珠　玛瑙　珊瑚　石蟹各五钱　雌黄　雄黄各二钱五分

以上用布包裹，槌碎研细，水飞过，加金银箔各二百片，同研细，再人人乳，研十万下，如尘欲飞。然后用荆芥穗、草决明、防风、羌活、木贼、菊花、蕤仁、千里光各五钱，细锉，煎水二碗，澄清熬膏，加乳汁，复熬透，调前药捶之万下。如干以膏湿之，做成片子藏固，临用取少许润软点之。

立灵散

芦甘石一钱，同上制　冰片　麝香各一分　熊胆二分　蕤仁三分，去油净

研细，点翳膜上。

粉丹散

轻粉　黄丹等分为末，盛小竹筒吹耳内，左翳吹右，右翳吹左，奇效。

辟尘膏　治尘埃入目，揩成肿痛，发热啼哭。

顶烟陈墨新汲水浓磨，入元明粉和成膏，新笔蘸点目内，日三五次，忌食煎炒

吴朴公曰：飞丝入眼，亦蘸墨点之，略闭刻许，墨染丝黑，用笔挑去。

补脑还睛丸

雌黄火煅，入醋，研，三钱　千里光酒拌炒　兔丝子酒浸炒　川木贼去节，童便浸一日　杏仁去皮尖　茺蔚子　荆芥穗　甘菊花　羌活　防风　蛇蜕酒浸焙　石决明煅，各一钱　川芎　白蒺藜　蝉蜕　苍术　酒蒸地黄各一两

各自为末和匀，炼蜜丸，如弹子大，每服一丸，日三次。薄荷汤或好茶送下。

大腹皮饮　治头疼眼胀，及偏正头风，神妙。

大腹皮　当归尾　何首乌　麻黄　川芎　北细辛

鼻

鼻为肺窍，一有风寒停滞，则气道壅塞，津液不收，流为浊涕。若冷结不散，久乃不闻香臭，辛夷散治之。有风寒挟热者，则鼻干不眠。又有乳母卧时，鼻中出息，吹著儿囟，亦令鼻塞，不能饮乳，开关散治之。

鼻渊有二症，风入胆中，移热于脑，脑寻窍于鼻而出涕，浓而臭为实热症，当归汤治之，鼻流不臭清涕，经年不瘥，为肺气虚寒之候，治宜石首鱼脑汤。又有郁火不宣，门户闭塞，稠粘浊涕，或硬或黄，不嚏则胀闷难忍，嚏则鼻梁疼痛，须加味逍遥散治之。

辛夷散

白芷　川芎　细辛　藁本　辛夷　木通　升麻　防风　甘草

开关散

香附　川芎　荆芥穗　细辛叶　白僵蚕　皂角烧存性各等分

为末，用生葱白同捣成膏，红绢包固，卧时贴囟门上。

当归汤

当归五钱　元参三钱　辛夷一钱　炒栀八分　贝母五分　柴胡三分

石首鱼脑汤

诃子　甘草各一钱　荆芥　细辛　人参各五分　桔梗二钱　石首鱼脑骨五钱，煅存性

为末，将上件煎好，去渣，入末，再煎一二沸服。

加味逍遥散

当归　白芍　白术　茯苓　甘草　陈皮　柴胡　桔梗　黄芩　白芷　半夏

囟

囟陷者，血气虚弱，不能上冲脑髓，或因泄利下陷，不得平满，总以狗头骨炙黄为末，入鸡子清调傅之。

囟填者，乳哺不调，致伤寒热，逆气冲填，突然高起，毛发短黄，颤惕自汗，寒气则牢硬不已，热气则柔软不支，寒者温之，热者凉之，兼调其气，而折其逆，自无不愈。

囟解者，小儿年大，头缝开解不合，由肾气不足，脑髓空虚，如树无根，岂堪培养。斯时也，惟以六味地黄，加龟板为丸，空心温水服之，外用防风、柏子仁去油为末，乳汁调涂，或以华阴细辛、肉桂、干姜为末，乳汁调傅，亦多有效。

六味丸

地黄八两　山萸肉　山药各四两　茯苓　泽泻　丹皮各三两

程格思曰：张仲景原方，有桂、附各一两，名八味丸，钱氏谓小儿稚阳，无补阳之理，故去桂、附治之。近世俗医，并六味亦不敢与小儿服矣。

颐

滞颐者，脾胃虚冷，涎流出而渍于颐间，不能收约，大宜温脾，姜术散主之，或八仙糕。加木香、白蔻仁亦妙。

姜术散

半夏　木香各五钱　川白姜　白术　青皮　陈皮各二钱五分

糕糊丸，麻子大，一岁十丸，米饮下。

八仙糕

人参五钱　苡仁　芡实　山药　茯苓　莲肉各四两　白米粉五升　白洋糖任用

脐

脐为有生之蒂，内通脏腑，偶或汁出，或赤肿，或生疮，俱为风湿相乘，当用白石脂末焙，出火气傅之，日三度，或油发灰傅，或当归末傅，或虾蟆灰傅，亦可。

安脐散

瓜蒂　南星　白敛　赤小豆

断脐时，以四药等分为末，每三钱，用芭蕉自然汁，调涂四傍，能去湿固气。

王介庭曰：断脐时，以蕲艾为捻子，香油浸湿，烧脐带至焦方断，断后用软帛厚棉裹束，每日看之，勿令儿尿浸润，可以预防脐风。

杨涵一曰：脐带落下，放新瓦上，煅存性，碾细，每一分，用飞过朱砂五厘和匀，外以黄连、当归、生地煎汁，调成稀糊，搽乳上，与儿吮吃，一日令尽，次日挞下黑粪，可免痘密，且无疮痕。

语　迟

言心声也，母有惊邪，儿感其气，心神不守，舌本不通，菖蒲丸主之。

菖蒲丸

人参　麦冬　川芎　当归　远志　菖蒲各二钱　乳香　朱砂各一钱

蜜丸麻子大，每服十丸，粳米汤下。

夜　啼

阴盛子夜，小儿脏冷，遇夜则阴极发躁，寒盛作疼，故夜啼而日歇，钩藤散主之。

钩藤散

茯神　茯苓　川芎　当归　木香　甘草　钩藤　生姜　大枣

如或心热烦疼而夜啼者，必面赤舌白，小便赤涩，即去当归、木香另为末，加辰砂一钱同研，少以木香煎汤调服。有触犯禁忌及惊骇者，服新安金药。见惊程书焉曰：夜啼一症，有用灯花末涂乳头者，有用灯心汤研化灯花四五粒而饮之者，有用井边草，或鸡窠中草安卧席下，不令母知者，俱有意焉。

龟　胸

胸高脐满，其状如龟，此肺家热邪，由乳母多用五辛酒面无度，或夏月热乳所致，宜服杏仁煎。

杏仁煎

川大黄　天冬　杏仁　百合　木通各一钱二分　桑皮　葶苈各五分　石膏八分　临卧时服。

龟　背

小儿生下，不能保护，客风入于骨髓，或坐早劳伤气血，多成瘫疾，间有灼艾收功者，肺俞穴第三椎骨下两傍各一寸五分，膈俞穴第七椎骨下各一寸五分，以小儿中指中节为一寸，艾炷如小麦大，灸但三五壮为止，内服松芷丹。

松芷丹

花松　枳壳　防风　独活各一两　川大黄　麻黄　前胡　桂心各五钱

蜜丸黍米大，粥饮服。

鹤　节

小儿肌肉瘦薄，骨节呈露，如鹤之膝，此先天禀受精髓不充，亟以六味地黄丸见囟加麝茸、牛膝治之，缓则必成废疾。

行　迟

小儿髓不满骨，血不荣筋，故软弱不行，虎骨饮治之，或六味丸加牛膝、五加皮、酒炙鹿茸亦可。若禀受肝气怯弱，致两足挛缩，

两手伸展无力，须薏苡仁丸治之。

虎骨饮

虎胫骨　干地黄　当归身　枣仁　茯苓　川芎　防风　牛膝　肉桂

为末，每服一钱，粥饮调入酒少许，日二次。

苡仁丸

秦艽　当归　苡仁　枣仁　防风　羌活

等分蜜丸，芡实大，每一丸，荆芥汤研化，入麝一厘服。

五　软

小儿生后，头项手足肉口皆软，乃先天诸阳之气不足也，头项症地黄丸见囟服之，甚者星附膏贴之。手足肉口症，补中益气汤主之见保产。有因吐泻之久，囟目顿陷，天柱骨倒，补中加附子治之，地黄丸料兼服之。

余子敬曰：肉软者，肉少皮宽，口软者，食少舌舒，皆脾胃之症。又有初生，遍身赤肉，全无皮壳，或有皮如鱼胞，如水晶，亦产母脾气不足所致。无皮者，以粳米粉拌黄土傅之。鱼胞水晶者，蜜陀僧碾细末傅之。更有燉赤发热者，石膏碾细傅之。

星附膏

南星　附子

等分为末，用生姜自然汁调傅。

五　硬

薛氏曰：五硬者，仰头取气，难以动摇，气壅作痛，连于胸膈，脚手心冷而硬，此阳气不营于四末也。又曰：手足冷而硬者，独阳无阴也，难治。若肚筋青急，为木乘土位，速宜六君子汤，加炮姜、肉桂、升麻、柴胡，以复其真气。如系风邪客于四末，而令硬冷者，须从惊风症中求之。

六君子汤

人参　白术　茯苓　陈皮　半夏　炙甘草

慈幼新书　卷三

明　江夏　程云鹏凤雏辑
鄞县　曹赤电炳章校

痘　疮

总　诀

痘曰胎毒，由男女交媾时，先有火会而后精聚，此火蕴酿于胚胎之中，为血液之贼。外有感触。忽然而生，莫可止遏。间有轻重不等者，或父母禀受所致，或天行运气使然。善治者因其势而利导之，何难皆中理解也。

儿在胞中，如雏在卵，形体未全，口无透窍，赖其母血液灌溉于脐带中，浑浑然太初之气也。产时母血横流，渗入儿口、容或有之，俗谓口含血饼咽下，寄于命门，蕴蓄成毒误矣。其有脐矢者，犹瓜果中浆汁，岂食血饼而成。若云腹中赖此滋生，则此乃血液之宝，焉得成毒哉？

沈甸仲曰：此益都翟氏之旨也，凤雏渊源翟氏，一番推出一番新。翟氏得未曾有，凤雏又发明其所以然，开聋瞆而济天枉。二先生宁止为斯道之功臣。

痘毒禀自胚胎，或数年而后发，或十数年而后发，或数十年而后发。其未发也，深藏潜伏，声臭俱泯。正如闾阎无事时，未可执人而诛之曰，尔将为寇也。奈何世有预解痘毒之说者。

预解痘毒方法，有偶中者，小儿胎毒本轻也。一或不中，当奈之何？尝见富贵之家，珍爱太过，遍觅方士金丹，及出痘时，反极重不可救药。良由所服损虚脏气，不得使痘毒宣畅故尔。

痘毒在人身中，无处不有。然其发也有次第，自骨髓而达于筋，肾主骨，血气壮盛，毒尽送出于筋，则肾经毒解，自筋达于肌肉。肝主筋，气血充足，毒尽送出于肌肉，则肝经毒解，自肌肉达于血脉。脾主肌肉，血气充足，毒尽送出于血脉，则脾经毒解，自血脉达于皮毛。心主血，气血充足，毒尽送出于皮毛，则心经毒解，自皮毛达于疮窠。肺主皮毛，气血充足，毒尽送出于疮窠，则肺经毒解。五脏毒解，血化为脓，毒从脓化，痂结靥落而功成矣。若出于筋而少留于骨髓，则壮热口干闷乱。出于肌肉而少留于筋，则搐搦牵掣，紫黑潮热。出于血脉而少留于肌肉，则得痈肿于四肢。出于皮毛而少留于血脉，则痘不圆肥。出于疮窠而少留于皮毛，则痂落迟而多麻癍。

痘毒与诸疮毒不同，诸疮毒未成形，可解散内消而愈。既成形而未成脓，犹可逐散不成脓而愈。痘毒发自先天，应期开落，不可内消，不能逐散，全仗气血送毒归痘。翟氏秘奥在此四字以灌脓结痂，生理沛然。一用寒凉冰伏，变症丛生矣。况有不必解者，又有不可解者，小儿禀赋强壮，素无疾病，饮食如常，其气血足以运送，变化成功，顺症也，焉用解。若先天禀赋素虚，后天脾胃复弱，出痘时饮食减少，或泻利腹胀，或手足冷，或气短促失声，或出不快，或根窠不红活，或色白顶陷，或当脓而不脓，当靥而不靥，此气血不能运送变化，宜速用温补。若参、芪、归、术，力不及者，即丁香、桂、附佐之，亦不为害，焉可解为？

痘毒蕴结于脏腑骨肉之间，与血气浑成一块，未曾破解，有感之后，渐渐分离。如胎之将产，此解字乃分形解体也。故痘出一分，毒解一分，痘出二分，毒解二分，痘尽出，则毒尽解，特在肌肉之间而未化耳。出不齐，胀不起，脓不化，痂不结，气血弱也，速宜助之。助之者，恐胶结难解也。若曰未出可解之不出，多出可解之少出，将使胎之在腹者，可使之不产，将产亦可使之有不产乎。

痘之发与杂症不同，杂症只在一经，痘则五脏之症俱见。古云似伤寒者，亦大概言也。孟春沂曰：寒出外入故恶寒，痘由内出故恶热，故恶寒无汗，头痛脊强，左额青纹，面色惨而不舒，此伤寒之所有，痘症之所无也。两目含泪珠如水精，鼻气出粗，睡中微惊，耳纹现淡红者吉、青紫者凶，恶热不恶寒，此痘症之所有，伤寒之所无也。有云中指独冷，耳尻冷等说，理亦信焉。

痘者豆也，肖其形则生，不肖其形则死。形之不肖，元神竭矣。尖圆而突，周净而松，形之有神者也。如麸色白如沸空壳，如疥无根顆如蚕种黑小如蛇皮一片，如蚊迹血、散如瘭斑根散，如汤泡皮肉、先烂如火刺血干，形之无神者也。形而无神，可冀生乎？至于色也，欲如春花之在露红活光润，不欲如秋草之经霜黑暗干黄。红白两分，明润光活，色之有彩者也。如腻粉，如枯骨，如红米饭，如猪肝色，色之无彩者也。形不有神，色不现彩，生意可知矣。呜呼，神彩其生死之门户也。

凡痘之看，先看元气。痘儿元气，非有非无，唯心领意会而已。如形色初善而终变恶者，元气内竭也。形色初恶而终归善者，元气内强也。元气本也，形色末也，故善治者必求本。

程书焉曰：昔人用人参、黄芪、甘草为保元汤，始终不易，正欲使元气内强耳。

桂岩子曰：人知痘藉气血，不知痘之所藉，尤有超于气血者，盖元气盛，则气血流通，而领逐，而负载，并行祛毒，痘必应期而开落。元气一亏，则在外者内不续，在内者外不固，毒肆妄行，或出或入，而为外剥内攻矣。调养真元，补益气血，诚治痘完策。不得已而欲攻他症，中病即止。经曰：常毒治病，十去其八，无毒治病，十去其九。夫包血成圆者，气也，气能拘血制毒，则痘晕必光明而红活。顶陷者，气之虚，塌陷者，气之离，晕枯者，血之虚，根散者，血之离。圆也晕也，气血之所为也。而所以成圆成晕者，气血不得专也。

吴东园曰：根顆者，血之运，脓者，血之腐。六日前专看根顆，无根顆者，必不灌脓毒在内也。六日后专看脓色，无脓色者，必难收靥元气不足。此理也势也。

无形者依有形，有形者附无形，互相依附，天地之道，亦气血之道也。气之离，不由血之散乎，故自气血交后，常观根晕为凭准。粗紧红活，生意沛然。若微细而不现不敛，且黯淡，则气将飞去而必不克制毒矣。是故内攻根散者死，内攻而根血犹附，非毒作楚，必三因致之因体虚、因移触、因误药。

气血有常，但不能盈于常，而能自亏于常。然亦有盈者，何也？毒壅于气，火搏于血耳。斑者，血有余也；疱者，气独盛也。经曰：邪气盛则实，真邪夺则虚。

气居亲上之尊，则痘顶尖圆白润；血安亲下之分，则四围色晕红活。若通顶红色，必不能浆，八九日痒塌而死。此非血之过，由气亏而失其尊，故血得妄行而僭居其位也。大补其气，犹或可救，误认血热，以凉治之，毙矣真血热则枯焦紫黑，甚至无痘处亦紫。

凡形色大恶，气不交，浆不成，似为死矣。若精神爽朗，便食如故，而天庭有一二悦目者，犹可发毒，作臭痘而愈。何也，毒在外，不在内也，故如此云。

陈氏云：痘以太阴脾肺二经为主，肺宜温而脾宜燥。万氏云：痘始终以脾胃为主，胃当养而脾当补。马氏云：痘以少阴心经为主

火不可太清，而血不可太寒。夫脾为孤脏，主肌肉，化水谷而生津液，灌溉诸经，而熏蒸发育。肺主气，心主血，气血充盈，昫濡流贯，而痘有不得其天者乎。

心主血而属火，痘藉之以运用一身，温则流行，寒则凝滞，世以犀角凉之，此不知阴阳之属也，恶能使之运化痘毒而成功乎？故予只于痂后余毒用之。若天行疠气，与气血争盛者，脉洪数，痘初出即带紫色，既出而稠密红紫，内症烦闷躁渴，小便赤涩，大便秘结，量入清凉之味解之，或酒炒大黄微利之，甚有口鼻出血者，犀角暂用之。若毒盛而气血不盛者，虽曰解毒，必兼活血补气，参、芪、归、芍，安可缺耶？

黄连、犀角皆泻心之品，时下恃为治痘神良，不论虚实寒热，一切用之，更益以石膏、明粉、生地汁、羚羊角之属，冰伏其生生之气，噫异哉。

痘始终藉热成功，先三日热而后出，出齐则退，浆将行又热，浆足则退。回浆前又热，浆回则退，结痂收靥落痂又热，名曰烧癍。凡此皆不宜凉解，凉解则气血凝滞不行，痘毒留中而祸作矣。初热未退，应即出日火齿，宜辛凉托表。

痘不为害，惟毒为害，毒尽附于痘中不为害，惟不尽附于痘中则为害秘奥法门。故无论随所因而用何剂，必少加穿山甲末，透其窍而逐之，使毒归于颗粒而后已。又必加白芍，敛其血而收其毒，使无一分渗漏傍溢。治痘之法，其庶几乎？

痘未出前，升发微汗，使毒气宣通，毒出外而内自安也。既出后，调气助血，使浆路充盈，浆始化而毒无不尽也。

毒停肌肉则发肿，毒滞皮肤则作臭，肌肉阳明主之，属土，皮肤太阴主之，属金，痈肿土象，腥臭金象，亦各从其类也。

书谓红癍者生，紫癍者死，黑癍蓝癍，百不救一。虽然，亦有红癍死，而紫癍蓝癍得生者，夫癍、血热也，失于解利则发癍，恶痘癍出，势所必然，无论颜色，癍与不癍皆死。但天庭疏朗，形色善而斑出，又当别论。昔一癍症，诸医莫治，召予视之，已七日矣。斑分上中下，上斑红、中斑紫，下斑青，视其痘，则绽突疏朗，内含清水，色黑黯而精神爽健。视唇舌，则多苔燥。予曰：失解故也，进以清凉自愈。后果然。由是书不可拘也，察形色，验唇舌是准。

痘前后有衄血者，毒气外泄，冲于肺也，此非恶候，只宜发灰散、清肺汤调之，不可用犀角等峻剂。

疔之结也，亦热毒壅盛，失于解和，内不能入，而结隧道空隙之处，恶痘疔结，逆转为顺矣。但结前后心必死，结耳门喉下者死。辨疔有法，慎无以黑痘作疔，黑痘犹痘也。疔则陷入肉中，形如螺盖，捏之则有核，割之不知痛，其根白或长寸许，医多误认，靥后疔烂，七日前后者，四圣丹主之。

痘起胀，或收结时，骤然泄泻不止，危在旦夕。有用异功散仍不效者，豆蔻丸、白术散止之热毒作泻用加味四苓散。起胀灌脓时，有六七日不大便而烦闷作痛者，毒盛而秘也，清毒活血汤去参、芪。加牛膝、倍紫草、当归，服时入生蜜半杯，甚者加酒炒大黄三钱利之。若仍不通，用猪胆汁滴入谷道中，即通，切不可用硝黄大下，使生变症，禁绝荤腥是矣。然亦有富贵之子，其脾胃赖此以养成者，一旦使之不食，则生生之气，将何赖以熏蒸长育乎？是又不可以常法论者。

痘之所恃者，血为养而气为充也，故眼鼻必欲封塞，眼封则神不外驰，鼻塞则气不外逐，神气内荣，而毒不为之制伏者鲜矣。然又有鼻塞而有涕，美之征也。鼻塞而窍外干黑者死，眼封而有泪，生之兆也。封而沿眶涂煤者死，封眼五六日间未肿，过封后必眼疾，痘少者不封，或封而才靥，即退。

气血之分，犹清浊之本于上下也。气血之交，犹阴阳之互为依附也当分不分毒结之，当交不交毒隔之。知阴阳散郁，何不分之有

知清热解毒，何不交之忧。

痘之形症有四：曰毒壅，曰血热，曰气虚，曰血虚。又虚实有四：表里虚实是也。见点稠密，形不尖松，色惨黯而皮肤间欲出不出，此毒壅也。见点深红，而渐变紫黑，夹疔夹癍，此血热也。顶陷皮薄，平塌不振者，此气虚也。色淡根散，或痘色与肉色无异者，此血虚也。身微热而有汗曰表虚。壮热无汗，喘促，脉浮皮毛焦，肌肉痛，表实也。精神疲倦，唇舌淡白，曰里虚。狂乱气盛，渴饮善食，唇燥而舌见黄白苔者，里实也。毒壅血热，同表里之实。气虚血虚，同表里之虚。此一而二，二而一者也。壅者疏之，热者凉之，虚者补之，实者泻之，不虚不实，平剂以调之。明此数者，思过半矣。虽然，辨寒热虚实，尤须用舌作纲维。

三等：顺、险、逆。顺者，血气充和，痘毒宣畅，不必施治。险者，气血不舒，痘毒壅遏，或杂症搅扰，当急施治。逆者，痘毒凝结，气血干枯，治之无功。五要：一、出欲尽。二、起发透。三、脓稠满。四、收靥齐。五、结痂厚。五善：一、饮食如常。二、大小便调。三、疮红活坚实。四、脉静身凉，手足温暖。五、声音清亮，动止安和。九者不能全得，得一二亦曰清吉。七恶：一、烦躁闷乱，谵妄恍惚。二、呕哕泄利，饮食不能。三、黑陷焦枯，痒塌破烂。四、头面预肿，鼻煽肩抬，目张唇裂。五、喉舌溃烂，食入即哕，水入即呛。六、寒战咬牙，声哑色黯。七、腹胀喘促，四肢逆冷。七者不必皆有有一二亦自难为七恶之外，又有浑身血疱，心腹刺痛，陷伏不出，便溺皆血，寻衣撮空，是又卒死而不可救者。

叶天士曰：逆症亦有得生者，未可舍之不治也。险症必无死理，死者医之过，非痘之过也。今且有拣顺症治之，以混俗沽名，而舍弃其险者，吾是以恶金镜录等书分症之言，为不仁也。

痘有至佳者，随出随长，随长随灌，顶尖圆而色红润，稍见浆而即靥。又有至奇者，随出随长，随长即靥，通不见脓汁，名为旱痘。二者俱不宜施治，庸妄者每至杀人。先出疹，疹靥而痘始出，曰垫疹。疹与痘并出，疹靥而痘始长，曰夹疹。痘出即有小小颗粒堆于痘之上，曰罩痘疹。痘出时，皮肉间隐隐有癍点，大小不一，曰夹癍。皮肉间艳色红赤如云头，而突起成片，曰丹毒。靥后痂落而疹出，曰盖疹。种种不同，要皆痘毒之浮游散漫于皮肤间者，只当于痘中用治法，不可与正经麻疹癍毒同科。

大都症候相似，运气使然也。彼与此一，症状尤殊，非气运而何。于涸者火郁胜，吐泻而肉肿者土郁胜，咽燥喘促者金郁胜，彼此凝伏者水郁胜，郁而不出者木郁胜。火则清之，土则平之，木则发之，金则润之，水则温之。不泥于法，求之于经，自可斡旋造化。

谅形体用药上工也。小儿脏腑易虚易实，体实过剂，尤为之损，况弱乎？凡痘极光润，极荣灌，至回谢日而忽变逆，谁之咎欤？形体本虚，理宜补益，不察而行攻劫，使人元气一驱而出，外虽荣灌，内实耗竭，欲不死得乎？谅形体者，非泥于形体之形，而审形体之神也。

痘症之陷有四：有白有红，有灰有黑。魏桂岩皆责气虚，而后人以四者俱用补，误矣。彼之论陷，有深究其源。唇舌滋润，身不壮热，惟色变迁而陷，故责以气虚。若唇燥舌苔，壮热燎人，焦紫其色，而凹陷不起，果虚耶，抑毒耶？补益妄投，按图索骥，予治不然，有外实则解之，有内实则清之下之，内外无症，则平剂调之。不独治陷，痘终始皆然。药随舌转，症用舌痊。呜呼！舌之功大矣。

舌通乎五内，人知之而莫之用，不由指示，临局必迷，不知此乃用药枢纽也。药有寒者、凉者、温者、热者，一唯枢纽在手，则纵横颠倒，皆自我出，而是非而利害，姑置

勿论。夫易虚易实，小儿也。使无定见，而谓不枉人命，吾未之信。

此吴氏秘法，旬仲得自孙其犹而语予者。因思凡一切药，欲通乎脏气者，皆曰放舌底噙化，非舌能通百脉之窍乎？况痘假心火成功，运用造化，全在此灵台方寸，至论不刊。

治痘之药不可过，过于热则涸，过于寒则凝，过于燥则耗血，过于润则滑肠，过于攻则损真，过于补则助邪。古有云，药须病更，机非在我。我者不通变之谓也。

邪热壅盛，隧道阻塞，而卒无死者有之，禁绝寒凉过也。若根颗不散尚活，宜置凉处以彻其热，亦能复苏，毋因其气绝而遂舍去。

治痘有四节次，务要不紊，紊则气血颠倒，火毒肆疟，而诸症蜂作矣。故惊者狂者，吐者泻者，癍者疹者，腰痛腹痛者，肉肿痘不肿者，水呛错喉者，皆当发不发，毒壅三焦，停气道也。焦紫者，枯黑者，渴者，躁者，发疔毒者，胃烂口臭者，皆当清不清，阳明内热所致也。当补不补，则为白陷，为泄泻，为痒塌，为倒靥，外剥内攻，中气虚也。当渗泄不渗泄，则反壮热，或少食，或吐泻不止，或肌肉作痓疖而疤烂，何者？脾湿内淫也。标离而异，本合而同，药当其节，变症息矣。不应四法，必三因乘之。六气外袭为外因，惊恐内动为内因，调理失宜为不内外因。四法正也，三因奇也。奇正互用而得之矣。

治痘症不治杂症，万古秘论也。杂症有日，痘症只两七日而已。且痘中之症，缘失治而作。今犹治症不治痘，将症愈甚，而痘愈惫矣。

程既莘曰：杂症非痘中所有，医实误之，愿世人着眼，治杂症一寸，则痘症落后一丈。昔人固尝言之，今人欲故犯之何也。

痘有当吐者吐之，吐中有发意存焉，滴水不入者，毒壅气道也，宜吐之。食饮痰停，形色生变，阳气郁遏也，宜吐之。惟气虚多汗者忌之吐法用升麻栀子豆豉煎服探吐之。

痘有当汗者汗之，当汗不汗，后必变症，壮热皮燥，喘促面浮，可汗也。痘隐隐不出，肉肿疮不肿，毒停不成浆，或因寒倒靥，皆可汗也。但兼解补有殊耳。可清也，可下也，舌之黄白尽之矣。可温也，可补也，舌之淡红尽之矣。其详审诸。

出痘之童，嗜欲开而血气耗，虚火炎蒸，或烦或渴，或咽喉痛，或鼻时出血，肿盛不任温补，当是时参麦清补汤，频服于五六日前，犹或可救。若七八日不成脓，非参归鹿茸汤不可。

女人月事，时至必行，将行经，忽然暴至，险之险也。痘之成功，全藉气血，气虚可为，血虚难为。如痘不倒陷，根晕不散，犹可冀生。若倒陷根散者必死。治疗之法，在重养其阳以生阴，症属血热。又有得行经而反吉者，然在见点起胀时，非灌脓时宜也。

凡治孕妇，务要无失时，胎之堕也，非血热必气虚。药投其时，皆有安胎之妙。四五日唇燥舌苔，虽硝黄亦可下。经曰：有故无殒，亦无殒也谓胎亦无殒也。有实症不下，胎可保乎？故传曰：变而通之存乎人。

痘症堕胎，务审在何时，在初出则补而升之，在起胀则补而清之。在行浆则峻补之。又当以根晕散不散为生死证验。

痘之失治，必至于死。然死之日死之状何如？沈虚明曰：郁而不出者三日死，出而不齐者六日死，不起胀者九日死，不灌浆者十二日死。凡内攻之痘，皆死于十二日之前，不成痂者十五日死。又毒陷于脾者，泄泻而死，毒壅于胃者，干枯焦黑而死，郁毒未解，喘促而死，火毒未解，外剥而死。此势之所必有也。节斋曰：重症属虚寒者，九日后变症而死，或延至十数日变症而死。属实热者，毒蒸内伤五脏也，不过六日而已。余又不然，不断以日，唯断以死。若曰某日变某日死为神奇，吾不羡也。

世有神痘家，其术在能定婴儿禀赋，出痘不死，然后种之，百无一失。间有坏事者，

偏属富贵之子，盖非不能灼见，未免贪利心切，即不可种而意图侥幸，遂至失手。此医之过。抑富贵者自取，果能听造化主持，出痘虽重，高明犹可着手，乃必勉强矫揉其正气，使之根本脱离而不可救，不亦可哀也夫。

慈幼新书　卷四

昧　江夏　程云鹏凤雏辑
鄞县　曹赤电炳章校

痘　疮

发热三日诀

痘不热不发，犹五谷不热不结，但热有轻重，毒轻则热轻，毒重则热重。有热五六日出者，有热一二日出者，太过则正不能胜邪，愆期则气血凝滞。惟三四日而身凉痘出者为正，此吉兆也。

凡发热，肌肤温平潮润，唇舌滋洁无苔，声音清亮，睡中微惊，便食如故，或少食贪睡，皆吉兆也，重则反是，一发热而唇裂舌炕，烦躁闷乱，口渴恶寒，两耳灼热，目睛红，二便秘，苏枳汤加明粉，或千里马下之，恶热者单下，以苔为增减，不可拘在初当发之说，此百中一二，又无执以为常。如唇舌滋润，虽见恶症，切不可妄下以损人也。

发热时，腹痛腰痛，四肢酸痛，皆重症也。若表过痛止者吉，痛加甚者凶。

发热时吐泻，切不可用止法，惟吐泻酸臭，可加消导药佐之，是必伤食者。

惊发痘前者吉，何也？惊属阳，痘属阴，阳破阴冲，则无壅遏之患，故吉。若误服惊药而冰伏其毒，酿害非浅亦有惊即死者，必因中恶。

发热时，谵语颠狂，见神见鬼，躁乱不宁，是热甚失表，外邪内毒，两相激搏也，重发之则愈。舌见黄苔，非下不可。

凡脏腑郁热，非微汗则不解，故一发热，必用汗药也。身热四五日不退者，知毒犹在内也，务要使热退为佳。

身热四五日不退，痘影焦紫，郁郁不出，此必寒气外薄，闭塞鬼门也。出臭汗则热自退，痘亦自出。

一发热，头面中有大痘数点，余痘不出，复不除热，名曰报痘。急用银针挑破，胭脂涂之，不则领败正气，为留连之祸也。

初热时，即头温足冷，不渴，大便溏，面皖白，或泻利清谷，呕食不化，虚症也，须从虚症方中考。

唐芳友曰：凡痘未有不由毒来者，小儿禀赋有虚实，各从治之易易耳，乃世谓虚中夹毒，为不治逆症，其言不仁之甚。试思天下小儿，何能人人皆实，何能有痘无毒哉。吾愿为父母者，捧诵凤雏先生此书，不使庸妄者得启其口，尔子孙其厚幸矣。

发热时，灯照肉内，隐隐有红紫成片者重，面红唇白亦重，再加形色不善，死必矣。九窍流血者死。目闭无魂，舌黑声哑，胸高而突，掌纹出血，皆死症不治。起发白浆，不论何处，主七日死。

苏桔汤　此汤无论痘与不痘，但见小儿身热，呵欠烦闷，睡中微惊，噫喷眼涩，鼻气出粗，手足酸软，即宜与服。

紫苏　桔梗　前胡　甘草　升麻　葛根　连翘　赤芍　当归　葱白　生姜

身热壮盛，肚腹膨胀而喘满，加麻黄。

烦满，加花粉、麦冬，调满天秋。备用方

搐惊时发，加木通、生地。

喉痛，加大力子、元参、荆芥。

咳嗽，加杏仁、桑皮。

呕吐甚，加陈皮、黄连、猪苓、泽泻。

泄泻，加猪苓、泽泻。

失血干呕，加犀角、芩连。

便血，加桃仁、黄连。

溺血，加犀角、栀子。

溺短涩．加木通、车前、腹皮。

便秘结，加枳壳、当归。

喘满秘结，壮热烦躁，面目浮肿，唇燥舌苔．甚则身恶寒，四肢逆冷，加千里马。备用方谵语狂乱，加石膏、知母，调满天秋。

伤食腹痛呕酸．加山查、厚朴、神曲、麦芽。

腰痛．加羌活、防风。

妇人行经，加生地、川芎。

不期而行，加熟地、热见愁。备用方

经行暴哑，加人参、麦冬、生地。

经行适断，有谵妄等症．加羌活、柴胡，下热见愁。

便秘加千里马。

益元汤　此为元气虚弱者立也．辨症果真，则前后皆不可易，中间杂症．虽或不同，要皆气虚致之，治者只于本方消息加减。

人参　黄芪　甘草　白术　陈皮　当归　川芎　升麻　桔梗　生姜

热甚，易沙参。

皖白，减川芎。

停滞腹痛，或泻酸臭，加山查、曲芽。不因停滞者，加干姜、芍药。

腹痛甚，加异功散。备用方

泄泻不已，去当归，加肉果，或调中丸。

便秘结，倍用当归。

不思饮食，倍白术，加神曲。

溺涩赤，加腹皮、木通、茯苓。

呕吐，去桔梗，加干姜、丁香、陈皮。

呕甚，加丁香再一倍。

虚烦作渴，加麦冬、五味子。

咳嗽，加麦冬、五味子、杏仁。

有痰，加贝母。

感寒咳嗽，加苏、防、杏仁。

四肢冷，加干姜、肉桂。

有汗，去桔梗、升麻，加桂。

惊悸．加天麻、钩藤．磨安神丸。

三四日痘出不快．肌肤惨惨然，毛孔起举、去升麻，加桂、白芷。

五六日候当长大，如起不快，或皮薄易破，色不红活．倍参、芪。加芷、桂、乳、酒。

水疱．倍白术．加防己、白芍。

疹亦然。

痒甚，用猪鬃小帚轻掷之，或行熏法亦妙。

四肢不起．加桂枝、防风。

七八日乃贯浆时也．如停浆不贯，气血淡白，或灌清水．加芷、桂、木香常服，不可缺糯米、乳、酒亦宜常服。

凡痘至此而寒战．而泄泻，而反白痒塌，皆不能免．一见此症．急以木香异功散，出人用之。如脓色一足，唇舌转红．又须叱去．惟照本方加苓、芍，以助收敛耳。拘滞之医，徒执温补．一偏之制也。

虚症而反见腹胀喘促，便秘而渴，麦冬汤主之。咽喉烦躁．滋阴润燥汤主之。盖此乃虚症变实非真实也。倘疏利之剂、不察而姿意妄行．则方升之气、又将转而虚脱矣。九日十日．亦惟本方加苓、芍耳．有杂症加减之。至靥后痈毒等症，亦惟照后参之。

痘有纯虚纯实者．有先实后虚者，有从虚转实者．如此方治症纯虚也。故始终不移．虽有增减．要皆补益气血为主。凡遇此症，必以此法行之，若苏桔、十神等剂，切不宜用。

或曰：加减益气．乃虚症所必需，然首尾不易，得无固乎，且参芪皆峻补之味，何可妄行若此。予曰不然，用药有诀，唇、舌，用药之诀也．能识唇舌红白而进退之，多用可也，常用可也。即不用可也，何妄之有？

见点三日诀

见点三日，死生判矣．断于此时，方称高列开窍，唯面部要紧，面者诸会之真，天庭印堂，尤面部最要紧者。师曰：天庭为看

痘把柄，何者，元神所归也。元神者，元气也。小儿出痘，不过气、血、毒三字，气血又元气所统也，元气胜毒，开落应期，毒胜元气，内攻外剥，毒既胜矣。又安望元气之复胜哉。

天庭先见先起，先灌先靥，密而痒毒盛气不足，惨而黯毒盛血不足，皆死症也。毒从虚发，信矣哉。

凡见点磊落，摸过碍手，颜色润泽，眼部以下先见，身热渐退，吉症也。盖此等磊落碍手，稀而有神者也，色润泽，谓有彩也。天庭后见，元气内固也，反是者逆。

叶锡侯曰：毒盛从上部先见，毒微从下部先见，如火之盛，而必先有焰于上也。不由血领气拘，而先上头额者，则毒固可知，而生死亦从可知矣。

痘初出时，三五相连者，后必密，单见者稀，毒之浅深，于此可以预决。

形属气，色属血，两者俱可验吉凶，定生死，人何专言血而不及气。气无形难知，血有形易见，故见点三日，色如猪肝者死，如红米饭者死，毒散漫于皮肤，如洗过大红绸者重。虽然，而部上有数十颗神彩奕奕者，尚可救活。师曰：不虑形恶，虑无神；不虑色恶，虑无彩。形绽而凸，彩润而明，恶症紧要处，见有一二红活可爱，虽凶亦吉。何者？元气犹存也。

程古五曰：有一二红活可爱，虽凶亦吉。何庸妄者，必诿之不治。病家又有眼不识高明，甘视其孩抱之呼号而莫之救，哀哉。

大都自眉以上见点，有神彩悦目可爱，仍不琐屑，又不歪邪，虽遍身稠密，杂症百出，总不至于死。悦目二字，即予笔舌，亦难尽述，在学者心领意会而已。

见点头焦神躁，舌苔而色或紫者，是血分毒炽，而未必不由内热也。

见点白如水珠者重，若稀疏不密，人素色黄，而痘颇起发，气至而血不至也。当散火。倘神不内守，痘日增多，顶尖作痦子形，毒大盛也，恐非药所愈。

见两日而大便尚秘，舌上无苔，知是血热，非毒壅也，急行清解，本方加枳壳、明粉治之，否则恐灌浆时，呕痛作泻而不起，本方内芎、归宜倍用。

见点色白不红，不可便作虚治。白而无神，唇舌淡白，或吐或泻，虚症也。若白而起皖色，唇舌赤红，非虚也。三日后渐变深紫，其误人不浅，见点脚冰冷者，不必虑之，气未下行也。

初见时，大小不一。有色点如沸者，曰夹疹，本方加救苦丹治之。又有一等琐屑红点，隐隐肉间，口夹疹，治亦同之。丹毒亦然。但有此症，必正痘悦目可爱，方为疹疹之夹。不然，是痘也，最当别之。又有痘出数颗，而夹疹遍身，圆净疏朗，形色红活，现两日而尽没，见者莫不惊愕。然此疹也，非痘也。痘没必闷乱烦躁，此则宁静，且正痘显然，故知其为疹也。治以平剂自愈。然未没时，亦难识认。

点见身热，毒未尽也，但所感不同，有寒气外郁者，有热气内郁者，均散之。

见点自汗，有生者，有死者，丹溪谓自汗无妨，指形色善者言也。若汗出而颜色日变必死，不可不极辨之。

凡痘出不快，须审时药之，冬则寒郁，夏则热郁，然亦有虚实之别。唇舌滋润无苔，当从虚治。

见点色白，不甚起发，唇舌淡莹，或吐或泻，或腹胀，或自汗肢冷，神气怯弱，须从虚例。

见点在于肚脐，或在肛门，而四围成堆者，皆重症也。

初见数颗于山根上者重，才出而声遂变，亦重。

痘出数点，而面目即光亮如瓜，口中气臭，勃勃冲人，必至发斑吐血而死。

见点先于眉上，或两太阳出数粒，突起光亮，少顷即没，此贼痘也，必死。

有初出爱人，皮薄光亮，一两日即长大，是未至而至，疠气使然也，后必痒塌而死。凡患诸疮毒未愈，或疮毒新愈，而见点于此者重，此阳毒也。若疮不干红，虽重不死。

谓为于可为之时则从，为于不可为之时则凶，指险症也。至见点如蛇皮，如蚕种，如蚊迹，如癜斑，如汤泡，如火刺，如青黑蓝斑，或身如被杖，发斑而唇肿口臭，或锁项，或蒙头，或断腰，或无根，或色粉白如枯骨，或胸高气喘，七孔流血，或面纹如橘皮，形色不正而惊狂，并腰痛腹疼不止，可为乎？不可为乎？

书谓见点吐紫黑血者不治。向有潘姓女六岁，见点两日，夜间吐紫数升，举家惊恐，即老医亦因吐血而去，余详之，非毒也，大补脾胃而痊。何者？唇舌滋润，内无毒也。形色两善，外无毒也。血去而神宁，血有余也。女父素患血症，此之吐血，是子乘父余，乃热激动，故一涌而出，非毒也。倘用犀角解毒，得无殒乎？古云：尽信书不如无书。

凡谓断腰无根，必诸痘形色不善方是。苟形色圆泽，即腰脚无，又何妨哉。

十神解毒汤　治身热毛焦，皮燥腮红，额红点红，烦渴引饮，睡卧不宁，小便赤涩等症

当归　川芎　生地　赤芍　丹皮　红花　连翘　木通　甘草　桔梗　灯心　葱白　大腹皮　淡竹叶

身热壮盛，皮急肉紧，加干葛、前胡、地骨皮。

出不快，加山查、大力子、蝉退。

作痒，加桂枝。

作痛，加防风、黄芩。

唇燥舌苔，加热见愁。备用方

夹疹，下救苦丹。备用方

发红斑，加元参、犀角，下热见愁。

眼眶红肿流泪，加柴胡、胆草、热见愁，外用护法。

咳嗽，加杏仁、桑皮。

咽痛，加元参、射干，外行吹法。

黑陷疔毒，加赛春雷，外点四圣丹。备用方

失血干呕，加犀角、热见愁。

呕吐，加陈皮、黄连、猪苓、泽泻。

溺血，加犀角、生地。

溺短涩，加车前、地肤子。

便秘，加枳壳、杏仁、苏梗，倍当归。

便黑，加犀角、桃仁、黄连。

腹胀喘满，目怒而浮，毛直皮焦，加麻黄，下救苦丹。

秘而喘者，加千里马。备用方

烦满身热，加花粉、麦冬。调满天秋。备用方

泄泻，加猪苓、泽泻。

谵言狂乱，加石膏、知母，调满天秋。

腰痛，加羌活、独活。

伤食膨胀，加查、朴、曲芽。

腹痛有三：伤食，和中丸。毒攻冲，救苦丹。气滞，加青皮、木香。

凡腹痛俱宜千里马下之，一通即已，不可过。过则毒气内作，反成他症。

四日五日毒气盛者，加查、芷、笋尖。痘至四日，理该易方。若毒盛未除，何可轻易。唯加人参四五分足矣，此名唤浆法。

凡遇热苔，热见愁不可缺。有下症，千里马不可缺。有壅遏症，救苦丹不可缺。痘欲出不出，干紫焦枯，黑陷疔毒，赛春雷不可缺。若唇舌红赤，小便短少，身热烦渴，痘色干红者，满天秋不可缺。大都凡见热症，满天秋乃第一要药。

或曰：热见愁、千里马，皆苦寒药也，子以舌苔，用热见愁固矣。乃所谓下症者何也。曰：谓舌苔过甚耳。曰：有舌苔而作泻可乎？曰可。通因通用，此之谓也。

曰：壅热者谓何？曰：谓毒盛郁遏耳。何以验之？曰：腹胀喘满，目怒面浮，毛直皮枯，欲出不出，蒸蒸然烦，翕翕然热是也。

慈幼新书　卷五

明　江夏　程云鹏凤雏辑
鄞县　曹赤电炳章校

痘　疮

起胀三日诀

曰起胀，是点已定，毒气尽出时也。本乎上者上之，本乎下者下之。血气定位，毒被制服成脓矣。若白不从顶，红不敛颗，气血毒混而为一，元气弱也。苟能察形色，验唇舌，如转柁回流，一持而正，后断如破竹势矣。

凡痘三日后，先见者先起胀，后见者后起胀，顶白根红，如一颗明珠，坐于胭脂之上，面与目渐浮肿，鼻流涕，口角涎出，眼蒙欲开不开，顺症也。即不然，两腮间，有一二悦目起肿者，顶白根红，亦顺症也。不可妄治。

凡起胀时，色焦紫者，毒盛也。形大皮薄而起皱纹者，毒盛气虚也。顶红满者，血滞也。滞者活之。焦者清之，气虚毒盛，补而兼解之。但面部有一二悦目可爱，用药当节，则枯者润，薄者厚，面生意勃然矣。

方鹿村曰：明此则虚中夹毒，非逆症可知。

痘至五日，而内外症平，宜该起发退红，不尔正气虚也。方中倍加参、芪。古人以此为唤浆法也。

起胀时诸痘未起，而有一二似脓非脓，色如黄金者，名曰贼胀痘。又四日起，大快亦非吉兆。何者？表虚毒盛也。七日后肿退倒靥，皆此之变，遇此须分虚实预防之。

起胀时，有一等光活可爱，娇嫩艳观，手揉之则破，灯照之如琉璃，此假胀也，名曰空欢喜。急救表，或可幸活，否则痒塌而死。

又有至五日，即带黄色，假浆也，不信，请以神彩辨之。有神有彩者为真浆，此则无也。或补或泻，唯舌是准。

起胀时，痘上有小孔，不黑不白，曰癍痘，此元气不足而受寒，用保元汤，加丁、桂服之其孔一密而痘自起。

有四围高起，中间略低凹者，曰菜黄痘。此中气不足，发未透彻，能食者，至养浆时尽充满而起。不能食者，宜扶中气排脓汤，加苓、术主之。

有四围沸起，中间落陷无水，犹是死肉，其形如钱，名曰鬼痘，急宜攻之。

痘正起发时，口唇先熟，内带黄浆，名为鹅口，最恶之候。待诸痘成浆，此痘已靥，唇皮揭脱，渐变呕呛，不可救矣。亦宜急攻。

起发时，痘渐变黑，延蔓一身，此天行疫疠之气所致，正谓火发而熏昧者也。加味保元汤主之。

水疱者，形大皮薄，内含一包清水，是毒气壅遏留伏于内，热气冲突，毛孔开张，驱透津液而先行也。速以银针刺其根窠，令出紫血，以胡荽酒，调官粉涂之。

痘出五六日，眼不封，鼻不塞，而大孔时失气者，元气下陷也，难治，轻痘无妨。

大都痘出五六日，而气血不分，颜色焦紫，而红肿如瓜，而痘伏，或犹烟云罩定，或舌白至唇，唇白者内溃，或通身发紫疱，或闷乱不宁，叫哭不已，腰腹犹痛，皆死症也。

虽然，亦有神色本善，调理失宜而然者。又有误饵汤药而然者，在医者活看。

加减排脓汤　治血热痘症，服药后热症悉退，内外和平，唯不易长者用之。保元气，活血行滞，助痘成功。如前症未除，仍当服十神、解毒，不可执程法而抱泥也。

当归　川芎　白芍　人参　甘草　陈皮　白芷　山查　桔梗　木通　黄豆二三十粒　笋尖五钱

五六日后，易用糯米引。

色尚干红焦紫，加紫草、红花，调满天秋。备用方

不甚起发，加大力子、蝉退。

皮薄塌陷，加黄芪。

起发不匀，加防风。

咳嗽，加麦冬、五味。

渴如之。

泄泻，加升麻、泽泻。

水疱，加白术、茯苓。

作痒，加僵蚕、白芷。

毒停肌肉，或风寒阻塞，不易起发者，俱加赛春雷。备用方

停痰经络，板硬不灌者，加一丸托之。此行浆圣药也。五日后有停痰症者宜用，不可缺。

或问毒滞痰停，与风寒阻塞，何以别之，曰浑身壮热，形色焦紫，或干枯，或塌陷，或肿胀其肉而痘不起者，毒滞肌肉也。内外无症，唯痘板硬不起者，痰滞经络也。板硬不起而复喘满身热者，风寒阻塞也。

灌脓三日诀

痘出七日，阴中之阳，尽达于外，内则空虚，如釜中甑内之气，妙不可言。阳起一分，阴亦长一分，故其浆也，则宜渐而黄，根下血晕，则宜渐而紧。如线围定，不铺散，不灰黯，昼夜不痛楚，饮食倍常，大便少，身热微微，吉兆也。反是者逆。至是决死生，惟视血晕紧散，脓色真伪耳。真者宝色烨烨，手捏粘丝；伪则土黄色。紧者气能拘血化毒也，散则气虚散而华气将绝矣。血晕全无者死，脓者毒所化也。诀曰：六日以后，专看脓色，故有脓则生，无脓则死。使或有或无而根脚不红，或连肉灰红作痒，烦躁目封欲开，作泻干呕不食，少睡气虚，不能拘血化毒也，急峻补之。倘此时尚见舌黑有刺，生意绝矣。不唯不容补，即补之何益。

痘出七日，忽大泻者，气陷也，急宜涩之。若浆色止而根线紧绕定，虽泻无妨。浆色不正，根盘不化，血散不敛，毒在内也。七日毒仍在内，如命何。

浆行七日，肿要过项，浆要过胸，肿者毒外出也。言过胸者，从上下也。至阳物亦要灌，乃宗筋之会也，两脚不灌不妨。又两臂亦宜满，不然临收时必不食而生他变，手臂脾所主也。

凡痘当泻时，但看根窠红活，饮食如故，精神清爽，此阳泻也。无妨，但看舌，用兼止之药而愈。

八九日浆行似足，忽眼开而陷，毒内攻也。内攻者必闷乱烦躁，根晕飞散。若无是而唇舌洁净，托里汤，加桂、附治之。唇燥舌赤，托里如芩、连治之。

有一等至第八日，充实饱满，挨摸不破，而剔破无脓，毒陷伏也。不可作顺症误人。托里加赛春雷同服，是正法也。若数服而板硬无脓，根窠不活，生意可知矣。然必神不内宁。若神宁痘少，自可不必药治。

灌脓时作痒，十常六七，并当以唇舌验之。但爬破成坑，或干而无水，皆不治。

行浆作痛。大热也，亦吉兆也。毒滞作痛，血热作痛，皆实症也。

八九日寒颤咬牙，虚极也。惟峻补而已，不止重补之，此外无法。若头摇手颤，目闭无魂，为痘后惊痫，阳气绝于内也，不治。

旬仲曰：亦有火极似水，寒颤咬牙者，当清之。

八九日，有一等土黄色而硬者，往往作

正浆目之，不知此为阴阳失政，浆注于中，板腻死塞而黄硬也，名曰板黄痘。急须辨舌治之。

珠不在大，在乎体之明；浆不在足，在乎色之正。土黄者，黄而无彩者也。

又有灌浆充足，至九日大便忽欲出不出，阳明血燥也，托里倍当归润之，不治则靥落之后，非滞下必干热而死。即不死，亦难免痈疽疔毒。

灌脓发疱，气太过甚也。托里加苓、术渗利之。擦破水出，而不能抱者，败草散掩之，切不可用气药而破泄也。

八九日，最忌皮薄浆清，皮薄则嫩而易破气虚，浆清则水而不脓血虚。书曰：浆假毒成，毒从浆化，若此而幸成者，未之有也。凡皮薄浆清，至九日而躁乱不宁，生死可隔壁断矣。周岁半岁，又不必九日，只七日便蹬打不定，揩破即干，万不能救一。何者？痘以七日为界，七日以前，气血外行也；七日以后，气血内行也。外行时尚不能化毒，矧内入时乎？故七日以后躁乱者，是毒内攻也，毒内攻者必死。

灌脓时，额上如汤泡，皮肉尽赤而干，此气自尽而不能拘血，血亦不能附气而制毒，必死。诸痘才灌，而两唇先黄硬，此毒先入脾，失次序矣，必死。擦破而疮痕隐隐有生意，秽触也，不当作死症治。

加减托里汤　治实热之症，服寒凉而冰伏，呕吐泻利，或皮薄浆清，或塌陷无神。

血色不活，躁痒烦渴，凡此则唇舌必淡白洁净，大便必不牢固，绵延不治，而腹胀闷乱，寒颤咬牙，死不旋踵矣。

黄芪　人参　甘草　当归　白芍　白芷　山药　陈皮　木香　肉桂　糯米

临服加人乳半杯，酒酿数匙，同饮。

泄泻，去当归，加升麻、诃子、肉蔻、炮姜、丁香，调银锁匙。备用方

腹痛，加煨干姜、神曲。

咳嗽，加麦冬、五味子。

烦渴同之。

水泡，加防风，倍白芷。

作痒亦然。

抓烂，以松花粉或荞麦粉掩之。

寒颤咬牙，四肢逆冷，唇舌淡白，加附子。

凡皮薄浆清，或泄泻，木香异功散皆可用。

按：此即前加减益气汤也。益气为元气素虚者设，此则非也。元气素虚，则火邪易动，故终始不移。若素实而寒凉以致者，是火由寒伏，偏于补益，则药不终剂，而原本之火，又炎炎起矣。治之者务宜斟酌，不嫌一日数服，审内外调治之。如浆足而不减参、耆，唇舌红而不除桂、附，实实之祸，其能免乎？夫盲者肢废者，甚至不待目盲肢废而先父母去者，谁之咎欤？吾尝论医不难于治，而难于识症，师亦曰：六日之前，专看唇舌；六日之后，亦专看此。此用药枢纽也。是故有苔者清之下之，淡白者温之补之，不苔燥不淡白者平剂以调之。当毒盛之际，而竟行温补，得无误乎。

结靥三日诀

痘至十日毒解矣，脓亦转黄作苍蜡矣。元气实者，痘必循次而结。如口角怀阳物先结，正收也。身渐轻快，肿渐消，眼渐矇矇而欲开，食倍常，便如故，从上至下，而逐渐收结，痂厚色红，大事毕矣，不然犹未可以为善。惟结痂时匆匆发热者，不必虑之，乃蒸浆作靥也。凡一时痂尽，一时即落者，毒火内烁也，急解之。此症必脓未充足。若声哑烦闷，喘促不食，死期迫矣，否则必发毒而解。

痘正收靥时，靥而不靥，非气虚必血热也。气虚血热，唇舌之红不红尽之。亦有时令致然者，时之寒也，用温剂以调之，时之热也，用凉剂以清之。

凡不及期，眼开者重，轻痘不拘，又过

期而眼不开亦重，十二日眼开期矣。当结靥时而渴饮无休，津液竭也，保婴百补汤，加生脉散主之。若渴甚而泻利不止为难治。渴切勿利小便，便愈利而渴愈甚矣。戒之戒之。

九日十日，半痂半不痂，作泻者不必虑，乃阳气内回，非灌浆时比也。保婴加苓、术治之，切忌涩剂。倘不知误用，后必不食而作痢，留邪热在内也。

十二十三日，有形如火烧烟熏者，血不载毒而内攻也。生死看诀，音不清，食不入，破处干枯，烦乱不寐，死症也。音清能食，睡卧安宁，爬破淋漓，神舒气爽，生症也。又当分虚实治，唇舌洁净，温补兼清解之。唇燥舌苔便秘，单解之。解而苔去，施以平和，则攻补两尽矣。

当靥时而流水浆不已，为过表故，然亦缘饮水，或霪湿致然者，两者皆保婴倍苓、术，加苍术燥之。或腐烂而和皮脱去者，倒靥也，保婴加人参、丁、桂主之。破者复灌，消者复肿，空处复出一层，治功也。俗呼曰翻空痘，逆痘有此，大吉也。

靥后腮红唇干，而色带紫者，肺痈将成也，连翘饮主之，桔梗、知母、百合、麦冬、宜常服无缺。

痘至结靥，未有不作气息者，带腥气者佳，口臭者死。全无气息，知有余毒也，须解。额与足迟靥者，独阴独阳也，轻。额与足先靥者，反阴背阳也，重。当靥时腹胀气喘，咽烂不食，或唇白至舌，泄泻闷乱，昏沉不省，作炕尸臭，目中无神，寒颤咬牙，手足摇动，皆死症也。间有不死，亦幸活面已。

十日而补脾燥湿，是言症之常。危险之症，至此而作脓窠者有之，何不察面概行苦寒也。苦寒渗湿，脓足毒尽之后，复施之灌脓，得无谬乎？痘以日程限，为初学计，活法在胸，何程限可拘？当补者补之，当泻者泻之，不泥于书，始足以寄人司命。

保婴百补汤　九日浆足之后，别无他症，并以此方主之。惟气虚者，本方加芪、桂。

若有杂症，仍照前方加减。

人参　白术　茯苓　甘草　川芎　当归　熟地　白芍　山药　桔梗　莲肉　大枣

有热，加芩、连、木通。

有湿，加猪、泽、羌活。

不易靥者，本方加敛脓散催之。有余症，俱照前法。

落痂余毒诀

痘至落痂，大事毕矣。然末路难恃，功亏一篑，最当慎之。如痂久而不落，或堆如鸡粪，薄如竹膜，疱发丹缠，痈肿疔毒，或疹或麻，或呕或吐，或赤白痢，或咳嗽，或虚烦不眠，坐立微颤，唇不盖齿，咽哑腹痛，或发热发痒，面色粉红，非险乎？又如破而不灌坑陷干枯，惊搐无魂，走马牙疳，目睛吊白，或胸高而喘，战栗无休，疤痕之色，皆粉白不红，非逆乎？且气血初定，相火易煽，即靥后疤红，而不禁辛热，犹致目疾，不避风寒，犹作疮痍，不节饮食，犹成吐泻。诸症具在，何敢遽以无事目之。

痂渐结渐落，色明而厚，顺也。或粘肉不脱，或嵌入肉内，或半粘半揭，或痂半有衣，或薄如竹膜，色如煤黑者，险也。有虚实寒热，实而热者，连翘饮主之，虚而寒者，调元解毒汤，加参、芪、肉桂主之。治癍色亦然。紫红者实也，粉红者虚也，粉白者气血衰也，气血衰而服药不转者死。

癍白者，以手揩拭，全无红色，此血虚也，虽过三四十日犹死。急用十全大补，去白术，加红花治之。以手揩拭，犹见红色者，此气虚也，多服保元汤，自无不愈。

有浆老而顶皮嫩薄，堆起一尖，状如攒陷，包周围之皮渐皱，脓渐干而痂结，其色微黄，稍待则色黑而焦硬，随结随落者。

有浆老而顶皮与周围之皮皆焦硬，形如小铙钹，瓦灰色，人皆惊疑，后其脓渐干，痂结甚厚，灰色变为黑色，随结随落，竟无恙者。

有脓回痘与皮平，全无痂状，稍待则皮渐堆起，痂结甚厚，随结随落，竟无恙者。

有脓回剩一空壳，全无痂形，后壳破，其中却有结成之痂，虽不甚厚，痂落亦竟无恙者。

痘后有数颗陷下，不能结靥，名曰盘陷。用马齿苋为末，鸡子清调，点入即瘥。

痘后痈毒，非痘之过，医之过也。当发不发则成痈，当补不补亦成痈。痈者壅也，元气内实，毒不能留，故寻窍而出。经曰：营气不从，逆于肉里，则生痈肿是已。曲池、委中、三阴交之地毒多壅，此虚故也。然有实者，有虚者。形体怯弱，食少热微，肿处不痛，虚也。形体壮盛，身热能食，痛叫不已，实也。虚者流气饮，实者连翘饮，外以必胜膏牛李子熬点之。溃而出脓，大补汤。久不收口者，生肌膏涂之。再不愈，以大片附子炙之。凡多眠不食，呕泻不休，睛慢唇白，而脓出清水者，死不治。

痈后病目，俗谓目中出痘，果痘也，胡不见根点成脓，而遂结痈也。古云：热壅于肝则病目，确言也。有赤肿而眼不能开者，菊花饮治之。翳膜卷帘，切忌点药，睛突瞳陷，不能治矣。痘初出，即用护眼法，恶有后患。

凡口疳，皆胃热致之。有轻者，有重者，有死不治者。满口白糜，或红点簇，轻症也，吹口丹治之。唇舌肿硬，牙龈黑烂成疳者，重也，内服甘露饮，外吹灵枣丹。烂入喉者，亦以药吹之。色如干酱，臭烂自甚，而鼻发红者，俗名走疳，难治。然此医之过也。

痘后腹痛甚重，须分治之。伤食，和中丸。饮毒，连翘饮。血虚，调元汤去翘、桔，加参、芪、黑姜治之。腹痛而见舌白，元气竭也，必死。

惊发痘后，诸书云莫救者，是目闭无魂，兼吐泻唇白腹冷也。如痰热内甚，小便闭涩，或素有惊痰，又非不可治者，安神定惊之剂服之，亦自收功。

痘后出麻，名痧盖痘，痂落发此，吉兆也，不可作寻常麻治，止许疏风之剂，加葛、翘一二品足矣。丹与瘾疹亦然。

痘后浮肿，囊大如钵，毒蓄皮肤也，连翘饮加腹皮、茵陈治之。有热加枳壳，倍柴胡，数服自效。

痘后毒流大肠，患赤白痢，调元汤加香连丸。

痈后诸症，不能悉举，大都捷法，惟看原得轻重何如。果重也，痘后气血必虚，当温补。果似轻而实重也，必有余毒存留，当清解。虚实不消，唇舌参用，治无余蕴矣。

调元解毒汤　痘后气血不调，瘢痕不正，诸症将作，用此调之。若诸症既作，须照前加减。

白芍　川芎　当归　茯苓　白术　山药　甘草　桔梗　连翘　木通　生姜　大枣

当靥不靥，加参、芪、芷、桂。

抓破不干，以棉茧散备用方敷之。

下利脓血，加香连丸。

泄泻，加猪、泽。

后重，加枳壳、槟榔。

气脱，加升麻。

腹痛，加木香。下和中丸。

溺短，加木通、车前。

伤食发热，加查、曲芽。

风寒发热，加桂枝、柴胡、干葛。

乍寒乍热，加参、芪、柴、桂。

热不退，加黄芩、地骨皮。

厥冷，去翘、桔，加参、芪、桂。

神昏喜睡，去翘、桔，加麦冬、茯神、人参。

自汗，加参、芪、肉桂、柏子仁。

急惊加木通、生地、栀仁。

喘，加杏仁、冬、味。

呕吐，加陈皮、黄连。

吐血，加黄连、蒲黄。

衄血，加蒲黄、黄芩、丹皮。

吐蛔，加苡仁、乌梅。

痂不落，蜜水调滑石敷之。

丹病瘾疹，连翘饮。备用方

口疳，加黄连，外行洗法。

翳膜羞明，风卷云。备用方

凡痘后诸疾，不由痘中成者，曰：怪异。必先详服何汤药，啖何饮食，感冒六淫之邪，知犯何逆，即照所犯治之。古云：药不执方，合宜而用，此之胃也。

慈幼新书　卷六

明　江夏　程云鹏凤雏辑
鄞县　曹赤电炳章校

痘　疮

备　用　方

清地散花饮　凡痘见标三日，宜清脚地，肃脏腑，理气活血，引毒达于四肢，此方主之，切忌升提。盖痘虽胎毒，而药可使之上下，遍布一身，则虽重亦轻。若尽提头面，则虽轻亦重矣。如升、柴、羌、芷、藁本、川芎之类，可轻用乎？若未标之前，标齐之后，又不在禁例矣。予见一症，因用升、羌，头面独重，身上甚稀，遂改用防风，引毒于四肢，用苏梗，引至下部，果得心应手而愈。大约三冬初春，时令严寒，下身先标而头面不标者，本方加干葛、白芷，外用清肌汤，帐内熏洗之。夫痘初标，乃发萌时也，散毒为主，清火次之。今一见火，便用芩、连之属，独不思寒凉太重，反冰伏其毒，而为内剥害命乎。

防风　山查　当归　地丁各一钱　大力子　山慈姑各八分　荆芥七分　前胡　青皮各五分　蝉蜕三分　红花　茯神　水通草　生姜皮各二分　大枣一枚

夹疹，加莲心九个，菊花五分，兰花根一钱。

夹丹加黄芩、生地、薄荷、山栀、小竹叶，或黄紫草。

腰腹痛，倍查、青，加杜仲、胡桃肉。

小腹痛，加厚朴、笋兜、青木香、延胡索。

额上灰滞色，加菊花、梅花、兰花，或用根。

准头先标，加木香、笋兜，外以清肌汤浴之。

色娇亮者，湿胜也，倍防风，少加大腹皮。

玉液春膏饮　起胀时用。

前胡　桔梗　山查　贯仲　蝉蜕去头足各八分　大力子　当归　连翘各一钱　川红花　川芎　青皮　木通各三分　陈米百粒

标未齐，加笋尖。倍查、青。

左颐不起，加辛夷。

上颐不起，加西河柳。

背浆不足，加酒炒土兰花。

下身浆不足，加巴戟。

灰白，倍芎、归，加肉桂、红花、桃花。

干红，加丹皮、生地。

紫，加芩、连。倍翘、众。

皖白，加木香、官桂。

心火，加黄连，甚者犀角、生地。

肝火，加金银花。

脾火，加芦根，甚者石膏。

胃火，加山栀、石膏。

口臭，加白芷。

肺火，加黄芩。

肾火，加知母。

痰嗽，加麦冬、贝母、瓜蒌仁、旋覆花，或用宁金散。

寒嗽，去连翘。

火嗽，去芎、归，加骨皮、丹皮、芩、地。

毒嗽，至宝饮，送发灵丹。

疔噤，先治疔。

四五日发痒，加荆芥、石膏、元参、丹皮、白蒺藜。

六日痒，加白芷、生地，余同上，惟不用荆芥。

风闭，加升、葛、羌活。

误服药而喘，倍青皮，加枳壳、麦冬、黄连。

饮食不进，加白术、砂仁、神曲。

唇反肿或肉裂，加芦根。

肠鸣，加丹参。

便血，加蒲黄炒。

阴症腹痛，加姜、桂、丁香、木香，甚者去蝉蜕。

阳症腹痛，加升麻、黄连、木香。

腹左痛，加青皮，右痛加木香，中痛加延胡、海藻，甚者莪术、三棱。

积血在丹田，加桃仁。

腰痛，加羌活、萆薢、巴戟、杜仲、胡桃肉。

心胸痛，加红花、海藻、三棱、莪术。

手痛，加桂枝、桃仁。

头痛，有风痰，加天麻、僵蚕、钩藤、荆芥、胆星、牛黄、天竺黄。

有湿，加羌、芷、苍耳。

三豆汤

大黑豆　赤小豆　绿豆

此扁鹊方也。黑豆解肾经毒，治相火，赤豆解心经毒，治君火。绿豆解阳明经毒，治胃火。易办有便于乡村，易食有便于童稚，真仙方也。

吕晚村曰：凡乡村出痘时，用三豆各一升，甘草三两，浸汁去渣煮，取豆汁，每日空心饮之。喜食豆者，与豆食之，不但稀豆，竟有绝不出者。

辟秽者

苍术一斤　大黄半斤

锉碎细烧。

汪凯承曰：药气猛，体虚者恐难任受，唯常取大枣焚之，既解秽触，又且和脾。

九味神功散

人参　紫草　生地　红花　黄芪　赤芍　甘草　嫩前胡　大力子

翟氏曰：此方合扁鹊之四圣，华陀之保元，可谓能夺造化之权，而定危亡之命者也。华陀论气尊血分者生，毒参阳位者死，故以参、芪提其气，使气尊而血附，以紫草、赤芍行其滞，使血气活动，毒随血气而行。加红花、生地，虞其缓也。毒之所乘，以相火萃于阳明而作热，故用牛蒡以止沸息薪，毒之所发，因风寒客于腠理而作热，故用前胡以散郁缓蒸。又用甘草以和合诸药，一面托里，一面解毒，妙方妙方。

参麦清补汤

人参　当归各八分　麦冬一钱二分　花粉同麦冬用酒蒸晒　生黄芪各一钱　前胡　大力子各五分　白芍酒生，四分　甘草生炙，三分　红花　川芎　生地俱酒洗　桔梗各三分　山查五粒　龙眼三枚　生姜三片

木香散　治纯阴无阳，泄泻而渴。

木香　人参　肉桂　半夏　青皮　前胡　丁香　大腹皮　赤茯苓　炙甘草　诃子煨去核　生姜　糯米

虚甚，加黄芪。

陈氏云：腹胀渴者，泻渴者，足指冷渴者，惊悸渴者，身温渴者，身热面㿠白渴者，寒颤渴不止者，气急咬牙渴者，饮水转水泻不已渴者，九症皆非热也，乃津液少，致脾胃肌肉虚故耳。此方治之。然必痘色白，手足凉，小便清利方效。若痘色红，大便秘，小便赤，即非所宜矣。

异功散　治纯阴无阳，痘出不光泽，不起胀，根窠不红，虚而痒塌者。

木香　当归　人参　茯苓　肉桂　肉蔻　丁香　陈皮　半夏　白术　厚朴　附子　生姜　大枣

陈氏云：阳明主肌肉，胃气充足，则肌肉温暖，自然光泽起胀，而无痒塌之虞。若

中气虚，则表气无所主而亦虚，诸症生矣。真见道之言。

内托散　治表虚里实，气血皆弱。

黄芪　人参　当归各二钱　肉桂　木香各三分　川芎　桔梗　厚朴　白芷　防风　甘草各一钱　白芍炒，五分　生姜一片　大枣一枚

顶尖色淡，表虚也。息重气粗，里实也。参、耆、草补气。芍、芎、归补血，防、芷、桂引诸药自内达外，香、桔、朴调其壅实，以归于和，而内无留毒矣。

参归鹿茸汤

鹿茸蜜炙去毛，三钱　黄芪蜜炙，一钱五分　人参一钱二分　甘草炙，六分　当归酒洗，五分　生姜三片　龙眼二枚

清毒活血汤　攻补兼施。

生黄芪　山查各八分　生地　白芍　连翘各钱五分　当归　前胡　木通　紫草茸　大力子各六分　酒芩　酒连各七分　桔梗　甘草各四分　人参三分　生姜一片

烦渴去参、芪，加麦冬、花粉。

快癍越婢汤

炙黄芪　炙甘草　炒白芍　桂枝　防风　生姜　大枣

越者发越之意，婢者卑也，言此方开隧道，活气血。虽至于足下至卑之处，亦能发越也，故曰快斑越婢汤。

回浆散

人参　黄芪　白术　茯苓　白芍　甘草　何首乌

象牙散　难收靥者用之。

何首乌　人参　白术　黄芪各一钱　甘草五分　茯苓一钱五分　象牙火煅为末，一钱　大枣三枚　糯米一撮

煎好，冲象牙末服。

象牙有利水之功，群药得之，奏效甚捷，故名。

人参清神汤

人参　黄芪　白术　甘草　麦冬　当归　枣仁　陈皮　茯神　黄连　糯米　大枣

荆防败毒散

荆芥　防风　柴胡　前胡　人参　甘草　桔梗　川芎　茯苓　枳壳　羌活　独活　薄荷

白芷升麻汤　治痘痈。

白芷　升麻　桔梗　甘草　黄芪　黄芩　红花　当归　连翘　羌活　黄柏　生姜一片　连须葱白三茎

大连翘饮

防风　荆芥　当归　连翘　柴胡　黄芩　栀子　蝉蜕　赤芍　木通　滑石　甘草　大力子　车前子

起顶散

人参六分　白术　当归　川芎　陈皮各五分　黄芪　山查各八分　甘草　肉桂各三分　木香　淫羊藿去剌羊油炒　穿山甲土炒为末，各二分　生姜一片　大枣二枚

清肺汤

天冬　麦冬　花粉　甘草　桔梗　当归　知母　丹皮　白芍　黄芩酒炒

菊花饮

生地一钱五分　当归　柴胡　花粉　黄连　天冬　麦冬各一钱　菊花二钱　甘草五分

犀角地黄汤

犀角　芍药　丹皮　生地

地凉心血，芍和肝血，丹去血中之火，犀解经中之热。

张钦庵曰：凡属火症，只此足以治之。

甘露饮

天冬　麦冬　生地　熟地　黄芩　石斛　茵陈　甘草　枇杷叶

地黄汤

熟地　当归　防风　蝉蜕　羌活　元参　大黄　黄连　白蒺藜　沙苑蒺藜　犀角　炙甘草　谷精草　木贼草

为末，羊肝煎汤调食。

罩胎散　治孕妇。

柴胡　干葛　荆芥　防风　黄芩　桔梗　白芷　砂仁　紫草　阿胶

救苦丹

羌活　防风　升麻　生地　麻黄连根　黄柏酒炒　连翘各五钱　当归酒洗　黄连各三钱　川芎一钱五分　藁本　苍术　酒芩　生芩各二钱　细辛　甘草　陈皮　苏木　红花　吴茱萸各一钱

蜜丸，龙眼大，姜汤化下，或同煎药服。

赛春雷

麻黄去节　紫草各一两　白附子　甘草各五钱　僵蚕酒洗　蝉蜕各二钱　穿山甲炙黄，二钱五分　蜈蚣炙，一条　全蝎酒洗，八分　蟾酥一钱

为末，另浆紫草　红花各一两，麻黄二两，水酒煎，去渣取汁，熬膏半小杯，入蜜二两，同熬，和末为丸，灯心汤下，或煎药研服。

满天秋

石膏煅　滑石飞，各一两　人中白煅　紫草　茜根各三钱　寒水石四钱　甘草　红曲　郁金各二钱

为末，每用二三钱，灯心汤或同煎药服。

热见愁

黄芩　黄连　山栀　黄柏俱用酒浸炒五分　升麻三钱　烧人粪一两

同前法服。

烧人粪，最为解毒神品，古方无价散，用人猫鸡犬四色，不若此一味为独绝。

千里马

蚯蚓去土炙　大黄各一两　川芎　乌药各三钱　红曲炒，五分

外用大黄四两熬膏，人蜜两许为丸，同前法服。

一丸春　治顶陷不灌。

龙胆草　白附子　全蝎　甘草各二钱　天麻　僵蚕　花粉　黄连　角沉香各三钱　狗宝二钱五分　礞石煅　朱砂各一钱　牛黄五分　麝香二分

玄米饭为丸，朱砂为衣，龙眼大，每服先以酒酿磨象皮五分同服。

蟾酥丸　治痘顶陷而作惊狂。

蟾酥一分　牛黄　雄黄　人牙　珍珠各三分　朱砂五厘

乳汁为丸，如黍米大，每服数丸，人参汤下。

红炉雪　自见点至六七日，凡有痰者皆效。

滑石飞　礞石煅，各五钱　硼砂二钱　牛黄　朱砂各五分　柿霜三钱　青黛一钱　冰片半分

为末，淡姜汤下。

王叔夏曰：一法用朱砂一钱，硼砂五分，冰片五厘，为末，调放舌上，大能化痰。

银锁匙　止泻。

枯矾　玄米各一两　煅干姜　莲须　粟壳蜜水泡去筋，各五钱　五倍子二钱

为末，每服一钱。

豆蔻丸

肉蔻　木香　砂仁　龙骨　诃黎勒肉各五钱　赤石脂　枯矾各七钱五分

曲糊丸，黍米大，每服三五十丸，米饮下。

凡泻，有湿、有滑、有积，此方矾、脂燥湿，骨、诃涩滑，砂、蔻消积，木香调脾胃滞气，服之神良。

流气饮

人参　白术　茯苓　甘草　青皮　陈皮　白芷　乌药　木香

风卷云

夜明砂　蝉蜕俱洗净，一两　谷精草去根　蜜蒙花酒洗，各五钱

为末，作二服，用猪肝切开，入药扎好煮熟，取肝并汤食之。

程格思曰：痘在眼中，攒起白眵，用橄榄核磨水，加轻粉一二厘调匀，搽眼胞上，令药气熏人即落。

碧云散　治痘风眼，数十岁皆效。

冰片　铜绿各五分

共研极细末，用蜜调粘盅子内，以柏木板一小块，艾一小丸，安放板上烧烟，将盅子内药，向烟熏之。俟烟尽，再取井水滴数

点，入药调匀，用新笔缓缓蘸抹眼皮红处数次，勿见风即愈，终身不发。

郑破水曰：此方传自鄢在公别驾，云得之内府，试之良验。

四圣丹

绿豆　豌豆各四十九粒，烧存性　珍珠煅，一分　头发灰二分

胭脂水调药成膏，用银针拨开疔口，点入。

立马回疔丹　痘疔初生紫点，次渐变黑，毒浅者浮高而润，毒盛者深陷而焦，发时身温疤润者吉。身热色枯声哑者凶。

蟾酥酒化　硇砂　轻粉　白丁香各钱　雄黄　朱砂各二钱　乳香六分　麝香二分五厘　金顶砒五分　蜈蚣一条，炙

共为细末，糊成麦子大，针透疔根，插入一粒，候四边裂缝，是疔疮摇动时，须用刀割去，内服鼠粘子汤，外搽玉红膏而愈。若刺针无血，插药干枯，脓汁不变，终无生理。

加减鼠粘子汤

鼠粘子　花粉　知母　荆芥　炒栀各六分　甘草三分　淡竹叶二十片　灯心二十节

身热，加柴胡、黄芩。有痰，加麦冬、贝母。咽哑，加元参、桔梗。咬牙，加薄荷、石膏。便秘，加蜂蜜、明粉。昏愦，加黄连、朱砂。痂枯，加当归、生地。恋疤，加川芎、蝉蜕。

方公度曰：痘疔落后，脓水出多，气血虚弱，须服八珍汤见保产，始易收敛。

玉红膏

白芷五钱　甘草一两二钱　当归身　白蜡各二两　瓜儿血竭　轻粉　紫草各四钱　麻油一斤

上药将归、甘、紫、芷四味，先入油内浸三日，放勺内，慢火熬，微枯色，细绢滤去渣。复入勺内煎滚，下血竭化尽，次下白蜡亦化，外将茶盅四只，预顿冷水中，以膏倾入盅内，候片时下轻粉研极，细每盅一钱，搅匀，缓缓取起收贮，用时以抿脚挑于掌中捺化，擦上，外以太乙膏见杂症护之。

曹闻在曰：三方治痘疔，并一切痈疽发背、棒毒溃烂，无不立应。

清肌汤

樱桃叶　握，冬则枝干　苏叶二两

煎汤置帐中，令气熏半个时辰，倾出汤洗，一时即起。如浆靥时发痒，用荆芥、薄荷、丹皮、地骨皮、白蒺藜、何首乌，如法熏洗亦妙。

胭脂涂法

升麻一两　雄黄五分

煎浓汁，将胭脂于汁内捻令红出，即以蘸汁拭疮上。若疮不起，须热拭之。胭脂红花膏所成，取其能活血败毒耳。

生肌散　治热毒疮烂，并痘后焦蚀不敛，脓血杂流。

地骨皮　黄连　黄柏　五味子　五倍子　甘草　枯矾

绵茧散

绵茧

将矾填满，烧令汗出，为末渗之。

程师恪曰：痘破出水，用墙上陈茅草，去泥土晒干，为末渗之妙，将愈疮烂，用古墙上白螺蛳壳，烧存性，渗之亦妙。

罗修远曰：痘烂生蛆者，以柳条带叶铺地上，与卧片时，其蛆尽出。

百花膏

石蜜

略用汤和，以鹅翎刷之，疮痂易落。

金华散　治痘后肥疮、疳疮、疥癣，能收水凉肌解毒。

黄丹　黄柏　黄芪　黄连　大黄　麝香

共为细末，疮湿干渗，疮干用腊猪油熬化，调敷。

拔毒膏

马齿苋捣汁　猪脂　石蜜　赤小豆末　绿豆末

和合熬膏涂肿处，如干，以水润之。

人牙散

人牙煅存性，韭汁淬之，大牙三次，小牙二次，为末，入麝香二分，或红曲亦可，用鸡冠血调成膏，好酒半杯、乳一杯，葱白一撮，煎汤下

外感秽气则陷入，内食秽物则凸出，故用二秽物以起陷下之痘，自筋骨达于皮肤，法无捷于此矣。

吴楚源曰：倒靥色黑，唇口冰冷，最为危候。用狗蝇七枚，擂细，和酒少许调服，即红润如常。冬月蝇藏狗耳中。

独圣散

穿山甲炒一钱　麝香一分

鸡冠血调冲酒服，与人牙散意同。

吹口丹

黄连　青黛　儿茶　片脑

三仙散　治走马牙疳，顷刻即死者。

妇人桶中垢白者火煅，一钱　铜绿三分　麝一分

麝矾散　治同前。

铜绿五钱　胆矾　生白矾各一钱　麝香少许

张特英曰：药未合就，以黄鳝一条剁断，取热血搽之，亦佳。

麦汤散　水痘者，面红唇赤，眼光如水，咳嗽噫喷，涕唾稠粘，身热二三日而出，明净如水疱，易出易靥，温之则痂难落面成烂疮，亦不宜食姜辣，沐浴冷水，致成痈疥水肿，自始至终，惟服此为当。

地骨皮炒　甘草炙，各一钱　滑石二钱　麻黄四分　人参　熟地　知母　羌活　甜葶苈各三分　小麦十粒

稀痘方　忌妇人手。

羌活　生地　黄柏　升麻　防风　麻黄各五分　甘草　黄连　归身各三分　川芎　黄芩酒浸　藁本　柴胡　干葛　苍术各二分　红花酒浸　细辛　苏木　陈皮　白术各一分　连翘炒　吴茱萸各半分

上二十二味，合一剂，每逢立春、立夏、立秋、立冬之前一晚，取水二盅，煎八分，露一夜，如遇天阴，露在房檐下，次早温服，以一年尽四剂，不必再服。小儿服药后微泄，则胎毒去。有不泄者，胎毒轻也。

郑芳贻曰：凤雏雅不喜预解痘毒，指方土金石丹药也。若此不过官方药料，调理血脉，疏通脏气，竟有奇功。余初亦不甚信，久而历观其效，服四剂者不出，服一二剂者，出亦稀。凤雏救世心切，闻余言急索付梓，读者幸毋忽诸。

玄兔散

兔丝子一斤，淘净，用无灰好酒砂锅内煮一日，入石臼内捣成薄片，晒干　玄参斤半

为末和匀，入磁罐收贮，常晒，每遇二十四节，以砂糖汤调下，量儿大小，或五分，或一钱二钱。如邻近出痘，即日日服之神效。

仙砂散

川芎　当归　升麻　甘草各六两

东流水七大碗，煎至二大碗，去渣，用好明净朱砂四两，吸去铁砂，飞净碾碎，细绢袋盛，悬砂锅内，将药水慢煮，至水尽为度。取出焙干为细末，外用糯米半升，淘净，候干，以盐泥为饼，裹米在内，火煅透，取出冷定，拣黄色者，亦为细末，每小儿一岁，朱砂一分，米粉一分，蜜一匙，酒三匙，米汤半酒杯，调匀服之。才觉热者不出，见点者出必稀，回早者服之复起。修合须斋戒静室，勿令妇人鸡犬闻见。

蔡氏曰：余季子出痘热甚，鼻血流满床席，用丝瓜近蒂三寸，连皮子烧灰存性，入朱砂细末一钱，蜜水调服而愈或砂糖拌干服亦妙。凡以此治已出未出诸症，无不霍然。

龙凤膏

地龙小红活者一条　乌鸡卵一个

上以鸡卵开一小窍，入地龙在内，夹纸封之，放饭上蒸熟，去地龙，与儿食之。每逢立春日，或春分日，食一枚，能令终身无痘，即有亦稀。若邻里正出时，服一二枚极妙。

慈幼新书　卷七

明　江夏　程云鹏凤雏辑
鄞县　曹赤电炳章校

麻　疹

麻疹发自六腑，亦曰糠疮，较痘疮似浅，有形无浆，易出易收，多实热者。然条忽变化，其症急速。自初出一二日，及愈后月余，皆不可轻玩。经曰：痘前疹后，信哉。

初生婴儿，弥月内未生痘疹之先发此，曰烂衣疮，百日内外曰瘙疮。盖因在腹中为阴血之气熏蒸，生后忽遇阳风一逼，遂发遍身红点如粟米状，此疹不治自愈。

天行疫疠，大人小儿感之，大便秘结，热气流于胃中，忽发红斑，隐于皮肤之内，有色点而无颗粒，如蚊蚤之迹，锦文之状，无头且平，曰发斑。其症狂言妄见，有阳毒阴毒之殊，总由阳明结热所致，法当清解，白虎见伤寒加大青、元参，一服即愈。误用发散，热势外烈，多致枯焦紫黑而死。

瘾疹多属脾肺虚火，状类伤寒，颇多奇痒，或为不仁，与真麻疹特异，加减通圣散治之。

麻疹之发也，有风热风痰，颗粒浮于皮肤，随出随没，没则又出。虽值严冬，亦不宜盖覆过暖，闭塞玄府，恐毒入咽喉，令人声哑。治宜清肺降痰，发表令透。亦有可下者，然首尾当滋养阴血，不可少动阳气。昔人以防风通圣散为消息，参、芪、术、夏之品，务宜缺之。升麻能令气上冲，亦不宜多用。盖麻疹标属阴而本属阳也。

初发热时，咳嗽嚏喷，耳鼻尖冷，眼胞浮肿，眼角生眵，眼泪汪汪，恶心干呕，恒欲饮水，或痰涎吐泻，不思饮食，大便急而小便涩，其略类伤寒者，憎寒壮热，头痛目赤颊红，身体疼痛。斯时也，有热一二日出者，有热五六日出者，有热七八日出者，氤氲之际，惟宜宣毒发表汤，盖覆衣被得汗。自头至足，渐渐减去，则皮肤通畅，腠理开豁，自无留毒，而疹出易易矣。

麻疹禁忌，较痘疮更甚，一切酒肉鸡鱼之类，犯之早则发惊搐，变紫黑而死。百日内犯之，犹足生疮疖，成泻痢便血，可不慎乎？

发热时耳后项上腰腿先出，一日三次，两日六次，见点红活显露，形小明净，顶尖不长，随出随没，三四日收尽，顺症也，不治自愈。

发热时面先青黑，乃毒气攻心，逆症也，急宜内托散、消毒汤解之。

热极不出，或出而带紫色不明，或与肉平不起，或一二日即没，喘嗽下利，亦逆症也。急宜麻黄汤见伤寒发之，外用胡荽酒洗。

疹出色白，按之稍红，血虚也，养荣汤。出时色红甚，火胜也，化毒清表汤。色紫黑而内外热炽，逆症也，速用宣毒汤，加麻黄。

已出不能没落，内有虚热也，四物汤。失血加犀角汁。已没落，余热不除，黄连解毒汤，调益元散，甚者热日夜不退，烦躁谵语而失血，或发惊搐，或重出一番麻疹，比前略少，此乃心血耗散，余毒炽盛，犀角地黄汤见痘先治其血，余以四物、五苓见前六一等，次第调之。

出一日而没，风寒袭也，宣毒汤消息之。

不则毒气内攻，痒烂而死。大凡麻疹退后，俱不可当风，必令黄瘦病目，生麻疯疮，遇此宜连翘饮见痘加金银花消息之，烂处敷生肌散见痘。

热时汗出不止，乃毒盛致津液妄行，用五倍子三钱为末，唾津调贴脐上，即止。

麻疹没落，七八日声哑无音，儿茶散服之立效。

发热时鼻中血出，毒亦从之而解，不宜骤止，如过甚，当归六黄汤，一服即瘥。若没落后牙龈腐烂，鼻血横流，急以木通、犀角之类，引之下行，不可轻视。甚者眼角中出血，及大便血不止，皆逆也，用清热导滞消息之，可救一二。溺赤如泔浊者，五苓散见前加车前、木通可愈。

疹前后恣食甘甜，生走马牙疳，穿腮落齿，或面颊浮肿，环口青黑，唇崩鼻坏，昏闷失音，为不治逆症。若初时觉口中气臭，唇口生疮奇痒，急服清胃散见齿化虫丸等药，外以独枣丹、雄黄散擦之，或犹及可救。

痘后云头疹，三仙散加防风、黄连，消积食，除风热，可免泻痢之患。

孕妇麻疹，以安胎清血为主，宜四物加白术、条芩、艾叶治之。胎气上冲，芎根、艾叶煎汤，磨槟榔服之。有热甚胎气不安，服固胎饮。如腹痛腰酸，胎在必堕，即以产法论，先用大补，次用他症药，胎虽动而妇可生。盖麻宜里空，热毒堕胎气而自下也。

宣毒发表汤　治初热欲出未出。

升麻　粉葛各八分　防风　桔梗　木通各五分　荆芥　薄荷　甘草各三分　前胡　连翘　枳壳　大力子　淡竹叶各六分

夏加黄芩八分，冬加麻黄八分。

此方疏风开表，透毒清热宽气，较升麻葛根汤力大而不猛，用广而不杂，最为妙当。

化毒清表汤　治已出而红肿过甚。

连翘　花粉　黄芩　黄连　栀子　知母　葛根　元参　大力子　地骨皮各八分　桔梗七分　前胡　木通各六分　甘草　薄荷　防风各三分

渴加麦冬八分，煅石膏二钱。

大便涩，加酒炒大黄一钱。

此方泻火抑阳养阴，仍兼疏表送毒，诚以势虽炽甚，必求外出，视用黄连解毒合白虎者，其天机活泼，为不侔矣。

清热导滞汤　治毒气流注成痢，亦治疳痢。

黄芩　黄连　白芍　枳壳　山查　厚朴各一钱　青皮　槟榔各六分　当归　甘草各八分　连翘　大力子各五分

红多者，加红花三分，地榆五分。

秘涩后重者，加酒大黄一钱二分。

此方调气行血清热，不过滞下平剂，一入大力、连翘，而群药俱化疹用，遂为清利麻疹余毒之方，非寻常治痢之比，渊乎妙哉。

防风通圣散

防风　川芎　当归　白芍　大黄　薄荷　麻黄　连翘　石膏　黄芩　桔梗　滑石　甘草　荆芥　白术　山栀

加减通圣散

麻黄　滑石　川芎　当归　桔梗　连翘　黄芩　白术　石膏　甘草　半夏　贝母　苍术　羌活

内托散　治一切恶疮，与痘家名同实异。

绵黄芪　金银花　甘草　蜂房火煅，二次

煎七分，入黄酒一盅，再煎至七分，随疮上下，分食前后服。

消毒汤　治一切恶疮肿毒，脓已成未成等症。

金银花　地丁　当归　赤芍　大黄　黄芪各五分　甘草一钱　升麻三分

酒煎温服。

养荣汤

川芎　当归　白芍　生地　人参　白术　黄芪　甘草

四物汤

地黄　当归　川芎　芍药

六一散

滑石六两　甘草

黄连解毒汤

黄连　黄柏　黄芩　栀子

当归六黄汤

当归　黄芪　黄芩　黄柏　黄连　生地　熟地

儿茶散　治声哑无音。

儿茶五钱　硼砂二钱

为末，每服一匙，凉水调下。

独枣丹　治麻疹后牙龈溃烂，肉腐出血。

干红枣一枚　雄黄米大一块，入枣肉内，烧灰存性，研末，米泔煎汤入盐少许，漱口擦之

化虫丸　能化虫为水。

硫黄一两　木香五钱　蜜陀僧三钱　附子一枚

将附子另为末，醋熬成膏，和三末为丸，荆芥汤下，每二十丸。

雄黄散

雄黄一两　铜绿二钱

为末干渗。

云盖三仙散　治痘后云头疹。

山查　神曲　麦芽

每末二钱，入白砂糖少许，百沸汤调下。

固胎饮　止痛安胎。

生地　川芎各五分　桑上羊儿藤七叶圆者，一钱　当归　人参　白芍　陈皮各一钱　白术炒　黄芩各一钱五分　甘草三分　黄连　黄柏各二分　糯米二十粒

痛甚加砂仁，虚甚加木香。

丹　毒

丹有五色，变易不同，要皆心火内郁而发。或在手足，或在头面胸背，令儿躁闷腹胀。其热如火，痛不可言。自腹达四肢者易治，自四肢入腹者难痊。治宜败毒散见痘加紫草茸，外用碧雪，或神黄散敷之。

赤白游风，往来不定，无色可观，由胃中郁热所致，治宜清热凉血，元参汤主之。

元参汤

生地　丹皮　甘草　元参　牛膝　赤芍　荆芥　花粉

碧雪

芒硝　朴硝　牙硝　青黛　石膏　甘草　寒水石

又方

大黄　皮硝

为末，用鲜柏叶捣汁调敷。

神黄散

大黄一两二钱　姜黄　黄柏各八钱　白芨一两　赤芍　花粉各七钱　红花　肉桂各五钱

程古五曰：此方治一切热毒红肿，俱能定痛内消。

风　毒

惊风之后，毒气蓄于皮肤，结为顽核赤色，多在腮颊之间，或耳根骨节之处，宜荆防败毒散见痘消息治之，兼傅外消散。

小儿跌扑，破损皮肤，风邪乘袭发肿，谓之破血伤风，亦宜败毒散，加红花、苏木、当归、生地服之，外以膏贴。

外消散

大黄　牡蛎各五钱　朴硝

田螺三枚洗净，用水半盏，浸一宿去螺，浆水调涂。

破伤风膏

血竭　藁本各二钱　茴香六钱　乳香　没药各一钱　轻粉二钱　黄丹　黄蜡各一两　麻油四两

七药各另为末，将油蜡熬化调匀，入麝香、朱砂少许摊贴。

惊　丹

小儿生后，百日内外，眼胞红肿，面青夜啼，或面如胭脂，或散生满面，如水痘状，脚微红而不壮热，从头至项，出没无定，赤

如丹砂，急宜施治。若渐至胸膈，即为内攻矣，宜服三解散。

三解散 此方兼治口疮咳嗽。

人参 防风 天麻 茯神 郁金 大黄 黄芩 赤芍 全蝎 僵蚕 枳壳 甘草 薄荷 白附子 灯心

惊

惊有八候，搐、搦、掣、颤、反、引、窜、视，搐者两手伸缩，搦者十指开合，掣者势如相扑，颤者头偏不正，反者身仰向后，引者臂若开弓，窜者目直似怒，视者睛露不活。

急惊身热目赤，口鼻气粗，痰涎潮涌，忽然而发，发过容色如旧。有因惊骇者，亦有不因惊骇者，大都是火燥木急，故身先有热，未有身凉而发者。症皆属阳，宜用凉剂，除热化痰，则惊自息。然昔人谓痰生热，热生风，风生惊，其实皆本气自病，虽平肝必兼扶土，清火散惊汤主之。世不解风自内生，徒执金药天麻、胆星、瓜蒌、贝母、僵蚕、全蝎、钩藤、竹沥等，杂乱风痰之剂。治之不应，更加广东蜡丸、牛黄、紫雪治之。及至元气损伤，虚痰上逼，胸膈膨胀，则谓症变结胸，无可着手，有是理哉？值此速以大剂六君子汤见五硬救之。

慢惊成于吐泻，或久疟之后，中气虚衰，寒痰壅遏，而风动筋急。其症属阴，与急惊相反。发时身冷面白，不甚搐搦，口鼻中气寒，大小便清利，昏睡露睛，微微上视，筋脉拘挛，古人即以此为阴痫，俗又呼为天吊风，危极之候。速用温中补脾汤，或十二味异功散见痘，庶可挽回，若误服抱龙、牛黄、苏合等药，必死。

汪树人曰：亦有误服凉药，阳气无所归，反见身热面赤，口鼻中气温者，仍须温中、异攻治之。

慢脾即系慢惊失治所致，不必另立法门。但视其脏气未坏者，以温中、异攻二药进退之，自可霍然而起。

惊未发时，觉身热面青，心悸不宁，啼叫恍惚，宜定惊丹服之。若已发搐，兼服压惊汤。如身热神宁，手足不搐，虽有痰嗽腹痛诸症，应从杂症治之，不必二药。

慢惊有服药即吐者，胸膈间寒痰拒逆也，六君子汤加桂、附、干姜、黄芪、白蔻、姜、枣，浓煎一盏，骤灌之，冲开壅隔自愈，或服乌沉汤亦效。

急惊搐搦大作时，须听其自然，切不可扶持把捉，使风痰流入经络，则手足拘挛。亦不宜艾火攻灸，以希速效。

将出痘疹，身热惊跳，或时发搐，当表散之。

惊风退后，声哑不能言，用大南星一枚，泡去皮脐为末，每二三分，或四五分，以猪胆汁调成稀糊，入淡姜汤少许，食前服之，立愈。一切病后不能言，俱效。或服朱连散，亦佳。

清火散惊汤

白芍一钱 白术 栀子 柴胡各三分 茯苓二分 陈皮 甘草 半夏各一分

温中补脾汤

白术一钱二分 半夏七分 人参 黄芪各八分 茯苓 砂仁 白蔻仁 干姜各五分 肉桂 陈皮 白芍 炙甘草各四分 生姜 大枣

甚者加附子五分。

频频服之，必得肢体温和，风除神爽，方可住服。

压惊汤

茯神一钱 人参 白术 神曲各五分 甘草 半夏 辰砂各三分 陈皮一分 砂仁一粒

吐者去甘草，加砂仁。泻者加车前子。

乌沉汤 驱风助胃。

天麻一钱 人参 生川乌 广木香 全蝎 沉香 南星各五分 炙甘草二分 生姜一斤

参宝定惊丹

人参三两　白术二两一钱　茯苓　白芍各七钱五分　半夏　麦冬　枳壳　甘草　山查肉　干姜　柴胡　神曲各二钱四分　炒黑荆芥　薄荷叶　石菖蒲　槟榔　麦芽各一钱二分半　广木香七分半

炼蜜为丸，如大元眼核大，每服一丸，白汤下。有痰姜汤下，重症，参汤下，危急者用二丸三丸。

程潜庵曰：此方治惊痞吐泻，大是神功，其为万世无穷之利，不啻如东垣先生之补中益气汤也。

桑虫丸治惊时不省人事。

桑虫一条，捣烂　麝香　朱砂各五厘

丸如绿豆大，薄荷汤下二三丸，大人中症亦效。

蔫虫丸

朱砂　轻粉各一钱

为细末，取青蔫节内虫同研，丸如麻子大，晒干磁罐收贮，一岁一丸，人乳汁调化下。蔫虫须七月初旬取，迟则生翅飞去

刘希岸曰：薛氏有飞龙夺命丹，取蔫虫入砂、麝同丸，不用轻粉，以姜汤服之。

汪有章曰：此方治急惊痰涌者神效。又法：用癞虾蟆胆一枚揉汁，和姜汁一匙服，危症立苏。

程格思曰：白颈蚯蚓三条，刀切二段，取跳得急者，阴阳瓦焙干为末，用薄荷三分，同金银首饰煎汤送下，治急惊。跳得慢者，作三段。亦用前法制服，治慢惊。

朱连散

雄黄　朱砂　黄连　乳香各半分　冰片　麝香各一厘

取金眼虾蟆胆汁调和，塞口内，或痰或粪，略出少许，即苏。

叶锡侯曰：薛氏云，凡虎狼蛇犬所惊，其气入心络，皆令人不能言语，以密陀僧研细如飞面，茶清调服即通。惊邪入心，皆入包络也，世每误治。

新安金药

胆星　天麻各一两　天竺黄　山栀仁各四钱　大黄　甘草　朱砂各三钱　雄黄　天花粉　当归　麻黄　硼砂羌活　川芎　防风五钱　龙胆草一两二钱　麝香二钱

蜜丸芡实大，金箔为衣，僵蚕、贝母、钩藤煎汤下。

此即时下所常用抱龙丸秘方也。不论内伤外感，一见发热痰嗽，辄日日服之。以为惊可预散，不知发热多端，退热亦有多法。设非惊症，引贼入门，缠绵不解，变症蜂作，则又以为药力尚轻，更服利惊丹、广东蜡丸、牛黄、紫雪等剂，速其死亡。自有幼科以来，未有斯药之弊之甚也。尤可骇者，习俗移人，病家无论何症，医不以此药与之，即加嗔怪，竟视为寻常服饵养生之方矣。悲哉悲哉。

汪表圣次子两岁，偶感风邪，发热身颤，角弓反张，日服此药，及羌、防、柴、葛、天麻、胆星、瓜蒌、全蝎之品，昏沉欲绝。盖不知小儿气血未旺，不耐风寒，才犯之即发痉病，但助其气血，即风除神爽。一用此等药治，则风门大开，荣卫无主，旧病未去，新病益增，安望生理？表圣因诸医推诿，始来延予，与以五味异功散，加柴胡二分，桂枝一分，附子一分，连服二剂而瘳。

蒋千宫第五子一岁，伤暑发热，服此药十余日，搐搦几殆。又进蜡丸、牛黄、紫雪，死去矣。予察其误中于药，以补脾汤加减治之，立愈。

吴振公次女四岁，伤食吐泻，发热发颤，予谓此女多食瓜果，致脏气不行，酿成湿热。既经吐泻，湿去热留，脏腑之中，无阴相养，故变成风象。为定参、术、半夏、砂仁、干姜、厚朴、当归、茯苓一方。振公忽延某医参用，某医谓弱龄女子，岂得服参、术，遂易一切消导之味，并金药服之。至五日，人事昏沉，头偏睛露，医欲更进广东蜡丸，振公复来相召，以温中补脾救之立苏。

叶弘士之子岁半慢惊，服金药及风痰之剂，昏闷七日，指纹直抵三关，医辞不治。予

投以加减补脾汤立愈。此症予活人多矣，皆不用一味风痰药成功，奈何同道诸先生，不深究阴阳脏气之消长，而徒视人命为儿戏也。

利惊丹

防风　胆星各一两　天麻　大黄各八钱　巴霜三钱　枳壳　礞石各五钱　甘草二钱

矾红为衣，碎芥子大，量儿大小服之。

此亦时下常用秘方也，不论内伤外感，凡有痰嗽发热者，服金药不效，即以此利之，实者变虚，虚者致死，皆不察病情之过也。从来秘方，必以一药统治诸病，杀人几不可以数计矣。

汪栗亭曰：予见凤雏治症，有用朱银丸见胎惊、褊银丸见咳嗽重剂者矣，有用黄连、犀角、石膏、牛黄苦寒者矣，独于此丁宁告诫者，良以此症自喻嘉言、陈远公而外，未有发明者耳。世医守一师说，束书不观，岂能辨晰毫末。吾恐是书出，不但河汉于其言，且有掩卷而非笑之矣。

程庆其曰：利惊丹自是痰家妙品，但不论内伤外感，一切服之，则不可耳。读者勿死句下。

痫

痫有阴阳，与急慢惊风相似。古有鸡、猪、羊、牛、马五痫之名，又有风、食、惊三因之论，钱氏用朱砂、雄黄、水银、珍珠、黑铅，为五色丸统治之，大概以坠痰为主。然持此以治，颇不验，何哉？夫心、神所舍也，惊恐则神离，痰涎乘之，遂成痼疾，初则火燥木急，惊门诸药可以治之，久则寒痰迷闷，郁滞不开，非三生饮豁其痰，地黄丸见囟善其后，未有不为终身之忧者。世以幼而忽之，医又不闻高论，奈何哉。

三生饮

生南星一两　生川乌　生附子去皮，各五钱　广木香二钱

雌黄丸　治颠痫搐掣，恶声嚼舌。

雌黄　黄丹微煅，各五钱　麝香五分

牛乳汁三合，熬膏杵丸，麻子大，每服二三丸，白水下。

蛇黄丸　治震骇恐怖，啼叫恍惚，是名惊痫。

真蛇黄三枚，火煅醋淬　郁金七分　麝香一字

为末，烂饭丸，桐子大，每服二三丸，磨刀水煎金银首饰汤化下。

牛黄丸　治汗出解脱，风邪乘之，迷闷涎潮，屈指如计数，是名风痫。

胆星　全蝎　蝉蜕各二钱五分　防风　天麻各一钱二分　白附子　白僵蚕炒，各一钱五分　水银　牛黄各五分　麝香半字

枣肉丸，绿豆大，每服一二丸，荆芥姜汤下。

妙圣丹　治惊而停食吐乳，大便酸臭，是名食痫。

巴霜三钱　代赭石煅淬，二钱五分　杏仁炒，二钱　雄黄　朱砂　蝎梢各一钱　轻粉　麝香各一匙

枣肉丸，桐子大，每服一丸，木贼草煎汤下。

虎睛丸　治惊痫邪气入心。

虎睛一对，细研　远志姜制　犀角镑　大黄湿纸包煨　石菖蒲　麦冬各二钱　蜣螂三个，去翅足炒

米糊丸，桐子大，每服二三丸，竹叶汤或薄荷金银饰汤下。

断痫丸　治瘥而复作，症候多端，服此即解。

黄芪蜜炙　钩藤钩　细辛　甘草各五钱　蛇蜕二寸，酒炙　蝉蜕四个　牛黄一钱，另研

煮枣丸，麻子大，每服一二十丸，人参汤下。

发　热

小儿百病，先从热起，自变蒸外，有感寒伤风者，则恶风寒，头痛脉浮，咳嗽嚏啼

有伤食者，则手心热甚，嗳气吐食，大便酸臭。有癖积者，则颊赤口疮，便涩腿肿。有痘疹者，则耳鼻尖冷，两目含泪，耳纹现，中指冷。有惊者，则面青自汗，心悸不宁，啼叫恍惚。有疳者，则形瘦多渴，骨蒸盗汗，泄泻无常，肚大脚小。种种不同，随症治之，百无一失。然疑似之间，有古人未传者。如一儿感冷，恶寒大热。用发表药，则汗出热退，过一日复热，大便秘，必里未解也，服四顺清凉饮见嗽门利一行热退，隔日又热，小便赤，服导赤饮见目热退，过三日又热，庸劣者几无措手矣。诊其脉，脉已和，既发汗，又利大小便，其儿已虚，阳气无所归。皆见于表，所以热，以六神散和其胃气，加乌梅一枚，令微有酸味，收其阳气归内，自此全愈。又一儿有积热，表里俱热，颊赤口干，小便赤，大便焦黄，用四顺饮，利动脏腑，热乃去。既去复热，里解而表未解也，发散微汗，热乃去。隔日又热，此无他，表里俱虚，气不归元，而阳浮于外，所以再热。实非热症也，只以六神散，入粳米煎，和其胃气，则阳气归内，身体自凉，此等处最易误人，特揭以补千古之缺。

六神散

人参　白术　茯苓　甘草炙　山药　藕豆姜水浸去壳炒　煨生姜　大枣

柴胡饮子　统治肌热、蒸热、积热，或汗后余热。

黄芩　白芍各七分　当归一钱　甘草四分　大黄八分　柴胡　人参各五分　生姜煨，一片

慈幼新书　卷八

明　江夏　程云鹏凤雏辑
鄞县　曹赤电炳章校

伤　寒

小儿八岁以前，无伤寒症，非无伤寒也。营血未充，才伤即变热病，热则生风，发为惊搐，与伤寒迥异矣。初用寒门方药消息，次惟参合散惊汤见惊。又有因惊而气虚，寒邪乘之，名曰夹惊，先辨其初受急慢，急则宜以清凉解散，慢则必以温中实脾。又有先伤风寒，后复停滞饮食，或先停滞饮食，后复伤于风寒，名曰夹食。其症状热头痛，嗳气腹胀，大便酸臭，留连不解，须大柴胡汤下之。体弱者，惺惺散调之。小儿八岁后，气血充盈，经脉完固，伤寒传变次第，与大人同，故自表达里，先皮毛，次肌肉，又次筋骨肠胃，丝毫不爽。其始也，先从太阳寒水一经，有恶风恶寒，头痛脊痛等症，寒郁皮毛。是为在表。脉浮紧无汗为伤寒，以麻黄汤发之，得汗而解。脉浮缓有汗为伤风，以桂枝汤散之，汗止而解。

吕晚村曰：太阳经在最外一层，故邪入皮毛，即先伤之。皮毛不能传变，由太阳之络传经，而后内人诸经也。邪客于皮毛，即玄府闭，人身脏腑之气，无刻不与外气通，故和畅。玄府闭，则内气不能泄而生热，非风寒能变热也。此时但发其皮毛，玄府开而邪随汗散矣。麻黄、桂枝汗皮毛之方，非解中之方也。表不解，则热积而日甚，从本经反而之内，及各经井荥俞原合交会之处，则热交于他经，而各经病见矣。

太阳既解，无头痛恶寒，脉又不浮，为表症罢而在中，乃阳明少阳之分，脉不沉不浮，在乎肌肉之间，皮毛之下。然有二焉，若微洪而长，阳明脉也，外症鼻干不眠，用葛根汤解肌。脉弦而数，少阳脉也，外症胁痛耳聋口苦，寒热往来，以小柴胡汤和之。盖阳明少阳，不从标本，从乎中治也。若有一毫恶寒，邪尚在表，虽入中还当兼散邪。

晚村曰：肌肉不能传变，肌肉之中，皆经络也。经络也谓之中，里则脏腑，表则皮毛，脏腑之气血，惟经络传达，外邪之壅热，亦惟经络传变，故阳明少阳，皆从中治。中者经病，非胃与胆病也。经病用和解，和解亦必由汗散，然非开发皮毛之法矣。盖邪初客表经中，阴津未伤，但启其窍而汗自通。及热传中经，血液燔灼，窍虽启而汗为热隔，不能达外，庸工不知，尚用风热之药以发其表，益助热而耗阴，汗源干涸，究竟不得汗而毙者多矣。仲景和解，只清解热邪，而津液自存，阴汁既充，涌出肌表，而外邪自然涣散，此养汗以开玄府，与开玄府以出汗之回乎不同也。

寒在阳明则解肌，寒在少阳则和解，然病犹未退，即为传里，实热脉不浮而沉，按之筋骨之间，所谓阳明胃腑病也，与经病不同。若脉沉实有力，外症不恶风寒而反恶热，谵语大渴，六七日不大便，皆肠胃燥实致之。轻则大柴胡汤，重则三承气汤，大便通而热愈矣。

晚村曰：热邪入里，驱出为难，故就大便通泄，从其近也。得汗而经热从汗解，非汗为害而欲驱之也。便矢而腑热从矢出，非

矢为难而欲攻之也。医不察此。但知消克泻下之法，始终禁绝饮食，惟求一便矢为能事，殊可笑矣。

寒邪直入三阴之经，名曰直中。乃三阳主气衰，无热拒寒也。故初起即手足厥冷，或战栗蜷卧不渴，或腹痛呕吐泄泻，或口出涎沫，面如刀乱，不发热而脉沉迟无力，此不从阳经传入热症。治例更当看外症如何，轻则理中汤，重则姜附汤、四逆汤治之。

伤寒者，由皮毛经络而后入脏腑，初虽恶寒发热，而终为热症，其人必素有火者。中寒者，直入脏腑，始终恶寒，面并无发热等症，其人必素无火者。一则发表攻里，一则温中散寒，两途判然明白。

症有反常者，如发热面赤烦躁，揭去衣被饮冷，脉大，非阳症乎？然投寒药死者，何也？内有伏阴也。切其脉，不论浮沉大小，必指下无力，按之筋骨之间皆然，甚者服一切茶汤及药皆吐，此阴盛格阳，乃白通汤加人尿、胆汁对子。仲景将传经与直中并论，正谓有阴症似阳，阳症似阴耳。如太阳症，头痛发热，当脉浮而反沉，又似少阴矣。故用麻黄附子细辛汤。少阴症脉沉，应无热而反发热，又似太阳矣，须用甘草干姜附子汤。阴症四肢厥逆，而阳症亦有厥逆，此四逆汤与四逆散不同也。阴症下利，而阳症亦有漏底，此理中汤与黄龙汤不同也。

伤寒头绪虽多，总括不过五法：一曰发表，其症脉浮发热，身痛恶寒，脊项强，喘咳嗽，头痛，四肢拘急，目舌和，脉不出，口不渴，大小便如常方主麻黄桂枝青龙之属。一曰解肌，脉尺寸俱长，目痛鼻干，嗽水不欲咽方主葛根升麻葛根之属。一曰和解，脉不浮不沉，往来寒热，呕吐胁痛，胸前胀满，耳聋头汗，盗汗舌滑，目眩口苦方主小柴大柴之属。一曰攻里，脉沉而有力，潮热恶热，腹痛下利，转失气，手足心腋下有汗出，咽干齿燥，目不明，谵语发狂，小腹满，下利清黄水，不得眠，小便多，自汗、头痛、发热俱止方主白虎承气之属。一曰救里，脉沉而无力，下利清谷，小便清长，四肢厥逆，呕吐清涎沫，背恶寒，蜷卧多眠，囊缩唇甲青，吐蛔干呕，舌卷，手足拘急，身体疼痛如被杖方主理中四逆真武白通之属。

麻黄汤　治太阳经寒伤营血，发热无汗恶寒。

麻黄甘热，即中之阳，二钱　桂枝一钱　甘草五分　杏仁八枚，炒

桂枝汤　治太阳经，风伤卫气，发热自汗恶风。

桂枝辛热，阳中之阳，二钱　芍药二钱　甘草一钱

加芍药一倍，为桂枝芍药汤。

加大黄，为桂枝大黄汤。

小青龙汤　治表不解，心下有水气，干呕，或咳或噎或嗽。

麻黄　桂枝　芍药各一钱　熟半夏一钱二分　甘草　干姜　细辛各五分　五味子十二粒

表不解者，头痛身热尚在也。渴时饮水过多，故心下有水气，咳噎喘者，水寒射肺也。有声无物曰干呕，此方麻、桂、草发表。夏、辛、姜散水气，芍药和阴血，五味收肺气，所谓青龙者，东方木神，主发育万物之义。

大青龙汤　治太阳症见风脉。

麻黄去节　石膏各三钱　桂枝一钱　杏仁五枚，炒　甘草四钱　生姜一片　大枣一枚

太阳症而见风脉，是有头痛身热，无汗恶寒，但脉不紧而缓，为伤寒兼中风之候，故合麻黄、桂枝用之。风寒外盛。则入身之阳郁为内热，石膏所以加也，曰大青龙。又言其行云致雨之速。苟不善用，则亡阳之祸，变为筋惕肉瞤矣。可不慎哉？

惺惺散　治小儿元气虚弱，热不能受。

人参　白术　茯苓　甘草　白芍　桔梗　花粉　细辛　川芎　防风　生姜　大枣

葛根汤　治阳明胃经，目痛鼻干不眠。

葛根一钱五分　赤芍　桂枝　甘草各六分

麻黄一钱　葱白二茎　生姜一片　大枣一枚

如恶寒，加麻黄。恶风，加桂枝。

如正阳明腑病，不恶寒，有汗而渴，当用白虎汤。

升麻葛根汤　治邪在阳明之经，无汗恶寒发热。

升麻　葛根　芍药　甘草

此方疏表去实，和血调气，故痘家用之。

小柴胡汤　治少阳胆经，耳聋胁痛，寒热往来口苦。

柴胡三钱　黄芩　甘草　人参　半夏各一钱

此经无出入路，不可汗下，止此汤和解之。如兼阳明症，本方加葛根、芍药。如尚有恶寒等症，用大柴胡汤。

太阳经，表之表也，行身之背。阳明经，表之里也，行身之前。少阳经，半表半里也，行乎两胁之傍。过此则少阴、太阴、厥阴，俱入脏而为里。

大柴胡汤　治表症未除，里症又急，汗下兼行。

柴胡一钱二分　黄芩　芍药各一钱　半夏八分　大黄七分　枳实四分　生姜　大枣

白虎汤　治身热大渴而有汗，脉洪大者，无渴不宜。

石膏五钱　知母三钱　甘草一钱　糯水一撮

邪入于里，内有实热，故恶热，热越故有汗，里燥故作渴，邪盛故脉大，邪在阳明故脉长。白虎者，西方金神也，名此者，欲秋金之令行，而夏火之炎息耳。

此暑月热病发热正方，石膏寒中之药，淡而辛，能汗能利，必其人有大汗而渴。

齿燥，脉洪长可用，若无汗，脉虚而不洪长，或重按全无，虽壮热口渴，象白虎症。

此脾胃气虚，元阳不足，误服必死。

调胃承气汤　治太阳、阳明，不恶寒，反恶热，大便秘结而呕，日晡潮热。

大黄六钱　芒硝四钱　甘草一钱

大承气汤　治阳明、太阴谵语，五六日不大便，腹满烦渴，并少阴舌干口燥，日晡发热，脉沉实者。

大黄五钱　厚朴二钱　枳实一钱　芒硝四钱

小承气汤　治六七日不大便，腹胀满闷，病在太阴，无表症，汗后不恶寒，潮热狂言而喘者。

大黄四钱　厚朴二钱　枳实一钱

桃仁承气汤　治外症已解，小腹急，大便黑，小便利，为瘀血症。

大黄二钱五分　芒硝一钱五分　甘草一钱　桂枝一钱　桃仁十个

凡用三承气者，须以手按病人，自胸至小腹，果有硬处，手不可近。又看其舌之燥滑何如，然后分当急下大承气，　可少与小承气，宜微和胃气调胃承气　之法用之。

小建中汤　治伤寒腹中急痛，阴阳相乖。

桂枝一钱　芍药二钱　甘草六分　饧糖三匙　生姜五片　大枣二枚

阴症腹痛不大便，桂枝芍药汤。腹痛甚，桂枝大黄汤。腹痛自利，小便清白，宜四逆、理中。

黄芪建中汤　治伤寒汗后身痛，脉迟弱者。

黄芪炒，一钱五分　芍药炒，二钱　肉桂去皮，一钱　甘草六分　生姜五片　大枣二枚

煎好，入饧二匙，煎一沸服。若微溏利，或呕者不用。

汗多耗损阴气，不能荣养筋骨，故痛。阳虚故脉迟，汗后故脉弱，此方建立中气，使生长荣卫，通行津液，则表不虚而身痛自愈。

理中汤　治太阴即病，自利不渴，寒多腹痛。

人参　白术各二钱　干姜一钱　甘草八分

真武汤　治汗发过多，心下悸，头眩身眴，振振欲擗地者。

附子　芍药　茯苓各二钱　白术一钱　生姜五钱

心亡津液，肾气欲上而陵心，故悸。汗多亡阳，虚邪内动，故眩晕欲擗地，曰真武者，北方之神，能司水火，救偏方之不及。

白通汤　治少阴下利。

附子三钱　干姜一钱五分　葱白三茎

少阴主禁固二便，寒邪居之，则失其权矣，故下利。葱白所以通阳气也，姜、附所以散阴寒也。能散能通，差，足尽少阴之职。

服此汤，利不止，复厥逆无脉，干呕而烦，即加人尿五合，猪胆汁一合服之。脉微续者生，脉暴出者死。

麻黄附子细辛汤　治少阴病始得，发热脉沉。

麻黄去节　细辛各五钱　附子三钱

病发于阴当无热，有热者乃太阳经表里相传之症耳。少阴虚，则太阳之邪由络直入。其不尽入者，留为表热。故用麻黄以发汗，用辛、附以温中，中外互攻，而贼邪当服矣。

四逆汤　治太阴自利不渴，身痛脉沉。

附子三钱　干姜　甘草各一钱五分

加甘草一倍，为通脉四逆汤。

四逆散　治阳气亢极，血脉不通，四肢厥逆，在臂胫之下。若阴症，则上过乎肘，下过乎膝矣。

柴胡　芍药　甘草　枳实

阳邪传入少阴，里有结热，阳气不能伸于四末，故四逆而不温。用枳实，所以破结气而除里热。用柴胡，所以升发真阳而回四逆。甘草和不调之气，芍药收失位之阴。夫伤寒以阳为主，四逆则有阴进之象。若用苦寒下之，必致阳益亏矣。故用此方。

甘草泻心汤　治呃逆，脉洪大，心火上奔，肺不得纳。

甘草二钱　黄连五分　半夏　人参　黄芩　干姜各一钱　姜五片　枣五枚

胃寒呃逆，脉微细，干姜、半夏、丁香、柿蒂治之。若因失下，大便实者，小承气治之。

玄参升麻汤　治发斑咽痛。

玄参　升麻各一钱五分　甘草八分

阳毒升麻汤　治赤斑狂言，吐脓血。

升麻一钱五分　犀角磨，一钱　射干　黄芩　人参　甘草各八分

阳症误温，当汗失汗，当下失下，或下早邪热入胃，或下迟热留胃中，皆致发斑。

赤者二方可治，紫黑必死。

世有内伤发斑者，胃气虚极，一身之火，游行于外，宜补以降之。此症人多不识。

发疹者，太阴风热表症也，须防风、黄芩、薄荷、桔梗、蝉蜕治之。

桃仁汤　治狐惑声哑。

桃仁　槐子　艾叶各三钱　大枣三枚

狐惑者，失汗所致，食少胃空，虫咬其藏，则上唇生疮为惑。虫食其肛，则下唇生疮为狐，其候齿燥，声哑恶食，面目乍赤、乍白、乍黑，舌上白胎，唇黑，四肢沉重，喜眠，服此须更以黄连、犀角清之。

黄连犀角汤

犀角磨，三钱　黄连二钱　乌梅四个　木香磨，三分

雄黄锐散　治食肛狐症。

雄黄　桃仁　苦参　黄连　青葙子

为末，艾汁丸，如小指尖大，棉裹纳肛道中。

牛蒡根汤　治发汗不透，馀毒在心胞络，令瘥后昏沉，甚至手足搐搦，或寒或热。

牛蒡根　麻黄　牛膝　南星各六钱

好酒同研，滤去渣取汁，用炭火烧一地炕令赤，去火，投药汁在内，烧令黑色，取出细研，酒调服五分，日三次。

牡蛎泽泻汤　治前症，腰以下有水气者。

牡蛎　泽泻　蜀漆　商陆　葶苈　海藻　花粉

为末，米饮服。

黄龙汤　治发热不退，或寒热往来。

柴胡五钱　黄芩炒　甘草炙，各二钱　赤芍三钱　生姜　大枣

慈幼新书　卷九

明　江夏　程云鹏凤雏辑
鄞县　曹赤电炳章校

感　冒

感冒轻于伤寒，得之浅易，不必用寒门重剂。凡头痛发热恶寒者，阳气不得舒伸也，薄荷汤、八宣汤消息之。兼痰嗽气壅者，半夏散、藿香散。兼鼻塞声重者，神术散。兼停食吐泻者，藿香和中散见吐泻体虚者，参苏饮。里气郁结者，指迷汤见胎、热平素有疮癣，皮肤燥痒，忽兼感冒者，荆防败毒散见痘主之。因感冒痰热而发搐者，护子汤。

薄荷汤

薄荷　川芎　羌活　荆芥　甘草　白芷　防风　细辛　生姜　葱白

八宣汤

葛根　升麻　川芎　甘草　麻黄　赤芍　陈皮　白芷

半夏散

苏叶　苍术　茯苓　前胡　陈皮　枳壳　桔梗　甘草　半夏

藿香散

茯苓　紫苏　藿香　苍术　陈皮　厚朴　桔梗　半夏　甘草　大腹皮

神术散

苍术　藁本　白芷　细辛　川芎　羌活　甘草　葱白　生姜

参苏饮

紫苏　枳壳　桔梗　茯苓　干葛　甘草　前胡　半夏　陈皮　人参

护子汤　治偶感风邪，发热身颤，手背反张，一剂即定。俗医每以抱龙、牛黄杀人。

茯苓二钱　白术二钱　人参一钱　柴胡五分　桂枝二分

咳　嗽

小儿咳嗽，六淫之气乘于肺也，与大人颇异。从外入者麻黄汤。见伤寒。发之长夏火旺，泻白散清之。嗽而涎热，咽喉不利，甘桔汤疏之。嗽而面青搐掣，散惊汤见惊解之。嗽而痰喘面赤，饮水不休，褊银丸下之。久嗽则肺亡津液，须阿胶散补之。至若麻痘，或癖积，皆有痰嗽，则从专症治之，不必从事于此。

咳而上气喉中水鸡声，射干麻黄汤亡之。有嗽而声哑者，盖金实不鸣，金破亦不鸣，实则清之，破则补之，皆治肺之事也。

胎嗽乳嗽，用去心川贝母五钱，甘草一钱，红砂糖调，临卧服七分，药尽自愈。未愈再服。

泻白散

桑皮　炙甘草　地骨皮

甘桔汤

甘草　桔梗各一钱　阿胶炒，五分

褊银丸

巴豆去皮心油　水银各五钱　陈墨火烧醋淬，八钱　黑铅二钱五分，同水银结砂子　麝香研，五分

各研和匀，陈米糊丸，如绿豆大，一岁一丸，五岁以上五六丸，薄荷汤下。

阿胶散

明阿胶面炒，一两五钱　马兜铃五钱　黍黏子炒　甘草炙、各一钱　杏仁七个　糯米五钱

为末，每服一钱。

程格思曰：此方治屡嗽不止极效。又一法：薏苡仁一合，慈孝竹叶三十片，同洗净，煮成粥汤，或仁或汤，听其自吃，数次亦愈。

方鹿村曰：嗽有童子痨者，最属难愈，用人中白，须天露者，不拘多少，炭火煅过，布包放青靛缸中，浸七日取起，晒干为末，每服三钱，蜜汤送下，十日即瘥。

射干麻黄汤

射干　麻黄　紫菀　半夏　细辛各八分　款冬一钱　北五味子十粒　生姜　大枣

痰

小儿惊痫寒热痘疹诸疾，未有不兼痰者。专症重则治其症，而痰自除。若无专症，反因痰而生他病者，青黛丸、利痰散子治其痰，重者以褊银丸见嗽下之。饮食生痰，胸膈膨闷，健胃开涎散，湿痰作眩，青州白丸子，以参汤服之。

利痰散子

白丑五钱　槟榔八分　茵陈　木香各五分

为末，白汤下，每服一钱。

汪令凯曰：此方治小儿风痫多痰，痴而不慧者，大有神效。

青黛丸

橘红　杏仁　枳实　黄芩　茯苓　白附子各二钱　瓜蒌霜　半夏　胆星各三钱　大黄蒸　礞石　百部　麻黄各一钱　皂角一条

姜汁丸，芡实大，青黛为衣，滚水化服。

健胃开涎散

茯苓三钱　白术　苡仁各二钱　人参　花粉各五分　陈皮　干姜各二分　砂仁一粒

程潜庵曰：此方治小儿气逆痰壅，经脉闭塞，手足厥冷，如慢惊者，神效。

青州白丸子　兼治惊风吐乳。

半夏　南星　白附子各三两　川乌五钱

为末，浸水中五日，用糯米粉煎粥清，丸如芡实大，滚水冲姜汁化服。

疟　疾

小儿当乳母襁褓之时，以及嬉戏跌扑食饮之际，触冒风寒暑湿，客于皮肤，积于脏腑，邪正相攻，阴阳偏胜。作，为寒热往来。阳不足者，先寒后热。阴不足者，先热后寒。寒多热少者阴胜阳，热多寒少者阳胜阴。阴阳互攻，则寒热相半。其初也，必内有痰食，致脏气不流，故须清脾饮为消息。若胃中寒痰凝结，不易开解，草果饮一服愈之。

夏伤于暑，秋必痎疟，此亢则害，承乃制，子来救母之义，有止发之定期，其间日作者，气之舍深，内薄于阴，阳气独发，阴与阳争不得出，故须间日。三日一作者，邪入于三阴也。作于子午卯酉日者，少阴也。作于寅申巳亥日者，厥阴也。作子辰戌丑未日者，太阴也。发在夏至后，处暑前者，三阳受病，伤之浅者，近而暴也，发在处暑后，冬至前者，三阴受病。伤之重者，远而深也。发在子半之后，午之前，是阳分受病，易愈。发在午后者，是阴分受病，难愈。

凡治疟，先问寒热多寡，而参之脉症。大抵寒热往来，皆属少阳胆经，法用小柴胡汤见伤寒加味，即清脾饮为主。寒多者，加桂枝，有但热不寒者，名曰瘅疟。阴气孤绝，阳气独发，骨节疼痛，少气烦冤，时时呕逆，白虎汤见伤寒加桂枝主之。有但寒不热者，名曰牝疟，蜀漆散主之。如但寒而脉或洪实，或滑仍当作实热治。如但热而脉或空虚，或微弱，仍当作虚寒治。

凡疟将发之时，与正发之际，邪正混战，治之无功，必待阴阳并极而退。邪留所客之地，然后攻之。或当未发二三时前，迎而夺之可也。

阳虚则恶寒，阴虚则恶热，阴气上入于阳中，则恶寒。阳气下陷于阴中，则恶热。若

此，又非小柴、白虎所宜；直须理中见保产补中、见伤寒六君见五硬之属，加姜、桂治之。然方中亦必用升、柴，以提出阴中之阳，使水升火降，自无不愈。

吕晚村曰：大人元气素虚，服疟药，不应，须补中益气，倍柴胡、人参，加半夏、生姜立愈。间有不愈者，服桂附八味丸，最为神应。又产后及一切阴虚，俱有寒热往来，似疟非疟，唯用六味地黄汤见肉加柴胡、白芍、肉桂、五味子方效。若服疟门诸方，祸不旋踵。

人有脏腑久虚，大便常滑，忽得疟疾，呕吐异常。赵养葵以二陈汤加人参、白蔻与服，遂觉气脉顿平，寒热不作。盖白蔻能流行三焦元气，营卫一转，寒热自平，切不可用常山，益虚其气。

久疟失治，遂成疟母。邪伏肝经，胁下有块，此营卫亏损之候，以六君子汤加木香、肉桂、莪术、鳖甲主之。

世以夜发为鬼疟，非也。邪入阴分，发子六阴，宜四物汤见麻疹加知母、红花、升麻、柴胡，提出阳分，方可截之。若时行不正之气，真鬼疟也。宜平胃散见保产，加雄黄、桃仁。

青皮饮

白术　黄芩　半夏　厚朴　青皮　茯苓　柴胡　甘草　草果　生姜　大枣

寒多加肉桂。

热多加黄连。

草果饮

草果　常山　知母　乌梅　槟榔　甘草　穿山甲

知母性寒，治足阳明独盛之火热，使其退就太阴；草果性温，治足太阴独盛之阴寒，使之居于阳明。二经合和，则无阴阳交错之变，是为君。常山主吐胸中痰结，是为臣，甘草和诸药，乌梅去痰，槟榔除痰癖，破滞气，是为佐。山甲穴山而居，遇水而人，出阴入阳，穿其经络于营分，以破暑结之邪，为之使。

蜀漆散

蜀漆烧去腥　云母烧三夜　龙骨各等分

未发前服。若温疟，加蜀漆一倍，临发时服。

二陈汤

半夏　陈皮　茯苓　甘草　乌梅　生姜

柴苓汤　初发一二日服。

柴胡　白术　黄芩　茯苓　猪苓　泽泻　厚朴　甘草　人参　香薷暑疟加

苍术汤

苍术　柴胡　黄芩　半夏　青皮　草果　槟榔　川芎　生姜　葱白

疟发三四度后，用水酒各半煎，温服取汗。

截疟方

藿香　白芍　橘红　泽泻　滑石　木通各一钱　犀角　羚羊角各五分　白术七分　小丁香研、末四分　姜皮二分

空心服，服后饿半日，方许饮食，忌面食大荤。

痢　疾

古论小儿八痢，饥、饱、劳、役、暑、湿、风、惊。又谓触冒天地八风之邪，然未有不因脏气衰弱，湿热盛于大肠而作者治法唯助其所能，而导其所滞，别无他主。

凡痢皆热病，世以白痢为寒，非也。亦有用辛热药而愈者，盖病微得热，则郁结开通，气和而愈，甚者病转剧。故治痢者，必以寒胜热，以燥胜湿。少加辛热佐之。为发散开通之用，如此无不愈者。

痢家腹痛后重，小便短少，口渴喜冷饮，大肠口燥结，是为挟热下痢。旧法，用归、芍和其血，香、槟、枳壳调其气，红花、生地、地榆凉其血，芩、连、栀、柏清其火，重则更以大黄汤荡涤之。然亦有挟寒下痢者，腹痛甚，唯口不渴，喜热饮，小便清长，身不

热，腹喜热手熨，须理中、姜、桂温之。又有初起原系热痢，迁延日久，各症不减，或反加重，理当别治，须补中益气，倍用参、芪，一升一补。如小腹重坠，切痛奔豚，此兼属少阴虚寒，急加吴朱萸、破故纸、肉桂、肉果，甚则加附子。更有纯血者，加炒黑干姜，虚回而痢自止。若必待血清痢止而后补，晚矣。

晚村曰：久痢必补，其法精绝。然痢与伤寒大异，颇有不渴，喜热饮，便清身不热，腹喜热手熨，而仍属火症者，挟寒二字须活看。

似痢非痢者，饮食所伤，胃中上升清华之气，反从下降，是为飧泄，久则太阴传少阴，而为肠癖，里急后重，脓血交错，数至圊而不能即便，亦须补中益气，使升降之道行，其痢不治自愈。

有热者，益气汤，加姜炒黄连。有寒者，加姜、桂。寒兼少腹痛者，建中汤见伤寒。有风寒者，加羌活。肝气乘脾者，倍柴胡，加芍药、木香。滑泄者，加粟壳、诃子。如此不愈，更当从事命门。

如积滞已少，但虚坐努责，此下多亡血，须倍用当归，更加入生血药一二味。

后重有二：邪气坠下者，圊后不减。虚努不收者，圊后随减，可辨虚实。

噤口痢者，汤药入口，随出肛门，缠注急迫，多因热毒炽甚，逆冲胃口，胃气伏而不宣，急用吴朱萸、炒过黄连，合人参、糯米浓煎，细细呷之。但得润下，便不吐矣。如吐再服。间亦有寒气逆上者，用温补之药调之。

休息痢者，经年累月，愈而复发，此系寒积在大肠底，诸药所不到，独巴豆一味研炒，蜡丸，如龙眼大，空腹服之，再不复发。又有疳积休息痢，须鸡蜡丸治之。

世有疟后痢者，亦有痢后疟者，夫既为疟后发泄已尽，必无暑热之毒留为痢疾，此系元气下陷，不能升举，似痢非痢也。既为痢后，下多亡血，气随痢散，阴阳两虚，阳虚则恶寒，阴虚则恶热，故寒热交战，似疟非疟也。二者俱用益气汤，加温补药，其病不治自愈。

晚村曰：疟后之痢，亦有邪未尽而变发者，当于益气汤中，加清理之味。

世有疫毒痢，初得时，先发寒热，或头痛壮热，思入凉室，思吃冷水，狂言狂走，浑身肌肉疼痛，手不可著，忽下痢，或赤或白，或赤白相杂，此太岁中，其年春夏内，多寒湿之化，阳光少见，寒热之气交争，寒邪犯心，水火相敌，血变于中，所以赤痢尤多，如紫草、苋菜色。若白者，尚为轻，可治。法先存其寒，以后随症调理。

芍药汤　行血调气。

芍药一钱五分　大黄一钱　黄芩　黄连　当归各八分　甘草　槟榔　肉桂　木香各五分

痢不减，渐加大黄。

泽泻汤

陈皮　厚朴　黄芩　黄连　槟榔　白芍　甘草　茯苓　滑石　大黄　泽泻

程迈庄曰：治痢法，山查五钱，去核为粉，滚水调服。赤痢加蜜少许，白痢加黑砂糖拌之极效。又法：楮树叶炒干为末，每服三钱，酒一杯，空心调下。白痢加砂糖一钱，赤痢加蜜七分，砂糖三分。赤白相半，砂、蜜均，加噤口者，加儿茶末三分奇效。

王皇思曰：噤口痢用鹿角二三钱，煅存性为末，好酒送下极佳。又法：腊肉骨烧存性，碾极细，好酒送下。或粪蛆洗净，焙干为末，每用一二匙，米饮调服亦佳。

大黄汤

大黄一两，好酒煮，分二服，痢止勿服，未止再服，以利为度

感应丸　新旧冷积并可下，神妙不可言，虽有巴豆，不令人泻下，其积自然消化。

木香　丁香　肉蔻各一两五钱　巴豆七十粒，去皮心油　百草霜　炮姜各一两　杏仁去皮尖，一百四十粒

上先将木香、丁香、炮姜、肉蔻为末，入百草霜研，巴豆、杏仁另研，七味同和匀，用黄蜡六两，溶成汁，滤去渣，以酒煮数沸倾出，候冷，其蜡自浮于上，取起秤用，再以清油一两，铫内熬令香熟，次下蜡四两，同化成汁，就铫内乘热拌和药末，捻成锭子，丸如绿豆大，每日空心姜汤下五丸或十丸，量人大小加用。

香连丸

川黄连一斤，去毛芦　广木香四两

外用吴茱萸四两，当归、白芍、川芎、生地、厚朴、车前、木通、枳壳、槟榔、茯苓、白术、黄芩、香附、陈皮、苍术各二钱，水七碗，煎至四碗，滤去渣，将汁煮川连，至汁干为度，取起焙脆，同木香碾为细末，以老米粉和滴醋，打糊为丸，如梧桐子大，每服一二十丸。白痢姜汤下，赤痢细茶下。

鸡蜡丸

黄蜡指大一块，放杓内，火上熔化，入生鸡子一个，拌炒，与儿空腹服之，最有神效

吐　泻

小儿吐泻，有因伤食者，吐出酸臭，泻出糟粕，宜加味平胃散。有感寒停食者，胸腹刺痛，霍乱不宁，宜藿香和中汤。有伏暑者，小水不利，烦渴引饮，甚者转筋寒热，宜六和汤。若医作屡止，最是小儿危候，吐泻既多，胃气虚极，急须七味白术散，或参术散，加山药、扁豆温补之，不则中气顿绝，虚痰上涌，而须臾告变矣。

郑明永曰：胃既亏败，不能统摄诸气归元，而阳浮于外，更有身热面赤，作渴而似热症者，苟投凉药，宁冀生乎。

加味平胃散

苍术　厚朴　山楂　陈皮　青皮　麦芽　砂仁　香附　甘草　藿香　小川芎

藿香和中汤

藿香　香附　紫苏　苍术　厚朴　山楂　川芎　羌活　砂仁　麦芽　陈皮　白芷　甘草　生姜

六和汤

人参　白术　木瓜　扁豆　香薷　厚朴　砂仁　杏仁　藿香　半夏　生姜　大枣　赤茯苓　炙甘草

此方兼治中酒胎产诸疾，诚以呕吐泄泻，便赤口渴，未有不从胃中湿热来耳。

朱古愚曰：有呕吐吞酸者，胃火也，生熟石膏等分，滴醋为丸，吞服自愈，酒人胸膈时闷，或作呕逆，服之亦效。

七味白术散

人参　白术　茯苓　甘草　木香　干葛　藿香　煨生姜

慈幼新书　卷十

明　江夏　程云鹏凤雏辑
鄞县　曹赤电炳章校

食　积

小儿脾胃脆弱，饱则易伤，健脾丸、猪肚丸主之，枳术丸参之。有寒者，指迷汤见胎寒。有热者，去桂，加黄连。兼风寒者，藿香和中汤见吐泻。久乃成积，肌瘦面黄，启脾丸、丁香烂饭丸。伤生冷硬物，不能克化，心腹满痛，三棱消积丸、四神消积丸、惊积参宝丸见惊朱银丸见脐风。癖积，或乳或食，积久成块，在于腹胁，挨癖丸、消乳丸、对金丸。有腹胀者，指迷汤。有湿气内攻，腹胀水肿，小便不利，大便滑泄，须大橘皮汤。

健脾丸

白术土炒　扁豆炒　莲肉去心　茯苓　薏苡仁炒　麦芽　山药各四两　五谷虫　白芍酒炒　远志去心　山楂　神曲　陈皮　泽泻各二两　甘草一两六钱　砂仁六钱　桔梗一两二钱

有积，加鸡肫皮。

荷叶煎水打老米糊跌为丸，绿豆大，食远白汤服一钱或二钱。

小健脾丸

白术四两　山楂　白芍　莲肉　山药　苡仁各二两　麦芽粉　砂仁　枳实麦麸炒　陈皮各一两　黄连酒炒，七钱　大粉草炙　木香各三钱

制服同上。

大健脾丸

白术三斤，饭上蒸五次　广陈皮温水洗　茯苓各一斤　川黄连姜汁炒　枳实去穰净饭上蒸三次　谷芽炒去壳　神曲各半斤　青皮去穰土炒　人参各五两　吴茱萸泡去苦水　白蔻仁各二两　木香二两　当归身酒洗，六两

制服同上。

和中健脾丸

茅山苍术去须，米泔水浸一宿，洗去泥晒干，盐水炒　莲肉　川黄连　山楂肉酒浸蒸，各二两　人参另研　山药　茯神　当归身酒蒸　白芍酒浸一宿　白茯苓用甘草七钱浸汁一碗，陈皮一两四钱浸汁二碗，去渣入茯苓煮至汁干为度　广陈皮略去白　白术各一两五钱　陈仓米一合　荷叶九张，切碎

用水六碗，煎浓汁二碗，拣去荷叶，将米并汁磨成浆水，和药末入石臼内捣极透。丸如绿豆大，每日中午姜汤下二钱，或清米汤、白滚汤早晚下之亦可。

至宝健脾丸

半夏曲炒　枳实　山药各一两　白术二两　香附醋炒　山楂　藿香　黄连　厚朴姜汁炒　麦芽擂粉　神曲　萝卜子炒，各七钱　陈皮　茯苓　白扁豆　白芍各八钱　粉草　入参各五钱　滑石澄飞，一两五钱　砂仁　木香各三钱

炼蜜丸，龙眼大，不拘时服一二丸。极能进食消积，长肉生肌，其功甚大。

猪肚健脾丸

莲肉去心　红枣肉去皮核，各四两　白茯苓人乳拌晒，三两　扁豆去皮炒　山楂去核，各二两　陈皮一两　神曲五钱　雄猪肚一具，装入七药扎紧煮烂放白内捣如泥添入　金银花去叶净　白术陈土炒，各一两　苍术泔水洗晒，五钱　甘草三钱，各为末同捣透，将原汤拌匀，晒干另用　老锅焦十两，共磨细末，加白洋糖做成糕饼任服

枳术丸

白术六两　枳实四两

荷叶包煨，烂饭为丸，桐子大，每服四五十丸，空心白汤下。

香橘丸

木香　神曲　厚朴　青皮　陈皮各一两　麦芽　砂仁各二两　三棱一两二钱

蜜丸，龙眼大，每服一丸，姜汤或米汤下。

启脾丸

人参　陈皮　扁豆　神曲　苡仁　山药各二两　白术　茯苓各一两五钱　甘草去皮，六钱　桔梗炒，七钱　白芍八钱　麦芽　莲肉各二两

龙眼肉四两煮烂，和炼蜜捣丸，如龙眼大，空心米饮服。

方鹿村曰：此方治脾胃不和，体气虚弱，面无血色，大有奇功。

丁香烂饭丸

丁香　丁香皮　甘草　三棱　莪术各一钱　砂仁　益智仁　木香各二钱　香附五钱

汤浸饭饼丸同前法服。

三棱消积丸

丁香皮　益智仁各三钱　青皮　陈皮　茴香各五钱　神曲　莪术　三棱各七钱　巴豆和米炒去米二钱

制服同前。

四神消积丸

陈皮三两　厚朴　青皮醋炒　山查　莪术煨切　枳实蒸　槟榔　半夏曲　香附　麦芽　神曲各二两　三棱煨切　吴茱萸　砂仁各一两　白芥子炒　木香各五钱

萝卜煎汤跌丸，食远白汤下。

程克庵曰：核桃一斤，略敲损，用皮硝四两，同煮去硝，服桃。极能消积，小儿不肯药者，宜与之。又法：荸荠与海蜇同煮，去蜇食荠亦妙。

对金丸

茅山苍术一斤　半夏　茯苓各三两　枳壳二两　粉草六两　厚朴　陈皮各十二两　小红枣去核，一百二十枚　生姜切片，四两

共作一剂用水十五碗，慢火煮干，捣成饼、晒透为末，蜜丸桐子大，白汤服之。治一切肚腹饱胀食积，如神。

挨癖丸

代赭石火煅醋淬　木香　青皮　莪术　大黄　五灵脂各三钱　巴豆去油，一钱

醋面糊丸，麻子大，每服二三丸，食后姜汤下。

消乳丸

砂仁　陈皮　三棱　莪术　神曲　麦芽各五钱　香附一两

面糊跌丸，白汤服。

大橘皮汤

陈皮　木香　滑石　茯苓　猪苓　槟榔　白术　泽泻　甘草　肉桂

疳　积

小儿乳食不调，肥甘无节，积郁既久，则热生焉。热蒸既久，则虫生焉。有热有虫，而疳成矣。当其有积时，用药消导，则热退而虫不生，及其将成，仍用莪、棱、槟、朴消其积，川连、胡连清其热，史君、芜荑、川楝、芦荟杀其虫，循次早治，亦可获痊。迨至既成，胸陷腹满，骨露齿张，肌硬目闭，则元气脱去，虽卢扁奚为哉！

积疳之源，由脾胃虚弱，是所能者病也。然当消积清热时，不可骤用补剂，益助病能。若先天元气虚极，则六神散见发热与肥儿丸间服可耳。

母有孕，儿饮孕乳，多成积热，久亦成疳，疳热甚而成痫，清热导滞汤见麻疹去葛、翘，加莪棱。有癖块者，挨癖丸见食积、外以红花膏贴之。

疳有名无辜者，壮热羸瘦，头露骨高，舌下有虫，或脑后项边有物如弹丸，按之转动，软而不疼，其内有虫须速针出，不尔，便传食脏腑矣。此症因夜露儿衣时，为鸱枭羽所污而致。有丁奚者，手足细甚，顶小骨高，尻削体瘘，腹大脐突胸陷，号哭不已。有哺露

者，虚热往来，头骨分开，翻食吐虫，烦渴呕哕。治法，皆不外肥儿、芦荟、芜荑之属。

疳不可分冷热，惟有泻有不泻耳。不泻者，积热无所发泄，故胸腹发热特甚，泻者积热有所发泄，故胸腹不甚热，然亦由积热作泻也。非冷也。方书有冷疳之名，谬矣。

肥儿丸

三棱　莪术　青皮俱醋炒　神曲　史君子肉各一两　芦荟　槟榔　香附　陈皮　麦芽　芜荑各五钱　川黄连　胡黄连各八钱　南木香二钱

曲芽另末，打糊和丸，如粟米大。二岁以下三分，五岁以下五分，空心米饮下，临卧白汤下。有癖块加阿魏酒浸、研化干漆。炒，各七钱。

鸡肝饼

五谷虫瓦上焙干　全蝎各一两，去毒　人参　龙胆草各二钱　谷精草五钱

为末，每用二分，将陈酒糟一撮，雄鸡肝一具，共捣成饼，放饭上蒸熟，以酒食之，轻者五六服，重者十服全愈。此方新安杨氏得自罗修远家，屡获奇效。如未应，更以五疳丸参之必效。

大芦荟丸

治疳虫蚀脊膂，身热羸瘦，十指生疮。频咬指甲。

芦荟　芜荑　青黛　槟榔　川黄连各二钱　胡黄连　史君子肉各七钱半　南木香三钱半　蝉蜕二十四只　麝香少许

猪胆二枚，取汁浸糕，丸如麻子大，量儿大小，米饮服之。

红花膏

红蓼花一捆，煎汁去渣熬膏一碗　阿魏　血竭各三钱　没药五钱　赤芍　当归　麝香各一钱

各药为末，入膏内搅匀，以青布照广狭摊贴患处。

秘方五疳丸

干蟾一只，置新瓦上实以土炼存性　连翘微炒　青皮　莪术　三棱　枳实俱醋炒　川黄连　胡黄连　芦荟　丹皮　白芜荑仁　桔梗各一两　茯苓　神曲炒　泽泻炒　白术土炒，各一钱　木香一钱五分

共为细末，用雄猪胆二枚，取汁和水跌丸，如豌豆大，每服一钱二分，米饮下。

郑补翁曰：余幼女病疳，两目几废，偶得此方，服之神光复现。余友汪宗玉子亦患此，肌肉瘦削，饮食大减，诸药无功，余以此授之，服一料而病去如扫。

程白闲曰：蟾蜍治疳，神妙不可言。夏月取沟渠中不跳不鸣，腹大多癞者一只，置瓮中，以粪蛆与食一昼夜，将小袋盛放急流水内，浸去污秽，新瓦上焙干为末，入麝少许，揉饭为丸，麻子大，每服二三十丸。凡小儿无辜疳积，厂奚哺露，一服热退，二服渴除，三服泻痢止。吾乡有擅此利数世者，其方亦前人所备，偶为识出，因附以传。

汪宁士曰：疳症眼目不明，小便如米泔色者，用大雄鸡一只，杀取肝肺胆三件，入酒小半盅共捣，滤去渣，滚酒冲服，泻数次即愈。

大芜荑汤　治无辜疳。

黄柏　羌活　柴胡　防风　白术　茯苓　黄连　当归　麻黄根　山栀仁　炙甘草　大芜荑

腹　痛

小儿骤然腹痛，其症不同，有挟热者，其痛多缓，或一日数次，痛过一阵，则有时不痛，甚则面赤壮热烦躁，指迷汤见胎寒去桂、夏，加翘、芩、栀、连。有感寒挟食者，其痛多急，连绵少有停止，甚者或如刀刺，欲吐不吐，欲泻不泻，手足冷，面青或黑黯，亦宜前汤，或升消平胃散。有伤积者，时作时止，面黄目无晴光，或白睛，多贪睡，畏食，大便酸臭，亦宜升消平胃散，去羌、防、芎、苏，加吴茱萸、炒过黄连、木香、肉桂。有虫痛者，面㿠白，口中沫及清水出，闻煎炙

食物香气则甚，宜煎苦练皮、史君子肉，送下牛黄琥珀丸，杀其虫则痛自止。

升消平胃散

苍术 厚朴 小川芎 香附 紫苏各五分 砂仁 藿香 白芷 陈皮 羌活 防风各三分 甘草炙，二分 麦芽六分 山楂一钱 姜一片

牛黄琥珀丸

牵牛二两，麸炒香熟 槟榔一两 朱砂不拘多少，以红为度

为末，空心糖汤服。

方事荦曰：此方追虫积如神，功在疏利，不伤脏腑。

小 便

小便有肥脂似膏，浮于小便之上，曰膏淋。先颤栗而后小便，曰冷淋。小便黄赤，涩痛而滴沥，曰热淋。心热之极，传于小肠，渗入于胞，为血淋。肾水结热，便则茎中痛，滴沥如砂石，痛引小腹，甚则令人昏闷，遍身有汗而后醒，曰石淋。凡此有冷者，金匮肾气汤，或指迷汤见胎寒加车前、牛膝。有热者，木通散见胎热加黄柏、石苇、海金沙。

小便闭塞不通，有三症：因冷湿乘虚入里者，五苓散见目加木香温之，或绢裹炒盐熨脐四傍。因暴热所逼，涩而不通者，五苓加灯心、车前。热逼而大便多痰癖者，紫霜丸。因膀胱不利为癃者，脏气虚，邪热壅塞，宣化不行，肚腹胀满，非涩非痛，亦用前药，或指迷汤、木通散消息之。若发热口干，或兼白浊，清心莲子饮治之。

尿床及遗溺不禁，皆先天脏冷所致，鸡肠散主之，指迷汤消息调之。

乳哺伤脾，尿白如米泔状，久则成疳，指迷汤去桂，加麦冬、滑石、灯心。

诸疝者，阴气内积，血泣成瘕，睾丸肿大弔痛，牵连脐下，至不可忍，指迷汤加川楝肉治之。

阴肿核肿者，内感外伤之气，停结不散，指迷汤，加黑牵牛、桃仁泥，服时入盐少许，外以牡蛎、干地龙为末，鸡子清调傅之。如无他症，但觉茎物通明，牡蛎一味，傅之甚效。

《金匮》肾气汤

茯苓 山萸 山药 丹皮 泽泻 牛膝 熟地 肉桂 附子 车前子

清心莲子饮

人参 黄芪 远志 茯苓 甘草 黄芩 车前子 地骨皮 石菖蒲 柴胡 薄荷 麦冬 莲肉

鲍殿一曰：生天门冬捣汁半盏服，能治砂淋血淋，痛不可忍，郁金煎汤半盏，捣韭菜汁半盏，空心热服，以糕压之，治血淋，三服即愈。

紫霜丸 疏利脏腑实热，亦治惊积痰癖食痛，温壮诸热。

代赭石一两，烧醋淬，以裂为度 赤石脂七钱，同赭石捣末 巴豆三十粒，去油心 杏仁五十枚，去皮

同捣三千杵，如硬则少加炼蜜，更捣丸，如粟米子大，密器盛固，每服二丸，乳汁下。若不应，更服二丸。

鸡肠散

鸡肠草二两 牡蛎三钱 茯苓 麦冬 龙骨煅 桑螵蛸炙，各五钱

为末，姜枣煎汤服，每次一钱。

一方无麦冬，有肉桂，不用鸡肠草，即以雄鸡腹内肠炙脆代之。

洪涵子曰：车前草捣汁，入蜜同熬，露一宿，清晨服之，治小便不禁神效。

叶秋林曰：初生儿七日不小便，用葱白三四寸，加入乳捣如泥，傅儿口内，即与吮乳，须臾自通。

血

小儿饮食饥饱，脾胃内虚，不能克化，荣卫相冲，气逆而血妄行，或吐或衄，亟须调

其寒热，疏其壅滞，黄芩、柏叶参症治之。若久而不愈，更服麦门冬饮子为当。

大便下血者，疳湿所伤，风邪自入，血郁不行，渗于肠中，时下时止，久则肌发萎黄，而虚症见矣。指迷汤去桂、夏，加阿胶、地榆治之，或服乌梅丸。及有粪后红者，时止时发，六一散见麻疹一料，加红曲三两治之。

小便出血者，心与小肠气逆，致热聚膀胱，而血渗入也，木通散或火府散治之。

黄芩汤

黄芩为末、蜜丸芡实大、盐汤化服

柏枝饮

柏枝　藕节

俱晒干为末，以鲜藕汁调下。

麦门冬饮子

五味子十粒　麦冬　黄芪各一钱　当归身　人参　生地各五分

汪静山曰：柏叶、石榴花为末，吹鼻治吐衄甚效。衄不止，水调白芨末，涂鼻上，并囟门立瘥。

火府散

木通　生地　甘草　黄芩

程未能曰：麦门冬去心，煎汤频服尽四两，治小便出血极佳。

乌梅丸

槐花一两　柿饼五个，烧存性

乌梅肉二两，蒸熟为丸，空心白汤服。

汗

小儿盗汗，肌肉虚也。亦缘心气不足，津液不固，牡蛎散、团参汤主之。若泄泻自汗。遍身冷，脾胃大虚，参苓白术散见吐泻附子理中汤见伤寒俱可用。积症盗汗，亦脾冷所致，指迷汤。无故冷汗时出为惊汗，散惊汤见惊消息之。

牡蛎散

牡蛎　生地　黄芪　浮麦

团参汤

新罗人参　川当归各一钱　雄猪心一枚，洗净切片

新汲井水同煎，食前温服。

扑汗方

牡蛎粉　黄连　贝母各五钱　米粉一升和傅

汗痱方

蜜陀僧　白矾　甘松　三奈　白僵蚕炒　皂角刺

肥皂同捶细，润擦之。

疸

黄症多端，总不外湿热蕴结，如盒曲相似。治黄之法，总不外加减泻黄散为主。经云：脾苦湿，急食苦以燥之。故用黄连、茵陈之苦寒，以除湿热为君。肾欲坚，急食苦以坚之。故用黄柏之苦辛寒，强筋骨为臣。湿热成烦，以苦泻之，故黄芩、山栀之用，以止烦满为佐。湿淫子内，以淡泄之，故茯苓、泽泻之用，以利小便导湿为使。

慈幼新书　卷十一

明　江夏　程云鹏凤雏辑
鄞县　曹赤电炳章校

疮疽杂症

世间疖疥疮癣痈毒，唯小儿独多，岂其稚阳纯气，易与岁运火热之政相乘耶？抑不识不知，而寒温动定之乖其道耶？又有父母余毒所遗，为儿终身瘤疾者，可不有以治之耶？因述经验治法为一卷。

五福化毒丹　治胎毒及痘后，头面生疮，眼目肿痛。

生地　熟地　天冬　麦冬俱杵膏　元参各三两　甘草　朴硝煮，各二两　青黛一两五钱

蜜丸芡实大，白汤服一丸。服此而发搐痰喘者，中气受伤，而变虚热也，急服五味异攻散。若手足厥冷，加姜、桂服之。

方鹿村曰：薛氏云，痈疽阴症及杂症，阳气脱陷，与寒气逼阳于外者，发热口干，烦躁作泻，投以姜、桂、附子之类，津液顿生，烦热顿退，其应如响。按此则以异功、姜、桂，治病后虚搐，诚非异事也。

加味解毒散　治天泡诸疮，发热作痛。

连翘　元参　升麻　羌活　白芍　当归　金银花　大力子　生地黄　黄芩　甘草　漏芦

九味解毒散　治一切热毒胎毒，发为疮疡，未溃作痛。

黄连　连翘　漏芦　白芷　当归　防风　甘草　炒栀子　金银花

复元活血汤　治从高坠下，恶血流于胁肋，疼痛不止。

大黄一两　柴胡五钱　当归三钱　瓜蒌仁　甘草各二钱　穿山甲　红花各一钱　桃仁五十个

为末，每服三钱，酒煎热饮。

程葭陆曰：出血后，瘀血入肺，面黑喘促者，用人参五钱，苏木一两，煎服即瘥。

恶疮毒肿神方

花粉　赤芍　白芷　贝母　甘草节　乳香各一钱　归尾　陈皮各一钱五分　金银花三钱　皂角刺　防风各七分　没药五分　穿山甲照患处取用三大片，酒煮酥炙　酒三盅，煎盅半

患在背膂，皂角刺为君。在腹胁，白芷为君。在四肢，金银花为君。在胸次，加瓜蒌仁。如系疔疮，加紫河车草。疮热大四两势小二两。体虚者，加黄芪。

凡诸疮在上者饱服，在下者饥服。若善饮者，服药后再饮数杯，睡一觉，痛止疮愈。

大黄活命丹　治天时疫病。

锦纹大黄半斤　直僵蚕去头脚，炒，四两　白芷二两

为末，姜汁丸，弹子大，朱砂、雄黄各一两为衣，冷水化下，汗出即愈。

方二如曰疫病传染，惨毒可怜，但服此方，有如神护。读凤雏是书者，愿得广为流布，亦即天地之心也。

神效散　治杨梅疳疮，鱼口便毒，不拘新久，七剂全瘳。

金银花　归尾各一钱　紫草　木通　苦参　蝉蜕　白芷　皂角刺　川牛膝各一钱　红花三分　甘草　川乌各三分

上白潮润土茯苓六两，洗净打碎和药，用水六碗，煎至三碗，早、中、晚各服一碗。

疮在下部，先药后饭，疮在上部，先饭后药。凡服药日，必食建猪肉，熟米饭，饮好酒四五杯，使药力宣畅，其疮易愈。忌食猪首、肝、肠、牛、羊、驴肉、鸡、鹅、辛辣之物。

一方：并忌盐、酱、茶、醋、鱼、虾、鸭卵。土茯苓煨肉食妙，煎汤代茶亦妙。

三七化毒丹　服前药未愈者，更服此丸立效。

荆芥　防风　乳香　没药　僵蚕　全蝎　蜈蚣　穿山甲　三七叶酒洗，各五钱　朱砂　雄黄各三钱

为末，陈米粉打糊跌丸，绿豆大，朱砂为衣，每服三分，黄酒下。

程六谦曰：杨梅为父母遗毒，秘方甚夥，然未有如此二药之得心应手者。予业医数世，枕中玄奥，尽为凤雏流传矣，奈何。

洪宝丹　治唇舌伤损，或耳鼻伤亦效。

花粉三两　姜黄　白芷　赤石脂各一两

茶汤调傅。

没药散　治伤损止血定痛。

风化灰　定粉各一两　枯白矾三钱，另研　乳香　没药各五分，另研

为末调搽。

白蒺藜散　治刀伤人咬狗咬，及跌打损伤俱效。

松香透明者，化开倾地上候冷用　黄丹各一两　白蒺藜炒　白鲜皮炒，各五钱

为末，先将冷粥洗过患处敷上，以绷片扎之，如已作脓血，鲜肉汤洗之。

接骨散

鹏砂一钱五分　水粉　当归各一钱

为末，先将跌损碎骨整顿后，以苏木汤调此，作二次服之。

又方

巴豆去油净，一粒　半夏一个　淮安土鳖一个

共捣为小丸，生酒送下，重者全服，轻者半服。

又方

土鳖一个　雄黄　朱砂各一分　乳香　没药各六厘　麝香三厘

共研细末，小磁罐盛，勿泄气。凡遇跌打垂死者，但能入药即苏，自五厘起至一分五厘止，量人大小，酒调服之。不能服者灌之。善酒者，服药后照量与醉，厚被覆之，睡醒则肿消痛止矣。人小不可多服。凡用土鳖，不拘多少，将好烧酒浸死晒干。

又方

土鳖煅存性　半夏炒　归尾　乳香　没药俱去油　巴霜另研净　血竭　白硼砂

烧酒为丸，每重一分，用酒磨服，尽醉出汗为度。

叶西友曰：接骨藤去叶，并粗硬者捣烂，和生酒糟炒熟敷上，痛即止，断即续。如只面目跌扑青肿者，半夏磨汁，涂之立消。

胜金丹　治肌肤伤损青肿。

黄茄极大者一枚，切如指厚片，新瓦上焙干，为末，临卧酒调服二钱，一夜消尽无痕

程涵远曰：跌时瘀血在内烦闷者，以热酒调服蒲黄末二钱立安。

本事内消散

生地研如泥　木香为细末

以地黄随肿大小摊纸上，加木香末一层，复上地黄一层贴之，三五度即愈。

乳香定痛散　治伤损，及一切疮疡溃烂疼痛皆效。

乳香　没药各五钱　滑石一两　冰片一钱

共为末傅之。

班蝥夺命丹　治疯狗咬。

班蝥　红娘子各七个，去翅足头

糯米三合，先炒黄色，入二味同炒透，去米研为细末，加滑石二钱，以好酒空心送下，二三日服有血行，五六日服有鱼冻行，七日不治。如服过痛不止，再服之。

仍痛不止，服绿豆粉清之。忌食油盐。

又方

班蝥七个，去头足　杏仁四十九粒　大黄五钱

白芷二分　甘草三分

为末，先用葱白汤洗净疮口，再用蜜和药傅之。

玉珍散　治同前。

南星　防风等分为末调傅

郑克裕曰：犬伤后，忽遇风寒头痛，角弓反张者，温酒调下。若牙关紧急，童便调下。二药似觉无奇，然垂死皆能取效。

六谦曰：有蛇蝎蜈蚣咬者，贝母末酒调服。或蒜片灸痛处极佳。有蜘蛛咬者，羊乳饮之。有蝼蛄咬者，石灰调醋涂之。有晰蜴咬者，青麻心捣汁涂之。

有蚯蚓呵者，阴囊肿胀，甚者须眉脱落，如大麻疯，入夜则遍身闻蚯蚓之声，只浓煎盐汤浸洗即愈。有蚁螫者，雄黄一钱，麝香五分，麻油调傅。有蜂螫者，生芋梗调涂。

王叔夏曰：疯犬毒蛇咬者，人粪涂之妙，狗咬时，急令人寻顶中黄发一根拔去，将热牛粪涂患处亦佳。若一时难得，即将牛牵至高坡，令上下三四十次，必然遗矣。

汪耀东曰：蜈蚣咬者，桑树汁涂，或独蒜擦之，或草纸烟熏之俱妙。又有人相斗时，口咬指头欲断，用栎漆树叶，生捣去筋，加津唾润透搽上，软绢包护自瘥。

程师恪曰：白矾成块者，端午晒一日为末，水调涂，各种虫咬极效。

绛袍散　治刀伤。

五倍子　真降香各二钱，为末，敷上即完

冰黄散　治小儿赤瘤，刺去瘤头赤晕，恶血毒汁。

上硝五钱　大黄一钱

为末，新汲井水调涂。

豆豉饼　治疮疡肿痛，或硬而不溃，或溃而不敛，及一切顽疮毒疖。

江西豆豉为末，津唾调成饼，厚如三四钱，置患处，以艾铺饼上，灸之，未成者即消，已成者能逐去余毒

神效当归膏

生地　当归　黄蜡各一两　麻油六两

将归、地入油内，煎好去渣，下蜡溶化，候温搅匀。

铁箍散

芙蓉叶　大黄　黄柏　白芷　五倍子

一切肿毒恶疮，以此调搽四围，则毒易攻溃。

猪蹄汤　去瘀肉，润疮口。

白芷　黄芩　当归　赤芍　羌活　甘草　露蜂房各五钱

猪蹄一只，煮熟去油渣，入前药煎数沸，去渣温洗，随用膏药贴之，或敷他药。

敷肿毒方

干蟾一枚，新瓦炙　陈人中白　陈米分各五钱　五倍子四钱　乳香　没药各三钱

俱用新瓦炙透为末，蜜调傅之。

内消散　治诸般肿毒发背，对口恶疮俱效。

飞罗面炒存性　牙皂煅　没药　朱砂　雄黄　百草霜　巴豆去油　儿茶各一钱　巴豆壳煅，七分

为末，置舌上，冷水服之，泻二三次，五岁后用三分，幼者止一分。

犀角丸　治痈肿，肠痈、乳痈、发背，一切恶疮肿毒，服之消化为水。

犀角屑一钱二分　黄芩　防风　人参　栀子炒　当归　黄芪　黄连　干蓝　蓼实　甘草各四分　升麻　大黄各五分　巴霜二十四瓣

捣筛蜜和，更捣三千杵；丸如梧子大，空心米饮下三丸至五丸，以利为度，不利投以热饮，如利以冷浆水冷粥止之，未瘥再服，以意量之。大约下至黄水或肿轻皮皱，即是消候。

软疖方

萆麻子　松香各二两，同捣膏贴患处

汪湘芷曰：铜绿研细，入柏油熬化，布片作膏贴之亦妙。

吴一如曰：小儿夏秋间，每多热疖，以土辣茱萸为末，香油调傅，极佳。

蟾酥丸

蟾酥酒化　雄黄各二钱　朱砂三钱　蜗牛

二十一个　枯矾　铜绿　乳香　没药　寒水石煅透　胆矾　麝香各一钱　轻粉五分

各为末，先将蜗牛研，烂人蟾酥同研稠粘，方入各药，同研极匀，丸如绿豆大，每服三丸。用葱白五寸，口内嚼烂，吐于手心，男左女右，捺裹裹药在内，以无灰酒一盅送下，厚被覆之，如人行五六里许，汗出则病退。甚者更进一服，自无不瘥。

程潜庵曰：此方治疔疮、发背、脑疽、乳痈、附骨、臀腿等一切恶症，麻木不痛，或呕吐昏愦者、服此则不痛者转痛，痛甚者即止，昏愦者即醒，呕吐者自解，未成者即消，已成者即溃。有回生起死之功，为外科秘宝。

合时须五月五日中午，在净室中，不令妇人鸡犬闻见更佳。

郑依翘曰：敷痈疽恶疮法，于清明日取蝌蚪，用大毛竹筒，两头留节，节上开一小孔，装蝌蚪入内，更下朱砂一两五钱，雄黄五钱，麝香五分，外以桐油灰封极蜜，浸厕中三七日开取汁，并砂、黄、麝研细，入磁罐收贮，用时将新笔涂之。

生肌散

乳香　没药　龙骨　黄丹　全蝎　海螵蛸各三钱　赤石脂四钱　轻粉一钱五分

玉蟾生肌散　疮毒已去，肉败未能生新，糁前药疮口如故，用此方速效如神。

癞蟾一枚，用轻粉三钱装入腹内，线缝其口，扎缚成团，以枣肉揭烂包蟾在内，裹以熟黄泥包固炭火烧一昼夜，去泥，枣为细末，每一钱加乳香、没药、黄丹、海螵蛸、雄鸡肫皮各三分，研极细，将疮口洗净敷之

潘汝咸曰：冬瓜叶烘干，研细末，搽多年疮口不干立效。又法：五倍子一枚，挖一小孔，入儿茶塞满，对纸数层，加湿面包固，火内煅透，去纸面，加冰片少许，研细搽之亦效。

漏芦汤　治一切恶疮毒肿，丹瘤瘰疬，丁肿鱼睛，五发瘰疽，初觉一二日，便如伤寒，头痛烦渴，拘急恶寒，肢体疼痛，四肢沉重，恍惚闷乱，坐卧不宁，皮肤壮热，大便闭涩，小便赤黄，并宜服之，惟妇人怀孕不可。

漏芦　白蔹　黄芩　升麻　赤芍　朴硝　甘草炙　麻黄去节　枳实麸炒，各一两　大黄二两

为末，水煎空心热服，小儿每次一钱，大人三钱。

偷刀散　治便毒未成者内消，已成者脓从大便下。

大黄　白芷各二钱　穿山甲一钱

为末，作二次空心酒送下。

太乙膏

生地　元参　白芷　当归　赤芍　肉桂　大黄各一两　黄丹飞净，十二两，不入油煎

麻油二斤，将七药同浸，春夏一日，秋冬二日，文武火熬，槐柳条搅至油粘手，渣枯黑，住火候冷，以棕皮滤去渣，复熬至油滴水成珠取起，再下黄丹，不住手搅成膏，入丸器收贮。用时先将疮肿温水洗净，软绵拭干，绢片摊贴。又可捏成丸子，治各病照引服之。

气血不通，温酒下。

风赤火眼，栀子汤下，外贴太阳穴。

咳嗽喉闭喉风，用新绵包放口中，噙化服之。

跌打损伤，陈皮汤服，外贴患处。

腰膝痛，淡盐汤下，外贴患处。

吐血，用蛤粉为衣，桑皮汤下。

瘰疬肢疮，温酒下，外以盐汤洗过贴。

脓疥诸疮，用麻油煎滚，取少许熔化，和膏涂之。

虎犬蛇蝎汤火刀伤酒下，外贴。

杨梅疮毒溃烂者，贴之极效。

大人发背，及远年流注，冷水下。

女人赤白带，当归酒下，经水不通，甘草汤下。

神效千捶膏　小儿一切无名肿毒，贴上止痛内消，加麝香少许贴脐上，立止泄泻。

松香一斤，熔化滤净下水钢中，多使人抽拔，至白色莹亮，待干研末　木鳖子去壳　杏仁泡去皮尖　草麻子去壳　大枫子去壳，各半斤　铜绿另研

蛇床子　穿山甲锉碎炒　樟脑另研　胆南星　白芷　面粉　半夏各二两　川乌　甘草节　草乌各一两　五倍子　闹杨花　红芽大戟　金线重楼　乳香　没药二味另研　孩儿茶　血竭　轻粉　雄黄各五钱　龙骨　青竹蛇　山慈姑　甘遂各四钱

白花蛇小半条　僵蚕　麝香另研，各一钱二分　蜈蚣六条　癞虾蟆半个　全蝎　阿魏　莪术　三棱各一钱五分

葱汁、姜汁、柏油、桐油等分制净，将各药研细筛过，入油汁拌匀，放臼内杵三千下，令稠润成膏，如干渐加油汁，摊布贴之，不可见火。如日久放干，以温水煅开摊上，略烘柔软贴之。

瘰疬丸方

夏枯草半斤　元参　青盐煅，各五两　生地酒洗　海藻　海粉　花粉　贝母　白蒺　川大黄酒蒸　薄荷　连翘　桔梗　当归酒洗　枳壳麸炒　焰硝　甘草各一两

酒糊跌丸，绿豆大，食后、临卧白汤服百余丸，服后低枕卧一时。未溃者内消，已溃者易愈，外贴太乙膏收口。

又煎方

当归　黄芪　连翘各八分　贝母　金银花　苡仁　花粉各一钱　陈皮　白芷　海藻各七分　桔梗六分　甘草节三分

气实者，加青皮四分。气虚者，加入参五分。女子，加制香附七分。

汪有章曰：服此方三日后，服羊角散一剂极佳。其法用羊角数对，威灵仙四两，放罐内煮一日，待角软，取出切片，新瓦上炒至油烟起为度，研细，加木香一钱，白芥子二钱，蜜丸如碎芥子大，每服一钱，槟榔汤下，或夏枯草汤亦可。服后七日，大便下黑羊矢，小便下黑水，则病去，未下再服之。切忌生冷煎炙食物。

许彦修曰：苘麻子四十九粒，去净壳油，用绵纸裹，作捻子七条，以鸡子七枚，打开小孔插入，将纸封固，放饭上蒸熟，去捻，每日空心食一枚，食尽则疮绽脓出而愈，不必外贴膏药。

潜庵曰：初起痰核，用南星捣烂，滴醋调敷即愈。若将成瘰疬，用江西淡豆豉每岁一粒，酒浸涨，加麝少许为丸，临卧酒送下，亦瘥。若成脓日久，用夏枯草六两，煎浓汤服，或煎膏服，或更以膏涂患处。内服十全大补汤，或服前煎方，加远志尤善。夏枯草为瘰疬圣药，有便贫民，不可不广为流布。

金疮膏药

生猪油四两　芸香　樟脑各二两　白芨炒一两　儿茶　轻粉　乳香　没药各一钱

各另为细末，将油熬化，放入白芨、芸香，次入樟脑，取起候冷，再入乳、没、儿茶，冷极方下轻粉成膏。凡遇创时，血流未止，即便敷上扎定，微疼片时即愈。

潜庵曰：此方治跌扑刀剪所伤神效，脓疮、湿疮破者，亦无不妙应，惟不能久留，须用现合。

王介庭曰：金疮血出不止，用原蚕蛾炒熟为末敷之，或半夏亦可。

张方臣曰：降香节四两，五倍子四两，真山漆五钱，为末敷之，或松香、头发灰、栎漆花，等分傅之亦效。

程位三曰：鲜蟹壳放屋上，露一宿，焙干为末，酒服一二钱，醉饮熟睡即瘥。端午日取韭菜与风化石灰捣成饼，贴壁上阴干为末，传之亦效。

夏桓又曰：风化石灰、血见愁、马齿苋、旱莲草、韭菜了，端午日捣成饼，阴干为末，能接断指。

杨淇益曰：芙蓉叶阴干，去筋揉细，敷患处，断指即续，刀口即封。

天蛇头方

雄黄五分　面粉一分　麝香三厘

酒调敷。

程未能曰：鲜田鸡皮剥下，包裹一昼夜即差。如冬月从桑树下觅之可得。

吴楚源曰：有横弦者，取二三寸鲜鲫一

尾，不用洗切，同鲜山药一段，捣如泥敷。

方耘夫曰：有鳝痰头者，茅根炙脆为末，香油调敷妙。又法：黄泥二分，盐一分，捶成饼，煅为末，香油调敷亦妙。

汪怀牧曰：有蛇咬指头者，发击患处，清茶洗之，以白芷四钱，鸭绿胆矾一钱，为末糁上自愈。

血风疮方

大枫子肉二钱　蛇床子二钱五分　硫黄一钱五分　雄黄　轻粉各二分　寒水石　樟脑各四分

腊猪油调搽，治癣亦妙。

肺风疮方

白芷　防风　荆芥　轻粉　白附子各一两　雄黄　白芨　细辛　甘松　山柰　樟脑　白蒺藜各五钱　儿茶三钱　牙皂六钱

同官肥皂捶极细，每辰擦洗。有雀斑加鹰粪一两，淘去沙。鼻准红，加大枫子肉，另研金星凤尾草各五钱。

疔疮方

硼砂　硇砂　皂矾绿色明亮者　食盐等分

捣成粗末，铁杓内炒化为水搅干，炒至柳绿色为度，研细入瓶封固。用时将银簪挑见生血，蘸药点入，以面糊摊小膏护贴之。

吴兰持曰：毒盛者，挑至骨亦无生血，二三日即死，治之无功。然挑后以父母兄弟子侄至亲人刺血少许，滴入点上件药，亦有得生者。

汪虞升曰：菊花或叶捣汁，冲酒服，即以渣加盐少许，敷牛毒、疔疮、水疔疮，最效。

疳疮方

乳香　没药　儿茶　血竭　龙骨煅　象牙　海螵蛸各五分　冰片一分　麝香五厘

为末，米泔水洗过擦之，外服龙胆泻肝汤一二剂。

又方

寒水石煅，三钱　轻粉一钱　朱砂六分　片脑分半

煎地骨皮汤熏洗阴干，以此药为末糁上。

又方

面粉　轻粉各三钱

研末，和银朱五厘，复研如面，临用每一钱加冰片二分，复研，以猪油调傅之，日二次。

方稚子曰：黄蜡、轻粉各一钱五分，香油五钱，熬膏傅之亦妙。二法须先以泔水煅温洗净。

龙胆泻肝汤

人参　麦冬　黄芩　黄连　炒栀　甘草　柴胡　知母　天冬　五味子

汤泡疮方

大黄　白蔹　刘寄奴

等分为末，先用香油擦患处，然后敷之，七日全愈。

郑芳贻曰：石膏为细末，生桐油调膏敷上，热平痛止，不损肌肤，甚妙。又大黄为末，鸡子清调傅亦佳。

马子房曰：猫天灵盖烧灰存性，研细，香油调搽，痛止疮灭，未出毛小鼠香油内浸透，将油擦之，或鲜蚌蚬带肉烧灰为末，香油傅之亦好。

臁疮方

水粉　水银各二钱五分　大枫子肉去油，五分　卢甘石七分半　轻粉六分　冰片二分　苘麻子去壳稍蒸，三分半

为末，研死水银，烛油调膏，油纸摊贴，先以甘草或茶煎洗。

又方

蚯蚓粪煅　白锡灰炼　枯矾

为末，生桐油调油纸贴。

克裕曰：此方治血风疮亦效。

又方

无名异一两　轻粉四钱

为末，桐油调好，将油纸缝袋装之。用时先以川椒槐条煎水洗净贴上，三日一换。

又方

定粉一钱　珍珠　轻粉各五分　冰片一分

黄蜡熔为隔纸膏。

又方

杏仁炒黑　松香同研如泥傅之

涵远曰：治黄水疮亦效

程振庵曰：桐油煎豆腐贴，能止痛，生芝麻捣烂贴，能长肉收口。

疥疮一扫光方

水银一钱五分　乳香　没药　硫黄　樟脑　花椒各五分　蛇床子炒，二钱五分　大枫子净肉，五钱　烛油调傅。

又方

硫黄　雄黄　花椒　大枫子肉各一钱　蛇床子　苦参　芜荑　枯矾各二钱　樟脑　轻粉各四分

醋调，布包擦患处。

汪远期曰：此方治头疮、漆疮、火丹，及妇人阴蚀疮、无名肿毒，皆效。

又方

枯矾五钱　硫黄　槟榔各二钱　水银一钱

葱椒煎水洗，桐油调敷。

又方

大枫子肉　全蝎　白芷　枯白矾　水银　樟脑　轻粉

又方

木鳖子　蛇床子　大枫子　轻粉　雄黄　水银　花椒

油核桃同研，柏油调敷。

葭陆曰：浑身疮疥，经年不瘥，以槐树头煎浓汤洗浴，松香一味，研细傅之极佳。

脓窠疮方

防风五钱　苦参　大枫子肉各三钱五分

真香油二酒杯，鸡子黄二枚和匀，将药入油内，微火熬枯，如败絮样，用绢滤去渣，再以樟脑一钱五分，槟榔、雄黄各五分，川椒三分，同为末，入油和匀，另用防风、荆芥、苦参、苍术、葱椒，煎水洗傅。

吴镜秋曰：豆腐一块，中挖小穴，纳入硫黄，水煮以腐色黄透为度，外用雄槟榔一枚，同为末，点之立愈。

汪蛎林曰：红枣去核，葱白去须叶，捣烂煎汤，乘热熏之，少冷即洗，洗久即不痛，痛止则掏去皮，洗去脓，一日即结盖而愈。未愈以硫黄、槟榔末点之。

肥疮黄水疮方

苦参一两　黄柏　黄丹各五钱　枯矾四钱　花椒三钱

为末，疮湿则干敷，疮干则麻油调敷。

坐板疮方

萝卜子种三钱　轻粉一钱　冰片半分　杏仁四十九粒

为末，擦疮口上，一日即愈。

癣疮方

硫黄　明矾　川花椒

等分碾细，用牛舌草根捣烂和匀，麻布包成团子，先以穿山甲刮破疮皮，徐以药团磨擦，日三五次。

又方

生半夏　胆矾

等分碾细，生姜蘸而擦之，轻者即愈，重者必用前方。

吴彤有曰：浑身风癣者，皂角煎汤，日洗三四次，半月全愈。

耳冻疮方

白蔹一两　黄柏炒黑、五钱

冻疮方

黄犬粪露天久者变成白色、煅用　陈石灰

等分为末，麻油调敷。

陈远公曰：冻未成疮，荆芥汤洗之妙。已成疮，鲜山药捣汁涂之，或鲜橘皮烘热熨之亦妙。

头上肥疮方

黄丹　黄柏　松香各五钱

猪油四两，同捣烂，纸裹成条，点烧滴取热油，擦疮上即愈。如痒甚以飞矾少许掺之。

张特英曰：此方治脓窠亦妙。

又方

猪骨髓一两　轻粉二钱

又方

雄黄末　水银　雄猪油各二钱

先将油一半，入雄黄研为膏，入水银又研，次将油一半，在磁瓢内煎滚，倾入同研，令水银死，以汤洗去疮壳，于赤肉上薄薄搽之，次日如汤泡样，又次日即结痂而愈。痂落皮赤，生姜擦之，则发易生。

特英曰：头癣终年不愈，敷此极佳。

振庵曰：有癞痢者，刮碎洗净，用木枣口中嚼碎敷上，青布包之，二日后揭换，三次即愈。

室女阴户外疮方

黄柏　儿茶　白薇炒　铅粉炒　蚯蚓炒　乳香　樟脑各三钱　轻粉　冰片各五分　麝香三分

为末，醋调敷。

又煎方

当归　白芍　茯苓　炒栀　柴胡　楝树根

有痒痛者，服此一二剂。

有痰，加白芥子。

有火，加黄芩。

有寒，加肉桂。

阴户内虫方

当归　白芍　炒栀　甘草　泽泻　茯苓　白术　陈皮

水煎温服。外用鸡肝一副，多刺小眼，塞户中，使虫爬入，三次全瘳。

足指内疮方

黄丹一两　枯矾四钱　细辛三钱　白芷二钱　藁本五钱

为末糁上。

湿疮方

轻粉　韶粉各二钱　百草霜　乳香　没药各五分

桐油调作隔纸膏贴。

足缝烂湿方

陈石灰　赤石脂　面粉　轻粉各二钱　冰片一分

为末糁上。

通利湿气丸方

沉香　木香　丁香各另研，二钱　巴霜　陈皮洗　青皮醋炒　莪术炒　乌梅肉焙干　黄连　槟榔各五钱

将巴霜醋浸一时煮干，皮纸重碾去油，和各药研细，米糊丸，黍米大，每用温白汤下三五丸。

湿气神应膏

半夏　川椒　枳壳　头垢　男子发各一两　穿山甲二两　槐条一段　麻油八斤，共七药煎汁去渣下　黄丹四斤，成膏再入　甘松末　黄柏末　天麻子泥各一两　苏合香油二两，冷定入　乳香　没药　血竭　儿茶各二两　麝香八钱

未能曰：淮阴卑湿，民多粗腿，偶得一法，治之甚效。用空心柳树中屑，取出筛细，入锅内炒热，以臭泔水洒湿又炒，加面少许拌匀，趁热取起敷腿上，候水出再炒敷，数次自愈。

大麻疯方

大枫子一斤，去壳，苍术、陈茶各二两，同入新砂锅内，煮去油，换水又煮，屡煮屡换，至苍术手捻如面糊为度。除去苍术茶叶，将枫子肉上衣剥尽晒干　防风　荆芥　川杜仲盐水炒去丝，三钱　小胡麻即益母草子，去灰土，炒至口开，各十二两　苦参　白蒺藜炒过，捣去刺净，各十两　炒栀　连翘去心炒，各二两　川黄连　川牛膝各五钱　真川芎一两五钱

为末，老米糊丸，绿豆大，初服早、中、晚三次，陈茶送下二钱，一月后早、晚服二次。

其消候从上至下为顺，未愈，再服一二料。

血脉不通，加当归、生地、枳壳各二两。

遍身烂疮，加苍术、桑皮各二两。

遍身黄癣，加黄柏、川羌活各二两。

遍身肉痛，加乳香、没药各六钱。

遍身红块，加苏木、红花各一两。

遍身白块，加白术一两，当归身二两。

口眼歪斜，加犀角二两，朱砂六钱，炒

栀子四两。

眼中泪甚，加栀子三两，川连五两，京子二两五钱。

眼中胀痛，加羚羊角、木贼草各一两，甘菊花三两。

鼻中出血，加连翘五两，黄柏二两，川黄连五钱。

皮肤破裂，加黄柏五两，牛膝四两，外做隔纸膏贴之。

脚肿过甚，加川木瓜、防风各三两，牛膝五两，归尾二两。

手足挛蜷，加藏灵仙五两，续断二两，破故纸一两。

面部黑滞，加归尾、白附子童便浸炒各二两。

面部红紫，加白芷三两，桃仁二两。

面无血色，加白术三两，当归身、干地黄各二两。

又煎方 治四肢筋骨疼痛。

当归 地黄 茯苓 黄芩 川芎 柴胡 独活 苡仁 白芍 桔梗 生姜 葱白

手挛足蜷，加风梢蛇三分，琥珀一分，麝香、冰片各半分，为末冲服。

声哑，加黄连、黄柏、黄芪、灯心、菊花根、龙胆草。

面上起灰白癜疮，用轻粉、冰片、芝麻炒焦敷之。如不退，加血竭、儿茶。

牙露唇弔，眼歪面笑，加犀角、羚羊角各五钱，蔓荆子二两，于丸方内煎剂中亦减少用之。

叶锡侯曰：以上诸疮外，有曰漏者，炼熟松脂末，并发灰、黄丹填傅之。有曰瘭者，卒得赤烂疼痛，牛粪烧灰，研傅之。有曰鱼脐者，疮头黑深，破之黄水出，四畔浮浆，蛇蜕烧灰，存性细研，鸡子清调傅之。有曰螳螂者，燕窠土研细，猪脂调傅之。有曰白秃者，鲜鲫一尾，重三四两者，去肠肚，以乱发填满，湿纸裹烧存性，入雄黄少许，麻油调傅之。有曰炼银者，眉丛中生，以穿山甲前膊鳞，炙焦为末，少入轻粉，麻油调傅之。有曰天泡者，蚯蚓粪为末，香油调傅，或蛇含草捣傅亦佳。有曰漆者，生蟹黄搽患处，或杉木劈片，煎水洗之。

程退夫曰：诸疮有疮口翻花者，藜芦为末，猪脂调傅突处。又有疮内生蛆者，皂矾煅为末糁之。

鹤膝风

陈石灰 芙蓉叶 生姜 菖蒲

为末杵成块，分作药膏贴患处，三次即愈。

又方

苎麻根二两，捣烂 建猪脑子二个 乳香 没药各二钱 和匀敷之。

江儒思曰：有膝痛砑子骨痛者，肿者，以真蕲艾半斤，煎水熏洗数次自瘥。

绣球风

蕲艾 川椒 吴萸 明矾 食盐

煎汤熏洗。

又方

五倍子微火煅脆研 儿茶研

等分为末，有水者干糁，无水燥痒者，醋调涂之。

鲍殿一曰：有鹅掌风者，鹅卵石一块，烧红放烘炉灰火中，以皂角为粗末，烧烟熏之，或桐油擦患处，柏枝叶烧烟熏之。或蜜陀僧为末，生桐子肉捣如泥，和成膏敷之，灯火上熏极痒，布包过夜去之。

又曰：有破伤风者，班鸠血下酒，立愈。出血不止，当归末傅之。又丹溪法，治破伤风血凝心，及针入肉游走者，寒水石为末涂之，其痛立止。针入肉不出者，白梅水研烂，调象牙末出之，或腊蝥蚱捶烂涂出之。鱼刺入肉，吴茱萸嚼烂涂出之。

竹刺入肉，牛膝或生栗嚼烂涂出之。

又曰：有诸骨鲠喉间，犬涎可下，或凤仙子捣碎为末，水调服之。若谷芒鲠者，鹅涎下之。

又曰：小儿失脚落水，或误服金屑末，而

忽然死去者，活鸡血灌之可苏。

木通散　荆芥穗汤以上见卷一

吹喉散　玉锁匙　细辛散　乌鱼散　青液散　口糜散　龙骨散　安脐散　星附膏以上见卷二

荆防败毒散　白芷升麻汤　大连翘饮　立马回疔丹　加减鼠粘子汤　玉红膏　生肌散　金华散　拔毒膏　吹口丹　三仙散　磨矾散以上见卷六　**防风通圣散　加减通圣散　内托散　消毒汤　儿茶散　独枣丹　神黄散　碧雪　外消散　破伤风膏　三解散**以上见卷七

慈幼新书　卷十二

明　江瓘　程云鹏凤雏辑
鄞县　曹赤电炳章校

痘家应用药性杂症附

发明于各卷方论者，一语不载；君主于各症专方者，一味不收。读全书自易通晓。

升麻味苦甘，气平微寒，味薄气厚，浮而升阳也

阳明经药。阳明主肌肉，欲痘之出，必使肌肉疏通，送毒出尽，方免于患。故一发宜用，每用五分，至一二钱，直至热退毒尽方止，不可拘泥俗说。惟汗多者减之，恐表虚也。七日后，泻不止者，亦炒黑用之。

解百毒，杀精鬼，辟疫瘴，止喉疼，兼治头痛、齿痛、鼻衄、口疮。

葛根味甘气平，性轻而浮阳也

阳明经药。能解肌热，止烦渴，开提胃气，与升麻同功。惟忌虚症初出，有汗不可再用，二朝无汗，亦可少用。

止呕吐、头痛，散血痢、郁火。

前胡味苦气微寒

解内外蓄热，去痰涎。凡七日内有热者，加用不可缺。

主心腹结气，治时气发热，风寒、咳嗽喘满。

柴胡味苦气平微寒，气味俱轻阳也

引清气，行阳道。

主伤寒疟疾，寒热往来，呕吐胁痛，口苦耳聋，目赤头痛，痰实结胸，五疳羸热。

紫苏味辛甘气温

解肌发表，人虚少毒者宜之。古方以参苏饮，治虚痘发热是也，痘出即止。

治心腹胀满，开胃下食。

麻黄味苦甘气温，气味俱薄阳也

发散风寒，泄卫实，去荣中寒，善走皮毛，通孔窍。凡毒盛喘满，身热燎人，欲出不出者，宜暂用一二钱。有坏症，七八日无浆，可用四五钱，加附子一二片，黄柏四五分，酒煎与服，令出臭汗。变烂痘得生，欲行此法，必其人能食神清，天庭上有生意方可，否则不宜。取陈久者去根节，酒蜜各半浸透，晒干微炒。

羌活味苦气温，气味俱薄阳也

独活味苦辛甘气温，气味俱轻阳也

主周身骨节，散寒邪，驱热毒，腰痛头痛，壮热憎寒，宜用不可缺，见点后去之。

羌活气雄，其用广，独活气细，故专为足少阴引经。

防风味甘辛气温，阳也

泻肺实，散头目滞气，除上焦风邪，解痘后余症，每用三四分，多则损人元气，出不匀者加之。灌脓时，亦可佐黄芪同用，手足疮不起，与白芍、桂枝同用，疮太湿亦用之，为风能胜湿也。

荆芥味辛苦气温

辟邪气，利咽喉，清上焦火邪，止血热作痒，痘出不透快者用之，灌脓时不宜，每三五分，多亦伤气。

散初发肿毒，破疮疡结聚。

白芷味辛气温，气味俱轻阳也

治身热头痛，善行浆，予治痘常用行浆药，又能止痒，浆足去之，痘后痈毒亦宜。

排脓止痛，内托生肌，诸疮圣药，又目痒目泪，面瘢鼻塞，眉痛齿痛，一切皆良。

桔梗味苦辛气微温味厚气轻阳中之阴

开提气道，善理咽喉，始终宜用，惟呕吐气逆者缺之。

清肺热，治痈痿，通肠结，祛鼻塞。

甘草味甘气平，生寒熟温，阳也

生能解毒，炙可补气，自始至终皆宜，惟腹胀者减去，为甘能缓中也。

稍止茎中作痛，节医肿毒诸疮。

连翘味苦气平微寒，气味俱薄阳也

解毒圣药，前后皆宜，惟气虚无毒者不可用，每七分或一二钱。

除心经客热，降脾胃湿热，主诸痈毒恶疮。

大力子味辛苦气平

善解毒，理咽喉，故毒盛烦密，与痘后余毒，皆宜用。

主喉闭风痰，头面浮肿。

蝉蜕味酸甘气寒

能发痘毒，但不宜多，多则虚抬空壳，不能灌浆，慎之。用在见点二三日上，一二分止。

留翘足，治痘出不快，或倒陷，去翘足研碎，治目中翳，并小儿惊痫、夜啼。

僵蚕味辛咸气寒

治痘作痒，亦解毒，许暂用。

主惊风痰壅，昏闷失音，四肢抽制，消瘰疬，拔疔毒，灭疤痕。

穿山甲味苦气微寒

善追毒排脓，引诸药入脏腑，透肌骨。凡痘顶陷不起，用数分于补剂中，余毒亦可。

紫草味苦气寒

凉血活血，去血分之毒。凡痘色干红，或焦紫发癍，皆宜用，但色转即止，不可过。

用此必加糯米，亦能发痘。

沈旬仲曰：用此者凉心开窍，使痘发越而易起也，不可过者，恐大便利而真气泄也。

红花、茜草，功与此同。红花尤能行滞，有去瘀生新之妙。

生地味苦气寒，阴中之阳

凉血圣药。凡痘色红甚焦紫，或发癍，吐血衄血，皆可用，无则去之。

凉心火之血热，泻脾土之湿热，止鼻中之衄热，除五心之烦热。

犀角味苦酸咸气寒

与生地同功，须用酒磨，每五六分止，多则能损血耗阴，小儿血虚者禁用。

羚羊角味咸气寒

独入肝经，理热毒而散瘀结，实症可用。然其性寒峻，能伐肝木生生之气，先天虚弱者，切宜缺之，勿为俗医所惑。

丹皮味辛苦气寒，阴中微阳

泻血分中热，止吐衄，痘色红艳者宜加红而不艳者止服。

泻阴火，主无汗骨蒸。

地骨皮味苦气寒，阴也

泻气分中热，凡见点后，身热不退，加一二钱于解毒药中，热清即止。

解肌热，主有汗骨蒸。

木通味辛甘气平，味薄阳也

滑石味甘气寒，性沉重

车前子味甘咸气寒

地肤子味苦气寒

皆能利小便，去膀胱中热。凡痘热甚红紫，舌有黄胎者，并用木通每四五分，车、地每六七分，滑石每二三钱。总六日前用。

木通利九窍血脉关节，出音声，疗耳聋，通鼻塞，散痈肿，结滞不消，杀三虫，除淋闭。

滑石燥湿行滞，化食毒，逐凝血。

车前子利小便而不走气，疗肝中风热，冲目赤痛。

地肤子主用多在皮肤，作浴汤甚妙。

大腹皮味辛气微温

利小便，解热毒，下一切气。凡腹胀浮肿，非此不除，惟虚人忌用。

石膏性寒味甘辛

胃经本药，凡火邪盛而唇肿者，宜用一二钱。若肿至黄硬宜多用之，即一二两不妨，

肿消即止，过则伤胃作泻。

枳壳味苦酸辛气微寒，味薄气厚，浮而升微降，阴中阳也

破胸中痞塞，散腹中结气。凡见点四五日，不大便者，用三四分，加当归以润之。

泻肺气，走大肠，与枳实同，但枳实性速，治血分，枳壳性缓，治气分。

青皮味苦辛气微寒，气味俱厚，沉而降，阴也

散积气，消宿食，凡发热腹痛者用之。

陈皮味苦辛气温，味厚气薄，可升可降，阳中之阴也

理滞气，健脾胃，自起胀至结痂，皆可用。

元参味苦咸气微寒

山豆根味苦甘气寒

专治喉痛。

元参治空中氤氲无根之火，独入少阴，管领诸气，使上下肃清，散颈下痰核痈肿，遂肠内血结癥瘕。

砂仁味辛苦气温

藿香味甘辛气微温，味薄气厚，浮而升阳也。

善理脾胃虚寒，止呕吐气逆，胸中烦闷，不思饮食者，尤宜之。

麦冬味甘微苦，气平微寒，阳中微阴

五味子味酸气温，味薄气轻，阴中微阳

治气虚烦渴而咳嗽，或血随火泛而妄行，二者并能相济。

五味子涩精除热，收肺气，敛汗固肠。

黄芩味苦气平寒，味薄气厚，可升可降，阳中阴也

黄连味苦气寒，味厚气薄，阴中阳也

栀子味苦气寒，味厚气薄，气浮而味降，阳中阴也

黄柏味苦微辛气寒，气味俱厚，沉而降，阴也

主治固有不同，其泻火解毒，则一而已。舌胎黄者芩、连，白者栀、柏。在六七日前，用皆一钱上下。又表热甚者，片芩可用，芩属太阴，走表故也。

芩泻肺与大肠，能消痰、退热、除痢。

连，泻心与脾，能解郁、定惊、除满。

柏、泻肾火，能滋阴水，而除燥湿。

栀，屈曲下行，能除五内烦实，眠卧不宁。

胡黄连能杀疳虫，治骨蒸。

朴硝味苦辛咸，气薄味厚，沉而降，阴也

治天行疫热，消肿软坚。

元明粉朴硝煅炼所成，气味稍轻

下药也。热甚胎黄者，用此通之，余不可。

大黄味苦气大寒，气味俱厚，沉而降，阴也

荡涤肠胃实热，号称将军，若不善用，必致杀人。凡见热症而用芩、连等剂，火不退，须以此大下之。用此必以舌胎为主，胎果老黄，自一钱至三五钱，皆可用。若一剂而少退，即止。盖痘喜温而恶寒，过则必伤元气，元气一伤，变不旋踵，可不慎耶？

木香味辛苦气温，味厚，阴中阳也

山楂味甘酸气温平，阴中阳也

理腹中痛，并滞气。又能破参、耆之滞，多则参、芪之功反损。

木香开郁醒脾，治慢惊，误服凉药者甚效，有鬼邪虫毒，尤宜服之。

山楂消肉食之积，行乳食之停。

猪苓味甘苦而淡，气平寒，气味俱薄，升而微降

泽泻辛甘咸气寒，气味俱厚，沉而降，阴也

能降六腑湿热，消浮肿，止呕泻，利小便。凡实症吐泻者用之。九日后湿甚不醒，亦用数分。

猪苓解伤寒瘟疫大热，治渴消。

泽泻逐膀胱三焦停水，治淋秘。

当归味辛甘气温，气味俱轻，可升可降，阳也

补血行血，始终皆宜，惟虚寒泻者缺之，为滑肠故也。

何首乌味甘苦涩气微温

调和气血，九日后宜用之，亦能止血热作痒。

消诸种痈疮，疗阴阳久疟。

川芎味辛气温，味薄气厚，浮而升，阳也

血中之气药，有起发之功，不可不用，又不可多用，多则走人真气，七日后去之。

白芍味酸气微寒，味厚气薄，阴中之阳，降也

敛血药也。凡痘儿血气虚，脾胃弱，血散不收，疮晕不敛，并宜用之。

安脾而主中满腹痛，泻痢不和，制肝而主血热目疾，胁下作疼。

赤芍

熟地味苦甘气寒，味厚气薄，沉而降，阴也

皆血分之药。熟地补血，赤芍泻血，五六日前，血热症非赤芍不可。若熟地惟补剂用之。

熟地能补肾中元气，治痘中无脓而血虚。

人参味甘气温，气味俱薄，浮而升，阳也

补元气，生津液，定虚喘而领毒，退虚热而止渴。若皮肤燃赤烦躁，舌苔，便不可用。色白浆清，塌陷不起，多用无防。痘密色红，四五日不得用排脓汤者，加五分于十神汤内，名曰唤浆。

开胃化食，安神定惊，疗心腹寒痛，除胸胁逆满。

沙参味苦气微寒

滋五脏真阴，去内外邪热，易老以此代人参，非无故而作也。

排脓消肿，止痂气绞痛，去惊烦，除燥痒。

黄芪味甘气温平，味厚气薄，可升可降，阴中阳也

肺经主药，专补气，固表托里排脓。凡皮薄浆清，塌陷不起，宜急用之，每八分至三五钱止。六日前生用，六日后炙用，四肢不起不灌者，桂枝煎酒浸透用。

解渴定喘，止泻生肌，兼治风癞。

紫河车味甘咸气温

鹿茸味酸甘苦辛气温

大补元阳，虚甚无浆，及脾寒陷伏不起者，宜用以助之。

河车补心，除惊悸，滋肾理虚劳。

鹿茸健骨而生齿，强志而益气，去肢体酸疼，除腰脊软痛。

肉桂味辛甘气大热，气味俱薄，体轻而上行，浮而升，阳也

行经妙药，参、芪非是不能成功。故凡用补剂，必加此为引导。若四肢不起胀者，补药中加桂枝二三分引之。

虚寒腹痛，非肉桂不除，腠理坚凝，非桂枝莫达。

程格思曰：桂能定惊痫，通血脉，服金药牛黄，冰伏脏气，令昏沉如死者，服此立苏。

丁香味辛气温，纯阳

干姜味辛气大热，气味俱厚，半浮半沉，可升可降，阳中阴也

虚症腹疼，呕吐泄泻，痘色灰白，非此不痊。

丁香治胃寒呃逆如神，齿牙疳蚀甚效。

干姜破血消痰，温中下气。

肉豆蔻味苦辛气温

诃子味苦酸气温性急，善降

症属虚寒，非吐即泻，泻者诃子，吐者肉蔻，吐泻兼见，彼此参之。

肉蔻亦治泻痢，以其入胃与大肠也。诃子亦治呕咳，以其入肺而敛气也。

大附子味辛甘气大热，其性走而不守，可升可降，而之阳也

补阳气不足，温暖脾胃，治四肢厥逆，寒战咬牙，痘色灰白，痒塌。然非唇舌淡莹，切不宜投，但见唇舌转红，即当叱去。凡姜、桂、丁、附，过用则损目发痈，最宜详慎。

茯苓味甘淡气平，气味俱薄，能升能降，阳也

山药味甘平气微

苡仁味甘气微寒

白术味甘气温，味厚气薄，可升可降，阴中阳也

皆能健脾理气。凡属虚症，悉宜用之。若实症必浆足方可。此盖燥湿利水之品，痘症之发，必要湿气上蒸，始能灌脓，故燥药皆不可用。以此收靥，正得其宜。山药一味，自起胀至靥后，用之无碍。

白茯补中气，赤茯利小便，茯神安心神。

山药益气强阴，涩精安神，退热止泻。

苡仁除风湿，理脚气，消肺痈止嗽，理

腹胀止痢。白术温中进食，止泄止呕，痘发水疱，非此不除。

贝母味辛苦气平微寒

止嗽化痰，解渴开郁。

南星味辛苦气平

除风痰，利胸膈。

石菖蒲味辛苦气温

治痘内惊痫，神昏谵妄，浑身热毒肿痛，或痂不结而溃烂成疮疥。

一寸九节者，通九窍，出音声，令耳目聪明，心开智长。风寒湿痹宜求，咳逆上气莫缺，止小便利，理脓窠疮。

厚朴味苦辛气温，气味俱厚，体重浊而降，阴中阳也

散结透毒，有疏通之能。

乌梅味酸气平，阳也

收肺气、止下痢，化痰除渴。

杏仁味苦甘气温

主咳逆上气急满，散肺中风寒，润肠中燥结。

大枣味甘气平微温，味薄气厚，阳也

安中养脾。

麝香味辛气温

拔毒气，起黑陷。

牛膝味苦酸气平

活血生血，引诸药下行。

桃仁味苦甘气平，阴中阳也

润燥去瘀血。与杏仁同润大肠，但杏主气秘，桃主血秘。

苏木味甘酸咸，气平，阳中之阴

破血排脓，消痈去肿。

石斛味甘气平

治胃中虚热，长肌肉，除脚软，逐皮肤邪热痈痛，安神定惊，厚肠止泻。

白蒺藜味苦辛气微寒

治疮痒溃烂，去瘀长肌。

花粉味苦气寒

排脓消肿，利膈除热，化痰生肌。

苦参味苦气寒

主时气恶热，细疹痒痛。

湿气熏蒸致齿痛，及肠澼者宜服之。

知母味苦辛气寒、气味俱厚，沉而降，阴也

泻肾火，除胃中热，化痰消肿。

瞿麦味苦辛气寒，阳中微阴

疏壅排脓，明目去翳，通诸种关格，破血利水出刺。

射干味苦气平微温

主喉闭咽痛，消结核逆气。

薄荷味辛苦气凉、气味俱薄，浮而升，阳也

引诸药入荣卫发汗，通利关节。治壮热风涎，惊搐霍乱食滞。

调蜜擦伤寒舌胎，和醋搽蛇伤猫咬。

蔓荆子味苦辛甘气温微寒，阳中之阴

治太阳头痛脑鸣，厥阴目泪睛痛。

淫羊藿味辛气温

治痘疮绝不起。

利小便，除茎中痛。

扁豆味甘气微温

和中下气。

白附子味甘辛气温

治痘中风热不退，头目不清，亦治中风失音。

牛黄味苦气寒

解心家火毒，惊热狂乱发癍。然必痘色紫赤者可用，灰白者不宜。

琥珀味甘气平，属阳

治痘惊痰热，鬼魅侵临。

胡麻味甘气平

治痘疮溃烂。

风病人蒸晒久服，令步履端正，语言不蹇。

乌药味辛气温

治膀胱冷气相冲，天行疫瘴为祟，亦能杀虫化积。

马齿苋味酸气寒性滑

起痘中盘陷，祛痘后牙疳。

山慈菇味甘辛气平

解毒。

痈疽疔肿，酒煎服，瘰疬疮疡醋拌涂。治毒蛇狂犬之伤，傅粉淬癍黡之面。

白芨味苦气微寒

排脓。

主肺伤吐血。

草龙胆味苦涩气大寒，气味俱厚沉而降，阴也

凉血明目，消赤肿疼痛。

治惊悸，杀肠中小虫，清下焦湿火。

茅根味甘气寒

止消渴，去瘀血，利小便。掘取新者，捣烂绞汁用。

茅针能溃痈，服一针溃一孔，两针溃两孔。

兔粪味甘气平

为丸去翳。

甘菊花味苦甘气平寒

草决明味咸苦气平微寒

蜜蒙花味甘气平微寒

夜明砂味苦酸气平微寒

痘后眼中赤涩，眵泪羞明者，备用之。

菊花主胸中热，去头面风。

夜明砂烧灰酒服，能下腹中死胎，研末拌饭中，能治小儿无辜疳积。

灯心味苦气微寒

淡竹叶味辛甘气凉

热症引导之功。

灯心烧灰吹喉痹，涂乳治夜啼。

竹叶通小便，解心烦。

陈仓米味甘咸酸气温

治眼珠吊白，除烦渴，开胃气，止泻痢。

糯米味甘气平微寒

助胃调元。

黄豆味甘气平

行浆。

神曲味甘气温

麦芽味甘咸气温

消食健脾。

生豆腐味甘气平微寒

敷余毒发肿。

生姜味辛气微温，气味俱轻，阳也

和中发表，开胃止呕。

姜汁最能豁痰，中症与霍乱并用。

明朱砂味甘气微寒

消手足痈疡，定神魂惊悸。

金钱花味甘气温

消痘痈肿痛，止血痢宽膨。

鸡冠血味甘辛气微温

人乳味甘气平

行浆妙品。

鸡属巽风，故冠血能发痘疮，通乳汁，涂口吻。

酒味苦甘辛气大热

发痘破结。

蜜味甘气平

止痛，解毒，润燥。

伏龙肝味甘气微温

消痘痈，止吐泻。

童便味咸气寒

治天行疫毒，吐血狂乱。

金汁味苦气寒

痘疮血热，紫黑焦枯，发狂、发痫、发疔均治。

紫雪味苦咸气厚大寒，善降

紫雪以硝为质，以金为气，痘有天行疫毒者宜之，余用不及金汁，医者往往杀人。更有持此以治慢惊，其罪尤不可深究矣。

《慈幼新书》终

原瘖要论

〔清〕　袁（佚名）　编辑

《原瘖要论》提要

清·鄞县袁氏撰。袁某嘉庆时人，是书家传抄本，道光戊子年，东农主人以其论症辨状，甚为了然，对症用药，亦极详慎，爰纠同志，校正讹误，付宁城东壁齐刊刻梨枣，以广厥传。炳章于民国初年得此原刻初印一册，阅其各论治法，卷帙虽少，确是家传心法。查其版片，漫没不堪再印，犹恐失传，为此采刊本集，以广其传云。

序

自来医之一道，内症凭脉象，外症凭形状。外症惟痘瘄最关紧要，痘症见于古人坊本者甚多，而于治瘄则尚略。迩来痘瘄，迥非昔比，调治非时，变为棘手。吾郡袁氏沈氏虞氏，有治瘄抄本，其论症辨状，甚为了然。对症用药，亦极详慎，爰纠同志，登诸梨枣，以广厥传。至症之轻重，时之寒热，地之燥湿，则尤在高明者因宜增减，谅不泥于古也。

长至节后三日东农主人谨序

《原瘖要论》目录

论汗…… 637
麻症干渴发热论微热 壮热 乍热 潮热 复热…… 637
论下身冷全身冷…… 638
论口疮…… 638
论腹痛…… 638
论吐痰…… 638
论唇舌干燥唇舌破裂舌胎…… 638
论发斑…… 638
论云暗…… 638
看疹诸色论…… 639
论咳嗽…… 639
论鼻涕鼻衄鼻扇…… 639
论发搐…… 639
总附咳嗽诸方论…… 639
总附渴症诸方论…… 640
总附鼻涕鼻衄诸方论…… 640
发水泡论…… 640
论气促…… 640
眼闭论总附白珠赤珠 …… 640
啮牙论…… 640
论吐沫…… 640
论衄…… 640
论呕吐…… 640
论泄泻…… 641
论药味所忌…… 641
安胎止痛方…… 646
胎产…… 646
产后…… 646
虞氏麻疹治法…… 646

原瘖要论

痘出于五脏，疹由于六腑，皆是命门相火、一感时生，发泄阴阳胎毒。然痘出于五脏，俱有见症，而疹于肺居多，何也？盖肺属金，清气上浮而多嗽。故疹未有不嗽者，若嗽多者肺之郁火也；疹未有不喉痛者，喉痛肺之窍塞也。肺火上冲于喉故痛，痛者哑之由也。疹多腹痛，大肠与肺相表里，肺火上冲于内故腹痛。疹多泄泻，大肠为肺传逮之官，肺火下注故泄泻。疹多喘，喘者肺气大盛也。疹多痰，痰者肺火蒸腐也。疹症不出于肺，治疹之法，初宜升提，头面背部俱出，未至手足者，用升中之轻降。如未至爪甲者，切不可重用降药，宜降中之升药。疹未出齐，虽有枭毒烈火诸症，只可用破敌之法，如石膏、大黄、力子、山楂、荆芥、干葛，佐以桔梗、薄荷、木通、杏仁、苏子之类。瘀血加赤芍、红花，腹痛加桃仁、青皮，无汗加麻黄，名曰完济。待至出齐，重用瓜蒌、花粉、生地、丹参、知母、羚羊、山栀、黄芩。舌上黑刺，加犀角、黄连．鼻衄亦宜投。咽痛加元参、山豆根，龈肿亦可用。睛红目痛，加菊花、木贼草、柴胡之类。虫积肚痛，加胡连、使君子、雷丸、槟榔、花椒。然此类宜毒有未发之地，后必余火缠扰，若下稠上疏，须防收紧作喘之症，当用大黄、青皮以透之，再加紫草、赤芍，以导其瘀，徐徐收去，方为无害。切不可风吹，致毛窍闭塞而即没矣。

论　汗

疹之初出未出时，俱宜微汗。汗则肌肤通畅，腠理开豁，而毒自透。一见微汗，不宜过用升发之药，致使汗多亡阳，轻者变重，重者难救。隐暗不透之症，因之并发，不可不慎。又有无汗者何？缘重感风寒，使皮肤干燥，毛窍不开，而疹不出，多成内攻之患，使腹胀气喘，秋夏宜微加升发，春冬重以疏散，但使浑身有微汗为妙。又有痰鸣，无分迟早，急用寒凉降火清润之药，佐以升发，否则变为败症。故自始至终，得汗为主，若无汗，后必多余毒，宜解毒为要。

秋夏微加升发汤

升麻　葛根　苏叶　羌活　赤芍　甘草

春冬重以疏散汤　即升发汤。加

麻黄　桂枝

寒凉降火汤

生地　黄芩　黄连　山栀　石膏　花粉　杏仁　苏子　生甘草

佐以升发汤

薄荷　山楂　大力　桔梗　杏仁　苏于　升麻

麻症干渴发热论

微热　壮热　乍热　潮热　复热

小儿口唇红如丹，是欲发渴，皆内热所致。然宜辨其虚实，二便闭是实，用清热和凉之药。二便清利，唇口淡而渴是虚，必其先食寒凉，致中气干燥也，急补中气。若腹胀不食，是为败症，至于麻症有远近，不比于痘，或三四日，或五六日，或八九日或半月，又乍寒乍热，至壮热经日不退是也。若始热遂见外疹，又宜详察。有微热者，热轻而不壮也，此初起之时则犹可，将出之时则不可，恐其不能透表，急用疏托之药。如没当未尽没时，毒轻而清，不必服药。若夫壮热者，热甚而经日不退也，初见太热，至出

时而不稍退，其症必重，若先热至出重是为顺症，如已出尽而有此壮热，宜服疏托和解之药，至没后而热不退，更宜用和解之药，以免后患。又有午热者，或热数日，过数日又热，或午热，或午热，未出之时见之，总毒不透，急宜疏托。没后及未没见之，毒有未尽，宜凉解分利。亦有因病后中气虚弱者，临症者须酌治。若夫潮热者，一日一至，如潮之汛而不失也。初出必无此症，至出后没后者有之。此因气血而作，治宜益阴而退阳可也。且有复热者，谓热退而复发也，皆因余毒未解，宜疏解为上，妄用燥剂，必致不治。

论下身冷全身冷

疹之有下身冷者，不比疫疾，谓头温足冷，作逆症看，麻出自上，故上热而下冷。若初起时上热下冷，不妨，出完之时，下身冷是逆症，须详审而治。又有身体四肢如冰者，麻本属火，全身自应温暖，今反冰冷，必是逆症。若初出正出之时不热，则毒不能尽出，而反渐没。若正没没后有此者，必脾胃倒坏，气血大虚，毒不能尽，后变无穷，定为不治，故不立法。

论口疮

口疮者，心脾之火，多见于正没之时，皆因余毒未尽，留于上焦，必大便闭，小便赤，宜清利脾火，兼滑大肠为主。若乳上小儿之母，亦当服药，使乳清凉。

论腹痛

疹之腹痛者，毒气内作而不能透表，多见于初出正出之时，治宜疏托，发出即止。如正没未没尽而痛，缘外邪未尽，而复于内，亦宜疏托，佐以清凉。然细微处，以意度之，从外症加减。

论吐痰

痰之吐有二，有吐出如丝者，有吐出成块者，皆由肺胃之火，久积而作。宜清肺消痰降火为主，不可用南星、半夏香燥温脾之药。

论唇舌干燥唇舌破裂舌胎

舌燥多属于脾，脾热有二：一则唇白而燥，其热尚微；一则唇赤而燥，其热则重。又有带紫黑而燥，其热尤重，治宜清热分利而已。何则？舌乃心之苗，麻本火候属于心，故舌胎有三种，黄白黑是也。白者微热，黄者虽重可治，黑则难治。此症不分始末，不过清热疏利而已。舌破唇裂者，此心脾二火盛，上冲所致，其色必深红而紫黑。亦有不紫红而赤甚者，其火不轻，治当分首尾。若初热而色赤，此火不解而毒不尽。若其色有活，犹可以治用寒凉，加以疏托。倘紫黑焦枯，而色不活者不治。若已出而有此症难治。盖毒虽出而唇舌破裂者，心脾二经俱坏也。若将没之时有此，亦危候也，当谨慎细察为要。

论发斑

发斑者，火毒炽甚，血被熬煎，当以紫草、红花、石膏等味，凉血清火为主。亦有初热时为风寒所搏，而成瘾疹，似斑非斑，治宜疏解，其瘾自退。若误为真斑，而用寒凉，以致水泻不止，元气下陷，不能透表，危亡立至，可不慎诸？

论云暗

疹如云暗者，上有大片红肿者，大片红肿之间，又有小颗粒于其上，皆由火盛所致，重用寒凉之药，不可迟缓。如身上一片红暗，

与皮内一片并样，此症只可发散。若发散后仍如此者，不治。

看疹诸色论

疹色之美恶，与痘无异，红活滋润者吉。有一样色淡而润，是无内症，其疹最清。若淡而不润，或干燥，或嫩艳，此不正之色。火毒盛伏，当清火解毒为要。又有一样深红者，其色红而且重，是血热，宜清散之。又有一种艳红者，其色如胭脂，是血热，其内必有火，火遇火必发毒，大用寒凉，以先制其焰，否则狂躁喘急立至。又有一种干红者，如纸之矾于红，滞而不活，内有伏火，血受其瘀，颗粒必大，嗽而必喘，急用攻破。又有一种色紫者，是热极将瘀，急破血以凉之，若带艳则重甚矣。又有一种色黯者，其症较紫更重，初出急破，迟则难救，若半靥色黯者无妨。又有一种其色白者，血瘀之极，此是内症，急破其瘀，迟则倒靥面白，故须山楂、丹皮、红花、大黄、生地、桃仁等剂。如匀净无内症，身不热，不咳嗽，是血不足而无火，不必多治，宜审之。

论咳嗽

麻症之干咳，连声不断也，因火旺肺跃。凡疹先时喜咳，咳甚则毛窍开而易透，咳微则腠理闭而难透，故方出之时欲其咳。至既出之后，欲其不咳为佳，如仍有咳，当以清痰降火为要。若初起时不咳，麻必不出，于发散中加半夏，以助其嗽，使麻可出。

论鼻涕鼻衄鼻扇

鼻通多涕，此肺气顺也，最吉。故初出时至没后，而皆有是者，此肺气和平而不阻塞，顺症也，不必服药。今云多涕，谓浓涕而时有也，非谓涕少而暂有，临症者宜推之。若无涕鼻干，肺腑火热，闭塞毛窍不通，初出未出时，得此必重。又有内为热甚外为鼻眵所结，至于无涕，云其眵结而涕自见，是肺气通，虽重可救。如真有鼻干无涕，此症甚危，亦轻没后，治宜详审。若下药得喷嚏，肺气得解而通也。将出未出之时，必先外感，而今得通故也，其毒虽重可救。正出而得此症，其毒尽解，又何后患？又有衄血者，因内热狂盛，邪血沸腾，血从火化，是以从肺而上溢于鼻，名曰衄血。将出未出之时，而忽有衄，是毒从衄解，不必服药。至于久衄不可，若出透与没后有此症者，宜于清肺药中佐以凉血之味，使火退而衄止。如并口中有血者，服凉剂不止，惟用发散，使毒得出，而衄自止矣。又有名为鼻扇者，是肺气将绝也。喘满喉鸣，多属于痰，因火毒内结而亢甚，若喉中无痰喘，精神如故，还可挽救，急用润肺消痰清热为主，否则难治。

论发搐

疹之发搐，不比寻常。若喉中发痰，非真搐也，当分先后。若见于发热初出之候不妨，治宜疏托，引加清凉。若见于正出已没之时难治。总要清上焦之热，兼利小便而已。

总附咳嗽诸方论

凡疹回后，有咳嗽者，是火气旺燥，肺金受克故也。治宜清金降火汤，用黄芩、黄连、山栀、石膏、花粉、贝母、陈皮、桑皮、杏仁、苏子、甘草、麦冬、瓜蒌仁。如不应，外加葶苈、枳壳。若声不出，以清金降火汤作主，再加葶苈。倘有烦躁腹胀，泻痢不止，声哑唇青紫黑者，宜用黄连解毒汤，药用黄芩、黄连、枳壳、归尾、红花、赤芍、生甘草、大黄。或用甘桔汤，甘草、桔梗、力子、玄参、连翘、知母、杏仁、干姜。若痰中带血，喘促闷乱，用凉膈散，黄芩、山栀、薄

荷、连翘、生甘草、大黄。

总附渴症诸方论

凡疹渴有二者，虚实是也。看其舌胎起，唇红色，有如丹，二便闭，此内热所致，内外皆实，治宜清凉疏理之药，生地、黄芩、花粉、牛蒡、连翘、荆芥、葛根、桔梗、石膏、黄连、加灯草。若唇口淡红，舌上无胎，二便清调，此是内虚，宜清金益肺汤，沙参、麦冬、生地、丹参，绿豆汤或芝麻茶炒米汤。如气喘腹胀，是为败症，切不可饮冷水，致生蓄水之患。

总附鼻涕鼻衄诸方论

凡疹无涕者，此因火旺铄金，治宜清金肺润汤，药用知母、黄芩、生地、花粉、连翘、蒌仁。一疹有鼻衄者，皆肺金郁热火冲之故，当以葛根、生地、山栀、薄荷、丹皮、茅根、犀角、羚羊角、黄芩。出齐之后而有此症，当用犀角地黄汤，加茵陈、木通，使火下行而愈。犀角地黄汤，生地、犀角、丹皮、白芍加茵陈、木通。

发水泡论

疹有发水泡者，此因火毒太甚，迫于肌肤而不能透表，故发水泡，此症多于见点之时，亦有于未见点之时，皆为不治，故不立法。

论气促

疹之有气促者，由肺不清而致，当分先后。若见于正出未出之时，宜疏托。若见于已出正没之时，宜降火清痰之药。

眼闭论 总附白珠赤珠

疹有眼闭者，常于没后见之，皆因脾火旺盛，致目肿而闭，但宜清上焦之药，兼以利水，使热退而眼自开矣。又有白珠者，又有赤红者，俱属肺气，宜清肺火，兼以风药佐之。

啮牙论

疹有啮牙者，是阳陷于阴，热火相搏，故啮牙耳。其口必多渴，手足俱热，喜食冷物，治宜滋阴降火，不可食辛辣之物。若误食之，后必下血，痰响而死。

论吐沫

吐沫之症，亦由胃火亢盛而致，宜清胃降火为主治。

论蛔

疹前吐蛔者，毒火上冲，胃难安养，蛔从上出。若初出发热之时不妨，待热退身凉，自然不吐，亦宜清胃，用生地、当归、丹皮、连翘、石膏、升麻，庶无他症。如已出同时而有此症，用使君子、黄芩、川连、花粉、胡连、川椒为主。如蛔死者，毒火猖獗，胃气将绝，死期立至。有泻蛔者，不必过治，清解自愈。如泻死蛔者亦重。

论呕吐

疹有呕吐者，毒火冲胃，未经发泄，不必过治。若出齐回后有此症，宜用清凉解毒之药。

论泄泻

疹有泄泻者，其色黄而有沫，小便赤涩，口干唇燥，此因肺经热甚，未出与当出之时而泻者，不必服药。经云毒以痢松，但不宜久，若回后有此泄者，是积热移于大肠，治宜四苓散，猪苓、茯苓、白术、泽泻，加黄芩、黄连、木通、瓜蒌仁霜。如下有红紫色，总因热毒留连，药宜赤芍、大黄，行一二次，毒尽自愈，不宜多下。切不可因其泄泻，用诃、蔻以止之，恐其腹胀喘急而死。如首尾水泻，小便短赤，用木通、车前利水之剂，佐以升提可也。

论药味所忌

肺属金，轻清上浮，切忌辛热香燥。盖人参补肺，防其肺热还伤肺；黄芪补中，防其助痰而气喘。当归辛热助火，反欲党邪而为恶；生地补肾，肾为肺子。经曰：实则泄其子，是肾宜泻不宜补，防风无汗干燥，须当表虚之堪忧。他如干姜、附子、白术、丁香、砂仁、肉桂、细辛、藿香、蔻仁、乌药、草蔻、良姜、茱萸、荜拨、香附、麝香等药，皆以辛香，切宜禁用。又忌食物如椒姜糖醋鱼鳖虾蟹猪犬牛羊马肉，并一切炙煿之物，非特助邪为恶，恐天行时气必然重出，要忌四十九日外，有鸡子不可食，恐其坏目，食糖恐犯牙疳。独有归、芎，可于血虚色白者权宜酌用。又有忌用大黄而用瓜蒌何也，盖疹发于肺，肺主气，经曰：气有余便是火，肺与大肠相表里，肺移热于大肠故秘结，用瓜蒌仁以润肺，佐枳壳以宽肠，则秘自通矣。若大黄号曰将军，有斩将搴旗之功，恐其太过，致使心血两虚，则脾燥肺气器张，风火益猛矣。

一疹当出之时，被风寒所折，以致色白如肌肤，毛窍耸起如粟子者，宜疏散。用

干葛一钱　木通二钱　川芎八分　红花四钱　陈皮一钱　羌活一钱　防风一钱　前胡二钱　桔梗一钱　荆芥一钱　薄荷一钱　大力四钱　蝉衣八分

倘色白如肤，但见粒头高肿者，此表虚所致，用

生地一钱　川芎五分　红花三钱　归身二钱　大力四钱　葛根一钱　山栀一钱　桔梗二钱　木通一钱　麦冬三钱

一疹因风寒所折，皮肤干燥，毛窍不通，身热喷嚏，以致不能透发者，宜疏托，用

羌活一钱　防风二钱　葛根二钱　苏叶二钱　大力四钱　蝉衣一钱　前胡一钱　荆芥一钱　橘红一钱　桔梗二钱　木通一钱　升麻二钱

加大黄、葱白。

一疹因风寒所折，见暖则和活，不暖则枯燥者，宜凉解。

干葛一钱　薄荷八分　荆芥二钱　桔梗二钱　前胡二钱　通草八分　防风二钱　枳壳二钱　橘红八分

一疹因毒气抑郁于内，热极不能透出，根窠浑成一片，以致色带红紫者，急以清解为主，佐以升发，用

干葛二钱　荆芥一钱　薄荷一钱　蝉退八分　大力五分　石膏一两　桔梗二钱　升麻一钱　山栀四钱　前胡一钱　黄连六分　橘红二分

加麻黄四分。

一疹有浑身麻疹，隐于肌肤之间，欲出不透者，宜大升发。

羌活五分　防风一钱　葛根二钱　通草八分　薄荷八分　大力五分　蝉退一钱　麻黄八分　升麻一钱　前胡二钱　桔梗二钱

热甚加石膏、大黄

一疹有胸腹腰背暖处，见粒即红，手足头面暂无者，宜清解。

升麻一钱　干葛二钱　荆芥一钱　薄荷一钱　大力五钱　石膏三钱　蝉退八分　桔梗二钱　花粉六钱　山栀四钱　黄芩三钱　前胡二钱　橘红八分　福花二钱

加麻黄

—疹有色紫赤暗，粒头尖耸者，急用寒凉解毒，佐以消痰。

石膏一两　黄连一钱　桔梗二钱　荆芥五分　山栀三钱　干葛一钱　陈皮一钱　枳壳一钱　薄荷五钱　前胡二钱　大力五钱　花粉一两　通草八分　紫草八分

加大黄。

—疹色鲜红，点子低陷不高者，其毒重甚，急宜清肺泻火。

干葛二钱　前胡二钱　石膏一两　蝉退一钱　大力五钱　薄荷二钱　桔梗二钱　木通一钱　山栀一钱　升麻一钱　陈皮一钱　枳壳四钱　荆芥二钱

加大黄。

—疹色淡红，为风寒所折，点子低而色燥不润，宜疏散。

荆芥二钱　防风二钱　前胡二钱　桔梗二钱　大力四钱　川芎八分　红花四分　蝉衣八分　干葛二钱　通草八分　橘红八分　升麻一钱

—疹色淡红，颗粒不高，唇舌俱燥而赤，此毒火内郁，宜用寒凉，佐以疏托。

大黄三钱　枳壳三钱　山栀四钱　桔梗二钱　大力五钱　蝉衣二钱　薄荷一钱　木通一钱　生甘草八分　陈皮二钱　紫草一钱

—疹已出而粒顶尖焦，无论赤红，皆为热极，急宜清鲜，佐以凉血。

石膏一两　木通一钱　紫草一钱　桔梗二钱　大力五钱　薄荷一钱　陈皮一钱　黄芩六钱　荆芥一钱　生甘草六分　大黄三钱

—疹已出，红肿太甚者，药用

前胡二钱　桔梗二钱　干葛二钱　薄荷二钱　大力五钱　荆芥三钱　防风二钱　山栀三钱　木通一钱　生甘草一钱

如口渴，加石膏、花粉。便闭，加大黄、枳壳。身烦热，加黄芩、黄连、元参、陈皮。

—疹未出透，而见风早没，及误食荤腥油腻，以致毛窍闭塞，不得透表者，俱宜疏托。暧处无点影者，谓之早没，二症用药

石膏八钱　麻黄八分　升麻二钱　干葛二钱　大力四钱　蝉退一钱　桔梗二钱　生甘草一钱　杏仁一钱　荆芥一钱　防风一钱　木通一钱

早没者加芦根，误食者加山楂、枳壳。

—疹未出而呃逆者，是胃败恶症也，悉属火毒，以升阳透发为主。

荆芥一钱　葛根二钱　羌活二钱　桔梗二钱　大力四钱　陈皮二钱　石膏二两　黄连一钱　生甘草一钱　前胡四钱　蝉衣二钱　升麻四钱　竹茹一钱　薄荷一钱

若疹已透而呃逆者。

花粉一两　荆芥二钱　薄荷一钱　葛根三钱　羌活二钱　桔梗二钱　大力四钱　陈皮一钱　石膏二两　黄连一钱　生甘草一钱　竹茹一钱

—疹子出透，三四日而不没者，此毒火亢盛，宜清凉解毒。

前胡二钱　干葛二钱　石膏一两　山栀四钱　连翘三钱　杏仁一钱　荆芥二钱　薄荷一钱　木通一钱　元参二钱

—疹没肌肤之上无点粒，又见红片，平而不高者，此没不尽也。药用

前胡二钱　桔梗二钱　干葛二钱　薄荷一钱　大力四钱　荆芥一钱　木通二钱　山栀二钱　蝉衣八分　生甘草八分　陈皮一钱　枳壳一钱

如内热烦渴，加黄连、石膏。

—疹色带白干燥，隐隐于皮肤之间，似没非没，必因风寒所致，而不能透表故也。急用疏托，勿加寒饵。

前胡二钱　桔梗二钱　荆芥二钱　薄荷一钱　生甘草一钱　干葛一钱　防风二钱　木通一钱　蝉衣八分　大力四钱　陈皮二钱　福花三钱

—疹发热及正出之时，沉睡不醒，此是火抑于内，而不达于外，后必发热烦躁，变症多端。药用

前胡二钱　干葛二钱　荆芥一钱　薄荷一钱　大力子六钱　桔梗二钱　木通一钱　防风一钱　橘红八分　升麻五分

—疹子因热火拂抑而无汗，以致皮肤干燥，唇口破裂，二便不通，沉昏腹胀，气喘痰鸣，急用寒凉，佐以升发。

石膏一两　紫草二钱　麻黄八分　蝉衣八分　大力五钱　干葛二钱　薄荷一钱　前胡二钱　木通一钱　紫苏一钱　桔梗一钱　荆芥二钱　滑石三钱

加葱白三条。

一疹初发热时，因毒火内迫，以致浑身大汗，不能尽透者，宜清解。

石膏一两　紫苏一钱　干葛二钱　薄荷一钱　大力四钱　桔梗二钱　生甘草一钱　丹皮二钱　山栀二钱　前胡一钱　荆芥一钱

加大黄、淡竹叶。

一疹有冒风寒，皮燥无汗不出，反有腹胀气喘者，宜疏散。

前胡二钱　桔梗二钱　干葛二钱　防风一钱　羌活一钱　橘红八分　紫苏二钱　大力四钱　蝉衣一钱　荆芥二钱　木通一钱　枳壳一钱

或加麻黄、葱白、陈皮。

一疹症忽有汗，忽无汗，汗后肌肤仍燥，身子大热，而疹仍未透，宜清解。用

前胡二钱　桔梗二钱　干葛一钱　薄荷一钱　大力四钱　蝉衣一钱　生甘草一钱　丹皮二钱　山栀一钱　木通一钱　石膏一两　紫草一钱

加大黄、淡竹叶。

一疹未出先，昏沉喜睡，倦梦谵语，此因热毒炽盛，不能外达故也。宜清心解毒。

干葛一钱　防风一钱　大力四钱　蝉衣八分　荆芥二钱　薄荷一钱　前胡二钱　桔梗二钱　滑石一钱　木通二钱　陈皮一钱　青皮二钱　钩藤二钱

加大黄、石膏、黄连、淡竹叶。

一疹已出透，而有谵语者，用

荆芥二钱　薄荷一钱　前胡二钱　枳壳一钱　黄芩一两　滑石一钱　大力四钱　木通二钱　陈皮一钱　青皮二钱　钩藤二钱

加大黄、石膏、黄连、淡竹叶。

一疹有元气素虚之人，疹已透而谵语者，用

当归三钱　生地一钱　丹参二钱　麦冬三钱　川贝一钱　陈皮一钱　连翘三钱　生甘草八分　山栀三钱　钩藤一钱

一疹已出透，而仍烦躁，面赤咽痛，目赤唇焦，宜清降。

黄连一钱　石膏一两　黄芩一两　山栀五钱　生甘草一钱　元参三钱　丹皮一钱　大力四钱　陈皮一钱　枳壳三钱　杏仁二钱　苏子二钱　知母二钱　萎仁一两

再加大黄、淡竹叶。

一疹未出，唇红似丹，二便闭塞，喜饮冷，此热毒内蒸，宜用辛凉药。

干姜三钱　薄荷一钱　前胡三钱　桔梗二钱　大力五钱　荆芥一钱　滑石二钱　石膏一两　生甘草一钱　花粉三钱　木通二钱

再加芦根、竹叶。

一疹已出而发渴者，鼻气勃勃冲人，此肺中火邪熬煎，宜清金降火。

黄连一钱　黄芩一两　石膏二两　知母三钱　花粉二钱　滑石一钱　山栀一钱　葛根二钱　薄荷一钱　瓜蒌仁一两　桔梗二钱　生甘草一钱　大力五钱　枳壳二钱

一疹有二便清利，唇口淡红而渴者，此必过服寒凉，致中气虚，干渴。

当归二钱　生地二钱　麦冬三钱　升麻一钱　桔梗一钱　元参一钱　陈皮一钱　生甘草一钱

一疹出时手足多热，忽尔冰冷，名曰厥逆，似水之象，宜用升散。

干葛二钱　升麻八分　苏叶一钱　防风一钱　大力二钱　桔梗二钱　木通一钱　麻黄八分　前胡二钱　荆芥二钱　橘红八分

加葱白。如便闭，加大黄。

一疹后厥逆者，用清解。

黄芩二两　黄连八分　花粉一两　山栀四钱　前胡二钱　生甘草一钱　木通一钱　陈皮一钱　桔梗二钱　贝母二钱　石膏一两　枳壳五钱

加大黄、萎仁。

一疹中寒热似疟，身寒手足冷极者，宜滋阴养血发表。用

柴胡二钱　黄芩一两　当归三钱　川芎八分　陈皮一钱　葛根二钱　生甘草八分　生地

二钱　泽泻一钱　茯苓二钱　贝母二钱

寒多加苏叶，热多加知母，渴甚加石膏、大黄。

一疹将出而发惊，是毒蕴于心，肺火鼎沸，以致手足搐搦，宜解表发汗。

羌活一钱　防风一钱　荆芥二钱　薄荷一钱　大力四钱　蝉退一钱　青皮二钱　钩藤一钱　橘红一钱　前胡一钱　紫草一钱　干葛一钱

外加朱砂二厘。如痰多加胆星二钱。若食积加山楂、枳壳，甚者加黄连、花粉。倘有已出而发惊搐者，此由毒火元气俱盛，宜清火解毒。用

黄连一钱　黄芩五钱　钩藤二钱　陈皮一钱　前胡二钱　龙胆草一钱　山栀四钱　木通一钱　贝母一钱　枳壳一钱　花粉一两　生甘草五分　杏仁一钱　芦荟一钱

加莲肉心、石膏三两。又有一种惊重，元气虚，恐变慢惊风者，用

当归二钱　生地二钱　茯苓三钱　陈皮一钱　生甘草八分　天麻一钱　川贝一钱　麦冬三钱　钩藤二钱　连翘二钱　木通一钱　防风一钱

加莲肉、胆草、橘红。

一疹初发时，呕吐不能食者，此毒火壅于胃故也，宜清解疏托。

前胡二钱　枳壳二钱　干葛一钱　防风一钱　大力三钱　连翘二钱　桔梗二钱　蝉退一钱　陈皮一钱　荆芥二钱　生甘草八分　滑石一钱　石膏一两

火轻者，加山栀、芦荟。火重者，加石膏、滑石。又有一种疹已出透，而呕吐不食者，宜清解中加疏托药。用

石膏二两　陈皮一钱　前胡二钱　枳壳三钱　干葛二钱　大力三钱　山栀一钱　薄荷一钱　桔梗二钱　生甘草八分

加芦荟。如疹已没后，仍呕吐不食者，宜清凉药。

石膏二两　黄芩一两　黄连一钱　花粉三钱　陈皮一钱　枳壳三钱　山栀二钱　木通一钱　桔梗一钱　丹皮一钱　元参二钱　生甘草八分　前胡二钱　大力二钱

一疹有毒迫大肠，里急后重，变为滞下者。

黄连八分　黄芩一两　枳壳二钱　木通一钱　生甘草八分　大黄六钱　陈皮一钱　杏仁一钱　丹皮一钱　蒌仁一两

若泄泻不止，变休息痢，腹中痛，便见脓血，此血热大肠也。宜用

黄连一钱　条芩二钱　青皮二钱　枳壳二钱　生甘草八分　滑石一钱　桔梗一钱　山栀一钱　大黄八钱

又一种变为赤痢者，用

黄连一钱　条芩一两　陈皮一钱　枳壳三钱　生甘草八分　槐花二钱　荆芥二钱　滑石一钱　山栀一钱　大黄三钱　地榆一钱

或加升麻、杏仁。

一疹未出透，咳嗽不绝，面目浮肿，此系毒火不能外达，肺金受克也，速用清热透毒。

荆芥二钱　薄荷一钱　大力四钱　蝉退一钱　生甘草八分　干葛二钱　陈皮一钱　桔梗二钱　防风一钱　木通二钱　前胡一钱

加石膏、山栀。如疹已出透，而气喘鼻煤干燥，宜用清金降火汤。

条芩八分　黄连八分　石膏二两　蒌仁一两　陈皮一钱　枳壳三钱　苏子一钱　杏仁二钱　贝母一钱　花粉四钱　知母一钱　葶苈二钱　桑皮二钱

加茅根汁。又有一种有痰有声者，治宜

前胡二钱　桔梗二钱　生甘草三分　贝母一钱　陈皮一钱　石膏一两　知母二钱　花粉二钱　枳壳二钱　桑皮三钱　山栀三钱　杏仁二钱　大力四钱　兜铃三钱

加竹沥。又有一种有声无痰者。

黄芩二两　黄柏三钱　知母三钱　花粉五钱　蒌仁一两　前胡三钱　贝母三钱　陈皮一钱　苏梗一钱　杏仁二钱　石膏一两　生甘草三分　桔梗一钱　枳壳二钱　元参三钱

加茅根。

一疹出咽喉痛，皆由肺火上炎故咽痛，治

用

生甘草一钱　桔梗二钱　大力五钱　荆芥二钱　薄荷一钱　干葛三钱　木通一钱　石膏一两　防风二钱　前胡三钱　橘红一钱　射干一钱

一疹已出透，而咽痛失音，发热作渴面赤，喜饮冷物，俱是上焦实热。

生甘草二钱　桔梗三钱　大力四钱　元参三钱　射干二钱　黄芩五钱　黄连分　石膏一两　荆芥二钱　山豆根二钱　花粉八钱　陈皮一钱　枳壳二钱　蒌仁一两　夏枯草三钱

有痰，加贝母。

一疹未出而热极火动者，致血妄行，从口鼻出者。

荆芥三钱　紫草三钱　薄荷一钱　干葛一钱　大力五钱　郁金二钱　山栀四钱　生甘草二钱　桔梗二钱

甚者加黄芩、茅根汁。若疹已出透而衄血者。

黄连八分　黄芩一两　黄柏二钱　山栀四钱　丹皮三钱　元参五钱　生甘草二钱　桔梗二钱　花粉一钱

或加茅根汁，或加生地、麦冬。又衄后火气已清方。

生地二钱　麦冬三钱　元参二钱　当归二钱

一疹中头痛身疼者，此内之火毒，与外之风寒相结不散，宜疏解。

羌活三钱　防风一钱　荆芥二钱　大力四钱　蝉衣一钱　前胡三钱　桔梗二钱　干葛二钱　苏叶一钱　木通八分　川芎八分

一疹中腰疼，因气滞血凝脾肾二经，外感内伤所致。

青皮一钱　红花一钱　大力三钱　羌活一钱　防风一钱　荆芥三钱　苏叶一钱　前胡二钱　桔梗一钱　木通一钱

又方

枳壳一钱　黄芩二钱　山栀三钱　麦冬三钱　当归一钱　川芎八分　郁金一钱　青皮一钱　陈皮一钱　木通一钱　连翘二钱

一疹没腹痛，与未出透，皆不谨起居，或食冷物，或冒风寒，以致寒热相激而痛。

治未出透而痛方。

羌活二钱　防风二钱　荆芥二钱　苏叶一钱　大力二钱　陈皮二钱　青皮一钱　前胡二钱　桔梗一钱　枳壳二钱　木通一钱

治疹已出透腹痛。

陈皮一钱　枳壳二钱　苏叶一钱　杏仁二钱　黄芩三钱　桔梗一钱　木通二钱　生甘草一钱

一疹后齿腮肿痛，口角流涎之症。

黄芩一两　黄连一钱　石膏二两　元参一两　大力三钱　生甘草一钱　荆芥二钱　桔梗一钱　防风二钱　白芷一钱　川芎八分

一、疹后牙疳，根有血出肿烂。

生地三钱　元参一钱　黄连一钱　麦冬三钱　生甘草二钱　花粉三钱　丹皮二钱　葛根一钱　荆芥二钱　石膏一两　知母三钱　枳壳二钱

一疹后牙疳，是胃热未清，以致火毒上炎。

黄芩一两　黄连一钱　石膏二两　花粉一两　知母二钱　生甘草一钱　元参四钱　荆芥三钱　桔梗二钱　大力四钱　升麻一钱　山豆根二钱　射干一钱

一疹后咳嗽口破。

麦冬三钱　桔梗二钱　花粉八钱　知母二钱　元参三钱　荆芥二钱　大力五钱　山豆根三钱　射干二钱　连翘五钱　薄荷二钱

或加

黄连八分　石膏一两　黄芩八钱

一疹后焦烂。

薏仁二钱　薄荷一钱　甘菊一钱　柴胡一钱　决明一钱　大力五钱　黄连一钱　黄芩二两　山栀五钱　生甘草二钱　花粉八钱　干葛四钱

或加

石膏三两　桔梗二钱　蒌仁二两　大黄一两　荆芥三钱

一疹后目疾药味。

羌活　防风　干葛　薄荷　柴胡　桔梗　草决明　川芎　黄连　大力　花粉　山栀　生甘草　当归　生地　甘菊　木贼　蒙花

谷精草

初二剂当去黄连、生地，后去羌活、防风。若有稍明，照依此方，加黄芩、石膏、升麻、胆草、蒌仁。

一、疹出十二三日，又发红黑疔，小儿能自手指拔去，疔不痛痒者，急以解毒拔疔丹。使毒火尽退而愈。

礞石煅、五钱　黄芩二两　木香一钱五分　元明粉五钱　沉香一钱五分　大黄二两

共研末，朱砂为衣，作丸服。

独枣汤

治疹后牙龈烂，用干红枣二枚，雄黄一块，入枣内，烧灰存性研末，米泔水煎服，入盐少许，漱口即愈。

一疹后中气虚弱，乍寒乍热，是阴血虚也。

当归二钱　生地一钱　麦冬二十粒　元参三钱　生甘草八分　黄芩一两　生山栀三钱　丹皮三钱　白芍药一钱　黄连八分　花粉三钱　桔梗二钱　骨皮一钱

一疹未出而乍寒乍热，是毒未透发，用疏托。

升麻一钱　干葛二钱　荆芥一钱　蝉退一钱　大力二钱　前胡二钱　桔梗二钱　苏叶一钱　防风二钱　橘红八分　通草一钱

或少加麻黄、葱白。

一疹已出，复乍寒乍热，二便短赤，是余毒未尽，用凉解。

黄芩一两　黄连八分　石膏一两　山栀四钱　大黄一两　生甘草八分　荆芥一钱　大力一钱　陈皮一钱　枳壳四分　贝母三分　杏仁一钱　花粉五分　木通二钱　瓜蒌仁二两

一疹后日热不退，身热燎人，二便不通，急用和解。

黄连一钱五分　黄芩一两　生蒌仁一两　石膏一两　山栀五钱　陈皮一钱　枳壳四钱　苏子一钱　杏仁一钱　花粉一两　滑石一钱　生甘草八分　木通一钱　胆草二钱

一疹回后热退身凉，过三五日又作热，是余毒复还，宜疏解。

荆芥一钱　薄荷一钱　干葛二钱　前胡二钱　桔梗一钱　大力一钱　陈皮一钱　枳壳三钱　黄芩一两　山栀五钱　生甘草一钱　元参三钱　连翘一钱

其者加大黄、石膏、蒌仁。

一产后出麻，本宜补血，但麻属火，不可骤补，补则毛窍固敛，不能出透，故须升发。

宜葛根汤加酒炒芍药、桔梗、苏叶发汗，使麻易出。

一怀胎出麻，只宜清凉，佐以疏托，勿用实脾行气等药，以致堕胎。

安胎止痛方

生地　川芎各五分　桑树羊思藤七片叶　当归　人参　陈皮各一钱　白术　黄芩各一钱五分　黄柏　黄连各三分　甘草三分　糯米二十粒

痛甚加砂仁，虚甚加木香。

胎　产

胎疹才热即出而即没，此风寒所致，宜凉血疏风消痰之药。若难没者，亦由风寒壅盛，或经水浸行太早，速宜疏解。此虽胎疹，亦须避忌。

产　后

产后虽大补气血为主，一遇疹子，不可骤用。如发热之后，热甚者不嫌发散，宜升麻葛根汤，内用炒白芍加苏叶、桔梗，以发其汗，汗出疹亦出矣。凡升发之药不可用寒凉，使毒易出，而无后患也。

虞氏麻疹治法

古谓麻即疹也。疹如麻成朵，瘾如豆成

粒，皆象其形而名之也。夫胎毒一也，痘出于五脏，脏属阴，阴主血，故痘有形而有浆，其症寒热备有也。疹出于六腑，腑属阳，阳主气，故疹有形而无浆，其症多热而无寒也。为症既异，而治法亦殊。痘宜内实，可用补剂；疹忌内实，只宜解散。惟初热发表，略相似耳。既出之后，痘则补气以生血，疹宜补阴以制阳。何也？盖疹热甚则阴分受其熬煎，而血多虚耗，故治以清火滋阴为主，而不可少动其气。若燥悍之剂，首尾当深忌之。世知痘症之重，而不知疹之杀人尤甚，方书多略而不备，可太息也。

一、疹发热之初，多似伤寒，惟疹则咳嗽喷嚏，鼻流清涕，眼胞肿，泪汪汪，面浮肿，两腮赤，恶心干呕为异耳。但见此候，即是麻症，宜谨避风寒，戒荤腥厚味，用药以表散之，使皮肤开畅，腠理通豁，而毒疹易出也。

一、疹之发虽曰胎毒，未有不由天行疠气而发。故用药发散，必先明其岁气。如时令温暖，以辛凉之药发之，防风解毒汤，暄热以辛寒之药发之，黄连解毒汤。大寒以辛温热之药发之，桂枝解毒汤。时寒时暖，以辛平之药发之，升麻解毒汤。此因时用药，不可误作伤寒，妄施汗下，反伐天和也。又须看人虚实，如大便秘结，烦热盛而发不出者，以酒炒大黄微利之，不止，以参药之类补之。经曰：毋虚虚，毋实实，损不足，补有余，夭人性命也。

防风解毒汤

防风　荆芥　薄荷　石膏　知母　桔梗　力子　甘草　连翘　木通　枳壳均分

淡竹叶、灯草，水煎服。

黄连解毒汤

黄连　黄芩　黄柏　栀子　力子　甘草　防风　知母　荆芥　石膏　桔梗　元参　木通

姜三片，水煎服。

桂枝解毒汤

桂枝　麻黄　赤芍　防风　荆芥　羌活　甘草　大力　人参　川芎　姜

水煎服。

升麻解毒汤

升麻　干葛　羌活　人参　柴胡　甘草　桔梗　力子　防风　荆芥　赤芍　连翘　淡竹叶

水煎。

前药发散，而疹随见，则毒尽解矣。若发不出，再加味麻黄之药发之。

加味麻黄散

升麻　麻黄　人中黄　大力　蝉退等分

水煎服。

外以芫荽、酒糟，蒸热擦之，自头上至足为齐。若头面愈多者为佳，倘迟延日久而不能出，则腹胀气喘，昏眩闷乱，烦躁而死。

一、看疹之法，多于耳后项上腰腿先见，其顶尖而不长，其形小而匀净者吉。若色见红者，兼火化也，轻症可治，化斑汤主之。如白者，此血不足也，养荣汤主之。如色紫赤，干燥暗晦，乃火盛毒炽也，宜六一散、四物汤，加柴胡、黄芩、干葛、红花、力子、连翘之类，滋阴凉血，而热自除，所谓养阴退阳之义也。此亦五死一生之症，外有大青龙汤，入烧人屎亦妙。如便秘者，加酒大黄利之，或元参解毒汤，皆可选用。若黑色者，热毒太甚为十死一生之症，不可不明察，而混施治也。

化斑汤

人参　知母　石膏　大力　连翘　升麻　甘草　地骨皮　淡竹叶　糯米

水煎服。

养荣汤

人参　当归　红花　赤芍　甘草

水煎服。

六一散

滑石六两　甘草一两

为细末，量小儿大小，每服一钱半或二钱。本方加辰砂三钱，名辰砂益元散。

四物汤

当归　熟地　白芍　川芎

大青龙汤

玄参　大青　桔梗　人中黄　知母　升麻　石膏　栀子　木通

水煎服。

元参解毒汤

元参　黄芩　山栀　桔梗　甘草　生地　干葛　荆芥均分

水煎服。

一、疹表后，红影出于肌肤成片，切戒风寒生冷。如一犯之，则皮肤闭塞，毒气壅滞，遂变为浑身青紫，而毒反内攻，烦躁肚痛，气喘闷乱，诸症作矣。欲出不出，危亡立至，其可忽诸？

一、疹已出而反没者，乃风寒所逼而然也。若不早治，毒成内攻，以致痒塌而死，急用消毒饮，合升麻汤服之，则疹复出而安矣。

升麻汤

升麻　干葛　白芷　甘草　姜　葱

水煎热服。

消毒饮

荆芥　力子　甘草　姜

水煎服。

一、发热之时，遍身出汗，此毒从汗解，玄府开，疹易出也。有出衄者，此毒从衄解也，俱不可遽止之。若汗多血多皆不止，此火甚逼迫太过，致汗妄流，血妄行也。急宜当归六黄汤以止汗，茅化汤以止血，迟则汗出多而元气虚，血出多而精神散，难以治矣。

当归六黄汤

当归　黄芪　黄连　黄柏　生地黄　熟地黄均分

水煎。外加浮小麦止汗。

茅化汤

茅化　归头　丹皮　生地　甘草

加玄参、百草霜，水煎服。

一、发热时或呕吐，或自利或滞下，此火邪内逼，毒气上行则吐，下行则利，毒太甚则里急后重，而为滞下也。吐者，竹茹石膏汤。自利者，升麻泽泻汤。下者，黄芩芍药汤，加黄连、生地、木通、当归、人参、枳壳，或少加大黄微下之。

竹茹石膏汤

陈皮　半夏　石膏　白茯苓　甘草　竹茹

水煎服。

升麻泽泻汤

猪苓　泽泻　赤苓　石膏　黄连　甘草　升麻均分

水煎服。

黄芩芍药汤

条芩　白芍　升麻　甘草

水煎服。

一、发热之时，未有不渴者，但当以绿豆灯心汤，入炒米饮之，人参白虎汤佐之，以生津解渴而已。若恣饮冷水，恐生水畜之症，故水入于肺，为喘为嗽，宜用葶苈，以泄肺中之水。水入于脾，为肿为胀，为自利，宜用白茯苓、生地、木香，以泄脾水。水入于胃，为呕为哕为自利，宜用猪苓、泽泻、赤苓、木通，以泄心下之水。水入于肝，为胁痛，用芫花以泄肝水。水入于肾与膀胱，为小便不利，为阴囊肿，用车前、木通，以泄肾及膀胱之水。俱当因其症而治之。

人参白虎汤

人参　石膏　知母　甘草　糯米

煎服。

一、疹出之时，咽喉肿痛，不能饮食者，此毒火拂郁，上熏咽喉也。宜用甘桔汤，加元参、大力、连翘主之。更以十全散，若玉锁匙吹之，切不可妄用针刺出血也。

甘桔汤

甘草　桔梗

十全散

黄芩　黄连各一钱五分　苦参一钱　元胡三分　硼砂二分　乳香二分　儿茶　雄黄各五分

为细末，每用少许，芦筒吹之。

玉锁匙

硼砂一钱　朴硝五分　僵蚕一条　片脑五厘

为末吹之。

一、疹出之时咳嗽口干心烦者，此毒在心肺，发未尽也。用泻白散，若黄连杏仁汤。

麻疹作泻，加厚朴、甘草。

泻白散

桑皮　地骨皮　甘草　竹叶　灯草

水煎服。

黄连杏仁汤

黄连　陈皮　杏仁　麻黄　枳壳　干葛　姜

水煎服。

一、疹出之时，自利不止，或泻稀水频数者，最为恶候。但要看其疹，若遍身稠密太盛，或紫色，或红色，甚者则无妨。盖毒在大肠，非泻则毒不解，惟用平胃散加干葛、连翘以解之。疹一发透，依期收去，自然泻止。若疹已收，而泻犹不止，疹必未尽，再用前药，加连翘、川连、大力、木通、泽泻以分利之。若用诃子、肉蔻等，则变肚痛胀满喘急，危矣。

平胃散

苍术　厚朴　陈皮　甘草

一、疹子之出，常以六时收为度。如子为阳午后收，午后为阴子后收，乃阳生阴成，阴生阳成，造化自然之妙也。故渐出而渐收者，其势轻。若一出之后热不退，延绵三四日而不收者，此毒火太甚，外发不尽，内为有余之邪所致，须投化斑汤。

化斑汤

人参　知母　石膏　大力　连翘　升麻　地骨皮　甘草　淡竹叶　糯米

水煎服。

三味消毒饮

荆芥　大力　甘草　生姜

水煎服。再加元参、石膏、桔梗为治。

一、疹子出后，自然退热。若遍身既出，而犹拂拂烦热，频作呕吐者，此毒尚未尽，留连于肺胃之间，宜化斑汤见前。大便秘少，加大黄利之。

一、疹已收去，反浑身发热，昼夜不退，此毒未尽解，邪火抑于肌肉之间，久则毛发干焦，皮肤枯槁，肌肉羸瘦，为骨蒸劳瘵之症。急宜芦荟肥儿丸，加当归、连翘等治之，迟则变为睡则露睛，口鼻气冷，手足厥逆，瘛疭慢脾风，不治之症矣。

芦荟肥儿丸

芦荟　龙胆草　木香　地骨皮　使君子　麦芽　槟榔　黄连　白芜荑　胡黄连

为细末，猪胆汁为丸，如黍米大，每服五六十丸，饮汤下。

一、疹收之后，身虽不羸瘦，但时发壮热，烦躁不宁，搐掣惊悸，神昏志乱者，此阴血衰耗，致余毒入肝而传于心也，宜养血安神，四物汤加麦冬、枣仁、石菖蒲、龙胆草、茯苓、黄连、辰砂、甘草、竹叶、灯心主之。或以前药为末，蒸饼，猪心血为丸，服之亦可。

四物汤

地黄　当归　川芎　白芍

一、疹毒入胃，久而不散，致成牙根黑烂血出，为走马疳，传与二颊浮肿，久而穿颊破腮，缺唇崩鼻，为崩砂狐惑等危症。外用文蛤散，或雄黄散搽之，内服芦荟丸，以清胃火。或有愈者，然不能多见也。

文蛤散

文蛤一钱五分　雄黄一钱五分　梔子枯矾五厘　蚕退下烧灰为末

米泔漱口，搽药。

雄黄散

雄黄一钱　黄柏一钱　麝香五分

和匀，以艾煎汤，洗净后，搽药末。

芦荟丸

人中白　芦荟　使君子肉　龙胆草　黄连　五灵脂均分

共为细末，浸蒸饼为丸，白滚汤下。

一、疹出之时，曾作泻痢，未经清解，至疹退之后，变为休息痢，不问赤白，里急后重，昼夜无度频并者，此余火毒在肠也。须分虚实治之。实者三黄丸利之，虚者香连丸和之，后用黄芩汤合益元散，以养血行气为治。河间云：养血则便脓自愈，调气则后重自除。诚哉是言也。

三黄丸

黄芩蒸　黄连炒　大黄蒸熟

为末糊丸，桐子大，每服三十丸，白汤下，量儿大小虚实加减。

香连丸

黄连一两　吴萸五两

同水拌匀炖滚水内，半日取出，炒干拣去吴萸，只用黄连为末，再加木香一两，不见火，为末和匀，黄连末醋糊丸，米汤下一二钱。

黄芩汤

黄芩　黄连　当归　川芎　木香　青皮　枳壳　槟榔　甘草

水煎好，入益元散调服。

益元散

滑石六两　甘草一两　辰砂三钱

为末，量儿大小，或一钱五分，或二钱。

一、疹退之后，微微咳嗽者，此余毒未尽也。用清肺饮，加力子、甘草治之。若嗽甚，气喘连声不止，名为顿嗽，甚至饮食汤水俱呛出，或咳出血者，此热毒乘肺而然也。宜麦冬清肺饮，加连翘主之。如见胸高如圭，肩耸而喘，血从口鼻而出，或摆手摇头，面色或白或青或红，以及枯暗者，皆不可治之症也。然亦有肺气虚，为毒所抑而发喘，并无咳嗽出血呛食等证者，亦用麦冬清肺饮，倍加人参治之。切不可拘于肺热之一端，而纯用清肺解毒之药也。

麦冬清肺饮

川贝　天冬　桔梗　力子　瓜蒌　知母　麦冬　杏仁　兜铃　甘草

加糯米，水煎服。

一、疹退之后，声哑不出，或咳或喘，或身热不退，以致日久不愈者，此热毒未尽，肺金受克也。宜清金降火汤，加竹沥、生姜汁主之。

清金降火汤

黄芩　贝母　瓜蒌　麦冬　力子　黑山栀　知母　杏仁　元参　麻黄　石膏　竹叶

水煎服。

一、疹退之后，饮食如常，动心如故，猝然心腹绞痛，遍身汗出如水者，此元气虚弱，失于补养，外虽无病，内已虚损。又为恶气所中，谓之中恶，此朝发夕死之证。急用养荣双和汤救之。如有积食，加神曲、麦芽，如有热，去肉桂。

养荣双和汤

人参　当归　熟地黄　黄芪　肉桂　白芍　麦冬　甘草

水煎服。

一、疹退之后，热毒未尽，或发痈毒，四肢骨节疼痛者，宜用羌活散，黄酒冲服一二钱，量大小强弱与之。使其微汗微利而愈。

羌活散

羌活　穿山甲　大黄　全蝎　皂角刺　乳香　一叶金　白芷梢　甘草

一、疹退之后，余热未尽，或热甚而失血者，犀角、地黄合黄连解毒汤治之，或四物汤加茵陈、木通、犀角之类，以利小便，使热气下行而愈也。

犀角地黄汤

犀角　白芍　黑山栀　生地黄　丹皮　黄芩　红花　当归　甘草　藕节

水煎服。

黄连解毒汤

黄连　黄芩　黄柏　力子　连翘　黑山栀　防风　木通　荆芥　元参　甘草　竹叶

四物汤　见上。

一、疹收之后，余热未退，日夜烦躁，谵语昏狂者，宜用益元散，煎灯芯汤下，或五苓散去白术、肉桂，加辰砂、黄芩、黄连治

之。若初发疹时，即有烦躁谵语之证者，升麻葛根汤，加葱白、黄芩，夏令再加石膏。如或风盛者，并加消风散，兼调益元散服。

益元散

滑石　辰砂　甘草

五苓散

茯苓　猪苓　白术　肉桂　泽泻

升麻葛根汤

升麻　葛根　赤芍　力子　木通　连翘　甘草

水煎服。

一、孕妇出疹者，宜用四物汤，加白术、黄芩、艾叶等养胎清热为主，使胎无虞，而疹易没也。如胎气上攻，急以芒麻根、艾叶少许煎汤，磨生槟榔服之，更宜多服上药为妙。

一、热毒蒸胎，胎多受伤，但胎虽伤，而母实无恙也。盖疹与痘不同，痘宜内实，故胎落而母易亡。疹宜内虚，故胎去而母易存。然与其胎去而母存，孰若母子两全之为愈也。

一、出疹之症，比较出痘似轻，然调治失宜，其祸反不旋踵。盖痘由胎毒而发，其形势轻重多少，自可预断。至于疹子，虽由感受邪气而发，然轻者可重，重者可轻，全在调治有方，方保无虞。故其饮食禁忌，比痘为甚。若食鸡鱼，则终身皮肤粟起如鸡皮之状，但遇天行出疹之时，又要重出。误食油肉，则每岁出疹之月，必然下痢脓血；误食盐醋，即患咳嗽，且遇出疹之时，必复发咳；误食五辛之物，不时惊热，必待过四十九日，或百日之后，始可无忌也。

《原瘄要论》终

麻疹备要方论

〔清〕　吴砚丞　编辑

《麻疹备要方论》提要

清·吴砚丞编辑。砚丞字亦鼎，徽州歙县人，咸丰三年刊成。考先哲传书，详于论痘，略于论麻。盖以麻出六府，与痘出五藏者不同。治得其法，可以片言居要，后学不明此意，辄谓治痘难，治麻易，浅试轻尝，多致草菅人命，良可悲也。先生汇有《麻疹备要》，皆采古人精言良法，可与明理者证活幼之心源。其首元始论，次疹脉，次辨症，次初热，次疹治合时，次见形论治，次收没论治，次分论始终杂证，次禁忌，次麻疹备用诸方，删繁就简，取精用宏，诚治麻瘖之要诀也。

吴　序

夫天有非时之气，人即有非时之疾。禀赋强厚者，尚得以元气胜之，惟麻痘两症，尽人不免；每多发于婴儿，则为寰区通病。考先哲传书，详于论痘而略于论麻，盖以麻出六腑，与痘出五脏者不同，治得其法，可以片言居要，后学不明此意，辄谓治痘难，治麻易，浅试轻尝，多至草菅人命，良可悲也。壬子岁，自春延及夏秋，凡大村小落，小儿枉折者，不知凡几。虽曰气数使然，亦半由司命者未得其窍要也。砚丞汇有《麻疹备要》，皆采古人精言良法，可与明理者证活幼之心源。顷因家君代刻《神灸经纶》一书，请付梓其后，爰志数言于简端。

时咸丰三年岁次癸丑仲夏月双溪吴与九书于聊且粗略之居

《麻疹备要方论》目录

原始论 …… 659
疹脉 …… 659
辨症 …… 659
初热 …… 660
疹治合时 …… 660
见形论治 …… 661
收没论治 …… 661
分论始终杂证 …… 663
　发热 …… 663
　身冷 …… 663
　咳嗽 …… 663
　气喘 …… 663
　气促 …… 663
　呕吐 …… 664
　吐下蛔虫 …… 664
　烦渴 …… 664
　谵妄 …… 664
　发搐 …… 664
　饮食 …… 664
　目疾 …… 664
　鼻症 …… 664
　口舌牙喉病 …… 665
　论汗 …… 665
　腹痛 …… 665
　泄泻 …… 665
　痢疾 …… 665
　大小便闭 …… 666
　沉睡 …… 666
　麻疥 …… 666
　妊妇出疹 …… 666
　盖痘疹 …… 666
　瘾疹 …… 666
禁忌 …… 666
麻疹备用诸方 …… 666

麻疹备要方论

清　古歙　吴亦鼎砚丞编辑
鄞县　曹赤电炳章圈校

原　始　论

疹之为病也，本乎胎毒，感时行沴戾之气而发，亦与痘同。但痘出五脏属阴，阴主血，故有形有浆，其症有寒有热有虚实。疹出于六腑属阳，阳主气，故有形无浆，其症多实，有热而无寒。症既不同，治法亦异。世咸知痘疹所系于人者甚重，而不知疹之系人生死者为尤重。盖人当有生之初，受天地之气以成形，干为天阳也，故称乎父，坤为地阴也，故称乎母。阴阳二气交感，而相火即寓乎其中，所以阴中之火，伏于人之身，发而为痘，阳中之火，伏于人之身，发而为疹。当其未发，无形可拟，无迹可寻，如石中之火，必击而后动。及其动也，因人之禀质为轻重，轻者可不治而愈，重者非善治不愈，所谓先天而天不违者此也。又必因天行之时气为缓急，缓者外邪之来不暴疾，可轻散，可清解，随表达而不遗；重者外邪之气多暴疾，正气先被其侵伐，内毒蕴结而不出，急当专力以治其标，使蕴结者乘势而外达，所谓后天而奉天时者此也。苟能悉先天之体，明后天之用，则周旋折旋，无所往而不得其中矣。

疹　脉

凡候疹脉，自初热见形，以及收没，但看右手一指脉洪大有力，虽有杂症，亦无大害，盖右手一指脉，太阴肺脉也。肺主皮毛，脉气通，自能载毒外出，是以无害。若肺脉沉小无力，大非所宜，疹发于阳经，脉反沉小，是为阳症阴脉。司命者于此处最要留心，不得谓疹症无虚寒，而固执清热解毒，以败乃事也。

辨　症

症者证也，证之于外，以知其内。凡病皆然，不独疹也。疹出于脾肺二经，初必因外感而发，与伤风伤寒无异，特其症咳嗽喷嚏，面肿腮赤，目胞浮肿，眼泪汪汪，鼻流清涕，呵欠闷顿，乍凉乍热，手足稍冷，或中指独冷，睡时惊悸，或恶心呕哕，或以手掐面目唇鼻，是皆出疹之候。又必发热五六日，而后见遍身红点，大者如苏子，次者如芥子，小者如蚕子，而成粒成片者是也。麻则最细而碎，如蚊迹模糊，斑则无颗粒，惟成片红紫，如云如锦。又有遍身但红而绝无斑点者，谓之火丹，数种亦皆疹类，大都正疹则热至五六日而后出，则成朵成粒，非若斑疹之皮红成片也。且斑疹之出，则不拘三日四日五日六日，出而又没，没而又出，俗谓一日三出，三日九出，只要出透，以遍身红润者为美，最嫌黑陷，及面目胸腹稠密，缠锁咽喉者为逆。发不出而喘者即死。如伤寒发斑，不能透发者亦危。金鉴谓麻为正疹，亦胎元之毒，故凡出疹，必须识各经中现症，如邪气遏郁于脾，则泄泻不止，扰乱于心，则烦热不退而发惊，熏灼于肺，则呕嗽出血，移热干肝，则目多眵泪，归结于肾，则牙龈烂面疳蚀。五藏受病既深，正气日馁而不振，若

非及早图之，鲜有不败者矣。更有不治之症，如黑黯焦枯一出即没者，气血两败也。鼻扇口张者，脾肺气将绝也。鼻青粪黑者，脾肾垂危也。气喘心前吸者，心气已殆也。谚云：走马看麻痘，极言其变迁甚速，非比寻常内伤外感，可缓治以图功。

初　热

天地六淫之气感人，多致发热，但手足稍微冷，恶寒而无汗，面色青惨不舒，左颊有青纹者，伤寒之热也。手足稍微冷，发热有汗，面赤而光者，伤风之热也。目胞肿，右颊有筋，发热时头额肚腹更甚，或兼呕吐腹疼者，伤食之热也。面色青红，额正中有纹，手掌心有汗，时作惊惕，手络微动而发热者，惊热也。身热而倍能食，唇红颊赤，大小便秘，胁下汗者，火热也。面色红黄，发热多汗，腹痛吐泻，暑邪湿热也。凡此症各不同，而热则一。麻疹之热，又何以别？大法以面赤耳冷，手中指独冷，目含泪，鼻清涕，咳嗽喷嚏为别耳。且麻疹发热见点，近者五六日，远则七八朝，甚者有十余日，不限定日数也。初起一二日内，不可即行汗解，妄用寒凉，若热发微和，发一日退一日，可不必服药。如热来连日不退，嗽烦无汗，宜毒发表汤主之，或用升麻葛根汤发之。

疹治合时

疹由胎毒，亦必因时令之气而发，先宜表托，使毒尽达于肌表。若过用寒凉，遏伏热毒，则必不能出透，多致毒气内攻，喘闷而亡。若已出透，又当清利，以解余热，免致疹后变生诸症。且疹属阳，热重则阴分受伤，血为所耗，故没后必须养血，以保阴亏发燥；勿执泥于清利也。若病者血气和平，素无他疾，虽感时气，而正能胜邪，发热必然和缓，微微汗出，神清气爽，二便调匀，见点则透彻，收没亦不疾不徐，此为轻而易治，故万氏家法，戒用药不可太早，恐致耗散元气，反生害患，必待见点方用，徐徐升发。然饮药亦有次第，凡一剂分作十余次服，以疹在皮肤之间。若作一次服，则药性催之太速，每致谵语烦躁，是可为轻视妄药之良箴也。若素有风寒食滞，表里交杂，一触邪阳，火旺之气，内外合发，而正不能制邪，必大热无汗，躁烦口渴，神气不清，便闭尿涩，见点不能透彻，收散或太急速，则为重而难治，急宜临机审察，果犯何逆，损其有余，扶其不足，毋稍存游移之见，此又万氏之法不可拘守也。善治者机圆而法活，用药必合时宜，如时值温暖，宜发之以辛凉，用防风解毒汤。时值暄热，宜治之以辛寒，用黄连解毒汤。若大寒之时，宜以辛温发之，用桂枝解毒汤，或麻黄汤。当乍寒乍暖之际，宜以辛平发之，用升麻解毒汤，或荆防败毒散。因时用药，毋伐天和。又须看人之虚实。如大便闭结，躁烦热重，疹发不出，属实症者，将酒蒸大黄微利之。如大小便清利，热不重，吐利不止，属虚症者，可加人参、白术之类补托之。毋实实，毋虚虚，贵得其平，中病则止。如用前药发散，一剂而疹仍不出，再作一剂，水煎温服，外擦以芫荽酒，又以芝麻藤酒熏之，务使肌理疏通，疹尽透发于表，庶无腹胀喘闭之患。若再不出，则为不治之症矣。然亦有不尽然者，当人人束手之时，细心详察。

一初起发热，遍身自汗，此毒从汗解，麻疹易出。若自汗过多，又是火盛内迫，致汗妄流，恐有亡阳之变，宜当归六黄汤加浮麦止之。

一发热鼻血，亦毒从鼻衄解也，不可妄治，倘血出太多，是火盛致血妄行，以茅花汤主之。

一发热呕吐者，是邪火内逼，毒气上行，用竹茹石膏汤，微吐者不必用此。

一初起自利甚者，亦火邪内炽，毒气奔下大肠，宜升麻泽泻汤。

一初热里急后重，毒甚而滞下也，宜黄芩芍药汤。

一初热咳嗽气急，而出不快者，宜麻黄汤，春夏秋加石膏，冬加桂枝，或用羌活散，或用消毒饮，外以芜荽酒自头至足遍擦之。

见形论治

麻出有阴阳部位多寡之分，自头而背及四肢向外处为阳部，宜多出起顶，向内处为阴部，宜稀少。若见阳部稀疏而不起顶，纵阴部多出起发是阴阳相反，必有后患，当预防之。又云：自耳后项上腰腿先见，其顶尖而不长，其形小而匀净者吉也，勿药有喜。大凡疹子只要出得尽，则毒邪散，正气自得和平。如拂拂发热，烦闷不安，如蛇在灰，如蚓在尘，或呕吐注泻，皆毒邪壅遏，尚未尽出，急用托里散表之剂，或用麻黄汤，去杏仁加蝉退、升麻，外用胡荽酒之类。

一疹出色白，由于脾胃气馁，血不充肌，不可专主于清热，宜助益脾气，或养营汤，或人参败毒散主之。

一风寒外闭，欲出不出，热重无汗，内外有不可解之势，速用羌活内托散。若见隐影紫色，热甚气喘，宜清热黄芩汤。

一麻出紫黑，晦暗不透，宜黄连解毒汤。若紫红干燥色晦，是火毒炽盛，宜滋阴凉血汤，或大青汤，或元参汤选用。

一麻出不透，热极目红，发痰作喘，此毒未尽出，气因热逼，宜用柴连解毒汤。

一麻出热不退，渴不止，遍身如锦纹者，宜化斑汤，毒甚烦躁不眠，紫滞不红活者，宜疏风解毒饮。夹痰烦渴者，宜人参白虎汤。

一麻出夹斑，无他杂症，宜小柴胡汤。若蕴毒发斑者，宜黄芩橘皮汤。疹出色黑，热毒亢极，乃不治之症，姑用加味化斑汤，或凉血解毒汤。

一麻出紫赤，内热极也，但得形色光润，颗粒尖耸者可治，速宜清凉解毒，佐以清痰定喘，便得安痊。若枯燥无起色者不治。又有见暖则红活，不暖则枯燥，是为风寒所折，虽宜凉解，不可太过。如见疹色鲜红，光泽有艳，头粒离肉者轻，头顶平塌不起者重。

一麻出如云一片红肿，又有细碎红点，见于红肿大片之上，此毒火炽盛，宜清解分利。

一疹已透表而粒焦者，无分红淡，皆属热重，急当清解肺胃之热，分利小便。如大便闭者，佐以凉血润下之品，甚则投以承气汤，失治则变紫黑，难以救疗。

一暑月出疹，发自阳明，古人治暑，以白虎汤主之。盖以暑必兼湿，非用甘寒，不足以彻其热。若疹毒内发，暑湿外侵，烦渴神不安者，宜却暑丹，佐以化毒。

一咳嗽气喘，口于心烦者，乃毒在心肺发未尽也，宜泻白散。

一咽喉肿痛，不能食者，乃毒火抑郁上熏，宜甘桔汤加味，或以千金散少许，用竹管吹入喉中，或玉锁匙亦可。

一疹出即没，烦渴躁甚者，宜白虎汤加桔梗，连进二三服，若疹出后，热不退，连绵三四日不收者，此毒火太甚，外发未尽，内有余邪，宜化斑汤，或消毒饮，加元参、石膏、桔梗。倘遍身既出，而犹烦热，频作呕吐，此毒邪留于肺胃，亦宜化斑汤。如大便闭结者，少加大黄微利之。

收没论治

麻疹收没，期以三日为常，不疾不徐，自无后患。若未至三日而没，肌肤暖处，绝无形影，此为太速，必因调摄不谨，或为风寒所袭，或为邪秽所触，以致毒反内攻，急宜内服荆防解毒汤，外用胡荽酒熏其衣被，使疹透出，方保无虞。有至二三日，疹虽没而肌肤暖处还有形迹，此毒尚未尽，失治必致内攻，仍当疏托，佐以清凉。若当散不散者，内有虚热留滞于肌表也，切不可纯用寒凉之剂，以柴胡四物汤治之，使血分和畅，余热

悉除，疹即没矣。若麻点带白色，隐于肌表，似没而不没者，必因风寒外折，而不能透发，亦表虚故也，宜温散风寒，使白变红活，免致生变。古云：白疹温而自消是也。有延至五六日不没者，此内热未除，以致不能尽没，宜清凉佐以利水。若加烦躁，右关脉洪数有力，此胃中伏有湿热，宜化斑汤。若疹已没而身犹热，昼夜不退，此邪火伏郁皮肤之间，久则毛发焦枯，肌表干燥，肉见消瘦，是为骨蒸痨症，宜芦荟肥儿丸治之，迟则不救。如疹没后身虽不见瘦削，但时发壮热，烦躁不安，搐掣惊悸，神昏志乱者，此阴血虚耗，余毒入肝而传于心，宜枣麦四物汤主之。

一疹没绵绵发热，不知早治，则成疳症，必致腹胀，午后发热头痛，宜柴苓四物汤。若口渴少食烦闷，宜小柴胡汤。

一没后潮热，宜升麻葛根汤，烦渴用黄连解毒汤，溺赤如米泔汁宜五苓散加车前子、木通。若见便血，宜黄连解毒合犀角地黄汤。鼻血用凉膈散，加栀仁、生地童便。

一没后日夕烦躁，谵语狂乱，是余热在肺胃，宜辰砂益元散，灯草煎服下，或辰砂五苓散，水煎服。

一没后饮食如常，动止如故，卒然心腹绞痛，遍身汗出如水，此元气虚弱，失于调补，偶为恶气所中，谓之中恶，危在旦夕。用砂仁末二钱，浮麦煎汤冲服，或伏龙肝泡水温饮，亦百中救一。

一没后腹痛兼泻利，宜连芍汤。若腹胀不食，脾胃受伤，宜柴苏清肺饮。

一面目浮肿，此饮食内伤，或过食生冷，致阴阳不能升降，膀胱之气不行。如见小便短少，必致气喘，宜五苓散，加木通、滑石、腹皮。若见喘促，又宜四苓，加竹沥、桑皮、葶苈。喘促甚急者不治。

一没后泄泻，用黄连解毒合导赤散。若泄泻不止，口渴目闭，四肢厥冷者难治。加以呕吐不食，肛门突出，或大孔直如竹筒者不治。如没后痢疾，是热积大肠，宜四苓加芩、连、木通、白芍，或香连丸亦可。

一没后咳嗽，宜凉膈散，加桔梗、地骨皮。嗽不止，宜清肺饮，或四物合二陈，加桔梗、瓜蒌、五味。渴加麦冬。喘加桑皮、枳壳、苏子。呛嗽或咳出血，此热毒乘肺，宜麦冬清肺饮。

一胸高如龟，肩耸而喘，血从口鼻出，摇头摆手，面色时变枯黯者不治。亦有肺气虚，为毒所遏，而发喘不已者，宜清肺饮，倍人参，不可拘肺热一端，纯用清凉。若声哑喘咳，身热不退，肺金受克，宜清金降火汤。又有麻毒内攻，喘促胸突，肚急目闭者，九死一生之症，速用防风消毒饮治之。

一没后发痈毒，肢节疼痛者，乃热毒留结，宜羌活散，微汗利之。或遍身生疮，为麻风疮，宜大连翘饮。若生疮发热不退，宜解表，用疏风散，不治必每岁应时而发。

一没后眼红目肿，翳膜遮睛，乃麻毒上攻，久必伤目，宜芎归饮。

一口舌生疮肿痛，此心脾有热，必二便结涩，宜清心脾之火，兼润大肠，用猪苓泽泻汤，泄去余毒，其症自愈。若满口唇舌黄赤白烂，其症最重，速宜清胃凉血，佐以润肠。

一没后牙疳，乃心脾二经为毒火所攻，若不早治，渐有穿腮落齿之患，甚至痰喘，救无及矣。又麻后血液伤耗，早食甜物，及感风生虫侵蚀筋骨，口鼻坏烂，先以米泔温洗净，急用胜金散敷之，或揩牙散亦好，仍以消毒饮煎服，合四物汤加甘草五味更妙。若烂喉者，以小竹筒装药吹之。如山根发红点者，便不可治。若牙疳肉烂，鼻血横行，并为失血之症，用四物加山楂、茵陈、木通、犀角治之。如疳及舌苔白色者，则胃已烂，亦不可治。又有麻毒入胃，结而不散，致成牙龈黑烂出血，是为走马牙疳，久则穿腮破烂，缺唇崩鼻，遂成危症。外用文蛤散吹之，或雄黄散，先以艾煎汤洗净揩之，再服芦荟黄连丸，以清胃火。大抵牙疳一症，初见红肿，

俱宜清胃散主之。

分论麻疹始终杂症

发　热

麻疹非热不出，然有微热，有壮热，有乍热潮热复热之不同。微热者热轻而不壮，惟初起为宜。正出之时，热不可微，微则不能透表，将没及没后见此，为疹毒已尽，不须服药。壮热者经日不退，正出时是为正候。若初起壮热，直至已出不少减，其症必重。没时壮热不退，尤为不宜，急当用药清解，热退神安，方可无虑。然亦有没后壮热，口干唇燥，昏睡沉沉，服清凉解毒之药，热退身冷如冰，少时又复大热，再投以芩、连之类，全无应效。而且面色青惨，喉作鸡声，头摇目泛，气喘神昏，此为中气虚寒，浮阳外越，有不得终日之势。非大辛大热之品，不足以冲开寒痰反真阳于内府，速用熟附汤，或加肉桂、胡椒、炮姜之类，接用附子理中汤，合六味丸料，去泽泻、丹皮，加枸杞子、破故纸，庶使寒消阳复，风熄痰平，再加枣仁、白芍、五味子，以敛其阴，所谓甘温能除大热，正此意也。有热数日止，过数日又热，或一日间早热午凉，中热暮止，均为乍热，未出时见之，毒邪难透，宜疏散，正出时见之，恐毒攻内，宜疏托。若没后乍热，毒邪未尽，当凉解分利。又有一日一度，如潮水之信，来不失期曰潮热。初时必无此症，出尽及没后，气血两虚，营卫之行，失其常度，故热应时而作，宜益阴退阳，乃为正治。复热者热已退而复发，亦没后有之，是余毒未尽，治宜凉解总之疹子出透，其热当减。倘仍大热者，宜化毒清表汤，疹已收没而身热者，宜柴胡清热饮。

身　冷

麻疹属火，身宜温暖，今反身冷如冰，未出正出时见之，最为逆候。正没及没后有此，属气血大亏，脾胃将坏，当行温补，或可得生。

咳　嗽

疹喜咳嗽，咳多则毛窍开而易出，故先时以嗽为吉。若初热三日中咳，至四五日仍不见咳，便非疹候，初时咳少，则腠理秘密，而疹不出，当于发散药中加半夏，以助其咳。又有干咳，连咳不断者，此为火旺，肺金受克，必须清肺降火，佐以升发，初起升麻葛根汤，加前胡、桔梗、苏梗、杏仁，没后用清金宁嗽汤。但疹后旬日内，尚宜有嗽，所遗余毒，须假嗽而散，此顿出顿入之势，切不可见嗽多而治嗽也。

气　喘

喘为恶候，麻疹厚为不宜，喘者开口而作，胸胁高叠，起止不定是也。当分虚实施治，虚者小便清利，大便溏泻，唇白身不甚热，绝无火证又非外邪，必皆气脱之候。此非六气，煎贞元饮，必不可也。实者大便坚结，小便赤涩，热重不退，初出未透无汗，用麻杏石甘汤，已出用清气化毒饮，或如神定喘汤亦佳。大抵未出而喘者可治，已出并没后喘者，多不可救。

气　促

气来急迫，呼吸紧而不和，是属肺病。盖肺为五脏华盖，主气出入，一经毒火熏灼，失其清肃之权，则气不清，因致急促，见于未出正出之时，治宜疏托，甚至鼾鹘声鸣，速为清痰降火，十中可救二三。若见于正没，没后亦宜清火保金。倘见风没早，毒火内攻，并见鼾鹘，可不必治。

呕　吐

麻疹呕吐，是胃中毒火，不能发泄，郁而上攻，须以竹茹石膏汤，和中清热，其吐

自止。若吐清涎白沫，亦胃火内逼，津液上泛，又有吐出如药者，有吐出成块者，皆宜降火消痰，用花粉、贝母、甘桔、芩连、杏仁、桑皮、麦冬之类，南星、半夏等燥药，又不可妄用。

吐下蛔虫

虫之吐下，见于将出正出之间，因胃中有热，膈上有痰，虫不能安，所以吐而下也。正没没后犯此，是热重不纳食，虫无所养，思食而出，若过十余条，则有虫厥之变。初热吐虫者，是脾胃亏虚，疹必难出，大非所宜。没后下虫，乃胃热未清，热退自愈。

烦渴

凡麻疹烦渴者，乃毒火壅甚也，心为热扰，神志不得安然，故嘈杂而烦，胃因热郁，津液被火烁耗，故口干而渴。初出用升麻葛根汤，加麦冬、花粉，已出用白虎汤，没后用竹叶石膏汤。若烦至干燥，渴无已时，则亦难矣。

谵妄

谵妄一症，乃真气昏昧，神识不清所致。夫心藏神而主火，病则热气归焉。麻疹胃中热甚，上乘于心，心为热冒，则神明昏乱，而言无伦次，遂成谵妄之语。未出宜三黄石膏汤治之，已出用黄连解毒汤治之。

发搐

麻症发搐，不可以急惊风同论。初热见形之时，热势勃勃，周身气扰动筋络，遂抽搐，无甚大害，只宜疏散，加以清凉。若没后壮热不除，忽作搐者，宜导赤散，加人参、麦冬，送七味安神丸。小便清者可治，短少者难治。如见多痰，或用抱龙丸，或以四物汤，加麦冬、枣仁、淡竹叶、龙胆草、甘草、黄连、茯苓、辰砂、石菖蒲之类。

饮食

凡出疹不思饮食，此胃为邪气所侵，或三四日，或五六日，亦无妨。切不可因其不食，着意治之，只宜清胃火，疹子出尽，自能渐进谷食。若麻后血虚脾弱，不思食者，宜四物汤，加麦芽、神曲治之。如欲饮水者，可少少与之，则毒气随之渐解。盖疹为实热，自初至末，必皆喜饮凉水，此不必禁。

目疾

凡疹初热未出，眼光如水，此为正候。若眼多眵泪，乃肝脾有火，无分前后，总宜清热。未出时白珠赤肺有热也，疹出自解。没后白珠仍赤，亦肺火未尽，宜清肺泻火。若没后不避风寒，以致眼眶红烂流泪，速宜疏风解毒。若延迟不治，则有终身之患。若没后余毒入目，翳膜遮睛，或成珠目蟹眼，用孙氏洗肝散。又斑疮入目生翳障，用通神散。余毒坏目，用明目方。

鼻症

鼻为肺窍，肺气清则疹易出。若鼻干无涕，脏腑热极，塞而不通，前后见之，皆为重症，或暂涕暂无，或先无涕，热退清涕即来。或因热鼻眵干结，似无涕者，此皆热毒闭塞，速为清热解毒，得嚏涕鼻通，毒即解矣。若毒火上冲，肺气载血上行，则为鼻衄。然衄中有发散之义，以毒从衄解，不须止，但不可太过，过则血脱而阴亡也。如衄甚者，外用发灰散吹入鼻中，内服犀角地黄汤，其血可止。又有鼻扇者，肺将绝也，一见喘满痰鸣，便不能治。若咽清不喘，精神如故，治以润肺清痰，庶危者犹可望其生也。

口舌牙喉病

凡麻症口臭，是火毒积于肠胃，若其人平日已然，又不以此论，只清胃降火，口臭自平。若见唇口破裂，知为心脾二经热毒上

冲，初起色红血活，用清凉加以疏托，尚可解散。如见紫黑枯燥，血已凝滞，遂不易治。没后见此，则心脾已败，必不免于危亡。若唇生疮，亦属胃热，每日用米泔水温洗十余次，渐次消解。至于舌乃心之苗，舌苔薄热亦轻，舌苔厚热亦重，或生疮蕈，白屑肿痛，皆心火炎灼，俱宜清凉疏利治之。惟黑苔枯燥起刺，火亢而兼水化，则胃败矣。凡出疹之先，或有胃火，及出疹之后，余毒不散，热毒积聚于牙龈，若不知早为解毒，多变走马疳症。又有热重咬牙者，此阳隐于阴，必多渴而手足俱热，喜饮冷水，宜滋阴降火。如食辛辣助热之物，必致下血，咽痛痰响而死。盖热毒上攻咽喉，轻则肿痛，重则汤水难下，最为可虑。表邪郁遏疹毒，不能发舒于外，而咽喉肿痛者，元参升麻汤主之。里热壅盛，疹已发于外，而咽喉作痛者，凉膈消毒饮主之。若热毒闭塞肺窍，以致失音，初出用元参升麻汤，已出用加减凉膈散，没后宜儿茶散主之。

论　汗

凡出疹最喜有汗，有汗则腠理开通，毒从汗解，但不可太过。如汗太多，用人参白虎汤，或合黄连解毒汤治之。若皮肤干燥无汗，闭而难出，或致内攻，为腹胀气急等症。此外为风寒所折，夏秋用轻剂宣发肌表，春冬用重剂升散寒邪。如果属火热，闭郁无汗，必唇红破裂，二便结涩，浑身胀痛，多致喘促，鹅鸭痰鸣，速用寒凉，清肺降火，俾肌表透达而有汗，疹即随汗而尽出于外，后可无余毒，不然即成败症，故麻症始终以微汗为吉。

腹　痛

麻症腹痛，由于食滞凝结，热毒不能宣发于外，故有时曲腰啼叫，两眉频蹙，须用加味平胃散治之。若不因食积，全是热毒内结，治宜疏托，使疹子尽出，痛自止矣。没后见此，又宜清凉解毒，使毒内消，痛亦随减。

泄　泻

麻本火候，大便溏泻，黄褐色为正。初热正出时，下利数次，毒气得泄，但不宜多，久久则脾气下陷。毒难发越，后恐变痢，初起作泻者，以升麻葛根汤，加赤苓、猪苓、泽泻主之。已出作泻者，以黄连解毒汤主之。若水泻黄色有沫，小便赤，唇燥口干，乃毒热移入肠胃，传化失常，亦宜清凉利水，俱不可用温热之剂。如自利不止，水泻频数，最为恶候。若疹子稠密，或紫红色，则又无妨。盖以毒在大肠，非泻不解，宜平胃散加黄连、葛根、连翘以解之。疹子发透，自然泻止。有没后仍不止者，此未出尽，再用前药，倍连翘、黄连，加木通，泽泻、牛蒡子分利之，切勿治以固涩，致腹胀痞满，喘急不治。景岳以为泻利一症，果由疹毒，固不可以温补，若其人脾气本弱，或过用寒凉之药，或误食生冷，致伤脾胃，而为泄泻者，虽曰由疹而发，而实非疹毒之病矣。但察其无热症热脉，而兼色白气馁者，便宜温胃饮、五君子煎、胃关煎之类主之。若执谓疹毒不可温，则无不危矣。

痢　疾

麻疹作痢，谓之夹疹痢，因毒热未解，移于大肠所致。有腹痛欲解，或赤或白，或赤白相兼者，悉用清热导滞汤主之。若见痢色紫黯，或如痈脓，屋漏水，鸡肝色，黑豆汁，气喘燥渴，发呃不食，皆不可治。若麻出之时，曾作泻痢，未经清解，至没后变成休息痢，里急后重，昼夜无度，此余毒留于大肠，须分虚实用药。实者三黄丸利之，虚者香连丸和之，再以黄芩汤养血行气，血和则便脓自愈，气行则后重自除，正此谓也。

大小便闭

麻疹大便闭者，乃火邪留结大肠，结而不解，致毒内攻，故无论前后，即与润利无妨。小水赤涩者，初起正出时为正候，若见于正没及没后，为遗毒不散，宜用导赤散治之。如仍不通，或因大便闭结所致，通其大便，小便自利。

沉睡

凡麻疹热轻，神安气定，醒睡如常吉也。设当发热正出之时，昏昏沉睡，必是火邪内郁，未透于表，速宜用药宣发，佐以清热，免致后患。若正没及没后见此，又是热退神清，多睡以养复元气，不为害也。倘昏睡不省人事，不知痛痒，或似睡非睡等症，皆在不治。又有一等面肿目闭者，乃脾经火旺，治以泻黄利水，火退，目闭自开。

麻疳

麻后发热成疳，初时夜间身热自汗即退，或日晡时面红神倦嗜卧，微热得汗稍解，日复如是，宜早为施治，用黄连解毒汤主之。倘延迟失治，或四五十日、或百日、或一二年，形体日瘦，腹膨泄泻，不可救药。

妊娠出疹

凡妇人怀胎出疹，不可与寻常同论，须以安胎清热为主，使胎无犯，而麻易没也，宜四物汤，加条芩、白术、艾叶、砂仁。如胎气上冲，急用苎根、艾叶煎汤，磨槟榔少许，服之即安。

盖痘疹

凡小儿出痘方愈，随即出疹，名盖痘疹。因痘后余毒未尽，更兼不戒口腹，外感风寒，以致遍身出疹，色赤作痒，始如粟米，渐成云片，宜加味消毒饮，疏风清热，疹即愈矣。

瘾疹

瘾疹者，发必多痒，色则红赤，隐隐于皮肤之间，乃心火灼于肺金，又兼外感风湿，先用加减羌活散，疏风散湿，继以加味消毒饮，清热解毒，表里清而疹自愈。

禁忌

凡麻疹初出，切戒风寒生冷，如一犯之，则皮肤闭密，毒气壅滞，遂变浑身青紫，而毒反内攻，烦躁腹痛，气喘闷乱，诸症作矣。欲出不出，危亡立至，首宜慎之。至于饮食，尤宜戒忌，鸡鱼炙煿，盐醋五辛之类，须过七七之后，方宜食之。惟宜食淡，不可纵口，致生他疾。若误食鸡鱼，则终身粟起如鸡皮之状，误食猪肉，则每岁出疹之月，多致下利，误食盐醋，必致咳嗽，亦遇出疹时必发，误食五辛，则不时多生惊热。此皆出疹之家，不可略意，而遗小儿终身之患也。戒之慎之。

麻疹备用诸方

宣毒发表汤

升麻 葛根 荆芥 防风 薄荷叶 枳壳 桔梗 前胡 连翘 牛蒡子 木通 生甘草 淡竹叶

引加芫荽，水煎。外感寒邪，加麻黄，夏月勿用。食滞加南山楂。内热加黄芩。

升麻葛根汤

升麻 葛根 赤芍 生甘草

引加芫荽。水煎。

防风解毒汤

荆芥 防风 连翘 枳壳 牛蒡子 桔梗 石膏 知母 木通 生甘草 淡竹叶

引加灯心，水煎温服。

加味黄连解毒汤

黄芩 黄连 黄柏 元参 山栀仁 桔梗 石膏 荆芥 防风 牛蒡子 知母 木

通　生甘草

水煎服。

桂枝解毒汤

麻黄　桂枝　赤芍　甘草　荆芥　防风　川芎　羌活　桔梗　人参　牛蒡子

生姜引，水煎。

升麻解毒汤

升麻　葛根　荆芥　防风　柴胡　前胡　甘草　桔梗　羌活　牛蒡子　连翘　赤芍

引用竹叶，水煎。

荆防败毒散

羌活　荆芥　独活　防风　茯苓　生甘草　枳壳　柴胡　前胡　川芎　桔梗

引用生姜，水煎服。

当归六黄汤

当归　黄连　黄芩　黄柏　黄芪　山栀仁　生地　熟地

引加浮小麦，水煎服。

茅花汤

生地　丹皮　归身　甘草　茅花　元参　百草霜

水煎服。

犀角地黄汤

犀角　丹皮　生地　白芍

水煎服。

竹茹石膏汤

半夏姜制　赤苓　石膏煅　陈皮　生甘草　竹茹

引用生姜，水煎服。

升麻泽泻汤

赤苓　猪苓　泽泻　甘草　滑石、升麻用引灯芯，水煎服。

黄芩芍药汤

黄芩　黄连　当归　白芍　升麻　甘草　生地　木通　枳壳

或加大黄。水煎服。

羌活散

羌活　防风　川芎　前胡　枳壳　桔梗　薄荷　甘草

引用生姜，水煎服。加连翘、蝉退、茯苓，名加味羌活散。

消毒饮

荆芥　防风　桔梗　枳壳　牛蒡子　升麻　苏叶　甘草　石膏

引用生姜，水煎服。

本方去枳壳、桔梗、苏叶、石膏，加连翘、赤芍、山楂，名加减消毒饮。

养营汤

人参　当归　赤芍　红花　甘草

水煎服。

羌防内托散

羌活　防风　葛根　桔梗　楂肉　地骨皮　蝉退　僵蚕　连翘　甘草

引用姜、枣，水煎服。

清热黄芩汤

黄芩　赤芍　木通　防风　葛根　桔梗　楂肉　元参　连翘　蝉退　僵蚕　花粉　石膏　地骨皮

引用灯芯，水煎服。

黄连解毒汤

黄连　黄芩　黄柏　黑山栀

水煎服。

滋阴凉血汤

当归　白芍　川芎　柴胡　葛根　牛蒡子　黄芩　连翘　红花

水煎服。

大青汤

大青草　元参　桔梗　石膏　知母　人中黄　栀子仁　木通　升麻

水煎服。

元参解毒汤

元参　甘草　桔梗　山栀　黄芩　葛根　荆芥　生地

水煎服。

柴连解毒汤

柴胡　黄芩　黄连　元参　知母　贝母　防风　赤芍　连翘　牛蒡子　陈皮　甘草

水煎服。

化斑汤

人参 知母 石膏 牛蒡子 连翘 升麻 地骨皮 竹叶 甘草 粳米

水煎服。

人参白虎汤

人参 石膏 知母 甘草 粳米

水煎服。去人参即白虎汤。

疏风解毒饮

荆芥 牛蒡子 丹皮 元参 贝母 苏叶 黄连 甘草 麦冬

水煎服。

小柴胡汤

人参 半夏 甘草 黄芩 柴胡

引用生姜，水煎。

黄芩橘皮汤

黄芩 陈皮 干葛 杏仁 枳实 麻黄 厚朴 甘草

水煎服。

凉血解毒汤

当归 生地 紫草 红花 丹皮 连翘 白芷 川连 甘草 桔梗

引用灯芯，水煎服。

小承气汤

大黄 厚朴 枳实

水煎服。

却暑丹

黄芩 甘草各五钱 朱砂二钱

研末蜜丸，麦冬汤下。

泻白散

桑白皮 地骨皮 甘草 粳米

水煎服。

甘桔汤

甘草 桔梗 连翘 元参 防风 牛蒡子

水煎服。

千金散

黄柏钱半，酒炒 黄芩二钱 元参五分 硼砂三分 乳香二分 儿茶四分 雄黄五分

共研细末，每用少许吹之。

玉锁匙

硼砂一钱 朴硝五分 僵蚕二条 冰片五厘

共为细末，用竹管吹之。

荆防解毒汤

荆芥 薄荷 黄连 防风 大青草 黄芩 犀角 人中黄 连翘 牛蒡子

引用灯芯、芦根，水煎。

四物汤

生地 白芍 当归 川芎

水煎服。

柴胡四物汤

即四物加人参 柴胡 淡竹叶 地骨皮 知母 黄芩 麦冬

引用姜、枣，水煎。

枣麦四物汤

即四物加麦冬 枣仁 黄连 石菖蒲 淡竹叶 龙胆草 茯神 甘草

引用灯芯，水煎。

柴苓四物汤

即四物加茯苓 黄芩 陈皮 甘草 柴胡 黑山栀 木通

水煎服。

芦荟肥儿丸

芦荟 龙胆草 木香 蝉蜕 人参 胡黄连 川黄连 槟榔 芜荑 使君子肉 麦芽 当归 连翘

各制为末，猪胆汁丸黍米大，每服五六十丸，米饮下。

五苓散

白术 泽泻 茯苓 猪苓 官桂

水煎服。本方除桂，即四苓散。本方加辰砂，即辰砂五苓散。

凉膈散

大黄 朴硝 黑山栀 连翘 黄芩 薄荷 甘草

水煎服。

辰砂益元散

滑石六钱 甘草一钱 辰砂三分

共为细末，每服三钱，灯芯煎汤调服。

连芍汤

当归　白芍　黄芩　黄连　甘草　枳壳　葛根　陈皮　苍术　乌梅

水煎服。

清肺饮

知母　贝母　甘草　桔梗　杏仁　牛蒡子　石膏　马兜铃　粳米

水煎服。

麦冬清肺饮

即前清肺饮加麦冬　连翘

水煎服。

紫苏清脾饮

防风　柴胡　苏叶　厚朴　腹皮　当归　山楂　香附　神曲　麦芽　陈皮　甘草　砂仁

水煎服。

导赤散

生地　木通　甘草梢　淡竹叶

水煎服。

香连丸

黄连一两，吴茱萸一两水拌盖定，坐滚水内半日许，炒拣去萸　广木香三钱，不见火

同研末。醋糊丸。每服一钱。米饮汤化服。

清金降火汤

生地　当归　白芍　陈皮　瓜蒌子　贝母　天冬　杏仁　甘草　石膏　黄连　黑山栀　桑皮　茯苓　元参　苏梗　黄芩

水煎，加姜汁、竹沥服。

防风消毒饮

荆芥　防风　牛蒡子　甘草　枳壳　桔梗　石膏　苏叶　百部　马兜铃　葶苈　桑皮

水煎服。

大连翘饮

当归　赤芍　荆芥　防风　黑山栀　黄芩　柴胡　甘草　蝉蜕　淡竹叶

水煎服。

疏风散

羌活　当归　白芍　连翘　升麻　苍术　干葛　生地　柴胡　甘草

水煎服。

芎归饮

升麻　干葛　蔓荆子　连翘　荆芥　防风　木贼　白蒺藜　石膏　白菊花　黄芩　黄柏　黑山栀　甘草　灯心

水煎服。

猪苓泽泻散

荆芥　防风　薄荷　连翘　当归　白芍　川芎　白术　白芷　陈皮　桔梗　猪苓　泽泻

水煎服。

清胃散

升麻　黄连　当归　生地　牡丹皮

水煎服。

胜金散

青黛　明矾　雄黄　文蛤　皂荚　栀子　血余　冰片

制为细末。磁瓶收贮。

文蛤散

雄黄五钱　五倍子二钱　桔矾八分　麝香五厘

共为末，用吹牙疳甚效。

雄黄散

雄黄一钱　黄柏二分　麝香五厘

合为末，用治牙疳，先以艾煎汤，洗净搽之。

芦荟黄连丸

芦荟　龙胆草　黄连　五灵脂　使君子肉　人中白

蒸饼为丸，开水下。

熟附汤

熟地　制附子

水煎服。

附子理中汤

人参　制附子　白术　炙甘草　炮黑干姜

水煎冷服。

六味丸

熟地 丹皮 泽泻 山萸肉 山药 茯苓

制末蜜丸，或照料煎服亦可。

化毒清表汤

葛根 薄荷 地骨皮 牛蒡子 荆芥 防风 黄芩 黄连 元参 知母 甘草 桔梗

引生姜、灯草，水煎。

柴胡清热饮

生地 白芍 柴胡 黄芩 麦冬 地骨皮 知母 甘草

引生姜、灯草，水煎。

清金宁嗽汤

前胡 桔梗 瓜蒌仁 杏仁 川连 贝母 橘红 炙桑皮 甘草

引生姜、红枣，水煎。

麻杏石甘汤

麻黄 杏仁 石膏 甘草

水煎服。

清气化毒饮

前胡 桔梗 瓜蒌仁 杏仁 川连 黄芩 连翘 桑皮 元参 麦冬 甘草

引芦根，水煎。

如神定喘汤

黄芩 川连 栀子仁 桔梗 花粉 赤苓 贝母 牛蒡子 瓜蒌仁 杏仁 麦冬 生石膏

水煎，冲竹沥一杯服。

三黄石膏汤

麻黄 石膏 淡豆豉 黄柏 黄连 栀子仁 黄芩

水煎

七味安神丸

川连 麦冬 当归 茯苓 甘草各五钱 朱砂一两 冰片二分半

上为末，蒸饼，用猪心血捣，丸黍米大，每服十丸，灯芯汤下。

抱龙丸

天竺黄 水飞辰砂 生甘草 炒枳壳 白茯神 姜炒胆星 白硼砂各一两 怀山药二两 琥珀七钱 沉香 雄黄各五钱 麝香三分

蒸饼为丸，芡实大，金箔为衣，阴干收贮，薄荷汤下。

孙氏洗肝散

全蛇脱一条 马勃一两 皂角子十四枚

共入磁罐内，盐泥封固，烧存性，退火研末，白汤调下。

通神散

甘菊 绿豆皮 谷精草

上等分为粗末，同柿饼用粟米泔慢火熬干，去药渣，食柿饼，不过十余个立效。

发灰散

取少壮无病人发，煮皂角水洗净，焙干填满新瓦罐内，用新瓦片盖定，盐泥封固，用炭火围罐之半，煅一炷香，取出候冷，研极细末，吹入鼻中。或发灰二分，童便七分，酒三分调服，止血如神。

加减凉膈散

苦桔梗 山栀仁 黄芩 生甘草 元参 牛蒡子 薄荷 连翘 麦冬

水煎服。

儿茶散

硼砂二钱 孩儿茶五钱

共为细末，凉水一盏调服。

加味平胃散

升麻 防风 枳壳 葛根 南山楂 麦芽 苍术 厚朴 陈皮 生甘草

引生姜、灯芯，水煎。

五君子煎

人参 茯苓 白术 炙草 炮姜

水煎服。

温胃饮

人参 当归 扁豆 白术 炙草 陈皮 干姜

水煎服。

胃关煎

熟地　山药　扁豆　炙甘草　淡吴萸　白术　炮姜

水煎服。

清热导滞汤

当归　白芍　连翘　牛蒡子　小青皮　炒枳壳　黄芩　川连　山楂　厚朴　槟榔　甘草

引生姜，水煎。

三黄丸

黄芩酒炒　川连吴萸拌炒　蒸大黄

上各等为末，糊丸梧子大，每服二十丸，白汤下。

黄芩汤

黄芩　黄连　当归　川芎　人参　木香　青皮　枳壳　槟榔　甘草

水煎服。

贞元饮

熟地　当归　甘草

水煎服。

六气煎

人参　黄芪　当归　肉桂　白术　炙草

水煎服。

《麻疹备要方论》终

活幼心书

〔元〕　曾世荣　撰著

《活幼心书》提要

元·曾世荣编撰。世荣字德显，号育溪，衡之丞西人。《四库》未著录，书分上中下三卷。上卷为决证诗赋七十五则。中卷为明本论四十三则，拾遗论八。下卷为信效方，又分四卷，其卷一列汤散门，列汤方四十五，散方七十五。卷二列圆膏门，丸方三十二，膏方十五。卷三列丹饮门，丹方七，饮方卅七。卷四列金饼门，金方三，饼方三，附拾遗方十四，统计二百廿五方。柯逢时跋云：元本是书每半叶十一行，每行二十一二字不等。盖至元甲午曾氏原刻本全佚，艺风前辈所藏士礼居本，德显出处无征，是书辨证详明，处方精审，允为仁人之言。同治《衡阳县志》及各家著录，多作新书，黄跋偶沿其误。《千顷堂书目》，光绪《湖南通志》，据抱经堂补元志并作二卷，殆亦未见全书。明·宣德庚戌有修补本，日本高保甲寅，曾为校刻，皆不及此本之完善。因属翟君展成，萧君伯丞再三雠校，改正良方，并附校勘记于后，以明实在。清宣统二年，曾由武昌医馆刻成，流行绝少，且无句读，爰再为重校，加以圈点印行之。

和　序

医家惟小儿科为尤难。盖自其能言而被病者，犹可以问而知之，而其未能言者，不可以问而知也。《史》言扁鹊入咸阳，为小儿医，然鹊之书多不传其言。有曰：望而知之谓之神，闻而知之谓之圣，鹊之术固不在于书欤。信斯言也！惟鹊为可也。夫医不可以无书也，太仓公乃亦以医者意耳，不肯为书，使仓公者常有于世焉，虽无书可也，如仓公之不常有。何哉？且吾闻学医者，与学儒无异。儒者求圣贤之心法，以有圣贤之书存焉耳。医无其书，则轩岐之心法泯焉而不传久矣。又何由而学之？故医书之浩衍，与儒书相埒，殆又过之。然板行于天下，人得而有之者，往往大方脉之书为多，彼为小儿者，每以专科自名，或私得一方，即祖父子孙相传，世享其利，他人万金不顾授也。其肯与天下后世公共之哉？育溪曾君，用儒攻医，得戴刘二家之传，自少至老，凡活人之幼者，枚数不知几何人。在证处方，皆超然众医之表，乃以得之师传者，广粹精核，为活幼心书一编。既成不以私其家，将以公之天下后世，使为其术者，无学医废人之患。凡人之幼，皆有成人之望焉，厚哉育溪之用心也，人孰无此心哉？皆能以育溪之心为心则善矣。虽然，书本陈言，心须活法，或徒泥其书而不善用，譬之兵家，不知合变，胶柱而调瑟焉，吾未见其可也。昔临安李立之者，以小儿科擅名一时。有婴儿忽病喑，求治之，立之令人乘高扑之地下，以一衾盛之，儿不觉大惊，遂发声能言。问之。曰：此乳搐心也，非药所能疗。此活法之说也，因附著之。

泰定丁卯闰九月朔中议大夫前同知海北海南道宣慰使司事副都元帅和尼赤序

廉　序

育溪曾德显，儒家者流，明小方脉，幼幼之心，不啻父母仁人之用心也。余家有襁褓童子，感惊风疾，其父母者咸忧焉，德显乃不惮烦暑，随招随至，一视之曰：毋虑。遂用对证之药疗之。药未既而效已随之，诚可嘉尚。原其平昔用心之勤，集诸方书之经验者，著以成帙，目之曰《活幼心书》。夫心者，虚灵善应，神妙不测，主宰一身，应酬万事者也。推广此心以及人及物，使颠连无告者为同胞，痒疴疾痛者为同体，乃刻诸梓，以广其传。非惟传之今，亦且传诸后。俾后人亦能推此心以及人及物，则活幼之心为无穷也，岂曰小补哉。

天历己巳八月廿又一日朝散大夫同知衡州路总管府事廉公亮引

吴　序

人得天地生物之心以为心，则当视天地万物为一体，痒疴疾痛，举切吾身，仁者事也。先儒谓医家以手足痿痹为不仁，斯言善状仁字，盖手足痹则气脉不相通，痛痒无所觉，心之生道息矣，乌得仁？况医家之于婴孩，语言未足辨，脉理未足凭，必能以心体之，然后可以察其痒痛疴疾之所在。非有志于仁者，其能若是乎？烝西曾君德显，儒而为医，幼从乡先生李月山，固已得儒学于心授，长从世医刘氏，又能得医学于心传，精读医经，详味药性，参前辈之奥议，伸自己之独见，有求必应，不倦于贫，集其平时论证与方，名曰《活幼心书》。将与同志共之。夫作书以述其心之所用，而且克广其传，亦庶乎仁者之用心矣。尝观其书，则审证施剂，信有异乎人者。五苓散在诸家止用之解伤寒温湿暑毒霍乱，而德显于惊风痰搐疮疹等疾，通四时而用之。前同知衡州府事胡省斋因其子惊风得愈。问之曰：五苓散何以愈斯疾乎？德显曰：此剂内用茯苓，可以安此心之神。用泽泻导小便，小肠利而心气通。木得桂而枯，足能抑肝之气，而风自止，所以能疗惊风。施之他证，亦皆有说。省斋深然之，此其善用五苓散也。小儿惊风搐搦，医者视为一病，辄以金石脑麝蜈蚣蝎等剂投之，非徒无益，反激他证。德显则谓有因惊风而搐者，有因气郁而搐者。惊属心，风属肝，而郁于气者亦有搐。陈氏所谓蓄气而成搐者是也，但未著其方。余于惊风则随证施治，若气郁而搐者，则用宽气饮治之，只以枳壳枳实为主。尝因患搐者，仓卒求药，教服铺家枳壳散，而搐亦止。病者深感之，此又治搐之特见也。其他紧证，俱能究心，用药之奇，成效之速，有未易缕述者，寄寓予家将十年。二孙藉其调护，每识证子微渺，制疾于萌芽。其用心之溥，非特于吾辈为然。盖其笃志子仁，重义轻利，亦自读书中来，非可以庸俗例视也。读其方论，因叙数语于篇端，识者倘察予言，必有知其用心者。

元贞乙未上巳日前太学笃信斋进士吴刚中谨书

罗　序

吾乡月山李先生，博极群书，操行修洁，最谨于义利界限，媚学之子，翩翩从之。其诲诸生也，不止于词艺而已，必勉以正心修身，俾之有士君子之行。德显曾君，从游者之一也。居无何，场屋之事废，于是以业儒者而业医焉。昔贤达则愿为良相，穷则愿为良医，其心均在济人耳。医岂细事哉，而幼幼之医，尤不易也。盖气色微，筋骨脆，痒疴疾痛，不可问而知。他人止于面色指纹之间揣摩投剂，德显则切脉先之，倘证阳而脉阴，证阴而脉阳，必治脉不治证，精思详究，探本索原。药饵所施，百不失一。未尝以病家之贵贱贫富而异用其心，或遇窘乏太甚之家，亦随力捐赀济其馆粥，以故全活者众。德显非饶于财者，能推是心，亦贤矣哉。业医三十年，古今医书，读之不辍，今取其平日阅证用药之已效者，著为方论，纂为诗歌，名之曰《活幼心书》。是心也，恒心也，恻隐之心也，心诚求之之心也。对越天地神明而无愧矣。且欲锓梓以为海内共之，用心广大可敬也。夫余尝观赵德麟侯鲭录，有人得痈疽方甚奇，宝而不传，后为虎所食，非天谴欤？德显心事若兹，天必福之，以诱世人之善用其心矣。德显衡之烝西人，号育溪，名世荣，德显其字也。

丁未中秋邵清道老七十翁罗宗之巨海甫谨序

自　序

闻之先儒曰：天向一中分造化，人于心上起经论。大哉心乎！其万事之机括乎，前乎千百世而上，为天地立心，生民立命者，此心也。后乎千百世而下，为往圣继绝学，来者续师传，亦此心也。是心也，以之活幼，即有恻隐之真，所谓乍见孺子将入于井，皆有怵惕恻隐者，无非自此心中来。宋翰林侍御世医戴克臣者徽宗朝，名尧道，活幼宗师也。取信当时，有声朝野，心以传心，得其妙者，惟燕西高原刘茂先名祀自号固穷山叟。茂先之心，其五世孙字直甫者名思道，又深得之。推其所得，随施辄效，亦可以见其用心矣。然昔贤之学，固以心而传，而昔贤之心，非书又无以衍其传。况自开庆以来，其书散漫，戴刘二公之心传，几不复见。予生二公之后，而无默契乎二公之心，早岁师事直甫，于兹有年，面命心传，领会多矣。但念一宗医书，方论待决，岁月浸远，卷帙不齐，设有危难，未易检阅。吁！得其心者，敢不究其心哉。明窗昼熏，短檠夜雨，因就其遗书而精加编次，繁者删之，缺者补之，书非可用不敢录，方非已效弗敢收。脱亡遗漏，存十一于千百，上探三皇前哲之遗言，下探克臣茂先之用心，实则吾心固有之理，旁求当代明医之论，亦姑为活幼之一助云耳。遂名其书曰活幼心书。书成，客或难予曰：医者意也。但观形切脉，以意逆志，是为得之，何必一切求诸书，而且以心书名之哉。予曰：不然。予非有心于著述，而求异于人也。不过推广刘氏数传之贞心。以求契夫戴氏之初心耳。朱文公有言，意者，心之所发也。书之所述，岂非心之流行发见者乎！客唯而退，于是乎书。

至元甲午菊节衡阳后学曾世荣德昱识

《活幼心书》目录

卷上 决证诗赋

观形气 …… 687
及幼攻补 …… 687
戒毁同道 …… 687
为医先去贪嗔 …… 688
辨证早决安危 …… 688
五色主病 …… 688
诊脉明证 …… 688
议金银薄荷 …… 689
胎寒 …… 689
藏寒 …… 689
胎热 …… 689
弄舌舒舌 …… 689
脐风 …… 689
脐突 …… 689
夜啼 …… 689
急惊 …… 689
天钓 …… 689
急惊后如疟 …… 689
慢惊 …… 689
搐证 …… 689
诸风毒 …… 689
破血伤风 …… 689
伤积 …… 690
惊积 …… 690
诸热 …… 690
吐泻 …… 690
伤寒 …… 690
伤风 …… 690
夹惊伤寒 …… 690
夹食伤寒 …… 690
下后伤风 …… 690
夹风伤寒 …… 690
风寒互证 …… 690
结胸伤寒 …… 690
痞似结胸 …… 690
坏证伤寒 …… 690
赤白痢 …… 690
五色痢 …… 690
风痢 …… 690
肿证 …… 690
五疳 …… 690
走马疳 …… 690
脱肛 …… 691
痫证 …… 691
疟证 …… 691
癖证 …… 691
诸疝 …… 691
龟胸 …… 691
惊丹 …… 691
咳嗽 …… 691
鹅鹅 …… 691
疮疹 …… 691
豆疮传变 …… 691
斑疹 …… 691
阴囊肿 …… 691
惊瘫鹤膝 …… 691
瘰疬 …… 691
五淋 …… 691
腹痛 …… 691
丁奚 …… 691
哺露 …… 691
口疮 …… 691
诸疮 …… 692
目疾 …… 692
丹毒 …… 692
重舌鹅口 …… 692
五软 …… 692

天柱倒 …… 692
解颅 …… 692
诸汗 …… 692
黄证 …… 692
失血 …… 692
不内外因 …… 692
小儿常安 …… 692
小儿专科赋 …… 692

卷中　明本论

胎寒 …… 694
胎热 …… 694
脐风撮口 …… 694
夜啼 …… 695
急惊 …… 695
慢惊 …… 696
风毒 …… 696
伤积 …… 697
热证 …… 697
伤寒 …… 698
咳嗽 …… 699
吐泻 …… 700
诸吐 …… 700
诸泻 …… 701
赤白痢 …… 702
肿证 …… 703
疳证 …… 703
走马疳 …… 704
脱肛 …… 704
痫证 …… 704
疟疾 …… 705
癖证 …… 705
疝证 …… 705
龟胸 …… 706
惊丹 …… 706
疮疹 …… 706
阴囊肿 …… 708
惊瘫鹤膝 …… 708
瘰疬 …… 709
五淋 …… 709
腹痛 …… 709
丁奚 …… 710
口疮 …… 710
诸疮 …… 711
目疾 …… 711
丹毒 …… 712
重舌 …… 712
五软 …… 712
诸汗 …… 713
黄证 …… 713
失血 …… 713
不内外因 …… 714
小儿常安 …… 714
拾遗 …… 714
论小方脉数差殊 …… 714
辨药病不相主对 …… 714
治豆疮不应疏利 …… 715
评非时用附子大黄 …… 715
明小儿四证八候 …… 715
治暑风用药次序 …… 715
为医要量大见高 …… 716
遇诸涂救治惊风 …… 716

卷下　信效方

汤散门 …… 717
汤类 …… 717
日生汤 …… 717
牛蒡汤 …… 717
黄芩四物汤 …… 717
蒼归汤 …… 717
枳实汤 …… 717
小柴胡汤 …… 717
防己汤 …… 718
防风汤 …… 718
知母汤 …… 718
白芍药汤 …… 718
茯苓厚朴汤 …… 718
茯神汤 …… 718
守中汤 …… 718
泻肺汤 …… 718
五和汤 …… 718
养藏汤 …… 719

贝母汤 …… 719
固真汤 …… 719
生地黄汤 …… 719
姜橘汤 …… 719
理中汤 …… 719
桂枝汤 …… 719
麻黄汤 …… 719
独活汤 …… 719
五黄汤 …… 720
化毒汤 …… 720
青木香汤 …… 720
排风汤 …… 720
中和汤 …… 720
人参甘桔汤 …… 720
人参芎归汤 …… 720
五拗汤 …… 720
六和汤 …… 721
黄芪六一汤 …… 721
真武汤 …… 721
牡蛎大黄汤 …… 721
坎离汤 …… 721
清脾汤 …… 721
麦门冬汤 …… 721
化丹汤 …… 721
茴香汤 …… 721
大柴胡汤 …… 722
快膈汤 …… 722
升麻汤 …… 722
小陷胸汤 …… 722

散类

百解散 …… 722
五苓散 …… 722
当归散 …… 722
三解散 …… 722
匀气散 …… 722
雄黄散 …… 723
惺惺散 …… 723
木通散 …… 723
乌梅散 …… 723
黄金散 …… 723
平胃散 …… 723
七宝散 …… 723
三棱散 …… 723
立消散 …… 724
天竺黄散 …… 724
连床散 …… 724
川草散 …… 724
柿煎散 …… 724
拂毒散 …… 724
金铃散 …… 724
消黄散 …… 724
疏风散 …… 725
陈氏木香散 …… 725
陈氏异功散 …… 725
羌活散 …… 725
香薷散 …… 725
泻黄散 …… 725
调元散 …… 725
醒脾散 …… 725
醍醐散 …… 726
二圣散 …… 726
补肺散 …… 726
安神散 …… 726
烧盐散 …… 726
绿袍散 …… 726
益黄散 …… 726
解表散 …… 726
参苓白术散 …… 727
守胃散 …… 727
南星腹皮散 …… 727
导赤散 …… 727
钱氏白术散 …… 727
和中散 …… 727
糖煎散 …… 727
六柱散 …… 727
九仙散 …… 728
草龙胆散 …… 728
金波散 …… 728
内金散 …… 728
霹雳散 …… 728
顺搐散 …… 728
外消散 …… 728
活血散 …… 728
桃花散 …… 728
三白散 …… 729
麝香人齿散 …… 729

四黄散 …… 729
薄荷散 …… 729
槲皮散 …… 729
白芨散 …… 729
二香散 …… 729
万金散 …… 729
神效散 …… 729
赤葛散 …… 729
四圣散 …… 730
天花散 …… 730
蟠龙散 …… 730
伏龙肝散 …… 730
益无散 …… 730
祛风散 …… 730
全蝎观音散 …… 730
备急散 …… 730
黄土散 …… 730
回阳散 …… 730
蜜陀僧散 …… 731

圆膏门

圆类

琥珀抱龙圆 …… 731
镇惊圆 …… 731
乌犀圆 …… 731
香芎圆 …… 732
香连圆 …… 732
化癖圆 …… 732
芦荟圆 …… 732
使君子圆 …… 732
补肾地黄圆 …… 732
宽肠圆 …… 733
香陆胃苓圆 …… 733
二姜圆 …… 733
没石子圆 …… 733
半夏圆 …… 733
六圣圆 …… 733
内消圆 …… 733
截惊圆 …… 734
散气圆 …… 734
金粟圆 …… 734
万应圆 …… 734
金茱圆 …… 734
二圣圆 …… 734
商陆圆 …… 734
枳壳圆 …… 734
浚川圆 …… 735
三圣圆 …… 735
莪术圆 …… 735
豆蔻圆 …… 735
碧玉圆 …… 735
快活圆 …… 735
沉香槟榔圆 …… 736

膏类

朱砂膏 …… 736
如意膏 …… 736
地黄膏 …… 736
乌梅膏 …… 736
乌附膏 …… 736
乌鼓膏 …… 737
辟尘膏 …… 737
苹麻膏 …… 737
钩藤膏 …… 737
黄连膏 …… 737
益中膏 …… 737
玄霜膏 …… 737
清凉膏 …… 737
祛风膏 …… 738
千金膏 …… 738

丹饮门

丹类

水晶丹 …… 738
不惊丹 …… 738
鹤顶丹 …… 738
黑虎丹 …… 738
祛暑丹 …… 739
四神丹 …… 739
祛痧丹 …… 739

饮类

百伤饮 …… 739
速效饮 …… 739
柴胡饮 …… 739
四顺饮 …… 739
清肺饮 …… 740
冲和饮 …… 740
明目饮 …… 740

玉露饮 …… 740
宽气饮 …… 740
绿豆饮 …… 740
宽热饮 …… 740
赤苋饮 …… 740
化虫饮 …… 741
玄参饮 …… 741
参香饮 …… 741
健脾饮 …… 741
五皮饮 …… 741
立效饮 …… 741
沉香饮 …… 741
拔毒饮 …… 742
藿香饮 …… 742
参苏饮 …… 742
紫草茸饮 …… 742
天麻饮 …… 742
黑白饮 …… 712
白附饮 …… 742
二仙饮 …… 742
双金饮 …… 742
大顺饮 …… 743
快斑饮 …… 743
消暑清心饮 …… 743
定喘饮 …… 743
常山饮 …… 743
消毒饮 …… 743
缩砂饮 …… 743
定吐饮 …… 743
万安饮 …… 743
金饼门
金类
一字金 …… 744
七金 …… 744
一抹金 …… 744
饼类
香橘饼 …… 744
通圣饼 …… 744
姜豉饼 …… 744
拾遗
香艾圆 …… 745
乌白圆 …… 745
既济解毒丹 …… 745
轻粉散 …… 745
独圣散 …… 745
藿香托里散 …… 745
拔毒散 …… 745
神应散 …… 746
凉肺散 …… 746
玄明粉 …… 746
必胜散 …… 746
远彻膏 …… 746
至圣散 …… 746
八仙饮 …… 716

活幼心书　卷上

元　衡阳　曾世荣德显编次
鄞县　曹赤电炳章圈校

决证诗赋

观　形　气

观形观气要精通，禀受元来自不同，细察盈亏明部分，随机用药见奇功。

形者，面色也。气者，神气也。张吉夫云：小儿证候，不可取之一端，在表里相应，随机消息，岂胶柱调瑟者所能观其形而知其证哉？信斯言也。况小儿虚实，有非系乎肥瘦，而系乎气色者，何以言之，盖有肥而气怯，瘦而气壮，气怯则色必嫩，其为虚可知矣。气壮则色必盛，其为实可知矣。由是论之，五脏之气，皆形于面部，肝青、心赤、肺白、肾黑、脾黄，是其本体。肝旺于春，心旺于夏，肺旺于秋，肾旺于冬，各七十二日，脾寄旺于四季后一十八日，是其本位。然有时乎不春不冬，而面变青黑者，非肝之与肾也。不秋不夏而面变赤白者，亦非心之与肺也。盖五脏之气，层见叠出，随证流形，初无一定，忽然青黑主乎痛，忽然赤者主乎热，忽然白者主乎冷，忽然黄者主乎积。此其气之开阖，非系乎时，非拘乎位。又如心主颏，肝主眼，并左睑，脾主唇之上下，肺主右睑，肾主耳前颏音孩外，其形或见于位，或露于他部，所谓不可取之一端，明其义也。且脾主唇之上下为吐泻，或患痢日久，然其色黑则肾之乘脾，水反克土，名为强胜，其藏或败耳。肝主眼并左睑，其色青，本色也，主惊骇风痰发动，是为顺证。若见白色，乃肺之克肝，即为逆证。以此推考，变而通之，存乎其人，学者留心于此，诚有用焉。

及幼攻补

察病必须明表里，更详虚实在初分；恶攻喜补人皆信，谁识攻中有补存。

张子和曰：人身不过表里，血气不过虚实。此言其大略耳。惟庸工之治病，纯补其虚，不敢治其实，举世皆曰平稳，误人不见其迹。渠亦不自省其过，虽终老而不悔。且曰：吾用补药也，何罪焉？病人亦曰，彼以补药补我，彼何罪焉？虽死亦不知觉，此庸工误人最深。如鲧湮洪水，不知五行之道。夫补者人所喜，攻者人所恶，医者以其逆病人之心，而不见用，不若顺病人之心，而获利也，岂复计病者之死生乎？盖医有贤愚，人多谬误，以贤为非，以愚为是，不明标本，妄投药饵，自取危困，徒切感慨。所谓攻者，万病先须发散外邪，表之义也；外邪既去，而元气自复，即攻中有补存焉，里之义也。然察其表里虚实，尤在临机权变，毋执一定之规也。

戒毁同道

大抵行医片言处，深思浅发要安详；更兼忠厚斯为美，切戒逢人恃己长。

郑端友曰：医门一业，慈爱为先，尝存救治之心，方集古贤之行。近世医者，诊察诸疾，未言理疗，訾毁前医，不量病有浅深，效有迟速，亦有阴虚阳实，翕音吸合转移，初无定论，惟务妒贤嫉能，利己害人，惊谎疼

家，意图厚赂，尤见不仁之心甚矣。昔神宗时，钱仲阳为医有声。皇子仪国公病瘼音炽疢音纵国医莫能治，长公主朝，因言钱乙起草野，有异能。立召入。进黄土汤而瘉音愈。神宗褒谕，问黄土何以愈斯疾状。乙对曰：以土胜水，木得其平，则风自止。且诸医所治垂愈，小臣适当其愈。上悦其对，擢太医丞，赐紫衣金鱼，一旦超然众医之表，岂不贵哉。学者能以仲阳之心为心，则善矣。

为医先去贪嗔

为医先要去贪嗔，用药但凭真实心；富不过求贫不倦，神明所在俨如临。

人有恒心，践履端谨，始可与言医道矣。凡有请召，不以昼夜寒暑远近亲疏，富贵贫贱，闻命即赴。视彼之疾，举切吾身，药必用真，财无过望，推诚拯救，勿惮其劳，冥之中，自有神佑。如临汝张彦明为医，未尝以钱为较，应有求医，期于必效。一日城中火灾，周回燔尽，烟焰中独存其居，后且子孙荣贵。以此见天道有阴扶显助之灵，诚为可敬。

辨证早决安危

色脉参详贵造微，早凭疾证决安危；时医怕触病家讳，病稍差池便怨咨。

为医固难，及幼尤难。故医者诊视小儿之证，倘色脉精明，则死生可判。若以恐触病家之讳，犹豫其说，不吐真情，稍有差池，必招其怨。与其受怨于后，孰若告之于先。纵有危难，夫复何怨。昔扁鹊见桓侯曰：疾在腠理，不治将深。桓侯不信。复见曰：疾在骨髓，虽司命无如之何。后果弗起。学者于此，触类究心，斯有得于扁鹊之妙旨。

五色主病

积黄青则是惊风，热赤伤寒紫淡红；黑痛白为虚冷嗽，更须随部用神工。

望闻问切，医者先之。凡看病形指文，听声察色，其病图载方册，皮有薄厚，但周时外婴孩，多在怀抱，手无垢腻，则指白皮嫩，其纹显而易见。至三五岁者，常贪戏耍，手弄泥水，则指粗皮厚，其纹隐而难辨。参诸面部，是为捷要。有紫黑而纹粗，或叫怒而容变，则仓卒难定，必须听声。有中风而迷闷，或久患而昏沉，语迟失音，口疮咽痛，尤非闻而知之所能尽。问证一节，最为的当。然幼幼方脉，谓之哑科，纵稍长成语不足信，有饱曰饥，痒曰痛，如是类者，屡尝试之。每究心及此，初在父母审其得患之由，而告医者参详，则易于调治。多有病家不肯自言其致疾之始末，而一听医者之揣摩。由是观之，问亦难矣，必须诊脉以决诸证。然南北禀赋不同，施治之法亦当随其虚实冷热用药可也。若夫造妙工夫，初无其他，大学所谓若保赤子，心诚求之。专是业者，倘不尽此心之诚，何以察不言之疾乎？

诊脉明证

小儿脉应二周前，一指分关寸尺全；六至号为无病子，不和气主按如弦；浮洪风热数惊候，虚冷沉迟实积坚；指滞脾经时缓应，过犹不及乱难痊。

叔和脉经曰：孩儿三岁至五岁，呼吸须将八至看，乃以八至为平。及观张氏脉诀云：小儿常脉，只多大人二至为平。予尝指下审之，果一息六至为平。若七至八至，乃是数脉，主发热作惊。由此而论，则脉之微妙，不可不察，学者当审而切之，庶无错误。凡把幼稚之脉，仅二三岁者，但以一指揣按关部，侧指于关前取寸口，侧指于关后取尺泽，至四五岁余，却密下三指，按三部，明标本，察病证，然后可以克进退，决安危。盖周岁以前，气血未完，脉难依据，周岁以后，气血和平，始可诊脉。二岁以前，只依一指按关部取法为率。若弦紧主气不和，先与顺之，然后调中快气，浮洪主风热，先与解之，然后疏风除热。急数主受惊，先与发散，然后镇

心退惊。沉迟主虚冷，先与温之，然后理虚去寒。实滑主伤积，先与表之，然后疏涤积聚。沉缓主宿冷滞脾，钱氏脉诀云：沉缓为积，此又因宿冷积滞于脾，则脾气弱而不能磨化谷食，遂成积也。先与和解，然后去积温脾。以上脉病，皆宜对证调治，有传作乖异，尤在临机应变，不可执一，所谓医者意也。其有旨哉。若一息十余至为危急，谓之太过；一息仅二至为虚极，谓之不及。大小不同为恶候，谓之乱，皆难治也。若年至十二三以上，又当参诸大方脉，以明得病之由，因其所制之方以为治，斯不误矣。

议金银薄荷

薄荷汤内用金银，多为讹传误后人；细读明医何氏论，于中载述得其真。

古方所载金银薄荷为汤，使后人之医者，遂薄荷之外，加以金钗银钗同煎，殊欠讲明。夫钗者，乃妇人常带之物，垢腻浸渍，用以煎煮，其味杂乎药内，大非所宜，切须戒此。昔明医何澄论金银薄荷，乃金钱薄荷，即今之家园薄荷叶小者，是其叶似金钱花叶，名曰金钱薄荷。此理甚明，非所谓再加金银同煎。大概钱字与银字相近，故讹以传讹，是亦鲁鱼亥豕之类也。

胎寒先后数诗虽曰繁赘，诚为学者识证提纲

孩儿百日胎寒候，足曲难伸两手倦音拳；口冷腹膨身战栗，昼啼不已夜噫嘻。

藏　寒

手兼足冷面微青，腹痛肠鸣泄泻频，盖为生时感寒湿，夜多啼切日常轻。

胎　热

三朝旬外月间儿，目闭胞浮证可推，常作呻吟烦躁起，此为胎热定无疑。

弄舌舒舌

弄舌微微露即收，得于病后最难瘳，出长收缓名舒舌，热在心脾不用忧。

脐　风

风邪早受入脐中，七日之间验吉凶，若见腹疼脐凸音迭起，恶声口撮是为风。

脐　突

婴孩生下旬余日，脐突光浮非大疾，秽水停中明所因，徐徐用药令消释。

夜　啼

夜啼四证惊为一，无泪见灯心热烦，面莹夹青脐下痛，睡中顿哭是神干。

急　惊

面红卒中浑身热，唇黑牙关气如绝，目翻搐搦喉有痰，此是急惊容易决。

天　钓

天钓元因积热深，延潮心络又多惊，双眸翻上唇焦燥，呵欠频频疾便生。

急惊后如疟

急惊之后传如疟，外感风邪为气虚，略表次和脾与胃，自然寒热得消除。

慢　惊

阴盛阳虚病已深，吐余泻后睡扬睛，神昏搐缓涎流甚，此证分明是慢惊。

搐　证

搐证虽分急慢惊，亦因气郁致昏沉，良医欲治宜宽气，气顺之时搐自停。

诸风毒

诸风夹热隐皮肤，凝结难为陡音斗顿除，项颊肿须护喉舌，内疏风热外宜涂。

破血伤风

跌扑皮肤因破损，外风侵袭在伤痕，随

时发肿微加痛，活血疏风是要言。

伤　积

头疼身热腹微胀，足冷神昏只爱眠，因食所伤脾气弱，下宜迟缓表宜先。

惊　积

大府无时泄下青，见人啾唧似生嗔，解惊去积宜施剂，立致精神起卧宁。

诸　热

诸热元初各有因，对时发者是潮名，乍来乍止为虚证，晚作无寒属骨蒸。

吐　泻

脾虚胃弱病根源，水谷如何运化行，清浊相干成吐泻，久传虚渴便风生。

伤　寒

伤寒之候有多般，一概推详便究难，面目俱红时喷嚏，气粗身热是伤寒。

伤　风

恶风发热头应痛，两颊微红鼻涕多，汗出遍身兼咳嗽，此伤风证易调和。

夹惊伤寒

身微有热生烦躁，睡不安兮神不清，此是夹惊感寒证，亦须先表次宁心。

夹食伤寒

鼻涕头疼时吐逆，面黄红白变不一，此因夹食又伤寒，发表有功方下积。

下后伤风

表而未尽遽宣通，通后从而喘气攻，此是阳微阴弱证，肺经再受有邪风。

夹风伤寒

孩子伤寒又夹风，目多眵泪脸腮红，太阳冷汗微生喘，口水如涎滴满胸。

风寒互证

风寒双中汗难通，重下雄黄散是功，得汗来时犹可治，莫教不汗变张弓。

结胸伤寒

大结胸兮小结胸，水兼寒热不雷同，阳经下早留为毒，用药无非直达攻。

痞似结胸

证同前证应无痛，病在阴经下早虚，邪毒结留心下满，此名痞气膈中居。

坏证伤寒

此病初传不识机，致令汗下失其宜，邪乘虚入伤荣卫，知犯何经急疗之。

赤白痢

小儿下痢细寻推，不独成于积所为，冷热数般虽各异，宽肠调胃在明医。

五色痢

痢成五色岂堪闻，日久传来神气昏，干痛烦啼为最苦，更防儿小命难存。

风　痢

风毒乘脾黄褐色，看来其痢与惊同，但闻不臭斯为异，独泻脾经自有功。

肿　证

古今议肿是脾虚，大抵多从湿热为，十种根因各调治，详分补泻在临机。

五　疳

五疳五藏五般看，治法详推事不难，若见面黄肌肉瘦，齿焦发竖即为疳。

走马疳

伤寒热毒上熏蒸，面色光浮气喘生，口

臭齿焦腮有穴，马疳如此是真形。

脱　肛

肛门出露久难收，再感风伤事可忧，况自先传脾胃弱，更详冷热易为廖。

痫　证

惊传三搐后成痫，嚼沫牙关目上翻，明辨阴阳参色脉，不拘轻重总风痰。

疟　证

夏伤于暑秋成疟，间日连朝不少差，解表去邪须次第，再宜养胃固脾家。

癖　证

本因积久成顽结，男左女右居腹胁，俗云龟痹不须听，化癖调脾自安帖。

诸　疝

诸疝元来各有名，盖因寒湿气侵成，治分芍药乌梅散，匀气金铃与五苓。

龟　胸

无端唇口忽然红，心肺因痰饮聚中，风热乘之加喘急，形如覆掌号龟胸。

惊　丹

儿在胎时母受惊，惊传邪热子伤神，忽然赤片微微起，凉解肌肤始见宁。

咳　嗽

咳嗽虽然分冷热，连声因肺感风寒，眼浮痰盛喉中响，戏水多因汗未干。

齁　鮯

孩儿齁鮯为啼时，食以酸咸又乳之，或自肺经伤水湿，风痰结聚早为医。

疮　疹

毒停在胃布诸经，运气变迁疮疹生，面口唇红兼嗽渴，腹疼中指冷分明。

豆疮传变

黑陷疮枯嗽失音，泻兼渴甚吐无停，身凉食减多沉困，更有痰多命必倾。

斑　疹

斑证总言因胃热，赤生黑死分明别，忽如锦片出肌肤，温毒发时从两胁。

阴囊肿

厥阴少阴寒激搏，致令肿缩宜温药，光浮不痛作虚医，赤肿须凭凉剂却。

惊瘫鹤膝

风湿流传骨节间，痛兼心悸是惊瘫，若于腕胫多疼重，凝结成团鹤膝看。

瘰　疬

初发原于耳项旁，证轻多谓是无妨，因循作肿成脓后，穿破名为瘰疬疮。

五　淋

淋病虽然分五虫，要明各类在详看，曰膏曰冷同其证，血石均为热一般。

腹　痛

大凡腹痛初非一，不特癥瘕与痃癖，分条析类证多端，看取论中最详悉。

丁　奚

久积成疳因失治，肚高颈细变丁奚，更兼手足如筒样，面白身黄汗不时。

哺　露

积传疳后曰丁奚，哺露因而又得之，腹大青筋虫满肚，吐频泻数急调脾。

口　疮

心脾胃热蒸于上，舌白牙根肉腐伤，口

角承浆分两处，有疮虽异治同方。

诸　疮

满头及额生如癞，但用连床得安瘥，遍身糜溃更多烦，一抹金涂无不快。

目　疾

生下经旬目见红，盖因胎受热兼风，凉肝心药斯为妙，疝气豆疮宜别攻。

丹　毒

小儿气弱肌肤薄，热毒乘虚来发作，急须化毒与消风，毒散风消始安乐。

重舌鹅口

孩儿胎受诸邪热，热壅三焦作重舌，或成鹅口证堪忧，用药更须针刺裂。

五　软

禀赋元虚髓不充，六淫之气易来攻，头兼手足身羸弱，此证名为五软同。

天柱倒

忽然天柱倒何如，此病皆因肝肾虚，外有风邪容易袭，故传项软不相随。

解　颅

头颅初见如开解，肾弱元虚大可忧，补肾调元是良药，投之不应定难瘳。

诸　汗

小儿自汗证多端，切莫将为一例看，要识阴阳虚实病，勤勤调理自然安。

黄　证

身黄暑湿蒸脾得，内外因分治最良，更有胎传生便见，母宜多服地黄汤。

失　血

九道何为血妄行，盖因抑郁热邪生，随经施治明虚实，气顺如常血自匀。

不内外因

人身一或才伤损，重则宜其血亦多，不内外因然有自，各分证治在专科。

小儿常安

四时欲得小儿安，常要一分饥与寒。但愿人皆依此法，自然诸疾不相干。

上前诗诀，言虽鄙俚，所贵平易能记者，得之于心，应之于手，何施不可。参诸后论，尤见详备。此特为初学之勉，非敢立异于人也。

小儿专科赋以小儿专科要识形证为韵，即前场屋中应举八韵赋式

细辨诸证，难明小儿。惟造理以达此，于专科而见之，伤风清涕交流，初传在肺，夹食黄纹必见，是属居脾。原夫七日之内，脐痛乃多，百晬之外，骨蒸者少。惟惊疳积热，半在攻里，故暑湿风寒，先宜发表，总谓十三科目，各贵精专，不拘长幼儿童，均称是小。观其得病婴孺，要参脉形，虽痛痒难通于一问，然重轻明察于诸经，暴感邪气，腮颊微紫，久因客忤，山根太清，勿问儿小，但凭药灵，肾有证攻，黑色多浮于地阁即承浆，心为邪克，赤纹独露于天庭即额心。兹盖脉病证治，审察要详襁褓婴孩，变更莫测。凡有疾苦，全凭见识，非业擅一门，何以取效？苟医不三世，徒然用力，难同初学之妄议，贵在专科之定式。心肝恬淡，自然毋染于时灾。脾胃和平，戒以勿餐于夜食，请言夫医通仙道，溥以生意，家传秘方，及诸幼年，参天地之化育，无息少间，免父母之忧怀，有惊即痊。虽用药圣，亦由业专。然而见鱼口兮气弱殊甚，闻雅声兮命倾必然。既危吐露以真实，安有怨咨而妄传。表用疏通，细述戴君之语，藏明补泻，载稽钱氏之篇，专者何。精义无二，全活孩提，博学有诸，在明机要，

是知小脉科兮，尝喜一药多效；大方科兮，固有十形三疗。盖进以乳食，务要撙节，而远之鼓药，免生惊叫。调和自小以无恙，长大何忧于不肖？春融一念，普推活幼之诚，日究千方，庶尽及人之妙。然尝论形质始具，夙有灵性，语言未通，是为哑科，非圆机之士，焉察彼证。必精制之剂，能除宿疴。有信巫不用医，适以谬甚，有是方不重药，尤其误矣。此病家自取过耳，于医者殊无奈何？术显咸阳扁鹊，全婴而有验，脉明晋代叔和，及幼以无讹，抑又闻皖白虚盛，神气常昏，紫黑实多，声音益胜，阳证似阴，脉按细紧，阴证似阳，脉来缓应，然大学所谓若保赤子，心诚求之，此又在究心而观证。

尝谓为医不易，而幼幼之科，尤不易也。

黄帝曰：若吾不能察其幼小虽圣人犹难之，况后学乎，余虽不才，谩成前赋。以便学者观形切脉之要，临病之际，非特少资谈柄，亦可以发挥神圣工巧之妙，岂不韪欤？其或未然，后之明者，改而证诸，幸莫大焉。

活幼心书　卷中

元　衡阳　曾世荣德显编次
鄞县　曹赤电炳章圈校

明本论

胎　寒

孩儿初生百日内，觉口冷腹痛，身起寒粟，时发战粟，由足握拳，昼夜啼哭不已，或口禁不开，名曰胎寒。其证在胎时母因腹痛而致。《产经》云：胎寒多腹痛，亦有产妇喜淡甘肥生冷时果，皆致胎寒。或胎前外感风寒暑湿，治以凉药。内伤胎气，则孩儿生后，昏昏多睡，间或呕乳泻白，若不早治，必成慢惊慢脾。凡有此候，宜以冲和饮、当归散，合和水煨姜煎服，使之微泄。泄行进匀气散调补，泄止气匀神安痛定，手足舒伸，次用参苓白术散以养胃气，白芍汤去其寒湿。乳母宜节生冷饮食，庶渐瘥也。又有手足稍冷，唇面微青，额上汗出，不愿乳饮，至夜多啼，颇似前证，但无口冷寒战，名曰藏寒。其疾夜重日轻，腹痛肠鸣，泄泻青水。间有不泻者，此证亦在百日内有之，皆因临产在地，稍及冷气侵逼，或以凉水参汤洗儿，或断脐带短，而又结缚不紧，为寒气所伤，如此宜以白芍药汤及冲和饮加盐炒茴香、茱萸，水姜煎投，并乳母同服。

胎　热

婴儿生下，三朝旬月之间，目闭而赤，眼胞浮肿，常作呻吟，或啼叫不已，时复惊烦遍体壮热，小便黄色，此因在胎母受时气邪毒，或外感风热，误服汤剂，或食五辛姜面过多，致令热蕴于内，熏蒸胎气，生下故有此证，名曰胎热。所谓胎热即多惊。若经久不治，则鹅口、重舌、木舌、赤紫丹瘤，自此而生。先以木通散煎与母服，使入于乳，儿饮之，通心气，解烦热，然后以四圣散温洗两目，日并进地黄膏、天竺黄散及牛蒡汤，当归散亦令母服，使从乳过，是一助也。乳母宜忌鸡酒羊面，庶得易安，不致反复。又有一证，如前证元无大病，而遽然弄舌者，但身热而四肢冷，唇青色，此脾胃不和所致，宜服守胃散自瘉音愈。有弄舌出于大病后，舌略出不长，一动即收，此是恶候，以钱氏白术散治之，不瘉音愈将传危急。舒舌者，此脱著衣服不常，外感风热，入于心脾，盖脾之脉络系于舌，故时复舒卷音捲，出长收缓，或渴或不渴，谓之舒舌，宜泻心脾经之热，用泻黄散加黄芩，水煎服。但不可以大寒之剂攻之，热退则寒起，传作他证，切宜谨之。

脐风撮口

婴孩始生，一七之内，腹肚胀硬，脐畔四围浮肿，口撮牙关不开，攒眉而叫，名脐风证。乃因剪脐带短，或结缚不紧，致外风侵入脐中，或用铁器断脐，为冷所侵，或牵动脐带，水入生疮，客风乘虚而入，传之于心，蕴蓄其邪，复传脾络，致舌强唇青，手足微搐，口噤不能进乳，啼声似哑，喉中痰涎潮响，是其候也。此证多致不救。若一七之外，先投劫风膏，次以五苓散加宽气饮，入姜汁、葱白、灯心，煎汤调服，与解风痰及用一字金，煎荆芥汤或薄荷汤，调抹口内，证

轻即快。如禀赋充实，发热有痰惊搐，投黑白饮、温蜜汤，空心调下，微泄似茶褐色二三行，进白芍药汤，水姜枣煎服，常用此法亦效。若脐凸音迭肚紧，微有青色，口撮不开，肝风盛而脾土受制，不可施治。凡有此候，百无一活。纵使得安，亦非长寿。一法用之，间有验者，孩儿牙根肉上有小泡，如粟米状，用温汤蘸旧绢裹手指。轻轻擦破，即口开舌软，不药自瘉音愈。有脐突一证，又非脐风，此亦因初生洗浴，系脐不紧，秽水侵入于内，产后旬日外，脐忽光浮如吹，捻动微响，间或惊悸作啼，治用白芍药汤加薏苡仁，水煎，空心温服，次以外消散涂贴，自然平复。

夜　啼

夜啼者，有惊热夜啼，有心热夜啼，有寒疝夜啼，有误触神祇夜啼，此四者，详具于后。惊热者，为衣衾之厚，或抱于极暖处久坐，致生烦闷，邪热攻心，心主神，神乱则惊，心与小肠为表里，故啼泣而遗溺者是也。治法遏热镇心，则自安矣。用百解散、牛蒡汤、三解散主之。心热者，见灯愈啼，面红多泪，无灯则稍息，盖火者阳物也，心热遇火，两阳相搏，才有灯而啼甚，故经曰，火疾风生，乃能雨。此其义也。宜凉心安神。用百解散，或五苓散加黄芩、甘草，水煎服，次牛蒡汤、三解散及琥珀抱龙圆为治。有遇黄昏后至更尽时，哭多睡少，有啼声不已，直到天明，乃胎中受寒，遇夜则阴胜而阳微，故腰曲额汗，眼中无泪，面莹白而夹青，伏卧而啼，入盘肠内吊之证，名为寒疝，治法去宿冷，温下焦。白芍药汤、乌梅散及冲和饮加盐炒茱萸、茴香，水姜煎服，及钩藤膏亦佳。误触神祇者，面色紫黑，气郁如怒，叫时若有恐惧，及睡中惊惕，两手抱母，大哭不休，此误触禁忌神祇而得。或因恶祟所侵，盖婴孩目有所睹，口不能言，但惊哭无时，指纹俱隐，故玉环集云：忽然两手形无见，定知唐突恶神灵。治法先解其表，宜百解散，次驱邪镇心，用苏合香圆、琥珀抱龙圆，投之自效。

急　惊

急惊之论，前代书所不载，惟曰阳痫，大概失所爱护，或抱于当风，或近于热地，昼则食多辛辣，夜则衾盖太厚，郁蒸邪热积于心，传于肝，再受人物惊触，或跌扑叫呼，雷声鼓乐，鸡鸣犬吠，一切所惊，未发之时，夜卧不稳，困中或笑或哭，啮五结切齿咬五巧切乳，鼻额有汗，气促痰喘，忽尔闷绝，目直上视，牙关紧急，口噤不开，手足搐掣，此热甚而然。况兼面红脉数可辨。盖心有热而肝有风，二藏乃阳中之阳，心火也，肝风也。风火阳物也，风主乎动，火得风则烟焰起，此五行之造化。二阳相鼓，风火相搏，肝藏魄，心藏神，因热则神魂易动，故发惊也。心主乎神，独不受触，遇有惊则发热，热极生风，故能成搐，名曰急惊。治之之法，先以五苓散加黄芩、甘草，水煎，或百解散发表，次通心气。木通散、三解散，疏涤肝经，安魂退热。牛蒡汤、防风汤主之。惊风既除之后，轻者投半夏圆，重者下水晶丹，与之去痰，免成痴疾，但不可用大寒凉药治之，热去则寒起，亢则害，承乃制。若仓卒之间，惊与风证俱作，只用五苓散加辰砂末，薄荷汤调服，少解其证。盖五苓散内有泽泻导小便，心与小肠为表里，小肠流利，心气得通，其惊自减。内有桂，木得桂则枯，是以有抑肝之气，其风自停。况佐以辰砂，能安神魂，两得其宜，大略要解热凉心肝，后用平和汤散调理，稍热之剂则难用，医者宜审之。愚尝感慨诸人，每见惊风搐作，不明标本，混为一证，遽然全用金石、脑、麝、蜈、蚕、蛇、蝎，大寒搜风等剂投之，耗伤真气，其证愈甚，多致弗救。殊不知惊生于心，风生于肝，搐始于气，是为三证。其惊与风，首已详及，然所谓畜气而成搐，陈氏之论，最为明理，但未著其方。余于此证，则用宽气饮治之，只

以枳壳、枳实为主，盖其气也，四时平和则身安，一息壅滞则疾作。况小儿啼哭不常，其气蕴蓄，内则不能升降，外则无由发泄，展转经时，亦能作搐。善医者审察病源，从而疗之，万无一失。更辨阴阳虚实，不可轻忽。若阳实证，煎平和汤调三解散主之，此急惊有搐之类。若阴虚证，煎固真汤调宽气饮治之，此慢惊有搐之类。若暴感此证，未别阴阳虚实，先用五苓散和宽气饮，及少加宽热饮，三药合用，姜汁沸汤调灌即解。大抵治搐之法，贵以宽气为妙，气顺则搐停，此自然之理。男左女右，手足搐者，即为顺证；男右女左，手足搐者，即为逆证，故难治也。有男右女左，证轻者投顺搐散，使分左右，庶好疗之。天钓者，初得时顿顿呵欠，眼忽下泪，身热脉浮洪实，是风痰壅聚，上贯心包，致经络闭而不通，目睛翻视，颈项强仰，两手掣转向后，大哭如怒，脚曲腰直，发热痰鸣，爪甲皆青，状如鬼祟，名曰天钓。治法同前急惊内药与服，先解风热，次理痰气，斯为当矣。暑风一证，因夏月感冒风寒太甚，致面垢唇红，脉沉细数，忽发惊搐，不省人事，治用消暑清心饮辰砂五苓散及琥珀抱龙圆，自发。切勿以温剂调补，热气得补则复盛，尤宜戒之。又有急惊天钓之后，变作潮热，手足逆冷，有似疟疾，盖因病愈之时，不善将护，外感风邪，乘虚而入于经络，再未解散，以致如此。经曰：重阳必阴，重阴必阳。又曰：亢则害，承乃制。此其义也。宜服柴胡加桂汤及当桂散，气实者，则以乌犀圆、水晶丹，略与通利，匀气散止补，后以参苓白术散调理，自然平愈。此证所用药品，间使苦寒之味，务在消阳盛之火，肺金得胜，肝木自平，而风邪亦散，斯为良法。大凡幼稚欲令常时惊悸不作，在乎肾藏和平，故戴氏曰：治惊不若补肾。谓心属火，火性燥，得肝风则烟焰起，致生惊悸，补肾则水升火降，邪热无侵，虽有肝风，不生惊骇。其法当于申时，进补肾地黄圆一服，或琥珀抱龙圆。用申时者，盖水生于申，佐之以药，则肾水得平，心火不炎，自无惊矣。

慢　惊

治慢惊者，考之古书，亦无所据，惟载阴痫而已。盖慢惊属阴，阴主静而搐缓。故曰慢。其候皆因外感风寒，内作吐泻，或得于大病之余，或传误转之后，目慢神昏，手足偏动，口角流涎，身微温，眼上视，或斜转，及两手握拳而搐，或兼两足动掣，各辨男左女右，搐者为顺，反此为逆，口气冷缓，或囟门陷，此虚极也。脉沉无力，睡则扬睛，谓两目半开半合，此真阳衰耗，而阴邪独盛。阴盛生寒，寒为水化，水生肝木，木为风化，木克脾土，胃为脾之府，故胃中有风，瘛音炽疭音纵渐生。其瘛疭证状，两肩微耸，两手垂下，时复动摇不已，名为慢惊。宜以青州白圆子、苏合香圆，入姜汁杵匀，米饮调下，虚极者加金液丹，次用冲和饮同七宝散，水煨姜煎服，使气顺风散，少解吐泻，间以胃苓汤救其表里。若吐不止，可投定吐饮，泻不减，宜服六柱散或日生汤，去胃风，定瘛疭，清神气。五苓散导其逆，调荣卫，和阴阳，若痰多唇白，四肢如冰，不省人事，此虚慢之极，用固真汤速灌之，以生胃气。胃气既回，投醒脾散、沉香饮调理。有慢脾风者，自慢惊传变，始因吐泻，经久不治，故胃弱脾虚，脾虚生风，风入经络，则手足无时摇动，昏沉不省，面带痿色，风势太甚，乃虚之极，急用青金丹、天麻饮灌服，或六柱散、固真汤，不问有热有痰，皆风入脾经，亦是危证。若痰如牵锯之声，面无风气犹甚缩，气粗颈软搐甚，不可治也。

风　毒

风毒者，因惊风之后，风从气行，血从气使，毒气蓄于皮肤，流结而为肿毒，遂成顽核赤色，多在腮颊之间，或耳根骨节之处，重则成痈成疖，谓之遁毒风。宜以百解散、牛

莠汤及当归散倍加枳壳、大黄，水煎服。或用皂角子、薄荷同煎，续投雄黄散、消毒饮。结在腮颊者，治用乌豉膏，以护咽喉，外则敷以拂毒散及外消散。若因跌扑破损皮肤，风邪侵袭，伤寒而发毒肿，谓之破血伤风，可投疏风散、活血散及黄芩四物汤调治。若发于喉下，如带横缠者，乃缠喉风也，三因方乌喉风，此证宜投化毒汤及乌豉膏，熔化护喉，却不可于喉外用药涂贴，但依前通毒风内治法如服药后散止不定，或上头项，或游于面目，而又复来喉下，如赤紫微浮，中有白突者，阳证变阴，亢则必害，谓之赤游风毒，亦难治矣。

伤　积

凡婴孩所患积证，皆因乳哺不节，过餐生冷坚硬之物，脾胃不能克化，积停中脘，外为风寒所袭，或因吃卧失盖，致头疼面黄，身热眼胞微肿，腹痛膨胀，足冷肚热不安，昏神饮食不思，或呕或哕，口噫酸气，大便酸臭，此为陈积所伤。如觉一二日，先以百伤饮发表，次当归散入姜煎服，温动积滞，方下乌犀圆、六圣圆，重与宽利，后用匀气散调补。有食饱伤脾，脾气稍虚，物难消化，留而成积，积败为痢，腹肚微痛，先调胃气，次理积，却止痢，则病根自除。和中散理虚养胃，三棱散、乌犀圆。助脾化积，沉香槟榔圆、守中汤。进食止痢，仍忌生冷黏腻之物，不致复作。有时时泄青水。如生菜汁，是受惊而后有积，烦闷啾唧，常似生嗔，名为惊积。先解惊，后理积。解惊五苓散或百解散，理积三棱散或乌犀圆及三解散，炒神曲、生姜，煎汤调服。醒脾散、沉香槟榔圆，宁惊化积，壮气和胃，仍节冷乳，自然平治。

热　证

仲景论曰：有翕翕音吸发热，有蒸蒸热，此分汗下之不同。翕者若翕之所覆，明其热在表也，属上太阳第一证，以桂枝汤主之。蒸者如熏蒸之甚，主其热在胃也，属阳明三十二证，以调胃承气汤下之。此仲景法也。缘小儿之热，似是而非，若同而异。有伤寒热，变蒸热，积热，麻豆热，惊风热，潮热，骨蒸热，有表里俱虚而热，有热虽同，名则异可不明辨标本以施治乎？须令验证，对证用药，斯为的论。伤寒热，十指稍冷，鼻流清涕，发热无汗，面惨凌振，右腮有紫纹，治法载于伤寒条内。变蒸热，温温微热，气粗惊少，呪乳泻黄，上唇尖有小泡，如水珠子，即变蒸也，不须用药攻治。如兼他证者，当依其所感之候，略与和解，不必重剂可也。盖变者变其形容，蒸者蒸长肌肉，三十二日为一变，六十四日为一蒸。又三大蒸，积五百一十二日，变蒸毕而形气血脉筋骨全矣。夫变蒸之说，再考明医陈氏书，载十变之内，五蒸存焉。又有三大蒸，计其数恰五百一十二日，最为明矣。积热，眼胞浮肿，面黄足冷，发热从头至肚愈甚，或闻饮食之气恶心，及腹疼呕吐，治法详载伤积论中。麻豆热，面赤足冷，身发壮热，呵欠顿闷，咳嗽腰疼，时或作惊，腹痛自痢，及中指独自冷者是也。治法详见疮疹证内。惊风热，遍身发热而光，自汗心悸不宁，脉数烦躁，治法与急惊证同。所用药饵，必先解表。潮热，有午后发热，或日晡发热，对时如潮水之应，不差是也。先用百解散发表，次以当归散及三解散治之。脉实者下之，宜大柴胡汤。虚浮散者微汗之，用百解散。若发热而呕者，小柴胡汤主之。虚热，因病后发热无时，一日三五次者，此客热乘虚而作，先以胃苓汤加黄芪末，温米清汤调服，次投钱氏白术散，或固真汤，带凉服，及用温盐汤，参入凉水送下黑锡丹，固守元气。骨蒸热，身体虚羸，遇晚二发，有热无寒，醒后渴汗方止，此乃疳病之余毒，传作骨蒸，或腹内有癖块，有时微痛，用参苓白术散，姜、枣、三棱煎汤调服，或投化癖圆，先疗脾虚宿滞，次以柴胡饮为治，仍忌鸡酒羊面毒物。有小儿热证用表里药后，其

热俱退，既退复热者何也。疗病至此，难以概举，或再解表攻里，或施凉剂，热见愈甚，以阴阳辨之，何者为是。推其原乃表里俱虚，而阳浮于外，阴伏于内，所以又发热，宜用温平之药和其里，则体热自除。投钱氏白术散，去木香加扁豆、水煎，及黄芪六一汤、安神散，自然平复。若日久汗多，烦渴食减，脉微缓，喜饮热，可服真武汤，虽附子性温，取其收敛阳气，内有芍药性寒，一寒一温，亭分得宜，用之无不验矣。

伤寒仲景一书前辈发明甚详，愚不敢赘，姑举其略

按仲景《伤寒论》云：春气温和，夏气暑热，秋气清凉，冬气冷烈。此四时正气之序也。惟冬时严寒，去寒就温，不致子伤偶然触冒，名为伤耳。小儿在襁褓中，或长成而禀赋虚怯，苟失其养，百病蜂起，故伤寒多得于秋冬。或薄暮清朝，盖秋冬多冷，夜起便送，或遽出风寒之地，为邪气所侵，旋即喷嚏凌振，五指稍冷，关纹不见，面目俱红，惨而不舒，气粗体热，无汗恶寒，是伤寒也。或面色光而不惨，汗出恶风，是伤风也。其候与大脉科若同而异，治疗之法，亦相去不远矣，余外不然。盖以小儿是纯阳之体，用药不可太热，此医门八法，所谓治小儿无热一也。然仲景一十六条，三百九十七法，前贤名曰金匮，岂不贵哉！兼五运有太过不及之异，六气有逆从胜伏之差变生灾眚音省，应在入身，或遇客邪临御，藏气虚弱，因受其病，谓之时气，又与伤寒不同，乃四时乖戾之气。如春应暖而反寒，夏应热而反冷，秋应凉而反热，冬应寒而反温，非其时而有其气，入感冒中伤而有病者，不择地之远近，所患一同，当以何经何藏所受病证，知犯何逆，以法治之。此仲景之妙旨。然治小儿伤寒伤风，与大方相同者，若发热身无汗，麻黄汤主之。以表实无汗，荣血受邪而设也。得汗则寒邪发泄，而无壅遏之患。若身热自汗，桂枝汤主之，以表虚自汗，卫受邪而设也。解肌则风邪疏散，而无壅滞之患。凡治病之要，尤在临机审察，庶无误矣。夹惊伤寒，其候谓感寒时忽受惊触，情性昏沉，身微有热，心躁或渴，睡中多惊，手足动掣，面红痰嗽，咬牙呵欠，山根准头皆淡青色，两眉下有紫红见，论其得病之由，或被惊发热，后感寒邪，或先感寒邪，后因被惊，遂致两热相乘。所有此候，宜百解散发表，次牛蒡汤治惊热，散邪气。若看证大，从容当归散、三解散，间以无惊圆、琥珀抱龙圆与服。夹食伤寒，其证鼻流清涕，头疼发热，昼轻夜重，时复吐逆，噫气酸馊，面黄红白，变之不一，目胞微浮，乍凉乍热，心烦发渴，腹痛胀满，皆因饮食过伤，又感风寒，激搏而热。其热气与食熏蒸于胃，胃为水谷之海，脾实则能克化，今脾胃因饮食所伤，致有斯疾。先煎小柴胡汤，加生姜自然汁同服，或五苓散入姜汁沸汤调下，与解寒邪，温胃止吐，次用百解散及当归散，水姜煎服，疏解外邪，温正胃气，乌犀圆去积，匀气散止补，参苓白术散调脾胃则痛音愈矣。下后伤风，其候两脸微红，眼胞浮肿，发热痰喘，饮食少进，此则亦因外感风寒，未经发散，下之失宜，邪气未除，而正气有损，调理又迟，致荣卫不和，正气失守，脾胃尚弱，过伤饮食，名为食复。用小柴胡汤和解，次三棱散调治。或因下后体气虚弱，腠理不密遽出风寒之地，易为感冒，此为再经外邪，侵袭于皮毛，皮毛者肺之合也，风寒外侵于皮毛，内合于肺经，致有痰热喘急，肺主气故也。亦宜发散，表邪既退，然后调脾，使中州之土固守，则何患乎外邪得以侵袭哉？用五苓散加麻黄去节存根沸汤泡过，功全表里，水姜煎服。其解表散、惺惺散、枳实汤，或当归散加陈皮，水姜煎服，以和中散调理。夹风伤寒，与前证相似，但脸红身热，气粗微喘，目泪口渴，手足皆温，太阳冷汗，口水流滴胸前，时或恶风，此因先伤寒发热，日久未经解散，将传

入里，而又感风，风热相搏于内，致心脾蕴热，热气上逼口舌发疮，名为夹风伤寒。诸热引肝风，目多眵泪，口燥发渴，手足温者，邪将传里，口水不止，而加生疮者，热上蒸也。太阳冷汗者，表之虚也。邪实表虚证在半表半里之间，宜以小柴胡汤加桂为用。疏涤肝风，羌活散。和解，四顺饮。去上焦热，则口舌之证乃除。而重感之邪，亦得消释。风寒互证，活人书云：脉似桂枝反无汗，病以麻黄反烦躁。风喜伤卫，寒伤荣。荣卫俱病，仲景以大青龙汤治之。然荣行脉中，卫行脉外，荣卫皆虚，疾由生矣。盖儿小者，因抱养失宜，风寒不避，致有斯疾。儿大者，或因水浸雨侵，或因向火脱著，遽然出外，外邪乘虚而袭，汗闭不通，其后或冷或热，昏醒不定，名为风寒互证。但小方用药品味，分两不与大人同。若此证一汗，风寒既除，惟当顺气化痰，慎勿投峻补之剂，热气得补则复盛，变生他证。初用雄黄散，水、姜、葱、薄荷同煎，并三服，稍热投，得汗即愈，免为角弓反张之证，次以当归散、惺惺散间服。若痰不退，牛蒡汤、如意膏、半夏圆。结胸伤寒，其候两眉尖红，唇紫鼻青，咳嗽口痛，痰结气促，咳嗽不活，身热汗出，目露白睛，项颈如柔痉之状，不可俯仰，结胸之证，居身之高分，故经云：高者因而越之，下者引而竭之。所谓结胸，如系结而不能解者，诸阳受气于胸中邪气与阳气相结，固而不解，非虚烦结实之比，胸膈高起，不按自痛，名大结胸。按之方痛，名小结胸，有水寒热结胸。凡此诸证，低者举之，高者陷之。仲景结胸之高邪，当行降下之法，以下结固之邪，《内经》曰：结虽大犹可解也。盖伤寒之结，非直达之剂，孰能解之。仲景治小结胸证，以小陷胸汤主之。平常小儿，多有小结胸证，然陷胸汤内有黄连极苦，难以施之。婴孩如发表后，但用鹤顶丹为治。有儿最小者，于此丹内加宽气饮、宽热饮少许，姜汁、茶清调下自愈。若仅六七岁儿，投小陷胸汤，入蜜同煎服取效。坏证伤寒，其候外察印堂多紫纹，唇白如灰色，四肢黄瘦，吐泻间作。或寒或热，饮食减少，大概外感风寒暑湿，内因饥饱失节，不能调护，以传受日深，医不辨其表里虚实，汗下失宜，使阴阳反错，邪气得胜，正气将衰，胃纳五味，以养五藏，脾受五味，以分清浊，而荣养百骸。今汗下不依其法，致伤荣卫。荣卫者，自中焦而生，得其气之清者为荣，浊者为卫，其重浊者为糟粕而下行。偶六淫所侵，治不如法，则外邪日盛，正气乖常，胃气衰微，变证多出，或作泻痢青黄，吐逆寒热，或为肿满偏枯，五疳八痢，或成丁奚哺露，传变不一，各有条论，随证治之，并宜先投加味白芍药汤和解。

咳　嗽

咳嗽者，固有数类，但分冷热虚实，随证疏解。初中时未有不因感冒而伤于肺，《内经》曰：肺之令人咳何也？岐伯曰：皮毛者，肺之合也。皮毛先受邪气，邪气得从其合。故《难经》云：形寒饮冷则伤肺，使气上而不下，逆而不收，冲壅咽膈，淫淫如养，习习如梗，是令咳也。乍暖脱著，暴热遇风，邪气侵于皮肤，肺先受之，而为咳嗽。若初得时面赤唇红，气粗发热，嗽来痰鸣，此是伤风痰壅作嗽，用清肺饮、五拗汤及小柴胡汤、羌活散，皆可解表，次青木香汤。有小儿汗出未干，遽尔戏水，亦致伤风咳嗽，外证眼胞微浮，额汗痰鸣，亦宜清肺饮、泻肺汤，与之疏风化痰，解利邪热，小柴胡汤亦可。若嗽日久，津液枯耗，肺经虚矣。肺为诸藏华盖，卧开而坐合，所以卧则气促，坐则稍宽，乃因攻肺下痰之过，名为虚嗽。声连不断，喉中痰鸣，气息欲绝，嗽罢则吐白沫或干呕，此肺虚而气不顺也。面唇皆白而惨，嗽过额上多汗，哽气长出，乳食减少，致脾虚而胃亦虚，宜其有吐，投茯苓厚朴汤及藿香饮，次温脾润肺，理中汤加杏仁、北五味，水煎服。盖此药补脾而益肺，藉土气以生金，则自愈

矣。或咳而夹红，有紫黯色，于理中汤内再加干姜为用，亦良法也。有脾虚亦能作嗽，当投补剂，用醒脾散、茯苓厚朴汤，令脾气实，然后间以清肺饮煎服，疏解肺经风寒，及藿香饮助脾养胃，亦救子益母之法也。有一证，咳嗽至极时，顿呕吐乳食与痰俱出，尽方少定，此名风痰，壅成肝木克脾土，宜以白附饮，投之即效。百日内婴孩，偶咳嗽痰壅，睡中不宁，亦因产后感风而得，但不可过用发散之剂，先以解表散一二服，次投贝母汤及惺惺散为治。小儿喘疾，重于咳嗽，然有虚实冷热之分，不可概举。实热者投清肺饮加五和汤，水姜葱煎，及泻肺汤、碧玉圆为治。经云：喘急多因气有余，盖肺主气故也。虚冷者，投枳实汤，水姜煎，并如意膏、补肺散、坎离汤，自效。此肺虚感风，气不升降，致有是证。及用定喘饮常验。不拘冷热皆可服。涎壅失音，二圣散主之。齁鮯一证，郭氏曰：小儿此疾，本因暑湿所侵，未经发散，邪传心肺，壅而为热，有热生风，有风生痰，痰实不化，因循日久，结为顽块，圆如豆粒，遂成痰母。细推其原，或啼哭未休，遽与乳食，或饲以酸咸，气郁不利，致令生痰，或节令变迁，风寒暑湿侵袭，或堕水中，水入口鼻，传之于肺，故痰母发动，而风随之。风痰潮紧，气促而喘，乃成痼疾。急宜去风化痰，先以五苓散同宽气饮宽热饮，用少姜汁和百沸汤调服，次进知母汤、雄黄散、如意膏、半夏圆。

吐　泻

吐泻者，乃挥霍扰乱之证。霍者吐，乱者泻。有心痛而先吐者，有腹痛而先泻者，莫不由中焦而作。上焦主纳。而不出，中焦主腐化水谷而生荣卫，灌溉百骸，下焦分别水谷，主出而不纳。此三才成式，日用常行，故脾居中州，胃为水谷之海，浮哺入胃，脾能克化，然后水谷分在脐上一寸，名分水穴，分其清浊，传受得宜，则无吐泻之患。凡婴孩上吐不止下泻不停，皆因六气六气者，筋骨血肉积气是也未完，六淫六淫者，风火暑湿燥寒是也易侵，兼以调护失常，乳食不节，遂使脾胃虚弱，清浊相干，蕴作而然。有先泻而后吐者，乃脾胃虚冷，其候先泻白水或白冻，吐亦不多，口气缓而神色慢，额前有汗，六脉沉濡，此为冷也。先吐而后泻者，乃脾胃有热，气促唇红，吐来面赤，脉洪而数，渴饮水浆，此为热也。冷热之分，要须详审。有数岁者，亦患此证。始自夏秋，昼近极热之地，解衣乘凉，夜卧当风之所，失盖感冷，阴阳相搏，气射中焦，名为霍乱。《活人书》用香薷散调治，以其能分别水谷，升降阴阳。又曰：热多欲饮水者，五苓散。寒多不饮水者，理中圆。详究治法，得非欲平中焦乎。又有脾经积滞未除，再为饮食所伤，不吐则泻，不泻则吐，宜以三棱散化积，守胃散和中，必自安矣。钱仲阳议曰：吐乳泻黄，是伤热乳；吐乳泻青，是伤冷乳。皆当下之。详夫此理，乃迎夺之法也。不若伤热者用五苓散以导其逆，伤冷者用理中汤以温其中，自然平复。有小儿盛夏初秋，遇夜乘风，渴而饮水，过餐生冷果物，攻激肠胃，遂乃暴吐暴泻，传作手足俱痹，筋挛而痛，痛则神志不宁，以惊证治之误矣。所谓筋遇寒则引缩，又以阳明养宗筋，属胃与大肠，因内伤生冷饮食、外感风邪，吐泻交作，胃气固虚，不能养其宗筋，亦致挛急。此证口气温，而色惨，脉沉缓，再以手按两膝腕下，见筋缩而引于皮间，是其候也。治以理中汤，加附子半生半炮，水、姜熟煎，空心温服，更详虚实冷热为治可也。

诸　吐

论吐之原，难以概举，有冷吐、热吐、积吐、伤风嗽吐、伤乳吐。其吐则同，其证有异。各述于后。冷吐乳片不消，多吐而少出，脉息沉微，面白眼慢，气缓神昏，额上汗出。此因风寒入胃，或食生冷，或伤宿乳，胃虚不纳而出，宜温胃去风除宿冷，用当归散、水

煨姜、陈皮煎服，或间投冲和饮、理中汤及姜橘汤，定吐饮。如诸药不效，以参香饮治之。热吐面赤唇红，吐次少而出多，乳片消而色黄，偏体热甚，或因暑气在胃，或食热物，精神不慢，而多烦躁，此热吐也，宜解热毒，用大顺饮，温熟水空心调下，并五苓散、小柴胡汤，并加姜汁缓服，及香薷散主之。误服热药，先投绿豆饮解之，次服止吐之剂。积吐眼胞浮面微黄，足冷肚热，昼轻夜重，儿大者脉沉缓，此宿冷滞脾，故吐黄酸水，或有清痰，脉实而滑为食积所伤，吐酸馊气，或宿食并出，儿小者呪乳不化是也。先用五苓散、姜汁，温汤调下和解，次以乌犀圆主之，最小者投三棱散、化癖圆。伤风嗽吐，有热生风，有风生痰，痰结胸中，肺气不顺，连嗽不止，和痰吐出此为嗽吐。痰壅而作，乃为实证，宜去风化痰，先投清肺饮，次小柴胡汤为治。若嗽久而肺虚，土不生金，故面白唇燥，干嗽干呕而无痰，可温补为上，用茯苓厚朴汤、惺惺散、如意膏为治。伤乳吐，才乳哺后即吐，或少停而吐，此因乳饮无度，脾气弱，不能运化，故有此证。譬如小器盛物，满则溢，治法宜节乳，投三棱散。诸吐不止，大要节乳，徐徐用药调治必安。节者撙节之义，一日但三次或五次，每以乳时，不可过饱，其吐自减，及间稀粥投之，亦能和胃解吐。医见不明此理，惟欲进药以求速效，动辄断乳二三日，致饿甚而胃虚，啼声不已，反激他证。盖人以食为命，孩非乳不活，岂容全断其乳！然乳即血也，血属阴，其性冷，吐多胃弱，故节之。医者切须知此，乳母亦宜服和气血、调脾胃等药。

诸　泻

论泻之原，有冷泻、热泻、伤食泻、水泻、积泻、惊泻、风泻、藏寒泻、疳积酿泻，种种不同，各分于后。冷泻多是白水，泻密而少，腹痛而鸣，眉皱目慢，面带白色，额有汗多，此为冷泻。冲和饮、当归散，合和水煨姜煎服，并守中汤、参苓白术散、益中汤、沉香槟榔圆治之。热泻大便黄色，如筒吊水，泻过即止，半日复然心烦口渴，小便黄少，食乳必粗，此为热泻。先用五苓散或大顺饮，次以钱氏白术散主之。香薷散亦佳。伤食泻，乃脾胃素弱，复为生冷果食所伤，故大便不聚而泻，或因乳母餐生冷肥腻之物，自乳而过，亦能作泻，面唇俱白，泻稀而少，或如坏鸡子，腥臭异常，身形黄瘦，名伤食泻。宜先温正胃气，次理积面后固脾，冲和饮、当归散，合和水、煨姜、枣子煎服。理积，儿大者乌犀圆，小者化癖圆、三棱散、固脾和中散、醒脾散。水泻谓之洞泄，乃阴阳不顺，水谷不分，泻黄水而小便少，番次密而无度，是夏秋之际，昼则解衣取凉，夜则失盖感冷，冷热相激，清浊浑乱，或因母自热中来，乳有热气，遽以哺之，令儿脾胃不和，水谷交杂而下，以咬咀五苓散加薏苡仁、车前子、半夏，水姜煎服。分正阴阳，或先用大顺饮，温白汤调下。香薷散调中止补，钱氏白术散、六和汤亦好。积泻，脾气虚弱，乳食入胃，不能运化，积滞日久，再为冷食所伤，传之大肠，遂成泄泻，留连不止，诸药不效。盖以积在脾胃，积既未除，何由得愈？宜先去积，后止泻，泻止实脾，则病除矣。三棱散、乌犀圆，续用沉香槟榔圆、参苓白术散、和中散、香橘饼调理。惊泻，粪青如苔，稠若胶黏，不可便止，但镇心抑肝，和脾胃，消乳食，斯为治法。先投五苓散，次用三棱散，水姜、粳米煎服，或三解散，煨神曲、生姜煎汤调服，及沉香槟榔圆、不惊丹调治。风泻，慢惊大病后有之。其粪稀黄褐色，或夹不消乳食同下，此因脾虚所致，或夹褐黑色者属肾。盖脾虚为肾水所乘故也。若久不进饮食，再有惊搐，宜疏肾水，去脾风，次补脾则自愈，庶无复作之患。疏肾水，咬咀五苓散加黑牵牛半生半炒，并薏苡仁，水、姜煎服。去脾风，泻黄散。调脾气，参苓白术散。藏寒泻，粪如青竹色，不稀不稠，或下青水，未

泻时腹痛而鸣，叫哭方泻，多是生来三五月内有此，周岁则无。始因断脐带风，风冷自外逼内而成。此疾先用冲和饮，水煎白煎投，温中解表，次以当归散，水、煨姜煎服，及投匀气散、理中汤。痢积酿泻，其候面色痿黄，肚胀脚弱，头大项小，发稀且竖，肌肉消瘦，不思饮食，昼凉夜热，或腹内有癥癖气块，泻则颜色不等，其臭异常，其泻有时，或一月半月旬日一番，自泻自止，名为痢积酿泻。先以当归散加三棱、陈皮，水、姜煎服，次投乌犀圆、沉香槟榔圆及化癖圆、芦荟圆、没石子圆。儿最小者，难下圆子，止投三棱散、快膈汤，自然痊愈。若泻或痢，色青甚而淡黄夹白，寒多热少，此阴邪胜阳，宜用守中汤、胃苓汤与服，扶表救里，方进当归散加陈皮、紫苏，水、姜、糯米煎服。亦宜和解，理中汤、清米饮，空心调服，温脾去湿，益气清神。寒盛者，理中汤内加熟附子，水姜、枣煎服，次投南星腹皮饮，水、姜煎服，和脾胃，去阴邪。若泻或泄，色青淡而有沫粪稠，热多寒少，亦致面黄肌瘦，烦躁不宁，宜以皎咀五苓散加薏苡仁、车前子，水姜煎服。解散余邪，仍用茵陈蒿、栀子仁煎汤，调细末五苓散温服，退黄色，消阳毒，及当归散，水、姜、枣煎投，或服万安饮、四神散。

赤白痢

赤白之痢，世人莫不曰赤为阳为热，白为阴为冷。或曰无积不成痢。至于调治，若以冷热之剂互进，或投去积之药，必难取效。不究其原，何由可疗？且四时八风之中人，五运六气之相胜，夏秋人多痢疾。《内经》曰：春伤于风，夏生飧泄。至真要大论曰：少阳在泉，火湿所胜，民病注泄赤白，其可拘于无积不成痢之说。若专以积为论，岂一岁之中，独于夏秋人皆有积，春冬不然，盖风邪入胃，本能胜土，不为暴下，则成痢疾，赤白交杂，此为阴阳不分。法当分正阴阳，五苓散以导其逆，理中汤以温其胃，使色归一，然后施治。若一分之后，仍赤白同下，则当究其所患之因。若先白后赤，乃内伤生冷，外失于盖，由元气感于暑热。治法先救其里，次解暑毒。若先赤后白，乃先伤热而后失盖感冷，先宜解热，后治其痢。有夹热而痢者，则下纯鲜血，此风能动血，宜冷服黄连香薷散、川芎散，以当归散加醋炒蒸柏叶，水、姜煎服，或羌活散加三和汤，水、姜、仓米煎。有夹冷而痢者，则下纯白冻，或白上有粉红色，或似猪肝瘀血，皆为阴证。盖血得寒则凝泣音涩故也。先用皎咀五苓散加守中汤煎投，次以附子理中汤带凉服，或固真汤。倘不辨其虚实冷热，妄行施治，必致脾胃愈虚，不能乳食，成噤口痢者，则难疗矣。又有里急后重，盖里急为阳，后重为阴，未圊音清，厕也前腹痛为里急，已圊后腹痛为后重，故里急者，大肠涩也。先以大顺饮加宽气饮和解及羌活散，水、姜、仓米煎服，次下宽肠圆。后重者，为气虚，用皎咀五苓散加人参，水、姜煎服，并投香连圆。若二证俱作，前二圆子并进，或双金饮、金粟圆亦效。然泻痢二字，白是两证，粪夹水来，多而顺者曰泻；带血冻白冻，来三五点而痛者曰痢。轻重阴阳，于此而分，斯为治法。有脓血交杂，经久不止，昼轻夜重，或昼夜频数，食减痛多，并用万金散、神效散主之。有五色痢者，乃因五藏蕴热，日久不散，故有是证，盖五藏受热，荣卫不调，五谷不化，熏腐藏府，神气昏沉，此候已危，最苦是腹中刺痛，儿小者无治法。盖五色者，乃五藏之色，皆见于外，儿大者，可用《局方》三神圆，或小来复丹，以五苓散送下，或者可疗。若投药如故，不可为也。又有风痢，多是黄褐色，与疳泻颇同，但不臭为异耳。此风毒停滞于脾，宜去脾经风毒，泻黄散主之。若见赤白同下，久而不禁，小便涩少，痛热并作，唇裂眼赤，气促心烦，坐卧不安，狂渴饮水，谷道倾陷，时复面容如妆，饮食不进者，难治。

肿证此疾更多，投五皮饮为好

原肿病之由，标本之疾，肾主元气，天一之水生焉。肺主冲化，地四之金属焉。肾为本而肺为标，皆至阴以积水。其为病也，肾者胃之关键，关键不利，枢机不转，水乃不行，渗于脉络皮肤，而为浮肿。当推究内外所因，而为施治。儿大者凭脉以明虚实，古方有十种论证，短气不得卧为心水，两胁紧痛为肝水，大便鸭溏为肺水，四肢皆重为脾水，腰痛足冷为肾水，口苦咽干为胆水，乍虚乍实为大肠水，腹急肢瘦为膀胱水，小便闭涩为胃水，小腹急满为小肠水。然脉浮为风为虚，沉伏为水病。沉则脉络虚，伏则小便难，即为正水。脾脉虚大，多作脾肿，因循不治，乃成水肿。盖脾属土，喜燥而恶湿，常感湿气，湿喜伤脾，血化为水，土败不能制水，则停蓄不行，留滞皮肤，故作浮肿。初得病时，见眼胞早晨浮突，至午后稍消，以羌活散疏解，次醒脾散主之，及间投南星腹皮散。其脾冷困，则燥以草果、缩砂之类。然此证夏与秋冬治之颇易，惟春不然。盖四时之水，无如春水泛溢，兼肝木旺而脾土受克，不能受水，所以难疗，进退不常，须徐徐调理取效。若脾热而困，又以药燥之，虽火能生土，亦可胜水。余何燥之太过，土不敌火，则热愈甚，而不食发热烦渴，医者又进之以燥剂，由此而面目转浮，致脾败而手足背皆肿。盖手足背与脐凸音迭即脾之外候，有未经发表，遽用下药以泻之，则一泻而肿消，乃云得泻之力，殊不知脾愈泻而愈虚，不逾旬月，其肿如初，此世人只知泻肿为最，而不求其十补勿一泻之论。法当随四时用药，解表通利小便，春以七宝散加麻黄、桂枝、赤茯苓、水、姜、葱煎服，夏以五苓散加麻黄、车前子、薏苡仁，秋以清肺饮加羌活、细辛、商陆，冬以冲和饮加白术、生川乌、赤小豆。以上三药，并用水、姜、葱煎投，滋润救脾导水汤剂渗泄之，乃为良法。更以香砂胃苓圆、赤苓饮频服，自然获安。盖《内经》云：开鬼门发汗也，洁净府利小便，平治权衡，以平为期。此之谓也。有初肿便觉痰嗽气喘，小水不通，正属肺肾所主，先服解表散，次以三白散为治。余证轻者投商陆圆，故经曰：其高者因而越之，即涌吐之义也。下者引而竭之，即渗泄之义也。凡得此病非一朝一夕之故，不可以孟浪之药求其速效，以致虚脱。如愈后再感外风，满面虚浮，用排风汤和解，仍服前救脾汤剂，免致反复。饮食之忌，惟盐酱诸鲜湿面，皆味咸能溢水者，并其他生冷毒物，亦宜戒之。重则半载，轻者二月。须脾胃平复，肿消气实，然后于饮食中，旋以烧盐少投，则其疾自不再作。故刘氏曰：治肿非易，补养尤难，所忌者切须详审，有经久不消者，下浚川圆即效。

疳　证

小儿疳证，其名有五：心、肝、脾、肺、肾是也。详析于后。咬五巧切牙舒舌舌上，生疮，爱饮冷水，唇红面赤，喜伏眠于地，名曰心疳。甘生眵粪，发际左脸多青，或白睛微黄，泻痢夹水，或如苔色，名曰肝疳。爱吃呢土冷物，饮无度，身面俱黄，发稀作穗，头大项小，腹胀脚弱，间或酿泻，肌瘦日慢，昼凉夜热，不思乳食，名曰脾疳。鼻下赤烂，手足枯细，口有腥气，或作喘嗽，右腮眺白，名曰肺疳。两耳内外生疮，脚如鹤膝，头缝不合，或未能行，牙齿生迟，其缝臭烂，传作走马疳之类，名曰肾疳。大抵疳之为病，皆因过餐饮食，于脾家一藏有积不治，传之余藏而成，五疳之疾。若脾家病去，则余藏皆安。苟失其治，日久必有传变。然脾家病宜芦荟圆、沉香槟榔圆，或水晶丹、乌犀圆，更察虚实疗之。有虫者投使君子圆、化虫饮，如心腹痛，吐清水，虫自下，多投二圣圆。诸疳证皆宜用局方五疳保童圆，或万应圆。宫服化积治疳，仍各投本脏调理之剂。宁心用茯神汤，调肝用芎归汤，调脾用参苓白术散，

补肺用补肺散，补肾用调元散。庶各得其宜，则前证不致再作。

走马疳

凡得此候，多因气虚受寒，及有宿滞，留而不去，积温成热，虚热之气上蒸，或食甜酸咸腻之物，而脾虽喜甘，积滞日久，蕴热上熏于口，致齿焦黑烂，间出清血，血聚成脓，脓臭成虫，侵蚀音食口齿，甚致腮颊穿破，乳食不便，面色光浮，气喘热作，名走马疳。治之之法，先去积热，用当归散，合三棱散，水、姜、枣煎服，次投芦荟圆、玉露饮，及以温盐水灌嗽，或软鸡翎蘸盐水拂洗，略拭干，仍以烧盐散、内金散、密陀僧散傅之。若经久不愈者，传于唇之上下，乃成崩砂证。或穴发满腮，齿落骨露，饮食减少，气促痰鸣，必致危矣。

脱　肛

《脉诀》曰：大肠共肺为传送。盖肺与大肠为表里，肛者大肠之门，肺实热则闭结不通，肺虚寒则肠头出露。有因痢久，里急后重，努力肛开，为外风所吹，或伏暑作泻，肠滑不禁，或禀赋怯弱，易于感冷，亦致大肠虚脱。凡小儿所患泻痢，皆因暑湿风热乘脾胃虚而得。盖风属木，木胜则制土，土主脾胃，虚而受制，又湿喜伤脾，因虚受湿，不能分别清浊，水谷交杂，则为洞泄。洞泄既久，大肠亦虚，大肠乃手阳明燥金，而土虚不能生金，金气既虚，则传送之道亦虚，又为风冷所袭，故肛门脱而不收。法宜补脾温胃，使金得受母之益而气实，宜藿香饮、匀气散、平胃散主之，次则内投固肠之剂，用健脾饮、养藏汤，服饵，外以敷贴之法，用伏龙肝散傅之，及革麻膏贴囟门，使引气上，令其自收，如收尽仍以水洗去其膏。又有邪热积滞于大肠，未经疏涤，亦成此疾。其肛门色红而软，肺脉浮数，右手指纹紫见，身微有热，时或烦躁先投清肺饮疏解，次用薄荷散、蟠龙散为治，间服万安饮，亦佳。

痫　证

古人议痫最多，大概在乎观形切脉，明辨阴阳，对证用药，不致妄投汤剂为上。阴痫者，因慢惊后去痰不尽，痰入心包而得，四肢逆冷，吐舌摇头，口噤白沫，牙关紧闭，但不甚惊搐作啼，面色或白或青，脉息沉微，故《婴孩宝书》云：睡中吐舌更摇头，正此之谓。治以固真汤加日生汤同煎，调宽气饮和解。阳痫者，因感惊风三次发搐，不与去风下痰，则再发。然三次者，非一日三次也，或一月、或一季、一发惊搐，必经三度，故曰三次。所谓惊风三发便为痫，即此义也。其病主身热自汗，两目上视，嚼沫咬牙，手足掣搦，面色红紫，六脉浮数，以百解散加五和汤，水煎疏解，次下痰，用水晶丹或半夏圆。胎痫者因未产前，腹中被惊，或母食酸咸过多，或为七情所汨，致伤胎气，儿生百日内有者是也。发时心不宁，面微黄，气逆痰作，目上视，身反张，啼声不出，先用参苏饮和解，次以不惊丹，或琥珀抱龙圆间投，轻者可愈，重则亦危。六畜痫者，发时作牛马猪羊鸡犬声，便致倜仆，口吐涎沫，不省人事。张氏论此。盖初发作羊犬声者，咽喉为风痰所梗，声自如此，其理甚明。若言六畜者，特强名耳。凡得此证，宜多投疏风顺气化痰等剂，早为治疗则免终身之患。

食痫者，因中焦不和，饮食时偶被惊搐，则惊气停滞中脘，食不克化，淹留日久，气郁痰结，痰结则风热生，由此致疾。陈氏有曰：结气而成痫，此其义也，宜宽中顺气，去风痰，疗惊积，和脾胃，则安矣。狂痫者，亦属阳。《难经》云：重阳则狂，至长成小儿才发。时妄言不食而歌。甚则逾墙上屋。弃衣而走。或一日二日方醒。始因胃热感风，风热内蓄，久则风痰郁结，上迷心包，盖心乃神之舍，偶为邪热攻逼，则神失所守而昏乱，名曰狂痫。然心火肝木皆为物，火不自炎，因

风吹起烟焰，木不自动，因风撼而自动摇，风火合德。两阳相搏，其热可知。心藏神，肝主惊，因风生痰，以致于此。医者为治疗，既能清心平肝，疏风退热，得病暂安，不与镇心下痰，则痰涎结实，停滞心络，病至再三，加以发搐频数，难为治疗，必成废人。有曰惊痫即与此证相类，若乍感真疾，日月稍近，法当解表散惊，及凉心肝，次下风痰，解表散惊百解散，凉心肝三解散、防风汤，下风痰水晶丹、碧玉圆，更须临证参详，乃无失也。

疟　疾

《内经·疟论》云：痎疟皆生于风，而发作有时何也。岐伯曰：夏伤于暑，秋必病疟。谓腠理开而汗出遇风，或得于澡浴，水气舍于皮肤，因卫气不守，邪气并居，其疾始作。伸欠寒栗，腰背俱痛，骨节烦疼，寒去则内外皆热，头疼而渴，乃阴阳二气交争，虚实更作而然。阴气独胜则阳虚，故先寒战栗，腰背头项骨节皆痛。阳气独胜则阴虚，故先热，发时不嗜食，善呕头疼腰痛，小便不利，阴盛阳虚，则内外皆寒。阳盛阴虚，则内外俱热，此外感六淫，或内伤七情，蕴积痰饮，病气与卫气并居，故病日作。卫气昼行于阳，夜行于阴，得阳而外出，得阴而内薄，内薄五藏，六气深入，不能与卫气俱出，则间日而作，当卫气所至，病气所在，则发。在阳则热，在阴则寒。经曰：亢则害，极乃反。俟阴阳各衰，卫气与病气相离则病休。阴阳相搏，卫气与病气再集则病复。各随其卫气之所在，与所中邪气相合而然也。先寒后热者，先伤寒而后伤风，名曰寒疟。先热后寒者，先伤风而后伤寒，名曰温疟。但热不寒者名曰瘅音赵疟，身重寒热，骨节痛，腹胀满，自汗善呕，名曰湿疟。但寒不热者。名曰牝疟。盖疟之为病，而证状非一。故处方之制，随其阴阳虚实，脉病证治，汗吐下温，对证施剂，以平为期。然百病中人，必因其正气之虚，感受邪气，留而不去，其病为实，自表传里，先汗后下，古今不易。盖治疟之法，必须先表，用百解散，水姜、葱煎投，次小柴胡汤，加桂、水、姜、枣煎服，以和解表里之邪，自然作效。若表里实，用当归散、五和汤，或乌犀圆、六圣圆下之，匀气散止补，后以藿香饮加草果、良姜，水、姜、枣煎投，正胃气，去寒邪，则自平复。如解表后，寒热往来，以二仙饮或三圣圆截之。寒热既除，用平胃散加茴香汤和匀，盐汤空心调服。温胃燥脾，进饮食，使中州之土既实，则外邪不战而自屈，此为明论。有寒多热少经久不愈，致脾胃弱，饮食减，神色慢，二姜圆主之，及清脾汤为治。每见治疟不明理者，多取草药捣水冷服，或露而投之，水伤脾胃，耗损真元，变证百出，或传成浮肿，或转作疳泻，或变为冷痢，致脾胃虚弱，饮食减少，因而不救者有之。且婴孩娇脆，何堪用以草药服饵？为医为父母者，切宜戒之。

癖　证

婴儿始生，禀赋未完，失于襁褓之不谨，乳哺之不节，外为六淫侵袭，内因五藏气虚，冷积久停于脾，不能克化，结成癖块，突于胁下或左或右，俗曰龟痨。其疾皆因积滞蕴作，致有寒热，或腹肚疼痛，或昼凉夜热。治疗之法，气实者，亦须温正胃气，后用乌犀圆或水晶丹下之。如过二三次，即以稀粥略止，候所作形证消尽，方投补益之剂。气虚者，先与调脾胃，固真元。神色稍正，饮食进多，如前法下之。若太虚甚，用三棱散、化癖圆渐消之。顺适阴阳，以平为期。然先补后泻，行迎夺之法，则取去陈寒冷积。若面黄唇白，发竖肌瘦，乃为虚极，不可轻下，但徐徐用药消化，调理为上。若儿小者，更令乳母常服藿香饮，使药从乳过，亦少助也。

疝　证

按《内经·大奇论》曰：肾脉大急沉，肝

脉大急沉，皆为疝证。心脉搏滑急为心疝，肺脉沉搏为肺疝。盖疝者，寒气结聚之所为，故令脐腹绞痛者是也。又巢元方曰：诸疝者，阴气积于内，复为寒气所伤，荣卫不调，二气虚弱，风冷入腹而成。故《内经》云：急者紧也。紧则为寒、为实、为痛，血为寒泣音涩则为瘕，气为寒聚则为疝。皆因本藏气虚，外感于寒湿，内伤于生冷，遂使脐腹绞刺激搏而痛，无有定处，仓卒之际，不堪忍者，谓之疝也。并宜先用五苓散，沸汤调服和解。轻则但以白芍药汤、乌梅散、钩藤膏为治，重者，金朱圆、散气圆，未有不瘥音愈也。

龟　胸

尝论此候，因风痰停饮，聚积心胸，再感风热；肺为诸藏华盖，居于膈上，水气泛溢，则肺为之浮，日久凝而为痰，停滞心胸，兼以风热内发，其外证唇红面赤，咳嗽喘促，致胸骨高如覆掌，名曰龟胸。治法宽肺化痰利膈，以除肺经痰饮。先用五苓散和宽气饮，入姜汁、葱汤调服，次清肺饮、雄黄散、碧玉圆、如意膏为治。若投前药，愈而复作传变，目睛直视，痰涎上壅，兼以发搐，则难治矣。龟背者，盖初生婴孩，未满半周，强令坐早，客风吹著背脊，传入于髓，故令背高如龟之状，名曰龟背。终成癆疾，何以为治？

惊　丹

婴孩生后，百日之内，半岁以上，忽两眼胞红晕微起，面带青黯色，向夜烦啼，或脸如胭脂，此伏热在内。亦有脸不红者，始因居胎之时，母受重惊，惊邪伤胎，递相传袭，降生之后，复受热毒，或再有惊，有惊则有热，热气内蕴，形发于外，初发时散生满面，状如水豆，脚微红而不壮，出没休息无定，次到颈项，赤如朱砂，名为惊丹。用四圣散先洗其目，次百解散加五和汤同煎，与解惊热丹毒，牛蒡汤、当归散、三解散、黄芩四物汤，皆可为治。如惊丹发至胸乳间，微有痰喘作搐，急宜宣热拔毒，免致内流，为害不浅。五和汤加升麻、生干地黄、水、姜、灯心煎服，则自消除。仍用前数药调治，不生他证，或投万安饮。

痘　疹斑毒附后

疮疹之作，始自婴孩生时，啼声一出，则咽下口中秽浊，蓄之在胃，因气运变迁，主客胜复邪气郁发，与元受秽浊激搏，而形于肌肉皮肤之外。初发有类伤寒，不拘四时，皆有此候。经云：春夏为顺，秋冬为逆，盖春夏则阳气布，玄府开，人之气血流畅，邪毒易出，秋冬则寒气胜，而水冰地冻，人之气血凝泣音涩，故难出也。小儿所患此证，轻重不等，命名亦异。轻者如麻，俗言麻子，重者如豆，谓之豆疮，重而又重，密如浮漂，俗曰赤漂。既传入此，已是危急。医与病家，切宜详审。故出各有其名，心为红点，肝为水疱，肺为脓疱，脾主结痂。惟肾居下，不受秽浊，所以独无其证。若见疮色黑陷，乃毒气入肾，急投麝香人齿散救之，及一七金尤妙。此言五藏各有所主，及其发也。始焉壮热腰痛咳嗽，面目皆赤，或乍凉乍热，两足微冷，有惊搐谵语者，有腹痛欲吐者，有头痛烦渴者，六脉紧数，耳尻音膏俱冷，呵欠顿闷，至五六日，身出红点，红点成水疱，水疱成脓疱，脓疱之后，结痂疙则瘥音愈矣。此证才见，似是而非，若同而异，疑贰之间，但以升麻汤加麻黄与之发表及清肺饮。盖肺主气，王氏曰：豆疮气均则出快。故用之。仍不可过投，兼此疾首尾无下法，若下之必损脾胃。然万物得土气温暖而生，下之则脾土虚冷，气血无自而盛。故豆疮因脾胃虚冷，而气血亦衰，遂有伏陷之变。又《内经》云：诸痛痒疮疡，皆属于心。虽各藏形证不同，而心实为之主。心主血，因其血热在里，再遇六淫侵袭，两相攻击，自内而形于外，则发之为豆疮，未有不先见其血点，而后结脓疱。

故其原出于心，或痛或痒，以分虚实。经曰：诸痛为实，诸痒为虚，切宜知此，不可妄投药饵。若一出便齐者为重，不齐者为轻，以中和汤通顺表里，及芪归汤催脓而已。既出不多，发之亦少，此为本疏，不宜再发。有大热者，以导赤葛散利小府。微热者用吹咀五苓散，加人参、甘草，水煎。欲出不见者快斑饮，久而不结痂疙者，是表有热，蒸蒸于皮肤，可用升麻汤加黄芩以解之。若豆疮见形，有渴泻吐痢，用陈氏木香散、异功散、豆蔻圆治之。有虚痒者，多服芎归汤及中和汤。以上豆疮，大约施治，不过如此，其余杂证预防之法，胡大卿陈文秀二公之书，该载详备。或问升麻汤治豆疮已发未发皆可服，何如。愚曰：予每致思及此，屡见病家不循次序，不问可否，以为常服，自取危困，良可叹也。殊不知古人立方，深有意焉。但后学不能究心造微，以为一定之方，误人多矣。盖未发之先可服，使其解利肌肤，自然出快。已发之际便不可服，为其药性差凉，凝滞气血，毒不能出，反以为害，结痂之后可服，使其解散余毒，气顺血和，免有豆瘢之患。或问豆疮倒靥，有用麝香、人齿散作效，亦有不效者何？予曰：其说有二，若见黑陷，毒气入肾，肾色主黑，盖齿者肾之余，用麝齿之法，引导归肾，而发出其毒，故效耳。及用一七金救之，其效尤速。若见痒塌灰白色，脾虚所致，多投陈氏异功散取效。以上二证，各有主治，不可执一，切须详审。或问：豆疮投紫草饮固好，亦有不服者。曾子曰：处方之妙，在乎君臣佐使，后之医者，不谙古法，令病家自取紫草，修合品味，或为汤使入诸药内，彼欲速效，而倍用恣饮。按本草云：紫草性寒，小儿脾气实者，或尔偶中，脾气虚者，反以为害。如戴氏方名紫草茸饮，后人讹传此方，缺其茸字，盖茸者春月才生之芽，色泽而红嫩，得阳气之使然。以类触类，所以用发豆疮故效，但罕得嫩茸，后以紫草头仅半寸者代之，即与茸初萌处同类。今人不达其理，遽全用之，有脾虚者服之作泻，疮陷不救者多。予尝目击其事，深为可伤。凡治豆疮，不可不明此理。盖戴氏紫草茸饮，内有人参、黄芪、当归、白芍药佐之，故用验矣。或问：病豆疮者，忌食粥饭欤。予曰：此俗忌也。病家恐患者疮烂如粥，故忌之。其实不然。毒气自里达表，满口糜溃乳食不能进，非以粥饮饲之，则脾土虚而豆疮陷，必致不救，深可痛惜。予尝调治此证，始终与粥，全活多矣。盖粥者以米为之，何毒之有，为父母者，切宜知此。或问：禁食荤腥者何？予曰：此亦世俗拘执之论。天以五气生万物，人以五味养五藏，豆疮之萌，始因藏受邪毒，感时气而郁发，自内达外，荣卫俱虚，里气亦弱，必藉五味荤腥，以为滋补，使气顺血和，自然出快。但不可食动风发热之物，以助毒气，尤则必害。或问：豆疮后与产后相类何如？予曰：盖产后之妇，血脉伤损荣卫大虚，败血未尽，偶六淫侵袭，便致急证，亦有不救者，故郭氏著产后二十一论，正为此设。且小儿豆疮，一身精血皆形于外，热作胀痛，叫声不已，耗损真气，结痂后表里俱虚，荣卫亦弱，余毒未解，失于调护，暴感邪气，多致夭伤，与产后传变何异。在父母者，倘不究心及此，悔将噬脐，为之晚矣。然有疮少气实，饮食如故，又不拘以此论，医者宜审之，切勿例指为虚也。凡豆疮欲痛音愈未愈之间，传变黑陷干枯，咳嗽失音，吐泻烦渴，浑身手足俱冷，睡则昏迷，饮食减少，及痰多气促燥痒，皆为不治。医者宜察之。世言麻子者，亦疹毒也。经曰：疹属于脾，胃为脾之府，有疾则同矣。疹毒乃天行气运变迁之使然，亦随天地乖戾之气而受病，故曰时气。不拘长幼，身发大热，咳嗽连声，腰痛口干，足冷，有寒热腹痛者，有头疼自痢者，有烦热惊搐者，此热使然也。但外证形于身体头面，如蚊蚤所啮五结切发红点而起头，其疮脚有紫黯色为异耳。盖因四时有非节之气，著人肌肤，留而不去，再经外邪郁

蒸，与元受蕴热相触，毒气遂发于外，形而为疹。若热太甚，则为痈为疽，为赤紫丹瘤，传入藏府，治之稍缓，亦致害人。有胎受秽液，热毒蕴蓄于肺胃，因感时气而发者，并以清肺饮疏表，及百解散去桂加黄连，水煎。或余毒之气上蒸，口齿糜烂作臭，饮食不便，以当归散加七宝散，入盐水姜煎服，并牛蒡汤疏风化毒。若疹出盛时，头痛肚热，神思烦闷，麦门冬汤主之。如夏月得此证者，烦躁发渴，小便少，神不安，投却暑丹即效。有毒气甚者，满口成疮，目赤肿痛，失音恶心，此余毒在肺胃之间未解，致肺胃俱虚。肺虚则语声不全，胃虚则饮食不纳，急宜早治。若气促心烦惊悸者，病必致危矣。世言此证有温毒发斑，有胃烂发斑。若温毒发斑，其瘾疹如锦纹片，出于两腋之下。盖两腋者，气之道路，故蕴毒随气之道路而先出，其疾咳嗽烦闷，或呕清水，此因冬时感冒寒毒，停于肌肉之间，至春阳气发动，而形于外，名为温毒发斑。以百解散、牛蒡汤，及当归散加陈皮、黄连为治。胃烂发斑，初因伤寒下早，热毒乘虚入里，及当下而不下，亦致热毒内蒸于胃。胃受热毒，则发出于皮肤，斑之赤者可疗，黑者十死一生，治法亦同前议。活人书以玄参升麻汤、大青四物汤、化斑汤为治，大人小儿，病同一体，用药施治，无逾古法，但小方分剂则轻少不等耳。此证更宜投拔毒饮、升脉汤，前豆疮余毒发见，皮肤溃烂，治用黄土散。

阴　囊　肿

巢元方论曰：诸筋会于阴器，邪客于厥阴少阴之经，与冷气相搏，则阴囊肿痛而引缩，经中虽分四证，曰肠癫、气癫、水癫、卵癫。然小儿患此，若治之不早，则成痼疾。如腰曲腹痛，冷汗自出，而阴囊二子，吊缩入腹，痛止方出，名为内吊。用乌梅散匀气散、金茱圆、金铃散为治。有阴茎全缩不见，有阴囊光肿不痛，此因肝肾气虚。宜以橘子仁煎汤，调下金铃散、匀气散，皆可投之。《内经》曰：癫癃疝肤胀者，阴亦盛而脉胀不通，故曰癫癃疝。由是观之，乃阴气盛而致有此吊缩者，筋急也。筋遇寒则引缩，遇热则纵弛，故三因所用方法，以宽小肠气疏风为治。然小儿此证，多因坐阴润之地，感风湿而得，用当归散加槟榔、苍术、水、姜煎服，并青木香汤、钩藤膏，外以立消散傅之。有外肾无故而肤囊肿大，不燥不痛，光亮如吹，此名气虚所致，以匀气散调治，三因方家韭子圆主之。一证外肾肤囊赤肿通明，及女儿阴户肿胀，乃心热之所传，皆以木通散、导赤散为治，或用薏苡仁煎汤，调五苓散，及以外消散傅之，并投天花散，用无灰酒煎下。不能饮者，水煎少入酒，同服亦好。

惊瘫鹤膝

肝者，东方青龙木也。其动则应于风，病则主惊骇。诸热引肝风，有风则生痰，有痰亦作搐。小儿惊风之际，手足动掣，当听其自定，然后疗之，免生异证。或父母见其病势可畏，从而按伏之，岂知筋者肝之令也。临病发时，若按束其手足，则筋不舒伸，遂至经络为风所闭，终为废人。内经曰：颓弱名缓风，疼重名湿痹。又有四肢痿痹不仁，致手足稍胀痛不堪忍者，此风毒之气使然。故传曰：风淫末疾是也。凡小儿心悸不常，及遍身肿痛，或手足不随，此为惊瘫候也。若治之稍迟，至臂腕膝胫骨节之间，流结顽核，或膝大而肿，肉消骨露，如鹤膝之状，或为痈为疖，此名鹤膝候也。以上形证，并宜发汗为先，使腠理开通，则风热可除，有湿亦去。用百解散和皎哇五苓散，倍加麻黄，水、姜、葱煎服，微得汗为度。或以麻黄汤发散尤佳，次防己汤、祛风散，及独活汤加桑寄生投服，并防风汤或黑虎丹，作小圆子间服，使风不生而痰不作，则其疾易瘥音愈。若为痈为疖，疼重者用黑牵牛半生半炒，略碾碎，煎无灰酒调下五苓散，以除流注之寒湿，则肿

毒可消。如大府闭而不通，此是风热内蕴，其右腮红紫，及右手三部脉浮而实滑，宜五和汤或当归散、枳壳圆治之。其加减之法，尤在临机审处。若泥一方，非良医也。前证更宜间服排风汤。

瘰　疬

瘰疬一证，先贤名曰九漏，究其所因似热，稽考形状非一，不过随象命名大概初发于颈项肌肉之间，未成脓者，从本引末，可使衰去，针之灸之傅之，从其所因而施疗。然小儿幼弱，岂堪针灸，但以服饵涂贴之剂为治。此疾多生于耳后及颈项两旁，初发止是一枚，次必连生，大小十数，缠绕项下，累累如贯珠，逐个先肿。作脓穿破，轻者可瘥音愈重者难除，先穴漏脓，长岁不干，谓之漏项。原其得病之初，自足三阳感受风热，与血气相搏而成。治以百解散加当归散，水、姜、葱、灯心煎服。次用玄参饮及牛蒡汤、木通散、内消圆，与之宣热化毒，洗以槲皮散，涂用白芨散、二香散，使气顺血行，脓干汁尽，则自愈矣。仍忌臊毒野味，其证不致再作。

五　淋

《巢氏病源》曰：诸淋皆肾虚所致，肾与膀胱为表里，至水下入小肠，通于胞，行于阴而为溲，肾气通于阴，下流之道也。淋有五名：曰膏、曰冷、曰热、曰血、曰石，各具于后。膏淋，见小便有肥脂似膏，而浮于小便之上，此肾虚不能制其肥液而下行也。冷淋，先战栗而后小便，此亦肾虚而下焦受冷，冷气入胞，与正气交争，故小便涩而战栗。热淋，下焦有热，热气传于肾，流入于胞，其溺黄，多而涩，间有鲜血同来者。血淋，热之极也，心者血之主，外行经络，内行藏府，热盛则失其常道，心与小肠为表里，故下流而入于胞，则为血淋。石淋，肾主水，水结则化为石，肾为热所乘，遇小便则茎中痛，不得流利，痛引小腹，则沙石从小便出，甚至塞痛，令人昏闷，遍身有汗而后醒，此痛之使然。盖五淋者，虽曰肾虚所致，然小肠为受盛之府，气通于膀胱，膀胱为津液之府，气通于肾，余化下流而不通，皆曰肾气不足。热入膀胱，水道涩而不利，出入起数，脐腹急痛，蕴作有时，或如豆汁膏血，并以《局方》五淋散，下龙脑鸡苏圆，自然平瘥音愈。及香芎圆、补肾地黄圆，与之疏导补益为上。有癃闭遗溺二证，与淋不同，《内经·宣明五气篇》曰：膀胱不利为癃，不约为遗溺。盖癃者，乃内藏气虚受热，壅滞宣化不行，非涩非痛，但闭不通，腹肚紧满，宜用咬咀五苓散加木通、车前子煎服。遗溺者，乃心肾传送失度，小肠膀胱关键不能约束。有睡梦而遗者，有不知而遗者，皆是下元虚冷所致，亦因禀受阳气不足，用三因方家韭子圆治之，及参苓白术散、补肾地黄圆。然此证法当实土以存水，乃免渗泄之患，所谓补肾不如补脾是也。平胃散倍加益智仁，锉碎，水、姜、枣、烧盐煎，空心温服。又有阴阳二闭证，阴闭者，为冷湿乘虚入里，因而不通，名曰阴闭，以白芍药汤加南木香，水煎服，及用炒盐，以绢帕兜令带温熨脐四围，并投五苓散，入灵砂末，温盐汤空心调下，其效尤速。阳闭者，因暴热所逼，涩而不通，名为阳闭，以咬咀五苓散加车前子，灯心水煎服，及木通散、玉露饮、益元散，皆可用之，或贴姜豉饼于脐上取效，不拘阴阳二证，悉能疗之，并投万安饮。

腹　痛

《内经·举痛论》：五藏卒然而痛者，何气使然？岐伯曰：经脉流行不止，环周不休，寒气入经则稽迟，泣音涩而不行，故卒然而痛。盖小儿腹痛，有藏寒痛，锁肚痛，盘肠内吊痛，积痛，癥瘕痛，痃痛，癖痛，吊肾痛，偏坠气，寒疝痛，蛔音回虫动痛。诸痛不同，其名亦异，故不可一概论之。藏寒痛议，附胎寒论后。锁肚痛，一月内婴孩，忽乳不

下咽，肚硬如石，赤如朱，撮口而哭，面青唇黑，手足口气俱冷，是也。始因断脐带不紧，为风冷所乘，证亦危急，以白芍药汤、乌梅散、一字金投之。日久则难瘉音愈，更参考脐风证内议论。盘肠内吊痛，议在夜啼论中。积痛，腹中阴阴而痛，面黄不食，儿大者口吐酸馊气，先治积滞，后调脾胃，其痛自止。仍辨虚实和解治法，见前伤积论中。癥瘕痛，乃久积所致，亦能成疳，此皆荣卫俱虚，外则感受风寒，内则过伤乳食，停滞既久，不能克化，故邪并于阴为癥，阴则专静凝面不移，邪并于阳为瘕。假物象形，动而不息，盖此二证，若久而不治，亦成脾疳积，或两胁间有块如石，按之则痛，不按则轻，或面黄肌瘦，肚硬而胀，及有青筋，昼凉夜热，蒸潮无时，乳食减少，爱吃泥土，或大便酿泻，痛则身冷如冰，法当调脾养胃，用醒脾散、参苓白术散，磨积理疳，用化癖圆、三棱散、木香莪术圆。治酿泻，没石子圆、沉香槟榔圆。然此积滞之疾，非匕剂可疗，必须次第调理，则日久自然平复。痃痛者，始则腹内一小长块，其硬如臂，从腰缠转，或左或右，良久痛甚，则见于皮下，不妨乳食。其证先因有疾，表解未尽，遽尔下之太过，气虚寒搏郁结而成。法宜益气理虚，用参苓白术散、沉香槟榔圆、木香莪术圆为治。或间投白芍药汤，加人参、茯苓。水、姜煎服。癖痛者，癥瘕痃癖四证，大同小异，各有治法，惟癖证详论在前。吊肾偏坠痛，论在阴囊肿证内，当理肾和气。寒疝痛，即在疝证论中详备。蛔虫动痛，口吐清水涎沫，或吐出虫，痛不堪忍，其疾因食甘肥荤腥太早而得，故胃寒虫动作痛。其虫吐来，或生或死，儿小者此痛苦甚，亦致危难。先以理中汤加乌梅，水煎服，使胃暖不逆，次芦荟圆、使君子圆化虫饮主之。有儿大者，面皖白而间黄色，肉食倍进，肌体消瘦，腹中时复作痛，此有血鳖蛔虫杂乎其间，以二圣圆下之。又有胃受极寒极热，亦令虫动，或微痛，或不痛，遽然吐出，法当安虫为上。若以治虫，反伤胃气，固不可也。因寒而动者，用理中汤加乌梅，水煎服。因热而动者，用咬咀五苓散，亦加乌梅，水姜煎投。

丁　奚

丁奚者，亦久积成疳之证，皆因饮食过伤于脾胃。脾胃虚，不能磨化饮食，饮食渐减，无以生其气血，面白色惨，潮热往来，腹大而多青筋，手足如筒，颅腮开解，颈项小而身黄瘦，先投万应圆，次参苓白术散。早晨一服，与养胃气，及醍醐散，进食，食后下乌犀圆三粒至五粒，助脾化食，此即用迎夺之法。间投醒脾散、沉香槟榔圆、木香莪术圆，次第调理。有渴泻腹痛，千金膏自好。若脾气稍和饮食渐进，再以化癖圆、快活圆常服，或用乌犀圆略下二三行，匀气散止补。有寒热往来，柴胡饮主之。腹胀投南星腹皮饮，有余热麦芽柳枝煎汤，调三解散。有虫下使君子圆，故斯疾得之，非一朝一夕。然施治之法，亦须渐渐令其平复，欲求速效，则为难矣。凡鸡酒羊面鱼鲜甘甜生冷毒物，宜忌之。哺露者，亦由乳哺不节，损于脾胃，脾胃损而饮食减，形容羸瘦，则藏府之气不能宣通，时间有热，谓之哺露，此候与丁奚相去不远，但食多吐逆，藏气虚冷，而泄泻无度，粪中有虫，治法同前丁奚证药，惟加养藏汤服之。

口　疮

口疮一证，形与名不同，故治法亦异。有发于未病之前，有生于已病之后。大抵此疾不拘肥瘦，有血气盛者，又加将养过温，或心脾二经有热，或客热在胃，熏逼上焦，而成其疮，此为实证。宜宣热拔毒，使无炎炽，自然作效。可用当归散，加升麻、干葛、黄芩，水、姜、葱、灯心煎服，及投牛蒡汤、拔毒饮、木通散，点以消黄散。若口内白烂，于舌上口外糜溃，于唇弦疮少而大，不甚为痛，

常流清水，此因脾胃虚热上蒸，内已先发，而后形于外，宜百解散疏表，当归散，水、姜、枣煎服，和胃气，理虚热次投牛蒡汤、三解散，涂以绿袍散立效。饮黄金散，或投天竺黄散、地黄膏。若疮生于口角；是脾有积热，才开口则燥痛，饮食多难，甚至再有外风吹著，便觉折裂，微有清血，谓之燕吻疮。治法同前药饵，轻者用甑盖上 炊流汁涂之亦验。有口唇下成小片赤烂，此因饮食腻汁，淋漓不洁，盖以婴儿皮肉脆嫩，浸渍成疮，及有风热乘之，名曰承浆疮。又谓之疳蚀疮，其所因者一也。治法同前证内药剂。有无故口臭糜溃，而不成疮，或服凉剂，或涂末药，不能疗者，此名元焦。故叔和《脉诀》云：阴数脾热，并口臭，是脾家有虚热，上攻于口，宜服回阳散，儿大者用黑锡丹，早食前新汲井水入盐少许调匀送下。与正元气，及参苓白术散、调元散，服之以立效。饮黄金散，干点溃烂处，或用蒸蜜同熟水调点舌上，令其自化，咽下无妨，诚良法也。仍忌毒物。

诸　疮

《内经》曰：诸痛痒疮疡，皆属心火。火郁内发，致有斯疾。盖心主乎血，血热生风，热郁内甚，递相传袭，故火能生土，血注阳明，主肌肉，风热与血热相搏，发见皮肤，其名不一。有黄脓而白者，土生金，母归子也。始生微痒而热轻，肿痛溃烂为热极，血凝化水，气滞成脓，甚至寒热作而饮食减，尤为可虑。宜宣泄风毒，凉心经，解胃热，用当归散加黄连、升麻、干葛，水、姜、葱、灯心煎服，及三解散、牛蒡汤、木通散间服，涂以四黄散、一抹金。若头上散生成片，常常燥痒，毛发稀少，有类白屑，此因积热上攻。名曰秃疮。疮虽生于头。世人只知以药外傅得瘉音愈。不逾旬月。其疮又发。何为而然。盖头者诸阳所会之处，洪范五行，火曰炎上，热毒上攻，两阳相灼，故疮生于头。法当解陈莝音锉之积热，导心经之烦燎音了，斯可矣。宜百解散，倍加五和汤，水、姜、葱、灯心煎服。次连床散涂之，及四黄散亦好。有遍身糜溃成片，甚至烦躁，衣不可著，盖因风火内郁于阳明，流毒于外，名曰风热疮。用百解散加五和汤，入何首乌、荆芥、白芷，水煎服，及牛蒡汤、当归散、木通散、五黄汤，疏涤肠胃，解散风热，其疮自瘉音愈，不致再生。外则涂以四黄散，或连床散亦佳。若见满头连额有痂如癞，或成黄脓，即是惊风积热，久滞在里，致上熏于头皮，名胎风疮，俗曰甜疮。亦以百解散先和表，次水晶丹去积疏风，或用乌犀圆与之宽利，匀气散止补。然后涂以连床散、四黄散、或投消毒饮，自然获安，更随禀赋虚实疗之。应汤火疮，先用羌活散发表，次以玄霜膏涂之即效。

目　疾

纯阳之子，始生旬月忽两目俱红，弦烂涩痒成医，此因在胎，为母感受风热，传于心肝而得，先以百解散加当归散，水、姜、灯心煎服，次导赤散及牛蒡汤加黄连、木贼、蝉壳，水煎服自效。有热极夹风，则目赤肿痛，昼夜不开，惊啼不已，先用九仙散，水、姜、葱煎投，次三解散，温米泔水调下，及点以黄连膏。若豆疮之后，眼生翳障，昏涩流泪，或浮肿不开，此豆疮余毒攻肝，投百解散，少加五和汤，水、姜、灯心煎服，次用牛蒡汤解之，洗以黄金散，及多投柿煎散。有豆疮后眼中成翳，或大或小，无非余毒使然，亦用牛蒡汤及甘桔汤，加蝉壳、白蜜，水煎服，次以金波散、黄金散，无时频洗，更详虚实为治，并羌活散加薄荷、谷精草、白菊花，水、灯心、姜皮煎投，间以糖煎散服。若天行时证，暴赤肿痛，昼夜苦甚，久则昏蒙，治法先以九仙散解表，次小柴胡汤去半夏加大黄、薄荷、竹叶、生地黄，水煎服，并投草龙胆散，及点用黄连膏，贴以清凉膏。有孩儿胃气表虚，脾气实盛眼胞赤肿，羞涩不开，遽投苦寒之剂，以退赤肿，反伤脾胃，不吐则

泻，或四肢微冷，复以温药调治，则目疾转加，宜先用咬咀五苓散，水、姜、灯心煎服，次投泻黄散自瘉音愈。有心脾蕴热经久，及肝受邪热，致两目羞明，眼胞浮肿，微有紫色，大府闭或流利，小便涩或通顺。先以百解散发表，次投明目饮，自然平复，仍忌酒荤三五日。有小儿薄劣，多致尘埃入目，揩摩成肿，发热作痛，啼哭不已，宜用辟尘膏治之立效。

丹　毒

经云：赤紫丹瘤，皆心火内郁而发，赤如丹砂，故名丹毒。心主血而火性热，血热相搏，阴滞于阳，即发丹毒。心虚寒则痒，心实热则痛，自腹生出四肢者易治，自四肢生入腹者难疗。先用百解散表之，次以当归散加连翘、荆芥，水煎服，及牛蒡汤加炒麻仁，研碎同煎与宣热拔毒。其次赤葛散，或初用化丹汤亦好。有身上发时，亦如前证，不甚燥痒，但见出浮于遍体，神昏不悦，名阴湿毒证。先以冲和饮加南木香、水、姜煎服，次用当归散、雄黄散。然此二证，不问赤白，若入腹入肾，多致为害，不可轻视如常，自取困尔。

重　舌

凡患此证，是脾与心肝屡受极热，有所谓重舌、木舌，又谓之舌黄、鹅口，名虽异，皆热也。大抵重舌生于舌下，挺露如舌，故曰重舌。然脾之络脉系舌旁，肝之络脉系舌本，心之络脉系舌根。凡此三经，或为湿热风寒所中，则舌卷音捲缩，或舒长，或肿满，宜消黄散、绿袍散主之，及当归散、羌活散与服。木舌者，舌肿硬而妨乳食，此为风热盛也，以当归泻黄散、玉露饮，皆可服之次消黄散点擦舌上。盖舌者心之官，心热则生疮破裂，肝壅则血出如涌，脾闭则白胎如雪，热则肿满，风则强木，口合不开，四肢壮热，气喘语涩，即其候也。治法凉解上焦，及心肝脾三经邪热，疏风化痰，初用百解散加五和汤，水、姜、灯心煎投，次以牛蒡汤，同当归散，入生地黄，水、姜煎服。鹅口者，始生婴儿，自一月之外，至半岁以上，忽口内白屑满舌，则上腭戴碍，状如鹅口，开而不合，语声不出，饮食多艰，亦因感受热毒，停积于脾，故上熏于舌，至极时药不能顿治，急以绢线札针嘴，约以粟谷长，刺破舌上下小疱，如芥子大，见黄水清血微出即减，方投前证内药同服，及以朱砂膏、地黄膏，调化涂点舌上，咽下无妨，或消黄散亦好。

五　软

戴氏论五软证，名曰胎怯。良由父精不足，母血衰衰而得，诚哉是言。以愚推之，有因母血海久冷，用药强补而孕者，有受胎而母多疾者，或其父好色贪酒，气体虚弱，或年事已迈，而后见子，有日月不足而生者，或服堕胎之剂不去，而竟成孕者徒尔耗伤真气，苟或有生，譬诸阴地浅土之草，虽有发生，而畅茂者少。又如培植树木，动摇其根，而成者鲜矣。由是论之，婴孩怯弱，不耐寒暑，纵使成人，亦多有疾。爰自降生之后，精髓不充，筋骨痿弱，肌肉虚瘦，神色昏慢，才为六淫所侵，便致头项手足身软，是名五软。治法用调元散补肾，地黄圆渐次调养，日久乃安。若投药不效，亦为废人。有小儿体肥容壮，不为瘦瘁，忽然项软倾倒，此名下窜，皆因肝肾气虚，客邪侵袭风府，传于筋骨，故成斯疾。盖肝主乎筋，肾主乎骨，筋骨俱弱，则项软垂下无力又名天柱倒。与五软相类不远，治同前药。有解颅一证，其囟缝不合，此肾气不足。肾主骨而脑为髓海，肾气不足则脑髓不满，故不合也，名曰解颅。凡得此候，不及千日之内，间有数岁者，偶因他疾攻激，遂成废人。若气色精明，能饮食者，多服调元散、补肾地黄圆，旬月内颇见效者，次第调理，或有可治。若投药后如故，亦难疗矣。世言囟肿皆以为热，殊不知有阴阳二证，切

宜详辨，坚硬为阴，红软为阳，故《婴孩宝书》云：寒气上冲则牢鞕音报，热气上冲则柔软。正此之谓。若阴证，以匀气散、理中汤主之，阳证，用玉露饮、当归散、防风汤为治。有囟陷者，虚之极也。胃气虚寒则囟陷，慢惊中有之。胃寒脾困吐泻者 为虚极，急以金液丹、固真汤及诸救元等药治之，外则贴以乌附膏。有后枕陷者，其证尤重，治法以囟陷药同，不效亦为难疗，此大虚极，百无一活耳。

诸　汗

汗者，心之液，故叔和心脏歌曰：液汗通皮润，声言爽气清。盖人之气血，犹水火也。平则宁，偏则病，阴虚阳必凑，则发热自汗，阳虚阴必乘，则发厥自汗。小儿脾虚自汗，多出额上，沾黏人手，速救胃气，全蝎观音散，用姜、枣煎汤调服，及沉香饮为治。脾虚泻自汗遍身冷而出，有时遇泻则无，泻过即有，此候大虚，急当补脾，投益黄散、参苓白术散、附子理中汤。肺虚自汗，其候右脸色多皖白，肺脉按之无力。盖久因咳嗽，连声不已，痰少不活，乃肺经虚气上壅，致令汗出，宜用补肺散为治，及以藿香饮调脾。此又益母救子之义也。慢惊自汗，遍体俱有，其冷如冰，此证已危，金液丹、固真汤主之。有实证自汗，外因感冒风邪发热，无问昏醒，浸浸汗出，当救表解肌，用百解散，水煎服。或间投五苓散，温白汤调下。有小儿无疾，睡中遍身汗出如水，觉而经久不干，此名积证盗汗，脾冷所致，用三棱散，水、煨姜煎服，次投益黄散、参苓白术散。有时时冷汗微出，发根如贯珠，面额上濈濈然，此为惊汗证，宜镇惊圆或琥珀抱龙圆，及茯神汤加麻黄根，水煎服取效。有夜睡中而汗自出者，名曰盗汗。《巢元方论》云：病因睡寐中而身体汗流，此因阳虚所致久不已者，令人羸瘠枯瘦，心气不足，津液妄出故也。用茯神汤加黄芪，水、姜、枣烧盐煎服。

黄　证

凡黄病者，不可一概而论。标本不同，证治亦异。故《婴孩宝书》云：黄病皆因胃热所为。由是观之，乃脾胃气虚，感受湿热，郁于腠理，淫于皮肤，蕴积成黄，熏发于外，故有此证。或脾胃虚弱，内因癥癖攻之而成。然疳泻亦主皮黄发竖，肚大青筋，肌肉消瘦，外无色泽，身必发黄，此又本于疳病而作，致有是证。治法若感湿热而得，身黄如烟熏之色，以皂咀五苓散加麻黄，水姜煎投，汗之即瘉音愈。或用茵陈蒿汤调下五苓散亦好。若得于疳癖者，其形如黄土相类，以醒脾散、化癖圆，醒脾快胃，磨积理疳。胃气既和，饮食倍进，运化精微，荣养百骸，灌溉藏府，五色各见于本部，精华乃形于面貌，其黄自除。有婴孩生下，便见遍体俱黄，惟两目弦厚如金色，身发壮热，名为胎黄。皆因未产之前，母受极热而传于胎，故有其证。乳母宜服生地黄汤，使药人于乳，令儿饮之，必获安矣。

失　血

小儿九道出血，何为而然？盖人之所有者，血与气也。心者血之主，肺者气之主，气主呴之，血主濡之，荣养百骸，灌溉孙脉，升降上下，荣卫谐和，自然顺适。一或不调，疾由生矣。或外为六淫所侵，内因七情所汩，气乃留而不行，血乃壅而不濡。内外抑郁，不能流注，以荣于身，必有妄动之患。叔和以芤脉为失血之义，在七表属阳故也。阳明主乎多气多血，未有不因热而得。盖气血俱热，毒郁内逼，失其常度，是以妄行。有在襁褓患此证者，因非七情所伤，皆因乳母执著，不自宽释，及淡辛辣之味，流于乳络，儿饮之后，停滞不散，郁蒸于内，亦能动血。又或居重帏暖阁，火气熏逼不令常见风日，积温成热，或极则涌泄，或吐或衄，或大小府亦多血来者。有气出而邪热乘之，则血不得循流故道，渗于诸经，亦生走失之证。其面㿠

白，脉沉微，血淡紫，口气缓是也。又况婴孩脆弱，易虚易实，因热内攻，血随气行，或壅而上逆，或下而妄返，遂有吐血、衄血、泻血、溺血之证。然而血不自动，因气使之，风不自生，因热而起。由是而论，可以类推。治法先明虚实，审得病源，随经施治。药饵无差，则不失其机要。实则小柴胡汤加生地黄、丝茅根或苦参亦好，并用水煎服，或咬咀五苓散，合五和汤，亦加丝茅根、苦参，水煎，及投消毒饮，次用《局方》鸡苏圆、三黄圆。可服。虚则理中汤，及人参芎归汤，皆可服。间有医者，见其血盛，以为热极，过投凉剂，遂使血寒不能归源而妄流，其色紫黯而凝滞，或成小片，当服姜、附之剂以温之，自然流畅，毋致妄行为佳。

不内外因

愚尝论十岁以上小儿，饮酒啖热，因热动血，醉饱掬撅，胃脘吐血，甚至鼻口俱出。此非内因外因之使然，乃自取过耳。治法先用百解散去桂，加黄连、水、葱、灯心煎服，疏利热毒，次以小柴胡汤。加生地黄，或藕节，水、姜煎下，定吐止血，其证自除。有长成小儿，偶因他物自伤，或戏走失足触损两目，血胀肿痛，昼轻夜重，投速效饮即快。仍忌鸡、酒、羊、面三五日，庶易瘥也。有因饮食中误吞骨鲠，吐不出，咽不下，气郁生痰，痰裹其骨，内则作痛，外则浮肿，啼声似哑，亦为可虑，投备急散取效。有孩儿贪劣，因弄刀锥，或乘高堕地，致伤皮破血出。轻者先用桃花散傅之，仍服活血散以匀其血，毋使作脓，溃烂肌肉。有仅十五岁者，恃其血气方刚，惟务驰骋，多致落马堕车，或斗很跌折肢体，一切损证，及毒虫恶兽所伤，此又世医各有专科，兹不繁引。

小儿常安

康节曰：与其病后求良药，不若病前能自防。然致疾之始，必有所因。大凡幼稚，要其常安，在乎谨寒暄，节饮食，夫复何虑。每见婴孩目有所睹，心有所欲，但不能言惟啼泣而已。父母不察其详，便谓饥渴，遽哺之以乳食，强之以杂味，不亦多乎？有数岁者，娇惜太过，不问生冷，甘肥时果，听其贪食，岂能知足！爱之实以害之，遂伤脾胃，不吐则泻，或成疳积浮肿，传作异证，此则得于太饱之故。有遇清朝薄暮，偶见阴晦，便加以厚衣重衾，或近于红炉烈焰，又且拘之怀抱，惟恐受冷，及长成者，所爱亦复如是，遂致积温成热。热极生风，面赤唇红，惊掣烦躁，变证多出，此乃失于太暖之故。殊不知忍一分饥，胜服调脾之剂，耐一分寒，不须发表之功。余故曰：孩提之童，食不可过伤，衣不可太厚，此安乐法也。为父母者，切宜深省。

拾　遗

论小方脉数差殊

宣和御医戴克臣侍翰林曰：得叔和小儿脉诀印本二集，一本云：呼吸须将六至看，一本云：呼吸须将八至看。遂与内台高识参详字义，审察至数，就诊五岁儿常脉，一息六至者是，八至者非。盖因镂板之际，误去六字上一点一画，下与八字相类，致此讹传。迨与卒以学易，作五十以学易之误是也。尝考默庵张氏《脉诀》亦云：小儿常脉一息只多大人二至为平，即六至也。然一呼一吸之间，六至明矣。不然，姑俟来者考之。

辨药病不相主对

郑氏议古人医书，不能无失。如钱氏治慢惊用括楼汤，与病不相主对，是谓之失。以愚观之，所传药性，医者之通晓，纵有前证，未必肯用，但不容不讲明耳。殊不知钱氏既没之后，其书成于仕路，故人阎孝忠编集刊行，屡经异代。况钱氏儒医，名闻朝野，施

治之法，如珠在贯，未尝少差。郑氏所指慢惊误用括楼汤，然本方下明载治肺热涎盛，非为慢惊之设，阎孝忠岂不知此。其或居官录梓之日，失于参考，讹传此剂，致有前议。今历年已远，卒难校正，若论五藏补泻之妙，却无瑕可指，及诸杂方，有功于世，不为不多，《直诀》一书，信不诬矣。

治豆疮不应疏利

张氏治小儿豆疮法，若才觉是其证，便当疏利。又云：若才见出时，皆不可转利，自立两说，遂使后人多生疑惑，以何为当，此张氏之论别矣。刘茂先曰：婴孺豆疮一证属里，首尾无下法。若下之则里虚，毒气何由而发泄，必至传变。大要爱护，庶获全安。此茂先之言是也。然后学不可执一而取，当择其善者而从之。亦有孩儿禀赋素实，豆疮出见，遍体红壮光泽，饮食快顺无外证，自然效速。如俗用符水神药，皆非良法，慎勿轻信耳。

评非时用附子大黄

前贤议曰：小儿证候，最易虚易实，要施治得宜，如隆暑戒用附子，隆寒戒用大黄。若用之，是实实虚虚，损不足而益有余。此亦理到之论。以愚评之，拘一法者，不足以善兵，泥一说者，不足以善学，在乎通变而已。记尝城居，侯自牧次子五岁，盛夏泄泻，面垢烦渴，耳尻冷，惊悸多，诊其心肝脉浮而洪大，脾肺脉虚而细数，予曰：面垢渴泻，脉虚细数者，此中暑也。惊悸发热，耳尻俱冷，心肝脉洪大者，此豆疮欲作也。先服黄连香薷散，解利暑气，续投陈氏异功散，再加附子，与之实脾，二日泻止，三日疮见，不旬余而收全功。此隆暑用附子之效也。又本路总管杨侯幼子四岁，腊月得患惊风搐掣，诸医调治，前证俱解，但神昏不食，四肢微冷，已五日矣，前医用醒脾助阳之药，不一而足。余诊六脉，独脾脉沉滑，余脉微缓，脾脉沉而滑者，此积蕴在脾，乃为脾约，当主大便不利，非阴厥也。彼曰：然。遂用泻黄散加大黄，水煎，并三服，大府一通，神气清而饮食进，随获安可。此隆寒用大黄之功也。用约如用兵，当用岂容自已，如五月渡泸，雪夜平蔡何待秋高马肥而后为之。若拘以四时取用，则兵药无成功矣。愚不敏，历医五十余载，凡调理旬月外婴孩有病，所用寒凉温燥之剂，必先明标本，辨虚实，然后处之以药，屡试辄效，此特又在察色听声，心诚求之而得，非假脉取。三岁之上小儿，以色合脉。尤其为妙。尝用已验活法，拯疗诸疾，危而复安者多矣。姑以杨侯二家疑难之证，详述于前，非矜能也。

明小儿四证八候

四证者，惊风痰热是也。八候者，搐搦掣颤。反引窜视是也。搐者两手伸缩，搦者十指开合，掣者势如相扑，颤者头偏不正，反者身仰向后，引者臂若开弓，窜者目直似怒，视者睛露不活。四证已备，八候生焉。四证既无，八候安有专是业者，可不究心及此。脉病证治，明有条类。大抵婴孩得疾，如火燎原，扑之在微，不致有延蔓之盛。疗病亦然。若初觉是受惊伤风发热，便与疏解，何患有传变之误。所谓阎门之盗，不可以固留，逆流之水，不可以顺决，此有疾在谨初之意也。

治暑风用药次序

衡州万户张侯寓屯田日，长子三岁，六月得患不语，手足蜷缩，已经二旬，命余至彼，诸医议论不一，观外形面垢有热，气促流涎，口眼㖞斜，不省人事，次则手足俱冷而蜷缩，身臂反张，诊六脉沉，按而取，独心肝脉虚而细数，余脉缓弱。余曰：面垢色脉细数，此因中暑感风，前贤所谓暑风者是也。手足冷缩而不伸，或服凉剂太过，寒之使然。若手足温，其效自速。愚以治法分阴阳顺乎气，五苓散加宽气饮，姜汁沸汤调下

三服，其证稍漫，次疏风和荣卫，百解散加荆芥、人参、当归，水、姜煎投。随以温灰汤浇洗手足，药一服，洗一次，至八九次，手足温则血活，血活则筋舒，筋舒则手足运动如常，余热未除，消暑清心饮主之。声音不全，二圣散取效。调理惟用万安饮，恰九日前证俱减。张侯曰：此子更生，端藉药力，不敢妄也。因笔漫纪，后有是证，仿此活人亦方便心矣。

为医要量大见高

元贞乙未春，有王千户来自广西，安船河下。一子仅二周，患头痛，服药针灸不效，召以诊视，色脉具好，惟额上微红，以手法验之，大哭泪下，其母怒而见给，愚亦置之勿论，但究心以病为事，再问当间得证之因，千户云：初在静江，大风吹篷扑著便不快。予曰：此疾若令细揣头上，便知其证。彼诺之。遂遣家人出外探亲，其父自抱手揣之，果有小篾签刺在囟上皮下，即篷签也以酥油润透，用摘镊取出，痛定即安。若初以匹妇饶舌而退，则及幼之心不溥矣。后之医流，傥见婴孩色脉好而病者，用药不应，必有他故，宜究心推原，切勿拘泥可也。

遇诸涂救治惊风

大德戊戌夏，因干出郭，至五里外，见有夫妇二人，抱子而哭于道旁，问之，答曰：入城探亲，三岁孩儿，忽得惊风，不省人事。观其面青黯色，目闭神昏诊之六脉全无，按太冲脉，沉而微有。余顾曰：毋虑此子可救，且左右竟无人家，遂于路侧拾得破碗半边，有姜小块，细嚼捻汁碗中，用五苓散、苏合香丸、宽气饮，浇水调和灌下。十数次方觉气回，声出目开，自此苏矣。漫附卷末，同志鉴之。

活幼心书　卷下

元　衡阳　曾世荣德显编次
鄞县　曹赤电炳章圈校

信　效　方

汤　散　门

汤　类

日　生　汤

治吐泻痢后，将传慢惊慢脾，神昏脉弱，饮食不进，睡露扬睛，书轻夜重，急宜投解。

北南星一两，锉破，瓦器盛东壁土同醋煮少时，滤干，切片，焙　人参　去芦　冬瓜子仁

上件咬咀，每服二钱，水一盏半，姜三片，慢火煎七分，候温无时少与缓服。投之急必吐。

此后应诸汤散圆剂，所述服药次序，不过言其大略。然煎煮调化，分数汤使下法，尤在临时量儿大小，以意加减，或多或少，随病轻重用之，余皆仿此，再不繁引。

牛　蒡　汤

主伤风发热，烦躁，鼻塞气喘，痰嗽惊啼，及诸疮赤紫丹毒，咽喉肿痛。

牛蒡子三两，略少研碎　大黄一两半　防风去芦　薄荷去老梗，二味各一两　荆芥去根老梗，四两　甘草一两一钱半

上件咬咀，每服二钱，水一盏，煎七分，无时温服。

黄芩四物汤

理诸疮丹毒，赤瘤燥痒。

黄芩一两　当归酒洗　生干地黄　赤芍药　川芎四味各半两　何首乌去粗皮　草乌炮，去皮　玄参三味各一钱半　甘草六钱　薄荷叶二钱

上件咬咀，每服二钱，水一盏，煎七分，无时温服。

芪　归　汤

治小儿禀赋素弱，豆疮出不快者，及肝虚目视不明。

黄芪一两，蜜水涂炙　当归酒洗焙干　白芍药　川芎三味各半两　甘草三钱，炙

上件咬咀，每服二钱，水一盏，煎七分，无时温服。

枳　实　汤

主伤风伤寒，胸满气促，咳嗽不活，食多夹痰吐出。

枳实去瓤锉片，麦麸炒微黄　赤茯苓去皮，二味各半两　甘草六钱　半夏七钱，汤煮透滤仍锉焙干　桔梗七钱半，锉炒

上件咬咀，每服二钱，水一盏，姜二片，煎七分，无时温服。

小柴胡汤

治伤寒温病，身热恶风，胸满胁痛，烦渴呕哕，小便不利，大便秘硬，能解表里邪毒，痰嗽气喘。

柴胡去芦，二两　半夏如前制　黄芩　人参

去芦　甘草四味各七钱半

上件咬咀，每服二钱，水一盏，姜二片，枣一枚，煎七分，无时温服。或去枣，加薄荷同煎。

防己汤

治感冒风湿之气，失于解表，流注两足疼痛，至两膝浮肿，不能屈伸，传成瘫痪。

防己去黑皮　麻黄去节存根，功全表里，锉碎汤泡滤过焙干　薄桂去粗皮，三味各半两　赤芍药一两　赤茯苓去皮，一两　苍术米泔水浸一宿去粗皮滤干锉片用火炒至微黄色，一两　甘草炙，七钱半

上件咬咀，每服二钱，水一盏，姜二片，葱一根，煎七分，空心热服，或入薤白同煎。

防风汤

治急惊后，余热未退，时复手足搐掣，心悸不宁，及风邪中入肺经，两目视入，并眨不常。

防风去芦　川芎　大黄　白芷　黄芩　甘草六味各半两　细辛去叶，二钱　薄荷叶二钱半

上件锉焙为末，每服一钱，用温汤无时调服。

知母汤

治胸胁气喘，痰鸣发热，咳嗽恶风。

知母　甘草二味各半两　贝母　羌活　滑石别研　大黄　小麦子五味各三钱　麻黄如前制　苦葶苈　诃子肉三味各一钱半　薄荷去梗，二钱

上件咬咀，每服二钱，水一盏，姜二片，煎七分，无时温服。

白芍药汤

治冷疝腹痛，及误汗误下，即坏证伤寒是也。并宜先服，次投对证之剂。

白芍药一两半　泽泻去粗皮，七钱半　甘草三钱炙　薄桂去粗皮，一钱半

上件咬咀，每服二钱，水一盏，煎七分，空心温服。误汗误下，加人参、南木香各二钱。脐下痛，入生姜及盐同煎，加钩藤亦好。

茯苓厚朴汤

主伤寒伤风，夹痰呕逆，并吐泻后，喉涎牵响，饮食减少，脾胃气虚。

白茯苓去皮　半夏如前制，二味各七钱半　甘草三钱，炙　厚朴五钱，去粗皮锉碎，每一斤用生姜一斤薄片切烂，拌拌匀，酿一宿，慢火炒干用

上件咬咀，每服二钱，水一盏半，姜三片，煎七分，无时温服。或加枣一枚去核同煎。

茯神汤

治心气不足，虚而惊悸，日常烦哭，及婴孩生下，羸瘦多惊，宜子母同服，自然有效。

茯神去皮木根，一两　人参去芦，半两　甘草炙，二钱　当归去芦尾，酒洗，半两

上件咬咀，每服二钱，水一盏，煎七分，无时温服。有微热烦躁，入麦门冬去心同煎。

守中汤

理春夏相交，阴湿气重，中伤脾胃，致腹痛泄痢，经久不止，渐传手足浮肿，饮食少思。

桔梗去芦锉炒　苍术如前制，二味各一两　白姜四钱，炮　甘草六钱，炙

上件锉焙为末，每服一钱，空心沸汤调服，咬咀水煎亦可，或用姜、枣。

泻肺汤即泻白散

主伤风后，五心烦热，咳嗽喘促，唇红颊赤，发渴引饮。

桑白皮锉炒　地骨皮净洗焙干，二味各二两　甘草炙三钱

上件咬咀，每服二钱，水一盏，粳大米百粒，煎七分，食后临卧温服，或不拘时。

五和汤

主宣利藏府积热，调和荣卫。

当归酒洗　赤茯苓去皮，二味各半两　甘草炙　大黄　枳壳水浸润，去瓤锉片，麦麸炒微黄，三味各七钱半

上件咬咀，每服二钱，水一盏。煎七分，无时温服。

养　藏　汤

主生津益气，温肠止痢。

人参去芦　甘草炙，二味各二钱半　白芍药　白术二味各半两　南木香　肉桂去粗皮，二味各一钱　罂粟壳去蒂，锉碎蜜水炒　肉豆蔻　诃子肉三味各一钱半

上件咬咀，每服二钱，水一盏，姜二片，枣一枚，煎七分，空心温服。或入仓米同煎。

贝　母　汤

主百日内婴孩，咳嗽有痰。

贝母一两　甘草半炙半生，二钱

上件锉焙为末，每服一字或半钱，用陈大米煎汤，空心调服。痰盛，淡姜汤调下。

固　真　汤

主吐泻痢后，胃虚脾慢，四肢口鼻寒冷，沉困不省人事。

人参去芦　附子汤浸炮裂去皮　白茯苓去皮　白术四味各二钱半　山药去黑皮　黄芪蜜炮涂炙　肉桂去粗皮　甘草湿纸裹煨透，四味各三钱

上件咬咀，每服二钱，水一盏，姜三片，枣一枚，煎七分，空心温服，或无时。

生地黄汤

治胎黄，乳母服，婴儿亦可少与含咽。

生干地黄　赤芍药　川芎　当归酒洗　天花粉五味各半两

上件咬咀，每服二钱，水一盏，煎七分，无时温服。

姜　橘　汤

治脾慢胃冷，呕吐不止。

白姜二钱，炮　陈橘皮去白，一两　粉草炙，三钱

上件锉焙为末，每服半钱或一钱，用温枣汤调化，空心少与缓服。

理　中　汤

主温脾暖胃，冷吐冷泻，及治气虚中寒腹痛。

人参去芦　白术二味各一两　干姜炮　粉草炙，二味各钱半

上件锉焙为末，每服半钱或一钱，用温白汤空心调服。

桂　枝　汤

治太阳中风，阳浮而阴弱，阳浮者热自发，阴弱者汗自出，啬啬恶寒，翕翕发热，鼻鸣干呕者。

桂枝去粗皮　芍药二味各一两半　甘草一两

上件咬咀，每服二钱，水一盏，姜二片，枣一枚，煎七分，不拘时温服。

麻　黄　汤

治伤寒头疼发热，身痛无汗喘满，又治太阳病脉浮紧无汗，发热身痛，八九日，表证不解者。

麻黄去根节，一两半　桂枝去粗皮，一两　甘草半两　杏仁三十五粒，汤泡去皮

上件咬咀，每服二钱，水一盏，煎七分，无时温服。

独　活　汤

治惊瘫鹤膝，及中风湿，日久致腰背手足疼痛，书轻夜重，及四肢痿痹不仁。

川独活黄色如兔眼者佳，半两　当归酒洗　白术　黄芪蜜水，涂炙　薄桂去粗皮　川牛膝酒洗，五味各二钱半　甘草炙，三钱

上件咬咀，每服二钱，水一盏，姜二片，葱白一根，煎七分，空心热服，或无时。

五　黄　汤

主解利遍身痈疖，恶核发热，及丁黄肿毒丹瘤。

黄芪一两，生用　黄连　黄芩　黄柏　大黄四味各二钱半

上件咬咀，每服二钱，水一盏，蜜一大匙，煎七分，无时温服。

化　毒　汤

解风热上攻，咽喉肿痛，饮食不便。

桔梗锉炒，半两　薄荷叶　荆芥穗　甘草三味各二钱半　山豆根取净皮，一钱半　牙硝　硼砂　朴硝　雄黄　朱砂五味各二钱

上前五味焙为末，后五味入乳钵细杵，同前药末一处再仵匀，每用一字至半钱，干点舌上化下，或以温汤浓调，少与含咽亦可。

青木香汤

治小儿阴茎无故而肿或痛缩，初因阳明经有风热，温气相传，所以如是，法当宽此一经，其证自愈。盖阳明受病，不能养其宗筋故也，宜服之。及咳嗽痰喘气促。

青木香去芦　枳壳如前制，二味各半两　甘草二钱半

上件咬咀，每服二钱，水一盏，煎七分，无时温服。

排　风　汤

治中风狂言，失音不语，精神昏困，惊瘫鹤膝等证，及肿疾才愈后，偶感外风，满面遍体虚浮，并宜可服。

白蒺皮　白术　白芍药　薄桂去粗皮　防风去芦　川芎　当归酒洗　杏仁汤泡去皮尖　甘草炙，九味各半两　川独活　麻黄去根节　白茯苓去皮，三味各七钱半

上件咬咀，每服二钱，水一盏，姜二片，煎七分，无时温服。

中　和　汤

此药大能通和表里，温养脾胃，匀调气血，顺正阴阳，发散风寒，辟除腥秽，善使豆疮易出易收，不致倒靥黑陷，传变危急。兼治遍身痈疖已溃未溃，排脓止痛，自然消释。常服清神驻颜，明目健脾，真元益固，邪气无干。

人参去芦　厚朴如前制　当归酒洗　防风去芦　白芷　肉桂去粗皮　桔梗　川芎　白芍药　沉香　檀香　乳香　藿香叶　紫苏叶　黄芪蜜水涂炙　甘草十六味各半两

上件咬咀，用无灰酒四两，重拌匀晒干，天阴略焙，每服一钱，水一盏，煎七分，无时温服。

人参甘桔汤

感冒风热，火气熏逼，豆疮蕴毒上攻，咽喉肿痛，痰气不顺，咳嗽失音，饮食减少，并宜治之。

人参去芦，半两　桔梗锉，用蜜水浸透，一两　甘草半生半炙，三钱

上件咬咀，每服二钱，水一盏，煎七分，无时温服，风热加荆芥、杏仁煎。豆疮后目生翳膜，用蝉壳净洗去嘴足同煎。咽痛入硼砂末煎，去渣无时含咽。

人参芎归汤

治九道血妄行。

人参去芦　川芎　当归酒洗，三味各半两　荆芥二钱半

上件咬咀，每服二钱，水一盏，煎七分，无时温服。

五　拗　汤

治感风湿，及形寒饮冷，痰嗽咳逆，连声不已。

麻黄不去根节　杏仁不去皮尖　荆芥不去梗　桔梗四味各五钱，用蜜水炒，锉用　甘草二钱半

上件咬咀，每服二钱，水一盏，煎七分，无时温服。

六　和　汤

治心脾不和，气不升降，霍乱吐泻，咳嗽胸满，头目疼痛，嗜卧倦怠，并阴阳不分，冒暑伏热烦闷，成痢中酒作渴，心逆畏食。

人参去芦　缩砂仁　甘草炙　杏仁汤泡去皮尖　半夏如前制，五味各一两　香薷　厚朴如前制，二味各四两　白扁豆炒熟，锉去壳，一斤，用生姜一斤碎切烂煮，拌匀，酿经一宿，焙干　藿香　赤茯苓去皮　木瓜各一两

上件咬咀，每服二钱，水一盏，姜二片，枣一枚，煎七分，无时温服。或入盐半字同煎。

黄芪六一汤

治诸虚不足，烦躁惊悸目扬，身体软弱，不思饮食。

黄芪六两，蜜水涂炙　甘草一两，炙

上件咬咀，每服二钱，水一盏，刺二枚，煎七分，无时温服。

真　武　汤

治伤寒诸疾后，表里俱虚，烦渴有热，遍身汗出。

白茯苓去皮　白芍药二味各七钱半　白术　附子如前制，二钱半

上件咬咀，每服二钱，水一盏，姜二片，煎七分，无时温服。

牡蛎大黄汤

治三五岁小儿，感受温湿之气，侵袭膀胱，致阴茎肤囊浮肿作痛。

牡蛎用熟黄泥包裹，夹水煅透，出地上候冷用　大黄纸裹水浸透，炮过候冷，二味各一两

上件锉研为末，每服一钱，用无灰温酒空心调服。不能饮者，温汤调，少入酒同服。

坎　离　汤

治虚喘昼轻夜重，食减神昏。

萆澄茄　石菖蒲二味各一钱　白术　白茯苓去皮　南木香三味各二钱　甘草炙　半夏如前制　紫苏子略炒杵碎，三味各四钱

上件咬咀，每服二钱，水一盏，煎七分，无时温服。

清　脾　汤

治诸疟久不瘥者，脾胃虚弱，形容憔悴。

厚朴如前制，一两　乌梅打破去仁　半夏如前制　良姜锉用东壁土炒　青皮去白，四味各半两　甘草炙，三钱　草果炮去壳取仁，二钱半

上件咬咀，每服二钱，水一盏，姜二片，煎七分，未发前并三服，仍忌生冷油腻时果毒物。

麦门冬汤

解斑疹热毒，头痛烦闷，狂渴妄语。

麦门冬去心　干葛二味各三钱　人参去芦　赤芍药　升麻　赤茯苓去皮　甘草五味各二钱　石膏末五钱

上件咬咀，每服二钱，水一盏，煎七分，无时温服。

化　丹　汤

解利丹毒，遍身燥痒，发热烦啼。

川独活　射香夜干　麻黄如前制　青木香　甘草　黄芩　薄桂去粗皮　石膏末八味各五钱

上件咬咀，每服二钱，水一盏，煎七分，无时温服。

茴　香　汤

和脾胃，进饮食，理腹痛，散邪气。

茴香炒　良姜锉，用东壁土炒，二味各一两半　苍术如前制，二两　甘草炙，一两

上件锉焙为末，每服一钱，烧盐汤空心

调服。

大柴胡汤

疏利风热，痰嗽腹胀，及里证未解。

柴胡去芦，四两　黄芩　芍药二味各一两半　大黄　半夏如前制，二味各七钱半　枳实如前制，七钱　甘草一两，小方故加用

上件咬咀，每服二钱，水一盏，姜三片，煎七分，无时温服。

快膈汤

理胸膈不快，饮食少进，亦能顺气和中，消导宿滞。

人参去芦　青皮去白　缩砂仁　乌药　良姜如前制　香附子　甘草炙，七味各一两

上件锉碎为末，每服一钱，温盐汤空心调服。

升麻汤

治时行瘟疫，头痛发热，肢体烦疼，及疮疹未见形先，疑贰之间，并宜可服。大能和顺血脉，解诸余毒斑证等疾。

升麻　干葛　芍药三味各一两　甘草半两

上件咬咀，每服二钱，水一盏，煎七分，无时温服。

小陷胸汤

治六七岁以上之儿，小结胸证。

半夏如前制，一两　净黄连　栝楼实各半两

上件咬咀，每服二钱，水一盏半，白蜜一大匙，煎至八分，无时温服。未效再投，得微下黄涎为好也。

散　类

百解散

主和解百病，虚慢阴证不宜。

干葛二两半　升麻　赤芍药二味各二两　黄芩一两　麻黄如前制，七钱半　薄桂去粗皮，二钱半　甘草一两半

上件咬咀，每服二钱，水一盏，姜三片，葱一根，煎七分，无时温服。有风热盛，加薄荷同煎。

五苓散

解伤寒温湿，暑毒霍乱，分阴阳，理烦渴。

泽泻去粗皮，二两半　白茯苓去皮　猪苓去皮　白术三味各一两半　肉桂去粗皮，七钱，不过火

上前四味锉焙，入桂同研为末，每服二钱，温汤调下，不拘时。若作咬咀，用赤茯苓，分两同前，每服二钱，水一盏，煎七分，无时温服。其余活法，明本论中随证详述。

当归散

调顺气血，和解表里，爽利心腹，疏理百病，及治温热停积，白痢，烦躁不宁。

当归去芦酒洗　赤芍药二味各二两　大黄半生半炮一两二钱　川芎　麻黄如前制，二味各半两　甘草半生半炙，一两

上件咬咀，每服二钱，水一盏，姜二片，煎七分，无时温服。

三解散一名宁心汤

主上焦蕴热伤风，面红目赤，狂躁气急，渴水惊啼烦闷，丹毒口疮，痰嗽搐掣。

人参去芦　防风去芦　天麻　茯神去皮木根　郁金无，以山栀仁代　白附子　大黄七味各二钱半　赤芍药　黄芩　僵蚕三味各五钱　全蝎十五尾，去尖毒　枳壳二钱，如前制　粉草六钱

上件锉焙为末，每服半钱至一钱，用温薄荷汤，无时调下，或灯心汤。

匀气散

主调补通利后，及冷疝腹痛，气滞不和。

桔梗二两，锉炒　陈皮去白，一两　缩砂仁　茴香二味各半两　白姜二钱，半炮　粉草四钱，炙

上件锉焙为末，每服半钱或一钱，空心

沸汤调服，冷疝腹痛，烧盐汤调下。

雄黄散

主暴中急慢惊风，鲊鲊痰涎满口，及雨侵闭汗不通，或凉或热，坐卧生烦。

雄黄红亮者，二钱半　白药去黑皮　川乌头炮裂去脐　草乌炮裂去皮　天麻明亮者　川芎五味各半两

上除雄黄外，余五味锉焙，同雄黄为末，惊风痰壅，每服半钱或一钱，用姜汁、茶清调下，发汗，水姜、葱、薄荷同煎，并投三服取效。

惺惺散

主伤风伤寒，痰嗽咳逆，理虚和气，宁心清肌，止啼去烦，利咽膈，解失音。

人参去芦，半两　桔梗锉破　白茯苓去皮　白术　天花粉四味各一两　细辛去叶，二钱　防风去芦　川芎　南星生用，三味各二钱半　甘草半生半炙，七钱

上件咬咀，每服二钱，水一盏，姜二片，薄荷三叶，慢火煎七分，无时温服。

木通散

主上膈热，小府闭，烦躁生嗔，及淋证诸疮丹毒。

木通去皮节　地黄蓄去老梗，二味各半两　大黄　甘草　赤茯苓去皮，三味各三钱　瞿麦去干梗　滑石末　山栀仁　车前子　黄芩五味各二钱半

上件咬咀，每服二钱，水一盏，灯心三茎，煎七分，无时温服。或入薄荷同煎。

乌梅散

治腹疼，及初生婴孩脐下冷痛疝气等疾。

乌梅和核　玄胡索　粉草半生半炙，三味各五钱　乳香　没药　钩藤和钩，三味各二钱半

上件咬咀，每服二钱，水一盏，煎七分，空心温服。

黄金散

解口内舌上疮毒，及治豆疮后目生医膜。

黄柏去粗皮，用生蜜涂透，烈日下晒干，再涂上蜜，凡经十数次为度　粉草二味各一两

上件锉焙，研为细末，治口疮用药末干点患处，或用麦门冬熟水调点舌上，令其自化。治豆疮后目生翳膜，汤泡澄清，无时频洗，仍投糖煎散、柿煎散二药。

平胃散

主脾胃不和，呕逆咽酸，霍乱腹痛。

厚朴如前制　陈皮去白，二味各二两半　苍术如前制四两　甘草一两

上件锉焙为末，每服半钱至一钱，姜、枣煎汤，空心温服，烧盐汤亦好。

七宝散

治时气伤风伤寒，头昏体热咳嗽，及脾胃肺藏不和，口中腥气异常，或牙缝微有鲜血，兼调理诸病后小证得中，以其品味不僭不燥为佳。

紫苏去老梗　净香附二味各三两　陈皮去白　甘草二味各　两半　桔梗二两半，锉炒　川芎　白芷二味各一两

上件咬咀，每服二钱，水一盏，姜二片，煎七分，无时温服。咳嗽加制半夏口腥气入盐煎，调理诸疾加枣子煎。

三棱散

主诸般停滞，疳积发热，泻痢酸馊，水谷不化，常服和脾胃，进饮食，长肌肉，益神气。

人参去芦，七钱半　三棱炮锉　净香附二味各一两半　青皮去白　益智仁　陈皮去白　半夏如前制　枳壳如前制　神曲炒　谷芽洗焙　莪术醋煮透，滤干锉焙　大黄半生半炮　紫苏去老梗，十味各半两、　甘草半生半炙，一两二钱

上件咬咀，每服二钱，水一盏，姜二片，

仓米百粒，煎七分，无时温服。气虚劳加白茯苓一两。

立　消　散

治膀胱久受热毒，致阴器肤囊赤肿胀痛。

赤小豆　赤芍药　枳壳生用　风化朴硝临入末药拌匀　商陆五味各半两

上件不过火，锉晒为末，柏枝煎汤，候冷调二钱或三钱涂肿处，仍服咬咀五苓散，加车前子、薏苡仁，水煎。

天竺黄散

主上焦风热，口鼻生疮，两目赤肿，咽膈不利，痰涎壅滞，气不通畅，惊搐烦闷，神思昏迷。

天竺黄　郁金无，以山栀仁代　茯神去皮　甘草四味各半两　硼砂　牙消　白芷　川芎　僵蚕去丝　枳壳如前制，六味各二钱半　朱砂水飞，二钱　麝香一字　蝉壳十五，洗去泥土蜕足

上除硼砂、牙消、朱砂、麝香四味，乳钵细作，余九味焙干末，同入乳钵内再作匀，每服半钱或一钱，温薄荷汤，无时调服，或麦门冬汤。

连　床　散

治满头如癞疮毒，及手足身上，阴器肤囊，痒则抓烂，黄汁淋漓燥痛。

净黄连一两　蛇床子去埃土，半两　五倍子去内虫屑，二钱半　轻粉十五贴

上前三味，晒干为末，再入乳钵内，同轻粉作匀，用清油稀调二钱或三钱，涂搽患处，必先以荆芥和葱煮水，候凉净洗拭干，后傅药。

川　草　散

治腹痛下痢赤白，不拘远近。

川芎　白芷　甘草半生半炙，三味各七钱　赤芍药　当归酒洗　净黄连三味各五钱

上件锉焙为末，每服半钱至一钱，白痢白姜汤调，赤痢甘草汤调，赤白痢温米清汤调，并空心服。

柿　煎　散

治豆疮后目生医膜。

白菊花　绿豆壳　谷精草三味各一两

上为咬咀，每服二钱，干柿一枚，粟米泔汁大盏，慢火煎干去渣，食后临睡，止吃柿肉，一日三枚，倍加尤好。如婴孩小，乳母可服，或用煮过柿子去核，薄切焙为细末，抄半钱，温米泔水调化，无时与儿服亦可。

拂　毒　散

治诸风热阴毒肿，核已结成未穿溃，或正发者。

半夏一两，生用　贝母　大黄三味各半两　朴消　五倍子去内虫屑，二味各二钱半

上件锉焙为末，用醇醋调一钱或二钱，涂患处，如干再涂，仍服疏风化毒之剂。

余药成末，除朴消，临入杵匀用。

金　铃　散

治疝气腹痛，投诸药后，愈而复作宜服。

金铃子肉六钱　三棱炮锉　莪术醋煮锉　青皮去白　陈皮去白，四味各二钱半　赤茯苓去皮　茴香二味各半两　南木香二钱　甘草四钱，炙　槟榔　枳壳如前制　钩藤和钩，三味各三钱

上除槟榔、木香不过火，余十味锉焙，仍同木香、槟榔为末，每服半钱至一钱。仍用炒茴香煎无灰酒空心调服，不饮酒者，煎炒茴香汤调下。

消　黄　散

治风热温气上攻，舌硬肿大不消。

风化朴消　真蒲黄二味各半两

上蒲黄晒干为末，同朴消乳钵内细作匀，每用一字至半钱，点揩舌上下。

疏风散

主小儿薄劣，跌触头脑，或弄刀锥，因而破血感风，致面目伤痕浮肿。

荆芥穗一两　防风去芦，二钱半　甘草半生半炙，二钱

上锉焙为末，每服一钱，用无灰温酒调服，或葱汤亦好。

陈氏木香散

能和表里，通行津液，清上实下，扶阴助阳，及治腹胀泻渴，温壮豆疮。

南木香　厚桂去粗皮　陈皮去白　诃子肉　丁香　人参去芦　赤茯苓去皮　半夏如前制　甘草半生半炙　大腹皮净洗焙　前胡去芦，十一味各半两

上件咬咀，每服二钱，水一盏，煎七分，无时温服。

陈氏异功散

能除风寒湿痹，调和阴阳，滋养血气，使豆疮易出易敛，不致痒塌泻痢。

南木香　当归酒洗　人参去芦　肉豆蔻　陈皮去白　丁香　白茯苓去皮　厚桂去粗皮　白术　厚朴如前制　半夏如前制　附子如前制，二味各二钱

上件咬咀，每服二钱，水一盏，姜二片，枣一枚，煎七分，空心温服，或不拘时。

羌活散

治伤风时气，头痛发热，身体烦疼，痰壅咳嗽，失音鼻塞声重，及解时行下痢赤白。

人参去芦　羌活　赤茯苓去皮　柴胡去芦　前胡去芦　川芎　独活　桔梗锉炒　枳壳如前制　苍术如前制　甘草十一味各一两

上件咬咀，每服二钱，水一盏，姜二片，薄荷三叶，煎七分，无时温服。发散风邪入葱白同煎，痢证姜仓米煎。

香薷散

主夏秋藏府冷热不调，或饮食起居不节，致吐痢心腹疼痛，发热烦闷，身体拘急，或脚转筋，四肢厥冷，有似阴证，但口气温，脉按沉紧为验。

陈香薷去老梗，三两　白扁豆如前制　厚朴如前制，二味各　两半

上三味，六两咬咀了，用无灰酒三两拌匀，仍晒干或焙，临入咬咀生甘草一两和匀，每服二钱。水一盏，煎七分，去渣，以瓦器盛在水中沈温，不拘时服。如热极或泻痢中有鲜血者，加净黄连一两，细锉拌匀，名黄连香薷散，下法如前。

泻黄散

治胃虚脾实，生热烦渴，头痛恶心。

藿香叶七钱半　栀子仁　防风去芦，二味各一两　甘草四钱半　石膏末八钱

上前四味锉，同石膏末用酒蜜微炒香，为咬咀，每服二钱，水一盏，煎七分，空心温服。

调元散

主禀受元气不足，颅囟间解，肌肉消瘦，腹大如肿，致语迟行迟，手足如瘫，神色昏慢，齿生迟者，服之有效。

干山药去黑皮，五钱　人参去芦　白茯苓去皮　茯神去皮木根　白术　白芍药　熟干地黄酒洗　当归酒洗　黄芪蜜水涂炙，八味各二钱半　川芎　甘草炙，二味各二钱　石菖蒲二钱

上为咬咀，每服二钱，水一盏，姜二片，枣一枚，煎七分，无时温服。如婴孩幼嫩，与乳母同服。

醒脾散

主醒脾养胃，止吐痢，进饮食，及调理病后神昏目慢，贪睡多困，脉弱气短，微有痰涎，并宜投服。

人参去芦　白茯苓去皮　藿香叶　白术　甘草炙，五味各五钱　丁香四十粒，不见火　大南星八钱，锉作小块，纸裹水透湿，炮过用　缩砂仁四十粒

上为咬咀，每服二钱，水大盏，姜三片，冬瓜子仁五十粒杵碎慢火煎七分，空心缓投服之，急必吐。

醍醐散

治吐泻后，调和脾胃，消进饮食，及丁奚哺露，虚热烦渴，气逆心恶。

陈皮去白　缩砂仁　厚朴如前制　麦芽洗净焙干　乌梅和核，五味各五钱　良姜如前制　干葛　乌药三味各二钱半　草果仁炮，二钱　甘草炙，三钱

上为咬咀，每服二钱，水一盏，姜二片，枣一枚，盐少许，煎七分，空心温服。

二圣散

治风痰壅闭，语音不出，气促喘闷，手足动摇，似搐非搐。

诃子十个，大者，半生半炮去核　大腹皮洗净焙干，五钱

上为咬咀，每服二钱，水一盏，煎七分，无时温服。

补肺散

治久患咳嗽，肺虚气促，有痰恶心。

阿胶一两半，锉炒　白茯苓　马兜苓去老梗　糯米三味各半两　杏仁二十一粒，汤泡去皮尖　甘草四钱，炙

上为咬咀，每服二钱，水一盏，煎七分，无时温服。

安神散

治吐泻诸病后，心虚烦闷，触物易惊，气郁生涎，涎与气搏，睡不得宁，预防变生他证。

人参去芦　白茯苓去皮　半夏如前制　甘草炙　陈皮去白　枳实如前制，六味各五钱

上为咬咀，每服二钱，水一盏，姜二片，刺一枚，竹茹小团，煎七分，无时温服。有微热微渴，人麦门冬去心同煎。

烧盐散

治走马疳，牙根肉溃烂黑臭。

橡斗不拘多少

上件每服大者两个，入盐满壳，盖作一合，或五六个，或十数个，安在火内，和盐烧透，取出地上，以瓦碗盖定，存性候冷，入麝香少许，乳钵内极细杵匀，每以半钱涂搽患处，常收用小瓦合盛贮，勿使纸裹，盖盐能作润。

绿袍散

治重舌，及满口内外疮毒，咽膈不利。

薄荷去老梗　荆芥穗二味各五钱　青黛　玄明粉　硼砂三味各二钱半　百药煎　甘草二味各三钱

上件锉焙为末，除玄明粉、硼砂二味，在乳钵内细杵，同煎药末再杵匀，用一字至半钱，干点舌上。令其自化，或以新汲水入蜜调点舌上亦好。

益黄散

治脾虚受冷，水谷不化，泄泻注下，盗汗出多。

陈皮去白　肉豆蔻炮，二味各五钱　丁香二钱　诃子肉炮去核，二钱　甘草炙，二钱半

或件咬咀，每服二钱，水一盏，煎七分，空心温服。

解表散

主伤风感冷，咳嗽痰喘，呕吐泻痢惊悸，有热证在表里发，当用气解药可投。

麻黄如前制　杏仁汤泡去皮尖　赤茯苓去皮，三味各一两　川芎　防风去芦　枳壳如前制，三味各二两　甘草半生半炙，七钱半

上件咬咀，每服二钱，水一盏，姜二片，葱一根，煎七分，无时温服。有热入薄荷同

煎。

参苓白术散

主脾胃虚弱，饮食不进，多困少气，中满痞噫，呕吐咳逆，此药不寒不热，性味温平。常服调脾悦色，顺正去邪。

人参去芦　白茯苓去皮　粉草　白术　白扁豆如前制　山药去黑皮　缩砂仁　薏苡仁　桔梗锉炒，九味各一两　莲子肉去心煎

上件锉焙为末，每服半钱至一钱，用枣汤空心调服，或温米汤亦可。

守胃散

治阴阳不和，吐泻不止，预防风证，常服调脾胃，进饮食。

人参去芦　白术　白茯苓去皮　山药去黑皮　干葛　扁豆如前制　南星如前制　甘草　藿香去老梗　防风去芦　天麻十一味各半两

上件咬咀，每服二钱，水一盏，姜二片，冬瓜子仁五十粒，掐碎煎七分，空心温服。

如泻不止，入沉香、白豆蔻同煎。

南星腹皮散

主肿疾欲愈未愈之间，脾胃虚慢，气促痰喘，腹胀胸满，饮食减，精神困，小便不利，面色痿黄。

南星同煎制，一两　大腹皮净洗焙干　生姜皮　陈皮去白　青皮去白　桑白皮锉炒　甘草炙　扁豆同前制，七味各半两

上为咬咀，每服二钱，水一盏，姜二片，煎七分，无时温服。

导赤散

治心经壅热，烦躁睡语，或时复上窜咬五巧切牙，小便黄涩，久则成惊，触物易动。

生干地黄净洗　木通去皮节，二味各一两　黄芩　赤茯苓去皮，二味各二钱半　甘草三钱

上为咬咀，每服二钱，水一盏，竹叶三片，煎七分，无时温服。或加麦门冬去心同煎。

钱氏白术散

治脾胃不和，呕吐泻痢，恶心发渴，大能补虚损，调荣卫。

南木香　白术二味各半两　人参去芦　白茯苓去皮　藿香叶　甘草四味各一两　干葛二两

上为咬咀，每服二钱，水一盏，煎七分，无时温服。

和中散

主久病方愈，面黄清瘦，神昏气弱，脾胃未实，食物过伤，停饮生痰，留滞中脘，耗虚真气，或成吐泻，此药性味甘平，大能调治。常服和胃气，进饮食，悦颜色，理风痰。

人参去芦　白扁豆同前　白茯苓去皮　川芎　缩砂仁　香附子　半夏同前制　甘草八味各一两　肉豆蔻　诃子去核，二味各七钱

上为咬咀，每服二钱，水一盏，姜二片，枣一枚，煎七分，空心温服，或不拘时。

糖煎散

治豆疮余毒，攻目成翳，涩痛有热，多泪羞明。

赤芍药　当归尾　大黄　川芎　荆芥　防风去芦　汉防已去黑皮　龙胆草　黄芪生用　黄芩十味各半两

上为咬咀，每服二钱，水一盏，沙糖小块，煎七分，食后临睡温服或无时。

六柱散

治吐痢泄泻，胃虚脾慢，手足俱冷，六脉沉微。

人参去芦　白茯苓去皮　熟附子　南木香　肉豆蔻　白术六味各半两

上为咬咀，每服二钱，水一盏，姜二片，枣一枚，煎七分，不拘时温服。

九　仙　散

解诸目疾，不拘岁月远近，并宜先服。

柴胡去芦　苍术同前制，二味各二两　赤芍药　荆芥　甘草二味各六钱半　麻黄同前制　川芎　薄荷和梗，三味各半两　旋覆花去老梗，三钱

上件咬咀，每服二钱，水一盏，姜二片，葱一根，煎七分，不拘时温服。

草龙胆散

治暴赤火眼，昼夜涩痛，作肿泪多。

草龙胆　木贼去节　荆芥　菊花　防风去芦　草决明半生半炒　甘草七味各半两

上件咬咀，每服二钱，水一盏，煎七分，无时温服。痛甚加羌活、乳香同煎。

金　波　散

治时行赤眼，肿痛成翳，有热多泪。

净黄连一两　硼砂　寒水石　大黄三味各二钱　海螵蛸　铜青二味各一钱　玄明粉二钱半　麝香一字　全蝎七尾，去尖毒

上除玄明粉、麝香，余七味锉晒为末，仍入玄明粉、麝香，乳钵内同前药末杵匀，每用一字至半钱，温净汤或凉水调化，澄清去渣，无时频洗。有风夹虫作痒，入轻粉取效，仍忌酒荤三五日。

内　金　散

治牙根肉臭烂黑色，有虫作痛。

鸡内金即鸡肫内粗皮，阴干，一两　白芷　铜青三味各半两　麝香一字

上前三味，锉晒或焙为末，仍以麝香乳钵内同杵匀，每用一字或半钱，干擦患处，先用温盐水灌漱，后傅药。

霹　雳　散

解急慢惊风，不省人事。

猪牙皂角三钱　细辛　川芎　白芷三味各二钱　蜈蚣一钱半

上件锉晒为末，每以少许，用大灯心三寸长，蘸点鼻内，得喷嚏为验，前药不可焙，焙则不应。

顺　搐　散

解男上女左搐不顺者。

枳壳如前制　钩藤去钩　荆芥　羌活　防风去芦　甘草六味各半两

上件咬咀，每服二钱，水一盏，顺切姜三片，煎七分，无时温服。或入薄荷同煎。

外　消　散

治婴孩初生，旬日外脐突，或痛或不痛，痛则啼声不已，及疗小儿因感温热相搏，致阴器肤囊浮肿。

大黄　牡蛎如前制二味各半两　朴消二钱

上前二味，锉焙为末，仍入朴消，乳钵内同杵匀，抄一钱或二钱，取田螺三枚净洗，再以水半碗活过一宿，去螺用水，调涂肿处即消，其螺仍放水中勿害之。昔贤有曰：杀生救生，去生远矣。物命虽微，亦可戒也。治阴器肤囊肿，车前子煎汤候冷，调傅患处。

活　血　散

解破血伤风。

当归酒洗　生干地黄　酒洗　川芎　红花　赤芍药　苏木六味各半两　甘草三钱

上件咬咀，每服二钱，水一盏，煎七分，无时温服。

桃　花　散

治一切破损肢体，血出作痛。

好石灰用纱净节，十两　清油小半灯盏　大黄五钱，锉碎水浸透，取汁大半盏

上石灰先用铁铛炒令带热，次入大黄汁、清油和匀，仍以慢火炒如桃花色，乌盆盛之，倾出在内，浮而不沉，鹅翎拂聚纸上，别著瓦器收藏，凡是破损伤痕，用涂立效，仍服疏风散、活血散。

三　白　散

解初中肿疾，四肢肤囊浮胀，大小便不利，皆因膀胱蕴热，风湿相乘。

白牵牛半生半炒，杵碎　桑白皮锉炒　白术　木通去皮节　陈皮去白　甘草六味各半两

上件咬咀，每服二钱，水一盏，煎七分，无时温服。

麝香人齿散

治豆疮黑陷，因毒气入肾，而形于外。

麝香少许　活人牙齿不拘多少，火煅过，得小儿自脱者佳

上二味同研为末，每用半钱至一钱，无灰温酒调下，止以一服。然此药固好，但人齿难得，当用一匕金取效。

四　黄　散

治小儿身上一切热毒疮疾燥痒，抓破有汁不干。

净黄连　黄柏　黄芩　大黄　滑石五味各半两　五倍子去内虫屑，二钱半

上件锉晒为末，用清油入桐油和调二钱至三钱，涂搽患处，仍服四顺饮、消毒饮。

薄　荷　散

治阳证脱肛。

薄荷和梗　骨碎补去毛，二味各半两　甘草二钱半　金罂粟根七钱半

上件咬咀，每服二钱，水一盏，入无灰酒大匙，煎七分，空心温服，或无时。

槲　皮　散

解瘰疬作肿疼痛。

槲皮仍去粗皮，此树在处有之即包盐槲叶木也

上件不拘多少，锉碎煮水候温，频洗患处。

白　芨　散

治瘰疬脓汁不干。

白芨　贝母　净黄连三味各半两　轻粉三十贴

上前三味，锉焙为末，仍以轻粉乳钵内同杵匀，抄一钱至二钱，清油调擦患处。必先用槲皮散煮水候温，净洗拭干方涂药。

二　香　散

治同煎证。

白胶香　降真香用心无土气者　海螵蛸　五倍子去内虫屑，四味各半钱

上件为末，如前先用槲皮散煮水净洗患处，后以此药一钱或二钱干涂上，外将水纸封掩，三五次即效。

万　金　散

治水泻下痢，久不瘥者。

罂粟壳去蒂，二两，一两锉碎醋蜜炒，一两生用　陈皮去白，二两　甘草不去节，二两，一两炙，一两生用　乌梅和核，一两

上件咬咀，每服二钱，热汤一盏，略煎二沸，和渣倾出碗内，上以盏盖定，候澄清去渣，空心温服。

神　效　散

治赤白痢昼夜频数，食减腹痛，小便不利。

罂粟壳去梗蒂，锉碎蜜水炒　白芷　乌梅和核，三味各一两　乳香　抚芎二味各半两

上件咬咀，每服二钱，水一盏，煎七分，空心温服。

赤　葛　散

治因血热与风热相搏，遍身丹毒燥痒，日久不消。

赤葛二两　甘草二钱

上件咬咀，每服二钱，无灰酒一盏，煎七分，无时温服。不饮酒者，止用水一盏，入酒大匙同煎。

四　圣　散

主婴孩胎受热毒，生下两目不开。

灯心　黄连　秦皮　木贼　枣子和核，五味各半两

上为咬咀，每服二钱，水一盏，煎七分，澄清去渣，无时频洗，两目自开。

天　花　散

治外肾肤囊肿痛。

天花粉二两　甘草三钱

上件咬咀，每服二钱，无灰酒一盏，煎七分，空心温投。不能饮者，止用水煎，少入酒同服。

蟠　龙　散

治阳证脱肛。

干地龙蟠如钱样者佳，略去土，一两　风化朴硝二钱

上锉焙研为细末，仍和匀朴消，每以二钱至三钱，肛门湿润干涂，或干燥用清油调涂，先以见毒消、荆芥、生葱，煮水候温浴洗，轻与拭干，然后傅药。

伏龙肝散

治阴证脱肛。

伏龙肝一两　鳖头骨半两　百药煎二钱半

上三味焙研为末，每用二钱至三钱，浓煎紫苏汤候温，和清油调涂患处，并如前法浴洗，拭干方上药。

益　元　散

解暑毒，利小便，理烦渴，除惊悸。

滑石六两　粉草一两，细锉

上二味，或晒或焙，研为细末，每服一钱至二钱，温熟水无时调服，凉水亦可。

祛　风　散

治卒暴中风，全不能言，口眼㖞斜，惊瘫搐掣，痰实烦躁，神昏有热，睡卧不稳。

防风去芦一两半　南星生用　甘草生用　半夏如前制　黄芩四味各一两

上件咬咀，每服二钱，水一盏半，姜三片，慢火煎七分，不拘时温服。

全蝎观音散

治外感风寒，内伤生冷，吐泻交作，脾胃俱虚，盗汗出多，神昏色慢，常服温中益气，进饮食宁心。

莲子肉去心　人参去芦　扁豆如上制三味各一两　天麻　防风去芦　全蝎去尾尖毒　羌活　白芷　南木香　甘草炙　黄芪盐蜜水涂炙，八味各半两　神曲炒　白茯苓去皮，二味各七钱半

上除木香不过火，余十二味锉焙，仍同木香碾为末，每服半钱至一钱，用枣汤无时调服。

备　急　散

治小儿诸般骨硬，致咽喉肿痛。

五倍子末一两　先春茶末半两

上二味和匀，抄一钱，温汤半盏，调化无时，少与咽下，依此法服饵，不过三五次即效。如骨出或刺破处血来多者，硼砂末六钱，水煎消毒饮调服，血止痛住，肿消食进。

黄　土　散

治豆疮余毒太甚，遍身溃烂，脓汁不干。

黄土不拘多少，取晒野背阴处深掘为妙

上件安地上，炭火煅透候冷，研为干末，用绢或纱兜扑患处，仍服解余毒之药，并忌动风发热等物。

回　阳　散

理脾虚感受风寒湿气，传作吐泻，手足逆冷，腹痛有痰，及阴证脱肛，疝疾盗汗。

附子如前制　甘草半生半炙，二味各二钱半　人参去芦，七钱半　细辛去叶，一钱半　桔梗锉炒，五钱　厚桂去粗皮　白茯苓去皮　川独活三味各二钱

半夏同前制，三钱

上件咬咀，每服二钱，水一盏，姜二片，煎七分，无时温服。或入枣子同煎。

蜜陀僧散

治走马疳，齿焦黑烂。

蜜陀僧一两　轻粉五十贴　麝香一字

上件为末，同轻粉、麝香，乳钵内杵匀，每用半钱，擦患处。

圆　膏　门

圆　类

琥珀抱龙圆

抱龙之义，抱者保也，龙者肝也。肝应东方青龙木，木生火，所谓生我者父母也。肝为母，心为子，母安则子安。况心藏神，肝藏魂，神魂既定，惊从何生。故曰抱龙圆。理小儿诸惊，四时感冒，风寒湿疫邪热，致烦躁不宁，痰嗽气急，及疮疹欲出发搐，并宜可投。其药性温平，不僭不燥，常服祛风化痰，镇心解热，和脾胃，益精神。

真琥珀　天竺黄　檀香细锉　人参去芦　白茯苓去皮，五味各一两半　粉草三两，去节　枳壳如前制　枳实如前制，二味各一两　水飞朱砂五两，先以碎石引去铁屑，次用水乳钵内细杵，取浮者飞过，净器中澄清去上余水如此法一般精制见朱砂尽千用　山药去黑皮，一斤，锉作小块，慢火炒令热透，候冷用　南星一两，锉碎用腊黄牛胆酿，经一夏用　金箔百片，去护纸取见成药一两，同在乳钵内极细杵，仍和匀前药末用

上前十二味，除朱砂金箔不入研，内余十味，檀香不过火外，九味或晒或焙，同研为末，和匀朱砂、金箔每一两，重取新汲井水一两，重入乳钵内略杵匀，随手圆此样〇大一粒阴干，晴霁略晒，日色燥甚则捩折，宜顿放当风处，取其自干。

治法并用葱汤，无时化服，或薄荷汤，痰壅嗽甚，淡姜汤下。豆疮见形有惊，温净汤下。心悸不安，灯心汤下。暑天迷闷，麦门冬熟水下。百日内婴孩每圆分三次投，二岁以上者止一圆或二圆。其品剂修合之日，但缺一味，不依制度，必无效矣。常用瓦瓶入麝香同贮，毋使散泄气味，入珍珠末一两合和，名金珠散。盖珍珠能镇心宁肝，坠痰尤效，治法汤使同前，此药乃家传秘方，当自精制出卖，人多信用，取者甚众。今推诚利行，愿与天下共之，非敢自矜，特以全婴为念耳。

镇　惊　圆

主急慢二惊，风痰上壅，手足抽掣，口眼㖞斜，躁烦生嗔，精神昏闷，常服宁心镇惊，疏风顺气。

人参去芦，三钱　粉草半生半炙　茯神去皮木根　僵蚕去丝　枳壳如前制，四味各五钱　白附子　南星如前制　白茯苓去皮　硼砂　牙消　朱砂水飞，六味各二钱半　全蝎拾尾去毒　麝香一字

上除牙消、硼砂、麝香、朱砂四味，用乳钵细研，余九味焙为末，入乳钵内和匀前四味，用糯米粉水煮清糊为圆，梧桐子大。就带润以银朱为衣，每服三圆至五圆或七圆，急惊用温茶清磨化投服。慢惊以生姜、熟附子煎汤研化温服，薄荷汤化下，或麦门冬汤。

乌　犀　圆

主诸积滞夹风，温胃调脾，消进饮食，吐逆有酸馊气，面黄肌瘦，不拘孩儿生后岁月远近，并宜可服。

乌犀　皂荚锉，三寸长，安灰火中见清烟起为度，取出地上瓦碗盖定，存性，冷用，七钱　硫黄　白姜二味各三钱半　陈皮去白　川乌炮去皮脐，二味各五钱　巴豆七十七粒，去壳膜心存油

上硫黄一味，先入研内研细，除巴豆外，余四味同焙为末，仍以巴豆薄切，在乳钵极细杵，再同前五味药末杵匀，用粳大米饭包作棕子一大个，小瓦瓶盛水熟煮，候冷取出。

在沙钵中烂杵，细布兜紧，捻出如稠糊，安在别器内。以药末亭分同杵细软，圆粟谷大，取诸积每服十五圆或二十一圆至三十三圆，并用淡姜汤泡冷饭取汁小盏，五更初空心送下。通利三五行，以匀气散，止补，治积吐有酸馊气，每服三圆至五圆，用淡姜汤入米醋少许候温空心投下。

香　芎　圆

治诸淋证，若患风闭尤效。

净香附盐水炒　川芎　赤茯苓去皮，三味各半两　海金沙　滑石二味各一两　枳壳如前制　泽泻去粗皮　石苇去毛梗取薄叶　槟榔不过火，四味各二钱半

上件锉晒为末，糯米粉煮为清糊，圆麻仁大，每服三十三圆，至五十五圆或七十七圆，并用麦门冬熟水空心送下。若小便涩痛，滴三五点者，取长江顺流水，用火微温，入盐少许调匀，空心咽服。

香　连　圆

治赤白下痢，烦渴作痛。

南木香半两，不过火　净黄连一两，锉，用茱萸炒，仍去叶梗　乌梅肉二钱半，薄切用，屋瓦慢火焙干

上件为末，用阿胶半两，锉碎炒胀，水化如糊，候冷入乳钵内，同前药末亭分杵匀，圆作麻仁大，赤痢每服三十三圆，至五十五圆，或七十七圆，甘草汤空心下。白痢圆数同前，白姜汤空心下。赤白交作，温米清汤，空心咽服。

化　癖　圆

主癖结气块，在两肋之间，日久不化，乍寒乍热，脏府不调，米谷不消，哽气喘促，胸腹满闷，及理丁奚哺露。

南木香　陈皮去白　莪术去毛，炒　三棱炮锉　青皮巴豆九粒去壳膜心微炒　枳壳如前制　槟榔七味各半两　白术　丁香二味各二钱　细墨烧存性，用四钱

上除木香、槟榔、丁香不过火，余七味焙，同前三味为末，面糊圆，作麻仁大，每服十五圆至二十一圆，清米汤空心下。有寒热往来，以柴胡饮间服，忌油腻生冷饮食。

芦　荟　圆

主五疳八痢蛇虫，藏府虚弱，身体瘦悴，头发焦疏，腹胀青筋，小便白浊，渴水无度。洞泄不时，谷食难化，遍身疮疥，神色干燥。此药大能养胃壮气，止痢除虫，长肌健力。

南木香　丁香二味各二钱半　诃子去核取肉　肉豆蔻二味各半两　使君子肉　芦荟二味各四钱　枣肉一两，薄切，用屋瓦盛，慢火焙干

上除使君子肉薄切，于乳钵内极细杵，仍将前南木香等四味，湿面裹煨，至香熟取出。地上候冷，去面锉焙，同枣肉、芦荟为细末，再入乳钵，同使君子肉杵匀，炼蜜圆，作麻仁大。每服三十圆至五十圆，温米汤空心送下，儿小米汤化服。

使君子圆

治腹内诸虫作痛，口吐清水。

使君子肉薄切，屋瓦焙干　槟榔　酸石榴根皮东向者佳，净洗锉焙　大黄半生半炮，四味各七钱半

上除槟榔锉晒不过火，余三味再焙，同槟榔为末，沙糖水煮面糊，圆麻仁大，每服三十圆至五十圆，淡猪肉汁空心下，或鸡肉汁亦好。

补肾地黄圆

治禀赋不足，肾气虚弱，骨髓枯竭，囟大头缝不合，体瘦语迟，行步多艰，齿生缓者。

干山药去黑皮　山茱萸酒浸润蒸透，去核取皮为用　熟干地黄酒洗焙干，三味各五钱　鹿茸蜜涂炙酒亦好　川牛膝酒洗焙，二味各四钱　牡丹根皮净洗　白茯苓去皮，二味各三钱　泽泻去粗皮，二钱

上件锉焙为末，炼蜜圆，作麻仁大，每服十五圆或二十五圆至三十五圆，空心温盐汤下，温酒亦佳。

宽肠圆

治痢后里急，大府闭涩不通。

枳壳同上制，仍用清油浸透一宿，焙干，五钱　麻仁去壳　木通去皮节　大黄半生半炮　槟榔　大腹皮净洗焙干，五味各二钱半

上除麻仁用乳钵极细杵，外五味槟榔不过火，余焙同研成末，入乳钵中，与麻仁再杵匀，炼蜜圆绿豆大，每服三十圆至五十圆，仍以枳壳、甘草煎汤，空心送下。一二月婴孩，温蜜汤化服。

香陆胃苓圆

治肿疾日久不愈，此药大能实脾导水，多服取效。

丁香去梗　商陆　赤小豆　陈皮去白　甘草炙，五味各二两　苍术如前制，三两　泽泻去粗皮，二两半　赤茯苓去皮　猪苓去皮　白术三味各一两半　肉桂去粗皮，一两　厚朴同上制，二两

上除丁香、肉桂不过火，余药锉焙，同前二味为末，用面微炒，水浸透，煮糊圆绿豆大，每服二十圆至五十圆，或七十圆，空心温汤下。儿小者圆作粟谷大吞服，粒数引子，并如前法。

二姜圆

治疟疾往来寒热，经及不愈者。

良姜一两，锉片，东壁土炒　白姜一两，锉片，巴豆九粒去壳同炒，微黄，去巴豆

上为细末，用猪胆汁和水煮面糊，圆麻仁大，就带润以朱砂末为衣，热多用温汤，早晨面北空心送下，寒多亦于清旦用温酒面南空心咽服。若寒热相亭，用阴阳汤以一半，冷水一半热汤参和是也，不拘向南北投服。

没石子圆

治久患疳痢及酿泻。

没石子二枚　南木香湿纸包，略炮过　肉豆蔻一枚，炮　净黄连锉碎，姜汁炒过，二味各二钱半　诃子四枚炮，去核

上锉焙成末，如乌犀圆，内制饭糊为圆，粟谷大，每服十五圆至三十圆或五十圆，温白汤空心下，或米清汤。

半夏圆

治痰证神妙，若惊搐后，风涎潮作，服之尤验。

半夏生用，二两　赤茯苓去皮　枳壳同上制，二味各一两　风化朴消二钱半

上前三味，锉焙为末，入乳钵同朴消杵匀，用生姜自然汁煮糯米粉为糊，圆绿豆大，每服三十圆至五十圆，仍以淡姜汤食后临睡送下。儿小者圆如粟谷大。

六圣圆

治诸积和胃，大能主气厚肠，消疳快膈，屡用取效。

莪术炮锉　净黄连　陈皮去白　白姜炮，四味各五钱　南木香二钱半

上除南木香不见火，余四味锉焙，同木香为末，每一钱重，巴豆三粒，去壳膜心存油碎切，入乳钵极细杵，同前药末再拌匀，煮醋面糊，圆麻仁大，每服十五圆至二十五圆或三十五圆，淡姜汤五更初空心送下。利三五行，匀气散止补。常服助脾化积，进食消疳，临睡以净汤或温酒下三粒及五粒而已，每一次止圆药末三钱重，净巴豆九粒为则，不可多合，久则味过，用之效迟。

内消圆

治瘰疬作脓穿破，久不愈者，或初得此证，投之亦效。

斑猫一两，除翅足，粟米大盏炒，令粟米微焦色，仍去粟米

上件入薄荷叶三两，同研为末，鸡子清为圆，绿豆大。初用半饥半饱间，以温茶清下一圆，逐日加一圆，加至五圆之外，又逐日减一圆，减至一圆之后，每一日只服五圆，

得瘥即止，不可过投。

截惊圆

治惊风搐掣，烦躁有热，两目上视，口噤牙关。

龙胆草去芦　防风去芦　青黛　钩藤和钩　净黄连　牛黄　甘草　朱砂末水飞者，八味各五钱　薄荷叶二钱半　麝香半钱

上除牛黄、麝香外，余八味锉晒，或焙为末，仍同前二味乳钵内杵匀，炼蜜圆，芡实大，每用一圆至二圆，温汤化服，或茶清。

散气圆

理诸疝气，小便利或不通，脐下作痛，不堪忍者。

海藻汤浸洗七次焙干　用泽泻去粗皮　茴香炒　车前子焙　萝卜子用屋瓦慢火焙干　川楝子取肉，斑猫九枚，去翅足，同炒少时，仍去斑猫，候冷用　大腹皮净洗焙干，七味各一两

上件锉焙为末，酒煮面糊，圆绿豆大，每服三十圆至五十圆，南木香煎酒，空心下，或防风、牡丹皮煎酒下。不能饮者，于木香汤中防风牡丹皮汤内各少入酒，并空心投亦可，再用盐炒茴香煎汤尤妙。

金粟圆

治下痢赤白。水谷不化。

净黄连一两　神曲一两，别研为末作糊　川芎　枳壳如前制　谷芽净洗焙干　赤茯苓去皮　白芷　南木香六味各半两

上除木香别锉不过火，余六味焙，入木香同为末，用神曲末煮糊圆粟谷大，每服七十圆至百圆，空心温米清汤下，不拘时。

万应圆

治诸般疳证，胃口有热，饮食不进，头发作穗，面色痿黄。

五倍子去内虫屑　胡黄连　青皮去白　陈皮去白　黄柏　神曲　麦芽净洗焙干　三棱炮锉　莪术炮锉　芜荑　槟榔　龙胆草　川楝子肉　使君子肉十四味各一两

上除槟榔不过火，麦芽二味外，余十二味锉碎，炒令微焦色，候冷同前麦芽槟榔研为细末，水煮面糊圆麻仁大，每服三十圆至五十圆，或七十圆，温米清汤无时送下，或空心。儿小者圆作粟谷大，粒数下法同前。

金茱圆

治冷疝气痛，及肤囊浮肿。

金铃子肉一两　家茱萸半两

上二味焙研为末，酒煮面糊圆麻仁大，每服三十圆至五十圆，空心温盐汤下。

温酒亦好，儿小者圆作粟谷大，粒数下法如前。

二圣圆

治腹内诸虫，及消谷逐水下气去风。

槟榔一两　巴豆十五粒，去壳膜内存油

上槟榔锉晒为末，巴豆碎切，在乳钵内极细杵，仍入槟榔末同再杵匀，面糊圆绿豆大，每服七十七圆至九十九圆，用温茶清五更初空心止投一服。见虫下尽，进以稀粥自安。

商陆圆

治水肿小便不通，勿拘远近。

商陆一两　净黄连半两

上二味焙为末，姜汁煮面糊圆绿豆大，每服三十圆至五十圆，用温紫苏熟水空心下。或温葱汤。

枳壳圆

治大府虚闭气连日不通，痢后里急，用之亦效，利小便热闭。

枳壳不拘多少，锉片，麦面炒过，仍以清油润透，一宿，焙干

上焙为末炼，蜜圆，作芡实大，儿小者，用甘草糯米煎汤化下一圆至二圆，儿大者圆

绿豆大，每服三十圆或五十圆，食前温米清汤送下。小府热闭，用车前子煎汤，候温空心投之。

浚川圆

治水肿及单腹满胀，气促食减，遍身面浮。

大戟　芫花醋炒　沉香　檀香　南木香　槟榔　莪术　大腹皮煅干净洗　桑白皮锉炒，九味各半两　黑白牵牛晒研取生末，一两　巴豆去壳膜心，存油，三十五粒

上除牵牛末巴豆外，前九味，内有沉香、檀香、木香、槟榔不过火，余五味焙干，同沉香等为末，就加牵牛末和匀。巴豆碎切，在乳钵内极细杵，入前药末同再杵匀，水煮面糊，圆麻仁大，每服十七圆，浓煎葱汤，候温五更初空心下。去水未尽，停一日减用十三圆，次减作九圆，再减至七圆，汤使下法如前。证退即止。仍投南星腹皮散，如单腹肿甚，能饮食气壮者，加甘遂末同圆取效，仍忌有甘草草药饵，不致相反。

三圣圆

治诸疟不拘远近。

穿山甲一两半，汤浸透取甲，锉碎，同热灰铛内慢火炒令焦黄色　鸡骨常山

鸡心槟榔二味各一两，薄锉晒干

上件再晒为末，水煮糯米粉为糊，圆绿豆大，就带润以红丹为衣，阴干，每服三十圆至五十圆，未发前隔晚用酒空心投一服，重则二服。经久不瘥，下祛疟丹。

莪术圆

和脾益胃，消进饮食，宽膈快气，悦色清神。

莪术炮锉　三棱炮锉　净香附三味各四两，醇醋浸一七慢火煮干再焙　槟榔一两，薄锉　生牵牛末一两，别研　青木香去芦　谷芽净洗焙干　青皮去白，三味各半两　草澄茄　丁香　南木香三味各四钱

上除槟榔、丁香、木香不过火，及牵牛末，余七味锉焙，仍同槟榔、丁香、木香为末，余临入牵牛末和匀，水煮面糊圆，绿豆大，每服三十圆至五十圆，无时用淡姜汤下，温茶温酒皆好。儿小者圆粟米大，粒数下法如前。

豆蔻圆

治患豆疮，脾虚作泻。

肉豆蔻　南木香　缩砂仁三味各三钱　白龙骨　诃子肉二味各五钱　赤石脂　枯白矾二味各七钱半

上除木香不过火，余六味锉焙，仍同木香为末，稠煮面糊圆麻仁大，每服三十圆至五十圆，温米清汤空心送下，或不拘时。儿小者圆粟谷大，下法同前。

碧玉圆

治痰嗽气喘胸满，饮食减少，睡不得宁，烦躁有热。

青黛　明白矾生用　南星生用　滑石四味各二钱半　轻粉五十贴　全蝎十五尾，去尖毒　巴豆四十九粒，去壳膜心存油碎切，入乳钵，极细杵

上除轻粉、巴豆外，余五味或晒或焙为末，仍入前二味，同在乳钵杵匀，姜汁煮糯米粉为糊，圆粟谷大，每服七圆至九圆或十一圆，用淡姜汤空心投。热甚者薄荷汤下，或不拘时。

快活圆

治丁奚疳证，皮肤瘦削，骨露如柴，肚大青筋，小便白浊，睡卧烦躁，神气昏沉。常服健脾化积，进食肥肌。

蒸饼一两，去顶剜空，入青矾内半钱重，仍以碎饼屑紧塞上用水纸封定，灰火中炮透，取出候冷用

上件锉焙为末，别以肥枣用米泔水浸，经一宿饭上蒸，少时去皮核，用乳钵烂杵如糊，同前饼末等分，再杵匀，圆麻仁大，每服三

十圆至五十圆，温米精汤无时送下。儿小者亦以米汤化服，其蒸饼不拘个数，大约以一两入青矾半钱重为定，下常如前法制半斤，作一料，后人切勿以见方不重药为误。余当屡试屡验其饼如南馒头样者。

沉香槟榔圆

和脾助胃，进食清神，宽胸快膈，顺气调中，悦颜色，壮筋骨，理面带痿黄，肌肤瘦弱，过食生果，停寒在里，乳癖腹胀作痛，及吐痢疟肿，瘥后诸疳虫积，并皆可投。

沉香　槟榔　檀香　南木香　丁皮　三棱炮锉　莪术炮锉　神曲炒　谷芽洗焙　厚朴同上制　苍术同上制　使君子肉锉，以屋瓦焙干　青皮去白　陈皮去白　缩砂仁　益智仁　净香附　枳壳同上制　良姜同上制，十九味各半两　粉草炙，一两半

上除沉香、槟榔、檀香木香、丁皮不过火，余十五味锉焙，仍同沉香等为末，水煮面糊，圆麻仁大，每服三十圆至五十圆，温米清汤无时送下。儿小者不能吞咽，炼蜜圆如芡实大，每以一圆或二圆，温汤化服。

膏　类

朱砂膏

五心烦热，喉痰壅盛，惊风搐搦，渴饮无时，睡中不宁，见人烦躁，口疮糜烂。

朱砂水飞，五钱　牙消　硼砂　玄明粉三味各二钱半　麝香一字　金箔　银箔各十五贴　白附子　枳壳如前制，二味各三钱　川芎　粉草二味各四钱　人参去芦　黄芩　薄荷叶三味各二钱

上前七味，入乳钵杵匀，后七味，锉焙为末，仍入钵中同前药和，炼蜜圆芡实大。每服一圆至二圆，用麦门冬熟水无时化服。

如意膏

治痰喘气促咳嗽，连声不已，冷热二证皆可投。

半夏炮裂　南星炮裂，二味各一两半

上二味为末，以生姜汁和匀，捻作小饼如钱样，用慢火炙干，再为末，复取姜汁如前，经两次炙干，仍焙为末，炼蜜圆芡实大，每服一圆至二圆，仍用姜蜜汤无时化服，有热以薄荷汤。

地黄膏

治口内舌上生疮作痛，饮食艰进，昼夜烦啼。

山栀仁　绿豆粉二味各一两半　粉草六钱

上件或晒或焙为末，用生地黄烂杵取汁一两半，好蜜一两半，以薄瓦器盛，在铜铁铫中水煮成膏，如稀糊相似，候冷亭分，入前药末，同在乳钵再杵匀，圆芡实大，每以一圆至二圆，麦门冬熟水无时化服。儿大者每用一圆，纳口内含化，或以新汲水调点舌上。

乌梅膏

治诸渴不止，吐泻后口干无味，及病中昏闷，咽痛不利，心悸似惊，此药品味不寒不燥，用得其宜，暑月出路含化，则津液生而烦渴少，神效异常。

人参去芦　檀香锉晒　薄荷叶三味各半两　乌梅肉薄切，用屋瓦慢火焙干　干葛　缩砂仁　百药煎　粉草五味各一两

上除檀香不过火，乌梅肉别焙，余六味或晒或焙，仍同前二味研为细末炼蜜圆芡实大，每服一圆或二圆，无时含咽。儿小者麦门冬熟水化服。

乌附膏

理囟门陷。

绵川乌生用　绵附子生用，二味各五钱　雄黄二钱

上件为末，用生葱和根叶细切烂杵，入前药末同煎，空心作成膏，贴陷处。

乌　豉　膏

治六七岁以上小儿，痄腮肿毒，牙关紧硬，饮食不便。

绵川乌水浸润，炮裂去皮、脐半两　玄明粉二钱　淡豆豉三钱重，水浸润饭上蒸透

上以川乌为末，同蒸豆豉玄明粉在乳钵烂杵为膏，圆芡实大，每用一圆。儿大者安在牙关内，令其自化，和痰吐出。又再如前法含化，肿毒自消。儿小者用薄荷蜜汤化开，以指头抹入牙关内，咽下亦不妨。

辟　尘　膏

治小儿尘埃入目，揩成肿热作痛，啼哭不已。

油烟细墨

上以烟墨新汲井水浓磨，入玄明粉半钱，和匀为膏，用笔多点目内，三五次即效，仍忌饮酒一昼宵。

蓖　麻　膏

治暴患脱肛。

蓖麻子一两

上件烂杵为膏，捻作饼子，两指宽大，贴囟上，如阴证脱肛，加生附子末，葱蒜同研作膏，依前法贴之。

钩　藤　膏

治百日内婴孩，唇面青冷，腹痛夜啼，及周岁以上者，盘肠内吊，诸疝气疾。

钩藤和钩　玄胡索　当归酒洗　粉草炙　乳香五味各五钱　肉桂去粗皮二钱　麝香一字

上前四味焙干，桂不过火，同为末，乳香蒴叶里，熨斗盛火，熨透候冷，入乳钵同麝细杵，后入前药末再杵匀，炼蜜圆芡实大，每用一圆至二圆，白汤空心化服。

黄　连　膏

治时行火眼，赤肿涩痛，昼夜烦啼。

净黄连二钱半

上件细锉，鸡子一枚，筋嘴札开，一头大处，取清瓦盏盛入黄连和匀酿一时，见黄色，以绢滤过成膏，患者仰面卧，外令人挑一字许，频点目内，觉口中有苦味满舌，上药之验也。豆疮余毒攻眼，眵多有热，用之亦验。

益　中　膏一名助胃膏

治脾胃虚弱，吐泻腹胀，肚疼困倦，有因感冷而泻，夜起频数，大便过时，食不克化。

肉豆蔻　丁香　缩砂仁　诃子肉炮去核，四味各二钱半　粉草炙　青皮去白，二味各半两　陈皮去白，一两　马芹净洗焙干，三钱

上除丁香不过火，余七味焙，仍同丁香为末，炼蜜圆芡实大，每用一圆至二圆，白汤空心化服。

玄　霜　膏

治一切汤火疮，但傅上痛止，更无瘢痕。

好糯米五升或不拘多少

上用坚硬铁器盛贮，见天处以雪水浸一二月，不问腐烂，仍用竹器捞出，于大筲箕内，别取净水淋过晒干，焦炒研为细末，新汲井水调涂患处。如干燥，又以软鸡翎蘸水添拂疮上，使之滋润痛减，药少再添用，自然效速。末久成围再研细，一名玄霜散，炒透黑色，烟清为度。

清　凉　膏

治暴赤火眼肿痛，及血疖作疼发热。

大黄　净黄连　黄柏　赤葛　细辛和叶　薄荷叶　风化朴消七味各一两

上前六味，或晒或焙为末，临入朴消，乳钵内同杵匀，每用一钱至二钱，冷水加姜汁调涂太阳，或新汲井水调妙，热疖以凉米汤水调，搽患处。

祛　风　膏

治急慢惊搐，脐风撮口，牙关紧闭，痰涎壅盛，咽喉肿痛。

威灵仙去芦，一两半，细锉焙，研为末

上用皂荚三两，去皮弦捶损，挪温水一碗，绢滤过，慢火熬若稀糊，入醇醋半两，再熬三五沸，去火候冷，用前药末亭分，乳钵内杵匀，圆芡实大，先用盐梅肉擦牙根，次以此膏一圆或二圆；温白汤浓调，抹入左上牙关内，即开。续进别药，熬时得瓦器为上，银器尤佳，及解风痰壅盛，淡姜汤调化，无时少与含咽，咽喉肿痛，温茶清调下，或薄荷汤。

千金膏

治水泻疳泻，下痢赤白，腹痛烦渴。

橡斗子一两　细茶　白姜　甘草三味各二钱半　白芷五钱

上件锉焙为末，炼蜜圆芡实大，每服二圆至三圆，温米清汤空心化下，入醋，与蜜相亭，为膏尤妙，汤温化服。

丹　饮　门

丹　类

水　晶　丹

治惊积、食积、虫积腹胀，烦啼恶心，食减面黄，并宜通利，此药有顽积惊重风紧，涎多热极，乃可服，非常用之剂，及急惊后，风痰未尽，免生凝疾，宜再投。

南星锉作小块，汤煮少时　半夏如前制，二味各三钱　滑石四钱　轻粉五十贴　净芜荑二百片　巴豆五十粒，去壳，全者，汤泡七次，又去心膜作二边，水煮少时，晒干碎切

上前三味焙为末，拌和轻粉外，芜荑仁、巴豆二味同碎切，在乳钵内细杵，入前药末再杵匀，如乌犀圆内制面糊圆麻仁大，每服十五圆至二十五圆或二十五圆，糯米汤泡葱白取汁，小盏五更初空心下，过三五行，进匀气散调补，下风痰用淡姜汤空心服。

不　惊　丹

治因惊气而吐逆作搐，痰涎壅塞，手足掣缩，目睛斜视，常服疏风顺气，自不作惊，和脾胃，进饮食。

枳壳同上制，一两　淡豆豉焙干　茯神去皮木根　南星同上制，三味各半两　蝎梢五十尾，去尖毒　净芜荑二钱半，先入乳钵内极细研烂

上除芜荑外，余五味焙为末，再同芜荑乳钵内杵匀，醋煮糯米粉糊为圆，周岁内婴孩粟谷大，每服三十圆至五十圆，乳汁下。三岁以上者，麻仁大，每服五十圆及六十圆，温米清汤下，候一时得吃乳食。

鹤顶丹

治阴阳二证结胸神妙，胜陷胸、承气、泻心三药。

明白矾一两　真银朱半两

上二味同研为末，用熨斗盛少炭火，坐小瓦盏在上，平抄矾朱末一钱入盏中熔化，急刮出就搓成圆。如有前证，每用一圆，研细茶清调匀温服，或入姜汁少许同炒下，听心上有隐隐微声，结者自散，不动藏府，不伤真气，无问虚实证皆可投，白矾能化痰解毒，银朱是水银或硫黄炼成汁，专破积聚，故治结胸。

黑虎丹

治诸般风证。

草乌去黑皮，只一两生用　川乌去黑皮生用　甘草二味各七钱半　麻黄不去根节　甘松　熟干地黄净洗　藿香叶　白芷　油烟墨烧存性　猪牙皂荚　川芎　当归　何首乌　南星生用　僵蚕去丝　赤小豆　羌活　白胶香　木鳖子去油十六味各半两

上件锉碎，或焙或晒，研为细末，糯米粉煮糊，圆麻仁大，每服三十圆至五十圆或七十圆，稍空心用淡姜汤下。儿小者，圆作粟谷大，治法如前。

祛暑丹

治小儿暑月五心烦热，睡卧不稳，无时噎嘻，及小便少，乳食减，渴饮水浆。

朱砂末水飞，三钱　黄芩末　甘草末二味各半两　五苓散末一两

上件和匀，炼蜜圆芡实大，每服一圆至二圆，麦门冬熟水无时化服，临睡时投亦佳。

四　神　丹

治水泻赤白痢。

净黄连一两三钱　黄柏去粗皮，七钱　白姜　当归酒洗焙干，二味各七钱半

上四味薄锉，或晒或焙为末，用乌犀圆内制饭糊圆麻仁大，每服三十圆至五十圆，乌梅煎汤空心下。其他病证，多好甘甜咸美，惟泻痢恶之，专喜酸苦涩淡为上，故以乌梅作汤使。儿小者圆粟谷大，下法同前。

祛疟丹

治疟疾经久不瘥。

常山二两，细锉　乌梅和核，一两，薄切　红丹半两

上除乌梅屋瓦别焙，常山或晒或焙，仍同乌梅、红丹研为细末，糯米粉煮糊圆麻仁大，每服三十圆至五十圆，未发前凉酒空心送下，或隔晚酒下。重则二服，轻则一服。忌鸡面羊生冷饮食毒物。

饮类

百伤饮

主百物所伤，感冒风寒邪气，不拘冷热二证，并宜可服，惟慢惊慢脾不用。

干葛三两　净香附二两　升麻净洗　青皮去白　陈皮去白　谷芽净洗焙干　麦芽净洗焙干　桔梗锉炒　紫苏和根　缩砂仁　甘草　神曲炒　赤芍药十一味各一两　麻黄同上制　枳壳同上制，二味各七钱半

上件咬咀，每服二钱，水一盏，煎七分，无时温服。或入姜、葱同煎。有积加水、酒、曲。

热多添灯心、竹叶煎投。

速　效　饮

治长成小儿，因他物或跌著触损两目，血胀肿痛。

荆芥穗　薄荷叶二味各半两　草决明一两，微炒　甘草二钱，生用

上为粗末和，半生半炒芝麻等分，炒二钱，在掌中盛，以干吃咀嚼，味尽，吐去渣，如此法投三五次即效。

柴胡饮

治骨蒸疳气，五心烦热，日晡转盛，口干无味，渴多身瘦，胸满痰紧，小便黄色，食减神昏。

北柴胡去芦净洗　人参去芦　当归酒洗　黄芩　赤芍药　甘草炙，六味各一两　大黄生用　桔梗去芦锉炒　北五味去梗　半夏同上制，四味各半两

上件咬咀，每服二钱，水一盏，乌梅小角，姜二片，煎七分，无时温服。

四　顺　饮

治血脉壅实，脏府生热，颊赤烦躁，四肢惊掣，及因乳哺过伤，寒暄失理，令儿肠胃不调，蕴蓄积滞，并风热结核，头面多生疮疖，目赤咽痛。

当归酒洗，二两　大黄一两半　赤芍药三两　甘草一两

上件锉焙为末，每服一钱，汤调温服，不拘时。

清　肺　饮

治肺受风邪客热，嗽声不断，气促喘闷，痰壅鼻塞，流涕失音，及解时行疹毒豆疮，涎多咳嗽，咽痛烦渴。

人参去芦，半两　柴胡净洗，二两　杏仁汤泡去皮尖　桔梗锉炒　赤芍药　荆芥　枳壳同前制　桑白皮锉炒　北五味　麻黄同前制　半夏同前制，九味各一两　旋覆花五钱　甘草一两半

上件咬咀，每服二钱，水一盏，姜二片，葱一根，煎七分，无时温服。或入薄荷同煎。

冲　和　饮

治感冒风寒，头疼发热，肩背拘急，恶心呕吐，腹痛膨胀，兼寒湿相搏，四肢拘急，冷气侵袭，腰足疼痛。

苍术同上制，一两二钱　人参去芦　前胡去芦　桔梗锉炒，三味各五钱　枳壳同上制　麻黄同上制　陈皮去白，三味各三钱　川芎　白芷　半夏同上制　当归酒洗　薄桂去粗皮　白芍药　赤茯苓去皮，七味各一钱半　干姜　厚朴同上制，二味各二钱　甘草炙，七钱半

上件咬咀，每服二钱，水一盏，姜二片，葱一根，煎七分，无时温服。伤冷恶心呕吐，煨姜同煎。开胃进食，加枣子煎，空心温投。寒疝痛，入盐炒茱萸、茴香同煎。

明目饮

治心脾蕴热，肝受风邪，致两目羞明，经久不愈。

山栀仁　净香附二味各一两　夏枯草去梗，半两

上件咬咀，每服二钱，水一盏，蜜大匙，煎七分，无时温服。

玉　露　饮

治颊赤咽干，心烦躁，睡不稳，身热头痛，兼中暑发渴昏闷，小便不通，惊气入肾，梦中咬牙，加金珠散、薄荷汤，空心温服。

寒水石中有细纹，以手可碎者是　石膏洁白坚硬而有墙壁者是，二味各一两重　甘草三钱，晒干，天阴火焙

上除前二味外，甘草锉晒或焙，同为细末，每服半钱至一钱，温汤无时调服。或麦门冬熟水。

宽　气　饮

主通利关节，除胸膈痞结，消痰逐水，进美饮食，及治蓄气而成搐，传变急慢惊风，气逆不和，精神昏倦。

枳壳同上制　枳实同上制二味各一两　人参去芦　甘草炙，二味各半两

上件锉焙为末，每服半钱至一钱，净汤无时调服。惊风痰搐加姜汁、葱汤同调，热极者入宽热饮，薄荷蜜汤调下，或麦门冬汤。

绿　豆　饮

解误服热剂，烦躁闷乱，或作吐或狂渴，宜先投之，次服对证药剂。

绿豆粉一两　净黄连　干葛　甘草三味各半两

上除绿豆粉外，余三味或晒或焙为末，人乳钵同绿豆粉杵匀，每服半钱至一钱，温豉汤调服。

宽　热　饮

主伏热在里，风痰壅满，气促昏闷，或脾胃停滞，日久饮食减少，面黄脉实，发热无时，并宜可服。

枳壳去瓤，一两，锉片，巴豆十五粒，作二边去膜心同炒，枳壳见微黄色，去巴豆片　大黄一两　粉草七钱半　玄明粉二钱半

上前三味，锉焙为末，临入玄明粉，乳钵内同前药末杵匀，每服半钱至一钱。儿小者抄一字，并用姜蜜汤无时调服，或薄荷汤。

赤　苍　饮

主脾胃因虚受湿，面浮而黄，或遍身作肿，饮食减少，气不升降，小便赤色，腹肚

膨胀，咳嗽有痰，及肿后当服神妙，加草果仁炮过，水、姜、枣煎投。

赤茯苓去皮　苍术同上制，二味各一两半　枳壳同上制，一两　藿香和根　半夏同上制　净香附　紫苏和梗　厚朴同上制　陈皮去白，六味各七钱半　甘草炙，一两二钱

上件咬咀，每服二钱，水一盏，姜二片，煎七分，无时温服。

化　虫　饮

治化虫毒在腹作痛。

槟榔　酸石榴根皮净洗焙干，二味各一两　红丹煅过　雷丸　贯众如鸡头者佳　使君子肉薄切焙，四味各二钱半　甘草炙　枳壳同上制　大黄三味各五钱

上为细末，用清油煎鸡子一枚，如春饼样，候冷抄药末一钱于上摊匀，空心卷面食之，儿小者用糯米粉水煮糊圆，粟谷大，每服十五圆至三十圆，以淡猪肉汁空心下，鸡肉汁亦好。

玄　参　饮

治瘰疬证，及颈上生恶核肿痛。

玄参　升麻二味各五钱　川乌炮裂去皮脐　草乌炮裂去皮　当归酒洗　川芎　赤葛　生干地黄　赤芍药七味各二钱半　甘草三钱　大黄半生半炮，四钱

上件咬咀，每服二钱，水一盏，姜二片，煎七分，无时温服。

参　香　饮

治胃虚作吐，投诸药不止。

人参去芦，一两　沉香　丁香　藿香和梗　南木香四味各二钱半

上件咬咀，每服二钱，水一盏，煎七分，去渣临入姜汁少许，作三次空心温服。

健　脾　饮

健脾养胃，理呕吐，治泻痢，及诸病后气色虚弱，有痰恶心，腹中微痛，饮食减，精神慢，并宜投服。

厚朴同上制，再热炒入醇醋透，仍以慢火炒干　人参去芦，二味各一两　白茯苓去皮　肉豆蔻　半夏同上制　益智仁　净香附五味各二钱半　良姜锉片，东壁土炒　诃子肉二味各二钱　甘草炙，五钱

上件咬咀，每服二钱，水一盏，姜二片，枣一枚，煎七分，空心温服或无时。

五　皮　饮

主头面四肢浮肿，时有微喘，饮食不进。

大腹皮净洗，焙干　桑白皮去粗皮锉炒　茯苓皮净去埃土　生姜皮略洗焙干　陈皮去白，五味各一两

上件咬咀，每服三钱，水一盏，煎七分，无时温服。此剂但多投自然作效，勿以见方不重药为误。

立　效　饮

主口内牙根舌上发疮作痛，致语言饮食不便咽痛，茶清调下。

净黄连一两　北细辛去叶，二钱半　玄明粉二钱

上件细锉，或晒或焙为末，仍同玄明粉乳钵内杵匀，每用一字，干点患处。或以一钱，新汲井水调涂疮上。儿小者畏苦不肯点咽，用蜜水调抹烂处及舌上，令其自化。

沉　香　饮

治吐痢后，神昏卷怠，饮食减少，脾胃气虚，水谷不化，或随时直下，五心烦热，盗汗常出，或闻食心恶。

沉香　丁香　南木香　藿香叶四味各二钱半　陈皮去白　白术　半夏同上制　白茯苓去皮　肉豆蔻五味各五钱　粉草炙，三钱

上除沉香、丁香、木香不过火，余七味或晒或焙，仍同前三味研为细末，每服半钱至一钱，用紫苏、木瓜煎汤，空心调服，枣汤亦好。

拔毒饮

解风热毒气上攻头项，浮肿作痛发惊，及治发斑。

天花粉去粗皮，一两　生干地黄净洗　白芷　当归尾酒洗　桔梗锉片，蜜水炒过　甘草五味各半两

上件咬咀，每服二钱，水一盏，煎七分，无时温服。

藿香饮

理虚化痰，及治脾胃不和，饮食少进，正气除邪。

人参去芦　半夏同上制　赤茯苓去皮　甘草炙，四味各一两　苍术同上制，二两　陈皮去白　藿香去皮，二味各七钱半　厚朴同上制，一两半

上件咬咀，每服二钱，水一盏，姜二片，枣一枚，煎七分，空心温服。或入烧盐同煎。

参苏饮

解惊风烦闷，痰热作搐，咳嗽气逆，脾胃不和。

人参去芦　紫苏和梗　前胡去芦　干葛　半夏同上制　赤茯苓去皮，六味各七钱半　枳壳同上制　陈皮去白　桔梗锉炒　甘草四味各五钱

上件咬咀，每服二钱，水一盏，姜三片，煎七分，无时温服。

紫草茸饮

和益脾胃，催张豆疮，庶使易收，不致传变。

紫草茸无嫩茸，取近芦半寸者代　人参去芦　黄芪生用　当归酒洗去尾　白芍药　甘草六味各半两

上件咬咀，每服二钱，水一盏，糯米五十粒，煎七分，无时温服。或入枣一枚，去核同煎。

天麻饮

治诸般风搐，不省人事。

天麻明亮者　川乌炮制去皮，二味各七钱

上件咬咀，每服二钱，水一盏，姜二片，慢火煎若稀糊，无时勤与温服。

黑白饮

治脐风气实者，及急惊壮热发搐。

黑牵牛半生半炒　白牵牛半生半炒　大黄生用　陈皮去白　槟榔五味各半两　甘草炙，三钱　玄明粉二钱

上除槟榔不过火，余五味或晒或焙，仍合槟榔为末，同玄明粉入乳钵再杵匀，每服半钱至一钱，温蜜汤调化，空心投服，或无时。此药新合最妙，久则效迟。

白附饮

治肝风克脾土，痰涎壅盛，和饮食吐出，盖风能生痰，痰壅甚食故吐出。

白附子　南星生用　半夏生用　川乌生用，仍去皮脐　天麻明亮者　陈皮去白　南木香　全蝎去尾尖毒　僵蚕去丝　丁香各二钱

上件咬咀，每服二钱，水一盏半，姜二片，慢火煎七分，作五次空心温服。

二仙饮

治疟疾，不拘岁月远近。

青蒿去梗，二两，五月五日采暴干用　桂枝去粗皮，半两

上二味，锉晒为末，每服一钱。寒热未发前，用凉酒调服。或先隔晚，亦以酒调下。

加香薷叶二两，好茶芽半两，合研成末，又名斩邪饮。治证下法同前，疗暑疟尤胜。

双金饮

治下痢赤白，昼夜频密，及泄泻经久。

大罂粟壳去蒂，锉碎，蜜水炒透，晒干，一两　大川芎锉碎酿，醋炒透候干，半两

上二味，再晒或焙为末，每服一钱至二钱，用粳米清汤空心调服，或温蜜汤。

大　顺　饮

解胃暑毒，烦渴吐泻，腹痛发热神昏，或衄血咯血，及大府下血，小便黄少，口干汗多。

细面二十两　生姜十六两　赤茯苓去皮　粉草二味各五两

上先以生姜方切如绿豆样，石钵内略杵烂，入面再杵匀，摊作薄片，烈日中暴干，赤茯苓、粉草二味，细锉，同前姜、面片，或晒或焙，合研为末，每服一钱至二钱，新汲井水无时调服，或温热汤。

快　斑　饮

治瘖疮出不快。

麻黄去节存根，一两半，略以酒浸透一宿，焙干红色曲半两　薄桂去粗皮　甘草二味各三钱

上锉焙为末，每服一钱，用温白汤无时调服。

消暑清心饮

解伏热中暑，烦躁作渴，神气不清，及有惊搐，名暑风证，投之即效。

香薷去老梗　泽泻去粗皮，二味各一两　扁豆同上制　净黄连　羌活　猪苓去皮　厚朴同上制　白术　干葛　赤茯苓去皮　升麻　川芎十味各半两　甘草一两二钱

上件咬咀，每服二钱，水一盏，煎七分，无时带凉服。治暑风证，先投此剂得效，次服却暑丹，其搐不致再发。

定　喘　饮

治夹风痰喘气促，不拘冷热二证。

人参去芦　麻黄不去根节　防己去黑皮　诃子去核　半夏同上制　甘草六味各五钱

上件咬咀，每服二钱，水一盏，姜二片，煎七分，无时温服。

常　山　饮

治疟后单热不退。

常山　槟榔二味各二两　乌梅一两，和核

上前二味各锉片，各用醇醋酿一宿，常山炒干，榔槟晒干，仍同乌梅咬咀，每服二钱，水一盏，煎七分。热未发，先空心带凉服，仍忌鸡酒羊面生果毒物。有寒热经久不除者，加此剂于小柴胡汤或藿香饮内，同煎亦效。

消　毒　饮

解急惊风毒，赤紫丹瘤，壮热狂躁，睡卧不安，胸膈满闷，咽喉肿痛，九道有血妄行，及遍身疮疥。

牛蒡子六两　荆芥穗二两　甘草一两

上件咬咀，每服二钱，水一盏，煎七分，无时温服。

缩　砂　饮

和胃气，消宿食，及理腹痛，快膈调脾。

沉香一两　缩砂仁　乌药二味各二两　净香附四两　甘草炙，一两二钱

上除沉香不过火，余四味锉焙，仍同沉香研为细末，每服一钱，用温盐汤无时。调服，或空心烧盐汤调下亦好，及紫苏枣汤尤妙。

定　吐　饮

治吐逆投诸药不止，用此神效。

半夏同前制，咬咀如绿豆大，节去细末，二两　生姜净洗拭干，和皮，二两　薄桂去粗皮咬咀，三钱

上生姜切作小方块，如绿豆大，同前半夏和匀，入小铛内，慢火顺手炒令香熟带干，方下桂再炒匀，微有香气，以皮纸摊盛，地上出火毒候冷，略簸去黑焦末。每服二钱，水一盏，姜二片，煎七分，稍空心少与缓服。

万　安　饮

此剂能推陈致新，除邪辅正，和益脾胃，宣通气血，调顺饮食，疏解风寒，宁心化痰，去烦理热，不拘证在表里，并宜可投。常服

百病不生，贞元益固，补养诸虚，亦有验矣。此方与《宣明论》当归饮相类不远，治法最多，其药品之外，惟加枳壳、半夏。

人参去芦　当归酒洗　大黄生用　防风去芦　柴胡去芦　枳壳同前制　半夏同上制　芍药净洗　黄芩　甘草十味各一两　滑石末六两

上件咬咀，除滑石末临入和匀，每服二钱，水一盏，姜二片，煎七分，无时温服。或加枣一枚同煎。

金 饼 门

金　类

一 字 金

治初生婴孩一七之外，欲成脐风撮口，及卒中急惊慢风，牙关紧闭，痰涎上壅。

僵蚕去丝　威灵仙去芦，二味各四钱　明白矾生用，二钱　细辛去叶，一钱　甘草生用，二钱半

上件锉焙为末，每服一字至半钱，姜汁沸汤调和，以指抹入牙关内。治卒中急慢惊证，口噤不开，用盐梅汤调擦上下牙根二处。

一 匕 金

治痘疮黑陷，或变紫黯色，证在急危，但投此药，亦能顿苏而复红壮，则此剂又胜人齿散。若精神昏慢，口鼻气冷，不复救矣。

穿山甲同上制，五钱　红色曲炒　川乌一枚灰火中带焦炮，二味各二钱半

上研为末，入麝香半字，同在乳钵杵匀，每用一匕，用葱白浓煎汤调下，止投一服或二服。

一 抹 金

治遍身生疮，溃烂如糜梨，燥痛脓汁不干。

黎芦净洗焙　蛇床子去埃土　红丹火飞过，三味各五钱　硫黄　赤石脂　明白矾火飞过　五倍子去内虫屑　黄柏去粗皮，五味各二钱　轻粉五十贴

上前八味，或晒或焙为末，仍同轻粉在乳钵再杵匀，用生肥猪膏碎切，以瓦钵和药末烂杵，涂抹患处，或清油调搽亦可。

饼　类

香 橘 饼

治婴孩过伤乳食，或吐或泻，及病后虚中感积成痢，气弱神昏，面黄目慢。

南木香　陈橘皮去白　青皮去白，三味各二钱半　厚朴同上制，七钱　缩砂仁　神曲湿纸裹炮　麦芽净洗焙，三味各五钱　三棱炮锉三钱

上除木香不过火，余七味锉焙，仍同木香研为细末，炼蜜捻作饼子，如芡实大。

每服一饼至三饼，用枣汤化开，空心温服，米清汤亦可。

通 圣 饼

治大府闭涩，连日不通，满腹膨胀，气壅闷乱，服药罔效。

净黄连二钱　巴豆　生蒜一个　生盐半钱

上以黄连锉碎为末，同后三味石钵内烂杵，捻作饼子，寸半阔，贴脐，紧搓干艾，切作绿豆大五枚，作五次安脐间饼子上，以火灸之即通。

姜 豉 饼

治久因湿气中于膀胱，复为风邪客热攻激，小便不利，脐凸腹胀，食减作痛，先投解表散，后用此药贴之。

生姜一两，碎切　生葱五根　豆豉七钱，润者　生盐一钱　生蒜七个，碎切　酽糟一灯盏，无有糟酒代　穿山甲同上制，五钱

上件入石钵内同杵烂，捻作饼子，二寸阔，用微火炒热，带温贴脐上，外以绢帕兜住。如冷，依前法换带温者贴之，或再以火烘暖亦好。

拾　遗

香艾圆

此剂小儿常进，惊积自除，色泽殊异，手足肥健，脾胃调和，兼理男子妇人诸虚不足。生气血，暖中焦，固养精神，消进饮食，男子服之身体强壮，寒暑耐安，妇人投之百病不生，经脉通顺。

净香附一斤　干艾叶四两

上二味，瓦器盛，用醇醋浸经七日，于净锅内用火煮令醋尽，就炒干研为细末，仍用醋煮粳米粉为糊，入乳钵亭分杵匀，小儿圆如萝卜子，大人圆如梧桐子。每服三十圆至五十圆或七十圆，汤酒米饮随意送下，并不拘时。妇人血气素虚无生育者，加琥珀二两，同作圆服，极效，粒数汤使下法，亦依前，或用枣汤。

乌白圆

治五六岁以上小儿，头风苦痛，或一边作痛，及疔耳聤耳。

绵川乌汤浸润略炮去皮脐　草乌略炮去皮　川白芷　苍术如上制，四味各一两

上件锉焙为末，用生葱汁合面糊圆，绿豆大，慢火焙干，晴晒亦好，每服三十圆至五十圆或七十圆，食后临卧用温清茶送下。其葱汁法，用生葱不去根叶，入水同捣烂取汁。

既济解毒丹

治小儿中热，睡中咬牙，梦语惊悸不宁，或吐血溺血，强渴引饮，手足动摇，状似鬼祟，并宜投服。

净黄连五分　黄叶去粗皮　黄芩净者　大黄三味各二钱半　肉桂去粗皮　枳壳同上制　白茯苓去粗皮，三味各二钱　甘草生用，七钱

上除桂不过火，余七味锉焙，仍同桂为末，滴水乳钵内熟杵，圆绿豆大，带润以水飞朱砂末为衣阴干，每服三十圆至五十圆，用麦门冬熟水无时送下。吐血溺血，栀子仁煎汤下。儿小者，薄荷汤磨化投服。

轻粉散

治长成小儿，虫蛀牙疼，饮食不便。

轻粉　白矾生用　雄黄　红丹四味各一钱　麝香半字

上件入乳钵细杵为末，先用五倍子、鹤虱、生葱，煮水大半碗，候温灌漱令净，次以前末药一字或半钱擦患处，六七次即效。

独圣散

治婴孩满口白屑，或如粟谷，糜烂作痛，不能乳食，昼夜烦啼，此名鹅口证。

大北南星锉开，白者为佳，不拘多少

上件为末，炒一钱或二钱，醋蜜调涂囟门上，于中间留一小指大不涂，及傅男左女上足心，仍以立效饮温蜜水调点舌上，令其自化尤佳。

藿香托里散

治诸肿毒痈疽，已溃未溃者，及疔疮流注遍身，并内外一切黄证，恶心呕逆，憎寒壮热，昼夜疼痛，不拘老少，悉宜服之，此药非特解毒，大能正气理虚，祛风去烦，排脓活血、定痛消肿。

藿香　连翘　山栀仁　川当归酒洗　木通去节　芍药　僵蚕去丝　甘草八味各二钱半　大黄生用　茵陈　黄芪生用　贝母四味各五钱

上件咬咀，每服二钱，酒水各大半盏，煎八分。病在上食后温服，病在下食前温服。

拔毒散

治癫犬恶犬所伤，不拘老幼，并宜可投。

斑蝥七枚，去翅足，用屋瓦盛入糯米，同一处匀炒，候米黄为度，以乳钵细杵，罗过不用米　黑牵牛末二钱半，先晒研取末

上二味和匀，用无灰温酒调作一服，空心投。其毒自小便中出，或从大府过，似葡

葡肉或如犬形，见毒出尽，尚觉腹中有痛，取用青黛入乳钵杵匀，仍罗为末，每服三钱，井花水调下二服，不拘时。

神　应　散

治小儿大人虚嗽，神效。

罂粟壳去梗蒂，锉碎，蜜水炒　杏仁汤泡去皮尖，炒过　白胶香浮者水煮过滤干　人参去芦　阿胶锉碎炒过　麻黄去节存根　乌梅和核，五味各二两　桑白皮去粗皮，锉碎蜜水炒透　款冬花浮者，四味各一两　甘草炙，一两

上件咬咀，每服二钱，水大盏，姜三片，枣一枚，煎八分，空心温服，或不拘时。

凉　肺　散

治小儿大人一切实嗽。

桑白皮去粗皮，锉碎蜜水炒过，二两　桔梗锉炒　天花粉净者　干葛　麻黄不去根节　薄荷和梗　黄芩　杏仁不去皮尖　知母　贝母　木通去节，十味各一两　款冬花净者　麦门冬去心，二味各七钱半　甘草生用，一两八钱

上件咬咀，每服二钱，水大盏，姜三片，葱一根，煎八分，无时温服。如有热气促，加大黄制、枳壳各一两。

玄　明　粉

治肾水衰虚，肝经邪热，视物不明，或生障翳，脏肉攀睛，迎风泪出，或如蝇飞油星，或睛涩肿，痛养不可忍，并皆治之，及疗风热上壅，咽痛口疮，痰实咳嗽不活，悉宜加诸药内，自然作效。

明净朴硝

上于腊月霜雪凝寒之际，用皂荚三两重，略炮捶碎，温热汤六碗，挪去渣浸化，薄皮纸二重滤过澄清，入铁锅煮至一半，候温，倾出瓦盆内，于见天处露一宿，次早结块，再用净热水六碗化开，入大萝卜八两重，切作二分厚一片同煮，见萝卜熟为度，仍便在瓦盆去萝卜片，放在见天处露一宿，次日结块去水，取去滤干，入好皮纸袋盛，悬卦当风处，自然成粉，用以点眼，只如常法，治风热等疾，随意加减用之。

必　胜　散

治小儿大人，病中闻饮食药气，即恶心干呕，不能疗者。

川白芷不拘多少

上件锉晒或焙研为细末，抄一字及半钱于舌上，令其自化，或用掌心盛之，以舌舐咽。儿小者，温净汤浓调，少与含化，并不拘时，至六七次即效。

远　彻　膏

治大小府秘涩，投诸药无验，不拘老幼，并皆疗之。

穿山甲尾足上者佳，烧透，二钱重　五灵脂净者，二钱重

上二味研为细末，次以巴豆二钱重，去壳研碎，和前药末，仍用大蒜四钱重，去上粗皮三五层，于砂钵内烂杵如泥，圆作一饼纳脐中，以绢帕系之，外以掌心火上烘热，熨至八九次，闻腹中微响即通。

至　圣　散

治老幼暴吐，服药不止者神验。

枇杷叶净刷去叶后毛，锉碎，二两重　半夏咬咀，净者，四两重

上件用生姜四两重，切作绿豆大，拌匀酿一宿，慢火炒令微焦色，以皮纸盛于地上候冷，每服二钱，水一盏，煎七分，去渣，空心少与缓投。或入诸药内同煎服，亦效。

八　仙　饮

治小儿男子妇人，血风目疾，经久不瘥，昼夜涩痛，视物不明，甚至生翳散漫，投诸药未验者。

生干地黄净洗焙干　赤芍药　大川芎　羌

活　川当归尾酒洗焙干　龙胆草　汉防己　甘草八味各五钱

上件咬咀，每服二钱，水一盏，白蜜半匙，煎八分，去渣，食后临卧二时温服。

《活幼心书》终

跋　一

曾世荣《活幼新书》上中下三卷，上卷为决证诗赋，中卷为明本论并拾遗，下卷为信效方并拾遗。余向曾见此刻多阙失，故未收，后又收得一本，非此刻矣。适从五砚楼以医书一橱归海宁友人，余为之介，遂检得是书，中多缺叶，影钞别本补全，即所收之又一本，而非原刻也。重付装池，而识其缘起如此。

嘉庆辛未中秋前二日复翁丕烈识

跋　二

元本《活幼心书》三卷，每半叶十一行，每行二十一二字不等。盖至元甲午曾氏原刻全帙，艺风前辈所藏士礼居本也。德显出处无征，是书辨证详明，处方精审，允为仁人之言，自序备述渊源，极有心得。爰为重刻，以广流传。同《衡阳县志》及各家著录，多作《新书》，黄跋偶沿其误，《千顷堂书目》，光绪《湖南通志》，据抱经堂补元志，并作二卷，殆亦未见全书。明宣德庚戌有修补本，日本享保甲寅，曾为校刻，皆不及此本之善。因属翟君展成凤翔萧君伯丞延平再三雠校，改正良多，并附校记于后。其昭晰无疑者，不复赘列，庶后之君子，有所考焉。

宣统二年庚戌二月武昌柯逢时

《活幼心书校》记

决证诗赋卷上

吴序　善状状原作壮　反激他证反原作及　成效之速成原作盛，速下原有者字

决证诗六论　因有薄荷原文恐误，下文有皮嫩皮厚之说，或系皮有薄厚之讹　皮嫩嫩原作濈　不言之疾乎乎原作耳

诗七论　盖周岁以前盖原作尽　疏涤积聚涤原作条

诗十九　扬睛原作杨睛

诗五十一　风痰结聚风痰原作冷热，据明本论咳嗽十一改

诗五十六　风湿湿原作温

诗七十一　暑湿湿原作温

赋七十五　肾有证攻肾原，作轻，怨咨咨原作恣，晋代叔和代原作伏

明本论卷中

胎寒一　庶渐瘥也渐原作垒

夜啼四　遏热镇心遏原作遇

急惊五　目睛原作日晴，如怒怒原作怒，匀气散止补匀原作钩

慢惊六　惟载阴痫载原作戴，不可治也治原作洽

风毒七　营化营疑作熔但依前依原作攸

伤积八　风寒所袭袭原作警

热证九　面惨惨原作惨，恰五百一十二日恰原作恰日原作月，腹疼呕吐腹原作肠，中指独自冷原中指毒作独冷，遇晚二发二疑误

伤寒十　音音省省原作肩，间以无惊圆间原作问圆，本书丸多作圆仍沿宋槧嫌名之例惟多错出今一律改圆，遽然出外遽原作据正气将衰正气二字增，百骸骸原作骇

咳嗽十一　癖块原作顽块

吐泻十二　详究治法究原作丸养宗筋宗原作宫

诸吐十三　其吐自灭灭原作咸

诸泻十四　素弱素原作索，化癖圆癖原作病，粳米粳原作占，案粳应作杭稻，不黏者以下照改，粪稠粪原作姜，赤白痢十五　亦效效原作故

肿证十六　施治施原作于，两肋肋原作协，鸭溏溏原作塘，手足背皆肿背原作皆，其肿如初其原作甚

脱肛十九　风属木木原作末

痈证二十　七情所汩汩原作泪

疟疾二十一　间日而作间原作开，匀气散止补匀原作白，加草果果原作菜，为医为父母者者在医原字下

疮疹二十六　发之亦少之字原作而，导赤葛散导字当衍，为其药性药原作乐，异功散功原作攻，噎脐脐原作剂，蚊蚤蚊原作蚊，病必致危病原作痈

阴囊肿二十七　纵弛原作弛张，感风湿湿原作温

惊瘫鹤膝二十八　间服排风汤间原作问

五淋三十　而为溲溲原作瘦，名曰阴闭闭原作问，姜豉饼豉原作鼓

口疮三十三　唇弦弦原作垓

诸疮三十四　及三解散及原作乃，木通散间服间原作虽

目疾三十五　红弦弦原作垓

重舌三十七　卷音捲原作卷音捲，札针札原作扎

五软三十八　邯音报原作邯，音昂

诸汗三十九　惊汗汗原作肝

黄证四十　两目弦弦原作垓

辨药病不相主对二　所传药性传原作恃

评非时用附子大黄四　侯自牧侯原作候，下同，惟杨侯二家原作侯

信效方卷下

目录　使君子圆圆原作丸，以下同，今改一律

拾遗目录凡十四原无今补

白芍药汤十　脐下痛脐原作剂

六和汤三十三　水一钟钟原作中

黄芪六一汤三十四　口扬扬原作锡，甘草一两一原缺

坎离汤三十七　甘草无分数，或下二味，当是三昧

化丹汤四十　石膏末无分数，薄桂下注入味各五钱当移此

雄黄散六　川乌头此叶钞补作川芎　按下重川芎，据幼科准绳引改乌头

泻黄散二十七　微炒香炒原作妙，据钱氏《直诀》改

调元散二十八　手足如瘸瘸原作简

霹雳散五十　白芷三味各二钱原作二味，据《准绳》改

麝香人齿散五十六　入肾肾原作胃

补肾地黄圆九　取皮为用用原作则

香陆胃苓圆十一　此药药原作兹

二姜圆十二　就带润带原作滞

没石子圆十三　肉豆蔻一枚一原刻模糊

二圣圆二十二　逐水逐原作遂

地黄膏三　纳口内纳原作纸

乌豉膏六　痄腮原作诈腮

劫风膏十四劫原作方，据目录改

宽热饮十一　见微黄色，去巴豆片原作见微去黄色法巴豆片

白附子饮二十六　白附饮共十味原注五味各二钱，兹《据幼科准绳》去五味二字

拾遗

轻粉散四　五倍子倍原作部

藿香托裹散六托原作柘，当作托

拔毒散七　犬形形原作刑

玄明粉十　蝇飞飞原作肾，据《类方准绳》改

幼科直言

〔清〕 孟介石 编著

《幼科直言》提要

清·孟河著。河字介石，江宁人。雍正四年刻成，首论痘症各证，次论痧疹及证治各方，次论小儿有病看三关虎口，小儿始生变蒸，小儿脉法、望色、呕吐、泄泻、急慢惊、五疳、痞疾、痢、疟、中暑、五疸、伤寒、腹痛、头痛、眼病、奶癣疮、疝气、肿胀、喘、汗、吐血、蠹子痨、龟胸、龟背、吐虫、解虫、鼻衄、口疮、垫舌、马牙、齿血耳聋、赤游风、疥疮、风疹、疙瘩、溺血、淋疾、孟氏庭训，末附败毒良方、易产良方及一切杂方，附论脉直指，送方送药说，以浅显之文，达幽深之理，虽村翁老妪，亦能读之。曰直言者，以直言无隐，简而不繁，质而不华，介乎浅深之间，状难明之症，传经验之方，按其方而治病，百无一失，足使举世之稚儿无夭枉之患。亟为重刊，传之后世。

孙　叙

雍正乙巳，予奉命视学安徽，署在姑孰，与金陵密迩。丙子春予幼子疾，几殆，延医于金陵，而东山孟年兄，竟不我弃而肯来焉。东山之先人，世以医名家，而东山业儒，遂于儒而兼医，故其医尤邃。计日程效，不爽时刻，虽古之和缓，不是过也。暇日出其先人介石公所著《幼科直言》，予读之而肃然起敬焉。夫医道不易，而幼科尤难。凡视病者，望闻问切，小儿不能言而脉易变，不可问而切也。故其症难明，脏腑皆弱，不胜诸毒，故其药难用。而天下之为幼科者，类皆村翁老妪，不能精通文义，故其书亦难著。浅言之而不详，深言之而不解。以不精通文义之人，读不详不解之书，以临难明之症，而用难用之药。如是而望其有效，必无冀矣。孟氏有忧之，故与之直言。简而不繁，质而不华，介乎深浅之间，其言易晓，而未尝不详。其理甚备，而尽人可解。状难明之症，传经验之方，虽村翁老妪读之，而皆能豁然有悟。按其方以治症，百不失一焉。是不啻汲上池之水，遍饮天下之人，皆可以为鹊佗和缓，将天下之孤幼得遂长，而老耆可以无悲，其为德岂有既哉？东山之重刊是书而广之也，可谓善继先志而能仁天下者矣，故为序。

时雍正四年仲秋朔旦安徽督学使者合河孙嘉淦书于姑孰署中

送方送药说

凡送方送药者，必先求其无害，而后求其有效，始称完全功德。如小儿奶癣疮方，传者甚众，搽上即愈，其后遗害不小，可不慎乎？故方必始终无害，乃可流传。若一概施之，功小害大，误人不浅，即如吐血虚弱等症，亦不可概施于人，恐阳脏阴脏不同，虚实各异，倘一错传，为害尤甚。至害眼生疮药物，种种不同，误事亦多，皆宜慎之。其方内药料太贵者，不宜用，恐贫乏者无力取买，或路僻取药不便，妄为改换，反致有误，高明者幸酌量之。

《幼科直言》目录

卷一　痘症

总论…… 763
发热…… 763
见点…… 763
部位…… 763
颜色…… 764
神情…… 764
惊…… 764
恶心作呕…… 764
口渴…… 764
呛…… 764
烦躁…… 764
喘凑…… 765
咬牙…… 765
寒战…… 765
吐虫解虫…… 765
吐血鼻血便血撒血…… 765
喷嚏…… 765
腹痛…… 765
腰痛…… 765
身痛…… 765
肿…… 765
唇肿…… 765
舌…… 765
齿…… 766
眼目赤红…… 766
鼻…… 766
汗…… 766
胃口…… 766
泄泻并便结…… 766
痢疾…… 766
小便…… 766
贼痘…… 766
聚痘…… 766
起泡…… 766
报痘…… 767
封眼…… 767
抓破…… 767
灌浆…… 767
停浆不收…… 767
皮薄痘…… 767
结痂…… 767
夹痧疹…… 768
夹斑…… 768
痘后生疮…… 768
痘后生毒…… 768
贴痘毒膏药…… 768
痘后作肿…… 768
痘疔…… 769
孕妇出痘…… 769
目翳…… 769

卷二

顺症痘方…… 770
险症痘方…… 770
逆症论…… 772
闭症论…… 772
痘症用药大概加减…… 772
痘症必用方…… 772
十全大补汤 …… 772
四君子汤 …… 772
六君子汤 …… 772
独参汤 …… 773
当归养血汤 …… 773
神功散 …… 773
竹叶石膏汤 …… 773
黄连解毒汤 …… 773
加味消遥散 …… 773
润肠丸 …… 773

抱龙丸 …… 773
犀角解毒丸 …… 773
补脾肥儿丸 …… 773
参苓白术散 …… 774
六一散 …… 774
猪肝散 …… 774
护眼方 …… 774
金汁 …… 774
人粪灰 …… 774
痘落痂后洗浴方 …… 774
稀痘说 …… 774
水痘辨 …… 774
总论 …… 775
发表药说 …… 775
论医 …… 776
忌触犯 …… 776
用灯看痘 …… 776
芜荑观音柳洗浴 …… 776
食物类 …… 776
药引说 …… 776
卷三　疹症
总论 …… 777
疹症方 …… 778
疹症用药大概加减 …… 779
补遗二则 …… 780
募施治疹要方 …… 780
卷四
小儿有病看虎口三关 …… 782
经纹歌 …… 782
小儿初受气论 …… 782
小儿始生变蒸 …… 782
小儿脉法 …… 783
持脉三要 …… 783
脉象纲领图 …… 783
望色 …… 783
呕吐 …… 783
泄泻 …… 784
急惊 …… 785
慢惊 …… 786
五疳 …… 786
痞疾 …… 787
痢疾 …… 788
疟疾 …… 789
中暑 …… 791
五痘 …… 791
卷五
伤寒 …… 793
伤寒咳嗽 …… 794
腹痛 …… 795
头痛 …… 795
霍乱 …… 795
眼症 …… 796
小儿奶癣疮症 …… 796
疝气 …… 796
肿症 …… 797
胀症 …… 797
出汗 …… 797
喘症 …… 798
童子痨 …… 798
吐血 …… 799
龟胸龟背 …… 799
中湿 …… 800
吐虫解虫 …… 800
鼻衄 …… 801
发热 …… 801
口疮 …… 802
垫舌马牙 …… 802
头晕 …… 802
耳聋 …… 802
齿缝出血 …… 803
丹瘤 …… 803
胃脘疼 …… 803
气疼 …… 803
疥疮脓窠疮 …… 803
风疹疙瘩 …… 803
便血 …… 803
小便撒血 …… 805
淋疾 …… 805

胎疾…… 806
伤食…… 806
附刻孟氏庭训…… 807
果报四则…… 807

卷六　杂症

败毒良方…… 808
易产良方…… 808
蛇丹疮…… 808
蜘蛛疮…… 808
火汤伤患…… 808
天泡疮…… 808
腿上生血风疮…… 808
男妇水臌肿胀效方…… 808
小肠气膀胱胀痛…… 809
鼻衄方补…… 809
乳蛾…… 809
募施夏秋泡汤正气散…… 809
中风…… 810
勿药…… 810
痘毒痘疔膏…… 811
小儿脱肛不收…… 811
滋肾种子丸…… 811
调经养荣种子丸…… 811
白虎痨节疯…… 812
痔疮经验良方…… 812
治男妇小儿颈上瘰疬方…… 812
治小儿不出痘经验良方…… 812
治痘风眼经验良方…… 813
治小儿痰核肿硬良方…… 813
发背勿药良方…… 813
杂症验方…… 813
颈项对口毒良方…… 813
久痢不止方…… 813
又方亦治久痢…… 813
吞黑豆良方…… 813
痔疮良方…… 814
壁蟢伤人方…… 814
治妇人儿风…… 814
治刺良方…… 814
洗浴瘫痪勿药良方…… 814
贴颈项瘰疬第一神效膏…… 814
药方…… 814
便血日久良方…… 814
用药必分阴脏阳脏说…… 815
敷毒验方…… 815
心口疼方…… 815
治中风口眼歪斜…… 815
大麻风癞疾…… 815
膈食病方…… 815
受蛊毒…… 815
华仙人稀痘良方…… 815
又稀痘方…… 815
跌打刀伤方…… 816
去竹柴鱼刺方…… 816
鹅掌风神效方…… 816
汤火伤患…… 816
治一切肿毒疼痛难忍者…… 816

论脉直指

脉之理甚微，凡看病须知望闻问切，望者望其颜色，闻者闻其声音，问者问其致病之根由，切者切其脉之表里虚实。但遇病必先明告医家，而后切脉，庶不有误。病犯重症而脉乃现，或雀啄，或虾游，或沸汤，或有或无，皆不治之症。至于寻常病症，恐未必尽准也，必病家详说，始知端的。

病有受暑似寒者，亦有虚弱似实者，用药有宜凉宜温者，且有阴脏阳脏之不同。至于真伤寒，乃冬月受之。而逢春末夏初发者，方为确耳。余月发者，不过类伤寒。今之医家，无论表里虚实，一见发热，即云伤寒慢寒，又云传何经络，或云结胸，或云漏底，用药回阳，况慢寒之说，古书从无一慢字，种种谬论误人不浅。凡遇病症，万不可草率，务须用心辨别。

阳脏误用暖药则害，阴脏误用寒凉则损。

症候有宜饿者，有不宜饿者，有当行而不行者，有当补而不补者，有宜清凉者，有宜温补者，有虽病而不须药者，有宜攻伐者，有宜安守者。有一种病家，急欲求好，医家又图速效，两家相急，而致于坏者。此等不可不知。

幼科直言　卷一

清　江宁　孟　河介石编著
四明　曹赤电炳章校点

痘　症

总　论

夫小儿禀天地阴阳之气以有生，受父精母血以成形。此一定之理也。然父精母血，皆有形之物。有形即有渣滓，渣滓即毒气也。感气深入脏腑。出胎之后，感岁气而出痘，痘即渣滓也，渣滓即浊气也。浊气轻者毒亦轻，浊气重者毒亦重。出痘者，乃发出浊气也。因感岁气，运动气血而发。毒气有浅深，而气血有虚实之不等耳。故察痘必在颜色鲜明，桃花色者，毒轻，顺候也。胭脂色者，毒深，险候也。紫黑色者，毒重，逆候也。毒气深入脏腑，激搏而喘促，不能透出者，即闭症也，岂泛常疮毒之可比者哉。痘粒尖耸而稀者为上，顶平者为中，平陷而不起者为逆。成片者为凶，密而分根颗者为险。大约看痘，必看颜色，分根颗，热透三日而出者为吉，热一二日而出者，为夹热，为险。看痘必见症多，用药必传授真，见症多者，始终能辩吉凶。传授真者，用药庶无杂乱，岂可轻视，而即妄为医也耶？

发　热

外热三日见点者，为吉。外热一二日见点者，为险为逆。亦有热数日而不出，复又发一二日热而出者，此症尤吉。其热之轻者毒亦轻，热之烈者毒亦烈。

人身有上、中、下三焦，发热三日，则气血通畅，故云吉，出痘以热退为齐。若外热不退，不可定其为齐。

见　点

一见而即高大，颗粒滚圆者为吉，见而稠密碎小者，为险为逆。

部　位

从唇而出者为吉，唇属脾，乃进饮食之关，有生气常存焉，故吉。从额而出者，为

部位吉凶图



险，额属肾，谓之冷脏。皮肉之外，又属心

火。头面为诸阳聚会之处，如痘多者，又为朦头，为险候也。从咽喉而出者，乃进水谷关窍之处，谓之锁喉，为大险候也。从两颐而出者，乃气血融化之处为吉。胸腹稠密者，诸阳受气之地，乃心肺之宫，痘多者，谓之缦胸，为险。从耳骨而出者属肾，为险候也。先见于手足心四肢者为吉。先见于下部两胯当内，乃盛血之处，为吉。见于两胯外而密者亦险。俗云：以脚底心见之，方为出齐，不准之说也。

一说看耳后有红纹，横贯耳边者，男左女右，为必出痘之兆，亦不足准信。

颜　色

色如桃花，华彩可爱者，乃毒气轻，而血脉荣和为吉。色深红而亮者，乃血热之故，亦为吉论。其色鲜明，痘虽多而始终可愈。其色深紫，颗粒大而稀者，亦为可治。若深红紫色，而颜色不暗，且高起者，亦为可治。

一种痘密而平，其色亦如水喷桃花，此气虚毒漫，凶候也。色紫而痘平，平而不圆，且密者，凶候也。色紫黑而暗，兼之不起，凶候也。色如银朱而密，此肺胃毒盛，凶候也。面青，指甲皆青，乃毒阴伏于内，重候也。

神　情

痘症前后，神情如旧者为吉。见苗之时，神情微倦，或时呵欠，身体潮润，或有微汗。此亦吉兆也。如初起时，眼目无神，面皮浑色，神情不安，或时狂叫，肚腹搅痛，为逆症也。

痘未见形时起惊者，为吉。惊属心，乃热逼心经之故，心不染邪，出痘故轻。古云：惊之轻者痘亦轻，惊之重者痘亦重。而惊痘之吉者居多。但痘后即不宜惊，此又毒盛气虚所致，故不吉也。

恶心作呕

痘见时，恶心作呕，呕之有声者。恶声也。上犯清道之故，险症也。经云：弦败者，声必嘶。木陈者，叶必落。脏败者，声必哕。此之谓也。又有口角流涎，乃毒犯于胃，亦为险症。

灌浆并回时，作干呕者，因灌浆未足，乃馀毒复归于脾胃，呕之轻者为险，呕之重者为逆。然呕吐之症，有伤冷物者，有受寒气者，亦有禀赋元气弱者，必分胃寒胃热而施治。有馀毒者，用解毒之药，此时大约以痘痂润色为吉。

痘浆出时，有肿大吐大泻而后见点者，不在干呕者论，乃毒气宣畅之故，为顺症也。

口　渴

作渴者，乃热气攻胃，渴之轻重，痘之轻重，灌浆时，或收靥时，或因泄泻而作渴者，或伤乳食而作渴者，或因服燥补药而作渴者，与前作渴，又不同也。烦躁作渴，用麦冬、黄芩、花粉之类，饮食作渴，用山查、桔梗、陈皮之类，泄泻虚寒作渴，用四君子汤等类。

呛

痘之前后作呛者，皆内毒薰灼于上也。呛之轻重，痘之轻重，有因喉干而呛，有因喉内有痘而呛者。若吃干物而不呛，吃稀物而呛者，喉内有痘也。声哑而作呛者，此症必重。

烦　躁

痘之烦躁，毒盛也。然亦看躁之轻重，以定痘之轻重。

喘　凑

痘之前后喘凑者，皆毒逆于肺，大不相宜者也。服解毒药而随愈者，或可医治。仍喘者，坏之甚速。古云：诸喘皆为恶故耳。

咬　牙

在灌浆之时，乃气虚留毒于胃，故有是症。若在初起见苗之时，当作有惊有热论。

寒　战

灌浆之时，脏腑精脉，俱逼出于外，空则生风，内不实而外摇动，此虚症也。若在初起见点之时，乃风热激搏而战也，又非虚论。

吐虫解虫

初起时吐虫者，热毒上攻，虫随而出，此重症也。解虫乃大肠之热，蒸逼而出者，宜清凉药治之，大约吐者重而解者轻。若在贯浆收靥落痂之时，乃脾虚有热，用药以扶脾胃为主，或量加乌梅一二可也。

吐血鼻血便血撒血

口鼻出血，乃毒气归于肺胃，前后皆凶候也。元气实者，用竹叶石膏汤。元气虚者，用六味地黄汤。若毒气流于大肠则便血，流于小肠则撒血，用竹叶石膏汤。

喷　嚏

痘之喷嚏，与瘄不同。如过于喷嚏，即头面稠密，此风热行于上，痘欲达于外也。结痂时而喷嚏者，又在感风感热论。

腹　痛

痘初起时，腹痛带呕者，毒盛也。痛之轻重，痘之轻重。灌浆时而腹痛者，有伤食与毒气归内之不同，须在临时细辨，随症施治，大约以清毒化气为主。

腰　痛

痛于痘初起时，乃肾经有毒，凶候也，肾属冷脏，出痘最难现形故耳。

身　痛

痘将见苗身痛者，毒盛之故。灌浆时而身痛者，乃痘浆激搏而痛，此症为轻。

肿

痘初起时，头面身体作肿胀，皆凶候也。耳肿腮肿。皆内热也。喉肿者，凶候也。灌浆时，痘肿而皮肤不肿者为顺，痘肉皆肿者为险。皮肤作肿而痘不肿，则毒盛凶候矣。结痂后，身体作肿，又系脾虚，余毒漫肿，与前作肿不同。

唇　肿

出痘唇肿，或起黄衣，乃毒攻脾胃，为重症。服药随消者，或可得生。灌浆时作肿者，则险候也。

舌

舌红或有黄胎者，热盛也。色照常者为吉，伸缩如常者为吉，舌强而挛者为凶。弄舌者为热，舌如黑墨者为凶，宜用解毒清热之药。

齿

齿痛属胃热，齿缝出血者，毒盛也。即妨痘后牙疳等症，宜服竹叶石膏汤。

眼目赤红

毒气熏蒸于肺，则眼目赤红。轻者随药而愈，重者 即防痘后生翳。若痘一见眼外胞即作肿者，乃毒盛险候也，药宜清肺解毒。

鼻

鼻孔干黑者为凶，润而有涕者为吉。干黑者，脾经热盛之故，鼻孔掀而气凑者，尤重用。

清肺饮

桑皮　贝母　桔梗　苏子　柴胡　薄荷　陈皮　甘草有毒盛而气凑者加黄连石膏

汗

痘初起时，微汗则吉，或见苗时，一汗而外热全退者亦吉。灌浆时，忽大汗如水，汗多伤表，即损真气，致痘变色，惨白者，此重症也。补中益气汤内倍加黄芪治之。

胃口

痘初起时，胃口如旧者为吉，不喜食者亦无妨。带干呕者即重。灌浆时，即宜甜进饮食，不食者重，带干呕者尤重。一种虽能食，慌张强吞，觉不自然。亦不可言轻。结痂后作呕哕者，毒气反归之故。亦有受冷寒而呕者，当分别治之。

泄泻并结燥

痘前作泻，毒随利减，此吉兆也。泻黄红色者属热，便结者亦属热盛。灌浆时泄泻乃脾虚，或伤于药，或伤饮食汤水。白色者，作脾胃虚寒论，红黄者，作热论。

痢疾

痘之前后，有红白痢疾者，看其元气虚实，量加清热之药。纯红者，单属热论，黄连等味为是。起长与灌浆之时而痢疾者，只可清热，不可分利，分利则痘不长不贯矣。痘后痢疾，乃脾虚，余毒流入大肠，宜清热健脾，量加分利一二味可也。

小便

小便赤红色，或涩痛者，皆热盛也。虽频频而出，出而少者，亦属热论。

贼痘

贼痘，乃毒盛所致，痘出三四朝，其痘有先灌黄脓者是，必用银针挑破，以油胭脂涂之，紫草末亦可。但看贼痘，须认真方妙，若将正痘妄行挑破，则误事矣。

聚痘

身原有疮疤，出痘多攻其处，而成攒聚者，此症为轻。一种痘见点三四日，每三五粒一攒者，形如蜘蛛疮，名为聚痘。若周身皆是，则为毒盛大险。

起泡

有痘成空泡者，有皮肤成泡者，皆毒盛

凶候也。亦有灌浆时，其痘发如空泡，而鼓起者，若皮厚而实，亦在可治之例。临症分别，不可尽弃。

报 痘

未发热之先，即现一二痘。其粒甚大，一名痘母。过数日后，又复发热，方现周身。此痘先出唇上者为吉，出于头上，脊背上者，为险为逆。因内热之极，故先报出，亦必看后出之痘，方可定其吉凶。

封 眼

毒之轻者，痘之稀者，自不封眼，毒之重者，痘之密者，肿起者，灌浆时自是封眼。结痂时，开眼为正。若浆期未足，封而忽开者，此浆不足而虚也。服补剂而复封者，亦为可治。一种毒盛而痘色干紫，不能封眼者，凶症也。大约色干而紫，虽封眼亦为难治也。一种未到长期，眼胞肿而封眼者，此毒盛所致，凶候也。

抓 破

灌浆时，有血热而抓破者，若流脓血即无妨，抓破干而无血者，乃毒盛不能化血成浆，此重症也。抓破而脓水烂皮者，以松花粉搽之，或用荞麦粉搽者，或用干牛粪烧灰，为细末搽者，皆妙方也。

一种抓破，而内生蛆虫者，若能进饮食，不勉强，亦可治。

一种自溃，而无臭气，或疮烂破而无生色者，为倒靥，不治之症也。

灌 浆

毒轻痘稀，出齐三日，长足三日，第六朝时，乃顺序灌浆之期，九日后，乃收靥之期，此顺症也。至于火症，色红而干，必大败毒清凉，待七八朝，方得有浆意，不可以顺症之日期定也。色白气虚者，必服助浆补剂。方得渐生清浆，徐徐成脓，亦不可以顺症之日期定也。临症细察，贵在变通。

一种七酿痘，又名七朝痘，乃长贯收靥，俱在七日之内，此乃毒气最轻，而痘粒最稀者，为大顺症也。

一种痘虽稀，而灌浆亦满，但色如竹叶者，此毒最重盛，不可不知。

一种痘，灌浆如饭色者，吉症也。

停浆不收

痘在十二朝，色如冷粥皮，竟不结痂，乃气虚不能运毒，此症甚重。药宜健脾胃，服四君子、六君子汤，而转动者可治，不然则难愈矣。

皮 薄 痘

痘皮薄而浆清，不应回时而先回者，若能进饮食，不作干呕，则无妨。不然，则为毒气归内论。盖气弱而内毒盛，故有此症。不可以七朝痘论之，又不在倒靥之论，须临症细心辨察。

结 痂

痘在九日后，渐渐收靥，其痂如油而润，如苍蜡色者，此顺症也。有抓破而成脓水，复又结痂者，此险中之顺也。

痂色干而皮肤白者，虽回时亦有性命之忧。盖痂干而无润色，为血少，皮肤白，为气不足故耳。

结痂之期，最不宜腹胀气凑，乃余毒入内之故。胀之轻者可治，胀而气凑不食者难治。若兼恶心，馀毒在胃也，皆为重症。

结痂时发热者，乃蒸痂热，听其自愈，不

必治之。亦看热之轻重，毒之轻重，不可皆泥为蒸痫也。亦有外感发热者，须留神治之。如或鼻流清涕，带微咳，鼻气不利，即外感热也。此时既不可发散，又不可清凉，忌酸敛之物可也。灌浆时发热，亦如是看之亦如是治之。

落痂后而疤凹，其色白如纸者，乃气虚血少，宜服补中益气汤。无杂症者可治，有杂症者难痊。

落痂后，疤色红润而凸者，为气实，正道也。若色太红者，用银花解毒汤。

落痂后，精神照旧，饮食如常者为吉。若精神惫倦，饮食不甜，亦重症也。

夹痧疹

夹痧疹，乃肺经之热。痘初起时，与落痂时夹之者轻，灌浆时夹之者重。见而随退者吉，久留者凶，盖灌浆时夹之重者，因用温补助浆面不可补，用清凉退痧而不可逆，有碍于必用药之时故耳。

清痧散

连翘　牛蒡子　黄芩　防风　荆芥　桔梗　归尾　陈皮　甘草

白水煎，痧色红紫者，石膏亦可加入。

夹斑

痘之夹斑，百不救一。有红、有紫、有青、有黑，大小不一，皆毒盛而气血不行，激烈面生。色红者，服药随散，或可医治。久留不退，为凶候也。

化斑汤

石膏　红花　连翘　荆芥　生地　黄芩　陈皮　甘草　归尾

白水煎，或加黄连、竹叶。

痘后生疮

痘后余毒生脓疥等疮者，银花解毒汤。脾虚者，服补脾肥儿丸。

痘后生毒

痘落痂后，余毒归内，或生毒者，治法看其元气虚实。痘后余毒，多肿于曲腕之间，有溃者，有消者，用药解毒健脾，宜服。

解毒固本汤

生地　丹皮　白芍酒炒　黄芩酒炒　连翘　当归　贝母　银花　陈皮　甘草

白水煎。

痘毒肿硬，人之面色青白、瘦弱，宜服

补元化毒散

生黄芪　白术土炒　白茯苓　苡仁　当归　扁豆　银花　山药　僵蚕酒炒　甘草　白芍炒　陈皮

白水煎。

贴痘毒膏药

用扁柏叶，麻油熬，去渣成膏，摊贴患处。药内或加黄蜡、黄丹少许。

痘后作肿

痘后周身作肿者，乃元气虚弱，而有余毒，有兼腹胀而喘者，难治。宜服

补脾解毒饮

苡仁　当归　扁豆　僵蚕　黄芩　川贝母　陈皮　白芍酒炒　银花　甘草　牛蒡子

白水煎。

痘　疔

痘之先有紫色，后因毒攻而成疔，生于喉间腹间为重，疔之多者亦重。其形似螺蛳盖，必挑破，多贴灵药膏药，此时虽败毒，又须补脾胃。宜服

银花解毒汤

僵蚕　连翘　银花　黄芩　丹皮　生黄芪　苡仁　白芍酒炒　陈皮　甘草

白水煎。

孕妇出痘

孕妇出痘，用药前后与小儿同，惟忌用山查、紫草、玄明粉、苡仁、牛膝、红花等味。至灌浆时，药内酌加阿胶，酒炒续断可也。若因出痘而落胎者，宜用四物汤，或八物汤调养血气为主。若汗多，即倍加黄芪。

四物汤加四君子即八物汤

熟地　白芍炒　当归　川芎

白水煎。

目　翳

结痂后，开眼之时，眼白作红，内有翳膜，乃热气熏蒸肝肺而成。宜服兔粪丸，或服清肝退翳散。若痘伤瞳人，即不易治。

兔粪丸

兔粪四两

为细末，炼蜜成丸，每丸重一钱，每日午间，白滚水服一丸，以愈为度。

清肝退翳散

生地一钱　丹皮六分　桑皮八分　谷精草八分　黄芩六分　陈皮四分　甘草五分　车前子六分　青葙子六分

白水煎，或加白芍，当归。

口疮并牙疳，宜服

滋阴解毒汤

僵蚕　扁豆　山药　桔梗　陈皮　生黄芪　当归　黄连土炒　白芍酒炒　甘草

白水煎。

搽药方

人中白五钱，火煅　铜绿半分　枯矾半分　牛黄一分　冰片半分　儿茶四分

共为细末，徐徐搽之。

幼科直言　卷二

清　江宁　孟　河介石编著
四明　曹赤电炳章校点

顺症痘方

顺症者，颗粒稀朗，颜色红润，长灌如期。盖先天所感之胎毒轻，而后天之气血和故耳。若此者，可不必服药，后方六首，存而应便可也。

发热，看岁气时行，防其出痘，未见点，疑似之间，用

葛根解肌汤

干葛　防风　桔梗　前胡　薄荷　山查肉　陈皮　甘草

白水煎。

见点一朝二朝，用

松肌透表汤

羌活　干葛　红花　荆芥　连翘　山查肉　牛蒡子　蝉退　陈皮　甘草

荸荠为引，白水煎亦可。

见点三朝出齐之日，用

活血解毒透肌汤

黄芩　川芎　防风　荆芥　红花　山查肉　连翘　牛蒡子

荸荠为引，白水煎亦可。

痘见四朝五朝，长足之期，用

助长解毒汤

当归　紫草　桔梗　牛蒡子　连翘　黄芩　花粉　陈皮　甘草

白水煎。

痘见六七八九朝，用

行血助浆汤

黄芪　防风　丹皮　当归　桔梗　僵蚕　川芎　连翘　陈皮　甘草

糯米一钱。

痘见十朝，十一二三朝，结痂收靥，用

固元解毒汤

当归　银花　苡仁　白茯苓　丹皮　扁豆炒　连翘　桔梗　黄芩　陈皮　山查肉　甘草

白水煎。

险症痘方

险之一字，可死可生，有中变而为逆，中变而为顺故耳。用药当者，救其险也。用药不当，则险变为逆矣。初起时，属火症者，灌浆时或转为虚寒者，变症不一，故名曰险。

险症发热，或一日二日，即见点者，一名夹热。或外热盛，而兼作烦。用

加味松肌透表汤

连翘　牛蒡子　山查肉　羌活　干葛　紫草　升麻少许　黄芩　桔梗　陈皮　甘草

荸荠为引。

险症见点三朝，出齐之日，色红口干，用

加味活血透肌解毒汤

玄参　黄芩　川芎　红花　连翘　山查肉　花粉　石膏　归尾　桔梗　牛蒡子　陈皮　甘草

荸荠为引。

险症在四朝五朝长期。用

化毒成浆汤

连翘　紫草　归尾　桔梗　石膏　牛蒡子　黄芩　生地　知母　陈皮　甘草

白水煎。

险症在六七八九朝，毒气盛而颜色干红者，用

加味行血助浆汤

黄芪　防风　当归　丹皮　僵蚕　桔便　连翘　牛蒡子

糯米二钱。

险症结痂，十朝十一二三朝，用

金银解毒汤

金银花　川贝母　黄芩　连翘　僵蚕　苡仁　当归　扁豆　陈皮　甘草

白水煎。

险症结痂收靥后，用

健脾解毒汤

白术　苡仁　扁豆炒　银花　连翘　丹皮　当归　陈皮　川贝母　甘草

白水煎。

险症结痂之时，大便泄泻者，用

白术健脾饮

白术炒　白芍炒　扁豆炒　苡仁　白茯苓　神曲炒　甘草　陈皮　车前子

泻黄色者，加炒黄芩。泻红色者，加炒黄连。泻白色，或如水者，加木香、莲米、肉桂、黄芪。

前顺险二症之方，不过循其日期大概之药。其痘必始终看颜色，分轻重，元气虚实，毒气浅深，用药宜表宜凉，宜温宜补，量其轻重加减可也。

痘初见一二日内，颜色红紫，浑无彩色，此热盛之极，前险症松肌透表汤内，加紫草、石膏、生地、黄连。若大便不通而烦乱者，即加大黄。

一种痘出齐，三四五日内，颜色干红，大便不通，前险症活血透肌汤内，量加大黄、玄明粉，或入化毒成浆汤内亦可。

一种火症，前曾用凉血解毒之药，毒气稍退，颜色少淡，在六七八九朝，当用

保元托脓散

黄芪　当归　僵蚕　白芍炒　防风　丹皮　桔梗　陈皮　甘草　糯米

七八九朝，如泄泻，寒战咬牙，浆清，痘壳不鼓，当用

补中益气汤

人参　黄芪　白术炒　归身　升麻　柴胡　陈皮　甘草

引用煨姜一片，大枣一枚，糯米二钱。

痘或色白浆清，虚寒之甚者，用

加味保元汤

人参　黄芪　白术炒　白芍炒　肉桂　甘草　糯米

痘症气弱脾虚，十二三朝无杂症者，当用

和中健脾汤

白术炒　白芍炒　白茯苓　归身　苡仁　扁豆炒　神曲炒　陈皮　甘草

白水煎。

痘之险症，见在七八九十朝，前已清凉解毒，在此时又不可重用清凉，又不可行，又不可补，浆又清而血又热。用

六味地黄汤

熟地三钱　山药一钱五分　丹皮一钱　山萸肉一钱五分　白茯苓一钱　泽泻一钱

白水煎。此方可以化血成浆，最为切当。

一种痘症，至七八九朝，色白气虚，寒战溏泄，若用参芪之药，胃间有火，反致气凑痰喘。当用

七味地黄汤

熟地三钱　山药一钱五分　丹皮一钱　山萸肉一钱五分　泽泻一钱　白茯苓一钱　肉桂三分

白水煎。此方生水固气，功有神效。

一种痘症，长浆时，或在结痂时，因中气不足，肺气不固，毒气流入大肠，忽然下血如注。当用

固金汤

阿胶蛤粉炒，一钱　生黄芪一钱　白芍六分，炒　甘草六分　净姜灰七分　黄芩七分，炒　归身五分　白术七分，炒

白水煎。

痘至收靥后，仍复以解毒药进之，恐馀毒归内故也。

连翘饮

连翘　僵蚕　黄芩　桔梗　陈皮　金银花　土贝母　丹皮　甘草

白水煎。

痘后人虚，必补脾生血，宜用

加味养血汤

黄芪　当归　丹皮　扁豆炒　木瓜　苡仁　白芍炒　白茯苓　陈皮　甘草

白水煎。

逆症论

一种逆症痘，或唇肿恶心，或烦乱作喘，痘甚稠密，发热不退，盖因先天所受毒热深重，百不活一。当下当凉，医治不过尽心而已。

闭症论

一种闭症，初起之时，或面色胀而光浮，有微喘之意，眼白微红，或微作干呕，默然无声，形若无病。治之者，必周身细看，有一二痘粒微现，色紫暗而不起者是也。盖先天毒热，深藏脏腑，固结而不能达于外，二三日即死，不可不知。

痘症用药大概加减

表散、清凉、利下、温补，已在前方详著。

如大便不通，烦躁色红，必用

大黄　玄明粉

热盛者，必用

金汁　黄连　石膏　紫草　黄芩　牛蒡子　人粪灰　生地此数味不可全入，随症量加一二味可也

补剂。看其症，宜轻补，宜重补，随症量加

人参　黄芪　白术　糯米

泄泻者，看其溏泻水泻。如面青唇白，虚寒，酌用

木香　肉桂　诃子煨　莲米炒　白茯苓　煨姜　粟壳蜜水炒　量加一二味。

生痰，看其虚实，酌用

贝母　桔梗　胆星　熟半夏

排脓入补剂，用

川芎　僵蚕炒　防风　皂刺　白芷　穿山甲酒炒

加一二味，不可用全。其等分，亦不过佐使而已。

痘症必用方

十全大补汤

治痘疮灌浆不满，气虚血少，色无华彩，面青唇白，大便不实，寒战咬牙等症。

人参　黄芪　白茯苓　白术炒　肉桂　白芍炒　熟地　当归　川芎　甘草

白水煎。

四君子汤

治痘色白，虚寒泄泻，浆不充满，顶陷等症，随症加减用之。

人参　白术　白茯苓　甘草

白水煎。

六君子汤

治痘症脾胃虚寒，生痰作泻，浆色不足，随症加减用之。

人参　白术　白茯苓　甘草　半夏　陈皮

白水煎。

独　参　汤

治痘气虚血少，虚寒作泻，面青唇白，不能多进药者，以此汤服之。

人参一钱　红枣二枚

当归养血汤

此汤能充实痘疮，浆不足者服之，功有神效。

黄芪五钱　当归一钱

白水煎，或用糯米二钱。

神　功　散

专治痘疮大火症，用在见苗以至起长之日，元气壮实，痘色干红而紫，大小便结塞不通，非行利而不能透现者，服一二剂，功有神效。若元气少虚，大便通利，即不可用也。

大黄　山查肉　石膏　甘草梢　紫草　牛蒡子

白水煎。

竹叶石膏汤

治痘疮见苗，以至起长，一切火盛热症。

石膏　生地　桔梗　红花　薄荷　竹叶　黄芩　陈皮　甘草

白水煎。若大便秘结，加大黄、紫草。

黄连解毒汤

治痘见苗，以至起长，一切烦热火症，或眼目赤红，或腮咽肿痛，或生口疮，或牙痛，或衄血，皆宜速服。

黄连　玄参　连翘　栀子　花粉　陈皮　甘草　竹叶

白水煎。

加味逍遥散

痘之前后，不可补，不可凉，似虚非虚之症，此方治之为善。能舒和气血，调畅荣卫，令诸症不生。

白术炒　白芍炒　白茯苓　丹皮　石斛　当归　柴胡　薄荷　陈皮　甘草

白水煎。

润　肠　丸

治痘症大便结塞不利，烦躁有热，一切火症。

大黄四两　归尾一两　枳壳一两　牛蒡子二两

共为细末，炼蜜为丸，如弹子大，每服一丸，白滚水化下。

抱　龙　丸

治痘症前后咳嗽，有惊有痰。

陈胆星二两　天麻五钱　钩藤五钱　全蝎三钱，去尾尖及子洗净僵蚕五钱，微炒　陈皮五钱　川贝母五钱，去心

共为细末，炼蜜成丸，每丸重五分，朱砂为衣，每服一丸，白滚汤下。有表症，伤风咳嗽者，淡姜汤化下。

犀角解毒丸

治痘前后内热，眼白赤红，烦躁作渴，弄舌等症。

生犀角五钱，犀坏不用　黄芩一两　贝母六钱，去心　连翘六钱　生地一钱　甘草四钱　栀子八钱，炒　薄荷四钱　陈皮五钱

或加黄连三钱

共为细末，炼蜜成丸，每丸重一钱，每次一丸，白滚水化下。

补脾肥儿丸

治痘后脾虚，元气亏损，或唇白面青，大便不实，或发热等症。

人参三钱　黄芪一两　白术一两，土炒　五谷虫一两，炒　扁豆一两，炒　黄连四钱，炒　陈皮八两　白芍一两，炒　甘草五钱　当归六钱　麦芽一两，炒　神曲一两，炒黄　白茯苓八钱　丹

皮六钱

共为细末，炼蜜成丸，每丸重一钱，每服一丸，白滚汤下。如无力之家，去人参亦可。

参苓白术散

治痘症泄泻，或恶心，或寒战，服之皆有奇效。

人参三钱　黄芪六钱　白茯苓六钱　官桂一钱五分　白术六钱，炒　甘草五钱　木香二钱　白芍六钱，酒炒　陈皮四钱

共为细末，每服五分，或一钱，米汤调下。

六一散

治痘症湿热作渴，小便不利，或赤红涩痛。

白滑石六两，为细末飞过用　甘草一两

共为细末，每用一钱，或二钱，竹叶汤下，滚水亦可。

猪肝散

治痘后翳膜遮睛。

谷精草三钱　大黑豆五钱　蛤蜊壳一两，擂碎

用雄猪肝一片，重一两，以竹刀花破，同药入砂罐内，井水煮熟，令儿食肝，或饮汤少许，药渣勿用，以愈为度。

护眼方

黄柏一两　紫草一两

共为细末，麻油调成膏。凡痘一见苗，即涂服眶周围上下，痘之毒气即不能人眼矣，干再涂之。

金汁多年无臭气者方可用

专治火症毒盛痘疮，颜色干红不起，或恶心烦渴，或夹瘀夹斑，或唇肿不食，躁闷不宁，杂言梦语，大便结实，或不通利，此物不宜见火，隔水烫服，量其体之大小，服之多寡可也。若气血虚寒，并泄泻者，及颜色鲜明者，皆不宜服此。

人粪灰

治痘疮不起，颜色惨暗，或夹斑疹，烦乱作渴，一切热症，每服一钱，白滚水下。此物宜干硬者，用阴阳瓦煅存性，以腊月者为佳，必预先制成，临时研用，乃痘中救人之要品也。

如无腊月者，即觅圊地上，干硬而露过数夜者，亦可。厕坑者勿用。

痘落痂后洗浴方

当归　苦参　甘草各五钱

共煎汤，温温浴之，浴后不可见风。如地僻无药，以豆壳煎浴亦可，不拘何豆壳，皆可用。

稀痘说

俗传稀痘之方，有用脐带朱砂者，有用瓜蒂散者，有除夕日用乌鱼水浴者，种种不一，皆毫无应验。即有见效者，亦是偶中者耳。平日宜常服三豆汤，乃败毒稀痘之古方，有益无损，为正道也。

三豆汤

绿豆　大黑豆各五钱　赤小豆三钱，即挤砂豆非云南豆也　甘草节一钱

井水煎服。

水痘辨

水痘乃风热所致，皮肤小疾，不经脏腑，一出即灌，如水之明亮而皮薄，多有破者，一现即回。色如粉红，亦有灌稀脓者，亦有如胭脂红者，但不圆实，形多歪斜，此一种不可不细辨也。有等医者，妄言水痘内，带过真痘，不知水痘，乃毒之轻者，真痘乃毒之

重者。重病兼轻病，容或有之，岂有轻病带过重病之理。高明之家，切勿为其所诳。

水痘不可发表，恐攻破痘皮，后成疮患也。其乳食亦宜清淡，服犀角丸或

连翘饮

连翘　荆芥　赤芍　黄芩　桔梗　陈皮　甘草

白水煎。

总　论

凡病有外症相同，而内症实不相同者，一定之方，有效于此，而不效于彼者。临症时，必虚心审察。古云：医者意也，不可言传，正此是也。

治病有汗吐下三法，惟痘不可用药令其吐，不可用药令其汗。若下之一法，随症施之可也。

一种痘初起时，四肢作冷者，不可用温热之药，多有热伏于内面作冷者，乃火极似水之故，必细察之。

痘至灌浆时，有云必固塞大便，泻者固之可也，不泻者，听其自便如常为是。

痘之险症，如寒战咬牙，泄泻不食，烦躁作于，颜色干红，作痒，弄舌，唇肿面肿，此种原系险症中之应现者，用药应手而愈者可治，用药不应手者则为逆矣。此数症，亦有轻有重，有可治不可治者，俱在临时对症施治耳。

治痘有首尾当补者，有首尾不宜补者，必细察斟酌之。痘之火毒盛者，十有八九用药有首尾当清凉者，有凉之宜轻者，有凉之宜重者，若拘一定之方，及一定之日期，则大害事矣。

一种一见苗，即当行利大便者，须察其虚实，热之轻重，毒之浅深，不可因循有误，养邪成后患也。

一种痘疮，大便不通，若用大黄芒硝，又恐太过者，药剂内倍加紫草、归尾、牛蒡子，润下之可也。

虚寒泄泻，寒战咬牙，恶心者，用人参、肉桂，必须临时看其面色青白，体之大小，斟酌量用，万勿以偏热偏寒，误人性命也。

出痘多在子午卯酉之年。盖子午君火司天，卯酉君火在泉，诸疮皆属心火故也。然亦有不准者。

江右多出神痘者，轻便易妙，药剂医方，竟觉无用矣。有儿女之家，不可不访其善者。

犀角、紫草茸虽系凉血解毒，不过比为菜内之交头可耳，焉得如石膏、黄连、紫草、人粪灰实为济事也。人牙、鸡冠血、桑虫虽为助浆之补，焉得如人参、黄芪、白术、当归实为救急也。

老妪俗传，茱萸痘、菀痘、珍珠痘乃相形以命名耳。至云蛇皮痘，必安土地上之说。此不可通俗之事。有种火症，未经清凉，烦躁不安，或一经土地而愈者，此千中之一二也，岂可常试也哉。

小儿未出痘之前，光皮俊脸，数日之后，焦头烂额。喘胀不堪，如离水之鳅鳝，性命反掌。悲哉何故。古传云：乃前生杀业之报，此论实耶虚耶？

小儿体幼，不能服药者，乳母照方服之，亦有一二分之功。

发表药说

痧痘本来属火毒，借感岁气而出，非寒疫病也。初见点时，古人用羌活者，必同入清凉药内，乃借羌活，松肌透表，或兼以荆芥、防风、前胡，皆相助达外之意。庸医不悟，重用发散，岂不谬哉？

痘至灌浆时，用白芷、川芎或皂刺、穿山甲者，乃排黄芪、当归、糯米，成脓起顶之故。若无参芪，此发散之物，不可用也。

灌浆时作痒，乃气弱浆清，不能化毒成浆，用药保元可也。俗人止痒，多用蝉退、皂刺、白芷、川芎等味，不知此发散之物也。保

元汤内，惟加一二味，以佐参芪成功。若专言白芷等味，能止痒起顶，冤哉，反盗其真气，不但不能止痒，而更令其作痒矣。未灌浆之期作痒，并回时作痒，此非病也，不过痘热之所致耳。

李濒湖云：出痧痘，戒吃笋汤，并忌为药引，此物能发汗，伤真气。原夫痧痘，不宜发汗，故戒之也。以生荸荠去皮代之，荸荠能发而不发汗，所以为善。

论　医

俗传医家，神而明者，一见能定生死。遇逆症全现，一见而知其死。遇顺症全现，一见而知其生。盖有之矣。若险症，必三日出齐，观其颜色，见其稀密，方可定之。及灌浆时，犹有变症，或险而变逆，或重而变轻，此一种。医家未必一见而了然也。故传其神者，不免过褒，传其庸者，未免过贬。此皆习俗之愚传愚耳。总之看痘，须细详险逆，用药要对症，温凉汤补得宜，药勿杂乱，勿炫奇惑愚，勿偏寒偏热，为正道也。有等医家，看痘之症候了然，而用药即杂乱不一，乃无师之学故耳。

痧痘乃现形之症，现形即不诊脉。若泥以脉理推详，反误事矣。

出痘有不药而愈者，有赖药之力而愈者，亦有误在医药而坏者。一种逆症，医家即束手无为，药饵亦觉为废物，即神传其术，至此亦无可奈何也。

忌　触　犯

凡出痘，月经归人，师尼僧道，不可进房，生母月经无碍。

痘初见苗时，宜烧芫荽红枣。

因生人秽物触犯，以致痘变颜色者，屋内宜烧檀香乳香，能驱邪气，扶正气也。收靥时，烧茵陈，或茶叶。

以上所烧诸品，皆宜远远焚之，不可切近小儿身体。

用灯看痘

用之照影则可，看颜色，分轻重则不可也。必在窗前亮处，方能定其险顺。如夜晚医家到迟，不过从权而已。此习气，多误在富贵之家。

夜晚用纸捻点灯照痘，不可用红纸作捻，此纸有矾能炸，且光亦不亮，宜用草纸作捻为是。倘用红纸，非徒无益，而反误事矣。

芫荽观音柳洗浴

痘将出未出时，微微煎洗则可，如见形，即不当浴矣。

食　物　类

痘见苗时，宜疏淡薄粥，清虚为是，若吃发物，如波菜、芫荽、麻菰汤、荸荠汤、荠菜汤可也。　次后用荤发物，用鱼白、切面。

灌浆时，煮辉枣肉，糯米晚米粥饭，莲米皆生浆健脾之物，俱可用也。

结痂时，如陈火腿、山药、扁豆，亦可以渐而进，但忌发物。起长与灌浆之时，盐酱酒醋椒姜葱蒜，并诸咸物，皆当切禁。

小孩不善吃者，乳母亦如是进之。

药　引　说

药内用引子，不可杂乱，治痘尤所当慎，庸医泛加，多致误事。即笋尖一物，为害不浅。

初见苗，药内宜用去皮荸荠，或观音柳。

补剂内，宜用红枣或辉枣。

热在表内，宜用竹叶。

止泻药内，宜用莲米，或加生姜。

幼科直言　卷三

清　江宁　孟　河介石编著
四明　曹赤电炳章校点

痧　症

总　论

痧症属肺，属火，系禀胎毒，蕴积本经。亦因感岁气而出。发热五七日，方得见形，初时咳嗽涕泪，目如含水之状，身体微汗潮润，则出最轻。若气喘、鼻干、作呕、惊狂者，最重。初见如芥子，如米尖，再后成片，红色者轻，紫色者险，黑色者逆。不可视为泛常。死生虽由天命，岂可用药失序，致令夭亡。务宜辨寒热虚实，察毒气浅深，庶人事始尽也。大抵初发热时，必当微表，见形即宜清凉，一种初起，眼白赤红，声哑唇肿，作渴，腰痛腹胀，人事不清，口鼻出血，烦乱狂叫不安，闭塞不出，即大凶候也。服大清凉解毒药后，若能现出者，或可得生，鼻内流血者，毒重，口内流血者，毒尤重。又一种初时失于清解，过于发散，以致后来元气虚弱，毒气停内，口鼻出血腥臭，骨瘦不堪，或生牙疳，身热不退，终成坏症，不可不慎。此症日出三次，三日九次为顺，总宜出透，毒气得净，即无他患。

一种奶痧风疹，此类感风热而出，乃皮肤小疾。服疏风清热之药即愈，不在此痧症中论也。

痧症与痘疮不同，未见形，并初见形时，微表或可，如太过，则胃气受伤，反令停毒攻肺，生痰作喘，以致闭塞难现。若服发表药而不出者，此热结在内，速宜清凉行利，则肺窍清而毛孔易开，痧疹乃现。今之愚夫愚妇，表痧痘，多用樱桃、荔枝核、葱头等物，不知此数种性热，大不相宜，轻者服之转重，重者变逆。惟发表时，只宜羌活、荆芥，少加一二味，兼佐以连翘、牛蒡子、观音柳、紫草、石膏，此种实为专司发痧之药。其性虽凉，而能通达肺表，故不可少。

一种痧痘初起，手足心如火热非常者，出之必垂危。

一种痧毒盛，多有发热，躁乱不安，必用大黄、玄明粉行利后，方能现出，大肠通利，肺热清减，方能透达于外，大抵痧症正出之时，用药最忌酸敛，如五味子、生白芍是也。其白芍必用酒炒黄色，痧疹前后，皆可加入。能舒肝气，通血脉故耳。

一种痧疹初起，四肢逆冷，乃火极似水之故，不可妄投热药，宜当利下清凉，痧现自然渐和也。

痧疹吐虫解虫，皆系热盛，大约吐者重而解者轻，用药以清热为主，如黄芩、栀子、丹皮。若吐虫解虫，在出痧之后者，可加乌梅一二，痧前则忌。

痧疹前后泻痢不宜用药速止，如泻黄红色，乃内有伏热，加黄连、黄芩、车前子可也。

痧疹所畏者，燥热之药，如苍术、丁香、肉桂、砂仁等味，万不可妄投，受害不浅。

未出痘，先出痧者，不算正砂。出痘后，随出痧者，乃痘之馀热所发，亦不算正痧。必出痘后，离月分远者，方为正痧也。江宁多

见如此，不知别省京地何如耳。

痧疹后，眼目赤红者，当用生地、菊花、决明子、蒺藜、归尾、柴胡、红花等味。一种痧后面色青白，骨瘦不堪，元气损伤，肝脾血少，成痞眼，懒睁畏明，似害非害，宜服健脾肥儿丸，或服六味地黄丸，庶可渐愈。一切疏风治眼之药，万不可妄投。不但痧后当如此，凡小儿病后失调，成疳疾痞眼者，俱当如此医治，养血健脾为主，倘大便泄泻稀白水者，归脾汤，补中益气汤，皆对症要药也。若泻黄水者，则又在热论，即不宜服此。

痧疹用药，男妇小儿皆同，惟孕妇方内去红花、山查，痧疹初起时，总宜清疏薄粥调养，万不可多伤厚味，忌食葱蒜、酒醋、面食、羊肉、鱼腥等物。

痧症方

痧症发热，二三日，或四五日，未见形，疑似之间。用

防风发表汤

防风五分　干葛八分　红花三分　枳壳七分，炒　山查肉二钱　桔梗八分　苏梗六分　川芎五分　荆芥六分　杏仁一钱，炒　当归六分　陈皮六分　甘草五分

白水煎。

痧症见形一二日内，服

解毒快斑汤托表凉解，活血化毒

连翘七分　牛蒡子六分　荆芥六分　防风六分　山查肉二钱　生地二钱　蝉退三枚　归尾六分　桔梗八分　黄芩八分，酒炒　川芎五分　干葛八分　紫草八分

白水煎，或加观音柳五分。

痧症见形，二三日内，色红烦躁，出不透快。宜服。

竹叶石膏汤

煅石膏三钱　竹叶三片　红花三分　生地二钱　黄连五分，微炒　花粉八分　陈皮五分　甘草五分　僵蚕五条　牛蒡子六分　连翘六分　玄参一钱　桑皮一钱

如大便不解，加生大黄二钱，再不解，即加玄明粉二钱。惟热毒重盛者方可。

如泻红水，或作烦渴，亦加大黄。

痧症四五六日回时，尚有馀毒，留于肺胃，咳嗽气粗，外热不退者，服

清肺饮

石膏二钱　生地二钱　柴胡六分　麦冬一钱　玄参一钱　桔梗八分　僵蚕五条　甘草五分　陈皮六分　黄芩八分　归尾八分　知母八分　竹叶二片

白水煎。

痧后面色青白，唇淡气弱，宜服

调元健脾保肺汤并治痧后瘦弱成疳疾

黄芪　白茯苓　丹皮　陈皮　沙参　扁豆　白芍　当归　百合　山查

如大便腥臭泻白色者，加木香、白术。

如泻黄色，加酒炒黄芩、车前子、黄连。

痧后痢疾，下红白，乃余火未清，热移大肠，或饮食失调。宜服

健脾解热汤

炒黄连七分　泽泻八分　山药八分　甘草五分　炒扁豆一钱五分　白芍酒炒，六分　白茯苓八分　木香一分　丹皮七分　炒白术七分　陈皮五分　山查肉一钱

如无黄连，加蜜水炒黄柏亦可。身体虚弱，面青唇白，加沙参三分，晚米二钱。痧后口疮，牙疳等患，宜服

清胃败毒汤

僵蚕　丹皮　甘草　生地　连翘　桑皮　沙参　白茯苓　银花　黄柏蜜水炒

如体虚，加白术。

痧后口疮牙疳，宜搽

救苦散

人中白五钱，煅　飞青黛三分　冰片一分　僵蚕一钱　寒水石井水飞细，三钱

共为细末，先以苦茶拭口，随搽此药。富贵之家，加牛黄二分研入，其效更速。痧疹咽喉肿痛，不拘初起回后，用

二圣散

苦参三钱　白僵蚕二钱

共为细末吹入。

有一种痧痘，大吐大泻而后见者甚轻，与作恶心干呕者不同。用药微表，和平安胃为主，宜服

和中汤

白术八分　归身七分　陈皮五分　甘草五分　白芍酒炒，六分　柴胡六分　防风六分　白茯苓七分　干葛八分　丹皮五分　桔梗七分

白水煎。

有种病后瘦弱，唇白气虚，感时气出痧疹者，宜服

加味逍遥散体弱气虚，痧出白色少红活者俱可服

炒白术　炒白芍　薄荷　白茯苓　归身　丹皮　陈皮　柴胡　麦冬　甘草　干葛

白水煎。

痧症不拘前后，痰多咳嗽，有风有热，俱宜服

抱龙丸

陈胆星四两　钩藤一两　桔梗二两　天麻二两　升麻五钱　陈皮一两　薄荷一两　僵蚕九钱　川贝母一两，去心

共为极细末，炼蜜成丸，如弹子大，朱砂为衣，乳孩每服半丸，大者每服一丸，白滚水下。若外感风邪用防风五分，煎汤调下。若内热，用竹叶汤调下。

痧症咳嗽气喘，唇红，结热在内，烦躁不安，口鼻出血，不拘前后，俱宜服

犀角解毒化痰清火汤

生犀角一两　归尾八钱　连翘一两　赤芍六钱　生地二两　丹皮一两　紫草一两　牛蒡子三钱　花粉一两　黄连三钱　薄荷一两　川贝母一两，去心　甘草梢一两

共为细末，炼蜜成丸，如弹子大，每服一丸，竹叶汤化下。犀坏不入药。

痧后失调体瘦气弱，或成疳疾，或泄泻等症，宜服

健脾肥儿丸

人参三钱　黄芪一两，蜜炙　炒神曲二两　扁豆一两，炒　山查肉一两　甘草六钱　生黄连三钱　白术一两，炒　白芍六钱，炒　橘红五钱　当归身八钱　陈皮五钱　白茯苓一两　山药一两　地骨皮六钱　百合八钱

共为细末，炼蜜成丸，如弹子大，每食远白滚水下一丸。不用人参亦可。

痧后咳嗽，内热不清，心神慌乱，夜卧不安，脾虚或生疮疥。宜服

天真膏

生地四两　麦冬四两，去心　玄参四两　白茯苓二两　生黄芪四两　沙参四两　茯神二两　当归二两　炒枣仁二两　丹皮二两　紫菀二两　桑皮四两　橘红二两　生苡仁四两

取长流水，用砂锅桑柴文武火，熬成珠，上好白蜜收成，盛磁器内，每服三五茶匙，白滚水调服。

观音柳　一名西河柳，乃痧疹之圣药也。冬月用枝梗，春夏用苗叶。每用一钱，煎汤服。年力大者，多服一二次更妙。能清肺、解毒、发表。

痧症用药大概加减

发热初起，或在疑似之间。用

防风　干葛　红花　山查肉　羌活　荆芥　前胡

咳嗽有涕泪，用

杏仁　桔梗　苏子　枳壳　贝母　薄荷　升麻

唇红有热，用

花粉　连翘　桑皮　牛蒡子

腹痛有食，用

枳壳　山查肉　神曲　青皮　白芍酒炒

见形鼻干唇红，烦躁作渴，用

石膏　栀子　桔梗　牛蒡子　连翘　玄参　黄芩

见苗影，出发不快，兼之大便秘塞，或渍黄水，或烦乱不宁，当速加

石膏　大黄　归尾　紫草　牛蒡子

小便不通，用

车前子　薄荷　木通　柴胡

散风热，用

薄荷　赤芍　桔梗　荆芥　柴胡　红花

痧子夹斑，用

红花　丹皮　石膏　赤芍　紫草　生地

痧毒盛，颜色红紫，烦躁作渴，目赤，用

石膏　玄参　红花　生地　紫草　花粉

口疮，用

桔梗　甘草　僵蚕　生地

大便泻白色，用

木香　白茯苓　白术　神曲

大便泻黄色，用

车前子　丹皮　木通　黄芩

大便泻，带红色，用

丹皮　黄芩　赤芍　木通

红白痢疾，用

木香　白茯苓　黄柏　黄连　神曲

痧后脾虚，用

白术　苡仁　山药　茯苓　沙参　人参　百合　丹皮　归身　甘草　炒白芍　石斛　炒扁豆

痧后余热等症，用

生地　银花　地骨皮　玄参　黄柏

痧后咳嗽不止，用

桑皮　紫菀　贝母　麦冬　玄参　苏子

痧疹前后鼻血，用

知母　丹皮　犀角　花粉　生地　玄参　连翘　紫草

痧症两胁作胀，气疼，用

薄荷　白芍酒炒　木香　柴胡　归身　白茯苓　丹皮　桔梗

痧出紫黑色，闭塞不透，烦乱不宁，最为重症。急用人粪灰，白滚水服二钱，或可救其万一。人粪灰制法，详见痘症方内。

补遗二则

痧疹属肺火，肺为五脏华盖，清虚其上，故出痧。现形即没，皮肤不留形迹，不似痘疮灌浆结痂也。所以服药，不可重表，恐攻动脏腑之热，熏蒸于肺，令肺窍闭塞，致痧不现，反增喘胀。今之庸医愚妇，一见痧疹，无论热轻热重，概行燥散，病家亦欢欣而进，彼此皆不知深受其害也。大抵此症，初起时，当以轻清微表，随宜清凉，以解肺热，此治痧之大法也。痧有顺险逆，逆者不可治，医家或逢此症，用清凉药治之而不愈者，此乃逆症，原不可治者也。在病家即云，误用凉药，深为致怨，庸医就俗，而清凉竟不敢用矣。可不悲哉！痧后宜戒鱼腥猪肉，过三七后，人事清爽，方可吃之。痧后馀热生毒者，看其元气虚实，用药解之，如生地、贝母、银花之类。元气虚者，兼以黄芪、当归。

小儿口疮，或牙疳，多因痧痘后，或病后元气虚弱，不能运化邪热，毒气停胃之故。当依前方，修合搽药，万不可多人冰片、麝香，盖此二味，香气迅烈，直达心肺，大伤真气，致令睡卧不宁，饮食不甜。壮实者，幸免其害，倘面色青黄，肌瘦不堪，气弱者，则有性命之忧。况见效不专在此二味，用者不可不慎。

募施治痧要方

石膏煅，九两　生黄芩三两　红花一两　荆芥二两　桔梗二两四钱　地骨皮二两五钱　干葛二两　甘草一两二钱　赤芍一两五钱　当归尾三两　薄荷一两五钱　牛蒡子生用，三两　陈皮一两　桑白皮三两　枳壳二两

上方共为粗末，每次用末五六钱，白水三盅，煎汤滤去渣服。

专治小儿并男妇痧疹，不拘四时，将见形，已见形者，皆可煎投。痧轻者，用六七

服，重者十数服。大能起发透表，解毒清热，不伤元气，功有神效。此系较正良方，经验有年，等分药味，万勿增损，恐致错乱无益。其痧数年流行一次，或传染一方一村，今祈四方善士，照方多合，施济贫苦，所费无几，功德无穷。

痧疹属火，胎毒蕴积，独禀肺经，毒气亦能流传诸经脏腑，借感岁气而出，肺象金，上为太白星，是以知病之在皮毛也。肺有孔窍，不宜闭塞，有病即喘咳，痧疹用药，不可太表太攻，恐气塞窍闭，则皮毛不开，痧亦不现，药须清润达表，痧始易出易透易净。治痧最忌酸敛、温补、燥热。古云：痧要清凉痘要温。清凉者，清肺热也。温者，温补生浆也。盖肺积热于肠则成痢，毒蕴于胃则成牙疳，亏损元气则虚弱。盖痧亦有顺逆险，顺者不须服药，险者服药尚可救，逆者百不救一。惟险候全要药饵相宜，不致后患。治痧贵慎乎初，本方实为专司发痧解毒者，甚有俗医，视方而起谤或云凉，或云轻，今表药性于左，了然可见。

石膏味辛，色白达表，淡而利窍，煅用即纯，痧症要药，清凉解毒，用以为君。陈皮、枳壳、桔梗，疏气消肺胀，桑皮润肺止喘，清火化痰，红花、归尾、赤芍味辛，活肺经血热，血活则毒散，牛蒡子解毒发瘾疹，干葛味辛，发表解渴透肌，薄荷清肺胃间热，通气舒毛孔，地骨皮解肺毒，消热躁，甘草解毒和药，荆芥散血分中之风热，能开毛孔，黄芩清肺热解毒。痧宜戒醋酒鱼腥，甜糖厚味，荤腻椒蒜，饮食只宜清淡，蔬菜薄粥，避风调理。

幼科直言　卷四

清　江宁　孟　河介石编著
四明　曹赤电炳章校点

小儿有病看虎口三关

初节寅关食指第一节，次节卯关食指第二节，三节辰关食指第三节。

经纹歌

左手红生似线形，须知发热又兼惊。右手脉纹如左样，脾伤惊积一齐生。纹头有似三义样，肺气生痰夜作声。色青应有伤寒症，若是空红泻定生。

指脉深青不暂停，微青腹痛粪多青。若兼黑色盘肠吊，眼搐牵抽不得宁。

小儿指脉深红色，发热惊时目强直。微红下痢腹中疼，吐泻脾虚多不食。

指上纹生紫气深，惊时啼叫又呻吟。微微紫色肠中痛，若是红弯主恶心。

虎口脉纹多，须知气不和。色青惊积聚，下痢泻如何。青黑慢惊发，入掌内钓多。三关急通过，此症必沉疴。

小儿初受气论

圣济总录云：小儿在母腹中，受其精气，一月胚，二月胎，三月血脉，四月形体，五月动作，六月筋骨成，七月毛发生，八月脏腑具，九月谷气入胃，十月百神备而生。生后六十日，瞳子成，孩儿能颁笑语识人；百日任脉生，能反覆；一百八十日，尻骨成，能独坐；二百一十日，掌骨成，能匍匐；三百日，髌骨成，能独倚；三百六十日，胫骨成，乃能移步。此是常定之法。至于已及期而不能者，则又禀赋之丰怯，是又不可以一概拘也。

小儿始生变蒸

三十二日一变，生癸肾脏。属足少阴经。

六十四日二变，一蒸，生壬膀胱腑。属足太阳经。

九十六日三变，生丁心脏。属手少阴经。

一百二十八日四变，二蒸，生丙小肠腑。属手太阳经。

一百六十五五日变，生乙肝脏。属足厥阴经。

一百九十二日六变，三蒸，生甲胆腑。属足少阳经。

二百三十四日七变，生辛肺脏。属手太阴经。

二百五十八日八变，四蒸，生庚大肠腑。属手阳明经。

二百八十五日九变，生己脾脏。属足太阴经。

三百二十二日十变，五蒸，生戊胃腑。属足阳明经。

至于心胞络脏，属手厥阴经。三焦为腑。属手少阳经。

此一脏一腑，俱无形状，故不变而不蒸也。然所谓变者，变生五脏也。蒸者，蒸养六腑也。又曰：变者变其情态，蒸者蒸其骨体。故血脉方荣，骨格始长，情性有异于前。

当变蒸之时，看儿唇口，如上唇微肿，有如卧蚕，或如珠泡子者，见变蒸症也。即宜少与乳食，不可妄投药饵，切不可用艾火灸。若不依此，多致杀儿。屡遇有此者，故书以告之。

小儿脉法

小儿之脉，与大人异，九至为伤，平和六至，沉细而知为冷，十至而病困矣。急弦为气之干，沉缓为食之滞，促急必是虚惊，紧者风痫是矣。弦而又急，客忤之气。沉而数者，骨热何疑。脉来乱者？必然难治。

弦急主气不和　沉缓主伤食　促急主虚惊　浮主风　沉主冷

持脉三要

一曰举轻手寻之　二曰按重手取之　三曰寻不轻不重委曲求之

上三要，惟寻字是诊家之至诀，即经之所谓三菽、六菽、十二菽之旨也。

脉象纲领图

此将七表八里之脉融会，至为切要

浮举之有余按之不足　轻手得而无力则为芤，有力则为洪　沉举之不足，按之有余　重手得而细小则为微，无力则为弱　至骨有力则为伏　迟一息三四至，来去极迟　重手得而少缓则为缓，无力则为软　短细则为涩　数一息七八至，来去极疾　轻手得而极数则为紧，流利则为滑　有力则为实

论浮沉迟数四脉，有力无力主病。

浮而有力为风，无力为虚。迟为风寒，数为风热。俱为表症。

沉而有力为积，无力为气滞。迟内寒，数内热。俱为里症。

迟而有力为痛，无力为冷为寒

数而有力为热，无力为疮为燥

滑者脉形流利，主气壅滞。主血不和，主痰

涩者脉形濡滞，主伤精败血。主气不和。

俱看在何部，此诊脉之切要也。

望　色

小儿有病，必察色听声，虎口脉纹，病重乃现。是望闻问切之四端，不可缺其一也。故察其面色之神情，即知五脏气血之受病。如面色白者气虚，面色青者气弱伤肝而有惊。面光泽而急胀者，有火有食。面色暗而急胀者，有毒有热。面色红而唇赤者，有热。弄舌者，心经有热有惊。气凑鼻干无泪者，肺热有惊。哭无转声者，关窍不通为病重。神情倦怠，目睛无神者，慢惊之候，为最重。耳根黄色，眼眶周围淡黄者，伤脾之候。唇青面白者，为吐泻慢惊之候。眉头频蹙者，为腹痛。兼之唇口青色者，腹痛而有虫。凡病后额角及耳后干枯，若无血色，由脏腑有亏，不治之候。面黑色者，乃脾肾有亏。兼之干枯，亦为难治。鼻孔掀露，有涕有泪，则为伤风。无涕无泪，须防成惊作喘。一切病症，声直者，干叫者，迷困者，无涕泪者，皆危候也。凡看小儿之病，必以指甲掐其人中，并眉心间，若易哭易叫，有转声者为轻，无转声者为重。小儿指甲青紫者，有惊有食，面白手尖冷者，初病则为风冷之候，病久则为气虚有惊。小儿凡有病，身体微润者易治，干热者难治。若病后干热，四肢作冷者，乃脾虚成疳。总之必察形望色，以辨其为寒热虚实而治之。以上诸款，举其大端，临症之际，细心审察，自无错乱也。

凡一切病中，囟门下陷，喉中拽锯，痰气不转，鸦声眼暗，牙龈如粉白，两腮似涂朱，现此等症者皆危。

呕　吐

小儿呕吐，皆属于胃。有胃间受风，有

伤乳食，有胃间受热而作呕吐。虽云伤胃则吐，伤脾则泻，但症有寒热虚实之不同，吐者有物无声，呕者有物有声，干呕则无物矣。

一种寒吐者，有冒风寒，有乳母过饮冷物，以致小儿受冷乳作呕吐者，或吐乳吐食，或夹清水白痰，或进茶汤，皆吐而不受。宜用

平胃散　或兼服和中丸。

苍术制　厚朴炒　陈皮　甘草　或加用木香　半夏　砂仁

引用生姜一片

一种胃热作呕吐者，或三焦受热，或伤热物，或受热药，夏月受暑气，即呕吐黄痰，或干哕或烦躁，唇红面赤，作渴，大便不利。宜用

竹叶石膏汤　兼服六一散或抱龙丸。

竹叶五片　石膏三钱，煅

白水煎服。

一种伤食吐，或伤乳吐，或腹痛手足心发热，或作嗳气或呕酸水，或作渴唇红。宜用

加减二陈汤

陈皮　半夏制　山查肉　枳壳　柴胡　神曲炒　木香

引加生姜一片

一种虚寒呕吐，或因体弱，面色青白，肢体困倦，眼目少神，或久吐胃虚，不能运化乳食，气脉不通，上焦少气，或生痰沫。宜用

四君子汤　或兼服健脾丸。

人参　白术炒　白茯苓　甘草

生姜一片，大枣一枚，或加半夏、陈皮，即六君子汤亦可。

一种乳孩吐乳，若从口中射出，或顺口角流出，此非病也。盖小儿不知饥饱，随口辄咽以致满面上溢。书云：水多则沼溢，酒满则卮倾。自然之理，非疾病也。若妄服药饵者，必反添病症，不可不慎。

大凡吐症，药引宜用生姜，不宜用葱。姜温胃，葱则达表发汗。吐已伤表，岂可令葱汗之。

小孩一切吐乳必戒乳，以清米汤代之，胃间清疏，即可速愈。

虚寒吐泻，古方加丁香者，或用附子理中汤者，但医家须善用之。投之少许，其效其速，真有起死回生之功。若用之不善，恐后随生热症，不可不斟酌之。

凡小儿呕吐不止，目上视，头后仰者，不治。

泄　泻

泄泻之症，人皆知其脾胃不调，但症非一端，有风泻，有虚寒泻有伤食，有大肠热泻之不同，当辨其症而治之。

一种热泻，口干作烦或腹痛，粪出射远，或泻后肛门努胀者，必分利清热，用

黄芩汤　或兼服六一散。

炒黄芩　红花　车前　山查肉　陈皮　甘草　白芍炒　泽泻　薄荷　青皮

白水煎，或加乌梅为引。

一种虚寒作泻，或伤冷乳即作渴，泻青白色，或腹痛、或兼吐乳食，服药宜温脾胃。用

调脾散　或兼用参苓散、五苓散治之。

炒白术　炒白芍　白茯苓　陈皮　甘草　木香　砂仁　官桂　麦芽

生姜一片，大枣一枚。

一种伤食泻肚痛作渴，或泻糟粕恶臭，宜用

加味平胃散　或兼用和中丸。

苍术制　厚朴炒　陈皮　木香　白芍　山查肉　槟榔　泽泻

生姜为引。

一种风泻乃大肠受风，或泻沫，或黄白冻，兼腹痛者，宜用

防风汤　或兼用五苓散。

防风　柴胡　炒白术　木香　木通　炒

厚朴　陈皮　甘草

生姜一片为引。

一种人虚之极，或泻成慢惊，手足逆冷，宜用

加味补中汤　或兼用参苓散。

人参　白术炒　黄芪　当归　肉桂　白芍炒　木香　升麻　柴胡　陈皮　甘草

煨姜一片，大枣一枚。

泄泻一症，多因伤食，或伤乳，必戒乳食，以米汤薄粥代之。泄泻多在夏秋时，亦有受暑气者，当审明时候，果有暑者，发热唇红，作渴烦闷，当量入香薷、柴胡、薄荷、白扁豆、乌梅等一二味治之，或兼用六一散。

凡小儿泄泻，用药必审虚实寒热，其药如五苓散、补中汤、平胃散、参苓散、黄芩汤、六一散、香薷饮，仍察四时所感投药，无有不效者。

五苓散

白术炒，一两　白茯苓一两　官桂四钱　猪苓一两　泽泻一两

共为细末，每服一钱或五分，白滚水下。

参苓白术散

人参四钱　白术炒，一两　木香四钱　莲肉去皮心，一两　砂仁五钱，去壳　白茯苓一两　甘草六钱　陈皮六钱　山药一两　黄芪一两，蜜炙，若缺人参，再加黄芪五钱亦可

共为细末，每服一钱或五分，陈米汤，或生姜汤调下。

急　惊

急惊者，因受病在内，发于卒然之间，痰涎壅塞，手足抽掣，角弓反张，目睛上视，或邪视，牙关紧急，人事不省。盖心为火，肝为风，风火相搏，抽搐不宁，其症有因过伤肥甘辛热之物，兼感风热在内，以致伤脾损肝，生风生热生痰，清气不升，浊气不降，关窍闭塞，即发抽搐。症有轻重不同，不可皆泥为急惊可治，而医家即轻忽之也。用药宜清凉行痰之剂，乳孩发惊者，皆受乳母热乳，兼之寒热不调，或受惊吓而成，必戒乳，服牛黄锭子，并抱龙丸。

一种急惊，有风、有食、有痰。宜用

醒风汤　兼服牛黄镇惊锭子。

天麻　胆星　薄荷　防风　羌活　枳壳　白僵蚕　钩藤　石菖蒲　红花　甘草　全蝎洗净去尾尖

生姜为引。

一种热盛烦躁作渴，抽搐等症，宜用

凉肝散　兼服牛黄丸

石膏煅　贝母　胆星　天麻　陈皮　甘草　枳壳　桔梗　红花　花粉

姜皮为引。

一种惊搐之症，体气壮实，气凑痰喘，大便闭塞。宜用

清气化痰汤　兼服牛黄丸

枳壳　大黄　栀子　花粉　黄芩　薄荷　牛蒡子　天麻　杏仁炒去皮尖

竹叶为引。

牛黄镇惊锭子　治一切风痰气喘，咳嗽发热，着吓，急惊等症，并肚腹膨胀疼痛，夹风夹食，并大便不通。若慢惊并吐泻，则不可用。

天麻二两　钩藤二两　广皮二两　羌活二两　枳实一两　僵蚕二两，炒　青皮二两　生黄连二两　贝母一两，去心　莪术一两　独活二两　生大黄二两　牛黄一钱　麝香二分　冰片二分　飞朱砂一两　薄荷二两　桔梗二两　赤芍一两　飞滑石二两　防风二两　柴胡二两　全蝎二两，去尾尖子并洗净腹内　陈胆星二两

共为细末，用砂器，炼好川白蜜揉末为锭，每锭重一钱五分，晒干听用。每服一锭或半锭。有外感用生姜汤磨服，余症用白滚水磨服。治病多端，不能尽述。

抱龙丸　治小儿着惊吓，伤心肝二经，即唇青，四肢摇动，起卧不宁，盖抱者，保也。

龙者，象东方肝木也。故此丸为治惊之要药也。

赤芍药三钱　贝母五钱，去心　僵蚕一两　防风二两　天麻五钱　钩藤一两　薄荷一两　枳壳一两　桔梗一两　胆星二两　陈皮一两

共为细末，炼蜜成丸，龙眼核大，朱砂为衣，每服一丸，白滚水化下，有外感即用姜汤化下。

牛黄丸　治痰多急惊，肺间郁热，唇红作渴，及久伤风，烦咳气喘等证

羌活一两　连翘五钱　陈胆星一两　甘草五钱　花粉五钱　黄芩八钱，炒　**牛蒡子**三钱　薄荷三钱　天麻三钱　枳壳五钱　全蝎五钱，去尖及子　僵蚕五钱　牛黄五钱

共为细末，炼蜜成丸，每丸重五分。有风邪用生姜汤化下，如内热，用竹叶汤化下。

慢　惊

慢惊者，因小孩禀赋先天不足，或因一切病后，亏损元气，神不归经，或过伤药饵，饥饱不一，即成慢惊、慢脾风等症。医治与急惊大相悬远，因虚生风，张口露睛，手足微搐，面白唇青，四肢作冷，盖急惊可治，而慢惊不可治。因真气有亏，俗云急惊惊病不惊医，慢惊惊医不惊病者是也。凡惊症有涕泪则轻，用手指掐人中，哭有转声者，可救其万一，不然，则束手无为矣。

一种似慢惊非慢惊之症。宜用

加味逍遥散

白术炒　白芍炒　白茯苓　陈皮　甘草　当归　薄荷　全蝎洗净　僵蚕炒

生姜为引。

一种面白唇青，吁气常出，微作惊搐，或闭目，或张睛，此真气有损。宜用

补中益气汤　兼服四君子汤六君子汤

人参　黄芪　白术炒　当归　升麻　柴胡　陈皮　甘草　生姜一片　大枣一枚

一种慢惊、慢脾风，或因吐泻有伤，或一切病后亏损气血，面白唇青，或吐痰沫，四肢厥冷。宜用

附子理中汤

人参　白术炒　附子制　甘草

大枣一枚为引。

五　疳

夫疳疾虽有心肝脾肺肾五症之不同，总因气血失调而起。或缺乳进谷，或过伤物腻，即成脾疳，或感热症后，即成肝疳，或禀来心气不足，遇病后作惊悸，即成心疳。或久咳而医药失当，即成肺疳。或肝脾血少，以致肾水不足，即成肾疳。必察明而施治之，则无过犯矣。

脾疳多因乳食不调，饥饱不一，或一切病后，亏损气血，以致时热时冷，或大便非结即泻，面黄肌瘦，肚大夜热。宜用

加味逍遥散　兼服健脾肥儿丸

白术八分，炒　白芍八分，炒　当归八分　白茯苓八分　柴胡五分　薄荷五分　陈皮六分　白扁豆一钱，炒　甘草六分　神曲一钱，炒　麦芽八分，炒

白水煎

肝疳多因病后湿热内蒸，肢体虽瘦，而善能哭叫，毛发稀少，饮食频进，或作烦渴，皮肤多黑。凡疳疾者多无股肉，或便食虫。宜用

滋肝散　兼服蚵皮芦荟丸

黄连三分，土炒　白芍八分　陈皮六分　甘草六分　当归六分　白茯苓八分　柴胡五分　山查肉一钱　白术八分　神曲一钱，炒　丹皮六分

白水煎。

蚵皮芦荟丸　专治肝经疳疾，并治继抱子疳疾。

蚵皮一两，炒　芦荟三钱，必拌黄土炒过方可入药，生用则能作泻　甘草五钱　白术一两　当归一两　史君子肉五钱　白芍一两　山药一两　麦芽一两，炒　白扁豆一两，炒　陈皮五钱　黄芪一两　白茯苓一两　山查肉二两，去核净

共为细末，炼蜜成丸，如弹子大，每服一丸，米汤化下，白滚汤下亦可。

心疳一症，体虚神弱而多惊悸，面色乍红乍白，瘦弱畏人。宜用

神枣汤　兼服健脾丸

茯神七分　枣仁六分，炒　白术七分，炒　当归六分　黄芪七分　沙参七分　百合七分，炒　白芍七分，炒　陈皮五分　甘草六分

白水煎。

肺疳面多青白，因肺经受伤，或久咳后而成者，或泄泻肚痛，或朝凉暮热，或病中服药失序，亏损脾肺。宜用

保肺健脾汤　兼服健脾丸八珍散

白术七分，炒　白芍七分，炒　苡仁一钱　白扁豆一钱，炒　黄芪七分　沙参八分　陈皮六分　甘草六分　当归六分　白茯苓七分

白水煎。

肾疳乃肝脾失调，加之禀来先天肾水不足而成，体多瘦弱，目昏神倦，或凉或热，或时时伤风。宜用

保元地黄汤　兼服六味地黄丸

黄芪八分　白术八分，炒　白芍八分，炒　沙参八分　当归六分　丹皮八分　白茯苓八分　熟地二钱　车前子八分

白水煎。

六味地黄丸

熟地黄八两　山药四两　白茯苓三两　丹皮三两　山萸肉四两　泽泻三两

共为细末，炼蜜成丸，每服二钱，白滚水空心吞下。不善吞者，调服亦可。

健脾肥儿丸　治小儿一切疳疾，诸病失调，泻痢后骨瘦如柴，朝凉暮热，夜出盗汗，皮肤干枯，毛发稀落，遍体生疮，精神怠倦，或呕虫食，腹痛常作，面色青浮，四肢虚肿，肚腹胀硬，疳眼羞明，久咳脾虚，黄疳等症。

白术一两，如鸡腿者土炒　白茯苓八钱　川黄连三钱，生用　山查净肉一两　人参三钱　史君子肉四钱，炒　当归六钱　广皮四钱　五谷虫一两，炒　木香二钱　白芍一两，酒炒　白扁豆一两，炒　青皮四钱　山药一两　牡丹皮五钱　甘草四钱

共为细末，炼蜜成丸，每丸重一钱，每服一丸，年大者服二丸，不拘时候，白滚汤下。

八珍散　治小儿虚损，泄泻疳疾，一切病后失调等症。

锅巴四两，炒　山药二两，炒　白茯苓二两　白扁豆二两，炒　苡仁二两　莲肉二两，去皮心　春冬入炒百合二两，　夏秋不加

共为细末，每服二三钱，每服量加白糖五分，白滚水不拘时调服。

痞　疾

症有痞块痞满，皆因气血不和，或腹如鼓硬，或眼羞明，而成雀朦，乃血脉失调，脏腑湿热熏蒸，故肚腹痛，四肢干瘦而黄，药饵不可克伐磨积，惟养中得保速愈。如春和则冰解也。宜用

白术七分，炒　白芍七分，炒　木香二分　白扁豆一钱，炒　白茯苓七分　当归六分　丹皮七分　史君子肉七分　陈皮六分　神曲一钱，炒　甘草六分

白水煎。

猪肝散　专治一切疳痞，病后失调，四肢无力，精神倦怠，骨瘦如柴，并痞眼羞明，雀朦怕亮，痘后目病，翳膜遮睛。

雄猪肝一片重九钱　谷精草一钱　白僵蚕七条，酒炒

共入砂罐内，井水二盅，煨一盅，吃汤并肝，余渣不用。每日一服，用二三十服之后，方可得愈，功有神效。

一种小儿喜食泥土杂物，乃脏腑湿热，脾胃不和，宜服蚵皮芦荟丸。脾胃得和，邪自不能胜正矣。

一种食伤脾胃，有似疳痞之症。宜用

和中丸

厚朴一两，炒　白芍一两，酒炒　苍术一两，土

炒　广木香三钱　陈皮一两　砂仁三钱，去壳　青皮五钱　真神曲一两，炒　甘草五钱

共为细末，炼蜜成丸，如弹子大，每服一丸，淡姜汤化下。此方能治食伤脾胃，腹痛呕吐泄泻，或吐虫食，或受冷气冷物，皆可服之。

痢　疾

痢之一症乃伏暑于脏腑，兼裹饮食而成。气血不能运化，肠胃不能通利，努胀坠痛，而下红白冻矣。红冻属暑，伤血分，白冻属暑，伤气分。若暑毒攻胃，即成噤口乳孩痢症，亦因伤热乳而成。症有轻重之异，体有虚实之分，用药必细心审察，方不至于错误也。

一种痢疾初起体壮滞多者，宜用

分利化滞汤

柴胡　薄荷　厚朴　陈皮　甘草　猪苓　枳壳　归尾　红花　黄芩　木香　山查肉

白水煎。

一种痢疾，暑气重者，恶心腹痛，涩胀不宁，不知饥饿，兼之烦闷，或发热作渴，唇干。宜用

清热导滞汤

猪苓　泽泻　薄荷　红花　陈皮　甘草　枳实　槟榔　大黄　黄连

白水煎。

一种痢疾，兼泄泻腹痛，唇红作渴者。宜用

加味平胃散　或兼服加味香连散。

苍术制　厚朴炒　陈皮　甘草　黄芩　车前子　山查肉　泽泻　白芍炒　木香

白水煎。

一种痢疾，体虚不便，行利导滞者。宜用

加味逍遥散　或兼服加味香连散。

白术炒　白芍炒　薄荷　陈皮　甘草　柴胡　白茯苓　当归　白扁豆炒　砂仁　木香　黄芩

白水煎。

一种暑伤血分，下纯血者。宜用

芩连散　兼服香连丸并六一散。

黄连　黄芩　红花　木香　当归　生地黄　泽泻　山查肉　陈皮　甘草

白水煎。

一种暑伤气分，下纯白者，或兼青色，或兼泄泻者。宜用

加味逍遥散　或兼服加味香连散。

白术炒　白芍炒　砂仁　柴胡　薄荷　当归　白茯苓　木香　陈皮　甘草

生姜一片为引。

一种痢疾，便杂色滞冻，兼呕哕不食者，此症必危乃暑毒深重之故。宜用

黄连解毒汤　或兼服香连丸或六一散。

木香　黄连　归尾　白芍炒　红花　连翘　滑石　枳壳　陈皮　甘草

白水煎。

一种痢疾日久，元气虚弱，面白唇青，或作呕吐，或为药饵伤胃，大便不坠而自利者，宜用六君子汤，或四君子汤，或参苓白术散，或加味香连散，皆可详察，择而用之。

一种人虚，而青唇白，久痢伤气，四肢作冷，宜用补中益气汤，或六君子汤，引加煨姜大枣治之。

一种痢症，暑伤血分，坠胀，作渴，体虚，用药不便燥补，不便消导，又不可分利寒凉。宜用

加味四物汤

当归　川芎少许　熟地　白芍炒　丹皮

白水煎。

一种痢症日久，腰痛，因作坠努，有伤肝肾。宜用

加味地黄汤

熟地　山药　白茯苓　山萸肉　泽泻　丹皮　白芍炒　五味子少许

白水煎。

一种痢疾日久，面白作渴，津液枯干，肢体瘦弱，粪门不收，兼无股肉。宜用

固真汤

人参　黄芪　白术炒　白芍炒　陈皮　甘草　归身　丹皮　五味子少许　山萸肉　补骨脂少许，盐水炒

大枣一枚为引。

一种痢疾初起，毒气深重，米谷汤水不能进，而成噤口者。宜用

加味香连散此方治一切红白痢疾

白术四两，米汤拌炒　黄连一两，土炒　砂仁二两五钱　厚朴三两，炒　黄芩三两　薄荷二两　白茯苓三两　白芍三两，酒炒　木香二两　陈皮二两　甘草二两　山查净肉四两　红花一两　扁豆三两，炒　柴胡二两　车前子三两　当归三两，隔纸烘干，另磨或晒干，恐回潮也

共为极细末，男妇大人每服二钱，或三钱。三五岁者，每服一钱或二钱。乳孩每服五六分。一切痢疾，俱用白滚汤化下。水泻用生姜汤化下。此方药味平和，须宜多服，以愈为度。

一种久痢，元气虚弱，暑热在内，唇红作烦，而成噤口，水米不进者。宜用

石莲子汤　兼服香连丸。

石莲肉　陈皮　甘草　白术炒　当归　川木瓜　白芍炒　白茯苓　白扁豆炒　丹皮　乌梅二枚为引。

一种痢疾，或体虚肿满者，四肢厥冷者，气血衰弱，不能运化谷气者，古方有用八味地黄汤或补中益气汤治之。医家必察明投用，真有起死回生之功。

痢疾初起，最忌涩药。若香连丸，乃痢中之圣药也。孕妇痢疾，治法皆同惟忌用山查、牛膝、红花等味。

痢疾之药，必斟酌不可苟简。如地僻人贫，缺少黄连，不得已以黄柏、黄芩、代之。缺少人参，倍用黄芪亦可。

痢疾有暑热，郁结于小肠，尿管涩痛不利者，药内可加车前子、川牛膝、薄荷、柴胡，或兼以六一散服之。

六一散

白滑石六两，飞过细末　甘草二两

共为细末，每服一钱，或二钱，白滚水调下。

香连丸

黄连一斤，吴茱萸泡汤，将汤拌连炒用　木香四两

上为细末，水叠成丸，量体之大小，服之多寡可也。白滚水吞下。乳孩调化服之，专治一切痢疾，功有神效。

八味地黄汤

熟地二钱　山药一钱　山萸肉一钱　泽泻七分　白茯苓七分　丹皮七分　附子二分，炒　肉桂二分

白水煎。

痢疾有传云，必先发散，嗟乎，内已受伤，岂可复伤其表。如果兼风邪，方内量加防风、葛根、薄荷、柴胡升表气分则可，如在盛暑之时，或量服四味香薷饮，一等愚俗。秋尽冬初仍讲病中有暑，犹加香薷，此愚之甚者也。

有云治痢，必先以大黄、芒硝行利而后可，此说不可执一而误事也。补泄须审轻重虚实，用药治之。

老妪讹传云：撑不死的痢疾、饿不死的伤寒。不知痢疾乃暑气积滞而成，必以饮食清疏，当戒荤腥腻物，服药方望速愈。不然，则有误性命矣。痢疾单方甚多，而有害者亦复不少，不可儿戏轻试。

疟　疾

夫夏伤于暑，秋必痎疟。寒时汤火不能温，热时冰雪不能寒。如凌疟人之状，故谓之疟。其症虽有寒有热，莫不由痰食劳暑风湿诸因而成。迨阴阳相胜，上下交争，即寒热相搏矣。邪乘于阳则作于午前，邪乘于阴则作于午后。疟久则邪盛气弱，即来无定时矣。初起时，必先取其汗，令邪从汗解。若少有塞闭，即累月累日，难望其愈矣。犹必

辨其邪气之浅深，体气之壮弱，活变施治，若泥一定之方药，则谬之甚也。

乳孩之疟，亦受风受暑受湿，或受乳母之热乳而成。初起当升清气，散郁热，而汗自透，然非羌活、独活、白芷、葱头攻发之法也。

疟起于暑风湿热，未有不生痰者。古云：无痰不成疟是也。服药必理气血，分阴阳，则痰自从之而化也。

夏月之汗，得之于风于暑，即生湿热于脏腑间矣。故疟疾之初，必善取其汗，不然疟虽愈，而后随生疮疥于遍体，皆初不曾化其湿也。

疟疾初起，寒热相等，必先汗透而后易截之，邪从汗解也。宜用

透肌汤　乳孩兼用抱龙丸。

防风　干葛　陈皮　甘草　山查肉　薄荷　柴胡　红花　枳壳　熟半夏

生姜一片为引。

如服本方三五剂，而汗出不透者，可加麻黄少许服之。

一疟因暑热盛，作渴作烦，汗不透者。宜用

加味透肌汤

防风　干葛　当归　薄荷　山查肉　枳壳　柴胡　陈皮　甘草　川贝母　煅石膏

生姜一片为引。

疟在五七次上，体壮有食，面赤唇红，寒热相等，来后汗多。宜用

青皮饮　乳孩兼服和中丸六一散。

青皮　知母　山查　枳实　熟半夏　当归　柴胡　陈皮　甘草

生姜二片为引。

疟在五七次上，汗多人虚。宜用

清热逍遥散

白术土炒　白芍酒炒　白茯苓　陈皮　甘草　薄荷　柴胡　当归　黄芩酒炒　丹皮

生姜二片为引。

疟在盛暑伏天，唇红烦躁，作渴，有暑有食。宜用

加味香薷饮

香薷　厚朴炒　白扁豆　甘草　柴胡　陈皮　川贝母

白水煎。

疟在五七次后，人虽虚而多热，其体势在不可截，不可消，不可补者。宜用

加味逍遥散

白术炒　白芍炒　白茯苓　陈皮　当归　甘草　薄荷　柴胡

白水煎。或加生姜一片为引。

疟来过数次，唇红作渴，寒少热多者。宜用

清疟饮

煅石膏　知母　厚朴炒　贝母　当归　白茯苓　青皮　陈皮　甘草　柴胡

白水煎。

疟来数次后，热少寒多者。宜用

桂枝汤

桂枝　当归　白芍炒　白术炒　白茯苓　柴胡　熟半夏　陈皮　甘草

生姜二片，红枣二枚为引。

疟在盛暑之时，唇红面赤，烦躁作渴，欲饮冷水者，或热多寒少者。宜用

加味石膏汤

煅石膏　柴胡　陈皮　甘草

竹叶十片为引。

疟在六七次上，虽寒热交战，而后少汗者，元气不能升，邪故难愈也。虽用截药，恐其不能应手，即或愈，亦多反覆，不可不慎。

凡治疟必先问来后出汗多寡，方可截之。如汗少，均不可下手截也。

疟症日久不愈，常多自汗，面青唇白，或四肢作冷，或手足心发热，神倦食少，宜用

补中益气汤。如热多寒少者，加酒炒常山。寒多热少者，加煨姜肉桂。

疟症日久不愈，寒战后，腰脊作痛者，宜用八物汤。热多寒少者，加酒炒常山。寒多热少者，加煨姜肉桂。如疟久不愈，或为药

饵所伤，后来腰痛腿酸者，宜用六味地黄汤。如热多者，加酒炒常山。寒多者，加肉桂。如疟久单寒不热，手足厥冷者，宜用

独参汤，或当归养血汤，或补中益气汤，或加肉桂、煨姜等味。

疟疾日久，有用人参五分或一钱。或三钱。如夹食疟疾，食重人壮，有用山查、青皮、槟榔者。

热疟方内，或加知母、何首乌常山、黄芩、石膏、鳖甲等味者。

独参汤

人参或一钱二钱三四钱

生姜二片，大枣二枚为引。

当归养血汤

黄芪一两　当归二钱

生姜二片，大枣二枚为引。

药剂之大小，须看症之轻重，人之大小，以定君臣佐使，所以前方，未定等分。

小孩夏秋之时，忽然惊悸，而后发热，竟成疟疾，乃风兼热相搏，而逼于心经之故。宜用透肌汤，兼牛黄锭子，并抱龙丸治之。必戒乳食，避风暑。

如疟与痢并作者，必先治疟为是。

乳孩疟疾，惟戒乳大半，或照方乳母服药，亦有微效。

治截疟良方，无论男妇长幼新久

生姜一片钱大　料豆四十九粒　乌梅三个　常山三钱，酒炒　槟榔三钱　红枣三枚　甘草三钱

用水二碗，煎一碗，露一夜，次早空心温服，二服再煎，次早再服。服药后不可吃饮食，戒鲤鱼、鸭蛋、牛肉、羊肉。疟疾来过三次后，方可服此药。

如遇天雨，即露于廊檐下。

中　暑

夏月伏天，阳气浮于外，阴气伏于内，炎热腾蒸而成暑，乃六气之一。中暑毒者，其性命损于时日之间，可轻视也哉？

正伏时，中暑者，忽然昏闷如醉，或流痰涎，作喘，面赤，不省人事者，宜随服竹叶石膏汤，并牛黄锭子、六一散、抱龙丸。

中暑面赤作渴，烦躁呕吐者，宜服

四味香薷饮或加黄连

香薷　厚朴炒　白扁豆炒　甘草

白水煎。

中暑兼腹痛，恶心泄泻，有食者。宜服

加味香薷饮

香薷　山查肉　枳实　猪苓　陈皮　甘草　白扁豆炒　厚朴炒

白水煎。

小儿中暑成暑厥，则人事不省，迷蒙昏沉，痰热阻窍所致，宜服六一散、牛黄锭子、抱龙丸等治之。

中暑而气虚面青，肢体软弱，大小便自利，兼作寒热者。宜服

人参竹叶石膏汤　乳孩兼服五苓散。

人参　石膏　竹叶　粳米

白水煎。

中暑兼感风者，宜服四味香薷饮。盖香薷一味，即大发散之药，不可重加羌活、川芎等味矣。

伏时中暑裹食，而秋后成疟痢泄泻等症，又在各本症详著。

大人中暑者，内虽服药，而外取新荷叶，并西瓜，多列于榻旁，亦解暑之一则也。

五　疸

疸之一症，由四时郁热而成，或脾胃不和，表里不达，以致肝肺火邪湿热薰灼，则眼目皮肤四肢，黄如金色，或生黄衣，出黄汗，而人分大小，症有五种，食疸、黄疸、酒疸、谷疸、女劳疸者，必分表里虚实轻重治之。

乳孩此症，多因吃乳母热乳而成。然必戒乳，吃药方效，以米汤薄粥代之，其乳母亦当如方服药，亦有功益也。

黄疸初起者。宜用

茵陈汤　幼孩兼服抱龙丸并六一散

茵陈　柴胡　薄荷　当归　猪苓　陈皮　车前子　白茯苓　甘草梢

白水煎。

黄疸脾虚有郁热者。宜用

郁金逍遥散

白术土炒　白芍酒炒　当归尾　白茯苓　黄芩　红花少许　柴胡　陈皮　甘草　薄荷　郁金如无真者，以丹皮代

竹叶三片为引。

黄疸神效良方

川芎二钱五分　乌梅三个　当归二钱五分　白茯苓二钱五分　生藕节七个　千年矮一两，一名六月雪

上方用水三碗，露一宿，空心温服。吃药后，随量饮酒，令得微汗，二三剂可以全愈。小儿三次服一剂可也。

黄疸而人虚体瘦，兼骨蒸劳热者。宜用

加味地黄汤

熟地黄三钱　薄荷六分　泽泻一钱　山萸肉一钱五分　白茯苓一钱　柴胡六分　牡丹皮一钱　山药一钱五分

白水三盅，空心煎服。

疸症须戒鱼腥、酒面、猪肉、鲤鱼、羊肉、野鸡、等物。

幼科直言　卷五

清　江宁　孟　河介石编著
四明　曹赤电炳章校点

伤　寒

小儿伤寒，与大人相等，但乳孩感真伤寒者少，而成童子者方有之也。书云：冬月中寒，深入经络，至春夏而作，则为正伤寒。余则类其症而已。治小儿伤寒，若泥于传经，以日期分表里，多舛误矣。惟察症分阴阳表里虚实而治之。

伤寒初起在表，发热头疼，脊强，腰痛，宜用

羌活汤

羌活　川芎　陈皮　甘草　干葛　桔梗　枳壳　山查肉

葱白一寸为引。

伤寒发表已过，仍在表里相兼，发热，恶心，作渴。宜用

干葛解肌汤

干葛　陈皮　甘草　柴胡　枳壳　神曲　川芎　红花　山查肉

葱白一寸为引。

伤寒得汗之后，身体微热，内症多而外症少，唇红，作渴，腹痛。宜服

加减柴胡汤

柴胡　陈皮　甘草　干葛　薄荷　黄芩　枳实　前胡

生姜一片为引。

伤寒厥阴，腹痛作泻，或成结胸者。宜服

桂枝汤

桂枝　厚朴炒　陈皮　甘草　桔梗　红花　柴胡　麦芽　神曲　木香

生姜一片，红枣二枚为引。

伤寒传里为热，发热作渴，谵言乱语，血分生热，小便赤黄，兼得微汗，传入少阴之症。宜服

黄芩芍药汤　兼服牛黄锭子。

柴胡　黄芩　赤芍　陈皮　甘草　花粉　桃仁　山查肉　归尾

白水煎。

伤寒至八九十日之间，传入足厥阴肝经，大便结塞，小便赤色，腹痛昏迷作渴。宜用

桃仁石膏汤

桃仁　石膏煅　陈皮　枳壳　大黄　归尾　黄芩　甘草

白水煎。

伤寒表症解，里症作，身有微汗而作渴者，鼻干目红，耳窍不通，兼手足心热。宜用

连翘饮

连翘　生地黄　陈皮　白芍炒　甘草　当归　花粉　黄芩　柴胡

竹叶三片为引。

伤寒表里阴阳得分，仍作渴作烦，乃太阴脾经之郁热耳。宜用

丹皮逍遥散

白术炒　白芍炒　陈皮　甘草　当归　白茯苓　丹皮　柴胡　薄荷

白水煎。

伤寒失表传里症而发斑者。宜用

化斑汤

黄芩　生地黄　柴胡　红花　连翘　归

尾　陈皮　甘草

白水煎。

伤寒发热狂言，其证似阳证，而大便泄泻，不渴，乃厥阴症也。宜服

官桂逍遥散

白术炒　白芍炒　白茯苓　当归　柴胡　薄荷　陈皮　甘草　官桂

生姜一片为引。

伤寒八九十朝后，面青，四肢懒动，齿根红紫，或出血，或作渴，大便不通。其证似厥阴而实伏热在内。宜用

黄连解毒汤

黄连　石膏　桔梗　当归　陈皮　甘草　连翘　知母

白水煎。

伤寒表里失序，汗未通达，遗留积热，或生毒，或手足不利，强痛不伸。宜服

生地芍药汤

生地黄　白芍　当归　连翘　陈皮　甘草　白茯苓　川贝母　苡仁　百合

白水煎。

伤寒之后，表里俱清，身体瘦弱，皮肤干枯，宜服六味地黄汤，兼服肥儿健脾丸。脾肾调和，自然复元矣。

伤寒厥阴，四肢逆冷，多阴，有用附子理中汤者，有用独参汤者。此又在方脉中论，医家临症酌之可耳。

医治伤寒，每以小儿风裹饮食，为伤寒治之，以轻为重，非大表，即大消，常误事于此。俗云：伤寒不药得中医者，乃惟恐其错治也。迩来有见一风食杂病，辄云慢寒，则谬甚矣。

伤寒咳嗽

小儿伤风，四时皆有，或裹食，或裹热，而冬春亦有寒伏火者，有伤风，又复加伤风，谓之重伤风。有咳嗽作呛声者，有病后表虚而易得伤风者，有风裹热而初时失表散，即成顿咳者。治法须分轻重虚实，体之大小，用药可耳。初起病在肺胃在表，日久在脾，脾乃肺之母也。

初伤风，或咳嗽，或发热。宜用

杏苏饮幼孩兼服姜汤抱龙丸。

枳壳　杏仁　紫苏　防风　陈皮　甘草　桔梗　前胡

生姜一片为引。

伤风有涕泪咳嗽，眼胞鼻梁，或兼作微浮者。宜服

加味杏苏饮　兼服抱龙丸或锭子

杏仁　枳壳　前胡　川芎　陈皮　甘草　熟半夏　苏子

生姜一片为引。

重伤风咳嗽，并寒伏火。宜用

羌活汤　小孩兼服锭子。

羌活　红花　陈皮　枳壳　桔梗　甘草　苏子炒　杏仁　干葛　薄荷

生姜一片为引。

伤风咳嗽，面青，唇白，体弱，或兼大便不实者。宜用

加味柴苓汤

柴胡　白茯苓　甘草　陈皮　防风　白芍炒　当归身　白术炒

生姜一片，红枣一枚为引。

伤风咳嗽，面色青白，或自汗，或病后表虚，时时伤风，体弱或泄泻者，不便重用发散，宜用四君子汤或六君子汤，或补中益气汤。气壮脾健，自无此患矣。

伤风日久，存热在肺成顿嗽，此症有二三月不愈者，一咳即一气无休，或吐痰食，面目作浮，或眼白作红，或脐内带血块血系者。宜用

清肺饮　兼服牛黄丸并锭子。

黄芩　苏子　贝母　归尾　陈皮　甘草　苡仁　花粉　连翘　薄荷　桑白

竹叶三片为引。

顿咳日久，面色青白，身体瘦弱，或为药饵伤败元气者。宜服

保肺健脾汤　兼服健脾肥儿丸。

苡仁　白术炒　山药　陈皮　白茯苓　白芍炒　当归　桑皮

白水煎。

腹　痛

小儿腹痛，有风痛、积痛、热痛、冷痛、虫痛，治法随症治之。

伤食腹痛，或病在一时，而无外证者。宜用

加味平胃散　小儿兼服和中丸。

苍术　厚朴炒　陈皮　甘草　木香　白芍酒炒

生姜一片为引。

积滞腹痛，体壮者，宜用

化滞汤　兼服和中丸。

槟榔　厚朴炒　陈皮　甘草　枳壳　归尾　青皮

生姜一片为引。

腹痛有外证初愈，而积滞未行，元气未亏，大便不通，或结燥，唇红者，宜用

导滞汤　兼服牛黄丸。

大黄　厚朴　槟榔　陈皮　甘草　青皮　归尾　白芍酒炒

白水煎。

腹痛，面青，唇口青色，腹内一块或高起，手不可摸者，此证有虫。宜用

史君子汤　兼服和中丸。

当归　厚朴　木香　白芍酒炒　甘草　陈皮　神曲　史君子肉

生姜一片为引。

腹痛受冷，无病忽然而作，或兼泄泻者，宜用

防风汤　兼服和中丸。

防风　木香　厚朴炒　白芍酒炒　甘草　苍术炒　砂仁　陈皮　麦芽

生姜一片为引。

腹痛而体虚弱，或在病中，不可消导，行滞者，宜用

加味逍遥散

白术炒　白芍炒　神曲　当归　木香　陈皮　甘草　白茯苓　柴胡　薄荷

生姜一片，红枣一枚为引。

腹痛因热而作者，面赤作渴，此证甚少。若察明此症，宜用

栀子饮

栀子炒黑　白芍炒　黄芩炒　柴胡　陈皮　甘草　神曲炒　麦芽炒　当归

白水煎。

头　痛

小儿头痛，种种不一。有感风痛者，用防风、干葛、川芎、柴胡。有热痛者，用黄芩、丹皮、薄荷、柴胡。有误服燥补者，用知母、甘草、花粉、归尾。有痰者，加贝母。虚火上炎，用生地四物汤，或六味地黄汤等类治之。在医家临症细辨之可也。

霍　乱

霍乱之症，因风入胃，阳气不舒作吐，阴气不纳作泻。四时皆有，惟夏秋月因伏暑在内，阴阳之气相逆而作。一种干霍乱，呕而不吐不泻，阳气不升，风热郁而不达，呕哕不宁。今存方数种，详辨择用可也。

霍乱上吐下泻，升气宽中，分阴阳。宜用

术苓汤　兼服和中丸或五苓散。

苍术制　厚朴炒　山查　防风　柴胡　木香　陈皮　茯苓

生姜一片为引。

霍乱吐泻，面青唇白，四肢逆冷。宜用

加减五苓散

白术　白茯苓　官桂　木香　防风　熟半夏　陈皮

生姜一片为引。

霍乱吐泻，气壮食重者，宜用

宽中汤

山查　厚朴炒　陈皮　熟半夏　桔梗　麦芽　神曲　木通　木香

生姜一片为引。

干霍乱。宜用

顺气汤

柴胡　薄荷　枳壳　山查　陈皮　桔梗　生姜一片为引。

霍乱吐泻，在夏秋时，有伏暑在内，面赤唇红作渴。宜用

加减五苓汤　兼服六一散。

柴胡　陈皮　甘草　厚朴炒　山查　白茯苓　白芍炒　麦芽炒　扁豆　猪苓

白水煎。

霍乱吐泻，阴阳不分，伏热在内，宜用蜀漆米煎汤服之。亦有神效。

眼　症

小儿病眼，多因感风热而攻上焦，或赤红浮肿，服药先以清风、散热、活血为主。其后方可清凉。凡害眼不宜头痛，头痛多能伤目，小儿目疾，万不可点洗治之。初起宜用

清风散　乳孩兼服抱龙丸

川芎　羌活　柴胡　薄荷　红花　归尾　桔梗　枳壳　陈皮　甘草

引用葱白一寸。目中有翳，加决明子。

目疾发表已过，单有热症。宜用

清热饮　兼服犀角丸。

黄芩　生地　当归　川芎　桑皮　连翘　麦门冬　丹皮　陈皮　甘草

白水煎。有翳加决明子，热腾盛者加黄连。

一种痞眼羞明，或成雀瞎者，多因病后失调，或多伤药饵成痞眼。其身体如瘦疾者，宜服猪肝汤或六味地黄丸，或健脾肥儿丸治之。此又不在风热眼中论之。

一种害白眼，不大红，微羞明，生眵者，亦当疏风清热可愈。

小儿奶癣疮症

此疮发于百朝，一周内外，系禀胎毒，生连背上，出水作痒，沾衣湿被，头堆厚痂，发而又发，毒气出尽，自然渐愈。万不宜用药搽洗，即如香麻油、柏油、微子油、烛油并花椒、苦茶、米泔等水，一概不可。儿戏轻试，虽极轻微搽洗之药，亦能受害。犯者多致伤命。倘疮干入内，即结热生痰作喘，腹胀成惊，或颈项红肿结核，或发热迷闷作呕，其证似受外感，实系内毒相搏于外，当用生荸荠去皮，每次以十数枚捣汁，徐徐饮之。但能咳嗽，有涕泪则轻，疮复发为愈。平日用清水温洗无妨。若疮盛者，必常服二圣解毒丸，能清热化痰、消散毒气。

二圣解毒丸

川贝母　金银花

共为极细末，炼蜜成丸，每丸重一钱，每次服一丸，白滚水化下。

乳母戒葱、蒜、椒、姜、烧酒、牛、羊、鲤鱼、动火等物。

疝　气

小儿疝气，与大人不同。大人之疝，多因肾虚受冷。若劳碌着急，则举发之。治法多用橘核、茴香温暖之味。小孩此症，虽因受冷，然多肝气相兼，肾不纳肝之故，不可随例而治。

童子疝气，或右一肾子胀大而痛者，当用

加味逍遥散

白术　白芍炒黄　白茯苓　柴胡　薄荷　陈皮　甘草　木香　香附醋炒　当归

生姜一片为引。

乳孩禀赋性急，好哭叫，亦能令肾子偏大。过时随愈，不可用药治之。服抱龙丸或

牛黄锭子，和其肝气可耳。

肿　症

肿之为病不一，有脾虚作肿，有湿气作肿，有疮毒入内作肿，有肺气虚作肿。肺主皮毛，受热、受风、受湿，亦能作肿。有湿热流行下部，肾囊小便，俱肿大而明亮者。凡肿病兼腹胀硬，或作喘者为重，当分别治之。

脾虚作肿无杂症者，宜用

健中汤　兼服肥儿丸。

白术炒　白芍炒　苡仁　扁豆炒　陈皮　白茯苓　柴胡　神曲炒

白水煎。

病后失调，元气有亏，脾虚作肿。宜用

健脾汤

广藿香　白芍炒　白术炒　白茯苓　苡仁　陈皮　甘草　车前子

白水煎。

脾虚伤食作肿，善能饮食。宜用

消中分利汤

厚朴炒　山查　神曲炒　麦芽炒　陈皮　猪苓　青皮　泽泻　大腹皮

白水煎。

疮毒入内作肿，或兼微喘。宜用

连翘饮

连翘　贝母去心　牛蒡子　陈皮　桑皮　桔梗　甘草梢

白水煎。

一种肿症，元气无亏，不过因湿热蒸肺，药宜微汗即愈。然此症甚少，不可以发汗而尝试之。此症宜用

解饥汤　兼服抱龙丸。

枳壳　干葛　陈皮　防风　川芎　桔梗　柴胡　薄荷

葱白一寸为引。

胀　症

胀症与肿不同，有伤饮食，胸前作饱胀者。有病后失调，以致肚腹肿胀者。有疮毒入内而肿胀者。有元气大亏，内少真气，而肚腹作肿胀者。须临症辨明施治之。

伤饮食胸前作饱者，宜用

加减平胃散　小儿兼服和中丸。

厚朴炒　陈皮　桔梗　白芍炒　柴胡　山查　枳壳　神曲炒

生姜一片为引。

疮毒入内，肚腹肿胀者，宜用

银花解毒汤

金银花　牛蒡子　甘草　连翘　柴胡　黄芩　扁豆炒　车前子　白芍炒　陈皮

白水煎。

元气亏损，真气有伤，肚腹作虚胀，此症必重。宜用

加减六君子汤

人参　白术炒　白茯苓　白芍炒　陈皮　甘草　扁豆炒　苡仁　柴胡

生姜一片，大枣一枚为引。

四肢干瘦，肚腹肿硬，夜间发热，或出盗汗。宜服

天真膏

白术一斤，去节　白芍四两，炒　沙参四两　白茯苓四两　陈皮四两　丹皮三两　当归身二两

共入沙器内，井水煎，去渣，成珠，再加好蜜一斤，同熬数滚，入磁器内收用。每服半酒杯，白滚水不拘时调下。

出　汗

小儿出汗，有湿热出汗，因脾胃不调，有湿有热，内蒸而外出汗者，谓之湿热出汗。面青唇白，禀赋气虚而出汗者，谓之虚汗。有病后面黄瘦弱，夜出汗者，谓之盗汗。有因

脾胃不和，内郁风热，外兼发热，必出汗而外热方退者，谓之邪汗。用药不一，必察其元气虚实治之。

湿热出汗。宜用

柴胡汤　小儿兼服和中丸或抱龙丸。

黄芩　柴胡　白芍炒　丹皮　陈皮　甘草　山查　神曲

白水煎。

小儿面青唇白，出虚汗者，宜用

黄芪汤

黄芪　扁豆炒　白芍炒　当归身　苡仁　白茯苓　沙参　地骨皮

浮麦一撮为引。

小儿病后，面黄瘦弱，夜出盗汗者，宜用

加味健中汤

白术炒　白芍炒　扁豆炒　黄芪　陈皮　甘草　白茯苓　丹皮　枣仁　沙参

大枣一枚为引。

小儿身体发热出汗而热方退者，宜服

逍遥散

白术炒　白芍炒　白茯苓　柴胡　当归　陈皮　甘草　薄荷

生姜一片为引。

喘　症

诸病之中，皆有犯喘者，当随证看表里虚实治之。但喘必重，诸喘皆为恶候，鼻干孔掀，腹胀，虽卢扁亦难挽回矣。

小儿伤风咳嗽，有涕泪作喘者，宜用

三苏饮　兼服抱龙丸。

苏梗　苏子炒　苏薄荷　陈皮　杏仁　川芎　防风　枳壳

葱白一寸为引。

小儿伤食作喘者，宜用

山查汤　兼服牛黄锭子。

山查肉　陈皮　桔梗　苏子　枳壳　柴胡　杏仁炒

生姜一片为引。

小儿唇红面赤，内热作喘者，宜用

连翘汤　兼服牛黄锭子。

连翘　花粉　牛蒡子　桔梗　贝母　黄芩　麦冬　枳壳　陈皮

竹叶三片为引。

小儿内热盛，食重，大便闭结，作喘者，宜用

大黄汤

大黄　石膏　桔梗　花粉　苏子　薄荷　归尾

白水煎。

小儿咳嗽，有惊作喘者，宜用牛黄锭子或抱龙丸。

喘胀内热，大便不通，一切火毒症，宜用

润肠丸

大黄四两　归尾一两　枳壳一两　牛蒡子一两　芦荟三钱

共为细末，炼蜜为丸，如弹子大，每服一丸或半丸，白滚水化下。

小儿虚喘，或出汗，面青唇白，或兼泄泻。宜用

加减逍遥散

白术炒　白茯苓　白芍炒　陈皮　甘草　柴胡　石斛

生姜一片，红枣二枚为引。

大人虚喘，出汗泄泻，宜用参耆桂附等类，此又在方脉中论也。

童子痨

小儿十岁以内，谓之疳疾。十岁以至十六岁，谓之童子痨。有因胎元不足，有因病后药饵失宜而成者。有因奔走负重，劳伤而成者。其症有咳嗽骨蒸发热，或吐血，或盗汗怔忡，或呕哕作泻，女子或肚郁经闭，病类种种。然皆属真元有亏，如此等症，照方依治，或可救其万一耳。

咳嗽吐痰，面青唇白，骨蒸发热。宜用

加味养血汤

黄芪　当归　白芍炒　白茯苓　沙参　苡仁　百合　甘草　白术炒　麦冬

莲米五枚去皮心为引。

胎元不足，面白心慌，或泄泻盗汗。宜用

加减归脾汤

人参　黄芪　枣仁炒　归身少许　白茯苓　水香少许　白芍炒　百合

大枣一枚为引。

咳嗽虚痨，夜热咽痛，大便干结，或有女子经闭。宜用

加味地黄汤

熟地　山萸　山药　丹皮　泽泻　白茯苓　麦冬　沙苑蒺藜

白水煎，宜饿服。

痨症咳嗽咽痛，大便燥结，面赤唇红，虚火上炎，或吐血。宜用

滋阴益气汤

黄芪　归身　丹皮　苡仁　生地　沙参　桑皮　麦冬　白扁豆炒

藕节一枚为引。

吐　血

小儿吐血症，与大人不同有肺火者，有途路奔伤者，有久咳成顿嗽者。必究其因而治之。

小儿吐血，面赤唇红。宜用

滋肺饮

生地　沙参　麦冬　黄芩　归尾　桑皮　丹皮　玄参　枇杷叶去毛　白芍

藕节为引。

小儿咳嗽，吐血，虚怯者，与前童子痨治法相等。

小儿顿咳吐血者，不在此论，方见咳嗽论中。

痨症阴虚者，应用滋阴之药，如六味地黄汤，沙参、鳖甲等类。受之不添泄泻，则可医也。

痨症阳虚者，应用补中汤或四君子汤、归脾汤、河车等类。服之咽喉不痛、不烦、不呛，则可望其愈也。

痨症但服对症之药，反增他病，实难愈也。

阴虚者，服滋阴之药而不见效。阳虚者，服气分之药而不见效。皆水少火盛，阴阳两亏，在医家亦束手无为矣。

虚痨之症，不究其本，面医病证之标，如头痛用川芎，咽痛用桔梗、栀子，泄泻用木通、泽泻，气胀用香附、木香，发热用苏梗，浮肿用腹皮、葶苈，出汗用浮麦，喘嗽用苏子、半夏，吐血用茜草等类，若如此医治，是为催命牌也。

龟胸龟背

龟胸者，胸前之骨高起而作痛。龟背者，腰中之骨拱起。又名曰龟背痰，皆因禀受胎气不全，借感风湿，风热面生痰入肺。其症胸喘、痰涎气壅，如是者，作二三月，其病方定。前高后弓此亦因人家风水坟墓之由来也。治法先宜清痰利气之药，然后养脾固肺，主一身之经络，服药止可救其性命，不能愈其残疾也。发热觖喘，痰壅初起。宜用

利肺汤　小儿兼服锭子并抱龙丸。

苏子炒　桔梗　薄荷　前胡　独活　杏仁炒　枳壳　陈皮

生姜一片为引。

外证渐减，有痰热者，宜用

清肺饮

天麻　胆星　贝母　桔梗　陈皮　花粉　桑皮　枳壳　黄芩

白水煎。

咳嗽气壅，前症已退者，宜用

固金汤　兼用健脾肥儿丸。

苡仁　紫菀　百合　陈皮　甘草　白术

炒　白芍炒　当归　僵蚕炒　白茯苓

白水煎。

单龟背，痰饷已定者，乃先天肾气不全。宜用

加味地黄汤

熟地黄　山萸肉　白茯苓　泽泻　山药　牡丹皮　藏蕊

白水煎，空心服。

单龟胸，气壅已平，当保肺健脾。宜用

加味四物汤　兼服肥儿丸。

当归　川芎少许　白芍炒　熟地黄　苡仁　藏蕊　白茯苓　山药　扁豆炒

白水煎。

中　湿

小儿湿症，皆因潮湿，风雨地气，以致腿脚肾囊小便肚腹作肿生疮。亦有因之而作吐泻者，看元气虚实用药。湿热薰蒸，清道不通，沉重不利，故有是症。

受湿。腿腹肿胀。宜用

加味术苓汤

苍术炒　厚朴炒　木瓜炒　腹皮　柴胡　陈皮　猪苓

生姜一片为引。

中湿，肾囊小便发肿生疮者，宜用

车前利湿汤

白术炒　白芍炒　白茯苓　苡仁　当归　白扁豆炒　车前子　神曲　怀牛膝

白水煎。

中湿生风，满身作痒，疮疥遍身者，宜用

防风散

白术炒　白芍炒　红花　金银花　防风　荆芥　苡仁　白茯苓　连翘　陈皮　甘草

白水煎。

脾虚受湿，肿胀，或作泄泻，或兼呕吐。宜用

加减逍遥散

白术炒　白芍炒　白茯苓　陈皮　甘草　柴胡　当归　神曲炒　熟半夏　石斛

生姜一片为引。

吐虫解虫

虫之一症，种种不同，有寒气伤胃而出者，有脾胃郁热而吐者有饮食内伤致生湿热便虫者，有热蒸肺胃，鼻内出虫者，有大肠受风，便寸白虫者。小儿面部青色，肝脾不舒，多有虫症。腹内拱痛，手不可近，即虫症也。治法消虫，惟宜调脾胃，清郁热，节饮食，气血和畅则无是症矣。然各症内出虫者，又在各症中论之。脾胃郁热，作渴唇红，吐虫者，宜用

加减平胃散

厚朴炒　陈皮　甘草　白芍炒　丹皮　黄芩炒　神曲炒　柴胡　史君子肉

生姜一片为引。

食伤脾胃，因生湿热，下虫，腹痛者，宜用

史君子汤　兼服和中汤。

史君子肉　苍术制　厚朴炒　陈皮　白芍炒　甘草　柴胡　槟榔　山查肉　木瓜

生姜一片为引。

寒气入胃，吐虫，面青，手足作冷者，宜用

桂枝汤

桂枝　防风　神曲　史君子肉　厚朴　木香　陈皮　白芍

生姜一片为引。

肺胃湿热，鼻内出虫者，宜用

加味甘桔汤　兼服抱龙丸。

甘草　桔梗　桑皮　丹皮　陈皮　黄芩　白芍　乌梅肉　史君子肉

生姜一片为引。

小儿脾弱面青，似有惊风而解虫者，宜用

加减逍遥散

白芍　白术　当归　白茯苓　柴胡　陈皮　甘草　木香少许　史君子肉

生姜一片为引。

有老人常便寸白虫，诸药不效，后服补中益气汤加乌梅、防风、生姜、大枣、而愈。

鼻　衄

鼻衄者，鼻中流血不止，乃肺热也。小孩受热物伤肺，即有此症。或察阳脏者，常多此患。有跌伤出鼻血者，或常有此症。俗名沙鼻子。大约阳乘于阴则鼻衄，当察其虚实治之。

肺热鼻流紫血者，宜用

竹叶石膏汤　兼服犀角丸。

煅石膏　连翘　黄芩　花粉　甘草梢　薄荷　柴胡

竹叶五片为引。

肝肺火盛，唇红面赤，鼻衄不止者，宜用

犀角地黄汤　兼服六一散。

生犀角　生地黄　连翘　黄连　白芍　甘草梢　玄参　麦冬　陈皮

藕节一枚为引。

脾肺虚弱，虚火上炎，鼻常流血水者，宜用

滋肺饮

山药　苡仁　茯苓　白扁豆炒　桑皮　丹皮　归尾　甘草梢　百合

柿蒂三枚为引。

肺肾不交，鼻常流血者，身体干瘦，毛发不润，心慌气弱，鼻衄者，宜用

加味地黄汤

熟地黄　山萸肉　山药　丹皮　泽泻　白茯苓　麦冬　葳蕤　黄柏炒　车前子

白水煎。

一种大人鼻衄，流血不止，盆盆者，其脉微细不起，有止用六味地黄汤加龟板、鳖甲而愈者。

一种大人鼻衄，流血盆余者，六脉虚大，乃命门火衰，不纳肺气。有用八味地黄汤，加五味子，煎汤冷服而愈者。此等症候，又在医家临时细察，神而明之可也。鼻中流血不止者，用生白矾二两为末，入热水内，将脚浸入盆中。

血流不止者，用热酒四五斤，将脚入盆内浸之。

发　热

发热一证，各症中皆有者，当随其表里虚实治之。

潮热者，或凉或热是也，有实有虚。当分别治之。内有食者，气壮唇红作渴。宜用

加减平胃散　或兼服和中丸。

柴胡　厚朴　山查肉　陈皮　甘草　神曲　青皮

白水煎。

潮热而唇白，神倦怠者，乃体虚也。宜用

加味养血汤　兼服健脾丸。

黄芪　白术炒　白芍　丹皮炒　柴胡　陈皮　甘草　当归

白水煎。

久热症，或因病后失调，或过伤药饵，体瘦干枯。宜用

归术汤　兼服健脾丸。

当归　白术炒　地骨皮　白芍炒　丹皮　沙参　黄芪　陈皮　甘草

或加人参

白水煎。

伤食发热者，唇红气粗，或夜热尤重，或兼腹痛。宜用

山查汤　兼服和中丸。

山查肉　柴胡　麦芽　青皮　陈皮　白芍炒　薄荷

白水煎。

手足心发热如火者，此热必有大病。或

有毒，或有惊，或出瘄痘，当察症治之。或消导，或解毒，或发表可也。发热将生惊者，面目青色，神气不安。宜用

天麻饮　兼服抱龙丸。

天麻　防风　贝母　陈皮　干葛　薄荷　枳壳　桔梗　甘草

生姜一片为引。

久热不退，干枯瘦弱，或误伤药饵，饮食或太饱太饿，以致久热者，宜用

六味汤　或兼服六味地黄丸。

熟地黄　山萸肉　山药　丹皮　泽泻　白茯苓

白水煎。

口　疮

口疮属热，但有虚实不等。有因乳母，吃动火热物，小孩感受而生者。有小孩过伤饮食，动湿热而生者。药宜清凉。有病后湿热上蒸而生者，虽系内热，有因虚火上炎者，甚有气虚胃火盛而成牙疳者，最难于用药。若以清凉治之，又与本病虚怯碍手，必量酌药饵。近有治口疮者，药内又兼消导，此则为害不浅矣，当慎之。

内热生口疮，或牙根舌肿者，宜用

连翘汤　兼服犀角丸。

连翘　僵蚕　陈皮　甘草　桔梗　黄芩　丹皮　或加黄连

白水煎。

病后虚热，生口疮者，宜用

调中汤

生黄芪　白僵蚕　甘草　当归　白茯苓　扁豆炒　白芍炒　苡仁　连翘

白水煎。

垫舌马牙

垫舌者，舌下重厚是也。乃小儿受母腹中积热，多有此症。亦有因胎热而生马牙者，牙根之上，如米尖总属胎热，垫舌宜用银针挑破，少出毒血可愈。但马牙必用新青布，水湿擦去。亦有用银针挑去者。二证俱宜用犀角丸、黄连水、化毒丹治之。气壮能裹乳者易愈。如胎弱而有热，不能裹乳者，虽用药亦难愈矣。

头　晕

小儿头晕，虚实不一。有面白气虚而作晕者，有面红火盛而作晕者，有病后气虚而作晕者。当辨其有余不足治之。

唇白气虚而作晕者，宜用

养血健脾汤

白术炒　白茯苓　当归　沙参　丹皮　黄芪　陈皮　甘草　白扁豆炒

白水煎。

气壮面红火盛而头晕者，宜用

生地汤

玄参　当归　生地黄　黄芩　陈皮　甘草　薄荷　柴胡

白水煎。

病后元气有亏而作晕者，宜用

加味四物汤

熟地黄　川芎少许　白芍炒　当归　白茯苓　白扁豆炒

白水煎。

耳　聋

小儿耳聋，最难治之。一种肝肺火盛，以致内生湿热，耳出脓水过多，成耳聋者。一种着惊吓，有伤心经，有伤肝气，以闭肾气成耳聋者。一种肝肺火盛，耳中作痒，以致挖伤，成耳聋者。虽对症服药，十愈其二三。若内伤耳底之明瓦，则不可愈矣。此症亦因人家风水使然者，有之耳。

清肝散

柴胡　薄荷　陈皮　甘草　当归　车前

子　白茯苓　桔梗

白水煎。

小儿着惊吓，有伤心经，有伤肝气，以闭肾气，耳聋者，宜用

养肝汤

沙参　石菖蒲　蝉退　当归　茯神　生地　枣仁　柴胡　陈皮　甘草

白水煎。

小儿病中服药不当，以闭肾气耳聋者，宜用

加味地黄汤

熟地黄　山萸肉　丹皮　泽泻　麦冬　白茯苓　山药　沙苑蒺藜

白水煎。空心服。

一种肝肺火盛，耳中作痒，以致挖伤耳聋者，宜用

玄参汤　兼服犀角丸。

玄参　黄芩　麦冬　白茯苓　丹皮　桔梗　陈皮　甘草　连翘　薄荷　柴胡　当归

白水煎。

齿缝出血

小儿齿缝出血者，皆因肺胃火盛，或食辛热甜糖，厚味之物，治宜清肺胃火邪而自愈也。

齿缝出血，宜服

连翘解毒汤

玄参　陈皮　甘草　黄连　石膏　薄荷　柴胡　归尾　连翘

竹叶为引。

一种齿缝出血日久，服前方而不愈者，宜用

加味地黄汤

熟地黄　山药　山萸　丹皮　白茯苓　泽泻　黄柏　车前子

白水煎，空心服。

丹　瘤　名赤游风

瘤者，流走动也。其症如红云成片，如胭脂色。总属胎热，或偕烘衣被，或受乳母热乳而发。走入心腹者，作喘作胀，不裹乳食，毒气深入而胎弱者，即难治之。或肾囊粪门，皆红如胭脂色。或出水者，或起干皮者，治宜清热解毒，乳母亦兼服药治之为是。

胎瘤游风，宜用

黄连解毒汤兼服犀角丸。

黄连　桔梗　连翘　土贝母　丹皮　甘草梢　黄芩　生地　白僵蚕　玄参

白水煎。

乳母宜服

银花解毒汤

金银花　甘草梢　连翘　归尾　丹皮　土贝母　白僵蚕　生地　黄芩　玄参

白水煎。

胎瘤红肿处，宜用敷药。

生大黄为细末，合生桐油调敷。

又方

生大黄一块，人乳磨敷瘤上。

胃　脘　疼

胃脘疼者，即心口疼也，乃胞络间痛，非真心痛也。小儿此症多因风裹饮食，或积冷伤胃，痛不能忍，食与冷气痛者，十居八九。气裹食痛者，亦有二三。积热痛者，十之一耳。必审明分别施治之。而真心痛者，旦发夕死，夕发旦死。此一种不可医治矣。

风裹食，胃气痛者，宜用

香砂散　兼服和中丸。

制苍术　木香　砂仁　陈皮　熟半夏　甘草　防风

生姜为引。

积冷作痛，呕吐痰水者，宜用

加味平胃散

防风　陈皮　制苍术　厚朴　木香　枳壳　白豆蔻　制香附　甘草　槟榔

生姜为引。

胃气虚寒，身体瘦弱，或遇风冷饮食，胃脘痛者，宜服

加味逍遥散

白术　白芍　当归　柴胡　薄荷　陈皮　甘草　白茯苓　木香　防风

生姜为引。

一种热痛者，唇红面赤，作渴，热气上攻，而即痛不能忍。宜用

栀子汤

栀子炒　丹皮　薄荷　柴胡　山查　陈皮　甘草　归尾　红花

白水煎。

一种胃寒，痛不即止，唇白面青，四肢厥冷。宜用

温胃汤

丁香少许　木香　陈皮　甘草　当归　白茯苓　白术炒　干姜

白水煎。

气　疼

小儿气疼，此症属肝。或禀性善怒，脾胃失调，面青体瘦，多有此症。或痛于右，或痛于左，痛气或能走动者，药宜舒肝理气而愈，不宜过用发散消导温燥之药。或病后失调，亦有此症。宜多服

加味逍遥散

白术　白芍　白茯苓　当归　薄荷　柴胡　陈皮　甘草　丹皮　石斛　木香少许

白水煎，生姜为引。

疥疮脓窠疮

小儿生疮，皆因湿热而生，亦有因病后湿热感出而生者。不宜用药搽洗，并不宜用熏药，犯之者疮毒入内，能作肿作喘生痰，因此而成不救者有之。药宜清热，疏风，解毒。日久不愈者，即宜滋阴养脾，方可得愈。疥疮作痒，乃血分风热所致。宜用

荆防解毒散

荆芥　防风　连翘　黄芩　当归　生地　甘草　陈皮

白水煎。

疥疮兼皮干肉瘦者，宜用

苡仁汤

薏苡仁　连翘　黄芩　当归　生地　生黄芪　金银花　甘草　丹皮　沙参

白水煎。

红根脓窠，乃血热蒸脾。宜用

清凉散

黄芩　赤芍　丹皮　金银花　当归　生地　黄柏　牛蒡子　荆芥　或加黄连

白水煎。

顽癣疥疮，年久不愈，谓之肾疳。宜用

加味地黄汤

熟地　山萸　山药　白茯苓　泽泻　丹皮　黄柏盐水炒　木瓜

白水煎，饿时服。

风疹疙瘩

小儿此症，乃肺郁风热，所感而出。此症极轻，宜疏风清热，万不可煎盐蒲包等水洗浴。宜用

连翘散　兼服抱龙丸。

连翘　荆芥　薄荷　柴胡　防风　红花　枳壳　陈皮　甘草

白水煎。

便　血　名肠风下血

此症多因病中失调，脾胃亏损，不能裹血而便者。古云粪前便者，属大肠经来者，粪后便者，属小肠经来者。有以粪之前后，以气血论之者，必皆分虚实治之。小儿此患，或

伤食积热，损胃而成者，亦有肺经有热流入大肠而成者，以致血败则面黄瘦，或因之浮肿者有之。有血裹粪而出者，此属热也。大人便者，又与小儿不同。有伤气怒而成者，有伤色欲而成者，近又有伤于烧酒烟毒而成者，又有粪门生痔疮，出大便时流血者。总要详察人之形体虚实治之，则万无一失矣。

伤脾湿热便血者，宜用

凉血散

黄芩　当归　陈皮　甘草　地榆　白茯苓　柴胡　神曲　白芍炒

白水煎。

肺经有热，流入大肠而便血者，宜用

清肺饮

连翘　陈皮　甘草　黄芩　苡仁　当归　生地　或加黄连

白水煎。

便血日久，面色萎黄，或作浮肿者，宜用

固真汤

黄芪　丹皮　当归　真阿胶　陈皮　甘草　白术炒　白芍炒　白扁豆炒　或加人参　大枣一枚为引。

血裹粪而出者，此大肠热也。宜用

加减凉膈散并治粪门痔疮流血者

槐花炒　黄芩　陈皮　甘草　白芍　当归　连翘　丹皮

白水煎。

一种大人，伤七情六欲，便血不止，面色萎黄，身体虚浮，或伤于凉药，气血大亏，有用补中益气汤，或加附子服之而愈者。此又在医家宜酌详察治之。此一等又不可不知也。

小便撒血

此症皆因肺热流入小肠，肺与小肠大肠相连，故有是症。然皆属湿热，药宜清热分利。宜用

利金汤

车前子　桑白皮　黄芩　黄连　归尾　怀牛膝　甘草梢　木通　红花

白果肉为引。

淋　疾

小儿淋疾，亦属肺经湿热，流入下焦。有赤白二色。作痛者名有五种，然皆属于热。一种久淋，面色黄瘦，淋而不痛，或小便后淋浊而不痛者，此脾肺两虚之故。又在调脾固气治之。一种湿热流下，而成白浊，亦当分利其热可也。

小儿赤白淋疾，痛不可忍者，宜用

分利饮　或兼用犀角丸。

泽泻　猪苓　怀牛膝　车前子　归尾　黄芩　黄连　甘草梢　薄荷

竹叶为引。

一种虽淋而不痛者，或久淋而不愈者，宜用

加味逍遥散

白术炒　白芍炒　白茯苓　当归　薄荷　柴胡　陈皮　甘草　家茭实　丹皮　白莲须

白水煎。

一种淋疾，肝肾有亏，淋而不痛，月分久而不愈，或为药饵所伤者，宜用

加味地黄汤

熟地黄　山萸肉　泽泻　白茯苓　山药　丹皮　葳蕤

白水煎，空心服。

小儿白浊疼痛者，宜用

连翘汤　兼服犀角丸。

连翘　白茯苓　车前子　甘草梢　陈皮　当归　黄芩　丹皮

白水煎。

淋疾作痛单方　生陈籼米一盅捣碎，以井水泡汤挤汁去渣，用白果肉三四十枚，捣汁去渣，合而服之。如不愈时再服之可也。此

汁须隔水汤温饿吃。

胎　疾

凡小儿在月内有病者，此胎疾也，并治其母。小儿月内，肠胃甚脆，气血未充，若有微疾，不可妄施补泻，恐伤脏腑。脏腑一伤，将贻患于终身矣。或致夭命，可不戒哉。如不得已而用汤丸，毋伐天和，中病即止。又不可过剂也。若娠母自乳，则不可乱投汤药。盖产后之妇，虚实不同，有补有泻，倘儿有热而用凉药，或犯产后之禁，必害其母。如有温补，或反助小儿之热，又害其子。医者，人之司命，偏害之事，而可为乎？必须斟酌谨慎，勿损阴隲也。

凡小儿生下就死者，急看儿口中悬痈，前腭上必有泡塞住，即以手指摘破其泡，用软绵拭令血净，若血入喉即死。

凡小儿初生，宜用旧衣袄，改作衣衫，真气相滋，令儿无病。切不宜新制贮丝绫罗毡绒之类。

凡初生三五月内，宜绷缚令卧，勿竖头抱出，免致惊痫。

凡乳与食宜相远，不宜一时混吃，令儿生疳癖痞积。一周岁以内，止可稀粥哺之，不可吃荤腥等物。

凡小儿初出胎时，常常伤风者多，因乳母抱宿，鼻孔之风，吹其囟门，即有此症。乳母不可不留神戒之。

凡小儿生后，或月内，或百日，痰多气喘，目闭眼赤，眵泪神困呵欠，遍身壮热，小便赤涩，大便不通，时复惊烦，此胎热也。因母平日恣食辛热，贪服暖药而致，以犀角丸，黄连解毒汤治之。

凡小儿生后，觉口中冷，腹痛肠鸣泄泻，昏昏多睡，或夜啼，此胎寒也。因母喜啖生冷，或有外感，多服凉药，致伤胎气，以和中丸、匀气散治之。

匀气散

桔梗一钱　陈皮一钱　砂仁五分　白芍二分半炒　木香二分　粉甘草四分

共为细末，每服一匙，枣汤调下。

伤　食

小儿伤食，受病皆从此而得。大者伤饮食杂物，小者伤宿乳，热乳，或郁结之乳。体有大小虚实，症有轻重浅深。凡伤食大者必断食，小者必断乳，宜多吃滚水粗茶。伤乳伤食之重者，或全戒其乳食，伤乳食之轻者，或戒其一半。其症亦有饿一日者，有饿二三日者，在医家与病家当细审之。

伤乳食之重者，用药如青皮、枳实、槟榔、厚朴。伤之轻者，如桔梗、神曲、麦芽、山查、陈皮。伤乳食而内热者，或兼用黄芩、花粉、柴胡、薄荷、石膏、红花。有伤乳食而有外感者，或兼用防风、干葛、前胡。有伤乳食大便闭塞，或兼用大黄、蒌仁。有伤饮食而气凑生痰者，或兼用贝母、杏仁、胆星。或有脾虚瘦弱而伤乳食，不可消导者，当以白术、茯苓、当归、扁豆、神曲、麦芽、山查肉，治之可耳。此论不过大概，必临症察而治之。小儿之病，有虚有实，有急有缓，有宜攻者，有宜守者，有不必服药者。若认病不真，妄为医治，或表或消，或补或行，不免其有误。损功败德，莫甚于此矣。

医治乳孩，全以丸散锭药，随症调摄，医家必照本方虔合，药筛必细，等分炮治必如法如数，炼蜜必真正。应症服之，无不见效者也。

小儿之病，误于父母失调者有之，误于过服药饵者有之。若有微病，不可轻易服药，必少用乳食，避风调养，亦可愈也。

小儿有病，衣被随其四时，不可太厚太薄，更不可轻加厚盖，取汗，倘孟浪妄加，误事不浅。

附刻孟介石先生庭训

医道盖难言也，一举指间而人之生死击之，苟非学问渊博，探索精深者，未足辨焉。故古之良医，明其道，不谋其利，行其义，不居其功。如或行坚言伪，欺世盗名，止足供有识者之一叹耳。予也承先人旧业，履薄临深，偶有见长，从未尝索报，况学识粗疏，从未授一生徒。即有亲友见托者，往往固辞，非以此矫语鸣高，第恐自误以误人也。汝曹有志上进，当以耕读为事，或不得已而为此，亦惟精其业，虚其心亲贤远佞，矢志于德行人品之间，其庶几乎。因录果报四则以志警。

果报四则

许叔微少尝以登科为祷，梦神告曰：汝欲登科，须凭阴德。叔微自念家贫无力，乃精意医学，久遂通妙。人无高下，皆急赴之，所治愈多，声名益著。后梦神授以诗曰：药有阴功，陈楼间处，堂上呼卢，喝六作五。是年登第六名进士。其第五姓卢、因上名不录，升第五，上则陈祖言，下则楼材，方省前梦不诬。

严用和能医，施药济人。时邻人有死三日复苏，言至一宅第，有穹碑，主者令亟记碑语，传示人间。语云：医生严用和，施药阴功多，自寿添二纪，养子掇高科。诵毕遂寤。后用和子，少年登第，位至大冢宰。

妇人杨阿剩，自幼贫病，晚亦狼狈，临终自语曰：我前生本一医人，失于详审，有一妇人自称病蛊，我不能辨其是孕遽以药下之，妇人与腹中二子俱毙，是我一举而杀三命。阴官罪我，令受诸苦满足，罚变女身，今已三次，世世尝为贱隶，长因饥渴，多病少安，可语世之医者，以我为戒。言讫而死。

目连尊者，日朝出城，见一饿鬼哭泣告曰：我之此身，有数块肉，被诸禽虫，常时啖食，何罪所致？目连曰：汝之生前行医，不精其术，妄投药饵，使彼病者，不得其愈，是以此报。

幼科直言　卷六

清　江宁　孟　河介石编著
四明　曹赤电炳章校点

杂　症

败毒良方

治一切大毒，痈疽发背，疔毒鱼口，对嘴无名肿毒，未成形者，服之即消，已成形者，服之易脓易愈。功效不能尽述，服之者，勿令加减。

黄芩二钱　当归二钱　广胶二钱　怀生地黄三钱　枳壳一钱　连翘二钱　怀牛膝二钱　穿山甲二钱，酒炒

上方照等分一剂，水三碗，煎一碗服之，吃药后随量饮酒，轻者二三服，重者五七服，无有不愈者。此方药味平和，能愈大症，惟孕妇忌之耳。

易产良方等分，必如数

孕妇至八九个月，即宜煎三五贴服之。临月时，再服二三贴，服之功，有神效。

川芎一钱　羌活五分　当归一钱　川贝母八分　陈皮八分　甘草六分　枳壳八分　丹皮八分　生地黄二钱　生黄芩二钱

生姜一片，水二大盅，煎一盅，食远服。

孕妇忌食兔獐鹿肉，犯者多生缺唇，多食螃蟹，损胎难产，多食生姜，犯者手足指尖生疮，多食鳖肉，生子颈短．怀胎时不可手指天虹日月星象，犯者生子六指。

蛇丹疮多生腰上

蜘蛛疮多生颈上

雄黄末，调熟猪油，多敷疮上，以愈为度二疮同一方治之、此疮多生于夏秋之间

火汤伤患

鸡蛋清，调定粉多敷之即愈定粉即是妇人搽面者。

天泡疮多生夏秋之时

井底泥，调滑石末，敷之即愈。

腿上生血风疮

生大黄末，调生桐油，多搽疮上，外将纸裹，或每日一换，或二三日一洗，以愈为度此疮能作痒，如伤手则日久难愈。

男妇水臌肿胀效方

兔丝子洗净　车前子　大蒜去皮　白蜜

每味四两，将药蜜盛入健猪肚内，用河水砂器内煮煎，抖去药，将猪肚再入汤内煮烂吃之，重者服一二肚，可愈。病者戒盐。

小肠气膀胱胀痛方

此方专治大人受热，小肠气膀胱胀痛。

当归　青皮　枳壳　细甘草　条芩　知母　瞿麦　白滑石　乌药　木通　车前子

每味一钱，白水二碗，煎服即愈。此症遇辛苦受热即发。

鼻　衄　方补

男妇鼻血不止，或流盆许者，速用玄参四两，井水四碗，煎至一碗，服之即愈。

吹药方　鼻血不止，用生栀子，研为极细末，吹入鼻内可愈。

乳　蛾

咽喉乳蛾，并喉内一切肿痛危症，蓬砂一味，研细三五分，井水调化含漱患处，以愈为度。

募施夏秋泡汤正气散

余家泡剂治病，殊多经验，取其气薄达表，而外感不能深入，使邪气易出，正气得扶，以致表里无伤，病有风寒暑湿，斯药无不兼该。四时之病，惟夏秋二季感症最多。故今录方子左，如法合制，勿令增损，取效甚捷。

夏秋方共为粗末，如后法泡服　治夏间一切风暑，寒热往来，出汗不透，烦躁不安，身体倦怠，胸膈不舒，兼腹痛泻痢恶心，疟疾，鼻衄等症，服之有效。

柴胡一两　薄荷一两　生白扁豆二两　甘草六钱　陈皮一两五钱　白茯苓一两　当归一两，晒干　赤芍八钱　干葛一两五钱　红花五钱　煅石膏四两　生黄芩三两　独活五钱　生黄芪一两五钱　紫苏一两五钱　真青皮二两　怀牛膝五钱，晒干　生桑皮二两

前方每料磨为粗末，如期施送，每服用末五钱，入一碗内，将极滚水冲泡，去渣吃汤。其渣再泡，即如冲茶之法，病轻者服三五次可愈，病深者必十数服方痊。须戒荤腥酒面烟物。

夏秋无疾人服之，得其肠胃通畅，亦可免生他病。

前方一交夏至，即当修合，至冬至方止。

药料必拣择真正，等分药味，必如法如数，勿妄行增损，恐致无益有害。前方实利于贫苦之人，而途路舟次，亦最为便当。若照方虔合，施送广济，则功德有归。

或有不知者，见方内有石膏，即畏而谤之，则误事多矣。今将本草所载药性，详开于后，则无疑矣。

石膏　味辛甘，气微寒。气味俱薄，火煅方灵。辛能透汗解肌，上行面理头痛，甘则缓脾益气，生津止渴。故风邪伤阳，寒邪伤阴，总解肌表而愈。

医者意也，善用意者，存乎心。不善用意者，窒以臆。每遇中暑伤风诸症，辄倡为臆说，名曰慢寒。桂附苍藿，热燥纷投，贻惑曷极。吾友介石氏忧且悯之，梓家传泡汤药方以行世。余昔薄游晋豫，夏往秋归，贮药盈囊，随处施饵，舆隶厮卒，及旅馆道路之人，应手立愈。存活者，无虑数十百辈，此明验也。或有以石膏为疑者，余常作谐语云：点膏为腐，味淡性和，贵贱均餐，比于菽粟。曾闻有戕生殒命者乎，冤哉石膏，负此奇谤。坐客曰：灵药在此。芦庄庚弟何平舟谨识

春冬便方　春冬并初夏深秋之时，多有头痛发热作寒，呕吐霍乱，腹痛胀满，胸膈不舒，或伤风咳嗽多痰，或有汗，或无汗等症。今录古传验方，以便通行服之。

鲜生姜一钱　陈茶叶一钱　大红枣二枚　干紫苏一钱

水二大盅，煎汤去渣服之。

若途路舟次贫苦者，煨药无具，以此药

入碗内，将极滚水泡汤，去渣服之亦可，即如冲茶之法。

寒冬服之，免其来年春夏时疫之患。夏时服之，能免秋时疟痢等病。凡遇微恙，即当多进。寒亦可散，风亦可除，食亦可化。使病不得深入，即有诸病亦能减轻，幸乞四方，修合施济。

四时传染不正之气，照方服之。但不可妄自加减，反令无益。生姜必用鲜者，茶叶无论粗细，隔年者为佳。红枣连核捣破，紫苏梗叶并用，药味须照等分，服药必戒荤物油腻生冷。男妇小儿同一治之。如幼小者，药味照等分减半服之可也。

江宁逢秋夏受暑者，有发热头痛作呕，四肢或冷等类，多有误认为风寒阴寒者，即用发表燥热之剂，如川芎、羌活、苍术、半夏、姜灰、葱头、桂附、砂仁、香附、藿香等味，反令病人或流鼻血，或躁热不宁，仍妄言回阳，此皆是认病不真之害。遇初感者，不若服前方探之，不失其为稳当也，存心者辨之。

中　风出本草

紫背浮萍，七月十五日采，依法曝之，竹筛摊开，水盆架住，曝向烈日，才得燥干，盆无水则不燥，研为细末，炼蜜成丸，如弹子大，空心醇酒化服。按：普济大风丹云，东京开河，掘得石碑梵书天篆，无有晓者。林灵素逐字释解，乃是治中风方，歌曰天生灵草无根于，不在山间不在岸，始因飞絮逐东风，泛梗青青飘水上，神仙一味去沉疴，采时须是七月半，怕甚摊风与中风，酒下三丸都汗散。

勿　药

凡一切久病，服药不效，更医不愈，当以不药得中医为是。以恬愉为务，以自得为功。往往得此法而愈者甚多。

补益并种子，不宜服热药，更不宜热药浸酒，无病不可轻尝，非沉寒痼冷，吐利之症，不可用也。禀来阴脏者服之或可，若阳脏之人，则受害无穷。如海狗、丁香、肉桂、附子、巴戟、料豆、骨脂、川椒、河车等类，虽能助阳，日后受患，多成中风。或失血，或生毒，或病目，或落齿。盖以性热能助相火，相火偏胜则多欲多欲则精枯，水少火盛，则热极生风，诸病出矣。保身者可不慎欤？至于一切房术方书，有损无益，尤当远之。

膈食病，皆因亏损中气而成，禁投通关破气之药。

老年咳嗽痰火，不可用药消痰利气。若攻尽其痰，则无血养筋，反令挛急偏枯。病目，不宜过点。

生疮，不宜煎烟根水熏洗。

屋檐口雨水，不可久吃，多因蛇蝎居之，受害则能生毒。

孕妇忌食兔獐鹿肉，犯者生子缺唇。多食螃蟹，损胎难产。多食生姜，生子手足指尖生疮。多食鳖肉，生子颈短。有孕不可手指天虹日月星象，犯者生子六指。小儿有病，不得已用挑惊推法则可。如将滚热水蒸洗，其后复加衣被，小孩哑口难言，反成不救。更不宜轻用艾灸顶门。

小儿皮骨嫩弱，凡洗头面，万不可用滚热水。热气入内，感生疮毒，惟以温和为是。小儿不可吃二三人乳。有等富贵之家，意欲儿女壮大，但不知乳杂即有毒，因各禀气血不合，小儿遇病反重。

核桃一物，俗传能消食，殊不知此种气温与阳助肾火，动风生痰，小儿有病，当切戒之。

鸡肫皮，乃磨坚之物，能刮肠胃，小儿多服，能成软病，伤于脏腑，则无可救治。

体虚之人，并久病者，不可多服香附川芎。本草云：过服者，损真气。此二味庸医常犯之。

夏暑之时，发热头疼恶心等症，不可错

认风寒，轻用发散燥热之剂。

骤风暴雷之时，不可出户视之。

凡人熟睡之时，不可狂叫吓醒。

凡人卧时，头间不宜置火炉。

三光之下，不宜赤身裸体，多招灾病。

人熟睡时，不可戏图花脸。

冰癣，不可轻入群药，戒之。

虫胀之症，有用大戟、商陆等药，受害者多，受益者寡。

朝脑，勿令入发熏头，因气烈伤人，多成劳病。

遇梅疮之人，勿与同器。

伤寒一证，用药必看受症浅深，元气虚实，真正伤寒，初起用药，发散固宜。有饮食者，兼用消导，但可用枳壳、山查之类，若加苍术、厚朴、香附，则不宜也。此等药能厚肠胃，坚积滞，反燥大便生热之害。

书云：益母草，去瘀血而生新血。若元气虚弱之人，去其瘀血而望生新血迟矣。所以妇女面白气虚者，不可概用。

豨莶丸　乃治壮实之人而中风者。若虚人类中风，服此搜风之剂，受害不浅必九蒸九晒用之方妙。

荷蒂逐瘀血，虚人并吐血者，不可多用。

古人药引，不过借此引经，原不足为轻重。玩其引子二字可见，乃今人则多方加入，行术欺愚，可欢也。

灯心为引，此无益亦无害之物。本草云：熟草只可点灯，不堪入药。

夏枯草，治壮实人生瘰疬甚善，但虚人不可多服，能损胃伤脾故也。

雄黄性热，不可入丸锭，与小儿服之，惟造敷药，用之无碍。

痘毒痘疔膏

扁柏叶，麻油熬成膏药，摊贴患处，药内或加黄蜡、黄丹少许。

小儿脱肛不收

蒲黄细末，合熟猪油，调搽肛上，以愈为度。

滋肾种子丸

大怀熟地黄八两，用蒸不用煨煮者，须捣烂另入群药　大怀山药四两　车前子四两，酒洗晒干　山萸净肉四两，烘干不宜炒　沙苑蒺藜二两，先用水洗去泥者，酒洗晒干　枸杞子三两，烘干不宜炒　牡丹皮三两，粉白者酒洗晒干　九蒸何首乌四两，用大黑豆蒸，不用料豆蒸，久蒸干　白莲须一两五钱，红莲勿用　家茨实二两　人参一两五钱　怀牛膝一两，酒洗晒干　川萆薢二两，白色者酒洗晒干　辽五味子一两五钱，烘干　兔丝子三两，洗去土，酒煮熟晒干　杜仲一两五钱，盐水拌炒去丝　鱼鳔二两，蛤粉炒

上方共为细末，炼白蜜成丸，如桐子大，每日空心，白滚水吞三钱。服药后，随宜进饮食，将药压入下部，服药须恒，勿令间断。

调经养荣种子丸

鱼鳔二两，蛤粉炒　牡丹皮一两五钱酒洗晒干　白芍一两，酒炒　沙苑蒺藜二两，酒洗　续断一两，酒洗晒干　白茯苓一两五钱　大熟地黄四两另捣　黄芩一两，酒炒　兔丝子一两五钱，酒煮　山萸肉一两　杜仲一两，盐水炒　川萆薢一两，白色者酒洗　山药二两　当归一两，酒洗晒干　车前子二两，酒洗　阿胶一两五钱，蛤粉炒真者　益母草一两，取嫩尖晒干，酒拌饭上蒸过，再晒干　香附米一两，童便浸七日后，洗净炒

上方共为细末，炼蜜成丸，如桐子大，每早白滚水吞三钱，空心服后，随宜进饮食，将药压入下部。

古传种子方极多，无非暖肾助阳之药，服之者，不但无有效验，且受害不浅，本堂考订男妇二方，应验十有六七。且治男妇一切

虚损百病，但服药者，必分阴阳二脏。阳脏者，服药必当滋阴生水，阴脏者，必当生火养元。此方乃滋水生精之要药。水足精生，自然生子，此理之晓然者。服之者，必照方炮制，万勿增减，功效若神。

男妇二方，不限定一齐并服。

白虎疬节疯

大人小儿皆有此症，总因体虚受风故耳。周身骨节疼痛，手不可近，身不能翻，即如虎咬之状，故名为白虎疬节疯。此症有似中风，半身不遂者，或大小便不通，或泻稀黄水，用药初宜疏风，随后当以理脾清热为主。

疏风化痰汤

胆星八分　天麻六分　防风六分　陈皮五分　甘草五分　杏仁一钱炒　独活六分　枳壳六分　山查一钱　柴胡五分　薄荷五分

生姜一小片为引。

加味逍遥散

白芍八分，炒　白术八分，炒　陈皮六分　甘草六分　当归八分　白茯苓八分　薄荷六分　黄芩一钱，炒　僵蚕一钱，炒　柴胡六分

白水煎。

清热止痛汤

当归六分　薄荷六分　陈皮六分　甘草六分　白茯苓八分　白术八分，炒　白芍八分，炒　柴胡六分　花粉八分　黄芩一钱，炒　赤芍七分　牛蒡子五分　连翘七分　山查肉一钱

如大便不通，加玄明粉、知母，白水煎。

清热地黄汤

熟地二钱　山萸肉一钱　山药一钱　丹皮八分　白茯苓八分　泽泻八分　柴胡六分　薄荷六分

白水煎，空心服。

六君子汤　治节疯脾虚作泻肿满。

人参三分　白术八分，炒　白茯苓八分　甘草六分　熟半夏五分　陈皮六分

生姜一片，大枣一枚为引。

清热理脾汤　治节疯作泻，或解黄水。

白芍八分，炒　白术八分，炒　木通八分　僵蚕一钱，炒　陈皮六分　甘草六分　白扁豆一钱　白茯苓八分　当归八分　黄芩一钱，炒　柴胡六分　薄荷六分

白水煎。

节疯方六首，随症之虚实，酌而用之。

痔疮经验良方

马齿苋一味，白水煮吃，并煎汤洗浴患处，多年日久者，皆有神效，久久洗之服之，自然全愈。马齿苋春夏秋用鲜者，冬月即用安乐菜。

治男妇小儿颈上瘰疬良方

全蝎一两，炒去尾尖　白芍药一两，酒炒　玄参二两，烘干　何首乌一两　当归身一两，烘干　昆布一两，阴阳瓦焙干　土贝母一两　海藻一两，阴阳瓦焙干　黄芩一两　生黄芪一两　白直僵蚕一两，酒炒　黄花地丁一两

共为细末，炼蜜成丸，如桐子大，每晚用粗茶吞三钱。小儿不善吞者，用粗茶调服二钱。

戒用羊肉、野鸡、鲤鱼、鸭蛋、萝卜、葱蒜、烟酒等物。

无论已破未破，皆可服之。

治小儿不出痘经验良方

羌活五分　生地黄五分　升麻五分　防风五分　黄柏五分　麻黄五分　甘草三分　黄连二分　当归身三分　川芎二分　藁本二分　黄芩二分　柴胡二分　干葛二分　苍术二分　红花一分　苏木一分　陈皮一分　白术一分　细辛一分　吴茱萸半分　连翘五分

上药二十二味，合一剂，每逢立春、立夏、立秋、立冬之前一日，取水二盅，煎至八分，露一夜，如遇天阴，即露在房檐下，露

时须防蛇蝎之类，次早温服。服后泻则毒去，第二次服则不泻。亦有初服不泻者，胎毒轻也。一年之内，只服四剂，永不出痘。即服一二剂者，出痘亦少。此方神验，不可轻视之。

分数药味，毫不可苟简泡制，药俱生用。

验后当发，愿随力放生，或鲤鱼、鲫鱼、鸟兽等类。

治痘风眼经验良方

小孩初生，剪衣胞时，将脐带内血用磁盅收下，以软鸡毛点入眼边内，如晚间点时，次早洗去，余血或干，即用人乳拌之，点一二次可愈。

其眼不拘新旧皆可治。

治小儿痰核肿硬良方

用地浮萍草，捣取汁，合陈细酒，每服三五茶匙，量儿之大小服之多寡可也。或生颈项，耳根傍，或生两胁内，或生周身腿上，服之俱能消灭。

发背勿药良方

发背未出脓时，先用清水洗过拭干，取人粪合于毒顶上，外用真陈蕲艾搓丸，如龙眼核大，放于粪上，用火灸之，以知痛为度，屡试屡验。

人粪须用干硬者为是，必灸透知痛痒，方可徐徐去艾。

治中满不受饮食呃逆吐痰带白沫或腹胀等症神效方

白茯苓一两　橘红一两　鲜枇杷叶一两，去毛剪碎　鲜芦根三两

以上药四味，合井水入砂锅内，以炭火先煨。俟熟时，用新白净布滤去渣，取汁再同甘蔗汁一饭碗，白梨汁一茶杯，姜汁一酒杯，人乳一碗，齐煨，将浓，加上好蜜八两，熬成珠，后加柿霜三钱。

此药每次半酒杯，用白滚水调下，不妨勤服。开关之后，止用薄粥，万勿即饭。

治颈项对口毒勿药良方

猪眼骚四枚，和糯米饭半酒杯许，同骚捣烂，敷毒患处，不露头，二日一换，再敷之。如此八日即愈。敷毒须在未出脓时，猪眼骚生猪头眼傍，乃屠人挑去不用之物，猪眼骚系生捣。

久痢不止方

用海味燕窝菜一个，阴阳瓦焙黄为细末，陈细酒下，以愈为度。

又方亦治久痢

陈白萝卜英，每用一两煎汤，露一宿，温服，以愈为度。

吞黑豆良方

料　豆

凡阴脏人，一岁吞一粒，如四十岁者，每日用白滚水生吞四十粒。七十岁者，每日生吞七十粒。久服能治阳气不足，坚筋骨，乌须黑发，百病不生。此豆扁而小者即是，阳脏人不可服。

黑大豆即家常煮盐豆者

此豆专补阴分不足，久服坚筋骨，乌须黑发，百病不生，又能治诸疮热毒，每日用白滚水生吞二钱，不必拘时，或一日分作二

次吞之可也。宜圆而小者为贵，阴脏人不可服。

平日喜食性热之物而无害者，即系阴脏之人也。平日喜食性冷之物，而无伤者，即系阳脏之人也。服豆者务须恒久，勿令间断为妙。

此豆方、极便于途路舟次，更利于贫苦之人，乃养身之妙丹也。

痔疮良方

生杏仁，用热水润去皮，隔纸赶去油，净末五钱，用好冰片五分擂碎，同杏仁拌匀，用鸡蛋清调搽，每搽少许，数日即愈。如内痔，即按痛处，搽在外面，亦愈。倘杏仁油去不净，搽上即疼。

壁蟢伤人方

壁蟢即喜喜，做窝贴在壁上者，性极毒，咬人至死。用桑树柴烧灰，入滚水搅过澄清，调生白矾，搽患处，旋干旋搽即愈。此方载本草内，何省齐先生所经验者，常以此方治人。

治妇人儿风

用各种骨头与狗食之，即将狗粪内骨头，淘出洗净，阴阳瓦焙焦存性，研为细末，每次一二钱，或滚水或酒，调与病人服之即愈。

治刺良方

凡一切竹木之类，刺入肉内者，用生栗子，嚼碎敷满，即刻止痛。其刺自出，二三日可愈。如遇疯狗咬伤者，亦照此方治之即愈。

洗浴瘫痪勿药良方

凡遍身肿痛湿痛，忽然瘫痪，手足痿痹，百节风、鹤膝风等症，用臭梧桐煎水洗浴，以愈为度。轻者半月即疼，重者必洗浴至百日外方效。臭梧桐高二尺许，对节生，开红花者。

贴颈项瘰疬第一神效膏药方

湿痰并贴之

槐枝四两，向阳者　柳枝四两，向阳者　川木鳖五钱　真肉桂五钱　白芷六钱　白敛六钱　杏仁六钱，去皮

以上诸味切碎，用真麻油四十两，浸三日，入锅内文武火熬之，仍用柳枝徐搅，熬至黑色，去渣再熬，俟滴水成珠，加黄丹二十两，先用水飞过，炒干徐徐而入，膏成时，离火片刻，入乳香三钱，没药三钱，血竭一钱五分，麝香五分，俱研细搅匀，用冷水一盆，将膏隔水浸露一宿，听用。摊膏药不宜近火，只宜用热水炖化，摊之为妙。

无论已破未破，俱可贴之，男妇小儿，皆有神验。

便血日久良方

专治男妇小儿，肠风下血，日久不愈，面色痿黄，或作浮肿。

生黄芪二两　白术一两，土炒　熟地黄四两，男捣　黄芩一两，酒炒　牡丹皮一两　川木瓜六钱　车前子一两，酒洗晒干　五味子一两，烘干　晚蚕砂二两，净　白芍一两，生用

上方共为细末，炼蜜成丸，如桐子大，每日空心，白滚水吞三钱。服之者，照方炮制。

药味等分，不可增损，吃药必恒心，勿令间断，方得速效戒色欲、烟酒、鲤鱼、羊肉、椒蒜、

萝卜、芥菜。

用药必分阴脏阳脏说

世人病即服药，而有效有不效者，皆由未探其本原，而混投药饵也。本原者，乃阴阳二脏也。阳脏之人，止可滋阴，万不可妄用大热之药，如桂附、人参、鹿茸、丁香、胡椒、硫黄、仙茅、河车、巴戟等类是也。阴脏之人，方宜温补，万不可过用苦寒之药，如黄柏、苦参、龟板、大戟、葶苈、大黄等类是也。如有半阳半阴者，滋补则用六味丸，或加大黑豆、九蒸何首乌等类。近见有余之家，希图长生，并壮阳种子，不分阴阳二脏，概用温暖补剂，久之百病俱出，受害不浅矣。良医诊视之时，必细心审察，男妇皆然。如平日多服性冷之物，而无碍者即系阳脏之人，多服性热之物而相安者，即系阴脏之人。体此而用药自当易于奏效。不务此而徒以脉理寻之，恐其尚有误也。

傅毒验方

凡遇蜈蚣、蜈蚣蝎子咬伤，头目发肿，毒气攻内疼痛难忍者，急用靛花半杯，人雄黄末二分，麝香半分，调搽痛处，能止痛消肿。

心口疼方

心口疼，用檀香心内泥一钱，调镪酒温服，即痊。或用苏木心内泥，调镪酒服亦效。

治中风口眼歪斜

并筋骨抽痛白虎历风节

用木通十二两，大而黄者，同陈细酒十斤，入砂器内隔水煮一线香时，迟一二日出火气，每日随量温饮，其效如神。

大麻风癞疾

用苦参一斤，荆芥一斤，同陈细酒浸一宿，取起晒干，为细末，酒叠为丸，每日用滚水早服二钱，晚服二钱，量佳者，酒吞更妙。

膈食病方

隔食早晚用陈细酒合黄牛乳服之，久久自愈。

受蛊毒

粤省妇人，多下蛊毒，受之者，皆有性命之患。惟服食大荸荠，久久其毒自化。服者无论生熟，并汤服之。

华仙人稀痘良方

凡出痧痘初觉时，将好朱砂一味，研为细末，以水醮遍晒干，用生蜜对滚水调服，量儿大小与服。不论温痘痧疹，皆可服之。轻者全然无事，重者可保无虞。周岁以下，可服三四分。五岁以下，可服六七分。十岁以下，可服八九分。屡用屡验。

黄河决后，徐城土人起修华仙洞，因得此方于洞中石碑上。

赤砂必用坚固而方整者多良，炼片后，朱色或黝者，多松而易碎，不可不察。

又稀痘方

生黄芪一两　黑豆一两　甘草一两

上药三味，共为细末，用蜜糊丸，与初生小儿在杯子内滚水调服，作六日服完，最能稀痘化毒。

跌打刀伤方

燕窝菜，凡跌打损伤、刀伤竹刺伤，将燕窝菜用口嚼烂碎，贴上三日即愈，刀伤指落者，仍可接上。

去竹柴鱼刺方

不拘竹柴鱼刺梗咽喉内不下者，用灰条菜油拌食之，自下。

鹅掌风神效方

采城头上青蒿草，春夏秋皆有，不拘多少，将手先用热水洗软后，用此草擦之，擦至十日后，起老皮即愈。

汤火伤患

用莲蓬壳烧灰为细末，生麻油调之，敷患处即愈。

治一切肿毒疼痛难忍者

用密陀僧一味不拘多少，为细末，生桐油调敷患处即愈。

《幼科直言》终

小儿卫生总微论方

佚　名

《小儿卫生总微论方》提要

不著撰者名氏。论凡一百条，自初生以至成童，无不悉备。论后各附以方，前有嘉定丙午和安大夫特差判太医局何大任序，称家藏是书已六十余载，初不知作者为谁，详加采访，亦未闻此书之流传，因即藏板于太医院。但查原刻本为明宏治己酉由济南朱臣刻于宁同府，更名为《保婴大全》。其后序云得之于医者郑和，而和谓乃自古冢中所发见。其说似过于神奇，不足信也。案北宋钱乙始以治小儿得名，其《药证直诀》一书，仅有传本，亦不免阙略。其他如晁、陈二氏所著录者，有《婴童宝镜》，《小儿灵秘方》，《小儿至诀》，《小儿医方妙选》，《小儿瘛疹论》诸书，皆不可得见。是书详载各证，如硬舌、鳞疮之类，悉近时医书所未备，其议论亦笃实明晰。自明以来，诸医家党同伐异，有各立门户之习，是编诚保婴之中庸书也。今据民国十三年湖北萧北承校勘及萧公耀南捐俸之重刊本，复增圈点，重校付梓。

萧　序

唐·孙真人著《千金要方》，谓生民之道，莫不以养小为大，若无小卒不成大。故孙氏方先小儿而后丈夫耆老，实崇本之义。譬夫良苗嘉植，初生之日，不克培其根本，去其螫贼，鲜有不夭折者；即幸而长成，其华实亦必不茂，则小儿科之急需讲求，洵医林之先务也。惟小儿气质微弱，有病每不能自为陈说，故医家目为哑科，最不易治。习是科者，必先于天时之寒暖，地势之高下，以及人身十二经脉之环周，奇经八脉之起止，三百六十五穴之部位，平日了然于心，临证复察色听声，反复推求，始能洞悉病情，而不致偾事。故《尚书》谓保民如保赤子。良以保民者，必周知民间之疾苦，所恶勿施，所好与聚，而民始治；犹保赤者，必诚求赤子之隐曲，时其饥饱，适其寒温，而赤子始安。余以辁才，奉命巡阅两湖，督理军务，兼长民政。夙夜祇惧，不惮博访谘谙，期举闾阎之疾苦，扫除而廓清之。为吾乡父老昆弟谋乐利而策安全，顾箕毕之好恶不同，一人之耳目有限，往往事与愿违，力不从心者，时或不免。至此始恧然于保民之难，愈憬然于保赤之不易。适吾宗北承孝廉倦游回鄂，携有手校《小儿卫生总微论方》二十卷，余素稔小儿科之难，而善本尤不易得，因捐资付梓。复商之北承孝廉，重加雠校，以免鲁鱼帝虎，贻误将来。庶几保民之愿，虽未尽慊于目前，而保赤之心，尚幸流传于后世。至此书为医学之宝笈，幼科之金针，前人序论，言之甚详，兹不赘述。

岁次甲子首夏两湖巡阅使督理军务兼湖北省长黄冈萧耀南衡山叙于武昌节署

何　序

余先君有《小儿卫生总微论方》二十卷，家藏甚久，今六十余载矣。不知作者谓谁，博加搜访，未尝闻此书之流播也。自婴孩初育以至成童，所谓保卫其生，总括精微，视古今方书极为详尽。仁哉，著书者之心也。宗族亲旧间，幼稚有疾，余每口传指授，效如影响。乂取其可以通用于大人者，增汤剂而用之，尤为神异，岂此书不言之妙，有待于余而发耶。乌可掩为一家之宝，而不与人共之。于是集二三同志，订正其誊写之舛，锓于行在太医局，以广其传。得此者敬而用之，当知余言不缪。或未免画蛇添足之讥，不暇顾矣。吁！齐鲁大臣，史失其名，恨不得详其人也。

嘉定丙子立春日和安大夫特差判太医局何大任序

范　序

《保幼大全》者，予同寅朱君时佐之所藏以寿世者也。其论理至精至密，其制方至详至备，盖自人之成形，以至成童，纤悉之证，莫不毕具，惜乎著之者失其名耳。相传谓得之古冢中，虽未必然，而用之疗疾，靡有不效，诚天地间一奇书也。君携至宣城，谋与李令宗仁，绣梓以传于四方。且请予序诸首，予惟传曰：如保赤子，赤子甚不易保也。而是书亦未易得之，得之者不私于一家一邑，而欲传之于四方，且将以及后世，使凡赤子皆得所以保之之道，而安然子长大寿考之域。二君子之用心，不亦公且溥矣乎。夫保赤子，即所以保民也。使保民者真能如保赤子，而民有未安者，吾未之信也。是为序。

弘治二年己酉秋七月望日赐进士出身中顺大夫直隶宁国府知府天台范吉以贡书

朱　序

《保幼大全》即《小儿卫生总微论方》之别名也。以其制方著论，详审精密，故复名之曰《保幼大全》。予素颇有志于济物，见医家书，每喜蓄之。挥使郑君和精于小儿医者也，与予友善，予扣其所以精于医之故，乃出是书焉。予阅是书之异于寻常也，又扣其所以得之之故，则曰相传农人得之于古冢中，于是求以录之。郑君无难色，遂以全集授予，录而珍藏诸笥者有年矣。间遇小儿疾，按方试之，往往得奇验。一日，偕宣城令李君宗仁询民瘼，会于公所，语及是书，宗仁又乐于济物者也，即取而刊之，以广其传，不数月而成。噫，予窃禄明时，无补于吾民尚矣；使一二孩提之童，得因是书而济万分之一于危迫仓卒之际，予之素心，宁不亦少慰乎。若其为术之高下，明者当自得之，盖不待予言者，姑序其所自云。

弘治己酉中秋旦京闱戊子乡贡进士宁国府通判世族济南朱臣时佐书

《小儿卫生总微论方》目录

卷一

医工论…… 829
裹受论…… 829
初生论…… 829
回气论…… 829
洗浴论…… 830
断脐论封脐、脐病 …… 830
相视寿夭论…… 831
初生服药论…… 831
中寒论…… 832
初生不乳论…… 832
脐风撮口论…… 832
胎中病论 梗舌 气闭 鹅口 垂痈 重腭 蕈疮 口噤 螳啼 血癣 胎赤眼 胎惊 胎怯 胎肥 胎热 胎不治病 六指 缺唇…… 833

卷二

五气论发不生 语迟 多汗 血凝 不能行 眉不生 解颅 齿不生…… 837
乳母论…… 839
慎护论…… 840
食忌论…… 841
大小论…… 841
诸般色泽纹证论…… 841
诸色泽候 …… 841
面目死生色 …… 842
诸处纹状候 …… 842
五藏主病论…… 843
诸形证候…… 843
诸死绝候…… 845

卷三

变蒸论…… 846
变蒸赋 …… 846
变蒸治方 …… 846
脉理论…… 847
诸身热论…… 848
身热治方…… 850

卷四

惊痫论上…… 853
欲发搐…… 853
已发搐…… 853
发搐逆顺…… 854
发搐阴阳天吊附阳搐脾风附阴搐 …… 855
发搐真假…… 856
惊痫杂论…… 856

卷五

惊痫方下…… 858
治惊欲发搐方…… 858
治风痫方…… 859
治惊痫方…… 860
治五藏五畜痫方…… 861
治偏搐方…… 862
治阳搐急惊方…… 862
治阴搐慢惊方…… 864

卷六

惊痫别论…… 873
惊痫咬牙…… 873
治惊痫咬牙方…… 873
治暗痫方…… 873
治诸痫通用方…… 874
治惊痫后余证方…… 876
治惊痫兼别病方…… 876
中风论…… 878
治心肺中风方…… 878
治风痉方…… 879
二证同治方…… 879
治中风角弓反张方…… 879
治中风口噤方…… 879
治中风拘挛不遂方…… 880

治中风口眼㖞斜方…… 880
治风癍不省方…… 880
卷七
伤寒论…… 881
卷八
疮疹论…… 887
卷九
吐泻论上…… 896
吐…… 896
泻论…… 897
吐泻…… 897
伤风吐泻…… 897
伤食吐泻…… 897
冷热吐泻…… 898
霍乱吐泻…… 899
卷十
吐泻方下…… 900
治吐方…… 900
治泻方…… 904
治吐泻方…… 908
治霍乱不止…… 911
吐泻后证…… 912
卷十一
八痢论…… 913
治冷痢方…… 913
治赤白滞痢方…… 913
治热痢方…… 914
治积痢方…… 917
治蛊毒痢方…… 917
治休息痢方…… 918
脱肛论…… 919
卷十二
五疳论…… 921
治五藏疳方…… 922
治疳泻方…… 923
治诸疳虫动方…… 925
治诸疳方…… 927
卷十三
诸虫论…… 932
食气积癖论…… 935
卷十四
心腹痛论…… 940
腹胀论…… 941
肿病论…… 943
虚羸论…… 944
咳嗽论痰饮上气附…… 945
卷十五
黄疸论…… 951
客忤论…… 951
三症论…… 952
夜啼论…… 954
诸汗论…… 956
不语论…… 957
渴论…… 958
血溢论…… 958
卷十六
寒热论…… 961
疟病论…… 961
弄舌论…… 962
慑病论…… 963
骨蒸论…… 963
腹皮青黑论…… 964
难乳论…… 964
大小便论…… 964
五淋论…… 966
卷十七
癫疝论…… 968
阴肿生疮论…… 969
腋气论…… 970
囟门肿陷论…… 970
滞颐论…… 970
肠痈论…… 971
针刺误伤论…… 971
诸物梗喉论…… 971
疣子论…… 972
诸虫咬蜇论…… 972
扑坠损伤论…… 973
药毒论…… 973

卷十八

头上诸病论…… 975
头疮…… 975
软疖…… 976
秃疮…… 976
耳中诸病论…… 976
耳聋…… 976
耳中鸣痛…… 977
眼目病论…… 978
目病引论…… 980
鼻中病论…… 981
面上疮论…… 981
唇口病论…… 982
牙齿病论…… 982
舌病论…… 983

卷十九

咽喉总论…… 985
项瘿论…… 987
恶核瘰疬论…… 987
龟胸论…… 988
龟背论…… 988
手脚拳挛论…… 988
风疾瘾疹论…… 989
疥癣论…… 989
金疮论…… 990
汤火伤论…… 991

卷二十

疳疮论…… 992
痈疖论…… 994
恶疮论…… 995
浸淫疮论…… 996
㿗浆疮论…… 997
冻疮论…… 997
瘭疮论…… 998
漆疮论…… 998
月蚀疮论…… 998
蝼蛄疮论…… 999
水毒论…… 999
赤游论…… 999
赤毒论 …… 1000
鳞体论 …… 1001
疵癜论 …… 1002

小儿卫生总微论方　卷一

医工论

凡为医之道，必先正己，然后正物。正己者，谓能明理以尽术也；正物者，谓能用药以对病也。如此，然后则事必济而功必著矣。若不能正己，则岂能正物，不能正物，则岂能愈疾！今冠于篇首，以劝学者。

凡为医者，性存温雅，志必谦恭，动须礼节，举止和柔，无自妄尊，不可矫饰，广收方论，博通义理，明运气，晓阴阳，善诊切，精察视，辨真伪，分寒热，审标本，识轻重。疾小不可言大，事易不可云难，贫富用心皆一，贵贱使药无别。苟能如此，于道几希；反是者，为生灵之巨寇。

凡为医者，遇有请召，不择高下远近必赴。如到其家，须先问曾请未，曾请师，即问曾进是何汤药，已未经下，乃可得知虚实也。如已曾经下，即虚矣。更可消息参详，则无误矣。又治小儿之法，必明南北禀受之殊，必察土地寒温之异，不可一同施治，古人最为慎耳。

禀受论

人禀父母精血化生，故《内经》有曰：阳施阴化，谓之有子。《圣济经》言：方其受授之初，一月血凝，二月胚胎兆，三月阳神为魂，四月阴灵为魄，五月五行分五脏，六月六律定六府，七月七精开窍，八月八景具全，九月气足象成，十月百神集备，至日满而生也。又云一月如珠露，二月若桃花，三月形象成，四月男女分，五月府藏具，六月筋骨全，七月魂生而动左，八月魄长而动右，九月三转身，十月足而生，未知其所出。其始有谓之妊者，以其阳始而阴任之也；有谓之胚者，以其未成为器而犹坯也；有谓之胞者，以其已为正阳而阴包之也；有谓之胎者，以食于母而为口颐也；有谓之娠者，以其有时而动也；有谓之怀者，以其有身而依也。原夫此象者，皆阳始阴任在有形之先，次由五行而后化成也，故曰阴阳具而五行立矣。且阴之所任者，壬也，一阳壬兆，则人乃肇生。命门主生气之原，精所藏焉。壬，阳水也，合丁之阴火而生丙，故有命门。然后生心，心主血，神所藏焉。丙之阳火，合辛之阴金而生庚，故有心。然后有肺，肺主皮毛，魄所藏焉。庚，阳金也，合乙之阴木而生甲，故有肺，然后生肝，肝主筋，魂所藏焉。甲为阳木，合己之阴土而生戊，故有肝，然后生脾，脾主肉，意所藏焉。戊为阳土，合癸之阴水而生壬，故有脾，然后生肾，肾主骨，志所藏焉。故肾与命门一也。此阴阳五行，夫妇生化，自然之理也。人之赋禀，自受气至胎化，自成形至生养，亦皆由焉。

初生论

儿才出生母腹中，急当举之，便以绵絮包裹，抱大人怀之温暖。虽暑月，亦不可遽去绵絮，须渐渐减去之。盖乍出母腹中，不可令冒寒也。又急以绵裹手指揩拭儿口眼中周围秽血，皆令尽净，不可令入口眼也。若举迟，失于包裹，则令儿中寒。若秽血得入口眼，则令儿生病。其证候方论并在后。

回气论

儿才生出母腹中，哭声迟者，急以葱白细鞭其背，呼父小名，即啼。又儿才生下，气欲绝，不能啼者，必是难产或冒寒所致，急以绵

絮包裹其儿，顿放大人怀中温暖；若已包裹，须更添之，令极温暖。且未得断脐，将胞衣置炭火上烧之，仍捻大纸，却盛蘸油点著于脐带上，往来遍燎之，以脐带连脐，得火气由脐入腹故也。更以热醋汤拭洗脐带，须臾则气回啼哭，然后如常洗浴断脐。此法甚良，救者甚多。

洗浴论

儿才生下，须先洗浴，以荡涤污秽，然后乃可断脐也。若先断脐，则浴水入脐而为脐疮等病。及浴水须入药预先煎下，以瓶贮顿，临时旋暖用之，不犯生水即佳。并已后浴之，亦用药煎汤，拣所宜时日则大良矣。凡浴，宜用寅卯酉日，若初生不值，但于日中选此三时，如时亦不值，唯忌壬午丁巳癸巳日时大凶，而与避之，余皆可也。今具煎汤用药下项：

用猪胆汁汤浴儿，则不患疮癣，皮肤滑泽。

用金银、虎骨、丹砂煎汤，则辟邪恶去惊。单用虎骨亦得。

用李叶切半升煎汤，则解肌热去温壮。

用白芷二两，苦参三两，挫碎煎汤，则去诸风。

用蒴藋、葱白、胡麻叶、白芷、藁本、蛇床子煎汤，退热。

用苦参、黄连、猪胆、白蔹、杉叶、柏叶、枫叶煎汤，去风。

用大麻仁、零陵香、丁香、桑椹、藁本煎汤，治诸疮。

用金银、桃奴、雄黄、丹砂煎汤，则辟邪除惊。

用益母草煎汤，治疥癣诸疮。

凡煎汤，每用水一斗，入药煎至七升，去滓，适寒温用之。冬不可太热，夏不可令冷，须调停得宜，乃可用之。儿自生之后，须依时洗浴，以去垢污，又不可数数。若都不洗浴，则皮皴毛落多生疮疥。凡洗浴时，于背上则微微少用水，余处任意，即不可极淋其背，亦不可久坐水中，则引惊作病，切须慎之。如常能依法用之，令儿体滑舒畅，血脉通流，及长少病，无不验也。

断脐论

儿生下，须当以时断脐。若不以时断脐者，则令脐汁不干而生寒，为脐风之由。断脐之法，当隔单衣，以牙咬断之，将暖气呵七遍。若用刀断之，须用剪刀，先纳怀中暖透，然后方用，不得便用冷刀，多致伤脐生病，宜切戒之。其断脐带，当令长至足趺，或云当长六寸。若太短则伤脏，令儿腹中不调，若太长则伤肌，令儿皮枯鳞起。才断脐干，须用烙脐饼子安脐带上，烧三壮，炷如麦大。若儿未啼，灸至五七壮。灸了，上用封脐散封裹之。法须捶治帛子令柔软，用方四寸许，上置新绵厚半寸，及上置药末，适紧慢以封之。如不备其药，即用极细熟艾一块，置于上封之，但不令封帛紧急，急则令儿吐哕，又须常切照顾，勿令湿著及褓褥中，亦不可令儿尿湿，恐生疮肿及引风也。

烙脐饼子

豆豉　黄蜡各一分　麝香少许

上以豆豉为细末，入麝研均，溶蜡和剂，看大小，捻作饼用。

封脐散

雄鼠粪七枚，两头尖者是　干姜枣大　甑带鸡子许三味，同烧灰　绵灰半两，别烧，称　绯绵灰别烧，称，半分　胡粉三钱，炒黄　麝香少许

上同研极细末，每用半钱至一钱，傅脐上封之，永不患脐疮肿。如已因风湿患疮肿者，看脐带落与未落，依此用药便差。

儿已封裹脐了，一切如法。得数日许，忽然怒啼，似衣中有刺者，此乃脐燥，还刺其腹故也，当与解之，易去故帛药物，更换裹之。如无此证，亦于十日许解视，换时须避风冷。若遇冬月，左右置火，于温暖处换之。至于寻常换衣用粉，亦当如是。若失于照顾，致伤脐患

者，具方于后。

治小儿初生，脐未落时，肿痛水出。

上取故绯绢烧灰，研细末傅之。

治小儿脐中汁出不止，赤肿。

上以白石脂为细末，炒令微暖傅之，日三四。

治小儿脐疮。

上以甑带烧灰，研细末，猪膏和傅，或以桑皮汁傅乳上，吮儿饮。

又方　以东壁上土傅之，治历年不差者，伏龙肝亦得。

又方　以当归为细末，傅之，久不差者，用之神效。

治赤肿或脓血清水出者。

又方　以马齿苋叶烧灰，研末傅之，或以露蜂房烧末傅之。

又方　以干蚵蛎火煅为灰，研末，傅之佳。

又方　以黄柏为细末傅之，治久不差者。

治小儿脐赤肿。

杏仁半两　猪颊车骨中髓七钱半

上先研杏仁极烂，和髓傅之。一方研杏仁如脂，和体中膏傅。

治小儿因剪脐，伤外风，致脐疮久不干。

白矾煅　白龙骨煅，等分

上同研为细末，傅之，少少用。如无两味，但得一味亦可。

又方　以绵烧灰，研为细末傅之，新旧皆可。

治小儿脐疮，湿不差，若至百日即危极。

胡粉散

胡粉一钱，细研　干姜烧灰，一钱，细研　白石脂烧存性，称一钱，细研

上同为细末，每用一字，或半钱傅上。

凡小儿患脐疮未愈，不可乳令大饱。大饱则令儿脐风。

相视寿夭论

儿生下，洗浴断脐之后，当视其寿命长短，成人不成人。

儿生，身不收者死；儿生鱼口者死；儿生，股间无生肉者死；儿生，汗血者死；儿生颐下破者死；儿生囊下白或赤者皆死；儿生，阴不起者死；儿生，身如凝血若无皮者死。

儿生，脐小不寿；儿生，声绝而复扬急者不寿。

儿初生，目自开者不成人；儿初生，头四破者不成人；儿初生，啼声散者不成人；儿初生，身软如无骨不成人；儿初生，啼声深者不成人；儿初生，头毛不周匝不成人；儿初生，汗出不流不成人；儿初生，小便凝如脂膏者不成人；儿初生，常摇手足者不成人。儿初生，枕骨不成，能言而死；儿生，膝骨不成，能倨而死--云尻骨；儿生，掌骨不成，扶伏而死；儿生，踵骨不成，能行而死；儿生，骸骨不成，能立而死。

儿初生，阴大而与身色同者成人；儿初生，脐中无血者成人。

儿初生，啼声相连延属者寿；儿初生，卵下缝通达而黑者寿；儿初生，身体鲜白而长大者寿；儿初生，额上有旋毛者好寿。儿初生，目视不正，数动或哭而豺声者，非佳人。儿初生，发稀少者不听人教。

初生服药论

儿初生，出母腹，揩拭口眼净，洗浴了。断脐毕，裹包讫。且未得与乳，当用好甘草一中指节许，擘碎，以水三蚬壳，煎二蚬壳，以绵缠指，醮与儿吮之。若吐出恶汁为佳；若服二蚬壳不吐，即无秽物，不须更服也。此法不问儿虚实壮怯，皆须服之。

次看形色，若面色红润，啼声响快者，用擘破黄连，以汤浸取浓汁，调朱砂末，抹儿口中打尽腹中旧粪，方可与乳。又法，以汞粉半

钱，旋旋吮儿，良久，脐粪乃下为佳。故《圣济经》云：凡儿初生，恶血未纳者，拭以绵指；吞而在胸膈者，吐以甘草；入而在腹内者，利以黄连汞粉，皆所以革污秽也。次用好朱砂一大豆许，细研水飞，炼蜜一蚬壳，看稀稠和膏，分三剂。每用一剂，乳汁化，时时滴儿口中，三日内服尽即止。姚和众云：成炼朱砂，能温肠胃，壮血气也。一日只可一豆许，勿得过也，分三次用。次用真牛黄一大豆许，细研，以炼蜜酸枣大，和成膏，每用一大豆许，乳汁化下，时时滴儿口中。姚和众云：能去惊，辟邪恶之气。若儿形色不实，怯弱者，不宜服之。如胎热或身体色赤黄者，宜多服，此法在三日外也。

中寒论

儿才生，举迟，或断脐晚者，令儿冒冷，故寒中之也。又先断脐，后洗浴，则水得入之，或洗时水气所干，亦为中寒之候。其证腹中绞痛，夭乳啼呼，面青黑，尿清白，当以归末为粉，著于絮上，灸而熨脐腹，日日频熨，至啼止脐干为度。仍不可灸令大热，恐引惊也。

初生不乳论

初生洗浴、断脐、裹包，革秽污，下脐粪都了，经曰：不饮乳，及不小便者，此因难产。或包裹举迟，中寒，或被风邪微干，阳动藏气所致。有此候者，多为撮口，治不可稍缓。

通关散　治初生儿不饮乳，及不小便。

以石银器中贮奶汁二合，入四破葱白一寸，煎取一合，药注子分灌之，服尽立效。

脐风撮口论

儿自初生，至七日内外，忽然面青，啼声不出，口撮唇紧，不能哺乳，口青色，吐白沫，四支逆冷，乃脐风撮口之证也。此由儿初生剪脐，不定伤动，或风湿所乘。其轻则病在皮肤，而为脐疮不差；其重则病入府藏，而为脐风撮口，亦如大人因有破伤而感风，则牙关噤而口撮，不能入食，身硬，四肢厥逆，与此候颇同。故谓之脐风撮口，乃最恶之病也。《千金》有曰：小儿忽患脐风撮口者，百无一活，皆坐视而毙，良可悯恻。有一法极验，但世罕有知者。凡遇其患，则看儿齿龈上有小泡子如米状，急以温水蘸熟绵子，裹手指，轻轻擦破，即口便开而安。又方，视小儿口中上下龈间，若有白色如豆大许，便以指甲于当中掐之，自外达内，令匝至，微有血出亦不妨。又于白处两连尽头，亦依此掐，令内外气断，不必直破入指甲矣，恐太甚则伤儿。此二法相类，《子母秘录》云：于掐破处以蜈蚣末傅之，大良，及有治方集之后。凡儿产时，诸物但令开口勿闭，以厌撮口、口噤也。

治小儿断脐之后，不慎照管，致风湿所乘，令儿不能乳哺，名曰脐风。宜速疗之，不久则为撮口也。

当归去须、半两，洗，焙　天浆子去壳，三个，微炒　乱发一钱，烧灰

上为细末，入麝香一字许，时时傅脐。

又方

黄柏锉　釜下墨煤　乱发烧灰存性

上各等分，同为细末，用一字或半钱傅之。

治小儿脐疮不差，因风传变，欲为撮口或为发痫者。

金两黄散

川黄连去须，一分，为末　胡粉一钱，研　龙骨一钱，煅红，研

上同为细末，每用少许，傅之，时时用。

治小儿剪脐中风，唇青撮口，吐白沫，四肢冷。

定命散

赤足蜈蚣半条，酒炙，令干　川乌头尖三个，生　麝香少许

上为末，入麝研匀，每服半字，煎金银薄荷汤调灌。

治小儿初生撮口。

蛇蜕皮一分，微炒　钩藤一分　干蝎梢一分，以上先细末　朱砂一分，别研，水飞　麝香半钱，别研　真牛黄半钱，别研

上同研细，拌匀再研。每服一字，取竹沥一两点，同乳汁调灌下。一方只蛇蜕、朱砂、麝香各一分，每用半字，津调涂口中，日五七次。

又方　以盐豉置脐上灸之。

又方　以夜合花枝，浓煎汁，拭口并洗。

又方　于儿口傍，先刺令见血，碎雀瞥汁涂之。

又方　生鼢鼠妇，并雀瞥汁相和，调涂抹口中，渐渐乳，得效。鼠妇乃湿生虫也。

胎中病论

儿自生下，至一脑前后有病者，多是未生之前，在母胎妊之时，母食毒物，胎有所感，至生下之后，毒气发而为病。又有母于娠妊之时，失于固养，气形勿充疾疢因之。故《圣济经》言：病生于中者，与生俱生也。今叙于后。

梗　舌

儿才生出母腹，因与揩拭口中恶物，便仔细看儿口中，如有皮膜，似芦苇管中之膜，裹定儿舌，或连舌根者，此名梗舌。乃始毒所攻而生，或母于妊娠时，爱食飞禽之物，感而所致。便须急以指甲刺破剥去之，揩拭血净，用烧白矾灰细末，傅半绿豆许。若不摘去，则梗其舌而不能语，令儿哑也。及日数多，亦不能去也。

气　闭

儿初生一两日间，有大小便不通，腹胀满而欲绝者，此胎毒之气郁闭所致也。便急令一妇人，用温水先漱口了，后吸咂儿前后心，并胁下及手足心，共七处，各五七次，以赤口红色为度，须臾气散，则自通矣。不尔，即无生意也。有此候，用此法，可谓再生。

鹅　口

儿自初生，至七日内外，因胎毒上攻，于舌上生白屑如米，连口两角，生黄疮，及舌下有膜，如石榴子大，令儿声不发者，名曰鹅口。

治小儿鹅口。

保命散

白矾一分，烧　马牙硝半两，研细　朱砂一分，研细，水飞，干

上同研匀细末，每用一字，取白鹅粪，以水搅取汁调之。先以手指缠乱发，揩拭儿舌上口角颊中，去垢秽净，然后用药傅之令遍。缠发揩时以井花水沾用，或以绵缠指头，沾栗荚汁用。

治小儿鹅口不能乳。

以马牙硝研细，遍掺舌上下两颊口角内外患处，日三四次。

又方　以桑白皮汁，和胡粉傅之。

又方　以鸡脛中黄皮烧灰研细，乳和傅之。

又方　以白鹅矢汁灌口中。

又方　以黍米汁傅之。

又方　以全蝎七枚，先用薄荷汁浸过，后用薄荷七叶裹之，文武火炮过，焙令干，研末，更入黄丹，同研匀细，熟蜜和为膏，傅病处。

垂痈

儿自初生，至七日内外，因胎毒上攻，血气不敛，儿口中上腭连喉舌，生物如芦篚盛水之状，或作疱，在悬壅之前，塞其气路不通，令儿危殆，名曰垂痈。又儿生下即死者，多此病也。入少知之，当急视之。凡遇是病，便以指甲摘破，或口以绵缠长针，留尖如粟米许刺之，令儿气泄则活，其疱破则出青黄血水，便用帛子揾拭，及用盐汤蘸帛擦揩令净。若人喉，即伤儿，慎之慎之。如一刺复作者，再刺。

治垂痈。

如圣散

铅霜一分，研细　真牛黄一分，研细　大阴玄

精石一分，研细　朱砂一分，研细，水飞，日干

上件再同研匀，入白龙脑细末半钱相和，每用抄一字至半钱，掺儿口中。

重　腭重龈，重舌

儿初生，至七日内外，因胎毒上攻于儿口中，若发于腭上作肿，作两重之状，名曰重腭。若发于上下齿龈两傍，肿如叠龈者，名曰重龈。若发于舌上肿起，初更生一小舌者，名曰重舌龈。肿闷作痛，令儿多啼，不能哺乳而妨碍。

治重腭重龈。

上以蛇蜕皮烧灰，研细末傅之。

又方　治如前。

上以生蒲黄末傅之。

乌鲗骨散　治重舌肿闷，妨碍吮乳。

乌鲗骨一两　干蜣螂半两，烧灰　蒲黄半两研　枯白矾灰一两，研

上和研如粉，每用半钱，以鸡子黄调涂肿上，咽津不妨。

又方　治如前。

上以蛇蜕皮为末，干捻傅舌下患处，不一时便消，不能饮乳者，用之得能饮，或以鸡羽蘸淳醋展药拈舌下。

又方　以木兰皮长一尺，广四寸，削去粗皮，以醋一升，渍之取汁，注患处。

又方　以伏龙肝研细末，牛蒡汁调傅，或以衣鱼涂舌上。

又方　以马牙硝末涂舌下，日三。

又方　以三家屠肉，切如指大以摩舌上。

又方　以黄丹豆许，纳管中，吹舌下。

又方　以蒲黄傅之，不过三次，差。一方微口炒，以纸铺地上，出火毒，研罗细末，先用温水，蘸帛裹指，轻轻按掠，后掺药。

又方　以桑白皮煮脓汁，涂乳上吮儿。

治重舌妨闷欲死。

上以乱发烧灰，研细末，以傅舌下，频频用。或烧簸箕皮傅上。

又方　治如前。以鹿角炙，适温热熨之。或如米粒大安舌下。

又方　以小豆煮汁，和鹿角灰傅之日三。或以赤小豆末醋和傅舌上。

又方　以露蜂房烧灰，研细末，醋和膏傅之。

蓐　疮

儿自初生，至七日内外，因胎毒攻发，身生疮者，名曰蓐疮。谓在产草上生疮也。

治蓐疮。

上以黄连为细末，先用生麻油涂盏子内，将黄连末遍掺油上，倒合在铫三脚子上，下用艾叶火熏令极干，刮聚，再入生油腻粉各少许，和膏傅之。

又方　以泽兰心细嚼傅之。

又方　以葵根烧灰傅之。

治小儿初生三日，头面生疮，缘起身体，壮热，多啼。

升麻　柴胡去苗　石膏各一分　甘草　当归去须，各半两

上㕮咀，每服一钱，水半盏，煎至二分，去滓，时时与，量儿大小加之。

治小儿初生，蓐中生热疮。

上以鸡子五枚，敲破，去白，只取黄，又以乱发如鸡子黄许，二味相和，铫子中煎熬，取汁涂之。更用苦参末傅之，甚奇。刘禹锡云，顷在武陵生子，蓐内便有热疮，发于臂腿，蔓延半身。初用他药无益，状候至重，昼夜啼号不乳。因阅本草有云：乱发合鸡子黄煎消为水，疗小儿惊热下痢。注云：去痰热百病。又鸡子，本草云疗热疮，因用之立见如神。煎法：鸡子黄，乱发，初入铫，煎时甚干，少顷发焦，遂有液出，旋取置一磁碗中，以液尽为度。

口　噤

儿自初生，至七日内外，忽口噤不能乳，腹急多啼，下青黑粪，或口生疮如粟米，名曰口噤。此证牙关急而口噤，与撮口相似。然撮口证面色青，啼声不出，口吐白沫。此口噤证，

面色赤而多啼，口不吐白沫，所以异也。此缘儿在母腹中时，为风热伤胎所致。故《圣济经》曰：风热伤胎，生而口噤也。《千金》云：赤者为心噤，白者为肺噤。

治初生儿口噤不开，不收乳。**立圣散**

干蜘蛛一个，去足、口，取新竹沥，入蜆壳中浸一宿，炙焦，为末　干蝎梢七个，为末，　腻粉一钱

上同研匀细末，每服一字，乳汁调，滴儿口中，时时用。

又方　以鹿角粉大豆末等分研细，乳和，涂乳上，令儿吮服。

又方　以生草一分细锉，水一盏，煎至六分，去滓放温，分数次灌儿口中，令吐出痰涎秽物，后取猪乳汁点儿口中，差。亦治撮口。

又方　以真牛黄少许研细，淡竹沥调一字灌之。次以猪乳滴口中。

又方　以赤足蜈蚣去足，炙黄为末，以猪乳调半钱，分三四次温灌之。一方同雀瓮不开口者五枚，烧灰研细末，饮调服，一字。

又方　以白僵蚕二枚为末，蜜和，傅儿口内，如无，以原蚕蛾二枚，炙黄代之，亦治撮口。

又方　以雀矢白，水和圆麻子大，乳服二圆，鸡矢白亦佳。一方，鸡矢白枣大，绵裹，水五合，煮二沸，分服。

治小儿口噤体热。

上以青竹茹三两，醋一升，煎取三分之一，温分数服。

治小儿口噤，牙关不开。

上以天南星一个，煨熟，急用纸封角，莫令透气，却以纸裹，近上尖处，剪一窍子鸡头大，令热气出，于鼻孔中和熏之，牙关立开。亦治撮口。

躯啼

儿自初生已来，身色青白，无血色，好啼哭，昼夜不止，身体仰而躯，夜则甚，腹满不乳，大便青白，昼夜躯啼，诸药不效者，此名躯啼。乃儿未生已前，在胎胞中时为风冷伤而所致。故《圣济经》曰，风冷伤胎，生而躯啼。《千金》有云，小儿有胎寒，则腹痛躯啼，时时吐哕，或腹中如鸡子黄，按之如水声，便没没而后出，不急治，多变为痫。

治小儿胎寒躯啼。**养藏汤**

当归去芦，一两　沉香　丁香　白术　桂心　川芎各半两

上为细末，每服一钱，水一盏，姜二片，煎半盏，去滓，滴儿口中。

治小儿忽患腹痛，夭矫汗出者，亦胎寒也。出《千金》。

上以梨叶煮浓汁七合，分三四次服。

又方　以当归为末，每用一小豆许，乳汁调下，日二夜一，病儿大添之。

又方　以柏子仁为末，每服一钱半，温水调下。

治小儿胎寒，躯啼，发痫。**矾石圆**

上以马齿矾，火煅半日为末，枣肉和圆黍米大，每服一圆，乳汁送下。量儿大小增损，以差为度。有痰亦去，神良。兼腹胀，不嗜食，大便青黄色。

血　癖又名胎积

儿未生之前，在母腹中，藉母经血以滋养焉。至生下时须拭去口中恶血，及用药下尽儿腹中秽血之粪，方才饲乳。若于生时，揩拭儿口中恶血不净，吞咽入腹。或腹中旧有秽粪，不曾下之，或下之不尽，因而成癖，故名曰血癖。又名胎积。至生下百日内外，儿生头疮，眼目赤涩，小便如血，口中气急，身体紫色，腹胀躁烦，多啼不乳。

治小儿血癖。**胎积丸**

白丁香二十一个　轻粉半钱　滑石半钱　乳香半钱　巴豆二十个，针串灯上烧焦，微存性

上为末，糊丸黍米大，每一二丸，看虚实大小与服，煎柳心七个，汤放温送下，连一二服，粪下恶物是效。亦令乳母服和气药调养饲儿，若儿服药后吐不止，大便不通，面黑气喘者死。

胎　赤　眼

儿自生下，至开眼已后，眼两眦及睑眶赤烂，名曰胎赤眼。此因儿生时稍难，留带时久，或不慎照顾，致恶血入于儿眼，又或生下时，揩拭儿眼边恶血不尽，亦令入儿眼，渍浥以生是病，不急治之，则至长不差。

治小儿胎赤眼。**二金散**

黄连去须，一钱　黄连一钱

上先为粗末，用奶汁同浸一宿，焙干收之，每用少许，以新绵裹荆芥汤浸之，放温，时时频洗。

胎　惊

儿在母腹，未生之前，因有所惊，胎内感之。至生下百日以来，儿心神不宁，睡卧不醒，壮热躁烦，啼哭无时，上视发搐，面青腰直，撮口缩腮，粪青黄水者，此名胎惊。方论著于惊疾门之中。

胎　怯

儿自生下以来，面无精光，肌肉脆薄，大便白水，身无血色，时时哽气多哕，目黑睛少，羸瘦多哭，此胎怯也。宜天麻浴汤治之。

胎　肥

儿生下肌肉厚，遍身血色红润，至满月以后，渐渐肌瘦，目白睛粉红色，五心热，大便难，时时生涎，此胎肥也。更看父母肥瘦，肥不可生瘦，瘦不可生肥，亦宜天麻浴汤。

胎　热

儿生下有血气，时叫哭，身壮热，如淡茶色，目赤，大便黄赤，粪稠，急食乳，此胎热也。治亦宜天麻浴汤。

治小儿胎怯、胎肥、胎热等诸疾。

天麻浴汤

天麻二钱　蝎尾去毒，为末　朱砂末　白矾末各半钱　麝香一字　乌蛇肉酒浸，去皮，焙干，为末　青黛末各二钱

上为末匀，每服三钱，水三碗，桃枝叶五七条，煎十数沸，带热浴之，勿得浴背，汤须适温热用。

治小儿胎热，或乳母饮食粗恶辛苦，乳汁不起，儿色如淡茶黄色，瘦瘠不为肌肤，四支瘛瘲缭戾，服之充悦健壮。

芍叶二两半　柴胡去苗，二两　鳖甲　茯苓去黑皮，各一两半　人参去芦　大黄各一两　甘草　干姜各半两，如热，即用枳实

上为末，炼蜜和丸，大豆大，百日至一岁儿服一丸。乳服，日二，量儿大小增减。

胎不治病

〔胎内十二证〕

一双臂，二双眇，三骈拇，四六指，五体残，六支废，七独肾，八喑哑，九缺唇，十社老，十一挛拳，十二侏儒。

〔胎外十二证〕

一睛凸，二近睹，三鼻齆，四耳返，五结喉，六项瘿，七舌短，八节弹，九龟胸，十驼背，十一膝并，十二交胫。

六　指

儿生下六指者，外科以利刀截一指，外贴生油膏，往往有不见痕迹者。

缺　唇

儿生下缺唇，亦能弥缝，然不能掩其痕。十二病中，惟是二种，仅有手段，昔人之不能，而后人得之。千载之后，必有治今人不治之病者。

按：此书未知成何人手，何序称家藏六十余年，而书中往往引《圣济经》，则知此书当在南渡之后矣。

小儿卫生总微论方　卷二

五　气　论

儿自胎孕以至生成，皆禀五行而分五藏，故自五气以生五态，而各不同。《圣济经》言：五行孕秀有异宜，五态委保有殊气，冲和均赋，体性潜异者，盖母气胎育，有盛衰之虚实，故其子生也，有刚柔之勇怯。又经云：心气虚而语晚，肝气微而行迟，脾气弱而肉瘠，肾气怯而解颅，如此之类，悉皆是矣。然五藏之气，禀受殊异，其于怯弱者，圣人亦有方药，以补养之矣。

心

心气盛者，则伶利，早言笑，形神清而多发。心气怯者，则性痴而迟语，发久不生，生则不黑。心主血，发为血之余，怯则久不生也。心系舌本，怯则语迟也。

治小儿生下无发，以鲫鱼烧灰末，和酱傅之即生。

治小儿发久不生。**菖胜丹**

当归去芦，一两　生干地黄去苗土，一两　芍药一两，以上并为末　菖胜一合，别研　胡粉半两，别研

上同研匀细，炼蜜和丸黍米大，每服十粒，煎黑豆汤下。兼化涂头上。量大小用。

又方　以楸叶中心子杵烂，绞汁涂之。

又方　以羊屎烧灰，淋汁，同豉汁洗之。三日一次，不过十次即生。

又方　治血热，发薄不生，以桃柳煎汤，入猪胆汁和，沐头，发自生。

治小儿心气不足，从小至数岁不能言。**菖蒲丸**

石菖蒲二钱　人参去芦，焙，半两　丹参去芦，一钱　天门冬去心，焙，一两　麦门冬去心，焙，一两　赤石脂三钱

上同为细末，炼蜜丸绿豆大，温水下五七丸，至十余丸，量大小增损。日三，久服取效为度，无时。

又方

菖蒲一两，一寸九节者良　远志甘草水煮，去心，一两　桂心一两　黄芪半两　人参去芦，半两　黄连去须，半两　酸枣仁汤浸，去皮，半两

上为细末，炼蜜和丸，如鸡头实大，每服一二粒，煎生姜汤化下，无时。

又灸法　灸心俞三壮，灸两足踝三壮。

又方　治五六岁不语，此心气不足，舌本无力，不能发转故也。一云：风冷伤于少阴。

以赤小豆为末，酒和涂舌上，神效。以社坛余胙酒，与少许饮。

肝

肝气盛者，则跷健而早行立，肝气怯者，则长不能行而脚细，名曰鹤膝。肝主筋，怯则筋弱，故长不能行也。又或眉久不生，眉属肝，肝气不荣，故眉久不生也。何以知眉属肝，且五藏皆有毛。其发属心，心为火，火性炎上，故发生上枪也；须属肾，肾为水，水性润下，故须生下顺也。是以女人皆无外肾，故无须也；毛属肺，肺在五藏之上而主外，故毛生皮肤之外也；眼睫属脾，眼轮亦属脾，脾在右偏，故睫斜生眼轮之上也；眉属肝，肝在左偏，故眉斜生眼睫之上也，左为上，右为下，所以眉在上而睫在下也。

治小儿从小至数岁不能行。**麝茸丹**经大验

麝香研　茄茸酥涂，炙黄　生干地黄去苗土　虎胫骨酥涂，炙黄　当归去芦，洗焙　黄芪锉，各半

两

上为细末，用羊髓二两，煮烂和丸黍米大，每服十丸，磨沉香汤送下，乳前，日三服。

又方　**羚羊角丸**

羚羊角用尖细节密者，锉，取末　虎胫骨酸破，涂酥，炙黄　生干地黄去苗土，焙　酸枣仁去皮，炒　茯苓去黑皮，各半两　桂去粗皮，不得见火　防风去芦，切，焙　当归去芦，切，焙　黄芪切焙，各一分

上为细末，炼蜜和剂，每用一皂子大，食前温水化下，日三，儿大者加之。

又方　以五加皮为末，饮服之。

又取葬家未门户，盗食哺之，日三，便能起行。

又灸法　小儿自小至五岁不能行者，灸两足踝各三壮。

又灸法　小儿鹤膝脚细，不能行者，灸膝眼三壮。

治小儿生下无眉毛，欲得生者。

以七月中，采乌麻花，不拘多少，阴干为末，以生乌麻油浸，每夜傅之。

治小儿眉毛眼睫，因癣退不生，名乳颓癣。**赤芝散**

野油花旋覆花是也　赤箭天麻苗　防风去芦，各等分

上为细末，先洗癣净揾干，以好油调涂之，后服**乌犀丸**

犀末一钱　猪牙皂角二钱，末　干蟾末三钱　龙脑少许

上为细末，龙胆汁和丸绿豆大，每服一丸，温水下，量大小加减。

脾

脾气盛者，肌肉厚而色紫，耐壮而乳多。脾气怯，则肌虚而喜汗，汗多则肉瘠。脾主肌肉，怯则肌虚，虚则荣卫衰，故汗多而肉瘠也。

治小儿脾怯多汗。**丁香散**

陈皮一两　青皮去穰　诃子肉去核　甘草各半两　丁香二钱

上为细末，每服二钱，水一盏，煎六分，食前温服，儿小分之。

治小儿喜汗。**香瓜丸**

大黄瓜黄色，出种子者　川大黄湿纸裹，煨纸焦　胡黄连　柴胡去芦　青皮去穰　鳖甲醋炙黄　黄柏去粗皮　芦荟去芦，各等分用

上将黄瓜割顶去瓤，以诸药为细末，填瓜内至满，却将顶盖口，杖子签定，慢火内煨熟，取药并瓜研之，如皮研不烂则去之，干却入面糊，和丸绿豆大，每服三二丸，乳后冷浆水下。儿大加之。

粉身法　黄连去须　牡蛎火煅　贝母各七钱

上为细末，以米粉一升，同研匀粉身，与丁香散同用。

肺

肺气盛者，肌肤莹白滑腻，发细黑浅，肺气怯则肌肤泪败。若无皮而血凝，故《宝鉴》亦名血凝。孙真人言，小儿出腹，肌肉犹是血也，渐渐坚化。肺主皮肤，肺气不充则血泪败，不成肌肤，故若无皮毛而血凝。面目绕鼻口悉黄闭目撮面，口中干燥，四支不能伸缩，哭无声，不吮乳，此皮毛不敛也，多是不育。《千金》治以龙胆汤。方具于后：

治初生儿血凝，皮肉不敛，哭无声，不吮乳。

以胡粉研细，酒和涂之，干即再。

又方　以白僵蚕为末，煎汤，适寒温浴之。

又灸法　初生儿血凝。

以脐四边，各去脐半寸，并鸠尾下五处，各灸三壮。

肾

肾气盛者，囟小而合早，牙齿早生；肾气怯者，解颅而囟不合，牙久不生，生则不

固，面惨，目睛多白。肾主骨髓，脑为髓海，怯则脑髓不成，故囟解而不能结解也。颅不差，而百病交攻，极难将护，此最为大病矣。又肾主骨，牙乃骨之余，怯则牙久不生也。

治小儿解颅。**玉乳丹**

盉乳粉依法炼者，半两　熟干地黄依法蒸者半两　柏子仁半两　当归去芦，半两　防风去芦，分铢　补骨脂一分，拣净，微炒　或加黄芪、茯苓亦得。

上为细末，入盉乳粉，柏子仁拌匀，炼蜜和丸，黍米大，每服十丸，煎茴香汤送下，乳后。

又方　细辛去苗　桂心各半两　干姜七钱半

上为细末，以乳汁和傅缝上，干即后傅，儿面赤即愈。

又方　以蛇蜕皮炒焦为末，用猪颊车骨中髓，调傅缝上，日三。一方，只用猪颊髓。

又方　以驴蹄烧灰，研细末，生油和傅缝上，以差为度。

治小儿囟不合

生蠹足骨半两　白敛半两

上为细末，以乳汁和贴缝上。

又方　以龟甲煮汤，适寒温渍之，不得用黑者。

治小儿囟不合，鼻塞不通。以大天南星微炮去皮，为细末，淡醋调，摊绯帛子上贴之，仍炙手熨，频熨立效。

治小儿囟不合，囟肿囟陷并主之。

蛇蜕皮半两，烧灰，细研　防风去芦　白芨　大黄湿纸裹，煨纸熟，各一分

上为细末，入青黛一分，同研极匀，每用半钱，用猪胆汁调匀，将纸一片，依大小长短，剪一纸花子，摊药在上，仍于四边各留少白纸，用淡醋糊涂遍，以贴病上，不住以温水润动，一伏时换。一方防风一两半，柏子仁、白芨各一两，为末，乳汁和傅囟上，十日知，二十日愈，日一易之。

又法治小儿解颅囟不合，作头巾子与裹，遮护之，久而自合。《千金》云：良法也。

治小儿齿久不生，以雄鼠屎三十枚，日一枚拭齿龈即生。其屎两角尖者，乃雄鼠屎也。一云用雌鼠屎，两头圆者若。

又方　以黑豆三十粒，于牛粪火内烧令烟尽，细研，入麝香少许，再研匀细，用针挑不生齿处，令出血，以药末揩上，不得见风。忌醋，多年不生者，用之极效。

又方　以尿坑中竹木，正旦刮屑涂之即生。

乳母论

儿生自乳养者一切不论。若令乳母乳养者，必择其人，若有宿疾，狐臭瘿瘿，上气喘嗽，疥癣头疮，龟胸驼背，鼻齆紧唇，痴聋喑哑，颠狂惊痫，疽痈等疾并不可令乳儿也。

凡乳母乃血气化为乳汁，则吾惟善恶悉由血气所生。应喜怒饮食，一切禁忌并宜戒慎。若纵性恣意，因而乳儿，则令儿感生疾病也；若房劳乳母，则令儿瘦瘁，交胫不能行；若醉以乳儿，则令儿身热腹满；若畜热乳儿，则令儿变黄，不能食；若怒作乳儿，则令儿惊狂上气；若吐下乳儿，则令虚羸气弱。是皆所忌也。

凡每乳儿，乳母当先以手按散其热，然后与儿吮之。若乳惊汁涌，恐儿咽乳不及虑防呛噎则辄夺之，令儿少息，又复与之。如是数反则可也。又当视儿饥饱节度，一日之中，知儿乳而足量以为常，每于早晨，若有宿乳，须当捻去。若夏月不去热乳，令儿吐哕，冬月不去寒乳，令儿咳利。又若儿大喜之后，不可便乳，令儿惊痫；若儿大哭之后，不可便与乳，令儿吐泻；又乳母不可太饱，恐停滞不化；若太饱，则以空乳令吮则消。

凡每乳儿，乳母当以臂枕儿头，令儿口与乳齐，乃乳之。不可用膊，即太高，令儿饮乳不快，多致儿噎。又乳母欲寐，则夺去

其乳，恐睡著不觉，被乳填沃口鼻，别生其他事，又且不知儿饥饱也。

凡儿生六十日，目瞳子成，能识人。百日，任脉反覆。一百八十日，尻骨成，能独坐。二百日，掌骨成，能匍匐。二百日，膑骨成，能独立。三百六十日，膝骨成，能移步。乳母常须依时按节，续续教引，使儿能会，此是定法也。即不得常常抱持，过时都不教引，致令儿筋骨弛堕，又恐成腰脚之疾也。

慎护论

凡乳母慎护养儿，乳哺欲其有节，襁褓欲其有宜，达其饥饱，察其强弱，适其浓薄，循其寒燠，盖自有道，不可不知也。

凡儿自初生至满月，宜常常时取猪乳汁滴儿口中，令咽，最为佳妙。又以珍珠末一大豆许，用蜜一蚬壳和之，分三次或四次，每十日内外与一次，涂儿口中，安心神，镇魂魄。

凡儿生肌肉未成，不可与暖厚新绵之衣，当与故絮帛薄衣。若与新绵厚暖，则蒸燠生热，筋骨缓弱，故《圣济经》云：襁褓者衣欲旧帛，绵欲故絮，非乃恶于新燠，亦资父母之余气，以致养焉。

凡乳母，若遇天和无风之时，当抱儿在日中嬉戏，使数见风日，则血凝气刚，肌肉硬密，堪耐风寒。若藏帏帐之内，重衣温暖，譬如阴地草木，不见风日，则脆软不任，易为伤损，故《圣济经》言：重衣温厚，帏帐周密，宜与减，甚则伤皮肤害血脉，是生多疾也。

凡儿常令薄衣，虽冬月，但令著两夹衣，及衲衣之类。若极寒，即渐加旧絮衣。人家多务爱惜，乃以新绵厚衣，温养过宜，适以为害。薄衣之法，当从秋习之，若至来春稍暖，须渐减其衣，不可便行卒减，恐令儿伤中风寒。

凡儿于冬月须着帽项之衣，夏月须着背褡。及于当脊，更衬缀一重，以防风寒所干。谓诸藏之俞，皆在于背故也。又常令乳母，每日三时摸儿项后筋两辕之间，名曰风池，若热，即须熨之，令微汗则愈。谚云：戒养小儿，慎护风池者是也。

凡儿于春时，不可覆头裹足，致阳气不得出泄，则发热矣。

凡儿常当看觑消息，无令身体有汗。若汗出则致腠理虚，而以受风寒。昼夜寤寐，皆当慎之。须审天气冷暖，衣复厚薄，及以治之。

凡儿于暑月，时常令在凉处，勿禁水浆，但少少与之，唯是不宜多与。

凡儿不可抱于檐下洗浴，又不可当风解脱，恐为寒干。又啼哭未断，不可与乳。冒冷冲寒，不可哺饲，恐为食伤。又不可近神佛之前，驴马之畔。又不可令儿见怪异之物，及各门异户不相识之人，恐为客忤。

凡儿生三日之外，当与少哺。姚和众云，以粟米煮粥，饮研如乳汁，每日与半蚬壳许，以助谷神，导达肠胃。孙真人云，以粳米饮，七日外与三大豆许，慎不可杂与药吃。巢氏云，儿生满三十日后，当哺少物，如二枣核许。至五十日，如樱桃许。至百日，如大枣许。若乳少，当以意增之，不可多与，恐不能胜，别生病矣。若乳多，不消哺食者，亦须少少与之，以壮肠胃。儿大稍稍增之，当有常剂。《圣济经》亦云：儿生三日用饮，过三日用哺，哺之以赖谷气也。哺之多少，量日为则。如是则五脏得养，而胃气壮矣。今之养小儿者，多务爱惜过当，往往至二三岁，尚未与食，致脾胃虚弱，体力怯软，平生多病。若在半年之后，宜煮陈米稀粥与之。十月以后，渐与稠粥烂饭，以助中气，则自然易养少病。惟忌生冷油腻荤茹甜物。

凡小儿乳哺，既有常剂。若忽尔却乳哺少者，此是腹中少有不和也，便当与微微下之。若都不肯食，但饮少乳者，此伤重，要

下之，不可不下也。若不与下，则生寒热，或为吐利，及为癖积，脉大者发痫，皆不早治之由也。孙真人亦曰：小儿寒热，亦当下之，乃差。又小儿乳哺不能无痰癖也，常当节适之。若稍不进乳食，便以微药克化，紫圆最妙。方在后。不得行快药转利，又不得为无事而迁延，致病大即难治尔。小儿微患，便与微下，则损不甚而易愈矣。若于春夏之时有疾，《千金》云立夏后。切不可妄行吐下，及微疾亦不可乱行针灸。盖针灸伤经络，吐下损府藏故也。若误行转泻，则使下焦虚而上焦热，变成大病也。故巢氏有言，小儿春夏，自非甚病，决定不可吐下者是也。

食忌论

凡小儿有不可食之物，不可不知，今具于后。

小儿不可多食栗子，令儿气弱行迟，热食则气壅。

小儿不可食蕨菜，令儿立则无力，久不能行。

小儿不可食芡，令儿不能行。

小儿不可食黍米、鸡肉、胡瓜，令儿腹中生虫，《经验方》云：小儿未断乳，食鸡肉令儿腹生蛔虫。

小儿不可食越瓜，令儿发痼疾。

小儿不可食麦，令儿发落。麦是荞麦也。

小儿不可食菟茨，令儿脐下痛。

小儿不可食鲟鱼，令儿生癥癖。

小儿不可食炒豆、猪肉，令生气壅致死。

大小论

经言：六岁以上者为小儿，十八以上者为少年。据此之言，则十八以下者皆为小儿也。此乃古之所论尔。以今时校之，则时世相异，理或未当。且《礼》云：男子三十曰壮有室。又曰男子三十而娶。是古之男子，皆三十以上方娶，故十八以下，得为小儿之称。今之时则不然，男不过十五而娶，至十八已有生一二子者，岂得为小儿也。以今时言之，当以十四以下为小儿治。其十五以上者，天癸已行，婚冠既就，则为大人治耳。

诸般色泽纹证论

经云：小儿六岁已还者，经所不载，有治难治，无承据之事也。详之，此谓婴儿未能言者，有病则无由问其所苦，故无承据也。若能言者，必能问之，小儿岂有六岁尚不能言者哉。其不言者，唯一二岁儿也。故先贤言婴儿未能言者，最为幼小。有病则肌肤未全，寸关不辨，变蒸交互，气血细微。若凭诊切，实难明晓，惟在观其形色，参其证候，乃知病之所在者矣。其观视之法，须要安神定志，勿令情意惑乱，不得于儿哭断之时，睡起之际，则色不正矣。须于辰时之后，巳时之前，夏即未热，冬即未温，外色不杂，内气闲雅，乃可向明而观察之也。《圣济经》曰：通识之士，必察刚柔勇怯，视其盛衰虚实，适以寒温，平以阴阳，病之轻重缓急，随证以治之，不必藏于难治也。诸所论繁紊，难以执据，今采其当者，叙而次之。

诸色泽候

而上五藏部分色：左颊主肝，右颊主肺，额上主心，鼻上主脾，一云唇口。颐上主肾。色青为风，色赤为热，色黄为食，色白为气，色黑为寒也。

而上五藏四时色：经言：五藏之色，皆外荣于面，故死生疾病系焉。肝主春，其色青，心主夏，其色赤，脾主长夏，其色黄，肺主秋，其色白，肾主冬，其色黑，是谓五藏之色。随四时各荣于面也。其色不深不浅，应常光润者为和平也。若色重深者，其藏实；浅淡者，其藏虚。

面上五藏生死色：经曰：滋荣者，其色

生。青如翠羽，赤如鸡冠，黄如蟹腹，白如豕膏，黑如乌羽。枯夭者，其色死，青如草兹，赤如坏血，黄如枳实，白如枯骨，黑如炱煤。

面上五藏部分相乘色：肝色青者本色也，赤者心乘肝也，黄者脾乘肝也，白者肺乘肝也，黑者肾乘肝也。心色赤者本色也，青者肝乘心也，黄者脾乘心也，白者肺乘心也，黑者肾乘心也。脾色黄者本色也，青者肝乘脾也，赤者心乘脾也，黑者肾乘脾也，白者肺乘脾也。肺色白者本色也，青者肝乘肺也，赤者心乘肺也，黄者脾乘肺也，黑者肾乘肺也。肾色黑者本色也，青者肝乘肾也，赤者心乘肾也，黄者脾乘肾也，白者肺乘肾也。

面上五藏四时相乘色：经言：青赤见于春，赤黄见于夏，黄白见于长夏，白黑见于秋，黑青见于冬，是谓五藏之生，五行相继也，为病轻；若肝色见青白，心色见赤黑，脾色见黄青，肺色见白赤，肾色见黑黄，是谓真藏之色，五行相克也，为病重。

面目死生色

《内经》曰：凡病面黄目青，面黄目赤，面黄目白，面黄目黑者，皆不死。《圣济经》云：脾真为本，而面黄必生者，以真气外荣故也。若面青目赤、面青目白、面青目黑、面黑目白、面赤目青者，皆死，谓无脾色外荣，而真气已绝故也。

〔鼻上色〕

《圣济经》曰：鼻端青为腹冷，黑为水气，白为无血，黄为胸寒，赤为有风，鲜明为留饮。

〔目内色〕

赤者心热，淡红者虚热，青者肝热，浅淡者肝虚，黄者脾热，无精色肾虚。

〔《金匮》死色〕

凡小儿病者，有黑色满面，或绕口入口，或延眉绕目，或暗入中者，皆死。有青色延面，连目入耳者死，目无精光，眼中有物，如横红针者死。

〔《外台》死色〕

凡小儿病者，面上有青黑色，如纱盖定，从发际至印堂者，不以疾状浅深，六十日死，至鼻柱者，一月死，至人中者，十日死，满面者，即日死。

诸处纹状候

耳后完骨上，有青脉如线三两路，卧不静者，此痫疾候，当刺掐破令血出，以为小治。若自肿破者，死候也。

手大指后，白肉鱼际之上，有筋络色青黑者，胃中有寒，赤黄者有热，赤青黑杂者寒热，若青而小短者少气。

叉手处，手大指第二指之间虎口上，有筋脉如线，看其颜色曲直，以诀其病，若纹直者是惊，曲者是伤，沉隐为风，曲外有冷，曲内为食。

歌曰：虎口青纹直，情知四足惊，黑色元因水，赤乃火飞禽，淡红人惊发，湾紫有伤寻，外冷内为食，沉隐定风生，长大疾须重，短小得安平，但看叉手处，病候验虚真。

第一指上仄三节，名曰三关。小儿有男左女右看之，有八般筋脉纹状，以验其病，名曰八片锦。最下一节，名为气关，有纹过者，病才觉重，诸病既生，则气不调顺，故名气关也。

第二节，名为风关，有纹过者，须发惊风，渐加困重，故名风关也。

第三节，名为命关，有纹过者，则病极而命危，故名命关也。

鱼刺形，主初惊　在气关主壮热吐泻；在风关，主初惊才发；在命关，惊极难治。

歌曰：

形如鱼刺是初惊，遍体如汤面色青，
吐泻躁烦如似此，通肠和气便惺惺。

——垂针形，主泻痢　在气关，主伤冷

吐泻；在风关，泻传惊风；在命关，惊传慢惊风极候。

歌曰：

形如悬针泻利多，发惊身热定违和，
此病若变惊风慢，命关已度是沉疴。

 水字形，主肺惊　在气关，涎痰咳嗽虚积；在风关，发惊喘哽涎；在命关，困不治。

歌曰：

形如水字肺家惊，虚积相传面色青，
膈上有涎须与治，命关若过更无宁。

乙字形，又曰中曲主食惊　在气关，主食伤吐痢；在风关，传变风，乙形属肝，肝刑于脾；在命关，传慢脾风，不治。

歌曰：

形如乙曲病因肝，眼慢惊啼瘈疭偏，
冷积为伤传变此，慢脾风已度三关。

去蛇形，主内实外虚。 来蛇形，主外实内虚。 。蛇中卷形，内外俱虚。此数样皆曲虫，又曰曲蛇。在气关，主疳积；在风关，主劳带惊；在命关，不治。

歌曰：

形如蛇曲病因深，脾积疳劳又带惊，
未过二关宜早治，若过三关更莫论。

长者弓形，短者环形，主疳积在气关，吐逆疳热，吃泥土；在风关，疳极羸瘦；在命关，不治。

歌曰：

形如环弓疳气黄，好食泥土是寻常，
此病早求良医治，三关已到命飞扬。

乱纹形主虫痛　在气关，主气不和，有虫积，食诸生物；在风关，主虫咬，心腹痛；在命关，病困极难治。

歌曰：

纹乱纵横虫上寻，晓夜啼号不可禁，
神佛求遍都无应，安虫取积得康宁。

〇珠形死候　此候不拘三关上下，见者皆为死候。

歌曰：

流珠死候不须医，便是沉疴莫疗之，
三关若见都休望，安排后事更无疑。

诸纹总歌：鱼刺初惊候，悬针泻痢多，水纹惊肺积，乙样是肝讹，曲虫惊疳病，环弓一论过，乱纹虫咬甚，流珠病已疴。

五藏主病论

诸形证候

〔肝藏〕

肝主风。肝病实，则目直叫哭，呵欠顿闷项急，治当泻之。肝病虚，咬牙多欠，口中气热，则外生风，口中气温，则内生风，治当补之。肝气则捋衣捻物，热甚则目直视不搐，风主动，又风淫末疾，热即风动于四末，故手捋衣捻物也。热入于目，牵其筋脉，则两眦俱紧，不能转视，故目直也。治当泻其心肝，肝有风则目连扎，风甚则身反折强直不搐，凡病新久皆引风，风动止于头目，目属肝，风入于目，则目上下左右如风之吹，不轻不重，儿不能任，故目连扎也。风甚则风入于筋脉，筋脉紧急，故身反强直也。治当泻肝补肾，肝有热有风，甚则皆见惊证，不搐者，谓未得心热故也。若心热乘于肝，则子母俱有实热，风火相搏，而乃发搐，其抽掣之势，如风荡火也。治在惊疾门之中。若肝热捋衣捻物，壮热饮食喘闷者，肺乘之也。治当泻肺。肝于四时，冬相春王，夏衰秋绝，若在春肝王之时，早晨亦同，反见肺病乘肝者，是肺强肝怯也。治当泻肺补其肾。今肝虚补肾者，母能令子实也，甚则宜补其肝，或子母补之俱补。轻者肺病退则愈。重者目中淡青，必发惊。若更有赤者，当发搐也，谓怯则目淡青色。有心热则赤，故当发搐。肝

虚实皆主风，若外感生者，则呵欠顿闷，口中气热，治当发散。若能食饮水不止者，当微下之，余不可下也。

〔心藏〕

心主惊。心病实，则叫哭发热饮水，惕跳上窜发搐，治当泻之；心病虚，则卧而悸动不安，手足摇纵，治当补之。心病虚实皆主摇，心实则喜仰卧，谓心气实则气上行涩，若合面卧，气则不通快，故喜仰卧，使气得上下通也，治当泻之。心热则视其口中气温，或合面卧而就冷，及上窜咬牙也。谓心热则胸亦热，儿虽不能言，有就冷之意，故合面卧也，治当泻热。若邪热乘心，则为惊啼，治当安神。心于四时，春相夏王，秋衰冬绝。若在夏心王之时，日中亦同，反见肾病乘心者，肾强心弱也。治当补其肝心，泻其膀胱，今肾强而泻膀胱者，谓肾主虚而无实，泻其膀胱之府，则藏不得盛也。轻者肾病退则愈，重者悸动不已，当发搐也。

〔脾藏胃附〕

脾主困。脾病实，则困睡身热，饮水能食，治当下之。脾病虚，则身温四肢冷，吐泻生风，治当补之。脾寒者夜啼，脾属阴冷，即夜间发痛，故儿啼哭，治当温中。脾热者弄舌，脾热则舌络紧，故时时舒吐也，或时饮水，热则津液少故也。治当分解其热，不可用凉药下之。医者多疑其饮水为热，便以凉药下之，加面黄肌瘦，五心烦热，则为疳也。治在疳疾门中。若不因脾热大病未已，弄舌者凶也。又脾藏冷热皆主吐泻困倦。若吐乳色黄者伤热，吐乳色青者伤冷，四时之间，秋冬春三时皆冷多，唯夏暑时有热多。

胃附　胃热者，若吐泻昏睡，露睛者虚热也，若吐泻昏睡不露睛者实热也。胃久虚热，多生痘病，胃冷者，若吐痰涎白绿水，不食腹痛，或泻青白利，谷不化者，胃虚冷也。若胃虚怯有汗者，但上至项，下至脐也。若面㿠白，目无精光，口频撮，口中气冷，不思食者，胃不和也。又小儿筋骨未成，血脉未全，自小多啼哭者，胃啼也。脾胃二者，府藏表里，人之司命，故同病也。脾于四时，王在四旁，证四季月。若于王时，反见他藏病乘脾者，是脾弱也。如春季三月木位土王之时，见肺来乘之。秋九月金位土王之时，见肝来乘之之类是也。他仿之。治当补弱为强，随证治之。轻者所乘之藏病退则愈，重者面目赤黄，脾怯也。

〔肺藏〕

肺主喘。肺病实，则身温闷乱，气促喘急。治当泻之。肺病虚，则身热哽气，长出气。治当补之。肺热则手陷眉目鼻面，甚则吐稠涎，及咯血者。久则肺虚，治当补之。若虚热则唇深红色。治当解热。若实则涎痰潮吐。治宜下涎。肺气盛而热，又复有风冷者，则胸满气闷乱，喘嗽上气。当先治肺后散风冷。若肺只伤风者，不胸满也。但只散风。又肺有虚实寒热咳嗽者，并于咳嗽门论之。肺于四时。夏相秋王，冬衰春绝，若在秋肺王之时，日选时同。反见肝病来乘肺者，是肝强肺怯也。肺怯则唇色白，若病而闷乱气粗，喘促哽气者难治，为肺虚损也。唇白者谓肺脾病久也。脾为肺之母，母子皆虚，不能相营也，故名曰怯。治当补脾肺而泻其肝也。轻者病退则愈，重者唇白枯者死，白泽者吉。

〔肾藏〕

肾主虚。肾病无实，唯斑疮。肾实则变黑陷，余无实病。肾病虚，则身冷无精光，畏明，体骨重，盖肾气不足，则下窜而骨重，惟欲坠于下而缩身也。又肾属水，阴也，虚则畏明。若因他病致肾虚者非也。又肾虚者，谓本怯，由胎气不成，精神不足，目中白睛多，面㿠白无光，多解颅。此皆难养，纵长不过八八之数。若恣色欲，多不及四十而亡也。治并当补之。肾于四时，秋相冬王，春衰夏绝。若在冬肾王之时，夜半同。反见心病来乘肾者，是心强肾弱也。治当泻心而补肾。轻者心病退则愈，重者下窜不语。肾怯虚也。

凡病必视其新久虚实，假令肺病又见肝证，若咬牙多欠者易治，谓肝虚不能乘肺也。若目直叫哭，项急顿闷者则难治，谓肺病久

则虚，肝强而实，反胜其肺也。虚则补其母，实则泻其子。又病必视其五藏衰王时候，参其相乘胜负虚实，其顺易治，微邪是也。逆者难治。贼邪是也。五藏相反，随证治之。

凡病先虚，或已经下之，有合下之者，必先实其母，后下其子也。假如肺虚而痰实，此可下之证，当先益其脾，后乃泻肺也。诸病仿此。

凡病有热者，或疏利解化之后，无虚证者，勿得用温补之，若用之，热必随生。

诸死绝候

〔乔岳五藏绝歌〕

心藏　吐泻变为痢，血黑渴难当。心主血，心绝则血色变黑，虚燥而发渴。肌瘦难行坐，虚舌不缩藏。心主舌，绝不能收。两脸如脂赤。痢久则面当无色，今面色反如脂者，心绝则虚阳上发也。无语口生疮。心主舌，绝则不能语。若向夏中得，更莫细思量。

肝藏　眼目时时涩，浑身似醉人，频频只要睡，心烦又多嗔。肝主目，绝则不能开，故涩而只要睡，又肝主筋，力绝则如醉人，不能举也。又肝主怒，绝则多怒不止也。唇白眼胞肿，狂躁足啼声，东方应此候，病则不宜春。

脾藏　面赤黄时好，不可见相传，体弱憎寒甚，虫行觅食餐。脾主肢体，绝则体弱，又脾绝则肾逆乘之，故发热憎寒。脾绝则胃热，故虫不安而上吐出。吃乳唇无力，齿露盖时难。脾主唇，绝则不能收掩其齿，又不能吮乳。眼倾休下药，眼眶属脾，绝则倾陷。免更住人间。

肺藏　肺候应白色，莫使见绝形，鼻青孔燥黑，腹胀眼胞倾。肺主鼻，绝则肺逆乘之，而色青，又肺绝则无涕，故孔黑燥也。肺主眼胞，绝则陷之。项直喘气急，胸凸没回声，肺主气，绝则喘急项直，以引气也。气绝则胸中满凸，但有出气而无回气也。秋间逢此候，四方别托生。

肾藏　冷汗时时有，尿多夜里惊，肾绝则阴阳相离，故冷汗出而小便不禁，精者神之舍，绝则精神离，故夜里多惊，肾属阴，夜亦属阴故也。遍身生粟疥，手足冷如水，阳尽不能充暖也。项倒头难举，面黑没精神，肾绝则天柱骨倒，而目皆黑无精神也。此候应壬癸，冬得殒其身。

〔王叔和死证歌〕

眼上赤脉，下贯瞳人，囟门肿起，兼及作坑。鼻干黑燥，肚大青筋，目多直视，都不转睛。指甲黑色，忽作鸦鸣，虚舌出口，啮齿咬人。鱼口气急，啼不作声，蛔虫既出，必是死形。用药速急，十无一生。

〔钱乙死证〕

泻不定，精神好；大渴不定，止之又渴；吹鼻不喷；病重口干不睡；时气唇上青黑点，颊深赤如涂胭脂；鼻孔开张，喘急不定，面有五色，不常不泽。

〔诸般死证〕

病困汗出，如珠不流。头毛上逆，唇口枯干，口鼻冷气。头足相抵，卧正如缚，四肢垂掸，手足掌冷。

〔通真子死候歌〕

囟陷唇干目直视，口中冷气卧如痴，身形强直手足软，掌冷头低尽莫医。

小儿卫生总微论方　卷三

变蒸论

小儿在母腹中，胎化十月而生，则皮肤筋骨府藏气血虽已全具，而未充备。故有变蒸者，是长神智，坚骨脉也。变者易也，蒸者热也，每经一次之后，则儿骨脉气血稍强，精神性情特异，是以《圣济经》言：婴孺始生，有变蒸者，以体具未充，精神未壮，尚资阴阳之气，水火之济，甄陶以成，非道之自然，以变为常者哉。故儿自生，每三十二日一次者，以人两手十指，每指三节，共骨三十段，又两掌骨共二十二段，足亦如之。以应之也。太仓公曰：气入内，支长机骨于十变者，乃是也。《圣济经》又曰：变者上气，蒸者体热，上气者，则以五藏改易，而皆上朝藏真，高于肺也。体热者，则以血脉敷荣，阳方外固，为阴使也。故变蒸毕而形气成就者也。亦由万物之生，非阴阳气蕴热蒸，无以荣变也。儿自生三十二日为第一变者属肾，又三十二日再变且蒸者属膀胱，肾与膀胱为表里，共六十四日也，其变则耳与骶骨皆冷者，肾为水，水数一，故为变蒸之始也。又三十二日为第三变属心，又三十二日为第四变且蒸属小肠，心与小肠为表里，共一百二十八日也，其变则汗出而微惊者，心为火，火数二，故为变蒸之次二也。又三十二日为第五变属肝，又三十二日为第六变且蒸属胆，肝与胆为表里，共一百九十二日也，其变则目不开而赤者，肝为木，木数三，故变蒸之次三也。又三十二日为第七变属肺，又三十二日为第八变且蒸属大肠，肺与大肠为表里，共二百五十八日也，其变则皮肤热，或汗或不汗者，肺属金，金数四，故为变蒸之次四也。又三十二日为第九变属脾，又三十二日为第十变属胃。脾与胃为表里，共三百二十日也，其变则不食腹痛而吐乳者，脾为土，土数五，故为变蒸之次五也。后又六十四日复一大蒸，四次积二百五十六日。大蒸毕，凡五百七十六日，大小变蒸数足，其血脉充荣，则手受血而能握，足受血而能步，此亦手足之应也。其变蒸之候，体热微惊，耳冷骶冷，上唇头有白泡起，若鱼目珠子，脉乱或汗或不汗，不欲食，食则辄吐，目白者重，目赤黑者，微闭而不开，至变蒸了，自然明矣。其轻者五日而衰，重者十日而衰，或先期五日，或后之五日，或十日之中，热乃除耳。若热甚违日不歇，不得惊动，勿令傍边人多而语杂，不可妄行灸刺，但少与紫丸微利之，则热便止矣。或用孙真人、《肘后》黑散子、粉香散调治亦可。唯不可余治。若伤寒时行温病，及惊热温壮等候，虽与变蒸颇皆相似，耳热骶热，唇上无白泡珠，乃为他病，各从其证为治。若于变蒸内有寒，加之寒热交争，脐腹夭矫，啼不止者，熨之则愈。

变蒸赋

看病婴儿，先明四时。既有变蒸之状，还如温壮之推。寒热初来，慎一七而方退，周期未满，当四八以重期。原夫魂魄将成，筋骸始荣，开舒腠理，通彻奇经。运用而阴阳以正，往来而血气初平。顿觉精神婴婴，全然有异，未知蒸变一一，仔细须明。肝者干也，东方所属。为木象之三数，发形证于两目。浑身壮热，令瞳子以无辉，遍体昏沉，为神魂而未足。四数于金，二由在火，咳嗽频频，汗珠颗颗，两日间噫喷仍加，数夜里虚惊又可，暗增骨髓，学反复以番身。渐长性

情，畏傍人而恋我。脾土五呼，肾水一称，谷气暗引，精志时增，乳哺甘甜，尻骨成而独坐戏。经络流利，掌骨具而匍匐能。次后筋脉之稍更，膝踝之渐变。气乃而荣于四肢，光彩而滋于满面，亭亭立犹未稳，喽喽语尚声颤，手足受血，移步行而堪怜。耳目通神，意智生而可羡，斯由呼吸以定，肌体乃厚，两气而外阳内阴，一息而入鼻出口，期来应节，自然府藏充盈，将养乖宜，致得风邪甚有。于是发竖无润，乳呪吐口，珠起丹唇，冷浸骭耳。或肠鸣而微利，或惊啼而勿喜。经云：蒸即蒸血肉之坚，变即变形神之正矣。

变　蒸　治　方

紫丸　治小儿身热，变蒸不解，及温壮伤寒，乳哺失节，宿滞痰癖，腹满吐呪，便利不调等疾。亦治食痫，先寒后热。

代赭石火煅，醋焠，十次　赤石脂各一两　巴豆三十个，去皮、心、油　杏仁五十粒，去皮、尖

上上二味为细末，下二味捣成膏，相和更杵二千下相得。若硬，入少蜜，同杵作剂，密器中收之。三十日儿，服麻子许分圆。乳汁送下，候食顷之后，方与少乳，勿得多与，至日中当小利，即除热。若未除，明旦更一服。百日儿，小豆许。以此准量加减。夏月多热，喜令发疹。每二三十日，辄一服甚佳。

黑散子　治婴小身热，变蒸不解，及挟时行温病。

麻黄去根、节，二分　大黄一分　杏仁一分，去皮，二分，和皮用

右都烧存性，为细末。每服壹字，或半钱，量大小加减，以水半银盏，煎少许，须抱儿于暖温避风处，连进二三服，取微汗，候身凉，以粉香散扑之。一方只炒黑用。

粉香散

蚌粉不以多少，研极细，水飞过　麝香少许，研

上匀末，用绵裹，扑粉儿身。如已凉，胃气未和，不快美乳，服观音散。方在后。

熨法　治小儿变蒸，内有寒加之。发寒热交争，脐腹夭矫而痛，啼不止。

灶中灰　食盐

上二味，量其相等和匀，炒令热，以重帛裹，适温热熨儿，仍不可太热，恐惊烁儿也。

以上凡儿于变蒸之内，若遇身热脉乱，汗不出，不欲乳食，乳食后辄吐者，必审其日数，度是变蒸之时者，虽有是证，无所苦也。陈知军云：小儿变蒸，但以四君子汤加茯神与服。其方白术、人参、茯苓、茯神各半两、甘草炙二钱，同末，薄荷汤调下一钱，慎不可余治、及服惊药，恐冷伤胃气也。

脉　理　论

凡儿禀受藏府气血，荣卫形体，虽有生皆全，然于未语之前，变蒸之际，则血气未充，肤革未固，筋骨未坚，脉状未成，若有病也，难为诊切，又难访问，是以先贤言婴小之病难治者，以无承据也，故立其观视形色之法焉。儿自生，积五百七十六日，大小变蒸数毕，则气血荣，精神异，筋骨壮，脉理全，然后方可诊切，又能言问也，或以谓小儿之脉与壮老不同者，是不达诊治之大体也，凡脉之长短迟速，在因形以别之，不必拘于至数。经言，小儿脉多雀斗，要以三部为主。其脉小数小细者平也，诸家所言甚众，今择其当者具之。孙真人云：小儿之脉，固难分表里，今撮其要者，不出数条。

其总目歌曰：

小儿有病须凭脉，一指三关定其息。小儿臂短，难以布其三指以分三关也，以一指诊之。

浮洪风热数为惊，虚冷沉迟实有积。

浮脉为风，秋得之曰平。余时得之，主伤风寒，头疼壮热，或夜热昼凉，咳嗽噫喷，鼻塞清涕，呕逆不食，歌曰：

浮为风兮秋日平，余中风寒头目疼。

壮气夜极鼻清涕，噫喷咳嗽吐食频。

洪脉为热，夏得之曰平。余时得之，主风热壅盛。身体温壮，疮疡血泄。歌曰：

洪为应候夏时和，余须发热壮温多。

风壅作惊或疮肿，有时泄下血滂沱。

数脉为惊，春得之曰平。余时得之，主惊风抽掣。脉数小者，多睡惕跳，直视怕怖，盗汗非时，咬牙吐舌，微吐喘息，脉数大者，一两日间，必发搐搦也。歌曰：

数为惊候春日长，余时小数睡惊扬。

喘息直视舌频吐，大数潮搐发沉殃。

沉迟为虚冷，冬得之曰平。余时得之，主脾胃虚弱、泄泻滑肠脱肛、吐痢不止，日渐尪羸，以成脾困，或作疳劳。歌曰：

沉迟之脉冬日安，余时脾胃弱虚言。

泄泻滑肠肛脱出，吐利尪羸瘦变疳。

实脉为积滞，四时得之，皆主食伤积聚，面黄腹胀，发焦烦渴，吐呪腹痛。歌曰：

实脉含伤积滞言，壮热腹胀发毛干。

吐痢肚疼或为癖，四时无异一般看。

《宝鉴》四时脉，谓春弦夏洪，秋浮冬沉，四季缓，各推其王相表里以察其病，假令春得弦而浮者，病在表在府，为阳为顺，病则易治；若得弦而沉者，病在里在藏，为阴为逆，病则难治。余时仿之。

王氏脉歌

王氏脉歌曰：

小儿乳后辄吐逆，更兼脉乱无忧虑。

弦急之时被寒缠，脉缓即是不消乳。

紧急细快亦少苦，虚濡邪气惊风助。

痢下宣肠急痛时，浮大之脉归泉路。

《脉经》曰：小儿之脉快疾，一息七八至曰平，不及曰损，太过曰至。

通真子歌

小儿三岁至五岁，呼吸须将八至看；

九至不安十至困，短长大小有邪干。

又曰：

小儿脉紧是风痫，沉脉须知乳化难，

腹痛紧弦牢实秘，沉缩有热在骨间。

死证脉

脉来三动而止不见者死，脉来速如弓弦硬直者死，脉来瞥然不见者死。歌曰：

三动而止不来凶，速硬如弦劲在弓，

瞥然至而反不见，皆为死脉定由宗。

诸般病脉

脉弦者为风寒，弦数者为疟；脉急者为气不和或为客忤；脉紧者为痛，紧数者惊痫；脉浮者为风，浮紧者惊风；浮大者伤寒，浮虚者盗汗，浮数者风热；脉伏者为气滞；脉缓脉细者皆为冷为乳不化；脉虚脉濡者为虚弱为惊，虚濡者慢惊风，虚紧者伏热；脉沉重者为有积，沉数者骨间冷，一云骨间热。沉迟者虚冷，沉缓者伤食；脉牢紧者癖聚，牢实者肠秘；心脉满大肝脉小急者惊痫，心脉数小者疳淋，数急者热。寸口脉直上直下者为惊；寸口脉大小脉不匀乱者变蒸；左手寸口无脉，心痛中热，呕逆口疮，或咳嗽。喉中哽声，头汗出而热，此乳母食冷以乳儿所作也。又脉乱者吐逆。右手寸口无脉，胸满短气，吐逆噫哕，喉中响，此乳母抱儿冲冒风寒所作也。

凡脉如雀啄而紧者风痫。

凡脉大小不依部次者恶候。

凡小儿脉快，呼吸八至曰平，九至曰病，十至曰困。

凡小儿脉虚者病亦虚，轻手得也。脉实者病亦实，重手得也。故急惊脉促急，慢惊脉虚微。

诸身热论

凡小儿有病，皆须身热，其证不一，今条而具之。

小儿于某时间发热，过时即退，至来日依时发热，昼夜同。此为潮热，欲发惊也。

小儿身热，但一向壮热不已者，此为壮

热，甚则发惊也。小儿身热，但温而不甚壮热，此为温热。小儿身热，口中气热，叫哭无时，呵欠顿闷，面目青色，此为风热，甚亦发惊。小儿身热，饮水悸惕，手足摇动，上视弄舌，印内青筋见；掌中赤，怕物生涎，此为惊热。小儿身热，面赤时久不退，睡觉颠叫，气急发渴，胸高涎壅，此为积热，与壮热相似，但胸高涎壅为异，乃藏府积蕴热毒，三焦膈脘壅滞也。又摇头顶硬者，亦三焦膈脘壅也。

以上皆甚则发搐。治在惊痫门中。

小儿身体发热，气促鼻塞，清涕嚏喷，寒毛立，眼泪出，或出痰水，此为伤寒。治在伤寒门中。

小儿身热，时发时退，退但肚热，或夜发热，面黄腹胀吐泻，乳食不化，粪酸臭异常，此为食伤。治在伤食门中。

小儿夜发热，晓即如故，多涎喜睡，此肺虚发热也。此与食伤夜发热相似，须要识之。况二证余候各皆不同，食伤者可下，肺虚者不可下。下之则失津液，发渴引饮。昔钱乙治朱监簿子五岁，夜发热，晓即如故。众医作热，以凉药解之不愈，其候多涎喜睡，又以药下其涎，病益甚，至五六日，大分饮，请乙治之，乙曰：不可下，乃取白术散煎汤三升，使任意取足服。朱曰：饮多不作泻否。乙曰：无生水不能作泻，纵利亦不足怪，但不可下耳。朱又曰，先治何病。乙曰：止泻治痰，退热清神，皆此药也。服尽，又作两次与服，其子不渴无痰，又投阿胶散二服而安。是此证也，钱乙方本集载之。小儿每早食后发热，至夜则凉，此为血热。治方在后。小儿身热，形瘦多渴，饮食不为肌肉，此为疳热。治在疳门中。

小儿血气旺盛，发渴引饮，大便黄坚小便赤少，四肢身体翕然而热，此为胃实热也。治宜下之。

小儿身热微惊，耳冷骭冷，上唇头有白泡起，如鱼目珠子，或汗或不汗，此为变蒸。治在变蒸门中。

小儿身热，昏睡惊悸，喜喷喷，耳尻冷，此为疮疹候。治在疮疹门中。此与食伤变蒸相似。伤寒耳尻皆热，变蒸唇上有白疣泡珠子为异。

小儿身热者，更有内外，在内者多饮水得之，在外者多因风寒得之。钱氏有云：小儿身热饮水者热在内，身热不饮水者热在外，此大概之验也。在内者宜下之，在外者宜散之。

若小儿积蕴内外，伤感表里，浑身俱热，颊赤口干，小便赤，大便焦黄少者，先以四顺清凉饮子，利动藏府，热即退矣。既而复热者，是里热已解，而表热未去，复以惺惺散，或红绵散加麻黄，微发其汗。表热乃去。既去又复发热者，世医尽不能晓，再下再表，皆为不可，误伤多矣。此表里俱虚，气不归元，阳浮于外，所以再发热也，但以六神散和其胃气，则收阳归内，身便凉矣。

阎孝忠论

小儿壮热，伤风温疫，伤寒风热，疮疹伤食，率皆相似，未能辨认之间，但与升麻葛根汤、惺惺散、小柴胡汤服之，甚验盖此数药通治之，不致误也。惟伤食者，则大便酸臭，乳不化，畏食或吐，宜与微下之。

孙真人论

小儿内外气盛，眠时小惊或微觉伤风伤食，又虑变蒸身热者，但以紫圆，方已在前变蒸门下，或龙胆汤为治。此二药无所不疗，虽微利动，以减盛气，亦不虚人。小儿粪黄而臭者，此腹中有伏热也，宜服龙胆汤。若粪白而酸臭者，此挟寒不消也，宜服紫圆。但少与，令内消，甚者小增，令微稀溏，皆须节乳哺一两日，令胃气平和。若不节，则病易复，复则复下，伤其胃气，令腹胀满，若至再三下之，则过伤矣。

身热治方

治小儿潮热温壮。**胜金散**

雄黄一钱，水飞　白附子半钱　甘草半两，炙　芍药半两，水煮十沸，焙干　南星半两，炮　荆芥穗一分

上为末，每服半钱。水一小盏，入薄荷三叶，煎至五分盏，去滓温服，无时。

治小儿潮热发躁。**金花散**

川大黄一两　秦艽去芦，半两

上为末，每服一字，或半钱。水一小盏，入青蒿三两叶，葱白二寸同煎，至五分盏，去滓温服。若变骨蒸劳气，用童子小便浸青蒿、葱白煎药。

治小儿潮热减食蒸瘦。**秦艽散**

秦艽去芦，切，焙　甘草炙，各一两　干猫儿薄荷叶半两，切，焙

上为末，每服一二钱。水一中盏，煎至五分盏，去滓，食后温服。

治小儿虚热潮作，亦治温壮，及解伤寒。**地骨皮散**

知母　柴胡去芦　甘草炙　半夏汤洗七次，切，焙　人参去芦头　地骨皮去骨　赤茯苓去黑皮，各等分

上为末，每服二钱。水一盏，生姜五片，煎至六分，去滓，食后温服，量大小加减。

治小儿温壮身热，脸赤烦渴燥闷。**凉肌圆**

龙胆草去芦，二两　玄参去芦，一两　当归去芦，洗净，一两

上为细末，炼蜜和圆绿豆大，每服二十圆。竹叶汤下，儿大增之，无时。

治小儿温壮风热。**牛黄膏**

寒水石四两，煅出火毒　雄黄一两，水飞　山栀子仁一钱半　甘草一分，炙　牙消一两　铅白霜半两

上为细末，入麝香少许，炼蜜和旋，取皂子许，薄荷水化下，乳食后。

治小儿温壮风热，睡卧不稳，咳嗽喘急。**克效散**

龙脑薄荷叶二两　白僵蚕去丝、嘴，半两，微炒　玄胡索去皮，半两

上为末，每服半钱，或一钱。蜜汤调下，无时。

治小儿风热惊热，眠睡不安。**镇心丹**此胡御带秘方，许宜赞传。

铁粉一分　蛇黄一两，煅，醋淬七次　代赭石半两，煅，醋淬十次　马屁悖半两　麝香一分，别研

上为细末，炼蜜入糊，圆如小豆大，每服一粒。磨剪刀钚水化下，食后，亦治惊痫发搐。

治小儿风热昏塞，躁闷不食。**梨汁粥**

上以鸭梨三枚切碎，以水二升，煮取汁一升，去滓，入粳米一合，煮粥食之。

治小儿惊热如火，亦治温壮。**龙齿散**

上以龙齿为末，调服，或以烂龙角研浓汁，服一二合。

又方**人参牛黄散**

上以人参、牛黄等分为末，以薄荷水调下最佳。

又方　治如前

上以竹沥二合，温之，分三四服，无即刮竹茹，以醋煎温服。

治小儿积热啼叫，三焦壅滞。**青金丹**

青黛四两　甘草二两，生末　蝉壳去足，一两末　麝香一钱，研　辰砂一分，研，水飞　牛黄别研　脑子各三钱　龙齿末半两　天竹黄半两

上为细末，以饴糖和圆鸡头大，每一粒分四服，温水化下，无时。

治小儿积热痰实，三焦蕴毒，及风热面赤，大小便秘涩。**犀角圆**

生犀末一分　人参去芦，半两　黄连去须，一两　枳实去穰，半两，炒　槟榔半两　大黄二两，酒浸，切片，以巴豆一百个去皮，贴在大黄上，纸裹，饭上蒸三次，切碎，炒黄焦，去巴豆，只用大黄

上为细末，炼蜜和圆，如麻子大，每服一二十圆，临卧时熟水下，未利加圆数，疏导极稳。

治小儿诸热。**四顺饮子**

地骨皮去骨　防风去芦、叉枝　山栀子去壳取仁　连翘各等分

上为细末，每用一钱或二钱，水一小盏，入灯心竹叶少许，煎至五分盏，放冷服，无时。

治小儿诸热。**甘露散**

牙消一分　龙脑薄荷叶一两　大黄半两　甘草半两，炙　芎藭一分　雄黄一分，水飞

治小儿诸热烦躁。**牛黄散**

上郁金大者，湿纸裹，慢火煨熟为末，入牛黄少许，冷水调下，大者一钱，小者半钱，无时。

治小儿身热不痊

上以熟汤研郁李仁，如杏酪，一日服二合。

又方

上以鸡卵一枚，和白蜜服之。

小儿于立夏之后，有病身热者，慎勿妄为吐下，但以除热汤浴之，除热粉粉之，赤膏摩涂之。出《千金》。

除热汤

上以白芷根苗、苦参等分为粗散，用清浆水煎，更入盐少许，以浴儿，浴毕用粉粉之。

又方

白芷、苦参、秦皮煎汤，或无众药，但得一味煮汤皆可。

又方

上切李叶一升，水七升，煎至五升，适温暖用之澡浴，或只用楮叶亦可。

凉肌粉

上以白芷、枫叶、藁本、苦参、黄连等分为细末，每用三钱，以蛤粉二大块，同研匀细，入生绢袋子，每浴了，以扑身遍，令匀。亦治夏月伏暑，遍身生赤痱子，用之极妙。

赤膏

丹砂　雷元　芒硝　戎盐　大黄各三两

上切碎，用苦酒半升，浸四物一宿，以炼成猪脂一斤煎，三上三下，去滓，入芒硝成膏，每用以摩心下，及涂脐中。

治小儿血热，早食后发热，至晚则凉。**猪胆圆**

胡黄连　宣黄连去须、各半两　赤芍药一两

上为细末，以猪胆汁和成剂，却入在胆皮中，悬铛上，用浆水煮，勿令浆水入，煮熟取出，圆如绿豆大，每服三十圆，米饮汤下。食后临卧日三，有生瘰疬一证，亦早食后身热，颇相似，但以鼻衄泄泻，宜审辨之。

牛黄膏　治小儿疳热引饮亦治伤风温壮

雄黄研，水飞　甘草末　川甜硝各一分　郁金末一钱　脑子一钱，研　寒水石生，一两，飞研　绿豆粉半两

上同为细末，炼蜜和成膏，每用半皂子大，薄荷汤化下，食后。

治小儿里热，头昏颊赤，口内热，小便赤，大便少，要微挨动藏府即安。**四顺清凉饮子**

又治睡卧不宁，五心烦热，四肢抽掣，及乳哺不节，并寒温失度，热久连绵，欲发惊痫，目赤口疮，疮疹余毒。

大黄湿纸裹，煨熟，一方生用　当归去须，洗　赤芍药　甘草炙，各等分

上为末，三岁上儿每服一钱。水一盏，煎至七分盏，分二服，更量大小加减，食后温服。

治小儿外热，要微发汗即愈。**惺惺散**《良方》名桔梗散。治小儿风热，及伤寒时气，疮疹发热等。

桔梗去芦　细辛去苗　人参去芦　甘草炙　白茯苓去黑皮　栝蒌根　白术各等分

上为细末，每服一钱匕，水一小盏，入薄荷三叶，同煎至六分，去滓温服。凡伤寒温壮，变蒸疮疹未辨，皆可服。

治小儿风湿体热，头目不清。**红绵散**

白僵蚕去丝、嘴，二两炒　天麻一两　天南星二两，薄切作片子，油炸黄　苏木节二两半，别研

上为细末，每服一钱，水一小盏，入绵少许，同煎至五分盏，去滓温服。若伤风有表证发热者，于本方中入去节麻黄半钱同煎。若有里热，心躁烦渴者，入滑石末半钱同煎。

治小儿发热已经汗下仍热者。**六神散**

人参去须　白茯苓去黑皮　干山药　白术　甘草炙　白扁豆

上为细末，每服一钱，水一小盏，入枣一枚，擘破，生姜三片同煎，至五分盏，通口服。此药用处甚多，治胃冷加附子，治风证加天麻，治诸利加罂粟壳，若服之热犹未退，更与银白散治之。

银白散

干山药　白术　白茯苓去黑皮，各半两　知母　人参去芦　白扁豆　甘草炙　升麻各一分

上为细末，每服一钱，水一小盏，枣一个同煎，至五分盏，温服。无时。

治小儿温壮惊风，及伤寒身体发热，或作疮疹，于初身热未辨之间，并宜服此。**升麻葛根汤**

干葛细锉　升麻　芍药　甘草炙，各等分

上为细末，每服二钱，水一小盏，煎至五分盏，去滓，温服。无时。

治如前。**小柴胡汤**

柴胡去苗，二两　黄芩　人参去芦，各三分　半夏六钱，一字，汤浸七次　甘草三分，炙

上为细末，每服二钱，入生姜三片，枣一枚，水一小盏同煎，至五分盏，去滓温服。无时。

治小儿自出腹来，血气实盛，发热不歇，及食不消，变蒸不解，客忤鬼气，温壮寒热，并诸惊痫，悉皆主之。**龙胆汤**

龙胆去芦　钩藤　柴胡去苗　黄芩　桔梗去芦　芍药　茯神去木　甘草炙，各一分　蜣螂二个，去翅、足，炙焦　大黄一分，锉碎，微炒，《千金》一两。疑太多

上为粗末，每服一钱，水一小盏，煎至五分，去滓温服。无时。

治婴小壮热，未能服药者。**粉方**

寒水石　芒硝　滑石　石膏　赤石脂　青木香　大黄　甘草　黄芩　防风去芦、叉枝　芎劳　麻黄根各等分

上为末，每用药末三合，入牡蛎粉一升，细蛤粉亦可，相和再罗细，用以粉儿，日二次。

桔梗　治小儿风热温壮，或伤寒时气，疮疹未发，并宜服之，仍兼小黑膏服尤善。

桔梗去芦　细辛去苗　人参去芦　栝蒌根　白术　甘草　川芎　白茯苓去黑皮。各等分

上为末，每服二钱。水一盏，入生姜三片，薄荷三叶同煎，至七分盏，三岁以下儿作四服，无时。

小黑膏

川乌　南星各一枚，大者

上入一小瓶子内，用湿纸密搭封口，慢火烧之。候火灭取出，削取中心所存白处，如皂子大用之。须烧数枚，择中度者方用为末。次入薄荷叶、玄参末各五钱匕，研匀，炼蜜和成剂。每用旋丸，豆许圆之，葱白汤下，频频服。若筋脉或缓或急，加乳香同葱白汤下之。

治小儿发热极甚，因伏留心经，昏冒不省，或误服热药，畜热所致，用之神效。

以生梅花脑子半字或一字，取新杀猪心中血一两滴，同研作一圆，新汲水少许化下，大良。未省，即再服一粒。

治小儿惊热，以水磨犀角汁服之。

薄荷散　治小儿风热温壮及伤寒、伤风，疮疹未辨之间，皆可服之。

薄荷叶　藿香叶去土　荆芥穗　甘松去土　白芷　防风去芦，并叉枝　川芎　桔梗去芦　白僵蚕去丝、嘴　甘草炙　藁本去土，各一两　细辛去苗，半两

上为末，每服一钱，茶调温服。亦治大人风气不顺，头面风等疾，大能清理头目，止昏眩，聪明耳目。

小儿卫生总微论方　卷四

惊瘛论上

欲　发　搐

小儿惊瘛者，世俗之总名，须分轻重也。轻者但身热面赤，睡卧不安，悸惕上窜，不发搐者，此名惊也。重者上视身强，手足拳，发搐者，此名瘛也。其发搐之病，最为重大。必有因渐，亦有将发之候，以明之也。养小儿之家，若能辨之，求治于未发之前，不惟易愈，又不至于危殆，今集欲发搐候下项。

目上视喜惕者，欲发搐也；身热项强，常汗出者，欲发搐也；手足喜振掉者，欲发搐也；摇头弄舌者，欲发搐也；喜欠目直面青者，欲发搐也；潮热或壮热不歇者，欲发搐也；睡中时笑，或狂语言，手足摇动者，欲发搐也；鼻中燥，大便小便不利者，欲发搐也；发上逆啼，面暗色不变者，欲发搐也；身热吐哕喘粗者，欲发搐也；噫气下而妄怒者，欲发搐也；鼻口青，喜忪悸者，欲发搐也；咬牙甚者，欲发搐也；目直色赤或青者，欲发搐也；瞳子卒大异常者，欲发搐也；面色青黄，上窜气急者，欲发搐也；眼斜视者，欲发搐也；咽乳不和或噎乳，唇舌紧者，欲发搐也；涎盛膈壅，呀呷有声者，欲发搐也；卧面不安，身热不乳，数惕悸者，欲发搐也；体热口中气亦热，面目青，呵欠顿闷者，欲发搐也；掌中赤，印内青筋见，怕物生涎者，欲发搐也；吐利不止，厥痛时起者，欲发搐也；唇口颊腮赤，手足心皆喜冷者，欲发搐也；目瘈昏闷，撮口吐舌者，欲发搐也；身热小便难，或目直视，或视不精，皆欲发搐也。

孙真人曰：小儿睡眠不稳，或身热之时，见有诸小惊之证，辄紫圆微下之，减其盛气，令终不病痫发搐也。月用一次甚佳。方已在前变蒸门中。

已　发　搐

发搐之候，世俗所说者多矣，有言一证属一藏，一证属一府。乔岳歌曰：小儿惊候有多般，不显根源见病难；睡里咬牙惊入肾，非时吊眼病归肝；夜啼到晓元因肺，唇白面青一般看；前后心烦四肢热，面红如火向心间；干呕吃水脾惊患，脉微气喘一同言。汉东王氏言：非时吊眼惊入肝，睡后咬牙惊入肾，夜啼到晓惊入小肠，面青乍白惊入胆，气喘吃水惊入肺，面红脸赤惊入心，五心烦热惊入脾，喉中锯响惊入大肠，干呕无时惊入胃，睡中啼哭惊入三焦，如此之类，言至百种，丛脞无据，何以为治。又有言惊发三次为瘛者，第一次发，两太阳左右青脉朝眼。第二次发，山根青脉见。第三次发，眼下睑连金匮青脉见。又言发搐面赤，指内青纹见者为瘛。又云耳后完骨上青脉如线者为瘛，此等之论，亦为臆说。大抵不发搐者为惊，发搐者为瘛也。《千金》论瘛证，大体只分三种：一曰风瘛，因解脱衣袂，触冒风邪面作。其证先屈指如数乃发，口中气热，呵欠顿闷，手足摇动，治当发散；二曰惊瘛，猛闻大声，或扑仆惊怖而作。其证先叫啼乃发，心神不宁，不可下之，下之内虚，则病益盛，治当安神去热；三曰食瘛，因乳哺失节，或有积而作癖。其证先不乳而吐，先寒后热乃发。其证身体或温或热，多睡喜唾，吐逆腹胀。故小儿有癖积，脉大者必发瘛，治当下之。此三种内，风惊二瘛，时时有之，食瘛者十中无一，下之便愈。详此三种，虽诸病皆能变瘛，

莫不缘于风惊食之所作也。又《内经》有云：五藏主五畜，其间发重者，各见其象。肝为犬痫，目直视，身反折，手拳犬鸣；心为马痫，张口摇头，背强硬马叫；一云心为羊痫，目瞪吐舌羊叫。脾为牛痫，目痴腹满牛叫；肺为鸡痫，摇头反折，手纵搐搦鸡叫；肾为猪痫，目横身直如尸，吐沫猪叫，以上论痫发者，乃诸书精要也。然不若钱乙所论发搐者，乃心肝二藏为病也，其理有据而妙。肝主风，心主火，风火相加，发而为搐。前论小儿诸病，新久皆能变痫发搐者，以人有病，则饮食退减，脾胃不旺，肝必凌之。引动肝风，肝又主掣，若不得心火，则不能发搐。又人有病，则气血错乱，心神不宁，引动心火，心又主惊，若不得肝风，亦不得发搐也。须肝心二藏相为子母，俱有实热，风火相搏，惊掣相持　乃能发搐。其状亦如风之火荡，焰炽掣然也。故肝心二藏为病之源，余藏虽不正主，亦有相乘兼见之证。及所发亦有其时，假如钱论潮热变发搐，在早晨寅卯辰时者，此肝用事之时也。身体壮热，目上视，手足摇动，口生热涎，项颈强急，此肝旺也。钱治补肾泻肝，是谓补其母而泻其子也。发搐在日中巳午未时者，此心用事之时也。心惕目上，白睛赤色，牙关紧急，口内涎生，手足摇动，此心旺也。钱治泻心，心热退则肝母亦不能旺，是谓子能令母虚也。发搐在日晚申酉戌时者，此肺用事之时也。目微斜视，不甚搐而喘，身热睡露睛，手足冷，大便黄水。钱治泻其肝心，而补其脾。发搐者心肝实为病之源，故泻之；手足冷，大便黄水者，脾虚候也，故补之。发搐在夜间亥子丑时者，此肾用事之时也。不甚搐，眠卧不稳，身体温壮，目睛紧斜，喉中有涎，大便银褐色，乳食不消，多昏不纳津液。钱治但泻其心而补其脾。且心肝二藏为病之源，今独泻其心，而不泻其肝者，此本因潮热所作，发在肾用事之时，是肾虚心热极甚也，故但泻其心，热退则肝亦平矣。若更泻肝，则肾转虚矣。其大便银褐色，乳食不消，不纳津液，皆脾衰之证，故补其脾也。以上四藏，分主十二时，脾藏为兼见之证。此潮热发搐，治则惟泻心肝者，盖二藏俱实，为病之源故也。其肺藏有虚实之证，见虚则补，见实则泻。况发搐是心火旺所作，而肺金实证亦罕，惟偏搐者有之外，肾藏但主虚而无实，见其虚则补之。《内经》有云：虚则补其母，实则泻其子，先补其母，后泻其子。子能令母虚，母能令子实。钱乙论此发搐元由，为治次第，乃谓得圣人之经旨深意也，可谓出群拔萃矣。今更以钱论三事参之，一者发搐逆顺，二者发搐阴阳，三者发搐真假，及各于逐项之下。以钱治法为证，后学之士，将此三事，参推五藏，审别形候，察其虚实，观以时刻，依法为治。则小儿发搐之病，无以外也。

发搐逆顺

男发左搐，或手大指屈外，或目左视，无声者顺也。若发右搐，或手大指屈内，或目右视，有声者逆也。女发右搐，或手大指屈内，或目右视，无声者顺也。若发左搐，或手大指屈外，或目左视，有声者逆也。顺者相胜也，左肝为木，右肺为金，一负一胜，故无声也；逆者战也，二藏俱实，木金相击，故有声也。顺者易治，逆者难治；男逆稍易，女逆极难。更当参其发时，以补泻为治。昔钱乙治李寺丞子三岁，发搐自卯至巳，目右视，大叫哭。乙见曰：逆也。男为阳。本发左视无声则顺，右视有声则逆，所以然者。左肝木也，右肺金也。逆则二藏相战，金木相击，而有声也。治乃泻强补弱。假令女发搐，目左视，是肺来胜肝，肝不能任，故哭叫也。当泻其肺，后治其心，续治其肝。若病在秋，日西时同。肺兼旺位，当大泻其肺。若病在春，早晨时同。此肝旺之时，尚不能胜肺，是肺强而肝大弱也。当补其肝肾，大泻其肺。若男发搐目右视，是肝来胜肺而叫哭，当泻其肝心。若病在春夏，早晨日中时同。肝心旺时，当大泻

其肝。若病在秋，日晡时同。此肺旺之时，尚不能胜肝，是肝强而肺极虚也，当补其肺，大泻其肝。所以言目反视者，乃肝主目也。凡搐则是风热相搏于内，风属肝，故引见于目也。今此病男反女，故稍易治于女也。先泻其肺，不闷乱，以知肺病退也；后补其肾，续治其肝心，五日而愈。乙又治徐氏子三岁，每日酉发搐，身微热，目微斜露睛，四肢冷而喘，大便微黄。请乙与李一医同治。乙问李曰：病搐何如？以何药治之？李对不当。乙曰：搐者心肝实也。身微热者，日酉肺用事之时，肺主身温，今且热者，肺虚也。目微斜露睛者，肝肺相乘胜也。四肢冷者，脾虚也。肺若虚甚，则脾母亦弱，木气乘之，四肢即冷。治当先补脾肺，得脾虚证退，然后治其心肝，九日乃愈。此亦逆搐，肝肺相乘，目斜者必当右视也。今举此以明逆顺为治之法尔。

发搐阴阳 天吊附阳搐，脾风附阴搐。

小儿发搐，为急慢惊者，古书无有，惟曰：阴痫阳痫。所谓急慢惊者，乃后世名之也。以阳动而速，故阳搐曰急惊；阴静而缓，故阴搐曰慢惊。此阴阳惊痫发搐之别也。

阳搐者，身大热，面赤引饮，口中气热，大小便赤黄，眼上视连扎，手足搐急，牙关紧噤，项背强直，涎潮响，此因心热极则生风，风属肝，心肝子母，风火搏炽，动而发搐也，及其发定，则了然如故。此阳盛阴虚，治当利惊以除风热，不可与巴豆快药大下之。恐畜虚热不消，小儿痰壅积热于心，因闻大声，或误惊触，则动而发搐。若热极者，虽不因闻声惊触，亦自发搐。小儿本实者，多此候也。

〔天吊〕附阳搐

小儿心膈壅滞，涎盛热积，不得宣通。或因母饮酒食肉无度，致烦毒之气，流入于乳，因以乳儿，令儿宿滞不消，热毒乘心，发为惊搐，眼目翻腾，壮热不休，甚者爪甲皆青，状若神祟，欲谓之天吊。此非天能吊人，以其眼吊上视，故取意名之。况小儿发搐，未有不眼上者，实亦阳搐之候也，治宜去涎热。昔钱乙治广亲宅七太尉弟八使发阳搐，自寅至午，丁未发前。钱乙见其目直视而腮赤，此心肝俱热。更坐石杌子就冷，此热甚也。又肌体素肥而本实，其脉急促，发搐自寅至午，皆心肝用事之时，治乃泻其心肝，而补其肾，病遂得愈，此亦泻强补弱也。

阴搐者，身温面㿠白，手足似搐不搐，但时时瘛疭，昏昏似睡，而无精神，眼露睛微微上视，或胃痛而啼作鸦声，或不能啼哭，唇口白色，脉沉弱，此因大病之后，或吐泻过甚，致脾胃虚损而生风，茬苒乃成，此阴盛阳虚，治当补其脾胃，泻去肝风，小儿虚弱，虽不因吐泻取转，直发阴搐者亦有之。本怯者多此候也。

〔慢脾风〕附阴搐

小儿因伤风冷，或病吐泻，医以温药补之不已，复用凉药治之又不已，本谓伤于风冷，医乱治之，致脾虚而内不能散，外不能解，至十余日，其证昏睡露睛，大便不聚而泻，此脾虚风入，风在脾胃之间，故大便不聚而泻。时瘛疭，身体四肢口鼻中气皆冷。小儿亦有因惊所传，或诸病久变，见此证者，皆因脾胃虚怯，而生风所为也，故俗谓慢脾风矣。实乃阴搐之危候，治当去脾间风，风退利止，以补脾胃。昔钱乙治王氏子病吐泻，他医以药下之，至虚变阴搐，其候睡露睛，手足瘛疭而身冷。乙见曰：此慢惊也。与药以实脾胃，即开目身温。王疑其子不大小便，又令他医以药利之，而复身冷，尚欲令乙利小便。乙曰：不当利，利之必身冷。王曰：已身冷矣。乙曰：不能食而胃中虚，若利大小便，使脾肾俱虚，当闭目身冷即死，今此儿幸胎气实而难衰。乙复补脾胃，则微能饮食。所以然者，谓利大小便，脾胃虚寒，当补脾而不可别攻也。后不语，他医作失音治。乙曰：既失音，何开目而能饮食？又牙不噤而

口不紧？他医不能晓。乙曰：此因用清药利小便，致脾肾俱虚，今脾已实，肾尚虚故也，遂以药补肾。及依法为治，半月能言，一月而痊。

发搐真假

真者，儿在母胎中时，血气未全，精神未备，则动静喘息，莫不随母，母调适乖宜，喜怒失常，或闻大声，或有击触，母惊动于外，儿胎感于内。至生下百日以来，因有所犯。引动其疾，则身热吐呕。心神不宁，睡卧昏腾，嗓啼无时，面青腰直，手足搐搦，口撮腮缩，目瞪气冷，或眼闭胶生，或泻青黄水，是胎痫也。是内藏感病，发为真搐，然亦发稀而难治，不过三两次必死矣。

假者，儿生出母腹，百日以来，肌肤嫩怯，血气软弱。被外风伤之，入客于内。每遇则儿不能任，故发搐搦。口中气热，呵欠嚏喷，此风痫之候。重者亦不呵欠嚏喷，与胎痫相似。然发频者轻，轻则易歇故也，治当发散。昔钱乙治李司户孙，生百日来发搐，日三五次。请众医治，或作热天吊，或作胎惊，或作惊痫，治皆无应。后请乙治，乙曰：婴儿初生，肌骨嫩怯，被风伤之。儿不能任，故发搐也。然频发者轻，以客风在内，每遇不任，即搐轻则易歇，故发频也。搐稀者，是内藏发病，不可救也。乙用微剂以散风邪，兼涂囟浴法，治之乃愈。仍不可多服，盖儿至小，易为虚实，多即生热，止一服而已。兼用封，无不效。以上钱乙所用方，并本集载之。

惊痫杂论

凡小儿急惊，虽搐甚不用忙扰，亦不足畏。慢惊虽微搐切当救，乃危候也。方搐之时，但与扶持，慎勿擒捉。盖风气方盛，恐流人筋脉，致手足曲戾不随，或成拘挛。

凡小儿急惊，阎孝忠云：当其搐势减时，与镇心治热药一二服，如麝香圆、抱龙圆、磨砂圆、紫雪之类，候惊势已定，用药下其痰热，如麝香圆、软金丹、桃枝圆之类，如此则心神安宁即愈。

凡小儿慢惊，若因吐泻，已成虚损者，阎孝忠云：当与速生胃气，以理中丸，并研金液丹末，煎生姜米粥调灌之，多服乃效。候胃气生，手足渐暖，四肢犹然瘛疭，即减金液丹一二分，增青州白圆子一二分同研，如上服，渐渐以意减金液丹，加白圆子，兼用异功散、羌活膏、钩藤饮之类调理，频频与粥，虽至危者，往往死中得生。

凡小儿急慢惊，阴阳异证，切宜辨而治之。急惊合用凉药，慢惊合用温药。世人多用一药，不能分别，误小儿多矣。殊不知药性自有温凉，岂可泛用！初虞世谓治阴阳痫，寒温药性，当于方中用时增损，则无失矣。又阎孝忠言，慢惊药中宜去龙脑，纵须合用，必以温药为佐，或少少用之，惟凉故也。

凡小儿于天阴雷发声之时，必掩塞其耳，或作杂声以乱之，恐猛闻大声而发搐。

凡小儿发搐，时醒而身软者为痫，若发搐不时醒，身硬者为痉，又名曰瘛。乃中风之候。论在中风门。

凡小儿惊痫泄泻等诸病，烦渴者皆津液内耗也。不问阴阳，煎钱氏白术散，使任意取足饮之，弥多弥好。

凡小儿惊痫药中，能不用水银、轻粉者尤佳。如不得已而用之，仅去其疾即止。

盖小儿肠胃易损，亦伤口齿。今所集之方，多不用银、粉，如须用之者，当依此酌量减损。

凡小儿欲生疮疹，有发搐者，当从疮疹为治。余诸病有与惊痫相兼，可以一方为治者，依法用之。若不可以一方为治者，则各用所主药，相兼治之。

凡小儿惊，蜣螂为治第一，世医多不学，未见有用者，若用之，须择不伤水者，伤水即不堪用。去其头、翅、足，炙令焦，乃入药。

凡小儿吐泻后，精神困顿，多睡，不吃乳食，四肢逆冷，欲变成痫者，以神曲为末，入脑麝各少许，温水调服。若已成痫，哭如鸦声，面色青黄，手足瘛疭，咽中不利，更入朱砂同末服之。若变痫滑利者，以面末蜜圆如鸡头大，温水化下。

又一方曲末一两，琥珀、甘草各二钱，朱砂、雄黄各一分，同末，蜜圆如鸡头大，名太乙丹，治小儿百病。

小儿卫生总微论方　卷五

惊痫方下

治惊欲发搐方

定心膏　治诸热，安心神，截惊痫欲发

生葛根取汁、半合．如无生者，干葛细锉、水浸、慢火熬取汁　竹沥半合，依法旋取　大麻仁一分，二味同研　绿豆粉一两，别研　朱砂半两，研，飞　牛黄一钱，研　麝香一钱，研

上同和如稀粥，更入少绿豆粉，相拌得所，石臼中杵三二百下，成膏圆鸡头子大。每服一丸，煎人参汤化下，量大小增减用。无时。

琥珀丹　治如前。

琥珀一两，令研　白僵蚕去丝、嘴，炒，半两　腊月牛胆制天南星一两　天麻一两　白附子半两　香白芷半两，以上先为细末　朱砂一两，研，水飞　龙脑一钱，研

上拌匀，炼蜜圆，如鸡头子大。每服一圆，煎入参、薄荷汤化下，量大小增减用。无时。

生葛根饮子　治热极不已，欲发惊痫。

生葛汁一合　竹沥一合　牛黄如杏仁许，别研

上相和，每服半合，量大小与之，无时。

钩藤饮子　治发热时时戴眼，口吐涎沫，欲发痫搐。

钩藤半两　蚱蝉七枚，去翅、足，微炒　人参去芦，一分　黄芩一分　大黄一分

上粗末，每服一大钱。水一盏，煎至六分入竹沥半合，再慢煎数沸，下牛黄一小豆许，细研入之，搅匀放温，量大小与服，得微汗为妙。乳母忌蒜面炙煿之物。

治小儿心胸积热毛焦，睡中狂语，欲发惊。

朱砂半两，研，水飞　牛黄六分

上同研如粉，每服一钱，摩犀角水调服，量大小与之．无时。

治小儿热盛，夜后狂语，欲发惊。以竹沥．一岁儿连夜饮二合，少少频与，儿大以意加之。无时。

参苓散　治小儿忽作惊状，目上视，手足强，未可服惊药，宜先与此服之。

人参去芦　茯苓去黑皮，各半两　甘草一分，炙

上为末，每服一钱。温汤调下，食空服。

茯神散　治小儿烦热心悸，手足摇动，欲发惊痫。

茯神去心内木　龙齿研细　牛黄别研　犀角屑各半两　寒水石一两　石膏研，飞，一两　川大黄一钱

上为粗末，每服一钱。水一盏，煎至五分，去滓，入竹沥半合，更煎一两沸，量大小与服，无时。

又方　治如前。

茯神去心内木　龙齿研　升麻　甘草炙，各半两　寒水石　石膏研，飞　麦门冬去心

上为末，每服一钱，水一盏，煎至五分，去滓，入竹沥半合，更煎一二沸，量大小与服，无时。

辰砂金箔散　治小儿心膈邪热，神志不宁，悸惕烦渴，睡卧不稳，弄舌啮齿，痰实咳逆，咽嗌不利，欲发惊痫。

辰砂七钱，研　桔梗去芦，五钱　人参去芦，三钱　白茯苓去皮，三钱　蛤粉八钱　牙硝枯，三钱，研　甘草一钱半，炙　脑子半字　金箔二片

上为细末，百日以下儿用半字至一字，薄荷水调膏涂舌上，令自咽。百日上儿或大便

涩者，蜜汤调一字与服。一岁上者半钱。咽喉肿痛，口舌生疮者，以少许掺病处，咽津必效。

牛黄散　清心凉膈，截惊痫欲发、已发。

牛黄半两，细研　朱砂一分，研、水飞　麝香一分，别研　蝎梢一分，末　天竺黄一分，研　钩藤一分，末

上同拌研匀。每用一字。新汲水调下，无时。

雌黄圆　治眼直恶声，嚼舌吐沫，欲发惊痫。

雌黄一两，研、水飞　黄丹一两，微炒　麝香一钱，研

上同研细，用牛乳半升，熬成膏和剂，圆绿豆大，每服三圆，温水下，日三，如无牛乳，用羊乳亦得。

急风膏　利胸膈，清心神，截欲发、已发惊痫。

朱砂半两，研、水飞　天浆子十四个，微炒、取虫，去壳，为末　腻粉一钱，研　青黛一分，研　干全蝎十四枚，为末

上拌研匀细，入龙脑细末半钱，再同研匀，用软饭剂成膏，圆皂子大。每服一粒，煎人参、荆芥汤化下，无时。

消惊膏　治小儿风热涎盛，截除惊痫，安镇心神，定宁搐搦，利膈脘去壅滞。

龙脑半钱　朱砂研，水飞　天南星　白附子生末　天麻末　蝎梢末　半夏汤洗净，生为末，各二钱　水银结砂子　腻粉各一钱

上同匀细，用石脑油盏内重汤煮过，搜和药末为剂，圆如黑豆大。每服一二圆，薄荷汤化下，更量大小加减服，无时。

神效朱砂圆　治小儿温壮，惊风积热，一切壅滞，能化痰清神，利膈消惊截搐。

朱砂研细，水飞　腻粉各一分　连六金箔七片　干蝎十个，全者　天麻一分　白附子一分，炮　半夏汤洗七次，焙干，一分　白僵蚕炒去丝、嘴，一分

上同为细末研匀，煮枣肉和如小豆大。每服二圆，煎荆芥、薄荷汤化下，无时。

剪刀股圆　治小儿惊风欲发，未见的证，但先服一圆，无不消退，用之常验。

五灵脂去砂石，一分　干蝎紧小全者　龙脑别研，半钱　干蟾净洗，去五藏、四足，慢火炙，令黄色，一分　牛黄别研细，一钱　蛇黄火煅醋淬七次，别研如粉，半两　白僵蚕直者，去丝、嘴，毕微炒用　天竺黄别研细，半两　朱砂研，一钱，水飞　麝香别研，半钱

上顺手研令极细，糊圆樱桃大。每服一圆，金银、薄荷汤，以剪刀股研化服之，三岁下者，只半圆，无时。

治风痫方

蜣螂散　治小儿风痫发搐。

干蜣螂三分，微炒　天麻半两　防葵半两　蝎梢一分　威灵仙半两，洗，焙，以上先为末　川芒硝　天竺黄各一分，二味同研细

上同拌匀为散，每服一字或半钱，乳香汤调下，量大小加减与服，无时。

麻黄蝎梢散　治如前。

麻黄去根、节，半两　蝎梢十四个

上将二味碎之，用薄荷叶裹遍，外更用纸裹了，于水醮湿，慢火中煨纸及叶干透，取出为末，每服半钱，金银、薄荷汤调下，无时。

芎犀散　治风痫多困不省。

川芎　犀角散　独活去芦，各半两　蝎梢　人参去芦　天麻各半两

上为细末，每服半钱，温酒调下，无时。

葱汤圆　治风痫发搐，痰盛壅热。

天南星炮裂为末，炒，一钱　蝎梢一分，微炒　半夏一分，汤洗七次　寒水石煅熟为末，一分　朱砂半钱，水飞　僵蚕炒，去丝、嘴，一分

上为细末，面糊圆绿豆大。烧葱白泡汤送下三五圆，量大小加减，无时。

人参化风膏　治风痫发搐，涕咳无时。

天麻一两，酒浸　全蝎十四个，微炒　僵蚕去丝、嘴，微炒　人参去芦　川芎　白附子各半两

羌活去芦　独活去芦　防风去芦并叉枝，各一分

上为细末，炼蜜圆如皂子大，每服一圆。荆芥汤化下，量大小与之。无时。

治小儿风痫

以鳖甲去裙襕，炙黄杵末，每服一钱，乳汁调服之。或以蜜和圆。如小豆大，服之亦可。无时。

鸡苏散　治小儿风痫。

鸡苏　木贼　荆芥

上各等分，为细末，以茶清调下半钱或一字。无时。

皂荚煎圆　治如前。

肥嫩不蛀皂角十挺，去皮棱，以水二大碗，搓汁至滓无味，将汁熬成膏，别顿　硇丹不拘多少，于熨斗内，簇熟炭火，煅至炭过，吹去其灰

上研硇丹为细末，量其所用，入皂荚膏和剂，圆绿豆大。每服五七圆。温汤送下，乳食前。

榴梅散　治如前。

以大石榴一枚，割顶去子，剜作瓮，入全蝎五个在内，却以顶盖之，纸斤槌黄，泥封裹了，先用微火炙干，渐加大火煅通赤，良久去火，放冷去泥，取其中焦者，细研为散。每服半钱，乳调下，搐者服之便定，不会服者灌之。儿稍大，用防风汤调下。无时。

大青膏　治风痫发搐

青黛一分，研　麝香一字，别研　天麻末，一分　白附子末，生，一钱半　蝎尾去毒，一钱　朱砂半钱，研，水飞　乌蛇肉酒浸一宿，去骨，焙，取末，一钱半　天竺黄五分

上为细末和匀，生蜜调膏，每用：月中儿粳米大，百日儿半皂子大，一岁儿一皂子。同牛黄膏温薄荷水化开一处服之。五岁上者，同甘露散一处服之。

牛黄膏

雄黄小枣大，一块，用独蒜、萝卜根同醋一大盏，煮至醋尽为度　甘草三钱，末　川甜硝三钱　朱砂末半钱，别研，水飞　龙脑一字　寒水石五钱，末，并炒

上为细末研匀，蜜和剂，温薄荷水化，如前法服之，无时。

甘露散一名玉露散

寒水石半两，嫩而带青中有细文者是　石膏半两，坚白者，有墙壁者　甘草生，一分

上同为细末，每服一字或半钱，温汤调下，食后。

治惊痫方

蝉壳散　治惊痫热盛发搐。

蝉壳去土，半两，微炒　人参去芦，半两　黄芩一分　茯神一分　升麻一分，以上细末　牛黄一分，别研　天竺黄一钱，研　牡蛎粉一分，研

七同匀细，每用半钱，煎荆芥、薄荷汤调服，无时。

镇心膏　治惊痫发搐热盛闷乱。

远志甘草水煮，去心，一两　防己半两　茯神去心内木，半两　人参去芦，半两　大黄半两，微炮，以上细末　辰砂研，飞，一两　雄黄一分，研，水飞　金箔二十片，细研　银箔三十片，细研　龙脑一钱，细研

上拌匀，炼蜜和膏，每服一皂子，薄荷汤化下，无时。

金银丹　治惊痫发搐，安神定志，解烦热，化痰涎。

羌活去芦　人参去芦　茯苓　川芎　山药　南星　蛇黄火煅，醋淬七次，别研，各一两　蜈蚣三分，炙　脑子一钱　乳香一分　全蝎一分　雄黄水飞，一分　蝉壳去土　僵蚕炒，去丝、嘴　铁粉各半两　麝香一钱　朱砂半两，为衣

上为细末，面糊和圆，作二三等圆子，随大小量圆数服，无时。

安神汤　治惊痫搐搦，精神伤动，心意不宁。

白茯苓一两　白鲜皮一两　菖蒲一两，九节者　人参去芦，一两　远志甘草水煮，去心，一两　石膏半两，研　甘草一分　犀角末一分

上为细末，每服一钱。水一盏，去心麦门冬少许，煎至五分，去滓放温，时时与服。

镇惊圆　治惊痫发搐、中焦壅热痰盛。

茯神去皮及心肉末　人参去芦　防葵　铁粉研　朱砂研，水飞，各半两　雄黄研，水飞　犀角屑　龙齿别研　大黄蒸，各一分　牛黄研　龙脑研，各一钱　金银箔各三十片

上为细末，炼蜜和圆小鸡头大。每服半圆或一圆，薄荷汤化服。量大小加减，无时。

治食痫方

《千金》用紫圆方。俱前变蒸门中。

真珠圆　治食痫发搐。

滑石末三钱　轻粉三钱　干蝎七个　巴豆四十个，去皮膜，出油尽用　半夏曲末二钱　南星末，一钱　麝香少许

上为末，蒸饼和圆绿豆大。一岁下者一圆，上者二圆，葱汤下。乳食前。

蚵蛸散　治食痫发搐，身热，眼上视。

干蝎　白附子　朱砂各一钱，研，水飞　腻粉半钱　巴豆二十四个，去皮膜，出油。一云不出油，研　天浆子三个，去壳　麝香一字

上同研细，每用一字，薄荷汤调下，量大小虚实加减，乳食前。

大青圆　治食痫发搐，及有惊积。许宣赞方。

青黛炒，五钱　蜈蚣一对，全者，微炒　蝎二十一个，全者，微炒　巴豆二十一个，去皮、心膜、出油尽用

上为末，用鹅梨汁煎，绿豆粉作糊，和圆豌豆大，每服一圆，酒一匙，水一匙，薄荷汁少许，同化下。食痫或急惊发搐，服之立效，乳食前。

银汤圆　治如前。

天南星醋煮透，切，焙干，为末，炒，一钱匕　棘冈子十四个，去壳　巴豆十四个，去皮心，出油尽　雄黄末炒，一钱匕　蝎梢十四个　朱砂末五分

上为细末，前薄荷汤调面作糊，圆如黍米大。每服五圆，煎金银汤下，乳前食，更是大小加减。

妙圣丹　治食痫发搐，利胸膈。

蝎梢四十九个，微炒　木香一分　代赭火煅，醋淬十次，一分　牙硝一分　大黄一分，炮，以上先为末　腻粉半分，研　朱砂半两，研，水飞　麝香半钱，别研　脑子半钱，研　巴豆七个，去皮心，纸裹，出尽油

上为细末，滴水和圆黍米大。每服三五圆，沉香汤下，乳食前。

蟾酥丹　治食痫毒盛，汤药不下。

蟾酥一分　真珠末一分　甘遂一分，慢火煨黄　牡蛎粉一分　犀角末一分　巴豆七个，去皮心，出油尽　杏仁一分，麸炒，去皮尖，细研　麝香一分，研

上拌研匀细，糯米饭和圆黍米大。每服三圆，煎荆芥汤放温送下，量大小加减，乳食前。

灵朱圆　治食痫乳食不消，心腹壅滞，四肢抽掣。

五灵脂去砂石　朱砂研，水飞，各一分　巴豆五枚，去皮心，研，纸裹，去油

上同研细如粉，烧粟米饭和圆黄米大。一二岁儿，温水下二圆。取或利或吐效。更在量大小加减服之，乳食前。

三痫丹　治痫证发，未能分辨，皆可治之。

黑锡一两　水银半两，二味同结沙子，研极细　蝎梢半两　木香半两　天南星半两，炮裂　僵蚕去丝、嘴，半两，炒黄　人参去芦，半两　半夏半两，汤洗七次　防风去芦并叉枝，半两

上为细末，石脑油半盏，研极细，入麝香一钱，脑子半钱，各研细，与药末拌匀，枣肉和圆黍米大。每服三五丸至十丸，煎荆芥、薄荷汤下，无时。

治五藏五畜痫方

治肝病犬痫　伏日取犬齿，水磨汁服。

又方　取犬颔骨为末服。

治心病羊痫　三月三日，取羊齿，水磨汁服。

又云心病马痫　取马齿，水磨汁服。

又方　取马毛烧灰为末，水服。一云马蹄

治脾病牛痫　取牛齿，水磨服，乌牛齿最佳。

又方　取白牛屎中豆服之。

又方　烧蹄末服。

又方　取牛鼻中木，烧灰服。

治肺病鸡痫　取白鸡脑，水调服。

治肾病猪痫　五月五日，取猪齿，水磨汁服。

又方　取猪乳服。

五色圆　治五脏五种痫并主。

朱砂半两，研，水飞　水银一分　雄黄二两，研，水飞　真珠末一两，令研极细　铅三两，同水银熬

上为末，炼蜜和圆麻子大。每服三四圆，煎金银、薄荷汤下，无时。

露蜂房散　治五种痫发搐，口吐涎沫。

露蜂房一两，洗净，炙干　石菖蒲一两，九节者良　桂心半两　远志甘草水煮，去心，半两　人参去芦，半两　牛黄一分，研　杏仁汤浸，麸炒，去皮、尖，研，一分　朱砂一分，研，水飞

上同为细末，每用半钱，麝香汤调下，无时。

治偏搐方

双剑金　治惊痫偏搐。

赤足蜈蚣一条　紫色大螳螂一个

上晒至干。以利刀当脊分切作两半，各逐左右，别研为细末，不得交错，各用贴子盛之。子贴子上号记左右，遇其患者，每用一字许，鼻内任搐之。左治左，右治右。俱搐者，任右则上住，任左则左住，左右任皆住。

双金散　治如前。

上以蜈蚣一条大者，去头足尾，用真酥涂。慢火上炙黄。置枯子，面南用快竹刀子当脊缝中分剖作两半，用两贴子号记左右字，不得交差，差则误矣。又以麝香一钱，亦分左右两处，先将左分一半在左字贴内，与蜈蚣同研作细末，却入左字贴内盛讫，次将右分一半入在右边贴内，与蜈蚣同研作细末，却入右字贴内盛讫，不得相犯。每遇病者，眼睛吊上，止见白睛，搐搦不省，不能出声者，用细苇筒子置药少许在中，随搐者左右鼻孔中吹之，用药不可多，若眼吊全未下，即添些小，以意度量，其眼随手便下，搐亦便止。余同上法，二方相犯。

保寿散　治惊痫偏搐。

雄黄研细，水飞　茯苓去黑皮　人参去芦，各一分　朱砂半两，研，飞　牙硝一钱

上细匀，每用半钱，熟水调下，一岁用一字，无时。

治阳搐急惊方

软红膏　治急惊潮搐涎盛。

天南星一两，生，为末　朱砂半两，研，水飞　水银一分，用真石脑油半盏，同研细　干蝎梢四十九个，为细末

上拌匀。入脑麝各一钱。再研枣肉和剂。入石臼中杵二五百下，圆如皂子大。

每服一圆。煎薄荷汤化下，神验。无时。

朱粉丹　又名鹤顶丹。　治急惊壮热，吐涎发搐。

朱砂半两，水飞　腻粉一分　蝎梢半两，微炒　巴豆七个，去心、皮、膜，出油尽用，一方只用五个

上为细末，糊圆黍米大，每服三两圆，煎桃仁汤下。一方无巴豆，但作散，每服半钱，汤使如前，无时。

百灵圆　治急惊，化涎定搐。

黑铅一分　水银一分，二味同结砂子　天南星一分，炮裂　白附子一分，炮裂　干蝎一分，微炒　天麻一分　蝉壳去土，一分，微炒　麝香一钱，研　牛黄一分，研

上为末匀细，糯米饭和圆黍米大。温酒下三圆。量大小加减服，无时。

天浆子圆　治急惊发搐。

天浆子十四个，有虫者去壳　牛黄一分，别研　麝香一钱，研　白附子一钱，炮裂　犀角末一分　半夏一分，汤洗七次　蟾酥一钱　猪胆一个

上为细末，入猪胆汁和剂，如汁少，入

少面糊圆黍米大。每服二五圆，薄荷汤下。无时。

朱砂散　治如前。

朱砂一分，研，水飞　腻粉半钱　麝香半钱，研　芦荟二钱，别研　胡黄连一钱　蝎梢七个　白附子二钱　金箔七片　僵蚕十个，去丝，嘴，炒　赤足蜈蚣一条，炙　甘草二钱，炙

上为细末，二岁上儿半钱匕，以下者一字，金银薄荷汤调下，三岁上者一钱匕，如口噤不开，灌入鼻中，无时。

白金散　治如前。

天南星一两，大者四破之　朴硝一两半　白矾一钱　甘草半两

上为粗末，用水五盏，慢火一处煮，水尽为度，焙干为细末，入朱砂末一钱拌匀，每用半钱，煎金银薄荷汤，放温调下，无时。

七宝牛黄圆　治急惊目睛上视、手足发搐。

朱砂水飞　粉霜别研　轻粉　雄黄研，水飞，各一钱　牛黄半钱，别研　脑子一字，研　麝香一字，研

上为细末，糯米粥和圆小豆大。二岁下儿半圆，上者一圆。金银、薄荷汤磨化服之。月内儿一圆分四服，百日者分三服。看儿大小壮怯，及病势轻重，以意加减，无时。

水银圆　治急惊，痰壅发搐，闷乱口噤。

水银一分，入枣肉少许，同研至星尽　腻粉一分，研　南星一分，炮裂　干蝎一分，微炒

上为末，再用枣肉和圆黍米大。每服五七圆，乳香汤下，量大小加减，无时。

小朱砂圆　治急惊发搐痰壅。

朱砂一分，研，水飞　巴豆三十个，去心皮、膜，出油令尽　半夏汤洗七次，焙干为末，抄二大钱　杏仁五个，热灰内炮过，汤浸去皮尖，炒黄

上为细末，面糊和圆绿豆大。二岁儿一圆，荆芥薄荷汤下，三岁加一圆，五岁者三圆，如有惊在内者，利动至病尽，药圆乃出，如无惊者，药不下也。甚妙面稳，乳食前。

至圣膏　治急惊发搐，手拳紧，多睡啼叫，烦热膈实。

朱砂一分，水飞　天南星腊月牛胆制，用半两　铁粉一分，水研　蝎梢十四个　续随子去皮，四十九个　脑麝各少许

上为细末，炼蜜和圆绿豆大。薄荷温汤化下一圆，如涎多加轻粉半钱，更量大小加减。无时。

牛黄散　治急惊搐搦壮热，膈壅痰盛。

干全蝎七个　巴豆二粒，去皮　轻粉半钱　雄黄二钱，水飞　川郁金一分，锉用，皂荚半锭，揉汁煮过，炒至干用　朱砂一钱，水飞

上为细末，入脑麝各少许，每用一字，薄荷汤下。或得吐泻，或得睡汗，皆愈。

如牙关噤，即先用药掺开，然后服之。开噤方在后。

蚵蛸散　治急惊风潮搐　以全蝎中紧实者，去尾尖上毒，炒焦为末，每服一钱。浓煎防风汤调下。予相识王宣教讳循理，一子病惊搐，得此方治安。渠恐再发，遂与常服之。妙选同与乌蛇散服之，尤佳。

四圣散　治一岁至五六岁儿，急惊潮搐。

天浆子一枚，去壳　朱砂二豆许，研，水飞　全蝎一枚　麝香一小豆大

上同研膏，每服少许，薄荷温水化下，无时。

治小儿卒得急痫

钩藤　甘草炙，各半两

上锉碎，以水五合，煮取二合，分八服，日五夜三。

治急惊风搐痰盛

天浆子二个，去壳，生用　干蝎七枚，生用　朱砂一钱，水飞

上同为末，软饭和圆粟米大，每服二圆，荆芥汤下。不计时。量大小加减。

又方　治如前。

以全蝎一枚，薄荷四叶裹合，火上炙，令薄荷叶焦，同研细末，分作四服，温汤调下，亦治大人风涎，只作一服，无时。

治急惊发痫，迷闷不省，嚼舌仰目瘛搐。

以真牛黄一大豆许，研细和蜜水服之。

以犀角末半钱匕温水二合分服。

以真熊胆二大豆许，以乳汁或竹沥服之。能去心中涎，即愈。

以虎睛研末，以水调灌之，量大小与。一方用一豆许，炙干研末，猪乳三合和之，绵缠蘸浸，与儿吮之，频频，以多为佳。

治小儿卒惊，似有痛处，而不知疾状。

以刺雄鸡冠血，滴少许，入儿口中。

治小儿初惊搐，壮热痰壅，呕吐不止。

蝎一枚，炙焦　麻黄一尺，不去节　薄荷四叶，炙焦

上为细末。量大小用药，以水六分，煎一呷温服。

牛黄膏　治惊风邪热，痰盛膈壅，时发潮搐，痰嗽不时，上视咬牙。服之退惊化涎，凉膈镇心，祛邪止嗽，美进乳食。

牛黄别研　人参去芦，各一钱　甘草炙，二钱　牙硝精　朱砂研，水飞，各半钱　雄黄一钱半，水飞　蛤粉三钱半　金箔一片　银箔一片　龙脑少许

上为细末，炼蜜和剂，每九钱重分作一十圆，以金箔为衣，每服一圆，温薄荷水化下，乳后。

〔天吊〕附

治孩童天吊痫搐

以东行桑根取汁与服，亦能傅鹅口疮。

保生圆　治天吊搐搦壮热，藏府壅滞。

蝎五枚，生　天南星一枚，炮裂　巴豆七枚，去皮、心

上于清明时初夜，将药露北极下一宿，明旦杵罗为末，以豉四十九粒，口含不语，津润至脱去皮，研烂和圆黍米大，随年圆数，温水下，乳食前。

治天吊备急涂顶法

川乌末一钱，生　芸苔子末三钱，生

上用新汲水调涂，贴顶上，立验。一方用稀糊调涂囟上。

一字散　治天吊眼上，能退风爽神。

大天南星半两，微炮裂　蝉壳去土，一分，微炒　干蝎一分　僵蚕去丝、嘴，一分

上为细末，次入荞麦面一分，用酸石榴一个，去穰子留壳，将诸药入在内，盐泥封裹，于灶内慢火烧至泥干燥为度，取出，再研极细，每服一字，温酒调下，无时。

蠹鱼膏　治天吊目睛上视，手足唇口搐掣。

上以壁鱼儿干者十个，湿者五个，用乳汁相和研烂，再入乳汁少许灌之。

琥珀散　治天吊惊风发搐。

琥珀末，一分　真珠末，一分　朱砂末，半分　铅霜半分　赤芍药一分半

上拌匀，每服一字，煎金银、薄荷汤调下，无时。

僵蚕散　治天吊目上视发搐。

白僵蚕去丝、嘴，炒，半两　马牙硝半两　郁金半两　干蝎半两

上为末，每服一字，乳汁调下，急者服半钱，无时。

治阴搐慢惊方

犀角散　治吐泻变慢惊，发瘈疭。

犀角屑一钱　白术二两，水煮　甘草半两，炙　橘皮半两，去白

上为细末，每服半钱，水一盏，入金银、薄荷煎至七分，温服。连进三服，无时。

银白散　治吐泻生风，发慢惊瘈疭，此药涤涎醒脾去风。

上用大天南星一个，重一两者，换酒浸，七伏时取出，置新瓦上，周围以炭火炙令干裂，顿于地上，去火毒，用瓷器合之，候冷取出，杵罗为末，次入朱砂细末一分拌匀，每服半钱，荆芥汤调下，早晨午前各一。

青金膏　治因吐泻变慢惊瘈疭。

乌蛇肉一分，酒浸一宿、焙干　蝎梢一分　天麻一分　白附子一分　大附子一分，炮裂，去皮、脐　青黛一分，研　麝香一钱，研　天竺黄一钱，研

上为细末，入研药拌匀，炼蜜和膏，圆

皂子大。煎人参、薄荷汤化下，量大小与服，无时。

睡惊圆　治慢惊身热，瘈疭昏愦。

朱砂末，一钱，水飞　香墨末，一钱　青黛一钱，末　芦荟末，一钱　腻粉一钱　龙脑半钱，别研　使君子二个，去壳为末

上拌匀细，寒食面作糊，和圆桐子大。薄荷汤化下一圆，无时。

附子散　治慢惊身冷，瘈疭昏困。《保生》名辰砂散。

大附子一枚，重几钱，上者，生用，去皮、脐　天南星二钱，生用　半夏沸汤洗七次，用二钱　白附子一钱半　朱砂二钱，研，水飞　麝香一钱，研

上为末同匀，每服一字，薄荷汤调下，无时。

羌活膏　治脾胃虚而生风，或因吐利，或取转过度，发为慢惊。

羌活去芦　川芎　人参去芦　白附子炮　赤茯苓去皮，各半两　天麻一两　僵蚕去丝、嘴，酒浸，炒黄，一分　干蝎去毒，炒，一分　附子炮，去皮、脐，二钱　白花蛇酒浸，肉炒，干称，一分　防风去芦，并叉枝，二钱　牛黄研，一钱半　麻黄去根、节　肉豆蔻面裹，煨　藿香叶去土　沉香　鸡舌香母丁香也　木香各二钱　真珠末研　麝香各一钱半　轻粉一字，研　脑子半字，研　雄黄研，水飞　辰砂研，水飞，各二钱半

上为细末同匀，炼蜜和剂，旋圆如大豆许。每服一圆，薄荷汤或去心麦门冬汤下一二圆，量大小加减。若急惊者勿服。此药性温故也，服之无时。

温白圆　治脾困瘦弱，或因吐泻，或久病成慢惊，身冷瘈疭。

天麻半两　僵蚕炒，去丝、嘴，一分　白附子生，一分　干蝎一分，去毒　天南星汤洗七次，锉碎，一分

上为细末，以汤调食面作糊圆绿豆大。圆了，顿寒食面中养七日毕，取而用之。若急用未足日数亦可用。每服五七圆至一二十圆，量大小加减，生姜米饮下，空心服，看病势渐加圆数，多与服妙。

钩藤饮子　治阴痫多昏睡，手足冷，时瘈疭，直视不乳。

钩藤钩子三分　僵蚕去丝、嘴，炒　川芎　甘草炙　蝉壳去土并头、翅、足，炙　蛇蜕炙焦黄，各一分　蜣螂三个，去头、足，炙黄

上为末，每服二钱，水一盏，生姜五片，煎至七分，去滓，量大小与服。小者分三四次与服，不会服即灌之。若审是阴痫的当，用药末二钱，入炮过附子碎，用指面许，依前煎之，温服，日三夜一。急惊不用附子，服之无时。

七圣圆　治阴痫体虚，羸瘦多困。

乌蛇酒浸软，去皮骨，只取肉用　蝎梢　白僵蚕炒去丝、嘴　青黛　白附子各一分　蜣螂五个，去头、翅、足，炙令焦　蝉酥一皂子大

上为细末，炼蜜圆桐子大。如遇病者，先以半圆，汤泡薄荷水化开，灌儿鼻中，如得嚏则可医。以金银汤化下一圆，日二三，服之无时。若灌药不嚏，难治。

天浆子散　治阴痫昏困多睡，时时瘈疭。

天浆子三个，去壳用虫　白僵蚕三个，微炒　干全蝎三个，微炒

上为细末，每服一字，煎去根节，麻黄汤调下，日二，得汗出为效，服之无时。

七神丹　治阴痫面青口噤，喉内涎吼，手足瘈疭搐搦。

朱砂研，水飞　牛黄研　羌活去芦，各一分　天南星半两，炮裂　麝香一钱，研　蝎尾炒　僵蚕去丝、嘴，炒，各七个

上为细末，以熟枣肉和圆绿豆大。薄荷汤下二三圆，儿小化服亦得，无时。

天南星煎圆　治阴痫慢惊瘈疭。

天南星一两，细锉，水二盏，慢火熬至半盏，去滓，再煎成膏　白附子半两，炮裂　天麻一两　干蝎一两

上下三味为细末，入膏和圆绿豆大。三岁儿二圆，五岁儿三圆，薄荷汤送下，日二服，无时。

五灵脂圆　治如前。

五灵脂去砂石　白附子生　天南星生　干蝎生　蝉壳去土、生，各一两

上为细末，用醋二盏，先以药末一两同熬成膏，入余药，和圆绿豆大。未满月儿以乳汁化下一圆，二岁下二圆，大者以意加之，金银、薄荷汤化下，服毕，鼻上汗出是效，无时。

蚬壳膏　治如前。

上以蝼蛄一个，去头、翅、足，入射香、轻粉各黄米许，同研极细，以新水少许就之，用蚬壳灌之，立效。

必救丹　治如前。

赤足蜈蚣一条，去头、足　蝎梢七个　生犀尖锉末，一钱　染坯半钱　朱砂半钱，研，水飞　麝香一字

上为细末，煎猪脂油圆黍米大，每服三五圆，用大金散下，无时。

大金散

辰砂水飞，五钱　真铁粉一钱　轻粉一钱　金箔一大片

上为细末，分作九服，如遇患者，将一服分二处，每一半，用童子小便并酒共半盏，煎三四沸，放冷，调药一半，送下必救丹，如行五里许，再一服，约半日后，便下惊痰恶积便安。如已经取转虚者，即用井花调大金散，下必救丹。须认是慢惊者，方可与服。立见其效。气虽绝，心头温者，灌下药，即醒。

熏陆香圆　治虚风慢惊，发搐瘈疭，安神魂，定心气。

血竭半两，细研　乳香一分，别研

上研细，于火上炙熔为圆。如干，即入少许水和，如酸枣核大。每服一圆，薄荷酒化下。兼治妇人产后血晕，不省人事，无时。

如神散　治如前。集大官人方。

蜈蚣一条，全者，酒炙黄　蝎十四个，全者，微炒　辰砂一钱，水飞

上为细末，百日儿一字，荆芥汤调下，渐大，以意加之，无时。

天雄膏　治如前。

赤头蜈蚣一条，日晒干，却用好酒半盏，滴润，炙令脆　天雄一钱，慢火煅存性，研　白附子一钱，切，焙　朱砂半钱，研，水飞　细辛去苗，一钱　轻粉半钱　雄黄半钱，水飞　白术一钱，焙　郁金一钱　半夏一钱，洗净，生姜汁一宿，又洗，切，焙干

上为细末，入脑麝各少许，炼蜜和圆鸡头子大。薄荷汤化下一圆，无时。

涂囟法　治阴痫慢惊。

上以天南星洗十遍，为细末，用生姜自然汁煮糊，调涂囟顶上。

妙圣散　治慢惊久不差，两手瘈疭，抽掣不定。

赤足蜈蚣一条，葱汁浸一日，焙干　草乌头尖十四个，薄荷、生姜自然汁浸一伏时，焙干，同为末　麝香一钱，研　龙脑半钱，研

上拌匀，每用半字，以小苇筒吹入儿两鼻孔中，候两手定时，方可兼服别药。

天麻钩藤汤　治因吐利，脾胃虚而生风，变慢惊。

钩藤二分　天麻　蝉壳去土　防风去芦并叉枝，切　人参去芦　麻黄去根、节　僵蚕去丝、嘴，炒黄　蝎尾去毒，炒，各半两　甘草炙　芎藭各一分　麝香一钱，研

上同为细末，每用二钱，水一盏，煎至六分，量大小与服，如冷多面青唇白、四肢冷，入附子末半钱，无时。

喝起散　治因吐泻生风，变慢惊，或作慢脾风。

半夏一两，汤洗七次，为末　生姜四两，研，取汁，和半夏末捏作饼，如稀入少面　朱砂水飞　滑石白矾生，各一分　没石子二个

上为末，每服一字，煎冬瓜汤调下，如一服醒，便止后服，无时。

生银散　治慢惊乍静乍动，手足瘈疭，时发时止。

生银末半钱，细研　蛇黄三分，煅，醋淬七次　黑铅一钱，水磨　天南星七钱，炮　磁石一钱煅，醋淬十次　铁华粉二钱　朱砂一钱，水飞　麝香一钱

上为细末，每服一字，煎犀角屑汤调下，如见沉困者，用薄荷、乳汁调下，汗出为效。

治阴痫者，多用性温热之药。有至痫证已退未退之间，却生热证，或反为急惊者甚多。凡治病必当先问病者之家，所患几日，因何得之，曾服何药，如此详审，若服热药太过，可用解毒药治之，无不效者。

豆卷散　治阴痫慢惊，服温热药太多，而却生热证，反为急惊。

大豆卷黄水浸黑豆生芽是也，晒干时用　贯众　板蓝根　甘草炙，各一两

上同为细末，每服半钱或一钱，白水煎，放冷服，甚者用药三钱。浆水入油数滴煎之，又治吐虫，无时。

龙脑散　治如前。

大黄蒸过　半夏汤洗，滑净，薄切，用姜汁浸一日，焙干，炒用　甘草炙　金星石　银星石　寒水石　禹余粮石火煅，醋淬　不灰木火煅　青蛤粉即青黛也

上等分为末，入龙脑一字再研，新水调下一字或半钱，量大小加减，此旧方也。钱乙入甘松两枝，藿香末一钱，金牙石一分，却减大黄一半，服之无时。

慢脾风附

银白散　治慢脾惊风危困者。

天南星末生姜自然汁和剂，捻作饼子，炙黄　白附子末薄荷自然汁和剂，捻作饼子，炙黄

上同为细末，每服半钱或一钱，煎冬瓜子汤调下。

羌活膏　治慢惊及脾风，身体冷，四肢硬，危急将不救者。

羌活去芦　独活去芦并土　人参去芦　茯苓去皮　防风去芦并叉枝　桂去粗皮，先为末，各一钱　干蝎一钱，酒浸，炒研　水银半钱　硫黄半钱，与水银同研如泥，后入　麝香一字，研

上先研硫黄，次入麝香水银，研至无星极细，又入诸药末拌匀，炼蜜和膏圆皂子大。薄荷汤化下。保生治胃虚吐泻生风，羌活、天麻、防风各半两，人参、茯苓、蝎、桂各一分，朱砂、水银、硫黄各一分，服之无时。

大天南星散　治吐泻，或服转药过度。脾虚生风为慢惊，或作脾风危急之候。

上以天南星一枚，重八九钱至一两者，先撅一地坑，深三寸许，用炭火五斤，烧通赤，去火，入好酒半盏在内，然后入天南星。却用炭火三两条盖却坑子，候天南星微裂，取出锉碎，再炒令匀熟，不可稍生，放冷为细末，每服一字或半钱，浓煎生姜、防风汤调服，无时。

又方　治如前。

梓州厚朴去粗皮，生姜制，一两，细锉　半夏一钱，汤洗七次，生姜汁浸半日，候干用

右用米泔三升，同浸一百刻，周一伏时，以水尽为度。如至百刻水未尽，加少火熬干，去厚朴，只用半夏为细末，每服半字或一字，薄荷汤化下，无时。

辰砂膏　治阴痫搐掣昏困，传为脾风。

上以大附子一枚，重六七钱上，微炮去皮脐，于顶头剜一窍子，入粉霜、硇砂各半钱，却用取下时附子末填满，于火上烧存性，次用天南星半两炮裂，蝎梢一分，羌活去节一分，朱砂半两研，同为细末，炼蜜和圆鸡头子大，每服一丸，麝香、薄荷汤入酒三两滴化服，无时。

丙丁散　丙日作曲、丁日制药。

天南星　乌蛇肉酒浸，去骨，各三钱　天麻麻黄去根、节，各半两　大附子一枚，重半两上者，炮裂去皮、脐　全蝎一钱半　白附子三钱半　白僵蚕去丝、嘴，四钱

上为末，以水一升浸三日，滤去其滓，用寒食面一袋和匀，踏作曲，楮叶罨七日取出，以纸袋盛吊起，十四日用。遇小儿吐泻，精神昏困，多睡不乳，四肢逆冷，欲发慢惊者，以曲一两为末，入脑子末一字，每服半钱或一钱，温水调下。若已发慢惊者，此五藏俱虚，皆受其病。心主血，病则血乱。肺主气，病则气并。肝主筋，病则抽掣。脾主困，病则昏困。肾主寒，病则身冷。故病者血乱气

并四肢抽掣，吐泻昏困，唇口色白，身体冰冷，神情忪悸，面青喉响，哭如鸦声，将上件已成药，更入朱砂末一钱半，当拌匀，服依上法。若慢惊吐利，传为脾风者，用曲末一两，朱砂末一钱半，拌匀炼蜜和丸鸡头大，名丙丁膏。温水化下。又别以曲末一两，朱砂末、雄黄末各抄一钱，琥珀末、甘草末各抄二钱，拌匀炼蜜圆鸡头大，名太乙丹。治小儿百病。此方陈易简家藏，服之无时。

阎孝忠云，小儿吐泻，脾胃虚而生风，以为慢惊，或传成脾风，大便不聚，至虚损危急者，当速生胃气，宜与理中丸，并研金液丹作末，煎生姜米饮调灌之，多服乃效。服至二三两无害。候胃气生，手足渐暖，阴退，四支犹然瘛疭，即减金液丹一二分，却用青州白圆子一二分，同研。如上法与服，以意详之，渐减金液丹，加白圆子，兼用异功散此乃温中正气，治虚吐泻药方，具吐泻门。羌活膏、温白圆、钩藤饮子之类，方并具前。依此治之，仍顿与粥食，虽至危殆，往往死中得生，十有七八。予于岳太尉处得一方，称自王运使所传，治小儿急慢惊风，吐泻不止，危不可治者，名为安胃圆。与上相似，大同而小异。

好青州白圆子三十粒　好金液丹三十粒　全蝎一枚，去刺　麝香少许

上同研为细末，以糯米饭和丸黍米大。每服三二十丸，煎萝卜糯米汤下，无时。

麝香牛黄丸　治小儿急慢惊风、慢脾风。

牛黄一钱，研　麝香一钱，研　蝎梢一钱，生　乳香一钱，研没药一钱，研　蜈蚣一条，酥炙　花蛇肉去骨，一钱，酒浸一宿　天南星二钱半，炮　草乌二钱半，炮去皮　天麻二钱半，锉研　防风去苗并叉枝，二钱半　雄黄半钱，研，水飞　朱砂八钱，研

上为细末，酒糊和剂，如皂子大。一岁至三岁儿每服一圆。研细煎金银、薄荷汤调下，七岁至十岁服二丸至三丸，煎人参汤调下。慢惊风细研三丸灌下，大有神效，无时。

麝香饼子　治小儿吐泻之后，脾虚生风，目睛斜视，背脊强硬，手足瘛疭，及治心肺中风，昏塞不省。此方与前方相犯而小异。

川乌炮，去皮脐，一分　天南星炮，一分　白花蛇酒浸一宿，去皮骨，取肉焙干用，一分　蝎梢一分　蜈蚣一条，去头、足。以上先为细末　朱砂半分，研，水飞　麝香一分，研　乳香半分，研　铁粉半分，研　牛黄半分，研

上为末，同匀细，酒糊圆如鸡头大。捏作饼子，每服一二饼，煎入参、薄荷汤化下。

圣脾散　治慢脾风。

香附子炒，去皮、毛，一合　小黑豆一合，炒　甘草半分

上为细末，每服半钱，饭饮调下，无时。

急慢惊通用　治小儿急慢惊风，声已不出，危殆，命在须臾者。男左女右，屈中指在手心横纹当中点炷，及与乳头上同时下灸。壮如麦粒，甚者不过二壮，声回即止。此灸法，王运使传，妙。

天麻膏　治小儿急慢惊风，及慢脾风，搐搦瘛疭，昏塞牙噤，一切恶候，及吐泻等疾。

全蝎一分　牛黄一钱，研　白附子四钱　天麻二钱　雄黄四钱，研，水飞　诃子去核，六钱　白术二钱　藿香叶去土，四钱　白豆蔻仁三钱　缩砂仁二钱　白僵蚕去丝、嘴，四钱，炒

上为细末，炼蜜丸如鸡头大，每服一丸，煎薄荷汤化下，甚者两丸。泄泻者煎冬瓜子汤下。呕吐者煎丁香汤化下。并不拘时候，更量大小，临时加减。亦看病之轻重用药则无失矣。

牛黄丸　治急慢惊，发歇不止。

牛黄研　天竺黄研　犀角屑　胡黄连各半两　芎藭　人参去芦　白茯苓　丁香　钩藤　龙齿研，各一分　麝香一钱，研　脑子半钱，研

上为细末，炼蜜和绿豆大。每服三丸，粥饮下，无时。

黑神圆　治急慢惊。

腻粉一钱半　香墨一钱　白面一钱　芦荟一钱　牛黄别研　青黛　使君子去壳，面裹煨熟用，各半钱　脑子一字　麝香一字

上为末，糊圆桐子大。每服半圆，薄荷

水下要利动，服一圆，楚州小医王鉴，因此药致富。甚保惜之，未尝传入，予得之，乃睡惊丸小异耳。治惊极效，垂死一服，立差，无时。

青金丹　治如前。

雄黄末一钱　朱砂末一钱　铁粉二钱　乳香末一钱　南星末二钱　蝎微炒，二钱　轻粉　青黛各三钱　麝香一字　花头蛇一个，酒浸一宿，取肉炒

上为末，以梨汁和剂，分三等圆之，黍米、麻子、绿豆大。量大小与一圆，薄荷水送下，煎金银汤亦得，无梨汁用薄荷汁。无时。

雄朱丹　治如前。

雄黄水飞　朱砂水飞，等分

上为细末，用白项曲蟮一条，放药中令缠湿。以竹篾子刮下，丸如芥子大。每服三丸，金银、薄荷汤下。其曲蟮却须放了，不可坏死。服之无时。

软金丹又名圣力丹。治小儿急慢惊风，三痫瘛疭，头项动摇，目睛上视，或牵斜偏搐，背脊强直，或反折如弓，口噤牙紧，或屈指如数，或温壮连绵，或服凉药过多，内生虚风，或因伤寒变搐发渴，或因吐痢生风为痫，一切诸证。乳食不进，昏冒不省，凡此急候，服之皆愈。但不喘急者，此药必效。如已喘急者，更须审详虚实。若涎实者，同水银圆化此药服之。二药引化惊涎，则潮搐立止。虚者但只服此药，即便放下眼来，如小儿涎热风热，有诸惊证，服之便差，更无变动。又治大人卒中风病，涎潮不省。此药神圣救人，不可俱载。

牛黄别研　丹砂研，水飞　雄黄研，水飞　生犀镑末细，研　天麻　僵蚕去丝、嘴　半夏汤洗七次，为曲　蝉壳去土，汤洗净，焙　南木香　使君子取肉，各一分　肉豆蔻面裹煨　香墨各一分半　天南星炮裂　白附子炮裂，各三钱　腻粉一钱　水银三钱半，用黑铅三钱半准七钱，结砂子用半两　白花蛇　乌蛇二蛇取项后粗处肉，各一两，酒浸一宿，去皮骨，曝干不见火　螺青一两二钱　麝香一钱，研　龙脑半钱，研　附子一枚，炮裂去皮脐，虚者用之　蜈蚣中者二条，生用，须赤足佳　全蝎三十个　天浆虫二十五个，去壳　大槟榔二枚　丁香一钱半　蟾酥三皂子大　金箔　银箔各十五片

上为末，逐件旋入，研之细匀，用不蚀皂荚一锭，刮去皮弦，以好酒半升，浸一宿，搓揉取汁，去滓。入石脑油三钱，银器内文武火煎十数沸，别炼蜜少许，投内和诸药得所。大者圆枣大，小者皂子大，别以金箔为衣，每服一圆，金银、薄荷汤化下，涎实者用水银圆化下，小儿量大小与，大有神验。水银圆具谭氏方也，服之无时。

夺命大青金丹　治小儿诸惊。此东京西瓦内出瓷，马儿粟家方。

天竺黄一斤末　墨二锭，不计大小，亦不得使尽　麝香一钱，研　朱砂一钱，研，水飞　水银半两　锡半两

上于铫内先熔锡化，入水银结砂子，乳钵内研开。次入诸药末研匀细，方用浓墨水和丸弹子大，以灰顿盆内铺纸，于纸上布药浥干。十岁儿一粒，分三四服。七八岁儿作四服。五六岁儿分六服。三四岁儿分十服。一二岁儿分十六服。新生百晬儿分三十服，并微利。常服者须隔旬日服一服。小儿风热发痫，潮搐涎盛嗽喘，并临时加减。如吐泻后生风，服亦不妨。此药性温，宜少服，并用汤化下。

如煎汤不可犯铁器，入口如圣，服之无时。

治急慢惊发搐。

乳香半两，研　甘遂一钱

上同研细，每服半钱，乳香小便调下妙。

又方　治如前。

蝎梢二十一个　朱砂一皂子许，研，水飞　麝香一豌豆许

上同为末，每服一字或半钱，用赤小豆拌匀，薄荷温酒调下，无时。

定命丹　治急慢惊风，吊眼撮口，搐搦

不定，壮热困重。

蝉酥一钱，干者酒浸一宿　干蝎七枚，全者　南星末一分　白附子末半钱　青黛半钱，研别为衣　麝香少许

上匀细末，粟米粥和丸绿豆大，别以青黛为衣。每服一丸，荆芥、薄荷汤下。

服药后困睡无疑。凡病者先化半丸点鼻中，得喷者必效。如新生儿用腻粉二捻，生油一滴，新水半茶脚，化一丸服之，取下胎中所受病，更无诸惊邪热，服之无时。

麝香饼子　治如前。

乌头蛇一对，酒浸一宿，取肉　蝎梢半两　白附子一两，炮　天南星一两，炮　白僵蚕一两，炒去丝、嘴　乳香半两，研　朱砂一两，研，水飞　天浆四十九个，去壳　麝香二钱，研　金箔十片

上为细末，炼蜜和丸桐子大，捏扁作饼子。用金银、荆芥汤化服，大小加减，无时。此便是除风膏。若以麦饭和丸，便是麦饭膏。此黑孩儿柏防御真方也。

如圣散　治如前。

白附子二钱　僵蚕炒去丝、嘴，一钱　全蝎二钱，中者用面炒，去足留身、尾、甲　人参去芦，二钱　草乌半两，炮去皮　牙硝二钱　丁香一钱，不见火　腻粉半钱　天竺黄一钱　天南星米泔浸一宿焙干，称二钱　龙齿二钱　郁金一钱　脑麝各少许

上为细末，十岁下儿半钱，以上者一钱，冷薄荷汤调下。如儿惊结，大小便不通，连进二三服，无时。

南星汤　治如前。以大南星一枚，重四钱者，细研为末，用浆水一碗，冬瓜子四十九粒，同煎至一盏，去滓，取青汁半盏，分三服。病愈以四君子汤补之。一方每用南星末一钱上下，以水半盏，浆水半盏，或酸汁亦得，入生姜三片，冬瓜子数粒，煎至半盏以下，分二服。尤治慢惊，服之无时。

南朱膏　治如前。以大天南星二两为末，用腊月黄牛胆取汁和之。却入胆中，如胆汁少量可用之，窨干为细末，入朱砂末一钱，麝香少许，煎甘草膏子和剂，丸鸡头子大。每一岁半丸，熟水化下，量大小加减，如一胆盛南星末不尽，用二胆亦得，服之无时。

朱金汤　治如前。以代赭石火煅醋淬十次，为细末，水飞过，日中晒干。每服半钱或一钱，煎真金汤调下，量大小与之，连进三服，儿脚胫上有赤斑点者，即是邪气已出，儿当安也。若无赤斑点出者，不可治也。服无时。

如圣青金丹　治忽发身热吐逆，变急慢惊潮搐。

龙脑一钱，研　麝香研　腻粉研，各一分　白面三钱　香墨一钱半，为末　青黛二钱，研　使君子去壳，二个，面裹，慢火煨熟为末　金箔　银箔各五片，研

上细匀末，滴水丸鸡头子大。慢惊用冷薄荷汤化下一丸，须臾便睡，睡觉立愈。更服三两服，急惊化下半丸，下涎一合以来，神效，无时。

滚涎膏　治慢惊风潮搐无时。

龙脑一字　朱砂一钱半，末　鹏砂末三钱　马牙硝五钱　铅霜二钱　水银二钱，结砂子　牛黄一字　麝香一字

上同研，自然成膏，丸杨梅核大。梨汁化下一丸，量大小加减，无时。

牛黄丸　治急慢惊，发搐痰壅，及吐泻生风。

牛黄一钱　牛胆制天南星末一钱　滴乳香末一钱，令研　人参去芦，一分　天麻一分，去苗　防风去芦，去叉枝，一分　白僵蚕炒，去丝、嘴，一分　茯神去心内木，一分　朱砂三钱，研，水飞　麝香一分　全蝎一分　脑子少许

上为细末，炼蜜和丸鸡头实大。荆芥、薄荷汤化下一丸，相宜加减，无时。

罢搐丸　治急慢惊发搐，牙关噤，身反张。

水银二钱　黑铅二钱，同水银结砂子　天麻半两，去苗　花蛇肉酒浸，炙，取肉，半两　人参去芦，半两　天南星半两，炮　白附子半两　干蝎半两，去毒　朱砂半两，水飞　青黛一分　脑子　麝香

各少许

上为细末，石脑油研和，丸小麻子大，每服一丸，薄荷汤化下，无时。

虎睛丸　治急慢惊搐，涎热多睡，及诸恶证。

虎睛一对，碎切，酒浸一宿，焙干　通明天麻半两　白茯神去心内木，半两　白附子一分　天浆子五十个，炒黄，去壳　使君子一百个，去壳切碎，焙干　朱砂二两，水飞　全蝎半两，去毒　牛黄半两　天南星一两二钱，慢火炮裂　京墨半两，烧过　青黛半两　麝香　轻粉各一分

上同匀细末，酒糊丸桐子大。每服一丸，薄荷汤化下，有急病加作二三丸，极妙，无时。

乌蛇散　治急慢惊，搐如弓，危困难治，疗之者，此方主之。

乌蛇肉酒浸，去皮骨，三钱　赤足蜈蚣二条，去头足，醋浸，炙黄　全蝎二钱，去毒　天麻半两　白茯苓半两　黑附子半两，炮裂，去皮脐　白附子一分，炮　麝香少许

上为细末，每服半钱，用旧断井索煎汤调下，其效如神。如急用，无断井索，煎荆芥汤代之。无时。

治胎痫发搐真假方

虎睛丸　治自生蓐内至百日以来，壮热惊搐，凡发在百日内者，虽发搐真假相似，然发频者，多是外风伤之也。

虎睛一对，酒浸，微炙，取二个　牛黄一分，别研　朱砂一分，研，水飞　雄黄一分，研，水飞　麝香一分，研

上为细末，炼蜜和丸绿豆大。以乳汁研化三五丸。

乌金膏　治胎痫发搐频并。

乌蛇一条，水浸，去皮骨，只取肉，别用酒浸一宿，焙干　蝉壳去土，半两　全蝎半两，上先为末　朱砂半两，研，飞　麝香半钱，研　脑子半钱，研　金箔三十片，细研

上拌匀，炼蜜和膏，丸皂子大。当每服一粒，煎人参、薄荷汤化开，服无时。

牛黄丸　治自生至百日以来，五藏多热，而发惊搐。

牛黄一分，令研　龙脑一分　黄芩末半两　朱砂半两，研飞　干蝎一分　犀角末半两

上同研如粉，粟米饭和丸麻子大。温水化一丸与服，无时。

羌活膏　治胎痫发搐，昏困不省。

羌活去芦，一两　乌蛇肉一两，酒浸一宿，焙干　独活去芦，一两　天麻半两　全蝎半两，去毒　白僵蚕去丝、嘴，半两，炒　人参去芦，半两

上为细末，炼蜜和膏，每服一皂子大。麝香、荆芥汤化下，无时。

银朱丹　治如前。

干蝎一分，微炒　天浆子一分，微炒，去壳　朱砂半两，研，飞　牛黄一钱，研　露蜂房一分，微炒，为细末　水银一分，用黑锡一分结砂子　麝香半钱

上同拌匀，面糊和丸黍米大。每服三五丸，金银、薄荷汤化下，儿小乳汁化下亦得，无时。

甲灰圆　治生下便喜多惊。

上剪父母两手爪甲烧灰研细，面糊和丸麻子大，井花水化下一丸，无时。

生犀膏　治新生儿肌肤幼弱，为风邪所中，身体壮热，手足惊掣。

甘草　防风去芦并叉枝，各一两　白术二十铢　雷丸二钱半　雷丸二钱半　桔梗去芦，二十铢

上哎咀，以猪肪脂一斤，煎油入药，微火上煎之良久，视稠浊得所，膏成乃去滓，丸如弹子大。每服一粒，炙手摩儿百遍。寒者更热，热者更寒。小儿无病，早起常以摩囟上及手足心，甚辟风寒之邪。

朱砂散　治一腊至月内儿发惊，转为慢惊。

朱砂一分，研，水飞　牛黄一分，别研　麝香一钱　干蝎十四个，微炒　天浆子十四个，麸炒色黄，去壳，取虫用

上各研细，处再研极细散，每服半钱，乳汁调抹儿口中，以乳汁送下，无时。

保生散　治新生儿胎惊，此在母胎中时，因有所惊乃感，至生下百日之内，心神不宁，睡卧不醒，壮热躁烦，啼哭无时，面青赤，腰直身冷，搐缩口撮，或粪青黄水。

胡黄连半两，水煮　鹏砂研　铁粉　轻粉各一钱

上为末，每服一字，薄荷、乳汁调下，服之无时。服药后，有青赤物下是效，如无，隔日服琥珀丸。

琥珀丸

干全蝎二枚　琥珀令研　铁粉炒各二钱　轻粉　南星炮　白附子炮，各三钱　龙脑半钱，研

上为末，酒糊和丸黍米大。薄荷温汤下一二丸。如服此药，眼反牙噤如鱼口者，乃死候也。服之无时。

治婴小初生未满月，惊著似中风欲死者，此方主之。以好朱砂用新汲水磨浓汁，涂五心上，神验。

治小儿新生中风

以麝香一分，驴前背交脊上会中毛，拔取手指大许一把，以乳汁和令得所。于铜器中，慢火炒令焦燥，与麝香同研如粉，每服一字，乳汁调下，日三服。

小儿卫生总微论方　卷六

惊痫别论

惊痫咬牙

小儿惊痫发搐，有咬牙不休，及未发、发过时亦常咬牙者。予在行朝，有李统制一子，病症如是。遂请众医询治，有言是惊入于肾者。此乃乔岳汉东王先生歌中“睡里咬牙惊入肾”之句。其意谓牙为骨，骨入肾，故以言之，此常流无据语也。古书无有，亦无惊入肾之理，果用药无验，今详校其证，特为明之，乃足阳明之病也。足阳明为胃之经，起鼻交额，循鼻外，入齿中，还出侠口，环唇，下交承浆，过颐后，出大迎，循颊车，且发搐为风。风属木，胃属土，木能刑土，是以牙齿受风则痒，颊车邪干则紧，故使咬牙不休，以缓颊车之急，以解牙齿之痒也。治当去胃中风。

〔暗痫〕

暗痫其病似惊痫，又似中风痉病。遇其发时，则暗地急，至令入僵仆，心神昏塞，志意迷闷，气乱不省，手足弹拨，战掉搐搦，喉中涎响，或吐痰沫，或作吼叫，其脉三部阴阳俱盛，每发远则终日或半日，近则一两时辰，发过便起，却如不病之人，俗呼谓之痫病。稍轻者谓之暗风，古人又云，小者发则为惊，大者发则为痫。小者气血怯嫩，发即难当而伤多，大者气血壮盛，发即易任而失少。

〔惊痫余证〕

小儿惊痫搐搦，至发定之后，有诸余证不退者，虽大势已罢，而病本尚在。或服冷热药过多，或汗下之失宜，故痫搐难退，而有余证也。

〔惊痫兼别病〕

小儿病久发搐，则五藏俱虚，并受其病，故发则血乱心气并肺搐搦，肝昏困脾体冷。肾又有因虚而别病兼发，或别病而因带惊痫。或有一方兼治之者，并采而具之。

治惊痫咬牙方

蝉花散　治惊风咬牙并夜咳嗽

蝉花和壳去土　僵蚕去丝、嘴，直者，酒浸、炒熟　甘草各一分　玄胡索去皮，半分

上为细末，一岁上儿一字，至三四岁者半分，煎去土蝉壳汤调下，无时

小镇心圆　治诸惊咬牙不宁，大便色青。

朱砂水飞　铁粉　京墨各一两　脑子　麝香各一字

上为细末，陈米饭和圆绿豆大。每服二三圆，荆芥汤化下，无时。

治暗痫方

真熊胆半两，研　生天南星末，半两　粉霜一分　朱砂半两，研，飞　雄黄半两，水磨　脑子半钱，研　麝香一钱，研

上匀研细，用猪胆汁和丸粟米大。每服五七丸至十五丸，金银、薄荷汤下，无时。

神乌散　治暗风痫极妙。歌曰：

腊月乌鸦一个全，半两朱砂口内填，麻缠乌嘴安瓶内，用瓶藏盛。盐泥固济火中安。窖干，火煅。黄昏上火天明住，用木炭，一称半。取出筛罗为末研，每服一钱麝酒下一日三服，服之十日定须痊。

又方　名同，治同前。

浑黑老鸦一个，全者　胡桃七枚　苍耳心子七个

上用一藏瓶，入逐药味在内，盐泥固济，木炭火煅烟尽为度。取出研细。每服一钱，空心热酒调下。如患疝气肾肿，阴囊偏坠，更入新生孩儿胎衣一副同烧，亦依上法，葱椒热酒调下，看大小加减。

异圣散　治痫病日发数次，诸药不能差。

猪蹄甲不以多少，净洗，去带毛处，锉碎，于锅内炒，令烟尽取出，于地上厚铺纸，薄摊其药，以盆盖之，候三日，出大毒毕，为细末　金星石　银星石　青礞石各半斤，三石同入一合内，以马粪和泥，固济晒干，先用熟火渐渐烧之，次添炭火煅之，通赤取出，仍先令掘一地坑，深一尺，取药合在地坑内，用土盖埋二日，出火毒，为细末

上用猪蹄甲末二两，石末一两半，再研匀细，入生麻油半两，再研极匀，每服半钱。以浆水研百遍调下，空心食前服，小者减之。

日应丹　治痫病连年不差。

黑锡　硫黄　水银　铁粉各一两　金箔银箔各三十片

上先将锡于铁铫内熔化，次入水银，不住手搅令匀，次入硫黄诸药，同炒搅匀，离火再炒良久，都倾出，用纸衬地上，顿一宿，出火毒讫，再研令匀细，以熟软粟米饭和丸绿豆大。每服五七粒，煎人参汤送下，无时。

接生如圣丸　治痫病暗风，年深不差。

赤石脂二两　硝石半两　白矾枯过，一分

上为细末，糯米粥和丸绿豆大。每服十丸十五丸，温水送下，食后，日三服，如日一次发者，服半月即愈。

啄木散　治多年痫病。

腊月啄木鸟一个，用无灰酒三升，先以瓦罐子一个，底铺荆芥穗叶厚一寸，上顿啄木鸟。又用荆芥穗叶盖一寸厚，倾酒在内，仍用纸封合，盐泥固济，炭煅之，候酒干青烟出为度。去火放冷，只取啄木鸟研为末，次入下项药。

石膏二两，煅研　铁粉用浆水半升煮尽，研细末，用一两　朱砂一分，研，水飞　附子一两，正坐者炮裂，去皮脐　麝香一分，研　脑子一钱，研

上同匀细末，每服一钱。先令病人呷温水三两口，以温酒一盏，先少许调药饮之，余酒送之，服毕便就枕睡少时，临发时一服，候一两日更服一次，每两日一服，不过十服即愈。予有一亲姓王，患痫病十余年，发即涎潮，手足僵蜷，颠仆不省，服此药百服而愈。小儿可减服。

又方　取芭蕉自然汁，时时呷一两口，甚者服及五升必愈。前有亲姓王，同服此得效。二者恐不可并废。此亦治惊痫搐搦。邵通直云，加麝香尤妙。

治诸痫通用方

开关散　治诸痫潮发，牙关紧急，口噤不开，不能进药。

蟾酥一小片　铅白霜一字

上研令极细，用乌梅肉醮药，于两口角揩擦良久乃开，以进别药。

蝎梢散　治如前。

蝎梢七个　朴硝一钱

上同研细，每用一字或半钱揩牙，须臾即牙关口噤自开，然后进别药。

定命丹　治诸痫发搐壮热，昏塞不省。

蝎七个，微炒　天南星炮裂，为末，一分　白附子炮过，为末，半分　青黛半钱，研　蟾酥一钱，干者酒浸一宿　麝香一字，研

上为细末，粟米粥和丸绿豆大，别以青黛为衣。新生儿用细粉一捻，油两滴，新汲水一蚬壳，化药一米粒许与服。便当汞粉取下胎中旧粪，则惊热诸疾不生。若患惊痫困重者，用荆芥、薄荷汤化下一丸。得困睡无疑，至觉乃愈。但有患者，先化下一丸，滴入鼻中，得嚏者为必差，不嚏者难治。

人参茯神汤　治诸痫发搐，精神昏愦。

羚羊角屑　人参去芦　茯神锉，去心木，以上各一两　天门冬去心　白鲜皮以上各半两　天竺黄　甘草各一分

上为末，每服一钱，水一盏，人姜二片，薄荷三叶，同煎半盏，去滓温服，无时。

铁粉丹　治诸痫搐搦，包络有涎，胸膈不利。

铁粉一两，研　朱砂半两，研，飞　牛黄一分，研　干蝎一支，生姜自然汁浸一时，炙焦，为末　牛黄一分，研

上为细末，糯米饭为丸黍米大。每服三五丸，煎人参汤下，无时。

大惊丸　治诸痫发搐，神志昏乱，痰涎壅塞。

雄黄研飞，一钱　青礞石火煅，研，一钱　铁粉二钱半　朱砂研飞，三钱　蛇黄火煅，醋淬九次，研飞，二钱　虾蟆灰一钱半

上研匀，以水浸饭饼和丸桐子大，每服一圆，煎薄荷水，磨剪刀股化下，日二三。此药治惊化涎，不用银粉，服之则无他苦，不拘时候。

睡惊丸　治诸惊痫搐搦，痰壅昏愦，咽膈不利。

铁粉研末，重罗　茯苓　蛇黄火煅赤，米醋淬七次，将醋煮干为度　使君子肉　天南星研为粉，以薄荷汁和为饼，炙干

上各称捌钱末，人金银箔各一十片，麝香一钱，脑子半钱，拌研匀细，糯米稀糊丸皂子大。朱砂为衣，每用五岁上儿一丸，分二服。三岁下儿分三四服。并薄荷汤磨下，无时

猪胆半夏丸　治诸般痫搐

上以半夏一两，汤洗七遍，用猜猪胆三个，取汁浸半夏于磁器中，日晒干，切片焙燥为细末，生姜自然汁煮面糊和丸桐子大。每服五七丸至十丸，煎麦门冬熟水下，食后临卧各一服，忌动风毒物，其效如神。

天麻防风丸　治一切诸痫，抽掣搐搦，精神昏愦，痰涎不利，及风温邪热等疾。

天麻　防风去芦并叉枝　人参去芦，各一两　干蝎　白僵蚕去丝、嘴，并炒，各半两　朱砂水飞　雄黄各研　甘草炙，各一分　牛黄　麝香各研，各一钱

上为细末，炼蜜和丸桐子大。每服一二丸，薄荷汤化下。无时。

神圣辰砂南星丹　诸痫发搐，服之曾经大效。

上以天南星四十九个，一般大者。于五月五日，取活蝎四十九个，与南星同炖在一瓦器中盛之，用盐泥固济外边周密，吊于净室中，至腊日取出，拣天南星曾被蝎蜇者用之。曾经蜇者有小窍子为验，其不曾经蝎蜇者不用。将可用南星，以酒浸一宿焙干，杵为末。次用好辰砂一分，真牛黄、麝香、龙脑各一钱，研细，一处拌匀，生姜汁和丸桐子大。每服一二粒，煎人参、薄荷汤化下。无时。

蝉蜍散　治诸痫经验。

上以蝉蜍三十枚全者，用一大石榴割开顶上，取去穰子，作一瓮子，入蝉蜍在内，却以割下顶子盖之，纸筋黄泥固济，厚半指许。初近火炙，渐至干，人火烧令通赤，良久放冷，取其中焦黑者，细研为散。每服一字，乳汁调下，儿稍大用半钱，防风汤下，无时。

白金散　治诸痫潮发，不省困重。

白僵蚕去丝、嘴，直好者，半两汤洗。焙黄，为末　天竺黄一分，细研　真牛黄一钱，别研　麝香研　龙脑研，各半钱

上拌研匀细，每服半钱，生姜自然汁调灌服，无时。

神授至圣保命丹　治一切惊痫风痉中风，并胎惊内吊，腹肚坚硬，夜啼发热，急慢惊风，恶候困重，上视搐掣，角弓反张，倒仆不省，昏愦闷乱等疾。

全蝎十四个，青色者　朱砂水飞，二钱，好者　麝香半钱　防风去芦并叉枝，一钱　金箔十片，研　天麻二钱　白僵蚕去丝、嘴，直者，一钱　白附子二钱，好者　天南星一钱　蝉壳去土泥，二钱

上为细末，粳米饭和丸樱桃大，以朱砂为衣。初生儿半丸，周晬儿一丸，乳汁或薄荷水下。三五岁有急候者用二丸，五七岁至十岁常服只一丸，此药性平温，不冷不热，大能镇心神，退惊痫，安魂定魄，祛风逐邪，化

涎消痰，甚有神效。

世之名医，固多妙药，如或未得此方，请试合一料，验之方知。子细养小之家，能自合之。庶不为银粉药所误，兼缓急亦可救人，服之无时。

青金定命丹　治诸惊痫抽搐瘈疭等疾。

水银研膏　辰砂水飞　全蝎小者　大南星生　犀角屑各八分　天麻　白附子烧存性　白僵蚕去丝、嘴，直者，各一两　青黛半两　麝香二钱

上同为细末，先用煮熟枣肉与水银研膏，至无星为度。然后和药末，如硬，更入枣肉，候得所，即丸如鸡头大，每服一丸，薄荷温汤下，无时。

治惊痫后余证方

延寿散　治痫搐止后，再被惊者，仍要发搐。

鸡舌香一钱　黄芪一分，蜜炙黄　辰砂二钱，水飞　五灵脂去砂石，半钱，研

上为细末，婴小用一字，二三岁半钱，四五岁一钱，糯米饮调下，无时。

回魂散　治痫搐差后，多吐逆腹胀，气急不食，及罢惊之后，一切虚候皆主之。

人参去芦　茯苓去黑皮　甘草　白僵蚕去丝、嘴　朱砂水飞，各一分　白附子一钱半，炮　全蝎一钱　蝉壳去土，净洗，去足，二十个

上为细末，每服半钱或一钱，煎冬瓜子、薄荷、清米饮调下，量大小与之，乳食前。

仙乌豆　治因发惊痫之后，心神失守而痴。

硇砂二两　晋矾二两

上同为末，入一合子盛，先用蛤粉封口缝，后以盐泥固济，炭火煅通赤，放冷取出研末，以水一斗，黑豆五升，同药末子锅中煮至水尽为度，晒干，任意与食。服无时。

通关散　治惊痫退后，只是声哑不能言。

上以天南星炮裂为细末。婴小半字一字，二三岁至四五岁儿半钱。六七岁儿一钱。猪猪胆汁调服，咽下便能言语。昔钱乙治王氏子，慢惊退后不语，他医作失音治之，不差。乙曰，既失音、何开目而能食饮，又牙不噤而口不紧也。诸医皆不晓。乙曰，此前患惊痫时，曾用清药利大小便，致脾肾俱虚，今补脾实而惊已退，肾尚虚怯，不能上接于阳故也。遂以地黄丸补，数日能言。其方本集载之。

天茄散　治惊痫退后，筋脉不舒，不能行步，或因汗出惊退，而汗出不通所致。

茄种见箱者，半两，切碎，焙干　附子半两，炮裂，去皮、脐　羌活去芦，一分，焙

上为末，二三岁儿一字，五七岁半钱，七八岁一钱，麝香酒调下，日三，疾愈止服，不拘时候。

治惊痫兼别病方

麝香饼子　治慢惊因虚而风邪又从背俞袭之，人伤心肺之经，为相合之病成慢惊。

本证之外，更加胸满短气，冒闷不省，汗出无时。外但心肺中风者，见中风门中

川乌头半两，炮去皮、脐　天南星半两，泡　白花蛇酒浸一宿，去皮骨，焙干，半两　干蝎梢半两　赤头蜈蚣二条，酒浸酥，炙黄，以上先为末　麝香半两，研　乳香一分，研　朱砂一分，研，飞　铁粉一分，研　牛黄一分，研

上同拌研匀细，酒糊丸鸡头实大。捻扁，每服一饼，人参、薄荷汤化下。

乌梢丹　治如前。

乌梢蛇水浸，去皮骨，二两　天浆子二十一个，微炒，去壳　天麻一两　防风去芦并叉枝，一两，锉　天南星一两，微炮　干全蝎一两，去毒　白附子一两，炮　大附子一枚，炮裂，去皮、脐　半夏一两，汤洗七次　人参去芦，一两

上都一处，好酒浸三宿，取出，焙干为细末。次用水磨雄黄一两，辰砂一两，同研细，水飞焙干，麝香二钱，龙脑一钱，各研细，与上件同拌匀，糯米饭和丸黍米大。每服五七粒至十粒十五粒，量大小加减，金银、薄荷汤送下，神验，不拘时候。

干漆芜荑散　治诸般虫证，传带惊痫，啮齿直视上窜，叫呼搐搦，渐成危急。

干漆炸碎、炒令烟尽即止　白芜荑去皮、各等分

上为末，每小者一字，大者一钱，米饮调下，日三，量大小加减，以差为度，乳食前。

绛朱丹　治惊痫涎痰，咳嗽喘满。

南星二两，炮　半夏二两，汤洗七次，去滑　白矾枯、过称、一两半　滑石二两，火煅通赤　铅霜半两，研

上为末，糊丸麻子大，朱砂为衣。每服十丸，生姜汤送下，乳食前。

缓息汤　治虚而生风，发搐喘满。此慢惊候。

桑白皮二两　白茯苓去黑皮，一两　白僵蚕去丝、嘴，一两　杏仁去皮、尖，炒黄，别研，一两，后入　甘草半两，炙　人参去芦，半两　桔梗去芦，一两，锉　白术一两　陈皮一两，去白

上为末，每服一钱，水一盏，入生姜三片，同煎至六分，去滓放温，时时呷之，此黑孩儿柏防御方也，服之便定。

青金丹　治诸痫诸疳诸虫泻痢等疾。

青黛二分，研　雄黄二分，研　朱砂二分，研　胡黄连二分　腻粉　熊胆温水化　芦荟各一分　白附子　脑子　麝香各半字　蟾酥一皂子大　水银皂子大一块，同朱砂研无星

上为末同研，用猕猴胆汁熬过，浸少蒸饼和丸黄米大。一岁儿二丸，量大小增减，如诸痫潮搐，先以一丸，温水化破，滴鼻中令嚏，吊眼者自下，搐搦亦定，更用薄荷汤化下一二服。如变蒸寒热，亦薄荷汤化下。诸般泻痢，米饮下。诸疳，粥饮下。疳虫蛔咬，苦楝子汤下。疳蚀口疮鼻烂，乳汁研涂。疳眼雀目，白羊子肝一片，竹刀批开，研药作末，掺在肝片内，麻缠，米泔煮熟，空心服。乳母常忌鱼大蒜鸡鸭猪肉。

如圣青金丹　治一切风痫搐搦，及寒热腹痛，诸虫五疳八利，肚大脚细，泄泻无时，天吊胎惊，暗风痫病，热疳口疮等疾，悉能主之。

青黛半两　瓜蒂一分　朱砂一分，水飞　轻粉一分　蝉壳去土、二个　雄黄一分，水飞　芦荟一分　胡黄连一分　熊胆一分，化开　麝香少许

用为末匀细，用猕猴猪汁和丸桐子大。瓷合贮之，诸般惊痫风疾，搐搦上视，温水化一丸，滴鼻中，嚏喷立效。更用薄荷水化下丸。久患泄泻，腹胀肚大，脚细诸疳，米饮化下。余同前方。

麝香丸　治诸痫诸疳等疾。

草龙胆去芦　胡黄连去须，各半两　木香　蝉壳去土、一分　瓜蒂　龙脑　麝香　牛黄各一钱

上为末匀细，猪胆汁和丸，作两等丸，大者如绿豆，小者如黍米。治疳眼，用猪肝汤下五七丸至一二十丸，量大小用药增减。疳渴者，猪肉汤下。惊痫发搐上视，薄荷汤下。更研一丸，滴鼻中。牙疳鼻疳口疮，研末傅之。虫痛，煎苦楝汤或白芜荑汤下。百日内儿大便不通，水研封脐中。诸虫证加干漆、麝香各少许，入生油一二滴，温水化下。惊疳或秘或泻，清米饮下，病急者研碎服之，病缓者浸化服之。若极虚慢惊者，不得与服。急惊痰热，尤宜服之。

夺命丹　治一切诸般惊风天吊，暗风痫病，胎惊发搐上视，身直背强，及治五疳肌瘦羸瘠，肚大脚细，发稀饶渴。又治便痢脓血，水谷不化，洞泄下注，并温壮身热，口疮烦躁，叫啼等疾。

朱砂半钱，研，水飞　麝香研　麒麟竭研，各半钱　牛黄研　龙脑研　没药研　熊胆研　粉霜一钱，研　青黛三钱，研　使君子十个，去壳，面裹煨熟，为末

上相和，再研匀细，取并花水滴水为丸，如豌豆大。每服一粒，以薄荷自然汁半蚬壳许化开，入温汤半茶脚调匀服之，若诸疳泻痢不止，或惊热涎盛，吊眼发搐者，以三丸化下，更量大小加减。

治诸惊痫客忤　以麝香当门子一粒，好

朱砂一块，如当门子大，同研极细，温熟水调下，未能服者灌之。

治惊痫夜啼　以仙人杖，安儿身边令睡。仙人杖乃笋欲成竹时立死者。

中风论

心肺中风

小儿血气柔弱，肌肉脆薄。若寒温失度，则肤腠开而为风邪所中。始著俞穴而行经脉，次随血气而入府藏，促其所著，即生病焉。其入府藏者，唯心肺二藏居膈膜之上，空隙之处，又俞穴亦在于上，故风乃易中，而有患者。其状昏困不省，手足抽掣，心胸满，气短多汗，此尤为急。大抵其余府藏，皆居膈膜之下，叠实之处，又俞穴亦在于下，故风乃难中，而无患者。其人于经脉者，为病甚多。今采其有患者具之。

风　痉一云风痓

风痉者，风邪伤中阳经也。或因解脱，或脐疮未合，为风所伤，皆令发痉。其状口噤不开，项背身体强直，耳中策策而痛，一向昏愦不省，其脉如弦，直上下也。虽与惊痫相似，然发而时省身软者，惊痫也。若发不时醒，身硬强直者，风痉也。其卒然身痉者死。

中风角弓反张

风角弓反张者，亦由风伤阳经也。故令腰背反折，不能俯屈，如角弓之状，此亦颇似痉病。然痉病身体强直，此病身体反折，所以异也。

中风口噤

风口噤者，手三阳之筋入络颔颊，足阳明之筋上夹于口，风邪中于诸阳之筋，使机关挛急不利，故使口噤不能开也。诊其脉迟者生。

中风拘挛不遂

风拘挛及不遂者，风邪寒热人于经络，搏于筋脉，筋脉受邪，冷则四肢拘挛，热则缓纵不遂也。诊其脉，脉急细如弦者，筋急拘挛也。若脾脉缓弱者，四肢不遂也。

中风口眼㖞斜

风口眼㖞斜者，由风邪入于颔颊之筋，其脉偏急，故令口眼㖞斜，目不能平视，语不能正也。诊其脉浮而迟者可治。又云夜卧当耳有隙，因风入耳，亦令人口㖞也。

中风瘫不省

风瘫不省者，由风邪先中于阴病，发于五藏。其状奄忽不知人事，喉中噫噫有声，舌强不能言，汗出身软，眼下鼻两边人中白有色白，可治。若一黑一赤吐沫者，难治。汗不出体直者，死。

治心肺中风方

半金散　治心肺中风，昏困不省，心胸满闷，抽掣短气，汗出不休。

乌蛇肉酒浸、去皮骨，焙，一两　天麻一两　全蝎去毒，一两，炒　僵蚕去丝、嘴，炒，一两，为末　朱砂半两，研，飞　龙脑一钱，研

上为末，拌匀细，每服半钱，温汤调下，无时。

比圣丹　治如前。

干全蝎去毒，一两，微炒　羌活去芦，半两　白附子半两　天南星半两，生　黑附子一枚，重半两，上炮裂，去皮、脐

上为细末，人腻粉一钱，研匀，炼蜜和丸绿豆大。每服五七粒，荆芥汤下，无时。

白花蛇散　治心肺中风，声不能出。

白花蛇腰以上者，酒浸去皮、骨，炙黄，一两　羚羊角屑一两　桂心一两　菖蒲一寸，九节者，一两　人参去芦，一两　川乌头半两，炮裂，去皮、脐，称

上为细末，每服一字或半钱，麝香、荆芥汤调下，并二三服，无时。

治风痉方

通圣散　治中风痉病，口噤体强，耳中策痛，发昏愦，不时省。

蝎尾二十一个，去毒　晚蚕蛾十四个　天浆子去壳，十四个　白附子半两，以上为末　朱砂一分，研飞　麝香一钱，研

上拌研匀，每服一字或半钱，薄荷汤入酒两滴调下。

天南星膏　治如前。

天南星一两，为细末，酒调，慢火熬成膏　赤头蜈蚣半两，酥炙　全蝎半两　乌蛇肉酒浸，去皮骨，半两，以上先为末　朱砂一两，研，飞　牛黄一分，研　麝香一分，研

上同匀细，入南星膏和剂，石臼中杵膏，软硬得所为度，每服一皂子大。薄荷自然汁，入酒一滴同化，服之无时。

二证同治方

乌犀煎　治心肺中风，及风痉病。

乌犀屑一两　天南星半两，微炮　白附子半两，炮　天麻半两　白花蛇酒浸，去皮骨，炙黄，半两　蝎梢半两，去毒

上为细末，用无灰酒两大盏，银器中同熬成膏，每用皂子许，麝香汤化下，无时。

夺命散　治如前。

干蛇头一个，酒浸，炙黄取肉　赤头蜈蚣一条，酥炙黄　干全蝎去毒，一分　麻黄去根节，一分　草乌头一个，去皮、尖，炒黄，以上为末　朱砂一分，研　牛黄一分，研　龙脑一钱，研

上拌匀细，每服一字，温酒调下，无时。

乌蛇散　治如前。及治角弓反张，并一切诸风之病。

乌蛇肉一两，生　石菖蒲一两，九节者良　天麻半两　全蝎半两，去毒　僵蚕炒，去丝、嘴，半两　附子一枚，半两者，炮裂，去皮、脐　羌活去芦，半两　人参去芦，半两　半夏一分，汤洗，切片，炒黄　白附子一分，炮

上为粗末，每二钱，水二盏，生姜十片，薄荷五叶，同煎至一盏，滤去滓，放温，时时滴口中。

治中风角弓反张方

归魂散　治中风腰背反折，如角弓之状。

蝎梢一钱半，炒　赤足蜈蚣半条，酥炙　水银粉一字　川乌头尖二个，炒，令深黄色　白花蛇肉酒浸，取炙黄，称，一钱　天南星切碎，生姜自然汁浸一宿，焙干，称，半钱　脑子一字　麝香一字

上匀细末，三岁下儿一字，上至四五儿半钱，金银、薄荷汤调下，量大小虚实加减，无时。

水银丸　治如前。

水银　蛇黄烧赤，米醋淬七次　轻粉三钱　雄典研，水飞，各一分　生犀末半钱

上同为末匀，以青州枣肉和丸大豆大，一岁儿蜜水化一丸，无时。

治中风口噤方

石膏汤　治中风口噤，颔颊紧急，冥冥如醉。

石膏　独活去芦　川升麻各一两　麻黄去根、节　桂枝　赤芍药　防风去芦并叉枝　细辛去苗，各半两　甘草一分

上为末，每服一大钱，水一盏，入薄荷、竹叶各数片，煎至五分，去滓温服，无时。

羌活紫汤　治中风口噤，身体强直。

上以羌活一两，去芦头锉碎，酒三升，浸一宿，用黑豆一升，净淘，炒烟出，乘热就锅中以酒药沃之，放温去滓，每服一注子灌之，日二三服，无时。

雀矢丸　治中风口噤，声音不出，饮食不下。

上取雄雀粪研末，糊丸麻子大。饮下三二丸，薄荷汤亦得。大良。雀矢白亦佳。

又方　治口噤颔急，风中阳经。

上以白棘烧灰研为末，水调一钱匙服。

又方　治卒口噤不开。

上以附子末，芦管吹入口中，甚良。

治牙噤不开。

上以天南星一枚煨熟，乘热用纸封裹，不令透气，仍于上尖处剪一鸡头大窍子，透气于鼻中，立开。

治中风拘挛不遂方

独活黄芪汤　治中风四肢拘挛。

独活　黄芪　酸枣仁汤浸一次，各一两　麻黄去根、节　羚羊角屑　桑白皮锉　肉桂去粗皮　芎藭各半两

上为细末，每服一大钱，水一盏，入生姜、薄荷各三片，煎至五分，去滓温服。无时。

赤箭汤　治中风半身不遂。

赤箭一两　僵蚕去丝、嘴，微炒，半两　白附子半两　独活去芦，半两　麻黄去根、节　白花蛇酒浸，去皮、骨，各半两　杏仁三十个，麸炒，去皮、尖，研，后入

上同为末，每服一钱，水八分，煎入石榴皮少许，煎至五分，温服，无时。

治中风口眼㖞斜方

防己汤　治中风口眼㖞斜，视不能平，语不能正。

汉防己　川升麻　天麻　川芎各一两　桂心　羚羊角屑　麻黄去根、节，各半两

上为细末，用杏仁一分，汤浸，去皮、尖，炒黄，研细，拌匀，每服一钱，水一盏，入生姜三片，薄荷三片，同煎至五分，去滓稍热，时时与服。

二圣散　专治中风口眼㖞斜。

蝉壳去土，一两，五月五日，取东南枝上者　寒食面一两

上同研匀细，每用半钱，以酽醋调摊薄纸上，如膏药花子，贴患处，左斜贴右，右斜贴左。如口正，急以水洗去之。

全蝎散　治中风口眼㖞斜，语言不正，手足偏废不举。

全蝎去毒，炒　僵蚕去丝、嘴，直者，炒　川芎　黄芩　大天南星汤洗七次，去皮、脐，切，焙　甘草炙　桂不见火　赤芍药　麻黄去根、节，各三钱　天麻六钱

上为粗末，每服二钱，水一盏，生姜七片，煎至六分，温服无时。

朱砂丸　治中风口眼㖞斜，筋急牵引。

朱砂半两，研，飞　干葛微炒　天麻　白附子炮　牛黄　白僵蚕去丝、嘴，微炒　干姜炮，锉　麝香研，各一分

上为细末拌匀，软粳米饭和丸黍米大，每服三钱，乳汁送下，日三服，无时。

又方　名同治同。

朱砂研，水飞　干蝎去毒，微炒　僵蚕去丝、嘴，微炒　天南星炮裂，各半两　白附子一分，炮

上为细末，糊丸绿豆大，一岁儿一丸，薄荷汤下，随数加之，无时。

治风瘧不省方

槐子煎　治中风瘧困不省。

槐子微炒　白僵蚕去丝、嘴，微炒　防风去芦　白附子炮，各一两　干姜炮　麻黄去根、节　半夏汤洗七次，各半两，为末，熬膏　朱砂半两，研　牛黄一分，研　麝香一分，研　金箔二十片，研后入

上用好醋两大盏，与前药慢火熬成膏，次日后药和匀成剂，圆绿豆大，每服五丸，温酒送下。量大小加减，牙关噤者，斡灌之。

急风散　治如前。

白附子四枚，大者去尖，生用　全蝎去毒，五枚，炙　天南星一个，锉，炙深黄色　半夏十个，汤洗七次，去滑尽　天麻一分　腻粉半钱

上为细末，每以一钱分四服，薄荷酒调下，立效。能治一切诸风，更量大小与之。

愈风汤　治如前。

香附子炒，揉去毛　川芎　羌活去芦，各等分

上为细末，每服一钱，水半盏，入酒两滴，同煎至七分，温服，急者汤酒调服。

小儿卫生总微论方　卷七

伤寒论

经曰：伤寒有五。有中风、有热病、有温病、有中湿、有伤寒。其所苦各不同。此五者配入五气，随四时为病。故春风、夏热、秋燥、冬寒、中温，而伤寒则居一焉。其细论在伤寒类证集中。其四时之病，皆谓之伤寒者，乃总概之名也。内热病者，乃盛暑之时，炎热之气中人为病也。又名曰中暍。湿病者，乃雨露霜雾，烟岚水渍，湿气中人为病也。小儿无此二病。谓小儿不治家事，未有干辨。早卧晚起，不致冲胃故也。外伤风、伤寒、温病，小儿有此三病。谓严寒万风温气，无所不至，小儿肌肉脆软，气血柔弱，易为伤之故也。是三病者，其证其脉，不可诊切。儿稍大者，可切脉而别之。伤风之脉，阳浮而阴弱也。伤寒之脉，阴阳俱盛而紧涩也。温病之脉，行在诸经，未知何经之动，随其经之所在而取之也。若婴小未能诊切者，但看其形候耳。

伤风者，乃四时八方为历之风伤入。其候昏睡呵欠顿闷，口中气热，或自汗恶风发热，鼻鸣干呕，热多寒少，面光而不惨，手足皆热，烦躁，治当发散。有饮水者，有能食者，有不能食者。其饮水能食者，可微下之，余不可下也。

伤寒者，乃冬时严寒之气伤入。入于腠理，当是之时，壮者气行而已。怯者则著而为病，其即发者为伤寒，至春发者为温病，一云在夏至之前，非时行温气之病。夏发者为热病。一云在夏至之后，非中暍之热病。其候面赤，浑身壮热，头痛体疼，鼻塞声重，清涕咳嗽，寒毛立，气促急，或呕吐白水。寒多热少，面色惨而不舒，手足指末微冷，不烦躁而恶寒。伤风者，不恶寒而恶风；伤寒者，不恶风而恶寒。其恶风者，当风而乃憎寒也。其恶寒者，虽不当风而亦自憎寒也。以此别之。治者若脉洪盛，身体壮热，头痛面赤，四肢暖者为阳证，宜温之。

若脉微细，身冷不甚，头痛体疼，面青四肢冷者为阴证，宜温之。

温病者，四时之间，非节候邪气伤人。如春应温而反寒；夏应热而反冷；秋应凉而反热；冬应寒而反温。言此时通行此气为病，无少长略同，故名天行时气，又名时行温病。其候头痛身重，壮热体疼，与伤寒相似。但临时看其脉与其证，属何经受病，随经而分别之，以为治也。以上三病，通以伤寒为治。邪在外者，解之汗之。邪在内者，温之下之。当随证按法而行之。钱乙言伤寒男体重而黄，女喘急面赤，各憎寒，口中气热，呵欠顿闷项急，此乃不分伤风伤寒而概言之也。况伤风、伤寒，证候传变多端，自有专经可凭。孙真人云：治小儿与大人与异，惟减用汤剂极少耳。更有伤风寒而兼食者，俗呼谓之夹食伤寒也。其候壮热烦渴，鼻塞声重，四肢困倦，眼黄腹中胀痛，涎唾呕逆，或呵欠顿闷，治者不先攻所伤，但先解表。候表解然后下之，则病与食皆去也。若不顾其表，便以药攻之，多致结痞也。又有因失饥而食寒饮冷，伤于脾胃，而中风寒。其候胸膈不快，腹胀而痛，面色唇口皆青，手足逆冷，脉沉细者，此寒伤于脾，病属太阴，庸工不识，以为胸膈不忆，妄用针灸，或便投快药，则胸膈愈不快而吐利，只一两日间，便致危殆。此不明之误，非其治也。所谓伤寒，本经药证甚多，难以俱述。今采其小儿常所患者之方，及有所兼见之证，略为条叙。

伤风寒手足冷，身热，面赤头痛者，此脾怯也。宜先和脾，然后发散。伤风寒自利者，脾虚也。宜先补脾，然后发散。未差者先调顺其中，有下证者微下之。有惊者退之。

伤风寒腹胀而喘者，脾虚也。宜先补脾，去胀定喘。候喘定，然后发散。

伤风寒得下后，大势已退，而余热未解者，是下之太过，胃虚而热乘之故也。胃中虚热者，饮水无多，当生胃中津液，津液得生，则热与渴皆止矣。以上钱乙论其治方，本集载之。

伤风寒其热在外者为表病。若未入于里而下之太早，里虚气逆，热结胸中，坚硬而痛者，此为结胸。但若硬满而不痛者，此为痞气。若因饮水得者，则为水结。若三四日外，热入于里，则腹满痛，内实有燥粪者，当下之。若热入大肠，则为大便秘涩不通。若热入小肠，则为小便难涩不通。热入大小肠，则为大小便不通。热入脾胃，脾胃属土。候于肌肉，热盛蕴蒸于外则为发黄，热熏于心胸则为烦躁。津液耗减者，则为发渴。热上冲咽喉口舌者，则生疮疼痛。有血泄者，血得热则流溢妄行。从鼻出者，则为衄血；从口出者，则吐血；从大便出者，则便血；从小便出者，则遗血。若壮热未汗，躁喘鼻鸣，因衄一升数合而热得歇者，病则解矣。若出至二三升者，危矣。若热毒积满于内，不得时下，致毒乘瘀血，则烦盛发狂。若郁塞昏冒闷乱者，死。或胃有寒气相搏，则呕哕咳逆。若肺有寒相搏，则咳嗽气急。若气怯者，传变入阴，则四肢厥逆，面青体冷，下利清谷，并当随证施治。

钱乙论伤风、伤寒、疮疹、伤食、壮热、昏睡，一皆相似。若仓卒未能辨认之间，但与升麻葛根汤、惺惺散、小柴胡汤，此数药通治，甚验。

《圣惠方》云：婴孩伤寒，不可用性燥药发汗。燥加府藏，热极伤心，则厥逆而难治。又不可用性热药，乃助阳。阳极则阴争，四肢汗出如油。手足或冷或热，多致发狂，颠痫搐搦，为难治。又不可用性寒药，寒则阳受其冷，则寒热相击，一向叫啼不睡，使热上冲于脑，则头骨缝开为难治。予流落钱塘，就馆于亲僚苏伯正防御家。伯正以医治伤寒名闻，予常观其用药次第。若小儿伤寒壮热，头痛体疼，脉大鼻塞声重，噫咳呵欠，恶风憎寒，病在表可汗者，用银白散，热多者甘露散。有食饮宿滞，脾胃不和者，以安胃丸间服。胸膈不快者，以香壳散间服。烦渴饮水，或作寒热者，灵砂散间服。有惊者，天麻防风丸、人参化风膏。涎盛咳嗽者，小珍珠丸。如此施治，随手得愈者，十有八九。余一二者，乃病久传深，或已成坏证，方才请召，亦依法调治，乃得痊可。其所用之药，多非古方，性不燥热，率皆温平，是谓达南北之异地，识寒热之所宜，深通古人治病之大体也。予尽得其方，今于诸方共叙于后。

银白散　治伤寒壮热，头痛体疼脉大，解表发汗，夹惊者皆可服。

上以煅熟寒水石半斤，研极细，入炒熟黄丹一钱半研匀，如淡即添入些小。以红粉色为度，每服一钱，生姜汤调下。未能饮者，稠调抹口中，以乳汁送下，无时。

甘露散　治伤风壮热，头疼体痛，解表发汗，及热多者。

上以好滑石二两研细，入甘草末半两拌匀。每服一钱，以浓煎萝卜汤调下。

方更有防风半两为末，同研匀，滑石可用桂府白色者妙。

安胃丸　乃化滞丹小丸于也。

香壳散　治伤寒心胸满闷不快。

上以橘皮洗去穰，为细末，每服一钱，生姜汤调下，乳前食。

灵砂散　治伤风寒温热，表里未解，头痛发热，口燥咽干，烦渴引饮，或水入即吐，小便不利，或作寒热，及汗出表解，而烦躁不止。

上以五灵散半两，入朱砂细末一钱，同研匀。每服一小钱，米饮调服。无时。

天麻防风丸、人参化风膏　上二方俱见惊痫门。

小珍珠丸　治风壅痰实，利咽膈，除咳嗽，止烦热，清头目。

半夏汤洗七次，焙干为末，一两　白矾烧汁尽，研末，一两　寒水石煅通赤，出火毒，研，一两

上拌匀研细，面糊和丸，黄米麻子绿豆三等丸子，每服五七丸至十丸，温生姜汤下。食后量大小加减与服。

欢喜散　治伤风寒，发热头痛，无汗恶风，或温热鼻塞清涕，泪出嚏喷。

防风去芦并叉枝　人参去芦　甘草炙　天麻去芦　前胡去芦，各二钱半　细辛去苗　柴胡去芦，各一钱半　白茯苓去黑皮　桔梗去芦，各二钱　枳壳去穰，麸炒，二钱半　川芎三钱

上为细末，每三岁以上抄一钱，水六分，薄荷两叶，同煎三两沸，通口服，无时。

红绵散　治伤风寒及夹惊取汗。

麻黄去根、节　全蝎炒　大黄纸裹，煨熟，切，焙　甘草炙　白附子　苏木锉，炒　天麻生，各一分

上为细末，一岁下儿服一字，以上儿半钱，四五岁一钱，水一小盏，以绵少许，裹药煎之，至绵红色即去绵。温服。

坯煎散　治伤风寒，夹惊潮发，头痛体热，咳嗽，手足冷。

麻黄去根、节，半两　人参去芦　茯苓　白僵蚕去丝、嘴　全蝎　天麻　白附子　甘草炙，各一分　朱砂二钱，研　川乌炮，去皮、尖，一钱半

右为末，每服半钱至一钱，水五分。入坯子胭脂一豆大，薄荷两叶，葱白一寸，同煎至四分，放温服，不拘时。

千金丸　治伤寒夹风夹惊夹食取微利。

朱砂末一钱　全蝎七个末　白丁香七个，末　腻粉一钱　麝香半钱

上为末匀，白饭和丸萝卜子大，薄荷汤下。一岁儿三丸，量大小加减，无时。

茯苓散　治伤寒数日，胸膈不利，调中养胃。

赤茯苓一两　陈皮三分　桔梗去芦，一两　甘草炙，半两

上为末，每服一钱，水六分，入生姜二片，煎至四分，温服无时。

枳实散　治伤寒已汗未汗，卒胸膈痞痛。

上以枳实麸炒黄为末，每服一钱或半钱，米饮调下，无时。

竹沥　治伤寒数日，烦躁不解。

上以竹沥新汲水各半茶脚和匀，服无时。

真珠散　治伤寒口干，心神烦躁。

真珠末研　龙脑研　牛黄研，各半钱　栝蒌根　茯神去心内木　朱砂研，各一分　牙硝　寒水石煅，半分

上为末匀，每服半钱，蜜水调下。无时。

秦艽煎　治伤寒心神烦躁，口干烦渴。

上以秦艽半两，去芦细锉，用牛乳半盏，煎至六分，去滓放温，分三四服。无时。

藕汁蜜　治伤寒烦渴。

上以生藕捣取汁半茶脚许，入蜜一钱，调匀服，无时。

葛根汤　治伤寒发热烦渴。

葛根　人参去芦，各半两　麦门冬去心　白茯苓　甘草炙　泽泻各一分

上为末，每服半钱或一钱，水半盏，薄荷两叶，煎至四分，去滓温服，无时。

百合散　治伤寒腹中满痛。

上以百合半两，炒黄为末，每服半钱或一字，米饮调下，无时。

黄芩散　治伤寒五六日，大便不通，热躁闷乱。

黄芩　枳壳去穰，麸炒　大黄　大腹子各半两

上为粗末，每服一钱，水半盏，煎至四分，去滓服，不拘时。

犀角散　治如前。

犀角屑　川大黄炮　柴胡去苗，各半两　人参去芦，一分　朴硝　甘草各半分

上为末，每服半钱，水五分，入枣二个，煎至四分，去滓温服，量大小加减。

石燕散　治伤寒小便不通，小腹胀满。

上以石燕火煅为末，葱白汤调下一字，以通为度，无时。

又方　以萱草根煎汤，调五苓散服之，乳食前。

葛根汁　治伤寒衄血不止，以生葛根汁一小盏，分三四服即止，无时。

立应散　治如前。

蒲黄　干葛根末　石榴花焙干，末，各一分

上为细末，每服半钱或一字，生地黄汁调下，并二三服止。无时。

又方　以黄药为末，每服半钱或一字，新汲水调下，无时。

金汁蜜　治伤寒衄血，数日不止。

生地黄汁小半盏　白蜜小半盏　蒲黄半两

上和匀，微暖过，每服半茶脚许。无时。

神白散　治伤寒吐血衄血咯血，大小便利血。

槐花一分，微炒　蛤粉半两

上同为细末，每服一钱或半钱，煎柳枝汤放温调下，如修合不及，但以柳枝为末，新水调下亦可。

香墨圆　治伤寒衄血，儿小不能服散药者。

上以好细墨为末，鸡子清和圆黍米大，每五七圆，饮下或灌之。

地黄汁　治伤寒吐血，心胸不利，烦渴不已。

上以生地黄杵绞取汁，量大小与之，亦治衄血。

麦门冬汤　治伤寒咳嗽喘急。

麦门冬去心　款冬花去枝梗　人参去芦　紫菀洗焙，各一两　桂心半两　甘草一分

上为末，后入杏仁二十枚，麸炒去皮尖，研细拌匀，每服一钱，水一盏，生姜二片，煎至六分，去滓温服，无时。

一捻金散　治伤寒风热咳嗽。

白僵蚕去丝、嘴，一钱　甘草半两，炙　延胡索去皮，一分

上为细末，每服一捻。汁调下。无时。

润肺散　治伤寒鼻塞，涎壅咳嗽，肺气不利，语声不出。

麻黄去根、节　人参去芦，各一两　杏仁麸炒，去皮、尖　贝母去心，麸炒黄，各一两　甘草炙，半两　陈皮去白，一分半　桔梗去芦，一分　阿胶蛤粉炒，如珠子大，用一分

上为末，每服一钱，水八分，煎至六分，去滓温服。无时。

赤芍药散　治伤寒阳证咳逆。

上以赤芍药沸汤浸七遍，每遍以瓦盆盖少时，数足取出，炒燥为末。每服一钱，豆豉三粒，生姜一片，水七分，煎至五分，放温服。无时。

茇良汤　治伤寒寒多咳逆。

茇澄茄　良姜各等分

上为末，每服一钱，水六分，煎数沸，入醋少许，搅匀带热服。

灵砂膏　治伤寒脉数，热入胃呕吐。

泽泻二两半　桂去皮，一两　猪苓去皮　赤茯苓去皮　白术去芦，各一两半

上为末，炼蜜和膏鸡头大。每服一丸，生姜自然汁化破与服，只末用便是五苓散。亦治发热烦渴饮水，水入即吐，或小便不利，瘀热在里发黄，浓煎茵陈蒿汤调下，余病饮调。

四味人参汤　治伤寒脉迟，胃冷呕吐。

干姜炮　黄芩　黄连去须　人参去芦，各等分

上为粗末，每服一钱，水六分，煎至四分，去滓温服。无时。

附子姜朴丸　治伤寒寒多，呕吐，手足厥冷。

附子炮，去皮脐，半两　干姜一分，块　厚朴去粗皮，生姜炒裂，一分

上为末，糊丸麻子大。每服五七丸，米饮下，无时。

半夏汤　治伤寒呕逆，不下乳食。

上以半夏半两，汤洗七次去滑，生姜一两，同锉碎，焙干。每服一钱，水一盏，煎

至五分，去滓。时时与服。无时。

芦根饮子　治伤寒干哕，及反胃呕吐。

生芦根切碎　青竹茹各二合　糯米半合　生姜半两

上㕮咀，先以水一升，煮干里鞋底，取半升，澄清。下药再煮，取二三合，随意服，量大小加减。

小半夏汤　治伤寒干哕欲死。

半夏　生姜各一两

上㕮咀，以水一大盏，入药煎，留半盏，去滓，分数服。

三黄散　治伤寒发黄。

川大黄半两，锉，微炒　黄芩一分　黄连去须，一分

上为末，每服半钱，水六分，煎半。去滓温服，无时。

大麦苗汁　治如前。

上取大麦苗捣烂、绞汁与服，小麦苗亦得。

人参柴胡饮子　治体虚伤于寒邪，浑身壮热，头目昏重，项背拘急，支体疼痛，干哕呕逆，或作寒热，发歇无时，烦渴不食。

人参去芦　柴胡去苗　白术　白茯苓　青皮去穰　桔梗去芦　麦门冬去心　川芎　白芍药　甘草炙　桑白皮　升麻各等分

上为末，每服一钱或二钱，水一盏，乌梅一个，则煎至六分，量大小分服，无时。

治伤寒时气，头痛不可忍。

上以朴硝研细末，生油调涂顶上。

治伤寒毒攻手足痛者。

上以羊桃汁，杂盐豉汁渍之。

黑龙散　治小儿伤寒在表，服冷药，寒伏于中，危困不得汗。

麻黄去根、节，三分　竹茹一分　苏木一分　蝎梢二十一个　乌龙土一分，乃火团也

上为末，每服半钱，水五分，煎至三分，温服无时。

鸡白调散　治伤寒伤风，发寒热似疟，久不差渐变骨间蒸热。

朱砂水飞　白矾枯　铁华粉　粉霜　铅白霜各一钱　轻粉　白附子各二钱　蝎梢六个　龙脑　麝香各少许

上为末，每服半钱，入鸡子白，井花水共约一茶脚，调匀服，无时。

茵陈散　治伤寒发黄不可下。

茵陈一两　白术半两　甘草半两

上为散，每服半钱，沸汤调下，小便不利者，加伏苓一两。

绛雪丹　治伤寒五六日，发黄，小便不利，烦躁热闷，饮水烦躁不解。

朱砂半两，研，水飞　硝石二两，研　龙脑少许

上同研匀细，白米饭和丸鸡头子大。沙糖水化下，量大小服。

商陆散　治伤寒咽喉肿痛。

上以商陆根切碎，杵烂炒熟，用手帕子裹之，熨肿处，冷即易之。

甘桔汤　治伤寒咽喉妨肿。

桔梗去芦，一两，米泔浸一宿，焙干用　甘草二两，炒

上为末，每二钱，水一盏，煎六分，放温冷，细细呷服。

黄柏蜜　治伤寒热毒，口舌生疮赤烂。

上以黄柏去粗皮，用蜜渍一宿，微煎过，含之，咽汁勿绝。或以黄柏为末，同煎膏之，量多少。

黄芩汤　治伤寒口舌诸病，舌黄舌黑，舌肿舌裂，舌上生芒刺，舌上出血，皆治。

黄芩二钱　赤芍药二钱　甘草二钱，炙

上㕮咀，每二钱水一盏，煎至六分，去滓温服，亦主鼻衄。

胜金饼子　治伤寒结胸气痞，并主之。

大黄半两　枳壳去穰，麸炒黄，净，一两

上为细末，炼蜜和剂，捏作饼子，如小钱大。结胸者用芒硝半钱，同生姜水化并饼或一饼服之。痞气者煎陈皮汤化下，无时。

生熟散　治伤寒结胸硬痛。

上以草乌头二个，一生一炮，同为末，生

姜自然汁和匀为丸，如鸡头子大。每一丸用蜜汤化下。

芫花熨法　治伤寒因饮水，心下结痞硬痛，名水结。

上以芫花醋拌匀，慢火炒熟，用绵裹熨之，冷即易。再炒用，以效为度。

蓝靛　治伤寒热毒乘心，神志冒闷，烦躁昏乱。

上以蓝靛一字或半钱，新水调下。

苦参酒　治伤寒热毒，结在胸膈，六七日望死。

上以苦参半两锉碎，用酒一盏，煎至半盏，去滓放温，分三四服，连并服之，须臾吐出苦胆汁，立愈。

黄连汤　治伤寒热入肠胃，下痢脓血。

黄连去须，微炒，二两　黄柏一两，锉，微炒　阿胶一两，蛤粉炒　栀子仁半两

上为粗末，每服一二钱，水六分，煎至四分，去滓温服，无时。

栀子仁汤　治伤寒热毒攻于肠胃，下赤汁或如烂肉鸭肝，壮热腹痛。

栀子仁二十一个　豉二合　薤白一握，切

上以水二大盏，同煎至一盏，去滓，量大小分作数服，无时。

乌仙散　治阴证伤寒，四肢厥逆。

上以川乌不拘多少，童子小便浸，不计日数，直至浸脱皮时，用水净洗切碎，晒至八分干，便以纸袋盛吊于当风处，用时旋取为末，腊茶调下半钱，量大小及病势与之。

烧附散　治伤寒阴盛隔阳，身冷厥逆，脉沉细，而烦躁体冷。

上以大附子一枚，半两者，入急火烧，微存中心二三分，取出。用瓷器合盖放冷为末，更入腊茶末一大钱，同研匀细。每服半钱，水一小盏，蜜少许。同煎半盏，去滓温服，服讫须臾，躁止得睡，汗出而解。

又一方　烧附末每一字或半钱，酒调下，频服取汗出，差。小儿本怯者，最宜服。

茱萸熨法　治伤寒阴证厥逆。

上以茱萸半升，酒和匀湿，用绢袋二枚盛，蒸令热甚，以熨脚心，冷即易之，候气通畅匀暖，即止。

牛蒡根汁　治伤寒汗后，余热不退，烦躁发渴，四肢无力，不能食。

上以牛蒡根杵烂，绞取汁服，看大小多少与之。

玉女散　治伤寒汗后，潮热日发，诸药不效。

上以川乌一两，火炮去皮脐，为细末。每服一钱，水一盏半，入生姜七片，枣一枚，煎至四分，温服无时。

伤寒之病，传变证候甚多。予当编伤寒类证论方，亦颇详备，今集小儿伤寒截方，如或有证候未尽者，请照类证依法为治耳。

小儿卫生总微论方　卷八

疮疹论

疮疹之候，古今皆云大率与伤寒相似，然亦有小异也。其初觉之时，头痛体重，面赤气粗，壮热多睡，惊悸呵欠，顿闷咳嗽，呕逆嘘喷，此皆同也。其疮疹者，不恶寒而恶热，面色与四支俱赤，眼睛黄，手足厥，唇红，耳尖冷，尻骨冷，小便赤，大便秘，其脉三部皆洪数绝大不定，是其候也，此小异耳。伤寒者宜发散解之，疮疹者宜温平处方。惟不可妄发妄下，又不可令受风冷。其疮疹乃儿在母胎中之时，食母血秽，滋养儿五藏之气。至生下已后，其毒不拘何时，须当出矣。惟年小者，皮肤嫩软，疮出快易。谓数岁以下者。若长大者，皮肤厚硬，疮出艰难。谓数岁以上者。然小儿所禀胎中秽毒，因中寒温，蕴发生热，三日以上，热连入皮肤。始如蚊蚤咬成赤点，或如沙粟、瘾疹、风疾之类，渐渐出面作疮也。前人言疮疹有表里证，其疮皮厚，如赤根白头，渐加赤肿有脓，差迟者谓之大痘，此谓里证，发于藏也。其疮皮薄，如水泡，破即易干者，谓之水痘，此为表证，发于府也。此言虽简，然未尽善，此但言脓泡水泡二种，外斑疹又不知属何所主也。不若钱乙所论，其疮出有五名，以属五藏之液。其状有五象，以属五藏之色。肝为水泡主泪，以泪出清如水，其色青而大。肺为脓疱主涕，以涕出浊如脓，其色白面大。心为斑主血，其色赤而稍大。脾为疹主裹血，其色黄赤而小。肾为倒靥，其色黑。细说在后。诸藏内惟涕泪出多，故水泡脓疱皆大。血营于内，所出不多，故斑子疹子皆小也。又病水泡脓疱者，涕泪俱少，以液从疮出故也。譬如泡中容水，水去则泡瘪矣。凡疮疹初欲出之时，则五藏证皆见，以热并动于五藏也。及至已出时，乃得归一藏者，以一藏受秽多而毒气盛也。亦有两证三证同出者，所受同而并发也。细说在后。昔钱乙治睦亲宅十太尉疹子，与众医坐上问曰：疹未出何属？一曰：胃热。一曰：伤寒不退。一曰：在母腹中时有毒。乙曰：若言胃热，何乍凉乍热？若言伤寒不退，七日之外，则为再经，何证不相应？若言母腹中之毒，今发属何藏？皆无以对。乙复曰：儿在母胎中，至六七月已成形，食母腹中秽液，入儿五藏，至十月即秽液满胃，至生时，儿口中犹有不洁。产母以物拭清，又以黄连、汞粉下其脐粪之秽，此母秽液不洁，余气在儿藏中，因遇寒温邪气相搏，而发热出成疮疹也。未出欲作之时，热动五藏，则五藏之证皆见，呵欠顿闷肝也；时惊悸者心也。乍凉乍热，手足冷者脾也；面颊赤，咳嗽嘘喷者肺也。惟肾无证，以其肾在府下，不能食其胃液。其候平者，但尻冷耳冷者是也。尻耳俱属于肾，主北方，主冷故也。疮既出则归一藏，肝为水泡；肺为脓疱；心为斑；脾为疹；肾虽无证，其候恶者，疮变倒靥而黑隐则归肾也。此由不慎风冷内虚所致，疮黑隐尻耳反热者逆也。今十太尉疹子无他证，当用平和药为治，用抱龙丸数服面愈。其方在本集载之。

凡疮疹欲出者，身必发热。其发亦自有时，随藏所主。如早晨发热不已为水泡，日午发热不已为斑，晡时发热不已为疹，日晚发热不已为脓疱。发热三日以上，热运入皮肤即出也。其热重者疮亦重，其热轻者疮亦轻。方其身热疮未出之时，须审认证候子细，不可有误，误则为害大矣。且疮疹欲作之时

皆身热，热则疮亦未出，热至三四日乃歇、疮方出也。若腹痛者，是腹中先出。眼涩者，是眼中先出。咽喉口舌痛者，觜先出也。若三日已后不出，或出快，热留肤腠之间故也。当以药微发之。止可服升麻葛根汤、抱龙圆之类，药平平者。或儿身不甚热者，与少胡蒌酒饮之。此微发不出，即加药发之。即发之后，出不多，脉平无他证者，即是疮本稀也，不可更发。若不能审察病势轻重，但务多以热药发之，则热药熏蒸，疮出转难，别生热证。大小便不通，更以快药下之，便致危殆，此误之甚矣。若苍欲发之时，有大热甚者，只可与利小便，如觉热极毒盛，服常药不可及者，宜微与利之，以减其毒，不可大利，须是子细，常与看觑，虽夜间亦不住用灯观照。若未有赤红点子出时，乃可与微利。若已有出者，则不可利也。钱乙有曰：身热烦渴，腹满而喘，大小便秘涩，面赤闷乱，大吐者，当利小便。不差者，微导利之。此亦疮疹未出之前，有此热湿之证，解而不减，乃可与微利之。张涣亦曰：疮疹未出，脉洪数甚大不定，而小便赤，大便秘者，此证正宜疏利。涣频年在禁中及在外治此证甚多，皆获安愈，亦与上证并同者也。若红点未出之前，无此热实之证者，亦不可利。朱肱曰：伤寒身热在表，固不可下，疮疹身热在表，亦不可下。盖伤寒与疮疹一体之病，是以伤寒证中有出疮疹之候也。世人不学，妄云疮疹初觉未出时，宜先利。其毒已出者，不可利。若出已定，脓血太盛者，亦可与利，此皆非也。大抵疮疹首尾皆不可下，此言甚善。医者当务从之，若能审察疮疹于未出之前，别无热毒之证者，不可与下。有热毒之证，轻者与利小便，重者利小便不减，方可与微下。若已出者，慎不可下。至出足已定，亦未可与下。须直候疮痂焦落，美饮食，能举动之后，方可与解余毒药下之。亦不可用快药过多，如此则无误矣。凡以疮疹变黑陷者，多因误投冷药，妄乱下之，及不慎风冷，乳食不饱，内虚脾弱所致也。故儿病疮疹，不得令受风冷，冬月必在暖处，夏月虽不可拥遏，亦须避其风凉，在凉荫处则可。又当频频喂饲乳食。常令饱足，无令饥馁，今俗辈多禁食饵。殊不知饥则内虚，脾胃气弱，别生他证也。且疮疹欲发之时，身必壮热，二三日渐凉，疮方始出，其出快，疮红肥，脉浮大而数者，毒气出也。若疮出多，却身热疼痛者，是内热外疮燃之所作，至出尽则凉也。庸工不明，见身热疼痛，以为热盛，便投凉药，致身反凉而疮出不快，变黑黵倒陷，脉沉细坏乱。到此病家方觉，医者拱手，如是夭伤，诚可哀憎。昔仓公扁鹊论小儿疾证，汤药有可服不可服之别。宜先顺阴阳，次调荣卫，然后方利藏府。古圣立言垂法，为后世逆治之戒，岂可忽诸，故众病之中，惟疮疹切忌妄下为最。昔钱乙治睦亲宅一大王儿疹子，始用一李医，以药妄下之，其疹稠密，乃召乙。乙见大惊曰：若非转下，则为逆病也。王曰：以下之。乙曰：疹始出，未有他证，不可下。但用平和之药，频与乳食，不受风冷可也。如三日外，出不快者，当依次发之。有大热者，当利小便。如疮痂起能食者，微利一两行即止。今先下早，疮未尽出而稠密已盛，为难治，此误也。纵虽得安，其病有三：一者疥，二者瘸，三者赤目。李不能治，经三日黑陷，复召乙。乙曰：幸不发寒，未致困也。盖疮黑者归肾，肾旺胜脾，土不能制水，脾虚寒战，则难治也。今未发寒，乃用药泻膀胱之府。府若不实，则肾之藏自不盛也，乃得安愈。或曰：何不泻肾？以肾主虚，而不受泻。若二服不效，加寒则死矣。乙之治方，本集载之。

凡疮疹欲作，有发惊搐搦者，以疹疮由热所生。心主热而为惊，又热则生风，风属肝。心肝二藏风火相搏，故发惊搐也。轻者疮出热去则自愈，重者亦当泻其心肝之盛也。又有因惊而发疮疹者；惊本亦由热作，治当退热定惊。庸工不明，更以热药发之，致发热入表，表热而斑出也。昔钱乙治四王宫五

大剧，因坠秋千，发惊抽搐，前医以热药发散，不愈。召乙，乙曰：本乃急惊，后生大热，初当合用利惊药治之，今发散乃逆也。乙用药退解之，至三日肌肤尚热。乙曰：更二日不愈，必发疮疹，盖热不能出也。后二日果疮疹出，以药治之，七日愈。其钱乙治方，本集载之。

凡疮疹出有轻、重、逆、顺。轻重者，若只出一般，或出作数次者轻；若三两般同出，或一次便出尽者重；出稀者轻，出密者重；里红外肥者轻，外黑里赤者重，里外俱黑者大重。疮端里有黑点如针孔者，势剧也。青干紫陷，昏睡汗出不止，烦躁热渴，腹满而喘，大小便不通者，困也。逆顺者，先发脓疱，后发疹子者顺。先发水疱，后发疹子者逆。先发脓疱，后发水泡多者顺，少者逆。先发水泡，后发斑子多者逆，少者顺。先发疹子，后发斑子顺。先出疹子、斑子者，后必更出水泡、脓泡。先出水泡、脓疱者，后必不出疹子、斑子。盖以水泡、脓疱重而毒气出甚，斑子、疹子轻而毒气出微，甚者必带了微者也，微者不带甚者故也。予家有数小儿，皆先出疹子，次出水泡，次出脓疱，共三次而已。其先出疹子者，或恐有斑子兼出，以斑疹相似。此两般乃子母之藏，故又轻重顺逆更看时月。大抵疮疹之病，在表属阳，出则为顺，不出则为逆。春夏病之则顺，秋冬病之则逆。又冬月肾旺寒冷之时，病者多归肾而变黑也。又当辨春脓疱，夏黑靥，秋斑子，冬疹子者，亦不顺也。病虽重，疮红肥犹当十活四五。若黑陷者，无问何时，十难救一。其候寒战牙噤，或身肿疮黑紫者，急以药泻膀胱之府，以减肾气而救之。若服药后身热气温，欲饮水者可治。以脾气生而胜肾，寒冷去而温热生也。若服药之后，恶寒不已，身冷汗出。耳尻反热者，死候也。以肾大旺，脾虚不能制也。

凡疮疹出多，稠密遍身，其势太甚，儿甚苦之，及变黑倒靥不出者，急以猪血、脑子救之。沈存中侍郎有方，治疮疹欲发，及伏陷危困者，取腊月猪血，瓶盛，挂风中令干，每用半枣大，加生龙脑豆许，温酒下，甚效。予家有小女病伤寒，但腰痛，昼夜号哭，手足厥冷。日加昏困，形证极恶。予疑是倒发疮子，先不畜此药，急令就屠家处买少生猪血。时盛暑，投之血已败恶，无可奈何。遂多以龙脑和而灌之，一服遂得少睡，须臾一身疮点出，获安，不尔几死。

凡疮疹若黑陷而忽泻，便脓血，并痂皮者，此却为顺也，如水谷乳食不化者逆也。何以然？且疮黑属肾，今脾气本壮，或旧服补脾药，脾气得实，肾虽用事，脾能制之。今虽入腹，为脓血及痂皮得出，是脾强肾退，即出而安也。若泻米谷乳食不化者，是脾虚不能制肾，则自泄也。此必难治。

凡疮疹若婴小及乳下儿病者，不可与稚一等为治，妄施汤药，小者宜少少服药，惟忌多服，多则反为累也。又令母慎口，又不可令儿失饥，避其风冷，及用药调理乳母为佳。若断乳儿患者，亦当审其轻重大小用药，如至八发岁以上，至十岁外者，方可施药也。

凡疮疹儿病大盛，遍身溃溃，脓血沾粘衣衾，睡卧不得，及有疮成片段无皮，或作窦穴，痘痈脓血多。盛者用腊月黄牛粪，日干烧灰，铺一寸许厚，令在上卧之。及掺其疮溃无皮之处，即愈。一方用黑牛粪烧灰傅，亦得。

凡疮疹儿病面上有者，才脓出。急以真酥润之，频润为佳。才有痂，便揭去更润之，纵虽揭损，有少血亦不妨，但以酥或面油涂润之，若不润及揭迟，则疮痂干硬不落，有碍肉生，即隐成瘢子也。此理昭然，人多不晓，反谓揭早成瘢，其误也。

凡疮疹切忌杂人，恐有汗气狐臭触之，又不可令儿闻秽恶臭物也。故左右不可阙于胡荽，以胡荽能御汗气，及辟诸恶气故也。家有数儿，一儿既患，余见次皆及之。便当为备以防之，以秽气转相传染也。儿能食者，可

时与少葡萄食之。盖能利小便，及取恶秽出快之义也。

凡疮疹儿患者，切不可洗面。恐生水入眼，即损眼也。若初欲发时，验得的当，急以胭脂或药涂儿面目周围。令疮不上面入眼也。若疮入眼者是毒气入于肝经，上冲于目。若疮初出时，觉眼肿痛，便与时时开眼看之。睛上无疮，即不妨矣。若有疮，须服药治之，睛破者无奈也。若疮干以后，无故眼肿痛者，是余毒不尽所攻也。又疮疼已发，及或入眼，切要慎口。止可食粥及鲫鱼、青鱼、鹌于，余鱼及猪羊等物皆不可食，最忌者鸡卵、鸭子。食之即目盲，漫若卵白之状，其应如神。

凡疮疹儿病出尽，至痂焦落，身已凉，喜饮食，能起动者，以清凉饮子浓煎，量大小与服，微利一两行，去其余毒即安，无后病也。若不下，则后恐发热为肿腮鼻衄下利，世人不用此法者，于此数证，或不能免也。

凡疮疹治疗之法，初觉之时，身热未出，证候未明，未能辨认者，与升麻葛根汤、消毒散服。若热二三日，证候已明者，则涂面目，辟秽气。若出快，别无他证者，平和药调之。出不快者发之，出太盛者散之，变黑黡者救之。又毒攻咽喉口舌，则肿痛生疮，毒冲心胸者，则烦渴躁闷；毒入大小肠，则大小便不通，或遗泻下血；毒攻肝经，则目生瘴医。疮生于睛，则损瞳人。以至灭疮瘢，退余热，一切诸候，皆随证用药。其乳下儿患者，可令乳母同服其药，则病得易愈。

升麻葛根汤　治疮疹初觉未出，身热不能辨认，恐是伤寒惊风，变蒸温壮，疑惑之间，皆可与服。

升麻　葛根　芍药　甘草炙，各等分

上为粗末，每二岁上儿用二钱，水一盏，煎至六分，去滓温服。无时。

消毒散　治疮疹未出皆可服，未出即消毒，已出即减。

牛蒡子二两，炒，纸衬　甘草半两，锉，炒　荆芥穗一分

上为粗末，每服一大钱，水一盏，煎至五分，去滓温服。下利者不可与服。若咽喉肿痛者，尤宜服之。一方，更有防风一两，荆芥穗亦一两。此《千金》方中。

紫草饮子　治如前。

上以紫草二两细锉，用百沸汤一大盏沃之。

化毒汤　治如前。本方治疮疹欲出，浑身壮热，情意不佳，不思饮食，服之即内消。已出，十解六七。全出者，当日须三服，立效。

嫩紫草去粗梗　升麻　甘草炙，各半两

上锉如麻豆，以水二盏，糯米五十粒，同煎至一大盏，去滓放温，量大小三四次与服。一方疮疹未出，服之内消。已出减轻，全出即当日焦痂，三服立效。

人参散　治疮疹才觉出便服，令稀少轻可。

人参　白术　贯众　甘草炙　羌活去芦，各等分

上为细末，每服一钱，水一盏，煎至六分。去粗，温服，无时。

紫草如圣汤　治疮疹才初出，便急与服之，令减毒轻可。乳下儿与乳母兼服之，断乳令自服。

紫草去粗皮，二两　陈橘皮去白、焙干，一两

上为末，每服一大盏，水一盏，入葱白二寸，煎至六分，去渣温服。无时。

腊胭脂　疮疹才初出，便用涂眼周围，以防疮于入眼也。左右悉涂之。

黄柏膏又名护目膏。　疮疹才出，急用以涂面，从耳前眼眶边厚涂之，以防疮子入眼，及面作瘢痕。能早用，即能护目，及面上不生。若用迟，纵出亦少。涂毕后，可用胡荽酒喷发。

黄柏一两，去粗皮。一方用蜜炙，一方只锉碎用　新绿豆一两，拣净，一方用一两半　甘草半两，生。一方用四两，分两少者出妙选，更有红蓝花一两；分两多者出钱氏，只三味，董汲方同

上为细末，用好生芝麻油捣为膏，从耳前眼眦外及腮面涂之，日三五次。

胡荽酒　以胡荽四两细切。用酒三盏煎沸，沃胡荽，便以物合之，勿令透气。候冷，滤取胡荽焙干，以红绢袋子盛之，缝合。令乳母并儿带之，其酒吸一两口，从儿项下喷，及肩背胸腹四支令遍，不得喷头面，余酒与乳母饮之为佳。能令疮出快速。《妙选》不论及喷，余皆并同。又于儿左右常令多多频带胡荽，能辟污秽之气故也。

鼠粘子汤　治疮初生，才作赤点。毒气未得透皮肤出作疮，恐出不快而微发之。

鼠粘子二两、炒香　荆芥穗一两　甘草半两、炙　防风去芦并叉枝

上为末，每服二钱，沸汤调服。及利喉膈，化涎止嗽。一方只鼠粘子一两，甘草半两为末，每服二钱，水一盏，煎至八分，去渣温服。无时。

紫草散　治如前。

钩藤钩子　紫草茸等分

上为细末，每服一字或半钱，温酒调下。无时。此先微用药发之，经夕未出，加药发之。

必胜散　治疮疹出，未能遍匀，服之能透肌解毒，以牛蒡子不限多少，炒令香熟。为细末。每服一钱，入荆芥二穗，水一盏，煎至七分，放温服，无时。

龙脑膏子　治疮疹未透，心烦狂躁，气喘妄语，或如见鬼。

上以生龙脑半钱研细，旋滴猪心血和丸鸡头肉大，每服一圆。煎紫草汤化下，少时心神烦躁便定。得睡，疮子已发得透了，自然依常法取安。此方亦治黑陷伏靥者，如用以温酒化下。

又方　只用猪血一橡斗许，脑子一小块，研细。酒少许和服之，极有神效之验。此沈存中所用之方也。

安斑散　治疮疹出快肥红，平调之。

川升麻　赤茯苓　绵黄芪　羌活去芦，各一两　人参去芦　枳壳去穰，麸炒　桔梗去芦　甘草各半两

上为细末，每服一大钱，水一小盏，入紫草、薄荷各少许，煎至五分去滓，温服无时。

快斑散　此方治病如前。

贯众一两，拣，洗净，焙干　赤芍药一两　甘草半两　川升麻半两　枳壳麸炒，去穰，半两

右为末，每服一钱，水一小盏，入竹叶七片，煎至五分，去滓温服。无时。其效如神。

抱龙圆　治如前。

天南星为末，用腊月牛胆汁和成剂，再酿荫百日而干，四两。如无，只以浆水或新水浸天南星三日，候透软，煮三五沸取出。乘软去皮脐，只取白软者，薄切焙干，炒黄色为末，用八两。以甘草二两半，擘破，水二碗浸一宿，慢火煮至半碗，去粗，旋旋酒入天南星末内，慢慢研之，令甘草水尽，次入于余药。

天竺黄一两　雄黄一分，研，飞　辰砂半两，研，飞　麝香半两，研

上同匀末，煮甘草膏子和圆皂子大。温水化服。百日儿一圆，分三四服，五岁儿一圆。若用腊月中雪水煮甘草和药，尤佳。此药治伤风伤寒，温疫风热，痰实咳嗽，惊风潮搐，蛊毒中毒温壮，及室女白带。钱乙治疮疹出快红肥，只以此药平调，最好。

《小品》**犀角地黄汤**　治疮疹太甚，解散之。

赤芍药一分半　生地黄四两　牡丹皮去心，半两　犀角屑半两，无即以升麻代

右为粗末，每服二钱，水一小盏，煎至六分，去渣温服。有大热如狂者，加黄芩半两，更量大小与服。

木香汤　治疮疹太盛烦痛。

青木香一两　丁香　藿陆香　白矾各半两　麝香一钱

上为粗末，每服二钱，水一小盏，煎至六分，去渣温服。热盛者，加犀角屑半两，轻者去白矾，大效。

猪胆醋　治疮疹内发盛者。

醋四两　大猪胆一个取汁用

上合煎三四沸，每服半合上下，量大小与之，日四五服。无时。

莱菔汁　治疮疹出不快。

上以开花萝卜煎汁，时时与饮。

紫茸汁　治如前。

上以紫草茸水煎汁服。

活血散　治如前。

上以白芍药为末，每服半钱或一字，温酒调下。如只欲止痛者，温熟水调下。无时。

蝉蜕饮子　治如前。

上以蝉蜕十枚，去泥土，洗净碎之，用水三大盏，煎至八分，去渣分二服。出不快者，带热服之。若出多，要消退者，放冷服之，神效。

四圣散　治疮疹出不快，小便赤涩，心腹胀满，一切恶候，亦治倒靨。

紫草茸一两　木通细锉，四两　枳壳麸炒，去穰，四两　黄芪炙，锉，半两　甘草半两

上为末，每服二钱，水一盏，煎至六分，去滓放温，时时呷之。

川芎升麻汤　治疮疹已出，未能匀遍，或毒气壅遏，虽出不快，此药御风透肌，发疮甚效。

川芎　川升麻　当归去芦，洗净　白芍药各半两

上为粗末，每服一钱，水七分盏，煎至五分，去渣温服，不拘时候。

解毒汤　治藏府蕴热，积毒发泄，斑疮稠密，脓血大盛，狂躁发渴，咽嗌不利，遍身溃溃苦无全肤，不能转侧，疼痛不任。

生地黄四两　犀角屑　白芍药　牡丹皮去心，各半两

上为粗末，每服一钱，水七分盏，煎至五分，去渣放温服之。

黑龙散　治小儿疮疹才发，服冷药伏靨，三日间危笃，急进此药。

麻黄去根、节，三分　竹茹一分　蝎梢廿一个　苏木一分　乌龙土一分，乃火团也

上为细末，每服半钱，水五分，煎至三分，温服。

白虎化斑汤　治疮疹赤黑，出不快，毒盛烦躁，或云大虎汤，有为大人药者，殊不知孙真人言：大人小儿为治不别，但用药多少耳。

石膏四两，捣碎　知母一两半，锉　甘草炙，三分　人参去芦，半两

上为末，每服二钱，水一盏，入粳米二十粒，同煎至半盏，去渣温服，小儿量大小分减。初春深秋，冬月寒时，加枣煎服，并乳母兼服，大妙，断乳儿只自服。

神通散　治疮疹倒靨，伏陷不出，毒气稍轻，大小便通利者。

地龙紫者去土，微炒，一两　朱砂一两，别研　生干地黄一两，以上先为末

上同拌匀，每服一字，煎胡荽酒少许，同温汤调下。无时。

如圣散　治疮疹已生，反倒靨内陷，舌缩，啼声不出，腹胀肚急，一切恶证。

上用蛇蜕皮于灯焰烧。先用碗一只在下，才烧焰绝，放在碗内。急用碗一只覆之，不令透气，良久揭开，细研为末，每服一字或半钱，用藿香汤调下。若变红活时，则用牛蒡子炒熟为细末，每服二钱，水一盏，煎至六分，放冷澄清，以匙抄清汁，频频与服，能滋润咽喉肺经，大解疮毒。

七神散　治疮疹毒气内攻，黑紫倒陷伏靨，危恶之候。

腊月猪血新瓦罐盛，密封至渗泣干，称一两。余血依旧封收之，以备再合要用　牙硝一两　硼砂　牛黄　麝香　龙脑各一钱，细研别入

上拌匀研细，以瓷合贮之，每二岁儿用一钱，新水调服，利下恶物，疮子红活为度。

又一方，更有朱砂细末一钱，余并同，名救生散，治如上。甚者不过再服，神验无比。

又一方，无硼砂，却有腻粉、朱砂各一钱，研同匀，名无比散。小猪猪尾上血三五

滴相拌，小者一字，乳汁调抹口中，大者半钱，新水调下，余并同。

宣毒膏　治如前，曾经大效，神妙。

朱砂一两，研，水飞　乳香一两，研　甘草细末，半两　牙硝半两，研　麝香一分，研　生龙脑一分，研

上于腊月八日，取赭猪尾后刺血一升，用新瓦盆盛，入诸药同拌搅匀。以一宽大旧竹筒，底留一节，都入在内。用纸数重密盖，紧系封合。却入筒口边通一窍子，以麻绳系垂在大粪坑屋梁上，至清明日取出曝干，更入龙麝各一钱，研细匀。滴水和圆皂子大，每服一圆，煎人参汤化下。若毒盛，疮子倒靨变黑，服之则红活而长。

猪血脑子　治疮疹黑紫，倒靨不出。

生龙脑一字，研细　猪尾上取血半蛤蜊壳

上二味相和，以帛子裹薄荷揉汁半合，调上件药匀，于汤中烫温，作一服饮之，神验。

一方，取小猪儿尾尖血三五滴，研生龙脑末少许，新水调下，治如前。

又一方，治疮疹黑靨恶候，医所不治者，用赭猪第二番血清半合，酒半合，研龙脑细末少许，和搅令匀，服之。利一两行，十救十人，大验。小者量与。

又一方，治疮疹发，心间有热，或误服热药，致畜热在心，昏冒不省人事，疮子黑靨。用新杀猪心一个，取心中血，以龙脑一字，同研合作一圆。新汲水化下，未省者再服。

又一方，治疮疹黑靨倒陷，子腊日收生猪血，新瓦瓶中蜜封，候自然渗泣至干。每用半钱许，研散。入麝香少许，同匀细，新水调下，其疮变红便出。以上数方，皆与沈存中龙脑膏相似，少有异尔，并经大验，今俱录之。

人齿散　治疮疹黑靨，发搐危困。

上以人牙齿三五枚，炙令黄。一方存性研为末，入麝香少许，每半钱，温酒少许调下。一方用乳香汤调下。沈存中言，屡见人用之效。

白丁母散　治如前。

上以白丁香为末，入麝少许，研匀，每服一字，米饮调下。无时。

桃胶汤　治如前。

上以桃胶煎汤，饮之大效。

一方，以水熬成膏，温酒调下。无时。

又方　治如前。

上以黑狗一只，牢系住，不与物吃一两日。候肠中旧粪尽，与生粟米吃。候粟米粪下，于活水中净淘。只留化不尽米，曝干收之。每用二钱，再淘净，研为细末，入麝香少许，新水调下，顷刻间疮变红活。

白祥圆、牛李膏，钱乙用此二药，治疮疹恶候，见于皮肤之下不出，或出而不长。反变黑紫，倒靨内陷，一切危急。用百祥圆以泻膀胱之府，减肾气不旺。用牛李膏为治，则病得从顺也。董汲云：汲小年自病此几殆，父母已不忍睨，服此牛李膏得安然。此方得于世甚久，惟收得不知早晚，故无效。今以收得，并叙载之。

百祥圆一名南阳圆

上以红芽大戟，不拘多少阴干，浆煮软去骨，日中曝干。复纳汁中煮汁尽，焙干为末，水和圆粟米大，每服一二十圆，研赤脂麻汤送下。无时，吐利是效。

牛李膏又名必胜膏。

上以牛李子不拘多少，须子九月后取之。乃野生道边，至秋结实，黑子成穗。九月后乃得成熟者，气全故也。烂研，绢滤取汁，子石银器中熬成膏。可圆时称，每膏二两，入研细麝香末半钱和匀。圆桐子大，每二岁儿一圆。或圆作皂子大，量大小分减用，以浆水煎杏胶汤化下，凡疮疹黑紫倒靨者，不过再服，当取下恶血，或如鱼子恶物，其疮黑陷于皮下者，即红大而出。

《保生方》论小儿疮疹，误服凉药太过。身冷疮陷，不红活，脉沉细者。急投金液丹，麻子大一二百粒，或有可生之意，至儿困极，则无及矣。方在和剂集中。

调肝散　治疮疹平调肝经，使毒气通流，疮不入眼。

牛犀角锉屑，一分　草龙胆去芦，半分　黄芪半两，炙，锉　甘草一分，炒　大黄一分，炒过　桑白皮一分，炙，锉　钩藤钩子一分　麻黄一分，去根、节　石膏半两，研　栝蒌实半两，去皮

上为散，每服二钱，水一盏，煎至五分，去滓温服。无时。

兔肝圆　治疮疹入眼，初觉眼肿痛，便时时看之，若睛上无疮，即无害。若有时，须先服清凉饮子，每日食后一服。取微利以去其毒，然后服此二药并下方。虽有赤白障膜遮交其睛，但瞳子不破陷者，皆可治。

黄柏一两，去皮　苍术半两，米泔水浸一日　石决明一两生

上为细末，煮兔肝烂捣，和圆绿豆大，每服三十圆，米泔水送下，食后临卧时服。

龙蛤散　与前药服。

龙胆草去芦　蛤粉等分

上为细末，每服二钱，猪肝半两，薄批掺药在中，以线缠定。用米泔子银石沙铫内炭火慢慢煮，至肝熟为度。食后少顷食之，以汁送下。日三，须先清凉饮子利动，方服此二药必效。

煎柿散又名通圣散　治疮疹入眼。

谷精草去根　白菊花无即用甘菊　绿豆皮各一分

上为细末，每服一钱，用柿子一个，粟米泔一盏，同煎至水尽，取柿子吃之。日三，一月验。一云：浅者五七日效，重者半月日效。

仙灵脾散　治疮疹入眼。

仙灵脾　威灵仙去芦，等分

上为细末，每服半钱，米汤调下，食后。

珍珠散　治疮疹入眼，翳膜赤痛羞明。

栝楼根一两　蛇蜕皮全者，炙焦，一钱

上为末，用羊子肝一叶，批开去筋膜，掺药末二钱，麻缕缠定，米泔煮熟，任意食之。乳下儿未能食者，以肝研烂，和圆黄米大，生米泔下十圆，乳头喂亦可。日三，令乳母兼食之佳。

浮萍散　治疮疹入眼，痛楚不忍，恐伤其目。

上以浮萍草阴干为末，每服一二钱，用羊子肝半片，入盆子内，以竹杖子刺碎烂，投水半合，绞取肝汁，调药服之。食后，不甚者，一服便差，若目已伤者，十服差。

蛇蜕散　治疮疹入眼，翳膜侵睛成珠子。

马勃一两　皂荚子十四个　蛇蜕皮全者一条

上入一小罐子内，泥封烧，不得出烟。烧存性，研为末，温水调下，食后。

仙术散　治疮疹入眼，生瘴膜丁子。先用朱砂、水银粉各一钱，粉霜三钱，一处拌匀。入一小砂锅子内盛讫，新盏一只盖口，黄土泥缝，炭火烧赤。少时取出，放冷收之。左眼有病，即取药一豆大，绵裹塞左耳中，右眼有病，塞右耳中。然后服此仙术散。

紫苏一两　苍术米泔浸一宿，焙，二两　谷精草去根，一两　青蛤粉一两

上为末，每用猪肝一片批开，掺药三钱在内，麻缕缠定。米泔熟煮，先于气上熏眼，然后食之。

煮肝散　治疮疹入眼，诸药不效。

青葙子　草决明　车前子　密蒙花各等分

上为细末，用羊子肝，竹刀薄批开，掺药二钱在内，荷叶裹，麻缕缚定。石器内煮熟，任意吃。

如圣汤　治疮疹毒攻咽喉肿痛。

桔梗去芦，一两　甘草一两，生　牛蒡子一两炒　麦门冬去心，一两

上为末，每服二钱，沸汤点。细细呷，入竹叶煎之，更妙，食后。

治斑疮入眼

夜明砂半两　木香半两　淡竹叶半两

上为细末，每服半钱或一钱，井水调下，食后。

紫雪　治疮疹毒攻咽喉肿痛，水浆下难。方载于和剂集中。

通关散　治疮疹心经有热，烦躁发渴，口舌生疮，及大小便不通。

大黄　瞿麦　木通　山栀子仁　滑石　甘草各半两　地扁竹一两　车前子半两

上为末，每服一钱，水半盏，入紫草少许，同煎三两沸，放冷温服，乳前食。

甘露饮　治疮疹已发，热毒上冲，牙龈宣肿，不能嚼物，并乳母可俱服之。

生干地黄切焙　熟干地黄切焙　天门冬去心　麦门冬去心　枇杷叶去毛　黄芩去心　石斛去根　甘草炙　枳实麸炒，去穰　山茵陈叶去土，各一两

上为末，每服二钱，水一盏，煎至七分，去滓温服。无时。

青黛　治疮疹热盛，心神烦躁。

上以青黛细研，每半钱，温磨刀水调下。日三。

败毒散　治如前。

白芍药　甘草炙　雄黄醋煮，水飞，各一分

上为末，每服一字或半钱，蜜水调下。无时。

牛黄散　治疮疹毒气入胃，便血日夜无度，腹痛啼哭。

郁金一两　牛黄一钱

上研匀细，每二岁儿半钱，浆水半盏，煎至三分，和滓温服。日二。

升麻汤　治疮疹已愈，余毒未解，疮痂虽落，瘢色黯惨，或凹凸肉起，宜用此灭瘢消毒。

上以川升麻不限多少，细锉，水一大盏，煎至七分，取汁，以绵蘸，洗拭疮瘢。

青金散　治疮疹愈而瘢不消。

白蒺藜半两　山栀子半两　青黛半两，研　腻粉一钱，研

上拌匀，每用少许生麻油调涂瘢上。

又方　治疮疹瘢子。

上以密陀僧细研为末，水调夜涂，明旦洗之。

又方　以真玉时时磨疮疹瘢子，久则平滑。

清凉饮子　治疮疹后解去余毒。

大黄湿纸裹，煨　当归　赤芍药　甘草炙各等分

上咬咀，每服一钱，水一大盏，入薄荷两叶，同煎至半盏，去滓温服，食后。

更看虚实，以意分减。

神朱散　治疮疹后解去余毒。

赤小豆二钱，炒　槐花二钱，炒　麝少许

上为细末，每服半钱或一字，温酒调下，临卧只一服，微利之。

小儿卫生总微论方　卷九

吐泻论上 哕呃附

小儿吐泻者，皆由脾胃虚弱，乳哺不调，风寒暑湿，邪干于正之所致也。其证不一，今条叙之。

吐 哕呃附

吐逆自生下便吐者，此是儿初生之时，拭掠口中秽血不尽，因咽入喉故也。

吐逆胸膈满闷气急者，此因儿啼哭未定，气息未匀，乳母忽遽以乳饲之。儿气尚逆，乳不得下，停滞于胸膈之间，因更饮乳。前后相杳，气不宣通，故气逆而乳随出之为吐也。宜调其气而止吐，古书亦曰，大哭之后食乳者，多成吐泻也。

吐逆腹胀喘息，乳不化，夹青水，面青唇白者，此因乳母冒寒取凉，食冷饮寒，致冷气入乳。变坏其汁，而不捻去，仍以饲儿。或能食者，因以冷物饲之，其冷乳冷食入腹，与气相搏，伤于脾胃，则气逆而吐也，其证若此。宜温胃止吐调气。若伤重有停滞者，以稳药磨化，不可快下，恐脾胃愈虚而生风也。凡风冷变坏之乳，常捻去之，暂断乳儿。令乳母服药温腹，然后饲儿。若不捻去，非只令儿吐逆，肠胃虚者，冷因得入，亦下利也。

吐逆身热，吐奶成片子者，胃有热也。此因乳母冒热，或因饮酒，热入其乳，变坏其汁，而不捻出，仍以饲儿。或儿乘热哺啜，致热气入胃，与气相搏，致气逆而吐也。其证若此。如久有积热者，必四肢生疮，多渴而面黄，宜微下之。虚者以稳药磨化，后调其气。

吐逆身热，鼻青呵欠顿闷，口中气热，夜间发躁者，此伤风吐也。因解脱失宜，风冷袭之。搏于血气，故身热呵欠顿闷，口中气热也，气不得顺，故逆而作吐也。宜调气止吐，发散风冷。

吐逆唇黑，面黄多啼，有痰吐气臭者，此脾胃有伤也。宜先下之，后调其气。

吐逆早晚发热，睡卧不安者，此惊吐也。心热则生惊，故睡卧不安。而神不宁也。心神不宁，则气血逆乱而吐也，宜与镇惊去热止吐。

吐逆面觥白无精光，口中气冷，口频撮，不思乳食，吐水者，胃气不和也，宜补脾胃。

吐逆痰涎色黄，稠粘上壅者，胃热也。若吐痰涎白渌，或吐沫者，胃虚冷也。热者宜微利之，冷者宜温补之。

吐逆痰涎及有血者，此肺热也，久则肺虚成瘘。昔钱乙治段斋郎子四岁，身热吐痰，嗽数日而咯血，他医以桔梗汤、防己圆治之不愈，涎上攻，吐喘不止，遂请乙治。乙下褊银圆大一服，复以补肺汤、补脾散为治。乙曰：此子咯血肺虚也，肺虽咯血，有热故也，久则虚瘘。今涎上潮而吐，当下其涎。若不吐涎，则不甚便。盖吐涎能虚，又生惊也，痰实上攻。亦能发搐，依法只宜先下痰而后补脾肺。必涎止而吐愈，为顺治也。若先补肺为逆耳。乙所用药方，本集载之，此所谓识病之轻重先后为治也。

哕呃者，比吐逆异也。吐者乃邪搏胃气，逆面上行，谷不能传化，随气出也，哕者但气逆而欲吐，吐则谷无所出，故俗谓干呕也。呃者乃儿因吮乳汁过多，胃满而上溢出也，故俗呼谓之噫乳。当便与空乳令吮，即定。若频久吮之，亦能为病。

泻　论

泻色白者，冷泻也。此由小儿肠胃虚弱，因解脱风冷干之，或因食寒饮冷，入于肠胃，冷气相搏，为利下也。其色白面白，或腹痛者，并宜调中。若又伤风冷，前后重沓，冷甚则泻不止，而为泄注也。

泻色赤者，热泻也。此由小儿肠胃本挟虚热，而风冷乘之，入于肠胃之间，热气相搏，而为利下，故其色赤也。宜微下之，以导其热，后调其气。

泻色乍赤乍白，或水或谷者，此冷热泻也。由小儿肠胃先因有冷，而复伤热，或先有其热，而复伤冷，肠胃宿虚，冷热交攻，而为利下，宜调其冷热，和养其气。

泻色黄赤红黑者，皆热也。赤黑者有毒。并微下之，然后调气。

泻色青，发热有时，睡卧不安者，此惊泻也。小儿粪黄，脾胃土之本色也。色青者，肝木为风，肝木夹刑脾土，宜早治之。不尔，则变脾风，而发瘈疭，则难治也。所谓粪青者，须才便下，便色青是也。若初下时黄，良久乃青者非也。小儿安者皆然，不可认为青粪也。若泻色青白，谷不化者，此谓冷也。宜温补脾胃，发散风冷。

泻酿下色赤白，腹大，上青筋儿，发稀饶啼，或吃泥土，时有蛔虫，此疳泻也。宜止泻退疳。治方具于疳门之下。

泻多日，唇口及粪色皆白，粪颇多者，久因成冷，脾胃衰困，恐变脾风发痫，宜以药防备而温养，补助脾胃。

泻于暑热时多患者，谓时热及饮食皆冷故也。不伤于热，必伤于冷。若伤热伏暑而泻者，则心藏烦热，必小便不利，清浊不分，泻色赤黄，宜利小便，解暑热。若小便快而泻者，冷泻也。色必青白，谷不化，宜温脾胃止泻。

泻者不可急以热药止之，多变为痢而泻脓血也。当审察冷热证候，详度缓急施治之。

吐　泻

吐泻多病于春夏秋三时，惟冬时绝少者，盖吐泻皆因脾胃虚冷热所致。以冬时阳气在内，多食温暖，少饮水浆故也。设有患者，必因伤于乳食也。若春时病吐泻者，多因于风。夏时病者多因于热。秋时病者多因于冷。凡治吐泻者，必当参其时候，观其形证，察其温良寒热，如此则无误矣。

伤风吐泻

伤风吐泻，身温，乍凉乍热，呵欠顿闷多睡，口中气粗而热，大便黄白色，呕吐乳食不消，时咳嗽，宜散风补脾。如先已曾经下，或无下证，慎不可下也。此由脾肺受寒，不能入脾也。更有五藏兼见之证。发散者，化大青膏服之。补脾者，后服益黄散，此钱乙所用药也。方在本集。

伤风吐泻，身热多睡，能乳，呵欠顿闷，口中气热，饮水不止，吐痰，大便黄水，此为胃虚，热渴吐泻也，当生胃中津液，以止其渴。钱乙用白术煎汤服之，然后发散风冷，亦用大青膏。又云，吐泻昏睡露睛者，胃虚热也；吐泻昏睡不露睛者，胃实热也。

伤风吐泻，身凉吐沫，泻青白色，呵欠闷乱，不渴，哽气长出，昏睡露睛，此伤风荏苒轻怯，因成吐泻，当先补脾。钱乙先用益黄散，后发散其风，用大青膏。此二病于春冬多也。

伤食吐泻

吐泻乳食不化，其吐及粪，皆有酸臭气者，此伤食吐泻也。凡吐乳泻黄赤者，伤热乳食也。若吐乳泻青白者，伤冷乳食也。并宜微下之，后和胃气，虚者以缓化滞药渐磨化之。

吐泻在初生三日内，壮热不乳，大便乳不消化，或白色者，是伤乳，当微与下。后和胃气，虚者以缓化滞药渐磨化之。

吐泻在初生三日以上至十日，身温凉，不思乳，大便青白，乳不消化，此上实下虚也。更有五藏兼见证，泻其所实者，而补其脾胃虚者也。

吐泻有兼藏证者，兼肺则睡露睛喘气，兼心则惊悸饮水，兼脾则困倦饶睡，吐泻乃脾胃之本病。兼肝则呵欠顿闷，兼肾则不语畏明。

昔钱乙治冯承务子五岁，吐泻壮热，不思食。乙见儿目中黑睛少，白睛多，面色㿠白。乙曰：此子必多病，面色㿠白者，神怯也。黑睛少者，肾虚也，本怯而虚，故多病也。纵长成，必肌肤不壮，不耐寒暑，易虚易实，脾胃亦怯，更不可纵于酒欲，若不保养，不过壮年也。面上常无精神光泽，如妇人之失血也。今吐泻不食，壮热者，微有伤食也。又虚怯则不可下，下之虚。入肺则嗽，入心则惊，入脾则困倦，入肾则加虚，但当以药磨化之，为微有食伤也。若重伤则须下之，不下则成癖也。若实食在内，乃可下也，下毕补脾必愈。随其虚实，无不效者。乙所用药，其方在本集载之。

冷热吐泻

吐泻在五月中已后，身壮热者，此热也。小儿藏府中十分中九分热，此因伤热乳，或胃热入内，吐乳不消，泻深赤色，宜与解热，钱乙用玉露散。

吐泻在六月中已后，身大温而似热，藏府中六分热四分冷也。呕吐乳食不消，泻色黄多白少似褐，或食乳，或不食乳，宜少补脾，而大解热，钱乙少用益黄散，多用玉露散。更宜审察冷热，如儿大热，泻色赤黄者，此热多。依五月中后治之。昔钱乙治广亲北宅四大王宫五太尉，六月中吐泻，米谷不化。众医用温药，一日而加喘吐不定。乙曰：当用凉药治之，谓伤热在内也。众医皆言吐泻多而米谷不化，当补脾胃，何得用凉药。王信众医，又用补脾温药。乙曰：不可服。此三日外必腹满身热，饮水吐逆，三日外一如所言，谓六月热甚，伏入腹中，而令引饮，热伤脾胃，即大吐泻。他医又行温药，即上焦亦热，故喘而引饮，三日当死。众医不能治，复召乙，乙见有热证，以白虎汤三服，更以白饼子下之。一日减药二分。二三日又与白虎汤二服，四日用石膏汤，及旋覆麦门冬、黄芩、脑子、牛黄、天竺黄、茯苓，以朱砂为衣，竹叶汤下五圆，热退而愈。乙所用方，本集载之。

吐泻在七月中已后，身温，藏府中三分热，七分冷也。不能食乳多，似睡，闷乱，哽气长出，昏睡露睛，唇白，多哕而不渴。钱乙于食前令多服补脾益黄散。于食后少服解热玉露散，更宜相度冷热。若身大温，泻后黄者，依六月中已后为治也。昔钱乙治广亲七大尉七岁吐泻，是时七月，其证全不食而昏睡，睡觉而闷乱，哽气于呕，大便或有或无不渴，众医疑睡，作惊治之不愈。乙曰：当先补脾而后退热，与四君子圆补脾，石膏汤退热。次日以水银、硫黄二物末之，生姜水调下一字。乙曰：凡吐泻，五月内九分下而一分补，八月内十分补而无一分下，此者是脾虚泻，医妄治之。至子虚损，下之即死，故只当补脾。若以四君子圆恐缓。已又留温胃益脾药止之。有一李医问曰：何食而哕？乙曰：脾虚不能食，津液少即哕逆。又曰：何泻青褐水？乙曰：肠胃至虚，冷极故也。乙治而愈。其方本集载之。

吐泻在八月中已后，身冷，无阳也。不能食乳，干哕泻青褐水，钱乙只用益黄散补脾，不可下。

吐泻所论冷热月时，此钱乙以中原之地言也。今较之江浙，则气候不同。今江浙之地，二三月尚寒，四五月温暖，六月入伏之后才热，七月热盛，八月热尚未退。虽冬月晴多便暖，虽夏月阴多便寒，不可概以中原冷热时候，便为定论。经所谓东西南北之异地，温凉寒热之异宜，况每岁寒热，自随时令早晚，难以拘定月日也。候之者乘其至也，

谓至其热则从热治，至其温则从温治，至其寒则从寒治，至其凉则从凉治，此乃随四时之气，各适其宜。

霍乱吐泻

吐泻于夏秋大热之时，伏暑伤冷，则心藏烦躁，小便不利，清浊不分，阴阳二气相干，名曰气乱。乱于肠胃之间，名曰霍乱。其证乘热伤冷，气逆而喘，腹胁胀满，身热脉乱，头痛体疼，如伤寒之状，上即大吐，下即大泻，重则四肢厥冷，脚胫转筋。法当调顺其气，分别清浊，升降阴阳。若只伏暑吐泻者，则小便不利，其证虽与上证稍同而轻，非霍乱比，泻色赤黄，此但只名伏暑吐泻，不为霍乱也。治霍乱吐泻，若热多而渴者，五苓散。寒多不渴，而心腹身体疼痛，及烦躁渴不能饮者，可服理中汤。寒甚腹痛转筋，四支拘急者，理中汤加附子。汗出恶寒，手足厥冷，下利清谷，内寒外热，脉微欲绝者，并四逆汤。以上诸证，并可与香薷散服之。以他药不能疗此证也。治伏暑吐泻，若小便不利，与五苓散利小便。及与香薷散解伏暑，坯莲散救生丹止吐。

吐泻不拘何时，则令脾胃虚弱，多致生风，而为脾风慢惊也。以脾土衰而肝木来刑故尔，当先补脾胃，不令困弱，则风不生，而病易愈也。

吐泻已定未定烦渴者，皆津液内耗也，不问新久，宜煎钱乙白术散，使满意取足饮之，多即愈好。不尔即津液内耗，而引饮不止，内生其热，外邪相干，则证变百端，以成他病，渐至危困也。

小儿卫生总微论方　卷十

吐泻方下

治　吐　方

木瓜圆　治自生下便有吐症。此因初生时，拭掠口中秽液不尽所致。

干木瓜末　麝香　腻粉　木香末　槟榔末各一字

上研匀，面糊和丸，粟米大每服一二丸，甘草水下，无时服。

塌气丸　治啼哭未定，便令食乳，气逆停滞，心胸满闷，气急吐逆。

巴豆三个，去皮，分为十片　胡椒十个　丁香十个　青橘十个，汤浸一宿，不去穰，每个入巴豆一片、胡椒一个、丁香一个，以麻缕缠之，余并同

上用醋米醋一碗，煮药至醋尽为度。取出细切焙干，同研为末，粟米糊和丸粟米大，每一二岁儿三二丸，三四岁儿四五丸，饮下，日三服。此药利胸膈。然后复进观音散一二服补气。食前。

和胃膏　治啼哭饮乳，气逆噎塞，及胃虚气不升降，胸膈痞满，吐逆不时。

人参去芦　藿香叶去土　水银　枇杷叶先炙、去毛，生姜汁涂，炙令香熟　白茯苓各一两　甘草炙，皆各半两　肉豆蔻面裹，煨熟　硫黄研细，入铁铫同水银一处拌匀，于火上炒，不住手研，如泥放冷，各半两

上同为末，次将硫黄、水银炒匀入之，再研匀细，炼蜜和膏。每一岁儿桐子许，生姜枣汤化下，量大小加减。亦治人番胃。服一皂子许。

白附子丸　治伤风冷吐逆，及治粪青下泻。

白附子一分，末　蝎梢一分，研　舶上硫黄半两，研细

上先将半夏半两，汤洗净，生为末，生姜自然汁和剂，捻作饼子，小钱大，沸汤内煮至熟，取出研成膏，入三味药末和之，如干，添少汤，丸萝卜子大。每服二三十丸，米汤或乳汁送下。无时。

羌活膏　治伤风吐逆，亦能截痫定泻。

羌活去芦　独活去芦　人参去芦　白茯苓　防风去芦并叉枝　肉桂去粗皮不见火　全蝎炒，各一分　硫黄三钱　水银一钱，与硫黄同研，青色至不见水银星子为度

上同为细末，炼蜜和膏，每用量大小，旋挦，婴孩大豆许，三二岁鸡豆大，五七岁儿龙眼大，并薄荷水化下。

托养丸　治伤食吐逆，心胸满闷，阴阳痞，手足厥冷，烦热躁闷。

硫黄　水银各半两，同研细不见星　附子半两，炮，去皮、脐　木香半两　当归去芦，洗净，半两，切，焙　大黄　两，湿纸裹，煨熟

上为细末，炼蜜和丸樱桃大。每服一粒，生姜汤化下。无时。

朱砂丸　治惊吐不止。

朱砂　乳香各一钱　半夏二十一个，洗净七次，姜汁浸一宿，切焙

上同为细末，姜汁湖丸黄米大。每服五七丸，乳香汤下，无时。

紫霜丸　治如前。

朱砂半钱　杏仁三十个，去皮、尖，炒黄

上同研细糊丸麻子大。每服五七丸，桃心汤下，乳食前。

三香丹　治挟惊吐逆不止。

藿香叶去土　丁香各半两　麝香当门子，半钱，研　腻粉半分，研　半夏一钱，汤浸七次，焙干

龙脑半钱，研

上为末拌匀，生姜自然汁糊和丸黍米大。每服十粒，人参、薄荷汤送下。无时。

四季散　治惊吐及番胃，诸药不效者，服之立验。以好硫黄半两，研细，入水银一分，同再研至无星，如墨煤色，再用一钱或半钱，以生姜自然汁同酒各半同煎，用少许调药，空心服之。服毕覆卧，当自汗出乃愈。

藿香散　治脾胃不和，气虚吐逆不食，渐成羸瘦。

丁香　沉香　木香　白术　藿香叶去土　制厚朴各半两　白茯苓　白豆蔻各一分

上为细末，入麝香少许拌匀，以水半升，蜜四两，大枣十五个，生姜十五片，于银器内慢火熬成膏，去姜、枣不用，以膏和药丸如皂子大，于当风处窖干。每服一丸，米饮化下。量儿大小加减，乳食前。

人参白术散　治胃气不和吐逆，不思乳食，亦治霍乱吐逆。

厚朴去粗皮，生姜制，二两　人参去芦　白术　半夏汤洗七次　陈皮去白，各一两

上为细末，每服一钱，水一小盏，生姜二片，煎至六分，去滓温服。

人参藿香散　治脾胃不和，吐逆不定。

人参去芦，一两，涂姜汁微炙　藿香叶去土，半两　白术锉，炒　丁香　良姜　枇杷叶去毛，姜汁涂，炙令香熟　甘草各一分，炙

上为细末，每服一钱，水一小盏，入木瓜一片，煎至五分，温服无时，去滓通口服。

藿香散　治脾胃气不和吐逆，心腹胀满。

藿香叶去土　半夏曲　甘草炙，各一两　陈皮去白　厚朴去皮，生姜制，各二两　人参去芦　白术各半两

上为细末，每服半钱或一钱，水一小盏，生姜三片，煎至六分，去滓温服。无时。

万安丹　治胃虚伤冷吐逆。

半夏一分，汤洗七次，焙干　白术一分　附子一个，炮制，去皮、脐　硫黄一分，研　朱砂半两，研，飞

上三味，先为末，入研药拌匀，生姜汁和丸黍米大，每服十粒，米饮下，乳食前。

圣石散　治如前。经验。

礞石四两，炭火烧一伏时　不灰石二两，炭火烧一伏时　母丁香一两　木香一两　人参去芦一两　白茯苓一两　半夏半两，汤洗七次，焙干　真阳起石半两，先同上为末　阿魏汤化去砂石，以面和成饼，焙干，一钱　巴豆　杏仁各十四个，并连皮灯上烧，作炭，略存性

上同匀细，汤泡蒸饼和丸荔枝子大。每服一粒，水一盏，入姜皂子大，擘破同煎至五分放温。时时服之。煎药须用银石器。

厚朴散　治胃冷气逆，吐不思食。

白茯苓一两半　肉豆蔻面裹煨，半两　厚朴去皮，生姜炙制，一两　枇杷叶炙，去毛尽

上为细末，每服一钱，水一小盏，生姜二片，煎至六分，去滓空心温服。无时。

人参膏　治脾胃虚冷，乳食不化，吐逆连并，不喜乳食。

人参去芦　滑石　藿香叶去土，半两　丁香一分　甘草二钱，炙　朱砂一钱半，研，水飞

上为末，炼蜜和膏，每用皂子大，米饮化下，无时。

楠皮汤　治胃冷吐逆，正气。

上以楠木皮煎汤汁服之。

温脾散　治寒湿吐逆。

厚朴去皮，涂姜汁炙，令香熟一两　丁香　白术　干姜各半两，焙　肉桂一分

上为细末，每服一钱，煎人参汤调下，无时。

香参汤　治寒痰吐逆。

丁香　藿香叶去土　丁皮　人参去芦　白茯苓各一两　青皮去穰　木香　甘草炙，各半两

上为末，每服一钱，水一小盏，生姜二片，煎至五分，去滓温服，无时。

三黄散　治伤热吐逆。

五灵脂　大黄　雄黄各等分，研，水飞

上为细末，每服一字，磨刀水调下，无

时，治热吐尤佳。

槐花散　治热吐不止。

皂角去皮，烧烟尽　白矾枯　槐花炒　甘草炙，各等分

上为细末，每服一钱，白汤调服。无时。

丁香益胃汤　治胃虚挟热，吐逆不止。

丁香　人参去芦各一两　桂去皮　大黄炮，黑黄色　诃黎勒皮一分

上为细末，每服一钱，水一小盏，生姜二片，煎至五分，去滓温服，无时。

人参桂姜汤　治热气不调吐逆，腹满胀痛。

人参去芦，三分　桂去皮　良姜各一两　甘草半两，炙

上为细末，每服一钱，水一小盏，生姜三片，煎至六分，温服，无时。

白术汤　治吐逆热烦而渴，津液燥少。

白术　干葛根　人参去芦，各一两　水香藿香叶去土　白茯苓　甘草炙，各半两

上为细末，每服一钱，水一小盏，生姜三片，煎至六分，去滓温服，或用生沸汤调下。无时。

香朴散　治冷热吐逆，调顺其气。

厚朴去皮，姜制，一两　人参去芦，一两　丁香半两　麦门冬去心，半两

上为细末，每服一钱，水一小盏，入生姜二片，枣一个，同煎至五分，去滓温服。无时。

坯莲丸　治一切冷热，吐逆不止。

半夏一两，汤浸洗七次，捶碎　胡椒一分，二味同炒紫黑色　丁香四十九个　莲子心一百个

上为末，姜糊和丸菜子大。每服三二十丸，煎坯子石莲汤送下。无时。

清膈饮子　治伏暑吐逆。

淡竹叶一两，去枝梗，只取叶，焙干　香薷一两　檀香半两　人参去芦，半两　半夏半两，汤洗七次，焙干　白茯苓半两　甘草半两　白粳米一合

上为粗末，每服一钱，水一小盏，煎至六分，去滓温服，时时加熟水服。

灯苍圆　治伏暑吐逆，头目痛，四支冷，烦躁不解。

半夏二两，姜制　硫黄一两　白善土一两

上为末，滴水和丸大豆大，每用一二丸，以针穿于灯上燎过，吐逆者盐艾汤下，烦躁者生姜汤下，四肢冷者热酒下，头痛者腊茶下，儿小者服一丸。

双金圆　治霍乱吐逆不止，又治番胃及沉积，赤白恶痢。

五灵脂去砂石，二两半，研　拣丁香一钱，为末　巴豆半两，去壳并心皮，细研，入上二味和匀

上以枣肉和丸黄米大。每用量大小虚实加减，二岁上五七丸，三岁上十丸，煎丁香藿香汤放冷送下。服药毕，须候两时辰，不得与乳食，候大便一两次，服补药四圣圆。如吐后躁热，心间烦闷，服四顺饮子。此三药乃一宗也。儿本壮，食伤积滞者，宜服。虚者更宜斟酌。

四圣圆

白豆蔻　肉豆蔻面裹，煨　草豆蔻去皮　干姜炮　良姜　藿香叶去土　丁香枝杖各等分

上为末，醋糊和圆绿豆大。每服三十圆，煎人参或白术汤下。如止泻，米饮下，无时。

四顺饮子

地骨皮去骨尽　防风去芦并叉枝　山栀子仁　连翘各等分

上为末，每服一二钱，水一盏，生姜三片，煎至五分，去滓临卧温服。如大便秘涩，煎灯心、竹叶汤放冷服。亦治诸热，心胸烦躁懊闷。

乳吮散　治婴儿吐乳不定。

枇杷叶一分，去毛，炙焦黄色　母丁香一分

上为末，每服少许或半字一字，涂乳上吮儿，便止。

马通汁　治婴儿吐乳黄色。

上以新马粪一块绞汁，量大小分减灌之。

葛根粉　治小儿吐逆壮热，不下食。

上以葛根粉二大钱，水二合调匀，泻入沙罗中，侧转令遍，如荡粉皮法，重汤内煮

令熟，以糜饮相和食之，亦治痢。

白鱼灰散　治百日内儿涎壅吐乳。

上以书中白鱼七枚，烧灰研细，乳汁调服一字与服，或傅在乳上吮之。

丁香散　治胃虚气逆，呕吐不定，霍乱不安，精神困弱。

丁香一分　人参半两　藿香叶去土，一分

上为末，每服一钱，水半盏，煎三五沸，入乳汁三五滴。更煎一两沸，带热服，无时。频频服效。

圣白圆　治小儿吐逆。

半夏半两，汤洗十次，竹刀切，作片子，焙令干　丁香半两

上于木臼中同杵为末，生姜自然汁和丸麻子大。每服十丸十五圆，温汤送下。无时。

白术散　治小儿吐逆，或加喘促。

白术二两　干山药　白茯苓各一两　人参去芦　木香　白扁豆炮　藿香去土，各半两　甘草一分，炙

上为末，每服一钱，紫苏汤下。喘者陈皮汤下，无时。

附子散　治小儿虚风呵欠，吐逆涎盛。

白附子炮　南星炮，各半两　黑附子炮，去皮脐，一分

上为末，每服一钱，水一小盏，生姜二片同煎，仍不住手搅，煎至半小盏，分三服，量大小与，甚效。

滑石散　治胃热吐奶食。

白滑石　白善土好者，等分

上为末研匀，每服半钱，葱白煎米饮调下。

坯莲散　治一切吐逆及烦渴。

枇杷叶大者五片，洗刷去毛尽，涂蜜炙焦黄色　麦门冬去心，一分　紫苏叶四十九叶　丁香一百粒　石莲心一百个　藿香叶去土，半两　甘草一分，炙

上为末，每服半钱，煎坯子、胭脂、石莲汤调下，无时。

白茅散　治吐逆不定。

丁香　花桑叶　人参去芦　藿香叶去土　白茅根锉，各一分

上为散，每服一钱，水一小盏，煎至五分，去滓，量大小分服，无时。

白附散　治小儿吐逆不定，虚风喘急。

白附子　藿香叶去土，等分

上为细末，每服半钱或一钱，米饮调下。无时。

油滴散　治小儿胃气虚冷，痰盛吐逆。

半夏大者十四枚，生　胡椒四十九粒

上为粗末，每服半钱，水一小盏，入生油七滴，煎至五分，去滓服，无时。

二白锉散　治小儿膈上痰壅，吐逆不食，渐生惊候，胸中满塞，咽嗌不利。

大天南星一个，炮裂，出火毒　大半夏四个汤洗七次，去滑

上并锉作块子，以水一大盏半，入生姜七片，慢火煎至一呷服之，入冬瓜子同煎更妙。

五香半夏圆　治小儿膈满，气不升降，吐逆痰壅，或作咳嗽。

沉香　麝香　丁香　木香各一分　藿香去土，半两，用叶　半夏汤洗七次，姜汁拌，炒黄，二两　肉豆蔻面裹，煨去净油　人参去芦　陈皮去白，各一分

上为细末，姜汁糊丸黄米大，每服三十丸生姜汤下，乳后。

定吐香银圆　治小儿脾胃气弱，挟于风寒，呕哕。亦治便青泄利。

丁香　干葛各一两　半夏汤洗七次，切焙　水银后入，各半两

上三味先为末，入水银研匀，生姜汁和圆麻子大，每服三五圆至十数圆，量儿大小与服，藿香汤下，无时。

龙虎救生丹　治一切吐逆，不下食。

水银半两　硫黄一两，二味同研细至无星为度　丁香半两　半夏曲一两　人参去芦，一分　天南星半两，炮　白附子一分，炮裂

上为末，生姜汁煮糊和丸萝卜子大。每

服一二十丸，煎藿香汤下。伏热吐者，煎莲子心汤下。量大小服。又治妊妇阻病。立效。

枇杷叶汤　治一切吐逆烦渴。

枇杷叶一两，拭去毛尽，炙微黄　丁香半两　人参去芦，半两　甘草炙　白茯苓各半两

上为细末，每服半钱，煎紫苏汤下。无时。

定命丹　治一切吐逆不止。

巴豆十个，去油　丁香一两，炒黑色

上为细末，以煮酒蜡就剂，旋圆如绿豆大。每服三五丸，米饮汤下。腹胀，皂儿汤下。夜啼，朱砂汤下。儿本壮实者，有积食宜服。

五倍子散　治吐逆不定。

上以五倍子二个，一生一熟，甘草一寸，用湿纸裹煨，同为细末。每服半钱，米泔调下，立差。

壁钱汤　治如前。

上以壁钱窠煎汤饮之。一方用二七个，其虫似蜘蛛，作白幕如钱于壁上。土人呼为壁玺。

麻仁汁　治如前。　此李谦议方，尝用极妙。

上以麻子仁二两杵烂，熬以水，研取汁，入盐少许，服之立效。

丁香散　治如前。

丁香　藿香去土　代赭石火煅醋淬，不计遍数，以易碎为度　甘草炙，各一分

上为末，每服半分，煎薄荷汤下。如吐泻，更与木香白术散同服。方具于治泻门中。

生姜汤　治吐逆，百药不差。

以生姜一两，细锉米豆大，将七合，于银器中煎取四合，空腹旋呷。大者和滓服。

羊粪酒　治无故吐逆酸水不止，或三五日，食后如此。

上以羊粪十颗，好酒二合，煎取一合顿服，未愈再服。更量大小加减。

附哕呃

羊乳　治哕呃，干呕烦热。

上以羊乳一升，煎至减半，分五服。无羊乳，只牛乳亦得。小者减之。一方与生姜汁合煎，牛乳二合，姜汁一合，银器中慢火煎五七沸，一岁儿服半合。

鹿角粉　治如前。

上以鹿角粉大豆末等分相和，乳汁涂上，令儿吮服之。

枇杷叶汁　治如前。

上以枇杷叶拭去毛净，煮汁饮之，亦治咳嗽。

玉真散

白术半两　半夏七个，汤洗七次，为末，生姜汁制　胡椒半钱

上为末，每用半字，以水一呷调下，大者一字。

消乳丸　治饮乳过多，呪吐奶瓣不消。好令常服。

丁香　木香　青皮去瓤，炒黄　肉豆蔻面裹，煨　牵牛子炒黄，各半两

上为末，滴水丸针头大，每服三五丸，乳上沾吮服。

蟛蜞饮　治呪乳不止。

上取田中曲蟛蜞一两研末，空心米饮调下半钱匕，一二服立效，儿小减服。

芦虫汤　治饮乳呪吐不入腹。

上取芦中虫二枚，煮汁饮之。须破芦取，虫似小蚕。

治泻方

粟煎汤　治肠胃受风寒，下泻不止，身体壮热。

白术　当归去芦，烧焙　川芎　人参去芦　肉桂去粗皮　芍药各一两

上为末，每服一钱，水一盏，入姜三片，粟米半匙，煎至米熟，去滓温服。

惺惺散　治伤风挟惊，下泻日久，脾困不食，及恐作脾风发痫。

天麻半钱　全蝎半钱，炒　糯米一钱，微炒　甘草一钱，炙　木香一钱，炮　白扁豆一钱，炒　山药一钱，焙　茯苓一钱，微炒　人参人参，微炒

上为末，婴孩一字，二三岁上儿半钱，水半银盏以下，枣半个，煎三五沸温服。

白附子圆、羌活膏　皆治伤风或惊，泄泻不止。方已具于吐门之下。

人参生犀散　治风寒惊悸痰嗽，服寻常药即泻。

前胡去芦，八钱　桔梗去芦，半两　人参去芦，三钱　甘草炙黄，二钱　杏仁去皮、尖，五钱，末

上四味为末，后入杏仁拌匀，粗罗罗过，每服二大钱，水一盏，同煎至八分，去渣温服。无时。

诃子汤　治伤冷泻不止。

诃黎勒皮　人参去芦　木香　白茯苓各一两　甘草炙　陈皮汤浸去白，各半两

上为末，每服一钱，水一小盏，入生姜二片，煎至五分，温服，无时。

诃黎豆蔻丹　治如前。

诃黎勒皮　草豆蔻仁各一两　白术　干姜炮　川黄连去须　当归去芦，洗焙，各半两

上为细末，粟米饭和圆黍米大，每服十粒，汤饮下，无时。

肉豆蔻散　治胃寒下泻。

肉豆蔻面裹，煨　白矾枯，各一两

上为末，温米饮调下一钱或半钱，空心服。

益脾散　治脾胃伤冷，泄泻腹痛，全不入食。

陈皮一两，去白　青皮去穰，半两　诃子肉半两　甘草锉炒，半两　丁香二钱　干山药二两

上为细末，每服一大钱，水一小盏，生姜三片，枣一个，煎至六分，去滓温服。

与益儿圆间服甚妙。

川椒圆　治夏月伤湿冷，泄泻不止。

川椒一两，去目，并闭口者不用，拣净，慢火炒香为度　肉豆蔻面裹，煨，半两

上为细末，粳米饭和圆黍米大。每服十粒，米饮下，无时。

柏叶　治泄泻洞下。

上以柏叶煮汁服之，或焙干作末，煎服。

乌姜圆　治脾虚泄泻，不入食。

生姜二两，切棋子大　黄连去须，二两，锉豆大，二味同炒紫黑色　肉豆蔻二十五个，每个入丁香二个，共五十个，在内讫，别用生姜研烂取汁，和面裹，煨熟，和面符之

上同为细末，滴水和圆芥子大，每二十三圆，枣汤下，乳食前。

龙香散　治肠胃虚弱，滑泄无度，腹痛肠鸣，或疳泻不止。

当归去芦净洗　龙骨煅　赤石脂　乌鱼骨　白术　香白芷　人参去芦，各等分

上为细末，每服半钱至一钱，温米饮调下，乳食前。

如圣散　治伤热生风，聚泻不定，或时惊悸，睡卧不宁。

板蓝根肥者二两，麸炒，令黄色　丁香半两　甘草一两，炮　乳石一两半　井泉石一两半

上为细末，每服半钱，米饮调下，并服三服，立效。如惊风薄荷汤调下。

治小儿水谷不调。

上以枳实面炒黄杵末，米饮服半钱匕，二岁下儿一钱匕，量大小加减服。

温脾散　治泻泄食不化。

苍术半两，米泔浸一宿，去黑皮　甘草炙　厚朴去粗皮，生姜制　诃子炮　木香　干姜炮　茯苓　人参去芦　桔梗去芦，各一钱

上为末，每服一字或半钱，米饮调下；食不化者，紫苏、盐汤调下；泻不止者，木瓜汤调下，乳食前。

二和圆　治泻不止。

黄连去须，一两　南木香一两，二物各半生半炒

上为末，醋糊和圆绿豆大，每服三四十丸，米饮下，乳食前。

还肌散　治洞泻聚泻疳泻等肌肤瘦弱，乳食不进。

肉豆蔻一个　诃子三个去核　没石子一个三味各用大麦面裹，慢火煨黄熟，勿令烟出

上为细末，每服半钱，米饮调下，如人行五里久，再一服，须用陈米饮下。神效。

和中散　治痰逆胃虚泄泻。

白术　陈皮去白　厚朴去粗皮，生姜制　甘草炙，各等分

上为细末，每服一大钱，水一小盏，生姜三片，枣一个，同煎至六分温服。一方更有藿香叶减半。

附子散　治胃寒泄泻不止。

上以半两附子一枚，炮裂去皮脐，为细末，每服一钱，水一盏，盐半钱，煎至五分温服。亦治洞泄，乳食前服。

赤石脂丸　治泄泻虚滑无度。

赤石脂　干姜炮，等分

上为末，糊丸麻子大。每服一二十丸，米饮下，空心服。

豆蔻丸治泄泻，米谷不化。

肉豆蔻面裹，煨，一两　木香　青皮去穰，炒黄，半两　黑牵牛一分，微炒

上为细末，滴水和丸黍米大。每服十丸，生姜米饮下，乳食前。

建胃散　治泄泻身热烦渴。

厚朴去粗皮，生姜制，一两　川黄连去须，一两　白术　肉豆蔻面裹煨，一两　缩砂仁半两　干姜半两，炮　木香半两

上为细末，每服一钱，水一小盏，入生姜、粟米各少许，煎至五分，去滓温服。无时。

顺胃丹　治泄泻虫烦腹痛。

白术　良姜　干漆炒烟尽　肉桂各一两　肉豆蔻面裹，煨，半两

上为细末，面糊和丸黍米大，每服十粒，米饮下，乳食前。

聪中丹　治泄泻腹痛多啼。

胡椒　蓬莪茂煨　全蝎一钱　肉豆蔻面裹，煨，半两

上为细末，面糊和丸黍米大。每服十粒，米饮下，乳食前。

茱萸散　治脾胃弱，食不消，泄泻无度。

吴茱萸拣净，半两，用盐二钱水一盏煮之，如此，换水煮十四次，各至水尽，遍数足，晒干，炒令紫黑色　甘草一两半，炙　陈皮去白，二两，炒令香熟

上为细末，每服一钱或半钱，沸汤点服。无时。

乳香豆蔻丸　治泄泻不已，肠中有恶气故尔。

上用肉豆蔻一枚，研分两半，中间剜开，安乳香一皂子大在内相合，以线扎定，和白面裹如胡桃大，煨熟为末，陈米饭和丸绿豆大，每服二十丸，陈米饮下，空心食前。

香矾丹　治泄泻浸久不差。

白矾一两，慢火枯，研成粉　木香一两　诃黎勒皮半两，微炒　酸石榴皮半两，炒黑

上为细末，炼蜜和丸黍米大。每服十粒，粥饮下，乳食前。

二白丸　治泄泻滑数不止。

白石脂　白龙骨煅，等分

上为末，滴水和丸黍米大，每服三五丸，紫苏、木瓜汤下，无时。

温白丸　治久患泄泻，脾虚不进饮食，或食讫仍前泻下，米谷不化。

白术一分半，米泔浸一时，切焙干　半夏一钱半，汤浸洗七次　丁香半钱，炒

上为细末，生姜自然汁糊丸黍米大，每半岁儿三丸，三五岁儿五七丸，淡生姜汤下，早晚各一。

没石子丸　治泄泻白浊及滑肠腹痛，亦治疳利。

木香　黄连去须，各一分　没石子一个　肉豆蔻二个，面裹，煨　诃子肉三个

上为细末，饭和丸麻子大，米饮下，量大小加减与之，无时。

银白散　治脾胃不和，泄泻不止，不思饮食，身体烦热。

人参去芦　白茯苓　白扁豆炒熟　甘草炙　白术炒，各一分　罂粟米微炒，二钱，别研

上为末同匀，每服半钱或一钱，紫苏汤调下，无时。

干姜散　治水泻无度。

上以干姜末，粥饮调下半钱或一字，量

大小与。

椒红丸　治如前。

上以椒二两去目，用醋二升，煮至醋尽焙干为末，糊圆绿豆大，瓷盒收之。每服十丸十五丸，米饮下。

一方治婴小水泻奶疳，以椒一分，去目为末，酥调少少傅脑上，日三。

乌药散　治乳母冷热不调，变坏乳汁不好，儿因饮之，心腹时痛，下泻如水。

香附子研，拣白者　良姜　赤芍药　天台乌药各等分

上为细末，每服一钱，水一盏，煎至六分温服。心腹痛者，入酒少许同煎。只水泻者，米饮调下，量大小与服。

白石脂散　治水泻形羸，不胜大汤药。

上以白石脂半两，研如粉，和白粥空心与服。

柏皮丸　治热泻。

上以黄柏削去粗皮，焙杵为末，用薄米饮和丸粟米大。每服十丸，米饮下，食前。

清胃散　治挟热下泻频。

川楝子去核　黄柏炙，锉　地榆炙　当归去须，洗焙　黄连去须，炒

上各半两为细末，每服一钱，水一小盏，煎至六分，温服无时。

香石散　治伏热中暑，烦躁发渴泄泻，小便不利。

上为末，每服一钱，米饮调下，亦治吐泻，无时。

分水车前散　治暑月伤热暴泻，小水不分。

上以车前子为末，米饮调下半钱或一钱，量大小加减。

白术膏　治暑月中热泄泻，小便不利，腹满气痞。

白术半两　白茯苓　人参去芦　滑石各一分　泽泻半两

上为末，炼蜜和膏。每用一皂子大，米饮化下，无时。

香连散　治伏暑泄泻，清浊不分。

木香　川黄连去须，各一两　人参去芦　厚朴去粗皮，生姜制，各半两

上为细末，每服半钱或一钱，米饮调下，乳食前。

草节汤　治冷热不调下泻。

胡黄连半两　绵姜一两，炮熟

上为细末，每服半钱，草节汤调下，食前。

樗根散　治水泻里急后重频数。

樗根皮一两　枳壳半两，炒　甘草一分，炙

上为末，每服半钱或一钱，粥饮调下，立止。无时。

厚朴散　治洞泻注下。

诃黎勒皮一两，炒　厚朴去粗皮、生姜制，一两　肉豆蔻面裹煨，一两　白术半两　干姜半两

上为细末，每服一钱，水一小盏，入生姜、粟米各少许，同煎至五分，去滓温服，食前。

香蜡散　治如前。

上于五月五日，取蜡一只，烧末，饮调一钱服之。儿小量减。食前。

阿胶丹　治洞泻暴注。

真阿胶一两，蛤粉炒　干姜一两，炮　芍药半两　当归去芦，半两　川黄连去须，半两　肉豆蔻面裹，煨，半两

上为细末，炼蜜和丸黍米大，每服十粒，粟米饮下，食前。

助胃丹　治洞注不止，手足冷。

附子一枚，重半两，炮裂，去皮、脐　硫黄半两　干姜半两　肉豆蔻面裹，煨，半两　肉桂半两　白术半两

上为细末，面糊和丸黍米大。每服十粒，米饮下，食前。亦治泻脱危困。

火轮散　治虚滑洞泄注下，日夜无度。

附子一枚，半两者，炮裂，去皮、脐　肉豆蔻半两，面裹，煨　良姜一钱半

上为末，每服一字或半钱，陈米饮调下，乳食前。

木香散　亦治冷热不调下泻。

木香　黄柏蜜炙，各一两　人参去芦　缩砂仁各一两

上为细末，每服半钱，米饮调下，亦治痢。

豆蔻香连丸　治寒热失宜，阴阳不调，泄泻无度，腹痛肠鸣。

黄连去须，三分，炒　肉豆蔻面裹煨　南木香各一分

上为细末，粟米饭和丸粟米大。每服三二十丸，米饮下，日夜四五服，量大小与之如圣。

小香连丸　治冷热不调，水谷滑肠，泄泻腹痛，脾胃不和，乳食不化，皆治之。

木香　诃子肉各一分　黄连去须，半两，炒

上为细末，饭和丸绿豆大。每服一二十丸，米饮下，乳食前。一方更肉豆蔻三个，甘草一分，同为末。每服半钱，饮调下，名香连散。

石榴汁　治泻下五色。

上以酸石榴五个，同穰壳捣烂，绞取汁，每服半合，量大小与之。

四色圆　治泻青色。

硫黄　厚朴去粗皮，生姜制

上各等分为细末，糊丸黍米大。每服十五丸，米饮下，无时。

木香白术散　治下泻色青如涎，或如白沫。

木香　白术　陈皮去白　丁香各一分　麦蘖炒黄，半两

上为末，每服半钱或一钱，水半盏，煎至三分温服，如吐泻，与前丁香散兼服。在吐门下。

六神散　治泻多日，粪色与唇口皆白，因成虚困，亦治洞泻吐利泄泻。

人参去芦　白茯苓　干山药　白术　白扁豆　甘草炙

上各等分为细末，每服一钱，水一小盏，生姜二片，枣一个，煎至六分，通口服。

此药用处甚多，调气和脾胃大良，如治冷泻，以用末二钱，附子末一钱匕煎之，分三四服，量大小与之。

又治风症加天麻。治痢加罂粟壳。吐泻者服之，以助胃气，防变痢病。

豆蔻丸　治伤乳食，脾胃不和，泄泻无度。

木香一分　肉豆蔻面裹，煨，一个　草豆蔻　槟榔　青皮去穰　陈皮去白，各一分　京三棱一两，炮，锉

上为细末，面糊和丸锉豆大。每服五七丸，姜汤下。无时。

黄连茱萸散　治伤乳食下泻。

黄连去须，一两　吴茱萸拣去枝梗，半两　干姜二钱　巴豆肥大者一个，去皮

上锉细，同炒至焦黄，去巴豆不用，外为细末，每服一钱，煎陈米饮调下，日三，乳食前。

缓中丸　治有伤泄泻。

神曲炒黄　诃子皮炮，各半两　吴茱萸拣净炒黑色，二两

上为末，炼蜜和丸麻子大。每服三二十丸，枣汤下，无时。

回阳散　治下泻虚极，或因服转药泻脱，四支逆冷，目瞪项强，大便不禁，心胸烦闷，不能乳食。

附子大者一个，炮，去皮脐　天南星大者一个，炮过为末，生姜汁和作饼，焙干　木香一分　人参去芦，一分　硫黄一分　朱砂一钱　麝香少许

上为细末，艾汤调半钱，乳食前服。

艾黄熨法　治泻脱困乏危笃。

苘麻七个，去壳研，如泥　熟艾半两　硫黄研末二钱

上拌匀，于脐上先铺纸，傅药在上，又用纸铺衬稍厚，用熨斗适温凉熨之，不可令熨斗大热，以脐内向为度。

治吐泻方

阎孝忠曰：凡小儿吐泻，多因寒冷，当

温补之。余每用理中丸以温其中，五苓散以导逆，五苓治小儿吐尤妙、逆者吐也。连与数服，兼与异功散正气，温药调理之，往往便愈。若已虚损，当速生其胃气，与理中丸，并研金液丹末，煎生姜米饮调灌之，惟多服乃效。服至二三两无害，得胃气生，手足渐暖，仍频与粥。虽至危者，往往死中得生，十有八九。金液丹治小儿吐泻虚极最妙。沈存中论金液丹。亲见小儿吐利剧，气已绝，服之得活者数人，真不妄也，须多服方验。若因吐泻生风，身冷瘛疭、变慢惊者，论在于惊门具之。其理中丸、五苓散、金液丹方并在和剂集载之。

异功散　治吐泻虚冷病，先与数服正气，能温中和气进食。

人参去芦　茯苓去皮　白术　甘草炙　陈皮各等分

上为细末，每服二钱，水一盏，生姜五片，枣二枚，同煎至七分，通口服，无时。

参苓散　治伤风冷脾胃不调，一切吐泻。

人参去芦　茯苓　白附子　羌活去芦　白术各一分　肉桂　犀角镑屑　藿香去土　川芎　芍药　甘草各一钱

上为细末，每服半钱，金银、薄荷汤调下，无时。

团参散　治脾胃虚弱，气不调顺，伤于风冷，一切吐泻，手足厥逆。

人参去芦，二两　白术一两　白扁豆炒，一两　罂粟米四两，别研　山药三两　陈粟米三两用生姜自然汁浸三宿，取出曝干　白茯苓一两，去皮　木香三分　川芎一两半　乌药一两半，锉碎　甘草三两，炙　厚朴去粗皮，生姜制，二两　白芷一两

上为细末，每服一钱，水一小盏，生姜三片，枣一个，去核同煎至半盏，温服，空心食前。

和中散　治三焦不调，停寒膈上，吐泻不定。

藿香去土　白豆蔻　人参去芦，各一两　木香　丁香　干姜炮　厚朴去皮，生姜制，各半两　甘草一分

上为细末，每服一钱，水一小盏，入生姜三片，煎至六分，温服无时。

益中汤　治脾胃不和，伤冷吐泻。

丁香半两　草豆蔻去皮，三个炒　人参去芦半两　青皮去穰、半两　桂心一分　诃黎勒去核、一分

上为细末，婴孩一字，二三岁半钱，五六岁一钱，煎木瓜、紫苏汤调下，日三，无时。

沉香散　治脾胃不和，吐泻不进乳食。

沉香一分　丁香一钱，炒　木香半钱，炮　桂心半钱，不见火　甘草一钱炙　茯苓一分　藿香去土，一钱

法如前方用。

观音散　治如前。

人参去芦　甘草炙　白扁豆炒　石莲肉去心，各一分　茯苓一钱半　白芷　黄芪捶碎涂蜜炒　木香炮，各一钱　神曲二钱

上为细末，每服一钱，水半盏，枣半个，煎三两沸温服。无时。

人参散　治如前。

人参　茯苓　石莲肉去心，各一分　甘草二钱，炙　黄芪半两，蜜炙

上为细末，每服一钱，水半盏，枣半个，煎三两沸温服，无时。

白术散　治胃气虚弱，吐泻发渴。

白术　人参去芦　木香　白茯苓　藿香叶去土　甘草炙，各一钱　干葛二分

上为末，每服一钱，水一小盏，煎至六分温服，无时。

半夏汤　治脾胃虚寒吐泻及有冷痰等疾。

半夏好者一两，汤浸，洗七次，切，焙干　陈粟米三分，无，即用陈粳米亦得

上㕮咀，每服三钱，水一大盏，入生姜七片，煎至四分，温服，无时。

张涣七香丸　治吐泻不进乳，心腹胀满，小便不利。

青皮浸，去穰，称一半生，一半炒用，一两　肉豆蔻半两，面裹，煨冷香熟　牵牛一两，炒

上为末，糊丸麻子大。每服二三十丸，生姜米饮下。无时。

治婴小吐泻。

乱发半两，烧　鹿角一分末

上同研细，米饮服一钱，日三。

治婴小吐泻。

上以特猪屎烧为末，水调汁，少少与服。

丁香安胃丸　治小儿胃虚，气逆呕吐，泄泻烦渴欲饮，精神昏困。

肉桂半两　丁皮　藿香去土　滑石　茯苓各一两

上为细末，炼蜜和丸鸡头大。每服一丸，温汤化下。无时。

温中丸　治胃寒泻白，腹痛肠鸣，吐酸绿水，不思乳食。

人参去芦　甘草炙　白术各一两

上为末，姜汁湖丸绿豆大。米饮下，一二十丸。无时。

糯米汤　治吐泻不止。

糯米一百粒　木香　黄连去须，三味，锉碎如米

上同炒至米焦黄，去木香、黄连不用，只以米为末，后用枇杷叶去毛净，焙干，等分，为末，和匀，白汤调半钱。无时。

进食丸　治伤饱乳食不消，壮热腹痛胀满，吐哕无度。

木香　枳壳麸炒，去穰　当归去须，洗焙　代赭石火煅醋淬，不计遍数，以易碎为度，别研　朱砂研，飞，各半两　巴豆霜一分

上为末，糊丸黍米大。一岁见一丸，温水下，无时。

不二丸　治伤食吐泻不止。

巴豆三十粒，去皮心膜，研细，别用好黄连半两，水浸浓汁，染纸二张，裹巴豆压去油　朱砂末一钱，水飞　寒食面一钱，炒

上同研细，滴水和丸绿豆大。新水磨化一丸，服无时。

感应丸　治脾胃虚怯，乳食过度，吐泻身热腹满。

肉豆蔻仁四个，面裹，煨　丁香末　三钱　川姜末二钱　木香三钱　百草霜四分　杏仁二十八个，去皮、尖，别研，取霜　巴豆十四个，去皮、膜，出油尽，取霜　黄蜡二两，熔滤去滓，却入好酒同煎半时，放冷凝

上同为细末研匀，先熔炼蜡和药成膏，恐硬时更入油少许，每用旋丸如黍米大。三四粒温水下，乳食前。

豆蔻散　治伏暑伤热，吐泻烦渴，腹胀小便少。

硫黄一分　白滑石三分　丁香　白豆蔻面裹，煨，各半分

上为细末，每服一字或半钱，米饮调下，无时。

藿香散　治伏暑冷热不调，吐泻不止。

藿香去土　白芷　丁香　缩砂仁各等分

上为末，每服半钱，沸汤点服。无时。

香石散　治伏暑烦躁，吐泻发渴。

丁香　滑石　硫黄　白芍药　甘草各等分

上为细末，每服半钱，米饮调下，无时。

三和散　治伏暑吐泻，津液燥少。

白茯苓一两　乌梅肉半两　干木瓜半两

上为细末，每服一钱，水一盏，煎至五分，去滓温服。无时。

乌烬散　治中暑发渴，烦躁闷乱吐泻。

上以谷精草不限多少，烧存性，用器覆之，放冷研为细末，每服半钱或一钱，冷米饮调下。无时。

大七宝散　治霍乱吐泻。

木香炮　丁香炒　桂去粗皮，不见火　茯苓　人参　麻黄去根、节　诃子去核　当归去须土　甘草炙　大腹皮　川楝子去核　秦艽去芦，炒，以上各一钱　地榆二钱，炒　藿香去土，一钱半，炒　肉豆蔻一个，面裹，煨

上为末，每婴孩一字，二三岁半钱，四五岁一钱，水半盏，入枣半个，煎数沸温服，

无时。

建脾膏　治霍乱吐泻。

丁香　藿香去土　人参去芦，各一两　沉香　木香各半两

上为细末，炼蜜和膏，每用鸡头子大，粟米饮化服，无时。

人参汤　治如前。

人参去芦，一两　厚朴去粗皮，生姜制，半两　甘草半两，炙　白术三分　生姜三分

上㕮咀，以水一升二合，煮取半升，六十日儿服一小合，百日儿分四服，周晬儿分二服，乳空服之，乳母忌生冷油腻。

苍术汤　治小儿霍乱吐泻。

人参去芦　芦葺各半两　扁豆藤二两　苍术一撮

上为粗末，每服二钱，水七分，煎至五分，去滓温服，立验。无时。

又方　名同，治同。

人参一两　木瓜一个　苍术一撮

上㕮咀，量儿大小，用煎如前服，立效。

治小儿霍乱吐泻。

上以牛涎一合，灌儿口中，量大小加减。

人参调胃膏　治霍乱吐逆，服药不下，烦渴者宜先服此药。

人参去芦　白术　丁香各一两　干姜炮　甘草　赤茯苓各半两

上为细末，炼蜜和丸皂子大。每服一丸，热汤化破，以新水沉极冷即服。无时。

快膈散　治霍乱吐逆，服药多即吐，先服此药。

甘草半两，炙　良姜微炮　肉豆蔻面裹煨　丁香各一分

上为细末，每服半服，新汲冷水调下。

白术膏　治伤暑伏热，头目昏痛，霍乱吐泻，烦躁作渴，小便不利，心胸满闷。

白术　泽泻各半两　茯苓　人参去芦　滑石各一分

上为细末，炼蜜和膏，每用一皂子大。煎麦门冬汤，放温化下，无时。

治霍乱不止

上以诃黎勒一枚，去核为末，沸汤研，顿服，如未差再作。

丁香丸　治霍乱吐泻，面青，四肢冷，虚汗出。

丁香　藿香去土，各一分　人参去芦，半两

上为末，炼蜜和丸麻子大。每服五丸，粥饮下，无时。

丁香散　治霍乱不食。

丁香一分　人参半两

上为粗末，每服一钱，水一小盏，煎五分去滓服。

斗门散　治霍乱吐泻转筋。

附子一枚生　胡椒一百粒

上为末，每服半钱，浆水一小盏，煎至四分，温服。

七宝散　治霍乱吐泻，腹内撮痛。

白术四两　人参去芦　白茯苓各半两　甘草一两，炮　草果子大者二个，炮过用　诃子四个，炮，去核　干姜一钱，炮

上为细末，每服一钱，水半盏，入枣一枚，姜三片，同煎至七分，带热服。三岁下者，药半钱，水半合煎之，泻不止，与香连丸间服。

香连丸　治冷热不调，霍乱吐泻，腹内疗痛。

黄连去须薄尽，一两，竹碎，微炒　木香一分　诃子七个，炮，去核　肉豆蔻二个，面裹，煨

上为细末，姜汁糊和丸绿豆大。每服十丸十五丸，米饮下，无时，日四五服。

治霍乱不止

寡妇薰草　治如前。小儿霍乱吐泻。

上取寡妇薰草二七茎，煮饮之。

又方　上取蠮音噎螉音雍窠微炙为末，乳汁调下一字。乃蜾蠃虫。

又方　上取芹叶细切，煮熟汁饮之。任意多少，得止为度。

香豆散　治霍乱烦渴吐泻。

藿香去土　甘草一分　肉豆蔻面裹煨，各一两　白扁豆　人参去芦，各半两

上为末，每服一钱，水八分盏，入生姜二片，煎至五分，去滓温服。

吐泻后证

醒脾散　治吐泻初定，脾胃虚弱，恐生风者，便当与服。

上以天南星沸汤浸洗七次，为细末，一岁儿半钱匕，用河水七分盏，入冬瓜子七粒，同煎至半，放温，旋旋与之。

碧香丹　治吐泻后，大渴不止，不得眠睡，甚则变疳。

天竺黄　不灰木烧赤放冷　赤石脂　龙骨煅，各一两，先为细末　腻粉　定粉　铅白霜　蛤粉各一两，别研

上拌匀，入麝香半两，再研，滴水和丸鸡头子大。每用一粒或半粒，同鲍螺儿二个，细研，沸汤浸化。却用冷水沉极冷服，大渴即与，神验。

丁香黄芪散　治吐泻后，脾胃虚弱，不能饮食，渐成羸瘦，面色青白，或作痢，时下时止。

丁香　绵黄芪锉　人参去芦　白术　当归洗，焙　鳖甲醋炙黄，去裙襕，各一两　胡黄连　甘草炙，各半两

上为细末，每服一钱，水一小盏，入生姜二片，枣一个，同煎至五分，去滓温服，食前。

香茂散　治泻后，但胸中不快。

藿香去土　蓬茂炮，锉　茯苓焙，各等分

上为细末，每服半钱或一钱，白汤点服。无时。

中和散　治吐泻定后烦渴。

人参去芦　白茯苓　白术　甘草锉，炒　干葛锉　白扁豆炒　黄芪切，焙　藿香去土，各等分

上为细末，每服二钱，水一盏，枣一个去核，生姜三片，煎至七分，放温服，无时。

小儿卫生总微论方　卷十一

八　痢　论

小儿气血怯嫩，藏府软弱，因触冒风寒，饮食冷热，以邪干正，致脾胃不和，凝滞停积，蕴毒结作，或水谷不聚，或脓血纯杂，变而为痢。其候有八：一曰水谷痢，谓便下粪稀，薄而不聚，快利出易，水谷不化也。然虽是泻便时，亦觉里急后重，故为痢也。二曰冷痢，谓便下纯白脓也。三曰热痢，谓便下纯赤血也。四曰滞痢，谓便下脓血相杂也。五曰积痢，谓有积伤为痢，浸久或差而后发也。六曰疳痢，谓患疳瘕而下痢也。七曰蛊痢，谓如蛊毒，下紫黑血，或如赤豆汁，或如鸡鸭肝片也。八曰休息痢，谓下血黑黯中有白物，如肠中之脂，或如烂鱼肠之状，此肠胃溃伤，患者更休爱惜，故以名之，亦名休息者，谓患即无休息而至死也。凡痢若粥药不能进者，此便为死候也。治水谷痢方，已具前泻项之下。

治冷痢方

玉肠散　治冷痢初，即大便青色，后乃作脓。

白石脂　当归洗、焙　丁香　白术各一两　草豆蔻去皮　厚朴姜制，各半两

上细末，每服半钱，粥饮调下。无时。

厚朴圆　治藏寒泄泻，下痢纯白，腹中绞痛，虚气胀满，手足逆冷。

厚朴姜制，半两　诃子半两、炮，去核　白龙骨半两　白矾半两

上用一器盛之，盐泥固济，留一窍子，木炭火煅，烟息为度，取出为末，面糊和圆黍米大。每服十圆，米饮下，食前。

乌骨散　主治如前。

上乌鱼骨去皮，研细末，每服半钱，米饮调服，或炙黄用之，亦治妇人漏血。

蓝汁　主治如前。

上以蓝青取叶，捣令极烂，绞取汁略温，每服半合或一合，无时。

马齿菜汁　主治如前。

上杵生马齿菜绞汁略温，每服一合，入蜜一匙头许调匀，空心服。

石莲散　主治如前。

上以石莲不拘多少、去皮，用沙糖炒过为细末，每服一钱，米饮调下，乳食前。累验。

胡黄连圆　治血痢下多，久而不差，或作藏毒下血，带青黄色。

胡黄连炒　芜荑拣净，炒　夜明沙各一分

上末，猪胆汁和圆黍米大。每服十圆，陈米饮下，无时。

治赤白滞痢方

罂粟饮子　治赤白滞痢

罂粟壳半两，蜜炙　人参去芦，一分　厚朴去粗皮　生姜制，一两　白茯苓半两　干姜一分，炮　乌梅三个，去仁，连核用　御米壳三个　阿胶三片，蛤粉炒焦，去粉

上同末，每服一钱，水酒各半盏，煎数沸，温服，乳食前。呕吐者不可服。

三奇汤　治白痢。

御米壳二两，涂蜜炙　酸石榴皮一两，涂蜜炙焦　阿胶半两，蛤粉炒，去粉

上细末，每服半钱，乌梅、甘草汤调送下，乳食前。

治热痢方

胜金圆　治热痢下血。

黄柏去粗皮，半两　赤芍药四钱

上末，饭和圆如麻子大。每服一二十圆，米饮下，乳食前。

当归散　治如前。

当归去芦并土，一分，焙　芍药一分，炒　黄连去须，一分，炒　枳壳一分，去穰，麸炒黄

上细末，每服半钱，水五分，煎至三分，温服。下血多者，入甘草一寸同煎，乳食前。

槐花散　治血痢不差。

槐花拣净，炒　地榆炒，各等分

上细末，每服半钱一钱，米饮调下，乳食前。

圣效散　治血痢久不差。

赤石脂一两，烧赤　白龙骨一两，煅　阿胶一两，锉，蛤粉炒，去粉　诃黎勒煨，去核，用半两　木香半两　黄连去须，半两　干姜半两，炮　甘草半两，炙

上细末，每服半钱，煎粟米饮调下，食前。

厚肠圆　治血痢肠虚。

黄连去须，炒　川楝子去核，各一两　木香　阿胶锉，蛤粉炒，去粉　当归去芦并土　吴茱萸去枝梗，微炒，各半两

上细末，粟米饭和圆黍米大。每服一二十圆，米饮下，食前。

白梅饮子　治血痢不止。

上以白梅一枚去核。盐水研烂，合蜡茶醋汤沃服之。昔陈应之治曾相痢血百馀日，诸医不能疗，陈用此一啜而差。又梁相亦病痢血。应之曰：此挟水谷者，用三物散数服而愈。

三物散

胡黄连　乌梅肉　灶下土各等分

上末，每服一钱，蜡茶清调下，食前空腹温服。

又方　治热痢下血，频并不差。

上以白梅五个取肉，蜡茶二钱，同研匀细，每服一钱或半钱，白汤点服。或以醋汤沃服之，量大小加减，食前。

黄连丹　治如前。

黄连去须，二两　当归去芦并土，一两，洗，焙　白头翁去芦，三分　蔓菁根三分，洗，焙干　木香半两　川楝子面裹煨，去核，用半两

上细末，粳米饭和圆黍米大。每服十粒米饮下，乳食前，或十五粒。

必效圆　主治如前。

川黄连去须，二两　大枣半升　干姜一两　肉豆蔻一分，面裹煨香，去面

上细末，糊圆黍米大。每服五七圆，米饮下，乳食前，儿大增之。

雄黄散　治肠胃虚冷，下痢频并，腹痛不可忍。

雄黄一分，研细，水飞　乳香一分，研细　白矾飞过，一钱，研细

上同研匀，每服婴孩一字，二三岁半钱，陈米饮调下，日三服，乳食前。

艾叶汤　治虚冷下痢白脓。

艾叶一两，微炒　当归去芦并土，一两　干姜一两，炮　木香半两　诃黎勒煨，去核，用半两

上细末，每服一钱，水一小盏，入粟米少许，同煎至五分，去滓温服，食前大小以意加减。

又方　治如前。

上以蜡茶一钱，入热醋少许调服，乳食前，大小以意加减。

又方　治如前。

上以沙牛角鳃烧存性为末，粥饮调下一钱或半钱，乳食前。

阿胶圆　治如前。

赤茯苓　赤芍药各一两，为细末

上以米醋煮阿胶一两和圆绿豆大。米饮下一二十圆，乳食前。

酒煎汤　治肠胃虚冷，泄泻不止，变成白痢。

甘草半两，炙

上粗末，每服二钱，水一盏，生姜三片，枣一个，煎至半盏，去渣放温，量大小加减服，赤多者加黑豆十粒同煎。

三神丹 治如前。

上以肥大无尖草乌头三个，各去皮，一个生，一个炮熟，一个烧作黑灰，同为细末，面糊圆如萝卜子大。每服三粒，水泻井花水下。白痢干姜汤下。赤痢甘草汤下。赤白滞痢干姜、甘草汤下。食前。

木香炒连圆 治脾胃虚弱，寒湿冷热相搏，滑泄下痢赤白。

黄连二两，粗，好折开如金色者，锉匀如豆大，又用生姜四两，净洗亦匀切如豆大，同入石银器中炒，不住手搅，费得匀也，炒至生姜焦脆，去姜不用，只用黄连 诃子煨，去核，用 半两 木香半两

上同细末，以湿纸包粟米饭，慢火煨，水脉溜取出，和药圆如绿豆大。每服二三十圆，食前米饮下，神效。

金锁散 治赤白滞痢，日久不差。

黄连去须，一分，用茱萸一分同炒，去茱萸不用，只用黄连 厚朴去粗皮，半两，生姜制

上同细末，婴孩一字，二三岁半钱，紫苏、木瓜汤调下，日三服，食前。

赤脂丹 治如前。

赤石脂 干姜炮 肉豆蔻各一两，面裹，煨香，去面用

上细末，面糊圆黍米大。每服十粒，米饮下，食前。

治小儿下痢脓血

茄澄茄一两 破故纸半两，炒黄 黄连去须，半两 木香一分

上细末，每服半钱，陈米饮调下，食前。日二服，量儿加减。

治小儿风邪所干，下痢颓并，里急后重。

以天南星一两，生为末，每服半钱，水二盏，生姜十片，米十粒，煎至半盏，温服。食前。

治小儿久痢藏毒，下脓血不止。

以好大枣一个去核，入黄丹半钱，硇砂一皂子许，腻粉十文，并研细置枣肉内，用大麦面裹，慢灰火中炮香熟，去面并枣皮了，研极细，入少软饭，圆如麻子大，量儿大小加减圆数，煎槐花汤下，甚者二服定。食前。

小桃花圆 治小儿赤白痢。

赤石脂 龙骨煅 密陀僧 定粉 黄丹炒紫黑色用

上等分醋糊圆绿豆大，每服十圆十五圆，米饮下，乳食前。

治赤白诸痢 以蜂房烧末饮服，量大小与。

又以鸡肠草取汁一合，和蜜温服良，以云母粉半两，更研极细，量儿大小加减。煮白粥拌匀，空腹食之。

又以胡粉熟蒸，熬令色变，饮服之。亦治无辜痢良，大小以意加减。

治久痢不差 以没石子二个，锉熬令黄，研细，作馄饨食之。

香连圆 治小儿诸痢。

黄连去须 龙骨煅 白石脂 川姜炮 枯矾各一两

上末，以粟米粥和圆麻子大。每服三十圆，米饮下，乳食前，量大小与服。

木香黄连圆 治冷热相杂，下痢赤白，里急后重，腹痛绞撮，及肠胃气虚，暴伤乳哺。

木香 黄连去须，各一分 白附子尖二个，炮

上细末，粟米饭和圆绿豆大，或黍米大。每服十圆至二三十圆，量大小与之，食前米饮下，日夜二四服。

四神散 治诸般赤白痢。

当归去芦并土，焙 干姜炮 黄柏炒 黄连去须，炒，各等分

上四味，各自为末。如水谷利，各用半钱和匀。量儿大小，一钱至半钱，浓煎乌梅汤调下。赤痢者，加黄柏焙之。白痢者加干姜焙之，后重里急肠痛者，加黄连焙之。腹中绞痛者，加当归焙之。并空心食前服。沈存中言，予家常作此药，最获大效。

橘皮汤 治如前。

上以新橡皮不拘多少，去外黑皮，细切晒干。每服二钱，水一盏，煎至半盏，去渣更煎如膏，量大小温服。立差。食前。

又方　治如前。以鸡子一个取清，摊连纸一张令遍，晒干，叠作四重，包撮乌梅十个，有肉好者，安熨斗内，炭火烧烟欲尽，存性取出，顿一碗中，上用盏子合之，候冷研细，更入水银粉少许和匀。量儿大小，分三五服，空心井花水调下，如一服微利。止后服。

二色圆　治如前。

吴茱萸拣去枝梗，二两　黄连去须，二两　巴豆四十九个，去皮

上同干铫子内炒令黄赤色，去巴豆不用。只将上面二味，各自为末，面糊和圆，如萝卜子大，看大小紧慢，加减圆数。如白痢只服茱萸圆。赤痢只服黄连圆。白多赤少者，多服茱萸圆。赤多白少者，多服黄连圆，少服茱萸圆，赤白相等者，中半服之。

御米汤　治如前。

御米十个，和壳用　甘草二钱炙　当归去芦，洗焙，一分　黄连去须，一分

上末，每服一钱，米饮调下，乳食前。

罂粟圆　治如前。

罂粟壳一两，蜜炒　酸石榴皮烧存性，四钱　甘草半两，炙　阿胶一钱，蛤蚧粉炒，去粉

上末，炼蜜和圆小鸡头肉大。每服一圆，水六分盏化开，煎至四分温服，乳食前。

三乌圆　治如前。

川乌一个　草乌一个　巴豆七个

上各烧及九分，同研细，酒煮黄蜡熔化，入少好油拌和，搅匀成膏，每用旋圆绿豆大。每服三圆，看大小加减。血痢黄连汤下。白痢干姜汤下。水谷痢倒流水下。赤白痢干姜、甘草汤下。

固肠圆　治赤白滞痢，多日不差，渐成羸瘦。

黄连去须，二两　木香二两　半夏二两，汤洗七次　干姜二两，炮　赤石脂二两，火煅五次　厚朴去粗皮，二两，生姜制　白术二两

上为细末，面糊和圆黍米大。每服十圆，米饮下，乳食前。

健胃丹　治赤白等痢疾，日久羸瘦。

黄连去须，锉、微炒，一两　白龙骨半两　白石脂半两　神曲半两，炒　乌梅肉半两，炒干　干姜半两，炮　白矾枯，一分

上细末，醋糊和圆黍米大。每服十粒十五粒，米饮下，乳食前。

妙应膏　治久痢赤白诸药不效。

密陀僧半两，末　黄丹半两，研　定粉半两，研，以上三味，同于铫子内，以醋拌匀，用火熬如茶褐色　诃黎勒皮　木香各一两，并末　巴豆　十粒，去皮膜，压油尽　砒霜半钱，研　麝香一钱，研

上同研匀细，先以黄蜡四两，慢火熔化，入药拌匀熬成膏，每用旋圆黍米大。未晬儿一粒，二三岁儿二粒，四五岁三粒，六七岁五粒，血多冷甘草汤下，脓多温艾叶汤下，临卧服，忌热物，亦治积痢。

金华散　治滞痢多时，羸瘦体弱不堪，疾势困重。

上好黄连为细末，每服一钱，水一小盏，煎至半盏，入蜜少许，和匀，放温服之，日五六服，食前。

又方　治如前。

上以麻子一合，炒香熟为末，每服一钱，温蜜浆水和服，立效。

木香三使汤　治赤白久痢，拖延时月，至天寒不断。

上以木香方寸许，黄连半两，水半升同煮至水干，去黄连不用，只将木香薄切焙干为末，分三服。第一服橘皮汤调下，第二服陈米饮下，第三服甘草汤调下，乳食前。

乌金散　治赤白滞痢及有所伤下痢。

上以青州枣不拘个数，去核入白矾末满，以纸裹煅，存性为末，每服半钱，米饮调下，未愈宜增之。如赤者更入好茶半钱同调服。白者不用。

治积痢方

软金丹　治久积成痢。

砒霜　雄黄研、水飞　巴豆去皮膜

上三味等分，各研细末，先以黄蜡看多少，于石银器内炭火熔化，入药末，竹篦子左右手各搅四十九遍，如此七次数足。取下火，乘软搓成小铤，以油单裹置新瓷器中，要用火烘软，旋圆如粟米大，或如萝卜子大，三五粒，量大小病势加减。赤痢温酒汁下，白痢或赤白杂下，并米饮下，乳食前。

大尊重圆　治虚中有积，肠滑下痢，里急后重，脐腹疼痛。

粉霜三钱　黄丹半两　定粉半两　硇砂半两　腻粉二钱　京三棱末一两　白面五钱，少即量添些小

上为末，同匀，滴水和圆，晒干，炭火上炒令烈焦，再杵罗为末，枣肉和圆绿豆大。每服一二丸，米饮下，乳食前。

朱砂万应丸　治积痢久痢滞痢，一切诸痢，多日不差。

朱砂末一钱　硇砂末一钱　巴豆七个，去皮膜　蜡二枣大许

上于铫子内，先熔蜡化，入巴豆熬至黑焦，去巴豆不用，却入上二味，搅极匀，放凝为剂。如用，旋圆如绿豆大。每服三九，白痢艾汤下，赤痢黄连汤下，赤白痢黄连、艾汤下，水谷痢新水下，乳食前。

针头丸　治如前。

朱砂半钱　砒一钱　巴豆七个，用油煎　硫黄只使鼓子大，研末，更用蜡为丸

上旋圆针头大，每服一丸，米饮下。量儿大小，加减丸数，食前。

烧青丸　治诸积痢。

轻粉二钱　玄精石一分　霜粉一钱　硇砂一钱

上为末，入白面二钱拌匀，滴水和剂，捻作饼子，文武火烧熟，再研为细末，滴水和圆芥子大。浆水下三四圆。

一方，保州邵廉访方无硇砂，却有龙脑一字，余并同，亦不烧，只为末，水浸蒸饼，圆麻子大，一岁儿一丸，二三岁二丸，四五岁三丸，六七岁五丸，并夜深空腹冷水送下。如虚中沉积，泄利脓血交下，腹痛烦渴，百药不效，不敢取转者，服之便愈，并不动气，忌一切生冷油腻毒物。又名瑞白丸。

治疳痢方　在疳疾之下

治蛊毒痢方

育肠汤　治蛊痢下血，如豆汁赤水腹痛。

罂粟壳五两，细锉，蜜水洒匀，炒黄　地榆　槐花蜜拌，炒赤　厚朴去粗皮，生姜制　甘草炙　橘皮去白　酸石榴皮　当归去芦，洗焙　白芍药　五倍子去其中虫，各一两三钱　阿胶蛤粉炒，二两，去蛤粉

上为粗末，每服二钱，水一盏，入陈粳米二十粒，饧一块，皂子大，煎至五分，去滓温服，食前。

缓肠汤　治蛊痢如前。

人参去芦　白术　当归去芦并土　白茯苓　厚朴去粗皮、生姜制　白芍药　甘草炙、各一两　阿胶蛤粉炒、去蛤粉　黄芪蜜炙　陈粳米炒、各二两　御米壳三两，蜜炙黄

上为粗末，每服二钱，水一盏，入生姜三片枣一个，同煎至五分，去渣温服，空腹食前，日三服。

犀角散　治蛊痢如前。

犀角屑　地榆锉　黄连去须，锉，微炒　柏叶微炒　黄柏微炙　黄芩　当归去芦土，洗净，微炒　赤薜荔取叶　生地黄各一两

上为细末，每服一钱，粥饮调下，乳食前。

地榆圆　治蛊痢，肠中畜毒，下血如豆汁，或诸恶物。

地榆一两，多锉　黄连去须，一两　干蓝叶一两　川升麻一两　川楝子去核，半两　苦楝子去核，半两

上为细末，软饭和丸如黍米大。每服十

丸，米饮下，量大上加减，乳食前。

地榆椿皮丸　治如前。

地榆四钱　椿根白皮三钱　白芍药一钱半　阿胶蛤粉炒，去蛤粉，一钱　当归去芦，洗净，一钱　乌梅肉二钱半　木瓜一钱半　枳壳去穰，麸炒黄，一钱　茯苓一钱　肉豆蔻一个，面裹煨，去面　甘草二钱，炙　木香一钱　绵姜半钱，炮　金樱子二钱　人参去芦，半钱

上为末，炼蜜丸麻子大。每服三二十丸，米饮下，乳食前。

地榆散　治蛊毒痢下血，或如鸡鸭肝片，腹痛不止。

地榆一两　甘草半两，炙　赤芍药一两　柏叶一两，微炒　茜根一两　当归去芦，洗净，一两，微炒　诃黎勒煨用皮，一两　黄连去须，微炒，一两

上为粗散，每服二钱，水一小盏，煎至六分，去渣温服，乳食前。

白头翁散　治蛊毒痢，如鸡鸭肝片，随脓血而下。

白头翁去芦　黄连去须，微炒　茜根锉，焙　苏枋木锉　故鼓皮炙焦，各一两　犀角屑半两　地榆半两，炙，锉　甘草一分，炙

上为细末，每服一钱，水一小盏，煎至六分，去滓温服，服乳前。

地黄汁　治蛊痢畜毒下血。

上以生地黄汁一升，分四五服，量大小与服，食前立效。

治休息痢方

鲊汤丸　治休息痢，下五色脓血，如烂鱼肠，无粪，肠中搅痛。

粉霜一钱　轻粉一钱　朱砂一钱，研末　硇砂一钱，研　白丁香末，四钱　乳香半钱，研　巴豆七个，去皮心，不出油

上为末和匀，蒸去皮，枣肉为丸粟米大，婴孩二三圆，二三岁儿四五丸，旋圆，儿大者圆如麻子大。鲊汤送下，日三服，及与调胃气药间服大良。亦治积痢蛊痢藏毒痢。

神安圆　治如前。

砒霜一字　龙骨二字，煅　乌鱼骨二字　赤石脂二字　茯苓二字　黄连去须，二字　定粉二字　干姜二字，炮　黄丹二字，火飞

上为细末，入麝香少许拌匀，饭和丸黍米大，每服五圆，轻粉汤下。亦治诸痢，赤者甘草汤下，白者干姜汤下，赤白杂者干姜甘草汤下。

椿根散　治积年毒痢，无休息。

椿根白皮大眼树是也，取北阴下根一截，擘破用之，无北阴下者亦可　诃子七个，取皮去核

上用河水三升，煮取一升，去滓，时时呷服，利住，吃淡粥，饮乳将息。

治诸利杂证

龙骨散　治下痢体热烦渴。

白龙骨一两，煅　茯神三分　人参去芦，三分　胡黄连半两　茅根三分，锉　麦门冬去心，焙，三分

上为散，每服一钱，水一小盏，煎至五分，去滓服，乳食前。

青黛散　治下痢发渴不止。时举方。

青黛一分　干藕节一两　密陀僧半两　汉罗乃旱螺，一分

上为末，每服半钱，米饮调下，无时。

冬瓜汁　治如前。

上杵冬瓜汁饮之。

乌梅饮　治如前。

乌梅十个，去核　麦门冬一分，去心　蜜二两半

上分为五七服，用水一小盏，煎半盏，入蜜搅匀服之，无时。

楮叶汤　治下痢发渴，得水饮便呕逆不止。

上以楮叶炙令黄香，用浆水半升浸之，候水绿色去叶，以木瓜一个切碎，内汁中，煮五七沸，去木瓜，放温细细服，无时。

治婴上下痢，腹大且坚。

上以衣中白鱼摩腹上。

治小儿热，下黄赤汁沫，及鱼脑杂血，肛

中疮烂，坐蜃生虫。

黄连去须土　柏皮炒　苦参　鬼臼　独活去芦　橘皮　芍药　阿胶蛤粉炒，去蛤粉，各半两

上为末，以蓝汁及蜜和丸小豆大。日服五圆至十圆。冬时蓝汁，用子一合为末，入药内。

治小儿久痢脓汁，湿蜃生疮。

上以艾叶一味，每服二钱，水一盏，煎至半盏，去滓温服，更量大小加减。乳食前。治小儿下痢，腹胀坚硬。

上以故衣带多垢者切碎，水三升，煮取一升，分服。

治小儿卒暴下痢　以小鲤鱼一头，烧灰末之，米饮调下。

以鸡子和黄蜡作煎饼与服。

又以林檎楮子同杵，取汁服，以意服之。

黄柿饼　治秋痢　以黄柿捣和米粉作饼，或作粥与食之。

治小儿洞下滑痢　以羊角中骨烧存性为末，饮调服方寸匕。

治小儿脾胃虚怯，泄痢腹痛。

上拣肉豆蔻绝大好者一个，开一深窍，填乳香一块，用酵面裹了，慢火煨面熟，将药为细末，面糊和丸绿豆大。每服二十丸，乳食前，米饮下。

养胃丹　治小儿藏寒，下痢白脓频数。

附子一枚，重半两者，炮裂，去皮脐　赤石脂一两　川姜一两，炮　诃黎勒皮，一两

上为细末，粟米饭丸黍米大，每服十粒，米饮下，乳食前。

脱肛论

小儿脱肛者，谓大肠肛头脱出也。此因泻痢日久肠滑，冷气相搏，里急下重而便难，用力努躯，致肛头脱而下出。寒冷干乘，不能收返得入，今叙治方于后。

治小儿肛头脱出，以故麻鞋底炙热得所，按令人。频频按之，即不出。或烧蜚头灰研细附上，然后按入。永差。

以木贼烧存性为末掺上，用手捺按令入。

蜚头丸　治小儿因泻痢，及冷搏积久，脱肛下出，不能返收肠中，疼而不得入。

死蜚头一个，炙令焦　小猬皮一个，炙令焦　磁石火煅，米醋淬，不计遍数，以易碎为度，四两　桂心二两，不见火

上为细末，炼蜜和丸小豆大。三岁至五岁儿五七丸，温米饮下，日三服。一方不用蜚头，只三味。

赤石脂散　治因泻痢努躯气下，推出肛头不入。

真赤石脂伏龙肝等分

上为细末，每用半钱，傅肛头上，频用按入。

蛛丹散　治因泻痢脱肛疼痛。又名黑神散

上以大蜘蛛一个，瓠叶重裹系定，入合子内，烧黑灰存性，入黄丹少许研匀，凡用先煎白矾、葱椒汤洗，拭干，将药掺在软绵上，手掌捺按收之，甚妙。亦治大入。

又一方桑叶裹，盐泥固烧。

芜荑丹　治久痢大肠虚冷，肛门脱出。

白芜荑去皮，一两，微炒　蜚甲一两，酥炙黄，去裙襕　蜗牛壳一两，炙焦　磁石烧，醋淬七次，研，水飞　黄连去须，微炒，半两　蚺蛇胆半两

上为细末，软饭和丸黍米大。每服十粒，粥饮下，乳食前。

二金散　治久痢肠头虚冷，肛门脱出。

龙骨一两，煅　枯蜚壳一枚，涂酥，炙黄用，一两

上为细末，每服一字或半钱，干掺上，捺安内之。

又方　以白龙骨研如粉扑之。

又以蜚头烧灰细末扑之。

又以沿桑螺烧末，和猪膏傅上，立缩收之。此螺全似蜗牛而微黄小，雨后沿桑而生。

又以虎骨烧末，水调服半钱，或一钱，日三，甚良。

治小儿大肠随肛带出，转久不能收之。以生栝蒌取汁涂之。

以猪肉汁蘸手，随接之。令暖自入。

又以干胡荽切一升，烧烟熏之则缩入。

又以木贼不拘多少，烧存性为末，掺上，接按之。

缩沙散　治小儿滑泄，肛头脱出。

以缩沙一两，去皮为末，每服一钱，以猪腰子一片批开，入药末在内，绵系米泔煮熟，与儿食之。次服白矾丸。如脱肛气逆，遍身虚肿，喘急者死，不治。

白矾丸

白矾枯　定粉　寒水石煅，各等分

上为细末，烂饭研细和丸黍米大。每服五丸，煎乌梅汤送下，乳食前。

斗门散　治小儿泻痢多时，青黄羸瘦，脱肛不收。

诃子肉　枳壳去穰，麸炒黄　地榆各等分

上为粗末，每用一钱，米饮调下。一岁下者半钱，乳食前。

又方　治如前。

香附子　荆芥穗等分

上为粗末，每用三匙，以水一大碗，煎十数沸，淋科音斡。

又方　以浮萍草不拘多少，晒干杵为细末，干贴上。以蝴蝶儿不拘多少，阴干为末，涂手心，接上即止。

小儿卫生总微论方　卷十二

五　疳　论

小儿疳病，诸论丛杂，唯五疳之说为当。其证候外则传变不同，内则悉属五藏。一曰肝疳，其候摇头揉目，白膜遮睛，遍身多汗，喜覆面而卧，眼中涩痒，色泽青黄，发坚头焦，筋青脑热，腹中积聚，不痢频多，日渐羸瘦。二曰心疳，其候浑身壮热，颊赤面黄，心胸膈脘烦躁满闷，口舌生疮，盗汗多惊，下利脓血，神彩衰耗。三曰脾疳，其候腹大如鼓，上多筋脉，喘促气粗，心腹壅胀，多啼咳逆，水谷不消，唇口干燥，好食泥土，情意不乐，憎明好暗，利多酸臭，肌肉内消，形枯力劣，甚则大肉陷下。四曰肺疳，其候咳嗽气逆，皮毛焦落，咽喉不利，揉鼻咬甲，口鼻生疮，腹内气胀，乳食不进，大肠不调，泄利不常，憎寒体栗，粪中米出，洞下白沫。五曰肾疳，其候上热下冷，寒热时作，齿断生疮，耳焦胸热，手足逆冷，吐逆滑泄，下部生疿，脱肛不收，夜啼饶哭，渐成困重，甚则高骨乃败。小儿疳疾，乃与大人劳瘵相似，故亦名疳劳。大人劳者，因肾藏虚损，精髓衰枯。小儿疳者，因脾藏虚损，津液消亡，病久相传，至五藏皆损也。大人劳疾，骨削而气耗。小儿疳疾，腹鼓而神羸。以其病之始也，其藏之传受不同故也。至于传久，五藏皆损则一也。故五损者，经言一损于皮毛。皮聚毛落，肺也。二损于肌肉。肌肉消瘦，饮食不为肌肉，脾也。三损于血脉，血脉虚少，不能荣于藏府，心也。四损于筋。筋缓不能自收持，肝也。五损损于骨，骨痿不能起于床，肾也。病极则大肉陷下，高骨败坏，以至死矣。凡小儿疳疾，多是下药所坏。小儿藏府嫩软，易虚易实，一切于诸病误行转下。致脾胃虚弱，津液内耗，皆能成疳。且如潮热，日中时发者，是脾藏虚，心藏实。日中乃心用事之时。而内发其热，法当先补其肝母，肝乃心之母也。肝实而后泻心。心得母气则平，而潮热乃愈。医见潮热，妄谓其实，便以大黄、牙硝等冷药利之，利既多而不能禁，则津液内亡，渐成疳也。又如癖病发作，寒热饮水，胁下有形而硬痛，法当用药渐消磨之。医见有癖，便以巴豆、硇砂辈快药下之。下既多而津液耗，则渐成疳也。又如伤寒五六日之后，有下证，因以冷药下之太过，致脾胃虚而津液耗，即便引饮不止而热生，如此则热气内耗于津液，肌肉外消而羸瘦，他邪相干，证变百端，亦因成疳也。又如吐泻病久津液耗亡，亦能成疳也。又如小儿食肥甘物多，因伤为积，则蕴利发热，津液内耗，亦能作疳，故甘即疳也。《圣济经》云：肥甘之过，积为疳黄，乃谓是矣，故诸病皆能成疳也。甘疳之候，眼涩多困，或生白膜，唇口淡白，身色黄黑，食泥土生米，喜卧冷地，疥癣头疮，洞泄青白黄沫，下痢脓血，腹满喘咳，耳鼻生疮，发稀作穗，头大项细，肚大青筋，脚手垂弹，瘦瘠饮水，筋痿骨重，形劣尪羸，皆其证也。本因脾虚津耗，久则传变而成。传缓者则为慢疳；传紧者则为急疳。又当辨认冷热肥瘦。其肥热疳者，乃因食肥甘，积聚生热而作，故多病于初也。钱乙治用黄连丸，其瘦冷疳者，乃因转下泻利生冷而作，故多病于热，不可妄行转下，恐变生疳也。若病初之脾虚津少，发渴欲饮者，当生胃中津液，煎钱乙白术散与服。惟多则才好。其钱乙诸方，本集载之。

又有一证，其候腹中有块，身体羸瘦，毛

发焦稀，腹大气喘，冷痢脱肛，吃食爱吐，俗曰无辜。《宝鉴》云：按《玄》中记有无辜之禽，一名姑护，一名钩星鬼，但喜夜飞。人有暴露小儿衣袂裀包，其禽飞立在上，令儿患此疾也。予性好寻阅异书，十余年间，竟不知玄中记所出。又此禽既云夜飞，必有形状，世间亦莫之曾见，是必巫觋假以鬼名而伪言者也。今详其证，而对其病，实乃疳疾之候耳，特为破其邪说，以祛惑乱矣。

治五藏疳方

地黄丸　治肝疳拘急，疳气入眼隐涩，或生白膜晕翳赤脉等疾。

熟地黄八钱　山茱萸取肉，四钱　干山药四钱　泽泻三钱　牡丹皮去心，三钱　白茯苓去黑皮，三钱

上为细末，炼蜜和丸桐子大。三岁下儿一二丸，上者三四丸，温水化下，空心。

熊胆天麻丸　治肝疳羸瘦，摇头揉目，百脉拘急。

熊胆　天麻　羌活去芦　蝉壳去土　使君子去壳　胡黄连各一两　芦荟　干蟾涂酥炙黄，各半两

上为细末，粳米饭和丸黍米大。每服十丸，煎荆芥汤下，量大小与，无时。

夺命丹　治心疳体热，惊搐烦渴，发稀肚大，泄泻羸瘦。

朱砂　麝香　牛黄　脑子　芦荟　没药　硼砂　熊胆　麒麟竭半两　粉霜一钱　使君子十个去壳　青黛三钱

上为末，滴水和丸豌豆大。每服一粒，薄荷水化下，日三，儿大二三丸。

朱黄丹　治心疳挟惊，发热烦渴，盗汗羸瘦。

朱砂一分，研，水飞　天竺黄半两，研　干全蝎二十一个，微炒，去毒　天浆子十四个，去壳，微炒　人参去芦，一两　胡黄连一两　青黛一分，研　龙脑一钱，研

上为末拌匀，炼蜜和丸黍米大。每服十粒，人参汤下，无时。

黄垩丸　治脾疳发黄身肿。

黄土一两，末　陈皮去白，一两　木香一分　巴豆二十个，去皮膜，出油尽

上为末，饭和丸粟米大。每服三二丸，煎黑豆汁送下，无时。

木香煎　治脾疳因不知饥饱，积滞内停，腹大脚细，下利无度。

南木香一两，锉　肉豆蔻一两，面裹，煨，去面　干蟾二个，酥炙　胡黄连一两　使君子去壳，一两　五灵脂一两　巴豆七个，去皮、心、膜，纸裹，出油尽　麝香一分，研

上为末细匀，滴水和剂，入石臼杵一二百下，圆如黍米大。每服一二丸至五七丸，量大小与，温生姜汤下，乳食后，一岁下者一丸，二岁上者三丸，以意加之。

肉豆蔻丹　治脾疳。如前。

肉豆蔻一两，面裹煨　使君子去壳，一两　青皮去穰，一两，炒黄　牵牛子一分，炒黄，四味为末　芦荟一分，研　麝香半钱，研

上研匀细，糯米饭和丸黍米大。每服十丸，生姜汤下，食后。

香连散　治脾疳泄泻，腹大脚细，渐成瘦弱，及诸脾胃不和，气不调顺，并能治之。

木香一分　黄连去须，半两，炒　诃子煨，去核取皮，一分　肉豆蔻三个，面裹煨，去面　甘草一分，炙

上为细末，每服一字或半钱，米饮汤调下，乳食前。

麝香丹　治肺疳皮毛枯燥，咳嗽上气。

胡黄连一两　半夏半两，汤洗七次　紫苏子一分，微炒　五味子一分　干蟾一个，酥炙焦，以上先为末　麝香一分，研　芦荟一分，研　朱砂一分，研

上为末细匀，枣肉和丸黍米大。每服五七粒，米饮下，无时。

灵砂丹　治肺疳因咳嗽羸瘦，皮枯毛落。

人参去芦，半两　甜葶苈一分，炒　五灵脂一分　胡黄连一分，四味为末　辰砂半两，研　麝香

一分，研　芦荟一分，研　杏仁去皮、尖，麸炒黄，一分

上为末拌匀，粳米饭和丸黍米大。每服十丸，人参汤下，无时。

石绿散　治肾疳耳上生疮，及治肥疳头疮鼻烂，浸久不差。石绿、白芷各等分，为末。先以生甘草水洗疮，拭干傅药，一日愈。

乌金膏　治肾疳入经，灌注阴囊，黄亮色肿。

通草一分，烧　黄皮一分，烧　大黄一分，烧　各存性

上同研为末，每用一钱，以猪胆调成膏。于阴肿处遍涂之。如未退，更煎蛇床子汤洗之，再调涂必效。

二肝丸　治疳痢不止。

龙胆草去芦，一两　漏芦去芦，一两　菖蒲一两，九节者　胡黄连半两　地榆半两，以上先为末　鸡肝一两，锉　猪肝一两锉

上将药末入二肝内裹定，以水二盏，入盐少许，煮至肝熟，于石臼中杵一二百下成膏，丸黍米大，每服十粒，麝香汤下，食前。

金灵散　治肾疳时久，骨沉力弱，项细头重，致天柱骨倒，不能惊举抬头。

又以白僵蚕不拘多少，拣直者去丝、嘴，炒焦为末。每服半钱或一字一钱，薄荷酒调下，日三，须臾用生力散涂之。

生力散

上以鳖子三个，苘麻子三十个，各去壳取肉同研细。每用一钱许，津唾调摊纸上，先紧抱定儿，揩项上令热，贴之。

治疳泻方

赤石脂散　治疳泻不止。

赤石脂　川芎各等分

上为细末，量大小多寡，米饮调下，乳食前。

二圣丸　治泻久不愈，羸瘦成疳，宜常服之。

川黄连去须　黄柏去粗皮，各一两

上为细末，将药入猪胆内，汤煮熟取出，丸绿豆大。每服二三十丸，米饮下，无时。

竹茹丸　治疳气泄泻烦渴，其效如神。

好黄连去须土，一两，锉作块子，一一相似　吴茱萸拣去枝梗，一两

上二味，以蜜相和拌匀，炒赤黄色，去茱萸，只用黄连为末，薄糊和丸萝卜子大。每服十丸，煎竹茹米饮送下，无时。

六神丹　治疳气羸瘦，藏府怯弱，泄泻虚滑，乳食减少，引饮无度，心腹胀满。

丁香　木香　肉豆蔻各半两，并面裹，煨用　诃子半两，煨去核，称　使君子去壳，半两　芦荟一两，细研

上为细末，枣肉和丸麻子大。每服五七丸，温米饮下，乳食前。服此药于夏秋间，应小儿泄泻色白，或泻多服药不差者，但与之便定。

如圣丸　治冷热疳泻。

胡黄连　川黄连去须、土　白芜荑去扇取仁炒，各二两　使君子去壳，一两　麝香半钱，研　干蟾三个，锉，酒熬膏

上为细末，入蟾膏和丸麻子大。二三岁以下者儿五七丸，以上者十丸一十五丸，人参汤下，食前。

木香散　治疳泻腹胀。

木香　青皮去穰，各一两　陈粟米一合　巴豆三十粒，去皮，同米炒至巴豆黑色，去巴豆，留米用　草豆蔻二个，一个生用，一个面裹煨熟　蛴螬二个，去头足、翅，糯米炒焦，去米

上为细末，每服一字或半钱，米饮调下，食前。

硫黄丸　治疳泻色白如米泔。

巴豆十四个去皮、膜，出油尽　硫黄末一钱　青黛一钱，末　芜荑去皮，一钱，末

上拌研匀细，水浸蒸饼和丸绿豆大。米泔水送下三丸，食前。

金粟丹　治疳瘦泄泻腹大，好食泥土。

母丁香　草龙胆去芦　厚朴去粗皮，生姜制　朱砂研，飞　青黛研，各一两　夜明砂微炒　蝉

壳去土尽　诃子肉微炒

上为细末，和蜜一半面糊一半，相和丸黍米大。每服十粒，米饮下，无时。

橘香丸　治疳积黄瘦，盗汗腹胀泄泻、宿滞不化，气促发喘。

陈皮　木香各一两　姜黄切片　草豆蔻仁　白术煨，炒　牵牛子　炒，各半两

上为细末，滴水和丸麻子大。每服十丸，葱白米饮下，食后。

木香芥粒丸　治如前。

陈粟米二合　巴豆半两，去皮膜，同米炒至米焦，去巴豆，用米　陈皮半两　槟榔一两，研细　人参去芦，一分　木香一分

上为细末，饭和丸芥子大。每用看虚实大小加减，三五丸，米汤下，不拘时。

麝香丸　治脾热生疳泄泻，气弱不食。

川苦楝取肉一两，用童子小便浸一宿，焙干　巴豆半两，去皮膜，同苦楝慢火炒至微紫色，去巴豆不用　芦荟　槟榔　芜荑去扇，各半两　没石子一分　麝香少许

上为细末，猪胆汁浸蒸饼和丸黄米大。每服十丸，米饮下，食后。

吴婆散　治疳泻不止，不计度数，渐成羸瘦，饮食减少，众药不效。

桃根白皮一分　黄柏蜜炙，一分　芜荑去皮，一分　黄连去须，一分，微炒　没石子一钱半　厚朴去粗皮，姜制，一钱　木香一钱　丁香一钱　楝根白皮半分　槟榔一钱

上为末，三岁以下儿每用半钱，以上至六七岁者一钱，煎紫苏、木瓜米饮调下，食前。日三，屡验。此药性小温，暴热泻者不可服。

一方无没石子、丁香、槟榔三味。

水蓼丹　治疳气羸瘦血痢。

蛇蜕一两　牛黄一分，别研末　鸡头壳一两，二味烧存性　胡黄连半两　水蓼半两，焙　朱砂半两，研　芦荟一分，研　粉霜一分，研

上拌匀细，软饭和丸黍米大。每服五七粒，麝香汤下，无时。

龙骨汤　治疳气瘦弱，下痢白脓，久而不差。

龙骨半两　诃黎勒皮半两，焙炮　赤石脂半两　酸石榴皮一分，炒黄　木香一分　使君子仁一分

上为细末，每服一字或半钱，麝香汤调下，无时。

丁香散　治如前。

丁香二个　黄连一寸　大枣一个，去核

上以枣裹二药，麻缠，火上烧存性，研为细末，米饮调下，无时。

芜蔚粥　治如前。

上以芜蔚叶即益母草也，煮粥食之，或取汁饮亦妙。

蔷薇汁　治如前。

上以生蔷薇根洗净，细切煎浓汁，稍稍饮之。

胜金丸　治如前，及加腹胀。

上以鸡子一枚，打一眼子，如豆大，入去皮巴豆一粒，腻粉一钱在内，以五十重纸裹，子饭甑内蒸三次，取鸡子肉同药研，更入麝香少许纪匀，添少糊，丸如黍米大。食后临卧温汤下二三丸，量大小与服。一方用鸡子一枚打破，和腻粉炒干为散，米饮调一字或半钱服。

薤糯饼　治如前

上以薤白一握，生杵如泥，同蜜和糯米粉研作饼，炙热与吃，不过二三次，差。

樗白棋子　治如前。

上以樗根白皮捣细碎，面拌和，切作小颗棋子，日晒少时，又拌面一次。凡三过为度，水煮熟，加盐醋顿服，量大小与，困重者服之。差。

樗根米泔汁　治如前。

上以樗根白皮煮浓汁，半鸡子壳，和粟米泔半鸡子壳，同灌下部，再作即差，其验如神。

木香使君丹　治疳气羸瘠，虽能食，不生肌肉，时时泄利无休。

使君子去壳，二两，炒　木香一两　丁香一两　厚朴去粗皮，生姜制，一两　没石子一两　胡黄连一两　肉豆蔻面裹，煨，去面，一两以上先为末　芦荟一分，研　麝香一分，研

上为末同匀，以粟米饭和丸黍米大。每服十粒，煎陈橘皮汤下，无时，乳食前。

君子丸　治疳劳发热，寻眉咬甲，发疏腹胀，不思乳食，羸瘦虚滑，下痢无度，爱食泥土。

厚朴去粗皮，姜制　甘草炙　青黛　诃子炒，去核，取皮用，各半两，一方一两，半生半熟　陈皮一分，去白　白芜荑去扇，三分　使君子去壳，一两，面裹，煨熟

上为末，炼蜜和丸鸡头子大。三岁下儿半丸，上者一丸，乳汁或米饮化下，若夹惊热泻，用之极妙。

青黛散　治诸疳泻痢，毛焦羸瘦。

上以青黛研为细散，水调服之，量大小与。

歌曰：

孩儿杂病变成疳，不问强羸女与男，
或似积伤食不进，渐成柴瘦困耽耽，
体热口干频饮水，皮毛枯槁四支摊。
腹大时时更下痢，青黄白赤一般般，
眼涩面黄鼻烂赤，口气增寒卧不安，
忽然泻下如泔淀，又似脓胶涕作团，
肛头凸出饶呕噎，不饮哺乳泪潸潸。
腹中有病须医疗，何须祈祷赛神盘，
此方便是青黛散，孩儿服饵立安痊。

赤虎丸　治疳积泻痢。

朱砂别研　胡黄连　川黄连去须　芦荟腻粉各一分　硫黄别研，二钱　肉豆蔻面裹煨，一个，去面　巴豆二十四个，去皮用，麸炒至麸黑，去麸，用巴豆，别研　麝香少许

上为细末研匀细，面糊和丸如萝卜子大。甘草汤送下，一岁儿一丸，以意加减。

漏芦煮肝散　治疳气肝胀，冷热不调，泻痢无度。

上以漏芦一两为末，每服一钱匕，猪肝一两，盐少许，水煮熟，空心顿服，大治无辜疳。

君子散　治五疳小便白浊，泻痢无度。

上以使君子仁为末，米饮调服，食前。

厚脾丸　治疳劳虚冷，白痢泄泻，手足逆冷。

厚朴去粗皮，姜制，半两　肉豆蔻一个，面裹煨，去面　龙骨半两，煅　诃子肉煨去核，用半两

上为细末，糊丸绿豆大。米饮下十丸，无时。

虾蟆丸　治诸疳疳泻。

芦荟研　黄连去须　谷精草　桂心　朱砂研，各一钱　缩砂仁二钱　熊胆半钱，温水化研　麝香半钱，研

上除研药外，锉细，用一大虾蟆去了肚肠，入锉药在内，以线缝合。先用好醋浸少时，次慢火炙，酒醋又炙，至焦黑，放冷，杵研为末，入研药拌匀，取猪猪胆汁和丸绿豆大。每服五七丸，米饮下，量大小加减。此乃知信州王绍祖方。

治诸疳虫动方

肥儿丸　治诸疳，久患藏府。胃虚虫动，日渐羸瘦，腹大不能行，发竖作穗，肌体发热，精神衰弱。

黄连去须　神曲炒，各一两　使君子仁　肉豆蔻面裹煨去面　麦蘖炒，各半两　木香二钱　槟榔二个，不见火

上为细末，面糊和丸萝卜子大，每服二三十丸，熟水下，食空服。

芦荟丸　治五疳羸瘦，虫咬腹痛，肚大青筋，一切疳疾。

芦荟　木香　胡黄连各一个，干蟾一个，酒浸炙焦　槟榔二钱，炮　青黛二钱　青皮去穰，称一分，切碎，入去皮巴豆十个，炒令焦，去巴豆，只用青皮　使君子仁三十个　芜荑一钱，用仁　麝香一字

上为细末，用猪胆汁和丸黍米大。每服十丸，米饮下，无时。

又方

芦荟　木香　胡黄连　川黄连去须　青皮去穰　白芜荑取仁　雷丸　鹤虱微炒，各半两　麝香一钱，研

上为细末，粟米饭和丸绿豆大。米饮下，一二十丸，无时。

又方

芦荟半钱　赤石脂一钱　使君子七个，去壳　雷丸一钱　姜黄一钱　川楝子去核，一钱　槟榔一钱　巴豆七个，去皮膜，出油尽

上为细末，猪胆汁糊圆黍米大。一岁儿二三丸，以上者三四丸，量大小与之，冷木香汤下，无时。

麝香黄连丸　治疳气羸瘦，白虫作。

胡黄连　白芜荑去扇，各一两半　宣连去须半两　辰砂一分，研　麝香一字，研　木香半两

上为细末，糊丸绿豆大。米饮下五七丸，三岁上者十丸，无时。

榆仁丸　治疳热瘦悴，虫作腹痛。

榆仁去皮　黄连去须，各一两

上为细末，用猪胆七个取汁，在碗中和药安甑上，蒸九次，每日一次，候数足，研麝香半钱入之，以白汤浸蒸饼和剂，丸绿豆大。每服五七丸至一二十丸，米饮下，无时。

雄黄丹　治五疳羸瘦，多生虫动。

干蟾酥，炙焦　胡黄连　白芜荑去扇　川黄连去须　干漆半两，炒烟尽先为末　雄黄半两，研，水飞　麝香一钱，研

上为末拌匀，猪胆汁和丸黍米大。每服十粒，新汲水下，无时。

干漆散　治疳疾蛔动，腹肚疼痛。

干漆一钱，炒烟尽　使君子十四个，去壳　白芜荑六卜片，去扇　楝树东边皮日晒，去粗皮，取白皮，一分

上为细末，每二三岁儿半钱，以下者一字，沙糖熟水调下，无时。

使君子散　治如前。

使君子仁一钱，炒　黑牵牛炒过为末，二钱　轻粉二钱匕

上为末，每用半钱，于五更初，疏米饮调下，无时。

三根散　治疳疾蛔作腹痛，啼叫不止，每至月初间即甚，状如神祟。

贯仲根去上　棠梨根取皮用　酸石榴根各两　栗刺　故绵　干漆各半两

上六味，并烧存性，为细末，每服一钱，水八分盏，煎至四分，去滓温服，无时。

猪肚丹　治疳瘦盗汗少力，大便有虫，曾经大效。

川黄连去须　胡黄连　木香各一两　羌活去芦　芦荟　肉豆蔻面裹煨，去面　白芜荑去扇　鳖甲酥炙焦，去裙襕，半两

上为细末，用猪肚一个，先刷令净，以好白芷二两内肚中，蒸极软熟，去白芷不用。却入诸药缝合，再蒸如泥，取出，同肚入臼，杵二三百下成膏，丸黍米大。每服十粒，米饮下，量大小加减，无时。

绿矾丸　治疳疾有虫，爱入泥土。

上以绿矾为末，猪胆汁和丸绿豆大，每服五七丸，米饮下，无时。

又方　治如前。

上以市合人聚时，买市中羊肉半斤，用绳系之，顿地上，令人把绳头拖至家，水洗净炒，炙，依科与儿食之。未能食者，煮至汁与饮。

一方　肉一斤，绳系曳数里，勿洗，炙与食。

除毒丹　治疳蛔不差，传染兄弟姊妹。

鬼臼一两，去毛　苦参半两，锉　青葙子半两　龙胆草去芦，半两　硫黄一分　绯绢一分　干蟾一分　白矾一分

上件药锉拌一处，并烧存性为末，炼蜜和丸麻子大。每服十粒，磨沉香汤下。无时。

治小儿疳蛔

上以鸬鹚粪干为末，炙猪肉蘸与之啖，奇妙。粪多在石之上，紫色如花，就上刮取之。

治小儿疳湿痛痒，下部生蠹虫蚀疮。

以没石子为末，吹下部中。又以地榆煮汁洗之，日二。又以铁衣著下部中。

治小儿疳湿生蜑蚀痛。

以地菰酱一把，水二升，煮至半升，空腹服半合、大小以意加减。

治小儿疳热，伏结肠中，下赤黄汁沫，及如鱼脑杂血，肛中疮痤蜑生，虫蚀痛痒。

黄连去须　柏皮炒　苦参　鬼臼　独活去芦　橘皮　芍药　阿胶各半两，锉、蛤粉炒，去蛤粉

上为末，以蓝汁入少熟蜜，和丸小豆大。每服五七丸，米饮下。无时。冬时无新蓝取汁，用子一合，舂为末，入药内蜜丸。

治小儿疳湿生蜑蚀，下部痒痛。

胡粉　雄黄各一分，水研飞

上同研细，每用少许，傅下部中。

治小儿疳痢不差，久成湿蜑。

上以艾叶半两，水一升。煮取半两，量儿大小，以意加减与服。

治诸疳方

五疳保童丸　治五藏诸疳一切并主。

青黛研　雄黄研　麝香研　芦荟研　熊胆研　胡黄连　黄连去须　龙胆去芦　苦楝皮取皮　虾蟆灰　蜗牛微炒　白鲜鱼炙焦黄，无，即炒白龙骨代　夜明沙微炒　五倍子　青皮去白　天浆子微炒，各一分　蝉头一枚，炙令黄

上为细末，糯米饭和丸麻子大。每一岁儿十丸，温米饮下，日三服，无时。

龙香散　治五疳瘦悴，多啼呕嗌，口疮发穗。

白术一分　石胆半钱，研　龙齿一钱　陈皮末，一钱　麝香半字，研

上为细末，每服半钱，米饮调下，二岁下者服一字，无时。

圣功散　治五疳。

苦楝根皮生字，东引者，米泔浸一宿　鹤虱各等分

上二味为末拌匀，每服半钱，熟水调下，连进二服，无时。

使君子丸　治诸疳，和脾胃。

使君子仁一两　川芎一分，生　厚朴去粗皮，生姜汁涂炙，用一分　陈皮一分，去白称

上为细末，炼蜜和丸皂子在。三岁以上一粒，以下半粒，陈米饮化下。无时。

二香青蝉丸　治久疳积热。面青口干，咬甲拭眉，爱盐食土，咳嗽，肚大青筋，柴瘦旭羸。

母丁香三个　麝香半字　青黛一分　蝉一只，去肠肚，炙令焦黄

上为细末，煮浆水饭和圆粟米大。温水送下三丸。无时。

芦荟丸　治五疳不长肌肉，食减，日渐黄瘦。

芦荟　芜荑去皮　青黛　槟榔　黄连去须，各一分　胡黄连半两　蝉壳二十一个，去土　猪胆一个　麝香少许

上除猪胆外，为细末，却用猪胆和丸麻子大，每服五七丸，米饮下，无时。

橘连丸　治疳气脾胃不和，饮食不化，日渐羸瘦。

陈皮一两　黄连去须，一两，米泔浸一宿

上为细末，别研麝香末半钱拌匀，用猪胆七个，分药入胆内，浆水煮。候至临熟，各以针微扎破，以熟为度，取出。入粟米饭和丸绿豆大。每服一二十丸，米饮下，无时。

熊胆丸　治诸疳羸瘦。

熊胆　使君子仁各等分

上研细，放入磁器中蒸熔，宿蒸饼就丸麻子大。米饮送下二十丸，无时。

蜗牛壳　治一切诸疳。

右以蜗牛壳七个，洗去尘土晒干，内酥蜜于壳中，瓷器盛之。纸封糊盖，于蒸饭下馈时盛馈中，蒸至饭热，取出细研，渐渐令服，一日至尽。

香蝉丹　治诸疳肌瘦，肚大筋多，发稀脚细。

干蝉五个，水浸去骨，用瓦藏瓶一个，顶上取一窍，入蝉肉在内，盐泥固济，通留窍子木炭火烧至烟息存性，取出放地上一宿，出火毒为末　胡黄连二两　蛇蜕一

两，烧灰　地龙去土、半两，微炒　天竺黄一分　朱砂半两，研　麝香一分，研

上为末匀细，糯米饭和丸黍米大。每服十粒，米饮下，无时。

夜明砂丹　治五疳腹胀，目涩多睡。

夜明砂一两，微炒　胡黄连半两　龙胆草去芦，半两　苦楝根皮半两　干蟾五个，烧存性，以上五味先为末　青黛　麝香　芦荟各一分，研细

上研匀细，粳米饭和丸黍米大。每服十粒，米饮下，无时。

紫霜丸　治诸疳发热，肚大脚细，发穗面黄，宿滞不消，或作寒热，腹内疼痛，经年瘦弱，及中恶等病。

代赭石火煅米醋淬，不拘遍数，以手捻得碎为度，半两，研细水飞　牛黄二钱，研　朱砂一分，研　麝香一钱，研　鳖甲一分，醋炙　巴豆一分，去皮心膜，出油尽　枳壳去穰，麸炒，二钱　当归去芦并土，二钱，炙　甘草二分，炙　木香一分　生犀木二钱　大黄三分

上为细末，炼蜜和丸黄米大。每服三五丸，米饮下，无时。

如圣丸　治五疳羸瘦，面黄腹急，盗汗体热，乳食不消。

白芜荑微炒，去皮，二两　黄连去须　神曲炒　麦蘖微炒，各一两，净

上为细末，猪胆汁煮糊和丸黍米大。每服一二十丸，米饮下，量大小虚实加减。

一方有陈皮、木香各半两，又名益儿丸。

鳖甲黄连丸　治诸疳羸瘦，发热盗汗寒热，肚大脚细，不肯进乳食，气粗促急，脾胃不调等证。

鳖甲盏子小便、米醋各半盏，慢火上醋炙至尽，色焦黄　黄连用巴豆七个，去皮膜，用水一盏，同煮水尽，去巴豆不用，只使黄连　白术　人参去芦　茯苓　甘草炙　川楝子肉　使君子仁　木香　草豆蔻炮，去皮　柴胡去芦　陈皮去白　草龙胆各半两

上为细末，猪猪胆汁和丸绿豆大。每服一二十丸，米饮下，如有潮热，体热不解，乌梅汤下。

熊胆丸　治一切诸疳羸瘦。

熊胆　芦荟　胡黄连各半两　牛黄一分，研　麝香一钱，研　蟾酥少许，研，入面煮糊和剂

上匀细末，入蟾酥糊和丸绿豆大，每服五七丸，麝香汤下。

金瓜丸　治疳热黄瘦，作热发渴，久服解热，进食肥肌。

黄连去须　黄柏　甘草炙　青皮去穰，各等分

上为细末，猪猪胆汁和匀，却入胆中，线系定，于银石器内，以浆水煮五七沸，取出，风里悬一宿，于胆内出药入钵，再入麝香少许，同研烂匀，丸绿豆大。三岁下五七丸，上者十数丸，空心米饮汤下，日三服，无时。

肥肌丸　治五疳黄瘦，久不美食，手与脚俱浮肿，烦渴饮水，常服退热肥肌，杀虫去疳。此卫小儿之宝也。

川楝子去核取肉，二两　川芎二两　橘皮拣净，四两　龙胆去芦，二两　巴豆十四个，去皮同橘皮、龙胆炒至焦，去巴豆不用

上为细末，面糊和丸麻子大。朱砂为衣，每服十丸十五丸，米饮下，腹胀橘皮汤下，无时。

香蟾丸　治诸疳。

大蟾一只，去肠肚，好醋浸三日，烙焦干　甘草一分，炙　芜荑去皮，一分　黄连去须，一分　夜明砂半合，用粳米百粒，同炒至焦黄，去米　使君子去壳，一分　麝香一字，研

上为细末，猪胆汁和丸萝卜子大。每服五七丸，米饮下，无时。

又方　名同，治同。

干蟾三个，酥炙，焦黄　五灵脂去砂石，二两　蝉壳去土，半两　雄黄半两，研飞　诃子肉，半两　母丁香半两　胡黄连一两　黄连去须，一两　使君子仁一两　青黛一分

上为细末，面糊和丸绿豆大。汤下二三十丸，无时。

又方　名同，治同。

鳖甲去裙襕，醋炙黄　虾蟆炙黄　诃子炮，取

肉　木香各一两　芦荟研　铁粉研　雄黄研飞　胡黄连各半两　麝香一分，研

上都如粉细匀，糊丸粟米大。每服一十丸，米饮下，病人羸瘦者，不过五七服愈，曾经效验。

牛黄煎　治诸疳食伤，气胀体瘦，壮热发穗，多困尪羸，齿烂鼻疮，泻痢丁奚，潮热等疾。

大蟾一只，去皮、骨、肚、肠，炙焦为末，用无灰酒一盏、猪胆一个，取汁同熬成膏　胡黄连　诃子炮，取肉　使君子仁　蝉壳去土　没石子　芦荟　芜荑去扇　熊胆　夜明砂　朱砂水飞　雄黄水飞，各一分　木香　肉豆蔻面裹煨，去面，二味春夏用半分，秋冬一分　牛黄一钱，别研　麝香一钱，别研　脑子半钱，别研

上为末，入蟾膏和丸麻子大。米饮下五七丸，惊疳金银、薄荷汤下，干疳腹胀桃仁、茴香汤下，疳蛔东引石榴、苦楝根汤下，五岁上者十丸。此药尤治疳利，若挟热者不可服。

黄连丸　治疳气眼涩多困，手足发热，脾胃虚弱，发黄作穗，渐渐羸瘦，不思乳食。

胡黄连　使君子肉　白芜荑去扇，各一分　巴豆十四个，去皮膜，出油尽

上为末，猪胆汁和丸麻子大。每服三五丸，米饮下，空心日二服。

芦荟丸　治五疳面黄肌瘦，腹胀发穗，目涩口臭，断烂鼻疮，咬甲拭眉，爱吃泥土，泻痢无度，寒热往来。

干蟾　大皂角二味等分，同烧存性，为末，每一两用下项药　青黛一分，研　芦荟一钱，研　麝香一钱，研　朱砂一钱，研水飞

上为末和匀，浸蒸饼和丸麻子大。每三岁下见一十丸，上者以意加至二十丸，温水饮送下，无时。

龙胆丸　治诸疳发热。

龙胆草去芦　黄连去须　使君子肉　青皮去穰，各等分

上为细末，猪胆汁和丸萝卜子大。每服一二十丸，熟水下，无时。

粉糖丸　治疳爱食泥土。

上以腻粉一分，用沙糖拌和，丸如麻子大。米饮下一丸，良久取下泥土，立差。

龙粉丸　治疳渴饮水。

龙胆草去芦　定粉微炒　乌梅肉焙，称　黄连去须，各半两

上为细末，炼蜜和丸麻子大。米饮下一二十丸。

香葛散　治如前。

藿香去土　干葛　甘草炙，各一两　白梅肉半两，炒

上同为细末，煎浮萍草汤调下半钱，量大小与服，无时。

熊胆丸　治疳瘦肚肿，烦渴吃水。

熊胆　雄黄　佛顶青各半两，入麝香少许，同研　肉桂末　人参各一钱，末

上为末同匀，糯米粥和丸绿豆大。每服五七丸，米饮下，无时，此方大妙。

推水散　治疳渴众药不效。

天仙子不以多少，新瓦上焙干，四月间采，又名水仙子，乃蝎虱也　干姜一两，炮　乌梅肉一两，焙称　汤瓶碱半两　甘草一分

上为细末，每服半钱或一字，煎水索头汤放冷调下，无时。良久推水不要饮，是效。

覆蚕丸　治诸疳泻痢惊风等疾，久不痊差，及断乳后羸瘦，尪羸渐困，不能治者，回死神妙。

覆蚕　个以线串其头，阴干，只取向后有粪处，细研，覆蚕是第二次出者蚕　辰砂三分，研，水飞　麝香三字，研　葶苈三钱半　雄黄三钱半，研，水飞　胡黄连三钱半

上为末，以新蒸粟米饭一块，泥裹煨之，取中心软者和药，丸绿豆大。每服五七丸，麝香汤送下。

鸡肉煎丸　治十岁以上疳劳壮热，形瘦骨热，渐成劳瘵者。

宣连去须土，二两　柴胡去芦，一两　芜荑去扇，半两　川鹤虱半两　知母一两　秦艽去芦并土

净，一两　黄芩一两　使君子肉一两

上为细末，以黄雌鸡一只，重一斤许者笼之，专以大麻子饲五日。杀之，去毛令净，于臀间开一孔，去肠肚净洗拭干。入药末在鸡腹内，以线缝合。用一小甑，先以甑底铺黑豆厚三寸，顿鸡在中，四傍又以黑豆围塞，上亦以黑豆盖之。自日出蒸至晚卫后，放温冷取鸡，出腹中药别炖，将鸡臁剔去筋、骨、头翅，以净肉研和药得所。如干入少酒，糊丸如麻子大。及绿豆大两等。每服一二十丸，以意量大小加减。空心临卧煎麦门冬熟水下，如疳劳骨热发蒸。年十五以上，温酒下，忌猪肉。

蝎虎丹　治一切诸疳羸瘦下痢，证候全备，又如有邪，此乃疳毒传深。俗呼无辜者，此乃疳毒也。

干蝎虎雄者，一个，微炙　蜗牛壳一分细研　兰香根一分　靛花一分　雄黄一分，研，水飞　麝香一分，研　龙脑半分，研

上为末，入研拌匀，米醋煮面糊和丸黍米大。每服十粒，煎芝麻汤下，乳食后，量大小轻重加减。无时。

香甲汤　治如前。能祛毒辟邪。

漏芦去芦，一两　沉香一两，锉　牛蒡子半两微炒　安息香去芦，半两　诃黎勒皮半两，微炒　鳖甲涂酥，炙焦黄，去裙襕，半两　乳香半两，研细

上为末匀细，每服一钱，水八分，入人参少许，同煎至四分，去滓温服，量大小加减，无时。

大麝香丹　治诸疳积癖羸瘦，肚大青筋，头重项细，腹中有积，毛焦气急，俗呼为丁奚。呼为无辜，此皆疳证也。

麝香半两，研　朱砂半两，研，水飞　粉霜半两，研　五灵脂拣净，一两　肉豆蔻面裹煨，一两　干蟾一两　夜明沙半两　白矾枯，半两　地龙去土，一分，炒　干蜣螂七个，去翅、足，炙黄焦

上为细末，入研拌匀，炼米和丸黍米大。每服五七粒，温水下，无时。

问命散　一切诸疳，可分轻重逆顺。

瓜蒂半两　细辛去苗，一分　干地龙去土，一分，炒　白矾灰一分　藜芦去芦，一分

上为细末，每用少许吹鼻中，得嚏即吉，若有虫出即愈。

治小儿脑疳鼻疼，毛发作穗，面黄羸瘦。

以鲫鱼胆汁滴鼻中，连三五日效。

治小儿腹疳　以蜘蛛烧熟啖之。

治小儿疳热，烦渴干瘦。

以蜗牛三四十个，放一净盘中，以物盖之，令行，即有涎似银泥，同腻粉和揩，便丸如黍米大。温水送下三丸，无时。

治小儿疳渴，饮冷不休水。

麝香　人中白各一分

上同为末，蒸饼和丸麻子大。一二岁服二丸，煎皂子汤送下，空心服。

还肌散　治小儿疳泻及洞泻谷不化。

肉豆蔻一个　诃子二个，去核　没石子一个，三味各用大麦面裹，慢火煨焦黄香熟，勿令有烟出　木香半皂子大

上为细末，每服半钱，米饮调下。如人行五里久。更进一服，神验。仍调服，须用陈米饮也。

又方　治如前。

黄连去须，一两　木香半两　芜荑去扇，一分　槟榔一个

上为末，猪胆汁和丸绿豆大。每服十丸，米饮下，无时。作三等丸，量大小与服，治疳痢日夜无度。

治疳泻　以赤石脂研如面，粥饮调半钱服，立差。

一方以川芎等分同为末服，妙。

芦荟丸　治小儿诸疳。

芦荟　槟榔　芜荑炒，取仁　胡黄连　川苦楝和核锉片，面炒　使君子仁　雷丸浸，刮去黑皮，各一分　橘皮半两，洗净　巴豆四十九个皮膜，同橘皮炒至巴豆焦色，只留二个半，余者巴豆不用，全用橘皮

上为细末，猪胆汁煮糊和丸麻子大。朱砂、麝香细末为衣，每服十丸十五丸。如头面浮肿，木瓜汤下。若泻而发渴，陈米饮下。

更量大小加减。

又方　名同治同。

芦荟　黄连去须　川楝子和核锉　芜荑去扇，各三分　天竺黄一钱半　麝香少许，研

上为细末，以猪胆汁和饭研烂和剂，于甑上蒸两次，丸绿豆大。以朱砂为衣，每服五七丸至十丸，熟水下，无时。

鳖血煎丸　治小儿诸疳。

吴茱萸　胡黄连锉碎，用鳖血浸一宿，同吴茱萸炒令干焦，去茱萸不用　白芜荑仁　柴胡去芦，各等分

上为细末，用猳猪胆汁浸蒸饼和丸绿豆大。每服十圆，熟水下，无时。

捉疳丸　治小儿一切诸疳。

蛆退先用米泔浸三日，以杖子搅击漉出。又以泔水浸三日五日，搅击淘漉如前，次入清水浸淘二日，至无秽气净时，于日中晒干。男子患用黄连，女儿患用黄柏。与蛆退等分为末，每药末半两，入麝香半钱，同研匀，以猳猪胆汁和丸黍米大。每服三四十丸，量大小加减，空心陈米饮送下，神效屡验。一方六月取粪坑中蛆，水淘净。入竹筒盛，封口至干时为末。每服一二钱，入麝香，米饮调下，甚妙。

消疳丸　治小儿诸般腹胀，四支肿满，气上喘促，小便不利。

木香　槟榔各二两　青皮去穰　姜黄　萝卜子炒　牵牛子各取七钱半

上为末，糊丸黍米大。每服二三十丸，食后姜汤送下，无时。

治小儿一切疳疾，以棘针瓜蒂等分为末，每用取黍米许，吹鼻中。日二次用。

治小儿诸疳，以黄连不拘多少，同乌梅煮至黄连透时，只用黄连为末，别以乌梅肉和丸，如麻子大。每服二十丸，温水下，无时。量大小加减。

熊胆麝香丸　治小儿一切疳疾，心腹虚胀，爱食泥土，四支壮热。

熊胆一钱，研　麝香半钱，研　壁宫一枚，去头、足、尾、面裹，煨熟，刨　黄连去须，取末，一钱

上同研极细，以蝉酥和丸黍米大。每服五丸，米汤送下，量大小加减，无时。

香蟾散　治小儿食疳羸瘦，不进乳食。

干蟾一枚，涂酥，炙微黄　蜣螂一分，去翅、足，微炒　麦蘖一分，微炒　神曲一分，微炒

上同为细末，每服半钱，粥饮调下，无时。

又方　治同前。

朱砂一钱，研，水飞　麝香半钱，研　端午日蟾眉脂

上将蟾眉脂和二味，丸麻子大。空心米饮下一丸，如脑疳以乳汁调内鼻中，无时。

治奶疳水泻　以川椒一分去目并闭口者，为末。酥调少许傅脑，上日三次。治疳痢垂死　以益母草煮食之，取足即差，甚佳。取汁饮之，亦治痔妙，以地榆煮汁和饧糖食之。

以楮白皮和食粳米、葱白、甘草、香豉，同煎饮服。

治小儿疳渴，饮水无度。

以大点鱼一头，先烧一地坑令红，投鱼坑中，便以蛤粉，专令一人掺在鱼上，须臾取出，用芦刀刮下粉，入麝香少许拌匀，和丸萝卜子大。每服五丸，桶绳根煎汤送下。一方云：冷水旋丸服。

五疳丸　治小儿一切诸疳。

川楝子　川芎等分

上为细末，以浆水煮猪胆取汁，和丸麻子大。每服一二十丸，温水送下，日三四服。

治小儿疳气不可疗者。

以绿矾火煅通赤，酽醋淬之，如此三次。细研为末，枣肉和丸绿豆大。每服五七丸，温水下，无时，日二三服。

桃柳汤　一切诸疳，服诸药后，皆可用此法也。

上以桃、柳枝各一握并锉，用水两大碗，煎数沸，通手浴儿，甚佳。浴毕，用一青衣盖之，疳虫自出为验。

小儿卫生总微论方　卷十三

诸虫论

经言人藏府中有九虫，内三虫偏能发动为病。人藏府实强，则不能为害；若藏府虚弱，则随虫所动而生焉。故经亦别立三虫之名，一曰蛔虫。又曰长虫。居胃脘之间，动则令儿吐青白沫，或吐清水，心腹刺痛，若虫贯心者即死。二曰蛲虫。居洞肠之间，多则发动为痔瘘蜃蚀，疮疥痈癣。三曰寸白虫。居肠胃之间，动则损人精气。令腰脚痛弱。更有一虫，形若细丝，或如马尾，故俗呼谓之马尾虫。此虫不拘久虫之数，或云饮食中误咽油发所变，亦居胃中，动则令儿腹中搅刺发痛，不可忍受。小儿虫动者，多病于诸病之外，盖因藏府虚弱故也。患疳劳吐泻者尤甚。钱乙论小儿虫动之证面眺白，心腹痛，唯是口不吐沫，及无清水出也。故乙又言心腹痛而吐者，虫痛也。心腹痛而不吐水者，冷痛也。但吐水不心腹痛者，胃冷也。又虫痛亦与惊痫证略略相似，但目不邪，手不搐也。以此别之，则无误矣。乙治虫痛者，用安虫散。然世人用治虫之药，多于临卧服之，并无日分，故多不验。唯于每月初四五日间，在五更时服之。至日午前，虫尽下矣。后以平调药一两服和之，不可多也。凡在人腹中，每月上旬头向上，中旬横之，下旬头向下。是以中下旬服药，则不入虫口，所以不验也。亦如牛马生子，上旬生者行在母前，中旬生者并母而行，下旬生者行在母后。又如猫之食鼠，上旬则食前段，中旬则食中段，下旬则食下段。此物理之自然，莫不知也。然虫痛极者，虽不贯心，亦能毙人。昔钱乙治辛氏女五岁病虫痛，他医以巴漆、硇砂之属药治之不效。至五日外，多哭而俯仰，睡卧不安，自按心腹，时大叫，面无正色，或青或黄，或白或黑，目无光而慢，唇白吐沫，至六日胸高而卧转不安。召乙至，详而视之，用芜荑散三服，见目不除青色。大惊曰：此病大困，若更加泻，则为逆矣。至次日见辛曰，夜来三更而泻。乙于泻盆中看如药汁，以杖搅之，见有药丸。乙曰：此子肌厚，当气实，今证反虚，不可治也。何以然？师曰：脾虚胃冷则虫动。今目青，此肝乘于脾，又更加泻，知其气极虚也。而药丸随粪下，即脾胃已脱。兼形为癖癥，乃食饮所作。经言积者阴气也，聚者阳气也。故阴沉而伏，阳浮而动。气之所积名曰积，乃五藏所生。其发有常处，其痛不离其部。气之所聚名曰聚，乃六腑所成。其发无根本，其痛无常处。是以积聚皆气之所为也。癖癥者，其始因脾胃虚冷，乳食不化，而以成伤，不为早治，停滞留结，乃成癖癥也。癖者邪癖也，所居在胁下。癥者正证也，所居在腹中。皆有其形，或长或短，或块或片，其状不一。皆坚硬作痛，其因乳得者，名曰乳癖癥，俗云奶癖者是也。其因食得者，名曰食癖癥，其因水浆得者，名曰水癖癥。若因按之或因转动时，自有声响者，此乃水癖癥也。是以癖癥皆食饮所作也。故小儿常当节适乳哺，调顺寒温，若少失保卫，则病从而生矣。如或乳哺不时，寒温失宜，则脾胃不和。气不调顺，其候口频撮，面眺白无精光，口中气冷，不思乳食，便当以药和之。若不即治，则成胃冷，其候乳食不化，或但吐水，急当用药温之。又不与治，则脾胃浸以成虚。其候面眺白色弱，腹痛，口吐痰沫白绿，急当用药温补，若下痢者，更与调养。其中病不相应，故知死病。后五日昏笃，七日

而死。钱乙用方，本集载之。学者当以此为法尔。今除疳劳虫动者，已具于疳疾门之下外，诸虫之方，叙而具后。

使君子　治蛔咬心腹疼痛。

上以使君子火煨熟，去壳与食，以壳煎汤送下。

红桃散　治蛔咬心腹痛，发歇有时。

风化石灰一两，烧赤，细研为末　朱砂一钱，细研为末，水飞

上拌匀细，用饭饮一大盏，入艾三五叶，煎二三沸，看多少，调一字或半钱与服。但少用，多则难吃。

龙胆汤　治蛔虫攻心。其痛如刺，吐出清水。

上以草龙胆一两，锉碎，水二盏，煮取一盏，去滓。隔宿不食，至五更头顿服，量大小与。

三角散　治如前。

上于七月七日，采蒺藜子不以多少，阴阳为散，每服半钱或一钱匕，饮服日三，量大小加减，无时。

木香桃仁丹　治蛔攻心，痛不可忍。

木香一两　桃仁汤浸，去皮、去尖、并双仁者，麸炒香熟，一两　槟榔一分　鹤虱一两，拣净　黑狗脊一两　苦楝根白皮半两

上为细末，猪胆汁和丸黍米大。每服十粒，麝香汤下，无时。

夺命丹　主治如前，病至危困者。

狼牙草一两　肩蓄一两　苦参一两　雷丸半两　薏苡仁半两　鹤虱半两

上为细末，糯米和丸黍米大。每服十粒，生地黄汁下，无时。

乳香丸　治虫动心腹疼痛。

乳香末　青皮去穰，炒黄，为末，各一分　槐花半合，炒，末　风化石灰研细，半两

上为末匀细，每服半钱，槐花汤调下，无时。

干漆散　治如前。

干漆炒烟尽，一钱　使君子仁二七个　芜荑去扇，六十片　楝根白皮取东边者，一钱

上为细末，每服一字，沙糖熟水调下，二三岁半钱，四五岁一钱，无时。

楝皮汁　治如前。

上取楝根皮，削去外苍皮不用，只用白者，以煮浓汁，量大小与服。

抵圣散　治如前。痛不可忍者。

苦楝根白皮二两　白芜荑去扇，半两

上为末，每服一钱，水一小盏，煎取半盏，放冷，待发时服，量大小加减，无时。

胜丸子　治如前。

龙脑研　芦荟研　麝香各一字　牛黄半字，研　胡黄连半钱，末

上为末，同研匀，熊胆和丸绿豆大。每服三五丸，生米泔水化服，无时。

又方　以槟榔生为末，用东引石榴根煮汤调下，量大小与服，或半钱一钱。治寸白虫神效，上旬空心食前服之。

治小儿蛔虫动作　以楝实一枚，煮浓汁。内孔中，亦治蛲虫。

以槐子杵烂内孔中，亦治蛲虫。

治小儿寸白虫　以桃叶杵烂绞汁服之。

雷丸散　治小儿三虫。

雷丸　川芎等钱

上为细末，每服一钱，饮调之，日二服，无时。

胡粉牛黄丸　治小儿蛔动，腹内时时疼痛。

胡粉三钱　牛黄一钱　麝香一钱

上同研为末，用猪胆一枚取汁，浸蒸饼和丸绿豆大。五岁儿温水下七丸，以意加减，无时。

又方　治如前。以葶苈子一分，生为末，水三合，煎取一合，一日服尽。以薏苡根煮汁作糜食之，甚香而效。

治蛲虫内啮，心腹疼痛。

以鹤虱为细末，用肥猪肉汁调服。五岁儿服二合，虫出便止，更以意加减。

治蛲虫及虫攻蚀，下部痒痛。

以蒿蓄一把，水一升煮熟。五岁儿空腹服三二合，乳食前。

治蛲虫攻蚀下部。

以胡粉、雄黄各一分，同研为末，每以少许傅下部。

补胃膏 治如前。痛甚不可忍，啼哭不止。

良姜一两，微炮 肉桂去粗皮，一两 肉豆蔻面裹煨，半两 干漆炒烟尽，半两 乌梅肉半两，炒干

上为细末，炼蜜和丸鸡头子大。每服一二粒，米饮化下，无时。

香雷散 治如前。

雷丸 鹤虱 苦楝根皮 白芜荑去扇，各半两

上为细末，每服一字或半钱，用生猪肉煮淡汤调下，无时。

化虫丸 治虫咬腹中搅刺疼痛。

芜荑去扇，一分 槟榔二钱 川鹤虱一分

上为细末，猪胆汁和丸麻子大。每三岁五丸，五七岁十丸，陈米饮下，无时。

川楝丸 治胃寒虫动，心腹疼痛，及上中二焦因虚而虫动。

干漆一分，炒，烟出尽 雄黄一分，研，水飞 巴豆霜一钱

上为细末，糊丸黍米大。每服五七丸，量大小加减，取东引石榴根煎汤下，痛甚者煎苦楝根汤或煎芜荑汤下。

芜荑散 治上中二焦虚，及胃寒虫动，心腹刺痛，危恶证候，与惊痫相似。

白芜荑拣净 干漆炒烟尽，等分

上为末，每服一字或半钱，米饮调，发时服，儿大者一钱。无时。

五灵脂散 治虫动攻心痛欲绝。

五灵脂去砂石，末，二钱匕 白矾枯，半钱匕

上拌匀，每服一钱或半钱，水八分，煎至减半温服，当吐虫出。

绿矾丸 治腹中有虫，爱食生物。

上以绿矾不拘多少为细末，猪胆汁和丸，绿豆大。每服五七丸，米饮下，无时。

蜂窠蛹子 治腹有诸虫，口中吐出。

上以蜂窠中蛹子与食之。

槟榔散 治寸白蛲蛔诸虫。

槟榔一个 木香一钱

上同为末，每用一钱匕，煎楝根白皮汤调下。如楝根赤者不堪用，即害人。须在月初四五日间，至五更头。先嚼肉脯一小片，只咽其汁，少顷服药。至日午前虫下。勿登厕，但用盆子，或在净地上，庶见取下虫多少也。一服永绝根本，且食粥一二日，不须服补药，忌生冷硬物五七日佳。

碧金散 治寸白蛔蛲诸虫，随时大便粪下。

苦楝根皮一两，微炒、锉 鹤虱半两，拣净 槟榔半两 猪牙皂角三挺，烧灰 使君子仁半两，以上先末 青黛半两，研 麝香一分，研

上拌匀细，每服一字，淡猪肉汤调下，无时。

化虫丹 治数岁上食肥甘物多而虫动。

鹤虱一两，拣净 槟榔一两 苦楝根皮一两以上先为末 胡粉半两，研 白矾半两，研

上为细末拌匀，面糊和丸黍米大。每服十粒，温浆水入生油一两点，搅匀送下，无时。

黑金散 治虫烦扰乱，服之烦已，得睡为验。

干漆一两 肉桂半两 草豆蔻仁一分 石榴根一分 雄黄一分，研

上都于一瓦器中烧存性，研为极细末，每服一字或半钱。研麝香少许，煎粟米饮调下。

黄金散 专治吐利后虫动。

干漆一两，炒烟尽 白芜荑去扇，半两 肉豆蔻面裹，煨，去面，半两，以上先为末 雄黄三分，研，水飞

上研拌匀细，每服半钱，煎葱白汤入生油一二点同调下，须调令匀，熟即得。如药冷，再上火温服，不拘时候。

胡粉丹 治蛲虫发动，甚者成痔漏疮疥。

大枣五十个，蒸熟取肉，去皮核　水银半两，二味同研匀细，成膏　胡粉一两，研　雄黄半两，研，水飞

上同入枣膏研匀，丸黍米大。每服十粒，煎苦楝根汤送下，无时。

猬皮散　治蛲虫耗损气血，已成痔者。

猬皮一两，烧灰　鳖甲一两，酥炙黄，去裙襕　蛇蜕皮一两，烧灰　露蜂房半两，微炙

上为细末，入麝香末一钱拌匀。每服半钱，米饮调下，无时。

棕榈散　治如前。

棕榈一两，烧灰　荆芥穗一两　侧柏一两，炙黄　牛膝去芦，半两　枳壳去穰，麸炒黄，半两　黄芪半两

上为细末，每服半钱，米饮调下，乳食前。

神蟾谷精丹　治诸病有虫下如丝，或如马尾，甚者便至危殆。

干蟾三枚，五月五日取者，酥炙黄　谷精草三两，入一瓶内，盐泥固济，慢火煅通赤　胡黄连半两　皂角三寸，烧灰　瓜蒂半两　母丁香半两，上先为末　粉霜一分，研　芦荟一分，研　麝香一分，研

上同拌匀，以猪胆汁和丸黍米大。每服十粒，温米饮下，无时。

食气积癖论

小儿积聚癖癥者，其证不同，积聚乃气之所患。又不与治，脾胃既已虚冷，饮食先已不化。乳哺再稍失宜，即便乃成伤也。其候身体壮热，口中气温，面黄腹胀，目无精光，或白睛多，喜睡。四肢垂弹，畏食肚热，大便酸臭。或为吐泻，水谷不消。须宜稳药克化，不可便行快药取转。小儿气实，脾胃壮者，患之有渐。若气怯脾胃弱者，但稍失调养，便成伤也。昔钱乙治黄承务子二岁，因伤食而泻。他医与止之十余日便青白。乳不消，身凉，加哽气昏睡，以谓困笃而召乙。乙先与益黄散、补肺散，三日而身温不哽气，后以白饼子微下之，复与益脾散而利止得安。或问何以其然？乙曰：此本脾虚伤食而作利。初不与下之。留连十余日，上实下虚，脾气弱则引肺亦虚，脾肺子母故也。今先补脾腑，病退身温，不哽气是也，然后下其所伤。又问既有所伤，何不先下而后补？乙曰：粪青白为虚冷。若先下之，必大虚也，故先实而后下则不虚矣。后更与补之乃安，此乃治所伤也。若伤重而不与急治，则停滞留结而为癖癥。其候与食伤相似，而更加困重。及一向不食，但微饮少乳，或渴而饮水，时作寒热，亦与潮热相似。昔钱乙治曹宣德子三岁，病面黄时发寒热，不食而微饮乳，及饮水不止。众医以为潮热，用退热药不愈，又用止喝药反吐。请乙至，乙曰：此乃癖也。与白饼子下之，后补脾，乃以消积丸磨之，果愈。或问何以故？乙曰：不食但饮水者，食伏子胃脘，内不能消，致令发渴。服止渴药吐者，药冲于脾，气逆不得下故也，下之乃愈。又钱乙论小儿癖癥，由乳食不消，伏在腹中，乍凉乍热，饮水不止，或喘而嗽，与潮热相似。不早治之，必成疳劳。以其有癖癥，则令儿不食，致脾胃虚而发热，故引饮也。饮多则荡涤肠胃，亡失津液，脾胃不能传化水谷，脉沉细，益不能食，遂渐羸瘦而成疳也。钱乙所用之方，本集载之。及脾胃虚冷，米谷不化下利者，已具于前泻门之下外，合用诸方叙后。

半两丸　治五积六聚。

巴豆去皮　大戟锉碎，各半两

上二味同入铫内。油炒焦黄为细末，糊丸麻子大。每服三丸，量虚实大小加减与服，临卧米饮下，乳食前。

三棱汁　治诸气积气聚气癖。

上以京三棱取汁。作羹粥米面任为，与乳母食之。每日取枣大与儿吃，大者渐加之。又治十岁以下至百日儿无辜疳痫痃癖。神妙大效，功不可述。

三棱煎丸　治气积、气聚、气块、痃癖，

水气奔豚，肾余五膈五噎，及一切诸般气滞凝结。

京三棱炮　蓬莪茂炮、各四两、洗净　芫花一两，去枝梗

上将上二味入磁瓶内，以米醋五升浸满，封闭瓶口，用炭火攒煮之，度量微干时取出。以余醋炒元花，至醋尽药干为度。同上二味，锉，焙干为末，醋煮糊丸绿豆大。每服三五丸，生姜、盐汤下，乳食前，更量大小加减。

姜橘丸　治乳哺失宜，脾胃不和。

上以好陈橘皮不拘多少，极陈者尤妙。洗净去白，焙干为细末，每五两入生姜末三两和匀，炼蜜丸麻子大，每服三四十丸，米饮下，无时，更量大小加减与服。

调中散　治乳哺冷热失宜，脾胃不和。

木香一两、锉　人参去芦、一两　青皮去穰、一两　丁香半两　白术半两　白茯苓半两　大腹皮半两、锉　甘草半两、炙

上为细末，每服一钱，水一小盏，入生姜三片，煎至五分，去滓服，无时。

益胃丹　治如前。

当归去芦、洗焙　木香　白术　沉香各半两、锉　白芍药锉　人参去芦、锉　蓬莪茂炮锉　缩砂仁各一分

上为细末，面糊和丸黍米大，每服十粒，麝香汤送下，无时。

楠木汁　治胃冷正气。

上以楠木皮煎汁服之。

益儿丸　治胃冷气不和，食不消化，亦治疳气。

神曲炒黄　白芜荑去扇，炒，各一两　宣连去须，二两　陈皮　木香各半两

上为细末，猪胆汁和药末成剂，再入胆内系口定，以浆水煮数沸取汁和丸绿豆大。每服一二十丸，米饮下，腹胀木瓜汤下。无时。一方有没石子、芦荟各半两。

益脾散　治脾胃虚冷，腹痛不利，全不入食。

陈皮一两　青皮去穰，半两　诃子肉半两　甘草半两，锉，炒　丁香一钱　干山药三两

上为细末，每服二钱，水一盏，入生姜二片，枣一个，同煎至五分，去滓温服，无时。

消食丸　治伤饱乳食不化，壮热腹胀疼痛。

木香半两　枳壳去穰、麸炒黄　当归去须、土　代赭石火煅红，米醋淬，不计遍数，以手捻得碎为度　朱砂研，水飞，各半两　巴豆一分，取霜

上为细末，糊丸黍米大。一岁儿一丸，温水下，乳食前服。

大麦面　治乳食过饱，烦闷腹胀，但欲睡。

上以大麦、生面水调服一钱，如无，麦蘖亦得。如无，只用白面炒微香，调服一钱。小儿食不知饥饱，但烧鼠屎二枚，为末服之。

香橘丸　治宿食不消，痰滞。

木香　陈橘皮各半两　牵牛子炒黄取末，一分　白术一分　草豆蔻仁一分，面裹煨　姜黄一分

上为细末，滴水和丸黍米大。每服十粒，葱白汤下。小便秘涩不通，乳食前服之。

惺惺丸　治宿食不化，心腹胀满，身热不思乳食。

青皮温汤浸软去穰、焙干，称一两　胡黄连一两　蓬莪茂一两，炮　巴豆取霜，半钱

上为细末，面糊和丸黍米大。每服三五丸，乳汁下，大者白汤下，量大小加减，乳食前。

小沉麝煎丸　治宿滞不化，满闷身热。

乌梅一个，连核去仁　巴豆二个去壳、并心膜　丁香三个　胡椒四个

上为末，醋糊为丸芥子大。每服三四丸，米饮下，临卧。

消乳丹　治伤乳凝滞，能磨积化疳，大妙。

虾蟆十个，烧灰　木香一两　蓬茂一两半，炮　青皮去穰，一两　青黛一两　肉豆蔻面裹煨，去面，一两　腻粉二钱　续随子一分，炒　麝香少许

上为细末，面糊和丸黍米大。每服五七丸，乳汁下，无时。

蝎梢丸　治乳食所伤，涎痰壅滞，诸般积聚，急惊食痫。

黑铅二钱，以水银二钱结沙子　轻粉二钱　粉霜二钱　天南星一分　木香四钱　白丁香四钱，炒　青黛二钱　全蝎二钱，去毒　乳香一钱　巴豆霜，一钱半　滑石二钱　麝香半钱　脑子半钱

上为细末，面糊和丸黍米大。每服五七丸，乳汁或米饮下。治惊风搐搦者，更入天麻、白附子各二钱，此药与《千金》紫丸同，然效更妙。

大真珠丸　治如前。

滑石末三钱　轻粉三钱　半夏曲末二钱　天南星末二钱　全蝎七个　巴豆十四个，去皮膜，出油，取霜　麝香少许

上为细末，蒸饼和丸绿豆大。一岁儿一丸，葱汤送下，乳食前。

小真珠丸　治宿食凝滞不消，乳癖积聚，大小便秘涩，腹胀气痞，取磨虚中之积。

木香　白丁香直者　丁香各半钱　滑石末二钱　巴豆十四个，去皮膜，水浸一宿，研细烂　轻粉半钱，留少许为衣

上细匀，以湿纸裹陈米饭烧，取中间软者和丸麻子大。一岁儿一丸，炮皂子汤放温送下。挟风热秘涩难动者，先服凉药一服。乳癖者，量虚实加减丸数，隔日临卧更服。

葱汤丸　治诸般积癖，腹胀腿肿。

天南星末二钱　白附子末二钱　滑石末二钱　全蝎七个　轻粉二钱　朱砂一钱半，研　巴豆十四个，去皮、心、膜，出油尽，取霜

上为末，面糊和丸黍米大。每服三五丸，葱汤送下，临卧。

水晶丹　治一切积癖及百物所伤。

天南星一钱　滑石一钱　水银粉半钱　芜荑仁去扇，半钱　巴豆十四个，去皮膜，取尽油，留霜

上为细末，烂饭和丸绿豆大。每服二三丸，其汤泡生葱汤送下，服时须令空心，不可与乳食，放稍饥，临卧服，利过，忌生冷粘腻硬食果子等物，以药补之。

北亭丸　治一切积癖黄瘦吐食。

北亭一钱七，末　朱砂一钱七，末　腻粉一钱　牙硝一钱，七　巴豆二十一个，取霜

上同匀细末，用蒸饼剂，裹药煨熟，去焦硬者，取中心软处，近药润者，用药和剂，如硬，滴入水得所，丸绿豆大。每一岁儿一丸，荆芥汤下，乳食前。

消坚丸　取积癖，下交奶交奶，即交乳也。隔实，消食乳癖。

硇砂一钱，末　水银沙子两皂子大　明胶五钱，末　巴豆霜一钱　轻粉一钱　细墨少许

上同为细末，面糊和丸麻子大。一岁儿一丸，倒流水下，食后。

神妙丸　取虚中积滞，化痰涎乳癖。

白丁香半钱　朱砂一钱，水飞　定粉半两　粉霜一钱半　轻粉一钱　麝香少许

上为末，粟米饭和丸黍米大，捻作饼子，火炙紫色，粟米饮下一饼，乳食前。

妙香丸　取虚中积，及治发寒热，心腹胀满疼痛。

辰砂一两，水飞　牛黄　龙脑　麝香各一分　金箔十四片　粉霜　腻粉各一分　蜡二两　巴豆一百二十粒，去皮膜，出油尽，为霜

上于铫子内先熔化蜡，入巴豆霜拌匀，放入诸药搅匀和剂。量大小虚实，旋丸麻子大。每丸米饮下。要药势紧者捻药匾，若儿大或疾重者之加。皆用针刺药饼作孔，以行药力。如取积癖，丸绿豆大。治吐逆下胸中虚烦积滞尤妙。

灵砂丸　取虚中积滞，及治藏府虚滑，久经取转，里急后重，久积恶痢，或暴泻不止，神效无比。

通明辰沙颗块有墙壁者，一分　通明硇砂一钱，各研细

上拌研细，用蜡半两，先于盏内熔化成汁，以去皮全者巴豆二十一粒入内，煎至紫

色，漉巴豆出，研细。与上二味拌匀，将蜡用三分中取一分，再熔成汁，倾药于内，急搅令匀，下火凝冷，刮出成剂，瓷盒贮之。如用即取绝三丸、绿豆大。

浓煎甘草汤，放冷送下，临卧时服。久积病大者，药随病共下。小可病轻者，不动便安。治暴泻恶痢，浓煎艾汤，先呷三五口，候冷下药。治水泻者，冷水下。儿大稍增丸数。

蒜贴膏　治乳癖。

石燕子煅　半夏各等分

上为末。用蒜一头杵烂，摊在旧绯绢帛子上，比儿患处大小，剪作圈子，掺药上，贴患处。候病儿口鼻中蒜气时，揭去帛子。作效，更不得吃药。

神应散　治如前。

硫黄栗子大，一块　硼砂栗子大，一块　诃子一个，去核　密陀僧栗子大，一块

上为细末，每服半钱，乳汁调下。服了时，就有癖处卧少时，当取下黑物效。

丁香饼子　治如前。

大丁香二钱　密陀僧二钱，研　木香一钱半　硫黄一钱半　白丁香一钱，拣直两头尖者　硼砂半钱，研　甘草一钱半，炙　麝香少许

上为细末，汤浸蒸饼丸绿豆大，捻作饼子，每服二饼，乳香、生姜汤下，乳食前。

软银丸　治如前。

水银一钱，用铅一钱结沙子　续随子四十九个去壳　白丁香末一钱　腻粉一钱匕　鹰粪白末，一钱匕　巴豆十四个，去皮膜，出油尽

上为细末，枣肉和丸绿豆大。一岁儿一丸，温水下，乳食前。

丁香散　治如前。

黑丁香七个　密陀僧　硫黄　白丁香各一分　肉豆蔻一个，面裹煨，去面

上为细末，每服半钱，温水饮调下，乳食前。

白丁香散　治如前。

白丁香十四个直者　石燕子一个，火煅，瘦者乃是雄　硫黄一皂子大　腻粉十个　密陀僧半两　黑丁香二十一个

上为细末，每料分作十服，用面丝汤调下，或煮面汤亦得，服了取下如虾蟆胎之类恶物是效。

三棱散　治奶癖结实，服药不差。

京三棱一两，炮，锉碎　鳖甲一两，酥炙，去裙襕　赤茯苓去黑皮，一两　白术半两　木香半两　枳壳麸炒，去穰，半两

上为细散，每服一钱，水一盏，入生姜五片，煎至五分，去滓温服，时时与也。

圣饼子　治乳癖疳瘦。

粉霜一钱　硇砂一钱　腻粉五个　石燕子一个，火煅　玄明索三个，去皮　巴豆霜一钱

上为细末，入生面一大钱拌匀，滴水和剂，分十二处，捻作饼子，用刀上烫熟。每服一饼，煎皂子汤下。

鼠肉汁粥　治诸癥。

上以鼠肉煮汁作粥与食。

圣效丹　治癥结癖积久不差。

当归去芦土，一两　木香一两　桂心一两　甘遂一两，慢火煨黄色　朱砂一两，研，水飞　京三棱半两，炮，乘热锉　鳖甲半两，涂酥，炙黄焦，去裙襕　蕤仁一分，汤浸，去皮研　麝香一分，研　巴豆二十一个，去皮、心、膜，绢袋盛好，酒煮一宿，研

上为末，拌匀细研，用黄蜡六两，慢火熔化，入药搅匀成膏，丸黍米大。一岁儿一粒，二三岁者二粒，四五岁者三粒，六七岁者五粒，温米饮下，乳食前。

大腹汤　治癥癖腹胀，小便不利。

大腹皮一两，锉，炒　槟榔半两　枳壳麸炒，去穰，半两　人参去芦，半两　知母半两　陈皮半两，去白称　甘遂一分，慢火煨令黄

上为细末，每服一钱，水一小盏，煎至五分，去滓放温服。无时。

治幼小胎中宿热，乳母饮食粗恶，及多辛苦，乳汁不起，儿乳哺宿滞，不为肌肤，心腹痞满，萎黄瘦瘠，四肢瘘蹙，服之充悦。

芍药二两半　大黄　人参去芦，各一两　柴

胡去芦，一两　鳖甲酥炙，去裙襕　茯苓各一两半　甘草半两　干姜半两，有热者去干姜，用枳实麸炒

上为末，炼蜜和丸大豆大。一岁以下儿服一丸，上者二丸，乳服。

牛黄鳖甲丸　治幼小癖实壮热，食不消，中恶忤气。

牛黄半两　鳖甲酥炙，去裙襕　麦曲炒　柴胡去芦　枳实麸炒　大黄煨　芎藭各一两　厚朴去皮，姜制　茯苓　桂心不见火　芍药　干姜各半两，炮

上为末，炼密为丸如小豆大，以意量大小与服，日二服，无时。

丁香散　治小儿奶癖。一服取效，不动脏腑，不损胃气。

舶上硫黄一枣大块　丁香二十一个　密陀僧一枣大

上研细，量大小，临卧以荆芥汤调下。来日下黑物，乃病故也，永不再发。

治小儿癖胁下结块不消

腻粉一钱　雄雀粪一分，微炒，两头尖者是

上同研匀细，去皮枣肉和丸粟米大。新汲水下一丸，取下恶物是效，更量大小虚实用之。

治小儿闪肭成癖，腹大痞满。

以鹳雀脚骨及嘴煮汁服之，亦可烧灰存性，研为末，饮服。

治小儿积癖，发黄羸瘦，及生瘰疬。

以生林檎杵烂，醋和傅上。若癖移则就傅之，以苦瓠未破者煮令热，解开熨之，亦入热汤在内熨之。

治小儿乳癖。

橘皮拣净　青皮去穰　牵牛各一分，三味并为末

上用蒜一颗，每瓣入巴豆一粒，煨熟去巴豆，研如泥，和药末豌豆大，朱砂为衣，每服一丸，细嚼酒送下。

一方用蒜去青皮，同巴豆研烂和丸。临卧冷茶清下一丸，更量大小加减，乳食前。

小儿卫生总微论方　卷十四

心腹痛论

小儿心腹痛者，由藏府虚而寒冷之气所干，邪气与藏气相搏，上下冲击，上则为心痛，下则为腹痛，上下俱作，心腹皆痛。更有一证，发则腹中撮痛，干啼无泪，腰曲背弓，上唇干，额上有汗，此名盘肠内吊之痛，亦由冷气入藏所为也。今叙诸方于后。

木香丸　治心腹痛及脾痛。

木香一分　肉桂一分　茯苓去黑皮，半两　槟榔半两　当归去芦，一分，醋浸一宿，焙令黄熟

上为细末，酒糊丸黍米大。每服五七丸，柳枝汤下，不拘时候。

蓬莪散　治气刺心腹痛。

上以蓬莪术炮熟透，锉杵，罗为细末，每服一钱，热酒调下，无时。

宽中汤　治心腹疼痛不可忍，闷乱啼哭不止。

良姜　木香各半两　丁香　桔梗去芦　青皮去穰，炒黄　甘草炙，各一分

上为细末，每服半钱，温酒调下。无时。

当归木香丸　治如前。

当归去芦，一两　蓬莪术一两，炮锉　木香半两　人参去芦，半两　桂心半两，不见火　黑牵牛一钱，炒微黄

上为细末，面糊和丸黍米大。每服十丸，生姜汤下，无时。

当归丸　治肠胃冷袭而痛，啼哭不休。

当归去芦　芍药等分

上为细末，面糊和丸绿豆大。米饮汤下，不拘时候。

乳香汤　治如前。

木香　五灵脂去砂石　乳香各一钱，别研　天南星取中心末，一钱

上为细末同研匀，每服半钱，水半盏，生姜一片，煎至二分，去滓温服。无时。

温胃丸　治腹痛哭不止。

人参去芦，一两　白术一两　木香一两　良姜半两　五味子去枝梗，半两　当归半两

上为细末，面糊和丸黍米大，每服十丸，米饮汤下，无时。

橘香汤　治如前。

青皮去穰，一两，炒　吴茱萸拣净，一两　木香一两　当归去芦，一两　姜半两　丁香半两

上为末，每服一钱，水八分，生姜二片，煎至五分，去滓稍热服，无时。

乌药散　治乳母冷热不调，败坏乳汁，因以饲儿，致儿心腹疼痛，或时下利，但令乳母服药，调和乳汁哺儿。

香附子炒，去毛　良姜　赤芍药　乌药各等分

上为细末，每用一大钱，酒水各半盏，煎至六分，去滓温服，无时。儿能服药者，兼与之。

鲤鱼肠　治肠胃中有疮而作疼痛。

上以鲤鱼肠煮食之。

钩藤膏　治盘肠内吊腹痛。

好乳香研　没药研　木香　姜黄各四钱　木鳖子仁二十个

上为细末，炼蜜为剂收之，一岁儿半皂角子大。煎钩藤汤化下，无时，量大小加减，次用魏香散。

魏香散

上以温水化阿魏一钱，去砂石，浸蓬莪术半两，一昼夜取出。焙干为细末，每服半钱，煎米饮、紫苏汤调下，空心服。

阿魏丸　治盘肠吊痛，日夜叫啼不止。

上以阿魏为末，用大蒜半瓣，火炮熟，研烂和末，丸麻子大。每服五七丸，煎艾汤送下，无时。

乳香蝎梢丸　治盘肠内吊，痛不可忍。

乳香一钱半，别研　蝎梢十四个　没药半钱　沉香一钱半

上为细末，炼蜜和丸黍米大。婴孩三丸，一岁儿五丸，三岁儿七丸，乳香汤下，不拘时候。

桃符丸　治如前。

银朱一钱，研　乳香一钱，研　大蒜一瓣，煨熟，研烂为膏

上二味和匀，入蒜膏再研，硬软得所，丸绿豆大。每婴孩三丸，半岁五丸，一岁七丸，二三岁七丸，薄荷汤下，无时。

腹胀论

小儿腹胀，有虚有实，或因吐泻，或因乳食。动于脾胃，致脾胃虚而气攻所作也。实者闷乱喘满，治可下之。钱乙用紫霜丸、白饼子。虚者不喘，治不可下。又不可以丁香、木香、橘皮豆蔻大温药治之。以脾胃虚，气未出，故虽腹胀而不喘，只好用药，使上下分消其气则愈，钱乙用塌气丸。若误下之。则脾虚，气上附肺而行，脾肺子母皆虚也。肺主目胞腮之类，脾主四肢，色黄虚甚，则目胞腮颊四肢黄色而肿，钱乙用塌气丸。若虚气已出，附肺而行，即脾胃内弱，每生虚气，入于四肢面目矣。小儿易为虚实，脾虚则不受寒温，服寒则生冷，服温则生热，当识此勿误也。胃久虚热，多生疸病。或引饮不止，脾虚不能胜肾随肺气上行于四肢，面目肿若水状，肾气浸浮于肺，即大喘也。钱乙亦用塌气丸，未愈渐加丸数。病愈后面未红者，虚衰未复故也。若治虚腹胀，塌气丸未愈，腹中有食积法，粪小便黄，时微喘，脉伏而实，饮水能食者，亦可下。盖脾初虚而后有积法也。所治宜先补脾，后与下之。下后又复补脾，即愈也。若不先补而便下之，则大虚矣。又不可补肺，恐生虚喘也。钱乙所用方，本集载之外，叙诸方于后。

家实塌气丸　治小儿啼哭未定，或气息未调，遽以乳饮，或寒冷相干，腹胀气急，乳食不化。

巴豆十片　胡椒十粒　丁香十个　青皮十个，汤浸一宿，令软去穰

上将青皮每个入巴豆一片，胡椒一粒，丁香一个，裹了，以麻线缠定，都裹十个毕，顿锅内，入酽醋一碗，煮至醋干，取出细切，同诸药焙干为末，粟米糊和丸粟米大。每三岁下儿二三丸，上者五丸，五岁儿七丸，七岁儿十丸，米饮汤下，无时。

褊银丸　治痰涎气壅，膈实上热，乳食停滞，腹胀喘急。

巴豆去壳，半两，取霜　好墨八钱，研　麝香半钱，研　水银半两，用铅二钱半，结沙子

上将巴豆霜与墨再研匀，次入沙子麝香，又拌研至细匀，以陈米粥和丸绿豆大，捻褊。一岁儿一丸，二三岁三丸，煎薄荷汤放冷送下，不得化破，食后服。

厚朴丸　治风冷寒邪客于藏府，腹胀满闷，气不宣通。

厚朴去粗皮，一两，姜制　丁香一两　木香一两　白术一两　青皮去穰，半两　牵牛子一钱，炒

上为细末，炼蜜和丸黍米大。每服十丸，煎陈皮汤下，无时。

分气丸　治腹胀腹痛。

巴豆十个，去壳皮膜，出油尽　木香一钱　附子一个，重半两，炮去皮、脐、尖

上为细末，面糊和丸麻子大。每服三二丸，熟水送下。

又方　治腹胀。又名塌气丸。

蝎半两　胡椒一两　木香半两　巴豆一分，去壳、皮、膜，出油尽

上为细末，面糊和丸黍米大，每服三五丸，葱白汤下，无时。

胡粉盐　治腹胀。

上以胡粉、盐炒色变，以摩腹上，或以车毂中脂和轮下土作丸，吞之。

韭根汁　治如前。

上杵韭根汁和猪脂服，或烧父母指甲灰，乳头上饮。

半夏丸　治腹胀及暴腹胀欲死。

上以半夏随多少，火炮为细末，酒和丸粟米大。每服三五丸，儿小者乳汁下，大者生姜汤或米汤下，未差加之，日二服，只用末贴脐。亦佳。

又方　治心腹胁肋胀满，烦闷欲死。

上以鸡子壳烧末，酒服一钱或半钱。

塌气丸　治脾胃气虚，腹胀满闷。

全蝎一钱　黑牵牛四钱，一半炒熟，一半生用　萝卜子四钱，一半炒熟，一半生用　陈皮二钱去白　青皮去穰，二钱　京三棱二钱，炮，锉　蓬莪术二钱，炮，锉，一方生用

上为细末，面糊和丸萝卜子大。每服一二十丸，生姜汤下，无时。

塌气丸　治腹胀气满如肿。

胡椒半两　甘遂一分　黑牵牛一两，炒　木香一钱

上为细末，面糊丸绿豆大。每服五七丸，姜汤送下，无时。

塌气丸　治脾虚腹胀，或面目四肢发肿。

胡椒一两　蝎尾半两，去毒。此方便是钱乙集中方也

上为细末，面糊和丸粟米大。每服五七丸至一二十丸，陈米饮下，无时。量大小加减。一方有木香一钱。

一方全蝎一枚，胡椒十粒。同为末，一剜耳，米饮调下。

五百丸　治气虚腹胀。

郁李仁别研　胡椒　丁香　黑牵牛　萝卜子各一百粒

上为细末，葱汁和丸绿豆大。每服三五丸，儿大加之，煎葱汤下，无时。

白术膏　治脾胃不和，腹胀气痞，小便不利。

白术半两　白茯苓去黑皮，一分　人参去芦，一分　滑石一分　泽泻半两

上为末，炼蜜和膏，每用皂子大。米饮化下，无时。

豆蔻散　治腹胀烦渴，小便少而吐泻。

硫黄一分　白滑石三分　丁香半分　肉豆蔻面裹，煨，半分

上为细末，每服一字或半钱，米饮调下，无时。

托养丸　治阴阳气痞不通，腹胀膨闷，呕吐烦渴，手足时厥。

硫黄　水银各半两，同研不见星　附子炮，去皮、脐　木香　当归去芦、洗焙，各半两　大黄一两，湿纸裹，慢火煨熟

上为末拌匀，炼蜜和丸樱桃大。每服一丸，生姜汤化下，无时。

木香丸　治小儿气胀，腹满不下食，能去恶气。

木香　诃黎勒煨，去核，等分

上为末，以沙糖水煮糊和丸绿豆大。每服一二十丸，米饮下，无时。

葛根汁　治小儿热气，痞满腹胀。

以生葛根杵烂绞汁饮下。

桂心丸　治小儿食杂果，腹胀气急。

以桂心为末，饭和丸绿豆大，熟水下五丸。未差再服，不拘时候。

治婴小腹中胀满。

以父母指甲烧灰乳上服。

治小婴腹中胀满或未能服药者。

以晚桑叶不拘多少，浓煎汤，熏下部，通手时淋洗肚腹。

治小儿腹胀满急，不能服药。

以生姜煨热，绵裹内下部，冷即易。

赚气丸　治小儿腹胀。

丁香一钱　萝卜子半两，用巴豆一分，拍破同炒至黑色，去巴豆不用

上为末，水浸蒸饼心和丸绿豆大。每服五丸，橘皮汤下，无时。

治小儿上热痞闷，气壅胀满。

以葛根捣汁，量大小轻重与服。

肿　病　论

小儿肿病有二，一者气肿，因脾胃虚而气攻腹，腹胀误行转药下之，致虚气上附于肺，行入四肢面目，而作肿也。疳气亦然。二者水肿，因上焦烦渴，饮水无度，脾胃虚而不能约制其水，肾反乘脾，土随水行，上附于肺，肺主皮肤，脾主四肢，故水流走于四肢皮肤而作肿也。甚则肾水浸浮于肺，则生大喘，为难治也。

款肺散　治小儿风痰，咳嗽喘气逆呕吐，面目浮肿。

白僵蚕五两，汤洗去灰丝并头足焙干　玄胡索去皮，三两，生

上为细末，每服一字或半钱，煎淡葱汁放温调下。如婴孩，乳汁调半字，不拘时候。

熊胆丸　治小儿疳气，体瘦肚肿吃水。

熊胆　雄黄研，水飞　佛头青各半两，入麝香少许，同研细　桂心　人参去芦，各一钱，为末

上拌研匀，糯米粥和丸绿豆大。每服五七丸，米饮下，食后。

槟榔丸　治小儿疳气腹胀，四肢肿满，气急喘闷，小便不利。

槟榔　木香各二钱　青皮　姜黄各一两　萝卜子炒　牵牛子各取末，七钱半

上为末，糊丸黍米大。生姜汤下，二三十丸，食后。

绯绶丸　治小儿疳气，黄瘦肚大，手脚浮肿，饮水不休。

川楝子去核　芎藭各二钱　橘皮四两，去穰　龙胆去芦，二两　巴豆十四个，去皮膜，将陈皮，龙胆同巴豆炒焦黑时，去巴豆不用

上四味为末，糊丸麻子大。朱砂末为衣，每服十五丸或二十丸，米饮下，腹胀陈皮汤下，食后。

治小儿手足身体浮肿。

以小便温暖渍之，大良。

又方　治如前。

以巴豆五十个去皮心，水三升，煮取一升，绵蘸拭病上，随手即消。

治小儿浑身头面及阴囊虚肿。

上使君子一两，去壳，用蜜半两，炙尽为细末，每服一钱，米饮调下，食后，只三服效。

内消丸　治小儿头面手脚虚肿。

青皮五个，汤泡，去穰　巴豆七个，去壳　木香一钱，炮　防己一钱半　丁香十四个

上先以青皮巴豆铫内同炒，至巴豆苍黑，去巴豆不用，将青皮诸药为细末，蒸饼和丸麻子大，每服三五丸，量大小加减，男孩儿煎陈米汤下，女孩儿煎艾叶汤下，七八岁者十丸，不拘时候。

红粉散　治浑身虚肿，气喘不食。

朱砂一钱　槟榔一钱　轻粉半钱

上为末，每服一字或半钱，薄荷煎汤调下，一服利，止后服，用《家宝》观音散，或人参散调补，忌生冷坚硬之物。

通草散　治一身黄肿透明。

通草蜜涂，炙干，为末　木猪苓去黑皮，为末，各等分

上为细末，再入研细，去土地龙、麝香少许，每服半钱或一钱，米饮调下，神效，亦治肾肿。

圣饼子　治气肿。

大戟于半两　甘遂末一分　牵牛末一两

上拌匀，每用半钱，以白面半钱，水和作饼子，如钱大，煮令熟，放冷细嚼，姜汤下，小者一饼，大者二饼，食前。

金华散　治水气肿满，通身明亮。

大黄末四钱　牵牛末四钱　朴硝研末，八钱　巴豆肉五个，研

上同拌匀，每服一字，生姜蜜水调下。此方猛烈，斟量所宜。

葶苈丸　治水气腹肿，小便涩滞。

上以葶苈子半两微炒，杵如泥，入枣肉再杵和丸绿豆大。每服五丸，枣汤下，空心

晚后。

郁李仁丹　治一切诸肿。

郁李仁半两，汤浸去皮，微炒　槟榔半两　牵牛子一钱，炒

上为细末，滴水和丸。每服十粒，煎葱白汤下，空心服。

海蛤散　治身体肿满，大小便不利。

海蛤　桑白皮各一两　汉防己半两　赤茯苓去黑皮，半两　白术半两　甜葶苈纸衬，炒紫　川朴硝　木猪苓去黑皮，各一分

上为细末，每服一钱，水一盏，煎至五分，去滓温服，乳后食。

杏仁膏　治小儿卒然面目浮肿，杵杏仁膏傅之。

治小儿浑身虚肿，及头面阴囊并肿。

木香一钱　槟榔一枚，锉，以莱菔炒　青皮一钱，以巴豆七个，去皮炒，去巴豆

上同为末，每服半钱或一钱，陈米饮调下，食前。

治小儿因泻痢后，身体虚肿。

硫黄一两　焰硝三钱

上同研细，蒸饼和丸萝卜子大，蚌粉为衣，每服十丸，米饮下，量儿加减，食前。

虚羸论

小儿虚羸者，由诸病之后，或误行转药，或吐而利，致脾胃虚弱，不能传化谷气，饮食不入，肌肤消瘦，乃成虚羸也。有冷者时时下痢，唇口青白，有热者身体温壮，肌肉微黄，此冷热虚羸也。钱乙治冷者木香丸、夏月不可服，如有症则少服之。治热者胡黄连丸，冬月不可服，如有症则少服之。昔钱乙治齐郎中，其人好收药散施，有子忽患藏热。齐自取青金膏三服并一服饵之，服毕，至三更泻五行，其子困睡。齐言子睡多生惊，又与一服，再泻两行，加口干而身热。齐言尚有其热，又欲与青金膏。其妻曰：用药泻十来行未安，莫生病痞？召乙看之，乙曰：已成虚羸也。先多煎白术散，时时与服，后用香瓜丸，十日愈。乙又治朱盐薄子五岁发热，腮赤唇红。烦躁引饮，前医曰：此心热也。遂用牛黄丸，及以一物泻心汤下之，来日加无力而不能食，又下之，乃便利黄沫。召乙看之。乙曰：此心经虚而有留热在内，必被凉药下之，致此虚羸也。乙先用白术散生胃中津液，以生犀散治之。朱曰：大便黄沫何如？乙曰：胃气正即泻自止，此虚热也。朱曰：医用泻心汤何如？乙曰：泻心汤黄连一物耳，性寒，多服则利，能寒脾胃也。坐久，前医至。曰实热。乙曰虚热。若实热何以泻心汤下之不愈，又加面黄颊赤，五心烦热，不食而引饮。前医曰：既虚热，何大便黄沫。乙笑曰：便黄沫者，服泻心汤多故也。乙复与胡黄连丸，愈。乙又治一子夜发热，晓即如故，前医作热治，以凉药解之，不愈。其候多涎而喜睡，医又以铁粉丸下之，其病益甚，至五日大渴引饮，唇白不食。召乙看之，乙曰：此肺怯有热，不可下之，若下之，则损脾胃，致虚羸也。乃用白术散，更以术一两，煎药汁三升，使任意取足服。朱曰：饮多不作泻否？乙曰：无生水不作泻，纵泻亦不作怪也。但不可下耳。朱曰：先治何病？乙曰：止泻治涎，退热清神，皆此药也，至晚服尽。乙看曰：更可服之，又作三升，服尽稍愈。第三日又作三升与服，其子不渴无涎，遂投阿胶散二服而安。以上三证，皆因误行转下之药，亡耗津液，致胃虚发渴不食，而成虚羸。钱乙并先煎白术散与服，以生胃中津液，得胃气正，然后依本病为治也。如齐郎中子藏热，与香瓜丸。朱盐薄子心虚热，与生犀散胡黄连丸，次子肺怯。与阿胶散，并皆安愈。故阎孝忠云：转下过多，泄泻等诸病烦渴者，皆津液内耗也，不问阴阳，煎钱乙白术散，使满意取足饮之，弥多弥好，今特为详而论之，使学者法矣。钱乙所用方。本集载之外。治虚羸诸方，具于后。

丁香黄芪散　治脾胃虚弱不能食，渐致

肌瘦虚羸。

丁香　绵黄芪锉　人参去芦　白术　当归去芦　鳖甲涂酥炙焦，去裙襕，各一两　胡黄连　甘草炙，各半两

上为细末，每服一钱，水一小盏，生姜二片，枣一个，煎至五分，去渣温服，食前。

集香煎　治如前。

丁香　沉香　木香　藿香去土　厚朴去粗皮，姜制，各一两　白术　白茯苓　白豆蔻各半两

上为细末，入研细麝香一钱拌匀，以水一升，蜜半斤，大枣三十枚，生姜二十片。于银器中慢火熬成膏，去姜枣不用，搅匀，顿当风处阴干，每用皂角子大，米饮化下。乳食前。

固老丸　治瘦瘠虚羸，惙惙少气。

上以甘草炙焦黄，杵末，炼蜜和丸绿豆大，每服五丸，温水下，日三服，一岁儿五丸，以上者七八丸，以意加减，无时。

咳嗽论附痰饮上气

夫咳嗽者，《内经》以为肺感微寒而所作也。若七八月之间，肺气旺盛之时，病嗽者，其病必实，非久病也。其症面赤痰盛而身热，治当下之，钱乙用葶苈丸。若病久者，不可下。若十一月十二月嗽者，乃伤风寒嗽也，风寒从背第三椎肺俞穴入，其症烦闷恶风憎寒，昼轻夜甚，治当汗之，钱乙用麻黄汤。若有热症，则面赤饮水，涎壅咽喉不利，钱乙兼用甘桔汤。若嗽于五七月间，其病身热痰盛唾粘，或痰盛不甚喘，面赤或时饮水，钱乙并以褊银丸下之。若肺盛，嗽而后喘，身热闷乱面肿，或饮水不饮水者，钱乙用泻白散。昔钱乙治张氏孙儿九岁，病肺热咳嗽，前医以珠、犀、龙、麝、牛黄药治之，一月不愈，其症咳嗽喘急闷乱，饮水不止，全不能食，召乙治之。乙用使君子丸益黄散。张曰：本有热，何又行温药？他医用凉药攻之，一月尚无效。乙曰：凉药久则胃寒不能食，小儿虚不能食，当与补脾，候饮食如故，即泻肺经，病必愈矣。服补脾药二日，其子欲饮食，以泻白散泻肺遂愈。张曰：何以不虚？乙曰：先实其脾，然后泻肺，故不虚也。

又伤风寒咳嗽，无热症而但嗽者，钱乙用麻黄汤，及化痰药治之。若肺虚，而嗽有哽气，时时长出，喉中有声者，此久病当补也，钱乙用阿胶散。昔钱乙治杜氏子五岁，自十一月病嗽，至三月未止，始得嗽而吐痰，乃风寒入肺也。风在肺中，故嗽而吐痰，宜以麻黄辈发散，后用凉药压之，即愈。他医却以诸药下之，其肺即虚而嗽甚，至春三月间尚未愈，乃召钱氏看之。其候面青而光，嗽而喘促哽气，又时长出气。钱曰：病困十已八九矣，所以然者，面青而光，乃肝气旺也。春三月者，肝之位，肺衰之时也，嗽者肺之病，自十一月至三月久，即肺虚痿。又曾下之，脾肺子母俱虚，复为之所胜，此为逆也，故嗽而喘哽气，长出气也。乙急与泻青丸泻肝后，与阿胶散实肺，次日面青而不光，乙又与补肺，其嗽如前，又与泻肝，未已，而又加肺虚，唇白如练。乙曰：此病必死，不可治也，何者？肝大旺而肺虚绝，肺病不得时，而肝胜之，今三泻其肝，而肝病症不退，三补其肺，而肺病尤虚，此不久生，故言死也。此症病于秋者，十救三四；病于春夏者，十难救一，果大喘而死。

又肺气不足，谓寒邪所干，咳嗽喘满短气者，治补肺。昔钱乙治李转运孙八岁，病嗽面喘满短气。他医以为肺经有热，用竹叶汤牛黄膏治之，三日加喘。召乙治之，乙曰：此肺气不足，复有寒邪，即便喘满，当补肺脾，勿服凉药。李曰：已服竹叶汤、牛黄膏。乙曰：何治也？前医至曰：退热退涎。乙曰：何热所作？医曰：肺经热而生嗽，嗽久不除生涎。乙曰：本虚而风寒所作，何热也，或作肺热，何不治肺，而反调心也，竹叶汤、牛黄膏皆治心药也，医有惭色，乙依所论而治愈。

又咳嗽咯脓血者，肺热也，钱乙用甘桔汤。若嗽而吐痰涎喘者，先实其脾，钱乙用益黄散，后微下之，钱乙用褊银丸，涎退即补肺，乙用阿胶散。昔乙治段齐郎子四岁，病嗽身热，吐痰数日咯血，前医以桔梗防己丸治之，不愈，涎上攻，吐喘不止。请乙治之，乙下褊银丸一大服，复以补脾药治之。或问此子咯血肺虚，何以下之？乙曰：肺虽咯血，有热故也，久则虚痿，今涎上潮而吐，当下其涎，若使不吐涎，便为甚，盖吐涎能虚，又生惊也，痰实上攻，亦使发搐，故依法只宜先下其痰为顺，此治先下后补，与前论先补后下，其意相反者。经以谓病有缓急，治有先后也。治病症如钱乙，所以得圣人之旨趣，学者宜为法耳。嗽而吐青白绿水者，此胃冷有停饮也，乙用百祥丸下之。嗽而吐痰涎乳食者，此有伤宿滞不化也，乙用白饼子下之。

若久嗽肺虚亡津液者，乙用阿胶散补之。治嗽大法，盛则下之，久则补之，风则散之，更量大小虚实，以意施治。是以慎护小儿，须常著夹背心，虽夏月热时，于单背心上当背更添衬一重，盖肺俞在背上，恐风寒伤而为嗽，嗽久不止，亦令生惊。若百碎内儿病嗽者，十中一二得全，亦非小疾矣。

又有停饮作痰者，由儿乳饮失宜，致脾胃不和，停滞其饮不散，留结成痰，若随气上干于肺而嗽者，此为痰嗽，若不嗽者，则肺壅不利，咽塞唾涎，胁腹膈滞。

又脾胃冷热不调，涎不归胃，致涎流口角，而无休止，冷者鼻上色青，及大便青白，热者鼻上赤色，及大便赤黄，以上除钱乙所用方，本集载之外，今叙诸方于后。

金华散　治婴小咳嗽。

郁金半两　防风去芦及叉枝，一分　半夏一分　巴豆二十一粒　皂角一锭

上以水一升，于银器用煮诸药，至水干，去巴豆皂角不用，外三味别用温汤洗净，焙干为细末，每婴孩一字，二三岁半钱，四五岁上者一钱，薄荷蜜水调下，不拘时候。

藿香散　治不因风寒所得，肺胃气不和而咳嗽。

藿香去土，二十一个叶　枳壳二片，去穰，湿纸裹煨，令熟　蚌粉枳壳大一块

上为细末，婴小服一字，二三岁半钱，蜜水调下，不过二三服安，儿大以意加之。无时。

紫金丸　治诸咳嗽，坠化痰涎。

上以叶子雌黄不拘多少，研细，入锅子内，微火中烧令成汁，候冷取出，再研细软，饮和丸萝卜子大，热水下丸二个，临睡。

杏仁煎　治小儿咳嗽上气。

上以去皮尖炒黄杏仁一升，熟捣，用蜜三合，先入一合，捣令强，次入一合，捣如膏，又入一合捣熟，每食后用少许，顿儿口中，含化咽之，日三次，无时。

生姜煎　治幼小咳嗽。

生姜一两　干姜六钱，炮　桂心一分　甘草四钱，炙　杏仁去皮、稍炒黄，一两　款冬花去枝梗　紫菀各四钱

上为末，以蜜一两，入药在内，微火上煎之如饴，量大小多少与含化咽，百日儿如枣核大。日二，甚效。

款冬花丸　治小儿咳嗽，日差夜甚，初不得息，不能复啼。

款冬花　紫菀各一两半　桂心半两　伏龙肝一分

上同为细末，炼蜜和如泥，每服枣核大，敷乳上，令儿吮之，渐渐令儿饮，一日三次。

麦门冬汤　治初生儿十日上至五十日，卒得謦咳吐乳，呕逆暴嗽，昼夜不息。

麦门冬去心，一两　紫菀去芦，三分　甘草一钱半　桂枝半两

上为末，每服二钱，水一盏，煎至七分，以绵醮，滴儿口中，昼夜四五遍，仍节乳哺。

五味子汤　治小儿风冷入肺，咳嗽气逆，面青喘迫，昼夜不息，饮食不下。

五味子去枝梗　当归去芦，各半两　麻黄去节　干姜炮　桂心　人参去芦　紫菀　甘草各一

分　细辛去苗，半分　大枣三枚

上为粗末，每服二钱，水一盏，煎至半盏，去滓温服，量儿大小。

人参半夏汤　治小儿痰逆，咳嗽不止。

人参去芦　半夏曲　白芷各半两　藿香叶去土，一分　丁香　杏仁霜各半分

上为细末，每服二钱，水一盏，生姜五片，陈粟米五十粒，煎至七分，去滓，时时呷服，日三四。忌醋咸炙煿生冷。

款肺散　治小儿风壅痰盛，咳嗽气急，壮热颊赤，昏愦呕吐，面目浮肿，乳食减少。

白僵蚕五两，净洗，去丝、头、足，焙干　玄胡索去皮，一两

上为末，每服一字或半钱，淡齑汁温调服之，无时。婴孩只乳汁调半字。

治小儿咳嗽声不出。

杏仁一两，汤浸，去皮、尖，及双仁者，以水一盏，一绞取汁　紫菀去芦，半两，洗去土为末

上将紫菀末入杏仁汁中，更入蜜一合，同煎成膏，每服半茶匙，清粥饮调下，无时。

皂荚豉汤　治小儿咳嗽。

上以皂荚烧灰，研细末，每服半钱或一钱，豉汤调下。无时。

露蜂房散　治如前。

上以露蜂二两，净洗，去蜂粪尘土，以快火烧为灰，研末，每服一字，米饮下，无时。

葶苈散　治如前。

甜葶苈半两，炒　麻黄去根节，一分　甘草一分，炙　贝母去心炒，一分　杏仁去皮、尖，一分炒黄，研

上为细末，每服半钱，水半盏，煎至三分，去渣温服，无时。

诃子膏　治如前。

上以诃子一两，每个分作两片，甘草一分，水一大盏，煮至水尽为度，焙干为末，炼蜜和膏鸡头子大，每用一大豆许，薄荷熟水化下，无时。

生姜浴汤　治如前。

上以生姜四两，煎汤沐浴。

一捻金散　治风痰咳嗽，颊赤痰盛，喘促气急，吐呕浮肿，乳食减少。

白僵蚕直者，去丝、嘴，一两　甘草半两，炙　玄胡索去皮，一分

上为细末，每服一捻齑汁调下，婴孩只乳汁调下半字。食后。

惺惺散　治伤寒风热痰壅咳嗽。

桔梗去芦　细辛去叶　人参去芦　甘草锉，炒　白茯苓去皮　白术　瓜蒌根各半两

上为细末，每服二钱，水一盏，薄荷五叶，煎至半盏，温服。如要和气，更入生姜三片同煎。一方更有防风一分。

保肺丸　治肺胃受风热痰盛，咳嗽喘吐，连声不止，及治久嗽不愈。

白僵蚕去丝、嘴，炒，二两　山药半两　白茯苓去皮，一两　紫苏叶一两　藿香去土，一两　百部半两　黄芩一两　防风去芦，一两　杏仁去皮、尖，麸炒，一两　百合半两　五味子去枝梗，一两

上为细末，炼蜜和丸鸡头大，每服半丸一丸，煎桔梗汤化下，食后临卧服。

贝母汤　治肺感风邪，咳嗽喘满。

贝母去心，一两，炙黄　半夏一两，白矾汤洗七次，焙干　干姜半两，炮　麻黄去根节，半两　款冬花去枝梗，半两　甘草半两，炙

上为细末，每服一钱，水一小盏，生姜三片，杏仁二个，去皮、尖，同煎五分，去渣温服，不拘时。

菖蒲煎　治肺中风邪，肩息喘鸣，或发咳嗽。

石菖蒲一两，一寸九节者良　款冬花去枝梗，一两　紫菀去土，净洗，焙干，一两　人参去芦，一两　桂心一两

上为细末，炼蜜和剂，入石臼中，杵一二百下，丸皂子大，每服一粒，煎糯米饮化下，食后临卧服。

绛朱丹　治惊风涎痰，咳嗽喘满。

天南星二两，炮　半夏二两，汤洗七次，去滑　枯白矾一两半　滑石二两，火煅通赤　铅白霜一分

上为细末，面糊和丸麻子大，朱砂为衣，每服十粒，姜汤送下，食后临卧服。

人参犀角散　治时气塞壅，咳嗽痰逆，喘满惊悸，风热。

前胡去芦，八钱　桔梗五钱　人参去芦，三钱　甘草三钱，炙黄　杏仁浸去皮、尖，晒干，为末，五钱

上先将上四味为末，入杏仁末拌匀，粗罗筛过，每服二钱，水一盏，煎至七分，去渣温服，食后。亦能调和五藏六府，进美乳食。又治一切风热，服寻常凉药即泻减食者，尤宜与服。

油滚丸　治痰盛咳嗽，亦治乳嗽。

五灵脂末，一钱　雷丸末，一钱　巴豆三十个，去皮膜，取霜

上为细末，滴水丸芥子大。每服三五丸，油滚井水送下，临卧而服。

龙爪散　治涎喘咳嗽。

上以猪蹄甲四十九个，洗净控干，每个猪甲内入半夏、白矾末各一字，入一罐子内封闭，不透烟火，煅通赤放冷，为细末，入研细麝香一钱拌匀，每服半钱，糯米饮调下，空腹。

辰砂半夏丸　治寒痰咳嗽。

瓜蒌根蜜炙　天南星汤洗　半夏汤洗七次　干姜炮，各半两

上为末，生姜自然汁和丸麻子大。朱砂为衣，每服十丸，生姜汤下，不拘时候。

玉珠丸　治诸涎嗽。

半夏一两，汤洗七次　硝石一分

上为细末，滴水丸麻子大。每服三五丸，生姜汤送下，不拘时候。

百部丸　治肺寒咳嗽微喘。

百部焙干，称，三分　麻黄去根节，称，三分，二味先为末　杏仁四十个，去皮、尖，微炒，更煮三五沸，焙干，研细

上同匀细末，炼蜜和丸皂子大。温水化下二三丸，日三服。钱乙加松子仁五个，糖和丸，含化大妙。

露蜂房丸　治肺胃虚寒，咳嗽喘满，呕逆不食。

露蜂房二钱，炒　蝉壳去上、二钱，炒　蛤蚧一双，重四钱，涂酥炙干　丁香　木香　人参去芦　地黄　麻黄去节根　马兜铃子　五倍子去虫，各二钱　五味子去枝梗　贝母去心，焙　杏仁童子小便，浸二宿，去皮、尖，炒　半夏曲各二钱半　款冬花去枝梗，半两

上为细末，炼蜜和丸绿豆大。每服二三十丸，生姜汤下，日三四服，食后。

缓息汤　治风伤肺气虚喘，咳嗽上气。

桑白皮一两半　白茯苓半两　白僵蚕半两，去丝，炒　甘草一分，炙　杏仁半两，去皮、尖，研，后入　人参去芦，一分　桔梗去芦，半两　白术半两　陈皮半两，去白

上为细末，每服一钱，水一盏，生姜三片，杏仁二个，煎至六分，去滓，时时温服。

白术五味汤　治气逆上喘咳嗽。

白术　五味子去枝梗，炒　人参去芦　款冬花去枝梗，各半两　细辛去土叶，一分

上为细末，每服一钱，生姜三片，煎至四分，去滓放温，时时服。

桔梗汤　治咳嗽痰壅，呀呷，咽膈不利。

桔梗去芦，半两　甘草半两，炙　紫苏叶半两，去土，微炙　石膏半两　半夏半两，汤泡七次　皂荚一分，烧灰存性

上为末，每服一钱，水一盏，生姜三片，煎至五分，去滓放温，时时服，无时。

淡竹沥　治咳嗽短气，胸中吸吸，咯唾稠浊臭粘唾亦随。

上以淡竹沥一合服之，日三四次。

木香半夏丸　治肺胃有寒咳嗽。

木香　半夏汤泡七次，焙干　肉豆蔻面裹煨，各一两　藿香去土　丁香　白术各半两

上为细末，生姜自然汁和丸黍米大。每服十丸，煎人参汤送下，不拘时候。

白蚬壳散　治卒然暴嗽不止。

上以白蚬壳不拘多少，杵研极细，每服半钱，米饮调下，无时。

五灵脂丸　治久嗽渐成羸弱，恐变疳劳。

五灵脂去沙石，半两　蝉头一枚，酥炙黄　蝉壳去土，半两，微炒　款冬花去枝梗，半两　青黛一分，研　雄黄一分，研，水飞

上同研匀细，糯米饭和丸黍米大，每服十丸，煎人参汤下，食后。

人参半夏丸　治痰饮咳嗽。

人参去芦　半夏汤泡七次　白术　川姜炮　南星微炒，各半两

上为细末，生姜自然汁煮糊，和丸黍米大。每服十丸，姜汤下，月内百晬儿丸针头大，乳上吮服，不拘时候。

马兜铃　治肺壅咳嗽气喘，大便不利。

马兜铃　紫苏子炒　人参去芦，各一两　木香　款冬花去枝梗，各半两　杏仁汤浸，去皮、尖，研后入，一分

上五味，先为末，入杏仁末拌匀研，炼蜜和丸黍米大，每服十丸，生姜汤下，不拘时候。

百合汤　治肺经风寒，痰壅不利。

百合　紫菀洗，焙　白术　人参去芦，各一两　白茯苓去黑皮　青皮去穰　甘草　麦门冬去心，各半两

上为末，每服一钱，水八分，淡竹叶三片，薄荷二叶，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

爽神汤　消寒痰，除肺壅，清神爽意。

白术　人参去芦　白茯苓各一两　桔梗去芦　瓜蒌　甘草各半两　细辛去苗，一钱

上为末，每服一钱，水八分，荆芥、薄荷各少许，煎至五分，去滓温服。不拘时候。

苏香汤　治肺壅，消痰滞。

紫苏叶去土　木香　人参去芦，各半两　五味子去枝梗　甘草　陈皮各半两

上为细末，每服半钱，生姜自然汁少许，荆芥汤调下，不拘时候。

蝉壳汤　治肺气壅滞不利。

蝉壳去土后炒　人参去芦　五味子去枝梗，各一两　陈皮　甘草炙，各半两

上为细末，每服半钱，生姜汤调下，无时。

神曲汤　治痰涎壅滞，气不和顺，腹胁满闷。

神曲一两，微炒　木香一两　半夏一两，用姜半斤同杵烂，炒令黄，姜是生姜也　芜荑一两　青皮去穰，半两，炒　甘草半两，炙　白茯苓半两

上为细末，每服半钱，盐少许，沸汤调温服，无时。

白金丹　消肺壅痰实，治胸膈不利。

桑白皮一两，锉　前胡去芦，一两　半夏一两，汤泡七次　白术一两　人参去芦，半两　陈皮半两　甘遂一分，微炒

上为细末，炼蜜和丸黍米大。温水下五七丸，周晬至一二岁儿三丸，以上者以意量加，不拘时候。

前胡半夏丸　治风热痰实，肺气壅滞，涎流口出。

前胡去芦，一两　半夏一两，汤泡七次，焙干　大黄半两，炮　麦门冬去心，半两　川朴硝半两

上为细末，生姜自然汁和丸黍米大。每服十丸，煎人参汤下，不拘时候。

犀角丸　治风热面赤，胃气不和，大小便秘沥，痰实涎盛，三焦壅滞及积热蕴毒。沥音沥。

生犀末一分　人参去芦，半两　黄连去须，一两　枳实去穰炒，半两　槟榔半两　大黄二两，酒浸一宿，切作片子，以巴豆一百粒去壳皮，贴大黄上，纸裹定，饭上蒸三次，去巴豆，切，炒焦

上为细末，炼蜜和丸麻子大。每服五七丸，临卧熟水下，未动加丸数，服此疏利极稳之药。

治小儿痰壅肚热诸病。

以鸡子、乱发熬良久，得汁与服之，良。

枳壳汤　治痰实肚热，心膈烦闷，气不调顺，不早治，恐生惊痫。

枳壳一两，去穰，麸炒　干姜半两，炮　甘草半两　前胡去芦，一两　木香一两　半夏一两，洗七次

上为末，每服一钱，水一小盏，生姜三片，陈皮一片，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

温脾丸　治脾胃宿冷，口角涎流。若涎溃颐颔，口角生疮，名曰滞颐，别立于后。

丁香一两　木香一两　半夏一两，用生姜六两，同杵烂，炒令黄　青皮去穰，半两，炒　白术半两　干姜半两，微炒

上为末，炼蜜和丸黍米大。每服十丸，米饮下，不拘时候。

丁香汤　治如前。

丁香一两　白术半两　肉豆蔻面裹煨，半两　半夏半两，白矾水浸一宿，洗净，炒黄　干姜半两，炮　甘草半两　人参去芦，半两

上为细末，每服一钱，水八分，姜二片，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

治小儿口涎出　以白羊屎内口中。

麻黄汤　治小儿风中肺经，喘急肩息，气上不安。

麻黄去根节，二两　半夏　生姜各二两，制　面甘草一两　桂心半两　五味子去枝梗，半升

上㕮咀，每服二钱，水一盏，煎六分，去滓服，无时。

马通粟粒丸　治小儿喘急肩息气逆，胁下作痛，寒热往来，不进乳食，渐成羸瘦。

马通中粟粒三分　杏仁汤浸，去皮尖　紫菀去芦　细辛去苗，各半两　石膏　秦艽去芦　半夏汤泡七次　茯苓去皮　五味子去枝梗，各一分

上为末，炼蜜丸小豆大，每服十丸，生姜汤下，日三服，加至十二丸，不拘时候。

小儿卫生总微论方　卷十五

黄　疸　论

小儿有身体肌肤面目悉黄者，此黄病也。因将息过度，饮食伤饱，脾胃受热，与谷气相搏，蒸发于外。脾胃象土，其色黄，候肌肉，故为是病也。慎不可灸，灸则热转甚矣。若身体痛，背膊强，大小便涩，腹胀满，一身尽黄，及目睛爪甲皆黄，小便如屋尘色，著物皆黄，此疸病也。若发渴小便涩，腹满脉沉细，为难治也。黄病者稍轻，疸病者极重。又有自生下，面身深黄者，此胎疸也。因母藏气有热，熏蒸于胎故也。经言诸疸皆热，色深黄者是也。若身微黄者，胃热也。若但面黄腹大，渴而食泥土者，脾疳也。此二项各在本病具之外。黄病、疸病，叙方于后。

三黄散　治黄病。

川大黄一两，锉碎，微炒　黄芩半两　黄连去须，半两

上为细末，每服一钱，水一盏，煎至五分，去滓放温，食后，时时服。

子芩散　治如前。

黄芩　栝蒌根　茯神去心内木，各一两　甘草炙　胡黄连各半两

上为细末，每服一钱，水一盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

韭根汁　治如前。

上杵韭根取汁，滴儿鼻中，大豆许。

丁香散　治黄病遍身如金色。

上六月六日收瓜蒂四十九个，丁香四十九个，入乾锅子内，火烧烟尽，取出放冷，研细末，每用半字吹鼻中及揩牙。

蔓菁子汁　治如前。

上以蔓菁子汁，水和服之，半钱或一钱。亦治疸病。

猪苓通草散　治黄病透明黄肿。

木猪苓去黑皮　通草除蜜炙干，各等分

上为细末，更入研细麝香去土地龙末各少许拌匀，每服半钱或一钱，米饮调下，不拘时候，神效。

栝蒌根汁　治小儿忽发黄，面目皮肤悉黄。

上以生栝蒌根杵取汁三合，蜜一大匙，暖熔相和，量儿大小服之，不拘时候。

双连丸　治诸疸病。

川黄连去须，一两　胡黄连一两

上为细末，用黄瓜一枚，切蒂头留作盖子，去穰，入药末在瓜中，却以盖子盖定。用面裹，慢火煨令面熟、焦，去面，杵烂成剂，丸绿豆大，每服五七丸至十九，温米饮下，量大小加减，不拘时候。

茅煎汤　治黄疸病。

柴胡去苗，净洗，焙干一两　甘草一分

上㕮咀，每服二钱，水一盏，白茅根少许同煎至五分，去滓温服，无时。

螺肉酒　治如前。

上取田螺肉一二十个，作刮剁酒服之。

驴乳汁　治婴小热黄胎疸。

上取驴乳汁，少少与服。

客　忤　论

小儿中客忤者，小儿神气嫩弱，忽有非常之物，或未经识见之人，偶然触而见之，其客气与儿神气相忤以生病，谓之客忤。其候吐下青黄白色，水谷解离，腹痛夭矫，面颜变易，五色不常，状似惊痫。但目不上视，其脉弦急数者是也。若不即治，久则难疗。《圣

济经》曰：出处不时，而为客忤，戒其恐见非常人物为病也。《千金》曰：小儿衣帛绵絮及鞋帽中，皆不得令有头发。又青衣不可用白带，白衣不可用青带。或诸不识人物外来者，并当令儿避之勿见。若误有触犯，并令儿患客忤。或有犯而患者，急视其儿口中悬痈左右，有肿核如麻豆大者，便须刺摘令溃之，用绵缠钗绕头，展去其血，兼服诸药为治。

治小儿客忤，腹痛夭矫，面色变易。

以香豉数合，水拌令湿，捣熟作丸子，如鸡子大，用摩儿囟上，及手足心各七遍，及摩儿心脐，上下行转摩之，食顷，破其丸视其中当有细毛即掷弃丸于道中，痛乃便止。

治小儿卒中客忤涂法

灶中黄土　蚯蚓粪等分

上研细，水调涂儿头上，及五心中大良。

又方　浴法，治如前。

以马粪三升，烧令烟绝，用酒三升，煮数沸去滓，浆以浴儿。

以豶猪粪二升，热汤灌搅，适温暖浴儿。

又方　治小儿客忤服法。

以牛口沫涂乳上饲儿。

以铜镜鼻烧令赤，内酒中，能饮者令自饮，不能饮者含而灌之。

治小儿中客忤，吐青白沫，及乳食皆出，腹中痛，气欲绝者。

以桂心一两为末，一二百日儿以半钱，用水一小盏，煎至五分，去滓，温分四服，不拘时候，量儿大小加减。

又方　治小儿客忤。

上以白僵蚕七枚为末，酒调服半钱至一钱。

又方　治如前。

上取书中白鱼十枚，傅乳头令儿吮服。今人呼为衣鱼。

又方　治如前。

上取驴乳汁少少与服。或以热马屎一块，绞汁饮，咽下即愈。

麝香乳　治客忤项强欲死。

上以麝香少许研细，用乳汁调抹儿口中，如大豆许，良。

又方　治如前。

上以桔梗烧末半钱调服，量大小加减。

治马毒客忤。

上以马尾于儿面前烧，令儿咽其烟气，每日用之，取差。

治客忤夜啼禳法

上用本家厨下烧残火柴头一个，以焦头为上，朱书云：吾是天上五雷公，将来作神将，能收夜啼鬼，一缚永不放，急急如令。书了勿令儿知，立在儿床下，倚前脚里厢立之，男左女右。

辟邪膏　治客忤。及治中恶邪厉鬼气，其候似痫，但目不上视倒视，脉弦急，中之卒暴者，立至苏省。

降真香锉　白胶香别研　沉香　虎头骨酥炙黄　鬼臼去毛　草龙胆去芦　人参去芦　白茯神去心内木，各半两

上为细末，次入研飞过雄黄末半两，研细麝香一钱，拌匀，炼蜜和丸鸡头子大。每服一粒，煎乳香汤化下，及丸一弹于大，用绿绢袋盛之，带儿衣上，仍于卧处常烧炒。

三　痉　论

小儿痉病有三。一者鬼痉，小儿神魂气弱，早晚抱持，出入无时，为鬼厉邪气所干，其候皮肤掣痛，游易无常，或心腹刺痛，夭矫闷乱欲死，乃名中恶。甚者卒致于死，缓者延引岁月，更变沉滞，以至于死。又痉傍人。二者尸痉，人腹中有虫，曰尸痉。小儿气血嫩弱，邪气外伤，留滞身中，尸虫移引，相乘为病。其候沉沉嘿嘿，不知的病之处，或寒或热，或心腹闷痛，涉引岁月，遂至于死。又痉傍人，三曰蛊毒痉，谓诸毒虫之中有一能啖其余者，即为之最，名之曰蛊。或因人作，或因引注，随饮食而入儿腹中，食人藏

府。其候心腹刺痛，燠闷欲绝，利下无时，或便血片，急者即死。名曰中蛊之毒。缓者涉引岁月，以至藏烂乃死。又疰傍人。今叙诸治方于后。

虎头枕　治中鬼气，为游气为魔。

上以虎头骨为枕，与儿枕之。

千金汤　治小儿暴惊啼绝死，因人从外来，邪气所遂，令儿得疾，众医不治。

上以蜀椒左顾牡蛎各六铢碎之，酢浆一升，煮取五合，分服。

豆豉丸　治中恶鬼气寒热。

上以湿豉丸鸡子大，摩儿腿上，及手足心六七遍，又摩心腹脐上。旋旋以言祝之，了即破其豉丸看之，当有细毛弃道中。

又方　治中恶邪鬼气，或于病间忽然而卒绝。

上以生菖蒲根杵烂，取汁灌之。

又方　治如前。

上以羊屎烧烟，以熏鼻中。

又方　治如 前。

上视其死者上唇里弦，有核子如黍米，以针挑破之，复苏。

又方　治如前。

上以皂荚末或生半夏末少许，吹两鼻中。

又方　治如前。

上凡中恶邪或魔死者，不得用灯火照之，亦不得近前急唤，或与接气，恐被注染，多致杀人。但只与痛咬脚跟及足，把指甲边，多唾其面，即活。

又方　治如前。

上以好酒浸绵半盏，及手捼其汁，灌鼻中。

又方　治如前。

上以芦管吹两耳，并取病人发二七茎，捻作任子，刺鼻中。

又方　治中恶鬼邪。游痛如刀刺，或胸胁腹中绞痛急切，手不可近而按摩。

上以好酒灌鼻孔，亦治中恶，吐血下血。

又方　治如前。

上以盐一钱，水一盏，搅和令匀服，并以冷水噀之，取吐即差。

又方　治如前。

上以蓬茂酒研令服。

又方　治如前。

上以灶下黄土水调服之。

又方　治中恶鬼邪为祟及鬼疰尸疰。

上以桃仁研碎，水煮顿服，当吐即差，不吐或吐不尽，病再作。或以桃仁汁，煮米为粥与食。

鳖头散　治尸疰瘦瘠，时发寒热。

上以鳖头一枚，烧灰杵末，新汲水调下半钱。

雌黄丹　治尸疰。

雌黄研，水飞　雄黄研，水飞　川大黄慢火煨，黑色　鬼臼去毛，各一两　麝香一分，研　桃仁三十个，汤浸去皮、尖，研　白头翁去芦，半两　巴豆十个，去皮、膜，纸裹，去油尽

上为细末拌匀，以羊脂五两，熔化和药成膏，丸黍米大，每服三五粒，荆芥汤下，无时。

立效散　治尸疰。

川大黄一两，炮，锉　干桃柳叶各一两，洗，焙　栀子仁半两　赤芍药半两　朱砂一两，别研水飞　雄黄一分，别研，水飞　麝香一分，别研

上为细末拌匀，每服半钱，蜜汤调下。无时。

神功散　治中蛊毒。

大甘草半两，生末　晋矾一两，末

上拌匀，新汲水调下一钱或半钱，吐出毒物。效。

雄麝散　专治蛊毒。

雄黄一两，水飞，研　麝香一两，研　羚羊角一两，屑　鬼臼半两，去毛　赤芍药一两　莽草去芦，半两　败鼓皮一两，炙黄焦　马兜铃根半两

上除雄麝外，为细末，入二味拌匀，每服半钱，浓煎甘草汤调下。无时。

麝犀汤　治如前。

犀角一两，屑　鬼箭取羽，一两　安息香一两

苦参半两　牡丹皮去心，半两，以上先为末

雄黄一两，研，水飞　麝香半两，研

上拌匀细，每服一钱，水一盏，煎至五分，去滓放温，时时服。

甘草汤　治中蛊毒欲死。

上以甘草半两锉碎，用水一盏，煎至五分，去滓温服，当吐出毒物。

宝灵丹　治中蛊毒。

朱砂一两，研，水飞　雄黄一分，研，水飞　黄丹一分，研　苦药子一分　续随子一分，去皮毛　山豆根一两，生　蜈蚣二条，一条微炙，一条生用　斑猫一分，去头、翅、足，半生半炒　巴豆二分，去皮膜，出油尽　麝香二分，研

犬妇人，用糯米粥和丸麻子大。若未能语儿，中毒即休。如能语儿，但将药一粒入门。即患儿先闻其香是验。以腊茶清送下一丸，不得嚼破。须臾患儿必言心头作响声，毒物便下，或从口鼻出，或自大便下，嫩即是血，老即如诸虫状，其形不一，药随物下，凝血中裹之。取出丸，以香水洗净收之，一丸可救四五儿，口噤者拗灌之。如知用蛊之人，即不得根究，必再发，不可治。

治中蛊下血欲死　以盐捣汁频频服半合。

治中蛊毒，腹中坚痛，面目青黄，淋露骨立，病变无常。

以桃上寄生为末，茶点服，日四五。

桔梗丸　治鬼疰尸疰蛊疰皆疗。

桔梗去芦　藜芦去芦　皂荚去皮子　巴豆去壳心膜　附子各半豆许

上为末，炼蜜和剂，入臼杵万下，每服二丸，或一丸如黍米芥子大。仰卧勿侧眠。至食时许，病在膈上者即吐，在膈下者即泻，取下恶物，如蝌蚪虾蟆胎，或长一二尺，下后大虚口干，但作鸡羹饮五合，与极饮。或食粥三四日乃痊，病未除尽，再服。

夜啼论

小儿夜啼者，证候甚多，其所专者，不出三种。一者冷，谓脾藏寒则腹痛而啼，其候面青白，手冷腹肚冷，口中气亦冷，曲腰而啼，不肯吮乳，又有从生下多啼，入夜则甚者，此胃寒也。亦曰胎寒。《圣济经》言积冷而夜啼，夜则为阴。冷则作痛，故夜间痛甚，令儿啼哭也。二者热，谓心藏热则烦躁而啼，其候面赤，小便赤，口中气热，心腹亦暖，仰身而啼，不肯吮乳，又有多饶惊悸惕跳，或睡中忽然叫啼，此风热也。亦曰惊啼。心主热，其候惊，故热则生惊。又心为火，热则火旺，故热邪燥甚，令儿啼哭也。三者邪祟，谓有鬼气所持，其候睡卧不稳，或作疼痛，且鬼祟者，阴物也，入夜则旺，小儿精神怯弱，血气嫩微，夜间被鬼所持，故令儿啼哭也。以外客忤虫动，重舌口疮等病，亦皆能为夜啼。其治方各逐本项下具之。非若此三等之为专也。今叙方于后。

蒜香膏　治冷症腹痛夜啼。

上以大蒜一颗，慢火煨香熟，取出切细研烂，于日中暴，或火上炕半干，可丸时即以好乳香称半钱，研细如粉拌入，再研极匀，丸如芥子大，每服七丸，乳头粘服，或乳汁送下，食空。

当归丸　治如前。

当归去芦、洗净，焙干，称　白芍药　人参去芦，各一分　甘草炙　桔梗去芦　陈皮不去白，半分

上为细末，每半钱，水煎时时服之。

龙角丸　治小儿五惊夜啼。

龙角一分　黄芩半两　牡蛎一分半，火煅，一作牡丹　蚱蝉去土，二枚　牛黄小豆大，五块　川大黄一分半

上为末，炼蜜和丸麻子大，薄中儿二丸，大小以意加减。

芎藭散　治小儿夜啼，至明则安。

芎藭　白术　防己各半两

上为末，以乳和与儿服，以意量大小多少，又母用手掩入儿脐中，及摩儿头脊，大验。儿生二十日已里，未能服者，以乳和麻子大一丸，置儿口中，乳汁送下。

又方　交道中土　伏龙肝各一把

上同研细，水调少许饮之。

治小儿夜啼

以蝉蜕去土为细末，用生姜蜜水调涂儿下唇。

又方　治如前　男左女右臂上书尹喜二字，更于手心内书天字一个。

又方　治小儿惊啼夜啼。

以腊月缚猪绳，烧灰，水调服。

以猬皮三寸烧灰，著乳上饮之，疗如物刺啼。

灯花丸　治如前。能祛邪止痛。

以灯花二十个，乳香皂子大两块，同为末，粟米饮和丸芥子大，每服七丸，桃心汤下。无时。

万金散　治藏寒气弱，面色青白，遇夜多啼，状若神祟。

沉香锉　丁香　人参去芦　五味子去枝梗，炒　当归去芦，洗焙，各一两　白术锉　赤芍药各半两　桂心一分

上为细末，每用一钱，淡浆水一小盏，煎至五分，放温，时时滴口中，儿大稍稍饮，立效。

当归散　治胎寒气啼不止，久能变痫。

上以当归为末，每用小豆许，乳汁调抹儿口中，日夜五服。

三黄丸　治热症心燥，夜啼及诸热症。

黄芩半两　大黄去皮，湿纸裹，煨熟，一分　黄连去须，一分

上为细末，面糊和丸绿豆大，每服五七丸，人参汤下，亦治昼啼。

又方　治热烦腹痛夜啼。

上以真牛黄少许，如小豆大，乳汁化服。又于脐下书一田字，差。

又方　治热症心燥夜啼。

上以灯花三两颗，用灯心煎汤，调抹儿口中，乳汁送下，日三。钱氏亦治藏冷夜啼，但顿乳上，令儿吮之。又经验方，以灯心烧灰，涂乳上吮儿。

红桃散　治风热体如汤火，夜啼不乳。

天南星二个，每个中心剜作窝子，入朱砂装满，用木盖盖之，水调，取下中心末，涂缝，掇一地坑，顿在内，以炭盖之，用火煅赤，放冷，取出研末　全蝎半钱，为末　白附子大者二个，为末　腻粉一钱

上拌研匀，每用一字，金银、薄荷汤调下。

绿霞散　治如前。

柏叶二钱，末　蝎末一钱　天南星炮过，为末，一分　白僵蚕去丝，嘴末，一钱　郁金末一钱　雄黄末，一钱，水飞

上拌匀细，每服一字或半钱，薄荷、蜜水调下，无时。

前胡丸　治风热气啼。

上以去芦前胡为末，炼蜜和丸小豆大，日服一丸，熟水下，服至五六丸，即差。

牛黄膏　治儿睡着时，忽然乍惊哭而觉，面赤口干，状若神祟，此虽夜啼，非名夜啼也，乃风热邪气乘心藏而作，名曰惊啼。

真牛黄研　煅过牡蛎粉　朱砂研，水飞　雄黄研飞，各一分　人参去芦　甘草炙，各半两　龙脑半分，研

上为末拌匀，炼蜜和膏鸡头子大，每服半粒或一粒，薄荷汤化下，乳食后。

安神丸　治如前。

麦门冬去心，焙　马牙硝　白茯苓　干山药　甘草半两　寒水石研，各半两　朱砂一两，研，水飞　龙脑一字，研

上为细末，炼蜜和丸鸡头子大，每服半丸，沙糖水化下，无时。

虎睛散　治惊惕夜啼。

上以虎睛为散，竹沥调少许，抹口中。

又方　治如前。

上取车辖脂小豆许，内口中，又取内脐中。

又方　治如前。

上以父乱头发烧灰研末，酒调服一字，更量大小，温水亦得。

又方　治如前。

上以鸡粪白烧灰研末，米饮调服。

明砂丸　治心神不宁多惊，心腹疼，夜啼不止。

朱砂通明者，一钱　杏仁十四个，去皮、尖，炒黄　好坯子半钱

上为末，软饭和丸黍米大，每服三五丸，薄荷汤下。

麝香散　治惊啼夜哭，发歇不止。

上以麝香研细，用半字，清水调下，日二三服。

丁头代赭石半两，火煅醋淬，不记遍数，以易碎为度　铁胞粉一钱　白附子一钱　辰砂一钱，水飞　麝香一字，研　龙脑一字，研

上为细末，拌匀，蒸枣烂和成膏，旋用，婴孩半皂子许，至二三岁一皂子许，金银、薄荷汤化下，不拘时候。

七宝轻青丹　治惊啼夜哭及诸热等疾。

螺青半两　蛤粉一分　钩藤炒为末，一钱　白附子三字　铅锡灰二钱　丁香一字，炒　天竺黄一钱

上为细末，入麝香半皂子许，研细拌匀，米粉煮糊和丸豌豆大，每服一丸，薄荷汤磨水下。无时。

又方　治夜间卒惊啼哭，似有痛处，而不知疾状。

上取雄鸡冠血，临儿口上，滴少许入口中。即差。

又方　治如前。

上以乱发烧灰为末，涂乳上令儿吮之，能食者饮调亦得。

甑带法　治鬼祟邪厉夜啼。

上取甑带悬户上。

又法　治如前。

上以胡粉水调二大豆许与服，日三。

马骨末　治小儿诸夜啼。

上以马骨为细末，傅母乳头上，令儿吮服，即止。

又方　治如前。

上取狼粪中骨烧灰，研为细末，服黍米许，便止。

又方　治如前。

上取鸡窝中草，安于卧席之下，勿令乳母知之。

诸汗论

小儿有遍身喜汗出者，此荣卫虚也。荣卫相随，通行经络，营周于身，环流不息，荣阴卫阳。荣虚则津液泄越，卫虚则不能固密，故喜汗出遍身也。钱乙用香瓜丸。若睡中汗出，不自知觉者，此肌肉虚而盗汗也。如盗者窃物，使人不知觉也。

又有但额上汗出者，此厚衣温暖，将养过宜也。上二项，钱乙并用止汗散。若上至头、下至项有汗而不曾过胸者，此六阳虚汗也。六阳脉皆上至于头故也。若上至项下至脐有汗者，此胃虚汗也，当与补胃。昔钱乙治张氏三子，大者喜遍身汗出，次者汗上至项下至脐，小者但头面有汗，至项下而无。他医以麦煎散治之不效。遂请乙治之。大者与香瓜丸，次者与益黄散，小者与石膏汤，各五日而愈。钱乙治方，本集载之，外收诸方叙后。

沉香黄芪散　治荣卫虚，遍身喜汗。

沉香锉　绵黄芪锉　人参去芦　当归去芦洗净，焙　赤芍药以上各一两　木香　桂心各半两

上为细末，每一大钱，水一小净盏，入生姜三片，枣一枚，同煎至半盏，去滓放温，食前时时与服。

苁蓉丸　治血少喜汗。

肉苁蓉一两，酒浸一宿，刮去外皮，炙干　鳖甲一两，酥炙黄，去裙襕　绵黄芪半两　何首乌半两

上为细末，炼蜜和丸黍米大，每服十丸，米饮送下，食前。

木槿花　治盗汗。

上取木槿花开而再合者，焙干为末，每用一钱，猪皮煎汤调下，食后临卧。

牡蛎散　治盗汗。

牡蛎一两，煅赤　麻黄根二两，锉　甘草半两

上为末，每用二钱，以野水一盏，煎至七分，去滓放温服。无时。

升麻汤　治肌热盗汗。

升麻　绵黄芪去芦　人参去芦，各一两　熟干地黄　天竺黄研　牡蛎粉研，各半两

上为细末拌匀，每服半钱或一钱，煎竹叶汤调下，无时。

柴胡人参散　治如前。

柴胡去芦　人参去芦　白术　白茯苓　青皮去穰　桔梗去芦　麦门冬去心　川弓　白芍药　甘草炙　桑白皮　升麻

上等分为末，每服一钱，水一盏，煎至七分，温服，食后。

紫苏饮　治肌热烦躁，多渴盗汗，揉鼻腹满。

柴胡去苗　藿香去土　甘草　乌梅肉　紫苏叶去土　干葛　人参去芦　茯苓　麦门冬去心　秦艽去芦　地骨皮去骨　防风去芦并叉枝

上等分为末，每二钱，水一盏，煎至七分，去滓放温，时时呷。

沉香鳖甲丸　治潮热盗汗。

沉香锉　草龙胆去芦　鳖甲童子小便浸一宿，涂酥炙焦，去裙襕，各一两　绵黄芪一两，锉　川黄连去须，半两　川大黄半两，微炮

上为细末，炼蜜和丸黍米大，每服十丸，用麦门冬去心煎汤送下，无时。

柴胡黄连膏　治盗汗潮热往来。

柴胡去苗　胡黄连等分

上为末，炼蜜和膏丸鸡头子大。每一二丸银器中用酒少许化开，入水五分，重汤煮二三十沸，放温服。无时。

黄芪散　治虚热盗汗。

牡蛎粉　黄芪　生干地黄焙干，等分

上为细末，每服一钱，水一小盏，煎至六分，去滓温服。无时。

虎杖散　治实热盗汗。

上以虎杖锉细，水煎服之，量大小多少与服。

黄连粉　治盗汗。

黄连去须　牡蛎粉　贝母去心，各等分，为细末

上三味各一两，即入米粉一两，研匀细，以粉身。

龙胆粉　治如前。《千金》治头汗。

牡蛎粉　茯苓各二两

上同为细末，于生绢袋子盛之，有汗即扑身。

牡蛎粉　治诸汗。

牡蛎粉二两　麻黄根　赤石脂　糯米粉各一两

上匀为细末，人龙脑末一钱拌之，每用一匙头，新绵包扑有汗之处，止盗汗最佳。

又方　名同治同。

牡蛎粉二两　麻黄根一两　蛇床子　干姜各半两

上同为细末，用如上法。

治小儿藏热多汗。**犀角饮子**

犀角屑三分　茯神去心内木　龙齿各一两　麦门冬去心，一两半　甘草半两　白术一分

上为末，每服一钱，水一盏，煎至七分，去滓温服。无时。

不语论

小儿有不能语者，其证有三：一者心气不足，心系舌本，气营而举之，则舌本动而语声作矣。今气怯而不能营用于舌，故不能语也，此证已在五气项下具之。二者卒不能语，因风寒之邪，干于哑门，连络舌本，使舌本紧急，故卒不能语也。又一证喉咙为气之道路，会厌为声之门户，暴为风客于喉厌，则失音而语声不出，非不能语也。三者因病

后不能语，此因服清药以利小便，致肾虚而不能上接于阳，故不能语。昔钱乙治王氏慢惊病愈后，有声而不能语，众以为失音。乙曰：既失音何开目而能饮食，又牙不噤，口不紧，而能咽药，众医皆不晓。乙曰：此因用清药利小便，致虚肾气，不能上接于阳故也，遂用地黄丸补肾，而渐渐能言，一月而愈。其方本集载之，外收方具后。

菖蒲散　治感风寒客于哑门，卒不能语。

菖蒲　桂心　远志去心，甘草水煮，各一分

上为细末，每一钱，水一盅，煎至五分，温服无时。

桂散　治风寒客于喉厌，语声不出。

川芎三分　远志去心，甘草水煮，三分　麦门冬去心，三分　人参去芦，半两

上为细末，炼蜜和丸小豆大，平旦空心米饮下五丸，日三，儿大加之，久服取效。

渴　论

小儿有渴而饮水者，此因藏府有热，热则藏燥，故多体热发烦，亡耗津液，即令作渴，欲饮水以解之也。又有疳渴，吐泻发渴，霍乱发渴者，各逐本项具之。阎孝忠云：凡小儿诸渴，因亡失津液引饮者，但多煎钱氏白术散与服，使任意取足饮之，弥多弥好，其方本集所载。热渴者叙方于后。

莲汤散　治婴小发渴心燥。

上以粉霜研极细，每婴孩一字，三四岁下者半钱，煎莲花汤调下，冬月无花时莲肉代之。

香葛汤　治渴甚津液燥少。

木香　干葛根锉　人参去芦，各一两　白茯苓　藿香叶去土　甘草炙，各半两

上为细末，次用麝香半钱研细，入药拌匀，每服半钱，或是一钱，生姜汤调，温服无时。

葛根汤　治体热烦渴。

葛根　人参去芦，各一两　麦门冬去心　白茯苓　泽泻　甘草炙，各半两

上为细末，每服一钱，水八分，入生姜二片，薄荷三叶，煎六分，去滓温，量大小服。无时。

凉肌丸　治肌热脸赤，烦渴燥闷。

草龙胆去芦，二两　玄参去芦，一两　当归去芦，洗净，一两

上为细末，炼蜜和丸绿豆大，每服一二十丸，竹叶汤下，无时。

葛根饮子　治热渴久不止。

上以葛根半两锉碎，水一盏，煎至六分，去滓，频频服，无时。

神蛎散　治一切诸渴。

上以大牡蛎于腊日端午日，用黄泥裹，煅通赤，放冷，去泥为细末。取活鲫鱼煎汤调下半钱，只一二服，差。

治小儿热渴久不止。

上以石莲心三十个，炒黄，浮萍一分，水一盅，生姜少许，同煎至六分，去滓，每服半合，徐徐服。

血　溢　论

小儿诸血溢者，由热乘于血气也。血得热则流溢，随气而上，从鼻出者为衄衄，从口出者多则为吐血，少则为唾血，若流溢渗入大肠而下者，则为便血，渗入小肠而下者，为溺血。又有血从耳目牙缝龂舌诸窍等出者，是血随经络虚处着溢，自皮孔中出也。今叙方于后。

治衄溢方

盆消一分，研　乱发一分，烧灰研　红蓝花一分，为末

上同匀细，以绵缠子揾药塞鼻孔中。

槐花散　治如前。

槐花一两，炒　蒲黄半两　川面姜一分

上为细末，每服半钱，新水调下，无时。

又方　治如前。

上以滑石为细末，饭丸萝卜子大，每服

三二十丸，微微嚼破，新水咽下，未能嚼者，捶之。

又方　治如前。

上以生萝卜锉碎，研取汁，入酒相当，量大小温服，立止。

华盖散　治唾血吐血。

阿胶半两，蛤粉炒，如珠子，去蛤粉　黄芩一分　人参去芦，一分

上为细末，每服半钱，陈米饭调下，无时。

紫参散　治如前。

紫参　山栀子仁　生干地黄各一两　刺芥烧灰　乱发烧灰　蒲黄研　伏龙肝研，各一分

上拌细匀，每服半钱或一钱，煎竹茹汤调下，无时。

黄连散　治吐血。

上以黄连一两，去须为细末，每服一钱，水七分，入豉二十粒，同煎至五分，去滓温服。无时。

上方　治如前。

上以蒲黄细研，每服半钱，用生地黄汁调下，无时。

又方　治如前。

上以蛇蜕皮炒焦黄为末，乳汁调下。

又方　治如前。

上以黄明胶、新绵各一两，并烧灰研为细末，每服半钱或一钱，糯米饭调下，日三。

又方　治如前。

上以灯心净碗内烧灰，以物盖之，研为末，每服半钱或一钱，麝香汤调下。

甑带灰　治大便下血

上以甑带烧灰研末，涂乳下，与儿吮之，南人以蒲为甑带，久经蒸溜，或败烂者良。

又方　治如前。

上以车缸烧赤，内水中饮服。

又方　治如前。

上取雌鸡翅下血与服，或以鳖头一枚，炙黄黑为末，饮调半钱服。

车前散　治小儿尿血。

车前子一分　牡蛎半两，煅为粉　甘草一分，炙　川朴硝一分

上为细散，每服一钱，水一小盏，煎至五分，去滓温服。

又方　治如前。

上以甘草二两，炙黄为细末，炼蜜和丸绿豆大，每服五七丸，温水下，日二，或生锉，以水六合，煎取二合，去滓服。

神白散　治诸吐衄便溺等血妄出。

槐花半两，微炒　蛤粉一两

上为细末，每服半钱或一钱，煎柳枝汤调下。

青龙丹　治小儿热盛，一切血妄行，神效。

甘草　贯众　茯苓　干葛　龙脑　薄荷叶　藿香各一两　缩砂五两，去皮　山茵陈叶　寒水石各六两

上为细末，面糊和丸樱桃大，别研青黛为衣。

又方　治诸血妄行，从耳目口中鼻中出。

上以赤马粪烧灰，研为细末，温酒调下一字或半钱，看大小与服。

地黄散　治舌上出血如针孔。

生熟地黄一两　明胶半两，炒

上为末，温汤调下一二钱。

又方　治如前。

上以豉一合，水一盏，煎数沸温服半盏，或一盏，亦治下血。

又方　治如前。

上以小豆一合为末，水三盏，和搅汁饮之。

戎盐丸　治舌上有数黑孔，血出如涌泉。

戎盐　黄芩　黄柏　大黄各二两半　人参　桂心各一两　甘草半两，炙

上为细末，炼蜜和丸绿豆大，饮下五七丸，日三，如舌上孔穴大，血不止者，仍烧铁烙之。

苦竹叶汁　治牙齿断缝间血不止。

上以苦竹叶不拘多少，水煎浓汁，入盐

少许，通口漱盥。

又方　治如前。

上以童子小便半盏暖热，通口漱盥。

噀法　治九窍四肢指岐间皆出血，此暴惊所致。

上勿令患人知觉，以井花水猛噀其面。

治小儿尿血

以鹊巢烧灰，井花水调服。

以川升麻五分，水五合，煎取一合，去滓。一岁儿日服尽。

小儿卫生总微论方　卷十六

寒　热　论

小儿寒热者，由风邪外客于腠理，痰饮内渍于藏府，致血气不足，阴阳更胜而所作也。阳胜则发热，阴胜则发寒，阴阳交争，邪正相干，则寒热往来，时发时止，然此症与疟相似。而发寒不致战栗，发热不致闷乱，所以异也。今叙方于后。

人参前胡散　治寒热往来。

人参去芦　柴胡去苗，各一两　前胡去芦，一两　桔梗去芦　半夏汤洗七次，焙干　地骨皮去骨　甘草炙，各半两

上为细末，每一钱，水一盏，入生姜二片，煎至半盏，去滓服，无时。

秦艽汤　治如前。

秦艽去芦、一两　鳖甲一两，醋炙焦黄，去裙襕　大黄半两，锉碎，微炒　竹茹一分　麻黄去根节，半两　甘草一分

上为粗末，每服一钱，水一盏，人葱白二寸，煎至五分，去滓温服，无时。

又方　治如前，及治赤气中人。

上以猪后蹄烧灰研末，以乳汁调服一钱，治中热亦佳。

香甲散　治寒热肌瘦。

木香一两　鳖甲一两，酥炙黄，去裙襕　川大黄半两，锉，微炒　当归去芦，洗净，焙，半两　槟榔三个　陈皮汤浸，去白，焙，称半两　柴胡去苗，半两　知母半两　甘草半两

上为粗末，每服一钱，水一盏，生姜二片，煎至六分，去滓温服，无时。

二姜圆　治痹疾发寒热似疟。

干姜　良姜各等分

上细锉，同炒黄，为细末，饭饼和圆绿豆大，每服三五圆，煎杨、柳枝汤送下，空心服，亦治疟。

冬瓜汁　治生下至五月以里，乍寒乍热，往来无时。

上以冬瓜炮熟，绞汁与服，或锉柳枝，煮汁浴儿。

疟　病　论

疟病者，由夏伤于暑，客于肤里，致肌腠虚隙，至秋又寒湿乘之，动前暑热，邪正相搏，阴阳交争，会遇有时，更相胜负，阳胜则发热，阴胜则发寒。阴阳互胜，则发寒热。热则烦躁闷乱，寒则禁栗战慄。阴阳会遇，交争已过，邪正相离，则寒热俱歇。若邪动气至，又复发作。故疟休作有时也。其发晏者，邪正会遇迟也。其发朝者，邪正会遇早也。其间日发者，邪气入深而行差迟，不能日作，故间日乃发也。今叙方于后。

桃仁汤　治小儿发疟不止。

桃仁汤浸，去皮尖并双仁者，麸炒黄，一两　鳖甲一两，酥炙黄，去裙　桂心半两　黄芩半两　川升麻半两　赤茯苓去黑皮，半两

上为粗散，每服一钱，水一小盏，煎至五分，去滓温服。无时。

灵豆膏　治如前。

大蒜一枝，去皮，研　巴豆三斤，去皮心

上同湿纸裹，煨熟，一处研为膏，圆麻子大。每服二三五圆，醋汤送下，吐泻即差。后用藿香补之。

藿香汤

藿香去土　肉豆蔻面裹，煨　甘草各一分

上为细末，每服半钱，水一盏，煎至七分温服，连服三服，无时。

朱衣使者　治如前。

砒半两，细研　绿豆末一分　黑豆末一分

上同研匀细，滴水丸黍米大，辰砂为衣。间日发者，于好日夜临卧时，面北冷醋水送下二圆。频日发者，只于当日夜服如上法。儿极小者与一圆。端午日合佳。

又方　治如前。

上以生鹿角为细末，发已前乳汁调服一字。

又方　治如前。

上以鸡脛中黄皮炒极燥为末，乳汁服之，男雄女雌。

又方　治如前。

上以蛇蜕皮一两，取每条长五寸以上者，烧灰存性，研细末，每服一钱，新水调下，未发前服。三岁上半钱，以下者一字。

又方　治如前。

上以黄丹二分，蜜水和之与服，如冷者以酒和，冷服。

万金丹　治痰盛挟积，发疟久不差。

阿魏一钱，汤化去砂石，和面作饼，煨熟锉细，炒干　朱砂一分，研，水飞　砒霜一钱，用醋半盏，慢火上熬醋尽　丁香半两　巴豆七个，去皮膜，油尽取霜　木香半两　相思子十四个

上为细末，炼蜜和圆黍米大，未发前新水下一二粒，一岁加一粒，至十岁上止十粒，绝早服，忌热物一时辰。

知母圆　治疟疾热甚者。

知母一两，微炒　鳖甲一两，酥炙焦，去裙襕　川大黄一两，细锉，微炒　朱砂一钱，水飞，研　赤茯苓去黑皮，一两　川芒硝半两　川升麻半两　龙脑一钱，研

上为末，拌匀细，炼蜜圆黍米大，每服五七圆，生姜汤送下，得利即愈，量大小加减。

小儿温疟　灸两乳下一指三壮，壮如小麦大。

恒山汤　治小儿疟疾。

恒山一两，锉　小麦三合　淡竹叶切，一升

上为粗末，水煎去滓，腊中儿服一蚬壳，半月者二蚬壳，满月者半小合，以意增之。

乌梅圆　治疟疾寒甚者。

乌梅肉一两，焙干　母丁香半两　桂心半两　当归去须、洗焙，半两　干漆半两，炒烟出尽

上为细末，入研细麝香末半钱拌匀，炼蜜和圆黍米大，每服十圆粥饮下。

茶清散　治诸疟疾。

人言一两　黑豆一升　河水四升

上同煮至水尽，炒干为末，每服一字或半钱，热多者腊茶清调下，寒多者草茶清调下，间日者于发夜临卧服，频日者但临卧，忌热物一时辰，此方宜斟酌。

鬼见愁　治乳奶婴小患疟，无计可治，服此的验神应。

代赭石用丁头五粒，火煅，醋淬十次，研极细　朱砂透明块子，半钱，水飞　砒霜皂子大

上三味，用湿纸七重裹慢火内煨至纸干，取出顿地上出火毒，次入脑麝各半字，金箔五片同研，共为细末，每一字，于发日早以麻油一滴，调药傅鼻尖上。立止。

草果子汤　治脾寒发疟。

草果子二个　甘草五寸　大枣七个

上并锉碎，分三服，水一盏，煎至半盏，放温服，更量大小加减。

符法治诸疟　仙　杂　遣

上于发日不得梳头洗面、嗽口，及弄水浆，日出时用朱砂书上第一字，于净纸上剪下，于两脚心、于两手心、两颊上、并额上、并前后心共九处帖了。然后吃饮食，如未止，书第二字，永除根本，鲜有书及第三字者。

弄舌论

小儿弄舌者，其症有二：一者心热，心系舌本，热则舌本干涩而紧，故时时吐弄舒缓之。二者脾热，脾络连舌，热则舌亦干涩面紧，故时时吐弄舒缓之，皆欲饮水，心热

则发渴，脾热则津液耗，皆引饮。二症相似，宜加审别。心热者面赤，睡即口中气热，时时烦躁，喜就其冷，咬牙上窜，治宜退热。脾热者大便稠硬，赤黄色，面黄身亦微黄，治宜微导之。不可用冷药，又不可转下。若误下之，则脾胃虚，津液耗，又加五心烦热，面黄肌瘦，变为疳也。若大病未已，用药弄舌者，大凶也。今叙方于后。

人参知母散　治心热弄舌。

知母一两　蓝叶半两　人参去芦，半两　钩藤一分　川升麻一分　干葛一分　黄芩一分

上为细末，每服一钱，水八分，入竹沥三两滴，煎至五分，去滓温服，无时。

泻黄散　治脾热弄舌。

藿香叶去土，七钱　山栀子仁一两　石膏半两　甘草三两　防风去芦并丫枝，切焙，四两

上并锉，以蜜酒洒拌匀，炒香燥，为细末。每服一钱，水一盏，煎至六分，去滓放温，取清汁服。一方有山药二两。

魅病论魅音奇

小儿魅病，其论有二。一者《圣惠》云：小儿生十余月已后，母又娠，因以乳儿，令儿生病，其候精神不爽，身体痿瘁，骨立发落，名曰魅病，又曰继病，又曰交奶。二者《巢氏》云：小儿在母胎妊之时，其母被恶神导其腹中胎气，至儿生下，往往恍惚，微微下利，寒热往来，毛发焦竖，多嗔不悦，其候颇似于疳，今叙方于后。

虎骨丹　治魅病。

虎头骨涂酥炙黄，一两　鬼臼一两　草龙胆去芦一两　鬼箭取羽，一两　琥珀半两，令研　白胶香半两，令研

上为细末，同研匀，炼蜜和圆黍米大，每服十粒，乳香汤送下，无时。

又方　治如前。

上取伏翼蝙蝠是也，烧灰研细末，粥饮调下半钱，日三，若炙令香熟，嚼烂哺儿，亦效，如得重一斤者尤佳。又得黄精自然汁，涂炙之。最良。

又方　治如前。

上取百劳鸟毛，与儿带之。又名博劳，又名鹎。

骨蒸论

小儿自周晬以上，至十余岁，血气隆盛，因厚衣温燠，将养过宜，食羊肉肥甘果食诸物，藏府生热，熏蒸肌骨，身体发热，夜有盗汗，渐渐瘦悴，乃成骨蒸，若不即治，则为急劳，今叙方于后。

秦艽散　治潮热蒸瘦减食。

秦艽去芦，切焙　甘草炙，各一两　干猫儿薄荷叶半两，不见火

上为粗末，每服一二钱，水一中盏，煎至七分，去滓温服，食后。

地骨皮汤　治骨蒸体热肌瘦。

地骨皮去骨　胡黄连各一两　鳖甲涂酥炙黄，去裙尽　柴胡去苗　犀角锉，取屑　嫩桃枝锉　川大黄炮　知母各半两

上为细末，每服一大钱，水一盏，煎至五分，去滓温服，无时。

麦煎散　治童男室女，骨蒸肌热盗汗，减食痿瘦。

鳖甲醋炙，去裙襕　大黄纸裹，煨熟　恒山柴胡去苗　赤茯苓去黑皮　干生漆炒烟尽　当归去芦，洗净，酒浸一宿　白术　生地黄　石膏各一两　甘草半两，炙

上为末，每服一钱，水一盏，入小麦五十粒，煎至六分，去滓温服，食后临卧，有虚汗者，加麻黄根一两。

连艽散　治骨蒸肌瘦，渐为急劳。

黄连去须，一两　秦艽去芦，一两　天灵盖一枚，涂酥炙黄　甘草半两，炙

上为细末，每服半钱，粥饮调下，无时。

腹皮青黑论

小儿腹肚皮腠虚薄，为风寒邪气所乘，而真气微弱，不能滋其血气，失于荣养，致邪气著而不去，故腹皮卒然青黑也，此候危恶，今叙方于后。

二圣散　治腹肚皮肤，忽然青黑。

上以胡粉、苦参各一两，为细末，每服一钱，温酒调下，兼涂患处。

又方　治卒腹皮青黑，不能喘息，宜急用此方。

上以大青为末，纳口中酒送之。

又方　治卒腹皮青黑，不急治，须臾即死。

上以酒和胡粉涂之，干则再涂，仍于脐四边各半寸，并鸠尾下一寸，共五处，各灸三壮。

难乳论

小儿难乳有二。一者儿初生，客风邪热中脐，流入心脾之经，即令舌厚唇燥而急，口不能乘乳，故乳而不能咂饮也。二者儿初生时，拭掠口中秽血不及，咽而入腹，则令儿心腹痞满，短气促急，故口不能吮乳饮之也。今叙方于后。

五福化毒丹　治心脾经热，舌厚唇燥，急不能乘乳。

生干地黄焙，称　熟干地黄焙，称，各半两　天门冬去心，称　麦门冬去心，称　玄参去芦　甘草炙　甜硝各三钱　青黛一钱半

上先六味为细末，后研入硝黛拌匀，炼蜜和圆鸡头大，每服半圆或一圆，食后水化服之无时。

又方　治儿饮乳不快，喉舌似紧，不相从顺。

上以沙牛角烧灰存性，研细末涂乳上，放儿口中，捻汁饮吮咽下。

又方　治胸腹痞满，短气促急，不能饮乳。

上取鸡子壳烧灰，酒服半钱。

又方　治心胸热痞，饮乳不快。

上以生葛根杵烂，绞汁饮灌之。如无，以干葛煮灌之，亦得。

治小儿不能乳。

上以雀矢四枚末之，著乳上，令吮之，儿大增服。

治小儿初生不饮乳及不小便。

上以乳汁二合，葱白一寸四破，于银器内煎取一合，药注灌之，立效。

大小便论

小儿大便有秘涩者，有不通者，皆由府藏有热，乘于肠胃，胃热则津液少，少则粪燥结实而硬，大便难下，则为秘涩，甚者则不能便，乃为不通也。小便有滴涩者，有不通者，由小肠与膀胱有热，二经俱主水，水入小肠，传于膀胱，循水道出而小便也，热气乘之，则水耗少而行涩，故滴沥而下也，甚者水道干而不通也。若热入大小肠，则皆壅滞，不得宣利，故大小便俱不通也。

金花散　治大便秘涩便难。

皂角仁一钱，炒　槟榔一个，生　甘草一钱

上为细末，每服一字或半钱，沙糖熟水调下。

柏子仁膏　治如前。

柏子仁拣净　松子仁　胡桃仁各等分

上研和膏，每弹子大，热汤化下，未快再服。

人参荆芥汤

上以人参　荆芥各自为末，每用人参末半钱，荆芥末一钱和匀，水一盏，煎至七分，放冷，量大小时时与服。

木香粗散　治大便不通。

木香　诃子煨，取皮，等分

上为粗末，每半钱或一钱，水煎去滓，放温时服。

又方　治如前。

上以猪苓一两为末，水少许，煮鸡矢白汤调下一钱，差。

又方　治如前。

上以酵不拘多少，先搦干曝为末，面糊为圆绿豆大，每服五七丸至十余丸，量大小米饮下。

木通散　治小便涩滞滴沥，不得通快。

木通　滑石　甘草炙　焰硝研，各半两　三叶草一分

上为末细匀，每服一字或半钱，沸汤点服，乳食前。

滑石散　治如前。

滑石　瞿麦　葵子炒　芸薹子　甘草炙　山栀子仁　郁金　海金沙炒，各一钱

上为细末，每服半钱，煎灯心、葱汤调下，乳食前。

如圣散　治如前。

海金沙炒　滑石等分

上为细末，每服一字或半钱，煎灯心汤调下，乳前食。

八正散　治如前。又治心经邪热，又治热淋。

瞿麦　木通　山栀子仁　地扁竹　车前子　甘草　滑石各三钱　大黄一钱半

上为细末，每服一钱，水七分，入薄荷二叶，同煎二分，去滓温服，无时。

治小儿小便不通，三日欲死。

葵根一握，锉　壁鱼七枚，别研

上以水一大盏，煎葵根取汁六分，入壁鱼末，再煎三五沸，去滓放温服。

治小儿小便赤涩不通。

蒲黄　滑石各等分

上研匀细，每服一钱，煎灯心汤调下，沙糖水亦得。亦治淋痛，乳食前。

治小儿卒不得小便。

以盐安脐中灸之。

治小儿小便赤涩不通。

滑石二两　木通一两　葵子一合

上为粗散，每服一钱，水一小盏，煎五分，去滓温服，无时。

冬葵子散　治小儿卒小便不通，小腹急闷。

冬葵子一两　木通半两

上为粗末，每服一钱，水一小盏，煎至五分，去滓，不拘时候。

捻头散　治小便不通。

延胡索去皮　川苦楝去核

上为细末，每服半钱或一钱，捻头汤调下。如无捻头，即于汤中滴油三两点，食前服。

一方车前草、小麦各一升，水二升，煮取一升二合，去滓，煮粥服，日二，量儿大小加减。

葶苈散　治如前。

葶苈半两，炒　青皮去瓤，炒黄，半两

上为细末，每服半分或一分，空心姜汤调下，乳食前。

僵蚕散　治如前。

白僵蚕炒，去丝、嘴　当归去芦，洗净，等分

上为细末，每服半钱或一钱，煎车前子汤调下，亦治血淋。若沙淋者，煎羊蹄草汤调下。无时。

又方　治如前。

右以绵黄芪为末，每服一钱，水一盏，煎至五分，温服无时。

又方　治如前。

上以乌梅肉为末，每服一钱，水调服。神效。

又方

上以扁竹煎汤，放温服，如熟水饮之，效。

白术膏　治小便涩滞不通，胸腹痞满。

白术半两　白茯苓一分　泽泻半两　人参去芦，一分　滑石一分

上为末，炼蜜和膏，每皂子大，米饮化下，亦治脾胃不和，不美乳食。

朱砂散　治小便赤涩不通，心神烦躁。

朱砂一两，研　滑石半两，研　犀角屑半两　黄芩一分　车前子一分，炒　甘草一分，炙

上为散拌匀，每服半钱，煎竹叶汤下，乳食前。

葵石散　治小便不通闷乱。

葵根一握，锉　滑石一两　木通一两　牵牛子半两，炒

上为粗散，每服一钱，水一大盏，入灯心、葱白各少许，煎至六分，去滓放温，食前服。

鸡肠草散　治小肠膀胱有热，小便难涩，服冷药过多，却致小便不能禁止。

鸡肠草一两　牡蛎粉三分　龙骨火煅，半两　麦门冬去心、焙，半两　白茯苓去黑皮，半两　桑螵蛸米泔水煮，半两

上为粗散，每服一钱，水一盏，入生姜二片，枣一个，煎至六分，去滓温服，亦治遗尿、乳食前。

郁李仁丸　治大小便秘涩不通。

郁李仁一两，汤浸，去皮　大黄一两　槟榔三两　青皮去瓤，半两

上为细末，炼蜜和丸绿豆大，每服十丸至十五丸，姜汤下，无时。

芎黄散　治如前。

芎劳一两　川大黄三分，锉碎，微炒　郁李仁三分，温汤浸，去皮，微炒黄

上为散，每服一钱，温水调下，乳食前。

朱粉丹　治如前。心神烦，腹胁闷，卧中多惊。

朱砂半两，研细，水飞　腻粉一钱　续随子半两

上为末，研拌匀，炼蜜和丸黍米大，每服七粒，温水送下，食后。

木通锉散　治大小便不通。

木通　瞿麦　滑石　山栀子仁各三钱　茯苓去黑皮　甘草各四钱　续随子三钱　车前子一分

上咬咀，每服一钱，水一盏，煎至半盏，去滓温服，更量大小加减，乳食前。

红绵散　治如前。

朱砂研，水飞　郁金　轻粉各一分　马牙硝半两

上入麝香少许，研匀细，每服半钱，薄荷蜜水调下，无时。

又方　治如前。

上以滑石为末，每服半钱，清油调如稀糊，再入好酒一茶脚许，搅匀服之，如一时久，未通再服。

又方　治如前。

上以不蛀皂角去皮核，生为末，用二钱，取独头蒜一颗，沙盆内同皂角末磨擦蒜尽，以酽米醋少许和之，捻作饼子，如香花子，贴脐中，立通。

又方　治如前。

上以露蜂房烧灰研细，酒调一钱或半钱，日二。

郁李仁膏　治褓褓小儿，大小便不通。

郁李仁一两，浸去皮　滑石半两，研　大黄去粗皮，取实者一两，锉碎，酒浸半日，捏干炒焦为末

上先将郁李研为膏，和二味丸黍米大，每服一二十圆，量大小与，小者乳汁下，大者薄荷汤下，要疏风热痰实服，但微溏极稳。

五　淋　论

淋病有五：一曰热淋，血淋。二曰寒淋，膏淋。三曰气淋，四曰劳淋，五曰石淋。五淋之中，小儿有所患者，惟寒热气之三症外，劳石二症，虚极所致。小儿未亲色欲，故无患者。内石淋恐儿本怯肾弱者有之，亦千人中无一矣。今并具五淋之证于下。

热淋者，因热乘小肠膀胱二经。皆主水，水入小肠，传于膀胱，行于水道，出于阴中，而为小便也。故阴为水液之路，膀胱为津液之府，热则水道燥涩，水液行涩，致水道不利。小便淋沥，因名曰淋。其候出少而起数，小腹急痛，引脐连茎中痛也。热甚者溺血，故亦曰血淋。血得热则流散，渗入于胞，随淋溺而下也。

寒淋者，因寒冷干于二经而作，其候先

寒战而后溺之，是邪气与正气交争也。寒气胜则发寒战，正气胜则寒战解而得溺，溺则出少涩滞，小腹连茎中而痛，寒甚者溺白如稀膏，故亦曰膏淋。亦如痢下热则便血，寒则便脓也，痢下者寒热搏于大肠也，今淋者寒热搏于小肠也。

气淋者，小儿因怒而啼，气入二经，留滞不散，邪正相搏，胞内气胀，其候每溺则脐下悗胀，水道涩不能下，茎中相引而痛，常有余沥也。

劳淋者，因房事过度，肾虚精竭，气通于阴，水道干涩之所为也。肾与膀胱为表里，今肾虚精竭，则膀胱亦虚，不能约制其水，故水液频数而下，水道干燥，则不能通利，其候尿留茎内，数起不出。引小肠连茎而痛也。

石淋者，小者为沙，大者为石，皆云肾主水，水为热结，化而为石。其言虽近，而不知其本也。且肾有二藏，左者为肾，右为命门，主水而为壬。《圣济经》云：壬者一水一石之谓欤，不知一水一石之道语。未达生化之妙，本太一精真在上，兆于水，立子石，是肾中本有真之物也，患者乃真精化而真物出焉。其候沙石从水道中出，塞痛闷绝，故痊者鲜矣。

琥珀圆　治热淋疼痛。

琥珀半两，研　乳香半两，研　桃胶半两，研

上拌研匀，糊为丸绿豆大，每服一二十丸，煎萱草汤下。

又方　治如前。

上以黄芩二两，绢袋贮之，用水二升，煮取一升，时时服，无时。

蒲黄散　治血淋沥痛。

蒲黄半两　冬葵子半两　生地黄半两

上为细末，每服一钱，水一盏，煎至六分，去滓温服，无时。

又方　治如前。

上以雄鸡屎尖白如粉者，炒微黄研细末，酒糊圆绿豆大，酒下三五丸，日连连四五服，取效。

玉粉丹　治寒淋膏淋如神，又治下痢。

牡蛎粉四两，研　干姜末，二两，炮

上拌匀，面糊为丸麻子大，每服一二十丸，米饮送下，无时。

二胶散　治气淋小肠悗胀不通。

桃胶　李胶等分

上为末，每服半钱，葱白汤调下，无时。

又方　治气淋。

上以蚕退纸烧灰，研细，每服半钱或一钱，煎去心麦门冬汤调下，无时。

又方　治如前。

上以马兜铃炒焦黄，为细末，每服半钱或一钱，麝香酒调下，温酒亦得，无时。

葵子散　治沙石淋，痛不可忍。

冬葵子一两　石南叶　榆白皮去末，锉　石苇去毛　木通锉，各半两

上为细末，每服半钱，葱白汤调下。一方只煮冬葵子汁服。

二石散　治如前。

滑石　石苇去毛，各一两。一方更有瓜蒌根一两

上为末，每服半钱，煎大麦汤清调下，无大麦，米饮亦得。

治小儿淋闭。

露蜂房　乱发灰等分

上为末，每服一钱，水调服之，日二。

又方　治如前。

以冬葵子一两，杵粗散，每服一钱，水一小盏，煎至五分，去滓温服。无时。

又方　以衣中白鱼摩脐下，及小腹。

又方　治如前。经效小儿诸淋。

治小儿遗尿。

瞿麦穗　龙胆草去芦　皂荚去皮弦　桂心各半两，人参去芦，一两　鸡肠草一两　车前子一两，炒一分　石苇去毛，半两

上同为末，炼蜜和丸小豆大。每服五丸。食分，日三。

又方　以小豆叶捣汁服之。以鸡肠烧灰研末，浆水调服一钱，面北斗服，日三。

小儿卫生总微论方卷十六终

小儿卫生总微论方　卷十七

癫疝论

小儿癫疝由怒啼躯气，冲击肾经，气下通于阴囊，故令肿大坚硬，又偏肿者，气乘偏虚而作也。其有水者，肾主水，下通阴，因怒啼躯气，肾水随气而下作。

海蛤散　治气击于下，阴肾肿大而坚硬。

海蛤三分，研　茴香子三分，炒香熟　薏苡仁半两　白术半两　槟榔半两，面裹，炮

上为细末，每服半钱，温酒调下，早晚乳食前。

又方　治外肾肿硬，渐欲成癫。

上以干地龙去土尽，为细末，唾调涂之，常避风冷湿地。

胜金桃仁膏　治卵癫肿大。

上杵去皮、尖，桃仁为膏傅之。

川楝子丸　治疝气偏坠，一大一小。

川楝子去核，取肉，一钱　续随子去皮净，一钱　轻粉二钱匕

上为细末，面糊和丸黍米大，每服十丸，葱白汤下，不过十服愈。

荆三棱散　治如前。

荆三棱炮　斑猫去足并翅，等分

上为细末，每服半钱，米饮调下。

三香昆布丸　治如前。

藁陆香三分　青木香三分　藿香叶去土，半两　昆布三分，洗去咸味　牵牛子半两，微炒

上为细末，枣肉和圆麻子大，每服十丸，空心牡蛎汤下。

治小儿狐疝，伤损生癫。

地肤子一两半　白术一两三分　桂心三分

上为末，炼蜜圆如小豆大，酒服七圆，量大小增减。

又方　治如前。

芍药　茯苓各三分　防葵一作防风　大黄各半两　半夏　桂心　蜀椒去目并闭口者，一分

上为末，炼蜜和丸如大豆，每服一圆，日三四。

五等圆　治小儿卵核坚癫，或阴卵偏大。

黄柏炒　香豉　牡丹去心　防风去芦并叉枝　桂心各半两

上同为末，炼蜜和圆如大豆许，三岁儿饮服五丸。

又方　治小儿癫。

以蜥蜴二条，烧灰研为末，酒服之，一二岁儿半钱。

治小儿卵肿。

以鸡翅六茎，烧灰服之，随在左右取翻，能治阴大如瓠。

治小儿气癫

土瓜根　芍药　当归去须，洗焙，各一两

上咬咀，每服二钱，水一盏，煎至半盏，去滓温服，量大小加减。

又方　治如前。

以三月上除，取白头翁，去芦捣之，随左右偏处傅一字，作疮，二十日愈，亦治肾痈。

又方　治小儿卵肿。捣墙衣傅上。

治小儿偏癫，或气攻小腹痛疼。

蛇床子为末，半两　马鞭草取汁，一合

上相和如膏，涂病处。

又方　治如前。

以枳壳去穰三两微炒，杵为细末，每用煎至柏枝浓汁，调膏厚涂肿处，良妙。

治小儿阴癀，肿大不消。

以硼砂一分，以水研化，涂之立效。

治小儿阴癀，偏大气胀。

以雄黄一两，研极细，甘草一钱锉，同煎汤，淋渫。

又方　治如前。

牡丹皮去心　防风去芦并叉枝，等分

上为末，每服半钱，米饮调服。无时。

治小儿卒卵肿痛而胀。

赤小豆末，半两　桂心末，一分

上以生牛蒡取汁二大盏煎稠，入二味相和为膏，涂病处。即消。

治小儿阴囊肿痛，虚热。

以蚯蚓屎，用甘草汁调涂之。

又方　治疝气肿痛，连小腹如刺。

上以生射干杵汁服之，亦可作丸服。

又方　治如前。

以藜叶煎浓汁一升，煎去七合，每服半合，顿服。量大小加减。

蜘蛛散　治癫疝。或肿坚，或偏坠，或大小，时时上下。

蜘蛛十四个，炒焦　桂心半两

上为散，每服一字或半钱，米饮调下，或蜜丸服。

玉粉散　治水癫，上下不定。

煅熟牡蛎粉二两　炮裂干姜末一两

上拌匀，冷水调稀稠得所，涂病处，以小便大利即愈。此方若用糊为圆服之，治冷淋膏淋，下痢脓血，及妇人带下。

阴肿生疮论

小儿有阴肿及生疮者，由肾经虚而邪气乘之。肾气通于阴，邪搏冲于下，则阴为肿，甚者冲攻以生疮。又有因风湿外干皮肤，则阴为之痒。搔之以成疮者，并叙方于后。

桃仁圆　治小儿阴肿。

白蒺藜半两，炒去刺　桃仁三分，汤浸去皮尖并双仁者，麸炒黄　牡丹去心，半两　桂心半两　郁李仁一分，汤浸，去皮，炒

上为细末，炼蜜和丸黍米大，每服十圆，温酒下，乳食前。

胡连散　治阴肿生疮。

胡黄连半两　胡粉半两　白矾灰一分

上为细末，每用少许，油调涂患处。一方只用黄连胡粉等末，香脂油和傅。

又方　治如前。

上以人屎或狗屎烧灰傅之。

又方

上以马骨或狗骨烧灰研细傅之。

治小儿阴肿。

以狐茎炙焦黄，杵细末服之。

以芫青捣傅上。以衣中白鱼傅之。

以斫取桑白皮汁涂上。

治小儿阴疮痛痒，搔之黄赤水出，不差。

五倍子　腊茶等分

上为末，更入腻粉少许，先以浆水葱白椒煎汤洗之，帛子拭干，用药傅之。

治小儿阴上生痈，疡医不能疗。

上以鳖甲一枚，烧灰研末，鸡子白和傅之。

治小儿阴疮

上以黄柏水煮汁，洗了拭干，白蜜涂之。

治小儿恶毒疮肿，生于阴髀间，痛牵入腹不可忍，一宿杀人。

上以茜香苗、叶捣取汁，量大小与服，日二三，其滓傅肿处，冬月无苗叶，取根用。

又方　治小儿阴肿生疮。

上浓煎狼牙草汤洗之，冬月取根用。或捣烂傅之。

治小儿卒然阴肿痛胀。

赤小豆末半两　肉桂末一分　生牛蒡根取汁，二盏

上先将牛蒡汁煎稠，后入二末和膏，傅病处。

治小儿阴肿，虚热作痛。

以蚯蚓粪用甘草汁调，轻轻涂上。

治小儿阴头忽生肿疮，此名尿灰疮。

以黑豆皮嚼烂傅之，以伏龙肝研末，和鸡子白涂之。

又方　治阴头生疮。

上以蜜煎甘草涂之，若阴头生疮，不痒不痛，但溃蚀者，此名下疳疮，方具于后。

又方　治阴肿疡，搔之成疮。

蛇床子　细辛　吴茱萸去枝梗，各一两

上为末，每用一匙，水一大碗，葱白三茎，煎至数沸，通手淋洗，三五次极妙。

又方　治阴痒生疮。

胡椒半两　紫梢花一两

上为粗末，水煎浴洗如前。

又方　治如前。

上以黄柏锉碎，煎汤洗浴。

腋气论

小儿腋气者，血气不荣，腋下有孔，一如毛孔而稍大，臭秽之气，从其中出，若狐气之臭，故俗呼曰狐臭也。亦有父母遗体相传者，又有乳养之人而有染著者，今叙方于后。

绿银散　治腋气。

铜绿　蜜陀僧各三钱　白芨一个，烧存性，九钱

上为细末，每用半钱，津唾调涂腋下，三五日一次，以效为度。

又方

上以轻粉一钱匕，分两处，麝香酒调一半服之，好酒调一半涂腋下，以不臭为度。

又方

上以左桃开通钱五文，火烧通赤，内醋中焠之，凡七次，杵罗为末，用老生姜一块，刀背斫断，将生姜以斫断处擦腋下，有毛擦不倒者，乃是病也。拔去其毛，以生姜自然汁调药涂之，屡验。若些小腋气汗气，只以生姜擦涂腋下亦可。

囟门肿陷论

小儿初生，皆有囟门者，藏气未充，骨髓未完，滋养未备故也。藏府皆以脾胃为养，儿自生以后，得五谷所滋，则藏气充而骨髓完，所以儿至能食，则囟门合也。囟门者，系于脾胃，《圣济经》言：卫囟之天五，五者土也，脾胃属焉，小儿有囟肿，由脾胃不和，冷热不调，或怒啼饮乳，或喘急咳嗽，致阴阳气逆，上冲而囟肿也。热则肿而软，冷则肿而硬，又有囟陷者，或因泻痢，或小便频数，或曾服清药以利小便，或本怯气弱，或别病缠绵，皆使藏虚而不能上荣于囟，故令囟陷也。皆小儿恶症，得愈者鲜矣。

治小儿囟肿软

上以青黛冷水调傅之及兼服化毒丹方已具前。

治小儿囟肿硬及陷。

干熟地黄八钱，焙，称　山茱萸去肉　干山药各四钱　泽泻　牡丹皮去心　白茯苓去皮，各三钱

上为末，炼蜜和丸绿豆大。三岁下者，三五丸，温水化下，空心及兼服钱氏益黄散。

治小儿囟陷。

以狗头骨炙黄杵末，鸡子清调傅。

滞颐论

小儿滞颐者，脾冷所致也。脾之液为涎，脾冷则不能约制，故涎常从口角流出，滞渍于颐颏，浸久生疮，名曰滞颐。

治小儿滞颐，涎从口出，浸渍颐颏，口角下生疮。

以桑白皮汁涂口中。

又方　治如前。

以东行牛口中沫，涂儿口及颐上。

治小儿口角下黄肌疮

以羚羊须烧灰，和腊月猪脂傅上。

以羊角烧灰和腊猪脂傅。

温脾圆　治脾冷多涎，流渍颐下生疮。

丁香　木香　半夏用生姜六两同杵碎，炒黄色，各一两　青皮去穰　白术　干姜锉碎，微炒，各半两

上为细末，炼蜜和丸黍米大，每十丸，米饮下，无时服。

温脾散　治如前。

丁香一两　肉豆蔻面裹煨　半夏白矾水浸去滑，炒黄　白术　干姜炮　人参去芦　甘草各半两

上为末，每服一钱，水八分，生姜二片，煎至五分，去渣温服。食前。

又方　治口中涎出，流渍颏下不干。

上以白羊屎内口中，服前药，仍更洗疮净，以烧饧末傅之。

肠痈论

小儿肠中有痈疮者，由寒热之气搏于肠间，气血结滞而生也。其候食少，腹中痛闷，小肠微强者是也。

治小儿肠生痈疮。

上以鲤鱼肠煮令食之。

针刺误伤论

小儿有因动作，误被针刺骨刺竹木签刺伤而入肉，或已折在内不出者。叙方于后。

上以白梅肉烂杵，和象牙末傅上，若针伤，即以象牙屑水调傅之，仍更以瞿麦为末，水服方寸匕，或煮汁饮之，日三。

又方

以松脂如乳香者末傅之，帛裹三五日，不觉而出落。

诸物梗喉论

小儿有误吞诸物在喉中，不能下，不能出，妨碍饮食，气出不快，甚者塞刺疼痛，霎时不任，便致危殆。

磁石　治误吞针刺喉中。

上以磁石如枣核大，磨令光，钻作窍子，以线穿系定，令儿含之，针则自出。

若误吞钱者，用枣大。

又方　治误吞竹木入喉。

上烧秤锤通赤，渍，酒饮之。

又方　治误吞金银铜铁钱物，在喉中不下。

上以南天烛根烧灰，研细，熟水调服一钱，立下。

通气散　治如前。及治钩绳之类在喉。

鹅毛一钱，烧灰　磁石一皂子大块　象牙一钱，烧存性

上为细末，每服半钱，新水调下。

又方　治误吞金铜银铁钱等物，在腹内不下。

上以石灰一皂子许，硫黄半皂子许，同研为末，酒服之。

又方　治如前。

上以胡粉一两，水调分服，量大小加减。

又方　治鱼骨鲠喉不下。

上以硇砂少许，口中咀嚼咽之，立下。

又方　治如前。

上以故鱼网覆颈项则下。未可，煮汁饮之，立下。

又方　治如前。

上以鸬鹚毛烧灰，水调服，量大小与。

又方　治一切诸般骨刺竹木签刺梗不下。

上于腊月取鳜鱼胆，北檐下阴干，每用少许，酒煎化，温呷，得逆便吐，梗乃随出，未吐再服。其梗刺虽咽在腹内，久痛黄瘦者，服之亦出，极妙。无鳜鱼，取青鱼、鲤蠹鱼胆亦可，并治喉痹。

又方　治桃李果梗喉。

上以狗头煮汤，摩头上。

又方　治一切诸物梗喉。

上以瞿麦为末，水调半钱或一钱服。

大圣玉屑无忧散　治诸物梗喉及一切咽喉诸病，解毒治百疾。

玄参去芦　贯众　白茯苓炒黄　缩砂仁　滑石　荆芥　川黄连去须　山豆根　甘草

炙　硼砂各半两　寒水石三两，火煅，埋土中，出火毒七日

上同为末，每用半钱，抄口中，新汲水一口咽之，治误吞叫子、骨刺、枣核、金银铜铁、瓦石、麦稻、针刺等诸物梗喉，及治咽喉一切诸疾，喉痹乳蛾等疾。又解巴豆、杏仁诸药之毒能杀人者，又治蛇蝎诸虫咬蜇毒气入腹，并心腹胀满，脾积癥块，风涎奶癖，他药不能治者，但服此药，立见效验。能润三焦，消五谷，除九虫，益五藏，辟温疫，无所不治。

治小儿一切珠当钱等梗喉。

上以弩铜牙烧赤，内水中，放冷饮之。

疣子论

小儿有附贴皮肤生核，如麦豆大，其色与皮肉无异，谓之疣子。有一两个生者，又有数个连续生者，割破其里　状如结筋，亦有微血，亦与肉相似，此由风邪搏客，血气变化所生。又有一种，初生核小，日久渐长，滋益而大，名曰瘤子。亦由邪搏血气变化所生，则气血顺活，故渐长大也，今叙方于后。

以针或小刀子决疣子四面，微微血出，取患疮人疮中脓汁傅之，莫得近水，三日外脓溃，其根动自落。

以白粱米粉子铫内炒令赤色，用众唾相和傅上，厚一寸许，即消。

治疣子连续生十数个者。

以艾柱一枚，如麦豆大，灸最生者一个，名疣母，余即自消，核大者稍增艾炷。

治瘤子

以稻科上花蜘蛛十余个，取顿于桃科子枝上放之，候丝垂下，取东边捻为线子，系定瘤子上，七日后换，其瘤自落。沈兴宗待制有老母病瘤如拳，用此法系之，至三换，遂干落，于枕畔得之，一似干栗。

诸虫咬蜇论

小儿有为诸毒虫咬蜇者，多于夏热之时，取凉解脱，就地坐卧，忽然误有触遇，因被咬蜇，其痛不可忍，直至终夜乃歇，甚者连引一边，痛无少止。又有毒瘤，疮中肿溃苦楚。或有虫因卧误入耳不出者，并叙方于后。

治蛇咬所伤

以生猪血调雄黄末傅之，如仓卒间只用猪血亦效。若独用雄黄即不验。以冷水先洗疮了，揾干，用茱萸一合，水半碗，研取汁服之，将渣傅疮上。

一方　用酒调茱萸末服之，油调末傅疮上。

治蛇咬毒气内攻，肿痛不任。

以人屎厚傅之，用绵裹即消。以白矾、雄黄等分研末，于刀头上煏令熔，便滴疮上，即自差。

治蝎蜇。

以吃勒藤，令患人自嚼烂涂之。

以干姜，令患人自嚼烂涂之。

治蜈蚣咬

以醋磨生铁汁涂之，亦治蜘蛛咬，以独头蒜磨咬著处，痛止为度。以活蜘蛛一个，安口在咬著处，则自然吸咽其毒，痛乃即减。至蜘蛛肚胀时放之，别取如前用。不尔，则直胀死。不休恐伤生命，故放之。又同将用过蜘蛛放水中，即解其毒，不死。

治蜘蛛咬。

以活蚯蚓入葱叶筒中，紧捻两头，勿令泄气，频频摇动，则自然化为水，滴在咬著处。又治蜒蚰入耳不出，点药滴入，即化为水。

治壁镜咬。

以生姜汁调皂角末涂之，破者取乌梅肉贴。

治蜒蚰入耳。

以酽醋灌耳中，即出。以小蒜汁灌之，以

驴乳汁灌之．以龙脑大豆许，线系，左入塞右，右入塞左，立效．以香油灌之。

又方　治如前。

道人头　楝叶　车前子各等分

上为末，唾调置耳门中，则自出。传方人直寻蜒蚰自送入耳，用此药试之乃出。

治百虫入耳。

以椒末醋调灌耳中，如行十里久，自出。以猪肉炙香熟，掩耳，虫闻则出。

又方　治如前。

白矾　雄黄各半两

上研为细末，生油调成膏，用皂子许塞耳，虫自出。

扑坠损伤论

人之血气，循身周流而无停止。小儿有因落床，或从高坠堕，或打扑损伤，致血气失度，随损处停留，或流行入腹，瘀蕴不散，致羸瘦痿黄，时作疼痛，啬啬微寒，翕翕微热，重者有至筋伤骨损，举动不能。叙方于后。

蒲黄散　治小儿因打扑坠堕，血气停滞，或败血入腹不散，作疼痛，寒热羸瘦痿黄。

蒲黄　当归去须、洗、焙　生干地黄各一两　琥珀另研　赤芍药　桂心各半两

上为细末，每服一钱，水一小盏，煎至五分，去渣温服，无时。

茯神丸　治如前。

茯神去心内木　当归去须，洗，焙　麦门冬去心，各一两　人参去芦　黄芩　草龙胆去芦　桃仁汤浸，洗去皮、尖并双仁者，麸炒香熟，研细，后入，各半两

上为细末拌匀，炼蜜和丸黍米大，每服十圆，用生地黄汁少许，同酒送下，无时。

三黄散　治小儿因损伤，败血不出，但伤不断者，服之立效。

黄连去须，半两　黄芩三分　甘草半两　玄胡索去皮，半两

上为末．每服一分，用童子小便半小盏，酒三分之一，同煎四五沸，热服，取下恶物，立差。

灵龟散　治扑坠内有伤损。

当归去芦，洗净，二分　白芷　漏芦去芦，各半两

上为末，每服一钱，温酒调下，食前。

又方

以生地黄不拘多少，杵烂绞汁，用温酒调服，量大小与之，其效如神。如内损，热血冲心，甚者气绝不认人，下咽即醒，取下恶物，遂好。

没药丸　治扑坠损伤，骨节疼痛，或已可而有时发作，痛不可忍，时发赤肿，数服立效，永除根本。

没药　泽兰叶　香白芷　骨碎补　草乌去皮、尖　破故纸炒　败龟酥炙黄　虎骨涂酥炙黄　续断　白头翁去芦　乌金石各一两　自然铜烧赤，醋淬过七次，二两

上为细末，醋糊圆桐子大，焙干，醋磨浓墨为衣，生姜温酒下三五圆，筋骨损者，用虎骨散贴之。

虎骨散

虎骨涂酥，炙黄，一分　金毛脊去毛，一两　穿山甲一两，烧　骨碎补一两

上为末，以仓米煮粥，临熟，更入米醋如糊，摊纸上，然后掺药在上，包裹贴损处，如大段损折，即以杉夹正，不过三上，即安。此二方屡用大效，亦治大人。

四黄散　治落床坠地，瘀血在腹，阴阴寒热，不乳啼哭。

蒲黄　大黄　黄芩各十铢　黄连去须，十二铢　麦门冬十铢　甘草八铢　芒硝七铢，后入

上㕮咀，以水二升，煮取一升，去滓，内硝令烊，看大小分服，羸瘦者忌冷食，大小便血，即愈。

药　毒　论

小儿肠胃怯弱，藏府嫩软，血气未壮，因

服药不胜其味之毒，致烦躁闷乱，或口舌麻木，或如针刺，甚者吐利，有致唿血也。

玄胡索散　解诸药毒，烦躁闷乱，吐利呕血。

玄胡索去皮、一两　甘草生　白矾生、各半两

上为末，每服半钱，水一小盏，煎至六分，去渣放温服，时时呷。

矾茶散　治诸药毒，烦躁，口舌麻木，或如刺痛。

草茶一两　白矾一两

上为末，每服半钱或一钱，汲新水调下，立解。

又方　解百毒药。

以白扁豆为末，水调一二钱服。

以出了蚕者故纸烧灰细研，冷水调下半钱，频服。

龙脑散　治药毒吐血，如神。

大黄蒸　半夏汤洗七次，薄切，姜汁浸，一日焙　甘草炙　金星石　银星石　寒水石　禹余粮火煅、醋淬七次　不灰木煅　青蛤粉各半两，青蛤粉即青黛

上为细末，入细研龙脑末一字拌匀，每服一字或半钱，新水调下。钱乙更有甘松、藿香叶末各一钱，减大黄一半。

小儿卫生总微论方　卷十八

头上诸病论

头　疮

小儿头疮者，由藏府有热，上冲于头，外被风湿，复相乘之，搏于血气而生其疮，故曰头疮。此候与秃疮特异。且秃疮者，有白有赤，硬痂遍满其头。此头疮者，但一两处生，其痂并不白硬而干，时时常有脓血湿汁，欲呼为长头疮。小儿失于沐发者，便生此疮也。

玄精石散　治小儿头疮。

太阴玄精石　寒水石各一分，研　轻粉　麝香各少许

上为细末，先以淡浆洗去疮痂，拭干，油调药涂之，甚者不过再。

栝蒌散　治如前。

栝蒌一枚　盐豉一合，入栝蒌中和穰并烧灰，研末　灶下黄土一分　腻粉一分

上为末，入麝香一字拌匀，每用少许，油调涂之，湿者干掺。

淡豉散　治如前。

淡豉炒黑、焦干　绛矾各一两　腻粉二钱

上二味先末，入粉研匀，先以桑柴灰淋汁，热洗疮净，用甘草末掺疮上，后以生油调药涂之，湿者干掺。

黄连散　治如前。

黄连去须，二两　胡粉一两

上为细末，先洗去疮痂，拭干傅之，即差。再发用前。

胡粉膏　治头疮久不差，经隔年岁。

松脂　苦参　黄连去须，各一两半　大黄生　胡粉各一两　黄芩　水银各一两一分　白矾半两　蛇床子三分

上为细末，以腊月猪脂和研，至不见水银星为度，傅之。

又方　治头疮久不差。

腻粉少许　胡桃和皮灯上烧过，存性，用碗盖，出火毒，研末

上为细末，以生油调涂，仍剃去疮上发涂之，只一二次差。

又方　治如前。

以屋上尘和油脚涂之，仍先用皂荚汤洗讫涂药。以马骨烧灰研末，醋和傅之。

以虎脂煎令凝涂之。日三四次。

以蓼末蜜和涂之，有虫出而愈，不作瘢。

又方

鸡卵七枚去白皮，于铜器内熬，和油涂之，亦治干秃不出汁者。

以鸡卵壳烧灰研末，猪脂和傅之。

又方

以鸡屎研末傅之。

以醋少许，和净水洗去疮痂，再以温水洗之挹干，用百草霜入轻粉研细，用少许生油调涂。

以菟丝煎汤洗之。

以竹叶烧灰研细，猪脂和涂。

以黑豆炒烟尽，杵为末，入腻粉研匀细，生油调涂之。

治头疮出脓水不差，差而复发。

以杏仁一百枚烧灰，入腻粉一分，同研匀细，生油调涂。

治头疮渐引不效。

以乌油麻嚼烂涂之。亦治浸淫疮及干疮。

治头上恶疮。

以黄泥裹豆豉煨熟，放冷，取豉研末，以纯菜油调傅上。

软　疖

小儿头上生软疖者，由风邪冷热之气客于皮肤，搏于血气，壅滞经络，蕴结而生。亦如身上生疖无异。但生在头上，始则赤肿而硬，其邪微者，散则自消。其邪甚者，肿赤内搐，溃脓血作痛。以头上皮紧，至熟多不能去脓。根中有恶汁不尽，因而复发。或在根边别生，连续不差，常常生脓，故名曰软疖。

如圣膏　治软疖。

菜油一两　黄腊半两　沥青一钱　黄丹半钱　羊筒骨内髓一个

上一处熬成膏，摊于纸上，贴患处，上用冷铁一片，于疮口上压定，四面针破，如脓出不快，以纸捻任之，熬药不得犯铜铁器。

又方

以青涩柿子连皮薄切，焙干，杵为细末，每用时先以温汤洗捻，去其脓血，用药少许，入轻粉三分之一拌匀，以薄薄牛皮胶水调成膏，摊熟帛子上贴之，愈。

又方

以炒油麻，铫子中取，乘热嚼烂傅之。

以生油饼剂子一个，捻薄，留一窍于疖上贴，来日脓自出，便效屡验。

又方

以兔毛皮不拘多少，烧灰研细，入腻粉少许，生油调涂。

又方

用枳壳去穰，周围用糊合于疮上，去脓生肌即愈，极效。

治头皮虚肿，如蒸饼裹水之状。

以口嚼麦面傅之。

秃　疮

小儿头有秃疮者，按九虫论云，是蛲虫动作，与风邪相乘，上干头之皮肤，搏于血气，伤其荣卫而所生也。荣为血，受病则为赤秃。卫为气，受病则为白秃。荣在内，邪稍难干，故患赤秃者少。卫在外，邪易得者，故患白秃者多。其始生如癣之斑点，上有皮屑渐渐作痂，以成其疮，遂至满头发落逮尽，若刮去其痂，则疮皆是孔眼，大小不等。如虫之窠，有脓汁出，不痛而痒，痒乃不可禁。是知有虫为风也，又一种俗呼为鬼舐头。小鬼有头疮，遇夜被鬼舐之，则引及满头有赤痂，或云便赤也。

治小儿白秃头上团团然。

以蒜揩白处，早朝使之。

治小儿白秃，干谷不出汗。

以鸡子七枚，去白皮，铜器中熬，和油涂之。

治小儿白秃。

以葶苈子杵末，汤洗去其痂，涂之。

以陈香薷煮浓汁少许，同猪脂和胡粉傅之。

以白头翁根杵烂，傅一宿。已作疮者，二十日愈。

以榆白皮杵末，醋和涂，虫当出。

以鸡窠中草和白头翁花一处烧灰、研细，用腊月猪脂和匀，先用醋泔洗疮后傅之。

又方

以椿楸桃三般叶心取汁傅之，大效。

一方　只用楸叶杵汁傅。

以人屎烧灰末之，用腊月猪脂和傅。

治赤秃。

以白马蹄烧灰细研，腊月猪脂和傅，以靛滓傅之。

治鬼舐头。

以儿粪腊猪脂和傅，以腊月猪屎烧灰末傅，以屎烧灰研细，和腊月猪脂涂傅。

耳中诸病论

耳　聋

小儿有忽患耳聋沉听者，由风邪乘于手太阳之经也。邪随其经人于耳内，邪正相搏，

气停塞滞，则令耳聋，不能聪听于音声也。轻者则为沉听，谓耳中沉沉然，轻小之音则不辨，重大之声才闻也。

通鸣散　治风邪恶入耳令儿耳聋。

菖蒲一寸，九节者良　远志甘草水煮，去心，各一两　柴胡去苗　麦门冬去心　防风去芦并叉枝，各半两　细辛去苗　甜葶苈炒　磁石火煅，醋淬十次研，各一分　杏仁十四个，汤浸，去皮尖双仁者，炒黄

上为细末，每服半钱，煎葱白汤调下，乳食后，日二三服。

乌麝汤　治如前。

大川乌头一个，重二钱上者，以猪脂油煎令裂，不得削了面上块子，只刮去皮尽，切碎，杵，罗为末　通草半两，薄切作片子，片片相似，以糯米粉作稀糊拌匀，焙干，杵，罗为末

上二味，入麝香末少许研匀，每服一钱，水一小盏，入薄荷二叶，枣一枚，煎数沸，放温服，或只以温酒调服。

菖蒲圆　治如前。

菖蒲一寸　巴豆一粒，去皮、心

上二物合杵为剂，分作七丸，用一粒，绵裹塞耳中，一日一易。

又方

菖蒲末，一分　杏仁半两，汤浸，去皮尖双仁者

上二物合杵如泥，每服用一麻子许，绵子裹内耳中，一日一易。

萆麻膏　治如前。

萆麻子十枚，去皮　枣肉七枚

上同研为膏，每用巢核许，绵裹内耳，一日一易。

治新久耳聋。

以巴豆一粒，蜡裹，针刺令通透，塞耳中。以猫已捉住老鼠夺之，取其鼠胆汁灌病耳中。一云只以鼠胆用之亦可。

以地龙一条，盐少许，俱贮葱筒中，时动摇则化为水，用点耳中。

以米醋一碗，用铁一块弹子大，烧赤，投醋中，令病耳就上，使气熏人耳，即效，三二日可治。

又方

以葱白于灰火中煨令熟，将葱白头内耳中，一日二易，以芥子杵烂，人乳汁和，绵裹内耳中，一日一易。

以荆子中蚌虫白粉，和油滴耳中，日二，亦治沉听新聋耳。

以驴脂和生椒杵烂作丸，绵裹塞耳中，治久聋。

又以醇醋微火煎附于至软，削令尖，塞耳中。

耳中鸣痛

小儿有耳中或鸣或痛者，由风邪入耳，与正气相干，搏于血气者，即为鸣。搏于经络者，即为痛也。

治耳中痛。

以干百合为末，温水调下一钱，乳后。

以柳树蚍虫，粪水化取汁，调白矾末少许，滴耳中为妙。

以盐二三升，蒸热包裹，以耳枕之，冷即易，亦治洪洪声。

治耳鸣如流水，或如风声。

以生乌头才撅得，乘湿削如枣核，塞耳中，旦用夜易，不过三日愈。及治耳痒。无，即用干者。

治耳中常鸣。

以生地黄截塞病耳，数数易之，或以纸裹微煨用。

耳中肿疮出脓汁

小儿有耳中肿或生疮出脓汁者，由风虫相乘，入于耳，邪正相干，搏于气血，伤于经络，轻则为肿，重则生疮。若津液结溃，变为脓血汗出。又有因水或眼泪入耳，停搏正气，亦为浓汁，俱名停耳，又名脓耳也。

龙朱散　治耳内肿，及生疮出脓汁，或只痒痛，虚鸣应耳中，一切诸病，悉皆主之。

龙脑一字，研　朱砂一钱，研，水飞　竹箭干内蚍虫粪三钱，研　坯子胭脂半分，研　麝香一

字，研

上匀研细末，以斡耳子挑药入病耳中，如有脓水者，先以新绵捻子缠之净尽，方倾入药，每夜临卧时一次。

治耳中肿或生疮。

以白矾烧灰研细，每用少许，以苇筒吹耳内，日三四次，或以绵裹塞耳中，生疮者胡桃油调药著耳。

矾香散　治小儿聤耳内生疮，或有脓汁。

白矾一两，烧灰　蛇床子一分，为末

上相和，入麝香末五分，同研细，每用一字，掺入病耳。

蓝花散　治如前。

红蓝花一两，洗焙干　黄柏一两，锉　乌鱼骨半两　黄芩半两，以上为末　雄黄半两，研，水飞　麝香一分，研

上拌匀，每用少许，以新绵子缠捻子搵药塞耳中，一日二易。

麝香散　治如前。

蜘蛛一个　坯子胭脂半钱　麝香半字

上晒极干，研匀细，每用半斡耳许，以鹅毛管吹入耳。

桃红散　治如前。

白矾一钱，烧灰　坯子胭脂一钱　麝香一字

上研匀细，每用少许，以绵捻子搌耳中脓尽，掺药入耳内。

箭虫散　治如前。

箭竹内蛀虫粪屑二钱　坯子胭脂二钱　凌霄花干者，二钱　海螵蛸二钱　麝香一字，研后入

上为细末拌匀，每用时先以绵捻子搌耳中脓尽，乃以纸捻蘸药入耳中，日三。

红绵散　治如前。

信砒一钱匕　坯子胭脂三钱匕　麝香一字匕

上为末拌匀，以柳絮滚和匀，每用黄米许，掺入耳中，如绕耳生疮，脓汁不差者，依此傅疮上，纸片封之妙。

油引散　治如前。

石燕子雌雄一对，用砖垒一地，炉木炭火煅，白色为末　虢丹飞，等分　腻粉　麝香各少许量入

上同研匀，先以绵捻子搌耳中脓汁尽时侧卧，掺药一字许，入耳中，以好油一滴引下，立效。

绵裹散　治如前。

桂心一分　青羊屎一分，炒令转色

上同末，每用一字，绵裹塞耳中。

治小儿聤耳脓汁出。

以硫黄细研，每用少许，掺入耳中，日一次，夜一次。

以白矾末一钱，麝香一字研匀，少少掺入耳。

以桑木上毒蜂房炙黄，杵末，温酒调下半钱，空心。

以蚯蚓粪研细，吹耳中。极效。

治小儿耳上生疮　以鸡子白傅之。

眼目病论

小儿眼目生病者，多因恣食甘酸，藏生邪热，熏炙肝经，冲发于目。或为赤肿痒痛，或眵泪隐涩，或生赤脉，或生翳膜。又痰饮毒气渍肝，致藏气不得宣通者，则精华未得明审，故黑睛虽全，而视物眩眩，此名睛盲。若昼日明，至暝不见物者，此邪干经之阴也，谓之雀目。言如鸟之目，暝时无所见也。又有障眼者，乃气毒障缦其睛也，又有瘕肝之气冲子目者，亦能生其翳膜，以为遮障也。

博金散　治眼赤肿痛不可忍。

白药子半两　黄芩一钱半

上为末，每用一字，沸汤点洗之。

又方　治如前。

上取嫩槐芽或嫩叶煎汤，放温洗之，白睛如血，泪多者最宜用。

又方　治如前。治赤眼肿痛，才觉便截。

上以铜绿研细，抄二钱半，用乳香皂子大二块，同研匀极细点之，立效。

又方　治赤目。

上以黄芩为末，煎汤澡脚，神效。

又方　治如前。

天南星一分，去皮、脐　干蝎一分半

上为末，每用一字，茶调下，服了摇头数次，立验。

又方　洗热毒眼。

上以细朴硝沸汤浸，澄去滓，乘热洗之。

又方　洗风毒热赤。

铜绿一钱　滑石二钱

上研极细，每用少许，沸汤点洗。

洗心散　治心藏邪热，目赤肿痛。

大黄一两，煨　荆芥穗一两半　甘草半两，生　麻黄一两，去根不去节

上为细末，每服半钱或一字，蜜水调下。

洗肝散　治三焦壅热，眼目赤肿，隐涩多泪。

芍药一分　羌活去芦，半分　防风去芦并叉枝，一分　大黄半分　甘草半分

上为细末，婴小一字，二三岁半钱，上者一钱，水半盏，入灯心黑豆各少许，煎数沸，食后放冷服，须银石沙铫中煎，仍与四顺散间服，并用青凉膏贴太阳穴。

四顺散

当归去芦，洗，焙　芍药　大黄纸裹，煨　甘草炙，各等分

上为末，每服一钱，水一盏，煎至半盏，去渣温服，更量大小加减，无时。

清凉膏　治眼赤肿痛，贴太阳穴。

上须立秋日已后，取芙蓉叶阴干为末，每一字或半钱，井花水调，贴太阳穴。

地黄散　治壅热目赤肿疼，或赤脉白膜，四边散漫者，犹为易治，若遮黑睛，多致失明，宜用此。

生干地黄切，焙，称　熟干地黄切，焙，称　当归去芦，焙，称，各等分　黄连去须　大黄去皮，取实处，锉，焙，称　防风去芦并叉枝，称　羌活去芦　生犀角　蝉壳去土　沙苑蒺藜炒，去刺　木贼　谷精草去根　白蒺藜炒，去刺，各一钱　玄参去芦，半钱　木通　甘草锉，炒，各一钱半

上为细末，每服一字或五分，煮羊肝汤调下，日三，乳食后。

玄精石散　治眼生赤脉。

玄精石一两　甘草半两

上为细末，每服半钱，竹叶汤调下。

羌菊散　治眼生浮翳障膜。

羌活去芦，一分　菊花拣净，半两　防风去芦并叉枝，一分　山栀子去壳，一分，炒　甘草一分半，炒　白蒺藜炒去刺，半两

上为末，每服半钱或一钱，蜜汤调，日三，与决明丸间服。

决明圆

决明子拣净　车前子　菊花拣净　川芎　宣连　当归去芦，洗净，各一分　大黄　黄芩各半分

上为细末，炼蜜和圆麻子大，每五岁下三五丸，上者七八丸，煎桑枝汤，或麦门冬汤送下。

又方　治目生黑花，浮翳涩痛。

上以贝子一两，烧灰研极细，入龙脑末少许，点之。

又方

凡小儿数岁，眼中生肤翳未坚者，不可妄用，但以珊瑚研如粉，每日少少点之，三日见效。

镇肝散　治痰热眼生翳膜。

胡黄连　栀子仁各一两　甘草微炒，炙　马牙硝　青葙子以上各半两　真珠一分，另研　牛黄一分，别研

上为末拌匀，每服一钱，水八分，入荆芥、薄荷各少许，煎至半盏，去滓温服，食后。

又方　治目睛上生白膜。

上以白矾一分，水四合，于热铜器中煎取半合，下白蜜调之，用绵滤过，每用芥子许点之，日三。

又方　治翳膜重厚。

上以猪胆白皮曝干，合作小绳，如粗钗股大，烧作灰，放冷研细，点翳，二三五度，差。

真珠膏　治眼眩眩不见物，睛盲者。

真珠末一分，研　甘菊花拣净，一分　香豉一分，炒黄　井泉石一分

上为末拌匀，用白蜜一合，鲤鱼胆一枚，司药于石银器中慢火熬成膏，次入好龙脑末一钱搅匀，每少许，时时点之。

又方　治目盲。

以猪胆一枚，取汁微火上煎之可丸，丸黍米大或芥心大，每用一丸，内眼中，食顷。

又方　治睛盲神法也。如用之，视物如鹰鹘，有奇效。

上于正月八日、二月八日、三月六日、四月四日、五月五日、六月二日、七月七日、八月二十日、九月十二日、十一月二日、十二月晦日，每遇上件神日，用桑柴灰一合，煎汤于磁器中澄令极清，稍热洗之，如觉冷，即重汤煮令得所，不住手沃之，如遇上件神日不得不洗，此神日本法也。

复明散　治雀目至暝不见物。

苍术二两，米泔浸，去皮，切，焙干　谷精草一两　地肤子半两　决明子半两　黄芩半两

上为细末，每服一钱，水八分，入荆芥少许，煎至五分，去滓温服，食后。

又方　治如前。

上以黄蜡不拘多少，器内熔成汁，取下，入蛤粉相和得所，团成毬子，每用以刀子切下一二钱许，以猪肝一二两批开，掺药在内，麻缕扎，水一碗，铫内煮熟，乘热气熏眼，至温时并肝食之，神效，日二服。

又方　治如前。

上以豆豉于新瓦上炒令黄色，入雄黄半两同研为细末，每用药一钱，猜猪肝一片批开，掺药裹合，陈米饮煮熟与食之。

又方　治如前。

上以石膏为细末，每用一钱，猪肝一片薄批，掺药在中，麻缕缠定，入砂瓶中煮熟，切作块子与食，此方治诸药不效者，服之如神。

《千金》仙术散　治气障眼，又治肝热，目赤生病。

苍术四两，米泔浸七日，逐日换泔至月足，取出刮去黑皮，细切入青盐一两，同炒色黄，去盐　木贼二两，童子小便浸一宿，水淘净，焙干，一方又有甘草一两

上二味，同为细末，每用米饮调下一钱，服之甚效。

四仁膏　治毒气障眼，亦治疳眼。

桃仁四个，去皮、尖　杏仁四个，去皮、尖　薏仁五个，去皮、尖　郁李仁五个，去皮、尖　芜荑五个，取肉　海螵蛸取中心末，半钱　北亭小豆大一块，硇砂是也

上于乳钵内研极细，将白蜜看多少搅匀，绢或绵滤过，别入龙脑细末、轻粉细末各少许点之。

治小儿雀目

以夜明砂炒过为末，猪胆汁和丸绿豆大，每服十丸，米饮下。

开泉石散　治疳热攻眼，生障翳，致损睛瞳。

井泉石一两　决明石半两，火煅　甘菊花拣净，半两　夜明砂半两，微炒　黄连去须，半两　晚蚕砂半两，微炒

上为细末，每用一钱，米泔一盏，入猪肝少许，煎至肝烂熟为度，放温时服。

又方　治疳眼。

上以乌鲗鱼骨、牡蛎各等分研为细末，糊丸皂子大，每用一丸，取猪肝一叶，同药入清米泔煮至肝熟为度，和肝食之，汁送下。

目病别论

小儿有脑热注目，则睑涩常闭不开，又有诸物因入眼，眯之不出，又有误被诸物冲触，伤损目睛者，叙方于后。

治脑热注目，常闭不开。

上以大黄一分，粗锉，以水三合，浸一宿，一岁儿每日分半合，余涂顶上，干即更涂。儿大以意加服。

治误飞麦芒入目不出。

上用新布覆目上，持蛴螬于布上摩之，其芒出著布上。甚良。

又方　治诸物入眼，眯之不出。

用好墨清水研汁，铜箸点之即出。

又方　治误被诸物冲触伤目。

上以牛尿点之，日二，仍避其风，虽黑睛破损亦愈。

鼻中病论

肺气通于鼻，气不和，为风冷所乘，停滞鼻中，搏于津液，使涕凝结壅，气不通快，不闻臭香，谓之鼻塞。若风冷搏于血气而生瘜肉塞滞者，谓之鼽鼻。若风湿相搏，则鼻内生疮，而有脓汁出也。若脑热攻鼻中干燥，或生疮痂，硬而无脓汁也。

辛荑散　治鼻塞。

辛荑叶一两，洗，焙干　细辛去苗，半两　木通半两　白芷半两　木香半两，以上为末　杏仁一分，汤浸去皮、尖，研，后入

上为末拌匀，用羊髓猪脂各二两，同诸药于石银器内慢火熬成膏，赤黄色，入脑麝各少许，搅匀放冷，每用少许，涂在鼻中，乳儿因风吹著囟子鼻塞者，只涂囟上。

菊花散　治鼻塞涕浊。

甘菊花拣净　防风去芦并叉枝　前胡去芦，各一两　细辛去苗　桂心各半两　甘草炙，一两

上为末，每服半钱，入乳香少许，煎荆芥汤调下，食后服。

蒺藜子散　治鼻塞不闻香臭，水出不止。

上以蒺藜子半掬为细末，以水一小盏，煎至减半，令患人仰卧，满含饭一口，以药汁灌鼻中，不过再，即嚏而气出，儿大者有此病，小者未有。

治鼻中生疮有脓。

取黑牛耳中垢，先揩鼻中脓尽，傅之。

犀角升麻散　治脑热攻鼻，燥爆生疮，鼻中干硬。

犀角屑一两　马牙硝半两，研　川升麻半两，为末　黄连去须，半两，为末　朱砂半两，研飞　牛黄一分，研　龙脑一分，研

上拌匀细，每服半钱，温蜜汤调下。

清柿膏　治鼽鼻不闻香臭，出气不快，或生瘜肉。

上为细末，入龙脑少许拌匀，炼蜜和丸皂子大，绵裹纳鼻中。

又方　治鼽鼻有瘜肉，出气不快，不闻香臭。

上以白矾末和面脂绵裹塞鼻中，数日瘜肉随药自出。

面上疮论

上儿面上忽遇有经络虚隙，谓风湿寒热所乘，搏于气血则生其疮，或如火烧，或出脓，或出黄水，日久不能痊差。今叙方于后。

治面上生疮如火烧。

上以赤薛荔叶杵末，生油调傅。一名山乔麦。

又方　治如前。

上以黄粱米一升杵末，蜜水和傅，以差为度。

又方　治面上生疮出脓汁。

上蛇蜕皮炙焦为末，和猪脂傅上。

又方　治面疮出黄水。

以鲫鱼头烧灰研末，和酱清汁傅上，一日易。

又方　治面生诸般疮。

上以兔丝汤洗之。

又方　以大麦烧存性为末，生油腻粉调涂，神妙。大麦只炒黑焦，亦得。

又方　治面疮出黄水。

豆豉一合，炒焦黄　黄柏一两，锉

上为细末，每用先以热灰汁洗疮净，拭干傅之，亦治身生如此疮。

又方　治面疮赤肿燉痛

以地榆八两，细锉，水一斗，煮至五升，去滓，适寒温洗之。

唇口病论

风毒湿热，随其虚处所著，搏于血气，则生疮疡。若发于唇上生疮，乍差乍发，谓之紧唇，又曰沖唇。其发频者，唇常肿大粗厚，或上有疮，不较甚者，以至唇腘。

上发于唇里，连两颊生疮者，名曰口疮。若发于口吻两角生疮者，名曰燕口。俗云因乳食看视燕子，则生燕口疮也。并叙方于后。

葵根散　治紧唇。

葵根一两，烧灰　乌蛇半两，烧灰　黄柏半两，为末　鳖甲半两，烧灰

上为末，每用半钱，猪脂少许，和涂唇上，时时用。

青液散　治赤口疮。

以青黛一钱研末，入脑子少许拌匀，少少傅上。

治小儿及老人虚人口疮咽痛。

吴茱萸去枝梗　地龙去土等分

上为末，米醋入生面调涂足心。

治小儿口傍疮久不软。

乱发烧灰　故絮灰　黄连去须土　干姜各等分

上为末，每用少许傅上，不过三次愈。

治小儿紧唇。

上以马芥汁即大刺芥是也。　先刺唇血出，以汁傅之，日七次。

治小儿热口疮。

以故锦烧灰研末，傅疮上。

治小儿诸口疮。

以五月五日虾蟆炙燥为末，傅疮上，兼治蕈疮。

治小儿唇口边肥疮。

白矾一两，烧灰　蛇床子一两，为末

上为末，干掺疮上，立效。亦治耳疮头疮痈疮。

绿云散　治如前。

黄柏半钱　螺青三钱

上同研匀细，每服一字或半钱，掺患处。

又方　治口中赤烂。

上取牯羊生乳含之。

又方　治白口疮。

又方　治口中疮通白者，或白漫漫然，亦治疳蚀。

上以白僵蚕炒黄色，拭去毛尽，为末，蜜和傅之，立效。或以父发拭口中净，桑汁涂。

又方　治诸口疮。

上以大天南星去皮，只取中心龙眼大一块，为细末，醋调涂脚心。

又方　治如前。

上以香白芷、铜绿等分为末，掺上，立效。

又方　治如前。

上以汤瓶内碱为末，临卧时以好醋调于脚心底，明书个十字，立验。

槟榔散　治如前。

槟榔　铜绿　贝母各等分

上为细末，如患干口疮，生蜜调扫之。若患湿口疮，干掺。

血余散　治燕口疮，吻两角生。

上以乱发烧灰研细，和猪脂傅之。

又方　治如前。

上以白锡烧灰傅之。

牙齿病论

小儿牙齿病者，由风热邪毒，干于手太阳之经，随经入于龂龋。搏于血气，则生宣烂。又云，因恣食酸甘肥腻油面诸物，致有细粘渍著牙根，久不刷掺去之，亦发为疳宣烂，龂作臭气恶血。若风湿相搏，则为牙痈。如风毒入于牙中，与正气交争，则为风痛。有虫动龁齿，则为虫病。更有一证疳，龁口鼻牙齿者，名曰走马疳，别具疳疮门下收之，外叙方于后。

治牙齿宣烂、臭气有血。

皂角一挺，肥好者连皮　羊胫骨一挺

上并于炭火烧烟尽，以盆覆之候冷，用纸一张，铺湿地上顿药，出火毒一夜，为末，如常揩牙用之，三上差。

又方　治如前。

芜荑半两，炒黑　白矾半两，生

上为细末，入麝香少许拌匀，先以水漱口齿净，然后用少许揩牙。

又方　治如前。

上以风化石灰一块，大火中煅通赤，取出放冷为末，每用少许，旋入麝香少许，傅牙根疮上。

桃红散　治牙痈肿烂脓血。

朱砂一钱，研，水飞　绿豆粉一两　硼砂半钱　脑麝各一字

上为末，每用一字，傅患处，或揩贴之。

麝香散　治如前。

铜绿半钱　绿豆粉一两　胆矾半钱，火煅过用　脑子一字

上为末，入麝少许研匀，每服一字，擦贴患处，有涎即吐。

甘露散　治小儿胃热，牙龈宣露出血，口臭脸肿，赤眼口疮，不欲乳食，肌体烦热，及疮疹已未发，皆可服。

熟干地黄　生干地黄　天门冬去心　麦门冬去心　枇杷叶刷去毛，净　枳壳麸炒，去穰　苦参　石斛去根　山茵陈　甘草各等分

上为末。每服二钱，水一盏，煎至半盏，去滓温服，食后，量大小加减。

治小儿牙宣，常有鲜血，龈缝臭秽。

枇黄一钱　麝香半钱

上同研细，以纸条子生油涂过，掺药在上，少少用末，翦作小纸棋子，看大小用，插在病处缝内。

治小儿牙齿宣疳。

以黄连为末，入麝研匀，贴病处，亦治口疮。

治风虫牙疼。

上以马鞭草煎汤含漱之。

又方　治如前。

莽草　升麻　细辛去苗　甘草各一分

上粗锉，水一碗，煎数沸，盥漱之，冷即吐，别含漱。

藁本散　治如前。

藁本去芦　白附子　川芎　莽草各半两，先内末　青黛一钱　芦荟一钱　麝香一字，并各研

上拌匀细，每服一字或半字，揩患处。

又方　治如前。

上以肥皂一个去子，满填盐在内，炭火烧烟尽，放冷研细，每用一字或半钱，揩患处，有涎即吐。

舌病论

小儿舌上偶生疮肿者，由风毒邪热，搏于血气，随其虚处，著而生病也，发于舌上紫肿者，名曰紫舌胀。若肿粗大木闷而硬者，名曰木舌胀。若风湿相搏而生疮者，名曰舌疮。若风多而舌肿如吹泡者，名曰鼓舌，其紫舌木舌鼓舌肿甚者，同满口溢出，闭塞气门，皆能杀人。

治紫舌肿。

上取羊乳饮之。

又方　治如前。

上以新鲫鱼，薄起肉片子，顿舌上，数数易之。

治舌上生疮，不能饮乳。

上以白矾研末，和鸡子置醋中涂儿足底，一七愈。

又方　治如前。

上以蒲黄傅之。

又方　以桑白皮汁涂乳上吮服。

又方　治如前。

上以胡粉细研，用猪筒骨中髓调傅之，日三。

治木舌肿硬，满口逡巡，气闭则杀人。

上以釜底煤和盐等分，以酒调，表里涂舌，须臾即消，无酒亦得。

又方　治如前。

川朴硝半两　真紫雪一分　白盐半分

上和研匀细，每用半钱，入竹沥三两滴白汤少许，调涂舌上，咽津不妨。

治舌卒肿如吹泡，满溢出，气不得通，奈无可治。

上以半夏十枚，汤洗去滑尽，以苦酒一升，煮取五合，稍稍含漱之，不得咽津，载人咽喉，加以生姜一两，同煮亦得。

又方

上煎甘草浓汁含之。

又方

以糖醋满口含之，良。

又方　治紫舌本鼓，肿满闭气，诸药不效，当用此救。

上以舌两边，以指刮破，或以铍刀决破，出其毒血，慎勿伤舌下中央脉也，若血出不止，已及数升者，烧铁篦烙疮数过已，绝之，烧铁篦约度，不可太过。

小儿卫生总微论方　卷十九

咽喉病论

小儿咽喉生病者，由风毒湿热搏于气血，随其经络虚处所著，则生其病，若发于咽喉者，或为喉痹，或为缠喉风，或为乳鹅，重者或为马喉痹，又或悬痈肿，或腮颔肿，或喉中生疮，一切诸病，随症具方于后。治喉痹肿闷。

以露蜂房烧灰研细末，每服一钱，乳汁调服。

以蛇蜕皮烧灰研细末，每服一钱，乳汁调服。

以鲤鱼二七枚，和灶底土涂患处。

以川升麻令含一片。

以韭一把杵烂熬，傅上，冷即易。

以白矾棋子大，含之。

以陈白梅一个，取肉，裹白僵蚕一枚，含咽津。

以地龙一条研烂，内鸡子白和匀，便倾入喉中。

以绳缠扎手大指屈，于节上针挑刺出血，即差。

铁粉散　治如前。

铁叶粉一分　硼砂一分　白矾半两，生

上为末，每服半钱，冷水调下，连二三服。

蛇蜕散　治如前。

蛇蜕一分　白梅肉一分，炒　牛蒡子半两，炒　甘草一分，生

上为散，每服一钱匕，绵裹，汤浸少时，含咽津汁，小儿吮之。

又方　治喉痹咽肿，出气不快。

上以鼠粘子二两炒焦，甘草半两炙黄，同为细末，每服一钱，新水调下，更入蜜少许。

又方　治喉痹不能语。

以大豆煎汁，放冷含之。

以龟胆少许，生姜、薄荷汁化服，得吐便愈。青鱼胆亦得，收得以青黛酿之。

治缠喉风，束气不通。

蛇蜕炙令焦黄　当归去芦，焙，各等分

上为末，温酒调下半钱，得吐良。

又方　治如前。

蓖麻子去皮，二个　朴硝二钱

上为末，新水调下一钱，未效再服。

又方　治如前。

天南星生　白僵蚕生去丝、嘴，各等分

上为末，每服一字或半钱，生姜自然汁调下。

又方　治如前。

上以白僵蚕二个，去丝为末，生姜自然汁调，更入蜜少许拌匀，分二三服，或只用半钱一字，旋调服之。

定命散　治缠喉乳蛾等病。

川大黄锉，炒　黄连去须　白僵蚕直者炒，去丝、嘴　甘草生，各半两　五倍子一分　腻粉五个

上为细末，每用一字，竹苇筒子吹入喉中，如毒气攻心肺，喉中生疮，咽饮不得者，以孩儿乳汁调药一字，鸡羽蘸之，深探入喉中，得吐者活，不吐者死。

又方　治缠喉乳蛾喉痹，咽喉额项肿闷闭塞，气不得通者。

上令患人先呷好麻油少许，后以蓖叶烧灰研细末，水调下半钱，立效。大者增之。

犀角散　治马喉痹，其候如喉痹，更加连咽项颔颊肿甚，咽喉闭塞，但数数喷气，此症极恶。

犀角屑半两　射干三分　桔梗去芦，三分　马兰根三分，锉　甘草半两，炙　川升麻半两

上为粗末，每服一钱半，水一盏，入竹叶五片，煎至六分，去滓，入马牙硝半钱，搅匀细，含咽。

又方　治如前。

上以马衔一具，水二盏，煎至半，量大小分服。

治悬痈暴肿妨闷　以干姜、半夏等分为末，少少以箸点药著上半夏以白矾汤洗数次去滑。

以硇砂半钱，绵裹含之，细细咽津。

又方　治悬痈忽倒。

上以白矾灰、盐各半两，研细，箸头点上拨正，亦治肿闷，日七八遍。

治咽喉腮颊肿闷。

上以蒜塞耳鼻中。

又方　治如前。

上以马鞭草根截去两头，取在中者，捣汁服之。

又方　治如前。

上以黄柏、寒水石等分为末，量肿处，以薄荷水调药，用鸡羽扫又，干即再扫。

绿云散　治喉痹、马喉、缠喉、乳蛾、重舌、木舌、一切咽喉之疾。

螺青　盆硝　生蒲黄　生甘草各等分

上为细末，每服一钱，生姜自然汁调，细细含咽，若已闭塞不通者，用苇筒入药吹入喉中。重舌木舌，生姜汁调涂患处。咽颔肿痛者，依此用之。口疮舌又生疮，用此药涂之最效。李方叔、阎孝忠皆以此方救人甚多，以磁盒密封收贮。

如圣汤　治咽喉一切诸疾。

甘草一两　桔梗去芦，一两

上为粗末，每服一大钱，水一盏煎，去滓放温，时时呷，煎六分。

龙石散　治如前，并治口舌疮肿。

寒水石煅通赤，一斤　朱砂研，飞，一两二分半　脑子研，半分

上为细末，每用少许，掺患处，病在咽喉者，吹入喉内，细细咽津，日五七次，临卧一两次用，妙。

如圣圆　治咽喉一切诸病。

川大黄一分，末　白矾一分，末　马屁勃一分，末　蜗牛十四个　陈白梅肉十分

上于五月五日午时取蜗牛，以白梅肉同研烂，入药和圆如楝子大，每用一圆，绵裹含化咽津。若病重不能开口，即研药作末，竹筒吹入喉中，滴水三四点送之，或以净水磨药灌之，立差。

通关散　治如前。

枯白矾　雄黄水飞　藜芦微炒　白僵蚕去丝、嘴　猪牙皂角去皮、弦

上各等分为细末，每用一字，鼻内搐之，甚者苇筒吹入喉中，涎出或血出，立愈。

治小儿咽喉肿痛塞闷。

以桑叉螳螂窠一两烧灰，马屁勃半两同研匀细，炼蜜和丸桐子，三岁下煎犀角汤研下三圆，大者加之。

治小儿饮乳不快，觉似喉痹。

以沙牛角烧刮取灰，涂乳又吮儿，咽下，即差。

射干汤　治如前，咽喉一切诸病。

射干　川升麻各一两　马牙硝　马屁勃各半两

上为末，每服一钱，水一盏，煎至六分，去滓温服。

金露膏　治如前。

寒水石煅通赤，四两，研　雄黄一两，研，水飞　硼砂二钱，研　甘草末四钱　脑子一字，研

上拌匀炼蜜和圆桐子大，食后含化一圆。

荆芥桔梗汤　治疮中生疮。

荆芥穗　桔梗去芦　甘草生　牛蒡子炒，各等分

上为细末，每用一钱，水一小盏，煎至六分，去滓，温服之。

又方　治如前。

桔梗去芦　甘草生　牛蒡子炒，各一两

上为粗末，每用一钱，水一小盏，入青茹少许，煎至六分，去滓放温，时时呷。

又方　治如前。

上以葱须阴干为末，又别以胆矾为末，并各自，每用以葱末二钱，胆矾末一钱和匀，以半字或一字，苇筒吹入喉中病处。

项瘿论

小儿项瘿，由啼怒未定，遽以乳食，致气逆小散，留结而生，其状在项垒垒然，渐渐长大而分有瓣。又云：葛根在地，泉流浸之，人因取其水以食饮，则生项瘿。故近山居人多有之，以葛生在山中故也。

昆布圆　治项瘿。

昆布一两，洗去咸味　海藻一两，洗去咸味　草龙胆去芦，一两　槟榔半两　甜葶苈一两，隔纸炒　牵牛子半两，炒

上为细末，面糊和圆黍米大，每服十圆，人参汤下。

又方　治或生项瘿，已及一二年。

上以黄药子半斤，须万州紧重者为上，若轻虚者，即是别州所出。力慢须用一倍，取无灰酒一斗，入药固瓶口，以糠火煨烧一伏时。火不可猛，酒不可有灰，待冷即开瓶，令患者时时饮半合一合，不可令绝酒气。经三五日看之，觉消即止饮。不尔，更令儿项细也。刘禹锡亦著效验，其验如神，唯烧酒候香气出，瓶头有津出便止，不必须待一伏时也，仍禁喜怒，但以线子逐日围度，乃知其效也。

恶核瘰疬论

小儿府藏不和，及遇项边经络虚隙，为风热毒气所干，与血气相搏于项边，结成核于，复遇风寒所加，则不消不溃，名曰恶核。若更风温相加，搏于津液，与府藏相乘，则溃化脓血，或较而复发，或根傍别生，以至数个，连续不差，名曰瘰疬。俗呼疬子。此府藏血气内外相属之病也。

皂角膏　治项边生核子不消。

皂角大者一挺，烧存性　糯米一合，炒黑焦　草乌头二钱，生　黄皮二钱，炒黑色

上为末，量多少，以井花水调贴核又，未消与水晶丹下之，利过以观音散补之，仍再贴之，即消。

水晶丹

天南星洗净，生为末，一分　滑石生为末，二钱　水银粉秤，半钱　芜荑取仁一百斤　巴豆五十粒，去壳，不去油

上先研巴豆极细，次入芜荑仁复研，方入众药研匀，烂饭和圆黍米大，每服三五圆，量大小加减，临卧稍饥，葱白米汤送下，利过忌生冷硬物，仍以观音散补之。方已具前。

如圣散　治如前。

绵黄芪一两，锉　连翘一两　鸽粪半合，烧灰　川大黄半两，锉，炒　糯米半两，用斑猫七个同炒米黄，去斑猫　犀角屑半两

上为细末，每服一钱，水八分，入酒三四滴，同煎至五分，去滓放温，时时呷。

紫檀散　治如前。

紫檀香　木香　川朴硝研　卷柏各一两　赤芍药　川大黄各半两

上为细末，每服少许，以鸡子白调，稀稠得所，涂患处。

取瘰疬内消。

上以长三寸鲫鱼一个去肠，以和皮巴豆填满，麻皮扎定，以一束秆草烧烟尽，取出放冷，研为细末，烂稠粥和圆黍米大，每服一丸，粟米饮下，临卧，未利加一丸，以利为度。

又方　治如前。

上以斑猫一两去翅、足，用粟米一升，同炒至米焦，去米不用，只以斑猫为细末，入薄荷细末四两拌匀，乌鸡子清和丸黍米大，空心茶清下一丸，一日加一丸，至五丸止，翌日却减至一丸，以后每服五丸。

胡麻圆　治瘰疬。

胡麻四两，炒香　羊踯躅一两，焙

上以为末，炼蜜和丸麻子大，每服七圆，渐加至二十一圆，热水下，日二，见效为度，已破者，更用黑母牛粪烧灰，研末傅之。

治一切瘰疬经效方。

上以牡蛎火煅通赤，取出，湿地又纸衬，出火毒一宿，每四两，用玄参三两，同为末，面糊和丸绿豆大，早晚食后酒下，各下三十丸，药尽则病除根本。

又方　治瘰疬已破未破，其效如神。

上以如前煅过牡蛎四两，用甘草二两，同为细末，每服一钱，腊茶点服，日二。

治小儿瘰疬。

以蜗牛壳一两，用牛乳半升，铫子中慢火熬令乳尽，取蜗牛壳研如粉，入大黄末一分，更研匀，每服半钱，皂荚子仁汤调下，大小便中出恶物，差。

又方　治如前。

以白僵蚕去丝、嘴，炒过为末，每服半钱，温水调下，日三。

龟胸论

小儿有龟胸者，因乳母有宿乳恶汁，不捻去之，仍以饲儿，忽遇风热邪毒相干乘，伤于肺经，致肺气滞停，重壅胸膈，骨渐高起，状如龟壳，故曰龟胸。

百合圆　治小儿龟胸。

百合一两　川朴硝半两　杏仁半两，汤浸，去皮、尖　木通半两　桑白皮半两　川大黄半两　天门冬去心，半两

上为细末，炼蜜和圆黍米大，每服十圆，米饮下。

又方　治如前。

上以龟尿摩擦胸骨，取龟尿法，以莲叶内顿一物，安龟在又，用镜照之，则尿自出流莲叶，以物盛用之，甚佳。

龟背论

小儿有龟背者，由儿在婴小时髂骨未成，强令独坐，则背隆阜。而偶为风邪干袭，与血气相搏，入骨髓壅滞不散，致背高隆起，若龟壳之状，故曰龟背。又名隆背。如驼有峰块起者，是名驼背，乃胎孕之病，不可不治。

松药丹　治儿龟背。

松花一两，洗，焙干　枳壳麸炒，去穰，一两　独活去芦，一两　防风去芦并叉枝，一两　前胡去芦，半两　麻黄去根节，半两　桂心半两　川大黄半两炮

上为细末，炼蜜和丸黍米大，每服十粒，米饮下。

又方　治如前。

上以龟尿摩背脊骨，取尿法在前。

手足拳挛论

小儿有手脚拳挛者，由本气不强，筋骨力弱，血气不荣，而为风邪所乘，搏于经络，则筋脉缩急，骨本无力，则手拳而不能展用，脚挛而不能伸举也。若生下便拳挛者，此胎孕中病，不可治也。

薏苡仁圆　治手拳不能展开。

薏苡仁一两，汤浸洗净，去皮　当归去芦，一两，洗焙干　秦艽去苗，一两　防风去芦叉枝，一两　羌活去芦，一两　酸枣仁去皮，一两

上为细末，炼蜜和丸鸡头实大，每服一圆，麝香荆芥汤化下，儿大增之。

海桐皮散　治脚挛不能伸举。

海桐皮　当归去芦，洗净，焙干　牡丹皮去心　熟干生黄　牛膝去芦，酒浸，焙干，各一两　山茱萸　补骨脂各半两

上为细末，每服一钱，水八分，入葱白二寸，煎至五分，去滓温服。

风疾癮疹论

小儿风疾癮疹者，小儿肌肤嫩，血气乘弱，或因暖衣而腠理疏开，或天暄而汗津润出，忽为风邪所干，搏于血气，藏流于皮肤之间，不能消散，而成磁成趴，相连而生，其状如生姜片，轻者名曰风斑，不至改色。重者名曰癮疹，改赤紫色，发搔痒，搔之不解，甚者使人心神闷乱。上先看其色泽，白者以牛膝酒浸一宿，焙干为末，每服一钱或半钱，温酒调下。若色赤者，以灶下黄土研细末，生姜蜜水调下一钱或半钱。

又洗方　治如前。

荆芥　细辛去苗　白芷　薄荷叶各等分

上为粗末，每用两大匙，水一桶，取羊蹄菜一棵，连根叶枝茎细锉，同煎至叶烂，倾盆中，先以寻常热汤暖处浴身体，候有汗出，即用药汤淋洗，洗毕避风，忌海鲜鲊酱毒物。

又涂方　治如前。

上以白矾一两二钱，暖酒投化，用马尾搽涂之。

防风汤　治如前。

防风去芦、叉枝　鼠粘子　荆芥穗　人参去芦，各一两　甘草炙　天麻各半两

上为细末，每用一钱，水八分，入生姜、薄荷各少许，同煎至五分，去滓温服。

治卒发风疹。

上以上灰不拘多少，和酸浆水调涂之，随手灭。

治小儿癮疹。若不治，人腹即能杀人。

以盐汤洗了，用蓼子授烂傅之。又以枳壳锉末，煎汤洗之。又以蚕砂二钱，水二碗，煮一碗洗之。

又方　治如前。

上以吴茱萸半升，酒二升半，煮取五合，以绵蘸拭。

三奇散　治风疾癮疹遍身，掐之不认痛痒。

凌霄花　白扁豆　甘草各等分

上为细末，每用一字或半钱，蜜汤调服。

又方　治风疾癮疹，心神迷闷。

上以巴豆二两捶破，用水七升，煮取三升，绵蘸搽拭之。

麝犀丹　治风疹不差，甚者如癞，服之神验。

犀角屑一两　乌蛇肉半两，酒浸，去皮骨，焙　天麻半两　白附子半两　白僵蚕半两，炒已又先为末　朱砂一两，研，水飞　龙脑　麝香各一钱，研

上拌匀，炼蜜和圆黍米大，每服十粒，煎金银、薄荷汤下。

又方　治风疹入腹，身强舌干，亦能杀人。

上以蔓菁子为末，温酒调下一钱或半钱，又以蚕沙二钱，水二碗，煮一碗洗之。

疥癣论

小儿血气热，为风湿所干，搏于血气，散于皮肤之间，而生疥癣。又云，蛲虫作动，内外相乘之所生也。

雄黄膏　治小儿遍身疥癣如粟，痒而搔之脓血出。

雄黄一两，研，水飞　雌黄一两，研水飞　松脂一分，研　川乌头一个，去皮脐，为末　乱发一分

上以猪脂六两，于铫子中煎成油，入乌头、松脂、乱发，煎至发消尽，以绵滤去渣，入二黄末搅匀，盛瓷器中，候冷成膏，每用少许，涂擦头叉，日三，亦治癣。

又方　名同治同。

雄黄末，一钱　黄丹一钱　腻粉一匣　蜡一块　巴豆十粒，去皮　葱五根，切碎

上用油一两，入葱、巴豆煎黑焦，滤去滓，入余药搅匀，候蜡熔取下，磁器中盛放，冷成膏，每用抓破疥疮涂擦。

碧粉散　治如前。

蛇床子一两，微炒　狼毒半两　硫黄半两　青黛半两

上为末，腻粉少许拌匀，好油调涂擦，神效。

又方　治如前。

大腹子二分　蛇床子二分　硫黄一分半

上为细末，入轻粉少许、好油调匀，临卧抓破擦疥又，及以药少许涂手心脚心，用手擦极热，甚者不过两次又。

治癣新生。

上以沙糖硇砂各一小块同烂，抓破涂之。

又方　治诸癣。

上以蛇床子为末，和猪脂为膏涂之。

又方　治湿癣。

上以桃树青皮为末，和醋傅之。

又方　治圈儿癣。

上以羊蹄根干生为末，与白矾等分，研细匀，好醋调涂。

又方　治诸癣。

上以决明子为末，入少许水银粉研匀，以物擦破癣又涂之，立差。

又方　治如前。

斑猫五个，去翅、足，微炒　盐豉四十九粒，浴令润　砂糖皂子大一块

上先研斑猫将细，入二味同研成膏，每用一大豆许，唾津调涂上，大效。

又方　治奶癣。

黄连去须　赤芍药等分

上为细末，入轻粉少许，嚼芝麻揉汁调药，先洗净拭干，以药傅之，不过数次而愈。

治下练癣疮，常对在两脚。

上以白犬血涂之，立差。

治上练癣，常在头上。

上以芦荟一两，甘草半两，同为末，先以温浆水洗之，以帛子拭干，用药傅之，立干便差。甘草炙过用。

又方　治如前。

上以大栀子不限多少，烧存性为末，好油调傅之。

又方　治疥癣。

因用硫黄、砒霜药，病愈后臭毒之气不歇，欲去之，又以藁本煎汤浴之，及用浣衣。

金疮论

小儿有误被尖刃硬物伤其肌肤，其轻浅者，虽有血出，不至危殆，其重深者，有损伤子经脉，血出不止，又有因伤中风者，则口噤身强，俗云破伤风也。

治诸金疮。

槟榔　黄连去须，各一两　木香半两

上为细末，如治一切金刃所伤，血出疼痛，以末傅之，血定不痛不脓，如斫下指来，血未定，速将药裹，便得连接。

又方　治诸金刃所伤，血出不止。

槟榔　黄连去须　石膏各一两　黄柏半两

上以为细末，随多少掺傅疮上，血定便入水不妨。

又方　治如前。

上以白芍药为末，贴傅即住。

又方　金疮深者，不可以药速合，则内溃伤肉。

上但以黄丹、滑石等研细末傅之。

天蛾散　治诸金疮。

上以晚蚕蛾不拘多少，为细末，掺傅伤上，用绢帛封裹，随手血止疮合，大妙。

又方　治如前。

上以五倍子刷净为末，掩伤处，血立止，较即无痕。

又方　治如前。

上磁石末、烧毡灰甑带、烧千金石灰米，若仓卒之间，得一味傅之皆可。

治破伤风、口噤身强。

上以天南星一个，防风二寸，同为末，先用童子小便洗疮口，后用药傅之，追出赤水是效。

又方　治如前。

上以肉苁蓉切作片子，晒干，用一小盏子，底上穿一孔合著，火烧，药如香烟从孔中出，熏疮口，累验。

又方　治如前。

上以好鳔胶二钱，火又炙焦为末，热汤调下，分二服连服。一方用一仰一合瓦，内烧鳔至烟断，研细末，热酒调下，汗出愈。

又方　治破伤风腰脊反张，牙关紧急，四支强直。

上以鸡粪白半升，大豆二升半，和炒令变色，乘热用酒沃之，微煮，令豆味出，量性饮之。

追风散　治破伤风。

草乌头四个，二个生用，二个炮熟　椒二十八粒

上为末，贴疮上，风毒自出。

又方　治如前。

上以黑豆四十粒，朱砂一字，同研为末，酒半盏，调下一字，差。

又方　治如前。

上以白面、盐各一撮，新水调涂疮。

又方　治如前。

上以苏木锉，煎浓汁灌疮中，十数盏不令绝，候疮中黄水出是效。

又方　疮口作白痂无血者，杀人最急。

以雄雀直粪研，热酒调下一字或半钱。

又方　治破伤风经验。

上以狗顶上毛烧灰，贴疮上。

汤火伤论

小儿有偶被汤烫火烧成疮者，轻则初乃疱起，破有黄水而为疮也，重则便皮破肉伤而为疮也。切不可用冷物泥蜜之类涂之，恐令热气不出，伏留溃烂，深伤经脉，宜加慎之，今叙方于后。

麻子膏　治汤火疮，经验。

大麻子一合　柏木白皮一两　香白芷一两　甘草一两　生地黄一两

上为粗末，以猪脂八两，同药熬色黄，以绵滤去滓，盛瓷器中成膏，每用少许涂疮上。

又方

以洗面脚日晒干，炒焦黑，研细，好麻油调涂，更解热毒。以蔡叶烧灰研细，油调涂之，止痛无瘢。经验，以水煮大豆汁涂之，易差无瘢。以醋和泥傅之。孙光宪家婢抱一孩儿，误落炭火上烧疮，便以醋和泥傅之，较无瘢痕。

以柏子房晒干，通风处挂之，要用时旋为末，好油调鸡翎扫上，如铺冰，痛便止。

以蛤蜊壳为细末，油调涂之，如冰无瘢。

以小麦面炒焦黑，研如粉，生麻油调涂，鸡羽扫上，大妙。

又以风化石灰不拘多少，铫子中炒黄色，地上出火毒毕，研细末，生麻油调涂。凡伤至重，燋痛不已，败坏筋骨皮肉者皆治。

又以捉一大活鼠，先用铫子煎芝麻油一斤至热，旋打死鼠，候冷顿油内煎，直至毛骨俱散，滤去滓不用，入乳香末没药末各半两搅匀，又炭火熬成膏，瓷器盛封系定，掘一坑深一尺许窖之，候三月取出。凡遇汤火伤涂之立效，亦治金疮。

小儿卫生总微论方　卷二十

疳疮论

小儿有诸疳疮者，由内有疳气，因而虫动，外被风毒所干，内外相乘，搏于血气蚀发之所作也。若发于口鼻牙齿者，初则疮小，渐渐蚀大，其蚀有缓急，缓者名曰常疳，急者名曰走马疳。有至鼻口蚀烂，牙齿脱落者。若发于缘身四肢者，只名疳疮。若发于阴物者，名曰下疳。其疳皆不甚痛，但微痒而已。不觉之间，蚀以深大，若不早治，皆能为害也。

泽泻散　治疳蚀其鼻生疮，及鼻下赤烂。

泽泻　川郁金生　甘草炙　山栀仁炒，各一分

上为细末，每婴小一字，二三岁半钱，五七岁一钱，甘草汤调下，日二，及用青金散傅之。

青金散

铜青　白矾生，各一钱

上为末，每少许傅疮上。

黄连散　治如前。

上先以米泔水洗疮讫，用黄连细末傅之，日三四。

芦荟散　治如前。

上以芦荟为末吹鼻中，鼻下有疮即傅。

又方　治如前。

上以熊胆半分，汤化涂患处。

又方　治如前。

上以黑牛耳中垢傅疮上。

又方　治如前。

上以鲫鱼胆滴鼻中，连三五日甚效。

石胆散　治疳蚀口鼻，生疮赤烂。

石胆一两　乱发烧灰，半两　莨菪子半两，生地龙去土洗净，焙，一分

上为细末，入麝香半钱，同研匀细，每用一字，贴疮又。

又方　治疳疮口齿蚀透。

上以白僵蚕去丝嘴，炒黄为末，蜜和傅之。

又方　治疳蚀牙齿龈烂疮溃。

上以发不拘多少，烧作灰，麝末少许，同研细匀，掺又立效。

龙骨散　治走马疳蚀口齿疮烂。

砒霜一字　粉霜半钱　龙骨一钱　定粉一钱半　蟾酥一字

上先研砒细，入龙骨研细，方入诸药，入龙脑半字，同研匀细，每用少许傅止。

治小儿牙疳蚀断肉溃血出。

人中白取法：用一瓦盆盛人尿，旬余日至满，澄去其清，取白脚暴干，称半两　麝香半钱

上为细末，入糯米饭研匀和剂。搓细小短条子，临时随牙缝大小，扎在病处缝中，甚效。一方只用末傅之。

治小儿走马牙疳。

上以雄黄不拘多少研细，以连纸条子掺上，捻作纸，灯上烧过，入钵中，同麝香少许研细，掺疮上。

治小儿走马疳蚀牙断损烂。

以胆矾为末，薄切萝卜作片子，反复揾末，于火上炙令干，研，更入麝香研匀，傅患处，立安，已验。

以五倍子中虫末研细，更入麝香拌匀，先用浆水漱口，小儿未能漱者，以帛子揾浆水揩之，须令留浆水气，以药傅之。若龈烂，即病已深矣。若小儿面又或骨节又生赤疮无头，如烂梨靥者，即用此药贴之。一方用五倍子烧存性，为末傅之。

又方

以不蚰皂荚一锭烧灰，胆矾四钱为末，盐一弹子大，用纸包了，黄泥固济，炭火煅，青烟起为度。顿冷地又，碗覆一宿出火毒，三味同研匀细，每用先以盐汤漱口了，以药于病处揩至痛，复用盐汤漱之妙。

以杨花少许，烧灰存性，入麝研匀傅之。

治小儿急疳蚀口鼻，数日至尽，欲死。

以文蛤烧灰，腊月猪脂和傅。

治小儿疳蚀鼻烂。

治胆矾一块，烧令烟尽，研末掺病处，一二日差。

治小儿疳蚀，口鼻作疮黄瘦。

石胆一分　芦荟一分

上同研细末，掺病处，但频用，即烂肉自然成脓，便生好肉，亦不别损，渐渐差愈。

治小儿疳蚀，鼻下两道赤者，名曰疳鼻。

以黄连去须为末，先以米泔洗净，用末傅之，日三四次。

又方　治如前。

石胆一分　黄连去须，末，一分

上同研匀细，生油调涂之。

又方　治如前。

五倍子三分，为末　黄丹一分，水飞

上同研匀细，以绵裹贴病处，或涂之亦得，日四五次

治小儿疳蚀，满口彻鼻。

麝香一钱，研末　**蟾酥**三片，如柳叶大，于铁叉慢火炼焦，黄色，别，研末　**五灵脂**去砂石末，一钱　**蜜**半两

上相和，于铫子内慢火熔成膏，每用先去却疮又烂物，以药涂之，日夜四五次。

治疳疮。

以胡粉熬八分，猪脂和傅，油亦得。

又方

上蛆壳洗净焙干为末，每用先以葱汤洗疮拭干，用药掺之。以栗子嚼烂傅之。

龙脑膏　治走马急疳蚀口鼻。

龙脑一字　麝香一字　砒一字　白敛一字

上为细末，用猪胆汁调药，适稀稠，以纸任予涂又，即差。

又方　治走马急疳蚀口鼻，数日间欲死。

上以蓝淀傅之令遍，日十次，夜四次，取差。

又方　治走马急疳，蚀牙齿，断透损骨。

上以天南星一个，当心取作坑子，安雄黄一块在内，用面裹烧之，候雄黄作汁取出，以盏子合在净地上，出火毒了，即去面裹，研为细末，入麝香少许匀之，傅疮上。量多少用。

熊胆膏　治走马急疳，蚀口鼻牙齿。

熊胆半两，研　蚺蛇胆一分，研　芦荟一分，研　牛黄一分，研　龙脑一钱，研

上同末，更入麝香末一钱拌匀，以井花水一小盏搅和药匀，入瓷器中，重汤慢火熬者成膏，每服一豆大，薄荷汤化下，兼涂疮上。一方更有黄矾一分，治缘身疳疮，用少许涂之。

蟾蜍散　治走马急疳，虫伤府藏，又蚀口鼻，牙齿赤烂。

干蟾烧灰，半两　莨菪子烧微黑，半两　白矾半两　生硫黄一分，又先末　**熊蟾**半两　雄黄一分，研，水飞　芦荟一分，研　麝香一分，研

上拌匀细末，每用一字，煎荆芥汤调下，及傅疮。鼻中痒生疮者，以少许吹入鼻中，日三。

兰覆散　治走马急疳。蚀口齿，恶血臭气，不喜所闻，牙齿脱落。

黄连末去须，三钱　铜绿一钱　水银一钱，用煮枣肉一个，同研　麝香一字，研

上同匀细，洗净漱口了，以药傅疮上，用生兰香果覆之，蚀肉成坎者，一傅肉生。

三白散　治走马急疳蚀唇口，牙齿臭烂，逡巡狼狈者。

砒霜　粉霜二物先研细末　石灰研细，罗三次用，各称等分

上相合，先左研千下，却上转研千下，当极细腻如粉，每用以鸡羽尖掠少许扫疮上，其

疮便干，慎勿多用，恐毒入腹，无令咽津。此药儿小者难用。

治疳疮立效方

黄连去须、一分　腻粉二筒　麝香少许

上为细末，先含水洗疮净，干贴之。

又方　治如前。

大粪内蛆踏、洗净、晒干　虾蟆只用四脚、晒干　蜜陀僧　使君子去壳

上等分为末，先以温水洗疮净，用药掺贴之，及以滴水和圆绿豆大、煎使君子汤下五七圆。

又方　治急疳疮。

上以蚺蛇胆研细，水调傅之。

治下疳定效散。

诃子一两、去核　好腊茶一两　腻粉十筒　麝香少许

上同为末，先用汉葱、木贼、川椒三味煎汤，乘热熏疮，候通手洗渫，令脓血净，将药量多少傅之。

又方　治如前。

上先以韭菜根打碎，百沸汤泡，洗疮净，帛子揾干，用密陀僧不拘多少，研细末，入轻和匀，干掺傅之，效。

又方　治如前。

上以朝生暮老花一钱为末，入腻粉十文，同研极细匀，生油调涂，仍先以葱椒汤洗疮净，帛子揾干，然后用药，忌酸辣鲊酱毒物。

痈疖论

小儿生痈疖者，由六府不和，风毒邪热等干于皮肤，搏于血气，入客经络之间，留结而生。小而有头者为疖，大而无头者为痈。初生则赤肿，渐渐肿起，外则皮薄而光，内则肉腐败溃，变而为脓，无头者须针刺破，有头者不必刺也。熟则捻去脓血得尽者，随即便差。若脓血不尽、疮口合者，虽暂时得差，终须更发，或根边别生。若邪毒入深，附骨骨留结者，则为附痈。若出脓血复遇风冷所乘、搏搏日久不差者，则为疽疮。若外面皮肤虽合，而毒气入里，攻溃转深，只有疮孔，时出恶汁者，此变瘘疮也。

治痈疖方

上以甘草一两锉，各二寸长，用水八分一碗，将甘草醃水，文武火又炙至水尽，为粗末。别用水一碗，煎至半碗，放温时时，量性服，取微利，其毒自消，未利再服。

又方　治痈疖欲成，未见其头，但肿痛不已。

官桂　陈皮等分

上杵末，水调傅肿处。

又方　治如前。

上以大黄、朴硝等分为末，每用三钱，入面一钱，新水调涂。

雄黄膏　治痈疖才发，赤肿作痛，便用龙角散、忍冬散三方大妙。

雄黄半两、研、水飞　天南星半两、生末　寒水石煅过、一两、研　黄丹　分　乳香半两、研

上拌匀，细蜜调成膏，摊帛子又贴之。

龙角散

地龙去又、称、一两　荆芥穗一两　甘草一两、炙　角刺一两、取紫色不枯者、净洗、捣去骨、只用皮

上为粗末，每用一合，水三盏，酒一盏，煎至二盏半，去滓，再煎至二盏，入研细乳香末一钱匕调匀，量大小旋旋与服，五七岁儿半盏、以下分二服，日三，神验。

忍冬散

忍冬草干者、一两　甘草节半两　大黄半两、生

上同为细末，每用三钱匕，水一大盏，煎至七分，调乳香末半钱匕，服如又法。

又方　治痈疖无头要生。

上以葵菜子一粒，新汲水吞下，即生头破而脓出，要两处破，服二粒，要破处，即逐粒加之。

又方　治痈疖无头。

上以川山甲、猪牙皂角去皮弦各一两，共炙焦黄为末，每用一钱，热酒调下，服药毕、

其疮便破，甚妙。仍以冬瓜藤为末，疮干即水调傅之，诸疖疮皆可用。

乳香膏　贴痈疖。

乳香一两，研　腻粉半两，研　松脂半两，研　密陀僧半两，研　生地黄汁半两

上拌匀，先用一铫子煎好油四两，黄蜡二两至熔熟，下诸药搅匀，入麝香细末一钱，熬成膏取下，瓷器盛之，窖一宿，每用看大小剪贴子，摊药在又贴之，一日两换。

沉香散　治痈疖。

沉香半两　黄芪半两　白敛一分　川朴硝一分　川大黄一分，炮　甘草一分

上为粗散，每用一钱，水一小盏，入麝香少许，煎至五分，去滓温服。

又方　治背上生痈疖，凡疮生背上者，非善疮也。

上以多年烟熏壁土，并黄蘗二味，等分为细末，生姜自然汁调成膏，摊纸又贴之，更以茅香汤调下一钱匕，大妙。

治附骨痈。

上以槲皮烧末，每服一钱匕，已破者，以蜣螂七枚，和大麦烂捣贴封之。

治痈疮久不差，败坏成虫。

大虾蟆一枚，白死者　乱发一块，鸡子大　猪脂一斤

上同煎之，至消尽又二物时取下，入盐一合搅匀，放冷成膏，每用先龙骨研作粉，围疮四面，厚二分许，以膏药着疮中，日二易，有虫出如发，出尽愈。

又方　治如前。

上以白杨叶杵末傅之。

又方　治如前，鸡舌香散。

鸡舌香　木香　沉香各一两　麻黄去根节　海藻洗去咸味　大黄炮，各半两

上为粗散，每用一大钱，水一盏，入竹沥二三点，煎至五分，去滓温服，兼煎适温热，淋渫其疮。

治痈疽瘘疮。余治瘘疮方并在后。

铜绿　湿生虫

上同研细末，每用芥子心许，纸捻蘸药，任入疮口。

恶疮论

小儿有缘身生诸恶疮者，由府藏有热冲发于外，外被风湿所干，内外相乘，搏于血气，随其经络虚处，停滞留结而生，或大或小，或痒或痛，破溃成疮，或脓或血，或腐或败，挟毒所作者，久而不差，皆曰恶疮。若毒行攻里，亦皆能变瘘疮也。

治小儿身生小疮作痒痛。

宣连去须，一两　腻粉一分　白芨一两　芜荑去皮，半两

上为细末，先洗疮净拭干，生油调涂。

治生大疮作烦痛。

黄丹一两　腻粉一钱匕

上研匀细，嚼杏仁取汁调傅。

治生疮如火烧。

上以赤薜荔叶杵末，油调涂之。

治肺毒风疮如辣癞。

上以好桑叶洗净蒸一宿，日晒干为末，每服一钱，温水调下，无时。

治恶疮不识者。

上以蜣螂杵烂，绞汁傅之，亦治瘖疮。

治诸恶疮。

上以黄牛蹄甲烧灰，须再三烧令极细末，入麝香少许拌匀，干掺疮又。

又方　治如前。

上以地骨皮先刮取浮皮，别收之，次取浮皮下白皮如粉者，为细末，上以其下赤坚皮细锉，共浮皮一处相和为粗末，粗细各贮之，每用一粗末一合，煎浓汁乘热洗疮，直候汤冷以软帛拭干，用细末傅之，每日洗傅一次，取差。

又方　治如前。

炒豉焦至烟绝为细末傅之，不过数次差。

又方　治如前。

以陈小麦半升，不犯铁器中炒黑色。枯

白矾灰半钱。同为细末，每用少许贴疮又。

又方　治如前。

黄柏厚者，去粗皮　黄连去须　山栀子去壳　甘草各一两

上各锉如豆，于沙石铫子内炒令烟绝，如烬炭样，放冷研细，入麝香一钱拌匀，先以温浆洗疮去脓血净，软帛拭干，掺药在疮又，以纸片子盖了，软帛子包系护之，隔日再用，不得入水。昔卫州一老兵患疮九年，溃烂见骨，得此药效愈。

治疔灸疮伤。

上以猪胫骨髓、腻粉和为剂，却入骨内，泥裹，火煨熟取出，先以盐水洗疮净，后乃傅之，立效。

追恶疮脓血。

上以巴豆二十粒槌碎，用清麻油二两，煎至黑焦，去豆滤过，入黄丹一两，以东引柳条数枝搅之，煎成膏，每用以绢帛摊药贴之，以葵节烧灰傅之。

治小儿鱼脐疮。谓疮形状似鱼脐也，此亦恶疮候。

以蛇蜕皮炙焦黄一两，烧灰细研，用鸡子清旋调少许涂之。

治小儿鱼脐疮。

以寒食饧烧灰，研末傅之，以白蒿苣杵烂，绞汁，先以针刺疮四畔，滴汁于疮口又。

治小儿风气相搏，身生疮疡。

地龙去土，一两　白僵蚕去嘴、丝，一两　川芎一两　甘草一两，生用

上为细末，薄荷汤调下一钱或半钱。

治恶疮久不效，肉黑烂脓，色黑赤。

上先以不灰木、槟榔各一分为细末，掺贴疮又，候肉红脓黄，即用后木香散。

木香二钱　槟榔一钱　黄连去须，四钱

上同为细末，干掺贴又，用之必效。

马苋散　治诸疮久不差，变瘘疮。

马齿苋一两，增又生者　乌蛇肉一两，酒浸一宿，焙干　蒺藜子半两，炒去刺　乱发半两，烧灰　曲头棘针半两，烧灰　绯帛子半两，烧灰

上为细末，每量疮大小，用白酒调药，摊帛子上，贴疮上。

贴久瘘疮。

白胶香　赤石脂　黄蘗　密陀僧各半两

上为细末，干贴疮又。

又方　治诸瘘疮。

上以蜗牛三个，瓷合子内收，麝香少许盖了，火内烧过，研为细末，水和小圆子，每用一圆内疮中。

又方

以牛膝末傅之。妙。

又方　治如前。

上以赤小豆、黄连等分为末，温浆水入盐，洗疮净掺药，或只以白胶香末掺之，亦效。

乌金散　治疳疮瘘，出脓水，痛不止，诸药无效者，有虫。

小以羊羔儿骨不拘多少，入藏瓶内，盐泥固济，炭火烧合宜，研细，每用末五钱，入麝末一钱，雄黄末一钱，同研拌匀，时看疮大小，先以通手汤洗脓血净，口含洗之，软帛拭干，将药满填疮口，当次生肉，三日外疮合。

浸淫疮论

小儿生浸淫疮者，由府有热，熏发皮肤，复为风湿相持，搏于血气，而其疮初生碎小，后有脓汁，浸淫渐大，脓汁着处便生，故谓之浸淫疮也。又一证，风毒湿疮，颇似浸淫疮，亦脓汁浸淫而生，但脓痂遍周，比浸淫疮稍大尔。

治浸淫疮痛不可忍，发寒热。

上以刺蓟为细末，新水调傅疮上，干则易之。

雄黄膏　治浸淫疮，经效。

雄黄一两，研，水飞　雌黄一两，研，水飞　川乌头一个，去皮脐，研为末　松脂一分，研　乱发一分，烧灰

上以猪脂六两，于铫子内熬成油，后入后三味，煎至发消尽，以绵滤去滓，入二黄末搅匀，盛瓷器中成膏，每用少许涂疮上，日三次。

又方　治如前。

上以蜡胭脂于灯下用镜子照疮口，念咒曰：浸淫疮，好夜妆，明镜照，红粉妆。每念一遍，抹胭脂涂疮上，如此七遍，胭脂抹周遍其疮即愈。此法极验，甚者不过再。

苦瓠散　治风毒湿疮。

于苦瓠一两　蛇蜕半两，烧灰　露蜂房半两，微炙

上为细末，每用半钱，生油调涂，疮多添之。

四生散　治如前。

绵黄芪　白附子　羌活去芦　蒺藜各等分

上为细末，每服一钱，温酒调下。

燏浆疮论

小儿生燏浆疮者，由风热毒气客于皮肤，搏于血气而所生也。始生如火烧汤烫，作泡而起，寻即皮破，燏浆出以成疮，亦甚疼痛，渐引相续而生，有至遍身溃烂，皮肉不可救者，故又名烂疮，宜速治之。又一证，生疮狭长，如鱼脐，黄水出，四面亦燏浆泡起，此虽与燏浆相似，而有少异。燏浆疮者，先起浆泡，破而成疮。此疮先乃生疮，后即四面续生浆泡，其状狭长，浑似鱼脐，故名曰鱼脐疮。燏浆疮即不似鱼脐也。

治燏浆疮　神效屡验。

上以柏叶洗净，切碎，细研傅之，随手便干，更取汁半盏，水解服之。

又方

以桃仁去皮、尖，熟研，和面脂傅之。

又方　治燏疮黄烂。

上烧艾叶灰傅之。

一方烧马骨灰傅之。

生地黄膏　治燏疮毒甚，发引遍身。

生地黄去芦，洗净　川升麻　蓝叶　栀子仁　大黄各一两

上研细，以猪脂八两，同于铫内慢火煎色变，滤去滓，以瓷盒盛，放冷成膏，每用少许涂疮又。

治小儿面目缘身，卒生燏泡。

上以羖羊角烧灰研细末，鸡子白和涂神验，卒无萧注云：此处原缺三字。和，亦妙。治小儿燏浆如鱼胞，赤烂成疮，热痛不可忍。

上以磨家驴粪，或块结而不散者，不以多少晒干，地又堆定，用手垒作屋状，以灯点着，烧至欲过，盆子合杀，令作黑灰，勿令白，研为末，每用一钱，和腻粉二钱，残灯油调涂如水，除热痛，甚妙。

治小儿燏浆疮，起如丁盖，发头又，一两日后，面又胸背缘身皆生，其疮热痛。

朱砂半两，研，水飞　胡粉一两半　水银半两

上一处研，入水二三滴，研至水银无星，用腊月猪脂三两，于铫内慢火熬熔去滓，入药末搅匀成膏，瓷盒盛，放冷，即用少许涂之。

治缘身生火燏疮，如麻豆，有脓汁，作痒痛，一身尽遍。

甘草　芍药　白敛　黄芩　黄连去须　黄蘗去粗皮　苦参各等分

上为细末，用蜜和傅之，日二夜一，亦可作粗散，煎汤洗之。

治小儿燏烂疮。

以铁烧赤，淬水中二七遍，浴洗，以烧艾热灰傅之。又以酒煎茱萸拭上。又以桃仁杵烂和面脂傅。又以赤小豆煮汁冷洗。不过三次，差。

冻疮论

小儿有冻疮者，多生于耳轮或脚上，由冬月严寒之气所伤，客于肌肤，搏于血气所作，初即肿痒，须渐破而成疮，颇难得差，至春暖时自可，到冬月冷时复发，故名冻疮。

黄柏膏　治冻疮。

黄柏末　白敛末，各一两　白芨末，半两　生芝麻二合，杵烂，取汁

上同研匀细，以蒸萝卜一枚，好酒一盏，一处杵烂成膏，每用少许，先以童子小便洗疮了，后以药涂。

又方

以雀见脑髓涂之，立差。

痱疮论

小儿夏月多生痱疮，此由盛热汗津出而腠理开，被风热毒气干于血气所生，其状细碎，累累如粟芥之类，色赤而痒，多生额头胸背之上，甚者遍身，俗呼痱子，痒而搔之，亦能成疮。

治痱疮。

以菟丝子茎叶汤洗之，亦治头疮及女人面疮。

治痱疮痛不止。

干藕节末，三两　生油麻三合

上先杵油麻烂后，下藕节末，更入生蜜，和调得所，涂之三五次，差。

龙脑散　治痱疮。

龙脑一分，研　黄柏半两，末　白面二两　腊茶一两，研末

上拌匀，每以新绵揾药扑又，破者傅之，取差。

又方

上以蚌粉研细，用雪水稀调，临床涂之，能以热汤浴毕涂之，更佳。无雪水用新水。

又方

上以雪水磨檀香，鹅毛蘸扫又。

漆疮论

小儿有偶谓漆伤者，本不耐漆，或因见闻，或因使新漆器，被漆气所触，便著其毒而生肿赤，状似瘾疹，破而作疮，微有脓汁，亦颇疼痛，俗呼为漆咬疮也。

化毒散　治漆疮痒痛。

木通一两，锉　蓝叶半两　麦门冬半两，去心　犀角屑一分　马牙硝一分　甘草一分，炙微赤，锉

上粗散，每服一钱，水一小盏，煎至半盏，去滓温服。

垂柳膏　治如前。

垂柳枝五两　苦参二两　黄芩一两

上锉散，每用三匙，水两碗，煎至一碗，去滓，研入好墨汁半匙搅匀，再熬成膏，以瓷盒盛，候冷，用少许涂疮上。

又方

以好麻油生用涂上。以黄芦木锉碎，煎浓汁放冷淋之。

月蚀疮论

小儿有月蚀疮者，或生耳鼻，或生手指，随月生死。世云：月初生之时，儿以手指月，乃生其疮，故因以名之。

治耳伴生月蚀疮。

上以黄连为末傅之。

治手指生月蚀疮，或肿或破，随月生死。

上以生薤一把，苦酒中煮数沸熟，出以傅之。

治诸处月蚀疮。

上于月望夕取兔屎内虾蟆腹中同烧，研细傅之。

又方　治如前。

上于五月五日，取虾蟆烧灰研细末，和猪膏傅之。

又方　治如前。

上取蛇蜕皮烧灰研末，和猪脂傅。

又方　治如前，亦治月蚀九窍皆有疮。

上烧蚯蚓粪研末，和猪脂傅。

治月蚀疮生两耳，出脓水不止。

水银　胡粉各一两，入水银三两，点研至水银星尽　黄连去须为末，二两　松脂一两，研末

上并同研匀细，以粉疮上，若干，即用炼成猪脂和膏傅，仍先以盐汤洗疮净，拭干涂药。一方只用胡粉和土傅之。

又方　治耳后月蚀疮。

败鼓皮一两，烧灰　虾蟆一枚，烧灰

上同研为末，以炼成猪脂和膏涂之。

蠼螋疮论

小儿生蠼螋疮者，因居处屋壁之间，有其虫，名曰蠼螋。其形寸许，脚甚多而细瘦，其游走之时，偶遇人影，则尿之，随所尿着处，人身则应而生疮，多在腰间，初生赤小痦疮，如黍粟麻豆，茬苒不已，长出脓汁成疮，因其虫名而名之也。北方人便为漫淫疮也。未知的否，今两存具之。

治蠼螋尿疮

上取胡燕巢中土水和傅之，或以猪脂苦酒和傅。

又方

上取白扁豆叶傅之，最佳。

又方　治蠼螋疮，绕身匝则死。一云绕腰腹。

上取蒺藜叶捣傅之，无叶用子。

水毒论

小儿有诸般疮疡，因洗面或洗手脚或澡浴等，偶然水入疮中，则发肿面疼痛，名曰水毒，宜早治之。不尔，则溃发其疮，变出脓汁，迁延时日，久不能效也。治汤水入疮为水毒，发肿痛。

上以香附子、干姜各一分，皆烧存性，研细末傅之。

赤游论

小儿患赤游肿痛者，由内有积热熏发于外，外被风毒所干，内外相乘，搏于血气，则皮肤赤肿，其风邪毒气随经络行游不定，故为赤游也。若重者，随血气虚处流注为赤肿，或片或涡，毒渐引大，疼痛难忍，若游至于心，或毒入腹者，皆能杀人。

治赤痛游遍身上下不定，若至于心即危。

上以芒硝投汤中，取浓汁拭之，亦治丹毒。

又方　治如前。

上以蒴藋煎汁浇淋之。

治小儿缘身赤肿，渐引肿起。

以米粉熬令黑色，研细唾和傅之。

治小儿半身赤，渐渐长引不止。

以牛膝、甘草二味等分，咬咀。一方甘草减半，每用一两。　水一盏，煎五分，去滓，调伏龙肝末涂之，大效。

又方　治如前。

以乱发烧灰，同伏龙肝末，用膏油和傅。

治赤热毒肿，游行身上下，至心即死。

以草鞋乱发烧灰，醋和傅之。以伏龙肝研末，鸡子白和傅，干即再傅。又以生景天杵烂傅上，亦治丹发。一方用一握绞汁拭之，以水中苔杵烂傅之。又以松菜杵烂傅之，以白豆末水和傅之，干即易。

治头面缘身生赤毒，肿起作片。

以栝蒌根二两，伏龙肝半两为末，醋调涂之，干即再傅。

治赤游肿半身红，渐渐展引不止。

以红蓝花末，醋调傅之，又以芸苔叶杵烂傅之。

又方　治如前，赤肿游行上下，遍身不定。

上以芭蕉根汁煎涂之。

防己散　治如前。

防己半两　川朴硝　犀角屑　黄芩　黄芪　川升麻各一分

上为细末，每服半钱，煎竹叶汤调下。

木通散　治赤游成片涡，赤色如染，肿毒渐渐引大。

木通一两　川升麻　川大黄锉碎，微炒　川

朴硝各半两　栀子仁　甘草微炙，各一分

上为粗散，每服一钱，水一小盏，煎至五分，去滓，温服之。

截毒散　治如前。

川大黄生　郁金　赤芍药　腻粉　猪牙皂角去皮子弦，各半两

上为细散，每用少许，生油调涂之。

又方　治如前。

上以五味子去枝梗，焙干为末，热酒调下一钱，痛自消，神效。

又方　治如前。

上以黄柏、寒水石等分为末，用薄荷水稀调，鸡翎扫涂之，干即再。

治赤游肿遍身，入腹即杀人。

上取灶下黄土研为末，油调涂，勿令干，若人腹及入阴者，以慎火草取汁一盏，分服，如无生者，用干者末之，水调服。

赤　毒　论

小儿丹毒者，由风热毒邪客于腠理，搏于血气，发于皮肤之所作也。又《千金》论小儿黄丹恶毒，皆热积所成，或冬间向火烘衣，夜间盖覆太暖，或乳母受食烧炙饮酒，皆令儿病丹。发处其热如火，轻轻手近，则痛不可忍。又有五色丹，虽赤色者最多，皆煞热作痛，甚者遍身壮热，烦渴闷乱。更有诸火丹，其名证甚多，不可尽述，皆赤丹之异名也。其毒入腹者，亦能杀人，宜速治之。

治赤丹　此热毒所作，其色纯赤，如丹涂之，故名赤丹。

上以荞麦面醋和傅之，一方用荞麦面用鸠脑和饼，索串吊起放干，要用时研末，鸡子清调膏，以鸡羽翎扫上，效如神。

又方

以胡荽汁傅之，又以寒水石半两，白土一分，研细末，米醋调傅，以蓝淀或慎火草水苔生地黄栀子仁，但得一味为末，水调傅之皆可。

治白丹虚肿如吹，此风热所作，而风多者，其色则白。

香豉二合，炒令黄　伏龙肝一两

上同为细末，每用半钱，生油调涂之。

治黑丹痛肿。此本热毒，复有冷以乘之，互相瘀抑，故黑色。

川升麻　川芒硝　漏芦去芦，各二两　黄芩　栀子仁各一两

上为粗末，每用两匙，水三盏，煎至二盏，去滓，稍热以软帛蘸塌患处，以消为度。

治丹五色变易不常。此风毒冷热相搏，盛衰不同，故色无定也。

枣木根四两　丹参去芦，二两　菊花拣净，二两

上细锉拌匀，每用二匙，水二碗，煎数沸，适温热，避风处浴洗。

又方　治如前。

上以蜜和干姜傅之。

治急丹引上。

上以鸡子白和赤小豆傅之。

治赤丹。

以葛勒藤蔓轻轻摩破，醋研诃黎勒汁涂之，炒。以淬铁水饮一合，得打铁处淬铁槽中水澄清用。

治黑丹。此本热毒搏于血气，热轻而挟于风多，故色黑也。

以风化石灰二两，屋四角茅草三两，烧灰同研细末，鸡子白调涂，日三五次，效。以猪槽下泥涂之。

治白丹。此本热毒搏于血气，热轻而挟于风多，故色白也。

以猪粪烧灰研末，鸡子白调涂。

治殃火丹。生于两胁腋及髀上。

以川朴硝研细，竹沥调下半钱，更量大小加减。

治天灶火丹，发于髀里尻间，正赤流阴头肿，或出血。

以蚕沙一升，水煮去滓，取汁洗之。

治废灶火丹，发足趺赤色。

以赤小豆末一两，牛角二两烧灰，同研匀细，鸡子白和涂。

治尿灶火丹。发膝股，起脐间，走腹头。

以屋四角茅草烧灰研细，鸡子白和傅。

治火焰丹。发两臂及背膝如火炙。

以老雅眼睛草叶和醋研烂傅之，亦治赤肿。

治五色丹。遍身壮热，如热烧，若绕脐即损人。

以蒴藋叶杵烂，水和傅之。

治丹毒。从脐中起。

以伏龙肝研末，用屋漏水和傅之，干即再用，取效为度。如无屋漏水，新汲水亦得。

治丹肿起于两胁心背，不速治，即杀人。

以羚羊角屑八两，水五升，煎至一升，绢滤去滓，入炼了猪脂五两和匀傅之。治丹毒忽生头又，皮赤肿起晕，有碎疮，初发如钱，渐开及身长一二尺，良久遍体，入口耳，到藏府，胃烂即死，此候可畏，宜速治之。

以甘草一两劈破，入水一大盏，煎汤温温，令乳母满口呷含数漱，徐徐吐洗病处，以掌摩揩。不得犯指甲，恐伤破，仍更甘草汤服之，三用即差。

治丹毒。

以鲫鱼肉细切五合，小豆屑三合，同杵如泥，水和傅又。

《千金》漏芦汤　治小儿热毒赤白，诸丹痈疽疮疖。

漏芦去芦　连翘　白敛　芒硝　甘草炙，各一分　大黄煨　升麻　枳实麸炒　麻黄去根节

上㕮咀，以水一升半，煎取五分，量儿大小增减服。

治一切诸丹

以马齿苋杵烂傅之，治赤丹热如火，绕腰即损人。以黄芩末水调傅之。以蓖麻子五个去壳，并皮研细，人面一匙，水调傅之。以水煮棘根洗之。以栗子刺壳煎汤洗之。以柳叶一斤，水一斗，煮取三升，去滓，挹洗病处，日五六次。以蚯蚓粪水和傅之。以蒴藋叶、浮萍草、五叶藤、海藻叶，但得一味为末，水调傅之。

又方　治诸丹已破作疮，出黄水酸痛。

上以豆豉炒焦，烟绝，为细末，油调傅之。

《千金》麻黄汤　治诸丹恶毒，发处如火，轻轻手近，则痛不可忍，急与砭针出血，仍与此汤，并塌汤治之。

麻黄去根节　升麻　葛根各一两　射干　鸡舌香　甘草炙，各半两　石膏半合

上㕮咀，以水三升，煮取一升，三岁儿分三服，日尽。

塌汤　治诸般数十种丹毒。

大黄生　甘草生　当归　芎藭　白芷　独活去芦　黄芩　赤芍药　升麻　沉香　木香　木兰皮各一两　芒硝三两

上㕮咀，以水一斗二升，煮取四升，去滓，内芒硝搅烊，以绵揾塌之，干则易，仍适温热用，取差止。

消毒散　治诸丹发赤肿作痛甚久，赤游肿背。

川升麻　黄芩各半两　麦门冬　川大黄锉碎，微炒　川朴硝各一分

上为粗末，每服一钱，水一小盏，煎至五分，去滓温服。

鳞体论

鳞体者，谓皮肤之又，如蛇皮鳞甲之状，故又名蛇体。此由气血否涩，不能通润于皮肤矣。又生下便有者，此儿在母腹形象未具之时，母曾观看或曾食吃或服药饵，有犯鳞甲网罟秽毒之物。儿胎中感而化之，故又谓之胎垢，谓生下身皮黑垢，若鳞者也，此必难治。

治小儿身上皮肤若蛇皮之鳞。

以白僵蚕去丝、嘴为末，煎汤适温暖浴之，一云与蛇蜕同煎。

疵　黡　论

疵黡者，谓皮肤之又生赤色或黑色之点，大小不等，如滓粒之状，缘身犹可，若生面上，则多恶之，女子尤甚。此由风邪搏于津液之气而作。又言因傅胡粉，皮肤虚而为粉气入于腠理化生。又有生下便有者，此由胎中形象未具之时，母食杂有毒，感气而化，又有父母遗体所生者，此下二项，不可治也。

治小儿皮肤又生赤疵。

以马尿洗之，日四五次。

又方　治小儿生赤黑疵。

以针刺父脚中血，滴疵上，即消。

又以狗热尿傅之，疵自卷落。

《小儿卫生总微论方》终

后　序

医书有云：宁医十男子，莫医一妇人；宁医十妇人，莫医一小儿。是小儿为医家最难也。其为业既难，而其方书传于世者无几，扁鹊、华佗，世不恒有，后之业小儿医者，将焉所持循哉。宁国通守朱公，一日与愚萃于公所，出所藏小儿方书一部。且曰是书也；昔有人得之古塚中。以献津要，往往愈疾，有奇验。若职居子民，刊布以济人，是亦仁爱之一端也。愚领阅之，未详作者何人。其分类著论，因论著方，既详且备，诚医家之宝鉴，活幼之指南，世不可无者也。于是命工锓梓，以永其传，以溥其济。抑先哲有云，不为宰相，必为名医。以医之功，足以济世故耳。然一医之所济有限，而是书流布，将济天下后世以及于无穷，朱公之功不浅矣。公名臣，字时佐，世族济南，起家乡进士云。

弘治己酉孟秋之吉赐进士文林郎宣城知县前河南道监察御史济南李廷寿书

跋

《小儿卫生总微论方》二十卷。宋嘉定丙子，何氏刊于行在太医局。序中已言不知作者谓谁，卷中多引《圣济经》及钱仲阳方论，盖宋南渡后隐君子也。第七卷末，自记编伤寒类证诸方，亦颇详备。考《伤寒类证》三卷，初刊于金大定，宋氏谓得之异人，至明虞山赵氏复刻，附入仲景全书。今其书具在，条件分明。俾读长沙书者，犁然有当，盖不独精于幼科，而其名亦不著，可不谓贤欤？此书一名《保幼大全》，当是明人所改，范氏书目以为明朱臣编，盖偶记刊书姓名耳。明刻脱误甚多，传世渐少，兹请武昌医馆馆长萧孝廉北承，详加校订，重为梓行。仲阳心法，实亦推阐无遗矣。

宣统二年三月三日武昌柯逢时

重校《小儿卫生总微论方》记

是书乃柯巽奄中丞创办武昌医馆时出以相示，余时方主持馆事，见是书明刻，讹误过多如声作户，羌作义之类，俗字甚多，因萃馆中诸生，详为雠校，甫经蒇事。余适有龙江之行，时天门周少朴师巡抚黑龙江，奏充抚署参事，并龙江全省防疫会会长。爰归之中丞，俾付剞劂。自后余奔走四方，中丞亦捐馆舍。其梓行与否，无暇过问，越十数年，余因手校《内经》、《太素》脱稿，遄返武昌，亟谋付梓，适晤梓人陶子麟，询及前事，陶告以是书正拟开雕，而武昌义起，幸当时与《钱氏小儿科》一并藏之笥箧，携往沪上，未经散佚。因以原书归余，余展卷披阅，曩时所校，墨迹犹新，不胜狂喜。特走谒吾宗珩珊巡使。巡使素以活人济世为心，即慨捐巨资，与《内经》、《太素》及钱氏《小儿直诀》三书同时付梓，仍属余董理其事。余因留居武昌，重加雠校，不数月而三书次第出版。昔昌黎云：莫为之前，虽美弗彰，莫为之后，虽盛弗传。今是书之成，中丞与巡使，可谓前后辉映矣。至原序谓得是书于古冢中，乃方技家假诡异以骇俗，语本无稽。兹观其书中，一则曰余流落钱塘，再则曰予在行朝。作者当为宋南渡时人。盖士君子生际乱世之末流，既不得假斧柯以行其志，而悲天悯人之心，终不能自已。特托为仁术，冀消沴戾而普慈祥，亦犹宣公罢相，广集医方，文正微时，愿为良医之意。惜是书虽著作详备，而名氏缺如，致今后之景仰者，徒溯洄于葭苍露白之中，不识伊人之宛在，其贤更加人一等矣。余既喜是书之成，特为志颠其末，以见善本之流传，良非偶然也。

岁次甲子长夏黄陂萧延平谨识

幼幼集成

〔清〕陈复正　辑订

《幼幼集成》提要

清·陈飞霞著。飞霞字复正，罗浮人。其例言云：胎婴柔嫩之姿，乍离母腹，如水上沤、风前烛，防护稍疏，立见夭枉。而幼科常用毒劣之方，令其暗损真元，虽侥幸得生，而精神已耗。他如惊风之传，诚多谬误。喻嘉言、陈远公、程风雏业已专门之指出病痉，惜未申明病痉与治痉之法，仍无着落，不足服人。予兹彻底揭破，以伤寒病痉，杂病诸搐，并竭绝脱证，分为三则，以搐字概之，曰误搐，或类搐，曰非搐。条分缕晰，证治判然，名目既正，庶治疗不惑。周虚中曰：开此三大法门，可济无穷夭扎。幼科惟从惊风摹拟，而伤寒门类，全然遗弃，故学者但知有惊风，而不知有伤寒。毫芒千里，害岂胜言。独程风雏能见及此，兹并纂入以备用。夫火功为幼科第一要法，今以异授神火，绘图作歌，公诸同志，急迫之际，可以着手回春。是书治疗，先列正方，复以经验简方，并外治之法，附于方后。本书所辑，凡义理明确，有裨实用者取之，浮而不切者去之，间有未妥之处，即参以己意，并素所经验者成全之。故难分某段为何人之说，非敢掩人之功为己有也。是书刻本与石印，讹误甚多，爰为粗校圈点之。

裘　序

余读太史公书而叹越人之善乎方也，邯郸贵妇人则治妇人，周贵老人则治老人，秦人爱小儿亦即治小儿，其施屡变，然其所奏亦并效。何哉？盖古者卜筮、医药皆有专官，世授其业，不迁而为良。苟能专其传、精其意，通知其理而无所惑，则妇人、孺子、老幼之各得其治，吾以为虽不必越人可也。后世专业既失，凡其治方术者，又不能精而多通，由此，妇人、丈夫之与小儿，始各为分科。而小儿之中又有所为疹者、疳者、惊风者、疮疡者，与夫他疾多端之分部。《庄子》所云：道为天下裂者，非耶？然世之为小儿医者，虽习其书、用其方，往往无所效，岂其传于古者，法犹有未备，而道或犹有所未至也乎！岭南陈君飞霞自幼知医，以治小儿者多所乖误，而弊实中于惊风家言，不惮大声疾呼，以辟其谬。乃取前代之说，存其精要，辨其是非，订为一书，名之曰《幼幼集成》。其间以搐子易惊字，标出误搐、类搐、非搐三条，既可使天下习惊风之教者，废然自返，而又俾从书中所载病因、证治，循涂守辙，庶几于动无不当，投无不宜。君之心勤而语恳如此，此盖欲举天下之幼，扶持而安全之，令一无夭札而后快也。君学仙好道，飘笠洒然。吾闻道家者流，以老氏为宗。老氏言三宝，其一曰慈。夫慈之为道大矣，固不独幼幼，然幼幼则所以为慈。君本此意行之，而将托是书以为婴儿孺子之福，岂非仁人长者所乐与哉！乃因其请而为之序云。

赐进士出身通奉大夫日讲起居注官内阁学士兼礼部侍郎加二级西昌裘曰修撰

梁　序

医之为言，意也。神存采心之间，心可得解，口不可得言。然则方剂之著无益乎？而非也。观乎《灵枢》、《素问》，肇自轩皇，嗣是而医家名流著书立说，不一其人，家相祖述，代有师承，于吕稽旧闻、谛诊视，救其偏败而济乎夭死，厥功伟焉！则不事方书，乃神于医者之深造自得，而非可以概天下也。故医者济人之术，而方书之作，则以得诸心者传诸世，以济人于无穷也。独是书凭臆见，既虞师心之滞于偏，书守成规，又嫌胶柱而不知变。盖观一言之误，贻害非轻，而叹方书之难言也。虽然，为方书难，为方书而及幼科则尤难。何则？呱呱襁褓，啼笑无端，疾痛疴痒，不能自白；其脏府未定，则药物不能多受；其筋骨尚脆，则针砭尤非易施；误用刀圭，便伤生理。此炼师陈君飞霞三折肱于斯道，有《幼幼集成》之作也。君少慕冲举，学道罗浮，龙虎功能，洞然有得于性命之际，乃瓢笠云游，借医药以济世。谓世之医小儿者，因前人以伤寒病症，称为惊风，讹谬相沿，无论外感内伤，遇发热者，率以惊风为名而妄用其法，致扎伤者多，心甚恫焉！乃取在昔幼科诸书，参互考订，按之临证之所心得，判其合离，析其同异，以搐字易惊字，概曰搐，将急惊、慢惊、慢脾三则，易为误搐、类搐、非搐，分门别类，详其审切之诀，附以经验之方，自胎孕乳哺及痘麻疮疡诸证，胥辨晰而条贯焉。将受梓，征叙于余。余循览之下，叹其宅心之良厚，而殚精之不辞其瘁也。君已疾，多奇效，有他医治之垂绝，君则曰可生，服其药，无不活。遇窭人疗之不受谢，有急需补剂者，或更以参术相资；意所不合，虽贵富人招之不可致。盖天真疏放，不随俗俯仰，故游情方外而有急病让夷之思也。是编也，本长生之妙道，作保赤之灵丹。其斯为明六度而除四魔，以自利利他乎；其斯为父天地而母神明，恫幼稚之颠连，而弘煦妪于吾胞乎！后之业幼科者，习于斯而有得，将千载榛芜，一朝尽辟，以治婴孩，自足以辨析毫芒，随机用巧而利赖靡涯矣。余既重君之行高而志厚，又信此书之足以行世而行远；而撰诸我夫子怀少之志，暨天子恤幼之仁，均有合焉。爰浣笔以叙其端。

礼部进士文林郎候选县尹龙泉梁玉撰

小　引

稽自三坟启秘，神圣迭兴，《本草》、《内经》，昭垂星日。盖圣人继天立极，位育为功，念天壤之间，阴阳代谢，运气推迁，至之先后，已无成规，应之早迟，靡有定律，其间六淫胜复，酿为灾眚。哀此苍黎，能无因是而夭扎者，此岐伯演十世之传，黄帝启九章之问，而有医氏之学也。伏读黄帝之谓岐伯曰：至哉，圣人之道，天地大化，非夫子孰能通之？请藏之灵兰之室，非斋戒不敢示。夫圣如轩皇，而于医事崇尚若此，岂非痌瘝一体，胞与为怀，欲登万世斯人于仁寿者欤！《素问》而下，如伊尹《汤液》、皇甫谧《甲乙》、秦越人《问难》、张仲景《金匮》、王叔和《脉经》、陶弘景《肘后》，此数公者，虽曰祖述《灵》、《素》，其实以作为述。自兹以往，医事寥寥，虽著作者代不乏人，求其无偏无陂，实难多观。惟明末李时珍、张景岳、喻嘉言递出，阐明《金匮》、发泄《内经》，扫芜秽而返清纯，有功于医事者不小。然数人虽产明代，而其书始盛行于康熙初年，大为世用。盖由圣天子临御，德孚中外，仁协万方。近纂《医宗金鉴》，遍周海宇，将见民无疵疠，物遂生成，故预产明良，以襄位育之功，非偶然矣。惟幼科一门，不无遗憾。虽嘉言微启其端，而其言未竟。予每读惊风之书，未尝不三叹而流涕也！于幼禀亏多病，于医家色脉之要顿，尝究心长际仙师，授金鼎火符性命之秘。嗣是遨游海岳，冀遇同俦，竹杖芒鞋，行踪几半。宅内凡绅衿士庶、名公巨卿，以及至贱至微者，盖尝随录而方便之。其临证救治之多，有非笔楮所能罄。第念惊风之说，在在讹传，莫获辞而正之，坐使无辜婴稚，枉受贻殃，前后相仍，迄无底止。兹将惊风之说，概为删订，而附以一得之愚，自禀于胎元，火功烁艾，以及杂证麻痘，汤火疮疡，无不周备，汇为六卷，计数十万言。书成付梓，颜曰《幼幼集成》。其中诊治权衡，一遵经旨，冈或偏枯，务期有当于理，无害予人而后已。非敢妄议前人，遂其一隅之见，第念保赤诚求，不中不远，此书不无万一之助，勿忍终默而息，不辞狂瞽，请政大方，岂曰井海瓮天，立言启后，亦聊体古圣仁民爱物之心，欲自效其负暄之悃云尔！

时维大清乾隆十五年岁次庚午孟春月罗浮陈复正飞霞氏书于涎阳之种杏草堂

凡　例

一幼科之书几于汗牛，其惊风之传，诚多谬误。喻嘉言、陈远公、程凤雏业已辟之，指出病痉，惜未申明病痉之由与治痉之法，仍无着落，不足服人，予兹彻底揭破，以伤寒病痉，杂病致搐，并竭绝脱证分为三则，以搐字概之：曰误搐、曰类搐、曰非搐。条分缕晰，证治判然，名目既正，庶治疗不惑。周虚中曰：开此三大法门，可济无穷夭扎。

一幼科论证，悉以阳有余，阴不足立说，乖误相承，流祸千古。后人误以婴儿为一团阳火，肆用寒凉，伤脾败胃。古初禀受敦庞，贻害犹浅。今非昔比，怯弱者众，古方今病，每多龃龉，是故聊为删订，非敢轻前人而执己见，盖亦因时制宜之用也。

一胎婴芽嫩之姿，乍离母腹，如水上沤、风前烛，防护稍疏，立见殇夭。而幼科所用毒劣之方，令其暗损真元，阴阳荣卫，即侥幸得生，而精神已耗，一生虚怯，莫可补救，况复不生者多。兹于劫夺之方，毒劣之味，概行删去，而易以反正逆从之治，无辜赤子，或可免含冤于九地。

一《颅囟》肇于东汉卫沈，而成于宋人钱仲阳、其能用仲景地黄汤治赋禀不足，以七味白术散治泻利作渴，岂不卓然有见。迨门人某隐其名，寿厚也，假托其名，辄用霸方劫夺，致人夭枉，遂致贻讥后世。兹为用其所长，去其所短，非敢好为节略，实所以成仲阳之初志。

一幼科惟从惊风摹拟，而伤寒门类全然遗弃。故学者但知有惊风，不知有伤寒，毫芒千里，害岂胜言！独程凤雏能见及此。兹并纂入，以备酌用。痘疹为幼科切要，诸家多不经意，或另立一门。学人以为源流各别，不复留心讨论，今并纂入，使知痘实幼科本有，不敢不经心体察。

一痘科之书，如冯氏、陈氏、聂氏、翟氏、万氏，虽皆不为无见，而实繁简不侔。又惟万氏明显，可以济急，惜原板毁于明末，康熙二年复梓者，则亥豕盈篇，鲁鱼过半，诗歌叶韵全亡，证论先后重复，识者鄙之，予甚惜焉。因为详悉删润，纂入以成全璧。

一火功为幼科第一要务，济急无捷于此。奈从前所传，悉犯关门逐盗之戒，不惟无济，而反有害。今以异授神火，绘图作歌，公诸同志，急迫之间，可以回春顷刻。

一治疗自有正方，其未尽者，复以经验简方并外治之法，附于方后，内有起死回生之诀，若能留心记览，随宜酌用，其利无穷。

一是书不但为知医者设，即不知医者，亦能用之，盖理路通畅，用方简切，并无幽渺难明之说。家置一册，可以对证调治，自利利人，不无小补。

一是书虽云编辑，而幼科家言，又未敢尽信以为确。其理明义畅，有裨实用者取之，浮泛不切者去之，间有未妥之处，即参以鄙见，并素所经验者成全之。故难分某段为何人之言，非敢掩人之功为己有也。盖幼科非方脉之比，以其病因疾苦，莫能告人，一匕下咽，死生立判，故不敢不为详慎。是书斟酌去取，颇为得宜。

一是书文义荒疏，由予幼时未尝学问，只以无辜夭扎，不忍坐视，所以忘其固陋，不禁率意言之。语虽不伦，理虚非诬，明者幸毋以是见薄，第原其忠爱之心而赐之规正，是亦茧菟之幸也。

复正再识

《幼幼集成》目录

卷一

赋禀 …… 1019
护胎 …… 1019
指纹析义 …… 1020
指纹切要 …… 1021
三关部位歌 …… 1022
浮沉分表里歌 …… 1022
红紫辨寒热歌 …… 1022
淡滞定虚实歌 …… 1022
纹形主病歌 …… 1023
小儿脉法 …… 1023
《内经》脉要 …… 1023
四脉主病 …… 1023
主证 …… 1023
总括脉要歌 …… 1024
脉证宜忌歌 …… 1024
保产论 …… 1024
难产七因 …… 1024
产要 …… 1024
附气脱案 …… 1026
集成三合保胎丸 …… 1028
三合保胎丸方 …… 1028
附方 …… 1029
初诞救护 …… 1031
调燮 …… 1032
脐风论症 …… 1032
用火口诀 …… 1033
集成神火图 …… 1034
集成神火歌 …… 1034
指明火穴 …… 1034
宜用火者 …… 1034
切忌火者 …… 1035
脐风火图 …… 1035
回生艾火 …… 1035
入方 …… 1036
脐证简便方 …… 1036
初生护持 …… 1036
勿轻服药 …… 1037
药饵之误 …… 1038
看病诀 …… 1038
寿夭辨 …… 1039
面部形色赋 …… 1039
一审颜色苗窍知表里之寒热虚实 …… 1041
简切辨证 …… 1042
五脏所属之证 …… 1042
变蒸辨 …… 1043

卷二

胎病论 …… 1044
入方 …… 1045
惊风辟妄 …… 1047
录诸家惊风论 …… 1048
辨明致妄之由 …… 1052
新立误搐类搐非搐分门别证 …… 1053
附血虚寒袭太阳病痉类 …… 1054
入方 …… 1055
暑证 …… 1056
入方 …… 1056
疟疾 …… 1056
入方 …… 1057
痢疾 …… 1057
入方 …… 1057
咳嗽 …… 1057
入方 …… 1057
丹毒 …… 1058
入方 …… 1058
疮痈 …… 1058
入方 …… 1058
痘疮 …… 1058

入方 …… 1059
附案 …… 1059
霍乱 …… 1059
入方 …… 1059
客忤 …… 1059
入方 …… 1060
中恶 …… 1060
入方 …… 1060
吐泻 …… 1061
入方 …… 1061
大惊卒恐 …… 1062
入方 …… 1062
附小儿时疫证治 …… 1062
入方 …… 1063
痫证 …… 1063
入方 …… 1064
幼科预宜修制应用丸丸粟 …… 1064
乳子伤寒证治 …… 1065
入方 …… 1065
小儿伤寒类治 …… 1066
伤寒总括五法 …… 1067
入方 …… 1067
伤风证治 …… 1070
入方 …… 1070
伤暑证治 …… 1071
入方 …… 1071
伤湿证治 …… 1072
入方 …… 1072
霍乱证治 …… 1073
入方 …… 1073
霍乱简便方 …… 1073
卷三
咳嗽证治 …… 1075
入方 …… 1075
百眸嗽论 …… 1077
附案 …… 1077
咳嗽简便方 …… 1078
哮喘证治 …… 1078
入方 …… 1079
哮喘简便方 …… 1079
诸痢证治 …… 1080
入方 …… 1080
各证加减法 …… 1080
入方 …… 1082
痢证简便方 …… 1082
呕吐证治 …… 1083
入方 …… 1084
呕吐简便方 …… 1084
泄泻证治 …… 1084
入方 …… 1085
泄泻简便方 …… 1085
伤食证治 …… 1086
入方 …… 1087
食积证治 …… 1088
入方 …… 1088
食积简便方 …… 1088
发热证治 …… 1089
入方 …… 1090
神奇外治法 …… 1090
治病端本澄源至要口诀 …… 1091
痢疾证治 …… 1091
入方 …… 1093
痢疾简便方 …… 1094
疟疾证治 …… 1095
入方 …… 1096
疟疾简便方 …… 1097
消渴证治 …… 1097
入方 …… 1097
消渴简便方 …… 1098
诸血证治 …… 1098
入方 …… 1099
诸血简便方 …… 1099
卷四
肿满证治 …… 1100
入方 …… 1100
水肿简便方 …… 1100
胀满证治 …… 1101
入方 …… 1102

腹胀简便方 …… 1102
黄疸证治 …… 1102
入方 …… 1103
黄疸简便方 …… 1103
腹痛证治 …… 1103
入方 …… 1104
腹痛简便方 …… 1104
癖积证治 …… 1105
入方 …… 1105
癖积简便方 …… 1105
虫痛证治 …… 1106
入方 …… 1106
下虫简便方 …… 1106
诸汗证治 …… 1106
入方 …… 1107
汗证简便方 …… 1107
疝气证治 …… 1107
入方 …… 1108
疝气简便方 …… 1108
啼哭证治 …… 1109
入方 …… 1109
夜啼证治 …… 1109
入方 …… 1109
夜啼简便方 …… 1109
二便证治 …… 1110
入方 …… 1110
二便不通简便方 …… 1110
小便不利证治 …… 1110
入方 …… 1111
小便简便方 …… 1111
大便证治 …… 1111
入方 …… 1111
头项囟证治 …… 1112
入方 …… 1112
头项简便方 …… 1112
目病证治 …… 1112
入方 …… 1113
眼目简便方 …… 1113
耳病证治 …… 1114
入方 …… 1114
耳病简便方 …… 1115
鼻病证治 …… 1115
入方 …… 1115
鼻病简便方 …… 1116
口疮证治 …… 1116
入方 …… 1116
口疮简便方 …… 1117
舌病证治 …… 1117
入方 …… 1117
舌病简便方 …… 1117
齿牙证治 …… 1118
入方 …… 1118
齿牙简便方 …… 1118
咽喉证治 …… 1118
入方 …… 1119
咽喉简便方 …… 1119
龟胸龟背 …… 1119
入方 …… 1120
鹤膝证治 …… 1120
入方 …… 1120
五软五硬 …… 1120
入方 …… 1120
丹毒证治 …… 1120
入方 …… 1121
十种丹证 …… 1121
水痘露丹 …… 1121
入方 …… 1121
破伤风证 …… 1122
入方 …… 1122
瘰疬瘿瘤 …… 1122
入方 …… 1122
诸疮证治 …… 1122
入方 …… 1123
瘰疬证治 …… 1123
杨梅疮证治 …… 1124
附案 …… 1124
疮疡杂方 …… 1124
汤火简便方 …… 1125

卷五　万氏痘麻

痘麻天元赋 …… 1127
痘疹西江月 …… 1128
痘有顺险逆并五善七恶之症 …… 1131
痘疹总略歌 …… 1131
入方…… 1132
发热证治歌 …… 1134
入方…… 1135
见形证治歌 …… 1137
入方…… 1139
起发证治歌 …… 1140
入方…… 1144

卷六

成实证治歌 …… 1149
入方…… 1151
收靥证治歌 …… 1153
入方…… 1154
落痂证治歌 …… 1155
入方…… 1156
痘后余毒证治歌 …… 1157
入方…… 1159
妇女痘疹证治歌 …… 1162
入方…… 1163
麻疹骨髓赋 …… 1164
麻痘西江月 …… 1165
麻疹证治歌 …… 1166
入方…… 1168

幼幼集成　卷一

清　罗浮　陈复正飞霞辑订
鄞县　曹赤电炳章圈校

赋　禀

夫人之生也，秉两大以成形，藉阴阳而赋命，是故头圆象天，足方象地，五行运于内，一曜明于外。乃至精神魂魄，知觉灵明，何者，非阴阳之造就，与气化相盛衰。然天地之气化有古今，斯赋禀由之分厚薄。上古元气浑庞，太和洋溢，八风正而寒暑调，六气匀而雨旸若，人情敦茂，物类昌明，当是之时，有情无情，悉归于厚，非物之厚，由气厚也；及开辟既久，人物繁植，发泄过伤，攘窃天元，雕残太朴，世风渐下，人性浇漓，故水旱有不时之扰，流灾有比户之侵，生物不蕃，民用目促。值此之际，有知无知咸归于薄，非物之薄，由气薄也。然则今之受气于父母者，其不能不薄也可知矣。况有膏粱异养，贵贱殊形，医术称仁，顾可视为不经之务。夫膏粱者，形乐气散，心荡神浮，口厌甘肥，身安华屋，颐养过厚，身质娇柔，而且珠翠盈前，娆妍列侍，纵熊罴之叶梦，难桂柏以参天。复有痴由贪起，利令智昏者；有雪案萤窗，剖心喷血者；有粟陈贯朽，握算持筹，不觉形衰气痿者；有志高命蹇，妄念钻营，以致心倦神疲者。凡此耗本伤元，胚胎之植，安保其深根固蒂也！乃若藜藿之家，形劳志一，愿足心安，守盖廉瓶仓，对荆钗裙布，乃其神志无伤，反得胎婴自固，以此较彼，得失判然矣。若夫怒伤元气，劳役形骸，迅雷烈风，严寒酷暑，日月薄蚀，病体初安，醉饱伤神，落红未净，胎孕之由斯愈薄，实又成于人所不觉者，故今之禀受，十有九虚，究其所因，多半率由于是。

业斯道者，当知气化厚薄，人事浇醇，因以察其胎元之受于父母者之盛衰坚脆，庶几近焉。若但以上古成方，而治今时薄弱，胶柱鼓瑟，究归无当，泥而不通，未可以言达于理也。

护　胎

《易》曰：天地氤氲，万物化醇；男女媾精，万物化生。盖天地生生之道，终古为然矣。《颅囟经》曰：成胎之后，一月为胞胎，精气凝也，二月为胎形，始成胚也，三月阳神为三魂，四月阴灵为七魄，五月应五行，分五脏也，六月应六律，定六腑也，七月精开窍通，光明也，八月元神具，降真灵也，九月宫室罗布，以御外侮，十月受气足，万象成也。此胎元长养，造化自然，非人力也。第妊母脏气护胎，仍若四时之有序：足厥阴肝、足少阳胆，属木旺春，养胎在一月二月；手心主包络、手少阳三焦，属火旺夏，养胎在三月四月；足太阴脾、足阳明胃，属土旺长夏，养胎在五月六月；手太阴肺、手阳明大肠，属金旺秋，养胎在七月八月；足少阴肾，属水旺冬，养胎在九月。至十月，儿气已足，待时而生。惟手少阴心，君主之官，神明之脏，虽不主月，而无月不在，其胎元长养，脏气护持，可谓至矣。而人事恣纵败坏，能保其冲任有恒乎？蓄德录曰：世人无不急于生子，要知生子之道，精气交媾，溶液成胎。故

少欲之人恒多子，且易育，气固而精凝也；多欲之人常艰子，且易夭，气泄而精薄也。譬之酿酒然，斗米下斗水，则酽醑且耐久，其质全也；斗米倍下水，则淡；三倍四倍则酒非酒，水非水矣，其真元少也。今人夜夜淫纵，精气妄泄，邪火上升，真阳愈惫，安能成胎？即侥幸生子，又安能必其有成！所以年少生子者，或多羸弱，欲勤而精薄也；老年生子者，反见强盛，欲少而精全也。且凡嗜于饮者，酒乱其性，精半非真，无非湿热。勤于欲者，孕后不节，盗泄母阴，耗其胎气，所谓恣纵败坏者，殆以是欤！然父天母地，古人尝言之矣。父主阳施，犹天雨露；母主阴受，若地资生。胎成之后，阳精之凝，尤仗阴气护养，故胎婴在腹，与母同呼吸、共安危，而母之饥饱劳逸、喜怒忧惊、食饮寒温、起居慎肆，莫不相为休戚。古人胎教，今实难言。但愿妊娠之母，能节饮食，适寒暑，戒嗔恚，寡嗜欲则善矣。此尤切于胞胎之急务，幸毋视为泛常而忽之。

指纹析义

幼科指纹，总无正论，且游移不定，莫可稽考。有谓不必用者，有用而至于怪诞不经，诬民惑世者，是皆未明纹中之理，所以有用不用之殊议。请以一得之愚，聊发其要。盖此指纹与寸关尺同一脉也。按《内经》十二经络始于手太阴即肺脉也，其支者从腕后出次指之端，而交于手阳明支者，即旁支也。从手腕后出食指之端，而交通荣卫于手阳明大肠之经，即此指纹是也。明如景岳，犹谓此纹为手阳明浮络，不知手太阴经起于中府，而终于大拇指之少商，手阳明经起于食指之商阳，两不相值。若无此旁支交通荣卫，不几令太阴、阳明表里断绝乎！况此脉可诊，人所不知，其迟数代促与太渊一毫无异，但脉体差小，由旁支也。指纹之法起于宋人钱仲阳，以食指分为三关：寅曰风关，卯曰气关，辰曰命关。其诀谓风轻、气重、命危，虽未必言其悉验，而其义可取。盖位则自下而上，邪则自浅而深，证则自轻而重，人皆可信。只恨复出诡异之说，谬撰惊风门类，致后贤多岐亡羊，反成疑案。予意仲阳宋之明人，以孝见称，岂肯为此误世。大抵后之俗子，假托其名而为之者。惟有识者知其语言鄙俚，论证荒唐，便能弃之不用，如张景岳、夏禹铸辈，皆谓可不必用，盖非不用，实恶其妄诞不经而无可用耳。近世医家不知真伪，不辨是非，习而行之，乃致惑世诬民，祸害婴幼。夫医事动关生命，乃听无稽之言，流传贻殃，是岂其可！予虽不敏，粗知经脉，每见幼科指纹之说，不胜发竖，欲为规正，恨非其人，知而不言，此心未慊，今幸余闲，请言其要。盖此指纹，即太渊脉之旁支也，则纹之变易，亦即太渊之变易，不必另立异说，眩人心目，但当以浮沉分表里，红紫辨寒热，淡滞定虚实，则用之不尽矣。倘舍此不图，妄执伪说以为是，临证不察病源，谬指为人惊、畜惊，诳惑愚昧，予恐盲人瞽马，终坠重渊，莫之能出也。

周虚中曰：指纹晰义之精，自仲阳以来，七百余年，无人道及。今读至此，如梦初觉，如醉初醒，足以快人神智，真千古特识也。

盖世人乍闻此言，未能深信，姑就其舛谬之传，撮其大要以正之。其略曰：指上辨青纹，认是四足惊，虎口脉青色，是猪犬马惊，黑色因水扑，赤色火人惊，紫色多成泻，黄即是雷惊。又曰：青惊白是疳，黄即困脾端，青色大小曲，人惊并四足云云。凡此等之言，断非钱氏所出，实齐东野语，正人君子所不屑挂于齿颊者，然不明指其非，人或以予言不实，今驳其最无理者，以博一笑。其曰：指上辨青纹，认是四足惊，虎口脉青色，是猪犬马惊，黑色因水扑，赤色火人惊，紫色多成泻，黄即是雷惊。是指纹之青黄赤黑，一皆惊之所致。然则小儿之赋禀厚薄，胎元寒热，以及内伤外感，杂证麻痘，数百之证

悉当以惊风称之，以惊风治之矣。不然，除去青黄赤黑之纹，又将何者辨其非惊风乎？谬误之传，莫此为最！既云黄即困脾端矣，是谓指纹黄色，脾土受伤，不足之证，又曰黄即是雷惊，似谓闻雷致惊，有余之候。假令小儿指纹见黄，不知此时应断为脾困乎，抑应断为雷惊乎？治之者，不知应治脾乎，应治其雷乎？或将合一为治乎？抑亦分晰其方乎？且脾困为虚，雷惊为实，治虚遽实，治实碍虚，兼治不能，分治不可，予亦莫知何所适从乎！至谓青色大小曲，人惊并四足。夫人与四足，灵蠢天渊，清浊冰炭，气化纯杂不侔，断无并列之理。今既曰人惊并四足矣，则是临证时，凡指纹青者，谓之人惊可也，即谓之四足惊亦可也，是人与四足竟可以通称，而四足与人不几同类耶！即以纹曲之大小别之，原其意必谓大曲为人惊，小曲为畜惊，又安知人惊不为小曲，畜惊不为大曲乎？何所据而确知其人惊之曲必应大，畜惊之曲必应小？设使大曲之中仍有小曲，小曲之旁兼见大曲，得无曰此人惊中之畜惊，畜惊中之人惊耶？无稽之谈，不堪寓目。再究其治疗，更无是处。若谓人惊畜惊总为一惊，不必论证，不须异治，则今之分大分小，指人指畜者，得无谵妄乎？若谓人惊畜惊各为一惊，未可同论，正不知人惊为何病？畜惊为何证？宜以何物治人惊？何物治四足惊？既有以上之惊名，应立以上之证治，何以并无一法，而徒设此无稽虚言以诳俗？在庸妄固不足责，而立言诸公，不之规正，反为编次于书，遗误后世，吾恐有目者，未必不为之眦裂也！

再曰青惊白是疳，青惊即已前诸说，不必琐赘，至于白是疳，诚为妄诞。夫疳证即方脉之虚劳，在幼稚谓之疳积，本脾肾两伤之候；久之，五脏俱损，中气败极，则面目肌肤俱见晃白，形如枯骨之象，故曰白是疳。此以形色言也，今以指纹当之，谬之甚矣。盖气血两伤，精神久亏之证，其纹必淡，凡虚证皆然，不特疳证已也。然只可言其色淡，不可谓之色白，盖指上从无白纹，予临证四十余载，未尝一遇。后人勿谓古人之言一定不易，必俟其指纹白色，始可称之为疳，若然，则疳证之儿无幸矣。故知按图索骥，终非解人。神而明之，始称匠手。指纹辨证，详列于左。

指纹切要

小儿自弥月而至于三岁，犹未可以诊切，非无脉可诊，盖诊之难而虚实不易定也。小儿每怯生人，初见不无啼叫，呼吸先乱，神志仓忙，而迟数大小已失本来之象矣，诊之何益？不若以指纹之可见者，与面色病候相印证，此亦医中望切两兼之意也。

令人抱儿对立于向光之处，以左手握儿食指，以我右手拇指推儿三关，察其形色，细心体认，亦惟辨其表里寒热虚实足之矣。世人好异，不从实地用功，以此为浅近之谈，不屑留意，不知临证能辨此六者，便为至高之手。盖表里清，则知病之在经在府，而汗下无误；寒热明，则知用寒远热，用热远寒，或寒因寒用，热因热用，因事制宜，用无不当；虚实辨，则知大虚有盛候，大实有羸状，不为假证眩惑，凡真虚真实易知，假虚假实难辨，真假既明，则无虚虚实实之患。于此切要关头，不知体会，但以不经之言欺世诳俗，谓何者为人惊，何者为畜惊，不特欺人，而且自欺，不特无益治疗，而且误人生命，是谁之咎哉？



指纹三关图

三关部位歌 部位未可以定轻重安危，由古有三关之说，姑存之耳

初起风关证未央，气关纹现急须防。乍临命位诚危急，射甲通关病势彰。

纹见风关，为病邪初入之象，证尚轻微，体亦未困，治之甚易；纹现气关，邪气正盛，病已沉重，治之宜速。倘三关通度，纹出命关，则邪气弥漫，充塞经络，为至重之候；设透关射甲，则邪气无所容，高而不能降，为亢龙有悔之象，治之者切宜留心，慎毋轻视。

浮沉分表里歌

指纹何故乍然浮，邪在皮肤未足愁。腠理不通名表证，急行疏解汗之投。

此纹与太渊脉相通，凡有外邪，太渊脉浮，此纹亦浮。盖邪在皮毛腠理之间，故指纹亦显露于外，谓之表证。速宜疏散，启其皮毛，开其腠理，使邪随微汗而解，一匕成功，何嫌而不投哉？

忽尔关纹渐渐沉，已知入里病方深。莫将风药轻相试，须向阳明里证寻。

指纹见沉，知邪入里，但有浅深之别。若往来寒热，指纹半沉，尚在阳明胃经，治宜解肌；若外证壮热不已，指纹极沉，已入阳明胃府，速宜攻下。庸妄见其身热，犹以风药治之。盖病在内，治其外，非其治也。不特病邪不服，适足以燥其阴血，愈增其困耳。

红紫辨寒热歌

身安定见红黄色，红艳多从寒里得。淡红隐隐本虚寒，莫待深红化为热。

神气恬宁，荣卫静谧，定见太平景象。盖黄为中和之气，红为文明之色，红黄隐隐，景物熙熙，焉有不安之理！寒邪初入皮毛，经络乍滞，所以纹见红鲜，由血滞也，无论内寒外寒，初病久病，一见此纹，总皆寒证。凡人中气怯弱，荣卫不充，纹色必淡，淡而兼红，虚寒之应。至谓深红化热，其理安在？红本寒因，岂能化热？由其寒闭皮毛，腠理不通。盖人身内脏之气，时与皮毛之气相通贯，无一息之暂停。今寒闭汗孔，内出之气无所泄，郁于皮毛之间，渐积渐厚而化为热矣。此内出之气为热，非外受之寒能变热也。

关纹见紫热之征，青色为风古所称。伤食紫青痰气逆，三关青黑祸难胜。

荣行脉中，卫行脉外。热壅经络，阻其阴荣之道，所以纹紫。紫为热炽，千古定评也。少阳甲木，其色本青，肝胆受邪，纹见青色，此伤风候也，但可以风热称之，不可称惊风以误世，夫青者木之色，《内经》有在天为风，在地为木之言，所以风木同气。肝受风邪纹必见青，此理最明最显。而幼科偏不言青为风，偏言青为惊。据幼科所论，惊出于心，然青非心之色，何以青为惊乎？此等牵强之说，最为谬误。予有惊风辟妄，详列二卷。紫而兼青，食伤之候。盖食饮有形之物，阻抑中焦，壅遏脾气，不能宣布，故风木乘其困而侮之，所以痰气上逆也。疏通壅滞，令其流利可也。倘抑郁既久，脾气愈不运，荣卫愈见涩，则风痰实热，固结中焦，所以青而兼黑，此抑郁之至也，急宜攻下，庶有生机，误认惊风，百无一救。

淡滞定虚实歌

指纹淡淡亦堪惊，总为先天赋禀轻。脾胃本虚中气弱，切防攻伐损胎婴。

小儿禀受阳虚，肌肤㿠白，唇舌淡色者，指纹四时皆淡，虽有病亦止淡红淡青淡紫而已。盖淡红虚寒，淡青虚风，淡紫虚热。此等之儿根本不坚，中气怯弱，无论新病久病，总归于虚，一毫攻伐，不敢轻用，倘误投克削，覆水难收，悔之迟矣。

关纹涩滞甚因由，邪遏阴荣卫气留。食郁中焦风热炽，不行推荡更何求？

病邪阻郁荣卫，运行迟滞，升降羁留，所以指纹推之转涩，全无活泼流利之象。由食饮风热相搏，是为实证，急宜推荡，去其菀

莹，其愈亦易。若三关纯黑，推之不动、死证也，不治。

纹形主病歌

腹痛纹入掌中心，弯内风寒次第侵。纹向外弯痰食热，水形脾肺两伤阴。

掌心包络所主，纹入掌中，邪侵内脏、由中气寒也，故为腹痛。纹若弯弓，内外有别：其纹之两头弯向中指为内，为顺证，为外感风寒，治之犹易；其纹弯向大指为外，为逆证，为内伤饮食、治之稍难。形如"水"字，脾肺不足，食塞太阴，中气怯弱，脾不运化故也。或问指纹惟止一线，安能如水字之形？曰：不观太渊之脉，亦止一线，何以阳维、阴维、阳跷、阴跷，皆左右弹石，岂非小字之形乎？脉有左右，安知纹无左右？但能触类旁通，无往非理，岂特指纹为然哉！

凡看指纹，以我之大拇指侧面，推儿食指三关，切不可覆指面推。盖螺纹有火，克制肺金，纹必变色。又只可从命关推上风关，切不可从风关推出命关。此纹愈推愈出，其纹在先，原未透关，今误推而出之，大损肺气，慎之戒之！

以上表里寒热虚实，凿凿有据，但能于临证时，认得此六字分明，胸中自有主宰，虽不中，不远矣。若但以惊证塞责，何难应对，第晨盥自问，未免怀惭。凡我同人，互为砥砺，幸矣！

小儿脉法

小儿三五岁，可以诊视，第手腕短促，三部莫分，惟以一指候之，诚非易易。《内经》诊视小儿，以大小缓急四脉为准。予不避僭越，体其意，竟易为浮沉迟数，而以有力无力定其虚实，似比大小缓急，更为明悉。后贤其体认之。

《内经》脉要

黄帝曰：乳子而病热，脉悬小者何如？夫乳子病热，脉见悬小者，阳证见阴脉，本为大忌，但小而缓者，邪之微，其愈易；小而急者，邪之甚，为可虑。故以为问。岐伯曰：手足温则生，寒则死。夫小儿以稚阳之体而加病热，脉不当小。若脉体虽小，手足温者，以四肢为诸阳之本，阳犹在也；若四肢寒冷者，则邪胜其正，元阳去矣，故曰死也。

帝曰：乳子中风热，喘鸣肩息者，脉何如？岐伯曰：喘鸣肩息者，脉实大也，缓则生，急则死。此言小儿之外感也。风热中于阳分，而喘鸣肩息者，脉当实大。但大而缓，则胃气存，邪渐退，故生；实而急，则真脏见，病日进，故死也。此《内经》之旨。圣人立言简切，而总括无余。世人不悟，视为泛常，能于此等处着眼，则诊视之要，思过半矣。予之临证诊视，每论吉凶而多中者，亦不外此，第意之所至，口莫能宣。窃详经所谓大小缓急者，亦发而不露之意。盖大即浮洪类也，小即沉细类也，急即数也，缓即迟也，何若竟易以浮沉迟数之为得乎？再以节庵之有力无力，辨其表里虚实，诚诊视小儿天然不易之妙诀。夫节庵亦一常人，而能以有力无力，辨其阴阳表里、寒热虚实，虽至显浅、至平易，却至确当，孰谓古今人不相及耶！

四脉主病

浮脉主表病在外，沉脉主里病在内；迟脉主脏病为寒，数脉主腑病为热。

五至四至为迟、为寒、为不足浮迟外寒，沉迟内寒，有力实寒，无力虚寒；

七至八至为数、为热、为太过浮数表热，沉数里热，有力实热，无力虚热。

主　证

浮而有力风热，无力阴虚；沉而有力痰

食，无力气滞；迟而有力为痛，无力虚寒；数而有力实热，无力疮疡。

总括脉要歌

太渊一指定安危，六至中和五至亏。七八热多三四冷，浮沉迟数贵详推。有力为阳为实热，虚寒无力里何疑。若能留意于中取，何致亡羊泣途岐。

浮而有力实兼风风热皆阳，表之实也，无力阴虚汗雨蒙阴荣妄泄，表之虚也。有力而沉痰食害痰凝食滞，结于里也，沉沉无力气凝胸气滞于中，不运化也。迟而有力多为痛浮迟外痛，沉迟内痛，无力虚寒气血穷气弱血衰，至虚之候。数脉热多终有力数而有力，实热何疑，疮痍无力热虚攻阴血受伤，虚热所致。

脉证宜忌歌

脉浮身热汗之松阳邪居表，应从汗解，沉细身凉莫强攻无论表里，不堪攻伐。咳嗽正嫌浮带数浮缓为宜，浮数大忌，细沉肿胀定知凶脾胃虚寒，愈不运化。沉迟下痢方为吉气血俱伤，最嫌洪数，洪大偏宜痘疹逢阴阳充足，毒不能留。腹痛不堪浮有力三阴受病，浮则反常，浮洪吐衄总无功阳火太盛，阴血愈伤。

陶节庵曰：诊脉之要，无论浮沉迟数，但于有力无力中分。有力者为阳、为实、为热；无力者为阴、为虚、为寒。至哉斯言也，后贤无忽！

保产论

生产一道，天地自然之理，不待勉强而无难者也。然今之世，往往以难产闻者，得无以人事之失，而损其天耶？保产之术，可不详乎？世风不古，胎教久废，为母者既不能保于平时，而徒临产措置，犹觉其迟。谨将难产之由，详列于左，庶知预为调摄也。

难产七因

一因安逸。盖妇人怀胎，血以养之，气以护之，宜常时微劳，令气血周流，胞胎活动。如久坐久卧，以致气不运行，血不流顺，胎亦沉滞不活动，故令难产。常见田野劳苦之妇，忽然途中腹痛，立便生产可知。

二因奉养。盖胎之肥瘦，气通于母，母之所嗜，胎之所养。如恣食厚味，不知减节，故致胎肥而难产。常见藜藿之家，容易生产可知。

三因淫欲。古者妇人怀孕，即居侧室，与夫异寝，以淫欲最所当禁。盖胎在胞中，全赖气血育养，静则神藏，若情欲一动，火扰于中，血气沸腾。三月已前犯之，则易动胎小产；三月已后犯之，一则胞衣太厚而难产，一则胎元漏泄，子多肥白而不寿。且不观诸物乎？人与物均禀血气以生，然人之生子，不能胎胎顺，个个存；而牛马犬豕，胎胎俱易，个个无损。何也？盖牛马犬豕一受胎后，则牝牡绝不相交，而人受孕不能禁绝，矧有纵而无度者乎！

四因忧疑。今人求子之心虽切，保胎之计甚疏，或问卜祷神，或闻适有产变者，常怀忧惧，心悬意怯，因之产亦艰难。

五因软怯。如少妇初产，神气怯弱，子户未舒，更腰曲不伸，辗转倾侧，儿不得出；又中年妇人，生育既多，气虚血少，产亦艰难。

六因仓皇。有等愚蠢稳婆，不审正产、弄产，但见腹痛，遽令努力。产妇无主，只得听从，以致横生倒生，子母不保。

七因虚乏。孕妇当产时，儿未欲生，用力太早；及儿欲出，母力已乏，令儿停住。因而产户干涩，产亦艰难，惟大补气血助之可也。

产要

产妇临盆，必须听其自然，勿宜催逼，安

其神志，勿使惊慌，直待瓜熟蒂圆，自当落矣。所以凡用稳婆，必择老成忠厚者，预先嘱之，及至临盆，务令从容镇静，不得用法催逼。尝见有稳婆忙冗性急者，恐顾此失彼，强勉试汤，分之掐之，逼之使下，多致头身未顺，而手足先出，或横或倒，为害不小。故未有紧阵，不可令其动，切记紧。尝见奸诡之妇，故为哼讶之声，或轻事报重，以显己能，以图酬谢，因致产妇惊疑，害尤非细，极当慎也。

一孕妇将产，不可占卜问神。如巫觋之徒哄吓谋利，妄言吉凶，产妇闻之，倍生疑惧，因令气血结滞，多致难产，所宜戒也。

怀孕六七个月，或八九个月，偶略曲身，胎忽乱动，三二日间或痛或止，或有水下，惟腰不甚痛，胎未离经，名曰弄产。又有临产一月前，忽然腰痛，却又不产，此是转胞，名曰试月。胎水有无俱不妨，但宜直身坐卧行立，自然无事。又有伸手高处取物，忽然子鸣腹中，但令鞠躬，片时即安。

临产阵痛，有二三日，有五七日者，原非正产，惊动太早，子未出胞，非难产也。但听其坐卧任意，不得扶坐努力，而令其忧疑气馁，惟劝其饮食，以药饵滋补之。

临产有七候：脐腹急痛；腰间重坠；眼中出火；粪门迸急；产户肿满；手中指筋脉跳动；胞水或血俱下。方是子出胞时，始可用力。如数证未备，即一二日，切不可使其努挣。又有胞水以下，儿头已至产门，三四日仍不下者，因母气先馁。此时惟人参为专攻，力不能者，大剂八珍汤，补其元气，调其饮食，时至自生。

临产时饮食减少，最为可虑，即宜以独参汤常服，不可使其精力衰乏。若交骨不开，由气衰不能运达，宜十全大补助之自开，加味归芎汤亦可。

临产时惊动太早，血先下而胎元干涸，僵死腹中，不必惊惶。惟令产母上床稳卧，切勿用力努挣，徒伤神气，第宜勉进饮食，勿令气乏。予治极多，十可全十。惟以脱花煎加芒硝三五钱，水煎热服，其胎化水而下矣。古方以平胃散加芒硝，下死胎、下胞衣，功虽最捷，而暗中有损。予见数人用此者，胞胎虽下，而产妇过一二年皆夭，无一免者。大都平胃散克伐胃气，而芒硝咸寒伤血，所以脏腑暗中受损。今易用脱花煎，药味甘温，而归、芎生血活血，肉桂暖血，更加附子一二钱，虽芒硝之寒，不能为害矣。此等之事，非临证久者，莫知其弊也。予尝治一少妇，年二十四，原系初产，总由慌忙急促，产不如法，乃至久不能下，延予至而胎已死矣。问产妇腹内动否？曰不动，小腹阴冷。知其胎死无疑，欲用前药，虑其初产，门户未舒，因与主家商酌，肯听予言，则万无一失。今死胎僵硬，以药下之，恐交骨未开，必损其母，莫若以十全大补倍参、桂，一以扶产母精力，二可以暖其下元，使胎自烂，始能保全无恙。主家以予言为是，依此行之，以十全大补倍参、桂，服一剂后，腹中温暖，不痛不急。予曰得之矣，所虑者腹痛作坠，今不痛不坠，可以耐之。更幸产妇年力本强，脾胃素健，每食干饭三盂，肥鸡半只，予见更喜，以其中气不衰，自堪承任。仍每日如是调理，至五日而死胎自下，糜烂臭秽不堪，产母精神如旧，毫无伤损。可见死胎不忙不乱，尚能保全，况生胎乎！第人不肯安静，必欲强为，奈之何哉！

产时子有出户之势，转身差缓，母力一逼，或手或足，或横或倒；又有生路未顺，儿头偏拄左右腿畔，名曰偏产；又有儿头偏拄谷道，名曰枕后。此等数证，稳婆精巧者，则不须服药。若稳婆无用者，急扶产母上床，正身仰卧，厚被覆之，令老成稳婆徐徐往上推之，内服补中益气汤升提之，须臾提上，重新转身，儿头已对产门，急扶即下。

产时门户俱正，儿已露顶而不下，此转身时脐带绊其肩也。扶母正身仰卧，轻轻推儿向上，以手指轻按儿肩，去其脐带，然后

用力送下。

胎衣来迟，气虚弱也，急服脱花煎。若血流入衣中，胀闷疼痛，脱花煎加芒硝下之。或有能事稳婆，以手循脐带而上，以中指顶其衣，轻覆衣中之血，从容候之亦下。此良法也。

产时用力太早，水衣先破，被风所吹，产户肿胀、干涩、狭小者，以紫苏煎汤熏洗，以香油和蜜润之，从容俟之，无不下者。

产时肠先出，用净盆盛温水，少入香油养润，待儿与胞衣下时，母略仰卧，自己吸气上升，稳婆以香油涂手，徐徐送入，或浓煎黄芪汤浸之，内服补中益气汤即上。又有儿并胞衣下后，膀胱坠出产户者，用前法送入，仍服补中益气汤。若稳婆不谨，膀胱扯破者，八珍汤加猪脬为引，服之可复。

产毕产门不闭，血气大虚，十全大补汤。若因胎大而擦伤产门者，蕲艾、益母草煎汤洗之。

产时胞胎既下，气血俱去，忽尔眼黑头眩，神昏口禁，昏不知人。古人多云恶露乘虚上攻，故致血晕。不知此证有二：一曰血晕，一曰气脱。若以气脱作血晕，而用辛香逐血化痰之剂，则立刻毙矣。不可不慎。

气脱证，产时血既大下，则血去气亦去，故昏晕不省。微虚者，少刻即苏；大虚者，竭脱即死。但察其面目，如眼闭口开，手撒手冷，六脉微细之甚，或浮而散乱，此即气脱证也。速用人参，多则五七钱，少则三二钱，加人炒米、煨姜、红枣，煎汤徐徐灌之，但得下咽，即可救活，若少迟延，则无及矣。无力备参者，以大剂当归补血汤加炒米、煨姜、红枣，煎汤灌下，亦能救。

附：气脱案

州左遂阳云轩高君夫人梁氏，膏粱之禀，其质最怯，产育亦多，戊午分娩，未见过艰，产下精神犹健。云翁不以为意，与予闲话中庭。殊因一时下血过多，忽报倒仆于地。急视之，则口张手撒，面唇俱黑，呼吸已寂然矣。幸人参有便，煎之不及，即以一枝碎嚼，纳产妇口中，以滚汤灌之，方得下咽，一吐倾囊而出，盖胃气已不纳受矣。又嚼又灌，连嚼五枝，虽吐而未尽出。良久，暖气一声而呼吸渐回，乃大进参术而愈。自后分娩，不复为难。客岁复妊，偶患微痔。予曰：孕中患痔，难于用药，姑缓图之。云翁深以为是，而夫人必欲速愈。予知其不可，不敢承任，劝其更医。连易数手，分毫无效，复延外科，妄用毒劣，胎虽未堕，而疮愈坠而不收，以致昼夜呼号，窘迫万状，精神形质，困惫已极。及至临月，见其面唇皖白，声息至微，六脉空浮而无根。当夜用参三钱，服十全大补一剂，次早胞水以下，煎参七钱，以鸡汤冲服，登时即产一男，产妇精神胜旧。不意三朝偶沾外感，头疼身痛，恶寒发热，投以熟料五积散而愈。未数日，忽因恼怒，陡然上气喘急，咳嗽连声，胸前胀痛，喉内痰鸣，水米不入，略啜茶汤，则上下阻截，气不相续，数人扶坐，莫能伏枕，不时昏绝。举室惶惶。因诊其脉，则细数无伦，将近十至，予知为无根，脱气上冲，乃以八味地黄汤冀纳其气，二剂毫不为动。予曰：此等之证，非大补真元，莫能挽也。乃以六味回阳饮，参、附、桂、姜、归、地各三钱，加鹿茸五钱，一剂下咽，而气平能卧，四剂全安。衰之大脏干枯，业已滋润，而痔疮痛苦，亦不复言矣。此等脉证，在常俗之辈，必疑临产服参过多，非用宽胸下气不可。清降一投，下咽即毙，仍归罪于从前之参，必群起而攻之矣。不知临产之口，非猛进参术，则已脱于当产之际，何能至今！今之气喘，实由参力已过，虚证复现，子午不交，竭绝立至，非大力之方，安可挽回！此证得生，实由云翁学识超迈，胸中有主，惟予言是听，所以效捷桴鼓。稍循俗见者，万无生理矣。

凡闭脱二证，不特产后宜辨，即中风中痰，气厥暑风，及卒然倒仆，昏晕不省，咸

宜辨之。如牙关紧闭，两手握拳，谓之闭证，有余之候，即疏风化痰亦可用之；如口张、手撒、眼闭、遗尿、鼾声，谓之脱证，盖口张心绝，手撒脾绝，眼闭肝绝，遗尿肾绝，鼾声肺绝，皆元气竭绝之候，惟大进参、附，或可十中救一。

予见产后脱证，不敢服参而毙者，不知其几？尝闻人曰，某产后无病，忽尔眼暗，一晕而绝者；又某产后忽一呵欠，即张口气绝者，即此脱证是也。复有妄人，不知脱证为何事，不识人参为何物，而从中阻挠，不令服参而毙者，亦不知凡几！死者有知，能无抱九京之恸乎！

血晕证，本由气虚，一时昏晕，然血壅痰盛者，亦或有之。如果形气脉气俱有余，胸腹胀痛气粗、外证两手握拳，牙关紧闭，此血逆证也，黑神散；无胀无痛者，属气虚，大剂芎归汤加肉桂。

卒然晕倒，药有未及者，烧红秤锤，用瓦盆盛至床前，以醋沃之，令醋气人鼻，收神即醒。

产后百脉空虚，洗拭太早，令中风口噤，手足搐搦，角弓反张；或因怒气，发热迷闷。用荆芥穗酒炒至黑，大当归各三钱，用水半杯、酒半杯、童便半杯，煎至一杯，灌之，牙关紧，以簪抉开灌之，仍捻其鼻，以手摩其喉，使得下喉即活矣。此即产后病痉，而幼科称为惊风者是也。

孕时触损脏气，胞系断裂，忽然胎坠，名曰小产。亏败子宫，较大产为尤甚，然治此亦不同大产，惟以滋补为上计。

冯楚瞻曰：小产不可轻视，将养宜十倍子正产，大产如果熟自脱，小产如生探之，破其皮壳，断其根蒂也。忽略成病者不少，因而致死者恒多。然此证始因敛血以成胎，继因精血以长养，终因精血不足而屡堕，故瘀血甚少，倘有腹痛，成块有形，多属血虚气逆，惟大用温补，则新者生而瘀者去；若行消导破滞，则逆气愈攻而愈升，多致不救。更有血虚腹痛，复有阴亏不能纳气，以致瘕疝为患者，当以八味地黄丸加牛膝、五味，早晚服之自愈。

张景岳曰：凡小产有远近，其在二三月者谓之近，五月六月谓之远，新受而产者其势轻，怀久而产者其势重。此皆人之所知也。至若尤有近者，则随孕随产矣。凡今艰嗣之家，犯此者十居五六。其为故也，总由纵欲而然，第自来人所不知，亦所不信。兹谨以笔代灯，为迷者指程，倘济后人，实深愿也，请详言之。盖胎元始肇，一月如露珠，二月如桃花，三月四月而后，血脉形体具，五月六月而后，筋骨毛发生，方其初受，不过一滴之玄津耳。此其橐籥正无依，根荄尚无地，筑之则固，决之则流，故凡受胎之后，极宜节欲以防泛溢。而少年纵情，罔知忌惮，虽胎固欲轻者，保全亦多。其有兼人之勇者，或持强而不败、或既败而复战，当此时也，主方欲静，客不肯休，狂徒敲门撞户，顾彼水性热肠，有不启扉而从，随流而逝者乎！斯时也，落花与粉蝶齐飞，水枣共交梨并逸，合污同流，已莫知其昨日孕而今日产矣，朔日孕而望日产矣，随孕随产，本无形迹。在明产者，胎已成形，小产必觉；暗产者，胎仍似水，直溜何知，故凡今之衙衍家多无大产，以小产之多也。娶娼妓者多少子息，以其子宫滑，而惯于小产也。又尝见艰嗣之人而求方者，问其阳事，则曰能战，问其功夫，则曰尽通，问其意况，则怨叹曰人皆有子，我独无。亦岂知人之明产，而尔之暗产耶！此外，如受胎三月五月，而每有堕者，虽衰薄之妇常有之，然必由纵欲不节，至伤母气而堕者，为尤多也。故凡恃强过勇者，多无子，以强弱之自相残也；纵肆不节者，多不育，以盗损胎元之气也，岂悉由妇人之罪哉！

此景岳见道之言。古人每曰寡欲多男，此即其注脚也。世人每恨不孕，孰知既受而暗损之，屡受而屡损之，终身无子，不亦宜乎！第有妇人由于衰弱，或阴阳偏胜，堕胎至于

数次，而医者竟无一策以保固之，亦可哀矣！予有至神至圣保孕之方，屡经效验，但信而行之，断不相误。

集成三合保胎丸

此为素惯堕胎者设也。盖胎孕之屡堕，虽由于冲任亏、脾肾弱，若德性幽闲，内脏无火者，决不堕也；能清心节欲，起居有恒者，决不堕也。凡屡堕者，皆偏陂之性，暴怒之人，以致于肝气有余，肝血不足，血虚生热，火烁子宫；又或恣纵不节，其胎必漏而堕矣。而世之安胎者，无非执泥古法，以香、砂、芎、艾为保孕良图，不知热药安胎，犹抱薪救火，不惟无济，而反速之。予甚不慊，因以古之内补丸、杜仲丸、白术散三方合凑，名三合保胎丸。以条芩清肝火而凉血，白术扶中气以健脾，当归养血宁心，熟地滋阴补肾，续断填损伤而坚胞系，杜仲益腰膝而暖子宫。至怯者加以人参，力不能者，不用亦可。药虽平易，功胜神丹，诚所谓钺斧相投，捷如影响，凡屡堕者服之，无不保全，实亦妇科保孕安胎之圣药也。再有叮咛，凡屡堕者，受娠一月，即制此丸服之。盖堕胎必在三月五月七月之间，此三月内切忌房劳、恼怒，犯之必堕，七月已过，万无一失。

三合保胎丸方

大怀地一十二两，用砂仁三两、老姜三两，同地黄入砂锅内，先以清水煮两昼夜，俟地黄将烂，始入好酒煮之，总以地黄糜烂为度，将酒煮干，取起，拣去砂仁、姜滓不用，将地黄捣膏听用　大当归去头尾，取身切片，一十二两，以好酒洗过，晒干听用　漂白术取净干片，一十二两，以黄土研碎，拌炒极黄，取起，筛去土。孕妇肥白者气虚，加二两　实条芩枯飘者不用，取小实者，切片，六两，酒炒三次。孕妇黑瘦者加一两，性躁者二两　棉杜仲切片，一十二两，盐水拌炒，以丝断为度　川续断切片，一十二两，酒炒

上将后五味和为一处，火焙干燥，磨为细末，筛过，以前地黄膏和匀，少加炼蜜，入石臼内捣千余杵，为丸绿豆大。每早盐汤送三钱，晚临卧酒送三钱，每日如此，不可间断。孕妇素怯者，须两料方可，自一月服起，过七个月方保无虞。此方至神至圣，幸勿轻视。

凡临产时，亟斋有六字真言：一曰睡，二曰忍痛，三曰慢临盆。予复有三字宝，曰未离经。较六字真言，更为亲切。盖六字真言出于常人之口，产妇未能深信；三字宝为医者之言，不容不信，诚保产金丹，回生上药。予以此法救人，莫可胜纪。凡临产家诊视，无论脉之滑涩，痛之紧缓，但曰未离经。仍嘱产妇曰，脉未离经，尚非正产，且脉气舒徐，定然安吉，惟宜加食稳卧，俟其时至可也。此何意？盖产育全赖母气为主，产妇闻其脉未离经，知时未到，不敢望其速下，惟安心耐之而已。产妇一安，举室皆安，庶无仓皇扰攘之患。天下原无难产之事，凡难产而致死者，总由时候未至，仓皇逼迫害之也。始则家长惊张，不能镇定，继则产妇娇怯，不肯忍痛，或弄产，或转胞，稍有腹痛，随即声扬，无知稳婆，便称是产，而试水坐草，一任胡为。岂知七候未临，胎气未足，子在胞中，安然不动，欲令其产，焉可得乎？因其久而不下，产妇则惊惧忧疑，饮食不纳，渐至气怯神昏，常有未产而毙者矣。予临是证，但曰未离经，惟以大剂甘温之药与之，如八珍、十全之类，助其产母之元气。若为正产，则腹痛阵紧一阵，痛急自下；倘非正产，则腹痛渐减渐缓，胎元得暖而安矣。予之所经，稳婆谓头已平门，予诊得脉未离经，用固胎暖药而安之，有迟至一月半月十日而产者，已经十数人矣。岂有头已平门，而能倒悬一月半月之理？即此可知稳婆之不足信。不观亟斋言曰：凡邪淫之妇，私胎并无难产，总因胎起于私，怕人知觉，只得极力忍痛，痛到极熟之时，则脱然而出。此岂有稳婆分掐，妙药催生乎？凡产育能耐心忍痛，听其自然，则万举万全；若谓药能催生，予则未敢许也。至

催生之法，谓产时胞浆以下，一二时辰不生，方可用之。盖浆乃养儿之物，浆干不产，必胎元无力，愈迟则愈干，力必愈乏，不得不以大补气血之药助其母力。又惟人参为至圣，其次则脱花煎、芎归汤皆可。然亦须子已出胞，交骨既开，门户已正，方为有益，若止凭产妇腹痛之言，稳婆头至之说，妄用催生方药，不惟无济，反速其毙，慎之戒之！

附　方

十全大补汤

拣人参　炒白术　白茯苓　怀熟地　当归身　正川芎　杭白芍　炙黄芪　上肉桂　炙甘草

生姜、红枣为引。

八珍汤

拣人参　炒白术　白茯苓　大当归　正川芎　白芍药　怀熟地

生姜、大枣为引。

加味芎归汤　治新产交骨不开。

全当归　正川芎　油发灰　败龟板炙

水煎热服。

周虚中曰：阳主开而阴主阖，自然之理也。今交骨不开，阴极矣。必加肉桂以宣布阳和，庶为有济，若龟板、发灰之纯阴，仅可为通任脉之响导耳。

脱花煎　凡生产临盆，此方最佳。并治产难，经日不下，并死胎、胞衣不下俱妙。

全当归一钱　正川芎三钱　上青桂二钱　淮牛膝二钱　净车前一钱五分

水煎，加酒对服。若胎死不下，及胞衣不来，并加芒硝五钱；气虚困剧者，加人参二三钱，更加附子二钱，无不下者。此方比平胃散加芒硝，功胜百倍，其药味甘温，不伤元气故也。

补中益气汤

拣人参　炒白术　炙黄芪　黑升麻　北柴胡　全当归　广陈皮　炙甘草

生姜、大枣引。

当归补血汤　治产时去血过多，心内征忡，头晕眼黑，昏沉不醒。

炙黄芪一两　当归身五钱　加炒米一两　生姜五片　大枣五枚

水煎服。

黑神散　治产后血晕，胸腹胀痛，气粗，牙关紧闭，两手握拳，血逆之证。

上青桂　全当归　杭白芍　黑炮姜　怀熟地　大黑豆炒，五钱

水煎，酒对服。

生化汤　此方去旧生新。凡产后无论有病无病，能服数剂，使恶露尽去，新血速生，诚产后之要药也。世俗每以红糖下瘀，反致损胃，戒之！

大归身五钱　正川芎二钱五分　光桃仁二十一粒　黑炮姜一钱　炙甘草一钱

每日一剂，水煎热服，四五剂为度。

清魂散　治产后瘀血攻心，数日神昏不醒，瘀化为脓，流出臭秽而不知者，神效。

白当归二钱　正川芎二钱　鲜泽兰三钱　荆芥穗一钱　益母草二钱　拣人参一钱　炙甘草五分

生姜、大枣，水煎服。

加味芎归汤　催生及产后最为稳当，功亦巨。

当归身二两　大川芎五钱　上青桂一钱

催生俱用此三味，水煎，对酒服，立下。预防血晕，以本方加酒炒荆芥二钱，先将此药煎好，俟胞衣以下，随即服之，断无血晕之患。效经千百，断不误人。

八味地黄汤　产后气浮喘促，不甚虚者，以此纳气归元。至虚者不能。

怀熟地五钱　正怀山四钱　净枣皮三钱　白茯苓三钱　宣泽泻一钱　粉丹皮一钱　川附片二钱　上青桂二钱

水煎极浓，空心服。

六味回阳饮　凡真元已败，气血既亡，阴阳将脱，非此莫能挽回，诚回天赞化第一之

功。此景岳新方，知者尚少。

大熟地五钱　大当归三钱　黑炮姜二钱　熟附子一钱　青化桂二钱　上拣参三五钱

加鹿茸数钱功更捷。生姜、大枣为引，水煎温服。此方不刚不猛，能回散失之元阳，能敛乱离之阴血，济急扶倾，无出其右者。

催生简便方

人能镇定耐痛待时，必无难产之患。或因仓皇急迫，不幸遇此，而催生之法，不可不知；又或穷乡僻壤，医药不便，诚为困苦。故附单方于此，以备急需。

一治横生逆产，胞衣不下，并落死胎。用蓖麻子四十九粒，去壳研烂，于产妇头顶心剃去少发，以蓖麻膏涂之。须臾，觉腹中提上，即宜除下，却急于足心涂之，自然顺生。生下即速去药，迟则恐防肠出。如胞衣不下，贴足心即下。

一乡村僻壤无药之处，不幸遇此。即觅花椒叶、香圆叶、柚子叶、茱萸叶、生姜、生葱、紫苏，浓煎汤一盆。俟可下手，即令产妇以小凳坐盆上，浇汤淋洗其脐腹阴户，久久淋洗，气温血行，登时即产。以上诸叶，少一二味亦不妨。

一治死胎不下及胞衣来迟，用黑豆一升炒香熟，入醋一大碗，煎至六七分，去豆取汤，分三次服之。以热手顺摩小腹，其胞胎俱下。

又方　用冬蜜一大杯，以百沸汤调服之，立下；如胞衣来迟，再服一碗，即下。

一治产难及横生逆产，或血海干枯，以致胎死不下，惶惶无措，死在须臾，急用皮硝五钱、熟附子一钱五分，好酒半杯、童便半杯，同煎三沸，温服立下，百发百中。

一方治产妇元气弱极，胞衣来迟者，用真青化桂三钱，当归、川芎各钱半，酒煎，热服立下。

一下死胎　用麦芽半斤，捣碎，水二大碗，煎至一碗，服之即下。

一方　天花粉酒炒四钱，上肉桂、淮牛膝　淡豆豉各三钱。

用水二碗，煎至一碗，热服即下。

熟料五积散　此方专治妇人产后外感内伤，瘀血不行，痰凝气滞，头疼身痛，恶寒发热，心腹疼痛，寒热往来，似疟非疟，小腹胀满，伤风咳嗽，呕吐痰水，不思饮食，胸紧气急，手足搐搦，状类中风，四肢酸疼，浑身麻痹，凡产后一切无名怪证，并皆治之。

夫产后百节俱开，气血两败。外则腠理不密，易感风寒；内则脏腑空虚，易伤饮食；稍有不慎，诸证丛生。古书有产后以大补气血为主，杂病以末治之之戒，后世莫不遵之。惟事滋补，不知风寒未去，食饮未消，滋补一投，反成大害。昧者犹以为药力未到，愈补愈深，死而后已。天下之通弊，莫此为甚！予昔于潭州遇师指授此方，按法治之，往辄裕如，不敢自秘，逢人口授，并曾刊板印送，于兹四十余载，活人莫可胜纪。但虑世人不悟，以为浅近之方，安能神应若是？故古人谓千金易得，一诀难求。予今诀破，庶狐疑顿释。方名五积者，谓此方能去寒积、血积、气积、痰积、食积也。今产后之病怯，正犯此五积，以五积之证，投五积之方，岂非药病相值乎！犹虑药味辛散，而以醋水拌炒，名熟料五积散，俾药性和缓，表而不发，消而不攻。方内所用肉桂解表逐寒，白芍和荣谐卫，苍术、厚朴走阳明而散满，陈皮、半夏疏逆气以除痰，芎、归、姜、芷入血分而祛寒湿，枳壳、桔梗宽胸膈而利咽喉，茯苓去饮宁心，甘草和中补土。大虚大怯者，加人参，微虚者可不用。共为温中散寒之妙剂，用于产后，无往非宜。

五积散　本方原有人参，因世人不敢轻用，故方中未载。

香白芷一钱，不炒　上青桂一钱，不炒　川厚朴一钱　正川芎一钱　芽桔梗一钱　陈枳壳　白云苓　炒苍术　杭白芍　法半夏　黑炮姜

炙甘草　广陈皮以上各一钱　全当归二钱　虚加人参一钱

上药味皆宜秤过，除白芷、肉桂在外不炒，余药合为一剂。用好醋小半杯，净水一杯，与醋和匀，将药润湿，入锅内炒至黄色为度，取起摊地上，去火毒，候冷，入白芷、肉桂在内。生姜三片，红枣三枚，净水二碗，煎至一碗，热服。此方至平稳，见效之后，依而服之，不拘剂数，以愈为度，惟产后大汗泄泻，或虚脱之证，忌之。盖此方但能去病，不能补虚，虚证有方在前，并宜参考。

产后简便方

产时母肠先出，然后见生，产后其肠不收，甚为危迫。用醋半杯，新汲水半杯调匀，噀产妇面，每噀一缩，三噀收尽。真良法也。

又方　以蓖麻子四十九粒，去壳研烂，涂产妇头顶心，肠即收入，急去药，以温水洗净。倘其肠干燥难收，用磨刀水温润其肠，再以雄磁石煎汤服之，其肠自收。

产妇及平居，偶因用力太过努伤，致子肠不收。用艾丸绿豆大，灸头顶心百会穴三五壮，即收。

又方　以盐汤洗净，后用五灵脂烧烟子桶内，令患者坐桶上，熏之自上。

又方　用清油五斤炼熟，以盆盛之，候温凉，令产妇坐油盆内，约一顿饭久；仍以皂角为细末，微以一厘吹入鼻中，令作嚏，立止。

产后玉门肿痛　用蛇床子三两煎汤，频洗即愈。又以葱白和乳香捣成膏，贴肿上效。

产后乳汁不通　用天花粉炒黄为细末，每用二钱，以红饭豆煎浓汤调服，每日服二次，其乳流溢。

产妇气血太虚无乳者，用

全当归三钱　正川芎二钱　穿山甲炙　王不留行各一钱五分　川木通五分

猪蹄一只煮药，以猪蹄烂为度，去药，服汤并蹄，立通。

产后阳气虚寒，玉门不闭，用。

石硫黄　海螵硝　北五味各等分。

共为末，掺患处，日三易。

产后玉门不闭，阴户突出。

石硫黄三钱　菟丝子　吴茱萸各二钱　蛇床子一钱五分

水一大碗，煎至半碗，频洗自收。

产后擦破膀胱，不能小便而淋沥。

黄丝绢一尺，剪碎　牡丹皮　鲜白茇各一钱

将丹皮、白茇研为末，同黄绢用水一碗，煮至绢烂，空心服之。服时不可作声，作声则不效。

初诞救护

小儿初生，或不能发声，谓之梦生。多不知救，深为可悯。切勿断脐带，速用明火将胞衣炙暖，使暖气入儿腹，更以热汤荡洗脐带；却取猫一只，以布袋裹其头足，使伶俐妇人，拿住猫头，向儿耳边，以口啮猫耳，猫必大叫一声，儿即醒而开声，方可剪断脐带。

又有因难产，或冒风寒，收之稍迟，儿气欲绝，不能啼者，亦以前法温暖之，令暖气入腹，气回即苏，更令父母之真气呵而接之。

凡断脐带，世俗皆以刀剪断之，最为不妥。但以大纸捻蘸香油，燃火子脐带上，烧之令断。盖所以补接其阳气，不但为回生起死之良法，且日后无伤寒泄泻之患。

初生肾缩，乃受寒气所致。用硫黄、吴茱萸各三钱，研极细末，捣取葱汁调药，涂脐腹；另以蛇床子烧烟，熏之即伸。

闷脐生者，儿粪门有一膜，闷住儿气，故不能出声，拍之则膜破而叫矣。又有用轻巧妇人，以银簪轻轻挑破为甚便；或不能挑，急以暖衣紧包，勿令散放，以热水浸其胞衣，寒天则以火炙之，久则热气入腹而气内鼓，其膜自破，声自出。

又有生下无谷道者，乃肺热闭于肛门。急

以金银或玉簪，看其端的刺穿之，或以火针刺穿，但不可深。以油纸捻套住，免其再合。

儿初生下，遍身如鱼脬，或如水晶，破则流水，以密陀僧研细末糁之。

初生遍身无皮，俱红肉，急以早米粉干扑之，候其皮生全则止。

初生大小便不通，腹胀危急者，急令妇人口含热水，吮儿之前后心，并脐下、手足心共七处。每一处吮吸七口，以肉色红赤为止，须臾即通。又方，以葱汁、人乳各半调匀，抹儿口中，须臾即通。

初生不尿，以葱一根切碎，人乳半杯同煎，去葱取乳，分作四次服，即尿。不吮乳者，服此即吮乳。

调　燮

小儿初生，饮食未开，胃气未动，廓然清虚之府，宜乘此时加意调燮。于儿未啼之时，令精巧妇女轻指探儿口，挖去污血，随以甘草汤，用软帛裹指蘸汤，拭去口中涎沫。然后看儿面色，若身面俱红，唇舌紫赤，知其必有胎毒。每日用盐茶，但不可太咸，以帛蘸洗其口，去其粘涎，日须五六次。此法至神至异，世所不知。盖儿之胎毒，藏于脾胃，口中多有粘涎，其马牙、鹅口、重舌、木舌，皆从此起。每日洗拭，则毒随涎去，病从何来？而且至简至易，何忽视而不为？倘胎毒重，直须洗过周岁方得。此有毒者之调燮也。倘儿面唇淡红，此为胎寒，不可用茶，惟以淡姜汤洗拭，每日一二次足矣。盖姜能开胃，而且和中，最切于时用者。至于古方之用黄连、大黄、朱砂、轻粉开口之法，此时断不可用。今时禀受，十有九虚，苦寒克削，最不相宜。况婴儿初诞，如蛰虫出户，草木萌芽，卒遇暴雪严霜，未有不为其僵折者，以苦寒而入有涎之口，亦若是也。每见三朝七日，必有肚疼、呕乳、泄泻、夜啼之证，是皆苦寒伤胃之害，其孰能知之！

或曰：子言苦寒不可用于初诞之口，何以后之沆瀣丹及泻青丸，有三黄大黄，得无矛盾乎？曰：彼胎毒已现，外证可凭，有病病当，何大黄之足畏！今初诞开口，未辨毒之有无，即使有毒，尚然未发，深藏潜伏，声臭俱泯。程凤雏有言：正如阖闾无事时，未可执平人而诛之曰，尔将为寇也。以苦寒而开口，是诛平人也；毒发而畏苦寒，是有寇不诛，乌乎可也？

脐风论证

脐为百风总窍，五脏寒门，道家谓之下丹田，为人身之命蒂。儿在胎时，口鼻未通呼吸，惟脐间真息，随母之呼吸为呼吸；及其下地，囫囵一声，气通口鼻，而胎元之一息，不复为用矣。遂寄于脐内一寸三分，中虚一穴，左青右白，上赤下黑，中央黄色，八脉九窍，经纬联络，为真息往来之路，坎离交会之乡，凡修炼仙胎，皆从此处立基，所以谓之命蒂。故小儿初生，惟脐之干系最重。断脐之时，不可不慎，或剪脐带太短，或束不紧，致外风侵入脐中，或浴儿时牵动脐带，水入生疮，客风乘虚而入，内伤于肾，肾传肝，肝传心，心传脾，脾传肺，蕴蓄其毒，发为脐风。其证面赤啼叫者心病，手足微搐者肝病，唇青口撮，痰涎壅塞者脾病，牙关紧急者肾病，啼哭不止者肺病。五脏之证略见一二者，犹可治，悉见者不治。

小儿初生，惟脐风为恶候。其证有三：曰脐风，曰噤口，曰锁肚。虽皆脐证，而寒热自别，治者宜详。

一曰脐风。由断脐后为水湿风寒所乘，入于脐而流于心脾，令肚腹胀满，吮乳口松，多啼不乳，此初起之时，速用火攻散之。若至气息喘急，啼声不出，或肚上青筋，吊疝作痛，此胎毒夹风邪入脏，外用火功，内服指迷七气汤方见二卷胎毒门二。若肚脐青肿，撮

口不开，牙关紧闭，口吐白沫，爪甲青黑者，皆不治。

一曰噤口。其证眼闭口噤，啼声渐小，舌上聚肉如粟米状，吮乳不得，口吐白沫，大小便不通。遇此先看其上腭有点子，即以指甲轻轻刮破，以木香、白蔻仁各五分，煎汤化下沆瀣丹，利动脏腑，气顺自愈。

一曰锁肚。由胎中热毒壅盛，结于肛门，大便不通。急令妇女温水漱口，吮儿之前后心，并脐下及手足心，共七处，凡四五次；外以轻粉五分研末，蜂蜜少许，温水调服，以通为度。如更不通，以葱白三四寸长，用油抹润，轻透谷道，纳入二寸许，以通为快，若至七日不通者死。

古人之论脐风，皆谓由于水湿风冷所致，予则以为古论犹未尽也。盖脐风有内外二因，有可治不可治之别。外因者，风湿所伤；内因者，禀父母之真阳不足也。予尝见一士，其妻产育十数胎皆男，尽殇于七日内之脐风，无一存者。若谓外邪所伤，何以独伤此家之儿，又岂无一儿能避之者?此内因之显而易见也。凡男子之命门真阳不足者，右尺脉必细涩无神，生子必有脐风。此予察之详，见之确，非耳闻者比也。其外因者，病发于二、三、四、五日之间，病生于六腑，故可治；内因者，必发于六七日之间，病生于五脏，故不可治。曩者，夏禹铸有预防脐风之诀，谓三朝一七，看儿两眼角黄，必有脐风，不知禀受厚者，生下即满面红黄，乃为吉色，误认脐风，其害不小，此法不确。惟令乳母每日摸儿两乳，乳内有一小核，是其候也。然乳内有核，发脐风者固多，而复有不发脐风者，此法十有七八，亦有二三分不确。但看小儿不时喷嚏，更多啼哭，吮乳口松，是真候也，急宜治之。第脐风之治，无一成法可遵，虽有疏风攻下之法，莫能济急。独予异授灯火，无论脐风痉搐，以及凶危险证，用药不能挽回者，此火可以生之，久经效验，未肯轻传，因见幼科不知火穴，往往错误用之，反致引动风邪，蔽固火毒，致儿身热不退，火毒内攻，每多不救，故不忍隐秘，尽行吐露，以公诸世。世之幼科治病，辄曰剪风，曰截风。夫剪者，邀遏之谓也；截者，堵塞之谓也。以火功用于中宫任脉所行之地，岂非堵遏其邪，而犯关门逐盗之戒乎？不知风邪之在人身，善行数变，无形无声，欲除其害，无如疏散条达而去之，不使久羁于荣卫经络则善矣。如仲景之治伤寒，而立汗吐下三法。邪之在表者，汗而散之；邪之在上者，吐而越之；邪之深入者，下而夺之。总欲其邪尽而后已，未闻有邀截之为也。今幼科不但不为逐邪，而反闭关绝险，阻其去路，使邪气进不可，退不能，猖狂踯躅，欲其不倒勿相攻，斩关逆犯者，不可得也。此皆为治者酿成之祸，于邪何尤?凡邪之伤人，未有不从三阳而入；驱除之法，亦必使其从三阳而出。故此火穴亦惟三阳有之，盖欲引其出表，断不使之入里也。敬为图说详后，并请政大方。

用火口诀

夫婴儿全身灯火，诚幼科第一捷法，实有起死回生之功。火共六十四燋，《阴符》易数，能疏风散表，行气利痰，解郁开胸，醒昏定搐，一切凶危之候，火到病除。用火之时，倘值寒冬，必于房中燃烧明火，使儿不致受寒。灯草大小适中，以麻油染用。令老练妇人，抱儿解衣去帽，从左耳角孙起，总依后之歌诀用之。凡用火不可姑息，勿谓火数太多，悯其难受。盖小儿受病，由其经络凝滞，脏气不舒，以火散之，正欲使其大叫大哭，方得脏气流通，浑身得汗，荣卫宣畅，立时见功。此火暗合周天，不可减少，少则不效，若救脐风，非此不可。火穴歌图并列于后。

集成神火图



铜人正面



铜人背面

集成神火歌

仙传神火天然理，始自角孙瘈脉起，听宫曲鬓本神旁，次及天容仍右取。囟会承浆左肩井，曲池合谷诸邪屏，气关已过至神门，右亦如之昏可醒，左乳根中七燋始，右亦如之何待齿。脐下阴交续命关，平平三点凶危止。脊中身柱至长强，肺俞阳陵承山当。昆仑解溪邱墟穴，涌泉右亦效之良。俞音恕.

指明火穴

仙传神火天然理，始自角孙瘈脉起凡用神火，无论男婴女婴，皆从左边用起。角孙在耳尖上，瘈脉在耳后根。听宫曲鬓本神旁，次及天容仍右取听宫在耳门前，曲鬓在鬓脚旁，本神在额角，天容在耳轮根下。左边已完，右亦如此。囟会承浆左肩井，曲池合谷诸邪屏囟会即囟门，承浆在下唇宛宛中，肩井在肩上宛宛中，从左起，故曰左肩井。曲池在肘湾上靡屈纵处，合谷在虎口近叉骨处。气关已过至神门，右亦如之昏可醒气关在食指第二节，神门在掌后下靡锐骨之端。左完右亦如之。左乳根中七燋始，右亦如之何待齿自左乳根下起，从上至下七燋止，右乳根亦如此。脐下阴交续命关，平平三点凶危止阴交在肚脐下半寸，用火三燋。脊中身柱至长强，肺俞阳陵承山当身柱在项骨三节下，从上至下九燋，至长强穴止。肺俞在两饭匙骨缝中，阳陵泉在膝外边下三寸，承山在脚肚尽处。昆仑解溪邱墟穴，涌泉右亦效之良昆仑在外踝骨后，解溪在系鞋带处，邱墟在外踝骨前，涌泉在脚底中心。左脚燋完，右亦如之。

宜用火者

一平素产子有脐风，则胎胎不爽。于产下第二日，勿待其发，先以此火散之，百不失一。

一胎婴生下，多啼不乳，喷嚏呵欠，吮乳口松，是即脐风作矣。急以此火散之。

凡儿病面青面黑，扭项摇头，仰身擦面，或眼青怒视，或左右斜视，或上下窜视，或两目连扎，或头项牵强，蜷舌露筋，嘘风撮口，啼哭咬人，或手如数物，或两手牵引，或两足跳掣，忽扰忽乱，失张失志，但觉神情与常有异者。由从前表里不清，将欲作痉，此火至妙。

一伤寒已痉，角弓反张，眼目斜视，左右搐搦，并中恶、客忤、痫证，与食填太阴，及一切风闭、火闭、痰闭、气闭，乍然卒死者，此火最神。

一食伤脾胃，肚大青筋，于端午日午时，用全身灯火，复于青筋开叉处，以火截之，一

又一点，其病自消。

一风寒痰气闭塞之证，此火实有神功。凡用灯火既完，候儿啼哭已停，即以金粟丹半丸，姜汤化服。服后，以衣裹之，蒙其头面，令之安卧片时，以复其神志，其病如失。

切忌火者

一小儿四时伤风感冒，身热自汗，大小便调，唇舌如常，口不作渴，此表病轻证也，疏解之则愈。愚人妄用，是谓轻病重治，反为不详。

一小儿邪已入里，身热面赤口渴，大小便秘，唇焦舌紫眼红，或手足心热，夜热焦烦，舌上黄胎，扬手掷足，掀衣揭覆，此里证内热也。清利之自愈，不可用火，强用，不特不能使热邪从里以达表，适足以助热面耗阴，致身热不退，在夏秋燥令，尤为大忌。

一小儿大病久病，身体怯弱，面目青黄，唇舌白莹，摇头斜视，昏睡露眼，形骸消瘦，声息轻微，自汗盗汗，或一切呕吐泻利，痘麻疮痈，久疟久嗽，失血之后，精神疲倦，乳食减少，指纹沉细，六脉无神，此皆虚极之证。切忌火攻，虑其升故也。

一一切久热消渴疳证，形骸黑瘦，毛发焦枯，由阴亏血弱，虚热所为。误用灯火，愈增其病，慎之！

一灯火为儿科切要。今医家不特不明火穴，而并不辨寒热虚实，不当用而用之，反为大害。惟依以前辨法，则用之无不当矣。

夏禹铸曰：脐风初发，吮乳必口松，两眼角挨眉心处，忽有黄色，宜急治之，治之最易；黄色到鼻，治之仍易；到人中、承浆，治之稍难，口不撮，微有吹嘘，犹可治也。至唇口收束锁紧，舌头强直，不必治矣。一见眉心鼻准有黄色，即用灯火于囟门一燋，人中、承浆，两手大拇指端少商各一燋，脐轮绕脐六燋，脐带未落，于带口一燋，既落，于落处一燋，共一十三燋，风便止而黄即退矣。

予按：古今灯火，惟上全身火，有经有府，有理有法，无有出其右者。第火穴多，恐仓卒之际，在娴熟者不难，倘素未经练者，一时不能用，故附夏氏脐风火图于此，庶忙迫之时，可以济急。此火亦曾经验，第不及全身灯火耳。

夏禹铸脐风火图



回生艾火

以前全身灯火，皆为实邪升散之用，并一切怪证莫可名状者，无不奏功。倘涉久病体虚，忽然精神溃乱，人事昏沉，前火则为不宜，须用回生艾火挽之。盖此火能回散失之元阳，收归气海，固其根蒂，免致离散。其法以生姜切为纸厚薄片，大如指甲，贴尾闾穴脊骨尽处、命门穴在腰脊间，前正对脐，以艾绒揉紧如绿豆大，安姜片上，用火灸之，每穴以三炷为度，灸完，另以姜片贴脐下阴交穴，如前灸之。此火不特小儿可用，凡男妇一切中风中痰，气厥阴证，虚寒竭脱，凶危之候，咸宜用之。有起死回生之功，幸毋轻视。

凡小儿中恶、客忤，以及痰闭、火闭、风闭，乍然卒死，即以全身灯火醒之。倘一时未有其人，即以大拇指掐其人中穴，病轻者一掐，即啼哭而醒；倘不应，掐合谷；又不应，掐中冲；若再不应，其病至重，则以艾丸如萝卜干大，于中冲穴灸之，火到即活。盖中冲一穴，为厥阴心包络之脉所出，其经与少阴心脏相通。此火一燃，则心中惕然而觉，倘此火全然不知，则百中不能救一矣。



入　方

辰砂僵蚕散　治撮口、脐风、锁肚。

镜辰砂水飞，五钱　直僵蚕炒，一钱　天竺黄五分　蚌珍珠三分　真麝香一分

为末。每用少许，蜜调，抹儿口中。

龙胆汤　治身热脐风撮口。

龙胆草　钩藤钩　北柴胡　片黄芩炒　京赤芍　炙甘草　芽桔梗　白茯苓各五分　川大黄纸包，煨，一分

大枣一枚，水煎，温服。

治撮口　用牛黄一分，研末，竹沥调，滴入口中。

又方　取蝎虎即壁虎也一个，装瓶内，用朱砂细末，亦入瓶内，封其口月余。令食朱砂，取出，其身赤色，阴干为末。每一二分，酒调下。

又方　治撮口用。

穿山甲　用尾上甲三片，羊油炙极黄色　蝎梢七个

共为细末，入乳汁调涂乳上，令儿吮之。用厚衣包裹，须臾汗出即愈。

保生汤　治脐风、锁肚、口噤。

北防风七分　陈枳壳五分　小橘红四分　白茯神三分　荆芥穗三分　远志肉四分　制南星五分　芽桔梗三分　炙甘草二分

灯芯引。

二豆散　治脐肿突。

红饭豆　淡豆豉　天南星　鲜白蔹各一钱

共为末。用芭蕉自然汁少加香油调药，敷脐四旁，得小便自下，即愈。

龙骨散　治脐疮。

石龙管煅，一钱　真轻粉五分　川黄连一钱　枯白矾煅，一钱

共为末，干掺。

一方　用大红羊绒，烧灰为末，敷之效。

脐证简便方

小儿初生犯撮口脐风、荷包风、鹅口风等项，并齿根边生白点，名马牙，啼哭不吮乳，即看口内坚硬之处，或牙根边白点，将针挑破出血，浓煎薄荷汤，磨京墨调匀，以指搅过，再以产母乱发蘸墨，满口搽之；仍用新青布蘸温水展口，即愈。

小儿脐风撮口，用完全生葱二根，捣烂取汁，又以直僵蚕三个，炒去丝，研极细末，以葱汁调匀，涂母乳头上。令儿吮之，或灌儿口内亦可。

小儿脐风撮口，以艾叶烧灰填脐上，以帛缚之；若脐带已落，用蒜切薄片，贴脐上，以艾火灸之，候口中有艾气，立愈。

小儿噤风，初生口噤不乳，蝉蜕十四枚，全蝎去尾毒，洗去盐泥十四枚，炒干为细末，入轻粉三分。每用一匙，乳汁调灌。

小儿撮口，但看舌上有疮如粟米者是也。以蜈蚣炙焦，研末敷疮上。

撮口噤风，面黄色，气喘，声不出，由胞气挟热，流毒心脾，故令舌强唇青，撮口发噤，用直僵蚕二枚，去嘴，略炒为末，蜜调，纳儿口中。

小儿十日内，口噤不乳，取大蜘蛛一枚，去足，炙焦，研细末，入猪乳一小杯和匀。分作三次，徐徐灌之，神效无比。

小儿脐疮出血及脓，用海螵蛸、胭脂共为末，以油润疮，乃搽药。

初生护持

婴儿初生，肌肤未实，宜用旧絮护其背，

亦不可太暖。更宜数见风日，则血气刚强，肌肉致密；若藏于重帏密室，或厚衣过暖，则筋骨软脆，不任风寒，多易致病。衣衫当随寒热加减，但令背暖为佳，亦勿令其汗出，恐致表虚，风邪易入。乳哺亦不宜过饱，所谓忍三分饥，吃七分饱，频揉肚，少洗澡，皆至言也。又须令乳母预慎六淫七情，盖儿初生，藉乳为命。善为乳母者，夏不欲热，热则致儿吐逆；冬不欲寒，寒则致儿咳嗽。怒乳则上气颠狂，醉乳则身热腹痛。新房而乳，则瘦瘠交胫不能行，新浴而乳，则发吐伤神。冷热不调，停积胸膈，结为痰饮，遂成壮热，壮热不已，乃成风痫。儿啼未停，剧以乳哺，气逆不消，因成乳癖；有孕而乳，致儿黄瘦，肚大脚小，名曰蛔虫忌病。总之，乳母能慎寒暑、恚怒、厚味炙煿，庶乳汁清和，儿不致病；否则，阴阳偏胜，气血沸腾，乳汁败坏，必生诸病。若屡服药饵，则脏腑阴损，多变败证，均不可不知。

初诞之时，有于头额之前，发际之间灸之，又有以灯火遍身烧之，彼以为能截风路，不知适足以大开风门。盖火功由儿有病，不得已而用之，无故而用，伐及无辜，诸病自兹始矣。戒之戒之！

凡浴时，须调和汤水，试看冷热。若不得所，令儿怖畏，况冬久浴则伤寒，夏久浴则伤热。其浴儿当护儿背，恐风寒从背而入。

凡洗儿衣，不可露于星月之下，易惹邪祟。如偶失收，当用醋炭熏过，方可衣之。有鸟名天地女，又名隐飞鸟，最喜阴雨夜过，飞鸣徘徊，其鸟纯雌无雄，善落羽毛于儿衣中，令儿作病，不可不谨。

凡当春夏月间，宜令其地卧，使不逆生长之气；如遇秋冬，宜就温和，使不逆收藏之令。

凡在春天，勿与护顶裹足，以致阳气不舒，因多发热。即至年长，下体勿令过暖，盖十六岁前，血气方盛，如日方升，惟真阴未足。下体主阴，得清凉则阴易长，过温暖则阴易消。故《曲礼》云：童子不衣裘裳。

大人以脾胃为主，故乳哺须节，节则调养脾胃，过则损伤脾胃。夏天忌热乳，冬月忌寒乳，皆宜捏去之，而后与之。凡食后不可与乳，乳后不可与食，小儿脾胃怯弱，乳食并进，难于消化，初得成积，久则成癖成疳，皆乳母不慎之过。

凡寒则加衣，热则减衣，过寒则气滞而血凝涩，过热则汗泄而腠理疏，以致风寒易入，疾病乃生。更忌解脱当风，易于感冒，然风和日暖，又当抱出游戏。如阴地草木，不见风日，未有能坚起者，又不可日置地间，令肚着地，以致脾宫受寒，腹痛泄泻，慎之慎之！

勿轻服药

初诞之儿，未可轻药。盖无情草木，气味不纯，原非娇嫩者所宜，且问切无因，惟凭望色。粗疏之辈，寒热二字且不能辨，而欲其识证无差，未易得也。凡有微疾，不用仓忙，但令乳母严戒油腻荤酒，能得乳汁清和，一二日间，不药自愈。所谓不药为中医，至哉言也！每见愚人，儿稍不快，即忙觅医，练达者或不致误，疏略者惟以通套惊风药治之。此无事之中生出有事，伐及无辜，病反致重。父母见其无效，是必更医，卒无善手，相与任意揣度：曰风、曰痰、曰惊、曰热？前药未行，后药继至，甚至日易数医，各为臆说，汤丸叠进，刻不容缓。嗟乎，药性不同，见识各异，娇嫩肠胃，岂堪此无情恶味扰攘于中！不必病能伤人，而药即可以死之矣。予每见不听劝戒，杂药妄投者，百无一救，哀哉！

冯楚瞻曰：凡为幼科，犹宜参看方脉诸书。盖幼稚名曰哑科，疾病痛苦，勿能告人，全赖治者细心详察。况幼科诸书，理浅言略，难明病源。惟以小儿不节饮食为执见，最重消磨。更以纯阳之子为定论，恣投寒苦。孰

知易停滞者，脾气必虚，若图见小效于目前，则便遗大害于日后。况芽儿易虚易实，言虚者，正气易于虚也；言实者，邪气易于实也。然邪凑之实，必乘正气之虚，若不顾正气之虚，惟逐邪气之实，其有不败者几希！如寒伤荣也，但温养荣阴；风伤卫也，惟辛调卫气。但使荣卫和平而宣行，则客邪不攻而自散。使正气自行逐贼，则邪退而正气安然，如浮云一过，天日昭明也；若专投与气血无情之猛剂，客邪虽散，正气亦伤，乘虚之邪，将接踵而至矣。岂知正气不至空虚，邪必不能凑而为实！至于云纯阳者，以无阴而谓，乃稚阳耳，其阳几何？阴气未全，而复败其阳，将何以望其生长耶？况天地之气化日薄，男女之情性日漓，幼稚之禀受日弱。有禀父之气不足者，多犯气虚中满；有禀母之阴血不足者，多犯阴虚发热。患痘则多犯肾虚内溃之证。此皆先天不足所致，近来比比皆然，若徒效上古克削寒凉，如肥儿丸、芦荟丸之类，则千中千死，莫能挽也。至云小儿阳火有余，不知火之有余，实由水之不足，壮水以制阳光，先贤至论，服寒凉百不一生，古哲格言。以不生之药，投欲生之儿，心何忍哉！凡小儿脾胃自能消谷，今偶有停滞，则脾胃受伤，只健其脾胃，而谷自化矣。故方有助脾消化，推荡谷气者，有禀命门火衰，生火补土者，有一消一补者，有以补为消者，诚恐宽一分即耗一分元气也。夫人有生，惟此一气，易亏难复，何可轻耗？况幼稚之禀，尤为易亏。惟必根究先天之薄弱，而从方脉诸书，求源探本以为治，斯能补救当代赤子元气于后天，便亦培植后代赤子元气于先天，而寿世于无疆矣。若徒宗上古幼科浅略方论，则犹灌溉树木者，不顾根本，而惟洒润枝叶，欲望其生长，未之有也，而况复加划削者乎！

药饵之误张景岳

小儿气血未充，一生盛衰之基，全在幼时，此饮食之宜调，而药饵尤当慎也。今举世幼科，既不知此大本，又无的确明见，而惟苟全目前。故凡遇一病，则无论虚实寒热，但用海底兜法，而悉以散风消食，清痰降火，行滞利水之剂，总不出二十余味，一套混用，谬称稳当，何其诞也！夫有是病而用是药，则病受之；无是病而用是药，则元气受之。小儿元气几何？能无阴受其损而变生不测？此当今幼科之大病，而医之不可轻任者，正以此也。又见有爱子者，因其清瘦，每以为虑，而询之庸流，则不云痰火，必云食积，动以肥儿丸、保和丸之类，使之常服。不知肥儿丸以苦寒之品，最败元阳，保和丸以消导之物，极损胃气，谓其肥儿也，适足以瘦儿，谓其保和也，适足以违和耳。即如抱龙丸之类，亦不可轻易屡用。予尝见一富翁之子，每多痰气，或时惊叫，凡遇疾作，辄用此丸，一投而愈，彼时以为神丹，如此者不啻十余次。及其长也，则一无所知，凝然一痴物而已。岂非暗损元神所致耶？凡此克伐之剂，最当慎用。故必有真正火证疳热，乃宜肥儿丸及寒凉等剂；真正食积胀满，乃宜保和丸及消导等剂；真正痰火喘急，乃宜抱龙丸及化痰等剂。即用此者，亦不过中病则止，非可过也。倘不知此，而徒以肥儿、保和等名，乃欲藉为保障，不知小儿之元气无多，病已伤之，而医复伐之，其有不萎败者，鲜矣！

看病诀

小儿初生，欲知其有病无病？以手捻其头，摸其颐颔，不作声者为无病。以手指探其口，虽发声而从容咂指者，有病亦轻；若能发声，不咂指者，面色青红带紫，或牙关紧急，不纳乳汁，此落地受寒之甚，风邪入足太阳及足阳明而然也，须急治之，庶可平复。

初生之儿，肥胖色嫩，日觉好看者，此其根本不坚，甚非佳兆，且最易感冒风寒。邪

入腑者，近在第二三日见之，其证吐乳夜啼腹鸣。此皆胎风之类，然证犹浅而易治，宜用全身灯火，十不失一。若邪之入脏，远在六七日见之。此即脐风、噤风、撮口风之候，若口噤舌大，痰壅者，皆不治，盖病传入脏，系心脾肺三经也。此风气甚盛，无所发泄，便形见于喉口、牙关、声音也。凡生下时，身破裂者死，阴囊白者死，阴不起者死，无粪门者死，股间无生肉者死，开口如鸭声者死，粉白花色者死，皮肉不光者死，泣不出声者死，舌如猪肝色者死。面无彩色者夭，脐带短大紫色者夭，生下浑身银白色者夭。生下有齿者大凶，主伤父母，不然必伤自身；生下未裹即撒尿者，杀父母，荡家产，在世终身劳苦。

寿　夭　辨

头者诸阳之会，髓之海也。凡儿头角丰隆，髓海足也；背者五脏六腑俞穴，皆附于背，脊背平满，脏腑实也；腹者水谷之海，腹皮宽厚，水谷盈也。目为肝窍，耳为肾窍，鼻为肺窍，口为脾窍，七窍无阙，形象全矣。故知肉实者脾足，筋强者肝足，骨坚者肾足，不妄言笑者心足，不多啼哭者肺足，哭声连续者肺实，不久眠睡者脾实，兼之脚健而壮，项长而肥，囊小而黑，根本固也；肌肉温润，营卫和也，而更腮妍如桃，发黑似漆，表气实也；小便清长，大便滋润，里气实也。以上皆为寿相，其儿无病易养。

诸阳皆起于头，颅破项软者，阳衰于上；诸阴皆起于足，脚小脚蜷者，阴衰于下。鼻孔干燥肺枯，唇缩流津脾冷。发稀者血衰，项软者柱折。青紫之筋散见于面者，多病风热，兼之形枯色夭者，表虚；泻利无时者，里虚。疮疥啼哭，及多笑语者，皆阳火妄动之候。以上皆为夭相，其见多病者难养。

凡声音清亮者寿，有回音者寿；哭声涩者病；散而无声者夭。

五脏所属面色部位图



面部形色赋 辨色分注附

察儿形色，先分部位欲辨形之强弱坚脆，色之夭泽枯荣，必先分上下左右之部，定五行四象之位，然后按部察色，以定证之安危。左颊青龙属肝，右颊白虎属肺经曰：左右者，阴阳之道路也。盖五行之位，木旺在卯，金旺在酉，天地之气，阳从左升，阴从右降，故以左颊配肝，右颊配肺。非谓左颊即是肝，右颊即是肺，无过以生杀之理，配木金龙虎之位，以候其脏气之强弱耳。天庭高而离阳心火，地角低而坎阴肾水《周易》以东震西兑、南离北坎，定子午卯酉之四正。盖后天之用，有形者无不由之，故以心配离南之午火于天庭，肾配坎北之子水于地角，亦阳上阴下之义。第据其理而言之，非谓额上即心，唇下即肾，窃笑幼科未识渊源，刻舟求剑，未可向病人说梦也。鼻在面中，脾应唇际《内经》以鼻为面王，以其位居正中，内通呼吸，先死赖之，所以谓之中也。脾为中土，经曰：中央黄色，入通于脾，开窍于口。又曰：脾胃者，仓禀之本，其华在唇四白。故曰脾应唇际，亦中州受纳之地也。或问既五脏之经

脉未行于面，何以又从面部而察五脏之证，能无幻耶？曰：望色察证，《内经》之传，第轩岐大圣天人之学，后世莫能效法，所以据五行四象，列以部位，使望色者有所凭依耳。又曰：布列虽按五行，恐内脏之气不应，奈之何哉？曰：五脏之脉实未行于面，而藏象论曰：十二经脉，三百六十五络，其气血皆上于面而走空窍。盖人上下九窍，而七窍在面，目二、耳二、鼻二、口一，故目为肝窍，耳为肾窍，鼻为肺窍，口为脾窍，舌为心窍。有此诸窍，而后三百六十五络之气，皆通于面，故曰气血走空窍。由是按部察色，以决其吉凶，亦犹方脉之两手六部，分左心小肠肝胆肾，右肺大肠脾胃命。夫两手惟一肺脉耳，他脏何涉？亦前哲按八卦方位，以手太阴一经巧分六部，以候十二经脏气之盛衰。然则脉之隐微莫睹者，尚可候其成败，而色之一望显然者，独不可推其吉凶乎？医理至微，后之贤者幸毋忽略。红色见而热痰壅盛，青色露而肝风怔悸此概言通面之色，通面为足阳明胃经所主。胃经郁热，面必淡红，热搏津液，定化为痰而壅滞；风邪冲并，面必见青，心神不安，则为怔忡惊悸。如煤之黑为痛，中恶逆传；似橘之黄食伤，脾虚吐利面见黧黑，至凶之候，幸而暴病乍见，实为中恶之征。偶因恶毒之气，从鼻而入，肺先受之，阻遏正气，隧道不通，所以腹痛，邪盛不能自出，反致子乘母位而逆传，如肺传脾，脾传心者是也。橘黄，言其深黄也。脾司运化，乳食不停，何黄之有？由其运化失职，所以食填太阴，脾气凝滞，故深黄上面，必致有吐泻之虞。白乃疳痨，紫为热炽白属肺气虚，子伤累母，所以脾必困而为疳，紫为风热炽，经络受邪，定化为壮热而不已。青遮日角难医，黑掩太阳不治此下逐部分言之。诸书皆误为口角，不知面部无口角之位，不但无此位，证亦全不符。盖小儿中气强者，唇不变色；中气虚寒者，十有九青，此为常候，非难医之证。今正之，日角，左额也。犹日之东升而为青色遮蔽，为木蔽阳光，病则必有疑难之虑。太阳，左右两额也。太阳为众阳之宗，属火旺夏，气色宜红，今黑色掩映，将有水来克火之象，定见伤残，故曰不治。年寿赤光，多生脓血；山根青黑，每多灾异年寿，鼻梁也，为气之门户。赤光侵位，肺必受伤，气不流行，则血必凝滞，将有脓血之灾。山根，足阳明胃脉所起。大凡小儿脾胃无伤，则山根之脉不现；倘乳食过度，胃气抑郁，则青黑之纹，横截于山根之位，必有延绵啾唧，故曰灾异。朱雀贯于双瞳，火入水乡；青龙达于四白，肝乘肺位朱雀，赤脉也；双瞳，肾水也。赤脉贯瞳，火乘水位，治宜泻心补肾。青龙，肝木也；四白，肺金也。白珠见青，肝风侵肺。治宜保肺平肝。泻痢而戴阳须防，咳嗽而拖蓝可忌泻属脾病，痢属肾病。脾肾两脏既伤，先后二天并弱，面宜憔悴，今反面见红赤，知为虚阳上泛，故曰须防。咳嗽，肺病也。青者，肝色也。由其肺气已虚，肝无所畏，木乘金位，恐其生火以克金，故曰可忌。疼痛方殷，面青而唇口撮；肝风欲发，面赤而目窜视疼痛，腹痛也。寒气侵脾，内脏无火，一派阴冷，阻抑阳和，故面青而唇撮也。窜视，目直视也。幼科指为肝病，其实太阳经本证。盖太阳之脉系目上纲，血虚受寒，则上纲紧急，故目直视。今指为肝气，必用风药耗其津液，反成不救，能知养血，其病自瘳。火光焰焰，外感风寒，金气浮浮，中藏积滞通面火光，风寒伤胃，阳明拂郁，表未解也；黄色满面，食伤脾也，运化无功，久成积也。乍黄乍白，疳积连绵；又赤又青，风邪疯瘛黄为脾虚，白为肺弱，脾肺俱伤，无气以运，乳食难消，轻则为积，久则为疳；赤为火色，青为风色，风火相乘，荣血枯燥，筋脉牵强，甚则搐搦而为痉矣。气乏囟门成坑，血衰头毛作穗小儿禀受精髓不足者，平日脑髓未充，赖气以充之，今大病之后，中气下陷，安保其囟不成坑耶？发乃血之余，血荣则发黑，今头毛如草之颖，知其荣血枯焦也。

肝气眼生眵泪，脾冷流涎滞颐眼属肝，肝气实则眵干硬，肝气虚则眵胶粘。寒伤肝则泪冷，热伤肝则泪热。脾主涎，脾气虚冷，不能收摄，故津液妄泄而滞于颐间，误为脾热，祸不旋踵。面目虚浮，定腹胀而上喘；眉目频蹙，必腹痛而多啼脾肺两虚，中宫寒肃，以致气不归源，反逆血之上，则上气喘急，面目虚浮，因知其内必腹胀。小儿知识未开，于七情六欲毫不相关，何频蹙之有？亦因脏寒腹痛，所以不时啼叫，面频蹙不乐也。左右两颊似青黛，知为客忤，风气两池如黄土，无乃伤脾左右两颊俱青，客忤之证。由小儿神气怯弱，阳和未充，外邪客气，得以乘之，从鼻而入，忤其正气，则口吐青黄白沫，面色变异不常，腹痛喘急者是也。风池、气池，眉上眼下也。风池属肝，气池属胃，如黄土之色，由木胜土复，所以真脏色见。风门黑主疝，青为风；方广光滑吉，昏暗危风门，耳前也，少阳经所主，黑则为寒为疝，青则为燥为风，方广，眉棱也，亦少阳所主，光亮则吉，昏暗则危。手如数物兮，肝风将发；面若涂朱兮，心火燃眉邪热伤神，手如数物，谓十指屈伸不定，如数物之状。速宜疏解热邪，断无肝风之发。淡红为阳明胃经表热，深红为少阴心经里热，面若涂朱，知为心热，心不可泻，惟泻小肠，丙火一清，丁火自息。坐卧爱暖，风寒之入；伸缩就冷，烦躁何疑凡小儿偎入母怀，藏头密隐，欲人怀抱者，必恶风寒也。由风寒初入，未能化热，所以坐卧爱暖。邪已入里，则掀衣揭覆，扬手露面，偃胸仰卧，口渴躁烦。由其内外皆热，所以欲就清凉。肚大脚小，脾欲困而成疳；目瞪口张，势似危面必毙脾不运化而肚大，肌肉消削而脚小，盖脾主肌肉。由其乳食失节，所以脾困而成疳。膀胱绝而目瞪，脾气绝而口张，其势已危，必无可生之理。噫！五体以头为尊，一面惟神可恃，况声之轻重不同，啼之干湿顿异。呵欠连绵，知病之欲作；忽然惊叫，识火之将炜。此察证之规绳，幸拳拳而不谆头为元首，故以为尊。面分五位，惟神是赖，神存则生，神亡则死，盖指眼光而言也。况声有轻重，啼有干湿，安得无辨？凡声微者，知其气不足；声壮者，知其气有余。哭而无泪者实，哭而多泪者虚。呵欠连绵，为阴阳交引，升降不前，知其病之将至；忽然大叫，则知火热扰神，必有壮热之证。倘能依此辨证，亦犹工之有规矩，乐之有六律，是则是效，是究是图，自不致有望洋之叹矣。

一审颜色苗窍知表里之寒热虚实

夏禹铸曰：望闻问切，固医家之不可少一者也，在大方脉则然，而小儿科惟以望为主，问继之，闻则次，而切则无矣。经云：切而知之之谓巧夫小儿以脉未全，切之无可切，而巧亦无所用其巧，问而知之之谓工小儿于未言时，问之无可问，即于能言者问之，多不以实对，是问不必问，而工亦无所有其工，闻而知之之谓圣小儿初病时，声音或不失其常，至病久而气丧，气丧而声失，闻之无可闻，而圣又何所见其圣。况书曰：哭声不响赴阴君，而亦有不赴阴君者何？无非疑其声而不得肺之绝与不绝故也，吾故曰以望为主。曰：五脏之属，体隐而理微，望从何处？曰：体固隐矣，而发见于苗窍颜色之间者，用无不周；理固微矣，而昭著于四大五官之外者，无一不显。《中庸》所谓费而隐微之显著，不可引之相发明哉？故小儿病于内，必形于外，外者内之著也。望形审窍，自知其病，按病用药，见效之速，未有不如响之应声者。内有脏，曰心、曰脾、曰肺、曰肾、曰肝，五脏不可望，惟望五脏之苗与窍。舌乃心之苗，红紫，心热也；肿黑，心火极也；淡白，虚也。鼻准与牙床乃脾之窍，鼻红燥，脾热也；惨黄，脾败也；牙床红肿，热也；腐烂，胃火也。唇乃脾之窍，红紫，热也；淡白，虚也；黑者，脾将绝也。口右扯，肝风也；左扯，脾之痰也。鼻孔肺之窍，干燥，热也；流

清涕，寒也。耳与齿乃肾之窍，耳鸣，气不和也；耳流脓，肾热也；齿如黄豆，肾气绝也。目乃肝之窍，努视而睛转者，风也；直视而睛不转者，肝气将绝也。以目分言之，又属五脏之窍：黑珠属肝，纯见黄色，凶证也；白珠属肺，色青，肝风侮肺也，淡黄色，脾有积滞也，老黄色，乃肺受湿热证也；瞳人属肾，无光彩又兼发黄，肾气虚也。大角属大肠，破烂，肺有风也；小角属小肠，破烂，心有热也。上胞属脾，肿则脾伤也；下胞属胃，青色，胃有风也；睡而露睛者，脾胃虚极也。面有五位，五脏各有所属：额属心，离火也；左腮属肝，震木也；右腮属肺，兑金也；口下属肾，坎水也；鼻准属脾，坤土也。五脏里也，六腑表也。小肠心之表，小便短黄涩痛，心热也；清长而利，心虚也。胃乃脾之表，唇红而吐，胃热也；唇惨白而吐，胃虚也；唇色平常而吐，作伤胃论。大肠肺之表，闭结，肺有火也；肺无热而便秘，血枯也，不可攻下；脱肛，肺虚也。胆乃肝之表，口苦，胆火也；闻声作惊，肝虚也。膀胱肾之表，筋肿筋痛，肾之寒气入膀胱也。面有五色：一曰红，红病在心，面红者热；一曰青，青病在肝，面青者痛；一曰黄，黄病在脾，面黄者脾伤；一曰白，白病在肺，面白者中寒，一曰黑；黑病在肾，面黑而无润色，肾气败也。望其色，若异于平日，而苗窍之色，与面色不相符，则脏腑虚实无有不验者也。

简切辨证

小儿热证有七：面腮红，大便秘，小便黄，渴不止，上气急，足心热，眼红赤。此皆实热证，忌用温补。

小儿寒证有七：面㿠白，粪青白，肝虚胀，眼珠青，吐泻无热，足胫冷，睡露睛。此皆虚寒，忌用寒凉。

五脏所属之证

肝者，足厥阴木也，实则目赤大叫，呵欠顿闷，虚则呵欠咬牙；有风则目连劄，有热则目直视；成疳则白膜遮睛；主怒则性急大叫，哭甚则卵肿；热则大小便难，手寻衣领，手乱捻物，甚则撮空摸床，此丧魂病也。儿病时，目睛视物不转，或目合不开，或目开不合，或哭而无泪，或不哭而泪出，皆肝绝也。

心者，手少阴火也，实则叫哭，发热饮水，虚则困卧，悸动不安；心血足则面色红润易养，心血亏则面色昏黯难养；热甚则津液干而病渴，神乱而卧不安，喜伏卧，舌破成疮，又为重舌、木舌、舌出不收之病。凡病丹瘤、斑疹、龙缠、虎骨、虫疥、燥疮，皆心之证也。如心病久，汗出发润，或舌出不收，暴瘖不语，或神昏溃乱，或斑疹变黑，此皆心绝也。

脾者，足太阴土也，为水谷之海，实则困睡，身热饮水，虚则吐泻生风，伤湿则为肿为胀，为黄为吐泻。故脾病则腹痛；脾疳则肚大青筋；脾热则口臭唇疮，饮食不为肌肤，吐舌弄舌，口干饮水，寒则口角流涎，谓之滞颐；气不和则口频撮。虚则肉削而瘦，不喜饮食；伤食则成积，积久则成疳成癖。如脾久病，大肉消削，肚大青筋或遍身虚肿，或吐泻不止，饮食不入，或多食而瘦，或虫出于口，或唇蹇而缩，皆脾绝也。

肺者，手太阴金也，实则闷乱喘促，虚则哽气长出。经曰：寒伤肺由儿之衣薄受寒也，经曰：热伤肺由儿之衣厚郁热也。寒热伤肺，则气逆而为喘为咳。肺受风，则喷嚏而流清涕，受寒则鼻塞，呼吸不利，受热则鼻干，或为衄血，成疳则鼻下赤烂；喘不止则面肿，咳不止则胸骨高，谓之龟胸；燥则渴不止，好饮水，谓之膈消。如肺久病，咳嗽连绵，喘息不休，或肩息，或龟胸，或咳

血不止，或鼻孔黑燥，或鼻孔开张而喘，或泻痢不休，大孔如筒，或面目虚浮，上喘气逆，皆肺绝也。

肾者，足少阴水也，虚则目畏明，目中白睛多，其颅即解，色皖白，骨髓不满，儿必畏寒，多为五软之证。尻骨不成则坐迟，髁骨不成则行迟，真阳不足则齿迟，血脉不荣则发稀，心气不足则语迟。热则耳中出脓生疳。如肾病久，身惫，窜目如见鬼状，或骨痿弱，卧不能起，或二便遗失，此肾败也。

变蒸辨

幼科谓婴儿生下三十二日为一变，六十四日为一蒸。变者，变生五脏；蒸者，蒸养六腑，长气血而生精神、益智慧也，积五百七十六日而毕。凡遇变蒸，必有身热，或有惊惕，而口面唇舌俱不变色，身热或重轻，而精神与常无异，口中气出温和，三四日间自愈；或有热不退，乳母宜服小柴胡则安，此犹为幼科中杰出者之言也。乃考其变蒸方中，有用褊银丸之巴豆、水银、黑铅、京墨、麝香之类而峻下之者。夫既曰长气血、生精神、益智慧，惟宜助其升生可也，顾且用毒劣，灭其化元，不几于非徒无益而又害之耶？据其说，以周天三百六十五度，应人身三百六十五骨节，内除手足四十五余骨外，止三百二十数，以生下一日主十段，十日百段，三十二日则三百二十段为一变。而以天一生水，地二生火为次序，则一变肾，二变膀胱，三变心，四变小肠，五变肝，六变胆，七变肺，八变大肠，九变脾，十变胃，虽无实据，而理有可取，即令以此为准，变见确然不易之法。乃又有以木火相生为言者，则似为一肝、二胆、三心、四小肠、五脾、六胃、七肺、八大肠、九肾、十膀胱矣。复有以木金相克为言者，则又为一肝、二胆、三肺、四大肠、五心、六小肠、七脾、八胃、九肾、十膀胱矣。夫小儿脏腑骨度，生来已定，毫不可以移易者，则变蒸应有定理。今则各逞己见，各为臆说，然则脏腑竟可以倒置，骨度亦可以更张，是非真伪，从何究诘？谓天一生水者为是，则木火相生，木金相克者非也；谓木火相生，木金相克者为是，则天一生水者非矣。徒滋葛藤，迄无定论，将使来学何所适从？所幸变蒸非病，可任其颠倒错乱，假如变蒸为病，率宜依经用药者，岂不以脾病而治肾，膀胱病而治胃乎？总之，此等固执之言，不可为训。盖天地阴阳之理数，可限而不可限。如五运六气为一定不易之规，而有应至不至，不应至而至，往来胜复，主客加临，有应不应之殊。天地尚且如斯，而况婴儿之生，风土不侔，赋禀各异，时令有差，膏粱非一，而以此等定局，以限其某时应变，某时应蒸。予临证四十余载，从未见一儿依期作热而变者，有自生至长，未尝一热者，有生下十朝半月，而常多作热者，岂变蒸之谓乎？凡小儿作热，总无一定，不必拘泥。后贤毋执以为实，而以正病作变蒸，迁延时日，误事不小，但依证治疗，自可生全。

张景岳曰：小儿变蒸之说，古所无也，至西晋王叔和始一言之，自隋唐巢氏以来，则日相传演，其说益繁。然以予观之，则似有未必然者，何也？盖儿胎月足离怀，气质虽未成实，而脏腑已皆完备；及既生之后，凡长养之机，则如月如苗，一息不容有间，百骸齐到，自当时异而日不同，岂复有此先彼后，如一变肾，二变膀胱，及每变必三十二日之理乎？又如小儿之病与不病，余所见者、治者，盖亦不少，凡属违和，则不因外感，必以内伤，初未闻有无因而病者，岂真变蒸之谓耶？又见保护得宜，而自生至长，毫无疾病者不少，抑又何也？虽有暗变之说，终亦不能信，然余恐临证者，有执迷之误，故道其愚昧若此，明达者以为然否？

幼幼集成　卷二

清　罗浮　陈复正飞霞辑订
鄞县　曹赤电炳章圈校

胎病论

儿之初生有病，亦惟胎弱、胎毒二者而已矣。胎弱者，禀受于气之不足也。于于父母，一体而分，而禀受不可不察。如禀肺气为皮毛，肺气不足，则皮薄怯寒，毛发不生；禀心气为血脉，心气不足，则血不华色，面无光彩；受脾气为肉，脾气不足，则肌肉不生，手足如削；受肝气为筋，肝气不足，则筋不束骨，机关不利；受肾气为骨，肾气不足，则骨节软弱，久不能行。此皆胎禀之病，随其脏气而求之。所谓父强母弱，生女必赢；父弱母强，生儿必弱。故小儿有头破颅解，神慢气怯，项软头倾，手足痿软，齿生不齐，发生不黑，行住坐立，须人扶掖者，此皆胎禀不足之故也。

胎毒者，即父母命门相火之毒也。命门者，男子以藏精，女子以系胞，道家谓之下丹田也。夫二五之精，妙合而凝，纯粹之精，溶液而成胎，淫佚之火，蓄之则为胎毒矣。盖人生而静，天之性也；感物而动，人之欲也。成胎之后，其母之关系尤繁。凡思虑火起于心，恚怒火生于肝，悲哀火郁于肺，甘肥火积于脾，淫纵火发于肾，五欲之火隐于母胞，遂结为胎毒。凡胎毒之发，如虫疥，流丹、湿疮，痈疖、结核、重舌，木舌、鹅口，口疮，与夫胎热、胎寒、胎搐、胎黄之类是也。更如一七之脐风，百日之痰嗽，半岁之真搐，一周之流丹，此又毒之至酷至烈，而不可解者也。

胎寒者，母娠时患热病，多服寒冷之药，又或过餐生冷，令儿受之。生后昏昏多睡，间或吮乳泻白，此内因也。或百日之内，忽病寒栗口冷，手足蜷曲不伸，腹痛啼叫不止，此生后受寒得之。治宜温散，指迷七气汤、助胃膏为佳。

胎热者，母娠时喜食辛热炙煿之物，或患热病，失于清解，使儿受之。生后目闭面赤，眼胞浮肿，弩身呢呢作声，或啼叫惊烦，遍身壮热，小便黄涩，此胎热也。若不早治，则丹瘤疮疖，由此而至。宜集成沆瀣丹，徐服解之，以平为度。

胎搐者，母娠时曾因惊恐，气传于子。生后频频作搐，其后身热面青，手足搐掣，牙关紧闭，腰直身僵，睛邪目闭，多啼不乳。此乃胎痫，不治之证。如因身有热而作者，必先啼叫，虽曰胎病，由外因也。宜天麻丸，后以六味地黄汤滋其化源，久服自愈。

盘肠气者，幼科称内吊者是也。皆因胎气郁积，壅结荣卫，五脏六腑，无一舒畅。其气不能升降，筑隘肠胃之间，抵心而痛，其声辘辘，如猫吐恶，干啼口开，手足皆冷，宜疏散通气，调中散及木香丸。

脐突者，小儿多啼所致也。脐之下为气海，啼哭不止，则触动气海，气动于中，则脐突于外。其状突出光浮，如吹起者，捏之则微有声。用乱发烧灰，枯矾等分为细末，敷突脐上，以膏药贴之自消。

不乳者，小儿生下三二日间，忽然不乳。当询问之，勿以不乳作脐风治，盖脐风有多啼撮口之证，此则无之，但不乳耳。有吐乳，

乳之又吐者，或因拭口不净，恶秽入腹也，宜用槟榔、木香、甘草煎汤与服；如啼哭不乳者，腹痛也，亦胎寒之证，宜木香、丁香、乳香、当归、甘草煎汤与服。如无以上诸证，无故不乳，宜问其母之乳汁多少。乳多者伤乳也，宜少节之，不久自思乳矣；乳少者必有他证，细心察之。

胎黄者，儿生下面目浑身皆黄如金色，或目闭，身上壮热，大便不通，小便如栀子汁，皮肤生疮，不思乳食，啼哭不止。此胎中受湿热也。宜茵陈地黄汤，母子同服，以黄退为度。

胎肥者，儿生下遍身肌厚，肉色通红，面色亦红，而黑睛多，时时生痰；自满月以后，渐渐肌瘦，五心热面大便难，白睛粉红色，此名胎肥。是亦在胎时，母食甘肥湿热太过，流入胞中，以致形质虚肥，血分壅热也。加减大连翘饮，外以浴体法浴之。

胎怯者，生下面无精光，肌肉瘦薄，大便白而身无血色，目无精彩，时时哽气多哕者，此即治怯也。非育子父母之暮年，即生于产多之孕妇。成胎之际，元精既已浇漓，受胎之后，气血复难长养，以致生来怯弱。若后天调理得宜者，十可保全一二。调元散助之。

入　方

指迷七气汤　一切腹痛寒热，多啼不乳等证，皆由阴阳不升降，气道壅塞而然，并宜此方。凡人身内之气，呼吸出入，无刻不与天道阴阳之气通，故六淫外袭，则感而致病，一定之理也。内气闭塞，则天道不通，升者不升，降者不降，寒热由此而生也。是方疏利脏腑，神化无穷，最宜领会。

广陈皮　杭青皮　藿香叶　芽桔梗　蓬莪术　香附米　法半夏　上肉桂　公丁香　益智仁　老生姜　大红枣　炙甘草

上㕮咀。水二碗，煎至一碗，母子同服。

助胃膏　治胎寒内钓，胃气虚弱，胸胁胀满，呃乳便青。

白豆蔻　肉豆蔻须炮煨，去油　官拣参　广木香各两五钱　公丁香三钱　藿香叶　云茯苓　漂白术上炒　真青桂　西砂仁　炙甘草各一两　广陈皮一两二钱　洋沉香二钱　怀山药一两五钱

为末，蜜丸芡实大。每一丸，炒米汤化服。

集成沆瀣丹　音亢械，北斗夜半所降之甘露也　治小儿一切胎毒，胎热胎黄，面赤目闭，鹅口口疮，重舌木舌，喉闭乳蛾，浑身壮热，小便黄赤，大便闭结，麻疹斑瘰，游风疥癣，流丹瘾疹，痰食风热，疙瘩面肿，十种火丹，诸般风搐，并皆神效。

此方古书未载，得之异授，微似古之神芎丸。近有能者，妙出化裁而增损之，遂为幼科有一无二之神方，作三焦之主治。盖凡脏气流通者，必不郁滞，或受毒于妊前，或感邪于诞后，遂尔中气抑郁，则见以前诸证。方内所用黄芩清上焦之热；黄柏清下焦之热；大黄清中焦之热，又藉其有推陈致新之功，活血除烦之力，能导三焦郁火，从魄门而出。犹虑苦寒凝腻，复加槟榔、枳壳之辛散，为行气利痰之佐使；川芎、薄荷，引头面风热，从高而下趋；连翘解毒除烦；赤芍调荣活血；牵牛利水，走气分而舒郁；滑石清润，抑阳火而扶阴，又能引邪热从小便而出。用治以前有余诸证，应如桴鼓。予生平最慎攻伐，惟此方用之最久，功效莫能殚述，真济世之良方也。

杭川芎九钱，酒洗　锦庄黄九钱，酒蒸　实黄芩九钱，酒炒　厚川柏九钱，酒炒　黑牵牛炒，取头末，六钱　薄荷叶四钱五分　粉滑石水飞，六钱　尖槟榔七钱五分，童便洗，晒　陈枳壳四钱五分，麸炒　净连翘除去心隔，取净，六钱　京赤芍炒，六钱

上十味，依方炮制，和匀焙燥，研极细末，炼蜜为丸，如芡实大。月内之儿每服一丸，稍大者二丸，俱用茶汤化服。乳母切忌油腻。但觉微有泄泻，则药力行，病即减矣。

如不泄，再服之。重病每日三服，以愈为度。此方断不峻厉，幸毋疑畏，惟胎寒胎怯，面青白者忌之。

六麻丸　治胎搐。先以此丸通其经络，次服地黄丸。

明天麻姜制　法半夏　北防风　川羌活　牛胆星　直僵蚕　北全蝎各五钱

为末，蜜丸芡实大。每一丸，钩藤汤下。

六味地黄丸　即仲景所制《金匮》地黄丸。原治肾水亏损，小便淋沥，头目眩晕，腰腿酸软，阴虚发热，自汗盗汗，憔悴瘦弱，精神疲困。壮水之主，以制阳光，此方是也。

钱仲阳以之治小儿胎怯，禀受先天不足，并肝疳白膜遮睛，泻血失音，身瘦疮疥，肾怯语迟，解颅行迟等证。

薛立斋又以治小儿肝经血虚燥热，肾经虚热作渴，小便淋秘，痰气上壅，或风淫客气，瘰疬结核，或四肢搐搦，眼目瞤动，或咳血吐血，头目眩晕，或咽喉燥痛，口舌生疮，或禀质不足，解颅失音，五迟五软，肾疳肝疳。凡肝肾不足之证，皆宜用此，以滋化源，其功不能尽述。

予按：钱、薛二翁，能用此方治小儿先天不足，诚卓然有识者，予所敬佩。奈今之小儿，体质元气更不及前。古以地黄丸为补剂，今则实为凉剂矣。此药用于阴虚枯燥者，诚为得宜。倘儿肌肥面白，脾弱多痰者，服此必致腻膈，变生他证，其害不小。非方之不良，由今禀受愈薄也。予故为之斟酌其炮制，必使地黄阴凝之质稍近阳和，不致沉寒冱冷，始能免腻膈损脾之患也。

大怀地四两，以西砂仁一两不必捶碎，生姜二两切片，缝一小夏布袋，盛此二味，同地黄入砂锅，以水煮二昼夜，方入好酒点一昼夜，以地黄糜烂为度，取起，其袋不用，以地黄捣膏，听候　白云苓一两，乳汁蒸晒　怀山药三两，乳汁蒸晒　净枣皮二两，炒研　粉丹皮一两，酒炒　宣泽泻一两，盐水炒焦

上依炮制，和匀一处，焙燥，研为细末，和前地黄膏，少加炼蜜，石臼内杵匀，重钱半一颗。半周一岁者，每用一丸，三五岁者，二丸，俱空腹盐汤化下。倘丸一时未备，即以前药十分之一，但宜炮制，不可生用，水煎服之，名六味地黄汤，功效更捷。

调中散　治婴孩盘肠气，腹内筑痛。

青木香　川楝子　暗没药　白云苓　上青桂　杭青皮　莱菔子　陈枳壳　尖槟榔　炙甘草等分

入葱白二寸，盐一钱，水煎空心服。

茵陈地黄汤　治初诞小儿，面目浑身，其黄如金，胎中受湿热也。

怀生地　京赤芍　正川芎　大当归　天花粉　赤茯苓　结猪苓　茵陈蒿　宣泽泻

诸药随时定分两，水煎母子同服。

大连翘饮　治胎肥，解热毒。

净连翘　瞿麦穗　白滑石　牛蒡子　车前子　川木通　北防风　炒栀仁　片黄芩　荆芥穗　大当归　北柴胡　京赤芍　净蝉脱　炙甘草竹叶十片灯芯十茎

水煎热服。

浴体法　治胎肥。

明天麻二钱　净全蝎去毒　箭朱砂各五分　乌蛇肉酒浸　枯白矾　洋青黛各三钱，真麝香一分

共研匀。每用三钱，水三碗，桃枝一握，同煎十沸，温热浴之，但勿浴背。

调元散　治胎怯。

拣人参　漂白术　白茯苓　化橘红　大当归　甘枸杞　炙甘草各二钱　陈粳米三合

为末。每服二，三钱，龙眼煎汤调下。

八味地黄丸　治禀受先天不足。

即前六味地黄丸加青化桂一两、熟川附一两，治禀赋命门火衰。凡齿迟、语迟、行迟，囟门开大，肾疳等证，或火衰不能生土，以致脾土虚寒，不思乳食，夜多漩溺，皆禀先天不足。自睁周时，即有虚病肾病，能自幼填补，亦多可复。此方用水煎，名八味地黄汤。经曰：益火之源，以消阴翳。此之谓也。凡乳母肥白者，母子同服。

惊风辟妄

喻嘉言曰：惊风一门，古人凿空妄谈，后世之小儿受其害者，不知千百亿兆。盖小儿初生，阴气未足，性禀纯阳，身内易致生热，热盛则生风生痰，亦所恒有，乃以惊风命名，随有八候之目。夫小儿腠理不密，更易感冒寒邪。寒邪中人，必先入太阳经。太阳之脉，起于目内眦，上额交巅，还出别下项，夹脊抵腰中，是以病则筋脉牵强，遂有抽掣搐搦种种不通名目。妄用金石脑麝，开关镇坠之药，引邪深入脏腑，千中千死。徒据小儿八岁以前无伤寒之说，而立惊风一门。殊不知小儿不耐伤寒，故初传太阳一经，早已身强多汗，筋脉牵强，人事昏沉，病势已极，汤药妄投，危亡接踵，何由得至传经解散哉！故言小儿无伤寒也。不知小儿易于外感，惟伤寒为独多，而世之妄称惊风者，即此也。是以小儿伤寒，要在三日内即愈者为贵；若至传经，则无力耐之矣。且伤寒门中，刚痉无汗，柔痉有汗，小儿刚痉少，柔痉多。世俗见其汗出不止，神昏不醒，便以慢惊为名，妄用参芪术附，闭塞腠理，热邪不得外越，亦为大害，但比金石差减耳。所以凡治小儿之热，切须审其本元虚实，察其外邪重轻，或阴或阳，或表或里，但当彻其外邪出表，不当固邪入里也。仲景原有桂枝汤，舍而不用，徒事惊风，毫厘千里，害岂胜言哉！

又曰：小儿体脆神怯，不耐外感壮热，多成痉病。后世多以惊风立名，有四证八候之凿说。实则指痉病之头摇手动者，为惊风之抽掣；指痉病之卒口噤脚挛急者，为惊风之搐搦；指痉病之背反张者，为惊风角弓反张。幼科翕然宗之，病家坦然任之，不治外淫之邪，反投金石脑麝之药，千中千死而不悟也。

又曰：凡治小儿痉病，妄称惊风名色，轻用镇坠之药者，立杀其儿。此通国所当共禁者也。盖小儿不耐伤寒壮热，易致昏沉，即于其前放铳呐喊，有所不知。妄揑惊风，轻施镇坠，勾引外邪深入内脏，千中千死，从未有一救者，通国不为厉禁，宁有底止哉！

又曰：妇人产后血舍空虚，外风易入。仲景谓新产亡血，虚，多汗出，喜中风，故今病痉后贤各从血舍驱风，成法可遵，非甚不肖者，不妄用镇惊之药。不似小儿惊风之名，贻害千古，在贤智且不免焉。兹约通国，共为厉禁，革除惊风二字，不许出口入耳。凡儿病发热昏沉，务择伤寒名家，循经救治，百不失一，于以打破小儿生死关，天人共快也痉，拳上声，风强病也。

前为喻先生辟除惊风，指明病痉之说，诚善矣！第惊风之名，误传既久，沉迷者众。倘不为之剖晰详明，指出证候治疗，俾临证者有所依归，则后人何能深信？予不辞狂瞽，请为详晰申明之。盖病痉非止一端，男妇皆有，不特小儿为然也。如太阳过汗变痉，风病误下变痉，疮家误汗变痉，产后汗多遇风变痉，跌扑破伤冒风变痉，表虚不任风寒变痉，一切去血过多变痉。然男妇病此，医者皆从太阳、厥阴循经救治，未闻以惊风之治治痉者，无如小儿病痉，独以惊风为名而治者，由宋人之讹传也。一人倡之，遂群起而和之，然亦无师之智，各为臆说，愈趋愈下，遂致于离经叛道，乃有黄帝不知幼小之妄谈。殊不知《内经·通评虚实论》有乳子病热，乳子病风热脉证之辨，《刺逆论》有婴儿肉脆，血少气弱，毫针之传。经虽三章，而脉证治疗，井然可据。盖以今日之丈夫，即昔年之乳子，他时之方脉，即此际之幼科。人此人也，理此理也，安可岐之为二，故不易立科分。孰料后人不特岐之，而并皇皇经旨，全然抹煞，蒙蔽后人耳目，得肆其无稽之妄谈，背经毁圣，罪无可逭！所以嘉言痛辟其谬者，有由来矣。予亦非妄言附和，实有成见，盖临证四十余载，所治婴幼以万计，从不以惊风挂齿颊，亦未尝遇一儿之惊风。间有伤寒病痉，昏迷不省者，予以火功苏之，仍为循经治疗，

无不生全，从未假一抱龙、苏合为之镇坠开关。可见喻氏之言，确乎其不爽矣。或曰：经以风寒湿合邪而病痉，今乳子未离襁褓，安得有风寒湿而病痉乎？曰：子谓风寒湿婴儿绝少，殊不知风寒湿惟乳子为独多。如藜藿之儿房廊卑隘，户牖萧疏，衣褓单寒，坐卧非处，风寒之来，孰能悉为捍御？膏粱之子，过于慎重，于其甫生，辄闭户塞牖，不亲风日，不窥外门，重衣叠绵，温暖过度，微汗时出，腠理甚疏，偶然脱换，风寒则乘虚而入矣。至于湿气，尤为难避。凡衣褓不干，非湿乎？衾褥遗溲，非湿乎？澡浴粪秽，非湿乎？愚夫愚妇遇儿有疾，重衣复被，包裹严密，以致雨汗淋漓，失于更换，非湿乎？婴儿患是三者于隐微之中，而医者莫之能测也。况幼科诸君，临证不察病源，惟以惊风二字，横于胸臆。及至诊视，但见发热昏沉，即以惊风名之，辄以开关镇坠，截风定搐之死法，以治变幻莫测之伤寒，抑遏其表邪，遮拦其出路，乃致荼毒以死。而死者不知其然，父母不知其然，医者亦不知其所以然而死之也。此非后人之咎，作俑者不得辞其责矣。

妄名之害，其祸最酷。不特举世儿科满口惊风，而举世病家，亦满口惊风，其至愚至惑者，又惟妇女为尤甚。习俗相沿，竟成一惊风世界。最可骇者，遇儿有疾，亦不察其为伤寒、为杂证，为内伤、外感，且先曰病由于吓，致医者闻之，正中下怀，不辨是吓非吓，先与之镇惊。及其引邪入里，壮热不退，医者复不究其热之在表在里，为虚为实，且先曰热则生风矣。病家闻之适合其意，不察有风无风，乃嘱其医者先需截风定搐之药。医必投其所好而与之，病家坦然无疑而受之，南辕北辙，劫夺误投，病日沉危，而病家不以为怪。设有明者，辨证既确，不事惊风，而病家不喜，是必更医，必致覆水难收，死而后已。如此死者，亦不可尽归咎于医，盖病家有以致之也。吁，妄名之为害如此乎！

录诸家惊风论愚有小注，以辨其惑

有曰：急惊身热目赤，口鼻气粗，痰涎潮壅，忽然而发，发过容色如旧（未有不因外感内伤，而无故身热目赤，气粗痰壅而发者。此突然而来，亦暴拟之辞也）。有因惊骇者，亦有不因惊骇者，大都是火燥木急（由寒伤筋急者居多，未可尽指为火燥也）。故身先有热，未有身凉而发（二语好，但应体究热从何来？始有实据，若但曰身先有热，不知此热在表在里，未足服人）。证皆属阳，宜用凉剂（岂有不经疏散，而辄用凉剂，不虑其引邪入里乎）。除热化痰，则惊自息。昔人谓痰生热，热生风，风生惊，其实皆本气自病（何所据而知为本气自病）。世人不解风自内生（焉知其不由外至，而尽由于内生，未确），徒执天麻、胆星、瓜蒌、贝母、僵蚕、全蝎，杂乱风痰之药，治之不应（由于递相授受，以致祸世殃民，千古恨事）。更以广东蜡丸牛黄、紫雪治之，及至元气损伤，虚痰上逼，胸膈臌胀，则谓证变结胸，有是理哉（此开门揖盗，引邪入里，误治致败之故）！

有曰：惊者，吓也（惊由吓致）。由儿先有内伤，复来外感，肺窍痰迷，心无所主，一着惊而即发也（既知先有内伤，复来外感，以致于肺窍痰迷，心无所主。此实由于病，非由于惊也。今日一着惊即发，则所重在惊，治之者不治痰而治惊，置内伤外感于不问，而从事于无据之惊，弃本逐末，其害可胜言哉）。

有曰：惊生于心，痰生于脾，风生于肝，热出于肺，此一定之理也（半真半妄，难曰确然）。热盛则生风，风盛生痰，痰盛生惊，此贼邪必至之势（上云惊生于心，痰生于脾，风生于肝，热出于肺，惊风痰热皆本脏自生，何以又为贼邪，不几认主作贼乎）。疗惊必先豁痰，豁痰必先祛风，祛风必先解热，而解热又以何者为先乎？肺主皮毛，皮毛为热邪出入之门户（此又明指外邪，则非心肝脾肺

自生矣）。彼风寒暑湿燥火六淫之来（前云风自内生，此又明言六淫外至，不知孰是孰非），皮毛受之，即入犯乎肺。肺本出热地也（肺出清肃之地，何以见肺为出热之地？经曰：形寒饮冷则伤肺。此门户岂热邪可以出入，而寒邪独不可以出入乎）。燥火暑邪，一入则热，与热依而热虚；风寒湿邪一入，肺窍为之闭塞（六淫初来，无过皮毛，犹为太阳所主。若肯为之疏散，岂能便入肺窍，而至于闭塞耶），则热无所泄，而热亦盛。若解热必先祛邪（上云疗惊必先豁痰，豁痰必先祛风，祛风必先解热，解热必先祛邪。岂非在先竟不祛邪，以致邪不能解，而发热、生风、生痰、生惊；今者仍从发表祛邪起，而后解热祛风，豁痰定惊。何若在先肯为解表祛邪，岂不一了百当，又何致费如此周折乎？幼科镇坠止泻之误，于斯尽见矣）。

有曰：急惊者，肝经血虚，火动生风（此另换题目，别开生面）。盖风生则阴血愈散，阴火愈炽（阴虚则阳火炽，此阴火又不知指何物为言也）；火动肺金愈虚，肝邪愈炽。宜滋肝血，养脾气。若屡服祛风化痰泻火之剂而不效（若果火盛生风，则祛风化痰泻火之剂，不为误用。今屡服而不效，盖由证候不确，药不对病，所以费如许揣摹，亦终归于无济也），便宜认作脾虚血损（便宜认作，是无确见，上味模棱），急补脾土（急补脾土，则知误治致变，刻不容缓。不然，何用急乎）。

有曰：急惊属木火土实（屡言木邪凌土，木旺土衰，何能有上实之证），木实则搐而有力，目上视动扎频；土实则身热面赤而不吐泻，偃卧合睛。治宜凉泻。亦有因惊而发者（因惊而发，神虚可知。此为火虚，非火实也），以致牙关紧急，壮热等证。此内有实热，外挟风邪（此所挟之风，不知指内生之风耶，外来之风耶），当截风定搐（截风定搐四字，比于将、莫邪、龙泉、太阿更胜百倍。今天下幼科，皆用此利器也）。

有曰：急惊者，壮热痰壅，窜视反张，搐搦掣动，牙关紧急，口中气热，颊赤唇红，脉浮洪数。此肝邪风热，阳盛阴虚证也（脉浮洪数，饮冷便结，明是伤寒之证，未经疏解，以致热邪入里，表里皆急，方显以上诸证。非疏里不足以解表，犹敢以急惊称之耶）。

有曰：小儿惊风，肝病也，亦脾肾心肺病也（诸书皆以小儿天癸未足，肾不主病，惟心肝脾肺主之。今忽言及于肾，诚所谓破天荒矣）。盖小儿之真阴未足，柔不济刚，故肝邪易动（人身荣卫脉度，每日寅时起于手太阴肺，然后五十度周于身，至丑时终于足厥阴肝，寅时复交于肺，为阴阳大会之脏，真邪起元之所。而幼科目为肝邪，则人生无不邪之脏矣）。则木能生火，火能生风，风热相搏则血虚，血虚筋急（寒伤阴荣，多见筋急）。筋急则眩掉反张强直之类，皆肝木之本病也（此本《内经》太阳筋所生病，而为惊面之色相，可笑）。至其相移，木邪侮土则脾病，木盛金衰则肺病，木火上炎则心病，木火伤阴则肾病（肝为乙木，阴柔之体，芽蘖之姿，发生之本。天地无此风木，则春生夏长，秋实冬成者，以何物为利，盖五运无此丁壬，则苍黄赤素玄，运行于五天之中者，以何物为从合，六气无此巳亥，则司天在泉，循环于左右两间，更以何物为对化；人生无此肝胆，则受胎一月，如露方凝之际，以何间为重始？肇基化元，莫大乎此。而幼科一偏百和，曰为万恶凶淫之害气。诸脏逢之，无不焦头烂额，乃至于动风生火，凌土侮金，伤阴害水，诸恶毕备。即攻伐并至，不足以尽其辜，除非杀此婴儿，使肝木无置身之地，始可祛其凶残也。违心背理，其何以堪！或曰，大都肾水未足，肝气有余，所以害及诸脏，亦或有之，今必谓其无，恐难尽信。曰：嘻！此言愈相矛盾矣。既知肾水未足，肝气有余，则此无根之木，偏胜之气，摇摇不定，欲住无因，正宜速救根本，滋水以生之，养血以配之，汲汲培补，犹恨其迟，致认为贼邪者，克

之凌之虐之，坐令其凋残摧折，挽救无由，不亦大可悲哉）。此五脏惊风之大概也。（此处明言五脏惊风，则惊风之属五脏也明矣）。治之之法，有要存焉：一曰风，二曰火，三曰痰，四曰阳虚，五曰阴虚（忽谈阳虚、阴虚之法）。

有曰：急慢惊风，古人所谓阴阳痫也（痫为癫疾，非是暴病，不应排入）。急惊属阳，慢惊属阴，惊邪入心，则致面红颊赤，惕惕夜啼；入肝则面目俱青，眼睛窜视；入肾则面黑恶叫，啮齿咬人；入肺则面色淡白，喘息气急；入脾则呕吐不食，面色淡黄（前云惊者吓也，惟心脏受之足矣。此处忽曰惊邪入心、入肝、入肾、入肺、入脾，又不知指惊邪为何物？而哓哓然论之也）。然风非火不动，火非风不发，风火相搏而成惊风；故心肝二脏主之（前云惊邪在五脏，则肝风无与焉，于此又必社入肝风，以证其木火生风之妄语，令人欲呕）。然火虚则金伤，水失其母，而火无所畏，且木无所制，而脾土又受伤矣（独不可曰水盛则火伤，土失其母，而水无所畏，且金无所制，而肝木又受伤矣。牵枝带叶，何患无辞？不过欲实一肝风名目，而累及于五脏，即失火殃鱼，亡猿祸木，未若是之婪也）。

有曰：急惊者，阳证也。小儿阳常有余，阴常不足经曰：阳气者，若天与日，失其所，则折寿而不彰。又曰：阳精下降，其人夭。《易》以阳为君子，阴喻小人，非贵阳贱阴，盖以阳主升生，阴主肃杀故也。幼科之人，必欲相反，圣人则扶阳抑阴，幼科则护阴贱阳，每每以阳有余阴不足为方，然虽谆谆言之，究竟不知其所谓。若谓血为阴，气为阳，经曰：婴儿肉脆，血少气弱。未尝曰血少气多，盖谓真气未生，惟此呼吸一线而已。今认为有余，必使此一线之气出入全无，方可谓阳不足乎！若谓寒为阴，热为阳，寒主收敛，热主发生，人之所赖者，惟此阳和而已。有此阳和，则百骸五官方能运动。今认为有余，必使此温暖之气，寂灭无余，至于四肢僵木，遍体寒水，方可谓阳不足乎！若谓水为阴，火为阳，天一非阴，地二非阳，坎戊非阴，离己非阳，更为不切。若谓肝为阴，肺为阳，金不制木，肝气有余，不知肝属厥阴，职司藏血，血乃阴荣，乙癸同源，误认为阳，益倍殊谬。若谓肝为阴，胆为阳，胆无出入，虽属少阳，专司半表半里，有病惟宜和解表里，严禁汗吐下三法。今误认少阳胆经之热，为阳火有余，轻用凉泻攻下之治，不几故变常经，甘蹈误世之讥乎！若谓真阳有余，小儿天癸未足，真阳尚未肇基，一发无谓。若谓五脏为阴，六腑为阳，即应专泻六腑之阳，不应以心火肝风为贼邪，乃以黄连、甘遂，大寒大毒之物，以泻其不足之阴。不知果何所指而哓哓其词，岂小儿别有所谓阳有余，阴不足乎？予之识见短浅，不足以窥其幽深）。易于生热，热盛则生风、生痰、生惊（巴人下里之音，通国和之者欤）。且食饮难节（忽归咎于食饮），喜怒不常（忽委罪于性情），暴怒伤阴，暴喜伤阳，伤阴则泻，伤阳则惊（上云阳常有余，既有余，则伤不为害。今曰伤阳致惊，则阳之不可伤者，又在言外矣。辞执两端，难堪为式）。小儿暴喜伤乳（上云暴喜伤阳，此言暴喜伤乳，乳为血液，本非属阳，何以暴喜伤之乎）。夫乳甘缓恋膈（又归咎于乳汁，特有发明乳食之议矣），又兼外感寒邪，则痰凝壅塞，郁滞熏蒸（乳既恋膈，寒复外侵，以致于痰凝壅塞，郁滞熏蒸。治疗之术，惟有绝其乳食为上着，不然，病根何时得断哉），内有食热，外感风邪（上云乳滞挟寒邪，此云食热挟风邪，一片迷离梦境）。心家热盛则生惊（前云惊由吓致，此言心热生惊），肝家风盛则发搐，肝风心火交争（前云风非火不动，火非风不发。是风火交相为用者。此言风火交争，不知所争者，何物也）。因乃痰生于脾，风生于肝，惊出于心，热出于肺。惊风痰热四证若具，八候生焉（此篇从阳盛阴虚，生热生风说起，乃至食饮、

喜怒、乳哺，冷热寒邪、内伤外感，多般妆点，仍然说到惊风痰热四字止。费如许心思，不过欲为惊风二字作陪衬，不知无本之举，谬误之谈，任极口铺来，说来，总不顺理，无非东扯西拽，以诳俗人耳目，明眼者必不为其所欺也）。

有曰：急慢惊风，或闻大声，或大惊而发搐，发过如故。此无阴也，当下之（《内经》言：大惊卒恐，气血分离。此正神志受伤，阴阳破散，挽救尚虞其不及，何以见无阴而当下，不虑及其下多亡阴乎）。此证本因热生于心（既大惊卒恐，心热何来），身热面赤，嗜饮，口中气热，大小便黄赤，剧则热也。盖热盛则生风，属肝，阳盛阴虚也，故下之，以除其痰也（上云发过如故，下云身热面赤种种热证。若谓未发搐前而见此证，此由于病，非由于惊也。若谓发搐之后而见此证，则前之所谓发过如故者，不几呓语乎）。小儿痰热，客于心间（无怪乎骤用巴豆、甘遂，以逐心间之痰。岂知小儿作搐，纵使有痰，不过阻于脾之大络，塞其气道耳，何尝能入心间，而以大毒之物伐及无辜，伤其神明之脏，欲不成痫，其可得乎），因闻非常之声，动而发搐矣。若热极不闻声及惊，亦自发搐也（闻声悸惕，神虚者有之。修炼家以精生气，气生神，神之倚气，如鱼依水。凡小儿禀受薄者，先天既不足于妊前，癸水复未成于现在，故元精未足。元气无根，所以元神最怯，每多闻声则惕。此实神虚胆怯不足之证。而幼科不但不怜其元神不足，而偏指为心火有余，不但指心火有余，而并肝风、脾痰、肺热一总扯入，以证其惊风痰热四证八候之妄言。复有闻非常之声，见异类之物，乍然惊怪动惕，此正神魂无主，荣卫俱乱，摇摇泛泛，欲定不能之际，而不为之防护保救，犹曰热生于心，必欲下之以除其痰，入井下石，雪上加霜。此等人，不知是何肺肠，洵堪诧异）。

有曰：小儿平常无事，忽然壮热，手足搐搦，眼目戴上，涎潮壅塞，牙关紧急，身热日赤（既曰平常无事，则无病可知，乍见以上种种恶候，必如俗人所言鬼病也。不然，何以平常无事，而忽凶危若是耶？岂知小儿易感风寒，易伤乳食，在先半日，邪已入内，儿不能言，父母未觉，邪郁不伸，所以乍然而搐，观其忽发壮热之言可知矣。非风寒入里为壮热，即食饮停滞为壮热，此实因病而致，岂平常无事之谓哉！治此无难，但应察其受病之源，外因则达之发之，内因则导之夺之，病邪既去，神性自宁焉耳。若必曰无因而致，在俗人必疑为鬼祟，求之巫觋，庸工必目为惊风，妄为治疗。两相眩误，奈之何哉）。此急惊属阳，病在腑（每云惊风为心肝所主，此处忽云属腑，不知心肝属腑乎，属脏乎？要问幼科之开天祖师，方能辨白，予则眼花撩乱，莫能识也）。

有曰：急惊者，阳证也，俱腑受病耳。小儿客痰热于心膈，是少阳相火旺（每言心火，此曰相火，新奇）。经云：热生风。因时火盛而作（不知此火，何由而盛）。盖东方之震木，得火气而发搐（此处不言肝风心火作搐，硬说为少阳相火作搐，但闻雷得火而丰，未闻震得火而搐。杜撰）。

有曰：身热脉浮，精神恍惚，或吐泻不思乳食，发搐，即半阴半阳合病（身热脉浮，外感风寒也；吐泻兼作，内伤饮食也。但曰外感内伤足矣，何必曰半阴半阳？原其意，不过以身热脉浮属太阳，吐泻属阳明太阴。凡幼科所言者，无非心肝脾之脏病，若曰外感内伤，则惊风痰热之证，何处安顿，岂不自呈败露乎）。身热脉沉，精神倦怠，或吐不泻，又有乳食发搐，亦半阴半阳合病（身热脉沉属太阴，但吐不泻属阳明，明是阳明伤食，太阴受寒，显然夹食伤寒，偏不明言。悲哉）。

有曰：亦有急惊，凉泻而不愈，或与吐下药太过，变为慢惊者（此等之言，益见背谬。诸书以急惊为阳，为实热，既是急惊，则用凉泻无疑，何以不愈？盖因误以伤寒表证

为急惊，所以不愈也。既凉泻不愈，则认证不确，自应愧悔，何昧焉不察，而更用吐下之药乎？凉泻一误，吐下再误，而不变为坏证者，未之有也。非病之能变，由医变之也）；又有慢惊补温而不愈，变为急惊者（幼科疏忽，于此数语，尽见底里。既以脾虚阴寒为慢惊，则用温补，适为恰当。今不特不愈，反加变证，盖误以伤风自汗为慢惊，不知此证本有风邪在表，正宜解肌，今误用温补而致变，偏不言错认病源，误用反药，而曰病变急惊，即至于死，亦曰病变于死，与医何涉？可谓善为说辞者矣）。

有曰：病有阴阳，急惊风属热，病在心肝二脏，谓之阳痫；慢惊风属虚寒，病在脾肺二脏，谓之阴痫，此以寒热分阴阳也（以寒热分阴阳，虽曰牵强，犹可混赖；以心肝二脏主阳痫，不通）。五脏属阴，六腑属阳，急惊发于六腑为易治，慢惊发于五脏为难治。此以脏腑分阴阳也（上节言急惊属实热，病在心肝二脏；慢惊属虚寒，病在脾肺二脏。此以急慢二惊，皆属五脏也明矣，与六腑无涉。下节即云急惊发于六腑，慢惊发于五脏，是又以脏腑均有惊风也。夫六腑者，膀胱、胃、胆、小肠、大肠、三焦，六经是也。其六经证治，轻重不等，理应指明急惊发于何腑。五脏者，心、肝、脾、肺、肾，五经是也。其五经证治，贵贱不同，理应指明慢惊发于何脏，后人始有实据。今竟不指明，第泛言急惊发六腑，慢惊发五脏。岂急惊之来，六腑齐病，应用六经之药治之乎；慢惊之至，五脏均伤，应用五经之药治之乎？必无是理。若以上节心肝脾肺之言为是，则与下节六腑五脏不相侔矣；若以下节六腑五脏之言为是，则与上节心肝阳痫，脾肺阴痫，相矛盾矣。盖腑脏关乎表里，岂容混称！如腑为表，脏为里，表病不可治里，里病不可治表，不易之规，以其阴阳不同，内外自别，不可误治者也。今详前说，既惊风之属脏属腑者，已无定论，而临证之治表治里者，安有成规？吾恐其李帽张戴，势所不免。如前诸家之论，非但脏腑混淆，表里不辨，而反多增名色，眩人心目，曰风、曰痰、曰惊、曰吓、曰火、曰热、曰血虚、曰木急、曰相火、曰阴火、曰外感、曰内伤、曰喜怒、曰乳哺、曰阳盛、曰阴虚、曰属腑、曰属脏，究于惊风二字，毫无着落。其论证如此支离，治疗何能不误，不为规正，其害岂胜言哉）。

诸家之说，已见于前，种种不经，殊难尽述。夫古哲立言，自有定理。如仲景伤寒六经，表里汗下和温，井然不乱，孰敢妄赞一辞！独此惊风之说，纷纭鼎沸，莫可究诘。医事动关生命，岂容混乱经常，不特来学无归，练达者难言不惑。予因不辞狂悖，易去惊风字样，庶知病各有名，治无致误，在医者俾不致入海求蟾，病者亦可以鉴车易辙矣。

辨明致妄之由易去惊字

惊风二字，千古疑城。嘉言欲打破人鬼关，其实未易能也。盖从前有此名目，后人莫敢翻其成案，惟从惊风摹拟，究竟愈摹愈失，愈论愈晦，其实由于仲阳立名之不慎也。在伊当日，或适因婴儿伤寒病痉，乍有反张搐搦之态，故偶立惊风之名，亦犹方脉中之惊悸、惊惕、惊慌等类，初亦未尝即欲以此两字示法来兹，而门人继述不善，遂以惊字为惊吓之惊，风字即惊字之变文，观幼科书中，凡青为风者，皆曰青为惊可知矣。谬为小儿之病，悉由惊而生风。误以伤寒无汗之表证为急惊，以伤风自汗之解肌证为慢惊，以脾败胃伤竭绝之证为慢脾。妄立诸惊名色，眩惑后人，何尝有一毫实际裨于治疗。而诸家旋祖其术，极力敷演，亦不过随波逐浪，猜度摹拟，初无理要可以服人。是仲阳偶以一字之乖讹，而后世受祸如此其烈也。至于见证立名，更为舛谬。如小儿伤寒病痉，外证有头项强，背反张，目上视，此《金匮》所谓能仰不能俯者，属太阳，则称天吊惊；眼目下窜，即《金匮》之颈项几几（音殊），海

藏之低头下视，属二阳合病，则称看地惊；两脚掣跳，海藏所谓肘膝相构属阳明，则称马蹄惊；两手牵引，海藏所谓左右搐搦，属少阳，则称弩弓惊；伤寒病痉，误用惊药，耗其津液，而筋脉受伤，遂致两手拘挛，已为不治之证，乃犹称鹰爪惊，虚证肆行攻伐，乃致脾败胃绝，四肢躄曳，奄奄待尽，犹复称撒手惊。至于阴寒腹痛，面青口撮，口吐白沫，曰鲫鱼惊；脾虚生热，舌络紧急，不时舔舌，曰蛇丝惊；蛔虫贯膈，大叫一声，即昏闷不省，曰乌鸦惊；儿病作热，本为常候，曰潮热惊；食饮停滞，胸腹饱闷，曰膨胀惊。更有诸多不通名项，莫能枚举。夫以上诸证，皆表里寒热分明，证候显然可据。而若辈不究病源，妄立名色，悉以惊字目之。设也人病阳明内实，逾垣上屋，则将名飞天惊。阴极发燥，欲卧泥水中，则将名擗地惊；少阴昏沉嗜寐，则将名瞌睡惊；中消多食无厌，则又名饕餮惊乎？荒唐鄙野，虽奚童爨婢有所不言，而医者公然笔之于书。后人见其证皆惊证，纹悉惊纹，相与依样葫芦，一倡百和，以为一遵古法，谁曰不然。不知论证可任其牵强，而治疗不容于假借。如伤寒病痉，由风寒湿三气合邪，病在太阳、阳明、少阳，与心惊、肝风、脾痰、肺热，风中牛马，若以惊风治之，则无辜心肝脾肺，枉受剥肤，而风寒湿外至之邪，翛然磐石。此岂有一可乎？

予欲为之更改之以为非，易去惊风二字，仍恐流祸无已，将欲以痉字、痓字易之，又虑其不入俗。因思幼科以搐掣名惊，今即以搐字易惊字，屏去祸害之惊，祛除笼统之风，总名之曰搐，庶不骇听，而又不失病痉之本来。复以急惊、慢惊、慢脾之入石堆者，易之为误搐、类搐、非搐之三宝筏，提携沉溺，稳步康衢，将于是乎在焉。

何谓误搐？盖伤寒小儿最多，由医者治不如法，抑遏其表邪，莫能外解，故壮热不退，遂尔变而为痉，则有搐搦反张之候。要知此证由风寒湿所致，虽有身热，俱皆表邪，非火热之比，且与《内经》诸痉项强，诸风掉眩，诸寒收引之例，恰正相符。因剔出风、寒二痉归于误搐条下，俾临证者，知为伤寒病痉，不致有开关镇治之害。何为类搐？盖伤暑疟痢、咳嗽丹毒，疮痘霍乱，客忤中恶，其证显然可见，辨认既明，一药可愈，何至作搐？由医者迁延时日，或抑遏邪气，无所发泄，间有变为搐者，搐非固有，所以谓之类搐。要知此证由火热居多，实非风寒，惟咳嗽疟疾微兼表邪，治者宜审。今遵《内经》诸热瞀瘈，皆属于火之例，共一十条，总归于类搐条下，逐证注明，各从本门为治，以免截风定搐之患。何谓非搐？盖小儿大吐大泻，久病病后，脾败胃绝，昏睡露睛，虚痰来往，此竭绝之证，而幼科以为慢脾风。更以大惊卒恐，神魂离散之证，为急惊风。不知以上二证，死生呼吸，犹敢以惊风称之耶！因体东垣非风之意，竟以非搐名之，使后人知此等证候，全非风搐，而治风治搐之法，远摈三舍，庶可以保全竭绝，而不致于夭折无辜也。以上三门，逐证分晰，其所用药方，一遵经旨，罔敢立异。要使幼科之证，毫无遗漏，而惊风二字，不屏自却，人鬼关岂徒打破，行将化为琼楼玉宇矣。

周虚中曰：雄辞闳辨，驳得诸家之言惊者，无可置喙，快极快极！

新立误搐类搐非搐分门别证

曰误搐，即伤寒病痉也。盖头项强，背反张，目上视，属太阳；低头下视，口噤不语，手足牵引，肘膝相构，属阳明；眼目或左或右而斜视，手足或左或右而搐搦，属少阳。此实三阳表证，岂得混称为惊风？痉由误致，今故易名误搐，然痉有刚柔，治非一类，以柔痉列之于首，刚痉次之，更详其致痉之由，与治痉之方，总归于误搐条下，证治井然有据，明者当不以予为妄也。

柔痉伤风有汗为柔，风性软弱也

经曰：太阳病发热汗出，不恶寒者，名曰柔痉。其证初起，发热自汗，口中气热，呵欠顿闷，手足动摇，甚则反张，由风邪伤卫，荣卫不和。小儿体弱者，最多此证，亦因腠理不密，自汗无时，所以风邪易入。幼科见其多汗昏沉，辄以慢惊称之。

按：此条风邪伤卫，本属轻证。若能早为解肌，调和荣卫，药到病起。误作慢惊，妄投补剂，其祸不可胜言矣此即前诸家所云，慢惊温补而不愈，变为急惊者，即此例也。

刚痉伤寒无汗为刚，寒性刚劲也

经曰：太阳中风，重感寒湿而变痉。盖伤风原有汗，愚人不知，重衣厚被，令其大汗。汗多衣褓必湿，湿久寒生，渗注关节，故为重感寒湿。寒湿内闭，反令无汗，是名刚痉。其证初恶风寒，发热头痛，偎藏于母怀者是也。小儿口不能言，父母一时不觉，但见其发热，不知其恶寒，但见其昏沉，不知其头痛。医者见其发热，满口称为惊风，置伤寒表里于不问，惟事镇坠凉泻，抑遏其表邪，不能外出，必致延及于三阳太阳传阳明，阳明传少阳。所以有身热足冷，颈项强急，头身俱热，面目红赤，独摇头，卒口噤，背反张，手足搐搦，眼目斜视。此则三阳经之全痉，幼科所称四证八候者，即此也。斯时正宜循经用药，解去三阳之邪，其病霍然而起。倘舍此不图，邪必自三阳而入于三阴，发热腹痛，四肢伛偻，能俯不能仰，已成阴痉凶危之候，犹以慢惊风称之，风药乱投，死将旋踵。哀哉！此即前诸家所云，急惊凉泻而不愈，或与吐下药太过，变为慢惊者，即此例也。

按：伤寒之来，岂初日便能变痉，由医者误治致之耳。盖邪自太阳而入，太阳之脉上起于头，中行于背，下至于足，因其经脉受邪，荣卫涩滞，则头项背足，皆有痛楚牵强之象。幼科见此，便诧为惊风，妄行镇坠，以致邪无所伸，而后乃变为痉。此际尚不知为误治所致，而反谓小儿固有之证。此其所以为误中之误也。尝观夏初明治小儿作搐而死，以至三五日不醒者，悉用天保采微汤投之而愈。其子禹锡广传其方，惜无一家发明之，致后人莫维其义。予不辞饶舌，聊为剖露：夫天保采微汤乃败毒散、不换金正气散、升麻葛根汤三方合凑者也。其中作用，以羌、独走太阳而祛寒发表，以苍、前、升、葛、陈、朴、甘、苓走阳明而除湿解肌，以芎、柴入少阳而和解表里，以桔、半、枳、藿、芍药，入太阴而和荣逐饮。或问既为三阳表药，何以辄及于太阴？曰：小儿全藉脾肺为行药之主。此实扶中气以托邪，岂引邪入里之谓耶？然其中一十七味，并非五金八石、三黄四神，而能于死中求活者，岂疏解之药可以起死回生乎？由从前误以伤寒作惊治，未经发散，以致邪闭而死。今投疏解以生者，亦不过为从前补其阙失耳，岂有奇特深义哉！第此等之治，犹为末着。若早循经治疗，又何至如是凶危，始效猎人之罗网四张，希庶几乎一遇。苟如鄙刻所集，一见小儿发热昏沉，即为之分别有汗无汗，有汗者解散肌邪，无汗者开通荣卫，领邪外出，神志自清，又何者闭塞昏迷之变耶？

附血虚寒袭太阳病痉案

周虚中曰：张景岳有云，太阳血少者，多有戴眼反张之证，俗医称为惊风，误矣。盖太阳经脉，起于目内眦，上额，由后颈下背脊，至足小指。凡有血虚不能荣养经络者，一着寒邪，则收引而急缩，理固然也。时俗不察，往往以豁痰截风之剂，耗其血液，岂不悖哉！此景岳之特见也。

予忆往者，张乃媛，年五六岁，体极瘦削，一日群坐，忽然颠倒，作反弓状，自言楼上有鬼，眼目翻腾，见白而不见黑。幼科群集，作惊风治不效，已经三日矣。观其入

之骨露筋浮，明系太阳少血，况楼为枯木，鬼属阴邪，亦系寒气伤荣所致。乃遵景岳之言，与道翁先生相商榷，用厥阴门中当归四逆汤为主，甫投一剂，黑睛稍现，反弓之状亦减，于是连进三服而安。又姻翁高某某乃妾，冬月拥炉向火，忽然背筋抽引作痛，头足弯后，四肢厥逆，眼皮吊起不能下。亦用前汤，倍加当归，大剂煎服，一剂而痊。可见先生之力辟惊风，确乎不谬，而太阳之痉，又有血虚体弱之不同也。

痉有刚柔，刚痉无汗，柔痉有汗。小儿刚痉少，柔痉多，而且肌肤薄，腠理疏，不胜发表，惟宜解肌治痉。当以《金匮》为主，杂《金匮》之方，未敢辄用，而世人亦不能用。今之所选，独海藏五方、《金匮》一方、杂选一方、附血虚寒袭一方，以为婴儿病痉之准则。其随机应变，又在后贤神而明之，予又何敢以拘？

入　方

海藏桂枝葛根汤　治伤风项背强，身热自汗柔痉。此盖邪在太阳，微兼阳明，用此方通其荣卫，则外受之邪，有出无入，其所全甚大。

嫩桂枝一钱　白芍药一钱五分　粉干葛一钱五分　老生姜一钱　大红枣三枚　炙甘草一钱

水煎，热服。仍欲微似有汗，庶风邪自出，而汗孔自闭，但不可令其大汗，致伤荣气。

海藏桂枝加川芎防风汤　治发热自汗柔痉，比前方药性轻微。

嫩桂枝一钱五分　白芍药二钱　北防风一钱　正川芎一钱　老生姜一钱　大红枣三枚　炙甘草一钱

水煎，热服。

予按：此方不特治痉，凡小儿外感初起发热，不论有汗无汗，皆宜用之，效捷桴鼓，人所未识。

海藏柴胡加防风汤　治汗后不解，乍静乍躁，目直视，口噤，往来寒热。此证太阳阳明已罢，邪尚未解，传入少阳半表半里，故以小柴胡汤加防风和解之，不使之入里也。

官拣参七分　北柴胡一钱　片黄芩一钱制半夏一钱　北防风一钱　炙甘草五分　老生姜二片　大红枣一枚

水煎，热服。

海藏防风当归汤　治发汗过多，发热，头面摇，卒口噤，背反张者，太阳兼阳明也。宜去风养血，速救阴荣，以静胜躁也。

北防风一钱五分　当归身二钱　正川芎一钱　大生地一钱五分

净水煎，热服。

《金匮》瓜蒌根桂枝汤　治太阳头痛，身热，身体颈项俱强，无汗，为刚痉。此即先因伤风自汗，汗多衣湿，湿久寒生，反而入内，故谓重感寒湿。寒湿内闭，反令无汗，故见以前诸证，此荣卫闭塞也。设不用此通其荣卫，则未痉者成痉，已痉者难愈矣。

瓜蒌根一钱五分　嫩桂枝一钱　白芍药一钱五分　老生姜一钱　大红枣三枚　炙甘草一钱

水煎，热服，荣卫既和，微汗而解。

予按：小儿发热，身体颈项俱强，在幼科必以为惊风矣。孰肯认为太阳阳明之病痉，而用此开通荣卫之方？若早知为伤寒，能用此方，则未痉者不痉，已痉者可瘳。其如偏执惊风，舍太阳阳明之邪而不治，反攻其无过之心火肝风，致令外邪愈强，内气愈弱，不至于死地不止也。

凡小儿伤寒无汗者，不论已痉未痉，皆当以此方为主，出入加减，断无不效之理。予非亲履实践，必不敢妄言以误世也。

羚羊角散　治刚痉身热无汗，头项强直，四肢疼痛，烦躁心悸，睡卧不宁。

羚羊角屑　真犀角屑　北防风　白茯神　陈枳壳　大麦冬去心　官拣参　粉干葛　北柴胡　熟石膏　炙甘草以上各七钱五分　真龙齿煅，二钱五分

上研粗末。每用三钱，水一盏，煎至半

盏，去渣，温服，不拘时。

予按：此证先由风寒湿闭其腠理，不能开通，内出之气，壅而为热，则风寒湿不能自强，皆化而为热矣。尚在肌肉之间，犹未入里，故以辛凉解散之，实治热也，非治风寒湿也。

嘉言谓此方治伤寒阳痉，深得清解之法。

海藏附子散　治阴痉手足厥冷，筋脉拘急，汗出不止，头项强直，头摇口噤。此由多汗亡阳也。

青化桂七分　川附片七分　漂白术一钱五分　正川芎一钱　川独活八分　大红枣五枚

水煎，温冷服。

当归四逆汤　治小儿血虚体弱，寒邪伤荣，以致眼目翻上，身体反张。盖太阳主筋病故也。

当归身　嫩桂枝　杭白芍以上各三钱　川木通　炙甘草以上各二钱　北细辛一钱　大红枣五枚

水煎，热服。

以上所选之方，原为误搐病痉而设。其下类搐十条，证候不同，各随本门用方，不得与误搐混同论治。

曰类搐，即幼科所云惊风余证者是也。原非小儿固有，由迁延而致，予故名为类搐。何以言之？盖暑证疟痢，咳嗽丹毒，疮痘霍乱，客忤中恶，其证显然可见，但能识证详确，则一药可愈。医者审视不的，药罔对证，迁延时日，其热愈甚。小儿阴血未充，不耐壮热，热盛则神志昏闷，阳亢必津液受伤，血不荣筋，则手足搐掣。此正与《内经》之诸热瞀瘈瞀音务，人事昏闷也；瘛音翅，手足抽掣也，皆属于火之例相符。概将以下十证，皆列类搐条下，仍逐证注明，各依本门用方，庶与误搐非搐之寒热虚实，治不相淆矣。

暑　证

经曰：太阳中热，暍是也。其证初起，面垢身热自汗，烦躁不安，唇舌皆赤，气出如火，小便赤涩，口中大渴。此证常见夏秋。

按：此条在藜藿之儿多有之，以其坐卧烈日之中，澡浴寒涧之内，以致暑气入里，内热外寒，故见以前诸证。医者见其身热自汗，口渴烦躁，疑为惊风，妄用风药，反燥其血，以致心中噎闷，昏不知人，甚则反张搐搦，皆由血不荣筋，烦热过甚之故也。若膏粱之儿，不涉长途，不经酷日，暑证尚少，何有暑风？若谓高堂广厦，口餐生冷，身纳风凉而得之者，即伤寒之类，又何暑之可称？

古人谓暑伤心，其实心不可伤，伤之必死。盖心为君主之官，虚灵湛寂，神性居之，邪不易犯。止因六气之中，以暑配君火，故曰暑伤心，然所犯者心包络耳。包络为心之宫阙，捍蔽外邪，不容轻侮，惟由暑热摇撼外郭，故神志为之昏惑。但泻其太阳内火，则少阴君主神志自宁矣。宜却暑丹。

入　方

却暑丹　治小儿伤暑，误用风药，致心神昏闷，烦躁不安，甚则搐搦。

漂白术五钱　白茯苓五钱　洁猪苓五钱　宣泽泻五钱　青化桂二钱　片黄芩五钱　正川连三钱　镜辰砂二钱　炙甘草五钱

上为细末，炼蜜为丸，如芡实大。每服二三丸，量儿大小加减，麦冬汤化服。或十中取一，煎服亦可。

疟　疾

经曰：夏伤于暑，秋必痎疟。其证初起，呵欠顿闷，发热口渴，面带黄白，头额有汗，一哭汗出，其热渐退二三分，不久复热如故，喉内痰鸣，一哭即呕，呕则痰出，每日如此者，即疟证也。

按：《内经》谓十二经皆有疟，究其所因，而大要不离乎少阳胆经。夫疟之不离乎少阳，犹咳嗽之不离乎肺也。盖凡寒热往来，总为少阳所主。早能和解表里，分理阴阳，则疟邪霍然而散；由其误认惊风，轻施镇坠，以

致正邪激搏，荣卫迟留。阳欲入里，阴内阻之；阴欲出表，阳外遏之。少阳欲升不得升，太阴欲降不得降，乃致精神溃乱，临症而搐。宜清脾饮解之，其搐自止。

入 方

清脾饮 治小儿热症作搐，不必治搐，惟治其症。

杭青皮一钱 制半夏一钱 枯黄芩一钱 草果仁五分 白云苓一钱 北柴胡一钱 真陈皮一钱 漂白术一钱 川厚朴一钱 炙甘草五分

生姜三片，大枣三枚，水煎，热服。

痢 疾

经曰：饮食不节，起居不时，阴受之则入五脏，下为飧泄，久为肠澼。其证初起，两眉皱而多啼，由腹痛也；烦躁不安，由里急后重也；数至圊而不能便，或赤白相兼，或单红单白，是其候也。

按：此证虽曰内伤饮食，莫不由于外感而发也。有至妙之治，人所不知，但以人参败毒散升散之，其病即减。设有食饮停滞，轻则消导之，重则疏通之，去其积垢，无不愈者。昧者不察，反投诃、蔻止涩之，乃致积毒内郁，腹痛里急，欲圊不能。此通因通用之证，而反通因塞用，遂尔神昏扰扰者有之矣。急用沆瀣丹、三仙丹二药同服，疏通之后，其病自去。

入 方

集成沆瀣丹 方见二卷胎病论。

集成三仙丹 治小儿纵口饮啖，食物过多，有形之物，填塞肠胃之间，不能转运传送，脾气抑郁，所以发热不退，眼闭难开，人事昏沉，四肢瘫软，俨然虚极之象。古人谓大实有羸状，即此证也。昧者以为虚证而峻补之，或疑为惊风而镇坠之，百无一救。速以此丸同沆瀣丹同服。待其下后，人事即清。予救治既多，剖心相告：痢疾误用涩药，闭其湿热，比食物有形之塞，殆有甚焉，速宜下之，不下即死。

五灵脂一两，南木香五钱 巴豆仁四十粒

上将灵脂、木香研为细末听用。以巴豆剥去壳，取净肉四十粒，去其肉上嫩皮，纸包水湿，入慢火中煨极熟，取起，另以棉纸包之，缓缓捶去其油，纸湿则另换，以成白粉为度，谓之巴霜。与前二味和匀，醋打面糊为丸，绿豆大，以朱砂为衣，晒干收贮。每服五丸，或七丸、九丸，量儿大小加减，合沆瀣丹二三丸同研烂，茶清调下。待其下后，其病立愈。此起死回生之药，勿以常方视之。

咳 嗽

经曰：咳嗽上气，厥在胸中，过在手阳明太阴。其证初起，面赤唇红，气粗发热，咳嗽痰鸣，或眼胞微浮，额上汗出。此外感风寒，急宜疏解。

按：咳嗽致搐，其证尝少。盖外感以咳嗽为轻，内伤以咳嗽为重。大凡春温夏热秋燥冬寒，四时正病与夫时行疫疠，即至重至危之候，但有咳嗽，便是生机，盖外感一传于六经，断不致死，故谓外感以咳嗽为轻，至于酒色狂荡之辈，平素嗜欲不节，耗费过伤，但逢咳嗽，即为可虑，倘治不如法，则虚劳肺痿，跂足而待，故谓内伤以咳嗽为重。婴儿知识未开，内伤何有？所有咳嗽，无非寒热二者而已矣。寒固伤肺，热亦伤肺，医者能的辨其寒热，对证用方，效无不捷。其如不识阴阳，罔分寒热，应辛散者而反凉泻，应滋润者反用升浮，乃致寒者愈寒，燥者愈燥，欲不声音不转，眼翻手搐，其可得乎？治宜集成金粟丹。

入 方

集成金粟丹 此丸专能疏风化痰，清火降气，并治咳嗽上气，喘急不定，嗽声不转，眼翻手搐。凡诸家截风定搐之方，皆不及此

方之圣。倘前医用药不当，误而致搐，昏沉不醒，即以全身灯火醒之，用此丸一服即痊。

九制牛胆南星二两　明天麻一两，姜汁炒　节白附一两，姜汁炒　净全蝎拣去尾足，以滚汤泡净，去其盐泥，晒干，炒，一两　明乳香去油净，一两　代赭石火煅红，以好醋淬之，煅七次，淬七次，研细末，以水飞，晒干，一两　直僵蚕炒，去丝，一两　赤金箔五十张　真麝香三分　梅花片三分

共为细末，炼蜜为丸，皂角子大，贴以金箔。每用一丸，姜汤化服。此方比抱龙、金液、保命、至宝、定命等方，功倍十百，惟虚寒之痰，无根之气，绝脱之证，不可用之，以其降令重也。

制南星法　用生南星半斤，研极细末，盛于碗内，取牛胆一枚，倾出胆汁于碗内，将南星末和匀，仍复装入胆皮之内，悬有风无日之处，俟其阴干。有胆之时，将前胆剖破，取出南星研末，仍以胆汁和匀，装入悬之，能装过九胆，诚为至宝。任彼正真牛黄，莫能及此，且今之牛黄，切无真者。若市肆胆星，一胆而已，不可用。

丹　毒

《千金》曰：丹毒一名天火，皆风热恶毒所为，入腹则杀人。其证由心火炽盛，热与血搏，或起于手足，或发于头面胸背，游移上下，其热如火，赤如丹砂，形如锦纹，其痛非常。凡自胸腹而散于四肢者，易治；自四肢而入腹者，难治。

按：丹毒虽曰风热，而有胎毒之发者，十之八九，小儿最多，方脉无此。世有丹毒伤生而不知者，盖此毒每发于隐密之处，倘父母不觉，遂致伤儿。大凡小儿头面四肢、胸背胁腋，忽有红晕一点，渐次散开，色如锦纹，外带黄色，即是火丹。速宜砭去恶血，内服沆瀣丹，庶不致内攻作搐；倘医者不知针砭，妄用搽敷，逼毒入内，必致作搐而死。每见丹毒之祸儿者，比比矣。

入　方

集成沆瀣丹　方见二卷胎病论。

磁锋砭法　法见四卷丹毒证治。

疮　痈

经曰：诸痛痒疮疡，皆属心火。

按：疮疖疥癣，小儿独多。由胎毒淫火使然也。治之者，宜清热解毒，使之外出可也。倘医者视为泛常，不先内托解毒，误用砒、硫毒药搽之，逼毒内入，以致疮忽自平，其证腹胀便闭，身无血色，目闭不开，手足动摇。此毒气内攻也。

此条与方脉之发背痈疽，偶伤风湿，而手足搐搦，角弓反张者，大不相侔。盖彼因误伤风湿而病痉，此因误用搽敷而致搐。病因不同，治宜各别。速服雄黄解毒丸微下之，疮出则吉，疮不出如喘者死。

入　方

雄黄解毒丸　治疮疡毒气内攻，腹胀便闭，身无血色，目闭不开。并能解一切疮疥之毒，更可下痰追虫打积。

明雄黄一钱　川郁金二钱　巴豆霜一钱

上为细末，醋打米糊为丸，绿豆大。每服三五丸，白汤送下，以利为度。

痘　疮

痘禀先天胎元之毒，遇时行而即发，其证初起，两眼含泪，珠如水晶，鼻气出粗，睡中惊惕，两耳纹现，恶热不恶寒，痘证也。

按：初起发热三四日间，应与疏通腠理，微解表邪，使毒气易出；若不行疏散，以致腠理固闭，热盛神昏而搐矣。此常候也。先宜入参败毒散升散之，次用导赤散加朱砂，以制其猖獗。痘出则吉，屡搐者凶。

收靥后作搐，此痘毒倒陷，雄黄解毒丸紫草汤下。痘复出者吉，搐不止者凶。五六卷痘疹门论证最详，宜考。

入　方

人参败毒散　治四时感冒，并痘疮升散之用。

川羌活七分　川独活五分　北柴胡五分　信前胡四分　正川芎五分　白云苓五分　真枳壳五分　芽桔梗五分　上拣参三分　炙甘草四分

姜一片，枣一枚，水煎，热服。

导赤散　此清心经之热，从小便而出。

大生地三钱　川木通二钱　生甘草一钱

上作一剂，竹叶七片为引，水煎，临服，加朱砂末一分，调服。

雄黄解毒丸　方见先条疮疡门。

附　案

遂阳文庠立天张君，有子三岁，于今春布种神痘，一夕作搐十数次。痘师某者，坐守其家，莫能得定。次早微明，张君来寓叩门，因诉其作搐之由。予念故人之子，往视之，见其昏迷不醒，手足搐掣，各处艾火疤无数，问所服药，一派凉泻，予知其误治。乃以全身灯火醒之，即能开声，因用人参败毒散令其母子同服，一剂而搐止痘出。可见理之未明，毫厘千里。盖痘麻初起，全赖阳和升生之气，故发热本为正候，由其不与疏通腠理，毒郁不伸，乃致作搐。此时正宜升散，助其生机，顾乃反用艾火堵截之，用凉药镇坠之，欲其搐止，其可得乎？是幼科惊风之说，皆此辈酿成之祸，于患者何有焉！

霍　乱

经曰：足太阴厥气上逆则霍乱。其证先伤于食，后感风寒，邪正相争，心腹绞痛，有上吐下泻者；有上不得吐，下不得泻者，所以烦躁闷乱，其证最急，速宜盐汤探吐之，俟其吐泻之后，乃用藿香正气散分理其阴阳可也。但见喘而搐者，不治。

按：此乃干霍乱也，俗名绞肠痧，由其上不得吐，下不得泻，所以抽搐昏乱。若上既能吐，下既能泻，则宿食痰饮俱去，安有昏乱之理。若曰大吐大泻之后，而见昏愦，此即脱证之例，岂作搐之谓耶？看书若止随文解义，则执一不化，皓首无成，然此犹为中人言之也；至有全不知书，道听途说，讹讹相指，以致于诬民惑世者，此类医中尽多。昔人谓巫者对本宣科，教风扫地，予谓巫者犹能对本宣科，而医中之不肖者，即欲宣科，更苦于无本可对。然则医风之扫地，不殆有甚乎？

入　方

盐汤探吐法　法见二卷霍乱门。

藿香正气散　治内伤脾胃，外感风寒，吐泻霍乱等证。

藿香梗　家苏叶　大腹皮　真广皮　芽桔梗　白云苓　法半夏　六神曲　香白芷以上各一钱　川厚朴　炙甘草各五分

上作一剂，生姜三片，大枣三枚，水煎，温服。

客　忤

小儿客忤，由儿真元不足，神气未充，故外邪客气得以乘之。经曰：邪之所凑，其气必虚。不治其虚，安问其余？忤者，谓外来人畜之气，忤触其儿之正气也。或因生人远来，或因六畜暴至，或抱儿戏骑牛马，或父母骑马远归，未及熏衣，即抱其儿，则马汗不正之气，从鼻而入。经曰：五气入鼻，藏于心肺，则正气受忤，此外因之客忤也。其证口吐青黄白沫，面色变异，喘急腹痛，反侧不安，手足瘛疭。第此证神不昏乱为异耳。治宜涂囟法、搐鼻法，内服摄生饮。

复有内因客忤。或儿平日所喜者，乃戏而夺之；平日所畏者，乃戏而恐之。凡亲爱之人，喜食之果，玩弄之物，心之所系，口不能言，一时不得，遂逆其心志。其候昏昏喜睡，寤不惺惺，不思乳食，即其证也。宜

先顺其心意，内服沉香安神丸并惺惺散。

入　方

涂囟法　专治客忤等证。

灶心土一钱　明雄黄五分　真麝香半分

共为细末，枣肉和匀，捏作一饼子，照囟门宽窄为样，以饼贴囟上，取艾绒作豆大一粒，灸三炷即止。

搐鼻法　治伤风伤寒，头目不清，并治客忤。

正川芎　藿香叶　鲜藜芦各三钱　玄胡索　粉丹皮　镜辰砂飞，各二钱

共为极细末，以少许吹鼻中，得嚏则邪气出矣。

攝生饮　治一切卒中，大小科同。

制南星　南木香　法半夏各一钱半　北细辛　漂苍术　石菖蒲　炙甘草各一钱

上作一剂，生姜三片水煎，热服。

沉香安神丸　治内因客忤。

官拣参一钱　漂白术　真广皮　陈枳壳　芽桔梗　青礞石煅，各五钱　炙甘草　上沉香各一钱　镜辰砂飞，一钱　真川连一钱五分

共为细末，蜜丸炎实大。每一二丸，麦冬汤下。

惺惺散　方见卷二乳子伤寒门。

中　恶

此证比之客忤为更甚。盖客忤无非外来人畜不正之气，中恶则中恶毒之气。如老枢荒厝，淫祠古树，冷庙枯井，败屋阴沟，皆有恶毒之气存焉。小儿触之，从鼻而入，肺先受之，闭其清道，填塞胸中，忽然而倒，四肢厥逆，两手握拳，上气喘急者是也。

复有中恶毒之物者，亦谓之中恶。如菌草河豚，瘟牛疫马，自死六畜，并水鸡虾蚌之类，自口而入，则胃肠受之，故心腹刺痛，腹皮青黑，闷乱欲死。前后二证，俱宜霹雳散搐其鼻，令其喷嚏之后，毒气已出，然后用药。前证中毒气死者，用返魂汤；此中毒物死者，用雄黄解毒丸下去之。

入　方

霹雳散　治中恶卒死，并一切卒暴之证。

猪牙皂三分　北细辛五分　大川芎五分　香白芷五分　蹢躅花半分　明雄黄二分　真麝香半分

上为极细末，每用少许，以灯芯三寸长，蘸药点鼻孔内，以得喷嚏为验。

返魂汤　治中恶卒死，宜此主之，即仲景之麻黄汤也。因其毒气闭塞肺窍，以此开通之。

净麻黄去节，二钱　光杏仁去皮，七个　炙甘草一钱　葱白二寸

水一盏，煎半盏，分数次服。

雄黄解毒丸　方见卷二类搐搐疡门。

一曰非搐，即幼科之慢惊风、慢脾风者是也。

按：幼科有言曰：急惊传慢惊，慢惊成慢脾。慢脾者纯阴之证也。然慢惊亦有虚热，尝多便秘痰壅气塞，便误认为实热。妄用巴、黄，以下痰行便；或妄投脑、麝，以通窍凉脏。致使阴气愈张，阳气愈弱，幸不死而成此证。又有一名虚风，因吐泻日久，风邪入肠，乃大便不禁，面色虚黄，脾气已脱，真元已亏，继此发热，即是慢脾。此不必皆由急惊传至，男子以泻得之为重，女子以吐得之为重。其候面青舌短，头低眼合，吐舌咬牙，声音沉小，睡中摇头，四肢微搐，冷而不收。身则有冷有热，痰涎凝滞，神志昏迷，沉沉喜睡。逐风则无风可逐，疗惊则无惊可疗，乃至重之候，十难救一二也。治法大要：生胃养脾，回阳益志，镇心定魄，化痰顺气。若眼半开半合，手足不冷，二便涩滞，此尚有阳证，须温和化痰理气，不可即用回阳，然亦不可因阳证而用清凉之药。此仅虚火往来，会成如阳证耳。在幼科所论者如此。

予见此等辨论，娓娓其辞，自相矛盾，乖误多端，惟有拊膝长嘘而已。孰料幼科谫劣，

一至此哉！既知慢脾为纯阴之证，又误以慢惊之虚热作实热，误下痰，误通窍，乃致变为慢脾。又有因吐泻日久，风入肠胃，大便不禁，面色虚黄，脾气已脱，真元已亏，继此发热，即是慢脾。如此之候，即应急救真元，维持竭绝，何得以眼之半开半合，手足不冷，二便涩滞，为尚有阳证，不可即用回阳？吁，此浅近之理，犹且未明，面尚欲立言传世乎！盖眼之半开半合，名为昏睡露睛。此脾胃两伤，败极之证，安得目为有余？手足为诸阳之本，四时皆宜温和，今手足不冷，犹幸有一线微阳，牵引接续，尚未至于厥逆，岂可谓之阳证？二便涩滞，由其气血伤败，大肠枯焦，无以滋荣传送，又岂里实便秘之比哉？此等之证，治之得法，尚可挽回，而乃称为阳证，为之顺气化痰，岂眼之半开半合，手足不冷，二便涩滞，果为阳热有余耶？抑由痰凝气滞耶？不然，化痰顺气，将焉用之？呜呼，幼科浅陋，莫可挽救！凡小儿有热，不辨表热里热、虚热实热，阳浮作热，阴极发躁，一概称为阳火。今慢脾之热，无非纯阴之证，真阳被逼，不能存贮，浮越肌表，散漫无归，亡在倾刻，即急为收摄敛纳，犹虑不及，而反谓之阳证，必欲其口鼻无气，两眼不开，四肢冰雪，二便长流，始可谓之阴证乎！立言者见地如斯，继述者自可知矣。予故于此等之证，以非搐名之。使知一意挽救，不用猜度，且亦不须细辨。请以幼科夏禹铸之言，以明斯证之误，亦可见予言之不虚也。

夏禹铸曰：世人动曰慢惊，予独曰慢证，盖此证多成于大病之后。庸工一见病愈，遂不防守去路，或初误汗误下，吐泻久而脾胃虚极，故成慢证。慢字缓字，虽对急字而言，然所以成此证者，亦由于父母怠慢之故。或有汗多不止者听之，吐泻不止者听之，以致汗多亡阳，吐久亡胃，泻久绝脾，成难起之证，故曰慢证。慢证何惊之有？以慢证而云惊，皆属庸医见儿眼翻手搐握拳，形状似惊，故以惊名之，一作惊治，或推或拿或火，是犹儿以下井，而复落之以石也。慢证者，脾虚也。眼皮属脾，脾败故眼皮不能紧合，而睡则露睛；虚则脾失元气，故两目无神而漂泛；脾败则枯涎无统，故凝滞咽喉而有牵锯之声；手足为脾胃所司，脾胃败，故四肢厥冷；虚必生寒，寒则大便泻青而小便清利。便知为慢脾之候。若疗惊则无惊可疗，祛风则无风可祛，除痰则无痰可除，解热则无热可解，惟脾间枯痰虚热往来耳。治此或以六君子汤加炮姜，或理中汤加附子。

此夏氏之见，超乎流俗。申明慢惊慢脾，一皆竭绝之证，而疗惊祛风、除痰解热之治，毫不可用，先得我心之所同然者。今以夏氏所云吐泻脾败之证，列之于前，复以景岳所云大惊卒恐次之，归于非搐条下，以见此等之证，总非风搐，庶不乞灵颅囟，枉害无辜也。以上治法，悉依夏氏、张氏原方，予毋容复赘。

吐　泻

经曰：少阳所至为涌呕。又曰：春伤于风，夏生飧泄。其证先伤乳食，后感风邪，乃致脾胃受伤，吐泻不止，渐至遍身四肢口鼻俱冷，手足微掣，昏睡露睛。盖小儿全赖乳食以为命，吐多则乳食不入，泻多则乳食不藏。吐则伤气，泻则伤血，乳食既绝，气血复伤，速救真元，以免竭脱。

入　方

六君子汤　治小儿吐泻之后，脾胃大伤；或大病之后，不思乳食；一切久病中气虚寒，并皆治之。

官拣参一钱　漂白术二钱　白云苓一钱五分　法半夏五分　真广皮五分　炙甘草一钱

四肢厥冷，加炮姜，甚者，加附子五分；手足搐掣，加青化桂七分，钩藤一钱。

上作一剂，煨姜三片，红枣三枚，早米一撮，水煎，温服。

理中汤　方见卷二乳子伤寒证治。

大惊卒恐幼科以此为急惊，故详辨明之

张景岳曰，小儿忽被大惊，最伤心胆之气。《内经·口问篇》曰：大惊卒恐，则气血分离，阴阳破散，经络厥绝，脉道不通，阴阳相逆，经脉空虚，血气不调，乃失其常。此《内经》概言受惊之病有如此，矧小儿气血尤非大人之比。若受大惊卒恐，则真神气失散，愦乱不堪，尚何实邪之有？斯时也，收复正气，犹恐不暇，顾可复为清散耶！即如朱砂、琥珀之类，不过取其镇坠之意，亦非救本之法。今幼科诸书，皆以大惊之证，例作急惊，误亦甚矣。不知急惊由于风热，慢惊由于脾肾之虚，皆不必由惊而得余之千言万语辟除惊风，只消景岳二十三字便以道尽。后贤若肯于此数语体认，更不必予之琐琐于斯也。而此以大惊致困者，本乎心胆受伤，神气陡离之病，当以收复神气为主。宜秘旨安神丸、团参散、独参汤之类，加金银等物煎服之。

入　方

秘旨安神丸　原治心血虚而睡中惊惕，并治大惊卒恐。

官拣参　净枣仁　白茯神　法半夏以上各一钱　大当归　杭白芍　小橘红各七分　北五味七粒　炙甘草五分

上为细末，炼蜜为丸，如芡实大。每服一丸，生姜汤化下。

团参散　治心虚血热，自汗盗汗，并治大惊卒恐。

官拣参　白当归等分

上为细末，用猪猪心一个，切作三片，每以药末一钱，用猪心一片，煎汤调服。

独参汤　治气虚气脱，神散魂离，以此亟救元阳，神草还丹之名，诚不愧也。

官拣参不拘多少，同炒米、煨姜、红枣浓煎汤，徐徐服之，实有起死回生之力。

或曰：伤寒病痉与非搐二条，不可用惊风之治，已闻命矣。而类搐十条，既为火热，何以不用惊风门中，截风定搐，凉泻镇坠之法治之，此何意也？曰：暑、疟、嗽、痢、痘、霍乱、丹疮，病虽不一，而搐由病致，第寻其源，治其病，而搐自止，若不去病，而用截风定搐、凉泻镇坠之治，作抑遏其病邪，非但搐不能止，必致变生他证。医者复不察其本病未去，疑为惊风症重，药不去病，而用毒劣劫夺之者。每见治惊风，愈治愈危，乃至不救者，皆此弊也。曰：由谈惊风而得治病求源之要，诚至论也。请笔之以为来学式。

以上误搐类搐非搐证，共一十四条，即幼科之急惊慢惊慢脾者，尽止于此，业已条分缕晰，逐款逐条注明矣。临治者，当知各证之病源有别，而治疗之攻补自殊，不得复以急惊慢惊慢脾混同立论，而以截风定搐之死法统治之。从前未经剖露，犹谓陷于不知，今已证治判然，惟祈后贤留心讨论，神而明之。医称仁，于是乎不相远矣。

附小儿时疫证治

吴又可曰：凡小儿感冒风寒，疟痢等证，人所易知，一染时疫，人所难窥，所以耽误者良多。盖幼科详于痘疹吐泻惊疳，并诸杂证，在伤寒时疫，甚略之，一也。古人称幼稚为哑科，盖不能尽罄所苦以告师，师又安能悉夫问切之义，所以但知其身热，不知其头疼身痛，但知其不思乳食，心胸膨胀，疑其内伤乳食，安知其疫邪传胃也，但见呕吐恶心，口渴下利，以小儿吐泻为常事，又安知其协热下利也，又何暇致思为时疫，二也。小儿赋质娇怯，筋骨柔脆，一染时疫，延捱失治，即便两目上吊，不时惊搐，肢体发痉，十指勾曲，甚则角弓反张。必延幼科，正合渠平日学习见闻之证，因多误认为慢惊风，遂投抱龙丸、安神丸，竭尽惊风之剂，转治转剧。因见不啼不语，又将神门、眉心乱灸，艾火虽微，内攻甚急，两阳相搏，如火添油，死者不可胜计，深为痛悯！今凡遇地方疫毒流行，大人可染，小儿独不可染耶？但所受之

邪虽一，因其气血未足，筋骨柔脆，故所现之证为异耳。务宜求邪以治，故用药与大人仿佛。凡五六岁以上者，药当减半；一、二、三、四岁者，四分之一可也。又肠胃柔脆，少有差误，为祸更速，临证尤宜加慎。

入　方

太极丸　凡疫疠流行之时，小儿作热，即是时疫。乍有眼目上窜，角弓反张，手足搐掣，不可误认惊风，但以时疫之治自愈。

天竹黄五钱　胆南星五钱　酒大黄二钱　直僵蚕三钱　真麝香二分　梅花片二分

共为细末，端午日午时修合，炼蜜为丸，如芡实大，朱砂为衣。凡遇疫证，姜汤化服一丸，神效。

痫　证

钱仲阳曰：小儿发病，因气血未充，神气未实，或为风邪所伤，或为惊怪所触，亦有因妊娠时七情惊怖所致。若眼直目牵，口噤流涎，肚膨发搐，项背反张，腰脊强劲，形如死状，终日不醒，则为痉矣。

按：仲阳之说，亦明知有痉病，而谓终日不醒者为痉，不知痉病为三阳表证。据幼科所称惊痫，为心肝脾肺之里证。今反以表病腑病为重，里病脏病为轻；经脉行于皮肤肌肉者为重，经脉行于内脏贯膈者为轻；邪伤传导之腑为重，邪伤神明之脏为轻。颠倒背谬，令人不解。仲阳尚为此言，又安保后人之不讹传也！

万密斋曰：痫者，卒然而倒，四肢强直，目闭，或眼珠翻上不转，口噤，或有咬其舌者，口中涎出，或无涎者，面色或青或白面色或青或白，后贤仔细着眼，或作六畜声，其状不一，乃小儿之恶证也。昏晕一时，即醒如常矣。其发也，或以旬日计，或以月计，或以岁计。古人有三痫五痫之名，证治太多，似无一定之说，故后学不知其所从也。凡治痫之法，幼科所载，其方甚多，而无可取者，惟予家秘新方，名断痫丸，诚治痫之神方也。

予按：密斋之说，不为无见，乃私心窃喜，赖有斯人为之砥柱。及考其断痫之方，则皆寒凉攻伐，镇坠毒劣之药，予又以为不尽然焉。夫痫者癫疾也，非暴病之谓。亦由于初病时，误作惊治，轻施镇坠，以致蔽固其邪，不能外散，所以留连于膈膜之间，一遇风寒冷饮，引动其痰，倏然而起，堵塞脾之大络，绝其升降之隧，致阴阳不相顺接，故卒然而倒。病至于此，其真元之败，气血之伤，了然在望，挽之不能，犹认作此中之邪，无异铁石，非攻坚破垒，不足胜其冥顽。呜呼，以娇嫩亏歉之体，而犹人井下石，岂司命慈幼之心哉！因录原方，以正其惑。

断痫丸此方重坠，寒凉毒劣，用之增困

川黄连　青礞石　石菖蒲　辰朱砂　蚌珍珠　铁华粉　胆南星　白甘遂　上沉香　白茯苓

别以人参一钱，白术三钱，煎汤煮糊为丸，猪心汤下。

通心丸本非心病，何用通心？伐及无辜，未可为训

辰朱砂　马牙硝　明雄黄　真麝香　白附子　陈枳壳　正川芎　白茯苓　拣人参　川黄连　金银箔

蜜丸，麦冬汤下。

此即所谓断痫丸也。予谓此等之见，似未离乎幼科习气。夫病至于痫，非禀于先天不足，即由于攻伐过伤。每见痫儿，无不肌肥面白，神慢气怯，即万氏亦谓面色或青或白，岂有青白之儿，能任攻伐者乎？只因中气素弱，脾不运化，则乳食精微，不化荣卫，而化为痰，偶值寒凝，即倏然而发。岂必心窍有痰而后发哉？若果心窍有痰，则已懵然一物，何以发过清明如故？可知非痰迷心窍之证，误作痰迷心窍之治，愈攻愈败，愈发愈勤，不至于废弃不止也。有识者补救尚虞不暇，犹敢以礞石、朱砂、珍珠、铁粉之重

坠，伤其心气，以甘遂大毒之物，损其心血，更加黄连之苦寒败胃，虽有一钱之人参，如红炉点雪。后方朱砂、牙硝、雄黄、金箔之类，亦犹是也。原其意，不过谓重坠可以镇心，苦寒可以泻火，毒劣可以攻痰。此等治痫，无异赧王伐秦救赵，而周赵卒为秦并，虽理或有说，而势所不能也。故予之治痫，从不用治痫之方，而十全其十。此等之证，非用从治之法，莫能成功。其如幼科诸君，枋榆自足，高远厌闻，惟知见证治证，不知古哲有见痰休治痰，见血休治血，有汗勿止汗，逢热莫退热，喘生毋降气，精遗勿涩泄之训。此盖从治之法，而幼科视为泛言，寄司命之责者，固如是乎！有见者毫不治痰而痰自不生，毫不治痫而痫自不作，此其所以为神也。

入　方

消风丸　凡治小儿诸般痫证，先服此丸七服。此非治痫之药，用以疏散外感，开通经络，庶后药得以流通故耳。

南薄荷　川羌活　川独活　北防风　明天麻　荆芥穗　正川芎　北细辛以上俱一钱　胆南星二钱

上为细末，炼蜜为丸，重一钱一颗。每日一丸，薄荷、苏叶汤化服，服完七丸，方服后药。

集成定痫丸　治小儿痫证，从前攻伐太过，致中气虚衰，脾不运化，津液为痰，偶然有触，则昏晕卒倒，良久方苏。此不可见证治证。盖病源深固，但可徐图，惟以健脾补中为主，久服痰自不生，痫自不作矣。倘系年深日久者，与河车八味丸间服。无不愈者。

官拣参一两切片，焙干　漂白术一两五钱，切片，土炒　白云苓一两，切片，姜汁蒸过，晒干　真广皮一两，酒炒　法半夏一两　石菖蒲五钱，取九节者，切片　白当归一两，酒洗，晒，切　青化桂五钱，去皮，得桂不用　杭白芍一两，酒炒　白蔻仁一两，酒炒　漂苍术一两，用黑芝麻拌炒、南木香五钱，忌火　真龙齿一两，火煅醋淬，研末，水飞过，晒干，取五钱　赤金箔三十张　镜面砂三钱，研末，水飞，晒干听用

上药各依分两制过，合为一处，焙干，研细末筛过，炼蜜为丸龙眼核大，以朱砂为衣，贴以金箔，晒干，以磁瓶收贮。每日早午晚各服一丸，姜汤化服。痫证未久者服此，倘年深日久者，早服河车八味丸，午晚服此。无力备参者，不用亦可。

河车八味丸　治小儿痫证，年深日远，肝肾已亏，脾肺不足，心血耗散，证候不时举发。此证总归于虚，不可以为有余而攻逐之，致成不救。但以此丸早服，以救肝肾，前定痫丸午晚服，以宁心健脾生肺，则万举万全，真神治也。

紫河车一具，头生男者，用白矾煎汤揉洗极净，用姜汁同酒煮烂　大地黄三两，姜汁、砂仁同酒煮烂　净枣皮一两，炒干　粉丹皮五钱，酒炒　宣泽泻五钱，盐水炒干　嫩鹿茸二两，切片，炒干　白云苓一两五钱，乳汁蒸晒　怀山药一两五钱，酒炒　川熟附七钱五分，切，焙干燥　青化桂七钱五分，去粗皮，研　北五味一两，去梗，炒干　大麦冬一两，去心，糯米拌炒

上药依法炮制，和为一处，焙极干，研为细末，炼蜜为丸，龙眼核大。每早一丸，用淡盐汤化服，以饮食压之。午及临卧，各用前定痫丸一服。

幼科预宜修制应用丸粟七方

消风丸　凡疏通腠理，清解表邪，启发皮毛，流利经络，病之初起者用之。

方见卷二痫证门。

集成金粟丹　凡开关通窍，下气利痰，醒昏定痉，一切危急者用之。

方见卷二咳嗽门。

集成沆瀣丹音亢械　凡导滞清热，降火利膈，解胎毒，去积热，通利二便用之。

方见卷二胎疾门。

泻青丸　凡退热平肝，清表里，定痉搐，解烦退热，表里两急者用之。

方见卷四啼哭门。

理中丸　凡脾虚中寒，面青腹痛，寒呕寒泻，四肢厥冷，一切虚寒者用之。

方见卷二乳子伤寒之理中汤，加增分两，炒研蜜丸，即理中丸。

三仙丹　凡饮食过多，有形之物填塞中焦，及痢疾大便不通，一切宜攻下者用之。

方见卷二痢疾门。

太极丸　凡遇年岁疫疠流行，小儿发热昏沉，甚则作搐者，时疫也。宜用此。

方见卷二小儿时疫门。

以上七方，皆宜预为修制，以备急需。凡古方截风定搐之药，无所用之，不必留意。

乳子伤寒证治

幼科谓小儿八岁以前无伤寒，不知此语出于何经？夫寒风暑湿燥火，为六气政令，乃阴阳代谢之机，岂伤人之物？只因人之脏气不足者，各从其类而禽受之，因其偏受而致病，所以谓六淫之邪，其来自天，决无择人而入之理。今谓小儿八岁以前无伤寒，不知寒邪不伤八岁以前之儿乎？抑八岁以前之儿不受寒邪之伤乎？若谓八岁以前天癸未足，则八岁以后天癸仍未足，则应云十六岁以前无伤寒，又何独以八岁为言哉？夫癸肾内藏真阳，与膀胱为表里，今癸水真阳未足，则壬水清寒，故寒邪之来，各从其类，竟趋太阳寒水之经，以寒召寒，诚莫能御，所以小儿伤寒为最多。今谓其无伤寒，不几令小儿之病伤寒者，束手待毙，皆死非命乎！非小儿无伤寒，因其荣血未充，易于生热，治之不当，即变而为痉。幼科指为惊风者，即此是也。然小儿伤寒，贵于急治，但不宜发表，由其肌肤薄，腠理疏，恐致汗多亡阳。若能于初起之时，即为解肌，祛其表邪从外而出，则必无变痉之虞矣。

或曰：伤寒同一病耳，面乳子与小儿治各有异，何也？曰：乳子筋骨柔脆，不耐伤寒，初入太阳，即人事昏沉，浑身壮热，筋脉牵强。医不详辨，误认惊风，其祸立至。所以乳子伤寒贵于急治，故辨证不繁，用方宜简，若迁延时日，则无力耐之矣。是以与小儿之传经论治者，缓急不同。

其证初起，男体重，面黄而带惨色，女面赤而带惨色，喘急恶寒，口中气热，呵欠顿闷，项急者是也。

如恶风寒，心偎藏其身于母怀者，是藏头伏面，此谓表证。可与解肌，桂枝防风汤。

如恶热，出头露面，扬手掷足，烦渴便秘，掀衣气粗，是为里证，略疏通之，小柴胡汤加大黄，中病即止。

如头额冷，手足冷，口中气冷，面色暗淡，大便泻青，此为阴证里虚。当救其里，宜理中汤。

如大热大渴自汗，此表里实热。宜和解，柴胡白虎汤清之。

又有先伤风寒，后伤饮食，或先停饮食，后感风寒，名夹食伤寒。其证壮热头痛，嗳气腹胀，大便酸臭，留连不解，大柴胡汤下之。体素弱者，猩猩散。

入　方

桂枝防风汤　治半周一岁以至三五岁幼儿，伤寒初起，恶寒发热，体重面黄，或面白喘急，口中气热，呵欠顿闷，速以此方解散肌肉之邪。此方有汗能止，无汗能发，不致过汗亡阳，为幼科解表之第一方。

嫩桂枝一钱半　杭白芍二钱　北防风一钱半　老生姜一钱　大红枣五枚　炙甘草一钱

上作一剂，水煎，热服。有痰，加北芥子一钱；有呕吐，加陈皮、半夏各一钱；热多，加柴胡一钱；胸紧气急，加枳壳、桔梗各一钱。

小柴胡汤加大黄　治小儿里热恶热，出头露面，扬手掷足，烦渴燥粪，掀衣气粗，微利之。

官拣参七分　北柴胡一钱半　片黄芩一钱

法半夏一钱　炙甘草五分　锦庄黄一钱

生姜三片，红枣三枚为引，水煎，热服。

理中汤　治阴证里虚，头额冷，手足冷，口中气冷，面色暗淡，大便泄青。

官拣参一钱　漂白术二钱　炮姜炭一钱五分　炙甘草一钱

大枣三枚为引，水煎浓，凉冷服。

柴胡白虎汤　治表里皆热，大热大渴自汗。

官拣参一钱　熟石膏二钱　净知母一钱　北柴胡一钱　炙甘草一钱

合一剂，用早粳米一撮为引，水煎，热服。

大柴胡汤　治夹食伤寒，其证壮热头痛，嗳气腹胀，大便酸臭，延绵不解。

北柴胡一钱五分　锦庄黄一钱　法半夏一钱　赤芍药一钱　小枳实一钱二分

生姜三片，大枣一枚为引，水煎。热服。

惺惺散　治小儿真元不足，气血怯弱，内伤外感，热不能受。

官拣参一钱　漂白术一钱五分　白云苓一钱　白芍药一钱　芽桔梗一钱　天花粉一钱，酒炒　北细辛五分　正川芎一钱　北防风一钱

生姜三片，红枣三枚为引，水煎，热服。

小儿伤寒类治 出程风雏《慈幼筏》

帝曰：人伤于寒，而传为热，何也？岐伯曰：夫寒盛则生热也。帝曰：今夫热病者，皆伤寒之类也。小儿八岁以后，气血充足，经脉完固，伤寒与大人同治。仍自表达里，先皮毛，次肌肉，次筋骨、肠胃，丝毫不爽。其始也，先从太阳寒水一经，有恶风恶寒，头痛脊强等证。寒郁皮毛，是为在表。脉浮紧无汗为伤寒，麻黄汤发之，得汗而解；脉浮缓有汗为伤风，以桂枝汤散之，汗止而解。

〔疏〕太阳经在最外一层，故邪入皮毛，即先伤之。皮毛不能传变，由太阳之络脉传入本经，而后内入诸经也。邪客皮毛，即玄府闭汗孔也。人身脏腑之气，无刻不与外气通，通故和畅；玄府闭则内气不能发泄而生热，非风寒能变热也。此时但发其皮毛，玄府开而邪随汗散矣。麻黄、桂枝汗皮毛之方，非解中之药也。若表不解，热积而日甚，从本经反而之内，及各经之井荥俞合交会之处，则热传于他经，而各经并见矣。经脉所出为井，所溜为荥，所注为俞，所入为合，十二经脉莫不皆然。

太阳既罢，无头痛恶寒，脉又不浮，为表证罢而在中，乃阳明少阳之间。脉不浮不沉，而在乎肌肉之间，皮毛之下。然有二焉：若微洪而长，阳明脉也，外证鼻干不眠，用葛根解肌；脉弦而数，少阳脉也，外证胁痛、耳聋、口苦，寒热往来，以小柴胡汤和之。盖阳明少阳，不从标本，从乎中治。若有一毫恶寒，邪尚在表，虽入中，还当兼散邪。

〔疏〕肌肉不能传变，肌肉之中皆经络也。经络谓之中，里则脏腑，表则皮毛。脏腑之气血，惟经络传达；外邪之壅热，亦惟经络传变。故阳明少阳皆从中治。中者，经病也，非胃与胆病也阳明属胃，少阳属胆，皆外之经络受病，非内之胃与胆病也。经病用和解，必由汗散，然非开发皮毛之法矣。盖邪初客表，经中阴津受伤，但启其毛窍而汗自通；及热传中经，血液燔灼，窍虽启，而汗为热隔，不能外达。庸工不知，尚用风热之药，以发其表，益助热而耗阴，汗源干涸，究竟不得汗而毙者多矣。仲景和解只清解热邪，而津液自存，阴汗既充，涌出肌表，而外邪自然涣散。此养汗以开玄府，与开玄府而出汗者，迥乎不同也。

邪在阳明则解肌，邪在少阳则和解。然病犹未退，既为传里实热，脉不浮而沉，按之筋骨之间，所谓阳明胃府病也，与经病不同阳明经病已罢，至此传入于胸中之胃府矣。若脉沉实有力，外证不恶风寒而反恶热，谵语大渴，六七日不大便，皆肠胃燥实致之，轻则大柴胡汤，重则三承气，大便通而热退矣。

〔疏〕热邪入里，驱出为难，故就大便通

泄，从其近也。得汗而经邪从汗解，非汗为害，而欲驱之也。便矢而府邪从矢出，非矢为难而欲攻之也矢与粪同。医不察此，但知消克泻下之法，始终禁绝饮食，求一便矢为能事，殊可笑矣！

寒邪直入三阴之经，名曰直中。乃三阳主气衰，无热拒寒也。故初起即手足厥冷，或战栗蜷卧，不渴，或腹痛呕吐泄泻，或口吐涎沫，面如刀刮，不发热而脉沉迟无力。此不从阳经传入同治之例，更当外证何如。轻则理中汤，重则姜附汤、四逆汤治之。

〔疏〕伤寒者，由皮毛经络而后入脏腑。初虽恶寒发热，而终为热证，其人必素有火者；直中脏腑，始终恶寒而并无发热等证，其人必素无火者。一则发表攻里，一则温中散寒，两途判然明白。证有反常者，如发热而赤烦躁，揭去衣被，饮冷脉大，非阳证乎？然投凉药而死者，何也？内有伏阴也。切其脉，不论浮沉大小，必指下无力，按之筋骨之间皆然，甚者服一切茶汤及药皆吐，此阴盛格阳，乃白通汤加入尿猪胆汁证。仲景将传经、直中并论，正谓有阴证似阳，阳证似阴耳。如太阳证头疼发热，当脉浮而反沉，又似少阴矣，故用麻黄附子细辛汤；少阴证脉沉，应无热而反发热，又似太阳矣，须用甘草干姜附子汤。阴证四肢厥逆，而阳证亦有厥逆，此四逆汤与四逆散不同也；阴证下利，阳证亦有漏底，此理中汤与黄龙汤不同也。

伤寒总括五法

一曰发表，其证脉浮发热，身痛恶寒，脊项强，气喘咳嗽，头痛，四肢拘急，口舌和，脉不沉，口不渴，大小便如常，方主麻黄、桂枝、青龙之属；

一曰解肌，脉尺寸俱长，目痛鼻干，漱水不欲咽，方主葛根汤，升麻、葛根之属；

一曰和解，脉不浮不沉，往来寒热，呕吐胁痛，胸前胀满，耳聋，头汗盗汗，目眩口苦，方主小柴胡、大柴胡之属；

一曰攻里，脉至沉而有力，潮热恶热，腹痛，下利转失气，手足心腋下有汗出，咽干齿燥，目不明，谵语发狂，小腹满，下利清黄水，不得眠，小便多，自汗；外证头痛发热俱罢，方主白虎、小承气、六一、顺气之属；

一曰救里，脉沉无力，下利清谷，小便清长，四肢厥冷，呕吐清水涎沫，背恶寒，蜷卧多眠，囊缩，爪甲青，吐蛔，干呕舌卷，手足拘急，身体痛如被杖，方主理中、四逆、真武、白通之类。

入　方

麻黄汤　治太阳经寒伤荣，发热无汗恶寒。

净麻黄　嫩桂枝　光杏仁　炙甘草各等分

水煎，热服。得汗而解。

桂枝汤　治太阳经风伤卫，发热自汗恶风。

嫩桂枝一钱五分　杭白芍二钱　老生姜一钱五分　大红枣五枚　炙甘草一钱

水煎，热服。仍得微汗，不可大汗。

大青龙汤　治太阳证见风脉。

净麻黄　熟石膏各三钱　嫩桂枝一钱　光杏仁五枚　炙甘草四钱　老生姜一片　大红枣一枚

水煎，温服。惟恐汗多。

太阳证而见风脉，是有头痛身热，无汗恶寒，但脉不紧而缓，为伤寒兼中风之候，故合麻黄、桂枝用之。风寒外盛，则人身之阳郁为内热，石膏所以加也。曰大青龙，言其行云致雨之速。然苟不善用，则亡阳之祸，变为筋惕肉瞤矣，可不慎哉！

小青龙汤　治表不解，心下有水气，干呕，或咳，或噎，或喘。

净麻黄　嫩桂枝　白芍药　制半夏以上各一钱二分　炙甘草　白干姜　北细辛各五分　北五味十二粒

水煎，温凉得所，徐服。

表不解者，头痛身热尚在也。渴时饮水过多，故心下有水气。咳噎喘者，水寒射肺也。有声无物曰干呕。此方麻、桂、草发表，夏、辛、姜散水气，芍药和阴血，五味收肺气，所谓青龙者，东方木神，主发育万物之义。

葛根汤　治阳明胃经，目痛鼻干不眠。

粉干葛一钱五分　赤芍药　嫩桂枝　炙甘草各六分　净麻黄去节，一钱　鲜葱白二茎　老生姜一片　大枣一枚

净水煎，热服。如恶寒，加麻黄；恶风，加桂枝。如正阳明腑病，不恶寒，有汗而渴，当用白虎汤。

升麻葛根汤　治邪在阳明经，无汗恶寒发热。

绿升麻　粉干葛　赤芍药　炙甘草

净水煎，热服。

此方疏表去寒，和血调气，故为痘家之用。

惺惺散　方见前乳子伤寒门。

小柴胡汤　治少阳胆经，耳聋，胁痛，寒热往来，口苦。

北柴胡三钱　官拣参　片黄芩　法半夏　炙甘草各一钱　生姜一片　大枣一枚为引

水煎服。

按：此经无出入之路，不可汗下，止此汤和解之，如兼阳明证，本方加葛根、芍药；如尚有恶寒等证，用大柴胡汤。

太阳经表之表也，行身之背；阳明经表之里也，行身之前；少阳经半表半里也，行乎两胁之傍。过此则少阴、太阴、厥阴，俱入脏为里。

大柴胡汤　治表症未除，里证又急，汗下兼行。

北柴胡一钱五分　片黄芩一钱　白芍药一钱　法半夏八分　锦庄黄七分　小枳实四分　老生姜三片　大红枣一枚

水煎，空心热服。

白虎汤　治身热大渴而有汗，脉洪大者。无渴者不宜。

熟石膏三钱　净知母二钱　炙甘草一钱　晚粳米一撮

净水煎浓，热服。

邪入于里，内有实热，故恶热，热越故有汗，里燥故有渴，邪盛故脉大，邪在阳明故脉长。白虎者，西方金神也。名此者，欲秋金之令行，而夏火之炎息耳。此暑月热病发热正方。石膏寒中之药，淡而辛，能汗能利，必其入有大汗而渴，齿燥，脉洪长可用。若无汗，脉虚而不洪长，或重按全无，虽壮热口渴，象白虎证，此脾胃气虚，元阳不足，误服必死。

调胃承气汤　治太阳阳明，不恶寒，反恶热，大便秘结而呕，日晡潮热。

锦庄黄三钱　白芒硝二钱　炙甘草一钱

生姜五片，水煎，热服。

大承气汤　治阳明太阴，谵语，五六日不大便，腹痛烦渴，并少阴舌干口燥，日晡发热，脉沉实者。

锦庄黄五钱　川厚朴二钱　小枳实二钱　白芒硝二钱　老生姜五片

用水煎滚，热服。

小承气汤　治六七日不大便，腹胀满闷，病在太阴；无表证，汗后不恶寒，潮热狂言而喘者。

锦庄黄三钱　川厚朴二钱　小枳实二钱

净水煎浓滚，热服。

桃仁承气汤　治外证已解，大便黑，小便利，为瘀血证。

锦庄黄二钱五分　白芒硝一钱五分　嫩桂枝一钱　光桃仁十粒　炙甘草一钱

水煎滚热，空心服。

凡用三承气者，须以手按病人，自胸至小腹，果有硬处，手不可近，又看其舌之燥滑何如。然后分别当急下者，宜大承气汤；可少与者，宜小承气汤；宜微和胃气者，调胃承气汤。此以仲景圣法用之也。

小建中汤　治伤寒腹中急痛，阴阳相乖。

嫩桂枝一钱　白芍药二钱　炙甘草一钱　新饧糖五匙　老生姜五片　大红枣三枚

净水浓煎，半饥服。

阴证腹痛，不大便，桂枝芍药汤；腹痛甚，桂枝大黄汤；腹痛自利，小便清白，宜四逆、理中。

黄芪建中汤　治伤寒汗后身痛，脉迟弱者。

炙黄芪一钱五分　炒白芍二钱　青化桂一钱　炙甘草一钱　老生姜五片　大红枣五枚

煎好，入饧糖三匙，再煎一沸服。若微溏泄者，或呕者，皆不用。

汗多耗损阴气，不能荣养筋骨，故痛，阳虚故脉迟，汗后故脉弱。此乃建立中气，使生长荣卫，通行津液，则表不虚，而身痛自愈。

理中汤　治太阴即病，自利不渴，寒多腹痛。

人参片二钱　漂白术三钱　炮干姜一钱　炙甘草一钱

净水浓煎，温凉徐服。

真武汤　治汗发过多，心下悸，头眩，身瞤，振振欲擗地者。

熟附片　白芍药　白云苓各二钱　漂白术一钱五分　老生姜二钱

净水浓煎，温凉得中服。

心亡津液，肾气欲上而凌心，故悸；汗多亡阳，虚邪内动，故眩瞤欲擗地。真武者，北方之神，能司水火，不使蛟龙起陆者也。

白通汤　治少阴下利，无脉。

熟附子三钱　白干姜一钱五分　鲜葱白三茎

净水浓煎，冷服。

少阴主禁固二便，寒邪居之，则失其权矣，故下利。葱白所以通阳气也，姜附所以散阴寒也，能散能通，差足尽少阴之职。服此汤利不止，复厥逆无脉，干呕而烦，即加童便半杯，猪胆汁五匙服之。脉微续者生，脉暴出者死。

麻黄附子细辛汤　治少阴病，始得发热，脉沉。

净麻黄三钱　熟附片三钱　北细辛一钱

净水煎浓，温冷服。

病发于阴，当无热，有热者，乃太阳经表里相传之证也。少阴虚，则太阳之邪由络直入，其不尽入者，留为表热，故用麻黄以发汗，辛、附以温中，中外互攻，而贼邪自服矣。

四逆汤　治阳气亢极，血脉不通，四肢厥逆在臂胫之下。若阴证则上过乎肘，下过乎膝矣。

北柴胡　白芍药　小枳实　炙甘草等分

净水浓煎，远热服。

阳邪传入于阴，里有结热，阳不能伸于四末，故四逆而不温，用枳实所以破结气而除里热，用柴胡所以升发真阳而回四逆，甘草和不调之气，芍药收失位之阴。夫伤寒以阳为主，四逆则有阴进之象，若用苦寒下之，必致阳益亏失，故用此方。

甘草泻心汤　治呃逆脉洪大，心火上奔，肺不得纳。

炙甘草二钱　正川连五分　法半夏一钱　片黄芩一钱　官拣参一钱　白干姜一钱　老生姜一钱　大红枣五枚

净水浓煎，对人参汤服。

胃寒呃逆，脉微细，干姜、半夏、丁香、柿蒂治之；若因失下，大便实者，小承气汤治之。

玄参升麻汤　治发癍咽痛。

黑玄参一钱五分　绿升麻一钱　炙甘草一钱

净水浓煎，热服。

阳毒升麻汤　治赤癍狂言，吐脓血。

绿升麻一钱五分　真犀角一钱　鲜射干一钱　片黄芩一钱　官拣参一钱　炙甘草八分

净水浓煎，对入参汤热服。

阳证误温，当汗失汗，当下失下，或下

旱邪热入胃，或下迟热留胃中，皆致发痫。赤者二方可治，紫黑必死。

世有内伤发痫者，胃气极虚，一身之火，浮游于外，宜补以降之，此证人多不识。

桃仁汤　治狐惑声哑。

光桃仁二十粒　槐花子二钱　陈艾叶一钱　大红枣三枚

净水久煎极浓，空心热服。

狐惑者，失汗所致，食少胃空，虫咬其脏，则上唇生疮为惑，虫食其肛，则下唇生疮为狐。其候齿燥声哑恶食，面目乍赤乍白乍黑，舌上白胎，唇黑，四肢沉重，喜眠。服此须臾，以黄连犀角汤清之。

黄连犀角汤　服桃仁汤后服此。

真犀角三钱　正川连二钱　肥乌梅四个　南木香三分

净水浓煎，磨木香冲服。

雄黄锐散　治虫食肛狐惑证。

明雄黄　光桃仁　干苦参　正川连　青葙子各等分

为末，艾汁和匀如小指尖大，绵裹，纳入谷道中，日易之。

牛蒡根汤　治发汗不透，余毒在心包络，令瘥后昏沉，甚至手足搐搦，或寒或热。

牛蒡根　净麻黄　川牛膝　制南星各六钱

上为末。每服五分，好酒调下，日三服。

牡蛎泽泻汤　治前证腰以下浮肿者。

左牡蛎　宣泽泻　甜葶苈　天花粉等分

上为细末。每服一钱，米饮调下。

黄龙汤　治发热不退，或寒热往来。

北柴胡三钱　炒黄芩　赤芍药　炙甘草各二钱　老生姜三片　大红枣三枚为引

水煎热服。

伤风证治

经曰：风为百病之长，清净则肉腠闭拒，虽有大风苛毒，弗之能害。否则天有八风，乘虚感袭。又曰：贼风虚邪，避之有时。贼风者，如立春日起，肝木王七十二日，西风为贼邪，金克木也；立夏日起，心火王七十二日，北风为贼邪，水克火也；立秋日起，肺金王七十二日，南风为贼邪，火克金也；立冬日起，肾水王七十二日，西南风为贼邪，土克水也；三、六、九、十二月，脾土每季王一十八日，东风为贼邪，木克土也。此对冲之风，最能伤人，然中气足，腠理密者，始能无害。其所以受邪致病者皆怯弱之体，故风邪得以乘之。或有不慎而感受者，顿然头痛鼻塞，呵欠喘急，身热脉浮者是也。盖肺主皮毛，风入皮毛，多为咳嗽，其指纹红紫而长，外感候也。复有伤风自利，腹胀而手足冷者，脾怯也，当与和脾而兼发散。有潮热多睡，气粗呕吐，乳食不消，大便黄白而嗽者，脾肺受寒，不能受纳而吐也。若伤风多泪，胁痛目肿而咳者，兼肝证也；舌苦面赤，汗流而嗽者，兼心证也；而黄唇肿，少食恶心，兼脾证也；面白眶肿，上气喘急，为肺本病也；嗽而腰疼者，兼肾证也。

入　方

人参败毒散人参无力措办者，不用亦可　治小儿四时感冒，以及伤风咳嗽。凡咳嗽痰不应者，每日二服，不拘剂数，以痰豁为度。

官拣参五分　白桔梗　陈枳壳　正川芎　甘草　白云苓　川羌活　川独活　信前胡　北柴胡　北防风　荆芥穗各一钱

生姜一小片为引，水煎，热服。忌油。

脾怯者，倍云苓，加怀山、扁豆；脾肺寒者，倍云苓，加白术、怀山、藿梗；兼肝证，倍柴胡，加白芍，微加青皮；兼心证，倍独活，加连翘、木通；兼脾证，加六曲、山楂、麦芽；兼肺证，倍枳壳，加北芥子；兼肾证，倍独活。

伤暑证治

经曰：因于暑汗，烦则喘满，静则多言，体若燔炭，汗出而散。又曰：气盛身寒，得之伤寒；气虚身热，得之伤暑。婴儿之患，夏秋为甚，盖火土旺于长夏，正当金水受伤。稚阳阴微，已失天和，加之暑热，阳气浮于外，生冷戕于中，夏失长养，则不能生金而病于暑。然有中暑而病者，有因暑而致病者，虽病有不同，而总由于暑。故其为病有阴阳二证：曰阴暑，曰阳暑。治由冰炭，不可不辨也。

阴暑者，因暑而受寒也。凡膏粱之儿，畏暑贪凉，不避寒气，又或居深堂广厦，或乍热乍寒之时，不谨衣被，以致寒邪袭于肌表。其证头痛无汗恶寒，身体拘急，四肢酸疼。此以暑月受寒，虽名阴暑，即伤寒也。治宜温散，五积散、清暑益气汤。不恶寒而发热者，人参白虎汤，热退后，用调元生脉散补之。

又有不慎口腹，过食生冷瓜果，凉茶冷水，以致寒凉伤脏，而为呕吐泻利腹痛等证。此亦因暑受寒，寒邪在内，治以温中为主，加味五苓散，不应，理中汤。

阳暑者，藜藿之儿有之。常在烈日之中，坐于热地之上，澡浴寒涧之内。其证发热头痛，烦躁，大渴大汗，脉洪滑，大便干结，小便赤痛者，白虎汤；脉虚，烦渴而少气者，人参白虎汤；若眩晕者，生脉散；兼吐泻者，薷苓汤。

凡治暑证，最当辨其阴阳寒实。若外中热邪，内亦烦躁而热者，此表里俱热，方是阳证，治宜清补如前。

若脉虚无力，或为恶寒背寒，或为呕恶，或为腹痛泄泻，或四肢鼻尖微冷，或不喜凉茶冷水，或息促气短，无力以动之类，皆阳中之阴证也。凡见此类，但当专顾元气，四君子为主治，或理中汤加芍药。若虚寒甚者，则舍时令而从证，附桂在所必用，切不可因暑热之名，而执用寒凉解暑，则祸不可胜言矣。

入　方

五积散　治阴暑受寒，头痛无汗恶寒，身体拘急，四肢酸疼，以此温散之。

香白芷　真广皮　川厚朴　芽桔梗　陈枳壳　正川芎　杭白芍　白云苓　漂苍术　大当归　制半夏　嫩桂枝　黑炮姜　炙甘草

生姜三片，红枣三枚，水煎服。

清暑益气汤　治伤暑烦热，自汗口渴，畏寒发热者。

官拣参六分　炙黄芪一钱　漂白术一钱　六神曲五分　宣泽泻五分　川黄柏五分　杭青皮五分　粉干葛一钱　北五味三分　炙甘草五分

生姜一片，大枣三枚为引，水煎，热服。

人参白虎汤　治中暑不恶寒而发热者。

官拣参一钱　熟石膏二钱　净知母一钱　炙甘草一钱　晚粳米五钱

水煎，热服。

口渴甚，加麦冬一钱、北五味五分。

调元生脉散　平肝木，益脾土，泻邪火，补元气。小儿要药。

官拣参一钱　炙黄芪二钱　大杭冬一钱　北五味三分　炙甘草一钱

生姜三片，大枣三枚，水煎，温服。

加味五苓散　治暑证之要药也。

漂白术二钱　白云苓二钱　结猪苓二钱　宣泽泻二钱　青化桂一钱　藿香梗一钱　宣木瓜一钱　西砂仁一钱

生姜一片，大枣一枚，灯芯十茎引，水煎，热服。

理中汤　治阴暑呕吐，泻利腹痛。

官拣参三钱　漂白术三钱　黑炮姜一钱五分　炙甘草二钱

大枣三枚引，水煎，温服。

白虎汤　治阳暑发热，头痛烦躁，大渴大汗，脉洪实，大便秘结，小便赤痛。

熟石膏三钱　净知母二钱　炙甘草一钱　晚粳米一两

水一碗，先煎米熟，纳后三味同煎，滚热服。

生脉散　固中气，清火热，保肺金。

官拣参一钱　大杭冬三钱　北五味七分

水煎极浓，温服。

黼苓汤　治阳暑脉虚，兼吐泻。

漂白术二钱　陈香薷一钱五分　白云苓二钱　结猪苓二钱　宣泽泻二钱　青化桂一钱　白扁豆一钱五分　川厚朴一钱　炙甘草五分

生姜一片，大枣一枚，灯芯十茎引，水煎服。

四君子汤　方见三卷疟疾门。

理中汤加芍药　治伤暑腹痛泄泻。

即本方加炒白芍药一钱五分。

伤湿证治

经曰：诸湿肿满，皆属于脾。又曰：风雨则伤上，清湿则伤下。是湿之为病，有出于天气者，雨露是也；有出地气者，泥水是也；有出饮食者，酒浆生冷是也；有出人事者，汗衣卧湿，如小儿澡浴，粪秽，衣褓不干，皆是也。然所因虽异，悉由乎脾气之虚，而辨治之法，其要惟二：一曰湿热，一曰寒湿尽之矣。病而发热者，谓之湿热；病而多寒者，谓之寒湿。湿热之治，宜清宜利，热去湿亦去也；寒湿之治，宜燥宜温，非温不能燥也。

一湿热证：其证发热身痛，多烦渴，小便赤涩，大便秘结，脉见洪滑，方是热证。宜利宜清，柴苓汤、茵陈饮。如果湿热之甚，或元气壮而兼秘结不通者，方可推荡之，集成沆瀣丹。

一寒湿证：惟胀满泄泻呕吐，皆寒湿之病也。凡小儿喜弄冷水，坐卧湿地。其证头痛身重，寒热往来，宜胃苓汤。如兼呕吐，加藿香、砂仁。如因中湿浮肿者，胃苓汤合五皮汤。如不效，必用温补，俟阳气渐复，则阴邪始退，如理中汤、八味丸，宜择用之。

凡脾虚多病湿，内因酒面停滞，嗜瓜果，喜生冷、烧炙甘肥，以致湿热壅溢而为病者，此内因也；复有坐卧湿地，雾露阴雨所客，澡浴为风所闭，涉水为湿所郁，郁于肌腠则发黄，此湿由外生。可见内外所感，皆由脾气虚弱，而湿邪乘而袭之。中湿发黄者，茵陈五苓散；不效，六君子汤燥里而黄自退。

入　方

柴苓汤　治中湿恶热如疟。

官拣参一钱　北柴胡一钱五分　枯黄芩一钱　法半夏一钱　漂白术一钱　结猪苓一钱　宣泽泻一钱　上青桂五分　白云苓一钱　炙甘草五分

生姜三片，大枣三枚，水煎，热服。

茵陈饮　治中湿发黄作热，大小便涩。

茵陈蒿二钱　黑山栀一钱五分　赤茯苓一钱　甜葶苈一钱　小枳实五分　生甘草五分

灯芯十茎，水煎，食前服。

沆瀣丹　方见卷二胎疾门。

胃苓汤　治中湿头重体重，往来寒热，和水土，调脾胃。

漂苍术二钱　炒厚朴一钱　广陈皮一钱炒　白术一钱　白云苓一钱　结猪苓一钱　宣泽泻一钱　炙甘草五分　上青桂五分

生姜三片，水煎，食前服。

五皮散　此方合胃苓汤，专治浮肿，神效。

生姜皮　大腹皮　茯苓皮　桑白皮　五加皮以上各二钱

灯芯十茎，大枣三枚为引，水煎，空心服。

理中汤　方见卷二伤暑门。

八味地黄汤　方见卷一保产门。

茵陈五苓散　治中湿发黄。

茵陈蒿二钱　漂白术一钱　白云苓一钱五分　结猪苓一钱　宣泽泻一钱　青化桂五分

炙甘草五分

生姜三片，大枣三枚为引，水煎服。

六君子汤　方见卷二非搐门。

霍乱证治

经曰：足太阴厥气上逆则霍乱。又曰：不远热则热至，热至则身热，吐下霍乱。夫霍乱之病，起于仓卒，其证挥霍扰乱，无有宁止，故名霍乱。多因夹食伤寒，阴阳乖隔，上吐下泻，而烦躁闷乱者是也。盖人有三焦：上焦受纳水谷，主入而不主出；中焦腐化水谷，流行于五脏六腑；下焦分别水谷，主出而不主纳。故邪在上焦则吐，邪在下焦则泻，邪在中焦则上吐下泻。凡霍乱得吐泻，则邪气上下得出，斯无苦也；陈莝出尽，而吐泻自止。乃有上不得吐，下不得泻，为干霍乱，又名绞肠痧。其病因脾胃之邪无从而出，若加喘满作搐者，十不救一。其有上吐下泻者，当分寒热而治之，亦宜止其乳食，恐其增痰也。故霍乱饮米汤必死，以其助胃邪故也，宜藿香正气散。

有先泻后吐者，乃脾胃虚寒，故先泻白水，而吐亦不多，口气缓而神色慢，额上有汗，六脉沉细，此为虚冷，宜温之，六君子汤。不愈，则理中汤加藿香、木瓜各一钱。

有先吐后泻者，乃脾胃有热，故喘促唇红，吐多面赤，渴饮水浆，脉洪而数。此为热也，宜和解之，五苓散加藿香。

其干霍乱上不得吐，下不得泻，最为危迫，速用盐汤探吐之，必待其吐出宿食积痰，然后用药，或以针刺十指甲边令血出，或刺膝湾名委中穴，出血即解，后用藿香正气散。

入　方

藿香正气散　治风邪伤胃，阴阳不和，上吐下泻。

紫苏叶一钱　大腹皮一丸　芽桔梗一钱　白云苓一钱　制半夏一钱五分　川厚朴一钱　真广皮一钱　炙甘草一钱

生姜三片，大枣二枚，水煎，热服。

六君子汤　方见卷二非搐门。

理中汤　方见卷二乳子伤寒门。此加藿香、木瓜。

五苓散　方见二卷中暑门。加藿香。

盐汤吐法　其法以温水调食盐略咸，一大碗，令儿服之。良久，以指探其喉间则吐，一吐即松。

霍乱简便方

凡霍乱吐泻腹痛者，切忌热汤及米汤，犯之必死，必待其吐泻后一二时久，服药过后，俟其胃气稍回，渴止知饥，方可以稀粥与之。

凡霍乱呕吐，不能受纳药食危甚者，速以新汲水和百沸汤各一盏和匀，名阴阳汤，饮数日即定。

凡痰症及宿食恶毒之物，阻塞中焦，而令腹胀欲作霍乱者，即与盐汤，令其顿服，吐尽痰食即安。

霍乱吐泻诸药不效，绿豆、胡椒各二十一粒，研细，水煎服；如口渴甚者，将二物研细，以新汲井水调服则安。

一方以六一散一二钱，浓姜汤调服，夏月更妙。盖六一散凉，姜汤热，亦寒因热用之意也。

干霍乱即绞肠痧，其证忽然心腹绞痛不可忍，上不得吐，下不得泻，痰壅腹胀，手足厥冷，六脉沉细或伏，死在须臾，真恶候也。急用食盐一两，生姜五钱，捣散，同盐炒黑色，水一大碗，煎数沸，温服。良久，以指探喉中探吐之，或不吐即泻。

绞肠痧亦有阴阳。阴痧腹痛手足冷，看其身上有红点，以灯火子红点上淬之；阳痧腹痛手足暖，以针刺其十指背近爪甲处一韭叶许，出血即安，仍先自两臂捩下其恶血，令聚指头，然后刺之。

凡发痧手足厥冷，腹痛，用温水一碗，令病人伏卧凳上，以手蘸水，拍其两膝湾，名

委中穴，看其有紫黑点现，以针刺出恶血即愈脾脉、肝脉、肾脉、三阴之脉皆从此委中穴过。又法，以香油拍两手曲池穴，即肘内湾处，以贮麻蘸油熏之，刮起紫疹，立刻即愈。肺脉、心脉、心包络脉皆从此曲池而过。以上所为，亦疏散之意也。

幼幼集成　卷三

清　罗浮　陈复正飞霞辑订
鄞县　曹赤电炳章圈校

咳嗽证治

帝曰：肺之令人咳，何也？岐伯曰：五脏六腑皆令人咳，非独肺也。又曰：邪在肺，则病皮肤痛，寒热，上气喘，汗出，咳动肩背。夫肺为华盖，口鼻相通，息之出入，气之升降，必由之路，故专主气。经曰：形寒饮冷则伤肺。由儿衣太薄，及冷饮之类，伤于寒也。经曰：热伤肺。由儿衣太厚，爱养过温，伤于热也。又曰：皮毛者，肺之合。皮毛先受邪气，邪气得从其合，使气上而不下，逆而不收，充塞咽嗌，故令咳嗽也。

凡有声无痰谓之咳，肺气伤也；有痰无声谓之嗽，脾湿动也；有声有痰谓之咳嗽，初伤于肺，继动脾湿也。在小儿由风寒乳食不慎而致病者，尤多矣。经曰：五脏六腑皆令人咳。然必脏腑各受其邪而与之，要终不离乎肺也。但因痰而嗽者，痰为重，主治在脾；因咳而动痰者，咳为重，主治在肺。以时而言之，清晨咳者，属痰火；午前嗽者，属胃火；午后嗽者，属阴虚；黄昏嗽者，火浮于肺；五更嗽者，食积滞于三焦。肺实者，顿嗽抱首，面赤反食；肺虚者，气逆虚鸣，面白飧泄；肺热者，痰腥而稠，身热喘满，鼻干面红，手捏眉目；肺寒者，嗽多痰清，面白而喘，恶风多涕。故治者各因其虚实寒热而调之，斯无误矣。

因于寒者则气壅喘促，声浊而无汗，鼻塞声重，宜参苏饮微汗之。

咳而气逆，喘嗽，面白有痰。此肺本经病，宜清肺饮。咳甚，葶苈丸微利之。

咳而喉中介介有声，面赤发热心烦，或咽喉痛声哑者，此肺病兼见心证，宜清宁散。咽喉痛，沆瀣丹。

咳而面黄体倦，痰涎壅盛，或吐痰，或吐乳食。此肺病兼见脾证。大抵咳嗽属脾肺者居多，以肺主气，脾主痰故也，宜橘皮汤。

咳而面青多怒，痰涎壅盛而发搐者，盖因咳嗽声不能转，所以瞪目直视。此肺病兼见肝证，宜集成金粟丹。

咳而面色暗黑，久咳而吐痰水。此肺病而兼见肾证，宜六味地黄丸加麦冬、五味。

咳而声不出，口鼻出血者，此气逆血亦逆也。须顺气宁嗽为主，宜人参冬花膏。

咳而久不止，并无他证，乃肺虚也。只宜补脾为主，人参五味子汤。

咳而胸高骨起，其状如龟者，谓之龟胸。此肺热之极，阳火熏蒸而致也，清燥救肺汤。

咳而日久，胸前疼痛，口吐脓血腥臭者，此肺火壅盛，已成痈也，桔梗汤。治不如法，其证多死。

凡咳嗽痰涎壅塞，逆气冲并而作搐者，多难治。故头摇目上视，及闭目呻吟，手足摆舞，肩息胸突，喉中痰鸣，口噤不乳，喘而手足冷，皆死证也。

入　方

人参败毒散　此方辛平升散，为咳门第一神方，举世少有知者。凡有咳嗽，无论内伤饮食，外感风寒，夹湿夹毒，不拘男妇大小，胸紧气急，咽痛口苦，痰不相应，即用

此方升散之。或感冒重者服此，其咳愈甚，不知者以为药不相符，弃而勿服，不知正是升散之力，佳兆也；再服之，渐次轻减，不拘剂数，只以痰应为度，声响痰出，是其效也。枯燥之人，数剂之后，略加沙参、玉竹、当归、白芍、生地、麦冬之类，以滋其阴，无不愈者。再有叮咛：凡咳嗽初起，切不可误用寒凉及滋阴之药，闭其肺窍，为害不小，但以辛散为先着，俟痰应之后，渐加滋阴则得矣。

官拣参五七分，不用亦可　芽桔梗一钱二分　正川芎一钱　白云苓一钱　陈枳壳一钱　信前胡一钱　川羌活七分　川独活五分　北柴胡一钱　南薄荷一钱　荆芥穗一钱　北防风一钱　净连翘一钱　炙甘草五分

生姜一片为引，水煎，半饥服，每日二剂。

参苏饮　治四时感冒，头痛发热，咳嗽痰盛。此方不如前方，用之多不效，姑存之。

官拣参五分　白云苓一钱　陈枳壳一钱　法半夏一钱　信前胡一钱　芽桔梗一钱　老苏叶一钱　粉干葛一钱　真广皮一钱　炙甘草五分

生姜三片，葱白三寸，水煎，温服，取微汗。

清肺饮　治气逆面咳，面白有痰。

信前胡一钱　北柴胡七分　桑白皮五分　陈枳壳一钱　净知母一钱　川贝母一钱　南薄荷七分　白云苓一钱　白桔梗一钱　金并胶一钱　大麦冬一钱　荆芥穗一钱　炙甘草五分

水煎，热服。切忌油腻。

葶苈丸　治乳食冲脾，伤风咳嗽，面赤身热，痰多喘嗽。

甜葶苈去土，隔纸略炒　黑牵牛炒　光杏仁去皮、尖，炒黄色，另研　汉防己炒

上药等分为细末，入杏仁泥，和蒸枣肉为丸，绿豆大。每五七丸，姜汤化下，量儿大小加减。

此丸因乳食伤脾痰甚者，及壮实小儿可用之。苟不因乳食所伤，并怯弱者，本方去牵牛，易家苏子等分，炒研为丸。效。

清宁散　治心肺有热而令咳嗽，宜从小便利出。

桑白皮蜜炒　甜葶苈微炒　赤茯苓酒炒　车前子炒　炙甘草减半

上为细末，每服五分，生姜、大枣煎汤调服。

集成沆瀣丹　方见卷二胎热门。

橘皮汤　治咳嗽痰甚呕吐。

法半夏一钱　白云苓一钱　真广皮一钱　旋覆花一钱　北细辛五分　官拣参五分　芽桔梗一钱　陈枳壳一钱　炙甘草五分

生姜三片，大枣一枚，水煎，徐服。

集成金粟丹　方见卷二类搐门。

六味地黄汤　方见卷二胎疾门。

人参冬花膏　治气逆咳血，痰中见血。

官拣参　天门冬　麦门冬　款冬花　川贝母　桑白皮　金并胶　片枯芩　白当归以上各一钱　北五味　炙甘草各五分

上为细末，炼蜜为丸龙眼核大。每一丸，灯芯汤下。

人参五味子汤　治久嗽脾虚，中气怯弱，面白唇白，此神方也。

官拣参一钱　漂白术一钱五分　白云苓一钱　北五味五分　杭麦冬一钱　炙甘草八分

生姜三片，大枣三枚，水煎，温服。

清燥救肺汤　喻嘉言制。治诸气膹郁，诸痿喘呕，皆属肺之燥也。

鲜桑叶经霜者，得金气而柔烂不凋，取之为君，用一钱　炙甘草利胃，生用，一钱　熟石膏禀清肃之气，极清肺热，用一钱二分　官拣参生胃之津，养肺之气，七分　胡麻仁炒，研，一钱　真阿胶八分　杭麦冬去心，一钱二分　北杏仁泡，去皮、尖，炒黄，七分　枇杷叶一片，刷去毛，蜜涂，炙黄用

水一碗，煎六分，频频分二三次服。痰多，加川贝母、瓜蒌；血虚，加生地黄；热甚，加犀角、羚羊角。

桔梗汤　治肺痈出脓血。

芽桔梗二钱　白当归一钱　川贝母一钱　瓜蒌皮一钱　汉防己一钱　光杏仁五分　陈枳壳一钱　薏苡仁二钱　生黄芪一钱　鲜桑叶一钱　润玄参一钱

用芦、茅桂三钱为引，水煎，热服。

百晬嗽论

凡乳子百日内有痰嗽者，谓之百晬嗽。或出胎暴受风寒，或浴儿为风所袭，或解换襁褓，或出怀喂乳，而风寒得以乘之。此病由外来者。或乳汁过多，吞咽不及而呛者；或啼哭未定，以乳哺之，气逆而嗽者，此病由于内生者。皆能为嗽。第前汗下之剂，难于用之，以其胃气方生，不能胜药故也，故曰百晬嗽难医。然虽曰难医，正未尝曰不医。予之治此，未为不多，其用药之治，有案在后；复有不治之治，更为捷径，而又百治百愈，但须乳母听戒，治之无难。凡遇百晬嗽，先用荆防败毒二小剂，母子同服，服完止药。惟令乳母忌口，凡荤酒油腻、盐醋酸咸、姜椒辛辣、青菜面食之类，一概屏绝，惟用香茶白饭，少佐橘片橙片，以清其乳。虽儿嗽至重者，不过十日八日，得哺清乳，嗽自愈矣。倘不听戒，复不择医，徒然服药，有名无实，竟何益哉！

附　案

滋阳明经高君作梅翁，与令弟云轩翁，同于甲寅五月举子。然皆膏粱之裔，胎元怯弱，于七月间，两儿同患百晬嗽。予谓云翁曰：公郎面白唇淡，白服带青，嗽声连续，痰不相应。此肝风有余，肺气不足，虽有喘嗽，未可以常法治之。设投疏风清肺，适足益燥伤阴，不特嗽不能愈，面证必加重。云翁深以为是，乃投人参五味子汤，其应如响，四剂全瘳。计用人参二钱八分。作翁者，其体更弱，外候面白眼青，自汗多嗽，满头青筋，囟门宽大。因谓之曰：令侄正同此证，已服补脾保肺之剂愈矣。公郎中气更虚，速宜用参，始不费手。适有老妪专挑马牙者，从内阻之，复有医者，从外阻之，力言不可用参，服参则不可治，且云未见百日之儿敢用参者。老妪更嘱其母曰，道翁丸药，切不可服，其中多有人参，服之为害不浅。其母闻之，以为诚然，于是视予药如砒毒矣。作翁因素艰嗣息，莫能主张于予言，似有阳是阴否之意。予见其迟疑不决，亦不敢强，姑听之。此医日一诊视，自七月下旬治起，直至十月初旬，作翁往府考贡，其病愈治愈危，竟至奄奄一缕，而逆证丛生，无可救药。医者束手乏策，老妪缄口无言，皆绝迹不至矣。夫人辈无所倚仗，复恳于予。予叹曰：早听予言，何有今日！乃入诊视，见其面目如蓝，形体惟皮束骨，声哑无音，咳嗽气促，雨汗淋漓，四肢搐掣，逆证全具，毫无生机。因不忍释手，详为审视，惟两目神光尚存。予曰：生机或在是乎！遂以大参一枝、天员五粒，蒸汤与服。初服小半，予为抱之，环步室中，审其呼吸之息，气虽未减，而亦不见其增，即与服完，良久觉气稍顺。予喜曰：得之矣。遂用大参二钱、天员肉七粒，蒸汤服之，竟获大效。是夜汗搐俱止，喘嗽略亦轻减。第苦于人小体弱，即二钱之参汤，亦须一夜方能服完。幸予此时行动匀静，数载未曾设榻，终夕无眠，竟与抱之，昼夜不一释手，醒即予服，服后仍睡。数日之后，则鼾声如雷，睡眠极隐，呼吸极长。予知为气复神归之效。如此者十昼夜，诸证已愈八九，惟形色未复，音声未亮。予曰：功程虽半，未敢暂停，参须倍之。于是每日大参四钱、天员十四粒，如前调理，计前后二十昼夜，共用官拣六两有零，始奏全绩。于是声音清亮，面色红融，肌肉复生，精神胜旧；今已长成，俨然美丈夫矣，而且聪明持达，经史皆通，他日翱翔，奚能限量！如此之证，如此之治，不特世人未见，医家未闻，即诸书亦所未载。半岁乳子，而用六两之参，起沉疴于万难之日，苟无定识者，未必有成。故拜恳同道，但须认证真确，不必

拘泥古方，神而明之，存乎人耳。

或问二证皆百晬嗽，何以前证用药，而后证独用参者何也？曰：有理焉。前证在七月间，正肺金旺时，为风邪冲并，但伤其中气，他脏无涉，故以四君子补脾，生脉散保肺，收其耗散之金，得返清肃之令，中气一回，应手而愈。后证自七月起至于十月，金已退气，正当水旺木相之时，由肾水无源，所以肝木失养，诚母病子伤，故面目俱青，手足搐搦，此非肝强，实肝败也。《内经》有善则不见，恶则见之之言，显然可证。在常俗之辈，见其搐搦，又必为之镇惊化痰，截风定搐矣，谁复为之保固真元，维持竭绝哉？不知此等之证，阴阳两败，脏腑俱伤，苟非大力之品，莫可挽回。所以屏去杂药，独用人参之甘温，天员之甘润，味极纯正，饲之儿喜，况人参之力，在阴益阴，在阳益阳，荣卫气血，精神意智，无不补者，而且昼夜不御，则真元阴受其长养之功，乌得不效！又曰：初服即效，而必待三七之日，始奏全绩者，何也？曰：克削过伤，枯燥已极，如旱苗焦壤，暴雨无裨，心淙淙润泽，始可盈科。至于三七之久，天地来复之机，业已三至，人身荣卫，已周一千五十度，升降有恒，神气已足，不药之庆，夫复何疑！此等之治，非谓世之婴儿，一有咳嗽，便当用参，第禀受先亏，胎元怯弱者，有不得不用之势。独惜前医偏执己见，即数分之参，断不肯用，孰知用至六两之多，始收全效。可见辨证不真，误人非浅，故笔此以为择医者劝。

咳嗽简便方

小儿咳嗽声不出者，紫菀微炒研末，杏仁去皮尖，研如泥，等分，炼蜜为丸芡实大。每服一丸，北五味七粒煎汤，化服。

肺实咳嗽痰喘，葶苈子隔纸炒为末，枣肉为丸龙眼核大。每服一丸，白汤化服。

咳嗽多痰，葶苈子隔纸炒、知母微炒，各五钱，研末，砂糖为丸芡实大。每服一丸，白汤化下。

小儿喘嗽发热，自汗吐红，脉虚无力。人参切片，焙干，天花粉切片，酒炒，等分为末。每服五分，蜜汤调服，以瘥为度。

秋天肺燥，咳嗽无痰，北沙参一味，每服五钱，净水浓煎，热服。

小儿百晬嗽，痰壅喘咳，用贝母五钱，淡姜汤润湿，饭上蒸过，甘草半生半炒，二钱五分，研细末，砂糖为丸龙眼核大。每服一丸，米饮化服。

热痰咳嗽，痰出稠浓，或咽喉痛，制南星、制半夏各三钱半，枯黄芩七钱，焙燥为末，砂糖为丸芡实大。每用一丸，姜汤化服。

哮喘证治

经曰：犯贼风虚邪者阳受之，阳受之则入六腑，入六腑则身热不得卧，上为喘呼。又曰：肺病者，喘咳逆气，肩背痛，汗出。夫喘者，恶候也。肺金清肃之令，不能下行，故上逆而为喘。经曰：诸气膹郁，皆属于肺。喘者，肺之膹郁也。吼者，喉中如拽锯，若水鸡声者是也；喘者，气促而连属，不能以息者是也。故吼以声响言，喘以气息名。凡如水鸡声者为实，喉如鼾声者为虚，虽由子痰火内郁，风寒外束，而治之者不可不分虚实也。

有因外感而得者，必恶寒发热，面赤唇红，鼻息不利，清便自调，邪在表也。宜发散之，五虎汤。

有因热而得者，必口燥咽干，大小便不利。宜葶苈丸微下之。

有因宿食而得者，必痰涎壅盛，喘息有声，先用山楂、神曲、麦芽各三钱，煎汤与服，消其食，次千缗汤。

素有哮喘之疾，遇天寒暄不时，犯则连绵不已，发过自愈，不须上方。于未发时，可预防之。有一发即能吐痰者，宜服补肾地黄丸加五味、故脂，多服自愈。若发而不吐痰

者，宜痰喘方。

凡哮喘初发，宜服苏陈九宝汤。盖哮喘为顽痰闭塞，非麻黄不足以开其肺窍，放胆用之，百发百中。

或胸膈积热，心火凌肺，热痰壅盛，忽然大喘者，名马脾风。盖心为午火属马，言心脾有风热也。小儿此证最多，不急治，必死，用牛黄夺命散下之效。

凡大病久病之后，或久服寒凉克削之后，或久吐久泻之后，忽然气急，似喘非喘，气息短促，名为短气。短者断之基，气将脱也。速宜挽救，人参五味子汤效。

又有虚败之证，忽然张口大喘，入少出多，而气息往来无滞。此肾不纳气，浮散于外，大凶之兆，速投贞元饮；不效，理阴煎加人参、鹿茸，或可挽救。

如汗出如油，发润而喘者，肺绝也；汗出如油，张口大喘者，命绝也；直视谵语而喘者，肝绝也。凡大病正气欲绝，无根脱气上冲，必大喘而绝矣。

入　方

五虎汤　治寒邪入肺而作鹘𪂆，盖鹘𪂆为寒痰固结，非此方不能解散。

净麻黄七分　光杏仁一钱　陈细茶一钱　熟石膏一钱五分　炙甘草四分

净水煎，空心服。

葶苈丸　方见卷三咳嗽门。

千缗汤　治痰闭肺窍，喘息有声。

法半夏二钱　大皂角五分　老生姜一钱　炙甘草一钱

水煎服。以上皆素无哮喘，而暴发者用。

补肾地黄丸　治先天不足，肝肾虚者通用。

熟地黄　怀山药　山萸肉各一两　嫩鹿茸　淮牛膝各二两　粉丹皮　白云苓　宜泽泻各一两　北五味　补骨脂各一两

上为末，蜜丸绿豆大。每服三钱，淡盐汤空心下。

痰喘方　治哮喘无痰者，盖痰入于肺窍，不能出故也。

官拣参　制南星　制半夏　瓜蒌霜　香附米　皂角灰　真广皮炒　萝卜子炒，各等分

共为末，姜汁煮神曲糊丸麻子大。每服一钱，姜汤化下。

苏陈九宝汤　治风寒闭肺而作哮喘。

净麻黄五分　红云皮五分　南薄荷五分　青化桂取心，五分　紫苏叶四分　桑白皮五分　大腹皮一钱　光杏仁四分　炙甘草六分

生姜三片，水煎，临服加童便少许冲服。

牛黄夺命散　治胸膈有痰，肺胀大喘。

黑牵牛半生半炒，取头末，五钱　锦庄黄酒润，晒干　陈枳壳麸炒、各一两

上为细末。每服一钱五分，白汤调下。量儿大小加减，临服加蜜数匙，以气平为度。

人参五味子汤　方见卷三咳嗽门。

贞元饮景岳新方　治气短似喘，呼吸急促，提不能升，咽不能降，势甚垂危。常人但知为气急，其病在上，而不知元海无根，肝肾已败。此子午不交，气脱证也。

大熟地五钱　白当归三钱　炙甘草一钱

水煎，热服。如兼呕恶，或恶寒者，加煨姜五片；气虚脉微至极者，速加人参；如肝肾阴虚，手足厥冷，加肉桂一钱。

理阴煎景岳新方　治肾肝亏败，不能纳气，浮散作喘。

干熟地三钱　白当归二钱　炮姜灰一钱五分　炙甘草一钱

手足冷者，加熟附子一钱，青化桂一钱。

水二盅，煎七分，热服。

哮喘简便方

治痰气壅塞，雪梨汁一杯，生姜汁四分之一，蜂蜜半杯，薄荷细末一两，和匀，器盛，重汤煮一时之久，任意与食，降痰如奔马。

化痰丸　丝瓜烧存性，为细末，枣肉为丸，如弹子大。每服一丸，姜汤化下。化痰

最捷，兼能止嗽。

坠痰丸　治一切风痰、湿痰、老痰、痰火，胸痞满，气壅塞。

黑牵牛四两，炒，止取头末一两　大皂角去皮弦及子，酥炙黄，四钱　生白矾三钱

共为细末，米糊丸。每服一钱，儿稍大者二钱，空心姜汤服。痰涎从大便出；久病之人，五日、十日一服；病缓者半月一服。

治醋呛成吼，用甘草二两去赤皮，每段切二寸长，两半劈开，用猪胆二枚取汁，浸甘草三日，取起，火上炙干为末，蜜丸绿豆大。每晚临卧服二钱，茶汤送，神效！

哮喘久不止，不拘老小，一服即止，并治小儿奶哮，石膏、半夏、瓜蒌仁、陈皮、麻黄各一钱五分，枳实、杏仁各一钱，甘草七分，生姜五片，水煎，热服。

清金丹　治一切吼疾，或痰或食，遇厚味即发者尤妙。

萝卜于蒸熟，晒干，为末，猪牙皂烧存性，等分

共为细末，姜汁打面糊丸绿豆大。每服一二十丸，姜汤送下。

诸疳症治

夫疳之为病，亦小儿恶候。十六岁以前，其病为疳，十六岁以上，其病为痨，皆真元怯弱，气血虚衰之所致也。究其病源，莫不由于脾胃，盖胃者，水谷之海也。水谷之精气为荣，悍气为卫，荣卫丰盈，灌溉诸脏。凡人身充皮毛、肥腠理者，气也；润皮肤、美颜色者，血也。所以水谷素强者无病，水谷减少者病，水去谷亡则死矣。凡病疳而形不魁者，气衰也；色不华者，血弱也。气衰血弱，知其脾胃必伤。有因幼少乳食，肠胃未坚，食物太早，耗伤真气而成者；有因甘肥肆进，饮食过餐，积滞日久，面黄肌削而成者；有因乳母寒热不调，喜怒房劳之后，乳哺而成者；有二三岁后，谷肉果菜恣其饮啖，因而停滞中焦，食久成积，积久成疳；复有因取积太过，耗损胃气，或因大病之后，吐泻疟痢，乳食减少，以致脾胃失养。二者虽所因不同，然皆总归于虚也。其证头皮光急，毛发焦稀，腮缩鼻干，口馋唇白，两眼昏烂，揉眉擦鼻，脊耸体黄，斗牙咬甲，焦渴自汗，尿白泻酸，肚胀肠鸣，癖结潮热，酷嗜瓜果、咸炭、水泥者，皆其候也。然治寒以温，治热以凉，此用药之常法。殊不知疳之为病，皆虚所致，即热者亦虚中之热，寒者亦虚中之寒，积者亦虚中之积。故治积不可骤攻，治寒不宜峻温，治热不可过凉。虽积为疳之母，而治疳必先于去积，然遇极虚者而迅攻之，则积未去而疳危矣。故壮者先去积，而后扶胃气；衰者先扶胃气，而后消之。书曰：壮人无积，虚则有之。可见虚为积之本，积反为虚之标也。

如恶食滑泻，乳食直下，牙龈黑烂，头项软倒，四肢厥冷，下痢肿胀，面色如银，肚硬如石，肌肉青黑，肛门如筒，口吐黑血，吐利蛔虫，并为不治。

初病者以集圣丸为主，久病者但以肥儿丸调之，以补为消可也。

凡疳之初起者，集圣丸为主方，其有五脏兼证，从权加减，不必多求方法。

入　方

芦荟丸　治冷热新久一切疳证，以此为主。

真芦荟酒蒸　五灵脂炒　夜明砂炒　真广皮酒炒　杭青皮醋炒　蓬莪术煨　使君肉炒　南木香屑　白当归炒　正川芎酒炒，以上俱各二钱　官拣参三钱，切片，焙干　正川连姜制　干蟾蜍酥炙，俱三钱　西砂仁酒炒，二钱

上为细末，用公猪胆一枚取汁，将前末和匀，粟米糊丸龙眼核大。每服一丸，米饮调下。

各证加减法

一病有咬牙舒舌，舌上生疮，爱饮冷水，

唇红面白，喜伏地卧。此心疳也。本方去莪术、砂仁、青皮、陈皮、川芎、木香六味，加生地、茯苓、胆星各二钱，朱砂、甘草各一钱；

一面青，目生白膜，泄泻夹水或青色，此肝疳也，本方去莪术、砂仁、陈皮、木香四味，加胆草、栀仁、防风、天麻、蝉蜕各二钱，青黛一钱五分；

一爱食泥土、冷物，饮食无度，身面俱黄，发稀作穗，头大项小，腹胀脚弱，间或泄泻，肌瘦，昼凉夜热，不思乳食，此脾疳也，专用本方；

一鼻下赤烂，手足枯细，口中腥臭，或作喘嗽，右腮晃白，此肺疳也，本方去莪术、砂仁、青皮、川芎、木香四味，加桑皮、桔梗、苏叶、阿胶、炙甘草各二钱，外用泽兰叶、铜绿、轻粉，等分为末，贴烂处；

一两耳内外生疮，脚如鹤膝，头缝不合，或齿缝臭烂，变成走马疳，此肾疳也，本方去莪术、砂仁、青皮、陈皮、木香、灵脂六味，加熟地、茯苓、山药、萸肉各三钱，丹皮、泽泻各二钱；

一食积久而成疳。其证形瘦腹紧，时发潮热，羞见生人，见之则哭，本方去芦荟、灵脂二味，加人参、黄芪、白术、茯苓、半夏、枳实、厚朴、炙草、神曲、麦芽、鳖甲、三棱各二钱；

一久泄不止，胃虚成疳，此疳泻也，本方去芦荟、莪术、灵脂三味，加白术、茯苓、肉蔻、诃子各二钱，加人参三钱；

一久痢不止，胃虚成疳，此疳痢也，本方去芦荟、莪术、青皮、灵脂四味，加诃子肉、建莲肉各三钱；

一疟久未已，胃虚成疳，此必有癖，谓之疳疟，本方去芦荟、灵脂二味，加黄芪、鳖甲、柴胡、半夏、神曲、三棱各二钱，倍人参三钱；

一脑疳，皮毛光急，满头疮饼，脑热如火，发结如穗，遍身多汗，腮肿囟高，令儿眼痛，其病在肝，本方去莪术、砂仁、青皮、陈皮四味，加胆草、川芎、升麻、羌活、防风各二钱；

一脊疳，虫食脊膂，发热黄瘦，积中生热，烦渴下痢，拍背如鼓鸣，脊骨如锯齿，或十指皆疮，频啮指甲，宜安虫丸，盖五疳或有停食成积，积久生虫，或如丝发、如马尾，多出于头项背腹之间，虫色黄白赤者可治，青黑者难治也，安虫丸，即本方去莪术、砂仁、青皮、陈皮、当归、川芎六味，加苦楝根白皮、贯众、芜荑、槟榔各二钱，名安虫丸；

一蛔疳，皱眉多哭，呕吐清沫，腹中乍痛，痛时腹中结聚成块，摸之梗起，满肚青筋，唇口紫黑，肠头啮痒者是也，蛔从口鼻出者难治，宜安虫丸，即上方；

一丁奚疳，手足极细，项小骨高，尻削体瘦，腹大脐突，号叫胸陷者是也，集圣丸本方；

一啫露疳，虚热往来，头骨分开，翻食吐虫，烦躁呕哕者是也，集圣丸本方；

一无辜疳，因浣衣夜露，被无辜鸟落毛所污，小儿服之，身体发热，日渐黄瘦，脑后项边有核如弹丸，按之随动，软而不痛，其中有虫如米粉，宜刺破其核，以膏药贴之，内以本方去莪术、砂仁、灵脂三味，加黄芪、鳖甲、槟榔各二钱；

一疳热，由于胃脾虚弱，阳浮于外，气不归元，只以补脾为主，使阳气收敛，热自退矣，用参苓白术散多服为妙，或兼脾阴虚者，间服六味地黄丸；

一疳渴，由胃气下陷，津液不生故也，宜补其胃，使清阳上升，津液渐生，渴自止矣，七味白术散；

一走马疳，虫病也，齿属肾，肾主虚，才受热邪，直奔上焦，初起口臭，名曰臭息，次则齿黑，名曰崩砂，甚则龈烂，名曰溃漕，有血迸出，名曰宣露，甚至齿皆脱落，名曰腐根。纵得全活，齿不复生，外证脑热肌瘦，手足如冰，寒热时有，滑泄肚痛，口臭干渴，齿

龈破烂，爪甲黧黑，身多疮疥，痘疹之后，多有此证，不可救治，毒归于肾故也，初起者清胃散，另有治法，在齿牙本门；

一魁病，儿将周岁，母复有娠，儿饮其乳，谓之魁者忮乳，以成此证，或有母患别病，儿饮其乳，以类母病者有之，盖母之血气若调，乳则长养精神，血气一病，乳则反为病根，母既妊娠，精华下荫，冲任之脉，不能上行，气则壅而为热，血则郁而为毒，小儿神气未全，易于感动。其候寒热时作，微微下利，毛发脱落，意殊不悦，甚则面色痿黄，腹胀青筋，泻青多吐，日渐尪羸，竟成疳证，俗以孕在胎中，因儿饮乳，其魄识嫉而致儿病，故谓之胎妒，龙胆汤；

一骨蒸之病，多起于胃，其始也，邪火上冲而能啖，火消烁而善饥，盖胃为气血之海，气血不足，邪火杀谷，水谷之精气不足济之，渐成口秽烦躁，夜热朝凉，毛焦口渴，气促盗汗，形如骨立，谓之消瘅。若大便日十余行，肢瘦腹大，频食多饥，谓之食并，此皆邪火为害，耗伤津液而致者，大肥儿丸。

入　方

参苓白术散　治脾胃虚弱，饮食不进，或呕吐泻痢，大病之后，补救脾胃，此方为神。

官拣参切片，焙干　漂白术土炒　白云苓乳蒸　怀山药炒，各一两五钱　芽桔梗焙　薏苡仁炒　建莲肉去心　炙甘草各一两

共为细末。每服一二钱，姜、枣汤调服。

六味地黄丸　方见卷二胎疾门。

七味白术散　方见卷三泄泻门。

清胃散　治走马牙疳。

雅黄连　白当归　绿升麻　怀生地　粉丹皮　白芷梢等分　北细辛减半

净水煎滚，热服。

龙胆汤　治小儿魁病。

草龙胆　钩藤钩　北柴胡　芽桔梗　赤芍药　正川芎　官拣参　白云苓各一钱　炙甘草五分

井水煎服。外以夜明砂不拘多少，以红纱作一小袋盛之，系儿胸前。

大肥儿丸　治小儿脾胃虚弱，泄泻骨蒸。

官拣参切片，焙干　山查肉炒　漂白术土炒　真广皮炒　蓬莪术炒　川厚朴姜制　六神曲炒　雅川连姜制　胡黄连炒　杭青皮醋炒　白云苓乳蒸　杭白芍酒炒　地骨皮酒炒　宣泽泻炒　肉豆蔻煨　尖槟榔　正川芎炒　北柴胡酒炒　使君肉炒　干蟾蜍煅　炙甘草各五钱　五谷虫一两

共为末，炼蜜为丸弹子大。米饮化下。

加减肥儿丸　治一切久病成疳，总归虚处，不可以前法治之，只宜以此丸久服，以补为消，无不愈者。

官拣参切片，焙干　嫩黄芪蜜炙　漂白术土炒　白云苓乳蒸　广陈皮酒炒　杭青皮醋炒　白归身酒洗　大鳖甲醋炙　正川连姜制　南木香屑　使君肉炒　干蟾蜍酥炙　炙甘草各等分

上为细末，另以山药打糊为丸。量儿大小加减，日日服之，以米汤调下。病愈药停。

疳证简便方

小儿疳积，黄瘦骨立，头上疮痂，发如麦穗。用干蟾蜍三五只，去四足，以香油涂之，炙焦为末，蒸黑枣去核，取肉捣膏，和蟾末为丸龙眼核大。每日三服，积垢自下，多服之，形容自变，其病如失。

又方　买天浆虫四两，洗极净，晒干，微炒为末，加甘草细末五钱，米糊为丸弹子大。每服一丸，米饮下。

小儿诸疳日久，身面生疮，烂成孔凹，如大人杨梅疮样。用蒸糯米饭时，甑盖四边滴下气水，以碗盛取，扫疮上，数日即效。百药不验者，此方如神。

疳蚀口烂，用粪蛆洗漂极净，晒干，微炒为末，褐衣烧灰减半，共研匀，频吹口内效。

小儿口疳破烂。人中白煅过，厚黄柏蜜炙焦，二味等分，少加冰片，共研末，以盐

茶洗口后，以药搽之。

走马牙疳及齿龈腐烂黑臭者，用溺壶内多年积垢，名人中白，煅红一两，儿茶五钱，黄柏、薄荷、青黛各一钱，冰片三分，共研细末，先以温水漱口，然后吹药于疳上，每日六七次。吹药之时，涎从外流者为吉，涎收向内者，毒入里也，不治。

牙疳鼻疳，人中白煅一钱五分，毛褐灰、枯白矾各一钱，为细末，湿者干搽，干者先以香油润湿，然后搽药。

急疳蚀烂口鼻欲死。海中紫贝子煅过，俗名南蛇牙齿，又名研螺，岭南称狗支螺者是也，炭火煅过为末，腊猪油调涂。

牙疳溃烂，穿唇破舌，并治口疮。胡黄连五分，胆矾、儿茶各一钱五分，共为细末，搽之。

呕吐证治

经曰：诸逆冲上，皆属于火；诸呕吐酸，皆属于热。又曰：寒气客于肠胃，厥逆而出，故痛而呕。夫呕吐者，阳明胃气下行则顺，今逆而上行，故作呕吐。其证有声有物谓之呕；有物无声谓之吐；有声无物谓之哕，又曰干呕，久病见此者死。盖小儿呕吐，有寒有热有伤食，然寒吐热吐，未有不因于伤食者，其病总属于胃。复有溢乳、哺乳、呕哕，皆与呕吐相似，而不可以呕吐治之。更有寒热拒隔之证，又有虫痛而吐者，皆当详其证面治之。凡治小儿呕吐，先宜节其乳食，节者，减少之谓也。凡呕吐多渴，不可与之茶水，水入复吐，终不能止，必强忍一二时久，而后以米汤与之，吐自止矣。

寒吐者，乳片不消，多吐而少出，面白眼慢，气缓神昏，额上汗出，脉息沉微，宜温中消食。轻者藿香正气散，不止，理中汤加藿香，又不止，参香散。再若不止，此阴盛格阳，谓之拒格，急以理中汤一剂，用公猪胆汁和童便少许，将药润湿炒熟，煎服即止。此《内经》热因寒用之法也。盖阴寒太过，阳热之药拒而不纳，故以猪胆汁、童便为向导，其始则同，其终则异，下咽之后，阴体渐消，阳气乃发也。

热吐者，面赤唇红，吐饮少而出物多，乳片已消，色黄，遍身发热而烦躁。夏月多此证，宜五苓散加藿香，不止，藿连汤，再不止，用理中汤，煎熟，调六一散冷服即止。此寒因热用也。

伤食吐者，眼泡浮肿，面色微黄足冷，其热日轻夜重，或吐馊酸之气，或吐黄水，或吐青痰，其脉弦实而滑。此有宿食也，宜下去其积乃止，消积丸。

伤乳吐者，才乳即吐，或少停而吐。此因乳食无度，脾胃娇嫩，不能运化。此满则溢也，名嗌乳。但宜节其乳，则吐自止。

哺乳者，时时吐乳而不多，似吐非吐，皆胃虚所致也，宜参香散。

有乳多而吐出者，非真吐也；苟不知禁，即成真吐也。百日内小儿多有之，盖身小身软，必等乳母拥抱之，苟有倾侧，乳即溢出。此人事也，不须用治。

嗽吐者，儿有咳嗽，必待其嗽定，方可与乳。若嗽未定，以乳哺之，其气必逆，乳不消化而为痰，痰气壅塞，嗽不得转面吐乳也，枳桔二陈汤。

小儿初生三日内吐乳者，用丁香三粒、陈皮三分，生姜三片，煎服自止。又不若煨姜汤更妙！此予用最多者，盖三四日内总皆寒吐也。

初起哺乳，即当调治。如哺不已即成吐，吐不已即成呕，呕不已即成哕，至此胃气大虚，精神渐脱矣。若呕吐不已，日渐沉困，囟陷囟肿，青筋大露者；并频吐不食，昏沉语塞，喘急大热，常吐腥臭者，皆死。

哕者，有声无物，最恶之候，凡久病之后而见此者，皆为不治。

予按：为医者临诊治病，贵能体贴病情，能用心法。大凡呕吐不纳药食者，最难治疗。

盖药入即吐，安能有功？又切不可强灌，胃口愈吐愈翻，万不能止。予之治此频多，先将姜汤和黄土作二泥丸，塞其两鼻，使之不闻药气。然后用对证之药煎好，斟出澄清，冷热得中，止服一口，即停之半时之久，再服一口，又停之良久，服二口停之，少顷则任服不吐矣。斯时胃口已安，焉能得吐？愚人不知，明见其吐药不纳，偏以整杯整碗强灌之，则一吐倾囊而出，又何药力之可恃乎？此等之法，不但幼科可用，即方脉亦当识此。倘临证不体病情，全无心法，即如呕吐一证，虽能识病，虽能用药，其如不纳何哉？

入　方

藿香正气散　方见卷二类搐门。

理中汤　方见卷二乳子伤寒门。

参香散　治小儿胃虚作吐，诸药不止。

官拣参切片，焙干　上沉香锉末　公丁香研　藿香梗焙　南木香锉屑，各等分

共为细末，每服五七分，木瓜煎汤调服。

五苓散　方见卷二中暑门。此加藿香。

藿连汤　治小儿热吐不止。

真雅连七分，姜汁炒　紫厚朴一钱，姜汁炒　藿香叶一钱

生姜三片，大枣三枚，水煎，热服。

六一散　方见卷三痢疾简便方。

清积丸　治食停胃口而作吐。

西砂仁十二个，酒炒　公丁香九粒　乌梅肉三个，蒸，去核，取净肉　巴豆仁二粒，煨，捶去油

共研细末，米糊丸绿豆大。每服三丸，白汤送。

枳桔二陈汤　治小儿胸膈有痰，咳嗽作吐。

陈枳壳一钱　芽桔梗一钱　白云苓一钱五分　法半夏一钱　真广皮一钱　炙甘草五分

生姜三片，大枣三枚，水煎，热服。

呕吐简便方

小儿呕吐，外证不热不渴，而白唇淡，神慢气怯，寒吐也。用生姜一大块，直切薄片，勿令折断，层层掺盐，以贮麻紧扎，外用草纸七层包之，水湿，慢火煨令熟，取起，去麻、纸，将姜捣烂，和早米煎汤服，立止。

小儿卒呕不止。生姜取自然汁一盏，煎滚听用；蜂蜜四两，炼熟听用。每服用姜汁一匙，蜜二匙，白汤调服，每日五六次，效。

小儿胃热呕吐。外证面赤烦躁，身热作渴，手足心热者，热吐也。黄连一钱姜汁炒，熟石膏一钱，共为细末，每服一钱，白汤调下。吐止，止后服。又用枇杷叶火上炙之，刷净毛，每用叶三片，煎汤热服，立止。

小儿干呕，极恶之证。用甘蔗取汁听用，生姜取汁听用。临服用蔗汁六匙，姜汁二匙，和匀温热服，不用汤水调。

凡呕吐服药不纳者，内有蛔虫在膈间，蛔闻药气则动，动则药出而虫不出。但于呕吐药中，加入川椒十四粒，则不吐矣，盖蛔得椒则伏矣。

治小儿一切吐逆，不拘冷热，及久吐诸药不效者。用硫黄五钱，水银一钱，同研至不见星，姜汁打，米糊为丸小豆大。三岁者三丸，大人则三四十丸，以阴阳水送下。此二味加增分两，入阳城罐内封固，以炭火升炼之，即是灵砂，为仙家所用之物。最能升降阴阳，交济水火，乃扶危济困之神丹也。

泄泻证治

经曰：水谷之寒热，感则害人六府。又曰：虚邪之中人也，留而不去，传舍于肠胃，多寒则肠鸣飧泄，食不化，多热则溏如糜。夫泄泻之本，无不由于脾胃。盖胃为水谷之海，而脾主运化，使脾健胃和，则水谷腐化，而为气血以行荣卫。若饮食失节，寒温不调，以致脾胃受伤，则水反为湿，谷反为滞，精华之气，不能输化，乃致合污下降，而泄泻作矣。

凡泄泻肠鸣腹不痛者，是湿，宜燥渗之；

饮食入胃不住，或完谷不化者，是气虚，宜温补之；腹痛肠鸣泻水，痛一阵、泻一阵者，是火，宜清利之；时泻时止，或多或少，是痰积，宜豁之；腹痛甚而泻，泻后痛减者，为食积，宜消之，体实者下之；如脾泄已久，大肠不禁者，宜涩之，元气下陷者升提之。

泄泻有五：寒、热、虚、实、食积也。但宜分别所泻之色。凡暴注下迫，属火；水液清澄，属寒；老黄色属心脾肺实热，宜清解；淡黄色属虚热，宜调补；青色属寒，宜温；白色属脾虚，宜补；酱色属湿气，宜燥湿，馊酸气属伤食，宜消。

脾土虚寒作泻，所下白色，或谷食不化，或水液澄清。其候神疲，唇口舌俱白色，口气温热，宜理中汤或六君子汤。

热证作泻，泻时暴注下迫，谓其出物多而迅速也，便黄溺赤，口气蒸手，烦渴少食，宜五苓散加栀仁。

有伤食及滞泻者，其候口噯酸气，吞酸腹胀，一痛即泻，一泻痛减，保和丸消之。

如食已消，痛已止，面犹泄泻不止者，乃脾失清升之气，气虚下陷，补中益气汤。

有风泻，泻而色青稠粘，乃肝木乘脾，宜六君子汤加防风、柴胡、白芍。

有湿泻，腹内肠鸣，肚不痛，身体重而泻水，或兼风者，水谷混杂，宜升阳除湿汤。

凡大泻作渴者，其病不论新久，皆用七味白术散生其津液。凡痢疾作渴亦然。盖白术散为渴泻之圣药。倘渴甚者，以之当茶水，不时服之，不可再以汤水，兼之则不效矣。

久泻不止，多属虚寒。宜参苓白术散，加肉豆蔻煨熟为丸，服之自止。

久泻未止，将或疳者，参苓白术散加肉豆蔻煨，倍加怀山药，共为末。每日服之，则泄泻自止，津液自生，不致成疳矣。

经曰：五虚者死，一脉细，二皮寒，三少气，四泄泻不止，五饮食不入。五虚悉具者死，能食者生。

凡泻不止精神好者，脾败也；吐泻而唇深红者，内热也；色若不退者死，面黑气喘者死。遗屎不禁者，肾气绝也。

入　方

理中汤　方见卷二乳子伤寒门。

六君子汤　方见卷二类搐门。

五苓散　方见卷二伤暑门。此加栀仁。

补中益气汤　方见卷一保产门。

升阳治湿汤　治风湿作泻。

绿升麻一钱　北柴胡一钱　六神曲一钱　北防风一钱二分　宣泽泻一钱　结猪苓一钱　漂苍术一钱五分　真广皮五分　炙甘草五分

生姜三片，大枣三枚，水煎，热服。若胃寒肠鸣，加益智仁、半夏各一钱。

七味白术散　治泄泻津液下降，烦躁大渴。

官拣参一钱　漂白术一钱　白云苓一钱　南木香三分　藿香叶一钱　粉干葛二钱　炙甘草五分

水煎，当茶饮。

此方治小儿阳明本虚，阴阳不和，吐泻而亡津液，烦渴口干。以参、术、甘草之甘温补胃和中；木香、藿香辛温以助脾；茯苓甘淡，分阴阳、利水湿；葛根甘平，倍子众药，其气轻浮，鼓舞胃气，上行津液，又解肌热。治脾胃虚弱泄泻之圣药也，兼治久泻不止，口渴无度，并痢疾口渴。幼科之方，独推此为第一，后贤宜留意焉。

参苓白术散　方见卷三疳证门。

泄泻简便方

治水泻，或饮食过度，或饮冷水冒暑而发。用生姜捣烂三钱，陈细茶三钱，浓煎汤饮，立止。盖泄泻由脏腑阴阳不和，姜能和阴，茶能和阳，是以多效。体素薄者，加莲子去心二钱。

泄泻因伤湿而起，米谷不化，不思饮食，困弱无力。用白术土炒、白茯苓各三钱，水煎，食前服。腹痛者，加炒白芍一钱，炙甘

草五分。

泄泻因于寒者，腹痛手足冷。用胡椒十四粒、生姜三钱、淡豆豉三钱，煎汤，热服。

泄泻腹痛奇方，用鸡蛋一枚，将小头打一小孔，入胡椒七粒在内，以纸封顶，纸包煨熟，酒送更效。胡椒吞与不吞，不拘。

脾虚久泻，用白术土炒、山药酒炒、莲肉去心蒸熟、砂仁酒炒各一两，共为细末，以白砂糖二两和匀。每服一二钱，米饮调下。

又方，用早米造饭锅巴，取四两研末，莲子去心，蒸晒，为末四两，白糖四两，共和匀。每服二三钱，白汤调下，每日三服。

集成止泻散治久泻如神，此方经验最多。用车前子以青盐水炒七次，秤过二两，白茯苓炒二两，山药炒二两，炙甘草六钱，共为细末。每服二三钱，炒米汤调，乌梅汤更好。真神方也。

伤食证治

经曰：饮食自倍，肠胃乃伤。东垣云：饮者，无形之气也；食者，有形之血也。由此推之，乳为血液，饮之类也；谷有糟粕，食之类也。乳之与食，原非同类，岂可不辨乎哉？

凡小儿饮食伤脾之证，非可一例而论。有寒伤、有热伤；有暂病、有久病；有虚证、有实证。但热者、暂者、实者，人皆易知；而寒者、久者、虚者，人多不识。如今之小儿，以生冷瓜果，致伤胃气而为腹痛泻利者，人犹以为火热，而治以寒凉，是不识寒证也。有偶因停滞而为胀痛，人皆知其实也，然脾胃之素强者，即滞亦易化，惟其不能化者，则恒有胀满之证。又或有不食亦知饥，少食即作胀，或有无饥无饱，全不思食，或因病有伤胃气，久不思食，本非有余之证。时医遇此，无论有余不足，鲜有不用开胃消导之剂者，是不知虚证也。盖脾胃原有运化之功用，今既不能化食，则运用之职已失其权，而尚可专意克削，以益其困乎！故凡欲治病，必先藉胃气以为行药之主。若胃气强者，攻之则去，而疾常易愈，此以胃气强而药力易行也；胃气虚者，攻之亦不去，此非药不去病，以胃气本弱，攻之则益弱，而药力愈不行，胃愈伤病亦愈甚矣。若乃体质贵贱，尤有不同。凡藜藿之儿，壮健之质，及新暴之病，自宜消伐，惟速去为善；如以弱质弱病，而不顾虚实，概施欲速攻治之法，则无有不危矣。

凡素喜冷食者，内必多热；素喜热食者，内必多寒。故内寒者，不喜寒；内热者，不喜热。然热者嗜寒，多生中寒，寒者喜热，多生内热。《内经》所谓久而增气，物化之常，气增而久，夭之由也。凡治病者，又当于素禀中察其嗜好偏胜之弊。

凡饮食致病，伤于热者多为火证，而停滞者少；伤于寒者多为停滞，而全非火证。大都饮食之伤，必因于寒物者居多，而温平者次之。盖热则易于腐化流通，所以停滞者少。

冯楚瞻曰：凡小儿伤食，皆由胃气怯弱。今时之医，以平胃散为脾胃之准绳，孰知平胃者，胃中有高阜，则能使平之，使一平即止，不可过剂，过则平地反成坎矣。又不若枳实丸为胜，方为洁古老人所制，用枳实一两、白术二两，补多于消，先补而后消也。但此丸原为伤食者设，今若专以为补脾药，又误矣。夫枳实有推墙倒壁之功，用之不当，能无克削？即如山查、神曲、麦芽，举世所常用者，然山查能化肉积，凡多年母猪肉之不烂，但入山查一撮，登时皮肉即糜；又产妇儿枕痛，以山查煎服，儿枕立化，可见其破滞之功，岂可轻用！曲、麦者，以米饭在磁缸中，必藉曲以酿酒，必藉蘖以成糖。脾胃在人身中非磁缸比，原有化食之功，今食不化，因其所司者病也，只补其运用之能，而食自化，何必用此消克药哉？

大凡小儿原气完固，脾胃素强者，多食不伤，过时不饥。若儿先因本气不足，脾胃素亏者，多食易伤，如攻伐一用，饮食虽消，

而脾气复经此一番消伐，愈虚其虚；后日食复不化，犹谓前药已效，汤丸叠进，展转相害，羸瘦日增，良可悲矣！故医有贫贱之医，有富贵之医，膏粱子弟与藜藿不同，太平之民与疮痍自别。乡村里巷，顽夫壮士，暴有所伤，攻伐之剂，一投可愈；倘膏粱幼稚，禀受怯弱，娇养柔脆，一例施之，贻害不小矣。

楚瞻曰：人之脾胃虽能化食，实由于水火二气运用其间，非脾胃之所专能也。内火盛则脾胃燥，水盛则脾胃湿，皆不能健运，乃生诸病。如消渴证，火偏盛而水不能制；水肿证，水偏盛而火不能化。惟制其偏而使之平，则善矣。制者，非谓去水去火之意。人身水火，本自均平，偏者病也。火偏多者，补水配火，不必去火；水偏多者，补火配水，不必去水。譬之天平，此重则彼轻，一边重者，只补足轻之一边，决不凿去马子，盖马子一定之数。今人见水利水，见火泻火，是凿马子者也。

小儿之病，伤食最多，故乳食停滞，中焦不化而成病者，必发热恶食，或噫气作酸，或恶闻食气，或欲吐不吐，或吐出酸水，或气短痞闷，或腹痛啼叫。此皆伤食之候也，便宜损之。损之者，谓姑止之，勿与食也，使其自运。经谓伤之轻者，损谷则愈矣。损之不减，则用胃苓丸以调之；调之不减，则用保和丸以导之；导之不去，则攻下之。轻则木香槟榔丸，重则消积丸。

伤食一证，最关利害。如迁延不治，则成积成癖；治之不当，则成疳成痨。故小儿之强壮者，脾胃素实，恃其能食，父母纵之，以致太过，停留不化。此食伤脾胃，真伤食也，可用前法治之。如小儿之怯弱者，脾胃素虚，所食原少，或因略加，即停滞而不化。此乃脾虚不能消谷，转运迟耳，非真伤食，作伤食治则误矣。惟宜六君子汤，助其健运，多服自愈。

凡小儿脾胃实者，倘纵其口腹，不知节制，则饮食自倍，肠胃乃伤，而实者必致为虚矣。其体之虚怯者，能节其饮食，则肠胃不伤，谷气渐长，而虚者终变为实矣。

凡伤食吐泻后，则其所伤之物俱去，只与和其胃气，或异功散，或六神丸。

入　方

洁古枳实丸　治小儿伤食，脾不运化，以致面黄肚大。此方补多消少，诚为伤食运化之良方。

漂白术二两，用土拌炒　小枳实一两，酒炒

胃虚不思饮食者，加藿香叶五钱焙，西砂仁五钱酒炒，名香砂枳实丸；小儿体质肥白有痰者，加真广皮五钱酒炒，法半夏五钱焙，名橘半枳实丸。

上药炒制，以鲜荷叶包饭煨熟，去荷叶，将饭同前末捣匀，为丸极小。每一二钱，半饥白汤下。

胃苓丸　方见卷二伤湿门。

保和丸　治饮食停滞，胸膈痞闷，腹胀等证。

六神曲炒　真广皮炒　法半夏　白云苓炒，各一两　京查肉三两　净连翘炒　萝卜子炒，各五钱

共为细末，炼蜜为丸。每服一二钱，姜汤下。

丁香槟榔丸　治伤食消之不去，以此下之。

黑牵牛炒，取头末，五钱　尖槟榔炒，五钱　锦庄黄五钱，酒蒸，晒干　南木香三钱　六神曲炒，一两

共为细末，姜汁打米糊为丸。量儿大小加减用之。此方亦不峻厉，白汤送下。

消积丸　方见卷三呕吐门。

六君子汤　方见卷二类搐门。

异功散　专治脾胃虚弱，吐泻之后、大病之后，以此调理。

官拣参切　漂白术土炒　白云苓乳蒸　真广皮酒炒　炙甘草各等分

生姜、大枣水煎服。为末，姜、枣汤调

服亦可。

六神丸　与异功散主治同，实脾之功胜之。

官拣参切片，焙干　漂白术七炒　白云苓乳蒸　怀山药乳蒸　白扁豆炒　炙甘草各等分

共为末，炼蜜丸弹子大。每服一丸，姜汤化下。

食积证治

经曰：新积痛可移者，易已也，积不痛，难已也。夫饮食之积，必用消导。消者，散其积也；导者，行其气也。脾虚不运则气不流行，气不流行则停滞而为积，或作泻痢，或成癥瘕，以致饮食减少。五脏无所资禀，血气日愈虚衰，因致危困者多矣。故必消而导之，轻则和解常剂，重必峻下汤丸。盖浊阴不降，则清阳不升；客垢不除，则真元不复。如戡定祸乱，然后可以致太平。若积因脾虚，不能健运药力者，或消补并行，或补多消少，或先补后消，洁古所谓养正而积自除。故前人破滞削坚之药，必假参术赞助成功。经曰：无致邪，无失正，绝人长命。此之谓也。

夫食者，有形之物，伤之则宜损其谷，其次莫若消之，消之不去则攻之。此治初伤乳食之法也。倘治之不早，以致陈莝菀聚，乃成积也。其候面色黄白，或青黄，腹大或紧，食少腹痛，发则数日不止。而医者治积，不问平日所伤之物是寒是热，并不察儿之形气或虚或实，可攻不可攻，竟用偏寒偏热峻下之药，而犯虚虚之戒，其害岂胜言哉！如先伤热乳热食者，则为热积；伤冷乳冷食者，则为冷积。五谷之类为食积，禽畜之类为肉积，菜果之类为冷积，故药宜分寒热。冷积应用消积丸，热积木香槟榔丸，仍用原伤之物作汤送之，谓之溯源汤。

凡用攻下取积之药，必先补其胃气，如六君之类，预服数剂，扶其元神，然后下之，免伤胃气也。

如小儿体质素怯者，虽有积必不宜下，当以补为消。六君子汤加莪术、木香，共为细末，姜汁打神曲糊丸。每一二钱米汤下，久服自消。今儿禀受怯弱者众，有积皆当识此，攻积之药，慎勿轻用。

入　方

消积丸　方见卷三呕吐门。

木香槟榔丸　方见卷三伤食门。

六君子汤　方见卷二类搐门。此加莪术、木香。

食积简便方

消积丸　消食、消水、消气、消痞、消胀、消肿、消积，其功甚捷，惟久病虚羸者不宜用。此比前消积丸药力轻缓，不甚峻厉。

香附米酒炒，一两　五灵脂淘净，一两　黑牵牛炒，去头末，二两

共为细末，醋打面糊丸绿豆大。每服一二十丸，食远姜汤送下。

治伤冷食及难化之物，用生姜、紫苏煎浓汤，置浴盆内，令患者乘热坐汤内，以手揉其腹胸，以热汤淋之，气通即化矣。

又方　以生姜捣烂，紫苏捣烂，炒热布包，熨胸腹；如冷，再炒再熨，神效。

治伤食停积不消，用白酒曲，即酿酒小曲。炒二两，老麦芽取净末一两，共为细末，每服二钱，白汤调下。治粽伤及糯米所伤，更妙。

治饮食停滞，饱闷不消。以糯米一升炒热，以布包之，分作二包，于脐腹上轮换熨之，助其脾气转运也，立消。

因食肉停滞不消，用山查子三十粒，捶碎，煎浓汤饮之，自化。

因食犬肉成积，不治则杀人。用山查肉二十四粒，杏仁去皮尖二十四粒，煎浓汤饮，自化。

因食牛肉腹胀不消，用干稻草一把，煎浓汤滚热饮之，自消。

因面食腹胀，生姜捣汁，冲好酒热服，即消。又方，以生萝卜取汁，温热服，神应。

凡食面必用醋，断不作胀。

因食菱角腹痛作胀，生姜捣取自然汁，以滚汤冲服，立消。

因食瓜果生冷太多，以致腹胀气急，用真青化桂去粗皮，取肉研细末，以饭捣和为丸绿豆大。小儿每服五丸，稍长者十丸，水送，病愈药停。

凡小儿病，医认证不确，错用反药，或烦躁不宁，或呕泻不止。欲与解去，其药用黑豆一杯，甘草三钱，煎浓汤服之，自解。倘无黑豆，绿豆亦好。

发热证治

经曰：阳胜则热，阴胜则寒。重寒则热，重热则寒。寒伤形，热伤气。又曰：气实者，热也。小儿之病，多有发热，然幼科论证太繁，来学眩目，莫得其要。予谓小儿之证，惟宜明显简切，有裨于治疗足矣。今以小儿发热，分为四大证：一曰表热，一曰里热，一曰虚热，一曰实热。表里虚实既明，则大纲在手，然后逐证辨认，又岂能逃其冰鉴乎？

一、小儿无故发热，多由外感风寒。其证喜人怀抱，畏缩，恶风寒，不欲露出头面，面带惨色，不渴，清便自调，吮乳口不热，或鼻塞流涕，或喷嚏，浑身拘急。此表热也。初起时一汗可解，桂枝汤加柴胡、粉葛，热服，取微汗效。若元气怯弱者，四君子汤加防风、柴胡、粉葛。

一、发热时，喜露头面仰身卧，扬手掷足，揭去衣被，渴欲饮水，吮乳不休者，口渴也，吮乳口热，小便赤，大便闭。此里热也。宜解利之，导赤散煎送泻青丸。

一、虚热者，多从大病之后，或温热，或潮热，如潮汐有定期也，或渴或不渴，大小便如常。宜补之，竹叶调元汤。

一、实热者，面赤腮燥，鼻孔干焦，喜就冷，或合面卧，或仰面卧，露出手足，揭去衣被，大渴不休，大小便秘。宜微下，集成沆瀣丹。

以上四热为纲，其下杂证为目，有纲有目，而犹不能辨别者，未之有也。

伤风发热，其证自汗身热，呵欠，目赤多睡，恶风喘急。此因解换裸裳，受风所致。治宜解肌，柴葛桂枝汤，热退之后，略宜滋阴。

伤寒发热，其证无汗身热，呵欠顿闷，项急面赤，喘急恶寒，口中气热。此因脱换受寒所致。治宜惺惺散。热退后，微服沆瀣丹，以防内热。

既伤风寒，发热，又兼吐泻者，不可发散。此脾胃虚怯也。但以五苓散煎送理中丸。

伤热发热，多在夏月。其证身热自汗，作渴昏睡，手足俱热。此因天气过热，面包裹过厚，受其热也。人参白虎汤以解其热，次以调元生脉散补之。

伤暑发热，夏月有之。其证身热自汗，作渴昏睡，手足冷。此由高堂广厦，阴冷太过，中气受伤所致。先以调元生脉散补其气，次服四君子汤以防吐泻。

心热者，浑身发热，面青自汗，心悸不宁，脉数烦躁，狂叫恍惚，此心热也。导赤散加黄连。

夜热者，夜间作热，旦则退去，此血虚也。六味地黄汤加龟板、当归、白芍，敛纳阴气。

伤寒无汗，服表药而汗出，其热不退，又复下之，热仍不退，乃表里俱虚，气不归元，阳浮于外，此为虚热，不可误用寒凉，即当和其胃气，裨阳气收敛，其热自退。四君子汤加炮姜。

疳热者，形色黄瘦，食不长肌，骨蒸盗汗，泄泻无恒，肚大脚小。多起于大病之后，失于将息，又或伤饥食饱，脾气受伤。六君子汤加当归、白芍。

壮热者，一向热而不已。由气血壅实，五

脏生热。郁蒸于内，则睡卧不安，精神恍惚；蒸发于外，则表里俱热，燥急喘粗，甚则搐搦。以导赤散煎汤送泻青丸，大小便秘者，集成沆瀣丹。

烦热者，躁扰不安，五心烦躁，四肢温壮，小便赤涩。此心经有热，宜导赤散加麦冬、栀仁。

积热者，面赤口疮，大小便黄赤。此表里俱实。或因内伤酒面，煎炒炙煿，或误投峻补之药；或外因厚棉炉火，温暖过度，皆能生热。此人事所致，宜沆瀣丹清解之。

虚热者，或汗下太过，津液枯焦，或大病之后，元气受伤，皆能生热。其证困倦少力，面色青白，虚汗自出，神慢气怯，四肢软弱，手足厥冷。此气虚发厥，血虚发热，大虚证也。四君子汤加炮姜，甚则加附子，热退以平剂调之。

客热者，乍有乍无。邪热干心，则热形于额，故先起于头面，而后身热，恍惚多恐，闻声则惕。此正气虚而热邪胜，故邪正交争，发热无定，乍进乍退，如客之往来莫测也。导赤散先彻其邪，后以团参散护其正气。

血热者，每日巳午时发热，过夜则凉。此心经血热也。轻则导赤散，重则四顺散。

入　方

柴葛桂枝汤　治小儿伤风，自汗发热。

嫩桂枝一钱　杭白芍一钱五分　北柴胡一钱　粉干葛一钱　炙甘草八分　老生姜一钱　大红枣五枚

净水浓煎，热服。

惺惺散　方见卷二乳子伤寒门。

集成沆瀣丹　方见卷二胎疾门。

五苓散　方见卷二伤暑门。

理中汤　方见卷二乳子伤寒门。

人参白虎汤　方见卷二伤暑门。

调元生脉散　治夏月伤热发热，以此扶其元气。

官拣参六分　炙黄芪一钱五分　杭麦冬一钱　北五味五分　炙甘草五分

老生姜二片，大红枣二枚，水煎，温服。

四君子汤　方见卷三疟疾门。

导赤散　方见卷四啼哭门。

六味地黄汤　方见卷一胎疾门。

六君子汤　方见卷二类搐门。

泻青丸　方见卷四啼哭门。

团参散　方见卷二非搐门。

四顺清凉散　方见卷四腹痛门。

神奇外治法

疏表法　小儿发热，不拘风寒食饮，时疫痘疹，并宜用之。以葱一握，捣烂取汁，少加麻油在内和匀，指蘸葱油，摩运儿之五心、头面、项背诸处，每处摩擦十数下，运完，以厚衣裹之，蒙其头，略疏微汗，但不可令其大汗。此法最能疏通腠理，宣行经络，使邪气外出，不致久羁荣卫，而又不伤正气，诚良法也。

清里法　小儿发热至二三日，邪已入里，或乳食停滞，内成郁热。其候五心烦热，睡卧不宁，口渴多啼，胸满气急，面赤唇焦，大小便秘。此为内热。以鸡蛋一枚，去黄取清，以碗盛之，入麻油约与蛋清等，再加雄黄细末一钱，搅极匀；复以妇女乱发一团，蘸染蛋清，于小儿胃口拍之，寒天以火烘暖，不可冷用，自胸口拍至脐轮止，须拍半时之久，仍以头发敷于胸口，以布扎之，一炷香久取下不用。一切诸热皆能退去。盖蛋清能滋阴退热，麻油、雄黄拔毒凉肌故也。此身有热者用之，倘身无热，惟啼哭焦烦，神志不安者，不必蛋清，专以麻油、雄黄、乱发拍之，仍敷胸口，即时安卧。此法多救危险之证，功难殚述。

解烦法　凡小儿实热之证，及麻疹毒盛热极，其候面赤口渴，五心烦热，啼哭焦扰，身热如火，上气喘急，扬手掷足。一时药不能及，用水粉一两，以鸡蛋清调匀，略稀，涂儿胃口及两手掌心；复以酿酒小曲十数枚，研

烂，热酒和作二饼，贴两足心，布扎之。少顷，其热散于四肢，心内清凉，不复啼扰。

开闭法　凡小儿风痰闭塞，昏沉不醒，药不能入，甚至用艾火灸之，亦不知痛者，盖因痰塞其脾之大络，截其阴阳升降之隧道也。原非死证，用生菖蒲、生艾叶、生姜、生葱各一握，共入石臼内捣如泥，以麻油、好醋同前四味炒热，布包之，从头项背胸四肢，乘热往下熨之。其痰一豁，倏然而醒。此方不特小儿，凡闭证皆效。

引痰法　凡小儿痰嗽，上气喘急，有升无降，喉中牵锯之声，须引而下行。用生白矾一两研末，少入面粉，米粉亦可，盖生矾见醋即化成水，入面粉取其胶黏故也，好醋和作二小饼，贴两足心，布包之。一宿，其痰自下。

暖痰法　凡小儿胸有寒痰，不时昏绝，醒则吐出如绿豆粉，浓厚面带青色。此寒极之痰。前法皆不能化，惟以生附子一枚、生姜一两，同捣烂、炒热、布包，熨背心及胸前，熨完，将姜、附捻成一饼，贴于胃口。良久，其痰自开。

纳气法　凡小儿虚脱大证，上气喘急，真气浮散，不得归元，诸药莫效。用吴茱萸五分、胡椒七粒、五倍子一钱，研极细末，酒和作饼，封肚脐，以带扎之，其气自顺。

通脉法　凡小儿忽尔手足厥冷，此盖表邪闭其经络，或风痰阻其荣卫，又或大病之后，阳不布散于四肢。速用生姜煨熟，捣汁半小杯，略入麻油调匀，以指蘸姜油，摩儿手足，往下搓挪揉捺，以通其经络，俟其热回，以纸拭去之。凡小儿指纹滞涩，推之不动，急以此法推豁之。盖此法不论阴阳虚实，用之皆效。

定痛法　凡小儿胸中饱闷，脐腹疼痛，一时不能得药，用食盐一碗，锅内炒极热，布包之，向胸腹从上熨下。盖盐走血分，最能软坚，所以止痛，冷则又炒又熨，痛定乃止。男妇气痛，皆用此法。

以上九法，非古书所有，实予异授心传，经验既久，神应无方，笔之于书，以公世用。

治病端本澄源至要口诀

凡临病家诊视小儿，无论病之轻重，证之顺逆，稍长者令其本身忌口，乳子即令乳母忌口，严禁荤酒油腻，酸咸辛辣，但可香茶白饭，稍用蜜饯糖食而已。盖乳房为胃经所主，饮食入胃，腐化精微而为荣血，贮于冲脉，冲脉载以上行，遂变赤为白而为乳汁。小儿赖此以为命，与乳母气候相关，吉凶共际。是以母食热，子受热；母食寒，子受寒；母食毒，子中毒。又惟荤酒油腻，甘肥凝滞之物为尤甚，故凡小儿有病，但得乳母忌口，即不药亦能自愈。不观穷乡僻壤，藜藿单寒之家，所育之子，肥实壮健，面且少病，病亦易愈。人但云他人之子，何以易育？不知他家无甘肥凝腻，口腹清淡，所以病少面易育；自家乳母，纵口饮啖，荤酒不忌，医虽用药得法，其如乳汁不清，胃口油滞，不能宣布药力，所以多病难医也。此至紧至要关头，医者不为切戒，其咎在医，至于病家，每多自误。凡乳子有病，其母于房劳食饮，寒暑喜怒，一毫不慎，惟责效于医之草根树皮，讵知刀头圭角，能胜其无情之相火，能制其有质之油腻耶？徒令医者劳心，病儿受苦，深可悲悯！复有妇人姑息之爱，切要提防。昔予一堂弟年八岁，因病伤寒几死，得遇明者保全，稍能步履，医嘱严忌荤腥。予伯母觑面承错，私以烂蹄花一碗与之。病人见肉，登时食尽，时予目睹其事。夜即变证，四肢厥冷，口吐白沫，喉内痰鸣，两目直视而绝。予伯与医者惊惶无措，莫测其由，因询曾食何物？伯母坚辞无有，微风不露，予亦莫敢直言。医者无可下手，遂辞去。予取山查肉，炒研细末，以浓姜汤调灌数次。盖山查多服，最能通利，五更大泻数行，所下油腻胶滞之物，内有精肉犹存，人事倏清。伯见所下之物，始

知食肉生变，痛胃其母，几至反目。幸予在侧开解之，令予调理，予为畅脾而安。此等暧昧，苟非予之目击，伯母必不直告，即至真死，彼亦不言，医者亦不知其何以变证而死！可见妇女误事，为祸如此其烈也。凡类此者，以天下之大，又岂特一人而已。故凡遇膏粱宦室，不可不谆切言之，以杜其姑息之害。

小儿在胎之时，冲脉运血以养之；及其产下，冲脉载血以乳之。乳为血化，所以儿之脾胃，独与此乳汁相吻合，其他则皆非所宜矣。凡小儿一周二岁，止可饮之以乳，切不可饵以谷食。盖谷食有形之物，坚硬难消。儿之脾气未强，不能运化，每多因食致病。倘乳少必欲借谷食调养者，须以早米炒熟磨粉，微入白糖，滚汤调服，不致停滞。至于肉食，尤为有害。凡小儿五岁之内，能忌肉食，终身无脾病。无奈愚夫愚妇，莫可理喻，见儿病稍愈，即以肉食饲之，谬云虚补不如实补，谓药补为虚，肉补为实。不知此语出于何经？妄诞无知，真堪唾骂！及其脾胃凝滞，儿病复作，始为仓惶懊悔，是谁之咎！故小儿病后，必不可妄用荤腥，只可素食调理，或一月半月，待其脾气已健，始可略与清汤，仍不得过用甘肥。盖甘肥之物，非但不能益儿，适足以致病。医者能知此意，治病必不掣肘；病家能依禁忌，断无反复之虞。此非摸拟之辞，实知之深，见之确，端本澄源，莫切乎此。予虽未学，临证有年，病家之弊，无不周知，故不得不剖心相告，庶后贤知所提备云。

痢疾证治

经曰：饮食不节，起居不时，阴受之则入五脏，填满闭塞，下为飧泄，久为肠癖。夫飧泄者，水谷不化也；肠癖者，下痢是也。小儿之病，伤食最多，内有宿食停积，更受外感，则成痢矣。古今方书，以其闭滞不利，故又谓之滞下，其证里急后重，或垢或血，或见五色，或多红紫，或痛或不痛，或呕或不呕，或为发热，或为恶寒。此证之阴阳虚实，最宜详审，庶不致误。仍当以脉证辨之：凡身热作渴，脉数有力而能食者，为热；身凉不渴，脉沉无力而不能食者，为寒。

初起腹中苦痛，里急后重者为实，宜急下之，集成沆瀣丹、集成三仙丹二药同服，立应。

如兼外感者，必身有寒热，不可遽下。凡痢由外感而发者最多，急宜发散。若下之早，必致引邪入里，而为绵延之证；以仓廪散疏解之。

因伤风得之者，则纯下清血。盖风伤其阴络，致血不循经，所以血妄下，宜胃风汤。

赤白相兼者：心主血，因伤热得之，则心移热于小肠，故赤者从小肠来；肺主气，因伤热得之，则肺移热于大肠，故白者从大肠来。皆以芍药汤治之，调血则便脓愈，行气则后重除。此治痢之要法也。又法，以黄连阿胶丸加当归、木香治血痢，于血中行气；以胃苓丸加当归、白芍治白痢，于气中养血。有积者，治痢保和丸。

痢久不止，名休息痢，切不可止涩，和中丸最妙。后有集成至圣丹，专治久痢，百不失一。

有泄泻变痢者，有痢变泄泻者。先泻后变痢者，脾传肾也，为贼邪，难治；先痢后变泻者，肾传脾也，为微邪，易治。盖初泻变痢者，此气病传入血中，宜养血为主，加调气之药，不可误下，以伤胃气；初痢变泻者，血病传入气中，以调气为主，加养血之药，不可收涩，恐毒气留而不去，复成痢也。泻变痢者，加味四物汤；痢变泻者，加味四君子汤。

痢久不止，脾胃受伤，中气下陷，则为脱肛，热毒上逆，则食入便吐，不思乳食，谓之禁口；久痢阴伤，肾气虚败，则两膝红肿，谓之鹤膝。

脱肛者，胃气下陷，后重不除，努挣太过，故肠头脱出，宜养血调气，微加升提之品，则痢止肛自收矣，升麻汤。外用洗法、托法。

禁口者，乃胃虚逆气上冲而吐也，有不思饮食，皆虚损也，宜参苓白术散米汤调服。凡痢疾能食者吉，不能食者凶。

鹤膝者，两膝红肿，如鹤之膝。小儿痢后多有此证，乃肾虚之极，宜补肾地黄丸加牛膝、鹿茸。

痢疾腹胀，中气虚也，胃苓丸调之。倘因毒气未尽，庸流误服涩药而致腹胀者，为实也，不可作虚治，保和丸消导之。

痢疾不治证：痢见五色，五脏俱败；痢如烟尘水，如屋漏水；下痢久，肛门如竹筒；如鱼腥；久痢唇红舌胎，气促心烦，坐卧不安，大渴饮水，面容似朱者。皆死证也。

入　方

集成沆瀣丹　方见卷一胎疾门。

集成三仙丹　方见卷二类搐门。

仓廪汤即人参败毒散加陈仓米　方见卷二小儿伤风门。

治伤风痢疾，及时行疫痢，大小相似者，宜先服此即人参败毒散加陈仓米煎服，即名仓廪汤。喻嘉言以此方为治痢之圣药，无论新久，必用此药升散之，深得逆流挽舟之法也。予每用之，轻者，三四剂即愈矣，不必另方；重者，服药后外证悉去，惟腹痛、里急后重未除者，以沆瀣丹、三仙丹同服，推去积滞，无不愈者。盖仓廪汤治痢，与用四逆散治痢同意，后贤宜深究焉。

胃风汤　治风冷客于肠胃，泄下鲜血，及肠胃湿毒，下如豆汁，或下瘀血。

官拣参一钱　漂白术一钱五分　白云苓一钱　白当归一钱　正川芎五分　杭白芍一钱　上桂心五分　陈粟米一撮

姜一片，枣一枚，水煎，温服。

河间芍药汤　调血便脓愈，行气后重除，此方是也。

杭白芍一钱五分　大当归一钱　雅川连五分　实黄芩八分　锦庄黄五分　尖槟榔一钱　南木香三分

净水浓煎，热服。

黄连阿胶丸　治血痢，于血中行气。

正雅连一钱　东阿胶二钱　白云苓一钱　当归身一钱　南木香一钱

共为细末，水丸。每服一二钱，米饮下。

胃苓丸　方见卷二伤暑门。治白痢，于气中养血，本方加当归、白芍、白术。

治痢保和丸　治痢疾积滞未尽，或在先原未得下，今已脾虚不可下者，宜服此。

广陈皮　法半夏　白云苓　陈枳壳　川厚朴　正雅连　京楂肉　六神曲　老麦芽以上诸味各一钱　南木香　尖槟榔　炙甘草各五分

共为细末，另以神曲煮糊为丸。每服一二钱，米饮下。

和中丸　治休息痢及疳痢。

官拣参　炙甘草　当归身　正川芎　车前子　结猪苓　宣泽泻　六神曲　老麦芽　建莲肉以上各二钱　漂白术　白云苓　真广皮　杭白芍　南木香　炮姜炭　肉豆蔻各一钱

共为细末，酒煮而糊丸。每服一二钱，米饮下。

加味四物汤　治先水泻而变痢者。

当归身　正川芎　杭白芍　怀生地　白云苓　正雅连　南木香各等分

水煎，空心热服。

加味四君子汤　治先痢而后泻者。

上官拣　漂白术　白云苓　当归身　杭白芍　炙甘草各一钱

生姜三片，大枣三枚，水煎温服。

升麻汤　治虚痢脱肛，仍调气养血，微带升提。

绿升麻一钱五分　官拣参　漂白术　白云苓　芥穗　真广皮　当归身　杭白芍　北防风以上各一钱　炙甘草五分　肥乌梅一粒

水煎，食后服。

脱肛洗药

五倍子五钱　白芒硝一钱　荆芥穗一钱五分

煎汤熏洗，仍以五倍子研末敷之，方以软帛托入。

参苓白术散　方见卷三疳证门。

补肾地黄丸　方见卷三哮喘门。此加虎胫、牛膝、鹿茸。

补肾地黄丸　方见卷二伤暑门。

保和丸　方见卷三伤食门。

痢疾简便方

治痢疾，用干马齿苋煮烂，红痢以蜂蜜拌，白痢以砂糖拌，红白相兼，蜂蜜、砂糖各半拌食，一日二次，连汤服之，更妙。按马齿苋名五方草，其叶青、梗赤、根白、花黄、子黑，五行俱备，所以寒热赤白皆治。

六一散　此方取"天一生水，地六成之"之义，为北方壬癸之精。以其清暑毒、去湿热、分阴阳、利小便、泻丙水，从小便而出，故为治痢妙方。

白滑石研细末，以清水调飞，其重浊滓质不用，待其水清，去水，晒干，每滑石末六两，加甘草细末一两、研匀听用。

白痢用六一散七钱，干姜末七分，红痢用六一散七钱，红曲末七分，各用姜汁打面糊为丸，梧桐子大。每服一二钱，白汤下。

久痢不止，用红糖、白糖、饧糖各三钱，甘草一钱，陈茶叶二钱，同煎熟，露一宿，次早温热服，神效。

禁口痢不思饮食，以腊猪肉去肉取骨，锅内煎浓汤，徐徐服之，百发百中。

治赤白相兼，用山查肉不拘多少，炒研为末，每服一二钱，红痢蜜拌，白痢红砂糖拌，红白相兼，蜜、砂糖各半拌匀，白汤调服，空心下，更妙。此药不分虚实，不分久近，皆效，甚稳甚验。

集成至圣丹新出　治冷痢久泻，百方无验者，一服即痊。凡痢之初起，实热实积，易知而易治，惟虚人冷积致痢，医多不以为意。盖实热之证，外候有身热烦躁，唇焦口渴，肚疼窘迫，里急后重，舌上黄胎，六脉洪数。证候既急，治者亦急，轻则疏利之，重则寒下之，积去而和其阴阳，无不愈者。至于虚人冷积致痢，外无烦热躁扰，内无肚腹急痛，有赤白相兼，无里急后重，大便流利，小便清长。此由阴性迟缓，所以外证不急。遇此切不可姑息，但以集成三仙丹下之，以去其积，倘不急下，必致养虎贻患。其积日久，渐次下坠，竟至大肠下口、直肠上口交界处，有小曲折隐匿于此，为肠脏最深之处，药所不到之地。证则乍轻乍重，或愈或发，便则乍红乍白，或硬或溏，总无一定，任是神丹，分毫无济。盖此积不在腹内，而在大肠之下，诸药至此，性力已过，尽成糠粃，安能去此沉匿之积？所以冷痢有至三五年、十数年不愈者，由此故也。古方用巴豆为丸下之者，第恐久病神虚，未敢轻用。今以至捷至稳鸦胆子一味治之。此物出闽省、云、贵，虽诸家本草未收，而药肆皆有。其形似益智子而小，外壳苍褐色，内肉白而有油，其味至苦，用小铁锤轻敲其壳，壳破肉出，其人如米。敲碎者不用，专取全仁用之。三五岁儿，二十余粒，十余岁者，三十多粒，大人则四十九粒，取大圆肉包之，小儿一包三粒，大人一包七粒，紧包空腹吞下，以饭食压之，使其下行，更藉此天圆包裹，可以直至大肠之下也。此药并不峻厉，复不肚痛。俟大便行时，有白冻如鱼脑者，即冷积也。如白冻未见，过一二日再进一服，或微加数粒，此后不须再服。服药时忌荤，酒三日，戒鸭肉一月，从此除根，永不再发。倘次日肚中虚痛，用白芍一根、甘草一根，俱重三钱，纸包水湿，火内煨熟，取起捶烂，煎汤服之，立止。不忍隐秘，笔之于书，以公世用。

疟疾证治

经曰：痎疟皆生于风。又曰：夏伤于暑，秋必痎疟。夫风与暑阳邪也，寒与水阴邪也。然风为阳中之凉气，暑为热中之寒邪，合是四者而言，无非皆属乎寒，故俗号为脾寒，谓病邪客于肌肉之间，而脾应肉也。及疟之将发，必先手足厥冷，以脾主四肢也。经言暑者，言时气也；寒者，言病气也。虽邪气自浅而深，郁寒成热，然终不免寒为本，热为标耳。久而不解，纵实变虚，非大补真气，大健脾胃，莫能瘳也。

疟必有寒有热，盖外邪伏于半表半里，正在少阳所主之界。出与阳争，阴胜则寒；入与阴争，阳胜则热。即纯热无寒为温疟，纯寒无热为牡疟，要皆自少阳而造其极偏，故补偏救弊，亦必还返少阳之界，使阴阳协和，而后愈也。谓少阳而兼他经则有之，谓他经而不涉少阳，则不成其为疟矣。疟之不离乎少阳，如咳嗽之不离于肺也。

凡小儿触冒风寒暑湿，客于皮肤，积于脏腑，邪正相攻，阴阳偏胜，发为寒热往来。阳不足则先寒后热，阴不足则先热后寒。寒多热少者，阴胜阳也；热多寒少者，阳胜阴也；阴阳互攻，则寒热相半。其初也，必内有痰食，致脏气不流，故发而为疟。

疟之正发有定期，其间有一日、间日、二三日者。此脏气有盛衰，邪之轻重不等也。发于夏至后处暑前者，三阳受病，伤之浅而暴也；发于处暑后冬至前者，三阴受病，伤之远而深也。发在子后午前者，阳分受病易愈；发在午后子前者，阴分受病难愈。尤当以寒热多寡，禀受强弱而参之，则得矣。

疟疾之证，始而呵欠，继而足冷，面色青黄，身体拘急战栗，头项腰脊俱痛，寒去未已，内外皆热，头痛而渴，但欲饮水，呕恶烦满而不嗜食者，皆其候也。由小儿脾胃素弱，邪气得以乘之，虽有寒热虚实之不同，然要不离乎脾胃。其证亦有五，乃风寒暑湿食也。治法之要，宜分初中末而治之。初则截之，谓邪气初中，正气未伤，略与疏解，则驱之使去，不可养以为患也；中则和之，谓邪气渐入，正气渐伤，或于补中加截药，或于截中加补药，务适其中，以平为期；末用补法，谓邪久不去，正气已衰，当补其脾胃为主，使正气复强，则邪不攻自退矣。

一、风疟，因感风得之，恶风自汗，烦渴头疼。风，阳也，故先热后寒。初时宜发散，桂枝白术汤；不退，小柴胡加常山、槟榔、乌梅截之；久而不退，补中益气汤多服自愈。

一、寒疟，因感寒得之，无汗恶寒，挛急面惨。寒，阴也，故先寒后热。宜发散寒邪，养胃汤加桂心；不止，平胃散加槟榔、草果截之；久不止，六君子汤加姜、桂。

一、暑疟，因伤暑得之，阴气独微，阳气独发，但热不寒，烦渴少睡，呕恶时见，肌肉消烁。宜解暑毒，柴胡白虎汤；不止，去石膏加贝母、常山、槟榔截之；久不止，补中益气汤。

一、湿疟，因冒袭雨湿，汗出澡浴，坐卧湿地得之。身体重痛，肢节烦疼，呕逆胀满，胃苓汤；不退，平胃散加茯苓、槟榔、常山截之；久不止，参苓白术散。

一、食疟，一名痰疟，由饮食不节，饥饱有伤然也。凡食啖生冷鱼肉油腻之物，以致中脘停痰，皆为食疟。其候饥不欲食，食则中满，呕逆腹痛。宜去其食，四兽饮；不止，以二陈汤送红丸子；久不止，六君子汤加青皮、姜、桂。

有疟痢并作者，初用小柴胡加当归、白芍、槟榔以解表导滞；不已，六君子汤加桂枝。

疟后肿，此病极多。胃苓丸、五皮汤下；不消，六君子汤加姜、桂、砂仁，四肢冷者，加附子。

疟后食少黄瘦，不长肌肉者，将欲成疳，

但以平疟养脾丸调之，多服自愈。

有夜疟，此邪在血分，宜麻黄桂枝汤加地黄、红花。不止，以四物汤合小柴胡汤加升麻，提出阳分，用四君汤加常山、乌梅、槟榔截之。

入　方

桂枝白术汤　治感风而发热疟。

嫩桂枝一钱　杭青皮一钱　真广皮一钱　正川芎五分　香白芷五分　法半夏一钱二分　白云苓一钱　漂白术六分　家苏叶七分　芽桔梗五分，尖槟榔五分

生姜三片，大枣三枚，水煎，于未发前二时服。

小柴胡汤　方见卷二伤寒门。

补中益气汤　方见卷一保产门。

养胃汤　治感寒发疟。

草果仁姜制，五分　藿香叶一钱五分　真广皮姜汁炒，一钱　上桂心一钱　炙甘草五分

生姜三片，乌梅一粒，水煎，热服。

平胃散　治寒疟不止，以此截之。

漂苍术一钱二分　紫川朴一钱五分　真广皮一钱二分　炙甘草一钱　尖槟榔一钱　草果仁姜汁炒极熟，一钱

生姜三片，大枣三枚，水煎，清早空心服。

六君子汤　方见卷二类搐门。

柴胡白虎汤　治伤暑发疟，但热不寒。

官拣参一钱　北柴胡一钱二分　片黄芩一钱　法半夏一钱　熟石膏一钱五分　净知母一钱　炙甘草一钱　晚粳米一撮

生姜三片，大枣三枚，水煎，未发前服。

胃苓汤　方见卷二伤湿门。

参苓白术散　方见卷三疳证门

四兽饮　治食疟，和胃消痰。

官拣参一钱　法半夏一钱二分　白茯苓二钱　真广皮一钱　漂白术一钱二分　老生姜一钱　大红枣一枚　肥乌梅三粒　炙甘草五分

净水浓煎，半饥服。

二陈汤　方见卷三呕吐门。

红丸子　治食疟食积，气滞腹胀。

京三棱　蓬莪术　杭青皮　真广皮　真胡椒　白干姜以上各三钱

共为细末，早米粉煮糊为丸绿豆大，黄丹为衣。每服一二十丸，二陈汤煎送。

五皮汤　方见卷二伤湿门。

平疟养脾丸　不问远年近日，此药不发不截，诚治疟之王道，又擅去疟之良能也。

官拣参切片，焙干　漂白术土炒　白茯苓乳蒸　真广皮酒炒　杭青皮醋炒　法半夏焙　漂苍术焙　紫川朴姜制　北柴胡酒炒　嫩黄芪蜜炙　结猪苓炒　宣泽泻炒　嫩桂枝焙　小常山焙　大鳖甲醋炙　白当归酒炒　正川芎酒炒　粉甘草炙　草果仁姜制各等分

共为细末，酒煮面糊丸米粒大。每服一二钱，米饮下。有痞块者，加三棱、莪术。久疟体虚者，非此莫愈。

麻黄桂枝汤　治夜疟血分有邪，宜用此发散其血中风寒。

净麻黄一钱　柳桂枝一钱二分　片黄芩一钱　光桃仁十五粒　炙甘草一钱　大生地一钱　鲜红花五分　葱白一茎

水煎，热服。

四物汤合小柴胡汤　治夜疟，以此提出阳分。

大熟地二钱　大当归一钱五分　杭白芍一钱　正川芎一钱　官拣参五分　北柴胡一钱　片黄芩一钱　法半夏一钱　炙甘草五分　绿升麻一钱

生姜三片，大枣三枚，水煎，热服。

加味四君汤　治夜疟已出阳分，以此截之。

官拣参一钱　漂白术二钱　白云苓一钱五分　炙甘草一钱　小恒山一钱　尖槟榔一钱　肥乌梅三粒

生姜三片，大枣三枚，水煎，发日微温服。

疟疾简便方

小儿凡发疟疾，多有病气。须常烧檀香，以僻其邪，更常熏其衣裸等物，气秽去而邪易除矣。

凡疟药必露者，疟乃暑邪之因，露为肃杀之气。《性理大全》谓雾属阳，露属阴，雾生物，露杀物，则知暑邪逢露即解矣。

凡疟疾口渴，切不可饮冷水冷茶，并生冷之物，犯之其病益甚，惟以姜汤乘热饮之。此良法也。

凡疟疾热未全退，切不可令其饮食，必俟其热已退尽，方可食之。不然，终成癖积。

凡服止截之药，必须饿过发时，不发，方可吃粥，食早疟必再作，下次截药无灵矣。

清邪止疟方李士材制　升麻、柴胡各二钱，提阳气上升，使远于阴而寒可止；黄芩、知母各一钱五分，引阴气下降，使远于阳而热自已。生姜三钱，却邪归正；甘草五分，和其阴阳，二三剂自止。

四神酒　治久疟不止，一服即住，永不再发。用常山一钱五分、槟榔一钱、丁香五分、乌梅一个，好酒大半碗，略煎，露一宿。发日空心冷服。

无痰不成疟，所以疟家多蓄痰涎溢饮。常山能破涎逐饮，故有截疟之功，然须用于发散表邪之后，及提出阳分之时，则发无不中矣。凡服常山，切勿热服，须露一宿为妙。热服则吐，生用亦吐，与甘草同服亦吐。凡大虚之体，切宜斟酌，未可遽投。

小儿邪疟，其发无时，日期不定，乍早乍晚，或有或无者，名为邪疟。以麝香五厘，同好京墨同研，书“去邪辟魔”四字于额上，效。

小儿热疟不寒者，用穿山甲一两、大红枣十个，同烧存性为末。每用一钱，发日五更，白汤调服。

小儿久疟不止，用大鳖甲，小者不用，以醋炙枯研末。每一钱或钱五，隔夜一服，清晨一服，将发时一服，无不断者。

疟来寒多热少，饮食不思，用良姜一两麻油炒，炮姜一两，共为末，每二钱，用猪胆汁调成膏，临发时热酒调服；或以猪胆汁和丸如芡实大，每服七丸，酒送亦佳。胆属甲木，取其引入少阳也。

消渴证治

经曰：心移热于肺，传为膈消。又曰：二阳结，谓之消。夫消渴者，枯燥之病也。凡渴而多饮为上消，肺热也；多食善饥为中消，胃热也；渴而小便数，膏浊不禁为下消，肾热也。虽为火盛水衰之证，然由虚热者多，实热者少。若作有余治之，误之甚矣。

始而心肺消渴，脾胃消中，或肾虚消浊；传染日久，即肠胃合消，五脏干燥，精神倦怠，以致消瘦四肢，将为不起之候。初起治之得法，必不至是。

一、消渴，由心火动而消上，上消乎心，移热于肺，渴饮茶水，饮水又渴，名曰上消。小便最多，由其水不能停，所以饮水无厌。若饮一溲一者，可治；饮一溲二者，不可治。宜莲花饮为主，次以生津四物汤滋其阴，庶几有济。

一、消肌，脾火动而消中，中消于脾，移热于胃，喜多食，食无足时，小便色黄，名曰中消。宜人参白虎，清胃保中。

一、消浊，乃上消之传变。肺胃之热久不清，乃致动而消肾，移热于膀胱，小便浑浊，色如膏脂，名曰下消。宜加味地黄汤，滋其真阴，久服可愈。

以上渴证，初起者，宜用前法。倘日久不愈，津液枯焦，其渴愈甚。若仍用黄连、花粉苦寒之类，未有不致危殆者，惟七味白术散对证之药，放胆用之，非此不愈。

入　方

莲花饮　治上消口渴，饮水不休。

白莲须　粉干葛　白云苓　大生地以上各一钱　真雅连　天花粉　官拣参　北五味净知母　炙甘草　淡竹叶以上各五分

灯心十茎，水煎，热服。

生津四物汤　治上消，已服莲花饮后，用此。

白归身　大生地　杭白芍　净知母　大麦冬　官拣参以上各一钱　正川芎　正雅连　天花粉　川黄柏　炙甘草以上各五分　肥乌梅一粒

灯芯十茎，水煎，热服。

人参白虎汤　治中消，消谷易饥，食无厌足。

官拣参一钱　熟石膏二钱　净知母一钱五分　炙甘草一钱

加晚粳米一两为引，水煎，以米熟为度，澄清热服。

加味地黄汤　治下消，小便浑浊，色如膏脂。

大怀地二钱　正怀山一钱五分　山茱肉一钱二分　宣泽泻六分　粉丹皮一钱　白云苓一钱二分　建莲肉七分　净知母五分　炙实米一钱　大麦冬一钱　北五味十四粒

净水浓煎，清晨空心服。

七味白术散　治小儿久病消渴，口干不止，惟此最神，放胆用之。方见卷三泄泻门。

消渴简便方

蚕茧汤通治三消之证。用蚕茧壳，或取丝绵结块者，取来煎汤，时时当茶饮，饮至二七，无不愈者。盖此物与马同气，皆属午火，在人为少阴君火，善伏膀胱之火，引阴液上潮于口，而渴自止。昧者以为膀胱之火作祟，不知膀胱之火，不能收摄，已随小便而去，惟其不能上潮，所以津液不生而口作渴。不观仙家运用三昧真火，以心为君火，命门相火，膀胱民火；起火必自膀胱始，而后相火、君火，三火齐发；煅炼阴魔，真火熏蒸，甘露自降，何渴之有？

消渴日夜饮水无度，用猪肚一个，洗极净，入淡豆豉五钱在内，以线缝之，煮极烂，取汁饮之。肚亦可食。

又方　煮猪血清汤，不入油盐，多饮极效。此物善能滋阴降火，专走血分。脾气虚者，间日饮之，恐防作泄故也。

诸血证治

经曰：营者，水谷之精也，调和于五脏，洒陈于六腑，乃能入于脉也。生化于脾，总统于心，藏受于肝，宣布于肺，施泄于肾，濡润宣通，靡不由此。凡吐血者，荣卫之气逆也。盖心者血之主；肺者气之主。气主煦之，血主濡之，营养百骸，溉灌筋脉，升降有常，自然顺适。或外干六淫，内伤饮食，气留不行，血壅不濡，是以热极涌泄，不无妄动之患。且气有余便是火，火乘于血，得热妄行，上奔而为吐血也。故小儿吐血，因伤食者最多，盖阳明多气多血。若郁热内逼，必致荣血妄行，所以小儿吐血，属胃者十之七八。更有尚在襁褓而吐血者，多由重帷暖阁，火气熏逼，或过啖辛辣，流于乳房，儿饮之后，积温成热，热极上崩，或吐血、或衄血、或尿血、或便血者有之矣。若久嗽血者，是又肺虚所致，宜保肺滋阴。

肺朝百脉之气，肝统诸经之血。脾胃有伤，荣卫虚损，故血失常道而妄行，倘气虚神倦，唇无红色者，切勿寒凉，宜四君子汤先救其脾，脾实则血止矣。

血虚者，精神如旧，唇舌如常。以四物汤加参、术，补气即所以生血也。

吐血者，胃中积热，火逼其血而妄行，故从口吐出。宜清其胃火，使血归经，盖血属阴，阴主降，凡血证从下出者顺，从上出者皆逆也，清胃散。

鼻血者，脾热传肺，虚火上炎，血行清道，故血从鼻出。宜加味四君子汤。

有咳嗽而吐血者，此心肾水火不升降，火炎无制，肺胃枯燥。宜滋阴降火汤。切不可

作童子痨治。

有大便下血者，粪前见血者为近血，盖自大肠来也，黄连解毒汤；粪后见血者为远血，从胃脘小肠来也，清胃散止之。久不止者，补中益气汤加胡连。

入　方

四君子汤　方见卷三疟疾门。

四物汤　方见卷三疟疾门。此加人参、白术各一钱。

清胃汤　治吐血，并粪后血。

黑栀仁　怀生地　粉丹皮　大当归以上四味各一钱　雅川连五分

净水浓煎滚，热服。

加味四君子汤　治脾传肺，血从鼻出。

官拣参一钱　漂白术一钱　白云苓一钱　粉甘草八分　芽桔梗一钱　大麦冬二钱　黑栀仁一钱　片黄芩一钱五分

灯芯十茎，竹叶七片，水煎，热服。

滋阴降火汤　治小儿咳嗽见血，升水降火。

大生地　当归身　杭白芍　净知母　建莲肉　润玄参　大杭冬以上七味各一钱　真雅连　天花粉　炙甘草以上三味各五分

净水浓煎，清晨空心服。

黄连解毒汤　治吐血，并便前下血。

正雅连五分　川黄柏一钱　小条芩一钱　黑栀仁一钱

灯芯十茎，水煎，滚热服。

补中益气汤　方见卷一保产门。

诸血简便方

凡吐血、鼻血，低头掬损肺脏而吐血，以及上下一切血证，用百草霜扫下，研为细末，以糯米煎汤，大人每服三钱，小儿每服一钱，米饮调服，三服立愈。百草霜须乡间烧茅草锅底取之，烧柴炭者不用。

凡鼻血如注，顷刻流至数升，无药可解，急将患者头发解开，将发梢浸新水盆内，良久，血即止，止后仍服凉血清火之药。至浸发亦不可太久，只问病者心内觉有凉气即止，久则凉冷入心，恐生别证。至神至奇！此可治稍大之儿，乳子无发可浸。

又方　治鼻血不止，用大蒜一枚，去皮，研如泥，作饼子如钱大。左鼻出，贴左足心；右鼻出，贴右足心；两鼻俱出，贴两足心。立时即止，即以温水洗去之。

又方　以乱发烧灰吹鼻，以线扎中手指根，左鼻出扎左，右鼻出扎右。又以栀子烧灰，研末吹鼻内。

又方　治鼻血，以韭菜捣汁一杯，童子小便一杯和匀，温暖服之，血散火降，立时即止。盖韭菜散血，童便降火故也。

大便泻血，用乱油发、鸡冠花、侧柏叶俱烧灰，三味等分，研极细末。每服一钱，水酒调服。

又方　用霜后干丝瓜烧灰存性，研为细末。每服一钱，酒调空心服。

下血危笃不可救者，用干丝瓜一条，烧灰存性，研末听用；槐花烧灰存性，研末听用。

每以丝瓜末一钱、槐花末五分，共研匀，米饮调，空心服。

小儿小便血淋，用鸡白屎白如粉者，炒极焦，研末。每五分，酒调，空心服。

小儿尿血，乌梅烧灰存性，研为细末。每次一钱，米饮调下。

幼幼集成　卷四

清　罗浮　陈复正飞霞辑订
鄞县　曹赤电炳章圈校

肿满证治

经曰：肤胀者，寒气客于皮肤之间，腹大，身尽肿，皮厚，按之窅而不起，腹色不变，此其候也。又曰：诸湿肿满，皆属于脾。又曰：水病下为肿肿腹大，上为喘呼，不得卧者，标本俱病。夫肿满之证，悉由脾胃之虚也。脾土喜燥而恶湿。因中气素弱，脾虚无火，故水湿得以乘之，而脾愈不运，则乳食凝而不化，停积于中，而肿满作焉。治肿者，当以脾胃为本，而以浮肿为标，斯庶几矣。若以消伐克削为能事，未有不致危殆者。

治肿当分上下，经曰：而肿者风，足肿者湿。凡肿自下而起者，皆因于风，其治在肺，宜发散之，参苏饮合五皮汤。肿自下而起者，因于肾虚水泛，或因于脾气受湿，宜渗利之。故仲景云：治湿不利小便，非其治也。宜五苓散加防己、槟榔。

一身尽肿者，或胎禀不足，卒冒风寒，或因疟痢脾虚，皆能作肿。轻者胃苓丸，重者加味胃苓丸，当与末条参考。

凡小儿之肿在表者，头痛身热，此风寒在表。宜微汗之，五苓散少加麻黄、葛根、苏叶、杏仁以发之。若身无热，五苓散加肉桂，膀胱气化，小便利而肿消矣。

阳水肿，身热，大便秘，小便赤涩，烦躁口渴，以五皮汤作煎，送沆瀣丹微下之；阴水肿，身不热，口不渴，身冷怯寒，二便自调，平胃散加白茯苓、草果、木香、藿香。

凡肿证先起于腹，而散于四肢者可治；先起于四肢，后归于腹者不可治。

若小儿元气本虚，复遇大病之后，而浑身浮肿，四肢冷，不渴，小便清长，大便滑泄，不思饮食。此阴寒之极，脾胃将绝，治肿之方俱不可用，惟以四君子汤加青化桂、炮姜、砂仁、白蔻，以救其脾胃，斯可矣。昧者但见其肿，不知元气之竭绝，而犹消导利水，复以舟车、禹功暨大戟、芫花、甘遂劫夺之者。此杀人之事，慎之戒之！

入　方

参苏饮　方见卷三咳嗽门。

五皮汤　方见卷二伤湿门。

五苓散　方见卷二伤暑门。

胃苓丸　方见卷二伤湿门。

加味胃苓丸　即胃苓丸本方加后药。

头面肿初起，略加麻黄；作喘加桑白皮、杏仁；小便黄赤加木通；身肿加五加皮；腹胀加砂仁、白蔻、丁香、枳壳；脚冷不温加附子、上青桂、防己。

平胃散　方见卷三疟疾门。

加味四君子汤　治脾败胃伤，阴寒作肿，多服自消。

官拣参一钱　漂白术一钱　白云苓一钱五分　上青桂八分　黑炮姜一钱　西砂仁一钱　白豆蔻一钱　公丁香三分　炙甘草五分

大枣三枚，水煎，半饥温服，以愈为度。

水肿简便方

凡小儿患肿，切须忌盐，盐助水邪，服之愈甚，必待肿消之后，以盐煅过，少少用

之。治水肿从脚起入腹则难治，用红饭豆五升，水煮极熟，取汤四五升，温浸两膝之下，冷则重暖；若已入腹，以红豆煮汤，日日服之亦消。盖红豆之功，专于行湿利小便故也。

治脚肿，掘杉木根切断，而内色红者为油杉，方可用，若切开白色者，不堪。以红根切碎，煎浓汤，将肿脚先熏后洗，一二次自消。又方，以红糟一大碗，加入生姜、生葱，三味同煎汤，先熏后洗。

又治头面手足俱肿，用苦葶苈一两，隔纸炒熟，研细末，以大红枣蒸过，去核取肉，和前末，杵匀为丸，如小豆大，每服七粒，白汤下，日三服，五七日则小便多，肿自消也。忌咸酸生冷。

伤寒伤湿肿，以羌活切片，莱菔子二味等分，同炒香取起，拣去莱菔不用，只以羌活为末。每服一钱，初日一服，二日二服，三日三服，效。

肿证气喘，男妇大小，肿因积得，既取积而肿再作，小便不利。若再用利药，性寒而小便愈不通矣，医者至此束手。盖中下二焦气不升降，为阴寒否隔，水遂凝而不通。用熟附子三钱、生姜二钱、沉香三分，同煎浓汤，冷服；大人附子一两、生姜六钱、沉香磨浓汁，以附姜汤对服。不拘服数，以愈为度。

身面浮肿，坐卧不得，取向东桑枝烧灰淋汁，煮红豆数升，每饥即食之，不得别饮汤水。

水肿本于脾虚不能制水，水积妄行而为肿，当以参、术补脾为主，使脾气实，则能健运而水自行，切不可下。

胀满证治

经曰：足太阴虚则鼓胀。又曰：胃中寒则胀满。又曰：浊气在上，则生膜胀。

夫胀满者，腹胀气满也。由于脾肺气虚，不能健运，所以作胀也。有虚胀、实胀、热胀、寒胀。大抵虚胀、冷胀，十之七八；实胀、热胀，十之二三。盖实热之证，人所易见，或因伤食，或因伤寒入里，所以易知而易治；虚冷之证，由中气虚衰，脾气不化而胀，所以难见而难医。若以虚冷之胀，而误以为实热之胀治之，其变不可胜言矣。

虚胀者，或因吐泻之后，或因服药攻下太过，致成腹胀者。宜温中调气，厚朴温中汤。若虚而兼寒者，加附、桂。

实胀者，腹中原有食积，或饮食过饱，固结于中。外证则胃口、胸前高胀，身热口渴，倦卧不语，腹痛微喘，目闭不开，俨然虚极之象。小儿此证最多而难识。昧者不为详审，见其四肢不举，目闭不开，误以为慢惊，而用宁神导痰之药，千中千死，无一活者。不知大实有羸状，即此是也。急宜下之，集成沆瀣丹、集成三仙丹同服。

热胀者，或伤寒热邪入里，大便秘结，小便短赤，浑身壮热，面赤烦躁，集成沆瀣丹。

寒胀者，由中气素寒，冷滞郁结，无身热口渴，而唇青，手足厥冷，气喘腹胀。先以塌气丸消之，后以异功散调其脾胃。

凡遍身疮疡，因淋洗涂搽，逼毒归内而腹胀者，轻则荆防败毒散升散之，重则集成沆瀣丹微利之。疮出胀消者吉，疮不出者凶。

经谓脏寒生胀满。盖脾为阴中之至阴，因脾湿有余，无阳不能施化。如土之久于雨水，则为泥矣，岂能生育万物？必待和风暖日，湿去阳生，自然生长也。凡此宜以辛热之药运用之，可也。

经谓下之则胀已，此以湿热饮食有余，脾胃素实，形体气质壮实者言之也。若脾虚内寒，而气不能运精微以成胀者，只宜以甘温补脾为主，少佐辛热以行壅滞之气，庶使脾土健旺，胀满运行，斯可愈矣。此经之所谓"塞因塞用"，从治之法耳。医者不察乎此，惟执"下之胀已"，急于获效，病者喜行利药，以求通快。不知暂快一时，则真气愈伤，胀满愈甚，去死不远矣。

诸家治胀治肿，但知行气利水，克削并行，辄用猛剂下之。此速死之道。不知脾气虚极，而肿而胀，愈下愈虚，惟劫目前之快，而阴损真元，祸不旋踵，后贤幸加意焉。

入　方

厚朴温中汤　治胃寒心腹胀。

紫厚朴一钱五分　真广皮一钱　黑姜炭一钱　白云苓一钱　草蔻仁五分　南木香五分　炙甘草五分

虚兼寒者，加熟附子五分、青化桂五分。生姜三片。

壮气丸　治寒气郁结，肚腹虚胀。

胡椒仁一两　全蝎尾五钱，拣去钩子，洗净，炒干

上以胡椒略去皮，取净一两，炒过，和蝎尾研末，面糊丸极小。每服一二钱，陈皮汤送下。

集成沆瀣丹　方见卷二胎疾门。

集成三仙丹　方见卷二类搐门。

异功散　方见卷二伤食门。

荆防败毒散　治疮疥毒气内陷，肚腹作肿。

荆芥穗　北防风　净连翘　陈枳壳　绿升麻　南薄荷　川羌活　川独活　粉干葛　川木通　金银花　片黄芩　正川芎　黑栀仁　炙甘草以上每味各一钱

上身肿，加葱三茎；下身肿，加灯芯十茎，水煎服。

腹胀简便方

治气胀、水胀，用羯鸡粪干者一升，炒焦黄色，出火毒，研细末，以百沸汤三升淋汁，每服一盏，调木香、槟榔末各五分。此中满蛊毒胀有一无二之方也。

治食胀、气胀，用萝卜子一两，研细末，水调滤汁，用砂仁一两，以萝卜子汁浸一宿，炒干，又浸又炒，共七次，为末。每服一钱，米饮调下。

黄疸证治

经曰：身痛而色微黄，齿垢黄，爪甲上黄，黄疸也。又曰：溺黄赤安卧者，黄疸。已食如饥者，胃疸。夫黄疸之证，古人多言为湿热，及有五疸之分，皆未足以尽之。予谓黄之大要，亦惟有二：曰阳黄，曰阴黄。而寒热虚实，总括二者之中，无余义矣。

一、阳黄证，因湿多成热，热则生黄。此则所谓湿热证也。其证必身热烦渴，或躁扰不宁，或消谷善饥，或小便热痛，或大便秘结，其脉实而有力。此证不拘外感风湿，内伤食饮，皆能致之。但察儿之元气尚强，脾胃无损，而湿热果盛者，直宜清火邪、利小便，茵陈五苓散最稳，胃苓汤加茵陈亦佳；若大便秘结热甚者，集成沆瀣丹。

一、阴黄证，全非湿热，面总由气血之败。盖气不生血，所以血败，血不华色，所以色败。凡病黄而绝无阳证阳脉者，便是阴黄，或因大病之后，或脾胃久亏，故脾土之色自现于外。其证喜静恶动，喜暗畏明，神思困倦，言语轻微，畏寒少食，四肢无力，或大便不实，小水如膏。此皆阳虚之候，与湿热发黄者反如冰炭，使非速救元气，大补脾胃，终无复元之理。且此证最多，而昧者不察，遂云黄疸同是湿热，而用茵陈、栀子清火利水，则无有不随药而毙者。如四君子、五君煎、温胃饮，是其宜也。

凡小儿脾胃素弱，常有积滞，面色多带黄白，不可消积，惟以集成肥儿丸多服。使脾胃健，食自消，灌溉脏腑，流行荣卫，自然五色修明，何黄之有？

小儿黄病，昧者一概呼为湿热，无非除湿利水，清热退黄，除此之外，无别法矣。岂知湿热发黄者少，脾虚发黄者多。盖脾土强者，足以捍御湿热，必不生黄，惟其脾虚不运，所以湿热乘之。治此者，无非暂去湿热，茵陈五苓散亦佳；黄稍退，即速健脾，不得

屡用消耗，而谓有是病用是药也。

若面目俱黄而带虚浮，唇白舌淡，口不渴，身不热，夜无烦热，小便不涩，不可认为湿热而分利之，速救脾胃。四君子六君是其宜也。

凡服分利之药，黄久不退，以致口淡心慌，四肢软弱，憎寒发热，小便带浊，皆为虚甚。宜四君子煎送八味地黄丸，不可再行分利，以致脾败肾绝而死矣。

入　方

茵陈五苓散　方见卷二伤湿门。

胃苓汤加茵陈　方见卷二伤湿门。此加茵陈一钱。

集成沆瀣丹　方见卷一胎疾门

四君子汤　方见卷三疟疾门。

五君煎　治脾胃虚寒，呕吐泄泻而兼湿者。

官拣参一钱　漂白术二钱　白云苓二钱　炮姜炭一钱　炙甘草一钱

水一盅半，煎服。

温胃饮　治中寒呕吐，吞酸泄泻，不思饮食。

官拣参一钱　漂白术二钱　白扁豆一钱　广陈皮五分　炮姜炭一钱　大当归一钱　炙甘草六分

水一盅，煎七分服。

集成肥儿丸　治小儿脾胃虚弱，饮食不消，肌肤瘦削。如多服能令儿肥。此丸久经效验，比诸家肥儿丸功独甚。

建莲肉二两四钱，去心皮，炒　西砂仁六钱，酒炒　漂白术一两，土炒　官拣参一钱，切片，焙干　京查肉四钱，炒　杭白芍四钱，酒炒　广陈皮四钱，酒炒　法半夏四钱，炒　白云苓一两，乳汁蒸晒　真雅连二钱，姜制　苡仁米六钱，炒　六神曲六钱，炒　炙甘草二钱

共为细末，炼蜜为丸弹子大。每日早午晚各服一丸，米饮化下。

六君子汤　方见卷二类搐门。

八味地黄丸　方见卷一保产门。

黄疸简便方

小儿急黄，以丝瓜连皮带子，火烧存性研末，每服一钱，米汤下。连进数服愈。小儿黄如金色，因积滞凝于脾家，以糯稻草煎浓汤饮之，数次效。

治小儿黄疸如金，取山间薏苡仁根，洗极净，煎汤，服之自愈。

治湿热发黄，用生姜半斤、茵陈半斤，同捣烂，以布包之，时时周身擦之，其黄自退。

腹痛证治

帝曰：愿闻人之五脏卒痛，何气使然？岐伯对曰：经脉流行不止，环周不休，寒气入经而稽迟，泣而不行，客于脉外则血少，客于脉中则气不通，故卒然而痛。凡病心腹痛者，有上中下三焦之别。上焦者痛在膈上，此即胃脘痛也；中焦者在中脘，脾胃间病也；下焦痛在脐下，肝肾病也。然有虚实之分，不可不辨。辨之之法，但察其可按者为虚，拒按者为实。久病者多虚，暴病者多实；得食稍减者为虚，胀满畏食者为实；痛徐而缓，莫得其处者为虚，痛剧而坚，一定不移者为实。虚实既确，则治有准则。

夫腹痛之证，因邪正交攻，与脏气相击而作也。有冷有热，有虫痛，有食积，辨证无讹，而施治必效。

挟冷痛者，面色或青或白，冷甚者，面色暗淡，唇口爪甲皆青。此脾气虚寒之极，轻者当归散，重者烧脾散，有吐泻者，保童丸。

挟热痛者，面赤壮热，四肢烦，手足心热。宜四顺清凉散加青皮、枳壳；大便秘者，木香槟榔丸；大便调者，芍药甘草汤。

食积痛者，口中气温，面黄唇白，目无精光，或白睛多，多眠恶食，大便酸臭。宜三棱丸，甚者 消积丸，下后六君子汤调之。

虫痛者，面白唇红，六脉洪大，心腹疼

痛，口中涎沫及清水出，腹内结聚成团，摸之梗起一条。小儿脾胃虚者，最多此证。宜乌梅丸。

凡腹痛喜手按及热熨者，为虚为寒，速宜温补；如手不可按者为实，速宜下之。

入　方

当归散　治腹痛有寒无热。

大当归一钱五分　南木香五分　青化桂一钱　大拣参一钱　炙甘草五分

生姜三片，大枣三枚，水煎，温服。

烧脾散　治伤生冷果菜，停积中焦，心脾冷痛。

黑炮姜一钱　紫厚朴一钱　草蔻仁五分　西砂仁一钱　六神曲一钱　老麦芽一钱　真广皮一钱　高良姜五分　炙甘草一钱

或丸，或散，或水煎，俱可。

保童丸　因伤风冷，食积肚疼，泄泻呕恶。

官拣参切片，焙干　漂白术土炒　紫厚朴姜炒　正广皮酒炒　白云苓炒　结猪苓焙　宣泽泻炒　藿香叶焙　公丁香揭　法半夏焙　白干姜炒　青化桂去粗　白蔻仁炒　杭青皮醋炒　肉豆蔻煨　南木香屑　炙甘草各等分

共焙燥为细末，神曲糊丸弹子大。每服一丸，米饮化下。

四顺清凉散　治挟热腹痛，面赤壮热，四肢烦，手足心热。

杭白芍二钱　白当归一钱　锦庄黄一钱　炙甘草五分

净水煎滚，热服。

芍药甘草汤　此方无论寒热虚实，一切腹痛，服之神效。

白芍药一根，重三钱　粉甘草一根，重二钱

上二味俱要整的，用纸七重包之，水湿慢火煨熟，取起，杵烂煎汤服。寒月，略加肉桂数分更妙。

三棱丸　治食积胃脘痛、心腹痛、小腹痛、癖痛、虫痛。

京三棱煨　蓬莪术煨　半夏曲焙　小枳实麸炒　正川连姜炒　吴茱萸泡　正广皮酒炒　杭青皮醋炒　南木香屑　尖槟榔炒　川厚朴姜制　川楝肉炒　小茴香酒炒

共为末，神曲糊丸。量儿大小加减，米饮调服。

木香槟榔丸　方见卷三食积门。

乌梅丸　治胃冷，虫痛攻心，呕吐，四肢冷。

官拣参　川黄柏　北细辛　青化桂　川熟附以上各六钱　川黄连五钱　正花椒　大当归　黑姜炭以上各四钱　肥乌梅三十个，蒸，去核，收净肉，捣烂

共为细末，酒蒸乌梅肉捣膏和药，少加炼蜜为丸，如芡实大。每服一丸，水送，每日二三服，以十分之一，水煎服亦可。

腹痛简便方

治一切胃痛胸痛腹痛腰痛，疼如锥刺，不可忍者，花椒不拘多少，研为细末，和少面粉，醋和成饼，贴于痛处，上铺艾绒，用火灸之，疼立止。

一切腹痛，不问虚实寒热皆效。用小麦杆烧灰，地上出火毒，将布包之，滚水淋汁，一服立止。

一切疼痛，或寒或热，或积食，或积血，证莫能辨，药不能施，有起死回生之妙。用生姜一斤，捣烂，略挤去汁，入锅内炒热，用布分作二包，先以一包熨痛处，冷即换热者，勿令间断。如姜已干，略加前汁拌之，又炒又熨，痛止乃已。

凡小儿腹痛，摸其肚有一块梗起者，虫痛也，不须用药，惟令大人以手擦揉其块处，久久搓之，半日许，其虫将死，皆从大便面出，痛立止。

小儿腹痛，啼哭不止。用南木香、明乳香、黑没药俱去油各五分，水煎温服。

小儿胎寒腹痛，啼哭吐乳，大便青色，身出冷汗。用姜黄一钱，南木香、乳香、没药

俱去油各三钱，共为细末，蜜丸芡实大。每服一丸，姜汤调下。

小儿盘肠气痛，月内之儿多有之。其证腹内如蛙声，啼哭不止者是也。盖寒热不和，脏气不行。用栀仁五钱、附子三钱，同炒极枯，取起，拣去附子不用，单取栀仁，加入白芷一钱为末。每服五分，小茴香汤下。

小儿腹痛，啼哭不止。用乳香一钱，去油，灯花七枚，同为末。每服二分，乳汁调服。

小儿虫痛，口流涎沫。使君子取肉微炒，为末，五更时，米饮调下。

小儿腹痛，一痛即死者，名为虫痛，似瘕。用干漆烧灰，白芜荑二味，等分为末，每五分，米饮调下。证重者，每服一钱。

小儿盘肠腹痛，浓煎葱汤，浇洗儿腹，仍以葱捣烂，炒热作饼贴脐上，良久，屎出痛止。

癖积症治

经曰：新积痛可移者，易已；积不痛，难已也。又曰：胃之大络，名曰虚里，贯膈络肺，出于左乳下，其动应衣，脉宗气也。结而横，有积矣。凡饮食之积，其渐积者，不过以饮食偶伤，必在肠胃之内，故可行可逐，治无难也。惟饮食无节，以渐留滞者，多成癖积于左胁膈膜之间，此阳明宗气所出之道也。若饥饱无论，饮食叠进，以致阳明胃气一有所逆，则阴寒之气得以乘之，而脾不及化，故余滞未消，并肠外汁沫搏聚不散，渐成癥疾矣。然其初起甚微，人多不觉，及其既久，则根深蒂固，而药饵难及。今西北小儿多有此疾，而尤于食面之乡为最，正以面性多滞，而留积于皮里膜外，所以不易治也。惟当以渐消磨，求法治之，幸毋孟浪欲速，妄行攻击，徒致胃气受伤，而积仍未及，以速其危也。

癖者，血膜化水则癖，胁傍时时作痛，时发潮热，或寒热往来似疟，故疟家多有此证。凡疟疾发过之后，必令其热退极尽，方可饮食；若热未尽而饮食之，则中脘多蓄黄水，日久而成癖积。

小儿脏腑和平，脾胃壮实，则荣卫宣畅，津液流通，纵使多饮水浆，不能为病；惟脾胃不胜，乳哺失调，三焦不运，水饮停滞，冷气搏之，结聚而成癖也。体素弱者消癖丸，气壮实者赭石挨癖丸。大约有癖之儿，虚者居多，攻下之药，非可常用，即不得已而用之，待其略减，用消癖丸缓缓消之，至为良法。

入　方

消癖丸　治癖在胁下，面黄肌瘦，午后发热似疟。

官拣参切片、焙干　漂白术土炒　正广皮酒炒　白云苓乳蒸　杭青皮醋炒　川厚朴姜制　小枳实麸炒　法半夏焙　西砂仁酒炒　六神曲炒　陈麦芽炒，以上十一味俱各二钱　九肋鳖炙，三钱　京三棱煨　蓬莪术煨　炮黑姜以上各一钱　青化桂　南木香各二钱　正雅连姜汁炒，二钱

共为细末，早米粉糊为丸。每服一二钱，量儿大小加减，米饮下，以癖消药止。

赭石挨癖丸　治腹中癖块，或生寒热，或时作痛。小儿壮实，饮食素强者，方宜用之。脾胃素弱者，切不可服，惟以前消癖丸攻补兼施，久之自愈。

代赭石火煅，醋淬至酥，研末，水飞过用　杭青皮醋炒　蓬莪术煨　南木香锉骨　青化桂各三钱　巴豆霜去油极净，取霜，一钱　川大黄二钱

上为细末，醋煮面糊丸萝卜子大。每服五丸，淡姜汤送下。

积癖简便方

治癖积心腹内结如拳，及胁腹痛不可忍，用庄黄一两酒蒸，炮姜五钱、熟附子三钱、九肋鳖八钱，用好醋将鳖甲煮一时久，取起，酥炙黄色为度，共为细末，用三年老米醋一升，熬至半升，和前末为丸绿豆大。每服十丸，空心米汤下。取下积如鱼脑、败血、烂肉、青

泥即愈，后用补脾调理。按此方药廉功大，比挨癖丸力胜十倍，允称神妙。

小儿好食茶叶成癖，用鲜榧子一斤，空心，晌午、黄昏，每服十四粒，吃完即愈。榧子京果铺有卖。

小儿食积结痞块，用大红枣一斤、皮硝一两同煮，以水干为度，晒干。每日食此一枣，徐徐服之自消。

小儿积久而成"鳖"，腹内有形，摇头掉尾，大者如杯，小者如钱，上侵入喉，下蚀入肛，或附胁脊，或隐肠腹。用生硫黄研极细末，每日老酒调服一钱，空心下，久服自化。硫黄须色如初出鹅雏者方可用，带青带赤带黑色者，皆不堪。此物最平稳，任多服无碍。

虫痛证治

经曰：肠中有虫瘕、蛟蛔，皆不可取以小针。又曰：饮食者，皆入于胃，胃中有热则虫动，虫动则胃缓，胃缓则涎出。夫虫痛者，蛔虫也。盖由小儿脾胃虚弱，多食甘肥生冷，留而为积，积化为虫，动则腹痛，发则肿聚一块，痛有来去，乍作乍止，呕恶吐涎，口出清水，久而不治，其虫长至一尺，则贯胃伤心杀人矣。外证面白唇红，六脉洪大，是其候也。内有虫，必口馋好甜，或喜食泥土、茶叶、火炭之类，宜攻去之，槟榔丸。

小儿虫痛，凡脾胃怯弱者，多有此证。其攻虫取积之法，却又未可常用。及取虫之后，速宜调补脾胃，或集成肥儿丸，或乌梅丸，或六君子汤多服之，以杜虫之复生。

入　方

槟榔丸　治小儿一切虫积，能杀诸虫。

小槟榔一两　南木香五钱　鹤虱子五钱　光贯仲五钱　广锡灰五钱　陈漆渣烧灰　正轻粉一钱　白雷丸二钱　巴豆霜一钱

以漆渣灰五钱，同众药研为细末，醋煮面糊丸麻子大。每服二十丸，五更时，苦楝根皮煎汤下。

集成肥儿丸　方见卷四黄瘅门。

乌梅丸　方见卷四腹痛门。

六君子汤　方见卷二类搐门。

下虫简便方

凡小儿甘肥过度，或糖食甜物太多，乃致湿热久停而成积，积久生虫，时发腹痛，以手摸之，腹内有块，或作一条梗起。外证面白唇红，六脉浮洪，其痛时作时止，痛止即能饮食者，虫痛无疑。又有腹痛，一痛即死者，亦是虫证。欲去此虫，无如苦楝根皮，诚天下打虫第一神方。其法，于月初旬，虫头向上之时行之。先夜掘苦楝根，须取每年结子者方是母树，其根浮于土面者有毒，不可用，专取土中者，净洗泥土，以刀刮其红皮，止取白皮四五钱，儿大者六七钱，切碎听用。次早，以油煎鸡蛋令儿嗅之，以引其虫头向上而求食；另于别室，以水一盏，浓煎苦楝皮汤一小杯，不可使儿闻其药气，一闻其气，虫即潜伏矣；俟药熟，以鸡蛋与儿食，即服药，半日不可饮食，俟虫下后，方饮食之。服药后，儿似困顿，万万放心。虫下后精神如旧，仍当急为健脾，庶虫不复生，永无患矣。

诸汗证治

经曰：阳之汗，以天地之雨名之。又曰：阳加于阴谓之汗。又曰：心为汗。夫心之所藏，在内者为血，在外者为汗。盖汗乃心之液，而自汗之证，未有不由心肾两虚而得之者。然阴虚阳必凑之，故发热而自汗，阳虚阴必凑之，故发厥而自汗。是皆阴阳偏胜所致也。

小儿脏腑娇嫩，肤腠未密，或重衣厚被，致内脏生热，热搏于心，故心液不能自藏而额汗出也。额为心之位，宜收敛心气，团参汤。

大病后气血两虚，津液自汗，或潮热，或寒热，发过之后身凉。自汗日久，令人黄瘦，失治则变蒸痨，宜黄芪固真汤。

睡中汗出，醒来则止。此心虚盗汗，宜敛心气、养心血，用团参汤。

睡中遍身有汗，觉来久不干者，此食积盗汗，脾冷所致。益黄散。

脾虚泄泻，自汗后而遍身冷，有时遇泻则无汗，不泻则有汗。此为大虚之候，急当补脾，理中汤；待泻止，黄芪固真汤

凡自汗上至胸，下至脐，此胃虚也。当补胃，四君子汤加黄芪。

肺虚自汗，面白唇白，六脉无力。盖因久嗽脾虚，故令自汗。四君子汤加麦冬、五味。

伤风自汗，宜实表，桂枝汤；伤寒汗出，自头至颈而止者，欲发黄也，茵陈汤。如有实热在内，烦躁汗出不止者，胃实也，宜集成沆瀣丹微下之。

诸汗服药久不止者，用五倍子一个研细末，醋和作一小饼，贴肚脐，以带扎之，效。

入　方

团参汤　收敛心气，固心血，能止自汗。

官拣参切片，焙干　当归身切片，焙干，各二钱

上二味，分作二服，用猪心一个，切作二片，用前药二钱，猪心一片，水一盅，煎汤，空心服。

黄芪固真汤　治气虚自汗。

嫩黄芪一钱　官拣参五分　漂白术五分　当归身一钱　炙甘草五分　天圆肉三枚

水煎服。

益黄散　治食积盗汗。

正广皮五钱　杭青皮四钱　诃子肉四钱　粉甘草四钱　公丁香一钱

共为末，大儿二钱，小者一钱。如感冒吐泻，加姜、枣同煎服。

理中汤　方见卷二乳子伤寒门。

四君子汤　方见卷三疟疾门。

桂枝汤　方见卷二小儿伤寒门。

茵陈蒿汤　治头汗至颈而还，将欲发黄。

茵陈蒿一钱五分　川黄柏一钱　黑栀仁一钱　灯芯十茎

水煎滚，热服。

汗证简便方

凡男妇小儿，及产母一切虚证，偶然大汗，诸药莫能止者，盖由玄府大开，一时难闭，所以服药不能止。先将五倍子末，醋调作小饼子，纳入脐中，以布扎之，然后以旧蒲扇烧灰，多加糯米粉和匀，以夏布袋装之，自头至足，遍身轻扑之，使其粉入毛窍，玄府自闭，虚汗即止。神治也。

疝气证治

经曰：邪客于足厥阴之络，令人卒疝暴痛。又曰：病在小腹痛，不得大小便，病名曰疝，得之寒。故疝气者，寒邪结聚而成也。内则脐腹绞痛，外则卵丸肿大，专属肝经，与肾无涉。盖肝主怒，小儿性急，多叫哭而得之者，此气动于内，谓之气疝。应行气开郁，初宜柴苓汤升散之，次宜加减二陈汤，或木香内消丸。

如因久坐湿地得之者，此冷气入腹，谓之寒疝，宜温中散寒，加减当归散、茱萸内消丸。

有肿而不痛，由中湿所致；卵虽肿而无热，复不痛，宜行湿消肿，加减守病丸。

小儿素有疝气，或一年半年发者，发则有形，外连睾丸，内贯小腹，肿硬一条，如小杵，约长五六寸，大小便不通。宜当归木香汤。

小儿木肾，肿大不痛，连年不消者，不早治便为终身痼疾。宜茱萸内消丸，加牵牛子半生半炒，取头末用，更灸脐傍章门穴，大效。取穴法：以本儿手掌第五指本节横纹，对脐中心，其中指头尽处是穴。

小儿湿地上坐，或有蚯蚓吹其卵，肿大而垂者，以盐汤浸洗之，盖盐能杀蚯蚓毒也；或以苍术煎汤，加盐少许，洗之效。

小儿阴囊生疮痛烂者，谓之脱囊。用紫苏叶研末傅之，以荷叶包之，或用生荷叶火烘令软包之。虽囊丸露出，亦可治也。

小儿外肾臊臭，时复湿痒，柴胡龙胆汤，痒甚不可止者，胡椒煎汤洗之。

入　方

柴苓汤　治少阳胆经有邪而病疝。

官拣参一钱　北柴胡一钱五分　枯黄芩一钱　法半夏一钱　漂白术一钱　白云苓一钱　结猪苓一钱　宣泽泻一钱　青化桂五分　炙甘草五分生姜一片　大枣一枚

水煎，热服。

加味二陈汤　治性急多哭，卵肿，痛连小腹，谓之气疝。

正广皮　法半夏　白云苓　小茴香　正川芎以上各一钱　青化桂　炙甘草各五分

生姜三片，水煎，温服。

木香内消丸　治证如前。

南木香屑　京三棱煨　结猪苓焙　宣泽泻炒　川楝肉炒　正广皮酒炒　香附米酒炒，以上各七钱　杭青皮醋炒，二钱

共为末，酒煮米糊为丸。每服一二钱，空心盐汤下。

加味当归散　治受寒湿之气，小腹绞痛，外肾红肿，并腹痛啼哭等证。

当归身一钱五分　吴茱萸三分　青化桂五分　正川芎五分　黑姜炭一钱　南木香五分　小茴香一钱　炙甘草五分

水煎，临服加盐七分，空心温服。

茱萸内消丸　治寒湿所袭，留伏作痛，癫疝偏坠。

吴茱萸醋浸一宿，焙干，炒过　青化桂去皮　净枣皮蒸，去核，捣　元胡索醋炒　大茴香盐炒　化橘红炒　杭青皮醋炒，以上各一两　桃仁炒　白蒺藜炒　南木香屑，以上各五钱

共为细末，酒煮面糊丸龙眼核大。每服一丸，淡盐汤送下。

加减守病丸　治卵肿不痛。此湿气也，又各木肾。

漂苍术盐炒　制南星炒　香白芷焙，以上各一两　京查肉炒　正川芎炒　广橘核炒　法半夏焙　六神曲炒　吴茱萸炒，以上各二钱五分

共为细末，酒煮面糊为丸，龙眼核大。每服一丸，小茴香煎汤化下。

当归木香汤　治小儿久疝不愈。

京查核　全当归　正川芎　川木通　小茴香　川楝肉　杭青皮　结猪苓　宣泽泻以上各一钱　南木香　黑栀仁各五分

上用净水浓煎，空心热服。

龙胆汤　治小儿外肾臊臭，时复湿痒。

北柴胡一钱二分　宣泽泻一钱　车前子八分　川木通一钱　怀生地一钱　当归尾六分　龙胆草五分

水煎，空心服，以饮食压之。

疝气简便方

治小儿疝气肿痛，用荔枝核炒焦五钱，大茴香酒炒二钱五分，共为细末。每服一钱，温酒调下。又方，不论小儿及男妇一切疝气，以及诸般气痛，用荔枝核四十九个炒焦，留白陈皮九钱、生硫黄四钱，共为末，盐水打面糊为丸绿豆大。遇痛时，空心酒研送九丸，良久，再进一服，不过三服，全安。

小儿肾肿硬痛，橄榄核、荔枝核、山楂核，三件等分，俱烧过存性研末。每服一钱，空心小茴香汤送下。

小儿疝气痛，全蝎不拘多少，炒焦为末。每三分，小茴香煎酒送下。

小儿冷疝作痛，阴囊浮肿。川楝子去核五钱，吴茱萸二钱五分，炒研为末，酒打面糊为丸小豆大。每服十丸，盐汤化下。

小儿疝久，阴囊坚硬如石，名为木肾。用瓜蒌连皮带子二钱，荜拨二钱、生姜二钱、葱白二钱，酒煎，热服，被覆暖卧，取汗出效。

啼哭证治

小儿初生，百日一周之内，神安意静，不妄笑多哭者易养。如日夜啼哭不止，为母者心诚求之，渴则饮之，饥则哺之，痛则摩之，痒则抓之，其哭止者，中其意也；如哭不止，当以意度之。盖小儿初生，性多执拗，凡有亲狎之人，玩弄之物，一时不见，其心不悦而哭，谓之拗哭，急与之，勿使怒伤肝气致病也。假如又不止，请医视之。如大哭昼夜不止者，肝热也，泻青丸；如日夜啼哭，身热烦躁者，心热也，导赤散，俱用灯芯汤服。

入　方

泻青丸　此肝经之主药。凡幼科中截风定搐之方，多用金石脑麝，无益有损。惟此方清心平肝，疏风凉血。凡小儿作热不退，将成风搐，或已成风搐，但服此丸，其应如响。方虽古方，人不知用。予昔游潭州遇师指授，始能用之。凡幼科中抱龙、保命、至保、新安金药、苏合香丸，一概不取。惟此方为幼科截风定搐之第一神方也。

川羌活　正川芎　黑山栀　龙胆草　全当归　北防风以上俱各一两　锦庄黄五钱

上药合为一处，以火烘燥，研为细末，炼蜜为丸，青黛为衣，如大豆大。每服一二丸，清茶化下。

导赤散　治心经有热，一切烦啼不安，皆效。

怀生地二钱　川木通一钱五分　枯黄芩一钱　生粉草五分　淡竹叶十四片　灯芯十根

水煎，热服。

夜啼证治

小儿夜啼有数证：有脏寒、有心热、有神不安、有拗哭。此中寒热不同，切宜详辨。

脏寒者，阴盛于夜，至夜则阴极发躁，寒甚腹痛，以手按其腹则啼止，起手又啼。外证面青手冷，口不吮乳，夜啼不歇。加减当归散。

心热烦啼者，面红舌赤，或舌胎白涩，无灯则啼稍息，见灯则啼愈甚。宜导赤散加麦冬、灯芯，甚则加川连、胆草。

神不安而啼者，睡中惊悸，抱母大哭，面色紫黑，盖神虚惊悸。宜安神丸定其心志。及吐泻后及大病后夜啼，亦由心血不足，治同上。

凡夜啼见灯即止者，此为点灯习惯，乃为拗哭，实非病也。夜间切勿燃灯，任彼啼哭，二三夜自定。

入　方

加味当归散　方见卷四痘证门。

导赤散　方见卷四啼哭门。

十味安神丸　治神虚惊惕，至夜则啼。

官拣参　白茯神　大杭冬　怀山药　正龙齿煅，以上各二钱　镜面砂水飞　寒水石水飞　粉甘草以上各五分　梅花片一分　赤金箔十片

共为细末，炼蜜为丸芡实大。每服一丸，灯芯汤下。

夜啼简便方

小儿心热面赤，夜多啼泣，朱砂五分，牛黄一分，共为末。每一二分，犀角磨汤调下。又治同前证夜啼。青黛研筛过，每服二分，灯芯十茎，煎汤，调服。

小儿一百二十日内夜啼，用蝉退四十九个，煎去前半截，用后半截，焙干燥，研末。每服四分，钩藤汤下。

又方　用蝉脱十四个，去翅足，焙干，入朱砂一分，共研末，蜜调涂母乳头上，令儿吮之．纳儿口中亦可。

小儿夜啼，不论有余不足皆有效。用五倍子研末，口中津唾和作饼子，纳肚脐，以带扎之，效。

又方　以灶心土研末二钱，朱砂飞过一

钱，麝香少许，共为末，蜜丸绿豆大。每服五丸，水调下。

二便证治

经曰：北方黑气，入通于肾，开窍于二阴。夫二阴者，前阴窍出小便，后阴窍出大便。又云：前阴主气，后阴主血。盖膀胱之津液，血所化也，由气而后能出；太阴之传送，气之运也，由血而后能润。此便溺之流通，见气血之依附，而人之所以为生者，以其有此出入关窍耳。清阳出上窍，谓呼吸也；浊阴出下窍，谓大小二便也。倘一息不运，则机缄穷而死矣。故二便不通，加以腹胀气喘，呕哕烦躁者，不可治也。凡二便秘，宜八正散；外用掩脐法、蜜导法，则前后俱通矣。

入　方

八正散　治热聚下焦，二便不通。

淮木通　白滑石　黑栀仁　车前子　瞿麦穗　锦庄黄　白芒硝　萹蓄俱等分，看儿大小加减之

除大黄、芒硝在外，将六味水煎极熟，加入大黄，再煎十数沸，取起，斟出澄清，以芒硝冲服。

掩脐法　治中下二焦积热，大小便秘。

连须葱七茎不洗，生姜一大块、淡豆豉三钱、食盐三钱，同捣烂作一饼，铫子烘热，掩肚脐，以帛扎定。良久，气通二便自利。

蜜导法　治二便不通，以此通其大便，则下焦气行，而小便自通矣。

用冬蜜八两，炼至滴水成珠不散，入皂角细末二钱，和匀，稍冷，捻如小指大一条，外以葱涎涂上，轻轻插入谷道中，气通则便利矣。

二便不通简便方

大小便不通，经二三日危急者，以皂角烧灰研末，米汤调下一钱，立通。

又方　以蜂蜜一盏、皮硝一钱、白汤一盏。空心调下；另以皂角于桶内烧烟，令儿坐桶上熏之，即通。

又方　用草乌一个，削去皮，略以麝香搽上，抹以香油，轻插谷道内。名霹雳箭，至捷。

二便不通，百方不效。肚腹胀痛，咽喉窒塞，或痰壅气喘，水米不下，死在须臾，宜急救之。用甘遂五分，面包煨熟，取出为末，入麝香三厘，捣饭为丸。小儿服二分，大人五分，姜汤送下。

又方　以小竹筒抹以葱涎，插入谷道，以芒硝五钱研细，香油半盏，皂角末少许，令人口含，灌入谷道中，少时即通。

小便不利证治

经曰：膀胱者，州都之官，津液藏焉，气化则能出矣。又曰：膀胱不利为癃，不约为遗溺。又曰：肝有热则小便先赤。凡小便赤涩为热，小便自遗为寒。热者火有余，水不足，治宜泻心火、滋肾水，加味导赤散；寒者火不足，水有余，治宜温肾水、益心火，益智散。

小便不通，乃由脏气虚，受热壅滞，宣化不行，非塞非痛，但闭而不通，腹胀紧满。宜五苓散加车前、灯芯。

大病之后，气虚津液不足，而小便闭者，不可利之。利则中气日虚，津液愈涸。宜人参散。

小儿患淋，小便淋沥作痛，不必分五种，然皆属火热。宜清利之，海金沙散。

小儿久病气虚而淋病者，不可利小便，宜六味地黄丸，滋其化源。

小便自出而不禁者，谓之遗尿；睡中自出者，谓之尿床。此皆肾与膀胱虚寒也。益智散加附、桂、龙骨。

小儿初便黄赤，落地良久，凝如白膏者，谓之尿白。伤脾所致，久而成疳。胃苓丸，盐

汤下。

小儿小便出时，色白混浊，随尿而来，谓之白浊。此心经虚热，宜清心莲子饮。

入　方

加味导赤散　治心热肝热，小便赤涩。

淮木通　怀生地　炙草　枯黄芩　黑栀仁　泽泻　北柴胡以上各一钱

淡竹叶七片灯芯十茎

水煎，空心热服。

益智散　治水有余，火不足而遗溺。

益智仁五钱，盐水炒　补骨脂三钱，盐水炒　白云苓五钱，酒炒

共为细末，每服一钱，盐汤调下。

五苓散　方见卷二暑证门。

人参散　治气虚津液不足，小便不通。

官拣参一钱　大麦冬二钱　川黄柏五分　炙甘草一钱

生姜三片，水煎服。

海金沙散　治小儿诸淋，皆属于热。

香附米酒炒　正川芎酒炒　赤茯苓屑炒，以上各五钱　白滑石水飞，一钱　陈枳壳炒　宣泽泻焙　陈石苇焙　尖槟榔炒，以上各一钱五分

共为细末，每服一钱，淡盐汤调下。

胃苓丸　方见卷二湿证门。

清心莲子饮　专治白浊。

建莲子二钱　白云苓一钱五分　益智仁一钱　远志肉五分　大麦冬一钱　官拣参五分　石菖蒲五分　车前子五分　漂白术六分　宣泽泻四分　生甘草三分

灯芯十茎，水煎，空心服。

小便简便方

凡小便不通，服药无效，用商陆五钱研末，入麝香少许，先以旧夏布盖于脐上，将药放布上。待药气入腹，一时即通。

小便数日不通，遍身手足肿满，诸药不应者，用苏叶一斤煎浓汤，入脚盆内，令患者坐盆上熏之，冷则又添热汤；外用炒盐熨脐上，及遍身肿处。良久，便通肿消而愈。

又方　用连须葱白一斤，捣烂炒热，分作二处，各以布包，轮流热熨脐下，即通。小便闭结不通，药不能效。用食盐一两，调温水服之；良久，以指入喉中探吐，一吐即通。盖上窍不通，下窍闭也。

又方　以皂角研末，吹些微入鼻中，令其喷嚏，亦是上升之意。如水注闭其上窍，则下窍不通，稍升提之，即时通矣。

大便证治

经曰：太阴司天，阴痹，大便难，阴气不用，病在于肾。又曰：太阳之胜，隐曲不利，互引阴股。夫饮食之物，有入必有出也。苟大便不通，出入之机几乎息矣。急宜通之，使旧谷去而新谷得入。然有实闭、有虚闭，最宜详审。如形实气实脉实又能食者，的有可下之证，则下之，如八正散、承气汤、木香槟榔之类，择而用之，中病即止，不可过也；而形虚气虚脉虚而兼食少者，虽有可下之证，宜缓不宜急，但用保和丸加枳实微利之；如平素便难者，血不足也，宜润汤丸、蜜导法。

入　方

八正散　方见卷四二便门。

承气汤　方见卷二伤寒门。

木香槟榔丸　方见卷三伤食门。

保和丸　方见卷三伤食门。

润肠丸　治老人虚人，小儿产妇，大便闭结。

火麻仁去壳　光杏仁去皮　光桃仁去皮　当归尾酒洵　陈枳壳以上各七钱五分　金井胶炒　萝卜子炒　家苏叶以上各三钱

共为细末，炼蜜为丸。每服一二钱，量人加减，白汤送下。

蜜导法　方见卷四二便门。

头项囟证治

经曰：头痛耳鸣，九窍不利，肠胃之所生也。小儿头囟之证，多由脾胃而得。又头为六阳所会，七窍居焉，故小儿之头，四时宜凉，但见头热，即有病生，宜预防之。

解颅者，谓头缝开解而颅不合也。是由禀气不足，先天肾元大亏。肾主脑髓，肾亏则脑髓不足，故颅为之开解。然人无脑髓，犹树无根，不过千日，则成废人。其候多愁少喜，目白睛多，而眊白色。若成于病后者，尤凶。宜久服地黄丸，外用封囟法。

囟肿者，囟门肿起也。脾主肌肉，若乳哺不常，饥饱无度，或寒或热，乘于脾家，致使脏腑不调，其气上冲，为之填胀，囟突而高，如物堆垛，毛发短黄，骨蒸自汗。然亦有寒气冲上而肿者，则牢韧坚硬；热气冲上而肿者，则柔软红色。然寒肿者十之一，热肿者十之九，更有因包裹严密，盖覆过厚，阳气不得外出，亦令赤肿，皆用封囟法。热肿者泻青丸，寒肿者参苏饮。

囟陷者，有因泄泻久而气血虚弱，不能上充髓脑，故下陷如坑，此乃胃虚脾弱之极，宜急扶元气。若与枕骨同陷者，百无一救。此中有禀受父精不足，母血虚羸而陷者，有因久病而陷者。然枕陷尤甚于囟陷，二者皆肾元败绝之证也，俱参苓白术散或八味地黄丸。

天柱骨倒。小儿有色肥壮，不为瘦悴。孰知形体过肥，中气愈弱，是盛于外而歉于内也。忽然项软倾倒者，此肝经风热也，小柴胡加粉葛、当归、白芍。

有因久病之后，或泄泻日久，忽然颈项倾侧，名天柱骨倒，最为危候。速救真元，大全大补汤加鹿茸。

有小儿生下颈便软者，胎气不足也。由禀父之肾元虚败，峻补先天，其庶几矣，补肾地黄丸与六君汤间服。

天柱骨倒之证，虽则三条，总系真阳大败之候，为小儿之恶证。保救真元，是其大要，外以生筋等药贴之可也。

入　方

六味地黄丸　方见卷一胎疾门。

封囟法　治头缝不合，名曰解颅。

天南星不拘多少，以姜汁炒枯，研细末，醋调涂于绢帛上，烘热贴囟门上，以合为度。

泻青丸　方见四卷啼哭门。

参苏饮　方见卷三咳嗽门。

参苓白术散　方见卷三疳证门。

八味地黄丸　方见卷一保产门。

小柴胡汤　方见卷二伤寒门。此加粉葛、当归、白芍。

十全大补汤　方见卷一保产门。

补肾地黄汤　方见卷三哮喘门。

六君子汤　方见卷二类搐门。

生脉散　治筋软无力，天柱骨倒。

木鳖子六个　蓖麻子六十个，并去壳

以药研如泥，先抱头起，以手摩其颈令热，津唾调药，涂颈项。

又方　贴项软。

生附子去皮，二钱　生南星去皮脐，三钱

共研末，姜汁调，摊贴患处。

头项简便方

小儿解颅，或因病后忽然囟门宽大，头缝四破。此脑髓不充，大虚之候。用鹿茸、防风、白芨、柏子仁四味各五钱，共为末，乳汁调作饼，贴囟门上，一日一换，以合为度。

治小儿囟陷如坑，由久病真元不足，气血两虚，大凶之候。速宜十全大补加鹿茸、姜、枣煎服；外用狗头骨炙黄为末，鸡蛋清调敷之，效。

目病证治

经曰：诸脉者，皆属于目。又曰：东方青气，入通于肝，开窍于目。夫目虽为肝窍，

而五脏俱备，神之所托。故白珠属肺，黑珠属肝，瞳仁属肾，两角属心，上下眼胞属脾，五脏五色，各有所司。心主赤，赤甚者心实热也，赤微者心虚热也；肝主青，青甚者肝热也，淡青者肝虚也；脾主黄，黄甚者脾热也，淡黄者脾虚也。目无精光，及白睛多而黑睛少者，肝肾俱不足也。

目内赤色，心经积热上攻。宜泻丙火从小便而出，导赤散加黄连、防风。

目内黄者，脾热也，宜泻黄散；上下眼胞肿者，脾经风热，亦同上治。

目连扎者，肝有风也。凡病或新或久，肝风入目，上下左右如风吹，儿不能任，故连扎也。泻青丸。

目直视者，肝有热也。热气入目，障其筋脉，目之两角俱紧，不能转运，故直视也。泻青丸。

小儿初生目闭，此胎热也。内服生地黄汤，外用胆草煎汤洗目上，一日七次，恐延缠则损目。

小儿生下眼胞赤烂者，由产时拭洗不净，以致秽恶侵渍两目角，故两胞赤烂，至长不瘥。真金散。

小儿久嗽，其目两眶肿黑，如物伤损，白珠红赤如血，谓之血眼。内服泻白散，外用贴法。

小儿生下数月之内，目不见物，谓之雀目，由肝虚也。六味地黄丸，常以猪肝煮熟压药。

小儿热病，其目羞明喜暗者，风热也。宜疏散风热，清阳散火汤。

入　方

导赤散　方见四卷啼哭门。

泻黄散　治脾经积热，白珠生黄。

藿香梗一钱二分　黑栀仁一钱　熟石膏一钱　北防风一钱　炙甘草五分

净水煎，半饥服。

生地黄汤　治小儿胎热，初生眼闭不开。

怀生地一钱五分　赤芍药一钱　正川芎五分　大当归一钱　天花粉酒炒　炙甘草各五分

灯芯十茎，长流水煎，热服。

真金散　治小儿眼胞赤烂。

雅川连　川黄柏　大当归　赤芍药各一钱　光杏仁去皮、尖、五分

上锉碎，以乳汁浸一宿，饭上蒸过，取浓汁点眼内。

泻白散　治小儿久嗽，两眶黑肿，白珠如血。

芽桔梗　炙甘草　广陈皮　桑白皮　地骨皮各等分

水煎，热服。

贴药

大生地一两　大黑豆一两

二味用水同浸一夜，取起捣为膏，贴眼皮上，其血自散。血泪即出，肿黑即消。

六味地黄丸　方见卷一胎疾门。

清阳散火汤　治小儿风热眼疾，羞明喜暗。

小条芩　荆芥穗　正川芎　北防风　净连翘　黑栀仁　当归尾　熟石膏各一钱　川羌活　炙甘草各五分

灯芯十茎，水煎，食后服。

眼目简便方

治目生胬肉，赤脉贯瞳，白膜遮睛，诸般云翳，用白丁香，即麻雀屎也，倒者为雌雀屎不用，取竖立者雄雀屎也，不拘多少，取来研末，水飞过如飞朱砂样，渣滓不用。俟药澄底，倾去清水，晒干。每以些微同乳汁研化，点翳上，其翳自去。神方也。

取麻雀屎，寺院中暨城楼上有。

赤眼肿痛，用朴硝一撮，以碗盛豆腐一块，将硝放豆腐上，饭上蒸之，俟硝已化，去豆腐不用，取汁点眼自愈。

敷火眼及风热眼，生南星五钱、红饭豆五钱，共为末，取生姜自然汁，调作二饼，贴两太阳。又敷火眼痛极，用大红枣取肉五六

枚，葱三四根，共捣如泥，作二小饼，闭目贴之。令其发散。盖眼无风寒，必不疼痛。以此疏散，立时见效。昧者以为火眼必用凉药敷贴，而用黄连、黄柏之类，不知抑遏其火邪，不能外出，必变眼珠疼痛，久不能愈。慎之！

治烂弦风眼，百药不治，此方最神。用鲜色铜绿三钱，研细末，以生蜂蜜浓调涂粗碗内，要调略干，稀则少时流出矣。用艾烧烟，将碗覆艾烟上熏之，须熏至铜绿焦黑为度，取起冷定，以乳汁调匀，饭上蒸过，搽眼皮上烂弦处，百不失一。

治眼毛倒睫不起，用五倍子为细末，蜜调敷眼皮上，其睫自起。

又方　以无名异为末，纸卷作捻，点灯吹灭，闭目熏之，睫自起。

赤眼肿痛不消，以精猪肉一片，如指甲大，以水洗净其血，贴于眼皮上，良久易一片，即消。

耳病证治

经曰：北方生寒，在脏为肾，在窍为耳。又曰：肾气通于耳，肾和则耳能闻五音矣。故耳本属肾，耳珠前属少阳胆经。小儿有因肾经气实，其热上冲于耳，遂使津液壅而为脓，或为清汁。亦有因沐浴水入耳中，灌为聋者，内服蔓荆子散，外用龙骨散搽之。耳珠前后生疮，浸淫不愈者，名月蚀疮。俗谓以手指月，则令耳之前后生疮。皆用外治之法，黄柏散搽之。

若耳中忽作大痛，如有虫在内奔走，或出血水，或干痛不可忍者，用蛇蜕散。

有忽然气塞耳聋，此由风入于脑，停滞子手太阳经。宜疏风清火，导赤散加防风，或通窍丸。

耳旁赤肿者，热毒也，若不急治，必成大痈，外用敷毒散，内服消毒饮。

入　方

蔓荆子散　治小儿肾气上冲，灌为聤耳。

蔓荆子一钱　粉干葛一钱　赤芍药一钱　信前胡一钱　桑白皮一钱　淮木通一钱　怀生地一钱　杭麦冬一钱　赤茯苓三钱　绿升麻　小甘草各五分　灯芯十茎

水煎服。

龙骨散　治小儿聤耳，流脓出汁，以此吹之。

石龙骨煅　明白矾煅　真铅丹炒，以上各三钱　胭脂胚三钱　当门子五厘

共为末，以绵展干耳内脓水，用小竹筒吹药入耳。

黄柏散　治小儿耳珠前后生疮、浸淫不愈。

川黄柏　白枯矾　海螵蛸　白滑石　石龙骨各等分

共为末，疮湿用干搽，疮干用猪油调搽。

蛇蜕散　治耳中痛不可忍，或出血水，或干痛。

用蛇蜕烧灰存性，为细末，鹅毛管吹入耳中，取蛇之善蜕，以解散郁火也。

导赤散　方见卷四啼哭门。

通窍丸　治小儿耳忽暴聋。

雄磁石煅，一钱　真麝香五厘

共为细末，以枣研烂，和为一丸，如枣核大，绵裹塞耳中。又以生铁一小块，热酒泡过，含口内，须臾气即通矣。

敷毒散　治小儿耳傍赤肿热毒也，恐防作痈。

用绿豆粉不拘多少，以老醋调成膏，敷肿处，干则易之。

消毒散　治小儿耳傍赤肿，内服之药。

川羌活　北防风　片黄芩　净连翘　芽桔梗　官拣参　正川芎　当归尾　北柴胡各七分　小甘草四分

生姜一片，灯芯十茎，水煎服。

耳病简便方

治小儿无故耳聋，取龟尿滴入耳中，效。或以生麻油日滴三五次，数日即愈。

耳内肿痛，流脓出水，用虎耳草，又名倒垂莲，捣取汁，多灌入耳中，常常用之。此治耳聋之妙药，略加枯矾更妙。

耳内脓水不干，用千层石榴花焙干为末，以小竹筒吹入耳内。

耳外生疮，用黄丹一钱、松香八分、轻粉一分，共为细末，香油调搽。

小儿耳后生疮为肾疳。以地骨皮研末，筛出嫩末，香油调搽，粗末煎水洗。

诸虫入耳，取猫尿滴入耳中，其虫自出。若用麻油滴之，则虫死难出。取猫尿法：以生姜擦其鼻，则尿自出。

一切恶虫入耳，用稻草烧灰淋汁，沥入耳中，其虫即死而出也。

鼻病证治

经曰：西方白气，入通于肺，开窍于鼻。又曰：五气入鼻，藏于心肺，有病而鼻为之不利也。盖鼻为肺之窍，鼻塞者肺气不通于窍。然肺主皮毛，风寒外感，则肺气壅闭而鼻塞。川芎膏。

鼻涕者，肺为寒风所袭，而津液不收，则为鼻涕。细辛散疏之。

鼻齆者，肺受风寒，久而不散，脓涕结聚不闻，使不闻香臭则齆矣。万金膏。

以上三证，皆宜疏利，俱用通气散。

鼻干者，心脾有热，上蒸于肺，故津液枯竭而干，当清热生津，导赤散加麦冬。

如病已极，鼻干而黑，窍张，长出冷气者，肺绝也，不治之证。

鼻渊者，流涕腥臭。此胆移热于脑，又名脑崩，宜用辛夷散。

凡小儿初生，三朝一七，忽然鼻塞，不能吮乳，不得呼吸者，因乳母夜卧之时，不知回避，鼻中出气吹儿囟门，或因洗水未避风寒，所以致儿鼻塞。通关散。

鼻衄者，五脏积热所致。盖血随气行，得热而妄动，溢出于鼻。宜凉血降火，加减地黄汤，外用吹鼻散。

入　方

川芎膏　治小儿外感风寒，肺气壅闭而鼻塞。

正川芎三钱　北细辛一钱　小藁本一钱　香白芷三钱　炙甘草三钱　梅花片　当门子　光杏仁去皮尖，各一钱

共为末。炼蜜为丸龙眼核大。每服一丸，灯芯汤化服。

细辛散　治小儿风寒所袭，鼻流清涕。

官拣参　信前胡　北细辛　北防风　正川芎　炙甘草各等分

共为末。每服一钱，姜、葱汤调服。

万金膏　治小儿风热侵肺，鼻齆不闻香臭。

川羌活　正川芎　北细辛　淮木通　净麻黄　石菖蒲各一钱

共为末，每服一钱，以蜜和匀，姜汤化服。

丽泽通气散　治小儿鼻塞、鼻涕、鼻齆。

川羌活　川独活　濂苍术　北防风　绿升麻　荆芥穗　粉干葛　香白芷　正川芎　淮木通以上各二钱　净麻黄　北细辛　炙甘草以上各五分

生姜三片，大枣三枚，水煎，食后服。

辛夷散　治小儿鼻流浊涕而腥臭。

辛夷仁五钱　苍耳子炒，二钱五分　香白芷二钱　薄荷叶一钱　雅黄连二钱

共晒干为末，每服一钱，葱汤调下。

通关散　治乳子鼻塞，不能吮乳。

香附子　正川芎　荆芥穗　直僵蚕　北细辛　猪牙皂以上各五钱

共为细末，以葱白捣成膏，每用药末五钱，与葱膏和匀，摊软帛上。临卧烘热，贴

儿囟门上，早晨取去。

加减地黄汤　治小儿鼻中出血。

怀生地二钱　片黄芩二钱　黑栀仁二钱　赤芍药一钱　白茅根一钱

水煎，空心热服。

吹鼻散　治小儿鼻中出血。

黑栀仁炒　乱油发烧，存性，各等分

共为极细末，以些微吹鼻中。

鼻病简便方

鼻疳破烂，用杏仁去皮、尖，以纸包压去油，以成白粉为度。每杏仁粉二分，对真轻粉一钱，和匀吹患处。

鼻流浊涕不止，名曰鼻渊。乃风热在脑故也。用苍耳子炒，辛夷仁、白芷、薄荷等分，为细末。每用一钱，临卧葱汤调服，不以数拘，以愈为度。

鼻中流臭黄水，名控脑沙。用紫贝子，俗名南蛇牙齿，粤人呼狗屐螺，取二三枚，火煅醋淬为末，纸包放地上去火毒。每服一钱，大人二钱，以丝瓜藤煎汤调药，空心服，以愈为度。

鼻被破伤，或擦落，急以猫儿头上毛剪碎，以口中津唾调敷之，自愈。

疳疮蚀鼻，破烂不堪。用五倍子烧灰存性，研末以腊猪油和涂之。

口疮证治

经曰：中央黄色，入通于脾，开窍于口。又曰：脾气通于口，脾和口能知五味矣。故口者脾之外候。凡鹅口者，口内白屑满舌，如鹅之口。此肺热而心脾为甚，故发于口也。内服沆瀣丹，外以保命散吹之。

口疮者，满口赤烂。此因胎禀本厚，养育过温，心脾积热，熏蒸于上，以成口疮。内服沆瀣丹，外以地鸡擂水搽疮上。地鸡即扁虫，人家罅下有之。

口糜者，满口生疮溃烂，乃膀胱移热于小肠，膈肠不便，上为口糜。以导赤散去小肠之热，五苓散去膀胱之热，当以二方合服。

口疮服凉药不效，乃肝脾之气不足，虚火泛上而无制。宜理中汤收其浮游之火，外以上桂末吹之。若吐泻后口中生疮，亦是虚火，理中汤。昧者以为口疮悉为实热，概用寒凉，必不救。

上腭有胀起如悬痈者，此名重腭。由脾胃挟热，气血不能收敛而成。用针刺去恶血，内服沆瀣丹，外以碧雪吹之。

小儿两颐流涎，浸渍胸前者，此名滞颐。盖涎者脾之液，口为脾窍，脾胃虚寒，不能收敛津液，故涎从口出而滞于颐，宜温脾丹。

小儿口频撮者，气不和也。盖唇应乎脾，气出于肺，脾虚不能生肺，故口频撮。异功散补脾生肺愈矣。

小儿口撮，面青多哭，此阴寒之至，肝脾虚冷，脐下痛也。理中汤温之。

小儿急欲吮乳而口不能吮者，心脾有热，舌不转运。泻黄散清之。

入　方

集成沆瀣丹　方见卷一胎疾门。

保命散　治小儿鹅口疮。

箭头砂　枯白矾　明牙硝三味俱五钱

共为细末，吹之。

导赤散　方见卷四啼哭门。

五苓散　方见卷二伤暑门。

理中汤　方见卷二乳子伤寒门。

碧雪散　治小儿悬痈重腭。

茸蒲黄　洋青黛　白硼砂　明牙硝　生甘草各等分

共为细末，吹之。

温脾丹　治小儿脾冷流涎，浸渍颐间。

南木香　法半夏各三钱　黑炮姜　漂白术各二钱　广陈皮　杭青皮各一钱

上为末，炼蜜为丸龙眼核大。每服一丸，米饮下。

异功散　方见卷三伤食门。

泻黄散　治小儿心脾有热，舌不转运，不能吮乳。

赤茯苓　片黄芩　川黄柏　川黄连　黑栀仁　宣泽泻　茵陈蒿各一钱

灯芯十茎，水煎，热服。

口疮简便方

口疮破烂，并治咽喉喉癣、喉痈，用凤凰衣，即伏鸡子壳内皮也，微火焙黄，橄榄烧存性，儿茶，三味俱等分，共为末，以一钱为则，加冰片五厘。口疳搽患处，喉病吹入之，即能进饮食。

口疮久不愈，虚火也。用生附子一个，切焙为末，醋和作饼，男左女右贴脚心。引火下行，自愈。

小儿口角生疮，名燕口疮。以乱发烧灰存性，米饮调服，外即以此敷之。又方，蒸饭时收甑盖上流下气水，搽之即愈。

口唇肿黑，痒痛不可忍，先以磁锋砭去恶血，以古铜钱磨猪油涂之。

治走马牙疳及各样口疳，多年田野中白螺蛳壳研烂，少加儿茶，共为细末，吹患处即愈。

口疳疮及咽喉疼痛，用吴茱萸二两研末，少加面粉，醋调作二饼，贴于足心，以布扎之，过夜即愈。

舌病证治

经曰：南方生热，热生火，火生心，心主舌，在窍为舌。又曰：心气通于舌，心和则舌能知五味矣。夫舌为心之苗，胃之根。小儿多生舌病，以心脾之积热也，故有重舌、木舌、弄舌、舌胎等证，宜辨其虚实而治之。

重舌者，心脾有热。盖脾之大络，出于舌下，有热则气血俱盛。附舌根下，忽重生一舌而短小，内服沆瀣丹，外以针刺去恶血，用蒲黄、黄柏末敷之。

木舌者，心脾积热之气上冲，故令舌肿，渐渐长大，塞满口中。若不急救，必致害人。内服沆瀣丹，外以针刺去恶血，以碧雪散、竹沥调匀敷之。

弄舌者，脾脏虚热，令舌络紧，时时舔舌，俗人称为蛇丝惊者是也。切勿以寒凉攻下治之，少与泻黄散服之，不效，四君子汤。或渴欲饮水，面无红赤色，此脾胃津液不足，不可误认为热，宜七味白术散。

面黄肌瘦，五心烦热而弄舌者，此疳证也。须从疳证门参考，宜集圣丸。

大病后精神困倦，饮食少思而弄舌者，凶候。盖气血两虚，精神将脱。速以十全大补汤挽救之。

舌上黑胎，其热已剧，急以薄荷煎汤洗之。如舌转红色者，可治，凉膈散下之；洗不红者，不治。

泄泻后舌上白胎，此津液不深，不能上潮于口，为虚热也。理中汤。

入　方

集成沆瀣丹　方见卷一胎疾门。

碧雪散　方见卷四口疮门。

泻黄散　方见卷四口疮门。

七味白术散　方见卷三泄泻门。

集圣丸　方见卷三疳证门。

十全大补汤　方见卷一保产门。

凉膈散　治心脾有热，舌上黑胎。

净连翘一钱　黑栀仁六分　锦大黄五分　薄荷叶六分　片黄芩六分　芒硝五分　生甘草四分

竹叶七片，灯芯十茎，水煎，临服加生蜜十匙对服。

舌病简便方

治重舌木舌，肿满强硬，或疼不止，不能言语，宜用粗针线扎箸头上，刺患处，甚者数十刺为妙。只针舌尖及舌两傍，舌中心及舌下切不可针，犯之令出血不止。其刺出之血，以红色者毒轻，紫色者为重，黑色者

最危。仍以蒲黄研末，擦舌上即消。舌或胀大肿硬，即时气绝，名为翼舌翼，衫，入声。用皂矾不拘多少，新瓦上以火煅，变红色为度，放地上候冷，研细搽舌上立愈；重舌木舌皆效。翼，蔽根之饰，谓如翼之蔽大相上也

舌肿满不能出声，以梅花冰片研烂敷之；或以食盐、百草霜共为末，井水调敷即效。

绊舌者，舌根下有筋一条，绊其舌尖，令舌短缩不能吮乳。细视之，明见舌根之下有筋如线，牵绊其舌。用针轻轻挑断之，挑时但挑此筋，不可误伤舌根，为祸不小。曾见愚妇以刀割断之，误伤舌根，流血不止而死。

舌断能重生。用活蟹一只，炙干为末，敷之。此方至神至验。

齿牙证治

经曰：天有列星，人有齿牙。又曰：手阳明之脉，入下齿中；足阳明之脉，入上齿中。故知上牙属胃，下牙属大肠，齿属肾。凡齿生迟者，肾气不足也。盖肾主骨，齿者，骨之余，肾不足则髓亏，不能充乎齿，所以齿迟。宜地黄丸。

上下牙床肿者，此手足阳明实热也。凉膈散为君，加知母、石膏、升麻为佐，频频含咽。

重龈者，肾脏积热，附龈而肿痛也。以针刺去其血，用盐汤洗净，黄柏为末敷之，效。小儿有多食肥肉，齿牙臭烂不可近者，名为鼻息。此胃膈实热也，内服沆瀣丹，外以荆沥和姜汁含嗽。

牙疳者，初作臭气，次则齿牙黑，甚则龈肉烂而出血，名为宣露。此由肾热，其气直奔上焦，故以走马为喻，宜速治之。若上下唇破，鼻穿齿落者，名曰崩沙，气喘痰潮，饮食减小则不可治。内服沆瀣丹，外以如圣散敷之。

梦中咬牙，风热也。由手足阳明二经积热生风，故令相击而有声也。必在梦中者，风属阳，动则风行于阳；静则风归于里也。宣风散。

咬牙一证，惟痘疹见此为危候，余则皆无大害。亦有因病战栗鼓颔而斗牙者，治其本证，则自止也。

牙齿落后不复生者，由于舌舔之故，其肉顽厚。用针刺去其血，以鼠骨散搽之，自生。

入　方

六味地黄丸　方见卷一胎疾门。

凉膈散　方见卷四舌病门。

如圣散　治小儿走马疳，并崩沙、宣露。

用妇人尿桶中白垢，刮下，瓦上煅至烟尽一钱，铜绿二分，麝香半分，共为末，先以蜡树叶浸米泔水洗净，后搽此药。

宣风散　治梦中咬牙。

尖槟榔五钱　广陈皮一两五钱　炙甘草五钱

共为末。每服一二钱，蜜汤调，空心服。

鼠骨散　治小儿齿落不生。

用雄鼠一只，烂去皮，取全骨炙枯研细末，加麝香一分，擦刺处，良久，以姜汤漱之。

齿病简便方

牙龈溃烂，诸药不效者，以盐榄二三个，连皮带核火中煅过存性，加冰片半分搽之神效。走马牙疳，臭烂出血。红枣三枚去核，以明雄研末，填满枣内，新瓦盛之，火煅存性，研末搽之。

又方　凤凰衣未得见水者，焙黄，少加枯矾，共为细末搽之。

咽喉证治

经曰：咽喉者，水谷之道也；喉咙者，气之所以上下者也。又曰：一阴一阳结，谓之喉痹。盖咽者胃管，主纳水谷而居后；喉者

肺管，专主呼吸而居前，为人一身之总要。若胸膈郁积热毒，致生风痰，壅滞不散，发于咽喉，病名虽多，无非热毒。速宜清解，缓则有难救之患，轻则甘桔汤，重则化毒汤。

如痘疮咽喉痛者，毒气上攻也，加减甘桔汤。喉中生疮，不能吮乳，化毒汤。

小儿为诸骨所哽，骨大难咽者，以鹅毛扫咽吐之；骨小者，用海上方治之。

入　方

甘桔汤　治小儿胸膈积热，致生风痰而患喉痹。

粉甘草四钱　芽桔梗四钱

以净水煎，细细咽之。

化毒汤　治小儿咽喉证危迫者。

芽桔梗　南薄荷各一钱　荆芥穗　炙甘草各一钱五分　白芒硝一两　山豆根一钱五分　马牙硝　白硼砂各二钱五分　明雄黄　镜面砂各一钱

共为细末。每服一钱，白汤调下，仍以此药吹喉中。

海上方　治小儿诸骨所哽。

用金凤花根捣碎，以米醋浓煎，用有嘴瓶盛之，口衔瓶嘴，仰面吸药吞之，其骨即下。吞药勿令沾牙。又或以玉簪花根亦可，如上法咽之。

咽喉简便方

治喉闭乳蛾，用鸡内金，勿洗，阴于，烧过存性，研末以小竹筒吹之，即破而愈。鸡内金即鸡肚腹内肫皮也

咽喉内生疮，鼻孔内赤烂，若作喉风治，立死。用白霜梅一个烧存性，枯矾一钱，穿山甲炙枯一钱，共为细末，吹喉中，神效。

喉疮已破，疮口疼痛，难进乳食。用猪脑髓蒸熟，姜醋调和，服之自愈。

咽中结核，不通水食，危困欲死。用百草霜以蜜和丸如芡实大。每一丸，白汤化开灌之，甚者不过二次愈。

误吞针，用磁石研末，以黄蜡熔化，和丸如豆大，吞下。针共丸药，同从大便出。

误吞铜钱、金银钗环之类，只以米糖多服之，久之自出。

误吞铜钱，生慈菇捣汁多饮，自然消化；生荸荠捣汁饮，更妙。

误吞竹木及鱼骨，哽咽不下，用象牙磨浓汁，调服，若吞铁钩子，以沙糖拌象牙末服。治诸骨哽咽不下，用威灵仙三钱煎汤，频频咽之，其骨即软如绵而下。

诸骨哽咽，用狗一只，倒吊取口涎，徐徐与咽即化；又或以狗涎半盏，沙糖半盏，调服立消。

凡误吞金银铜铁之类，以盐槐烧灰研末，水调下，其物即出。此方经验极多。

凡诸骨哽咽，谷树叶捣烂取汁服，其骨自软而出。盖威灵仙、谷树叶、楮实子皆能软骨故也。

龟胸龟背证治

龟胸者，胸高胀满，形如覆掌，多因乳母多服五辛酒面、炙煿之类，或夏月热乳宿乳与儿。盖儿肺气最清，为诸脏华盖，日久痰滞，则生风热，肺受火邪，则胸骨胀起。麻痘之后，多有此证，宜清肺降火，杏仁煎。

龟背，生下不能保护，以客风入于骨髓，或儿坐早，劳伤气血，或咳嗽久，以致肺虚，而肾亦无所生矣。肾主骨，风寒乘虚而入于骨髓，致精血不能流通，故成龟背。宜松蕊丹，外以龟尿涂法。此从前所论证治也。

予按：龟胸有治，龟背乃不治之证。前人证治，犹有未善，虽曰客风入骨，坐早劳伤，咳嗽肺虚，然未窥其病源，无非以现在者言之也。凡小儿禀受真元足者，尝见其赤身裸体，当风露坐，半周之后，坐以座栏，从未闻有客风入骨，坐早劳伤，嗽久而病龟背之说。此证盖由禀父母精髓不足，元阳亏损者多有之。不观小儿龟背，正在命门之间，渐

次骨节浮露，其腰如弓，实因骨痿不能支撑之故，岂风邪为患哉？此证百不一救，原无治法。而前人强立松蕊丹，反用麻黄、大黄、独活、防风一派攻伐之药，适足以速其殇也。若以鄙见，但当以六味地黄丸加上桂、鹿茸，救其先天，复以四君、六君之类，扶其胃气，或可十中保一，除此之外，并无治法。若谓松蕊丹能治龟背，吾不信也。

入　方

杏仁煎　治小儿肺受热邪而患龟胸。

锦大黄好酒九蒸九晒　天门冬去心　真杏仁去皮尖，取净仁　淮木通各一钱二分　桑白皮　甜葶苈　熟石膏各八分

水煎，临卧时服。加增分两，以蜜为丸，徐服更妙。

松蕊丹　治小儿龟背，姑存之可也。

黄松花　陈枳壳　北防风　川独活以上各一两　净麻黄　信前胡　川大黄　青化桂以上各五钱

为末蜜丸绿豆大。每服十丸，米饮下。

六味地黄丸　方见卷一胎疾门。

四君子汤　方见卷三疟疾门。

六君子汤　方见卷二类搐门。

鹤膝证治

小儿鹤膝，因禀受肾虚，血气不充，以致肌肉瘦削，形如鹤膝，外色不变，膝内作痛，屈伸艰难。若焮肿色赤而作脓者，为外因可治；若肿硬色白不作脓者，是属本性难治。属外因者，十全大补汤加苍术、黄柏、防己；属本性者，以六味地黄丸加鹿茸，补其精血。仍须调补脾胃，以助生化之源。

入　方

十全大补汤　方见卷一保产门。此加苍术、黄柏、防己。

六味地黄丸　方见卷一胎疾门。

五软五硬证治

小儿生后，有五软五硬之证，乃胎元怯弱，禀受先天阳气不足，不耐寒暑，少为六淫所犯，便尔五软见焉。五软者，头项软、身体软、口软、肌肉软、手足软，是为五软。然头项软肝肾病也，肝主筋，肾主骨，肝肾不足，故头项软而无力；手足软脾胃病也，脾主四肢，脾胃不足，故手软而懒于握，足软而懦于步也；身体软，阳衰髓怯，遍身羸弱，而不能强立；口软者，虚舌出口而懒于言；肌肉软者，肉少皮宽，肌体虚怯之象也。总之，本于先天不足，宜地黄丸以补肝肾。而更所重者在胃，盖胃为五脏六腑之化源，宜补中益气，升举其脾气。倘得脾胃一旺，则脏气有所禀，诸软之证，其庶几矣。

五硬者，手硬、脚硬、腰硬、肉硬、颈硬也。仰头取气，难以动摇，气壅疼痛，连于胸膈，手心脚心，冰冷而硬，此阳气不荣四末也，为独阴无阳，难治。若肚筋青急，乃木乘土位，俱宜六君子汤加姜、桂、升麻、柴胡，以补脾平肝；若面青而小腹硬者，不治。

入　方

六味地黄丸　方见卷一胎疾门。此加鹿茸、上桂。

补中益气汤　方见卷一保产门。

六君子汤　方见卷二类搐门。此加干姜、上桂、升麻、柴胡。

丹毒证治

小儿赤游丹毒，皆由心火内壅，热与血搏，或起于手足，或发于头面胸背，游移上下。其热如火，痛不可言，赤如丹砂，故名丹毒。凡自腹出四肢者易治，自四肢入腹者难治。治丹之法，先用辛凉解表，使毒渐消，方可搽敷；若先不解毒，遽用搽敷，必逼毒

入腹，以致不救。小儿一岁以外者易治，未周岁者难治，治之得法，无论大小。予尝治百日内外火丹，从阴囊下起，按法治之，三日后阴囊蜕去一壳而愈。

小儿十种丹毒，如三日不治，攻入肠胃则不救。宜逐一辨认，依方治之，百不失一。

凡治丹毒，俱宜先服防风升麻汤，以解毒发表。次用磁锋针去其血，则毒随血散。至神至捷，百发百中。

入　方

防风升麻汤　总治十种丹毒。

北防风　绿升麻　黑栀仁　大麦冬　荆芥穗　淮木通　粉干葛　南薄荷　润玄参　牛蒡子以上各一钱　粉甘草五分

灯心十茎，水煎，热服。便闭，加大黄利之。

磁针砭法　用上清磁器，轻轻敲破，取其锋锐者一枚，将箸头劈破，横夹磁针，露锋于外，将线扎紧，以磁锋正对丹毒之处，另以箸一条，子磁锋箸上轻轻敲之，其血自出，多刺更妙。毒血出尽，立时见功。

治丹若不砭去恶血，专用搽敷，十不救一。

十种丹证

一、飞灶丹，从头项起肿，然后散开。先用葱白捣取自然汁，涂之效。

二、走灶丹，从头项起红肿，痛苦异常。用红饭豆研末，鸡蛋清调涂。

三、鬼火丹，从面部起红肿。用灶心土研为细末，鸡蛋清调涂。

四、天火丹，从背上起赤点。用桑白皮切碎，焙干为细末，羊油调涂。

五、天灶丹，从两臂赤肿、黄色起。用柳木烧炭研末，净水调涂。

六、水丹，先从两胁起赤肿。用多年锈铁磨浓汁，猪油调涂。

七、葫芦丹，先从脐下起。用尖槟榔切碎，焙干研末，米醋调涂。

八、野火丹，先从两脚起红肿。用乳香去油研末，以羊油调涂。

九、烟火丹，从脚背上起红肿。用猪槽下土研末，麻油调涂。

十、胡漏丹，从阴囊下起红肿。用门槛下干脚土研末，羊油调涂。

更有胎毒重者，遍体皆是。速用芸苔子，即油菜子也，秤过一两，酒一大壶，和研滤去渣，取酒复煎数沸，不拘时温服一盏。

又方：芸苔菜，即油菜也。取菜叶捣烂敷之，随手即消。如无生菜，干者为末，水调敷。凡丹毒遍身，或连腰周匝，百方不能治者，惟此最神。

水痘露丹

水痘似正痘，外候面红唇赤，眼光如水，咳嗽喷嚏，涕唾稠黏，身热二三日而出，明净如水泡，形如小豆，皮薄，痂结中心，圆晕更少，易出易靥，温之则痂难落而成烂疮，切忌姜椒辣物，并沐浴冷水，犯之则成姜芥水肿。自始至终，惟小麦汤为准。

小儿生后，百日内外，半岁以上，忽然眼胞红肿，面青黯色，夜间烦啼，脸如胭脂，此因伏热在内，发之于外。初则满面如水痘，脚微红而不壮，出没无定，次至颈项，赤如丹砂，名为露丹，以三解散疏散之。

入　方

小麦汤　治小儿水痘。

白滑石　地骨皮　生甘草各五分　官拣参　川大黄　净知母　川羌活各四分　葶苈子五分

小麦一十四粒引，水煎，热服。

三解散　治露丹。

官拣参　北防风　明天麻　川郁金　节白附　锦庄黄　枯黄芩　直僵蚕　北全蝎　陈枳壳　南薄荷　京赤芍　小甘草随宜加减

灯芯十茎，水煎，热服。

破伤风证

小儿或因跌仆，或刀斧破伤，风邪暗袭，伤处发肿，谓之破伤风，速宜治之，不然则发痉矣。内服疏风活血散，外以紫金锭涂之。

疏风活血散　治小儿破伤风，已痉未痉者皆治。

全当归　怀生地　赤芍药　北防风以上各一钱二分　鲜红花　大川芎　广苏木　炙甘草以上各六分

生姜三片，大枣一枚，水煎，热服。

紫金锭

山慈菇三两　五倍子三两　芽大戟一两五钱　明雄黄　镜辰砂各一两　真麝香三钱

共为细末，糯米饮和药为锭，磨水涂之。

瘾疹瘾疹证治

小儿瘾与疹，宜分证候阴阳，其燥肿于外者，属少阳相火，谓之瘾。其证发于面部，或背部、或四肢，极其稠密，色如锦纹，红赤者胃热也，紫黑者胃烂也。宜消瘾青黛饮。

其红点发于皮肤之内不出者，属少阴君火，谓之疹。其证发于胸腹手足，稀而少者，此由无根失守之火，聚于胸中，上蒸于肺，隐于皮肤而成小疹，其状如蚊迹、蚤斑而非锦纹也。理中汤。

瘾疹自吐泻者，慎勿止之，因其毒气从上下出，宜调中气。若吐泻后遍身发热，瘾如锦纹者，恐防热气乘虚入胃，其夏月多有此证，化瘾汤 。

瘾疹多属于脾，以其隐隐在皮肤之间，发而多痒，或不红者，俗人名为风丹。加味羌活散。

又　方

消斑青黛饮　治阳毒发斑。

正雅连　熟石膏　净知母　北柴胡　黑栀仁　润玄参　绿升麻　怀生地　片黄芩以上俱各一钱　官拣参　洋青黛　炙甘草各五分

生姜三片，豆豉二十一粒，水煎，热服。

化斑汤　即人参白虎汤，治阳明胃热发斑。

官拣参一钱　熟石膏四钱　净知母二钱　炙甘草一钱　淡竹叶一钱

粳米一撮，水煎，热服。

加味羌活散　治瘾疹作痒，世俗谓发风丹者是也。

川羌活　信前胡　芽桔梗　苏薄荷　陈枳壳　明天麻　香白芷　正川芎　净蝉蜕以上俱各一钱　官拣参　炙甘草各五分

生姜三片，水煎，热服。

搽药方　芸苔菜捣烂取汁，生铁锈、生大黄等分研末，以芸苔汁调涂之。

诸疮证治

经曰：诸痛痒疮疡，皆属心火。世间疮疡疖疥，惟小儿最多，岂其稚阳纯气，易与岁运火政相乘耶？抑不识不知，而寒温动定之乘其道耶？复有父母之遗毒，为儿终身之害者，可不有以治之乎？

小儿初生，遍身虫疥，与乎流水风疮，一皆胎毒也，切勿外治，宜内服胡麻丸。倘误用搽洗，逼毒入腹，以致腹胀，危候也，急服解毒汤为佳。

凡头面遍体有疮，原未搽洗面疮忽自平，更加痰喘气急者，切不可下，宜连翘丸解托之。

小儿未过周岁，无论一切疮疥，皆不宜搽洗，总以胡麻丸为主治，至稳。

小儿生痈毒肿疖，皆气血凝而火热乘之，内服大补汤，外以紫金锭涂之。颈上结核肿胀发热者，内服胡麻丸，外以五倍子为末，醋水调敷，一日二易为妙。

入　方

胡麻丸　治小儿风疮疥癣。

嫩苦参五钱　何首乌蒸　胡麻仁炒　蔓荆子炒　蒺灵仙炒　荆芥穗焙　皂角刺炒，以上各三钱　石菖蒲炒　白菊花各二钱

上为细末，酒打米糊丸。每一二钱，量儿大小，竹叶煎汤调下。

解毒汤　治小儿疮疥，误用搽洗，逼毒入腹，以此托之。

润元参　净连翘　绿升麻　片黄芩　京赤芍　全当归　川羌活　北防风　怀生地　荆芥穗　淮木通以上各一钱　炙甘草五分

灯芯十茎，水煎，热服。大便秘，加酒大黄。

连翘丸　治小儿疮疥，毒陷入里，以此托之。

净连翘　桑白皮　白头翁　粉丹皮　北防风　川黄柏　青化桂　淡豆豉　海螵蛸　软秦艽　川独活以上各三钱

上为细末，炼蜜为丸龙眼核大。每一丸，灯芯汤下。

大补汤　治小儿或生痈疽，出脓之后，或顽疮破烂，久不收口。凡一切痈疡，皆属不足，切不可再用寒凉。

官拣参一钱　嫩黄芪　正川芎　净连翘　香白芷　白云苓　大归身　漂白术　怀生地　赤芍药　炙甘草以上俱各二分

生姜三片，大枣三枚，水煎，半饥服，每日一剂。

瘰疬证治

小儿瘰疬，由肝胆二经风热血燥而成，盖二经常多气少血，倘怒则肝火动而血热，肾阴虚则不生木而血燥，燥则筋病，累累然结若贯珠。其候多生于耳之前后，连及颐项，下至缺盆及胸腋之侧，又谓之马刀。初起如豆粒，渐如梅李，或一粒或数粒，按之则动而微痛，不甚热，久之则日益以甚，或颈项强痛，或午后微热，或夜间口干，饮食少思，四肢倦怠，或坚而不溃，或溃而不合，皆由气血不足，往往变成瘖瘘。此证本非外科，切忌刀针烂药取去其核。昧者不识病源，误用烂药取核，不知肝胆二经内有相火，抑郁不伸而生瘰疬，为之益气养荣，舒筋散郁，犹恐不暇，何敢用刀针烂药，以致破烂不收，脓血交并耶？予目击其误治致死者，不可胜纪。凡小儿患疬，不可妄治，只宜内服单方，切忌取核，慎之戒之！

凡小儿颈项结核，或三五粒、十数粒，或痛或不痛，或热或不热，用墙根下凤尾草梗如铁线而黑，叶似凤尾，本草内名石长生，即墙缝中所生小蕨其也，单取其根，水洗净，每用一两，以糯米浓酒一碗，瓦瓶浓煎，去渣服酒，每日一服，勿求速效，多则一月，少则二十日，其核全消，再不复发。此药气味平淡，更不苦寒，实为神授，药贱而功弘，诚仙方也。

凡小儿耳之前后，忽有疮作核如杏核，大小不一，名马刀疮，为瘰疬之根。用桃树白皮，切三指大一块，刮去外皮，留内一层，贴疮上，以艾炷于桃皮上灸之，觉热痛即止，毋令伤皮。明日又灸，不数次而核消矣。

治小儿瘰疬未溃者，令内消，已破者能收口，服此一月痊愈。用直僵蚕半斤，先用清水洗三次，去石灰净，晒干炒枯，另将晚米半斤炒熟，共研细末，米糊为丸，重一钱一颗。每日空心时，以夏枯草煎汤，儿大者二丸，小者一丸，研烂调服，常须以甘肥荤润之物滋泽之。

入　方

紫霞膏　治瘰疬初起，未成者贴之自消，已成者贴之自溃，已溃核存者贴之自脱。并治诸色顽疮，破烂不愈，疼痛不已者，俱皆神效。

用明净松香一斤，研末，鲜色铜绿二两，

研末，以真麻油四两，入锅内先煎数沸，滴水中不散，方下松香熬化．次下铜绿，煎至白烟将尽，其膏已成，退火，倾入磁罐收之。凡用时于热汤内炖熔，旋摊旋贴。

集成白玉丹　专治瘰疬破烂，多年不愈，连及胸腋。

《老子》曰：下士闻道，大笑之。不笑，不足以为道。此则世人闻方，大笑之，不笑，不足以为方。药则至贱不堪，功则神丹莫并。专治瘰疬破烂，连及胸腋，臭秽难闻，三五载、十数载不愈者，药到病起。

用新出窑矿石灰一块，滴水化开成粉，用生桐油调匀，干湿得中，先以花椒、葱煎汤，洗净其疮，以此涂之，不数日痊愈。真奇事也。

昔予道门一友，患瘰疬烂及胸腋，十数载不愈。一愚人传此方，用之立应，后以治人，无不愈者，诚仙方也。

杨梅疮证治

夫梅疮一证，以其肿突红烂，状如杨梅，故尔名之。西北人名天泡疮，东南则名棉花疮。盖小儿患此者，实由于父母贻毒传染而致也，然非寻常胎毒之可比。盖青楼艳质、柳巷妖姬，每多患此，而少年意兴，误堕术中。由泄精之后，毒气从精道乘虚直透命门，以灌冲脉，所以外而皮毛，内著筋骨，凡冲脉所到之处，无不受毒，此其为毒最深最恶。设初起之时，治不如法，去毒未净，而随至败坏殒生者，有之矣；或遗毒儿女，以致生而不育者，有之矣。世人见此恶道，而不寒心知避者，愚亦甚矣！

小儿亦有不因遗毒而成。盖因偶伤湿热，即或患此，亦不过在皮肤肌肉之间而已。治之者，能知清热解毒除湿，自必痊愈，无足虑也。

附　案

予高友少年不慎，尝发梅疮，治不如法，以致毒气内伏，外虽愈而内成结毒。每夏月则手心多现紫疹，如鹅掌风样。及其生子，皆于月内二十七日必发此毒。初从阴囊之下，红癍数点，似火丹之状；不数日，则延及遍体，皮肉溃烂，形类火烧，昼夜啼号，诸药莫救；延至半月，则精神竭脱而死。连生三子，有如一辙，友悔恨无及，力恳于予。予虽感其诚敬，而实不得其法，因静思熟计，恍然有得。盖此毒从泄精后，乘虚透入命门，直灌冲脉，已为负隅之虎矣，而且盘踞多年，根深蒂固，何可动摇！倘剿捕不得其法，反致蹂躏疆场，损我民物。古人云：多算胜，少算不胜。苟非攻坚破垒，捣巢覆穴，不足以绝其根株。因自制一方，名窜毒丸。以鲮鲤甲头尾、胸脊以及四足，各用鳞甲数片，取其穿山透穴，率领诸药，直趋毒巢，则内而脏腑，外而经络，凡冲脉所行之地，无处不到，以之为君；用刺猬皮仍以上法，各取其刺，虽搜毒之功不如鲮鲤，而以毒攻毒，力则过之，故以为臣；用蝉蜕、蛇蜕，虽为解毒清热之需，实所以取其蜕脱之义，以之为佐；以芩、连、栀、柏清其雷龙之火，用皂刺、土茯、槐花领毒外出，不使久留精窍，以之为使；复略加入参护其胃气，使之宣行药力，庶无溃乱壅遏之虞，以为四路救应。制而服之，诚所谓得心应手，针芥相投，药未尽而毒出。忽于左脚膝发一恶疮，皮肉紫黑，痛苦异常，号呼床第，一月方痊。嗣是手掌如故，所生子女，不特不发梅疮，而并毫无疥癣。可见病有万殊，理无二致。予素未谙外科，而能拔兹社鼠城狐之毒，恃此理也；倘无其理，而欲邀天之幸，吾未能信。

小儿梅疮，最为恶候，倘发于一二月间，或半岁之内，最难救治。以其毒禀先天，来路既远，方药难及，即日服数匙之药，杯水车薪，终难有济。昧者但以搽洗之法治之，适

足以阻其出路，反致内攻不救。只当缓以图之，庶能保全。先以胡麻丸修制精细，每日服之，三七之后，内毒将尽，方用点药，不三日而疮尽愈矣。此法至神至捷，第不可用之太早，恐内毒未尽也。

入　方

梅疮点药

杏仁一两，热汤泡去皮，以绵纸包之，木捶缓缓捶去油，此物极难得干，必数十换纸，方得油净，以成白粉为度，谓之杏霜。每杏霜一钱，加入真轻粉八分、明雄一分，共研匀，先以槐花煎浓汤，将疮洗净，疮湿则以药干搽之，疮干则 以公猪胆汁调涂。三日痊愈，百发百中。此方不特治小儿梅疮，凡外科下疳疮、蜡烛疮，药到病除，久经效验。

疮疥杂方

凡半周一岁乳子，偶患疮疡，最忌外治。必先服解毒之药数剂，然后稍用外治，无不愈者；倘不先解毒而妄用搽敷，必致逼毒入内，反为大害，慎之！

治疥神方，大风子肉三钱，轻粉、明矾各五分，共为末，听用。生以腊猪油二两，入麻黄五钱，同入锅内熬之，以麻黄色黑为度，滤去渣，退火冷定，调前末搽之。

治癞痢白秃头疮方，用鸡蛋十个，去壳搅匀，入小锅，香油荡成一饼，乘热盖儿头上，一时许，蛋冷取下，又将上面用油煎热，再覆头上。数次愈，妙不可言。

黄水头疮，即肥疮也。其疮黄水流下即沿生，渐至眉耳，不治则杀人。用黄连五钱、轻粉三钱，共为细末，麻油调成膏，涂粗碗内，须干湿得中，将碗覆转，下烧艾烟熏之，缓缓烧烟，熏至黑色为度，放地上出火毒，次加冰片三分，研匀，香油调涂数次，即愈。

一切无名肿毒，诸般火丹，热瘰湿疮，取阴地蚯蚓粪四两、皮硝二两，共研末，新汲井水浓调，厚敷患处，干则易之。

治热毒疮疥，用生石膏、生硫黄、陈细茶各二钱，共为末，以生猪油和药，捣匀搽之。小儿诸般疳疮，生于面上遍身，烂成孔臼，俨如大人梅疮。于蒸饭时，甑蓬四连滴下气水，以碗盛取，扫疮上，数日即愈。百方不效者，此法如神。

治小儿热疮，用鸡蛋五枚煮熟去白，专取蛋黄，再以乱发一团，如鸡子大，同入锅内，以炭火熬之，初甚干，次则发焦，乃有液出，久熬则液渐多，而黄发尽化而成液，以黄发尽为度，取起冷定，取涂疮上，即以苦参末渗之。此神方也。

神治小儿头上软疖，此疖愈而复发，至难除根，用枳壳一个，刳去穰，磨令口平，以面糊涂抹枳壳四围，安贴子疖上，子一边安一灯芯，以通脓水，则脓自出，愈后枳壳自脱，更无痕迹。枳壳，即臭橘子是也，鲜者更妙。树名铁篱笆，多刺而硬，人家园圃多植之，以御宵入者。此方不独治软疖，凡久年顽疮、臁疮不能收口，依法用之，无不愈者。

汤火简便方

凡汤火伤初起，即以食盐研末，用米醋调匀敷患处，频涂不绝，暂时虽痛，却能护内不坏，然后用药敷贴。切不可用冷物塌、冷水洗，并凉药敷贴。予每见以冷水冲击者，使热气不得出，必致内攻而不救，慎之！

凡汤火伤，闷乱不省人事，急以蜂蜜调汤灌之。若至重者，急以煮过好熟酒数十壶，入浴盆内，以患儿浸酒中，虽至重者不死。

女儿火烧手，且骇骇至掌，即以酸醋升余浸之。出醋尚痛，少时痛止，不疮不脓不疤痕。奇方也。

治汤火伤，久经效验者，凡汤火伤烂，皮已脱去，惟有鲜肉，或臭烂不堪，诸药不治者，用猪毛一篮，以破锅炭火煅红，入猪毛在内煅之，少时猪毛消化而成黑液，取起冷定，略加大黄数钱，共研细末，再加冰片一分，研匀，香油、茶油、蜡烛油，俱可调搽。

至神至灵之方也。

凡遭火药烧坏者，先以好酒洗净，次用鸡蛋黄熬油，听用，以大黄研末，鸡蛋油调搽即愈。

幼幼集成　卷五

清　罗浮　陈复正飞霞辑订
鄞县　曹赤电炳章圈校

万氏痘麻

天　元　赋

痘本胎毒，俗名天疮。传染由于外感，轻重过于内伤。初起太阳，壬水克乎丙火；次归阳明，血水化为脓浆。所喜者红活鲜润，可畏者黑陷焦黄。势若燃眉，变如反掌。皮肤臭烂，血气虚尪。若救焚兮，徙薪何如焦额；似拯溺兮，落井不及宽裘。原乎一元肇化，二索成祥。欲火动而妄作，胎毒炽而流殃。啼声骤发，机毒深藏。命门养火，胞户收焫。待四时之疫疠，动五脏之皮囊。荣气逆于腠理，恶血发于膀胱。二火相煽，四大成疮。毒之轻者发则微，贵乎调养；毒之重者发则密，急于提防。至于运气推迁，在于胜复升降，时令乖异，无非寒热温凉。苟阴阳之逆理，为气候之反常。五行郁而灾见，九曜窒而变彰。疠气流行，无论郡邑乡党；恶毒传染，岂分黎庶侯王。此则不形于诊，贵在能制其亢。先事解散兮，十全八九；临时区处兮，耻寻常。

大抵气运先岁，痘疹属阳。春夏为顺兮，乐其生长；秋冬为逆兮，恶其收藏。暴寒兮，恐邪毒之郁遏；暴热兮，虑腠理之开张。脓疱春而莫疗，黑陷夏以为殃。秋斑实恶，冬疹非祥。此逆四时之令，休夸三世之方。且如证候殊形，脏腑异状。肝主泪而水泡，肺主涕而脓浆。心斑红艳，脾疹赤黄。惟肾经之无证，惟变黑而可妨。所以观乎外候，因而辨其内脏。呵欠顿闷兮，肝木之因；咳嗽喷嚏兮，肺金之相。手足冷而昏睡兮，脾土困于中央；面目赤而惊悸兮，心火炎于膈上。耳骫属肾，温暖如常。二处烁热兮，下极火炎而必毙；四肢厥冷兮，中州土败而倾亡。

先分部位，次察灾祥。阳明布于面中，太阳行于头上。心肺居胸膈之要，肝胆主胁腋之旁。手足司于脾胃，腰背统于膀胱，泄泻者邪甚于下，呕吐者邪甚于上。气逆而腹痛隐隐，毒深而腰痛皇皇。心热甚而搐搦，胃邪实而颠狂。鼻燥咽干，肺受火邪而渡竭；屎硬溺涩，肾由火旺而精亡。气弱减餐者，不任其毒；神强能食者，不失其常。

欲决重轻，但观发热；如占顺逆，须认其疮。毒甚兮身如炎火，热微兮体或清凉。若寒热之来往，定征兆之佳祥。数番施出兮，春回阳谷；一齐涌出兮，火烈昆岗。蚊迹蚤斑，刻期而为鬼录；蛇皮蚕壳，引日而返泉乡。不喜珠红，更嫌灰白；最宜苍蜡，切忌紫黄。常要明润兮，恐薄嫩之易破；不宜干枯兮，防搔痒之难当。恶候如此，上工审祥。而颊稀而磊落，清安可保；胸膈密而边串，凶吉难量。顶要尖圆，不宜平陷；浆宜饱满，切忌虚空。兼之颜色喜老而恶嫩，皮肤爱糙而怕光。焰起根窠，终防痒塌；丹浮皮肉，必致夭殇。头面预肿兮，三阳亢甚；手足厥冷兮，五脏摧伤。疮堆喉舌，毒缠颈项。咽喉痛而呼吸则难，饮食少而吞吐则呛。此天命之安排，岂人力之可仗。

烦躁闷乱兮，七神离散；谵语眩冒兮，五毒猖狂，鼓项战栗兮肺败，咬牙口噤兮肾伤。渴不住兮焦膈，泻不止兮滑肠。失声兮咽烂，

吼气兮腹胀。昼夜搔爬兮，将荣卫之外脱；乳食断绝兮，必胃气之受戕。肿忽消，毒归于里；色反黑，疔起于疮。

食谷则呛兮，在婴儿之命促；饮水则喷兮，较医工之短长。

轻重反复，调理乖张。轻变重而可畏，重变轻而莫慌，风寒素慎，饮食如常。出入禁乎男女，盖覆适其温凉。内无妄动，治不乖方。此则变轻之候，实为保命之良。若当犯乎禁忌，或误投乎丸汤。徒肆房室，不顺阴阳。外感不正之气，内伤不时之粮。平人且病，患者敢当？是以顺则逆而逆则险，宜乎轻变重而重则亡。

发自肺经，相连脾脏。气热味辛，燥金受克；形寒饮冷，华盖先伤。浩饮则水来侮土，而成泄痢；过食则脾不运化，而作痞胀。皮毛亏损，肌肉虚尪。起发迟而不胖壮，收靥缓而作脓疮。轻则延绵乎时日，重则泣送于效邙。奈愚夫之不晓，致生命之夭亡。不信医而祷诸神鬼，枉杀牲而号乎穹苍。

药贵中病，医不执方。喜行温补者，动称乎文山；专用凉泻者，祖述乎仲阳。贵其因人而治，相时而行。正气为先，戒开门延寇；解毒为急，休视虎如狼。首尾不可汗下，法之固执；缓急各有权宜，治之经常。拘其绳墨者，如守株之待兔；惑于方书者，似多岐而亡羊。

且如红燉紫肿兮，凉血为上；灰白平陷兮，补气最良。出不快兮，责表实而发散可用；便或秘兮，责里实而疏利何妨。毒不能速解，毒甚者令微汗之散越；热不可尽除，热剧者使小便之清长。三阴多寒兮，必投辛热；三阳多热兮，无过苦凉。安可恶寒而喜热？莫知贵阴而贱阳。

是故补气者参芪白术，养血者归芍地黄。发散表邪，轻葛根而重官桂；疏通里实，微枳壳而甚大黄。解毒兮芩连栀子，快斑兮荆防牛蒡。连翘药内之要领，甘草方中之君相。咽痛求诸甘桔，头肿取乎羌防。木通利其小水，人屎攻其黑疮。气逆兮青皮陈皮，胃寒兮丁香木香。泄泻无如苓术，呕吐莫若生姜。麦冬干葛而止渴，厚朴腹皮而消胀。望月砂退翳有准，穿山甲折毒无双。枳实麦芽山楂子，消宿食而克化，大黄干葛地骨皮，解余热以清凉。咳嗽以枳桔又用杏仁，痢疾以黄连再同木香。苦参主乎热毒，溺白治其疳疮。用之合宜，工可称良。

其诸药物，各有主张。春夏桂枝而少服，秋冬芩连而莫尝。疮若干枯，白术非其质贵；色如红艳，黄芪岂可入方。里虚少食者，勿投枳实；表虚多毒者，休使生姜。汗自出兮，用干葛重虚其表；溺本数兮，加木通再损其阳。泄泻酸臭兮，诃蔻不宜轻用；呕吐清冷兮，连栀安得作汤。凡用芩连必资炒制，如加丁桂须假寒凉。应制伏而不诛无过，保和平而万寿无疆。

大势若平，余邪须讲。热毒流肝兮，双睛生翳；火邪入脾兮，四肢成疡。口内生疮兮，烂龈破舌；腹中作痢兮，腐胃败肠。皮肤嫩而洗浴太早，因以添热；脏腑虚而甘肥太过，遂致内伤。若中风寒，凝痰作嗽；灰白顶陷，灌蚀归疮。

嗟夫！惟此证候，其苦非常。外缠皮肉，内连腑脏。改换形容，如蛇蜕皮龙换骨；淋漓脓血，若蚓在灰蟮在汤。轩岐置而未言，秦汉弃而无方。古无此证，或云起于建武；今有是疾，相传得于南阳。拘于日数者，不知轻重之责；执其偏见者，枉增虚实之防。本温再热，已寒又凉。徒自胶而必固，反致恶而见殃。透骨髓之真诠，非其人而不授；宣肺腑之秘奥，牢记诵而莫忘。

痘疹西江月 凡四十九首

痘疹毒从何起？母胎火毒流传。生来秽物下喉咽，藏在命门里面。一旦天行时气，感令相火熬煎。毒从骨髓见皮间，彼此一般传染。

五脏各有形证，认时须要分明。往来寒

热睡脾经，呵欠顿闷肝证。咳嗽喷嚏受肺，面红惊悸属心。惟肾清静忌邪侵，手足耳尻俱冷。

五脏各有一证，其间治法难同。肝为水肺泡为脓，大小疮形异种。脾证发为疹子，心经现作斑红。肾为黑陷病多凶，纵有灵丹何用！

痘疹要知顺逆，天时人事相随。大端阳火是根基，若遇阴寒不喜。春夏发而多吉，秋冬逆以何疑。如逢稠密必凶危，稀少方为平易。

治法面今不定，清凉温补分明。各持一见论纷纭，自曰予为神圣。解毒喜行凉泻，补中爱使辛温。不明时令与元神，枉自捕风捉影。

假令天时暄热，辛温助为灾殃，严凝凉解雪加霜，病者如何抵挡？壮实再行温补，虚尪又使寒凉。虚虚实实伐元阳，无异隔靴爬痒。

看取时行疫疠，天时热气炎炎。精神肥健食能兼，解毒清凉甚便。若是风寒太甚，虚羸吐泻连绵。此宜温补法为先，又在医人活变。

痘疹要知轻重，吉凶顺逆精通。毒轻疮少顺家风，汤药不宜妄用。疮密毒重为逆，皮肤寸寸成脓。此般形证例多凶，仔细扶持休纵。

轻者三四次出，头面胸背稀疏。小便清利大便稠，饮食如常充足。重者遍身齐出，状如麻子麦麸。咽疼泄泻闷悠悠，饮食不思可恶。

多有先轻后重，只因触冒风寒。房劳不避秽腥干，食饮偏于冷暖。闲杂人带秽厌，诸般禽兽盘桓。庸工术浅误汤丸，反使痘疮变换。

重者变轻何以？常常和暖衣衾。房中谨密少入行，饮食随时添进。未见误投汤药，不曾妄啖酸腥。此为人事夺天灵，安可归于有命！

要识痘疮死证，无过五证分明。紫黑喘渴闷何宁，痒塌咬牙寒噤。灰白顶陷腹胀，皮嫩易破成坑。泄泻气促见鬼神，声哑头面足冷。

既识五般死证，其间吉病如何？疮头饱满作脓窠，任是推磨不破。四畔根盘红活，安眠静卧平和。光壮收靥不蹉跎，管取疥疾勿药。

黑陷干枯肾败，咬牙寒战肝伤。失声喘气肺摧创，泄泻脾虚腹胀。痒塌闷乱心死，狂言见鬼神亡。皮嫩易破气无阳，便血阴崩模样。

首尾不可汗下，汗时腠理开张。风寒易入透斑疮，收靥不齐火旺。误下必犯脾胃，无事自取内伤。泄泻黑陷致倾亡，枉使魂灵飘荡。

大抵痘疮未出，先须升葛参苏。如斯不出汗忙疏，红点见时药住。大便若还秘结，轻轻四顺相符。假饶自利伐无辜，定与阎罗掌簿。

调痘无过二法，补中解毒兼行 。补中参术草芪苓，枳实山楂有应。解毒芩连栀柏，连翘枳实防荆。芎归养血妙如神，加减消详前定。

血气要分虚实，但于疮色推求。紫肿红燃血实由，四物内加解毒。灰白中陷气弱，四君子是良谟。略加解毒药相符，补气实脾无误。

但是痘疮初出，如逢热盛昏醒。解毒发散药先行，莫待临渴掘井。桔梗升麻干葛，连翘甘草黄芩。牛蒡栀子木通荆，蝉蜕防风作引。

若是如常潮热，只消干葛升麻。芩连甘草赤芍加，牛蒡连翘无价。或用参苏饮子，青皮木香内加。煎来一服胜灵砂，痘见表疏才罢。

初热多生搐搦，急将导赤疏通。木通甘草与防风，生地黄连同用。再加辰砂调服，须臾救护朦胧。此方端的有神功，管取行之必

中。

壮热不曾出现，大便秘结难通。颠狂唇裂眼珠红，此证凶险堪恸。急与芩连栀柏，大黄酒炒疏中。连翘牛蒡与木通，贯众射干俱用。

自此出而稠密，认他虚实调医。虚家泄泻色如灰，大补十全堪取。若是肿燃红绽，芩连栀柏芎归。翘蒡升葛枯甘奇，此个真机妙秘。

灰白不能起发，又加泄泻频频。温中妙药不宜停，急急扶危济困。当归黄芩芍药，甘草干姜人参。木香栀子及青陈，官桂丁香灵应。

毒甚常生咽痛，可怜饮食难尝。射干甘桔最相当，连翘升麻牛蒡。若是痘堆颈项，此名锁膈凄惶。一朝破烂命将亡，变作喑哑水疮。

起发状如蚕壳，干枯不见水浆。此名血竭毒归藏，不治必然命丧。当归地黄养血，参芪甘草温良。连翘牛蒡与木香，桔梗青皮发旺。

起发常将捻视，切防黑陷来攻。若然黑陷现其中，药点许多妙用。豌豆七粒烧过，乱发火煅和同。珍珠水浸胭脂红，针破搽之自肿。

药点反加黑陷，丧门吊客匆匆。百祥牛李与宣风，总是脱空卖弄。不如人猫鸡犬，四般举煅和同。木香汤引妙无穷，妙法半文不用。

起发初生搔痒，比于痒塌争差。伤寒身痒表留邪，痘亦同兹休讶。治用疏风凉血，荆防翘蒡芎麻。地黄归葛效堪夸，竹叶木通无价。

大抵痘宜胀痛，最嫌虚痒相干。只因饮食湿邪攒，心火克而闷乱。外宜茵陈艾炬，内宜参术汤丸。若还止痒证方安，抓破面皮凶断。

何为正面怕痒？面含五脏精华。假如破损实堪嗟，气散魄飞魂罢。尤忌先伤正额，心经火带虚邪。几番试验不争差，寄语明人体察。

相火位居正额，出现胖壮休先。果然额上痘蝉联，大抵凶而不远。喜是两颐口鼻，始终都在其间，任教稠密势缠绵，到底终无倾险。

起发成浆欲靥，忽然泄泻来攻。此时脾胃不宜空，变出百端可恸。多是内伤饮食，只求药有神功。若还消肿泄淋浓，父母北邙泣送。

先用人参白术，黄芪炙草煨姜。茯苓山药及木香，大剂煎来温养。不效次求豆蔻，木香芡实良方。三番只有异功良，此实尽头酌量。

记取成浆欲靥，最防厌秽腥膻。大黄苍术共烧烟，可解一切秽厌。内服调元饮子，黄芪炙草人参。当归苍术酒芩连，犯着荆防即变。

到得成浆痘熟，依时都要成痂。若还腐烂臭腥加，此是表虚堪讶。急进参芪归术，荆防苍葛升麻。连翘牛蒡密蒙花，休得弄真成假。

若是痘疮熟烂，皮破脓血淋漓。内服归术与参芪，牛蒡连翘官桂。外用多年败草，晒干研细成灰。铺开床席任施为，最解火邪毒气。

痘熟不能收效，反行破烂成疮。一时焦痛甚难当，请问如何发放？但取甘草滑石，辰州豆粉清凉。蜜调涂上便安康，此法不留书上。

有等痘疮纯正，缘何日久难收？请君仔细问根由，不可临时差谬。或是曾伤冷水，或因秘结热留。两般治法各推求，不枉青囊异授。

果是曾伤冷水，湿伤脾胃皆虚。脾应肌肉主中区，无怪血脓流注。可用参芪苍白，青陈甘桔无拘。丁香官桂有方书，救里收表妙处。

如是大便秘结，三朝一七未通。此为热

气内蒸烘，因此毒难开纵。内服归黄麻子，大黄略入相攻。再行胆导妙无穷，管取成痂去壅。

收后许多余证，医家须要分明。毒留肝脏目生疔，翳障瞳人隐隐。毒入肺脾痈肿，责归手足阳明。内伤外感要调停，免致多生怪病。

两目忽然肿痛，痘家毒入肝经。轻为浮翳掩瞳睛，重则终身废病。去翳菊花蝉蜕，蒙花蔗蔍谷精。各为细末共和匀，汤煮猪肝作引。

痈毒发于肢节，常常脓血不干，不知调理早求安，废疾终身为患。内服千金托里，外涂太乙金丹，排脓长肉未为难，任是千金不换。

痘后不宜澡浴，痘疱皮嫩易伤。不知禁忌受寒凉，遍体热生痛僵。此因伤寒劳复，不宜官桂麻黄。只须九味羌活汤，次以补中调养。

痘后或伤饮食，致令腹痛非轻。不宜转下损脾经，消导方为对证。白术人参枳实，黄芩大麦青陈。山楂白茯与砂仁，积化痛疼俱定。

痘烂不齐收靥，正面灌痛流脓。急防两目毒来攻，解毒清凉好用。酒炒芩连栀柏，连翘蝉蜕木通。升麻牛蒡苦参同，细研酒丸酒送。

大凡痘疮一证，名为百岁圣疮。如龙蜕骨换心肠，又似蝉蜕壳样。出现光壮收靥，落痂颜色相当。饮食寒暑顺阴阳，自此精神长旺。

痘有顺险逆并五善七恶之症

顺证：气血冲和，痘毒宣畅，精神素健，饮食如常，不必施治；

险证：气血不舒，痘毒壅遏，或杂证搅扰，开落失期，速宜施治；

逆证：痘毒凝结，气血干枯，怪证丛生，病不对药，治之无功；

五善：一、饮食如常，二、大小便调，三、疮色红活，皮厚坚实，四、脉静身凉，手足温暖，五、声音清亮，动止安和。五者不能尽得，得一二亦自清吉；

七恶：一、烦躁闷乱，谵妄恍惚，二、呕吐泻利，饮食不能，三、黑陷焦枯，痒塌破烂，四、头面顶肿，鼻煽肩抬，目张唇裂，五、喉舌溃烂，食入即呕，饮水则呛，六、寒颤咬牙，声哑色黯，七、腹胀喘促，四肢厥冷。七者不必皆有，有一二亦自难为。

七恶之外，又有浑身血泡，心腹刺痛，伏陷不起，便溺皆血，寻衣撮空，是又卒死而不救者。

痘疹总略歌凡一十一首，共一十五方

痘虽火毒肇胚胎，不遇天行不见灾。郡邑若逢疵疠日，预施灵药解将来。

凡痘疹之证，皆由父母胎毒蓄于命门之中。命门者，下极丹田也，为人身生化之源。或遇冬温，阳气暴泄，人则感之，触动相火，至春夏生长之时即发，传染相似，是谓天行疫疠也。未出痘疹者，但觉冬温，宜先服解毒之药，如辰砂散、三豆汤、代天宣化丸之类，使毒气无倾伏留连之患；如脾胃素弱者，更宜调其胃气，间以四君子汤加陈皮、木香之属与之，使胃气和畅，荣卫流通，使痘易出易靥也。

予按：代天宣化，即韩氏之五瘟丹也。苦寒克削，损胃败脾，纵能解疫疠之毒，未必能预解先天之毒，即使能之，亦只可行于藜藿稟实之儿。倘膏粱禀怯，不察妄投，吾恐毒未解而胃先损，痘未至而中已寒，预伐无辜，暗伤真气，及出痘时，反不能救，夭枉相仍，咎将谁诿！盖藜藿稟实而毒轻，无俟于解；膏粱禀薄而毒重，势不能解。岂有先天之毒，深藏潜伏于命门之中，毫未发觉，而敢用此沉阴沍寒之品，预伐其生机，诚为危道，必不可行，即欲解之，又不若三豆汤之为得也。

欲知痘疹吉凶机，察色观形在细微。年寿山根犹紧要，鲜明可喜黯青非。

痘疹未出之先，欲知吉凶轻重，但于面部推之，其色红黄明润者吉，青黑昏暗者凶。相书以山根管命宫，年寿管疾厄，所以二处犹为紧要也。

汗下虽然谓不宜，刻舟求剑岂通医？能分虚实知权变，可越乾坤造化维。

首尾不可汗下，诚痘科固执之言，然亦自其平证语之耳。若遇风寒外袭，应出不出，则汗剂仍不可少；如大便连日不通，烦闷狂躁，不与下之，宁不夭人生命，是下剂之在所必用。但能消息虚实，与时权变，斯可谓之通医。

始终便溺自调嘉，便若艰难事可嗟。腹胀喘呼多壅遏，急行疏导免留邪。

此言可利则利者也。大抵豆疮始终小便清利，而大便滋润者为顺。若小便或秘，急宜利其小便，宜八正散；若大便秘结，速用通幽汤滋润之。

痘家脉证喜中和，徐疾由来不可过。弦急浮洪为实候，微迟短涩属虚多。

夫人以胃气为主，脉亦当以胃气为主。脉有胃气，则气象中和，所谓弦不弦，石不石者是也。太过为实，不及为虚，最宜消息。

痘疹伤寒证一般，上工临证贵详端。休将汗下轻相试，解表和中病自安。

痘疹发热与伤寒相似，但伤寒只见一经形证，若痘疹则五脏之证皆见。如呵欠顿闷，肝证也；乍冷乍热，手足梢冷，好睡，脾证也；面燥腮赤，咳嗽喷嚏，肺证也；惊悸不宁，心证也；尻凉耳凉，肾之平证也。若尻耳俱热，则邪伏肾经也。

痘疹虽然本属阳，往来微热始相当。倘逢昼夜身如火，解毒须教小便长。

凡痘疹属阳，非热不成，故治痘不可尽除其热；如热太甚，毒未发尽，只宜解毒兼利小便，宜连翘升麻葛根汤。

食饮能多胃气充，自然荣卫两丰隆。休言食少无他虑，但恐脾虚毒内攻。

痘疹始终能食者，其人脾胃素强，自然气血充实，易壮易靥。若一旦食减，即宜询问。或咽喉肿痛，宜甘桔汤；伤食者橘皮汤；若非以上二证，因脾胃气弱，不能消食者，宜参苓白术散运用之。

最宜安静号和平，表里无邪心自清。忽尔躁烦宜审谛，更防神爽欠分明。

痘疮以安静为贵，此表里无邪，不必服药。但有烦躁，必毒气壅并，表里不宁，宜审谛之。如搔爬不宁，疮痒也；心神不宁，里热也；呻吟不止，疮痛也。非折肱之手，莫能识其病情。以上治疗见后。

四时分治证须真，暑湿风寒各有因。异气莫教经触犯，灾危反复立缠身。

大凡治病之道，春夏养阳，秋冬养阴。故春病治在肝，夏病治在心，秋病治在肺，冬病治在肾，不可逆也。治痘之人，切须识此。如天有烈风暴雨，酷暑严寒，常要谨其帷幕，适其寒温，寒则盖覆欲厚，热则居处欲清。苟伤热则血气淖泽，疮易腐烂；偏寒则血气凝滞，疮难起发。若有触犯，轻则变重，卒生异证，是谓灾怪。如暴风连日，病见伤风之证，治以桂枝葛根汤；如寒威凛烈，病见伤寒之证，治以正气散；若酷暑熏蒸，病见热证，治以人参白虎汤；倘值久雨浸淫，有受湿之证，泄泻身重，治以胃苓汤。

治痘皆言在补脾，补中有害少人知。虚虚实实休轻放，审证施方贵合宜。

凡痘疮始终以脾胃为本，若饮食如常，六腑充实，不须服药，若补其脾，反增烦躁，为害非轻；倘不能食，常多泄泻，此气虚也。宜四君子汤助之可也。

入　方

辰砂散　预解时行痘毒。

镜面砂一钱，研末，水飞　干丝瓜近蒂三寸，连皮，带子，烧灰存性

上研末，蜜水调，分三次服。

三豆汤　预解痘毒，不损元气。

红饭豆一升　黑大豆一升　鲜绿豆一升　生甘草三两

上以三豆淘净，甘草切碎，入雪水八升，若无雪水以长流水代之，同煮豆熟为度，去甘草，将豆晒干，又入原汤内，再浸再晒，汁尽为度。逐日取豆与儿食之，最解痘毒。

代天宣化丸　即五瘟丹。预解时行疫疠，传染相似，并治痘毒。

人中黄属土，甲己之年为君　片黄芩属金，乙庚之年为君　川黄柏属水，丙辛之年为君　黑栀仁属木，丁壬之年为君　雅黄连属火，戊癸之年为君　鲜苦参佐　荆芥穗佐　北防风佐　净连翘佐　山豆根佐　牛蒡子佐　家苏叶佐

前五味，视年之所属者以为君，其余四味以为臣。为君者分两倍之，为臣者半之，为佐者如臣四分之三。冬至之日修合为末，取雪水煮升麻汤，加竹沥在内，煮神曲糊为丸，龙眼核大，用辰砂、明雄为衣。每服一丸，竹叶汤下。制入中黄法：取大甘草不拘多少，纳于新竹筒中，紧塞其口，放在粪缸中，浸七七日，取起，晒干听用。

八正散　治痘疹小便秘涩，宜清心火、利膀胱。

淮木通　白滑石　小甘草　净连翘　绿升麻　结猪苓　赤茯苓　陈瞿麦　淡竹叶以上各一钱

灯芯十茎，水煎，热服。

通幽汤　治痘疹大便秘结，宜润肠凉血降火。

紫草茸　当归尾　怀生地　火麻仁　陈枳壳　酒大黄　尖槟榔　鲜红花　桃仁泥俱等分

生姜一片为引，水煎，热服。

连翘升麻葛根汤　治痘毒不能尽发，宜升托之。

净连翘　绿升麻　粉干葛　京赤芍　芽桔梗　酒黄芩　黑栀仁　淮木通　麦门冬　牛蒡子　白滑石　炙甘草

淡竹叶七片，灯芯十茎为引，水煎，热服。

加味甘桔汤　治痘疹不能饮食，由咽喉作痛。

大甘草　芽桔梗君　牛蒡子　鲜射干　绿升麻　荆芥穗

灯芯十茎，水煎，热服。

橘皮汤　治痘疹不能饮食，由伤食所致。

广陈皮　杭青皮　陈枳壳　南木香　生甘草　山楂肉　白云苓

麦芽一撮为引，水煎，空心服。

参苓白术散　治痘疹脾胃虚弱，不思饮食。

官拣参　漂白术　白云苓　粉甘草　京楂肉　真广皮　芽桔梗　南木香

砂仁三粒为引，水煎，半饥服。

桂枝葛根汤　治痘疹初起，伤风咳嗽自汗。

嫩桂尖　京赤芍　粉干葛　北防风　炙甘草

生姜三片，大枣三枚，水煎，热服，略暖盖覆。

正气散　治痘疹初起，因伤于寒，作热无汗，头身痛，肢强。

漂苍术　广陈皮　川厚朴　南木香　净麻黄　柳杨桂　炙甘草

生姜三片，大枣一枚，水煎，温服。

人参白虎汤　治痘疹初起，夏月伤暑，大热烦躁作渴。

官拣参　净知母　熟石膏　陈香薷　大麦冬　藿香叶　白扁豆　淡竹叶　炙甘草

粳米一撮为引，水煎，热服。

胃苓汤　治痘疹初起，伤湿泄泻身重。

漂苍术　广陈皮　紫厚朴　漂白术　白云苓　结猪苓　宣泽泻　嫩桂枝　炙甘草

灯芯十茎，水煎，热服。

四君子汤　治痘疹脾虚食少，更多泄泻。

官拣参　漂白术　白云苓　炙甘草

生姜三片、大枣三枚引，水煎服。

四物汤　治痘疹能食，大便秘，疮红肿。
白当归　正川芎　杭白芍　怀生地
生姜一片引，水煎，热服。

发热证治歌凡一十五首，共二十五方

痘疮初起身先热，轻重吉凶何以别？热轻毒浅吉堪云，热重毒深凶可说。

凡发热乍进乍退与微热者，其痘必稀而轻，毒亦浅，不必服药；若蒸蒸作热，烦躁昏眩，其痘必密而重，毒亦深，宜发表解毒托里，加味葛根汤。

初逢热渴邪藏里，切忌冰瓜与冷水。生津止渴是良图，小渴任之而已矣。

凡发热作渴，因痘毒内蒸，销其津液，故令口干而渴。微者频以炒米汤与之，切不可以冷水、冻柿、柑梨、西瓜、菱角之类，食之反伤胃气，亦不可以椒姜汤饮之，恐生疮毒而有他变。渴甚不止，宜解毒葛根汤。

如痘已出齐，或起发，或收靥而渴不止者，宜人参麦冬散。

如泄泻不止而作渴者，此脾胃虚弱，津液枯也，宜七味白术散。

腹痛刚逢发热时，毒攻于里报君知。大肠秘结须攻下，莫待临危悔已迟。

书云：发热腹中痛，痘疮毒内攻，发多生不久，发少更防痈。可见痘疹腹痛，即是毒气内攻，便当托里化毒为上，不可逡巡以生他变。若饮食如常而腹痛者，宜化毒汤。如大便秘结，烦躁作渴而腹痛者，宜三黄解毒汤；若泄泻而腹痛者，宜建中托里汤。

发热腰疼毒伏留，几人逢此得优游。人参败毒真奇绝，痛减疮稀病可瘳。

凡痘疹发热腰痛，其证最恶，速用人参败毒散托之。服药痛止者吉，不止者凶。

初时发热多风搐，要识病源属肝木。木能胜土又归心，风火相争脾不足。

凡痘疮发热有作搐者，因木邪盛而侮土，以导赤散加辰砂服之即止。此痘甚好，以搐搦发散于四肢故也。

如痘应出不出，而搐搦不止，宜泻青导赤散解之；服药后搐止，但心烦啼叫，用麦冬导赤散清之。

若痘已收靥，余热不退而作搐，此大虚之候，多不可救。但父母不忍坐视，强而治之，当以宁神汤合抱龙丸，倍加人参服之。轻者可愈。

热时吐泻相兼作，上下毒伸无郁遏。三焦火盛热中求，日久须防脾胃弱。

凡痘疮发热，有呕吐者，有泄泻者，有吐泻兼作者，不可骤止，令毒上下得出。但痘疮现形，吐泻即止者，吉兆也。如久不止，先以理中汤和之；如仍不止，以豆蔻丸止之。服药后吐泻既止，更服调中汤，使脾气实，其痘易壮易靥也。

狂言躁扰疑逢鬼，神识昏迷热在里。镇心解毒以平期，谵妄不休应不起。

凡痘疮发热，妄有所见而谵语者，或昏昏好睡、梦中呓语喃喃，或狂走，寻衣摸床，皆毒气内攻，神识不清所致也。急用镇心解毒之药，以辰砂导赤散主之，服药神情复旧者吉，不止则凶，不可治也。

浑身发热四肢寒，脾胃虚衰阴冷干。益气补中应令暖，仍前疮盛急寻棺。

凡痘疮浑身宜热，独耳尻二处宜凉，所以痘疹之证，头宜凉，手足宜温。若反冷者，此脾胃虚弱也。四肢脾胃所司，宜补中益气，扶其中气斯可矣。

发热熏蒸血妄行，不知何道血如倾？但从鼻出方无忌，别道来时祸立萌。

人身之血不可妄动。痘疹之火，熏烁于内，迫血妄行，随火而动。或从口出，或从大小便出，皆死证也。但从鼻出者，或有可救之机，宜玄参解毒汤清之。若烦躁闷乱，出血不止，此阳痘出血之证，多不可治。

晨昏发热浑无歇，口舌生疮唇破裂。咽喉塞痛食难尝，方用黄连及甘桔。

凡痘未出而热不止，昼夜烦躁，口舌生疮，唇裂咽痛，此毒火熏蒸，其热甚急，治

不宜缓，急以黄连解毒汤合甘桔汤治之。服药不效者，不治。

微微热汗吉之机，腠理疏通毒发稀。但恐汗多阳气弱，调元固胃效无违。

凡痘疹发热自汗，此不必治。盖腠理疏通，毒气发越，无郁遏也。所以古人喻如庖人蒸笼之法，但欲其松耳。如恐汗出太多，卫气反弱，痘疮不能成就，用调元汤以止之。

恶热憎寒且战兢，表虚邪正两相凌。但将柴葛加官桂，升散余邪吉可称。

痘疹所忌者寒战。如发热之时，憎寒振振战动者，其人表气素虚，痘疹欲出不出，留连于肌腠之间，邪正交争。振战，火之象也，宜柴葛桂枝汤升散之。

发热绵绵不现形，其间凶吉费调停。解肌托里须斟酌，施治详明内外宁。

凡痘发热三日便出者，常期也。如过四五日犹不出，热势绵绵无休歇者，吉凶之兆未可卜也，急与解肌托里，分内外治之。疏者吉，密者凶。

如劳苦之人，皮肤粗厚，腠理闭塞，及风寒外感，疮为外邪所遏，不易出者，此外因也。宜麻黄解毒汤。

如因虚吐泻，毒气内陷而不出，及伤饮食，陈物菀莝肠胃之间，与毒合并，郁而不出者，此内因也。体虚者，以托里十补汤托之，体实者，以枳实导滞汤微利之。

发表之时少定方，古人专用葛根汤。能通权变知增减，何必劳劳问短长。

时师治痘，方其发热，但知用葛根汤，一见红点，便禁而不用，此乃不知权变者也。如痘见热除，表里无邪，所以不可再用葛根汤；若痘已见，热甚不退，此毒深于内。尚恐葛根汤，力小不足胜任，宁可止而不饮耶！

解毒升麻汤最良，红斑虽见饮何妨。时师胶柱无变通，一见红斑未敢尝。

凡痘发热，初用解毒之剂，详见各条之下，此不重赘，但附葛根汤加减之例于后，俾临证择用可也。

入　方

加味葛根汤　治痘初热，毒气深重，大热眩晕。

绿升麻　粉干葛　京赤芍　炙甘草　荆芥穗　北柴胡　牛蒡子　白桔梗　净连翘　淮木通　北防风

如大便结加紫草、红花，作渴加麦冬、花粉，腹痛加酒大黄，或秘结亦用酒大黄解之。

水一碗，淡竹叶七片为引。

解毒葛根汤　治痘疹初热，口渴不止。

粉干葛　天花粉　绿升麻　杭麦冬　怀生地　酒黄芩　粉甘草　茅根汁

水煎众药熟，以茅根汁对服。

人参麦冬散　治痘已出，或收或靥而渴不止。

官拣参　杭麦冬　粉干葛　漂白术　天花粉　酒黄芩　炙甘草

水煎，以竹沥、乳汁对服。

七味白术散　治痘因泄泻，津液不足而作渴者。

官拣参　白云苓　漂白术　南木香　藿香叶　炙甘草等分　粉干葛君

水煎，徐徐代茶饮。

化毒汤　治痘初起，饮食如常，别无他证而腹痛。

粉干葛　杭白芍　杭青皮　广木香　陈枳壳　京楂肉　净连翘　炙甘草

水煎，热服。

三黄解毒汤　治痘初起，烦躁作渴，大便秘结腹痛。

酒黄芩　酒黄连　紫草茸　鲜红花　小枳实　淮木通　小槟榔　酒大黄

水煎滚，热服。

建中托里汤　治痘初热，因泄泻而腹痛。

官拣参　炙甘草　绿升麻　粉干葛　白云苓　陈枳壳　芽桔梗　小川芎　北柴胡　川独活

水煎，姜引，加竹沥对服。或五苓散加

独活亦可。

导赤散　治痘初起，发热作搐。

大生地　淮木通，苏薄荷　北防风　炙甘草　镜辰砂另研

灯芯十茎引，水煎，以辰砂末调服。

泻青导赤散　治痘应出不出而作搐。

当归尾　淮木通　黑山栀　川羌活　北防风　小川芎　酒黄连　生甘草

淡竹叶七片，灯芯十茎引，以竹沥对服。

麦冬导赤散　治搐搦后，心烦啼叫不宁。

淮木通　杭麦冬　黑栀仁　生甘草

灯芯引，水煎服。

宁神汤　治痘后作搐，至危之候。

石菖蒲　白茯神　黑栀仁　川雅连　淮木通　官拣参　炙甘草

灯芯十茎为引，水煎，入竹沥、人参汤对服。

抱龙丸　合前宁神汤，治痘后搐搦。

胆南星四钱　天竺黄五分　真牛黄三分　明雄黄五分　镜辰砂二分

共为末，甘草煎浓汤煮面糊为丸。不用麝香，以痘疮忌麝故也。

理中汤　治痘已现形，而吐泻不止。

官拣参一钱　漂白术一钱　炙甘草一钱　绿升麻一钱

煨姜三片，大枣三枚，水煎服。

豆蔻丸　治痘出吐泻，服理中汤不止者。

南木香三钱　西砂仁二钱　石龙骨五钱　白枯矾七钱　肉豆蔻面包，煨，五钱　赤石脂煅过，七钱五分　诃子肉净肉，五钱

共为末，米糊丸如胡椒大。三岁儿十丸，四岁以下二十丸，陈米饮下。

调中汤　治吐泻既止，速调中气。

官拣参　炙黄芪　漂白术　杭白芍　南木香　广陈皮　炙甘草

大枣三枚为引，水煎服。如三焦火盛者，又当甘凉之剂解之，不在此例。

辰砂导赤散　治痘毒内攻，神识不清，或谵妄狂惑。

官拣参　正雅连　黑栀仁　漂白术　淮木通　大麦冬　辰朱砂另研

灯芯十茎，水煎，入竹沥，调辰砂末服之。

补中益气汤　治痘初热，四肢厥冷，中气弱也。

官拣参　炙黄芪　漂白术　广陈皮　当归身　青化桂　炙甘草

煨姜、大枣引，水煎服。服药后手足暖者生，逆冷不回者死。

玄参解毒汤　治痘初热，毒火熏蒸，而见鼻血。

润玄参　枯黄芩　炒栀仁　芽桔梗　怀生地　粉干葛　荆芥穗　炙甘草

水煎，入茅根汁，加京墨磨浓调服。

黄连解毒合甘桔汤　治痘烦热不止，口舌生疮，咽喉痛。

酒黄连　酒黄芩　黑山栀　熟石膏　芽桔梗　净连翘　南薄荷　荆芥穗　牛蒡子　生甘草

水煎，和竹沥服。

调元汤　治痘证自汗过多，卫气反伤，宜止之。

大官拣　炙黄芪　条黄芩　漂白术　杭白芍　杭麦冬　炙甘草

水煎服。如汗不止，加地骨皮、麻黄根，以猪心肺煮汤，对前药服，更妙。

柴葛桂枝汤　治痘将出而憎寒振战，此毒气留连于腠理间也。

北柴胡　粉干葛　川羌活　大拣参　北防风　嫩桂枝　牛蒡子　炙甘草

淡竹叶十片，水煎，热服。

麻黄解毒汤　治痘未形，发热不退，腠理闭塞及风寒外遏不出。

陈麻黄去根节，用蜜酒炒黑　川羌活　绿升麻　荆芥穗　粉干葛　北防风　净蝉蜕　芽桔梗　牛蒡子　炙甘草

水煎，入烧过人屎调服。

托里十补汤　治痘因泄泻，毒气内陷而

不出。

官拣参　炙黄芪　当归身　柴川朴　芽桔梗　青化桂　正川芎　北防风　香白芷　炙甘草

水煎，调牛蒡子末服。

枳实导滞汤　治痘因伤饮食，郁滞而不出。

小枳实　净连翘　法半夏　酒黄连　山楂肉　炙甘草　紫草茸　酒大黄

水煎，调槟榔末服。

升麻葛根汤　治痘证初热，将出未出，以此助其升生。

绿升麻　粉干葛　白芍药　炙甘草

口渴，加天花粉、杭麦冬、丝茅根汁；**腹痛**，加小枳实、淮木通、山楂肉；腰脚痛，加漂苍术、川黄柏、川羌活、淮木通；头痛，加小蘇本、香白芷；搐搦，加淮木通、水竹沥、苏薄荷、净连翘；泄泻，加官拣参、漂白术、白云苓、怀山药；谵妄，加石菖蒲、黑栀仁、淮木通、辰砂末；四肢冷，加官拣参、炙黄芪、黑姜炭、青化桂；呕吐，加漂白术、白云苓、法半夏、广陈皮；衄血，加润玄参、黑栀仁、枯黄芩、茅根汁；咽痛，加芽桔梗、牛蒡子、鲜射干；咳嗽，加广陈皮、家苏叶、陈枳壳、信前胡；大便秘，加怀山药、紫草茸、鲜红花、当归尾；多啼哭，加淮木通、黑栀仁、正雅连、大麦冬；吐舌、弄舌证，并加正雅连、北防风、黑栀仁。以上皆用净水煎服，随证加味用之。

见形证治歌

凡一十八首，共一十八方

发热三朝痘出稀，方为毒浅吉之机。先期痘甚浑无制，过此多因血气微。

凡痘发热三日而出，常期也。出而稀者，不须服药。如发热一二日即出者，此毒气太甚，冲击荣卫，一齐涌出，难以制服，大凶之象，必欲治之，不过消毒救里，使无陷伏耳，宜消毒快斑汤。

如过期四五六日始出，此血气本虚，不能载毒使出，当补中托里发表，宜增损八物汤。

痘出迟迟有数般，皮肤闭塞属风寒。里虚吐泻宜分治，痘壅三焦治却难。

凡痘出有常期。若应出不出，或外感风寒，六腑闭塞，不能即出，其证头眩身痛，发热无汗，喜盖覆猥倚怀中，此恶风寒之象也，当发散之，宜加味参苏饮。若曾经吐泻，里虚不能快出，宜加减调中汤。

如发热烦躁，狂妄大渴，唇燥舌裂，此毒气壅并，留而不泄。毒火郁于三焦，荣卫不行，上下不通而死矣。

应期不出事如何？发表诸方切忌讹。腹胀便坚烦躁甚，消斑承气理沉疴。

凡痘疹应出不出，或外感风寒，内虚吐泻，治各不同。如前参苏饮、调中汤、败毒散、葛根汤之类，皆良法也。若热甚腹胀气粗，烦躁闷乱，大便秘结，此毒火内蓄，急以消斑承气汤解之。

痘出身凉吉可期，如逢炽热覆明夷。终朝渐密无空隙，怪证丛生必定疑。

痘疮之热，毒火为之。未出之先，毒火在内，故发热于外；既出之后，其毒发外，热当尽退，毒本轻而痘亦稀也。若痘既出，热仍不退，是毒积于中，未可为轻，急用解肌化斑升托之。服药后热渐退，方可言吉；更不退，其痘累累而出，痘空中始虽稀而终朝渐密，最怕生出他证，或狂妄，或泄泻，或腹痛，或搔疮，或失声，或错喉干呕，或喘促黑陷，皆不可治。

出现先观面部中，其间凶吉最难通。绕唇夹颊方为吉，额上眉心未可逢。

人之面部，五脏精华皆见于此。故左颊属肝木，右颊属肺金，颏属肾水，鼻属脾土；又正额太阳脉之所会，唇颊阳明脉之所经，两耳旁少阳之所过。痘为阳毒，故随阳位而见于面。但阳明胃与大肠，积陈受污，气血俱多，先于其部出现者吉；若太阳则水火交战

之位，少阳则木火相并之冲，若于其位出现者凶。不但出形忌于正额眉间，耳之前后，凡起灌收靥，但从此处先者，皆逆象也。

头为元首称至尊，更有咽喉阖辟门。若使痘疮多出此，蒙头锁项受灾连。

经曰：头者，精明之府。五脏精华皆现于面，至尊至贵，不可凌犯者也。咽者，胃脘水谷之道路，主纳而不主出；喉者，肺管呼吸之往来，主息之出入。人非此则水谷绝，呼吸废而死矣，故谓阖辟之门。痘疮最要头项稀少，如头面多者，谓之蒙头；咽喉多者，谓之锁项。蒙头则视听昏废，神明失居；锁项则内者不出，外者不入。正所谓神出则机息，气止则化绝，死之兆也。

头面胸前痘欲稀，四肢虽盛毒犹微。浑身碎密多惆怅，疏解当知发散机。

头面诸阳之会，胸前诸阳之聚，脏腑受气之区。陈氏曰：痘疹轻者，作三四次出，头面稀少胸前无，以清阳之分不可浊乱也；至于四肢，虽为阳之本，乃身之役使，卒伍卑贱之职，故不畏其多也。若遍身稠密琐碎，急为解毒，疏通荣卫，令气得其均，血得其活，一齐起发，庶无干枯黑陷之变，用疏毒快斑汤，随证加减而调之。

痘疮磊落不须防，丛聚相粘定见伤。蚕壳蛇皮生不久，蚤斑蚊迹祸难量。

凡痘疮初出，须看相去远近。若相去三五寸一粒者，轻证也，一二寸者颇密，如二三成丛者，必密而重，其候多变痒塌。如蚕之壳、蛇之皮者，此气至而血气不随也，当行气补血，宜祛风匀气散；如蚤之斑，蚊之迹者，此血至而气不随也，当凉血补气，宜参芪和气饮。

一出形来艳色娇，定知皮嫩气虚枵。溶溶破损生难久，个个成浆喜气饶。

痘疮出形，如平日正色者吉。痘色带艳而赤，其后多皮嫩易破，痒不可救。但见带艳，即防后日痒塌之变，早用疏风固表消毒之药，使血气充实，邪火渐退，正气不亏，光壮干收，如期不乱可也，宜固阳散火汤，解毒固表。

最怕头焦雎色封雎音陶，青黑色也，又愁皮嫩水溶溶。头焦变黑多归肾，皮嫩须防痒塌攻。

痘疮初出，所喜明润而鲜，坚实而厚。若头焦带黑，此毒在血分，不急治之，则变黑归肾而难救矣。宜凉血解毒汤，解散血中之邪。若皮嫩囊薄，此毒在气分，不急治之，则痒塌而死。宜加味固阳散火汤。

痘疮切要解咽喉，喉痹咽疮毒火浮。但恐一朝封管箭，锁喉声哑枉营谋。

凡痘疮未有咽喉不痛者，如烟囱之状，火焚于下，炎升于上，宜乎作痛。宜鼠粘子汤，外用一圣散吹之。

惟恐斑疮入眼中，膏煎黄柏妙无穷。但观眼内多红赤，急泻心肝免损瞳。

痘疮之毒，第一防眼，所以古人用护眼之法，其虑深矣。宜黄柏膏涂之。

若眼内有红筋萦缠，或眼肿闭，多生眵泪，急泻心肝之火，宜蝉花散清解之。

痘疮只出一般奇，斑疹相参最不宜。消疹化疹宜急解，倘仍不解势倾危。

钱氏曰：痘只一样为善。若已现形，间有碎密如芥子者，此夹斑也，皮内鲜红成块，此夹疹也。皆毒火熏烁于内，故使斑疮夹出于外，急宜解毒，使斑疮消散，痘得独成。宜荆防解毒汤消散之。

痘标才见两三窠，爬搔浑身瘙痒多。此是火邪留腠理，急清风火证应瘥。

凡痘初出之时，遍身作痒，爬掐不止，此火邪留于肌肉皮肤之间，不能即出故耳。与伤寒不出汗作痒同，非痒塌之例也，宜泻心肝火邪，其痒自除。宜清风去火化毒汤升散之。

口中腥臭气冲冲，邪毒炎蒸肺作痈。泻火清金须急用，淹延七日祸相从。

凡痘初出，若口中之气腥臭冲人，此肺中邪火熬煎炎燥，故令腥臭出于口，急与清

金泻火汤解之。倘淹延不治，至七日而死矣。经曰：肺绝者，七日死。此证之变。或失声，或喘，或干呕，皆其候也。

皮中簇簇如寒粟，肉肿隆隆似热瘤。如此岂能延日月，哀哉不久返瀛州！

凡痘初出，欲期颗粒分明，皮肉柔润。若簇簇生于皮间，似风寒粟子之状，此痘变于反掌，不待起发即隐而不见，啼叫烦闷而死矣。或有正面、腰背、胸膈、手足肿硬成块，似丹瘤之状，此证俟起发之时，其处疮先黑陷，破烂不能成浆，干硬而死，皆为不治。

出形未定先涵水，起发之时便戴浆。脓水未成收靥急，休夸妙术有青囊。

凡痘初出一点血，血化为水，水化为脓，脓成而毒解，此自然之序；若初出之时，半为水泡，或将起发，便戴白浆，或脓水未成，忽然收靥，此毒火太甚，失其自然之序。不应至而至，谓之太过，不久倒陷入里而死，无有治矣，盖不应至而至，所谓早发还先萎也。比之应至不至者，因其气血不充，尚有补救，所谓人夺天功，此则不相侔矣。

鼻如灶突面烘烟，皮似涂朱或橘然。唇舌咽喉痘丛聚，任教和缓莫回天。

凡痘疮之证，始终归重于太阴、阳明，手太阴肺、手阳明大肠、足太阴脾、足阳明胃者是也。盖鼻者肺之窍，贵于滋润，鼻干黑燥如灶突之状，火刑金也；面者阳明经所聚，贵于鲜明，面黑而枯，精华散矣；皮者肺之合，欲其色红白如常，色若涂朱，火之象也，或如橘柚，火极如土则黄矣。咽喉肺胃之管龠，唇吻脾之窍也，舌者脾之络也。痘甚于此，其毒极矣，安可治哉？

入　方

消毒快斑汤　治痘未期而出，毒气太甚。

芽桔梗　荆芥穗　北防风　京赤芍　炙黄芪　牛蒡子　当归尾　润玄参　净连翘　信前胡　淮木通　天花粉　炙甘草

水煎，热服。

增损八物汤　治痘过期而出，气血虚弱。

官拣参　漂白术　炙黄芪　白当归　正川芎　牛蒡子　荆芥穗　京赤芍　净连翘　北防风　芽桔梗　粉干葛　炙甘草

水煎，不拘时热服。

加减参苏饮　治痘应出不出，由外感风寒，玄府闭塞。

官拣参　家苏叶　粉干葛　广陈皮　信前胡　香白芷　芽桔梗　陈枳壳　川羌活　北防风　炙甘草

竹叶十片为引，水煎服。

加减调中汤　治因吐泻，内气痿弱，痘出不快。

官拣参　漂白术　炙黄芪　南木香　上薄桂　白云苓　法半夏　广陈皮　炙甘草

生姜一片为引，水煎服。

消斑承汤　治痘因毒火郁遏，应出不出，大便秘结，宜下之。

锦庄黄　陈枳壳　川厚朴　片黄芩　川黄柏　黑栀仁　净连翘　淮木通　炙甘草

热甚者，加芒硝、紫草。生姜二片引，水煎滚，热服。

解肌化斑汤　治痘出热仍不退，由毒气未尽也。

绿升麻　粉干葛　淮木通　牛蒡子　芽桔梗　天花粉　地骨皮　荆芥穗　片黄芩　川黄柏

大便结加紫草茸。水煎，热服。

疏毒快斑汤　治痘出浑身琐碎稠密。

官拣参　北防风　荆芥穗　净连翘　牛蒡子　当归梢　芽桔梗　赤芍药　炙甘草

热甚，加酒黄芩、酒黄连、地骨皮；渴者，加粉干葛、天花粉、大麦冬；气虚，加炙黄芪、南木香；便坚，加紫草茸、陈枳壳；溺赤，加车前子、淮木通；食少，加漂白术、京楂肉、广陈皮；痒者，加上薄桂、南薄荷；腹胀，加川厚朴、大腹皮；喘咳，加净知母、桑白皮；泄泻，加上薄桂、诃子肉、黑姜炭；作痛，加白芍药、酒黄芩。

俱灯芯引，水煎，热服。

祛风匀气饮　治痘出如蚕壳、如蛇皮，由气至而血不随也。

官拣参　正川芎　大当归　赤芍药　杭麦冬　北防风　杭青皮　荆芥穗　南木香　上薄桂　炙甘草

水煎，半饥服。

参芪和气饮　治痘出如蚤之斑、蚊之迹，由血至而气不随也。

官拣参　炙黄芪　净连翘　牛蒡子　酒黄芩　粉干葛　净蝉蜕　当归身　淮木通　芽桔梗　炙甘草

水煎服。服后气血均随者吉，如旧者凶。

固阳散火汤　治痘出色艳而赤，切防痒塌。

官拣参　炙黄芪　炙甘草　绿升麻　当归尾　北防风　怀生地　淮木通　荆芥穗　大枣三枚为引，水煎服。

凉血解毒汤　治痘出头焦带黑，血分有毒，防变黑陷。

京赤芍　当归尾　怀生地　淮木通　牛蒡子　净连翘　紫草茸　芽桔梗　鲜红花　山豆根　生甘草

水煎，人烧过人屎一钱，调服。

固阳散火汤

方见前。此加漂白术、云茯苓，减去生地黄。

鼠粘子汤　治痘出咽喉作痛。

鲜射干　芽桔梗　净连翘　牛蒡子　生甘草

水煎，入竹沥和匀服。

一圣散　苦参不拘多少，切片略焙干，研为细末，每用一二分，吹之甚效。若不早治，咽疮烦躁，吸门肿塞，水入则呛，食入则呕，咽哑失声，救之迟矣。

黄柏膏　治出痘预护其眼，免致痘疮入目。

厚川柏一两　粉甘草一两

二味研为细末，用新绿豆五合，新汲水三碗，浸豆一昼夜，去豆，入红花一两煮之，其水约减二盏，又去红花，然后入前二末，慢火熬成膏，每用敷眼胞上下厚涂之，则痘疮不入眼矣。

蝉花散　治痘出两目肿闭，多生眵泪。此非封眼之时，急治。

净蝉蜕　密蒙花　酒黄连　当归尾　淮木通　草龙胆　北柴胡　正川芎　黑栀仁　北防风　白豆蔻

淡竹叶十片为引，水煎，热服。

荆防解毒汤　治痘出夹斑夹疹。

官拣参　北防风　荆芥穗　枯黄芩　牛蒡子　净知母　川黄柏　生甘草　润玄参　绿升麻　熟石膏　净连翘

淡竹叶为引，水煎服。服此斑疹仍不消者，不治。

清风去火化毒汤　治痘初出，风热作痒，表未解也，非痒塌之谓。

北防风　绿升麻　杭白芍　柳桂枝　荆芥穗　粉干葛　牛蒡子

淡竹叶为引，水煎服。

清金泻火汤　治痘出口中腥臭之气冲人，谨防肺痈。

净知母　怀生地　枯黄芩　熟石膏　芽桔梗　黑栀仁　杭麦冬　紫菀茸　淮木通　天花粉　生甘草

鲜桑叶七片为引，水煎，竹沥对服。

起发证治歌凡二十六首，共五十方

起发出来无定期，庸常计日强猜疑。不知毒气分深浅，妄执方书只补脾。

时俗医云：三日发热，三日出形，三日起发。此鄙论也。盖毒气有深浅，元气有厚薄，出之先后，壮亦因之，大抵不出五六日间。彼毒浅气厚者，其起发常易；毒深气薄者，至五六日始壮者有之，未可以常期准也。俗医见其起发之迟，不认毒之浅深，概谓正气不足，妄用补脾之剂，殊不知曾因吐泻不能食者，补脾以助长可也；若无吐泻能食，六

根坚固，复用补药，不免党邪为害，非徒无益，而反害之。

起发如期贵适从，过犹不及类皆凶。先期痘出充肤腠，过后斑疮腹里壅。

凡痘疮起发，只在六七日，谓之得中，盖自发热算起，正当六七日也。如未及期而骤发，此毒火太甚，荣卫气虚，直犯清道而出，谓之邪气太过。法当固表解毒，以防痒塌之变，宜黄芪芍药汤。

如过六七日不起发，此脏腑虚弱，毒留于中，壅塞不出，谓之正气不及。法当托里解毒，以防倒陷干黑之变，宜内托护心散。

出形已定视根窠，红活充肥气象和。倘若青干兼紫黑，急宜解托勿蹉跎。

凡痘出现已尽，时当起发，仅视根窠，以决轻重。如形充满，色红润，此气血和畅，毒气发越，大吉之兆，不须服药；若形扁而塌，色枯而黑，此气血多滞，毒气壅遏不能起，急用解毒托里之药，用十宣散内托之。

痘出稀疏正得宜，如斯平顺不须医。若然稠密休轻易，解毒常常虑险危。

凡痘出稀少，不须服药。若稠密，其毒必盛，防气血不足，起发不透，渐生变易。

当服解毒托里散。服药之后，红活光壮，此气血内实，毒不能留，即止后服；如服后病势淹延，此邪气盛、正气虚，不能成就，宜屡服之；如服此药当起不起，此必有变，不可治之，反取怨尤也。

郛郭充肥完且坚，色多苍蜡或红鲜。如逢破损多器薄，纵有良方恐莫延。

凡痘乳郭充实，皮囊坚厚，以指擦之，坚实不破，其色苍蜡而红活，皆顺证也，不喜干燥，淫湿。若疮虽红鲜，反干燥而不充肥，此火甚而血不足，宜轻清之剂退火凉血，用四物快斑汤。

如疮充肥而带湿淫，此湿盛而气不足，宜利湿补气兼风药治之，盖风能胜湿故也，四物快斑汤。

如疮红活充肥，以指擦之随破，此名皮嫩疮，破后必痒塌不合治，宜大补快斑汤。

如当起发，如浮囊空壳，如蚕之壳、麦之麸，皮中无水色者，此血气俱虚，用大补快斑汤治之。用药后，若转而润泽，中涵水色者可治；否则，痒塌闷乱，叫哭而死矣。

形色须教着意观，紫红实热白虚寒。倘然错认分毫处，咫尺云泥祸害端。

凡痘疮起发，须谛观形色，以定重轻吉凶。如根窠红润，顶苍蜡色者上吉，根窠红，顶灰白色者次之；根窠赤，顶亦赤而带艳者，此火胜，用解毒泻火汤清之。服药色退者生，不退者凶。

如纯白色者，作寒论，此血寒气虚也。虚则补之，十全大补汤加丁香、鹿茸，回其阳气，四肢冷者，加附子。

如纯紫色者，作热论，此血热气实也。实者泻之，黄连解毒汤加犀角之类，以平为期，服药疮色回者，十死一生。

四围起发陷居中，阳气亏衰尚未通。若是中枯成黑子，此名疔痘类非同。

痘疮起发，其形不一。有紧小而充实者，俗呼珍珠痘，此痘易壮易靥；有粗大而饱满者，俗呼天痘，此痘早壮迟靥；有四围起中心落陷者，俗呼茱萸痘，此痘有吉凶、有轻重。稀者轻而吉，密者重而凶，盖因中气不足，时日未到，但四围起发而中心尚是好肉，未得起发耳，时日既到，自然充括而成血浆，轻稀者不须治，重密者用解毒化斑汤。若先有水，忽然干枯黑陷，此名疔痘，不可与中气不足同例论。

中心微起四围干，不久焦枯变一般。毒火熏蒸津液竭，开关启鬲治应难。

凡痘有中心微起含水色，四畔干枯者，此毒火熏蒸，津液枯竭，急以疔痘之法治之，否则尽枯。又复烦躁叫哭喘渴者不治。

痘疔只为火伤阴，济急无如砭与针。解毒透肌兼发散，胭脂四圣效应深。

大抵痘之初出一点血，此一点属正气，觉毒气冲击，随腠理而出现；其后，毒与血化

为水，水化为脓，脓成毒解。若毒大甚，熬煎阴血，其血干枯而变黑色，不得化水，反闭塞毒出之路，以致毒气陷伏不得出，此名倒陷。其人烦躁腹胀，喘满口渴，多不可救。故古方外以针刺破，吮出其血，或用灯火淬之，无非欲其开关启鬲，而使毒气得出也。宜四圣珍珠散治之，用药后其疮便回者吉，如不回，反添黑陷，死证也，不可妄治。内服之药，有用穿山甲烧人牙者，药既非解毒发表之药，又无托里快斑之能。愚者执而用之，适足误事，又不若四圣快斑散，屡多奇效。

密斋曰：钱氏用百祥丸、牛李膏，必其人大小便秘结，烦躁作渴，故宜服之；若其人大小便自调，身无大热，则必不可用。今改去百祥丸、牛李膏，以宣风快斑散代之，服此以通为度，通后疮回，以四君子汤徐调之。若或因泄泻，其疮由灰白而变黑陷，此名倒靥，宜木香快斑散治之。

予按：痘中坏证，惟黑陷最恶。凡见黑陷者，大便未必自调，身体未必不热，神情未必不扰攘，宣风快斑散或可治其轻者；若大便秘结，烦躁闷乱，大热口渴，舌上黄黑者，舍百祥无以挽回。盖黑陷凶危之证，非峻厉之方，不足以制其猖獗。今凡如百祥丸及枣姜百祥丸、无价散、胡蒌酒，并外治忍冬汤五方，宜预制，以便临证酌用。万氏、钱氏两存可也。

黑陷疮为坏证先，此名恶候古今传。若教出现浑身上，卢扁无功莫怨天。

凡黑陷用以前治法，其疮红活，依期光壮，吉兆也；倘服药如故，则不可治。若痘本稀，其中起发者多，略有数个黑陷，此则可治；假如稠密，又不起发，或灰白、或紫赤、或青干，又加黑陷者，治之无功。

灰白迟延顶复平，紫红燉肿候须明。且将气血分虚实，莫弃圆机执一行。

凡痘疮喜红活充实，若不红活充实虚也，红肿太过实也。假如灰白色，当起不起，而顶平陷者，此气虚也。必问其人初起证候，如初因吐泻不能饮食，其后泻止而灰白顶平者，此正气虚弱，宜大补快斑汤以补之。

如泄泻一向不止，用异功快斑汤兼豆蔻丸；如服以上之药，泄泻仍甚，用附子理中汤以温其中。

若其人素日虚怯，而吐泻不止，此元气不足，用补元快斑汤；如误服解毒寒凉，及误饮冷水者，用调中快斑汤。

若灰白色又加痒塌、顶陷、腹胀，此不治之证；假如红燉紫肿，血热也，宜凉血快斑汤。

若其人素实，初起误服热药，以致红燉紫肿，宜三黄解毒汤清解之；若紫赤变黑，喘渴不宁者，不治。

起发犹如锡饼铺，皮肤光若水精壶。其人能食方无虑，不食将为鲍肆枯。

凡痘疮稠密，要依次起发，红活尖者吉。一齐起发，遍身白色如锡饼形，头目浮肿，此恶候也。但看其人之食饮何如：若能食，大便坚，小便清，无他证，往往延至日久，浑身皮脱而愈；若不能食，后加吐泻热渴搔痒，必死之证。能食者，宜服解毒之药，用助脾快斑汤扶其中气。

起发之时未试浆，口唇疮色早焦黄。如斯恶候无人识，慢自矜夸强立方。

口唇，脾之候也。脾司运化以养血气，所以痘疮不宜脾胃受伤。如初出起发之时，浆水未试，口唇疮色内带黄浆，此恶候也。时人不识，喜其成浆，便呼为吉，不知六七日间，其疮先靥，剥落一层而死矣。

疮头起发浆先白，不问何经皆是贼。慢夸妙手有仙方，七日应为泉下客。

凡痘由红点而水泡，由水泡而脓泡而结痂，有自然之序。初起发时，头带白浆，此疫疠也，不可治。

发时磊落最堪夸，相串牵连事可嗟。若又四围添小粟，定然搔痒证来加。

凡痘起发，颗粒分明，尖圆磊落者吉；若彼此牵连成一片者凶。如上分气血虚实，用

解毒快斑治之。或本痘起发，或于根窠四畔又旋出小者，攒簇本疮，成丛似粟者，不待养浆，即加搔痒而死矣。

起发时常验四肢，发而不透成凶危。此缘脾胃多虚弱，发散还须当补脾。

凡痘疮宜视手足何如：若手足循序起发，此脾胃素强，毒气得越，不必忧虑；若遍身俱起，手足起不透，此脾胃本弱也。盖脾胃主灌溉四肢，今既虚弱，不能行其津液，使毒得越，所以手足起发不齐，宜补脾快斑汤助长可也。

起发之时贵谨扶，调和何必问医巫！暑寒食饮须当慎，后悔噬脐莫可图。

痘疮有轻变重者，犯禁，或误医药，或犯风寒，有重变轻者，反是。然轻者吉凶之变，存乎起发之时，调护不可纵弛也。或遇暴风骤雨、迅雷闪电，即当以密布帏幙，紧饰房户，以防客风怪气之侵。如失调护，为寒凉所郁，不能起发，宜正气快斑汤。

凡痘起发之时，遇久阴雨不能起发，宜平胃快斑汤以燥其湿。

凡痘当起发，遇天气暄热，俗人不知，谓痘欲温暖，盖覆太厚，以致毒火郁遏，不得发越。此壮火食气，反虚其气，宜白虎快斑汤。

凡痘当起发，误伤生冷，以致脾虚不能起发者，用理中快斑汤。

凡痘疮起发，内伤饮食，腹中饱闷或痛，以致中气郁遏，不能起透者，宜宽中快斑汤。

自此常宜大便坚，如常调理保安然。若逢泄泻无休歇，寒热须教仔细研。

痘疮自起发之后，大便要坚，虽三四日一次亦无事；小便常要清利，若见小便赤少，宜四苓新加汤。

或有忽然泄泻，宜分寒热治之。视其所泄之物，或焦黄酸臭，此内热也，或伤饮食，宜胃苓和中汤。

若泄出之物，清白澄冷，里寒也。用附子理中汤方见前。如久泄不止，用理中汤吞送豆蔻丸方见前。

其人能食素脾强，大便虽溏也不妨。但用补中消导药，六君加味倍良方。

其人能食，虽有泄泻不能为害，当用补中之药，宜六君子汤固其中气。

起发预防头面肿，大头时气可兼医。疮宜磊落色宜润，反此倾危命必随。

凡痘疮起发，有头面由渐而肿，此毒气发越，聚于三阳，欲作脓血，故皮肉掀肿。此虽正病，亦当解毒、护目、救咽喉而兼治之，宜清毒化斑汤。

若头面不肿，必疮本稀疏磊落，痘根轻浅，虽作脓血，却不占处，故且不肿，不必治之。

若痘稠密，应肿不肿，此毒郁于内，不能起发，急服托里快斑汤。服药后，疮起者吉，不起者凶。

至于肿时，又要观其皮色何如，磊落红活者吉；模糊黑黯灰色者，多不可治。

亦有痘将起发，便头目先肿。此天行疫疠之气，名大头瘟者是也。急解其毒，宜苦参散。

面肿头浮眼不开，如斯恶候实堪哀。未应开处偏开早，搔痒频加凶祸来。

痘疮起发，头面浮肿，有不闭目者，但观其痘之轻重疏密。若疏轻者，目虽不闭亦不妨，重密者，其目要闭，宜闭不闭者凶。盖眼封鼻塞，神气内固而不外驰，吉兆也。但遇封眼之时，必待其收靥之时而后渐开可也；若未及收靥，渐生搔痒，而肿消目开者，大凶！

痛痒原来有实虚，痒虚痛实载于书。都来痛者终为吉，诸痒难言吉自如。

大凡诸痛为实，痒为虚。谓之实者，邪气实也；谓之虚者，正气虚也。盖痘疮始终气以载之，血以养之，气血充实，则禁固其毒，不得横行，所以紧实而为痛也。痛乃美事，不须服药，苟欲治之，宜凉血芍药汤。

疮痘作痒，邪气横行，泛滥皮肉，不任

条约，侵蜚是为痒也。盖痘疮惟回头作痒，容或有之，此否极泰来之兆。若发热及养浆时作痒，皆危证也，内宜托里解毒之药，外用熏洗之法，令无致于痒塌破陷可矣。仍要分虚实治之，若能食而大便秘者，此邪气内实，正气外虚，宜加味四圣解毒汤，外用洗法；若有泄泻而作痒者，乃正气里虚，邪气外实，宜调元托里汤，外用熏法。

起发之时渴又临，火邪内迫热偏深。急宜解毒生津液，休得俄延向外寻。

凡痘疮起发，身上作热，不可除其热。若不热则痘不发，如热太过，甚于常时，唇焦口燥，小便短少，不可不治，宜导赤解毒汤微解之。

若痘疮作渴，此是常事。盖由胃中津液不能滋养本元，内则炽子毒火，外则灌溉于疮，故宜渴耳。凡一切瓜果生冷之物，不可与食，惟炒米汤饮之为宜。若渴太甚，看其人虚实而治。

若饮食如常，大便坚实而渴者，此内热也，宜生津地黄汤润之。

若泄泻而渴，此内虚津液不足，不能上潮于口，宜七味白术散滋之。

声哑无音更咬牙，憎寒躁扰乱纷哗。错喉于呕多昏闷，形气俱伤最可嗟。

痘疮始终要声音清朗，人事安静，五脏坚实，饮食如常。若起发之时，忽然失声咬牙，寒战烦躁，昏迷呛水，错喉于呕，痰气喘急，泄泻不止，腹痛闷乱，俱皆凶证。古人云：痘出而声不变者，形病也；痘未出而声变者，气病也；痘出而声不出者，形气俱病，将欲治之，诚难为力。咳嗽而失声者，非此论。

痘儿呕哕不堪闻，不是寒邪是火焚。妄进汤丸如拙匠，内伤脏腑非妖氛。

凡痘疮于呕无物，或时常哕逆，此脏腑内伤，冲任之火上犯清道，故为呕哕之恶声。经曰：弦败者，声必嘶；木陈者，叶必落；脏败者，声必哕。针灸无功，汤药无效。此之谓也。若饮食而呕，当分寒热而治。

如曾伤冷物，受寒气，此寒呕也，宜二陈理中汤；如未伤冷物及寒气，此热呕也，宜二陈一连汤和之。

若饮食哽塞而呕哕者，咽中有疮，必作痛，闭塞而呕，宜加味鼠粘子汤，外用控涎散吹之。

浑身痘密精神耗，补泻无功烦复躁。狂言啼哭见鬼神，脏腑败伤天命到。

凡痘稀少、自然易壮。密者切防气血亏损，起发不透，即是病之所在。如前法治之。虚则补之，实则泻之，在气补气，在血补血，随机应变，每中权衡，不可执方以误人命。若补泻无功，反增沉重，或啼哭不止，日夜呻吟，烦躁闷乱，狂言妄语，如见鬼神，此脏腑伤败，神魂离散，复何为哉！

入　方

黄芪芍药汤　治痘起发太快，毒火作祟。

官拣参　炙黄芪　生白芍　酒黄芩　净连翘　北防风　牛蒡子　芽桔梗　粉干葛　荆芥穗　炙甘草

淡竹叶十片为引，水煎服。

内托护心散　治痘起发太迟，正气不足。

官拣参　大当归　北防风　酒黄连　酒黄芩　酒黄柏　牛蒡子　荆芥穗　淮木通　青化桂　净蝉蜕　炙甘草

便秘加大黄、紫草。水煎，人烧过人屎调服。

十宣内托散　治痘起发之时，形扁塌，色枯黑。

官拣参　炙黄芪　全当归　正川芎　芽桔梗　荆芥穗　牛蒡子　北防风　炙甘草

大便秘加酒大黄、紫草；小便涩，加木通；渴，加花粉、麦冬、葛根。水煎，入烧过人屎同服。烧人屎，痘科之圣药也。

解毒托里散　治痘出过于稠密，防起发不透。

芽桔梗　牛蒡子　荆芥穗　鲜红花　北

防风　当归尾　净蝉蜕　绿升麻　粉干葛　赤芍药　净连翘　炙甘草

水煎，入烧过人屎同服，令易壮易靥。

四物快斑汤　治痘疮干燥，形不充肥。

全当归　正川芎　京赤芍　怀生地　绿升麻　粉干葛　净连翘　鲜紫草　荆芥穗　牛蒡子

水煎，和烧过人屎服。

四君快斑汤　治痘虽充肥，而带淫湿。

官拣参　炙黄芪　白云苓　柳桂枝　荆芥穗　香白芷　北防风　广陈皮　杭白芍　炙甘草

净水煎，热服。

大补快斑汤　治痘起发，皮嫩易破，防痒塌。

官拣参　炙黄芪　全当归　大川芎　赤芍药　怀生地　牛蒡子　炙甘草　北防风　连翘壳　柳杨桂

水煎，入烧过人屎同服。

解毒泻火汤　治痘出根窠红赤，顶赤带艳。

酒黄芩　牛蒡子　当归梢　黑栀仁　净连翘　山豆根　生甘草　芽桔梗　绿升麻　粉干葛　地骨皮

水煎，入烧过人屎调服。服后色退者生，不退者凶。

十全大补汤　治痘出纯白色，此血寒气虚也。

官拣参　漂白术　白云苓　怀生地　青化桂　当归身　大川芎　杭白芍　炙黄芪　公丁香　嫩鹿茸　炙甘草

煨姜三片，大枣三枚引，水煎服。

黄连解毒汤　治痘出纯紫赤色，血热气实也。

正雅连　川黄柏　枯黄芩　黑栀仁　怀生地　牛蒡子

灯芯十根为引，水煎，热服。

解毒化斑汤　治痘四围起发，中心陷下不起。

官拣参　炙黄芪　生甘草　当归梢　正川芎　牛蒡子　北防风　净连翘　荆芥穗　冬月加上薄桂

水煎，入烧过人屎服。

四圣珍珠散　治痘疔。

新豌豆　新绿豆各四十九粒，烧灰存性，　油头发一握，烧灰　海蚌珠七粒，研末

上将四味研为细末，用胭脂取汁，和上四末调匀，以针挑破其疔，纳药于中，更以胭脂汁涂四围，其疮色回者吉，不回反添黑陷者死。

四圣快斑散　治痘疮黑陷，解毒托里。

淮木通　净连翘　生黄芪　鲜红花　鲜紫草　炒麻黄　人中黄　镜辰砂另研　丝瓜连蒂，烧灰　烧过人屎各等分

共为细末。白汤调服二三钱。

蠹风快斑散　治黑陷而身无大热，大小便调者。

淮木通　陈枳壳　尖槟榔　川大黄　牵牛末　生甘草俱等分

水煎服，以大小便通利为度。

木香快斑散　治由灰白而变黑陷。

官拣参　南木香　炙黄芪　青化桂　杭青皮　诃子肉　炙甘草　当归身　漂白术　广陈皮

姜、枣引，水煎服。中病即止，不可多服，恐增热证。

百祥丸　治痘黑陷，大小便秘，烦躁闷乱，喘急，舌黑。

红芽大戟不拘多少，水煎极软，去骨，日中晒干，复内原汁中煮汁尽，焙干为末，水丸如粟米大。每一二十丸，研，赤脂麻汤下。

枣变百祥丸　治证如前，方稍缓。

红芽大戟去骨，一两　青州大红枣三十个，去皮核

上用水一碗，以前二味同煮，水干为度，去大戟不用，将枣肉捣烂为丸。从少至多，木香汤下，以利为度。

无价散　治黑陷由疫毒而致。

用人、猫、猪、狗粪等分，于腊月内烧灰，磁缸收贮。用时，以砂糖水调服二三钱。

胡荽酒即芫荽也　治痘疹倒陷不起。

胡荽四两切碎，以好酒入瓶内，先煎一二沸，入胡荽在内，盖定勿煎，勿令泄气，放冷。每吸一口，微喷患者，从背至足，勿喷头面。病人常令闻此胡荽气。

外浴忍冬汤　治痘疹倒陷，黑陷不起，皆良。

忍冬藤，俗名金银花是也。春冬用枝，夏用枝叶，挫碎，以长流水一大釜，煎七分，将三分之一置浴盆内，以手试之，温热得中。先宜服用汤药，然后浴洗，渐渐添汤，以痘起光壮为度，不拘次数。

予按：忍冬汤，治痘焦枯倒陷不起，诚为良法，第严寒时令，深为可虑。予尝见寒月当风浴洗，痘未起而作搐死者矣，盖伤于寒也。愚意必于帐中卷去被褥，用小盆盛汤，抱儿入帐中，垂帐以洗，则暖气熏蒸，断不致受寒生变。此法有益无损，不可不知。

大补快斑汤　治痘起发，由吐泻不能饮食而灰白。

官拣参　炙黄芪　漂白术　炙甘草　杭白芍　全当归　正川芎　南木香　上薄桂　广陈皮　藿香叶

大枣三枚为引，水煎，半饥服。

异功快斑汤　治痘证久泻不止。

官拣参　炙黄芪　炙甘草　漂白术　南木香　全当归　青化桂　广陈皮　公丁香　白云苓　诃子肉

大枣三枚为引，水煎，半饥服。

豆蔻丸　治证同前，服异功不愈者。

肉豆蔻煨　南木香煨　西砂仁炒　石龙骨煅　诃子肉煨　赤石脂煅，以上各五钱　白枯矾七钱五分

共为末，面糊为丸胡椒大。每服十五丸，米饮化下。

附子理中汤　治痘证中寒泄泻，粪色青白。

官拣参　漂白术　黑炮姜　熟川附　炙甘草

量儿大小加减分两，水煎，温凉服。

补元快斑汤　治痘儿脾胃元气素弱，而吐泻不止。

官拣参　炙黄芪　漂白术　全当归　炙甘草

当归土拌炒，姜、枣引，水煎服。

调中快斑汤　治痘疹误服寒凉及冷水，以致泄泻。

官拣参　漂白术 - 白云苓　法半夏　炙甘草　青化桂　南木香　广陈皮　漂苍术　川厚朴　紫香叶

生姜三片引，水煎服。

凉血快斑汤　治痘疹红燉紫肿，血热故也。

净连翘　当归尾　怀生地　鲜红花　绿升麻　牛蒡子　生甘草

大便秘，加紫草，甚者，加大黄；小便秘，加木通。灯芯十茎为引，水煎，热服。

三黄解毒汤　治痘初起，误服热药，以致红燉紫肿。

酒黄芩　酒黄连　酒川柏　淮木通　生甘草　黑栀仁　绿升麻　净连翘　牛蒡子

淡竹叶为引，水煎，热服。

助脾快斑汤　治痘稠密，一齐起发，形如锡饼。

广陈皮　山楂肉　荆芥穗　牛蒡子　南木香　杭青皮　陈枳壳　淮木通　炙甘草

水煎，服一二剂，不宜多。

补脾快斑汤　治痘疹手足起发不齐。

大官拣　炙黄芪　北防风　汉防己　柳杨桂　炙甘草

水煎服。若手足痘见而复隐，起而复塌，此本根已废，枝叶先萎之象，必死不治。

正气快斑汤　治痘犯暴风疾雨，寒凉所郁，不能起发。

川羌活　漂苍术　北防风　芽桔梗　当归身　粉干葛　香白芷　正川芎　炙甘草

冬月，加上薄桂，生姜为引，水煎服。

平胃快斑汤　治痘值天时久雨，湿滞不能起发。

漂苍术　广陈皮　川厚朴　川羌活　北防风　上薄桂　结猪苓　白云苓　炙甘草

净水煎，半饥热服。

白虎快斑汤　治痘值炎天暑月，误用盖覆，以致毒火郁遏，闭其腠理，不能起发。

官拣参　熟石膏　大麦冬　粉干葛　绿升麻　淡竹叶　生甘草

昏迷者，加辰砂末。小便赤者，加木通。大便坚者，加生石膏。粳米一撮为引，以米熟为度，热服。

理中快斑汤　治痘误伤生冷，寒凝不能起发。

官拣参　漂白术　白云苓　青化桂　黑姜炭　南木香　炙甘草

呕，加半夏；泄泻，加怀山。生姜三片，大枣三枚引，水煎服。

宽中快斑汤　治痘误伤饮食，中气抑遏，不能起发。

广陈皮　法半夏　漂白术　陈枳壳　六神曲　山楂肉　西砂仁　正雅连　南木香　川紫朴　杭青皮　净连翘　炙甘草

生姜一片为引，水煎，热服。

四苓新加汤　治痘已起发，小便赤少。

结猪苓　宣泽泻　赤茯苓　淮木通　白滑石　净连翘　甘草梢

灯芯、淡竹叶为引，水煎服。

胃苓和中汤　治痘已起发，忽然泄泻，或伤饮食。

结猪苓　宣泽泻　漂白术　白云苓　广陈皮　诃子肉　炙甘草　川黄连　南木香　绿升麻　藿香叶

粳米一撮为引，水煎服。

六君子汤　治痘起发，能食而泄泻，虽无害，亦宜调其中气。

官拣参　漂白术　白云苓　广陈皮　法半夏　炙甘草　炙黄芪　六神曲　南木香　绿升麻　西砂仁

生姜、大枣为引，水煎服。

消毒化斑汤　治痘疮起发，头面作肿。

芽桔梗　牛蒡子　净连翘　北防风　紫草茸　绿升麻　净蝉蜕　密蒙花　草龙胆　人中黄

水煎，食后服。

托里快斑汤　治痘稠密，头面应肿不肿。

川羌活　北防风　牛蒡子　芽桔梗　绿升麻　荆芥穗　净连翘　粉干葛　当归梢　上薄桂　炙甘草

竹叶十片为引，水煎服。

苦参散　治痘疮初壮，头面未应肿而肿，天行瘟疫也。

川羌活　北防风　牛蒡子　芽桔梗　净连翘　酒黄芩　荆芥穗　人中黄　嫩苦参

水煎，入竹沥、姜汁调匀，徐徐服。

四圣解毒汤　治痘疮作痒，能食而大便秘。

紫草茸　淮木通　陈枳壳　炙黄芪　柳桂枝　锦大黄酒炒

水煎，空心热服。

洗法　治痘疮作痒。

绿升麻　漂苍术　全麻黄　槐树枝　柳树枝

煎浓汤，乘热拭之

调元托里汤　治痘疮作痒而兼泄泻。

官拣参　炙黄芪　炙甘草　南木香　广陈皮　诃子肉　嫩柳桂　北防风　川羌活　赤芍药　荆芥穗

生姜为引，水煎服。

熏法　治痘疮作痒，泄泻内虚者。

茵陈蒿　蕲艾叶

二味烧烟熏之，如用上二法而痒止者吉，反甚者凶，不治。

导赤解毒汤　治痘起发时，身热太甚，唇焦口渴。

淮木通　北防风　大麦冬　净连翘　地骨皮　绿升麻　白芍药　粉干葛　怀生地

天花粉　炙甘草

灯芯十根为引，水煎服。

生津地黄汤　治痘起发，大便坚实而渴。

怀生地　大麦冬　净知母　天花粉　炙甘草

竹叶十片为引，水煎，热服。

七叶白术散　治痘起发，泄泻而渴。

官拣参　漂白术　南木香　藿香叶　白云苓　粉干葛　炙甘草

生姜、大枣为引，水煎服。

二陈理中汤　治痘曾伤冷物，受寒气而呕者。

官拣参　漂白术　广陈皮　法半夏　炙甘草

生姜三片为引，水煎服。

二陈一连汤　治未伤冷物、寒气而呕者，热也。

广陈皮　法半夏　白云苓　酒川连　炙甘草

竹茹、生姜为引，水煎，热服。

加味鼠粘子汤　治咽喉中生疮，闭塞而呕者。

芽桔梗　牛蒡子　新射干　北防风　山豆根　广陈皮　荆芥穗　净连翘　炙甘草

水煎，热服。

控涎丹　吹咽中生疮。

辰砂五分　明雄黄三分　儿茶五分　川柏五分

共为末，吹喉中。

幼幼集成　卷六

清　罗浮　陈复正飞霞辑订
鄞县　曹赤电炳章圈校

万氏痘麻

成实证治歌凡二十一首，共二十六方

起发之时渐作脓，毒随脓化语无凶。或成空壳兼清水，毒气留连虑晚攻。

凡痘疮自起发之后，血化为水，水化为脓，至此脓已成，毒已化矣。饮食如常，不亦吉乎！若当起发，壳中出清水，此气至而血不随也，治之当益其荣，宜四物化毒汤。

或内含清水，平塌不起，此血至而气不随也，当益其卫，宜保元化毒汤。

或窠囊浮肿，中含清水，如水泡之状，此气血俱虚，不能制毒，反为毒逼，渐变痒塌，治之当托其毒，固其荣卫，使无痒塌，以十全化毒汤主之。

亦有饮食如常，六脏充实，若见空壳清水之证，虽能收敛，未免发为痈毒，不可不早治之。

脓成毒化笑颜开，犹虑形生变证来。莫谓清安无个事，风云不测霎时灾。

痘疮至成脓疱，此收功之时，手足常要和暖，过热过寒者，变也；人事常要安静，烦躁闷乱者，变也；六腑常要充实，忽吐利者，变也；声音常要响亮，忽喑哑者，变也；饮食要渐进，忽不食反作渴者，变也；色要苍蜡，形要饱满，忽灰白平塌者，变也；疮要安和，忽痒痛者，变也。或触风寒，或犯禁忌，或伤食，或误服汤丸，医者当详察其所因而治之。

四肢温暖始相宜，寒热乘常势渐离。补泻无偏能谨慎，折肱端的信良医。

凡痘疮手足常要和暖，不宜太热太寒，寒热太甚，则水火偏胜而残矣。假如病人六腑闭结，狂妄烦躁，口干作渴，其脉洪数沉紧者，实也，手足热，本病也。若手足冷，阳极似阴，谓之阳厥，下之勿疑，宜承气化毒汤。

若曾经吐泻，其脉沉细微弱者，虚也，手足冷，本病也。若手足热，乃阴极似阳，谓之阴躁，宜补之，回阳化毒汤温之。

养浆安静声堪夸，战惕鸣牙祸必加。痛痒躁烦双足冷，纵教仙手枉喧哗。

凡痘疮已成浆，或寒战，或咬牙，单见一证者可治。盖寒战因疮出太甚，表虚而振振摇动者有之，宜养卫化毒汤。

若咬牙者，必肝火甚，其牙相戛而鸣也，宜清神化毒汤凉解之。

若寒战咬牙并作者，此阳脱神丧，不可治矣。若因疮痛由脓血绷急而胀痛者，宜导神化毒汤。

若吐利而手足冷者，宜回阳化毒汤，方见前。更兼寒战咬牙，闷乱烦躁痒塌者，不治。

有脓有血毒归疮，端的其人正气强，莫遇中虚生吐泻，功亏一篑费治详。

凡痘疮成浆之时，不宜吐泻。如吐而无物，恶证也。因冲任之火上冲于胃，直犯清道而逆出之，为不治。若吐而有物者，用养胃化毒汤和之。

凡泄泻，视其所出之物何如：若色黄而臭，小便黄赤，热也，宜香连化毒汤；若泻出之物清冷不臭，小便清长，舌上无苔，寒

也，宜理中化毒汤。

如泻久不止，不论冷热，皆宜止之，通用理中化毒汤，吞豆蔻丸。方见前。

若吐泻不止，手足厥冷，此脾胃之气将绝，急宜附子化毒汤。

其有无时溏泄，手足和暖，饮食如常，虽治之不止，亦可言无事也。

身外诸疮脓血成，咽喉自此贯宁清，反加呛水声音哑，咽烂喉穿鬼伴行。

凡痘疮初出，失于调解，以致毒火熏蒸，喉舌生疮，又失于解毒，其疮稠密，然外疮未熟。至于养水之时，则先熟者又先腐矣。所以咽喉宜渐和平，声音清亮，饮食不难，此吉兆也。若当此时，饮水则呛，食谷则哕，甚者失声，此内疮糜烂，舌上成坑，咽门腐烂，肺管壅塞，以致呼吸皆废，饮食卒绝而死矣。亦有先本无疮，因误食辛热之物，或误投辛热之药，其后旋生是证者，可急用甘桔化毒汤。服药后，病退者吉，不退者凶。

或咽门无疮而暴喑者，此少阴之血不荣子舌也，宜养心化毒汤。

若有声而不清，此火毒乘于肺也，宜泻白化毒汤。中病即止，不中勿治。

陷起平尖脚润红，窠囊饱满蜡浆充。自然气色咸如式，略见差池便不同。

凡痘养浆之时，若平日中陷者尽起，顶平者尽尖，根脚红活，窠囊饱满，其色苍蜡，气如蒸豆，自然安吉。盖灰白虽为脓之正色，亦由气之不足，宜大补化毒汤。若因泄泻面灰白者，宜固本化毒汤。

若其气腥臭，此有湿热，宜解其标，用解肌化毒汤，外以益元散薄敷疮上，勿令至于溃烂可也。

正值成浆忽痒搔，用心调护莫辞劳。不分干湿皆凶候，能食神清福自高。

凡痘至成浆，切防搔痒抓破，以泄其气。俗云抓破出血者吉，不出血者凶。殊不知起发之时，其疮未熟而内是血，抓破宜出血，若养浆之时，其疮已熟而内是脓，抓破有血无血，何足以定吉凶？大抵不宜作痒，如作痒而人清爽，自知其误抓破，或言其痒，欲人拊之者吉；若痒而闷乱烦躁，语之不听，禁之不止，摇头扭项，手足舞乱者，凶也。如其人清爽，搔痒不住者，当视其形体虚实，未曾吐泻者，宜四圣化毒汤；如元气素弱而有吐泻，宜参归化毒汤。又要看其抓破处，复灌成疮则吉，破而不灌，皮肉焦黑者，不可治也。

正而将脓早破伤，依然肿灌复成疮。莫嗟败面留残喘，肿若消时愈断肠。

凡视痘疮以正面为主，盖五脏精华，皆聚于面。如他处痘疮破损，正面完全，可言无事；若正面成片破损，别处虽完全，亦何益哉！若破处复得肿灌成疮，脓血淋漓，却又无事，而虽败，穿鼻破唇，但留残喘耳。岂不愈于死耶，若破处不灌不肿，或肿而又消，烦躁闷乱，此毒气倒陷，决不可治矣。

眉心鼻准耳轮边，唇口诸疮贵活鲜。但有焦枯兼黑腐，慢求医卜命难全。

凡痘欲成脓之时，眉心鼻准耳轮两颊，若先有焦枯黑腐，此名倒陷，医之不能，祷之无效，凶矣哉！

正待行浆浆濯濯，惟愁干塌成空壳。倒陷由来证本乖，劳君着意毋偏驳。

凡痘自出现面起发，自起发而至养浆之时，便要成浆。如当养浆而反不成浆，依旧平塌，与未起发相似，或起发内有空虚，干枯无水者，名倒伏。谓之倒者，脓根在里也；谓之伏者，毒伏而不出也；谓之陷者，毒出而复入也。此等之时，人事清爽，饮食如常，别面治之。小便大便秘结，壮热烦渴，宜下之以承气化斑汤。方见前。若吐泻频数，六脉虚弱，宜温之以回阳化毒汤。方见前。若人事昏闷，寒战咬牙，足冷腹胀喘促者死。

额上浑如沸水浇，溶溶破烂气残凋。渐延两颊多亏损，泄尽元阳魂魄飘。

凡痘起发养浆，额上似沸汤所浇之象，皮溶易破，不成颗粒，大片损烂，此因失下之过。毒火熏蒸，渐延两颊，破损水出而干，似腐非

膈，则阳脱阴留，徒增烦闷，呻吟而死矣。

疮头有孔出脓腥，结聚成堆堆屎形。此个未闻人救得，徒教医祷恐无灵。

凡痘最要皮囊坚厚，包裹完全。若苍头有孔，脓水淋漓漏出，堆聚干结，其色灰白如天泡疮及癞疮之形，或清水非脓，无事自破，水出干黑，未有能治者矣。

虽然痘密着床久，疮好皮坚无败朽。如逢擦破更焦枯，任彼天人应费手。

凡痘稠密，最难为肘膊、腰臀之间，其外久着床席，辗转挨磨，若非坚厚，鲜有不破者，但破须要肿灌。若焦干黧黑，如火烧汤泼之状，必死；又见其人手足破烂，成片而不灌者，亦死。

略见浆脓起发时，休教人物往来驰。邪风秽气相侵触，变乱无常悔却迟。

凡痘疮起发之后，渐渐养浆，即当谨饰房户，禁止人物，内者休出，外者休入，谨防秽厌触犯其疮，轻者作痛作痒，变而为重；重者痒塌抓破，烦闷而死矣。故房户内外，常须烧苍术、大黄，以避不正之气。但二味气味恶劣，不可使痘儿闻之，更不可焚烧诸香。盖香能助火透人关节，所以禁之。其诸秽厌，房事最毒，酒次之，五辛又次之，死尸之气，烈于粪秽，狐狸之气，甚于犬羊。烈风暴雨，亦能为害。饮食之偏寒偏热者，勿恣于口；天气太热，则薄其衣衾，常令凉爽；太寒则温其盖覆，常令温暖。皆调理切要之法，不可不知。凡用僧道洒水涤秽与医家用药，必用老诚之人，既能清心寡欲，而且经验复多，自能司人之命。凡被房事、生产、月经所厌，以大枣烧烟解之；被酒所厌，以葛根、茵陈烧烟解之；五辛所厌，烧生姜烟解之；被死尸、疫疠厌，以苍术、大黄烧烟解之；狐狸犬羊所厌，烧枫树球烟解之。凡遇风雨，须烧枫树球以避湿气。

脓血淋漓心脏虚，舍空神乱若邪居。睡中妄语难苏省，养血安神病自除。

凡痘稠密，成浆之时，或昏昏而睡，呼之不醒，口中喃喃妄语，如被邪祟之状。时人不知，多生惊怪，殊不知此由脓血出多，心脏空虚，神无所依而然，当养血安神，病当自退，宜宁神化毒汤与安神丸相间服之。

疮成腹痛果何因？便秘肠中火烁津。又恐误伤生冷 食，消详补泻贵情真。

痘出之初腹痛，乃为毒气；疮成无脓而腹痛，未可以为毒也，当审其人便解饮食何如耳？倘若未得大便，此燥屎在里而痛，宜大黄化毒汤微利之，不可拘于首尾不可下之说，坐以待变也。若因误伤生冷，或饮冷而痛，宜温中化毒汤暖之，效。

疮毒无邪证适中，忽然腹胀气庞鸿。此因食饮多生变，消导天然不用攻。

凡痘顺正，表里无邪，脓血已成，可无苦矣。忽然腹胀气喘，色变而烦闷者，必伤食得之也。何以知之？以其疮正故也。宜消导之，用助脾化毒汤。

脓成尽说毒将升，谁料其间未足凭。饱满坚牢诚可爱，塌平淫湿最堪憎。

世俗之见，但知痘疮已过一七，发起作脓，便言无事。不知脓成之时，尚未可凭信，若郭郭坚厚，脓浆饱满，言其无事信矣；若平塌不饱满，湿淫不坚厚，莫言无事。至于十二三日之后，尚有变异，延绵日久，而有死者矣。

险逆诸疮且勿云，聊将顺证语诸君 。缘何业已成浆日，尚有凶危不可垠？

凡痘分三等：有顺、有险、有逆。顺者不须治，险者治之吉，逆者无可治。今除险逆不必论，然顺者亦有成浆之日，反变为险逆者，此何故也？盖有失调理，触犯禁忌，误服汤丸，恃其轻少而不调护，故令轻者变重。此人事之害也。又有只出一二粒而殒命者，疠气使然也，岂人能逆料者哉！

入　方

四物化毒汤　治痘已起发，气至而血不至，壳中出清水。

全当归　正川芎　怀生地　白芍药　大麦冬　牛蒡子　淮木通　生甘草等分　上薄桂减半

灯芯为引，水煎，热服。

保元化毒汤　治痘血至而气不至，内涵水色，平塌不起。

官拣参　炙黄芪　全当归　正川芎　荆芥穗　上薄桂　牛蒡子　北防风　赤芍药　炙甘草

粳米一撮为引，不煎服。

十全化毒汤　治血气俱虚，窠囊浮肿，中涵清水如水泡。

官拣参　漂白术　白云苓　炙甘草　正川芎　当归身　白芍药　怀熟地　炙黄芪　上薄桂　牛蒡子　粉干葛

生姜、大枣为引，水煎，温服。

承气化毒汤　治痘阳极似阴，手足厥冷。

小枳实　紫厚朴　川大黄酒炒　尖槟榔　生甘草

生姜三片为引，水煎滚，热服。

回阳化毒汤　治痘阴极发躁，手足大热。

官拣参　青化桂　漂白术　白云苓　川附片　炙甘草

大枣为引，水煎，温服。

养卫化毒汤　治痘出太甚，表虚而振战。

官拣参　炙黄芪　柳桂枝　当归身　炙甘草

生姜三片，大枣三枚引，水煎服。

清神化毒汤　治肝火太甚而咬牙。

绿升麻　怀生地　杭麦冬　淮木通　北防风　炙甘草

灯芯十茎为引，水煎服。

导神化毒汤　治痘疮太甚，脓血绷急而痛，以致咬牙。

淮木通　杭麦冬　黑栀仁　炙甘草　炒枣仁　镜辰砂研

灯芯十茎为引，水煎，热服。

养胃化毒汤　治成浆时，呕吐而有物，胃虚也。

漂白术　广陈皮　白云苓　西砂仁　姜炒连

生姜一片为引，水煎服。

香连化毒汤　治泄泻色黄而臭，热也。

南木香　炒黄连　结猪苓　漂白术　炙甘草

灯芯十根为引，水煎服。

理中化毒汤　治泄泻所出之物，清冷不臭，寒也。

官拣参　炙甘草　漂白术　白云苓　黑炮姜

大枣三枚为引，水煎服。

附子化毒汤　治吐泻不止，手足厥冷，脾胃将绝也。

熟川附　官拣参　漂白术　炙黄芪　炮姜炭　炙甘草

炒米一撮、大枣一枚引，水煎，温令服。

甘桔化毒汤　治误食辛热之物，或误服热药，以致咽喉破烂。

大粉草　芽桔梗　鲜射干　净连翘　牛蒡子

水煎，入竹沥和服。

养心化毒汤　治咽中无疮而暴痛。

大当归　怀生地　大麦冬　绿升麻　天花粉　川黄柏　漂苍术　荆芥穗

生姜一片为，水煎服。

益元散

白滑石一两，研细，水飞　粉甘草五钱

共为细末，蜜水调敷。疮焦痛，胭脂浸汁调敷。

四圣化毒汤　治成浆之时，忽然搔痒，无吐泻者。

淮木通　当归尾　赤芍药　北防风　柳杨桂

净水煎服。

参归化毒汤　治元气素弱，又兼吐泻而作痒。

官拣参　大当归　炙黄芪　赤芍药　桂枝梢　漂白术　炙甘草

水煎服。

以上二证，俱用熏洗法，熏、洗二方俱见前。

宁神化毒汤　治成浆后脓血去多，心虚神无所主，口中呓语。

官拣参　当归身　怀生地　大麦冬　淮木通　石菖蒲　赤芍药　黑栀仁

灯芯引，水煎服。

安神丸　治证如前。

炒川连一钱　当归身一钱五分　白茯神一钱　炙甘草五分　远志肉一钱　石菖蒲一钱　炒枣仁五分

共为末，猪心血捣匀为丸，如芡实大，辰砂为衣。每二三丸，灯芯汤下。

大黄化毒汤　治浆成大便秘结而腹痛，内有燥粪。

绿升麻　当归身　怀生地　火麻仁　光桃仁　鲜红花　陈枳壳　锦大黄　尖槟榔

生姜为引，水煎，空心热服。

温中化毒汤　治误伤生冷、冷水而腹痛。

官拣参　公丁香　南木香　漂白术　青桂心　炙甘草　炒白芍　西砂仁　小枳实　广陈皮　炮姜炭

大枣、生姜引，水煎服。

助脾化毒汤　治饮食过伤，抑遏脾气，所以腹胀而喘。

广陈皮　法半夏　川厚朴　陈枳壳　家苏子　萝卜子　尖槟榔

生姜为引，水煎服。

收靥证治歌共十五首，又一十六方

收靥 难拘日数文，但凭稀密实虚分。缓收循序多坚稳，太急须防余毒熏。

痘疮收靥，不可以日数拘也。大抵痘稀元气实者，易出易靥，痘密元气虚者，难出难靥。只要循序缓收，倘收太急，乃毒熬煎，血气枯焦，非正收也，必发痈毒怪证，甚则丧躯，微则残形矣。

人中上下别阴阳，收靥先于此处良。若是足颅先靥黑，多凶少吉早提防。

人中者，督任二脉交会之衢。痘疹先从此处出壮收靥，为阴阳和畅；若于额颅手足心先靥，乃邪气攻心，莫救。

收靥从来贵整齐，臭腥烦烂便跷蹊。其间顺逆宜详审，慎勿逡巡当局迷。

痘疮收靥，贵于整齐。干如螺靥者，上也；顶破脓出，结如鸡屎者，次也；破烂无痂者，下也。凡遇此等收靥，便须询察曾犯何逆？如血气本实，误投补药，以邪得补反溃正气，如火烁烂，宜天水散解之，则邪火退而收靥齐矣。

如初饮冷水，浸淫脾胃，以致收靥不齐，以除湿汤渗之，则内渗其湿，外燥其表，令好收靥。

若头面溃烂，其气腥臭，及遍身手足和皮脱去，宜分顺逆。果脓成毒化，饮食如常，更无他苦者，顺也；脓水未成，是名倒靥，未可量。

痘到收时脓自干，封藏收敛壳团乐。莫教腐烂和皮脱，此个还将倒陷看。

痘疮成脓之后，结为螺靥，此毒从外解；若不能结痂，反成腐烂，和皮脱去，此倒陷毒气入内也。

但逢倒陷毒深潜，复肿翻生始不嫌。头面肿消空未补，剥肤灾近易先占。

凡痘倒陷，系中气不足，急用温中托里汤托之。服药后，破者复加肿灌，无痘处又复出一层，谓之补空，俗云翻生痘是也。此正气不亏，邪气不留，虽过期延日，不为害也。如头面不肿，空处不补，即易所谓剥床，以肤切近灾矣，安可为哉！

靥时自利忽然侵，顺逆中间仔细寻。脓血痂皮为顺候，不分水谷定归阴。

收靥之时，忽然泻痢，若脓血痂皮之物，此脾强肾弱为顺候，痢尽自愈，不可强治；若不分水谷，此肾强脾弱为逆候，用炒米汤送豆蔻丸，痢止则吉，不止则凶，豆蔻丸方见前。

过期不靥事跷蹊，臭烂浑身靥不齐。粘席粘衣何所治？白龙败草指群迷。

凡痘成脓之后，过期不靥，浑身溃烂，以致粘席粘衣，用白龙散、败草散衬贴铺床最佳。

收靥迟延须急治，劳君察证毋拘执。纵意违师徒自伤，临危施济终难及。

凡痘当靥不靥，须要详审，不可忽略。如冬寒之时，盖覆少薄，被寒风郁遏不能靥者，宜桂枝解毒汤疏解之。

如夏月衣被太厚，热气熏蒸不能靥者，宜去其衣被，少令清凉，用甘露解毒汤清之。

倘一向大便秘结，里热太甚，不能靥者，宜当归解毒汤微利之。胆导法尤妙。

如泄泻气虚不能靥者，此只收靥不齐，欲呼坐浆干也，不须妄治。如元气素弱，以致难靥，宜参归化毒汤解之。

脓水将干结靥时，休教愚昧失支持。不知禁忌多翻变，却是为山一篑辞。

世俗于痘收靥之时，即杀鸡食之，或姜椒之类，谓其和暖，殊不知鸡属巽，能动风，辛能助火。脾胃强者无害，弱者反助火邪，以致发痈伤胃，口舌生疮，则至坏病者有之矣。又或宜温而过热，宜凉而过寒，皆为犯禁，亦能生变，切宜慎之！

一向浑身凉且和，靥时忽热事如何？微微发热干脓水，太甚焦枯病转多。

痘疮始终要有微热，不可尽去。若收靥之时，反大热作渴烦躁，此毒在内，更防陷伏，急用生津凉血葛根汤以清之。

破疮复灌依然烂，及至收成功愈慢。淋漓脓血苦难当，大补汤丸君莫惮。

凡痘疮犯着皮嫩易破，本不治之证，但破损之后，重复肿灌，此正气尚强，毒不能入而发于外，亦当依期收靥。设不能靥，乃正气被邪气剥削，虽能逐邪出外，不能逼邪成痈也，急宜大补汤温之，不可因循，反生灾变。

数个顽疮不肯收，犯时鲜血却长流。如逢此证休轻易，破膜伤筋命必休。

痘疮破损，灌肿作痛，不能干水，一名疳蚀疮，一名阳疮。犯着即出血不止，乃难治之证，内服大补汤方见前，外以绵茧散敷之。若逡巡不治，以致灌伤筋骨，穿膜破空，夭人生命者多矣。

灌疮满面血脓多，败面伤睛奈若何！却在良医施妙手，调和中外起沉疴。

如面疮破烂，反复肿灌，脓血浸淫，却防坏眼残形，宜升麻解毒汤清之。

痘疮抓破状多般，出血成坑水更干。搔痒焦疼微小事，伤筋溃肉使形残。

其痘疮抓破之证非一：有破而出血者，阳疮也，宜当归凉血散解之；有破而无水便干枯者，此陷伏也，要疮复灌，肉复肿者为佳，内服托里回生散；有破而成坑者，此内陷也。内服托里回生散，外用白龙散方见前敷之。若不详审以上三症治之。微则残形，甚则伤命。

收靥依期更着痂，或时战栗或言邪。三元正气将回复，不必延医不必嗟。

凡痘欲收靥之时，痂皮圆静，但时或战栗、语言妄谈，此为正气将复，不能自持，不必忧疑，须臾自定。

入　方

天水散　治痘误投补药，反馁正气而不收靥。

白滑石水飞，一两　粉甘草细末，五钱

共研匀，蜜水调，以鹅毛蘸药拂拭疮上。

除湿汤　治脾胃受湿，收靥不齐。

川羌活　漂苍术　北防风　淮木通　结猪苓　宣泽泻　漂白术　赤芍药　上薄桂

净水煎服。

温中托里汤　治痘疮尚未收靥，忽然倒陷，中气虚也。

官拣参　炙黄芪　炙甘草　牛蒡子　当归身　净连翘　上薄桂　杭青皮　南木香

大枣三枚为引，水煎服。

白龙散　治痘疮浑身破烂，不能怀抱者。

用干牛屎烧灰，取中间白者研末筛过，敷烂处。

败草散　用茅屋上烂茅烧灰，研细筛过，铺于席上，任其展转。此草多受霜露，功能解毒故也。

桂枝解毒汤　治痘为风寒郁遏，不能收靥。

上薄桂　赤芍药　牛蒡子　北防风　净蝉蜕

生姜、大枣引，水煎服。

甘露解毒汤　治夏月天令炎热，暑气熏蒸，不能收靥。

结猪苓　宣泽泻　大麦冬　淮木通　小条芩　地骨皮　上薄桂　净连翘　炙甘草

水煎，热服。

当归解毒汤　治里热太甚，大便秘结，不能收靥。

怀生地　大当归　火麻仁　陈枳壳　净连翘　酒大黄　紫草茸

净水煎，空心滚热服。

胆导法　治大便结燥，血不润肠，以此通之，不损元气。

用大猪胆一个，以小竹管插入胆内，以线扎定，吹气令满，另以线打活结，收住其气，以竹插入谷道内，解去活结，捏其胆，令胆汁射入肠中，直待气透，然后去胆，便即通矣。

参归化毒汤　治元气虚弱，疮不收靥。

官拣参　炙黄芪　当归身　牛蒡子　炙甘草

水煎服。

世人不知此等关系，视若泛常，不早求治，待毙而已。悲夫！

生津凉血葛根汤　治收靥忽然大热烦渴。此里有毒也。

粉干葛　天花粉　地骨皮　当归梢　淮木通　净连翘　牛蒡子　酒黄芩　北柴胡　淡竹叶　大拣参　炙甘草

水煎，热服。

大补汤　治痘破烂复灌，元气伤残，不能收靥。

官拣参　炙黄芪　当归身　净连翘　上薄桂　牛蒡子　炙甘草

大枣为引，水煎服。

蚕茧散　治痘疮破烂，水不能干，犯之血出。

用出子蚕蛾绵茧，不拘多少，以白生矾捶碎，纳入茧内，炭火煅之，待矾汁干，研末，干搽疮上即安。

升麻解毒汤　治面疮破烂复灌，脓血不干。

绿升麻　香白芷　酒黄芩　净连翘　净蝉蜕　淮木通　牛蒡子　密蒙花　白蒺藜　荆芥穗　北防风　大当归　炙甘草

灯芯为引，水煎，热服。

当归活血饮　治痘疮抓破而出血者。

当归尾　鲜红花　酒黄芩　净连翘　炙黄芪　官拣参　地骨皮　牛蒡子　生甘草

灯芯为引，水煎，热服。

托里回生散　治痘疮破而无水，即便干枯者。

炙黄芪　大当归　净连翘　上薄桂　牛蒡子　炙甘草

水煎，入烧过人屎调服。

落痂证治歌 凡五首，共三方

痂皮应落偏迟落，但恐斯时还作恶。补脾实表有奇功，未可逡巡轻弃药。

收靥之后，痂壳自残，若粘着皮肉不脱，乃表虚也。尤当禁忌，不可因循，恐生他变，宜调元固本汤治之。

收靥之时不落痂，昏昏喜睡莫咨嗟。只因脾胃多虚弱，调治专从戊己佳。

此证乃脾胃虚而好睡也。胃属戊土，脾属己土，宜健脾开胃，调元清神汤醒之。

落痂之后察疮瘢音盘，平整红鲜日渐安。若是凸凹兼黑黯，好将敷药补形完。

其疮落痂之后，瘢痕平整红活者吉；若

瘢肉凸起，或凹陷紫黑，吉凶未可知也，用灭痕散敷之。

疮痂自落何劳急，捋 掐须防邪气袭。他年终作疱风疡，此际浸淫空涕泣。痂落依期不必忧，缘何头足更迟留？阴阳孤独如鳏寡，安得同时取次收！

凡阳生者，以阴成之；阴生者，以阳成之。经曰：孤阳不生，孤阴不成。其疮收靥，自人中平分上下。发际以上，阳之阳也，谓之孤阳；足膝以下，阴之阴也，谓之孤阴。所以疮之收靥，至此二处，每每迟留，不能便干，不可服药，听其自然则吉。

入　方

调元固本汤　治痘痂粘肉不脱。

官拣参　炙黄芪　当归身　净蝉蜕　炙甘草

生姜、大枣引，水煎服。

调元清神汤　治痘痂粘肉不脱，而昏沉好睡。

官拣参　炙黄芪　大当归　杭麦冬　广陈皮　炒枣仁　炒川连　炙甘草

大枣为引，水煎服。

灭瘢散　治痂落，瘢肉凸凹紫黑。

密陀僧研为细末，以乳汁调搽疮疤，如无乳汁，蜜调亦可。若此药搽上，凸凹者自平，紫黑者自退，应效者吉，不应效者凶。

痘后余毒证治歌

凡三十一首，共四十六方

借问何为痘后痈？只因平塌少成脓。毒邪蕴聚难消散，透节寻关出要冲。

凡痘初出一点血，由血而化至脓，脓成而毒解矣。若出形之后，应起发不起发，应成脓不成脓，一片空壳，状如蛇皮，或平塌破损，都无脓水，本为死证。缘其人脾胃素强，又能饮食，亦可以引日收效。只是毒邪蕴蓄于里，必寻出路于关节之间而为痈肿，但发一二处可治，若流注于手足，发之不止，肿灌不愈，久而死矣。

痘痈先要明经络，解毒调元兼里托。决脓去毒急施功，莫待残形变为恶。

凡痈之发，先看在何经络，分气血多少而治之，次看人之虚实，以解毒托里为先，不可乱施敷药，以致毒不得出，内炎筋骨而成坏证。如肿而未成脓者，用必胜膏贴之；已成脓者，将铍针决破其脓，以生肌散敷之。若肿毒而元气素弱者，以十六味流气饮流通之；若气血虚而泄泻者，加附子以温之；若元气素强者，用连翘解毒汤主之；如痈毒日久，脓血去多者，以十全大补汤扶元解毒。

恶证无如痘后丹，皮肤蕴火毒相干。看他所发归何部？心肾之经治亦难。

赤火丹瘤，恶候也，流移红肿，其痛手不可近。痘疮之后，有发丹瘤者，因蓄火太甚，不能发泄，郁于肌肉之间，故发而为丹。从头上起过心即死，从足下起过肾即死，内服玄参化毒汤解之，外用磁锋砭法。

瘾疹何为痘后呈？肌肤蕴毒未全清。若教发尽无停滞，免得重重怪证生。

瘾者，皮肤间隐隐成疙瘩也，俗人谓之风丹；疹者，皮肤点点状如蚊蚤咬迹也。痘后发瘾疹，因毒火未发尽，藏于皮肤之间，或搔痒因抓而成，或因受风火相搏而成，皆吉兆也，正欲其发泄，无使停留以变他证。如发太甚，内服防风败毒散，外以益元散拭之。益元散，方见前。

痘已收成靥不干，或时出血病难安。从前毒气藏肌表，蚀肉伤肌不忍看。

此与前顽疮不收相同。凡觉痘疮当靥不靥，即防此证，当内服大补汤，外以绵茧散敷之。绵茧散方见前。

翳膜何为眼内攒？怪他热毒壅于肝。还睛去翳多奇术，点洗徒招废弃端。

小儿出痘之时，即用黄柏膏和胭脂涂眼，防斑疮入眼也。但斑疮入眼，本不在初，多在收靥之时，或满面破烂，重复肿灌，脓血胶固，毒火郁蒸在内，其斑疮入眼；或痘出

已甚，成就迟缓，医用辛热之药发之，亦令斑疮入眼；又或收靥之时，喜啖辛热，谓之干浆，以致二火相煽，亦令斑疮入眼。但在白珠上不必治，久而自去，惟在黑轮上者，或掩蔽瞳人，急用密蒙花散治之。

两目今朝乍畏明，肝虚邪火暗伤睛。凉肝养血功无比，能使双眸炯炯清。

凡痘后双目见明不开，暗则开者，谓之羞明，宜凉肝明目散治之；若向暗处亦不开者，却防目中有疮，当如上法治之。

收后缘何便下红？多由倒陷毒归中。利完脓血应须愈，强治翻为聚怨丛。脓血痂皮一路来，任他自止莫疑猜。和中清热施残着，劫涩轻投病转乘。

痘后忽利脓血，待其自止，然后用和中清热之剂，不可便用止涩。但痢势甚者，宜黄连解毒汤清解之，脓血尽后，宜和中汤。

痘证从前无倒陷，缘何脓血利无时？大肠郁火多潜毒，解毒通肠贵早施。

痘无倒陷之证，却有脓血之痢。由于平日食煎炒，素有积热，今因痘后气血虚，不能胜积，故痢脓血也，此名滞下，必然肠鸣作痛，里急后重。或因痘出之后，饮食太多，水停作泄，热毒乘虚入里，便下脓血，此名肠垢，宜调胃承气汤以彻其毒，次用黄芩汤调其阴阳。

最怕收成呕哕频，咽疼胃弱毒潜湮。错喉呛水宜施治，干哕无声死作邻。

有声有物谓之呕，有物无声谓之吐，有声无物谓之哕。食谷即吐谓之错喉，饮水而喷谓之呛水。今痘后凡有此等，由热毒壅塞胃口，故令呕吐；咽门涩塞，故令错喉呛水也。惟干呕乃胃疮腐烂，不能纳谷，故时时张口，似吐不吐，乃不治之证；亦有咽喉作痛，而呕吐失声者，乃咽喉腐烂，亦不可治。惟但呕吐，陈皮竹茹汤；咽喉痛，甘桔汤。

身已清安热不除，或因毒甚或元虚。调元解毒分投用，寒热分明效自如。

痘既收靥，则毒解而热当除矣。如热一向不已，非毒气之余烈，必元气之素虚，惟以脉辨之，如脉数形勇，烦躁而热，引邪气实也，宜知母解毒汤；如脉迟形怯，热而喜睡，此正气虚也，宜黄芩调元汤。

收后浑身一向温，乍然发热细评论。内伤外感须分治，此个真机妙法门。

痘靥之后，一向温暖和平，并无余热，今忽发热，不可以余毒未解、正气之虚同论，必因外感风寒。其证头目昏痛，恶寒脉浮，宜桂枝汤。

或因内伤饮食，其证肚腹饱闷，不喜饮食，其脉弦滑，以补中益气汤加消导药而运用之。

食饮如常腹里疼，盖由脾弱化难能。看他虚实行消导，方显明良三折肱。

收靥之后，忽然腹疼，或呕或泄，不思饮食，此伤食之证。虚则用补中益气汤治之，如无吐利腹痛、气急，宜丁香脾积丸下之。若腹满而痛，烦闷不宁，此毒火入中，急用雄黄解毒丸利之，不然渐加喘急、手足厥冷，则难治矣。

收后缘何食不思？偶然伤食少人知。补脾消导为良法，强忍成疳悔后迟。

一向能食，收后反不能食，闻食气即呕逆，此必食伤，甚则以脾积丸方见前，治之，微则以保和丸调之。若隐忍不急求治，久则消瘦，渐成疳痨矣。

寒热缠身似疟侵，不分早晚应期临。只缘脾胃多虚弱，补气升阳贵酌斟。

此因痘后气血两伤，阴虚则内热，阳虚则外寒，乍寒乍热，俨然疟疾。切不可以为疟治，但以补中益气汤升举之，其病自愈。

收后浑身手足寒，好将气血作虚看。六经脉细如将脱，急早回阳病自安。

凡痘收靥之后，手足厥冷，六脉沉细，元气大虚，急用调元生脉散以温之，稍用寒凉，必取败亡也。

强打精神睡思昏，终朝何事不惺惺？此因毒解神虚倦，气血和平体自宁。

收靥而好睡，乃毒解神虚，此常事也，不必调治。有等苟且之流，欺人不知而取利；庸下之徒，妄用汤丸而致祸者，戒之戒之！

睡思沉沉不识人，恍疑中酒妄言频。只因热伏心包络，保护心君妙入神。

凡收后昏睡，连日不醒，口中妄语，或有醒时，亦似醉人，每多错语，此热邪攻心。心君不肯受邪，传于包络，宜导赤解毒汤清之，或用安神丸亦佳。

收靥之余搐搦紧，责其火毒未全清。清心散火风应退，发作无休命必倾。

痘出发热作搐，此常候也。若收靥之后反发搐者，乃疮发未透，毒火内侵故也。然此候发于收靥之余，血气已衰，治之甚难，宜清神散火汤。如药对病者可治，若连发不已，死证也。

身已康宁手足挛，分明血少致斯愆。补脾养血诚仙诀，不遇知音莫浪传。

凡痘后手足忽然挛拘，不能屈伸转运，乃血少不能养筋，又或外被风寒水湿以致然耳。不可用发散并疏风之药，以耗其血，只宜当归桂枝汤补脾养血，则手足自和。

痘后还愁咳嗽多，总由毒火肺中磨。清金降火兼调气，肩息胸高若命何！

痘疹之后，惟肺受伤，至于收靥毒解，宜乎宁矣。若反咳嗽喘急，乃毒火流人肺中也，当清金降火，宜宁肺汤保肺解毒。服药嗽不止，胸高龟壳肩息者不治。

忽尔浑身肿胀形，或风或水食偏停。肿因肺受宜清表，胀属脾家利解宁。

痘收之后，或面目浮，四肢肿，此属于肺。因表虚而受风寒，仍宜汗解，用加味五皮汤。

若腹胀如鼓，眼胞微肿，此属于脾。由脾胃虚，饮水过多。蓄湿于内，所食过多，积热于中，仍宜利解，宜厚朴汤；倘属虚胀，不可妄攻，但宜莱菔子丸。

小便宜清偶涩迟，膀胱蓄热少人知。不将导赤为良法，只恐迁延有变时。

凡痘疹，小便始终宜清，若收后不利，此热积膀胱，宜加减导赤散以清其心。

便贵滋荣乍觉难，谁知肠胃液津干。润肠胆导宜兼用，纵有余邪便后安。

凡大便始终须宜润泽，一二日一次为佳。若至于收靥后而大便秘结，乃痘出太多，血枯气不润肠，宜润肠丸兼胆导法方见前。

腠理疏通雨汗倾，卫虚荣弱两无情。建中自汗汤偏胜，盗汗归黄六味平。

经曰：卫气者，所以温肌肉，充皮毛，肥腠理，司开合也。痘疮之后，卫气受伤，故收靥之后，卫弱而汗出也。醒时常出为自汗，宜建中汤；睡着而出者为盗汗，当归六黄汤。

血在身中本自宁，火邪迫血血违经。鼻中细出堪调治，便尿中来命不停。

痘收靥后，忽见血证，大为危候。盖鼻血出于肺，吐血出于胃，溺血出于小肠，便血出于大肠，皆由毒入于内，迫血妄行，急宜凉血地黄汤止之。服药后血不止者，不治。

忽吐蛔虫证已非，要知内热又常饥。但闻食臭虫斯出，呕吐心烦虫作威。

伤寒吐蛔，责之胃寒；痘证吐蛔，责之里热。由热毒拂郁于里，又不能食，虫无所养，但闻食臭即涌出者，宜黄连止蛔汤。

炎炎胃火成疳蚀，辛热频餐阳毒炽。牙龈臭烂怕穿腮，药有神功休论值。

凡痘疮后牙龈生疮，时时出血，谓之牙宣；呼吸息臭，谓之息露。此走马疳也。由热在阳明、少阳，宜内服洗心散，外以蚕蜕散敷之。

如舌上生疮，赤者谓之赤口疮，此热在心脾二经，内服洗心散，外用阴阳散敷之；其疮白者，名白口疮，又名鹅口疮，此热在心肺二经，亦服洗心散，外以朱矾散敷之。

食饮缘何不发肌，多因气血两相亏。和平丸散常宜服，偏热偏寒愈见离。

凡儿素常肌肥，痘后羸瘦，虽能饮食，而不为肌肤，乃气血虚故也。治之须兼阴阳，不可偏胜，偏阳则伤血，偏阴则伤气，愈见乖

离矣。阴日宜服参苓白术散，阳日宜服当归益荣丸。

痘后分明皮肉娇，切宜保护在昏朝。风寒暑湿常宜避，洗拭搽挦祸莫饶。痘后中虚食易伤，辛香生冷莫轻尝。若贪口腹浑无忌，犯却中和变内伤。

此二条言收后调理之法。在外也，皮肤薄嫩，易于感冒，若不避风寒暑湿，梳洗搏抬，则至于痈肿者有之，生疮癣者有之；在内也，肠胃并弱，难于克化，若不分生熟软硬、寒热凉温，任意食之，则成胀满者有之，至于泻痢者亦有之。可不慎欤！

入　方

必胜膏　治痘痈初肿而未脓者。

马齿苋取汁　公猪肪熬油　好冬蜜

三味等分，同入砂锅内熬成膏，厚涂肿上。

生肌散　治痘痈已成脓，破烂不能收口。

香白芷一钱　石龙骨五分　浙贝母二钱　赤石脂一钱　新白芨一钱

共为极细末敷。

十六味流气饮　治痘痈肿痛，元气素虚者。

官拣参　大川芎　当归身　赤芍药　北防风　南木香　炙黄芪　上薄桂　香白芷　芽桔梗　尖槟榔　川厚朴　台乌药　紫草茸　陈枳壳　炙甘草

气血虚而泻利者，加熟附子；大便秘结者，加酒蒸大黄。净水煎，半饥服。

连翘解毒汤　治痘痈肿痛，能食而元气强者。

净连翘　香白芷　大川芎　当归尾　赤芍药　牛蒡子　穿山甲　炙甘草

净水煎服。

属太阳经者，本方加川羌活、汉防己；属阳明经者，本方加绿升麻、粉干葛；属少阳经者，本方加北柴胡、枯黄芩；属太阴经者，本方加青化桂、北防风；属少阴经者，本方加川黄连、淮木通；属厥阴经者，本方加北柴胡、杭青皮。

予按：但云六经加味，而不指明处所，未免阙略。今分晰之，以便治疗。太阳经所属：项、背、腰、臀、足外膝、足踹；阳明经所属：额眉眶、面胸、两乳、牙龈；少阳经所属：左右头角、耳前、左右两胁腋；太阴经所属：中脘、四肢、两足跗；少阴经所属：脐腹、手足心、手足内膝、足跟；厥阴经所属：头项、小腹、男妇阴器。

十全大补汤　治痘痈破烂，脓血去多，速救元气。

官拣参　正川芎　当归身　赤芍药　怀熟地　白云苓　炙黄芪　青化桂　香白芷　金银花　净连翘　炙甘草

生姜、大枣为引，水煎服。仍照以前加入引经药。

凡见痈毒，以上法治之，不可因循，恐成大患，微则残形，甚则殒命。

玄参解毒汤　总治痘后余毒，十种火丹。

润玄参　当归尾　怀生地　鲜红花　净连翘　地骨皮　熟石膏　赤芍药　北防风　淮木通　荆芥穗

淡竹叶十片为引，水煎，热服。

磁锋砭法　法见四卷丹毒门。

防风败毒散　治痘后身发癍疹，出而过多者。

北防风　赤芍药　绿升麻　粉干葛　生甘草

水煎，灯芯引，热服。

大补汤　治痘靥而不干，犯之出血。

官拣参　炙黄芪　当归身　净连翘　上薄桂　牛蒡子　正川芎　杭白芍　香白芷　炙甘草

大枣三枚为引，水煎服。

密蒙花散　治斑疮入眼，翳障瞳人。

密蒙花酒洗，五钱　谷精草五钱　净蝉蜕去翅足，洗，晒干，五钱五分　望月砂炒，一两

共为细末，用猪肝一两，竹刀剖开，每

用末药一钱。擦在肝内，水煎肝熟，饮汤食肝，神效。不可轻用点洗之药，反成废弃。

凉肝明目散　治痘后双目羞明怕日。

当归身　草龙胆　北柴胡　正川芎　北防风　密蒙花　酒黄连

用猪肝煎汤，煮药服之。

黄连解毒汤　治痘后患痢，其热甚者。

酒黄连　酒黄芩　陈枳壳　当归尾　酒大黄　生甘草

水煎滚，热服。

和中汤　治痘后患痢，脓血既清，以此和之。

官拣参　大当归　陈枳壳　淮木通　炙甘草

姜、枣引，水煎，温服。

调胃承气汤　治痘后热毒作痢，腹痛，里急后重。

陈枳壳　锦庄黄　尖槟榔　生甘草

生姜三大片为引，水煎滚，热服。

黄芩汤　治痘后痢，已经下后，以此调其阴阳。

酒条芩　酒黄连　当归身　大川芎　淮木通　南木香　赤芍药　炙甘草

久不止，加绿升麻；腹痛，加酒大黄。水煎服。

陈皮竹茹汤　治痘后呕吐，有声有物。

雅黄连用吴茱萸同炒，去吴茱萸，用连　正广皮　白云苓

竹茹一丸为引，水煎，热服。

甘桔汤　治痘后余毒不清，咽喉塞痛。

芽桔梗君　大甘草君　牛蒡子臣

灯芯为引，水煎服。

知母解毒汤　治痘后余邪作热。

净知母　怀生地　熟石膏　地骨皮　酒黄芩　牛蒡子　绿升麻　天花粉　生甘草

淡竹叶为引，水煎，热服。

黄芩调元汤　治痘后元气怯弱，虚热身倦。

官拣参　酒黄芩　大麦冬　当归身　炙甘草

生姜、大枣为引，水煎服。

桂枝解肌汤　治痘后热已尽除，勿因外感作热。

柳杨桂　赤芍药　片黄芩　官拣参　粉干葛　北柴胡　炙甘草

生姜、大枣、竹叶为引，水煎服。

补中益气汤　治痘后久已无热，因伤食发热。

官拣参　炙甘草　漂白术　广陈皮　小枳实　杭青皮　南木香　六神曲　老麦芽　炙黄芪

生姜、大枣为引，水煎服。

丁香脾积丸　治痘后伤食，腹痛气急。

京三棱去毛，醋浸，煨熟　蓬莪术去皮，如上制　公丁香　南木香以上各五钱　杭青皮去瓤　肥乌梅连核烧，存性　猪牙皂烧，存性，以上各三钱　巴豆仁四十九粒，煨，煅，去油极净

共为细末，醋煮面糊为丸，如绿豆大。每三丸或五丸、七丸，量儿大小，白汤送下。

雄黄解毒丸　治痘后伤食，腹满而痛，烦闷不宁。

明雄黄一钱，另研　川郁金三钱　巴豆霜一钱

共为末，米糊丸绿豆大，小茴香煎汤，下三五丸。

保和丸　治痘后一向能食，今不思食，闻食气即呕。

官拣参切片，焙干　漂白术各三钱　白云苓一钱五分　炙甘草　山查肉　老麦芽　六神曲各一钱

共为细末，米糊丸极小。每服一二钱，米饮下。

补中益气汤　治痘后脾虚，寒热似症，非真症也。

官拣参　漂白术　北柴胡　绿升麻　广陈皮　上薄桂　当归身　南木香　炙甘草

虚甚者，加熟附子。生姜、大枣为引，水煎服。

调元生脉散　治痘后手足冷，脉沉细，极虚之征。

官拣参　炙黄芪　炒白术　全当归　大麦冬　北五味　青化桂

虚冷甚者，加熟附片。生姜、大枣为引，水煎服。

导赤解毒汤　治痘后神昏妄语，余热未除也。

淮木通　怀生地　大麦冬　白茯神　黑栀仁　上拣参　石菖蒲　炙甘草

灯芯为引，水煎服。

安神丸　治证同前。

真吐黄五分　正雅连炒，三钱　当归身　黑栀仁各二钱五分

共为细末，以猪心血和匀为丸，如绿豆大，朱砂为衣。每五七丸，灯芯汤下

清神散火汤　治痘后毒邪未飞，忽然作搐。

淮木通　润玄参　大麦冬　正川连　大当归　官拣参　白茯神　炙甘草

大便秘者，微加酒大黄；自利者，倍人参。水煎，去渣，以辰砂末调服。

当归桂枝汤　治痘后血少，手足拘挛，不能转运。

官拣参　当归身　正川芎　白芍药　炙黄芪　漂苍术　川黄柏　炙甘草

气虚肢冷，加附片；感冒风寒，以致筋骨痛，加羌活、防风；气血大虚者，加鹿茸、虎胫、淮牛膝。姜、枣为引，水煎，微加好酒一杯对服。

宁肺汤　治痘后邪火未退，侵扰肺脏，致令咳嗽。

净知母　牛蒡子　北沙参　怀生地　地骨皮　大麦冬　熟石膏　生阿胶　信前胡　杭白芍　炙甘草

新桑叶七片，枇杷叶一片引，水煎，入竹沥对服。

加味五皮汤　治痘后面目浮、四肢肿。

川羌活　五加皮　漂苍术　桑白皮　上薄桂　北防风　淮木通　汉防己　结猪苓　炙甘草　生姜皮

灯芯为引，水煎，热服。

厚朴汤　治痘后腹胀如鼓，眼泡肿，由水湿饮食所致。

漂苍术　川厚朴　广陈皮　结猪苓　大腹皮　茯苓皮

因于食者，加六神曲、山查肉、京三棱、蓬莪术、小枳实。生姜、大枣为引，水煎，热服。

莱菔子丸　治痘后虚胀，面唇白，四肢冷者。

莱菔子炒，五钱，另研　洋胡椒厚朴煎汤浸过，晒干用，二钱　漂白术土炒，二钱

共为末，蜜丸。每一钱，陈皮汤下。

加减导赤散　治痘后余热，郁积膀胱，小便赤涩。

淮木通　车前子　麸麦穗　白滑石　赤茯苓　黑栀仁　淡竹叶

灯芯为引，水煎，热服。

润肠丸　治痘后大便秘结，血枯气弱也。

当归尾　怀生地　火麻仁　光桃仁

莱菔子为引，水煎，热服。

蠲中汤　治痘后阳虚自汗，醒着而出者。

柳杨桂　白芍药　当归身　炙黄芪　炙甘草

生姜、大枣为引，水煎，热服。

当归六黄汤　治痘后阴虚盗汗，睡着而出者。

当归身　怀生地　怀熟地　炙黄芪　片黄芩　酒黄连，酒黄柏

小麦一撮为引，水煎，热服。

凉血地黄汤　治痘后毒火流行，伤阴动血。

真雅连　当归尾　怀生地　黑玄参　炒栀仁　生甘草

鼻血，加丝茅根、新桑叶；吐血，加熟石膏、净知母、乳童便、香附米；尿血，加淮木通、白滑石；便血，加北秦艽、槐角子、

荆芥穗；不止，加蒲黄茸、生藕节、生柏叶。莲蓬壳烧灰为引，水煎服。

黄连止蛔汤　治痘后吐蛔，此即仲景乌梅丸之变剂。

官拣参　漂白术　川附片　川黄连　川黄柏　肥乌梅　真黎椒

净水浓煎，人参汤对服。

洗心散　治痘后走马牙疳，并赤口疮、白口疮。

川黄连　当归尾　怀生地　锦庄黄　淮木通　南薄荷　净连翘　牛蒡子　生甘草

灯芯十根为引，水煎，热服。

蚕蜕散　治痘后走马牙疳，以此吹之。

蚕蜕纸烧灰，一钱　枯白矾二钱　人中白取久年者，火煅，二钱　五倍子二钱

共为末。洗净败血，以此药搽之。

阴阳散　治痘后赤口疮。

正川连二钱　黑炮姜一钱

共炒，研细末。用茶洗净败血，以此药敷之。

朱矾散　治痘后白口疮。

镜辰砂二钱　枯白矾一钱

共研为细末，用茶洗口疮，以此药敷之。

参苓白术散　治痘后饮食不为肌肤。

官拣参二钱　漂白术三钱　白云苓二钱　真广皮二钱　怀山药一钱五分　南木香一钱　六神曲一钱　杭青皮一钱

共为末，米饮调服一钱，阴日服此。

当归益荣丸　治证同前

当归身　正川芎以上俱二钱　正川连姜汁炒，一钱五分　真芦荟二钱二分，蒸，切　使君子肉一钱二分

共为末，蜜丸。米饮下，阳日服此。

妇女痘疹证治歌凡十二首，共十一方

女人痘疹最难医，阴质从来血易亏。待得疹疮将发日，只愁天癸有常期。

《正理论》云：婴儿女子，益以兹甚。以女人阴质，血常不足。痘疹始终以气血为主，一或不足，则变生焉。故女子十四岁已后，有出痘疹者，常恐天癸之行，血走气虚，每成伏陷。

发热经行非正时，火邪迫血血奔驰。急须凉血停为美，莫待中虚悔却迟。

痘疹发热，经水妄行，却非天癸之期。此毒火内蕴，扰乱血海，迫经妄行，月事不以时下，宜玄参地黄汤，或四物合黄连解毒汤，以凉血为主，必欲其止。如久不止，中气虚弱，致生陷伏者有之。

发热时逢经水行，毒邪已解污方清。过期不止须当虑，补气温经热自平。

发热之时，经水适逢其期，此积污得去，毒亦轻解，不须治之。若过四五日尚不止，以热邪乘血室之虚，迫血妄行，宜先服小柴胡加生地黄汤，以清血室之热，后用十全大补汤以补气血之虚，令其出匀，易壮易靥。

适逢发热经斯断，血室空虚怕烦懑。若然谵妄神不清，热入子宫 医莫缓。

发热时经水适断，宜早服柴胡四物汤，以防血室空虚，毒邪乘虚而入，致生他疾。若已憎寒壮热，神识不清，妄诞见闻，言语错乱，此为热入血室，宜四物汤合导赤散，与安神丸相间服之。

女子居经日已赊，岂堪痘疹证来加！却愁血海停污垢，犹虑胞门隐毒邪。

女子经闭，谓之居经，满而不泻，病在心脾。经曰：二阳之病发心脾，女子不月。痘疹之毒发于心，又以脾为主，心脾先病，血室不行，冲任之间已多积垢。一旦痘疹之火郁于命门、胞户之中，当出不出，毒邪留伏，致生乖戾者有之。故发热之初，即当涤除停垢，以桃仁承气汤主之，后以四物汤合匀气散调理之。

崩漏多时血已枯，泻而不满有余无。岂堪当此天行病！济弱扶倾在吸呼。

女子一向崩漏未止，气血已虚。若当天行痘疹，必不能任其毒，惟宜大补气血为主，十全大补汤。痘出，灰白平陷，难发难靥者，

更加熟附一一二钱。

起发成浆忽动经，气随血散岂能停！食多胃足无他虑，不食须防陷伏形。

痘既出现已后，最宜表里俱实，饮食能多。若当起发胞浆之时，天癸忽动，人但知恐被秽气独犯正气，不知自身之血，不足为厌。但血出而气亦虚，毒邪乘虚陷入于里，惟元气素壮能食者，必无是变。如气虚食少之人，未有不成陷伏者，宜十全大补汤主之，虚甚者，加熟附、鹿茸。

经行暴哑毒邪侵，血出津枯乍失音。养血通心言语出，一朝声价值千金。

女子出痘，经水忽行，暴哑不能言。盖心主血，舌乃心之苗，血去则心虚，心虚则少阴之脉不能上荣于舌，故卒失音不语。先以当归养心汤养其心血，利其心窍，自然能言，以十全大补调之。

起发经行证已乖，内虚伏陷早安排。药灵中病终须吉，证逆违师事不谐。

月事大行，其疮不起发，不光壮、不饱满、不红活，顶平陷灰白色，或青干黑陷者，此里虚之候，痘复陷入也，宜十全大补汤与夺命散相间服之。其痘胖壮红绽，或痘空中，再出一番，大吉之兆；若加腹胀喘满，谵妄闷乱，寒颤咬牙，手足厥冷，必死也。

妊娠出痘有真传，惟有安胎法最先。不可令胎轻独动，胎元独动命归泉。

孕妇出痘，始终以安胎为主，不可触动其胎。其初发热，以参苏饮发之；痘出现后，多服安胎饮为佳；起发收靥迟，十全大补汤去肉桂。

痘正丰时产正临，几人得法有规箴。涤除恶露休轻易，补益元神功效深。

孕妇出痘，正当盛时，忽临正产，只以大补气血为主，十全大补汤。若腹中微痛，此恶露未尽也，宜涤去之，生化汤。

产后如逢出痘疮，此时胎去免忧惶。只凭补益收功效，莫犯寒冷生气伤。

妇人产后出痘，只以大补气血为主，十全大补汤。其白芍用好酒炒熟，不可妄用寒凉，以伤生发之气也。

入　方

玄参地黄汤　治妇女痘疹作热，经水不依期而至，此妄动也。

怀生地　润玄参　粉丹皮　绿升麻　黑栀仁　炒滴黄　生甘草　灯芯十茎，为引

水煎，热服。

四物合黄连解毒汤　治证同前，火盛毒重者用此。

当归身　怀生地　杭白芍　正川芎　正雅连　川黄柏　条黄芩　黑栀仁

净水浓煎，热服。

小柴胡加生地黄汤　治妇女痘初作热，正值经期，若四五日不止，宜清血热。

官拣参　软柴胡　小条芩　法半夏　怀生地　炙甘草

生姜一片，大枣一枚，水煎，热服。

十全大补汤　治妇女痘疹发热，经行之后当补之，以免陷伏。

官拣参　漂白术　白云苓　当归身　正川芎　杭白芍　怀熟地　炙黄芪　青化桂　炙甘草

生姜一片，大枣一枚，水煎，温服。

柴胡四物汤　治妇女经血方净，适逢痘疹作热，宜升提。

官拣参　软柴胡　小条芩　当归身　正川芎　怀生地　杭白芍　地骨皮　杭麦冬　光知母　淡竹叶

生姜一片引，水煎，热服。

四物合导赤散　治妇女经后出痘，热入血室，神识不清，谵妄。

全当归　正川芎　杭白芍　怀生地　川木通　怀熟地　炙甘草

灯芯十根，水煎，热服。

安神丸　治证同前，与前方间服。

真川连　全当归　杭麦冬　白云苓　炙甘草以上各五钱　镜辰砂一钱　梅花片二分五厘

共为细末，以腊猪心血搀和，少加炼蜜，杵千余下，为丸芡实大，每一丸，灯芯汤下。

桃仁承气汤　治妇女经闭日久，正值痘临，宜疏去垢秽，免留伏。

大桃仁二十个，去皮尖，研泥　川庄黄二钱，酒润　鲜红花一钱　生甘草五分　桂枝尾五分

先煎大黄、桂枝、红花、甘草，汤成去滓，入桃仁泥化开，空心服。

四物合匀气散　治疏通经水之后，以此调其气血。

当归身　川芎　京赤芍　怀生地　南木香　京查肉　炙甘草

水煎，不拘时服。

十全大补汤　方见前。

当归养心汤　治妇女痘疹经行之后，忽然暴哑。

官拣参　大拣冬　绿升麻　全当归　怀生地　炙甘草

灯芯二十根为引，水煎，热服。

夺命丹　治痘方起发，正值经期，其血大下，以致陷伏，以此与**十全大**补汤间服之。

净麻黄蜜酒炙黑　绿升麻各三钱　山豆根　鲜红花　牛蒡子　净连翘各二钱五分　净蝉蜕　紫草茸　人中黄各三钱

共为细末，蜜酒和丸芡实大。每二丸，薄荷叶煎汤化服。

参苏饮　治孕妇出痘，发热之初，以此疏通腠理。

官拣参　紫苏叶　芽桔梗　粉干葛　信前胡　广陈皮　白云苓　陈枳壳　南木香　炙甘草

生姜一片，红枣一枚，水煎服。

安胎饮　治孕妇痘已出现，以此固其胎气。

拣人参　漂白术　实条芩　怀熟地　正川芎　全当归　杭白芍　西砂仁　老苏叶　广陈皮　炙甘草

生姜三片，红枣三枚，水煎，温服。

生化汤　治孕妇出痘，适逢正产，产后腹痛，恶露未尽。

当归身五钱　正川芎二钱　光桃仁二十粒　黑炮姜一钱　炙甘草一钱

净水浓煎服。

麻疹骨髓赋

麻虽胎毒，多带时行，气候寒温非令，男女传染而成。其发也，与痘相似；其变也，比痘匪轻。愚夫愚妇每视为泛常，若死若生总归于天命。不知毒起于胃，热流于心。始终之变，肾则无证；脏腑之伤，肺则尤甚。闭户问途，何若出门寻径；扬汤止沸，不如去火抽薪。

初时发热，俨似伤寒。目出泪而不止，鼻流涕而不干。咳嗽太急，烦躁难安。以火照之，隐隐皮肤之下；以手抹之，亭亭肌肉之间。其形若疥，其色若丹；随出随没，乍隐乍现。根窠若肿兮，麻而兼瘾；皮肤若赤兮，麻以夹斑。似锦而明兮，十有九吉；如煤而黑兮，百无一痊。

麻毒最重，治法不同。微汗常出，热势越而不留；清便自调，毒气行而无壅。腠理拂郁兮，即当发散；肠胃秘结兮，急与疏通。苟视大而若细，恐变吉而为凶。故衄血不必忧，邪从衄解；利血不必止，毒以痢松。所喜者身中清凉，可畏者咽中肿痛。饮水不休，法在生津养血；饮食若减，方须清胃和中。

又如出之太迟，发表为贵；出之过甚，解毒堪宜。毋伐天和，常视岁气。寒威凛凛，毒势郁而不行；火热炎炎，邪气乘而作疠。或施温补，勿助其邪；若用寒凉，休犯其胃。制其过但取其平，诛其暴必欲其正。远寒远热，阴阳之胜负不齐；责实责虚，人禀之强弱或异。

麻疹既出，将息尤难。坐卧欲暖，饮食宜淡。风寒若袭兮，为肿为热；咸酸不禁兮，为咳为喘。异气纵感，变证宜参。便多脓血兮，仓廪血热；咳多涎沫兮，华盖伤寒。口烂唇裂，心火未退；皮焦发槁，荣卫将枯。苟

不详于临证，何以见其折肱？

麻痘西江月 凡二十首

麻痘俗呼麻子，盖因火毒熏蒸。朱砂红点遍身形，发自胃经一定。切忌黑斑死证，最宜赤似朱樱。大都治法喜凉清，不许辛甘犯禁。

麻疹因何咳嗽？盖由肺胃相连。肺金被火苦熬煎，以致咳嗽气喘。治法清金降火，不宜误用辛甜。蒸笼包子譬如然，只要气松火遍。

麻疹如何辨认？分明状似伤寒。此多咳嗽有红斑，喷嚏眼中水现。或见腹疼阵阵，或时吐泻相兼。疹麻吐泻不须嫌，正要毒除热减。

麻与痘疮异治，二家不可同方。痘宜温解疹宜凉，又要现形为上。若受风寒不出，其间凶吉难量。急宜发散保安康，最怕神昏腹胀。

大凡麻痘未出，详看天令如何？假如日暖又风和，败毒荆防堪可。若是时行疫疠，芩连消毒宜多。用心调理救沉疴，坐井观天莫学。

且论荆防败毒，真为发散仙方。荆防生地要相当，酒炒芩连二样。桔梗人参甘草，连翘牛蒡无双，玄参酒柏妙真良，竹叶升麻停当。

又有芩连消毒，散火解毒尤佳。芩连栀子及升麻，桔梗石膏多把。甘草人参知母，连翘牛蒡红花，引寻竹叶要多加，此个方儿无价。

发散仍前不出，令人真个忧疑。麻黄酒蜜炒如煤，栀柏芩连一例。更着大黄酒炒，连翘莠子相宜。石膏蝉蜕最为奇，不效命难再立。

如见出时紫黑，此般自古多凶。急求人屎路朝东，火煅成灰取用。研碎酒调吞下，须臾黑变为红。若还依旧黑朦胧，纵有神丹何用？

麻已现形发热，化斑汤用为先。石膏甘草及人参，桔梗连翘灵验。若是毒多热甚，芩连消毒真传。大肠秘结大黄添，务用微通数遍。

麻疹类多咽痛，火邪熏烁无他。连翘甘桔要多加，牛蒡射干同下。外用十宣妙散，吹喉休要吁嗟。假如药后有争差，消毒芩连妙也。

麻疹再兼泻痢，预先用药调医。泻时减桂五苓宜，加上甘草滑石。如是痢兼赤白，香连丸子相随。大端痢止便为奇，不效令人疑忌。

麻咳声声气促，只消降火清金。赤苓栀子并黄芩，桔梗石膏灵应。知母人参地骨，瓜蒌杏子玄参。麦冬牛蒡妙如神，竹叶将来作引。

麻后切防四证，因循多致误人。遍身久热欠清宁，咳嗽连声牵引。牙齿疳生走马，痢下赤白难禁。各求方法贵精纯，始是医家绝品。

为甚身中壮热，只因余毒连绵。金花丸子用芩连，龙胆栀仁堪羡。郁金雄黄解毒，灯芯地骨汤煎。若还脾弱热长延，集圣胃苓任选。

咳嗽频频不止，或因不忌酸咸，又加火毒肺家延，尤恐胸高气喘。体实兼行葶苈，神虚清肺为先。如斯调理保安痊，莫向风波弄险。

葶苈丸除肺热，杏仁防己为奇。牵牛葶苈枣相随，莱菔共研成剂。清肺神丹降气，盐汤煮焙陈皮。芩连甘草杏仁泥，苏子同丸甚美。

口齿生疮臭烂，此名走马牙疳。金花丸子好求安，外用除疳妙散。先取尿缸白垢，火烧白色如盐。更将五倍铜绿添，砒枣烧灰灵显。

赤痢泻时鲜血，黄连柏叶槐花。枳壳荆芥穗同加，痢止血除方罢。白痢吴萸滑石，槔根枳壳升麻。乌梅取肉作丸佳，赤白香连可

下。

四疾更防死证，临门休要殊差。儿多体热瘦如麻，咳嗽面青声哑。走马唇穿齿落，痢多禁口吁嗟。此般即是死冤家，任是神仙也怕。

麻疹证治歌凡二十五首，共二十九方

痘麻胎毒发于心，胃腑相连热毒侵。咳嗽鼻中清涕出，且观双目泪淋淋。

痘麻皆胎毒所为。毒者，火也。痘为少阳相火，阳道常饶，故痘大而燃肿；麻乃少阴君火，阴道常乏，故麻小而碎密。心火旺则肺受之，故治麻当以肺为主。凡咳嗽者，火炎于肺也；鼻流清涕者，以火铄金而液自流也；目中泪出，乃肺热移于肝也；凡手掐眉目鼻面者，肺热证也。

凡遇冬温最不详，民多疫疠发疮疡。若逢斑疹相传染，可用汤丸预解良。

春温夏热，秋燥冬寒，此四时之主气也。冬应寒而反温，阳先暴泄，火令早行，人感其气，至于来春必生疮疹。未出痘麻者，必感而发，虽曰胎毒，未有不由天行厉气，故一时传染，大小相似。但见麻疹之出，宜服代天宣化丸以预解之，可使毒彻，不为已甚也。

麻出须明岁气先，忽轻汗下致颠连。察人虚实施方法，暗损天和寿不坚。

麻初发热，与伤寒相似，但麻疹则面颊赤，咳嗽喷嚏，鼻流清涕，目中泪出，呵欠喜睡，或吐泻，或手掐眉目鼻面，宜升麻葛根汤，不可作伤寒，妄用汗下也。汗之则增其热，为衄血，为咳血，为疮咽痛，为目赤痛，为烦躁，为大小便不通；下之则虚其里，为滑泄，为滞下。经曰：必先岁气，毋伐天和。此之谓也。

麻喜清凉痘喜温，须知麻痘不同门。麻苗痘实无人解，寒热宜分未可浑。

麻喜清凉，痘喜温暖，此法人皆知之。然麻疹初发，亦宜和暖则易出，所以发苗之初，只要发出得尽，则毒便解矣。若痘必苗而秀，秀而实，毒斯解也。然成实之时，若太温热，则反溃烂不收，是痘后亦宜清凉。故治痘麻，无过热，无过寒，温凉得宜，阴阳自和，是为得之。

麻毒从来不可留，出完毒解便无忧。腹中胀痛邪犹伏，喘促昏迷命必休。

麻疹只怕不能得出，若出尽，毒便解矣。凡麻疹发热之时，当审时令寒暄，以药发之。如时令大寒，以桂枝葛根汤发之；大热，以升麻葛根汤合人参白虎汤发之；不寒不热，以荆防败毒散发之。如兼疫疠时行，以人参败毒散发之，外以胡荽酒，用苎麻蘸酒遍身戛之，务令亟出。若发而不出，反加腹中胀痛，气上喘促，昏闷谵妄者，死证也。

过期不出势淹延，毒伏身中未得宣。急用透肌休怠玩，岂堪脏腑受熬煎！

发热六七日已后，明是麻证，却不见出。此皮肤坚厚，腠理闭塞，又或为风寒袭之，曾有吐泻，乃伏也，急用发表之剂，麻黄汤去杏仁，加蝉蜕、升麻，外以胡荽酒散麻刮之。如前未更衣者，毒甚于里，伏而不出，凉膈散加牛蒡子发而解之。再不出者，死证也。更衣，谓大便也。

肺为华盖脏称娇，毒火炎蒸津液消。喘嗽连声痰唾少，急须清润救枯焦。

麻疹初发热时，未见出现，咳嗽百十声不已，上气促急，面浮目胞肿，时卧时起。此火毒内蒸，肺叶焦举，宜甘桔汤加石膏、知母、牛蒡子主之。

火热熏蒸汗不停，毒邪并迫血违经。汗多卫表邪从解，血去荣中毒少宁。

麻疹发热自汗，或鼻血出，不须止之，亦发散之义。故汗者毒从汗散，衄者毒从衄解，但不可太过。如汗太多，人参白虎汤合黄连解毒汤清之；衄太甚，玄参地黄汤凉之。

发热乍然生吐泻，由他频出不须怕。肠胃停污自此清，胞胎之毒全消化。

麻疹发热吐泻，纯是热证，不可作寒论，

乃火邪内迫。毒在上焦则吐，毒在下焦则泻，毒在中焦则吐泻并作。单泻，黄芩汤；吐而兼泻，黄芩加半夏汤；自利，里急后重，黄连解毒汤合天水散。

毒火熏蒸气上腾，咽喉自此痛烦增。从来麻痘多斯证，解毒清咽效自能。

麻痘咽痛，本为常候，乃火毒熏蒸而痛也，勿与喉痹同论，妄用针刺。盖喉痹之证，内作痈肿，故宜以针决去恶血，麻痘只是咽干作痛，宜甘桔汤或鼠粘子汤，细细咽之自愈。

麻毒如焚饮水饶，炎邪未许一杯浇。咽喉急燥心家热，津液频枯胃腑焦。

麻疹渴喜饮水，纯是火邪，肺焦胃干，心火内亢故也。初发热作渴，升麻葛根汤方见前加天花粉、麦门冬；渴甚，人参白虎汤合黄连解毒汤方见前

一齐涌出莫惊惶，顷刻浑身朱锦庄。似痘出时还又没，如瘢红处却成疮。

痘疹贵三四次出，谓出匀；麻疹贵一齐涌出，谓出尽。麻疹只要得出便轻减，以火照之，遍身如涂朱之状，此将出之兆。出形细密，与痘疹密者相似，但麻疹粒粒成疮，非若瘢又皮红成片，如蚊咬之迹也。

痘疮赤艳痒来攻，麻见红鲜毒得松。白色血虚犹可疗，黑斑恶证莫相逢。

痘麻之色不可同论，大抵痘怕太红，皮嫩易破，必生燥痒；麻喜通红，麻发于心。红者，火之正色。若麻色淡白，心血不足，宜养血化斑汤主之；色太红艳，或微紫，或出太甚，并宜大青汤。黑者，死证也。

麻之出没合阴阳，出以温和没以凉。连出不收阳气盛，迟迟间出是阴强。

麻疹出没，常以六时为准。假如子后出，午时即收；午后出，子时即收，乃阳生阴成，阴生阳成，造化自然之数。凡此旋出旋收者轻。若一出连绵三四日不收，乃阳毒太甚，大青汤方见前解之；逡巡不出，乃风寒外束，皮肤闭密，宜荆防败毒散方见前。

麻出浑身似火烧，毒邪壅甚急难消。解肌只许皮肤暖，救里还期便溺调。

麻疹欲出，则遍身发热，或烦躁，或头眩，或身拘急；及既出，则身即清凉，诸病悉解。此一层麻疹随收矣。如麻既出，热甚不减，此毒壅遏，宜大青汤方见前以解其表；小便涩，大连翘汤以解其里；大便秘，凉膈散方见前加牛蒡。

麻疮出尽得安和，毒水清时奈若何。拂拂热烦邪尚炽，频频呕泻毒犹多。

凡麻疹只要出得尽，则毒邪解散，正气和平。如怫怫发热，烦闷不宁，如蛇在灰，如蚓在尘之状，或呕吐，或泄泻，此毒邪壅遏，尚未出尽。烦热，黄连解毒汤；呕泻，黄连橘皮汤。二者并外用胡荽酒，以苎麻蘸酒搽之。方法见前。待麻出尽，则烦热自除，呕泻自止矣。

麻毒流殃为伏邪，几经恶候致嗟呀。虽然疫疠由天降，也是因循人事差。

麻疹欲出未出之时，即当早为发散，以解其毒，庶无余灾。若不预解使之尽出，以致毒蓄子中，麻后必为壮热，日久枯瘁，或成搐弱，或为痫疾，或咳血喘促，或作疳蟨而死。此虽一时疫疠之染，未有不由人事之未尽。

麻后连日热不除，蒸蒸烙手发毛疏。骨消骨立成疳瘦，幸有良工药可茹。

麻疹收后，身有微热，此虚热也，不须施治，待气血和畅，自然清凉。若热太甚，或日久不减，以柴胡麦冬散清之；如发枯毛竖，肉消骨立，渐渐羸瘦，柴胡四物汤主之。

发热无休神渐昏，忽然瘈疭乍惊魂。莫将痉病同调治，退热凉心命可存。

痘后热不除，忽作搐搦，不可称为惊风而用风药，宜导赤散加人参、麦冬，煎汤送安神丸方见女人麻疹条。小便清者可治，短少者不可治。

麻毒流殃走马疳，牙龈溃烂药空含。穿喉漏颊声音哑，早赋归欤疾似骖。

凡麻后牙龈黑烂，肉腐血出、息臭冲人，曰走马疳。马鸣散主之。若面颊浮肿，环口青黑，颊漏齿脱，唇崩鼻坏者，死证也。宜从卷四齿牙门参考。

麻后泄泻名休痢，昼夜无停真可异。勿轻劫涩图霸功，禁口毒深凶莫避。

麻后泄痢，日久不已，曰休息痢。不可妄用涩剂以图霸功，宜黄芩汤合六一散煎送香连丸。若呕吐不能食，谓之禁口。更加肠滑不止，或下鲜血，或如烟尘水者，死证也。

炎炎胃火金遭迫　咳嗽百声痰阻隔。胸高肩息目虚浮，摆手摇头泉下客。

麻疹收后微咳，此肺气未平，不须调治。若咳转甚，喘气上逆，发则连绵不已，此肺中伏火，宜人参清膈散主之；身热，门冬清肺汤主之。若咳久不止，面浮目胞肿，胸高而喘，息则耸肩，血自口鼻中出，面色或青或赤，鼻燥昏闷，摇头摆手者，死证也。

麻收禁忌切须防，盐醋鸡鱼慎勿尝。欲莫从心终是福，物多爽口定为殃。

麻后通禁鸡鱼炙煿盐醋之类，须过七七之后方可食之，惟宜食淡，不可纵口，以遗后患也。

麻收无恙将平复，饮食如常未纵欲。心胸绞痛忽倾亡，疫疠侵凌名中毒。

曾见痘麻收后，动止出入饮食如常，忽然心胸绞痛而死者，还是元气怯弱，疫疠之毒乘之。正不能胜，邪伏于中，外若无病，内已亏损，故一中而死，谓之中恶。

婴孩初离胎壳中，遍身斑驳似朱红。胎中热毒于今现，莫作时行麻疹攻。

凡小儿初生未满月者，遍身红点，俗呼奶麻子是也。此胎中受热，故生下即发，现于皮肤，不可作时行麻毒论治，妄用汤剂。盖脏腑娇嫩，不能胜汤丸也，宜溯源解毒汤与乳母食之。

入　方

桂枝葛根汤　治严寒时令，麻毒难出，以此发之。

柳杨桂　粉干葛　赤芍药　绿升麻　北防风　炙甘草

生姜三片，淡豆豉一钱为引，水煎服。

升麻葛根合人参白虎汤　治炎天暑月，毒为热隔，以此凉解之。

绿升麻　粉干葛　白芍药　炙甘草　净知母　熟石膏　上拣参

糯米一撮，水煎服。

荆防败毒散　治天时不寒不热，以此平解之。

上拣参　北柴胡　正川芎　芽桔梗　荆芥穗　白云苓　陈枳壳　信前胡　川羌活　川独活　北防风　炙甘草

薄荷五片为引，水煎，热服。

人参败毒散　时逢疫疠流行，适值麻疹，以此凉解之。

官拣参　川羌活　川独活　信前胡　北柴胡　川芎劳　白云苓　陈枳壳　芽桔梗　炙甘草

生姜三片，水煎服。

胡荽酒俗名芫荽　治麻疹不出，以此发之。

胡荽四两切碎，先以好酒二杯，壶内煎滚，方入胡荽在内，盖定勿煎，勿令泄气，以当麻蘸酒，遍身戛之。使麻易出，真神法也！

麻黄汤　治麻疹六七日，应出不出，或风寒闭塞。

净麻黄　熟石膏　净蝉蜕　绿升麻　炙甘草

葱白三寸为引，水煎服。

凉膈散　治麻毒深重，里气不通，而应出不出。

锦庄黄　白芒硝　净连翘　黑栀仁　南薄荷　淡竹叶　甘草梢

水煎，去渣，加生蜜三匙和服。

甘桔汤　治麻疹胃火炎肺金，咳嗽面浮，应出不出。

生甘草　芽桔梗　熟石膏　净知母　牛

蒡子

生薄荷叶五片为引，水煎服。

人参白虎合黄连解毒汤　治麻疹自汗太过，恐防卫弱，以此止之。

官拣参　净知母　熟石膏　生甘草　正雅连　川黄柏　片黄芩　黑栀仁

糯米一撮为引，水煎，热服。

玄参地黄汤　治麻疹衄血太过，恐防伤阴。

润玄参　怀生地　粉丹皮　黑栀仁　绿升麻　杭白芍　生蒲黄　生甘草

茅根即丝茅根也，七茎为引，水煎，热服。

黄芩汤　治麻疹发热自利。

枯黄芩　白芍药　炙甘草

大红枣一枚为引，水煎，热服。

黄芩加半夏汤　治麻疹发热吐泻。

即前黄芩汤加半夏、生姜。

黄连解毒合天水散　治麻疹自利，里急后重，欲作痢也。

正雅连　川黄柏　枯黄芩　黑栀仁　飞滑石　炙甘草

净水浓煎，空心滚热服。

甘桔汤　治麻疹咽喉疼痛，饮食难艰。

生甘草君　芽桔梗臣　牛蒡子使

灯芯十茎为引，水煎服。

鼠粘子汤　治证同前，稍重者用此。

鼠粘子炒　绿升麻　鲜射干　生甘草

灯芯为引，水煎，热服。

养血化斑汤　治麻疹色淡白，心血不足。

官拣参　当归身　怀生地　鲜红花　净蝉蜕

生姜、大枣引，水煎服。

大青汤　治麻疹色太红，或微紫，或出太甚。

鲜大青　润玄参　怀生地　熟石膏　净知母　川木通　地骨皮　荆芥穗　生甘草

淡竹叶十二片为引，水煎，热服。

大连翘汤　治麻疹既出，热盛不减，小便短涩。

净连翘　北防风　瞿麦穗　荆芥尾　淮木通　车前子　当归尾　北柴胡　净蝉蜕　赤芍药　枯黄芩　白滑石　黑栀仁　紫草茸

灯心十茎为引，水煎，热服。

黄连解毒汤　治麻疹出后，仍发热烦躁。麻出未尽也。

川雅连　川黄柏　黑栀仁　枯黄芩

净水煎滚，热服。

柴胡橘皮汤　治麻疹热邪未尽，麻未出完而兼吐泻。

官拣参　软柴胡　广陈皮　枯黄芩　法半夏　白云苓

竹茹一团，生姜一片为引，水煎服。

柴胡麦冬散　治麻疹收后，大热不退，毒未出尽也。

官拣参　软柴胡　北沙参　大拣冬　润玄参　草龙胆　炙甘草

灯芯一团为引，水煎，热服。

柴胡四物汤　治麻疹收后，发热不退，毛焦肉削。

官拣参　北柴胡　枯黄芩　当归身　正川芎　怀生地　杭白芍　地骨皮　杭拣冬　净知母　淡竹叶

桑叶三片为引，水煎服。

导赤散　治麻后热不除而作搐。

怀生地　淮木通　麦门冬　生甘草

淡竹叶七片为引，水煎服，送安神丸。

马鸣散　治麻后牙龈溃烂，臭气冲人。

马鸣蜕即蚕蜕也，火烧过，存性，二钱五分　人中白即尿桶垢，刮取，火煅如盐，五钱　五倍子二钱　白明矾二钱，将矾打成块，装入五倍子内，火煅，以矾枯为度

共为极细末，以米泔水洗口，然后敷此。

黄芩汤合天水散　治麻后患痢，日久不已，仍宜清解。

枯黄芩　杭白芍　白滑石　粉甘草

大枣二枚为引，水煎熟，去滓，送后香连丸。

香连丸　治证同前。

真雅连一两，以吴萸黄五钱同炒，去吴萸黄不用　南木香五钱，锉细末　广陈皮五钱　建莲子去心皮，二钱五分

共为细末，醋打神曲糊为丸，如绿豆大。每服一钱。

人参清膈散　治麻后咳嗽日久，连绵不已。

官拣参　北柴胡　当归身　杭白芍　净知母　鲜桑叶　漂白术　白云苓　炙黄芪　地骨皮　枯黄芩　白滑石　熟石膏　生甘草

生姜一片为引，水煎服。

门冬清肺汤　治麻后咳喘不已，身热而烦。

天门冬　麦门冬　净知母　鲜桑叶　怀生地　枯黄芩　地骨皮　信前胡　北沙参　炙甘草

灯芯为引，水煎服。

溯源解毒汤　治乳子出胎后，遍身奶麻。

大当归　怀生地　正川芎　杭白芍　北沙参　正川连　广陈皮　上拣参　淮木通　净连翘　生甘草

水煎，乳母服之，不可令儿服。

《幼幼集成》终

[General Information]
书名=中国医学大成　七　妇科　儿科分册
作者=
页数=1170
SS号=11155298
出版日期=

封面页
书名页
版权页
前言页
目录页
盘珠集胎产症治&（清）施澹宁　　严西亭　　洪辑庵　　同辑
胎产指南&（清）单南山　　著
重订产孕集&（清）张曜孙　　纂辑　　（清）包兴言　　增订
女科切要&（清）吴道源　　著
经效产宝&（唐）咎殷　　撰集
女科经纶&（清）萧赓六　　纂著
校注妇人良方&（宋）陈自明　　编辑　　（明）薛立斋　　补注
慈幼新书&（明）程凤雏　　辑
原　ｓｅｐｅｒａｔｏｒ要论&（清）袁（佚名）编辑
麻疹备要方论&（清）吴砚丞　　编辑
活幼心书&（元）曾世荣　　撰著
幼科直言&（清）孟介石　　编著
小儿卫生总微论方&佚名
幼幼集成&（清）陈复正　　辑订
附录页

知盈医学资源网 WWW.KNOWWING.COM

金沙医院 专业妇科疑难杂症治疗

廖艺 专家 咨询>>

杨碧玉 专家 咨询>>

点击咨询更多>> 医保定点医院/二级乙等医院 028 66250088 200032222

焦点图片

站内统计 | 站内公告

- 共有资源数量 541
- 今日更新资源： 0 个
- 资源总的容量： 7.512 G
- 共有书籍数量： 441 个
- 今日更新书籍： 0 个
- 共有文献数量： 100 个
- 共有视频数量： 0 个
- 当前在线人数： 0

下载更新 more

- [药膳食疗]家庭食疗妙方精选 2012-05-22
- [美容养颜]番茄健康美容疗法 2012-05-22
- [饮食健康]食用菌治百病（第二版） 2012-05-22
- [饮食健康]疯狂果蔬：开启果蔬养生密码 2012-05-22
- [男性养生]陈氏男性养生补阳全方 2012-05-22
- [男性养生]细说男性病 2012-05-22
- [男性养生]人体使用手册 男人版 2012-05-22
- [男性养生]男性自诊手册 2012-05-22
- [男性养生]男性保健与疾病防治189法 2012-05-22
- [男性养生]男人不可不知的118个保健细节 2012-05-22
- [男性养生]当代男性病妙方 2012-05-22
- [男性养生]男人幸福一生的健康法则 2012-05-22
- [男性养生]妻子关爱丈夫健康枕边书 2012-05-22
- [男性养生]男性健康管理书 2012-05-22
- [男性养生]走进男性健康生活 2012-05-22
- [男性养生]细说男性健康202个细节 2012-05-22
- [男性养生]中国男人书——我们的身体秘密和健康选择 2012-05-22
- [男性养生]男人二十四小时健康保养书 2012-05-22
- [男性养生]家用男性保健养生药酒666例 2012-05-22
- [男性养生]青年男性常见病自我按摩与养生 2012-05-22

推荐下载

- 骨桥蛋白通过MAPK信号通路上调MM
- 甲型H1N1流感病毒（2009）HA蛋白
- IL-6、TNF-α在术后肠梗阻动物模
- 肠道病毒71型的层析纯化
- 耻垢分枝杆菌MSMEG_6402基因功能
- 结核分枝杆菌Rv1096的表达及功能
- 结核分枝杆菌Rv3717基因的克隆、
- 首次利用人iPSC产生HCV能够感染的
- 鉴定出产生培育造血干细胞微环境
- 揭示LSD1在胚胎干细胞分化中起关
- 猪髂内动脉粥样硬化狭窄模型的建
- 开发一种指导干细胞增加骨生成和
- 人源白细胞介素(h-IL2)基因克隆及
- 防腐固定心脏材料制作心血管铸型
- 兔抗Myosin X多克隆抗体的制备及
- 内质网应激与胰岛β细胞功能
- 负载人热休克蛋白抗原肽的树突状
- 人DC-STAMP真核表达载体的构建及
- NK细胞联合西妥昔单抗对大肠癌细
- 血红素加氧酶-1高表达对大鼠同种

中医书籍 more

- 珍版海外回归中医古籍丛书第7册
- 海外回归中医善本古籍丛书（续）第5册
- 海外回归中医善本古籍丛书（续）第4册
- 海外回归中医善本古籍丛书（续）第3册
- 海外回归中医善本古籍丛书（续）第2册
- 海外回归中医善本古籍丛书（续）第1册
- 珍版海外回归中医古籍丛书第6册
- 珍版海外回归中医古籍丛书第4册
- 珍版海外回归中医古籍丛书第9册
- 珍版海外回归中医古籍丛书第10册
- 珍版海外回归中医古籍丛书第8册
- 珍版海外回归中医古籍丛书第5册

养生书籍 more

- 家庭食疗妙方精选
- 番茄健康美容疗法
- 食用菌治百病（第二版）
- 疯狂果蔬：开启果蔬养生密码
- 陈氏男性养生补阳全方
- 细说男性病
- 人体使用手册 男人版
- 男性自诊手册
- 男性保健与疾病防治189法
- 男人不可不知的118个保健细节
- 当代男性病妙方
- 男人幸福一生的健康法则

本月下载排行

1. 谢海洲——中国百年百名中医临
2. 于已百——中国百年百名中医临
3. 周次清——中国百年百名中医临
4. 海外回归中医善本古籍丛书第1
5. 张琪——中国百年百名中医临床
6. 米伯让——中国百年百名中医临
7. 叶桔泉——中国百年百名中医临
8. 海外回归中医善本古籍丛书（续
9. 张缙——中国百年百名中医临床
10. 俞慎初——中国百年百名中医临
11. 许润三——中国百年百名中医临
12. 一日养生24法

中药功效 more

- 大黄蛰虫丸在络病治疗中的临床应用
- 丹红注射液治疗维吾尔族青年人急性脑梗死疗效...
- 丹红注射液治疗COPD急性发作的疗效观察
- 丹红注射液治疗不稳定性心绞痛70例临床观察
- 丹红注射液治疗急性脑梗死46例疗效观察
- 通督手法联合丹红注射液治疗椎动脉型颈椎病的...

中药药理 more

- 大蒜油拮抗酒精性肝损伤及相关机制的研究
- 芦笋多糖、芦笋皂苷抗肿瘤作用及机制研究
- 蒿红方止咳抗炎的药效研究和机理的初步探讨
- 黄芪丹参药对及其有效组分对肾纤维化JAK/STAT...
- 参附注射液对大鼠心肌缺血再灌注损伤的保护作...
- 生黄合剂对缺血再灌注大鼠心肌脂质过氧化损伤...

本周下载排行

1. 谢海洲——中国百年百名中医临
2. 于已百——中国百年百名中医临
3. 周次清——中国百年百名中医临
4. 张琪——中国百年百名中医临床
5. 米伯让——中国百年百名中医临
6. 张缙——中国百年百名中医临床

› 中药丹红注射液治疗缺血性脑卒中95例疗效分析...
› 丹红注射液对急性冠脉综合征患者血清hs-CRP的...
› 丹红注射液对急性脑梗死患者脑循环动力学影响...
› 丹红注射液治疗老年冠心病心绞痛的临床观察
› 丹红注射液治疗老年患者慢性脑供血不足的疗效...
› 丹红注射液治疗急性脑梗死患者对血浆TXB_2、6...

› 中药何首乌饮对衰老大鼠睾丸组织NO和iNOS含量...
› 中药吴茱萸活性成分吴茱萸次碱与牛血清蛋白作...
› 桂枝加葛根汤对组胺致大鼠毛细血管通透性的影...
› 宁夏四种道地药材及其复方醇提物体外抑菌实验...
› 菩人丹超微粉对2型糖尿病大鼠血糖和血脂的影响...
› 大黄水提物对雄性小鼠睾丸影响的实验研究

7 俞慎初——中国百年百名中医临
8 许润三——中国百年百名中医临
9 一日养生24法
10 海外回归中医善本古籍丛书（续
11 张镜人——中国百年百名中医临
12 邹云翔——中国百年百名中医临

家庭食疗妙方精选



番茄健康美容疗法



食用菌治百病（第二



疯狂果蔬：开启果蔬



陈氏男性养生补阳全



细说男性病



人体使用手册 男人版

首页连接(首页连接日IP>15000,次页连接无流量限制,欢迎合作连接!)

华夏中医网 华夏中医论坛 华夏医学视频网 华夏中药店 绵阳药品批发网 更多链接 更多链接 更多链接 更多链接 更多链接

按字母检索	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
按声母检索	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	W	X	Y	Z	数字	符号	

Copyright © 2008-2012 KnowWing.Com. All Rights Reserved .

页面执行时间：250.00000 毫秒

Powered by：Www.Knowwing.Com

历代中医资料大全分享

你好，我是逢原，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

只需要在下面输入你的邮箱并确认就可以直接下载中医资料：

http://list.qq.com/cgi-bin/qf_invite?id=03157beabc6d50e0b64029a2715966596d94dcac7ed0cfd7

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com

二、加我 **QQ/微信：2049346637**

三、关注微信公众平台——**逢原中医**，经常有中医文章更新。

四、关注我的**空间**：**http://user.qzone.qq.com/2049346637**

免责申明：所有资源均是网上搜集，本人收集整理这些中医资料，仅仅为了方便中医同道中人私下交流学习之用，不为营利，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后 24 小时内删除，任何涉及商业营利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！如果您觉得满意，请购买正版资源。

私人微信号：2049346637

公众平台：逢原中医