

二十世纪中医之精华

● 主 编 张文康

「临 中」 家 「床 医」

贾

方 方
士

编著 贾 召

中国中医药出版社



责任编辑 李 玮
封面设计 董 玲 萍

「临」中
「家」医
「床」医

ISBN 7-80156-326-3



9 787801 563262 >

定价：17.00 元

中国百年百名中医临床家丛书

贾 堃

贾 召 编著
苗文红 协编
贾 堃 审定

中国中医药出版社

·北 京·

中国百年百名中医临床家丛书

主 编 张文康

副主编 余 靖 李振吉

图书在版编目 (CIP) 数据

贾瑩/贾召编著. - 北京: 中国中医药出版社,
2002.3

(中国百年百名中医临床家丛书)

ISBN 7-80156-326-3

I. 贾… II. 贾… III. 中医学临床-经验-中国-现代
IV. R249.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 011563 号

中国中医药出版社出版

发行者: 中国中医药出版社

(北京市朝阳区东兴路 7 号 电话: 64151553 邮编: 100027)

印刷者: 衡水华兴印刷有限责任公司

经销者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 850×1168 毫米 32 开

字 数: 264 千字

印 张: 11.875

版 次: 2002 年 3 月第 1 版

印 次: 2002 年 3 月第 1 次印刷

册 数: 5000

书 号: ISBN 7-80156-326-3/R·326

定 价: 17.00 元

出版者的话

祖国医学源远流长。昔岐黄神农，医之源始；汉仲景华佗，医之圣也，在祖国医学发展的长河中，临床名家辈出，促进了祖国医学的迅猛发展。中国中医药出版社为贯彻卫生部和国家中医药管理局关于继承发扬祖国医药学，继承不泥古，发扬不离宗的精神，在完成了《明清名医全书大成》出版的基础上，又策划了《百年百名中医临床家丛书》，以期反映近现代即 20 世纪，特别是建国 50 年来中医药发展的历程。我们邀请卫生部张文康部长做本套丛书的主编，卫生部副部长兼国家中医药管理局局长余靖同志、国家中医药管理局副局长李振吉同志任副主编，他们都欣然同意，并亲自组织几百名中医药专家进行整理。经过几年的艰苦努力，终于在 21 世纪初正式问世。

顾名思义，《中国百年百名中医临床家丛书》就是要总结在过去的 100 年历史中，为中医药事业做出过巨大贡献、受到广大群众爱戴的中医临床工作者的丰富经验，把他们的事业发扬光大，让他们优秀的医疗经验代代相传。百年轮回，世纪更替，今天，我们又一次站在世纪之巅，回顾历史，总结经验，为的是更好地发展，更快地创新，使中医药学这座伟大的宝库永远取之不尽、用之不竭，更好地服务于人类，服务于未来。

本套丛书第一批计划出版 140 种左右，所选医家均系在中医临床方面取得卓越成就，在全国享有崇高威望且具有较高学术造诣的中医临床大家，包括内科、外科、妇科、儿科、骨伤科、针灸等各科的代表人物。

本套丛书以每位医家独立成册，每册按医家小传、专病论治、诊余漫话、年谱四部分进行编写。其中，医家小传简要介绍医家的


生平及成才之路；专病论治意在以病统论、以论统案、以案统话，即将与某病相关的精彩医论、医案、医话加以系统整理，便于临床学习与借鉴；诊余漫话则系读书体会、札记，也可以是习医心得，等等；年谱部分则反映了名医一生中的重大事件或转折点。

本套丛书有两个特点是值得一提的，其一是文前部分，我们尽最大可能的收集了医家的照片，包括一些珍贵的生活照、诊疗照以及医家手迹、名家题字等，这些材料具有极高的文献价值，是历史的真实反映；其二，本套丛书始终强调，必须把笔墨的重点放在医家最擅长治疗的病种上面，而且要大篇幅详细介绍，把医家在用药、用方上的特点予以详尽淋漓地展示，务求写出临床真正有效的内容，也就是说，不是医家擅长的病种大可不写，而且要写出“干货”来，不要让人感觉什么都能治，什么都治不好。

有了以上两大特点，我们相信，《中国百年百名中医临床家丛书》会受到广大中医工作者的青睐，更会对中医事业的发展起到巨大的推动作用。同时，通过对百余位中医临床医家经验的总结，也使近百年中医药学的发展历程清晰地展现在人们面前，因此，本套丛书不仅具有较高的临床参考价值和学术价值，同时还具有前所未有的文献价值，这也是我们组织编写这套丛书的由衷所在。

中国中医药出版社

2000年10月28日



贾塋先生近照
(2001年1月)



贾堃先生在查房

内容提要

本书为我国著名中医肿瘤专家、小儿病专家贾堃先生的临证经验集要。

贾堃先生从医六十余年，中医理论造诣颇深，临床经验丰富，兼通诸家之长，并形成自己独特的学术思想，成为陕西中医学界承前启后的重要人物之一。本书重点介绍贾堃先生最擅长的癌瘤及小儿病的临床辨治经验，有理论，有例证，条理清晰，叙述系统，适合广大中医、中西医结合临床工作者及学习者阅读参考。

序

贾堃是我国著名的中医肿瘤专家，20世纪中医肿瘤医学的创始人。

贾堃1919年生于陕西西安，祖籍商县。贾堃少年时代即志于学医。他师从名医，勤学苦练，崇尚《大医精诚》，誓济世活人，以德为先。他熟读经典医著，博采众长，医技早成，于40年代即悬壶济世，声名鹊起。早年擅长儿科，临床辨析微妙，用药精到而独特，每起沉疴。四十多年前，又开始致力于中医药抗肿瘤的研究。他所研制的抗肿瘤中药——平消系列药品，开创了我国中医药治疗肿瘤理论与临床实践的先河，蜚声海内外。

贾堃现在是陕西省中医药研究院主任医师，中华全国中医学会陕西分会理事，香港中国中医抗癌学会理事，陕西省文史馆名誉馆员，西安市人民代表大会代表，政协常委。

贾堃，历经六十余载岐黄医技的实践，精通经典，旁及诸家，中医理论造诣颇深，临床经验丰富。他法崇经方，但不悖时方，知守善变，兼通诸家，融会贯通，并蓄其长，形成了自己独特的学术思想。他

高尚的医德和精湛的医术，得到广大患者和学术界的称赞和高度评价。90年代，他光荣地被选入中国近百年百名著名中医之列，是陕西省目前唯一获得这一殊荣的中医专家。

贾堃在陕西中医学界，是具承前启后作用的重要人物之一。

1946年，经国家考试院考试，贾堃取得了高级中医师资格证书，经卫生示范区批准，设立法古诊所，开始了漫长的中医临床实践。

1955年，他始任西安市中医门诊部儿科主任，是当时西安市最早的十四名高级医师之一。

50年代末，他在中医儿科领域已饮誉长安。贾堃高尚的医德和高超医术远扬省内外，使一些绝望中的癌瘤病人，也不远千里慕名求治。为了不辜负患者一片信赖与爱戴之心，他面对医学领域中癌瘤这一新的课题，又毅然踏上了攻克癌瘤的漫长而艰辛的里程。从此，他与癌瘤的研究结下了不解之缘，并从而开启了学术生涯的新篇章。

他在雄厚的中医理论和丰富临床经验的基础上，围绕癌瘤课题，查经问典，潜心研究有关传统古方、中医验方、民间偏方、科研处方，并在秦巴山区的镇巴山高山毛垭公社双坪大队，一边从事巡回医疗，一边走访民间中草医，对抗癌瘤中草药进行调查研究。

他对民间治疗乳腺癌的毛芋子的藤叶和果实进行了详尽考察，并引种到自家庭院，与西北植物研究所专家进行系统的鉴定与科学研究，而至应用于抗癌药物的研制。他如此孜孜不倦攻克癌瘤的科学实践精神，无不为同行所钦佩。

贾堃在千百次的试验和临床观察基础上，经过科学合理组方，精心周密地配伍，终于于1958年自行组方配伍研制出抗癌瘤中药——平消丹。他怀着对病人深深的祝福，希望病人个个“平平安安，消除癌瘤”，药名平消丹，即由此而定之。

平消丹的卓著疗效，使癌瘤患者络绎不绝地奔向长安，并引起了西安市政府的高度重视。当时的西安市副市长杨晓初决定，由西安国药厂生产平消丹成药，以满足患者和社会的需求，并指示加大对贾堃抗癌瘤中药研究的支持力度。1960年，西安市卫生局正式成立了由贾堃任组长的西安市癌瘤科研组，在西安市红十字会医院设立了30张病床和20张简易病床，作为平消丹治疗组，在第二人民医院、第六人民医院各设30张病床，分别为外科治疗和化疗对照组。这是国内第一个中医药治疗癌瘤的科学研究组织和临床实践基地。

贾堃在中医药抗癌瘤方面的研究取得了极大的成功，平消丹治疗癌瘤的研究成果受到了医药卫生界的

高度重视和评价。1983年11月，来自北京、上海、西安等地的全国医药学家，对平消丹进行了科学鉴定。会议一致认为，平消丹具有缓解症状、缩小瘤体、抑制癌瘤生长、提高机体免疫功能、延长患者生命等显著功效。1985年，平消丹受到中国人民解放军后勤部嘉奖，并荣获国家科技成果二等奖。

贾堃对中医药治疗癌瘤的研究目标是，通过精微的临床观察和辨析，不断深化、创新，精益求精。于是，他在平消丹的研究基础上，开始了平消系列抗癌药物的研究，目的是根据中医理论，做到随证用药，因人而异，因病化裁，剂型不同，对证选用，以求效稳速愈，使用药更符合中医临证的辨证论治指导原则。这正是贾堃精研岐黄、学术思想独到和临诊奥妙之所在。至今，他通过临床实践，已从百余个治癌瘤方剂中筛选出“平消1~13号”系列方药，构成了平消丹的衍生、升华、换代，和针对性更强、疗效更可靠的系列产品。他新研制并通过了专家鉴定的抗癌瘤新药——重生胶囊，即是平消4号这一换代抗癌瘤产品。

贾堃在六十余年的临床实践特别是近四十多年专司抗癌瘤研究的临床实践中，积累了极其丰富的临床经验。他不断总结，笔耕不辍，著作颇丰，发表和出版过不少有影响的学术论文和十余部专著，尤其值得

提及的是其中的六部专著：

1979年出版的《癌瘤中医防治研究》，总结了他二十多年治癌研究成果，是我国中医防治癌瘤的第一部专著。曾荣获陕西省优秀图书奖。1983年出版英文版本，享誉港、澳和国际医学界。在德国莱比锡国际图书展览会上备受推崇。

1989年出版的《中医癌瘤证治学》，总结了他防治癌瘤的新成果和临床经验。本书将中医学对癌瘤的论述、病因病机、辨证论治、舌象脉象、处方用药作了系统概述和阐发，病例资料丰富，被誉为贾堃在中医药治疗癌瘤方面的又一重大研究成果。

1991年出版的《中老年防癌健身良方妙法》，为癌瘤患者提供了自诊自治的良方和癌瘤预防对策，受到普遍欢迎。

1996年出版的《中医癌瘤学》，是1979年第一部专著的姊妹篇，篇幅宏厚，内容丰富，更具新意，颇得学术界好评。他的专著《临床实用儿科学》和《小儿四季常见传染病的防治》，则是贾堃在中医儿科学术领域成就的见证。

贾堃在中医学学术上的声誉和治疗癌瘤的成功，赢得了海内外的赞扬和高度评价。日本东京曾野医院院长曾野维西偕夫人曾野艾子，于1984年和1988年先后两次专程来西安，每次停留十余日，特地向贾堃请

教中医药治癌瘤的有关理论与实践。日本学者西川农，更将贾堃的专著译成日文，以期传播华夏岐黄医术，造福人类。

贾堃，不愧是我国著名的中医癌瘤专家，不愧是中国百年百名中医桂冠的拥有者。

章雷

2001年1月

▼ 贾 璧，我国著名的中医肿瘤专家、小儿病专家，从医六十余载，中医理论造诣颇深，临床经验丰富，兼通诸家之长，并形成自己独特的学术思想，成为陕西中医学界承前启后的重要人物之一。贾璧先生研制的抗肿瘤中药——「平消」系列药品，开创了我国中医药治疗肿瘤理论与临床实践的先河。▲

中国中医药出版社

目 录

医家小传	(1)
专病论治	(5)
癌瘤	(5)
癌瘤辨治概要	(5)
胃癌	(61)
食道癌	(70)
肝癌	(79)
肠癌	(89)
胰腺癌	(100)
肺癌	(111)
鼻咽癌	(125)
乳腺癌	(135)
子宫癌	(145)
骨瘤与骨癌	(155)
脑瘤	(162)
甲状腺肿瘤	(171)
白血病	(179)
淋巴瘤	(193)
肾癌	(199)
膀胱癌	(205)
小儿病	(210)
小儿病辨治概要	(210)

发热	(243)
咳嗽	(271)
泄泻	(285)
痢疾	(291)
腹痛	(296)
抽风	(303)
尿床	(312)
口疮	(316)
皮疹	(319)
诊余漫话	(331)
防患于未然 重视癌瘤的预防	(331)
加强癌瘤患者的调养护理	(334)
合理安排癌瘤患者的饮食	(336)
感冒的预防和治疗	(339)
如何养生	(341)
头面部保健按摩	(342)
年谱	(345)
附录	(351)

医家小传

1972年，美国前总统尼克松曾预言，1976年美国建国200周年庆典上，他将宣布，人类永远征服了癌症。为此，美国政府花费了15亿美元，结果并未能如愿。

他没想到，为实现这个人类医学史上的奇迹，一位中国中医临床家默默奋斗了30年，并在一定程度上取得了成功。

这位中医临床家就是贾堃，1919年12月26日出生于西安市灞桥镇方家村一户农家，15岁学医，从医近70年，成为陕西中医界一位承前启后的重要人物。

1946年，贾堃在西安三桥镇开设诊所行医，1955年任西安中医门诊部儿科主任，是西安市最早的14位高级医师之一。一些绝望中的癌瘤病人慕名求医，面对医学领域这一尚未攻克的难题，面对濒临死亡的病人的哀求，是回避退让，把病人推走，还是勇担风险，知难而进？

癌症，俗称“不治之症”。据统计，当今世界上每年有700万癌症患者，幸存者不足三分之一。由于癌症而死亡者

占人口总死亡率的10%，在我国竟高达15%。我国壮年人受癌瘤威胁最大，是首位死亡原因。攻克癌瘤是延长人类寿命的重要难题，多少世界名医为此碰得头破血流，从此望而却步。

有朋友为贾堃担心，怕治癌失败，有损名誉。他回答：“我不愿作懦夫，只要能挽救病人，我个人受多大损失也心甘情愿。”他当时四十多岁，年富力强，他要夺回的不是医学宝座上的金像，而是一个个被死神扼住咽喉的生命。

他如饥似渴，复习中医典籍，发现殷墟甲骨文里已有“瘤”字，历代对七情郁结，脾胃受伤，导致气血凝滞，形成癥瘕、积聚等论述中就包括了癌瘤。春秋战国时期秦国名医医和提出七情失调的理论。到《吕氏春秋》《内经》《后汉书·华佗传》《千金方》，直至明清医典，都使他深受启发。他不采取直接杀灭癌细胞的方法，而是改善患者全身状况，从培本入手，以扶正祛邪、软坚化痰、活血散结、双补气血为治则，组成基本方剂，再施以辅助治疗。

1958年，上海有位老姬患乳腺癌，千里迢迢来求医，服用他配制的方剂后，癌瘤日益缩小，直至痊愈。消息传开，求医者愈多。当时西安市副市长杨晓初决定将这一药方交西安国药厂生产成药。贾堃怀着对癌瘤病人深深的祝福，希望病人“平平安安，消除癌瘤”，定药名为“平消丹”。1960年，上海警备司令刘飞患胃癌，食不下咽，气吞如虎的将军被病魔折磨得骨瘦如柴。贾堃亲自到南方诊治，效果奇佳，胃癌治愈了。这位与许世友一起参加革命的将军，至今仍健在。

1962年，延长县农民刘某，右股骨患“成骨肉瘤”，经第四军医大学活体组织检验诊断为恶性肿瘤，西安六大医院

诊治，均无良方，建议截肢，否则性命难保。他住进红十字会医院西安市癌瘤研究组，坚持服用“平消丹”，到1964年痊愈，保全了肢体，恢复了健康。住院期间，他苦学中医，现在已是四个儿女的父亲，并当上了一名校医。他给贾堃写信道：“您对我恩深似海，德重如山，我拜您为再生父亲。”

贾堃的科研成果日益受到医学界重视。1983年11月，北京、上海、西安等地的全国医药学专家对“平消丹”进行鉴定，一致认为对胃癌、肺癌、食道癌等有缓解症状、缩小瘤体、抑制癌瘤生长、提高机体免疫功能、延长患者生命等作用。1985年，该成果受解放军后勤部嘉奖，并获国家科研成果二等奖。

在长期临床实践中，贾堃积累了丰富的经验。看到有些老中医把医学遗产视为“祖传秘方”带进棺材，他痛心疾首，多次发出呼吁：祖国医学遗产必须抢救、丰富和发展。他具有深厚的理论功底，白天看病，晚上就着昏暗的灯光，点点滴滴整理临床验方。即使“文革”期间下放长安，也始终笔耕不辍。

1979年，他完成了一部重要著作《癌瘤中医防治研究》，该书总结了他20多年治癌研究成果，是中医防治癌瘤的第一部专著，发行后引起强烈的反响，很快被抢购一空。该书荣获陕西省优秀图书奖，1983年增订再版，并出版了英文版本，受到港澳及国际医学界人士的赞誉。本书在原联邦德国书籍展览会展出，大受欢迎，送去3000册，被抢购一空。该书后来还被日本“中国汉方株式会社”译为日文。

1989年，贾堃又完成了《中医癌瘤证治学》，总结了他防治癌瘤的新成果，将中医学对癌瘤的论述及病因病理、辨证论治、舌象脉象、处方用药都作了系统阐述。书中引用大

量病例资料，令人信服。它无疑是中医学上又一重大成果。

1991年，贾堃又写成一本《中老年防癌健身良方妙法》。

50多年来，贾堃把精力、智慧、心血完全贡献给祖国医学，家庭生活却十分清贫。

妻子胡毓芳，20世纪30年代的中学毕业生。她白天帮丈夫开处方，扎针，料理家务，抚育儿女，晚上送走病人，就着灯光帮他誊写书稿。50年共同生活，没有高声说过一句话。常常是中午、晚上，他刚刚睡下，病人叫门了，老妻不忍心，想让他睡一会儿，自己接待病人，他却一骨碌爬起来。过度辛苦、操劳，他挺过来了，老妻却先他而去。妻子去世，他大病一场，刚刚痊愈，病人又拥满了他的小屋。行医50多年，两万多个日日夜夜，没有一天不和病人共度。“你任何时候都没法拒绝病人。”这是他的口头禅。

贾堃虽已八十高龄，仍然坚持查房，带教新一代。除了医院，他就是在自己低矮的阁楼上，不问贵贱贫富，默默迎接每一张痛苦的病容，对徘徊在天堂地狱交叉路口的人，献上一片爱心，伸出一双热情有力的手。

桃李不言，下自成蹊。一代名医贾堃的名字流传在古城西安的大街小巷，直到遥远的异国他乡。

专
病
论
治

癌 瘤

癌瘤辨治概要

多年来，贾老通过对大量癌瘤患者的研治工作，体会到癌瘤是人体全身病变的局部表现，由于内外病因的影响，人体生理机能的失调，局部组织恶性增生，逐渐发展成为癌瘤。治疗中应掌握好辨病与辨证的结合，只有病证结合，随证施治，才可取效。现就其多年总结的治疗法则、治疗特点及用方集要简介如下：

一、治疗法则

扶正攻邪 癌瘤乃机体正邪斗争中正气虚而邪气留滞所致。凡属外界环境存在的致癌物质，称之为邪气、邪毒，而

外邪是因先有内虚而侵袭致病，机体的阴阳失调，脏腑经络气血功能障碍，引起气滞、血瘀、痰凝、热毒、湿聚等互相交结而致癌瘤，亦可浸润、扩散、转移。癌瘤又可不断耗气伤血，致正气更虚。能否控制癌瘤的扩散、转移，决定于正邪斗争的结果。临床治疗中，不但要着重消癌祛邪，更应注重扶助正气，增强抗病能力，尤其是患病晚期，阴血亏耗，手术已失去时机时，只重抗癌消瘤，以毒攻毒，直攻直消，可致元气亏损，患体难以支持，贾老临床中常用黄芪、人参、骨碎补、补骨脂、薏苡仁、白术、鸡蛋黄、料姜石、制马钱子、蜂房、枳壳、火硝、郁金等，通过培元固本、软坚消瘤，以防止癌瘤的进一步恶化。

祛瘀生新 气血瘀滞，经络受阻，则可使局部组织变形、变性，致使癌瘤发生。此类患者多见舌质紫暗或有瘀斑，脉细涩或细弦，治以活血化瘀。药用硃砂、蟾酥、丹参、土鳖虫、莪术、辣蓼子、三棱、干漆、五灵脂、蜈蚣等，通过破瘀散结，达到祛瘀生新、止痛消肿化瘤的目的。

清热解毒 癌瘤患者到中晚期，常伴有发热、疼痛、口渴、五心烦热、溲黄便秘、舌红绛、苔黄腻、脉数或弦数等毒热内蕴表现，治以清热解毒，消炎杀菌。药用重楼、白矾、雄黄、仙鹤草、半边莲、野菊花等以消除感染及炎症，达到控制癌瘤、防止其他并发症发生的目的。

化痰除湿 痰湿为机体的病理产物，亦可致病。痰凝湿聚，可出现胸脘痞闷、胃纳不佳、胸痛气短、腹部胀满、下肢浮肿、颈项关节酸痛、小便黄、大便溏泻等症，治以化痰祛湿。药用天南星、牡蛎、僵蚕、半夏、海藻、山慈菇、蜂房、蛇蜕、蜈蚣、蟾酥等，化痰祛湿与软坚消肿药同用，以散结消瘤。

注重健脾 临床中，无论使用放疗、化疗、中草药或者通过手术治疗癌瘤，常可损伤脾胃，患者出现食少纳呆、恶心呕吐、腹胀腹泻等症，应予健脾和胃之剂。药用苍术、厚朴、薏苡仁、猪苓、藿香、佩兰叶、枳壳等，以扶助后天之本，改善营养状况，增强抗病能力。

二、治疗特点

（一）癌瘤病因内伤，治宜“平”剂消之

贾老认为癌瘤的病因主要是内伤、情志变化、外感邪气、病毒侵袭等，均可导致生理上的变化而发病。七情太过，能引起气血运行失常，脏腑功能失调，情志不遂，这是癌瘤发生发展的主要原因。“郁结伤脾，肌肉消薄，与外邪相搏而成瘤”。“乳岩由于忧思郁结，所愿不遂，肝脾气逆，以致经络阻塞，结果成核”。“骨瘤由于淫欲伤肾，肾火郁遏，骨无营养所致，其病坚如石，推之不移”。起居失常、饮食不当、机械刺激、房事不节也是癌瘤发生的因素。

癌瘤严重危害人民健康，为了更好地为患者服务，贾老悉心钻研癌瘤的防治。在《黄帝内经》《千金方》《云笈斋医书》《医部全录》《景岳全书》《金匱要略》《本草纲目》《医术》等中医学典籍关于癌瘤防治资料的启迪下，贾老陆续创制了“平消片”、“新平消片”、“重生胶囊”等系列平消制剂，治疗胃癌、肝癌、食道癌、肺癌、肠癌、喉癌、脑瘤、鼻咽癌、乳腺癌、子宫癌等二十余种癌瘤。

平消片由枳壳、郁金、干漆、制马钱子、仙鹤草、五灵脂、火硝、白矾等八味药物组成。方中五灵脂、干漆、郁金、白矾能散瘀活血，攻坚破积，止痛生肌，活血解毒；火

硝能软坚化痰，推陈致新；马钱子能通络除湿，祛毒消肿，提神补脑，疏通血脉；仙鹤草、枳壳能强心滋补，理气宽畅，疏滞消痞，散结攻坚，散瘀止痛。诸药配伍合用，功能攻坚破积，祛腐生新，解毒强心，理气止痛，健胃养血，扶正祛邪，经过四十余年的临床应用，收到了相当满意的效果。

（二）攻补兼顾整体，着重辨证论治

在治癌的实践中，除了以平消片为基础方外，贾老根据癌瘤发生部位的不同，拟了 200 余首随证配合的方剂辨证施治，这也是他多年临床实践的成果。各个部位发生的病变有其不同特点。例如食道癌患者，轻者咽下困难，重者连水也难下咽，这样得不到足够的营养，身体很快地衰弱、消瘦，有时伴有声音嘶哑，或有严重的咳嗽症状等。因此在治疗时，除用平消片攻坚破积、活血化瘀、扶正祛邪外，还须补中益气、降逆镇冲、化痰理气、养血润燥，可配合用山芪赭花丸，其组成为：山豆根、生黄芪、蜂房、旋覆花、索罗子、代赭石、青果。方中用山豆根、蜂房清热解毒，消肿止痛，软坚消积；黄芪补气扶正，并促进机体新陈代谢；旋覆花、代赭石降逆镇冲；索罗子、青果化痰润燥，理气止痛。各药配伍，具有降逆镇冲、软坚消积、活血化瘀、理气止痛、化痰养血、补气扶正、促进新陈代谢之功。再如胃癌患者，主要症状是食欲不振、饭后胃腹胀气、呕吐等，除应用平消片外，还须配合补益安中、活血润膈、开胃健脾之剂，可以服用蛋楞丸，其组成是：白术、鸡蛋壳、枯白矾、炒谷芽、索罗子、代赭石、瓦楞子。方中用鸡蛋壳、瓦楞子、索罗子软坚止痛，补益安中；白术、炒谷芽开胃健脾，亦有补

益安中、化瘀软坚、降逆镇冲之效。其他部位的癌瘤也是如此。从这里可见辨证论治的基本精神，关键在于既要照顾整体，还要注意各个部位以及疾病发生的各个阶段的特点。

三、用方集要

(一) 治癌主方

1. 平消片

枳壳 30 克 火硝 18 克 五灵脂 15 克 郁金 18 克 白矾 18 克 仙鹤草 18 克 干漆（炒）6 克 制马钱子 12 克

制法：将上药共研为细粉，水泛为丸。每次服 1.5~8 克，1 日 3 次。开水送下。

方义：本方以五灵脂、干漆散瘀活血，攻坚破积，止痛消结；郁金、白矾疏肝解郁，消炎解毒，利胆除烦；火硝消坚化瘀，推陈致新；制马钱子通络除湿，祛毒消肿，提神补脑，通血脉；仙鹤草、枳壳强心滋补，利气宽肠，消痞疏滞，活血止血。八种药综合起来，有攻坚破积、去息肉、蚀腐肉、解毒强心、利气止痛、健胃养血、健脾理气之功，从而推陈致新，强壮神经，促进组织及细胞的组成和结构的营养恢复，健脾理气，纠正脾虚，纠正血液粘度，纠正蛋白质、脂肪、糖、维生素、矿物质（包括微量元素）、水分代谢的紊乱，增强机体抗病能力，消除病邪的有害反应，扶正祛邪，使癌细胞退变，体积缩小或消失，或使癌细胞逆转。

2. 金星散

郁金 20 克 白矾 20 克 火硝 20 克 重楼 20 克 蟾酥 3 克 红硃砂 6 克 鸡蛋壳 30 克 料姜石 30 克 天南星 30 克

制法：将上药共研为细粉。每次服 1~6 克，1 日 3 次。开水送下。

方义：本方中料姜石、鸡蛋壳和胃健脾，降逆镇冲；红砂疏滞消痞，化瘀通经；白矾、郁金、重楼、蟾酥散瘀活血，攻坚破积，理气止痛，消炎解毒，疏肝解郁；火硝消坚化瘀，推陈致新；仙鹤草、天南星祛瘀生新，消滞散结，燥湿祛痰，强心滋补。十味药配伍，可攻坚破积，清热解毒，利气止痛，养血健脾，降逆镇冲，强心滋补，调节机体机能，增强机体抗病能力，消除病邪的有害反应，扶正祛邪，使癌细胞退变，体积缩小，以至消失。

3. 参石丸

料姜石 50 克 郁金 30 克 制马钱子 30 克 红人参 30 克 清半夏 30 克 砂 9 克 重楼 15 克 蟾酥 4 克 仙鹤草 30 克

制法：将上药共研为细粉，水泛为丸。每次服 1~3 克，1 日 3 次。开水送下。

方义：本方中砂疏滞消痞，软坚散结，化瘀通经；重楼、蟾酥散瘀活血，攻坚破积，理气止痛，抑菌抗癌；制马钱子除湿祛毒，消肿提神，通血脉；郁金疏肝解郁，行气开窍；仙鹤草、清半夏燥湿祛痰，消滞散结，祛瘀生新，强心滋补；红人参补气宁心，扶正祛邪。九种药配伍，可通经化瘀，补气强心，软坚散结，理气止痛，健胃强脾，疏肝解郁，降逆镇冲，宁心强壮，扶正培本，养血活血，纠正脾虚，纠正血液粘度，纠正糖与蛋白质代谢紊乱，增强机体抗病能力，消除病邪的有害反应，促使癌细胞产生退行性改变，或使癌瘤体积缩小以至消失。

4. 补金丸

料姜石 50 克 郁金 30 克 硃砂 9 克 清半夏 30 克
制马钱子 30 克 重楼 15 克 仙鹤草 30 克 补骨脂 100 克
蟾酥 6 克

制法：将上药共研为细粉，水泛为丸。每次服 1~8 克，1 日 3 次。开水送下。

方义：本方中用硃砂疏滞消痞，软坚散结，化痰通络；重楼、蟾酥散瘀活血，攻坚破积，理气止痛，强心利尿，消炎解毒；料姜石降逆镇冲，止血消炎，杀菌抗癌；制马钱子除湿祛毒，消肿提神，通血脉；郁金疏肝解郁，行气开窍；仙鹤草、清半夏燥湿祛痰，消滞散结，祛瘀生新，强心滋补；补骨脂壮腰补肾，扩张冠状动脉，加强心肌收缩力，调整内分泌系统，增强免疫功能。九种药配在一起，有壮腰补肾、通经化痰、软坚散结、理气止痛、健胃强脾、疏肝解郁、降逆镇冲、止血活血、培本强壮、调整内分泌、增强免疫功能之功效。

5. 芪酥丸

明雄黄 60 克 明白矾 60 克 山慈菇 90 克 蟾酥 15 克
制马钱子 30 克 朱砂 30 克 生黄芪 120 克 麝香 15 克

制法：上药除蟾酥、麝香、黄芪外，共研为细粉。将黄芪熬膏后烘干，蟾酥用牛奶浸，将麝香与上药粉及干燥的黄芪膏、蟾酥合在一起，研匀，再加胆汁（猪胆汁或牛胆汁均可）适量为丸。每次服 0.05~0.1 克，1 日 3 次。开水送下。

方义：本方以明雄黄、山慈菇、明白矾解毒消炎，化痰软坚；制马钱子、蟾酥、朱砂、麝香开窍醒脑，止痛熄风，养心强壮，安神镇静；黄芪补气托里以扶正。上药配合，有

活血化瘀、开窍醒脑、安神镇静、强心补气、补虚止痛、消坚除积、托里扶正等功效。

6. 参楼散

茅苍术 40 克 苦参 100 克 明雄黄 30 克 重楼 100 克
清半夏 100 克 蜈蚣 30 克

制法：将上药共研为细粉。每次服 1 克，1 日 2~3 次。开水送服。

方义：本方以茅苍术、重楼、苦参燥湿健脾，和胃厚肠，清热解毒，消肿止痛；清半夏、蜈蚣止咳祛痰，理气散结，降逆止呕；明雄黄消肿杀菌，除秽解毒。六味药综合配伍，有开胃健脾、消肿散结、燥湿祛痰、理气止痛、清热解毒、软坚化积、降逆止呕、活血化瘀之功效。

7. 破石丸

煅皂矾 20 克 焦山楂 180 克 建神曲 60 克 破故纸 120 克 黑大豆（炒）60 克 料姜石 140 克 红枣肉（去皮核）120 克

制法：将上药前六味共研为细粉，用枣肉为丸，如梧桐子大。每次服 3~8 克，1 日 3 次。开水送下。

方义：本方用料姜石、山楂降逆镇冲，止血消炎，软坚散结，消积消食；煅皂矾、炒黑豆补血燥湿，利肝补脾；补骨脂壮腰补肾，强心滋补，调整内分泌；建神曲、红枣肉健脾和胃，增强营养吸收。七味中药配在一起，有补气补血、健脾和胃、降逆镇冲、软坚散结、燥湿消积、补肾壮阳、调整内分泌、杀菌抗癌、增进营养吸收、增强免疫功能之力。

8. 芪仙丸

蟾酥 6 克 白矾 18 克 炒干漆 18 克 制马钱子 18 克
生黄芪 1440 克 山豆根 480 克 仙鹤草 480 克

制法：将蟾酥、白矾、干漆、制马钱子各研为细粉，合在一起研匀，生黄芪、山豆根、仙鹤草加水煎2遍，过滤后，浓缩为膏，再将前药粉加入膏内为丸。每服8~10克，每日3次。饭后开水冲服。

方义：本方以蟾酥、白矾止血消炎，消肿止痛，活血化瘀；制马钱子除湿祛毒，消肿提神，通血脉；干漆、山豆根攻坚破积，清热解毒；生黄芪、仙鹤草补气补血，强心滋阴，祛瘀生新。七味药相配伍，有清热解毒、软坚散结、消肿止痛、活血止血、祛瘀消积、滋阴养血、疏通血脉、提神扶正之功效。

9. 三莪散

蓬莪术 50克 明白矾 20克 红人参 50克 血竭 10克
三七 50克 生大黄 10克 麝香 1.5克

制法：将上药共研为细粉。每次服2~8克，1日3次。开水送下。

方义：本方用蓬莪术、血竭、三七活血化瘀，养血止血，疏肝解郁；明白矾清热解毒，消炎软坚；生大黄清泻里热；红人参补气补血，扶正祛邪；麝香理气止痛，引诸药以达病所。各味药相合，可补气补血，软坚散结，泻热消肿，理气止痛，疏肝解郁，活血化瘀，清热解毒，扶正祛邪。

10. 茶贞丸

煅皂矾 50克 女贞子 60克 料姜石 60克 太子参 100克
山慈菇 50克 紫阳茶 40克 鸡蛋壳（焙）60克

制法：将上药共研为细粉，水泛为丸。每次服5~8克，1日2~3次。开水送下。

方义：本方用皂矾补血祛湿；女贞子、山慈菇清热解毒，滋阴养血，消肿软坚；料姜石、鸡蛋壳和胃健脾，降逆

镇冲，以补机体必需的微量元素；紫阳茶、太子参补气补血，提高白细胞防御能力。诸药配合，有补血养血、滋阴消肿、和胃健脾、增强机体免疫功能、提高防御能力、扶正祛邪之功效。

11. 蓼参丸

明雄黄 60 克 明白矾 60 克 冰片 30 克 苦参 120 克
山慈菇 90 克 郁金 90 克 朱砂 30 克 制马钱子 30 克 生
黄芪 120 克 红蓼子（水红花子）90 克

制法：先将生黄芪、苦参熬膏后烘干，再将上药共研为细粉，合在一起研匀，再入胆汁（猪胆汁或牛胆汁均可）适量为丸。每次服 1.5~3 克，1 日 3 次。开水送下。

方义：本方用红蓼子、郁金、苦参消积活血，清热燥湿，化痞利水，解郁抗癌；明雄黄、山慈菇、明白矾解毒消炎，化痰软坚；朱砂、制马钱子、冰片开窍醒脑，养心强壮，安神镇静，散结健胃；生黄芪补气扶正。各味药综合配伍，有活血化瘀、开窍醒脑、安神镇静、软坚散结、健胃强壮、补气强心、消积化痞、止痛抗癌、扶正祛邪之功效。

（二）辨证用方

对于每一部位不同性质的癌瘤，结合不同的病因病机与病人的体质特点，也就是按照不同癌瘤过程矛盾的特殊性及其本质，拟定出解决这一矛盾的原则，辨证用药。

在辨证治疗过程中，不同部位、不同类型的癌瘤，均可按以下几点增减用药：

1. 症见胸闷，胸胁胀满，胃或腹部胀痛，暖气，恶心，呕吐，乳房胀或肿块胀。舌苔薄白或薄腻。脉弦细，或弦滑。此属气滞。治宜理气止痛，降逆镇冲。用佛香丸，或用

佛香汤加减煎服。

佛香丸：

枳壳 120 克 佛手 150 克 薤白 150 克 木贼 200 克
清半夏 150 克 料姜石 600 克 索罗子 150 克 制香附 150
克 白芍 200 克 郁金 150 克

制服法：将上药共研为细粉，水泛为丸。每次服 6~10
克，1 日 3 次。开水送下。

方义：本方用佛手、制香附、薤白、索罗子理气止痛，
通阳消痞；郁金、白芍疏肝解郁；木贼、枳壳、清半夏、料
姜石宽膈化滞。各药配伍，有理气止痛、降逆镇冲、疏肝解
郁、软坚散结、宽胸化滞、通阳消痞之功效。

佛香汤：

枳壳 12 克 佛手 15 克 薤白 15 克 清半夏 15 克 索
罗子 15 克 制香附 15 克 白芍 20 克 料姜石 60 克 郁金
15 克 木贼 12 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2~3 次服。每
日 1 剂。

方义：同佛香丸。

2. 症见局部肿胀，或有肿物痞块，痛有定处。舌紫暗，
或有瘀点、瘀斑。脉细涩，或细弦。此属血瘀。治宜活血化
瘀，止痛散结。用棱莪丸，或用棱莪汤加减煎服。

棱莪丸：

三棱 150 克 蓬莪术 150 克 当归 300 克 丹参 300 克
土鳖子 100 克 川楝子 150 克 赤芍 150 克 凌霄花 200 克
苏木 100 克

制服法：将上药共研为细粉，水泛为丸。每次服 8~10
克，1 日 3 次。开水送下。

方义：本方中三棱、蓬莪术、苏木、凌霄花活血化瘀，软坚散结；当归、丹参养血活血；土鳖子、赤芍消坚破积，滋阴消炎；川楝子理气止痛。九味药配伍，有活血化瘀、软坚散结、理气止痛、攻坚破积、解毒养血之功效。

棱莪汤：

三棱 15 克 蓬莪术 15 克 丹参 30 克 当归 15 克 土鳖子 10 克 川楝子 15 克 赤芍 15 克 凌霄花 20 克 苏木 10 克

煎服法：同佛香汤。

方义：同棱莪丸。

3. 症见面色晄白，语言低微，呼吸短促，食欲不振，自汗疲倦。舌淡，苔少。脉虚无力。此属气虚。治宜补气健脾。用贞术丸，或用贞术汤加減煎服。

贞术丸：

黄芪 600 克 党参 300 克 白术 200 克 当归 150 克 丹参 300 克 枸杞子 200 克 女贞子 300 克 生甘草 30 克

制服法：将上药共研为细粉，水泛为丸。每次服 6~10 克，1 日 3 次。开水送下。

方义：本方用黄芪、党参补气扶正；白术、生甘草健脾和胃；当归、丹参活血养血，软坚散结；枸杞子、女贞子补肾壮腰，增强免疫功能。八味药配在一起，有健脾补气、活血养血、壮腰强肾、增强机体抗病能力、扶正祛邪之功效。

贞术汤：

黄芪 60 克 党参 30 克 白术 20 克 当归 15 克 丹参 30 克 生甘草 8 克 枸杞子 20 克 女贞子 30 克

煎服法：同佛香汤。

方义：同贞术丸。

4. 症见头晕眼花，面色萎黄，心悸怔忡，睡眠不安，失眠，手足麻木。舌淡，苔少。脉细无力。此属血虚。治宜补血益气。用丹甲丸，或用丹甲汤加减煎服。

丹甲丸：

黄芪 600 克 党参 300 克 丹参 300 克 熟地黄 300 克
川芎 100 克 当归 200 克 炒枣仁 300 克 鳖甲 200 克

制服法：将上药共研为细粉，水泛为丸。每次服 6~15 克，1 日 3 次。开水送下。

方义：本方以炒枣仁养心安神；黄芪、党参补气扶正；丹参、当归、熟地黄、鳖甲、川芎活血化瘀，滋阴养血。各味药综合，有补血益气、养血安神、活血软坚、扶正祛邪之功效。

丹甲汤：

黄芪 60 克 党参 30 克 丹参 30 克 熟地黄 30 克 川
芎 10 克 炒枣仁 30 克 鳖甲 20 克 当归 20 克

煎服法：同佛香汤。

方义：同丹甲丸。

5. 症见面色晦暗，下利清谷，无热恶寒，四肢厥冷，小便清长。舌淡，少苔。脉迟无力。此属阳虚。治宜温肾补阳。用苁仙丸，或用苁仙汤加减煎服。

苁仙丸：

补骨脂 200 克 仙茅 150 克 肉桂 60 克 附子 150 克
薏苡仁 300 克 菟丝子 150 克 骨碎补 150 克 诃子肉 150 克

制服法：将上药共研为细粉，水泛为丸。每次服 6~10 克，1 日 3 次。开水送下。

方义：本方用补骨脂、骨碎补、菟丝子壮腰强肾，增强

免疫功能；仙茅、肉桂、附子温阳抑阴；薏苡仁、诃子肉健脾止泻。综合诸药，有温肾补阳、燥湿健脾、温中止泻、补肾强腰、增强免疫功能之功效。

苡仙汤：

补骨脂 30 克 仙茅 15 克 肉桂 6 克 附子 15 克 薏苡仁 30 克 骨碎补 15 克 诃子肉 15 克 菟丝子 15 克

煎服法：同佛香汤。

方义：同苡仙丸。

6. 症见面色红似火，口干咽燥，心悸气短，五心烦热。舌质红绛，舌光无苔，或花剥苔。脉细数。此属阴虚。治宜养阴生津。用竹甲丸，或用竹甲汤加减煎服。

竹甲丸：

生地黄 300 克 山萸肉 150 克 玉竹 300 克 北沙参 200 克 天花粉 300 克 龟板 200 克 鳖甲 200 克

制服法：将上药共研为细粉，水泛为丸。每次服 6~15 克，1 日 3 次。开水送下。

方义：本方用生地黄、玉竹、北沙参、天花粉养阴生津，润燥除烦，清热消炎；山萸肉、龟板、鳖甲软坚滋阴。各药综合一起，有养阴生津、软坚散结、润燥除烦、强心养血、凉血补血、消炎解热之功效。

竹甲汤：

生地黄 30 克 山萸肉 15 克 北沙参 30 克 天花粉 30 克 龟板 20 克 鳖甲 20 克 玉竹 30 克

煎服法：同佛香汤。

方义：同竹甲丸。

7. 症见肿块，发热，疼痛，口干咽燥，大便秘结，小便黄少。舌质红，苔黄。脉弦数。此属热毒。治宜泻火利

湿，解毒消肿。用重苓丸，或用重苓汤加减煎服。

重苓丸：

重楼 100 克 山豆根 100 克 全蝎 100 克 露蜂房 100 克 薏苡仁 300 克 猪苓 600 克 白花蛇舌草 300 克 野菊花 300 克

制服法：将上药共研为细粉，水泛为丸。每次服 3~6 克，1 日 3 次。开水送下。

方义：本方中用重楼、山豆根、野菊花解毒清热；全蝎、露蜂房、白花蛇舌草泻火消肿；薏苡仁、猪苓利水燥湿。八味药配伍，有清热解毒、消炎消肿、软坚化瘀、泻火利湿、健脾利水、通便消癥之功效。

重苓汤：

重楼 10 克 山豆根 10 克 全蝎 10 克 蜂房 10 克 薏苡仁 30 克 猪苓 60 克 白花蛇舌草 30 克 野菊花 30 克

煎服法：同佛香汤。

方义：同重苓丸。

8. 症见颈项瘰癧包块，颈项酸痛，头痛胸闷，痰液粘稠难咯，痰涎壅盛。舌苔白腻。脉滑。此属痰凝。治宜消肿化痰，软坚散结。用海铃丸，或用海铃汤加减煎服。

海铃丸：

海藻 150 克 昆布 150 克 天南星 150 克 重楼 100 克 杏仁 150 克 瓦楞子 300 克 蛇蜕 100 克 马兜铃 120 克

制服法：将上药共研为细粉，水泛为丸。每次服 8~10 克，1 日 3 次。开水送下。

方义：本方以海藻、昆布、瓦楞子软坚散结；天南星、杏仁、马兜铃燥湿化痰；重楼、蛇蜕解毒消肿。八味药配伍，有软坚散结、活血化瘀、解毒消肿、燥湿化痰、定喘止

咳之功效。

海铃汤：

海藻 15 克 昆布 15 克 天南星 15 克 重楼 10 克 杏仁 15 克 瓦楞子 30 克 蛇蛻 10 克 马兜铃 12 克

煎服法：同佛香汤。

方义：同海铃丸。

9. 症见胸闷腹胀，食欲不振，呕吐恶心，口粘腻，四肢沉重，足肿，大便溏，小便短少。舌苔厚腻。脉濡缓。此属湿聚。治宜化湿健脾，利水消肿。用兰香丸，或用兰香汤加减煎服。

兰香丸：

苍术 120 克 川厚朴 100 克 枳壳 120 克 薏苡仁 300 克 猪苓 600 克 藿香 100 克 佩兰叶 300 克 清半夏 150 克 生甘草 30 克

制服法：将上药共研为细粉，水泛为丸。每次服 8~10 克，1 日 3 次。开水送下。

方义：本方用苍术、川厚朴、薏苡仁健脾和胃；清半夏、藿香、佩兰叶化湿降逆；猪苓、枳壳、生甘草利水消肿，帮助消化。九味药合在一起，有健脾利水、消肿化湿、降逆镇冲之功效。

兰香汤：

苍术 12 克 川厚朴 10 克 薏苡仁 30 克 猪苓 60 克 藿香 10 克 佩兰叶 30 克 清半夏 15 克 枳壳 12 克 生甘草 3 克

煎服法：同佛香汤。

方义：同兰香丸。

(三) 癌瘤常见症状的辨证施治

1. 发热

①瘀血热：癌瘤病，症见发热，面色青紫，局部刺痛，便秘。舌紫有瘀斑，舌苔白。脉弦，或脉涩。此为瘀血。治宜活血化瘀，退热解毒。方药可用桃丹银翘汤加减，或麻翘石膏汤加减。

桃丹银翘汤：

桃仁 12 克 丹参 60 克 红花 10 克 连翘 30 克 仙鹤草 60 克 金银花 30 克 鸡血藤 30 克 生甘草 3 克 重楼 10 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：方中用桃仁、红花、丹参活血化瘀，软坚润便；仙鹤草、鸡血藤滋阴强心，破积通血脉；重楼、连翘、金银花、生甘草退热解毒，消炎止痛。各药综合一起，有软坚化瘀、退热解毒、滋阴强心、消炎止痛、通血脉之功效，用于癌瘤发热、面青、局部疼痛之时。

麻翘石膏汤加减：

麻黄 6 克 生石膏 20 克 大贝母 20 克 金银花 20 克 连翘 20 克 丹参 60 克 仙鹤草 60 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，加入白糖、蜂蜜各 30 克，分 2 次服。

方义：本方以麻黄解表邪；石膏清里热；大贝母宣降肺气；连翘、金银花清热解毒；丹参、仙鹤草软坚化瘀，活血强心；蜂蜜、白糖滋润缓下，固塞心脏。各药综合，有通阳泄热、双解表里、活血化瘀之功效。用于癌瘤发热，便秘，面色青紫。

②湿热：癌瘤疾病，症见发热忽高忽低，头痛自汗，心烦胸闷，恶心，浮肿。舌苔黄腻。脉滑数。此为湿热。治宜燥湿理脾，软坚化痰，清化解热。方药可用薏苡汤加减。

薏苡汤：

薏仁 10 克 藿香 12 克 柴胡 12 克 薏米 30 克 杏仁 15 克 龙葵 15 克 苍术 12 克 竹茹 10 克 大青叶 30 克 土茯苓 30 克 仙鹤草 60 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：方内以杏仁、藿香、薏仁、竹茹降逆和胃；苍术、土茯苓、薏米燥湿理脾；柴胡、仙鹤草、大青叶、龙葵清热解毒，软坚化痰。各药合在一起，有降逆和胃、清化退热、消肿除烦、清热解毒、强心利水之功效。用于癌瘤出现头痛、心烦、胸闷、恶心、浮肿及发热时高时低之时。

③毒火热：癌瘤病，症见发热发冷，头痛，周身燔热，大便干，小便黄，局部肿痛。舌绛，苔黄。脉洪。此为毒火。治宜解毒降火，通便消肿。方药可用丁翘汤加减。

丁翘汤：

紫花地丁 30 克 连翘 30 克 重楼 10 克 金银花 30 克 黄芩 10 克 大黄 10 克 野菊花 30 克 土茯苓 30 克 赤芍 20 克 生甘草 3 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：方内以紫花地丁、连翘、金银花、重楼、野菊花清热解毒；大黄、黄芩、土茯苓、生甘草、赤芍药通便泻火，消炎，消肿。各药综合一起，有通便泻火、清热解毒、消炎、消肿、止痛之功效。用于癌瘤发冷发热、头痛、烦热、大便干秘、小便黄赤之时。

④营血热：癌瘤病，症见持续高热，心烦躁动，斑疹出

血。舌绛，尖红。脉弦数。此为热入营血。治宜清营解热，凉血除烦，活血止血，软坚化瘀。方药可用地草汤加减。

地草汤：

生地黄 30 克 牡丹皮 12 克 黄药子 12 克 黑玄参 15 克
赤芍药 15 克 紫草根 15 克 鱼腥草 30 克 仙鹤草 30 克
水牛角 20 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，分 2 次服。

方义：本方用生地黄、玄参、丹皮、赤芍药凉血止血，除烦清营；紫草根、鱼腥草、仙鹤草、黄药子、水牛角活血化瘀，滋阴强心，清热解毒。各药相合，能清营凉血，退热化斑，止血除烦。用于癌瘤病高热斑疹之时。

⑤心包热：癌瘤病，症见高热神昏，循衣摸床，躁狂昏迷。舌绛。脉细数。此为心包热。治宜清热安宫，豁痰开窍，解毒软坚。方药可用茶胆汤。

茶胆汤：

野牛角 20 克(或犀角 10 克) 胆汁(猪胆汁、羊胆汁、牛胆汁均可用)(冲)3 克 蜂房 10 克 僵蚕 10 克 全蝎 10 克
生石膏 60 克 知母 10 克 大青叶 30 克 绿茶叶 10 克

煎服法：一剂药煎 2 遍(除胆汁)，合在一起，兑入胆汁，分 2 次服。

方义：方中以牛角、胆汁豁痰定惊，开窍清心；蜂房、全蝎、僵蚕解痉散结；生石膏、知母、大青叶、绿茶叶清热解毒，强心利水。各药综合起来，有安宫清热、豁痰开窍、清热解毒之功效。

⑥阴虚热：癌瘤病，症见蒸蒸发热，热自骨，盗汗，消瘦，五心烦热。舌光，无苔。脉沉细。此为阴虚 治宜滋阴软坚，除蒸退热。方药可用加减青蒿鳖甲汤。

青蒿鳖甲汤：

鳖甲 20 克 银柴胡 20 克 知母 12 克 地骨皮 30 克
青蒿 15 克 生地黄 30 克 玄参 30 克 生甘草 3 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：方中用鳖甲、银柴胡、生地黄、玄参滋阴软坚；知母、地骨皮、青蒿、生甘草退热除蒸。各药合在一起，有滋阴软坚、凉血活血、退热除蒸之功效。用于各种癌瘤出现骨蒸发热、盗汗自汗、形瘦烦热之时。

2. 咳嗽

①痰热咳：癌瘤病，症见咳嗽痰多，胸闷发热。舌苔黄厚。脉滑。此为痰热。治宜润肺清热，豁痰止咳。方药可用杏铃汤加减。

杏铃汤：

杏仁 15 克 马兜铃 10 克 清半夏 15 克 瓜蒌 30 克
葶苈子 10 克 鱼腥草 30 克 百部 15 克 木瓜 12 克 大蒜
20 瓣 生甘草 3 克 大枣 6 枚

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：此方用杏仁、马兜铃、清半夏、瓜蒌宣肺祛痰；葶苈子、鱼腥草降气清热 百部、木瓜、大蒜润肺止咳；生甘草、大枣健脾理中。诸药相伍，有宣肺降逆、镇咳豁痰、润肺清热、消炎解毒之功效。用于各种癌瘤胸闷、痰多、咳嗽之时。

②肺燥咳：癌瘤病，症见咳嗽，咯痰带血，胸部闷痛燥热，口渴咽干。舌燥红。脉弦。此为肺燥。治宜清燥救肺。方药可用清燥救肺汤加减（喻嘉言方）。

清燥救肺汤：

北沙参 20 克 生石膏 30 克 麦门冬 15 克 杏仁 15 克

阿胶 20 克 霜桑叶 10 克 仙鹤草 30 克 白茅根 30 克 生甘草 3 克 枇杷叶 10 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

③肺热咳：癌瘤病，症见咳嗽无痰，或少痰，盗汗，低热，咽痛，气憋。舌红。脉细数。此为肺热。治宜养阴清肺，消炎润燥。方药可用沙芦汤加减。

沙芦汤：

沙参 30 克 麦门冬 20 克 重楼 10 克 玉竹 30 克 鲜芦根 30 克 银柴胡 12 克 石斛 15 克 青蒿 15 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：方中用沙参、麦门冬、玉竹养阴润燥；重楼、芦根、银柴胡、石斛、青蒿清热消炎。各药配在一起，有滋阴润燥、清热解毒、消炎清肺、利气止咳之功效。

④肺脾两虚咳：癌瘤病，症见咳嗽气短，肢冷便溏，疲倦，浮肿。舌苔白腻。脉濡。此为肺脾两虚。治宜健脾益肺。方药可用蒜瓜楂榴汤加减。

蒜瓜楂榴汤：

大蒜 20 瓣 木瓜 12 克 百部 12 克 白扁豆 20 克 陈皮 10 克 山药 30 克 薏米 30 克 焦山楂 30 克 石榴皮 15 克 生甘草 3 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方以大蒜、木瓜、百部益肺疏肝，止咳下气；白扁豆、陈皮、山药、薏米健胃和脾；焦山楂、石榴皮、生甘草和中健运，止泻利水。各药配伍，有益肺止咳、健脾补肺、疏肝解郁、帮助消化、止泻之功效。

⑤肾不纳气咳：癌瘤病，症见咳嗽，气喘，稍有活动喘息即作，腰酸遗尿。舌苔黑。脉沉，尺弱。此为肾不纳气。

治宜补肾纳气，止咳定喘。方药可用百龙汤加减。

百龙汤：

天门冬 20 克 太子参 20 克 苏地龙 12 克 仙灵脾 10 克 苦杏仁 12 克 细辛 3 克 枸杞子 20 克 熟地黄 30 克 百合 30 克 五味子 10 克 瓜蒌 30 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：方内用仙灵脾、枸杞子、五味子、熟地黄补肾纳气；百合、瓜蒌健脾补肺；天门冬、太子参、地龙、细辛、杏仁通络定喘，宣肺止咳。各药合在一起，能补肾纳气，止咳定喘，宣肺通络。用于癌瘤病咳嗽气喘、腰酸腿疼、遗尿及四肢无力。

3. 呼吸困难

①肺失肃降：癌瘤病，症见呼吸困难，恶寒发热，咳嗽咽痛，鼻塞，胸满胸痛。舌苔薄白。脉滑。此为肺失肃降。治宜开肺降气。方药用苏子降气汤加减。

苏子降气汤：

苏子 12 克 清半夏 12 克 全当归 15 克 麻黄 6 克 杏仁 12 克 北沙参 30 克 桑白皮 10 克 麦门冬 20 克 瓜蒌 30 克 生石膏 20 克 苍耳子 12 克 生甘草 3 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

②脾虚痰湿：癌瘤病，症见呼吸困难，痰多，胸闷，呕恶，背寒无力。舌苔厚。脉滑数。此为脾虚痰湿。治宜健脾温中，化痰理气。方药可用参杏夏术汤加减。

参杏夏术汤：

红人参 10 克 云茯苓 15 克 白术 30 克 桂枝 10 克 北细辛 3 克 清半夏 15 克 五味子 10 克 麻黄 6 克 杏仁 15 克 生甘草 5 克

煎服法：一剂药煎2遍，合在一起，分2次服。

方义：本方用红人参、白术、茯苓、生甘草补气健脾；桂枝、细辛、清半夏通阳理气；五味子、杏仁、麻黄降逆解表。各药相伍，有理气化痰、通阳解表、补气温中、健脾和胃、除湿祛痰、扶正祛邪之功效。

③肾虚气逆：癌瘤病，症见呼吸困难，喘息难卧，腰腿酸软，稍有活动即汗出气短，疲倦。舌红。脉数，或脉数无力。此为肾虚气逆。治宜益肾固金。方药可用加减肾气汤（《金匱要略》方）。

加减肾气汤：

肉桂6克 制附子6克 山药12克 山萸肉12克 熟地黄24克 粉丹皮9克 云茯苓9克 百合30克 川贝母10克 淫羊藿12克

煎服法：一剂药用开水煎2遍，合在一起，分2次服。

4. 鼻堵塞

①瘀结：癌瘤病，症见息肉鼻塞，经常流出恶臭鼻涕，息肉质硬，或息肉开花。舌苔白。脉弦。此为瘀结。治宜散瘀透塞，清热解毒。方药可用苍辛丹杏汤加减。

苍辛丹杏汤：

苍耳子12克 辛夷花12克 肥知母10克 杏仁15克 黄芩12克 枇杷叶10克 升麻3克 马兜铃12克 丹参60克 粉丹皮12克 夏枯草30克 仙鹤草50克

煎服法：一剂药煎2遍，合在一起，分2次服。

方义：本方用苍耳子、辛夷通透鼻塞；知母、黄芩、丹皮、杏仁、枇杷叶、马兜铃清热解毒，宣降逆气；丹参、升麻、夏枯草、仙鹤草活血化瘀，软坚散结。各味药合在一起，有通透鼻咽、除风消炎、清热解毒、软坚散结、止血止

痛、活血化瘀、去塞除臭之力。用于癌瘤息肉，均能收效。

②衄塞：癌瘤病，症见衄血鼻塞，头晕目眩，头胀烦躁。舌紫。脉数。此为衄塞。治宜清热凉血。方药可用菊柏汤加减。

菊柏汤：

野菊花 30 克 生地黄 30 克 赤芍药 15 克 粉丹皮 12 克 黄芩 12 克 山慈菇 30 克 侧柏叶 30 克 赤茯苓 15 克 小蓟 20 克 藕节 30 克 白茅根 30 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用生地黄、侧柏叶、小蓟、藕节、白茅根凉血止血，滋润软坚；赤芍药、粉丹皮、赤茯苓活血化瘀；山慈菇、黄芩、野菊花柔肝熄风，清热除烦，解毒通塞。诸药综合一起，有柔肝熄风、凉血止血、滋润软坚、消胀除烦、清热解毒、活血化瘀、通塞消炎之功效。

③热毒：癌瘤病，症见浊涕鼻塞，经常流出青黄浊涕，气多腥臭，头痛低热。舌苔黄腻。脉沉，或沉数。此为热毒。治宜清热解毒，化溃透塞。方药可用苍耳汤加减。

苍耳汤：

苍耳子 12 克 辛夷花 12 克 香白芷 10 克 粉丹皮 12 克 夏枯草 30 克 黄药子 15 克 野菊花 30 克 赤芍药 15 克 重楼 10 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方以苍耳子、辛夷通透鼻咽，消炎除风；白芷、赤芍药止痛除臭；粉丹皮、夏枯草、黄药子、野菊花、重楼清热解毒，软坚化瘀，消炎消肿。各味药配合在一起，有清热解毒、软坚化瘀、活血止痛、消炎消肿、化溃除臭、通透鼻咽之功效。

5. 声音嘶哑

①风寒：癌瘤病，症见突然发作，声音嘶哑，恶风恶寒，咽喉发紧。舌苔白。脉浮紧。此为风寒。治宜疏风解表，散寒降逆，温肺利膈。方药可用麻朴汤加减。

麻朴汤：

麻黄 6 克 杏仁 15 克 生甘草 3 克 桔梗 10 克 枳壳 12 克 川厚朴 10 克 清半夏 10 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用麻黄、杏仁、生甘草、清半夏解毒散寒，疏风温肺；桔梗、枳壳、川厚朴利膈和中。诸药相伍，有疏风解表、温肺散寒、和中利膈、降逆畅咽之功效。

②寒兼火：癌瘤病，症见声哑咳嗽，发热胸痛，咽喉干痛。舌苔黄。脉弦数。此为有寒兼火。治宜清肺利咽。方药可用加味麻杏石甘汤（《伤寒论》方）。

加味麻杏石甘汤：

麻黄 6 克 生石膏 20 克 苦杏仁 15 克 天花粉 15 克 桔梗 10 克 生甘草 3 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

③气阴两虚：癌瘤病，症见声音嘶哑，气短，气喘，语言低微，多汗，口干。舌红，少苔。脉沉细。此为气阴两虚。治宜补虚益气，润燥清音。方药可用冬参汤。

冬参汤：

人参 10 克 云茯苓 15 克 全当归 15 克 生地黄 30 克 麦门冬 20 克 天门冬 20 克 诃子肉 12 克 阿胶（烔化）15 克 梨汁 30 毫升

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，入阿胶烔化，加梨汁，分 2 次服。

方义：本方用人参、茯苓益气生津；当归、生地黄、麦门冬、梨汁滋阴润肺，强肾固金以定喘；阿胶、诃子肉止血润燥，清音敛汗。各药综合一起，能补虚益气，滋阴润肺，清音敛汗，生津止渴，强肾固金并定喘。

④肺虚有热：癌瘤病，症见声音嘶哑，低热，盗汗，咽干口燥，五心烦热。舌红，苔黄。脉沉数。此为肺虚有热。治宜补肺滋阴，益气清热。方药可用鱼芦汤。

鱼芦汤：

生地黄 30 克 麦门冬 20 克 桑白皮 10 克 杏仁 15 克
阿胶 15 克 知母 12 克 北沙参 30 克 芦根 30 克 鱼腥草 30 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方以生地黄、桑白皮、麦门冬、杏仁滋阴补阴，润燥清咽，降逆除烦；阿胶、北沙参、知母、芦根、鱼腥草补虚清热，滋肾益气。各药配伍，有补肺滋阴、降逆除烦、益气清热、清咽润燥、益音强壮之功效。

6. 疼痛

①毒热痛：癌瘤，症见头痛头胀，呕吐发热，面紫目青。舌绛紫。脉沉弦。此为毒热。治宜开窍醒神，清热解毒，活血化瘀，止痛止呕。方药可用麝香丹参汤。

麝香丹参汤：

麝香 0.1 克（冲） 丹参 60 克 川芎 6 克 苏地龙 12 克
全当归 15 克 全蝎 10 克 怀牛膝 12 克 野菊花 30 克
重楼 10 克 羊角 10 克 桃仁 10 克 红花 10 克

煎服法：一剂药煎两遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用丹参、桃仁、红花活血化瘀，软坚散结，推陈致新；麝香开窍醒神；苏地龙、野菊花、羊角、怀牛膝柔肝

熄风，通络止痛；川芎、当归补血养血；重楼、全蝎清热解毒。诸药综合配伍，有开窍醒神、柔肝熄风、通络止痛、活血化瘀、软坚散结、养血补血、清热解毒、消胀止呕之功效。

②痰浊痛：癌瘤，症见头痛头昏，自觉头沉，且有空洞感觉，胸膈满闷，痰涎呕恶。舌苔白，厚腻。脉沉滑。此为痰浊。治宜燥湿涤痰，降逆祛浊，补气止痛。方药可用半夏天麻汤加减。

半夏天麻汤：

清半夏 12 克 白术 20 克 明天麻 10 克 云茯苓 20 克
猪苓 60 克 生黄芪 60 克 党参 15 克 夏枯草 30 克 全瓜
蒌 30 克 杏仁 15 克 蜂房 10 克 全蝎 10 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：方中用半夏、白术燥湿化痰，降逆化浊，益气利水；生黄芪、党参补气升阳，托里固表；天麻、夏枯草清肝散郁，消肿止痛；茯苓、猪苓渗湿和中，健脾宁心；瓜蒌、杏仁宣降祛痰；蜂房、全蝎清热解毒，软坚散结，熄风止痛。各药互相配合，有燥湿涤痰、降逆化浊、补气止痛、软坚散结、熄风解痉、升阳固表、托里消肿、清肝散郁、消炎除烦之功效。

③寒厥痛：癌瘤，症见头脑冷痛，面容惨淡，忧郁青晦。舌淡晦暗。脉沉紧。此为寒厥。治宜解肌散寒，调和营卫，温肝和胃，回阳救逆，止痛散结。方药可用参桂汤加减。

参桂汤：

桂枝 20 克 白芍药 15 克 细辛 3 克 清半夏 12 克
当归 15 克 通草 10 克 红人参 10 克 龙葵 20 克 黄药子
15 克 蜈蚣 2 条 生甘草 3 克 生姜 15 克 大枣 6 枚

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用桂枝、白芍药、生甘草、生姜、大枣解肌发表，调和营卫；半夏、细辛、通草燥湿化痰，降逆止呕，通阳散结；当归补血养血；黄药子、龙葵清热解毒，消肿软坚，凉血止血；蜈蚣、红人参熄风解痉，通络散寒，补气生津，安神健脾。诸药综合配伍，有解肌发表、调和营卫、理气解郁、通阳散寒、降逆止呕、补血养血、消肿止痛、软坚散结、燥湿化痰、疏肝和胃、止血活血、回阳救逆之功效。

④肝火痛：癌瘤，症见头晕耳鸣，轰轰胀痛，状似上冲，呕吐苦水，大便干，小便黄。舌苔黄。脉弦数。此为肝火。治宜清热泻火，柔肝熄风，凉血止痛，平肝镇冲。方药可用菊苣汤加减。

菊苣汤：

黄芩 12 克 木贼 12 克 元参 12 克 大黄 10 克 白芍药 20 克 野菊花 30 克 龙胆草 10 克 石决明 30 克 猪苓 30 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用木贼、野菊花、石决明、龙胆草柔肝熄风，泻火解毒，清脑潜阳，清热明目；黄芩、大黄、元参平肝镇冲，泻热滋阴；猪苓、白芍药渗湿利水，消胀止痛。诸药合并起来，有柔肝熄风、清脑泻火、平肝镇冲、泻热滋阴、清热解毒、凉血明目、消胀止痛之功效。

⑤血虚痛：癌瘤病，症见头痛，目眩，心慌气短，面色㿔白，眼眶疼痛，手脚发热，眼皮酸重，恶心呕吐。舌淡，苔少。脉沉细弱。此为血虚。治宜补血养血，滋阴潜阳，宁心安神。方药可用地明汤加减。

地明汤：

生地黄 30 克 全当归 15 克 白芍药 15 克 何首乌 20

克 川芎 10 克 桑寄生 12 克 女贞子 30 克 钩藤 25 克
龙骨 30 克 牡蛎 30 克 珍珠母 30 克 丹参 60 克 生石决
明 30 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方以生地黄、全当归、白芍药、川芎、女贞子、丹参补血养血，活血凉血，止血滋养，化瘀软坚；生龙骨、生牡蛎、珍珠母、生石决明柔肝潜阳，软坚散结，宁心安神，清热明目；桑寄生、何首乌、钩藤清头风，补脑，疏风止痛。诸药配伍，有滋阴潜阳、柔肝熄风、安神宁心、除风止痛、软坚散结之功效。

⑥阴虚肺热：癌瘤，症见胸闷胸痛，发热，气短，咳嗽，咽干，身体虚弱，消瘦，盗汗。舌暗，少苔。脉沉细。此为阴虚肺热。治宜降逆止咳，止痛利咽，养阴清热。方药可用鱼铃汤加减。

鱼铃汤：

瓜蒌 30 克 清半夏 12 克 重楼 10 克 马兜铃 12 克
杏仁 15 克 枇杷叶 15 克 玉竹 15 克 苇根 30 克 鱼腥草
30 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用杏仁、枇杷叶宣肺降逆；重楼消肿止痛；清半夏、马兜铃、瓜蒌止咳祛痰；玉竹、苇根、鱼腥草补阴清热，解毒消炎。这几味药配在一起，有宣肺降逆、止咳祛痰、补虚润阴、清热消炎、止痛除烦、解毒软坚之功效。

⑦肺虚痰凝：癌瘤，症见胸闷，胸痛，气短，咳嗽，痰多难咯，颈多疙瘩。舌苔厚腻。脉弦滑。此为肺虚痰凝。治宜补肺通阳，化痰散结，利气止痛。方药可用瓜蒌鱼贝汤加减。

瓜蒌鱼贝汤：

瓜蒌 30 克 薤白 15 克 重楼 10 克 清半夏 15 克 鱼腥草 30 克 土贝母 30 克 大贝母 12 克 黄连 10 克 蛤粉 30 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用瓜蒌、薤白、重楼、清半夏通阳以治胸痛；鱼腥草、土贝母、黄连解毒消炎，软坚散结；大贝母、蛤粉止咳祛痰，宣降肺气。各药综合起来，有补肺通阳、软坚散结、活血化瘀、祛痰止咳、利气止痛、消炎解毒之功效。

⑧肺毒血热：癌瘤，症见胸痛咯血，或胸背疼痛，痰黄带血，面青唇红。舌尖红绛。脉沉数。此为肺毒血热。治宜解毒消炎，凉血止血，化瘀止痛。方药可用丹胡失笑汤加减。

丹胡失笑汤：

元胡 15 克 全当归 15 克 生黄芪 30 克 生蒲黄 10 克 五灵脂 10 克 乳香 10 克 没药 10 克 郁金 15 克 丹参 60 克 粉丹皮 10 克 小蓟 15 克 白茅根 30 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用丹参、丹皮、当归活血化瘀；生蒲黄、五灵脂、没药、元胡、乳香止痛软坚；黄芪补气扶正；郁金解郁；小蓟、白茅根止血。诸药互相配伍，有解毒消炎、凉血止血、活血化瘀、软坚解郁、止痛散结、补气扶正之功效。

⑨毒蕴痛：癌瘤，症见结痛，锐痛，持续性的疼痛，或包块坚硬。舌青紫暗。脉弦实。此为毒蕴疼痛。治宜解毒散结，活血化瘀，消肿止痛。方药可用莪菊汤加减。

莪菊汤：

野菊花 30 克 重楼 10 克 蓬莪术 15 克 元胡 15 克
鸡血藤 60 克 红蓼子（水红花子）15 克 龙葵 30 克 铁
树叶 30 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用野菊花、重楼、龙葵解毒消肿；蓬莪术、
鸡血藤、红蓼子、元胡活血化瘀，散结止痛；铁树叶养血止
血。上药综合一起，有清热解毒、软坚散结、活血化瘀、养
血止血、消炎消肿、通络止痛之功效。

⑩气滞痛：癌瘤，症见胀痛，胸闷气短，时急时缓，四
肢沉重。舌暗。脉弦。此为气滞疼痛。治宜行气消胀，导滞
止痛。方药可用柴金汤加减。

柴金汤：

柴胡 10 克 郁金 15 克 当归 15 克 白芍 20 克 佛手
15 克 乳香 10 克 没药 10 克 瓜蒌仁 30 克 大黄 10 克
蜣螂 10 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用柴胡、郁金、佛手理气解郁，消胀疏解；
当归、白芍、乳香、没药止痛养血；瓜蒌仁、大黄、蜣螂润
便导滞。各药配伍，有行气解郁、软坚导滞、活血养血、消
胀止痛之功效。

⑪血瘀痛：癌瘤，症见刺痛，痛有定处，稍压则疼痛加
剧。舌紫暗。脉涩。此为血瘀。治宜通经止痛。方药可用红
莪汤加减。

红莪汤：

红花 10 克 桃仁 10 克 蓬莪术 15 克 元胡 15 克 当
归 15 克 五灵脂 10 克 丹参 60 克

煎服法：一剂药煎2遍，合在一起，分2次服。

方义：本方用红花、桃仁、丹参活血化瘀；蓬莪术、五灵脂软坚散结，通经活络；当归、元胡养血止痛。诸药综合起来，有化瘀通经、活血养血、软坚散结、止痛通络之功效。

⑫风寒痛：癌瘤，症见窜痛，痛无定处，得温后疼痛减轻。舌苔白。脉紧。此为风寒疼痛。治宜疏风散寒，通络止痛。方药可用羌活汤加减。

羌活汤：

羌活 12 克 麻黄 6 克 姜黄 15 克 防风 10 克 当归 15 克 元胡 15 克 乌蛇 10 克 桂枝 10 克 威灵仙 30 克 生甘草 3 克

煎服法：一剂药煎2遍，合在一起，分2次服。

方义：本方用羌活、防风疏风通络；麻黄、威灵仙、桂枝散寒通经；姜黄、当归、乌蛇、元胡、生甘草养血活血，散结止痛。综合诸药，有通经活络、疏风散寒、活血养血、散结止痛之功效。

⑬脾虚寒结痛：癌瘤，症见隐痛，痛作绵绵，遇寒骤痛。舌苔白，厚腻。脉迟缓。此为脾虚寒结。治宜健脾散寒，通经止痛。方药可用苡辛汤加减。

苡辛汤：

生薏苡仁 30 克 辽细辛 3 克 白术 12 克 红人参 10 克 麻黄 6 克 桃仁 10 克 当归 15 克 索罗子 15 克

煎服法：一剂药煎2遍，合在一起，分2次服。

方义：本方用薏苡仁、白术除湿健脾；麻黄、细辛通络散寒；桃仁、当归、索罗子养血活血，通经止痛；红人参扶正祛邪。各药综合一起，有和胃健脾、除湿散寒、通经活

络、养血活血、消结止痛、扶正祛邪之功效。

⑭疼痛严重：癌瘤，症见疼痛严重，用一般止痛药效果不显时，不论性质，不分部位，除一般治癌药物继续服用外，都可以加服金钱丸、外敷金柏散以止痛。

金钱丸：

制乳香 15 克 制没药 15 克 红花 15 克 郁金 15 克
麻黄 60 克 制马钱子 120 克

制用法：共研为细粉，用米饭糊，或用面粉打糊为丸，如绿豆大。每次服 6~12 丸，1 日 3 次，开水送下。痛止停药。

方义：本方用制马钱子、制乳香、制没药止痛消肿，提精神，通血脉；郁金、红花、麻黄解郁通络，活血化瘀。六味药配合在一起，对各种癌瘤剧烈疼痛有效。

金柏散：

洋金花 20 克 生南星 15 克 北细辛 20 克 川芎 20 克
冰片 15 克 木鳖子 20 克 黄柏 20 克

制用法：上药除冰片另研外，各药共为细粉，加入冰片研匀，按疼痛部位大小，适量用白酒调敷患处。或用香油调敷，或用膏贴敷患处亦可。每日敷药 1 次。痛止停药。

方义：方中用洋金花、川芎、木鳖子、生南星行气活血，消肿止痛，燥湿散寒，消坚散结；冰片、细辛散瘀开窍，祛风止痛；黄柏行气理热。诸药互相配伍，有镇痛散瘀、行气活血、消肿止痛、消坚破积、燥湿散结、清热开窍之功效。

⑮疼痛剧烈用药无效：癌瘤，疼痛进一步严重，其他止痛药无效时，也可用芪酥丸内服，并敷金柏散。疼痛更进一步剧烈，服止痛药效果不显时，除内服止痛药外，并可用香

蓼子酒外敷止痛，或用香蚣散外敷。

香蓼子酒：

红蓼子 60 克 阿魏 15 克 急性子 15 克 大黄 15 克
甘遂 10 克 麝香 1.5 克 巴豆 10 粒

制用法：上药各捣为末，合在一起，纳入猪尿脬内，再加白酒 500 克。外敷痛处，痛止停药。

方义：本方用红蓼子、阿魏活血化瘀止痛；急性子、甘遂、大黄软坚逐水；巴豆、麝香、白酒散瘀镇痛，通经活络。诸药综合在一起，有通络止痛、活血软坚、逐瘀开窍之功效。

香蚣散：

蜈蚣 10 克 生半夏 45 克 陈橘皮 45 克 硼砂 30 克
重楼 45 克 全蝎 30 克 乳香 30 克 没药 30 克 紫花地丁
45 克 银朱 9 克 麝香 1.5 克

制用法：共研为细粉，合在一起，研匀。每次按疼痛部位大小取适量，用荞麦面打糊调药粉，外敷于疼痛部位对侧皮肤上。每隔 12 小时换药 1 次。痛止停药。

方义：本方用蜈蚣、生半夏、重楼、没药、乳香消炎定痛，解毒活血；紫花地丁、陈皮、硼砂、全蝎、银朱软坚消肿；麝香芳香走窜，引诸药直达病所。各药配合在一起，能止痛活血，软坚消肿。

7. 呕吐

①瘀毒反胃：癌瘤病，症见朝食暮吐，或暮食朝吐，吐物腐臭，有时带血，羸瘦，大便黑，小便黄。舌青紫。脉沉弦。此为瘀毒反胃。治宜化瘀解毒，降逆止呕。方药可用加减参赭培气汤（《医学衷中参西录》方）。

参赭培气汤：

人参 10 克 丹参 60 克 代赭石 30 克 桃仁 10 克 廔虫 10 克 丁香 10 克 沉香 6 克 清半夏 15 克 紫石英 15 克 瓦楞子 30 克 山慈菇 30 克 生甘草 3 克 料姜石 60 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 3 次服，1 日 1 剂。

②胃寒：癌瘤，症见呕吐酸水、清水，口内多涎，恶寒喜热。舌苔白。脉沉紧。此为胃寒。治宜温胃散寒，降逆镇冲。方药可用半夏干姜汤加減。

半夏干姜汤：

清半夏 15 克 干姜 12 克 吴茱萸 10 克 人参 10 克 大枣 6 枚 料姜石 60 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用干姜、吴茱萸温胃散寒；料姜石、清半夏降逆镇冲；人参、大枣健脾扶正。各药配合在一起，有温胃散寒、降逆镇冲、消涎止吐、扶正祛邪、健胃强脾之功效。

③胃热：癌瘤，症见呕吐酸苦物，口有秽气，食后即吐，恶热喜寒。舌苔黄腻。脉数。此为胃热。治宜清胃止呕，除秽清热，软坚散结。方药可用石竹汤加減。

石竹汤：

竹茹 15 克 清半夏 15 克 陈皮 10 克 枇杷叶 10 克 黄芩 10 克 柿蒂 10 克 紫石英 30 克 料姜石 60 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用竹茹、黄芩、枇杷叶降逆除秽，清胃热；陈皮、清半夏、柿蒂、料姜石和胃止呕；紫石英重镇软坚。诸药配合在一起，有清胃止呕、降逆镇冲、和胃健脾、除秽

清热、软坚散结之功效。

④胃郁积滞：癌瘤，症见呕吐反腐，吐前自觉胸腔胀满，暖气吞酸。舌苔黄。脉弦。此为胃郁积滞。治宜理气和胃，健脾止呕，消积导滞。方药可用姜橘汤加减。

姜橘汤：

生姜 15 克 陈橘皮 10 克 六神曲 10 克 炒麦芽 30 克
鸡内金 12 克 莪术 10 克 三棱 10 克 川厚朴 10 克 大黄
10 克 料姜石 60 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用三棱、莪术、鸡内金活血化瘀，消积解郁；生姜、陈橘皮、六神曲、麦芽健脾止呕，和胃助消化；川厚朴、大黄、料姜石导滞消胀，理气降逆。诸药配伍在一起，有健脾止呕、消积导滞、活血化瘀、理气和胃、消胀解郁、降逆除秽、软坚散结、帮助消化之功效。

⑤胃宿痰饮：癌瘤，症见呕吐痰浊，头眩晕，胸闷，心悸恶心。舌苔白腻。脉弦滑。此为胃宿痰饮。治宜辛开化浊，苦降行水，化饮镇呕，蠲痰除烦。方药可用芩连半夏汤加减。

芩连半夏汤：

清半夏 15 克 黄芩 10 克 干姜 10 克 人参 10 克 黄
连 10 克 代赭石 30 克 旋覆花 10 克 陈橘皮 10 克 竹茹
12 克 生甘草 3 克 柿蒂 10 克 料姜石 60 克 云茯苓 15
克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用清半夏、代赭石、旋覆花降逆镇冲，化痰下气；黄芩、黄连、云茯苓苦降行水，消闷除烦；干姜、陈橘皮、竹茹辛开化浊，镇呕静悸；人参、柿蒂、生甘草、料

姜石和胃止呕，扶正祛邪。诸药配伍，有降逆镇冲、消闷除烦、辛开化浊、苦降行水、下气化痰、镇呕静悸、和胃止呕、扶正祛邪之功效。

8. 胀满

①气胀：癌瘤，症见胸腹胀满，时胀时消。大小便无异常。舌苔白。脉弦。此为气胀。治宜理气解郁，消胀健胃，软坚散结。方药可用枳朴汤加减。

枳朴汤：

川厚朴 10 克 枳实 10 克 陈橘皮 10 克 全瓜蒌 30 克
当归 15 克 防己 12 克 龙葵 30 克 半枝莲 30 克 佛手 15 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用枳实、厚朴、佛手、陈橘皮理气消胀；瓜蒌、防己、当归活血消肿，利气解郁；龙葵、半枝莲清热解毒，利水软坚。各味药配伍在一起，有理气解郁、消胀利水、活血化瘀、消炎消肿、软坚散结、清热解毒之功效。

②水胀：癌瘤，症见胸腹胀满，有积液，大便溏，小便少。舌质暗，舌苔厚。脉沉。此为水胀。治宜消积逐水，补气温化。方药可用丑苓汤加减。

丑苓汤：

二丑（牵牛子）10 克 小茴香 12 克 莱菔子 30 克
防己 12 克 生黄芪 30 克 猪苓 60 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用二丑、莱菔子消积逐水，软坚散结；小茴香温化消胀；防己、猪苓、黄芪补气利水。各药互相配伍，能软坚散结，活血化瘀，消积逐水，温化除胀，补气利水。

③血胀：癌瘤，症见胸闷腹胀，腔内出血，面色晦暗，

心悸气短。舌绛。脉沉数。此为血胀。治宜滋阴养血，凉血止血，清热解毒，软坚散结。方药可用茅及汤加减。

茅及汤：

生地黄 30 克 龟板 15 克 马勃 10 克 白人参 10 克
三七 6 克 白及 12 克 龙葵 30 克 白茅根 30 克 仙鹤草 60 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用生地黄、龟板养血滋阴；三七、马勃、白及、白茅根、仙鹤草止血活血，软坚破积；龙葵清热解毒；人参补气扶正。这几味药综合起来，有滋阴养血、活血止血、活血化瘀、软坚破积、消胀消肿、解郁除烦、清热解毒、补气扶正之功效。

④癥胀：癌瘤，症见胸闷气短，腔内包块，腹胀腹鸣，大小便不畅。舌紫暗。脉沉弦。此为癥胀。治宜软坚破瘀，消癥活血。方药可用莪黄汤加减。

莪黄汤：

五灵脂 10 克 桃仁 10 克 大黄 10 克 蓬莪术 15 克
乳香 10 克 没药 10 克 当归 15 克 川厚朴 10 克 肉苁蓉 30 克 瓦楞子 30 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用莪术、桃仁、五灵脂软坚破积，化瘀活血；大黄、川厚朴、瓦楞子消癥散结，消肿消胀；乳香、没药、当归、肉苁蓉止痛润便。诸药综合配伍，有消胀消癥、软坚破积、活血化瘀、攻坚散结、消炎消肿、止痛润便、滋阴补气之功效。

9. 噎膈

①血噎：癌瘤，症见噎膈吐血，饮水则入，食谷难下，

食入即吐，胸骨后痛。舌紫暗。脉弦。此为血噎。治宜活血止血，化痰启膈，宽中行气。方药可用术丹汤加减。

术丹汤：

丹参 60 克 郁金 15 克 青皮 10 克 代赭石 30 克 砂仁 10 克 莪术 10 克 柿蒂 10 克 料姜石 60 克 仙鹤草 60 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用丹参、莪术活血化瘀；青皮、郁金疏肝解郁；代赭石、料姜石镇冲降逆，消炎消胀；砂仁、柿蒂和胃镇呕，行气宽中；仙鹤草滋阴强心，收敛止血，祛瘀生新，理气止痛，启膈化痰。各药综合起来，有活血止血、消肿消炎、化痰散结、行气宽中、和胃镇呕、强心祛瘀、理气止痛、化痰启膈之功效。

②痰噎：癌瘤，症见噎膈反涎，胸腔痞闷，痰盛多涎。舌苔白腻。脉滑。此为痰噎。治宜降气宽胸，化痰启膈。方药可用赭铃汤加减。

赭铃汤：

旋覆花 10 克 代赭石 30 克 瓜蒌 15 克 陈皮 10 克 竹茹 10 克 瓦楞子 30 克 清半夏 15 克 马兜铃 10 克 料姜石 60 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用旋覆花、代赭石、清半夏行水下气，降逆镇冲，化痰化涎，通血脉；瓜蒌、马兜铃、竹茹宽胸利气，祛痰散结，清热降气；陈皮、瓦楞子、料姜石软坚消积，止血消炎。诸药综合配伍，有降逆化痰、启膈镇冲、宽胸利气、软坚散结、止血消炎、活血化瘀、消涎降气之功效。

③食噎：癌瘤，症见噎膈惧食，胸腹胀满，恶心呕吐。

舌苔白厚。脉沉。此为食噎。治宜降逆镇冲，消食导滞。方药可用枳术汤加减。

枳术汤：

枳实 10 克 六神曲 10 克 川大黄 10 克 蓬莪术 10 克
砂仁 10 克 代赭石 30 克 旋覆花 10 克 生姜 10 克 柿蒂
10 克 料姜石 60 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用旋覆花、代赭石降逆镇冲；枳实、大黄导滞通塞；神曲、砂仁健脾和胃，助消化；莪术活血化瘀；生姜、柿蒂、料姜石消胀止吐，启膈进食。各药配伍在一起，有降逆镇冲、消胀止吐、畅噎启膈、导滞通塞、健胃强脾、助消化、进饮食之功效。

④火噎：癌瘤，症见噎膈灼痛，吞咽困难，滴水不入。舌干，舌苔黄。脉数。此为火噎。治宜软坚润燥，解毒泻火。方药可用生地桃仁汤。

生地桃仁汤：

生地黄 30 克 玄参 20 克 桃仁 12 克 鬼臼（即桃儿七）10 克 露蜂房 10 克 竹茹 16 克 天花粉 20 克 山豆根 10 克 料姜石 60 克 山慈菇 30 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用生地黄、玄参、桃仁滋阴润燥，软坚化瘀；鬼臼（桃儿七）、露蜂房、山豆根、山慈菇清热解毒，泻火消炎；竹茹、天花粉、料姜石祛痰散结，降气镇呕。诸药相互配合，能滋阴凉血，软坚润燥，活血化瘀，消肿消毒，泻火解毒，凉膈启膈，止痛清热。

10. 肿块

①气滞血瘀：癌瘤，症见肿块形态不定，常有压痛。舌

紫瘀斑。脉涩。此为气滞血瘀。治宜攻坚破积，行气化瘀，解郁止痛。方药可用桃参汤加减。

桃参汤：

丹参 60 克 水蛭 10 克 仙鹤草 60 克 桃仁 15 克 郁金 15 克 乳香 10 克 没药 10 克 三七 6 克 五灵脂 10 克 苦参 30 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用丹参、水蛭、桃仁、五灵脂活血化瘀，行气止痛，软坚散结；仙鹤草、三七祛瘀生新，养血止血；郁金、苦参燥湿解郁，消肿消痞；乳香、没药止痛。诸药综合起来，有破积散结、行气化瘀、攻坚消积、祛瘀生新、止痛解郁、养血止血之功效。

②痰核积聚：癌瘤，症见肿块光滑，体表结节，常为多发。舌苔厚。脉滑。此为痰核积聚。治宜活血化瘀，攻坚破积，消肿散结。方药可用藻楞汤加减。

藻楞汤：

海藻 12 克 海蛤壳 15 克 僵蚕 10 克 土贝母 30 克 山慈菇 30 克 黄药子 15 克 瓦楞子 30 克 瓜蒌 30 克 苦参 30 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用海藻、黄药子、海蛤壳消痰散结，解毒消肿，化癭瘤，凉血止血；土贝母、山慈菇清热解毒，软坚化瘀；僵蚕、苦参、瓦楞子攻坚破积，燥湿消痞；瓜蒌宽胸祛痰，清热润肠。诸药互相配伍，有活血化瘀、攻坚破积、消癭瘤、燥湿化痰、消肿止痛、清热解毒、凉血止血、消积散结之功效。

③蕴毒癰结：癌瘤，症见肿块坚硬，常在体腔。舌绛。

脉弦。此为蕴毒癥结。治宜祛毒散结，攻坚破积，化瘀消癥。方药可用莪丹汤加减。

莪丹汤：

紫石英 15 克 龙葵 30 克 莪术 15 克 桃仁 10 克 三棱 10 克 瓦楞子 30 克 丹参 50 克 水红花子 20 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用龙葵、紫石英、瓦楞子清热解毒，攻坚破积；莪术、三棱、桃仁、丹参、水红花子活血化瘀，消癥散结，祛瘀生新。八味药配伍在一起，有散结祛毒、攻坚破积、活血化瘀、清热消炎、消肿消癥之功效。

④急结：癌瘤，症见肿块结节，疼痛，根盘散漫，颈项强痛，虚热。舌苔黄。脉数。此为急结。治宜清热解毒，疏风解郁，活血化瘀，化痰散结。方药可用丹夏汤加减。

丹夏汤：

牛蒡子 15 克 连翘 30 克 丹皮 12 克 元参 20 克 丹参 50 克 夏枯草 30 克 山豆根 10 克 板蓝根 30 克 瓜蒌 30 克 海藻 12 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方以牛蒡子、板蓝根、连翘清热解毒；丹皮、丹参活血化瘀，消肿止痛；元参、夏枯草、海藻疏风祛瘀，化痰散结，清肝解郁；瓜蒌、山豆根解毒消肿，解热宽胸，消炎止痛。各味药综合配伍，有清热解毒、活血化瘀、化痰散结、疏风祛郁、攻坚消积、消炎消肿、补虚止痛之功效。

⑤慢结：癌瘤，症见结节串发，坚硬不痛，不热。舌紫。脉弦。此为慢结。治宜疏肝解郁，化痰散结，活血化瘀，消肿止痛。方药可用柴豆汤加减。

柴豆汤：

柴胡 10 克 当归 15 克 赤芍药 15 克 川芎 10 克 瓜蒌 30 克 生地黄 20 克 天花粉 30 克 丹参 60 克 山豆根 10 克 重楼 10 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用柴胡、当归、赤芍药疏肝解郁，补血活血；川芎、生地黄、丹参养血凉血，祛瘀生新；瓜蒌、天花粉清热化痰，滋阴生津；山豆根、重楼清热解毒，消肿止痛。十味药综合配伍，有疏肝解郁、活血化瘀、补血凉血、化痰散结、消肿止痛、养血消炎之功效。

⑥气血凝滞：癌瘤，症见结节先软后硬，潮热盗汗，疲倦，消瘦。舌淡，苔白。脉沉细。此为气血凝滞。治宜补气生津，利气养血，活血化瘀。方药可用参芪汤加减。

参芪汤：

红人参 12 克 云茯苓 15 克 陈橘皮 10 克 香附子 10 克 熟地黄 30 克 川芎 10 克 当归 15 克 白芍药 15 克 白术 20 克 薏苡仁 30 克 女贞子 30 克 黄芪 60 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用黄芪、人参补气生津，升阳强壮；云茯苓、陈橘皮、香附子理脾渗湿，利气养血；当归、川芎、白芍药、熟地黄滋阴补血，活血止痛；白术、薏苡仁燥湿健脾，利水益肺；女贞子补肾养肝。诸药配伍，有补气生津、利气养血、升阳强壮、补肾养肝、燥湿散结、滋阴益肺、活血化瘀、解凝清热之功效。

⑦痰湿瘀结：癌瘤，症见可活动之肿块，皮色不变，软硬相兼，粘连较少，颈部经常出现结节、疙瘩。舌苔白腻。脉滑。此为痰湿瘀结。治宜软坚化瘀，祛痰散结，解毒消

肿，利湿健脾。方药可用海鹤汤加减。

海鹤汤：

海藻 12 克 昆布 12 克 海带 12 克 苍术 12 克 清半夏 15 克 当归 15 克 川芎 10 克 黄药子 20 克 丹参 60 克 仙鹤草 60 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用海藻、昆布、海带消痰散结，溶解癭瘤；苍术、半夏燥湿祛痰；当归、川芎、丹参活血化瘀，止痛养血；黄药子、仙鹤草解毒消肿，凉血止血，滋阴消坚。各药配合在一起，有化痰散结、软坚化瘀、解毒消肿、燥湿祛痰、凉血止血、活血消炎之功效。

⑧气血留滞：癌瘤，症见肿块较硬，青筋盘曲，气闷气短，病人气虚，忿怒时作。舌紫焦。脉弦细。此为气血留滞。治宜活血化瘀，攻坚破结，理气止痛，补气益脾。方药可用莪参汤加减。

莪参汤：

人参 10 克 当归 15 克 天花粉 30 克 三棱 10 克 莪术 15 克 香附子 12 克 清半夏 15 克 胆南星 10 克 云茯苓 15 克 陈橘皮 10 克 女贞子 30 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用人参补气生津，安神益脾；当归、三棱、莪术活血化瘀，止痛软坚；天花粉、女贞子止渴降火，补肾养肝；香附子、清半夏、胆南星理气解郁，燥湿化痰，消痞散结，祛风镇痉；茯苓、陈橘皮健脾和中，渗湿利水。诸药综合起来，有活血化瘀、攻坚破积、补气益脾、理气止痛、补肾养肝、祛风解郁、燥湿化痰、消痞散结之功效。

⑨毒热郁肝：癌瘤，症见肿块形似蒸馍，不能活动，进

展很快，并有头痛。舌暗，有瘀斑。脉弦数。此为毒热郁肝。治宜泻热清肝，行气解郁，清热解毒。方药可用荟金汤加减。

荟金汤：

芦荟 10 克 黄连 10 克 青皮 10 克 昆布 12 克 海藻 12 克 当归 15 克 川芎 10 克 生地黄 30 克 赤芍药 15 克 丹参 60 克 郁金 15 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用芦荟、黄连泻热凉肝，清热解毒，燥湿消炎；昆布、海藻消痰结，散癭瘤；青皮、郁金行气解郁，破瘀止痛，疏肝理气；当归、川芎、生地黄、赤芍药、丹参活血化瘀，养血补血。这些药综合在一起，有泻热凉肝、清热解毒、化痰散结、消癭瘤、行气解郁、燥湿消炎、疏肝理气、破瘀软坚、养血补血之功效。

11. 硬块

①实火：癌瘤，症见口腔硬块，局部红肿、疼痛，表面溃烂。舌紫红，苔黄厚。脉弦数。此为实火。治宜清心降火。方药可用芩菊汤加减。

芩菊汤：

黄芩 12 克 大黄 10 克 野菊花 30 克 桔梗 10 克 连翘 30 克 生甘草 3 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方以黄芩、大黄清热泻火，解毒导滞；野菊花、连翘清热解毒，消肿散结；桔梗、生甘草消痰利咽，润肺止痛。各药相合，有泻火清心、清热解毒、消肿散结、宣肺利咽、消炎止痛、导滞降火之功效。

②结节白斑：癌瘤，症见口腔硬块，局部色淡发白或白

斑，结节表面凸凹不平。舌紫暗。脉沉弦。此为结节白斑。治宜活血化瘀，软坚散结。方药可用丹菇汤加减。

丹菇汤：

丹参 60 克 当归 15 克 川芎 10 克 赤芍药 15 克 红花 10 克 莪术 15 克 三棱 10 克 僵蚕 10 克 山慈菇 30 克 瓦楞子 30 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用丹参、红花、三棱、莪术活血化瘀，软坚散结；当归、川芎、赤芍药补血养血；僵蚕、山慈菇、瓦楞子清热解毒，消痈消肿，攻坚破积。诸药合并配伍，有活血化瘀、软坚散结、清热解毒、祛瘀生新、养血补血、消痈消肿、消炎止痛之功效。

③肾虚瘀毒：癌瘤，症见硬块肿，牙齿松动、脱落。舌淡，苔白。脉沉细。此为肾虚瘀毒。治宜滋阴益肾，活血化瘀，养血壮骨，清热解毒。方药可用棱地汤加减。

棱地汤：

生地黄 30 克 天花粉 30 克 粉丹皮 10 克 三棱 10 克 莪术 10 克 仙鹤草 50 克 补骨脂 30 克 肉苁蓉 30 克 女贞子 30 克 重楼 10 克 生甘草 3 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方以生地黄、补骨脂、肉苁蓉补肾滋阴，壮骨养血；粉丹皮、三棱、莪术活血化瘀，破积攻坚；仙鹤草滋阴强心，软坚散结；天花粉、女贞子、生甘草、重楼清热解毒，养阴生津，消肿止痛。各药互相配合，有滋阴补肾、强腰壮骨、补血凉血、活血化瘀、强心养血、软坚散结、清热解毒、养阴生津、消坚破积之功效。

④痰郁凝结：癌瘤，症见乳腺硬块光滑，不红不肿。舌

苔白膩。脉沉滑。此为痰郁凝结。治宜化痰散结，疏肝解郁，软坚消积。方药可用瓜楞汤加减。

瓜楞汤：

瓜蒌 30 克 当归 15 克 白芍药 15 克 海藻 12 克 茅苍术 12 克 夏枯草 30 克 柴胡 10 克 郁金 15 克 瓦楞子 30 克 大枣 6 枚

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用瓜蒌、柴胡疏肝解郁，化痰散结；当归、白芍药止痛活血，平抑肝阳，补血敛阴；海藻消痰结，散癥瘤；苍术、瓦楞子燥湿健脾，攻坚破积；夏枯草、郁金清肝解郁，祛瘀散结，清心凉血；大枣健脾和中。十味药综合配伍，有疏肝解郁、化痰散结、燥湿健脾、活血化瘀、攻坚破积、凉血止血、敛阴清心之功效。

⑤肝郁热结：癌瘤，症见乳腺硬块，红肿，疼痛，乳头溢液或破溃。舌红。苔黄。脉弦数。此为肝郁热结。治宜清肝解郁，凉血养血，活血化瘀，消肿止痛。方药可用柴胡汤加减。

柴胡汤：

当归 15 克 白芍药 15 克 云茯苓 15 克 柴胡 10 克 三棱 10 克 莪术 10 克 仙鹤草 30 克 生地黄 30 克 郁金 15 克 连翘 20 克 土贝母 20 克 山慈菇 30 克 生甘草 3 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方以柴胡、郁金疏肝清肝；当归、白芍、生地黄凉血养血，止血活血；三棱、莪术、仙鹤草攻坚破积，化痰散结，滋阴强心；茯苓渗湿利水；连翘、土贝母、山慈菇、生甘草清热解毒，消肿止痛。诸药综合，有清肝解郁、

凉血养血、活血化瘀、攻坚破积、清热解毒、消肿止痛、渗湿利水、强心滋阴之功效。

⑥脾肾肝郁，郁毒凝结：癌瘤，症见硬块坚硬，皮核相连，高低不平，腋下结核。舌暗紫。脉沉细。此为脾虚肝郁，郁毒凝结。治宜健脾利湿，舒郁清肝，活血化瘀，清热解毒。方药可用香楼汤加减。

香楼汤：

香附 12 克 重楼 10 克 人参 10 克 云茯苓 15 克 白术 20 克 瓜蒌 30 克 当归 15 克 薏苡仁 30 克 土贝母 20 克 柴胡 10 克 山慈菇 30 克 生甘草 3 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用人参、白术、茯苓、生甘草健脾利湿，补气养阴；香附子、柴胡疏肝解郁，理气止痛；重楼、山慈菇、土贝母清热解毒，消痈散结，解痉消肿；瓜蒌化痰宽胸；当归、薏苡仁补血活血，燥湿益脾。上药综合配伍，有健脾利湿、疏肝解郁、清热解毒、消肿散结、活血化瘀、理气止痛、补血养阴、祛瘀化痰、消炎软坚之功效。

⑦肝郁瘀积：癌瘤，症见长期肝病，时重时轻，右胁下出现包块，突然增大，发硬，隐痛或疼痛，全身无力，消瘦。舌边青紫。脉弦细。此为肝郁瘀积。治宜疏肝解郁，活血化瘀，攻坚消积，清热解毒。方药可用蓼金汤加减。

蓼金汤：

郁金 15 克 当归 15 克 丹参 60 克 龙葵 30 克 紫石英 20 克 瓦楞子 30 克 山慈菇 30 克 红蓼子（水红花子）20 克 生甘草 3 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用郁金疏肝解郁；当归、丹参活血化瘀，补

血养血；龙葵、山慈菇清热解毒，祛瘀散结；紫石英、瓦楞子攻坚破积；红蓼子、生甘草消积散血，消肿止痛。诸药综合配伍，有疏肝解郁、活血化瘀、补血养血、攻坚消积、消肿消炎、理气止痛、清热解毒之功效。

⑧气滞血瘀，胆道阻塞：癌瘤，症见右肋硬块刺痛、压痛，厌食发热，全身皮肤黄染，面目黄甚，大便干秘，小便黄赤。舌瘀斑。脉弦数。此为气滞血瘀，胆道阻塞。治宜活血化瘀，行气解郁，利胆退黄，清热解毒。方药可用茵桃汤加减。

茵桃汤：

丹参 60 克 香附子 12 克 郁金 15 克 牡丹皮 12 克
茵陈 100 克 山豆根 10 克 索罗子 15 克 重楼 10 克 金钱草 30 克 山慈菇 30 克 桃仁 10 克 生甘草 3 克

方义：本方用丹参、牡丹皮、桃仁活血化瘀，养血安神，清热凉血；香附子、索罗子理气止痛；郁金、茵陈、金钱草行气解郁，利胆退黄，清热利湿，疏肝清心；山豆根、重楼、山慈菇清热解毒，消肿止痛；生甘草消炎解毒。各药综合配伍，有活血化瘀、清热解毒、行气解郁、利胆退黄、疏肝清心、养血安神、消肿消炎、理气止痛之功效。

⑨肾虚水臌：癌瘤，症见右肋硬块增大，胸闷气短，腹胀腹痛，腹大如鼓，羸瘦疲倦，大便不利，小便黄少。舌暗，苔白。脉沉弦。此为肾虚水臌。治宜补肾养肝，利水消肿，疏肝理气，消食消胀，化瘀消癥。方药可用苓莪汤加减。

苓莪汤：

莪术 15 克 青皮 10 克 半枝莲 30 克 香附子 12 克
枸杞子 20 克 半边莲 30 克 生地黄 15 克 莱菔子 30 克

猪苓 60 克 云茯苓 30 克 车前子 30 克 肉桂 3 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方以枸杞子、生地黄补肾生血，养肝润肺；半枝莲、车前子、半边莲、猪苓、茯苓利水渗湿，消肿消炎；莱菔子消食消胀，祛痰降气；莪术、香附子、青皮活血化瘀，疏肝理气，消滞散结；肉桂温中止痛。十二味药综合起来，有补肾养肝、利水消肿、化痰降气、活血化瘀、疏肝理气、温中止痛、消滞散结、消食消癥之功效。

⑩瘀结：癌瘤，症见中上腹硬块坚实，逐渐增大，压痛固定，时寒时热。舌紫。脉弦有力。此为瘀结。治宜破积消坚，活血化瘀，解毒消痞，补气扶正。方药可用丹棱汤加减。

丹棱汤：

丹参 60 克 党参 15 克 桃仁 10 克 红花 10 克 莪术 15 克 三棱 10 克 廔虫 10 克 黄芪 60 克 仙鹤草 60 克 瓦楞子 30 克 生甘草 3 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用桃仁、红花、莪术、三棱、廔虫破瘀软坚；丹参、仙鹤草滋阴强心，活血祛瘀；党参、黄芪、生甘草补气扶正；瓦楞子消坚消积。诸药综合，有攻坚消积、活血化瘀、滋阴强心、破瘀散结、解毒消痞、推陈致新、补气扶正之功效。

⑪气聚：癌瘤，症见硬块痞满，移动不定，时大时小，时胀时痛。舌绛。脉弦数。此为气聚。治宜消痞散结，温中散寒，理气消胀，活血化瘀。方药可用佛苍汤加减。

佛苍汤：

当归 15 克 苍术 12 克 川朴 10 克 云苓 20 克 干姜

10克 肉桂6克 佛手15克 丹参60克 生甘草3克

煎服法：一剂药煎2遍，合在一起，分2次服。

方义：本方以苍术、川朴燥湿消痞；佛手理气止痛；茯苓健脾渗湿；当归、丹参补血活血，化瘀生新；干姜、肉桂温中散寒；生甘草补脾解毒。各药配合在一起，有消痞散结、燥湿健脾、温中散寒、理气消痞、活血化瘀、散气止痛、利水解毒之功效。

⑫脾虚邪积：癌瘤，症见硬块痞满，疼痛，形瘦面黄，饮食难进，小便黄少。舌暗，有瘀斑。脉沉弦数。此为脾虚邪积。治宜健脾利水，软坚消积，攻补兼施。方药可用苓枳汤加减。

苓枳汤：

人参10克 白术20克 云茯苓30克 薏苡仁60克
东山楂30克 瓦楞子30克 当归15克 猪苓60克 车前子30克 黄芪60克 生甘草3克

煎服法：一剂药煎2遍，合在一起，分2次服。

方义：本方用人参、白术、茯苓、生甘草健脾利水，补虚扶正；薏苡仁、东山楂、瓦楞子软坚消积；当归活血养血；猪苓、车前子利水消胀；黄芪、料姜石补气止血，消肿祛瘀。诸药综合，有健脾利水、软坚消积、补气益血、消肿止痛、活血化瘀、开胃进食、扶正祛邪之功效。

⑬瘀毒：癌瘤，症见右下腹硬块，疼痛或不适，食纳不佳，大便秘结，或稀溏，或带血。舌红，苔黄。脉弦数。此为瘀毒。治宜攻坚破积，活血化瘀，清热解毒，消肿散结。方药可用桃棱汤加减。

桃棱汤：

三棱10克 莪术10克 青皮10克 香附子12克 粉

丹皮 12 克 桃仁 10 克 红花 10 克 仙鹤草 60 克 山慈菇 30 克 生甘草 3 克 料姜石 60 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用三棱、莪术、桃仁、红花攻坚破瘀，活血消积；香附子、青皮、粉丹皮清热散结，疏肝理气，解郁止痛；仙鹤草、山慈菇、生甘草、料姜石清热解毒，消痈散结，滋阴强心。诸药综合，有活血化瘀、攻坚破积、清热解毒、消痈散结、消肿止痛之功效。

⑭寒凝：癌瘤，症见右下腹硬块，肿胀疼痛。舌紫，苔白，脉沉细。此为寒凝。治宜温肾散寒，消肿止痛，祛寒解凝，养血化滞，活血化瘀。方药可用莪附汤加减。

莪附汤：

当归 20 克 川芎 10 克 赤芍药 15 克 莪术 15 克 薏苡仁 30 克 附子 12 克 丹参 60 克 肉桂 6 克 焦杜仲 30 克 生甘草 3 克

煎服法：一剂药用开水煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用附子、肉桂温中散寒；当归、川芎、赤芍药补血养血；莪术、丹参活血化瘀；薏苡仁、焦杜仲、生甘草健脾补肾，消肿止痛。十味药综合配伍，有温中散寒、补肾壮腰、消肿止痛、祛寒解凝、活血化瘀、养血化滞之功效。

⑮气滞：癌瘤，症见左下腹硬块胀痛，大便带血。舌紫，苔白。脉沉弦。此为气滞。治宜活血化瘀，散寒温经，理气消胀。方药可用香楝汤加减。

香楝汤：

当归 15 克 川芎 10 克 莪术 12 克 元胡 12 克 青皮 10 克 木香 3 克 川楝子 20 克 小茴香 15 克 仙鹤草 60

克 香附子 12 克 生甘草 3 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方以当归、川芎补血活血；小茴香、木香、香附子散寒温经，理气消胀；莪术、仙鹤草活血化瘀；元胡、川楝子、生甘草、青皮疏肝止痛。各药综合配伍，有活血化瘀、补血止血、温经散寒、理气消胀、疏肝养血、消积散结之功效。

⑯毒凝瘀滞：癌瘤，症见左下腹硬块，大便脓血。舌苔白厚。脉迟而有紧象。此为毒凝瘀滞。治宜解毒凉血，祛瘀化滞，燥湿排脓。方药可用齿榆汤加减。

齿榆汤：

地榆 20 克 白头翁 10 克 马齿苋 30 克 焦山楂 30 克
川厚朴 10 克 当归 15 克 吴茱萸 10 克 干姜 12 克 石榴皮 20 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用地榆、白头翁、马齿苋解毒凉血，清热止血；焦山楂、石榴皮、川厚朴燥湿止泻，化滞祛瘀，消胀排脓；当归活血补血；吴茱萸、干姜温中散寒。诸药综合配伍，有祛瘀化滞、解毒凉血、燥湿排脓、补血止血、温中散寒之功效。

⑰脾虚湿毒：癌瘤，症见左下腹硬块，腹胀腹痛，少腹下坠，大便多，或梗阻。舌暗紫。脉沉细。此为脾虚湿毒。治宜健脾补虚，利湿调便，解毒清热，消痞化滞。方药可用诃苡汤加减。

诃苡汤：

诃子肉 12 克 全当归 15 克 土白术 20 克 人参 10 克
焦山楂 30 克 石榴皮 20 克 薏苡仁 30 克 山慈菇 30 克

生甘草 3 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用焦山楂、诃子肉、土白术健脾利湿；山慈菇、生甘草清热解毒；薏苡仁、石榴皮燥湿利脾；人参、当归补气生津，补血养血。综合诸药，有健脾补虚、燥湿理气、清热解毒、止痛化滞、补气养血、消痞调便之功效。

⑮气滞瘀结：癌瘤，症见腰部硬块，推之可移，侧腹胀满，窜痛。舌苔黄。脉数。此为气滞瘀结。治宜疏肝解郁，理气止痛，化瘀散结。方药可用金楞汤加减。

金楞汤：

陈皮 10 克 川厚朴 10 克 紫石英 20 克 台乌药 12 克
茅苍术 12 克 川郁金 15 克 红花 10 克 桃仁 10 克 龙葵
30 克 瓦楞子 30 克 生甘草 3 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方以郁金、川厚朴、陈橘皮疏肝解郁，理气消胀；桃仁、红花活血化瘀；台乌药、茅苍术燥湿散结，温中祛寒；龙葵清热解毒；紫石英、瓦楞子软坚破积；生甘草消炎止痛。各药综合配伍，有疏肝理脾、消胀解郁、活血化瘀、燥湿温中、软坚破积、理气止痛、清热解毒、祛寒散结之功效。

⑯血瘀凝结：癌瘤，症见腰部硬块坚硬，推之不移，压痛，痛掣少腹。舌焦紫，苔厚。脉弦。此为血瘀凝结。治宜活血化瘀，行气解凝，温中散寒。方药可用丹虻汤加减。

丹虻汤：

三棱 10 克 莪术 15 克 肉桂 6 克 丹参 60 克 虻虫
10 克 元胡 15 克 仙鹤草 60 克 生甘草 3 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方以三棱、莪术、虻虫活血化瘀，攻坚破积；肉桂温中散寒；丹参、仙鹤草祛瘀解凝；元胡、生甘草行气散瘀，消肿止痛。诸药综合，有活血化瘀、温中散寒、行气解凝、祛瘀散结、攻坚破积、消肿止痛之功效。

②肝肾瘀毒：癌瘤，症见胁腹硬块固定，胁痛，发低热，恶心呕吐，腹水，浮肿，小便少。舌暗，苔少。脉沉细。此为肝肾瘀毒。治宜调理肝肾，疏肝解热，活血化瘀，利水消肿，消胀止呕。方药可用地苓汤加减。

地苓汤：

熟地 24 克 山萸肉 12 克 当归 15 克 云茯苓 15 克
陈皮 10 克 车前子 30 克 猪苓 60 克 郁金 15 克 丹参 60 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：方用熟地黄、山萸肉滋补肝肾，补血填精；当归、丹参、郁金活血化瘀，解郁止痛；茯苓、猪苓、车前子利水消肿；陈皮理气燥湿，化痰导滞。各药综合，有滋补肝肾、理气止痛、疏肝清热、消胀止呕、活血化瘀、利水消肿、软坚消积之功效。

③肝气瘀结：癌瘤，症见下腹硬块，少腹不适，腰酸腿软，多梦失眠。舌焦瘀斑。脉弦。此为肝气瘀结。治宜清肝化滞，活血化瘀，补血养血。方药可用牡金汤加减。

牡金汤：

全当归 15 克 赤芍药 15 克 川郁金 15 克 丹参 60 克
三棱 10 克 莪术 10 克 生牡蛎 30 克 桃仁 15 克 仙鹤草 60 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方以川郁金、当归、赤芍药补血清肝；丹参、

牡蛎、仙鹤草滋阴强心，软坚祛瘀；三棱、莪术、桃仁破积消坚。诸药综合，有活血化瘀、清肝化滞、补血养血、破积消坚、祛瘀宁神、散结止痛之功效。

②热毒蕴结：癌瘤，症见下腹硬块，坠胀刺痛，尿频，或尿急，或尿血。舌红，苔白。脉沉细。此为热毒蕴结。治宜清热解毒，燥湿散结，利水通淋。方药可用丹葵汤加减。

丹葵汤：

瞿麦 12 克 篇蓄 12 克 滑石 20 克 车前子 30 克 丹参 60 克 龙葵 30 克 白茅根 30 克 生牡蛎 30 克 薏苡仁 30 克 白花蛇舌草 30 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用瞿麦、车前子、篇蓄、滑石利水通淋；丹参活血化瘀；龙葵、白花蛇舌草清热解毒；薏苡仁、牡蛎燥湿理脾，软坚散结；白茅根利尿止血。各药互相配合，有利水通淋、清热解毒、燥湿散结、补血止血、活血化瘀、理气止痛、软坚消积之功效。

③毒热瘀结：癌瘤，症见下腹硬块，腰酸腿痛，贫血消瘦，下坠或有臭带，阴道出血。舌焦紫暗。脉沉数。此为毒热瘀结。治宜清热解毒，利水通淋，软坚化瘀，燥湿散结。方药可用桃苓汤加减。

桃苓汤：

紫石英 15 克 全当归 15 克 红花 10 克 马鞭草 30 克 莪术 12 克 丹参 60 克 桃仁 10 克 泽兰 20 克 土茯苓 30 克 女贞子 30 克 猪苓 60 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用紫石英、当归、红花、桃仁攻坚破积，养血润燥，活血止痛；马鞭草、泽兰、土茯苓清热解毒，利湿

行水；莪术、丹参活血化瘀，推陈致新；女贞子、猪苓滋阴通淋。综合诸药，有清热解毒、祛瘀散结、利水通淋、攻坚消积、活血止痛、壮腰润便、补血止血之功效。

胃 癌

胃癌，中医学有“反胃”、“胃反”、“膈气”等名称。一般把发生在胃部的癌瘤称胃癌。

胃癌，是常见病、多发病，其病程短、发展快，常为进行性，发病多在40岁以上。在日本、奥地利、冰岛等地发病率较高，日本发病率居世界首位，我国胃癌的发病率亦高。有人统计，胃癌发病率及死亡率占人类全部癌瘤的10%，占消化道癌瘤的40%~50%。但各地发病不同，有些地区，胃癌居全部癌瘤的首位；有些地区，胃癌居全部癌瘤的第二位。

胃癌早期发现较难，常被误诊。故对40岁以上的病人，既往有胃溃疡、消化不良、胃炎等病，近年症状加重，或既往没有胃病，突然出现上腹部疼痛、膨胀，呈进行性加重，进食后仍不能缓解的病人，应当注意。

胃癌按细胞分类为腺癌（乳头状腺癌、管状腺癌）、粘液腺癌（粘液细胞性腺癌、粘液结缔性腺癌）、低分化癌（硬癌、髓样癌）、未分化癌。其形态分类为蕈伞型（菜花型）、溃疡型、弥漫型。

【病因病机】

多因忧思恚怒，情志变化，所谓“大怒未止辄吃食物”，或因长期饥饱不均，饮食没有规律，或偏食，喜吃肥肉，喜用浓厚的花椒、胡椒、辣椒及其他麻辣辛酸等调味剂，经常

食麻辣火锅，大量饮酒，尤其喜饮沸酒、烈性酒，常饮过烫热茶及吸烟等，损伤胃粘膜，或身体虚弱，衰老，抵抗力下降等引起。

【症状】

一般早期没有明显症状，当就医时，常在患病半年之后。

初起，病人食欲不振，厌食，饭后胃部不舒，有膨胀和闷压感觉，伴疲乏无力，饮食无味，尤其对肉食更觉无味，或病人饮食嗜好改变，常有噎气，体重逐渐下降，出现贫血，出现疼痛，为绞痛或钝痛，进行性加重，进食时疼痛加剧，用制酸药不能缓解，常伴胃灼热，多数进食时梗噎，吞咽困难。一般在起床前或在早饭后常有恶心感觉。由于胃被堵塞，在进食前后呕吐。患者面色苍白，精神萎靡不振，形体消瘦，轻度发热，体力减退。有的病人，先出现便秘，后腹泻。有的病人，便秘与腹泻交替出现。有的病人，由于饮食久滞留在胃中，不能通过胃幽门流入肠道，而出现反胃，或由于胃癌使胃功能减退，胃消化和排空力不足，胃内容物滞留时间延长，出现朝食暮吐，或暮食朝吐，宿谷不化。也有病人没有疼痛，而仅体重下降。许多病人早期没有症状，是因转移病灶而发现。

胃癌晚期，出现重度疼痛，或因癌瘤堵塞食道或幽门而发生梗阻，有少数转移至胆管周围可出现黄疸。在疾病进展时，体重明显下降，身体更加虚弱，如胃肠道出血可出现持续的腹泻和黑便等。

病人长期有溃疡病、胃炎、胃窦炎及胃息肉等病史，不明原因的贫血，胃酸缺乏，粪便有潜血，尤其是40岁以上的人，出现食欲不振，厌食，饭后胃有膨胀及闷压等不适

感，饮食无味，尤其对肉食无味，吃饭前后心口胀疼，用制酸药不能缓解，恶心，吞酸，呕吐，胃肠胀气，进食发噎，吞咽困难，朝食暮吐或暮食朝吐，持续性的上腹部疼痛，消瘦，乏力，体重逐渐下降，上腹部出现肿块，应注意本病的发生。

【检查】

舌象：舌质红紫，或紫暗，或有瘀点，舌有裂纹。

脉象：脉弦而数但虚，或微而数，或紧或涩，趺阳脉浮涩。

查体：锁骨上淋巴结、腋窝淋巴结肿大。腹部可触及坚硬不痛的肿块，有时合并腹水。

X线钡剂透视：胃粘膜紊乱，或胃蠕动减弱，甚至消失。

胃镜活体组织检查或胃脱落细胞检查发现癌细胞。

粪便潜血试验：强阳性，或持续性阳性。

【论治】

1. 对胃癌的治疗（包括胃部的各种癌瘤），初起出现食欲不振，厌食，饭后不舒，伴胃脘部膨胀闷压，消化不良时，可服平消片。

平消片服法：每次服8片，1日3次，温开水送下。

如伴神倦乏力，饮食无味，尤其厌食肉食，或病人饮食嗜好改变，噯气时，可服蛋楞丸与平消片。

蛋楞丸：

白术 60 克 鸡蛋壳（焙） 120 克 枯白矾 30 克 炒谷芽 60 克 索罗子 90 克 代赭石 90 克 瓦楞子 60 克

制服法：共研为细粉，水泛为丸，如绿豆大。每次服3~6克，1日3次。黄芪煎水送下，或温开水送下。

方义：本方用鸡蛋壳、瓦楞子、索罗子软坚止痛，补益安中；白术、炒谷芽开胃健脾；枯白矾、代赭石消炎镇冲。诸药综合配伍，有开胃健脾、补益安中、化痰软坚、降逆镇冲之功效。

2. 如果病情发展，出现胃部胀满，恶心泛酸，或有呕吐，无节律性疼痛，进行性加重，或进食后加重，用制酸药不能缓解，可服参赭桃红汤与平消片。

参赭桃红汤（参红汤）：

人参 10 克 代赭石 20 克 索罗子 15 克 陈皮 10 克
当归 15 克 川厚朴 10 克 白术 12 克 红花 10 克 桃仁 10 克
生黄芪 30 克 生甘草 6 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服，或徐徐服下。

方义：本方以白术、川厚朴、陈皮、生甘草健脾渗湿，行气消胀；生黄芪、人参补气扶正；当归、桃仁、红花活血化瘀，软坚止痛；代赭石、索罗子理气镇冲。诸药配合，有开胃健脾、行气消胀、活血化瘀、消炎止痛、理气镇冲、软坚攻积、扶正祛邪之功效。

3. 病情继续发展，症状复杂时，可根据不同症状辨证用药。

①症见胸胁胀满，心烦口苦，胃内嘈杂，胃脘胀痛，暖气呕逆，大便时干时稀，小便正常。舌苔薄白或薄黄，脉沉细弦。此属毒气上逆，肝胃不调。治宜清热解毒，降逆镇冲，疏肝理脾，开胃和中，可用郁术汤与平消片。

郁术汤：

郁金 15 克 代赭石 30 克 清半夏 15 克 枳壳 12 克
苍术 12 克 蜂房 10 克 全蝎 10 克 川厚朴 10 克 陈皮 10 克

瓦楞子 30 克 山豆根 10 克 生甘草 6 克 料姜石 60 克

煎服法：同参赭桃红汤。

方义：本方用代赭石、料姜石降逆镇冲；山豆根、蜂房、全蝎解毒消坚；郁金疏肝解郁；苍术、陈皮、川厚朴、生甘草和胃健脾；清半夏、枳壳消胀镇呕；瓦楞子软坚散结。诸药综合配伍，有清热解毒、降逆镇冲、疏肝理脾、开胃和中、软坚散结、理气止痛、消胀解郁之功效。

②症见胃脘隐痛，食后胀满，胀痛喜按，得温痛减，嗳气呃逆，朝食暮吐，或暮食朝吐，口泛清水，疲倦无力，四肢不温，面色萎黄，呕吐，浮肿，大便稀溏。舌暗，苔白，脉沉细。此属脾胃虚寒。治宜和胃健脾，化瘀温中，可用苡莪汤与平消片。

苡莪汤：

黄芪 60 克 苍术 12 克 代赭石 30 克 茯苓 60 克 瓦楞子 30 克 薏苡仁 30 克 索罗子 15 克 清半夏 15 克 蓬莪术 15 克 生甘草 6 克 干姜 30 克 料姜石 60 克

煎服法：同参赭桃红汤。

方义：本方以苍术、薏苡仁、生甘草、干姜温阳和胃，健脾止呕；黄芪补气扶正；代赭石、瓦楞子、料姜石降逆镇冲，消胀抑呃，软坚散结；茯苓、清半夏利水渗湿；索罗子、蓬莪术活血化瘀，理气止痛。各药配在一起，有和胃健脾、温中止呕、活血化瘀、降逆镇冲、温阳理气、软坚散结、利水消胀、止吐止痛之功效。

③症见胃脘嘈杂，胃内灼热，心下痞硬，刺痛或压痛，食后剧痛，脘胀拒按，口干欲饮，肌肤甲错，吐血，便血，大便干涩，小便黄赤。舌质紫暗，有瘀斑、瘀块，脉沉细。此属瘀毒凝滞，胃热阴伤。治宜清热解毒，活血化瘀，清胃

养阴，可用竹莪汤与平消片。

竹莪汤：

玉竹 30 克 猪苓 60 克 蓬莪术 15 克 藤梨根 30 克
瓦楞子 30 克 索罗子 15 克 白术 20 克 佛手 15 克 郁金
15 克 仙鹤草 60 克 阿胶 30 克 生甘草 3 克 料姜石 60
克

煎服法：同参赭桃红汤。

方义：本方用蓬莪术、藤梨根活血化瘀，清热解毒；阿胶、仙鹤草、玉竹养阴止血，消炎润燥；瓦楞子、料姜石软坚散结，降气和胃；郁金、索罗子、佛手疏肝解郁，理气止痛；猪苓、白术、生甘草健脾利水，消肿止痛。综合各药，有活血化瘀、软坚散结、清胃和中、养阴润燥、理气止痛、养血止血、疏肝解郁、清热解毒、利水消胀、降逆镇冲之功效。

④症见心口痞块巨大，固定不移，胃脘疼痛，饮食难下，精神疲倦，自汗盗汗，虚烦难眠，身体寒冷，面色苍白，四肢无力。舌质暗淡，舌干少苔，脉沉细无力。此属脾胃阳虚，气血两亏。治宜补气养血，健脾益肾，可用蜂补汤与平消片。

蜂补汤：

生黄芪 60 克 当归 15 克 骨碎补 15 克 仙灵脾 15 克
刺五加 15 克 白术 20 克 瓦楞子 30 克 索罗子 15 克 露
蜂房 10 克 生甘草 3 克 料姜石 60 克

煎服法：同参赭桃红汤。

方义：本方用黄芪、刺五加、白术补气健脾；当归、骨碎补、仙灵脾益肾补血；瓦楞子、索罗子、料姜石软坚消积，理气止痛；露蜂房、生甘草解毒消肿。诸药配伍，有补气补血、软坚散结、理气止痛、健脾益肾、活血化瘀、降逆

和中、温阳补虚、扶正祛邪之功效。

⑤如果病人精神差，胃脘部及腹部胀满不适，心口灼热，吞咽困难，起床前或早饭后恶心、嗝气时，可服漆豆散与平消片。

漆豆散：

干漆（炒）30克 仙鹤草30克 枯白矾15克 炒谷芽30克 鸡内金30克 藏青果15克 蜂房30克 全蝎30克 蛇蜕30克 山豆根60克

制服法：共研为细粉，每次服3克，1日3次。黄芪煎水送下，或温开水送下。

方义：本方用干漆、藏青果、枯白矾攻坚破积，消炎润膈；鸡内金、炒谷芽、仙鹤草开胃健脾，强心滋养，助运化食；蜂房、蛇蜕、全蝎、山豆根清热解毒，软坚化瘀。各药综合，有清热解毒、活血化瘀、开胃健脾、滋养润膈、降逆助化之功效。

⑥如果病人胃脘部疼痛，两胁疼痛，咽下困难，呕吐多涎，可服蜂宝散与平消片。

蜂宝散：

射干24克 狗宝（或马宝）9克 藏青果15克 山豆根30克 建神曲45克 蜂房9克 蛇蜕9克 全蝎9克

制服法：共研为细粉，每次服1.5～3克，1日3次。黄芪煎水送下，或温开水送下。

方义：此散以射干、山豆根、藏青果、狗宝消炎止痛，清热利膈，镇冲降逆；建神曲健脾助消化；蜂房、全蝎、蛇蜕解毒软坚，活血化瘀。诸药综合，有降逆镇冲、宽膈健脾、帮助消化、清热解毒、消炎止痛、活血化瘀之功效。

4. 如果癌瘤晚期病人，身体虚弱，咽下困难，疼痛剧

烈，朝食暮吐，或暮食朝吐时，可服芪酥丸或七矾丸，亦可服参赭三甲汤。

七矾丸：

红人参 10 克 鸡内金 30 克 代赭石 60 克 蜈蚣 10 条
土鳖子 30 克 水蛭 150 克 红花 30 克 制马钱子 150 克
硃砂 15 克 干漆（炒）30 克 白矾 30 克 柿饼霜 60 克

制用法：共研为细粉，水泛为丸，为绿豆大。每次服 1~3 克，1 日 3 次。黄芪煎水送下，或温开水送下。

方义：本方用红人参、制马钱子强壮通络，消积止痛；鸡内金、干漆、红花、硃砂、水蛭、土鳖子活血化瘀，软坚攻积，帮助消化；代赭石、蜈蚣、白矾、柿饼霜平逆通降，解毒消炎。诸药配伍，有破瘀软坚、活血消炎、健胃宽膈、理气止痛、滋补强壮之功效。

参赭三甲汤：

旋覆花 10 克 代赭石 30 克 党参 10 克 清半夏 15 克
龟板 15 克 鳖甲 15 克 牡蛎 15 克 瓦楞子 30 克 蜂房 10 克
黄芪 30 克 山豆根 10 克 赤芍 15 克 鸡血藤 30 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方以旋覆花、代赭石、清半夏平镇降逆，化痰理气；龟板、鳖甲、牡蛎、瓦楞子、赤芍、鸡血藤软坚破积，滋阴养血；蜂房、山豆根消肿止痛，清热解毒；黄芪、党参补气扶正。诸药综合配伍，有补中益气、平镇降逆、软坚化瘀、消炎解毒之功效。

【典型病例】

赵某，女，40 岁，工人。陕西省咸阳市人。

初诊：1983 年 12 月 4 日。

主诉：胃脘部胀满疼痛半年，咽下困难 3 月余。

现病史：半年来胃脘胀满疼痛，近3个月咽食噎阻，伴呃逆，纳差，头晕，乏力，身困。大便干，小便正常。曾在外院行胃镜检查，诊为胃底贲门癌。病理报告：“腺癌”。因拒绝手术，服氟脲嘧啶1周，呕吐较甚而停药，遂来我院门诊治疗。患者形体消瘦，面色萎黄不华，情志忧郁。

既往史：1963年患外阴白斑，手术切除。

个人史：20岁结婚，生三女一子。

家庭史：父母早亡，死因不详。爱人及儿女均健康。

舌象：舌质淡，舌苔白。

脉象：脉沉涩。

上消化道钡透：胃底粘膜不齐，贲门狭窄，食道中下段扩张。

辨证：气痰结聚，肝胃不和，气血亏虚。

治法：理气和胃，软坚散结。

方药：

(1) 黄芪60克 白术15克 厚朴10克 陈皮10克
佛手15克 瓦楞子30克 索罗子15克 全蝎10克 蜂房10克

煎服法：一剂药煎2遍，合在一起，分2次服。

(2) 平消片：每次服8片，1日3次。

患者在我院历时一年半治疗，来诊60次，服平消片120瓶，汤剂384剂，病情逐渐稳定，但仍感胃脘隐痛，生气后感到噎阻。

1984年7月29日来诊，收住院治疗。改用补金丸，每次服2片，每日3次。汤剂仍以前方为主方，随证加减用药。经3个月观察治疗，症状消失，带药出院。

1987年1月24日来诊，无明显症状，体重增加，精神

好转，可做家务劳动。

食 道 癌

食道癌，又称食管癌。中医学有“关格”、“膈证”、“噎食”、“噎膈”、“膈食”或“回食病”等名称。

食道癌是食管恶性肿瘤之一。临证把食道癌的病位分为上、中、下三段。平主动脉弓上缘以上为上段，主动脉弓上缘至肺下静脉的平面为中段，肺下静脉以下为下段。

食道癌按病理性质分为鳞癌、腺癌两类。发生在上段、中段者，多为鳞癌；下段有鳞癌，也有腺癌。有的又分髓质型、蕈伞型、溃疡型、缩窄型与不定型等五种。

食道癌在我国为最常见的癌瘤之一，大部分地区均有发病，多发于40岁以上的男性病人。按死亡回顾调查，不少地区食道癌占恶性肿瘤死因的前三位。地区分布方面，以华北地区较南方为多。一般认为，食道癌的高发区以河南林县、山西阳城为中心形成一个同心圆，随着圆的半径的延长，发病率渐低。

【病因病机】

主要由于忧思急躁等情绪的影响及口腔不洁，或因长期暴饮暴食，喜饮烈性酒，喜吃硬食，常食过热的饮食，进食快，或吸烟等所引起。

【症状】

早期有的没有症状，有的偶尔在进食时感觉咽下梗噎，不经治疗可自行消除，但隔几天或隔几个月又再发作，多在生气或忧郁等情绪波动时出现。进一步发展，可出现轻微的咽下困难，开始时吃馒头等一些较干的东西稍有发噎，以后

严重时就不能下咽，必须吃汤面条或带水的东西，但吃烤干的馍片或桃酥（点心）一类的食品可顺利咽下。病情继续发展，可至只能吃很稀的东西（流质），最后水也不能下咽，致使关格不通。有的病人有时稍微感觉疼痛，但多数疼痛不明显。有时伴有背沉、暖气、耳疼、胸骨后闷胀等症状。

由于癌瘤发病部位不同，有的病人在早期咽东西时即能感觉疼痛、烧灼、咽下困难或发噎（多数噎得不明显），有的病人，一直到晚期，还能吃普通食物。有些病人，咽食时胸骨后疼痛，吃粗糙的或热的或有刺激性的食物时则疼重，吃流食或温食疼痛较轻，食后疼痛减轻或消失；有的病人疼痛较重，甚至持续疼痛。也有一部分病人，开始感觉上腹部疼痛，暖气呃逆，食欲减退。大多数食道癌病人，体重减轻，消瘦，大便秘结。癌瘤病人到晚期，如果食道阻塞可出现口渴流涎。如果癌瘤穿破气管或侵及神经，可出现声音嘶哑，或发生严重的咳嗽等症状。如果颈部淋巴被转移的癌瘤压迫，或破坏臂丛神经，可引起上肢疼痛、活动受限。

结合病史，年龄在40岁以上，特别是男性病人，有吞咽梗噎、胸骨后疼痛并有烧灼感、进行性咽下梗阻等症状即可以诊断。

【检查】

舌象：舌质暗红，或暗绛，或暗紫，或暗青，或暗青紫，或有瘀点。舌苔白，或白腻，或黄腻，或黄干。一般初期，舌苔为桃形，中晚期在舌的后段黄苔逐渐加重、增厚，舌根两侧多有紫红色芒刺，后面逐渐粗糙不光，出现裂纹，舌后芒刺变平，色多红紫。

脉象：脉弦细，或细涩或涩或滑，或濡滑，或弦数，或沉细弱，或虚大等。

通过 X 线食道钡透检查、食道镜活体组织检查或食道脱落细胞检查可以确诊。

【论治】

初期治疗，以攻坚破积、去息肉、蚀腐肉、直攻为佳。病至晚期，攻补兼施、扶正祛邪较好。如果只知抗癌消块，杀死癌细胞，尤其以毒攻毒，直攻直消，则元气亏损，如逢疾病复发，则患者无力支持。故对食道癌的治疗，必须扶正祛邪，增强抗病能力，消除病邪的有害反应，促使癌瘤缩小以至消失。

治疗食道癌（包括食道各种组织细胞的癌瘤），宜用平消片并结合补中益气、降逆镇冲、化痰理气、破瘀软坚、养血润燥、清热解毒之中药辨证用药。

1. 初起可服平消片，每次服 4～8 片，1 日 3 次，温开水送下。亦可用金星散。

2. 如咽下困难，且症状逐渐加重时，可服平消片或金星散，并服山芪赭花丸。

山芪赭花丸（山花丸）：

山豆根 15 克 生黄芪 90 克 蜂房 15 克 旋覆花 15 克
索罗子 15 克 代赭石 15 克 青果 15 克

制法：共研为细粉，水泛为丸，如绿豆大小。每次服 3～6 克，1 日 3 次。温开水送下。

方义：本方用山豆根、蜂房清热解毒，消肿止痛，软坚消痞；黄芪补气扶正，促进机体新陈代谢；旋覆花、代赭石降逆镇冲；索罗子、青果化痰润燥，理气止痛。诸药综合配伍，有降逆镇冲、软坚消痞、活血化瘀、理气止痛、化痰养血、补气扶正、促进新陈代谢之功效。

3. 病情发展，食干食发噎，或食道部位疼痛，大便干

燥时，可服参芪赭花汤，并服平消片，或金星散。

参芪赭花汤（参花汤）：

党参 15 克 黄芪 30 克 知母 10 克 丹参 30 克 元肉 15 克 法半夏 15 克 天门冬 15 克 肉苁蓉 30 克 旋覆花（色重）15 克 代赭石 30 克 红花 10 克 金银花 20 克 柿饼霜 10 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用清半夏、旋覆花、代赭石降逆镇冲，行水下气，消炎，通血脉；红花、丹参活血化瘀；黄芪、党参、天门冬、肉苁蓉、知母、元肉补中益气，润便养血；金银花、柿饼霜清热解毒，消炎止痛。诸药综合，有补中益气、降逆镇冲、养血润便、消炎止痛之功效。

4. 病情继续发展，症状复杂时，可根据证候不同辨证治疗。

①症见头痛目眩，胸背隐痛，烦躁失眠，进食梗阻，口苦胸闷，胁下胀痛，纳食不舒，呃逆时作。舌淡，舌苔白腻，或舌苔薄黄，脉细弦。此属肝气郁结。治宜疏肝解郁，理气散结，降逆镇冲，可用旋石汤，并服平消片或金星散。

旋石汤：

旋覆花 12 克 山豆根 10 克 清半夏 15 克 代赭石 30 克 白芍 20 克 柴胡 15 克 郁金 15 克 茯苓 20 克 瓦楞子 30 克 川楝子 15 克 蜂房 10 克 全蝎 10 克 料姜石 60 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用白芍、柴胡、郁金疏肝解郁；旋覆花、代赭石、清半夏、料姜石降逆镇冲，和胃健脾；瓦楞子软坚散结；山豆根、蜂房、全蝎清热解毒，消肿祛瘀；川楝子理气

止痛；茯苓利水理脾。诸药综合配伍，有降逆镇冲、化痰理气、疏肝解郁、软坚散结、和胃健脾、清热解毒、散瘀止痛、利水消肿之功效。

②症见吞咽不顺，胸背不舒，暖气恶心，胸膈胀满，咳嗽痰多，频吐涎沫。舌苔白腻，脉弦滑。此属气滞痰郁。治宜化痰祛瘀，降气散结，宽胸理气，镇冲止呕，可用旋梨汤，并服平消片或金星散。

旋梨汤：

旋覆花 12 克 藤梨根 30 克 清半夏 15 克 代赭石 30 克 陈皮 10 克 郁金 15 克 蜂房 10 克 重楼 10 克 茯苓 30 克 瓦楞子 30 克 山豆根 10 克 杏仁 15 克 料姜石 60 克

煎服法：同旋石汤。

方义：本方以杏仁、清半夏、陈皮化痰止呕，宽胸理气；旋覆花、代赭石、瓦楞子、料姜石降逆镇冲，软坚散结；郁金、茯苓解郁渗湿；藤梨根、蜂房、重楼、山豆根清热解毒，消肿止痛。诸药配合，有化痰祛瘀、降逆镇冲、宽胸理气、散结止呕、消痰利水之功效。

③症见吞咽困难，胸背疼痛，咽下痛剧，口渴烦热，面色瘀滞，大便干秘，小便黄赤。舌绛有瘀斑，尖边紫暗，舌苔厚腻，脉细弦，或细涩。此属瘀毒凝滞。治宜活血化瘀，清热解毒，消滞散结，止痛降逆，可用桃葵汤，并服平消片或金星散或补金散。

桃葵汤：

旋覆花 12 克 代赭石 30 克 山豆根 10 克 郁金 15 克 丹参 30 克 龙葵 10 克 陈皮 10 克 当归 15 克 桃仁 10 克 红花 10 克

煎服法：同旋石汤。

方义：本方用桃仁、红花、丹参活血化瘀，消滞散结；旋覆花、代赭石降逆镇冲；龙葵、山豆根清热解毒；陈皮、郁金、当归止痛养血，和胃解郁。综合诸药，有清热解毒、活血化瘀、消滞解郁、理气止痛、降逆镇冲、和胃理脾、软坚散结之功效。

5. 病程日久，形体消瘦，症见进食梗阻，吞咽不下，形寒肢冷，面色晄白，咽干口燥，发热盗汗，体倦无力，咳嗽气短，痰涎壅塞，面目、四肢浮肿，大便燥结，小便黄少。舌绛，少苔，脉沉细无力。此属阴液枯竭。治宜养血润燥，滋阴益气，可用枳贞汤，并服平消片或金星散或补金散。

枳贞汤：

生黄芪 60 克 生地黄 30 克 女贞子 30 克 枳壳 12 克
当归 20 克 鳖甲 30 克 旋覆花 12 克 代赭石 30 克 北沙参 30 克 料姜石 60 克 白花蛇舌草 30 克

煎服法：同旋石汤。

方义：本方用生地黄、女贞子滋阴润燥；鳖甲、生黄芪、沙参、当归益气养血，软坚扶正；旋覆花、代赭石、料姜石降逆镇冲；白花蛇舌草、枳壳润便宽肠，清热解毒。诸药配伍，有益气养血、滋阴润燥、软坚散结、降逆镇冲、扶正祛邪之功效。

6. 病情进一步发展，仅能进食流食，或咽水困难时，可服七矾丸，并服参赭三甲汤，或服海花夏赭糖浆。

海花夏赭糖浆（海赭糖浆）：

代赭石 30 克 三七 18 克 夏枯草 60 克 薏苡仁 60 克
白花蛇舌草 30 克 海藻 30 克 莪术 20 克 瓦楞子 30 克

赤芍药 20 克 白及 30 克 昆布 30 克 旋覆花 20 克 半枝莲 60 克 鳖甲 30 克

制服法：将上药加水 3000 毫升，煎至 1000 毫升，过滤去渣，再加入蜂蜜 60 毫升，熬成糖浆。4 日服完，1 日服 3 次。

方义：本方用代赭石、旋覆花降逆镇冲；三七、莪术、赤芍药活血化瘀，软坚消结；夏枯草、白花蛇舌草清热解毒；薏苡仁燥湿健脾；海藻、昆布、瓦楞子、鳖甲软坚破积；白及止血补虚；半枝莲利水祛湿；蜂蜜润便缓下。诸药综合配伍，有降逆镇冲、活血化瘀、软坚消积、养血润便、燥湿健脾、清热解毒、补血止血之功效。

7. 病人仅能进流食，甚至水也不能下咽时，可咽硃矾散与参赭三甲汤。

硃矾散：

红硃砂 30 克 柿饼霜 60 克 白矾 30 克 雄黄 30 克
炒谷芽 30 克 砂仁 20 克

制服法：共研为细粉，每次服 1.5 克，1 日 3 次。黄芪煎水或温开水送下。

方义：本方用白矾、雄黄消炎解毒，蚀腐软坚；硃砂化瘀通经，疏滞消痞；炒谷芽、砂仁健胃理脾；柿饼霜利咽消肿。诸药配合，有攻坚破积、去息肉、化痰利咽、健胃理脾、消炎解毒、通经宽膈之功效。

病人消瘦，精神不振，水亦难以下咽时，用硃矾散含咽，然后用七矾丸徐徐咽下。汤水难下，难以服药时，可用桃枣丸嚼咽，能咽下汤水时，再服上药。

桃枣丸：

铜钱（锉细粉）5 枚 红花（为细粉）10 克 核桃仁

(捣泥) 250 克 红大枣 (去核捣泥) 500 克 红糖 500 克

制服法：将上药五味合在一起，捣匀为丸，共制 30 丸。
每次服 1 丸，1 日 2 次。咀嚼咽下。

方义：本方以红花、核桃仁、铜钱活血化瘀，壮阳滋润，消肿开塞；红大枣、红糖健脾益气，补虚扶正。各药综合，有活血化瘀、软坚开塞、壮阳滋润、止痛消肿之功效。

8. 病人是否患有癌瘤，可用枣霜膏作试验，以协助诊断。

枣霜膏：

葱白 3 节 巴豆 7 粒 大枣 7 枚 砒霜 9 克

先将葱白、大枣捣碎，加水熬粘，再入巴豆、砒霜，捣匀为膏，贴敷手心。连贴 5 日为 1 疗程，3 个疗程为 1 期 (15 天)。贴后 2 小时不起泡为对证，可能是癌；若起泡，为不对证，可能不是癌。

【典型病例】

徐某，男，48 岁，工人。河南省林县人。

初诊：1974 年 2 月 10 日。

主诉：咽下困难近 1 年。

现病史：1973 年 3 月感到咽下食物有噎阻，呈进行性加剧。6 月 28 日，在外院检查确诊为“食管中下段癌”。

X 线食道钡透 (7352451 号)：食管中下段约 4 厘米不规则狭窄，粘膜破坏，扩张差，钡剂通过受阻，上段扩张。

因拒绝手术治疗，要求出院。

患者曾服中药，病情未见缓解，咽下食物噎阻继续加剧，呕吐粘涎，体重下降，胸背痛。大便干，小便正常。可进半流质食物，精神可。

舌象：舌质红，有瘀斑，舌苔白。

脉象：脉象弦细。

辨证：痰瘀结聚，胃失和降。

治法：行气豁痰，化痰散结。

方药：

(1) 旋覆花 12 克 代赭石 30 克 清半夏 15 克 蜂房 10 克 蜈蚣 2 条 瓦楞子 30 克 山豆根 10 克 制南星 10 克 山慈菇 30 克 郁金 15 克 三七 6 克 生甘草 3 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

(2) 平消片：每次服 8 片，1 日 3 次，温开水送下。

患者经过 2 年治疗，症状有所缓解。

1981 年 9 月 19 日来诊：诉症状加重，咽下困难，吃半流质食物亦感到噎阻，呃逆。大便干秘。

X 线片示：食管中下段狭窄，管壁僵直，粘膜破坏。

现症：患者咽下困难，噎阻。

舌象：舌质绛，舌下有瘀斑。

脉象：痰瘀结聚，脾胃不和。

治法：健脾和胃，化痰散结。

方药：

旋覆花 12 克 代赭石 30 克 瓦楞子 30 克 清半夏 15 克 蜂房 10 克 蜈蚣 2 条 黄芪 60 克 三七 6 克 山豆根 10 克 料姜石 60 克 生甘草 3 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

患者又经 5 年治疗，来诊 130 次，贾老以上方为主，随证加减用药：

气滞痰结，加香附 15 克，枳实 6 克，土贝母 15 克；脾胃阴亏，加玉竹 15 克，郁李仁 30 克；气虚者，加党参 30 克，白术 15 克；肾气虚者，加补骨脂 30 克。

经过 8 年的治疗，服平消片 400 余瓶，汤剂 820 余剂，症状逐渐消失。1985 年 4 月 30 日胃镜复查：食道中下段 2~3 厘米处，食管后壁约见 1 厘米长溃烂面，表面稍隆起，上附白粘液，不易冲掉，组织较脆弱，触之易出血，其他均正常。病理报告（850252 号）：见到少量坏死组织，见到个别核异质细胞。患者体力恢复，已退休，可做一般家务劳动。

肝 癌

中医学中没有肝癌这个名称，“肝积”、“肥气”、“黄疽”、“脾积”、“癥积”、“坚癥”、“积聚”、“肝著”等病与之极其相似。临床有原发性肝癌及转移性肝癌之分。原发性肝癌包括肝细胞性肝癌、胆管细胞性肝癌和混合型肝癌三类。根据肉眼所见，又可分为以下三型：①结节型（肝内可见许多散在的、大小不等的癌瘤结节）；②巨块型（肝脏很大，癌瘤为单独的巨大包块）；③弥漫型（是最少见的一种，肝脏大小正常，肝内弥漫浸润性结节，结缔组织广泛增生，类似肝硬化）。

肝癌发病率近年来逐年上升，死亡率仅次于胃癌和食管癌，居第三位。小至几个月的婴儿，大至 70 岁以上的老人，均可发生，且男性多于女性。肝癌发展极快，平均存活时间在 4~9 个月之间。

【病因病机】

原发性肝癌的发生，可能与肝炎病毒、寄生虫病、黄曲霉素、亚硝胺等有密切关系。不少肝癌患者都有肝炎病史。在肝癌高发区，肝硬化并发肝癌者在 90% 以上。这说明在

肝炎、肝硬化病理改变的基础上，有可能转化为肝癌。有人甚至认为，乙型肝炎病毒在一定条件下可能直接导致癌变。在南非，气候温，热度大，黄曲霉素污染严重，肝癌发病率高。动物实验亦证明，黄曲霉素能够诱发肝癌。国内资料统计表明，肝吸虫病可使胆管管腔细胞增生，逐渐变为胆管型肝癌，血吸虫病感染与肝癌无明显关系。亚硝胺、微量元素及遗传与肝癌的关系尚有待于进一步探讨。

目前，用不同的细胞株和不同的癌基因探索细胞癌变的过程，均发现大多数癌症主要有两个遗传学步骤，才能使一个细胞癌变。第一阶段，为细胞“力求生存”的时期，即细胞克服机体的控制而发展能力，是引入一种癌基因引起的基因突变。如果人体的正气不虚，抗病能力很强，这种“基因突变”是不能实现的，即所谓“正气存内，邪不可干”。只有在人体正气不足的情况下，这种“基因突变”才有可能实现，即所谓“邪之所凑，其气必虚”。第二个阶段为转化阶段，这些细胞迅速增殖，细胞的表面发生变化，而成为癌细胞，是引入和激活另一种癌基因导致细胞恶性变化的过程。第一个阶段和第二个阶段之间，可经历数周甚至数年，这一连串的过程是无形的。

中医认为，肝癌的发生主要与以下三方面的因素有关：

1. 情志不舒，正气虚弱：肝主疏泄，性喜条达。心胸狭窄，或性格内向，事不遂心，气郁于内，日久难解，或禀性刚烈，暴生怒气，致肝气郁结，难以畅达，积气留结，癌毒欲萌，日久正气渐衰，产生恶变。肝藏血，体阴而用阳，若思虑过度，劳伤心脾，血之化源不足，或劳倦太过，肝血被伤，或房劳伤肾，精亏及血，肝血不足，抵抗力低下，皆为肝癌病因。故癌瘤患者常表现为阴虚火旺，肝血不足。

2. 气机逆乱，瘀血阻滞：怒则气上，思则气结而血聚，惊则气乱。离经之血，随处而停，阻塞经络，人动，血难流于诸经，人静，血不归于肝脏。血瘀日久，邪毒凝结，肝癌乃生。

3. 饮食不节，郁毒内结：嗜食炙煨肥腻，或饮酒无度，湿停脾胃，郁久化热，湿热阻滞于脾胃，肝之疏泄功能失常，或脾胃素弱，寒湿停聚于中，加之肝气失疏，气滞血瘀，水湿代谢障碍，郁毒内结不解，变生癌瘤。

【症状】

一般早期症状多不明显，易与慢性肝炎或肝硬化相混淆，一旦症状出现，多数已至晚期，故应注意早期检查诊断。若年龄在30岁以上，既往有肝炎病史，近来上腹部不舒，胃纳减退，肝区疼痛加重，身体明显消瘦，肝大且硬、有结节，癌变可能性最大，应尽快进一步检查。

初期主要症状是：进行性的肝脏肿大，表面不平，可以摸到多数质硬的结节或肿块。如果癌肿在肝右叶时往往会使右膈肌抬高，如果癌肿在肝左叶时多被误认为脾大。少数肝癌因发生坏死或液化表面柔软。癌肿组织侵袭，常致两肋下疼痛，或使右上腹部或中上腹部胀痛不舒，或隐痛、钝痛或刺痛。如果癌组织侵犯肝脏，或结节压迫肝总管则肋下满痛，并出现黄疸。当癌组织坏死，或并发感染时，常出现持续性的低热，或阵发性不规则的高热。当癌细胞侵入门静脉、肝静脉及下腔静脉时，则会形成癌栓。肝硬化或癌侵犯腹部时，多数出现腹水。

晚期病人，多呈进行性消瘦，逐渐出现腹水、黄疸、消化道出血和昏迷等。伴有肝硬化时，可出现肝掌、蜘蛛痣、脾大、腹壁或食道静脉曲张。如果癌瘤破裂时，常能引起腹

腔出血、鼻衄、黑粪、急腹症和休克，当肝系膜下出血时，肝区疼痛剧烈，右下腹出现反射性的压痛和肌痉挛等。

【检查】

舌象：舌质暗红，或红绛，有瘀斑。舌苔白，或白腻，或黄腻。

脉象：脉弦，或弦细，或弦紧。

【论治】

可用平消片或金星散配合清热解毒、软坚化瘀、疏肝散结、活血止痛、行气利湿、开窍逐水之中药，随证治疗。

1. 初起肝大表面不平质硬时，可服瓜蒌逍遥汤，并服金星散或平消片。

瓜蒌逍遥汤：

白术 15 克 瓜蒌 30 克 云茯苓 15 克 郁金 15 克 白芍 15 克 柴胡 15 克 当归 15 克 香附 12 克 生甘草 3 克 薄荷 15 克 鹿角 15 克

方义：本方用郁金、柴胡疏肝解郁，化瘀活血；白芍、当归通经活络，柔肝止痛；茯苓、白术、生甘草和胃健脾；瓜蒌、香附、鹿角、薄荷增强解郁疏肝、活血消肿作用。诸药配伍，有疏肝止痛、化瘀活血、软坚散结之功效。

2. 病情进一步发展，除服平消片或金星散外，尚要结合疾病所出现的不同证候，辨证用药。

①症见右胁胀痛，或两胁胀痛、坠痛，伴胸闷，脘腹胀满，纳呆食少，检查肝大，表面不平，质地坚硬。舌质红，脉弦。此属肝气郁结。治宜疏肝解郁，软坚散结，理气止痛，可服平消片或金星散，并用柴枳汤煎服。

柴枳汤：

柴胡 12 克 白芍 30 克 白术 20 克 当归 15 克 茯苓

30克 瓦楞子 30克 郁金 15克 全蝎 10克 蜂房 10克
香附 15克 丹参 30克 生甘草 3克 料姜石 60克

煎服法：一剂药煎2遍，合在一起，分2次服。

方义：本方用柴胡、郁金、香附疏肝理气，解郁止痛；白芍、当归养血柔肝；丹参、瓦楞子活血化瘀，软坚散结；白术、茯苓、生甘草、料姜石和中健脾；全蝎、蜂房解毒消积。诸药合用，有疏肝解郁、化瘀软坚、解毒消积之功效。

②症见胁肋刺痛，痛有定处，疼痛剧烈，痛引腰背。舌质紫暗，有瘀斑、瘀块，少苔，脉沉细而涩。此属瘀血内阻。治宜消积化瘀，活血散结，理气止痛，可服平消片或金星散或补金丸，并用莪术汤煎服。

莪术汤：

三棱 15克 莪术 15克 白芍 30克 蜂房 10克 全蝎 10克 郁金 15克 丹参 30克 土鳖子 12克 当归 15克 牡蛎 30克 瓦楞子 30克 生甘草 3克 料姜石 60克 川楝子 15克

煎服法：同柴楞汤。

方义：本方用三棱、莪术、瓦楞子、郁金、丹参、土鳖子活血化瘀，软坚破积；当归、白芍养血柔肝；全蝎、蜂房、牡蛎解毒散结，消积祛瘀；川楝子理气止痛；生甘草、料姜石健胃和中，降逆镇冲。诸药合用，有消积祛瘀、养血柔肝、健脾和胃、解毒散结之功效。

③症见胁肋刺痛，脘腹胀满，发热出汗，烦躁易怒，口苦口干，恶心纳呆，双目、皮肤发黄，大便干结，小便黄赤。舌暗红或绛，舌苔黄腻，脉弦滑或数。此属肝胆湿热，瘀毒内结。治宜清热利湿，泻火解毒，利胆退黄，可用茵陈汤煎服，并服平消片或金星散或补金丸。

茵陈汤：

茵陈 60 克 郁金 15 克 猪苓 60 克 全蝎 10 克 蜂房 10 克 半边莲 30 克 半枝莲 30 克 金钱草 30 克 大青叶 30 克 大黄 10 克 大枣 6 枚

煎服法：同柴楞汤。

方义：本方用茵陈、郁金、金钱草清热利湿，疏肝解郁，利胆退黄；全蝎、蜂房、大青叶清热解毒，软坚消积；半边莲、半枝莲、猪苓利水消肿；大黄导滞通便；大枣健脾固脱。诸药合用，有泻火解毒、祛湿退黄、疏肝解郁、利水导滞之功效。

④症见胁肋隐痛，绵绵不休，头晕目眩，五心烦热，低热盗汗，腹胀如鼓，纳呆食少，形体消瘦，眼睛、皮肤发黄，呕血便血，皮下出血，小便黄赤。舌红，少苔，脉细数无力。此属阴虚内热，肝血不足。治宜滋阴清热，养血柔肝，可用地阿汤煎服，并服平消片或金星散或补金丸。

地阿汤：

生地黄 30 克 白芍 30 克 玉竹 30 克 猪苓 60 克 丹皮 10 克 阿胶 30 克 当归 15 克 仙鹤草 60 克 石决明 30 克 山萸肉 15 克 骨碎补 15 克 郁金 15 克 黄芪 60 克 料姜石 60 克

煎服法：同柴楞汤。

方义：本方用生地黄、山萸肉、骨碎补、玉竹、丹皮滋阴清热；当归、白芍养血柔肝；郁金、石决明疏肝解郁；仙鹤草、阿胶养血止血；黄芪、猪苓、料姜石补气利水，健脾和胃。诸药合用，有滋阴清热、养血止血、补气利水、健脾和胃之功效。

⑤如果肝大质硬，能摸到多数结节或肿块时，均可服金

甲丸与平消片，或蛋楞丸与平消片。

金甲丸：

龟板 鳖甲 生牡蛎 大青叶 索罗子 地龙 青皮
郁金 蜂房 蛇蛻 全蝎各等份

制服法：共研为细粉，水泛为丸，如绿豆大。每次服3~9克，1日3次。黄芪煎水送下，或温开水送下。

方义：本方用龟板、鳖甲、牡蛎软坚滋阴；大青叶、索罗子、地龙、青皮、郁金清热解毒，解郁活络；蜂房、全蝎、蛇蛻消坚破积，化瘀消肿。诸药合用，有清热解毒、软坚化瘀、解郁止痛、通络消肿、滋阴柔肝之功效。

3. 病情进一步发展，胁下疼痛，上腹部胀痛，可服青金三甲汤，并服平消片或金星散或矾酥丸。

青金三甲汤：

牡蛎 15 克 龟板 15 克 鳖甲 15 克 山豆根 10 克 地龙 12 克 郁金 15 克 红花 9 克 金铃子 18 克 丹皮 9 克 大青叶 30 克 贯众 15 克 丹参 30 克 大枣 10 枚

煎服法：一剂药煎2遍，合在一起，分2次服。

方义：本方用龟板、鳖甲、牡蛎、地龙、金铃子软坚化瘀，滋阴活络；郁金、红花、丹参活血补血，解郁除烦；大青叶、贯众、山豆根、大枣清热解毒，消炎健脾。各药相互配合，有软坚化瘀、活血补血、解郁除烦、清热解毒、通络止痛、滋阴消炎功效。

矾酥丸：

穿山甲 30 克 蜈蚣 20 条 雄黄 30 克 白矾 30 克 龙胆草 30 克 仙鹤草 60 克 红花 30 克 蟾酥 3 克 桃仁 15 克 鸡内金 30 克

制服法：共研为细粉，水泛为丸，如绿豆大小。每次服

1.5~3克，1日3次。黄芪煎水送下，或温开水送下。

方义：本方用雄黄、白矾、穿山甲、蟾酥清热解毒，消炎止痛；蜈蚣、龙胆草、仙鹤草泻肝熄风，滋阴活血，强心解痉；桃仁、红花、鸡内金化瘀活血，开胃健脾。十味药相合一起，有消炎解毒、活血化瘀、健脾和胃之功效。

4. 病情继续发展，肝脏包块质地坚硬，并出现黄疸时，可服茵金丸与平消片，或漆青散与平消片。

茵金丸：

硃砂 9克 白矾 45克 郁金 45克 滑石 30克 茵陈 60克 黄芩 30克 火硝 30克 谷芽 30克 生甘草 30克

制法：共研为细粉，水泛为丸，如绿豆大。每次服1.5~3克，1日3次。黄芪煎水送下，或用温开水送下。

方义：本方用火硝、白矾、硃砂、郁金消坚破积，利胆消炎，止痛化瘀；滑石、茵陈、黄芩、谷芽、生甘草利湿解热，健脾和中。诸药配伍，能消坚破积，活血化瘀，消炎止痛，利胆除湿，健脾和中。

漆青散：

干漆（炒） 30克 仙鹤草 30克 枯白矾 15克 炒谷芽 30克 鸡内金 30克 藏青果 15克 蜂房 30克 全蝎 30克 蛇蜕 30克 山豆根 60克 料姜石 50克

制法：共研为细粉，每次服3克，1日3次。黄芪煎水送下，或温开水送下。

方义：本方用干漆、藏青果、枯白矾攻坚破积，消炎润膈；鸡内金、炒谷芽、仙鹤草、料姜石开胃健脾，强心滋养，帮助消化；蜂房、蛇蜕、全蝎、山豆根清热解毒，软坚化瘀。各药合用，有清热解毒、活血化瘀、开胃健脾、滋养润膈、降逆镇冲、帮助消化之功效。

5. 病情严重，出现腹水，可服苡莲汤与平消片。

苡莲汤：

半枝莲 30 克 半边莲 30 克 枳壳 12 克 白芍 18 克
川厚朴 9 克 丹参 30 克 薏苡仁 30 克 云茯苓 30 克 郁
金 15 克 茵陈 30 克 软柴胡 12 克 生甘草 3 克 车前子
30 克 大枣 6 枚

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2~3 次服，或徐徐服下。

方义：本方以白芍、柴胡疏肝止痛；半枝莲、半边莲、薏苡仁、茵陈、车前子、云茯苓利水消肿，健脾除湿，软坚化瘀；枳壳、川厚朴、郁金、丹参、生甘草、大枣止痛清肝，健脾扶正。各药相配，能利水消肿，软坚化瘀，宽肠顺气，清肝理脾。

6. 包块巨大，疼痛剧烈，可服硃茵丸，并外敷香松散或蓼子酒。

硃茵丸：

茵陈 200 克 黄芩 150 克 炒谷芽 150 克 滑石 200 克
生甘草 30 克 硃砂粉 9 克 明白矾 45 克 火硝粉 30 克
红花粉 30 克 红人参粉 30 克 鸡内金粉 30 克 郁金粉 60
克 制马钱子粉 18 克

制服法：前五味药加水煎 2 遍，去渣，熬膏，烘干为末，合后八味药粉，研为极细粉，水泛为丸，如绿豆大。每次服 1~2 克，1 日 3 次。温开水送下。

方义：本方用茵陈、黄芩、滑石、炒谷芽、生甘草利湿解热，健脾和中，利胆消炎；郁金、火硝、白矾、硃砂消坚破积，利胆消炎；红花活血化瘀；红人参、制马钱子粉强壮通络，消块止痛；鸡内金消积助消化。诸药配伍，有燥湿利

胆、健脾和中、消炎解热、攻坚破积、活血化瘀、强壮通络、止痛消肿、助消化之功效。

【典型病例】

姚某，男，28岁，农民。家住陕西省渭南县良田乡。

初诊：1980年9月25日。

主诉：肝区疼痛、腹胀半年。

现病史：半年来肝区不舒，伴腹胀，乏力。1980年9月2日在渭南地区医院检查肝功，黄疸指数：10单位；转氨酶：130毫摩尔。

9月8日同位素检查：肝位置正常，弥漫性增大，核素分布欠均匀，肝右叶上外可疑一放射性稀缺损区。

省医院B超检查：肝上界6肋处，下界肋下7.5厘米，剑下7厘米，开大后，见密集微小波，反射波型迟钝，出波减弱。右侧胸腔7肋处，见液平段，侧卧可见2厘米液平段。

9月13日抽腹水600毫升。腹水检查：氯化物620毫克，蛋白3090毫克，糖125毫克，细胞计数150，淋巴细胞占优势。肝功大致正常，AKP 21.3，AFP 60。

同位素扫描：肝外形失常，肝位置明显下移。报告结果：符合肝硬化，肝内占位疾病。

9月20日西安医学院第一附属医院检查：肝大，呈结节状。一般情况差，无手术指征。同意肝硬化、肝新生物诊断。

现症：腹胀，食欲不振，小便不利，形体消瘦。肝肋下7厘米，质较硬，边缘不齐。脾大3厘米。腹水征（+）。

舌象：舌质绛，舌苔白。

脉象：脉沉细。

辨证：肝郁脾虚，水湿内停。

治法：疏肝健脾，利水散结。

方药：

(1) 柴胡 10 克 白术 20 克 白芍 15 克 茯苓 60 克
猪苓 50 克 半边莲 30 克 半枝莲 30 克 瓦楞子 30 克 郁
金 15 克 蜂房 10 克 全蝎 10 克 生甘草 3 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

(2) 平消片：每次服 8 片，1 日 3 次，温开水送下。

经 3 个月连续治疗，平消片坚持服用，服上方一百余剂，腹水消失，肝大 2 厘米，脾未扪及。

又经半年治疗，症状消失。

1981 年 5 月 23 日陕西省人民医院复查，肝功正常。超声波检查示：肝肋下 0.5 厘米。AKP 13.2，AFP 阴性。以后一直坚持服平消片。

1986 年底随访，身体健壮，已参加劳动。

肠 癌

肠癌是常见的癌瘤之一。在食道癌高发地区，肠癌发病率亦较高。在消化系统癌瘤中，肠癌仅次于食道癌、胃癌和肝癌。肠癌可发生在肠的任何部位，大肠部位发生的较多。大肠部位的癌瘤，在中医学里又称“肠中积聚”。临证过程中，又可将肠癌分为结肠癌（肠风下血）、直肠癌（脏毒）、肛管癌（结阴）等多种。主要由于情志不舒，忧思郁怒，损伤脾胃，以致抵抗力减弱，及长期的机械性刺激或炎性刺激，或因血吸虫虫卵沉积形成肉芽肿块，或慢性腺瘤性息肉或慢性溃疡或肛瘘等恶变所致。肠癌发病，多在 30~50 岁，

45 岁左右发生最多。一般男性较女性为多见。

【分型】

肠癌多是腺癌。按细胞形态有髓样癌、硬性癌、粘液腺癌及乳头状腺癌之分。

按病理分为以下几型：

巨块型：肿块如菜花状，突入肠腔表面，可早溃破，常伴坏死出血继发感染。多是分化较好的腺癌，浸润性较小，向深层组织侵蚀和转移较晚。多发生在盲肠、升结肠和直肠壶腹部。

溃疡型：肿块开始为扁平形，以后则为典型的火山口样溃疡，中心凹陷，边缘坚硬隆起，基底为结节状。多是分化较差的腺癌，淋巴转移较早。

狭窄型：为癌内纤维组织收缩造成肠腔环状狭窄，环绕肠壁在粘膜下生长蔓延。癌细胞分化极差，经淋巴与血液运行转移较早。多发生在乙状结肠及直肠上部，常发生肠梗阻。

粘液型：因癌细胞产生大量粘液，挤压细胞核，为戒指状。生长慢，转移晚，但彻底切除难，易复发。多发生在直肠，或乙状结肠，或盲肠，或升结肠。

【症状】

因部位不同而表现不同的症状。

结肠癌：有右侧结肠癌及左侧结肠癌之分。右侧结肠癌，病人多是食少乏力，右下腹部隐痛，经常腹泻或便秘，或是腹泻与便秘交替出现。病人逐渐出现贫血，体重减轻。腹部有时可以摸到结节状坚硬的肿块，并伴有压痛。左侧结肠癌，大便次数多，粪便带血和粘液。有的病人由于粪块与癌瘤的肿块增大，容易发生肠梗阻。多数病人有腹部阵阵疼

痛，或腹胀，便秘。结肠癌晚期，可发生肠穿孔，或合并腹膜炎。侵入膀胱或子宫时，可出现膀胱或子宫的相应症状。压迫输尿管时，出现尿毒症。腹腔广泛转移时，出现腹水。有时会阴与腹部呈放射性疼痛。

直肠癌：早期没有症状，也无疼痛。病情发展，粘膜受刺激，分泌物增加，病人感觉肠内不舒，或有便意。粪便表面有时有条状粘液，或便秘。癌瘤溃破时，大便稀薄，有时如水样，混有粘液和血。在合并感染时，大便多是血液与粘液，次数也增多，肛门有下坠或不舒感觉。直肠癌患者的大便，多是粪条变细，次数增多。重者出现里急后重，也可发生梗阻。病情进一步发展，可出现剧烈的疼痛，有时尿频数，或排尿不畅，或是尿血。当癌瘤向近处转移，或是转到肝脏的时候，左锁骨上淋巴结肿大，并出现恶液质、黄疸和腹水等。

肛管癌：主要症状是便血和疼痛，在排便的时候疼痛剧烈。当癌瘤侵犯到肛门括约肌的时候，就会发生便意频数，里急后重，或大便失禁，或排便困难。癌瘤侵犯到腹股沟的时候，腹股沟淋巴结肿大，并且质硬。病情继续发展，可出现大便如下痢样，不分昼夜，次数增多，常有里急后重。病情进一步发展，肠腔狭窄可能发生慢性不全性肠梗阻，或粪便变细，或是粪便如羊粪样。有时，因为块状粪便堵塞肠腔狭窄的上端或形成套迭时，病人腹部膨胀，严重时发生呃逆和呕吐。

年龄在 30 岁左右的病人，既往大便正常，近来大便习惯改变为腹泻或便秘，或腹泻与便秘交替出现，粪便带血和粘液，或全是血便，病人腹部隐痛，或有胀气，或是出现原因不明的贫血，形体消瘦，或腹部出现肿块，应警惕肠癌的

发生。直肠癌病人感觉在直肠内有不舒服，或感觉有便意，并在粪便表面有条状粘液。病人有时便秘，有时发生腹泻，粪便含有粘液。有的大便稀薄如水样，混有血液和粘液，或全是血便，好像菌痢样等。肛门指诊检查，应注意病变的形态、范围与周围情况，肿块离肛门远近，基底可否活动，并观察指套上有无血液和粘液。

【检查】

舌象：舌质红或紫，或紫蓝，或暗青紫。舌苔白，或白腻。或舌有瘀点。上唇系带有小至绿豆大的小结节，色粉白或赤红，形扁平质硬。

脉象：脉弦滑，或弦数，或沉涩。

乙状结肠镜检查、X线钡剂灌肠透视、化验检查与免疫学检查等可助确诊。

【类证区分】

结肠炎、憩室、息肉、痢疾和淤塞粪块，应与左结肠癌区别。肠结核、阿米巴痢疾、血吸虫肉芽肿，应与右结肠癌区别。

肛门与直肠交界处黑色素瘤、痢疾、肠炎、痔疮出血、骶尾骨的脊索瘤、子宫颈瘤、骨盆底部转移癌及淤塞的粪块，应与直肠癌区别。

外痔血栓形成的硬节、肛门结核，应与肛管癌鉴别。

【论治】

治疗肠癌（包括结肠癌、直肠癌和肛管癌），宜用平消片，结合解毒消肿、润燥活血、软坚祛腐、健脾强胃、涩肠止泻、止血止痛等中药辨证使用。

1. 不论哪种肠癌，在症状初起时可服平消片或金星散。
2. 症见周身无力，面目浮肿，色黄不华，头晕目眩，

嗜睡气短，肠鸣腹泻，有时便秘，大便变细，小便清长。舌淡，苔白，脉细无力。此属气虚血亏。治宜补气养血，可用芪藤汤，并服平消片或金星散。

芪藤汤：

黄芪 60 克 党参 30 克 瓦楞子 30 克 马齿苋 30 克
薏苡仁 30 克 蜂房 10 克 全蝎 10 克 紫阳茶 10 克 红藤
30 克 料姜石 60 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用黄芪、党参、薏苡仁补气健脾；紫阳茶强心、利水、消肿；瓦楞子、料姜石软坚散结；马齿苋、红藤、蜂房、全蝎养血活血，解毒消肿。十种药综合配伍，有补气养血、软坚散结、健脾止泻、强心醒脑之功效。

3. 症见面黄不华，胸闷不舒，疲倦气短，食欲不振，腹胀，腹痛拒按，大便稀溏，或大便脓血，秽臭异常，有粘液，里急后重。舌苔黄腻，脉细数，或细滑，或细濡。此属脾虚湿热。治宜健脾利湿，清热理气，可用苍藤汤与平消片。

苍藤汤：

苍术 12 克 猪苓 60 克 薏苡仁 30 克 红藤 30 克 石榴皮 30 克 焦山楂 30 克 白头翁 10 克 诃子肉 15 克 藤梨根 30 克 料姜石 60 克

煎服法：同芪藤汤。

方义：本方苍术、薏苡仁燥湿健脾；石榴皮、焦山楂、诃子肉止泻止痢；红藤、白头翁、藤梨根清热解毒，活血养血；猪苓、料姜石利水消胀，降逆镇冲。诸药综合配伍，有健脾利湿、理气止痛、清热解毒、止泻止痢、消肿抗癌之功效。

4. 症见腹部肿块，腹胀腹痛，痛有定处，矢气后胀减，大便脓血、粘液，里急后重。舌暗红，有瘀斑，舌苔薄黄或腻，脉弦细。此属湿热瘀毒。治宜理气散结，清热利湿，可用齿参汤与平消片。

齿参汤：

马齿苋 30 克 白头翁 10 克 川楝子 15 克 半边莲 30 克 苦参 30 克 石榴皮 30 克 蓬莪术 15 克 瓦楞子 30 克 香附 15 克 料姜石 60 克

煎服法：同苡藤汤。

方义：本方用苦参、白头翁、马齿苋清热利湿，消肿止痛；石榴皮杀菌止泻；川楝子、香附、蓬莪术理气止痛，软坚化瘀；半边莲利水消胀；瓦楞子、料姜石攻坚破积。各药相配，有理气止痛、清热解毒、利湿消胀、止泻止痢、活血化瘀、软坚散结、消炎抗癌之功效。

5. 症见面色苍白，形体消瘦，精神疲倦，嗜睡气促，腹痛喜热，肠鸣腹泻，泻痢频繁，泻后稍安，四肢厥冷。舌淡，苔白，脉沉滞细。此属脾肾寒结。治宜温肾健脾，祛寒散结，可用苡榴汤与平消片。

苡榴汤：

焦山楂 30 克 诃子肉 15 克 红参 10 克 补骨脂 30 克 石榴皮 30 克 赤石脂 30 克 薏苡仁 30 克 苍术 12 克 干姜 15 克 料姜石 60 克

煎服法：同苡藤汤。

方义：本方用于姜、苍术、薏苡仁、补骨脂温肾健脾，燥湿消肿；焦山楂、诃子肉、石榴皮、赤石脂止泻止痢；红参、料姜石补虚扶正。十味药配合，有温肾健脾、祛寒散结、利湿止泻、扶正祛邪之功效。

6. 右侧结肠癌，病人精神疲倦，食欲不振，腹胀，右下腹部隐痛，腹泻，宜服楂榴汤与平消片。

楂榴汤：

焦山楂 18 克 山药 30 克 诃子肉 12 克 石榴皮 21 克
山豆根 9 克 蜂房 9 克 赤石脂 15 克 莲子肉 30 克 蛇蛻
9 克 地榆 15 克 炒谷芽 30 克 全蝎 9 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用山药、莲子肉、焦山楂、炒谷芽开胃健脾；蜂房、蛇蛻、全蝎、山豆根清热解毒，软坚化瘀；诃子肉、石榴皮、赤石脂、地榆涩肠止泻，止血止痢。诸药配合，有软坚化瘀、清热解毒、健脾止泻、帮助消化之功效。

如果出现便秘，粪便干燥时，可服豆黄丸与平消片。

豆黄丸：

蜂房 蛇蛻 全蝎 瓦楞子 火麻仁 大黄 金银花
鸡内金 山豆根 白扁豆各等份

制服法：共研为细粉，水泛为丸，如绿豆大小。每次服 6~9 克，1 日 3 次。黄芪煎水送下，或温开水送下。

方义：本方用蜂房、蛇蛻、全蝎、山豆根、金银花清热解毒，消肿化瘀；瓦楞子、鸡内金、白扁豆助消化，健脾胃，攻坚破积；火麻仁、大黄润肠泻下。诸药综合配伍，有消肿化瘀、活血止痛、清热解毒、攻坚破积、润肠泻下、健脾开胃之功效。

如果便秘与腹泻交替出现，可服豆楞汤与平消片。

豆楞汤：

紫石英 15 克 花蕊石 15 克 瓦楞子 30 克 山豆根 9
克 槐角 15 克 连翘 30 克 蒲公英 15 克 牛蒡子 15 克
大黄 9 克 木通 9 克 桃仁 9 克 金银花 30 克

煎服法：一剂药煎2遍，合在一起，分2次服。

方义：本方以紫石英、花蕊石、桃仁、瓦楞子、槐角软坚破积，活血止血；山豆根、连翘、蒲公英、金银花、牛蒡子清热解毒，润燥消炎；大黄、木通泻下利尿。各药配伍，能清热解毒，软坚破积，活血止血，化瘀定痛，通肠泻下，利尿消肿。

腹部如有坚硬的结节状肿块并有压痛的时候，可服硝马丸与豆楞汤加减。

硝马丸：

火硝 15 克 制马钱子 15 克 郁金 15 克 白矾 15 克
生甘草 3 克

制服法：共研为细粉，水泛为丸，如绿豆大小。每次服 0.3~0.9 克，1 日 3 次。黄芪煎水服下，或温开水送下。

方义：本方用火硝、郁金、白矾软坚攻积，消炎解毒，活血止痛，推陈致新；制马钱子、生甘草消痞块，通血脉。五味药配合，能软坚破积，活血止痛，消炎消肿，消痞块，通血脉。

7. 左侧结肠癌，大便次数多，粪便带血与粘液时，可服楂榴汤与平消片。

发生肠梗阻时，出现腹部阵阵疼痛，或腹胀便秘，可服蛇龙汤与平消片。

蛇龙汤：

白花蛇舌草 30 克 龙葵 15 克 红藤 30 克 大黄 9 克
丹皮 12 克 鳖甲 15 克 瓦楞子 30 克 黄芪 30 克 龟板 15 克 薏苡仁 30 克

煎服法：一剂药煎2遍，合在一起，分2次服。

方义：本方用白花蛇舌草、龙葵、红藤、大黄畅塞通

便，活血消炎，清热解毒；丹皮、龟板、鳖甲、瓦楞子软坚破积，化痰润燥，止痛止血；黄芪、薏苡仁补气健脾以扶正。各药配合，能活血消炎，清热解毒，软坚破积，健脾补气，润燥畅塞。

8. 直肠癌病人，经常有便意，或粪块表面有条状粘液，或便秘，可服豆黄丸与平消片。大便稀薄，混有粘液与血液，大便次数多，有时肛门下坠或不舒适的时候，可服瓦榴汤与平消片。

瓦榴汤：

炒苡米 30 克 石榴皮 20 克 焦山楂 30 克 诃子肉 12 克 山豆根 9 克 瓦楞子 30 克 黄芪 30 克 党参 15 克 料姜石 30 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用薏苡仁、石榴皮、诃子肉健脾止泻；焦山楂、瓦楞子、料姜石软坚开胃，助消化；山豆根清热解毒；黄芪、党参补气。诸药综合配伍，有补中益气、开胃健脾、帮助消化、软坚化痰、涩肠止泻之功效。

如果粪条变细，次数增多，里急后重，或发生梗阻的时候，可服枳藤汤与平消片。

枳藤汤：

枳实 9 克 红藤 30 克 薏苡仁 30 克 地榆 15 克 苦参 30 克 石榴皮 18 克 料姜石 30 克 焦山楂 30 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用枳实利气宽肠；红藤、苦参、地榆活血止血，解毒消炎；薏苡仁、石榴皮、料姜石、焦山楂开胃健脾，除湿止痢。诸药合用，能宽肠利气，活血止痛，除湿消炎，开胃健脾，软坚补虚，止泻止痢。

如果疼痛剧烈时，可加服金钱丸。

9. 肛管癌病人便血，排便时疼痛剧烈，可服青牛散与金钱丸，并用雄参膏外敷患处。

青牛散：

青黛 15 克 硃砂 15 克 硼砂 15 克 牵牛子 9 克 大黄 15 克 蜈蚣 10 条 红参 15 克 料姜石 30 克 地榆 30 克

制用法：共研为细粉，每次服 1.5～3 克，1 日 3 次。黄芪煎水服下，或温开水送下。

方义：本方用青黛、硼砂、蜈蚣、硃砂消炎解毒，软坚化瘀；大黄、牵牛子利便；红参、地榆、料姜石止血消痞，补虚强壮。诸药配合，有补虚强壮、活血止血、软坚化瘀、消炎解毒、化痞利便之功效。

雄参膏：

雄黄 15 克 白矾 15 克 硃砂 1 克 黄柏 30 克 乳香 15 克 没药 15 克 麝香 2 克 蟾酥 2 克 苦参 30 克 冰片 3 克

制用法：将上药各研为细粉，合在一起，研匀，用蛋黄油调成膏敷患处。每日换药 1～2 次。

方义：本方用雄黄、白矾、黄柏、苦参清热解毒，燥湿消炎；硃砂祛腐软坚；没药、乳香、麝香、蟾酥、冰片止痛消肿，祛瘀生新；蛋黄油生肌，保护创面。诸药综合配伍，有消炎消肿、清热解毒、软坚化瘀、祛腐生肌、活血止痛、燥湿润肤、保护创面之功效。

蛋黄油炼法：先将鸡蛋煮熟，去蛋白，将蛋黄放铁锅内炒炼至黑色，压油，去渣，用纱布过滤即成。

如果里急后重较重，或大便失禁，或排便困难时，可服

豆黄丸与平消片。

10. 肠癌发生转移时，可根据出现的证候随证用药。

【典型病例】

张某，男，35岁。陕西省商县陈塬乡商县铁炉子钴锌矿职工。

初诊：1983年10月29日。

现病史：1983年3月30日在商洛医院诊断为盲肠段肠癌，行手术切除。病理报告为盲肠未分化癌。7月份开始采用“丝裂霉素”、“氟脲嘧啶”化疗1个疗程。

现症：腹痛，食纳呆滞。大便稀，不成形。

舌象：舌苔白。

脉象：脉细沉滞。

血象：白细胞1500/立方毫米。

辨证：脾胃虚弱，邪毒瘀结。

治法：健补脾胃，解毒散结。

方药：

(1) 红藤60克 蜂房10克 全蝎10克 马齿苋30克
瓦楞子30克 山豆根10克

煎服法：一剂药煎2遍，合在一起，分2次服。连服6剂。

(2) 平消片：每次服8片，1日3次。

复诊（11月5日）：大便仍稀，腹痛。舌脉同上。

方药：上方加薏苡仁30克，黄芪60克。

煎服法：同前。

三诊（11月12日）：头晕恶心，食欲尚可。大便已正常。舌脉同上。

方药：前方加料姜石60克。

煎服法：同前。

四诊（11月21日）：近几日小腹胀，肠鸣，恶心，干呕。大便稀。舌脉同上。

方药：上方加焦山楂30克，诃子肉15克。

煎服法：同前。

五诊（11月26日）：近来恶心，不思饮食，肠鸣，小腹疼痛较前好转，头晕。大便稀。舌脉同上。

方药：上方加石榴皮30克。

煎服法：同前。

六诊（12月3日）：病情稳定。睡眠差，仍大便稀。舌脉同上。

方药：上方加炒枣仁30克。

煎服法：同前。

七诊（12月10日）：病情稳定。舌脉同上。

方药：

（1）原方继服。

（2）平消片继服。

患者治疗历时近4年，共服汤剂200余剂，平消片130瓶。1987年9月19日来诊，健壮如常人。

胰 腺 癌

胰腺癌，中医学称为“伏梁”，一般起于胰管、腺泡和胰岛三个部位。

起于腺管的较多见，位于胰头部，由胰管上皮柱状细胞组成，浸润性强，容易阻塞胰管，使胰腺肿大，产生纤维化病变，质地坚硬，属硬化型癌，称胰腺癌。起于腺泡者由球

状细胞组成，质地柔软，较少见，属肉质型癌，称腺泡癌。胰岛细胞癌很坚韧，能增生，并保持其结构特征。鳞状上皮细胞癌亦少见。

胰腺癌生长迅速，常早期转移。胰头癌可直接蔓延，常累及胆总管下端及十二指肠，使胆道扩大，胆囊、肝脏肿大，并出现阻塞性黄疸。胰体和胰尾部癌常向前蔓延至腹膜部位。胰腺癌易淋巴转移，胰头癌先转移至胃幽门下或肠系膜上动脉附近淋巴结，再至腹腔淋巴结；体部或尾部癌早期转移至脾门，或直接侵至腹腔淋巴结；胰岛癌可转移至局部淋巴结及肝脏。胰腺癌亦可经血液转移至肝脏、肺、胸、腹、脊椎等。

胰腺癌发病年龄多在 40~60 岁，男性多于女性，常为 3:1。发生在胰腺头颈部的约占 80%，称胰头癌，在体部的称胰体癌，在尾部的称胰尾癌。

【症状】

一般为上腹部疼痛，黄疸，体重减轻。胰头癌黄疸出现较早，程度较深，常是绿黄或灰黄色，为持续性及进行性，常伴皮肤瘙痒。尿色深黄，粪便多是白陶土色。

胰体和胰尾癌，早期上腹部闷胀，或隐痛，有时可出现剧烈疼痛，并延至背部及放射至肩部，屈腰起坐可减轻疼痛。胰腺癌的主要症状：上腹部胀痛牵引背部，平卧时痛剧，屈腰时痛减；或上腹部灼痛，泛酸，有时伴有顽固性腹泻。若伴发胰管梗阻，则引起胰腺肿大，或形成潴留性囊肿，或化脓性炎症，前挤脾脏，后迫腰椎，病人不能平卧，平卧腹痛，状似伏梁。

肝脏肿大，胆囊肿大。严重时，上腹部可摸到不规则结节状肿块，腹水征阳性。

【检查】

舌象：舌红或绛紫，有瘀斑。舌苔白或厚腻。

脉象：脉弦缓，或弦数。

化验：粪便含有不消化的肌肉纤维和脂肪。血胆红素升高，一般不超过 15 毫克%。血淀粉酶有时增高。胰岛细胞如损，可有血糖过高和尿糖。CT 检查胰腺有包块。

十二指肠引流液中，隐血阳性或有鲜血，涂片找到癌细胞，则可确诊。

【论治】

胰腺癌（包括胰脏部位的各种癌瘤）宜疏肝利胆，活血化瘀，健脾和胃，理气止痛，软坚散结。

1. 初起，病人精神疲倦，食纳呆滞，有时恶心，呕逆。舌苔白，脉弦缓。治宜疏肝理气，和胃降逆，软坚散结，可用柴姜汤与平消片。

柴姜汤：

柴胡 12 克 白术 20 克 茯苓 15 克 郁金 15 克 白芍 20 克 蜂房 10 克 全蝎 10 克 瓦楞子 30 克 山豆根 10 克 索罗子 15 克 生甘草 3 克 料姜石 60 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用柴胡、索罗子疏肝利胆，理气止痛；料姜石、瓦楞子、白术、生甘草降逆镇冲，和胃止呕，软坚散结；茯苓、郁金、白芍利水消胀，解郁利胆；蜂房、山豆根、全蝎清热解毒。诸药综合配伍，有疏肝利胆、理气止痛、降逆镇冲、健脾和胃、清热解毒、软坚散结、活血化瘀之功效。

2. 病情发展，黄疸出现，疼痛加重，包块明显。舌红，有瘀斑，苔白，脉弦细。治宜活血化瘀，软坚散结，可用豆

莪汤加减与平消片。

豆莪汤：

三棱 10 克 莪术 10 克 白芍 15 克 当归 15 克 柴胡 12 克 龟板 20 克 鳖甲 20 克 郁金 15 克 山豆根 10 克 佛手 15 克

煎服法：同柴姜汤。

方义：本方用三棱、当归、莪术活血化瘀；柴胡、佛手、白芍、郁金疏肝解郁，解热止痛；龟板、鳖甲、山豆根软坚散结，清热解毒。十味药合在一起，有软坚散结、活血化瘀、疏肝理气之功效。

3. 病情进一步发展，黄疸加深，包块坚硬，疼痛剧烈。舌红绛，有瘀斑，苔白，或苔黄腻，脉弦。治宜攻坚破积，活血化瘀，理气止痛，利胆退黄，可用茵硝丸与平消片，或秦茵汤与平消片。

茵硝丸：

礞砂（水飞）9 克 白矾 45 克 郁金 30 克 滑石 30 克 茵陈 60 克 黄芩 30 克 火硝 30 克 炒谷芽 30 克 生甘草 30 克

制服法：共研为细粉，水泛为丸，如绿豆大。每次服 3~6 克，1 日 3 次，温开水送下。

方义：本方用礞砂消坚破积；白矾、郁金、火硝疏肝解郁，软坚散结；滑石、生甘草、黄芩泄热消炎，消肿止痛；茵陈利胆退黄；炒谷芽和胃健脾，助消化。九味药配伍，有攻坚破积、活血化瘀、理气止痛、利胆退黄、消炎消肿、疏肝健脾之功效。

秦茵汤：

秦艽 15 克 茵陈 60 克 半枝莲 60 克 全蝎 10 克 蜂

房 10 克 山豆根 10 克 金钱草 30 克 生黄芪 60 克 大枣 6 枚 料姜石 60 克

煎服法：同柴姜汤。

方义：本方用秦艽、茵陈、金钱草利胆退黄；蜂房、全蝎、山豆根清热解毒；半枝莲利水消胀；生黄芪、大枣、料姜石健脾和胃，补气扶正。十味药配在一起，有清热解毒、活血化瘀、利胆退黄、软坚散结、健脾和胃之功效。

【典型病例】

杨某，男，45 岁，某部队干部。

初诊：1981 年 11 月 21 日。

主诉：上腹部疼痛、纳呆半年。

现病史：1981 年 6 月感上腹部疼痛，纳呆，两胁胀，身困乏力，在第四军医大学第一附属医院行剖腹探查诊为胰头癌。病理报告：高分化腺癌。由于粘连无法手术，且胆汁排泄不畅，置 T 形引流管，并进行化疗。

现症：腹胀，纳差，乏力，两肩背沉困，出虚汗，气短。大便稀糊状，一日 2~3 次，呈灰白色，小便黄。引流物每天 600 毫升左右。

舌象：舌体胖，有瘀斑。

脉象：脉弦细数。

辨证：肝郁脾虚，瘀痰结聚。

治法：疏肝健脾，软坚散结。

方药：

(1) 柴胡 10 克 白术 20 克 白芍 15 克 云苓 15 克 郁金 15 克 瓦楞子 30 克 山豆根 10 克 索罗子 15 克 蜂房 10 克 全蝎 10 克 生甘草 3 克 料姜石 60 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

(2) 平消片：每次服 8 片，1 日 3 次，温开水送下。

复诊（11 月 30 日）：症状有所减轻。舌脉同上。

方药：原方继服。

三诊（12 月 21 日）：仍感两肩沉困，口干，乏力，出虚汗多，大便不成形。

舌象：舌质绛，舌苔花剥。

脉象：脉沉细。

辨证：中气虚弱，胃阴不足。

方药：上方加黄芪 60 克，玉竹 30 克。

煎服法：同前。

四诊（1982 年 1 月 10 日）：服上药诸症减轻，但仍有口干，少气，乏力。舌脉同上。

方药：上方加人参 10 克。

煎服法：同前。

五诊（9 月 6 日）：服上方百余剂，平消片一直服用，腹痛、口干、两肩沉困等症状已消除，惟动作出虚汗，有时腹胀。

舌象：舌苔白。

脉象：脉弦细。

方药：上方加麻黄根 12 克。

煎服法：同前。

六诊（9 月 15 日）：药后汗出已少。舌脉同上。

方药：原方继服。

七诊（9 月 29 日）：停药 1 周，两胁不舒，少腹结滞。

舌象：舌有瘀斑，舌苔白。

脉象：脉弦细。

方药：上方加川楝子 15 克。

煎服法：同前。

八诊（10月11日）：药后上述症状消失，但有时头晕，耳鸣，目涩。舌脉同上。

辨证：肝阴不足，虚阳上浮。

方药：初诊时方加川楝子 15 克，牡蛎 30 克，石决明 30 克，菊花 30 克。

煎服法：同前。

九至十三诊（10月20日～12月6日）：相继来诊 5 次，连服汤剂 30 剂，症状缓解。舌脉同上。

方药：原方继服。

十四诊（12月15日）：纳差，腹胀，少气，乏力，仍有耳鸣，出虚汗近 1 周。大便稀，1 日 3 次。

舌象：舌质红，舌苔白。

脉象：脉沉涩。

辨证：脾胃虚弱。

方药：

黄芪 60 克 白术 12 克 云苓 15 克 白芍 15 克 郁金 15 克 柴胡 10 克 瓦楞子 30 克 蜈蚣 2 条 山豆根 10 克 料姜石 60 克 红参 10 克

煎服法：同前。

十五诊（12月20日）：药后精神较佳。舌脉同上。

方药：上方加野菊花 30 克。

煎服法：同前。

十六诊（12月25日）：纳差脘痞，身困倦怠，大便仍稀，1 日 3 次。舌脉同上。

方药：上方加薏苡仁 30 克。

煎服法：同前。

十七至十八诊 (1983 年 1 月 5 日~1 月 10 日): 服上药后, 大便已正常。仍出虚汗, 肌肉酸困。舌脉同上。

方药: 上方加麻黄根 15 克。

煎服法: 同前。

十九至二十六诊 (1 月 19 日~3 月 12 日): 服上方后, 精神好转。胆汁引流不畅。现大便白色, 小便黄。舌脉同上。

方药: 上方去红参, 加茵陈 60 克, 金钱草 30 克。

煎服法: 同前。

二十七诊 (3 月 16 日): 服汤剂 48 剂。近日夜间低热, 体温 37.3°C 左右, 身困乏力, 纳差, 时有盗汗。

舌象: 舌质红。

脉象: 脉弦细而数。

辨证: 湿郁化热。

方药: 上方加大青叶 30 克, 败酱草 30 克。

煎服法: 同前。

二十八至三十诊 (4 月 4 日~4 月 15 日): 来诊 3 次, 症状减轻。舌脉同上。

方药: 原方继服。

三十一至三十四诊 (4 月 20 日~5 月 16 日): 来诊 4 次, 低热消除, 饮食增加。仅引流伤口处疼痛。舌脉同上。

方药: 初诊时方加元胡 15 克, 重楼 10 克, 板蓝根 30 克。

煎服法: 同前。

三十五诊 (5 月 23 日): 近来眠差, 腰痛, 出虚汗, 身困。舌脉同上。

方药: 上方加夜交藤 30 克。

煎服法：同前。

三十六诊（6月4日）：前症好转。近来恶心，大便稀糊状。

舌象：舌质绛。

脉象：脉细缓。

方药：上方中料姜石量加至100克。

煎服法：同前。

三十七诊（6月13日）：近日饮食减退，乏力。大便稀，1日2~3次。

舌象：舌苔白。

脉象：脉细缓。

化验：大便有粘液，脓球少许。

方药：上方加焦山楂30克，石榴皮30克，诃子肉15克。

煎服法：同前。

三十八至四十诊（6月20日~7月8日）：来诊3次，服汤剂18剂后，症状好转。舌脉同上。

方药：原方继服。

四十一诊（7月12日）：恶心，呃逆，两胁不舒，腹胀。

舌象：舌质红，舌苔白。

脉象：脉弦细。

方药：初诊时方加半夏15克，桑椹30克，人参10克。

煎服法：同前。

四十二诊（7月23日）：引流管处疼痛，有时恶心。舌脉同上。

方药：上方加三七6克。

煎服法：同前。

四十三至五十二诊（9月5日～10月31日）：来诊10次，服药后诸症好转。舌脉同上。

方药：原方继服。

五十三诊（11月5日）：耳鸣，腰酸，下肢酸困。舌脉同上。

方药：上方加石决明30克，杜仲20克。

煎服法：同前。

五十四至七十七诊（11月26日～1984年6月10日）：来诊24次，仍有耳鸣、腰痛。舌脉同上。

方药：上方加补骨脂30克，生地30克。

煎服法：同前。

七十八诊（10月24日）：上药服140余剂，症状减轻，精神恢复。患者6月中旬去北京首都医院复查，肿块较前明显缩小，予手术切除。病理报告：高分化腺癌。术后恢复较好，10月份返回西安。现腰痛，耳鸣，小便频数，伤口处隐隐作痛，大便初干后稀。

舌象：舌质绛，舌苔白。

脉象：脉虚细。

辨证：脾肾亏虚。

治法：补益脾肾。

方药：

补骨脂30克 生地30克 枸杞30克 白术20克 茯苓15克 白芍15克 柴胡10克 瓦楞子30克 蜂房10克 全蝎10克 山豆根10克 料姜石60克 生甘草3克

煎服法：同前。

七十九诊（11月5日）：乏力，身困。舌脉同上。

方药：原方继服。

八十至八十七诊（11月17日～1985年2月15日）：来诊8次，近来纳差。舌脉同上。

方药：上方加山楂30克，太子参30克。

煎服法：同前。

八十八诊（3月6日）：伤口处作痛，睡眠差，时有腹胀。舌脉同上。

方药：上方加三七6克，没药10克，枳壳10克。

煎服法：同前。

八十九至一百零四诊（4月1日至10月30日）：来诊15次，服上药后症状逐渐减轻。舌脉同上。

方药：上方继服。

一百零五诊（11月6日）：近日又有低热，左腹部时痛。大便正常。

舌象：舌苔白。

脉象：脉弦细。

方药：上方加野菊花30克，大青叶30克。

煎服法：同前。

一百零六诊（11月13日）：热退，身困，纳差。舌脉同上。

方药：上方去大青叶，加紫苏10克。

煎服法：同前。

一百零七至一百三十诊（1986年1月6日～12月29日）：治疗历时1年，B超复查多次，无复发迹象。舌脉同上。

方药：

白术20克 黄芪60克 补骨脂30克 郁金15克 半

夏 15 克 佛手 15 克 瓦楞子 30 克 薏苡仁 30 克 白芍 15 克 蜂房 10 克 全蝎 10 克 丹参 30 克 料姜石 60 克

煎服法：同前。

患者连续来诊 23 次，现已上班工作。

肺 癌

肺癌，中医学称之为“肺积”、“息贲”。因其发病快，病程较短，对人类生命威胁大，素来被医家所重视。早在一千多年前，就有类似其症状、病机、治疗的记载。

肺癌是人体肺部严重的恶性疾病之一，目前已成为临床常见病和多发病。世界各地的统计资料表明，从 20 世纪 20 年代起至今，其发病率不断上升，男性多于女性，矿业工人较其他职业者为多。例如，在欧洲某铀矿的死亡矿工中，约一半是因肺癌死亡，较当地一般居民发病率高达 30~50 倍。在工龄 20 年以上的镍业制造工作者中，肺癌的死亡率较一般居民高 6 倍。随着医学科学的发展，卫生知识的普及，人类寿命的延长，老年人增加，肺癌在人群中发生的机会增多。同时，“三废”增多，环境污染，不能迅速净化和处理，也是肺癌趋于增加的原因。目前对肺癌的诊断方法不断改进，诊断率提高，使肺癌的统计数字明显增大。

【病因病机】

正气内虚，风、寒、暑、湿、燥、火外邪侵入肺脏，日久不散，痰毒化热，或七情太过，人体气机升降出入障碍，肺之宣发肃降失调，或营养不良，先天缺陷，或长期吸烟，工业废气、尘埃、煤烟、铬、钴、铀、矽等放射性元素及某些有机化合物、流感病毒的侵袭，或肺结核慢性感染，或

咽、喉和气管的慢性炎症刺激等，使支气管粘膜和其中的感觉神经末梢遭受损害，终致肺癌发生。

【发病】

肺癌发病年龄一般在 30~70 岁之间，也有年龄很小的。大部分为鳞状上皮癌，或未分化细胞癌（包括小细胞癌）。鳞状上皮细胞癌多见于年龄较大的男性，未分化细胞癌多见于年龄较小的男性。女性则以腺癌为多见，但也不是绝对的。

【好发部位】

中心型肺癌最为多见，常发生于复支气管、叶支气管或段支气管。周围型肺癌是发生于肺实质内的独立结节。特殊型肺癌，有肺尖癌、粟粒型癌、肺炎型癌、纵隔型癌、隐性肺癌、胸膜性癌等。

【症状】

阵发性呛咳、咯血，或出现反复少量而色鲜红的血痰，发热，持续性胸痛，胸闷或气急，颈部与腋下淋巴结肿大，四肢关节肿大及杵状指等。一般初起多无明显症状，有些病人还是在一般查体中才发现。随着瘤体的增大，对周围组织与器官产生压迫、浸润或转移时，才会出现症状。早期多为阵发性干咳或刺激性呛咳，无痰或有少量的白色泡沫痰，颇与感冒相似，病人多不注意。伴有感染时，则见咳嗽加重，出现脓性痰液，量多，色呈黄色或深绿色。平时无咳嗽之人，突然出现阵发性干咳，用一般方法治疗无效，且干咳逐渐加重时，即应引起注意。当癌组织因咳嗽损伤，或感染溃烂时，则出现咯血痰，或痰中带血丝，并伴有胸中闷胀、钝痛或刺痛。疼痛剧烈时，表明病情已至中期或晚期。有些病人常觉困乏无力，或出现低热，用一般退热药物无效。

当肺癌继续发展出现广泛转移时，或胸水较多时，就会使呼吸受限而出现气急。严重时，呼吸迫促，感觉气绝。部分病人由于胸膜转移，而呈现持续性的尖锐剧痛乃至憋气。有些病人还会出现声音嘶哑，心慌，或头、面、颈、上肢和上胸部水肿发绀与静脉怒张。有时上臂疼痛，不能抬起，肩部向手指放射疼痛。症候复杂时，瞳孔缩小，上眼睑下垂，眼球下陷。部分病人因有脑转移而出现头痛、头晕、呕吐。如出现骨转移，则有骨痛、骨压痛、叩击痛。

30岁以上的人，长期吸烟，有慢性肺部疾病史，职业、工种及致癌的物质接触史，家属的癌瘤史等，结合其咳嗽长期不能治愈，痰中带血，气急，发热，胸痛，气短，尤其是持续性尖锐剧烈的胸痛，身体消瘦等症状，均应注意本病的发生。

【检查】

X线透视、拍片及CT检查包块的大小、部位、范围、受累区域、肺门和纵隔淋巴结肿大的情况，并注意胸水及肋骨侵蚀等情况。结核块影，尤其3厘米以上的增长肿块，有节段性肺炎或肺不张，肺门阴影大，特别是进行性不规则的偏心厚壁空洞病变，用抗痨药不能吸收反而增大，应予X线断层摄影或支气管碘油造影。病变在肺门或支气管附近时，可进行支气管镜活体组织检查。痰液脱落细胞检查癌细胞阳性率较低。也可在颈部淋巴结取活组织检查。

舌象：舌质绛红，或红紫。舌苔白，或白腻。

脉象：脉细数或弦数且浮。

【类证区分】

肺炎与支气管肺癌的鉴别：肺炎短时间内经用消炎药治疗症状可以消失。支气管肺癌形成的阻塞性肺炎，用消炎药很难消除，甚至症状不减。

浸润性肺结核与上叶中心型肺癌的鉴别：应作痰液的癌细胞与结核杆菌检查，必要时还可作气管镜检查。

结核球型病灶与孤立性周围型肺癌的鉴别：前者用抗痨药治疗后有效，后者用抗痨药治疗无效。

粟粒型结核：用抗痨药治疗无效。

肺脓肿：多是急性发病，高热，痰多而腥臭。

支气管扩张：有慢性病史，咳嗽、咯痰反复发作，支气管造影显示支气管扩张影、片状的炎症影，肺癌则是支气管阻塞影。

【论治】

1. 早期症状不明显或无症状，可服平消片。

2. 病情发展至咯粘液痰时，可用瓜蒌前橘汤与平消片。

瓜蒌前橘汤：

北沙参 30 克 橘络 9 克 天门冬 15 克 黄芪 30 克
前胡 12 克 小蓟 15 克 白前 12 克 仙鹤草 30 克 瓜蒌 30 克
桔梗 9 克 紫草根 12 克 松香 3 克 鱼腥草 30 克 马兜铃 10 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用前胡、白前、北沙参、天门冬、小蓟、桔梗宣肺祛痰，滋阴养血；橘络、瓜蒌、鱼腥草、马兜铃软坚活络，清肺止喘；黄芪、仙鹤草、松香、紫草根补气强心，扶正祛邪。诸药合用，有滋阴软坚、强心活血、镇咳祛痰、清热解毒、活络止痛之功效。

如果出现脓样痰，痰量多，色黄或深绿时，可加服瓜蒌豆蜂丸。

瓜蒌豆蜂丸：

北沙参 白前 小蓟 黄芪 山豆根 清半夏 蜂房

蛇蜕 全蝎 瓜蒌各等份

制服法：将上药研为细粉，水泛为丸，如绿豆大。每次服3~6克，1日3次，温开水送下。

方义：本方用白前、清半夏、沙参宣肺祛痰，健胃理脾；瓜蒌、黄芪、小蓟润肠止血，补气扶正；蜂房、蛇蜕、全蝎、山豆根攻坚破积，消炎解痛。十味药相合，有软坚化痰、镇咳祛痰、止血止痛、扶正祛邪之功效。

3. 如果病情进一步发展，除用平消片外，尚须结合疾病所出现的不同症候辨证用药。

①症见咳嗽少痰或无痰，或痰呈白色泡沫，或色黄难咯，或干咳，咯血，痰中带血，气促胸疼，心烦失眠，低热，盗汗，咽干口燥，大便秘结，小便黄赤。舌质红，苔薄，脉细数。此属阴虚痰热。治宜益气镇咳，养阴清肺，解毒散结，可用沙艾汤加减。

沙艾汤：

天门冬 15 克 麦门冬 15 克 生地黄 30 克 北沙参 30 克
山慈菇 30 克 鱼腥草 30 克 瓦楞子 30 克 蜈蚣 2 条
陈皮 10 克 生艾叶 20 克 生甘草 3 克 生姜 10 克

煎服法：一剂药煎2遍，合在一起，分2次服。

方义：本方用北沙参、陈皮、生艾叶益气镇咳；生地黄、天门冬、麦门冬养阴清肺；瓦楞子、蜈蚣、山慈菇、鱼腥草解毒散结，软坚滋阴；生甘草、生姜和胃降逆。诸药综合起来，有滋阴清肺、软坚散结、清热解毒、健脾和胃、镇咳祛痰、止痛止血、滋阴润肺之功效。

②症见咳嗽痰多，胸闷，胸痛，腹胀纳呆，疲倦懒言，面色㿠白，或颜面浮肿，大便稀溏。舌质嫩胖或舌淡，舌苔白或厚腻，脉濡缓，或有滑象。此属脾虚痰阻。治宜健脾益

气，燥湿化痰，解毒散结，镇咳祛痰，可用百星汤加减。

百星汤：

苍术 12 克 天南星 15 克 薏苡仁 30 克 党参 30 克
大蒜 20 瓣 生艾叶 20 克 百部 12 克 木瓜 12 克 蜂房 10
克 蜈蚣 2 条 陈皮 10 克 山豆根 10 克 生甘草 3 克 生
姜 10 克

煎服法：同沙艾汤。

方义：本方用苍术、天南星、薏苡仁燥湿化痰，健脾和中；大蒜、木瓜、生艾叶、陈皮、百部镇咳祛痰；党参、生姜、生甘草益气养胃；蜈蚣、蜂房、山豆根解毒散结。各药配合，有健脾益气、解毒散结、燥湿和胃、化痰止咳之功效。

③症见咳嗽气短，咯痰无力或少痰，头昏耳鸣，面色晄白或潮红，形体消瘦，怕冷畏寒，恶风自汗或盗汗，疲倦纳差，少动气喘，有时咯血，或痰中带血，胸闷腹胀，口干多饮，声音低弱，大便溏薄。舌质淡红，舌苔薄或白腻，脉细弱，或沉细无力。此属气阴两虚。治宜益气益阴，清热解毒，补肾纳气，扶正止咳，可用艾补汤加减。

艾补汤：

黄芪 60 克 党参 30 克 五味子 10 克 补骨脂 30 克
白术 20 克 茯苓 30 克 骨碎补 15 克 生艾叶 20 克 陈皮
10 克 重楼 10 克 生地黄 30 克 生甘草 3 克 生姜 10 克

煎服法：同沙艾汤。

方义：本方用黄芪、党参、白术补气健脾；生甘草、生姜、五味子、补骨脂、骨碎补、茯苓补肾纳气；生艾叶、重楼、生地黄、陈皮清肺止咳，解毒散结，养阴益血。诸药综合起来，有补气补血、纳气镇咳、养阴清肺、软坚散结、清

热解毒之功效。

④症见咳嗽气喘，胁痛胸闷，发热或低热，心烦口渴，声音嘶哑，咯血痰。舌绛，舌苔白腻，脉弦滑。此属毒热内蕴。治宜解毒散结，滋阴清热，镇咳定喘，可用苇腥汤加减。

苇腥汤：

蜂房 10 克 全蝎 10 克 大青叶 30 克 山豆根 10 克
生艾叶 20 克 陈皮 10 克 郁金 15 克 生地黄 30 克 生甘草 3 克 生姜 10 克 鱼腥草 30 克 杏仁 15 克 苇根 30 克

煎服法：同沙艾汤。

方义：本方以苇根、鱼腥草、生地黄滋阴清肺，消炎凉血；生艾叶、杏仁宣肺止咳；蜂房、全蝎、山豆根解毒散结；郁金、生甘草、陈皮、生姜理气和中；大青叶清热解毒。诸药综合配伍，有清热解毒、镇咳定喘、滋阴润肺、消炎凉血、软坚散结之功效。

⑤症见咳嗽不畅，胸闷胸痛，气促，肋肋胀痛，痛有定处，咳声不畅，或咯痰不爽，或痰夹血块，或痰血暗红，面色晦暗，大便干燥，小便黄。舌质暗紫，或有瘀斑、瘀块，舌苔薄黄，脉细涩，或弦细。此属气滞血瘀。治宜软坚散结，理气消肿，用桃菱汤加减。

桃菱汤：

土鳖 10 克 桃仁 10 克 重楼 10 克 蜂房 10 克 乌蛇 10 克 瓜蒌仁 30 克 香附 15 克 山豆根 10 克 川楝子 15 克 瓦楞子 30 克 仙鹤草 60 克 马兜铃 10 克 料姜石 60 克

煎服法：同沙艾汤。

方义：本方用土鳖、瓦楞子、桃仁、仙鹤草活血化瘀，

软坚散结；重楼、蜂房、乌蛇、山豆根解毒消肿；瓜蒌仁润肠通便；香附、川楝子理气止痛；马兜铃、料姜石止咳祛痰，消肿降逆。各药综合起来，对癌瘤病人气滞血枯、疼痛肿胀、面色晦暗有功效。

4. 肺癌如果出现咳嗽，咯脓样痰，剧烈胸痛，气短，可服艾蜂汤与平消片，或服蒜艾汤与平消片。

艾蜂汤：

蜂房9克 蛇蜕9克 全蝎9克 生艾叶18克 陈皮9克 生黄芪30克 山豆根9克 清半夏15克 云茯苓9克 生甘草3克 生姜9克

煎服法：同沙艾汤。

方义：本方以蜂房、蛇蜕、全蝎、山豆根化瘀解毒，软坚破积；生艾叶、陈皮、生黄芪、生姜温肺镇咳，健胃祛痰，止呕补气；云茯苓、生甘草、清半夏降逆渗湿，和中理脾。综合上药，有健胃止呕、镇咳祛痰、软坚化瘀、补气活血之功效。

蒜艾汤：

大蒜20瓣 木瓜9克 百部9克 陈皮9克 生艾叶18克 生姜9克 生甘草9克

煎服法：同沙艾汤。

方义：本方用大蒜、生艾叶镇咳祛痰，温肺利尿；陈皮、木瓜和脾疏肝；百部、生甘草、生姜温中下气，镇咳止呕。诸药综合一起，有健胃止呕、镇咳祛痰、温肺和脾之功效。

5. 如果咳嗽剧烈，咯血，或咯血痰，或痰里有血丝时，可服蒜艾汤加减与平消片，或服豆慈丹与艾橘汤。

豆慈丹：

海藻 12 克 昆布 12 克 山慈菇 9 克 川贝母 12 克
百合 12 克 北沙参 12 克 橘络 12 克 山豆根 15 克 蜂房
9 克 全蝎 9 克 蛇蜕 9 克 瓦楞子 15 克

制用法：将上药共研为细粉，水泛为丸，如绿豆大小。
每次服 4.5~9 克，1 日 3 次，温开水送下。

方义：本方用海藻、昆布消坚散结；山慈菇、山豆根、
蜂房、蛇蜕、全蝎解毒化瘀，消肿止痛；百合、川贝母、瓦
楞子润肺补肺，化痞祛痰；北沙参、橘络补肺消积，止咳化
痰。诸药综合一起，有止血活血、润肺止痛之功效。

艾橘汤：

生艾叶 18 克 陈橘皮 9 克 生姜 9 克

煎服法：同沙艾汤。

方义：本方用生艾叶温肺镇咳，陈橘皮健胃祛痰，生姜
止呕。综合上药，有健胃止呕、镇咳祛痰之功效。

6. 如果感染发热时，可用蓝蜂汤与平消片。

蓝蜂汤：

板蓝根 30 克 露蜂房 9 克 山豆根 9 克 龙葵 15 克
金银花 30 克 紫花地丁 40 克 十大功劳叶 15 克

煎服法：同沙艾汤。

方义：本方用龙葵、板蓝根、金银花清热解毒；蜂房、
山豆根、紫花地丁、十大功劳叶止痛消积，退热解毒。诸药
综合起来，有解热化痞、消炎解毒之功效。

7. 如果癌瘤继续发展，出现咳嗽，呼吸促迫，气急欲
绝时，可服参芪艾陈汤加减。

参芪艾陈汤：

生黄芪 60 克 白丽参 9 克 生艾叶 18 克 陈皮 9 克

生甘草 3 克 生姜 9 克

煎服法：同沙艾汤。

方义：本方用生黄芪、白丽参、生甘草补气和中；生艾叶、陈皮、生姜健胃止呕，镇咳祛痰。诸药综合起来，有补气和中、镇咳祛痰、扶正祛邪之功效。

8. 如果癌瘤转移，出现尖锐剧烈的疼痛，甚至痛闭时，可服平消片，并服豆蚣丸或芪酥丸。

豆蚣丸：

山豆根 60 克 蜂房 30 克 蛇蛻 30 克 生艾叶 120 克
陈皮 60 克 蜈蚣 10 条 干姜 60 克 全蝎 30 克 生甘草 30 克

制服法：将上药共研为细粉，水泛为丸，如绿豆大小。每次服 3~6 克，1 日 3 次。黄芪煎水送下，或温开水送下。

方义：本方用蜂房、全蝎、蛇蛻、山豆根软坚破积，清热解毒，止痛消肿；生艾叶、陈橘皮、干姜健胃止呕，镇咳祛痰；蜈蚣、生甘草和中化痰，镇咳祛痰。诸药综合，有软坚破积、清热解毒、健胃止呕、镇咳祛痰、止痛消肿之功效。

9. 如果出现胸水，或四肢肿胀发绀时，可服二莲葶苓汤或小青龙汤，并服平消片。

二莲葶苓汤：

半边莲 30 克 蜂房 9 克 葶苈子 9 克 半枝莲 30 克
全瓜蒌 30 克 云茯苓 15 克 车前草 30 克 夏枯草 30 克

煎服法：同沙艾汤。

方义：本方以半边莲、半枝莲、全瓜蒌利水消胀，润肺止咳；云茯苓、车前草渗湿止血；葶苈子、蜂房、夏枯草泻肺定喘，排水解毒。诸药相合，有利尿消肿、泻肺定喘、止

血渗湿、清热解毒及排水之功效。

小青龙汤：

桂枝 9 克 白芍 9 克 细辛 3 克 清半夏 9 克 麻黄 6 克
干姜 9 克 五味子 9 克 生甘草 3 克

煎服法：同沙艾汤。

【典型病例】

刘某，男，69 岁，退休工人。住西安市东关北火巷 59 号。

初诊：1984 年 3 月 7 日。

主诉：咳嗽、气喘 10 年，近 2 月加重。

现病史：咳嗽、气喘 10 年，2 个月前因受凉咳嗽、气喘加重并伴有发热。曾在第四军医大学附属二院检查，X 线片报告：右肺中野模糊阴影，右肺上叶肺不张，亦见小片状块影。意见：右肺炎伴右肺上叶部分不张。血象：正常。肺功能测定：流速、容量均降低。经用抗生素等药物治疗后，热退，但仍咳喘，少痰，胸闷，胸痛，乏力，气短，脘腹痞满，纳差。二便正常。

既往史：既往身体健康。

个人史：有吸烟及饮酒嗜好。

家庭史：配偶及子女均健康。

舌象：舌质淡红，舌苔白。

脉象：脉弦细。

辨证：气痰结聚，肺脾亏虚。

治法：益气宣肺，化痰散结。

方药：

沙参 30 克 白术 12 克 郁金 15 克 清半夏 15 克 瓦楞子 30 克 索罗子 15 克 山豆根 10 克 料姜石 60 克 生

甘草 3 克

煎服法：水煎服，每日早晚分服。连服 6 剂。

复诊（3 月 17 日）：服药后，饮食增加，气短好转，咳嗽、胸闷、胸痛未见减轻。舌脉同前。此乃病重药轻。继续用上方加瓜蒌 30 克，土贝母 15 克。连服 6 剂。

服法同前。

嘱患者进行支气管镜检，以确定诊断。

三诊（3 月 31 日）：3 月 29 日第四军医大学附属二院纤维支气管镜检报告：右肺上叶开口深部见有玉米粒大小似菜花样瘤组织突出，堵塞全上叶支气管，致使所居各段开口看不见，瘤组织表面充血，触之易出血，在此处取活检。正对此上叶开口略下方主支气管内侧壁处支气管壁略内陷，其中央有直径约 0.6 厘米黑色突起物，周围粘膜轻度充血。右下叶背段及中叶内侧段口均见似米粒大小粘膜突起，似息肉样，中叶外侧亦有上述黑色样物堵塞。

结论：中心型肺癌。

活检病理：鳞状细胞癌（病理号：84-815）。

因镜检而咳嗽，咯血痰，余症同前。舌脉同上。

方药：继续用上方，再加生艾叶 20 克，陈皮 10 克，生姜 10 克，蜂房 10 克，全蝎 10 克，仙鹤草 60 克。

煎服法：同上。连服 6 剂。

平消片每次服 8 片，每日 3 次。

四至八诊（4 月 7 日～5 月 5 日）：来诊 5 次，服上方 24 剂后，血痰消失，症状缓解。但经 X 线拍片检查，右肺上叶阴影稍有增加。因年老体衰，拒绝手术及化疗，建议加用放疗，以抑制肿瘤发展。舌脉同上。

方药：继续用上方。连服 6 剂。

九至十五诊（5月17日～7月25日）：来诊7次，此间进行放疗。

舌象：舌红少苔。

脉象：脉细弦。

辨证：气阴不足。

调整前方如下：

补骨脂 30克 沙参 30克 白术 12克 郁金 15克 清半夏 15克 瓦楞子 30克 索罗子 15克 山豆根 10克 生艾叶 20克 陈皮 10克 生姜 10克 川贝母 15克 地龙 10克 料姜石 60克 生甘草 3克

煎服法：同上。共服42剂。

十六诊（8月8日）：咳嗽、气喘均减轻，咯白粘痰。

舌象：舌质红，苔白腻。

脉象：脉细弦。

继续用上方，加细辛3克，以逐阴分之痰结。

煎服法：同上。

十七诊（9月25日）：家属来诉，前方服18剂，症状逐渐消退，饮食增加，精神好转。于9月13日行X线片复查：右肺上叶可见片状及条索状阴影，纵隔轻度右移，侧位片相当于右上肺后段呈密度增高影。患者因无明显症状，要求停药汤剂。

嘱继续服平消片，不能间断。

十八诊（1985年1月28日）：近日受凉，咳嗽少痰，口干，胸痛，咳嗽时胸痛较甚，无发热恶寒。纳差，腹胀，身困。二便正常。

舌象：舌苔白。

脉象：脉弦细。

辨证：宿痰未尽，为寒邪所缚，气阴不足。

治法：仍予宣肺化痰，益气散结。

方药：

生艾叶 20 克 陈皮 10 克 杏仁 15 克 细辛 3 克 生姜 10 克 沙参 30 克 白术 12 克 郁金 15 克 清半夏 15 克 瓦楞子 30 克 山豆根 10 克 地龙 12 克 蜂房 10 克 全蝎 10 克 料姜石 60 克 生甘草 3 克

煎服法：同上。连服 6 剂。

十九至三十二诊（2 月 4 日～7 月 29 日）：来诊 14 次，服汤剂 96 剂，症状又消除，能做一般家务。X 线片复查：与 1984 年 9 月 13 日片比较，病灶无明显变化。

舌象：同前。

脉象：同前。

仍继服平消片。

三十三至三十四诊（1986 年 1 月 6 日～1 月 13 日）：因感受风寒，咳嗽，气喘，浑身酸困，咯白痰，纳差。大小便尚正常。

舌象：舌苔白。

脉象：脉弦细。

方药：

大蒜 10 瓣 生艾叶 20 克 木瓜 12 克 百部 12 克 陈皮 10 克 生姜 10 克 清半夏 15 克 山豆根 10 克 白前 10 克 杏仁 15 克 生甘草 3 克

煎服法：同上。连服 12 剂。

三十五至三十八诊（3 月 17 日～4 月 7 日）：近日咳嗽，气喘，吐黄痰，烦热。大便干，小便黄。

舌象：舌质红，舌苔薄黄。

脉象：脉细数。

辨证：痰湿内郁化热。

方药：原方加鱼腥草 30 克，猪苓 60 克，以宣肺化痰，利湿清热。

煎服法：同上。连服 24 剂，症状消除。

三十九诊（12 月 6 日）：近日发热恶寒，咳嗽，气喘，吐白痰，胸闷。

舌象：舌苔白。

脉象：脉浮紧。

辨证：风寒感冒。

治法：宣肺解表。

方药：小青龙汤。

服 6 剂。

四十诊（12 月 13 日）：服上药症状好转，但仍有胸闷。继续用上方，加瓜蒌 30 克。连服 6 剂。

四十一诊（1987 年 1 月 10 日）：劳累后出现气短，其余正常。经 X 线检查，病灶无明显变化，病情稳定。

鼻 咽 癌

鼻咽癌，在中医学里称“上石疽”或“失荣”。鼻咽在鼻腔的后方，是上呼吸道的一部分，是连接鼻腔与口咽的一个空腔，前壁为后鼻孔，两侧壁有鼻咽管隆突与咽隐窝，顶为颅底，后壁相当于第 1、第 2 颈椎，由软腭构成。在这一部位发生的癌瘤称鼻咽癌，是常见的癌瘤之一。

中医学按不同阶段的征象，对鼻咽癌有不同的记载。所谓“有流臭黄水者，甚则脑亦作痛，俗名脑砂”。多数人认

为肺开窍于鼻，肺气不和则上焦热盛，迫血离经则出现鼻衄。若气急凝滞，津液壅塞停结则生疮疽。瘀血不散，肝郁气滞，胆必受累，肝胆热者，可移于脑，而成鼻渊，又称“脑漏”、“脑崩”等。

鼻咽癌的发病年龄为 30~70 岁之间，以 40~50 岁的发病较多。鼻咽癌各地均能见到，以华南地区发病为多，特别在广东最多，故广东为鼻咽癌的高发区。该病患者男多于女。

【病因病机】

主要是由于情绪的变化，情志不舒，伤及内脏，抵抗力减弱，不能适应外界气候、环境的变化，病毒的侵入，或吸烟，饮酒，或因鼻咽疾病（包括鼻咽部位残余腺感染、粘膜糜烂、粘膜溃疡、鼻咽增生结节）等引起。

【症状】

鼻咽癌初起，一般没有自觉症状，往往被人疏忽。当癌瘤浸润发展，瘤体表面的粘膜溃破或感染时，就会出现少量的鼻血或鼻涕，鼻血与鼻涕混在一起，自鼻咽回吸咯出，有时也可以从鼻孔流出。如果发现由口内吸出的鼻咽分泌物内带有血丝或血块，就要多加注意。多数鼻咽癌病人，鼻塞初起是单侧，以后随着癌瘤的增大而加重，可发展成为两侧鼻塞。

癌瘤发生在耳咽部附近或是堵塞耳咽管，致使中耳腔气压平衡失调，可发生耳鸣，或听力减退，甚至耳聋。有的还能引起化脓性中耳炎。

头痛是鼻咽癌主要症状之一，常为一侧固定性的或是持续性的头痛。当癌瘤侵犯颅骨或压迫颅神经时，就会发生这种偏侧固定的和持续的头痛或全头痛。

病情发展至鼻腔被完全堵塞时，鼻咽内流出有腐败气味的分泌物。鼻咽癌病人多数于早晨起床后，由鼻擤出或由鼻咽回吸经口咯出带有血丝或小血块的分泌物甚至血性分泌物。

病情进一步发展，常有颈部淋巴结转移，多为单侧进行性增大，初起能活动，继而固定，有时能融合成团块，一般无疼痛，如果继发感染时，会发生红肿和压痛。

鼻咽癌继续发展，可能发生面神经麻痹。病人出现一侧嗅觉减退或鼻阻塞，视物模糊，视野缩小，甚至出现偏盲或全盲。有的病人眼球除了能向外侧转动外，多是眼球固定，上睑下垂，并且复视。有的病人出现三叉神经痛，眼和下颌疼痛，面部麻木或知觉减退，咀嚼困难，或牙关紧闭，下颌歪斜，颞肌萎缩，甚至角膜反射消失。有的病人出现眼球震颤。有的病人发生舌咽神经痛，吞咽困难，反胃，咽喉感觉减退。有的病人出现声音嘶哑，咳嗽。有的病人出现心动过速，呼吸急促，涎多或少涎。有的病人出现耸肩无力。有的病人出现舌歪斜，语言困难，甚至出现舌偏瘫。有的病人出现瞳孔缩小，眼球内陷，或眼裂缩小，同侧无汗。

鼻咽癌颈淋巴转移，会出现颈部肿块。肿块多在乳突下胸锁乳突肌的深部。这种肿块多是不痛性的，进行性增大，初起可以活动，以后因为浸润淋巴结周围组织而粘连固定。如果继发感染，可出现红肿或压痛，并且可以向下发展到锁骨。

因此，鼻涕带血，或鼻衄、鼻塞，尤其是中年男性病人，突然发生原因不明的耳鸣、耳聋，或鼻涕带血，或颈部淋巴结肿大，耳垂下方肿块质地坚硬、无痛，或是在早晨由口内吸出的鼻咽分泌物内带有血丝或血块，并且鼻塞不通，

或不明原因的单侧鼻塞，或听力减退，头痛等，应注意本病的发生。

【检查】

舌象：舌红，或红紫，或红绛，或紫蓝，或青且暗。舌苔白或腻。

脉象：脉弦细，或弦数，或细数浮而无力等。

结合口腔、口咽及喉部的检查，进一步用鼻镜检查，仔细察视软腭和咽部有没有麻痹，耳咽管、鼻咽顶和咽隐窝处有没有肿块或溃疡。病理切片，活体组织检查，或颈部淋巴结切除，或穿刺取活体组织检查，X线检查，VCA-LGA抗体的EB病毒结构抗原-IgA抗体的测定等，有助于确诊。

【类证区分】

鼻咽纤维血管瘤：多发生在青少年，尤其多见于10~16岁的男孩，往往有反复的鼻出血。如果用手指触诊，多可见到手指有染血。瘤体有弹性、韧性或较软。

鼻咽部位良性疾病：在小儿咽扁桃腺过于增大时，应注意与鼻咽癌区别。

鼻咽的良性淋巴组织增生：多是双侧的，并且有触痛，可与鼻咽癌区别。

听神经瘤：多有听力减退，或听力丧失，眩晕，眼球震颤，恶心，头痛，视力减退等，可与鼻咽癌区别。

【论治】

鼻咽癌（包括鼻咽部位的各种癌瘤）宜服平消片，结合清热解毒、消炎止痛、软坚化痰、熄风镇静、通透消肿等法辨证用药。

1. 初起鼻塞，或有少量鼻血或鼻涕，或早起咯出分泌

物内带有血丝或血块时，宜服平消片。

2. 如果病情进展，出现鼻塞、鼻涕、鼻血，并出现耳鸣、耳聋，或听力减退时，宜服豆果丸与平消片。

豆果丸：

山豆根 90 克 鱼脑石 60 克 射干 120 克 茜草 90 克
青果 60 克 蝉蜕 60 克 蜂房 60 克 辛夷 90 克 苍耳子 60 克
料姜石 120 克

制用法：共研为细粉，水泛为丸，如绿豆大小。每次服 6~9 克，1 日 3 次。黄芪煎水送下，或温开水送下。

方义：本方用山豆根、射干、蝉蜕、青果清热解毒，利咽消肿；鱼脑石、茜草、料姜石、蜂房、辛夷、苍耳子除风消炎，止血止痛，活血化瘀，通透鼻咽。各药配伍，有利咽消肿、清热解毒、活血化瘀、止痛消炎、除风定痛、通透鼻咽之功效。

3. 病情继续发展，一侧肿块固定或持续头痛时，可服苍辛银豆汤与平消片。

苍辛银豆汤：

金银花 30 克 连翘 30 克 射干 9 克 山慈菇 15 克
桑寄生 12 克 夏枯草 30 克 山豆根 9 克 蜂房 9 克 辛夷
12 克 蛇蜕 9 克 全蝎 9 克 苍耳子 12 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用山豆根、射干、山慈菇、桑寄生、夏枯草、连翘、金银花利咽消肿，清热解毒；苍耳子、辛夷通透鼻咽；蜂房、蛇蜕、全蝎软坚化瘀，消炎攻积。诸药综合，有攻坚破积、活血化瘀、清热解毒、消肿利咽、通透鼻咽、止痛化瘤之功效。

4. 如果病情严重，症状复杂时，应结合疾病不同情况

辨证用药。

①症见头痛眩晕，胸胁胀痛，烦热不安，鼻塞稍咳，鼻涕带血，口苦咽干，耳内闷胀，大便秘结，小便黄或正常。舌暗紫有瘀斑，舌苔白或黄，脉弦，或弦细，或细涩。此属肝郁犯肺，气血凝结。治宜疏肝解郁，祛痰止咳，消肿散结，可用柴辛汤，并服平消片。

柴辛汤：

柴胡 12 克 郁金 15 克 丹参 30 克 白芍 20 克 辛夷 12 克 苍耳子 12 克 仙鹤草 60 克 山豆根 10 克 瓦楞子 30 克 全蝎 10 克 蜂房 10 克 当归 15 克 生甘草 3 克 料姜石 60 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方以柴胡、郁金、白芍疏肝解郁，清热除烦；辛夷、苍耳子透脑止痛；丹参、仙鹤草、当归活血化痰，消炎止血；山豆根、全蝎、蜂房、生甘草清热解毒，消肿安痛；瓦楞子、料姜石软坚散结，清眩敛血。十四味药配伍，有疏肝解郁、清热解毒、透脑清眩、软坚散结、消肿止痛、清肺消胀之功效。

②症见鼻塞不通，鼻涕带血，头痛头重，恶心心悸，胸闷气短，咳嗽咯痰，胃纳不佳，大便溏。鼻咽部肿块色淡，肿块表面光滑，颈部淋巴结肿大。舌红绛，或有瘀斑，或尖边红，舌苔厚腻或苔白，脉弦滑，或弦数。此属肺脾灼津，浊痰不化。治宜清肺消浊，健脾化痰，可用瓜辛汤及平消片。

瓜辛汤：

瓜蒌 30 克 胆南星 10 克 土贝母 15 克 猪苓 60 克 辛夷 12 克 重楼 10 克 杏仁 15 克 陈皮 10 克 白茅根 30

克 料姜石 60 克

方义：本方用瓜蒌、杏仁、土贝母消浊清肺，宣肺止咳；胆南星、陈皮化痰消炎；辛夷、猪苓、重楼清热解毒，通透消肿；白茅根、料姜石健脾利水。上药配合一起，有健脾理气、清肺解毒、化痰止咳、软坚散结、化浊消肿、透脑清咽、止血止痛、安神镇静之功效。

③症见视物不清或复视，头晕头痛，或面瘫舌歪，或口眼歪斜，鼻塞鼻衄，鼻流浊涕，口苦咽干，面部、颧部潮红，咳嗽痰稠，心烦不眠，肿块溃烂或呈菜花状。舌红绛，脉弦数，或滑数。此属风热毒蕴，肺络堵塞。治宜解毒清热，熄风通络，凉血止血，可用菊楼汤及平消片。

菊楼汤：

重楼 10 克 钩藤 30 克 土贝母 10 克 山豆根 10 克
桑叶 10 克 辛夷 10 克 野菊花 30 克 生地黄 30 克 僵蚕
10 克 仙鹤草 60 克 丹参 30 克 夏枯草 30 克 杏仁 15
克

方义：本方用重楼、野菊花、土贝母、山豆根清热解毒，软坚散结；生地黄、仙鹤草、丹参凉血止血；僵蚕、钩藤熄风通络，宣肺止咳，透脑止痛。各药配伍，有清热解毒、软坚散结、活血化瘀、熄风通络、祛痰透脑、宣肺止咳、消肿通塞之功效。

④症见面色晦暗，四肢无力，形削体弱，畏寒肢冷，腰酸腿痛。舌暗淡，舌苔白，脉沉细涩。此属气血双亏，正气衰败。治宜温肾固本，双补气血，可用芪补汤，并服平消片。

芪补汤：

生黄芪 60 克 红人参 10 克（或党参 30 克） 仙茅 15

克 仙灵脾 15 克 补骨脂 30 克 骨碎补 15 克 焦杜仲 20 克
枸杞子 20 克 女贞子 30 克 料姜石 60 克

方义：本方用黄芪、红人参补气扶正；仙茅、仙灵脾、补骨脂、骨碎补、料姜石、焦杜仲、枸杞子、女贞子固本温肾，强腰止痛。诸药配合起来，有补肾强腰、软坚散结、理气止痛、双补气血之功效。

5. 如果病情进一步发展，头痛严重，鼻腔堵塞，鼻咽内流出有腐败气味的分泌物时，除服苍辛银豆汤加减与平消片外，还可使用硼脑膏或辛石散塞鼻孔，或吹入鼻孔。

硼脑膏：

金银花 9 克 鱼脑石 6 克 黄柏 6 克 硼砂 6 克 冰片 0.6 克

制用法：共研为细粉，用香油或凡士林调成软膏。可用棉球蘸药膏塞鼻孔内，或将药粉吹入鼻孔内。1 日 3 次。

方义：本方用金银花清热解毒；黄柏消炎除湿；鱼脑石、硼砂消肿软化；冰片香窜，引诸药直达病所。各药配合在一起，有消炎消肿、除湿止痛、清热解毒之功效。

辛石散：

白芷 3 克 鹅不食草 3 克 细辛 3 克 辛夷 6 克 鱼脑石 4 克 冰片 4.5 克

制用法：将上药分别研为细粉，合在一起，研匀，并研极细粉，吹入鼻孔内，1 日 2~3 次。

方义：本方用白芷、细辛开窍除风；鹅不食草、辛夷通透鼻咽；鱼脑石、冰片止痛消肿。诸药综合一起，有芳香开窍、通透鼻咽、除风止痛、利湿消肿之功效。

6. 病情发展，头痛剧烈，耳鸣、耳聋较甚时，可服干慈丸与平消片，并服苍辛银豆汤加减。

干慈丸：

干漆（炒）30克 千金子9克 郁金30克 山慈菇30克 辛夷30克 五倍子9克 蜂房30克 全蝎30克 苍耳子30克 料姜石30克

制用法：共研为细粉，水泛为丸，如绿豆大小。每次服3~6克，1日3次。黄芪煎水送下，或温开水送下。

方义：本方用干漆、千金子、山慈菇、郁金攻坚破积，活血化瘀，消肿止痛；苍耳子、辛夷通透鼻咽；五倍子、蜂房、全蝎、料姜石清热解毒，软坚止血。诸药配伍，有活血化瘀、消肿止痛、攻坚破积、清热解毒、止血利咽之功效。

如果出现眩晕、耳鸣、耳聋时，可用菊明汤与平消片。

菊明汤：

木贼12克 牡蛎15克 野菊花30克 夜明砂9克 黄芪30克 山豆根9克 瓦楞子15克 白芍药15克 海浮石30克 蜂房9克 全蝎9克

煎服法：一剂药煎2遍，合在一起，分2次服。

方义：本方用木贼、牡蛎、野菊花、夜明砂柔肝熄风；山豆根、瓦楞子、海浮石软坚消肿；白芍药、蜂房、全蝎清热解毒，化瘀止痛；黄芪补气扶正。各药综合，有柔肝熄风、镇静止痛、软坚消肿、清热解毒、活血化瘀、补气扶正之功效。

7. 如果鼻咽癌发展到晚期，出现转移症状过多时，可按相应的症状，在不同证候处方中加减用药。

【典型病例】

尹某，男，28岁。渭南龙背乡安王村人。

初诊：1984年3月6日。

主诉：鼻塞疼痛4月余。

现病史：1983年11月左右自觉鼻塞，疼痛，鼻孔流黄水，并发现右侧鼻腔有一小块肿块，逐渐增大，鼻部疼痛加重。右耳听力减退，右侧面部感觉迟钝。食欲、睡眠均好。1984年3月3日第四军医大学第一附属医院检查：右鼻腔隆起，右鼻前庭有新生物，自上部起有坏死，质硬；右颌下淋巴结肿大，约3厘米×3厘米，质硬，活动度差；右侧面部感觉迟钝。活检病理：鼻前庭未分化癌，颌下淋巴结转移。是时经渭南地区医院病理检查，诊为右鼻腔恶性肿瘤，恶性肉芽肿（病理号7511-1）。3月5日行放射治疗，症状反而加重，早晨起床后稠涕多，其他各症同前，停止放疗。

舌象：舌质暗红，舌苔黄腻。

脉象：脉细弦数。

辨证：肺脾灼津，虚热毒蕴。

治法：清热透脑，通塞止痛，扶正祛邪。

方药：

(1) 平消片：每次服8片，1日3次，温开水送下。

(2) 辛夷12克 苍耳子10克 山豆根10克 蜂房10克 郁金15克 全蝎10克 茜草15克 黄芪60克 生甘草3克

水煎，每日早晚分服。

复诊（4月2日）：服药后，各症减轻。近两日发热，鼻出血。

舌象：舌红，苔白。

脉象：脉细数。

方药：上方去郁金，加金银花30克，白茅根60克。水煎服。

三诊（4月15日）：服药后热已退，鼻仍出血。舌脉同

上。

方药：3月6日处方去茜草，加土贝母15克，白茅根60克，仙鹤草60克。水煎服。

四诊（5月11日）：各症无明显变化。舌脉同上。

方药：3月6日处方加茅苍术10克，蜈蚣1条。水煎服。

五诊（10月25日）：病情稳定。

舌象：舌苔白。

脉象：脉缓。

方药：3月6日处方加瓦楞子30克，黄药子15克，重楼10克。水煎服。

六诊（1985年4月25日）：症状消除，精神佳，已能正常劳动。

舌象：舌质微红，舌苔薄白。

脉象：脉缓。

方药：在上方基础上加丹参30克，党参30克。水煎服。

七诊（1986年4月23日）：照上方服6剂后，停药汤剂，继续服平消片。每次服8片，1日3次。病人已恢复正常。

1997年随访，病人尚健在。

乳 腺 癌

乳腺癌又称乳房癌。中医学曾有“乳岩”、“乳痈坚”及“乳石痈”等名称。

乳腺癌是妇科常见肿瘤之一。该病在妇女生育期内的发

病率随年龄而增加，到 60 岁以后，则又有下降的趋势，常见的多是 40 岁左右的妇女，也有年龄很小的。乳腺癌在男性发病者较少。

中医学很早提到“乳岩”与“乳痈”的病变不同，“乳石痈”与“女石乳”不同。对于乳腺癌的预后，则提出有能治的，有不能治的，并且已经认识到乳腺癌不只一个类型。对治疗乳腺癌，大多数是强调辨证论治。同时，提出晚期乳腺癌不宜开刀，应当补气养血，扶正祛邪。这些是很值得我们注意的。

【病因病机】

由于哀、哭、忧、愁、惊、恐、郁结等七情所伤，情志不遂，致使机体气血失调，脏腑功能紊乱，或忧郁积忿，致使内分泌失调，引起细胞分裂失去控制，出现癌变。或七情内伤，导致气血紊乱，冲任失调，脏腑功能紊乱，对癌细胞的监视和抵抗力降低。《外科正宗》记载：“忧郁伤肝，思虑伤脾，积悲在心，在愿不得志者，致经络痞涩，聚结成核。”或由于长期应用性激素，或体内性激素过剩，内分泌失调性增生，继而转变为癌。妊娠早期中断，或人工流产，或寡居不嫁，或未哺乳，或哺乳不正常，破坏神经系统正常活动，影响卵巢激素的分泌，卵巢和神经系统正常的调节作用发生障碍，致使正常的神经系统与内分泌的活动失调，以致本病。或由于经气虚，正气不足，风寒外袭，或毒邪内蕴，气滞血瘀，痰浊交凝，结滞而成，或由于患有其他疾病所致。

【分型】

乳腺癌有腺癌、硬癌、髓样癌（软癌）、单纯癌等，这几种分化差，发展快，占乳癌的多数。还有粉刺样癌、乳头状癌、粘液腺癌、湿疹样癌，这几种分化较好，发展较慢。

又有乳腺肉瘤和癌肉瘤，极为少见。

【症状】

乳腺癌早期，多数没有全身症状，仅乳房内发现肿块，一般多不痛，偶有沉重感觉，偶有疼痛。这类肿块边缘不整，摸起来较硬，常是圆形，与周围组织界限不清，皮肤大部分没有变化。肿块位置浅的，上面的皮肤为点状凹陷（好像橘皮一样），用手推动肿块，皮肤也跟着移动。有一部分病人，在推动肿块的时候，从乳头流出少许带血的乳汁样东西。肿块常常是逐渐扩大，一般是向深处及四周发展，多与皮肤粘连，严重的时候，往往穿破皮肤而溃烂，并且流出脓血。同时，有恶臭气，而且疼痛。肿块上面的皮肤，往往发硬，变紫。

有一部分病人可见淋巴结肿大，初起多数是患侧腋下淋巴结肿大。晚期的时候，可出现锁骨上淋巴结肿大，或者是对侧的锁骨上和腋下淋巴结肿大。

癌瘤继续发展，转移到肺、肝、骨的时候，就会出现相应的症状。

【检查】

对于乳腺癌的诊断比较容易，妇女应当经常进行自我检查，早期发现。

妇女正常乳腺具有完整的弧形轮廓。为了明确乳房的健康情况，可在两次月经中期，乳房充血最少的时候，察看乳腺轮廓是否改变。注意不能用手拉出的乳头内陷（先天性的乳头内陷常可用手拉出）、局部皮肤凹陷和汗孔清晰（酒窝征或橘皮征），注意乳头溢液（乳头溢液在经期为浆液样，或牙膏样，或伴有痛胀，多是增生，也有1%是乳癌）。不断地改变姿势，双手高举，缓缓放下，两手叉腰等，对照两

个乳房的外观。对有家族癌瘤病史，乳腺囊性增生，或其他良性肿瘤，未婚未育妇女，功能性子宫出血，甲状腺机能低下而肥胖的人，要仔细比较每次检查的情况。

查体：身体仰卧，在受检查一侧垫上枕头，受检查的患者上肢上举过头，手指平放在乳腺上。先自上而下查乳腺内侧，再由下而上查乳腺外侧，腋窝深部，乳头下部。左右互换。检查时，用力要轻匀，不要用手抓捏，避免将正常乳腺组织视为肿块。

【类证区分】

乳腺增生：常见于中青年妇女，并常随月经周期而变化，活动度大。

乳房纤维瘤：常见于青春期少女，硬度中等，圆形或椭圆形，可推动，有弹性。

炎性肿块：有红、肿、热、痛的炎性反应。

乳汁潴留囊肿：多见于哺乳后期，在乳晕部常见到圆、软、光滑、周界明显的肿块。

大导管内乳头状瘤：在乳晕部可摸到结节、小索状物，或可见小出血点，压时渗液。

当发现乳房肿块，或怀疑是乳癌时，可到医院进行检查以确诊。

舌象：舌质红，舌苔白，舌尖边红。

脉象：脉弦数，或弦缓。

【论治】

1. 乳腺癌（包括乳房部位各种癌瘤）初起仅发现肿块时，宜服平消片，每次服4~8片，1日3次。或服金星散。

如果偶尔感觉肿块沉重，或有微痛时，可服瓜蒌银蜂丸与平消片。

瓜蒌银蜂丸：

全瓜蒌 90 克 丹皮 60 克 金银花 60 克 蜂房 60 克
蛇蜕 60 克 全蝎 60 克

制法：共研为细粉，水泛为丸，如绿豆大小。每次服 3~6 克，1 日 3 次。黄芪煎水送下，或温开水送下。

方义：本方以蜂房、蛇蜕、全蝎软坚化积，活血解毒；全瓜蒌、丹皮、金银花消炎解郁清热，润肺抑肝消肿。诸药配合在一起，有舒郁解毒、软坚化痰、消肿止痛之功效。

2. 如果肿块发展为可推动，从乳头流出少许带血的液体，发热，肿块疼痛时，可服萎菊慈菇汤，并服平消片或金星散。

萎菊慈菇汤：

夏枯草 18 克 金银花 18 克 菊花 15 克 连翘 18 克
瓜蒌 30 克 山慈菇 12 克 陈皮 9 克 乳香 9 克 没药 9 克
山豆根 9 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用陈皮、夏枯草、乳香、没药疏肝理气，解毒软坚，止痛消炎；山豆根、山慈菇、金银花、连翘清热解毒，消肿祛痰；菊花、瓜蒌皮柔肝熄风，利气化痰。诸药综合一起，有理脾清肝、清热解毒、开结消积、利气化痰、柔肝熄风之功效。

3. 病情进一步发展，症状复杂时，除服平消片和金星散外，要结合疾病出现的不同症候辨证用药。

①症见肿块不痛不痒，皮色不变，质地较硬，胸胁闷痛或窜痛，食纳呆滞，情绪忧郁。舌红，舌苔薄黄，或苔白，脉弦沉。此属肝郁气滞。治宜理气解郁，疏肝散结，可用瓜蒌逍遥汤加减，并服平消片或金星散。

②症见肿块坚硬不平，胀木不痛，初起如棋子，胸闷胁胀，精神不爽，咳嗽咯痰，食纳减少，面色萎黄，身体沉重。舌暗红，舌苔厚腻，脉弦数，或弦滑。此属脾阳不振，痰湿痹病。治宜温阳利湿，软坚散结，可用桂星汤，并服平消片或金星散。

桂星汤：

桂枝 20 克 黄芪 60 克 郁金 15 克 天南星 10 克 重楼 10 克 苍术 10 克 当归 15 克 柴胡 10 克 瓦楞子 30 克 藤梨根 60 克 莪术 10 克 白芍 15 克 甘草 3 克 料姜石 60 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用桂枝、天南星、生甘草、料姜石、苍术温阳利湿，健脾和胃，祛痰消肿；莪术、白芍、柴胡、郁金、瓦楞子软坚散结，疏肝理气；藤梨根、重楼清热解毒，消积破坚；黄芪、当归补气养血。各药配伍，有健脾和胃、疏肝理气、温阳利湿、软坚散结、活血化瘀、清热解毒、消肿止痛、祛痰通经之功效。

③症见肿块坚硬灼痛，边界不清，周围固定，推之不移，皮色青紫，头痛眼红，面红易怒，心烦失眠，大便干秘，小便黄赤。舌质紫绛，舌底红瘀块，脉弦数。此属肝郁毒蕴。治宜疏肝解郁，消毒散结，可用柴金汤，并服平消片或金星散或补金丸。

柴金汤：

郁金 15 克 香附 15 克 山豆根 10 克 柴胡 12 克 丹参 30 克 蜂房 10 克 瓦楞子 30 克 全蝎 10 克 白芍 20 克 云茯苓 15 克 生甘草 3 克 料姜石 60 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方以山豆根、全蝎、蜂房清热解毒，软坚散结，消坚破积；郁金、柴胡、香附、丹参、白芍疏肝解郁，理气止痛；瓦楞子消肿利水；生甘草、云茯苓、料姜石健脾和胃。各药互相配合，有疏肝理气、软坚散结、活血化瘀、健脾利水、消肿止痛、清热解毒之功效。

④症见面色㿔白，头晕目眩，心悸气短，失眠盗汗，腰酸腿软，体倦无力，大便溏稀，小便清长。舌质淡，舌苔白腻，脉沉细弱。此属正虚邪盛，血不养肝。治宜补气养血，扶正培本，可用芪苡汤，并服平消片或金星散或补金丸。

芪苡汤：

黄芪 60 克 党参 30 克 郁金 15 克 当归 15 克 旱莲草 30 克 白术 20 克 白芍 15 克 重楼 10 克 丹参 30 克 薏苡仁 50 克 料姜石 60 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用黄芪、当归、党参补气养血；白芍、白术、薏苡仁、旱莲草、郁金疏肝养肝，益心健脾；料姜石、重楼、丹参清热解毒，消坚散结。诸药综合，有补气养血、疏肝解郁、健脾补肾、养心安神、扶正祛邪之功效。

4. 如果癌肿溃烂，流出脓血或疼痛，肿块上面皮肤发硬、变紫，全身发热时，可服砒酥丸与平消片，并用雄参膏外敷。

伤口不愈，可用砒倍散撒患处，或用蛋黄油调膏敷患处。每日换药 1~2 次。

砒倍散：

苦参 50 克 白砒 20 克 五倍子 50 克

制用法：以上三味药各研为粉，合在一起，再研为极细粉，按伤口大小适量撒患处。或用蛋黄油调膏敷患处。每日

换药 1~2 次。

方义：本方用苦参清热解毒；白矾消炎止血；五倍子生肌收敛。诸药配伍，有清热解毒、消肿消炎、止血止痛、燥湿收敛、生肌长肉、保护创面之功效。

如果伤口疼痛，可撒七香散，或用胆汁（猪胆汁、牛胆汁均可）加香油少许调膏敷患处。每日 1~2 次。

七香散：

重楼 20 克 金银花 15 克 三七 10 克 血竭花 30 克
乳香 15 克 没药 15 克 麝香 1 克 冰片 1.5 克 牛黄 1 克

制用法：将上药各研为粉，合在一起，再研为极细粉。按伤口大小适量撒患处。

方义：本方用重楼、金银花清热解毒，消肿消炎；三七、血竭花、乳香、没药活血止痛，软坚祛瘀；牛黄、冰片、麝香止痛散结，化浊祛秽。九味药配伍，有解毒消炎、止痛活血、化瘀散结、祛秽除臭、祛腐生肌、燥湿清热、消肿敛疮之功效。

5. 病人食欲不振，忧郁，消瘦时，可服瓜蒌逍遥汤加减与平消片。

6. 病情进一步发展，出现淋巴转移时，可服金硝丸。

金硝丸：

千金子 6 克 绿矾 3 克 干漆 9 克 郁金 3 克 花蕊石 3 克 山慈菇 3 克 白矾 3 克 火硝 9 克 枳壳 60 克 五灵脂 6 克 制马钱子 9 克

制用法：共研为细粉，水泛为丸。每次服 1.5~3 克，1 日 3 次。黄芪煎水送下，或温开水送下。

方义：本方用白矾、火硝、郁金、干漆、五灵脂软坚消炎，化瘀活血，消积攻坚，推陈致新；马钱子、枳壳通络提

神，消痞驱风，顺气宽肠胃，疏滞以通血脉；千金子、绿矾、花蕊石、山慈菇利气止血，清热解毒，止痛消肿。诸药配伍，有攻坚破积、生肌长肉、推陈致新、养血消炎、健胃强脾、宽肠理气之功效。

【典型病例】

海某，女，41岁，回族。住西安市北关正街65号。

初诊：1982年9月18日。

主诉：左乳房有肿块2个多月。

现病史：2个月前发现左乳头溢出黄水。生气后乳房胀痛，月经前亦感到乳房胀。睡眠多梦，饮食正常，大小便亦正常，月经正常。

检查：左乳房外侧可触及3厘米×3厘米肿块，边缘不清，质软，腋下淋巴结不大，左乳可挤出黄色分泌物。

舌象：舌质绛，舌苔白。

脉象：脉弦细。

辨证：肝郁气滞，痰瘀结聚。

治法：理气化痰，通络散结。

方药：

瓜蒌 30克 白术 12克 瓦楞子 30克 郁金 15克 当归 15克 白芍 15克 皂刺 20克 土贝母 20克 生甘草 3克

煎服法：一剂药煎2遍，合在一起，分2次服。

经过半年34次的治疗观察，左乳房肿块明显缩小，左腋下淋巴结稍大，乳腺癌仍不能排除，动员手术切除，患者拒绝。

1983年6月初追踪随访，经说服后于7月份在西安医学院第二附属医院行手术切除。

病理报告：单纯性乳腺癌。术后行化疗 1 个疗程，并服中药扶正养血。

11 月 9 日来诊：左锁骨上淋巴结肿大，建议再行放疗。

舌象：同前。

脉象：同前。

治法：补气养阴，软坚散结。

方药：

黄芪 60 克 瓜蒌 30 克 全蝎 10 克 蜂房 10 克 郁金 15 克 重楼 10 克 山豆根 10 克 生地 30 克 白术 15 克 瓦楞子 30 克 生甘草 3 克

煎服法：同前。

经放疗及服上方 28 剂后，锁骨上淋巴结肿大消退。但有咳嗽，左胸痛。

舌象：同前。

脉象：同前。

方药：上方加贝母 15 克。

煎服法：同前。

又经 16 次来诊，服上方 96 剂后，左锁骨上淋巴结再度肿大。

舌象：同前。

脉象：同前。

方药：上方加黄药子 15 克，桑椹子 30 克，山慈菇 30 克。

煎服法：同前。

经服 54 剂后，肿大淋巴结完全消退，症状消除，已上班工作。

子 宫 癌

子宫癌，在中医学中有“石瘕”、“瘕聚”、“行枯”、“血瘕”、“血瘕”、“倒开花”、“倒血经”、“崩漏”及“带下”等名称。其中包括了子宫的各种癌瘤。妇女子宫分宫颈、宫体、宫底三个部分，发生在子宫最下端的癌瘤称宫颈癌，发生在子宫腔里边的癌瘤称宫体癌。子宫癌包括宫颈癌与宫体癌。子宫癌是妇女常见的、多发的癌瘤之一。多发生在20岁以上，35~55岁为最多，60岁以上发病率有下降趋势，但并非绝对。

子宫癌外观上有菜花型、溃疡型、弥漫浸润型、结节型等四种类型。病理上有鳞状细胞癌（占多数）、腺癌与混合癌（较少见）等类型。

【病因病机】

多数由于长期忧思郁怒，七情内伤，六淫病毒，或由于胎产、性交的刺激，损伤脾胃及冲、任二脉，致使内分泌紊乱而引发。或宫颈糜烂（上皮组织增殖），或早婚多产，宫颈撕裂、外翻，病毒侵及而致。或丈夫包茎、包皮过长，长期刺激引起炎症而诱发。或由于长期服用雌激素及长期受放射线刺激等而致。

【症状】

初起多数没有症状，个别病人在性交后有点状出血。一般妇女在绝经后出血，或在月经前后阴道出现滴血，就要注意宫颈或宫体癌的发生。年近绝经的妇女，如果月经量反而增多，或有不规则的阴道出血，或一月行经数次，或是在性交或排便或劳动以后有阴道出血等现象，必须注意子宫癌。

子宫颈癌往往能引起大出血和多次的出血，并且因为出血而造成病人重度贫血和衰竭。多数子宫癌病人白带增多，有感染和组织坏死时，往往会排出混有血丝或血液的白带，或是有恶臭气的白带。病情进一步发展可出现尿频或尿失禁，或由阴道流出臭水，并且出现恶液质。

病情发展到晚期，会出现不同性质的疼痛（轻痛、剧痛、锐痛），有时疼痛向腹壁和背部放射。一般癌瘤病人的疼痛多在腰部，或是在下腹部位。有的病人，因为癌瘤侵犯部位的不同，而发生不同部位的疼痛。癌瘤发展越到晚期，疼痛就会越剧烈，症状就越严重。

当癌瘤侵犯膀胱以后，小便次数增多，或尿不畅，或尿道疼痛。严重时，出现脓尿或是血尿，甚至出现尿毒症。

当癌瘤侵犯直肠，大便次数增多，或是便秘，一部分病人在大便时疼痛或便血。

子宫体癌，开始有稀薄的白带，以后变成污黄色臭带，下腹部疼痛，伴有腰痛。有的病人，经常由阴道流出像米汤样的臭液体。50岁以后的妇女，如果逐渐或突然发生阴道出血，并且出血不规律，就要及时检查。子宫体癌病人，在绝经前往往是月经期间大量出血，或淋漓不断出血，无规律性，或是有周期地大量出血。有的病人，在绝经以后1~2年或是几年后突然阴道出血，逐渐血量增多。有一部分病人，由于子宫腔排出坏死组织或排出血块，引起不规则的收缩，病人感觉腰痛。但是，当坏死组织或血块排出以后，这种疼痛就能减轻，或者疼痛停止。这种疼痛，多数是阵发性的不规则的疼痛。疼痛的时间是1~2日或是3~5日疼1次。有些病人，是持续性的隐痛，或是剧烈性的疼痛。

子宫颈癌或子宫体癌如果转移扩散到锁骨上淋巴结，或

肺、骨、肝等远处器官的时候，就会出现该部位相应的症状。

总之，30岁以上的妇女，出现不规则的阴道出血，或是在性交以后出血，或闭经后突然出血，或是白带增多，或是白带有血丝，或是白带伴有恶臭气，或疼痛等症状，应注意本病的发生。

【检查】

舌象：舌质嫩红，或红色，或暗青紫，或有瘀点，或暗红。舌苔白或润白，或薄白，或白厚，或黄腻，或剥脱。

脉象：脉滑数，或沉细，或细数，或弦细，或弦，或涩，或沉涩，或滑紧，或细数无力等。

子宫癌可以用窥阴器观察，或用手进行直肠、阴道、腹壁三合诊检查，以确定肿块的范围、大小和子宫旁有无浸润及浸润程度。怀疑膀胱内转移，可用膀胱镜检查，怀疑输尿管阻塞，可作肾盂造影和肾功能测定。并进一步作阴道涂片检查脱落癌细胞，或在可疑的部位取活体组织作切片检查。或用阴道镜检查、刮宫检查及“B”超等协助确诊。

【论治】

对子宫癌的治疗，宜以清热解毒、补中益气、活血化瘀、滋阴软坚、止血止痛等法辨证用药。

1. 症状初起，月经前后出血或滴血，或在性交后出血，可用椿甲丸，并服平消片或金星散。

椿甲丸：

蛇床子 60 克 蜂房 30 克 鳖甲 60 克 龟板 60 克 生牡蛎 60 克 椿根白皮 30 克 仙鹤草 60 克 炒小茴香 30 克 蛇蛻 30 克 全蝎 30 克

制服法：共研为细粉，水泛为丸，如绿豆大。每次服

6~9克，1日3次。黄芪煎水送下，或温开水送下。

方义：本方以蜂房、全蝎、蛇蜕清热解毒；龟板、鳖甲、牡蛎滋阴软坚；椿根白皮、仙鹤草、炒小茴香、蛇床子止血活血，强心补虚。诸药综合起来，有清热解毒、活血化瘀、软坚滋阴、补虚止血之功效。

2. 病情发展，白带增多，或白带有血丝，或绝经后出血，或大量出血时，可服三甲榆蜂汤，并服平消片或金星散。

三甲榆蜂汤：

生黄芪 60 克 党参 15 克 龟板 15 克 鳖甲 15 克 牡蛎 15 克 蜂房 10 克 蛇蜕 10 克 全蝎 10 克 地榆 15 克 荷叶 15 克 仙鹤草 30 克 茜草 15 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用生黄芪、党参补气扶正；龟板、鳖甲、牡蛎滋阴软坚；蜂房、全蝎、蛇蜕清热解毒，软坚消炎；地榆、荷叶、仙鹤草、茜草滋阴止血。诸药综合，能补中益气，滋阴软坚，清热解毒，活血化瘀，止血止痛，扶正祛邪。

3. 已近绝经，而月经量反而增多，或不规则的阴道出血，或一月内行经数次，宜服仙蕊汤，并服平消片或金星散。

仙蕊汤：

生黄芪 30 克 当归 15 克 党参 15 克 生牡蛎 20 克 大小蓟各 15 克 龟板 15 克 鳖甲 15 克 白术 12 克 仙鹤草 30 克 贯众 15 克 山豆根 10 克 花蕊石 30 克 紫石英 15 克

煎服法：同三甲榆蜂汤。

方义：本方用黄芪、党参、当归补气补血；龟板、鳖甲、牡蛎、花蕊石、紫石英滋阴软坚；大蓟、小蓟、白术、仙鹤草、贯众、山豆根止血凉血，健脾强心，清热解毒。诸药综合，有健脾补心、软坚化积、滋阴强壮、止血定痛、消炎消肿之功效。

4. 病情继续发展，症状复杂时，可根据症候辨证用药。

①症见情绪忧郁，胸胁胀满，全身窜痛，口苦咽干，心烦易怒，少腹胀痛，阴道接触出血，血色鲜红或夹血块，月经提前，白带稍多，色黄，局部轻度糜烂，或小菜花样损伤，大便干秘，小便黄赤。舌质暗，舌苔薄白，或微黄，脉弦细。此属肝郁气滞。治宜疏肝解郁，理气止痛，活血止血，清热解毒，调理冲任，可用佛参汤，并服平消片或金星散。

佛参汤：

丹参 30 克 柴胡 12 克 当归 10 克 猪苓 60 克 郁金 15 克 白术 12 克 半枝莲 30 克 蜂房 10 克 蜈蚣 2 条 白花蛇舌草 30 克 索罗子 15 克 仙鹤草 60 克 佛手 15 克 料姜石 60 克

煎服法：同三甲榆蜂汤。

方义：本方用柴胡、郁金、佛手疏肝解郁；当归、仙鹤草、丹参活血止血；猪苓、半边莲、白花蛇舌草利水润便；索罗子理气止痛；白术、料姜石和胃健脾；蜂房、蜈蚣清热解毒，软坚散结。诸药配伍，有疏肝理气、软坚化瘀、解郁除烦、养血活血、止痛止血、健脾利水、清热解毒、调理冲任之功效。

②症见脘闷腰痛，少腹胀痛，食纳不佳，下肢沉痛，月经量多，带色黄赤，或赤白相杂，带下粘稠，腥臭难闻，局

部有空洞，或菜花样坏死溃疡。大便秘结，小便短少，色黄赤。或小便频数，或尿急。舌绛，或暗红，舌苔黄燥，或黄腻，脉弦数，或弦滑。此属瘀毒湿热。治宜清热解毒，活血化瘀，疏肝理气，利水止痛，可用柏苓汤，并服平消片或金星散。

柏苓汤：

黄柏 10 克 苍术 10 克 重楼 10 克 猪苓 60 克 当归 20 克 郁金 15 克 龙葵 30 克 薏苡仁 30 克 蜂房 10 克 全蝎 10 克 白花蛇舌草 30 克 料姜石 60 克

煎服法：同三甲榆苡汤。

方义：本方用苍术、薏苡仁、黄柏清热利湿；蜂房、全蝎、龙葵、重楼、白花蛇舌草清热解毒，软坚破积，润便抑癌，消炎消肿；猪苓利水消胀；当归、郁金、料姜石活血养血，疏肝解郁，祛瘀散结，利水消肿。诸药合用，有清热解毒、养血润便、理气止痛、消毒抑癌之功效。

③症见头晕目眩，心悸气短，脘闷纳呆，腰酸腿软，少腹胀痛，带多质稀，色似米泔，淋漓不断，腥臭难闻，体倦无力，月经过多。大便干，或大便溏；小便浑浊色黄。局部有空洞或菜花样溃疡。舌苔白腻，或黄腻，脉沉细。此属瘀毒蕴结，脾虚湿浊。治宜活血化瘀，健脾利湿，清热解毒，可用苡欢汤，并服平消片或金星散。

苡欢汤：

党参 15 克 苍术 12 克 蓬莪术 15 克 瓦楞子 30 克 猪苓 60 克 薏苡仁 30 克 蜂房 10 克 全蝎 10 克 生黄芪 60 克 骨碎补 15 克 合欢皮 30 克 料姜石 60 克

煎服法：同三甲榆蜂汤。

方义：本方以莪术活血化瘀；苍术、薏苡仁健脾燥湿；

瓦楞子軟堅散結；豬苓利水排濁；蜂房、全蝎、料姜石清熱解毒，和胃降逆，消堅破積；黃芪、黨參、骨碎補、合歡皮補氣養心，扶正強壯，除煩安眠。各藥綜合一起，有健脾利濕、軟堅散結、燥濕排濁、利水通淋、活血化癥、清熱解毒之功效。

④症見頭暈眼花，失眠耳鳴，腰酸膝冷，食少納呆，手足心熱，午後低熱，五心煩熱，陰道流血，帶下清稀，腥臭難聞。大便先干後稀，夜間尿多，小便頻數。舌胖紅，少苔，或舌苔白潤，脈沉細無力。此屬陰虛內熱。治宜健脾補腎，扶正培本，可用珠補湯，並服平消片或金星散。

珠補湯：

生黃芪 60 克 黨參 20 克 白朮 20 克 女貞子 30 克
豬苓 60 克 骨碎補 15 克 珍珠母 30 克 補骨脂 30 克 蜂
房 10 克 蜈蚣 2 條 仙靈脾 15 克 夜交藤 30 克 料姜石
60 克

煎服法：同三甲榆蜂湯。

方義：本方用白朮、骨碎補、女貞子、補骨脂、仙靈脾補腎壯腰，健脾培本；生黃芪、黨參補氣扶正；豬苓利水消腫；珍珠母、夜交藤柔肝熄風，養心安眠；蜂房、蜈蚣、料姜石滋陰清熱，軟堅散結，消腫解毒。綜合諸藥，有健脾補腎、清熱解毒、滋陰益陽、補氣養心、除煩安眠、扶正培本之功效。

5. 病情進一步發展，性交或排便或活動後出血，或白帶多，腥臭難聞，可服三蛭丸，並服平消片或金星散。

三蛭丸：

雞內金 水蛭 三七 廬蟲 白朮 三棱 莪朮 紅麗
參 干漆（炒） 蛇床子各等份

制服法：共研为细粉，水泛为丸，如绿豆大小。每次服3~6克，1日3次。黄芪煎水送下，或温开水送下。

方义：本方用水蛭、三棱、莪术、干漆、虻虫化瘀活血，消肿定痛；鸡内金、红丽参健胃强脾，补虚扶正；三七、白矾、蛇床子止痛止血，消炎解毒。诸药综合，能止血止痛，健胃强脾，活血化瘀，扶正祛邪。

6. 凡病人身体虚弱，出血量多，出现重度贫血时，宜服参芪三甲汤，并服平消片或三蛭丸或金星散。

参芪三甲汤：

生黄芪 60 克 党参 30 克 薏苡仁 30 克 龟板 15 克
丹参 30 克 鳖甲 15 克 牡蛎 15 克 蛇蜕 10 克 蜂房 10 克
天南星 10 克 料姜石 30 克

煎服法：同三甲榆蜂汤。

方义：本方以黄芪、党参、丹参、薏苡仁、天南星补气补血，健脾除湿；龟板、鳖甲、牡蛎软坚滋阴；蛇蜕、蜂房、料姜石解毒消肿，祛瘀止血。诸药综合，有补气补血、活血化瘀、软坚滋阴、消肿止痛、止血扶正之功效。

7. 癌瘤发展到晚期，出现尿频数或尿失禁，或阴道流臭水，或出血过多时，宜服三甲榆蜂汤与芪酥丸。

8. 晚期病人发生不同性质的疼痛，疼痛难以忍耐时，可服三蛭丸与仙蕊汤加减，或服芪酥丸与参芪三甲汤加减。

9. 晚期癌瘤，发生不规则的、阵发性的疼痛，1~2天或3~5天疼1次，或持续性隐痛，或剧烈疼痛时，可服芪酥丸与参芪三甲汤加减。

10. 晚期子宫癌，均可内服砂雄丸，外撒青硼散，或用香薷子酒外敷，或将平消栓塞入子宫。

砂雄丸：

制马钱子 0.18 克 雄黄 0.6 克 青黛 0.6 克 乌梅 0.6 克 硼砂 0.6 克 硃砂 0.6 克

制用法：共研为细粉，每次服 1.5 克，1 日 2 次。黄芪煎水送下，或温开水送下。

方义：本方用制马钱子、硃砂开通经络，攻坚破积，除湿止痛；乌梅、雄黄、青黛清血解毒，消炎蚀腐；硼砂消痞除污。诸药配伍，能清血解毒，消痞除污，攻坚破积，消炎止痛，通络祛瘀，推陈致新。

青硼散：

黄柏 15 克 紫草 15 克 硼砂 30 克 枯矾 30 克 冰片 30 克 青黛 30 克

制用法：共研为细粉，撒患处。或用凡士林配膏搽患处。1 日 1~2 次。

方义：本方用青黛、黄柏、紫草消炎解毒，除湿祛瘀；硼砂、枯矾、冰片蚀腐杀菌。诸药综合，有祛腐生肌、消炎解毒、杀菌除湿之功效。

平消栓：

明雄黄 30 克 枯矾 15 克 乳香 30 克 没药 30 克 蛇床子 30 克 五倍子 100 克 炒乌梅 50 克 炒蒲黄 30 克 山豆根 30 克 冰片 15 克

制用法：上药各研为细粉，合在一起，研匀，制为栓锭，塞入子宫。每日 1 次。

方义：本方以明雄黄、枯矾消炎解毒，燥湿蚀腐；乳香、没药、乌梅消肿止痛；山豆根、蛇床子清热解毒；炒蒲黄、五倍子生肌祛腐，保护创面；冰片芳香去秽。诸药配在一起，有清热解毒、消肿止痛、软坚破积、芳香去秽、生肌

祛腐、消炎燥湿之功效。

11. 癌瘤晚期，疼痛剧烈，或局部肿胀，或局部溃疡，除内服药外，宜用雄参膏外敷。

【典型病例】

李某，女，53岁。

初诊：1980年11月12日。

主诉：腹胀腹痛6月。

现病史：1980年5月因为腹痛在西安医学院第二附属医院作剖腹探查，诊断为双侧卵巢乳头状浆液性囊腺癌，大网膜及肠管转移。超声波检查：子宫靠上方有一8.5厘米×9厘米肿块，波型迟钝，出波衰减，呈丛状。意见：①盆腔肿瘤；②子宫癌。

现症：腹胀，刺痛，闭经，阵发性腰痛等。

舌象：舌绛，少苔。

脉象：脉沉细数。

辨证：脾肾虚弱，气瘀搏结。

治法：滋补脾肾，软坚散结。

方药：

(1) 黄芪60克 丹参60克 蜂房10克 全蝎10克
瓦楞子30克 山豆根10克 补骨脂20克 山慈菇30克
党参30克

煎服法：一剂药煎2遍，合在一起，分3次服。

(2) 平消片：每次服8片，1日3次，温开水送下。

复诊（12月1日）：症状无变化。

舌象：同前。

脉象：同前。

方药：上方加料姜石60克。

煎服法：同前。

三诊（1981年1月26日）：食纳差，盆腔部位疼痛，胸部刺痛，尿道疼痛。大便尚好。

舌象：舌质淡苔白。

脉象：脉弦缓。

方药：

蜂房 10 克 全蝎 10 克 蛇蜕 10 克 黄芪 60 克 瓦楞子 30 克 索罗子 15 克 元胡 15 克 料姜石 60 克

煎服法：同前。

平消片继服。

四诊（9月9日）：精神好转，食纳增加，经西安医学院第二附属医院检查，直肠、胃、肝等均已正常。

骨瘤与骨癌

骨瘤，包括原发性骨瘤与转移性骨瘤两大类。原发性骨瘤良性较多，预后较好；转移性骨瘤均是恶性肿瘤，一般来自甲状腺、乳腺、肺、前列腺及肾等部位的癌瘤，是晚期癌瘤。软骨瘤或骨肉瘤、骨囊肿多发于 10~20 岁；骨巨细胞瘤多发于 20~40 岁；多发性骨髓瘤、脊索瘤和转移癌多发于 40~50 岁以上。成骨肉瘤、软骨肉瘤一般多发于青少年。男性多于女性，下肢多于上肢。恶性骨瘤以骨肉瘤为最常见的一种。

骨肉瘤又称骨生阴毒，属“骨痹”、“肾虚劳损”的范畴，是恶性极强的癌瘤之一，进展快，转移早，常转移于肺。所以，对骨肉瘤的早期发现早期治疗是很重要的。

【病因病机】

多由于先天禀赋不足，骨髓空虚。肾主骨，骨生髓，肾

虚骨病、肾亏内伤或遗传均可致病。外感寒湿，下陷肌肤，毒攻于内，伤筋蚀骨，或气血凝滞，经络受阻，日久不化，蕴结成毒，耗阴腐骨，结聚而成。

现代医学认为内因多是由于先天残存胚胎组织瘤化，发育异常，或有遗传因素。外因则有化学致癌物质甲基胆蒽诱发或感染，电离辐射，放疗等。

【症状】

软骨瘤常发于指或趾，呈不规则的圆形或纺锤形。骨巨细胞瘤早期有间断性隐痛，局部肿胀、压痛，或关节受限，皮肤红，温度高，有红色斑点。

软骨瘤以幼儿多见，肿块表面光滑，质硬，基底与骨相连。如果位于关节或肌腱附近则妨碍活动，有时有局部摩擦，压迫疼痛，但多数是自行停止生长。如果发现继续增长，应注意恶变。

骨肉瘤早期呈间歇性疼痛，继之变为持续性剧痛。有的病人因疼痛剧烈而抱肤辗转，彻夜不能安眠，疼痛如针刺、刀割、火烧、钻痛，邻近关节有放射性疼痛，不能活动，甚至服用镇静药无效。因发生的位置不同，症状不一。

软骨肉瘤半数以上发生于股骨下端与胫骨上端，大多数是长骨干骺端的骨膜深层。有的骨瘤是由良性恶变而成，发展缓慢，有长期病史，钝痛开始间断，逐渐加重而变为持续。如果生于骨端，邻近关节受限，局部肿块坚硬，周围皮肤发红，温度增高。骨肉瘤多发生于四肢，包块坚硬如石，难消难溃。

【检查】

良性骨瘤发展慢，无明显症状，在浅表部位可摸到肿块，或在某部位引起压迫症状，轻的酸痛，重的疼痛剧烈难

忍，尤其是夜间加重。X线常能发现骨膜下新骨增生，有的可见到科德曼三角形成，骨皮质穿破，看到不规则的阴影，应注意骨癌。化验血清碱性磷酸酶增高。活体组织病理检查、骨扫描等可助确诊。

舌象：舌质红，或绛，有瘀斑。舌苔白薄或白腻。

脉象：脉象弦或弦细或弦数。

【论治】

目前对骨瘤的治疗多数是早期截肢、放疗、化疗及中药治疗。贾老对骨瘤的治疗方法是：活血化瘀，软坚散结，止痛消肿，提高免疫功能。一般开始服平消片或金星散。

1. 发生于上肢的（包括上肢部位各种癌瘤），宜结合使用补肾养血、化瘀消肿、行气通络、软坚导滞之品，可用平消片或金星散，并服海藤丸或藤枯汤。

海藤丸：

海藻 30 克 昆布 30 克 全蝎 10 克 桂枝 30 克 山豆根 30 克 鸡血藤 60 克 补骨脂 60 克 威灵仙 60 克 当归 60 克

制法：共研为细粉，水泛为丸，如绿豆大。每次服 3~10 克，1 日 3 次，温开水送下。

方义：本方用海藻、昆布、当归、鸡血藤行瘀消肿，活血通络；全蝎、山豆根软坚散结，清热解毒；桂枝、威灵仙、补骨脂通阳补肾，增强机体免疫力。九味药综合配伍，有活血化瘀、补肾养血、通络导滞、软坚散结、止痛消肿之功效。

藤枯汤：

桂枝 12 克 夏枯草 30 克 姜黄 15 克 三棱 12 克 当归 15 克 潼蒺藜 12 克 生牡蛎 30 克 丹参 30 克 丝瓜络

12克 鸡血藤 30克 料姜石 60克

煎服法：一剂药煎2遍，合在一起，分2次服。

方义：本方以桂枝、夏枯草、姜黄助阳通络，行气消肿；三棱、丹参、鸡血藤活血化瘀，软坚散结；当归、潼蒺藜补肾养血；丝瓜络、生牡蛎、料姜石降逆镇冲，活络消坚。诸药配合在一起，有补肾养血、活络导滞、软坚散结、行气解郁、活血化瘀之功效。

2. 发生于下肢的（包括下肢部位各种癌瘤），宜结合补肾养血、软坚散结、行气活血、导滞通络之品。可用平消片或金星散，并服海豆丸或莪膝汤煎服。

海豆丸：

海藻 30克 昆布 30克 全蝎 10克 山豆根 30克 川牛膝 60克 补骨脂 60克 威灵仙 60克 焦杜仲 60克 鸡血藤 60克 乌蛇 30克

制服法：共研为细粉，水泛为丸，如绿豆大。每次服3~10克，1日3次，温开水送下。

方义：本方用海藻、昆布、鸡血藤软坚散结，活血化瘀；全蝎、乌蛇、山豆根清热解毒，止痛通络，消炎散肿；川牛膝、补骨脂、威灵仙、焦杜仲补肾养血，通经活络，壮腰强筋。各药综合配伍，有补肾养血、活血化瘀、消肿止痛、软坚散结、通经活络、增强机体免疫力之功效。

莪膝汤：

山豆根 10克 潼蒺藜 15克 生牡蛎 30克 全蝎 10克 川牛膝 12克 蓬莪术 15克 当归 15克 补骨脂 30克 丝瓜络 20克 乌蛇 10克 生甘草 3克

煎服法：同藤枯汤。

方义：本方用山豆根、乌蛇、全蝎清热解毒，消肿止

痛；潼蒺藜、补骨脂补肾壮腰，增强机体免疫功能；生牡蛎软坚散结；川牛膝、蓬莪术、当归活血化瘀，消坚通络；丝瓜络、生甘草活络消炎，止痛消肿。各药配伍，有补肾养血、软坚散结、消炎止痛、导滞通络、解毒活血之功效。

3. 症状复杂治疗效果不显时，可按所出现的不同症候辨证用药。

①症见下肢近端骨痛，时痛时止，逐渐加重，好像针刺、刀割一般疼痛，肿胀隆起，患部压痛，辗转难眠，彻夜不安，活动障碍，甚至全身不舒。舌淡，脉沉细。此属阴寒凝结，阴毒壅滞，凝结不通。治宜温阳开凝，解毒软坚，通络化滞，可用平消片或金星散，并用灵骨汤煎服。

灵骨汤：

五灵脂 10 克 地龙 12 克 补骨脂 30 克 骨碎补 15 克
蜈蚣 2 条 川牛膝 15 克 透骨草 30 克 桂枝 12 克 乌蛇 10 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方以五灵脂活血化瘀；地龙、透骨草通络舒筋；补骨脂、骨碎补补肾壮腰，坚骨益精；蜈蚣、乌蛇疏风止痛，除湿解凝；川牛膝、桂枝通阳解肌，消肿止痛。九味药相配，有疏风通络、温阳解凝、活血化瘀、软坚散结、补肾益精、解毒消肿、坚骨止痛、增强机体免疫力之功效。

②症见上肢肿胀，骨瘤增大迅速，皮肤色暗或变紫，灼痛，刺痛，压痛，似火烧电击，转侧艰难，胳膊不能上举。大便干燥。舌绛，有瘀斑，脉细数，或弦数，或涩。此属气滞血瘀，毒热蕴结。治宜活血化瘀，祛毒散结，可用平消片或金星散，并用透仙汤加减。

透仙汤：

红蓼子 10 克 廔虫 10 克 刘寄奴 30 克 透骨草 30 克
地龙 12 克 柳枝 30 克 蓬莪术 15 克 威灵仙 30 克 乌蛇
10 克 料姜石 60 克

煎服法：同灵骨汤。

方义：本方用红蓼子、廔虫、刘寄奴、蓬莪术活血化
瘀，攻坚破积；透骨草、地龙、乌蛇除湿解凝，驱风止痛；
柳枝、威灵仙、料姜石祛湿通络，和胃降逆。各药配在一
起，有活血化瘀、软坚散结、疏风通络、除湿止痛、清热解
毒、消炎消肿之功效。

③症见上肢或下肢肿块隆起，皮肤青紫，肿胀疼痛，发
热贫血，活动障碍，朝轻暮重，疼痛难忍，身热口干，全身
虚弱，咳嗽，唇淡。大便干秘，小便不畅。舌质暗，舌苔
腻，或少苔，或黑苔，脉沉细。此属肾虚髓伤，骨骼瘀毒，
火毒瘀结。治宜补肾填髓，活血化瘀，扶正止痛。可用平消
片或金星散，并用寄补汤或芪补汤加减煎服。

寄补汤：

补骨脂 30 克 骨碎补 15 克 郁李仁 30 克 透骨草 30
克 猪苓 60 克 生地 30 克 桑寄生 15 克 蜂房 10 克 全
蝎 10 克 乌蛇 10 克 薏苡仁 30 克

煎服法：同灵骨汤。

方义：本方用补骨脂、骨碎补、生地黄补肾填髓，凉血
补血，增强机体免疫力；透骨草、桑寄生、薏苡仁疏风止
痛，祛湿健脾；郁李仁、猪苓润便利水；蜂房、全蝎、乌蛇
软坚散结，清热解毒。诸药配伍，有补肾填髓、活血化瘀、
润便利水、软坚散结、除湿止痛、养血润燥、增强机体免疫
力、扶正祛邪之功效。

【典型病例】

张某，男，24岁。西安市延光机械厂工人。

初诊：1980年2月6日。

主诉：左臀下部出现肿块1年余。

现病史：1年来左腿痛，进行性加剧，活动受限。经西安市红十字会医院检查，病理报告为软骨肉瘤。患者拒绝手术治疗，经放射治疗，肿块未见消退。X线片显示：左侧坐骨软组织块影，骨膜受累，有溶骨破坏现象。

现症：左腿疼痛，行走困难，持双拐可走动。伴有腰痛，乏力。饮食欠佳。局部可扪及直径5厘米肿块。大便正常，小便频数。

舌象：舌质红，有瘀斑，舌苔白。

脉象：脉弦。

辨证：瘀痰结聚，肾气不足。

治法：补肾化瘀，通络散结。

方药：

(1) 黄芪100克 威灵仙30克 补骨脂30克 元胡15克 瓦楞子30克 山豆根10克 仙鹤草60克 蜂房10克 全蝎10克 蜈蚣2条 枸杞子30克 生甘草3克

煎服法：一剂药煎2遍，合在一起，分2次服。

(2) 平消片：每次服8片，1日3次。温开水送下。

患者经过2月余治疗，局部肿块明显缩小，但仍感腿痛，活动受限。

舌象：同前。

脉象：同前。

方药：上方加三七6克，乌蛇10克。

煎服法：同前。

患者经过2年多治疗，共服汤药520余剂。X线片复查：骨膜已修复，肿块消失。患者行走自如，并可跳跃活动，但下蹲仍有不便。

又经过1年间断服用汤剂，身体完全恢复，已上班工作。

1986年8月16日复诊，复查均正常。

脑 瘤

脑瘤，又称颅内肿瘤，包括脑实质或其邻近组织（血管，脉络丛，垂体，松果体等）原发的肿瘤及转移瘤。脑瘤有神经胶质瘤（包括髓母细胞瘤，多形性胶质母细胞瘤，星形细胞瘤，少突神经胶质瘤，室管膜瘤），脑膜瘤，听神经瘤，脑血管肿瘤（包括脑血管畸形，脑血管母细胞瘤），颅咽管瘤，垂体腺瘤，胆酯瘤，松果体瘤，第三脑室胶质囊肿，颅内转移瘤等多种。

【病因病机】

多是由于惊恐或大怒，或哀哭忧郁，使气血运行受阻，抵抗力减弱，病邪乘虚而入，发为癌瘤。

【症状】

肿瘤发生的部位不同，疾病的性质不同，而表现不同。大多数头痛，一般在初起呈间歇性，早晨容易发作，以后症状逐渐加重，次数逐渐增多。很多病人伴有呕吐，往往是突然发作，呕吐的性质多是喷射样，多数无恶心，也与饮食无关。发作时间大部分是在夜间，或是早晨空腹时发作。这种呕吐，常与头痛并发，尤其是在病人头痛剧烈时发作。小儿的小脑肿瘤，在早期多发生呕吐。

脑瘤病人常出现视力减退或复视或偏盲，有一部分病人在症状严重时失明。一般是一侧发生，也有两侧同时发生的。

脑瘤病人常有全身性癫痫样抽搐或瘫痪，或反应迟钝，并有性格改变。有的病人肢体感觉异常，或肢体感觉消失。有一些病人运动障碍，走路不稳。有的病人出现眩晕，并且有不稳定的感觉。有的病人弯腰时有倾倒的感觉。有的病人往往出现嗜睡。有的病人出现昏迷。有的病人精神错乱，对地点和时间的定向力消失。有的病人智力减退，神情淡漠，甚至大小便失禁，出现进行性的痴呆。有的病人记忆力与注意力减退，容易激动。有的病人发生全身抽搐，在抽搐前想说什么，但又说不出来，抽搐时头与两眼转向对侧，肢体多有阵挛性的强直性运动（转头）。有的病人一时性静止不动，保持一定姿势，或肢体被任意摆成一种姿势不能活动。有的病人往往握住别人的手不放。有的病人一侧身体无力，尤其是面部及舌部无力。有的病人一侧肢体震颤。有的病人嗅觉消失，一侧视神经萎缩，或视神经乳头水肿。有的病人有时出现不愉快的幻觉，感觉到有油漆或烧焦的味道，也有鼻咽部感觉异常。有的病人工作时突然感到思维停止，但不会跌倒，往往表现出像在梦中或是一种茫然的样子。有的病人发生奇特的记忆障碍，但回忆不起发作的情况。有的病人常有不随意的舔舌、吮唇和尝味的动作。有的病人味觉和嗅觉减弱。有的病人出现系统性的人物或动物形象的幻觉。有的病人出现光的闪烁感。有的病人对事物的命名叫不出来，或言语没有伦次。有的病人面肌无力，身体震颤。有的病人有时出现刺激感，或触电样的感觉，或（少数）有疼痛感觉。有的病人不能识别患侧手里的东西。有的病人瞳孔不对称，眼

球向上凝视无力。有的病人出现嗜睡，多尿，血糖过高，肥胖，性机能减退，和不规则的发热。有的病人眼球震颤与共济失调。有的病人有舞蹈样的动作。有的病人有耳聋。有的病人上眼睑上缩或下垂，瞳孔不等大，并且多数是瞳孔变大。

【检查】

根据症状结合 X 线拍片或脑脊液检查、脑室造影或脑血管造影检查、脑电图及超声波检查，必要时，进行放射性同位素定性检查，或用 CT、核磁共振检查及病理检查，以助确诊。

舌象：舌质红，或紫红，或紫蓝，或青暗。苔白，或白腻，或滑。

脉象：脉弦数，或紧，或弦缓。

【类证区别】

脑脓肿：发病多是急性或亚急性，往往突然发作，病人低热，血液化验白血球增多。脑脊液检查与脑瘤不同。

蛛网膜炎（包括局限性浆液性脑膜炎，假性脑瘤）：发病可能与炎症有关，多数是随着急性淋巴细胞性脉络丛脑膜炎疾病以后发生，可与脑瘤区别。

脑积水：主要是慢性颅内压增高，出现头大，多数没有头痛和呕吐。

颅内动脉瘤：开始有很轻的头痛，以后头痛加重，出现视力障碍。

癫痫：抽搐症状的出现常在 25 岁以前开始，除了症状发作后有头痛外，平时没有头痛，与脑瘤不同。

【预防】

要避免忧思郁怒及过度的劳累，加强身体锻炼，适当参

加体力劳动，搞好个人卫生。发现脑部疾病早期治疗。常饮绿茶可以预防。

【论治】

脑瘤（包括头脑部位的各种癌瘤）治宜平消片或金星散或补金丸，并结合驱风熄风、镇静清温、补养等药以透脑化瘤。

1. 症状初起，间歇性地发作，早晨头痛，宜服平消片或金星散或参石丸或芪仙丸。

2. 症状逐渐加重，伴有与恶心及饮食没有关系的呕吐，可服仙脑丸，并服平消片或芪仙丸或补金丸。

仙脑丸：

鱼脑石 60 克 石决明 60 克 生牡蛎 60 克 蜂房 60 克
蛇蜕 60 克 全蝎 60 克 威灵仙 120 克

制服法：共研为细粉，水泛为丸，如绿豆大小。每次服 3～6 克，1 日 3 次，黄芪煎水送下。

方义：鱼脑石、石决明、威灵仙、生牡蛎驱风止痛，柔肝熄风，镇静透脑；蜂房、蛇蜕、全蝎消炎解毒，清温软坚，化痰止痛。各药综合一起，可软坚化痰，熄风镇静，驱风透脑，消炎解毒，止痛清温。

3. 病情发展，头痛剧烈，并发呕吐及视力减退时，宜服蚕菊汤加减，并服平消片或补金丸。

蚕菊汤：

生石决明 20 克 僵蚕 10 克 蝉蜕 10 克 木贼 12 克
生鳖甲 15 克 蜂房 10 克 钩藤 10 克 牡蛎 15 克 丝瓜络
15 克 全蝎 10 克 晚蚕砂 10 克 甘菊花 30 克 地龙 12 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用生石决明、牡蛎、木贼、晚蚕砂柔肝熄风，滋阴潜阳；僵蚕、蝉蜕、生鳖甲、钩藤、丝瓜络驱风止痛，清温解毒，活络透脑；蜂房、全蝎、甘菊花、地龙清脑止痛，软坚消积。综合各药，能驱风止痛，熄风透脑，活血化瘀，软坚消炎，扶正祛邪。

4. 病情继续发展，症状复杂时，根据不同症候辨证用药。

①症见头晕，头痛，目眩，耳鸣，视力下降，烦躁易怒，恶心，呕吐，咽干颧红，健忘，失眠，四肢麻木，抽搐震颤，项强昏迷，眼目斜视或上吊，舌强失语，大便干燥，小便黄。舌红少苔，脉弦细数。此肝肾阴虚，肝风内动。治宜柔肝熄风，滋阴补肾，明目潜阳，用蚕明汤加减煎服，并服平消片或参石丸或芪仙丸。

蚕明汤：

生地 24 克 山药 12 克 山萸肉 12 克 野菊花 30 克
牡蛎 30 克 木贼 10 克 茯苓 10 克 丹皮 10 克 全蝎 10 克
僵蚕 20 克 蜂房 10 克 石决明 30 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 3 次服。

方义：方中木贼、牡蛎、野菊花、石决明柔肝熄风，潜阳明目；山药、山萸、丹皮、生地、茯苓滋阴补肾；全蝎、僵蚕、蜂房解毒熄风，软坚散结。诸药配伍，有明目潜阳、滋阴补肾、柔肝熄风、软坚散结、镇静止痛之效。

②症见头晕，头痛，口干多饮，耳聋目眩，视力障碍，精神不振，腰膝酸软，形寒肢冷，气短懒言，四肢无力，肌肤痿软，阳痿多尿。舌质淡，舌苔白润，脉细弱无力。此属脑虚髓少，脾肾阳虚。治宜填髓补脑，温补脾肾，用地床汤加减，并服平消片或参石丸或茶贞丸。

地床汤：

补骨脂 30 克 附子 10 克 桂枝 10 克 仙茅 15 克 仙灵脾 15 克 蛇床子 10 克 僵蚕 15 克 蜈蚣 2 条 熟地黄 24 克 山萸肉 12 克 丹皮 10 克 山药 12 克

煎服法：同前。

方义：熟地黄、山萸肉、仙茅、补骨脂、仙灵脾填髓补脑，强肾滋液；附子、桂枝、山药、蛇床子温补脾肾；僵蚕、蜈蚣、丹皮熄风解痉，活血化瘀。各药配合，有填髓补脑、温补脾肾、活血化瘀、熄风解痉、软坚散结之效。

③症见头晕目眩，头痛耳鸣，视力障碍，恶心呕吐，肢体麻木，或半身不遂，谵语神昏，喉中痰鸣，咳嗽痰多，舌强不语，身重乏力。舌胖大，舌苔白腻，脉弦滑。此属痰迷心窍，痰湿阻络。治宜涤痰开窍，祛痰通络，用金胆汤加减煎服，并服平消片或参石丸或补金丸。

金胆汤：

清半夏 15 克 胆南星 10 克 白术 10 克 郁金 15 克 全蝎 10 克 威灵仙 30 克 瓜蒌 20 克

煎服法：同前。

方义：清半夏、白术健脾燥湿；郁金、胆南星开窍醒脑，涤痰熄风；瓜蒌止咳祛痰，通络消滞；蜈蚣、全蝎、僵蚕清热解毒，软坚消滞。综合诸药，有健脾燥湿、止咳祛痰、通络消滞、开窍醒脑、熄风镇静、清热解毒、软坚消积之效。

④症见头痛头胀，似锥刺裂，面红耳赤，口苦咽干，喷射样呕吐，唇暗色紫。舌苔白或黄苔，脉弦数。此属瘀毒内结，肝胆郁热。治宜清热解毒，泻火化瘀，用地胆汤加减，并服平消片或芪仙丸或补金丸。

地胆汤：

龙胆草 10 克 野菊花 30 克 牡蛎 30 克 生地 30 克
木通 10 克 当归 15 克 赤芍 15 克 全蝎 10 克 清半夏 15 克
蜂房 10 克 大黄 6 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用龙胆草、野菊花、大黄泻肝清火，解毒润燥，利便导滞；当归、牡蛎、赤芍活血化瘀，软坚散结；生地、木通导火下行；清半夏燥湿止呕；全蝎、蜂房消坚祛积。各药相配，有清热解毒、泻火化瘀、软坚散结、解郁润燥、除湿止呕、润便导滞之效。

5. 病情进一步发展，出现癫痫样抽搐或瘫痪，或性格改变，可服蚕菊汤加减与菊黛丸，并服平消片或补金丸或芪仙丸。

菊黛丸：

木贼 12 克 牡蛎 15 克 甘菊花 30 克 石决明 18 克
夜明砂 9 克 蜂房 9 克 全蝎 9 克 蛇蜕 9 克 山豆根 9 克
青黛 18 克

制服法：共研为细末，水泛为丸，如绿豆大小。每次服 3~6 克，1 日 3 次，黄芪煎水送下，或温开水送下。

方义：方中用木贼、牡蛎、甘菊花、石决明、夜明砂柔肝熄风，清脑明目；蜂房、全蝎、蛇蜕、青黛、山豆根清热解毒，消炎解郁，软坚化瘀，消瘤止痛。各药综合，有驱风镇静、清脑除烦、消炎解毒、软坚化瘤、柔肝熄风之效。

6. 病情严重时，病人肢体感觉异常，或感觉消失，或走路不稳，或眩晕，或有倾倒感，或嗜睡或昏迷，或精神错乱，或情绪淡漠，或进行性痴呆，宜服磁龙丸与平消片，或用加减蚕菊汤，并服平消片或补金丸或芪仙丸。

磁龙丸：

蜂房 30 克 全蝎 30 克 蛇蜕 30 克 菊花 90 克 木贼 30 克 牡蛎 60 克 石决明 60 克 僵蚕 30 克 地龙 30 克 瓦楞子 60 克 磁石 60 克 朱砂 30 克 山豆根 60 克 杭白芍 30 克 白矾 30 克 郁金 60 克

制法：共研为细粉，水泛为丸，如绿豆大小。每次服 3~6 克，1 日 3 次，黄芪煎水送下，或温开水送下。

方义：蜂房、蛇蜕、山豆根、全蝎消坚破积，清热解毒；木贼、郁金、牡蛎、地龙、菊花、石决明、僵蚕透脑熄风，柔肝解郁，止痛通络；瓦楞子、杭白芍、磁石、朱砂、白矾镇静解痉，消炎除烦。诸药配合，有驱风熄风、镇静解痉、透脑解郁、消炎解毒、除烦安眠、活血化瘀、软坚破积、止痛通络之效。

【典型病例】

周某，女，20 岁。西安市结核病医院护士。

初诊：1965 年 1 月 11 日。

主诉：头痛 1 年。

现病史：患者于 1964 年因头痛抽搐到第四军医大学第一附属医院手术治疗。病理检查（病理号 68964）：星形细胞瘤（蛛网膜部）。术后头痛如故。同年 11 月和 1965 年 1 月 3 日大抽风 2 次，抽时嘴歪（向左），吐白沫，眼斜，手稍握，小便失禁，每次约十余分钟，醒后如常。大便正常。以往曾患胸膜炎，头痛。家族无同样病史。

舌象：舌红苔白。

脉象：弦数。

方药：

（1）平消片每次服 8 片，1 日 3 次。

(2) 木贼 15 克 牡蛎 15 克 菊花 30 克 石决明 15 克
夜明砂 10 克 蜂房 10 克 蛇蜕 10 克 瓦楞子 15 克 僵蚕
10 克 地龙 10 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

复诊：服药后症状无变化，抽风未发作。舌脉同上。

(1) 原方继服 6 剂。

(2) 平消片继服。

三诊 (1 月 23 日)：服药后，症状同前。原方继服。

四诊 (2 月 3 日)：头痛头晕减轻，其他无异常。原方
继服。

五诊 (3 月 4 日)：症状逐渐减轻，精神佳。原方继服。

六诊 (4 月 10 日)：症状同上。原方继服。

七诊 (4 月 17 日)：症状同上。原方继服。

八诊 (4 月 20 日)：症状逐渐消退，精神好转。

方药：

(1) 木贼 120 克 牡蛎 300 克 夜明砂 300 克 野菊花
300 克

共研为细粉，水泛为丸。每服 6 克，1 日 3 次。

(2) 平消片每次 8 片，1 日 3 次。

九诊 (4 月 5 日)：前天抽风 1 次，症状较前减轻，睡
眠、饮食及大小便均正常。舌红，苔白，脉弦缓。

方药：

(1) 平消片继服。

(2) 木贼 15 克 牡蛎 15 克 菊花 30 克 石决明 20 克
蜂房 10 克 夜明砂 10 克 僵蚕 10 克 蛇蜕 10 克 蜈蚣 1 条
煎服法同前。

十诊 (5 月 29 日)：症状已除，舌苔白，脉缓。原方继

服。

十一诊(6月17日):各症状均已消失,精神好转,舌脉均正常,准备上班,改服丸药。

方药:

(1) 蜂房 30 克 全蝎 30 克 蛇蜕 30 克 菊花 90 克
木贼 30 克 牡蛎 60 克 石决明 60 克 僵蚕 30 克 地龙 30 克
瓦楞子 60 克 山豆根 60 克 杭白芍 30 克 磁石 60 克
朱砂 30 克 白矾 30 克 郁金 60 克

制法:共研为细粉,水泛为丸,如绿豆大小。每次服 6 克,1 日 3 次,开水送服。

(2) 平消片每次 8 片,1 日 3 次。

十二诊(6月26日):已上班工作,一切正常。继服丸药,平消片继服。10月10日又配上方丸药 1 料,与平消片一起继服至 12 月底停药。

1970 年结婚,1971 年生一子,产后身体健康。

1977 年 10 月 9 日随访身体健壮。

1991 年 6 月 1 日西安市结核病防治所一同志带小孩来诊,谈周健壮。

甲状腺肿瘤

甲状腺肿瘤约占所有癌瘤的 1%,在地方性结节性甲状腺肿流行的地区,甲状腺癌尤其低分化癌发病多。在中医学里有“瘰疬”、“石瘰”、“血瘰”、“气瘰”、“颈间生瘤”等名称。甲状腺瘤分滤泡型与乳头状两种,恶变率约有 10% 左右。结节性甲状腺肿亦可发生恶变。甲状腺癌分乳头状腺癌、滤泡状腺癌、未分化癌、髓样瘤及恶性淋巴瘤等。甲状

腺腺瘤多见于青壮年妇女，合并囊肿时称甲状腺囊腺瘤，合并功能亢进时称功能亢进性腺瘤，有乳头状改变时称乳头状腺瘤。

乳头状腺瘤、滤泡癌多见于妇女，未分化癌多见于男性。甲状腺恶性肿瘤中多数为癌，亦有少数为肉瘤。

【病因病机】

多由于内伤情志，忧思悲怒，肝郁不舒，气滞血瘀，痰湿凝聚而成。

【症状】

甲状腺内有圆形或椭圆形包块，有包膜，表面光滑，可随吞咽上下移动。一般为单发性结节，生长缓慢，如出现囊性改变、瘤内出血或恶变，则结节凹凸不平，活动受限，并出现食道与气管压迫症状，咽下与呼吸困难，声音嘶哑。伴功能亢进者消瘦，心慌，出汗，乏力，口干，纳差，颈下包块逐渐增大，质地变硬，晚期溃烂出血，疼痛剧烈。

总之，甲状腺肿块小硬，单发结节突然增大，尤其小儿发现甲状腺结节，多为瘤。一般的甲状腺结节经治疗后不见缩小，或甲状腺肿块固定，坚硬如石，凹凸不平，不随吞咽上下活动，肿块迅速增大，外形不整，出现压迫症状，或伴有颈中、颈下胸锁乳突肌旁淋巴结肿大，应考虑癌变，亦不应排除结核。

【检查】

同位素扫描：肿块显示为冷结节。

X线检查：甲状腺内散在钙化点，气管受压移位。结合活检以助确诊。

舌象：舌暗淡，或暗灰，或暗紫，或绛。苔薄白或腻，或少苔，或黄苔。

脉象：弦滑或沉细无力，或弦数，或滑数。

【类证区分】

结节性甲状腺肿：多见于中年以上的妇女，病程长，可达数十年。双侧多发结节，大小不等，有囊性改变，质较软，表面光滑，随吞咽上下移动，无压迫症状，但巨大肿块有重坠感。发生癌变时，发展较快，肿块迅速增大，向周围组织浸润，肿块坚实，活动度差，颈部静脉怒张，呼吸困难，声音嘶哑，并会出现气管旁淋巴结、颈深淋巴结、锁骨上淋巴结转移。

亚急性甲状腺炎：多发于中年妇女。一般发病前出现上呼吸道感染，轻度发热，精神紧张，出汗，震颤，血沉快，白细胞升高。局部疼痛，吞咽时较甚，放射到耳部。甲状腺双侧增大，质硬，有压痛，约经数日至2月可自愈。

慢性淋巴性甲状腺肿：多发于40岁以上的妇女。甲状腺增大，硬如橡皮样，偶有粘液水肿，多无自觉症状。

慢性木样甲状腺肿：为纤维增生性疾病，见于50岁以上妇女，病程长。甲状腺增大，质木硬，保持甲状腺原有外形。进行性发展，常出现呼吸紧迫困难，声音嘶哑。

【论治】

1. 发现甲状腺肿小质硬，单发结节突然增大，即可用平消片或金星散或参石丸或参术片内服。

2. 肿块迅速增大，凹凸不平，吞咽受限时，宜服平消片或金星散，或早期手术切除结合放疗、化疗，并配合软坚散结、清热解毒、活血化瘀、燥湿祛痰、理气止痛之中药，用海元汤加减煎服。

海元汤：

海藻 12 克 昆布 12 克 土元 10 克 全蝎 10 克 益母

草 30 克 瓦楞子 30 克 山豆根 10 克 料姜石 60 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服，日服 1 剂。

方义：海藻、昆布软坚散结；益母草行气活血，消肿解毒，清肝明目，通经止痛；土元、全蝎消坚破积；瓦楞子、山豆根、料姜石清热解毒，健脾和胃，降逆镇冲。各药综合配伍，有软坚散结、消肿消炎、理气止痛、通经活络、活血化瘀、清热解毒、燥湿祛痰作用。

3. 症状复杂，按出现的不同症候辨证用药。

①症见颈部单发瘰块，质地较硬，随吞咽上下，活动受限，胸闷咳嗽，多痰，吞咽时局部憋痛。舌暗灰，舌苔薄白或腻，脉弦滑。此属痰湿凝聚。治宜理气消瘰，软坚散结，化痰解凝，用海莲汤加减煎服，并服平消片或金星散或补金丸。

海莲汤：

海藻 12 克 昆布 12 克 牡蛎 30 克 夏枯草 30 克 土贝母 10 克 黄药子 10 克 半枝莲 30 克 清半夏 15 克 陈皮 10 克 料姜石 60 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用海藻、昆布、牡蛎、夏枯草、清半夏化痰散结，软坚消瘰；土贝母、黄药子、半枝莲清热解毒；陈皮、料姜石理气健胃，降逆镇冲。诸药综合配伍，有软坚散结、清热解毒、化痰消炎、理气止痛、燥湿消肿、解凝消瘰之效。

②症见心悸气短，全身乏力，自汗盗汗，声音嘶哑，口干欲饮，头晕目眩，纳少，二便失调。舌暗淡少苔，脉沉细无力。此属气血双亏，毒热未尽。治宜益气养血，败毒散

结，化瘀软坚，用茺菊汤加减煎服，并服平消片或金星散或补金丸或参朮片。

茺菊汤：

生黄芪 60 克 北沙参 30 克 夏枯草 30 克 山豆根 10 克 重楼 10 克 黄药子 10 克 瓦楞子 30 克 仙灵脾 15 克 野菊花 30 克 昆布 15 克 生地黄 30 克 料姜石 60 克

煎服法：同海莲汤。

方义：方用生黄芪、北沙参益气养阴；黄药子、重楼、野菊花清热解毒；生地黄、山豆根补血凉血，消肿软坚；瓦楞子、仙灵脾、昆布软坚散结，温阳消瘕，且昆布含碘丰富，是制造甲状腺激素的原料之一，能增强甲状腺机能，加强抗癌活力；料姜石、夏枯草降逆镇冲，消炎化瘤。诸药综合配伍，有补气养血、清热解毒、软坚散结、消肿消炎、降逆和胃、温阳消瘤、扶正祛邪的效果。

③症见肿块坚硬，疼痛肿胀，推之不移，有压痛，胸闷气憋，心烦易怒，头痛目眩，呼吸困难，吞咽障碍。舌暗紫，脉弦数。此属肝郁气结，气滞痰凝。治宜疏肝理气，化痰散结，用星布汤加减煎服，并服平消片或金星散或补金丸或参朮散。

星布汤：

夏枯草 30 克 天南星 10 克 海藻 10 克 昆布 10 克 柴胡 12 克 郁金 15 克 瓦楞子 30 克 黄药子 10 克 制香附 15 克 全蝎 10 克 蜂房 10 克 料姜石 60 克

煎服法：同海莲汤。

方义：本方以柴胡、郁金疏肝理气；夏枯草、黄药子清热解毒；天南星、料姜石化痰散结；海藻、昆布软坚消瘕；瓦楞子、全蝎、蜂房、制香附理气止痛，消肿消坚。综合各

药，有疏肝理气、软坚散结、清热解毒、化痰消瘿、消肿止痛之效。

④症见肿块凹凸不平，发展迅速，灼热疼痛，头痛，呼吸困难，咽下不畅，有时恶心，声音嘶哑，咳嗽，咯黄痰，大便干燥，小便黄。舌质绛，舌苔黄，脉滑数。此属肝火郁滞，毒热蕴结。治宜清肝解郁，化毒散结，用菊元汤加减煎服，并服参楼散或平消片或补金丸。

菊元汤：

重楼 10 克 山豆根 10 克 鱼腥草 30 克 瓦楞子 30 克
白花蛇舌草 60 克 野菊花 30 克 郁金 15 克 柴胡 15 克
全蝎 10 克 土元 10 克 料姜石 60 克

煎服法：同海莲汤。

方义：本方用重楼、山豆根清热解毒，消肿止痛；鱼腥草、全蝎、土元止咳祛痰，消坚化痰；白花蛇舌草、野菊花利便泻火，解热解烦；郁金、柴胡清肝解郁；瓦楞子、料姜石软坚散结，降逆和胃。诸药综合，有清肝解郁、软坚散结、消肿止痛、活血化痰、清热解毒、利便泻火、和胃降逆之效。

4. 无论肿块的部位、性质、证候如何均可进行按摩。通过自我按摩颈部皮肤不同部位的经络，可起到信息传导作用，反馈调节颈前后区病灶肿块边缘，使颈部持续保持气流通的良好状态，从而促进机体新陈代谢，消肿止血，消积导滞，达到自然消除肿块的目的。

方法：由本人自行操作，任意取立位，微闭双眼，放松，然后用单手手掌面或四个手指的指面紧贴于颈部，尽量用力作横向及上下来回匀速按摩，两手交替进行，使按摩热量逐渐深透，整个颈部有明显温热感及松弛、松爽惬意感。

每次操作 15 分钟，每日清晨 1 次。

【典型病例】

屈某，男，56 岁。蒲城县机砖厂干部。

初诊：1980 年 9 月 13 日。

主诉：颈部出现包块伴暗哑 4 年。

现病史：1976 年“左侧甲状腺癌”手术后转移为右侧“甲状腺癌”，声音嘶哑。舌有瘀斑，舌苔白，脉细濡。

方药：

(1) 昆布 12 克 海藻 12 克 牡蛎 30 克 郁金 15 克
瓦楞子 30 克 山豆根 10 克 蜈蚣 2 条

6 剂，水煎服。一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

(2) 平消片：每次 4 片，日服 3 次。

复诊（12 月 15 日）：上药继服至今，自觉甲状腺包块缩小，纳可，声音仍嘶哑。

方药：

(1) 上方加重楼 10 克，黄药子 15 克，水煎服。

(2) 平消片：每次 8 片，每日 3 次。

三诊（1981 年 4 月 4 日）：病情同上。

方药：

(1) 上方加僵蚕 10 克，水煎服。

(2) 平消片：每次 8 片，每日 3 次。

四诊（7 月 6 日）：病情同前。

方药：

(1) 上方加土贝母 15 克，水煎服。

(2) 平消片：每次 8 片，每日 3 次。

五诊（8 月 24 日）：药后肿块缩小 2/3，且已变软。

方药：

(1) 上方加全蝎 10 克，水煎服。

(2) 平消片：每次 8 片，每日 3 次。

六诊（1982 年 3 月 7 日）：症状已消，包块缩小。

方药：

(1) 初诊方加全蝎 10 克，料姜石 60 克，继服。

(2) 平消片：每次 8 片，每日 3 次。

七诊（5 月 16 日）：一切正常。

方药：

(1) 上方加枳壳 12 克继服。

(2) 平消片：每次 8 片，每日 3 次。

八诊（11 月 21 日）：病情稳定，包块已消失。

上方继服，平消片继服。

九诊（1983 年 9 月 11 日）：近来腹泻，一切稳定。

方药：

(1) 初诊方加苡米 30 克，焦山楂 30 克，诃子肉 15 克。

6 剂，水煎服。

(2) 平消片：每次 8 片，每日 3 次。

十诊（1984 年 4 月 16 日）：近日咽喉肿痛。

方药：

(1) 初诊方加牛膝 15 克，元参 30 克，水煎服。

(2) 平消片：每次 8 片，每日 3 次。

十一诊（1987 年 4 月 8 日）：近来头昏，有时头痛，血压 150/110 毫米汞柱。

方药：

木贼 12 克 牡蛎 30 克 菊花 10 克 石决明 30 克 海藻 12 克 山豆根 10 克 补骨脂 30 克 五味子 10 克 诃子肉 15 克 瓦楞子 30 克 生杜仲 15 克

6 剂，水煎服。

经治疗后症状消失，病情稳定。

白 血 病

白血病又称血癌，属于中医学“血癌”、“热癆”、“急癆”、“虚癆”、“癆瘵”、“癥瘕积聚”等范畴，是造血系统的恶性肿瘤，为常见的癌瘤病之一。发病年龄以小儿和青年人为多，急性白血病中粒细胞型和单核细胞型 20 岁到 30 岁的病人较多，男性多于女性。白血病的特征是骨髓产生大量的幼稚细胞，这些幼稚白细胞起不了应有的作用，并且由于幼稚白细胞产生过剩，挤掉了制造红细胞和血小板的位置，因此引起贫血和出血。

常见的白血病有粒细胞型白血病、淋巴细胞型白血病和单核细胞型白血病。骨髓红细胞系统的幼稚红细胞恶性增生称为红血病，幼稚红细胞与幼稚粒细胞（幼稚单细胞）恶性增生称红白血病。

【病因病机】

内因是机体抗病能力不足。易感因素是热毒蕴酿导致脏腑功能失调，肾阴不足，肝阳火旺，肝阴不足，血液亏伤。外因是风寒暑湿燥火六淫及环境污染，病毒侵入，饮食与药物使用不当，使用骨髓毒性化学物质，起居失常，过度劳累，或因其他疾病诱发等。可归纳为遗传因素、电离辐射、苯类化学物质、感染因子等。

遗传对人类白血病起到重要的作用，染色体异常者白血病发病率高，某些免疫性疾病与白血病发病也有联系。而白血病发病率随生育胎数的增加而减少。在患白血病儿童的兄

弟姐妹中，Down 氏综合征的发病率增加。

放射工作者特别易患白血病。核反应、临床治疗、临床诊断三种类型的辐射，都是白血病的主要原因。发病率和辐射剂量有直接关系。辐射产生的白血病主要是非淋巴细胞型白血病，从受辐射到出现白血病之间的潜伏期从 2 年至 3 年甚至 20 年或更长时间，潜伏期的长短随年龄和辐射量的不同而不同，年龄小的潜伏期短，辐射量大潜伏期短。从事核工业的工作人员，核试验的军事人员，以及居住在受核试验尘埃污染地区的人群中，白血病发病率高。

化学物质可产生对骨髓细胞的毒性，有致白血病的作用。苯具有强烈的致白血病作用，苯诱发粒细胞型白血病，在过去接触苯的工作人员中，白血病的发病率明显增加。除了苯以外，有机溶剂也可能有致白血病作用。化学家白血病发病率增加且可能出现骨髓染色体断裂。有机碳氢化合物有致白血病作用，接受农业化学物质与从事碳氢化合物有关职业者，其子女白血病与其他癌症的发病率高，化工工人与其子女染色体断裂增加。

烷化剂药物具有致白血病的作用，临床医生在为病人制定治疗方案时，必须考虑到诱发癌症的危险性。

感染是白血病的一个主要病因。目前对传染性疾病使用的免疫方法可能会把动物肿瘤病毒（如脊髓灰质炎病毒死疫苗中的 SV-40 病毒和黄热病疫苗中家禽造血白细胞组织增生病毒）污染物带到人体，因而增加白血病的发病率。在医院内和白血病患者接触的人群中，白血病发病率增加。

【症状】

眩晕心悸，形瘦体倦，食少嗜卧，面色不华，贫血，出血，发热，骨蒸，齿衄、舌、口腔肿痛、溃烂或溃疡，皮肤

疱疹、紫斑，骨痛，尤其是胸骨痛较明显。肝脾肿大，淋巴结肿大，血液和骨髓中出现大量不成熟的异常的白细胞（幼稚白细胞），并浸润到周围血液和组织中，白细胞计数可能增高或在正常范围甚至低于正常，全身各组织及器官都有异常增生的血瘤细胞浸润，骨髓、肝、脾和淋巴腺较甚。

急性白血病一般起病急，变化快，常有突然寒战，发热，贫血与出血，面色苍白，肝脾肿大，在浸润至关节时出现关节酸痛、肌肉疼痛，发病前两年 15% 的小儿及 5% 的成年人曾出现关节肿胀、发热、红斑、疼痛与体温上升等症状。关节疼痛呈现弥漫性锥刺样痛，侵犯部位绝大多数是双侧下肢，其次为上肢与脊椎。关节疼痛症状有的随白血病缓解减轻，有的在减轻以后更为严重，X 线检查关节无异常。因为成熟的白细胞减少，常有口腔和咽喉感染或发生肺炎，亦可出现头痛头晕，食纳减少。

慢性白血病早期多无症状，一般起病缓，开始多为疲倦乏力，贫血，脾脏肿大，淋巴结肿大，随着病情发展，身体日益衰弱，容易外感发热，出血等。慢性粒细胞型白血病多发生于青壮年，肝脾肿大明显；慢性淋巴型白血病多发生于老年人，淋巴结肿大明显；慢性单核型白血病容易出现咽喉感染和皮肤浸润。

【预防】

增强体质，预防病毒感染，严格控制 X 线诊断，尽量避免不必要的放射线检查，严格控制放射治疗，避免接触苯类化学物质及其他有害的物质，合理使用烷化剂等抗肿瘤药物。

【论治】

对白血病（各种类型的白血病）的治疗，均可用平消片

或补金丸或参楼散或参术丸或重参丸或蛋矾散内服，并可结合补肝肾、养气血、清热解毒、滋阴凉血、健脾理气、活血化瘀、补气补血等品辨证用药。

参术丸：

重楼 30 克 仙鹤草 300 克（熬膏干燥） 莪术 60 克
苦参 300 克（熬膏干燥） 天南星 30 克 土元 30 克 黄芪
300 克（熬膏干燥） 料姜石 100 克

制用法：共为细粉，水泛为丸。每服 3~6 克，1 日 3 次，温开水送下。

方义：本方用重楼、苦参清热解毒，健脾燥湿，利窍止痛。据现代研究苦参具有提高白细胞介素的作用。实验证明，白细胞介素在机体衰老变化中起重要调节作用，可参与机体的免疫调节，异常则引起造血功能和免疫功能的异常，苦参能使下降的白细胞介素上升而使之接近正常水平。用莪术、土元消坚破积，活血化瘀。土元又称虻虫或地元，是消坚化瘀的要药，实验证明有抑制白血病白细胞的作用。用天南星、料姜石降逆镇冲，镇静解痉，化瘀散结。用黄芪、仙鹤草补气托里，强心滋养。八种药综合配伍，有清热解毒、活血化瘀、理气止痛、健脾燥湿、软坚散结、补血益气、提高免疫、防癌抗癌之效。

重参丸：

红人参 50 克 苦参 100 克（熬膏干燥） 重楼 20 克
莪术 50 克 冰片 10 克

制用法：上药各为细粉，合在一起研匀，装胶囊。每服 3~6 粒，1 日 3 次，温开水送下。

方义：方中用苦参、重楼燥湿健脾，和胃理肠，消肿止痛，清热解毒；莪术活血化瘀，软坚散结；冰片开窍启闭，

醒脑强心；红人参补气宁心，扶正祛邪。五味药综合配伍，有活血化瘀、软坚散结、和胃健脾、补气养血、消肿止痛、宁心理气、醒脑启闭、扶正祛邪等功效。

1. 白血病初起宜补气解毒，可用平消片或参楼散或青参丸与蛋矾散。

青参丸：

蜂房 45 克 生黄芪 300 克 丹参 300 克 全蝎 45 克
红人参 45 克 当归 300 克 蛇蜕 45 克 山豆根 90 克 白芍 120 克 生地黄 300 克 大青叶 120 克

制法：共为细粉，水泛为丸。每服 3～9 克，1 日 3 次，温开水送服。

方义：本方用全蝎、蜂房、山豆根、蛇蜕清热解毒，消积软坚，活血化瘀；生黄芪、生地黄、红人参补气养阴；丹参、当归、白芍补血养血，止血凉血；大青叶清热解毒。诸药综合配伍，有补血养血、软坚化瘀、凉血止血、清热解毒、消积散结之效。

2. 病情发展，症候复杂时，宜根据出现的症候辨证用药。

①症见高热或低热，头晕头痛，眼目昏花，口干咽痛，自汗盗汗，腰酸腿软，五心烦热，疲倦无力。舌红或暗红，舌苔薄黄，脉细数或沉数。此属肝肾阴亏，毒热内蕴。治宜清热解毒，滋补肝肾，用补金丸或参楼散或参术丸，并用地菊汤加减。

地菊汤：

生地黄 30 克 银柴胡 20 克 女贞子 30 克 龟板 30 克
野菊花 30 克 重楼 10 克 鳖甲 30 克 大青叶 30 克 半枝莲 30 克 粉丹皮 10 克

煎服法：一剂药煎2遍，兑在一起，分2次服。

方义：本方用生地黄、龟板、鳖甲、女贞子滋补肝肾，软坚散结，龟板、鳖甲滋阴潜阳，可增强免疫功能，抑制急性淋巴型白血病；粉丹皮、银柴胡清热凉血，消炎除烦；重楼、野菊花、大青叶、半枝莲清热解毒，消除蕴热。诸药综合，有滋补肝肾、清热解毒、软坚散结、补血活血、生血消炎之效。

②症见衄血，吐血，咯血，便血，皮下出血，子宫出血，低热，盗汗乏力，心悸气短，纳差失眠，五心烦热。舌绛尖红，舌苔白或薄黄，脉细数或沉细数。此属阴虚血热，迫血妄行。治宜养阴清热，凉血止血，用参楼散或补金丸或重参丸，并用地青汤加减。

地青汤：

生地黄 30 克 大青叶 30 克 旱莲草 30 克 女贞子 30 克
仙鹤草 60 克 生地榆 30 克 生黄芪 60 克 茜草根 20 克
露蜂房 10 克 料姜石 60 克

煎服法：一剂药煎2遍，兑在一起，分2次服。

方义：本方用生地黄、大青叶、女贞子清热解毒；旱莲草、仙鹤草、生地榆、茜草根止血活血，滋补强心，软坚化瘀；生黄芪、料姜石补气止汗，降逆镇冲。黄芪多糖（ASS）有广泛的生物活性及抗癌活性。各药配伍，有养阴清热、凉血止血、化瘀解毒、滋补强心、扶正驱邪之效。

③症见面色苍白无华，唇淡少血，头晕耳鸣，心悸气短，失眠多梦，面干发枯，自汗盗汗，腰凉肢冷，甲无血色，皮下出血，衄血咯血，纳差便溏。舌淡苔薄或苔白，脉虚大或沉细无力。此属血虚气亏，心脾两虚。治宜补气养血，宁心健脾，用补金丸或参楼散或重参丸，并用杞参汤加

减。

杞参汤：

红人参 10 克 生地黄 30 克 五味子 20 克 枸杞子 30 克 当归 15 克 白芍 20 克 黄芪 60 克 白术 20 克 炒枣仁 30 克 料姜石 60 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，分 2 次服。

方义：本方用红人参、生黄芪补气养血，扶正祛邪；枸杞子、五味子壮腰健肾，滋阴敛汗，坚筋骨补精气；生地黄、当归、白芍养阴凉血，活血止血；白术、炒枣仁、料姜石宁心健脾，软坚散结，降逆开胃。诸药配伍，有补气益血、宁心健脾、活血化瘀、软坚散结、补肾强腰、止血敛汗之效。

④症见血枯脱发，或久病发枯而稀，或化疗后脱发。舌淡少苔，脉虚。此属肾阴亏，血液伤。治宜补肾养血，凉血生发，用平消片或参楼散或金星散或重参丸，并用地莲汤加减。

地莲汤：

桑椹子 20 克 生地黄 30 克 旱莲草 30 克 何首乌 30 克 山慈菇 30 克 料姜石 60 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，分 2 次服。

方义：桑椹子、生地黄、何首乌滋补肾阴，凉血生发；山慈菇、旱莲草、料姜石清热解毒，健脾和胃，补肾润发。上药综合一起，有补肾益血、凉血润发、解毒消肿、健脾和胃、补养乌发之效。

⑤症见视物不清，头脑发胀，眩晕，检查白细胞增多，幼稚细胞上升。舌红少苔，脉弦细或尺脉滞。此属血枯毒盛，肝风上扰。治宜清热解毒，柔肝熄风，养血明目，用平

消片或金星散或蝉仙散或参楼散，并用慈明汤加减。

蝉仙散：

生黄芪 100 克 仙鹤草 100 克 蝉蜕 50 克 蜈蚣 30 克
土鳖虫 50 克 牛蒡子 70 克

制服法：共为细粉，每次服 2~6 克，1 日 3 次，温开水送下。

方义：本方用生黄芪、仙鹤草扶正祛邪，促进生长，这两种药均有抗癌活性；蝉蜕宣肺开音；土鳖虫消坚化瘀；牛蒡子、蜈蚣熄风解毒，蜈蚣又称天虫，有明显的抗癌活性。诸药配伍，能软坚散结，清热解毒，强心滋养，活血化瘀，宣肺开音，熄风解痉，增强免疫功能。

慈明汤：

山慈菇 30 克 野菊花 30 克 草决明 15 克 枸杞子 20 克
补骨脂 30 克 木贼草 12 克 料姜石 60 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方以山慈菇、野菊花清热解毒；枸杞子、补骨脂补精气，壮腰膝，增强免疫功能；木贼草、草决明、料姜石柔肝熄风，降火明目。诸药配伍，能清热解毒，柔肝熄风，壮腰补肾，滋阴降火，消炎明目，增强免疫。

⑥症见发热时作，食纳呆滞。舌红少苔，脉细数。此属热毒内蕴，肾阴亏，相火旺，血液耗伤。治宜清热解毒，养阴泻火，软坚散结，消炎活血，用平消片或参楼散，并用慈地汤加减。

慈地汤：

山慈菇 30 克 生地黄 30 克 板蓝根 30 克 料姜石 60 克
全蝎 10 克 蜂房 10 克 蝉蜕 10 克 地龙 10 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：方中山慈菇、板蓝根清热解毒；生地黄滋阴补血；蜂房、全蝎、蝉蜕、地龙泻热除毒，清除蕴热，软坚散结，疏通血脉；料姜石降逆和胃。诸药配伍，有清热解毒、软坚散结、养阴泻火、滋阴补血、消炎活血之效。

⑦症见皮肤红点红斑，似痘似疹。脉数或濡数，舌红绛，苔少或苔腻。此属体虚火旺，内蕴毒深。治宜透疹，泻热解毒，用平消片，并用蛋矾散或参楼散，亦可用平消片配合蛋矾散或慈葛汤加减：

慈葛汤：

山慈菇 30 克 粉葛根 20 克 紫草根 30 克 牛蒡子 15 克 金银花 30 克 贯众 15 克 全蝎 10 克 料姜石 60 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，分 2 次服。

方义：是方用粉葛根、紫草根透疹解毒；用山慈菇、牛蒡子、金银花、贯众、全蝎、料姜石泻火解毒，消除蕴毒，软坚散结。各药配伍，能透疹解表，清热解毒，泻火祛瘀，消除蕴毒，健脾和胃。

⑧症见发热，头晕，口、舌、齿龈咽喉溃烂肿痛，尤其化疗后发热头晕，口舌、齿龈、咽喉溃烂肿痛。舌苔薄或苔腻，脉细数。此属阴虚毒盛，虚火上炎。治宜化腐消肿，解毒消炎，用参楼散或蝉仙散或青倍丸内服，并用青甘散含咽，同时也可配合使用慈蒡汤加减。

慈蒡汤：

山慈菇 30 克 山豆根 10 克 补骨脂 30 克 生地黄 30 克 女贞子 30 克 牛蒡子 20 克 大青叶 30 克 蝉蜕 100 克 料姜石 60 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，分 2 次服。

方义：本方以山慈菇、山豆根、大青叶、蝉蜕、料姜

石、牛蒡子消炎消肿，牛蒡子有较强的抗癌活性；补骨脂、生地黄、女贞子滋阴补肾。各药综合，有清热解毒、消肿消炎、滋阴补肾、化痰泻火、增强免疫之功效。

青倍丸：

苦参 60 克 青黛 30 克 蓬莪术 30 克 五倍子 20 克
十大功劳叶 60 克

制服法：各为细粉，合在一起研匀，水泛为丸。每次服 3~6 克，1 日服 3 次，温开水送下。

方义：本方用苦参燥湿祛痰，平喘利尿；青黛、十大功劳叶清热解毒，消炎保肝，杀菌抗癌；蓬莪术、五倍子止血敛肺，行气破血，消积止痛，收涩升白。五味药综合配伍，能清热解毒，活血化瘀，燥湿健脾，平喘敛肺，行气祛痰，消炎止痛，利尿通肠，升白强心，保肝抑癌。

青甘散：

青黛 30 克 珍珠（煨）1 克 雄黄 3 克 煨甘石 3 克
硼砂 3 克 冰片 1 克 白矾 3 克

制用法：各为细粉，合在一起，共研极细粉，每次少许撒于患处，1 日 1~2 次。

方义：本方用煨甘石燥湿消肿，收敛生肌，甘石成分为氧化锌，有防腐收敛保护创面之功；硼砂、青黛化腐消痰，抑菌解毒；雄黄、白矾清热解毒，消肿燥湿；冰片、珍珠化湿消风，散郁强心，清热止痛，保护粘膜。诸药互相配伍，有化腐解毒、消肿消炎、燥湿止痛、生肌祛腐、保护粘膜、促进溃疡愈合之效。

3. 病人出血较甚，贫血严重，宜用平消片或重参丸或补金丸或参楼散，并用蛋矾散内服或芪胶汤加减。

芪胶汤：

生黄芪 30 克 大党参 15 克 丹参 30 克 蜂房 10 克
蛇蜕 10 克 全蝎 10 克 茜草 15 克 阿胶 30 克 山豆根 10
克 当归 15 克 赤芍 15 克 龟板 15 克 鳖甲 15 克 紫草
根 15 克 紫花地丁 25 克 生甘草 15 克（血压高时生甘草
用 3 克）

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：此方以生黄芪、大党参、生甘草补气健脾，益血扶正；蜂房、全蝎、蛇蜕软坚化痰，消肿散结；丹参、茜草、紫草根活血消积，祛瘀生新；阿胶、当归、赤芍药、龟板、鳖甲滋阴软坚，补血止血；山豆根、紫花地丁清热解毒。各药配在一起，有补气养血、凉血止血、健脾益肾、软坚散结、清热解毒、祛瘀生新、滋阴填髓之效。

4. 病人高热，出血严重，宜服平消片或参石丸或金星散或参楼散或重参丸，并用犀甲汤加减。

犀甲汤：

犀角 6 克（或水牛角 20 克） 银柴胡 12 克 龟板 15
克 鳖甲 15 克 麦门冬 15 克 大青叶 30 克 元参 15 克
山梔 15 克 太子参 30 克 地骨皮 30 克 生地黄 30 克 生
石膏 30 克 阿胶 30 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用犀角（或水牛角）、生地黄、阿胶凉血止血；银柴胡、龟板、鳖甲滋阴养血；大青叶清热解毒；麦门冬、地骨皮、元参、山梔养阴除蒸；太子参补气；生石膏泻热。诸药相伍，有补血滋阴、凉血止血、清热解毒、泻热除蒸之效。

5. 病人疲倦乏力，萎靡不振，肝脾肿大，淋巴结肿大，

宜用平消片或重参丸或参楼散或参石丸，并用芪豆汤加减或芪丹汤。

芪豆汤：

生黄芪 60 克 元参 30 克 云苓 75 克 白术 20 克 当归 30 克 山豆根 10 克 生地黄 30 克 炒枣仁 30 克 大青叶 30 克 生甘草 30 克（血压高时改用 3 克） 红大枣 10 枚

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方以生黄芪、白术、茯苓、红大枣补气健脾；元参、当归、生地黄滋阴补血，养血生血；山豆根、大青叶清热解毒；炒枣仁安神养心。诸药综合配伍，有补气补血、健脾益阴、清热解毒、养心安神、扶正祛邪之效。

芪丹汤：

生黄芪 60 克 丹参 30 克 蜂房 10 克 蛇蛻 10 克 全蝎 10 克 山豆根 10 克 花蕊石 30 克 瓜蒌 30 克 当归 30 克 红人参 10 克 生甘草 3 克 红大枣 10 枚

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：方中用生黄芪、红人参、生甘草、红大枣补气健脾，扶正祛邪；蜂房、蛇蛻、山豆根、全蝎软坚祛瘀，解毒散结；丹参、当归活血养血，祛瘀生新；花蕊石消瘀止血；瓜蒌利气化痰。各药综合起来，有活血养血、祛瘀生新、利气化痰、清热解毒、软坚散结、补气健脾、扶正祛邪之效。

6. 白血病患者肝脾肿大，出血多，宜用平消片或参楼散或茶贞丸，并用三甲紫豆汤加减。

三甲紫豆汤：

紫草根 15 克 阿胶 30 克 山豆根 10 克 瓦楞子 30 克 龟板 15 克 鳖甲 15 克 生牡蛎 30 克 枳壳 12 克 生黄芪

30 克 太子参 30 克 生甘草 3 克 红大枣 10 枚

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：此方以紫草根、阿胶养血止血；山豆根清热解毒；瓦楞子、龟板、鳖甲、生牡蛎滋阴软坚，攻坚消积；枳壳宽中快膈；生黄芪、太子参、生甘草、红大枣补气健脾。诸药综合，有滋阴软坚、养血止血、补气健脾、宽中快膈、清热解毒、攻坚消积、增强免疫功能之效。

7. 白血病疲倦乏力，萎靡不振，疼痛，昏迷，气喘心慌，肝脾肿大，宜用重参丸或参石丸或茶贞丸或平消片，并用参酥丸与三甲紫豆汤加减。

参酥丸：

苦参 20 克 雄黄 10 克 制乳香 5 克 制没药 5 克 蜈蚣 3 条 全蝎 10 克 硼砂 10 克 血竭 5 克 冰片 6 克 蟾酥 1.5 克 麝香 0.5 克

制服法：各研细粉，合在一起研匀，面糊为丸，如绿豆大。每次服 2~4 丸，1 日 2 次，温开水送下。

方义：方中以苦参、雄黄燥湿杀虫，祛痰抗癌；蟾酥、麝香、冰片强心兴奋，消散肿瘤；乳香、没药、硼砂、血竭止痛软坚；蜈蚣、全蝎消积镇痛。各药合在一起，能兴奋强心，燥湿杀虫，解毒消肿，活血化瘀，软坚消积，镇痛散结。

【典型病例】

张某，女，24 岁。宝鸡渭滨区马钢厂职工。

初诊：1972 年 10 月 8 日。

主诉：低热、乏力 4 月余。

现病史：患者于 1972 年 6 月发热，心口胀（一般体温是在 37°C ~ 38°C 之间），疲倦乏力，头晕，心慌，出汗，有时鼻出血（约 2 周）。6 月 21 日住外院检查：脾肋下 14 厘

米，肝肋下 3.6 厘米，血色素 6.4 克/分升，红细胞 311 万/立方毫米，白细胞 44600/立方毫米，中性 20%，淋巴 70%，原粒 20%，早幼粒 40%，中幼粒 28%，晚幼粒 21%，嗜酸晚粒 3%。并在内科作骨髓细胞检查，诊断为慢性粒细胞型白血病。于同年 10 月 6 日出院。患者曾于 1966 年因卵巢肿瘤行手术切除。

检查：形体消瘦，面色苍黄不华，发干。舌质绛，舌苔白，脉细数无力。

治法：清热解毒，健脾理气，补肝肾，养气血，滋阴止血，软坚散结。

方药：

(1) 平消片：每次 6 片，1 日 3 次。

(2) 黄芪 30 克 丹参 30 克 当归 15 克 蜂房 9 克 蛇蜕 9 克 山豆根 12 克 瓦楞子 30 克 阿胶 30 克 龟板 15 克 鳖甲 15 克 茜草 15 克 生甘草 6 克 大枣 10 枚

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。连服 6 剂，休息 1 天再服。

复诊（11 月 15 日）：精神好转，热已退，食纳增加，舌苔白薄，脉缓。治宗上法。

方药：

(1) 蜂房 9 克 蛇蜕 9 克 全蝎 9 克 山豆根 10 克 瓦楞子 15 克 花蕊石 15 克 丹参 30 克 黄芪 30 克 党参 15 克 当归 15 克 生地 30 克 地榆 15 克 生甘草 6 克 大枣 10 枚

煎服法：同前。

(2) 平消片：每次 8 片，1 日 3 次，温开水送下。

三诊（1973 年 1 月 10 日）：精神好转，食量正常，于

去年12月15日上班工作，无任何不适感觉。舌苔薄，脉和缓。查血色素7.5克/分升，白细胞5050/立方毫米，中性63%，淋巴34%，单核20%，酸性1%，血小板81000/立方毫米。治疗仍宗上法。

方药：

(1) 黄芪30克 当归15克 丹参30克 生地黄30克 山豆根15克 蜂房9克 全蝎9克 人参须9克 川芎9克 阿胶15克 地榆15克 生甘草9克 大枣6枚

煎服法：同前。

(2) 平消片：每次8片，1日3次。

四诊（4月20日）：一切正常，无任何异常感觉，舌脉正常。查血色素8.4克/分升，白细胞8800/立方毫米，中性65%，淋巴34%，单核1%，血小板102000/立方毫米。

方药：

(1) 熟地黄24克 黄芪30克 党参15克 丹参30克 山药12克 山萸肉12克 山豆根9克 丹皮9克 云茯苓9克 泽泻9克

煎服法：同前。

(2) 平消片：每次8片，1日3次，温开水送下。

1973年6月22日询访：上班工作以来，一切正常。嘱其继服平消片。

淋 巴 瘤

淋巴瘤是发生在淋巴网织细胞的恶性肿瘤，一般位于淋巴结内，主要症状是淋巴结肿大。因淋巴网织细胞广泛分布，淋巴瘤亦可发生在淋巴结外或发生于淋巴系统以外，如

肺、胃、肠道、肝、骨、睾丸等部位。

淋巴瘤分为何杰金氏淋巴瘤（HL）与非何杰金氏淋巴瘤（NHL）两大类。任何年龄均可发病，多发于青壮年，15～30岁、50～70岁为两个高峰。男性发病高于女性。

恶性淋巴瘤可侵犯所有淋巴结与淋巴组织，因此表现多种多样，病情变化复杂。中医学对淋巴瘤早有认识，记载的“恶核”、“石疽”、“痰核”、“失荣”等证候多类似恶性淋巴瘤，由于病变部位皮色不变，不痛不痒，故属阴疽的范畴。

【病因病机】

先天免疫缺陷或后天免疫缺损，情志郁结，病毒感染，寒痰凝滞，毒陷阴分或寒凝气结，风热血燥，病发五脏，脏腑亏损，气血亏虚，阳气不足，为阴为里，属冷属虚。

【症状】

主要为无痛性淋巴结肿大。何杰金氏淋巴瘤以颈淋巴结、锁骨上淋巴结肿大为主，非何杰金氏淋巴瘤以膈肌上下多处淋巴结肿大为主。淋巴结外或淋巴系统以外，可扩展至口咽、胃肠道、皮肤、骨、睾丸等处。

全身症状有发热、夜间盗汗，体重下降。初起淋巴结微肿，皮色不变，日久逐渐增大，推之不移，坚硬如石，经半载一载，开始隐痛，气血衰弱，形体消瘦。有的病人肿块破溃，渗流血水，溃后难敛。有的病人肿块冷肿如莲。

有的病人脾脏肿大，有的病人肝内有弥漫性或结节性浸润致使肝脏肿大。病至晚期，因纵隔淋巴结显著增大致使上腔静脉阻塞，肿块生长在硬膜外可压迫脊髓，浸润骨髓致骨髓功能不全，并出现进行性贫血，白细胞与血小板减少。

【检查】

实验室检查、X线检查、淋巴结活检、病理检查可助确

诊。

舌象：舌暗红或紫或绛。苔白或黄腻或燥。

脉象：涩或弦或细弱。

【论治】

1. 对恶性淋巴瘤的治疗，根据专方专药的原则，在发病初起可在平消片、金星散、参石丸、补金丸、参楼散等方剂中选出一种与雄藻丸并服。

雄藻丸：

僵蚕 30 克 牡蛎 30 克 雄黄 15 克 昆布 30 克 蜈蚣 15 克 土白术 60 克 硼砂 30 克 土鳖虫 30 克 瓦楞子 30 克 莪术 60 克 海藻 30 克 料姜石 60 克

制法：共为细粉，水泛为丸。每次服 3 克，每日服 3 次，温开水送下。

方义：本方用牡蛎、瓦楞子软坚散结；雄黄、土白术温阳解毒，燥湿消结；海藻、昆布、硼砂消坚破积，消炎消肿；僵蚕、蜈蚣、土鳖虫化痰解凝，开结疏风；莪术活血化瘀；料姜石降逆镇冲。诸味药综合配伍，有软坚散结、清热解毒、温阳燥湿、化痰解凝、降逆镇冲、活血化瘀、消肿止痛之效。

2. 病情发展，必须保护胃气，温阳开结，活血化瘀，祛痰解凝，软坚散结，清热解毒，用黄藻汤加减煎服，并服平消片或补金丸。

黄藻汤：

海藻 12 克 白术 20 克 苦参 30 克 黄药子 10 克 瓦楞子 30 克 牡蛎 30 克 山豆根 10 克 料姜石 60 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：此方用海藻、牡蛎、瓦楞子软坚散结；山豆根、

黄药子清热解毒；白术、苦参、料姜石燥湿和胃，降逆镇冲，保护胃气。诸药相配，有清热解毒、活血化瘀、软坚散结、燥湿祛痰、健脾和胃之效。

3. 病情进一步发展，症状复杂时，可根据不同症候辨证用药。

①症见颈项耳下肿核，不痛不痒，皮色不变，坚硬如石，形寒怕冷，体倦无力，面苍不华。舌苔白，脉沉细。此属寒痰凝滞毒结。治宜温化寒凝，祛痰解毒，用地藻汤加减煎服，并服平消片或金星散或补金丸。

地藻汤：

熟地黄 30 克 昆布 12 克 海藻 12 克 瓦楞子 30 克
麻黄 6 克 白芥子 10 克 皂角刺 10 克 天南星 10 克 夏枯草 30 克 炮姜 10 克 料姜石 60 克

煎服法：同黄藻汤。

方义：方用熟地黄、夏枯草温养散结，补血消肿，滋阴润燥；麻黄、皂角刺、天南星温化解凝，祛痰逐寒；昆布、海藻、瓦楞子软坚散结；白芥子、炮姜、料姜石化痰消坚。诸药配伍，有温化寒痰、软坚散结、消肿解毒、滋阴温养之效。

②症见胸闷胁胀，脘腹结痛，胸脘不舒，形体消瘦，体倦乏力，颈项、腋及腹股沟出现累累肿块，皮下硬结。舌淡红有瘀点瘀斑，舌苔白，脉沉弦或弦滑。此属气郁痰结，恶核石疽。治宜疏肝解郁，软坚散结，用金藻汤加减煎服，并服平消片或金星散或参术片。

金藻汤：

郁金 15 克 海藻 15 克 当归 15 克 夏枯草 30 克 白芍 30 克 柴胡 12 克 红蓼子 30 克 瓦楞子 30 克 土贝母

12克 清半夏 15克 料姜石 60克

煎服法：同黄藻汤。

方义：本方以柴胡、郁金、白芍疏肝解郁；海藻、夏枯草软坚散结，柔肝消肿；当归、红蓼子、土贝母活血化瘀，养血攻坚，消炎止痛；瓦楞子、清半夏、料姜石化痰降逆，健脾和胃。各药相伍，有疏肝解郁、软坚散结、消肿消炎、活血化瘀、柔肝止痛、健胃理脾之效。

③症见口干身热，皮肤瘙痒，皮肤红斑、硬结，大便燥结，小便色黄量少。舌质红，舌苔白或黄，脉沉细数或细弦。此属血虚内燥，风热瘀毒，毒热内盛。治宜养血润燥，疏风解毒，用贞藻汤加减煎服，并服平消片或金星散或补金丸或参楼散。

贞藻汤：

女贞子 30克 生地黄 30克 海藻 12克 当归 15克
昆布 12克 白芍药 30克 重楼 10克 土鳖虫 10克 天花粉 30克 郁李仁 30克 料姜石 60克

煎服法：同黄藻汤。

方义：方中女贞子、生地黄、当归养血润燥，生津凉血；昆布、海藻软坚散结；白芍药、土鳖虫、天花粉、重楼清热解毒，活血化瘀；郁李仁、料姜石软坚润便，降逆和胃。各药配在一起，有养血润燥、疏风解毒、凉血生津、软坚散结、清热解毒、活血化瘀、降逆和胃之效。

④症见五心烦热，腰酸腿软，午后潮热，疲倦无力，胃呆纳少，形体消瘦，面苍不华，全身多处淋巴结肿大。舌红或舌淡红，舌苔薄白，脉细数无力。此属气血双亏，肝肾阴虚。治宜补气养血，滋补肝肾，用芪藻汤加减煎服，并服平消片或补金丸或参楼散。

芪藻汤：

生黄芪 60 克 熟地黄 30 克 土贝母 10 克 夏枯草 30 克 海藻 12 克 昆布 12 克 红蓼子 30 克 料姜石 60 克

煎服法：同黄藻汤。

方义：此方以生黄芪补气；熟地黄养血补血，滋养肝肾；土贝母、夏枯草、海藻、昆布软坚散结，解毒消积；红蓼子活血化瘀；料姜石降逆和胃。诸药综合一起，有补血益气、滋补肝肾、活血化瘀、软坚散结、扶正祛邪之效。

【典型病例】

王某，男，52 岁，临潼区人，干部。

初诊：1981 年 3 月 4 日。

主诉：颈部发现包块 3 年。

现病史：患者 1978 年发现两侧颈部包块，1980 年到临潼区医院切片活检为“淋巴肉瘤”，化疗 1 个疗程，因副作用大而停止。现腹股沟淋巴结及腋窝淋巴结肿大，低热，一般为 37.2℃ 左右，心慌，颈下包块疼痛。舌暗紫有瘀斑，舌苔白，脉弦细尺濡。治宜软坚散结，疏肝解郁，清热解毒，理气止痛。

方药：

(1) 昆布 12 克 海藻 12 克 牡蛎 30 克 丹参 60 克 瓦楞子 30 克 山豆根 10 克 山慈菇 30 克 郁金 15 克

(2) 平消片：每次 8 片，1 日 3 次，温开水送服。

复诊（3 月 11 日）：服药后纳可，口干，其他无异常。

方药：

(1) 上方加天花粉 30 克，煎服法同上。

(2) 平消片：每次 8 片，日服 3 次。

三诊（3 月 18 日）：药后精神好转，热已除，右侧颈部

包块疼痛减轻，腹股沟淋巴结及腋下淋巴结包块均疼痛消失，二便调。

上方加减共服 432 剂，平消片 110 瓶，共来诊 70 次，症状消除，包块消失。1989 年 11 月 2 日因中耳炎、耳膜下陷、听力差来诊，前病已愈。1990 年随访健壮。

肾 癌

肾癌多由于忧思郁怒，情志不舒，过度劳累，抵抗力减弱而引起。

发病年龄为 20~70 岁之间，以 40~60 岁较多。男性较女性为多。发展较慢，但是容易转移。

肾癌多来自肾小管上皮细胞，一部分由腺瘤恶变而成，常见于肾的两极，以上极较为常见。肾癌常见症状是血尿，腰痛，腰部或上腹部出现包块。

肾癌主要有两种：一种是癌细胞的胞浆内富含类脂质和糖原的大透明细胞，排列成管状、乳头状和片块状，称为肾腺瘤；一种是癌细胞体积小，胞浆为颗粒状，排列与透明细胞相同。另外还可见到多角形或棱形大小不等、形状不同的未分化细胞。

肾癌主要是通过血行转移至肺、骨等部位，也可向脑或肝转移，或经淋巴转移。

【症状】

肾癌一般初起没有自觉症状，当癌瘤发展，首先出现无痛性血尿。血尿常是间歇性发作，连续尿血几次或是连续尿血几天以后自行停止，经过几天或几十天又发作，尿血反复出现。血尿量很大，多是全程血尿，有时尿中可出现条状血

块。一部分腰部或上腹部出现包块的病人出现腰部疼痛、发热、食欲不振、消瘦、贫血等症状。

上腹部或腰部的包块是肾癌的一个重要症状，多见于小儿肾母细胞瘤（小儿包块常见，但血尿较少）。大部分肾癌病人腰部钝痛，少部分病人是绞痛，有的病人在左侧可发生精索静脉曲张。

血尿、包块、疼痛是肾癌三大征象，一般可能不会同时出现，当癌瘤发展到晚期，才会全部出现。

总之，主要应根据血尿、疼痛及包块等症状，最主要的是根据无痛性间歇性血尿的特征加以判断。

【检查】

一般正常肾脏很难触及，当有癌瘤时，只要仔细进行触摸，有时可以触及，并可进行B超检查、肾造影、CT及细胞学检查以助确诊。

舌象：舌质暗淡或紫。苔白或白腻，或黄腻。

脉象：脉弦或涩或沉细。

【预防】

尽量避免忧思郁怒，加强身体锻炼，增强体质。多吃白萝卜、胡萝卜、韭菜、菠菜、西红柿、芹菜等新鲜蔬菜，多食新鲜水果，长饮绿茶或料姜石水以预防。

【论治】

肾癌宜用平消片或补金丸或碎石丸或芪仙丸，并结合清热解毒、活血化瘀、补肾强腰、养血止血、滋阴利尿、消肿止痛之品辨证用药。

1. 症状初起，小便有血或大量尿血，或尿血反复发作，宜用平消片或补金丸或碎石丸或芪仙丸，结合补肾养阴，止血降火，使用鹤仲汤加减。

鹤仲汤：

仙鹤草 60 克 焦杜仲 30 克 补骨脂 30 克 生地黄 30 克
白茅根 30 克 焦地榆 30 克 知母 10 克 黄柏 10 克
干荷叶 15 克 山慈菇 30 克 料姜石 60 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：此方用仙鹤草、生地黄、白茅根、焦地榆、干荷叶滋阴强心，止血养血；焦杜仲、补骨脂补肾强腰；知母、黄柏、山慈菇、料姜石降火泻热，解毒软坚。各药综合，有补肾滋阴、止血养血、泻热降火、清热解毒之效。

2. 尿血反复发作，腰腹痛，腰部或上腹部出现包块，可服茅地汤，并服平消片或补金丸或破石丸或芪仙丸。

茅地汤：

白茅根 60 克 生地黄 30 克 黄药子 20 克 生苡米 30 克
半枝莲 30 克 半边莲 30 克 小蓟 30 克 猪苓 60 克
全蝎 10 克 蜂房 10 克 仙鹤草 60 克 山豆根 10 克 瓦楞子 30 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方以白茅根、生地黄、小蓟、仙鹤草养阴止血；黄药子、山豆根、蜂房、全蝎、瓦楞子、生苡米清热解毒，燥湿强腰，软坚化痰；半边莲、半枝莲、猪苓利水消肿。诸药综合配伍，有活血止血、燥湿养阴、清热解毒、软坚化痰、利水消肿、补肾强腰之效。

3. 尿血量大，腰或上腹部包块明显并疼痛，发热，食欲不振，消瘦，贫血，可服莪蓟汤加减，并服平消片或补金丸或芪仙丸。

莪蓟汤：

莪术 10 克 大蓟 20 克 小蓟 20 克 三棱 10 克 五灵

脂 10 克 生蒲黄 10 克 三七 10 克 郁金 20 克 蜂房 10 克 全蝎 10 克 元胡 15 克 猪苓 60 克 白芍 15 克 苡米 30 克 龙葵 30 克 料姜石 60 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方用莪术、三棱活血化瘀；大蓟、小蓟止血；五灵脂、生蒲黄、郁金止痛解郁；三七、元胡活血止血，祛瘀止痛；蜂房、全蝎、龙葵清热解毒，消坚祛积；猪苓、白芍、苡米、料姜石燥湿健脾，补肾利水，攻坚破积，清热解毒。诸药综合配伍，有止痛解郁、补肾利水、攻坚破瘀、清热解毒、祛瘀生新之效。

4. 病情进一步发展，出现转移扩散时，按所出现的不同症候辨证用药。

①症见腰部酸痛，精神疲倦，身体虚弱，低热，或术后复发。舌淡红，舌苔薄，脉细滑或沉滑。此属气虚肾亏，邪毒瘀滞。治宜滋肾补气，解毒通淋，用海猪汤加减煎服，并服平消片或补金丸或参石丸。

海猪汤：

生地黄 30 克 补骨脂 30 克 生黄芪 60 克 白术 20 克 海金沙 30 克 党参 30 克 半枝莲 30 克 仙茅 15 克 仙灵脾 15 克 蜂房 10 克 全蝎 10 克 猪苓 60 克 料姜石 60 克

煎服法：同上。

方义：本方用补骨脂、仙茅、仙灵脾壮腰补肾；生黄芪、白术、党参健脾补气；半枝莲、海金沙、猪苓利水通淋；全蝎、蜂房清热解毒；仙鹤草、生地黄、料姜石止血益阴，强心滋补，增强免疫。诸药综合，有补气健脾、壮腰强肾、清热解毒、利水通淋、提高免疫之功。

②症见血尿不止，腰痛剧烈，腰腹部包块增大，发热口渴，纳少，恶心，呕吐。舌暗红，舌苔白，脉滑数或弦数。此属湿热结毒，气血瘀滞，治宜清热利湿，活血散结，用葵蕊汤加减，并服平消片或补金丸。

葵蕊汤：

龙葵 30 克 半枝莲 30 克 猪苓 60 克 黄柏 10 克 小蓟 30 克 仙鹤草 60 克 花蕊石 30 克 全蝎 10 克 蜂房 10 克 重楼 10 克 虎杖 20 克 苦参 30 克

煎服法：同上。

方义：本方以苦参、龙葵、黄柏利湿泻热；全蝎、蜂房、重楼、虎杖清热解毒，消坚散结；小蓟、仙鹤草、花蕊石活血止血，强心滋阴；猪苓、半枝莲利水滋阴。诸药综合配伍，有泻热利湿、解毒散结、活血化瘀、止血养血、软坚散结、清热滋阴之效。

③症见咳嗽气促，口干低热，心悸烦躁，面黄不华，贫血消瘦，身困气短，包块增大疼痛。舌质淡有瘀斑，舌苔白或黄，脉沉细数，或虚大数。此属气血双亏，毒热瘀结。治宜补气养血，解毒化瘀，用芪蛭汤加减，并服平消片或参石丸。

芪蛭汤：

大蒜 20 瓣 黄芪 60 克 猪苓 60 克 全蝎 10 克 蜂房 10 克 半枝莲 30 克 党参 30 克 生地 30 克 白术 20 克 当归 30 克 杏仁 15 克 水蛭 2 克（焙，研末冲） 仙鹤草 60 克 料姜石 60 克

煎法服：同上。

方义：此方用黄芪、党参、白术健脾补气；大蒜、杏仁宣肺止咳；蜂房、全蝎、水蛭化瘀解毒；当归、生地黄、仙

鹤草滋阴补血，活血养血；猪苓、半枝莲、料姜石利水通淋，降逆镇冲。诸药配合，有补气补血、活血化瘀、宣肺止咳、清热解毒、软坚散结、扶正祛邪之效。

【典型病例】

田某，女，24岁，陕西省米脂县人。

初诊：1973年10月26日。

主诉：腰痛3月。

现病史：患者于1973年7月23日在西安市中心医院切除左肾包块，病理诊断为“乳头状腺癌”，伤口愈合后出院。9月21日头昏，睡眠不安甚至失眠，怕惊，食纳呆滞，继之下腹部下坠，排尿困难，尿血，腰痛，到中心医院检查，医生认为是肾癌复发转移至腹腔、子宫，并且认为病人精神异常，嘱服中药，未进行其他治疗。近几日腰痛剧烈，不能伸展，大量尿血，尿急，尿道痛，右侧小腹下坠严重，大便秘结，小便不畅，失眠，纳呆，消瘦，面黄不华。舌绛紫，有瘀斑，苔少，脉细濡。

方药：

(1) 平消片：每次8片，1日3次。

(2) 三棱10克 莪术10克 大蓟30克 小蓟30克
三七10克 蜂房10克 猪苓60克 元胡15克 龙葵30克
生苡米30克 炒枣仁30克 料姜石60克

煎服法：一剂药煎2遍，合在一起，分2次服。

本患者共服平消片100余瓶，汤药200余剂，症状消失，精神好转。

1976年生一小孩，1980年随访，母子健康。

膀 胱 癌

膀胱癌，中医学有“尿血”之称。膀胱癌为泌尿系统的癌瘤之一，一般在血吸虫病流行的国家发病率较高，我国也常见到膀胱癌。50~80岁均有发病，男性较女性为多。

【病因病机】

由于肾气不足，不能摄血，气血双亏，气化不利，湿热邪毒蕴结膀胱而致本病。现代认为多由芳香胺、2-萘胺等化学物质接触时间过长，不注意防护，及吸烟等所引起。

【病理】

多是移行细胞癌或鳞状细胞癌或腺癌。

【症状】

间歇性血尿，或大量无痛性血尿，排尿困难，尿频。血块堵塞尿道时出现溢出性尿失禁，感染后尿痛。

【检查】

根据无痛性血尿、尿频等症状，尿化验、尿液显微镜检查、膀胱镜取组织活检等可助确诊。

舌象：舌淡或暗有瘀斑。苔白或白腻或黄腻。

脉象：沉细或滑数或沉弦。

【论治】

1. 膀胱癌的治疗宜滋肾利湿，补气摄血，清热解毒，消积养血，软坚散结，燥湿利尿，用平消片或茶贞丸或参楼散或补金丸内服，并用茅仙汤加减煎服。

茅仙汤：

白茅根 30 克 补骨脂 30 克 仙灵脾 15 克 仙鹤草 60 克
山豆根 10 克 海金沙 30 克 猪苓 60 克 生地黄 30 克

苦参 30 克 生黄芪 60 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：本方以补骨脂、仙灵脾滋肾纳气；生黄芪、生地黄补气摄血，滋阴养血；白茅根、仙鹤草强心止血；山豆根、猪苓、苦参、海金沙利湿解毒，利水通淋。各药相合，有滋肾利湿、补气摄血、清热解毒、软坚散结、滋阴养血、利水通淋、活血止血之效。

2. 病情进一步发展，应根据不同的症候辨证用药。

①症见无痛性血尿，间歇性发作，腰酸腿软，疲倦无力，头昏眼花。舌质淡红，舌苔白，脉沉细无力。此属肾气亏虚，气不摄血。治宜滋肾益气，收敛摄血，用平消片或茶贞丸或参楼散，并用仙床汤加减煎服。

仙床汤：

蛇床子 15 克 菟丝子 10 克 枸杞子 20 克 生地黄 30 克
山萸肉 15 克 旱莲草 30 克 仙鹤草 60 克 生黄芪 60 克
大党参 30 克 补骨脂 30 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：方内用菟丝子、枸杞子、补骨脂、蛇床子滋肾益气，壮腰强筋；生黄芪、大党参补气摄血；旱莲草、仙鹤草强心益肾，活血养血；生地黄、山萸肉滋阴强肾。十味药相合，有补气摄血、壮腰强肾、活血止血、强心利尿之效。

②症见尿频尿急，尿道灼热，血尿时作，小腹胀满，食欲不振，有时低热。舌苔白腻或黄腻，脉滑数。此为湿热下注，膀胱血淋。治宜清热利湿，解毒通淋，用平消片或金星散（片）或补金丸内服，并用苦根汤加减煎服。

苦根汤：

海金沙 30 克 白茅根 30 克 篇蓄 12 克 瞿麦 12 克

小蓟 30 克 猪苓 60 克 苦参 30 克 全蝎 10 克 露蜂房 10 克 滑石 30 克 生甘草 3 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：此方以海金沙、白茅根、全蝎、露蜂房解毒通淋；篇蓄、瞿麦、猪苓、苦参清热利湿；小蓟、滑石、生甘草泻热除湿，和中消毒。诸药相伍，有清热利湿、解毒散结、利尿通淋、消炎止痛之效。

③症见血尿成块，尿中见腐肉，恶臭难闻，排尿困难，或癃闭堵塞，少腹坠胀，疼痛难忍。舌暗瘀斑，舌苔白或少苔，脉沉弦。此属瘀毒内阻，蕴结膀胱。治宜解毒祛瘀，清热通淋，用金星散（片）或补金丸或参楼散内服，并用水根汤加减煎服。

水根汤：

半枝莲 30 克 白茅根 30 克 龙葵 30 克 苦参 30 克 重楼 10 克 全蝎 10 克 赤小豆 30 克 冬葵子 10 克 露蜂房 10 克 猪苓 60 克 水蛭（焙研冲）6 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：方用重楼、龙葵清热解毒；全蝎、水蛭、露蜂房、冬葵子祛瘀消坚，软坚破积，活血止痛；半枝莲、白茅根、苦参、赤小豆、猪苓利尿通淋，止血利湿。综合诸药，有清热解毒、活血化瘀、软坚散结、攻坚破积、利尿通淋、消肿止痛之效。

【典型病例】

马某，58 岁，干部。

初诊：1989 年 10 月 28 日。

主诉：尿血 2 月。

现病史：患者于 8 月 6 日出现无痛性血尿，在西安医学

院第二附属医院住院，经病理诊断为膀胱移行细胞癌Ⅱ级，即行手术切除，术后膀胱灌注3次，血尿停止。后因全身疲倦无力于9月30日复查，诊为乳头状癌，于10月16日第2次手术切除。近来全身疲倦乏力，腰痛，出现血尿，经复查诊为“膀胱癌”复发。舌质暗红，舌苔黄腻，脉沉无力。

方药：

(1) 白茅根 30 克 生黄芪 60 克 猪苓 60 克 全蝎 10 克 蜂房 10 克 山豆根 10 克 瓦楞子 30 克 料姜石 60 克

(2) 平消片：每次 8 片，每日 3 次，温开水送服。

复诊（11 月 11 日）：病情无变化。

方药：

(1) 上方 12 剂，煎服法同上。

(2) 平消片：每次 8 片，每日 3 次。

三诊、四诊（11 月 25 日～12 月 6 日）：精神好转，腰痛减轻，血尿消失。

方药：

(1) 上方 16 剂，煎服法同上。

(2) 平消片：每次 8 片，每日 3 次。

五诊（12 月 16 日）：病情稳定。

方药：

(1) 上方 6 剂，水煎服。

(2) 平消片：每次 8 片，每日 3 次。

六诊至十七诊（1990 年 1 月 6 日～6 月 27 日）：共来诊 11 次，服汤药 102 剂，症状逐渐消除，精神好转。

方药：

(1) 上方 12 剂，水煎服。

(2) 补金丸（片）：每次 2 片，每日 3 次。

十八诊至三十一诊（7月11日～12月19日）：共来诊14次，服汤药150剂，病情稳定。

方药：

（1）上方12剂，水煎服。

（2）补金丸（片）：每次2片，每日3次。

三十二诊至三十九诊（1991年2月2日～6月5日）：精神好，食纳正常。

方药：

（1）上方12剂，水煎服。

（2）补金丸：每次2片，每日3次。

四十诊至四十三诊（7月29日～10月21日）：共来诊3次，服汤药36剂，症状消失，精神好转。

方药：

（1）上方12剂，水煎服。

（2）补金丸（片）：每次2片，每日3次。

四十四诊至四十七诊（11月11日～1992年1月13日）：精神佳。

方药：

（1）上方12剂，水煎服。

（2）补金丸：每次2片，每日3次。

四十八诊至五十二诊（2月12日～4月18日）：来诊5次，病情稳定，精神好，食纳正常。

方药：

（1）上方12剂，水煎服。

（2）补金丸：每次2片，每日3次。

五十三诊至五十六诊（8月1日～11月28日）：来诊3次，服汤药36剂，一切均好，身体健壮。

方药：

(1) 上方 12 剂，水煎服。

(2) 补金丸：每次 2 片，每日 3 次。

小 儿 病

小儿病辨治概要

一、概述

儿科是研究小儿生长、发育、疾病防治等的一门综合性学科。小儿并不是成人的缩影，有些病症虽然与成人相同，但在诊断和处理上有所不同。

小儿在解剖、生理及病理上有其自己的特点。如在疾病的种类上，成人有五劳、七伤等，小儿没有或极少见；小儿有脐风、脐疮、水痘、惊风、疳积、夜啼、五迟及五软等，成人没有或极少见。小儿除了先天的因素外，一般病因比较单纯，不外乎外感六淫、内伤饮食等。小儿患病之后，寒热虚实，变化迅速，但是一有转机，又易趋康复。因而对于小儿疾病的预防、诊断和治疗等方面，必须进行专门的研究。

中医学上曾有小儿脏腑脆弱、气血未盛、易寒易热、易虚易实等记载。古代称儿科为哑科，因为在幼儿时期，语言未通，疾苦难以诉说，且病情变化急速，稍一不慎，则变化多端。因此，儿科医生必须根据小儿的特点，做好小儿的预防、护理及治疗工作。

小儿如初生的嫩芽，由初生至成人，时时都在发育成长，尤其是3岁以下的小儿更为迅速。古人把这种生机蓬勃发育迅速的机体称为纯阳之体。小儿活泼好动，心跳、脉搏与呼吸较快，加之小儿易患外感热病，多属实证，在病变过程中，容易化火生风，常有发热昏迷、抽搐等症。这是由于小儿的体质特点以阳为用，阳气在生理状态下是全身的动力，在病理状态下是抗病的主力，所以当正邪相斗的时候，常表现为实证。

小儿除了为纯阳之体外，又属“稚阴稚阳”。因为婴幼儿时期，肾气未充，肾阴肾阳（真阴真阳）不足，且脾胃薄弱，影响肾气。《育婴秘诀》说：“……惟肾本虚，为命所关，肝常有余兮，实则生风，脾常不足兮，虚则成疳……”小儿在疾病发展过程中，由于先天后天的不足，邪气亢盛，既易实又易虚。总之，小儿机体柔弱，脏腑娇嫩，阴阳二气均不足。纯阳之体，侧重在机体抗病功能活动方面；稚阴稚阳之体，侧重在机体本身物质不足方面。两者说明小儿体质的特点，在疾病发展过程中有易虚易实两个方面，不能把纯阳理解为纯粹属阳。

小儿年龄愈小，与成人的差别愈多，其发病率亦愈高。1岁以内的小儿，体温常有急剧变化，出现症状多不典型。小儿神经调节机能不足，易受惊吓，胃肠脆弱且狭小，易饥易饱，刺激性食物及药物容易伤害小儿脾胃发生消化紊乱。因此，虽属内科，但在病程和症状的轻重上与成人就有很大的差别。例如急性痢疾，小儿感染后大多数出现高热，甚至昏迷，抽搐易惊，发病急骤而且凶险，这在成人比较少见。同时由于小儿机体柔弱，抗病能力差，因而易患水痘、天花、百日咳、伤寒、肺炎、丹毒、小儿半身不遂（急性脊髓

前角灰质炎)、惊风(包括脑膜炎等多种抽风病)、疳积病及遗尿等多种疾病。但是对猩红热(6~12个月)、白喉(6个月)、麻疹和风疹(4~6个月)等病,有暂时性的免疫力。由于小儿扁桃腺和副鼻窦发育不足,很少发生咽峡炎和鼻窦炎。小儿除了容易患病外,变化亦非常迅速,如调治不当往往造成不良后果。由于小儿稚阳未充,稚阴未长,患病之后邪气易实而精气易虚,并且由于稚阳未充容易出现阴伤阳亢的易热症状。所以,儿科医生对疾病的诊察,必须认真负责,辨证论治,注意变化,而不可粗心大意。

二、诊断特点

小儿疾病要获得合理的治疗,首先要对病情有正确的了解和认识,这就是诊断。诊断是对每一个患儿的疾病性质、发展和转归进行详细的观察、具体的分析、正确的估计,从一般规律中寻找出个别患儿的特殊规律,这样才能做到有的放矢,正确诊断。诊断也要理论联系实际,正确地解释病因和病机,才能制订出可靠的治疗方案。

诊断是一个认识疾病的过程,中医叫作辨证。对于每一种疾病,必须有周密系统的调查(观察),周密系统的研究(思考),才能有正确的论治。辨证是具体地辨别某种疾病过程的矛盾的特殊性,从而掌握这一疾病的本质。论治是根据这一疾病过程的矛盾的特殊性及其本质,规定出解决矛盾的方法(治则立法),并采取解决矛盾的措施(制方用药)。两者相互联系,没有正确的辨证,也就难以拟定出正确的治疗原则和措施。辨证先要区别患儿为外感病或是内伤病,如果属于外感病的范畴,则应当以伤寒六经来辨证,或以温病的卫、气、营、血及三焦系统来辨证;如果属于内伤病范畴,

则应当以脏腑的系统来辨证。把患儿的所有症状、体征按照这些系统分别排列，如咳嗽喘逆属肺，心悸怔忡属心，呕吐呃逆属胃，发热、恶寒、头痛、项强属太阳，往来寒热、胸胁满闷、口苦咽干、目眩心烦、喜呕属少阳。对任何疾病的每一症状、体征，都要用八纲去考察，然后以主要症状为依据进一步深入研究，求得正确的诊断。

中医学诊断的主要内容是四诊和八纲。四诊是诊察过程中的具体做法，也就是望、闻、问、切四种检查方法。它发挥医生的感官作用，如利用眼望，以观察病儿的神色形态；用耳闻，以听取病儿的声音气息；用鼻嗅，以嗅取病儿身上和排泄物的气味；用口问，以探知与疾病有关的情况；用手按切，以触知病儿的脉象及其身体某些部位的变化。四诊从病儿的各方面来观察变化和收集症状，以全面了解和认识病情，它也就是观察病情、搜集有关疾病资料的具体方法。

八纲是阴阳、表里、寒热、虚实。它是对病情的分析、归纳，然后作出判断，用以指导临床治疗。也就是在诊察疾病的过程中，从感性认识提高到理性认识，通过理论的指导，把复杂多变的病情进行归纳、总结，为进一步处理疾病提供依据。

四诊是了解症状的具体方法，八纲是分析病情的理论指导。如果只凭四诊了解病情，没有八纲的分析归纳，就不可能从复杂的病变中掌握主次，辨别真假。四诊与八纲是密切联系，互相为用的。

在临床过程中，“脉因证治”更能理解诊断学的重要性。因为在治病之前，必须先要掌握其“脉因证”，而“脉因证”等情况的掌握，必须通过诊断来体现，也就是必须运用四诊和八纲的诊断方法来了解和分析其“脉因证”，然后才能治

疗。所以说，没有正确的诊断，就不可能真正地认识疾病，治疗上的立法用方、药物的配伍等就都不可能有正确的依据，汗、吐、下、和、温、清、补、消等八法的运用，也就失去了依据。八法的运用是以八纲的归纳来确定的，而药物的寒热温凉、升降浮沉、酸苦辛甘等不同的性味，更要通过八纲才能正确地运用。

任何事物，如果一种矛盾的性质发生了变化，就会影响到其他矛盾的发展。所以诊断必须从整体观念出发，任何一种病症的诊断，都要注意四时气候的变化，人事环境的变迁，病人体质的强弱，脏腑表里的协调，以及神气、色泽、声音、脉搏的变化。小儿一种疾病或症状的出现，都应联系到各个方面来认识，而不是孤立地看人，孤立地看病，孤立地看症。因为人生长在自然界中，他的活动与周围环境是息息相关的，所以，诊断不但要明确人体内部的整体统一性，更要明确外界环境与人体之间的密切关系。正常情况下，人体与外界的一切变化相适应，则发挥其正常功能。如果遇到了剧烈的变化，或人体机能对外界环境不能相适应时，就会因内外失去平衡而发生病变。由此可知，致病的病因，主要是内在因素，外因通过内因而起作用。再从人体本身来说，凡发生病变，从一点可以影响到全面，或是病于内而表现于外，或病变于外而影响及内，五脏六腑，气血表里，都可以相互影响传变。

人体是统一的机体，一旦染病，不但可以在发病部位找到病症，也可以在其他有关部位反映出来。中医学运用四诊、八纲、脏腑、六经、卫气营血及三焦辨证论治，如果离开了这些理论指导，单凭片面的经验或单纯地从表面的症状来治病，那就不得要领，医治不能收效。儿科的诊断也是在

四诊八纲的基础上，根据小儿的特点进行的。我国自北宋以后，儿科就完全向专业方面发展，对于儿科疾病的诊断方法，也就逐渐地趋于全面。总之，儿科的诊断，除了要用检查成人的各种方法外，还要熟悉小儿的生理与病理特点，并综合其他的症候，进行分析、归纳，这样才能全面地正确地了解病情，进行正确的诊断。

三、辨证经验

辨证是治疗的关键，只有正确地辨证，才能为治疗提供合理的依据，临床上才能取效。贾老从医 60 余年，在儿科疾病的辨证上积累了丰富的临床经验，现介绍如下：

形寒发热，有汗或无汗，口渴或不渴，啼哭声亮有泪，舌苔薄白，舌尖红，脉浮数，指纹浅浮而红，为表实热。

发热有汗而热不解，颜面潮红，口渴喜饮，哭声尖锐，有泪不多，小便黄赤而少，大便秘结，舌红，舌苔黄，脉数有力，指纹沉滞而色紫，为里实热。

小儿往来寒热，面色红，烦躁作恶，胃呆纳少，口渴，热退时神清，小便时清时黄，舌苔白而尖边红，脉弦细，指纹隐隐不明，为实热半表半里。

小儿突然发热，面色发黄，胸腹饱满，啼哭皱眉，呕吐或泄泻，吐出或泻出之物气味酸臭，有残渣，苔黄，脉弦数，指纹不活而滞，为伤食发热。

小儿午后发热，面色不华，发热时两颧发红，神疲声微，啼哭少泪，口渴而不多饮，小便正常，舌光少苔或干，脉细数，指纹色淡，为阴虚发热。

小儿发热时颜面发白，四肢不温，睡后出汗，大便溏薄，小便清而多，舌苔白薄，舌质淡，脉沉细无力，指纹沉

而色淡，为阳虚发热。

小儿发热起伏没有定时，颜面色黄，神情安静，饮食正常，大小便正常，舌苔白薄，脉细数，指纹无明显变化，为营卫不和发热。

小儿起病暴急，高热，面色发红，昏迷不醒，抽搐，角弓反张，舌苔黄，脉数，指纹青紫，纹至气关或命关，多为急惊证。

小儿面色萎黄或面色发白，形体消瘦，身体发热或不发热，神倦而胃呆纳少，间歇性地轻微抽搐，舌苔黄干或白腻，脉沉细无力，指纹色青或淡而不明等，多为慢惊证。

小儿发热，涕泪均无，口唇周围色青，四肢冷而不温，神志昏迷，为闭厥证。

小儿脸面发白，汗出，四肢冷，神情呆钝，哭声低哑，睡眠露睛，小便清或小便失禁，脉细弱无力，无热，为脱厥证。

小儿突然抽搐，面色青，四肢冷，喉有痰声，口吐白沫，无发热，大小便失禁，停止抽搐以后一切正常，舌苔无变化，脉沉伏，为痫证。

小儿萎黄病，因营养不良或发育不全（血色素减少）而皮肤苍白，一般病来缓慢，面部虚胖，面色萎黄带白，眼睛不黄，精神萎靡不振，喜吃生米、生菜、菜叶等，口唇及舌色淡，多见于钩虫病（桑叶黄）。

小儿全身皮肤出现萎黄色，多见于败血症，磷或砷中毒，贫血，疟疾，肺闭，或黄疸病属胆道闭塞证者。

小儿黄色鲜明，如橘似金，发热，面赤口渴，胃纳不佳，胃腹疼痛或不舒适，小便短少黄赤如浓茶样，大便秘，舌苔黄，脉洪滑有力，为湿热（阳黄）证。

小儿黄色晦暗，无热畏寒，精神疲倦，食欲不振，口不渴，大便不实，小便淡黄，舌苔白薄，脉迟而细，为湿寒（阴黄）证。

小儿面色皮肤萎黄，眼耳不黄，精神疲倦，唇舌淡白，指甲淡而无华，多见于失血及气血两亏。

小儿皮肤色黄，色泽较淡，眼睛不黄，左腹部有痞块，多是疟疾或疟母。

小儿一过性全身皮肤黄染，开始于手掌及足，为黄皮症，多因吃蜜柑、南瓜、橘子等过多而致。

小儿皮肤色如青铜（古铜），或有黑褐色斑点，为肾经病变，或砒中毒致色素蓄积于皮内所引起，见于小儿硬皮症、糖尿病和砒类中毒症等。

小儿皮肤紫蓝色（发绀），显于口唇及指甲（重症也有延及全身皮肤的），为血液中缺氧，二氧化碳过多，或淤血所致，多见于呼吸障碍或循环障碍。

小儿皮肤肿胀，在硬骨组织的部位（如踝部及足背等处）用指压之凹陷，不随手而起，面色发白或萎黄，精神疲倦，胃纳不佳，大便稀溏，小便清白或淡黄，舌质淡，苔薄，为浮肿虚肿。

小儿皮肤光亮明显，以指压之凹陷，随手即起，或伴发热气急，小便黄赤而量少，舌苔黄腻或白腻，脉细弦而数，为浮肿实肿。

小儿腹大，腹部青筋暴露，精神疲倦，肌肉消瘦，饮食无味，舌苔薄，脉细无力，为单腹胀虚证。

小儿腹膨胀满，有时疼痛，按之坚实，舌苔黄厚，脉实有力，为单腹胀实证。

小儿精神疲倦，面色苍白，曲腰啼哭，腹软，喜热喜

按，按压痛止，四肢欠温，有时泄泻，小便多而清，舌苔白薄，脉迟缓，为寒证腹痛。

小儿烦躁不安，腹痛时拒按，哭声洪亮，面红唇赤，小便黄赤而少，舌苔黄，脉弦，为热证腹痛。

小儿胸满腹胀，痛时压之更甚，面黄，嗳酸，有时伴有吐泻，食欲不振，舌苔厚垢，脉涩不利，指纹滞而不活，为有积腹痛。

小儿腹痛，脐周围明显，有时摸到条状物，痛甚时面色苍白，四肢厥冷，甚则惊厥，痛止时症状消失，一切如常，面部可见到白斑，口唇内侧有小白颗粒，白眼球有青点，舌苔薄如地图，脉沉滞或沉伏，为腹痛有虫。

小儿面黄带白，囟门凹陷，睡眠露睛，神疲倦怠，手足发冷，呕吐，吐出物量少而不臭，舌淡苔薄，脉细无力，指纹青淡，为虚吐。

小儿胸腹胀满，压之皱眉疼痛，面红唇赤，或伴发热，吐出物酸臭较甚，大便秘结，小便少，舌苔黄腻，脉弦滑或数，为实吐。

小儿神倦嗜睡，烦躁不安，皮肤干枯，眼眶凹陷，口渴，饮后即吐，所下尽为稀水，啼哭无泪，小便短少，舌质干，苔薄黄，脉沉细或脉弦数，指纹沉滞等，此为吐泻并作，气血并竭证。

小儿面色萎黄，身体消瘦，四肢无力，腹部喜按，盗汗，大便含有不消化的谷物，无酸臭气，舌苔薄白，脉细软，指纹沉淡，为虚泻。

小儿食欲不振，腹满啼哭，嗳酸，大便气臭色黄，伴有泡沫，舌苔腻垢，脉实而滑，指纹沉滞，为实泻。

小儿面色不华，身体疲倦，食欲减退，下利而次数不

多，里急后重较轻，有时肛门下坠，小便白，舌质淡，舌苔少，为虚痢。

小儿腹痛啼哭，或有发热，口渴，下利次数多，里急后重较甚，粪便粘腻如冻，小便少而色黄，舌苔腻垢，脉滑而数，为实痢。

小儿面色苍白，畏寒，鼻塞，鼻流清涕，咳嗽声音重浊，咯痰色白，舌苔白腻而厚，脉紧，为寒咳证。

小儿面色红赤，不恶寒反恶热，鼻塞，流黄涕，咳声不爽，咯痰色黄稠而粘，舌质红，舌苔黄腻，脉浮，为热咳证。

小儿面色黄而带白，饮食减少，口粘而不渴，痰鸣时咳较甚，咯出稠痰，大便带有粘腻，舌苔厚腻而浊，脉滑，为痰咳证。

小儿呼吸气短而促，气怯，声低息短，稍活动则加重，喘促虚迫，必须引长呼吸才觉畅快，身体发凉而易出汗，吐痰稀薄并伴有泡沫，发作时轻时重，脉弱无力等，为虚喘证。

小儿声粗胸满，呼吸气急，发出喘鸣声，呼音较长，苦闷不安，发作较为剧烈而急，痰浓稠，脉数或脉滑大等，为实喘证。

小儿初起赤红色圆形丘疹，以后变成绿豆大，有圆形水疱（浆较稀），点粒根脚浅薄，大小不匀。色深红的毒重，偏血分；点粒稀、色淡红的毒轻，偏气分。一般参差不齐，一部分结痂，另一部分还是水疱。常发生在颜面、躯干、四肢等部位，有微热。此为水痘。

小儿疹如芥子大（或麻子大），有形无浆，色红，界线分明，疹与疹之间有健康皮肤，色深红带紫的毒重，色淡红

的体虚，先发于面部，次及颈部、躯干、四肢，遍布于全身皮肤，约3~4日后疹退，5~6日落屑，为麻疹。

小儿全身皮肤透发细小朱红色疹点（鲜红的小斑点），融合成片，用指甲划之出现白痕，咽喉红肿疼痛，口唇周围苍白，为丹痧（烂喉痧或称猩红热）。

小儿皮疹色白形尖，大如芥子（白色水晶状的水疱疹），透出于皮肤，此由于汗腺分泌障碍，排泄物郁积所致。如色润晶莹有神的为邪达，为吉；色枯白不泽，空壳稀疏的为气液不足，阴伤之象。常见于高热，炎夏汗出不畅或汗孔闭塞等。此为白痞（疱疹或痞疹）。

小儿疹点细小而散，色淡红，无汁无根脚的，为风痧。

小儿疹大如粟米，形圆，渐渐长大，散在或密集。干的痒痛起白屑，形如癣疥；湿的有水液及脓液渗出，抓痒难忍，黄水浸淫。重的融合成片，皮肤色红，灼热，红晕成片，游走如火丹。急性的灼热、瘙痒，丘疹肿胀，渐变成水疱或脓疱；慢性的因急性经久不愈，反复发作，皮肤肥厚浸润成暗褐色，干燥粗糙。多由于慢性胃肠病、肾脏病及皮肤刺激等引起。此为湿疹。

小儿皮疹隐没无常，痒感颇重，疹块高出皮肤表面，多由于风热邪留血分，或药物引起，为风疹块。

小儿疹点尖红粒小，很快变成小脓疱，多密集而生，几天后干燥成细小鳞屑，多由于暑热遏伏，汗出不畅所致，为痱子。

小儿斑色明显，或稠如锦纹，或成块成片，称为斑。色紫成片为血热，色黑为血败，色青为血有伏热。斑迹不显，细如蚊迹，面色极淡，病属虚寒，为阴斑；斑迹明显，色泽鲜明，病属实热，为阳斑。初起呈轮形小丘疹，生小疱渐向

四周扩展，中央渐落而愈，瘙痒最甚，多发生于大腿内侧及臀部的，为顽癣症。初现糠秕状丘疹，色白而有光泽，搔之落屑，渐向周围蔓延增大，为钱币状或轮状，如两斑连合而成地图状，多发于肘关节、膝关节、颈部及头处的，为干癣症。丘疹初起，黄赤色或褐色，粟粒大小，为苔癣。皮肤干燥肥厚如鳞皮，多发于1~2岁的小儿，在四肢背面尤其在膝盖或肘关节部较多的，为鱼鳞癣症。

上述各种辨证方法，均贯穿着中医学的阴、阳、表、里、虚、实、寒、热。例如，区别疾病的类型，是以阴代表不足、衰弱；阳代表有余、强盛。划分病变的部位及浅深，是以表代表偏于外，里代表偏于内。分辨病邪的性质，是以寒代表怕冷、身寒、喜温、沉静（不等于安静如常），热代表怕热、身热、喜凉、烦躁。辨别邪正的盛衰，是以虚代表正气虚，实代表邪气实。但是八纲的运用并不是孤立的，而是互相联系的，是以邪正斗争来表明病情的变化。

四、治疗特色

贾老在下放长安期间，治愈了许许多多的患儿，临床中取得了奇效，享有“长安小儿王”之赞誉。其对儿科的治疗经验，可谓珍中之珍，奇中之奇，确有其独到及精专之处，很值得后辈学习及进一步探讨。

1. 一般说来，凡小儿表实热，可用麻黄汤，或大青龙汤、小青龙汤。里实热，可用大承气汤，或小承气汤、调胃承气汤。半表半里热，可用小柴胡汤、大柴胡汤。

2. 小儿伤食，发热时间长，可用楂钙散。厌食，精神萎靡不振，用大黄干姜散。

3. 小儿伤食，腹部发胀，触之有硬块，或呕吐，或腹

泻，惊烦不安，盗汗，用二甲姜薄散。腹泻，可用泽泻白术汤。

4. 小儿阴虚发热，可用甲骨汤。

甲骨汤：

地骨皮 15 克 龟甲 15 克 麦冬 12 克 天冬 12 克 人参 6 克 青蒿 9 克 当归 15 克 白芍 12 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 茶杯。1~3 岁的小儿，分 6 次服；3~6 岁的小儿，分 5 次服；6~9 岁的小儿，分 4 次服；9~12 岁的小儿，分 3 次服。每隔 6 小时服 1 次。

5. 小儿阳虚发热，可用加减补中益气汤。

补中益气汤：

黄芪 30 克 党参 9 克 升麻 3 克 白术 9 克 当归 9 克 陈皮 9 克 柴胡 12 克 生草 3 克

煎服法：同甲骨汤。

6. 小儿营卫不和，发热，用桂枝汤。

7. 小儿急惊证，发热抽搐，用麻翘石膏汤，或用大青叶 30 克煎水当茶饮。

8. 急惊后脑部疼痛厉害，背和四肢酸痛，恶心呕吐，抽搐不安，加服蝎蚕珀牛散，或青蝉散。

青蝉散：

大青叶 30 克 蝉蜕 30 克

制服法：共研为细粉。1 岁以内的小儿，每次服 0.3~0.6 克；1~3 岁的小儿，每次服 0.6~0.9 克；3~6 岁的小儿，每次服 0.9~1.2 克；6~9 岁的小儿，每次服 1.2~1.5 克；9~12 岁的小儿，每次服 1.5~1.8 克。1 日服 3 次，温开水送下。

9. 急惊，昏迷不醒，头向后背，口张不开，脖颈强直，高热谵语，烦躁不安，发惊抽搐，可用银葛桂枝汤。

10. 小儿慢惊证，抽搐，一般用参桂散。

参桂散：

丹参6克 山萸肉3克 枸杞子3克 土白术3克 干姜3克 红人参3克 炒枣仁9克 元肉3克 补骨脂3克 生黄芪6克 附子3克 生甘草3克

制服法：共研为细粉。1岁以内的小儿，每次服0.15~0.3克；1~2岁的小儿，每次服0.3~0.6克；3~6岁的小儿，每次服0.6~0.9克；6~9岁的小儿，每次服0.9~1.2克；9~12岁的小儿，每次服1.2~1.5克。1日服3次，温开水送下。

11. 慢惊病儿，身体虚弱，或久病不愈，或出疹出痘以后，或误服过凉药物，呕吐腹泻，可先服椒姜散，接着服参桂散。

椒姜散：

黑胡椒15克 炒干姜15克 上元桂15克 丁香15克
制服法：共研为细粉。服法同参桂散。

12. 慢惊病儿，气血大损，精神已亏，非常瘦弱，用加味理中地黄汤。

加味理中地黄汤：

熟地黄15克 当归6克 山萸肉6克 枸杞6克 炙黄芪9克 补骨脂6克 白术9克 肉桂3克 干姜3克 炒枣仁9克 党参6克 炙甘草3克 生姜6克 大枣3枚 核桃（打碎）2枚

煎服法：一剂药煎2遍，兑在一起，约煎取1茶杯，再用附子1.5克煎水1盅掺入。1岁以内的小儿，分5次服；

1~3岁的小儿，分4次服；3~6岁的小儿，分3次服；6~9岁的小儿，分2次服。1日2次。

13. 小儿闭厥证，高热面红，气粗谵语，烦躁不安等，可用紫雪丹，或用清营汤。

14. 小儿闭厥，神昏，昏睡，面色垢滞，呼吸鼾声，微热，痰闭等，可用苏合香丸。

苏合香丸：

苏合香油 45克 安息香膏（丁香、安息香各为末，用无灰酒5合熬膏） 薰陆香 15克 沉香 3克 檀香 3克 麝香 30克 龙脑 15克 木香 3克 香附 30克 朱砂 30克 犀角 30克 萆薢 30克 诃子肉 30克

制法：后11味药共研为细末，将安息香膏、苏合香油与诸药末和匀，炼蜜为丸，如芡实大，朱砂为衣，蜡壳护封。每服1丸。一方加白术，去檀香、萆薢、诃子肉。一方有白术，无诃子肉。一方无萆薢，有白术。

15. 小儿闭厥，伴有高热，用至宝丹。

至宝丹：

生乌犀屑 30克 生玳瑁屑 30克 琥珀（研） 6克 朱砂（研飞） 30克 雄黄（研细） 4.5克 龙脑 4.5克 麝香 4.5克 牛黄（研） 1.5克 金箔银箔各 15张（研细）

制法：用安息香 30克，炖化，和诸药为丸，每丸重3克，金箔银箔为衣，蜡护。每服1丸，研末，温开水送下。

16. 小儿脱厥证，嗜睡乏力，面色灰白，口鼻气冷，凶陷目凹，四肢发冷，粪便稀，尿少，为阳气暴脱，用参附龙牡汤。

参附龙牡汤：

附子 9 克 龙骨 15 克 牡蛎 15 克 人参 6 克 白芍 9 克 炙草 3 克 炮姜 9 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 茶杯。1~3 岁的小儿，分 6 次服；3~6 岁的小儿，分 5 次服；6~9 岁的小儿，分 4 次服；9~12 岁的小儿，分 3 次服。每 4 小时服 1 次。

17. 小儿脱厥，高热起伏，面色苍白，四肢发冷，出汗多，神昏似睡，为阴阳两脱，用参芪龙牡汤。

参芪龙牡汤：

人参 9 克 麦冬 15 克 五味子 9 克 附子 9 克 黄芪 30 克 炙草 6 克 龙骨 15 克 牡蛎 15 克

煎服法：同参附龙牡汤。

18. 小儿脱厥，肢冷，汗出，气促神衰，面白，舌淡，用加减可保立旭汤。

可保立旭汤：

黄芪 30 克 党参 15 克 白术 12 克 当归 15 克 白芍 15 克 山萸肉 12 克 炒枣仁 18 克 枸杞子 15 克 破故纸 9 克 核桃 3 枚（捣）

煎服法：同参附龙牡汤。

19. 小儿痫证（癫痫），用磁朱白金散。

磁朱白金散：

磁石 60 克 朱砂 30 克 白矾 30 克 郁金 60 克 清半夏 60 克 赭石 60 克

制服法：共研为细粉。1~3 岁的小儿，每次服 0.3~0.45 克；3~6 岁的小儿，每次服 0.45~0.9 克；6~9 岁的小儿，每次服 0.9~1.5 克；9~12 岁的小儿，每次服 1.5~

3克。1日服3次，温开水送下。

20. 小儿痫证发作次数多，可用龙蜂散或妙圣丹。

龙蜂散：

龙衣（蛇蜕皮）7.5克 蜂房15克 白矾15克 郁金15克

制法：共研为细粉。1岁以内的小儿，每次服0.15～0.3克；1～3岁的小儿，每次服0.3～0.45克；3～6岁的小儿，每次服0.45～0.6克；6～9岁的小儿，每次服0.6～0.9克；9～12岁的小儿，每次服0.9～1.5克。1日服2次，温开水送下。

妙圣丹：

明雄黄6克 蝎梢（蝎尾）6克 代赭石6克 苦杏仁6克 巴豆（去油）3枚

制法：共研为细末，蒸枣肉为丸，如梧桐子大。1岁以内的小儿，每次服半丸；1～3岁的小儿，每次服1丸；3～6岁的小儿，每次服2丸；6～9岁的小儿，每次服3丸；9～12岁的小儿，每次服4～6丸。1日服3次，用广木香煎汤送下。

21. 小儿痫证，发作次数多，时间长，患儿精神差，可用雄矾磁神散。

雄矾磁神散：

高丽参3克 川黄连3克 明雄黄3克 生地黄12克 当归6克 柏子仁3克 灵磁石3克 石菖蒲6克 麦门冬6克 天门冬6克 茯神9克 远志9克 元参6克 炒枣仁18克 明白矾6克 郁金9克 朱砂4.5克 五味子4.5克

制法：共研为细粉，装入有色的瓶子里。1岁以内的

小儿，每次服0.15~0.45克；1~3岁的小儿，每次服0.45~0.9克；3~6岁的小儿，每次服0.9~1.8克；6~9岁的小儿，每次服1.5~3克；9~12岁的小儿，每次服3~6克。1日服3次，温开水冲服。

22. 一般痢证，都可用茶矾汤或果矾散。

茶矾汤：

绿茶叶6克 明白矾0.15克 郁金6克 胡桃核12克
生黄芪18克 炒枣仁18克

煎服法：一剂药煎2遍，兑在一起，约煎取1茶杯。1岁以内的小儿，分5次服；1~3岁的小儿，分4次服；3~6岁的小儿，分3次服；6~9岁的小儿，分2次服。每隔6小时服1次。

果矾散：

藏青果27克 明白矾3克

制服法：共研为细粉。服法同龙蜂散。

23. 小儿痢证，每次发病前，当小儿感觉头痛，或觉得不舒服时，应及时服海羊散。

海羊散：

海参肠子 羊枣（也叫羊哀、羊疙瘩）各等份

制服法：将这两样药物焙干，合在一起，研成细粉，用黄酒作引。每次服0.3~0.6克（此为12岁以上小儿量，年龄小的按年龄酌减）。一般于发病前服药，病可不发。用温开水送下。

24. 小儿萎黄病（桑叶黄或称钩虫病），一般俗称懒黄病，或黄胖病，可用贯楝汤或雷槟散。

贯楝汤：

苍术9克 槟榔15克 贯众30克 苦楝根皮30克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 茶杯。
1~3 岁的小儿，分 6 次服；3~6 岁的小儿，分 5 次服；
6~9 岁的小儿，分 4 次服；9~12 岁的小儿，分 3 次服。每
隔 6 小时服用 1 次。

雷槟散：

雷丸 90 克 槟榔 30 克 苦楝根皮 30 克

制服法：共研为细粉。1~3 岁的小儿，每次服 1.5~3
克；3~6 岁的小儿，每次服 3~6 克；6~9 岁的小儿，每次
服 6~9 克。1 日服 2 次，温开水送下。

25. 蛔虫泻下后，可用加减人参养荣汤或加减归脾汤。

人参养荣汤：

人参 9 克 麦冬 15 克 五味子 9 克 生地黄 30 克 当
归 15 克 白芍 9 克 陈皮 6 克 生甘草 9 克 丹参 30 克

煎服法：同贯楝汤。

归脾汤：

黄芪 18 克 党参 9 克 白术 6 克 云茯苓 9 克 炒枣
仁 15 克 远志 3 克 木香 3 克 当归 12 克 生草 3 克 大
枣 6 枚

煎服法：同贯楝汤。

26. 小儿萎黄病，胆道闭塞，用茵金汤。

茵金汤：

金钱草 30 克 茵陈蒿 45 克 郁金 9 克 贯众 9 克 大
枣 4 枚

煎服法：同贯楝汤。

27. 萎黄病湿热（阳黄证或称黄疸），用茵栀汤。

茵栀汤：

茵陈 30 克 郁金 9 克 大黄 9 克 山栀 9 克 大枣 6 枚

煎服法：同贯楝汤。

28. 萎黄病湿寒（阴黄证），用加减逍遥汤。

逍遥汤：

苍术 9 克 云茯苓 9 克 白芍 9 克 当归 9 克 柴胡 12 克
郁金 9 克 丹参 18 克 生草 3 克 大枣 6 枚

煎服法：同贯楝汤。

29. 萎黄病，气血两亏，用加减八珍汤。

八珍汤：

党参 9 克 白术 9 克 茯苓 9 克 当归 15 克 川芎 6 克
白芍 9 克 生地 15 克 丹参 30 克 生草 3 克 大枣 6 枚

煎服法：同贯楝汤。

30. 萎黄病，左腹有痞块（疔母），用漆甲桃金散或术矾散。

漆甲桃金散：

干漆 12 克 鳖甲 18 克 桃仁 9 克 郁金 9 克 鸡内金 12 克
三棱 9 克 莪术 9 克 乳香 6 克 没药 6 克 赤芍 18 克
谷芽 18 克 紫蔻仁 12 克

制服法：共研为细粉。1 岁以内的小儿，每次服 0.12～0.15 克；1～3 岁的小儿，每次服 0.15～0.45 克；3～6 岁的小儿，每次服 0.45～0.6 克；6～9 岁的小儿，每次服 0.6～1.2 克；9～12 岁的小儿，每次服 1.2～1.5 克。1 日服 3 次，温开水送下。

术矾散：

苍术 36 克 皂矾（醋煨）48 克 神曲 120 克 炒麦芽 120 克

制服法：共研为细粉。1～3 岁的小儿，每次服 0.3～

0.6克；3~6岁的小儿，每次服0.6~0.9克；6~9岁的小儿，每次服0.9~1.5克；9~12岁的小儿，每次服1.5~3克。1日服3次，温开水送下。

31. 小儿黄皮症，用茵陈当茶饮，或用葛根煎水当茶饮。

32. 小儿砒霜（人言）中毒，用胡萝卜绞泡水饮。

33. 小儿肾脏病变及硬皮症、糖尿病等，均可用骨皮地黄汤。

骨皮地黄汤：

地骨皮 30克 山药 12克 山萸肉 12克 泽泻 9克
丹皮 9克 云苓 9克 生地 24克 王不留行 12克

煎服法：一剂药煎2遍，兑在一起，约煎取1大茶杯。1~3岁的小儿，分7次服；3~6岁的小儿，分6次服；6~9岁的小儿，分5次服；9~12岁的小儿，分4次服；12岁以上的小儿，分3次服。每4~6小时服1次。

34. 小儿皮肤发绀，呼吸或循环障碍等，用参麝樟脑散或参麝樟茶散。

35. 小儿皮肤肿胀，压之凹陷，长时间不起，面色黄白，疲倦，不欲饮食，大便稀，小便色白，为浮肿虚证，用胃苓汤或苓腹五冬汤。

36. 小儿皮肤肿胀光亮，压之凹陷，随后即起，发热气急，小便色黄，为浮肿实证，用麻桂茯苓汤或加味二苓泽术汤。

37. 小儿腹大，血脉暴露，疲倦消瘦，饮食无味，为单腹胀（虚证），用姜苓汤或莱苓汤。

姜苓汤：

白术 9克 茯苓 15克 陈皮 9克 木香 3克 砂仁 6

克 官桂 3 克 干姜 6 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 茶杯。
1~3 岁的小儿，分 6 次服；3~6 岁的小儿，分 5 次服；
6~9 岁的小儿，分 4 次服；9~12 岁的小儿，分 3 次服。每
4 小时服 1 次。

莱菔汤：

莱菔子 15 克 陈皮 9 克 槟榔 9 克 赤苓 15 克 木香
3 克 建曲 9 克 川朴 9 克 苍术 9 克 猪苓 12 克 生草 3
克

煎服法：同姜苓汤。

38. 小儿腹部胀满，时有疼痛，按之坚实，为单腹胀
(实证)，用丁桂汤或二苓枳朴汤。

丁桂汤：

丁香 6 克 木香 6 克 官桂 3 克 建曲 9 克 陈皮 9 克
清半夏 9 克 三棱 6 克 莪术 6 克

煎服法：同姜苓汤。

二苓枳朴汤：

枳实 6 克 厚朴 9 克 姜黄 9 克 干姜 6 克 茯苓 15
克 猪苓 12 克 陈皮 9 克 白术 9 克 砂仁 6 克 清半夏 9
克 泽泻 9 克 生甘草 3 克

煎服法：同姜苓汤。

39. 小儿曲腰啼哭，面色苍白，疲倦，腹软，喜热喜
按，按压痛止，为寒证腹痛，用归芍汤、蒜乳丸、茴苍汤或
附子理中丸。

归芍汤：

当归 9 克 白芍药 9 克 人参 9 克 陈皮 9 克 生草 3
克 干姜 4.5 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 茶杯。
1~3 岁的小儿，分 6 次服；3~6 岁的小儿，分 5 次服；
6~9 岁的小儿，分 4 次服；9~12 岁的小儿，分 3 次服。每
4 小时服 1 次。

蒜乳丸：

大蒜 1 颗（慢火煨香，熟后捣烂） 乳香（研细粉）
1.5 克

制服法：捣合为丸，如芥子大。每服 7 粒，1 日 3 次，
温开水送下。

茵苍汤：

炒小茴香 9 克 良姜 9 克 苍术 9 克 炙甘草 6 克

煎服法：同归芍汤。

40. 小儿啼哭烦躁，腹痛拒按，面色发红，口唇赤红，
为热证腹痛，用茯苓丸。

茯苓丸：

茯苓 30 克 黄连 30 克

制服法：共为细粉，炼蜜为丸。1~3 岁的小儿，每次
服 0.3~0.6 克；3~6 岁的小儿，每次服 0.6~0.9 克；6~
9 岁的小儿，每次服 0.9~1.5 克；9~12 岁的小儿，每次服
1.5~3 克。1 日服 3 次，温开水送下。

41. 小儿面黄，腹胀泛酸，按压痛重，不欲饮食，吐泻
气味酸臭并伴食物残渣，为积食腹痛，用养脾散。

养脾散：

苍术 15 克 陈皮 15 克 缩砂仁 6 克 草果仁 6 克 益
智仁 9 克 白茯苓 6 克 炒麦芽 15 克 厚朴 6 克 建曲 6
克

制服法：共研为细粉。1~3 岁的小儿，每次服 0.3~

0.6克；3~6岁的小儿，每次服0.6~0.9克；6~9岁的小儿，每次服0.9~1.5克；9~12岁的小儿，每次服1.5~3克。1日服3次，温开水送下。

42. 小儿脐周疼痛，痛时面色发白，四肢发冷，发惊，痛止各症消失，为蛔虫性腹痛，用安虫散，或用芜漆散、化虫散。

安虫散：

干漆（炒烟尽）0.6克 雄黄0.3克 巴豆霜3克

制服法：共研为细粉。1~3岁的小儿，每次服0.03~0.06克；3~6岁的小儿，每次服0.06~0.09克；6~9岁的小儿，每次服0.09~0.15克；9~12岁的小儿，每次服0.15~0.3克。1日服2次，温开水送下。

芜漆散：

白芜菁 干漆（炒）各等份

制服法：共研为细粉。服法同安虫散。

化虫散：

槟榔30克 石榴皮（焙干）30克 雷丸30克 贯众（焙干）9克 枳壳（麸炒）15克 使君子肉（焙干）9克 大黄15克 炙甘草15克

制服法：共研为细粉。服法同养脾散。

43. 小儿面色黄白，睡眠露睛，精神疲倦，手脚发冷，呕吐物不臭，为虚吐，用参香汤或香夏散。

参香汤：

人参6克 沉香3克 木香3克 藿香6克 丁香3克 生姜9克

煎服法：一剂药煎2遍，兑在一起，约煎取1茶杯。1~3岁的小儿，分4次服；3~6岁的小儿，分3次服；

6~9岁的小儿，分2次服。每隔6小时服1次。

香夏散：

姜半夏9克 人参9克 白术9克 木香9克 丁香9克 藿香9克 沉香3克 朱砂3克

制服法：共研为细粉。服法同养脾散。

44. 小儿胸腹部胀满，按压疼痛，面唇红赤，发热，呕吐物酸臭，大便秘结，小便短少，为实吐，用葛姜汤，或用橘茹汤、三香散。

葛姜汤：

葛根12克 姜半夏9克 生甘草3克 茯苓9克 竹茹6克 生姜6克

煎服法：同参香汤。

橘茹汤：

橘红9克 葛根12克 麦冬12克 竹茹6克 生草3克 生姜9克

煎服法：同参香汤。

三香散：

藿香叶3克 丁香3克 姜半夏3克 冰片0.3克 麝香0.3克 干姜2.4克

制服法：共研为细粉。服法同养脾散。

45. 小儿吐泻并作，气血并竭，用二苓车前汤。

二苓车前汤：

白茯苓9克 猪苓9克 香薷9克 车前子9克 人参4.5克 灯心1撮

煎服法：同参香汤。

46. 小儿面黄消瘦，四肢无力，腹部喜按，盗汗，大便时粪中有未消化的食物，大便不臭，为虚泻，用参朴散，或

用术丁汤、香矾散。

参朴散：

姜厚朴 3 克 人参 3 克 诃子肉 3 克 肉豆蔻（煨）3 克 白术 3 克 黄连 3 克 地榆 3 克 生草 1.5 克 干姜 1.5 克

制服法：共研为细粉。服法同养脾散。

术丁汤：

白术 9 克 丁香 9 克 清半夏 12 克 生姜 6 克

煎服法：同参香汤。

香矾散：

枯白矾 30 克 诃子肉 15 克 石榴皮 15 克 木香 30 克

制服法：共研为细粉。1~3 岁的小儿，每次服 0.3~0.45 克；3~6 岁的小儿，每次服 0.45~0.6 克；6~9 岁的小儿，每次服 0.6~0.9 克；9~12 岁的小儿，每次服 0.9~1.8 克。1 日服 3 次，温开水送下。

47. 小儿不欲饮食，腹部胀满，啼哭，泛酸，大便色黄很臭有泡沫，为实泻，用香连散，或用四苓汤、加味玉露散。

香连散：

黄连 60 克 木香 15 克

制服法：共研为细粉。服法同香矾散。

四苓汤：

白茯苓 15 克 猪苓 12 克 泽泻 9 克 白术 12 克

煎服法：同养脾汤。

加味玉露散：

寒水石 30 克 石膏 30 克 白术 30 克 焦山楂 30 克 生甘草 9 克

制服法：共研为细粉。服法同香矾散。

48. 小儿面色不华，不欲饮食，精神疲倦，腹泻次数少，里急后重，肛门下坠，小便色白，为虚痢，用莲榴汤，或用石连汤、槐矾散。

莲榴汤：

炒莲子肉 12 克 炒山药 12 克 石榴皮 9 克 焦东山楂 9 克 地榆 9 克 椿皮 9 克 建曲 6 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 茶杯。1~3 岁的小儿，分 6 次服；3~6 岁的小儿，分 5 次服；6~9 岁的小儿，分 4 次服；9~12 岁的小儿，分 3 次服。1 日服 3 次。

石连汤：

当归 12 克 黄连 6 克 龙骨 12 克 赤石脂 9 克 姜厚朴 9 克 石榴皮 9 克 干姜 7.5 克

煎服法：同加味莲榴汤。

槐矾散：

槐花（炒）15 克 白矾 30 克

制服法：共为细粉。服法同香矾散。

49. 小儿腹部疼痛，啼哭，或发热口渴，腹泻次数多，里急后重，粪内有粘液，小便量少色黄，为实证痢疾，用白头翁汤，或用地榆散。

地榆散：

地榆 60 克 黄连 30 克 升麻 30 克 大青叶 30 克 川楝子 30 克

制服法：共为细粉。服法同香矾散。

50. 小儿面色苍白，畏寒，鼻塞，流清涕，咳嗽声重，咯痰色白，为寒咳，用三拗汤，或用华盖汤、艾橘汤、麻黄

汤、五虎汤、小青龙汤。

三拗汤：

麻黄 6 克 杏仁 9 克 生甘草 3 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取半茶杯。
1~3 岁的小儿，分 5 次服；3~6 岁的小儿，分 4 次服；
6~9 岁的小儿，分 3 次服；9~12 岁的小儿，分 2 次服。每
隔 6 小时服 1 次。

华盖汤：

麻黄 6 克 紫苏子 9 克 桑白皮 9 克 杏仁 9 克 赤苓
12 克 陈皮 9 克 生甘草 3 克

煎服法：同三拗汤。

51. 小儿颜面色红，怕热，鼻塞，流黄涕，咳嗽不利，
痰粘黄稠，为热咳，用麻翘石膏汤，或用凉膈散、四黄星防
散、清肺饮。

清肺饮：

柴胡 9 克 人参 6 克 桔梗 9 克 赤芍 9 克 荆芥 6 克
枳壳 9 克 桑白皮 9 克 五味子 9 克 麻黄 6 克 清半夏 9
克 旋覆花 9 克 生甘草 3 克 杏仁 9 克

煎服法：同三拗汤。

52. 小儿面色黄白，纳差，口粘不渴，痰鸣，咯稠痰，
大便带有粘液，为痰咳证，用夏星散，或用麻贝苏子散、桑
贝散。

夏星散：

清半夏 30 克 天南星 30 克 人参 15 克 白术 30 克
干姜 15 克

制服法：共研为细粉。1~3 岁的小儿，每次服 0.3~
0.6 克；3~6 岁的小儿，每次服 0.6~0.9 克；6~9 岁的小

儿，每次服 0.9~1.5 克；9~12 岁的小儿，每次服 1.5~3 克。1 日服 3 次，温开水送下。

53. 小儿呼吸气促，语言声低，活动时加重，喘促，身体发冷，容易出汗，咯痰稀有泡沫，为虚喘证，用桃杏茶蜜膏，或用小青龙汤、冬百膏、皂星散。

皂星散：

贝母 12 克 天南星 9 克 人参 9 克 茯苓 12 克 白附子 9 克 皂角子 9 克 生甘草 3 克

制服法：共研为细粉。服法同夏星散。

54. 小儿声粗胸满，气急喘鸣，苦闷不安，咯痰黄稠，为实喘证，用葶麻二母汤，或用葶铃散、梨姜膏。

葶麻二母汤：

知母 9 克 贝母 9 克 羌活 6 克 滑石 6 克 大黄 6 克 麻黄 6 克 葶苈子 6 克 诃子肉 6 克 薄荷 3 克 生甘草 3 克

煎服法：同三拗汤。

葶铃散：

葶苈子 30 克 马兜铃 30 克 汉防己 30 克 杏仁 30 克
制服法：共研为细粉。服法同夏星散。

55. 小儿麻疹，初起好像伤风，发热怕冷，头痛流泪，怕光眼红，咳嗽喷嚏，流清涕，用加减升麻葛根汤。

升麻葛根汤：

升麻 1.8 克 葛根 6 克 前胡 6 克 桂枝 6 克 贝母 12 克 荆芥 12 克 防风 6 克 薄荷 1.2 克 生甘草 1.2 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 茶杯。
1~3 岁的小儿，分 5 次服；3~6 岁的小儿，分 4 次服；
6~9 岁的小儿，分 3 次服；9~12 岁的小儿，分 2 次服。每

4 小时服 1 次。

56. 小儿麻疹，身体虚弱，呕吐，腹泻，发惊，腹痛，手梢脚梢发凉，用防疹汤。

防疹汤：

黄芪 24 克 防风 6 克 大贝母 9 克 橘皮 6 克 清半夏 6 克 白芍 6 克 泽泻 9 克 生草 1.5 克 生姜 3 克

煎服法：同加减升麻葛根汤。

57. 疹子已经出齐，发热厉害，用柴桑银翘汤。

柴桑银翘汤：

软柴胡 6 克 霜桑叶 6 克 金银花 18 克 连翘 18 克
大青叶 9 克 生甘草 1.5 克 生姜 6 克

煎服法：同加减升麻葛根汤。

58. 麻疹已落，舌深红，干燥，口干，用银翘地黄汤。

银翘地黄汤：

金银花 18 克 连翘 18 克 天花粉 12 克 山药 12 克
山萸肉 12 克 泽泻 9 克 丹皮 9 克 茯苓 9 克 生地黄 24 克

煎服法：同加减升麻葛根汤。

59. 小儿皮肤起赤红色丘疹，渐大如绿豆样水疱，大小不匀，参差不齐，一部分结痂，另一部分仍为疱，为水痘证，用荆葛蝉麦汤。

荆葛蝉麦汤：

荆芥 9 克 葛根 9 克 蝉蜕 6 克 麦芽 12 克 东山楂 6 克
连翘 18 克 前胡 9 克 桔梗 9 克 生草 3 克

煎服法：同加减升麻葛根汤。

60. 小儿水痘如已化脓，用麻翘石膏汤。

61. 小儿丹痧（猩红热），初起发热怕冷，咽喉肿痛，

咽下困难，烦躁不安，用麻翘石膏汤。有抽搐现象，加服蝎蚕珀牛散。

62. 小儿猩红热，发热，咽喉肿痛严重，咽下困难，遍身出红疹，用银地射干汤。

银地射干汤：

金银花 18 克 连翘 18 克 花粉 9 克 山药 12 克 山萸肉 12 克 泽泻 9 克 丹皮 9 克 茯苓 9 克 生地黄 24 克 射干 6 克 元参 15 克 桔梗 9 克

煎服法：同加减升麻葛根汤。

63. 小儿猩红热，咽喉肿烂、疼痛，大便秘结，干燥，用桑桔土贝汤。

桑桔土贝汤：

霜桑叶 9 克 土贝母 9 克 生大黄 6 克 连翘心 6 克 桔梗 6 克 生甘草 1.5 克 灯心 0.9 克

煎服法：同加减升麻葛根汤。

64. 小儿皮疹色白形尖，大如芥子，为白痞证，用桑萍汤。

桑萍汤：

霜桑叶 12 克 浮萍草 18 克 紫苏叶 9 克 麻黄 6 克 金银花 18 克 连翘 18 克 生草 3 克 防风 9 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 茶杯。1~3 岁的小儿，分 6 次服；3~6 岁的小儿，分 5 次服；6~9 岁的小儿，分 4 次服；9~12 岁的小儿，分 3 次服。每 4 小时服 1 次。

65. 小儿皮肤疹点细小，色红淡，散发，为风痧证（风疹），用豆蒂蒡桔汤。

豆蒂茅桔汤：

黄豆卷 12 克 牛蒡子 9 克 蝉蜕 6 克 桔梗 9 克 前胡 6 克 薄荷 3 克 大贝母 9 克 生甘草 3 克

煎服法：同桑萍汤。

66. 小儿湿疹，初起皮肤发红，肿胀，瘙痒，可搽硫椒膏。

硫椒膏：

硫黄 30 克 花椒 9 克 亚铅华粉 6 克

制用法：各药研为极细粉，合在一起，研匀，用凡士林 180 克、香油 30 克调膏，轻轻地搽敷患处。每日或隔日搽 1 次（湿疹已溃烂，或红肿厉害，不可搽硫椒膏）。

67. 小儿湿疹变成脓疱时，服连梔二苓汤，并可外用连柏膏或石膏青柏散。

连梔二苓汤：

黄连 3 克 山梔 3 克 猪苓 6 克 茯苓 12 克 黄芩 6 克 黄柏 3 克 泽泻 9 克 白术 6 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 茶杯。1 岁以内的小儿，分 6 次服；1~3 岁的小儿，分 5 次服；3~6 岁的小儿，分 4 次服；6~9 岁的小儿，分 3 次服；9~12 岁的小儿，分 2 次服。1 日服 3 次。

连柏膏：

川黄连 15 克 亚铅华 30 克 黄柏 30 克 枯矾 7.5 克

制用法：共研为细粉，用凡士林加豆油或香油调膏搽患处。

石膏青柏散：

石膏 45 克 青黛 4.5 克 黄柏 4.5 克 山梔 1.5 克

制用法：共研为细粉，撒患处。或用凡士林加清油调

膏，搽患处。

68. 小儿湿疹，痒甚，病久，外用蝎矾散。

蝎矾散：

白矾 90 克 全蝎 15 克 黄柏 12 克 冰片 3 克

制用法：先将白矾熔化后，入全蝎煅干，凉后加黄柏为细粉，再加冰片研匀，撒患处。或用凡士林、清油调膏，搽患处。

69. 小儿皮疹隐现无常，疹块高出皮肤表面，痒甚，为风疹块（荨麻疹或风疙瘩），用蝉萍汤。

蝉萍汤：

蝉蜕 9 克 苍术 9 克 当归 9 克 土茯苓 18 克 浮萍草 18 克 牛蒡子 9 克 荆芥穗 6 克 防风 9 克 麻黄 6 克 生草 3 克

煎服法：同桑萍汤。

70. 小儿皮肤疹点尖红而小，很快变成小脓疱，多密集发生，为痱子，用六一散。

71. 小儿癣疮，一般都可搽硫椒膏，或用蝎矾散，或将韭菜根焙干为细粉，清油调搽患处。

72. 小儿一切皮肤疮、疹、斑、癣等证，均可用银翘青防汤，或用芪苓银青汤，并外搽苍柏白芷散。

银翘青防汤：

金银花 18 克 连翘 18 克 大青叶 18 克 防风 9 克 生甘草 3 克

煎服法：同桑萍汤。

芪苓银青汤：

生黄芪 30 克 茯苓 30 克 金银花 18 克 连翘 18 克 大青叶 18 克 生甘草 3 克

煎服法：同桑萍汤。

苍柏白芷散：

茅苍术 川黄柏 香白芷各等份

制用法：共研为极细粉，撒患处。或用凡士林、香油或豆油调膏，搽患处。

发 热

一、伤风感冒引起的发热

小儿伤风感冒，是由于大人经管不周，受凉引起。患病后，有的轻微发热，有的高热。通常全身不舒，乏力，鼻塞，流涕，喷嚏，咳嗽，咽痛。一两岁的幼儿，吃奶和出气时呼吸困难；大一点的孩子吃东西口里乏味，不欲饮食，怕冷，全身疼痛。一般在清早和夜里病情较重。

【预防】

平素给小儿脱换衣服要注意避免受凉，小儿夜里睡觉要盖好被子。

【治法】

1. 伤风感冒初期，孩子全身不舒，乏力，用姜葱盐醋汤。

姜葱盐醋汤：

生姜（切碎） 葱白（切碎） 食盐（捣碎） 醋各适量

制用法：将上药合在一起，用开水泼汤，趁热顿服，盖好被子出汗即愈。

2. 小儿感冒鼻塞，微热，头痛，用苍耳汤。

苍耳汤：

苍耳子 6 克 辛夷 6 克 茜草 6 克 金银花 18 克 连翘 18 克 菊花 9 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 大茶杯。1~3 岁的小儿，分 6 次服；3~6 岁的小儿，分 5 次服；6~9 岁的小儿，分 4 次服；9~12 岁的小儿，分 3 次服。每 6 小时服 1 次。

3. 小儿受凉高热，用苍耳青风汤。

苍耳青风汤：

苍耳子 6 克 大青叶 18 克 防风 6 克 紫苏 4.5 克 橘皮 6 克 桔梗 4.5 克 荆芥 4.5 克 金银花 15 克

煎服法：与苍耳汤同。

4. 感冒呼吸困难，咳嗽，用麻翘石膏汤。

麻翘石膏汤：

麻黄 6 克 连翘 18 克 金银花 18 克 生石膏 18 克 浙贝母 18 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 大茶杯，加白糖 30 克，蜂蜜 30 克。1 岁以内的小儿，分 6 次服；1~3 岁的小儿，分 5 次服；3~6 岁的小儿，分 4 次服；6~9 岁的小儿，分 3 次服；9~12 岁的小儿，分 2 次服。1 日服 3 次，或每 6 小时服 1 次。

5. 病儿流涕，用辛夷汤。

辛夷汤：

辛夷 6 克 白芷 6 克 川芎 6 克 薄荷 3 克 白芍 9 克 荆芥 6 克 桔梗 3 克 生甘草 3 克 生姜 3 克

煎服法：与苍耳汤同。

6. 一般无论感冒轻重，都可用人参败毒汤。

人参败毒汤：

桔梗 3 克 人参 3 克（或用党参 9 克） 羌活 6 克 独活 6 克 柴胡 9 克 前胡 6 克 川芎 6 克 枳壳 6 克 茯苓 9 克 薄荷 1.5 克 生甘草 1.5 克 生姜 9 克

煎服法：与苍耳汤同。

7. 小儿受凉，仅表现为发热，可用青橘散。

青橘散：

青黛 15 克 橘红 15 克 薄荷 15 克 生甘草 15 克

制服法：将以上药物合在一起，研成细粉。1 岁以内的小儿，每次服 0.15~0.3 克；1~3 岁的小儿，每次服 0.3~0.45 克；3~6 岁的小儿，每次服 0.45~0.6 克；6~9 岁的小儿，每次服 0.6~0.9 克；9~12 岁的小儿，每次服 0.9~3 克。1 日服 3 次，温开水送下。

二、流感引起的发热

流感的特点，病来迅速，极易流行，往往一人患病，全家甚至一村或一个地区的人均会患病。小儿流感，初起畏寒或打颤，全身无力，不欲饮食，继而高烧，头痛，浑身疼痛，鼻塞，流清鼻涕及眼泪，眼睛发胀，咽喉红肿干痛，咳嗽，脖项发硬，哭叫不安，有时出汗，口渴，皮肤上出现疹子。

【预防】

在流行性感流行时期，可选服下列方剂进行预防：

1. 绿豆甘草汤

绿豆（捣碎）30 克 生甘草 1.5 克

用水煎汤当茶饮，连饮 1 星期。

2. 二白汤

白菜根 1 个 白萝卜 1 条

用水煎汤加些白糖饮，连饮 1 星期。

3. 绿豆芦根汤

绿豆（捣碎）9 克 芦根 6 克

用水煎汤饮。1 日饮 2 次，连饮 3 天。

【治法】

1. 小儿患流行性感冒，一般可用麻翘石膏汤。

2. 病儿身体虚弱，可用加味麻翘石膏汤。

加味麻翘石膏汤：

麻黄 6 克 连翘 18 克 金银花 18 克 生石膏 18 克
浙贝母 18 克 生黄芪 15 克 炒酸枣仁 10 克 远志肉 3 克
茯苓 6 克 生地黄 6 克 党参 6 克 石菖蒲 3 克

煎服法：与麻翘石膏汤同。

3. 如果病儿心里烦乱不安，除应服麻翘石膏汤外，并可加服枣蚕蝉星散。

枣蚕蝉星散：

焦酸枣仁 10 克 全蝎 3 克 僵蚕 3 克 蝉蜕 3 克 琥珀 3 克 天竺黄 3 克 胆南星 3 克

制服法：将药物合在一起，研成细粉。1 岁以内的小儿，每次服 0.15~0.3 克；1~3 岁的小儿，每次服 0.3~0.6 克；3~6 岁的小儿，每次服 0.6~0.9 克；9~12 岁的小儿，每次服 0.9~2 克。1 日服 3 次，温开水冲服。

或在麻翘石膏汤内加蝉蜕 10 克，水煎服。

4. 患流行性感冒的小儿，如果心跳无力，昏迷不醒，除应服麻翘石膏汤外，并可加服参麝樟脑散或朱冰散。

参麝樟脑散：

丽参 1.5 克 樟脑 1.5 克 麝香 0.45 克

制服法：将诸药合在一起，研成细粉。1 岁以内的小

儿，每次服 0.15～0.3 克；1～3 岁的小儿，每次服 0.3～0.6 克；3～6 岁的小儿，每次服 0.6～0.9 克；6～9 岁的小儿，每次服 0.9～1.2 克；9～12 岁的小儿，每次服 1.2～2 克。1 日服 1～2 次，温开水冲服。或将药粉加入麻翘石膏汤内服。

朱冰散：

朱砂 4.5 克 冰片（樟脑片）0.9 克 薄荷冰 0.6 克
甘草粉 3 克

制法：与参麝樟脑散同。

三、急性扁桃腺炎引起的发热

急性扁桃腺炎的主要症状是咽喉痛。患儿突然高烧，头痛，无精打采，病情严重的出现昏迷，四肢发凉，嗓子红肿疼痛，咽食不利，有时咳嗽。有的病儿在嗓子肿胀的地方出现淡黄色的脓点，有的有灰黄色或灰白色的脓样物，亦有脓点或脓样物融合成为一层薄膜，这种薄膜很容易取下来。

一般病儿的脖项或颌下常有肿胀，按压疼痛。

【预防】

防止小儿伤风，带孩子外出时须戴上口罩。

【治法】

1. 小儿患急性扁桃腺炎，初起高烧、头痛的时候，可用麻翘石膏汤。

2. 病儿咽喉红肿疼痛，可用元桔地冬汤。

元桔地冬汤：

南元参 10 克 苦桔梗 6 克 干地黄 10 克 麦门冬 10 克 防风 6 克 紫苏 3 克 大青叶 10 克 金银花 20 克 连翘 20 克 土茯苓 10 克 生甘草 3 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 大茶杯。1~3 岁的小儿，分 6 次服；3~6 岁的小儿，分 5 次服；6~9 岁的小儿，分 4 次服；9~12 岁的小儿，分 3 次服；12 岁以上的小儿，分 2 次服。每 4 小时服 1 次。

3. 如果病儿耳下、颌下和脖项肿胀、疼痛，发烧，除服用元桔地冬汤外，可加服归防青桔汤或芩连银翘汤。

芩连银翘汤：

金银花 18 克 连翘 18 克 条黄芩 9 克 川黄连 3 克
生甘草 3 克

煎服法：与元桔地冬汤相同。

4. 一般患急性扁桃腺炎的病儿均可用硝硼散。

硝硼散：

火硝 18 克 硼砂 18 克 僵蚕 12 克 梅花冰片 3 克

制用法：将这几样药合在一起，研成很细的粉末，用细竹管将药吹向嗓子。1 日吹药 3 次。

5. 患儿咽喉肿痛，舌红或有浅黄色舌苔，宜服豆桔汤。

豆桔汤：

山豆根 6 克 苦桔梗 6 克 连翘 18 克 黄芩 9 克 赤芍药 6 克 淡竹叶 6 克 薄荷 1 克 生甘草 1.5 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 茶杯。1~3 岁的小儿，分 4 次服；3~6 岁的小儿，分 3 次服；6~9 岁的小儿，分 2 次服。每 4 小时服 1 次。

6. 患儿咽喉肿痛，舌红，苔黄而焦燥，宜服豆桔知柏汤。

豆桔知柏汤：

山豆根 6 克 苦桔梗 6 克 薄荷 1.5 克 生石膏 30 克
知母 9 克 黄柏 6 克 黄芩 9 克 黄连 3 克 竹叶 3 克 生

甘草 1.5 克

煎服法：与豆桔汤相同。

7. 患儿咽喉肿痛，舌红，舌苔老黄而腻或焦燥黑裂，宜服豆桔枳朴汤。

豆桔枳朴汤：

山豆根 6 克 苦桔梗 6 克 山楂 6 克 生石膏 60 克
知母 9 克 黄芩 9 克 黄连 6 克 黄柏 6 克 大黄 9 克 芒硝 9 克 枳实 6 克 厚朴 6 克

如果患儿咽喉干燥，可在本方内再加生石膏 60～120 克；大便秘结，再加大黄 3～6 克；小便不利，加木通 3 克。

煎服法：与豆桔汤同。

8. 患儿咽喉肿痛，咳嗽，舌白（或淡红）无苔，宜服豆桔紫荆汤。

豆桔紫荆汤：

山豆根 6 克 苦桔梗 6 克 清半夏 3 克

煎服法：与豆桔汤同。

9. 患儿咽喉肿痛，舌红绛无苔，宜服生熟地黄汤。

生熟地黄汤：

生熟地黄各 15 克 山药 9 克 山萸肉 9 克 丹皮 6 克
泽泻 6 克 白茯苓 9 克

煎服法：与豆桔汤同。

四、伤食（消化不良）引起的发热

小儿处在生长发育时期，身体尤其是胃肠功能尚未完善，往往因为食物不洁，或是食了不熟的瓜果、霉烂的东西，或是吃东西过量，都会使胃肠遭受损伤，出现消化不良等疾病。

小儿伤食，多在下午发烧，或是上午热轻下午热重，尤其是手足热甚，厌食，乏力，暖气，呕吐，大便酸臭，有时又吐又泻，有时发烧不退，惊烦不安，咬牙，盗汗等。一般伤食的小儿心口下可触及一硬块。

【预防】

平素给小儿吃奶、吃饭应该节制，应让其少吃油腻、生冷的食物，多吃容易消化富有营养的食物。

【治法】

1. 伤食的小儿，如果素体虚弱，或病久，可以长期服楂曲槟钙散。

楂曲槟钙散：

东山楂 60 克 建神曲 60 克 净蝉蜕 60 克 花槟榔 75 克 炒谷芽 75 克 乳酸钙 60 克

(注：如果没有乳酸钙，可换生牡蛎 60 克，或蛋壳粉 60 克。)

制用法：将这几样药合在一起，研成很细的粉末。1~3 岁的小儿，每次服 0.3~0.6 克；3~6 岁的小儿，每次服 0.6~0.9 克；6~9 岁的小儿，每次服 0.9~1.5 克；9~12 岁的小儿，每次服 1.5~3 克。1 日服 3 次，温开水冲服。

2. 小儿伤食发热，厌食乏力，如果小儿身体强壮，可用大黄干姜散。

大黄干姜散：

大黄 30 克 干姜 30 克 巴豆霜 3 克

制用法：将这几样药合在一起，研成细粉。1~3 岁的小儿，每次服 0.03~0.06 克；3~6 岁的小儿，每次服 0.06~0.09 克；6~9 岁的小儿，每次服 0.09~0.15 克；9~12 岁的小儿，每次服 0.15~0.3 克。仅服 1 次药，目的

是使病儿泄泻，病儿服药泄泻后，应改服楂曲槟钙散。

3. 病儿腹胀，按之有硬块，或又吐又泻，惊烦不安，盗汗，可服二甲姜薄散。

二甲姜薄散：

醋炙鳖甲 醋炙山甲 干姜 薄荷各 30 克

制用法：将这几样药合在一起，研成细粉。1 岁以内的小儿，每次服 0.3 克；1~3 岁的小儿，每次服 0.3~0.6 克；3~6 岁的小儿，每次服 0.6~0.9 克；6~9 岁的小儿，每次服 0.9~1.5 克；9~12 岁的小儿，每次服 1.5~3 克。1 日服 2 次，用温开水冲服。

或在二甲姜薄散内加红糖 21 克，与麦面合在一起，烙成 16 个饼子。1~3 岁的小儿，每次最多吃半个；3~6 岁的小儿，每次最多吃 1 个。1 日 2 次。也可将饼子泡在开水里给小儿吃。

五、流行性腮腺炎引起的发热

流行性腮腺炎也叫炸腮，是一种传染病，多发生在春、冬二季。患病的大多是 2 岁以上的小儿。

小儿患腮腺炎，初起怕冷，发烧，厌食，乏力，恶心，呕吐，头痛，咽痛，有时流鼻血，全身酸痛。大约经过半天，有的是在 2 天以后，病儿的耳下或耳前肿胀，也有一部分小儿患病后耳下就出现肿胀。在患儿脸腮尚未肿胀前，先是脸腮的一边或两边感觉稍痛，随即发烧红肿疼痛，这时病儿张口、咀嚼或说话时，耳朵下边紧绷和疼痛。脸腮的肿胀，常常先是一边，过几个小时或 3 天以后，另一边也肿大，也有两边同时肿大，或只肿一边的。约经 2~3 天左右，病儿脸部肿胀，耳朵挤向上方，有的脖颈前后均肿甚。大部

分病儿经过 5 天左右肿胀即慢慢消退，但也有十几天不能消退的。

【预防】

1. 将病儿与健康的孩子完全隔离。
2. 与病儿接触过的健康小儿可服银翘青叶汤。

银翘青叶汤：

连翘 金银花 大青叶各 6 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，当茶频饮。

【治法】

1. 小儿患腮腺炎，无论症状轻重，均可在病儿颈项肿胀一侧手指少商穴针刺放血，即可治愈。方法是：放血前，用手从肿胀的部位顺着小儿的胳膊向下至手腕部，慢慢地推运一二十次，用带子将手腕扎紧，取棉花蘸酒精或烧酒在手指少商穴处涂擦，用酒精或烧酒泡过或在清油灯上烧过的针速刺放血。1 日放血 1 次，直至病愈为止。一般腮腺炎，针刺放血两三次即可治愈。如果小儿颈项两侧同时肿胀，可在两手指少商穴同时放血。

2. 患腮腺炎的小儿，可服归防青桔汤，或服牡参汤。

归防青桔汤：

当归 9 克 防风 9 克 大青叶 18 克 桔梗 9 克 连翘 18 克 金银花 18 克 生枳壳 9 克 生甘草 3 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，当茶频服。

牡参汤：

生牡蛎 元参 川贝母各 9 克

煎服法：与归防青桔汤同。

3. 小儿患腮腺炎，如果煎药不方便，可用龙胆阿非散。

龙胆阿非散：

龙胆末 9 克 阿斯匹林 7.5 克 非那西汀 7.5 克

制用法：将药物合在一起，研匀。1 岁以内的小儿，每次服 0.15～0.21 克；1～3 岁的小儿，每次服 0.21～0.24 克；3～6 岁的小儿，每次服 0.24～0.3 克；6～9 岁的小儿，每次服 0.3～0.45 克；9～12 岁的小儿，每次服 0.45～0.6 克。1 日服 3 次，用温开水或白糖水冲服。

4. 病儿脸腮和脖项肿胀严重，除内服药物外，还可外敷二矾雄焦散。

二矾雄焦散：

明白矾 18 克 枯矾（煨白矾）9 克 明雄黄 3 克

制用法：将这三样药合在一起，研成细粉，用鸡蛋清或清油调和，敷在肿胀的地方。1 日敷 2 次。

或用毛巾热敷肿胀处，消肿效果也好。

六、癆病（结核病）引起的发热

癆病即结核病，种类很多，人们常说的肺癆、肠癆、老鼠疮等是癆病中比较常见的几种。因为癆病可传染，近几年发病率又抬头，目前临床上比较常见。患病的小儿，多是身体较弱，抵抗力较差者。

小儿患癆病，不管在身体的哪一部位，一般都有发烧、厌食、乏力、少动、皮肤发白、关节疼痛。此外，由于发生的部位不同，病情轻重不同，又各有不同的表现。这里着重介绍肺癆和老鼠疮的症状。

肺癆病的小儿，多是下午发烧，咳嗽，胸部刺痛，气喘。病重时，阵咳，夜间热甚，呼吸困难，精神差，身体瘦弱，亦有高热、头痛、心跳快、昏迷、脸青、谵语的。病情

进一步发展，有的患儿咳嗽吐痰，痰里带血，呼吸困难，盗汗，身体消瘦，皮肤为青紫色；有的头痛厉害，呕吐，角弓反张，发烧，发惊，睡眠不安，脸颊发红，眼睛瞳仁时大时小，昏迷不醒，口张不开，不能咽食，身体更加消瘦。

小儿患老鼠疮，颈项两边或一边肿大，触之发硬，初起不痛，皮肤颜色正常，随后皮肤变成红色，疼痛，最后溃烂，形成漏管。仅有少数病儿颈项肿胀数天后可自行缩小，硬块慢慢消失。

【预防】

1. 初生儿或结核菌素试验阴性者接种卡介苗。
2. 要把小儿与患病者隔离。病人用过的东西，吃饭用的碗筷等，必须经过日晒、水煮消毒才能给孩子使用，有条件者应给孩子单独准备餐具。

【治法】

1. 无论为哪一种瘰病，或是新病久病，都可服桑及二母汤。

桑及二母汤：

桑椹 9 克 白及 9 克 知母 9 克 贝母 9 克 炒米壳 1 克 桑白皮 9 克 橘皮 9 克 生甘草 3 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 大茶杯，加白糖。1 岁以内的小儿，分 6 次服；1~3 岁的小儿，分 5 次服；3~6 岁的小儿，分 4 次服；6~9 岁的小儿，分 3 次服；9~12 岁的小儿，分 2 次服。1 日服 3 次。

2. 病儿发烧，呈阵发性，伴乏力时，除服桑及二母汤外，加服柴桑芝麻散。

柴桑芝麻散：

软柴胡 18 克 黑芝麻 3 克 霜桑叶 12 克 南杞叶 1.5

克 生石膏 6 克 大野党参 12 克

制服法：将药物合在一起，研成很细的粉末。1 岁以内的小儿，每次服 0.3～0.6 克；1～3 岁的小儿，每次服 0.6～0.9 克；3～6 岁的小儿，每次服 0.9～1.2 克；6～9 岁的小儿，每次服 1.2～1.5 克；9～12 岁的小儿，每次服 1.5～3 克。1 日服 3 次，用温开水冲服。

3. 病情严重的小儿，吐痰带血，发高烧，头痛，昏迷，谵语，口张不开，发惊不安，呼吸困难，盗汗，服桑及蜈甲散。

桑及蜈甲散：

桑椹子 30 克 白及 30 克 蜈蚣 15 克 穿山甲 6 克
僵蚕 15 克 全蝎 15 克

制服法：将这几样药合在一起，研成很细的粉末。1 岁以内的小儿，每次服 0.1～0.3 克；1～3 岁的小儿，每次服 0.3～0.45 克；3～6 岁的小儿，每次服 0.45～0.6 克；6～9 岁的小儿，每次服 0.6～0.9 克；9～12 岁的小儿，每次服 0.9～1.5 克。1 日服 3 次，温开水冲服。

4. 肺癆的患儿，如果肺上有空洞，可服七及珠蛤散，或用合珠散（空洞及浸润型者均可用），或在服桑及蜈甲散的同时加服生松香粉。

七及珠蛤散：

田三七 5 克 白及 30 克 桑椹 30 克 珍珠（放在豆腐内蒸好）0.75 克 蛤蚧 15 克 清半夏 15 克 冰糖 15 克
羊肺（烤干）10 克

制服法：将这几样药合在一起，研成很细的粉末。1 岁以内的小儿，每次服 0.3～0.6 克；1～3 岁的小儿，每次服 0.6～0.9 克；3～6 岁的小儿，每次服 0.9～1.2 克；6～9

岁的小儿，每次服 1.2~1.5 克；9~12 岁的小儿，每次服 1.5~3 克。1 日服 3 次，用温开水或糖开水冲服。

合珠散：

制阿胶 60 克 川贝母 60 克 五味子 30 克 肥白及 120 克 干百合 90 克 大珍珠 3 克（豆腐蒸）

制法：共为细粉。用量同七及珠蛤散。服时用同药粉等量的羊肺粉为引。（羊肺粉的制法：先将羊肺洗净后用砂锅或不锈钢锅煮熟切碎，再以砂锅焙干，研细粉。）

生松香粉：

制法：将生松香研成细粉，1 岁以内的小儿，每次服 0.3~0.6 克；1~3 岁的小儿，每次服 0.6~0.9 克；3~6 岁的小儿，每次服 0.9~1.2 克；6~9 岁的小儿，每次服 1.2~1.5 克；9~12 岁的小儿，每次服 1.5~3 克。1 日服 3 次，温开水冲服。

5. 小儿患老鼠疮，无论是否溃烂，都可内服小金丹。

小金丹：

白胶香 45 克 草乌头 45 克 五灵脂 45 克 地龙 45 克 木鳖 45 克 乳香（去油）22 克 没药（去油）22 克 墨炭 3.5 克 当归身 22 克 麝香 9 克

制法：将诸药研成细粉，合在一起，用糯米粉 36 克和成丸，如绿豆大，每料药大约能丸 250 丸左右。1 岁以内的小儿，每丸分 6 次服；1~3 岁的小儿，每丸分 5 次服；3~6 岁的小儿，每丸分 4 次服；6~9 岁的小儿，每丸分 3 次服；9~12 岁的小儿，每丸分 2 次服。1 日服 1 次或 2 次，用黄酒或温开水送下。

或用以上治肺癆病的方剂治老鼠疮，也很有效。

或每天给病儿吃蛇蜕香油炸鸡蛋。制法：香油 500 克，

蛇蜕 15 克。先把香油倒在锅内煎开，再把蛇蜕洗净放在香油内炸，当蛇蜕呈焦灰色后，去渣，晾冷，将香油灌入瓶子里。每日用这种油给病儿炸鸡蛋吃。

6. 小儿患老鼠疮，如要速取疗效，除内服药外，须配合外用药。无论疮是否溃烂，都可用石桐膏或石黄粉外涂患处。

石桐膏：

生石灰 生桐油各适量

制用法：将生石灰倒在水中，取浮沫，晒干，研成细粉，与桐油调成膏涂患处。1 日涂 1 次。

石黄粉：

大黄 30 克 陈石灰 60 克

制用法：将大黄切片，铺在小铁锅底上，把石灰撒在大黄上面，然后将铁锅放在火上，待大黄被烧焦，石灰变成桃红色后，去掉大黄，把石灰研成细粉，用清油或其他油调成膏涂患处。1 日涂 1 次。

七、中暑引起的发热

中暑是在热天常见的一种急性病。小儿中暑，大多数是由于在炎热的太阳下玩耍时间过长，饮水过少。

小儿中暑，出现发烧、怕冷、乏力、头晕、头痛、眼花、恶心、呕吐、口干、心烦、腹痛、腹泻或大便秘结，继而突然晕倒，不省人事，出汗很多（也有出汗少或不出汗的），严重的病儿，多四肢冰凉，全身疼痛，小腿痉挛，抽搐等。

【预防】

炎热的夏季，用下列方药煎水给小儿当茶饮，预防中暑

效果很好：

1. 菊豆饮

白菊花 10 克 绿豆 30 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，加些白糖，当茶饮。

2. 乌梅银花汤

乌梅 金银花各 30 克

煎服法：与菊豆饮同。

3. 楂藕汤

干藕节 60 克 山楂片 60 克 金银花 30 克

煎服法：与菊豆饮同。

【治法】

1. 小儿中暑头晕，恶心，腹痛，上吐下泻，可服十滴水。

服法：1 小瓶药水，1~3 岁的小儿，分 6 次或 10 次服；3~6 岁的小儿，分 4 次或 6 次服；9~12 岁的小儿，分 2 次或 5 次服。1 日服 2~3 次。兑温开水服。

2. 小儿中暑，可服六一散。

六一散：

滑石粉 18 克 甘草粉 3 克

制服法：将上药合在一起，研匀。1~3 岁的小儿，每次服 3~6 克；3~6 岁的小儿，每次服 6~12 克；6~9 岁的小儿，每次服 12~20 克。服药时加些白糖，用凉开水冲服。

3. 如果病儿心烦，腹痛不安，可用益元散。

益元散：

滑石粉 18 克 朱砂 3 克 甘草粉 3 克

服法：与六一散同。

4. 小儿突然晕倒，不省人事，四肢抽搐，除服益元散外，可加服苏合香丸。1~3岁的小儿，1丸分4次服；3~6岁的小儿，1丸分3次服；6~9岁的小儿，1丸分2次服。每日服2次，温开水送下。

5. 小儿腹痛甚，除服益元散外，可在患儿的颈项、肩、背、胸腹、臂弯、腿弯等处，用手指揪扭，或用铜钱、羹匙刮皮肤，至皮肤刮成青紫色为止。

八、麻疹引起的发热

麻疹是一种常见的小儿传染病，也叫疹子、痧子，春冬季节多见。患麻疹的小儿，初起似乎为受凉，发烧，怕冷，头痛，流眼泪，怕亮光，两眼发红，咳嗽，喷嚏，流涕，烦躁不安。有的小儿呕吐或腹泻，四肢发凉，夜里睡觉发惊，有时腹痛，脸蛋发红，口渴，身上时冷时热，不欲饮食。病后两三天，可以用手电在病儿的耳朵背后照射，耳内有红点或红纹，可以证明是出麻疹。如果在病儿口里大牙齿邻近的粘膜或口唇内看到青白色的周围有红晕的水疱（叫作麻疹斑点）时，就完全可以确诊。

麻疹的出现，是在发烧的三四天以后，这时病儿热甚，耳朵前面或耳根出现小红疹子，以后在脸、脖子、胳膊、胸、背和腹部出现疹子，慢慢地发展到全身。疹子初起很稀，颗粒分明，颜色为桃红色，随后慢慢稠密增大，融合成片，颗粒明显，颜色变成暗红色，而疹子之间仍然能看到正常的皮肤。当皮疹出透齐，病儿高热，全身不舒，干咳，一般症状也较严重。这时如果对病儿照管不周，可以引起各种并发症。

在皮疹出齐以后，病情就会慢慢好转，疹子随着发疹的

次序也逐渐消退，发烧也逐渐减轻，其他症状慢慢消失。

【预防】

1. 麻疹的传播较广且快，预防的主要方法之一是把患儿与没出过麻疹的小儿分开。

2. 麻疹流行的时候，可用葱白二豆汤预防。

葱白二豆汤：

绿豆 30 克 黑豆 30 克 葱白 2 节

煎服法：将这几样药煎汤，令小儿当茶饮，1 日至少饮 3 次，连饮 3 天。

3. 在麻疹发生的季节，应让孩子服贯众粉（将贯众洗净研为细粉）。6 个月～1 岁的小儿，每次服 0.15～0.3 克；3～6 岁的小儿，每次服 0.3～0.6 克。1 日服 3 次，连服 7 天。或将上药按小儿年龄大小把药量加大 3 倍，煎汤当茶饮。

4. 麻疹的预防，也可用紫草根或紫草皮研成细粉。服药的方法与贯众粉相同。

5. 将母亲的血注射到小儿肌肉里，这对麻疹的预防效果很好。

【治法】

1. 出麻疹的小儿，初起伤风发烧，怕冷，头痛，流眼泪，畏光，眼红，咳嗽，喷嚏，流涕，用加减升麻葛根汤。

升麻葛根汤：

升麻 1.5 克 葛根 6 克 前胡 6 克 桂枝 6 克 浙贝母 12 克 荆芥 6 克 防风 6 克 薄荷 1.5 克 生甘草 1.5 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 大茶杯，加些白糖。1 岁以内的小儿，分 4 次服；1～3 岁的小儿，分 3 次服；3～6 岁的小儿，分 2 次服。每 4 小时服 1 次。

2. 出麻疹的小儿，如果身体虚弱，呕吐或腹泻，发惊，腹痛，四肢发凉，用防疹汤。

防疹汤：

生黄芪 18 克 防风 6 克 浙贝母 9 克 橘皮 6 克 清半夏 6 克 杭白芍 6 克 泽泻 9 克 生甘草 1.5 克 生姜 1.5 克

煎服法：与加减升麻葛根汤同。

3. 疹子已经出齐，高热，用柴桑银翘汤。

柴桑银翘汤：

柴胡 6 克 霜桑叶 6 克 金银花 18 克 连翘 9 克 大青叶 15 克 生甘草 1.5 克 生姜 1 片

煎服法：与加减升麻葛根汤同。

4. 疹子已落，病儿舌色深红，干燥，口干，用银翘地黄汤。

银翘地黄汤：

金银花 18 克 连翘 18 克 天花粉 6 克 山药 6 克 山萸肉 6 克 泽泻 4.5 克 粉丹皮 4.5 克 茯苓 6 克 生地黄 12 克

煎服法：与加减升麻葛根汤同。

5. 麻疹发生时，如果对病儿照护好，能够按病用药，一般都可收到满意的效果。如果治疗不当，容易引起并发症。现将其治疗介绍如下：

(1) 出疹期间，咳嗽，出气急促，呼吸困难，鼻翼煽动，高热，嘴唇和手指足趾青紫，如果在出疹初期出现这种情况，疹子很快下去，皮肤颜色变成苍白色，叫作麻疹内陷，用麻翘石膏汤。

麻翘石膏汤：

麻黄 6 克 连翘 18 克 金银花 18 克 生石膏 18 克
浙贝母 18 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 大茶杯，加白糖 30 克，蜂蜜 30 克。1 岁以内的小儿，分 6 次服；1~3 岁的小儿，分 5 次服；3~6 岁的小儿，分 4 次服；6~9 岁的小儿，分 3 次服；9~12 岁的小儿，分 2 次服。1 日服 3 次，或每 6 小时服 1 次。同时须加服消炎药物。

(2) 出麻疹的小儿，出现耳内流脓时，外用硼连牛黄散或二矾散，并可服蚕蝉黄滑散。

硼连牛黄散：

硼砂 9 克 黄连 3 克 冰片 0.6 克 牛黄 0.6 克

制用法：将这几样药合在一起，研成很细的粉末。每次向耳内吹入一点药粉，用细竹管或别的细管吹药。1 日吹药 1~2 次。

二矾散：

白矾 枯矾各 20 克

制用法：将这两样药研成很细的粉末，每次用细竹管向耳内吹入一点药粉。1 日吹药 1 次或 2 次。

蚕蝉黄滑散：

僵蚕 15 克 蝉蜕 4.5 克 姜黄 3 克 滑石 9 克 生甘草 1.5 克

制用法：将这几样药合在一起，研成很细的粉末。1 岁以内的小儿，每次服 0.45~0.9 克；1~3 岁的小儿，每次服 0.9~3 克。1 日服 3 次，服药时加些白糖。

(3) 出麻疹的小儿，如果口腔内溃烂，咽痛，可内服麻翘石膏汤，外用牛硼梅黛散或矾黛散。

牛硼梅黛散：

硼砂 6 克 梅花冰片 3 克 牛黄 0.5 克 青黛 3 克

制用法：将上药合在一起，研成细粉。搽口内烂处，或向咽部吹药粉。1 日用药 3 次。

矾黛散：

白矾 15 克 枯矾 15 克 青黛 6 克

制用法：将这几样药合在一起，研成很细的粉末。用药的方法与牛硼梅黛散相同。

(4) 小儿出麻疹期间，出现腹泻，用参苓薏砂散。

参苓薏砂散：

丽参 15 克 白术 15 克 茯苓 15 克 豆蔻 15 克 砂仁 12 克 生黄芪 30 克 小茴香 30 克

制用法：将这几样药合在一起，研成很细的粉末。1 岁以内的小儿，每次服 0.15~0.3 克；1~3 岁的小儿，每次服 0.3~0.7 克。1 日服 3 次，温开水冲下。

(5) 病儿出现上吐下泻，头痛，高烧，烦躁不安，暖气，口臭，腹痛，可用雄矾砂丹散。

雄矾砂丹散：

雄黄 白矾 朱砂 黄丹各 30 克

制用法：将这几样药合在一起，研成很细的粉末。服药的方法与参苓薏砂散相同。

(6) 出麻疹的小儿伴角膜溃疡时用明砂苓泽汤，同时可外用连矾水洗眼，眼睛洗过后点霜梅散。

明砂苓泽汤：

泽泻 6 克 粉丹皮 6 克 云茯苓 12 克 生地黄 12 克 夜明砂 9 克 生牡蛎 12 克

煎服法：与加减升麻葛根汤同。

连矾水：

黄连 白矾各 10 克

制用法：将这两样药用开水浸泡 1 天，过滤去渣，洗眼时药水中兑些开水温洗。

霜梅散：

黄瓜霜（或西瓜霜）3 克 梅花冰片 1.5 克

制用法：将这两样药研成很细的粉末，用净开水调和点眼。1 日点眼 3 次。

九、白喉引起的发热

白喉是常见的一种小儿传染病，主要是经呼吸道传染，发病很快。白喉可以分为咽白喉、喉白喉、鼻腔白喉三大类。

1. 咽白喉：开始有轻微的发烧、咽痛，一两天后发热加重，甚至高烧，浑身不舒，乏力，厌食，头痛，有时恶心呕吐，咽食物或喝水时嗓子更痛，病情严重的往往引起抽风。患儿颌下和脖子两边肿大，压之疼痛，咽部及扁桃腺红肿，咽部出现大小不同的灰白色点子（或可看到有灰白色的条块），这些点子很快地扩大成不容易剥开的灰白色假膜，如果强剥，易引起出血。如果病治不投，灰白色膜继续发展到口腔其他部分，则病情更为复杂。

2. 喉白喉：开始也是轻微的发烧，咳嗽声如狗吠。因患儿喉头狭窄，咳后呼吸困难，鼻翼煽动，气喘，口唇青紫，面色苍白，出冷汗，病情严重时往往因为呼吸加快、昏睡、抽风而死亡。

3. 鼻腔白喉：多是 1 岁以下的小儿，开始有的轻微发烧，有的不发烧，患儿鼻塞，鼻子红肿，流出混有血色的稠

鼻涕，鼻孔与上嘴唇糜烂。病儿的鼻中隔、鼻甲及鼻咽部位出现灰白色的膜。因为病儿鼻塞，可以听到似睡鼾声的鼻音，多伴张口呼吸，吃奶困难。

【预防】

1. 把患白喉的小儿与健康的孩子隔离。
2. 白喉病儿的衣服和用具要经常消毒。
3. 白喉流行的季节，健康的小儿应打白喉预防针，增强小儿对白喉的抵抗力。

【治法】

白喉虽然有几种，而治法却大致相同，只要根据以下介绍的方剂用药，就不会耽误病情。

1. 无论哪种白喉的小儿，初起都可内服麻翘石膏汤。
2. 患白喉的小儿，高烧，咽痛，用麻翘石膏汤加大青叶 18 克。煎服法与麻翘石膏汤相同。
3. 患白喉的小儿，如果厌食，恶心呕吐，抽风，咽痛，用青桔银翘汤。

青桔银翘汤：

大青叶 30 克 桔梗 9 克 连翘 9 克 蝉蜕 9 克 生甘草 9 克 金银花 9 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 大茶杯。1~3 岁的小儿，分 6 次服；3~6 岁的小儿，分 5 次服；6~9 岁的小儿，分 4 次服；9~12 岁的小儿，分 3 次服。每 4 小时服 1 次。

4. 患白喉的小儿，颌下和脖子两边肿大，按压疼痛，用归防青桔汤。

归防青桔汤：

当归 9 克 防风 9 克 大青叶 18 克 桔梗 9 克 连翘

18克 金银花18克 生枳壳9克 生甘草3克

煎服法：与青桔银翘汤同。

5. 患白喉的小儿，咽部及扁桃腺红肿，可见灰白色点子，或已发展成灰白色假膜，强剥出血时，用龙元蓝芩汤。

龙元蓝芩汤：

龙胆草3克 元参9克 板蓝根9克 黄芩9克 大青叶9克 生石膏9克 肥知母9克 桔梗9克 生甘草3克

煎服法：与青桔银翘汤同。

亦可给病儿服紫雪丹。1~3岁的小儿，每次服0.15~0.3克；3~6岁的小儿，每次服0.3~0.45克；6~9岁的小儿，每次服0.45~0.6克；9~12岁的小儿，每次服0.6~1克。1日服3次，温开水送下。

6. 白喉病儿咽部灰白色假膜消退以后，可用养阴清肺汤。

养阴清肺汤：

生地黄9克 南元参9克 麦门冬9克 白芍药9克 粉丹皮3克 贝母9克 薄荷3克 生甘草3克

煎服法：与青桔银翘汤同。

7. 白喉病儿的咽喉可用加减珠黄散或白喉散吹药。

珠黄散：

珍珠粉1克 牛黄0.7克 琥珀1克 西瓜霜（或黄瓜霜）3克

制用法：将这几样药合在一起，研成很细的粉末。用吹药器具或细竹管吹敷咽部。

白喉散：

牛黄0.3克 珍珠0.4克 梅花冰片0.45克 琥珀0.45克 白硼砂0.45克 血竭花1.5克 龙骨1.5克 象

皮 1.5 克 儿茶 1.5 克 乳香 1.5 克 没药 1.5 克 五倍子 (焙黄) 1.5 克

制用法：先将珍珠用坩锅微煨，五倍子焙黄，再将各药混合在一起，研成很细的粉末。用吹药器具或细竹管吹敷病儿的病伤部位，吹药后让病儿低下头流涎水。1 日吹敷 2 次，每次连吹 3 遍，每 10 分钟吹 1 遍。

8. 无论哪种白喉，一般都可用二根汤。服二根汤的同时，可吹敷雄硼散。

二根汤：

芦苇根 板蓝根各 30 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，令病儿缓缓地口服。

雄硼散：

雄黄 3 克 硼砂 6 克 梅花冰片 0.3 克 白矾 6 克 青黛 6 克

制用法：将这几样药合在一起，研成细粉。用吹药器具或细竹管吹敷咽喉部位。

如果用上方药无效时，应及时到医院就诊。

十、急惊风引起的发烧

急惊风是中医的称谓，西医称之为脑膜炎，或流行性脑膜炎。多发生在冬季和春季。不论是婴儿或是年龄较大的儿童，都有被传染上的可能。小儿得了急惊风，如果治得不对头，就会造成不好的后果。

小儿被传染上急惊风，一般多是突然发烧，怕冷，头痛剧烈，尤其是后脑部痛得更严重，背部和四肢酸痛，不愿意吃东西，恶心呕吐，有的还拉肚子，而且往往引起抽风。有

的小儿刚一得病就昏迷不醒，有的小儿病过二三天就昏昏昏迷，糊里糊涂。头向后背，如果令其头向前弯屈，就痛得厉害，引起哭叫，口张不开，脖项直硬，皮肤知觉锐敏，并常出现一些皮肤疹子，这些疹子很快又看不见了。有一少部分病儿皮下有出血现象。以后病儿就说胡话，烦躁不安，严重的时候，昏睡或发惊抽搐。有的一直是高烧，有的是一阵阵地发高烧。婴儿得了急惊风，大部分是大囟门搏动紧张而膨胀，眼睛斜视，眼皮下垂，瞳仁散大，或左右瞳仁大小不一样，也有口眼歪斜的。

【预防】

1. 要让病儿和别的孩子分开住、分开吃，也不让他们在一起玩耍。病儿的衣服、用具和玩具等，应经常进行蒸煮和日晒消毒。

2. 健康的小儿要是接触了病儿，可服银翘青叶汤。

银翘青叶汤：

连翘 6 克 金银花 6 克 大青叶 3 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，令小儿当茶饮。每次服药需连服 3 天。

【治法】

1. 小儿得了急惊风，初期多是突然发烧、怕冷、头痛，可服用麻翘石膏汤，或用大青叶 30 克熬成稠汤。1 岁以内的小儿，分 4 次服；1~3 岁的小儿，分 3 次服；3~6 岁的小儿，分 2 次服。可用抗生素配合治疗。

2. 在病儿的后脑部痛得厉害，背部和四肢酸痛，恶心呕吐，不安静，并抽搐的时候，除用麻翘石膏汤外，还须加服蝎蚕珀牛散或青蝉散。

蝎蚕珀牛散：

全蝎 2.5 克 僵蚕 7.5 克 琥珀 7.5 克 天麻 7.5 克
川贝母 10 克 赤金珀 1 张 牛黄 0.5 克 麝香 0.3 克 梅
花冰片 0.3 克

制服法：将这几样药合在一起，研成细粉。1 岁以内的小儿，每次服 0.1~0.3 克；1~3 岁的小儿，每次服 0.12~0.45 克；3~6 岁的小儿，每次服 0.3~0.6 克；6~9 岁的小儿，每次服 0.5~0.9 克；9~12 岁的小儿，每次服 0.6~1.2 克。1 日服 3 次，开水送下。

青蝉散：

大青叶 30 克 蝉蜕 30 克

制服法：将这两样药研成细粉。1 岁以内的小儿，每次服 0.2~0.6 克；1~3 岁的小儿，每次服 0.24~0.9 克；3~6 岁的小儿，每次服 0.6~1.2 克；6~9 岁的小儿，每次服 0.9~1.8 克；9~12 岁的小儿，每次服 1.2~2.4 克。1 日服 3 次，开水送下。

3. 在病儿昏迷不醒、头向后背、口张不开、脖项直硬、发高烧、说胡话、烦躁不安、发惊抽风的时候，用银葛桂枝汤。

银葛桂枝汤：

金银花 18 克 连翘 18 克 大青叶 18 克 粉葛根 10 克
嫩桂枝 10 克 生白芍 10 克 僵蚕 10 克 蝉蜕 10 克 生甘
草 3 克 生姜 10 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，合在一起，约煎取 1 大茶杯。1 岁以内的小儿，分 6 次服；1~3 岁的小儿，分 5 次服；3~6 岁的小儿，分 4 次服；6~9 岁的小儿，分 3 次服；9~12 岁的小儿，分 2 次服。每 4 小时服 1 次。

4. 在病儿一直高烧不退，或一阵一阵地发高烧，不愿意吃东西的时候，用蚕蝉雄星散。

蚕蝉雄星散：

僵蚕 6 克 全蝎 6 克 蜈蚣 6 克 明雄黄 6 克 胆南星 6 克 蝉蜕 6 克 天竺黄 6 克 麝香 0.6 克

制服法：将这几样药合在一起，研成细粉。1 岁以内的小儿，每次服 0.15~0.3 克；1~3 岁的小儿，每次服 0.3~0.6 克；3~6 岁的小儿，每次服 0.45~0.9 克；6~9 岁的小儿，每次服 0.6~1.2 克。每 4 小时服 1 次，用温开水冲服。

5. 婴儿得了急惊风，脉搏变得快而无力，有些乱，大囟门膨胀，眼睛斜视，眼皮下垂，瞳仁散大或左右瞳仁不一样，口眼歪斜，或拉肚子的时候，用参麝樟脑散。

参麝樟脑散：

红人参 3 克 樟脑 3 克 麝香 0.9 克

制服法：共研为细粉。1 岁以内的小儿，每次服 0.06~0.15 克；1~3 岁的小儿，每次服 0.09~0.18 克；3~6 岁的小儿，每次服 0.18~0.3 克；6~9 岁的小儿，每次服 0.3~0.6 克；9~12 岁的小儿，每次服 0.5~0.9 克。1 日服 3 次。

6. 在病儿昏迷不省人事、口眼歪斜、手足抽动的时候，用附星散。

附星散：

白附子 36 克 明天麻 6 克 生南星 6 克 防风 6 克
白芷 6 克

制服法：将这几样药合在一起，研成细粉。服药的方法与参麝樟脑散相同。

咳 嗽

一、伤风受凉咳嗽

给小儿脱换衣服注意不够，或是夜里睡觉没有盖好被子，就容易伤风受凉。起初是发烧，怕冷，咳嗽，大部分病儿先是干咳，随后出现粘痰。多数病儿发烧在2天左右就自行退烧，但是咳嗽不止，一部分病儿逐渐消瘦，精神不佳，厌食，呼吸短促。

【预防】

根据天气冷热给小儿增减衣服；夜里小儿睡觉，褥子不能铺得太厚或太薄，被子不要盖得太多或太少，冬天最好把小儿的被子缝到褥子上，防止其蹬开被子。饮食方面，要给小儿多吃青菜、水果及其他有营养的食物。

【治法】

1. 小儿伤风受凉，发烧，怕冷，咳嗽，气喘，出汗，可用五虎汤。

五虎汤：

麻黄6克 杏仁9克 生石膏18克 生甘草3克 绿茶叶6克

煎服法：一剂药煎2遍，兑在一起，约煎取1茶杯。1岁以内的小儿，分5次服；1~3岁的小儿，分4次服；3~6岁的小儿，分3次服；6~9岁的小儿，分2次服。每6小时服1次。

2. 小儿伤风受凉，发烧，怕冷，咳嗽，气喘，无汗，头痛，全身疼痛，用麻黄汤。

麻黄汤：

麻黄 9 克 杏仁 9 克 桂枝 6 克 生甘草 3 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 大茶杯。1 岁以内的小儿，分 8 次服；1~3 岁的小儿，分 7 次服；3~6 岁的小儿，分 6 次服；6~9 岁的小儿，分 5 次服；9~12 岁的小儿，分 4 次服。每 4 小时服 1 次。服药以汗出热退为止。

3. 小儿伤风受凉以后，无论有汗无汗，发热或不发热，都可用麻翘石膏汤。

4. 小儿咳嗽有痰，可用加减二陈汤。

二陈汤：

桔梗 9 克 茯苓 12 克 橘皮 9 克 清半夏 9 克 生甘草 3 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 茶杯。1 岁以内的小儿，分 5 次服；1~3 岁的小儿，分 4 次服；3~6 岁的小儿，分 3 次服；6~9 岁的小儿，分 2 次服。每 6 小时服 1 次。

5. 小儿伤风咳嗽，发烧，胃脘部胀满，厌食，可用加减参苏饮。

参苏饮：

人参 3 克（或用党参 10 克） 紫苏叶 9 克 前胡 9 克 葛根 9 克 枳壳 9 克 橘皮 9 克 清半夏 9 克 茯苓 9 克 桔梗 9 克 广木香 3 克 生甘草 3 克 生姜 9 克 大枣 3 枚

煎服法：与五虎汤同。

6. 小儿平素经常咳嗽，吐泡沫痰，气喘，四肢发冷，可用小青龙汤。

小青龙汤：

桂枝 3 克 芍药 9 克 麻黄 3 克 干姜 3 克 细辛 1.5 克
五味子 9 克 清半夏 9 克 生甘草 3 克

煎服法：与五虎汤同。

7. 如果小儿发烧已退，但仍咳嗽，气喘，喉中有痰，可用麻杏橘半汤。

麻杏橘半汤：

麻黄 6 克 杏仁 9 克 生石膏 18 克 橘皮 9 克 清半夏 9 克 茯苓 12 克 生甘草 3 克

煎服法：与五虎汤同。

8. 小儿慢性咳嗽日久不愈，只咳不发烧，可用加减清肺饮子。

清肺饮子：

毛橘红 9 克 五味子 6 克 桔梗 6 克 杏仁 9 克 茯苓 12 克 浙贝母 15 克 生甘草 6 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 茶杯。1 岁以内的小儿，分 5 次服；1~3 岁的小儿，分 4 次服；3~6 岁的小儿，分 3 次服；6~9 岁的小儿，分 2 次服。每 6 小时服 1 次，或 1 日服 3 次。

9. 小儿不发烧，咳嗽日久不愈，如果发病在春天又出现流清鼻涕，可用苏防橘贝汤。

苏防橘贝汤：

紫苏叶 6 克 防风 9 克 毛橘红 9 克 五味子 9 克 桔梗 6 克 贝母 15 克 薄荷 3 克 黄芩 6 克 麦门冬 10 克 茯苓 12 克

煎服法：与加减清肺饮子同。

10. 小儿不发烧，咳嗽日久不愈，如果在炎热的夏天，

可用知冬橘贝汤。

知冬橘贝汤：

肥知母 9 克 麦门冬 9 克 黄芩 9 克 毛橘红 9 克 五味子 6 克 桔梗 6 克 杏仁 9 克 贝母 15 克 生石膏 9 克 桑白皮 9 克 生甘草 3 克

煎服法：与加减清肺饮子同。

11. 小儿不发烧，咳嗽日久不愈，发病在秋季，可用苍防橘贝汤。

苍防橘贝汤：

茅苍术 9 克 防风 9 克 毛橘红 9 克 五味子 6 克 桑白皮 9 克 黄芩 6 克 桔梗 6 克 贝母 15 克 茯苓 12 克 生甘草 3 克

煎服法：与加减清肺饮子同。

12. 小儿不发烧，咳嗽日久不愈，发病在寒冷的冬季，可用麻桂橘贝汤。

麻桂橘贝汤：

麻黄 3 克 桂枝 3 克 毛橘红 9 克 五味子 6 克 清半夏 9 克 干姜 3 克 桔梗 6 克 贝母 15 克 防风 6 克 生甘草 3 克

煎服法：与加减清肺饮子同。

13. 小儿不发烧，咳嗽日久不愈，按照不同的季节用药可以收到良好的效果。如果小儿咳嗽早晨重，或仅在早晨咳嗽，可在上面介绍的各季药方内加黄连 3 克，生石膏 10 克。如果夜里咳嗽重，或仅在夜里咳嗽，可在上面介绍的各季药方内加诃子皮 3 克。

14. 小儿一般干咳，可用冬杏散。

冬杏散：

天门冬 炒杏仁 生甘草各等份

制服法：将这三样药合在一起，研成细粉。1岁以内的小儿，每次服0.15~0.3克；1~3岁的小儿，每次服0.3~0.6克；3~6岁的小儿，每次服0.6~0.9克；6~9岁的小儿，每次服0.9~1.2克；9~12岁的小儿，每次服1.2~3克。每4小时服1次，温开水冲服。

15. 一般小儿咳嗽有痰，可用桔半三黄散。

桔半三黄散：

苦桔梗 炒杏仁 条黄芩 锦大黄 麻黄 清半夏 云茯苓各30克

制服法：将这几样药合在一起，研成细粉。服药的方法与冬杏散相同。

16. 小儿长期咳嗽，有痰，气喘，可用星贝芥子散，或用皂星莱菔丸。

星贝芥子散：

天南星6克 象贝母6克 白芥子6克 清半夏6克
牙皂角3克 生甘草3克

制服法：将这几样药合在一起，研成细粉。1岁以内的小儿，每次服0.06~0.15克；1~3岁的小儿，每次服0.15~0.3克；3~6岁的小儿，每次服0.3~0.45克；6~9岁的小儿，每次服0.45~0.6克；9~12岁的小儿，每次服0.6~1.5克。每4小时服1次，温开水冲服。

皂星莱菔丸：

牙皂角30克 天南星30克 莱菔子30克 明白矾15克
干姜15克 瓜蒌仁30克

制服法：将这几样药合在一起，研成细粉，用蜂蜜为

丸，如绿豆大。1~3岁的小儿，每次含咽半丸至1丸；3~6岁的小儿，每次含咽1~2丸；6~9岁的小儿，每次含咽2~3丸；9~12岁的小儿，每次含咽3~6丸。1日2~3次。

17. 咳嗽时间过长或服其他药无效时，可用桃茶膏。

桃茶膏：

核桃仁（炒焦为末）30克 绿茶叶（炒焦为末）6克
蜂蜜（炼）适量

制法：前二味研匀，用蜂蜜调膏，每次半调羹含咽（用量根据小儿体质情况酌情增减）。

二、肺炎咳嗽

肺炎咳嗽，主要是由于小儿遭受风寒，或是尘埃侵入肺间，或是其他疾病引起。多发生在冬天和春天。年龄越小的孩子，患病就越严重，危险性也越大。但是，只要认清病情，及时进行治疗，就可以很快治愈。

小儿患肺炎，多数咳嗽逐渐加重，呼吸困难，突然高烧，嘴唇和四肢成青紫色，发惊，昏迷，四肢发凉，精神极差或烦躁不安，鼻翼煽动，肋骨下边出现深凹，厌食。身体壮实的小儿，有时大便不利；身体虚弱的小儿，有时不烧，但是呼吸更为困难，甚至呕吐及腹泻。

有些小儿在发病以前呕吐、腹泻、腹痛，往往错认成肠胃病。有的小儿在发病以前还有头痛、发惊和抽搐现象。发病时突然高烧，过几天又突然烧退。通常病儿在发烧的第2天开始咳嗽、胸部痛，咳嗽时咯出铁锈色粘痰（年龄太小的孩子咯不出痰来），同时呼吸困难，嘴唇和手脚梢成青紫色，颜面发红，尤其右侧面部较重，嘴唇部出现疱疹，皮肤

上出现红色疹子。

有的小儿在患麻疹、百日咳或流行性感冒等病期间，突然高烧，咳嗽气喘加重，呼吸困难，呕吐，脚梢手梢成青紫色，即是并发肺炎。

出生2个月左右的婴儿患肺炎，大多数不发烧，颜面为青色，呼吸困难，咳嗽逐渐加重。

【预防】

1. 要将病儿与别的孩子隔离。

2. 小儿住的房屋要冷暖适宜，脱换衣服要谨防受凉。另外，小儿的饮食也要加以节制。

【治法】

肺炎咳嗽的种类虽然有多种，但是治疗方法大体相同。

1. 患肺炎的病儿，一般都可用麻翘石膏汤。

2. 病儿平常身体壮实，病后大便不利，除服麻翘石膏汤外，可加服枳星牛黄散。

枳星牛黄散：

生枳壳 30 克 胆南星 15 克 黑牵牛 15 克 酒大黄 30 克

制服法：将这几样药合在一起，研成细粉。1岁以内的小儿，每次服 0.15~0.3 克；1~3 岁的小儿，每次服 0.3~0.6 克；3~6 岁的小儿，每次服 0.6~1.2 克；6~9 岁的小儿，每次服 1.2~1.5 克；9~12 岁的小儿，每次服 1.5~3 克。1 日服 3 次，温开水或糖开水送下。

3. 小儿平常身体壮实，病后大便干燥或正常，厌食，烦躁不安，除服麻翘石膏汤外，可加服星蚕雄砂散或星霜散。

星蚕雄砂散：

胆南星 3 克 僵蚕 3 克 薄荷 3 克 杏仁 3 克 巴豆霜 6 克 明雄黄 6 克 清半夏 3 克 朱砂 6 克 钩藤 3 克

制服法：将这几样药合在一起，研成很细的粉末。1 岁以内的小儿，每次服 0.06~0.12 克；1~3 岁的小儿，每次服 0.12~0.15 克；3~6 岁的小儿，每次服 0.15~0.18 克；6~9 岁的小儿，每次服 0.18~0.3 克；9~12 岁的小儿，每次服 0.3~0.5 克。1 日服 2 次，温开水送下。

星霜散：

胆南星 6 克 巴豆霜 6 克 明雄黄 6 克 朱砂 3 克 青黛 30 克 毛橘红 9 克 全蝎 6 克 僵蚕 12 克 大黄 9 克 东楂肉 9 克

制服法：与星蚕雄砂散相同。

或在麻翘石膏汤内加大青叶 30 克煎服。

4. 病儿昏迷，除服麻翘石膏汤外，可加服参麝樟茶散。

参麝樟茶散：

丽参 3 克 麝香 0.9 克 樟脑 3 克 绿茶叶 3 克

制服法：将这几样药合在一起，研成细粉。1 岁以内的小儿，每次服 0.09~0.18 克；1~3 岁的小儿，每次服 0.18~0.24 克；3~6 岁的小儿，每次服 0.24~0.3 克；6~9 岁的小儿，每次服 0.3~0.6 克；9~12 岁的小儿，每次服 0.6~1.2 克。1 日服 3 次，温开水或糖开水送下。

5. 病儿昏迷，烦躁不安，除服麻翘石膏汤外，可加服参星蝉砂散。

参星蝉砂散：

丽参 7.5 克 胆南星 7.5 克 明雄黄 7.5 克 蝉蜕 7.5 克 朱砂 15 克 神曲 15 克 琥珀 7.5 克

制服法：与参麝樟茶散相同。

6. 病儿如果呕吐和腹泻，或身体虚弱，可服桑贝散。

桑贝散：

丽参 6 克 花粉 12 克 桑白皮 12 克 地骨皮 1.2 克
川贝母 12 克 浙贝母 12 克 全蝎 3 克 麝香 0.12 克 清
半夏 6 克 生甘草 3 克

制服法：将这几样药合在一起，研成细粉。1 岁以内的小儿，每次服 0.15~0.3 克；1~3 岁的小儿，每次服 0.3~0.6 克；3~6 岁的小儿，每次服 0.6~0.9 克；6~9 岁的小儿，每次服 0.9~1.5 克；9~12 岁的小儿，每次服 1.5~3 克。1 日服 3 次，温开水送下。

7. 肺炎咳嗽的病儿，须配合服用消炎药。

三、百日咳

阵阵咳嗽是百日咳的特点，一般白天咳轻，夜里咳重。年幼的小儿患病较多，而且多发生在冬、春两季。一旦发病，会传染给其他小孩，给小儿的精神上造成很大痛苦。

初期病儿每次咳嗽五六声，喉咙里有痰声，鼻子不通，喷嚏，厌食，发烧，口臭，腹胀，有的大便不利，有的腹泻。

发病后 20 天左右，病儿咳嗽加重，每次咳嗽十多声，甚至几十声、几百声，连续不断，夜间咳重。咳嗽时，常有好像鸡叫一样的吸气声，吐出胶样粘痰，病儿流鼻涕和眼泪，呕吐，脸和眼睛发红，嘴唇青紫。咳嗽严重的，常常在咳嗽的时候，憋得病儿流鼻血，痰中带血，或者咳嗽时遗尿、遗屎。

再经过半月左右（恢复期），病儿咳嗽和缓，连续咳嗽

的时间较前缩短，呕吐减轻，或不呕吐，饭量较前增加。如果没有其他并发症，大约经过七八十天，病儿就会慢慢恢复正常。

【预防】

1. 发现病儿要立即隔离。

2. 健康小儿可用萝卜缨煎水（最好加些白糖）当茶饮，或用生萝卜汁点鼻，或用大蒜汁加甘油（或蜂蜜）点鼻，或用贯众煎浓汁点鼻。1日3次，连用3天。亦可用百日咳疫苗注射。

3. 与病儿接触过的小儿，可予贯众3克，连翘15克，水煎当茶饮，连喝3天。

【治法】

1. 阵咳初期，可用杏苏饮或麻翘石膏汤。

杏苏饮：

紫苏9克 杏仁9克 前胡6克 桔梗6克 贝母12克 橘皮6克 生甘草1.5克

煎服法：一剂药煎2遍，兑在一起，约煎取1茶杯。1~3岁的小儿，分4次服；3~6岁的小儿，分3次服；6~9岁的小儿，分2次服。每6小时服1次。

2. 阵咳初期，咳嗽、发烧很轻，微喘，可用麻杏石甘汤。

麻杏石甘汤：

麻黄3克 杏仁9克 生石膏9克 生甘草3克

煎服法：与杏苏饮同。

3. 阵咳初期，如果病儿精神差，或身体虚弱，可在麻翘石膏汤内加生黄芪18克，大野党参9克。煎服的方法与麻翘石膏汤相同。

4. 初期的阵阵咳嗽，可用氯霉素或金霉素内服。1岁以内的小儿，每次服半片；1~3岁的小儿，每次服1片；3~6岁的小儿，每次服1片半；6~9岁的小儿，每次服2片。每4小时服1次。

5. 病儿每阵咳嗽十几声，甚至几十声、几百声，呼吸困难，可用四黄星防散。

四黄星防散：

麻黄 22.5 克 姜黄 7.5 克 大黄 7.5 克 天竺黄 5 克
荆芥 15 克 防风 15 克 僵蚕 22.5 克 蝉蜕 7.5 克 胆南
星 7.5 克 陈橘皮 7.5 克 薄荷 15 克 冰片 3 克

制服法：将这几样药合在一起，研成很细的粉末。1~3岁的小儿，每次服 0.3~0.6 克；3~6岁的小儿，每次服 0.6~0.9 克；6~9岁的小儿，每次服 0.9~1.2 克；9~12岁的小儿，每次服 1.2~3 克。1日服3次，温开水送下。

6. 咳嗽连续不断，颜面发红，流鼻涕，流眼泪，咯痰不利，发出好像鸡叫一样的吸气声时，可用麻贝苏子散。

麻贝苏子散：

麻黄 60 克 川贝 6 克 苏子 9 克 枳壳 6 克 陈橘皮 9
克 百部 6 克 桔梗 6 克 青蒿 6 克 东山楂 6 克 清半夏
6 克 旋覆花 6 克 桑白皮 6 克 牛蒡子 6 克 葶苈子 6 克

制服法：与四黄星防散同。

7. 病儿咳嗽时呕吐厉害，身体虚弱，可用芪贝银半汤。

芪贝银半汤：

生黄芪 20 克 川贝母 9 克 陈皮 6 克 清半夏 9 克
连翘 9 克 金银花 9 克 云茯苓 6 克 麝香 0.09 克（冲服）

煎服法：一剂药煎2遍，兑在一起，约煎取1茶杯。1岁以内的小儿，分4次服；1~3岁的小儿，分3次服；3~

6岁的小儿，分2次服。在服药时，先将麝香用水冲服，再服汤药。1日3次。

8. 小儿咳嗽、呕吐较严重，居地偏僻而不易配药时，四黄星防散、麻贝苏子散和芪贝银半汤三个方剂，可以单独服用，也可以交替服用。

9. 病儿阵咳严重，也可以用艾橘汤。

艾橘汤：

生艾叶 12 克 橘皮 6 克 生姜 6 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 茶杯。

1~3 岁的小儿，分 4 次服；3~6 岁的小儿，分 3 次服；6~9 岁的小儿，分 2 次服。每 6 小时服 1 次。

10. 在病儿服汤药期间，也可同时内服消炎药。

11. 病儿阵咳延缓、时间缩短的恢复期，可用天冬合剂。

天冬合剂：

天门冬 15 克 麦门冬 15 克 百部 9 克 毛橘红 6 克

清半夏 6 克 瓜蒌仁 6 克 竹茹 6 克

病儿流鼻血，加茅根 6 克，藕节 21 克；面部和眼睛发肿，加葶苈子 1.5 克。

煎服法：与芪贝银半汤相同。

四、哮喘咳嗽

哮喘咳嗽是一种比较常见的小儿病，常常是由于小儿受凉，或是消化不好，或是受到刺激，或是其他疾病引起。一般平素身体虚弱的小儿容易患此病。

发病以前，小儿常是先有 1 天或 2 天的咳嗽，接着在夜里突然呼吸困难，咳嗽喘鸣，大部分病儿的面部、口唇和四

肢都变成青紫色，出大汗，常吐出少量粘痰。每次发作的时间长短不一，有的不经过治疗在几十分钟或几个钟头以内就可以自愈，有的经数天治疗也不愈。有的几个月发作1次，有的几天发作1次。病儿一般不发烧，或仅有轻微的发烧。

【预防】

给小儿多吃富有营养的食物，还应多吃野菜、青菜，增强身体对疾病的抵抗力，尤应注意不要使小儿精神上受到刺激。

【治法】

1. 小儿患哮喘咳嗽，呼吸困难，宜用麻翘石膏汤。

2. 病儿的面部、口唇和四肢都变成青紫色，除服麻翘石膏汤外，并宜服桑茅散。

桑茅散：

白茅根 桑叶 地骨皮 枳壳各 15 克

制服法：将这几种药合在一起，研成细粉。1~3岁的小儿，每次服0.3~0.6克；3~6岁的小儿，每次服0.6~1.2克；6~9岁的小儿，每次服1.2~2克。1日服3次，温开水送下。

3. 病儿咳嗽声哑，可用加味五虎汤。

加味五虎汤：

麻黄 3 克 杏仁 9 克 生石膏 9 克 生甘草 3 克 射干 6 克 马兜铃 6 克 绿茶叶 3 克

煎服法：一剂药煎2遍，兑在一起，约煎取1茶杯。1~3岁的小儿，分4次服；3~6岁的小儿，分3次服；6~9岁的小儿，分2次服。每4小时服1次。

4. 如果病儿咳嗽汗多，除服加味五虎汤外，可加服蛤黛散。

蛤黛散：

蛤粉 青黛 枳壳各 9 克

制服法：与桑茅散同。最好在服药时加些蜂蜜或白糖。

5. 小儿患病日久，发作次数多，可用加减小青龙汤。

小青龙汤：

嫩桂枝 6 克 杭白芍 9 克 干姜 3 克 北细辛 1 克 清半夏 9 克 五味子 9 克 麻黄 3 克 生石膏 9 克 生甘草 3 克

煎服法：与加味五虎汤同。

6. 病儿咳喘发作时，病情严重，宜先予西医对症治疗，然后根据病情，按上面介绍的方剂服药。

7. 病儿哮喘咳嗽时间长，或久害癆病（结核），身体虚弱，或有心脏病，可用桃茶杏蜜膏。

桃茶杏蜜膏：

核桃仁（炒焦为末）60 克 绿茶叶（炒焦为末）60 克 银杏（白果炒为末）60 克 蜂蜜（炼）240 克

制服法：前三味药研匀，用蜂蜜调膏，每服半调羹至 1 调羹。1 日 3 次，温开水送服（剂量可根据情况增减）。

8. 小儿咳嗽时间久，可用龙莠散。

龙莠散：

苏地龙 15 克 牛蒡子 15 克 川楝子 15 克 炒枳壳 9 克 制香附 15 克 生牡蛎 20 克 大青盐 4.5 克

制服法：将这几样药合在一起，研成细粉。服药的方法与桑茅散相同。

9. 病儿咳嗽、哮喘，时轻时重，久治不效，可用梨姜膏。

梨姜膏：

大梨汁 120 克 生姜汁 30 克 南杞叶 30 克 蜂蜜 120 克

制用法：将这几样药合在一起，熬成膏。1~3 岁的小儿，每次服 10~15 克；3~6 岁的小儿，每次服 15~30 克；6~9 岁的小儿，每次服 30~60 克。1 日服 2~3 次。

10. 小儿咳嗽气短，病久，发作次数多，可用梨橘膏，或用冬百膏。

梨橘膏：

大梨 240 克 白藕 240 克 白萝卜 240 克 胡桃仁 240 克 毛橘红粉 6 克 蜂蜜 500 克

制用法：将前三样药捣烂取汁，再把后三样药投入，熬成膏。每天在小儿睡觉前予服 1~2 调羹。

冬百膏：

麦门冬 60 克 天门冬 60 克 知母 60 克 贝母 60 克 款冬花 90 克 生百合 180 克 杏仁（炒）45 克

制用法：上七味用水煎熬 3 遍，去渣，澄清，将药汁熬至 1/3，入白蜂蜜 480 克，核桃仁（研末）120 克，熟猪油 45 克，冰糖 120 克，再熬成膏。每次服半调羹至 1 调羹，早晚各服 1 次，温开水送服或含咽，夜间睡醒后再含咽 1 次，共 3 次。

泄 泻

一、上吐下泻

小儿上吐下泻，主要是因为胃肠功能差，吃了不熟的瓜

果，或吃了将要腐败和不干净的食物引起。起病很快，上吐下泻，腹痛，头痛，发高烧（也有不发热的），精神差，病儿逐渐消瘦，面色苍白，眼窠凹下。吐泻多是水样物，带有食物残渣及粘液，腐臭。一般病儿睡觉不安，烦躁啼哭，不爱吃东西，尿色黄，尿少，腹部胀满。病情比较重的，皮肤干涩，四肢冰冷，口干渴又不想喝水，口臭，暖气，小腿肚转筋，或脖项强硬，虚脱，嗜睡，抽搐等。

【预防】

1. 消灭苍蝇，注意饮食卫生。
2. 不要让小儿吃不熟的瓜果和腐败霉变的食物。

【治法】

1. 平素身体壮实的小儿，突然上吐下泻，宜先服加减大黄干姜散，续服加味芩连木通汤。

大黄干姜散：

大黄 6 克 干姜 6 克 硫酸镁 15 克（或芒硝 15 克）

制服法：将这几样药合在一起，研成细粉。1 岁以内的小儿，每次服 0.3~0.6 克；1~3 岁的小儿，每次服 0.6~1.2 克；3~6 岁的小儿，每次服 1.2~1.5 克；6~9 岁的小儿，每次服 1.5~3 克。1 日服 2 次，温开水或蜂蜜水送下。

芩连木通汤：

黄芩 9 克 黄连 3 克 木通 9 克 茯苓 12 克 白术 9 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 茶杯。1 岁以内的小儿，分 5 次服；1~3 岁的小儿，分 4 次服；3~6 岁的小儿，分 3 次服；6~9 岁的小儿，分 2 次服。每 6 小时服 1 次。

2. 患儿烦躁，口渴，小便不利，可服六一散，续服加

味葛根芩连汤。

加味葛根芩连汤：

葛根 10 克 黄芩 10 克 黄连 3 克 白芍 10 克 茯苓 10 克 生甘草 3 克

煎服法：与加味芩连木通汤同。

3. 病儿平素身体虚弱，吐泻较轻的，可服参砂散，或用龙石散。

参砂散：

丽参 7.5 克 白术 7.5 克 茯苓 7.5 克 砂仁 6 克 生黄芪 15 克 诃子肉 7.5 克

制服法：将这几样药合在一起，研成细粉。1 岁以内的小儿，每次服 0.15~0.3 克；1~3 岁的小儿，每次服 0.3~0.6 克；3~6 岁的小儿，每次服 0.6~1.2 克；6~9 岁的小儿，每次服 1.2~2 克。1 日服 3 次，温开水冲服。

龙石散：

煅龙骨 6 克 赤石脂 6 克 诃子肉 6 克 缩砂仁 3 克 明白矾 6 克 广木香 3 克

制服法：将这几样药合在一起，研成细粉。服药的方法与参砂散相同。

4. 一般上吐下泻的病儿，都可服雄矾砂丹散。

5. 小儿腹泻次数多，啼哭，腹痛，用诃香散。

诃香散：

诃子（煨）18 克 广木香 3 克 肉豆蔻（煨）3 克 干姜 6 克

制服法：与雄矾砂丹散相同。

6. 如果病儿吐泻严重，引起脱水，可服参麝樟脑散。病儿虚脱严重的，应送到附近医院治疗。

二、急性泄泻

小儿急性腹泻，多是由于伤风受凉，或猛吃猛喝，或吃了不洁食物。发病很急，突然发高烧（也有不发热的），腹痛，下泻，也有呕吐的，严重的发生抽搐和四肢发硬。病变在小肠的，粪便内常常有不消化的食物残渣，大便稀，有粘液；病变在大肠的，粪便多是粘液。一般病儿，一日泻十几次以上，里急后重，有时粪便内混血及很多血块。多数病儿可在左侧小腹部位摸到长条的硬结。

【预防】

对小儿的乳食要加以节制，不要多给小儿吃油腻、生冷食物。

消灭苍蝇，注意饮食卫生。

【治法】

1. 小儿一般急性腹泻，可在病儿的大趾隐白穴用消过毒的针速刺放血。

2. 小儿急性腹泻，一般可服泽泻白术汤，或服雄矾砂丹散。

泽泻白术汤：

泽泻10克 茯苓10克 白术10克 木香3克 陈皮6克 香薷6克 厚朴10克 白扁豆10克

煎服法：一剂药煎2遍，兑在一起，约煎取1茶杯。1~3岁的小儿，分5次服；3~6岁的小儿，分4次服；6~9岁的小儿，分3次服；9~12岁的小儿，分2次服。每4小时服1次。

3. 如果病儿腹中雷鸣，可服生姜泻心汤。

生姜泻心汤：

清半夏 10 克 黄芩 10 克 人参 3 克（或用党参 10 克）
黄连 3 克 茯苓 12 克 生甘草 3 克 生姜 12 克 大枣 3 枚
煎服法：与泽泻白术汤同。

三、慢性泄泻

小儿急性腹泻，如果治疗不当，或是小儿乳食过多、过饱，难以消化，或受凉，都能引起慢性腹泻。一般病儿，一天大便数次，或十几次，粪像粥样、泥样或是水样，粪便内多混有粘液，并伴腹胀、阵发性腹痛、腹鸣，消瘦，面色苍白，有时全身肿胀。

【预防】

除按照急性腹泻的预防方法预防外，并应积极治疗急性腹泻，以免转成慢性。

【治法】

1. 小儿慢性腹泻，一般可服胃苓汤，或服雄矾砂丹散。

胃苓汤：

茅苍术 10 克 广陈皮 10 克 厚朴 10 克 茯苓 12 克
猪苓 6 克 泽泻 10 克 桂圆 1 克 生甘草 3 克 生姜 10 克
大枣 3 枚

煎服法：与泽泻白术汤同。

2. 小儿腹泻日久，阵发性腹痛，有时全身发肿，可服参砂散。

3. 小儿慢性腹泻，一般均可服锅粑莲肉散，或用硫滑散。

锅粑莲肉散：

焦锅粑（炒） 熟莲肉 白糖各 60 克

制服法：将这几样药合在一起，研成细粉。1~3岁的小儿，每次服3~6克；3~6岁的小儿，每次服6~12克；6~9岁的小儿，每次服12~15克；9~12岁的小儿，每次服15~30克。1日服3次，温开水送下。

硫滑散：

硫黄 滑石各3克

制服法：将这两样药合在一起，研成细粉。1~3岁的小儿，每次服0.06~0.12克；3~6岁的小儿，每次服0.12~0.15克；6~9岁的小儿，每次服0.15~0.24克；9~12岁的小儿，每次服0.24~0.3克。1日服3次，温开水送下。

4. 小儿慢性腹泻，腹部发凉，腹痛，可用蔻姜散。

蔻姜散：

肉豆蔻 30克 建神曲 15克 炒小茴香 7.5克 干姜 7.5克 滑石 12克 生甘草 3克

制服法：将这几样药合在一起，研成细粉。1~3岁的小儿，每次服0.1~0.12克；3~6岁的小儿，每次服0.12~0.15克；6~9岁的小儿，每次服0.15~0.3克；9~12岁的小儿，每次服0.3~0.6克。1日服3次，温开水送下。

5. 慢性腹泻日久的，可用榴香散。

榴香散：

石榴皮（炒）30克 广木香 30克 明白矾 15克 诃子肉 30克

制服法：将这几样药合在一起，研成细粉。1~3岁的小儿，每次服0.15~0.3克；3~6岁的小儿，每次服0.3~0.6克；6~9岁的小儿，每次服0.6~1.2克；9~12岁的

小儿，每次服 1.2~1.5 克。1 日服 3 次，温开水送服。

痢 疾

痢疾是一种传染病，一年四季都可发病，尤其在夏天和秋天发病较多。根据痢疾症状的不同，发病的急慢不同，可分为中毒性痢疾、红白痢疾（急性）和休息痢疾（慢性）三大类。兹分别介绍如下：

一、毒痢

毒痢，亦称疫毒性痢疾、暴发型痢疾，是由于小儿吃了不洁食物，饮用生水，或热毒入内，暑热内闭所引起。其发病很急，变化又快，常常是刚才还精神饱满、嬉戏活泼、玩耍正常的小儿，突然高烧，精神沉闷，恶心呕吐，厌食，昏迷不醒，脸上发黄发白（青黯色或灰黄色），抽风，呼吸不匀，气喘及长叹气，嗜睡，或烦躁不安，谵语，手脚发凉，发抖，口唇和指甲变成青紫色，便脓血和粘冻粪便等。如果治疗不当或治不及时，病儿很快死亡。

【预防】

1. 使小儿养成爱清洁干净，不随地大小便，饭前便后洗手，不用别人的碗筷及茶碗等卫生习惯。
2. 对厨房、厕所和小儿的食具等经常进行消毒，消灭苍蝇。
3. 身体虚弱的小儿应少吃生冷食物及瓜果，并应对小儿饮食加以节制。
4. 注意小儿夜间肚腹勿受凉。
5. 将病儿与别的孩子隔离。病儿用的碗筷和玩具等要

进行消毒。

【治法】

1. 小儿患中毒性痢疾，要及时在病儿的胳膊弯、腿弯、人中、中指端及大拇指指甲内上角一韭叶处等部位，用消过毒的针刺破放血，接着服用加减葛根芩连汤，或服人参败毒散。

加减葛根芩连汤：

粉葛根 10 克 条黄芩 10 克 川黄连 10 克 广藿香 10 克
淡竹茹 10 克 大青叶 20 克 白僵蚕 10 克 净蝉蜕 6 克
钩藤 6 克 生甘草 6 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 茶杯。
1~3 岁的小儿，分 5 次服；3~6 岁的小儿，分 4 次服；6~9 岁的小儿，分 3 次服；9~12 岁的小儿，分 2 次服。每 4 小时服 1 次。

人参败毒散：

桔梗 6 克 人参 6 克 川芎 10 克 茯苓 12 克 枳壳 10 克
前胡 6 克 羌活 6 克 独活 6 克 柴胡 10 克 甘草 3 克

制服法：将这几样药合在一起，研成细粉。1~3 岁的小儿，每次服 0.3~0.6 克；3~6 岁的小儿，每次服 0.6~1.2 克；6~9 岁的小儿，每次服 1.2~1.5 克；9~12 岁的小儿，每次服 1.5~3 克。1 日服 2 次，温开水冲服。

2. 昏迷的病儿，灌服局方至宝丹。1 岁以内的小儿，每次服 1 丸；1~3 岁的小儿，每次服 2 丸；3~6 岁的小儿，每次服 3 丸。1 日服 2 次或 3 次，温开水送下。

3. 如果病儿呼吸不匀，除服加减葛根芩连汤或人参败毒散外，还应加服苏合香丸。

4. 如果发现病儿口唇、指甲变成青紫色，除针刺放血外，须及时给病儿服紫雪丹或安宫牛黄丸，病儿呕吐咽食不下，须到医院进行治疗。

二、红白痢（急性）

患红白痢的小儿，主要是因为脾胃虚弱，消化功能不好，或吃了不干净的食物引起。起病很快，多数小儿突然高烧，呕吐，腹痛，腹泻，粪便稀，继而腹痛加重，腹部雷鸣。年龄过小的病儿，常有抽搐现象。初期病儿的粪便带有食物残渣，大便几次以后便成血脓一样的粘液，气味腥臭，里急后重。病儿腹泻和呕吐严重的，常常引起脱水，感觉口渴，皮肤、嘴唇和舌头干燥，两眼窠陷下，小便减少，不规则发烧。如果治疗延误或治疗不当，病儿的面色变得苍白，嘴唇和指甲变成青紫色，四肢冰冷，有时嘴唇呈现杨梅红色，出气时有苹果一样的酸味，呼吸不匀，烦躁不安，不想吃东西，也可发生昏迷、抽搐。

【预防】

1. 将病儿与别的孩子隔离。病儿用过的东西要勤消毒。
2. 注意饮食卫生，扑灭苍蝇。
3. 痢疾流行时期，可服银翘青叶汤，或服消炎药。

【治法】

1. 小儿红白痢疾，初发病，可服葛根芩苓苦参汤，或服术榆汤、莲柏散。

葛根芩苓苦参汤：

粉葛根 10 克 黄芩 10 克 茯苓 10 克 苦参 10 克 炒谷芽 20 克 生甘草 6 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 茶杯。1

岁以内的小儿，分5次服；1~3岁的小儿，分4次服；3~6岁的小儿，分3次服；6~9岁的小儿，分2次服。每6小时服1次。

术榆汤：

茅苍术 10克 生地榆 10克 神曲 10克 云茯苓 10克
黄芩 10克

煎服法：与葛根芩苓苦参汤同。

莲柏散：

石莲肉 30克 黄柏 15克 槟榔 15克 生地榆 15克

制服法：将这几样药合在一起，研成细粉。1~3岁的小儿，每次服0.3~0.6克；3~6岁的小儿，每次服0.6~1克；6~9岁的小儿，每次服1~1.5克；9~12岁的小儿，每次服1.5~3克。1日服1次，温开水送下。

2. 病儿大便粘液，腹痛加重，可服葛芍芩连汤。

葛芍芩连汤：

粉葛根 10克 黄芩 10克 黄连 3克 杭白芍 10克
生甘草 3克

煎服法：与葛根芩苓苦参汤同。

3. 病儿出现血或脓一样的粪便时，宜服白头翁汤。

白头翁汤：

白头翁 10克 秦皮 10克 黄连 6克 盐炒黄柏 10克

煎服法：与葛根芩苓苦参汤同。

4. 病儿出现抽搐、发惊时，宜服蝎蚕珀牛散，或到医院注射鲁米那，或服矾连散。

矾连散：

明白矾 30克 炒黄连 15克 炒枣仁 30克

制服法：将这三样药合在一起，研成细粉。1岁以内的

小儿，每次服 0.15~0.3 克；1~3 岁的小儿，每次服 0.3~0.6 克；3~6 岁的小儿，每次服 0.6~1.2 克；6~9 岁的小儿，每次服 1.2~1.5 克；9~12 岁的小儿，每次服 1.5~3 克。1 日服 3 次，温开水送下。

5. 如果治疗延迟，病儿脸色变得苍白，四肢冰冷，嘴唇青紫，呼吸不匀，宜服参麝樟脑散，或到医院打强心针。

6. 如果病儿服参麝樟脑散等药无效，或是痢疾日久，可服芩连楂朴汤。

芩连楂朴汤：

黄连 6 克 黄芩 6 克 杭白芍 6 克 东山楂 6 克 枳壳 6 克 陈皮 6 克 厚朴 6 克 槟榔 6 克 当归 6 克 桃仁 3 克 地榆 3 克 红花 3 克 生甘草 3 克

粪便内白脓较多时，去桃仁、地榆，加木香 3 克。

煎服法：与葛根芩苓苦参汤同。

三、休息痢（慢性）

患休息痢的小儿，主要是因为乱吃乱喝，或吃了将要腐败的及苍蝇爬过的食物，邪毒藏于肠胃引起。一般发病缓慢，多不发烧，有轻微的腹痛，里急后重。大便次数较少，每次大便量多，气味腥臭，粪便多是粘液血便，有时粪便正常，有时粪便干燥，但是过几天以后，又会出现粘液血便。这样反复发作经年不愈。大部分病儿吃乳食差，少动，营养不良，瘦弱。

【预防】

与红白痢的预防方法相同。

【治法】

1. 一般小儿休息痢，可服椿皮连朴汤。

椿皮连朴汤：

椿白皮 10 克 黄连 3 克 姜厚朴 10 克 槟榔 10 克
生地榆 20 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 茶杯。
1~3 岁的小儿，分 6 次服；3~6 岁的小儿，分 5 次服；6~
9 岁的小儿，分 4 次服；9~12 岁的小儿，分 3 次服。1 日
服 3 次。

2. 病儿营养不良，身体瘦弱，可服芩连山药汤。

芩连山药汤：

黄连 6 克 党参 10 克 黄芩 10 克 炒莲子肉 30 克
怀山药 30 克 白扁豆 10 克 生甘草 3 克

煎服法：与椿皮连朴汤同。

3. 病儿除服上药外，还可加服西药治痢药。

腹 痛

一、阑尾炎引起的腹痛

阑尾炎俗称盲肠炎。根据发病的急缓，分为急性和慢性两种。常常是小儿正在玩耍时，突然腹痛，恶心呕吐。疼痛先是上腹部或在肚脐的周围，多为阵发性，几个小时以后，疼痛就转移到小腹右侧，疼痛加重，右边大腿屈曲不愿伸直，发烧。也有少数病儿腹痛在右上腹。病情严重的，常是满腹剧烈疼痛。多数病儿大便不利，仅有少数出现泄泻。

【预防】

不要让小儿乱吃东西。发现小儿腹痛的时候，要立刻进行治疗，以免延误病情。

【治法】

1. 阑尾炎不论是急性或是慢性，只要大便不利，发热，即可用大黄牡丹皮汤。

大黄牡丹皮汤：

锦大黄 12 克 牡丹皮 3 克 桃仁 3 克 冬瓜仁 6 克
芒硝 3 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 茶杯。
1~3 岁的小儿，分 6 次服；3~6 岁的小儿，分 5 次服；6~9 岁的小儿，分 4 次服；9~12 岁的小儿，分 3 次服。每 3 小时服 1 次。

2. 阑尾炎不论急性或慢性，只要大便正常，发烧严重，即可用归藤银翘汤。

归藤银翘汤：

当归尾 10 克 红藤 60 克 金银花 30 克 连翘 30 克
冬瓜仁 6 克

煎服法：与大黄牡丹皮汤同。

二、腹膜炎引起的腹痛

小儿得了腹膜炎，腹部摸着很硬，满腹疼痛，按压更甚，腹胀，面部和双脚肿胀，并伴有发烧、呕吐和大便不利。

【预防】

注意小儿的饮食卫生。发现小儿腹痛，要早期服药治疗。

【治法】

1. 初起腹痛较轻时，可用银藤归苓汤。

银藤归苓汤：

金银花 30 克 红藤 30 克 连翘 30 克 当归 15 克 云苓 30 克 大腹皮 15 克 金铃子 10 克 白芍 12 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 茶杯。1~3 岁的小儿，分 5 次服；3~6 岁的小儿，分 4 次服；6~9 岁的小儿，分 3 次服；9~12 岁的小儿，分 2 次服。每 4 小时服 1 次。

2. 腹痛严重时，在银藤归苓汤内加延胡索 10 克，五灵脂 10 克，生蒲黄 10 克。

煎服法：与银藤归苓汤相同。

3. 如果病儿腹胀，可用参苓汤。

参苓汤：

北沙参 15 克 云茯苓 15 克 麦门冬 15 克 法半夏 5 克 炙甘草 3 克 大枣 3 枚

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 茶杯。1~3 岁的小儿，分 4 次服；3~6 岁的小儿，分 3 次服；6~9 岁的小儿，分 2 次服。每 4 小时服 1 次。

三、寄生虫引起的腹痛

(一) 蛔虫病

小儿蛔虫病是很普遍的，尤其农村的小孩多见，主要是因为小儿用脏手拿东西吃，或是吃了带有虫卵的蔬菜、水果、泥土等引起。

病儿腹胀，阵发性疼痛，大多数脐周疼痛。伴有暖气、恶心、厌食、口臭、流涎，口唇内有灰白色的小结节。有时大便不利，有时腹泻，饮食习惯有所改变，逐渐消瘦，精神

差，脸色黄白，脸上有白点，眼睛周围为灰白色或灰褐色，在白眼珠上有蓝色或褐色小点，有时鼻孔发痒。

【预防】

1. 不要让小儿坐在地上玩耍，注意饮食卫生。
2. 病儿的用具和玩具要蒸煮、日晒消毒。

【治法】

1. 小儿蛔虫病，一般都可用榴皮雷贯散。

榴皮雷贯散：

雷丸 12 克 石榴皮 12 克 贯众 12 克 炒使君子 12 克
炒枳壳 15 克 锦大黄 15 克 花槟榔 30 克 建神曲 12 克

制服法：将这几样药合在一起，研成细粉。1~3 岁的小儿，每次服 0.3~0.6 克；3~6 岁的小儿，每次服 0.6~1.2 克；6~9 岁的小儿，每次服 1.2~1.5 克；9~12 岁的小儿，每次服 1.5~3 克。1 日服 3 次，温开水冲服。服至无虫为止。

2. 病儿身体衰弱，病情严重，除服榴皮雷贯散外，可加服槟参汤。

槟参汤：

花槟榔 10 克 炒榧子 10 克 丽参 1.5 克 建神曲 6 克
生黄芪 12 克 生甘草 1.5 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 茶杯。1~3 岁的小儿，分 4 次服；3~6 岁的小儿，分 3 次服；6~9 岁的小儿，分 2 次服。每 6 小时服 1 次。

（二）绦虫病

小儿绦虫病也是常见病，主要是因为吃了没有煮熟的带虫卵的猪肉、牛肉、鱼肉。病儿有时不愿意吃东西，有时肚

饿吃得很多，或是两种症状交替出现。伴消化不良、嗝气、恶心、胃脘部不舒，腹部似有物压，大便不利，或是腹泻，有时有的腹痛甚，头痛，眩晕，睡觉咬牙，发惊，抽风，有的视物不清，耳听声音不清，脸上有白点，白眼珠上有蓝色或褐色小点，口唇内有灰白色的小结节。

【预防】

注意饮食卫生，不要让小儿吃未煮熟的肉。

【治法】

1. 患绦虫病的小儿，一般都可用雷丸粉。

制服法：将雷丸研成细粉。1~3岁的小儿，每次服0.3~0.6克；3~6岁的小儿，每次服0.6~1.2克；6~9岁的小儿，每次服1.2~1.5克；9~12岁的小儿，每次服1.5~3克。1日服3次，连服3天停药，1星期后再服。

2. 绦虫患儿可用槟瓜榧子汤。

槟瓜榧子汤：

花槟榔 20克 南瓜子 10克 炒榧子 10克

煎服法：一剂药煎2遍，兑在一起，约煎取半茶杯。1~3岁的小儿，分3次服；3~6岁的小儿，分2次服。每6小时服1次。

3. 病儿睡觉咬牙，可用槟橘散。

槟橘散：

槟榔 60克 陈橘皮 45克 二丑 30克 生甘草 15克

制服法：与橘皮雷贯散相同。

4. 无论小儿为哪一种肠寄生虫病，都可用雷槟散。

雷槟散：

生雷丸 30克 鸡心槟榔 30克 石榴树根皮（去外黄皮）30克 二丑 30克 鹤虱 15克 使君子 30克 榧子 30

克

制服法：将这几样药合在一起，研成细粉。1~3岁的小儿，每次服3~6克；3~6岁的小儿，每次服6~10克；6~9岁的小儿，每次服10~15克。每隔5天服1次，早晨空腹服，用白糖水送下。

四、肝炎引起的腹痛

肝炎具有传染性（指甲肝及乙肝），往往一家几个孩子都患此病。初起病儿发烧，全身不舒，精神差，厌食，右上腹饱胀，有时疼痛，头晕头痛，心跳，恶心，呕吐，怕冷。大约在7天左右烧退，上腹部饱满，疼痛加重，身痒，有些病儿的皮肤、眼睛及小便发黄。一般病儿大便不利，或是腹泻，粪便多是白色或褐色，小便又稠又少，尿深黄色。大部分病儿舌苔厚腻，有时红燥起刺，但也有一些为薄苔。

【预防】

1. 不要让别的小儿接近病儿，病儿的碗筷、玩具、用具等要经常煮沸、日晒消毒。

2. 与病儿接触或生活在一起的大人和小儿宜服茵翘贯众汤。

茵翘贯众汤：

连翘 20 克 茵陈 20 克 贯众 6 克

水煎加糖当茶饮，连饮 1 星期。

【治法】

1. 小儿患肝炎，可用茵陈二金汤。

茵陈二金汤：

茵陈 30 克 广郁金 15 克 金钱草 30 克 建神曲 10 克
姜厚朴 10 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 茶杯，加白糖。1~3 岁的小儿，分 5 次服；3~6 岁的小儿，分 4 次服；6~9 岁的小儿，分 3 次服；9~12 岁的小儿，分 2 次服。1 日服 3 次。

2. 如果病儿无汗，可在茵陈二金汤内加麻黄 6 克，用黄酒和水煎服。煎服的方法与茵陈二金汤相同。

3. 病儿大便不利，小便深黄色，又稠又少，右上腹部胀满，在茵陈二金汤内加大黄 5 克，山梔 10 克，灯心 1 撮。煎服法与茵陈二金汤相同。

4. 病儿小便不利，出汗，大便正常，在茵陈二金汤内加茯苓 20 克，猪苓 10 克，泽泻 10 克，白术 10 克，肉桂 1 克，灯心 1 撮。煎服法与茵陈二金汤相同。

5. 病儿大小便均正常，在茵陈二金汤内加黄连 5 克，枳壳 12 克，陈皮 5 克。煎服法与茵陈二金汤相同。

6. 病儿的眼睛和皮肤不黄，右肋痛，腹部胀痛，在茵陈二金汤内加人参 3 克（或党参 10 克），白术 10 克，干姜 3 克，生甘草 3 克，大枣 6 枚。煎服法与茵陈二金汤相同。

7. 如果病儿出现腹水，阴囊肿胀，在茵陈二金汤内加茯苓皮 20 克，绿豆皮 20 克，连翘 20 克，金银花 20 克，车前草 10 克。煎服法与茵陈二金汤相同。

8. 病儿发高烧，眼睛和皮肤不黄，可用青金汤。

青金汤：

大青叶 30 克 紫丹参 30 克 贯众 15 克 郁金 15 克
大枣 10 枚

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 茶杯。1~3 岁的小儿，分 5 次服；3~6 岁的小儿，分 4 次服；6~9 岁的小儿，分 3 次服；9~12 岁的小儿，分 2 次服。每 4

小时服1次。

9. 病儿右肋下疼痛日久，时轻时重，可用雄金散。

雄金散：

明雄黄 明白矾 炒谷芽 郁金各15克

制用法：将这几样药合在一起，研成细粉。1~3岁的小儿，每次服0.3~0.6克；3~6岁的小儿，每次服0.6~1克；6~9岁的小儿，每次服1~2克。1日服3次，温开水或糖开水冲服。

抽 风

抽风又叫抽搐，常见于5岁以下小儿，男孩多见，年龄越小的孩子越容易发生抽风。能够引起小儿抽风的疾病很多，例如小儿营养不良，高烧，癫痫，急惊风，慢惊风，慢脾风等。往往由于治不及时，或是药用得不当，给病儿造成很多痛苦，甚至造成不良后果。急惊风在前面发烧内已作了介绍，这里主要介绍容易引起抽风的其他几种疾病。

一、营养不良引起的抽风

小儿营养不良，大多数是因为大人照管不好，小儿吃的食物太单纯，或是因为小儿肠胃不好，吸收功能差。

初起病儿觉得嘴周和四肢麻木，然后开始抽搐。如果继续发展，病儿手关节屈曲，大拇指向手掌内收，手指在掌关节的地方弯曲，其他关节伸直，足趾在足关节的地方向足底弯曲，好像马蹄内翻。病儿啼哭的时候常有尖声出现，吸气时像高声欢呼。有的发生惊厥，抽搐，昏迷，头向后背，嘴角向下抽，吐白沫，大囟门凸出等。严重的时候全身发生青

紫，甚至死亡。

【预防】

1. 让小儿多晒太阳，多吃鸡蛋黄、蔬菜等。
2. 妇女怀孕以后，应多吃青菜、水果等食物，多晒太阳，多活动。

【治法】

1. 一般营养不良的抽风可内服姜糖胡桃膏。

姜糖胡桃膏：

鲜生姜 30 克 红糖 30 克 胡桃仁 30 克 黑木耳 30 克
麦面 120 克

制法：将这几样药熬在一起，放在磁罐内，每次约 1 调羹，慢慢地给小儿吃。

2. 病儿发生惊厥、昏迷、抽搐，除服姜糖胡桃膏外，并宜加服蚕蝎散。

蚕蝎散：

全蝎 7.5 克 僵蚕 7.5 克 琥珀 7.5 克 天麻 7.5 克
麝香 0.3 克 梅花冰片 0.3 克 炒酸枣仁 7.5 克

制法：将这几样药合在一起，研成细粉。1 岁以内的小儿，每次服 0.1～0.15 克；1～3 岁的小儿，每次服 0.15～0.3 克；3～6 岁的小儿，每次服 0.3～0.6 克；6～9 岁的小儿，每次服 0.6～1.2 克；9～12 岁的小儿，每次服 1.2～2 克。1 日服 3 次。

3. 除服以上的药以外，可以多给病儿吃鸡蛋和青菜。

二、高烧引起的抽风

一般小儿体温在 40℃ 以上，常常发生惊厥、抽搐。抽搐时，病儿失去知觉，面部没有表情，痴呆，轻的全身颤

动，重的皮肤变成青紫色，脸变黄色、黄白色或淡红色，四肢抽搐或强直。呼吸不匀，或呼吸微弱，嘴唇发紫，咬牙，口张不开，眼睛向上翻，或是直视，或是斜视，大小便失禁，但过几分钟或几小时后，抽搐也可能自行停止。

【预防】

在小儿发烧时应及早治疗，并可用一些烧酒搽涂身体。

【治法】

1. 高烧引起抽风，一般应先退烧，可用银青菊苓汤。

银青菊苓汤：

金银花 30 克 连翘 30 克 大青叶 15 克 菊花 10 克
云茯苓 10 克 防风 10 克 钩藤 10 克 龙骨 10 克 生甘草
3 克 蝉蜕 6 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 大茶杯。6 个月以内的小儿，分 8 次服；6 个月至 1 岁的小儿，分 7 次服；1~3 岁的小儿，分 6 次服；3~6 岁的小儿，分 5 次服；6~9 岁的小儿，分 4 次服；9~12 岁的小儿，分 3 次服。每 4 小时服 1 次。

2. 小儿发烧较轻，抽风轻微，可将蝉蜕研成细粉。1 岁以内的小儿，每次服 0.15~0.3 克；1~3 岁的小儿，每次服 0.3~0.6 克；3~6 岁的小儿，每次服 0.6~1.2 克；6~9 岁的小儿，每次服 1.2~1.5 克；9~12 岁的小儿，每次服 1.5~3 克。1 日服 3 次，温开水冲服。

3. 病儿除服银青菊苓汤退烧外，并可加服蚕蝎散。

4. 不论哪一种抽风，在发作的过程中，都应采用针刺病儿的人中穴和十宣穴急救，以出血为止。或用罾黄散、香煤朱砂散。

螺黄散：

鱼鳔珠 10 克 朱砂 10 克 麝香 0.1 克 牛黄 0.1 克
郁金 10 克 赤金 3 张

制服法：将这几样药合在一起，研成细粉。6 个月内的小儿，每次服 0.1~0.2 克；6 个月至 1 岁的小儿，每次服 0.2~0.3 克；1~3 岁的小儿，每次服 0.3~0.4 克；3~6 岁的小儿，每次服 0.4~0.6 克。1 日服 3 次，温开水送下。

香煤朱砂散：

麝香 0.3 克 无烟煤炭 0.6 克 朱砂 0.9 克

制服法：将这几样药合在一起，研成细粉，分作 10 包，每次服 1 包。用凉开水冲服。

三、癫痫引起的抽风

癫痫引起的抽风，症状非常复杂，主要是阵发性发作。在发作的时候，昏厥、抽搐；不发作的时候，一切正常。每次在发作前先有全身不舒、乏力、头胀头痛等感觉，有时急躁，有时沉闷，但也有无任何感觉的。发作时突然跌倒，不省人事，全身肌肉抽动，两腿伸直，两臂夹紧，手臂紧紧地弯曲，牙关紧闭，紧握拳头，呼吸停止，面色青紫，头向旁边牵动，眼睛向上，牙齿对打，嘴角流出白沫，舌头有时咬烂出血，有时发出惨叫。过一会儿，肌肉慢慢地松弛，抽动逐渐停止，清醒如常。但有一些病儿在抽风以后感觉头痛，没有精神。有一些病儿抽风发作时仅有一阵短时间的意识不清，或仅有眩晕。有几年发作一次的，有一月或几个月发作一次的，也有一天发作好几次，甚至几十次的。

【预防】

平素要避免小儿精神上遭受刺激或过劳，有病须早治。

【治法】

1. 癫痫发作次数少病情较轻的，可用羊苦胆 1 个装入蜜蜂 7 个，把口扎紧，用麻纸包好，外面再用泥包一层，放在火炉上烘干，去掉泥和纸，研成细粉。1 岁以内的小儿，分 6 次服；1~3 岁的小儿，分 5 次服；3~6 岁的小儿，分 4 次服；6~9 岁的小儿，分 3 次服；9~12 岁的小儿，分 2 次服。1 日服 2~3 次，温开水送下。

2. 癫痫发作次数较多的，可用龙蜂散，或用砂圣丹。

龙蜂散：

龙衣（蛇蜕）7.5 克 蜂房 15 克 白矾 15 克 郁金 15 克

制服法：将药合在一起，研成细粉。1 岁以内的小儿，每次服 0.15~0.3 克；1~3 岁的小儿，每次服 0.3~0.6 克；3~6 岁的小儿，每次服 0.6~0.9 克；6~9 岁的小儿，每次服 0.9~1.2 克；9~12 岁的小儿，每次服 1.2~1.5 克。1 日服 2 次，温开水送下。

砂圣丹：

明雄黄 6 克 蝎梢 6 克 代赭石 6 克 苦杏仁 6 克 巴豆（去油）3 枚

制服法：将这几样药合在一起，研成很细的粉末，蒸枣肉为丸，如梧桐子大。1 岁以内的小儿，每次服半丸；1~3 岁的小儿，每次服 1 丸；3~6 岁的小儿，每次服 2 丸；6~9 岁的小儿，每次服 3 丸；9~12 岁的小儿，每次服 4~6 丸。1 日服 3 次，用广木香煎汤送下。

3. 癫痫发作次数多，时间长，患儿精神差，可用雄矾磁神散。

雄矾磁神散：

丽参 3 克 川黄连 3 克 明雄黄 3 克 生地黄 12 克
当归 6 克 柏子仁 6 克 灵磁石 6 克 石菖蒲 6 克 麦门冬
6 克 天门冬 6 克 茯神 10 克 远志 10 克 元参 6 克 炒
枣仁 20 克 明白矾 6 克 郁金 10 克 朱砂 6 克 五味子 5
克

制服法：将这几样药合在一起，研成很细的粉末，装入有色的瓶子里。1 岁以内的小儿，每次服 0.15～0.5 克；1～3 岁的小儿，每次服 0.5～1 克；3～6 岁的小儿，每次服 1～2 克；6～9 岁的小儿，每次服 2～3 克；9～12 岁的小儿，每次服 3～6 克。1 日服 3 次，温开水冲服。

4. 一般癫痫都可用茶矾汤，或用果矾散。

茶矾汤：

茶叶 6 克 明白矾 1.5 克 郁金 6 克 胡桃核 12 克
生黄芪 20 克 炒枣仁 20 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 茶杯。1 岁以内的小儿，分 5 次服；1～3 岁的小儿，分 4 次服；3～6 岁的小儿，分 3 次服；6～9 岁的小儿，分 2 次服。每 6 小时服 1 次。

果矾散：

藏青果 27 克 明白矾 3 克

制服法：将这两样药合在一起，研成细粉。服药的方法与龙蜂散相同。

5. 在每次发病前，当小儿感觉头痛，或觉得不舒服时，应及时服海羊散。

海羊散：

羊枣（也叫羊哀、草疙瘩） 海参肠子各 3 克

制服法：将这两样药焙干，合在一起，研成细粉，用黄酒作引。每次服 0.3~0.6 克（此为成人量，小儿按年龄酌减），用温开水送下。一般于发病前服药，病可不犯。

6. 癫痫均可用磁朱白金散。

磁朱白金散：

磁石 30 克 朱砂 15 克 郁金 30 克 白矾 15 克 清半夏 30 克 代赭石 30 克

制服法：将这几样药合在一起，研成细粉。服法用量同雄矾磁神散。

四、慢惊风、慢脾风

慢惊风主要是由于身体虚弱、或是急惊风治疗不当，或是痢疾、疟疾、吐泻等病发展而成。小儿发病时，慢慢地抽搐，时发时止，有的不发烧，有的高烧不退，身体时凉时热。病儿面色淡黄或青白色，四肢冰冷，昏睡，或是睁眼睡觉，或发惊抽搐，眼光昏暗，乏力，厌食，大便为青色的稀粪，尿量少而色白。病情进一步发展，四肢冰冷加重，出气急促，额上出汗，昏睡不醒，或睁眼直视，或闭眼摇头，遗尿，肌肉消瘦，抽搐，牙关紧闭，鼻翼煽动，口鼻出冷气，口吐清水或流涎沫，大囟门及眼窠下陷，指甲瘪陷。

慢脾风主要表现为病儿面色赤红或青暗，口唇色青暗或青淡，或口唇干燥出血，吐泻不止，食物不化，或大便不通，小便不利，腹陷如舟，腹中作响，不吃，不哭，或哭时无泪，体温过低，肌肉松弛，皮肤干燥没有弹性，烦躁不安，眼睛瞳仁散大等。

一般所说的天吊风、虚风等都属这类病，均可按慢惊风与慢脾风治疗。

【预防】

小儿患吐泻、痢疾、疟疾、痘疹等病，要及时治疗。平时多给小儿吃水果、青菜，多食富有营养、容易消化的食物。

【治法】

1. 小儿慢惊风或慢脾风，一般宜用参桂散。

参桂散：

紫丹参 6 克 山萸肉 3 克 甘枸杞 3 克 土白术 3 克
炒干姜 3 克 红丽参 3 克 炒枣仁 6 克 上元桂 3 克 破故纸 3 克 生黄芪 6 克 附子 3 克 生甘草 3 克

制用法：将这几样药合在一起，研成很细的粉末。1 岁以内的小儿，每次服 0.15~0.3 克；1~3 岁的小儿，每次服 0.3~0.6 克；3~6 岁的小儿，每次服 0.6~0.9 克，6~9 岁的小儿，每次服 0.9~1.2 克；9~12 岁的小儿，每次服 1.2~3 克。1 日服 3 次，温开水冲服。

2. 病儿身体虚弱，或久病不愈，或出痘、出疹以后误服过凉药物，呕吐泄泻，可先用椒姜散。

椒姜散：

黑胡椒 15 克 炒干姜 15 克 上元桂 15 克 丁香 15 克

制用法：与参桂散同。在椒姜散服过以后，接着服参桂散。

3. 病儿精神已亏，气血大损，非常瘦弱，可用加味理中地黄汤。

加味理中地黄汤：

大熟地 15 克 当归 6 克 山萸肉 3 克 枸杞 6 克 炙黄芪 6 克 破故纸 6 克 白术 10 克 肉桂 3 克 干姜 3 克 炒枣仁（捣）6 克 大党参 6 克 炙甘草 3 克 生姜 3 片

大枣 3 枚 胡桃（打碎）2 枚

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取浓汁 1 茶杯，再以附子 1.5 克煎水 1 盅掺入。1 岁以内的小儿，分 5 次服；1~3 岁的小儿，分 4 次服；3~6 岁的小儿，分 3 次服；6~9 岁的小儿，分 2 次服。1 日服 2 次。

如果病儿咳嗽不止，可在上方内加罂粟壳 3 克（或用艾叶 10 克），金樱子 3 克。

病儿并发高烧，在上方内加连翘 20 克，金银花 20 克，大青叶 30 克，烧退后即停服。

病儿腹泻不止，在上方内加丁香 3 克，诃子肉、银花各 20 克，大青叶 30 克，泻止后停服。

4. 如果病儿口唇干燥，可用加味附子理中汤。

加味附子理中汤：

白术 10 克 丽参 3 克 干姜 3 克 附子 3 克 甘草 3 克 五味子 10 克 金石斛 3 克

煎服法：与加味理中地黄汤同。

如果病儿昏迷，可在上方内加石菖蒲 3 克，马宝 1.5 克，清半夏 6 克。

病儿抽搐，可加天麻 6 克，蝉蜕 6 克，钩藤 6 克。

5. 病情进一步发展，抽风严重，宜用可保立苏汤。

可保立苏汤：

生黄芪 30 克 大党参 15 克 白术 10 克 当归 10 克 白芍 10 克 山萸肉 10 克 炒枣仁 15 克 枸杞子 15 克 补骨脂 10 克 胡桃（捣碎）2 枚

煎服法：与加味理中地黄汤同。

尿 床

一、一般尿床

一般尿床多是3~15岁的小儿或少年，男孩子比女孩子多，夜间比白天多。小儿夜间尿床，多在一定的时间不知不觉地尿在床上，有的是在梦中遗尿，有的是在啼哭时遗尿。有的尿床几年不愈，有的时好时犯，也有个别人直到成年仍然还尿床。

【预防】

1. 每夜可多唤小儿起床小便几次，养成按时小便的良好习惯。

2. 多给小儿食营养丰富的食物。

【治法】

1. 经常尿床的小儿，如果身体比较虚弱，可服参芪地黄汤，或用牡金散。

参芪地黄汤：

生黄芪 30 克 大野党参 15 克 山萸肉 6 克 福泽泻 4.5 克 粉丹皮 4.5 克 云茯苓 4.5 克 细生地 12 克 怀山药 6 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 茶杯。3~6 岁的小儿，分 4 次服；6~9 岁的小儿，分 3 次服；9~12 岁的小儿，分 2 次服。每 6 小时服 1 次。

牡金散：

鸡内金 12 克 生牡蛎 12 克 益智仁 6 克 桑螵蛸 12 克 肉桂 6 克 生黄芪 12 克

制服法：将这几样药合在一起，研成很细的粉末。3~6岁的小儿，每次服0.6~0.9克；6~9岁的小儿，每次服0.9~1.2克；9~12岁的小儿，每次服1.2~1.5克；12岁以上的小儿，每次服1.5~3克。1日服3次，温开水冲服。

2. 尿床的小儿，经常嘴唇干燥，可服知柏地黄汤。

知柏地黄汤：

肥知母10克 盐黄柏10克 怀山药6克 山萸肉6克
福泽泻4.5克 粉丹皮4.5克 云茯苓4.5克 细生地12克

煎服法：与参芪地黄汤同。

3. 尿床的小儿，嘴唇淡白，手脚发凉，可服龙牡乌智散。

龙牡乌智散：

台乌药12克 益智仁12克 怀山药12克 生龙骨6克
生牡蛎6克 肉桂1.2克 桑螵蛸6克 云茯苓12克

制服法：将这几样药合在一起，研成细粉。3~6岁的小儿，每次服0.6~1.2克；6~9岁的小儿，每次服1.2~1.5克；9~12岁的小儿，每次服1.5~3克。1日服3次，温开水送下。

二、寄生虫病引起的尿床

小儿寄生虫病常常引起尿床。患寄生虫病的小儿，一般纳食差，肚脐周围一阵阵疼痛，身体虚弱、消瘦。

【预防】

平素不要让小儿坐在地上玩耍，注意小儿的饮食卫生。病儿的用具和玩具必须经常消毒。

【治法】

1. 小儿寄生虫病引起的尿床，应当是以驱虫为主，可

服雷贯散。

雷贯散：

雷丸 12 克 贯众 12 克 炒使君子肉 12 克 炒枳壳 15 克 锦大黄 15 克 花槟榔 30 克 建神曲 12 克

制服法：将诸药合在一起，研成细粉。服药的方法与龙牡乌智散相同。

2. 小儿尿床，肚脐周围疼痛，可服君楝汤。

君楝汤：

炒使君子 15 克 苦楝根皮 15 克 槟榔 30 克 生黄芪 30 克 泽泻 12 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 茶杯。1~3 岁的小儿，分 4 次服；3~6 岁的小儿，分 3 次服；6~9 岁的小儿，分 2 次服。每 6 小时服 1 次。连服 2 日后，停药 7 天再服。腹痛停止后停止服药。

三、膀胱结石引起的尿床

小儿患膀胱结石，一般常有尿床现象。病儿（男孩）多用手拉着阴茎，啼哭吵闹不安，小便常是断断续续、点点滴滴的，尿频，尿急，常常遗尿。病重的小儿会出现尿血、尿脓。

【预防】

让小儿多吃青菜、水果。

【治法】

1. 小儿膀胱结石引起的尿床，可以用大剂量金钱草煎汤当茶饮。

2. 膀胱结石尿床的小儿，可服金米汤。

金米汤：

玉米秆 60 克 金钱草 15 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 茶杯。
1~3 岁的小儿，分 3 次服；3~6 岁的小儿，分 2 次服；6~9 岁的小儿，1 次服。每 6 小时服 1 次。

四、膀胱炎引起的尿床

小儿不注意喝水，易引起膀胱发炎，出现小腹疼痛，尿频，尿时阴茎疼痛，尿热，在病儿的尿里会发现很多像脓一样的粘液。有的病儿突觉小腹与阴茎疼痛严重，恶寒颤栗，高烧。有的病儿小便断断续续，尿完以后，小腹好像有物按压。

【预防】

多给小儿吃水果，让其多喝水，培养小儿的卫生习惯。

【治法】

1. 小儿患膀胱炎，初期感觉小便不利，尿频，可用芪苓汤。

芪苓汤：

生黄芪 18 克 土白术 12 克 云茯苓 12 克 猪苓 10 克
泽泻 10 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 茶杯。
1~3 岁的小儿，分 4 次服；3~6 岁的小儿，分 3 次服；6~9 岁的小儿，分 2 次服。每 6 小时服 1 次。

2. 病儿小便时阴茎痛，小腹痛，发烧，可服芪苓银翘汤。

芪苓银翘汤：

生黄芪 18 克 猪苓 12 克 金银花 15 克 连翘 15 克

车前子 10 克 藁本 3 克

煎服法：与芪苓汤同。

3. 如果病儿小腹及阴茎疼痛严重，小便断断续续，可服银翘地黄汤，或用木通甘草汤。

木通甘草汤：

木通 10 克 生甘草 6 克

煎服法：与芪苓汤相同。

口 疮

一、鹅口疮

小儿口腔及舌头溃烂，并出现白膜，称鹅口疮。初起烂处有许多白色小点，白色小点连在一起形成一片片白膜，不容易擦掉，硬擦易引起出血。鹅口疮虽然不疼，但是使小儿吃奶及咽下困难，流口水，一般身体虚弱的小儿症状较重。

【预防】

常给小儿用百分之一的硼砂水或碱水轻轻地洗擦口内，并注意奶头或奶瓶的清洁消毒。

【治法】

1. 鹅口疮可用雄矾梅冰散，或用朱矾散、青果蛋壳散。

雄矾梅冰散：

明雄黄 5 克 枯矾 12 克 明白矾 3 克 梅花冰片 6 克
冰糖 15 克

制用法：将这几样药合在一起，研成很细的粉末。每次用少许，撒在口里溃烂的地方，或撒在有白膜的部位。1 日撒药 2~3 次。

朱矾散：

朱砂 10 克 枯矾 10 克 牙硝 20 克

制用法：与雄矾梅冰散同。

青果蛋壳散：

青果核（连皮肉）5 枚 鸡蛋壳内皮 5 枚

制用法：将这两样药焙干，合在一起，研成很细的粉末，加入冰片少许。每次用少许撒患处。1 日撒药 2~3 次。

2. 鹅口疮亦可用银翘青英汤。

银翘青英汤：

金银花 20 克 连翘 20 克 大青叶 10 克 蒲公英 10 克
紫花地丁 6 克 茯神 10 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 茶杯。1 岁以内的小儿，分 6 次服；1~3 岁的小儿，分 5 次服；3~6 岁的小儿，分 4 次服；6~9 岁的小儿，分 3 次服；9~12 岁的小儿，分 2 次服。每 4 小时服 1 次。

3. 鹅口疮可用大青叶 30 克水煎加糖，予小儿当茶饮。

二、红口疮

小儿满口红肿，稍有接触就感觉疼痛，流涎，唾液粘稠带有酸味，口臭，吃奶困难，年龄大一点的小儿在喝水或吃东西尤其是吃酸辣、粗糙和灼热的刺激性食物时疼痛严重。舌干而燥，常有裂纹。病儿多数发烧，烦躁不安。

【预防】

与鹅口疮相同。

【治法】

1. 红口疮可用硼黛散。

硼黛散：

硼砂 12 克 青黛 6 克

制用法：将这两样药合在一起，研成细粉，加白糖适量。每次用少许放到病儿口中，使其慢慢咽下。1 日用药 2~3 次。

2. 病儿舌面干燥，或舌面有裂纹，可用雄矾梅冰散或冰硼散撒患处，或用青黄散。

青黄散：

青黛 3 克 黄柏 15 克

制用法：将这两样药合在一起，研成很细的粉末。用净布蘸药粉搽病儿口里。1 日搽药 2 次。

3. 病儿发烧较重，或烦躁不安，可用银翘青英汤，或服消炎药，或用银翘蝉菊汤。

银翘蝉菊汤：

金银花 18 克 连翘 18 克 炒小菊 10 克 净蝉蜕 10 克
桔梗 10 克 麦冬 10 克 生甘草 3 克

煎服法：与银翘青英汤相同。

三、白口疮

白口疮初起牙龈周围发红、肿胀或出血，不久出现灰白不清的薄膜，容易用棉球擦掉，灰白薄膜被擦掉的地方出现溃烂。病儿口臭，疼痛不安，不能吃奶或吃饭，高烧，流口水，颈项肿胀疼痛，全身不舒。严重时牙槽溃烂，牙齿变松，咀嚼时疼痛明显。进一步发展，一部分牙槽坏死，乳齿多数脱落，牙齿不易长出来。

【预防】

与鹅口疮相同。

【治法】

1. 一般白口疮，宜服银青地黄汤。

银青地黄汤：

金银花 30 克 大青叶 15 克 怀山药 6 克 山萸肉 6 克
红连翘 30 克 粉丹皮 4.5 克 泽泻 4.5 克 云茯苓 4.5 克
生地黄 12 克 桔梗 6 克 生甘草 3 克

煎服法：与银翘青英汤同。

2. 身体虚弱、营养不良的小儿，除服银青地黄汤外，可加服一些维生素，并可用雄矾梅冰散、硼黛散、青黄散、冰硼散撒口内。

皮 疹

一、风疹

出风疹的小儿，大多精神差，在疹子出来的前一两天发烧（也有不发热的），怕冷，流鼻涕，不愿吃东西，咳嗽，有的咳嗽时呕吐，有的咳嗽时腹痛。病儿的咽喉红肿疼痛，两眼发热但不红肿，眼睑内和鼻孔里稍微有些发红，继而脸上出现淡粉红色小疹子，大小不同，有的像针头大，也有豌豆大的，分布均匀，有的散在，也有的融合成片。风疹开始由面部而起，大多数在 1 天内蔓延到全身，2~4 天内疹子消失，热退，没有落屑现象，一切恢复正常。这些病儿的耳区、枕部或全身的淋巴结肿大，按压疼痛，但不化脓。

【预防】

1. 最好把患病小儿与正常小儿隔离。

2. 与病儿接触的小儿，可用苦楝根皮煎水洗浴 1 次。

【治法】

1. 出风疹的小儿，可服豆豉蝉桔汤。

豆豉蝉桔汤：

黄豆卷 12 克 牛蒡子 10 克 蝉蜕 6 克 桔梗 10 克
前胡 6 克 薄荷 1.5 克 浙贝母 10 克 生甘草 1.5 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 茶杯。1 岁以内的小儿，分 6 次服；1~3 岁的小儿，分 5 次服；3~6 岁的小儿，分 4 次服；6~9 岁的小儿，分 3 次服；9~12 岁的小儿，分 2 次服。每 4 小时服 1 次。

2. 病儿咳嗽，可服参桑麝贝散。

参桑麝贝散：

丽参 15 克 天花粉 30 克 桑白皮 30 克 地骨皮 30 克
川贝母 30 克 全蝎 7.5 克 麝香 0.3 克 生甘草 7.5 克

制服法：将这几样药合在一起，研成细粉。6 个月以内的小儿，每次服 0.1~0.3 克；6 个月至 1 岁的小儿，每次服 0.3~0.6 克；3~6 岁的小儿，每次服 0.6~1.2 克；6~9 岁的小儿，每次服 1.2~1.5 克；9~12 岁的小儿，每次服 1.5~3 克。1 日服 3 次，温开水或白糖开水送下。

3. 病儿发呕，不想吃东西，轻微咳嗽，可用橘半散。

橘半散：

橘皮 30 克 清半夏 30 克 款冬花 15 克

制服法：与参桑麝贝散相同。

4. 病儿咳嗽，头痛，精神疲倦，尿少，尿黄，可用桂枝车前汤。

桂枝车前汤：

嫩桂枝 3 克 香豆豉 6 克 生白芍 6 克 车前子 10 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 茶杯，加

白糖。1岁以内的小儿，分4次服；1~3岁的小儿，分3次服；3~6岁的小儿，分2次服。每4小时服1次。

5. 病儿咽喉红肿疼痛，用加减珠黄散，或用硼矾散。

硼矾散：

硼砂 12克 明白矾 6克

制用法：将这两样药合在一起，研成细粉，吹到病儿的咽喉部位。1日用药3次。

6. 病儿的皮肤上可撒些六一散。配药时可以多配一些，以便连续撒扑。

二、幼儿急疹

幼儿急疹是比较常见的一种皮肤病，大多数突然发烧，咽红，咳嗽，精神差。有的耳下和耳后肿胀，呕吐，有的出现抽风，发惊，腹泻，耳内疼痛，左胁疼痛。多数在3~5天烧退，烧退以后出现皮疹。皮疹开始出现在胸腹，逐渐发展到脸和颈项上，四肢出疹较少。疹子多是淡红色或红色，与麻疹、风疹很相像。一般2天以内可以完全消失，疹子消失以后有的轻微脱皮有的不脱皮。大多数病儿在疹子出现前48小时内在软腭（上腭的后边）上可以看到红斑点或条状物。

【预防】

1. 不要让小儿接近病儿。
2. 与病儿接触过的小儿，可服银翘贯众汤。

【治法】

1. 病儿发烧，可用麻翘石膏汤或加味银翘青叶汤。

加味银翘青叶汤：

金银花 10克 连翘 10克 大青叶 10克 防风 3克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 茶杯。6 个月以内的小儿，分 4 次服；6 个月～1 岁的小儿，分 3 次服；1～3 岁的小儿，分 2 次服。每 4 小时服 1 次。

2. 病儿如有抽风、发惊，除服加味银翘青叶汤外，可加服蝎蚕珀牛散。

3. 病儿咽红，可以用加减珠黄散吹到咽部。

4. 病儿乏力、嗜睡，可服参麝樟脑散。

三、丹毒

丹毒也叫赤游丹，是一种传染性皮肤病，1 岁以下的小儿患病较多。发病时，小儿皮肤的某处出现铜钱大的红斑点，疼痛，继而红斑慢慢向周围发展，与健康的皮肤间没有明显的界限。红斑最多的地方出现在脸部，躯干和四肢红斑较少。有时红斑上面有水疱，有时红斑发展成脓肿，出现烂疮，每一疮口都有少量的脓液。病儿面色苍白，小便短少，呕吐或泄泻，有时发热有时不热，有时打颤怕冷，有时发惊抽搐。

【预防】

1. 冬天小儿的衣被不可过厚。

2. 保持小儿皮肤清洁，受伤部位要及时消毒处理。

【治法】

1. 小儿皮肤出现发红，疼痛，宜服加减参芪地枣汤，或用银翘青蝉汤、雄甲银翘散。

参芪地枣汤：

党参 6 克 生黄芪 10 克 焦枣仁 6 克 远志 6 克 茯苓 6 克 生地黄 6 克 连翘 12 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 茶杯，加

些白糖。6个月以内的小儿，分5次服；6个月~1岁的小儿，分4次服；1~3岁的小儿，分3次服；3~6岁的小儿，分2次服。每4小时服1次。

银翘青蝉汤：

金银花12克 连翘12克 大青叶10克 蝉蜕6克

煎服法：与加减参芪地枣汤同。

雄甲银翘散：

明雄黄1.5克 鳖甲3克 升麻1.5克 金银花6克
连翘6克

制服法：将这几样药合在一起，研成很细的粉末。初生儿，每次服0.03~0.06克；1岁以内的小儿，每次服0.06~0.12克；1~3岁的小儿，每次服0.12~0.3克。每6小时服1次，温开水送下。或加白糖纳小儿口中慢慢咽下。

2. 如果病儿发烧，呕吐，泄泻，小便短少，可服芩连木通汤。

芩连木通汤：

黄芩10克 黄连3克 木通10克 茯苓12克

煎服法：与加减参芪地枣汤同。

3. 红斑发展成脓肿，溃烂，可用白玉膏外敷，或用菜子（油菜）叶捣烂敷患处，或用干菜子（油菜）叶煎水洗患处。

白玉膏：

炒寒水石30克 朴硝30克 青黛5克 姜黄15克
当归15克 生甘草5克 黄柏3克

制用法：将这几样药合在一起，研成很细的粉末，用凡士林和清油调和成膏，按面积的大小搽药。

4. 一般丹毒，都可用青黄白冰散。

青黄白冰散：

青黛 3 克 明雄黄 20 克 人中白 10 克 冰片 3 克 蚯蚓粪 27 克

制用法：将这几样药合在一起，研成很细的粉末，用凉水或童便调涂患处。1 日涂药 3 次。

四、湿疹

小儿湿疹也叫奶癣，是一种比较常见的顽固的小儿皮肤病。一般从婴儿出生一两个月内发生疹子，至两三年以后才能好。

患湿疹的小儿，可发烧，可不发烧，厌食，精神差，烦躁不安。疹子的发生，先自头皮开始，逐渐扩展到脸上、额部、耳朵前后等处，有时在胸腹和四肢也有，眼睛、鼻子和嘴周疹子很少。刚发病皮肤发红、肿胀，以后变成小水疱，瘙痒，小儿常把头在衣服上乱擦，水疱被擦破以后流出淡黄色水，擦破的地方慢慢糜烂成疮，疮干后结成黄色或浅灰色痂皮，剥去痂皮又可流水。这样不断地反复发作，一次比一次严重。如果护理不当，水疱变成脓疱，结成黄绿色厚痂皮，同时颈项和头后肿胀。

【预防】

1. 不要让小儿与病儿接近。
2. 不要给病儿洗脸，防止湿疹扩展。
3. 与病儿接触过的小儿，可将银翘青叶汤当茶饮。

【治法】

1. 湿疹初起，皮肤发红、肿胀，瘙痒，可搽硫椒膏。

硫椒膏：

硫黄 30 克 花椒 10 克 亚铅华 6 克

制用法：将这几样药合在一起，研成很细的粉末，用凡士林 180 克、香油（或豆油）30 克调和成膏，轻轻地搽敷患处（湿疹已经破烂，或红肿严重者，不可搽硫椒膏，以免刺激小儿皮肤）。1 日搽药 1 次，或隔日搽 1 次。

2. 湿疹变成水疱，宜内服连栀二苓汤。

连栀二苓汤：

黄连 1.5 克 山栀 1.5 克 猪苓 3 克 茯苓 6 克 条黄芩 3 克 黄柏 2 克 泽泻 5 克 白术 3 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取半茶杯。6 个月以内的小儿，分 5 次服；6 个月～1 岁的小儿，分 4 次服；1～2 岁的小儿，分 3 次服；2～3 岁的小儿，分 2 次服。1 日服 2 次。

3. 病儿服连栀二苓汤时，还可搽连柏氧锌膏。

连柏氧锌膏：

川黄连 15 克 亚铅华（氧化锌）30 克 川黄柏 30 克 枯矾 7.5 克

制用法：将这几样药合在一起，研成细粉，用凡士林加豆油或香油适量，调成软膏，搽敷患处。

4. 一般湿疹，都可用苍柏白芷散，或用石膏青柏散。

苍柏白芷散：

茅苍术 川黄柏 白芷各 20 克

制用法：将这几样药合在一起，研成很细的粉末，用豆油或香油调和敷患处。

石膏青柏散：

石膏 45 克 青黛 5 克 黄柏 5 克 山栀 1.5 克

制用法：将这几样药合在一起，研成很细的粉末，用凡士林或清油调和敷患处。

5. 湿疹瘙痒严重，可用蝎矾散。

蝎矾散：

全蝎 15 克 白矾 90 克 黄柏 12 克 冰片 3 克

制用法：先将白矾放锅内熔化后，入全蝎煨干枯待冷，加黄柏研细粉，再入冰片研匀。每次少许撒患处，或用凡士林油调成软膏搽患处。1 日用 1~2 次。

五、水痘

水痘，有称水疮和肤疹的，也是一种传染性皮肤病。10 岁以下的小儿患水痘的比较多。多发生在冬、春两季。

患水痘的小儿，开始一两天有轻微的发烧，皮肤上出现像猩红热似的红疹子。先在头皮和脸上散在出现，逐渐发展到全身和口里。病儿身痒，皮疹隆起，变成透明的水疱，以后水疱浑浊，化脓成暗褐色。脓疱溃破后，痂皮在几天内脱落，多数没有疤痕。病儿因为发烧，不愿意吃东西，乏力。但是也有一部分病儿不发热。

【预防】

病儿须待痘痂脱尽，或到发病的 10 天以后，才能与别的小儿接近。

【治法】

1. 患水痘的小儿，可服加味荆葛蝉麦汤。

加味荆葛蝉麦汤：

荆芥 6 克 葛根 6 克 蝉蜕 3 克 麦芽 10 克 东山楂 3 克 生枳壳 3 克 连翘 10 克 前胡 5 克 桔梗 3 克 生甘草 1.5 克

煎服法：一剂药煎2遍，兑在一起，约煎取1茶杯，加白糖。1岁以内的小儿，分4次服；1~3岁的小儿，分3次服；3~6岁的小儿，分2次服。每4小时服1次。

2. 水痘已经化脓，可用麻翘石膏汤，或用小儿消炎药。

六、荨麻疹

荨麻疹俗称风屎、风疹块、风疙瘩等，是一种常见的皮肤病。多是皮肤上突然出现一片一片或一块一块的疙瘩，有的好像云朵一样，有的好像蚊子咬了一样，界限清楚，稍高于皮面。患荨麻疹的小儿，因为瘙痒，烦躁不安，常常用手搔抓皮肤，搔抓后变成了烂疮。有的病儿眼皮、口唇肿胀，有的病儿双手或眼皮肿胀。一般的皮肤疙瘩有白色和粉红色两种。白色的遇见天阴下雨或冷风就发作，在天晴暖和时就减轻。粉红色的遇见热气就发作，遇到冷气反而减轻。病儿常有轻微的怕冷，或稍发烧，有的是既畏寒又发热。有些病儿烦躁不安，腹痛，腹泻，有些病儿咳嗽，气喘。一般的荨麻疹出现后，20分钟或30分钟或几小时能自行消失，不留疤痕，也有的时发时好，一天发生几次，甚至几个月或几年治疗不愈。

【预防】

1. 不要给小儿吃腐败的食物及肉类、鱼虾等。
2. 避免小儿皮肤遭受冷热刺激。
3. 使小儿的生活有规律，不乱给小儿服药。

【治法】

1. 荨麻疹的小儿，可服蝉萍散。

蝉萍散：

蝉蜕 15 克 浮萍草 15 克 牛蒡子 15 克 麻黄 15 克

苍术 15 克 生甘草 7 克

制服法：将这几样药合在一起，研成细粉。1~3 岁的小儿，每次服 0.3~0.6 克；3~6 岁的小儿，每次服 0.6~0.9 克；6~9 岁的小儿，每次服 0.9~1.5 克；9~12 岁的小儿，每次服 1.5~3 克。1 日服 3 次，温开水送下。

2. 荨麻疹发生次数多，日久不愈，可服蝉萍汤。

蝉萍汤：

蝉蜕 6 克 浮萍草 20 克 牛蒡子 10 克 麻黄 3 克 苍术 10 克 防风 10 克 当归 10 克 生甘草 3 克

煎服法：一剂药煎 2 遍，兑在一起，约煎取 1 茶杯。1~3 岁的小儿，分 5 次服；3~6 岁的小儿，分 4 次服；6~9 岁的小儿，分 3 次服；9~12 岁的小儿，分 2 次服。每 6 小时服 1 次。

3. 病儿发烧，可在蝉萍汤内加忍冬叶 30 克，连翘 30 克。煎服法与蝉萍汤同。

4. 病儿觉胃中嘈杂，可在蝉萍汤内加橘皮 10 克，姜厚朴 10 克。煎服法与蝉萍汤同。

5. 病儿腹痛或腹泻，可在蝉萍汤内加扁豆 10 克，云茯苓 20 克，干姜 3 克。

煎服法与蝉萍汤相同。

6. 病儿咳嗽、气喘，可在蝉萍汤内加大贝母 10 克，清半夏 10 克。

煎服法与蝉萍汤相同。

7. 皮疹溃烂流水，灼热，瘙痒，疼痛，除服上药以外，还宜外用石柏散。

石柏散：

煅滑石 60 克 煅赤石脂 60 克 煅石膏 60 克 煅炉甘

石 30 克 生黄柏 15 克

制用法：将这几样药合在一起，研成很细的粉末，用清油调成稀膏敷患处。1 日换药 1 次。换药时不要用水洗溃烂处。

8. 荨麻疹的病儿，一般都可外用白鸡冠花煎水洗。

另外，因小儿活泼好动，年幼无知，在日常生活中易引起中毒，发生意外。贾老针对苦杏仁中毒采用杏树皮水煎服，白果中毒采用白果壳水煎服，腌菜中毒采用生豆腐浆灌服，曼陀罗中毒采用生石榴皮捣烂绞汁灌服，苍耳子中毒采用绿豆煎服，这些方法在临床上均取得了较好的疗效，限于篇幅，不再一一详述。

诊
余
漫
话

防患于未然 重视癌瘤的预防

癌瘤对人们健康的影响非常严重，必然引起人们的高度警惕。针对癌瘤发生的各种因素，贾老采取了许多有效的预防措施，初步收到较好的效果。

一、对癌瘤的预防，与其他疾病一样，要搞好环境卫生和个人卫生。比如，设法使燃料充分燃烧，避免未烧透的气体散布到空气中去。同时，还要植树造林，栽种花草，绿化家庭院落，以净化空气。

二、要合理地安排劳动与休息，加强体格锻炼，增强体质，提高抗病能力。

三、要尽量避免忧思郁怒，防止情绪急剧变化，还要特别注意情绪的刺激和使精神过度紧张的因素，尽可能地防止脑力过度劳累，应当积极参加有益的文化活动，以调剂生

活。

四、要养成良好的生活习惯，饮食卫生更要重视。比如，吃东西要细嚼慢咽，进食不要过量，不要暴饮暴食，不吃硬食，不吃过烫的饭菜，不要饮滚酒（沸酒）或烈性酒，不经常喝过热的茶水，不经常吃肥肉，不吃烤得过焦的食品，更不要吃发霉的食物（据调查证明，吃了发霉的花生、玉米、豌豆、高粱、山药等，都可能使人致癌，用发霉的花生、玉米喂养牲畜、奶畜，然后将其肉或奶给人吃，也可能使人发生癌瘤）。尽可能不吃腌制的食物，特别是暴腌食物。尽量少吃烟熏肉类、鱼类食物。尽可能不吃酸菜，不要常吃又咸又辣或辛、酸、辣等食物。不要常吃浓厚的调味品，如花椒、胡椒等。少吃染过色的食品（染色的食品，如馒头、糕点、糖果等，都含有数量不等的致癌物质——亚硝酸胺）。不要喜欢吃的就多吃，不喜欢吃的或不合口味的就不吃，这样都不好。同时，饥饱也要均匀，既不吃得过饱，也不饥饿得时间过长。

五、注意烹调方法，这样既可以防止食物中的养分丢失，也能避免食物中致癌物质——亚硝酸胺的形成。如在烹调蔬菜时，一定要先洗后切，不要挤菜汁，要用旺火急炒，蔬菜中维生素 C 等营养就不会过分损失。食醋里含有维生素 B₁、维生素 B₂、烟酸等，做菜时适当地加点进去，不仅保护了维生素 B、维生素 C 不致被破坏，并且促进了钙、磷、铁等成分的溶解吸收，提高了营养价值，同时，使菜的味道鲜美。碱对维生素 B、维生素 C 起破坏作用，因而，烹调蔬菜尽可能不要放碱。

很多蔬菜具有防癌抗癌作用。如在萝卜、胡萝卜、大白菜、菠菜、芹菜、韭菜、番茄、豆芽、南瓜、莴苣、豌豆、

马铃薯中，都含有一种酶，能破坏亚硝酸胺，防止癌的发生。而白萝卜、胡萝卜等根茎类蔬菜中，还含有一种木质素，可将人体内吞噬癌细胞的功能提高 2~3 倍。蔬菜中的维生素与植物纤维等都有通便防癌作用，所以，多吃蔬菜能起到一定的预防效果。维生素 C 则提高免疫能力，它可以减少膀胱摄取致癌物质，还具有减少血管渗透性、脱过敏的作用。它能控制动脉硬化，降低胆固醇，对心源性休克有升压及改善心脏功能的作用，使心输出量增加，心脏收缩加强，冠状动脉血流量增加，改善心肌缺血缺氧，改善心肌代谢和全身代谢等，从而防止癌瘤发生。同时，在烹调时，一定要防止肉、鱼烧焦。由于肉、鱼里蛋白质组成的基本成分氨基酸中有一种色氨酸，如果将它烧焦，就会形成一种强烈的致癌物质——F-氮甲基衍生物，如果已有烧焦部分，一定要去掉，绝对禁食。

六、不要吸烟，防止致癌物质从口腔吸入。

七、经常进行体格检查，对于癌瘤尽可能做到早期治疗。如发现有食道上皮增生，或胃腺病样息肉，慢性萎缩性胃炎，恶性贫血，特别是经久不愈的胃溃疡等病，或咽喉、气管的慢性炎症，或流行性感冒，或子宫慢性炎症，或乳房的各种疾病，或肝硬化、慢性肝炎，或肠道的慢性炎症，或肛门的各种疾病等等，都应进行早期治疗。这时应服用平消片，每次服 6 片，1 日 3 次，连续服至增生消失，或症状消失，或微小的癌肿消除。一般健康成人，每半年服平消片 1 个预防疗程，即每次服 6 片，每日服 2 次，或每次 3 片，1 日 3 次，连服 7 天。如发现有溃疡病，可服平消片，每次 6 片，1 日 3 次，连续服至 X 线透视或拍片检查溃疡面完全愈合为止。

八、用料姜石改善水源。料姜石形似姜，遍地皆有，其含有微量元素，据临床应用有一定的防治癌瘤作用。在水井或泉内，应放入约一市尺厚的料姜石，或在水缸内放入料姜石约1千克，或将料姜石研为细粉，每日冲服3~9克，或将料姜石捣成小块，每日15~30克，放在烧开水的壶内烧水饮，或用料姜石水泡茶饮。

九、对于各种癌瘤的预防，必须做到加强身体锻炼，避免忧思郁怒、急躁情绪，尤其在吃饭前后或吃饭时不要过度思虑。

十、如果平素感觉身体不舒适或有不正常现象时，应及时地到附近医疗机构检查和治疗，以免由于一般病症的失治而发展、转变为癌瘤。在地方性甲状腺肿地区，应当早期治疗良性甲状腺瘤，特别是在食盐中加放碘化钾或多吃海带等，以防止癌变。

加强癌瘤患者的调养护理

患了癌瘤的人，在治疗和休养期间，除用药物或其他方法进行治疗外，还须在精神、饮食和起居等方面进行适当的调养。这就需要医生、护理人员和家属密切配合起来，做好护理工作。护理工作的好与不好，将直接影响到治疗的效果和预后。因此，这项工作显得特别重要。

致病的精神活动在疾病进程中有十分重要的意义。过强或过久的精神刺激能够影响内脏的正常活动，而使病情加重。因而，就要通过家属配合医护来减轻或消除一切对疾病

不利的精神刺激。

一般说来，癌瘤病人多数情绪不佳，顾虑较多。对这种情况，我们必须仔细地进行观察、了解，针对病人的思想活动，给以解释、说明。尤其当病人顾虑自己的病情严重，担心是否能够治愈而表现出不安时，医护人员应想尽一切方法来解除这种顾虑。

病人个性急躁，性情骄恣，稍有不如意，便生气动怒时，要首先消除外来的因素，耐心地劝说，使病人安静下来。

对探视病人的人，应提前提醒他，在探视病人时要沉住气，不要露出丝毫的紧张情绪，不要因看到病人病情严重而表现出惊惶不安的神情。医护人员或家属照护病人时，要和蔼热情，使病人心情愉快。

探视病人时，不要随便推荐医生，介绍药方，以减少病人不必要的思想负担。

要防止癌瘤病人常因烦躁、忧郁、恐惧或精神紧张、情绪低落甚至悲观失望而引起食欲不振。对性情急躁、个性强、随心所欲的病人，要用诚挚的态度进行劝说，使他受到感动而不再执拗。这样，就可使病程缩短，提早恢复健康。

对于癌瘤病人，除药物治疗或其他方法治疗外，还必须注意病人的饮食营养，以辅助治疗。由于癌细胞不断地大量吸收人体内的葡萄糖和氨基酸，致使病人发生营养不良而贫血、消瘦。但是，病人往往食欲下降，而引起营养不良，降低抗病能力，并容易并发其他疾病与癌瘤的转移。因此，设法使病人增加饮食，加强营养，使正气盛而邪气祛，是十分重要的。应该注意的是，饮食有寒热温凉、酸苦甘辛咸的不同，对病人的饮食，应根据病情的不同及口味的改变进行选

择。由于癌瘤的发展和变化，病人常有味觉改变。一般说来，多数病人喜欢甜食，不愿吃肉类，但也有不愿吃甜食而喜欢吃咸食或淡食的。

癌瘤病人应当忌烟、忌酒，并要注意慎用炙烤和刺激性较强的食物。此外，还要注意病人接受食物的能力与食物用量的情况。当病人消化能力未减弱时，食量应根据需要，不宜限制。如果病人消化能力减弱，对饮食量就应适当控制，采取少量多餐的办法，防止多食损伤脾胃，妨碍消化。饮食过少，营养不足，营养不良，不仅影响组织机能的修复，还会使体液与细胞免疫活性发生不利变化，特别是肝脏微粒体酶活力改变，使药物代谢也出现明显的变化。

合理安排癌瘤患者的饮食

癌瘤病人的饮食从我国各种癌瘤的发病情况来看，虽然有地区的差别，但是，食道癌与胃癌最多。所以，对癌瘤的防治，必须注意到膳食的重要意义。

食道癌、胃癌或其他癌瘤病人，在高热，病情严重，身体衰弱较甚，口腔和咽喉癌瘤等表现为吞咽困难时，宜用营养丰富、容易消化吸收、不用咀嚼的食物，每隔2~3小时进食1次，1日进食6~9次。一般情况下，可用花豆粉。

花豆粉：

花生饼（花生去油后的渣）2000克 大麦1000克 小麦麸皮1000克 黄大豆1000克

制用法：以上四味各炒熟，合在一起，研匀为细粉。每

次按食量大小服用适量，开水冲，加糖或加盐，或单独服食。

本方用花生饼悦脾利胃，润肺化痰；用大麦调中益气，除热消渴，凉血化积，壮力养血；用小麦麸皮建中止汗，镇痛散血；用黄大豆缓和滋养，消水肿，利大肠。本方对癌瘤病人吞咽困难有微妙的作用。

如果由于条件限制，不好配用花豆粉时，也可先用豆浆、牛奶、羊奶、肉汤、鸡蛋汤、藕粉、米汤油等食物，或配用一些菜汁、韭汁、甘蔗汁、梨汁、荸荠汁、芦根汁、萝卜汁、西红柿汁、无花果汁等。

当咽下稍微畅通或顺利时，可用小米粥、大米粥、面条、面片、面包、蛋糕、饼干、豆腐脑、馄饨、饺子、豆腐、煮鸡蛋、炒鸡蛋、肉末、各种蔬菜等营养较丰富的食品。忌食油炸或强刺激性食物。

60岁以上的病人，因涎腺、胰腺、胃腺所分泌的消化液随年龄的增长而逐渐减少，所以，应吃软食、素食、淡食等易于消化吸收的食物。

对癌瘤病人进行调养时，首先要使病人减少对癌瘤的恐惧，帮助病人恢复食欲，以便进行积极的治疗。必要时，也可用养心安神类的药物来减轻病人的忧郁与烦躁。当病人疼痛剧烈时，亦可用镇痛类的药物止痛。病人入睡困难时，可用镇静安眠类药物，促使病人充分休息。

为使病人保持足够的营养，当病人不想吃饭时，可经常更换食品的种类。如果病人不吃猪肉时，可换牛肉、兔肉、鸡肉或鸭肉等。病人吃的肉类食物一定要烧熟烧酥，容易消化吸收。病人的饮食应该过一段时间更换一次，种类要多。必要时，不妨吃一些新鲜鱼虾，淡水鱼虾与海水鱼虾均可以

吃，以补充营养。一般癌瘤病人忌食猪头肉、河蟹及无鳞鱼，并忌饮酒。

注意菜肴色、香、味的调配，想尽一切办法引起病人食欲。如红烧豆腐，可撒上些青葱或香菜。在绿色菜肴上，加上点西红柿酱，或把胡萝卜切片铺在菜肴上，或把胡萝卜切成丝，拌在绿色或其他淡色菜肴上，以增加菜肴的色泽。癌瘤病人宜吃煮、炖或蒸的食物，避免吃油炸或其他不易消化的食物。

多吃蔬菜可以促进食欲，调换口味。近年来发现胡萝卜能提高巨噬细胞的活力，新鲜的卷心菜、菜花、莴笋等青菜含有维生素 E，可促进细胞分裂，推迟细胞衰老等。这些蔬菜均有抗癌作用。

放射治疗、化学药物治疗的反应常使病人的饮食减少，影响营养的吸收，发生蛋白质、维生素等缺乏，体重下降，引起病人贫血、消瘦，影响对疾病的治疗。化疗还能使肠粘膜上皮产生增殖细胞，使肠蠕动紊乱，正常功能减退，有时发生肠麻痹或腹泻而发生营养不良。口腔、咽喉部经过放疗后唾液分泌减少，口干燥或并发口腔、咽喉或食道的炎症，致使咀嚼、吞咽受到影响时，可引起食欲不振。

腹腔放射治疗或腹部手术后，发生放射性肠炎或肠功能紊乱，影响消化吸收，有时出现腹水，病人出现饱闷腹胀感，食欲下降。这时宜用流食或半流食，不宜吃太热的饮食，这样能够减少刺激。

癌瘤毒性物质进入血液，造成消化吸收障碍，可引起营养不良，应加以注意，随证调治，促使营养恢复，争取治疗时间。

感冒的预防和治疗

感冒是常见病多发病，西医称之为上呼吸道感染。感冒分为普通感冒与流行性感冒。感冒在中医学里有比较详尽的描述，我国汉代张仲景《伤寒论》里有三百多证一百多方辨证论治。现代医学认为感冒的病因有细菌，如链球菌、肺炎球菌、葡萄球菌等，和病毒，如鼻病毒、柯萨奇病毒、埃可病毒、呼吸道合胞病毒、流行性感冒病毒及副流感病毒等。在不同的部位有不同的症状。普通感冒的症状多为鼻塞、鼻流清涕、打喷嚏、头痛、项强、咽干不适、咽痛、声音嘶哑、浑身不适、咳嗽、发热、恶寒、四肢痛等。流行性感冒症状较重，多有高热、寒战、咳嗽气促等。

近日《三秦都市报》载：法国有 100 万人患流感。英国按其标准 10 万人中有 400 人感染上称之为某种瘟疫的病。现英国 10 万人中有 300 人感染流感，最多的英格兰每 10 万人中已有 540 人感染流感，77% 的英国家庭至少有一人患上 A 型流感。美国是全民注射疫苗，在纽约市有 5 个区感冒病毒肆虐，医院与药店表示感冒人数激增，建议所有人打感冒预防针。医务部门警告，即使注射防流感疫苗的人也仍有患上流感的可能，因为造成流感的并非一种病毒。

大概在 1955 年前后，西安地区流行性感冒发生，病人很多，应接不暇，贾老按学医时读的歌诀“六经为病尽伤寒，气同病异其期然，推其形藏原非一，因从类化故多端”来思考，将给儿科配好正在使用的“麻翘石膏糖浆”给当时

流感病人服用，收到了满意的疗效，不到 1 个月收治 300 多例流感病人，论文刊登在《中华儿科杂志》《中医杂志》，全国有十余家报刊转载，1956 年在石家庄全国卫生会议上被评为甲等奖。

现将贾老多年用于养生防治、增强免疫、提高抗病能力而防治感冒的几种方剂介绍如下：

一、麻翘石膏糖浆

麻翘石膏糖浆方，麻黄连翘生石膏，大贝银花煎三遍，白糖蜂蜜制糖浆，一切咳嗽与感冒，流行感冒效亦良，每次一二十毫升，每日三次体复康。

方药：

麻黄 150 克 连翘 180 克 金银花 180 克 生石膏 180 克 大贝母 180 克 白糖 500 克 蜂蜜 500 克

制服法：将麻黄提取后留好，将麻黄渣与连翘、金银花、大贝母、生石膏共煎 3 次，倒出药汁，与麻黄提取物、蜂蜜、白糖合在一起，浓缩为 3000 毫升糖浆备用。每次服 10~20 毫升，1 日 3 次。

二、葛青丸

葛青丸内虎芍苍，葛青辛冰鼻塞方，一切感冒均防治，服后鼻通功效良。

方药：

葛根 300 克 大青叶 300 克 白芍 300 克 辛夷 150 克 苍耳子 150 克 虎杖 300 克 冰片 10 克

制服法：共为细粉，水泛为丸。每服 6 克，生姜汤送服，日服 3 次。

三、芝参丸

芝参丸中术芍莲，人沙芝草山苓冰，共为细粉水泛丸，健脾强胃并养肾，肾壮脾旺不受邪，肝疏心肺血流畅，气血旺盛精神爽，免疫力强恒健康。

方药：

红人参 150 克 云茯苓 300 克 土白术 300 克 怀山药 300 克 建莲肉 300 克 北沙参 300 克 黑芝麻 600 克 杭白芍 300 克 生甘草 30 克 冰片 20 克

制服法：共为细粉，水泛为丸。每服 3~6 克，日服 3 次，温开水送服。

四、姜葱盐醋汤

方药：

生姜 10 克 葱白 2 节 盐醋各适量

制服法：葱、姜用开水冲泡后加入盐、醋顿服，微汗即可。

如何养生

生命永恒有长短，短促漫长阶段变，老年收获好季节，年轻时光欣赏惯，坠地稚嫩童青年，跨过中年迈老年，纵横失落不足道，更多则获成熟收，回首风雨几沧桑，绝非成熟与生来，生活教会社（会）进步，时代变迁家（庭）殷实，儿孙成长诸付出，耕耘正是收获取，掐指来算人百岁，六成

到（手有）什（么）放不下，领悟老年是优势，珍惜享受并发挥，好似粮食熟透果，超然飘逸智慧强。

头面部保健按摩

按摩为人类最早的养生、医疗、预防、康复的方法，功能调和脏腑，疏通经络，活动关节，并通过按摩达到气血流畅，食欲增强，睡眠安静，大便、小便通畅。以皮肤摩擦运动脏腑，器官相因使人健康。

以下简要介绍头面部保健按摩。

梳头：两手手指微屈，自然分开，两大拇指靠近耳朵，两小指靠近前额正中，用指端从前额向后脑梳理，即从两眉间（印堂穴）经头顶（百会穴）至脑后（风池、风府穴）梳摩。应触及头皮稍用力梳摩，重复 20 次。功能刺激头皮神经末梢，促进头脑血液循环，流畅气血，调节大脑，增强脑细胞新陈代谢，延缓脑细胞衰老，增强记忆力，促进头皮的新陈代谢，减少或延缓白发的产生，提神醒脑，消除疲劳，聪耳明目，防治失眠、头痛、耳鸣、耳聋及高血压等。

叩头：两手微屈，自然分开，用十指指端叩击头部，从前额至枕后，然后叩击两侧颞部。叩击时两腕放松，稍用力，以感觉酸胀为度。两手交替叩击，重复 3~6 次。有疏通经络、行气活血、健脑提神之功能，可防治头痛头胀。

摩额：两手食指屈成弓状，以食指中节靠拇指侧紧贴额部，由前额中央抹向两侧太阳穴，重复 16~30 次。可改善额部血液循环，增加皮肤弹性，减少皱纹，清目醒脑，活血

通络，防治眩晕、头痛及鼻病。

摩面颊：两手掌相合摩擦至发热，乘热将两手掌分别上下摩擦两侧面颊，搓摩面颊部发热为度。搓摩时手掌紧贴面部（如能给面部涂少量油脂，能保护皮肤，提高摩面效力）。可清除皮肤排泄废物，促进面部皮肤血液循环，防止污秽、斑点、赘生物等的产生，并除皱消斑。

慰眼：两手掌搓热后，将手掌心捂盖在两眼上持续5秒钟，然后放下，手掌再相互摩擦捂眼，反复捂眼5~10次。两手中指指端分别按揉眼两侧内眦（内眼角）、外眦（眼外角），每次1分钟。用两手食指中节靠拇指内侧面紧压眼眶，做自内向外的刮动，先刮上眼眶，再刮下眼眶，出现酸胀感为度，重复10~20次。闭眼按顺时针方向转动6~10次，然后再逆时针转动6~10次。能提高视力，消除眼睛疲劳，调节眼肌，防治远视、近视、散光、夜盲。在早晨起床前，坐或卧，闭上双眼，两手指弯曲，从睛明穴开始顺眼皮中缝横揉至瞳子髕穴（用力不宜大），横揉60~100次后，用两食指尖端重压两侧太阳穴30~60次，起床活动。晚间临睡时再按原法按揉1次。可治肝肾两亏，脾胃虚弱，并促使眼球神经兴奋，血液循环流畅，清肝明目，化翳消障等。

擦耳：两手握空拳，用拇、食两指的指腹夹住耳廓上下搓擦，从耳尖擦至耳垂，再从耳垂擦至耳尖，两耳交替重复6~10次，直至耳廓（耳轮）发热。有健脑强肾、聪耳明目之效，防治尿频、腰腿疼痛、心慌气短、胸闷、头痛头昏、颈椎病等。用两手掌心紧掩两耳，然后骤然放开，重复6~10次。亦可用中指插耳6~10次。用两手食指压在中指上放于脑后枕骨处，用食指弹击枕骨10~30次，调整人体内脏功能，以聪耳助听，补肾滋阴，防治耳鸣、耳聋、烦躁易

怒、手脚心热等。

搓鼻：两手中指指面上下摩擦鼻两旁，擦热为度，以宣肺通鼻，防治感冒、鼻塞、头痛、流涕、鼻炎及鼻窦炎等。

按人中、风府：在立春、雨水、惊蛰、春分等节气，用食指按摩人中穴（在鼻孔与上嘴唇之间中上三分之一处）、风府穴（在后脑发际直上1寸处，与人中穴水平），左右旋转16~20次。也可在每天早晨起床后或遇有感冒先兆或感冒流行时按摩16~20次，以保持正气旺盛，防止邪气侵入，以预防感冒。感冒初起，即在早中晚各按摩尺泽穴（肘弯大经脉处）1次，每次左右肘弯各按摩1分钟，症状可逐渐消除。

叩齿：口微闭，上下牙齿有节奏地相互叩击，每次30~60次，可预防牙齿松动、牙周肿痛、过敏，坚固牙齿。

搅舌：舌头抵于唇齿之间及上下腭之间，进行卷抹，卷抹至口内生津，随后分次将唾液徐徐咽下。搅舌能促进唾液分泌，协助口腔卫生，润喉，助消化等。

年 谱

1919年 农历腊月二十六日，生于陕西省西安市，取名金辉。祖籍商县。祖父贾春祥，以木工为业（西安城隍庙的雕刻即为其祖父等所做）。父杨堂公行三，以实业为主，兼以务农。母刘崇华，善医术，常为乡亲疗疾。

1926年 在方家村私塾读书。

1928年 父逝，家境中落，离家到舅父家中读书。

1934年 初中毕业，随李瑞先生学习《伤寒论》《金匱要略》《神农本草经》《内经》《诸病源候论》等。后又师事雒庸先生专攻小儿科。

1940年 抗日战争开始后，响应号召，与同学们一起加入十四军新兵团，在山西中条山、阳城等地参加抗日战争。一次排长夫人生病，服西药无效，他采了几味中草药，药到病除，并交识了军卫生处处长刘宾南，随时向刘宾南处长学习西医知识，刘向他学习中医。

1942年 部队到河南洛阳补充整训，被派到西安办事处工作，休息时与医友联系，并加入中国国医学会及中医师公会，与医友魏宗权、成友仁、周世昌、曹旭等在竹笆市天

德堂义诊。后又迁到三桥权杨村、南何村，均抽空到西安天德堂义诊。后经郑南海理事长批准，在三桥设立了中国国医学会三桥分会，任会长。并在三桥一带义诊。

1945年 日本投降后，即脱离部队，在三桥一带行医。

1946年 经国家考试院考试，获得高级中医师证书。经三桥卫生示范区批准，建立了法古诊所。

1949年 解放后将法古诊所更名为仁诊所。被三桥人民选为长安县各界人民代表。同时任卫生工作者协会县支会副理事长，中医药学组组长，三桥卫生协会理事长。

1951年 参加西安市中医学习西医班8个月毕业（改造中医）。

1952年 组建三联诊所，将三桥镇的四个私立诊所组织联合称三联诊所，任所长兼科主任。

1954年 参加组建西安市中医门诊部（即西安市中医医院，为国立医院）。

1955年 5月1日在西安市西大街开诊，任小儿科主任。因杨晓初副市长、地质部刘景范部长来西安，要求诊治，1年多病情减轻，效果明显，继之省市领导均来就诊，故在小儿科一侧设了干部科室，由其诊治。

1958年 上海一位病人乳腺癌晚期，求其诊治，好转后，本院家属陈某乳腺癌术后复发，经治疗好转，烈属文某晚期胃癌亦前来诊治，服药后逐步好转。

1960年 成立西安市癌瘤研究小组，其任研究小组组长，每周集中到市卫生局开会一次，各院均有负责人一位。时值上海警备司令刘飞因患胃癌晚期，住福建省鼓浪屿休养，由刘景范部长介绍，经福建省委邀请，到鼓浪屿为刘飞诊治，服药病情好转后，其回上海。

同年被选为省、市劳动模范。

1961年 到上海为刘飞司令急诊，病情稳定，开药后约1周返回西安，在离开上海前，许世友司令在上海特别宴请一次。回西安后向市领导汇报情况。3个月后，又到上海为刘司令复诊，许世友司令宴请时，空五军军长王汝召、华东局计委主任犹景翔、警备副司令符成珍等约20多人亦求诊治。其后又到南京空军诊病多人。

1962年 开始为福州、厦门、上海、安徽、杭州等地多位领导同志诊病疗疾。

1965年 派赴镇巴山区巡回医疗队，住双坪大队贫下中农戴某家，闲谈中发现戴某的爱人陈某当时已过43岁，为她的外孙女哺乳，了解后才清楚她共生三胎，第三胎是男，时人多重男轻女，她的儿子吃母乳到6岁断奶，现已14岁了，大女儿生产后因结核病严重，生活不能自理，更不能哺乳，陈某在困难中想起她家老人说过毛芋子下奶的事，遂到房后山上挖了两个毛芋子炖猪蹄1对，喝汤吃猪蹄，过了几天又挖了几个烧熟吃了，1周后，乳汁分泌出来了，很充足。经她指点后，认识了毛芋子的蔓叶及块根，以后在镇巴巡回医疗的8个月中，凡遇缺奶、少奶的患者，均用毛芋子，疗效均很好。因而每次寻诊的路上均在道中采集一部分标本，在春节回西安时带回中草药标本200多种，受到省、市领导表扬，并将标本展览。元宵节过后，再返回镇巴，自编教材培训赤脚医生，这一册教材按镇巴中草药编写，并写出镇巴中草药剂型与应用，争取每一位赤脚医生都能不要钱为贫下中农治疗。

1966年 回城后文革开始。工作队进院，停止工作。

1967年 以“白专道路”、“天上飞地下跑的人物”等

“罪名”被批斗，停止工作，关进牛棚。

1968年 被批判，关牛棚，抄家，抄走三车书籍及书稿。

1969年 恢复工作，到一门诊上班，约在11月开始下放农村。

1970年 持介绍信到长安县革委会报到，发现名册中他被下放到长安县细柳公社，然后又被通知到县医院工作。2个月后县医院组织巡回医疗，由陈福儒（原来的院长）、沈毅（原急诊科主任）同其共3人组成医疗队到魏寨公社，约1月左右，鸣犊区组织了50多人（有文化的青年）要培养赤脚医生（全区）。当时3人研究决定直观授课，按其在镇巴经验，其担任中医药教师，带领学员由库峪进山，见一味药讲一味，并采一味，到沔峪出山共采集中药100多味，回到魏寨配成方剂，分给来参加学习的赤脚医生50多人，带回各队为贫下中农防病治病。

1971年 二炮司令员张达志经301医院诊断为肺癌，来西安求其诊治，因而县上规定每周回西安到人民大厦为张司令诊治1次，调回县医院上班。1年多后，张病情稳定好转，带“平消丹”一箱回北京继续服用，并带一处方坚持煎服。

1979年 撰成全国第一部中医药防治癌瘤的专著《癌瘤中医防治研究》，发行后获省优秀书籍奖。

1980年 调回省中医药研究院上班。

1983年 《浅谈小儿肺炎的辨证论治》获优秀论文三等奖。《癌瘤中医防治研究》英文版出版，享誉港澳。

1984年 被评为省先进科技工作者。

1989年 《中医癌瘤证治学》出版发行。

1990年 被评为中医药研究有显著成绩科技工作者，担任国家继承中医药专家经验者指导老师。

1991年 《中老年防癌健身良方妙法》出版。

1992年 被评为陕西科技精英。

1996年 《中医癌瘤学》出版发行。

1997年 任《陕西省中医药研究院学报》顾问。

1999年 《巡回医疗与毛芋子的发现》撰写成。

2000年 《养生保健箴言》撰写成。

附录

方剂索引

二画

丁桂汤	231
丁翘汤	22
二白汤	245
二矾散	262
二矾雄焦散	253
二根汤	267
二甲姜薄散	251
二莲荸苕汤	120
二苓车前汤	234
二苓枳朴汤	231
七矾丸	68
七及珠蛤散	255
七香散	142

三画

大黄干姜散	250, 286
干慈丸	133
三莪散	13
三甲榆蜂汤	148
三甲紫豆汤	190
三香散	234
三蛭丸	151
山芪赭花丸	72
小金丹	256

四画

丑苓汤	41
丹胡失笑汤	34

丹甲汤	17	瓜楞汤	51
丹甲丸	17	瓜蒌逍遥汤	82
丹夏汤	46	瓜蒌银蜂丸	139
丹菇汤	50	瓜蒌豆蜂丸	114
丹葵汤	60	瓜蒌前橘汤	114
丹棱汤	54	瓜蒌鱼贝汤	34
丹廬汤	58	瓜辛汤	130
化虫散	233	归防青桔汤	252, 265
木通甘草汤	316	归芍汤	231
牛磺梅黛散	263	归藤银翘汤	297
水根汤	207	甲骨汤	222
天冬合剂	282	可保立苏汤	311
瓦榴汤	97	可保立旭汤	225
乌梅银花汤	258	兰香汤	20
五虎汤	271	兰香丸	20
元桔地冬汤	247	龙葵散	284
		龙牡乌智散	313
		龙胆阿非散	253
		龙石散	287
		龙蜂散	226, 307
		龙元蓝芩汤	266
		生地桃仁汤	44
		生熟地黄汤	249
		石柏散	328
		石膏青柏散	241, 325
		石黄粉	257
		石连汤	236
		石桐膏	257
		石竹汤	39
		术丹汤	43

五画

平消片	9		
平消栓	153		
艾补汤	116		
艾蜂汤	118		
艾橘汤	119, 282		
白喉散	266		
白玉膏	323		
半夏干姜汤	39		
半夏天麻汤	31		
冬百膏	285		
冬参汤	29		
冬杏散	275		

术丁汤	235	朱矾散	317
术矾散	229	朱冰散	247
术榆汤	294	竹菰汤	66
四黄星防散	281	竹甲汤	18
仙床汤	206	竹甲丸	18
仙脑丸	165		
仙蕊汤	148		
加味玉露散	235		
		七画	
		补金丸	11
		苍柏白芷散	243, 325
		苍耳青风汤	244
		苍耳汤	28, 244
		苍防橘贝汤	274
		苍藤汤	93
		苍辛丹杏汤	27
		苍辛银豆汤	129
		豆蒂蒴桔汤	241
		豆蒴蝉桔汤	320
		豆蔻丹	119
		豆菰汤	103
		豆蚣丸	120
		豆果丸	129
		豆黄丸	95
		豆桔汤	248
		豆桔知柏汤	248
		豆桔枳朴汤	249
		豆桔紫荆汤	249
		豆楞汤	95
		佛参汤	149
		佛苍汤	54
		佛香汤	15
六画			
安虫散	233		
百龙汤	26		
百星汤	116		
地阿汤	84		
地草汤	23		
地床汤	167		
地胆汤	168		
地菊汤	183		
地莲汤	185		
地苓汤	59		
地明汤	32		
地青汤	184		
地榆散	236		
地藻汤	196		
防疹汤	239, 261		
合珠散	256		
红菰汤	35		
贞术汤	16		
贞术丸	16		
贞藻汤	197		

佛香丸	15	羌麻汤	36
附星散	270	芩菊汤	49
诃香散	287	芩连半夏汤	40
诃苡汤	57	芩连木通汤	286, 323
君楝汤	314	芩连山药汤	296
连柏膏	241	芩连银翘汤	248
连柏氧锌膏	325	芩连楂朴汤	295
连矾水	264	沙艾汤	115
连栀二苓汤	241, 325	沙芦汤	25
灵骨汤	159	苏防橘贝汤	273
妙圣丹	226	苇腥汤	117
牡参汤	252	羌漆散	233
牡金散	312	辛石散	132
牡金汤	59	辛夷汤	244
芪贝银半汤	281	杏铃汤	24
芪补汤	131	杏苏饮	280
芪丹汤	190	苡莪汤	65
芪豆汤	190	苡欢汤	150
芪胶汤	189	苡莲汤	87
芪菊汤	175	苡榴汤	94
芪苓汤	315	苡仙汤	18
芪苓银翘汤	315	苡仙丸	17
芪苓银青汤	242	苡辛汤	36
芪酥丸	11	皂星莱菔丸	275
芪仙丸	12	皂星散	238
芪苡汤	141		
芪藻汤	198		
芪藤汤	93		
芪蛭汤	203		
杞参汤	185		

八画

参苡汤	47
参桂散	223, 310
参桂汤	31

参苓薏砂散	263	果矾散	227, 308
参苓汤	298	金柏散	37
参楼散	12	金胆汤	167
参朴散	235	金甲丸	85
参芪艾陈汤	119	金楞汤	58
参芪地黄汤	312	金米汤	315
参芪地枣汤	322	金钱丸	37
参芪龙牡汤	225	金硝丸	142
参芪三甲汤	152	金星散	9
参芪赭花汤	73	金藻汤	196
参桑麝贝散	320	苦根汤	206
参砂散	287	苓莪汤	53
参麝樟茶散	278	苓楞汤	55
参麝樟脑散	246, 270	茅及汤	42
参石丸	10	茅仙汤	205
参术丸	182	茅地汤	201
参酥丸	191	明砂苓泽汤	263
参香汤	233	青倍丸	188
参附龙牡汤	225	青参丸	183
参星蝉砂散	278	青蝉散	222, 269
参杏夏术汤	26	青甘散	188
参赭培气汤	39	青果蛋壳散	317
参赭三甲汤	68	青黄白冰散	324
参赭桃红汤	64	青黄散	318
齿参汤	94	青金汤	302
齿榆汤	57	青金三甲汤	85
矾倍散	141	青桔银翘汤	265
矾黛散	263	青橘散	245
矾连散	294	青牛散	98
矾酥丸	85	青礞散	153

鱼铃汤	33	香薷子酒	38
鱼芦汤	30	香楼汤	52
郁术汤	64	香煤朱砂散	306
枣蚕蝉星散	246	星贝芥子散	275
枣霜膏	77	星布汤	175
泽泻白术汤	288	星蚕雄砂散	278
知冬橘贝汤	274	星霜散	278
九画		养脾散	232
		茵陈二金汤	301
柏苓汤	150	茵金汤	228
茶胆汤	23	茵金丸	86
茶矾汤	227, 308	茵苓汤	84
茶贞丸	13	茵翹贯众汤	301
茯苓丸	232	茵桃汤	53
荟金汤	49	茵硝丸	103
骨皮地黄汤	230	茵梔汤	228
贯楝汤	227	枳朴汤	41
茵苍汤	232	枳术汤	44
姜葱盐醋汤	243	枳藤汤	97
姜橘汤	40	枳星牛黄散	277
姜苓汤	230	枳贞汤	75
姜糖胡桃膏	304	重参丸	182
荆葛蝉麦汤	239	重苓汤	19
砂圣丹	307	重苓丸	19
砂雄丸	153	十画	
香矾散	235		
香夏散	234	破石丸	12
香蚣散	38	蚕蝉黄滑散	262
香连散	235	蚕菊汤	165
香楝汤	56	蚕明汤	166

蚕蝉雄星散	270	海羊散	227, 308
蚕蝎散	304	海元汤	173
柴豆汤	47	海猪汤	202
秦茵汤	103	桔半三黄散	275
柴菇汤	51	莱菔汤	231
柴姜汤	102	桑贝散	279
柴金汤	35, 140	桑及二母汤	254
柴楞汤	82	桑及蜈甲散	255
柴桑银翘汤	239, 261	桑桔土贝汤	240
柴桑芝麻散	254	桑茅散	283
柴辛汤	130	桑萍汤	240
莪丹汤	46	桃茶膏	276
莪参汤	48	桃茶杏蜜膏	284
莪附汤	56	桃丹银翘汤	21
莪黄汤	42	桃葵汤	74
莪蓟汤	201	桃棱汤	55
莪菊汤	35	桃苓汤	60
莪楞汤	83	桃葵汤	117
莪膝汤	158	桃枣丸	76
桂星汤	140	桃参汤	45
莲柏散	294	夏星散	237
莲榴汤	236	珠补汤	151
桂枝车前汤	320	透仙汤	160
海鹤汤	48		
海豆丸	158		
海花夏赭糖浆	75		
海莲汤	174		
海铃汤	20		
海铃丸	19		
海藤丸	157		
		十一画	
		蛋楞丸	63
		黄藻汤	195
		寄补汤	160
		菊柏汤	28
		菊黛丸	168

菊豆饮	258
菊苣汤	32
菊楼汤	131
菊明汤	133
菊元汤	176
梨姜膏	285
梨橘膏	285
绿豆甘草汤	245
绿豆芦根汤	246
麻贝苏子散	281
麻桂橘贝汤	274
麻朴汤	29
麻翘石膏汤	21, 244, 262
麻杏橘半汤	273
礞石散	76
礞茵丸	87
蛇龙汤	96
旋梨汤	74
旋石汤	73
银地射干汤	240
银葛桂枝汤	269
银翘蝉菊汤	318
银翘地黄汤	239, 261
银翘青英汤	317
银翘青蝉汤	323
银翘青防汤	242
银翘青叶汤	252, 268
银青地黄汤	319
银青菊苣汤	305
银藤归苣汤	298

十二画

葱白二豆汤	260
葛根苣苣苦参汤	293
葛姜汤	234
葛芍苣连汤	294
蛤黛散	284
锅耙莲肉散	289
椒姜散	223, 310
葵蕊汤	203
梭地汤	50
梭莪汤	16
梭莪丸	15
硫滑散	290
硫椒膏	241, 325
萎菊慈菇汤	139
葶苈散	238
葶苈二母汤	238
犀甲汤	189
硝马丸	96
硝硼散	248
雄参膏	98
雄矾磁神散	226, 308
雄矾梅冰散	316
雄矾砂丹散	263
雄甲银翘散	323
雄金散	303
雄硼散	267
雄藻丸	195

十二画以上

鳔黄散	306	雷槟散	228, 300
槟参汤	299	雷贯散	314
槟瓜榧子汤	300	蓼参丸	14
槟橘散	300	蓼金汤	52
蝉萍散	327	榴皮雷贯散	299
蝉萍汤	242, 328	榴香散	290
蝉仙散	186	礞黛散	318
椿甲丸	147	礞矾散	321
椿皮连朴汤	296	礞连牛黄散	262
慈蒴汤	187	礞脑膏	132
慈地汤	186	漆豆散	67
慈葛汤	187	漆甲桃金散	229
慈明汤	186	漆青散	86
磁龙丸	169	麝香丹参汤	30
磁朱白金散	225, 309	霜梅散	264
蜂补汤	66	蒜艾汤	118
蜂宝散	67	蒜瓜楂榴汤	25
鹤仲汤	201	蒜乳丸	232
槐矾散	236	藤枯汤	157
橘半散	320	蝎蚕珀牛散	269
橘茹汤	234	蝎矾散	242, 326
蔻姜散	290	楂榴汤	95
蔻苓汤	22	楂藕汤	258
蓝蜂汤	119	楂曲槟钙散	250
		赭铃汤	43
		藻楞汤	45

中国百年百名中医临床家丛书

(按姓氏笔画排列)

丁光迪
万友生
王文彦
王伯岳
史沛棠
叶橘泉
刘冠军
朱仁康
朱春霆
邢子亨
余无言
张子琳
张 琪
李今庸
李克绍
李翰卿
杨继荪
邱茂良

于己百
马光亚
王任之
邓铁涛
叶心清
石筱山 石幼山
刘炳凡
朱兴恭
米伯让
何 任
宋祚民
张珍玉
张赞臣
李玉奇
李寿山
杨甲三
汪逢春
邹云翔

于祖望
孔伯华
王合三
韦文贵 韦玉英
叶熙春
刘云鹏
刘弼臣
朱良春
许玉山
何炎燾
宋爱人
张梦依
张镜人
李仲愚
李斯炽
杨志一
肖龙友
陆南山

陆瘦燕
陈慎吾
周次清
岳美中
林沛湘
郑守谦
姜春华
胡天雄
赵心波
夏桂成
翁炳南
贾 堃
顾筱岩
章真如
黄宗勛
董建华
路志正
魏长春

顾伯华

陈可望
单健民
周筱斋
承淡安
欧阳倚
俞慎初
施今墨
胡希恕
赵炳南
徐小圃
耿鉴庭
郭士魁
梁剑波
黄文东
程门雪
蒲辅周
潘澄濂
魏龙骧

陈苏生
周仲瑛
孟澍江
林如高
罗元恺
姚国美
查玉明
赵 棻
赵锡武
徐恕甫
袁鹤侪
钱伯煊
盛国荣
黄竹斋
董廷瑶
裘笑梅
颜德馨
魏指薪

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名= 贾堃

作者=

页数= 3 5 9

S S 号= 0

出版日期=

V s s 号= 7 5 4 9 3 2 3 6

封面
书名
版权
前言
目录
正文
封底