

中 药 材

丁 香

Dīngxiāng

FLOS CARYOPHYLLI

【来源】 本品为桃金娘科(Myrtaceae)植物丁香树(*Eugenia caryophyllata* Thunb.)的干燥花蕾。多系栽培,产于马来西亚、印度尼西亚及东非沿海等地。通常当花蕾由绿转红时采摘,晒干即得。

【鉴别】 本品略呈短棒状,全长3—6分。上端为花瓣抱合呈圆球形,直径约2分。下部为萼筒呈圆柱形,略扁,长2—4分,宽约1.5分,厚约1分,基部渐狭小。表面红棕色或紫棕色,有细的皱纹。萼筒上端有4片三角形肥厚的萼片,向外突出。抱合的花瓣共有4片。花瓣内有多数向内弯曲的雄蕊,中间有一圆柱形的雌蕊。质坚实,断面有油性,用指甲刻划可见有油质渗出。气强烈芳香,味辛辣麻舌。

以完整、朵大、油性足、颜色紫红,香气浓郁者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,筛去灰屑,用时捣碎即得。

【性味】 辛,温。

【功能】 暖脾胃,壮肾阳,降逆气。

【主治】 脾肾虚寒,呃逆呕吐,吐泻,心腹冷痛。

【用法与用量】 三分至一钱。

【注意】 畏郁金。

【贮藏】 置阴凉干燥处,防热。

刀 豆

Dāodòu

SEMEN CANAVALLIAE

【来源】 本品为豆科(Leguminosae)植物刀豆(*Canavalia gladiata*(Jacq.) DC.)的干

— 1 —

燥成熟种子。均系栽培，主产于江苏、湖北、安徽等地。秋季果实成熟后采摘豆荚，剥取种子，晒干即得。

【鉴别】本品呈扁卵形或扁肾形，长0.6—1寸，宽3—6分，厚1.5—3.5分。外皮淡红色或红紫色，平滑而略有光泽，微皱缩不平，边上一条黑眉，长4.5—7.5分，眉上有三条白色的细纹。质坚硬，难破开，种皮革质，破开后内皮棕绿色而光亮，种仁两瓣，黄白色，油润。无臭，味淡。

以粒大、饱满、色淡红者为佳。

【炮炙】拣去碎壳及杂质，洗净，用时捣碎即得。

【性味】甘，温。

【功能】温中下气，益肾补元。

【主治】虚寒呃逆。

【用法与用量】一钱五分至二钱，煎服或烧存性研末服。

【贮藏】置通风干燥处，防虫蛀。

人 参

Rénshēn

RADIX GINSENG

【来源】本品为五加科(Araliaceae)植物人参(*Panax schinseng* Nees)的干燥根。栽培的称园参；野生的称野山参。鲜园参习称水参；除去地上茎叶及泥土，蒸熟后晒干或烘干即为“红参”；经水烫浸糖而后干燥的称为“白参”或“糖参”；经沸水微烫或直接晾晒干燥的称为“生晒参”。主产于吉林、辽宁、黑龙江等地，春、秋二季均可采收，以秋季采者质佳。

【鉴别】完整的人参可分为参体、芦头、芋、腿、须等部。

1. 园参 参体呈圆柱形或肥大的纺锤形，长2—3寸，直径3—6分。上部有断续的环纹，下部连有3—5支不等的参腿，末端则分枝为多数细长的参须。顶端有芦头，多弯曲带有凹窝状的茎基残痕，习称“芦碗”，排列稀疏而不成环，芦上有时生有2—3个不定根，习称为“芋”。

(1) 红参 全长2—3寸，参体长1—2寸，直径3—6分，上端钝圆与芦头相接，下部较粗，带有多数分枝的参腿作扭曲交叉状。表面红棕色或黄棕色，全体呈角质半透明状，有纵向皱纹，参体上端可见环纹和纵皱。质硬而脆，断面红棕色，中间有浅色圆心。气香，味

甘、微苦。

(2)白参(糖参) 大小不等,形状各异,参体长1—3寸,直径2—7分。芦头较长,但芦碗稀疏,参腿常为3—5支,参须多丛生且较乱。表面黄白色,外皮松泡,常带有糖样结晶,上端有较多的断续环纹,全体可见脱落表皮的小点。质嫩而薄,断面黄白色,疏松。气微香,味甜,嚼之能溶化。

(3)生晒参 形状与红参类似,参体长1—3寸,直径1—6分。腿短而弯曲,参须及部分细小参腿已除去,仅留短芦。表面灰黄色,有明显的环纹及纵皱。体轻,质脆,断面灰白色,显菊花纹。香气特异,味甘。

全须生晒参则有完全的芦、芋和参须,且参须多用线缠绕。

园参以支大、身长、芦长、须长为佳。支瘦小、芦短、浸糖较多者质次。

2.野山参 参体短粗,多与芦头等长或更短,长1—3寸,上粗下细,中部直径3—6分,顶端圆平有细而深的横环纹。一般芦头长1—3寸,干枯而坚实,上部扭曲,习称“雁脖芦”,芦碗密集排列成环,较深,呈马牙形或圆形,下部较光滑而无芦碗。芦上有侧生而下垂的芋,多中部丰满,呈枣核形。参腿常为2—3支。参须稀疏细长,多为参体的2—3倍,左右互生,清晰不乱,性柔韧,不易折断,其上生有明显的疣状突起,习称“珍珠点”。全体呈淡黄白色,皮细腻、光滑而足壮。具浓厚的特异香气,味甘、微苦。

野山参多加工制成白参与生晒参,除芦、芋、体、腿及须等具以上特点外,其他均与园参的相应加工品相似。

野山参以体灵、纹深螺旋状、芦碗密、枣核芋、须长清晰不乱、珍珠点明显者为佳。其特征不完全者质较次。

【炮炙】 白参 去芦,切段即得。

红参 去芦,切段或润透后切片即得。

【性味】 甘、微苦,温。

【功能】 大补元气,固脱生津,安神,益智。

【主治】 元气虚弱,食少、倦怠,反胃,滑泻,自汗暴脱,虚咳喘促,惊悸,健忘,消渴,崩漏,小儿慢惊,及一切气血津液不足之证。

【用法与用量】 二分至三钱,大量可用三钱至一两。

【注意】 反藜芦,畏五灵脂。

【贮藏】 置阴凉干燥处,密闭保存,防虫蛀。

八角茴香 (大茴香)

Bājiǎo Huíxiāng

FRUCTUS ANISI STELLATI

【来源】 本品为木兰科(Magnoliaceae)植物八角茴香(*Illicium verum* Hook.f.)的干燥成熟果实。多系栽培,主产于广西、广东、云南等地。春、秋二季果实成熟后采摘,用微火烘干即得。

【鉴别】 本品通常由8瓣小果集成。每瓣上部均有一裂缝呈小艇状,瓣的基部着生于一个共同的中轴上,成星状排列,中轴下面有一钩形弯曲的果柄。各瓣长短不一,一般长3—6分,高2—3分,宽约1.5分。外表面红棕色,有不规则的皱纹,内表面色较浅,光亮。顶端呈钝尖的鸟嘴状。内含种子一粒,扁卵形,长约2分,红棕色或灰棕色,光亮,尖端有小脐点,种皮脆,易捏碎,内含白色种仁,富有油性。气芳香,味辛甜。

以瓣大完整肥厚、色红、油性大、香气浓厚者为佳。

【炮炙】 筛去泥屑及种子,拣去果柄及杂质即得。

【性味】 辛,温。

【功能】 温中,散寒,理气。

【主治】 中寒呕吐,寒疝腹痛,肾虚腰痛。

【用法与用量】 一至二钱。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

九节菖蒲

Jiǔjié Chāngpǔ

RHIZOMA ANEMONES ALTAICAE

【来源】 本品为毛茛科(Ranunculaceae)植物九节菖蒲(*Anemone altaica* Fisch.)的干燥地下根状茎。均系野生,主产于陕西、河南、山西等地。5—6月间采挖,除去茎叶,洗净泥土,晒干后搓去细毛,筛去杂质即得。

【鉴别】 本品呈纺锤形,略弯曲,长约1寸许,直径约1分。表面黄色或黄棕色,上有一

多数横向半环状突起的节即鳞叶痕,节斜行交互排列,节上常有尖形小疙瘩状的根痕。质硬而脆,易折断,断面白色或浅黄色,有粉性。无臭,味微酸。

以肥大粗壮、表面色黄、断面色白者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,筛去灰屑即得。

【性味】 辛,温。

【功能】 开窍,逐痰,益智,散风,去湿,宽中开胃,解毒杀虫。

【主治】 癫痫风疾,痰厥昏迷,健忘多梦,风寒湿痹,气闭耳聋,下痢噤口;外治疔疽、湿疮。

【用法与用量】 八分至一钱五分;外用适量,研末塗敷患处。

【贮藏】 置干燥处,防虫蛀。

九 香 虫

Jiǔxiāngchóng

ASPONGOPUS

【来源】 本品为蝽科(Pentatomidae)昆虫九香虫(*Aspongopus chinensis* Dallas)的干燥全体。主产于云南、四川、贵州、广西等地。冬、春二季捕捉后,置布袋内入沸水中烫死,取出,微火烘干即得。

【鉴别】 本品略呈六角状椭圆形而扁平,长5—6分,宽约3.5分。表面红棕色或棕黑色。头部较小,略呈三角形,有一对其节的触角,多已脱落,有凸出的小眼一对。背部有膜质、半透明的翅两对。胸部有足三对,多已脱落,腹部有环节。质脆,折断后,见腹内含油质样的粉状物。有特异的腥臭,味微咸。

以个均匀、棕褐色发亮、油性大者为佳。

【炮炙】 拣净杂质,筛去灰土即得。

【性味】 咸,温。

【功能】 理气止痛,壮元阳。

【主治】 膈腕气滞作痛,脾肾亏损,腰膝痿弱。

【用法与用量】 一至三钱。

【贮藏】 置木箱内衬以油纸,防潮及虫蛀。

儿 茶

Ērchá

CATECHU SEU GAMBIER

【来源】 本品为豆科(Leguminosae)植物儿茶(*Acacia catechu* Willd.)枝干的干燥浸膏;或茜草科(Rubiaceae)植物儿茶钩藤(*Uncaria gambier* Roxb.)带叶嫩枝的干燥浸膏。前者习称“儿茶膏(黑儿茶)”,产于云南。全年均可采收,砍下枝干,除去外皮,劈成碎块,加水煎煮,不断搅拌,煮后过滤,将滤液蒸发浓缩至糖浆状,取出,冷却即得。后者习称“方儿茶(棕儿茶)”,产于印度尼西亚及马来西亚等地。

【鉴别】 儿茶膏(黑儿茶) 呈方形或不规则块状。表面黑色或红褐色,平滑而稍具光泽,有时可见裂纹。质脆,易碎裂,断面不整齐,有细孔,亦有光泽。无臭,味涩,先苦后甜。

以黑色略带红色、收敛性强者为佳。

方儿茶(棕儿茶) 略呈立方体形,每边长约1寸许。每面均向内收缩,楞角多偏斜或破碎。表面黑褐色,有胶质亮光,或呈棕褐色无胶质亮光而有裂纹。有粘性,质地坚实或较松,断面红褐色稍有亮光,或为红棕色而无亮光。无臭,味苦涩。

以黑褐色、粘性大、味浓者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,刷去灰屑,研成小块或研成细粉即得。

【性味】 苦,涩、微寒。

【功能】 清热,生津,化痰;外用定痛生肌,敛疮止血。

【主治】 痰热,咳嗽,口渴;外治湿疮,牙疳,口疮,下疳,痔肿。

【用法与用量】 三分至一钱;外用适量,研末敷患处。

【贮藏】 置阴凉干燥处,防热。

广 防 己

Guǎngfángjǐ

RADIX ARISTOLOCHIAE WESTLANDI

【来源】 本品为马兜铃科(Aristolochiaceae)植物广防己(*Aristolochia westlandi*

Hemsl.)的干燥根。多系野生,主产于广东、广西等地。秋季采挖,洗净泥土,刮去或不刮去粗皮,切成长3—6寸的段,个大者再纵向切开,干燥即得。

【鉴别】本品呈圆柱形或纵向对半剖为两块,略弯曲,长2—6寸,直径0.5—1.2寸。表面未去尽粗皮的多呈灰棕色,粗糙,有纵沟纹,去净外皮的有刀刮的痕迹,呈淡黄色。质坚硬如木质,不易折断。断面灰黄色,有明显的车轮纹,或呈片状突起。无臭,味苦。

以块大、粉多者为佳。

【炮炙】拣去杂质,用水浸泡,泡透后捞出,晒干,再润至内外湿度均匀,切片,干燥即得。

【性味】大苦、辛,大寒。

【功能】祛风,行水。

【主治】风肿,关节肿痛。

【用法与用量】一钱五分至三钱。

【贮藏】置干燥处。

广 豆 根

Guǎngdòugēn

RADIX SOPHORAE SUBPROSTRATAE

【来源】本品为豆科(Leguminosae)植物广豆根(*Sophora subprostrata* Chun et T. Chun)的干燥根部。均系野生,主产于广西等地。春、秋二季采挖,除去茎叶及须根,洗净泥土,晒干即得。

【鉴别】根头部呈不规则的结节状,顶端有残留茎基或茎痕,其下着生数条根,根呈长圆柱形,向下渐细,有时分枝,略弯曲,长0.2—1尺许,直径1—5分。表面棕褐色至棕黑色,有纵皱纹及横长略突起的皮孔。质坚硬,难折断,断面周边淡棕色,似蜡质,中间有黄白色木心,或稍显裂隙。无臭,味极苦,微有豆腥气。

以根条粗壮、外色棕褐、无须根、味苦者为佳

【炮炙】拣去杂质,除去残茎,分开大小条,用水浸泡,捞出,润透后切片,晒干即得。

【性味】苦,寒。

【功能】泻热解毒,消肿止痛。

【主治】喉痛,喉风,牙龈肿痛,喘满热咳,腹痛下痢,五痔,急黄;外治诸热肿、秃疮。

疥癬及蛇、狗、蜘蛛伤。

【用法与用量】 一錢五分至三錢;外用适量,研末油調敷或研汁塗患处。

【貯藏】 置干燥处。

三 七

Sānqī

RADIX PSEUDOGINSENG

【来源】 本品为五加科(Araliaceae)植物参三七(*Panax pseudoginseng* Wall.)的干燥根部。均系栽培,主产于云南、广西等地。7—8月間开花前采挖,去淨泥土,剪除細小根須及茎基,先暴晒至半干,再反复搓揉,使发汗析出水分,再晒干即得;或晒干后置适当容器內,加入适量蜡块,往返振盪,使表面光亮呈棕黑色即得。

【鉴别】 本品为圆锥形或紡錘形,长0.5—1.5寸許,中部直径2—6分。外皮灰黄色或棕黑色,有光泽,頂端較平或有茎痕,底部有剪断支根的痕迹,周身有凸起的斑痕及断續的纵皺紋。质坚实,难折断,断面灰白色至棕黑色,中間有菊花心或現裂紋。臭微,味苦而微甜。

以个大、皮細、质坚体重、断面棕黑色无裂隙者为佳。个小、体輕者质次。

【炮炙】 三七 洗淨,蒸透,取出,及时切片,干燥即得。

三七粉 洗淨,干燥,研成細粉即得。

【性味】 甘、微苦,温。

【功能】 散瘀,止血,消肿,定痛。

【主治】 吐血,衄血,便血,外伤出血,跌扑瘀血,痈肿疼痛,产后血运,瘀血腹痛。

【用法与用量】 五分至三錢;外用适量,研末敷患处。

【貯藏】 置阴凉干燥处,密闭,防虫蛀。

三 稜

Sānléng

RHIZOMA SPARGANII

【来源】 本品为黑三稜科(Sparganiaceae)植物黑三稜(*Sparganium ramosum* Huds.)

或小黑三稜 (*Sparganium simplex* Huds.) 的干燥块茎。药材均习称“荆三稜”。多系野生,主产于江苏、河南、山东、江西等地。冬、春二季采挖,除去茎苗及须根,洗净泥土,削去外皮,晒干即得。

【鉴别】 本品呈圆锥形或扁卵圆形,上圆下尖,长0.7—1.5寸,直径0.5—1寸许。表面黄白色或灰黄色,细腻或粗糙不平,有刀削痕迹,并有密集的小点状须根痕,略呈横向环状排列,两侧面有突起,凹凸不平。质坚实如木质,极难折断,切断面平坦,黄白色或灰白色,接近外皮处色较浅,向内则色较深,中间有多数不明显的筋脉小点。无臭,味淡,嚼之微有麻辣感。

以个匀、体重、质坚实,去净外皮、表面黄白色者为佳。

【炮炙】 三稜 除去杂质,用水浸泡,捞出,润透后切片,干燥即得。

醋三稜 洗净,置开水锅内浸没,煮至五、六成透时,加醋再煮至八成透,停止添水,此时余汤不应太多,停止续火,仍在锅内闷润,润透后捞出,晾晒至外皮无水分,切片,干燥即得。

每三稜100斤,用醋30斤。

【性味】 苦,平。

【功能】 破血,行气,消积,通经,止痛。

【主治】 瘀血,积聚,气血凝滞,胸腹脹痛,妇女经闭,产后瘀血腹痛。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【注意】 孕妇忌用。

【贮藏】 置通风干燥处。

干 姜

Gānjiāng

RHIZOMA ZINGIBERIS

【来源】 本品为姜科(*Zingiberaceae*)植物姜(*Zingiber officinale* Rosc.)的干燥地下根状茎。均系栽培,主产于四川、贵州等地。冬季采挖,除去茎叶及须根,洗净泥土,晒干或微火烘干即得。

【鉴别】 本品呈扁平不规则的块状,并有指状分枝,长1—2寸,厚2—4分。表面灰白色或灰黄色,有明显的环节,粗糙,具纵皱纹,各分枝顶端有茎痕或芽。质坚实,断面灰

白色或黄白色，有粉性，松者则显筋脉，有细小油点及一明显的环纹。气芳香特殊，味辛辣。

以质坚体重、粉性足、外皮灰黄色、肉灰白色、少筋脉者为佳。

【炮炙】 干姜 拣去杂质，用水浸泡，捞出，闷润透后切片或切小方块，晒干即得。

炮姜 取姜块，置锅内用武火急炒至发泡鼓起，外皮呈焦黄色，内呈黄色，喷淋清水少许，取出，晒干即得。

姜炭 取姜块，置锅内用武火炒至黑色，但须存性，喷淋清水少许，取出，晾干即得。

【性味】 辛，热。

【功能】 温中逐寒，回阳通脉。

【主治】 心腹冷痛，吐泻，肢冷脉微，寒饮喘咳，风寒湿痹。

【用法与用量】 五分至一钱五分。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防虫蛀。

干 漆

Gānqī

LACCA SINICA EXSICCATA

【来源】 本品为漆树科(Anacardiaceae)植物漆树(*Rhus verniciflua* Stokes)的干燥乳汁。栽培或野生，产于四川、湖北、陕西、河南、贵州、云南等地。收集漆缸底留下的漆脚，取出，晒干即得。

【鉴别】 本品为不规则的块状物。呈黑褐色或棕褐色。表面粗糙，有蜂窝状细小孔洞或呈颗粒状，有光泽。质坚硬，断面不平坦。微有漆臭。用火燃点能燃烧，发黑，漆臭更强。

以块整、色黑、坚硬、漆臭重者为佳。

【炮炙】 煨干漆 取擦净的干漆，砸成小块，置煨锅内至锅容量的三分之一，上面复盖一锅，两锅接合处用黄泥封固，上压重物，用文武火煨至贴在盖锅底上的白纸显焦黄色为度，擋住火門，待凉后，取出，剝成小块即得。

【性味】 辛，温；有小毒。

【功能】 破瘀血，消积，杀虫。

【主治】 妇女经闭，癥瘕，瘀血，虫积。

【用法与用量】 八分至一钱五分。

【注意】 孕妇忌用。

【贮藏】 密闭保存, 防火。

土 茯 苓

Tǔfúlíng

RHIZOMA SMILACIS GLABRAE

【来源】 本品为百合科(Liliaceae)植物土茯苓(*Smilax glabra* Roxb.)的干燥块茎。均系野生, 产于广东、浙江、安徽、湖南、四川、湖北等地。秋末冬初时采挖, 去净须根及泥土, 晒干, 或新鲜时切成薄片, 晒干即得。

【鉴别】 本品为不规则的块状物, 大小不一, 略呈扁圆柱形, 弯曲不直, 多分歧, 有结节状的隆起, 长2—6寸, 直径0.5—1.5寸。外表面黄棕色, 粗糙, 凹凸不平, 常有刀伤切口及侧根残余部分, 偶带残留的须根, 上端具茎痕。质坚硬, 不易折断, 断面粉质似细沙状, 多呈淡棕色, 微显光泽。无臭, 味淡。

土茯苓片呈长形薄片状, 大小不一, 厚0.5—1分, 两边不整齐, 中间略具筋脉。质较软, 富粉质, 微具弹性, 用水湿润后, 手捏有光滑感。

以淡棕色、粉性足、断面粗糙、筋脉少者为佳。

【炮炙】 用水浸漂, 夏季每日换水一次, 春、秋季每二日换水一次, 冬季可三日换水一次, 防止发臭, 均以泡透为度, 捞出切片, 及时干燥; 产地已切片者, 筛去灰屑, 即得。

【性味】 甘、淡, 平。

【功能】 利湿, 解毒。

【主治】 杨梅疮毒, 筋骨痹痛, 瘰癧瘤肿。

【用法与用量】 五钱至一两。

【注意】 服药时忌饮茶。

【贮藏】 置干燥处。

土 鳖 虫 (蟾 虫)

Tǔbiēchóng

EUPOLYPHAGA

【来源】 本品为鳖蠊科(Corydidae)昆虫地鳖(*Eupolyphaga sinensis* Walk.)的雌虫

干燥全体。均系野生,主产于江苏、浙江、河南、湖北等地。夏季捕捉后,置沸水中烫死,晒干即得;或先用清水洗净,再用盐水煮后,晒干或微火烘干即得。

【鉴别】本品呈卵圆形而扁平,前端较窄,尾端较宽,长7—9分,宽5—6分。全体呈红褐色至紫黑色,有光泽。头部形较小,有丝状触角一对,常脱落。背部呈甲壳状,为九个横节复瓦状排列而成,无翅。胸部有节足三对。腹部有横环节。质松脆,易碎,腹内呈灰黑色。稍有腥臭,味微咸。

以个小、完整者为佳。

【炮炙】拣去杂质,用沸水洗净,干燥即得。

【性味】咸,寒;有毒。

【功能】破瘀血、续折伤。

【主治】妇女经闭,产后瘀血腹痛,瘕瘕积聚,筋骨折伤。

【用法与用量】八分至一钱五分。

【注意】孕妇忌用。

【贮藏】置通风干燥处,防虫蛀。

大 风 子

Dàfēngzǐ

SEMEN HYDNOCARPI

【来源】本品为大风子科(Flacourtiaceae)植物大风子(*Hydnocarpus anthelmintica* Pierre)的干燥成熟种子。主产于越南、泰国、马来亚等地。4—6月采摘成熟果实,除去果皮,取出种子,晒干即得。

【鉴别】本品呈不规则的卵圆形,稍有棱角,长5—7分,直径3—5分。外皮灰棕色或灰褐色,有细纹,较小的一端有明显的沟纹。皮厚而坚硬,砸破后,内表面光滑,浅黄色或黄棕色,种仁与皮分离,种仁两瓣,灰白色,有油性,外被一层红棕色或暗紫色薄膜。臭微,味淡。

以个大、种仁饱满、色白,油性足者为佳。

【炮炙】大风子 筛去泥土杂质,洗净,晒干,用时捣碎即得。

大风子霜 取净大风子,除去外壳,碾碎,用吸油纸包裹,微炕或蒸后,压榨去油,碾细,过筛即得。

【性味】 辛, 热; 有毒。

【功能】 祛風燥痰, 攻毒杀虫。

【主治】 麻風; 外治楊梅瘡, 疥癬。

【用法与用量】 五分至一錢; 外用适量, 研烂塗敷, 或燒存性麻油調塗患处。

【注意】 內服宜慎。

【貯藏】 置阴涼干燥处。

大 皂 角

Dàzàojiǎo

FRUCTUS GLEDITSIAE SINENSIS

【来源】 本品为豆科(Leguminosae)植物皂荚(*Gleditsia sinensis* Lam.)的干燥成熟果实。野生或栽培, 主产于河北、山西、河南、山东等地。秋季果实成熟时采摘, 晒干即得。

【鉴别】 本品形长扁而宽, 或稍显弯曲状, 长5—8寸, 宽約1寸, 厚3—4.5分。表面不平, 紅褐色或紫紅色, 被灰色蜡粉, 擦去后有光澤。两端均略尖, 基部有短果柄或果柄断痕, 两侧有显明的纵棱綫。质坚硬, 破开后显淺黃色, 內含多数扁橢圓形的种子, 搖之有响声。种子外皮黃棕色而光滑, 质特坚。气味辛辣, 嗅之嗆鼻作嚏。

以个匀、肥厚、饱满、质坚者为佳。

【炮炙】 擦去杂质, 用水刷洗, 晒干, 用时去子搗碎即得。

【性味】 辛, 温; 微毒。

【功能】 去風湿, 泻热毒。

【主治】 腸風下血, 下痢噤口; 外治疮癰湿痒, 无名肿毒。

【用法与用量】 三至五分, 燒存性研末或为丸服; 外用生者适量, 煎湯洗, 搗烂或燒存性研末敷患处。

【注意】 孕妇忌內服。

【貯藏】 置干燥处, 防虫蛀。

大 豆 黃 卷

Dàdòuhuángjuǎn

SEMEN SOJAE GERMINATUM

【来源】 本品为豆科(Leguminosae)植物大豆(*Glycine max*(L.)Merr.)的成熟种子

按下述炮炙項下的方法加工制成。

【鉴别】 本品呈椭圆形略扁，长2—3.5分，直径1.5—2分。外皮黑色或黄色，微皱缩，靠一侧有一明显的脐点，中间呈白色，在脐的上方有一小芽。外皮质脆易碎，多裂开，内含种仁两瓣，黄色。无臭，嚼之有豆腥气。

以粒饱满、显皱纹、带芽者为佳。未发芽者不可入药。

【炮炙】 大豆黄卷 取拣净的颗粒饱满的大豆，加水浸泡至外皮微皱，捞出，置能排水的容器内，盖好，每日淋水1—2次，保持湿润，至发芽约长2—3分时，取出，晒干即得。

制豆黄卷 取灯心草、淡竹叶，置锅内加水煎汤，去渣，加入净大豆黄卷，用文火共煮至汤吸尽，取出，晒干即得。

每大豆黄卷100斤，用灯心草10两、淡竹叶20两。

【性味】 甘，平。

【功能】 发表，利湿。

【主治】 头风，湿痹，筋挛，膝痛，胃中积热，水肿胀满，小便不利。

【用法与用量】 三至五钱。

【贮藏】 置通风干燥处，防虫蛀。

大 枣

Dàzǎo

FRUCTUS ZIZYPHI SATIVAE

【来源】 本品为鼠李科(Rhamnaceae)植物枣(*Zizyphus sativa* Gaertn.)的干燥成熟果实。均系栽培，主产于河北、河南、山东、四川、贵州等地。秋季果实成熟时采收，晒干或烘软后再晒干即得。

【鉴别】 本品呈椭圆形或卵圆形，长约1寸，直径5—7分。外皮皱缩，暗红色，带光泽，显不规则的皱纹。一端有明显的凹陷，中具细果柄，另一端有一小突点。皮薄，果肉柔软如海绵状，棕黄色或淡褐色，富有糖性而油润。内含枣核一粒，纺锤形，两端锐尖，质坚硬。肉微有香气，味甜、带粘性。

以个大、色紫红、肉厚、油润者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，洗净，晒干，破开即得。

【性味】 甘，温。

【功能】 补脾胃，潤心肺，調和諸药。

【主治】 脾胃虛弱，气血津液不足。

【用法与用量】 二至五錢。

【貯藏】 置干燥处，防虫蛀。

大 青 盐

Dàqīngyán

HALITUM

【来源】 本品为一种結晶性石盐。主产于青海及內蒙古等地的盐湖或盐泉中。收集已結晶的干燥盐层即得。

【鉴别】 本品呈方块形或不規則的多棱形，顆粒大于海盐，直徑約 1—6 分。青白色至暗白色或略帶黄色，半透明，多数顆粒有一至数个小孔洞。质硬，但能砸碎，可溶于水。臭微，味咸。

以顆粒大，方形有孔洞、色青白，洁淨者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，簸去灰沙即得。

【性味】 咸，寒。

【功能】 凉血，明目。

【主治】 尿血，吐血，齿舌出血；外治風热牙痛，目赤濟昏，風眼爛弦。

【用法与用量】 三至五分；外用适量，研末揩牙或水化漱口洗目。

【注意】 水肿者內服宜慎。

【貯藏】 置干燥处，防潮。

大 黄

Dàhuáng

RHIZOMA RHEI

【来源】 本品为蓼科 (Polygonaceae) 植物掌叶大黄 (*Rheum palmatum* L.) 或其变

种唐古特大黄 (*Rheum palmatum* var. *tanguticum* Maxim.) 或大黄 (*Rheum officinale* Baill.) 的干燥地下根状茎。野生或栽培,主产于甘肃、青海、四川等地。秋末冬初当地地上部分枯萎时采挖,刮去粗皮及地上茎,或切成片,风干或烘干即得。

【鉴别】 本品形状不一,有近圆柱形、长圆锥形、马蹄形或切开成一面平坦、一面隆起的块片状。整个的长3—6寸,直径1.5—4寸。刮去粗皮者呈棕黄色或红棕色,可见类白色网纹,或有菊花形星点。未刮去外皮者呈棕褐色,表面有疙瘩状隆起,有横纹及纵皱纹,或具绳孔。顶端有茎叶残痕,切开面多凹凸不平。质坚实,有时中心较松软,断面淡橙红色至红棕色,横切面可见星点状的锦纹,稍显油性;亦有质地轻虚,断面锦纹不甚显著者。气清香特殊,味苦、不涩或微涩。

以质坚实、断面锦纹明显、红棕色、有油性、气清香、味苦而不涩、嚼之发粘者为佳。质较松、断面锦纹不明显、色棕黄、香气较微、味苦微涩者质次。质紧密、断面似菊花心、有油气、味苦涩者不可入药。

【炮炙】 大黄 拣去杂质,用水浸泡,约至六成透,捞出,闷润至内外湿度均匀,切片或切成小块,干燥即得。

酒大黄 取大黄片,用黄酒喷淋拌匀,微闷,置锅内用文火微炒,取出,晾干即得。

每大黄片100斤,用黄酒10斤。

大黄炭 取大黄片,置锅内用武火炒至外面焦褐色,但须存性,喷淋清水,取出,晒干即得。

熟大黄 取切成小块的大黄,用黄酒拌匀,置罐内或适宜的容器内,密封,坐水锅中,隔水炖透,取出,晾干即得。

每大黄块100斤,用黄酒30—50斤。

【性味】 苦,寒。

【功能】 泻实热,破积滞,行瘀血。

【主治】 实热便秘,谵语发狂,食积痞满,痢疾初起,腹痛后重,湿热发黄,水肿,妇女经闭,瘀血。外治痈肿疔毒,汤火灼伤。

【用法与用量】 一至四钱;外用适量,研末水或醋调涂敷患处。

【注意】 孕妇内服宜慎。

【贮藏】 置通风干燥处,防虫蛀。

大腹皮(大腹毛)

Dàfùpí

PERICARPIUM ARECAE

【来源】本品为棕榈科(Palmae)植物檳榔(*Areca catechu* L.)的干燥成熟果皮。多系栽培,主产于广东、云南、台湾等地。冬、春二季摘下成熟果实,剥取果皮,打松,置水中浸泡,晒干,再打松除去外果皮即得。

【鉴别】本品略呈椭圆形瓢状,长1.5—2寸,宽约1寸,厚约3分。外部为黄白色至灰黄色的疏松纤维,纤维纵向排列,外层松散成缕,内层纤维较粗,现棕毛状。内壁凹陷,呈褐色或深棕色,表面光滑呈硬壳状。体轻松,质柔韧,易纵向撕裂。无臭,味淡。

以色黄白、质柔韧、无杂质者为佳。

【炮炙】拣去杂质,用碾轧软后敲打,筛去泥屑,剥段即得。

【性味】辛,微温。

【功能】下气,宽中,行水。

【主治】水肿脚气,痞满腹闷,胎气恶阻。

【用法与用量】一钱五分至三钱。

【贮藏】置通风干燥处。

马宝

Mǎbǎo

CALCULUS EQUI

【来源】本品为马科(Equidae)动物马(*Equus caballus* (L.))的胃肠中的结石。主产于内蒙古、新疆、甘肃、河南、西藏等地。全年均可收集,将病马宰杀后摸其胃肠中有结石者,取出,洗净,晾干即得。

【鉴别】本品多呈球形、卵形或扁圆形,大小不一,大的重4—5斤,小的约半斤,一般直径2—6寸。外表面蛋青色或灰白色,光滑,常附有杂乱的细草纹或凹凸不平。质坚实而重,破开面灰白色而有同心层纹,每层厚1—3分,并多有灰黑色细密纹理,粗糙不平。

无臭,味淡,嚼之可成粉末。

以质重、坚实、蛋青色、光滑、具细草纹、断面有层纹者为佳。

【性味】 咸,寒。

【功能】 镇惊,化痰。

【主治】 癫狂,惊风。

【用法与用量】 一至三分,研末分服。

【贮藏】 置干燥处,密闭保存。

马 齿 苋

Mǎchǐxiàn

HERBA PORTULACAE

【来源】 本品为马齿苋科(*Portulacaceae*)植物马齿苋(*Portulaca oleracea* L.)的干燥地上部分。均系野生,全国各地均有生产。夏、秋二季茎叶茂盛时采收,洗净泥土,用沸水略烫或略蒸,取出,晒干即得。

【鉴别】 本品弯曲不直,常纠结成团。茎黄棕色,直径不及1分,表面有明显的纵沟纹。质脆,易折断,叶对生或互生,绿褐色,多皱缩脱落。茎顶端常有数个小果实,椭圆形,盖如小帽,脱落后形似小碗。果实内有多数细小灰黑色种子。臭微,味微酸而有粘性。

以棵小、质嫩、叶多、青绿色者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,除去残根,或用水洗净,稍润后,切段即得。

【性味】 酸,寒。

【功能】 清热,解毒,散血。

【主治】 热痢、血淋、血淋、丹毒、恶疮。

【用法与用量】 干者二至四钱,鲜者一两至一两五钱,鲜者捣汁服;并可外用,适量,干者研末或鲜者捣烂涂敷患处。

【注意】 孕妇内服宜慎。

【贮藏】 置通风干燥处,防潮。

马 勃

Mǎbó

LASIOSPHAERA

【来源】本品为马勃科(Lycoperdaceae)植物马勃菌(*Lasiosphaera nipponica* (Kawam.) Y. Kobayasi)的干燥子实体。均系野生,产于内蒙古、甘肃、吉林、辽宁、贵州、安徽等地。7—9月间采收,在霖雨季节生长很快,4—5日即成熟,注意适时采收,晒干即得。

【鉴别】本品呈扁圆球形,大小不一,直径0.5—1尺。外皮为棕褐色、灰棕色或灰紫色,微有光泽。皮薄,质软,易于撕下。除去外皮的表面为棕褐色或灰紫色。质松发泡,细腻光滑。有弹性,似海绵,以手拍打,孢子呈灰尘样飞扬。气似尘土,无味。

以个大、皮薄、饱满、松泡有弹性者为佳。

【炮炙】除去硬皮,剪成方块,筛去细末即得。

【性味】辛、平。

【功能】清肺,利咽,解热,止血。

【主治】咳嗽失音,喉痹咽痛,吐血,衄血,咯血;外治疮肿及刀伤出血。

【用法与用量】三至八分;外用适量,研末敷患处。

【贮藏】置于燥处,密闭保存。

马 钱 子 (番木鳖)

Mǎqiǎnzǐ

SEMEN STRYCHNI

【来源】本品为马钱科(Loganiaceae)植物马钱(*Strychnos nux-vomica* L.)的干燥成熟种子。主产于印度、越南、缅甸等地。果实成熟时采摘,除去果肉,取出种子,晒干即得。

【鉴别】本品呈扁圆形,鈕扣状,略弯曲,边缘微隆起,常一面稍凹下,另一面稍突起,直径5—8分,厚1.5—2分。表面灰棕色或灰绿色,密生勾伏的银灰色毛茸,呈幅射状排列,有丝光。底面中央有一稍突出的凹点,边缘有一小突起,在凹点与小突起之间有一条

棧綫。質堅硬，難破碎，破開後種仁淡黃白色，稍透明，角質狀。縱切面可見心形的子葉，無臭，味極苦。毒性劇烈，口嘗宜特別謹慎。

以個大、肉厚、質堅者為佳。

【炮炙】 馬錢子粉 取沙子，置鍋內炒至輕松，加入揀淨的馬錢子，炒至呈深黃色并鼓起，取出，篩去沙子，去毛，碾成粉即得。

油馬錢子 取揀淨的馬錢子，加水煮沸，取出，再用水浸泡，撈出，刮去皮毛，微晾，切成薄片。另取麻油少許，置鍋內燒熱，加入馬錢子片，炒至微黃色，取出，放涼即得。

【性味】 苦，寒；有大毒。

【功能】 散血熱，消腫。

【主治】 咽喉癰痛，瘡塊，癰疽，腫毒。

【用法與用量】 一至三分，炮炙後入丸散用。

【貯藏】 置干燥處。

馬兜鈴

Mǎdōulíng

FRUCTUS ARISTOLOCHIAE

【來源】 本品為馬兜鈴科 (Aristolochiaceae) 植物北馬兜鈴 (*Aristolochia contorta* Bge.) 或馬兜鈴 (*Aristolochia debilis* Sieb. et Zucc.) 的干燥成熟果實。均系野生，主產于河北、山東、陝西、山西、河南等地。秋季果實由綠變黃時，連柄摘下，晒干即得。

【鑒別】 本品呈卵圓形或長圓形，長 1—1.5 寸，直徑 0.5—1 寸。外皮呈灰綠色或灰黃色，有六條凸起的波狀縱稜，其間夾有六條順紋及橫向的細脈紋。一端較平，有小臍，一端有細柄。果皮輕脆，易裂為六瓣，果柄亦隨着分裂為六條綫。果內包有六排平疊的種子。種子扁平三角形或扇形片狀，邊緣淡棕色，中心棕色，一面附有薄膜。種仁乳白色，有油性。臭特異，味苦。

以個大、完整、灰綠色、無雜質者為佳。

【炮炙】 馬兜鈴 搓碎去筋，篩淨泥土即得。

蜜兜鈴 取淨馬兜鈴，加煉熟的蜂蜜與開水少許，拌勻，稍悶，置鍋內用文火炒至不粘手為度，取出，放涼即得。

每馬兜鈴 100 斤，用煉熟蜂蜜 35—40 斤。

【性味】 苦,寒。

【功能】 降气,清热。

【主治】 肺热咳嗽,气喘,痔瘕肿痛。

【用法与用量】 一至三钱。

【贮藏】 置阴凉干燥处,防压。

马 鞭 草

Mǎbiāncǎo

HERBA VERBENAE

【来源】 本品为马鞭草科(Verbenaceae)植物马鞭草(*Verbena officinalis* L.)的干燥地上部分。均系野生,产于江苏、湖北、广西、贵州等地。6—7月间花正开时割取地上部分,除去杂质,晒干即得。

【鉴别】 本品茎呈方柱形,每面均有纵沟,长2—3尺,表面绿褐色,粗糙,质硬而脆,断面中间有髓或中空。叶对生,皱缩,呈黑褐色,叶片三深裂,边缘有齿裂。茎顶多有细长的穗状花序,花小而数多。无臭,味苦。

以色绿、无杂草者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,洗净,除去残根,闷润后切段,晒干即得。

【性味】 苦,微寒。

【功能】 凉血,破血,杀虫,消胀。

【主治】 水肿腹胀,久疟,痢疾,痈肿,疮毒,妇女经闭,瘕瘕。

【用法与用量】 一钱五分至三钱;并可外用,鲜者适量,捣烂敷或煎汤熏洗患处。

【注意】 孕妇忌内服。

【贮藏】 置干燥处。

小 蓟

Xiǎojì

HERBA CIRSII SEGETI

【来源】 本品为菊科(Compositae)植物小蓟(*Cirsium segetum* Bge.)的干燥全草,均

系野生，全国大部分地区均有生产。夏、秋二季花开前采收，除去杂质，晒干即得。

【鉴别】本品主根呈细圆柱状，灰褐色，侧根呈须状。茎直立，长数寸至1尺，近顶部稍分枝，直径约1分。表面绿色或带紫色，有皱纹，被有白色绵柔毛。根生叶密集成簇，茎生叶互生，均皱缩卷曲，无柄。润湿展平后可见叶片长椭圆形，长1—3寸，宽3—6分，边缘有浅裂或全缘具针刺。正面绿褐色，背面灰绿色，两面均有白色柔毛。头状花序生于茎顶，呈紫红色。无臭，味淡微苦。

以色绿、无泥土及杂质者为佳。

【炮炙】小蓟 拣去杂质，抖去泥沙，浸润后去根，切段，晒干即得。

小蓟炭 取拣净的小蓟，置锅内用武火炒至有七成变黑色，但须存性，过铁丝筛，喷淋清水，取出，晒干即得。

【性味】甘，凉。

【功能】行瘀，凉血，止血。

【主治】吐血，衄血，崩漏，血淋，痈肿疮毒。

【用法与用量】一钱五分至三钱。

【贮藏】置通风干燥处。

山 柰

Shānnài

RHIZOMA KAEMPFERIAE

【来源】本品为姜科(Zingiberaceae)植物山柰(*Kaempferia galanga* L.)的干燥地下根状茎。均系栽培，主产于广东、广西、云南、台湾等地。冬季地上茎叶枯萎时采收，洗净泥土，除去须根，切成厚约1分许的横片，晒干即得。

【鉴别】本品为圆形或近圆形的厚片，厚约1分，直径4—7分。外皮呈灰褐色或淡灰棕色，皱缩不平，有少量须根和根痕。切断面为白色，显粉性，光滑细腻，略凸起，习称“缩皮凸肉”。质脆，易折断。气芳香，味辛辣。

以色白、粉性足、气芳香、辣味浓者为佳。味苦，香气特异者不可药用。

【炮炙】拣去杂质，筛去灰屑即得。

【性味】辛，温。

【功能】温中，辟秽，散寒，除湿。

【主治】 心腹冷痛，風虫牙痛。

【用法与用量】 一至二錢。

【貯藏】 置阴涼干燥处。

山 药

Shānyào

RADIX DIOSCOREAE

【来源】 本品为薯蓣科(Dioscoreaceae)植物山药(*Dioscorea batatas* Dcne.)的干燥块根。均系栽培，主产于河南、广西、湖南等地。冬季地上苗枯萎后采挖，切去根头，洗净泥土，用竹刀或銅刀削淨外皮及須根，烘干或晒干，即为毛山药。选择肥大順直的山药，用清水浸勻，保持湿润悶透，削去疙瘩，然后用木板搓揉，使成圆柱状，切齐两端，晒干后打光，即为光山药。

【鉴别】 毛山药 略呈圆柱形，弯曲而稍扁，长0.5—1尺，直径0.5—2寸。外表面黄白色或棕黄色，有纵沟与纵皺紋，未去淨外皮的則显淺棕色斑点，或具有疙瘩。质坚实，不易折断，断面白色，顆粒状，粉质。无臭，味甘、微酸。

光山药 呈圆柱形，两端平齐，长3—6寸，直径0.5—1寸。表面洁白，光滑圓潤。质坚实，断面亦呈白色，富粉质。无臭，味甘、微酸。

以质坚实、粉性足、色洁白者为佳。质較松、粉性小、色黄白者质次。未去外皮、质松、色棕黄者不宜入药。

【炮炙】 山药 拣去杂质，分开大小个，用水泡透后，捞出，晒晾，切片，及时干燥即得。

炒山药 将麸皮撒于加热的鍋內，俟烟冒出时，加入山药片，炒至淡黄色，篩去麸皮，放凉即得。

每山药片100斤，用麸皮10斤。

【性味】 甘，平。

【功能】 补脾肺，澆精气。

【主治】 脾虛泄瀉，久痢，虛勞咳嗽，消渴，遺精，帶下，小便頻數。

【用法与用量】 三至六錢。

【貯藏】 置通風干燥处，防虫蛀。

山 茱 萸

Shānzhūyú

FRUCTUS CORNI

【来源】 本品为山茱萸科(Cornaceae)植物山茱萸(*Cornus officinalis* Sieb. et Zucc.)除去果核的干燥成熟果实。栽培或野生,主产于浙江、安徽、陕西、河南、山西等地。秋、冬二季果实颜色变红后采摘,用文火焙烘适宜,冷后,取下果肉,再晒干或用文火烘干即得。

【鉴别】 本品呈不规则片状或囊状,多破裂而皱缩,长3—5分,肉厚不及0.5分。表面紫红色或紫黑色,皱缩有光泽,有去核的破口,一端有圆形小脐。质柔润,内面色较浅,不光滑。无臭,味酸涩而微苦。

以肉肥厚、色红、油润者为佳。肉薄、色较浅者质次。其果核不宜入药。

【炮炙】 山萸肉 拣净杂质,去净核即得。

酒山萸 取净山萸肉,用黄酒拌匀,装罐或适宜容器内,密封,坐水锅中,隔水加热,燉至酒吸尽,取出,晾干即得。

每山萸肉100斤,用黄酒20—25斤。

蒸山萸 取净山萸肉,置笼屉内加热蒸黑为度,取出,晒干即得。

【性味】 酸,微温,涩。

【功能】 补肝肾,益精气。

【主治】 腰膝痠痛,耳鸣,耳聾,遗精,阳痿,小便频数。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置阴凉干燥处,防潮。

山 楂

Shānzhā

FRUCTUS CRATAEGI

【来源】 本品为蔷薇科(Rosaceae)植物山楂(*Crataegus pinnatifida* var. *major* N. E. Br.)或野山楂(*Crataegus cuneata* Sieb. et Zucc.)的干燥成熟果实。栽培或野生,前者

为北山楂,主产于山东、河北、河南、辽宁等地,后者为南山楂,主产于江苏、浙江、云南、四川等地。秋季果实成熟时采摘,北山楂采摘后,横切成0.5—1分厚的片,立即置烈日下晒干,南山楂采摘后,晒干即得。

【鉴别】北山楂 为圆形的横切片,多卷边并皱缩不平,直径5—8分,厚约半分。外皮红色,显皱纹,有灰白色小斑点,果肉粉色或浅棕色。切面可见浅黄色的果核3—6粒,核多已脱落,有的片上可见短而细的果柄或凹窝。气微清香,味酸、微甜。

以片大、皮红、肉厚、核少者为佳。

南山楂 呈类球形,直径3—4分,间有压扁成饼状。表面灰红色,有细纹及小斑点,一端有凹窝,其边缘略突出,另一端有果柄痕迹。质坚硬,核大,果肉薄,棕红色。无臭,味酸、微涩。

以个匀、色红、质坚者为佳。

【炮炙】山楂 拣去杂质,筛去脱落的核即得。

炒山楂 取拣净的山楂,置锅内用文火炒至外面呈淡黄色,取出,放凉即得。

焦山楂 取拣净的山楂,置锅内用武火炒至外面焦褐色,内部黄褐色为度,喷淋清水,取出,晒干即得。

山楂炭 取拣净的山楂,置锅内用武火炒至外面焦黑色,但须存性,喷淋清水,取出,晒干即得。

【性味】酸、甘、微温。

【功能】消食积、散瘀滞。

【主治】肉积不消,癥瘕,痰饮,痞满,吞酸,腰痛,疝气,妇人产后儿枕痛,恶露不尽,小儿乳食停滞。

【用法与用量】二至四钱。

【贮藏】置阴凉干燥处,防虫蛀。

千金子 (续随子)

Qiānjīnzǐ

SEMEN EUPHORBIAE LATHYRIDIS

【来源】本品为大戟科(Euphorbiaceae)植物续随子(*Euphorbia lathyris* L.)的干燥成熟种子。多系栽培,主产于浙江、河北、河南等地。夏、秋果实成熟后,割取全草,晒干,

打落种子，去净杂质即得。

【鉴别】 本品呈椭圆形或卵圆形，长约2分，直径约1.5分。一端粗圆，另一端较细，有一小白蒂，易脱落，脱落后留下白色痕迹。外皮灰褐色，多皱纹，有暗褐色斑点，一侧具一纵沟纹。皮薄而脆，内表面灰白色，有光泽。种仁黄白色，富有油性。无臭，味辛。

以粒饱满、油性足者为佳。

【炮炙】 千金子 拣去杂质，用时打碎即得。

千金子霜 取拣净的千金子，搓去外壳，碾碎，用吸油纸包裹，加热微烘或蒸后，压榨去油，碾细，过筛即得。

【性味】 辛，温；有毒。

【功能】 下水消肿，破血散瘀。

【主治】 水肿，痰饮，宿滞，胀满，二便不通，妇女经闭，瘕瘕；外治疥癣，蛇咬，疣赘。

【用法与用量】 三至六分，去壳、去油用；外用适量，捣烂敷患处。

【注意】 孕妇忌内服。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

川 乌

Chuānwū

RADIX ACONITI

【来源】 本品为毛茛科(Ranunculaceae)植物卡氏乌头(*Aconitum carmichaeli* Debx.)的干燥块根。均系栽培，主产于陕西、四川等地。夏至至小暑间采挖，除去细小的侧根，洗净泥土，晒干即得。

【鉴别】 子根呈圆锥形，长0.5—1寸，直径5—6分。表面灰褐色，有细纵皱纹，顶端有凹陷的芽痕，侧边常留有自母根摘离的痕迹，下端尖，周围有数个瘤状隆起的支根，习称“钉角”。质坚实，难折断，断面外层褐色，内面为灰白色，粉性，横切面有一多角形环纹。无臭，味辛辣而麻舌。

母根呈瘦长的圆锥形，或带有残余的茎杆，体长1—3寸，直径0.5—1寸。表面棕褐色，皱缩不平，或有锥形的小瘤状侧根，并具割去附子后遗留的痕迹。质坚实，断面粉白色或微带灰色，横切面可见多角形的环纹。无臭，味辛辣而麻舌。

均以个匀、肥满、坚实、无空心者为佳。

【炮炙】 生川烏 拣去杂质，洗净灰屑，晒干即得。

制川烏 取淨川烏，用涼水浸漂，每日換水2—3次，泡至口嘗無麻辣感為度。取出，用甘草、黑豆煎湯共煮透，至內無白心為止，取出，除去甘草、黑豆，曬晾，悶潤後切片，曬干即得。

每川烏100斤，用甘草5斤、黑豆10斤。

【性味】 辛，溫；有大毒。

【功能】 除寒濕，散風邪，通經絡，止冷痛。

【主治】 風寒濕痹，筋骨風痛，四肢拘攣，半身不遂，頭風頭痛，心腹冷痛。

【用法與用量】 五分至一錢五分，一般炮炙後用；并可外用，生者適量，研末塗瘡痛處。

【注意】 孕婦忌內服，生者內服宜慎；反川貝母、浙貝母、半夏、白及、白朮、天花粉、桔梗子、枳椇、畏犀角。

【貯藏】 置通風干燥處，防虫蛀。

川 貝 母

Chuānbèimǔ

BULBUS FRITILLARIAE CIRRHOSAE

【來源】 本品為百合科(Liliaceae)植物羅氏貝母(*Fritillaria roylei* Hook.)或卷葉貝母(*Fritillaria cirrhosa* D. Don)的干燥鱗莖。多系野生，主產于四川、青海、甘肅、雲南等地。夏、秋二季采挖，或于積雪融化時采挖，除去泥土及須根，曬干或微火烘干即得。

【鑒別】 本品多呈圓錐形，有的略似桃形，或如馬牙，頂端稍尖，基部寬闊，高3—6分，直徑2—5分。表面白色或淡黃色，平滑，外層兩瓣鱗葉較大，呈心臟形，相對合抱，其內包有小鱗葉數枚及細圓柱形的殘莖1枚。質硬而脆，富粉性，斷面白色，呈顆粒狀。氣微弱，味微苦。

以圓錐形、整齊、粉性足、色潔白者為佳。個小、破碎、色灰白、有黃水銹者質次。

【炮炙】 拣去杂质，用水稍泡，捞出，闷潤后剥瓣去心，晒干即得。

【性味】 苦、甘，微寒。

【功能】 潤肺散結，止咳化痰。

【主治】 虛勞咳嗽吐痰，心胸郁結，肺癰，肺痿，癭瘤，癰腫；外治惡瘡。

【用法与用量】 一至三錢;外用适量,研末敷患处。

【注意】 反烏头、草烏。

【貯藏】 置通風干燥处,防虫蛀。

川 木 香

Chuānmùxiāng

RADIX JURINEAE

【来源】 本品为菊科(Compositae)植物川木香(*Jurinea souliei* Franch.)的干燥根。多系野生,主产于四川。冬季挖出后,去淨泥土、須根及地上莖,过长的横切为二段,粗大的纵剖为两半,晒干或烘干即得。

【鉴别】 本品呈圆柱形(习称“铁杆木香”),或槽状半圆柱形(习称“槽子木香”),略弯曲,长0.3—1尺,直径4—8分。根头多已变黑而发粘,习称“糊头”,表面黄褐色或棕黑色,粗糙。刮去外皮,露出絲瓜絡状的纖維网。体輕,质硬,断面黄色或黄棕色,有菊花心形的花紋及裂隙,并有棕黄色的油点,有的中心部分空松如网状。香气特殊,味苦,嚼之粘牙。

以根条粗壮結实、体重、油多气香、裂沟少者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,除去黑焦头,用水洗淨,潤透切片,干燥即得。

【性味】 苦、辛,溫。

【功能】 行气消脹,和胃止泻。

【主治】 肝胃气痛,嘔吐泄泻,腸鳴腹痛,痢疾里急后重。

【用法与用量】 五分至三錢。

【貯藏】 置阴涼干燥处。

川 木 通

Chuānmùtōng

CAULIS CLEMATIDIS ARMANDI

【来源】 本品为毛茛科(Ranunculaceae)山木通(*Clematis armandi* Franch.)的干燥

茎。均系野生，产于四川、贵州、湖南等地。秋季采收，截取茎部，刮去外皮，阴干即得。

【鉴别】本品呈长圆柱形，有的稍扭曲，长2—3尺，直径3—6分。外皮多呈撕裂状而易与木部剥离，表面呈灰黄色，有纵直の間沟及棱线。节处多膨大，可见一对叶柄或侧枝脱落的痕迹。体轻质硬，不易折断，断面呈放射形的裂片状。无臭，味苦。

以内外色黄、条匀、无黑心者为佳。

【炮炙】拣去杂质，洗净，润透后，切片，晒干即得。

【性味】淡、微苦，微寒。

【功能】清热行水，通利血脉。

【主治】水肿，小便不利，湿热癰闭，热淋，妇女经闭，乳汁不通。

【用法与用量】一至三钱。

【注意】孕妇忌用。

【贮藏】置通风干燥处，防潮。

川 牛 膝

Chuānniúxī

RADIX CYATHULAE

【来源】本品为苋科(Amaranthaceae)植物头序杯苋(*Cyathula capitata* Moq.)或毛杯苋(*Cyathula tomentosa* Moq.)的干燥根。栽培或野生，主产于四川。秋、冬两季均可采挖，去净泥土，切去残存的地上茎、须根及稍大的侧根，烘干即得。

【鉴别】本品呈长圆柱形而弯曲，上端多有膨大的根头，下部渐细，长1—2尺，根头部直径2—8分。表面灰黑色或棕黄色，有纵皱及侧根痕。质坚韧，不易折断，断面棕黄色，有灰白色或黄色的筋脉点排成数层圆环，质老的则筋脉多，体硬，环纹发白。无臭，味甜微苦。

以条大、质柔软、断面色棕黄者为佳。条不均匀、体硬、断面灰白色、筋脉多者质次。

【炮炙】拣去杂质，用水浸泡，捞出，闷润至透，去芦，切片，干燥即得。

【性味】甘、微苦，平。

【功能】祛风，利湿，通经，活血。

【主治】风湿腰膝疼痛，脚痿筋痹，血淋，尿血，妇女经闭，瘕瘕。

【用法与用量】一钱五分至三钱。

【注意】 孕妇忌用。

【贮藏】 置阴凉通风处，防潮。

川 芎

Chuānxiōng

RHIZOMA LIGUSTICI WALLICHII

【来源】 本品为繖形科(Umbelliferae)植物川芎(*Ligusticum wallichii* Franch.)的干燥地下根状茎。均系栽培，主产于四川。夏季采挖，除净茎叶及泥土，晒干或烘干后，撞去须根即得。

【鉴别】 本品为不整齐的结节状拳形团块，皱缩不平，直径1—2寸或较粗。表面黄褐色，显多数略隆起的环状轮节和凹陷的圆形茎痕及小瘤状的根痕。质坚实，断面不整齐，呈灰白色或黄白色，有明显的环纹和黄色小油点。具特异而浓郁的香气，味苦辛，麻舌。

以个大饱满、质坚、香气浓厚、油性大者为佳。个小、香气较弱、油性小者质次。

【炮炙】 拣去杂质，分开大小个，用水浸泡，捞出，晾晒，闷润至内外湿度均匀，切片，干燥即得。

【性味】 辛，温。

【功能】 行气，活血，散风，止痛。

【主治】 头痛，腹痛，胁痛，寒痹筋挛，痈疽疮疡，妇女经闭，月经不调。

【用法与用量】 八分至一钱五分。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防虫蛀。

川 楝 子

Chuānliànzi

FRUCTUS MELIAE TOOSENDAN

【来源】 本品为楝科(Meliaceae)植物川楝(*Melia toosendan* Sieb. et Zucc.)的干燥

成熟果实。多系野生，主产于四川、湖北、贵州、河南等地。冬季果实成熟时采摘，或收集经霜后落下的果实，晒干即得。

【鉴别】本品呈圆球形或椭圆形，直径5—7分。表面黄色或黄棕色，有光泽，滑润，具深棕色的小点，微有凹陷或抽皱。一端凹入，留有圆形的果柄残痕，另一端较平，有棕色小点。果皮革质，与果肉间常有空隙，果肉厚，呈淡黄色，质松软。果核坚硬，表面有6—8条纵棱，内有黑棕色长圆形的种子6—8枚。种仁乳白色，有油性。臭特异，味微苦。

以外皮金黄色、肉黄白色、厚而松软者为佳。

【炮炙】拣去杂质，用水洗净，烘干，捣碎即得。

【性味】苦，寒；有小毒。

【功能】利湿热，止痛，杀虫。

【主治】热厥心痛，湿热痢痛，虫积腹痛。

【用法与用量】一钱五分至三钱。

【贮藏】置通风干燥处，防潮及虫蛀。

女贞子

Nǚzhēnzǐ

FRUCTUS LIGUSTRI LUCIDI

【来源】本品为木犀科(Oleaceae)植物女贞(*Ligustrum lucidum* Ait.)的干燥成熟果实。栽培或野生，主产于浙江、江苏、湖南、福建、四川等地。冬季果实成熟时采摘，除去枝叶，晒干，或将果实略重后，晒干即得。

【鉴别】本品呈卵形或椭圆形，有的微弯曲，长2—3分，直径约1分。外皮灰黑色，具皱纹，两端钝圆，一端有果柄痕。质坚而体轻，横而破开后大部分为单仁，如为双仁，中间有隔膜分开。仁椭圆形，两端尖，外面呈紫黑色，里面灰白色。无臭，味甘而微苦。

以粒大、饱满、色灰黑、质坚实者为佳。

【炮炙】女贞子 拣去杂质，洗净，晒干即得。

酒女贞子 取净女贞子，加黄酒拌匀，置罐内或适宜容器内，密闭，坐水锅中，隔水煮至酒吸尽，取出，干燥即得。

每女贞子100斤，用黄酒20斤。

【性味】苦，平。

【功能】 补肝肾,强腰膝。

【主治】 阴虚内热,腰膝痠软,耳聾目昏,须发早白。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【貯藏】 置通风干燥处。

火 麻 仁

Huǒmá rén

SEMEN CANNABIS

【来源】 本品为大麻科(Cannabaceae)植物大麻(*Cannabis sativa* L.)的干燥成熟种仁。多系栽培,主产于黑龙江、吉林、辽宁、四川等地。秋、冬二季果实成熟时割取全株,晒干,打下果实,除去皮壳及杂质,收集净仁即得。

【鉴别】 本品为种仁,完整的果实呈扁卵形,长1—1.5分,直径约1分。外皮光滑,灰绿色或灰黄色,有白色或棕色的网状花纹,两侧各有一条浅色棱线。一端钝尖,他端中部有一圆脐。外皮脆,易破碎,内有黄白色种仁,为扁圆形,富有油性。臭微,味淡。

以仁整齐饱满、色白、油性足、而不泛油、无外壳者为佳。

【炮炙】 拣去杂质及残留外壳,取净仁即得。

【性味】 甘,平。

【功能】 润燥,滑肠。

【主治】 肠燥便秘。

【用法与用量】 三至五钱。

【貯藏】 置阴凉干燥处,防热及虫蛀。

王 不 留 行

Wángbùliúxíng

SEMEN VACCARIAE

【来源】 本品为石竹科(Caryophyllaceae)植物王不留行(*Vaccaria pyramidata*

Medic.) 的干燥成熟种子。均系野生，主产于河北、山东、辽宁、黑龙江等地。夏、秋二季种子成熟、果皮尚未开裂时割取全株，晒干，将种子打下，簸去梗叶等杂质，晒干即得。

【鉴别】 本品呈圆球形，直径约半分。表面黑色，有一条半圆形的浅沟和一个灰白色小点，仔细观察可见密布的小麻点。质坚硬，破开后种仁白色，粉性。无臭，味淡。

以子粒均匀、充实饱满、色黑、无杂质者为佳。

【炮炙】 簸净杂质，置锅内用文火炒至爆开白花六、七成，取出，放凉即得。

【性味】 苦，平。

【功能】 行血通经，催生下乳，消痈肿，敛金疮。

【主治】 妇女经闭，乳汁不通，难产；外治痈肿，恶疮，金疮出血。

【用法与用量】 一钱五分至三钱；外用适量，研末敷或煎汤洗患处。

【注意】 孕妇忌内服。

【贮藏】 置干燥处。

天 门 冬 (天冬)

Tiānméngdōng

RADIX ASPARAGI

【来源】 本品为百合科 (Liliaceae) 植物天门冬 (*Asparagus cochinchinensis* (Lour.) Merr.) 的干燥块根。野生或栽培，主产于贵州、四川、广西等地。秋、冬二季采挖，洗净泥土，剪去根头及须根，按大小分别入沸水中煮或蒸透后，捞出，浸入清水中，趁热除去外皮，洗净，微火烘干，或用硫磺熏后再烘干，剪去头尾即得。

【鉴别】 本品呈长圆纺锤形，中部肥满，两端渐细而钝，长2—6寸，中部直径2—6分。黄白色或浅黄棕色，呈油润半透明状，表面有细纵纹或纵沟，偶有未除尽的黄棕色外皮。干透者质硬而脆，未干透者质柔软，有粘性，断面蜡质样，黄白色，半透明，中间有不透明的白心。臭微，味甘微苦。

以肥满、致密、黄白色、半透明者为佳。条瘦长、色黄褐、不明亮者质次。

【炮炙】 拣去杂质，用水洗净，闷润至内外湿度均匀，切段，干燥即得。

【性味】 甘、苦，大寒。

【功能】 滋阴润燥，清金降火。

【主治】 虚劳发热，咳嗽，肺痿，肺痛，吐血，消渴，津枯便秘。

【用法与用量】 二至四钱。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防潮及虫蛀。

天 仙 子 (莨菪子)

Tiānxiānzǐ

SEMEN HYOSCYAMI

【来源】 本品为茄科(Solanaceae)植物莨菪(*Hyoscyamus niger* L.)的干燥成熟种子。多系野生，主产于河南、河北、辽宁等地。夏末秋初，当果实成熟时，割取结有果实的枝梗，晒干后打下种子，除去杂质即得。

【鉴别】 本品略呈肾脏形或卵圆形，两面扁平，直径小于半分。表面棕黄色或灰棕色，有细密的网纹，但非排列整齐的麻点，脐点处突出、不凹入。无臭，味微辛。

以粒大、饱满、无杂质者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，过罗，去净泥屑即得。

【性味】 苦，温；有大毒。

【功能】 定惊，止痛。

【主治】 癫狂，风痫，风痹厥痛，胃痛，喘嗽不止，久痢，久泻，脱肛；外治痈肿，恶疮。

【用法与用量】 二至四分；外用适量，研末敷患处。

【注意】 内服宜慎。

【贮藏】 置通风干燥处。

天 花 粉

Tiānhuāfěn

RADIX TRICHOSANTHIS

【来源】 本品为葫芦科(Cucurbitaceae)植物栝楼(*Trichosanthes kirilowii* Maxim.)的干燥块根。栽培或野生，全国各地均有生产，主产于河南、四川、山东、广西等地。秋、冬

二季采挖，洗净泥土，刮净外皮，切成长3—7寸的小段，较粗者再对半纵切成2或4瓣，晒干后，用硫磺熏白即得。

【鉴别】 本品呈不规则半圆柱形或圆柱形，多弯曲，一端较细，长3—6寸，直径1—2寸。表面黄白色或淡棕色，粗皮未去净的显棕色斑痕，有侧根痕及较深的横沟纹，纵切面有黄色条状的筋脉纹。质坚实，不易折断，断面白色，富粉性，有黄色的筋脉点，略作放射状排列。无臭，味淡后微苦。

以色白、粉性足、质坚细腻、筋脉少者为佳。色棕、纤维多者为次

【炮炙】 拣去杂质，分开大小个，用水泡约六成透，捞出，晒晾至外皮无水分后，闷润至内外湿度均匀，切片，干燥即得。

【性味】 甘、微苦、酸，微寒。

【功能】 生津止渴，降火润燥，排脓消肿。

【主治】 热病口渴，消渴，乳痈，痔瘕，疮肿。

【用法与用量】 三至四钱。

【注意】 反乌头、草乌。

【贮藏】 置通风干燥处，防虫蛀。

天 南 星

Tiānnánxīng

RHIZOMA ARISAEMATIS

【来源】 本品为天南星科(Araceae)植物天南星(*Arisaema consanguineum* Schott)、东北天南星(*Arisaema amurense* Maxim.)或异叶天南星(*Arisaema heterophyllum* Bl.)的干燥球状块茎。栽培或野生，产于四川、河南、河北、云南、辽宁等地。秋、冬二季采挖，除去残茎、须根及外皮，晒干即得。

【鉴别】 本品呈扁圆形块状，大小不一。直径0.5—2寸，厚3—6分，表面乳白色或淡棕色，皱缩或较光滑，茎基处有凹入痕迹，周围有麻点状须根痕，块茎的周边具球状侧芽的，习称“虎掌南星”，亦有不带侧芽。质坚硬，不易破碎，断面不平坦，色白，粉性，有的可见黄色筋脉。微有辛气，味辣而麻。

以体大、色白、粉性足、有侧芽者为佳。体小、黄白色、粉性小者质次。未去外皮者不宜入药。

【炮炙】 生南星 拣去杂质，洗净灰屑，晒干即得。

制南星 取拣净的天南星，用凉水浸漂，避免日晒，每日换水2—3次，根据其产地、质量及大小适当掌握浸漂日数，泡至数日后，如起白沫时，每天南星100斤加白矾2斤，泡一日后再进行换水，至口尝无麻辣感为度，取出，与鲜姜片及白矾粉层层均匀铺入容器内，加水淹没，腌约3—4星期，倒入锅内煮至内无白心，取出，拣去姜片，晾至六成干，闷润后切片，晒干即得。

每天南星100斤，用鲜姜25斤、白矾12.5—25斤。

【性味】 苦、辛，温；有毒。

【功能】 燥湿化痰，祛风定惊，消肿散结。

【主治】 中风痰迷，口眼喎斜，半身不遂，癫痫，破伤风，肩背痠痛；外用消痈肿、痰核。

【用法与用量】 八分至一钱五分，一般炮制后用；外用生者适量，醋磨或研末醋调涂敷患处。

【注意】 生者内服宜慎。

【贮藏】 置通风干燥处，防虫蛀。

天 麻

Tiānmá

RHIZOMA GASTRODIAE

【来源】 本品为兰科(Orchidaceae)植物天麻(*Gastrodia elata* Bl.)的干燥块茎。野生或栽培，主产于四川、贵州、湖北、陕西等地。冬、春二季采挖，冬季采者质量优良，除去地上茎及须根，洗净泥土，及时擦去粗皮，随即用清水或白矾水微浸，再煮或蒸透，取出晾干、晒干或烘至八、九成干，以硫磺熏后，晾干即得。

【鉴别】 本品呈长椭圆形，略扁，皱缩而弯曲，长2—4寸，宽1—2寸许，厚1—5分，表面黄白色或淡黄棕色，半透明。大的两端钝圆，小的下端稍尖，上端有时有枯干残茎或红黄色的芽，习称“鹦哥嘴”或“红小瓣”。下端有凹陷的根痕，呈圆盘状。全体多纵沟，有由点状的须根痕组成的横环纹。质坚实而紧密，光滑半透明，不易折断，断面平坦，角质状，淡黄白色或淡棕色。未蒸煮透者中间略有白纹或显裂隙。臭特异，味甘、微辛。

以体大、肥厚、色黄白、质坚实、断面明亮无空心者为佳。体小、肉薄、色棕红、断面中空者质次。

【炮炙】 拣去杂质，分开大小个，用水泡至約七成透，撈出，稍晾，再潤至内外湿度均匀，切片，干燥即得。

【性味】 甘，平。

【功能】 祛風，定惊。

【主治】 头昏，眼花，語言蹇澀，風寒湿痹，四肢拘攣，小儿惊風。

【用法与用量】 一至三錢。

【貯藏】 置通风干燥处，防虫蛀。

云 母 石

Yúnmǔshí

MUSCOVITUM

【来源】 本品为天然白云母矿石。我国南北均产。采挖后，去淨泥土及杂质即得。

【鉴别】 本品呈不规则的片状，大小不一，为多数薄片叠成。无色透明或呈白色，具玻璃样光泽。质柔韌，不易折断，但可片片剥离，薄片表面平滑，透明如玻璃紙，有弹性，能曲折，断面不平坦。有土腥气，无味。

以薄片状、无色透明、无泥土杂质者为佳。

【炮炙】 刷淨泥沙，搗碎即得。

【性味】 甘，平。

【功能】 下气，补中，斂疮，止血。

【主治】 虚損气弱，眩暈；外治癰疽疮毒，金疮出血。

【用法与用量】 三至四錢；外用适量，研末塗敷患处。

【貯藏】 置干燥处。

五 加 皮

Wǔjiápí

CORTEX ACANTHOPANACIS RADICIS

【来源】 本品为五加科 (Araliaceae) 植物細柱五加 (*Acanthopanax gracilistylus* W.

W. Smith)的干燥根皮。均系野生,产于湖北、河南、安徽等地。夏季采收,挖出根部,剥取根皮,晒干即得。

【鉴别】本品呈长筒状,多为双卷,长2—3寸,直径1—4分,厚0.5—1分。外表面灰褐色,有纵向稍扭曲的纵沟及横向长圆形皮孔。内表面呈黄色,有纵纹。质轻而脆,易折断,断面不整齐,灰黄色。微有香气,味微苦澀。

以粗长、皮厚、气香、无木心者为佳。

【炮炙】拣去木心及杂质,用水洗净,稍润后切片,干燥即得。

【性味】辛,温。

【功能】祛风湿,壮筋骨。

【主治】风湿痿痹,筋骨拘挛,腰脚痠疼,阳痿囊湿,女子阴痒,小儿行迟。

【用法与用量】一钱五分至三钱。

【贮藏】置通风干燥处。

五 灵 脂

Wǔlíngzhī

FAECES TROGOPTERORUM

【来源】本品为鼯鼠科(Petauristidae)鼯鼠属(*Trogopterus*)动物的干燥粪便。全系野生,主产于河北、山西等地。全年皆可采收,拣去杂质,晒干即得。

【鉴别】药材上常分为灵脂块及灵脂米两类:

灵脂块 为许多粪粒凝结而成的不规则团块,大小不一。表面黑棕色、红棕色或灰棕色,凹凸不平,有油润性光泽,粪粒呈长椭圆形,其表面常裂碎,显纤维性。体轻,质较硬,但较易破碎,断面不平坦,隐约可见粪粒形状。气腥臭,味苦。

以黑棕色、有光泽、显油润、无杂质者为佳。

灵脂米 为长椭圆形颗粒,两端钝圆,长1.5—4分,直径1—2分。表面黑棕色、灰棕色或红棕色,较平滑或微粗糙,常可见浅色的斑点,有的略具光泽。体轻而质松,易折断,断面黄色、黄绿色或黑棕色,呈纤维性。气微弱,味微苦咸。

以外表面黑棕色、内黄绿色、无杂质者为佳。

二者以灵脂块较灵脂米为佳。

【炮炙】五灵脂 拣除沙石杂质即得。

醋灵脂 取淨五灵脂、研成小块，置鍋內用文火微炒，隨即噴淋米醋，再炒至微干、有光澤为度，取出，晾干即得。

【性味】 甘，温。

【功能】 生用行血止痛，炒炭止血。

【主治】 生用治心腹血气諸痛，妇女經閉，产后瘀血作痛；外治蛇、蝎、蜈蚣伤；炒用治妇女血崩，經水过多，赤帶不絕。

【用法与用量】 一錢五分至三錢；外用适量，研末塗敷患处。

【注意】 恶人參。

【貯藏】 置干燥处保存。

五 味 子

Wǔwèizǐ

FRUCTUS SCHIZANDRAE

【来源】 本品为木兰科 (Magnoliaceae) 植物北五味子 (*Schizandra chinensis* Baill.) 的干燥成熟果实。均系野生，主产于辽宁、吉林、黑龙江、河北等地。秋季果实完全成熟时采摘，拣去果枝及杂质，晒干即得。

【鉴别】 本品为不规则圆形或扁圆形颗粒，直径约 1.5—2.5 分。有的数个粘连，外皮紅色、紫紅色或暗紅色，皱縮显油潤。果肉柔軟，内含种子 1—2 粒。种子腎臟形，表面棕黃色，有光澤，坚硬，种仁白色。果肉气微弱而特殊，味酸；种子破碎后有香气，味辛而苦。

以紫紅色、粒大、肉厚、有油性及光澤者为佳。

【炮炙】 五味子 拣去杂质，去梗即得。

酒五味子 取拣淨的五味子，加黃酒拌勻，置罐或适宜的容器內，密封，坐水鍋中，隔水燉至酒吸尽，取出，晒干即得。

每五味子 100 斤，用黃酒 20 斤。

【性味】 酸，温。

【功能】 敛肺，滋腎，生津，收汗，濟精。

【主治】 肺虛喘咳，口干作渴，自汗，盜汗，勞伤遺精。

【用法与用量】 五分至一錢。

【貯藏】 置阴涼干燥处。

五 倍 子

Wǔbèizi

GALLA CHINENSIS

【来源】 本品为漆树科(Anacardiaceae)植物盐肤木(*Rhus chinensis* Mill.)或青麸杨(*Rhus potanini* Maxim.)叶上的干燥虫瘿,前者所生称“角倍”,后者所生称“肚倍”。均由五倍子蚜虫寄生而形成。产于四川、贵州、陕西、湖北、福建等地。肚倍五月间采收,角倍八月间采收。自树上摘下后,用沸水煮,随时搅拌,使其由黄褐色转变成灰色(约3—5分钟),以杀死内部的虫,取出,晒干或阴干即得。

【鉴别】 肚倍 呈长圆形或纺锤形囊状,长1—2寸,直径0.5—1.5寸,厚不足1分。表面灰色或淡棕色。质硬而脆,易破碎,断面呈角质状,有光泽。内壁平滑,内有黑褐色死蚜虫及灰色粉状的排泄物。臭特异,味涩。

角倍 呈菱形,具不规则的角状分枝,表面有灰白色滑软的绒毛,壁较薄。其他与肚倍同。

均以个大、完整不碎、色灰褐、纯净者为佳。

【炮炙】 拣净,敲开,剔去其中杂质即得。

【性味】 酸,平。

【功能】 敛肺,清肠,收汗,止血,解毒。

【主治】 肺虚咳嗽,久泻脱肛,自汗,盗汗,吐衄崩漏,外伤出血,疮疡肿毒。

【用法与用量】 一至二钱;外用适量,研末涂敷或煎汤洗患处。

【贮藏】 置通风干燥处,防压。

木 瓜 (皱皮木瓜)

Mùguā

FRUCTUS CHAENOMELIS LAGENARIAE

【来源】 本品为蔷薇科(Rosaceae)植物木瓜(*Chaenomeles lagenaria* Koidz.)的干燥成熟果实。均系栽培,主产于安徽、浙江、湖北、四川等地。八月间果皮变青黄色时采摘,

置沸水中煮5分钟,捞出,晒至外皮有皱紋后,纵剖成两半,晒干即得。

【鉴别】本品为对半纵剖的长圆形,两端微翘,一面平,一面隆起,长1.5—2.5寸,直径1—1.5寸。顶端有凹窝,外皮紫红色或棕红色,常抽皱成折,抽皱处仍有细皱纹。剖面周边均向内卷曲,果肉红棕色,中心部分可见凹陷的棕黄色子房室,习称“隔瓢”,与果肉相连,种子常脱落,脱落处表面平滑而光亮。种子形似橘核,稍大而扁,长约3分,宽约1分,表面红棕色,有皱纹。质坚实。果肉微有清香气,味酸微涩。

以外皮抽皱、色紫红、质坚实者为佳。外皮抽皱较疏、色棕红、质松泡者质次。

【炮炙】用水泡至八成透,捞出,润透后切片,或蒸透后及时切片,干燥即得。

【性味】酸,温。

【功能】平肝,和胃,去湿,舒筋。

【主治】霍乱转筋,湿痹,脚气。

【用法与用量】一钱五分至三钱。

【贮藏】置阴凉干燥处,防潮及虫蛀。

木 香

Mùxiāng

RADIX SAUSSUREAE

【来源】本品为菊科(Compositae)植物木香(*Saussurea lappa* Clarke)的干燥根。多系栽培,主产于云南。冬季挖出后,去净泥土、须根及地上茎叶,切成2—4寸长的短块,粗大空心者纵剖为2—4块,晒干,除去外皮即得。

【鉴别】本品呈圆柱形、枯骨形,长1.5—3.5寸,直径0.5—1寸。表面棕黄色至灰褐色,有明显的皱纹、与纵沟,并有侧根的残痕。质坚,不易折断,断面不整齐,周边与中心部分呈灰白色或黄色,其间广大部位呈灰褐色至暗褐色,有菊花心,全体可见褐色散在的油点。有特异的香气,味苦。

以质坚实、香气浓、油多者为佳。质较松、香气弱、油少者质次。

【炮炙】木香 拣去杂质,刷去泥土,切成碎块即得。

煨木香 拣去杂质,用水微浸后,闷润,切片,及时在铁丝匾中,用一层草纸、一层木香,间隔平铺数层,置炉火旁或烘干室内烘煨,至木香中所含的挥发油渗至纸上,取出即得。

【性味】 辛、苦，溫。

【功能】 行氣止痛，溫中和胃。

【主治】 中寒氣滯，胸腹脹痛，嘔吐，泄瀉，痢疾里急後重。

【用法與用量】 五分至一錢五分。

【貯藏】 置陰涼乾燥處，防潮。

木 賊

Mùzéi

HERBA EUISETI HIEMALIS

【來源】 本品為木賊科(Equisetaceae)植物木賊(*Equisetum hiemale* L.)的乾燥地上部分。均系野生，主產於黑龍江、吉林、遼寧、陝西、湖北等地。夏、秋二季採收，齊地割下後，及時曬干或陰干即得。

【鑑別】 本品為長管狀，中空有節，不分枝。長1—2尺，直徑約1.5分，每節長1—2寸。表面灰綠色或黃綠色，有多數縱稜，順直排列，其上密生細刺，觸之有粗糙感。節處有筒狀深棕色的鱗葉。易自節處拔脫。質脆，易折斷，斷面中空，內有灰白色或淺綠色的薄瓢。無臭，味甘、微苦澀。

以莖粗長、色綠、質厚、不脫節者為佳。

【炮炙】 洗淨，略潤後，除去殘根，切段，乾燥即得。

【性味】 甘、微苦，溫。

【功能】 散風，退翳。

【主治】 目生雲翳，迎風流淚；外治脫肛。

【用法與用量】 一至三錢；外用適量，燒存性研末搽敷患處。

【貯藏】 置乾燥處。

木 通

Mùtōng

CAULIS AKEBIAE

【來源】 本品為木通科(Lardizabalaceae)植物木通(*Akebia quinata*(Thunb.) Decne)

的干燥茎。均系野生，产于江苏等地。秋季采收，截取茎部，除去侧枝，阴干即得。

【鉴别】 本品呈圆柱形而弯曲，长1—2尺，直径4—6分。表面呈灰褐色，外皮极粗糙而有許多不规则裂纹，节不明显，仅可见侧枝断痕。质坚实，难折断，断面不整齐，皮部较厚，黄棕色，中央木部呈黄白色，有车轮状花纹。中心有小形的髓。无臭，味苦而涩。

以条匀、内色黄者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，用水浸泡，泡透后捞出，剥成顺长段，切片，晒干即得。

【性味】 苦，微寒。

【功能】 泻火行水，通利血脉。

【主治】 胸中烦热，喉痹咽痛，尿赤澀滞，五淋，水肿，通身拘痛，妇女经闭，乳汁不通。

【用法与用量】 一至二钱。

【注意】 孕妇忌用。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮。

木 槿 花

Mùjīnhuā

FLOS HIBISCI

【来源】 本品为锦葵科(Malvaceae)植物木槿(*Hibiscus syriacus* L.)的干燥花。均系栽培，产于江苏、湖北、四川、河南、河北等地。夏季将花摘下，晒干即得。

【鉴别】 本品卷缩呈卵形或圆柱形团状，长约1寸，直径约5分。底部有灰绿色的花萼，表面密生细小绒毛，边缘5裂。花萼外面有数条灰绿色的线形苞片。常有短花柄。花瓣为白色，有5片或多数层叠，皱缩卷折。中间有黄色蕊，系多数雄蕊联合成一圆筒，包围雌蕊。质轻。微有香气，味甘。

以朵大、完整、色白者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，筛去灰屑即得。

【性味】 甘，凉。

【功能】 凉血，润燥，除湿，清热。

【主治】 肠风泻血，赤白下痢，里急后重。

【用法与用量】 一至三钱。

【贮藏】 置干燥通风处，防压及虫蛀。

木 蝴蝶

Mùhúdié

SEMEN OROXYLI

【来源】 本品为紫葳科(Bignoniaceae)植物木蝴蝶(*Oroxylum indicum*(L.)Vent.)的干燥成熟种子。均系野生,主产于云南、贵州、广西等地。秋、冬二季果实呈黑褐色时采摘,暴晒后扁平长大的木质果实自行裂开,收集种子,晒干即得。

【鉴别】 本品呈椭圆形片状,形似蝶翼,长约2寸,宽约1寸。外皮三面延长成宽大的翅,极薄,白色,半透明,上有放射状纹理,用扩大镜观察,见有多数透明的小孔,外缘多破裂。中部较厚,呈椭圆形,长6—9分,宽约5分,淡黄棕色。内有种仁两瓣,略似肾脏形,长约4.5分,宽约3分,淡黄色。无臭,味苦。

以张大、色白、翅柔软者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,筛去灰屑即得。

【性味】 苦,寒。

【功能】 疏肝、和胃,润肺,生肌。

【主治】 肝胃气痛,咳嗽;外治痈毒不敛。

【用法与用量】 五分至一钱;外用整张贴敷疮口。

【贮藏】 置通风干燥处。

木 鳖 子

Mùbiézi

SEMEN MOMORDICAE

【来源】 本品为葫芦科(Cucurbitaceae)植物木鳖子(*Momordica cochinchinensis* Spreng.)的干燥成熟种子。多系野生,主产于广西、四川、湖北等地。秋末冬初果实成熟时采收,剥去外皮,晒至半干,取出种子,或用草木灰与果实一同搅拌,然后用水淘洗,除去瓤肉及外膜,取出种子,晒干即得。

【鉴别】 本品呈扁平近圆形,中间略隆起,直径0.6—1寸,厚1—2分。外壳灰褐色,

較粗糙，有凹陷的網狀花紋，周邊有縱楞突起，呈鋸齒形。外壳質硬而脆，破開後，內有帶灰綠色絨毛狀薄膜的種仁，呈扁圓形或類圓形，黃白色，富油性。有特殊的油膩氣，味苦。

以籽粒飽滿、外皮無破裂、堅硬、體重、不泛油者為佳。

【炮炙】 揀去雜質，洗淨，用時連殼搗碎即得。

【性味】 苦、微甘，溫；有毒。

【功能】 消腫，追毒。

【主治】 癰腫，瘰癧，瘡毒，痔瘡，丹瘤。

【用法與用量】 入丸散服，用量隨方配合；外用適量，研末醋調塗敷患處。

【貯藏】 置通風乾燥處。

瓦 松

Wǎsōng

HERBA OROSTACHYOS

【來源】 本品為景天科(Crassulaceae)植物瓦松(*Orostachys fimbriatus*(Turcz.)Berg.)或瓦花(*Orostachys japonica* A. Berg.)的乾燥帶花地上部分。均系野生，全國大部分地區均有生產。夏、秋二季採收，全草枯萎時，連根拔起，除去根及雜質，曬干即得。

【鑒別】 本品莖長4—7寸，呈黃褐色或暗棕褐色，有多數葉脫落後的疤痕，交互連接成棱形花紋。葉灰綠色或黃褐色，皺縮卷曲多已脫落，長4—5分，寬約1分，莖上部葉間生有紅褐色小花，小花有柄，柄長短不一。質輕脆，易碎。臭微，味酸。

以花穗帶紅色、老者為佳。

【炮炙】 揀去雜質，除去殘根，切段即得。

【性味】 酸，平；有大毒。

【功能】 活血，止血，斂瘡。

【主治】 血痢便血；外治諸瘡不斂。

【用法與用量】 五分至一錢；外用適量，研末塗敷患處。

【注意】 內服宜慎。

【貯藏】 置通風乾燥處，防壓。

瓦楞子

Wǎlèngzǐ

CONCHA ARCAE

【来源】本品为蚌科(Arcidae)动物魁蚌(*Arca inflata* Beeve)、泥蚌(*Arca granosa* L.)或毛蚌(*Arca subcrenata* Lisekke)的贝壳。多系野生,主产于浙江、江苏、山东、广东、辽宁等地。春、秋二季收集,洗去泥土,置开水中稍煮,挖去肉,将外壳洗净,晒干即得。

【鉴别】本品略呈三角形或扇面形,左右两壳形状相同,或左壳稍大于右壳。长0.6—2寸,宽0.5—1.5寸。背面隆起,具数十条直楞如瓦壠状,由顶端一点向周围放射,楞纹明显,由灰褐色和白色相间而成。内面乳白色,光滑,上端边缘有突出的锯齿。质坚而厚,可砸碎。无臭,无味。

以个均匀、洁净、无残肉、沙土者为佳。

【炮炙】瓦楞子 洗净,碾碎,晒干即得。

煨瓦楞子 取洗净的瓦楞子,置坩埚内,在无烟火中煨红透,取出,晾凉,碾碎即得。

【性味】甘、咸,平。

【功能】软坚,散瘀,消积,化痰。

【主治】瘀血积块,痰积痞瘕。

【用法与用量】二至三钱。

【贮藏】置干燥处。

太子参

Tàizishēn

RADIX PSEUDOSTELLARIAE

【来源】本品为石竹科(Caryophyllaceae)植物孩儿参(*Pseudostellaria heterophylla* (Miq.) Pax.)的干燥块根。多系栽培,主产于江苏、山东等地。夏季采挖,除去地上部分,洗净泥土,入沸水中烫透,捞出,略晒,搓去须根,晒干即得;或除去泥土,摘除须根,直接晒干。

即得。

【鉴别】本品呈细长纺锤形或细长条形，平直或略弯曲，长0.6—2寸，直径1—2分。外表面淡黄白色，半透明，微有纵皱，并有若干横沟纹及须根断后的残迹，根头钝圆，上端多有残留茎基或茎痕，下端渐细。质脆，易折断，断面黄白色而发亮，直接晒干的断面为白色，有粉性。臭微，味甘。

以肥润、黄白色、无须根者为佳。

【炮炙】拣去杂质，摘除残留须根，筛去泥屑即得。

【性味】甘、苦，微温。

【功能】补气，生津。

【主治】肺虚喘咳，脾虚困倦，津液不足。

【用法与用量】二至三钱。

【贮藏】置通风干燥处，防虫蛀。

车 前 子

Chēqiánzi

SEMEN PLANTAGINIS

【来源】本品为车前科(Plantaginaceae)植物车前(*Plantago asiatica* L.)或平车前(*Plantago depressa* Willd.)的干燥成熟种子。均系野生，主产于江西、河南、黑龙江、辽宁等地。夏、秋二季种子成熟时割取果穗，晒干，打下种子，除去杂质，即得。

【鉴别】本品为扁平椭圆形的细粒，一面略凸起，一面稍平。表面棕褐色或黑紫色，在扩大镜下观察，可见细密网纹，在稍平一面的中部可见白色小点。质坚硬，切断面灰白色。无臭，无味，嚼之带粘液性。

以粒大、均匀饱满、色黑、无杂质者为佳。

【炮炙】车前子 拣去杂质，筛去泥屑，即得。

盐车前子 取净车前子，置锅内用文火炒至鼓起，喷淋盐水，再略炒取出，晾干即得。每车前子100斤，用盐2斤8两、加适量开水化开澄清。

【性味】甘，寒。

【功能】利水，清热，明目。

【主治】气淋五淋，暑湿泻痢，目赤障翳。

【用法与用量】一至三钱。

【贮藏】置通风干燥处，防潮。

巴 豆

Bādòu

SEMEN CROTONIS

【来源】 本品为大戟科(Euphorbiaceae)植物巴豆(*Croton tiglium* L.)的干燥成熟种子。多系栽培,产于四川、广西、云南、贵州等地。秋季种子成熟、果皮尚未开裂时采摘,晒干,破开果壳,取出种子,晒干即得。

【鉴别】 本品呈略扁的椭圆形或卵形,形似蓖麻子而少花纹,长3—5分,直径2—3分,厚约1—2分。外皮灰棕色或棕色,略粗糙,有微突起的纵纹或网纹。一端有深色的小点,一端有疤痕及细小的突起,但多脱落,腹面有一条突起的纵棱线。横断面略呈方形,种皮薄而坚韧,里面灰白色。种仁外面包有一层薄膜,内黄白色,富油性。将种仁纵剖两半,可见中央有菲薄的子叶二片,上有网状脉纹。无臭,味辛辣(不宜口尝)。

以粒饱满、种仁色白者为佳。粒较空、种仁泛油变色者质次。

【炮炙】 巴豆仁 拣净杂质,用粘稠的米汤或面汤浸拌,置日光下曝晒或烘裂,搓去皮,簸取净仁即得。

巴豆霜 取净巴豆仁,碾碎,用多层吸油纸包裹,加热微炕,压榨去油后,碾细,过筛即得。

【性味】 辛,热;有大毒。

【功能】 热下寒积,逐痰行水。

【主治】 寒积停滞,胸腹胀满急痛,痰饮,积聚,水肿,喉风喉痹;外治恶疮疥癬。

【用法与用量】 五厘至一分,去壳压去油,多入丸散分服;外用适量,研末涂或捣烂以绢包擦患处。

【注意】 孕妇忌内服;恶牵牛。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

巴 戟 天

Bājitiān

RADIX MORINDAE

【来源】 本品为茜草科(Rubiaceae)植物巴戟天(*Morinda officinalis* How)的干

燥根部。栽培或野生，产于广东、广西等地。冬、春两季均可采挖，洗净泥土，除去须根，晒至六、七成干，轻轻锤扁，晒干即得；或先蒸约半小时后再锤扁，晒干即得。

【鉴别】 本品呈扁圆柱形，略弯曲，长度不等，直径2—4分。表面灰黄色，粗糙，具纵纹，外皮因中断而露出部分的木心和横裂纹，形似连珠。质坚硬，肉厚，易剥落，断面淡紫色，中心黄棕色，木质坚韧。无臭，味甘而微涩。

以条大、肥壮、连珠状、肉厚、色紫者为佳。条细瘦、肉薄、色灰者质次。

【炮炙】 巴戟天 拣去杂质，用热水泡透后，趁热抽去木心，切段，干燥即得。

炙巴戟 取甘草，捣碎，置锅内加水煎汤，捞去甘草渣，加入拣净的巴戟天，煮至松软能抽出木心时（此时余汤不宜多），取出，趁热抽去木心，晒干即得。

每巴戟天100斤，用甘草6斤4两。

盐巴戟 取拣净的巴戟天，用盐水拌匀，置笼屉内蒸透，抽去木心，干燥即得。

每巴戟天100斤，用盐2斤加适量开水化开澄清。

【性味】 辛、甘，微温。

【功能】 补肾阳，强筋骨，祛风湿。

【主治】 阳痿，少腹冷痛，风寒湿痹，腰膝痠疼。

【用法与用量】 一至三钱。

【贮藏】 置通风干燥处，防虫蛀。

水 蛭

Shuǐzhì

HIRUDO

【来源】 本品为水蛭科(Hirudinidae)动物蚂蟥(*Whitmania pigra* Whitman)、柳叶蚂蟥(*Whitmania acranulata* Whitman)或水蛭(*Hirudo nipponica* Whitman)的干燥全体。均系野生，全国大部分地区均有生产。夏、秋二季捕捉后，洗净，加入石灰或用酒闷死，拌以草木灰，晒干或微火烘干即得。有的用线从虫体一端穿起，将虫体拉长晒干，有的用线从虫体中段穿起，晒干。

【鉴别】 药材中常依外形不同而分为三类：

宽水蛭 呈扁平纺锤形，全体由许多环节所组成，体长1.5—2.7寸，宽2.5—6分。常腹背相贴而呈拘挛状，体前端略尖，后端钝圆，两端各具一吸盘。背部黑棕色，体两侧及腹

面为棕黄色。质脆，易折断，断面呈胶质状而有光泽。有土腥气。

长条水蛭 呈狭长扁平形(有的在加工时拉成线状)，体节明显或不明显，体长2.5—3.6寸，宽0.3—1.5分。体两端均细，又因加工时，两端穿有小孔，所以吸盘常不明显。背腹面均呈黑棕色。质脆，易折断，断面无光泽。有土腥气。

水蛭 呈扁长圆柱形，通常用线穿起，体多弯曲扭转，并多数虫体密集成团。体长0.6—1.5寸，宽0.6—1分。全体黑棕色，亦由多数环节组成。断面不平坦，无光泽。

均以条整齐、黑褐色、无杂质者为佳。

【炮炙】 **炒水蛭** 洗净，晒干，切段；另取滑石粉置锅内炒热，加入水蛭段，炒至微鼓起，取出，筛去滑石粉，放凉即得。

油水蛭 取洗净的水蛭，置锅内用猪油炸至焦黄色，取出，干燥即得。

【性味】 咸、苦，平；有毒。

【功能】 破血，逐瘀，通经。

【主治】 妇女经闭，干血成痼，瘕瘕，积聚，少腹畜血，折跌损伤，瘀血作痛。

【用法与用量】 五分至一钱，多入丸散服。

【注意】 孕妇忌用。

【贮藏】 置通风干燥处，防虫蛀。

丹 参

Dānshēn

RADIX SALVIAE MILTIORRHIZAE

【来源】 本品为唇形科(Labiatae)植物丹参(*Salvia miltiorrhiza* Bge.)的干燥根部，多系野生，全国大部分地区均有生产。主产于河北、安徽、江苏、四川等地。秋季采挖，除去茎叶，洗净泥土，晒干即得。

【鉴别】 本品顶端有根状茎及茎的残基，根状茎下生多数细长的根，根呈圆柱形，上部膨大，略扭曲或破裂，有的多分枝，附细须根，根长3—7寸，直径2—5分。外皮棕红色或砖红色，粗糙，具纵皱纹，外皮松，易剥落。质硬而脆，易折断，断面不平坦，外层色较深，呈紫黑色或砖红色，内层有显著的筋脉白点。无臭，味甘、微苦，咀嚼时唾液成红色。

以条粗、色紫红、无碎断者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，除去根茎，洗净，捞出，润透后切片，晒干即得。

【性味】 苦,微寒。

【功能】 去瘀生新,活血調經,清心除煩。

【主治】 婦女月經不調,癥瘕,積聚,骨節疼痛,心煩內熱,痲腫丹毒。

【用法與用量】 一錢五分至三錢。

【注意】 反藜蘆。

【貯藏】 置干燥处。

月 季 花

Yuèjìhuā

FLOS ROSAE CHINENSIS

【来源】 本品为蔷薇科(Rosaceae)植物月季(*Rosa chinensis* Jacq.)的干燥花。野生或栽培,全国大部分地区多有生产。全年均可采收,但以夏、秋二季为主,采收半开放的花朵,晾干,或用微火烘干即得。

【鉴别】 本品为球形完整的花朵,杂有散碎的花瓣。花大小约5分许,呈紫色或粉红色。花瓣多数呈长圆形,有纹理,中央为黄色花蕊,花萼绿色,先端裂为5片,下端有膨大成长圆形的花托。质脆,易破碎。微有清香气,味淡、微苦。

以紫红色、半开放的花蕾、不散、气味清香者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,摘去梗,筛去灰屑即得。

【性味】 甘,温。

【功能】 活血調經,消肿解毒。

【主治】 婦女月經不調,經來腹痛;外治痲腫。

【用法與用量】 五分至一錢五分:外用适量,捣烂或研末敷患处。

【貯藏】 置阴凉干燥处,防压及虫蛀。

凤 凰 衣

Fènghuángyī

MEMBRANA FOLLICULARIS OVI

【来源】 本品为雉科(Phasianidae)动物鸡(*Gallus gallus domesticus* Briss.)的蛋壳

內的卵膜。全國大部分地區均有生產。全年均可采收，孵出小雞後，取出殼內軟膜，洗淨雜質，陰干即得。

【鑑別】 本品為皺折狀的薄膜。大小不一，邊緣不整齊。表面白色，不透明。內表面淡黃白色，附有血絲。體輕，質松，略有韌性，易破碎。臭微，味淡。

以色白、不破碎、無硬殼與雜質者為佳。

【炮炙】 揀去雜質，洗淨曬干即得。

【性味】 甘，平。

【功能】 潤肺，止咳。

【主治】 久咳氣結。

【用法與用量】 五至八分。

【貯藏】 置干燥處，防虫蛀。

牛 黃

Niúhuáng

CALCULUS BOVIS

【來源】 本品為洞角科(Bovidae)動物牛(*Bos taurus domesticus* L.)的膽囊中的結石。產于北京、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、陝西、甘肅、河南等地，全年皆產，于宰牛時，如發現有牛黃，應立即濾去胆汁，將牛黃取出，除淨外部薄膜，先裹以燈心草或通草絲，外面再包以白布或毛邊紙，懸挂陰涼處，陰干即得。

【鑑別】 本品多呈卵形、不規則的球形、方圓形、或三角形，直徑0.2—1寸許。表面金黃色或棕黃色，深淺不一，細膩而稍有光澤，有時外部挂有一層黑色光亮的薄膜，習稱“烏金衣”，有的表面有龜裂紋，亦有呈麻面而不光滑者。體輕，質松脆，手捻易碎，斷面棕黃色或金黃色，深淺不一，亦顯光澤，有間隔均勻、呈環列整齊的層紋。氣清香，味先微苦而後甘。入口芳香清涼，可慢慢溶化，嚼之不粘牙。取牛黃少許，以清水潤濕後，塗于指甲上能染黃色，經久不褪，習稱“挂甲”。

以表面光澤細膩、質輕松脆、斷面层紋薄而齊整、無白膜、味先苦後甘、清香而涼者為佳。

【性味】 苦、甘，涼。

【功能】 清心，解熱，利痰，止驚，開竅，解毒。

【主治】 热病神昏，谵语，癫痫，发狂，小儿惊风抽搐，咽喉口舌生疮，痈疽，疔毒。

【用法与用量】 五厘至一分二厘，多入丸散服；外用适量，研末敷患处。

【贮藏】 置阴凉干燥处，避光密闭保存，防潮防压。

牛 蒡 子 (大力子)

Niúbàngzǐ

FRUCTUS ARCTII

【来源】 本品为菊科(Compositae)植物牛蒡(*Arctium lappa* L.)的干燥成熟果实。野生或栽培，主产于河北、吉林、辽宁、浙江等地。秋季果实成熟时采摘，晒干，打出果实，除去杂质，再晒干即得。

【鉴别】 本品呈瘦长扁卵形，长约2分，中部直径约1分。外皮灰褐色，有数条微突起的纵纹，中间一条较明显，全体有稀疏的斑点。一端略窄，微弯曲，顶上一浅色小点，另一端钝圆，稍宽，有一小凹窝。纵面稍隆起，边缘光圆而厚。外皮较坚硬，破开后种仁两瓣，灰白色，富有油性。无臭，味微苦。

以粒大、饱满、外皮灰褐色者为佳。

【炮炙】 牛蒡子 拣去杂质，筛去泥屑，即得。

炒牛蒡子 取净牛蒡子，置锅内用文火炒至微鼓起，外面呈微黄色并微有香味，取出，放凉即得。

【性味】 辛、苦，寒。

【功能】 疏散风热，宣肺透疹，消肿解毒。

【主治】 风热痰嗽，咽喉肿痛，斑疹不透，痈肿疮毒。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置通风干燥处。

牛 膝 (怀牛膝)

Niúxī

RADIX ACHYRANTHIS BIDENTATAE

【来源】 本品为苋科(Amaranthaceae)植物牛膝(*Achyranthes bidentata* Bl.)的干燥

根。均系栽培、主产于河南。冬季莖叶枯萎时采挖，除去地上莖、須根和泥土，捆成小把，晒至干皺后，用硫磺熏数次，将頂端切齐，晒干即得。

【鉴别】 本品呈細长圓柱形，挺直或稍弯曲，上端較粗，下端較細，长 0.5—3 尺，直径 2—3 分。表面黃白色或灰黃色，有細纵皺紋和稀疏的側根痕。质硬而脆，潮潤时柔軟，微有彈性，易折断，断面平坦，微呈半透明状，中間有明显的黃白色木心，其周圍有許多筋脉小点。臭微，味微甜。

以身长、肉肥、皮細、色灰黃者为佳。身短、分支多、色灰褐、略帶紫性者质次。

【炮炙】 怀牛膝 拣去杂质，洗净，潤透后去芦，切段，晒干即得。

酒牛膝 取牛膝段，用黃酒噴淋拌勻，悶潤后，置鍋內炒至微干，取出，放凉即得。

每牛膝段 100 斤，用黃酒 10 斤。

【性味】 苦、酸，平。

【功能】 生用散瘀血，消痈肿；酒制补肝肾，强筋骨。

【主治】 生用治喉痹，痈肿，五淋，尿血，跌打損伤，妇女經閉，癥瘕，难产，胞衣不下，产后瘀血腹痛；酒制治腰膝骨痛，四肢拘攣、痿痹。

【用法与用量】 一錢五分至三錢。

【注意】 孕妇忌用。

【貯藏】 置阴涼通風处，防潮。

升 麻

Shēngmá

RHIZOMA CIMICIFUGAE

【来源】 本品为毛茛科(Ranunculaceae)植物升麻(*Cimicifuga dahurica* Maxim.)、大三叶升麻(*Cimicifuga heracleifolia* Komar.)或西升麻(*Cimicifuga foetida* L.)的干燥地下根状莖。均系野生，主产于黑龙江、辽宁、河北、山西、湖北及四川等地，春、秋二季采挖，除去地上莖苗和泥土，晒至須根干时，用火燎或其它方法除去須根，晒干即得。

【鉴别】 本品为不規則的长形块状物，多分歧成結节状，长 3—6 寸，直径 0.5—1 寸。表面黑褐色，粗糙不平，上面有几个圓形空洞的莖基痕，洞內壁显网状花紋，周圍殘留細根，质堅刺手，下側凹凸不平，具須根痕。体輕而质堅硬，不易折断，断面不平坦，纖維性，淡黃白色或黃綠色。臭微，味微苦而澀。

以体大、质坚、外皮黑褐色、断面黄绿色、无须根者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，略泡洗净，捞出，润透及时切片，迅速干燥即得。

【性味】 甘、辛、微苦，微寒。

【功能】 升阳，散风，解毒，透斑。

【主治】 时气毒痢，头痛寒热，喉痛，口疮，斑疹不透，中气下陷，久泻，久痢，脱肛，崩中。

【用法与用量】 五分至一钱五分。

【贮藏】 置通风干燥处。

乌 药

Wūyào

RADIX LINDERAE

【来源】 本品为樟科(Lauraceae)植物乌药(*Lindera strychnifolia* F. vill.)的干燥根部。均系野生，主产于浙江、湖南等地。冬、春二季采挖，除去须根，洗净泥土，晒干，或刮净外皮，切片，干燥即得。

【鉴别】 本品多呈纺锤形，略弯曲，两头稍尖，中部膨大成连珠状，长3—4寸，膨大部分直径3—6分。表面黄棕色或黄褐色，有须根脱落的残痕，具横裂纹及纵皱。质坚硬，难折断，横切面浅棕色而微红，稍显粉性，中心色较深，有环及菊花纹。微有香气，味微苦辛。

以连珠状、质嫩、粉性大、横断面浅棕色者为佳。质老，柴性大者不宜入药。

乌药片 分薄片与厚片，均为近圆形的片状，厚片有时斜切成椭圆形，直径3—6分，厚约半分，薄片厚在半分以下，平而有弹性。切面黄白色至淡棕色微红，有菊花纹及环纹。气味与未切片的乌药同。

以平整不卷、色淡、无黑斑、不破碎者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，分开大小条，用水泡透，根据季节注意换水，防止发臭，捞出，及时切片，干燥即得；如已在鲜时切片者，筛去屑即可。

【性味】 辛，温。

【功能】 顺气。

【主治】 中风气逆，痰壅气滞，胸腹胀痛，宿食不消，反胃呕吐，小便频数，疝气。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防潮及虫蛀。

乌 梅

Wūméi

FRUCTUS MUME

【来源】 本品为蔷薇科(Rosaceae)植物梅(*Prunus mume* (Sieb.) Sieb. et Zucc.)的干燥未成熟果实。多系栽培,主产于四川、浙江、福建、湖南、贵州等地。夏、秋二季采摘后,置烘炕上用低温烘干即得。

【鉴别】 本品呈不规则的球形或扁圆形,大小不一,直径6—8分,外皮乌黑色或棕黑色,皱缩不平,一端有明显凹陷的圆脐。果肉柔软可剥离,核坚硬,椭圆形,棕黄色,内含淡黄色的种仁一粒,其形状、气味与苦杏仁相似。果肉稍有特异的酸气,味极酸。

以个大、外皮乌黑、肉厚核小、柔润、味极酸者为佳。

【炮炙】 乌梅 拣去杂质,洗净,晒干即得。

乌梅肉 取净乌梅,微淋清水使湿润,俟肉绵软,取出略晾,敲破,剥取净肉即得。

乌梅炭 取净乌梅,置锅内用武火炒至皮肉鼓起,粘质已枯,喷淋清水,取出,晒干即得。

【性味】 酸,温,涩。

【功能】 敛肺,涩肠,生津,杀虫。

【主治】 久咳,久泻,久痢,便血,尿血,血崩,蛔厥呕吐,烦渴。

【用法与用量】 八分至一钱五分。

【贮藏】 置阴凉干燥处,防潮。

乌 梢 蛇

Wūshāoshé

ZAOCYS

【来源】 本品为游蛇科(Colubridae)动物乌风蛇(*Zaocys dhumnades* Contor)除去内脏的干燥品。均系野生,主产于浙江、江苏、贵州、湖北等地。夏、秋二季捕捉,捉住摔死,在腹面由颈至尾剖开,除去内脏,卷成圆盘形,用柴火熏,防止熏焦,至颜色发黑时,晒干或

炕干即得。

【鉴别】 蛇体长2—4尺，直径5—6分，多卷成盘形，圆盘直径4—5寸。全体黑褐色，密被菱形鳞片，无光泽。脊骨高耸呈屋脊状，头部扁圆似龟头盘于中央，口内有多数刺状牙齿，尾部细，多纳入腹内。腹部剖开，边缘向内卷曲，内黄白色，或已熏成灰黑色，可见多数肋骨密集排列。质坚韧。有腥气，味淡。

以皮黑褐色、肉黄白色、脊部有楞、坚实者为佳。

【炮炙】 乌蛇肉 斩去头，用黄酒闷透后，取出，除去皮骨，晒干即得。

炙乌蛇 斩去头，温水洗净，切段，用黄酒拌匀，闷透，置锅内用文火炒至微黄色，取出，放凉即得。

每乌梢蛇100斤，用黄酒20—25斤。

【性味】 甘，平；有小毒。

【功能】 祛风湿。

【主治】 骨节风痛、皮肤麻木，风瘙，瘾疹，疥癣，麻风。

【用法与用量】 一钱五分至三钱；并可浸酒，或研末和入丸散。

【贮藏】 置通风干燥处，防虫蛀。

片 姜 黄

Piànjiānghuáng

RHIZOMA CURCUMAE AROMATICAE CONCISA

【来源】 本品为姜科(Zingiberaceae)植物郁金(*Curcuma aromatica* Salisb.)的干燥地下根状茎。均系栽培，主产于浙江。冬季苗枯萎时采挖，除去须根，洗净泥土，立即纵切成约2分厚的片，晒干即得。

【鉴别】 本品呈长圆形或形状不规则的片状，大小不一，长1—2寸，宽0.5—1寸，厚1分左右。外皮灰黄色，粗糙皱缩，有时可见环节及须根痕，切面黄白色或灰黄色，有一圈环纹及多数筋脉小点散在。质坚实，粉质，有筋脉。有姜香气，味苦而辛凉。

以片大、色黄白、质坚实、起粉者为佳。

【炮炙】 拣去杂质及残留须根，刷洗泥屑，凉干即得。

【性味】 辛、苦，温。

【功能】 破血，行气。

【主治】 血瘀气滞，心腹胀痛，风痹臂痛，妇女经闭，癥瘕，产后败血攻心，跌打损伤瘀

血作痛，痈肿。

【用法与用量】 一至三錢。

【貯藏】 置阴涼干燥处，防虫蛀。

玄 参

Xuánshēn

RADIX SCROPHULARIAE

【来源】 本品为玄参科 (Scrophulariaceae) 植物玄参 (*Scrophularia ningpoensis* Hemsl.) 的干燥根部。多为栽培，主产于浙江、四川、湖北等地。秋、冬二季采挖，除去茎叶，剥脱留种的子芽，除去泥土及须根，曝晒至半干，堆积3—4天再晒，以后反复堆、晒，至完全干燥或烘干即得。

【鉴别】 本品呈近圆柱形，有的弯曲似羊角，中部稍粗或上粗下细，长2—6寸，中部直径0.3—1寸。表面灰黄色或棕褐色，有纵沟纹和须根痕。顶端芦头多已修齐，下部渐尖。质坚实，不易折断。断面乌黑色，微有光泽，无裂隙。无臭或有焦糊气，味甘、微苦咸。

以支条肥大、皮细、质坚、芦头修净、内色乌黑者为佳。支条小、皮粗糙、带短芦者质次。支条很小、芦头大、折断现紫性者不可入药。

【炮炙】 拣去杂质，除去芦头，洗净，润透后切片；或微泡捞出，置笼屉内蒸透，取出，晾至五、六成干，润至内外湿度均匀，切片，干燥即得。

【性味】 苦、咸，微寒。

【功能】 滋阴、降火、除烦、解毒。

【主治】 热病烦渴，发斑，蒸骨劳热，夜寐不安，咽喉肿痛，痈肿，瘰癧，津伤便秘。

【用法与用量】 二至四錢。

【注意】 反藜芦。

【貯藏】 置通风干燥处，防虫蛀。

玄 明 粉

Xuánmíngfěn

MIRABILITUM DEHYDRATUM

【来源】 本品为提净的芒硝按下述炮炙项下的方法加工制成。

【鉴别】本品为白色粉末。用手搓之微有涩感。易溶于水，取粉末少许，投入火焰中，火焰呈亮黄色。无臭，味咸而微苦。

以干燥、洁白、粉细者为佳。

【炮炙】取提净的芒硝，用能吸水的纸包裹，每包半斤，悬挂于通风处，使其风化，俟水份消失，全部成洁白粉末状，过罗或煅成粉末状，取出，放凉即得。

【性味】辛、苦、咸、寒。

【功能】泻热，润燥，软坚。

【主治】实热便秘，宿滞癥结；外治疮肿丹毒，咽肿口疮。

【用法与用量】一至三钱；外用适量，水化洗敷或研末吹敷患处。

【注意】孕妇忌内服；畏三棱，恶硫黄。

【贮藏】置通风干燥处，密闭保存，防潮。

玄 精 石

Xuánjīngshí

SELENITUM

【来源】本品为年久所结的小形片状石膏矿石。主产于陕西、甘肃、青海、四川等地。挖出后除去泥土即得。

【鉴别】本品呈椭圆形、菱形或各种不规则的片状，多边薄中厚，大小不一，一般长1—6分，宽1—3分，厚0.5—1分。青白色、灰白色、灰绿色或略带浅灰棕色，有的中间显黑色，形似龟背，半透明。质硬而脆，易砸碎成不整齐的菱形或柱状小块。微带土腥气，味微咸。

以块整齐、青白色、片薄中间有黑色者为佳。

【炮炙】洗净泥土，晒干，用时打碎即得。

【性味】甘、咸、寒。

【功能】滋阴，清热。

【主治】阳盛阴虚，头痛，壮热，烦渴，目赤肿痛。

【用法与用量】三至五钱。

【贮藏】置干燥处。

半 边 莲

Bànbīānlián

HERBA LOBELIAE RADICANTIS CUM RADICE

【来源】 本品为桔梗科(Campanulaceae)植物半边莲(*Lobelia radicans* Thunb.)的干燥带根全草。均系野生,产于安徽、江苏、浙江等地。多于夏季采收,连根拔起,除去杂草,晒干或阴干即得。

【鉴别】 本品常缠绕成团状。根状茎呈细长圆柱形,表面淡棕黄色,光滑或有细纵纹,生有须根。茎细长多节,灰绿色,节上有互生的枝或叶。叶狭长,长约0.5寸,宽1—2分,表面光滑无毛。花基部筒状,花瓣5枚,花筒内密生白色毛茸。臭微,有刺激性,味初微甘,后稍辛辣。

以叶绿、根黄、无泥及杂质者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,切段即得。

【性味】 辛,平。

【功能】 平喘,解蛇毒。

【主治】 气喘,蛇虫咬伤;外治疗疮肿毒。

【用法与用量】 三至五钱,鲜者捣汁服,干者煎服;外用鲜者适量,捣敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

半 夏

Bànxia

RHIZOMA PINELLIAE

【来源】 本品为天南星科(Araceae)植物半夏(*Pinellia ternata* (Thunb.) Breit.)的干燥块茎。均系野生,我国大部分地区均有生产,主产于四川、湖北、安徽、江苏等地。夏、秋二季均可采挖,洗净泥土,除去灰黄色的外皮及须根,晒干即得。

【鉴别】 本品呈类圆球形或扁圆球形,亦有作偏斜状,直径2—6分。表面白色或浅黄色,上端多圆平,中间有凹窝,系茎的残痕,呈棕黄色,周围密布小麻点状的根痕,下面多

鈍圓而光滑，或略不平，色潔白。質堅實，縱剖面腎臟形，粉質，細膩潔白，質老或干燥過程不適宜者呈灰白色或顯黃色紋。無臭，味辛辣，嚼之發粘、麻舌而刺喉。

以個大、皮淨、色白、質堅實、粉性足者為佳。個小、去皮不淨、色黃白、粉性小者質次。其未去外皮、發霉變色者不可入藥。

【炮炙】 生半夏 揀去雜質，篩去灰屑即得。

法半夏 取淨半夏，用涼水浸漂，避免日晒，根據其產地、質量及其大小斟酌調整浸泡日數。泡至10日後，如起白沫時，每半夏100斤加白礬2斤，泡一日後再進行換水，至口嘗無麻辣感為度，取出略晾。

另取甘草碾成粗塊，加水煎湯，用甘草湯泡石灰塊，再加水混合，除去石灰渣，倒入半夏缸中浸泡，每日攪拌，使其顏色均勻，至黃色已浸透、內無白心為度。撈出，陰干即得。

每半夏100斤，用白礬2斤、甘草16斤、石灰塊20斤。

姜半夏 取揀淨的半夏，照上述法半夏項下的方法浸泡至口嘗無麻辣感後，另取生薑切片煎湯，加白礬與半夏共煮透，取出，晾至六成干，悶潤後切片，陰干即得。

每半夏100斤，用生薑25斤、白礬12斤8兩（夏季用14斤8兩）。

清半夏 取揀淨的半夏，照上述法半夏項下的方法浸泡至口嘗無麻辣感後，加白礬與水共煮透，取出，晾至六成干，悶潤後切片，陰干即得。

每半夏100斤，用白礬12斤8兩（夏季用14斤8兩）。

【性味】 辛，溫；有毒。

【功能】 燥濕化痰，降逆止嘔。

【主治】 濕痰冷飲，嘔吐，咳喘，胸膈脹滿，中風痰厥，風痰頭暈，頭痛，不眠；外消腫痛。

【用法與用量】 一至三錢，一般炮炙後用；外用生者適量，研末塗敷患處。

【注意】 孕婦內服宜慎；反烏頭、草烏。

【貯藏】 置通風干燥處，防蟲蛀。

玉 竹

Yùzhú

RHIZOMA POLYGONATI OFFICINALIS

【來源】 本品為百合科(Liliaceae)植物玉竹(*Polygonatum officinale* All.)的干燥地

下根状茎。栽培或野生，产于河北、江苏、辽宁、湖南、浙江等地。春、秋二季采挖，除去茎苗、须根和泥土，晾晒至外表有粘液渗出，轻刮去毛，分开大小个，继续晾晒至由白色微变黄色，进行揉搓，晾晒，如此反复揉搓晾晒至无硬心后，晒干即得。或将鲜玉竹经蒸透后，边晒边揉，至于即得。

【鉴别】本品呈细长圆柱形或略扁，多不分枝，长2—5寸，直径1—3分。表面淡黄色或淡黄棕色，半透明，具纵皱纹及微隆起的环节，节上须根已除去，残留白色圆形小点，偶有圆盘状的地上茎痕迹。干燥者质硬而脆，易折断，断面角质样，受潮则变柔软。无臭，味甘而有粘性。

以条长、肉肥、黄白色、光泽柔润者为佳。

【炮炙】拣去杂质，洗净，捞出，闷润至内外湿度均匀，切片，干燥即得。

【性味】甘，平。

【功能】补中，润燥，除烦，止渴。

【主治】热病伤阴，咳嗽烦渴，虚劳发热，消谷易饥。

【用法与用量】一钱五分至三钱。

【贮藏】置通风干燥处，防潮及虫蛀。

甘 松

Gānsōng

RHIZOMA NARDOSTACHYOS

【来源】本品为败酱科(Valerianaceae)植物甘松香(*Nardostachys chinensis* Batal.)的干燥根状茎及根。均系野生，主产于四川等地。秋季采挖，除去地上残茎、须根及泥土，不用水洗，直接晒干或阴干即得。

【鉴别】本品略呈圆锥形，多弯曲如虾，长2—4寸，外层棕褐色或黑棕色，内层棕色至黄色，呈狭长膜质片状或纤维状。上端具有棕色的茎叶残基。主根呈条柱形，单一或数股交结，直径1—3分，表面皱缩，呈棕褐色，常裂成片状。质松。有特殊芳香气，味微甜而带苦。

以主根肥壮、芳香气浓、条长、无破碎末及泥沙者为佳。

【炮炙】拣去杂质，筛去泥屑即得。

【性味】甘，温。

【功能】 理气，醒脾，散寒，燥湿。

【主治】 寒湿内阻，心腹胀痛；外治牙疳龋齿，脚气浮肿。

【用法与用量】 八分至一钱五分；外用适量，泡汤漱口或研末敷患处，或煎汤洗脚。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防潮。

甘 草

Gāncǎo

RADIX GLYCYRRHIZAE

【来源】 本品为豆科(Leguminosae)植物甘草(*Glycyrrhiza uralensis* Fisch.)的干燥根及地下根状茎。均系野生。产于我国华北、东北和西北等地。秋季采挖，除去茎基的幼芽、枝、须根等，切成适当长短，晒至半干，打成小捆，晒干即得。去皮的甘草，一般习称为“粉草”。

【鉴别】 本品根呈圆柱形，不分枝，长1—4尺，直径0.2—1寸。带皮的甘草，其外皮松紧不等，显红棕色、棕色或灰棕色，具显著的皱纹、沟纹及稀疏的细根痕，两端切面平齐，切面中央稍陷下。质坚实而重，断面纤维性，黄白色，有粉性，有一明显的环纹和菊花心，常形成裂隙。微具特异的香气，味甜而特殊。根状茎形状与根相似，但表面有芽痕，横切面中央有髓。

“粉草”外表平坦，淡黄色，纤维性，有纵裂纹。

带皮甘草以外皮细紧、有皱沟、红棕色、质坚实、粉性足、断面黄白色者为佳。外皮粗糙、灰棕色、质松、粉性小、断面深黄色者质次。其外皮棕黑色、质坚硬、断面棕黄色、味苦者不可入药。

“粉草”较带皮甘草为佳。

【炮炙】 甘草 拣去杂质，洗净，用水浸泡至约八成透时，捞出，润透后切片，干燥即得。

蜜炙甘草 取甘草片，加炼熟的蜂蜜与开水少许，拌匀，稍闷，置锅内用文火炒至变为深黄色、不粘手为度，取出，放凉即得。

每甘草片100斤，用炼熟蜂蜜25—30斤。

【性味】 甘，平。

【功能】 和中缓急，润肺，解毒，调和诸药。

【主治】 脾虚食少便溏，劳倦发热，脘痛，口渴，咳嗽，心悸，咽喉肿痛，疮疡，中毒。

【用法与用量】 五分至三钱。

【注意】 反大戟、芫花、海藻、甘遂。

【贮藏】 置通风干燥处，防虫蛀。

甘 遂

Gānsuǐ

RADIX EUPHORBIAE KANSUI

【来源】 本品为大戟科(Euphorbiaceae)植物甘遂(*Euphorbia* sp.)的干燥根。均系野生，主产于陕西、山西、河南等地。春季开花前或秋末茎苗枯萎后采挖，除去外皮，以硫磺熏后晒干即得。

【鉴别】 本品呈连珠状纺锤形、长椭圆形或不规则的棒状，长形的略弯曲或扭曲，长1—2寸，直径2—5分。表面洁白或黄白色，常有未去净的外皮残留，显棕色斑点。质轻，易折断，断面白色，粉性，中心部微显黄色。无臭，味微甘，有刺激性。

以肥大饱满、表面洁白或黄白色、细腻、断面粉性足、无纤维者为佳。

【炮炙】 醋甘遂 拣去杂质，用醋拌匀，置锅内用文火炒至微干，取出，晾干即得。

每甘遂100斤，用醋30—50斤。

煮甘遂 拣去杂质，用水漂净，捞出，与豆腐共煮透，取出，晒至八成干，切碎，晒干即得。

每甘遂100斤，用豆腐50斤。

【性味】 苦，寒；有毒。

【功能】 通利二便，下水逐痰。

【主治】 水肿腹满，水蠱喘胀，癥瘕积聚，痰迷癰瘤，二便不通。

【用法与用量】 二至五分，炮炙后用，多入丸散服。

【注意】 孕妇忌用；反甘草。

【贮藏】 置通风干燥处，防虫蛀。

艾 叶

Àiyè

FOLIUM ARTEMISIAE ARGYI

【来源】 本品为菊科(Compositae)植物艾(*Artemisia argyi* Levl. et Vant.)的干燥

叶。栽培或野生，全国大部分地区多有生产。春、夏二季花未开、叶茂盛时采摘，晒干或阴干即得。

【鉴别】 本品多皱缩破碎，有短柄。叶片略呈羽状分裂，裂片边缘有不规则的粗锯齿。正面灰绿色，生有软毛，背面密生灰白色绒毛。质柔软。气清香，味微苦、辛。

以背面灰白色、绒毛多、香气浓郁、无杂质者为佳。

【炮炙】 艾叶 拣去杂质，去梗，筛去灰屑即得。

艾炭 取拣净的艾叶，置锅内用武火炒至七成变黑色，用醋喷洒，拌匀后过铁丝筛，未透者重炒，取出，晾凉，防止复燃，三日后贮存。

每艾叶 100 斤，用醋 15 斤。

【性味】 苦、辛，温。

【功能】 理气血，逐寒湿，止血，温经，安胎。

【主治】 腹中冷痛，久病下血，吐衄，妇女月经不調，崩漏带下，宫冷不孕，胎动不安；外治疥癣。

【用法与用量】 一至三钱；外用适量，煎汤洗；捣绒作炷，用以灸火。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

石 决 明

Shíjuémíng

CONCHA HALIOTIDIS

【来源】 本品为鲍科(Haliotidae)动物九孔鲍(*Haliotis diversicolor* Reeve)或盘大鲍(*Haliotis gigantea discus* Reeve)的贝壳。前者习称“光底石决明”，后者习称“毛底石决明”。均系野生，产于广东、山东、辽宁等地。夏、秋二季捕捉，挖去肉，取贝壳洗去粘附的杂质，晒干即得。

【鉴别】 光底石决明 为卵圆半球形贝壳，从内面观略呈耳形，大小不一，一般长 1—2.5 寸，宽 0.7—1.6 寸。壳外表面呈灰棕色，洁净，略平滑，具右旋的螺旋状纹理。壳顶钝，略凸出，从近壳顶处向右排列有多数由小渐大的疣状突起，末端 8—9 个特别大，且开口内外相通，孔口与壳面平，故又习称“九孔石决明”。壳内表面显珍珠样彩色光泽。质坚硬，不易破碎。无臭，味微咸。

毛底石决明 与前者相似，一般长 1.6—4 寸，宽 1—2.5 寸。壳的外表面呈灰棕色或灰黄色，常附有苔藓类或石灰虫等杂质，而呈绿色或棕色，凹凸不平，极为粗糙，肋状纹理

不明显,疣状突起数目较少,末端4—5个开口,孔口突出于壳面。质地、气味均与光底石决明同。

均以个大整齐、壳厚、外皮洁净、壳内有珍珠彩色者为佳。

【炮炙】 石决明 用水洗刷净,晾干,敲碎如豆粒大,即得。

煅石决明 取刷净的石决明,置无烟的炉火上或坩埚内煅烧,内服的煅至灰白色,外用的煅至白色,取出,晾凉,碾碎即得。

盐石决明 取刷净的石决明,置无烟的炉火上煅至微红,取出,喷淋盐水,碾碎即得。

每石决明100斤,用盐2斤8两加适量开水化开澄清。

【性味】 咸,平。

【功能】 平肝潜阳,除热明目。

【主治】 肝风眩晕,青盲内障,骨蒸劳热。

【用法与用量】 三钱至一两。

【贮藏】 置干燥处。

石 韦

Shīwěi

HERBA PYRROSIAE

【来源】 本品为水龙骨科 (Polypodiaceae) 植物庐山石韦 (*Pyrrosia shearerii* (Bak.) Ching) 或有柄石韦 (*Pyrrosia petiolosa* (Christ) Ching) 的干燥地上部分。前者习称大叶石韦,后者习称小叶石韦。均系野生,主产于江苏、浙江、河南、河北、湖北等地。春、夏、秋三季均可采收,除去根状茎及须根,洗去泥土,阴干或晒干即得。

【鉴别】 大叶石韦 具圆柱形长叶柄,长3—7寸,直径约1.5分,上面有一纵沟,无毛。叶片多皱缩卷曲,展平后呈披针形,长4—7寸,宽1—1.5寸。叶端渐尖,基部楔形、圆形、心形、或耳形,且不对称,全缘,正面黄绿色或灰棕色,散布有黑色圆形小凹点,背面密生红棕色的绒毛,有的叶片具棕色圆点状的孢子囊群,与中脉约呈60°角平行排列,分布几近整个叶面。叶片厚革质,硬而脆,易破碎。无臭,味微苦。

小叶石韦 形状与大叶石韦相似,惟全体较细小。叶柄长约2寸,直径约0.5分,上有一浅纵槽,内生密毛。叶片多卷曲呈筒形,展平后呈披针形,长1—2寸,宽约1寸,先端及基部均呈尖形,全缘,下表面密生粉棕色毛,其颜色、质地、气味多与大叶石韦类同。

均以叶厚、完整、纯净者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，用水喷润，去毛，切段，晒干即得。

【性味】 苦、甘，微寒。

【功能】 利水通淋，清肺泄热。

【主治】 小便不通，淋痛，崩漏，气热咳嗽。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置干燥通风处，防潮。

石 莲 子 (甜石莲)

Shíliánzi

FRUCTUS NELUMBINIS

【来源】 本品为睡莲科(Nymphaeaceae)植物莲(*Nelumbo nucifera* Gaertn.)的干燥成熟果实。均系栽培，主产于湖南、湖北、福建、江苏、浙江等地。收集坠入水中沉于泥内的果实，洗净，晒干；或秋末冬初莲房干枯时，割下莲房，取出果实，选择黑色坚硬者即得。

【鉴别】 本品呈椭圆形或卵圆形，两头略尖，长4—5分，直径2—3分。外皮灰黑色，表面平滑，密生浅色小点，一端有小圆孔，另一端有小短柄，小柄旁边有圆形小突起。质坚硬，不易破开，内有一椭圆形种子，即莲子，种皮红褐色，不易剥离。种子的一端具突起的帽状物，种仁两瓣，淡黄白色，显粉性，中间有一绿色莲子心。种仁无臭，味甘淡、微涩。

从色黑、饱满、质重者为佳。

【炮炙】 石莲肉 砸开，去皮去心，取净肉即得。

【性味】 甘，平，滑。

【功能】 清心，开胃。

【主治】 噤口痢。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置干燥处。

石 斛

Shíhú

HERBA DENDROBII

【来源】 本品为兰科(Orchidaceae)石斛属(*Dendrobium*)植物的新鲜或干燥茎。野生

或栽培，产于四川、贵州、广西、广东、云南、湖北等地。全年均可采收，以春末夏初和秋季采者为佳。鲜用者采取后除去泥沙即得；干用者去净根、叶，蒸透或烤软后，除去粗皮，晒干或烘干即得。

【鉴别】 本品因品种及加工方法不同，通常分为鲜石斛、石斛、扁石斛、细石斛及耳环石斛。

鲜石斛 下有须状根，圆柱形，茎丛生直立，高约1尺许，圆形或扁圆形。青绿色或稍浅，节明显，色略深，节上生有薄膜状叶鞘，表面光滑或有纵纹。质肥嫩多汁，易折断，断面青绿色。无臭，味微苦，嚼之有粘性，口中生沫。

以青绿色、肥满多汁、嚼之发粘者为佳。

石斛 呈长圆柱形，长约尺许，直径2—3分。金黄色或黄中带绿色，节间较短，表面纵皱纹显著。质脆而有弹性，断面不平坦，黄白色。无臭，味微苦，嚼之微粘。

以条长、肥满、质脆、色鲜艳、无根及叶鞘者为佳。

扁石斛 呈扁圆柱形。中部粗而宽，较干石斛略短，直径3—5分。金黄色或黄中带绿色，外皮光亮，有纵皱纹，节明显，顶端的一节扁平而膨大。质硬而脆，断面较平坦，灰白色。无臭，味苦。

以条长、肥满、质脆、色鲜艳、无根及叶鞘者为佳。

细石斛 呈细长圆柱形，多弯曲盘绕成团，直径约1分。节间短，为3—5分，节不明显。表面金黄色，光亮，有微细纵皱纹。质柔韧，断面较平坦。无臭，味淡。

以金黄色、茎细、质柔韧者为佳。

耳环石斛 形小而卷曲，呈螺旋形重叠的环状，长3—5分，直径约1分。金黄色或黄绿色。基部微带须根，习称“龙头”。茎末稍细，无剪口，习称“凤尾”。中部较粗，全体具细而密的纵皱纹，节不明显。质坚硬，断面较平坦。无臭，味淡，嚼之有粘性。

以肥满、色鲜艳、有龙头凤尾、嚼之易碎而发粘者为佳。

【炮炙】 取干燥的石斛，用水泡约至八成透，闷润，除去残根，拣去黑枝，切段，撞去薄膜，干燥即得。

【性味】 甘、淡、微咸，寒。

【功能】 滋阴除热，生津止渴。

【主治】 热病伤津，口干烦渴，病后虚热。

【用法与用量】 二至四钱。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮；鲜石斛置阴凉潮湿处。

石 菖 蒲

Shíchāngpǔ

RHIZOMA ACORI GRAMINEI

【来源】 本品为天南星科 (Araceae) 植物石菖蒲 (*Acorus gramineus* Soland.) 的干燥根状茎。均系野生, 主产于四川、浙江等地。秋季采挖, 除去泥土及须根, 晒干即得。

【鉴别】 本品呈扁圆柱形, 稍弯曲, 两侧有时具长短不等的分枝或分枝痕, 长3—6寸, 直径约3分。表面灰棕色或棕褐色, 外皮粗糙, 多环节, 疏密不匀, 节间长1—2分, 一面具叶痕, 略呈扁三角形, 左右交互配列, 节处有时有叶基呈细须状残存, 另一面具圆疤状的根痕, 有纵皱。质硬而脆, 易折断, 断面纤维性, 淡红色或白色, 有一不显著的环纹。气芳香, 味微辛。

以条长而粗壮、坚实、表面无毛须、断面白色、纤维性强者为佳。

【炮炙】 拣去杂质, 用水浸泡, 润透后切片, 晒干即得。

【性味】 辛, 温。

【功能】 开窍, 逐痰, 益智, 散风, 去湿, 宽中开胃, 解毒杀虫。

【主治】 癫痫风疾, 痰厥昏迷, 健忘多梦, 风寒湿痹, 气闭耳聋, 下痢噤口; 外治痈疽、湿疮。

【用法与用量】 八分至一钱五分; 外用适量, 研末涂敷患处。

【贮藏】 置阴凉干燥处, 防生霉。

石 楠 叶

Shínányè

FOLIUM PHOTINIAE

【来源】 本品为蔷薇科 (Rosaceae) 植物石楠 (*Photinia serrulata* Lindl.) 的干燥叶。均系野生, 产于江苏、浙江等地。全年皆产, 采摘后, 晒干, 扎成小把即得。

【鉴别】 本品呈长圆形, 长2—4寸, 宽0.6—1寸。叶柄长约寸许, 叶边缘有细密尖锐的锯齿。正面红棕色或暗棕色, 背面色稍浅, 主脉突起极明显, 两面均平滑无毛。叶较

厚，革质而脆。无臭，味苦而涩。

以棕黄色、无杂质者为佳。

【炮炙】 用水洗净，微浸捞出，切丝，干燥即得。

【性味】 辛、苦，平。

【功能】 祛风，补肾。

【主治】 肾虚脚弱，风痹腰背疼痛。

【用法与用量】 一钱五分至三钱，

【贮藏】 置通风干燥处。

石 膏

Shígāo

GYPSUM FIBROSUM

【来源】 本品为含水硫酸钙的矿石。主产于湖北、山东、山西、四川、贵州及甘肃等地。挖出后，除去泥土及杂石即得。

【鉴别】 本品为长块状或不规则纤维状的结晶聚合体，大小不一。全体白色，常附有青灰色或灰黄色片状杂质。体重质松，易分成小块，纵断面具纤维状纹理，并有绢丝样光泽。无臭，味淡。

以色白、块大、质松、表面如丝、无杂石者为佳。

【炮炙】 生石膏 去净杂石，洗净泥土，打碎成小块即得。

煅石膏 取净石膏块，置坩埚内，在无烟火中煅至酥松状，取出，放凉，打碎即得。

【性味】 甘、辛，大寒。

【功能】 生用解肌清热，生津止渴；煅敷生肌敛疮。

【主治】 壮热神昏，谵语狂躁，口渴咽干，肺热喘急，中暑自汗，胃火头痛，牙痛，热毒壅盛，发斑，发疹；外治痈疽疮疡溃烂不敛。

【用法与用量】 内服多用生石膏，三钱至一两，煎汤大剂可用六至八两；外用多用煅石膏，研末掺敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

石 榴 皮

Shíliú pí

PERICARPIUM GRANATI

【来源】 本品为石榴科(Punicaceae)植物石榴(*Punica granatum* L.)的干燥果皮。均系栽培,主产于江苏、湖南、四川等地。果实将成熟时采摘,剥取果皮,或于食用石榴时剥取果皮,晒干即得。

【鉴别】 本品呈瓢形或不规则的片状,大小不一,厚0.5—1分。外表面呈红棕色、棕黄色或棕紫色,粗糙,有麻点。顶端有筒状的突起,直径3—4分,高3—4分,边缘5—8裂,底部有粗壮的短果柄。内面呈黄色或红棕色,有隔瓢及种子脱落后的小凹坑,凹凸不平。质硬而脆,易碎,断面鲜黄色。无臭,味苦涩。

以块大、皮厚、红棕色、整洁者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,去净残留的内瓢及子,用水洗净,捣碎或切小块,晒干即得。

【性味】 酸,温,滞。

【功能】 泻肠,止血。

【主治】 泻痢,滑精,便血,脱肛,血崩,带下。

【用法与用量】 八分至一钱五分。

【贮藏】 置通风干燥处,防潮。

龙 齿

Lóngchǐ

DENS DRACONIS

【来源】 本品为古代哺乳动物如象类、犀牛类、三趾马等的牙齿化石。主产于河南、河北、山西及内蒙古等地。挖出后,除去泥土,敲去牙床即得。

【鉴别】 本品呈完整的齿状或破碎成不规则的块状。可分为犬齿及臼齿。犬齿呈圆锥形,先端较细或略弯曲,直径约1寸,近尖端处常中空。臼齿呈圆柱形或方柱形,略弯曲,一端较细,一般长1至数寸,直径约1寸,多有深浅不同的沟棱。其中呈青灰色或暗棕色

者,习称“青龙齿”,质地较坚硬,呈黄白色者习称“白龙齿”,质地坚硬。有的表面尚可见具光泽的珧琅质。断面粗糙,凹凸不平,或有不规则的突起棱线,有吸湿性。无臭,无味。

以不带牙床、吸湿力强者为佳。

【炮炙】 龙齿 刷净泥土,打碎即得。

煅龙齿 取刷净的龙齿,在无烟的炉火上或坩埚内煅红透,取出,晾凉,碾碎即得。

【性味】 甘,凉,滑。

【功能】 镇惊安神,除烦热。

【主治】 惊痫,癫狂,烦热不安,失眠多梦。

【用法与用量】 三至五钱。

【贮藏】 置干燥处。

龙 胆

Lóngdǎn

RADIX GENTIANAE

【来源】 本品为龙胆科(Gentianaceae)植物龙胆(*Gentiana scabra* Bge.)或三花龙胆(*Gentiana triflora* Pall.)的干燥根部。均系野生,产于黑龙江、辽宁、吉林、江苏、浙江等地。春、秋二季均可采挖,以秋末产者为佳,挖取根部,除去地上残茎,洗净泥土,晒干即得。

【鉴别】 本品顶端有小形根头,其下丛生数十条细根,根细长而直或稍弯曲,长3—6寸,直径0.5—1分。表面黄色或黄棕色,上部密生隆起的环纹,全体有纵皱。质脆,易折断,断面类圆形或类三角形,周边弯曲,黄白色或黄棕色,中心有数个筋脉花点。无臭,味极苦。

以根条粗长、黄色或黄棕色、无碎断者为佳。根条细短及根条少、色红黄者质次。

【炮炙】 拣去杂质,除去残茎,洗净,润透后切段,干燥即得。

【性味】 大苦,大寒。

【功能】 泻肝胆实火,除下焦湿热。

【主治】 目赤,咽喉,黄疸,惊痫,阴囊肿痛,阴部湿痒。

【用法与用量】 八分至一钱五分。

【贮藏】 置干燥处。

龙 骨

Lónggǔ

OS DRACONIS

【来源】 本品为古代哺乳动物如象类、犀牛类、三趾马等的骨骼化石。产于河南、河北、山西、内蒙古等地。挖出后除去泥土及杂质即得。五花龙骨质酥脆，出土后，露置空气中极易破碎，常用毛边纸粘贴。

【鉴别】 药材中常分为两类：

五花龙骨 呈不规则块状，大小不一。全体淡黄白色，夹有蓝灰色及红棕色的花纹，深浅粗细不同。表面平滑，时有小裂隙。质硬而脆，易片片剥落而散碎。吸湿性强，以舌舐之有吸力。无臭，无味。

以质脆、分层、有蓝灰、红、棕等色的花纹、吸湿力强者为佳。

龙骨 呈不规则的块状，大小不一。表面白色、灰白色或黄白色，多较光滑，有的具纹理与裂隙，或具棕色条纹和斑点。质硬断面不平坦，色白、细腻如粉质。在关节处有多数蜂窝状小孔。吸湿力亦强。无臭，无味。

以质硬、色白、吸湿力强者为佳。

以上两类，五花龙骨较一般龙骨为优。

【炮炙】 龙骨 刷净泥土，打碎即得。

煅龙骨 取刷净的龙骨，在无烟的炉火上或坩埚内煅红透，取出，晾凉，碾碎即得。

【性味】 甘，平，滑。

【功能】 镇惊安神，收敛精气；外用生肌敛疮。

【主治】 怔忡，多梦，遗精，自汗，惊痫，妇女赤白带下；外治脱肛、衄血、脐疮、溃瘍、阴囊湿痒。

【用法与用量】 三至五钱；外用适量，研末吹敷患处。

【贮藏】 置干燥处，防潮。

龙 眼 肉（桂圆肉）

Lóngyǎnròu

ARILLUS LONGANAE

【来源】 本品为无患子科(Sapindaceae)植物龙眼(*Euphoria longan*(Lour.) Steud.)

的假种皮。均系栽培，主产于福建、广西、广东、四川等地。7—10月果实成熟时采摘，选取质量好的果实直接晒干或烘干，然后剥皮去核，取肉晒至干爽不粘时即得。

【鉴别】本品为纵向破裂的不规则片状，长4—5分，铺平后宽8—9分。棕黄色，半透明，一面皱缩不平，一面光亮而有细顺皱纹。质柔润而有光泽，略粘，常数块粘在一起。微有香气，味浓甜而特殊。

以片大、肥厚、油润、棕黄色、味甜者为佳。

【炮炙】拣净杂质及残留的核、壳即得。

【性味】甘，温。

【功能】益脾长智，养心补血。

【主治】健忘，失眠，惊悸。

【用法与用量】一至三钱。

【贮藏】置通风干燥处，防热及虫蛀。

北 沙 参

Běishāshēn

RADIX GLEHNIAE

【来源】本品为繖形科(Umbelliferae)植物珊瑚菜(*Glehnia littoralis* Fr. Schm.)的干燥根。多系栽培，产于山东、辽宁等地。秋季采挖，除去地上部分及须根，洗净泥土，略晾，置沸水中烫后去皮，及时晒干或烘干即得。

【鉴别】本品呈细长圆柱形，中间较粗，两头细，长0.6—1尺，直径0.5—2分。表面淡黄白色，略粗糙，全体有细纵皱纹或纵沟，并有棕黄色或黄白色点状的须根疤痕，根头渐尖，颈细，有的略带棕黄色茎基。质紧密而脆，易折断，断面细腻，中间有黄色圆心。无臭，味甘。

以细长均匀、圆柱形、质坚实、色白、味甘者为佳。条粗、质较松、色棕黄者质次。条小未去外皮者不宜入药。

【炮炙】拣去杂质，除去茎基，洗净，略润，切段，干燥即得。

【性味】甘、苦，微寒。

【功能】清肺泻火，养阴止嗽。

【主治】阴虚肺热干咳，热病伤津，舌干口渴。

【用法与用量】 一錢五分至三錢。

【注意】 反藜芦。

【貯藏】 置通風干燥处,防虫蛀。

生 姜

Shēngjiāng

RHIZOMA ZINGIBERIS RECENS

【来源】 本品为姜科(Zingiberaceae)植物姜(*Zingiber officinale* Rosc.)的新鲜地下根状茎。均系栽培,主产于四川、广东、山东、陕西等地。夏季采挖,除去茎叶及须根,洗净泥土即得。

【鉴别】 本品呈扁平不规则的块状,并有指状分枝,各枝顶端有茎痕或芽。表面黄白色或灰白色,有光泽,具浅棕色环节。质脆,折断后有汁液渗出,断面浅黄色,有一明显环纹,中间稍现筋脉。气芳香而特殊,味辛辣。

以块大、丰满、质嫩者为佳。

【炮炙】 鲜生姜 拣去杂质,洗净泥土,用时切片即得。

鲜姜粉 取新鲜生姜,洗净,捣烂,压榨取汁,静置,分取沉淀的粉质,晒干或低温干燥即得。

【性味】 辛,温。

【功能】 发表,散寒,止呕,开痰。

【主治】 感冒风寒,呕吐,痰饮,喘咳,脘满;解半夏、天南星及鱼、蟹、鸟兽肉毒。

【用法与用量】 一至三钱。

【貯藏】 置阴凉潮湿处;或埋入砂箱内,防冻。

冬 瓜 子

Dōngguāzǐ

SEMEN BENINCASAE

【来源】 本品为葫芦科(Cucurbitaceae)植物冬瓜(*Benincasa hispida* Cogn.)的干燥

成熟种子。均系栽培，全国大部分地区多有生产。食用冬瓜时，掏去瓜瓤，取出种子，洗净，晒干即得。

【鉴别】 本品呈扁平的长椭圆形或长卵形，长约3分，宽约2分。外皮黄白色，有时具裂纹，一端尖形，尖端有两个小突起，另一端钝圆，边缘光滑（单边冬瓜子），或两面边缘均有环形薄边（双边冬瓜子）。去皮后可见乳白色种仁，有油性。无臭，味微甜。

以粒饱满、色白者为佳。

【炮炙】 冬瓜子 拣去杂质，洗净，晒干即得。

炒冬瓜子 取净冬瓜子，置锅内用文火微炒至黄白色，取出，放凉即得。

【性味】 甘，微寒。

【功能】 清热，润肺。

【主治】 痰热咳嗽，消渴，烦满，肠痈，肺痈。

【用法与用量】 二至四钱。

【贮藏】 置通风干燥处，防虫蛀及鼠咬。

冬 瓜 皮

Dōngguāpí

EPICARPIUM BENINCASAE

【来源】 本品为葫芦科(Cucurbitaceae)植物冬瓜(*Bemncasa hispida* Cogn.)的干燥外层果皮。均系栽培，全国大部分地区多有生产。食用冬瓜时，削取外皮，晒干即得。

【鉴别】 本品呈不规则的片状，多向内卷曲，大小不一。表面灰绿色或黄白色，革质，被有白霜。内壁平坦，微有筋脉。质脆。无臭，味淡。

以皮薄条长、颜色灰绿、洁净者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，筛去泥土，剪成小块即得。

【性味】 甘，微寒。

【功能】 行水消肿。

【主治】 水肿。

【用法与用量】 三钱至一两。

【贮藏】 置通风干燥处。

冬虫夏草

Dōngchóngxiàcǎo

CORDYCEPS

【来源】 本品为肉座菌科(Hypocreaceae)植物冬虫夏草菌(*Cordyceps sinensis* (Berk.) Sacc.)寄生在鳞翅类昆虫幼虫上的菌座及幼虫尸体的干燥物。均系野生,主产于四川、青海、贵州、云南等地。5—6月间挖出虫体及菌座,刷去泥土,烘干或晒干即得。

【鉴别】 本品为虫体与菌座相连而成,全长3—4寸。虫体形似蚕,长1—2寸,直径1—2分。表面深黄色,粗糙,背部有多数横皱纹,腹面有足8对,位于虫体中部的4对明显易见。断面内心充实,白色,略发黄,周边显深黄色。菌座自虫体头部生出,呈棒状,弯曲,上部略膨大。表面灰褐色或黑褐色,长可达2寸,直径约1分。折断时内心空虚,粉白色。臭微,味淡。

以虫身色黄发亮、丰满肥壮、断面黄白色、菌座短小者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,筛去泥屑即得。

【性味】 甘、温。

【功能】 保肺补肾,秘精益气。

【主治】 虚劳咳嗽,咯血多汗,阳痿遗精,腰膝痠疼。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置阴凉干燥处,密闭保存,防潮及虫蛀。

仙 茅

Xiānmáo

RHIZOMA CURCULIGINIS

【来源】 本品为石蒜科(Amaryllidaceae)植物仙茅(*Curculigo orchioides* Gaertn.)的干燥地下根状茎。均系野生,主产于四川、云南、贵州等地。2—4月发芽前或7—9月苗枯萎时采挖,除去须根和根头,洗净泥土,晒干即得。

【鉴别】 本品呈圆柱形,略弯曲,长1—3寸,直径1—2分。表面棕褐色或黑褐色,外

— 77 —

皮粗糙，有細孔狀的須根殘痕及縱橫皺紋。質堅硬，易折斷，斷面不平坦，淡褐色或棕褐色，靠近中心處色較深。微有辛香氣，味微苦、辛。

以條粗、質堅、外表黑褐色者為佳。

【炮炙】 仙茅 揀去雜質，洗淨，干燥即得。

酒仙茅 取淨仙茅，用黃酒拌勻，潤透後，置鍋內，微炒至干，取出，晾干即得。

每仙茅 100 斤，用黃酒 10—20 斤。

【性味】 辛，溫；有小毒。

【功能】 補腎陽，壯筋骨。

【主治】 陽痿精冷，小便失禁，心腹冷氣，腰腳冷痺。

【用法與用量】 一至三錢。

【貯藏】 置干燥處，防虫蛀。

仙 鶴 草

Xiānhècǎo

HERBA AGRIMONIAE

【來源】 本品為薔薇科(Rosaceae)植物龍芽草(*Agrimonia pilosa* Ledeb.)的干燥地上部分。均為野生，主產于江蘇、浙江、福建等地。夏、秋二季莖葉茂盛時割取地上部分，除去雜質及泥土，晒干即得。

【鑒別】 本品莖挺直，上部多分枝，長 1—2.5 尺，全體有白色柔毛。莖粗 1—1.5 分，下部紅棕色，呈圓柱形，上部黃棕色，呈方柱形，四面略內陷。通體有縱溝及稜綫，有節，上疏下密。質稍堅韌，易折斷，斷面中空。葉為互生的奇數羽狀復葉。葉片有大小二種，間隔生于總葉柄上，呈卵形，邊緣具齒，黃綠色或紫紅色，多皺縮。質脆易碎。無臭，味微苦、澀。

以莖紅棕色、質嫩、葉多者為佳。

【炮炙】 揀去雜質，洗淨，潤透後，除去殘根，切段，干燥即得。

【性味】 苦、辛，平。

【功能】 止血。

【主治】 吐血，咳血，尿血，便血。

【用法與用量】 二至四錢。

【貯藏】 置通風干燥處。

白 及

Báiji

RHIZOMA BLETILLAE

【来源】 本品为兰科(Orchidaceae)植物白及(*Bletilla striata* (Thunb.) Reichb. f.)的干燥块茎。野生或栽培,产于贵州、四川、浙江、湖南等地。秋、冬二季采挖,洗净泥土,除去残茎及须根,经蒸煮至内面白心,然后撞去粗皮再晒干即得。

【鉴别】 本品略呈掌状,扁平,有2—3个分叉,长0.5—1.5寸,厚1.5—3分。表面黄白色,角质状,有细皱纹,上面有凸起的圆疤状茎痕,下面有连接另一块茎的痕迹,以茎痕为中心,周围有棕褐色同心环纹,其上有棕色小点状的须根残痕。质坚硬,不易折断,横切面黄白色,半透明角质状。无臭,味苦有粘性。

以个大肥厚、色白半透明、质坚实、无须根者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,用水浸泡,捞出,晾至湿度适宜,切片,干燥即得。

【性味】 苦、甘,微寒,滑。

【功能】 补肺、止血,生肌,敛疮。

【主治】 肺伤咳血,鼻衄;外治金疮出血,汤火灼伤,手足皲裂。

【用法与用量】 八分至一钱五分;外用适量,研末敷患处。

【注意】 反乌头、草乌。

【贮藏】 置通风干燥处。

白 朮

Báizhú

RHIZOMA ATRACTYLODIS ALBA

【来源】 本品为菊科(Compositae)植物白朮(*Atractylodes macrocephala* Koidz.)的干燥地下根状茎。多系栽培,产于浙江、湖北、湖南、江西等地。霜降至立冬时,待下部叶枯黄、上部叶变脆易折断时挖起全株,除去茎叶和泥土,烘干或晒干,除去须根即得。烘者习称“烘朮”,晒者习称“生晒朮”。

【鉴别】本品为肥厚的拳状团块，长2—3寸，中部直径1寸左右。表面灰棕色或灰黄色，外皮撞掉处显白色斑纹，下部两侧膨大习称“云头”，往上则渐细，全身多有瘤状突起及断续的纵皱和沟纹，并有须根痕，顶端具茎基残迹或芽痕。质坚硬，不易折断，断面不平，外圈黄白色，中间色较深，略有菊花纹及棕黄色油点，微显油性。烘干的白朮或呈角质，断面色较深或有裂隙。气清香，味甘微辛，嚼之略带粘液性。

以个大、身长、有云头、体重、结实、无空心、断面黄白色者为佳。个小、无云头、断面色棕红、裂隙大者质次。

【炮炙】白朮 拣去杂质，用水浸泡，浸泡时间应根据季节、气候变化及白朮大小适当掌握，捞出，晾晒，润透后及时切片，干燥即得。

炒白朮 将麸皮撒于加热的锅内，俟烟冒出，加入白朮片，微炒至变为淡黄色，取出，筛去麸皮即得。

每白朮片100斤，用麸皮10斤。

焦白朮 取白朮片，置锅内用武火炒至焦黄色，喷淋清水，取出，晾干即得。

土炒白朮 取伏龙肝细粉，置锅内炒热，加入白朮片，炒至外面挂有土色，取出，筛去土，放凉即得。

每白朮片100斤，用伏龙肝细粉20斤。

【性味】甘、苦、温。

【功能】补脾，燥湿，和中。

【主治】脾虚劳倦，食少，泄泻，水肿，痰饮，自汗。

【用法与用量】一钱五分至三钱。

【贮藏】置阴凉干燥处，防虫蛀。

白头翁

Báitóuwēng

RADIX PULSATILLAE

【来源】本品为毛茛科(Ranunculaceae)植物白头翁(*Pulsatilla chinensis* (Bge.) Regel)的干燥根部。均系野生，产于内蒙古、辽宁、河北等地。春季开花前采挖，除去茎苗，保留根头部白色毛茸，去净泥土，晒干即得。

【鉴别】本品呈圆柱形至圆锥形，稍扭曲或有破皮处，长2—4寸，直径1.5—5分。外

皮黃棕色或灰棕色，多已脫落，殘存者亦易剝落，不帶外皮者呈灰黃色或淡黃褐色，具縱皺及斑狀支根痕，皮破處有網狀裂紋或裂隙。根頭頂端叢生白色毛茸及除去莖葉的痕跡。質硬而脆，斷面較平坦，外部黃白色或淡黃棕色，木心淡黃色。臭微，味苦澀。

以條粗長、整齊、外表灰黃色、頭部有白色毛茸者為佳。

【炮炙】 揀去雜質，洗淨，潤透後切片，曬干即得。

【性味】 苦，寒。

【功能】 清熱，涼血。

【主治】 熱毒血痢，溫瘧寒熱，鼻衄，血痔。

【用法與用量】 三至五錢。

【貯藏】 置通風干燥處。

白 芍

Báisháo

RADIX PAEONIAE ALBA

【來源】 本品為毛茛科(Ranunculaceae)植物芍藥(*Paeonia lactiflora* Pall.)除去栓皮的干燥根。均系栽培，主產於浙江、安徽、四川等地。夏、秋二季采挖，洗去泥土，切去頭尾及須根，刮去或擦去外皮，入沸水中略煮，撈出，翻曬，或再整理搓圓，曬干即得。

【鑒別】 本品呈圓柱形，粗細均勻而平直，或一端稍粗，微彎曲，長3—6寸，直徑3—8分。表面淡紅棕色或粉白色，平坦或有明顯的縱皺紋及須根痕，外皮未除淨處有棕褐色斑痕。質堅實，不易折斷，斷面灰白色或微帶棕色，中間有菊花心。無臭，味微苦而酸。

以根粗長、質堅實、粉性足、表面整潔者為佳。根細短、形彎曲、粉性小、表面有棕黑色斑點者質次。具須根及未去外皮者不宜入藥。

【炮炙】 白芍 揀去雜質，分開大小個，用水浸泡至約八成透，撈出，曬晾，潤至內外濕度均勻，切片，干燥即得。

酒白芍 取白芍片，用黃酒噴淋均勻，稍潤，置鍋內用文火微炒，取出，放涼即得。

每白芍片100斤，用黃酒10斤。

炒白芍 取白芍片，置鍋內用文火炒至微黃色，取出，放涼即得。

焦白芍 取白芍片，置鍋內用武火炒至焦黃色，噴淋清水少許，取出，涼干即得。

土炒白芍 取伏龍肝細粉，置鍋內炒熱，加入白芍片，炒至外面挂有土色，取出，篩去

土、放凉即得。

每白芍片 100 斤，用伏龙肝细粉 20 斤。

【性味】 苦、酸、微寒。

【功能】 养血，平肝，敛阴，收汗，缓中，止痛。

【主治】 胸腹胁肋疼痛，泻痢腹痛，自汗盗汗，四肢挛急，阴虚发热，妇女月经不調，崩漏。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【注意】 反藜芦。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防虫蛀。

白 芷

Báizhǐ

RADIX ANGELICAE

【来源】 本品为繖形科(Umbelliferae)植物白芷(*Angelica dahurica* (Fisch.) Benth. et Hook.)或川白芷(*Angelica anomala* Lall.)的干燥根部。多系栽培，主产于浙江、四川、河南等地。于夏、秋间叶黄时采挖，除去茎叶、须根及泥土，置烈日下晒干，即得。

【鉴别】 本品呈长圆锥形，有的稍弯曲，长 3—6 寸，根头部直径 0.5—1 寸许，尾部直径 2—3 分。上部略呈方柱形或圆柱形，顶端中央有凹洼的茎痕，表面灰黄色或淡棕色，具纵皱纹及侧根断去的痕迹，并有横长突起物习称“疙瘩丁”，有的排列整齐成纵列。断面白色或灰白色，粉性，并可见棕色环，呈方形或圆形，环的外层散布多数棕色油点。气芳香濃郁，味辛、微苦。

以条肥大、体重、粉性足、香气濃郁者为佳。条小或过大、体轻松、粉性小、香气淡薄者质次。

【炮炙】 拣去杂质，分开大小个，用水浸泡至八成透，捞出，晾晒，润透后切片，干燥即得。

【性味】 辛，温。

【功能】 祛风散湿、活血排脓、生肌止痛。

【主治】 头痛，牙痛，肩胛骨痛，鼻渊，肠风痔漏，赤白带下，痈疽疮瘍，皮肤燥痒。

【用法与用量】 八分至二钱。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防虫蛀。

白芥子

Báijièzǐ

SEMEN SINAPIS ALBAE

【来源】 本品为十字花科(Cruciferae)植物白芥(*Brassica alba* (L.) Boiss.)的干燥成熟种子。均系栽培,主产于安徽、河南等地。夏末秋初果实成熟时割取全株,晒干后打下种子,除去杂质即得。

【鉴别】 本品呈圆球形,直径约半分。外皮灰白色至黄白色,侧面有一条沟纹或不明显。用扩大镜观察,表面可见细微的网纹,其一端有明显的小点。破开内含黄白色折叠的种仁,有油性。无臭,味辛辣。

以粒大、饱满、色白者为佳。

【炮炙】 白芥子 筛去泥屑即得。

炒白芥子 取净白芥子,置锅内用文火炒至深黄色,并微发出香辣气为度,取出,放凉即得。

【性味】 辛,温。

【功能】 利气豁痰,温中散寒,消肿止痛。

【主治】 胸胁胀痛,痰喘咳嗽,反胃呕吐,阴疽痰核,脚气;外治疮肿,痹痛。

【用法与用量】 一至三钱;外用适量,研末醋调敷患处。

【贮藏】 置通风干燥处,防潮。

白花蛇(蕲蛇)

Báihuāshé

AGKISTRODON

【来源】 本品为蝮科(Gotalidae)动物五步蛇(*Agkistrodon acutus* Guenther)除去内脏的干燥品。均系野生,主产于浙江、江西等地。多于夏季捕捉,剖开蛇腹,除去内脏,盘成圆形,用竹片撑开,烘干即得,或不用竹片撑开,烘干亦可。

【鉴别】 蛇体卷成圆盘形,头在中央,盘径5—8寸,蛇体直径约1寸许。头部呈三角形而扁平,鼻尖端向上,口较宽大,习称“龙头虎口”,上颌有长毒牙。背部棕褐色,密被菱形鳞片,有纵向排列的24个方形灰白色花纹,习称“方胜纹”。腹部色白,鳞片较大,杂有少数黑斑,习称“念珠斑”。尾部渐细,末端呈三角形,角质,习称“佛指甲”。腹内部黄白

色。脊椎骨显著突起,两侧具多数的肋骨。微有腥气,味微咸。

以个大、头尾齐全、花纹斑点明显者为佳。

【炮炙】 蕲蛇 斫去头尾,用水润软后,切成方块,晒干即得。

蕲蛇肉 取白花蛇,斫去头尾,用黄酒润透后,取出,除去皮骨,晒干,即得。

【性味】 甘、咸,温;有毒。

【功能】 祛风湿,定惊搐。

【主治】 风湿瘫痪,大风疥癬,小儿惊风搐搦,破伤风,杨梅疮。

【用法与用量】 一钱至一钱五分。

【贮藏】 置通风干燥处,防虫蛀。

白花菜子

Báihuācàizǐ

SEMEN GYNANDROPSIS

【来源】 本品为白花菜科(Capparidaceae)植物白花菜(*Gynandropsis gynandra*(L.) Briq.)的干燥成熟种子。均系栽培,主产于河北等地。秋季果实成熟时,割取全草,晒干,打下种子,除去杂质即得。

【鉴别】 本品呈扁圆形,极细小,直径约半分。外皮黑褐色或黑色,显蜂窝状的麻纹,规则地排列成同心环状,边缘有一小缺口。剥去种皮,种仁发黄,稍有油性。气微,味苦。

以颗粒饱满、色黑者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,筛去泥土即得。

【性味】 苦、辛,温;有小毒。

【功能】 通血脉。

【主治】 外治风湿痹痛。

【用法与用量】 外用适量,研末敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

白果(银杏)

Báiguǒ

SEMEN GINKGO

【来源】 本品为银杏科(Ginkgoaceae)植物银杏(*Ginkgo biloba* L.)除去肉质外皮的

干燥成熟种子。均系栽培，主产于河南、广西、四川等地。秋季种子成熟时采收，除去肉质外皮，洗净，晒干，即得。

【鉴别】 本品呈椭圆形，两头稍尖，长5—7分，宽3—5分。外壳白色或灰白色，平滑坚硬，边缘有二条棱线，一端有小长方形突起物，壳内为椭圆形的种仁，剥落时，一端有淡棕色薄膜。种仁淡黄色或黄绿色，内部白色，粉质，中间有空隙，具小芯。无臭，味甘微苦。

以壳白色、种仁充实、饱满、色黄、里面色白者为佳。

【炮炙】 白果仁 拣去杂质，除去硬壳即得。

熟白果 取拣净的白果，蒸熟、炒熟或煨熟，去壳即得。

【性味】 甘、苦，平，涩；有小毒。

【功能】 益肺气，定喘嗽，缩小便，止带浊。

【主治】 痰喘，咳嗽，白带，白浊，小便频数。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置通风干燥处。

白 矾（明矾）

Báifán

ALUMEN

【来源】 本品为天然的明矾石经加工提炼而成的结晶体。主产于浙江、安徽、山西、湖北等地。

【鉴别】 本品为结晶形块状物，形状大小不一，无色，半透明，有光泽，表面常附有白色细粉。质硬而脆，易砸碎，可溶于水。无臭，味极涩。

以块大、无色透明、无杂质者为佳。

【炮炙】 白矾 去净杂质，用时捣碎。

煨白矾（枯矾） 取白矾，置砂锅内加热熔化并煨至枯干，取出，剥块即得。

【性味】 酸，寒。

【功能】 燥湿消痰，除风去热，解毒杀虫，止血定痛。

【主治】 喉痹，癰疽，痰涎壅盛，白带，黄疸，衄血；外治疥癬，疮瘍，口舌生疮。

【用法与用量】 二至五分；外用适量，研末敷或作汤洗患处。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

白 茅 根

Báimáogēn

RHIZOMA IMPERATAE

【来源】 本品为禾本科 (Gramineae) 植物白茅 (*Imperata cylindrica* var. *major* (Nees) Hubb.) 的干燥地下根状茎。均系野生，全国大部分地区均有生产。春、秋二季采挖，除去地上部分及泥土，用水洗净，晒干，揉去须根及膜质叶鞘即得。

【鉴别】 本品为细长圆柱形，长短不一，通常 1—2 尺，直径约 1 分。表面乳白色或黄白色，有明显的节，呈浅棕黄色微隆起的环状，每节约距 1 寸。质轻而韧，不易折断。断面中心黄色，并有一小孔，外圈色白，充实或有无数空隙似车轮状，外圈与中心极易剥离。无臭，味微甜。

以条粗肥、色白、无须根、味甜者为佳。

【炮炙】 白茅根 洗净，微润后切段，干燥，簸净碎屑即得。

茅根炭 取白茅根段，置锅内用武火炒至黑色，但须存性，喷淋清水，取出，晒干即得。

【性味】 甘，寒。

【功能】 清热，凉血，止血，利尿。

【主治】 吐衄诸血，胃热嘔逆，肺热喘急，内热烦渴，黄疸，水肿。

【用法与用量】 三钱至一两。

【贮藏】 置干燥处。

白 前

Báiqián

RHIZOMA ET RADIX CYNANCHI STAUNTONI

【来源】 本品为萝藦科 (Asclepiadaceae) 植物柳叶白前 (*Cynanchum stauntoni* (Dene.) Hand. —Mazz.) 或芫花叶白前 (*Cynanchum glaucescens* (Dene.) Hand. —Mazz.) 的干燥地下根状茎及须根。均系野生，主产于浙江、安徽等地。秋季采挖，除去地上茎，洗净

泥沙,晒干即得。

【鉴别】 柳叶白前地下根状茎呈细圆柱形,长达5寸,直径约1分。表面黄棕色或浅黄色,有节,节上生有许多毛须状的根,细长而弯曲,多盘曲成团,棕色或紫棕色,根状茎上部常残留有灰绿色或紫褐色的地上茎。根状茎质脆,易折断,断面中空,习称鹅管白前。无臭,味甘微辛。

芫花叶白前根状茎上端残留的短段地上茎,其节部芽对生而显著,有时根状茎较短,其下丛生多数细根,较柳叶白前的须根略长而粗,其色亦较浅,常为灰黄色。气微弱,味微甜。

均以根状茎粗、须根长、无泥土及杂质者为佳。

【炮炙】 白前 拣去杂质及残茎,洗净,闷润后切段,晒干即得。

蜜白前 取白前段,加炼熟的蜂蜜与开水少许,拌匀,稍润,置锅内用文火炒至不粘手为度,取出,放凉即得。

每白前段100斤,用炼熟蜂蜜25斤。

【性味】 辛、甘,微温。

【功能】 泻肺降气,下痰止咳。

【主治】 肺气壅实,多痰,喘满,咳嗽。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置通风干燥处。

白 扁 豆

Báibiǎndòu

SEMEN DOLICHORIS

【来源】 本品为豆科(Leguminosae)植物扁豆(*Dolichos lablab* L.)的干燥成熟种子。均系栽培,主产于河南、安徽、湖南等地。秋季豆荚成熟时采摘,剥取种子,晒干即得。

【鉴别】 本品呈扁椭圆形或扁卵圆形,长3—4分,宽约2.5分,厚约1.5分。外皮灰白色,平滑,略有光泽,有的底部具一深色点,边缘有一条白眉,周边微显黑纹。质坚硬,皮薄而脆,内有种仁两瓣,黄白色。气微,味甘,嚼之有豆腥气。

以粒大、饱满、色白、无杂质者为佳。

【炮炙】 白扁豆 拣去杂质,洗净,晒干,捣碎即得。

扁豆仁 取淨白扁豆，置沸水鍋中煮至皮微鼓起、松軟为度，撈出，倒入凉水中，搓去皮，晒干即得。

炒扁豆 取已去皮的扁豆，置鍋內用文火炒至微現黃色斑点为度，取出，放凉即得。

土炒扁豆 取伏龙肝細粉，置鍋內炒热，加入扁豆，炒至外面挂有土色，取出，篩去土，放凉即得。

每扁豆 100 斤，用伏龙肝細粉 25 斤。

【性味】 甘，微温。

【功能】 补脾除湿，消暑解毒。

【主治】 脾胃虛热，暑湿內蘊，嘔吐泄瀉，口渴，酒毒，河豚魚毒，妇女白帶。

【用法与用量】 三至四錢。

【貯藏】 置通風干燥处，防虫蛀。

白 胡 椒

Báihújiāo

FRUCTUS PIPERIS ALBUS

【来源】 本品为胡椒科(Piperaceae)植物胡椒(*Piper nigrum* L.)的成熟去皮果实。均系栽培，主产于云南、广东、广西等地。果实成熟时采收，用水浸漬后，将外皮搓去，晒干即得。

【鉴别】 本品呈圓球形，直徑約 1 分。表面灰白色，平滑，一端有一小凸起，另一端有一微凹陷的小圓臍，兩端間多有 10—14 条分布均匀的淺色脉紋。质硬而脆，破开面微有粉性，黃白色，外皮薄，中間有細小空心。香气特异，有峻烈的辛辣味。

以个大、粒圓、坚实、色白、气味峻烈者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，篩去灰屑，用时打碎或研細粉即得。

【性味】 辛，热。

【功能】 温中，下气，去痰。

【主治】 寒痰食积，冷气上冲，寒吐冷痢，阴寒腹痛。

【用法与用量】 三至五分。

【貯藏】 置阴凉干燥处。

白 狼 毒

Báilángdú

RADIX EUPHORBIAE FISCHERIANAE

【来源】 本品为大戟科 (Euphorbiaceae) 植物狼毒大戟 (*Euphorbia fischeriana* Steud.) 或钩腺大戟 (*Euphorbia sieboldiana* Morr. et Dene.) 的干燥根部。均系野生, 主产于辽宁、河南、山东、安徽等地。秋季采挖, 除去茎叶、粗皮及泥土, 切成厚约 4—8 分的横片或斜片, 晒干即得。

【鉴别】 本品为圆形的横切或斜切块片, 直径 1—3 寸, 厚 3—5 分。遗留的外皮黄棕色或浅棕色, 薄而疏松, 能分层剥落。切面不平, 粉性大, 有黄白相间的筋脉花纹。质轻易碎, 折断时有粉质脱落。无臭, 味甘, 并有刺激性辣味。

以片大、肥厚、整齐、有粉性、质泡而轻、有黄白相间的筋脉者为佳。

【炮炙】 生狼毒 拣去杂质即得。

醋狼毒 取白狼毒, 加醋拌匀, 稍闷, 待醋吸尽, 置锅内用文火炒至微干, 取出, 切块, 干燥即得。

每白狼毒 100 斤, 用醋 30—50 斤。

【性味】 辛, 平; 有毒。

【功能】 破积, 杀虫。

【主治】 咳逆上气, 痰饮积聚, 瘰疬虫积。

【用法与用量】 三至八分, 炮制后用。

【注意】 畏密陀僧。

【贮藏】 置通风干燥处, 防虫蛀。

白 梅 花

Báiméihuā

FLOS MUME

【来源】 本品为蔷薇科 (Rosaceae) 植物梅 (*Prunus mume* Sieb. et Zucc.) 的干燥花

蕾。栽培或野生，主产于江苏、浙江等地。春季花初开时采摘含苞待放的花蕾，晒干或烘干，除去梗屑即得。

【鉴别】 本品呈圆球形，直径1.5—2分，底部有短柄。短柄上方有数层褐色的鳞片状苞片。苞片内有萼片5枚，呈灰绿色。花瓣5枚或多数，白色或黄白色，紧紧相抱。花瓣内包含许多黄色丝状的雄蕊。中心有一枚雌蕊，子房呈卵形而有细长的花柱。质轻。有香气，味淡而涩。

以完整、含苞未放、萼绿花白、气清香、习称“绿萼梅”者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，去梗，筛去灰土即得。

【性味】 微酸，平，清。

【功能】 开胃，散郁，生津，安神，化痰，解毒。

【主治】 暑热烦渴，头目不清，郁闷心烦，痰热壅滞，瘰疬疮毒。

【用法与用量】 八分至一钱五分；并可外用，适量，敷疮毒。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防潮及虫蛀。

白 鲜 皮

Báixiǎnpí

CORTEX DICTAMNI RADICIS

【来源】 本品为芸香科(Rutaceae)植物白鲜(*Dictamnus dasycarpus* Turcz.)的干燥根皮。均系野生，产于辽宁、河北、四川、江苏、浙江、安徽等地。北方地区多于春、秋二季采收，南方地区多于夏季采收，挖出后，洗去泥土，搓去粗皮，纵向划开，抽去木心，晒干即得。

【鉴别】 本品呈卷筒状，长3—5寸，直径2—5分，厚可达1分。表面淡黄白色，有纵皱纹及除去细根后的痕迹。质脆，易折断，断面不平，淡黄白色，略疏松。有羊膻气，味微苦。

以皮灰白色、条大、无木心者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，用水洗净，稍润后切片，晒干即得。

【性味】 苦，寒。

【功能】 清热，燥湿。

【主治】 风疮，疥癣，湿痹，黄疸。

【用法与用量】 一钱五分至三钱；并可外用，适量，煎汤洗患处。

【贮藏】 置通风干燥处。

白 薇

Báiwēi

RADIX CYNANCHI ATRATI

【来源】 本品为萝藦科(Asclepiadaceae)植物白薇(*Cynanchum atratum* Bge.)或蔓生白薇(*Cynanchum versicolor* Bge.)的干燥根部。均系野生,产于辽宁、山东、安徽等地。秋季采挖,除去地上茎叶,洗净泥土,晒干即得。

【鉴别】 本品根头呈疙瘩状,上面具有圆形的茎痕,下面簇生多数细长圆柱形的须根,常弯曲,长3—5寸,直径约0.5分,全形略呈马尾状。表面棕黄色。质脆,易折断,断面黄白色,中央有一黄色木心。无臭,味微苦。

以根粗壮,无泥土与杂质者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,除去残茎,洗净,润透后及时切段,干燥即得。

【性味】 苦、咸,寒。

【功能】 清热,凉血。

【主治】 阴虚发热,风温灼热,热淋,血淋,产后虚烦,血厥。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置通风干燥处。

白 薇

Báiliàn

RADIX AMPELOPSIS

【来源】 本品为葡萄科(Vitaceae)植物白薇(*Ampelopsis japonica*(Thunb.)Makino)的干燥根。多系野生,主产于河南、湖北等地。春、秋二季采挖,除去茎及细须根,洗净,多纵切成两瓣或四瓣,或切成斜片,晒干即得。

【鉴别】 本品呈长椭圆形或纺锤形,两头较尖,略弯曲。长1—4寸,直径0.3—1寸。外皮红棕色,有皱纹,易层层脱落,里层淡红褐色。纵切瓣为长圆形,切面周边常向内卷曲,中部有一凸起的棱线。斜切片呈卵圆形,厚0.5—1分,中央略薄,周边较厚,微翘起或

微弯曲。质轻，易折断，折断时有粉尘飞出，断面白色或淡红色。臭微，味甘。

以断面粉红色、肥大、粉性足者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，研成小块；或洗净，润透后切片，干燥即得。

【性味】 苦、甘，微寒。

【功能】 泻火，散结，生肌，止痛。

【主治】 温疮，血痢，肠风，痔漏，女子赤白带下；外治痈肿，疔疮，汤火灼伤。

【用法与用量】 八分至一钱五分；外用适量，研末涂敷患处。

【注意】 反乌头、草乌。

【贮藏】 置通风干燥处，防虫蛀。

母丁香 (鸡舌香)

Mǔdīngxiāng

FRUCTUS CARYOPHYLLI

【来源】 本品为桃金娘科 (Myrtaceae) 植物丁香树 (*Eugenia caryophyllata* Thunb.) 的干燥果实。多系栽培，产于马来西亚、印度尼西亚及东非沿海等地。通常在果实成熟时采摘，晒干即得。

【鉴别】 本品呈长卵形，长 0.5—1 寸，直径 1.5—2.5 分。表面黄棕色或暗棕色，有细皱纹，顶端有 4 个分裂的萼片向内弯曲成勾状，外皮呈壳状。质坚硬，难破碎，破开后内含卵形种仁，黄棕色或暗棕色，显油润，由两片肥厚的子叶抱合而成，中央具一条明显的纵沟。气芳香，味辛辣。

以个大、完整、油性大、气味浓厚者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，筛去灰屑，用时捣碎即得。

【性味】 辛，温。

【功能】 温中，散寒。

【主治】 暴气心痛，胃冷嘔逆，小儿冷疳；外治口臭，舌疮，牙宣，齩齿，妇人阴冷。

【用法与用量】 三分至一钱；口齿诸病，外用适量，研末或煮汁含之；妇人阴冷，研末装纱布囊，纳入阴中。

【注意】 畏郁金。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防热。

决 明 子

Juémíngzǐ

SEMEN CASSIAE TORAE

【来源】 本品为豆科(Leguminosae)植物决明(*Cassia tora* L.)的干燥成熟种子。栽培或野生，主产于安徽、广西、四川等地。9—11月间荚果成熟时割下全株，晒干，打下种子，除去杂质即得。

【鉴别】 本品呈菱形，状似马蹄，一端较平，另端斜形稍尖，长1.5—2.5分，直径约1分。外皮黄褐色或绿褐色，平滑有光泽，两面各有一条凸起的棕色棱线，棱线两侧各有一条斜向的线纹，黄白色而稍凹陷。质坚，不易破碎。横切面皮薄，中部为棕色曲折纹，两侧乳白色或微绿。无臭，味淡、微苦。

以饱满、黄褐色、无杂质者为佳。

【炮炙】 决明子 筛去杂质，洗净，晒干即得。

炒决明子 取净决明子，置锅内用文火炒至微有香气，取出，放凉即得。

【性味】 咸，平。

【功能】 清肝火，祛风热，益肾明目。

【主治】 肝热头痛，青盲内障，目赤肿痛。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置通风干燥处。

冰 片

Bīngpiàn

BORNEOLUM

【来源】 本品为用化学方法合成的龙脑。

【鉴别】 本品为透明或半透明的片状结晶，形如梅花片状，整碎不一，直径2—5分，厚0.5—1分。洁白色，表面有如冰的裂纹。质松脆，有层，可剥成薄片，手捻即粉碎。气清香，味辛凉。燃烧时有黑烟，无残迹遗留。

以片大而薄、色洁白、质松、气清香纯正者为佳。

【性味】 辛、苦，微寒。

【功能】 通諸竅，散郁火，消腫止痛，去翳明目。

【主治】 中風口噤，驚癇痰迷；外治喉痹齒痛，口瘡痛瘍，目赤眵翳。

【用法與用量】 五厘至一分，多入丸散服；外用適量，研末點敷患處。

【注意】 孕婦內服宜慎。

【貯藏】 置陰涼乾燥處，密閉保存。

关 木 通

Guānmùtōng

CAULIS HOCQUARTIAE

【来源】 本品为馬兜鈴科(Aristolochiaceae)植物关木通(*Hocquartia manshuriensis* (Kom.) Nakai)的干燥莖。均系野生，产于吉林、黑龙江、辽宁等地。秋、冬二季采收，截取莖部，刮去外面糙皮，晒干或烘干即得。

【鉴别】 本品呈长圆柱形，偶有略弯曲，长2—3尺，直径4—8分。表面灰黄色或褐色，較平坦，节部略粗。质坚实，不易折断，断面皮部黄白色，质松如軟木状，木部呈黄色，布滿細小的孔洞，与黄色綫条相間呈車輪状。无臭，味极苦。

以条匀、无粗皮、內色鮮黄者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，用水浸泡，潤透后，斫成順段，切片，晒干即得。

【性味】 苦，寒。

【功能】 泻热、降火。

【主治】 口舌生疮，小便赤澀。

【用法與用量】 五分至一錢五分。

【貯藏】 置通風干燥处，防潮。

关 白 附

Guānbáifù

RADIX ACONITI COREANI

【来源】 本品为毛茛科(Ranunculaceae)植物黃花烏头(*Aconitum coreanum* (Léveil.)

Léveil.)的干燥块根。均为野生，主产于辽宁、吉林等地。秋季采挖，除去残茎及须根，洗净，晒干即得。

【鉴别】本品母根呈圆锥形，略弯曲，顶端有地上茎的残基，全长1—2寸，直径2—4.5分。表面灰褐至暗棕色，有纵皱及沟纹，并有多数横长突起的根痕散在或横列近似节状。子根呈卵圆形或长圆形，顶端无地上茎残基而有芽痕，长0.5—1.2寸，直径1.5—6分，表面棕色或褐色，有细纵皱纹及小点状根痕，少数有瘤状突起的侧芽痕。质均坚硬，难折断，断面白色，有粉性。母根多有裂隙，以水湿润后，二者断面均可见有小点成环状排列或散在。无臭，味辛辣、麻舌。

以根大皮细、饱满充实、粉性大的子根为佳。母根及粉性小的子根质次。

【炮炙】生关白附 拣净杂质，洗净，晒干即得。

制关白附 取关白附，用凉水浸漂，置于阴凉处，每日换水2—3次，泡5—7日后，捞出，与豆腐同置锅中，加清水适量，煮约30分钟，取出，拣去豆腐，阴干，再酌用开水湿润，闷透，切片，晒干即得。

每关白附100斤，用豆腐25斤。

【性味】辛、甘，大温；有小毒。

【功能】祛风，化痰，燥湿。

【主治】中风痰壅，口眼喎斜，偏正头风，风痰眩晕，痰厥头痛；外治面肝癰疽，疥癬風疮，阴下湿痒。

【用法与用量】五分至一钱，一般炮炙后用，多入丸散服；外用生者适量，研末涂敷患处。

【注意】孕妇忌内服，生者内服宜慎。

【贮藏】置干燥处，防潮及虫蛀。

灯 心 草

Dēngxīncǎo

MEDULLA JUNCI

【来源】本品为灯心草科(Juncaceae)植物灯心草(*Juncus decipiens* (Buch.) Nakai)的干燥茎髓。多系野生，产于江苏、福建、四川、贵州等地。夏末至秋季采收其地上茎，剥去茎的外皮，将白髓整理顺直，捆成小把，晒干即得。

【鉴别】 本品呈细长的圆柱形，长3—4尺，直径0.5—1分。白色或淡黄白色，表面有纵纹。体轻，入水不沉。极柔软，轻压略有弹性，可任意弯曲。易拉断，断面白色，无空隙。无臭，味淡。

以条长、粗壮、色白者为佳。

【炮炙】 灯心 拣去杂质，剪段即得。

灯心炭 取拣净的灯心，置煅锅内，上面复盖一锅，两锅接合处用黄泥封固，上压重物，用文武火煅至贴在盖锅底上的白纸显焦黄色为度，档住火门，待凉后，取出即得。

朱灯心 取灯心段，置盆内喷淋清水少许，微润，加朱砂细粉，撒布均匀，并随时翻动，至外面挂匀朱砂为度，取出，晾干即得。

每灯心10斤，用朱砂10两。

【性味】 甘、淡，寒。

【功能】 降心火，利小便。

【主治】 五淋，癃闭，水肿，心烦不寐，小儿夜啼；外治喉痹金疮。

【用法与用量】 五至八分；外用适量，烧灰或研末吹敷患处。

【贮藏】 置干燥处，防潮。

地 龙

Dìlóng

LUMBRICUS

【来源】 本品为钜蚓科(Megascolecidae)动物参环毛蚓(*Pheretima asiatica* Michaelson)或栉蚯蚓(*Allobophora caliginosa* Trapezoidea)的干燥全体。均系野生，全国大部分地区多有生产，主产于广东、江苏、山东等地。春、夏、秋三季均可捕捉。用草木灰或稻草灰拌后晒干或炕干(地龙)，或剖开腹部，洗去内脏及泥土，及时晒干或炕干(地龙肉)，即得。

【鉴别】 药材中常分为两类：

地龙 呈圆柱形，干燥弯曲。长2—3寸，直径约2分左右。外皮灰褐色或灰棕色，多抽皱不平。全体具环节，头部环节较突出，顶端略平，中心有小圆孔。质轻脆，折断后，中间充满泥土。有腥气，味微咸。

以体大、肉厚者为佳。

地龙肉 呈长条薄片状。长3—5寸,宽3—5分。外皮光亮棕褐色,略有卷边;全体具环节,前端有一环带,色较浅,习称“白颈”。体轻而略呈革质,不易折断,断面呈黄白色。其他性状同上。

以棕褐色、肉厚、白颈、无泥土者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,用水漂净,及时捞出,晒干,切段即得。

【性味】 咸,寒。

【功能】 清热,定惊,利小便,通经络。

【主治】 温病,大热狂烦,风热赤眼,喉痹,水肿,黄疸,小便不通,历节风痛,半身不遂,小儿惊风。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置通风干燥处,防虫蛀。

地 肤 子

Dìfúzi

FRUCTUS KOCHIAE

【来源】 本品为藜科(Chenopodiaceae)植物地肤(*Kochia scoparia*(L.)Schröd.)的干燥成熟果实。栽培或野生,主产于河北、山西、山东、河南等地。7—9月间果实成熟时将全株割下,晒干,打下果实,除去枝叶等杂质即得。

【鉴别】 本品呈扁圆形五角星状,直径约半分,周围具有5个分开的膜质小翅。表面灰绿色或浅棕色。膜质小翅背面中央有一小凸点,为果柄残痕,并可见数条明显放射状的棱线,腹面露出五角星状的空隙内含黑色小果,形似芝麻粒。在扩大镜下观察,可见表面有许多小麻点,小果破开后,可见白色显油润的种仁。无臭,味微苦。

以色灰绿、饱满、无杂质者为佳。

【炮炙】 簸净杂质,筛去泥土即得。

【性味】 甘、苦,寒。

【功能】 利小便,清湿热。

【主治】 热淋;外治皮肤风热瘙痒,恶疮。

【用法与用量】 一至三钱;外用适量,煎汤洗患处。

【贮藏】 置通风干燥处。

地 骨 皮

Dìgǔpí

CORTEX LYCHII RADICIS

【来源】 本品为茄科(Solanaceae)植物枸杞(*Lycium chinense* Mill.)的干燥根皮。野生或栽培,全国大部分地区多有生产。春初或秋后采挖,洗净泥土,剥下根皮,晒干即得。

【鉴别】 本品为短小的筒状或槽状卷片,大小不一,一般长1—3寸,宽2—5分,厚约1分。外表面灰黄色或棕黄色,粗糙,有错杂的纵裂纹,易剥落。内表面黄白色,较平坦,有细纵纹。质轻脆,易折断,断面不平坦,外层棕黄色,内层灰白色。臭微,味微甘。

以块大肉厚、无木心与杂质者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,去木心,略洗,晒干,切段即得。

【性味】 甘、淡,寒。

【功能】 泻热,凉血。

【主治】 骨蒸劳热,有汗消渴,咳嗽吐血。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置干燥处,防潮。

地 黄

Dìhuáng

RADIX REHMANNIAE

【来源】 本品为玄参科(Scrophulariaceae)植物地黄(*Rehmannia glutinosa* Libosch.)栽培品“怀庆地黄”的新鲜或干燥块根。主产于河南、陕西、浙江等地。秋季采挖,鲜用者洗净泥土即得;干地黄系将挖出的根,除去茎、叶、须根和泥土,置火炕上缓缓烘焙,逐渐干燥而颜色变黑,焙至八成干时,用手搓捻,使成圆形即得。

【鉴别】 鲜地黄 呈长纺锤形。长3—5寸,直径1—2寸。外皮薄,呈肉红色,平滑,具弯曲的皱纹及横长皮孔,多有不规则疤痕。横断面淡黄白色,肉质,有菊花心。臭微,味微甘略苦。

干地黄 习称“生地”，呈不规则的团块状或长圆形，中间膨大，两端稍细，长2—4寸，直径1—2寸。表面灰黑色或棕灰色，极皱缩，具不规则的横曲纹，细小的则稍扁而扭曲，多为长条状。通常质柔软，干后则坚实，体重，不易折断，断面灰黑色或棕黑色，菊花心不明显，有的断面呈乌黑色，有光泽，显油润，具粘性。无臭，味微甜。

以个大、体重、断面油润乌黑者为佳。个细小、体轻质硬、断面灰棕色者质次。

【炮炙】 **生地黄** 取干地黄，拣去杂质，用水稍泡，捞出，闷一夜，使皱纹展开，洗净泥土，闷润后切片或切小块，干燥即得。

酒熟地黄 取洗净的干地黄，加黄酒拌匀，置罐内或适宜容器内，密闭，坐水锅中，隔水燉至酒吸尽，取出，晒至外皮粘液稍干，置缸内贮藏即得。

每干地黄100斤，用黄酒50斤。

蒸熟地黄 取洗净的干地黄，置容器内加热蒸至黑润为度，取出，晒至八成干，切片，再晒干即得。

生地黄炭 取洗净的干地黄，分开大小个，置煅锅内装八成满，上面复盖一锅，两锅的接合处用黄泥封固，上压重物，用文武火煅至贴在盖锅底上的白纸显焦黄色为度，擋住火門，待凉后，取出即得；或将干地黄置锅内直接炒炭亦可。

熟地黄炭 取熟地黄，照上述生地黄炭的方法煅炭即得。

【性味】 鲜地黄：甘，大寒。

干地黄：甘，寒。

熟地黄：甘、微苦，微温。

【功能】 鲜地黄：泻火，凉血，生津。

干地黄：滋阴退阳，生血凉血。

熟地黄：滋阴补血。

【主治】 鲜地黄：温病伤阴，大热烦渴，斑疹，血热妄行。

干地黄：阴虚发热，消渴，吐血，衄血，尿血，崩漏。

熟地黄：阴虚血少，精亏劳损，腰痠脚弱，遗精，崩漏，耳聾，目昏，须发早白。

【用法与用量】 鲜地黄：四钱至一两。

干地黄：三至五钱。

熟地黄：三至五钱。

【贮藏】 鲜地黄埋在潮湿砂土中，防冻；干地黄置通风干燥处，防虫蛀。

地 榆

Dìyú

RADIX SANGUISORBAE

【来源】 本品为蔷薇科(Rosaceae)植物地榆(*Sanguisorba officinalis* L.)的干燥根部。均系野生,主产于江苏、河北等地。春季将发芽时或秋季苗枯萎后采挖,洗净泥土,除去残茎及须根,晒干即得。

【鉴别】 本品呈不规则的纺锤形或圆柱形,略弯曲,生有支根,根长3—7寸,直径2—6分。外皮暗紫红色或棕黑色,粗糙而有纵皱。质坚,不易折断,断面粉红色或淡黄色,有排成环状的小白点。无臭,味微苦涩。

以条粗、质坚、无残茎及须根、折断面粉红色者为佳。

【炮炙】 地榆 拣去杂质,用水泡至八、九成透,洗净,捞出,除去残茎,润透后切片,干燥即得。

地榆炭 取地榆片,置锅内用武火炒至外表变为黑色,但须存性,喷淋清水,取出,晒干即得。

【性味】 苦、酸,微寒。

【功能】 凉血,止血。

【主治】 吐血,衄血,血痢,下血,血崩;外治烫伤,虎、犬、蛇、虫咬伤。

【用法与用量】 一钱五分至三钱;外用适量,研末或用鲜者捣汁涂敷患处。

【贮藏】 置通风干燥处,防虫蛀。

老 鹳 草

Lǎoguàncǎo

HERBA ERODII SEU GERANII

【来源】 本品为牻牛儿苗科(Geraniaceae)植物牻牛儿苗(*Erodium stephanianum* Willd.)或老鹳草(*Geranium wilfordii* Maxim.)的干燥带果实的地上部分。前者称为长嘴老鹳草,后者称为短嘴老鹳草。均为野生,产于山东、山西、河北、湖北、四川、云南等地。

6—7月間果实近成熟时采收,晒干,捆成把即得。

【鉴别】 长嘴老鸛草 莖长1—1.5尺,直径1—2分。节膨大明显,多分枝,表面灰綠色或带紫色,有纵紋,并被稀疏的白毛,折断有空心。叶对生,具长柄,叶片卷曲皺縮,质脆易碎,潤湿展平后,可見为羽状分裂,裂片很細。果实长圓形,长2.5—3分,有宿存的长花柱,通称“长嘴”。嘴长5—8分,老熟时裂成五瓣,往往卷曲。无臭,味淡。

短嘴老鸛草 莖較纖細,长约1尺,叶的裂片較寬。果实較小,略呈圓球形,长1—1.5分,嘴較前者为短,长4—5分。其余与长嘴老鸛草类同。无臭,味淡。

均以灰綠色、果实多、无根及泥土者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,除去殘根,用水洗淨,撈出,切段,干燥即得。

【性味】 苦、微辛,平。

【功能】 祛風,活血,通經絡,健筋骨。

【主治】 風寒湿痹,跌打損伤,筋骨疼痛,肌肤麻木。

【用法与用量】 二至三錢。

【貯藏】 置干燥处。

西 河 柳 (山川柳)

Xīhéliǔ

CACUMEN TAMARICIS

【来源】 本品为檉柳科(Tamaricaceae)植物檉柳(*Tamarix chinensis* Lour.)的干燥細嫩枝叶。栽培或野生,主产于河北、河南、山东、安徽、江苏、湖北、云南、福建、广东等地。花未开时折取細嫩枝叶后,置通風处阴干,即得。

【鉴别】 本品枝梗呈圓柱形。嫩枝直径不及半分,表面灰綠色,生有許多互生的鱗片状的小叶。嫩枝质脆,易折断。粗梗直径約1分,表面紅褐色,叶片常脫落而殘留叶基呈突起状。粗梗断面黃白色,中央有髓。气微弱,味淡。

以色綠、质嫩、无杂质者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,去梗,噴潤后切段,晒干即得。

【性味】 甘、咸,平。

【功能】 疏風,解表,透疹,解毒。

【主治】 麻疹难透;外治風症身痒。

【用法与用量】 八分至二錢;外用适量,煎湯洗浴。

【貯藏】 置干燥处。

芒 硝

Mángxiāo

MIRABILITUM DEPURATUM

【来源】 本品为天然硫酸鈉經精制而成的結晶体。产于碱土地区。将天然产品加热水溶解后过滤,除去泥沙及不溶性杂质,将滤液放冷靜置即析出結晶,通称“皮硝”,再按下述炮炙項下的方法加工制成。

【鉴别】 本品为棱柱状或长方形結晶体,两端不整齐,高低不平,大小不一。无色透明,露置空气中則表面漸風化而复盖一层白色粉末。质脆,易碎,断面常不平齐,显玻璃样光澤,可溶于水。无臭,味苦咸。

以无色、透明块状結晶者为佳。

【炮炙】 取蘿卜,洗淨切片,置鍋內加水煮透后,加入皮硝共煮,至全部溶化,取出,过滤或澄清后傾出上层液,放冷至芒硝析出,取出芒硝,干燥即得。

每皮硝 100 斤,用蘿卜 10—20 斤。

【性味】 辛、苦、咸,大寒。

【功能】 泻热,潤燥,軟坚。

【主治】 实热便秘,停痰积聚。

【用法与用量】 一至三錢。

【注意】 孕妇忌用;畏三稜,恶硫黃。

【貯藏】 置阴凉干燥处,密封保存,防風化。

百 合

Bǎihé

BULBUS LILII

【来源】 本品为百合科(Liliaceae)植物百合(*Lilium brownii* var. *colchesteri* Wils.),

細叶百合 (*Lilium tenuifolium* Fisch.) 或山丹 (*Lilium concolor* Salisb.) 的干燥肉质鳞片。野生或栽培, 全国大部分地区多有生产。秋、冬二季采挖, 洗净泥土, 剥取鳞片, 用沸水烫或微蒸后, 晒干或烘干即得。

【鉴别】 本品呈长椭圆形的肉质片状, 皱缩不直或扭曲, 长 0.5—1 寸, 宽 2—6 分, 厚约 1 分。表面乳白色或淡棕黄色, 光滑细腻, 略显半透明状, 鳞片两端略尖, 周边较薄, 成波浪状或略向内卷曲, 瓣中心较厚, 内面可见数条色浅的筋脉纵向延伸。质硬而稍脆, 易折断, 断面平坦, 黄白色或淡黄白色。无臭, 味微苦。

以肉厚、质坚、色白、味苦者为佳。

【炮炙】 百合 拣去杂质, 筛除灰屑即得。

蜜百合 取净百合, 加炼熟的蜂蜜与开水少许, 拌匀, 稍闷, 置锅内用文火炒至不粘手为度, 取出, 放凉即得。

每百合 100 斤, 用炼熟蜂蜜 6 斤 4 两。

【性味】 甘, 平。

【功能】 润肺止咳, 清热宁心。

【主治】 虚劳咳嗽, 吐血, 虚烦, 惊悸。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置通风干燥处, 防潮及虫蛀。

百 草 霜

Bàicǎoshuāng

FULIGO E HERBIS

【来源】 本品为杂草经燃烧后附于锅底或烟筒内的烟灰。将锅底上或烟筒内的黑灰轻轻刮下, 用细筛筛去杂质即得。

【鉴别】 本品为黑色粉末或结成小颗粒状, 手捻即为细粉。质轻, 入水则飘浮分散。无油腻感。无臭, 味淡微辛。

以乌黑色、体质轻细、不含杂质者为佳。

【炮炙】 拣去杂质, 过筛即得。

【性味】 辛, 温。

【功能】 止血, 消积。

【主治】 衄血, 吐血, 下血, 齿缝出血, 崩中带下, 积滞泻痢, 咽喉口舌诸疮。

【用法与用量】 三至四分；外用适量，掺敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

百 部

Bǎibù

RADIX STEMONAE

【来源】 本品为百部科 (Stemonaceae) 植物直立百部 (*Stemona sessilifolia* (Miq.) Franch. et Savat.)、蔓生百部 (*Stemona japonica* Miq.) 或对叶百部 (*Stemona tuberosa* Lour.) 的干燥块根。均系野生，主产于山东、安徽、江苏、广西等地。春季新芽出土前或秋季苗将枯萎时采挖，洗净泥土，除去须根，置沸水锅中略烫，捞出，晒干即得。

【鉴别】 本品单条存在或多条丛生在短的根状茎上，块根呈纺锤形或长条形，两端略尖，皱缩扭曲，略扁平或有棱角，长 2.5—5 寸，直径 2—5 分。外皮多为灰白色，有深纵皱纹和不规则的纵沟。易折断，断面平坦，黄白色，呈角质状，微有亮光，中央圆形，中心柱甚小。无臭，味甘微苦。

以条肥、坚实、灰白色、无杂质者为佳。

【炮炙】 百部 洗净，拣去杂质，除去根茎，润透后切段，干燥即得。

蜜百部 取百部段，加炼熟的蜂蜜与开水少许，拌匀，稍闷，置锅内用文火炒至不粘手为度，取出，放凉即得。

每百部段 100 斤，用炼熟蜂蜜 12 斤 8 两。

【性味】 甘、苦，微温。

【功能】 润肺，杀虫。

【主治】 寒嗽，骨蒸劳嗽，蛔虫，寸白，蛲虫；外治疥癣，虫虱。

【用法与用量】 一至二钱；外用适量，作汤或浸酒洗患处。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮。

防 己 (粉防己)

Fángjǐ

RADIX STEPHANIAE TETRANDRAE

【来源】 本品为防己科 (Menispermaceae) 植物粉防己 (*Stephania tetrandra* S. Moore)

的干燥根。多系野生，主产于浙江、安徽等地。秋季采挖，洗净泥土或刮去外皮，直径在6—7分以上的纵剖为2或4瓣，干燥即得。

【鉴别】本品呈不规则圆柱形、半圆柱形或块状，两头稍尖，中部肥满，弯曲不直，形似猪大肠，长3—5寸，直径0.5—1寸。表面灰棕色，有细纵皱纹及横向突起的皮孔，刮去外皮者呈淡灰黄色，在弯曲处有深陷的横沟。质坚，体重，粉性大，断面灰白色，平坦细腻，有车轮纹。无臭，味苦。

以粉性大、质坚重者为佳。

【炮炙】拣去杂质，用水浸泡，泡透后捞出，晾晒，再润至内外湿度均匀，切片，干燥即得。

【性味】大苦，大寒。

【功能】行水、泻下焦血分湿热。

【主治】水肿，湿热脚气，手足痹痛。

【用法与用量】一钱五分至三钱。

【贮藏】置干燥处，防潮及虫蛀。

防 风

Fángfēng

RADIX SILERIS

【来源】本品为繖形科(Umbelliferae)植物防风(*Siler divaricatum* Benth. et Hook. f.)的干燥根部。均系野生，主产于黑龙江、吉林、内蒙古、河北等地。春、秋二季采挖，去净残茎、毛鬃、泥土等杂质，晒至八成干时，捆成小把，晒干即得。

【鉴别】本品呈圆锥形或圆柱形，略弯曲，长0.5—1尺，根头直径3—4分，中部直径4—5分。表面灰黄色或灰棕色，根头部有密集的环节，习称“蚯蚓头”，节上有棕色粗毛，顶端有茎的残痕，根身外皮粗糙，有纵皱纹及突起的小疙瘩状的须根疤痕，并有侧根痕。质松，易折断，断面不平坦，中有黄色圆心，外有棕色环、最外层浅黄白色，有空隙。微有香气，味微甘。

以条粗壮、皮细而紧、无毛头、断面外有棕色环、中心色淡黄者为佳。外皮粗糙，有毛头、带硬苗者质次。

【炮炙】除去残茎，用水浸泡，捞出，润透后切片，干燥即得。

【性味】辛、甘，温。

【功能】发表，祛風，胜湿。

【主治】外感風寒，头痛目眩，周身尽痛，風寒湿痹，骨节疼痛，四肢掣急。

【用法与用量】一錢五分至三錢。

【貯藏】置阴凉干燥处，防虫蛀。

阳 起 石

Yángqǐshí

ACTINOLITUM

【来源】本品为一种含硅酸鎂的石棉类矿石，主产于湖北、河南等地。挖出后，除去泥土与杂石即得。

【鉴别】本品呈长条形、扁长条形或不規則形，大小不一。全体乳白色、青白色至青灰色，或形成青白色与青灰色相間的条紋，具光澤。体重而质地松软，易剥离，断面不整齐，纵向破开呈絲状，柔软而光滑，捻碎后，其絲状結晶粘着皮肤上則发痒，且不易除去。无臭，味淡。

以灰白色、有光澤、易撕碎者为佳。

【炮炙】阳起石 洗净，砸碎即得。

煅阳起石 取洁淨的阳起石块，置坩堝内，在无烟的炉火中煅紅透，倒入黄酒內淬，取出，晾干，碾細即得。

每阳起石 100 斤，用黄酒 20 斤。

【性味】咸、温。

【功能】温补命門。

【主治】下焦虛寒，腰膝冷痹，男子阳痿，女子子宮久冷，瘕瘕崩漏，腹痛无子。

【用法与用量】一錢至一錢五分。

【貯藏】置干燥处。

当 归

Dāngguī

RADIX ANGELICAE SINENSIS

【来源】本品为繖形科(Umbelliferae)植物当归(*Angelica sinensis* (Oliv.) Diels)的

干燥根部。均系栽培，产于甘肃、云南等地。秋末采挖，除净泥土，待水分稍行蒸发后，按大小分别捆扎成小把，用微火慢慢熏干，至翌年春季干透，即得。

【鉴别】 本品可分为三个部分，根头习称归头、主根习称归身、支根及支根梢部习称归尾，全长3—7寸，归头直径0.6—1寸，支根直径2—3分。外皮灰棕色或棕褐色，全体具纵纹，归头上端平坦，有茎叶残基，常具环行皱纹，归身略呈圆柱形，身面凹凸不平，其下生有3—5条或更多的支根，归尾上粗下细，多扭曲，有小疙瘩状的须根痕迹。质多柔韧，断面黄白色，有裂隙，中层有浅棕色环纹，并有多数棕色油点。气清香浓厚，味甘、微苦辛。

以主根大、身长、支根少、断面黄白色、气味浓厚者为佳。主根短小、支根多、气味较弱及变红棕色者质次。

【炮炙】 当归 拣去杂质，洗净，闷润，稍晾至内外湿度适宜，切片，晒干即得。

酒当归 取当归片，用黄酒喷淋均匀，稍闷，置锅内用文火微炒，取出，放凉即得。

每当归片100斤，用黄酒10斤。

【性味】 甘、辛，温。

【功能】 补血和血，润燥滑肠。

【主治】 血虚头痛，腰痛，心腹诸痛，大便燥结，痿痹痠痹，疽疮疮疡，妇女经闭，经来腹痛，崩漏。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防潮及虫蛀。

肉 桂

Ròuguì

CORTEX CINNAMOMI

【来源】 本品为樟科(Lauraceae)植物肉桂(*Cinnamomum cassia* BL.)的干燥树皮。野生或栽培，主产于广西、广东、云南等地。夏、秋间剥取树皮，先经日晒，然后削制成一定形状，阴干即得。

【鉴别】 本品呈两侧向内卷曲的槽状，或卷成圆筒形，长1—1.5尺，宽或直径1—2寸，厚1—2分。两端常斜向削平。外面灰棕色，有不规则的细皱纹及横行突起的小疤，有时有灰白色斑纹。内表面棕红色，平滑，有细纵纹，用指甲刻划时可现油痕。质硬而脆，易

折断，断面棕紅色或紫紅色，不平坦，皮肉交接处有一层黃色綫紋。有濃烈的特殊香气，味甜辣。

以不破碎、外皮細、肉厚、断面紫紅色、油性大、香气濃厚、味甜辣、嚼之无渣者为佳。

【炮炙】 刷淨杂质，刮去粗皮，用时敲碎即得。

【性味】 辛、甘，大热。

【功能】 补命門、除积冷、通血脉。

【主治】 命門相火不足，肢冷脉微，腰膝冷痛，沉寒积冷，腹痛吐泻，阴疽疔瘰，虛阳上浮，上热下寒。

【用法与用量】 三分至一錢五分，煎服或研末服。

【注意】 孕妇慎用；畏石脂。

【貯藏】 置阴凉干燥处，密封保存。

肉 蓯 蓉 (大芸)

Ròucōngróng

HERBA CISTANCHES

【来源】 本品为列当科(Orobanchaceae)植物肉蓯蓉 (*Cistanche salsa* (C. A. Mey.) G. Beck.)的干燥带鳞叶的肉质莖。多系野生，产于內蒙古、甘肃、新疆等地。春、秋二季均可采收，春季采收后置沙地上，晒干，即为甜大芸；秋季采收肥大者投入盐湖內，經年取出，晒干，即为盐大芸。

【鉴别】 甜大芸 呈扁圆柱形，微弯曲，长0.5—1尺，直径1—2寸。表面灰棕色或褐色，密被肥厚的肉质鳞片，呈复瓦状排列。质柔軟，肉性，体重，断面棕色，有花白点或有裂隙。臭微，味甜。

盐大芸 形状較不整齐，黑褐色，质較軟。表面帶有盐霜，断面黑色。味咸。

均以肉质、条粗长、棕褐色、柔嫩滋潤者为佳。

【炮炙】 肉蓯蓉 取甜大芸，拣去杂质，用水浸泡，或取盐大芸，用水漂淨盐分，捞出，潤透后切片(纵切)，晒干即得。

酒蓯蓉 取淨肉蓯蓉片，加黄酒拌勻，置罐內或适宜容器內，密封，坐水鍋中，隔水燉至酒吸尽，取出，晾干即得。

每肉蓯蓉片100斤，用黄酒30斤。

【性味】 甘，微温。

【功能】 补命門，益精血，滑腸。

【主治】 男子阳痿，女子不孕，腰膝冷痛，血枯便秘。

【用法与用量】 二至三錢。

【貯藏】 置通風干燥处，防潮及虫蛀。

延 胡 索 (元胡)

Yánhúsuo

RHIZOMA CORYDALIS

【来源】 本品为罂粟科(Papaveraceae)植物延胡索 (*Corydalis bulbosa* DC.) 的干燥块茎。均系栽培，主产于浙江。5—6 月間采挖，除去莖叶及須根，洗淨泥土，以沸水煮透为度，捞出，晒干即得。

【鉴别】 本品呈不規則的扁圓球形，直徑 3—6 分。表面黃色或褐黃色，有网状皺紋或平滑，頂端中間有略凹陷的莖痕，底部或有疙瘩状凸起。质硬而脆，断面黃色，角质，有蜡样光澤。无臭，味苦。

以个大、饱满、质坚、色黄、内色黄亮者为佳。个小、色灰黄、中心有白色者质次。

【炮炙】 元胡 拣去杂质，用水浸泡，洗淨，晒晾，潤至内外湿度均匀，切片或打碎即得。

醋元胡 取淨延胡索，用醋拌勻，浸潤，至醋吸尽，置鍋內用文火炒至微干，取出，放凉即得。

每延胡索 100 斤，用醋 20 斤。

【性味】 苦、微辛，温。

【功能】 活血散瘀，利气止痛。

【主治】 心腹腰膝諸痛，跌打損伤，瘀血作痛，妇女月經不調，癥瘕，崩中淋露。

【用法与用量】 一至三錢。

【注意】 孕妇忌用。

【貯藏】 置通風干燥处，防虫蛀。

合 欢 皮

Héhuānpí

CORTEX ALBIZZIAE

【来源】 本品为豆科(Leguminosae)植物合欢(*Albizzia julibrissin* Durazz.)的干燥树皮。栽培或野生,全国大部分地区多有生产。夏、秋二季均可采收,剥下树皮,晒干即得。

【鉴别】 本品呈筒状或槽状,长可达数尺,粗细不等,皮厚约0.5—1分。外表面灰棕色,密生红棕色的疙瘩,有纵皱纹及片状黑色花斑。内表面黄白色,平滑有细纵纹。质硬而脆,断面黄白色,呈纤维性薄片状。微有香气,味涩而微苦。

以皮嫩、光滑者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,用水浸泡,洗净,捞出,润透后切块或切丝,干燥即得。

【性味】 甘,平。

【功能】 安神解郁,和血止痛,消痈肿,续筋骨。

【主治】 心神不安,忧郁失眠,肺痈吐脓,筋骨折伤,痈疽疮肿。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置通风干燥处。

全 蝎

Quánxiē

SCORPIO

【来源】 本品为钳蝎科(Buthidae)动物间荆蝎(*Buthus martensi* Karsch)的干燥全体。野生或饲养,主产于河南、山东、湖北、安徽等地。仲春至初秋均可捕捉,捕捉后,浸入清水中,待其吐出泥土,捞出,置沸水锅内加少量食盐,煮沸捞出,晒干即得。

【鉴别】 本品头胸前腹部呈扁平长椭圆形,后腹部呈尾状,皱缩弯曲,完整的体长约1.5寸。头胸部呈黑棕色,前面有一对较小的钳肢及一对大的螯夹,形似蟹螯,背面复有胸甲,腹面有足四对,均为七节,末端各具二爪钩。前腹部(中身)具环节,背面棕褐色,腹面

棕黄色。后腹部狭长似尾，呈棕黄色，亦具环节，节上均有纵沟，末端一带附有锐钩状毒刺。前腹部折断后，内有黑色或棕黄色物质，后腹部折断面中空。微有腥臭，味咸。

以整齐不碎、色黄、腹中少杂物及盐分者为佳。

【炮炙】 过罗去盐即得。

【性味】 甘、辛，平；有毒。

【功能】 祛风，定惊。

【主治】 惊痫抽搐，口眼喎斜，半身不遂，破伤风，瘰癧，疮毒。

【用法与用量】 全蝎八分至一钱五分；蝎尾三至五分。

【贮藏】 置干燥处，防虫蛀。

朱 砂

Zhūshā

CINNABARIS

【来源】 本品为天然的硫化汞矿石。主产于湖南、贵州、四川、广西、云南等地。挖出矿石后，选取纯净者用水淘洗掉杂石与泥沙，并用磁石吸净含铁的杂质，即得。

【鉴别】 本品呈大小不一的块状或细小颗粒状。全体呈鲜红色或暗红色，有光泽。体重，无臭，无味。其中呈细小片块状，色红明亮，触之不染手者习称“朱宝砂”。其中劈成板片状，呈斜方形或长条形，大小厚薄不一，边缘不齐，色红而鲜艳，光亮如镜而微透明，质较松脆，易破碎者习称“镜面砂”。其中块状较大，方圆形或多角形，颜色发暗，或现灰黑，体重质坚而不易碎者习称“豆瓣砂”。

以色红鲜艳、有光泽、微透明、无杂质者为佳。颜色发暗、质坚不易破碎者质次。

【炮炙】 朱砂 用磁石吸净铁屑即得。

朱砂粉 用磁石吸净铁屑，研成细粉或研细用水飞制成极细粉即得。

【性味】 甘，微寒。

【功能】 安神定惊，解毒。

【主治】 癫狂，惊悸，不寐，恶梦；外治疮毒。

【用法与用量】 一至三分，多入丸散服；外用适量，研末涂敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

竹节香附 (两头尖)

Zhújiéxiāngfù

RHIZOMA ANEMONES RADDEANAE

【来源】 本品为毛茛科(Ranunculaceae)植物紅背銀蓮花(*Anemone raddeana* Regel)的干燥地下根状茎。均系野生,主产于吉林等地。夏季采挖,除去殘莖及須根,晒干即得。

【鉴别】 本品呈长紡錘形,略弯曲,一端較粗,长0.3—1寸,直径0.5—2分。表面棕色至棕褐色,有节及略突起的分支,质硬而脆,易折断,断面略平坦,边缘棕黑色,中央黄白色,有粉性,或淡棕色角质状。无臭,味初淡、后微麻辣。

以条肥大、断面白色、粉性足、质坚实者为佳。

【炮炙】 篩去灰屑,拣去杂质即得。

【性味】 辛,热;有毒。

【功能】 祛風湿,消痈肿。

【主治】 風寒湿痹,四肢拘攣,骨节疼痛,痈肿潰烂。

【用法与用量】 入丸散服或入膏药外用,用量随方配合。

【貯藏】 置干燥处。

竹 茹

Zhúrú

BAMBOSAE IN TAENIA

【来源】 本品为禾本科(Gramineae)植物淡竹(*Phyllostachys nigra* var. *henonis* Stapf)的莖除去外皮后刮下的中間层。均系栽培,产于河南、湖北、江苏、浙江、江西、四川、广东等地。全年均可采制,砍下全株,取莖秆,先刮去外层的青皮,然后刮成絲条,晾干即得。

【鉴别】 本品呈不規則的絲团状,弯曲而拘攣。淺綠色或黃綠色。絲带宽窄厚薄不等,两头不整齐。质柔韌而輕松,有彈性。气清香,味淡。

以色綠、絲細均匀、质柔軟、有彈性者为佳。

【炮炙】 竹茹 拣去杂质及硬皮,揉成小团即得。

姜竹茹 取生姜,捣碎,加水少许,压榨取汁,将姜汁淋洒于竹茹上,拌匀,置锅内用文火微炒,取出,晾干即得。

每竹茹 100 斤,用生姜 12 斤 8 两。

【性味】 甘,微寒。

【功能】 清热,凉血,止吐,安胎。

【主治】 烦热呕吐,吐血,衄血,崩漏,胎动,小儿惊风。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置通风干燥处,防潮。

竹 黄 (天竺黄)

Zhúhuáng

CONCRETIO SILICEA BAMBUSAE

【来源】 本品为禾本科(Gramineae)数种竹类植物茎秆内的干燥分泌物。产于云南、广西、广东等地。秋季砍取生有竹黄的枯竹,剖取,晾干即得。

【鉴别】 本品呈不规则的块状或片状,大小不一。乳白色、灰白色或灰蓝色相杂。质轻、松脆,易击碎成小块,断面白色光亮,稍显粉质。吸水性强,但不溶于水,放在水中产生气泡。置舌上粘舌,味淡而有凉感。

以干燥、块大、淡黄白色、质脆、光亮、吸水性强者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,过罗去灰屑即得。

【性味】 甘,寒。

【功能】 泻热豁痰,凉心定惊。

【主治】 热病神昏谵语,中风痰迷不醒,小儿惊风抽搐。

【用法与用量】 八分至一钱五分。

【贮藏】 置阴凉干燥处,密闭保存,防潮。

伏 龙 肝

Fúlónggān

TERRA FLAVA USTA

【来源】 本品为久经草或木柴熏烧的灶心土。在修拆柴火灶或柴火烧的窑时,将烧

結成的土块取下,用刀削去焦黑部分及杂质即得。

【鉴别】 本品呈不规则的团块状,大小不一。全体红褐色,表面有削砍的刀痕。质较硬,指划易碎,并有粉末脱落。断面细软,色稍深,常有蜂窝状小孔。具烟熏气,味淡。

以块大整齐、红褐色、断面细软、质细软者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,斩成小块即得。

【性味】 辛,微温。

【功能】 温中,止呕,止血。

【主治】 嘔逆反胃,便血,尿血,吐血,衄血,妇女血崩,赤白带下。

【用法与用量】 五钱至一两。

【贮藏】 置干燥处。

自然铜

Zìránóng

PYRITUM

【来源】 本品为天然硫化铁矿石。产于四川、广东、湖南、河北及辽宁等地。采挖后去净杂石即得。

【鉴别】 本品多呈规则的方块形,大小不一。表面亮黄色,有金属光泽,酷似黄铜块,有的表面呈棕褐色。质坚硬,但易砸碎,断面亮黄白色,仍有金属光泽。无臭,无味。

以块整齐、黄而光亮、无夹杂的石层及无水锈者为佳。

【炮炙】 自然铜 刷净,敲成小块即得。

煅自然铜 取自然铜块,置坩埚内煅烧至红透,倒入醋盆内淬酥,取出,再煅烧淬酥一次至光泽消失为度,晒干后碾成粗末即得。

每自然铜 100 斤,用醋两次共 50 斤。

【性味】 辛,平。

【功能】 散瘀止痛,续筋接骨。

【主治】 跌打损伤,筋骨折伤。

【用法与用量】 一至三钱,研末,入丸散服。

【贮藏】 置干燥处。

血 余 炭

Xuèyútàn

CRINIS CARBONISATUS

【来源】 本品为人头发按下述炮炙项下的方法加工制成。

【鉴别】 本品呈不规则的块状，大小不一。色黑而光亮，表面有多数小孔，如海绵状。质轻脆、易碎，互碰则清脆有声。用火烧之有焦发气，味苦。

以色黑、发亮、质轻者为佳。

【炮炙】 取人头发加碱水洗去油垢，用清水漂净晒干后，置煅锅内，上面复盖一锅，两锅接合处用黄泥封固，上压重物，用文武火煅至贴在盖锅底上的白纸显焦黄色为度，挡住火门，待凉后，取出，研成小块即得。

【性味】 苦，微温。

【功能】 消瘀，止血。

【主治】 吐血，衄血，齿缝出血，肌肤出血，血痢，血淋，崩漏。

【用法与用量】 一钱五分至三钱；并可外用，适量，研末掺敷出血处。

【贮藏】 置干燥处。

红 大 戟

Hóngdàjì

RADIX KNOXIAE

【来源】 本品为茜草科(Rubiaceae)植物红大戟(*Knoxia corymbosa* Willd.)的干燥根部。均系野生，主产于广西、云南等地。春、秋二季采挖，除去残茎及须根，洗净泥土，晒干即得。

【鉴别】 本品略呈纺锤形，扭曲皱缩，长1—3寸，直径2—4分。上端有细小的残茎痕，下端有的具数条支根，表面红褐色或红棕色，粗糙有扭曲的纵皱纹。质坚硬，断面红褐色或棕黄色，用水湿润显粘液性。无臭，味辛、刺喉。

以根长、肥壮、红褐色、质坚、无须根者为佳。

【炮炙】 紅大戟 拣去杂质,用水洗净,润透后切片,晒干即得。

醋大戟 取淨紅大戟,加醋浸拌,置鍋中用文火煮至醋吸尽,取出切段,晒干即得。

每紅大戟 100 斤,用醋 30—50 斤。

【性味】 苦,寒;有毒。

【功能】 通二便,泻水飲。

【主治】 水肿脹滿,痰飲积聚。

【用法与用量】 五分至一錢,一般炮炙后用。

【注意】 孕妇忌用;反甘草。

【貯藏】 置阴凉干燥处。

红 花

Hónghuā

FLOS CARTHAMI

【来源】 本品为菊科 (Compositae) 植物紅花 (*Carthamus tinctorius* L.) 的干燥花。多系栽培,主产于河南、河北、浙江、四川、云南等地。夏初花正开、花瓣由黄变紅时采摘,在通风及微有日光处晾干或阴干即得。不宜强烈日光暴晒,以防褪色。

【鉴别】 本品为散乱的花朵,花长 3—6 分。表面紅色或紅黄色。花瓣下部联合成管状,上部分裂为 5 瓣,裂片窄长,先端尖形。内有 5 枚黄色雄蕊,联合成筒状。质柔软。有香气,味微苦。将花浸入水中,水染成金黄色,而花瓣不褪色。

以花細、色紅鮮艳、无枝刺、质柔潤、手握軟如茸毛者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,筛去土即得。

【性味】 辛,溫。

【功能】 活血,破瘀。

【主治】 妇女經閉,癥瘕,难产,死胎,产后恶露不行,跌打损伤,瘀血作痛。

【用法与用量】 一至二錢。

【注意】 孕妇忌用。

【貯藏】 置阴凉干燥处,防潮。

红 豆 蔻

Hóngdòukòu

FRUCTUS GALANGAE

【来源】 本品为姜科(Zingiberaceae)植物大高良姜(*Alpinia galanga* Willd.)的干燥成熟果实。多系野生,主产于广西、广东、云南等地。秋季果实变红时采摘,除去枝叶,晒干或阴干即得。

【鉴别】 本品呈椭圆形,长约2—4分,直径1.5—2分。一端有一小凹点,另一端冠以白色小筒状薄膜。外皮红棕色或枣红色,略皱缩,质薄,手捻即破碎。内含六粒种子,呈扁圆四面形或三角状多面形,黑棕色或红棕色,微有光泽,外附一层白色薄膜,破开内为灰白色。有香气,味辛辣。

以颗粒饱满、气味辛辣、无杂质者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,筛去灰屑,用时捣碎即得。

【性味】 辛,温。

【功能】 燥湿散寒,消食解酒。

【主治】 心腹冷气绞痛,呕吐酸水,酒湿水泻,噎膈,反胃。

【用法与用量】 八分至二钱。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

沉 香

Chénxiāng

LIGNUM AQUILARIAE

【来源】 本品为瑞香科(Thymelaeaceae)植物沉香(*Aquilaria agallocha* Roxb.)或白木香(*Aquilaria sinensis*(Lour.)Gilg)含有树脂的木材。野生或栽培,前者为进口沉香,产于印度、马来亚等地。后者为国产沉香,产于广东、广西等地。全年均可采收,割取含沉香的树干或根部,将不含沉香部分尽可能除去,阴干即得。

【鉴别】 进口沉香 多呈盔帽形、棒状或片状,外形极不规则,长2—5寸,直径或宽

0.5—2 寸。表面褐色，常有黑色与黄色交错的纹理，平滑光滑。质地坚实，沉重，难折断，用刀劈开，破开面呈灰褐色。能沉于水或半沉半浮。有特殊香气，味苦，燃烧时有油渗出，香气浓烈。

国产沉香 多呈不规则块状或片状，长 1—4 寸，直径或宽 1—2 寸。表面凹凸不平，有加工的刀痕，可见黑褐色的含油部分与黄色的木部相间，形成斑纹。其孔洞及凹窝的表面呈朽木状。质较轻，折断面刺状，大多不能沉水。气味与进口沉香同。

均以质重结实、含油多、香气浓厚、能沉水者为佳。

【炮炙】 刷净，劈成小块，用时捣碎或研成细粉即得。

【性味】 辛，微温。

【功能】 降气，温中，暖肾。

【主治】 气逆喘急，吐泻，呃逆，心腹疼痛，腰膝虚冷，大便虚秘，小便气淋，男子精冷。

【用法与用量】 三分至一钱。

【贮藏】 置阴凉干燥处，密闭保存。

沙苑子 (潼蒺藜)

Shāyuánzǐ

SEMEN ASTRAGALI COMPLANATI

【来源】 本品为豆科(Leguminosae)植物扁茎黄耆(*Astragalus complanatus* R. Br.)的干燥成熟种子。栽培或野生，主产于陕西、河北、山西等地。秋末冬初种子成熟而果实尚未开裂时连茎割下，晒干后打下种子，去净杂质，再晒干即得。

【鉴别】 本品略呈肾臟形而稍扁，长约半分，宽约 0.4 分。表面灰褐色或绿褐色，光滑。一边微向内凹陷。质坚硬。种仁两瓣，淡黄色。无臭，味淡，嚼之有豆腥气。

以粒大饱满、无杂质者为佳。

【炮炙】 沙苑子 用水漂净泥沙，捞出，晒干即得。

盐沙苑子 取拣净的沙苑子，用盐水喷淋均匀，置锅内用文火微炒，取出，放凉即得。每沙苑子 100 斤，用盐 2 斤加适量开水化开澄清。

【性味】 苦，温。

【功能】 补肝，益肾，明目，固精。

【主治】 肝肾不足，腰膝痠痛，目暗不明，遗精早泄，小便不禁。

【用法与用量】 二至三錢。

【貯藏】 置通風干燥处。

辛 夷

Xīnyí

FLOS MAGNOLIAE LILIFLORAE

【来源】 本品为木兰科(Magnoliaceae)植物木兰 (*Magnolia liliflora* Desr.) 的干燥花蕾。栽培或野生,产于河南、安徽、浙江、四川、陕西、湖北等地。冬、春二季采摘,除去枝梗,晒干或用微火烘干即得。

【鉴别】 本品呈毛笔头形或长卵形,基部有木质短柄。长约0.6—1寸,中部直径3—5分。外被苞片,生有黄绿色光亮的毛茸,剥去外层苞片,内有数层紧密相抱的棕紫色花瓣。除去花瓣后,内有螺旋状排列的花蕊。质轻脆,易分层,显油性,呈红棕色。气辛香,味辛辣。

以朵大、色黄绿、内瓣紧密、气香、无梗者为佳。

【炮炙】 拣去杂质及花柄,簸去泥屑即得。

【性味】 辛,温。

【功能】 散头面风热。

【主治】 头痛,鼻渊。

【用法与用量】 八分至一钱五分;外用适量,研末塞鼻。

【贮藏】 置干燥处,防潮及虫蛀。

诃 子

Hēzǐ

FRUCTUS CHEBULAE

【来源】 本品为使君子科(Combretaceae)植物诃子(*Terminalia chebula* Retz.)的干燥成熟果实。多系栽培,主产于云南、广东、广西等地。秋、冬二季采摘成熟的果实,晒干

即得。

【鉴别】 本品呈长圆形或卵形，长约1寸，直径5—6分。表面黄绿色或黄棕色，微带光泽，有不规则的皱纹、抽沟及5—6条纵棱，基部有果柄脱落后的小圆疤痕。果肉质坚实。果核一枚，黄白色，粗糙，极坚硬，内含一枚种子，呈狭长纺锤形，种皮薄，紧包于种仁之外，种仁白色，两片，相互重叠成卷旋状。稍有酸气，味酸涩。

以粒大、质坚体重、肉厚、外皮黄绿色、微皱、有光泽者为佳。

【炮炙】 诃子肉 拣净，用水浸泡，闷润，砸开去核，干燥即得。

【性味】 苦、酸，温、涩。

【功能】 涩肠，敛肺，降气。

【主治】 久泻，久痢，脱肛，久咳失音，肠风便血，崩漏带下，遗精盗汗。

【用法与用量】 八分至一钱五分。

【贮藏】 置干燥处。

补骨脂 (破故纸)

Bǔgǔzhǐ

FRUCTUS PSORALEAE

【来源】 本品为豆科(Leguminosae)植物补骨脂(*Psoralea corylifolia* L.)的干燥成熟果实。多系栽培，主产于河南、四川、陕西等地。秋季果实成熟时采摘果穗，晒干，搓下果实，去净杂质即得。

【鉴别】 本品呈肾臟形，略扁，长1—1.5分，宽0.6—1分，厚约半分。表面黑色或黑褐色，有微细的网纹，一边微凹陷。质坚硬，剖开外皮可见黄白色种仁，有油性。微有香气，味辛、微苦。

以颗粒饱满、黑褐色、无梗及杂质者为佳。

【炮炙】 补骨脂 拣净杂质，洗净，晒干即得。

盐补骨脂 取净补骨脂用盐水拌匀，微润，置锅内用文火炒至微鼓起，取出，晾干即得。

每补骨脂100斤，用盐2斤8两加适量开水化开澄清。

【性味】 辛，大温。

【功能】 温补命门。

【主治】 肾虚冷泻，小便频数，遗尿，腰膝冷痛，阳痿。

【用法与用量】 一至三錢，煎服或入丸散服。

【貯藏】 置通風干燥处。

远 志

Yuǎnzhi

RADIX POLYGALAE

【来源】 本品为远志科(Polygalaceae)植物远志(*Polygala tenuifolia* Willd.)的干燥根部。均系野生，主产于山西、陕西、河南等地。春、秋二季均可采挖，除去殘莖、須根及泥土，晒至二、三成干、皮稍皺縮时，抽去木心，晒干即得。

【鉴别】 本品呈长管状，弯曲不直，长1—4寸，直径1—3分。外皮灰黃色，全体有較密并深陷的橫皺紋及裂紋，或有細縱紋及細小的疙瘩状支根痕。质脆，易折断，断面黃白色，中空。臭微，味苦微辛，嚼之有刺喉感。

以筒粗、肉厚、去淨木心者为佳。

【炮炙】 远志 拣去杂质，切段，篩去灰屑即得。

炙远志 取甘草，置鍋內加水煎湯，去渣，加入拣淨去木心的远志，用文火煮至湯吸尽，取出，干燥即得。

每远志100斤，用甘草6斤4两。

蜜远志 取炙远志，加炼熟的蜂蜜与开水少許，拌勻，稍悶，置鍋內用文火炒至不粘手为度，取出，放凉即得。

每炙远志100斤，加炼熟蜂蜜20斤。

【性味】 苦、辛，溫。

【功能】 益智安神，散郁豁痰。

【主治】 惊悸健忘，癰疽疮肿，咳嗽多痰。

【用法与用量】 一至三錢，一般炮炙后用。

【貯藏】 置通風干燥处。

连 翹

Liánqiào

FRUCTUS FORSYTHIAE

【来源】 本品为木犀科(Oleaceae)植物連翹(*Forsythia suspensa* Vahl)的干燥成熟

果实。栽培或野生，主产于山西、河南、陕西等地。秋季当果实初熟、颜色尚带绿色或已熟透时采收，采下初熟果实，蒸熟，晒干，即为青翘；采收熟透的果实，晒干，除去种子及杂质，即为老翘。

【鉴别】 本品呈长卵形，长5—7分，直径2—3分。顶端锐尖，基部有小柄或已脱落，表面有不规则的纵皱纹及多数凸起的小斑点，两面各有一条明显的纵沟。青翘多不开裂，绿褐色，表面凸起的灰白色小斑点较少，种子多数，细长，一侧有翅，黄绿色。老翘自尖端开裂或裂成两瓣，表面黄棕色或红棕色，内表面多为浅黄棕色，种子棕色，多已脱落。微有香气，味苦。

青翘以色青绿、无枝梗者为佳；老翘以色黄、壳厚、无种子、纯净者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，去梗，搓开，簸筛去心即得。

【性味】 苦，微寒。

【功能】 清热，解毒，散结，消肿，排脓。

【主治】 温热，疮疡，痲瘋，丹毒，热淋，斑疹。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置通风干燥处。

麦 门 冬 (麦冬)

Màiméndōng

RADIX OPHIOPOGONIS

【来源】 本品为百合科(Liliaceae)植物沿阶草(*Ophiopogon japonicus* Ker-Gawl.)的干燥块根。栽培或野生，主产于浙江、四川等地。4—7月采挖整株，剪下块根，洗净泥土，暴晒、堆积使其反潮，摊开再晒干，除去须根即得。

【鉴别】 本品呈纺锤形，中部肥满，扁圆不一，长0.5—1寸许，中部直径1—2分。表面黄白色，半透明，有细纵纹。质柔韧，断面白色，蜡质状，细腻。中间有细硬心，可以抽出。微有香气，味甜，嚼之发粘。

以肥大、淡黄白色、质柔、嚼之发粘者为佳。瘦小、色棕黄、嚼之粘性小者质次。其须根部分不可入药。

【炮炙】 麦冬 取拣净的麦门冬，用水浸泡，捞出，润透后抽去心，洗净，捞出，晒干即得。

朱麦冬 取拣净去心的麦門冬，置盆内喷水少许，微润，加朱砂细粉，撒布均匀，并随时翻动，至外面挂匀朱砂为度，取出，晾干即得。

每麦門冬10斤，用朱砂3两。

【性味】 甘、微苦，微寒。

【功能】 潤肺，清心，泻热。

【主治】 虚劳烦热，咳嗽，吐血，咯血，口干燥渴。

【用法与用量】 一錢五分至三錢。

【貯藏】 置阴凉干燥处，防潮。

麦 芽

Màiyá

FRUCTUS HORDEI GERMINATUS

【来源】 本品为禾本科(Gramineae)植物大麦(*Hordeum vulgare* L.)的成熟果实按下述炮炙项下的方法加工制成。

【鉴别】 本品呈梭形，长约3分，直径约1分。有二片黄白色的外壳环抱，背面有五条脉纹，腹面有一条小沟。一端有约1分长的黄棕色幼芽，线形而扁；另一端有纤细弯曲的须根。剥去外壳，内有黄白色的大麦米一粒。无臭，味微甘。

以芽完整、黄色、无杂质者为佳。未发芽者不可入药。

【炮炙】 **麦芽** 取拣净的大麦，用水浸泡至六、七成透，捞出，置能排水的容器内，盖好，每日淋水一次，保持湿度，至发芽长约1分时，取出，晒干即得。

炒麦芽 取麦芽，置锅内用文火炒至深黄色，取出，风晾即得。

焦麦芽 取麦芽，置锅内用武火炒至焦黄色，微喷清水，取出，风干即得。

【性味】 咸，温。

【功能】 开胃，消食，下气。

【主治】 食积不消，心腹胀满。

【用法与用量】 三至四錢。

【注意】 孕妇慎用。

【貯藏】 置通风干燥处，防潮及虫蛀。

赤 小 豆

Chìxiǎodòu

SEMEN PHASEOLI

【来源】 本品为豆科(Leguminosae)植物赤小豆(*Phaseolus calcaratus* Roxb.)的干燥成熟种子。栽培或野生,主产于广东、广西、江西等地。秋季豆荚成熟而未开裂时将全株拔起,晒干,打下种子,除去杂质,晒干即得。

【鉴别】 本品呈长圆形而稍扁,长2—2.5分,直径约1分。表面紫红色,无光泽或微有光泽,一侧上端有白色突起的脐点,其中间凹陷成一条小沟。种子背面有一条不明显的棱脊。种仁两瓣,乳白色。无臭,味微甘,嚼之有豆腥气。

以体实、饱满、色紫红者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,用水洗净,晒干即得。

【性味】 甘、酸,平。

【功能】 利水散血,清热解毒。

【主治】 水肿,脚气,热毒痈肿,湿热泻痢。

【用法与用量】 三至五钱。

【贮藏】 置干燥处,防虫蛀。

赤 石 脂

Chìshízhī

HALLOYSITUM RUBRUM

【来源】 本品为天然产的一种红色的多水高岭土。主产于山西、河南、江苏等地。选择红色滑腻如脂的块状体,除去杂石、泥土即得。

【鉴别】 本品呈不规则的块状,大小不一。表面粉红色、红色至紫红色,或有红白相间的花纹,光滑如脂。质软细腻,易砸碎,断面表里相同,吸水性强,用舌舔之粘舌。有泥土气味,嚼之无沙石感。

以色红、光滑细腻、易碎、舌舔之粘性强者为佳。

【炮炙】 煅石脂 拣去杂质、碾成細粉，用醋和匀，搓条切段，晒干，置坩埚內，在无烟的炉火中煅紅透，取出，晾凉即得。

【性味】 甘，溫，瀉。

【功能】 瀉腸止血，收湿生肌。

【主治】 久痢滑泻、便血脫肛，遺精，崩漏帶下；外治潰瘍不斂。

【用法与用量】 三至四錢；外用適量，研末敷患处。

【注意】 畏肉桂、桂枝。

【貯藏】 置干燥处，防潮。

赤 芍

Chìsháo

RADIX PAEONIAE RUBRA

【来源】 本品为毛茛科(Ranunculaceae)植物芍药(*Paeonia lactiflora* Pall.)或草芍药(*Paeonia obovata* Maxim.)的干燥根部。多系野生，主产于內蒙古、辽宁、河北等地。秋季采挖，除去根头及須根，洗淨泥上，晾晒至半干时捆成小捆，再晒干即得。

【鉴别】 本品呈圆柱形，多扭曲不直，长0.3—1尺，直径2—6分。表面棕紅色或紫褐色，皮粗糙，易脱落，全体有纵沟及皺紋，并有根痕及凸起的横行小点。质硬而脆，易折断，断面不平坦，粉白色或粉紅色，中間有菊花心或塊裂隙。稍有香气，味微苦略酸。

以条粗、外皮易脱落、断面白色、粉性大、习称“糟皮粉渣”者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，分开大小条，用水洗泡約七、八成透，捞出，晒晾，潤至内外湿度均匀，切片，干燥即得。

【性味】 酸、苦，微寒。

【功能】 泻肝火，散瘀血。

【主治】 腹痛，胁痛，坚积，血痹，疝瘕，腸風，痢肿，目赤，妇女經閉。

【用法与用量】 一錢五分至三錢。

【注意】 反藜芦。

【貯藏】 置通風干燥处。

豆 蔻

Dòukòu

FRUCTUS AMOMI CARDAMOMI

【来源】 本品为姜科(Zingiberaceae)植物白豆蔻(*Amomum cardamomum* L.)的干燥果实。多系栽培,主产于越南、泰国等地。果实由绿色转为黄绿色时采收,除去枝梗,晒干即得。

【鉴别】 本品略呈圆球形,具不显著的钝三棱,直径3—5分。外皮黄白色,光滑,有许多纵向筋脉纹理,一端有小突起,一端有果柄痕,两端的棱沟中常有黄色的毛茸。果皮轻脆,易裂开,内含有种子二、三十粒,集结成球,习称“蔻球”。蔻球分三瓣,有白色隔膜,每瓣有种子7—10粒,习称“蔻米”或“蔻仁”,为不规则的多面体,直径约1分,表面暗棕色或灰棕色,有微细的波纹,一端有圆形小凹点,质坚硬,断面白色粉质,有油性。气芳香,味辛凉。

以个大饱满、果皮薄而完整、气味浓厚者为佳。

【炮炙】 拣净杂质,筛去泥屑,用时捣碎即得。

【性味】 辛,热。

【功能】 行气,暖胃,消食,解酒毒。

【主治】 感寒腹痛,吐逆反胃,气滞腹胀,呃逆噎气,宿食不消,酒醉不醒。

【用法与用量】 五分至二钱。

【贮藏】 置阴凉干燥处,密闭保存。

芦 荟

Lúhuì

ALOE

【来源】 本品为百合科(Liliaceae)库拉索芦荟(*Aloe vera* L.)及好望角芦荟(*Aloe ferox* Mill.)的植物液汁经浓缩的干燥物。均系进口,前者称为老芦荟,后者称为新芦荟。产于非洲等地。割取植物的叶片,收集其流出的液汁,经浓缩干燥制得。

【鉴别】本品呈不规则的块状，常破裂为多角形，大小不一。老芦茎表面呈红褐色或深褐色，发暗。体轻，质硬，不易破碎，断面粗糙或显麻纹。新芦茎表面呈暗褐色，发绿而有光泽。体轻，质松脆易碎，断面似玻璃而有层纹。有特殊的臭气，味极苦。

以气味俱浓、焙后无杂质及泥沙者为佳。

【炮炙】拣去杂质，斩成小块即得。

【性味】苦，寒。

【功能】清热，杀虫。

【主治】肝经实热便秘，妇女经闭，小儿癫痫，惊风，疳热；外治齿齙，湿痹。

【用法与用量】五分至一钱五分，多入丸散服；外用适量，研末敷患处。

【注意】孕妇忌内服。

【贮藏】置阴凉干燥处，防热。

芦 根

Lúgēn

RHIZOMA PHRAGMITIS

【来源】本品为禾本科(Gramineae)植物芦苇(*Phragmites communis*(L.)Trin.)的新鲜或干燥地下根状茎。野生或栽培，全国各地均有生产。春、夏、秋三季均可采挖，除去泥土，剪去残茎、芽及节上须根，剥去披在外面的膜状叶，晒干，或埋于湿沙中供鲜用。

【鉴别】鲜芦根 呈长圆柱形，长短不一，直径约0.5寸。表面黄白色，有光泽，顶端尖形似竹笋，绿色或黄绿色。全体有节，节间长3—5寸，节上有残根和芽痕。质轻而韧，不易折断。横切面黄白色，中空似竹筒，周壁厚约半分，有排列成环的小孔。外皮疏松可剥离，无臭，味甘。

干芦根 呈压扁的长圆柱形。表面有光泽，黄白色，节处较硬，显红黄色。节间有纵皱纹。质轻而柔韧。无臭，味微甘。

均以黄白色、有光泽、无须根、节长、条粗壮、不带细根、质嫩者为佳。

【炮炙】拣去杂质，用水洗净，切段，晒干即得。

【性味】甘、寒。

【功能】清热，止呕。

【主治】内热烦渴，嘔吐，反胃，肺痿，肺痛。

【用法与用量】 五錢至一兩。

【貯藏】 鮮芦根置阴涼潮湿处;干芦根置通風干燥处。

芫 花

Yuánhua

FLOS GENKWA

【来源】 本品为瑞香科(Thymelaeaceae)植物芫花(*Daphne genkwa* Sieb. et Zucc.)的干燥花蕾。多系野生,产于安徽、江苏、浙江、四川、山东等地。春季当花未开放前采摘,拣去杂质,晒干或烘干即得。

【鉴别】 本品呈棒槌状,上端膨大,下端較細,略弯曲。长约3分,直径約1分。单朵或3—7朵成簇。上端裂为4片,形如花瓣,藍紫色,下部呈灰棕色,其上密布短絨毛。花心較硬,呈紫紅色。全花质軟。气微香,久嗅能致头痛,味微甘,細嚼有辣感。

以花蕾多而整齐、藍紫色、无杂质者为佳。

【炮炙】 芫花 拣淨杂质,篩去土即得。

醋芫花 取淨芫花,加醋拌勻,潤透,置鍋內用文火炒至醋吸尽、呈微黃色,取出,晾干即得。

每芫花100斤,用醋50斤。

【性味】 辛,溫;有毒。

【功能】 逐水,滌痰。

【主治】 水飲,痰癖,喘嗽,胁痛,水肿,心腹脹滿。

【用法与用量】 五分至一錢,炮炙后用,多入丸散服。

【注意】 孕妇忌用;反甘草。

【貯藏】 置通風干燥处,防潮。

苏 木

Sùmù

LIGNUM SAPPAN

【来源】 本品为豆科(Leguminosae)植物苏木(*Caesalpinia sappan* L.)的干燥心材。

均系野生,产于广西、云南、台湾、广东等地。全年均可采收,除去外皮及边材,取心材,晒干即得。

【鉴别】 本品呈长圆柱形或为瓣状,有的则連結根部呈疙瘩状。长数寸至3尺。表面红黄色或黄棕色,一般均红黄相间,并有刀削的痕迹。全体呈木质性,坚硬,致密,横断面有明显的环纹,中心有暗棕色、质松的髓。无臭,味微甘。将本品投入热水中,水染成鲜艳的桃红色,加醋则变为黄色,再加碱又变为红色。

以粗壮坚实、红黄色的心材为佳。

【炮炙】 锯成长段,镑片或碾碎即得。

【性味】 甘、咸,平。

【功能】 行血破瘀。

【主治】 妇人血气心腹痛,经闭气壅,产后瘀血腹痛,痈肿,扑损瘀血。

【用法与用量】 八分至一钱五分。

【注意】 孕妇忌用。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

苍 朮

Cāngzhú

RHIZOMA ATRACTYLODIS

【来源】 本品为菊科(Compositae)植物苍朮(*Atractylodes lancea* (Thunb.) DC.)或北苍朮(*Atractylodes chinensis* (DC.) Koidz.)的干燥地下根状茎。均系野生,全国大部分地区均有生产,主产于江苏、安徽、湖北、河北、山西、内蒙古等地。春、秋二季采挖,除去泥土及残茎,晒干后除去须根即得。

【鉴别】 本品呈不规则的连珠状或结节状圆柱形。偶有分枝,多弯曲皱缩,块大小不一。长1—3寸,直径约5分。表面灰褐色或黑棕色,有皱纹及横曲纹,并残留有茎痕。质坚实,易折断,断面黄白色或灰白色,有多数习称“朱砂点”的油点。有濃郁的特异香气,味微甘而苦。

以个大、坚实、无毛须、断面朱砂点多、香气濃郁、断面暴露稍久可析出白毛状的结晶者为佳。

【炮炙】 苍朮 拣去杂质,用水泡至七、八成透,捞出,润透后切片,晒干即得。

炙苍朮 取苍朮片,用米泔水喷洒湿润,置锅内用文火炒至微黄色;或取拣净的苍朮,用米泔水浸泡后捞出,置籠屉内加热蒸透,取出,干燥即得。

【性味】 辛、苦,温。

【功能】 健脾,燥湿,散郁,辟秽。

【主治】 寒湿吐泻,心腹胀痛,水肿腹胀,风寒湿痹,湿痰留饮。

【用法与用量】 一至三钱;烧烟辟秽恶。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

苍耳子

Cāng'ěrzi

FRUCTUS XANTHII

【来源】 本品为菊科(Compositae)植物苍耳(*Xanthium strumarium* L.)的干燥成熟果实。均系野生,主产于山东、江苏、湖北等地。秋季果实成熟时割取全株,晒干,打下果实,去净梗叶即得。

【鉴别】 本品呈纺锤形,长3—5分,直径1.5—2分。表面浅绿色或黄绿色,全体有刺,刺顶端有倒钩。质坚体轻,破开后,皮较厚,内有双仁,皮灰黑,肉白,有油性。无臭,味甘微苦。

以粒大、饱满、色黄绿者为佳。

【炮炙】 苍耳子 拣净杂质,去刺,筛去屑末即得。

炒苍耳子 取苍耳子,置锅内用文火炒至深黄色,取出,放凉,搓去刺,过筛即得。

【性味】 甘、温,有毒。

【功能】 散风湿。

【主治】 风寒头痛,风湿周痹,四肢挛痛,疮疥瘙痒,鼻渊。

【用法与用量】 一至三钱。

【贮藏】 置通风干燥处。

芥 子

Jièzǐ

SEMEN SINAPIS

【来源】 本品为十字花科(Cruciferae)植物芥(*Brassica juncea* (L.) Coss.)的干燥成熟种子。均系栽培,主产于河北、山西等地。果实成熟时割取全株,晒干后,打下种子,除净杂质即得。

【鉴别】 本品略呈圆球形,直径近半分,比白芥子稍小。外皮深黄色或黄棕色,侧面有一条沟纹或不明显。用扩大镜观察,表面可见细微的网纹,一端有明显的小点。破开内含黄色折叠的种仁,富油性。无臭,研碎后加水浸湿则发生辛烈的特异臭气,味辛辣峻烈。

以粒均匀、饱满、色黄、味烈者为佳。

【炮炙】 芥子 筛去泥屑即得。

炒芥子 取净芥子,置锅内用文火炒至深黄色,并微发香辣气为度,取出,放凉即得。

【性味】 辛,热。

【功能】 温中散寒,豁痰利窍。

【主治】 胃寒吐食,肺寒咳嗽,风冷气痛,口噤唇紧。

【用法与用量】 一钱至一钱五分。

【贮藏】 置通风干燥处,防潮。

芡 实

Qiànshí

SEMEN EURYALES

【来源】 本品为睡莲科(Nymphaeaceae)植物芡(*Euryale ferox* Salisb.)的干燥成熟种仁。栽培或野生,主产于江苏、湖南、湖北、山东等地。秋末冬初茎叶枯萎后采收,击碎果皮,取出种子,除去硬壳,去净杂质,晒干即得。

【鉴别】 本品呈圆球形,直径约2分。一端呈白色,约占全体1/3,有圆形凹陷,另一

端为棕紅色,約占全体 2/3。表面平滑,有花紋。质硬而脆,破开后,断面不平,色洁白,粉性。无臭,味淡。

以顆粒飽滿、均匀、粉性足、无碎末及皮壳者为佳。

【炮炙】 芡实 拣去杂质和硬壳即得。

炒芡实 将麸皮撒于加热的鍋內,俟烟冒出时,加入淨芡实,炒至微黃色,取出,筛去麸皮,放凉即得。

每芡实 100 斤,用麸皮 10 斤。

【性味】 甘,平,濡。

【功能】 补脾去湿,益肾瀉精。

【主治】 遺精,白浊,带下,泄泻,腰膝痹痛,小便不禁。

【用法与用量】 二至三錢。

【貯藏】 置通風干燥处,防虫蛀。

花 蕊 石

Huāruǐshí

OPHICALCITUM

【来源】 本品为一种含蛇紋石大理岩石。主产于陝西、河南、浙江、湖南等地。挖出后,除去泥土及杂石即得。

【鉴别】 本品为不規則的块状物,形扁斜多具楞角,大小不一。表面不平坦,灰白色,有黃色或黃綠色花紋相夾其間,对光照之有閃星状亮光。体重,质坚硬,击碎后,断面不整齐。无臭,无味。

以块整齐、坚硬、夾有黃綠色斑紋者为佳。

【炮炙】 花蕊石 洗淨泥土,晒干,敲成小块即得。

煅花蕊石 取淨花蕊石,打碎,置坩鍋內,在无烟炉火中煅紅透,取出,晾凉,打碎成小块即得。

【性味】 酸,平,濡。

【功能】 化瘀,止血。

【主治】 吐血,下血,产后血运;外治金疮出血。

【用法与用量】 一錢五分至三錢，炮炙后用，多研末服；外用适量，敷患处。

【貯藏】 置干燥处。

杜 仲

Dùzhòng

CORTEX EUCOMMIAE

【来源】 本品为杜仲科(Eucommiaceae)植物杜仲 (*Eucommia ulmoides* Oliv.) 的干燥树皮。栽培或野生，产于四川、云南、贵州、湖北、河南、陕西等地。春、夏二季剥取树皮，刨去粗皮，晒干即得。

【鉴别】 本品呈扁平的板片状，少数两边稍向内卷曲，大小厚薄不一，一般厚1—3分。外皮平坦或粗糙，呈淡棕色或灰棕色，具明显的纵皱纹及纵裂槽。内表面暗紫色，光滑。质脆，易折断，断面有银白色丝状物相连，细密，略有伸缩性。臭微，味稍苦，嚼之有胶状残余物。

以皮厚、完整、去净粗皮、断面丝多、内表面黑褐色者为佳。皮薄、断面丝少或皮厚带粗皮者质次。

【炮炙】 杜仲 拣去杂质，刷去泥土，切块即得。

杜仲炭 取杜仲块，置锅内用武火炒至黑色并断丝，但须存性，用盐水喷洒，取出，防止复燃，晾干即得。

每杜仲块100斤，用盐3斤，加适量开水化开澄清。

【性味】 甘、微辛，温。

【功能】 补肝肾，强筋骨，安胎。

【主治】 腰膝痠痛，阴下湿痒，小便余沥，胎漏欲堕。

【用法与用量】 二至三錢。

【貯藏】 置通风干燥处。

鸡 内 金

Jīnèijīn

ENDOTHELIUM CORNEUM GIGERIAE GALLI

【来源】 本品为雉科(Phasianidae)动物鸡(*Gallus gallus domesticus* Briss.)的干燥沙囊内壁。全国各地均有生产,将鸡宰杀后,取出沙囊,剖开,趁热将内壁剥下,洗净,晒干即得。

【鉴别】 本品为近圆形或不规则的片状物。完整者长约1寸许,宽不足1寸。表面金黄色或黄褐色,有的微显绿色,具波浪状条棱。薄而脆,易折断,断面胶质状,有光泽。微有腥气,味微苦。

以个大、完整不破碎、无杂质者为佳。

【炮炙】 鸡内金 搓碎,过筛,用水漂洗,晒干即得。

炒鸡内金 取洗净的鸡内金,置锅内用文火微炒至鼓起,取出,放凉即得。

焦鸡内金 取洗净的鸡内金,置锅内用武火炒至黄黑色,取出,放凉即得。

【性味】 甘,平。

【功能】 健胃,消食。

【主治】 食积腹胀,呕吐,泻痢,小儿疳积。

【用法与用量】 一至三钱。

【贮藏】 置干燥处,防虫蛀。

鸡 冠 花

Jīgūānhuā

FLOS CELOSIAE CRISTATAE

【来源】 本品为苋科(Amaranthaceae)植物鸡冠花(*Celosia cristata* L.)的干燥花序。栽培或野生,全国大部分地区多有生产,秋季当花盛开时,连花轴一同剪下,晒干即得。

【鉴别】 本品为扁平肥厚的花轴，上宽下窄，长2—3寸，宽2—4寸。红色或白色，上缘形如鸡冠，有皱折，表面有细小的线状鳞片。花轴表面密生许多小花。小花的苞片及萼片均呈膜质，多数已结实，用手轻击即有种子散出。种子细小，扁圆形，黑色而光亮。无臭，味淡。

以朵大、色泽鲜艳者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，除去残柄，剪成段即得。

【性味】 甘、凉。

【功能】 凉血，止血。

【主治】 痔漏下血，赤白下痢，吐血，沙淋，妇女崩中，赤白带下。

【用法与用量】 一至三钱。

【贮藏】 置通风干燥处，避光保存。

阿 魏

Āwèi

ASAFOETIDA

【来源】 本品为繖形科 (Umbelliferae) 植物阿魏 (*Ferula assafoetida* L.) 的树脂，产于伊朗、阿富汗等地。植物开花前自根头处切断，以树叶复盖断面，数日后收集凝固的树脂即得。

【鉴别】 本品呈不规则块状，凝固如脂或互相粘连。颜色深浅不一，表面多呈黄棕色或红棕色。质坚硬或略软发粘，加温则软化。新鲜的切开面颜色较浅，可见乳白色与浅棕色或红棕色交错，通称“五彩阿魏”。有强烈而持久的蒜样臭气，味微苦辣。

以纯净、气味浓厚、断面乳白色者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，研成小块即得。

【性味】 辛，平。

【功能】 消积，杀虫。

【主治】 虫积，肉积，痞块，心腹冷痛，瘕疾，痢疾。

【用法与用量】 三至五分，多入丸散服；亦可入膏药外用。

【注意】 孕妇忌内服。

【贮藏】 置阴凉干燥处，密闭保存，防热。

陈 皮

Chénpí

PERICARPIUM CITRI RETICULATAE

【来源】 本品为芸香科(Rutaceae)植物柑橘(*Citrus reticulata* Blanco)的干燥成熟果皮。在药材中分为陈皮和广陈皮两类。均系栽培,主产于四川、福建、广东、浙江等地。冬季至翌年春季采摘,剥取成熟果实的果皮,炕干或晒干即得。

【鉴别】 陈皮 常剖成四瓣,每瓣多呈瓣圆形,由果柄处连在一起,有时破裂分离,或为不规则片状。外表面红黄色或红棕色,有细皱纹及圆形小凹点,对光照射,有较大的凹点,清晰可见。内表面浅黄色或黄白色,粗糙,亦有小凹点,但不甚明显。质柔软,干后发脆,易折断,断面不平。气芳香,味稍甜、后感苦辛。

广陈皮 均剖成三瓣或破裂分离成单片。外表面棕紫色或浅红棕色,粗糙、多皱缩,有圆形小凹点,对光照射稍透明。内表面黄白色,粗糙,有分布不均匀的筋络,亦有圆形小点。质柔软,不易折断,断面不平。香气浓郁,味微苦辛,嚼之稍麻舌。

均以瓣大、整齐、色鲜艳、质柔软、香气浓者为佳。瓣小、破碎、色浅、内表面色灰白者为次。

【炮炙】 刷净泥土,拣去杂质,喷淋清水,闷润后切丝,晾干即得。

【性味】 苦、辛,温。

【功能】 理气、燥湿、导滞、消痰。

【主治】 胸腹胀满,呕吐泄泻,咳嗽多痰。¹

【用法与用量】 一至三钱。

【贮藏】 置阴凉干燥处,防潮及虫蛀。

附 子

Fùzǐ

RADIX ACONITI CARMICHAELI PRAEPARATA

【来源】 本品为毛茛科(Ranunculaceae)植物卡氏乌头(*Aconitum carmichaeli* Debx.)

經加工过的干燥块状子根。均系栽培,主产于四川、陝西等地。夏至至小暑間挖取附子母根旁的子根,除去泥土,称为泥附子。用来加工,其法如下:

(一)盐附子 选取較大的泥附子洗淨泥土,浸入食盐和盐滷混合液中,每日取出晒晾,并逐漸延長晒晾時間,直至附子表面出現大量結晶盐粒,并体质变硬为止。

(二)黑順片 選擇中等大小的泥附子,浸入盐滷水液中数日,連盐滷水一同煮沸,撈出,水漂,切成厚片,再浸入稀盐滷水液中,并加入調色剂,使附片染成濃茶色,用水漂洗至口尝无麻痺感时,取出蒸熟,烘至半干,再晒干即得。

(三)白附片 選擇較小的泥附子,浸入盐滷水液中数日,并与盐滷水同煮至透心为止,撈出,剝去外皮,纵切成薄片,用水漂洗至口尝无麻痺感时,取出蒸熟,晒至半干,以硫磺熏后,晒干即得。

【鉴别】 盐附子 呈圓錐形,长2寸左右,直徑約寸許。頂端寬大,中央有凹陷的芽痕,上身肥滿,周圍生有瘤状隆起的分支,习称“釘角”,表面灰黑色,被盐霜。体重,横切面灰褐色,其不整齐的筋脉或中心有小空隙,其中充滿盐霜。无臭,味咸而麻痺。

以个大、坚实、表面起盐霜者为佳。

黑順片 为不規則形的纵切片,上寬下窄,长0.7—1.2寸,寬5—8分,厚約1.5分。外皮黑褐色,內部暗黃色半透明状,油潤而有光澤,并可見有纵走的筋脉。质硬而脆,破碎面角质状。无臭,味淡。

以片均匀、表面油潤光澤者为佳。

白附片 形状与黑順片相同,唯全体均为黃白色半透明状,片較薄,厚約1分。气味同黑順片。

以片匀、黃白色、油潤、半透明状者为佳。

【炮炙】 盐附子 过罗去盐即得。

淡附片 取盐附子,用清水浸漂,每日換水2—3次,至盐分漂尽,置鍋內与甘草、黑豆加水同煮透,至切开后口尝无麻痺咸为度,取出,去甘草、黑豆、刮去皮,切为兩瓣,置鍋內加水煮約2小时,煮透后取出,晒晾,反复悶潤数次,潤透后切片,晒干即得。

每盐附子100斤,用甘草5斤、黑豆10斤。

炮附子 取附子,用水洗淨,浸泡一夜,除去皮、脐,切片,再用水泡至口尝无麻痺咸为度,取出,用姜湯浸1—3天,撈出蒸熟,再焙至七成干,倒入鍋內用武火急炒至烟起微鼓裂,取出,放凉即得;或置鉄絲网上在熾炭上反复炮至微鼓裂,倒出,放凉即得。

【性味】 辛、甘、大热;有大毒。

【功能】 回阳补火,散寒除湿。

【主治】 阴盛阳格,大汗亡阳,暴泻脫阳,脈逆脉微,沉寒痼冷,心腹冷痛,寒泻冷痢,

風寒濕痹，腫滿脚氣，小兒慢驚，久漏冷瘡。

【用法與用量】 一至三錢，一般炮炙後用，生者作湯須久煮。

【注意】 孕婦忌用。

【貯藏】 鹽附子置陰涼乾燥處，防濕及防風；黑順片及白附片置乾燥處，防潮。

忍冬藤（金銀藤）

Rěndōngténg

CAULIS LONICERAE

【來源】 本品為忍冬科(Caprifoliaceae)植物忍冬 (*Lonicera japonica* Thunb.) 的乾燥帶葉莖枝。野生或栽培，主產於浙江、江蘇、河南、山東等地。秋、冬二季採收，割取藤莖，曬干即得。

【鑒別】 本品為圓柱形枝條，常數枝相互盤曲成束狀，多分枝，直徑1—1.5分。表面棕紅色或紫棕色，外皮光滑，易剝落，嫩枝呈灰綠色，有細柔毛。質脆易斷，斷面黃白色，中有空心。葉對生于節上，呈橢圓形，黃綠色，兩面均有茸毛，下面較密，葉脈明顯。無臭，味微甘。

以條勻、帶葉、表面棕紅色、質嫩、不破裂者為佳。

【炮炙】 揀去雜質，用水浸泡，約至八成透，撈出，悶潤後切段，乾燥即得。

【性味】 甘，寒。

【功能】 清熱，解毒。

【主治】 溫病發熱，痈疽，疥癬，惡瘡，腫毒，熱毒血痢。

【用法與用量】 三錢至一兩；并可外用，適量，研末塗敷患處。

【貯藏】 置乾燥處。

吳茱萸

Wúzhūyú

FRUCTUS EVODIAE

【來源】 本品為芸香科(Rutaceae)植物吳茱萸 (*Evodia rutaecarpa* (Juss.) Benth.)

的干燥未成熟果实。多系栽培，主产于贵州、广西、湖南、云南、浙江、陕西等地。9—11月果实呈茶绿色而未成熟时采摘，摊开晒干或晾干，遇阴雨可用微火烘干，搓揉后筛去枝梗及杂质即得。

【鉴别】本品呈略带五棱的扁球形，直径0.7—1.5分，高约1分。表面暗黄绿色或绿色，粗糙，有细皱纹及鬃眼（油室）。顶平，中间有凹窝及五条小裂缝，有的不明显，基部有花萼及果柄。果柄长约1分，直径约半分，棕绿色或黄绿色，密生毛茸。质坚，不易碎，破开后内部黑色，多充实或少有裂隙，用扩大镜观察，边缘显黑色油质麻点。香气浓烈，味辛辣微苦。

以粒小饱满坚实、色绿、香气浓烈、无枝梗者为佳。粒大、色黑、香气较弱者质次。其开裂似花椒、无臭、无麻辣味者不宜作吴茱萸入药。

【炮炙】吴茱萸 拣净杂质，去梗即得。

炙吴茱萸 取甘草，捣碎，置锅内加水煎汤，捞出甘草渣，加入净吴茱萸，稍润，俟汤吸尽，不断翻炒至微干，取出，晒干即得。

每吴茱萸100斤，用甘草6斤4两。

【性味】辛、苦，大热；有小毒。

【功能】散寒温中，燥湿解郁。

【主治】嘔逆吞酸，厥阴头痛，心腹冷痛，胃冷吐泻，血痹阴疽，脚气水肿；外治口舌生疮。

【用法与用量】五分至二钱；外用生者适量，研末醋调塗足心。

【贮藏】置阴凉干燥处，密闭保存。

旱 蓬 草（墨旱莲）

Hànliáncǎo

HERBA ECLIPTAE

【来源】本品为菊科（Compositae）植物鳢肠（*Eclipta prostrata* L.）的干燥地上部分。均系野生，产于江苏、江西、浙江、广东等地。夏、秋二季当枝叶繁茂时割取地上部分，除去杂质，晒干或阴干即得。

【鉴别】本品全体被有白色毛茸。茎呈圆柱形，长约1尺，直径约1分。绿褐色或带紫红色，有纵棱。叶对生，叶柄极短，或近于无柄。叶片卷曲皱缩或破碎，润湿展平后呈长

披針形，全緣或略具淺齒，綠褐色。莖頂多生頭狀花序，形似菊花，多已結實，果實眾多，顯黑色顆粒狀。浸水後搓其莖葉，則呈黑色。微有香氣，味淡微咸。

以色綠、無雜質者為佳。

【炮炙】 揀去雜質，略洗，悶潤後，除去殘根，切段，乾燥即得。

【性味】 甘、酸，微寒。

【功能】 涼血止血，補腎益陰。

【主治】 吐血，尿血，便血，血痢，須髮早白，牙齒不固；外治諸瘡出血。

【用法與用量】 一錢五分至三錢；外用適量，研末敷患處。

【貯藏】 置陰涼乾燥處。

谷 芽（稻芽）

Gǔyá

FRUCTUS ORYZAE GERMINATUS

【來源】 本品為禾本科(Gramineae)植物稻(*Oryza sativa* L.)的成熟果實按下述炮炙項下的方法加工製成。

【鑒別】 本品呈長橢圓形而扁，兩端略尖，長2—3分，寬約1分。兩側面各有2條凸出的縱稜，外殼黃色粗糙，擴大鏡下可見白色細毛茸。一端生有兩個小片，由其中一個小片的內側生出1—3條淡黃色彎曲的須根，長約1—2分。剝去外殼，內含白米一粒。質堅，斷面白色，有粉性。無臭，味淡。

以粒飽滿、大小均勻、色黃、無雜質者為佳。未發芽者不可入藥。

【炮炙】 谷芽 取揀淨的稻子，用水浸泡至六、七成透，撈出，置能排水的容器內，澆好，每日淋水一次，保持濕潤，使發芽，待須根長約1—2分時，取出，曬干即得。

炒谷芽 取谷芽，置鍋內用文火炒至深黃色，取出，風涼即得。

焦谷芽 取谷芽，置鍋內用武火炒至焦黃色，微噴清水，取出，風干即得。

【性味】 甘，溫。

【功能】 健脾開胃，和中消食。

【主治】 宿食不化，不思飲食。

【用法與用量】 一錢五分至三錢。

【貯藏】 置乾燥通風處，防蟲蛀。

谷 精 草

Gǔjīngcǎo

FLOS ERIOCAULI

【来源】 本品为谷精草科(Eriocaulaceae)植物谷精草(*Eriocaulon buergerianum* Koenig.)的干燥带花茎的花序。多系野生，主产于江苏、浙江等地。秋季8—9月采收，将花茎拔出，除去泥土，晒干即得。

【鉴别】 本品为带花茎的头状花序。花头(珠)呈扁圆形，直径约2分。灰白色，有层层膜片，排列较紧密，上附白色细粉，底部有鳞片状浅黄色总苞片，呈盘状。用手搓碎后，可见多数黑色小粒及灰绿色小形种子。花茎长5—6寸，黄绿色，有光泽。质柔，不易断。无臭，味淡，久嚼则成团。

以珠大而紧、灰白色、花茎短、黄绿色、无根、叶及杂质者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，切段即得。

【性味】 辛、甘，微温。

【功能】 散风，明目，退翳。

【主治】 目翳，头风，牙痛。

【用法与用量】 三至四钱。

【贮藏】 置通风干燥处。

牡 丹 皮

Mǔdānpí

CORTEX MOUTAN RADICIS

【来源】 本品为毛茛科(Ranunculaceae)植物牡丹(*Paeonia suffruticosa* Andr.)的干燥根皮。多系栽培，主产于安徽、四川、陕西、湖北、山东、甘肃等地。秋季或春初采挖，洗净泥土，除去须根及茎苗，剥下根皮，晒干，“刮丹皮”则需刮去外皮，晒干即得。

【鉴别】 本品呈圆筒状或半圆筒状，一侧常有纵裂缝，两边多向内卷曲。长短不一，一般长2—3寸，直径1—4分，厚约1分。外表面灰褐色或紫褐色，有纵皱纹、微突起的长

圓形橫生疤痕及須根痕，“刮丹皮”外表面則顯粉紅色。內表面棕色或淡灰黃色，有細縱紋，并常有多數亮銀星，在擴大鏡下觀察，可見為無色透明的針狀或柱狀結晶。質硬而脆，易折斷，斷面較平坦，顯粉性，外層灰褐色或粉紅色，內層粉白色。有特殊香氣，味微苦而澀，稍有麻舌感。

以條粗長、無木心、皮厚、斷面粉白色、粉性足、香氣濃、亮銀星多者為佳。條細、帶根須及木心、斷面粉性小、無亮銀星者質次。

【炮炙】 牡丹皮 揀去雜質，除去木心，洗淨，潤透後切片，曬干即得。

丹皮炭 取牡丹皮片，置鍋內用武火炒至表面焦黃，邊緣帶黑色，但須存性，噴淋清水，取出，曬干即得。

【性味】 辛、苦，微寒。

【功能】 清熱，涼血，和血，消癥。

【主治】 熱入血分，發斑，驚癇，吐血，衄血，骨蒸勞熱，婦女經閉，癥瘕，痛經。

【用法與用量】 一錢五分至三錢。

【注意】 孕婦慎用。

【貯藏】 置陰涼干燥處。

牡 蠣

Mǔlì

CONCHA OSTREAE

【來源】 本品為牡蠣科 (Ostreidae) 動物長牡蠣 (*Ostrea gigas* Thunb.)、大連灣牡蠣 (*Ostrea talienwhanensis* Crosse) 或近江牡蠣 (*Ostrea rivularis* Gould) 的貝殼。養殖或野生，我國沿海各地都有生產。全年均可采收，去肉，洗淨，曬干即得。

【鑒別】 本品呈極不規則的卵圓形、長圓形或類三角形貝殼。大小厚薄不一，一般長 0.3—1 尺，寬 1.5—3 寸，厚 0.4—1 寸。外表面顯灰褐色、灰白色或隱現紫色，層片分明，層紋作彎曲形，邊緣常成波狀起伏，內面多為乳白色，平滑而有光澤，基部有橫紋而無光澤。左殼比右殼厚而大，并因左殼固著在他物上，故常有海螺等水生物著生。右殼較薄而小，較平坦。質硬而重，不易破碎，斷面成層狀，顏色潔白。無臭，味微咸。

以個大整齊、內面光潔者為佳。

【炮炙】 生牡蠣 用水洗刷淨，晾干，碾碎即得。

煅牡蠣 取刷淨的牡蠣，置无烟的炉火上煅至灰白色，取出，晾凉，碾碎即得。

【性味】 咸，微寒，滑。

【功能】 清热补水，敛汗濡肠，软坚化痰。

【主治】 阴虚内热，自汗，盗汗，遗精，崩带，烦热，惊痫，瘰癧，温瘡。

【用法与用量】 三钱至一两。

【贮藏】 置干燥处。

龟 板

Guībǎn

PLASTRUM TESTUDINIS

【来源】 本品为龟科(Testudinidae)动物龟(*Chinemys reevesii*(Gray))的腹甲。均系野生，主产于浙江、湖北、湖南、安徽等地。全年均可捕捉，而以秋、冬二季为多。捕后将龟杀死，剔去筋肉，取其腹甲，洗净，晒干即为“血板”；或将其用沸水煮熟，取其腹甲，除净残肉，晒干即为“烫板”。

【鉴别】 本品呈板片状，近长方椭圆形，由12块小板(腹鳞甲)组成，两侧均有侧板(肋鳞甲)呈翼状向斜上方弯曲，有的已除去。周围具楞角，凹凸不平。长3—6寸，宽2—3寸，一端较狭，有一缺刻。外表面暗褐色或紫褐色，甲板缝呈锯齿状交错，“血板”有光泽，不脱皮，有的略带血迹，“烫板”颜色稍深，有脱皮的痕迹。内表面灰白色或淡黄色，不光滑。质坚硬，易自板缝处断裂。微有腥气，味微咸。

以血板、块大、无破碎、洁净、无腐肉者为佳。烫板质次。

【炮炙】 **龟板** 用水浸泡，去净皮肉，洗净，晒干即得。

醋龟板 取沙子，置锅内用武火炒至轻松，加入净龟板，炒至表面微黄色，及时取出，筛除沙子，置醋盆内略浸，取出，用水漂洗，晒干即得。

每龟板100斤，用醋30斤。

【性味】 甘，平。

【功能】 滋阴，潜阳。

【主治】 肾阴不足，骨蒸劳热，久咳，遗精，崩漏，带下，腰脚痠痛，阴虚风动，久痢，瘰癧，痔瘡，小儿囟门不合。

【用法与用量】 三至八钱。

【注意】 孕妇慎用。

【貯藏】 置干燥处。

何 首 烏

Héshǒuwū

RADIX POLYGONI MULTIFLORI

【来源】 本品为蓼科(Polygonaceae)植物何首烏(*Polygonum multiflorum* Thunb.)的干燥块根。多系野生,主产于河南、湖北、江苏等地。秋季叶枯萎时采挖,洗净泥土,削去两端,晾干,个大的切成块,用微火炕干或晒干即得。

【鉴别】 本品呈圆块状或不规则纺锤形,长2—5寸,膨大部分直径1—2.5寸。表面红棕色或红褐色,皱缩不平,带不整齐的纵沟,或有横曲纹及明显的斑痕。质较重,有粉性,横断面淡红棕色或淡黄棕色,周边有如云朵状的纹理环繞。无臭,味微苦而澀。

以质坚、显粉性者为佳。

【炮炙】 生首烏 拣去杂质,洗净,用水泡至八成透,捞出,潤至内外湿度均匀,切片或切成方块,干燥即得。

制首烏 取何首烏块倒入盆内,用黑豆汁与黄酒拌匀,置罐内或适宜容器内,密闭,坐水锅中,隔水燉至汁液吸尽,取出,晒干即得。

每何首烏块100斤,用黑豆10斤、黄酒25斤。

黑豆汁的制法:取黑豆10斤,加水煮約4小时,熬汁約15斤,豆渣再加水煮約3小时,熬汁約10斤,两次共熬汁約25斤。

【性味】 苦、甘,温,滞。

【功能】 补益肝肾,調和气血,收斂精气。

【主治】 肝肾阴虛,須发早白,腰膝痠痛,遺精,崩帶,腸風,久瘧,痢直,瘰癧。

【用法与用量】 三至四錢。

【貯藏】 置通風干燥处,防虫蛀。

佛 手

Fóshǒu

FRUCTUS CITRI SARCODACTYLIS

【来源】 本品为芸香料(Rutaceae)植物佛手柑(*Citrus medica* var. *sarcodactylis*)

Swingle)的果实纵切的干燥薄片。均系栽培,主产于四川、广东、云南等地。秋季果实变黄或尚未变黄前采收,纵切成0.5—2分厚的薄片,晒干或低温烘干即得。

【鉴别】本品为类椭圆形或卵圆形的薄片,大小不一,长2—3寸,宽1—2寸,厚约半分。顶端稍宽,有3—5个似手指状分歧的裂瓣,基部略狭,有的可见果柄痕。外皮黄绿色或橙黄色,有皱纹及油点。果肉白色,有凸凹不平的点或线纹,无瓢及种子。质硬脆,易折断。有香气,味酸微苦。

以片大、绿皮白肉、香气浓厚者为佳。

【炮炙】拣去杂质,用水喷润后,切碎,晒干即得。

【性味】辛、苦、酸、温。

【功能】理气,化痰。

【主治】呕吐,咳嗽,气郁,腹痛,胸膈胀满,停痰积饮。

【用法与用量】五分至三钱。

【贮藏】置阴凉干燥处,防潮及虫蛀。

伸 筋 草

Shēnjīncǎo

HERBA LYCOPODII

【来源】本品为石松科(Lycopodiaceae)植物石松(*Lycopodium clavatum* L.)的干燥全草。均系野生,产于湖北、浙江、江苏、贵州等地。夏、秋二季当茎叶生长茂盛时,连根拔起,晒干,除去泥土及杂质即得。

【鉴别】本品茎弯曲而细长,长2—4尺,直径0.5—1分。表面黄绿色,可见须状根。多分枝,嫩茎密生黄绿色的细长鳞叶。质柔韧,不易折断。断面外层有浅黄绿色的薄皮,内为黄白色木心。根上的外皮多脱落,露出黄色木心。无臭,味淡。

以茎长、黄绿色、无泥土杂质者为佳。

【炮炙】拣去杂质,切段,筛去灰屑即得。

【性味】甘,温。

【功能】舒筋活血,祛风通络。

【主治】风寒湿痹,关节肿痛。

【用法与用量】三至四钱。

【贮藏】置干燥处。

皂 角 刺

Zaòjiǎocì

SPINA GLEDITSIAE

【来源】 本品为豆科 (Leguminosae) 植物皂荚 (*Gleditsia sinensis* Lam.) 茎上的干燥棘刺。野生或栽培, 产于江苏、湖北、河北、山西、河南、山东等地。全年均可采收, 将刺剥下, 纵切成斜薄片, 晒干即得。

【鉴别】 完整的棘刺有多数分枝。主干圆柱形, 长1—4寸或更长, 基部直径2—3分。分枝刺一般长0.5—2寸, 有时再分成小刺。表面棕紫色, 尖端棕红色, 光滑或有细皱纹, 刺端极尖锐。质坚硬, 难折断。药材多纵切或斜切成薄片, 厚在半分以下。外表皮棕紫色, 内为黄白色的木质, 中心为淡灰棕色, 质疏松的髓。质脆, 易折断。无臭, 味淡。

以片薄、纯净、整齐者为佳。

【炮炙】 拣去杂质, 未切片的用水浸泡, 润透后切片, 晒干即得。

【性味】 辛, 温。

【功能】 搜风、杀虫、托毒、溃痛。

【主治】 痈肿、疮毒、瘾风, 胞衣不下; 外治疮疖。

【用法与用量】 一至三钱; 外用适量, 醋煎涂患处。

【注意】 孕妇忌内服。

【贮藏】 置干燥处。

泽 兰

Zélán

HERBA LYCOPI

【来源】 本品为唇形科 (Labiales) 植物地瓜儿苗 (*Lycopus lucidus* Turcz.) 的干燥茎叶。栽培或野生, 全国大部分地区均有生产。夏秋间茎叶茂盛时割取地上部分, 晒干即得。

【鉴别】 本品茎呈四方柱形, 少分枝, 长约尺许, 直径1—1.5分。表面黄绿色或带紫

色，每側面有一縱溝。質輕脆，易折斷，斷面中央有白色的髓或中空。葉有短柄，對生，葉片多皺縮不平，呈長圓形，長1.5—3.5寸，先端尖，邊緣有鋸齒，暗綠色或微帶黃色。有的葉腋間有簇生的小花成輪狀。無臭，味淡。

以葉多、色綠、不破碎、莖短、質嫩者為佳。

【炮炙】 揀去雜質，除去殘根，噴潤後切段，干燥即得。

【性味】 苦、辛，微溫。

【功能】 破血、行水。

【主治】 婦女經閉癥瘕，產後瘀血腹痛，痛毒，水腫，扑損瘀血。

【用法與用量】 一錢五分至三錢。

【貯藏】 置陰涼干燥處

澤 瀉

Zéxiè

RHIZOMA ALISMATIS

【來源】 本品為澤瀉科(Alismataceae)植物澤瀉(*Alisma plantaino-aquatica* L.)的干燥塊莖。均系栽培，主產于福建、四川、江西等地。冬季采挖全株，除去莖葉及須根，洗淨，焙干，再經撞擦除去須根及粗皮即得。

【鑒別】 本品呈圓球形、橢圓形或卵圓形，長1—2寸，直徑1—1.5寸。粗皮多已除去，表面黃白色，有不規則橫向環狀淺溝紋，并散有多數細小突起的須根痕，底部或有瘤狀的疙瘩突起。質堅實，斷面黃白色，粉性，有多數細孔。氣微弱，味微苦。

以個大、質堅、色黃白、粉性大者為佳。個小、皮較糙、破開現焦黃色者質次。

【炮炙】 澤瀉 揀去雜質，分開大小個，用水浸泡至約八成透，撈出，曬涼，悶潤至內外濕度均勻，切片，及時干燥即得。

鹽澤瀉 取澤瀉片，用鹽水噴淋均勻，悶潤，置鍋內用文火微炒至表面略現黃色，取出，晾干即得。

每澤瀉片100斤，用鹽2斤8兩，加適量開水化開澄清。

【性味】 甘，寒。

【功能】 滲濕熱，利小便。

【主治】 湿热小便不利，水肿胀满，呕吐，泻痢，痰饮，脚气，五淋，尿血。

【用法与用量】 二至四钱。

【贮藏】 置通风干燥处，防虫蛀。

油 松 节

Yóusōngjié

LIGNUM PINI NODI

【来源】 本品为松科 (Pinaceae) 植物油松 (*Pinus tabulaeformis* Carr.) 或马尾松 (*Pinus massoniana* Lamb.) 干燥的分枝处的木材。多系野生，全国大部分地区多有生产。全年均可采收，锯取分枝处含油的木材，晒干即得。

【鉴别】 本品多为圆形或不规则的块状或片状物，有刀砍或锯痕。大小粗细不一。表面黄棕色或红棕色。体重，质坚，横断面具圆形环纹，油性显著。有松节油香气，味微辣。易燃，燃烧时有油渗出。

以个大、油性足者为佳。无油性者不可入药。

【炮炙】 锯成寸段，劈小块即得。

【性味】 苦，温。

【功能】 祛风，燥湿。

【主治】 历节风痛，筋骨掣急；外治风蛀牙痛。

【用法与用量】 三至五钱，水煎或浸酒服；外用适量，煎水含漱。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

羌 活

Qiānghuó

RHIZOMA ET RADIX NOTOPTERYGII

【来源】 本品为繖形科 (Umbelliferae) 植物羌活 (*Notopterygium* sp.) 的干燥地下根状茎及根。主产于四川、甘肃、青海等地。春、秋二季采挖，除去细根及泥土，晒干或烘干。

即得。

【鉴别】 蜜茛 为羌活的地下根状茎，形似蚕，呈圆柱形或略弯曲，长1—3寸，直径2—6分，顶端有茎叶残基，表面棕褐色，有多数紧密而隆起的环节，节上密生瘤状突起的须根痕。质轻松，易折断，断而不齐，有菊花纹及空隙，外层棕红色，中心淡黄白色，均有朱砂点。有特殊的香气，味微苦而麻。

条茛 为羌活的根，呈圆柱形或分枝，长1—5寸，直径1—5分。表面棕褐色，有纵纹及瘤状突起的须根痕。上端稍粗大，有稀疏隆起的环节。质松脆，易折断，断面朱砂点不明显，气味稍淡薄。

以条粗壮、有隆起曲折环纹、断面质紧密、朱砂点多、香气浓郁者为佳。条细长，环节稀疏、质松脆，断面朱砂点不明显者质次。

【炮炙】 折去杂质，洗净，润透后切片，干燥即得。

【性味】 辛、苦，温。

【功能】 发表，散风，胜湿。

【主治】 感冒风寒，头痛，无汗，风寒湿痹，痈疽肿痛。

【用法与用量】 一至三钱。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防虫蛀。

卷 柏

Juǎnbǎi

HERBA SELAGINELLAE

【来源】 本品为卷柏科(Selaginellaceae)植物卷柏(*Selaginella tamariscina*(Beauv.) Spr.)的干燥全草。均系野生，主产于山东、辽宁、河北等地。春、秋二季均可采收，除去须根及泥土，晒干即得。

【鉴别】 本品全体卷缩成团，大小不一，一般长1.5—3.5寸，枝叶丛生，形扁有分枝，绿色或棕黄色，向内卷曲，枝上密生鳞片状小叶。质脆，易折断。基部残留有少数簇生的须根。无臭，无味。

以色绿、叶多、完整不碎者为佳。

【炮炙】 卷柏 除去残留须根及杂质，用水洗净，剪段，晒干即得。

卷柏炭 取洗净的卷柏，置锅内用武火炒至外表现焦黑色，内呈焦黄色，但须存性，喷

淋清水，取出，晒干即得。

【性味】 辛，平。

【功能】 生用破血，炒用止血。

【主治】 生用治妇女经闭，瘀血；炒用治便血，脱肛。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【注意】 孕妇忌用。

【贮藏】 置干燥处。

炉 甘 石

Lúgānshí

CALAMINA

【来源】 本品为一种主含碳酸锌的天然矿石。主产于广西、四川、湖南等地。挖出后，除去杂石即得。

【鉴别】 本品呈不规则的块状，圆形或扁平形，大小不一。表面白色或淡红色，有凹陷和小孔眼，显粉性。体轻而质松，易碎。断面白色或淡红色，呈颗粒状，并有细小孔隙，有吸湿性。无臭，味微涩。

以块大、白色或显淡红色、质轻者为佳。

【炮炙】 炉甘石 拣去杂质，打碎即得。

煅甘石 取净炉甘石，打碎，置坩埚内，在无烟的炉火中煅烧至微红，取出，立即倒入水盆中浸淬，搅拌，倾出混悬液，将石渣晾干，再煅烧3—4次，最后将石渣去掉。取混悬液澄清，倾去清水，将滤出的细粉干燥即得。

黄连水拌甘石 取黄连，加水煎汤，加入上述煅甘石细粉，拌匀并使吸尽，烘干即得。

每煅甘石细粉100斤，用黄连12斤8两。

【性味】 甘，温。

【功能】 收湿除烂，去翳退赤。

【主治】 目赤翳障，烂弦风眼，溃瘍不敛，皮肤湿疮。

【用法与用量】 专作外用，用量随方配合。

【贮藏】 置干燥处。

玫 瑰 花

Méiguìhuā

FLOS ROSAE RUGOSAE

【来源】 本品为蔷薇科(Rosaceae)植物玫瑰(*Rosa rugosa* Thunb.)的干燥花。均为栽培,主产于江苏、浙江、福建、山东、四川、河北等地。4—6月间当花蕾将开放时分批采摘,用微火迅速烘干即得。

【鉴别】 本品略呈半球形或不规则团状,直径5—7分。花瓣密集,短而圆,色紫红而鲜艳。中央为黄色花蕊,下部有绿色花萼,其先端分裂成5片。下端有膨大呈球形的花托。质轻而脆。气芳香浓郁,味微苦。

以朵大瓣厚、色紫、鲜艳、香气浓者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,摘除花柄及蒂即得。

【性味】 甘、微苦,温。

【功能】 理气解郁,和血散瘀。

【主治】 肝胃气痛,新久风痹,跌打损伤,妇女月经不调,乳痈肿毒。

【用法与用量】 一至二钱。

【贮藏】 置阴凉干燥处,防潮及防压。

青 木 香

Qīngmùxiāng

RADIX ARISTOLOCHIAE

【来源】 本品为马兜铃科(Aristolochiaceae)植物马兜铃(*Aristolochia debilis* S. et Z.)的干燥根。均系野生,主产于浙江、江苏、安徽等地。于冬季茎叶枯萎时采挖,除去须根及泥土,晒干即得。

【鉴别】 本品为圆柱形或扁圆柱形,略弯曲,长2—6寸,直径2—5分。表面黄褐色,粗糙不平,有皱纹及须根痕。质脆,易折断,折断时有粉尘飞出,断面不平,外圈淡黄色,其内有一层明显的环纹,中心为白色与黄棕色相间的菊花纹,黄棕色部分有小孔。香气浓,

味苦。

以条粗大、坚实、粉多、香气濃郁者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，分开大小条，用水浸泡，捞出，晾晒，再润至内外湿度均匀，切片，干燥即得。

【性味】 辛、苦，寒。

【功能】 行气，解毒。

【主治】 痧疫壅毒，胸腹胀痛，疝气，积聚；外治痈肿疔毒，无疮瘰癧，蛇虫咬伤。

【用法与用量】 一至三钱；外用适量，捣烂或研末涂敷患处。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

青 皮

Qingpi

PERICARPIUM CITRI RETICULATAE VIRIDE

【来源】 本品为芸香科(Rutaceae)植物柑橘(*Citrus reticulata* Blanco)的干燥的未成熟果皮或幼小果实。均系栽培，主产于福建、浙江、四川等地。一般在春末夏初时采集，但也有延长至秋季采摘未成熟的果实或拣取自行落下的果实，个较小者习称“青皮子”，中等者习称“个青皮”，晒干即得。稍大者用刀将皮剖成四片至蒂部为止，除净内瓤，晒干，习称“四花青皮”。

【鉴别】 四花青皮 果皮四深裂，形状不一，各瓣多向内卷曲，皮薄。外皮黑绿色或青绿色，有皱纹。内面黄白色有脉络纹。断面边缘有油点。气清香，味苦辣。

以皮黑绿色、内面白色、油性足者为佳。

个青皮 呈不规则的圆球形，直径6—8分，小于3分的称青皮子。表面深灰色或黑绿色，有细皱纹及小瘤状突起。基部有果柄痕，指划之可见油迹。质坚硬，破开后断面皮厚0.5—1分，淡黄色或黄白色，外层显油点，内有果瓤，青皮子则少有空隙。气清香，味苦辣。

以坚实、个整齐、皮厚、香气浓者为佳。

【炮炙】 青皮 拣去杂质，用水泡透，捞出，沥去水，切片，及时晒干即得。

醋青皮 取青皮片，用醋拌匀，置锅内用文火炒至微黄色，取出，晾干即得。

每青皮片100斤，用醋15斤。

【性味】 苦、辛，溫。

【功能】 疎肝，破氣，散結。

【主治】 胸脇氣痛，乳癰，疝氣，食積。

【用法與用量】 一至三錢。

【貯藏】 置陰涼乾燥處。

青 果 (橄欖)

Qīngguǒ

FRUCTUS CANARII

【來源】 本品為橄欖科(Burseraceae)植物橄欖(*Canarium album* Raeusch.)的乾燥成熟果實。均系栽培，主產於廣東、福建、四川等地。秋季採摘成熟的果實，曬干或陰干即得。

【鑒別】 本品呈紡錘形，兩頭鈍尖，長約1寸。直徑4—6分。表面灰綠色或棕黃色，有抽溝及皺紋。果肉灰棕色或棕褐色，可以與果核分離。果核梭形，暗紅棕色，具六條楞綫；質堅硬，不易碎。破開內有3室，其中各有一粒細長梭形的種子，外皮紅棕色。種仁白色，富油性。無臭，果肉味澀，久嚼微甜。

以個大、堅實、肉厚、整齊、灰綠色者為佳。

【炮炙】 揀去雜質，洗淨曬干，用時打碎即得。

【性味】 甘，酸，平。

【功能】 清肺，開胃，除煩，生津。

【主治】 咽喉腫痛，煩渴，解河豚毒及酒毒。

【用法與用量】 一錢五分至三錢。

【貯藏】 置干燥處，防虫蛀。

青 苳 子

Qīngxiāngzǐ

SEMEN CELOSIAE

【來源】 本品為苋科(Amaranthaceae)植物青苳(*Celosia argentea* L.)的干燥成熟

种子。均为野生，全国大部分地区多有生产。秋季种子成熟时割下全株或剪下花穗，晒干，搓出种子，除去杂质，晒干即得。

【鉴别】 本品呈扁圆形，直径不及半分，中心较边缘稍厚。表面黑色，平滑光亮，用扩大镜观察，可见表面有细密网纹和一个小凹点。种皮薄而脆，破开后种仁黄白色。用手捏之种子易粘在手上。无臭，味淡。

以粒饱满、色黑光亮者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，过罗去土即得。

【性味】 苦，微寒。

【功能】 祛风热，清肝火，明目。

【主治】 目赤肿痛，障翳，皮肤风热瘙痒，疥癩。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置通风干燥处。

青 蒿

Qīnghāo

HERBA ARTEMISIAE CHINGHAO

【来源】 本品为菊科 (Compositae) 植物青蒿 (*Artemisia apiacea* Hance) 或黄花蒿 (*Artemisia annua* L.) 的干燥茎叶。均系野生，全国大部分地区均有生产。夏季开花前，割取地上部分，阴干即得。

【鉴别】 本品茎呈圆柱形，上部多分枝，长 1.5—2 尺，直径 2—3 分。表面黄绿色，有许多纵向的沟纹及棱线，全体光滑无毛。质轻，易折断，断面中央有白髓。叶互生，叶片灰绿色或暗绿色，再次分裂成细小的线形，质脆，极易破碎。有特殊香气，味微苦。

以质嫩、色绿、香气浓者为佳。

【炮炙】 青蒿 拣去杂质，除去残根，用水浸闷，切段，晒干即得。

鳖血青蒿 取青蒿段，置大盆内，淋入用温水少许稀释的鳖血，拌匀，稍闷，置锅内用文火微炒，取出，放凉即得。

每青蒿段 100 斤，用活鳖 200 个取血。

【性味】 苦，寒。

【功能】 泻热，清暑，埋劳。

【主治】 温病，暑热，疟疾寒热，骨蒸劳热，疥痒恶疮。

【用法与用量】 一錢五分至三錢;并可外用,适量,煎湯洗患处。

【貯藏】 置阴凉干燥处。

青 黛

Qīngdài

INDIGO PULVERATA LEVIS

【来源】 本品为爵床科(Acanthaceae)植物馬藍(*Baphicacanthus cusia* Bremek.)、豆科(Leguminosae)植物木藍(*Indigofera tinctoria* L.)、蓼科(Polygonaceae)植物蓼藍(*Polygonum tinctorium* Lour.)或十字花科(Cruciferae)植物菘藍(*Isatis tinctoria* L.)叶中的干燥色素。产于福建、河北、河南、四川、江苏等地。夏、秋二季均可采收制造。采摘以上植物的茎叶后,置木桶或大缸中,加入清水,浸至叶腐烂、茎脱皮时。将茎枝捞出,立即加入适量石灰,充分搅拌,至浸液由烏綠色轉为深紫紅色为度,捞起液面泡沫,于强烈的阳光下晒干即得。

【鉴别】 本品为极細的粉末。深藍色,质輕,易飞揚,可粘手粘紙。有特殊草腥气,味微酸。将粉末投入水中,則浮于水面,极少量下沉。将粉末置紙上以火点燃,則生紫紅色火焰。若隔铁片烧之,則全部揮散。

以粉細、色鮮藍、质輕而松、能浮于水面,以火烧之呈紫紅色火焰、嚼之无砂石感、味酸者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,过罗即得。

【性味】 咸,寒。

【功能】 清热,凉血,解毒。

【主治】 时病热盛,斑疹,吐血,咯血,小儿惊癇,疮肿,丹毒。

【用法与用量】 五分至一錢;并可外用,适量,塗敷患处。

【貯藏】 置干燥处,防潮。

青 礬 石

Qīngmǎngshí

LAPIS CHLORITI

【来源】 本品为一种綠泥石片岩。主产于湖南、湖北等地。挖出后,除淨杂石和泥土

即得。

【鉴别】 本品呈不规则的扁斜块状，或斜棱状的小碎块，大小不一。全体青灰色或灰绿色，微带珍珠样光泽。体重，质软，易碎，用指甲即可划下碎粉末，断面呈层片状，可见閃发光的星点。无臭，味淡。

以色青、块整齐、破开面有星点、无泥土者为佳。

【炮炙】 煨青礞石 拣净，加等量的火硝混和，置坩埚内煨烧至烟尽为度，用水飞法制成细粉，或取净青礞石置坩埚内，在无烟火中煨红透呈金黄色为度，取出，晾凉，簸取净礞石，除去沙石即得。

【性味】 甘、咸，平。

【功能】 墜痰消食，下气平肝。

【主治】 痰积，惊风，宿食，癥瘕。

【用法与用量】 一至二钱，多入丸散服。

【贮藏】 置干燥处。

刺 猬 皮

Cìwèipí

CORIUM ERINACEI

【来源】 本品为刺猬科(Erinaceidae)动物刺猬(*Erinaceus europaeus* L.)或短刺猬(*Hemichianus dauricus* Sundevoll)的干燥外皮。均系野生，全国大部分地区均有生产。全年均可捕捉，捕捉后，将皮剥下，撒上一层石灰，于通风处阴干即得。

【鉴别】 本品呈多角形板刷状或直条状，有的边缘卷曲成筒状或盘状。外表面密生错杂交错的硬刺，刺长5—7分，坚硬如针，灰白色、黄色或灰褐色不一。在腹部的皮上多有灰褐色软毛。皮内面灰白色或棕褐色，留有筋肉残痕。具有特殊腥臭气。

以张大、肉脂刮净、刺毛整洁者为佳。

【炮炙】 炒刺猬皮 取拣净的刺猬皮，剥成小块，洗净，晒干，另取滑石粉置锅内炒热，加入刺猬皮，炒烫至呈黄色，取出，筛刷去滑石粉，剪去毛，放凉即得。

【性味】 苦，平。

【功能】 降气，凉血。

【主治】 反胃吐食，腹痛疝积，肠风痔漏。

【用法与用量】 二至三錢，炮炙后用，煎服或研末服。

【注意】 孕妇忌用。

【貯藏】 置干燥处，防虫蛀。

苧 麻 根

Zhù má gēn

RADIX BOEHMERIAE

【来源】 本品为荨麻科(Urticaceae)植物苧麻(*Boehmeria nivea* (L.) Gaud.)的干燥根部。栽培或野生，主产于江苏、山东、陕西等地。冬、春二季采挖，除去地上茎和泥土，晒干即得。

【鉴别】 本品呈不规则圆柱形，稍弯曲，长2—3寸，直径3—6分。外皮灰棕色，有突起的根痕及许多疣状凸起。体轻，质坚硬，断面纤维性，略有粉质，嫩者实心，有时可见中间有数个同心环纹，老者空心。无臭，味淡，嚼时略有粘性。

以色灰棕、条匀而坚实者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，分开大小条，用水浸泡，洗净，捞出，润透后切片，干燥即得。

【性味】 甘，寒。

【功能】 清热，散瘀。

【主治】 天行热疾，大渴，火狂，血淋，癰闭：外治赤游丹毒，痈疽发背。

【用法与用量】 一錢五分至三錢；外用鲜者适量，捣烂贴敷患处。

【貯藏】 置通风干燥处，防虫蛀。

苦 竹 叶

Kǔ zhú yè

FOLIUM PLEIOBLASTI

【来源】 本品为禾本科(Gramineae)植物苦竹(*Pleioblastus amarus* (Keng) Keng f.)的干燥嫩叶。均系栽培，我国南方各省多有生产，主产于江西、江苏、浙江等地。夏、秋二

季将嫩叶摘下，晒干即得。

【鉴别】 本品多呈细长的卷筒状。展开后，叶片为披针形，长3—4寸，宽3—5分。叶柄长2—3分。叶上端渐渐窄细而尖锐，叶基圆形。正面灰绿色，光滑，背面粗糙而有毛茸，中间有一条较粗的主脉，两侧有8—16条平行排列的细脉，边缘的一侧有细锯齿。质脆而有弹性。无臭，味微苦。

以叶嫩、色绿、卷成筒状者为佳。

【炮炙】 拣净杂质，切段即得。

【性味】 苦，寒。

【功能】 清热，除烦。

【主治】 烦热，不眠，口疮，目痛。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置干燥处。

苦杏仁

Kǔxìngrén

SEMEN ARMENIACAE AMARAE

【来源】 本品为蔷薇科(Rosaceae)植物杏(*Prunus armeniaca* L.)或山杏(*Prunus armeniaca* var. *ansu* Maxim.)味苦的干燥成熟种子。多系栽培，主产于我国北方各地。夏季果实成熟时采摘，除去果肉及核壳，取种仁，晾干即得。

【鉴别】 本品呈心脏形，略扁，长3—5分，宽2—3.5分，厚1.5—2分。外皮薄，黄棕色或红棕色，有纵皱纹。顶端尖，尖端稍下方的边缘有一短线形的疤痕，底部钝圆、肥厚、左右不对称，底部中央有一圆点，由此处散出多数脉纹。除去种皮后，种仁浅黄白色，两瓣，富油性。无臭，加水共研，则发生特殊的香气，味苦。

以粒匀、饱满、肥厚、味苦、完整者为佳。

【炮炙】 苦杏仁 拣去杂质及残留的硬壳，即得。

炒苦杏仁 取净苦杏仁，置沸水锅中煮至外皮微皱，捞出，浸入凉水中，搓去皮，干燥后筛净，置锅内用文火炒至微黄色，取出，放凉即得。

【性味】 苦，温；有小毒。

【功能】 祛痰，止咳，定喘，润肠。

【主治】 外感咳嗽，喘满便秘。

【用法与用量】一錢五分至三錢。

【貯藏】置阴涼干燥处，防虫蛀。

苦 参

Kǔshēn

RADIX SOPHORAE FLAVESCENTIS

【来源】本品为豆科(Leguminosae)植物苦参(*Sophora flavescens* Ait.)的干燥根。均系野生，全国大部分地区多有生产。春、秋二季采挖，除去根头及须根，洗净泥土，晒干，或切成约1—3分厚片，晒干即得。

【鉴别】本品呈长条圆柱形，上粗下细，常有分叉，长0.3—1尺，直径3—6分。外附棕黄色薄皮，多破裂向外卷曲，易剥落，剥落处显黄色，光滑而微带光泽，纵皱纹明显。质坚硬，不易折断，断面黄白色，中心色较淡。臭微，味苦而持久。

苦参片为圆形或椭圆形的厚片，厚1—3分，横断面皮部与中心木质部分分层明晰，木质部分有显著的圆环，多形成2—4层环纹，菊花状纹理细而明显，粗大较老者往往形成裂隙。

以条长、皮细、不带根头、无须根者为佳；片以黄白色、整齐者为佳。

【炮炙】除去残留根头，分开大小条，洗净，取水浸泡，捞出，润透后切片，晒干即得。

【性味】苦，寒。

【功能】清热，燥湿，杀虫。

【主治】热痢泻血，黄疸疳积，小便黄赤，疥癩恶疮。

【用法与用量】一錢五分至三錢；并可外用，适量，煎汤洗患处。

【注意】反藜芦。

【貯藏】置干燥处。

苦 楝 皮

Kǔliàupí

CORTEX MELIAE

【来源】本品为楝科(Meliaceae)植物楝树(*Melia azedarach* L.)及川楝树(*Melia*

— 159 —

toosendan Sieb. et Zucc.) 的干燥根皮及树干皮。栽培或野生,主产于四川、湖北、安徽、江苏、河南等地。春、夏二季采收,将树干砍下,树根挖出,剥取根皮及树干皮,除去泥土,晒干即得。

【鉴别】 根皮 呈不规则的片状或槽状,长短宽窄不一,厚1—2分。外表面灰棕色或灰褐色,粗糙,常破裂。内表面淡黄色,有细纵纹。质较轻而韧,断面纤维成层,作薄片状,可层层剥离,剥下的薄片有极细的网纹。无臭,味苦。

以皮厚、条大、无糟朽者为佳。

干皮 呈槽形的片状或长卷筒状,长1—3尺,宽1—3寸,厚1—2分。外表面灰褐色或灰棕色,较平坦而有棕色小麻点及细裂纹或皱纹。内表面为白色或淡黄色。质脆,易折断,断面显纤维性层片状。气味与根皮同。

以外表皮光滑、不易剥落、可见多数麻点的幼嫩树皮为佳。

【炮炙】 洗净,用水浸泡,捞出,润透后切丝,干燥即得。

【性味】 苦,寒;有小毒。

【功能】 清热,燥湿,杀虫。

【主治】 蛔虫腹痛;外治风疹,疮癤,疥癩。

【用法与用量】 一钱五分至三钱;外用适量,煎汤浸洗或研末用醋或猪脂调涂患处。

【贮藏】 置通风干燥处,防潮。

枇 杷 叶

Pípayè

FOLIUM ERIOBOTRYAE

【来源】 本品为蔷薇科(Rosaceae)植物枇杷(*Eriobotrya japonica* Lindl.)的干燥叶。均系栽培,产于广东、江苏、浙江、福建、湖北等地。全年均可采摘,采摘后,晒至七、八成干时,扎成小把,再晒干即得。

【鉴别】 本品呈长圆形,长5—8寸,宽约2寸。叶柄极短,叶面灰绿色、黄棕色或红棕色,正面有光泽,背面密布棕色绒毛。叶先端尖形,周边有疏锯齿,近叶基处无锯齿。叶脉呈羽状,主脉在下表面显著突起。叶革质而脆,易折碎。无臭,味微苦。

以叶大、色灰绿、不破碎者为佳。

【炮炙】 枇杷叶 刷去绒毛,用水喷润,切丝,晒干即得。

蜜枇杷叶 取枇杷叶丝，加炼熟的蜂蜜与开水少许，拌匀，稍闷，置锅内用文火炒至不粘手为度，取出，放凉即得。

每枇杷叶丝100斤，用炼熟蜂蜜25斤。

【性味】 苦，平。

【功能】 清肺和胃，降气化痰。

【主治】 肺热咳嗽，胃热呃逆。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置干燥处。

松 花 粉

Sōnghuāfěn

POLLEN PINI

【来源】 本品为松科(Pinaceae)植物馬尾松(*Pinus massoniana* Lamb.)或油松(*Pinus tabulaeformis* Carr.)的干燥花粉。栽培或野生，主产于江苏、浙江、辽宁、吉林、湖北等地。4—5月当花盛开时，将花穗摘下，晒干，搓下花粉，除去杂质即得。

【鉴别】 本品为淡黄色的细粉末。用放大镜观察呈均匀的小圆粒，体质轻飘，易飞扬，手捻有滑润感，不沉于水。无臭，味淡，尝之有油香气，并微有油腻感。

以均匀、淡黄色、无杂质者为佳。

【炮炙】 筛去杂质即得。

【性味】 甘，温。

【功能】 祛风益气；外用收湿。

【主治】 头旋，脑肿；外治诸疮湿烂。

【用法与用量】 一至二钱；外用适量，敷患处。

【贮藏】 置干燥处，防潮。

松 香

Sōngxiāng

COLOPHONIUM

【来源】 本品为松科(Pinaceae)植物馬尾松(*Pinus massoniana* Lamb.)及共同属植物

物树干中取得的油树脂，經蒸溜除去揮发油后的遺留物。多系野生，产于广东、广西、福建、湖南、江西、浙江、安徽等地。多于夏季采收，在松树的树干上用刀挖成V字形或螺旋紋槽，使边材部的油树脂自伤口流出，收集后，加水蒸溜，使松节油溜出，取残渣冷却后，凝固即得。

【鉴别】 本品呈不规则半透明的块状，大小不一。表面黄色，常有一层霜粉。质較輕脆，易碎，断面光亮，似玻璃状。具松节油香气，味苦。加热則軟化，燃燒时发濃烟。

以块整齐、质堅脆、香气濃厚者为佳。

【炮炙】 松香 拣去杂质，置銅勺中用文火加热熔化，除去木屑等杂质后倒入水中，俟凉后取出，干燥即得。

制松香 取葱煎湯，加入松香粉，煮至松香完全熔化，乘热倒入冷水中，取出，阴干即得。

每松香 100 斤，用葱 10 斤。

【性味】 苦、甘，温。

【功能】 燥湿祛風，生肌止痛。

【主治】 風湿痹痛；外治疔疽，疥癬，湿疮，金疮出血。

【用法与用量】 一钱五分至三钱；外用适量，入膏药或研末搽敷患处。

【貯藏】 置阴凉干燥处，防火，防热。

郁 李 仁

Yùlirén

SEMEN PRUNI

【来源】 本品为蔷薇科(Rosaceae)植物欧李(*Prunus humilis* Bge.)或郁李(*Prunus japonica* Thunb.)的干燥成熟种子。多系野生，主产于河北、辽宁、內蒙古等地。秋季果实成熟时采摘，除去果肉，取核，再去壳，取出种仁即得。

【鉴别】 本品略呈长卵形，长 1.5—2 分，中部直径 1—1.5 分。表面黄白色、黄棕色或深棕色，由基部向上，具纵向脉紋。頂端銳尖，基部鈍圓，中間有圓臍。外皮薄，易剝落，种仁两瓣，白色，带油性。无臭，味微苦。

以顆粒飽滿充實、淡黃白色、整齐不碎、不出油、无核壳者为佳。

【炮炙】 簸淨杂质，拣去殘留硬壳，用时搗碎即得。

【性味】 辛、苦、甘，平。

【功能】 潤燥，滑腸，下氣，利水。

【主治】 大腸氣滯，燥澀不通，大腹水腫，四肢浮腫，小便不利。

【用法與用量】 一至三錢。

【注意】 孕婦慎用。

【貯藏】 置陰涼乾燥處，防蟲蛀。

郁 金

Yùjīn

RADIX CURCUMAE

【來源】 本品為姜科(Zingiberaceae)植物姜黃(*Curcuma longa* L.)或郁金(*Curcuma aromatica* Salisb.)的乾燥塊根。均系栽培，前者主產於四川，習稱“黃郁金”，后者主產於浙江、四川等地，共產於浙江溫州的習稱“黑郁金”。冬、春二季採挖，挖出後，摘取塊根，除去須根，洗淨泥上，大小分開，入沸水中煮透，取出，曬干即得。

【鑒別】 黃郁金 呈紡錘形，兩端稍尖，中部肥滿，長0.6—1寸，中部直徑3—5分。表面灰黃色或淡棕色，有明顯的灰白色細皺紋及凹下的小點，一端顯折斷的痕跡，呈鮮黃色，另一端稍尖。質堅實，橫斷面平坦光亮，呈角質狀，杏黃色或橙黃色，中部有一顏色較淺的圓心。微有姜香氣，味辛而苦。

以個大、中身肥滿、外皮皺紋細、斷面橙黃色者為佳。個小、較瘦及外皮較光、斷面有空隙、色淡黃者質次。

黑郁金 呈長紡錘形，稍扁，多彎曲，兩端鈍尖，常有折斷痕而呈灰黑色，長1—2寸，中部直徑3—4分。表面灰褐色，外皮皺縮或有較細的皺紋。質堅實，橫斷面暗灰色發亮，中部有一條顏色較淺的環紋，中心扁圓形。無臭，味淡而辛涼。

以個大、外皮少皺縮、斷面灰黑色者為佳。個小、皮較糙、帶有細根者質次。

以上兩類，黃郁金較黑郁金為優。

【炮炙】 用水浸泡，洗淨，撈出曬晾，潤透後切片，曬干即得。

【性味】 辛、苦，寒。

【功能】 行氣解郁，涼血破瘀。

【主治】 血氣郁滯，心腹胸脇諸痛，吐血，衄血，尿血，婦女倒經，癲狂及熱病神昏。

【用法与用量】 一至三錢。

【注意】 惡丁香、母丁香。

【貯藏】 置干燥处，防虫蛀。

虎 骨

Hǔgǔ

OS TIGRIS

【来源】 本品为猫科(Felidae)动物虎(*Panthera tigris* L.)的骨骼。均系野生，主产于吉林、黑龙江、湖南、四川、云南、贵州等地。全年皆可猎捕，将虎杀死后剥去皮肉，仅留四脚爪上的皮毛。再剔净残余的筋肉，阴干即得。

【鉴别】 虎的头骨较圆，额骨平，前额上部有一浅槽，顶骨后面常有一脊棱。颧骨向外展出，眼眶下面各有一椭圆形透孔，孔面斜向。上颌骨生有门齿三对，犬齿一对，臼齿四对，下颌骨生有门齿三对，犬齿一对，臼齿三对，共有牙齿30个。门齿较小，犬齿呈圆锥形，强大而锐利，并略向内弯曲，臼齿呈“山”字形，锯齿状，上颌最后一对臼齿幼虎常不显著，均呈白色或浅黄白色，有光泽，齿基深入颌骨内部，故习称“坐骨生牙”。颈椎七节，第一颈椎呈蝶形，第3—7颈椎呈马鞍形。胸椎十三节，每节上面有一较长的棘状突起，两侧联结有肋骨十三对，近脊处呈圆形，近胸部呈扁形，作弓背状，向内弯曲。腰椎七节，两侧有较长的棘状突起，荐椎三节常愈合成为一块，上面可见三个棘状突起。尾椎22—28节，多为双数，节中间稍突出。坐骨一具，呈长方形，左右对称。

肩胛骨两块，呈扇状半圆形，近中央部很薄，在外面有一条脊状突起。虎的腿骨有明显的棱，上节均为一根独骨，下节两骨合成。前肢上节下端靠近骨环处侧面有一扁长孔习称“风眼”，下节两骨相似并立，形略扁，略呈扭曲状，但一根较长。后肢上节圆柱形，能四侧放平而不晃动，上端内侧有一圆轴，下端有长圆形的凹槽，为膝盖骨的所在处，膝盖骨（即虎脛）呈长圆形，内面光滑，厚而坚重，常带有舌状筋，下节主骨粗大，呈三棱柱形，另一根很细，习称“邦骨”。前足五趾，后足四趾，趾端均具短爪钩。

虎骨的表面均呈黄白色或灰白色，细腻而油润。体较重，质坚实。断面可见中间空隙约占三分之一，其内骨髓形成丝络网状，为灰黄色。

以个大、体重、坚实、黄白色、无残肉者为佳。个小、体较轻、灰白色、带残肉者质次。如用毒药杀死，其骨发黑者，不可入药。

【炮炙】 虎骨 去淨筋肉，洗淨，阴干，临用时敲碎即得。

油虎骨 取淨虎骨，置鍋內用麻油炸酥，或抹麻油后用火烤酥，即得。

醋虎骨 取沙子，置鍋內炒至輕松，加入淨虎骨，炒至黃色，篩去沙子，將虎骨乘熱倒入醋內淬酥，取出，晾干即得。

每淨虎骨 100 斤，用醋 20—30 斤。

【性味】 辛，溫。

【功能】 追風健骨，定痛辟邪。

【主治】 歷節風痛，四肢拘攣，腰腳不隨，驚悸癲癇。

【用法與用量】 三至五錢。

【貯藏】 置干燥通風處，防潮，防熱，防虫蛀。

昆 布

Kūnbù

HERBA LAMINARIAE

【来源】 本品为昆布科(Laminariaceae)植物昆布(*Laminaria japonica* Aresch.)或翅藻科(Alariaceae)植物鵝掌菜(*Ecklonia kurome* Okam.)的干燥叶状体。前者习称“海带昆布”；后者习称“黑昆布”。均系野生，产于辽宁、山东、福建等地。多于夏、秋二季采收，由海中捞出后，晒干即得。

【鉴别】 海带昆布 卷曲折叠成团，或纏結成把。全体呈綠褐色，表面附有盐霜。用水浸軟則膨脹呈扁平的带状，长可达数尺，寬約数寸，中部較厚，邊緣較薄而呈波状，质厚革质状而粘滑，用手捻不分层。有腥气，味咸。

黑昆布 卷曲皺縮成不規則团状。全体呈黑色，表面常附有盐霜，质較薄。用水浸軟則膨脹呈扁平的叶状，长寬均 5—8 寸，厚約半分。兩側呈羽状深裂，裂片呈长舌形，邊緣有小齿。质柔滑，用手捻可以剝离二层。有腥气，味咸。

均以干燥、整齐、质厚无杂质者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，用水漂淨，捞出，稍晾，俟湿度适宜，切成寬絲，晾干即得。

【性味】 咸，寒、滑。

【功能】 軟堅，利水。

【主治】 瘰癧，癭瘤，水肿，积聚，睾丸肿痛。

【用法与用量】 一錢五分至三錢。

【貯藏】 置干燥处。

明 党 参

Míngdǎngshēn

RADIX CHANGII

【来源】 本品为繖形科(Umbelliferae)植物明党参(*Changium smyrnioides* Wolff)的干燥根。多系野生,产于安徽、江苏、浙江、四川、湖北等地。多在春季采挖,除去茎叶及须根,洗净泥土,置沸水中煮至无白心,取出,刮去外皮,晒干即得。

【鉴别】 本品呈细长圆柱形或纺锤形,长1.5—7寸,直径0.2—1寸。表面黄白色或淡棕色,微透明,两端色较深,有纵沟及细皱纹,并有少数须根痕。质较坚硬,粗者不易折断,断面外层黄白色,半透明,呈角质状,易剥落,中间有一大形淡黄白色的木质心。臭微,味淡。

以条匀、质坚实而重、表面黄白色半透明、须根痕少、断面淡黄色者为佳。

【炮炙】 用水稍浸后捞出,润透切片,干燥即得。

【性味】 甘、微苦,微寒。

【功能】 利肺,化痰,和胃,解毒。

【主治】 咳嗽,呃逆,疔毒。

【用法与用量】 一至三錢。

【貯藏】 置通风干燥处,防潮及防虫蛀。

金 果 榄

Jīnguǒlǎn

RADIX TINOSPORAE

【来源】 本品为防己科(Menispermaceae)植物金果榄(*Tinospora capilipes* Gagn.)或青牛胆(*Tinospora sagittata* (Oliv.) Gagn.)的干燥块根。均系野生,产于广西、湖南等

地。秋、冬二季采挖，除去莖及須根，洗淨泥土，晒干即得。

【鑒別】本品為不規則圓塊狀，大小不一，長2寸，直徑0.5—1寸，棕黃色或淡褐色，外皮粗糙不平，有深皺紋。質堅硬，不易击碎，橫切面呈淡黃白色，有深色花紋，富粉性。无臭，味極苦。

以干燥、个大、堅實者為佳。

【炮炙】去淨雜質，用水浸泡，約至七成透，晒晾，潤至內外濕度均勻，切片或斫成小塊，干燥即得。

【性味】苦，寒。

【功能】清熱、解毒。

【主治】喉痛，目赤，熱咳，吐衄，疔瘡，腫毒，蚊蠅虫傷。

【用法與用量】八分至一錢五分；并可外用，適量，研末吹喉或醋磨塗敷患處。

【貯藏】置干燥處，防虫蛀。

金錢白花蛇

Jīngqián Báihuāshé

BUNGARUS PARVUS

【來源】本品為眼鏡蛇科(Elapidae)動物銀環蛇(*Bungarus multicinctus* Blyth)的幼蛇除去內臟后的干燥品。多為飼養，主產于廣東、廣西等地。多于夏季捕捉，剖開蛇腹，除去內臟，盤成圓形，用竹簽撐開，烘干即得。

【鑒別】蛇體頗小，卷成圓盤形，頭在中央，尾細，納于口內，盤徑約一寸左右，蛇體直徑一般為1—1.5分。背部黑棕色，有多數白色環紋，并有一條顯著突起的脊棱，鱗片細密，有光澤。腹部黃白色，鱗片稍大。微有腥氣。

以頭尾齊全、色澤明亮者為佳。

【炮炙】金錢白花蛇 刷去灰屑，去頭尾即得。

酒金錢白花蛇 取金錢白花蛇，去頭尾，用適量黃酒潤透即得。

【性味】甘、咸，溫；有毒。

【功能】祛風濕，定驚搐。

【主治】風濕癱瘓，大風疥癬，小兒驚風搐搦，破傷風，楊梅瘡。

【用法與用量】一錢至一錢五分。

【貯藏】置通風干燥處，防虫蛀。

金 銀 花

Jīnyínhuā

FLOS LONICERAE

【来源】 本品为忍冬科 (Caprifoliaceae) 植物忍冬 (*Lonicera japonica* Thunb.) 的干燥花蕾。栽培或野生, 全国大部分地区多有生产, 主产于河南、山东等地。夏初采摘花蕾, 晒干即得。

【鉴别】 本品呈棒状, 上粗下细, 略弯曲。全长 0.6—1 寸, 上部直径约 1 分, 下部直径约半分。表面黄白色, 密布短毛茸。花冠筒状, 顶端开裂呈唇形, 下端基部有绿色花萼 5 裂, 长约半分。花冠筒内有雄蕊 5 个, 雌蕊 1 个, 花柱绿色。有香气, 味微苦。

以花未开放、颜色黄白、质重者为佳。花已开裂、色棕黄、体较轻者质次。

【炮炙】 金银花 去净杂质, 筛簸去泥屑, 拣去残留梗叶即得。

银花炭 取拣净的金银花, 置锅内用武火炒至焦褐色, 但须存性, 喷淋清水, 取出, 晒干即得。

【性味】 甘、寒。

【功能】 清热, 解毒。

【主治】 温病发热, 痈疽, 疥癣, 恶疮, 肿毒, 热毒血痢。

【用法与用量】 二至五钱。

【贮藏】 置阴凉干燥处, 防潮及虫蛀。

金 櫻 子

Jīnyīngzǐ

FRUCTUS ROSAE LAEVIGATAE

【来源】 本品为蔷薇科 (Rosaceae) 植物金樱子 (*Rosa laevigata* Michx.) 的干燥成熟果实。均系野生, 主产于广东、湖南、浙江、江西等地。10—11 月间果实红熟时采摘, 晒干, 除去毛刺即得。

【鉴别】 本品呈倒卵形，略似花瓶，长约1寸，直径4—6分。外皮红黄色或红棕色，上端宿存花萼如盘状，下端渐尖。全身有突起的棕色小点，系毛刺脱落后之残痕，触之刺手。质坚硬，切开观察，肉厚约半分，内壁附有淡黄色绒毛，有光泽，内有多数淡黄色坚硬的核。无臭，味甘、微涩。

以个大、色红黄、去净毛刺者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，切两瓣，用水稍洗泡，捞出，闷润后除去残留毛刺，挖净毛、核，干燥即得。

【性味】 酸，平，滑。

【功能】 固精滑肠，缩尿止泻。

【主治】 滑精，遗尿，小便频数，脾虚泻痢。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置通风干燥处，防虫蛀。

金 礞 石

Jīnměngshí

LAPIS MICAE AUREUM

【来源】 本品为一种云母片岩。主产于河南、河北等地。挖出后，除去杂石及泥土即得。

【鉴别】 本品呈不规则的块状或碎粒状，大小不一。全体呈棕黄色，带有耀眼的金黄色光泽。质脆，易碎成小碎片。臭微，味淡。

以色金黄、块整齐、无杂质者为佳。

【炮炙】 煅金礞石 拣净，加等量的火硝混和，置坩埚内煅烧至烟尽为度，用水飞法制成细粉，或取净金礞石置坩埚内，在炉火上煅红透呈金黄色为度，取出，晾凉，簸取净礞石，除去沙石即得。

【性味】 甘、咸，平。

【功能】 降痰消食，下气平肝。

【主治】 痰积，惊风，宿食，瘕瘕。

【用法与用量】 一至二钱，多入丸散服。

【贮藏】 置干燥处。

知 母

Zhīmǔ

RHIZOMA ANEMARRHENAE

【来源】本品为百合科 (Liliaceae) 植物知母 (*Anemarrhena asphodeloides* Bge.) 的干燥地下根状茎。均系野生，主产于河北、山西等地。春、秋二季采挖，除去茎苗及须根，保留黄绒毛和浅黄色的叶痕及茎痕(习称“金包头”)，晒干，即为毛知母；剥去外皮晒干者即为知母肉。

【鉴别】毛知母 略呈压扁的条状或圆柱形，微弯曲，长1—5寸，直径2—6分。一端较细，一端较粗，偶有分枝，顶端有“金包头”，上面有一道陷下的纵沟，具紧密排列的环状节，节上密生金黄色扁平的绒毛，由两侧向根状茎上方集中，背面较皱缩，并有多数凹陷或突起的小圆点状根痕，黄绒毛少或无。质硬，断面白色。无臭，味甘而苦，带粘性。

以肥大、质硬、表面被金黄色绒毛、断面黄白色者为佳。瘦长形扁、外毛灰黑、内毛色暗者质次。

知母肉 较毛知母瘦小，长约1—4寸，直径约3分。表面黄白色或淡黄棕色，有扭曲的纵沟，一侧可见多数不规则散在的小形根痕。质硬，易折断，断面白色或黄白色；有的显筋脉点，水浸后有粘液。气味同毛知母。

以肥大、滋润、质硬、色黄白、嚼之发粘者为佳。

【炮炙】知母 拣去杂质，用水冲洗，捞出，润透后切片，干燥即得。

盐知母 取知母片，置锅内用文火微炒，喷淋盐水，炒干取出，放凉即得。

每知母片100斤，用盐2斤8两加适量开水化开澄清。

【性味】苦，寒。

【功能】滋阴降火，润燥滑肠。

【主治】烦热消渴，劳嗽骨蒸，阴虚燥热，二便不利。

【用法与用量】一钱五分至三钱。

【贮藏】置通风干燥处，防潮。

鱼 腥 草

Yúxīngcǎo

HERBA HOUTTUYNIAE

【来源】 本品为三白草科(Saururaceae)植物蕺菜(*Houttuynia cordata* Thunb.)的干燥茎叶。均系野生,主产于江苏、浙江、湖北等地。夏、秋二季茎叶茂盛时采收,除去根及杂质,晒干即得。

【鉴别】 本品茎扭曲而细长,长约尺许,棕黄色,无毛,有数条纵棱线。叶互生,有长柄,叶片绿褐色或黄棕色,皱缩折曲,润湿展平后呈心形,先端尖,全缘,质薄易碎。茎顶有时可见黄棕色花穗。有鱼腥臭,味微涩。

以茎叶完整、无泥土者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,除去残根,洗润后切段,晒干即得。

【性味】 辛,微寒;有小毒。

【功能】 清热,解毒,消肿。

【主治】 肺痈吐脓血,痈肿,痔疮,脱肛,虫毒,瘰疬。

【用法与用量】 三至五钱,或取鲜草一至二两捣汁服;并可外用,适量,捣敷或煎汤熏洗患处。

【贮藏】 置通风干燥处。

使 君 子

Shǐjūnzǐ

FRUCTUS QUISQUALIS

【来源】 本品为使君子科(Combretaceae)植物使君子(*Quisqualis indica* L.)的干燥成熟果实。多系栽培,主产于四川、广东、广西等地。9—10月间种子成熟、果皮变紫黑色时采摘,晒干或用微火烘干即得。

【鉴别】 本品呈椭圆形或卵圆形,具五条纵棱,两端尖形如梭状,长约1寸,直径5—6分。外壳黑褐色或紫黑色,平滑,微有光泽。质坚硬,体轻,不易折断,横切面五角星形,

— 171 —

稜角处皮較厚，中間呈类圓形，內有一种仁(君子仁)。种仁呈长橢圓形或紡錘形，長約6分，直徑約2分，表面有多数纵皺紋，外包一层灰黑色或黑褐色的薄膜，易剝离。肉黄白色，质軟，有油性；易折断，断面有裂紋。无臭，味甜。

以个大、仁饱满、无空壳者为佳。紫褐色、体較輕、有裂口者质次。

【炮炙】 君子仁 除去外壳，取淨仁即得。

炒君子仁 取使君子仁，置鍋內用文火炒至微有香气，取出，放凉即得。

【性味】 甘，溫。

【功能】 杀虫，消积，健脾。

【主治】 虫积腹痛，小儿疳积，乳食停滯。

【用法与用量】 一錢五分至三錢，多入丸散服。

【注意】 服药时忌飲热茶。

【貯藏】 置通風干燥处，防虫蛀。

側 柏 叶

Cèbǎiyè

CACUMEN BIOTAE

【来源】 本品为柏科(Cupressaceae)植物側柏(*Biota orientalis* (L.) Endl.)的干燥嫩枝与叶。栽培或野生，全国大部分地区多有生产。夏、秋二季均可采收，剪下小枝，晾干即得。

【鉴别】 本品为带叶枝梢，长短不一，分枝稠密。叶为鱗片狀，貼伏扁平的枝上交互对生。表面呈青綠色。质脆，易折断。微有清香气，味微苦、微辛。

以叶嫩、青綠色、无碎末者为佳。

【炮炙】 側柏叶 拣去杂质，揉碎去梗，过篩即得。

側柏炭 取拣淨的側柏叶，置鍋內用武火炒至焦褐色，但須存性，噴淋清水，取出，晒干即得。

【性味】 甘、苦，寒，澀。

【功能】 凉血，止血。

【主治】 吐血、衄血，血痢，便血，尿血，崩漏。

【用法与用量】 二至四錢。

【貯藏】 置通風干燥处。

佩 兰

Pèilán

HERBA EUPATORII

【来源】 本品为菊科(Compositae)植物兰草(*Eupatorium fortunei* Turcz.)的干燥茎叶。野生或栽培,产于江苏、浙江、河北、山东等地。夏季采收,当茎叶茂盛而花未开前,割取地上部分,晒干或阴干即得。

【鉴别】 本品茎呈圆柱形,多平直,少分枝,长约尺许,直径0.5—1分。表面黄棕色或黄绿色,有纵纹。质轻脆,易折断。断面中央有白色的髓或中空。叶对生,有短柄,多皱缩破碎,润湿展平后,完整者叶片多呈三裂,裂片长圆形,长1.5—3寸,边缘有锯齿,两面均无毛而呈绿褐色。微有香气,味微苦。

以叶多、色绿、茎少、质嫩、香气浓者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,用水洗净,捞出,稍润后,除去残根,切段,干燥即得。

【性味】 辛,平。

【功能】 辟秽,化浊。

【主治】 湿浊内蕴,脘痞不饥,脾瘅口甘。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

狗 脊

Gǒují

RHIZOMA CIBOTII

【来源】 本品为蚌壳蕨科(Dicksoniaceae)植物金毛狗脊(*Cibotium barometz*(L.)J.Sm.)的干燥根状茎。均系野生,主产于四川、浙江、福建等地。秋末冬初地上部分枯萎时采挖,除去泥土,晒干;或削去硬根、叶柄及金黄色绒毛,切片后晒干;或用热水煮或蒸后,晒至六、七成干,再切片晒干即得。

【鉴别】 本品呈不规则的长块状,长3—6寸,少数达尺许,直径1—3寸。外附金黄

色絨毛，上面有數個棕紅色的木質葉柄，下面叢生多數棕黑色細根。質堅硬，難折斷。尤臭，味淡，微澀。

狗脊片呈不規則的長條形或圓形，縱片長2—6寸，寬1—2寸，橫片直徑1—2寸，厚0.5—1分。周邊不整齊，偶有未去盡的金黃色絨毛，表面近于呈深棕色，平滑細膩，在近外皮1—3分處有一條明顯的棕黃色環紋，中間為淺棕色，滿布小點。質脆，有粉性，易折斷。熟狗脊片呈黑棕色，或棕黃色，環紋仍極明顯。

以體肥大、金黃色、堅實、無空心者為佳；狗脊片以厚薄均勻、堅實無毛、無空心者為佳。

【炮炙】取沙子，置鍋內炒至輕松，加入揀淨的狗脊，用武火炒至鼓起并顯深黃色，取出，篩除沙子，風晾後，撞去或刮盡黃絨毛，即得。產地已去毛蒸過的狗脊片，可不再制。

【性味】苦、甘，溫。

【功能】補肝腎，強腰膝，除風濕。

【主治】腰背痠疼，膝痛腳弱，寒濕周痹，小便失禁，女子白帶。

【用法與用量】一錢五分至三錢。

【貯藏】置通風乾燥處，防潮。

細 辛

Xixin

HERBA ASARI CUM RADICE

【來源】本品為馬兜鈴科(Aristolochiaceae)植物遼細辛(*Asarum heteropoides* var. *mandshuricum*(Maxim.) Kitag.)或華細辛(*Asarum sieboldi* Miq.)的干燥帶根全草，均系野生，主產于遼寧、吉林、黑龍江等地。5—6月間連根挖取，除淨泥土，置陰涼通風處晾干即得。

【鑑別】本品全長數寸，多卷縮成團。地下根狀莖呈不規則圓柱形，細長而彎曲，長約寸許，直徑約1分。灰棕色，表面粗糙，有環形的節，其上生有許多灰黃色的細根。質脆，易折斷，斷面黃白色。根狀莖上生2—3葉，葉具長柄，柄有縱紋，葉片心臟形，兩耳較明顯，多為灰綠色。有時可見花，花多已皺縮，暗褐色，鐘形。有香氣，味辛辣而麻舌。

以根色灰黃、葉色綠、無雜質、香氣濃、味辛辣麻舌者為佳。

【炮炙】揀去雜質，用水噴潤，及時切段，干燥即得。

【性味】 辛，温。

【功能】 散风，祛寒，行水，开窍。

【主治】 鼻渊，齿痛，头痛，风湿痹痛，痰饮喘咳。

【用法与用量】 三分至一钱。

【注意】 反藜芦。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防潮。

洋金花（风茄花）

Yāngjīnhuā

FLOS DATURAE

【来源】 本品为茄科(Solanaceae)植物白曼陀罗(*Datura metel* L.)或毛曼陀罗(*Datura innoxia* Mill.)的干燥花。多系栽培，前者为南洋金花，主产于江苏、福建、广东等地。后者为北洋金花，主产于河北、山东、河南等地。4—8月间将初开放的花朵摘下，晾晒七、八成干后，捆把，晒干或微火烘干即得。

【鉴别】 南洋金花 不具萼筒，多为数十朵花捆成直径约2寸的小把。花为筒状，长3—5寸。皱缩，花瓣上细折成绉。表面黄棕色或淡棕色。质脆，破开内有5个雄蕊，基部附着花瓣。无臭，味苦而涩。

北洋金花 具有萼筒，多分散或捆成小把。花的形状与南洋金花类似而较短，萼筒上有5个棱角，长1—1.5寸，灰绿色而发暗，外面有灰白色柔毛。气味与南洋金花同。

均以朵大、黄棕色、不破碎、无杂质者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，除去柄即得。

【性味】 辛，温；有毒。

【功能】 平喘，止咳，定痛。

【主治】 哮喘，咳嗽，风寒湿痹及各种疼痛。

【用法与用量】 一分至一分五厘，水泡或浸酒内服；治哮喘，除内服外，可将花瓣作卷烟燃吸。

【注意】 服用不宜过量，以防中毒。

【贮藏】 置干燥处，防潮及虫蛀。

穿 山 甲

Chuānshānjiǎ

SQUAMA MANITIS

【来源】 本品为鲛鲤科(Manidae)动物穿山甲(鲛鲤)(*Manis pentadactyla* L.)的鳞甲。均系野生,主产于广西、广东、贵州、云南等地。全年均可捕捉,捕获后杀死,割下整张的甲壳,置沸水中烫,或直接用沸水烫死,取下鳞甲,洗净,晒干即得。

【鉴别】 本品呈扇面形、菱形或盾形扁平片状,中央较厚,边缘较薄,大小不一,一般长或宽0.5—1.5寸。背面青黑色,有光泽,具多条纵纹,底部边缘有数条横纹。内表面色稍浅,较光滑,中部有一条明显弓形的横向棱纹。角质、坚韧而有弹性,微透明,不易折断。气微腥,味咸。

以片匀、色青黑或灰黑、无臭气、不带皮肉者为佳。

【炮炙】 炮山甲 取拣净的穿山甲片,分开大小,另将沙子置锅内炒至轻松,加入穿山甲片,炒至鼓起呈金黄色时,取出,筛去沙子即得。

醋山甲 用上述方法炮至鼓起呈金黄色时,筛去沙子,立即将炮穿山甲片倒入醋盆内,搅拌略浸,捞出,用水漂洗,晒干即得。

每穿山甲片100斤,用醋50斤。

【性味】 咸,微寒。

【功能】 搜风,通络,活血,消肿,溃痛,下乳。

【主治】 风寒湿痹,痈肿疮毒,乳汁不通。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置干燥处。

扁 豆 花

Biǎndòuhuā

FLOS DOLICHORIS

【来源】 本品为豆科(Leguminosae)植物扁豆(*Dolichos lablab* L.)的干燥花。均系栽培,主产于河南、安徽、浙江等地。夏、秋二季花未完全开放时采摘,除去杂质,晒干或阴

干即得。

【鉴别】 本品呈扁平形，长3—4分。花瓣5片，黄白色，其中两瓣合抱，弯曲呈镰刀形。雄蕊很长，上端呈须状，下端多联合成筒状，中间有一黄绿色雌蕊，略弯曲，先端有白色绒毛。花萼绿褐色，钟状，边缘有数裂口，不甚明显。体轻。臭微，味淡。

以整朵、未完全开放、无杂质者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，去柄，筛去灰屑即得。

【性味】 甘，平。

【功能】 和中，消暑，化湿，止血。

【主治】 痢疾，泄泻，赤白带下，血崩。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮及虫蛀。

姜 黄

Jiānghuáng

RHIZOMA CURCUMAE LONGAE

【来源】 本品为姜科(Zingiberaceae)植物姜黄(*Curcuma longa* L.)的干燥块茎，均系栽培，主产于四川、福建等地。秋、冬二季采挖，洗净泥土，煮或蒸熟至透心为度，晒干，撞去须根及外皮，再晒干即得。

【鉴别】 本品呈圆柱形、卵圆形或纺锤形，稍弯曲而扁，两端略狭尖形似姜而分叉少，或有断去分叉后遗留的圆形疤痕。长0.7—2寸，直径3—6分。表面深黄棕色，常带黄色粉末，多皱缩并具有明显的环状节及断去须根后的残痕。质坚实而重，难折断，断面显棕黄色或黄色，呈角质状，有蜡样光泽，近外圈有一黄色的环纹，中部常有黄色的筋脉小点。微有香气，味苦辛，咀嚼时唾液染黄色。

以圆柱形、外皮有皱纹、断面棕黄色、质坚实者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，用水浸泡，捞出，润透后切片，晒干即得。

【性味】 辛、苦，温。

【功能】 破血，行气。

【主治】 血瘀气滞，心腹脹痛，風痹臂痛，妇女經閉癥瘕，产后敗血攻心，跌打损伤瘀血作痛及癰肿。

【用法与用量】 一至三钱。

【貯藏】 置阴涼干燥处，防虫蛀。

前 胡

Qiánhú

RADIX PEUCEDANI

【来源】 本品为繖形科(Umbelliferae)植物白花前胡(*Peucedanum praeruptorum* Dunn)或紫花前胡(*Peucedanum decursivum* Maxim.)的干燥根部。多为野生，主产于浙江、安徽、湖北等地。秋、冬二季地上部分枯萎时采挖，除去茎叶、须根及泥土，晒干或炕干即得。

【鉴别】 本品主根呈不规则的圆柱形、圆锥形或纺锤形，上粗下细，身较短，略扭曲，下部有分歧，长1—4寸，直径0.3—1寸。表面黑褐色或灰黄色，根头部有茎痕及未去净的粗毛，上端有密生的环纹，多发黑，下部有纵沟及纵皱纹，色较浅并有根痕与小疙瘩。质坚硬，不易折断，断面黄白色，不整齐，周边乳白色，内层有黄棕色圈，中心有淡黄白色的菊花纹。有香气，味微苦辛。

以条整齐、身长、质坚实、断面黄白色、香气浓者为佳。

【炮炙】 前胡 拣去杂质，除去残茎，用水洗净泥土，捞出，润透后切片，晒干即得。

蜜前胡 取前胡片，加炼熟的蜂蜜与开水少许，拌匀，稍闷，置锅内用文火炒至不粘手为度，取出，放凉即得。

每前胡片100斤，用炼熟蜂蜜20斤。

【性味】 苦、辛，微寒。

【功能】 散风，清热，下气，消痰。

【主治】 痰热咳嗽，气喘，痞满，嘔逆。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【貯藏】 置阴涼干燥处，防虫蛀。

首 乌 藤 (夜交藤)

Shǒuwūténg

CAULIS POLYGONI MULTIFLORI

【来源】 本品为蓼科(Polygonaceae)植物何首乌(*Polygonum multiflorum* Thunb.)

的干燥茎。多系野生，产于河南、湖北、湖南、江苏、浙江、四川等地。秋季落叶时，割取藤茎，除去细枝及残叶，捆成把，晒干即得。

【鉴别】本品呈长圆柱形，常扎成捆，藤稍有扭曲，长数尺，直径1—2.5分。表面紫褐色，粗糙，具纵皱纹及断去侧枝的圆形疤痕，并具小斑点。质硬而脆，易折断，断面皮部紫红色，木部黄白色或淡棕色，具有多数小孔。无臭，味微苦涩。

以条匀、外表紫褐色者为佳。

【炮炙】用水浸泡，剥成尺许条，拣去杂质，切段，晒干即得。

【性味】甘、平。

【功能】祛风湿，安神，止汗。

【主治】血虚周身痠痛，失眠，多汗；外治风疮疥疔作痒。

【用法与用量】三至五钱；外用适量，煎汤洗患处。

【贮藏】置干燥处。

珍 珠

Zhēnzhū

MARGARITA

【来源】本品为真珠贝科(Pteriidae)动物马氏真珠贝(*Pteria martensii*(Dunker))、珠母贝(*Pteria margaritifera*(L.))或蚌科(Unionidae)动物褶纹冠蚌(*Cristaria plicata* Leach)的贝壳中受刺激而产生的颗粒状珍珠。养殖或野生，主产于广东、台湾、黑龙江、安徽等地。全年皆产，捞出真珠贝类，取出珍珠即得。

【鉴别】本品呈圆球形或近于球形，大小不一，直径0.4—2分。表面类白色、黄白色、浅粉红色或浅蓝色等，光滑圆润，半透明，具珍珠所特有的美丽光泽。质坚硬而重，破开后断面呈层纹状。无臭，味微咸。用火烧时有爆裂声。

以粒大、形圆、色白光亮、破开有层纹不显硬核者为佳。

【炮炙】珍珠粉 取珍珠，洗净泥垢，用布包好，加豆腐与水共煮约2小时，取出，用水洗净，捣碎，加水少许研成极细粉，干燥即得。

【性味】甘、咸，寒。

【功能】安神定惊，清热益阴，明目解毒，生肌收口。

【主治】惊风癫痫，心神不安，烦热消渴，喉痹口瘡；外治目生翳障，疮口不敛。

【用法与用量】 一至二分，入丸散服；外用适量，研粉点目敷疮。

【注意】 孕妇内服宜慎。

【贮藏】 置干燥处，密闭保存。

玳 瑁

Dàimào

CARAPAX ERETMOCHELYOS

【来源】 本品为海龟科(Cheloniidae)动物玳瑁(*Eretmochelys imbricata* L.)背部的甲片。均系野生，产于海南岛、台湾等地。全年均可捕捉，将玳瑁倒悬，以沸醋烫泼，使其甲片脱落，用水洗净即得。

【鉴别】 本品呈方形或多角形板片状，长3—6寸，厚0.5—1分。中间较厚，边缘较薄。表面有褐色与乳黄色交错而成的斑纹，平滑而有光泽，半透明，内面有白色的云彩样花纹或斑点，并有纵横交错的沟纹。质坚韧，不易折断，断面角质。无臭，无味。火烧时有似烧头发的臭气，但不冒火焰。

以片大而厚、半透明、斑纹显著者为佳。

【炮炙】 刷净泥土，用温水浸软后，切成细丝或研成细粉即得。

【性味】 甘，寒。

【功能】 清热，解毒，镇惊。

【主治】 热病，惊狂，谵语，小儿惊风，痈肿疮毒。

【用法与用量】 一至二钱，多人丸散或水磨服。

【贮藏】 置干燥处。

南 沙 参

Nánshāshēn

RADIX ADENOPHORAE

【来源】 本品为桔梗科(Campanulaceae)植物轮叶沙参(*Adenophora tetraphylla*(Th-

unb.)Fisch.)、杏叶沙参(*Adenophora stricta* Miq.)或同属他种植物的干燥根。均系野生,主产于贵州、安徽、浙江、云南、四川等地。秋季茎叶枯萎以前采挖,除去地上茎及须根,洗去泥土,用刀刮去粗皮,洗净,晒干或烘干即得。

【鉴别】本品略呈长纺锤形或圆柱形,略弯曲,有分歧,长3—8寸,直径0.3—1寸。芦头粗细不一,偶有双芦,表面黄白色,上部有许多深陷的横纹,呈灰褐色环状,下部有浅纵纹及纵沟,或有须根痕及褐色斑点。质轻松,易折断,断面不平坦,黄白色,有许多裂隙。无臭,味甘、微苦。

以粗长、条匀饱满、无粗皮及须根者为佳。

【炮炙】拣去杂质,去芦头,洗净,略润,切成厚片,晒干即得。

【性味】甘、苦,微寒。

【功能】清肺泻火,养阴止嗽,比北沙参力稍逊。

【主治】阴虚肺热干咳,热病伤津,舌干口渴。

【用法与用量】一钱五分至三钱。

【注意】反藜芦。

【贮藏】置通风干燥处,防虫蛀。

南 鹤 虱

Nánhèshī

FRUCTUS DAUCI CAROTAE

【来源】本品为繖形科(Umbelliferae)植物野胡萝卜(*Daucus carota* L.)的干燥成熟果实。均系野生,主产于江苏、浙江、安徽、湖北等地。秋季果实成熟时割取全草或摘取果枝,晒干,打下果实,除净杂质即得。

【鉴别】本品呈椭圆形,多已分裂成两瓣,长约1分许,宽约半分。表面黄棕色或黄褐色,一端有小突起,一端圆形,有时附有小果柄。果瓣背面隆起有4条突起的纵棱线,其上密生黄白色毛刺。腹面稍平坦,有3条纵脉纹,两侧的2条呈弧形,脉纹上有短柔毛。种仁黄白色,有油性。具特异香气,味辛、微苦。

以子粒充实、棕黄色、无枝梗等杂质者为佳。

【炮炙】拣去梗及杂质,筛去泥屑即得。

【性味】辛、苦,平;有小毒。

【功能】 杀虫。

【主治】 虫积腹痛。

【用法与用量】 一至二钱。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

胡 芦 巴

Húlúbā

SEMEN TRIGONELLAE

【来源】 本品为豆科(Leguminosae)植物胡芦巴(*Trigonella foenum-graecum* L.)的干燥成熟种子。均系栽培，主产于河南、安徽、四川等地。秋季种子成熟时割取全株，晒干，打下种子，除去杂质，即得。

【鉴别】 本品略呈扁斜方形，长1—1.5分，宽约1分，厚约半分。外皮黄棕色或红棕色，平滑。两侧各具一条斜沟，相交处有一小脐。质坚硬，浸泡水中有粘性，皮薄，剖开后外圈呈棕色半透明状。种仁两瓣，浅黄色，一端有一茁壮弯向一边略呈芽形的胚根。臭微，破碎时有特殊香气，味淡微苦。

以粒大、饱满、无杂质者为佳。

【炮炙】 胡芦巴 筛去杂质，洗净泥土，晒干即得。

炒胡芦巴 取净胡芦巴，置锅内用文火微炒，取出，放凉即得。

【性味】 苦，温。

【功能】 补肾阳，祛寒湿。

【主治】 冷气疝瘕，腹胁胀满，寒湿脚气。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置干燥处。

胡 桃 仁 (核桃仁)

Hútáorén

SEMEN JUGLANDIS

【来源】 本品为胡桃科(Juglandaceae)植物胡桃(*Juglans regia* L.)的干燥种仁。均

系栽培，主产于河北、山西、山东等地。秋季果实成熟后采摘，晒干，除去肉质外果皮，然后击破硬壳，取出种仁即得。

【鉴别】本品多破碎成不规则块状，完整的呈类球形，由二瓣种仁合成，皱缩多沟槽，形似猪脑。外披棕褐色或淡褐色薄膜状的种皮，剥去种皮显黄白色。质脆，富有油性，臭微，味甘美，种皮味涩。

以个大、饱满、整齐、油性足者为佳。

【炮炙】去净外壳及木隔心，取净仁即得。

【性味】甘，温。

【功能】温补肺肾，定喘，化痰，润肠，养精。

【主治】虚寒喘嗽，腰痛脚弱，大便燥结，遗精，阳痿。

【用法与用量】一至三钱。

【贮藏】置阴凉干燥处，防虫蛀。

胡 黄 连

Húhuánglián

RHIZOMA PICRORRHIZAE

【来源】本品为玄参科(Scrophulariaceae)植物胡黄连(*Picrorrhiza kurroa* Benth.)的干燥地下根状茎。均系野生，我国西藏有产，部分系进口。秋季采挖，除去泥土，晒干即得。

【鉴别】本品呈圆柱形，弯曲不直，长1—3寸，直径1—2分许。表面灰黄色或灰棕色，部分发黑，粗糙，有隆起的疙瘩、明显的纵皱纹及横环纹，在顶端处有残留叶的痕迹，密集呈鳞片状，暗红棕色，或脱落残留半环状的节痕。质松脆，易折断，折断时有粉尘飞出，断面灰黑色或棕黑色，中间有花白点4—7个，排列成环状。臭微，味极苦。

以条粗、折断时有粉尘、断面灰黑色、有花白点、味苦者为佳。

【炮炙】拣去杂质，洗净，润透后切片，晒干即得。

【性味】苦，寒。

【功能】清热，燥湿。

【主治】骨蒸劳热，心烦，目赤，泻痢，黄疸，痈肿，痔疮，小儿惊风，疳积。

【用法与用量】五分至一钱五分。

【贮藏】置通风干燥处，防潮。

茺蔚子

Chōngwèizi

FRUCTUS LEONURI

【来源】 本品为唇形科(Labiatae)植物益母草(*Leonurus sibiricus* L.)的干燥成熟果实。多系野生,全国大部地区多有生产。秋季果实成熟时割下全株,晒干,打下果实,除净杂质即得。

【鉴别】 本品呈三棱形,一端稍宽似平截状,另一端渐狭而钝尖,长约1分,宽约半分。表面灰褐色,平滑,无光泽或微粗糙,并有深色的斑点。横切面呈扇形,果皮薄,种仁类白色,有油性。无臭,味苦。

以粒大、饱满、无杂质者为佳。

【炮炙】 簸净杂质,筛去泥土,洗净,晒干即得。

【性味】 辛、甘,微温。

【功能】 活血调经,益阴明目。

【主治】 妇女月经不调、产后瘀血作痛,血滞目病。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置通风干燥处。

荆芥

Jīngjiè

HERBA SCHIZONEPETAE

【来源】 本品为唇形科(Labiatae)植物荆芥(*Schizonepeta tenuifolia* Briq.)的干燥带花序的地上部分。野生或栽培,产于江苏、浙江、河北、江西、湖北等地。秋季花开、穗正绿时割取地上部分,晒干即得。

【鉴别】 本品为带有花穗的茎枝。茎直立,方柱形,四面有纵沟,上部多分枝。长1.5—3尺,直径1—1.5分。表面呈淡紫红色。质轻脆,易折断,断面有白色髓。叶对生,叶片分裂,裂片细长。枝的顶端着生穗状轮伞花序,呈绿色圆柱形,长2—3寸,直径约

2分。花冠多已脫落，只留綠色萼筒，內有四個棕黑色小堅果。氣芳香，味微澀而辛涼。

以淺紫色、莖細、穗多而密者為佳。

【炮炙】 荊芥 揀去雜質，除去穗、葉及細枝，分開粗細，用水浸泡，撈出切段，及時曬干即得。

荊芥炭 取荊芥段，置鍋內用武火炒至黑褐色，但須存性，噴淋清水，取出，曬干即得。

荊芥穗 取上述荊芥中摘除的穗，去梗，過篩即得。

炒芥穗 取揀淨的荊芥穗，置鍋內用文火微炒，取出，放涼即得。

芥穗炭 取揀淨的荊芥穗，置鍋內用武火炒至焦褐色，但須存性，噴淋清水，取出，曬干即得。

【性味】 辛，溫。

【功能】 發表祛風，理血；炒黑止血。

【主治】 感冒風寒發熱，頭痛，咽喉腫痛，疔毒，疥癬，產後血暈，中風口噤，吐血，衄血，便血，崩漏。

【用法與用量】 一錢五分至三錢。

【貯藏】 置陰涼干燥處，防壓。

以條肥大、色黑褐、質堅實、斷面稍紅、味濃者為佳。

荖 菱

Bibó

FRUCTUS PIPERIS LONGI

【來源】 本品為胡椒科 (Piperaceae) 植物荖菱 (*Piper longum* L.) 的干燥未成熟果穗。均系栽培，主產于廣東、雲南及印度尼西亞等地。秋季果實由黃變黑時採摘，曬干即得。

【鑒別】 本品呈圓柱形，稍彎曲，長1寸許，直徑約2分。表面黑褐色，由多數小果聚合而成，排列緊密整齊，形成交錯的小突起。一端較細，一端有小柄或已脫落。質硬而脆，斷面稍發紅，呈現顆粒狀。有特異香氣，味辛辣。

【炮炙】 拣去杂质，去柄，筛去灰屑，用时捣碎即得。

【性味】 辛，热。

【功能】 温中，散寒，下气，止痛。

【主治】 心腹冷痛，嘔吐吞酸，腸鳴泄泻，头痛，鼻淵，風虫牙痛。

【用法与用量】 五分至一錢；并可外用，适量，研末噤鼻或堵塞虫牙孔中。

【貯藏】 置阴凉干燥处。

荜 澄 茄

Bìchéngqié

FRUCTUS LITSEAE

【来源】 本品为樟科(Lauraceae)植物山鸡椒(*Litsea cubeba*(Tour.)Pers.)的干燥成熟果实。均系野生，主产于广西、浙江、江苏、安徽等地。秋季果实成熟时采摘，除去枝叶及杂质，晒干即得。

【鉴别】 本品呈圆球形，直径约1.5分。外皮棕黑色或黑褐色，有很细的网状皱纹，划之有油渗出。果实基部偶有残留宿萼，下连细长的果柄。剥去柔软而多油的外皮，则见硬脆的内壳，破开后内含黄白色种仁两瓣，富油性。有类似姜的香气，味稍辛辣而微苦。

以粒圆、气味浓厚、富油性者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，摘去果柄，洗净，晒干即得。

【性味】 辛，温。

【功能】 温中，散寒，下气，消食。

【主治】 心腹冷痛，不思饮食，反胃呕吐，腸鳴泄泻。

【用法与用量】 五分至一錢。

【貯藏】 置阴凉干燥处。

茜 草

Qiāncǎo

RADIX RUBIAE

【来源】 本品为茜草科(Rubiaceae)植物茜草(*Rubia cordifolia* L.)的干燥根。均系野生,全国大部分地区多有生产,主产于陕西、河北、河南、山东等地。春、秋二季采挖,除去茎苗,去净泥土(不宜水洗)及细须根,干燥即得。

【鉴别】 本品无明显主根,自根头部丛生支根,根头上有茎的残基,支根呈圆柱形,弯曲或作扭曲状,长0.3—1尺许,直径0.5—3分。表面棕红色或暗紫红色,具多数的皱纹及少数须根痕,老皮易剥落,剥落处黄红色。质轻脆,易折断,断面平坦,棕红色,具多数小孔。无臭,味微苦。

以条粗长、表面暗紫红色、断面棕红色、无苗及泥沙者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,除去残茎,洗净,润透后及时切片,干燥即得。

【性味】 微酸、咸、温。

【功能】 行血,止血,消瘀,通经。

【主治】 吐血,衄血,下血,崩漏,跌折损伤,妇女经闭。

【用法与用量】 二至三钱。

【贮藏】 置干燥处。

荔枝核

Lìzhīhé

SEMEN LITCHI

【来源】 本品为无患子科(Sapindaceae)植物荔枝(*Litchi chinensis* Sonn.)的干燥成熟种子。均系栽培,主产于福建、广东、广西等地。6—7月间当果实成熟时采摘,去净皮肉,取出种子,洗净,晒干即得。

【鉴别】 本品呈长圆形或卵圆形,略扁,长6—7.5分,宽4—5分。表面棕红色或紫棕

色,平滑而有光澤,一端有黃白色疤痕,直徑2—4分,其旁有一小突起。質堅硬,除去種皮內有種仁兩瓣,灰黃色。無臭,味澀。

以粒大、飽滿、光亮者為佳。

【炮炙】 簸去雜質,用水洗淨,曬干,用時搗碎即得。

【性味】 甘,溫。

【功能】 溫中理氣,散寒止痛。

【主治】 胃脘痛,疝氣痛,婦人血氣刺痛。

【用法與用量】 一錢五分至三錢,多入丸散服。

【貯藏】 置干燥處,防虫蛀。

草 烏

Cǎowū

RADIX ACONITI AGRESTIS

【來源】 本品為毛茛科(Ranunculaceae)植物北烏頭(*Aconitum kusnezoffii* Reich.)、華烏頭(*Aconitum chinense* Paxt.)及卡氏烏頭(*Aconitum carmichaeli* Debx.)的干燥塊根。均系野生,全國大部分地區均有生產。秋季莖葉枯萎時采挖,除去殘莖、須根及泥土,曬干或烘干即得。

【鑒別】 本品呈圓錐形而稍彎曲,形如烏鴉頭,長1—2寸,直徑4—8分。頂端有殘留莖基或莖基的殘痕,表面暗棕色或灰褐色,外皮皺縮,有時有突起的支根,習稱“釘角”。質堅,難折斷,破碎面灰白色,粉性,并有曲折的環紋及筋脈小點。無臭,味辛辣而麻舌,口嘗須特別謹慎,切勿咽下。

以個大、肥壯、質堅實、粉性足,殘莖及須根少者為佳。

【炮炙】 生草烏 揀去雜質,用水洗淨,曬干即得。

制草烏 取淨草烏,用涼水浸漂,每日換水2—3次,泡至口嘗無麻辣感為度。取出,用甘草、黑豆煎湯共煮透,至內無白心為度,取出,除去甘草、黑豆,曬至六成干,悶潤后切片,曬干即得。

每草烏100斤,用甘草5斤、黑豆10斤。

【性味】 辛,溫;有大毒。

【功能】 搜風，胜湿，开痰。

【主治】 風寒湿痹，中風癱瘓，心腹冷痰，腸腹疼痛；外治痛疽未潰，疔疮初起。

【用法与用量】 五分至一錢五分，一般炮炙后用，多入丸散服；外用生者适量，研末塗敷患处。

【注意】 生者內服宜慎；反半夏、天花粉、桔槩子、桔槩、白藪、白及、川貝母、浙貝母，畏犀角。

【貯藏】 置通風干燥处，防潮及虫蛀。

草 豆 蔻

Cǎodòukòu

SEMEN ALPINIAE KATSUMADAI

【来源】 本品为姜科(Zingiberaceae)植物草豆蔻(*Alpinia katsumadai* Hay.)的干燥成熟种子团。均系野生，主产于广西、广东等地。秋季果实略变黄色时采收，晒至九成干，剥去果皮，将种子团晒干，或先将整个果实用水略烫，晒至半干，再剥皮取种子，晒干即得。

【鉴别】 本品呈圓球形或橢圓形，直徑4.5—8分。表面灰褐色，中間有白色隔膜分成三瓣，每瓣有种子多数，粘連緊密，略光滑，不易散落。种子卵圓状多角形，长1—1.5分，直徑約1分。有一条纵沟，一端有臍点。质坚硬，破开后里面灰白色。臭微，味辛辣。

以个圓、整齐、质坚实者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，除去殘壳，篩去灰屑，取出淨仁，用时捣碎即得。

【性味】 辛，溫。

【功能】 燥湿，祛寒，暖胃，健脾。

【主治】 心腹冷痛，痞滿吐酸，噎膈反胃，寒湿吐泻。

【用法与用量】 八分至二錢。

【貯藏】 置阴涼干燥处。

草 果

Cǎoguǒ

FRUCTUS AMOMI TSAOKO

【来源】 本品为姜科(Zingiberaceae)植物草果(*Amomum tsao-ko* Crevost et Lom.)的干燥成熟果实。多系栽培,产于广西、云南、贵州等地。9—10月果实成熟时采收,用微火烘干或晒干即得。

【鉴别】 本品呈长圆形,长0.6—1寸许,直径1—7分。外皮棕褐色,有许多突起的纵棱线纹,顶端有一个凹形突起,底部常有残留的果柄。外皮有韧性,易纵向撕裂。剥去外皮,见种子集结成团,有隔膜分成三瓣,每瓣有种子8—11粒。种子多面形,长约1.5分,红棕色或棕褐色,外被灰白色薄膜,在较狭的一端有脐点,背面中央有小凹穴,其间有纵沟。质坚硬,破开后内为灰白色。种子破碎时发特异的臭气,味辛辣。

以个大、完整、籽粒饱满者为佳。

【炮炙】 草果仁 拣去杂质,置锅内用文火炒至焦黄色并微鼓起,取出,稍晾,碾去壳,过筛,取仁即得。

姜草果仁 取草果仁,加姜汁与水少许,拌匀,置锅内用文火微炒,取出,放凉即得。

每草果仁100斤,用鲜姜10斤取汁。

【性味】 辛,温。

【功能】 燥湿,祛寒,除痰,消食,截疟。

【主治】 心腹冷痛,食积不消,痰饮痞满,反胃,呕吐,泄泻,疟疾。

【用法与用量】 八分至一钱五分。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

茵 陈

Yīnchén

HERBA ARTEMISIAE CAPILLARIS

【来源】 本品为菊科(Compositae)植物茵陈(*Artemisia capillaris* Thunb.)的干燥幼苗。均系野生，主产于陕西、山西、安徽等地。春季幼苗高约3寸时采收，除去杂质，去净泥土，晒干即得。

【鉴别】 本品多揉成团状，灰绿色，全体密被白毛，绵软如绒。茎长2—3寸，多弯曲或已折断；分枝细，基部较粗，直径约半分，去掉表面白毛后，可见明显的纵纹。完整的叶多有柄，与细茎相连，叶片分裂呈线状。有特异的香气，味微苦。

以质嫩、绵软、灰绿色、无杂质、香气浓者为佳。

【炮炙】 过筛，拣去杂质除去残根，碾碎，再过筛去净泥屑即得。

【性味】 苦、辛，微寒。

【功能】 清热，利湿。

【主治】 黄疸身热，小便不利。

【用法与用量】 二至六钱。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防潮。

茵 香 (小茴香)

Huīxiāng

FRUCTUS FOENICULI

【来源】 本品为繖形科(Umbelliferae)植物小茴香(*Foeniculum vulgare* Mill.)的干燥成熟果实。均系栽培，主产于山西、甘肃、辽宁等地。8—10月果实初成熟时，将全株割下，晒干后，打下果实，除去枝叶等杂质即得。

【鉴别】 本品呈长圆柱形或稍弯曲，两端略尖，长2—2.5分，直径约半分许。表面黄绿色或淡黄色，有明显的纵棱线和沟纹，一端有小突起物，另一端附有细小的果柄。果实极

易分离成两瓣(分果),每瓣呈长椭圆形,背面隆起,腹面稍平。断面边缘波状而较硬,中心灰白色,有油性。臭特异芳香,味甘微辛。

以粒均匀、饱满、黄绿色、气味浓厚、无杂质者为佳。

【炮炙】 茴香 筛簸去泥屑,拣净梗及杂质即得。

盐茴香 取净茴香,加盐水拌匀,略闷,置锅内用文火炒至微黄色,取出,晾干即得。

每茴香 100 斤,用盐 3 斤加适量开水化开澄清。

【性味】 辛,温。

【功能】 理气,开胃,祛寒。

【主治】 气胀,吐泻,寒疝,腹痛。

【用法与用量】 八分至一钱五分。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

茯 苓

Fú líng

PORIA

【来源】 本品为多孔菌科(Polyporaceae)植物茯苓(*Poria cocos* (Schw.) Wolf.)的干燥菌核。栽培或野生,产于安徽、湖北、河南、云南等地。全年皆可采挖,以立秋后 8—9 月份产品质量为佳。挖出后刷去泥土,堆置于不通风的房屋或容器内,用稻草或他物围盖,进行发汗,使其析出水分。然后取出,摊放阴凉处,待其表面干燥后再进行发汗。如此反复 3—4 次至皮色变褐色呈现皱纹,且内部水分大部散失后,置阴凉干燥处,晾至全干即为茯苓个。亦可在发汗后进行切制,切制后阴干即为成品。切制品按其取用部分不同而有茯苓皮、赤茯苓、白茯苓及茯神等。

【鉴别】 茯苓个 呈球形、纺锤形、扁圆形等不规则形状,大小不一,重量由数两至十斤以上。表面黑褐色或棕褐色,外皮薄而粗糙,有明显的皱纹或凹陷成沟。体重,质坚实,不易破开,破开面不平,颗粒状,现棱角,有的具裂隙或中间抱有松根。断面周边部分淡棕色或淡红色,内部白色,细腻。无臭,味淡,嚼之粘牙。

以体重坚实、外皮黑褐色而略带光泽、皱纹深、无裂隙、断面白色细腻、粘牙力强者为佳。体轻、质松、外皮带有砂粒者质次。

茯苓皮 系削下的茯苓外皮。形状大小不一,外皮黑褐色,内面白色或淡棕色。体软

质松，略具弹性。

赤茯苓 系除去茯苓皮后再切下外层或内部的淡红色部分。为大小不一的方块或碎块，均为淡红色或淡棕色。

白茯苓 系切去赤茯苓后的白色部分。为大小不一的薄片、方块或碎块。

茯神 系中间天然抱有木心(茯神木)者。呈方块或方形薄片，附有切断的一段茯神木，质坚实，色白。

【炮炙】 茯苓 用水浸泡，洗净，捞出闷透后切片晒干。切取外皮者为茯苓皮，切取带赤色者为赤茯苓，切取白色片为白茯苓，抱木心者为茯神。

朱茯苓 取切好的茯苓，置盆内喷水少许，微润，加朱砂细粉，撒布均匀，并随时翻动，至外面拌匀朱砂为度，取出，晾干即得。

每茯苓 10 斤，用朱砂 3 两。

朱茯神 取切好的茯神，按上述朱茯苓的方法炮炙即得。

【性味】 甘、淡，平。

【功能】 茯苓皮：利水消肿。

赤茯苓：行水，利湿热。

白茯苓：渗湿利水，益脾胃，安心神。

茯神：止惊悸，安心神。

【主治】 茯苓皮：水肿肤胀。

赤茯苓：小腸膀胱湿热，小便短赤。

白茯苓：脾虚湿胜，水肿胀满，痰饮咳逆，嘔吐泄泻，小便不利。

茯神：心虚健忘，多志，惊悸，失眠。

【用法与用量】 二至四钱。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防潮。

柿 蒂

Shidi

CALYX KAKI

【来源】 本品为柿树科(Ebenaceae)植物柿(*Diospyros kaki* L.f.)的干燥宿萼。均系栽培，主产于河北、河南、山东等地。冬季当柿子成熟时采摘，取下柿蒂，晒干即得。

【鉴别】 本品呈扁圆形，直径 5—8 分。背面黄褐色或红棕色，边缘薄，四裂，裂片多

向上反卷，易碎，中間微凸起，外层有圓紋，附有果柄或脫落，腹面黃棕色，密被細小絨毛，中心果实脫落处呈突起狀，无毛、质硬而脆。无臭，味澀。

以个大、质堅厚、色紅黃者为佳。

【炮炙】 洗淨，拣去杂质，去柄，晒干或打碎即得。

【性味】 苦，溫。

【功能】 降逆气。

【主治】 呃逆。

【用法与用量】 一錢五分至三錢。

【貯藏】 置通風干燥处，防虫蛀。

枳 壳

Zhǐqiào

FRUCTUS AURANTII

【来源】 本品为芸香科(Rutaceae)植物酸橙(*Citrus aurantium* L.)或香圆(*Citrus wilsonii* Tanaka)的干燥近成熟果实。均系栽培，主产于四川、江西等地。一般在夏秋当果实近成熟而外皮尚呈綠色时采摘，剖开后阴干、風干或微火烘干即得。

【鉴别】 本品呈半球形，直径1—1.7寸。外皮青綠色、綠褐色或黃綠色，有顆粒狀突起，每个突起的頂端有小凹点，有的有金錢环或果柄痕迹。果肉厚薄不一，厚約2—4分，黃白色。质堅实，不易折断。切面皆圓齐，光潤而稍隆起，邊緣油点明显，瓤松脆，呈車輪狀，紫黑色，內藏种子，亦堅硬。气清香，味苦微酸。

以个大、外皮青綠色、肉厚、色白、气清香者为佳。个較小、外皮黃綠色、肉薄、香气弱者质次。

【炮炙】 枳壳 挖去瓤核，用水洗淨，捞出，潤至发軟用手能捏对折为度，切片，干燥即得。

炒枳壳 将麸皮撒于加热的鍋內，俟烟冒出时，加入枳壳片，炒至淡黃色，取出，篩去麸皮，放凉即得。

每枳壳片100斤，用麸皮10斤。

【性味】 苦、酸、微寒。

【功能】 破气，行痰，消食。

【主治】 胸膈痰滯，心腹結氣，兩脇脹痛，宿食不消。

【用法与用量】 一至三錢。

【貯藏】 置阴涼干燥处，防潮。

枳 实

Zhǐshí

FRUCTUS AURANTII IMMATURUS

【来源】 本品为芸香科(Rutaceae)植物酸橙(*Citrus aurantium* L.)或香圆(*Citrus wilsonii* Tanaka)的干燥幼果。均系栽培，主产于四川、江西等地。在夏至前后，拣取受風吹落或自行脫落的果实，除去杂质，或将較大的切为两半，晒干即得。

【鉴别】 本品呈圓球形或半圓球形，直徑3—6分。外皮灰綠色、黑綠色或暗棕綠色，有顆粒状突起和皺紋及果柄痕迹，偶有不明显的金錢环。切面略現隆起，黃白色或黃褐色，邊緣有油点，中間有小的紫黑色的瓢，呈車輪形。质坚硬。气清香，味苦微酸。

以外皮黑綠色、肉厚色白、瓢小、体坚实、香气濃者为佳。

【炮炙】 枳实 拣去杂质，用水泡至八成透，撈出，潤至无硬心为度，切片，干燥即得。

炒枳实 将麸皮撒于加热的鍋內，俟烟冒出时，加入枳实片，炒至淡黃色，取出，篩去麸皮，放凉即得。

每枳实片100斤，用麸皮10斤。

【性味】 苦、寒。

【功能】 破气，泻痰，消积，除痞。

【主治】 胸膈痰癖，胸痹結胸，脹滿，痞痛，食积，便秘。

【用法与用量】 一至二錢。

【貯藏】 置阴涼干燥处，防潮。

枳 椇 子

Zhǐjǔzi

FRUCTUS HOVENIAE

【来源】 本品为鼠李科(Rhamnaceae)植物枳椇(*Hovenia dulcis* Thunb.)的干燥成

熟果实及肉质果柄或种子。多系野生，主产于陕西、广东、湖北、浙江、江苏等地。10—11月果实成熟时将果实连果柄采下，或收集种子，晒干即得。

【鉴别】 本品果柄肥厚，多分枝，形似鸡爪，其上结有果实数枚。果柄扭曲皱缩，粗细不均，长1—1.5寸，粗约1.5分，深紫色，质松易断。果实近圆形，直径约2分，表面棕黑色，上有三条浅沟及网状条纹，先端略尖，下有细果柄，内有种子三枚。果柄略有香气，味甜而涩。

种子扁圆形，直径1—1.5分。背面稍隆起，腹面较平，有一条纵棱线，一端有小凹痕。外皮棕红色或棕黑色，平滑而有光泽。质坚硬，种仁淡黄色至黄绿色，有油性。气微弱，味淡微甜。

以饱满肥厚、种子粒大、棕红色者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，洗净，晒干，用时捣碎即得。

【性味】 甘，平。

【功能】 止渴除烦，解酒毒，利二便。

【主治】 酒醉，烦热，口渴，呕吐，二便不利。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置通风干燥处。

枸 杞 子

Cǒuqǐzǐ

FRUCTUS LYCH

【来源】 本品为茄科(Solanaceae)植物宁夏枸杞(*Lycium barbarum* L.)或枸杞(*Lycium chinense* Mill.)的干燥成熟果实。栽培或野生，主产于宁夏、甘肃、河北等地。夏、秋二季果实成熟时将果实摘下，除去果柄，置阴凉处晾至果皮起皱纹后，再暴晒至外皮干硬、果肉柔软即得。遇阴雨可用微火烘干。

【鉴别】 本品呈椭圆形或纺锤形，两端较小，长3—6分，直径2—3分。外皮鲜红色或暗红色，具不规则皱纹，略有光泽，一端有白色的果柄痕迹，另一端有一小凸起。肉质，柔润，内有多数黄色种子，扁平似肾脏形。无臭，味甜微酸，嚼之唾液染成红黄色。

以粒大、肉厚、种子少、色红、质柔软者为佳。粒小、肉薄、种子多、色灰红者质次。

【炮炙】 筛去杂质，摘去残留梗和蒂，即得。

【性味】 甘,平。

【功能】 滋腎,潤肺,益肝,明目。

【主治】 肝腎陰虛,腰膝痠軟,目昏多淚,虛勞咳嗽,消渴,遺精。

【用法与用量】 一錢五分至三錢。

【貯藏】 置阴涼干燥处,防热及虫蛀。

柏 子 仁

Bǎizǐrén

SEMEN BIOTAE

【来源】 本品为柏科(Cupressaceae)植物側柏(*Biota orientalis*(L.)Endl.)的干燥成熟种仁。栽培或野生,主产于山东、河南、河北等地。于冬初种子成熟时采收,晒干,除去外壳及种皮,收集淨仁,阴干即得。

【鉴别】 本品呈长卵形或长橢圓形,长1.5—2分,直徑約1分。表面黃白色或淡黃棕色,平滑,外包有薄膜,尖端呈深褐色。质軟油潤,断面黃白色,富有油性。臭微,味甘。

以顆粒充实、黃白色、油性大而不泛油、无皮壳及杂质者为佳。

【炮炙】 柏子仁 拣去杂质,除去殘留的外壳和种皮即得。

柏子霜 取拣淨的柏子仁,碾碎,用吸油紙包裹,加热微炕,压榨去油,碾細即得。

【性味】 甘,平。

【功能】 养心,宁神,潤燥。

【主治】 惊悸,失眠,遺精,盜汗,便秘。

【用法与用量】 一至三錢。

【貯藏】 置阴涼干燥处,防热及虫蛀。

鴉 胆 子

Yādànzi

FRUCTUS BRUCEAE

【来源】 本品为苦木科(Simarubaceae)植物鴉胆子(*Brucea javanica* Merr.)的干燥

成熟果实。野生或栽培，主产于广东、广西等地。秋季果实成熟时采收，除去枝叶，晒干即得。

【鉴别】 本品呈长圆形或卵形，两头稍尖，长2—3分，直径1—2分。表面灰黑色，有不规则多角形的网纹，底端有凹陷的果柄痕。外壳质硬而脆，破开后内面灰红色或灰黄色，光滑而油润，内有黄白色种仁，呈卵形，长1—2分，直径1—1.5分，外包皱缩的薄膜，富有油性。无臭，味极苦。

以质坚、仁白、油性足者为佳。

【炮炙】 簸去杂质，洗净，晒干，除去外壳，取整仁用。

【性味】 苦，寒。

【功能】 燥湿，杀虫。

【主治】 痢疾，久泻，疟疾，痔疮；外治赘疣。

【用法与用量】 每次5至20粒，去壳用龙眼肉包或装胶囊吞服，一日三次；外用数粒，捣烂敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

牵牛子 (黑、白丑)

Qiānniúzi

SEMEN PHARBITIDIS

【来源】 本品为旋花科(Convolvulaceae)植物牵牛(*Ipomoea hederacea* Jacq.)或毛牵牛(*Ipomoea purpurea* (L.) Lam.)的干燥成熟种子。野生或栽培，全国各地多有生产。7—10月果实成熟时，将全株割下，晒干，打下种子，除去杂质即得。

【鉴别】 本品呈卵形，腹面具三棱，背面弓状隆起，为圆球形的六分之一，长约2分，背面及侧面宽1—1.5分。表面灰黑色(黑丑)或淡黄白色(白丑)，皱缩凹凸不平。背面有浅纵沟，腹面的一端有明显的脐点。质硬，种皮坚韧，横切面可见淡黄色或黄绿色皱缩折叠的子叶，微显油性。无臭，味辛、苦。

以籽粒饱满、无果壳、杂质者为佳。

【炮炙】 牵牛子 洗净泥屑，拣去杂质，晒干即得。

炒牵牛 取洗净的牵牛子，置锅内用文火炒至微鼓起，取出，放凉即得。

【性味】 苦，寒；有毒。

【功能】 泻水，下气，杀虫。

【主治】 水肿，喘满，痰饮，脚气，虫积，便秘。

【用法与用量】 一至二钱，煎服或入丸散服。

【注意】 孕妇忌用；畏巴豆。

【贮藏】 置通风干燥处。

厚 朴

Hòupò

CORTEX MAGNOLIAE OFFICINALIS

【来源】 本品为木兰科 (Magnoliaceae) 植物厚朴 (*Magnolia officinalis* Rehd. et Wils.) 或凹叶厚朴 (*Magnolia officinalis* var. *biloba* Rehd. et Wils.) 的干燥干皮和根皮。栽培或野生，产于四川、湖北、浙江、贵州、湖南等地。4—6月间剥取干皮及根皮，阴干，或入沸水中微烫，取出，堆置使发汗，待水分自内部渗出后，晒干，再蒸熟使变软，卷成筒状，阴干即得。

【鉴别】 干皮呈卷筒形或双卷筒形 (筒朴)，近根部的干皮一端展开如喇叭口 (靴脚朴)。全长 1—1.5 尺，皮厚 1—3 分。根皮呈卷筒形或块片状，大小不一，前者长 1 尺以上，厚约 1 分，后者长 3—6 寸，厚约 2 分。外面灰棕色或灰褐色，粗糙。有时呈鳞片状，或刮去部分粗皮而呈红褐色或灰黄色的花纹。内表面为棕紫色或棕红色，有纵直纹理，刻划时可现油痕。质坚实，不易折断，断面外层为灰棕色，中层紫棕色，颗粒状，显油性，有亮银星；内层有毛状的纤维。气辛香，味辛辣、微苦。

以皮肉细、油性大、气味浓厚、断面有亮银星、咀嚼时残渣少者为佳。皮稍糙、油性小、气味较薄、断面无亮银星者质次。

【炮炙】 厚朴 用水浸泡，捞出，润透后刮去粗皮，洗净，切丝，晒干即得。

姜厚朴 取生姜，切片煎汤，加净厚朴，与姜汤共煮透，待汤吸尽，取出，及时切片，晾干即得。

每厚朴 100 斤，用生姜 10 斤

【性味】 苦、辛，温。

【功能】 温中，下气，燥湿，消痰。

【主治】 腹痛胀满，反胃呕逆，宿食不消，痰壅喘嗽，湿满泻痢。

【用法与用量】 一至三錢。

【貯藏】 置阴涼干燥处。

厚 朴 花

Hòupòhuā

FLOS MAGNOLIAE OFFICINALIS

【来源】 本品为木兰科 (Magnoliaceae) 植物厚朴 (*Magnolia officinalis* Rehd. et Wils.) 或凹叶厚朴 (*Magnolia officinalis* var. *biloba* Rehd. et Wils.) 的干燥花蕾。栽培或野生, 主产于四川、湖北、浙江等地。春末夏初花将开放时采摘, 置蒸籠中蒸約 10 分钟, 取出, 用微火烘干或晒干即得。

【鉴别】 本品为椭圆球形, 頂尖, 基部鈍, 長約 2 寸, 直徑 5—6 分。表面紅棕色或棕褐色, 底部帶有長約 5—6 分、黑綠色或棕黑色的花柄。花瓣层层相互抱攏, 外层瓣片較大, 呈长卵形, 內层較小, 呈匙状, 表面不光滑, 有許多小点。用沸水泡开后, 花瓣厚, 显肉质, 中心有卵形黄色花蕊。气香, 味微辣。

以花朵完整、色棕紅、香气濃郁者为佳。

【炮炙】 拣淨杂质, 去梗, 篩去土即得。

【性味】 苦, 溫。

【功能】 理气, 化湿。

【主治】 胸膈脹悶。

【用法与用量】 五分至一錢。

【貯藏】 置阴涼干燥处, 防潮及虫蛀。

砂 仁

Shā rén

FRUCTUS SEU SEMEN AMOMI

【来源】 本品为姜科 (Zingiberaceae) 植物阳春砂 (*Amomum villosum* Lour.) 或縮砂

(*Annonum xanthioides* Wall.)的干燥成熟果实(壳砂)或种子(砂仁)。多系栽培,前者主产于广东、广西等地;后者为进口,主产于越南、泰国、缅甸、印度尼西亚等地。果实成熟时采收,晒干或微火焙干或剥去果皮,取出种子团,晒干即得。

【鉴别】 阳春砂 椭圆或卵圆球形,略呈三棱状,长4—6分,直径3—4.5分。表面棕褐色,密生刺状突起,一端具小突起物,一端有果柄痕。果皮质轻脆,内含多数种子,集结成团,呈球形或长圆球形,具钝三棱,分成三瓣,每瓣有种子6—15粒。种子为不规则的多面体,直径约半分许,表面棕红色或暗褐色,有细皱纹。破开后,内部灰白色,油润。气芳香,味辛凉、微苦。

进口砂 椭圆或卵圆球形,略呈三棱状,长4.5—6分,直径2.5—4.5分,表面黄棕色或灰棕色,密生刺片状突起。种子团形状较圆,表面灰棕色或棕色,去壳后的砂仁,往往因特殊加工处理,其外层被有白色粉霜。气味较阳春砂稍淡。

均以个大、坚实、仁饱满、气味浓厚者为佳。个小、仁较瘪、气味较淡者质次。二者以阳春砂质量为优。

【炮炙】 砂仁 拣去杂质,除去外壳即得。

盐砂仁 取净砂仁,用盐水浸泡拌匀,置锅内用文火炒至微干,取出,放凉即得。

每砂仁100斤,用盐2斤8两加适量开水化开澄清。

【性味】 辛,温。

【功能】 行气,调中。

【主治】 脾胃气滞,宿食不消,腹痛痞胀,噎膈呕吐,寒泻冷痢。

【用法与用量】 五分至二钱。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

轻 粉

Qīngfěn

CALOMELAS

【来源】 本品为用升华法制成的氯化亚汞结晶。将胆矾及食盐置瓷盆中,加少量水混合后,加入水银,搅拌至成糊状,再加入红土,拌成软泥状,捏成团块。另在平底锅中铺一薄层干沙土,面积与团块大小相等,将团块置沙土上,上复盖瓷缸盆,密封。加热,经24小时后,启开瓷缸盆,扫下轻粉,除去杂质即得。

【鉴别】 本品为片状结晶,形似雪花。色白,有银色光泽。体轻,手捻易碎成白色粉

末。置铁片上加热,逐渐变为黄色,最后化为青烟,无残迹遗留。

以雪花片状、色白、光亮、体轻、无水银珠者为佳。

【性味】 辛,寒;有毒。

【功能】 下痰,消积,杀虫。

【主治】 水肿,鼓胀,痰涎积滞,大小便闭;外治痈疽,恶疮,疥癬,梅毒。

【用法与用量】 三至七厘,入丸散分服;外用适量,研末掺敷患处。

【注意】 内服宜慎,孕妇忌用。

【贮藏】 置干燥处,避光,密闭保存。

韭 菜 子

Jiǔcàizǐ

SEMEN ALLII TUBEROSI

【来源】 本品为百合科(Liliaceae)植物韭菜(*Allium tuberosum* Rottl.)的干燥成熟种子。均系栽培,主产于辽宁、吉林、河北、江苏等地。秋季果实成熟时采收,连同部分花梗采下,晒干,搓出种子,去净杂质即得。

【鉴别】 本品呈扁平的半圆形或半卵圆形,直径约1分。表面黑色,一面凸起,一面略凹陷,凸面粗糙,有致密的皱纹,但无凸起的棱角,凹面皱纹不甚明显。质硬,破开后种仁白色。无臭,味微辛,似韭菜。

以饱满、色黑、无杂质者为佳。

【炮炙】 筛去泥屑,簸去杂质即得。

【性味】 辛、甘,温。

【功能】 补肝肾,暖腰膝,壮阳,固精。

【主治】 阳痿,遗精,小便频数,遗尿,白浊,腰膝痠软,妇女白带。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置干燥处。

虻 虫

Mángchóng

TABANUS

【来源】 本品为虻科(Tabanidae)昆虫中华虻(*Tabanus mandarinus* Schi.)、复带虻

(*Tabanus binittatus* Matsum.)、姚氏虻(*Tabanus yao* Macq.)或山崎虻(*Tabanus yamasakii* Ouchi)等雌虻成虫的干燥全体。主产于广西、四川、浙江、江苏、湖南、湖北、山西、河南、辽宁等地。夏、秋二季捕捉后,用线穿上挂起,晒干或阴干即得。

【鉴别】 本品呈长椭圆形,长4—7分,宽1.5—3分。头部呈黑棕色而有光泽,有凸出的两眼及长形的吸吻。背部呈黑棕色而有光泽,生有一对透明的薄膜状翅,翅长超过尾部。胸部有足三对,多折断。腹部呈黄褐色,有横纹节。质脆,易破碎,破开腹部内有灰黑色糟朽状物质。有臭气,味苦咸。

以头大、完整,无竹条等杂质者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,筛去泥屑,除去足翅;或炒用。

【性味】 苦,微寒;有毒。

【功能】 破血,逐瘀,通经。

【主治】 瘀结,积聚,瘀血,妇女经闭。

【用法与用量】 五分至一钱。

【注意】 孕妇忌用。

【贮藏】 置通风干燥处,防虫蛀。

威 灵 仙

Wéilíngxiān

RADIX CLEMATIDIS

【来源】 本品为毛茛科(Ranunculaceae)植物威灵仙(*Clematis chinensis* Osbeck)的干燥根部。均为野生,主产于安徽、浙江、江苏等地。秋季采挖,除去茎叶、须根及泥土,晒干即得。

【鉴别】 本品根状茎呈不规则的块状,其上丛生许多细根,根呈细长圆柱形,根长3—6寸,直径约半分,略弯曲。表面棕褐色至棕黑色,有细纵纹,有细小的须根。质脆,易折断,外皮与木心较易脱离,横断面圆形,周边灰黄色,中央木心黄白色。气微弱,味微苦。

以条匀、皮黑肉白、质坚实者为佳。

【炮炙】 威灵仙 拣去杂质,除去残茎,用水浸泡,捞出,润透后切段,及时干燥,筛去须毛即得。

酒灵仙 取净威灵仙段,用黄酒拌匀,闷透,置锅内用文火微炒干,取出,放凉即得。

每威灵仙段 100 斤,用黄酒 12—15 斤。

【性味】 辛、咸,温。

【功能】 祛风,行气,通经,泄水。

【主治】 中风,头风,痛风,顽痹,腰脚诸痛,瘀积聚,心膈痰水及诸骨哽咽。

【用法与用量】 一至三钱。

【注意】 服药时忌饮茶及面汤。

【贮藏】 置干燥处。

复盆子

Fùpénzǐ

FRUCTUS RUBI

【来源】 本品为蔷薇科(Rosaceae)植物复盆子(*Rubus Chingii* Hu)的干燥未成熟果实。均系野生,主产于浙江、福建、湖北、贵州等地。立夏后果实已饱满尚呈绿色时采摘,除净梗叶,用沸水浸 1—2 分钟后,置烈日下晒干即得。

【鉴别】 本品呈类圆锥形、球形或扁圆形,由多数小果聚合而成,直径 2—3 分。表面灰绿色,带灰白色毛茸。上部钝圆,底部扁平,有褐色的小托盘,五裂,托盘上有的留有棕色毛须,中央凹入,常带细长果柄。小果具三棱,呈月牙形,背部密生灰白色毛茸,两侧有明显的网纹,内含棕色种子一枚。无臭,味甘、微酸。

以个大、饱满、粒整、结实、色灰绿、无叶梗杂质者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,筛去沙土,去柄即得。

【性味】 甘、酸,温。

【功能】 补肝肾,缩小便。

【主治】 阳痿,多尿,遗尿。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置通风干燥处。

钟乳石

Zōngrǔshí

STALACTITUM

【来源】 本品为主含碳酸钙的钟乳状石块。主产于广西、湖北、四川等地。自石灰岩

山洞中采集凝积的石乳，洗净，晒干即得。

【鉴别】 本品略呈圆锥形或圆柱形，大小不一，一般长约数寸，直径约0.5—2寸。表面白色、灰白色或棕黄色，粗糙，凹凸不平。体重，质坚，难折断，断面显闪烁的亮光，中心多有一圆孔，圆孔周围呈多数圈层。无臭，味微咸。

以色白或灰白、空心、有亮光、无杂石者为佳。

【炮炙】 钟乳石 洗净，打成小块即得。

煅钟乳石 取钟乳石块，置坩埚内，在无烟炉火中煅红透，取出，晾凉即得。

【性味】 甘，温。

【功能】 温肺气，壮肾阳，通乳汁。

【主治】 虚劳喘咳，寒嗽，阳痿，腰膝冷痛无力，乳汁不通。

【用法与用量】 三至五钱。

【贮藏】 置干燥处。

钩 藤

Gōuténg

RAMULUS UNCARIAE CUM UNCIS

【来源】 本品为茜草科(Rubiaceae)植物钩藤(*Uncaria rhynchophylla* (Miq.) Jacks.)的干燥带钩茎枝。均系野生，主产于广西、广东、湖南、浙江、江西等地。春、秋二季采收有钩的嫩枝，剪去无钩的藤茎，晒干，或置锅内蒸后再晒干，即得。

【鉴别】 本品茎略呈方柱形，长4—8分，一般上下端与钩平齐或略长，直径约1分。表面紫红色或棕红色。茎上有环状的茎节，色浅而微突起。节上对生两个向下弯曲的钩，形似船锚，亦仅有生一钩者，对面为凸起的疤痕。钩底部的茎上均有一小高点，系叶脱落后的痕迹。钩大小不一，宽3—5分，基部稍宽，呈扁圆形，尖端向内卷曲。通体有细纵皱纹，微现光泽，有少数色浅的小斑点。质轻而坚韧，不易折断，断面中周有髓呈黄白色，松软似海绵，外圈坚硬，棕黄色。无臭，味淡。

以双钩、茎细、钩结实、光滑、质嫩、紫红色者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，去老梗，洗净，晒干即得。

【性味】 甘，微寒。

【功能】 清热平肝，息风定惊。

【主治】 头旋，目眩，小儿惊癇，瘰癧。

【用法与用量】 一錢五分至三錢。

【貯藏】 置干燥处。

香 加 皮

Xiāngjiāpí

CORTEX PERIPLOCAE RADICIS

【来源】 本品为蘿藦科(Asclepiadaceae)植物杠柳(*Periploca sepium* Bge.)的干燥根皮。均系野生，产于山西、河南、河北、山东等地。多于秋季采挖，趁湿剥取根皮，洗净泥沙，晒干即得。

【鉴别】 本品呈长筒状，单卷或为双卷，亦有成槽状，长1—3寸，直径2—4分，厚约1分。外表面灰棕色，粗皮松而糟，容易剥离。内表面淡黄色，较平滑，有纵纹。质轻脆，易折断，断面黄白色，不整齐。有浓厚的特殊香气，味苦而有刺激性。

以块大、肉厚、香气浓厚、无木心者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，洗净，闷润后切段，晒干即得。

【性味】 辛、苦，微温；有毒。

【功能】 除风湿。

【主治】 风寒湿痹，脚膝拘攣，筋骨疼痛。

【用法与用量】 二至三錢。

【貯藏】 置阴凉干燥处。

香 附

Xiāngfù

RHIZOMA CYPERI

【来源】 本品为莎草科(Cyperaceae)植物莎草(*Cyperus rotundus* L.)的干燥地下块茎。均系野生，全国各地均有生产，主产于山东、浙江、湖南、河南等地。秋季采挖，用火

燎去須毛，以沸水略煮或蒸透后晒干，即为毛香附。再撞除去須毛，晒干，即为光香附。也有不经火燎或蒸煮，直接撞去毛須晒干者。

【鉴别】 本品多呈紡錘形，有时略弯曲。长0.5—1寸許，直径1.5—3分。表面棕褐色或黑褐色，有纵皺紋，并有数个隆起的环节，节上有棕色毛状物及殘留的根痕，去淨毛須者則外表光滑，环节不明显。质坚硬，經過蒸煮者断面色棕黃而微紫紅，显角质性，生晒者断面色白而显粉性，周边与中心分层明显，中心色略深。气芳香，味微苦。

以个大、色棕褐、质坚实、香气濃郁者为佳。

【炮炙】 香附 拣去杂质，碾成小豆大的碎粒，簸去細毛并篩去細末即得。

醋香附 取淨香附粒，加醋拌勻，悶一夜，俟醋吸尽。置鍋內用文火炒至微黃色，取出，晾干即得。

每香附粒100斤，用醋20斤。

香附炭 取淨香附，置鍋內用武火炒至表面焦黑色，內部焦黃色，但須存性，噴淋清水，取出，晒干即得。

【性味】 辛、微苦、微甘，平。

【功能】 理气解郁，調經止痛。

【主治】 气血諸郁，心腹諸痛，妇女月經不調。

【用法与用量】 一錢五分至三錢。

【貯藏】 置阴涼干燥处，防虫蛀。

香 薷

Xiāngrú

HERBA ELSHOLTZIAE

【来源】 本品为唇形科(Labiatae)植物海州香薷(*Elsholtzia haichowensis* Sun)的干燥带花穗的地上部分。野生或栽培，主产于江西、河北、河南等地。夏季采收，当果实成熟时割取地上部分，晒干或阴干即得。

【鉴别】 本品全体被白色毛茸。莖細，多分枝，全长1—1.5尺，近根部为圓柱形，上部为方柱形。表面淡紫色或黃綠色。质脆，易折断。叶对生，皺縮破碎或已脫落。潤湿展平后，完整的叶片呈披針形或长卵形，邊緣有疏鋸齒，暗綠色或灰綠色。莖頂有穗状花序，呈淡黃色或淡紫色。具濃烈香气，味辛、微麻舌。

以质嫩、萼淡紫色、叶绿色、香气浓烈者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，用水喷润后，除去残根，切段，干燥即得。

【性味】 辛，微温。

【功能】 发表解暑，散湿行水。

【主治】 夏月乘凉饮冷伤暑，头痛，发热，恶寒，无汗，腹痛，吐泻，水肿，脚气。

【用法与用量】 八分至二钱。

【贮藏】 置干燥阴凉处。

香 櫟

Xiāngyuán

FRUCTUS CITRI

【来源】 本品为芸香科(Rutaceae)植物枸橼(*Citrus medica* L.)或香圆(*Citrus wilsonii* Tanaka)的干燥成熟果实。均系栽培，主产于四川、云南、江苏、浙江等地。8—10月采摘成熟的果实，放2—3日，待果实表面略干时，切成1—2分厚的片，亦可用绳穿起风干或低温烘干，或直接将果实晒干(避免暴晒)即得。

【鉴别】 本品呈长圆形或圆球形，直径约3寸。外皮黑绿色或略带黄色，皱缩，粗糙不平，密生小凹点，一端有小突起，一端有果柄痕迹。质坚硬，不易剖开，横切面皮黄白色，厚1—2.5分，肉瓢棕色或棕红色，呈车轮状，间有棕色种子。气清香，味苦、微酸。

以个大、形圆、皮粗、色黑绿、质坚厚者为佳。

香橼片 为横切或纵切的薄片，直径1.5—3寸。外皮粗糙，绿色、黄绿色或黄色，皱缩不平，密生小凹点，边缘成波状。横切面黄色或黄白色，皱缩，有脉纹，肉厚0.6—1寸，瓢呈车轮形；纵切时呈片状，中心柱粗壮坚实。肉柔韧，不易折断。香气淡，味甘、微苦辛。

以片薄、圆形、色白、香气浓者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，用水洗净，去瓢，润透后切成小块即得。

【性味】 辛、苦、酸，温。

【功能】 下气，化痰。

【主治】 心下气痛，痰饮咳嗽，气逆呕吐。

【用法与用量】 一钱五分至二钱。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防潮及虫蛀。

急性子

Jíxìngzǐ

SEMEN IMPATIENTIS

【来源】 本品为凤仙花科(Balsaminaceae)植物凤仙花(*Impatiens balsamina* L.)的干燥成熟种子。均系栽培，全国大部分地区多有生产。夏、秋二季果实将成熟时采摘，取出种子，晒干即得。

【鉴别】 本品呈扁圆形或卵圆形，少数略有棱角，直径0.5—1分。表面棕褐色或灰褐色，有小白点，在扩大镜下观察，表面微粗糙，有黄棕色或白色短条纹及少数白色成簇的短绒毛散在。质坚实，种仁呈灰白色，有油性。无臭，味淡微苦。

以纯净、颗粒饱满者为佳。

【炮炙】 簸净杂质，用水洗净，晒干即得。

【性味】 微苦，温；有小毒。

【功能】 软坚，消积。

【主治】 难产，积块，疔疰，咽中骨哽。

【用法与用量】 一钱至一钱五分。

【注意】 孕妇忌用。

【贮藏】 置干燥处。

胖大海

Pàngdàhǎi

SEMEN STERCULIAE SCAPHIGERAE

【来源】 本品为梧桐科(Sterculiaceae)植物胖大海(*Sterculia scaphigera* Wall.)的干燥成熟种子。主产于越南、泰国、马来亚等地。4—6月由开裂的果实上摘取成熟的种子，晒干即得。

【鉴别】 本品呈椭圆形，状似橄榄，长6—9分，直径3—5分。外皮棕色或暗棕色，微有光泽及不规则的细皱纹。一端钝圆，一端略尖，有一个直径约2分的圆形脐点。外皮质轻松，易剥落，遇水膨大成海绵状。内皮红棕色或棕黑色，一端有一黄白色的圆斑。剥去

內皮可見內有種仁兩瓣，暗棕色或灰棕色。無臭，味微甘，久嚼之有粘性，種仁味極麻辣。

以個大、堅實、棕色、有細皺紋及光澤、無破皮者為佳。

【炮炙】 揀去雜質，篩去泥沙即得。

【性味】 甘、淡，寒。

【功能】 清火、解毒。

【主治】 干咳無痰，骨蒸內熱，吐衄下血，時行赤眼，風火牙疼，痔瘡漏管及三焦火症諸症。

【用法與用量】 二至三枚，沸水泡服或煎服。

【貯藏】 置通風干燥處，防潮及虫蛀。

胆 矾

Dǎnfán

CHALCANTHITUM

【來源】 本品為一種含水硫酸銅的結晶體。天然產者可於開采銅礦時，選擇藍色玻璃狀有光澤的結晶，或用化學方法制得。

【鑒別】 本品為不規則的塊狀結晶體。深藍色或淡藍色，半透明。質脆，易碎，碎塊呈棱柱形，斷面光亮。無臭，味澀。能溶于水，加熱燒之變成白色，遇水則又變藍。

以塊大、深藍色、透明、無雜質者為佳。

【炮炙】 揀去雜質，斫成小塊即得。

【性味】 酸、辛，寒；有毒。

【功能】 涌吐風痰。

【主治】 風痰壅塞，喉痹，癰腫；外治口瘡，牙疳，風眼赤爛，瘡瘍腫毒。

【用法與用量】 一至二分，多入丸散服；外用適量，煅研末敷或泡湯洗患處。

【貯藏】 置干燥處，密閉保存，防風化。

禹 白 附

Yǔbáifù

RHIZOMA TYPHONII

【來源】 本品為天南星科(Araceae)植物獨角蓮(*Typhonium giganteum* Engl.)的干

燥块莖。多为野生，主产于河南、陕西、四川、湖北等地。秋季采挖，除去残莖及须根，撞去或用竹刀刮去外皮，晒干即得。

【鉴别】 本品呈椭圆形或卵圆形，长0.5—1.2寸，直径3—7分。表面白色或黄白色，略粗糙，有环纹及小麻点状的根痕，顶端显莖痕或芽痕。质坚硬，难折断，断面白色，富粉性。无臭，味淡，嚼之麻辣刺舌。

以个大、色白、粉性大者为佳。

【炮炙】 禹白附 拣净杂质，洗净，晒干即得。

制禹白附 取禹白附，分开大小个，用凉水浸漂，每日换水2—3次，泡至数日后，如起粘沫，换水时加白矾少许，泡一日后再行换水，泡至口尝无麻辣感为度，取出，与鲜姜片及白矾粉层层均匀铺入容器内，加水少许，腌约3—4星期，倒入锅内煮透，取出，拣去姜片，晾至六成干，闷润后切片，干燥即得。

每禹白附100斤，用鲜姜25斤、白矾12.5—25斤。

【性味】 辛、甘，大温；有毒。

【功能】 祛风痰，定惊止痛。

【主治】 中风失音，心痛血痹，偏正头风，喉痹肿痛，破伤风。

【用法与用量】 一钱至一钱五分，一般炮炙后用，多入丸散服。

【注意】 孕妇忌用，生者内服宜慎。

【贮藏】 置干燥处，防霉及虫蛀。

禹粮石（禹余粮）

Yǔliángshí

LIMONITUM

【来源】 本品为一种含氧化铁的矿石，主产于河南、江苏、浙江、四川等地。挖出后去净杂质，即得。

【鉴别】 本品呈不规则的斜方块状，大小厚薄不一，长2—3寸。表面呈红黄色或红棕色，亦有灰棕色者，多凹凸不平，或复有黄色粉末。质略硬，易击碎而呈粉性，断面显层次，红棕色与灰棕色相间，有的质松，用指甲可以划动。无臭，无味，嚼之无砂粒感。

以灰棕色或红棕色相间、质硬但易击碎成粉、断面显层次、无杂质者为佳。

【炮炙】 禹粮石 拣去杂质，洗净泥土，干燥即得。

煅禹粮石 取净禹粮石,打碎,置坩埚内,在无烟火中煅红透,倒入醋盆内淬酥,捞出,晒干即得。

每禹粮石 100 斤,用醋 30 斤。

【性味】 甘、微寒、滑。

【功能】 滑肠,止血。

【主治】 泻痢不止,女子崩漏带下。

【用法与用量】 三至五钱。

【注意】 孕妇慎用。

【贮藏】 置干燥处。

独 活

Dúhuó

RADIX ANGELICAE TUHUO

【来源】 本品为繖形科(Umbelliferae)当归属(*Angelica*)植物独活的干燥根。习称“川独活”。多系野生,主产于湖北、四川等地。秋季茎叶枯萎后或春季初发苗时采挖,除去残茎、须根及泥土,阴干或炕干即得。

【鉴别】 本品主根略呈圆柱形,上粗下细,下端有分枝,全长 3—6 寸,根头直径 1 寸左右。表面黄褐色或棕褐色,顶端有茎叶残基或凹陷。根头部多横皱纹,全体具纵皱纹,有横生隆起的小疙瘩及稍突起的细根痕。质坚实,断面可见多数黄棕色的油点散在或略排列成环状,周边呈白色,其内有棕色环,中心为灰棕色。香气特异而浊,味苦辛、麻舌。

以根条粗肥、质坚实、气味浓者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,分开大小个,洗净,润透后切片,干燥即得。

【性味】 辛,温。

【功能】 搜风,去湿。

【主治】 伤风头痛,腰膝痠痛,风寒湿痹,手脚挛痛。

【用法与用量】 八分至一钱五分。

【贮藏】 置阴凉干燥处,防霉及虫蛀。

丝瓜络

Sìguāluò

RETINERVUS LUFFAE FRUCTUS

【来源】 本品为葫芦科(Cucurbitaceae)植物丝瓜(*Luffa cylindrica* (L.) Roem.) 的干燥成熟果实的网状筋络。均系栽培,主产于江苏、浙江等地。秋季果实成熟、果皮变金黄色、内部干枯时采摘,搓去外皮及果肉或用水浸泡至果皮、果肉腐烂,取出,洗净,除去种子,晒干即得。

【鉴别】 本品呈长筒形或长梭形,略弯曲,两端较细,长1—2尺,中间直径2—3寸。表面白色或黄白色,全体系由多层丝样筋络缠绕交织而成的网状物。体轻,质韧,有弹性,不能折断。横切面有3个大洞,有时里面残留黑色的种子。无臭,无味。

以筋细、质韧、洁白、无皮者为佳。

【炮炙】 丝瓜络 拣去杂质,除去残留种子及外皮,干切成段即得。

丝瓜络炭 取丝瓜络段,置煅锅内装满,上面复盖一锅,两锅接合处用黄泥封固,上压重物,用文武火煅至贴在盖锅锅底上的白纸显焦黄色为度,擋住火门,待凉后,取出即得。

【性味】 甘,平。

【功能】 通经络,行血脉。

【主治】 气血不行,心膈气痛,腹痛腰痛,睾丸肿痛,妇女经闭,乳汁不通。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置通风干燥处,防潮。

浙贝母

Zhèbèimǔ

BULBUS FRITILLARIAE THUNBERGII

【来源】 本品为百合科(Liliaceae)植物浙贝母(*Fritillaria verticillata* var. *thunbergii* Bak.) 的干燥鳞茎。多系栽培,主产于浙江等地。立夏前后采挖,洗净泥土,大小个分开,大者摘除心芽,分别撞擦,除去外皮,拌以石灰,以吸去擦出的浆液,再晒干或烘干即

得。大者习称“元宝貝”，小者习称“珠貝”。

【鉴别】元宝貝 为鱗莖外层的单瓣鱗叶，一面凸出，一面凹入，呈元宝状，瓣长0.5—1寸，厚2—5分。表面白色，或带淡黄色，被有白色粉末。质硬而脆，易折断，断面不齐，白色或淡黄色，富粉性。气微弱，味苦。

珠貝 为完整的鱗莖，呈扁圓球形，高3—5分，直径0.6—1寸許。表面白色，外层2枚鱗叶肥厚，略似腎臟形，中央为2—3个皺縮的小鱗叶及干縮的殘莖，内表面呈淡黄白色。质地与气味同元宝貝。

均以鱗叶肥厚、表面及断面白色、粉性足者为佳。个較小、表面灰白色、断面中心呈棕紅色者质次。元宝貝較珠貝为优。

【炮炙】 拣去杂质或去心，用水略泡，捞出，潤透后切厚片，晒干即得。

【性味】 苦，寒。

【功能】 清热散結，潤肺化痰。

【主治】 痰热咳嗽，肺癰喉痹，瘰癧及諸疮瘍肿毒。

【用法与用量】 一錢五分至三錢。

【注意】 反烏头、草烏。

【貯藏】 置通風干燥处，防虫蛀。

娑罗子 (天師栗)

Suōluózi

FRUCTUS AESCULI

【来源】 本品为七叶树科(Hippocastanaceae)植物七叶树 (*Aesculus chinensis* Bge.) 或天師栗 (*Aesculus wilsonii* Rehd.) 的干燥成熟果实。均系栽培，主产于浙江、江苏、陕西等地。9—10月采摘，晒7—8日，再用微火烘至内部干燥即得。

【鉴别】 本品呈圓球形或倒卵形，直径約1寸。頂端突出或扁平，基部有果柄疤痕。表面棕褐色，粗糙，密布黃棕色的斑紋，有三条纵向沟紋，自果頂直达果柄处，形成三瓣状。外壳硬而脆，除去外壳可見扁圓形的种子一枚，表面深棕色，凹凸不平，略抽皺，有一淺色大疤痕，約占种子的1/3—1/2。种皮硬而脆，种仁坚硬，黃白色或淡棕色，粉质。无臭，味先苦后甜。

以飽滿、完整者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，除去外壳，用水洗净，晒干，用时捣碎即得。

【性味】 甘，温。

【功能】 宽中，下气，杀虫。

【主治】 胃寒作痛，脘膈膨胀，疳积虫痛，瘧疾，痢疾。

【用法与用量】 一至三錢，煎服或煨研末服。

【貯藏】 置通风干燥处，防虫蛀。

浮 小 麦

Fúxiǎomài

FRUCTUS TRITICI LEVIS

【来源】 本品为禾本科(Gramineae)植物小麦(*Triticum aestivum* L.)的干燥轻浮瘪瘦的果实。均系栽培，全国大部分地区多有生产。麦收后选取轻浮瘪瘦的麦粒，筛净杂质即得。

【鉴别】 本品呈长圆形，长约2分，直径约0.8分。表面黄白色或浅黄棕色，略抽皱，腹面有一深陷的纵沟。顶端钝形，带有黄色柔毛，另一端成斜尖形，有脐。质硬或较软，断面白色，有粉性。无臭，味淡。

以粒均匀、轻浮、无杂质者为佳。充实饱满的小麦粒，不宜作浮小麦入药用。

【炮炙】 拣去杂质，筛去灰屑，用水漂洗，晒干即得。

【性味】 甘、咸，凉。

【功能】 益气，除热，止汗。

【主治】 骨蒸劳热，自汗，盗汗。

【用法与用量】 二至四錢。

【貯藏】 置通风干燥处，防虫蛀。

浮 萍

Fúpíng

HERBA LAMNAE

【来源】 本品为浮萍科(Lemnaceae)植物紫萍(*Lemna polyrrhiza* (L.)Schleid.)的干

燥全草。均系野生，全国大部分地区均有生产。6—9月間采收，洗淨，晒干，除去杂质即得。

【鉴别】 本品呈薄片状，常三、四片集生而折叠卷曲。潤湿展平后，可見每片近圓形，直徑1—1.5分。正面綠色或黃綠色，光滑。背面紫色，略粗糙，生有数条細須根。体輕，质軟。无臭，味咸、微苦。

以叶色綠、背紫、无杂质者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，篩去灰屑，洗淨，晒干即得。

【性味】 辛，寒。

【功能】 发汗，行水，祛風，散湿。

【主治】 斑疹不透，風湿癱瘓、水肿，小便不利，風热癰疹：外治疮癤，汗斑，癩風，面皰，丹毒。

【用法与用量】 八分至一錢五分，多入丸散服；外用适量，煎湯浸洗或研末擦敷或鮮者搗汁塗敷患处。

【貯藏】 置通風干燥处，防潮。

海 马

Hǎimǎ

HIPPOCAMPUS

【来源】 本品为海龙科(Syngnathidae)动物克氏海馬(*Hippocampus kelloggi* Jordan et Snyder)、刺海馬(*Hippocampus histrix* Kaup)、大海馬(*Hippocampus kuda* Bleeker)或三斑海馬(*Hippocampus trimaculatus* Leach)除去內臟的干燥品。养殖或野生。主产于广东、福建、台灣等沿海地区。多在夏、秋二季捕捉后，洗淨，晒干，或刷去外部灰黑色皮膜，除去內臟，将尾作成盘卷状，晒干即得。

【鉴别】 本品略呈长条形而弯曲，体长3—8寸，中部直徑6—8分。表面黃白色，未去淨皮膜者呈灰黑色。全身有似瓦楞子的节紋，有的并具棘状突起。头略似馬头，与身体略成直角。头部有冠状突起，前方有一管状长嘴，无牙，两眼深陷。中部粗而扁方，具七条或六条纵棱，背部有鳍。尾部漸細，向內卷曲，具四条纵棱，故常以馬头蛇尾、瓦楞身概述其外形。体輕，骨质、坚硬。微有腥气，味微咸。

以个大、色白、头尾齐全者为佳。

【炮炙】 刷淨灰屑,用时捣碎即得。

【性味】 甘,温。

【功能】 暖水臟,壮阳道。

【主治】 男子阳痿,妇女难产,癥瘕,积聚,腹痛;外治疗疮肿毒。

【用法与用量】 一至三錢;外用适量,研末敷患处。

【注意】 孕妇内服宜慎。

【貯藏】 置阴凉干燥处,防虫蛀。

海 龙

Hǎilóng

SYNGNATHUS

【来源】 本品为海龙科(Syngnathidae)动物刁海龙(*Solerognathus hardwickii* Gray)、拟海龙(*Syngnathoides biaculeatus* Bloch)或尖海龙(*Syngnathus acus* L.)除去皮膜及內臟的干燥品。均系野生,主产于广东、台湾等地。夏、秋二季捕捉,除去皮膜及內臟,洗淨,晒干即得。

【鉴别】 本品呈长条形,中部略粗,尾端渐細而弯曲,全长0.5—1.2尺,中部直径6—8分。表面呈黄白色或灰棕色,全身及尾部均密布美丽的花纹及細横紋,头部前方具一管状长嘴,长约1寸,无牙,两眼圓而深陷。身部前方两侧有短寬的胸鳍一对,身体常具五条纵棱,有的具四棱或七棱,身部后方脊面有一背鳍,腹部末端有一小孔。尾部常具四条纵棱。体輕,骨质、坚硬。气微腥,味微咸。

以条大、色白、头尾整齐者为佳。

【炮炙】 刷淨灰屑,用时捣碎即得。

【性味】 甘,温。

【功能】 暖水臟,壮阳道。功同海馬而力倍强。

【主治】 男子阳痿,妇女难产,癥瘕,积聚,腹痛;外治疗疮肿毒。

【用法与用量】 一至三錢;外用适量,研末敷患处。

【注意】 孕妇内服宜慎。

【貯藏】 置阴凉干燥处,防虫蛀。

海 金 沙

Hǎijīnshā

SPORA LYGODII

【来源】 本品为海金沙科(Schizaeaceae)植物海金沙(*Lygodium japonicum*(Thunb.) Sw.)的干燥孢子。均系野生,主产于浙江、广东等地。8—9月采收,将刚成熟的海金沙莖叶割下,晒干,打下叶背的黄棕色细小孢子,用细筛筛去莖叶即得。

【鉴别】 本品呈均匀微细的粉末状,棕黄色,质轻。手捻有光滑感,置手掌中即由指缝滑落。取少量粉末撒于燃烧的纸上,易着火燃烧而发爆鸣及闪光,无灰渣残留。另取粉末少许撒于水上,飘浮水面而不下沉。

以干燥、黄棕色、质轻光滑、能浮于水、无泥沙杂质、引燃时有响声者为佳。

【炮炙】 筛净杂质,即得。

【性味】 甘,寒。

【功能】 通淋,清热,利湿。

【主治】 膏淋,石淋,热淋,小便茎痛。

【用法与用量】 一至三钱。

【贮藏】 置干燥处。

海 螺 蛸 (乌贼骨)

Hǎipiāoxiāo

OS SEPIAE

【来源】 本品为乌贼科(Sepiidae)动物乌贼(*Sepia esculenta* Hoyle)的干燥背骨。主产于浙江、福建等地。全年均产,以夏季为主,将漂浮在海边或积于海滩上的乌贼骨拣起,剔除杂质,以清水漂洗,晒干;或将食用弃去的乌贼骨收集后洗净,晒干即得。

【鉴别】 本品呈长椭圆形而扁平,边缘薄,中间厚。一般长3—5寸,宽1—2寸,中部厚2—4分。背部白色或淡黄白色,有密布的小疙瘩状凸起,形成近平行的半环状纹路。表面被一层硬而脆的膜。腹面洁白,偶有黄色透明薄膜附着,并有层纹或水波状纹。体

輕，質松脆，易折斷，斷面有明顯微向背面彎曲平行的細紋。除背部硬膜外，用手摩擦時有大量白色細粉脫落。微有腥氣，味微咸而澀。

以色白、完整不破碎者為佳。

【炮炙】 刷洗干淨，曬干，斬成小塊即得。

【性味】 咸，微溫。

【功能】 通血脈，去寒濕。

【主治】 吐血，衄血，便血，血枯，血瘕，久虛瀉痢，腹痛環臍，婦女經閉，崩漏帶下，陰蝕腫痛；外治目翳淚出，聾耳出膿，潰瘍不斂。

【用法與用量】 一錢五分至三錢；外用適量，研細末敷患處。

【貯藏】 置干燥處。

海 藻

Hǎizǎo

SARGASSUM

【來源】 本品為馬尾藻科(Sargassaceae)植物羊栖菜(*Sargassum fusiforme* (Harv.) Setch.)或海蒿子(*Sargassum pallidum* (Turn.) C. Ag.)的干燥全草。前者習稱“小葉海藻”，后者習稱“大葉海藻”。多系野生，主產于浙江、福建、廣東、山東、遼寧等地。夏季采收，除去雜質，用清水洗淨，曬干即得。

【鑑別】 小葉海藻 多細小，長5—6寸。表面黑褐色，用水浸軟后，全體肉質，粘滑。莖軸呈三棱形，直徑約半分。葉狀物數個，簇生，錐形，長0.5—1寸，直徑半分以上。

大葉海藻 呈分枝狀，長1—3尺。表面黑褐色或被有鹽霜，全體皺縮卷曲，用水浸軟后膨脹，肉質粘滑。莖軸有棱。基部的葉狀物長橢圓形，長約1寸，寬約2分，先端尖，邊緣有疏鋸齒，上部的葉狀物呈綫形，葉腋間長有習稱“燈籠泡”暗紅色的軟氣囊。二者干燥時質脆，易折斷，潮潤時則柔韌。均有腥氣，味微咸。

均以干燥、色黑褐、鹽霜少、枝嫩、無沙石者為佳。

【炮炙】 揀去雜質，用水洗漂，稍晾，切段，曬干即得。

【性味】 苦、咸，寒。

【功能】 軟堅，利水，清熱，消痰。

【主治】 癰腫，癭瘤，水腫，積聚，睾丸腫痛。

【用法与用量】 一錢五分至三錢。

【注意】 反甘草。

【貯藏】 置干燥处。

高良姜(良姜)

Gāoliángjiāng

RHIZOMA ALPINIAE OFFICINARUM

【来源】 本品为姜科(Zingiberaceae)植物高良姜(*Alpinia officinarum* Hance)的干燥地下根状茎。野生或栽培,主产于广东、广西、台湾等地。夏末秋初,挖取生长4—6年的根状茎,除去地上茎及须根,剥去残留的鳞片,洗净切断,晒干即得。

【鉴别】 本品呈圆柱形,多弯曲而分枝,长1.5—3寸,直径3—5分。表面暗红棕色,有纵皱纹与灰棕色波状环节,每节长1.5—3分,下侧面有圆形的细根残迹。质坚韧,不易折断,断面红黄色或棕红色。气芳香,味辛辣。

以红棕色、壮实、气味香辣、分枝少者为佳。过粗或过细、香气微弱、辣味小者不宜入药。

【炮炙】 拣去杂质,用水浸泡,洗净,捞出,润透后切片,干燥即得。

【性味】 辛,热。

【功能】 暖胃,散寒。

【主治】 胃脘冷痛,脾寒吐泻,噎膈反胃,瘴瘕冷癖。

【用法与用量】 八分至二钱。

【貯藏】 置阴凉干燥处。

凌霄花

Língxiāohuā

FLOS CAMPSIS

【来源】 本品为紫葳科(Bignoniaceae)植物凌霄(*Campsis grandiflora* (Thunb.)

Loisel.)的干燥花。栽培或野生,主产于江苏、浙江等地。7—9月采摘,晒干或用微火烘干即得。

【鉴别】本品为皱缩折叠的花朵。完整的花,长约2寸。花瓣棕黄色,先端5裂,裂片呈半圆形,下部联合呈漏斗状,表面具有棕红色细脉纹,并散布有棕色斑点。萼片暗棕色,长7—8分,先端5裂,裂片顶端长而锐尖,下端呈筒状,质薄。雄蕊4个,着生花瓣上,二长二短,顶端具有“个”字形花药。花的中央有一细长的柱状雌蕊,顶端扁圆,基部膨大有棱。微有香气,味微苦而略酸。

以花朵整齐、棕黄色者为佳。

【炮炙】拣去杂质,去梗即得。

【性味】甘、酸,寒。

【功能】凉血,去瘀。

【主治】妇女瘀血经闭,产后瘀血作痛,血热生风,风疹身痒。

【用法与用量】一钱五分至三钱。

【注意】孕妇忌用。

【贮藏】置通风干燥处,防潮。

拳 参 (重楼)

Quánshēn

RHIZOMA BISTORTAE

【来源】本品为蓼科(Polygonaceae)植物拳参(*Polygonum bistorta* L.)的干燥地下根状茎。均系野生,产于湖北、江苏、吉林等地。春初发芽时或秋季茎叶将枯落时采挖,除去残茎及泥土,晒干,再去须根即得。

【鉴别】本品呈扁圆柱形,两头较细,多弯曲,长1—3寸,直径3—6分。表面紫黑色,有环纹及多数硬质的须根,或留有除去须根的残迹,全体皱缩有细皱纹。质硬脆,易折断,断面浅棕红色,近边缘处有一圈灰白色小点。无臭,味苦涩。

以粗大、质坚实,断面棕红色、无须根及泥沙者为佳。

【炮炙】拣去杂质,洗净,润透后切片,干燥即得。

【性味】苦,微寒;有毒。

【功能】凉血,解毒。

【主治】 惊痫，癫疾，瘧疾；外治痈肿，蛇毒。

【用法与用量】 一錢五分至三錢；外用适量，醋磨塗敷患处。

【貯藏】 置干燥处。

益 母 草

Yìmǔcǎo

HERBA LEONURI

【来源】 本品为唇形科(Labiatae)植物益母草(*Leonurus sibiricus* L.)的干燥茎叶。均系野生，全国大部分地区多有生产。夏季未开花或初开花时离地面数寸处割取，晒干即得。

【鉴别】 本品茎呈方柱形，四面有纵沟，上部多分枝，长2—3尺，直径约2分。表面黄绿色或青绿色。质轻而韧，断面中心有白色的髓。叶对生，有柄，叶片灰绿色，皱缩扭曲，常破碎。完整的叶，依其生在茎上的部位不同而形状各异，下部叶掌状三裂，上部叶羽状深裂或浅裂成三片，裂片全缘或具少数锯齿，顶端叶较小而无柄。有的在叶腋部可见紫红色小花，围生成一环，花冠唇形，花萼筒状。具青草气，味甘、微苦。

以茎细、质嫩、色绿者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，除去残根，洗净，润透后切段，及时干燥即得。

【性味】 辛、苦，微寒。

【功能】 去瘀，生新，调经，消水。

【主治】 妇女月经不调，胎漏难产，胎衣不下，产后血运，血闭腹痛，尿血，泻血，浮肿，小便不利，肿毒疮疡。

【用法与用量】 三钱至一两；并可外用，干者适量，研末或鲜者捣烂敷或水煎洗患处。

【貯藏】 置干燥处，防压。

益 智

Yìzhì

FRUCTUS ALPINIAE OXYPHYLLAE

【来源】 本品为姜科(Zingiberaceae)植物益智(*Alpinia oxyphylla* Miq.)的干燥成熟

果实。栽培或野生，主产于广东、广西等地。7—8月果实由绿转红时采收，晒干即得。

【鉴别】 本品呈椭圆形，两端略尖，长5—6分，直径3—4分。外皮红棕色或灰棕色，有纵向凹凸不平的隆起线13—20条。皮薄而稍韧，与种子紧贴。种子集结成团，中有薄膜，将种子团分为三瓣，每瓣有种子6—11粒。种子呈扁圆形不规则块状，略有钝棱，大小约1分，呈灰褐色或灰黄色，破开后里面为白色，有粉性。臭特殊，味辛微苦。

以粒大、饱满者为佳。

【炮炙】 盐益智 取沙子，置锅内用武火炒至轻松，加入净益智，炒至外壳鼓起并显焦黄色，取出，筛去沙子，碾去壳，簸净取仁，用盐水拌匀，微炒，取出，放凉即得。

每益智100斤，用盐2斤8两加适量开水化开澄清。

【性味】 辛，温。

【功能】 温脾，暖肾，固气，济精。

【主治】 冷气腹痛，中寒吐泻，多睡遗精，小便余沥，夜多小便，崩中漏胎。

【用法与用量】 一至三钱。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

秦 皮

Qinpi

CORTEX FRAXINI

【来源】 本品为木犀科(Oleaceae)植物苦楸白蜡树(*Fraxinus rhynchophylla* Hance)或小叶白蜡树(*Fraxinus bungeana* DC.)的干燥树皮。多系野生，主产于陕西、河北、河南、山西、辽宁、吉林等地。春、秋二季剥下枝皮或剥取干皮，晒干即得。

【鉴别】 本品有枝皮和干皮两种：

枝皮 呈单卷筒或槽状长条形，全长1—2尺，厚约1分。表面灰褐色或灰黑色，往往相杂不匀。外皮不平滑，有浅色斑点，内面黄白色或棕色，有光泽。质硬，易折断，断面黄白色，纤维性。无臭，味苦。水浸液呈黄色，并有蓝色荧光。

干皮 为长条状块片，不成卷，厚2—3分，外皮灰棕色，有红棕色斑点相间或不规则的斑纹，外皮剥离后，可见红棕色的内皮。内面浅棕红色，平滑。断面纤维性强。臭，味及水浸液颜色均与枝皮同。

以整齐、长条呈筒状者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，洗净，润透后切块或切段，晒干即得。

【性味】 苦,寒,澀。

【功能】 清热,燥湿,收澀。

【主治】 热痢下重,目赤肿痛,迎风流泪,妇女崩带。

【用法与用量】 一錢五分至三錢;并可外用,适量,煎湯洗眼。

【貯藏】 置通風干燥处。

秦 艽

Qínjiāo

RADIX GENTIANAE MACROPHYLLAE

【来源】 本品为龙胆科(*Gentianaceae*)植物秦艽(*Gentiana macrophylla* Pall.)的干燥根部。均系野生,主产于甘肃、陕西、山西等地。春、秋二季采挖,除去茎叶及泥土,晒干,或堆晒至颜色成为红黄或灰黄色后,再摊开晒干,即得。

【鉴别】 本品略呈圆锥形,上粗下细,扭曲不直,全长3—7寸,中部直径0.5—1.2寸。表面棕黄色或灰黄色,根头部由一个单生或数个合生而成,顶端残存茎基并附有黄色毛状物,中部多具螺旋状扭曲的纵皱纹或有劈破处,并有须根或须根痕,下部为独根或有分枝。质松脆,易折断,断面不平坦,显油性,外层黄白色或棕黄色,中心有黄色木心。臭特殊,味苦而涩。

以粗大、肉厚、色棕黄、不带黑皮者为佳。

【炮炙】 洗净,拣去杂质,去芦,略浸捞出,润透后切片,及时干燥即得。

【性味】 苦、辛,平。

【功能】 祛风,除湿,清热,利尿,和血,舒筋。

【主治】 风湿痹痛,筋骨拘挛,黄疸,便血,骨蒸劳热,小儿疳热。

【用法与用量】 一至三錢。

【貯藏】 置通風干燥处。

莲 子

Liánzǐ

SEMEN NELUMBINIS

【来源】 本品为睡莲科(*Nymphaeaceae*)植物莲(*Nelumbo nucifera* Gaertn.)的干燥

成熟种子。均系栽培，主产于湖南、湖北、福建、江苏、浙江等地。秋季果实成熟时采收，剖下莲房，取出果实，除去果皮，晒干即得。

【鉴别】 本品呈椭圆形，长4~5分，直径3—4分。外皮红棕色或黄棕色，薄而稍皱，紧贴于种仁上，不易剥离，有棕色的纵纹，一端凸起呈棕色，多有裂口，有的已除去外皮，表面呈黄白色。质坚硬，不易破开，种仁两瓣，黄白色，有粉性，中心凹入成槽形，有绿色的莲心。无臭，味甘淡、微涩。

以个大、饱满、正齐者为佳。

【炮炙】 取莲子，用水略浸，闷透，切开去心，晒干即得。

【性味】 甘，平，涩。

【功能】 补脾，养心，涩肠，固精。

【主治】 脾虚泄泻，多梦遗精，崩漏带下。

【用法与用量】 二至五钱。

【贮藏】 置干燥处，防潮及虫蛀。

莲 子 心

Liánzǐxīn

PLUMULA NELUMBINIS

【来源】 本品为睡莲科(Nymphaeaceae)植物莲(*Nelumbo nucifera Gaertn.*)的成熟种子的干燥绿色的胚。均系栽培，主产于湖南、湖北、福建、江苏、浙江等地。由莲子中取出，晒干即得。

【鉴别】 本品略呈小棒状，长4—5分，粗约1分。上端青绿色，有两个分歧，一长一短，先端反折，紧密互贴，用水浸软后，展开，为二片盾状卷曲的幼叶，其基部中央有一黄绿色的小芽。下端短小，圆柱形，长约1分，黄绿色。质脆，易折断，断面有多数小孔。无臭，味苦。

以个大、均匀、整齐、色青绿、未煮熟者为佳。

【炮炙】 筛去杂质，即得。

【性味】 苦，寒。

【功能】 清心，去热。

【主治】 心烦，吐血。

【用法与用量】 五分至一錢。

【貯藏】 置通風干燥处,防潮及虫蛀。

蓮 花

Liánhuā

FLOS NELUMBINIS

【来源】 本品为睡蓮科(Nymphaeaceae)植物蓮(*Nelumbo nucifera* Gaertn.)的干燥花蕾。均系栽培,全国大部分地区多有生产。夏季采摘含苞未放的花蕾,阴干即得。

【鉴别】 本品呈圓錐形,长0.8—1.2寸,直径5—6分。表面灰棕色。花瓣多层,呈螺旋状排列,表面有多数細筋脉,基部略厚,质光滑柔軟。去掉花瓣可見中心的幼小蓮蓬,頂端圓形平坦,上面有十数个小孔,基部漸窄。有多数花蕊,生于蓮蓬周圍。花柄細圓柱状,上有皺沟或縱紋,直径約2分,表面紫黑色,具刺状突起。微有香气,味苦澀。

以未开放、瓣整齐、洁淨、有香气者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,去柄即得。

【性味】 苦、甘,温。

【功能】 去湿,止血。

【主治】 跌損嘔血;外治天泡湿疮。

【用法与用量】 八分至一錢五分;外用花瓣貼敷患处。

【貯藏】 置通風干燥处,防虫蛀。

蓮 房

Liánfáng

RECEPTACULUM NELUMBINIS

【来源】 本品为睡蓮科(Nymphaeaceae)植物蓮(*Nelumbo nucifera* Gaertn.)的干燥成熟花托。均系栽培,主产于湖南、湖北、福建、江苏、浙江等地。秋季果实成熟时采收,割下蓮房,除去柄及果实,晒干即得。

【鉴别】 本品呈倒圆锥形或漏斗状，下面尖削，上面圆形面平，直径2—3寸，高1—2.5寸。表面紫红色或灰褐色，粗糙，凸面有纵皱纹，尖端有柄的残基，较平的一面有多数圆形的孔洞，呈蜂窝状。体轻，质松如海绵。无臭，味涩。

以个大、紫红色者为佳。

【炮炙】 莲房 剔除灰屑，去柄，切块即得。

莲房炭 取净莲房，置煅锅内装满，上面复盖一锅，两锅接合处用黄泥封固，上压重物，用文武火煅至贴在盖锅底上的白纸显焦黄色为度，撬住火门，待凉后，取出即得。

【性味】 苦，温，涩。

【功能】 消瘀，止血。

【主治】 瘀血腹痛，产后胎衣不下，血崩，下血，血淋，尿血。

【用法与用量】 一钱五分至三钱，消瘀生用，酒煮服，止血烧存性，研末入丸散服。

【贮藏】 置干燥处，防潮。

莪 朮

Ézhú

RHIZOMA ZEDOARIAE

【来源】 本品为姜科(Zingiberaceae)植物莪朮(*Curcuma zedoaria* Rose.)的干燥地下根状茎。栽培或野生，产于广西、四川等地。秋、冬二季均可采挖，去净泥土，蒸熟后，晒干，除净毛须及杂质即得。

【鉴别】 本品呈卵圆形或纺锤形，两端稍尖，长0.6—1.2寸，直径5—9分。外皮灰黄色至棕黄色，略有皱纹，有环形的节，节上有断去细根后遗留的圆形稍凹下的疤痕，并有须根痕。质坚实而重，极难折断，破开面灰褐色至黄绿色，角质状，有光泽，并有一黄白色环及白色的筋脉小点。稍有香气，味微苦而辛。

以个均匀、质坚实、断面灰褐色者为佳。

【炮炙】 莪朮 拣去杂质，用水浸泡，润透后，置籠屉内蒸透，取出，切片，晒干即得。

醋莪朮 拣去杂质，洗净，置锅中加醋与热水使浸没，用文火煮透，捞出，晾至六成干，切薄片，阴干即得。

每莪朮100斤，用醋10—20斤。

【性味】 苦、辛，温。

【功能】 破血，行气，消积。

【主治】 气血凝滞，心腹脹痛，癥瘕，积聚，宿食不消，妇女血瘀經閉，跌打損傷作痛。

【用法与用量】 一錢五分至三錢。

【注意】 孕妇忌用。

【貯藏】 置干燥处，防虫蛀。

荷 叶

Héyè

FOLIUM NELUMBINIS

【来源】 本品为睡蓮科(Nymphaeaceae)植物蓮(*Nelumbo nucifera* Gaertn.)的干燥叶。均系栽培，全国大部分地区多有生产。秋季当花开后采摘，晒至七、八成干时去梗，对折成半圓形，再晒干即得。

【鉴别】 本品常对折成半圓形，展开后为圓形，直徑約1尺許。正面青綠色，背面灰綠色，中間有凸起的叶柄殘痕。叶脉明显、微凸起，由叶柄处向叶片四周分布。质脆，易破碎。微有清香气，味微澀。

以叶大、色綠、无斑点、不破碎者为佳。

【炮炙】 荷叶 去淨杂质，噴潤，切絲即得。

荷叶炭 取淨荷叶，置煅鍋內装满，上面复盖一鍋，两鍋接合处用黃泥封固，上压重物，用文武火煅至貼在盖鍋底上的白紙显焦黃色为度，擋住火門，待凉后，取出即得。

【性味】 苦，平。

【功能】 升阳，散瘀，止血。

【主治】 暑湿，泄泻，吐血，衄血，崩漏，便血，血淋。

【用法与用量】 一至三錢。

【貯藏】 置通风干燥处。

菟 絲 子

Tùsīzi

SEMEN CUSCUTAE

【来源】 本品为旋花科(Convolvulaceae)植物菟絲子(*Cuscuta chinensis* Lam.)的

干燥成熟种子。均系野生,主产于辽宁、吉林、河北、河南、山东、山西、江苏等地。秋季当种子成熟时,与寄主一同割下,晒干,打下种子,筛去杂质即得。

【鉴别】 本品呈细小类圆形,直径小于半分。外皮红棕色或棕黄色,微粗糙,在扩大镜下可见细皱纹,一端有小白点。质坚实,沸水煮之易破裂,露出白色卷旋形的种仁。无臭,味淡。

以颗粒饱满、无尘土及杂质者为佳。

【炮炙】 菟丝子 过筛去净杂质,洗净,晒干即得。

菟丝饼 取净菟丝子,加水煮至爆花,显褐灰色稠粥状时,捣烂作饼或再加黄酒与面作饼,切块,晒干即得。

【性味】 辛、甘、平。

【功能】 补肝肾,益精,明目。

【主治】 腰膝痠痛,遗精,目眩,尿有余沥。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置通风干燥处。

桂 枝

Guìzhī

RAMULUS CINNAMOMI

【来源】 本品为樟科(Lauraceae)植物肉桂(*Cinnamomum cassia* Bl.)的干燥嫩枝。野生或栽培,主产于广西、广东、云南等地。春、夏二季将桂树的嫩枝条砍下,除去叶片,切成1—2尺长,晒干即得。

【鉴别】 本品呈圆柱形,长约1—2尺,直径1—3分。外皮棕红色或紫红色,有小疙瘩、纵棱线及顺纹,并有横纹。质硬而脆,易折断,断面红黄色,外层棕红色,中间棕黄色,粗枝断面黄白色,呈木质状。有特殊香气,味甜微辛,皮部味较浓。

以枝条嫩细而均匀、棕红色、香气浓者为佳。

【炮炙】 桂枝 用水浸泡,捞出,闷润后,切段,晾干即得。

桂枝尖 拣桂枝的枝梢,用水泡透,捞出,切段,晾干即得。

【性味】 辛、甘,温。

【功能】 发汗解肌,温经通脉。

【主治】 風寒表証，肩臂肢節痠痛，婦女經閉腹痛。

【用法与用量】 五分至二錢。

【注意】 畏石脂。

【貯藏】 置陰涼干燥處。

桔 梗

Jiégěng

RADIX PLATYCODI

【来源】 本品为桔梗科(Campanulaceae)植物桔梗(*Platycodon grandiflorum* A. DC.)的干燥根部。多系野生，全国各地多有生产，主产于安徽、湖北、河南等地。春、秋二季采挖，除去茎苗、须根及泥土，刮去灰黄色外皮，洗净，晒干即得。

【鉴别】 本品略呈纺锤形，上粗下细，少分枝，稍弯曲，全长3—8寸，直径3—7分。芦头上有许多半月形的芦碗，表面白色或淡棕色，皱缩，上部有横纹，全体具纵沟，有时可见支根的痕迹。质脆，易折断，断面粗糙，有菊花心及浅棕色环纹。无臭，味甘而后苦。

以条粗均匀、体质坚实、色白、味苦者为佳。条不匀、折断中空、色灰白者质次。其带有灰黄色外皮者不宜入药。

【炮炙】 拣去杂质，去芦，洗净，捞出，润透后切片，晒干即得。

【性味】 苦、辛，微温。

【功能】 宣肺，散寒，消痰，排脓。

【主治】 外感咳嗽，咽喉肿痛，肺痛咳吐脓血。

【用法与用量】 八分至一钱五分。

【貯藏】 置通风干燥处，防虫蛀。

栝 楼 (瓜蒌)

Guālóu

FRUCTUS TRICHOSANTHIS

【来源】 本品为葫芦科(Cucurbitaceae)植物栝楼(*Trichosanthes kirilowii* Maxim.)

或多裂栝楼(*Trichosanthes multiloba* Miqu.)的干燥成熟果实。栽培或野生,主产于山东、安徽、河南、四川等地。9—11月果实成熟时采摘,置阴凉通风处,晾干即为栝楼,将初熟稍带绿色的果实摘下,晾至颜色变红,或将成熟的果实,剖开,除去瓜瓤及种子,洗净,晒干即为栝楼皮。

【鉴别】栝楼 呈圆球形或长圆球形,长2—3寸,直径2—2.5寸。外皮红黄色或杏黄色,光滑,或多皱缩,有颜色较深微凸起的筋脉。一端有短果柄或果柄痕迹,另一端钝圆。体轻重不一,质脆易破开。里面黄白色,附有红黄色丝络,具空腔,并有一团含种子的粘瓤,多和果皮粘连。气带焦糖样,味酸甜。

以整齐、个大、皮厚柔韧、皱缩、杏黄色或红黄色、糖性足者为佳。

栝楼皮 呈壳状,常切成二至数瓣,长2—3.5寸,皱缩不平,两边向内卷曲。一端有残存的果柄。质松脆。气微带焦糖样,味淡微酸。

以外皮红黄色、内面色白、皮厚、整齐、无杂质者为佳。

【炮炙】栝楼 去柄,刷洗去净泥土,压扁,切块即得。

栝楼皮 洗净,捞出稍晾,切丝,晒干即得。

【性味】甘、苦,寒。

【功能】润肺,滑肠。

【主治】痰热咳嗽,结胸,胸痹,便秘,乳痈。

【用法与用量】三至四钱。

【注意】反乌头、草乌。

【贮藏】置阴凉干燥处,防潮及虫蛀。

栝 楼 子

Guālóuzi

SEMEN TRICHOSANTHIS

【来源】本品为葫芦科(Cucurbitaceae)植物栝楼(*Trichosanthes kirilowii* Maxim.)或多裂栝楼(*Trichosanthes multiloba* Miqu.)的干燥成熟种子。栽培或野生,主产于山东、安徽、河南、四川等地。取成熟的栝楼种子,洗净,晒干即得。

【鉴别】本品呈扁平椭圆状,形如西瓜子,长3.5—5分,宽2—3分。外皮平滑,灰褐色,沿边缘有一圈沟纹,一端有小凹点。质坚硬,内含种仁两瓣,类白色,富油性,外被绿色

外衣。臭微、味甘、微苦澀。

以粒均匀、饱满、油性足者为佳。

【炮炙】 栝楼子 拣去杂质，簸除去干瘪的种子，捣扁即得。

炒楼子 取净栝楼子，置锅内用文火炒至微鼓起，取出，放凉即得。

楼仁霜 取去壳的净楼仁，碾细，用吸油纸包裹，加热微炕，压榨去油后，碾细，过筛即得。

【性味】 甘、苦、寒。

【功能】 润肺，滑肠。

【主治】 痰热咳嗽，燥结便秘。

【用法与用量】 三至四钱。

【注意】 反乌头、草乌。

【贮藏】 置通风干燥处。

桃 仁

Taórén

SEMEN PERSICAE

【来源】 本品为蔷薇科(Rosaceae)植物桃(*Prunus persica*(L.)Batsch)或山桃(*Prunus davidiana* Franch.)的干燥成熟种子。栽培或野生，主产于四川、陕西、山东、河北等地。秋季果实成熟时采摘，除去桃肉及核壳，取出种子，晒干即得。

【鉴别】 本品呈扁平长卵形，长3—5分，宽2—3分，厚约1分。外皮棕黄色或棕红色，有纵皱，顶端尖，中间膨大，底部略小，钝圆而偏斜，边缘薄。自底部散出多数脉纹，尖端的一侧有短线形的痕迹。外皮薄而脆，剥下外皮，露出白色种仁，富油性。臭微，味微苦。

以颗粒均匀、饱满、正齐不破碎者为佳。

【炮炙】 拣去杂质及残留的硬壳，置沸水锅中煮至外皮微皱，捞出，入凉水中浸漂，搓去皮，晒干，簸净即得。

【性味】 苦、甘、平。

【功能】 破血，润燥。

【主治】 蓄血发狂，跌打损伤，血燥便秘，妇女经闭，癥瘕。

【用法与用量】 一錢五分至三錢。

【注意】 孕妇忌用。

【貯藏】 置阴凉干燥处,防虫蛀。

夏 枯 草

Xiākūcǎo

SPICA PRUNELLAE

【来源】 本品为唇形科(Labiatae)植物夏枯草(*Prunella vulgaris* L.)的干燥果穗,均为野生,全国大部分地区多有生产,主产于江苏、浙江等地。夏季采收,产季較短,約30—40天,当果穗半枯时采下,晒干即得。

【鉴别】 本品呈圓棒状,略扁,由数十朵枯萎的小花組成,长约1—2寸,直径約3—5分。黄褐色的苞片对生于花轴上。每苞片內有小花3朵,外边具白毛,內有小坚果4枚,形似种子,棕褐色,有光泽。全穗枯干,质脆体輕,搖之作响。无臭,味淡。

以果穗正齐、无枝叶者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,去柄,篩去泥土即得。

【性味】 苦、辛,寒。

【功能】 清肝火,散郁結。

【主治】 瘰癧,癰瘤,乳疖,目珠疼痛,羞明流泪,女子赤白帶下。

【用法与用量】 一錢五分至三錢。

【貯藏】 置干燥处。

桑 叶

Sāngyè

FOLIUM MORI

【来源】 本品为桑科(Moraceae)植物桑(*Morus alba* L.)的干燥叶。栽培或野生,全国大部分地区多有生产,以南方蚕区产量較大。10—11月間霜后采摘,除去杂质,晒干

即得。

【鉴别】 本品呈卵圆形。长2.5—4寸，宽2—3寸。叶柄长寸许。叶顶端尖形，边缘有锯齿，有时作不规则的分裂，底部较平或呈心形。正面黄绿色，略有光泽，沿叶脉处有细小毛茸。背面黄白色，叶脉突起，小脉交织成网状，细毛较多。质脆易碎。无臭，味淡、微苦涩。

以叶片完整、大而厚、色黄绿、质脆、无杂质者为佳。

【炮炙】 桑叶 拣去杂质，搓碎，簸去梗，筛去泥屑即得。

蜜桑叶 取净桑叶，加炼熟的蜂蜜与开水少许，拌匀，稍闷，置锅内用文火炒至不粘手为度，取出，放凉即得。

每桑叶100斤，用炼熟蜂蜜20—25斤。

【性味】 苦、甘，寒。

【功能】 祛风清热，凉血明目。

【主治】 风热，头痛，目赤，口渴，劳热，咳嗽。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置通风干燥处。

桑 白 皮

Sāngbáipí

CORTEX MORI RADICIS

【来源】 本品为桑科(Moraceae)植物桑(*Morus alba* L.)除去栓皮的干燥根皮。栽培或野生，主产于安徽、浙江等地。春、秋二季将树根刨出，除去泥土及须根，刮去黄棕色栓皮，纵向割开皮部，除去木心，晒干即得。

【鉴别】 本品呈长而扭曲的板状，或两边向内卷曲成槽状，长短宽窄不一，厚1—2分。外表面呈淡黄白色或显黄色，有极少数棕黄色或红黄色斑点，表面稍平坦，有纵向裂纹及稀疏的纤维。内表面黄白色或灰黄色，平滑，有细纵纹，有的疏松，多纵向裂开，露出纤维。体轻，纤维性强，易纵裂，但不易分开，横向则不易折断，撕裂时有白色粉末飞出。臭微，味甘微苦。

以色白、皮厚、质柔韧、无粗皮、粉性足者为佳。

【炮炙】 桑皮 刷去灰屑，洗净，润透后切丝，干燥即得。

蜜桑皮 取桑皮丝，加炼熟的蜂蜜与开水少许，拌匀，稍闷，置锅内用文火炒至变为黄色、不粘手为度，取出，放凉即得。

每桑皮絲 100 斤，用煉熟蜂蜜 30 斤。

【性味】 甘，寒。

【功能】 瀉肺，行水。

【主治】 肺熱喘咳，吐血，水腫腹脹。

【用法與用量】 一錢五分至三錢。

【貯藏】 置通風干燥處，防潮及蟲蛀。

桑 枝

Sǎngzhī

RAMULUS MORI

【來源】 本品為桑科(Moraceae)植物桑(*Morus alba* L.)的干燥嫩枝。栽培或野生，全國大部分地區均有分布，主產于江蘇、浙江等地。秋、冬二季割取嫩枝，略曬，即趁新鮮時切成斜片或短段，再晒干即得。

【鑒別】 本品呈長圓柱形，少有分枝，長短不齊，直徑 2—3 分。表面灰黃色或灰褐色，有多數淡褐色小點及細縱紋，枝上并可見灰白色略呈半月形的葉痕和棕黃色的小芽。質堅韌，有彈性，較難折斷，斷面呈黃白色，具纖維性，外皮較薄，內皮淺灰綠色，中心有較細小而綿軟的髓。有青草氣，味淡略粘，久嚼則成纖維團。

以枝細質嫩而堅韌、斷面黃白色、嚼之發粘者為佳。

【炮炙】 揀去雜質，洗淨，用水浸泡，潤透后切段，晒干即得。

【性味】 苦，平。

【功能】 祛風濕，利關節，行水。

【主治】 風寒濕痹，四肢拘攣，腳氣浮腫。

【用法與用量】 三至五錢。

【貯藏】 置干燥處。

桑 椹

Sāngrèn

FRUCTUS MORI

【來源】 本品為桑科(Moraceae)植物桑(*Morus alba* L.)的干燥果穗。均系栽培，主

产于四川、江苏、浙江、山东等地。4—6月间果实变红时采收，晒干或烘干，或采收后略蒸，再晒干即得。

【鉴别】本品为由许多扁圆形的小果集聚复合而成的呈长圆形果穗，长约3—6分，粗约2—3分。一端有短柄。小果卵圆形或心臟形而略扁，长约1分，外包肉质萼片，紫红色或紫黑色。质油润，富有糖性。无臭，味甜。

以个大、肉厚、紫黑色、糖性大、完正无杂质者为佳。干瘦、松散、绿白色、无糖性者不宜入药。

【炮炙】用水洗净，拣去杂质，摘除长柄，晒干即得。

【性味】甘、酸，温。

【功能】补肝肾，明目，生津。

【主治】血虚，血痹，目暗，消渴。

【用法与用量】三至五钱。

【贮藏】置通风干燥处，防虫蛀。

桑 螵 蛸

Sāngpiāoxiāo

OÖTHECA MANTIDIS

【来源】本品为螳螂科(Mantidae)昆虫大刀螳(*Paratenodera sinensis* de Saussure)、小刀螳(*Statilia maculata* Thunb.)、薄翅螳螂(*Mantis religiosa* L.)或巨斧螳螂(*Hierodula patellifera* Serrille)的干燥卵鞘。均系野生，全国大部分地区多有生产。自深秋至翌年春季均可采收，采摘后，除去树枝，置蒸笼内，蒸约半小时，杀死虫卵，晒干或炕干即得。

【鉴别】本品呈类圆球形、类圆柱形或短半圆柱形，长0.6—1.5寸，宽3—9分。一端膨大，一端较窄，由多数呈斜向排列的薄片组成。表面灰黄色或暗棕色，附着树枝的一面平坦或有凹槽，另一面呈半圆形凸出，或中央凸起一条带状纵棱。体轻，质韧或坚脆，横断面可见许多放射状小室，室内有黄棕色、具光泽、椭圆形、细小的虫卵。气微腥，味淡或微咸。

以体轻、色黄、无树枝者为佳。

【炮炙】拣去杂质，簸去泥屑，置容器内，蒸透，晒干即得。

【性味】 甘、咸、平。

【功能】 益肾，固精。

【主治】 遗精白浊，赤白带下，老人尿频，小儿遗尿。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置通风干燥处，防虫蛀。

柴 胡

Cháihú

RADIX BUPLEURI

【来源】 本品为伞形科(Umbelliferae)植物北柴胡(*Bupleurum chinense* DC.)或狭叶柴胡(*Bupleurum scorzoneraefolium* Willd.)的干燥根。均系野生。前者习称“北柴胡”，产于辽宁、甘肃、河北、河南等地；后者习称“南柴胡”，产于湖北、江苏、四川等地。春、秋二季采挖，除去茎苗及泥土，晒干即得。

【鉴别】 北柴胡 为根并带少许茎的基部，根呈圆锥形，主根顺直或稍弯曲，下部有分歧，根头膨大，呈疙瘩状，长2—6寸，直径2—5分。外皮灰褐色或灰棕色，有纵皱纹及支根痕，顶部有细毛或坚硬的残茎。质较坚韧，不易折断，断面呈木质纤维性，黄白色。微有香气，味微苦、辛。

南柴胡 外形与北柴胡类似，惟根较细，分歧少，多弯曲不直。长1—3寸，直径2—3分。表面红棕色，有纵皱纹及须根痕，顶部无疙瘩头，而有地上茎叶枯死后所遗留的毛状纤维。质脆，易折断，断面平坦，呈淡棕色。微有香气，味微苦、辛。

均以根长整齐、无苗茎及细须根者为佳。

【炮炙】 柴胡 拣去杂质，除去残茎，洗净泥沙，捞出，润透后及时切片，避免发霉，随切随即干燥即得。

醋柴胡 取柴胡片，用醋拌匀，置锅内用文火炒至醋吸尽并微干，取出，晒干即得。

每柴胡片100斤，用醋12斤半。

鳖血柴胡 取柴胡片，置大盆内，淋入用温水少许稀释的鳖血，拌匀，闷润，置锅内用文火微炒，取出，放凉即得。

每柴胡片100斤，用活鳖200个取血。

【性味】 苦，微寒。

【功能】 发表和里，升阳解郁。

【主治】 寒热往来，胸满，胁痛，口苦，耳聋，头眩，呕吐，疟疾，中气下陷，脱肛，妇女月經不調，阴挺。

【用法与用量】 八分至一錢五分。

【貯藏】 置通風干燥处，防虫蛀。

通 草

Tōngcǎo

MEDULLA TETRAPANACIS

【来源】 本品为五加科 (Araliaceae) 植物通脱木 (*Tetrapanax papyrifera* (Hook.) Koch) 的干燥茎髓。均系野生，产于贵州、云南、台湾、广西等地。8—9 月間割取地上茎，截成段，趁鲜时将茎中髓部取出理直，晒干即得。

【鉴别】 本品呈圆柱形。一般长 1—2 尺，直径 0.4—1 寸。洁白色，有浅纵沟纹。体轻，质柔软，有弹性，易折断，断面平坦，中部有直径 2—3 分的空心或白色半透明的薄膜，外圈银白色。无臭，无味。

以色洁白、心空、有弹性者为佳。

【炮炙】 通草 拣去杂质，切片即得。

朱通草 取通草片，置盆内喷水少许，微润，加朱砂细粉，撒布均匀，并随时翻动，至外面挂匀朱砂为度，取出，晾干即得。

每通草片 10 斤，用朱砂 10 两。

【性味】 甘、淡，寒。

【功能】 利小便，下乳汁。

【主治】 五淋，水肿，小便癃闭，乳汁不下。

【用法与用量】 八分至一錢五分。

【注意】 孕妇忌用。

【貯藏】 置干燥处，防潮。

党 参

Dǎngshēn

RADIX CODONOPSIS PILOSULAE

【来源】 本品为桔梗科 (Campanulaceae) 植物党参 (*Codonopsis pilosula* Nannf.) 的

干燥根部。野生或栽培，产于我国北部地区。春、秋二季均可采挖，以秋季采挖者佳。栽培者将根挖出后，去掉地上茎苗及泥土，边晒边搓，使皮部与木质部贴紧，晒干即得；野生者晾晒或用微火烘干即得。

【鉴别】 本品呈长圆柱形，稍弯曲，长3寸至尺许，直径2—6分。外皮灰褐色或灰棕色，根头部有多数疣状突起的茎痕，通称“狮子盘头”，每个茎痕呈凹下点状，年久者则茎痕多而根头较大，根头下有致密的环状横纹，向下渐稀疏，有的达全体之半，全体有纵皱纹，散在有如眉状的疤痕，支根断落处常见黑褐胶状物。质硬，体轻，易折断，断面淡黄白色，有裂隙或菊花纹，中央有黄色圆心。有特殊香气，味微甜。

以条大粗壮、皮松肉紧、横纹多、质柔润、有香气、甜味浓者为佳。条细小、横纹少、无香气、甜味淡者质次。无甜味、有纤维性、不柔润者不合药用。

【炮炙】 党参 用水洗净，润透后去芦，切段或切片，干燥即得。

米党参 将米置锅内加热，喷水少许至米粘贴锅上，俟烟冒出时，加入党参段，轻轻翻炒至显黄色，取出，放凉，去净米粒即得。

每党参段100斤，用米20斤，

【性味】 甘，平。

【功能】 和脾胃，补中益气，生津。

【主治】 脾胃虚弱，肺气不足，体倦无力，食少，口渴。

【用法与用量】 三至四钱。

【注意】 反藜芦。

【贮藏】 置通风干燥处，防虫蛀。

骨 碎 补 (申姜)

Gǔsuìbǔ

RHIZOMA DRYNARIAE

【来源】 本品为水龙骨科(Polypodiaceae)植物槲蕨(*Drynaria fortunei*(Kze.)J. Sm.)的干燥根状茎。均系野生，主产于广东、浙江、四川、湖北等地。冬、春二季采挖，除去杂质，晒干后火燎即得。

【鉴别】 本品呈扁平条形，多弯曲而有分枝，长2—4寸，宽2—4分，厚约1分。表面密被薄片状红棕色的毛茸。经过火燎者呈扁片状，多皱缩，毛茸已脱落，显棕色或暗棕色。

一面具有略凸起或凹下的小圓疤的叶痕。质輕脆，断面紅棕色或淡紅棕色，有小黃点呈圓圈状排列。无臭，味淡微澀。

以棕色、条肥大者为佳。

【炮炙】 取沙子，置鍋內炒至輕松，加入拣淨的骨碎补，炒至鼓起并毛呈焦黃状，取出，筛去沙子，放凉后撞去毛，即得。

【性味】 苦，溫。

【功能】 补腎，破血，止血。

【主治】 腎虛久泻，耳鳴，牙痛，骨伤。

【用法与用量】 一錢五分至三錢。

【貯藏】 置干燥处。

射 干

Shègān

RHIZOMA BELAMCANDAE

【来源】 本品为鳶尾科(Iridaceae)植物射干(*Belamcanda chinensis* (L.) DC.)的干燥地下根状莖。均系野生，主产于湖北、河南等地。春、秋二季采挖，除去泥土，晒至半干，燎淨毛須，剪除莖苗及細根，再晒干即得。

【鉴别】 本品呈不規則結节状，长1—3寸，直径3—5分。外皮灰褐色或有黑褐色斑，有斜向或扭曲的环状皺紋，排列甚密，上面有凹陷的莖痕，下面有残留的細根及根痕，质坚硬，断面黃色。臭微，味苦。

以肥壮、肉色黃、須根少者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，用水浸泡，捞出，潤透，晾至內外湿度均匀，及时切片，干燥即得。

【性味】 苦，寒；有毒。

【功能】 降火，解毒，散血，消痰。

【主治】 喉痹咽痛，咳逆上气，痰涎壅盛，結核，癰疽，瘡母，妇女經閉；外治疮毒肿痛。

【用法与用量】 八分至一錢五分；外用适量，研末敷患处。

【注意】 孕妇忌內服。

【貯藏】 置干燥处。

鬼 箭 羽

Guǐjiànyǔ

RAMULUS EUONYMI

【来源】 本品为卫矛科(Celastraceae)植物卫矛(*Euonymus alatus* (Thunb.) Regel.)的干燥具翅状物的枝条。均系野生，全国大部分地区多有生产。全年均可采割，割取枝条，除去嫩枝及叶，晒干即得。

【鉴别】 本品呈圆柱形，有分枝，长1—2尺，直径1—3分。表面灰绿色，有纵皱纹，四面生有灰褐色片状羽翼，形似箭羽。羽翼质松脆，易折断或剥落，断面呈棕色。枝条木质，坚硬，难折断，断面黄白色，不整齐。无臭，味微苦涩。

以条匀、箭羽齐全者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，用水洗净，捞出，切段，晒干即得。

【性味】 苦、寒。

【功能】 破血，通经，杀虫。

【主治】 妇女经闭，产后瘀血腹痛，虫积腹痛。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【注意】 孕妇忌用。

【贮藏】 置干燥处。

淡 竹 叶

Dànzhúyè

HERBA LOPHATHERI

【来源】 本品为禾本科(Gramineae)植物淡竹叶(*Lophatherum gracile* Brongn.)的干燥茎叶。均系野生，产于浙江、江苏、湖南、湖北、广东等地。夏季花未开放时割取地上部分，晒干即得。

【鉴别】 本品为带叶的茎枝，全长1—2尺。茎圆柱形，有节，上部浅绿色，下部黄白色。质轻而柔弱，断面中空，叶鞘抱茎，叶片披针形，皱缩卷曲，长3—6寸，浅绿色或黄绿色。

色，叶脉平行不分歧。无臭，味淡。

以叶大、梗少、不带根及花穗者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，除去残根，切段，过筛去土即得。

【性味】 甘，寒。

【功能】 清热，利小便。

【主治】 烦热，小便短赤。

【用法与用量】 一至三钱。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防潮。

淡 豆 豉

Dàndòuchǐ

SEMEN SOJAE PRAEPARATUM

【来源】 本品为豆科(Leguminosae)植物大豆(*Glycine max* (L.) Merr.)的成熟种子按下述炮炙项下的方法加工制成。

【鉴别】 本品呈椭圆形，略扁，长2—3分，宽1—2分。外皮黑色，略皱缩不平，上有黄灰色膜状物。皮多松泡，有的已脱落，露出棕色种仁。质脆，易破碎，断面色较浅。有霉臭，味甘。

以色黑、附有膜状物、无糟朽籽粒者为佳。

【炮炙】 取桑叶、青蒿，置锅内加水煎汤，过滤，取药汤与洗净的黑豆拌匀，俟汤吸尽后，置笼屉内蒸透，取出，略晾，再置容器内上盖煎过的桑叶、青蒿渣，闷至发酵生黄衣为度，取出，晒干即得。

每黑豆100斤，用桑叶4斤、青蒿7斤。

【性味】 苦，寒。

【功能】 解表，除烦。

【主治】 时疫热病，头痛寒热，胸中烦闷。

【用法与用量】 二至四钱。

【贮藏】 置通风干燥处，防虫蛀。

淫羊藿

Yínyánghuò

HERBA EPIMEDII

【来源】 本品为小檗科(Berberidaceae)植物淫羊藿 (*Epimedium macranthum* Mort. et Dcno.)、心叶淫羊藿(*Epimedium brevicornu* Maxim.)或箭叶淫羊藿(*Epimedium sagittatum* (Siob. et Zucc.) Maxim.) 的干燥茎叶。药材顺序称为大叶淫羊藿、小叶淫羊藿及箭叶淫羊藿。均系野生,产于陕西、辽宁、山西、湖北、四川等地。夏、秋二季采收,割取茎叶,除去杂质,晒干即得。

【鉴别】 大叶淫羊藿 茎叶长约1尺,茎细,中空,在茎顶生叶,多为一茎生三枝,一枝生三叶。叶片呈卵状心形,长约3寸,宽约2.5寸,先端尖,基部心形,边缘有细刺状锯齿,正面黄绿色,光滑,背面灰绿色,中脉及细脉均突出。叶薄如纸而有弹性。有青草气,味苦。

小叶淫羊藿 叶片为圆心形,长约1.5寸,宽约1.2寸,先端微尖。其他与大叶淫羊藿同。

箭叶淫羊藿 叶片为箭状长卵形,长约3.5寸,宽约1.5寸,叶端渐尖呈刺状,叶基箭形,叶革质。其他与大叶淫羊藿同。

均以梗少、叶多、色黄绿、不破碎者为佳。

【炮炙】 淫羊藿 拣去杂质,去梗,干切宽丝,筛去碎屑即得。

炙淫羊藿 取羊脂油,置锅内加热熔化,去渣,加入拣净去梗的淫羊藿叶,微炒,使羊脂油吸尽,及时取出,放凉即得。

每淫羊藿100斤,用羊脂油(炼油)25斤。

【性味】 辛,温。

【功能】 补命门,强筋骨。

【主治】 阳痿,冷风劳气,筋骨攀急,四肢不仁,半身不遂。

【用法与用量】 一至三钱。

【贮藏】 置通风干燥处。

密 蒙 花

Miměnghuā

FLOS BUDDLEIAE

【来源】 本品为馬錢科(Loganiaceae)植物密蒙树 (*Buddleia officinalis* Maxim.) 的干燥花序或花蕾。均系野生,产于湖北、四川、陕西、河南等地。2—3 月花未开放前采摘,除去枝叶与杂质,晒干即得。

【鉴别】 本品为多数小花蕾密聚簇生的花序。形状、大小不一,表面灰黄色或淡褐色,密被细绒毛。单独的花蕾,呈短棒状,上粗下细,长约 2 分,粗约 1 分。顶端圆,略膨大,花萼钟形,四裂。全体质柔软而易碎,断面中央黑色。气微香,味甘而微苦辛。

以花蕾密聚、灰黄色、有绒毛、枝梗少者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,去柄,过罗去土即得。

【性味】 甘,微寒。

【功能】 润肝,明目。

【主治】 目赤肿痛,多眵泪,羞明怕日,青盲翳障。

【用法与用量】 二至四钱。

【贮藏】 置通风干燥处,防潮。

寄 生

Jìshēng

RAMULUS VISCI SEU LORANTHI

【来源】 本品为桑寄生科(Loranthaceae)植物槲寄生 (*Viscum coloratum* (Komar.) Nakai)或桑寄生(*Loranthus parasiticus* (L.) Merr.) 的干燥带叶茎枝。均系野生。前者习称“北寄生”,主产于河北、辽宁、吉林、内蒙古、河南、安徽等地。后者习称“广寄生”,主产于广西、广东等地。均于冬、春二季采收,割下寄生,除去粗大部分,晒干即得。

【鉴别】 北寄生 茎枝呈圆柱形,多分枝。全长 1 尺许,直径 1—3 分。表面黄绿色或黄棕色,有明显的皱纹。茎有节,节上生 2—3 个分枝。质轻而脆,易折断,断面不平坦,

外皮黃色，中心淺黃綠色。葉對生于枝梢，易脫落。葉片呈長圓形，長1—1.5寸，寬2—4分，顏色與莖枝相同，革質，微有光澤，兩面均有細皺紋，可見3條較明顯的葉脈。無臭，味微苦，嚼之有粘性。

以枝細嫩、色黃綠、葉未脫落、嚼之發粘者為佳。

廣寄生 莖枝呈圓柱形，有分枝。全長1尺許，直徑1—3分。表面紅褐色或灰褐色，有無數細小的斑點，嫩枝有棕色細毛茸。質堅硬，斷面不整齊，外皮紅棕色，中心色較淺。葉有短柄，易脫落，葉片橢圓形，黃褐色，被有細毛茸。無臭，味澀。

以枝細質嫩、紅褐色、葉未脫落者為佳。

【炮炙】 **北寄生** 用水浸透，撈出，切段，干燥即得。

廣寄生 用水浸泡，撈出，潤透后切片，干燥即得。

【性味】 苦，平。

【功能】 強筋骨，祛風濕，益血，安胎。

【主治】 腰背痠痛，妊娠胎動不安。

【用法與用量】 三至五錢。

【貯藏】 置干燥處，防虫蛀。

商 陸

Shānglù

RADIX PHYTOLACCAE

【來源】 本品為商陸科(Phytolaccaceae)植物商陸(*Phytolacca esculenta* Vahl.)的干燥根。多系野生，全國大部分地區均有生產，主產于河南、安徽、湖北等地。秋、冬、春三季采挖，除去莖葉、須根及泥土，鮮時橫切或縱切成2—3分厚的片，晒干或陰干即得。

【鑒別】 本品為橫切或縱切的不規則塊片，大小不一，厚約2分。外皮灰黃色或灰棕色。橫切片直徑1—2寸，表面黃白色，有凹凸不平的筋脈或同心環狀花紋。縱切片長1—3寸，寬1—2寸，有顯著的縱行筋脈。質堅，不易折斷。無臭，味稍甜，后微苦，久嚼之麻舌。

以片大、色白、有粉性者為佳。

【炮炙】 **生商陸** 揀去雜質即得。

醋商陸 取淨商陸，加醋拌勻，稍悶，俟醋吸盡，置鍋內用文火炒至微干，取出，切塊，

干燥即得。

每商陆 100 斤,用醋 30—50 斤。

【性味】 苦,寒;有毒。

【功能】 通二便,泻水。

【主治】 水肿胀满,喉痹不通;外治恶疮。

【用法与用量】 八分至一钱五分;外用适量,捣烂敷患处。

【注意】 孕妇忌内服。

【贮藏】 置干燥处,防虫蛀。

旋 复 花

Xuánfùhuā

FLOS INULAE

【来源】 本品为菊科(Compositae)植物旋复花(*Inula japonica* Thunb.)或钱叶旋复花(*Inula linariifolia* Turcz.)的干燥头状花序。多系野生,全国大部分地区多有生产。夏、秋二季采摘,将开放的花序,除去茎叶及杂质,晒干即得。

【鉴别】 本品呈扁球形,直径 3—4 分。底部有数层灰绿色膜质的总苞片,有时残留少许花柄。上面密生黄色的小花,基部有白色毛茸。质柔软轻松,手捻易散碎。无臭,味微苦咸。

以浅黄色、朵小、中心有黄绿色花心、不散碎、无枝梗者为佳。

【炮炙】 旋复花 拣去杂质,除去残柄,过罗去土即得。

蜜旋复花 取净旋复花,加炼熟的蜂蜜与开水少许,拌匀,稍闷,置锅内用文火炒至变为黄色、不粘手为度,取出,放凉即得。

每旋复花 100 斤,用炼熟蜂蜜 25 斤。

【性味】 咸,温;有小毒。

【功能】 下气,行水,消痰,软坚。

【主治】 胸上痰结,两胁胀满,咳喘,嘔逆,唾如胶漆,心下痞坚,噎气不除,大腹水肿。

【用法与用量】 一至三钱,入汤须布包煎或滤去毛。

【贮藏】 置干燥处,防潮及防压。

麻 黃

Máhuáng

HERBA EPHEDRAE

【来源】 本品为麻黄科(Ephedraceae)植物草麻黄(*Ephedra sinica* Stapf)、木贼麻黄(*Ephedra equisetina* Bge.)或中麻黄(*Ephedra intermedia* Schrenk et Mey.)的干燥草质茎。均系野生,主产于内蒙古、辽宁、河北、山西、陕西、甘肃等地。秋末割取绿色的草质茎,晒干即得。

【鉴别】 本品茎呈细长圆柱形,有分枝,并带有少许棕色木质茎。全长约1尺许,草质茎的直径约半分。表面黄绿色或淡绿色,粗糙,节间有细的纵棱线。节上有细小鳞叶二或三片,上部灰白色,先端尖形,其基部呈棕色联合成筒状。质轻脆,易折断,折断时有细粉飞出,断面不整齐,略呈纤维性,内心红黄色。微有香气,味苦澀。

以茎粗、淡绿色、根节少、充实、味苦澀者为佳。

【炮炙】 麻黄 拣去杂质、去尽木质茎及残根,用水洗净,微润后切段,干燥即得。

蜜麻黄 取麻黄段,加炼熟的蜂蜜与开水少许,拌匀,稍闷,置锅内用文火炒至不粘手为度,取出,放凉即得。

每麻黄段100斤,用炼熟蜂蜜10—15斤。

【性味】 辛、苦,温。

【功能】 发汗,平喘。

【主治】 伤寒表实,发热恶寒无汗,骨节疼痛,咳逆上气,水肿,风肿。

【用法与用量】 五分至二钱。

【贮藏】 置通风干燥处。

麻 黃 根

Máhuánggēn

RADIX EPHEDRAE

【来源】 本品为麻黄科(Ephedraceae)植物草麻黄(*Ephedra sinica* Stapf)、木贼麻黄

(*Ephedra equisetina* Bge.)或中麻黄(*Ephedra intermedia* Schrenk et Mey.)的干燥根部。均系野生,主产于内蒙古、辽宁、河北、山西、陕西、甘肃等地。秋末冬初时采挖,除去茎叶及须根,晒干即得。

【鉴别】本品呈弯曲的圆柱状,一端较细,常扭曲并有支根,长3—5寸,直径2—5分。表面红棕色至灰棕色,有纵皱及侧根痕,外皮粗糙,易剥落,剥落后木质部分呈淡黄色,有弯曲的小纵纹。质坚硬,不易折断,断面黄白色纤维性,有菊花心。臭微,味微苦。

以质坚、外皮红棕色、断面黄白色者为佳。

【炮炙】拣去杂质,除去残茎,用水浸泡,捞出,润透后切片,晒干即得。

【性味】甘,平。

【功能】止汗。

【主治】自汗,盗汗。

【用法与用量】一至三钱;亦可研粉外扑。

【贮藏】置干燥处。

鹿 角

Lùjiǎo

CORNU CERVI

【来源】本品为鹿科(Cervidae)动物梅花鹿(*Cervus nippon* Temminck)或马鹿(*Cervus elaphus* L.)的雄鹿已成长骨化的角。前者习称“花鹿角”,后者习称“马鹿角”。多系野生,主产于吉林、辽宁、黑龙江、新疆、青海等地。砍角一般在冬季,将鹿杀死后,连脑骨劈下,风干即成。脱角多在春季拾取,除去泥土即得。

【鉴别】花鹿角 呈分枝状,左右两枝对称,每枝多为四岔或三岔,一般长1—1.6尺。正挺向后面弯曲,直径0.8—1.4寸,分岔向两旁伸展,枝端渐细。表面黄棕色,枝端浅黄白色,无毛,有光泽,具疣状突起,习称“骨钉”,并有纵棱,基部有盘状突起,习称“珍珠盘”。骨质坚硬,断面外圈为白色,中央灰色且有细蜂窝状小孔。无臭,味微咸。

以质坚、全体有骨钉、具光泽者为佳。

马鹿角 形状与花鹿角相似,每枝多为3—6岔,全长1.5—2尺,较花鹿角为粗长,正挺直直径1—2寸。表面灰褐色或灰黄色,骨钉不显著,基部有珍珠盘。骨质坚硬,断面外圈白色层极厚,中央部灰黑色,有的微呈红色,具粗蜂窝状孔。无臭,味咸。

以粗壮、坚实、无枯朽者为佳。

【炮炙】 鋸成長段，用溫水浸泡，撈出，鏽片，晾乾即得。

【性味】 咸，溫。

【功能】 行血，消腫。

【主治】 瘡瘍腫毒，瘀血作痛，虛勞內傷，腰脊疼痛。

【用法與用量】 一錢五分至三錢。

【貯藏】 置陰涼乾燥處。

鹿 角 霜

Lùjiǎoshuāng

CORNU CERVI DEGELATINATUM

【來源】 本品為鹿科 (Cervidae) 動物梅花鹿 (*Cervus nippon* Temminck) 或馬鹿 (*Cervus elaphus* L.) 的雄鹿已長成骨化的角經提制鹿角膠後所餘的殘角。

【鑑別】 本品呈長圓柱形或劈破成瓣的塊狀，大小不一。由馬鹿角所成的霜塊較粗大，表面灰白色。體輕，質酥，斷面灰黃色或灰黑色，蜂窩粗大。梅花鹿角所成的霜塊較細小，斷面色較淺。均有石灰氣，口嘗有粘舌感。

以塊整齊、色灰白、不糟朽者為佳。

【炮炙】 揀去雜質，斫成小塊即得。

【性味】 咸，溫。

【功能】 補虛，助陽。

【主治】 腎陽不足，脾胃虛寒，嘔吐，食少便溏。

【用法與用量】 一錢五分至三錢。

【貯藏】 置乾燥處。

鹿 茸

Lùróng

CORNU CERVI PANTOTRICHUM

【來源】 本品為鹿科 (Cervidae) 動物梅花鹿 (*Cervus nippon* Temminck) 或馬鹿

(*Cervus elaphus* L.) 雄鹿未骨化而带茸毛的幼角。前者习称“花鹿茸”，后者习称“马鹿茸”。野生或饲养，产于吉林、辽宁、黑龙江、新疆、青海等地。锯取鹿茸或连同头骨砍下后，多将其浸于沸水中略烫，捞出，稍晾后再烫，连续操作至积血排尽，晾干或烘干即得。

【鉴别】 花鹿茸 全体呈圆柱形，多具1—2分枝。具一分枝者习称“二杠”，其主枝习称“大挺”，挺高5—6寸，锯口直径约1寸，离锯口约1寸许处分枝，分枝长3—5寸，直径较挺略细。外皮红棕色或棕色，多光滑，表面布有红黄色或棕黄色致密的茸毛，上端较密，下部较疏，分岔间具一条灰黑色筋脉，皮茸紧贴。体轻，锯口洁白有细蜂窝，外圍无骨质。气微腥，味微咸。

具二分枝者习称三岔。大挺长0.7—1尺，直径较细，多不圆，略呈弯弓形，微向后偏，先端略尖，下部多有纵棱线及突起的疙瘩，皮红黄色，毛稀较粗。

二茬茸和头茬茸相似，但挺长而不圆或下粗上细，下部有纵棱筋，毛较粗糙，体较重，无腥气。

砍茸即带脑骨的茸，二茸相距约2寸，脑骨前端平齐，后端有一对弧形骨，习称“虎牙”，脑骨洁白无残肉，外附脑皮，皮上密生茸毛。

以粗大、挺圆、顶端丰满、质嫩、毛细、皮色红棕油润光亮者为佳。挺细瘦、下部起筋、毛粗糙、体较重者质次。

马鹿茸 形状比花鹿茸粗大，分枝亦较多，侧枝一个者习称“单门”，二个称“莲花”，三个称“三岔”，四个称“四岔”或更多，其中以莲花、三岔、四岔为主。东北产的单门大挺长7—8寸，直径寸许。皮灰黑色，毛青灰色或灰黄色，细而光亮，质嫩，断面外皮较厚，灰黑色，中央米黄色，有较细的蜂窝眼，微有腥气，味微咸。莲花大挺长0.5—1尺，下部有棱线，而质不老，断面蜂眼稍大。三岔质较老，皮色深，四岔毛粗而稀，挺下部具棱线及疙瘩，分岔顶端多显露光头，习称“捻尖”。砍茸则脑骨较薄，色灰白，毛灰褐色，二茸间距离比花鹿茸为宽。西北产的马鹿茸多为砍茸，长1—3尺，挺多不圆，顶端圆扁不一，表面有棱，多抽皱干瘪，分岔较长且弯曲。毛灰色或黑灰色而粗长，锯面色较深，上端紫红色，中段以下灰红色，下部灰白色，常见骨质。有腥臭气，味咸。

以茸体饱满、体轻、下部无棱线、断面蜂窝状、组织致密、米黄色者为佳。茸体干瘪、毛粗不全、体较重、下部起筋、断面灰红色者质次。其茸体大部分毛已脱掉、显灰白色、或下部隆起疙瘩状、内部灰白色、体重已成骨化者不可作鹿茸入药。

【炮炙】 取鹿茸，燎去毛，再用玻璃片刮净后，以布带围绕，用热酒自底部孔内灌入，不断添酒，至润透为度，切片，压平，晒干即得。

【性味】 甘、咸，温。

【功能】 生精补髓，益血助阳，强筋健骨。

【主治】 一切虚损，眩晕，耳聩，目暗，阳痿，滑精，腰膝痠痛，妇女虚寒崩漏带下。

【用法与用量】 三至八分，多人丸散服。

【贮藏】 置阴凉干燥处，密闭保存，防虫蛀。

鹿 衔 草

Lùxiáncǎo

HERBA PYROLAE

【来源】 本品为鹿蹄草科(Pyrolaceae)植物鹿蹄草(*Pyrola rotundifolia* L.)的干燥全草。均系野生，主产于浙江、安徽等地。全年均可采收，晒至叶片较软略抽缩时，再经堆压发热，使叶片两面均变成紫红色或紫褐色时，晒干即得。

【鉴别】 本品茎略呈圆柱形或具棱角，紫褐色，表面有纵纹。叶多根生，叶柄长，扁平而中央凹下，两边呈膜质状。叶片圆形或卵圆形，大小不一，一般长约1寸，紫红色或紫褐色，边缘有稀疏的小锯齿，略向背面反卷，脉纹明显，叶片较厚，干燥后不易皱缩。常带小花梗，上有小花或扁球形小果，均为红褐色。无臭，味淡微苦。

以紫红色或紫褐色、无杂质者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，筛去泥沙，洗净，除去残根，切段，晒干即得。

【性味】 苦，平。

【功能】 祛风，解毒。

【主治】 风湿痹痛；外治恶疮。

【用法与用量】 三至五钱；外用适量，研末掺或水煎洗患处。

【贮藏】 置干燥处，防潮。

羚 羊 角

Língyángjiǎo

CORNU ANTELOPIS

【来源】 本品为洞角科(Bovidae)动物赛加羚羊(*Saiga tatarica* L.)的角。均系野

生，产于苏联及我国新疆等地。猎取后，将其角从头部锯下即得。

【鉴别】 本品呈圆锥形，长0.5—1尺，全体略呈弓形弯曲，角尖向外微展，基部直径约1寸。通体白色或黄白色，除尖端部分外，有10—20个隆起的曲节环绕，幼枝较少，光滑自然，手握有舒适感。尖部光圆，弯锥形，光滑如玉，嫩枝透视有血丝或呈紫黑色，无裂纹，质老的有纵裂纹，无黑尖。角的下半段内有骨塞，习称“羚羊塞”，骨塞圆形，表面有凸出的顺纹与角内面合槽，颇坚固，自截面上视之，其接合处呈不规则的锯齿状，将骨塞除去，角之下半段为筒形，中空，有细孔直通尖上，习称“通天眼”，迎光可透视，为本品的主要特征。质坚硬。无臭，味淡。

以质嫩、色白、光滑、有血丝、无裂纹者为佳。质老、色黄白、有裂纹者质次。

【炮炙】 羚羊角 取羚羊角，劈开，除去骨塞，置水中浸泡，捞出，去筋，镑片，晾干即得。

羚羊角粉 取羚羊角，镑碎，研成极细粉即得。

【性味】 咸，寒。

【功能】 平肝息风，清热镇惊，解毒。

【主治】 热盛神昏，谵语发狂，惊痫抽搐，目赤，头痛。

【用法与用量】 三至五分，煎服或入丸散服。

【贮藏】 置阴凉干燥处，密闭保存。

莱 菔 子

Láifúzi

SEMEN RAPHANI

【来源】 本品为十字花科(Cruciferae)植物莱菔(*Raphanus sativus* L.)的干燥成熟种子。均系栽培，主产于河北、河南、浙江、黑龙江等地。夏秋间种子成熟时割取全株，晒干，搓出种子，除去杂质，晒干即得。

【鉴别】 本品呈椭圆形或近卵圆形而稍扁，直径约1分，表面红棕色，一侧有数条纵沟，一端有一褐色小点。用放大镜观察，全体均有致密的网纹。质硬，破开后可见黄白色或黄色的种仁，有油性。无臭，味甘、微辛。

以籽粒充实、油性大者为佳。

【炮炙】 莱菔子 筛去杂质，漂净泥土，捞出，晒干，用时捣碎即得。

炒萊菔子 取淨萊菔子，置鍋內用文火炒至微鼓起，并有香气为度，取出，放凉即得。

【性味】 辛、甘，平。

【功能】 下气，化痰，消食。

【主治】 咳嗽，痰喘，食积，气滞，胸闷，腹胀，下痢后重。

【用法与用量】 一錢五分至三錢。

【貯藏】 置通風干燥处，防虫蛀。

菊 花

Júhuā

FLOS CHRYSANTHEMI

【来源】 本品为菊科(Compositae)植物菊(*Chrysanthemum morifolium* Ramat.)的干燥头状花序。均系栽培，产于安徽、浙江、河南、四川、河北、山东等地。秋末冬初当花正开时割取全株，阴干，摘花，晒干，或直接采摘鲜花，除去枝叶，烘干或蒸后，再晒干即得。

【鉴别】 本品为头状花序，外层为数层舌状花，呈扁平花瓣状，中心由多数管状花聚合而成。基部有总苞，系由3—4层苞片组成。气清香，味甘微苦。由于产地和加工不同，各地产品略有差异。

毫菊 花大饱满，瓣多紧密。花瓣长3—5分，白色。花心小，浅黄色。

滁菊 花较小，瓣细紧密。花瓣长2—3分，白色。花心黄色。总苞色较绿。

贡菊 形似滁菊。惟花瓣较厚，花心金黄色。

杭菊 因加工蒸过呈压缩状。朵大瓣宽而疏，灰白色或黄色。花心较大，深黄色。质柔润。

怀菊、川菊 花大，花瓣长3—6分，多为白色微带紫色。花心小，浅棕色。

均以花朵完整、颜色鲜艳、气清香、无梗叶者为佳。花朵散碎、颜色稍变、香气薄者质次。

【炮炙】 **菊花** 拣去杂质，除去残留的梗叶即得。

菊花炭 取拣净的菊花，置锅内炒至焦褐色，但须存性，喷淋清水，取出，晒干即得。

【性味】 甘、苦，微寒。

【功能】 散风，清热，明目，解毒。

【主治】 头痛，眩晕，目赤，疮，肿毒。

【用法与用量】 一至三錢。

【貯藏】 置阴涼干燥处，防潮及虫蛀。

草 薺

Bixiè

RHIZOMA DIOSCOREAE BISHIE

【来源】 本品为薯蓣科(Dioscoreaceae)植物粉草薺(*Dioscorea* sp.)的干燥地下根状茎。均系野生，主产于浙江等地。春、秋二季均可采挖，洗净泥土，除去须根，切成薄片，晒干即得。

【鉴别】 本品为不规则的薄片，大小不一，厚不到半分。边缘不整齐，或有棕黑色的外皮，切面黄白色，平坦细腻，有粉性及不规则的黄色筋脉点，对光透视，极为显著。质松，有弹性，易折断，折断时有粉尘飞出。无臭，味微苦。

以色黄白、片大、薄而有弹性、整齐不碎者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，筛除灰屑，即得。

【性味】 苦，平。

【功能】 祛风，利湿。

【主治】 风寒湿痹，腰膝疼痛，淋浊，阴茎作痛，小便不利，湿热疮毒。

【用法与用量】 三至五錢。

【貯藏】 置通风干燥处，防潮。

梔 子

Zhīzǐ

FRUCTUS GARDENIAE

【来源】 本品为茜草科(Rubiaceae)植物梔子(*Gardenia jasminoides* Ellis)的干燥成熟果实。栽培或野生，主产于浙江、江西、湖南、福建等地。9—11月间果实成熟时采摘，除去果梗及杂质后，直接晒干或烘干，亦可将果实放入沸水中烫；或放入蒸笼内约蒸半小

时,取出,再晒干即得。

【鉴别】 本品呈长椭圆形或椭圆形,长5—8分,直径4—5分。表面深红色或红黄色,具有5—8条纵棱。顶端残存萼片,另一端稍尖,有果柄痕。果皮薄而脆,内表面呈红黄色,有光泽,具2—3条隆起的假隔膜,内有多数种子,粘结成团。种子扁圆形,深红色或红黄色,密具细小疣状突起。浸入水中,可使水染成鲜黄色。臭微,味淡微酸。

以个小、完整、仁饱满、内外色红者为佳。个大、外皮棕黄色、仁较瘪、色红黄者质次。其外皮灰棕色、仁棕黑色、体轻质松者不可入药。

【炮炙】 生栀子 拣去杂质,碾碎,过筛即得。

炒栀子 取碾碎的栀子,置锅内用文火炒至金黄色,取出,放凉即得。

焦栀子 取碾碎的栀子,置锅内用武火炒至焦糊色,取出,放凉即得。

栀子炭 取碾碎的栀子,置锅内用武火炒至黑褐色,但须存性,取出,放凉即得。

【性味】 苦,寒。

【功能】 清热,凉血。

【主治】 虚烦不眠,黄疸,五淋,消渴,目赤,吐血,衄血,血痢,便血,热毒疮疡。

【用法与用量】 二至四钱。

【贮藏】 置通风干燥处,防潮。

常 山

Chángshān

RADIX DICHROAE

【来源】 本品为虎耳草科(Saxifragaceae)植物常山(*Dichroa febrifuga* Lour.)的干燥根部。多为栽培,主产于四川、湖南、贵州等地。秋季采挖,切去茎叶及须根,洗净泥土,晒干即得。

【鉴别】 本品呈圆柱形,常弯曲扭转,或有分枝,长3—5寸,直径1—6分。表面棕黄色,具细纵纹,外皮易剥落,剥落处露出淡黄色木质部。质坚硬,不易折断,折断时有粉尘飞出,断面黄白色,有菊花纹。无臭,味苦。

以根条均匀、质坚体重、色淡黄者为佳。条细小、色较浅者质次。其根粗长、条顺直、质松、色深黄、无苦味者不可入药。

【炮炙】 常山 拣去杂质,去芦,分开大小条,用水浸泡,泡透后捞出,沥去水,切片,

干燥即得。

酒常山 取常山片，用黄酒拌匀，闷润，置锅内用文火炒至微干，取出，放凉即得。

每常山片 100 斤，用黄酒 10—15 斤。

【性味】 苦，寒；有小毒。

【功能】 截瘧，吐痰。

【主治】 瘧疾，痰积。

【用法与用量】 一錢五分至三錢。

【注意】 孕妇慎用。

【貯藏】 置通風干燥处。

蛇 床 子

Shéchuángzi

FRUCTUS CNIDII

【来源】 本品为繖形科(Umbelliferae)植物蛇床(*Cnidium monnieri* (L.) Cuss.)的干燥成熟果实。均系野生，主产于河北、山东、江苏、浙江等地。夏、秋二季果实成熟时，将全株拔起，晒干，打下果实，除去杂质，晒干即得。

【鉴别】 本品呈橢圓形，由两个分果合抱而成，长约半分許，直径約半分。灰黄色或灰褐色，一端有小突起，另一端偶有細柄。每一分果的背面有薄而突起的纵棱五条及纵沟四条，接合面平坦，可見两条棕色略凸起的纵綫，其中夹有一条浅色的綫状物。果皮松脆，搓揉后可脫落，露出灰棕色細小的种子，有油性。气香，味辛凉。

以顆粒飽滿、灰黄色、气味濃厚、无杂质者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，篩去泥沙，洗净，晒干即得。

【性味】 辛、苦，温；有小毒。

【功能】 强阳益腎，祛風燥湿。

【主治】 男子阳痿；外治阴囊湿痒，女子阴痒，赤白带下，子宫寒冷不孕，風湿疮癬。

【用法与用量】 一至三錢；外用适量，研末塗敷或煎湯洗患处，或为坐药納入阴戶。

【貯藏】 置阴凉干燥处。

蛇 蛻

Shétuì

PERIOSTRACUM SERPENTIS

【来源】 本品为游蛇科 (Colubridae) 动物黑眉锦蛇 (*Elaphe taeniurus* Cope)、锦蛇 (*Elaphe carinata* Guenther) 或乌风蛇 (*Eucyrtophis dhumrakes* Cantor) 蛻下的干燥皮膜。主产于浙江、广西、四川、江苏、福建等地。多于春末夏初间收集，拾取后，抖去泥土，晒干即得。

【鉴别】 本品为圆筒形半透明的皮膜，多压扁或皱缩，偶有破碎，完整者其形似蛇，一般全长3—5尺。背部银灰色，有光泽，具菱形或椭圆形的半透明鳞片，鳞片衔接处呈白色，略抽皱或凹下。腹部乳白色或略显黄色。鳞片呈长方形，作复瓦状排列。体轻，质微韧而易碎，手抚有滑润感，轻轻搓揉，沙沙作响。气微腥，味淡或微咸。

以条长、银灰色光亮、味淡、无泥上杂质者为佳。

【炮炙】 蛇蛻 刷净，剪段即得。

酒蛇蛻 取蛇蛻段，用黄酒喷匀，闷润，取出，置锅内用文火炒至微干，即得。

每蛇蛻段100斤，用黄酒10—15斤。

【性味】 咸、甘，平；有小毒。

【功能】 祛风，退翳，杀虫。

【主治】 小儿惊痫，喉风口疮，痈肿，痔漏，目翳，疥癣。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【注意】 孕妇忌用。

【贮藏】 置通风干燥处，防虫蛀。

银 柴 胡

Yíncháihú

RADIX STELLARIAE DICHOTOMAE

【来源】 本品为石竹科 (Caryophyllaceae) 植物银柴胡 (*Stellaria dichotoma* var.

lanceolata Bge.)的干燥根。均系野生,主产于宁夏、内蒙古、陕西等地。春、秋二季采挖,除去茎苗及须根,洗净泥土,晒干即得。

【鉴别】 本品呈圆柱形,上端较粗,尾部渐细,少数有分枝,长0.6—1.2尺,直径3—6分。表面黄棕色而发灰,全体有略扭曲的纵纹,根头处有多数密集的症状凸起,习称“珍珠盘”。皮上有多数圆形小孔,习称“沙眼”,近根头处尤多,细根上少见,自沙眼处折断,可见有棕色花纹。质松而脆,折断时有粉尘飞出,断面粗糙,有空隙,外皮甚薄,中间有大形黄白色相间的菊花心。臭微,味甘微苦。

以条长均匀、圆柱形、外皮淡黄棕色、断面黄白色者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,去芦,洗净,略泡捞出,润透后切片,干燥即得。

【性味】 甘,微寒。

【功能】 清热,凉血。

【主治】 骨蒸劳热,阴虚久瘧,小儿疳热。

【用法与用量】 一至三钱。

【贮藏】 置通风干燥处。

甜 瓜 子

Tiánguāzǐ

SEMEN MELO

【来源】 本品为葫芦科(Cucurbitaceae)植物甜瓜(*Cucumis melo* L.)的干燥成熟种子。均系栽培,主产于山东、河北、陕西、河南、江苏等地。夏、秋二季果实成熟时采收,食用甜瓜时取出种子,洗净,晒干即得。

【鉴别】 本品为扁平长圆形,长约2分;宽约1分。一端尖,一端钝圆。表面黄白色或淡棕红色,平滑,微有光泽。剥开种皮,内有白色种仁,富油性。无臭,味淡。

以籽粒饱满、黄白色、纯净者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,用水洗净,晒干,用时捣碎即得。

【性味】 甘,寒。

【功能】 消痰,排脓,清肺,润肠。

【主治】 腹内结聚,肠痈。

【用法与用量】 三钱至一两。

【贮藏】 置通风干燥处,防虫蛀及鼠咬。

猪 牙 皂

Zhūyázào

FRUCTUS GLEDITSIAE OFFICINALIS

【来源】 本品为豆科(Leguminosae)植物猪牙皂(*Gleditsia officinalis* Hemsl.)的干燥成熟果实。均系野生,主产于四川、山东、贵州、云南等地。秋季果实成熟时采摘,晒干即得。

【鉴别】本品呈圆柱形,略扁,多少弯曲成新月形,长1.5—3寸,宽2—3.5分。表面紫棕色或紫黑色,被灰白色蜡质粉霜,擦去后有光泽,并有细小的疣状突起及缢状或网状的裂纹,腹面有棱脊,背面棱脊不显著而有棕黄色纵纹。一端有凸出的尖嘴,另一端尖,有果柄残痕。质硬而脆,易折断,断面椭圆形,外层棕黄色,中间黄白色,中心较软,有淡绿或淡棕黄色的丝状物与斜向网纹,纵向剖开可见有排列整齐的回窝,很少见种子。臭微,有刺激性,味先甜后辣。

以个小饱满、色紫黑、有光泽、无果柄、断面淡绿色者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,洗刷干净,晒干,用时捣碎即得。

【性味】 辛、咸,温;有小毒。

【功能】 开窍,消痰,搜风,杀虫。

【主治】 中风口噤,风痛,喉痹,痰气喘咳;外治疥癣肿毒。

【用法与用量】 三至五分,多入丸散服;并可外用,适量,研末吹鼻取嚏,或研末敷、煎汤洗或熬膏贴患处。

【注意】 孕妇忌内服。

【贮藏】 置干燥处,防虫蛀。

猪 苓

Zhūlíng

GRIFOLA

【来源】 本品为多孔菌科(Polyporaceae)植物猪苓(*Grifola umbellata* (Pers.) Pilat.)

的干燥菌核。均系野生，主产于陕西、河南、山西、河北、四川、云南等地。多在夏、秋二季采挖，除去沙石，洗净泥土，晒干即得。

【鉴别】 本品呈不规则的块状，大小不一。长形的略扁而弯曲，有的分枝如鲜姜，长2—8寸，宽1—3寸。小的较圆，直径1—2寸。表面黑色或灰黑色，皱缩，有瘤状突起。质坚而不实，轻如软木，断面细腻，白色或黄白色，显颗粒状花纹。无臭，味淡，嚼之绵软不易碎。

以外皮色黑光滑、断面洁白、体较重者为佳。

【炮炙】 洗净，用水浸润，挖去沙石，润透后切片，晒干即得。

【性味】 甘，平。

【功能】 利尿，渗湿。

【主治】 小便不利，水肿胀满，淋浊带下。

【用法与用量】 二至四钱。

【贮藏】 置通风干燥处。

续 断

Xùduàn

RADIX DIPSACI

【来源】 本品为山萝卜科(Dipsacaceae)植物川续断(*Dipsacus asper* Wall.)或续断(*Dipsacus japonicus* Miq.)的干燥根部。野生或栽培，产于四川、湖北、湖南、贵州等地。秋季采挖，除去根头、尾梢及须根，洗净泥土，阴干或炕干即得。

【鉴别】 本品呈长圆柱形，下端渐细，或稍弯曲，长2—4寸，直径2—5分。外皮灰褐色或黄褐色，有扭曲的纵皱及浅沟纹。质硬脆，易折断，断面不平坦，周边呈褐色，中心呈黑绿色，并有黄色花纹。无臭，味苦微涩。

以根条粗、质坚、易折断、外皮黄褐色、断面黑绿色者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，除去残留根头，用水洗去泥土，捞出，润透后切片，干燥即得。

【性味】 苦、辛，微温。

【功能】 补肝肾，续筋骨，通血脉。

【主治】 腰膝痠痛，胎漏，崩漏，带下，遗精，金疮，跌打损伤，痈疮肿毒。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防虫蛀。

斑 螫

Bānmáo

MYLABRIS

【来源】 本品为芫青科(Meloidae)昆虫南方大斑螫(*Mylabris phalerata* Pall.)或黄黑小斑螫(*Mylabris cichorii* L.)的干燥全体。均系野生,主产于辽宁、河南、江苏、湖南、贵州、广西等地。夏、秋二季在早晨露水未干时捕捉,放入容器内闷死或蒸死,晒干即得。

【鉴别】 本品呈长圆形,长5—7分,宽1.5—3分。头略呈圆三角形,黑色,向下垂,有一对较大的眼及一对鞭状触角,触角多已脱落。背部有二片革质鞘翅,黑色,带三条淡黄色或棕黄色的横纹。鞘翅下面有二个棕褐色薄膜状透明的内翅。胸部有三对足,腹部呈环节状。有特殊的臭气,味初辛后苦(不宜口尝)。

以个大、完整、颜色鲜明者为佳。

【炮炙】 生斑螫 拣去杂质,去足翅即得。

米斑螫 将米置锅内加热,喷水少许至米粘贴锅上,俟烟冒出时,加入斑螫,轻轻翻炒,取出,去净米粒,除去足翅即得。

每斑螫10斤,用米2斤。

【性味】 辛,寒;有毒。

【功能】 攻毒,破血。

【主治】 疯狗咬伤,胎死腹中,瘰癧;外治恶疮,虫毒。

【用法与用量】 一至五枚,炮炙后,煎服,或入丸散服;外用生者适量,研末敷或浸酒、醋塗患处。

【注意】 孕妇忌内服。

【贮藏】 置通风干燥处,防虫蛀。

琥 珀

Hǔpò

SUCCINUM

【来源】 本品为松科(Pinaceae)松属(*Pinus*)植物的树脂埋藏地下经久成为化石块

的物质。产于云南、广西、河南、福建、贵州等地。从地层下挖出，除净沙石、泥土等杂质即得。

【鉴别】 本品呈不规则的块状、颗粒状或多角形，大小不一。血红色、黄棕色或暗棕色，表面不平坦，有光泽。质松脆，捻之即成粉末。无臭，味淡，嚼之易碎无沙感。以火燃之易熔，爆炸有声，冒白烟、微有松香气。

以块整齐、质松脆、色红、明亮、易碎者为佳。块碎小、质较硬、色暗棕色者质次。

【炮炙】 拣去杂质，用时捣碎或研成细粉即得。

【性味】 甘，平。

【功能】 安神，散瘀，行水。

【主治】 惊痫，小便不利，血淋茎痛，产后瘀血腹痛。

【用法与用量】 三分至六分，多人丸散服。

【贮藏】 置干燥处。

款冬花

Kuāndōnghuā

FLOS FARFARAE

【来源】 本品为菊科(Compositae)植物款冬(*Tussilago farfara* L.)的干燥花蕾。栽培或野生，产于陕西、山西、河南、甘肃、青海、四川、内蒙古等地。在冬至前后，当花将出上时采挖，除去花梗及泥土，阴干即得。

【鉴别】 本品为长圆棒形的头状花序，常2—3个花序连生在一起，习称“连三朵”，长3—6分，直径2—3分。上端较粗，中部稍丰满，下端渐细或带有短梗。花头外面被有多数鱼鳞状苞片，外表面呈紫红色或淡红色。苞片内表面布满白色絮状毛茸。气清香，味微苦而辛，嚼之显棉絮状。

以朵大、颜色紫红、无花梗者为佳。朵小、色棕黄、带有短嫩梗者质次。其花梗老者不可入药。

【炮炙】 款冬花 拣去残梗、沙石、上块即得。

蜜冬花 取拣净的款冬花，加炼熟的蜂蜜与开水少许，拌匀，稍闷，置锅内用文火炒至微黄色、不粘手为度，取出，放凉即得。

每款冬花100斤，用炼熟蜂蜜25斤。

【性味】 辛、甘，溫。

【功能】 潤肺下氣，化痰止咳。

【主治】 咳逆，喘息，喉痹，肺痿，肺癰，咳吐血。

【用法與用量】 一錢五分至三錢。

【貯藏】 置陰涼乾燥處，防潮及蟲蛀。

粟 芽

Sùyá

FRUCTUS SETARIAE GERMINATUS

【來源】 本品為禾本科(Gramineae)植物粟(*Setaria italica* (L.) Beauv.)的成熟果實按下述炮炙項下的方法加工制成。

【鑒別】 本品呈類圓球形，一端鈍圓，一端略尖，直徑不及半分。外殼淡黃色，一端有初生的細須根，長約1分。剝去外殼，內含小米一粒。無臭，味微甘。

以粒飽滿、大小均勻、色黃、無雜質者為佳。未發芽者不可入藥。

【炮炙】 粟芽 取粟谷，簸篩淨雜質，用水浸泡，撈出，置能排水的容器內，蓋好，每日淋水1—2次，保持濕潤，使發芽，待須根長約1分時，取出，曬干即得。

炒粟芽 取粟芽，置鍋內用文火炒至深黃色，取出，風涼即得。

焦粟芽 取粟芽，置鍋內用武火炒至焦黃色，微噴清水，取出，風干即得。

【性味】 苦，溫。

【功能】 開胃消食，下氣除煩。

【主治】 宿食不化，煩悶不食。

【用法與用量】 一錢五分至三錢。

【貯藏】 置通風乾燥處，防蟲蛀。

萱 草 根

Xuāncǎogēn

RADIX HEMEROCALLIS

【來源】 本品為百合科(Liliaceae)植物黃花萱草(*Hemerocallis flava* L.)或小萱草

(*Heimerocallis minor* Mill.) 的干燥根部。野生或栽培，全国大部分地区多有生产，主产于河北、辽宁、江苏等地。秋季采挖，除去茎苗，洗净泥土，晒干或炕干即得。

【鉴别】本品单条存在或多条丛生在根状茎上。根多为纺锤形或长圆柱形，长1—3寸，直径1—2分。表面灰黄色，少数微带红棕色，有横纹及纵皱纹。外皮薄而松，易剥落。不干者质软，似有油性，干燥时质脆，易折断，断面不平坦，白色，周围有放射状裂纹，中间有淡黄色细小圆点。微有香气，味甘，略有粘液性。

以根条粗大、质充实饱满、无残茎及杂质者为佳。

【炮炙】拣去杂质，除去残茎，洗净，润透后切段，干燥即得。

【性味】甘，凉。

【功能】利水，凉血。

【主治】水肿，沙淋，小便不通，黄疸，衄血，便血，乳痛。

【用法与用量】一钱五分至三钱，煎服或用鲜者适量捣汁服；亦可外用，鲜者适量，捣烂敷患处。

【贮藏】置通风干燥处。

葶 藶 子

Tínglǐzǐ

SEMEN LEPIDII

【来源】本品为十字花科(Cruciferae)植物独行菜(*Lepidium apetalum* Willd.)的干燥成熟种子。均系野生，主产于河北、辽宁、内蒙古等地。夏季果实成熟时，割取全草，晒干，打下或搓落种子，去净杂质即得。

【鉴别】本品呈扁平长卵形，长不及半分。表面黄棕色，平滑，用扩大镜观察，表面多颗粒状的细小突起，两面中部各有一条纵沟。一端钝圆，一端尖，尖端有小白点。破开后种仁白色，有油性。种子中偶杂有半圆形黄绿色的果壳。无臭，味苦辛，有粘性。

以子粒充实、均匀、黄棕色、无杂质者为佳。

【炮炙】葶藶子 拣去杂质，筛去灰屑即得。

炒葶藶子 取葶藶子，置锅内用文火炒至微鼓起，并有香气为度，取出，放凉即得。

【性味】辛、苦，大寒。

【功能】下气，行水。

【主治】 肺壅喘急，痰飲咳嗽，水腫脹滿。

【用法与用量】 一至三錢。

【貯藏】 置通風干燥处，防潮。

篇 蓄

Biǎnxù

HERBA POLYGONI AVICULARIS

【来源】 本品为蓼科(Polygonaceae)植物篇蓄(*Polygonum aviculare* L.)的干燥地上部分。均系野生，全国大部分地区多有生产。夏季花开前叶茂盛时采收，除去根及杂质，迅速晒干即得。

【鉴别】 本品莖呈圓柱形而略扁，有分枝，全长1尺許，直径0.5—1分。表面棕紅色或灰綠色，有細密微突起的纵紋，节部稍膨大，有淺棕色薄膜狀的托叶鞘包圍，节間长约1寸許。质坚硬，易折断，断面有白色的髓。叶互生，柄短，叶片多皺縮破碎，潤湿展平后，完整者呈披針形，全緣、无毛，两面均呈棕綠色或灰綠色。无臭，味微苦。

以棵壯、质嫩、淺綠色、无杂质者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，除去殘根，洗淨，潤透后切段，干燥即得。

【性味】 苦、平。

【功能】 利尿、清热，杀虫。

【主治】 热淋，黄疸，疥疮湿痒，女子阴蝕，小儿蛔虫。

【用法与用量】 一錢五分至三錢；并可外用，适量，煎湯洗患处。

【貯藏】 置干燥处。

黃 芩

Huángqín

RADIX SCUTELLARIAE

【来源】 本品为唇形科(Labiatae)植物黄芩(*Scutellaria baicalensis* Georgi)的干燥

根部。均系野生，主产于河北、内蒙古、山西、山东及陕西等地。春、秋二季采挖，除去茎叶、须根及泥土，晒至半干，撞去粗皮，至显黄色后，晒干即得。

【鉴别】 本品呈圆锥形，扭曲不直，长2—8寸，直径3—7分。表面黄棕色或深黄色，上部皮较糙，有扭曲的纵皱或不规则的网纹，下部皮细，有顺纹和细皱，上下均有稀疏疣状的根痕。质硬而脆，易折断，断面深黄色，中间有棕红色圆心，老根断面中央呈暗棕色或棕黑色朽片状，根遇潮湿或冷水则变为黄绿色。无臭，味苦。

以条粗长、质坚实、色黄、除尽外皮者为佳。条短、质松、色深黄、成瓣状者质次。

【炮炙】 黄芩 拣去杂质，除去残茎，用凉水浸润或置开水中稍浸捞出，润透后切片，晒干（注意避免暴晒过度发红）即得。

酒黄芩 取黄芩片，喷淋黄酒，拌匀，置锅内用文火微炒，取出，晾干即得。

每黄芩片100斤，用黄酒10—15斤。

黄芩炭 取黄芩片，用武火炒至表面焦褐色，边缘带黑色为度，但须存性，喷淋清水，取出，晒干即得。

【性味】 苦、寒。

【功能】 除湿热，泻实火，安胎。

【主治】 肺热咳嗽，热病烦渴，湿热泻痢，黄疸，热淋，目赤肿痛，痈肿疔疮，积热吐衄，胎动不安。

【用法与用量】 一至三钱。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮。

黄 连

Huánglián

RHIZOMA COPTIDIS

【来源】 本品为毛茛科(Ranunculaceae)植物黄连(*Coptis chinensis* Franch.)或同属他种植物的干燥地下根状茎。均系栽培，主产于四川、湖北等地。秋季采挖，定植后，5—8年始可采收，除去苗茎、须根及泥土，晾1—2日后，烤干或晒干，再除去须根即得。

【鉴别】 本品多弯曲有分枝，粗细不一，团结相抱，形如鸡爪，全长1—2寸，单枝直径1—2.5分。外皮黄褐色，外皮剥落处呈红棕色，每分枝上有间断横纹，粗糙不平，形如连珠，上附生有细硬根及须根痕，触之刺手，有的表面无横纹，平滑如茎杆，习称“过江枝”，上

部多有褐色鳞叶残留,顶端或有未去净的残茎或叶柄。质坚实而硬,断面不整齐,呈红黄色,外层色深有红点,内层色浅有菊花纹,中间偶有空心。无臭,味极苦。

以条肥壮、连珠形、质坚重、断面红黄色者为佳。条细瘦、毛团状、断面黄色较浅者质次。其地上茎叶及须根不可入药。

【炮炙】 黄连 拣去杂质,除去须毛、泥土即得。

黄黄连 取吴茱萸,置锅内加适量的水煎汤,捞去吴茱萸,加入拣净的黄连拌匀,俟汤吸尽,微炒,取出,晾干即得。

每黄连 100 斤,用吴茱萸 6 斤 4 两。

姜黄连 取净鲜生姜切碎,加适量水压榨取汁,加入拣净的黄连拌匀,俟汁吸尽,置锅内用文火微炒至微干,取出,晾干即得。

每黄连 100 斤,用鲜生姜 12 斤 8 两。

酒黄连 取拣净的黄连,用黄酒拌匀,稍闷,置锅内用文火炒至微干,取出,晾干即得。

每黄连 100 斤,用黄酒 12 斤 8 两。

【性味】 苦,寒。

【功能】 泻火,解毒,燥湿。

【主治】 热盛心烦,痞满,消渴,热痢腹痛,里急后重,吐血,衄血,目赤,口疮,疮疥。

【用法与用量】 五分至一钱;外用生者适量,研末敷诸疮,并可浸乳汁点眼。

【贮藏】 置通风干燥处。

黄 柏

Huángbǎi

CORTEX PHELLODENDRI

【来源】 本品为芸香科(Rutaceae)植物黄皮树(*Phellodendron chinense* Schneid.)或黄檗(*Phellodendron amurense* Rupr.)除去栓皮的干燥树皮。多系野生,主产于四川、云南、贵州、辽宁、吉林等地。4—7 月间将树皮剥下,刮去外面粗皮,晒干即得。

【鉴别】 本品呈稍弯曲的板片状,边缘不整齐,长宽不一,厚约 1—2 分。外表面显深黄色、棕黄色及淡黄棕色,有纵棱纹和沟纹,并有棕色小点。内表面黄色或灰黄色,质轻,易折断,断面裂片状分层,纤维性,鲜黄色。臭微,味极苦。咀嚼有粘滑性,并使唾液染成黄色。

以皮厚、鮮黃色、外面去淨栓皮者為佳。

【炮炙】 黃柏 揀去雜質，用水洗淨，撈出，潤透後切絲，曬干即得。

鹽黃柏 取黃柏絲，用鹽水噴拌均勻，置鍋內文火微炒，取出，曬干即得。

每黃柏絲 100 斤，用鹽 2 斤 8 兩加適量開水化開澄清。

酒黃柏 取黃柏絲，噴淋黃酒，拌勻，置鍋內文火微炒，取出，曬干即得。

每黃柏絲 100 斤，用黃酒 10 斤。

黃柏炭 取黃柏絲，用武火炒至表面焦黑色，但須存性，噴淋清水，取出，曬干即得。

【性味】 苦，寒。

【功能】 瀉相火，除濕熱。

【主治】 熱痢，泄瀉，黃疸，淋濁，痔瘡，便血，骨蒸勞熱，目赤耳鳴，口舌生瘡，痿癰，癰瘡，瘡瘍，婦女赤白帶下。

【用法與用量】 一錢五分至三錢；并可外用，生者適量，研末敷諸瘡。

【貯藏】 置通風干燥處，防潮及蟲蛀。

黃 藥 子

Huángyàozǐ

RHIZOMA DIOSCOREAE BULBIFERAE

【來源】 本品為薯蕷科(Dioscoreaceae)植物黃獨(*Dioscorea bulbifera* L.)的干燥塊莖。多系野生，全國大部分地區均有生產，主產于湖北、湖南、江蘇等地。夏末至冬初採挖，洗淨泥土，除去須根，切成 3—4 分厚的圓片，曬干或烘干即得。

【鑒別】 本品為圓形或橢圓形的片，大小不一，直徑 1—2 寸許，厚 1—2 分。外皮棕黑色，有皺折，其上排列許多突起的棕黃色的圓形須根痕，有的尚有未去淨的細小硬須根，切面淡黃色或棕黃色，密布許多橙黃色的麻點。質脆，易折斷，斷面黃白色，有粉性。無臭，味苦。

以片大、外皮灰黑、斷面黃色者為佳。

【炮炙】 揀去雜質，洗淨，潤透後切小塊，干燥即得。

【性味】 苦，平。

【功能】 涼血，降火，消癰，解毒。

【主治】 諸般瘡腫，喉痹，瘰癧，蛇犬咬毒。

【用法与用量】 一錢五分至三錢；并可外用，适量，研末塗敷患处。

【貯藏】 置干燥处，防虫蛀。

黄 耆(黄芪)

Huángqí

RADIX ASTRAGALI

【来源】 本品为豆科(Leguminosae)植物黄芪(*Astragalus membranaceus* Bge.)或蒙古黄芪(*Astragalus mongholicus* Bge.)的干燥根。野生或栽培，主产于山西、甘肃、黑龙江、内蒙古等地。春、秋二季采挖，以秋季采者质量较佳，挖出后除去须根及根头，晒至六、七成干，捆成小捆，再晒干即得。

【鉴别】 本品为圆柱形，极少有分枝，上粗下细，长1—2尺，直径3分—1寸。表面灰黄色或淡棕褐色，全体有不整齐的纵皱纹或纵沟。质硬略韧，坚实有粉性，断面纤维性甚强，呈毛状，外层黄白色，较疏松，中间有黄色的菊花心，老根断面中央部分偶有枯朽，呈黑褐色或呈空洞。臭微，味甜，嚼之有豆腥气。

以条粗长、皱纹少、质坚而绵、粉性足、味甜者为佳。条细小、质较松、粉性小及顶端空心大者质次。

【炮炙】 黄耆 拣去杂质，除去残留的根头和空心较大者，用水浸泡，捞出，润透后及时切片，晒干即得。

蜜炙黄耆 取黄耆片，加炼熟的蜂蜜与开水少许，拌匀，稍闷，置锅内用文火炒至变为黄色、不粘手为度，取出，放凉即得。

每黄耆片100斤，用炼熟蜂蜜25—30斤。

【性味】 甘，微温。

【功能】 补气，固表，托毒，生肌。

【主治】 表虚，自汗，盗汗，气虚血脱，脾虚泄泻，痈疽不溃或溃不收斂，及一切元气不足之证。

【用法与用量】 一錢五分至三錢，大量可至数两。

【貯藏】 置通风干燥处，防湿潮及虫蛀。

黄 精

Huángjīng

RHIZOMA POLYGONATI

【来源】 本品为百合科(Liliaceae)植物黄精(*Polygonatum sibiricum* Red.)或多花黄精(*Polygonatum multiflorum* L.)的干燥地下根状茎。野生或栽培,全国各地山区均有生产。春、秋二季均可采挖,以秋季产者质佳,洗去泥土,除去须根,蒸至呈坨油润时,取出烘干或晒干;或置水中煮沸后,晒干或烘干即得。

【鉴别】 本品呈不规则的圆锥状,形似鸡头,或呈结节块状,分枝少而短粗,长1—3寸,直径0.3—1寸,表面黄白色至黄棕色,半透明,全体有细皱纹及稍隆起呈波状的环节,地上茎痕呈圆盘状,中心常凹陷,根痕多呈点状突起,分布于全体或多集生于膨大部分。干燥者质硬,易折断,未完全干燥者质柔韧,断面淡棕色,呈半透明角质样或蜡质状,并有多数黄白色的小点。无臭,味微甜有粘性。

以块大、色黄、断面透明、质润泽,习称“冰糖渣”者为佳。

【炮炙】 黄精 洗净泥土,略润,切片,晒干即得。

酒黄精 取拣净的黄精,洗净,置盆内用黄酒拌匀,装入罐内或适宜容器内,密闭,坐水锅中,隔水燉至酒吸尽,取出,切段,晾干即得。

每黄精100斤,用黄酒50斤。

蒸黄精 取拣净的黄精,洗净,置笼屉内加热蒸透,取出,切段,晾干即得。

【性味】 甘,平。

【功能】 补中益气、润心肺、填精髓。

【主治】 诸虚劳损、干咳口渴。

【用法与用量】 三至四钱。

【贮藏】 置通风干燥处,防潮及虫蛀。

葛 花

Gěhuā

FLOS PUERARIAE

【来源】 本品为豆科(Leguminosae)植物葛(*Pueraria pseudohirsuta* Tang et Wang)

的干燥花。野生或栽培，产于湖南、河南、广东、广西、浙江、四川、安徽等地。秋季当花未完全开放时采摘，晒干即得。

【鉴别】 本品呈扁长形，长2—3分。花瓣5片，外层呈淡棕色，内呈蓝紫色。下端有灰绿色筒状花萼。花萼边缘深裂成4瓣，其中一瓣较宽，上有明显的白色细柔毛。花瓣内有淡棕色连合成筒状的雄蕊，其中包有灰绿色或褐色的雌蕊，上有绒毛。无臭，味淡。

以朵大、淡紫色、花未开放、无梗叶杂质者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，去柄，筛去土即得。

【性味】 甘，平。

【功能】 解酒毒。

【主治】 酒毒烦渴，肠风下血。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置干燥处，防潮。

葛 根

Gěgēn

RADIX PUERARIAE

【来源】 本品为豆科(Leguminosae)植物葛(*Pueraria pseudohirsuta* Tang et Wang)的干燥根。多为野生，全国大部分地区有生产，主产于河南、湖南、浙江、四川等地。春、秋二季采挖，除去外皮，切成2—4分厚片，晒干或烘干即得。

【鉴别】 完整的呈长圆柱形，药材常为斜切或纵切的板状片，长数寸至尺许，直径1.5—3寸，厚2—4分。白色或淡棕色，表面有时可见残存的棕色外皮，切面粗糙，纤维性强。质硬而重，富粉性，并含大量纤维，横断面可见由纤维所形成的同心性环层，纵切面可见纤维与粉质相间，形成纵纹。无臭，味甘。

以块肥大、质坚实、色白、粉性足、纤维少者为佳。质松、色黄、无粉性、纤维多者质次。

【炮炙】 拣去杂质，洗净，用水浸泡，捞出，润透后及时切片，晒干即得。

【性味】 甘、辛，平。

【功能】 解肌退热，生津止渴，透发斑疹。

【主治】 温病发热，头痛，项强，烦渴，泄泻，痢疾，斑疹不透。

【用法与用量】 一錢五分至三錢。

【貯藏】 置通風干燥处，防潮及虫蛀。

棕 櫚 (棕板)

Zōnglǚ

PETIOLUS TRACHYCARPI

【来源】 本品为棕榈科 (Palmeae) 植物棕榈 (*Trachycarpus fortunei* H. Wendl.) 的干燥叶柄。均系栽培，我国南方地区多有生产，主产于湖南、四川、广东、广西、福建等地，多于秋季采收，当旧叶脱落后，割断旧叶柄，除去上面纤维状的棕毛，取其基部，即为棕板，晒干即得。

【鉴别】 本品呈长条板状，一端较窄而厚，另端较宽而稍薄，长约1尺许，宽0.5—3寸。表面红棕色，粗糙，上有纵直皱纹。一面有明显的凸出筋脉，在筋脉的两侧表面上着生很多棕色毛茸。质坚实，不易折断，断面纤维状。无臭，味淡。

以片大、棕色、质厚、陈久者为佳。

【炮炙】 棕櫚炭 取洁净的棕櫚，置煅锅内，上面复盖一锅，两锅接合处用黄泥封固，上压重物，用武火煅至贴在盖锅底上的白纸显焦黄色为度，擋住火門，待凉后，取出，剪块即得。

【性味】 苦，平，滑。

【功能】 收清，止血。

【主治】 吐血，衄血，便血，血淋，尿血，下痢，崩带；外治金疮、疥癬。

【用法与用量】 一至三錢；外用适量，研末敷患处。

【貯藏】 置干燥处。

楮 实 子

Chǔshízi

FRUCTUS BROUSSONETIAE

【来源】 本品为桑科 (Moraceae) 植物构树 (*Broussonetia papyrifera* Vent.) 的干燥

成熟果实。野生或栽培，主产于河南、湖北、湖南、甘肃等地。8—10月间当果实成熟时采摘，洗净，晒干，除去灰白色膜状的宿萼，去净杂质即得。

【鉴别】 本品略呈球形或卵圆形而稍扁，直径约半分。外皮红棕色，有网状皱纹或颗粒状突起，偶有未除净的灰白色膜状的宿萼，一侧有棱，一侧有凹下的沟纹，一端有小柄或小柄脱落后痕迹。质硬而脆，易压碎，种仁类白色，富油性。无臭，味淡。果实投入水中，水染成淡红色。

以色红、饱满、无杂质者为佳。

【炮炙】 筛净杂质，洗净晒干，用时捣碎即得。

【性味】 甘，寒。

【功能】 补虚，明目。

【主治】 腰膝无力，肝热目翳，肾虚目昏。

【用法与用量】 一至四钱。

【贮藏】 置干燥处，防虫蛀。

雄 黄

Xiónghuáng

REALGAR

【来源】 本品为含硫化砷的矿石。主产于湖南、贵州、云南等地。采挖后，剔除杂质、泥土等即得。

【鉴别】 本品呈不规则的块状，大小不一。全体呈深红色或橙红色，表面常复有橙黄色粉末，以手触之，易被染成橙黄色。体重，质松而易碎，断面红色，明亮。微有特异的臭气。其中颜色鲜艳、半透明、有光泽者习称“明雄”或“雄精”。燃之易熔融成红紫色液体，并生黄白色烟，有强烈的蒜臭气。

以色红、块大、质松、无石性者为佳。

【炮炙】 研成极细粉或水飞，晾干即得。

【性味】 辛，温；有毒。

【功能】 燥湿，杀虫，解毒。

【主治】 惊痫，久瘧，泄痢；外治疥癬，虫毒，蛇伤，疔疮，疔肿。

【用法与用量】 一至四分，入丸散服；外用适量，涂敷患处。

【注意】 孕妇忌内服。

【贮藏】 置干燥处，密闭保存。

硫 黄

Liúhuáng

SULFUR

【来源】 本品为天然硫黄矿，经初步加工而成。主产于山西、陕西、河南、湖北、湖南、四川、广东、台湾等地。将泥块状的硫黄及矿石在坑内用素烧罐加热至熔化，立即倒入模型中，冷后取出即得。

【鉴别】 本品呈不规则块状，大小不一。全体呈黄色或黄绿色。表面不平坦，常有麻纹及多数针眼状小孔，有光泽。体轻，质松易碎，断面常呈粗针状结晶形。有特异的臭气，味淡。燃烧易熔融，发蓝色火焰，并有刺激性臭气。

以色黄、光亮、松脆、无杂者为佳。

【炮炙】 生硫黄 拣去杂质，敲成小块即得。

制硫黄 取拣净的硫黄块，与豆腐同煮，至豆腐现黑绿色为度，取出，漂去豆腐，阴干即得。

每硫黄 10 斤，用豆腐 20 斤。

【性味】 酸，温；有毒。

【功能】 壮阳，杀虫。

【主治】 阳痿，大便冷秘；外治疥癣，疮癩。

【用法与用量】 五分至一钱，炮炙后入丸散服；外用生者适量，研末油调涂患处。

【注意】 孕妇忌内服；畏朴硝、芒硝、玄明粉

【贮藏】 置干燥处，防火。

硝 砂（白硝砂）

Nǎoshā

SAL AMMONIACUM

【来源】 本品为一种氯化铵的结晶体。主产于青海、甘肃、新疆等地。

【鉴别】本品为不规则块状结晶体，大小不一。全体白色，有的稍带淡黄色。质较脆，易碎，用指甲即可刮下白色粉末，断面显束针状纹理，有光泽。可溶于水。臭微，用舌舔之，味咸苦而刺舌。

以块整、色白、不含杂质者为佳。

【炮炙】刷净泥层，研成小块即得。

【性味】咸、苦、辛，温；有毒。

【功能】消积软坚，破瘀去翳。

【主治】肉积癥瘕，噎膈反胃，痰饮咳嗽，妇女经闭；外治目翳胬肉，鼻痔，面痣，疣赘，疔疮，痈肿。

【用法与用量】一至三分；外用适量，研末或水化点敷患处。

【注意】孕妇忌内服。

【贮藏】置干燥处，防潮。

犀 角

Xijiǎo

CORNU RHINOCERI ASIATICI

【来源】本品为犀科(Rhinocerotidae)动物印度犀(*Rhinoceros unicornis* L.)、爪哇犀(*Rhinoceros sondaicus* Desmarest)或苏门犀(*Rhinoceros sumatrensis* Cuvier)的角。产于泰国、印度、尼泊尔、缅甸、印度尼西亚等地。捕捉后，截取其角。

【鉴别】本品呈圆锥形，自底部向上渐细，略弯曲，大小不一，大者长达1尺许。表面乌黑色，下部色渐浅，呈黑褐色。底部周边有马牙状锯齿，习称“马牙边”，凹凸不平，马牙边向上的中部有纵纹及未去净的坚硬直刺，习称“刚毛”，中部渐光滑，角尖端细而钝圆且发亮，角前面有一纵长凹沟，沟长3—4寸，深约1寸，习称“天沟”，天沟下部相对的底盘上有一突出的高岗，习称“地岗”，岗长约2寸，高约1寸。底盘较大，长圆形，前窄后宽，形如龟背，长4—6寸，宽3—4寸，呈灰黑色或黑棕色，向外逐渐变浅呈灰棕色或灰黄色，底部密布鬃眼状圆点，故习称“沙底”，底面中央凹入，深1—2寸，习称“窝子”。角质坚硬，但可从纵面劈开，均系顺丝，无绞丝。镑片呈灰白色，有芝麻花点或短纹。气微清香而不腥，味微咸。

以色乌黑光亮、完整无裂纹、沙底色灰黑、鬃眼大、气清香者为佳。底盘色灰黑、特征不完全或不明显者质较次。

【炮炙】 犀角 取犀角，劈成瓣，置溫水中浸泡，撈出，镑片即得。

犀角粉 取犀角，銼粉，研成極細粉即得。

【性味】 苦、酸、咸，寒。

【功能】 清熱，涼血，解毒。

【主治】 傷寒時疫，熱入營分，驚狂，發黃，斑疹，神昏譫語，血熱妄行，吐血，衄血，下血，熱毒瘡腫。

【用法與用量】 三至六分，煎服或入丸散服。

【注意】 惡烏頭、草烏。

【貯藏】 置陰涼干燥處，密閉保存。

黑 芝 麻

Hēizhī má

SEMEN SESAMI

【來源】 本品為脂麻科(Pedaliaceae)植物脂麻(*Sesamum indicum* L.)的干燥成熟種子。均系栽培，主產于四川、山東、山西、河南等地。秋季果實成熟時割取全株，捆成小捆，梢端向上，晒干，打下種子，除去雜質，晒干即得。

【鑒別】 本品呈扁卵圓形，底圓，頭尖，長約1分，寬約半分。表面黑色，平滑或有網狀皺紋，尖端有棕色小點。種皮薄，破開后可見種仁白色，富油性。氣微弱，味甘。

以籽粒充實、純黑色、無雜質者為佳。

【炮炙】 簸淨雜質，篩去灰沙，洗淨，晒干即得。

【性味】 甘，平。

【功能】 補肝腎、潤五臟。

【主治】 肝腎不足，頭風眩暈，風痹癱瘓，大便燥結。

【用法與用量】 一至三錢。

【貯藏】 置通風干燥處，防蟲蛀。

紫 貝 齒

Zǐbèichǐ

CONCHA CYPRAEAE

【來源】 本品為寶貝科(Cypraeidae)動物蛇首眼寶貝(*Erosaria (Ravitrana) caput-*

serpentis(L.))、山猫宝贝(*Cypraea(Lyncina)lynx*(L.))或綬貝(*Mauritia arabica*(L.))的貝壳。均系野生,我国东南沿海地区多有分布,主产于广东、福建、台湾等地。5—6月間捕捉,挖去貝肉,洗淨即得。

【鉴别】本品呈卵圆形,长1—2寸,宽0.5—1寸許,高3—6分。背部隆起,底部較平,中間有沟,向內凹入,沟緣向內卷,并有鋸齿,两端各有一圓口。壳表面紫色、棕色,上有多数暗紫棕色与白色交錯的斑紋或圓形小点,平滑,有光澤,壳內藍白色。质坚硬。无臭,味淡。

以紫色、个匀、背有斑点者为佳。

【炮炙】用水洗淨,晒干,用时打碎或研成細粉即得。

【性味】咸,平。

【功能】清热,明目。

【主治】热毒目翳;小儿斑疹入目。

【用法与用量】二至五錢。

【貯藏】置干燥处。

紫 石 英

Zǐshíyīng

FLUORITUM

【来源】本品为含氟化鈣的天然矿石。主产于甘肃、山西、江苏、湖北等地。挖出后,去尽外附的砂礫及粘土即得。

【鉴别】本品呈不規則的块状,多具棱角。全体呈紫色或淺綠色,色深淺不匀,半透明至透明,有玻璃样光澤,表面常有裂紋。体較重而质坚硬,不易击碎,断面多不平齐。无臭,味淡。

以色紫、质坚、发亮、无杂石者为佳。

【炮炙】紫石英 洗淨,打成碎块即得。

煅紫石英 取淨洁的紫石英块,置坩堝內,在无烟的炉火中煅紅透,倒入醋盆中淬酥,取出,再煅淬一次,晾干即得。

每紫石英100斤,用醋30—40斤。

【性味】甘,温。

【功能】 鎮心,安神,暖子宮。

【主治】 虛勞,驚悸,女子血海虛寒不孕。

【用法与用量】 二至四錢。

【貯藏】 置干燥处。

紫 苏 子

Zǐsūzǐ

FRUCTUS PERILLAE ACUTAE

【来源】 本品为唇形科(Labiatae)植物紫苏(*Perilla frutescens* var. *acuta* (Thunb.) Kudo)的干燥成熟果实。多系栽培,主产于湖北、江苏、河南等地。秋季果实成熟时割取全株或果穗,打落果实,除去杂质,晒干即得。

【鉴别】 本品呈卵圆形或圆球形,直径不及半分。表面灰棕色或暗棕色,有隆起的网状花纹,较尖的一端有小白点。果皮薄脆,易压碎,种仁黄白色,有油性。捻之有香气,味微辛。

以粒小、颗粒饱满、均匀、灰棕色、无杂质者为佳。

【炮炙】 紫苏子 簸去灰屑,洗净,晒干即得。

炒紫苏子 取净紫苏子,置锅内用文火炒至冒香气或起爆声为度,用时研碎。

【性味】 辛,温。

【功能】 下气定喘,止咳消痰。

【主治】 上气咳逆,风痰喘急。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【貯藏】 置阴凉干燥处。

紫 苏 叶

Zǐsūyè

FOLIUM PERILLAE ACUTAE

【来源】 本品为唇形科(Labiatae)植物紫苏(*Perilla frutescens* var. *acuta* (Thunb.)

Kudo)的干燥叶。多系栽培,主产于江苏、湖北、广东、河南、河北等地。夏季当枝叶茂盛时采叶,阴干即得。

【鉴别】本品多皱缩卷曲成团状,有时破碎。润湿展平后可见完整的叶片呈卵圆形,长2—3寸,先端尖形,边缘有齿,基部近圆形而有柄。紫色,或正面绿色、背面紫色。质薄而脆,容易破碎。有特殊香气,味微辛。

以叶大、色紫、不碎、香气浓、无枝梗者为佳。

【炮炙】拣去杂质及梗,筛去沙土即得。

【性味】辛,温。

【功能】发表散寒,行气宽中。

【主治】感冒风寒,咳嗽气喘,心腹胀满。

【用法与用量】一钱五分至三钱。

【贮藏】置阴凉干燥处。

紫 苏 梗

Zisūgěng

CAULIS PERILLAE ACUTAE

【来源】本品为唇形科(Labiatae)植物紫苏(*Perilla frutescens* var. *acuta* (Thunb.) Kudo)的干燥茎,多系栽培,主产于江苏、湖北、广东、河南、河北等地。秋季割取地上部分,除去小枝和叶,晒干即得。

【鉴别】本品呈方柱形,长1—3尺,中部直径2—4分。表面紫棕色或淡棕色。四面均有纵沟及顺纹,上有稀疏的柔毛。分枝两两对生,长短不齐。质硬体轻,断面黄白色,中心有白色髓瓢或中空。有微弱的特殊香气,味淡。

以外皮紫棕色、分枝少、香气大者为佳。

【炮炙】拣去杂质,去掉枝叶,用水浸泡,捞出,润透后切段,晒干即得。

【性味】辛,温。

【功能】顺气安胎。

【主治】气逆腹痛,胎动不安。

【用法与用量】一钱五分至三钱。

【贮藏】置阴凉干燥处。

紫 河 車

Zǐhéchē

PLACENTA HOMINIS

【来源】 本品为健康人的干燥胎盘。将取得的新鲜胎盘，割开血管，用清水反复洗净，防止腐败，及时烘干制成。

【鉴别】 本品呈圆形或椭圆形碟状，直径3—5寸，厚薄不一，紫红色或棕红色，有的为黄色。一面凸起抽皱，另一面较平滑，在中央或一侧附有脐带的残余，四周散布细血管。每具重1—2两，质硬脆，有腥气。

以整齐、黄色或紫红色，洁净者为佳。

【炮炙】 制紫河車 取新鲜的紫河車，横直割开血管，用水反复洗漂干净，另取花椒置布袋中加水煎汤，去渣，加入净紫河車，煮2—3分钟，及时捞出，沥净水，放入黄酒盆内拌匀，置笼屉中蒸透，取出，烘干即得。

每紫河車100个，用花椒4两、黄酒3斤。

【性味】 甘、咸、温。

【功能】 补气，养血，益精。

【主治】 虚劳羸瘦，气喘，盗汗，遗精，阳痿，妇女血气不足，不能生育或乳少。

【用法与用量】 八分至一钱五分，多人丸散服。

【贮藏】 置通风干燥处，防虫蛀。

紫 草

Zǐcǎo

RADIX MACROTOMIAE SEU LITHOSPERMI

【来源】 本品为紫草科(Boraginaceae)植物新疆紫草(*Macrotomia euchroma*(Roxb.) Pauls.)或紫草(*Lithospermum erythrorhizon* Sieb. et Zucc.)的根。多为野生，前者习称“软紫草”，主产于新疆；后者习称“硬紫草”，主产于辽宁、湖南、湖北等地。春、秋二季采挖，以秋季采者为佳，将根挖出，除去残茎及泥土(勿用水洗，以防退色)，晒干或晾干即得。

【鉴别】 软紫草 呈不规则的长条圆柱形，多扭曲，长2—4寸，直径5—8分，表面紫

紅色或紫黑色，皮部極疏松，成條形鱗片狀，常十數層重重相疊，易剝落成不整齊的條狀碎片。質松軟而輕，易折斷，斷面顯層層圓環，中心木質稍硬，黃色，有的不甚明顯。微有香氣，味微苦澀。

硬紫草 呈扭曲不直的圓錐形，根頭較大，有側根，長2—4寸，直徑3—6分。表面紫紅色或紫黑色，粗糙有縱紋，皮部薄，稍有鱗片。質硬而輕脆，易折斷，斷面邊深紫色，微顯層紋，中間木心灰黃色。氣味與軟紫草同。

均以條粗長、肥大、色紫、質軟、皮厚、木心小者為佳。

【炮炙】 揀去雜質，去苗，剪成長段即得。

【性味】 苦，寒。

【功能】 涼血，活血，滑腸。

【主治】 斑疹，瘡毒，癰腫，大便秘結；外治皮膚濕疹潰瘍。

【用法與用量】 一錢五分至三錢；外用適量，煎汁或熬膏塗敷患處。

【貯藏】 置干燥處。

紫 草 茸

Zǐcǎoróng

LACCA

【來源】 本品為膠蚧科(Lacciferidae)動物紫膠蟲(*Laccifer lacca* Kerr.)在樹枝上所分泌的胶质。野生或培養，主產于雲南、四川、台灣等地。7—8月采收，連同樹枝一起剪下，將紫膠取下，除去樹枝，置干燥陰涼通風處，直至干燥即得。

【鑑別】 本品呈半圓柱狀，長1—3寸，寬3—5分。表面暗紫色或紫紅色，凹凸不平，有皺紋、小虫眼及孔隙，依附樹枝處凹入成溝。質硬而脆，斷面有平行排列的長圓形虫窩。臭微弱，味淡。遇熱則軟化而發粘。

以塊大、色紫、整齊者為佳。

【炮炙】 揀去雜質，除去殘留木枝，簸去灰屑即得。

【性味】 苦，寒。

【功能】 涼血，解毒，發痘，催生。

【主治】 痘毒不易透發，腫毒惡瘡，難產。

【用法與用量】 五分至二錢。

【注意】 孕婦忌用。

【貯藏】 置阴涼干燥处，防虫蛀。

紫 菀

Ziwǎn

RADIX ASTERIS

【来源】 本品为菊科(Compositae)植物紫菀(*Aster tartaricus* T. f.)的干燥根部。多为栽培，主产于河北、安徽等地。春、秋二季均可采挖，除去茎苗及泥土，摘下黄白色有节的母根供次年种植，将须根编成小辫，晒干即得。

【鉴别】 本品地下根状茎呈圆形的疙瘩头状，直径约半寸，顶端有茎基及叶柄的残痕，底部常有一条未除尽的母根，直径约1分，淡灰黄色，纤维性，质稍硬。疙瘩头下簇生许多细根，细根长2—4寸，直径约半分，多编成辫状。表面紫红色或灰红色，有纵皱纹。质柔韧，对折不易断，断而灰白色有紫边。微有香气，味甜、微苦。

以根长、色紫、质柔韧、去净茎苗、无泥土者为佳。

【炮炙】 紫菀 拣去杂质，除去残茎，洗净，稍润后切段，干燥即得。

蜜紫菀 取紫菀段，加炼熟的蜂蜜与开水少许，拌匀，稍闷，置锅内用文火炒至不粘手为度，取出，放凉即得。

每紫菀段100斤，用炼熟蜂蜜25斤。

【性味】 苦，温。

【功能】 温肺下气，消痰止咳。

【主治】 风寒咳嗽气喘，虚劳咳吐血，小便短赤不利。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置阴涼干燥处，防潮。

紫 梢 花

Zǐshāohuā

SPONGILLA

【来源】 本品为淡水海绵科(Spongillidae)动物脆弱针骨淡水海绵(*Spongilla fragilis* Lecidy)的干燥群体。均系野生，产于江苏、河南等地。秋、冬二季在河床或湖边拾取，

切去两端的树枝,除去杂草,晒干即得。

【鉴别】 本品呈不规则的块状或棒状,形似蒲棒,中央常有水草或树枝。大小不一,长1—3寸,直径4—8分。表面灰白色或灰黄色,有多数小孔,呈海绵状。体轻,质松泡,断面呈放射网状,网眼内含有灰黄色类圆形的小颗粒(芽球),振摇易脱落。无臭,无味。

以块大、质轻松、无大的树枝等杂质者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,洗净泥沙,晒干即得。

【性味】 甘,温。

【功能】 益阳,秘精。

【主治】 阳痿,遗精,尿有余沥,白浊如脂,小便不禁,阴疮湿痒,女子冷带。

【用法与用量】 五分至一钱,入丸散服,并可煎汤温洗阴部。

【贮藏】 置干燥处。

蛤 壳

Géqiào

CONCHA MERETRICIS

【来源】 本品为帘蛤科(Veneridae)动物文蛤(*Meretrix meretrix* L.)或青蛤(*Cyclina sinensis* Gmelin)的贝壳。均系野生,主产于江苏、浙江、广东等沿海地区。夏、秋二季采收,去肉、洗净,晒干即得。

【鉴别】 本品呈扇形或类圆形,向外隆起,一般直径1—3寸,壳厚0.5—1分,壳顶圆而至向一方。外表面灰白色、黄白色,有以壳顶为中心的明显或不明显的同心层纹,或有数条棕色或灰蓝色的轮纹。内面乳白色或略带青紫色,光亮无纹,边缘光滑或具整齐的细齿,有的边缘呈紫色。质坚硬,断面有层纹。无臭,味淡。

以光滑、黄白色、无泥沙、紫口者为佳。

【炮炙】 蛤壳 洗净,碾碎,晒干即得。

煅蛤壳 取洗净的蛤壳,置坩埚内,在无烟炉火中煅红透,取出,晾凉,碾碎即得。

【性味】 咸,寒。

【功能】 清热,利湿,化痰,软坚。

【主治】 热痰喘嗽,心脾疼痛,癰核,水肿,遗精,白浊,妇女崩带;外治汤火伤。

【用法与用量】 二至四钱;外用煅者,适量,研末油调塗患处。

【貯藏】 置干燥处。

蛤 蚧

Géjiè

GECKO

【来源】 本品为守宫科(Geckonidae)蛤蚧(*Gekko gecko* L.)除去内藏的干燥品。多系野生,产于广西、贵州、云南等地。全年均可捕捉,击毙后剖开腹部,取出内藏,用布擦干,用竹片撑之,使蛤蚧身体及四肢顺直,用白色纸条缠尾使与竹片紧密附贴,以防其尾脱落,然后用微火焙干,干后两只合成一对即得。

【鉴别】 本品四足头尾均撑直,呈扁片状。头颈部及中身长约3—4寸,头部约占三分之一。腹背部宽2—3寸,尾部长3—4寸。头大扁长,上有两眼,形较大,凹陷成穹隆,口内有齿,细小而明显,生于颈的边缘处,无犬牙。背部呈灰黑色或银灰色,有黄白色或灰棕色斑点,脊椎骨突起,两侧肋骨突起不显著。全身密布圆形或多角形微有光泽的细鳞,四足均有五爪,足趾底面有吸盘。尾细长而结实,上粗下细中部现骨节,与背部颜色相同。略有鱼腥气,味微咸。

以体大、肥壮、尾全不破碎者为佳。

【炮炙】 蛤蚧 除去竹片,截去头足及鳞(无尾者拣去不用),切成小方块即得。

酒蛤蚧 取蛤蚧块,用黄酒浸后,焙干即得。

【性味】 咸,平;有小毒。

【功能】 补肺,滋肾,定喘,止咳。

【主治】 虚劳,肺痿,喘嗽,咯血,消渴,阳痿。

【用法与用量】 一至二钱,多入丸散服。

【贮藏】 置通风干燥处,防虫蛀。

番 红 花

Fānhónghuā

STIGMA CROCI

【来源】 本品为鸢尾科(Iridaceae)植物番红花(*Crocus sativus* L.)的干燥柱头。产

于西班牙、希腊、苏联等地。采收花朵后，摘下柱头，阴干即得。

【鉴别】本品略呈管状线形，多弯曲，单独存在或三枚柱头连于一枚花柱上。全长约1寸，柱头顶端较宽，直径约半分，向下渐细。紫红色或深红色，花柱部分为黄色。浸于水中，水被染成黄色，柱头膨胀呈喇叭状，顶端边缘有不整齐的齿，一侧具一裂隙。质轻，易折断。具特异香气，微有刺激性，味微苦而辛凉。

以身长、色紫红、黄色花柱少。味辛凉者为佳。

【炮炙】拣去杂质，并将黄色毛须拣去即得。

【性味】甘、平。

【功能】活血，解郁。

【主治】心忧郁积，气闷不散，伤寒发狂，惊怖恍惚。

【用法与用量】一至二钱。

【注意】孕妇慎用。

【贮藏】置阴凉干燥处，密闭保存。

锁 阳

Suǒyáng

HERBA CYNOMORII

【来源】本品为锁阳科(Cynomoriaceae)植物锁阳(*Cynomorium coccineum* L.)的干燥肉质茎。均系野生，主产于内蒙古、新疆、甘肃等地。春、秋二季采挖，以春季产者为佳，挖出后置沙中，半埋半露，晒干即得。

【鉴别】本品呈扁圆柱形，微弯曲，长3—6寸，直径约1寸。表面棕色或棕褐色，粗糙，全体具明显纵沟，有时可见三角形鳞叶片，质薄如纸。体重质坚，极难折断，断面棕色，紧密而油润。臭微，味甘而涩。

以茎块肥大、体重坚实、断面显油润者为佳。

【炮炙】洗净泥土，剥成小块或润透后切片，干燥即得。

【性味】甘，温。

【功能】补肾，润肠。

【主治】阳痿，血枯便秘，腰膝痿弱。

【用法与用量】一钱五分至三钱。

【貯藏】 置通風干燥处,防潮及虫蛀。

鵝不食草

Ébùshícao

HERBA CENTIPEDAE

【来源】 本品为菊科(Compositae)植物鵝不食草(*Centipeda minima*(L.) A. Braun et Aschers)的干燥带花全草。均系野生,产于湖北、浙江、江苏、广东等地。夏、秋二季开花时采收,除去泥土,晒干即得。

【鉴别】 本品相互扭纏成团。灰綠色或棕褐色。莖細而多分枝,顏色較深。质脆,易折断,断面黃白色。叶小,多皺折破碎不全,完整的叶片呈匙形,邊緣有3—5个鋸齿,叶脉不明显,质极脆,易碎。头状花序小,球形,黃色或黃褐色。微有香气,久嗅有刺激性,味苦、微辛。

以灰綠色、无杂质、嗅之打噴嚏者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,剪段,过篩去土即得。

【性味】 辛,寒。

【功能】 通鼻窍,散疮肿。

【主治】 头痛脑酸,鼻生瘰肉,鼻塞不通,瘧疾;外治目翳,牙痛,痔疮肿痛,湿毒腥疮。

【用法与用量】 二至三錢;外用适量,研末嚥鼻,治目翳、牙痛,油調敷或用鮮者搗敷諸疮。

【貯藏】 置通風干燥处。

滑 石

Huáshí

TALCUM

【来源】 本品为天然矿石。主产于山东、江苏、陕西、山西、辽宁等地。采挖后,去淨泥土及杂石即得。

【鉴别】 本品呈扁平形、斜方形、或不規則块状,大小不一。全体白色、蛋青色或黄白色,微有蜡样光泽,半透明或微透明。质軟而細致,手摸有滑潤感,用指甲即可刮下白粉用块书写,見有白色条痕。无臭、无味。

以整洁、色白、滑潤、无杂石者为佳。

【炮炙】 洗淨,研成細粉或砸成小块即得。

【性味】 甘,寒。

【功能】 清热、渗湿。

【主治】 石淋,热淋,癃闭,水肿,暑泻,热痢,燥渴,吐血,衄血;外治皮肤湿烂,金疮。

【用法与用量】 三至四錢;外用适量,研末敷患处。

【注意】 孕妇内服宜慎。

【贮藏】 置干燥处。

雷 丸

Léiwán

OMPHALIA

【来源】 本品为多孔菌科(Polyporaceae)植物雷丸菌(*Omphalia lapidescens* Schroet.)的干燥菌核。均系野生,主产于四川、贵州、云南、广西等地。多于秋、冬二季采挖,洗去泥沙,晒干即得。

【鉴别】 本品呈球形或不規則的圓块状,一般直徑为0.4—1寸。表面黑褐色或灰褐色,有略隆起的微細皺紋。质坚实而重,不易破裂,破碎面呈白色或淺灰黄色,不平坦,呈顆粒状或粉质。无臭,味淡。咀嚼有顆粒样感觉,微带粘液性,久嚼則溶化而无殘渣。

以个大飽滿、质坚、断面色白者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,用水洗淨,晒干,用时搗碎即得。

【性味】 苦,寒;有小毒。

【功能】 杀虫。

【主治】 虫积腹痛。

【用法与用量】 二至三錢,入丸散服。

【贮藏】 置阴涼干燥处。

蒲 公 英

Pǔgōngyīng

HERBA TARAXACI CUM RADICE

【来源】 本品为菊科 (Compositae) 植物蒲公英 (*Taraxacum mongolicum* Hand. — Mazz.) 的干燥带根全草。均系野生, 全国大部分地区多有生产, 主产于河北、山东、河南等地。春、夏、秋三季花初开放时连根挖取, 除净泥土, 晒干即得。

【鉴别】 本品根呈圆锥状, 弯曲, 长1—1.5寸, 棕褐色, 皱缩, 根头部有棕色或黄白色的毛茸, 或已脱落。叶根生, 皱缩成团或为散乱皱缩的条片。外表绿褐色或暗灰绿色, 叶背主脉明显。有花莖数条, 每莖顶端生一个头状花序, 黄褐色或淡黄白色。无臭, 味微苦。

以叶多、灰绿色、根完整、无杂草及泥土者为佳。

【炮炙】 拣去杂质, 洗净泥土, 切段, 晒干即得。

【性味】 苦、甘、寒。

【功能】 清热, 解毒, 散结。

【主治】 脾胃郁火, 乳痈, 瘰疬, 疔毒, 热淋。

【用法与用量】 二至四钱。

【贮藏】 置通风干燥处, 防潮。

蒲 黄

Pǔhuáng

POLLEN TYPHAE

【来源】 本品为香蒲科 (Typhaceae) 植物长苞香蒲 (*Typha angustata* Bory et Chaub.) 或香蒲属 (*Typha*) 其他植物的干燥花粉。均系野生, 全国大部分地区多有生产。夏季花将开放时采收蒲棒上部的黄色雄性花穗, 晒干后碾轧, 筛取细粉即得。

【鉴别】 本品为鲜黄色的细小花粉。质轻松, 遇风易飞扬, 粘手而不成团, 放入水中则漂浮水面。用放大镜检查, 为扁圆形颗粒, 或杂有绒毛。无臭, 无味。

以色鲜黄、粉细、光滑、纯净、无杂质者为佳。

【炮炙】 生蒲黄 揉碎结块，过筛，除去杂质即得。

蒲黄炭 取净蒲黄粉末，置锅内用武火炒至全部黑褐色，但须存性，喷淋清水，将结块揉碎，过筛即得。

本品易复燃，应放置 1—2 日，注意检查后才能贮存。

【性味】 甘，平。

【功能】 凉血，活血，消瘀；炒黑止血。

【主治】 生用治妇女经闭，血气不行，心腹刺痛，产后瘀血作痛，跌扑血闷，疮疖肿毒；炒黑治吐血，衄血，泻血，血痢，崩漏，带下；外治重舌口疮，聤耳出脓，耳中出血，阴下湿痒。

【用法与用量】 一钱五分至三钱；外用适量，研末敷患处。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮及虫蛀。

蒺 藜（刺蒺藜）

Jili

FRUCTUS TRIBULI

【来源】 本品为蒺藜科(Zygophyllaceae)植物蒺藜(*Tribulus terrestris* L.)的干燥成熟果实。均系野生，主产于河南、河北、山东、安徽等地。秋季果实成熟时，将全株割下，晒干，打下果实，除去硬刺，筛净即得。

【鉴别】 本品为 5 个小果聚合而成，呈放射状五棱形，直径 2—3 分，有的单独存在。小果表面绿白色或灰白色，背部隆起，有许多网纹及小刺，并有一对长刺和一对短刺，经剔除硬刺者，则可见有残存的断痕及表面的网纹。质坚硬，刺手，切断面可见白色或黄白色有油性的种仁。无臭，味苦、辛。

以颗粒均匀、饱满坚实、色灰白者为佳。

【炮炙】 蒺藜 漂去泥沙，除净残留的硬刺，即得。

盐蒺藜 取去刺的蒺藜，用盐水拌匀，闷透，置锅内用文火炒至微黄色，取出，晒干即得。

每蒺藜 100 斤，用盐 2 斤 8 两加适量开水化开澄清。

【性味】 苦、辛、温。

【功能】 散风，下气，明目，行血。

【主治】 头痛、身痒、胸满、气逆、目赤肿翳、癰瘡、乳閉。

【用法与用量】 二至三錢。

【注意】 孕妇慎用。

【貯藏】 置干燥处。

蓖 麻 子

Bīmázi

SEMEN RICINI

【来源】 本品为大戟科(Euphorbiaceae)植物蓖麻(*Ricinus communis* L.)的干燥成熟种子。均系栽培，全国各地多有生产。秋季果实成熟时采摘，晒干，搓去果壳，收集种子，即得。

【鉴别】 本品呈椭圆形或卵形而稍扁，长3—5分，宽2—3分，厚1.5—2分。外皮有灰白色与红褐色或黑褐色相间的花斑纹，平滑而光亮。一端有一个黄白色的小疙瘩，较平的一面有一条微凸起的纵纹。质轻而脆，破开后内皮灰褐色，平滑，种仁白色，富有油性，外包一层白色薄膜。无臭，味微苦辣。

以粒大饱满、油性足者为佳。

【炮炙】 拣去杂质或用时去外壳，捣碎即得。

【性味】 甘、辛，平；有毒。

【功能】 消肿，追脓，拔毒。

【主治】 外治疮疥，肿毒，癰瘡。

【用法与用量】 外用适量，捣烂敷贴患处。

【貯藏】 置阴凉干燥处。

椿 皮

Chūnpí

CORTEX AILANTHII

【来源】 本品为樗树科(Simarubaceae)植物臭椿(*Ailanthus altissima* Swingle)的干

燥根皮或干皮。野生或栽培，全国大部分地区多有生产。全年均可采收，将树伐倒剥，取根皮及干皮，刮去外面粗皮或不去粗皮，晒干即得。

【鉴别】 根皮 呈扁平的块片状或向内卷曲呈瓦片状或卷筒状，大小不一，厚2—4分。外表面灰黄色或黄白色，粗糙，已除去粗皮的则显黄白色皮层。内表面淡黄色，较平坦，密布排列整齐的点状突起或小孔。质硬而脆，断面粗糙，呈颗粒状。臭微，味苦。

干皮 多呈不齐的板片状，厚4—6分。外表面暗灰色，极粗糙，有深纵裂。除去粗皮的露出淡棕黄色皮层。其余与根皮同。

均以无粗皮、块整齐、内面黄白色者为佳。

【炮炙】 椿皮 除去粗皮，用水浸泡，捞出，润透后及时切丝或切段，干燥即得。

炒椿皮 将麸皮撒入加热的锅内，俟烟冒出时，加入椿皮丝，炒至微黄色，取出，筛去麸皮，放凉即得。

每椿皮丝100斤，用麸皮10斤。

【性味】 苦，寒，清。

【功能】 清热，燥湿，清肠，止血。

【主治】 泄泻，久痢，肠风泻血，遗精，白浊，崩漏，带下。

【用法与用量】 二至三钱。

【贮藏】 置通风干燥处，防虫蛀。

路 路 通

Lùlùtōng

FRUCTUS LIQUIDAMBARIS

【来源】 本品为金缕梅科 (Hamamelidaceae) 植物枫香 (*Liquidambar formosana* Hance) 的干燥成熟果序。多系野生，主产于江苏、浙江、湖北、陕西等地。冬季果序成熟后采摘，或收集自落的果序，去净泥土杂质，晒干即得。

【鉴别】 本品呈圆球形，直径7—9分。表面灰棕色或棕褐色，密生多数尖刺及小钝刺，除去尖刺，则显无数小孔，状如小蜂窝。果序一端有圆柱形小柄或其断痕。体轻，质硬，不易破开，断面不平坦，有放射状的隆起及凹陷。无臭，无味。

以个大、无泥土及果柄者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，摘去柄，洗净，晒干即得。

【性味】 苦,平。

【功能】 通經絡,利水。

【主治】 周身痹痛、手足拘攣、小便不利、水肿脹滿。

【用法与用量】 一錢五分至三錢。

【注意】 孕妇忌用。

【貯藏】 置干燥处。

蜈 蚣

Wúgōng

SCOLOPENDRA

【来源】 本品为蜈蚣科 (Scolopendridae) 动物少棘巨蜈蚣 (*Scolopendra subspinipes mutilans* (L.) Kock.) 的干燥全体。多系野生,产于江苏、浙江、安徽、湖北、湖南等地。春、夏二季捕捉,将其用竹片绷直,晒干或炕干即得。

【鉴别】 本品体长而扁平,长3—5寸,宽1.5—3分。全体由二十二个同形的环节组成,最后一节略细小。头部为红褐色,有触角及毒钩各一对。背部黑绿色,光亮,有两条突起的棱线。腹部棕黄色,皱缩,每节有足一对,生于两侧,向后弯曲,黄色或红褐色。断面有裂隙或空虚。微腥并有特殊刺鼻的臭气,味辛而微咸。

以体长、头红、身黑绿色、头足全者为佳。

【炮炙】 除去竹片及头足,用时剪碎即得。

【性味】 辛,温;有毒。

【功能】 祛风,定惊。

【主治】 惊痫,脐风;外治瘰癧,秃疮。

【用法与用量】 三至六分;外用适量,研末或油浸涂敷患处。

【注意】 孕妇忌内服。

【貯藏】 置通风干燥处,防虫蛀。

蜂 房

Fēngfáng

NIDUS VESPAE

【来源】本品为胡蜂科(Vespidae)昆虫大黄蜂(*Polistes mandarinus* Sauss.)或同属近缘昆虫的巢。均系野生,全国大部分地区多有生产。一般在冬季采收,采摘后将蜂房晒干;或略蒸,除去死蜂死蛹,晒干即得。

【鉴别】本品呈圆盘状或不规则的扁块状,有的重叠形似宝塔,大小不一。灰白色或灰褐色。腹面有多数整齐有序的六角形小孔,孔大小不一,颇似窠房。背面有一个或数个黑色凸出的疑柱。体轻似纸质,略有弹性,捏之不碎。臭特殊,味辛淡。

以单个、整齐、灰白色、桶长、孔小、体轻、略有弹性、房内有幼卵及杂质者为佳。蜂房内有木质或革质、孔大者不可入药。

【炮炙】洗净,置筛网内蒸透,取出,剪块,晒干即得。

【性味】甘,平;有毒。

【功能】祛风,攻毒,杀虫。

【主治】惊痫痰厥,瘾疹瘙痒;外治癰疽疔瘡,痔漏,头癣,風虫牙痛,蜂螫肿疼。

【用法与用量】八分至一钱五分,煎服或烧存性研末服;外用适量,研末油调敷或煎水漱口患处。

【注意】内服宜慎。

【贮藏】置通风干燥处,防压,防虫蛀。

蜂 蜜

Fēngmì

MEL

【来源】本品为蜜蜂科(Apidae)昆虫中华蜜蜂(*Apis cerana* Fabr.)所酿的蜜。全国大部分地区多有生产。多在春、夏、秋三季采收,采收时,先将蜂巢割下,置于布袋中,将蜜

挤出或置离心机内将蜜摇出,过滤,除去蜂蜡的碎片及其它杂质即得。

【鉴别】 本品为半透明、浓稠半流动的液体。白色至淡黄色(白蜜),或指黄色至琥珀色(黄蜜)。用木棒挑起则蜜向下流,连续不断而呈折叠状;含水分多者较稀薄,不能挑起。夏季如清油状,有光泽;冬季则结晶,状似蜡油,并含有颗粒状物。气芳香,味极甜。

以稠如凝脂、味甜纯正、洁净无杂质者为佳。

【炮炙】 捞去杂质或用文火熬炼,过滤去沫即得。

【性味】 甘,平。

【功能】 润燥,补中,止痛,解毒。

【主治】 五脏虚不足,大便燥结,咳嗽,疮疡作痛,解乌头毒。

【用法与用量】 三钱至一两。

【贮藏】 置阴凉处。

蜂 蜡

Fēnglà

CERA FLAVA

【来源】 本品为蜜蜂科(Apidae)昆虫中华蜜蜂(*Apis cerana* Fabr.)分泌的蜡质,经精制而成。全国大部分地区多有生产。春、秋二季取下蜂巢,除去蜂蜜后,将剩下渣滓放入水中,加热使其熔化,除去上层泡沫杂质,趁热过滤,放冷,蜂蜡即凝结成块,浮于水面,取出即得。

【鉴别】 本品多为不规则团块,大小不一。全体呈黄色或黄棕色,不透明或微透明,表面光滑,手摸有油腻感。体轻,能浮于水面,冷时质软脆,断面显砂性颗粒,用手搓捏能软化。有蜂蜜样香气,味淡,嚼之细腻,无渣。粘成团块不碎。

以色黄、质较软而有油腻感,显蜂蜜香气者为佳。

【炮炙】 用时熔化,澄清或过滤即得。

【性味】 甘,微温。

【功能】 收涩,生肌,止痛。

【主治】 下痢脓血,妊娠胎漏;外治诸疮溃烂,脓疮,金疮,汤火伤疮。

【用法与用量】 一钱五分至三钱;外用适量,融化敷患处。

【贮藏】 置阴凉处,防热。

漏 芦

Lòulú

RADIX RHAPONTICI SEU ECHINOPSIS

【来源】 本品为菊科 (Compositae) 植物祁州漏芦 (*Rhaponticum uniflorum* DC.) 或禹州漏芦 (*Echinops latifolius* Tausch.) 的干燥根部。均系野生, 主产于河北、湖北、安徽等地。秋季采挖, 除去残茎及须根, 洗净泥土, 晒干即得。

【鉴别】 祁州漏芦 呈圆锥形或破裂成片块状, 多扭曲, 长 3—8 寸, 中部直径 3—6 分。外皮灰褐色或棕黑色, 多纵沟及交叉的网状裂纹, 时有浮皮, 顶端具灰白色毛茸。质硬而脆, 易折断, 断面不整齐, 有灰黄色菊花纹及裂隙, 中心呈灰黑色或棕黑色。臭特异, 味微苦。

以外皮灰黑色、条粗、质坚、不裂者为佳。

禹州漏芦 呈类圆柱形, 上粗下细, 稍扭曲, 长可达 1 尺, 直径 3—7 分。外皮灰褐色或灰黄色, 粗糙、有纵皱纹, 顶端丛生棕色硬毛, 下端偶有分枝。质坚, 不易折断, 横切面外圈褐色, 内有黄黑相间的菊花纹。无臭, 味微涩。

以条粗、质坚实者为佳。

【炮炙】 拣去杂质, 洗净, 润透后切片, 晒干即得。

【性味】 咸、苦, 寒。

【功能】 清热解毒, 排脓通乳。

【主治】 乳房肿痛, 乳汁不通, 痈疽发背, 疮疡肿痛, 瘰癧痔漏。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【注意】 孕妇忌用。

【贮藏】 置通风干燥处。

酸 枣 仁

Suānzǎorén

SEMEN ZIZYPHI SPINOSAE

【来源】 本品为鼠李科(Rhamnaceae)植物酸枣(*Zizyphus sativa* var. *spinosa* (Bge.) Schneid.)的干燥成熟种子。均系野生，主产于河北、河南、陕西、辽宁等地。秋季果实成熟时采收，除去果肉与核壳，取出种子，晒干即得。

【鉴别】 本品呈扁圆形或椭圆形，长2—3分，宽1.5—2分，厚约1分。表面紫红色或紫褐色，平滑有光泽，有时显裂纹。一面较平坦，中间有一条隆起的纵线纹，一面微隆起，尖端有小凹陷，微现白色。种皮质坚硬，除去种皮后可见两片种仁，浅黄色，富油性。臭微，味甘。

以粒大饱满、完整、外皮紫红色、无核壳者为佳。

【炮炙】 酸枣仁 用清水漂净皮壳，晒干；或簸拣去净皮壳即得。

炒酸枣仁 取洁净的酸枣仁，置锅内用文火炒至外皮鼓起并呈微黄色，取出，放凉即得。

焦酸枣仁 取洁净的酸枣仁，置锅内用武火炒至有八成变黑红色，取出，放凉即得。

【性味】 甘，平。

【功能】 宁心，敛汗。

【主治】 虚烦不眠，惊悸，烦渴，虚汗。

【用法与用量】 二至五钱。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防潮及虫蛀。

酸 浆（锦灯笼）

Suānjiāng

FRUCTUS PHYSALIS

【来源】 本品为茄科(Solanaceae)植物酸浆(*Physalis alkekengi* L.)的干燥带宿萼的成熟果实。均系野生，主产于吉林、河北、新疆、山东等地。秋季果实成熟、宿萼呈红色或

紅黃色時採摘、晒干即得。

【鑒別】本品呈三角形燈籠狀，多壓扁，長約1寸許，寬約1寸。基部略平截而內凹，中央有果柄着生，先端漸尖而開裂。表面紅色或紅黃色，有五條明顯的縱棱，棱間有網狀的細脈紋。質輕薄而柔韌，中空，或內有橙紅色果實一枚。果實圓形，多壓扁，直徑3—5分，果皮皺縮，內含多數種子。氣特異，宿萼味苦，果實味甘微酸。

以個大整齊、色紅、潔淨、不帶果柄者為佳。

【炮炙】揀去雜質，去柄即得。

【性味】酸、寒。

【功能】清熱，解毒，消痰，利水。

【主治】竹瀝勞熱，熱咳咽痛，黃疸，小便不利；外治天泡濕瘡。

【用法與用量】一錢五分至三錢；外用鮮者適量，搗爛敷，或干者適量研末油調敷患處。

【注意】孕婦忌內服。

【貯藏】置通風干燥處，防虫蛀。

蔓 荆 子

Mànjīngzǐ

FRUCTUS VITICIS

【來源】本品為馬鞭草科(Verbenaceae)植物單葉蔓荊(*Vitex rotundifolia* L. f.)或蔓荊(*Vitex trifolia* L.)的干燥成熟果實。多系野生，主產于山東、江西、福建等地。8—10月果實成熟時採收，晒干，除淨雜質即得。

【鑒別】本品呈圓球形，直徑1.5—2分。外皮灰黑色或黑褐色，有灰色的粉霜及四條縱溝，用放大鏡觀察，密布淡黃色小點。底部有薄膜狀的蒂及小果柄，蒂包被大半個果實，其邊緣有5個小裂片，常深裂成兩瓣，灰白色，密生細絨毛。體輕，質堅硬，不易破碎，橫斷面果皮灰黃色，有棕褐色油點，內分4室，每室有種子一枚，種仁白色，有油性。有特異的芳香气，味苦。

以粒大、充實、飽滿、氣芳香、無雜質者為佳。

【炮炙】蔓荊子 篩淨雜質，即得。

炒蔓荊子 取淨蔓荊子，置鍋內用武火炒至焦黃色，取出，放涼即得。

【性味】 辛、苦，微寒。

【功能】 疏散風熱。

【主治】 風熱頭痛，頭沉昏悶，目赤內痛，濕痹拘攣。

【用法與用量】 一錢五分至三錢。

【貯藏】 置陰涼乾燥處。

檳 榔

Bīngláng

SEMEN ARECAE

【來源】 本品為棕櫚科 (Palmae) 植物檳榔 (*Areca catechu* L.) 的乾燥成熟種子。多系栽培，主產於廣東、雲南、台灣等地，國外以菲律賓、印度、錫蘭及印度尼西亞產量最多。冬、春二季果實成熟時採收，剝去果皮，曬干即得。

【鑒別】 本品呈扁圓球形或圓錐形，高 5—8 分，底部直徑 6—8 分。表面淡黃棕色或黃棕色，具稍凹下的網狀溝紋，底部中央有一凹窩，其側緣有一明顯的疤痕。質堅硬，不易破碎，斷面有灰白色與棕紅色交錯的花紋。無臭，味澀而苦。

以個大、體重、結實、無破裂者為佳。體輕、質松、中間有空隙者質次。

【炮炙】 檳榔 揀去雜質，用水浸泡，按氣溫情況換水，以免發臭，泡透為止，撈出，切片，晾干；或取揀淨的檳榔打碎如豆粒大，即得。

炒檳榔 取檳榔片，置鍋內用文火炒至變色，取出，放涼即得。

焦檳榔 取檳榔片，置鍋內用武火炒至焦黃色，微噴清水，取出，晾干即得。

【性味】 苦、辛，溫。

【功能】 殺蟲，消積，下氣，行水。

【主治】 蟲積，食滯，心腹脹痛，瀉痢後重，瘧疾，水腫，腳氣，痰癰，癥結。

【用法與用量】 一至三錢。

【貯藏】 置通風乾燥處，防潮及蟲蛀。

榧 子

Fěizi

SEMEN TORREYAE

【来源】 本品为紫杉科 (Taxaceae) 植物榧 (*Torreya grandis* Fort.) 的干燥成熟种子。野生或栽培，主产于浙江、湖北、江苏等地。冬季种子成熟时采摘，除去肉质外皮，取出种子，晒干即得。

【鉴别】 本品呈卵圆形，长 0.6—1 寸许，表面灰黄色或淡黄棕色，有纵皱纹，深浅不一，一端钝圆，有一椭圆形疤痕，色较深，在其两侧各有一个小突起，另一端稍尖。外壳质硬脆，破开后内面红棕色，有麻纹。种仁卵圆形，皱缩而坚实，表面有灰棕色皱缩的薄膜，仁黄白色，有油性，微有香气，味微甜。

以个大、饱满、种仁黄白色，不泛油，不破碎者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，或去壳取仁，用时捣碎即得。

【性味】 甘，平。

【功能】 杀虫，消积，润燥。

【主治】 虫积腹痛，小儿疳积，燥咳，便秘，痔疮。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置干燥处，防虫蛀。

槐 米

Huáimǐ

FLOS SOPHORAE IMMATURUS

【来源】 本品为豆科 (Leguminosae) 植物槐 (*Sophora japonica* L.) 的干燥花蕾。栽培或野生，全国大部分地区多有生产。夏季当花枝上形成花蕾时采摘，尽速晒干，除去枝梗杂质即得。

【鉴别】 本品呈卵形或长圆形，长 1—2 分，直径约 0.5 分。花萼呈黄绿色钟状，有细

小的花柄，近花柄处有数条纵纹。萼的上方为黄白色未开放的花瓣。质轻松，手捻即碎。无臭，味微苦澀。

以个大、紧缩、黄绿色、无梗叶杂质者为佳。

【炮炙】 槐米 拣净杂质，去柄，筛去土即得。

炒槐米 取净槐米，置锅内用文火炒至深黄色，取出，放凉即得。

【性味】 苦，微寒。

【功能】 凉血，止血。

【主治】 吐血，衄血，便血，血痔，血痢，崩漏，风热目赤。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置干燥处，防潮及虫蛀。

槐 花

Huáihuā

FLOS SOPHORAE

【来源】 本品为豆科(Leguminosae)植物槐(*Sophora japonica* L.)的干燥花。栽培或野生，全国大部分地区多有生产。夏季花将开放时采摘，尽速晒干，除去枝梗杂质即得。

【鉴别】 本品花瓣多散落，完整的花瓣5片，黄白色，很薄，其中两瓣较大，近圆形，顶端微凹，向外反卷，其它瓣片呈长圆形。花瓣下面有绿色的钟状花萼。花瓣中间有棕黄色须状的雄蕊和1枚圆柱形而弯曲的雌蕊。质轻，干后易碎。无臭，味微苦。

以花头将开而未开、整齐不碎、色黄、无梗叶杂质者为佳。

【炮炙】 槐花 拣净杂质，除去残梗即得。

炒槐花 取净槐花，置锅内文火炒至微黄色，取出，放凉即得。

槐花炭 取拣净的槐花，置锅内武火加热炒至有八成黑色，但须存性，喷淋清水，取出，晒干即得。

【性味】 苦，微寒。

【功能】 凉血，止血。

【主治】 吐血，衄血，便血，血痔，血痢，崩漏，风热目赤。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置干燥处，防潮及虫蛀。

槐 角

Huáijiǎo

FRUCTUS SOPHORAE

【来源】 本品为豆科(Leguminosae)植物槐(*Sophora japonica* L.)的干燥成熟果实。栽培或野生，全国大部分地区有生产。11—12月间果实成熟时采摘，除去枝梗，果柄等杂质，晒干即得。

【鉴别】 本品形似豆荚，但不开裂，长1—2寸，直径2—3分。外皮黄绿色或黄褐色，皱缩而粗糙，一侧有一条黄色带，果实呈念珠状，内含1—6粒种子，多在收缩处折断，质柔润，断面显黄绿色，有粘性。种子扁椭圆形似黑豆，长约3分，表面光滑，棕黑色，一侧有灰白色的脐点，椭圆形，长约半分，质坚硬，种仁两瓣，黄绿色。果肉臭微，味苦；种子嚼之有豆腥气。

以个大、饱满、黄绿色、质柔润，无杂质者为佳。

【炮炙】 槐角 拣去杂质，去柄，洗净，晒干即得。

蜜槐角 取净槐角，置锅内用文火炒至鼓起，即喷洒入蜜水，再炒至外皮光亮、不粘手为度，取出，放凉即得。

每槐角100斤，用炼熟蜂蜜5—6斤。

【性味】 苦、寒。

【功能】 疏风热，凉大肠，润肝燥。

【主治】 肠风泻血，痔疮出血，心胸烦闷，风眩欲倒，目赤流泪，妇女阴疮湿痒。

【用法与用量】 二至四钱。

【注意】 孕妇忌用。

【贮藏】 置通风干燥处，防虫蛀。

磁 石

Císhí

MAGNETITUM

【来源】 本品为具磁性的铁矿石。主产于河北、山东、辽宁、江苏等地。采挖后，除去

杂质即得。

【鉴别】 本品呈不规则块状，或略带方形，多具棱角，大小不一。外表面铁黑色或棕褐色，不透明，有金属光泽。体重，质坚实、致密，断面不整齐，颜色与外表面相同。有土腥气，无味。有吸铁能力，铁粉附着其上，则成毛状直立，习称“活磁石”，日久失去磁性者，习称“死磁石”。

以铁黑色、断面致密、有光泽、能吸铁者为佳。

【炮炙】 磁石 拣去杂质，砸碎，过筛即得。

煅磁石 取刷净的磁石，砸碎，置坩埚内，在无烟火中煅红透，取出，立即倒入醋盆内淬酥，捣碎，再煅淬一次，取出，晒干，碾成粗末即得。

每磁石 100 斤，用醋两次共 50—60 斤。

【性味】 辛、寒。

【功能】 潜阳，纳气。

【主治】 头目眩晕，耳鸣，耳聾，喘喘。

【用法与用量】 三钱至一两。

【贮藏】 置干燥处，应常撒铁屑，以保持磁性。

豨 薟 草

Xìxiàncǎo

HERBA SIEGESBECKIAE

【来源】 本品为菊科(Compositae)植物豨薟草(*Siegesbeckia pubescens* Makino)的干燥茎叶。均系野生，主产我国中部及北部。夏季开花前割取地上部分，除去杂质，晒至半干时，置干燥通风处晾干即得。

【鉴别】 本品茎直立，长约 2 尺，多对生的分枝，全体有毛茸。上干直径在 3 分以下，略呈方柱形，黄棕色，有纵沟及细顺纹，节明显，略膨大。上部嫩枝呈灰绿色或紫棕色。茎质脆，易折断，断面黄绿色，中空。叶对生于节上，叶腋间生有小嫩枝，其上密布白色毛茸。叶片皱缩卷曲，湿润展平后均呈卵圆形，长 3—5 寸，宽 1—3 寸，边缘有钝锯齿，两面皆有毛茸。叶质脆，易破碎。臭微，味微苦。

以叶多、枝嫩、青绿色、无根及杂质者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，除去残根与老梗，先抖下叶另放，将梗洗净，用水浸泡，捞出，润透后切段，晒干，再与叶和匀即得。

【性味】 苦,寒;有小毒。

【功能】 祛風濕。

【主治】 四肢麻痺,骨節疼痛,腰膝無力,風濕癰瘍。

【用法与用量】 三至四錢。

【貯藏】 置通風干燥处。

蟬 蛻

Chántuì

PERIOSTRACUM CICADAЕ

【来源】 本品为蟬科(Cicadidae)昆虫黑蟬(*Cryptotympana atrata* Fabr.)羽化时的蛻壳。均系野生,主产于山东、河南、河北、湖北、江苏、四川等地。夏秋采集后,去淨泥土及杂质,晒干即得。

【鉴别】 本品形似蟬,足爪多相抱而作俯首弯曲状,长1寸許,寬約6分。脊背呈十字形裂开,裂口向內卷曲。表面黃棕色,半透明,有光澤。头部有一对絲状触角,多已脫落。横生二目,略突出。額部先端突出,口吻发达,上唇寬短,下唇伸长成管状。胸部背面两旁具小翅两对。胸部腹面有足三对,前一对足粗壮帶齿,后两对足稍細长,均被黃棕色細毛。腹部圓而丰满有曲紋,尾部鈍尖,由腹部至尾端共九节。体輕,膜质,中空,易碎。无臭,味淡。

以体輕虛、色黃亮、完整无杂质者为佳。

【炮炙】 拣去杂质,搓碎过罗,洗淨,晒干即得。

【性味】 咸、甘,寒。

【功能】 散風热。

【主治】 失音,目翳,風疹皮肤发痒,麻疹未透,惊癇。

【用法与用量】 八分至一錢五分。

【注意】 孕妇忌用。

【貯藏】 置干燥处,防压。

罌 粟 壳 (米壳)

Yīngsùqiào

FRUCTUS PAPAVERIS

【来源】 本品为罌粟科(Papaveraceae)植物罌粟(*Papaver somniferum* L.)的干燥果

壳。4—6月当采完供药用的阿片后，摘下果实，破开，除去种子晒干即得。

【鉴别】本品呈椭圆形或卵圆形，长1—2寸，直径0.8—1寸许。表面黄白色或淡棕色，平滑略有光泽，有纵向或横向割取阿片的刀痕。顶端有一圆盘，盘内有8—12条突起的纹理，呈放射状排列，下端有短柄，形似花瓶颈。质轻脆，断面粗糙，内生十余条隔膜，上有许多突起的粒状小点，每一隔膜的间隙色黄，光滑。微有香气，味微苦。

以个大、色黄白、质坚、皮厚者为佳。

【炮炙】罌粟壳 拣去杂质，洗净，润透后去柄，切丝，干燥即得。

蜜罌粟壳 取罌粟壳丝，加炼熟的蜂蜜与开水少许，拌匀，稍闷，置锅内用文火炒至不粘手为度，取出，放凉即得。

每罌粟壳丝100斤，用炼熟蜂蜜25斤。

【性味】酸，微寒，滑。

【功能】敛肺，止咳，滑肠，止痛。

【主治】久咳，久泻，脱肛，心腹筋骨诸痛。

【用法与用量】八分至二钱。

【贮藏】置干燥处，防虫蛀。

熊 胆

Xióngdǎn

FEL URSI

【来源】本品为熊科(Ursidae)动物黑熊(*Selenarctos tibetanus* Cuvier)或棕熊(*Ursus arctos* L.)的干燥胆囊。产于云南、黑龙江、吉林等地。捕捉后立即割取胆囊，将胆囊口扎紧，以防胆汁流失，再剥去胆囊外附生的油脂，用木板将鲜胆夹扁，悬于通风处阴干或置石灰缸中干燥。不宜晒干或烘干，以防腐臭。

【鉴别】本品多呈扁卵圆形，上部狭细，下部膨大呈囊状，大小不一，一般长3—6寸，宽1.5—2.5寸。表面灰褐色或灰黑色，有皱折，常附有筋肉薄膜，对光视之，上半部呈半透明状。囊内含有干燥的胆汁，习称“胆仁”，呈块状、颗粒状或稠膏状，颜色深浅不一，有光泽。气清香，入口溶化，味极苦，清凉而不粘牙。其胆仁中呈金黄色、透明光亮如琥珀、质松脆、味苦回甜者习称“金胆”或“铜胆”；呈黑色、质坚而脆或呈稠膏状者习称“黑胆”或“铁胆”；呈黄绿色、光亮较差、质亦较脆者习称“菜花胆”。取胆仁碎末投入水中，可逐渐溶解而盘旋，有黄线下降，直至杯底而不扩散。又取胆仁碎末，以火烧之，起泡而无湿气。

以个大、胆仁金黄色、明亮、味苦回甜者为佳。胆仁黄绿色、味苦不回甜者质次。

【炮炙】 去净皮膜即得。

【性味】 苦，寒。

【功能】 清心，平肝，杀虫。

【主治】 热盛黄疸，暑月久痢，蛔虫作痛、惊癇痲瘖；外治目赤翳障，腸風痔瘡，風虫牙痛。

【用法与用量】 五厘至一分，多入丸散服；外用适量，研末塗敷患处。

【貯藏】 置干燥阴凉处，防潮。

鹤 虱

Hèshǐ

FRUCTUS CARPESII ABROTANOIDIS

【来源】 本品为菊科(Compositae)植物天名精(*Carpesium abrotanoides* L.)的干燥成熟果实。均系野生，主产于河南、贵州等地。秋季果实成熟时采摘，晒干，除去皮屑及杂质即得。

【鉴别】 本品呈扁圆柱形，细小，长约1分。表面黄褐色，有多数细纵棱及沟纹，一端钝尖，一端尖细呈短喙状，尖端有灰白色的块状物。横断面近圆形，种仁黄白色，有油性。臭微，味微苦，尝之有粘性。

以粒均匀、充实、尝之有粘性、无白皮及杂质者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，筛去泥屑即得。

【性味】 苦、辛，凉；有小毒。

【功能】 杀虫。

【主治】 虫积腹痛。

【用法与用量】 一至二钱，入丸散服。

【貯藏】 置阴凉干燥处。

赭 石

Zhěshí

HAEMATITUM

【来源】 本品为一种赤铁矿的矿石。主产于山西、河北、广东等地。开采后，选取表

面有乳头状突起(习称“钉头”)的部分,除去杂石即得。

【鉴别】 本品呈不规则的扁平块状,大小不一。全体棕红色或铁青色,用手抚摸,则有红棕色粉末粘手,表面有圆形乳头状的“钉头”,另一面与突起相对应处有同样大小的凹窝。质坚硬,不易砸碎,断面显层叠状,且每层均依钉头而呈波状弯曲。无臭,无味。在砖地上擦磨显红色。

以色棕红、断面显层叠状、每层均有钉头者为佳。

【炮炙】 赭石 拣去杂质,砸碎,过筛即得。

煅赭石 取刷净的赭石,砸碎,置坩埚内,在无烟火中煅红透,取出,立即倒入醋盆内淬酥,捣碎,再煅淬一次,取出,晒干,碾成粗末即得。

每赭石 100 斤,用醋两次共 50—60 斤。

【性味】 苦,寒。

【功能】 镇逆,凉血。

【主治】 呕吐,反胃,噎气,哮喘,吐血,鼻衄,肠风,痔瘡,妇女崩漏带下。

【用法与用量】 三钱至一两。

【注意】 孕妇慎用。

【贮藏】 置干燥处。

蕤 仁

Ruí rén

NUX PRINSEPIAE

【来源】 本品为蔷薇科(Rosaceae)植物蕤核(*Prinsepia uniflora* Batal.)的干燥成熟果核。均系野生,产于甘肃、陕西、山西等地。夏秋间果实成熟时采摘,除去果肉,洗净,晒干即得。

【鉴别】 本品呈稍扁的卵圆形,两侧略不对称,长 2—3 分,宽 2—2.5 分,厚 1—1.5 分。表面浅棕色,有网状沟纹,沟纹色较深。质坚硬,砸开硬壳,内有扁平卵圆形或心脏形的种子,外包棕色薄膜,种仁两瓣,白色,富油性。无臭,味微苦。

以颗粒饱满、浅棕色、无杂质者为佳。

【炮炙】 簸去杂质,洗净晒干,用时捣碎即得。

【性味】 甘,微寒。

【功能】 养肝，明目。

【主治】 目赤肿痛，昏暗羞明，眵烂流泪。

【用法与用量】 一錢五分至三錢；并可外用，适量，去油研膏或煎湯点洗患处。

【貯藏】 置干燥处，防虫蛀。

櫻 桃 核

Yīngtáohé

NUX PSEUDOCERASI

【来源】 本品为蔷薇科(Rosaceae)植物櫻桃(*Prunus pseudocerasus* Lindl.)的干燥成熟果核。均系栽培，主产于江苏、浙江、福建、湖北等地。夏季果实成熟时采摘，除去果肉取核，洗净，晒干即得。

【鉴别】 本品呈卵圆形，长2—3分，直径约2分。表面灰白色或灰黄色，有网状纹理，核的两侧各有一条棱线，尖端微歪，底部钝圆，有一小坑。质坚硬，难破碎，砸开后内有棕黄色种子一枚，表面皱缩，干而无油。无臭，种子味微苦。

以色灰白、无杂质者为佳。

【炮炙】 簸去杂质，用水洗净，晒干，用时捣碎即得。

【性味】 辛，热。

【功能】 发表，透疹。

【主治】 麻疹不透。

【用法与用量】 一至三錢；并可外用，适量，煎湯熏洗。

【貯藏】 置通风干燥处。

薄 荷

Bòhé

HERBA MENTHAE

【来源】 本品为唇形科(Labiatae)植物薄荷(*Mentha arvensis* L.)的干燥茎叶，均

系栽培，主产于江苏、浙江、江西等地。夏季割取地上部分，俟其再抽茎叶，至秋季拔取全株，除去根及杂质。前后二次均及时晒至半干。再晾干或阴干即得。

【鉴别】 本品茎呈方柱形，长约尺许，直径0.5—1.5分。表面紫褐色或绿色，有节，节间长1—2寸，上部有对生的分枝，棱角处密生白色柔毛。质轻脆，易折断，断面白色，常中空。叶对生，有短柄，叶片多皱缩或破碎，湿润后展平，呈长圆形或卵圆形，长1—2寸，宽5—8分。顶端尖形，边缘有锯齿，正面暗绿色，背面色略浅，有稀毛。质脆易碎。有强烈的特殊香气，味辛凉。

以无根、叶多、色绿、气味浓者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，除去残根，先抖下叶另放，将茎喷淋少许清水，润透后切段，晒干，再与叶和匀即得。

【性味】 辛，凉。

【功能】 消风，散热。

【主治】 外感风热，头痛，目赤，咽喉肿痛，痰嗽口气，口疮，牙痛，皮肤瘾疹，瘰疬，疥疥。

【用法与用量】 一至二钱。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

薏 苡 仁 (苡米)

Yiyiren

SEMEN COICIS

【来源】 本品为禾本科(Cramineae)植物薏苡(*Coix lacryma-jobi* L.)的干燥成熟种仁。均系栽培，主产于福建、河北、辽宁等地。8—10月当果实成熟时割取全株，晒干，打落果实，除去外壳及黄褐色的外皮，去净杂质，收集种仁即得。

【鉴别】 本品呈椭圆球形或圆球形，基部较宽而略平，顶端钝圆，长1.5—2分，宽约1—1.5分。表面白色或黄白色，有时残留未除尽的黄褐色外皮；侧面有一条深且宽的纵沟，沟底粗糙，褐色，基部凹入，其中有一棕色小点。质坚硬，破开后白色，有粉性。无臭，味甘。

以粒大、饱满、色白者为佳。

【炮炙】 苡米 洗净糠土，及时晒干即得。

炒苡米 取净苡米，置锅内用文火炒至微黄色或用麸炒，取出，放凉即得。

每苡米 100 斤，用麸皮 10 斤。

【性味】 甘，微寒。

【功能】 健脾，补肺，清热，利水。

【主治】 水肿，脚气，泄泻，湿痹，拘挛，肠痛，肺痛，肺痿，淋浊，白带。

【用法与用量】 三至六钱。

【贮藏】 置通风干燥处，防虫蛀。

薤 白

Xiébái

BULBUS ALLII

【来源】 本品为百合科(Liliaceae)植物野薤(*Allium bakeri* Regel)或小根蒜(*Allium macrostemon* Bge.)的干燥鳞茎。多系野生，全国大部分地区均有生产。春、夏二季采挖，洗净泥土，除去苗茎及须根，蒸透，取出，晒干即得。

【鉴别】 本品呈不规则卵形，大小不一，长 3—5 分，直径 2—4 分。黄白色或淡黄棕色，半透明，底部钝圆，顶尖而细，表面有纵沟与皱纹或有白色薄膜包被。质坚硬，角质状，不易破碎，断面黄白色。有蒜臭，味辣。

以个大、质坚、饱满、黄白色，半透明者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，簸筛去须毛即得。

【性味】 辛、苦，温。

【功能】 理气，宽胸，通阳，散结。

【主治】 胸痹刺痛，泻痢后重。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【贮藏】 置干燥处，防潮防虫蛀。

橘 红

Júhóng

EXOCARPIMUM CITRI RUBRUM

【来源】 本品为芸香科(Rutaceae)植物柑橘(*Citrus reticulata* Blanco)、化州柚(*Citrus*

grandis var. *tomentosa* Hort.)或柚(*Citrus grandis*(L.)Osbeck.)的干燥外层果皮 均系栽培,主产于浙江、四川、福建、广东、广西等地。橘类橘红系将10月以后采摘的成熟鲜橘取外层果皮,晒干或阴干即得。柚类橘红系将未成熟的果实,先投入沸水中,即捞出,将果皮割成5—7瓣,除去果瓢及内面部分白色的中果皮后晒干或焙干,再以水润透,对折以木板压平,再焙干即得。

【鉴别】橘类橘红 呈长条形或不整齐的薄片状,边缘皱缩向内卷曲。外表面黄棕色或橙红色,有许多小点凹下或突起。内表面黄白色有许多透光小凹点。质脆易碎。气芳香,味微苦后觉麻舌。

以皮薄、片大,色红、油润、香气浓厚者为佳。

柚类橘红 为对折的七角、六角或五角星形,展开后直径4—6寸,厚0.5—1分。单片的呈柳叶形。有的外皮黄色或黄绿色,密布毛茸,有皱纹及小凹点,多做成七角,习称“黄七爪”、“绿七爪”。有的外皮黄棕色,光而无毛茸,亦有皱纹及小凹点,多做成五角,习称“大五爪”。内表面多为黄白色,有脉络纹。质脆,易折断,折断时清脆有声,断面不齐,外侧有一列不整齐的油点,内侧为黄白色。气微香,味苦。

以皮厚、毛多、气味浓厚者为佳。

【炮炙】橘类橘红拣去杂质,掰碎;柚类橘红洗净,闷润去白,切厚片,晒干即得。

【性味】苦、辛,温。

【功能】下气,消痰。

【主治】风寒咳嗽,胸膈胀闷,呕吐噎气。

【用法与用量】一至二钱。

【贮藏】置阴凉干燥处,防潮及虫蛀。

橘 络

Júluò

RETINERVUS CITRI FRUCTUS

【来源】本品为芸香科(Rutaceae)植物柑橘(*Citrus reticulata* Blanco)的果皮内层的干燥筋络。均系栽培,产于四川、福建、浙江等地。冬季至翌年春季采制,将橘皮剥下,撕取皮内面的白色分枝状筋络,晒干或烘干即为金橘络;如晒至九成干后,将筋络理顺,置小匣内压紧,用纸包好,再用微火烘干,则为凤尾橘络。

【鉴别】 凤尾橘絡 呈长形松散的网絡状，上端与蒂相連，下則筋絡交叉而順直，每枝长2—3寸，宽2—3分。蒂呈圓形帽状，筋絡稍弯曲，多为淡黄白色。质輕虛而軟，压紧为长方形块状，干后质脆，易折断。香气淡，味微苦。

金絲橘絡 呈不整齐的松散的乱絲团状，长短不一，与蒂相混合，其余与凤尾橘絡同。均以筋絡多、蒂小橘白少、无杂质者为佳。

【炮炙】 拣去杂质，摘去蒂，用水噴潤后撕开，晒干即得。

【性味】 甘、苦、寒。

【功能】 通經絡，宣滯气。

【主治】 經絡气滯，痰积血郁，伤酒口渴。

【用法与用量】 一錢至一錢五分。

【貯藏】 置阴涼干燥处，防潮及虫蛀。

橘 核

Júhé

SEMEN CITRI RETICULATAE

【来源】 本品为芸香科(Rutaceae)植物柑橘(*Citrus reticulata* Blanco)的干燥成熟种子。均系栽培。主产于福建、浙江、江西、四川等地。加工或食用橘子时，收集种子，洗净，晒干即得。

【鉴别】 本品略呈卵形，长2—3分，直径1.5—2分。外皮淡黄白色或淡灰白色，光滑，一侧有一条棱綫，一端鈍圓，一端长尖成小柄状。外皮质薄而韌，剥去后可見淡棕色薄膜紧贴外皮內。种仁两瓣，黄綠色，有油性。臭弱，味苦。

以粒均匀、饱满、色白、洁淨者为佳。

【炮炙】 盐橘核 取拣淨的橘核，与盐水拌勻，稍悶，置鍋內用文火炒至微黄色，并有香气为度，取出，晒干，用时捣碎即得。

每橘核100斤，用盐2—2.5斤加适量开水化开澄清。

【性味】 苦，平。

【功能】 理气，止痛。

【主治】 小腸疝气，阴核肿痛，腎冷腰痛。

【用法与用量】 一至三錢，煎服或入丸散服。

【貯藏】 置阴涼干燥处，防虫蛀。

藁 本

Gǎoběn

RHIZOMA ET RADIX LIGUSTICI

【来源】本品为繖形科(Umbelliferae)植物藁本(*Ligusticum sinense* Oliv.)或北藁本(*Ligusticum jeholense* Nak. et Kitag.)的干燥地下根状茎及根。均系野生,主产于湖南、湖北、四川、河北、辽宁等地。春、秋二季采挖,除去茎苗及泥土,晒干或烘干即得。

【鉴别】藁本 根状茎呈不规则的结节状圆柱形,有分枝,稍弯曲,多横向生长,长1—2.5寸,直径0.2—1寸。外皮棕褐色或棕黑色,皱缩有沟纹,上侧具有数个较长的茎基残留,茎基中空有洞,表面具纵直沟纹,下侧着生多数支根和须根,多已除去。支根直径约达1.5分,上有纵沟纹及呈点状突起的须根残痕,外皮易剥落。质硬,易折断,断面淡黄色或黄白色。气芳香,味苦而辛。

北藁本 根状茎呈不规则的柱状或团块状,常分枝,纵向及横向生长均有之,长0.5—2寸,直径2—5分。顶端残留有茎基,有时下陷呈空洞状,表面灰棕色至暗棕色,粗糙,密生细长而弯曲的根,有突起的节及根痕。质轻,较易折断,断面略呈纤维性,黄白色至浅棕色。根长可达1寸,直径1—2分,有纵皱及横纹,并有略突起的细根痕,外皮易剥离。气芳香,味苦辛。

以香气浓、整齐者为佳。

【炮炙】拣去杂质,除去残茎,洗净,润透后及时切片,晒干即得。

【性味】辛,温。

【功能】散风寒湿邪。

【主治】风寒头痛,寒湿痼疾,腹痛泄泻;外治疥癣。

【用法与用量】八分至二钱;外用适量,煎汤洗患处。

【贮藏】置阴凉干燥处,防潮及虫蛀。

檀 香

Tánxiāng

LIGNUM SANTALI

【来源】本品为檀香科(Santalaceae)植物檀香(*Santalum album* L.)的干燥心材。栽

培或野生，主产于印度、印度尼西亚及马来亚等地。全年均可采收，除去外皮及边材，锯成小段，阴干即得。

【鉴别】 本品呈圆柱形，长2—3尺，直径2—6寸。粗大者挺直，细小者弯曲。表面灰黄色，光滑圆润，或有枝杈痕迹与疤痕，部分有纵裂纹。两端皆锯齐，显棕色的环纹，颜色深浅不一。质坚实而致密，纵向破开为直丝纹。气芳香，味微苦辛，嚼之味厚似含油。燃烧时香气浓烈。

以色黄、质坚、显油纹、香气浓厚者为佳。

【炮炙】 锯成长段，用水浸泡，镑片或碾碎，晾干即得。

【性味】 辛、温。

【功能】 理气、和胃。

【主治】 心腹疼痛，嗜睡呕吐。

【用法与用量】 五分至一钱，多入丸散服。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

僵 蚕

Jiāngcán

BOMBYX BATRYTICATUS

【来源】 本品为蚕蛾科(Bombycidae)昆虫家蚕(*Bombyx mori* L.)的幼虫因感染白僵菌(*Beauveria bassiana* Bals.)而致死的干燥全体。多于夏季生产，将因感染白僵菌而死的蚕，倒入石灰中拌匀，吸去水分，晒干或烘干即得。

【鉴别】 本品略呈圆柱状，多弯曲不直而皱缩，长0.7—1.6寸，粗1.5—2.1分。表面多呈灰白色，被有白色粉霜。全体具节，头、体节均清晰可辨。头部较圆，目生两旁，腹两侧共有短足八对，尾部略呈二分枝状。质硬而脆，易折断，断面平坦，外层为白色，显粉性，中间棕、黑色不一，多光亮，内有四个褐色的亮圈，为本品鉴别的特征。微有腐臭气，味微咸。

以身直、肥壮、质坚、色白、断面光亮者为佳。

【炮炙】 僵蚕 拣净丝毛，洗去灰土，晒干即得。

炒僵蚕 将麸皮撒于加热的锅内，俟烟冒出时，加入净僵蚕，炒至黄色，取出，筛去麸皮，放凉即得。

每僵蚕100斤，用麸皮10斤。

【性味】 辛、咸，平。

【功能】 祛風，化痰，散結，行經。

【主治】 中風失音，惊癇，痰癰，头風，齿痛，喉痹，風痞，丹毒，風痰結核，癰癤。

【用法与用量】 一錢五分至三錢，煎服或入散服；并可外用，适量，研末塗敷患处。

【貯藏】 置通風干燥处，防虫蛀。

藕 节

Ōujié

NODUS NELUMBINIS RHIZOMATIS

【来源】 本品为睡蓮科(Nymphaeaceae)植物蓮(*Nelumbo nucifera* Gaertn.)的干燥根状莖节部。均系栽培，我国南方各地多有生产。秋、冬二季均可采挖，挖出藕，洗净，切取节部，晒干即得。

【鉴别】 本品呈短圆柱形，长0.5—1.5寸，直径0.4—1寸。表面灰黄色至灰棕色，节部膨大有须根或须根脱落后圆形疤痕，节部两端残留部分表面皱缩有横纹。体轻，节部质坚硬，断面有多数圆孔。无臭，味甘、涩。

以灰棕色、两头白色、无须根及泥土者为佳。

【炮炙】 藕节 剪去藕头和毛须，洗净，晒干即得。

藕节炭 取净藕节，置锅内用武火炒至外黑内呈黄色为度，喷淋清水，取出，干燥即得。

【性味】 甘，平，滑。

【功能】 消瘀，止血。

【主治】 吐血，衄血，咳血，血淋，尿血，便血，血痢，血崩。

【用法与用量】 一錢五分至三錢。

【貯藏】 置干燥处，防潮及虫蛀。

瞿 麦

Qūmài

HERBA DIANTHI

【来源】 本品为石竹科(Caryophyllaceae)植物瞿麦(*Dianthus superbus* L.)或石竹

(*Dianthus chinensis* L.)的干燥带花地上部分。栽培或野生，产于河北、辽宁、河南、江苏、湖北等地。夏、秋二季开花时割取地上部分，除去杂质，晒干即得。

【鉴别】本品茎直，长1—2尺，有分枝，表面浅绿色或黄绿色，节膨大，质较硬，断面中空。叶对生，抱茎，形似竹叶狭而长。茎顶可见筒状花萼2—3个，长6—7分，直径1—2分，黄绿色，上有细顺纹，顶端有裂口，分五瓣，上面偶见数片浅紫黄色花瓣，下端包有苞片数枚，呈复瓦状排列。无臭，味甘。

以茎短、色黄绿、穗多、叶密者为佳。

【炮炙】拣去杂质，除去残根，洗净，捞出，润透后及时切段，干燥即得。

【性味】苦，寒。

【功能】清热，利水，破血，通经。

【主治】五淋，小便不通，痈肿，妇女经闭；外治浸淫疮毒。

【用法与用量】一钱五分至三钱；外用适量，研末涂敷患处。

【注意】孕妇忌内服。

【贮藏】置通风干燥处。

翻 白 草

Fānbáicǎo

HERBA POTENTILLAE CUM RADICE

【来源】本品为蔷薇科(Rosaceae)植物翻白草(*Potentilla discolor* Bge.)的干燥带根全草。均系野生，全国大部分地区多有生产。夏、秋二季开花前连根挖取，除净泥土，晒干即得。

【鉴别】本品全长3—5寸。根呈纺锤形，表面灰褐色，扭曲而皱缩，质脆，易折断，断面灰白色。茎短不明显。奇数羽状复叶丛生于根端，小叶片两两对生，具短柄。顶端1枚较大，叶片长椭圆形，皱缩，正面暗绿色，背面灰白色，密被白色细毛，边缘具粗锯齿。根头部及叶柄均生有白色毛茸。臭微，味甘，嚼之有香气。

以无花茎、叶色灰白、无杂质者为佳。

【炮炙】拣去杂质，用水喷润，切段，干燥即得。

【性味】甘、微苦，平。

【功能】止血，解毒。

【主治】吐血，下血，崩漏，瘰疬，痈疮。

【用法与用量】 三至五錢。

【貯藏】 置干燥处。

藿 香

Huòxiāng

HERBA POGOSTEMI

【来源】 本品为唇形科(Labiatae)植物广藿香(*Pogostemon cablin* (Blanco) Benth.)的干燥茎叶。均系栽培。主产于广东等地。夏、秋二季在枝叶茂盛时割下地上部分,曝晒后堆放,反复至干即得。

【鉴别】 本品茎长1—2尺,多有对生的分枝。老茎呈方圆形,直径2—3分,表面灰棕色或灰绿色,毛茸较少,质坚硬,不易折断,断面粗糙,黄绿色,中心有白瓤。嫩茎略呈方形,密被毛茸,质脆,易折断,断面灰绿色。叶有柄,对生,叶片呈灰绿或黄绿色,多破碎皱缩;完整者呈卵圆形,长2—3寸,边缘有锯齿,两面均密生毛茸,质柔软而厚。香气浓郁,味微苦而辛。

以茎齐、茎粗壮、断面发绿色、叶肥厚柔软、香气浓郁者为佳。

【炮炙】 藿香 拣去杂质,除去残根及老梗,先抖下叶另放,茎用水洗泡,润透,切段,及时晒干,再与叶和匀即得。

藿香梗 取拣出的老梗,用水浸泡,润透后切片,晒干即得。

【性味】 辛,微温。

【功能】 快气,和中。

【主治】 呕吐泄泻,心腹绞痛。

【用法与用量】 一钱五分至三钱。

【貯藏】 置阴凉干燥处,防潮及防压。

蟾 酥

Chánsū

SECRETIO BUFONIS

【来源】 本品为蟾蜍科(Bufo)动物中华大蟾蜍(*Bufo bufo gargarizans* Cantor)

或黑眶蟾蜍 (*Bufo melanostictus* Schneid.) 的耳后腺及皮肤腺所分泌的白色浆液, 經收集加工而成。蟾蜍均为野生, 主产于河北、山东、江苏、浙江等地。多在夏季捕捉, 将其身体表面洗净, 采取其腺体中分泌的白色浆液, 滤去泥土及杂质后, 置模中或塗玻璃板上, 晒干即得。

【鉴别】 本品因加工不同, 而呈扁圓形团块状、餅状、片状或棋子状。表面光亮, 有的不平而具皺紋, 淡黄色、紫紅色或棕黑色。团块状或餅状者质坚硬, 不易折断, 断面茶褐色如胶质状, 有光泽。片状者质脆易折断, 紅棕色, 半透明。微有腥气, 嗅之作嚏, 味麻辣。遇水即起泡沫, 并泛出白色乳状液。

以质明亮、紫紅色、断面色均一、沾水即泛白色者为佳。

【炮炙】 酒蟾酥 取蟾酥块, 捣碎, 置磁盆中加入白酒浸漬, 时常搅动使酒浸入, 至全部溶化成稠膏状, 取出, 置盘中在通风洁淨处風干或晒干, 碾粉即得。

每蟾酥 10 斤, 用白酒 20 斤。

乳蟾酥 取蟾酥块, 捣碎, 置磁盆中加入鮮牛奶浸漬, 时常搅动使牛奶浸入, 至全部溶化成稠膏状, 取出, 置盘中在通风洁淨处風干或晒干, 碾粉即得(本法因易酸败, 在夏季炎热时不宜采用)。

每蟾酥 10 斤, 用鮮牛奶 20 斤。

【性味】 甘、辛, 温; 有毒。

【功能】 拔毒, 止痛。

【主治】 发背, 疔疮, 痈毒, 小儿疳积; 外治風虫牙痛。

【用法与用量】 半厘至一厘, 多入丸散服; 外用适量, 研末塗敷患处。

【注意】 孕妇忌內服。

【貯藏】 置通风干燥处, 防潮。

鳖 甲

Biējia

CARAPAX AMYDAE

【来源】 本品为鳖科 (*Trionychidae*) 动物鳖 (*Amyda sinensis* Weigmann) 的干燥背甲。均系野生, 主产于湖北、湖南、安徽、浙江等地, 全年均可捕捉, 砍去鳖头, 将鳖身置沸水內煮 1—2 小时, 至背甲上的硬皮能脫落时, 取出, 刮淨殘肉, 晒干即得。

【鉴别】本品呈椭圆形或卵圆形，长3—6寸，宽2.5—5寸，背面微隆起。黑褐色或黑绿色，略显光泽，满布皱纹，并有灰黄色或灰白色斑点。背甲中央有一条纵直棱，上有节状缝线，左右各有八条明显横向的锯齿状衔接缝。左右边缘可见由八对白色齿牙状突起、里面白色，中央有突起的一条脊椎骨，两侧各有八条肋骨。头骨向内卷曲。质坚硬，易自衔接缝断裂。臭微腥，味咸。

以个大、甲厚、无残肉、无腥臭味者为佳。

【炮炙】鳖甲 用水浸泡，去净皮肉，洗净，晒干即得。

制鳖甲 取沙子，置锅内加热炒至轻松，加入净鳖甲，炒至表面微黄色，及时取出，筛去沙子，置醋盆内略浸，取出，用水漂洗，晒干即得。

每鳖甲100斤，用醋30斤。

【性味】咸，平。

【功能】养阴清热，平肝潜阳，软坚散结。

【主治】骨蒸劳热，阴虚风动，久瘰，瘰母，胁下坚硬，癥瘕，妇女经闭，小儿惊痫。

【用法与用量】三至五钱。

【注意】孕妇忌用。

【贮藏】置干燥处。

麝 香

Shèxiāng

MOSCHUS

【来源】本品为鹿科(Cervidae)动物麝(*Moschus moschiferus* L.)的雄体香囊中的分泌物干燥而成。野生或饲养，主产于四川、西藏、云南、陕西、甘肃、内蒙古等地。多在冬、春二季猎取，猎获后，立即割取香囊，去掉多余的皮肉，阴干。或由囊孔放入纸捻吸去水分，悬置阴凉通风处晾干，再修边剪毛即成。

【鉴别】药材上通常分为整麝香及麝香仁两类。

整麝香 呈球形、椭圆形或扁圆形，直径1—2寸。开口面略平，密生白色或灰棕色的细短毛，呈旋涡状排列，中央有一小孔，去毛后显棕色的革质皮。另一面为黑棕色的皮膜，无毛，手捏略有弹性。用剪刀剪开，可见中层皮膜，呈银灰色且透明，习称“银皮”，内层皮膜呈棕红色，习称“里衣子”，再内包含有颗粒状及粉末状的麝香仁。质较柔软，有特异的

香气。

麝香仁 其中呈颗粒状者习称“当门子”，为不规则圆形或扁平状，多呈紫黑色，微有麻纹，油润光亮。粉末状者多呈棕黄色或紫红色，并偶尔夹有细毛。质柔有油性，手捻成团而不粘手、不结块，手放开立即松散弹起。有强烈而特异的香气，并经久不散，味微苦而略辣。取麝香少许，放入盛有热开水的碗中，立即溶化，无残渣，水溶液呈微黄色并有浓郁的香气。又取麝香少许，用火烧之，迸裂，香气浓烈四溢，燃烧后油点似珠，灰呈灰白色。

均以质柔软、有油性、当门子多、香气浓烈者为佳。

【炮炙】 用温水湿润，割开香囊，除去皮毛及内膜杂质，用时研细即得。

【性味】 辛，温。

【功能】 辟秽，开窍，通络。

【主治】 中风，痰厥，惊风，跌打损伤，瘰疬，心腹疼痛；外治疔疮，疮肿。

【用法与用量】 三至五厘，多入丸散服；外用适量，研末点敷患处。

【注意】 孕妇忌内服。

【贮藏】 置阴凉干燥处，密闭保存，避光，防虫，防潮。

中药成方制剂

二 龙 膏

Èrlóng Gāo

【处方】 活甲鱼十六两 鲜苋菜十六两 莪朮一两 三棱一两 乳香三两一钱
肉桂五钱五分 没药三两一钱 沉香五钱五分 麝香二钱五分

【制法】 以上九味，将乳香、肉桂、没药、沉香四味研细粉，过筛。与麝香配研，研细过筛。混合均匀。莪朮、三棱二味捣碎，取麻油二百四十两，同置锅中（或浸泡三至十日），与活甲鱼、鲜苋菜，用文武火炸枯，去滓。滤净后炼至滴水成珠。另取黄丹（七十五两至一百零五两），加入搅匀，收膏。将膏浸泡于水中。

取膏用文火熔化待温，加入上列乳香等细粉，搅匀。分摊于布上，即得。每张重五钱或一两。

【功能】 化痞消积。

【主治】 积聚痞块，面色萎黄。

【用法与用量】 每用一张，温热化开，贴于脐上。

【注意】 孕妇慎用。

【贮藏】 贮于阴凉干燥处。

二 冬 膏

Èrdōng Gāo

【处方】 天门冬二十二两 麦门冬三十二两

【制法】 以上二味，分次水煎取煎出液，至味尽，去滓。将煎出液过滤合并，用文火浓缩成清膏，另加蜂蜜十六两，收膏，即得。

【功能】 清肺益肾，生津止渴。

【主治】 咳逆上气，咽喉疼痛。

【用法与用量】 每服三至五錢，溫開水沖服。

【注意】 外感咳嗽不宜服用。

【貯藏】 密閉，貯于陰涼乾燥處。

二 陳 丸

Èrchén Wán

【處方】 姜半夏五兩 陳皮五兩 茯苓三兩 甘草一兩五錢

【制法】 以上四味，共研細粉，過篩，混合均勻。另取鮮生薑一兩切碎，酌加冷開水壓榨取汁泛為小丸。曬干或低溫干燥，即得。

【功能】 除濕化痰，調氣和胃。

【主治】 痰飲咳嗽，脘滿嘔惡，頭眩心悸。

【用法与用量】 每服二至三錢，每日一至二次，溫開水送下。

【注意】 孕婦慎用。

【貯藏】 密閉，防潮。

二 妙 丸

Èrmào Wán

【處方】 蒼朮一兩 黃柏一兩

【制法】 以上二味，共研細粉，過篩，混合均勻。用冷開水泛為小丸。曬干或低溫干燥，即得。

【功能】 清熱，燥濕。

【主治】 濕熱下注，腰膝疼痛。

【用法与用量】 每服二錢，每日二次，溫開水送下，姜湯或黃酒送下亦可。

【貯藏】 密閉，防潮。

十全大補丸

Shíquán Dàbǔ Wán

【處方】 黨參一兩 熟地黃一兩 黃耆一兩 白朮一兩 當歸一兩

白芍一两 肉桂一两 川芎一两 茯苓一两 甘草一两

【制法】 以上十味，共研细粉，过筛；或将熟地黄与处方内部分药物串研，晒干或低温干燥，再共研细粉，过筛。混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重三钱。

【功能】 培补气血。

【主治】 男妇体弱，气血两虚，面色萎黄，足膝无力。

【用法与用量】 每服一丸，每日二次，温开水送下。

【贮藏】 密闭，貯于阴凉干燥处。

十 灰 散

Shíhuī Sǎn

【处方】 大蓟一两 小蓟一两 侧柏叶一两 荷叶一两 茜草一两
白茅根一两 槐子一两 大黄一两 牡丹皮一两 棕榈一两

【制法】 以上十味，将棕榈煅炭，大蓟等九味分别炒炭，共研细粉，过筛，混合均匀，即得。

【功能】 凉血止血。

【主治】 男妇吐血、衄血、血崩及一切血出不止诸症。

【用法与用量】 每服一至三钱，每日一至二次，温开水冲服。

【贮藏】 密闭，防潮。

十 香 丸

Shíxiāng Wán

【处方】 沉香一两 木香一两 丁香一两 茴香一两 香附一两
陈皮一两 乌药一两 泽泻一两 荔枝核一两 猪牙皂一两

【制法】 以上十味，共研细粉，过筛。混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重三钱。

【功能】 理气散结。

【主治】 气滞腹痛，诸痛胀满。

【用法与用量】 每服一丸，每日一至二次，温开水送下。

【注意】 孕妇慎用。

【贮藏】 密闭，貯于阴凉干燥处。

七 宝 丹

Qībǎo Dān

【处方】 常山一两 厚朴一两 陈皮一两 青皮一两
槟榔一两 草果仁一两 甘草一两

【制法】 以上七味，共研细粉，过筛。混合均匀。用冷开水泛为小丸，晒干或低温干燥，即得。

【功能】 消痰行滞，截疟。

【主治】 疟疾，每日、间日或三日一发。

【用法与用量】 每服一至三钱，每日一至二次，温开水送下。

【注意】 孕妇慎用。

【贮藏】 密闭，防潮。

七 珍 丹

Qīzhēn Dān

【处方】 胆南星五钱 竹黄五钱 全蝎一两 明雄黄五钱 巴豆霜二钱
僵蚕一两 寒食麸一两 朱砂一两 麝香一钱

【制法】 以上九味，除麝香、巴豆霜外，朱砂研细水飞或研至极细粉，明雄黄研细水飞或研细粉，过筛。其余胆南星等五味共研细粉，过筛。将麝香与上列各细粉（取出适量朱砂细粉留作上衣用）及巴豆霜配研，研细过筛。混合均匀。用冷开水泛为细小丸。阴干，用遗留的朱砂细粉为衣，即得。

【功能】 祛风化痰，定惊导滞。

【主治】 小儿惊风抽搐，痰涎壅盛，乳食停滞。

【用法与用量】 每服三厘，每日一至二次，温开水冲服或化服。

【贮藏】 密闭，防潮。

七 厘 散

Qīlí Sǎn

【处方】 血竭一两 红花一钱 乳香一钱 儿茶二钱

沒药一錢 麝香一分二厘 冰片一分二厘 朱砂一錢二分

【制法】 以上八味，除麝香、冰片外，朱砂研細水飞或研至極細粉 其余血竭等五味，研細粉，过篩。将麝香、冰片与上列各細粉配研，研細过篩。混合均匀，即得。

【功能】 活血祛瘀，止痛收口。

【主治】 跌扑损伤，血瘀疼痛。

【用法与用量】 每服七厘至三分，每日一至三次，温黄酒或温开水冲服。外用白酒調敷患处。

【注意】 孕妇只可外敷，不可內服。

【貯藏】 密閉，防潮。

七 液 丹

Qīyè Dān

【处方】 大黃二兩 滑石十九兩二錢 甘草三兩 鮮佩兰三兩 鮮蘿卜二兩
鮮藿香三兩 鮮紫苏叶三兩 鮮荷叶三兩 鮮側柏叶三兩 鮮藕三兩

【制法】 以上十味，大黃研細粉，过篩，与黃酒三兩二錢拌勻，晒干 滑石研細水飞：甘草分次水煎取煎出液，至味尽，去滓，将煎出液過濾合併，适当濃縮，傾入滑石細粉內拌勻，晒干。与上列酒拌大黃細粉配研，混合均匀。再将鮮佩兰等七味搗碎，酌加冷开水压榨取汁，過濾，与上列細粉，搅拌均匀，分制为小块，晒干或低温干燥，即得。每块重四錢。

【功能】 清暑解热。

【主治】 外伤暑湿，身热不退，大便不暢，小便短赤，煩渴头疼。

【用法与用量】 每服一块，每日一至二次，开水泡服，或布包煎服。

【注意】 孕妇慎用。

【貯藏】 密閉，防潮。

人 参 养 荣 丸

Rénshēn Yǎngróng Wán

【处方】 人參一錢 白朮一兩 茯苓七錢五分 甘草一兩 当归一兩 熟地黄七錢五分

白芍一两 黄耆一两 肉桂一两 陈皮一两 远志五钱 五味子七钱五分

【制法】 以上十二味，将熟地黄与处方内部分药物出研，另取鲜姜五钱切碎与人参一两分次水煎取煎出液，至味尽，去滓。将煎出液适当浓缩，浸拌上列熟地黄等药物，晒干或低温干燥，再共研细粉，过筛。混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重三钱。

【功能】 温补气血。

【主治】 心脾不足，气血两亏，形瘦神疲，食少便溏，病后虚弱。

【用法与用量】 每服一丸，每日一至二次，温开水送下。

【贮藏】 密闭，貯于阴凉干燥处。

八宝红灵丹

Bābǎo Hónglíng Dān

【处方】 朱砂一两 硼砂二钱 麝香二钱 硝石一两
煅金礞石四钱 金箔五十张 明雄黄六钱 冰片二钱

【制法】 以上八味，明雄黄研细水飞或研细粉，过筛。朱砂研细水飞或研至极细粉，硼砂、煅金礞石二味共研细粉，过筛。将麝香、冰片与上列各细粉配研，研细过筛。再将硝石研细粉，过筛，同金箔共加入，混合均匀，即得。

【功能】 开窍解毒，辟秽祛邪。

【主治】 瘴气暑毒，头晕胸闷，腹痛吐泻。

【用法与用量】 每服一分，每日一至二次，小儿酌减。

【注意】 孕妇忌用。

【贮藏】 密闭，防潮。

八宝坤顺丹

Bābào Kūnshùn Dān

【处方】 益母草十五两 当归二两五钱 生地黄二两五钱 香附二两五钱 紫苏叶一两二钱五分
橘红二两五钱 沉香二两五钱 熟地黄二两五钱 川芎二两五钱 白朮一两二钱五分
乌药二两五钱 黄芩二两五钱 木香一两二钱五分 牛膝二两五钱 甘草一两二钱五分
白芍二两五钱 茯苓二两五钱 阿胶一两二钱五分 人参一两 琥珀一两二钱五分

砂仁一兩 一錢五分

【制法】 以上二十一味，共研細粉，過篩；或將熟地黃與處方內部分藥物串研，曬干或低溫干燥，再共研細粉，過篩。混合均勻。煉蜜為丸，即得。每丸重三錢。

【功能】 補氣養血，解郁調經。

【主治】 經血不調，腹痛帶下，精神倦怠，飲食減少。

【用法與用量】 每服一丸，每日一至二次，溫開水送下。

【注意】 孕婦慎用。

【貯藏】 貯于陰涼干燥處。

八 珍 丸

Bāzhēn Wán

【處方】 黨參一兩 甘草一兩 茯苓二兩 白朮二兩

熟地黃二兩 白芍二兩 川芎一兩五錢 當歸二兩

【制法】 以上八味，共研細粉，過篩；或將熟地黃與處方內部分藥物串研，曬干或低溫干燥，再共研細粉，過篩。混合均勻。煉蜜為丸，即得。每丸重三錢。

【功能】 調補氣血。

【主治】 氣弱血虧，形容憔悴，四肢倦怠及婦女月經不調。

【用法與用量】 每服一丸，每日二次，溫開水送下。

【貯藏】 密閉，貯于陰涼干燥處。

八 珍 益 母 丸

Bāzhēn Yīmǔ Wán

【處方】 益母草四兩 黨參一兩 白朮一兩 茯苓一兩 甘草五錢

熟地黃二兩 當歸二兩 川芎一兩 白芍一兩

【制法】 以上九味，共研細粉，過篩；或將熟地黃與處方內部分藥物串研，曬干或低溫干燥，再共研細粉，過篩。混合均勻。煉蜜為丸，即得。每丸重三錢。

【功能】 補氣血，調月經。

【主治】 婦女氣血兩虧，體弱無力，月經不調。

【用法与用量】 每服一丸，每日二次，温开水送下。

【贮藏】 密闭，貯于阴凉干燥处。

九 气 拈 痛 丸

Jiǔqì Niǎntòng Wán

【处方】 香附十六两 高良姜四两 郁金八两 莪朮三十二两 五灵脂十六两

甘草四两 陈皮八两 木香四两 槟榔八两 延胡索十六两

【制法】 以上十味，共研细粉，过筛。混合均匀。用冷开水泛为小丸。晒干或低温干燥，即得。

【功能】 理气止痛。

【主治】 胃脘疼痛，两胁胀满。

【用法与用量】 每服二至三钱，每日一至二次，温开水送下。

【注意】 孕妇忌用。

【贮藏】 密闭，防潮。

九 分 散

Jiǔfēn Sǎn

【处方】 乳香一两 没药一两 麻黄一两 制马钱子一两

【制法】 以上四味，共研细粉，过筛。混合均匀，即得。

【功能】 止痛消瘀。

【主治】 跌扑损伤，红肿作痛。

【用法与用量】 每服七至九分，每日一至二次，温开水或黄酒冲服。或遵医嘱服；亦可外敷。

【贮藏】 密闭，防潮。

三 黄 宝 蜡 丸

Sānhuáng Bǎolà Wán

【处方】 竹黄三两 当归一两五钱 刘寄奴三两 醋大戟三两 制藤黄四两

儿茶三两 芒硝一两 乳香三钱 麝香三钱 血竭三两
水银三钱 黑锡三钱 琥珀一钱 明雄黄三两

【制法】 以上十四味，除麝香外，明雄黄研细水飞或研细粉，过筛。将黑锡加热熔化，加入水银，不断搅拌，至结合成砂状，取出，俟冷与竹黄等十味共研细粉，过筛。再将麝香与上列各细粉配研，研细过筛。混合均匀。另取蜂蜡二十四两，熔化和细粉为丸，即得。每丸重一钱。

【功能】 消瘀。

【主治】 跌打损伤，瘀血凝阻。

【用法与用量】 每服一九，每日一至二次，黄酒煎化热服。儿童酌减。外用加麻油少许，重汤煎化敷患处。

【注意】 遵医嘱服。

【贮藏】 貯于阴凉干燥处。

寸 金 丹

Cùnjīn Dān

【处方】 厚朴三两六钱 羌活三两六钱 草果三两六钱 防风三两六钱 薄荷三两六钱
木香二两二钱 香附三两六钱 陈皮三两六钱 白芷三两六钱 甘草一两八钱
苍朮三两六钱 藿香三两六钱 砂仁三两六钱 赤茯苓三两六钱 乌药三两六钱
川芎三两六钱 前胡三两六钱 枳壳一两二钱 法半夏三两六钱 紫苏叶三两六钱
豆蔻一两四钱 六神曲三十三两六钱

【制法】 以上二十二味，共研细粉，过筛。混合均匀。用冷开水泛为小丸，晒干或低温干燥。另取适量朱砂细粉为衣，即得。

【功能】 解表和中。

【主治】 暑湿外感，积食内阻，头痛发热，嘔吐腹泻。

【用法与用量】 每服二至三钱，每日一至二次，温开水送下。

【注意】 孕妇慎用。

【贮藏】 密闭，防潮。

万 应 锭

Wànyìng Dìng

【处方】 京墨二两 儿茶一两 胡黄连一两 黄连一两

冰片六分 麝香五分 牛黄五分 熊胆二錢

【制法】 以上八味，将京墨、儿茶、胡黄连、黄连分研或共研細粉，过筛。与冰片、麝香、牛黄、熊胆配研（用胡黄连細粉配研最宜），研細过筛、混合均匀。另取牛胆汁适当濃縮，与上列細粉搅拌均匀，做成紡錘形小錠。阴干，即得。

【功能】 清火解热。

【主治】 中暑头昏，咽喉肿痛，无名肿毒。

【用法与用量】 每服五分至一錢，温开水送下。小儿酌减。外用醋磨調敷患处。

【注意】 孕妇忌内服。

【貯藏】 密闭，防潮。

万 应 膏

Wanyìng Gāo

【处方】 生川乌五錢 生草乌五錢 生地黄五錢 白薇五錢 白及五錢
象皮五錢 白芷五錢 当归五錢 赤芍五錢 羌活五錢
苦参五錢 木鳖子五錢 生穿山甲五錢 乌药五錢 甘草五錢
独活五錢 玄参五錢 大黃五錢 肉桂五錢

【制法】 以上十九味，将肉桂研細粉，过筛。其余生川乌等十八味，酌予碎断，取麻油二百四十两，同置鍋中（或浸三至十日）用文武火炸枯，去滓。滤淨后炼至滴水成珠。另取黄丹（七十五两至一百零五两），加入搅匀，收膏。将膏浸泡于水中。

取膏用文火熔化待温，加入上列肉桂細粉，搅拌均匀。分摊于紙上，即得。每張淨重五分或一錢五分。

【功能】 活血解毒。

【主治】 痈疽肿毒，痰核流注。

【用法与用量】 温热化开，貼于患处。

【貯藏】 貯于阴凉干燥处。

大 补 阴 丸

Dàbǔyīn Wán

【处方】 知母四两 黄柏四两 熟地黄六两 制龟板六两 猪脊髓十条

【制法】 以上五味，除猪脊髓外，将知母等四味出研，晒干或低温干燥，共研細粉，过

篩。將存甕置于甕內，另加入黃酒四兩，加蓋封閉，隔水加熱燉熟取出，與上列細粉拌勻，晒干或低溫干燥，再共研細，過篩，混合均勻。煉蜜為丸，即得。每丸重三錢。蠟皮封固。

【功能】 補腎水，降虛火。

【主治】 水亏火旺，耳鳴耳聾，陰虛發熱。

【用法與用量】 每服一丸，每日一至二次，溫開水送下。

【貯藏】 密閉，貯于陰涼干燥處。

大活絡丹

Dàhuólò Dān

【處方】	蕲蛇肉 一兩四錢	大黃 三兩	川芎 三兩	黃芩 三兩
	玄參 三兩	甘草 三兩	烏蛇肉 七錢五分	青皮 一兩五錢
	木香 一兩五錢	竹黃 一兩五錢	藿香 三兩	白芷 三兩
	草豆蔻 三兩	竹節香附 三兩	肉桂 三兩	黃連 二兩
	地龍 七錢五分	制附子 一兩五錢	香附 一兩五錢	白朮 一兩五錢
	何首烏 三兩	麻黃 三兩	羌活 三兩	沉香 三兩
	天麻 三兩	熟地黃 三兩	全蝎 七錢五分	制虎骨 一兩五錢
	細辛 一兩五錢	烏藥 一兩五錢	制松香 一兩五錢	檀香 一兩五錢
	骨碎補 一兩五錢	乳香 一兩五錢	威靈仙 一兩七錢五分	血竭 一兩一錢三分
	茯苓 一兩五錢	丁香 一兩五錢	赤芍 一兩五錢	沒藥 一兩五錢
	當歸 一兩七錢五分	制龜板 一兩五錢	人參 一兩	豆蔻 一兩五錢
	葛根 一兩七錢五分	防風 三兩七錢五分	麝香 五錢四分	冰片 一錢八分
	犀角 六錢六分	牛黃 三錢	朱砂 一兩八錢	安息香 六錢

【制法】 以上五十二味，除牛黃、麝香、冰片外，犀角銼研細粉，過篩。朱砂研細水飛或研至極細粉，其餘蕲蛇肉等四十七味，共研細粉，過篩；或將熟地黃與處方內部分藥物串研，晒干或低溫干燥，再共研細粉，過篩。將牛黃、麝香、冰片與上列各細粉配研，研細過篩。混合均勻，煉蜜為丸，即得。每丸重一錢，蠟皮封固。

【功能】 祛風除濕，理氣豁痰，舒筋活絡。

【主治】 中風癱瘓，痿痺痰厥，拘攣疼痛。

【用法與用量】 每服一丸，每日一至二次，溫開水送下。

【注意】 孕婦忌用。

【貯藏】 貯于陰涼干燥處。

大黃蟞虫丸

Dàhuáng Zhèchóng Wán

【处方】 熟大黃十兩 土蟞虫一兩 黃芩二兩 甘草三兩 白芍四兩 煨干漆一兩
虻虫一兩五錢 生地黄十兩 制水蛭二兩 蛭螬一兩五錢 桃仁四兩 苦杏仁四兩

【制法】 以上十二味，除桃仁、苦杏仁外，大黃等十味研細粉，過篩。再與桃仁、苦杏仁摻研，研細過篩。混合均勻。煉蜜為丸，即得。每丸重一錢。蠟皮封固。

【功能】 通經活血，導滯消瘀。

【主治】 血滯經閉，血瘀成塊，肌肢甲錯，潮熱羸瘦。

【用法與用量】 每服一錢，每日一至二次，溫開水送下。

【注意】 孕婦忌用。

【貯藏】 密閉，貯於陰涼乾燥處。

小 金 丹

Xiǎojīn Dān

【处方】 白膠香一兩五錢 地龍一兩五錢 沒藥七錢五分 制草烏一兩五錢 當歸七錢五分
五靈脂一兩五錢 乳香七錢五分 京墨一錢二分 木鱉子(去心)一兩五錢 麝香二錢

【制法】 以上十味，除麝香、木鱉子外，白膠香等八味共研細粉，過篩。再與木鱉子摻研，研細過篩。將麝香與上列細粉配研，研細過篩。混合均勻。另取糯米粉三兩打糊或蒸餅糊為丸。陰干，即得。每丸重二分。

【功能】 消腫拔毒。

【主治】 痰核流注，乳岩瘰癧，橫痃惡瘡，一切陰疽初起。

【用法與用量】 每服二丸，每日二次，黃酒或溫開水送下。

【注意】 孕婦忌用。

【貯藏】 密閉，防潮。

小 活 絡 丹

Xiǎohuólò Dān

【处方】 制川烏六兩 地龍六兩 制草烏六兩 乳香二兩二錢 胆南星六兩 沒藥二兩二錢

【制法】 以上六味，共研細粉，过篩。混合均匀，炼蜜为丸，即得。每丸重一錢。

【功能】 祛風活絡，除湿止痛。

【主治】 風寒湿痹，肢体疼痛，麻木拘攣。

【用法与用量】 每服一丸，每日一至二次，黄酒或温开水送下。

【注意】 孕妇忌用。

【貯藏】 密闭，貯于阴凉干燥处。

千金止带丸

Qiānjīn Zhǐdài Wán

【处方】 香附十六两 椿皮十六两 鸡冠花十六两 补骨脂四两 木香四两 白芍四两
杜仲四两 白朮四两 砂仁四两 延胡索四两 青黛四两 续断四两
茴香四两 牡蠣四两 党参四两 川芎八两 当归八两

【制法】 以上十七味，共研細粉，过篩。混合均匀。用冷开水泛为小丸。晒干或低温干燥，即得。

【功能】 补虚止带。

【主治】 妇女带下，腹痛腰痠，四肢倦怠，精神不振。

【用法与用量】 每服二錢，每日一次，温开水送下。

【貯藏】 密闭，防潮。

千金散

Qiānjīn Sǎn

【处方】 全蝎三两 殭蚕三两 朱砂四两 牛黄六錢 冰片二两
天麻四两 黄芩四两 胆南星二两 甘草二两

【制法】 以上九味，除牛黄、冰片外，朱砂研細水飞或研至极細粉。其余全蝎等六味共研細粉，过篩。将牛黄、冰片与上列各細粉配研，研細过篩。混合均匀，即得。

【功能】 定惊安神。

【主治】 小儿惊風，高热煩悶，痰涎壅盛，神昏譫語，手足抽搐。

【用法与用量】 每服二至三分，每日一至三次，温开水冲服。三岁以下小儿酌减。

【貯藏】 密闭，防潮。

川芎茶调散

Chuānxiōng Chátiao Sǎn

【处方】 川芎四两 薄荷八两 防风一两五钱 羌活二两

细辛一两 荆芥四两 白芷二两 甘草二两

【制法】 以上八味，共研细粉，过筛，混合均匀，即得。

【功能】 祛风止痛

【主治】 感冒风寒，鼻塞声重，头痛无汗；并治偏正头风。

【用法与用量】 每服二钱，日服二次，饭后浓茶冲服。

【贮藏】 密闭，置阴凉处，防潮。

女金丹

Nǚjīn Dān

【处方】 白朮一两 当归一两 川芎一两 赤石脂一两 白薇一两 延胡索一两

人参一两 藁本一两 白芍一两 肉桂一两 没药一两 牡丹皮一两

甘草一两 香附十五两 茯苓一两 白芷一两

【制法】 以上十六味，共研细粉，过筛，混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重三钱。

【功能】 调经养血，温暖子宫。

【主治】 子宫寒冷，经期不准。

【用法与用量】 每服一丸，每日一至二次，温开水送下。

【注意】 孕妇慎用。

【贮藏】 密闭，置于阴凉干燥处。

六一散

Liùyi Sǎn

【处方】 滑石六两 甘草一两

【制法】 以上二味，共研細粉，过篩，混合均匀，即得。

【功能】 清暑利水。

【主治】 暑热，身热，口干，溲赤。

【用法与用量】 每服二至三錢，每日一至二次，温开水冲服。

【貯藏】 密闭，防潮。

六合定中丸

Liùhé Dìngzhōng Wán

【处方】 藿香八錢 赤茯苓二两四錢 厚朴二两四錢 紫苏叶八錢 枳壳二两四錢
甘草二两四錢 香薷八錢 桔梗二两四錢 麦芽九两六錢 白扁豆八錢
木瓜二两四錢 谷芽九两六錢 木香一两八錢 陈皮二两四錢 六神曲九两六錢
檀香一两八錢 山楂二两四錢

【制法】 以上十七味，共研細粉，过篩，混合均匀。用冷开水泛为小丸。晒干或低温干燥，即得。

【功能】 祛暑除湿，和中止泻。

【主治】 胸膈恶心，寒热头痛，吐泻腹痛。

【用法与用量】 每服一至二錢，每日一至二次，温开水送下。

【貯藏】 密闭，防潮。

六味地黄丸

Liùwèi Dìhuáng Wán

【处方】 熟地黄八两 山茱萸四两 山药四两 泽泻三两 牡丹皮三两 茯苓三两

【制法】 以上六味，共研細粉，过篩；或将熟地黄与处方内部分药物串研，晒干或低温干燥，再共研細粉，过篩，混合均匀。蜜水泛为小丸，晒干或低温干燥；或炼蜜为丸，每丸重三錢，即得。

【功能】 滋补肾阴。

【主治】 憔悴羸弱，腰膝痠軟，头晕耳鳴，遺精便血。

【用法与用量】 每服二至三錢，每日二次，温开水或淡盐湯送下。

【貯藏】 密闭，貯于阴涼干燥处。

开胸顺气丸

Kāixiōng Shùqì Wán

【处方】 槟榔六两 牵牛子八两 陈皮二两 木香一两五钱

三棱二两 猪牙皂一两 莪朮二两 厚朴二两

【制法】 以上八味，共研细粉，过筛。混合均匀。用冷开水泛为小丸。晒干或低温干燥，即得。

【功能】 消积化滞。

【主治】 停食停水，气郁不舒，胸痞腹胀，胃脘疼痛。

【用法与用量】 每服一至三钱，每日一至二次，温开水送下。

【注意】 孕妇及年老体弱者忌用。

【贮藏】 密闭，防潮。

天王补心丹

Tiānwáng Bǔxīn Dān

【处方】 生地黄四两 麦门冬一两 茯苓五钱 玄参五钱 天门冬一两

人参五钱 当归一两 五味子一两 远志五钱 桔梗五钱

柏子仁一两 酸枣仁一两 丹参五钱 甘草五钱 九节菖蒲五钱

【制法】 以上十五味，除柏子仁、酸枣仁外，其余生地黄等十三味，共研细粉，过筛，再与柏子仁、酸枣仁掺研，研细过筛。混合均匀。炼蜜为丸，另取适量朱砂细粉为衣，即得。每丸重三钱。

【功能】 养心血，安心神。

【主治】 心血不足，怔忡健忘，心烦多汗，大便秘结。

【用法与用量】 每服一九，每日二次，温开水送下。

【贮藏】 密闭，贮于阴凉干燥处。

天麻丸

Tiānmǎ Wán

【处方】 天麻六两 牛膝六两 玄参六两 草薢六两 杜仲七两

当归十两 羌活十两 生地黄十六两 制附子一两 独活五两

【制法】 以上十味，共研细粉，过筛。混和均匀，炼蜜为丸，即得。每丸重三钱。

【功能】 散风活血，舒筋止痛。

【主治】 筋脉掣痛，手足麻木，腰腿疼痛。

【用法与用量】 每服一九，每日一至二次，温开水送下。

【注意】 孕妇慎用。

【贮藏】 密闭，貯于阴凉干燥处。

五苓散

Wǔlíng Sǎn

【处方】 茯苓一两八钱 泽泻三两 猪苓一两八钱 肉桂一两二钱 白朮一两八钱

【制法】 以上五味，共研细粉，过筛。混合均匀，即得。

【功能】 化气行水。

【主治】 诸湿肿满，水饮水肿，嘔逆泄泻，小便不利。

【用法与用量】 每服二至三钱，每日二次，温开水冲服。

【贮藏】 密闭，防潮。

五积散

Wǔjī Sǎn

【处方】 麻黄六两 苍朮二十四两 白芷三两 白芍三两 当归三两
川芎三两 枳壳六两 桔梗十二两 肉桂三两 姜半夏三两
甘草三两 茯苓三两 厚朴四两 陈皮六两 干姜四两

【制法】 以上十五味，共研粗末。混合均匀，分袋，即得。每袋重五钱。

【功能】 温中解表。

【主治】 外感寒湿，内伤生冷，头疼身痛，腹痛嘔吐。

【用法与用量】 每次五钱，每日一至二次，用适量水浸泡 10--20 分钟（或加鲜生姜三片，葱白二寸），加热煎数沸，取煎出液，滤过温服。将药渣再如法煎服一次。

【贮藏】 密闭，防潮。

五福化毒丹

Wǔfú Huàdú Dān

【处方】 桔梗五两 生地黄五两 赤芍五两 牛蒡子五两 玄参六两 连翘六两
甘草六两 芒硝五钱 青黛二两 黄连五钱 犀角一两

【制法】 以上十一味，将犀角镑研细粉，过筛。桔梗等十味，共研细粉，过筛；或将牛蒡子另研，将桔梗等九味，研细粉，过筛，再与牛蒡子掺研，研细过筛。与上列犀角细粉配研，混合均匀，炼蜜为丸，即得。每丸重一钱。

【功能】 清热解毒。

【主治】 小儿热毒蕴积，多生疮疖，口舌生疮，夜卧不安。

【用法与用量】 每服一丸，每日一至二次，温开水送下。三岁以下小儿酌减。

【贮藏】 密闭，貯于阴凉干燥处。

木香槟榔丸

Mùxiāng Bīngláng Wán

【处方】 木香一两 槟榔一两 黄柏二两 牵牛子四两 陈皮一两 香附二两
枳壳一两 钱朮一两 大黄二两 黄连一两 青皮一两

【制法】 以上十一味，共研细粉，过筛。混合均匀。用冷开水泛为小丸，晒干或低温干燥，即得。

【功能】 散郁破结，推陈致新。

【主治】 胸腹积滞，痞满结痛，二便不通，或痢疾腹痛，里急后重。

【用法与用量】 每服二至三钱，每日二次，温开水送下。

【注意】 孕妇忌用。

【贮藏】 密闭，防潮。

止红肠澼丸

Zhìhóng Chángpì Wán

【处方】 生地黄炭九两六钱 地榆炭八两四钱 升麻五钱 乌梅一两 黄连二两四钱

当归九两六钱 梔子八两四钱 槐花六两四钱 阿胶六两四钱
 黄芩九两六钱 白芍七两二钱 侧柏炭六两四钱 荆芥穗六两四钱

【制法】 以上十三味，共研细粉，过筛。混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重三钱。

【功能】 清热，凉血，止血。

【主治】 肠风便血，痔疮下血。

【用法与用量】 每服一丸，每日一至二次，温开水送下。

【贮藏】 密闭，貯于阴凉干燥处。

内消瘰癧丸

Nèixiāo Luǒlì Wán

【处方】 夏枯草八两 海藻一两 天花粉一两 连翘一两 生地黄一两 当归一两
 玄参五两 浙贝母一两 海粉一两 熟地黄一两 桔梗一两 硝石一两
 大青盐五两 薄荷一两 白薇一两 甘草一两 枳壳一两

【制法】 以上十七味，共研细粉，过筛。混合均匀。用冷开水泛为小丸。晒干或低温干燥，即得。

【功能】 软坚散结。

【主治】 瘰癧痰核，或肿或痛。

【用法与用量】 每服二至三钱，每日二次，温开水送下。

【注意】 孕妇慎用。

【贮藏】 密闭，防潮。

午时茶

Wǔshí Chá

【处方】 苍朮一两 柴胡一两 防风一两 枳实一两 前胡一两
 桔梗一两五钱 山楂一两 川芎一两 羌活一两 陈皮一两
 藿香一两 紫苏叶一两五钱 六神曲一两 连翘一两 厚朴一两五钱
 甘草一两 麦芽一两五钱 白芷一两 红茶三十三两

【制法】 以上十九味，共研粗末，过筛。混合均匀。另取精白面二十两，打糊做块，晒干，即得。每块重二钱五分。

【功能】 解表和中。

【主治】 感冒風寒、内伤食积、寒热吐泻。

【用法与用量】 每服一块，每日一至二次，开水泡开当茶饮。

【貯藏】 密闭，防潮。

牛黄上清丸

Niúhuáng Shàngqīng Wán

【处方】 牛黄一錢 黃連八錢 生石膏四兩 黃芩二兩五錢 薄荷一兩五錢
蓮子心二兩 白芷八錢 桔梗八錢 菊花二兩 川芎八錢
赤芍八錢 當歸二兩五錢 黃柏五錢 荆芥穗八錢 梔子二兩五錢
大黃四兩 甘草五錢 連翹二兩五錢 朱砂六錢 明雄黃六錢
冰片五錢

【制法】 以上二十一味，除牛黄、冰片外，明雄黃研細水飞或研細粉，过篩。朱砂研細水飞或研至極細粉。其余黃連等十七味共研細粉，过篩。將牛黄、冰片与上列各細粉配研，研細过篩。混合均匀。煉蜜为丸，即得。每丸重二錢。蜡皮封固。

【功能】 清火解毒。

【主治】 口舌生疮，牙齒肿痛，風火眼赤，大便燥結。

【用法与用量】 每服一丸，每日一至二次，温开水送下。

【注意】 孕婦慎用。

【貯藏】 貯于阴涼干燥处。

牛黄抱龙丸

Niúhuáng Bàolóng Wán

【处方】 牛黄四分 胆南星一兩 茯苓五錢 全蝎一錢五分 殭蚕三錢
竹黄三錢五分 琥珀二錢五分 明雄黃二錢五分 朱砂一錢五分 麝香二分

【制法】 以上十味，除牛黄、麝香外，明雄黃研細水飞或研細粉，过篩。朱砂研細水飞或研至極細粉，其余胆南星等六味，共研細粉，过篩。將牛黄、麝香与上列各細粉（取出适量朱砂細粉留作上衣用）配研，研細过篩。混合均匀。煉蜜为丸，用遺留的朱砂細粉为衣，即得。每丸重五分。蜡皮封固。

【功能】 祛風痰，定惊厥。

【主治】 小兒風痰壅盛，壯熱神昏，惊風痙厥。

【用法与用量】 每服一丸，每日一至二次，溫開水送下。三歲以下小兒酌減。

【貯藏】 貯于陰涼干燥處。

牛黃清心丸(萬氏方)

Niúhuáng Qīngxīn Wán (Wànshìfāng)

【處方】 牛黃五分 郁金四錢 梔子六錢 黃連一兩 朱砂三錢 黃芩六錢

【制法】 以上六味，除牛黃外，朱砂研細水飛或研至極細粉。其餘郁金等四味共研細粉，過篩。將牛黃與上列各細粉配研，研細過篩。混合均勻。另取六神麩九錢，研細粉，過篩。打糊為丸。晒干或低溫干燥，即得。每丸重四分。

【功能】 清心開竅。

【主治】 痰熱蒙閉，神昏抽搐。

【用法与用量】 每服一丸，每日一至二次，溫開水化服。

【貯藏】 貯于陰涼干燥處。

牛黃清心丸(局方)

Niúhuáng Qīngxīn Wán (Júfāng)

【處方】 牛黃十二兩八錢三分	當歸二十二兩五錢	川芎十九兩五錢
甘草七十五兩	山藥一百零五兩	黃芩二十二兩五錢
苦杏仁十八兩七錢五分	大豆黃卷二十七兩二錢五分	大棗(去核)四十五兩
白朮三十七兩五錢	茯苓二十四兩	桔梗十九兩五錢
防風二十二兩五錢	柴胡十九兩五錢	阿膠二十五兩五錢
干姜十一兩二錢五分	白芍三十七兩五錢	人參三十七兩五錢
六神麩三十七兩五錢	肉桂二十七兩	麥門冬二十二兩五錢
白蘞十一兩二錢五分	蒲黃三兩七錢五分	麝香三兩二錢一分
冰片八兩零二分	犀角七兩一錢一分	羚羊角十四兩一錢七分
朱砂三十四兩七錢五分	明雄黃十二兩	

【制法】 以上二十九味，除牛黃、麝香、冰片外，犀角、羚羊角銼研細粉，過篩。明雄黃研細水飛或研細粉，過篩。朱砂研細水飛或研至極細粉。其餘當歸等二十二味共研細粉，

过筛；或将苦杏仁另研，当归等二十一味研细粉，过筛，再与苦杏仁掺研，研细过筛。将牛黄、麝香、冰片与上列各细粉配研，研细过筛。混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重一钱，金箔为满衣。蜡皮封固。

【功能】祛风补虚。

【主治】心气不足，神志不宁，惊恐谵妄，虚烦不寐。

【用法与用量】每服一丸，口服二次，温开水送下。

【注意】温热病狂躁、谵语者不宜，孕妇慎用。

【贮藏】貯于阴凉干燥处。

牛黄镇惊丸

Niúhuáng Zhènjīng Wán

【处方】 牛黄四分 胆南星五分 天麻一钱 制禹白附五分
珍珠五分 琥珀三分 明雄黄五分 僵蚕五分
薄荷五分 防风一钱 钩藤五分 竹黄五分
法半夏五分 甘草二钱 朱砂五分 全蝎一钱五分
麝香二分 冰片二分

【制法】以上十八味，除牛黄、麝香、冰片外，明雄黄研细水飞或研细粉，过筛。朱砂研细水飞或研至极细粉。珍珠研为极细粉。其余胆南星等十二味共研细粉，过筛。将麝香、牛黄、冰片与上列各细粉配研，研细过筛。混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重五分。金箔为衣。蜡皮封固。

【功能】定惊安神，祛风豁痰。

【主治】小儿惊风，高热抽搐，牙关紧闭，烦躁不安。

【用法与用量】每服一丸，每日一至三次，温开水送下，三岁以下小儿酌减。

【贮藏】貯于阴凉干燥处。

乌鸡白凤丸

Wūjī Báifèng Wán

【处方】 乌鸡(去爪肠)六十四两 人参十二两八钱 鹿角胶十二两八钱 牡蛎四两八钱
白芍十二两八钱 当归十四两四钱 甘草三两二钱 黄耆三两二钱
鳖甲六两四钱 香附十二两八钱 天门冬六两四钱 桑螵蛸四两八钱

熟地黄二十五两六錢 生地黄二十五两六錢 川芎六两四錢 鹿角霜四两八錢
银柴胡二两六錢 芡实六两四錢 山药十二两八錢 升参十二两八錢

【制法】 以上二十味，先将烏鸡以下至桑螵蛸十二味，分别酌予碎断，置罐中，另加入黄酒一百二十八两，加盖封固，隔水加热燉至酒尽，取出。其余熟地黄等八味研为粗末，与上列燉制的药物掺匀。晒干或低温干燥，再研細粉，过筛。混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重三錢。蜡皮封固。

【功能】 益气养血，调經止带。

【主治】 妇人瘦弱，經血不調，崩漏带下。

【用法与用量】 每服一丸，每日二次，温开水送下。

【貯藏】 貯于阴凉干燥处。

烏 金 丸

Wūjīn Wán

【处方】 香附四两 酒大黄四两 木香五錢 乳香五錢 沒药五錢
肉桂五錢 五灵脂一两 桃仁一两 延胡索一两 烏药一两
羌活一两 当归一两 益母草二两 蚕茧二两

【制法】 以上十四味，将蚕茧煅存性，与香附等共研細粉，过筛；或将桃仁另研，香附、煅蚕茧等十三味，研細粉，过筛，再与桃仁掺研，研細过筛。混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重二錢。

【功能】 解郁行瘀。

【主治】 妇女气郁血滞，胸胁刺痛，产后瘀血，面黄肌瘦。

【用法与用量】 每服一丸，每日一至二次，温开水送下。

【注意】 孕妇忌用。

【貯藏】 貯于阴凉干燥处。

烏 梅 丸

Wūméi Wán

【处方】 烏梅肉二两 細辛六錢 干姜一两 黃连一两六錢 当归四錢

制附子六錢 花椒四錢 桂枝六錢 人參六錢 黃柏六錢

【制法】 以上十味，將烏梅肉用另取適量米醋浸泡一晝夜，隔水加熱燉爛。細辛等九味研粗末，與上列烏梅肉共搗爛，晒干或低溫干燥，再共研細粉，過篩。混合均勻。煉蜜為丸，即得。每丸重三錢。

【功能】 溫臟、安蛔。

【主治】 胃痛吐蛔，脾虛久痢。

【用法與用量】 每服一丸，每日一至三次，溫開水送下。三歲以下小兒酌減。

【貯藏】 密閉，貯于陰涼干燥處。

化 風 丹

Huàfēng Dān

【處方】 黃連一兩 橘紅一兩 僵蚕五錢 胆南星二兩 枳實二兩
酒大黃八兩 黃芩四兩 沉香五錢 鉤藤五錢

【制法】 以上九味，共研細粉，過篩。混合均勻。煉蜜為丸，另取適量朱砂細粉為衣，即得。每丸重五分。

【功能】 清熱通便，祛風豁痰。

【主治】 小兒身熱抽搐，痰涎壅盛。

【用法與用量】 每服一丸，每日一至二次。三歲以下小兒酌減。

【貯藏】 密閉，貯于陰涼干燥處。

化 蟲 丸

Huàchóng Wán

【處方】 鶴虱八兩 蕪荑四兩 玄明粉四兩 牽牛子四兩 使君子仁四兩
雷丸四兩 檳榔四兩 苦楝皮四兩 大黃八兩

【制法】 以上九味，共研細粉，過篩。混合均勻。用冷開水泛為小丸。晒干或低溫干燥，即得。

【功能】 殺蟲消積。

【主治】 蟲積腹痛。

【用法与用量】 每服二至三錢，每日一至二次，食前用溫開水或糖水送下。三岁以下小儿酌減。

【注意】 孕妇忌用。

【貯藏】 密閉，防潮。

化癥回生丹

Huàzhēng Huíshēng Dān

【处方】 人参六两 肉桂二两 麝香二两 片姜黄二两 丁香三两
花椒炭二两 虻虫二两 三棱二两 蒲黄炭二两 红花二两
苏木二两 桃仁二两 紫苏子霜二两 五灵脂二两 降香二两
煅干漆二两 当归四两 没药二两 白芍四两 苦杏仁三两
香附二两 吴茱萸二两 延胡索二两 制水蛭二两 阿魏二两
茴香三两 川芎二两 乳香一两 高良姜二两 艾炭二两
益母草十六两 熟地黄四两 鳖甲胶十六两 大黄八两 竹节香附二两

【制法】 以上三十五味，除麝香、紫苏子霜、鳖甲胶外，将益母草煎成清膏，其余人参等三十一味，共研細粉，过篩；或将桃仁、苦杏仁另研，熟地黄与处方内部分药物串研，晒干或低温干燥，研細粉，过篩。与桃仁、苦杏仁掺研，研細过篩。再将麝香与上列細粉及紫苏子霜配研，研細过篩。混合均匀。将鳖甲胶加适量黄酒燉化与益母草清膏混合，酌加适量炼蜜为丸，即得。每丸重二錢。

【功能】 消癥瘕，化瘀血。

【主治】 妇女产后瘀血攻心，癥瘕血痹，干血癆。

【用法与用量】 每服一丸，每日一次，飯前溫酒送下。

【注意】 孕妇忌用。

【貯藏】 貯于阴涼干燥处。

分清五淋丸

Fēnqīng Wǔlín Wán

【处方】 木通十二两八錢 黄芩十二两八錢 甘草三两二錢 大黄十九两二錢
茯苓六两四錢 黄柏六两四錢 滑石十二两八錢 扁蓄六两四錢

泽泻六两四錢 车前子六两四錢 猪苓六两四錢 知母六两四錢

瞿麦六两四錢 梔子六两四錢

【制法】 以上十四味，除滑石外，将木通等十三味共研細粉，过篩：或将車前子另研細，再与木通等共研細粉，过篩。混合均匀，用冷开水泛为小丸。晒干或低温干燥。再将滑石研細粉，过篩。上衣打光，即得。

【功能】 清热，利尿。

【主治】 小便不利，点滴刺痛。

【用法与用量】 每服二錢，每日二次，温开水送下。

【注意】 孕妇慎用。

【貯藏】 密闭，防潮。

半 贝 丸

Bànbèi Wán

【处方】 姜半夏四两 川贝母六两

【制法】 以上二味，共研細粉，过篩。混合均匀。另取鲜生姜一两切碎，酌加冷开水压榨取汁泛为小丸。晒干或低温干燥，即得。

【功能】 化痰止咳。

【主治】 痰多咳嗽。

【用法与用量】 每服一至二錢，每日一至二次，温开水送下。

【注意】 孕妇慎用。

【貯藏】 密闭，防潮。

半 硫 丸

Bànliú Wán

【处方】 姜半夏三两 制硫黄三两

【制法】 以上二味，共研細粉，过篩。混合均匀。另取鲜生姜四两切碎，压榨取汁和糯米粉一两五錢，蒸餅糊为小丸。晒干或低温干燥，即得。

【功能】 温肾通便。

【主治】 老年阳虚便秘。

【用法与用量】 每服一至二錢，每日一至二次，溫开水送下。

【注意】 孕妇慎用。

【貯藏】 密閉，防潮。

玉 眞 散

Yùzhēn Sǎn

【处方】 生禹白附^{十二兩} 防风^{一兩} 白芷^{一兩} 生南星^{一兩} 天麻^{一兩} 羌活^{一兩}

【制法】 以上六味，共研細粉，过篩。混合均匀，即得。

【功能】 散風止血。

【主治】 跌打损伤，金疮出血，破伤風。

【用法与用量】 外用調敷患处，內用三分至五分或遵医囑服。

【注意】 孕妇忌內服。

【貯藏】 密閉，防潮。

甘 露 消 毒 丹

Gānlù Xiāodú Dān

【处方】 九节菖蒲^{六錢} 黄芩^{一兩} 茵陈^{一兩一錢} 豆豉^{四錢} 木通^{五錢} 川贝母^{五錢}
薄荷^{四錢} 藿香^{四錢} 连翹^{四錢} 滑石^{一兩五錢} 射干^{四錢}

【制法】 以上十一味，共研細粉，过篩。混合均匀。用冷开水泛为小丸。晒干或低溫干燥，即得。

【功能】 芳香化浊，清热利湿。

【主治】 湿温时疫，发热体倦，胸悶腹脹，肢痠咽肿，斑疹黃疸，痄腮口渴，溺赤便秘，吐瀉瘧痢。

【用法与用量】 每服二至三錢，每日一至二次，溫开水送下。

【貯藏】 密閉，防潮。

艾 附 暖 宮 丸

Àifù Nuǎngōng Wán

【处方】 艾炭^{三兩} 香附^{六兩} 当归^{三兩} 续断^{一兩五錢} 吳茱萸^{二兩}

川芎二两 白芍二两 黄耆二两 生地黄一两 肉桂五钱

【制法】 以上十味，共研细粉，过筛。混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重三钱。

【功能】 理气补血，温暖子宫。

【主治】 月经失调，经来腹痛，腰痠带下。

【用法与用量】 每服一丸，每日一至二次，温开水送下。

【贮藏】 密闭，貯于阴凉干燥处。

左 金 丸

Zuǒjīn Wán

【处方】 黄连六两 吴茱萸一两

【制法】 以上二味，共研细粉，过筛。混合均匀。用冷开水泛为小丸。晒干或低温干燥，即得。

【功能】 泻火，止痛。

【主治】 脘肋疼痛，呕吐酸水，大便热泻。

【用法与用量】 每服一钱至一钱五分，每日一至三次，温开水送下。

【贮藏】 密闭，防潮。

石斛夜光丸

Shíhú Yèguāng Wán

【处方】 石斛五钱 人参二两 山药七钱五分 肉苁蓉五钱 枸杞子七钱五分
五味子五钱 甘草五钱 枳壳五钱 天门冬二两 茯苓二两
麦门冬一两 青箱子五钱 决明子七钱五分 蒺藜五钱 黄连五钱
牛膝七钱五分 菟丝子七钱五分 菊花七钱五分 熟地黄一两 生地黄一两
苦杏仁七钱五分 川芎五钱 防风五钱 羚羊角五钱 犀角五钱

【制法】 以上二十五味，羚羊角、犀角镑研细粉，过筛。石斛等二十三味，共研细粉，过筛；或将苦杏仁另研，熟地黄与处方内部分药物串研，晒干或低温干燥。再共研细粉，过筛，与苦杏仁掺研，研细过筛。与上列羚羊角、犀角细粉配研，混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重三钱。蜡皮封固。

【功能】平肝息風，滋腎明目。

【主治】肝腎兩虧，陰虛火旺，內障目暗，瞳神散大，視物昏花。

【用法與用量】每服一丸，每日二次，溫開水送下。

【貯藏】密閉，貯于陰涼乾燥處。

龙胆泻肝丸

Lóngdǎn Xiègān Wán

【處方】龍胆六兩 車前子三兩 柴胡六兩 當歸三兩 梔子三兩

生地黄六兩 甘草三兩 黃芩三兩 澤瀉六兩 木通三兩

【制法】以上十味，共研細粉，過篩；或將車前子研細，再與龍胆等九味共研細粉，過篩。混合均勻，用冷開水泛為小丸，曬干或低溫干燥，即得。

【功能】清利肝經濕熱。

【主治】肝熱頭暈，耳痛耳鳴，肋痛口苦，小便赤澀。

【用法與用量】每服二錢，每日二次，溫開水送下。

【貯藏】密閉，防潮。

四 紅 丹

Sìhóng Dān

【處方】當歸炭一兩 蒲黃炭一兩 大黃炭一兩 槐花炭一兩 阿膠一兩

【制法】以上五味，共研細粉，過篩。混合均勻，煉蜜為丸，即得。每丸重三錢。

【功能】清熱止血。

【主治】吐血，衄血，便血，尿血，婦女崩漏下血。

【用法與用量】每服一丸，每日二次，溫開水送下。

【貯藏】密閉，貯于陰涼乾燥處。

四 神 丸

Sìshén Wán

【處方】肉豆蔻二兩 補骨脂四兩 五味子二兩 吳茱萸一兩 大棗(去核)二兩

【制法】 以上五味，共研細粉，过篩。混合均匀。另取鮮生姜二兩切碎，酌加冷开水压榨取汁泛为小丸。晒干或低温干燥，即得。

【功能】 溫补脾腎。

【主治】 五更泄瀉，或便溏腹痛，腰痠肢冷。

【用法与用量】 每服三錢，每日一至二次，溫开水送下。

【貯藏】 密闭，防潮。

史国公药酒

Shǐguógōng Yàojiǔ

【处方】 甘草二錢 羌活二錢 川芎四錢 当归三錢 独活二錢 续断二錢
蚕砂四錢 木瓜三錢 牛膝六錢 防风四錢 玉竹一两六錢 桑寄生五錢
白朮六錢 红花三錢 鹿角胶一錢 鳖甲胶一錢 紅麴一两二錢

【制法】 以上十七味，除鹿角胶、鳖甲胶、紅麴外，将甘草等十四味共研和紅麴共置于罐中。另取冰糖三十二兩，研細粉，白酒一百八十兩，分取适量白酒将鹿角胶、鳖甲胶吸化，与冰糖細粉及下余白酒共入罐中，加盖，隔水燉至酒沸，傾入缸內，密封，靜置至少三个月。取清液，将殘滓压榨，榨出液靜置，与清液合并，滤过。或用冷浸法（附录 10 頁）配制，即得。

【功能】 祛風除濕，养血活絡。

【主治】 四肢麻木，骨节疼痛，風寒湿痺。

【用法与用量】 每次溫服三至五錢，每日二至三次。

【注意】 孕妇慎用。

【貯藏】 密封，防止洩气。

归脾丸

Guīpí Wán

【处方】 白朮一两 茯苓一两 黄耆一两 龙眼肉一两 酸枣仁一两
党参一两 木香一两 甘草五錢 当归一两 远志一两

【制法】 以上十味，共研細粉，过篩；或将酸枣仁另研，龙眼肉与处方內部分药物中

研，晒干或低温干燥，研细粉，过筛。再与酸枣仁掺研，研细过筛。混合均匀，炼蜜为丸，即得。每丸重三钱。

【功能】 补养气血，健脾安神。

【主治】 脾虚便血，怔忡健忘，食少不寐及妇人经水过多。

【用法与用量】 每服一九，每日二至三次，温开水或姜汤送下。

【贮藏】 密闭，貯于阴凉干燥处。

生肌散

Shēngjī Sǎn

【处方】 制象皮一两 血竭一两 赤石脂一两 乳香一两
龙骨一两 冰片三钱 没药一两 儿茶一两

【制法】 以上八味，除冰片外，制象皮等七味研细粉，过筛。将冰片与上列细粉配研，研细过筛。混合均匀，即得。

【功能】 生肌止痛。

【主治】 疮毒溃后，久不收口。

【用法与用量】 将患处用温开水洗净，撒布患处。或用温开水调敷。

【注意】 专供外用，不可内服。

【贮藏】 密闭，防潮。

白降丹

Báijiàng Dān

【处方】 水银一两 硝石一两五钱 皂矾一两五钱 硼砂五钱
食盐一两五钱 雄黄二钱 朱砂二钱

【制法】 以上七味，除水银外，朱砂研细水飞或研至极细粉，其余硝石等分研细粉，过筛。先将食盐、皂矾细粉，加入水银，研匀，再与硝石、硼砂等细粉，研匀，置瓦钵中，用文火加热熔化，不絕攪拌，俟均匀結底，停止攪拌，在微火上轉动烘干。将瓦钵复盖清瓷盆上，四周用靛皮紙条封固，連盆放在水面上。瓦钵上罩一铁皮圈，上放炭火（炭量一次加足），在开始半小时至一小时，火力要猛，以后逐漸收緩，約一小時半去火，俟冷却后，开启取丹。

即得。

【功能】 消肿，溃膜，脱腐。

【主治】 痈疽发背，一切疗毒。

【用法与用量】 用时研末。每用三至五厘，撒于疮头上，或用硬饭含药搓条插入疮口。

【注意】 专供外用，切忌入口。

【贮藏】 装瓷瓶或棕色玻璃瓶内，密闭，置干燥处，避光。

安宫牛黄丸

Āngōng Niúhuáng Wán

【处方】 牛黄一两 郁金一两 栀子一两 黄芩一两 黄连一两 朱砂一两

珍珠五钱 犀角一两 冰片二钱五分 明雄黄一两 麝香二钱五分

【制法】 以上十一味，除牛黄、麝香、冰片外，犀角镑研细粉，过筛。朱砂研细水飞或研至极细粉，明雄黄研细水飞或研细粉，过筛。珍珠研为极细粉。其余郁金等四味，共研细粉，过筛。将牛黄、麝香、冰片与上列各细粉配研，研细过筛。混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重一钱。金箔为满衣。蜡皮封固。

【功能】 清热解毒，镇心安神。

【主治】 热邪内陷，神昏谵语，痲厥抽搐。

【用法与用量】 每服一丸，每日一至三次，温开水送下。小儿酌减。

【注意】 孕妇慎用。

【贮藏】 贮于阴凉干燥处。

冲和散

Chōnghé Sǎn

【处方】 紫荆皮五两 赤芍二两 独活三两 石菖蒲一两五钱 白芷一两

【制法】 以上五味，共研细粉，过筛。混合均匀，即得。

【功能】 活血定痛，散瘀消肿。

【主治】 痈疽初起，红肿疼痛。

【用法】 白酒或醋調敷患处。

【注意】 专供外用,不可内服。

【貯藏】 密閉,防潮。

冰 硼 散

Bīngpéng Sǎn

【处方】 冰片五錢 硼砂五兩 朱砂六錢 玄明粉五兩

【制法】 以上四味,朱砂研細水飞或研至極細粉。硼砂研細粉,过篩。将冰片与上列各細粉及玄明粉配研,研細过篩。混合均匀,即得。

【功能】 清火止痛。

【主治】 咽喉肿痛,口舌生疮。

【用法与用量】 每用少許,吹敷患处。

【貯藏】 密閉,防潮。

再 造 丸

Zàizào Wán

【处方】 蕲蛇肉二兩	母丁香一兩	玄参二兩	熟地黄二兩	青皮一兩
何首烏二兩	黃耆二兩	竹节香附二兩	大黃二兩	骨碎补一兩
紅橘五錢	細辛一兩	香附一兩	三七五錢	豆蔻(去壳)一兩
川芎二兩	甘草二兩	黃连二兩	葛根一兩五錢	麻黃二兩
檀香五錢	竹黃一兩	地龙五錢	乳香一兩	防风二兩
片姜黃一錢五分	茯苓一兩	桑寄生二兩	藿香二兩	赤芍一兩
全蝎一兩五錢	制附子一兩	革薢二兩	沉香一兩	天麻二兩
草豆蔻二兩	沒药一兩	当归一兩	建神麴四兩	制虎骨一兩
制穿山甲一兩	白朮一兩	肉桂二兩	白芷二兩	羌活二兩
人參二兩	橘紅四兩	殭蚕一兩	制龟板一兩	於朮八錢
血竭七錢五分	威灵仙一兩五錢	烏药一兩	油松节一兩	牛黃二錢五分
麝香五錢	冰片二錢五分	犀角七錢五分	朱砂一兩	

【制法】 以上五十九味,除牛黃、麝香、冰片外,犀角銼研細粉,过篩。朱砂研細水飞或研至極細粉,其余蕲蛇肉等五十四味共研細粉,过篩;或将熟地黄与处方內部分藥物串

研，晒干或低温干燥，再共研细粉，过筛。将牛黄、麝香、冰片与上列各细粉配研，研细过筛，混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重二钱五分。蜡皮封固。

【功能】 祛风散寒，化痰通络。

【主治】 中风口眼喎斜，手足拘攣，言語蹇澀，左癱右瘓，筋骨痠痛。

【用法与用量】 每服一丸，每日二次，温开水送下。

【注意】 孕妇忌用。

【贮藏】 貯于阴凉干燥处。

西 黄 丸

Xīhuáng Wán

【处方】 牛黄三分 麝香一钱五分 没药一两 乳香一两

【制法】 以上四味，没药、乳香分研细粉，过筛。将牛黄、麝香与没药细粉配研，研细过筛，再与乳香细粉，混合均匀。另取黄米粉七钱，打糊或蒸饼糊为小丸。阴干，即得。

【功能】 解毒，散结，化结。

【主治】 乳岩瘰癧，痰核横痃，肺瘤肠瘤。

【用法与用量】 每服五分至一钱，每日一至三次，温黄酒或温开水送下。

【注意】 孕妇忌用。

【贮藏】 密闭，防潮。

耳 聾 左 慈 丸

Ěrlóng Zuǒcí Wán

【处方】 熟地黄八两 山茱萸四两 牡丹皮三两 山药四两

茯苓三两 泽泻三两 煅磁石一两 竹叶柴胡一两

【制法】 以上八味，煅磁石另研细粉，过筛。其余熟地黄等七味，共研细粉，过筛。或将熟地黄与处方内部分药物串研，晒干或低温干燥，再共研细粉，过筛。将上列二细粉与熟地黄等细粉配研，混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重三钱。

【功能】 滋肾和肝。

【主治】 肾虚肝郁，耳鸣失聪，头晕目眩。

【用法与用量】 每服一丸，每日一至二次，温开水送下。

【贮藏】 密闭，貯于阴凉干燥处。

百合固金丸

Bǎihé Gùjīn Wán

【处方】 百合一两 白芍一两 当归一两 川贝母一两 甘草一两
生地黄二两 熟地黄二两 麦门冬一两五钱 玄参八钱 桔梗八钱

【制法】 以上十味，共研细粉，过筛；或将熟地黄与处方内部分药物串研，晒干或低温干燥，再共研细粉，过筛。混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重三钱。

【功能】 养肺润燥。

【主治】 肺虚喘咳，阴虚火旺，咽痛失血，虚劳骨蒸。

【用法与用量】 每服一丸，每日一至二次，温开水送下。

【贮藏】 密闭，貯于阴凉干燥处。

导赤丹

Dǎochì Dān

【处方】 黄连十五两 生地黄十五两 大黄十五两 木通十五两 黄芩三十两
甘草三十两 滑石二十两 连翘三十两 栀子三十两 玄参三十两

【制法】 以上十味，共研细粉，过筛。混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重一钱。

【功能】 清热泻火，通利二便。

【主治】 小儿口疮，烦躁不安，大便干结，小便黄赤。

【用法与用量】 每服一丸，每日一至二次，温开水送下。三岁以下小儿酌减。

【贮藏】 密闭，貯于阴凉干燥处。

防风通圣丸

Fángfēng Tōngshèng Wán

【处方】 防风五钱 白芍五钱 麻黄五钱 生石膏一两 滑石三钱 白朮二钱五分

川芎五錢 大黃五錢 連翹五錢 甘草二兩 梔子二錢五分 當歸五錢
薄荷五錢 芒硝五錢 桔梗一兩 荊芥穗二錢五分 黃芩一兩

【制法】 以上十七味，除滑石外，將防風等十六味共研細粉，過篩。混合均勻。用冷開水泛為小丸，曬干或低溫干燥。再將滑石研細粉，過篩。上衣打光，即得。

【功能】 解表通里，清熱化毒。

【主治】 寒熱雜感，表里俱實，惡寒壯熱，頭疼咽干，便秘溲赤，皮膚瘙癢濕疹。

【用法與用量】 每服二錢，每日二次，溫開水送下。

【注意】 孕婦慎用。

【貯藏】 密閉，防潮。

陽和解凝膏

Yánghé Jiěníng Gāo

【處方】 鮮牛蒡(全草)四十八兩	鮮白風仙(全草)四兩	生川烏二兩	桂枝二兩
大黃二兩	當歸二兩	肉桂二兩	生草烏二兩
生附子二兩	地龍一兩	殭蠶二兩	赤芍二兩
白芷二兩	白蘞二兩	白及一兩	川芎一兩
續斷一兩	防風一兩	荊芥一兩	五靈脂一兩
木香一兩	香櫟一兩	陳皮一兩	乳香二兩
沒藥二兩	蘇合香四兩	麝香一兩	

【制法】 以上二十七味，將乳香、沒藥研細粉，過篩。與麝香配研，研細過篩。混合均勻。其餘除蘇合香外，將鮮牛蒡、鮮白風仙切碎，取麻油二百四十兩，同置鍋中，用文武火炸枯，去滓。再將生川烏等二十一味，酌予碎斷，入鍋(或浸泡三至十日)炸枯，去滓。濾淨后熬至滴水成珠。另取黃丹(七十五兩至一百零五兩)，加入攪勻，收膏。將膏浸泡于水中。

取膏用文火熔化待溫，加入蘇合香及上列乳香等細粉，攪拌均勻。分攤于紙上，即得。每張淨重五分或一錢。

【功能】 行氣血，散寒濕。

【主治】 陰疽流注，癰癰痰核，寒濕郁痹，筋骨痠痛。

【用法與用量】 溫熱化開，貼于患處。

【貯藏】 貯于陰涼干燥處。

当归龙荟丸

Dāngguī Lónghuì Wán

【处方】 当归一两 龙胆一两 芦荟五钱 梔子一两 黄连一两 黄芩一两
大黄五钱 木香二钱五分 黄柏一两 麝香五分 青黛五钱

【制法】 以上十一味，除麝香外，当归等十味共研细粉，过筛。将麝香与上列细粉配研，研细过筛。混合均匀。用冷开水泛为小丸。阴干，即得。

【功能】 泻火通便。

【主治】 肝胆火旺，神志不宁，惊悸抽搐，头晕目眩，耳鸣耳聾，咽喉不利，大便秘结，小便赤澀。

【用法与用量】 每服二钱，每日二次，温开水送下。

【注意】 孕妇忌用。

【贮藏】 密闭，防潮。

朱砂安神丸

Zhūshā Ānshén Wán

【处方】 朱砂一两 黄连一两五钱 甘草五钱 生地黄一两 当归一两

【制法】 以上五味，将朱砂研细水飞或研至极细粉。其余黄连等四味，共研细粉，过筛。再将上列朱砂细粉（留出适量作上衣用）与黄连等细粉配研。混合均匀。炼蜜为丸，用遗留的朱砂细粉为衣，即得。每丸重三钱。

【功能】 清心养血。

【主治】 血虚火盛，心神不宁，烦躁不眠。

【用法与用量】 每服一丸，每日一至二次，温开水送下。

【贮藏】 密闭，貯于阴凉干燥处。

舟车丸

Zhōuchē Wán

【处方】 牵牛子四两 醋大戟一两 陈皮五钱 轻粉一钱 大黄二两

醋芫花一两 木香五錢 制甘遂一两 青皮五錢 檳榔五錢

【制法】 以上十味，將輕粉置避光处研細粉，过篩。其余牽牛子等九味共研細粉，过篩。再与上列輕粉細粉配研，混合均匀。用冷开水泛为小丸。阴干，即得。

【功能】 逐水消肿。

【主治】 水肿脹滿，飲癰积聚，二便不利。

【用法与用量】 每服五分至一錢，每日一至二次，温开水送下。

【注意】 遵医囑服。

【貯藏】 密閉，防潮。

行 军 散

Xíngjūn Sǎn

【处方】 姜粉五分 硝石三分 牛黄五錢 明雄黄八錢

硼砂五錢 冰片五錢 麝香五錢 珍珠五錢

【制法】 以上八味，明雄黄研細水飞或研細粉，过篩。珍珠研为极細粉。硝石、硼砂分研細粉，过篩。將牛黄、麝香、冰片与上列各細粉(硝石細粉除外)及姜粉配研，研細过篩，再掺入硝石細粉，混合均匀，即得。

【功能】 开窍辟秽，清暑解毒。

【主治】 暑热痧脹，头目眩暈。

【用法与用量】 每服二至三分，每日一至二次，温开水冲服。

【注意】 孕妇忌用。

【貯藏】 密閉，防潮。

如意金黃散

Rúyì Jīnhuáng Sǎn

【处方】 天花粉十兩 黄柏五兩 大黃五兩 姜黄五兩 白芷五兩

厚朴二兩 陈皮二兩 甘草二兩 苍朮二兩 生南星二兩

【制法】 以上十味，共研細粉，过篩，混合均匀，即得。

【功能】 消肿止痛。

【主治】 疮疖初起，红肿热痛，妇人乳痈，小儿丹毒。

【用法】 用清茶调敷；米醋或麻油调敷亦可。

【注意】 专供外用，不可内服。

【贮藏】 密闭，防潮。

红 升 丹(红粉)

Hóngshēng Dān

【处方】 水银二两 硝石二两 白矾二两

【制法】 以上三味，先将硝石、白矾研细拌匀，置铁锅中，用文火加热至完全熔化，放冷，使凝结(结胎)。然后将水银倒在结胎上，用瓷碗复盖锅上，碗与锅的交接处用桑皮纸或楮皮纸条封固，四周并用细黄砂密封至接近碗底，碗底上放白米数粒，将锅移置火上加热，先用小火，逐渐加大火力，至碗底上白米呈黄色时，减小火力，俟米转成焦黄色时，停止加热，放冷，除去泥沙，开启取丹，即得。

【功能】 拔毒去腐，生肌长肉。

【主治】 疮口坚硬，肉暗紫黑。

【用法与用量】 用时研末，取少许撒在疮口，以膏药盖上。

【注意】 遵医嘱应用。

【贮藏】 密闭，防尘，避光。

沉香化气丸

Chénxiāng Huàqì Wán

【处方】 沉香五钱 甘草一两 香附一两 木香一两 陈皮一两

砂仁一两 莪朮二两 麦芽二两 藿香二两 六神曲二两

【制法】 以上十味，共研细粉，过筛。混合均匀。用冷开水泛为小丸，晒干或低温干燥，即得。

【功能】 化气行滞。

【主治】 肝胃气滞，胸腹痞满，噎气吞酸，不思饮食。

【用法与用量】 每服二至三钱，每日二次，饭前温开水送下。

【注意】 孕妇慎用。

【贮藏】 密闭，防潮。

沉香化滞丸

Chénxiāng Huàzhì Wán

【处方】 沉香一两六钱 牵牛子四两八钱 枳实四两八钱 五灵脂四两八钱 山楂八两
枳壳八两 陈皮八两 香附八两 厚朴八两 莪朮八两
砂仁八两 三棱一两二钱 木香一两二钱 青皮一两二钱 大黄二十四两

【制法】 以上十五味，共研细粉，过筛。混合均匀。用冷开水泛为小丸。晒干或低温干燥，即得。

【功能】 理气化滞。

【主治】 饮食停滞，胸膈胀满。

【用法与用量】 每服二钱，每日二次，温开水送下。

【注意】 孕妇忌用。

【贮藏】 密闭，防潮。

启脾丸

Qípí Wán

【处方】 人参一两 白朮一两 茯苓一两 山药一两 莲子一两
陈皮五钱 泽泻五钱 山楂五钱 甘草五钱

【制法】 以上九味，共研细粉，过筛。混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重一钱。

【功能】 健脾止泻。

【主治】 小儿脾胃虚弱，腹胀久泻。

【用法与用量】 每服一九，每日二至三次，温开水送下，三岁以下酌减。

【贮藏】 密闭，贮于阴凉干燥处。

补中益气丸

Búzhōng Yìqì Wán

【处方】 黄耆一两 党参三钱 甘草五钱 当归三钱

陈皮三錢 升麻三錢 柴胡三錢 白朮三錢

【制法】 以上八味，共研細粉，过篩。混合均匀。另取鮮生姜一錢切碎，大枣二錢，分次水煎取煎出液，至味尽，去滓。用煎出液泛为小丸。晒干或低温干燥，即得。

【功能】 补中益气，升清降浊。

【主治】 脾肺气虚，头痛懒言，阳虚自汗，恶风厌食，劳瘵寒热，久泻久痢。

【用法与用量】 每服二至三錢，每日二次，温开水送下。

【贮藏】 密闭，防潮。

连翘败毒丸

Liánqiào Bàidú Wán

【处方】 连翘十六兩 金银花十六兩 地丁十二兩 蒲公英十二兩 梔子十二兩
白芷十二兩 黄芩十二兩 赤芍十二兩 浙贝母十二兩 玄参十二兩
桔梗十二兩 木通十二兩 防风十二兩 白鲜皮十二兩 甘草十二兩
蝉蜕八兩 天花粉八兩 大黃十六兩

【制法】 以上十八味，共研細粉，过篩。混合均匀。用冷开水泛为小丸。晒干或低温干燥，即得。

【功能】 清热解毒，消肿止痛。

【主治】 疮疖溃烂，灼热流脓，丹毒疱疹，疥癬痛痒。

【用法与用量】 每服三錢，每日一至三次，温开水送下。

【贮藏】 密闭，防潮。

麦味地黄丸

Màiwèi Dìhuáng Wán

【处方】 熟地黄八錢 山药四錢 泽泻三錢 茯苓三錢
牡丹皮三錢 五味子二錢 麦门冬三錢 山茱萸四錢

【制法】 以上八味，共研細粉，过篩；或将熟地黄与处方内部分药物串研，晒干或低温干燥，再共研細粉，过篩。混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重三錢。

【功能】 养肺滋肾。

【主治】 阴虚内热，咽干口燥，肺肾两亏，久咳气逆。

【用法与用量】 每服一九，每日二次，淡盐湯或温开水送下。

【貯藏】 密閉，貯于阴涼干燥处。

坎 离 砂

Kǎnlíshā

【处方】 透骨草八兩 当归六兩 防风八兩 川芎八兩 生铁屑一千六百兩

【制法】 以上五味，除生铁屑外，透骨草等四味，酌予碎断，分次水煎取煎出液，至味尽，去滓，將煎出液合并，濃縮至約二十四兩，另取米醋九十六兩加入攪勻。將生铁屑篩选后，置鍋中用武火炒或煅紅，立即傾入上列药液，不絕攪拌至药液吸尽为度，待其自然冷却后，装袋，即得。每袋重八兩。

【功能】 散寒止痛。

【主治】 腰腿疼痛，阴寒腹痛。

【用法与用量】 每次用八兩，置大碗內，加入好米醋（約五錢）立即拌勻，使之全部湿润，装入布袋外包棉垫，俟发热后，緩緩熨患处，每日一至三次。

【貯藏】 密閉，防潮。

更 衣 丸

Gēngyī Wán

【处方】 芦荟一兩四錢 朱砂一兩

【制法】 以上二味，朱砂研細水飞或研至极細粉，芦荟研細粉，过篩，与上列朱砂細粉配研，混合均匀。另取精白面六錢和适量白酒打糊为小丸，晒干或低温干燥，即得。

【功能】 潤腸通便。

【主治】 病后津液不足，肝火內熾，便秘腹脹。

【用法与用量】 每服五分至一錢，每日一至二次，温开水送下。

【注意】 孕妇忌用。

【貯藏】 密閉，防潮。

两 仪 膏

Liǎngyí Gāo

【处方】 党参四兩 熟地黄八兩

【制法】 以上二味，酌予切碎，分次水煎取煎出液，至味尽，去滓，将煎出液过滤合并。用文火浓缩成清膏，另加蜂蜜四两，收膏，即得。

【功能】 补气益血。

【主治】 气血两虚。

【用法与用量】 每服二至三钱，每日一至三次，温开水冲服。

【贮藏】 密闭，貯于阴凉干燥处。

苏 合 香 丸

Sūhéxiāng Wán

【处方】 苏合香五钱 犀角一两 朱砂一两 麝香七钱五分 冰片五钱
诃子肉一两 香附一两 檀香一两 丁香一两 沉香一两
华发一两 木香一两 安息香一两 乳香一两

【制法】 以上十四味，除苏合香、麝香、冰片外，犀角镑研细粉，过筛。朱砂研细水飞或研至极细粉。其余诃子肉等九味共研细粉，过筛。将麝香、冰片与上列各细粉配研，研细过筛。混合均匀。再将苏合香熬化，加适量炼蜜为丸，即得。每丸重一钱。蜡皮封固。

【功能】 通窍顺气、辟秽祛邪。

【主治】 惊痫中风，痰厥昏迷，猝然心痛，时气瘴瘧。

【用法与用量】 每服一丸，每日一至二次，温开水送下。

【注意】 孕妇忌用。

【贮藏】 貯于阴凉干燥处。

杞 菊 地 黄 丸

Qǐjú Dìhuáng Wán

【处方】 熟地黄四两 山茱萸二两 牡丹皮一两五钱 山药二两
泽泻一两五钱 茯苓一两五钱 枸杞子一两 菊花一两

【制法】 以上八味，共研细粉，过筛；或将熟地黄与处方内部分药物串研，晒干或低温干燥，再共研细粉，过筛。混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重三钱。

【功能】 滋肾养肝。

【主治】 肝肾不足，阴虚阳浮，头晕耳鸣，羞明流泪，视物昏花。

【用法与用量】 每服一九，每日二次，温开水送下。

【贮藏】 密闭，貯于阴凉干燥处。

医 痼 丸

Yīxián Wán

【处方】 生禹白附四两 炙乌蛇八两 姜半夏八两 制南星八两
僵蚕八两 全蝎一两六钱 朱砂一两六钱 雄黄一两二钱
白矾十二两 猪牙皂四十两 蜈蚣二钱

【制法】 以上十一味，雄黄研细水飞或研细粉，过筛。朱砂研细水飞或研至极细粉。其余生禹白附等九味，共研细粉，过筛，与上列各细粉配研，混合均匀。用冷开水泛为小丸，晒干或低温干燥，即得。

【功能】 散风化痰，安神定搐。

【主治】 癫痫抽搐，时发时止。

【用法与用量】 每服一钱，每日一至二次，温开水送下。

【注意】 孕妇忌用。

【贮藏】 密闭，防潮。

局方至宝丹

Júfāng Zhìbǎo Dān

【处方】 犀角一两 玳瑁一两 琥珀一两 朱砂一两 明雄黄一两
冰片一钱 麝香一钱 牛黄五钱 安息香一两五钱

【制法】 以上九味，犀角、玳瑁锉研细粉，过筛。明雄黄研细水飞或研细粉，过筛。朱砂研细水飞或研至极细粉，琥珀、安息香研细粉，过筛。将牛黄、麝香、冰片与上列各细粉配研，研细过筛。混合均匀。瓶装，重五分。蜡封密闭，即得。或炼蜜为丸，每丸重一钱，金箔为满衣，蜡皮封固。

【功能】 清热解毒，镇惊安神。

【主治】 溫邪內陷，熱入心包，神昏譫語，斑疹隱現，及小兒急熱驚風。

【用法與用量】 散每服五分；丸每服一丸，每日一至二次，溫開水送下。

【注意】 孕婦慎用。

【貯藏】 貯于陰涼干燥處。

阿 膠

Ējiāo

【處方】 驢皮一百兩

【制法】 將驢皮置水中漂泡，每日換水一至二次，至能刮毛時取出，刮去毛，切成小塊，再用清水漂泡，每日換水一至二次，約二至五日，取出，置鍋中分次水煎，取煎出膠液，煎至膠質盡，去滓。將煎出膠液，過濾合并（或加入明礬細粉少許）靜置，濾取清膠液，用文火濃縮（或加入適量黃酒、冰糖）至呈稠膏狀，傾入凝膠槽內，俟其自然冷凝，取出，分切成塊，陰干，即得。每塊重一兩或二兩；小塊重約一錢五分。

【功能】 滋腎補血。

【主治】 虛勞羸瘦，痰中帶血，婦女月經不調，產後血虛。

【用法與用量】 每服一至三錢，每日一至二次，溫開水或黃酒化服。或遵醫囑配合應用。

【貯藏】 密閉，貯于陰涼干燥處。

阿 魏 化 瘡 膏

Āwèi Huàpǐ Gāo

【處方】	阿魏二兩	大蒜二兩	香附二兩	大黃二兩	生川烏二兩
	三棱二兩	當歸二兩	莪朮二兩	生穿山甲二兩	白芷二兩
	使君子二兩	厚朴二兩	蓖麻子二兩	木鱉子二兩	生草烏二兩
	蜣螂二兩	胡黃連二兩	乳香三錢	沒藥三錢	芦荟三錢
	血竭一錢	樟腦一兩五錢	雄黃一兩五錢	肉桂一兩五錢	

【制法】 以上二十四味，將阿魏、乳香、沒藥、芦荟、血竭、雄黃、肉桂七味研細粉，過濾。混合均勻。其餘除樟腦外，將大蒜等十六味，酌予碎斷，取麻油二百四十兩，同置鍋中（或浸泡三至十日）用文武火炸枯，去滓。濾淨后煉至滴水成珠。另取黃丹（七十五兩至一

百零五两),加入搅匀,收膏。将膏浸泡于水中。

取膏用文火溶化待温,加入樟脑及上列河鲀等细粉,搅拌均匀。分摊于布上,即得。
每张净重二钱、四钱或六钱。

【功能】 化痞消积。

【主治】 积聚痞块,腹中疼痛,胸胁胀满以及妇女瘀血块。

【用法与用量】 温热化开,贴于胸口或脐上,每七至十日换药一次。

【注意】 孕妇忌贴。

【贮藏】 贮于阴凉干燥处。

附子理中丸

Fùzǐ Lǐzhōng Wán

【处方】 人参二两 干姜二两 白朮三两 制附子二两 甘草二两

【制法】 以上五味,共研细粉,过筛。混合均匀。炼蜜为丸,即得。每丸重三钱。

【功能】 温中散寒。

【主治】 中寒腹痛,呕吐泄泻,手足厥冷。

【用法与用量】 每服一丸,每日一至三次,温开水送下。

【贮藏】 密闭,贮于阴凉干燥处。

龟板胶

Guībǎn Jiāo

【处方】 龟板一百两

【制法】 取漂泡后的净龟板,用水冲洗,置锅中分次水煎,取煎出胶液,煎至胶质尽,去滓。将煎出胶液,过滤合并(或加入明矾细粉少许)静置,滤取清胶液,用文火浓缩(或加入适量黄酒、冰糖)至呈稠膏状,倾入凝胶槽内,俟其自然冷凝,取出,分切为小块,阴干,即得。每块重约一钱五分。

【功能】 滋阴补血。

【主治】 阴虚血亏,骨蒸潮热,虚弱脱肛,妇女崩漏。

【用法与用量】 每服一至三钱,每日一至二次,温开水或黄酒化服。或遵医嘱配合

应用。

【贮藏】 密闭，貯于阴凉干燥处。

龟鹿二仙胶

Guīlù Èrxīān Jiāo

【处方】 龟板八十两 鹿角一百六十两 枸杞子二十四 人参十五两

【制法】 取龟板、鹿角按龟板胶、鹿角胶项下制法处理，煎至稠膏状。人参、枸杞子二味，分次水煎，取煎出液，至味尽，去滓。将煎出液过滤合并。用文火浓缩成清膏，倾入上列龟板、鹿角稠膏内（或加入适量黄酒、冰糖），再以文火浓缩呈稠膏状，倾入凝胶槽内，俟其自然冷凝，取出，分切为小块，阴干，即得。每块重约一钱五分。

【功能】 滋补精髓。

【主治】 肾气衰弱，腰背痠疼，遗精目眩。

【用法与用量】 每服一至三钱，温开水或黄酒化服。或遵医嘱配合应用。

【贮藏】 密闭，貯于阴凉干燥处。

兔脑丸

Tùnnǎo Wán

【处方】 兔脑髓一个 母丁香一钱五分 乳香二钱五分 麝香一钱

【制法】 以上四味，将母丁香、乳香分研细粉，过筛。将麝香与母丁香细粉配研，研细过筛。再与乳香细粉，混合均匀。取新鲜兔脑髓去膜捣烂为丸，即得。每丸重一分。蜡皮封固（本品宜在冬季制备）。

【功能】 催生。

【主治】 临产艰难。

【用法与用量】 每服一丸，临产时用温黄酒送下，逾二小时不产，再服一丸。

【注意】 遵医嘱服。

【贮藏】 貯于阴凉干燥处。

纯阳正气丸

Chúnyáng Zhèngqì Wán

【处方】 藿香十两 姜半夏十两 青木香十两 陈皮十两 丁香十两 肉桂十两

苍朮十兩 白朮十兩 茯苓十兩 朱砂一兩 硝石一兩 礞砂六錢
明雄黃六錢 煅金礞石四錢 麝香三錢 冰片三錢

【制法】 以上十六味，朱砂研細水飞或研至極細粉。明雄黃研細水飞或研細粉，过篩。礞砂、金礞石研細粉，过篩。將麝香、冰片与上列各細粉配研，研細过篩。然后将硝石研細粉，过篩后掺入，混合均匀。

其余藿香等九味共研細粉，过篩。混合均匀。另取花椒五兩，分次水煎取煎出液，至味尽，去滓。用煎出液泛为細小丸，晒干或低温干燥。用上列朱砂、明雄黃等細粉为衣，即得。

【功能】 辟秽散寒，止痛止泻。

【主治】 暑月受凉，腹痛吐泻，恶寒头痛，肢体痠重。

【用法与用量】 每服一錢，每日一至二次，温开水送下。

【注意】 孕妇忌用。

【贮藏】 密闭，防潮。

河车大造丸

Héchē Dàzào Wán

【处方】 紫河车一兩 麦门冬一兩 黄柏一兩五錢 天门冬一兩
熟地黄二兩 牛膝一兩 杜仲一兩五錢 制龟板二兩

【制法】 以上八味，将熟地黄与处方内部分药物串研，晒干或低温干燥，再共研細粉，过篩。混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重三錢。

【功能】 滋补气血。

【主治】 虚損劳伤，腰痠腿軟，骨蒸潮热。

【用法与用量】 每服一丸，每日二次，温开水送下。

【贮藏】 密闭，貯于阴涼干燥处。

青 果 膏

Qīngguǒ Gāo

【处方】 鲜青果一百六十兩

【制法】 将鲜青果敲破，分次水煎取煎出液，至味尽，去滓。将煎出液过滤合并。另取蔗糖四十两，用滤液溶化，静置，滤取清液，用文火浓缩，收膏，即得。

【功能】 清咽止渴。

【主治】 咽喉肿痛，口燥舌干。

【用法与用量】 每服五钱至一两，每日二次，用温开水冲服。

【贮藏】 密闭，貯于阴凉干燥处。

青 娥 丸

Qīng'é Wán

【处方】 胡桃仁五两 补骨脂八两 杜仲十六两 大蒜四两

【制法】 以上四味，补骨脂、杜仲研成粗末，大蒜煮烂与上列粗末掺匀，晒干或低温干燥，研细粉，过筛。再与胡桃仁掺研，研细过筛。混合均匀，炼蜜为丸，即得。每丸重三钱。

【功能】 温肾暖腰。

【主治】 肾亏腰疼，虚寒带下。

【用法与用量】 每服一丸，每日一至二次，温开水送下。

【贮藏】 密闭，貯于阴凉干燥处。

拔 毒 膏

Bádú Gāo

【处方】	白蔹三两三钱	苍朮三两三钱	连翘三两三钱	黄芩三两三钱
	白芷三两三钱	木鳖子三两三钱	生穿山甲三两三钱	赤芍三两三钱
	栀子三两三钱	大黄三两三钱	蓖麻子三两三钱	金银花三两三钱
	生地黄三两三钱	当归三两三钱	黄柏三两三钱	黄连三两三钱
	蜈蚣六钱	乳香六钱	没药六钱	血竭六钱
	儿茶六钱	轻粉六钱	樟脑六钱	红粉六钱

【制法】 以上二十四味，将乳香、没药、血竭、儿茶、轻粉、红粉六味分研细粉，过筛。混合均匀。其余除樟脑外，将白蔹等十七味，酌予碎断，取麻油二百四十两，同置锅中（或浸泡三至十日）用文武火炸枯，去滓。滤净后炼至滴水成珠。另取黄丹（七十五两至一百

零五两),加入搅匀,收膏。将膏浸泡于水中。

取膏用文火熔化待温,加入樟脑及上列乳香等细粉,搅拌均匀。分摊于纸上,即得。
每张净重二分或五分。

【功能】 拔毒止痛。

【主治】 疔疽肿痛,已溃未溃,疼痛不止。

【用法与用量】 温热化开,贴于患处,每隔一至三日换药一次。

【贮藏】 贮于阴凉干燥处。

拨云散

Bōyún Sǎn

【处方】 冰片一两 麝香二分 熊胆二钱 制甘石十两

【制法】 以上四味,除麝香、冰片外,先取炉甘石适量煅后,用黄连煎液淬(每炉甘石十六两用黄连一两)飞净,晒干,取出十两。将熊胆用清水溶化,静置,取清汁与上列炉甘石粉拌匀,晒干或低温干燥,研为细粉。再将麝香、冰片与上列细粉配研,研至极细过筛。混合均匀,即得。

【功能】 明目退翳。

【主治】 暴发火眼,红肿痛痒,外障云翳。

【用法与用量】 取玻璃棒用凉开水浸湿后,蘸药少许,点入眼角,每日一至三次。

【贮藏】 密闭,贮于阴凉干燥处。

虎骨木瓜丸

Hǔgǔ Mùguā Wán

【处方】 制虎骨一两六钱 木瓜一两六钱 白芷一两六钱 海风藤一两六钱
制川乌八钱 威灵仙一两六钱 川芎一两六钱 制草乌八钱
当归一两六钱 清风藤一两六钱 牛膝二两二钱 党参二钱

【制法】 以上十二味,共研细粉,过筛。混合均匀,炼蜜为丸,即得。每丸重三钱。

【功能】 舒筋活血,散风止痛。

【主治】 手足麻木,腰膝疼痛,筋骨无力,步履艰难。

【用法与用量】 每服一丸，每日二次，温开水送下。

【注意】 孕妇忌用。

【贮藏】 密闭，貯于阴凉干燥处。

虎骨木瓜酒

Hǔgǔ Mùguā Jiǔ

【处方】 制虎骨一两 木瓜二两 川芎一两 川牛膝一两 当归一两
天麻一两 五加皮一两 红花一两 续断一两 白蒺藜一两
玉竹二两 秦艽五钱 防风五钱 桑枝四两

【制法】 以上十四味，共研粗末，与另取白酒三百二十两，共入缸内，密封，每日搅拌一次，一周后改为每周搅拌一次，经一月后，取出浸液，将残渣压榨，榨出液与浸液合并，再另取冰糖三十二两，化开加入搅匀，静置滤过，即得。

【功能】 追风定痛，除湿散寒。

【主治】 风寒湿气，流入经络，筋脉拘攣，四肢麻木，骨节痠痛，口眼喎斜，历节风痛。

【用法与用量】 每次温服五钱至一两，每日二次。

【注意】 孕妇忌用。

【贮藏】 密封，防止洩气。

虎骨酒

Hǔgǔ Jiǔ

【处方】 虎骨八两 薏苡仁八两 草薢八两 淫羊藿八两 熟地黄八两
陈皮八两 玉竹八两 牛膝八两 当归五钱 五加皮五钱
青皮五钱 川芎五钱 白芍五钱 制草乌五钱 木瓜五钱
枸杞子五钱 红花五钱 紫草五钱 制川乌五钱 续断五钱
羌活五钱 苍朮五钱 独活五钱 白芷五钱 补骨脂五钱
白花蛇五钱 杜仲五钱 乌药五钱 防风五钱 牡丹皮五钱
佛手五钱 人参五钱 砂仁五钱 檀香五钱 肉桂五钱
豆蔻五钱 木香五钱 丁香五钱 油松节四两 鹿茸五钱
乳香二两 没药二两 麝香二分 红麴二十两 红糖九十六两
蜂蜜一百六十两

【制法】 以上四十六味，将虎骨煎至稠膏状（煎法见 372 页虎骨胶）、薏苡仁至人参等三十一味共串研，砂仁至鹿茸等八味共研粗末，乳香、没药研细粉，过筛。将麝香与乳香、没药细粉配研，研细过筛。另取白酒一千七百六十两，与红糖、蜂蜜共置罐中，再将上列虎骨煎膏、薏苡仁、砂仁等碎粗末及乳香等细粉并入罐中，加盖，隔水加热数至酒沸，倾入缸内，密封，静置至少三个月，取清液，将残渣压榨，榨出液静置，与清液合并，滤过；或用渗漉法配制，即得。

【功能】 祛风除湿。

【主治】 风寒湿痹，手足麻木，筋骨疼痛，腰膝无力。

【用法与用量】 每次温服五钱，每日二次。

【注意】 孕妇及阴虚火旺者忌用。

【贮藏】 密封，防止洩气。

虎 骨 胶

Hǔgǔ Jiāo

【处方】 虎骨 一百两

【制法】 将虎骨置水中浸泡，刮除筋肉，锯段约长三至五寸，去髓，漂洗（或微煮）净，置锅中，分次水煎，取煎出胶液，煎至胶质尽。将煎出胶液过滤合并（或加明矾细粉少许）静置，滤取清胶液，用文火浓缩（或加入适量黄酒、冰糖）至呈稠膏状，倾入凝胶槽内，俟其自然冷凝，取出，分切为小块，阴干，即得。每块重约一钱五分。

【功能】 祛风除湿，壮健筋骨。

【主治】 筋骨衰弱，足胫无力，四肢麻木，风湿疼痛。

【用法与用量】 每服一至三钱，每日一至二次，温开水或黄酒化服。或遵医嘱配合应用。

【贮藏】 密闭，貯于阴凉干燥处。

虎 潜 丸

Hǔqián Wán

【处方】 黄柏八两 制龟板四两 知母二两 陈皮二两 白芍二两

锁阳一两五钱 干姜五钱 熟地黄二两 制虎骨一两

【制法】 以上九味，共研细粉，过筛；或将熟地黄与处方内部分药物串研，晒干或低温干燥，再共研细粉，过筛。混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重三钱。

【功能】 养阴潜阳，强筋壮骨。

【主治】 肾阴不足，筋骨痿软，精血亏损，骨蒸劳热。

【用法与用量】 每服一丸，每日二次，淡盐汤送下。

【贮藏】 密闭，貯于阴凉干燥处。

明目上清丸

Míngmù Shàngqīng Wán

【处方】 黄连一两 大黄一两 桔梗一两 甘草一两 荆芥一两 梔子一两
生石膏一两 菊花一两 枳壳一两 黄芩一两 当归一两 连翘一两
蝉蜕一两 车前子一两 玄参一两 陈皮一两 薄荷一两 赤芍一两
蒺藜一两 天花粉一两 麦门冬一两

【制法】 以上二十一味，共研细粉，过筛。或将车前子研细，再与黄连等二十味共研细粉，过筛。混合均匀。用冷开水泛为小丸，晒干或低温干燥，即得。

【功能】 清热散风，明目止痛。

【主治】 风热壅盛，眼目昏暗，迎风流泪，羞明怕光。

【用法与用量】 每服二至三钱，每日二次，温开水送下。

【贮藏】 密闭，防潮。

明目地黄丸

Míngmù Dìhuáng Wán

【处方】 熟地黄八两 茯苓三两 牡丹皮二两 泽泻三两 山药四两 山茱萸四两
白芍二两 菊花二两 当归二两 枸杞子三两 蒺藜二两 石决明四两

【制法】 以上十二味，共研细粉，过筛；或将熟地黄与处方内部分药物串研，晒干或低温干燥，再共研细粉，过筛。混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重三钱。

【功能】 滋肾平肝，祛风明目。

【主治】 目睛昏暗，肝虛目暗，視物模糊，內障云翳，迎風流淚，夜盲。

【用法与用量】 每服一丸，每日二次，溫開水送下。

【貯藏】 密閉，貯于陰涼干燥處。

金 不 換 膏

Jīnbùhuàn Gāo

【處方】 川芎五錢 生草烏五錢 半膝五錢 大黃五錢 生川烏五錢 香附五錢
續斷五錢 桑枝五錢 防風五錢 羌活五錢 山藥五錢 白芷五錢
遠志五錢 桃仁五錢 白薇五錢 何首烏五錢 熟地黃五錢 天麻五錢
當歸五錢 杜仲五錢 桃枝五錢 威靈仙五錢 生穿山甲五錢 烏藥五錢
蒼朮五錢 赤芍五錢 獨活五錢 槐枝五錢 榆枝五錢 苦參五錢
柳枝五錢 大風子五錢 紅花五錢 陳皮五錢 麻黃五錢 細辛五錢
五加皮五錢 清風藤五錢 連翹五錢 荊芥穗五錢 蜈蚣三分 僵蚕五錢
金銀花五錢 血竭六錢 乳香六錢 沒藥六錢 樟腦六錢 輕粉六錢

【制法】 以上四十八味，將血竭、乳香、沒藥、輕粉四味研細粉，過篩。其餘除樟腦外，將川芎等四十三味酌予碎斷，取麻油二百四十兩，同置鍋中（或浸泡三至十日）用文武火炸枯，去滓。濾淨后煉至滴水成珠。另取黃丹（七十五兩至一百零五兩），加入攪勻，收膏。將膏浸泡于水中。

取膏用文火熔化待溫，加入樟腦及上列血竭等細粉，攪和均勻。分攤于布上，即得。每張淨重五錢或一兩。

【功能】 祛風，活血，止痛。

【主治】 手足麻木，腰腿疼痛，跌打損傷。

【用法与用量】 溫熱化開，貼于患處，每隔五至七日換藥一次。

【貯藏】 貯于陰涼干燥處。

金 銀 花 露

Jīnyínhuā Lù

【處方】 金銀花十六兩

【制法】 將金銀花用蒸汽蒸溜法蒸取溜液，至金銀花氣味淡為度。取溜液分裝玻璃

瓶(滿裝),瓶口密閉,蜡封,即得。

【功能】 清熱解毒。

【主治】 一切瘡毒或壯熱口渴,小兒胎毒。

【用法與用量】 每服二至四兩,飲服,每日二至五次。

【貯藏】 密封,置于陰涼干燥處。

金匱腎氣丸(桂附地黄丸)

Jīnguì Shèngqì Wán

【處方】 熟地黄八兩 山藥四兩 山茱萸四兩 茯苓三兩
牡丹皮二兩 澤瀉三兩 肉桂一兩 制附子一兩

【制法】 以上八味,共研細粉,過篩;或將熟地黄與處方內部分藥物串研,晒干或低溫干燥,再共研細粉,過篩。混合均勻,煉蜜為丸,即得。每丸重三錢。

【功能】 益腎氣、補命門。

【主治】 命門火衰,腎虛腰痛,男子消渴小便多,女子轉胞不得溺。

【用法與用量】 每服一丸,每日二次,溫開水送下。

【貯藏】 密閉,貯于陰涼干燥處。

知柏地黄丸

Zhībǎi Dìhuáng Wán

【處方】 熟地黄八兩 山茱萸四兩 山藥四兩 牡丹皮三兩
茯苓三兩 澤瀉三兩 知母二兩 黃柏二兩

【制法】 以上八味,共研細粉,過篩;或將熟地黄與處方內部分藥物串研,晒干或低溫干燥,再共研細粉,過篩。混合均勻。煉蜜為丸,即得。每丸重三錢。

【功能】 滋陰降火。

【主治】 陰虛火動,骨蒸勞熱,虛煩盜汗,腰脊痠痛。

【用法與用量】 每服一丸,每日二次,溫開水送下。

【貯藏】 密閉,貯于陰涼干燥處。

肥 儿 丸

Féi'ér Wán

【处方】 肉豆蔻五两 使君子仁十两 麦芽五两 胡黄连十两

六神麴十两 槟榔五两 木香二两

【制法】 以上七味，共研细粉，过筛。混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重一钱。

【功能】 健脾益胃，消疳杀虫。

【主治】 小儿脾胃虚弱，面黄肌瘦，腹大露筋，食少泄泻。

【用法与用量】 每服一至二丸，每日一至二次，温开水送下。三岁以下小儿酌减。

【贮藏】 密闭，贮于阴凉干燥处。

狗 皮 膏

Gǒupí Gāo

【处方】 枳壳一两 青皮一两 大风子一两 赤石脂一两 赤芍一两 天麻一两

甘草一两 乌药一两 牛膝一两 羌活一两 黄柏一两 补骨脂一两

威灵仙一两 生川乌一两 木香一两 续断一两 白薇一两 桃仁一两

生附子一两 川芎一两 生草乌一两 杜仲一两 远志一两 生穿山甲一两

香附一两 白朮一两 肉桂一两 川楝子一两 蜜蛭一两 茴香一两

蛇床子一两 当归一两 细辛一两 菟丝子一两 陈皮一两 清风藤一两

轻粉五钱 儿茶五钱 丁香五钱 樟脑五钱 没药五钱 血竭五钱

乳香五钱

【制法】 以上四十三味，将轻粉、儿茶、丁香、没药、血竭、乳香、肉桂七味，研细粉，过筛。混合均匀。其余除樟脑外，将枳壳等三十五味，均予碎断，取麻油二百四十两，同置锅中（或浸泡三至十日）用文武火炸枯，去滓。滤净后炼至滴水成珠。另取黄丹（七十五两至一百零五两），加入搅匀，收膏。将膏浸泡于水中。

取膏用文火熔化待温，加入樟脑及上列细粉等细粉，搅和均匀。分摊于狗皮（或其他兽皮）上，即得。每张净重五钱或一两。

【功能】 祛风散寒，舒筋活血，止痛。

【主治】 风寒湿痹，腰腿疼痛，肌肤麻木，跌扑损伤。

【用法与用量】 温热水化开，贴于患处，每隔七至十日换药一次。

【贮藏】 貯于阴凉干燥处。

参 苏 丸 (参苏理肺丸)

Shēnsū Wán

【处方】 党参七錢五分 紫苏叶七錢五分 葛根七錢五分 前胡七錢五分
法半夏七錢五分 茯苓七錢五分 枳壳五錢 橘红五錢
桔梗五錢 甘草五錢 大枣(去核)三錢 木香五錢

【制法】 以上十二味，共研細粉，过篩。混合均匀。另取鲜生姜三錢切碎，分次水煎取煎出液，至味尽，去滓。用煎出液泛为小丸。晒干或低温干燥，即得。

【功能】 解表止嗽。

【主治】 感冒風寒，头痛发热，嘔逆咳嗽，痰滞胸悶。

【用法与用量】 每服二至三錢，每日一至二次，温开水送下。

【贮藏】 密閉，防潮。

参 苓 白 朮 散

Shēnlíng Báizhú Sǎn

【处方】 人參三兩二錢 茯苓三兩二錢 白朮三兩二錢 白扁豆二兩四錢 甘草三兩二錢
山药三兩二錢 蓮子一兩六錢 桔梗一兩六錢 砂仁一兩六錢 薏苡仁一兩六錢

【制法】 以上十味，共研細粉，过篩。混合均匀，即得。

【功能】 調补脾胃。

【主治】 脾胃虛弱，飲食不消，或吐或泄，形瘦色萎，神疲乏力。

【用法与用量】 每服二至三錢，每日一至二次，温开水冲服。

【贮藏】 密閉，防潮。

参 耆 膏

Shēnqí Gāo

【处方】 党参五十兩 黄耆五十兩

【制法】 以上二味，酌予切碎，分次水煎取煎出液，至味尽，去滓。将煎出液过滤合并。用文火浓缩成清膏，另加与清膏等量的蜂蜜，收膏，即得。

【功能】 补益元气。

【主治】 气虚体弱，四肢无力。

【用法与用量】 每服三钱，每日二次，温开水冲服。

【贮藏】 密闭，貯于阴凉干燥处。

济生肾气丸

Jìshēng Shèngqì Wán

【处方】 熟地黄四两 茯苓三两 山药二两 山茱萸一两 牡丹皮一两五钱

泽泻一两五钱 牛膝一两 车前子一两 制附子五钱 肉桂五钱

【制法】 以上十味，共研细粉，过筛；或将车前子另研细，熟地黄与处方内部分药物中研，晒干或低温干燥，再共研细粉，过筛。混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重三钱。

【功能】 温补肾阳，化气行水。

【主治】 肾虚肿满，阳痿精冷，腰腿痠软，小便频数。

【用法与用量】 每服一九，每日二次，温开水送下。

【贮藏】 密闭，貯于阴凉干燥处。

神犀丹

Shénxī Dān

【处方】 犀角六两 九节菖蒲六两 黄芩六两 生地黄十六两 金银花十六两 连翘十两

板蓝根九两 淡豆豉八两 玄参七两 天花粉四两 紫草四两

【制法】 以上十一味，除生地黄外，犀角锉研细粉，过筛。其余九节菖蒲等九味，共研细粉，过筛。与上列犀角细粉配研，混合均匀。将生地黄用冷水浸透，再酌加冷开水分次压榨取汁泛为小丸，晒干或低温干燥，即得。

【功能】 清热解毒。

【主治】 湿温暑疫，高热不退，痲疯昏狂，谵语发斑。

【用法与用量】 每服三钱，每日一至二次，温开水送下。小儿酌减。

【贮藏】 密闭，防潮。

茴香橘核丸

Huixiang Juhé Wán

【处方】 茴香八錢 橘核一兩 厚朴五錢 桃仁一兩 昆布一兩
木通五錢 肉桂五錢 川楝子一兩 延胡索五錢 海藻一兩
木香五錢 枳實五錢 海帶一兩

【制法】 以上十三味，共研細粉，過篩；或將桃仁另研，茴香等十二味，研細粉，過篩，再與桃仁摻研，研細過篩。混合均勻。另取精白面一兩、黃酒二兩加適量水，打稀糊泛為小丸。曬干或低溫干燥，即得。

【功能】 消腫散寒，順氣止痛。

【主治】 寒濕下注，小腸疝氣，睪丸腫大，堅硬疼痛。

【用法與用量】 每服二至三錢，每日二次，空腹時溫開水送下。

【貯藏】 密閉，防潮。

柏子養心丸

Bǎizi Yǎngxīn Wán

【处方】 柏子仁二錢五分 黃耆一兩 茯苓二兩 酸棗仁二錢五分
川芎一兩 當歸一兩 半夏蠟一兩 甘草一錢
黨參二錢五分 肉桂二錢五分 五味子二錢五分 遠志二錢五分

【制法】 以上十二味，共研細粉，過篩；或將柏子仁、酸棗仁另研，黃耆等十味研細粉，過篩，再與柏子仁、酸棗仁摻研，研細過篩。混合均勻。煉蜜為丸，即得。每丸重三錢。

【功能】 補氣養血，安神益智。

【主治】 心氣不足，精神恍惚，怔忡驚悸，失眠健忘。

【用法與用量】 每服一丸，每日一至二次，溫開水送下。

【貯藏】 密閉，貯于陰涼干燥處。

胃 苓 丸

Wèilíng Wán

【处方】 蒼朮一兩五錢 厚朴一兩五錢 陳皮一兩五錢 白朮一兩五錢 茯苓一兩五錢

泽泻一两 猪苓一两 甘草六钱 肉桂五钱

【制法】 以上九味，共研细粉，过筛。混合均匀。用冷开水泛为小丸。晒干或低温干燥，即得。

【功能】 消胀利水。

【主治】 呕吐泄泻，胸腹胀满，小便短少。

【用法与用量】 每服二钱，每日一至二次，温开水送下。

【贮藏】 密闭，防潮。

香 连 丸

Xiānglián Wán

【处方】 萸黄连二两 木香五钱

【制法】 以上二味，共研细粉，过筛。混合均匀。用米醋二两酌加冷开水泛为小丸。晒干或低温干燥，即得。

【功能】 清化湿热。

【主治】 下痢赤白，脓血相杂，里急后重。

【用法与用量】 每服一至二钱，每日一至三次，温开水送下。

【贮藏】 密闭，防潮。

香 附 丸

Xiāngfù Wán

【处方】 香附四十八两 当归三十二两 川芎八两 白芍十六两 白朮十六两

熟地黄十六两 砂仁四两 陈皮八两 黄芩八两

【制法】 以上九味，共研细粉，过筛。混合均匀。用适量黄酒泛为小丸。晒干或低温干燥，即得。

【功能】 调气和血。

【主治】 血虚气滞，经来腹痛。

【用法与用量】 每服二至三钱，每日一至二次，黄酒或温开水送下。

【贮藏】 密闭，防潮。

香苏正胃丸

Xiāngsū Zhèngwèi Wán

【处方】 藿香八两 香薷八两 紫苏叶十六两 陈皮四两 白扁豆四两
厚朴八两 枳壳二两 砂仁二两 茯苓一两 山楂二两
六神曲二两 麦芽二两 滑石六两六钱 甘草一两一钱 朱砂三钱三分

【制法】 以上十五味，朱砂研细水飞或研至极细粉。其余藿香等十四味共研细粉，过筛。再与上列朱砂细粉配研，混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重一钱。

【功能】 解表和中，消食行滞。

【主治】 小儿感冒暑湿，停乳停食，头痛身热，呕吐泄泻，腹痛腹胀，小溲不利。

【用法与用量】 每服一九，每日一至二次，温开水送下。周岁以内酌减。

【贮藏】 密闭，貯于阴凉干燥处。

香砂六君子丸

Xiāngshā Liùjūnzǐ Wán

【处方】 党参一两 茯苓二两 法半夏一两 白朮二两
甘草七钱 陈皮八钱 木香七钱 砂仁八钱

【制法】 以上八味，共研细粉，过筛，混合均匀。另取鲜生姜一钱切碎，大枣二钱，分次水煎取煎出液，至味尽，去滓。用煎出液泛为小丸，晒干或低温干燥，即得。

【功能】 补脾和胃。

【主治】 脾胃虚弱，痰饮内停，胸脘胀闷，饮食不化，呕吐泄泻。

【用法与用量】 每服二至三钱，每日二次，温开水送下。

【贮藏】 密闭，防潮。

香砂养胃丸

Xiāngshā Yǎngwèi Wán

【处方】 白朮一两 陈皮一两 茯苓一两 法半夏一两 香附七钱 砂仁七钱

木香七錢 枳實七錢 豆蔻(去壳)七錢 厚朴七錢 藿香七錢 甘草三錢

【制法】 以上十二味，共研細粉，過篩。混合均勻。另取鮮生姜三錢切碎，大棗五錢，分次水煎取煎出液，至味盡，去滓。用煎出液泛為小丸。曬干或低溫干燥，即得。

【功能】 溫中和胃。

【主治】 不思飲食，嘔吐酸水，胃脘滿悶，四肢倦怠。

【用法與用量】 每服三錢，每日二次，溫開水送下。

【貯藏】 密閉，防潮。

保和丸

Bǎohé Wán

【處方】 山楂六兩 六神麵二兩 法半夏三兩 茯苓三兩

陳皮一兩 連翹一兩 萊菔子一兩

【制法】 以上七味，共研細粉，過篩。混合均勻。用冷開水泛為小丸。曬干或低溫干燥，即得。

【功能】 消食積，和脾胃。

【主治】 宿食不消，胸膈痞滿，噯氣吞酸，不思飲食。

【用法與用量】 每服二錢，每日一至二次，溫開水送下。

【貯藏】 密閉，防潮。

獨活寄生丸

Dúhuó Jìshēng Wán

【處方】 獨活三兩 桑寄生三兩 杜仲三兩 牛膝三兩 細辛三兩

秦艽三兩 茯苓三兩 肉桂三兩 防風三兩 川芎三兩

黨參三兩 甘草三兩 當歸三兩 白芍三兩 熟地黃三兩

【制法】 以上十五味，共研細粉，過篩；或將熟地黃與處方內部分藥物串研，曬干或低溫干燥，再共研細粉，過篩。混合均勻。煉蜜為丸，即得。每丸重三錢。

【功能】 養血舒筋，祛風逐濕。

【主治】 風寒濕痹，腰膝冷痛，關節不利。

【用法与用量】 每服一丸，每日一至二次，温开水送下。

【贮藏】 密闭，貯于阴凉干燥处。

绉 矾 丸

Jiàngfán Wán

【处方】 煅皂矾六两 苍朮六两 厚朴二两 陈皮二两 甘草一两

【制法】 以上五味，共研细粉，过筛。混合均匀。另取红枣四两，分次水煎取煎出液，至味尽，去滓。和精白面五两打糊为小丸，晒干或低温干燥，即得。

【功能】 运脾化湿。

【主治】 萎黄浮肿，心悸气促，肢体懈懒，或能食而无力，或嗜好香物及生米。

【用法与用量】 每服一至二钱，每日一至二次，温开水送下。

【贮藏】 密闭，防潮。

涌 泉 散

Yǒngquán Sǎn

【处方】 当归六两四钱 制穿山甲六两四钱 王不留行六两四钱 川芎三两八钱

【制法】 以上四味，共研细粉，过筛。混合均匀，即得。

【功能】 养血，活血，催乳。

【主治】 妇女乳汁不通。

【用法与用量】 每服一钱，每日三次，温黄酒冲服。

【注意】 本品不宜常服；气血虚弱者慎用。

【贮藏】 密闭，防潮。

消 癭 顺 气 散

Xiāoyíng Shùnrì Sǎn

【处方】 生地黄二两 浙贝母二两 海粉一两五钱 海藻一两五钱

昆布一两五錢 浮海石一两五錢 海带一两五錢

【制法】 以上七味，共研細粉，过篩。混合均匀，即得。

【功能】 消癭散結。

【主治】 瘰癧癰癰初起、皮色不变者。

【用法与用量】 每服一至二錢，每日二次，温开水冲服。

【貯藏】 密閉，防潮。

燙 火 散

Tànghuǒ Sǎn

【处方】 地榆炭八兩 黃柏四兩 大黃二兩 寒水石二兩 生石膏四兩

【制法】 以上五味，共研細粉，过篩。混合均匀，即得。

【功能】 清解火毒。

【主治】 燙傷火灼。

【用法与用量】 用麻油調敷患处。

【貯藏】 密閉，防潮。

调 经 养 血 膏

Tiáojīng Yǎnxuè Gāo

【处方】 当归四錢 香附三錢 丹参二錢 陈皮一錢五分 白朮二錢

延胡索三錢 党参三錢 续断三錢 白芍三錢 柴胡一錢

牡丹皮三錢 川芎二錢 阿胶三錢 益母草六錢

【制法】 以上十四味，除阿胶外，当归等十三味分別酌予碎断，分次水煎取煎出液，至味尽、去滓。将煎出液过滤合并。另取赤砂糖十六兩，用滤液溶化，靜置，滤取清液，再将阿胶加入化开，用文火濃縮，收膏，即得。

【功能】 养血調經。

【主治】 月經不調，赤白帶下，腹痛腰痠。

【用法与用量】 每服三錢，每日二次，温开水冲服。

【貯藏】 密閉，貯于阴涼干燥处。

养阴清肺膏

Yǎngyīn Qīngfèi Gāo

【处方】 生地黄一两 浙贝母四钱 玄参八钱 麦门冬六钱
牡丹皮四钱 甘草二钱 白芍四钱 薄荷二钱五分

【制法】 以上八味，分别酌予碎断，分次水煎取煎出液，至味尽，去滓。将煎出液过滤合并。用文火浓缩成清膏，另加与清膏等量的蜂蜜，收膏，即得。

【功能】 清热润肺。

【主治】 咳嗽上气，咽喉肿痛。

【用法与用量】 每服三至五钱，每日二次，温开水冲服。

【贮藏】 密闭，貯于阴凉干燥处。

益元散

Yìyuán Sǎn

【处方】 滑石六两 甘草一两 朱砂三钱

【制法】 以上三味，滑石、甘草共研细粉，过筛。朱砂研细水飞或研至极细粉，再与上列细粉配研，过筛。混合均匀，即得。

【功能】 清暑利水。

【主治】 暑热烦渴，小便不利。

【用法与用量】 每服二钱，每日一至二次，开水冲服。

【贮藏】 密闭，防潮。

益母草膏

Yìmǔcǎo Gāo

【处方】 益母草一百两

【制法】 将益母草切碎，分次水煎取煎出液，至味尽，去滓。将煎出液过滤合并。用

文火濃縮成清膏，另加與清膏等量的蜂蜜，收膏，即得。

【功能】 去瘀生新。

【主治】 婦女痛經及產後瘀血腹痛。

【用法與用量】 每服三錢，每日一至二次，溫開水沖服。

【貯藏】 密閉，貯于陰涼干燥處。

珠 黃 散

Zhūhuáng Sǎn

【處方】 珍珠一兩 牛黃一兩

【制法】 以上二味，分別研為極細粉，過篩。混合均勻，即得。

【功能】 解毒化腐。

【主治】 咽喉腫痛癰爛。

【用法與用量】 每用適量，吹敷患處。

【貯藏】 密閉，防潮。

荷 叶 丸

Héyè Wán

【處方】 荷葉十六兩 藕節三兩二錢 大蓳炭二兩四錢 小蓳炭二兩四錢
知母三兩二錢 黃芩炭三兩二錢 生地黄炭四兩八錢 棕櫚炭四兩八錢
焦梔子三兩二錢 京墨四錢 白茅根炭四兩八錢 玄參四兩八錢
白芍三兩二錢 當歸一兩六錢

【制法】 以上十四味，將荷葉取出一半炒炭；一半用黃酒十二兩浸拌，裝入罐中，加蓋封閉，隔水加熱燉至酒盡，取出，曬干或低溫干燥。與其余藕節等十三味，共研細粉，過篩。混合均勻。煉蜜為丸，即得。每丸重三錢。

【功能】 清熱涼血、去瘀止血。

【主治】 吐血，咯血，衄血，痰中帶血，溺血，腸風便血，痔瘡出血。

【用法與用量】 每服一丸，每日二次，溫開水送下。

【貯藏】 密閉，貯于陰涼干燥處。

夏 枯 草 膏

Xiàkūcǎo Gāo

【处方】 夏枯草一斤两

【制法】 将夏枯草切碎，分次水煎取煎出液，至味尽，去滓。将煎出液过滤合并。用文火浓缩成清膏，另加与清膏等量的蜂蜜，收膏，即得。

【功能】 清火散结。

【主治】 癰瘤瘰癧，結核肿痛。

【用法与用量】 每服三錢，每日二次，溫开水冲服。

【貯藏】 密閉，貯于阴涼干燥处。

桑 椹 膏

Sāngrèn Gāo

【处方】 黑桑椹十斤

【制法】 将桑椹分次水煎取煎出液，至味尽，去滓。将煎出液过滤合并。用文火浓缩成清膏。另加蜂蜜四斤，收膏，即得。

【功能】 养血润燥。

【主治】 血虛生風，血癰、風癰，肝腎两亏，腰腿痠軟，老年腸枯，大便秘結。

【用法与用量】 每服三錢，每日二次，溫开水冲服。

【貯藏】 密閉，貯于阴涼干燥处。

通 关 散

Tōngguān Sǎn

【处方】 细辛十两 猪牙皂二十两 薄荷四两 麝香二錢

【制法】 以上四味，除麝香外，細辛等三味共研細粉，过篩。将麝香与上列細粉配研，研細过篩。混合均匀，即得。

【功能】 开窍取嚏。

【主治】 中風痰厥，昏迷不省。

【用法与用量】 每用少許，吹鼻取嚏。

【注意】 孕妇慎用。

【貯藏】 密閉，防潮。

通经甘露丸

Tōngjīng Gānlù Wán

【处方】 当归四两 桃仁四两 酒大黄四两 牡丹皮四两 煅干漆四两

肉桂四两 牛膝四两 三棱五钱 莪朮一两 红花四两

【制法】 以上十味，共研細粉，过篩；或将桃仁另研，当归等九味研細粉，过篩，再与桃仁掺研，研細过篩。混合均匀。用冷开水泛为小丸。晒干或低温干燥，即得。

【功能】 化瘀通經。

【主治】 妇人經閉，少腹脹痛，午后发热。

【用法与用量】 每服二至三錢，每日一至二次，温开水送下。

【注意】 孕妇忌用。

【貯藏】 密閉，防潮。

通宣理肺丸

Tōngxuān Lǐfèi Wán

【处方】 紫苏叶十四两四钱 黄芩九两六钱 枳壳九两六钱 甘草七两二钱

陈皮九两六钱 桔梗九两六钱 茯苓九两六钱 苦杏仁七两二钱

前胡九两六钱 麻黄九两六钱 法半夏七两二钱

【制法】 以上十一味，共研細粉，过篩；或将苦杏仁另研，紫苏叶等十味研細粉，过篩，再与苦杏仁掺研，研細过篩。混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重二錢。

【功能】 解热止咳。

【主治】 外感咳嗽，发热恶寒，头痛无汗，肢体疼痛。

【用法与用量】 每服一至二丸，每日一至二次，温开水送下。

【貯藏】 密閉，貯于阴凉干燥处。

逍 遙 丸

Xiāoyáo Wán

【处方】 当归一两 白芍一两 柴胡一两 白朮一两
茯苓一两 甘草八錢 薄荷二錢

【制法】 以上七味，共研細粉，过篩。混合均匀。用冷开水泛为小丸。晒干或低温干燥，即得。

【功能】 解郁和中，理血調經。

【主治】 肝郁不舒，月經不調，胸腹脹痛，午后煩熱。

【用法与用量】 每服二至三錢，每日一至二次，溫开水送下。

【貯藏】 密閉，防潮。

铁 笛 丸

Tiědí Wán

【处方】 诃子肉一两 茯苓一两 桔梗二兩 青果四錢 麦門冬一两
川貝母二兩 黃柏一两 栝樓皮一两 甘草二兩 玄參一两

【制法】 以上十味，共研細粉，过篩。混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重一錢。

【功能】 潤肺利咽。

【主治】 失音声啞。

【用法与用量】 每服一丸，每日二次，溫开水送下。

【貯藏】 密閉，貯于阴涼干燥处。

脏 连 丸

Zànglián Wán

【处方】 黃芩二十四兩 槐角十六兩 生地黄十二兩 槐花十二兩 赤芍八兩
阿膠八兩 地榆炭十二兩 当归八兩 荆芥穗八兩 黃連四兩

【制法】 以上十味，共研粗末，另取猪大腸將粗末装入腸內，两头扎住，蒸熟切碎。

干，共研細粉，过篩。混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重三錢。蜡皮封固。

【功能】 清热，止血。

【主治】 臟毒下血，肛門墜痛，痔瘡焮肿。

【用法与用量】 每服一丸，每日一至二次，温开水送下。

【貯藏】 密闭，貯于阴凉干燥处。

健 脾 丸

Jiànpí Wán

【处方】 党参二两 麦芽二两 白朮二两 陈皮二两 山楂一两五錢 枳实二两

【制法】 以上六味，共研細粉，过篩。混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重三錢。

【功能】 健脾开胃。

【主治】 脾胃虚弱，胸腹胀滿，食少便溏。

【用法与用量】 每服一丸，每日二次，温开水送下，小儿酌减。

【貯藏】 密闭，貯于阴凉干燥处。

清 宁 丸

Qīngníng Wán

【处方】 大黄一百九十二两 绿豆八两 车前草八两 白朮八两 法半夏八两

黑豆八两 香附八两 桑叶八两 桃枝一两六錢 牛乳十六两

厚朴八两 麦芽八两 陈皮八两 侧柏叶八两

【制法】 以上十四味，将大黄碎为小块。另取黄酒一百九十二两，与大黄拌于罐中，加盖封固。隔水加热燉至酒尽，取出。晒干或低温干燥。其余除牛乳外，将绿豆等十二味，分别酌予碎断，分次水煎取煎出液，至味尽，去滓。将煎出液过滤合并，用文火适当濃縮后，加入牛乳，浸拌上列制成的大黄，再入罐中，加盖封固，按上法燉至液尽，取出，晒干或低温干燥，研細粉，过篩。炼蜜为丸，即得。每丸重三錢。

【功能】 去五臟湿热秽浊。

【主治】 飲食停滯，胸脘脹痛，头晕口干，二便秘結。

【用法与用量】 每服一丸，每日一至二次，温开水送下。

【注意】 孕妇忌用。

【貯藏】 密闭，貯于阴凉干燥处。

清肺抑火丸

Qīngfèi yìhuǒ Wán

【处方】 黄芩二十二两四錢 梔子十二两八錢 知母九两六錢 浙贝母十四两四錢
黄柏六两四錢 桔梗十二两八錢 苦参九两六錢 前胡六两四錢
天花粉十二两八錢 大黃十九两二錢

【制法】 以上十味，共研細粉，过篩。混合均匀。用冷开水泛为小丸。晒干或低温干燥，即得。

【功能】 清热止嗽，通便。

【主治】 咳嗽痰粘，咽喉疼痛，口干便秘。

【用法与用量】 每服二錢，每日二次，温开水送下。

【貯藏】 密闭，防潮。

清胃黄连丸

Qīngwèi Huánglián Wán

【处方】 黄连八两 生地黄八两 桔梗八两 玄参八两 黄柏二十两
牡丹皮八两 生石膏八两 知母八两 梔子二十两 甘草四两
连翘八两 天花粉八两 赤芍八两 黄芩二十两

【制法】 以上十四味，共研細粉，过篩。混合均匀。用冷开水泛为小丸。晒干或低温干燥，即得。

【功能】 清胃解热，消肿止痛。

【主治】 口燥舌干，咽喉肿痛，牙龈腐烂。

【用法与用量】 每服三錢，每日二次，温开水送下。

【貯藏】 密闭，防潮。

清 眩 丸

Qīngxuàn Wán

【处方】 川芎二两 薄荷一两 白芷二两 荆芥穗一两 生石膏一两

【制法】 以上五味，共研細粉，过篩。混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重二錢。

【功能】 散風清热。

【主治】 風熱上攻，头目眩暈，偏正头痛，鼻塞不通。

【用法与用量】 每服一至二丸，每日一至二次，温开水送下。

【貯藏】 密閉，貯于阴涼干燥处。

痔漏丸

Zhìlòu Wán

【处方】 大黃四兩 槐花四兩 胡黃連四兩 當歸四兩 桃仁三兩
象牙屑三兩 郁李仁三兩 芒硝三兩 石決明三兩 荊芥穗五錢
雄黃五錢 乳香一兩 沒藥一兩 制刺楸皮一兩 制穿山甲一兩
滑石一兩 京墨二兩

【制法】 以上十七味，雄黃研細水飛或研細粉，过篩。大黃等十六味共研細粉，过篩；或將桃仁、郁李仁另研，大黃等十四味研細粉，过篩。與桃仁、郁李仁摻研，研細过篩。再將上列雄黃細粉與大黃等細粉配研，混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重三錢。

【功能】 清火解毒，化痔散結。

【主治】 痔漏腫痛，大便下血。

【用法与用量】 每服一丸，每日二次，温开水送下。

【貯藏】 密閉，貯于阴涼干燥处。

麻仁丸

Má rén Wán

【处方】 火麻仁三兩二錢 大黃三兩二錢 白芍三兩二錢
厚朴一兩六錢 枳實三兩二錢 苦杏仁一兩六錢

【制法】 以上六味，除火麻仁、苦杏仁外，其余大黃等四味研細粉，过篩；再與火麻仁、苦杏仁摻研，研細过篩。混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重三錢。

【功能】 潤腸通便。

【主治】 津液干枯，大便乾結。

【用法与用量】 每服一丸，每日一至二次，温开水送下，空腹服用。

【貯藏】 密閉，貯于阴涼干燥处。

鹿 角 胶

Lùjiǎo Jiāo

【处方】 鹿角一百两

【制法】 将鹿角锯段，约长三至五寸，置水中漂泡，每日搅动并换水一至二次，漂至水清，取出，置锅中分次水煎，取煎出胶液，煎至胶质尽。将煎出胶液，过滤合并（或加入明矾细粉少许）静置，滤取清胶液，用文火浓缩（或加入适量黄酒、冰糖）至呈稠膏状，倾入凝胶槽内，俟其自然冷凝，取出，分切为小块，阴干，即得。每块重约一钱五分。

【功能】 补血添精。

【主治】 肾气不足，阴萎羸瘦，妇女子宫虚冷，崩漏带下。

【用法与用量】 每服一至二钱，每日一至二次，温开水或黄酒化服。或遵医嘱配合应用。

【贮藏】 密闭，貯于阴凉干燥处。

控 涎 丹(子龙丸)

Kòngxián Dān

【处方】 制甘遂一两 白芥子一两 醋大戟一两

【制法】 以上三味，共研细粉，过筛；或将甘遂、醋大戟研细粉，过筛，再与白芥子掺研，研细过筛，混合均匀。另取黄米粉八钱，打糊或蒸饼糊为小丸。晒干或低温干燥，即得。

【功能】 逐痰蠲饮。

【主治】 停痰伏饮，咳嗽胁痛，瘰癧痰核，癰瘤。

【用法与用量】 每服五分至一钱，每日一至二次，温开水送下。

【注意】 孕妇忌用。

【贮藏】 密闭，防潮。

梅花点舌丹

Méihuā Diǎnshé Dān

【处方】 冰片一两 硼砂一两 葶藶子一两 沉香一两 血竭一两 乳香一两 没药一两

牛黄二两 麝香二两 珍珠三钱 朱砂二两 明雄黄一两 蟾酥二两 熊胆一两

【制法】 以上十四味，硃砂、葶藶子、沉香、血竭、乳香、没药研细粉，过筛；或将葶藶子另研细，再共研细粉，过筛。珍珠研为极细粉，朱砂研细水飞或研至极细粉，明雄黄研细水飞或研细粉，过筛。将冰片、牛黄、麝香、熊胆与上列各细粉配研，研细过筛。混合均匀。蟾酥用白酒或牛乳化开（或研细粉混合上列细粉内）酌加冷开水泛为小丸，阴干，金箔为衣，即得。每丸重三厘。

【功能】 清热解毒。

【主治】 疔疮发背，痈疽肿毒。

【用法与用量】 每服三丸，每日一至二次，温开水送下。外用时用醋化开敷上。

【注意】 孕妇忌内服。

【贮藏】 密闭，貯于阴凉干燥处。

梔子金花丸

Zhīzi Jīnhuā Wán

【处方】 梔子二十八两八钱 黄柏十四两四钱 黄连一两二钱 黄芩二十八两八钱
天花粉十四两四钱 大黄二十八两八钱 知母九两六钱

【制法】 以上七味，共研细粉，过筛。混合均匀。用冷开水泛为小丸。晒干或低温干燥，即得。

【功能】 清热润燥。

【主治】 头昏目眩，烦躁不寐，梦语咬牙，惊悸，吐血，衄血，牙痛，咽肿。

【用法与用量】 每服二至三钱，每日一至二次，温开水送下。

【贮藏】 密闭，防潮。

银翘解毒丸

Yínqiào Jiědú Wán

【处方】 金银花一两 连翘一两 甘草五钱 荆芥穗四钱 桔梗六钱
淡豆豉五钱 薄荷六钱 牛蒡子六钱 淡竹叶四钱

【制法】 以上九味，共研细粉，过筛；或将牛蒡子另研，金银花等八味，研细粉，过筛，

再与牛蒡子掺研，研细过筛。混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重二钱。

【功能】 辛凉解表。

【主治】 温病初起，憎寒发热，头痛咳嗽，咽喉疼痛。

【用法与用量】 每服一丸，每日一至二次，温开水送下。

【贮藏】 密闭，防潮。

痧 气 丸 (痧药)

Shāqì Wán

【处方】 天麻三钱 苍朮三钱 麻黄三钱六分 大黄六钱 甘草四钱四分
丁香六钱 麝香三钱 朱砂三钱六分 麝酥九钱 明雄黄三钱六分

【制法】 以上十味，除麝香、麝酥、朱砂外，明雄黄研细水飞或研细粉，过筛。其余天麻等六味共研细粉，过筛。将麝香与上列各细粉配研，研细过筛。混合均匀。麝酥用白酒或牛乳化开（或研细粉混合上列细粉内），酌加冷开水泛为细丸。阴干。再将朱砂研细水飞或研至极细粉为衣，打光，即得。

【功能】 祛暑辟秽，开窍解毒。

【主治】 暑月贪凉饮冷，食物不慎，兼吸秽气，痧胀腹痛，霍乱吐泻，牙关紧闭，四肢逆冷。

【用法与用量】 每服二至三分，每日一至二次，温开水送下。外用研细，吹鼻取嚏。

【注意】 孕妇慎用。

【贮藏】 密闭，防潮。

琼 玉 膏

Qióngyù Gāo

【处方】 生地黄六十四两 党参六两 茯苓十二两

【制法】 以上三味，酌予切碎，分次水煎取煎出液，至味尽，去滓。将煎出液过滤合并。用文火浓缩成清膏，另加蜂蜜三十二两，收膏，即得。

【功能】 补虚健脾。

【主治】 气阴不足，肺虚干咳，津枯形瘦，劳损失血。

【用法与用量】 每服五錢至一两，每日二次，温开水冲服。

【貯藏】 密閉，貯于阴涼干燥处。

越 鞠 丸

Yuèjú Wán

【处方】 香附一两 梔子一两 川芎一两 六神麴一两 苍朮一两

【制法】 以上五味，共研細粉，过篩。混合均匀。用冷开水泛为水丸。晒干或低温干燥，即得。

【功能】 舒肝解郁，行气化湿。

【主治】 胸悶吞酸，脘腹脹痛。

【用法与用量】 每服二錢，每日一至二次，温开水送下。

【貯藏】 密閉，防潮。

搜風順气丸

Sōufēng Shùqì Wán

【处方】 酒大黃五兩 山藥二兩 獨活一兩 火麻仁二兩 車前子三兩 蓖麻子一兩
檳榔一兩 郁李仁三兩 牛膝二兩 防風一兩 枳殼一兩

【制法】 以上十一味，除火麻仁、郁李仁外，大黃等九味共研細粉，过篩；或将車前子另研細，再共研細粉，过篩。將火麻仁、郁李仁与上列細粉摻研，研細过篩。混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重三錢。

【功能】 搜風順气，潤腸通便。

【主治】 腸胃积热，胸膈痞悶。大便燥結，腸紅痔漏，腰膝痠疼。

【用法与用量】 每服一丸，每日一至二次，温开水送下。

【貯藏】 密閉，貯于阴涼干燥处。

黃連羊肝丸

Huánglián Yánggān Wán

【处方】 黃連二兩 石決明四兩 密蒙花四兩 青皮四兩 黃柏二兩

决明子四两 柴胡四两 木贼四两 胡黄连四两 黄芩四两
夜明砂四两 菟蔚子四两 龙胆二两 鲜羊肝十六两

【制法】 以上十四味，除鲜羊肝外，黄连等十三味，研粗末，将鲜羊肝切碎蒸熟与上列黄连等粗末，掺研均匀。晒干或烘干。共研细粉，过筛。混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重三钱。蜡皮封固。

【功能】 泻火，明目。

【主治】 肝火旺盛，两目昏暗，怕日羞明，胥肉攀睛。

【用法与用量】 每服一丸，每日一至二次，温开水送下。

【贮藏】 密闭，貯于阴凉干燥处。

黄 连 膏

Huánglián Gāo

【处方】 黄连二两五钱

【制法】 将黄连捣碎，分次水煎取煎出液，至味尽，去滓。将煎出液过滤合并。用文火浓缩成清膏，另加与清膏等量的蜂蜜，收膏，即得。

【功能】 清火解毒。

【主治】 暴发火眼，红肿作痛，怕日羞明。

【用法】 用温开水将患眼洗净，以药膏少许，点入眼角。静卧十至二十分钟，每日二至三次。

【贮藏】 密闭，貯于阴凉干燥处。

黑 锡 丹

Hēixí Dān

【处方】 黑锡二两 硫黄二两 川楝子一两 胡芦巴一两
木香一两 制附子一两 肉豆蔻一两 补骨脂一两
沉香一两 小茴香一两 起阳石一两 肉桂五钱

【制法】 以上十二味，将黑锡置锅中，加热熔化，硫黄研细加入并不绝搅拌，起火焙时，立即用醋淋洒，搅拌凝结成砂状，取出，待自然冷却，与川楝子等十味，共研细粉，过筛。混合均匀。另取精白面（每两细粉用面三钱）和适量黄酒打糊为小丸。晒干或低温干燥。

即得。

【功能】 升降阴阳，降痰定喘。

【主治】 真元亏虚，上盛下虚，痰壅气喘，胸腹冷痛。

【用法与用量】 每服五分，每日一至二次，姜汤或淡盐汤送下。

【贮藏】 密闭，防潮。

紫 金 錠

Zījīn Dìng

【处方】 山慈姑二两 醋大戟一两五钱 五倍子 一两 千金子霜一两

朱砂四钱 麝香二钱 明雄黄二钱

【制法】 以上七味，除麝香、千金子霜外，明雄黄研细水飞或研细粉，过筛。朱砂研细水飞或研至极细粉，其余山慈姑等三味，研细粉，过筛。将麝香与上列各细粉及千金子霜配研，研细过筛。混合均匀。另取糯米粉三两二钱打糊或蒸餅糊为錠，阴干，即得。每錠重五分或一钱。

【功能】 辟秽解毒。

【主治】 湿温时邪，神昏谵闷，嘔逆吐泻，以及小儿痰壅惊闭。外治痈疽疔疮，肿核结毒。

【用法与用量】 每服二至五分，每日一至二次，温开水磨服。外用醋磨调敷患处。

【注意】 孕妇忌内服。

【贮藏】 密闭，防潮。

紫 草 膏

Zǐcǎo Gāo

【处方】 紫草五两 当归一两五钱 防风一两五钱 生地黄一两五钱

乳香一两五钱 白芷一两五钱 没药一两五钱

【制法】 以上七味，将乳香、没药研细粉，过筛。其余当归等五味，除紫草外，分别酌予碎断，取麻油六十两，用文武火炸枯，去滓，再将紫草用水湿润，仍用文武火炸至油呈紫红色，去滓，过滤。另取蜂蜡适量（每油一两加蜂蜡二至四钱）加入溶化，收油膏。再将上列乳香、没药细粉加入搅匀，即得。

【功能】 化腐生肌。

【主治】 疮瘍已潰，疼痛不止。

【用法与用量】 将膏摊消毒紗布上貼患处，每隔一至二日換药一次。

【貯藏】 密閉，貯于阴涼干燥处。

紫 雪

Zìxuě

【处方】 寒水石四两八錢 滑石四两八錢 生磁石四两八錢 生石膏四两八錢 青木香五錢
玄参一两六錢 升麻一两六錢 甘草八錢 芒硝十六兩 硝石三四二錢
沉香五錢 丁香一錢 羚羊角五錢 朱砂三錢 犀角五錢
麝香一錢二分五厘 黄金十兩

【制法】 以上十七味，先将寒水石、滑石、生磁石、生石膏捣碎和黄金水煎数次取煎出液，約煎四十八小时，去滓，将黄金收回，煎出液合并。青木香、玄参、升麻、甘草、沉香、丁香六味分別酌予碎断，用上述煎出液和适量清水分次煎，至味尽，去滓。将煎出液过滤合并，用文火濃縮成清膏。芒硝、硝石分研細粉，过篩。加入攪勻，放冷使凝結，研細。羚羊角、犀角分銼研細粉，过篩。朱砂研細水飞或研至極細粉。再将麝香与上述各細粉配研，研細过篩。并按每兩細粉，另加金箔五張，混合均匀，即得。

【功能】 鎮惊安神，清心开窍。

【主治】 煩热不解，神昏譫語，发斑发狂，小兒惊風。

【用法与用量】 每服五分至一錢，每日一至二次，温开水送下。小兒酌減。

【注意】 孕婦忌用。

【貯藏】 密閉，貯于阴涼干燥处。

跌打回生丹(回生第一丹)

Diēdǎ Huíshēng Dān

【处方】 土鳖虫五兩 血竭二兩 煅自然銅三兩 乳香二兩
巴豆霜二兩 朱砂二兩 麝香三錢

【制法】 以上七味，除巴豆霜、麝香外，朱砂研細水飞或研至極細粉，其余土鳖虫等四

味，将乳香用灯心草四钱同炒，去灯心草后，再共研细粉，过筛。麝香与上列各细粉及巴豆霜配用，研细过筛。混合均匀，即得。

【功能】 活血止痛，急救疗伤。

【主治】 跌扑损伤，昏迷不省，瘀血作痛。

【用法与用量】 每服二分，每日一至二次，黄酒或温开水送下。

【注意】 孕妇忌用。

【贮藏】 密闭，防潮。

舒 肝 丸

Shūgān Wán

【处方】 厚朴一两六钱 川芎一两六钱 片姜黄六钱 香附一两六钱 豆蔻一两六钱
枳实一两六钱 沉香一两六钱 甘草一两二钱 牡丹皮一两六钱 白芍一两六钱
柴胡一两六钱 陈皮一两六钱 砂仁一两六钱 延胡索一两六钱 木香一两六钱

【制法】 以上十五味，共研细粉，过筛。混合均匀。炼蜜为丸，另取适量朱砂细粉为衣，即得。每丸重三钱。

【功能】 舒肝，解郁，止痛。

【主治】 两肋胀满，胃脘刺痛，呃逆嘈杂，噯气吞酸。

【用法与用量】 每服一九，每日一至二次，温开水送下。

【注意】 孕妇慎用。

【贮藏】 密闭，贮于阴凉干燥处。

锁阳固精丸

Suǒyáng Gùjīng Wán

【处方】 鹿角霜二两 龙骨二两 牡蛎二两 芡实二两
韭菜子二两 锁阳二两 菟丝子二两 莲子二两
牛膝二两 补骨脂二两五钱 大青盐二两五钱 杜仲二两五钱
肉苁蓉二两五钱 八角茴香二两五钱 莲鬚二两五钱 巴戟天二两
熟地黄五两六钱 山药五两六钱 山茱萸一两七钱 茯苓一两一钱
牡丹皮一两一钱 泽泻一两一钱 知母四钱 黄柏四钱

【制法】 以上二十四味，共研細粉，过篩：或将熟地黄与处方内部分药物串研，晒干或低温干燥，再共研細粉，过篩。混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重三錢。

【功能】 温肾固精。

【主治】 梦遗滑精，目眩耳鳴，腰膝痠痛，四肢无力。

【用法与用量】 每服一丸，每日二次，温开水送下。

【貯藏】 密閉，貯于阴涼干燥处。

暖 脐 膏

Nuǎnqí Gāo

【处方】 当归四两 白芷四两 乌药四两 茴香四两 八角茴香四两
木香二两 香附四两 乳香一两 母丁香一两 沒药一两
肉桂一两 沉香一两 麝香一錢五分

【制法】 以上十三味，将乳香、母丁香、沒药、肉桂、沉香五味研細粉，过篩。与麝香配研，研細过篩。混合均匀。其余当归等七味，酌予碎断，取麻油二百四十两，同置鍋中（或浸泡三至十日）用文武火炸枯，去滓。滤淨后炼至滴水成珠。另取黄丹（七十五两至一百零五两）加入搅匀，收膏。将膏浸于水中。

取膏用文火熔化待温，加入上列乳香等細粉，搅和均匀。分摊于布上，即得。每張淨重一錢、五錢或一两。

【功能】 行气止痛，祛寒止泻。

【主治】 少腹冷痛，脘腹痞满，大便溏泻。

【用法与用量】 每用一張，温熱化开，貼于臍上。每隔五至七日換药一次。

【注意】 孕妇忌貼。

【貯藏】 貯于阴涼干燥处。

錫 类 散

Xílèi Sǎn

【处方】 象牙屑三錢 青黛六錢 壁錢炭一錢 人指甲五分
珍珠三錢 冰片三分 牛黃五分

【制法】 以上七味，除牛黃、冰片外，珍珠研为极細粉，其余象牙屑等四味，将人指甲

用滑石粉制后，共研細粉，过篩。牛黃、冰片与上列各細粉配研，研細过篩。混合均匀，即得。

【功能】 解毒化腐。

【主治】 咽喉癰烂肿痛。

【用法与用量】 每用少許，吹敷患处，每日一至二次。

【貯藏】 密閉，防潮。

解肌宁嗽丸

Jiějī Níngsòu Wán

【处方】 麻黄一两 前胡四两 菊花四两 黄芩四两 枳壳四两
桑叶二两 桔梗二两 陈皮二两 紫苏叶二两 浙贝母二两
生石膏三四两 苦杏仁一两六钱 甘草一两

【制法】 以上十三味，共研細粉，过篩；或将苦杏仁另研，麻黄等十二味研細粉，过篩，再与苦杏仁掺研，研細过篩。混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重一钱。

【功能】 解肌清热，止嗽化痰。

【主治】 小儿感冒風寒，憎寒发热，咳嗽气促。

【用法与用量】 每服一九，每日一至二次，温开水送下，三岁以下酌减。

【貯藏】 密閉，貯于阴涼干燥处。

赛金化毒散

Sàijīn Huàdù Sǎn

【处方】 乳香二两 沒药二两 川贝母二两 黄连二两
赤芍四两 天花粉四两 大黃四两 甘草一两五钱
牛黃四钱 冰片五钱 明雄黃二两 珍珠八钱

【制法】 以上十二味，除牛黃、冰片外，明雄黃研細水飞或研細粉，过篩，珍珠研为极細粉。其余乳香等八味共研細粉，过篩。将牛黃、冰片与上列各細粉配研，研細过篩。混合均匀，即得。

【功能】 清热化毒。

【主治】 小儿疹后余毒未淨，煩躁口渴，口疮便秘。

【用法与用量】 每服二分，每日一至二次，温开水冲服。三岁以下小儿酌减。

【贮藏】 密闭，防潮。

槐 角 丸

Huáijiǎo Wán

【处方】 槐角四两 防风二两 当归二两 枳壳二两 黄芩二两 地榆二两

【制法】 以上六味，共研细粉，过筛。混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重三钱。

【功能】 凉血，止血。

【主治】 痔漏肿痛，大便下血。

【用法与用量】 每服一丸，每日二次，温开水送下。

【贮藏】 密闭，贮于阴凉干燥处。

磁 朱 丸

Cízhū Wán

【处方】 煅磁石二两 朱砂一两 六神麴四两

【制法】 以上三味，朱砂研细水飞或研至极细粉。煅磁石、六神麴分研细粉，过筛。将六神麴细粉取出适量作打糊用外，其余的细粉与煅磁石、朱砂细粉配研。混合均匀。用遗留的六神麴细粉，打糊为小丸。晒干或低温干燥，即得。

【功能】 镇心，去翳。

【主治】 心悸怔忡，惊惕失眠，内障视物朦胧。

【用法与用量】 每服五分至二钱，每日二次，温开水送下。

【贮藏】 密闭，防潮。

豨 薺 丸

Xīxiàn Wán

【处方】 豨薺草一百两

【制法】 将稀莪草切碎，取出五十两，分次水煎取煎出液，至味尽，去滓。将煎出液过滤合并。用文火浓缩成清膏。将下余五十两用黄酒一百两浸拌入罐中，加盖封闭，隔水加热燉至酒尽，取出，加入上列清膏，晒干或低温干燥，研细粉，过筛。加入适量炼蜜为丸，即得。每丸重三钱。

【功能】 祛风除湿。

【主治】 风湿痹痛，腰膝痿软，步履不健。

【用法与用量】 每服一丸，每日一至二次，温开水送下。

【贮藏】 密闭，貯于阴凉干燥处。

醒消丸

Xǐngxiāo Wán

【处方】 乳香一两 明雄黄五钱 没药一两 麝香三分

【制法】 以上四味，除麝香外，乳香、没药分研细粉，过筛。明雄黄研细水飞或研细粉，过筛。将麝香与没药细粉配研，研细过筛，再与上列各细粉配研，混合均匀。另取黄米粉七钱五分，打糊或蒸饼糊为小丸，阴干，即得。

【功能】 消肿止痛。

【主治】 痈疽肿毒，坚硬疼痛。

【用法与用量】 每服五分至一钱，每日二次，温黄酒或温开水送下。

【注意】 孕妇忌用。

【贮藏】 密闭，防潮。

避瘟散

Bìwēn Sǎn

【处方】 檀香四十一两六钱 零陵香四两八钱 白芷十一两二钱 香排草四十八两 姜黄四两八钱
玫瑰花十一两二钱 甘松四两八钱 丁香十一两二钱 木香九两六钱 麝香三钱七分
冰片三十六两八钱 朱砂一百七十六两五钱 薄荷冰三十六两八钱

【制法】 以上十三味，除麝香、冰片、薄荷冰外，朱砂研细水飞或研至极细粉，其余檀香等九味共研细粉，过筛。将冰片、薄荷冰同研至液化，另取甘油七十二两六钱，加入搅匀，再将麝香与上列各细粉配研，研细过筛，与冰片等液研合均匀，即得。

【功能】 芳香辟秽，开窍止痛。

【主治】 伤风头痛，鼻塞流涕，暑令受热，晕车晕船。

【用法与用量】 每用少许，搐入鼻窍。

【贮藏】 密闭，防止洩气。

礞石滚痰丸

Méngshí Gǔntán Wán

【处方】 煅金礞石一两 黄芩八两 沉香五钱 熟大黄八两

【制法】 以上四味，除煅金礞石外，将黄芩等三味共研细粉，过筛。混合均匀。用冷开水泛为小丸，晒干或低温干燥。再将煅金礞石研细粉，过筛，上衣打光，即得。

【功能】 逐痰，散结。

【主治】 顽痰壅塞，胸膈痞胀，神志迷蒙，大便秘结。

【用法与用量】 每服一至二钱，每日一至二次，温开水送下。

【注意】 孕妇忌用。

【贮藏】 密闭，防潮。

藿香正气丸

Huòxiāng Zhèngqì Wán

【处方】 藿香三两 大腹皮一两 茯苓一两 白芷一两 紫苏叶一两 陈皮二两

桔梗二两 白朮二两 厚朴二两 法半夏二两 甘草二两

【制法】 以上十一味，除大腹皮外，共研细粉，过筛。混合均匀。另取鲜生姜三钱切碎，大枣五钱与大腹皮分次水煎取煎出液，至味尽，去滓。用煎出液泛为小丸，晒干或低温干燥，即得。

【功能】 解表和中。

【主治】 外感风寒，内伤饮食，憎寒壮热，头痛胸闷，吐泻腹胀。

【用法与用量】 每服二钱，每日二次，温开水送下。

【注意】 孕妇慎用。

【贮藏】 密闭，防潮。

蟾 酥 丸

Chánsū Wán

【处方】 蟾酥二錢 沒药一錢 銅綠一錢 寒水石一錢 煅白矾一錢 乳香一錢
活蝸牛二十一个 胆矾一錢 麝香一錢 明雄黃二錢 輕粉五分 朱砂三錢

【制法】 以上十二味，除麝香、蟾酥外，明雄黃研細水飞或研細粉，过篩。朱砂研細水飞或研至極細粉。輕粉置避光处研細粉，过篩。將活蝸牛与煅白矾同串研，晒干或低溫干燥，与其余胆矾等五味，共研細粉，过篩。再將麝香与上列各細粉配研，研細过篩。混合均匀。蟾酥用白酒或牛乳化开（或研細粉混合上列細粉內）酌加冷开水泛为細小丸，阴干，即得。

【功能】 消解疮毒。

【主治】 疔疮，疔疮，恶疮。

【用法与用量】 每服五至六厘，每日一至二次，葱白湯加黃酒送下，盖被取汗，或遵医囑服。

【注意】 孕妇忌用。

【貯藏】 密閉，防潮。

蟾 酥 錠

Chánsū Dìng

【处方】 蟾酥二兩 朱砂八兩 雄黃八兩 麝香五分 活蝸牛四兩 冰片一錢

【制法】 以上六味，朱砂研細水飞或研至極細粉。雄黃研細水飞或研細粉，过篩。將活蝸牛与雄黃細粉同研碎，晒干或低溫干燥，再研細粉，过篩。將麝香、冰片与上列各細粉（取出適量朱砂細粉作上衣用）配研，研細过篩。混合均匀。再將蟾酥用白酒或牛乳化开（或晒干研細粉混合上列細粉內）酌加冷开水和細粉为錠，阴干，用遺留的朱砂細粉为衣，打光，即得。每錠重一錢。

【功能】 解毒，清热，止痛。

【主治】 疔疮，发背，脑疽，乳痈，一切恶疮初起，疼痛麻木。

【用法与用量】 醋研，調敷患处，每日一至三次。

【注意】 专供外用，不可內服。

【貯藏】 密閉，防潮。

鳖 甲 胶

Biējiǎ Jiāo

【处方】 鳖甲一百两

【制法】 取漂泡后的净鳖甲，用水冲洗，置锅中分次水煎，取煎出胶液，煎至胶质尽，去滓。将煎出胶液，过滤合并（或加入明矾细粉少许）静置，滤取清胶液，用文火浓缩（或加入适量黄酒、冰糖）至呈稠膏状，倾入凝胶槽内，俟其自然冷凝，取出，分切为小块，阴干，即得。每块重约一钱五分。

【功能】 滋阴补血，退热消瘀。

【主治】 阴虚潮热，久瘥不愈，癥瘕痞母。

【用法与用量】 每服一至三钱，每日一至二次，温开水或黄酒化服。或遵医嘱配合应用。

【注意】 孕妇忌用。

【贮藏】 密闭，貯于阴凉干燥处。

鳖 甲 煎 丸

Biējiǎjiān Wán

【处方】 鳖甲胶一两八钱 黄芩三两 柴胡六两 鼠妇三两 干姜三两 大黄三两
白芍五两 桂枝三两 葶藶子一两 石韦三两 厚朴三两 牡丹皮五两
翟麦二两 凌霄花二两 姜半夏一两 党参一两 上鳖虫五两 阿胶三两
蜂房四两 硝石十二两 蛭螂六两 桃仁二两 射干三两

【制法】 以上二十三味，分别酌予碎断，置罐中，另加入黄酒一百二十两，加盖封闭，隔水加热燉至酒尽，取出，晒干或低温干燥，共研细粉，过筛。混合均匀。炼蜜为丸，即得。每丸重一钱。蜡皮封固。

【功能】 消癥瘕，化痞母。

【主治】 癥瘕痞母，久瘥不止及三日瘥。

【用法与用量】 每服一钱，每日一至三次，温开水送下。

【注意】 孕妇忌用。

【贮藏】 密闭，貯于阴凉干燥处。

附 录

中药材炮炙通則

炮炙系指对中药材进行精选、切制及炮制的方法，其主要目的在于通过中药材的加工处理，使适应医疗应用的需要。炮炙方法系根据中医傳統理論制定。例如：酒制升提而制寒，姜制溫散而开痰，醋制注肝而收斂，盐制走肾而下行，蜜制甘緩潤燥，土制守中助脾，麸制資其谷气，蒸熟取其味厚，炒黑取其入血，炒炭存性取其止血，黑豆水、甘草水漬以解毒等等。

中药材炮炙的操作方法，通常可以分为五类，即（一）治制，（二）水制，（三）火制，（四）水火制，（五）其他。

（一）治制 本法系选取药材的药用部分，除去非药用的异物和杂质，或进行切制的方法，可分为（1）挑，（2）篩，（3）簸，（4）刮，（5）刷，（6）碾，（7）劈，（8）切，（9）镑等九法。

（1）挑 挑拣除去非药用部分或分离不同的药用部分，如人参去芦、麻黄去根、山茱萸去核等；或将药物按大小、粗细分类挑拣，便于加工处理。

（2）篩 篩除药材中夹杂的泥沙、石屑及其他夹杂物。

（3）簸 利用药材和杂质的轻重不同，经过揚簸，使与杂质分离。

（4）刮 刮去药材外附着的非药用部分，如肉桂去栓皮等。

（5）刷 刷除药材外附生的絨毛或杂质，如枇杷叶去毛等。

（6）碾 除去药材外附生的非药用部分或碾成粉末，如香附去鬚根、蒺藜去刺等。

（7）劈 将大块药材劈（包括斫、锤等）成小块，便于使用，如油松节（劈）、石膏（锤）等。

（8）切 将药材切碎、切段或切片，切后的药材称为“饮片”。

（9）镑 将坚硬的药材，用特制的工具“镑刀”刨成薄片，如镑羚羊角等。

（二）水制 本法系利用清水与其他輔料，除去药材附着的不洁物，或使药材軟化便于切制，或减低药材的毒性，或制取药材細粉的一些方法，可分为（1）洗，（2）泡，（3）浸，（4）潤，（5）漂，（6）飞等六法。

（1）洗 用清水将药材附着的泥土或不洁物洗去，洗时应注意掌握时间，勿使药材在水中浸泡过久，以免减失药效。

（2）泡 将药材放在水中浸泡，使其柔潤，便于切片，或加輔料浸泡，除去药材的毒质。泡时应注意将药材按大小、粗细、軟硬分类处理，并視季节、气温等适当掌握，以免影响质量。

（3）浸 浸的时间一般較泡为短，凡药材用水稍浸即柔潤可加工切制的或用水泡有损

药效的,可采用本法。

(4)潤 将药材浸泡后,置适宜的容器内盖严,使水分徐徐渗入药材组织内部,使药材内外湿度均匀,便于切制,操作时应注意温度和时间,以免发酵或霉败。

(5)漂 将药材在較多量的水中漂洗,或多換水,以漂去药材某些毒质或盐分、杂质等,如浮肉蓰蓉等。

(6)飞 系湿法分取药材极細粉末的方法,可将不溶于水的药材与水(或药液)共研細,加入多量的水,攪拌,較粗的粉粒即下沉,細粉混悬于水中,傾出,粗粒再研再飞。傾出的混悬液沉淀后,分出,干燥,即成极細的粉末。

(三)火制 本法系药材經加热处理的加工方法,按照加热的温度、时间和性质可分为(1)炒,(2)燙,(3)煨,(4)煨,(5)燎,(6)炮,(7)炙等七法。

(1)炒 系将药材在鍋内加热,不絕翻炒至一定要求的方法,通常有下列几种:

清炒 清炒时不加輔料,根据炒的时间 and 温度分为炒黄、炒焦和炒炭三种。炒黄系将药材炒至表面微黄色或能嗅到药材固有的气味为度,如炒杏仁、炒麦芽等;炒焦系将药材炒至表面焦褐色,如焦山楂、焦白朮等;炒炭系将药材炒至表面黑色,内部焦褐色,但須存性,如地榆炭、側柏炭等。

麸炒 先将鍋加热,撒入规定量的麸皮,至冒烟时,加入药材,不断翻炒,炒至药材表面微黄色,取出,篩去麸皮即得。

土炒 通常用伏龙肝,置鍋内炒至輕松,加入药材,共炒至药材表面挂匀土色,取出,篩去过利的土即得。

米炒 将米倒入用水噴湿的鍋内,加热使米貼附鍋底上,俟冒烟时,倒入药材,輕輕翻炒至药材变色,取出,篩去米粒即得。

(2)燙 系将药材加热炒燙,温度比炒法高而受热均匀,通常有三种:

沙燙 先将沙子置鍋中炒热,倒入药材,炒至药材表面鼓起或酥脆为度,取出,篩去沙子即得。

蛤粉燙 取蛤粉依沙燙法操作。

滑石粉燙 取滑石粉依沙燙法操作。

(3)煨 系将药材用火煨燒,通常分为二种:

直火煨 将药材直接在不烟的炉火上煨紅透,块粒細小的药材,可置适宜的容器内煨燒,至煨紅为度,如龙骨、石决明等。

悶煨 将药材置煨鍋内,上面复盖一鍋,接合处用黃泥封固,上压重物,加热煨透为止,如生地黄炭、灯心炭等。

(4)煨 系将药材用湿润面粉包裹,在炒热的滑石粉鍋内煨至外皮焦黄色为度;或层

层隔纸加热,以除去部分油分,如煨肉豆蔻、煨木香等。

(5)燎 系将药材在火焰上短时加热的方法,使药材表面毛茸迅速受热焦化而内部不受影响,如鹿茸燎毛等。

(6)炮 系将药材埋在热炭灰中,炮至鼓起爆裂为度,或置高热的铁锅中,急炒使药材焦黄,炮至鼓裂,如炮姜等。

(7)炙 系将药材与液体辅料共同加热,使辅料炙入药材组织内的加工方法,如蜜炙、酥炙等。常用的有下列几种:

蜜炙 通常用炼熟的蜂蜜,用量根据各该药材项下规定。将药材与炼熟的蜜及开水少许,拌匀,稍闷,置锅内用文火炒,使蜜炙入药材内,至水分去尽,不粘手为度,如蜜甘草、蜜桑皮等。

酥炙(油炙) 通常用油脂,用量根据各该药材项下的规定。酥炙方法通常有二:(1)油脂拌炒,如酥淫羊藿;(2)油炸,如油虎骨等。

姜汁炙 系将药材与鲜姜汁或姜汁与水拌匀,置锅内用文火炒制,如山栀子、黄连等。

鳖血炙 系将药材与新鲜鳖血拌匀,置锅内用文火微炒,如柴胡、青蒿等。

酒炙 通常用黄酒,用量根据各该药材项下的规定。酒炙的方法通常先将黄酒与药材拌匀,稍闷或不闷,倒入锅内加热炒至药材表面微黄色。

醋炙 通常用米醋,用量根据各该药材项下的规定。炙法与酒炙同。

盐水炙 取规定量的食盐,加水溶解澄清后,与药材拌匀后炒,或先将药材炒至一定程度时再喷淋盐水炒。食盐加水的量应适当掌握,以能使药材喷洒或搅拌均匀湿润为度。

米泔水炙 用米泔水与药材拌匀,稍闷后,置锅内加热炒至药材表面微黄色为度。

(四)水火制 本法系一种综合性的加工方法,通常分为(1)蒸,(2)煮,(3)淬,(4)焯,(5)燉等五法。

(1)蒸 系将药材置适宜的容器内于水锅上加热,利用水蒸气蒸药材的方法。如蒸玄参、蒸桑螵蛸等。

(2)煮 系将药材与水或辅料(如醋、姜、甘草、黑豆、白矾等)共煮的加工方法,通常有二法:一种为与辅料同煮至完全吸尽,如商陆、狼毒等与醋同煮至醋吸尽;另一种为与辅料煮至一定程度后捞出,弃去剩余的汤,如川乌、草乌与甘草黑豆汤煮至内无白心为度等。

(3)淬 系将药材煨后,乘热迅速投入醋或黄酒中使之酥碎的方法,如赭石、自然铜等。

(4)焯 系将药材投入沸水中,翻动片刻,捞起,以便除去药材表面附着的外皮,如杏仁、白扁豆等。

(5)燉 将药材与辅料如酒等拌匀,置罐内或适宜容器内,坐水锅中,隔水加热,燉透为度,如熟大黄、酒制萸肉等。

(五)其他 不属于以上四种类型的加工方法,比较常用的有下列数种:

(1)法制 系一种特殊的加工方法,意义是如法炮制,一般加有其他药料,按照各该药材项下的规定操作,如法半夏等。

(2)制霜 系将药材中所含的油分榨去,取用剩余的粉末,如巴豆霜、千金子霜等。

(3)药拌 加入其他药料拌制,如朱麦冬等。

(4)提净 系通过重结晶提纯,将药材中杂质除去的方法,如芒硝、硃砂等。

中药成方制剂通则

中药成方制剂系指按规定处方经过加工制备为丸、散、膏、酒等使用与贮藏均较便利的剂型。其有关制法除已在各成方制法项下规定者外,可参照本通则的规定处理。

丸

丸系按照规定处方,将药物粉碎为细粉,加适宜的粘合剂制成的圆球形制品。一般可分为:(一)蜜丸;(二)水丸;(三)糊丸;(四)蜡丸等类型。

(一)蜜丸

蜜丸系将药物用蜂蜜为粘合剂制成的圆球形丸剂。一般重五分至三钱不等。

【制法】 蜜丸的制备可分为:(1)炼蜜;(2)合药;(3)搓条;(4)成丸;(5)包衣(上衣)或蜡皮封固等步骤。

(1)炼蜜 蜜的选择及炼制程度是制备蜜丸的重要关键。蜜的质量以稠如凝脂、气味纯正、洁净而杂质少者为佳。炼蜜的目的在于除去其中杂质,蒸去部分水分,适当地加强其结合力。其法系将蜂蜜置铜锅或蒸汽夹层锅中,用直火或蒸汽加热溶化过筛,再置铜锅中继续加热沸腾,不时捞出漂浮杂质,逐渐蒸去所含水分。一般炼至无显著蒸气溢出,中间翻腾起红黄色泡沫,取出少许用手捻之有粘性拉黄丝而不产生白丝为度。

炼蜜根据经验,少炼则嫩,多炼则老。在制备蜜丸时,可视季节及所制蜜丸内药物性质,适当的掌握炼蜜老嫩程度。一般在冬季炼蜜可较嫩,夏季炼蜜可较老;含多量糖类或油脂丰富的药物可较嫩;含多量矿物性或纤维特多的可较老。

(2)合药 合药即炼蜜与药物粉末混和成丸块的操作。其法系将药物粉末置乳钵或搅拌机中,加入一定量的炼蜜。蜜的用量按各地气候以及所含药物性质不同而定。凡含糖类或油脂丰富的药物以及矿物性药物用蜜较少;质松而纤维多的药物则用蜜较多。一般用蜜量约为药物重量的50—120%。加蜜后乘热充分搅拌混合,至全部滋润、色泽一致、软硬适度的丸块时,即得。

合药时,一般均将炼蜜乘热加入药粉混合。如处方中含有較多昂的乳香、鹿角胶、龟板胶等药物,以及有些香气濃郁的药物如麝香、冰片、薄荷冰等須俟炼蜜放置半冷后,再与药粉混合。

(3)搓条 将丸块用人工或制丸机揉搓成均匀的长条状丸条。其粗細按所制丸剂的大小而定。丸大的較粗,丸小的較細,以便按需要重量进一步分割。如用固定容量的丸剂药准分割制丸,則丸条粗細,以适合丸剂模的口徑为度。

(4)成丸 用药准分割丸条者用手工搓揉成丸,用制丸板或制丸机者直接将丸条分割、搓揉为丸。

在搓条和搓丸时,为避免丸块粘附工具,可塗擦潤滑剂少許。潤滑剂系由麻油与黄蜡各适量(一般用麻油十六两加黄蜡三两)加热融合而成。

(5)包衣或蜡皮封固 按处方規定須朱砂或金箔包衣者,則將搓成的丸剂用朱砂或金箔粘連其上。朱砂包衣后并应在适当容器中滚动使表面光滑。如处方規定須用蜡皮封固者,則將蜡(白蜡与虫蜡混合物)溶化,用制蜡皮模型制成大小适宜的蜡皮壳。將蜜丸装入蜡皮壳中,隨即封閉,以不泄气为度。

【貯藏】 蜜丸宜密閉貯于阴涼干燥处;用蜡皮封固者貯于阴涼处,防止受热。

(二)水丸

水丸亦称“水泛丸”,系將药物細粉,用冷开水(或按处方規定用黄酒、醋、药物鮮汁或煎出液)借人工或机械泛制成的小球形丸剂。其崩解時間均較其他丸剂为快。水丸按大小和重量不同可分为下列三种:

小丸……………每两为 300—500 粒
細小丸……………每两为 600—1,500 粒
极小丸……………每两为 5,000—10,000 粒

【制法】 水丸的制备可分为:(1)起模(起母);(2)泛丸;(3)干燥;(4)包衣及打光(闔亮)等步驟。

(1)起模 丸模为水泛丸的基础顆粒。起模的优劣为水丸制备的重要关键。其法借人工或机械操作(人工用药匾为工具,机械操作可采用泛丸罐),先取冷开水(或按处方規定輔料)以刷帚蘸取或以噴霧器噴少許于药匾的一边或泛丸罐中,隨即在其上撒布少許药物粉末,摆动或轉动工具,至药物粉末全部湿润、均匀粘附为度。另用干燥刷帚緩緩將药物細粉刷下,使形成細小潮湿顆粒。再加入少量药物細粉旋轉,使顆粒加大滾圓。然后再刷水或噴水,并將顆粒旋轉使之湿润,再加药物細粉旋轉,如此反复操作,并随时篩选,使成細小均匀一致的丸模,旋轉光滑,即得。

遇有粘性較强药物,如熟地黄、麦門冬、黄柏等不易起模时,可于药物粉碎时,將处方

中粘性小較易起模的药物先分取一部分細粉,作为起模原料。

(2)泛丸 取丸模,再按上法繼續湿润,加入药物細粉,摆动或旋轉,反复操作,使丸模逐漸增大,并时加篩选,使均匀一致,至泛成一定大小为度。再充分摆动或旋轉,使之均匀光滑。

(3)干燥 将制成的丸剂晒干或低温(不超过 45°)烘干,并注意加以翻动。含有香气濃郁的药物的丸剂,可置通風处阴干。

(4)包衣及打光 按处方規定,須包衣者,則將干透的丸剂用冷开水湿润,加入处方規定的包衣用药料,用适当工具或泛丸罐充分旋轉,使包衣均匀。再低温干燥。

如按处方規定須打光者,即以布袋用人工摆动或用打光机旋轉,使表面圓滑而带光泽。

【貯藏】 水丸宜密封貯存,防止受潮。

(三)糊丸

糊丸系用米糊或面糊等为粘合剂制成的小球形丸剂。其崩解時間較水丸和蜜丸为慢。除处方另有規定者外,一般丸重每两为 200—400 粒。

按处方規定的不同,糊丸所用粘合剂有:米糊(粳米、糯米或黃米粉制成的糊);面糊(白面制成的糊);神麩糊(神麩研为細粉制成的糊)。此外尚有用黄酒、醋或药汁制糊,称为酒糊、醋糊或药汁糊。

【制法】 糊丸的制备可分为:(1)制糊;(2)合药;(3)搓条;(4)成丸;(5)干燥等步驟。

(1)制糊 将制糊的原料置鍋中,加适量水(或酒、醋、药汁)搅拌均匀,用文火徐徐加热,不断搅拌,至完全糊化为度。蒸餅糊系將糯米粉或黃米粉用水和勻制餅,置籠屉內蒸熟,

(2)合药、(3)搓条、(4)成丸等操作,可參照蜜丸項下制法处理。

(5)干燥 将制成的糊丸先以低温徐徐干燥,至接近干燥时,溫度可略高。如含有香气濃郁的药物宜阴干。

糊丸如处方中規定須包衣或包衣后打光者,其操作与水丸相同。

【貯藏】 糊丸宜密封貯存,防止受潮。

(四)蜡丸

蜡丸系用蜂蜡为粘合剂制成的圓球形丸剂。通常丸重一錢或为小丸,其崩解時間最慢,可使所含药物作用徐緩釋放,延长疗效。所用蜂蜡必須純淨,如夾有石蜡者,不可使用。

【制法】 蜡丸制备可分为:(1)熔蜡合药;(2)搓条;(3)成丸等步驟。

(1)熔蜡合药 將蜂蜡加热熔化(如蜂蜡不純淨,可先取适量水与蜂蜡加热熔化,搅拌使杂质沉淀,放冷凝固,將蜡取出,以除去在水中沉淀的杂质),随即将药物粉末与熔化的

蜂蜡搅拌均匀和成丸块。

(2)搓条、(3)成丸等操作与上列蜜丸项下的方法相同,但操作应力求迅速并在温暖处进行,以避免蜂蜡凝固影响制丸。

【贮藏】 蜡丸宜密闭贮存于阴凉处,防止受热。

(五)水蜜丸

水蜜丸亦称“蜜水泛丸”,系将药物粉末用蜂蜜的水溶液借人工或机械操作泛制成的小球形丸剂,其崩解时间介于水丸和糊丸之间。水蜜丸大小一般每两重300—500粒。

【制法】 水蜜丸的制备可分为:(1)制备蜜水;(2)起模;(3)泛丸;(4)干燥等步骤。

(1)制备蜜水 取蜂蜜按蜜丸项下炼蜜法将蜂蜜炼过,然后取炼蜜加水溶化,煮沸,过滤,放冷备用。水与蜜的比例约为3比1。

(2)起模、(3)泛丸、(4)干燥等操作,可参照水丸项下制法处理。

【贮藏】 水蜜丸宜密闭贮存,防止受潮。

(六)动物脏器丸

动物脏器丸系用动物的脏器如猪大肠、兔脑等制备的丸剂。有加蜜者,有不加蜜者,性状均与蜜丸类似。加蜜者制法与蜜丸同;不加蜜者,本版收载兔脑丸一种,其制法详兔脑丸项下。

散

散为一种或数种药物细粉均匀混合的干燥粉末(个别外用摩散系非干燥粉末)。根据医疗应用上的不同,可分为:(一)内服散;(二)外用散两种。

【制法】 无论内服或外用散,其制法基本相同。一般均须研为细粉并混和均匀。供眼科用的外用散须研为极细粉。

散的制备可分为:(1)粉碎;(2)混和等操作步骤。

(1)粉碎 药物的粉碎,为散剂制备中重要操作之一。药物的粉碎度按需要分为:

粗末 以能通过一至二号的药筛为度。

粗粉 以能通过四至五号的药筛为度。

细粉 以能通过七至八号的药筛为度。

极细粉 以能通过九至十号的药筛为度。

根据处方所含药物性质的不同,其粉碎操作有共研、分研、掺研、配研、串研等不同方法。分述于下:

共研法:一般性药物,无特殊胶质、粘性或挥发性者可采用共研法。将处方中药物混

合一起,借机械或人工研成粉末。

分研法:凡处方中含有香气濃郁的药物如麝香、冰片或犀角、羚羊角、珍珠等贵重药者,須采用分研法,单独个别粉碎,然后再按配研法混合。

掺研法:凡处方中含有油脂較多的药物如柏子仁、火麻仁或顆粒較小的药物如车前子、葶藶子之类者,可将处方中其他药物先研为細粉,然后取一部分細粉与油脂較多的或顆粒較小的药物掺合研細。

配研法:配研法(套色法)有研細和使药物混合均匀的双重意义,参照混和项下方法处理。

串研法:凡处方中含有粘性較强的药物如熟地黄、龙眼肉之类者,可将处方中其他药物預先粉碎,取一部分粉末与粘性药物串研使成不規則的碎块或顆粒,在60℃以下充分干燥,然后再共研成粉。

某些矿物类药物如朱砂、炉甘石等,可采用水飞法(附录2頁)操作。

(2)混和 凡处方中含有分研药物者,必須进行混和操作。即将須混和的药物粉末,置乳鉢中研磨混合或借机械攪拌混合,至混和均匀、色澤一致为度。其中含有分研药物量較小者,可采用配研法混和。其法系将量小的药物另行研細后,在乳鉢中加入等容积的其他药物細粉,研磨均匀后,再加入与此等容积的其他药物細粉研匀。如此倍量增加,至全部混和均匀,色澤一致为度。按处方規定过篩或不过篩,即得

上列粉碎、混和操作,除应用于散剂外,亦适用于丸、錠等成方制剂的制备。

【貯藏】 散剂适当包装后,应密封,貯于阴凉干燥处,防止受潮。

膏

膏系在常温时为固体、半固体或半流体的制品。由于医疗应用和制法的不同,可分为:(一)内服膏;(二)外貼膏;(三)外敷膏。

(一)内服膏

内服膏亦称膏滋,为药物用水煎煮,去滓后加蜂蜜或糖濃縮成稠厚半流体状制品。

【制法】 将处方規定药物切片或搗碎,用水加热煎煮。以沸騰时开始計算,每次煎煮約2—3小时,除处方另有規定外,一般煎取2—3次,至煎液气味淡薄为度。分次过滤,合并煎液,用文火徐徐蒸发濃縮成清膏,并加入与原料药物一定比例量的糖或蜂蜜等收膏。除处方另有規定外,一般加入蜜、糖量約为原料药物的25%。至濃縮呈稠厚膏状,取出少許,置易吸水的紙上观察,以不渗紙为度。或按处方規定先将煎液濃縮至不渗紙为度,再加入与所得清膏等重量或倍量的蜂蜜或糖等收膏,即得。

— 附录 8 —

【貯藏】 內服膏应以瓷罐或广口玻璃瓶盛装, 密閉, 貯于阴涼处。

(二) 外貼膏

外貼膏为一种摊布于紙、布或兽皮上专供外貼的粘性制品。

【制法】 将处方中一般性药物先酌予切斷或搗碎。用麻油或其他植物油置鉄鍋中用文武火煎炸(或浸泡約 3—10 日再炸, 夏季浸泡時間較短, 冬季則較长), 其中花、叶、果皮等不耐炸的药物可采用后入的方法, 至药物炸枯为度。滤去殘滓, 再繼續熬煉至滴水成珠为度。加入干燥的黃丹或鉛粉收膏(除处方另有規定外, 一般随季节气候每油十六兩加丹 5—7 兩)。移置水中浸泡以去火毒。临攤前取出用文火熔化或隔水燉化。如处方中有香气濃郁的药物或矿物类、树脂类以及其他較貴重的药物, 如麝香、冰片、樟腦、輕粉、雄黃、朱砂、血竭、乳香、沒药、丁香、沉香、肉桂等, 可按处方規定另研細粉, 加入于熔化的膏中, 攪拌混合均匀。按处方規定重量及摊布用材料, 分攤于紙、布或兽皮(狗皮或羊皮)上, 即得。

【貯藏】 外貼膏应对折后貯于阴涼干燥处。

(三) 外敷膏

外敷膏系用植物油、蜂蜡或其他适宜物质作为基质, 亦有将处方中部分药物用油炸枯去滓后熔入蜂蜡作基质, 再加入药物細粉調匀制成的柔軟半固体状专供外用的制品。

【制法】 外敷膏按制备方法不同, 可分为: (1) 冷法; (2) 热法二种。

(1) 冷法 将药物粉碎为細粉, 置乳鉢內, 与适量的基质研磨均匀, 至呈柔軟膏状, 即得。

(2) 热法 将药物粉碎为細粉, 另将适量基质加热熔化, 乘热加入药物。处方中如有强烈挥发性的药物如麝香、冰片等可在放置半冷时加入, 不断攪拌, 至冷凝呈均匀柔軟膏状。或按处方規定, 将部分药物用油炸枯去滓, 熔入蜂蜡作为基质, 再与其他药物細粉調匀, 即得。

【貯藏】 外敷膏应以适当容器包装, 密閉, 貯于阴涼处。

丹

丹系用数种药物用升、降或熔合等方法制成的制品; 亦有用一般混合方法制成者。可配制成丸、散或錠等剂型应用, 視处方的規定为准。

丹根据医疗上需要, 可供內服或外用。

【制法】 丹的制备, 除用一般混合方法制成的丸、散及錠按傳統习惯称“丹”, 可参照各該剂型制法項下制备外, 用物理、化学方法制成的丹多屬矿物类药物。其制法可分为:

(1)升华法;(2)熔合法等二种。

(1)升华法 将处方规定的矿物类药物,置坩埚(阳城罐或其他素烧瓷器)或铁锅中,上复瓷碗或铁盖,用六一泥(黄泥六分加食盐一分混合而成)封固,以文武火加热升炼,至药物全部升华或至处方规定时间,停火,放冷。刮取升华物,研为细粉或极细粉,过筛,即得。

(2)熔合法 将处方规定的矿物类药物,置铁锅或密闭容器中,用文武火加热使药物互相作用生成新的化合物或熔合物。如用不密闭的铁锅制备,应用鏟不断搅拌,至与处方规定色泽与形态相符为度。取出放冷,研为细粉。按处方规定,或再与其他药物粉末混合。制为丸或其他规定的剂型,即得。

【贮藏】 制为散剂的应以瓷瓶或玻璃瓶包装,密闭貯于凉暗干燥处。制为丸、錠的,可参照各该制剂贮藏项下的规定贮存。

药 酒

药酒系将药物用白酒作溶媒制得的浸出液,为含酒的澄明液体制品。一般均供内服。酒的浓度和用量,均按处方规定为准。

【制法】 药酒的制法可分为:(1)冷浸法;(2)热浸法;(3)渗漉法等三种。

(1)冷浸法 将药物切碎或研为粗末,置入瓷罈或其他适宜容器中,加处方规定量的白酒密闭浸泡(酒的浓度除处方另有规定外,一般用五十度以上的白酒),每日搅拌或振荡一次,如此浸泡七日后,改为每周搅拌或振荡一次,浸泡时间除处方另有规定外,一般应在30日以上。然后取出上部清液,再将残滓压榨,榨出液澄清后取清液与浸液合并,静置澄清,过滤,即得。

(2)热浸法 将药物切碎或研为粗末,置罐中加处方规定量的白酒,隔水或用蒸汽加热至沸,立即取下,倾入瓷罈内,密盖浸泡,浸泡时间除另有规定外,一般在30日以上,然后取出上部清液,残液压榨,榨出液澄清后与浸液合并,静置澄清,过滤,即得。

(3)渗漉法 将药物碎为粗粉,参照二部附录“浸膏与流浸膏剂”项下渗漉法的规定,依法渗漉。将所得漉液静置后过滤即得。

【贮藏】 用瓷罐或遮光玻璃瓶包装,密封貯于冷暗处。

药 露

药露系药物与水同蒸馏的馏出液,为澄明液体制品。一般供内服用。除处方另有规定

外,一般药料溜取成品约为药料重量的六至十倍。

【制法】 将药物拣净,适当粉碎后,置入蒸馏器内,用水蒸气蒸馏,收集溜液至规定量为度。收集溜液用的细口玻璃瓶及瓶塞,应在临用前蒸过,装满后随即加塞密闭,即得。

【贮藏】 保持密封,贮于阴凉处。存贮时间不宜过久。

药 锭

药锭系药物细粉加适当粘合剂制成的固体制品。供内服或供外用。根据处方规定有纺锤形、方形、长方形、圆柱形及块状等不同形状。

【制法】 药锭的制法可分为:(1)搓捏法;(2)模制法两种。

(1)搓捏法 将处方中药物先粉碎为细粉,用糯米糊、蜂蜜或处方规定的其他粘合剂混合均匀,搓条、分割,按规定形状搓捏成型,干燥,即得。

(2)模制法(包括用机器压制) 将药物研为细粉,加入处方规定的粘合剂,混合均匀。先压制成大块薄片,分切成适当大小后,置入锭模中,加模盖压制成一定形状的药锭。剪齐边缘,干燥,即得。或将药物细粉与规定粘合剂混合均匀后,用压锭机按规定形状及重量压制成药锭,或按处方规定用金箔包衣后干燥,即得。

【贮藏】 密闭,贮于阴凉干燥处。

胶

胶系以动物皮、骨、甲、角等为原料,用水煎取胶质经浓缩收胶制成的小方块或长方块状、黄褐色至黑褐色的固体制品。每块重量由一钱半至二两不等。供内服用。

【制法】 胶的制备可分为:(1)原料处理;(2)煎取胶液;(3)去滓澄清;(4)浓缩收水胶;(5)切块及阴干等步骤。

(1)原料处理 如用动物皮为原料,置水中浸漂,刮去毛后晒干,切为小块,再用清水漂净;如用动物骨为原料,置水中浸漂,刮去筋肉后漂净,锯成短段或碎为小块;如用动物甲为原料,置水中浸漂,刮去皮后,再用清水漂净;如用动物角为原料,先锯成短段,再置清水中漂净。

(2)煎取胶液 将经过加工处理的原料,置铜锅或蒸汽夹层锅中,加水适量,用直火或蒸汽加热,使徐徐沸腾,并随时添加沸水。除处方另有规定外,每次煎煮约24小时,先后共煎取3—7次,至煎液清淡为度。

(3)去滓澄清 将各次煎液合并,滤去残渣。静置澄清(或加入适量明矾,搅拌,静置)

— 附录 11 —

分取上层清液,过滤。

(4)濃縮收水胶 取上列滤液,置銅鍋內用文武火或蒸汽加热蒸发,不断搅拌,濃縮至常溫时能凝固的水胶。

(5)凝胶切块,将上列水胶,移置凝胶槽內(或加适量黃油、冰糖、植物油),俟自然冷凝,取出,按規定重量分切为小方块,阴干,即得。

【貯藏】 密閉,貯于阴凉干燥处,防止受潮。

药 茶

药茶按处方規定为含有茶叶或不含茶叶的药物混合粗末制品,或按規定用粘合剂制成的块状制品。以沸水泡汁或煎汁服用,或与其他药物配伍应用。

【制法】 药茶由于制法不同,可分为:(1)混合法;(2)粘合法。

(1)混合法 将处方中药物先粉碎为粗末,然后混合均匀,即得。

(2)粘合法 将药物碎为粗末或榨取鲜汁,混合均匀,以面粉調制成糊,或按处方規定用方內有粘合性的药物如六神麵等,以冷开水調制成糊,加入药物粗末混和,粘合成块,再用模印压制成規定重量的小方块,置通風处阴干或晒干,即得。

【貯藏】 密閉,貯于干燥处,防止受潮。

中文索引检字表

【二 画】	二	十	丁	七	刀	人	八	九	儿										
【三 画】	广	三	千	十	土	万	大	马	小	山	千	九	川	女					
【四 画】	六	火	王	元	天	开	云	五	木	瓦	大	车	巴	水	止	内	丹	月	风
		风	午	牛	升	鸟	片	化	分										
【五 画】	玄	半	玉	甘	艾	左	石	龙	北	申	四	史	引	生	冬	仙	白	母	
【六 画】	安	决	冲	冰	关	米	灯	地	老	耳	西	耳	芒	百	导	防	阳	当	肉
	延	合	全	朱	竹	伏	自	血	舟	瓜	行	如	红						
【七 画】	沉	沙	辛	良	河	启	朴	怀	远	连	麦	赤	坎	豆	更	两	芳	茫	苏
	苍	芥	茨	花	故	杜	杞	医	鸡	局	阿	陈	附	忍	吴	旱	谷	札	龟
	何	佛	伸	皂	兕	纯													
【八 画】	河	泽	油	夜	光	卷	炉	改	青	拔	拔	刺	莘	苦	枇	松	郁	彪	昆
	明	金	知	鱼	肥	使	侧	佩	狗	参	细								
【九 画】	济	洋	穿	扁	神	姜	前	首	珍	眠	南	胡	莞	荆	华	茜	荔	草	茵
	茴	伏	楠	枳	枸	柏	鸦	牟	厚	秒	轻	集	胃	虻	威	重	复	伸	筠
	香	急	胖	胆	禹	保	独	绛	绛										
【十 画】	浙	酒	涌	婆	消	烫	浮	海	高	凌	粉	调	养	拳	益	珠	奈	蓑	莲
	莪	荷	莼	核	桂	桔	栝	桃	夏	破	桑	柴	通	道	觉	骨	铁	胶	胜
	健	射	鬼																
【十一 画】	谈	清	淫	密	寄	商	旋	痔	麻	鹿	羚	控	采	菊	草	梅	柜	常	蛇
	银	甜	猪	续															
【十二 画】	痧	琼	斑	脱	款	越	搜	栗	萱	芋	藕	黄	葛	散	棕	梧	雄	硫	碱
	屏	黑	紫	跌	蛤	舒	香	锁	鸬										
【十三 画】	滑	笛	蒲	葵	芭	梧	路	暖	刺	蜂	蛇	锡	锦	解					
【十四 画】	漏	赛	荷	酸	蕊	槟	榔	杷	芭	芭	蚌	蚌	雷	熊					
【十五 画】	渣	鹤	赭	蕻	薹	榎	里	稻											
【十六 画】	醒	薄	葱	雍	橄	橘	避												
【十七 画】	虔	蕨	槐	獾															
【十八 画】	藕	像	瞿	翻															
【十九 画】	笨	竈																	
【二十 画】	鉴																		
【二十一画】	麝																		

中文索引

【二 画】

二龙膏	321
二冬膏	321
二陈丸	322
二妙丸	322
十全大补丸	322
十宝散	323
十香丸	323
丁香	1
七宝丹	324
七珍丹	324
七厘散	324
七液丹	325
刀豆	1
人参	2
人参养荣丸	325
八角茴香	4
八宝红灵丹	326
八宝坤顺丹	326
八珍丸	327
八珍益母丸	327
九气拈痛丸	328
九分散	328
九节菖蒲	4
九香虫	5
芫花	6

【三 画】

广防己	6
广豆根	7
三七	8
三黄宝蜡丸	326
三棱	8
干姜	9

卜漆	10
寸金丹	329
土茯苓	11
土鳖虫	11
万应锭	329
万应膏	330
大力子	53
大风子	12
大芸	108
大补阴丸	330
大皂角	13
大豆黄卷	13
大枣	14
大青盐	15
大茴香	4
大活络丹	331
大黄	15
大黄廕虫丸	332
大腹毛	17
大腹皮	17
马宝	17
马齿苋	18
马勃	19
马钱子	19
马兜铃	20
马鞭草	21
小金丹	332
小活络丹	332
小薊	21
山川柳	101
山柰	22
山药	23
山茱萸	24
山楂	24

千金子	25
千金止带丸	333
千金散	333
丸	
二陈丸	322
二妙丸	322
十全大补丸	322
十香丸	323
人参养荣丸	325
八珍丸	327
八珍益母丸	327
九气拈痛丸	328
三黄宝蜡丸	328
大补阴丸	330
大黄廑虫丸	332
千金止带丸	333
六合定中丸	335
六味地黄丸	335
开胸顺气丸	336
天麻丸	336
木香槟榔丸	338
止红脐痛丸	338
内消瘰疬丸	339
牛黄上清丸	340
牛黄抱龙丸	340
牛黄清心丸(万氏方)	341
牛黄清心丸(局方)	341
牛黄清心丸	342
乌鸡白凤丸	342
乌金丸	343
乌梅丸	343
化虫丸	344
分清五淋丸	346
半贝丸	346
半硫丸	346
艾附暖宫丸	347
左金丸	348
石斛夜光丸	348
龙胆泻肝丸	349
四神丸	349
归脾丸	350

安宫牛黄丸	352
再造丸	353
西黄丸	354
耳聋左慈丸	354
百合固金丸	355
防风通圣丸	355
当归龙荟丸	357
朱砂安神丸	357
舟车丸	357
沉香化气丸	359
沉香化滞丸	360
启脾丸	360
补中益气丸	360
逐邪败毒丸	361
麦味地黄丸	361
更衣丸	362
苏合香丸	363
杞菊地黄丸	363
医痫丸	364
附子理中丸	366
驱脑丸	367
纯阳正气丸	367
河车大造丸	368
青娥丸	369
虎骨木瓜丸	370
虎潜丸	372
明目上清丸	373
明目地黄丸	373
金匱肾气丸	375
知柏地黄丸	375
肥儿丸	376
参苏丸	377
济生肾气丸	378
茴香橘核丸	379
柏子养心丸	379
胃苓丸	379
香连丸	380
香附丸	380
香苏正胃丸	381
香砂六君子丸	381
香砂养胃丸	381

保和丸	382
狼活寄生丸	383
绛乳丸	383
荷叶丸	384
通经汁妙丸	388
通宣理肺丸	388
狗宝丸	389
铁笛丸	389
脐兜丸	389
健胃丸	390
清宁丸	390
清肺抑火丸	391
清胃黄连丸	391
清紫丸	391
痔漏丸	392
麻仁丸	392
栀子金花丸	393
银翘解毒丸	394
降气丸	395
越前丸	396
搜风顺气丸	396
黄芩羊肝丸	396
舒肝丸	400
锁阳固精丸	400
解肌宁嗽丸	402
独角丸	403
秘紫丸	403
缩肝丸	403
耐消丸	404
磁石滚痰丸	405
袪香正气丸	405
蟾酥丸	406
蟾蜍煎丸	407
川乌	26
川贝母	27
川木香	28
川木通	28
川牛膝	29
川芎	30
川芎茶调散	334
川楝子	30

女贞子	31
女金丹	334

【四 画】

六一散	334
六合定中丸	335
六味地黄丸	335
火眼仁	32
王不留行	32
元胡	109
天门冬	33
天王补心丹	336
天冬	33
天仙子	34
天花粉	34
天竺黄	143
天南星	35
天麻栗	214
天麻	36
天仁丸	336
开胸顺气丸	336
云母石	37
五加皮	37
五灵脂	38
五味子	39
五苓散	337
五倍子	40
五积散	337
五福化毒丹	338
木瓜	40
木香	41
木香缩脾丸	338
木贼	42
木通	42
木槿花	43
木蝴蝶	44
木鳖子	44
瓦松	45
瓦楞子	46
太子参	46
车前子	47

巴豆	48
巴戟天	48
水蛭	49
正红阳澄丸	338
内消瘰癧丸	339
丹	
七宝丹	324
七珍丹	324
七液丹	325
八宝红灵丹	326
八宝坤顺丹	326
寸金丹	329
大活络丹	330
小金丹	332
小活络丹	332
女金丹	334
天王补心丹	336
五福化毒丹	338
化风丹	344
化癥回生丹	345
甘露消毒丹	347
四红丹	349
白降丹	351
导赤丹	355
红升丹	359
局方至宝丹	361
神犀丹	378
控涎丹	393
梅花点舌丹	393
黑锡丹	397
跌打回生丹	399
丹参	50
月季花	51
凤凰衣	51
凤脂花	175
午时茶	339
牛黄	52
牛黄上清丸	340
牛黄抱龙丸	340
牛黄清心丸(万氏方)	341
牛黄清心丸(局方)	341

牛黄镇惊丸	342
牛蒡子	53
官猴	53
升麻	54
乌鸡白凤丸	342
乌金丸	343
乌药	55
乌贼骨	218
乌梅	56
乌梅丸	343
乌梢蛇	56
片姜黄	57
化风丹	344
化虫丸	344
化癥回生丹	345
分清五淋丸	346

【五 画】

玄参	58
玄明粉	58
玄精石	59
半贝丸	346
半边莲	60
半夏	60
半硫丸	346
玉竹	61
玉真散	347
甘松	62
甘草	63
甘遂	64
甘露消毒丹	347
艾叶	61
艾附暖宫丸	317
左金丸	348
石韦	66
石决明	65
石莲子	67
石斛	67
石斛夜光丸	348
石菖蒲	69
石楠叶	69

石膏	70
石榴皮	71
龙骨	71
龙胆	72
龙胆泻肝丸	349
龙骨	73
龙眼肉	73
北沙参	74
申姜	75
四红丹	340
四神丸	349
史国公药酒	350
明脾丸	350
生肌散	351
生姜	75
冬瓜子	75
冬瓜皮	76
冬虫夏草	77
仙茅	77
仙鹤草	78
白及	79
白朮	79
白头翁	80
白芍	81
白芷	82
白芥子	83
白花蛇	83
白花菜子	84
白果	84
白矾	85
白茅根	86
白前	86
白降丹	351
白扁豆	87
白胡椒	88
白狼毒	89
白梅花	89
白硫磺	274
白鲜皮	90
白薇	91
白蔹	91

陈丁香	92

【六 画】

安宫牛黄丸	352
决明子	93
冲和散	352
冰片	93
冰硼散	353
关木通	94
关白附	94
米壳	303
灯心草	95
地龙	96
地肤子	97
地骨皮	98
地黄	98
地榆	100
老鹳草	100
再造丸	353
西河柳	101
西黄丸	354
耳聋左慈丸	354
芒硝	102
百合	102
百合固金丸	355
百草霜	103
百部	104
导赤丹	355
防己	101
防风	105
防风通圣丸	355
阳和解凝膏	356
阳起石	106
当归	106
当归龙荟丸	357
肉桂	107
肉苁蓉	108
延胡索	109
合欢皮	110
全蝎	110
朱砂	111

朱砂安神丸	357
竹节香附	112
竹茹	112
竹黄	113
伏龙肝	113
自然铜	114
血余炭	115
舟车丸	357
瓜蒌	230
行军散	358
如意金黄散	358
红大戟	115
红升丹	359
红花	116
红豆蔻	117

【七 画】

沉香	117
沉香化气丸	359
沉香化滞丸	360
沙苑子	118
辛亥	119
良姜	220
诃子	119
启脾丸	360
补中益气丸	360
补骨脂	120
怀牛膝	53
远志	121
连翘	121
连翘败毒丸	361
麦门冬	122
麦冬	122
麦芽	123
麦味地黄丸	361
赤小豆	124
赤石脂	124
赤芍	125
坎离砂	362
豆蔻	126
更衣丸	362

两头尖	112
两仪膏	362
芦荟	126
芦根	127
芫花	128
苏木	128
苏合香丸	362
苍朮	129
苍耳子	130
芥子	131
芡实	131
花蕊石	132
苡米	308
杜仲	133
杞菊地黄丸	363
医桐丸	364
鸡内金	134
鸡舌香	92
鸡冠花	134
局万至宝丹	364
阿胶	385
阿魏	135
阿魏化痞膏	365
陈皮	136
附子	136
附子理中丸	366
忍冬藤	138
吴茱萸	138
旱莲草	139
谷芽	140
谷精草	141
牡丹皮	141
牡蠣	142
龟板	143
龟板胶	366
龟鹿二仙胶	367
何首乌	144
佛手	144
伸筋草	145
皂角刺	146
兔脑丸	367

纯阳正气丸.....367

【八 画】

河车大造丸.....368

泽兰.....146

泽泻.....147

油松节.....148

夜交藤.....178

羌活.....148

卷柏.....149

炉甘石.....150

玫瑰花.....151

青木香.....151

青皮.....152

青果.....153

青果膏.....368

青娥丸.....369

青箱子.....153

青蒿.....154

青黛.....155

青礞石.....155

续断膏.....369

拨云散.....370

蛎蛎皮.....156

刺蒺藜.....289

拳麻根.....157

苦竹叶.....157

苦杏仁.....158

苦参.....159

苦楝皮.....159

枇杷叶.....160

松花粉.....161

松香.....161

郁李仁.....162

郁金.....163

虎骨.....164

虎骨木瓜丸.....370

虎骨木瓜酒.....371

虎骨酒.....371

虎骨胶.....372

虎潜丸.....372

昆布.....165

明目上清丸.....373

三白地黄丸.....373

铜钱.....85

明定参.....166

金不换膏.....374

金果榄.....166

全蝎白花蛇.....167

金银花.....168

金银花露.....374

金果藤.....138

金匮肾气丸.....375

金樱子.....168

金砂仁.....169

知母.....170

知柏地黄丸.....375

鱼腥草.....171

肥儿丸.....376

使君子.....171

侧柏叶.....172

佩兰.....173

狗皮膏.....376

狗脊.....173

参苏丸.....377

参苓白朮散.....377

参茸膏.....377

理辛.....174

【九 画】

济生肾气丸.....378

洋金花.....175

穿山甲.....176

扁豆花.....176

珊瑚丹.....378

吴茱.....177

雷公.....178

青乌藤.....178

珍珠.....179

玳瑁.....180

南沙参.....180

南乳虱.....181

胡芦巴	182
胡瓜仁	182
胡黄连	183
菟藟子	184
荆芥	184
草发	185
半澄茄	186
茜草	187
荔枝核	187
草乌	188
草豆蔻	189
草果	191
茵陈	191
茴香	191
茴香橘核丸	379
茯苓	192
柿蒂	193
枳壳	194
枳实	195
枳实子	195
枳椇子	196
檀子仁	197
柏子养心丸	379
鸢尾子	197
牵牛子	198
厚朴	199
厚朴花	200
砂仁	200
轻粉	201
韭菜子	202
胃苓丸	379
蛇虫	202
威灵仙	203
垂枝	221
复盆子	201
钟乳石	204
钩藤	205
香加皮	206
香附	206
香附丸	380
香薷丸	380

香苏王胃丸	381
香砂六君子丸	381
香砂养胃丸	381
香薷	207
香薷	208
急性子	209
胖大海	209
胆矾	210
禹白附	210
禹余粮	211
禹粮石	211
保和丸	382
独活	212
独活寄生丸	382
绛矾丸	383
丝瓜络	213

【十 画】

浙贝母	213
消	
史国公药酒	350
虎骨木瓜酒	371
虎骨酒	371
涌泉散	383
麦罗子	214
消痰顺气散	383
灸火散	381
浮小麦	215
浮萍	215
海马	216
海龙	217
海金沙	218
海螵蛸	218
海藻	219
高良姜	220
凌霄花	220
窃防己	101
调经养血膏	384
养阴清肺膏	385
全参	221
益元散	385

— 索引 —

益母草	222
益母草膏	385
益智	222
珠黄散	386
秦皮	223
桑瓦	224
蕤管子	34
莲子	224
莲子心	225
莲花	226
莲房	226
菝葜	227
荷叶	228
荷叶丸	386
菟丝子	228
核桃仁	182
桂枝	229
桂圆肉	72
桔梗	230
枳椇	230
橘核子	231
桃仁	232
夏枯草	233
夏枯草膏	387
破故纸	120
桑叶	233
桑白皮	234
桑枝	235
桑椹	235
桑椹膏	387
桑螵蛸	236
柴胡	237
通义散	387
通草	238
通经甘露丸	388
通宣理肺丸	388
直捣丸	389
芫参	238
竹辟补	239
铁笛丸	389
胶	

阿胶	385
龟板胶	386
龟鹿二仙胶	387
虎骨胶	387
鹿角胶	388
鳖甲胶	407
脏连丸	389
健脾丸	390
射干	240
鬼箭羽	241

【十一画】

淡竹叶	241
淡豆豉	242
清宁丸	390
清肺抑火丸	391
清胃黄连丸	391
清眩丸	391
淫羊藿	243
密蒙花	244
寄生	244
商陆	245
旋复花	246
麻仁丸	392
麻黄	247
麻黄根	247
鹿角	248
鹿角胶	388
鹿角霜	249
鹿茸	249
鹿衔草	251
芫花丸	392
羚羊角	251
松涎丹	393
桑螵子	252
狗花	253
单藻	254
梅花点舌丹	393
梔子	254
梔子金花丸	394
常山	255

蛇床子	256
蛇蛻	257
银杏	84
银柴胡	257
银翘解毒丸	394
甜白莲	67
甜瓜子	258
猪牙皂	259
猪苓	259
续断	260
续随子	25

【十二画】

彩气丸	395
琼玉膏	395
斑蝥	261
琥珀	261
款冬花	262
越鞠丸	396
搜风顺气丸	396
栗芽	263
壹草根	263
孝慈子	264
嘉善	265
黄芩	265
黄连	266
黄连羊肝丸	396
黄连膏	397
黄蘗	269
黄柏	267
黄药子	268
黄耆	269
黄精	270
葛花	270
葛根	271
散	
十灰散	323
七厘散	324
九分散	326
千金散	333
川芎茶调散	334

六一散	334
五苓散	337
五积散	337
玉真散	347
生肌散	351
冲和散	352
冰硼散	353
行军散	358
如意金黄散	358
拨云散	379
参苓白朮散	377
涌泉散	383
消痰顺气散	383
烫火散	384
益元散	385
珠珀散	386
通关散	387
锡类散	401
赛金化毒散	402
避瘟散	404
棕板	272
棕榈	272
椿实子	272
雄黄	273
硫黄	274
硫砂	274
犀角	275
黑白丑	198
黑芝麻	276
黑锡丹	397
紫贝肉	276
紫石英	277
紫苏子	278
紫苏叶	278
紫苏梗	279
紫河车	280
紫金锭	398
紫草	260
紫草茸	281
紫草膏	398
紫雪	399

紫堇	282
紫柏花	282
跌打回生丹	299
蛤壳	283
蛤蚧	284
舒肝丸	300
番木鳖	30
番红花	284
琥珀	285
琥珀胆碱	400
蛤卜草	286

【十三画】

滑石	286
雷丸	287
蒲公英	288
蒲黄	288
玫瑰	289
鹿角子	290
椿皮	290
路路通	291
腰脐膏	301
琥珀	292
蜂房	293
蜂蛰	293
蜂蜡	294
淀	
万应锭	320
紫金锭	338
蟾酥锭	406
肉桂散	407
锦灯笼	296
解胆宁嗽丸	402

【十四画】

藜芦	295
紫金解毒散	402
膏	
二龙膏	324
二条膏	324
万应膏	330

胆和解凝膏	356
尚仪膏	362
河泥化痔膏	365
尚紫膏	368
拔毒膏	369
狗皮膏	376
金不换膏	371
参茸膏	377
调经养血膏	384
养阴清肺膏	385
益母草膏	385
夏枯草膏	387
桑椹膏	387
琼玉膏	395
黄庭膏	397
紫草膏	398
暖脐膏	401
酸枣仁	296
酸浆	296
淫制子	297
槟榔	298
椰子	299
糯米	299
视花	300
视角	301
视角丸	403
磁石	301
磁朱丸	403
猪苓丸	403
猪苓草	302
蚯蚓	303
雷木泥	303
鱼胆	304

【十五画】

五宝膏	118
仙露	305
蛭石	305
蛭蛇	305
透仁	306
谈虎核	307

墨旱莲.....	139
稻芽.....	140

【十六画】

醒消丸.....	404
薄荷.....	307
薏苡仁.....	308
薤白.....	309
橄欖.....	153
橘红.....	309
橘络.....	310
橘核.....	311
避瘟散.....	404

【十七画】

麝虫.....	11
黄木.....	312
檀香.....	312
殭蚕.....	313

【十八画】

何节.....	314
礞石滚痰丸.....	405
瞿麦.....	314
福白草.....	315

【十九画】

藿香.....	316
藿香正气丸.....	405
蟾酥.....	316
蟾酥丸.....	406
蟾酥錠.....	406

【二十画】

鳖甲.....	317
鳖甲豉.....	407
鳖甲煎丸.....	407

【二十一画】

麝香.....	318

中藥材拉丁文索引

Actinolium 阳起石	106	Concha Arcae 瓦楞子	46
Agkistrodon 白花蛇	83	Concha Cypraea 紫贝齿	276
Aloe 芦荟	126	Concha Halitidis 石决明	65
Alumen 白矾	85	Concha Meretricis 蛤壳	283
Arillus Longanae 龙眼肉	73	Concha Ostreae 牡蛎	142
Asafoetida 阿魏	135	Concreta Silicea Bambusae 竹黄	113
Aspongopus 九香虫	5	Cordyceps 冬虫夏草	77
Bambosae in Taenia 竹茹	112	Corium Erinacei 刺猬皮	156
Bombyx Batryticatus 蚕茧	213	Cornu Antelopis 羚羊角	251
Borneolum 冰片	95	Cornu Cervi 鹿角	248
Bulbus Allii 薤白	369	Cornu Cervi Degelatinatum 鹿角霜	249
Bulbus Fritillariae Cirrhosae 川贝母	27	Cornu Cervi Pantotrichum 鹿茸	249
Bulbus Fritillariae Thunbergii 浙贝母	213	Cornu Rhinocer Asiatici 犀角	275
Bulbus Libi 百合	102	Cortex Acanthopanax Radicis 五加皮	37
Bungarus Parvus 金钱白花蛇	167	Cortex Alnana 槲皮	290
Cacumen Riptae 侧柏叶	172	Cortex Albizziae 合欢皮	110
Cacumen Tamaricis 西河柳	101	Cortex Cinnamomi 肉桂	107
Calamina 炉甘石	150	Cortex Dioscore Radicis 白鲜皮	90
Calculus Bovis 牛黄	52	Cortex Eucorniae 杜仲	133
Calculus Equi 马宝	17	Cortex Fraxini 秦皮	223
Calomelas 轻粉	201	Cortex Lycii Radicis 地骨皮	98
Calyx Kaki 柿蒂	193	Cortex Magnoliae Officinalis 厚朴	199
Carapax Amydae 鳖甲	317	Cortex Meliae 苦楝皮	159
Carapax Eremochelyos 玳瑁	180	Cortex Mori Radicis 桑白皮	234
Catechu seu Gambier 儿茶	6	Cortex Moutan Radicis 牡丹皮	141
Caulis Akebiae 木通	42	Cortex Periplocae Radicis 香加皮	206
Caulis Clematidis Armandi 川木通	28	Cortex Phellodendri 黄柏	267
Caulis Hocquartiae 关木通	94	Crinis Carbonisatus 血余炭	115
Caulis Lonicerae 忍冬藤	138	Dens Draconis 龙齿	71
Caulis Perillae Acutae 紫苏梗	279	Endothelium Corneum Gigeriae Galli 鸡内金	134
Caulis Polygoni Multiflori 首乌藤	178	Eupolyphaga 土鳖虫	11
Cera Flava 蜂蜡	294	Exocarpium Benincasae 冬瓜皮	76
Chalcanthitum 胆矾	210	Exocarpium Citri Rubrum 橘红	309
Cinnabaris 朱砂	111	Faeces troglodytorum 五灵脂	38
Colophonium 松香	161	Fel Ursi 熊胆	304

Flos Buddleiae 密蒙花.....	244	Fructus Bruceae 鸦胆子.....	197
Flos Campsis 凌霄花.....	229	Fructus Canarii 青果.....	153
Flos Carthami 红花.....	116	Fructus Carpesii Abrotanoidis 鹤虱.....	305
Flos Caryophylli 丁香.....	1	Fructus Caryophylli 母丁香.....	92
Flos Celosiae Cristatae 鸡冠花.....	134	Fructus Chaenomelis Lagenariae 木瓜.....	40
Flos Chrysanthemi 菊花.....	253	Fructus Chebulae 诃子.....	119
Flos Daturae 洋金花.....	175	Fructus Citri 香橼.....	208
Flos Dolichoris 扁豆花.....	176	Fructus Citri Sarcodactylis 佛手.....	144
Flos Eriocauli 谷精草.....	141	Fructus Chidii 蛇床子.....	256
Flos Farfarae 款冬花.....	262	Fructus Corni 山茱萸.....	24
Flos Genkwa 芫花.....	128	Fructus Crataegi 山楂.....	24
Flos Hibisci 木槿花.....	43	Fructus Dauci Carotae 南鹤虱.....	181
Flos Inulae 旋复花.....	246	Fructus Evodiae 吴茱萸.....	138
Flos Lonicerae 金银花.....	165	Fructus Foeniculi 茴香.....	191
Flos Magnoliae Liliflorae 辛夷.....	119	Fructus Forsythiae 连翘.....	121
Flos Magnoliae Officinalis 厚朴花.....	200	Fructus Galangae 红豆蔻.....	117
Flos Mume 白梅花.....	39	Fructus Gardeniae 梔子.....	254
Flos Nelumbinis 莲花.....	226	Fructus Gleditsiae Officinalis 猪牙皂.....	259
Flos Puerariae 葛花.....	270	Fructus Gleditsiae Sinensis 皂角.....	13
Flos Rosae Chinensis 月季花.....	51	Fructus Hordei Germinatus 麦芽.....	123
Flos Rosae Rugosae 玫瑰花.....	151	Fructus Hoveniae 枳椇子.....	195
Flos Sophorae 槐花.....	300	Fructus Kochiae 地肤子.....	97
Flos Sophorae Immaturus 槐米.....	299	Fructus Leonuri 牻牛儿苗.....	184
Fluoritum 紫石英.....	277	Fructus Ligustri Lucidi 女贞子.....	31
Folium Artemisiae Argyi 艾叶.....	61	Fructus Liquidambaris 路路通.....	291
Folium Eriobotryae 枇杷叶.....	160	Fructus Litchae 荔枝茄.....	186
Folium Mori 桑叶.....	233	Fructus Lycii 枸杞子.....	196
Folium Nelumbinis 荷叶.....	228	Fructus Meliae Toosendan 川楝子.....	30
Folium Perillae Acutae 紫苏叶.....	278	Fructus Mori 桑椹.....	235
Folium Photiniae 石楠叶.....	69	Fructus Mume 乌梅.....	56
Folium Pleioblasti 苦竹叶.....	157	Fructus Nelumbinis 石莲子.....	67
Fructus Aesculi 娑罗子.....	214	Fructus Oryzae Germinatus 谷芽.....	140
Fructus Alpiniae Oxyphyllae 益智.....	222	Fructus Papaveris 罂粟壳.....	303
Fructus Anomi Cardamomi 豆蔻.....	126	Fructus Perillae Acutae 紫苏子.....	278
Fructus Anomi Tsaoko 草果.....	190	Fructus Physalis 酸浆.....	296
Fructus Anisi Stellati 八角茴香.....	4	Fructus Piperis Albus 白胡椒.....	88
Fructus Aretii 牛蒡子.....	53	Fructus Piperis Longi 荜茇.....	185
Fructus Aristolochiae 马兜铃.....	20	Fructus Psoraleae 补骨脂.....	120
Fructus Aurantii 枳壳.....	194	Fructus Quisqualis 使君子.....	171
Fructus Aurantii Immaturus 枳实.....	195	Fructus Rosae Laevigatae 金樱子.....	168
Fructus Broussonetiae 楮实子.....	272	Fructus Rubi 复盆子.....	204

Fructus Schizandrae 五味子	39	Herba Lycopi 泽兰	146
Fructus Setariae Germinatus 菜苣	263	Herba Lycopodi 伸筋草	145
Fructus Seu Semen Annona 砂仁	209	Herba Menthae 薄荷	307
Fructus Sophorae 槐角	30	Herba Orostachys 瓦松	45
Fructus Tribuli 蒺藜	289	Herba Pogostemon 藜香	316
Fructus Trichosanthis 栝楼	239	Herba Polygoni Avicularis 蒺藜	265
Fructus Triticis Levis 浮小麦	215	Herba Portulacae 马齿苋	18
Fructus Viticis 蔓荆子	297	Herba Potentillae cum Radice 翻白草	315
Fructus Xanthii 苍耳子	139	Herba Pyrolae 鹿衔草	251
Fructus Zizyphi Sative 大枣	11	Herba Pyrosiae 石胆	66
Fuligo e Herbis 百草霜	103	Herba Schizonepetae 荆芥	184
Galla Chinensis 五倍子	40	Herba Selaginellae 卷柏	149
Gecko 蛤蚧	281	Herba Siegesbeckiae 矮蒿草	302
Grifola 猪苓	259	Herba Taraxaci cum Radice 蒲公英	288
Gypsum Fibrosum 石膏	70	Herba Verbenae 马鞭草	21
Haematitum 赭石	305	Hippocampus 海马	216
Halitum 大青盐	45	Hirudo 水蛭	49
Halloysitum Rubrum 赤石脂	124	Indigo Pulverata Levis 青黛	155
Herba Agrimoniae 仙鹤草	78	Lacca 紫草茸	281
Herba Artemisiae Chinghao 青蒿	154	Lacca Sineae Baccata 土漆	10
Herba Artemisiae Capillaris 茵陈	191	Lapis Chrysolite 青金石	155
Herba Asari Cum Radice 细辛	174	Lapis Mene Aurea 金礞石	169
Herba Centipedae 鹅不食草	286	Lasiosphaera 马勃	19
Herba Cirsii Segeti 小蓟	21	Lignum Aquilariae 沉香	117
Herba Cistanches 肉苁蓉	168	Lignum Pini Nodi 油松节	148
Herba Cynomori 锁阳	285	Lignum Santali 檀香	312
Herba Dendrobii 石斛	67	Lignum Sappan 苏木	128
Herba Dianthi 瞿麦	314	Limonitum 禹粮石	211
Herba Ecliptae 旱莲草	139	Lumbrieus 地龙	96
Herba Elsholtziae 香薷	207	Magnetitum 磁石	301
Herba Ephedrae 麻黄	247	Margarita 珍珠	179
Herba Epinedii 淫羊藿	243	Medulla Juncei 灯心草	95
Herba Equiseti Hiemalis 木贼	42	Medulla Tetrapanacis 通草	238
Herba Brodiaei seu Geranii 老鹳草	100	Mel 蜂蜜	293
Herba Eupatorii 佩兰	173	Membrana Follcularis Ovi 凤凰衣	51
Herba Houttuyniae 鱼腥草	171	Mirabilium Dehydratum 玄明粉	58
Herba Laminariae 昆布	165	Mirabilium Depuratum 芒硝	102
Herba Lonicerae 浮萍	215	Moschus 麝香	318
Herba Leonuri 益母草	222	Muscovitum 云母石	37
Herba Lobeliae Radicantis cum Radice 半边莲	60	Mylabris 斑蝥	261
Herba Lophatheri 淡竹叶	241	Nidus Vespae 蜂房	293

Nodus Nelumbinis Rhizomatis 藕节.....314	Radix Clematidis 威灵仙.....203
Nux Prinsepieae 薏仁.....306	Radix Codonopsis Pilosulae 党参.....238
Nux Pseudocerasi 樱桃核.....307	Radix Curcumae 郁金.....163
Onophalia 雷丸.....287	Radix Cyathulae 川牛膝.....29
Ootheca Mantidis 桑螵蛸.....236	Radix Cynanchi Atrati 白薇.....91
Ophicalcitum 花蕊石.....132	Radix Dichroae 常山.....255
Os Draconis 龙骨.....73	Radix Dioscoreae 山药.....23
Os Sepiae 海螵蛸.....218	Radix Dipsaci 续断.....260
Os Tigris 虎骨.....164	Radix Ephedrae 麻黄根.....247
Pericarpium Arecae 大腹皮.....17	Radix Euphorbiae Fischerianae 白狼毒.....89
Pericarpium Citri Reticulatae 陈皮.....136	Radix Euphorbiae Kansui 甘遂.....61
Pericarpium Citri Reticulatae Viride 青皮.....152	Radix Gentianae 龙胆.....72
Pericarpium Granati 石榴皮.....71	Radix Gentianae Macrophyllae 秦艽.....224
Periostracum Cicadae 蝉蜕.....303	Radix Ginseng 人参.....2
Periostracum Serpentinae 蛇蜕.....257	Radix Glehniae 北沙参.....74
Petiolus Trachycarpi 棕榈.....272	Radix Glycyrrhizae 甘草.....63
Placenta Humani 紫河车.....280	Radix Hemerocallis 萱草根.....263
Plastrum Testudinis 龟板.....143	Radix Jujubeae 川木香.....28
Plumula Nelumbinis 莲子心.....225	Radix Knoxiae 红大戟.....115
Pollen Pini 松花粉.....161	Radix Linderae 乌药.....55
Pollen Typhae 蒲黄.....288	Radix Macrotomiae seu Lithospermi 紫草.....280
Poria 茯苓.....192	Radix Morindae 巴戟天.....48
Pyritum 自然铜.....114	Radix Ophiopogonis 麦门冬.....123
Radix Achyranthis Bidentatae 牛膝.....53	Radix Paeoniae Alba 白芍.....81
Radix Aconiti 川乌.....26	Radix Paeoniae Rubra 赤芍.....125
Radix Aconiti Agrestis 草乌.....188	Radix Peucedani 前胡.....178
Radix Aconiti Carmichaeli Praeparata 附子.....136	Radix Phytolaccae 商陆.....245
Radix Aconiti Coreani 关白附.....94	Radix Platycodi 桔梗.....230
Radix Adenophorae 南沙参.....180	Radix Polygalae 远志.....121
Radix Ampelopsis 白藜.....91	Radix Polygoni Multiflori 何首乌.....144
Radix Angelicae 白芷.....82	Radix Pseudoginseng 三七.....8
Radix Angelicae Sinensis 当归.....106	Radix Pseudostellariae 太子参.....46
Radix Angelicae Tuhuo 独活.....212	Radix Puerariae 葛根.....271
Radix Aristolochiae 青木香.....151	Radix Pulsatillae 白头翁.....80
Radix Aristolochiae Westlandi 广防己.....6	Radix Rehmanniae 地黄.....98
Radix Asparagi 天门冬.....33	Radix Rhapontici seu Echinopsis 漏芦.....295
Radix Asteris 紫菀.....282	Radix Rubiae 茜草.....187
Radix Astragali 黄耆.....269	Radix Salviae Miltiorrhizae 丹参.....50
Radix Boehmeriae 苧麻根.....157	Radix Sanguisorbae 地榆.....100
Radix Bupleuri 柴胡.....237	Radix Saussureae 木香.....41
Radix Changii 明党参.....166	Radix Scrophulariae 玄参.....58

Radix Scutellariae 黄芩.....	265	Rhizoma et Radix Cynanchi Stauntoni 白前.....	86
Radix Sileris 防风.....	105	Rhizoma et Radix Ligustici 藁本.....	312
Radix Sophorae Flavescentis 苦参.....	159	Rhizoma et Radix Notopterygii 羌活.....	148
Radix Sophorae Subprostratae 广豆根.....	7	Rhizoma Gastrodiae 天麻.....	26
Radix Stellariae Dichotomae 银柴胡.....	257	Rhizoma Imperatae 白茅根.....	86
Radix Stemonae 百部.....	104	Rhizoma Kaempferae 山柰.....	22
Radix Stephaniae Tetrandrae 防己.....	104	Rhizoma Ligustici Wallichii 川芎.....	39
Radix Tinosporae 金果榄.....	166	Rhizoma Nardostachyos 甘松.....	62
Radix Trichosanthis 天花粉.....	34	Rhizoma Phragmitis 芦根.....	127
Ramulus Cinnamomi 桂枝.....	229	Rhizoma Pierorrhizae 胡黄连.....	183
Ramulus Uncariae cum Uncis 钩藤.....	205	Rhizoma Pinelliae 半夏.....	60
Ramulus Visciei seu Loranthi 寄生.....	241	Rhizoma Polygonati 黄精.....	270
Ramulus Eonymi 鬼箭羽.....	241	Rhizoma Polygonati Officinale 玉竹.....	61
Ramulus Mori 桑枝.....	235	Rhizoma Rhei 大黄.....	15
Realgar 雄黄.....	273	Rhizoma Smilacis Glabrae 土茯苓.....	11
Receptaculum Nelumbinis 莲房.....	226	Rhizoma Sparganii 三棱.....	8
Retinervus Curi Fractus 橘络.....	310	Rhizoma Typhonii 禹白附.....	210
Retinervus Luffae Fractus 丝瓜络.....	213	Rhizoma Zedoariae 莪朮.....	227
Rhizoma Acori Graminei 石菖蒲.....	69	Rhizoma Zingiberis 干姜.....	9
Rhizoma Alismatis 泽泻.....	147	Rhizoma Zingiberis Recens 生姜.....	75
Rhizoma Alpiniae Officinarum 高良姜.....	220	Sal Ammoniacum 硫砂.....	274
Rhizoma Anemarrhenae 知母.....	170	Sargassum 海藻.....	219
Rhizoma Anemones Altaicae 九节菖蒲.....	1	Scelopendra 蜈蚣.....	202
Rhizoma Anemones Raddeanae 竹节香附.....	112	Scorpio 全蝎.....	110
Rhizoma Arisaematis 天南星.....	35	Secretio Butonis 蟾酥.....	316
Rhizoma Atractylodis 苍朮.....	129	Selenitum 玄精石.....	59
Rhizoma Atractylodis Alba 白朮.....	79	Semen Allii Tuberosi 韭菜子.....	202
Rhizoma Belamcandae 射干.....	240	Semen Alpiniae Katsumadai 草豆蔻.....	189
Rhizoma Bistortae 拳参.....	221	Semen Arecae 槟榔.....	298
Rhizoma Blechnae 白及.....	79	Semen Armeniacae Amarac 苦杏仁.....	156
Rhizoma Ciboti 狗脊.....	173	Semen Astragali Complanati 沙苑子.....	118
Rhizoma Cimicifugae 升麻.....	54	Semen Benincasae 冬瓜子.....	75
Rhizoma Coptidis 黄连.....	266	Semen Biotae 柏子仁.....	197
Rhizoma Corydalis 延胡索.....	109	Semen Canavaliae 刀豆.....	1
Rhizoma Curculiginis 仙茅.....	77	Semen Cannabis 大麻仁.....	32
Rhizoma Curcuma Aromaticae Concisa 片姜黄.....	57	Semen Cassiae Torae 决明子.....	93
Rhizoma Curcuma Longae 姜黄.....	177	Semen Celosiae 青葙子.....	153
Rhizoma Cyperi 香附.....	206	Semen Citri Reticulatae 橘核.....	311
Rhizoma Dioscoreae Bishie 草薢.....	254	Semen Coicis 薏苡仁.....	308
Rhizoma Dioscoreae Bulbiferae 黄药子.....	268	Semen Crotonis 巴豆.....	48
Rhizoma Drynariae 骨碎补.....	239	Semen Cuscutae 菟丝子.....	228

Semen Dolichoris 白扁豆.....87	Semen Sinapis Albae 白芥子.....83
Semen Euphorbiae Lathyroidis 千金子.....25	Semen Sojae Germinatum 大豆黄卷.....13
Semen Faryales 芡实.....131	Semen Sojae Praeparatum 淡豆豉.....242
Semen Ginkgo 白果.....84	Semen Sterculiae Scaphigeriae 胖大海.....209
Semen Gynandropsis 白花菜子.....84	Semen Strychni 马钱子.....19
Semen Hydnocarpus 大风子.....12	Semen Torreyae 榧子.....209
Semen Hyoseyami 天仙子.....34	Semen Trichosanthis 栝楼子.....231
Semen Impatiens 急性子.....209	Semen Trigonellae 胡芦巴.....182
Semen Juglandis 胡桃仁.....182	Semen Vaccariae 王不留行.....32
Semen Lepidii 苘麻子.....264	Semen Zizyphi Spinosa 酸枣仁.....296
Semen Litchi 荔枝核.....187	Spica Prunellae 夏枯草.....233
Semen Melo 甜瓜子.....258	Spina Gleditsiae 皂角刺.....146
Semen Momordicae 木鳖子.....44	Spongilla 紫柏花.....282
Semen Nelumbinis 莲子.....224	Spora Lygodii 海金沙.....218
Semen Oroxyli 木蝴蝶.....44	Squama Manitis 穿山甲.....176
Semen Persicae 桃仁.....232	Stalactitum 钟乳石.....204
Semen Pharbitidis 牵牛子.....198	Stigma Croci 番红花.....284
Semen Phaseoli 赤小豆.....124	Succinum 琥珀.....261
Semen Plantaginis 车前子.....47	Sulfur 硫黄.....274
Semen Pruni 郁李仁.....162	Syngnathus 海龙.....217
Semen Raphani 莱菔子.....252	Tabanus 虻虫.....202
Semen Ricci 蓖麻子.....290	Talcum 滑石.....286
Semen Sesami 黑芝麻.....276	Terra Flava Usta 伏龙肝.....113
Semen Sinapis 芥子.....131	Zaocys 乌梢蛇.....56

汉语拼音索引

- Āifù Nuǎngōng Wán 艾附暖宫丸.....347
 Āiyè 艾叶.....64
 Āngōng Niúhuáng Wán 安宫牛黄丸.....352
 Āwèi 阿魏.....135
 Āwèi Huàpì Gāo 阿魏化痞膏.....365
 Bābǎo Hónglíng Dān 八宝红灵丹.....326
 Bābǎo Kūnshùn Dān 八宝坤顺丹.....326
 Bādòu 巴豆.....48
 Bǎilú Gāo 拔毒膏.....369
 Báibǎndòu 白扁豆.....87
 Báibù 百部.....104
 Bǎicǎoshuāng 百草霜.....103
 Báifán 白矾.....85
 Báiguǒ 白果.....84
 Bǎihé 百合.....102
 Baihé Gùjīn Wán 百合固金丸.....355
 Báihuācǎizi 白花菜子.....84
 Baihuāshé 白花蛇.....83
 Báihújiāo 白胡椒.....88
 Báiji 白及.....79
 Báijiàng Dān 白降丹.....351
 Báijiēzi 白芥子.....83
 Bǎilángshù 白狼树.....89
 Báiliàn 白莲.....91
 Baimáogēn 白茅根.....86
 Báiméihuā 白梅花.....89
 Baiqián 白前.....86
 Báisháo 白芍.....81
 Bǎitóuwēng 白头翁.....89
 Báiwēi 白薇.....91
 Báixiānpí 白鲜皮.....90
 Báizhū 白芷.....82
 Báizhú 白朮.....79
 Bǎizǐrén 柏子仁.....197
 Bǎizǐ Yàoxīn Wán 柏子养心丸.....379
 Bǎijiǎo Huìxiāng 八角茴香.....4
 Bājiùtiān 巴戟天.....48
 Bānbēi wán 半贝丸.....346
 Bānbīanlián 半边莲.....69
 Bānlú Wán 半硫丸.....346
 Bānmáo 斑蝥.....261
 Bānxuà 半夏.....60
 Bǎohé Wán 保和丸.....382
 Bāzhēn Wán 八珍丸.....327
 Bāzhēn Yǔmǔ Wán 八珍益母丸.....327
 Běishāshēn 北沙参.....74
 Běidòuhuā 扁豆花.....176
 Biānxù 端硯.....265
 Bìbó 毕拔.....185
 Bìhéngqié 萆薢.....186
 Biējiǎ 鳖甲.....317
 Bìjiǎjiān Wán 鳖甲煎丸.....407
 Biējiǎ Jiāo 鳖甲胶.....407
 Bimazi 蓖麻子.....290
 Bīngláng 冰榔.....298
 Bīngpéng Sān 冰硼散.....353
 Bīngpiàn 冰片.....93
 Bīwēn Sān 温瘟散.....404
 Bìxù 萆薢.....254
 Bòhe 薄荷.....307
 Bōyán Sān 拔四肢.....370
 Bùgǔzhū 补骨脂.....120
 Bùzhōng Yìqì Wán 补中益气丸.....360
 Cāng'ěrzi 苍耳子.....130
 Cāngzhū 苍朮.....129
 Cǎodòngkǒn 草豆蔻.....189
 Cǎogǒ 草果.....191
 Cǎowū 草乌.....188
 Cèbái yè 侧柏叶.....172
 Cháhú 柴胡.....237

Chángshān 常山	255	Dāngguī 当归	109
Chánsū 蟾酥	316	Dāngguī Lóngzōu Wán 当归龙荟丸	357
Chánsū Dīng 蟾酥钉	406	Dāngshēn 党参	238
Chánsū Wán 蟾酥丸	406	Dānsēn 丹参	50
Chántuī 蝉蜕	303	Dānzúyè 淡竹叶	241
Chénpí 陈皮	136	Dàochì Dān 导赤丹	355
Chénxiāng 沉香	117	Dāo lǒu 刀豆	1
Chénxiāng Huàqì Wán 沉香化气丸	359	Dàqīngyán 大青盐	15
Chénxiāng Huàzhì Wán 沉香化滞丸	360	Dàzǎo 大枣	14
Chēqiánzǐ 车前子	47	Dàzàoqiǎo 大皂角	13
Chìbáo 赤芍	125	Dēngxīncǎo 灯心草	95
Chìshízhǐ 赤石脂	124	Diēdǎ Huíshēng Dān 跌打回生丹	390
Chìxiǎodòu 赤小豆	121	Dìfúzǐ 地肤子	97
Chōnghé Sǎn 冲和散	352	Dìgǔpí 地骨皮	98
Chōngwéizi 菟蔚子	181	Dìhuáng 地黄	98
Chuānbémǔ 川贝母	27	Dìlóng 地龙	96
Chuānliǎnzǐ 川楝子	30	Dīngxiāng 丁香	1
Chuānmùtōng 川木通	28	Dìyú 地榆	100
Chuānmùxiāng 川木香	28	Dōngchóngxiàcǎo 冬虫夏草	77
Chuānniúxī 川牛膝	29	Dōngguāpí 冬瓜皮	76
Chuānshānjiǎ 穿山甲	176	Dōngguāzǐ 冬瓜子	75
Chuānwū 川乌	26	Dǒukǒu 豆蔻	126
Chuānxióng 川芎	30	Dúhuó 独活	212
Chuānxióng Chātiáo Sǎn 川芎茶调散	334	Dúhuó Jīshēng Wán 独活寄生丸	382
Chūnpí 椿皮	290	Dùzhōng 杜仲	133
Chúnyáng Zhèngqì Wán 纯阳正气丸	367	Ébùshícǎo 饿不食草	286
Chúshízǐ 楮实子	272	Èjiāo 阿胶	365
Císhí 磁石	301	Èrchá 儿茶	6
Cízhū Wán 磁珠丸	403	Èrchén Wán 二陈丸	322
Ciwènpí 刺猬皮	156	Èrèng Gāo 二冬膏	321
Cùnjīn Dān 寸金丹	329	Èrlóng Gāo 二龙膏	321
Dàbǔyīn Wán 大补阴丸	330	Èrèng Zuǒcì Wán 耳聋左慈丸	354
Dàdòuhuángjuǎn 大豆黄卷	13	Èrmào Wán 二妙丸	322
Dàifēngzǐ 大风子	12	Fǎzhú 莨菪	227
Dàfùpí 大腹皮	17	Fānbáicǎo 翻白草	315
Dàhuáng 大黄	15	Fángfēng 防风	105
Dàhuáng Zhéchéng Wán 大黄蛰虫丸	332	Fángfēng Tōngshēng Wán 防风通圣丸	355
Dàhuóhuó Dān 大活络丹	331	Fángjì 防己	104
Dàimào 玳瑁	180	Fānhónghuā 番红花	284
Dàndòuchì 淡豆豉	242	Féi'ér Wán 肥儿丸	376
Dǎntán 胆矾	210	Fěizi 榧子	299

Fēngfáng 蜂房	293	Guizhī 桂枝	226
Fēnghuányī 凤凰衣	51	Gǔjīngcǎo 谷精草	141
Fēngxià 蜂蜡	294	Gǔsuībù 骨碎补	239
Fēngzhu 蜂室	293	Gǔyá 谷芽	140
Fēnqīng Wúlín Wán 分清五淋丸	346	Hǎijīnsā 海金沙	218
Fóshǒu 佛手	144	Hǎilóng 海龙	217
Fúfēng 茯苓	192	Hǎimǎ 海马	216
Fúlónggān 伏龙肝	113	Hǎipiāoxiǎo 海螵蛸	218
Fùpénzi 复盆子	204	Hǎizǎo 海藻	219
Fúfú 浮萍	215	Hǎnzǎocǎo 旱莲草	139
Fúxiǎomài 浮小麦	215	Héchē Dàzào Wán 河车大造丸	268
Fùzǐ Lìzhōng Wán 附子理中丸	366	Héhuānpí 合欢皮	110
Fuzi 附子	136	Hēixī Dān 黑锡丹	397
Gāncǎo 甘草	63	Hēizhūmó 黑芝麻	276
Gānjiāng 干姜	9	Hèshī 鹤虱	305
Gānlù Xiǎodù Dān 甘露消毒丹	347	Héshǒuwū 何首乌	144
Gānqī 干漆	10	Héyè 荷叶	228
Gānsōng 甘松	62	Héyè Wán 荷叶丸	386
Gānsu 甘遂	64	Hézi 诃子	119
Gāoběn 槲本	312	Hóngdàjì 红大戟	115
Gāoliángjiāng 高良姜	220	Hóngdòukǒu 红豆蔻	117
Gēgēn 葛根	271	Hónghuā 红花	116
Gēhuā 葛花	270	Hóngshēng Dān 红升丹	359
Gējié 蛤蚧	284	Hòupò 厚朴	199
Gēngyī Wán 更衣丸	362	Hòupòhuā 厚朴花	200
Géqiào 蛤壳	283	Huàchóng Wán 化虫丸	344
Gǒuji 狗脊	173	Huàfēng Dān 化风丹	344
Gǒupí Gān 狗皮膏	376	Huáihuā 槐花	306
Gǒuqǐzi 枸杞子	196	Huáijiǎo 槐角	301
Gǒutēng 钩藤	205	Huáijiǎo Wán 槐角丸	403
Guālón 栝楼	230	Huáimí 槐米	299
Guālózǐ 栝楼子	231	Huángbǎi 黄柏	267
Guānbáifù 关白附	94	Huángjīng 黄精	270
Guàngòutōng 广豆根	7	Huánglián 黄连	266
Guàngǎngjì 广防己	6	Huánglián Gāo 黄连膏	397
Guānmùtōng 关木通	94	Huánglián Yánggān Wán 黄连羊肝丸	396
Guibǎn 龟板	143	Huángqī 黄芩	269
Guibǎn Jiāo 龟板胶	366	Huángqín 黄芩	265
Guǐjiányǔ 鬼箭羽	241	Huángyàozi 黄药子	268
Guǐlù Èrxiān Jiāo 龟鹿二仙胶	367	Huāruǐshí 花蕊石	132
Guīpí Wán 归脾丸	350	Huáshí 滑石	286

Huàzhēng Huíshēng Dān 化癥回生丹.....345	Jiǔxiāngchóng 九香虫.....5
Hǔgǔ 虎骨.....164	Jíxìngzi 急性子.....209
Hǔgǔ Jiāo 虎骨胶.....372	Juǎnbái 卷柏.....149
Hǔgǔ Jiǔ 虎骨酒.....371	Juémíngzi 决明子.....93
Hǔgǔ Mùguā Jiǔ 虎骨木瓜酒.....371	Jūfāng Zhībào Dān 局方至宝丹.....364
Hǔgǔ Mùguā Wán 虎骨木瓜丸.....370	Júhé 橘核.....311
Húhuánglián 胡黄连.....183	Júhóng 橘红.....309
Huixiāng 茴香.....191	Jiǔhuā 菊花.....253
Huixiāng Júhé Wán 茴香橘核丸.....379	Júluò 橘络.....310
Húlǔbā 胡芦巴.....182	Kāixiōng Shùqì Wán 开胸顺气丸.....336
Huómárén 火麻仁.....32	Kānlǐshā 坎离砂.....362
Huòxiāng 藿香.....316	Kōngxián Dān 控涎丹.....393
Huòxiāng Zhèngqì Wán 藿香正气丸.....405	Kuāndōngguā 款冬花.....262
Hǔpò 琥珀.....261	Kǔliǎnpí 苦楝皮.....159
Hǔqián Wán 虎潜丸.....372	Kūnbù 昆布.....160
Hútaorén 胡桃仁.....182	Kúshēn 苦参.....159
Jiāngcán 僵蚕.....313	Kǔxīng rén 苦杏仁.....158
Jiàngǎn Wán 绛矾丸.....383	Kúzhúyè 苦竹叶.....157
Jiānghuáng 姜黄.....177	Láifúzi 莱菔子.....232
Jiànpi Wán 健脾丸.....390	Lǎoguàncǎo 老鹳草.....100
Jiégēng 桔梗.....230	Léiwán 雷丸.....287
Jièjī Níngsòu Wán 解肌宁嗽丸.....402	Liánfāng 连房.....226
Jièzi 芥子.....131	Liǎngyī Gāo 两仪膏.....362
Jīguānhuā 鸡冠花.....134	Liánhuā 莲花.....226
Jīli 藜蘆.....289	Liánqiào 连翘.....121
Jīnbúhuàn Gāo 金不换膏.....374	Liánqiào Bǎidù Wán 连翘败毒丸.....361
Jīnèijīn 鸡内金.....134	Liánzi 莲子.....224
Jīngjiè 荆芥.....184	Liánzixīn 莲子心.....225
Jīnguì Shèngqì Wán 金匱肾气丸.....375	Língxiǎohuā 凌霄花.....220
Jīnguǒlǎn 金果榄.....166	Língyángjiǎo 羚羊角.....251
Jīnmòngshí 金礞石.....169	Liùhé Dìngzhōng Wán 六合定中丸.....335
Jīnqián Báihuāshé 金钱白花蛇.....167	Liúhuáng 硫黄.....274
Jīnyīngzi 金樱子.....168	Liùwèi Dìhuáng wán 六味地黄丸.....335
Jīnyínhuā 金银花.....168	Liùyī Sǎn 六一散.....334
Jīnyínhuā Lù 金银花露.....374	Lǐzhīhé 荔枝核.....187
Jīshēng 寄生.....244	Lóngchǐ 龙齿.....71
Jīshēng Shèngqì Wán 济生肾气丸.....378	Lóngdǎn 龙胆.....72
Jiūcǎizi 韭菜子.....202	Lóngdǎn Xiègān Wán 龙胆泻肝丸.....349
Jiūfēn Sǎn 丸分散.....328	Lónggǔ 龙骨.....73
Jiūjié Chángpú 九节菖蒲.....4	Lóngyǎnròu 龙眼肉.....73
Jiǔqì Niántòng Wán 九气拈痛丸.....328	Lòulú 漏芦.....295

Lúgānshí 枞甘石	150	Mùzéi 木贼	42
Lúgēn 芦根	127	Nánhèshī 南鹤虱	181
Lúhuà 芦荟	126	Nánshāshēn 南沙参	180
Lùjiǎo 鹿角	248	Nàoshā 确砂	274
Lùjiǎo Jiǎo 鹿角胶	393	Nèixiāo Lǎoli Wán 内消瘰癧丸	339
Lùjiǎoshuāng 鹿角霜	249	Niúhángzǐ 牛蒡子	53
Lùlùtōng 路路通	291	Niúhuáng 牛黄	52
Lùqióng 鹿茸	249	Niúhuáng Bào lóng Wán 牛黄抱龙丸	340
Lùxiáncǎo 鹿衔草	251	Niúhuáng Qīngxīn Wán (Júfāng) 牛黄清心丸(局方)	341
Mǎbái 马宝	17	Niúhuáng Qīngxīn Wán (Wànshìfāng) 牛黄清心丸(万氏方)	341
Mǎbiāncǎo 马鞭草	21	Niúhuáng Shàngqīng Wán 牛黄上清丸	340
Mǎbó 马勃	19	Niúhuáng Zhènjīng Wán 牛黄镇惊丸	342
Mǎchǐxiàn 马齿苋	18	Niúxī 牛膝	53
Mǎlǒulíng 马兜铃	20	Nuǎnqí Gāo 暖脐膏	401
Mǎhuáng 麻黄	247	Nǚjīn Dān 女金丹	334
Mǎhuánggēn 麻黄根	247	Nǚzhēnzǐ 女贞子	31
Mǎiméndōng 麦门冬	122	Óujié 藕节	314
Mǎiwèi Dìhuáng Wán 麦味地黄丸	361	Pàngùhǎi 胖大海	209
Mǎiyǎ 麦芽	123	Pèilán 佩兰	173
Mángchóng 蛔虫	202	Piànjiānghuáng 片姜黄	57
Mángxiǎo 芒硝	102	Pípáyè 枇杷叶	160
Mǎnjīngzǐ 蔓荆子	297	Pǔgōngyīng 蒲公英	288
Mǎqiǎnzǐ 马钱子	19	Pùhuáng 蒲黄	288
Mǎrén Wán 麻仁丸	392	Qiāncǎo 茜草	187
Méiguīhuā 玫瑰花	151	Qiāngbó 羌活	148
Méihuā Diānshé Dǎn 梅花点舌丹	393	Qiánlú 前胡	178
Méngshí Gǒután Wán 礞石滚痰丸	405	Qiánjīn Sǎn 千金散	333
Mimóghuā 密蒙花	234	Qiánjīn Zhìdì Wán 千金止带丸	333
Míngdàngshēn 明党参	166	Qiánjīnzǐ 千金子	25
Míngmù Dìhuáng Wán 明目地黄丸	373	Qiānniúzi 牵牛子	198
Míngmù Shàngqīng Wán 明目上清丸	373	Qiānshí 芡实	131
Mùbiēzǐ 木鳖子	44	Qībào Dān 七宝丹	324
Mùdānpí 牡丹皮	141	Qǐjú Dìhuáng Wán 杞菊地黄丸	363
Mùlǐngxiāng 排丁香	92	Qīlǐ sǎn 七厘散	324
Mùguā 木瓜	40	Qīngdài 青黛	155
Mùhúdié 木蝴蝶	44	Qīngè Wán 青娥丸	369
Mùjīnhuā 木棉花	43	Qīngfèi Yīhuǒ Wán 清肺抑火丸	391
Mùlǐ 牡蠣	142	Qīngfěn 轻粉	201
Mùtōng 木通	42	Qīngguǒ 青果	153
Mùxiāng 木香	41		
Mùxiāng Bīngláng Wán 木香枳壳丸	338		

Qīngguō Gāo 青果膏	308	Shāorén 砂仁	200
Qīnghao 青蒿	151	Shāoyuánzǐ 沙苑子	118
Qīngméngshí 青礞石	155	Shuōchūánguǒ 蛇床子	256
Qīngmùxiāng 青木香	151	Shuōgān 射干	140
Qīngníng Wán 清宁丸	399	Shēngjī Sǎn 生肌散	351
Qīngpí 青皮	152	Shēngjiāng 生姜	75
Qīngwèi Huanglián Wán 清胃黄连丸	391	Shēngmá 升麻	54
Qīngxuàn Wán 清眩丸	391	Shēnjīncǎo 伸筋草	145
Qínjiāo 秦艽	224	Shēnlín Bǎizhū Sǎn 参苓白朮散	377
Qínpi 秦皮	223	Shēnqī Gāo 参茸膏	377
Qīngxiāngzǐ 青箱子	153	Shēnsū Wán 参苏丸	377
Qióngyù Gāo 琼玉膏	395	Shénxī Dan 神犀丹	378
Qípí Wán 启脾丸	390	Shétiān 蛇蛻	257
Qīyè Dan 七液丹	325	Shexiang 麝香	318
Qīzhēn Dan 七珍丹	324	Shíchānpú 石菖蒲	69
Quánshēn 拳参	221	Shíhú 柿蒂	193
Quánxié 全蝎	110	Shígāo 石斛	70
Qūmài 瞿麦	314	Shuāngōng Yàojiǔ 史国公药酒	350
Rěndōngtèng 忍冬藤	138	Shúhú 石斛	67
Rénshēn 人参	2	Shúhú Yèguāng Wán 石斛夜光丸	348
Rénshēn Yāngróng Wán 人参养荣丸	325	Shíhuǒ sǎn 十灰散	323
Ròucōngróng 肉苁蓉	108	Shíjiémíng 石决明	65
Ròuguì 肉桂	107	Shǐjūnzǐ 使君子	171
Rùirén 蕤仁	306	Shíliánzǐ 石莲子	67
Rúyì Jīnhuáng Sǎn 如意金黄散	358	Shíshúpí 石櫟皮	71
Sàijīn Huàdù Sǎn 赛金化毒散	402	Shíshùyè 石楠叶	69
Sāngháipí 桑白皮	234	Shíquán Dàbù Wán 十全大补丸	322
Sāngpiǎoxiào 桑螵蛸	236	Shíwú 石韦	66
Sāngren 桑椹	235	Shíxiāng Wán 十香丸	323
Sāngren Gāo 桑椹膏	387	Shǒuwùtóng 首乌藤	178
Sāngyè 桑叶	233	Shūzāi Wán 舒肝丸	400
Sāngzhū 桑枝	235	Shuǐzhū 水蛭	49
Sānhuáng Bǎolù Wán 三黄宝蜡丸	328	Siguāluò 丝瓜络	213
Sānléng 三棱	8	Sìhóng Dān 四红丹	349
Sānqī 三七	8	Sìshén Wán 四神丸	349
Shānglù 商陆	245	Sōnghuāfěn 松花粉	161
Shānnài 山奈	22	Sōngxiāng 松香	161
Shānyào 山药	23	Sòufēng Shùqì Wán 搜风顺气丸	396
Shānzhā 山楂	24	Suānjiāng 酸浆	296
Shānzhūyú 山茱萸	24	Suānzǎorén 酸枣仁	296
Shāqì Wán 炒气丸	395	Sūhéxiāng Wán 苏合香丸	363

Sūmù 苏木	128	Wūjīn Wán 乌金丸	343
Sūluózi 娑罗子	214	Wǔlíng Sǎn 五苓散	337
Suǒyáng 锁阳	285	Wǔlíngzhī 五灵脂	38
Suǒyáng Gùjīng Wán 锁阳固精丸	400	Wūméi 乌梅	56
Sùyu 粟芽	263	Wūméi Wán 乌梅丸	343
Tàizhishēn 太子参	46	Wūshāoshé 乌梢蛇	56
Tànghuǒ Sǎn 烫火散	384	Wúshí Chá 午时茶	339
Tánxiāng 檀香	312	Wúwèizi 五味子	39
Tàorén 桃仁	232	Wūyào 乌药	55
Tiánguāzi 甜瓜子	258	Wúzhūyú 吴茱萸	138
Tiānhuāfěn 天花粉	34	Xiàkūcao 夏枯草	233
Tiānmá 天麻	36	Xiàkūcao Gāo 夏枯草膏	387
Tiānmá Wán 天麻丸	336	Xiāngfù 香附	206
Tiānménāng 天门冬	33	Xiāngfù Wán 香附丸	389
Tiānnánxīng 天南星	35	Xiāngjiāpí 香加皮	206
Tiānwáng Bǔxīn Dān 天王补心丹	336	Xiānglián Wán 香连丸	380
Tiānxiānzi 天仙子	34	Xiāngyú 香薷	207
Tiānjīng Yāngxué Gāo 调经养血膏	381	Xiāngshā Liújūnzi Wán 香砂六君子丸	381
Tiēdǒ Wán 铁锁丸	389	Xiāngshā Yāngwèi Wán 香砂养胃丸	381
Tīnglǐzi 蓼子	261	Xiāngsū Zhèngwèi Wán 香苏正胃丸	381
Tōngcǎo 通草	238	Xiāngyǎn 香椽	208
Tōngguān Sǎn 通关散	387	Xiānhécao 仙鹤草	78
Tōngjīng Gānlù Wán 通经甘露丸	388	Xiānmáo 仙茅	77
Tōngxuān Lǐlèi Wán 通宣理肺丸	385	Xiǎohuóluò Dān 小活络丹	332
Tǔbiēnóng 土鳖虫	11	Xiǎohé 小薊	21
Tǔfúíng 土茯苓	11	Xiǎojīn Dān 小金丹	332
Tūnào Wán 兔脑丸	307	Xiāoyáo Wán 逍遥丸	389
Tùsǐzi 菟丝子	225	Xiǎoyíng Shùnqì Sǎn 消痰顺气散	385
Wǎlèngzǐ 瓦楞子	46	Xiébái 茭白	399
Wángbùliúxíng 王不留行	32	Xīhéliú 西河柳	101
Wányīng Dīng 万应锭	329	Xīhuáng Wán 西黄丸	354
Wányīng Gāo 万应膏	330	Xījiǎo 犀角	275
Wāsōng 瓦松	45	Xīlèi Sǎn 锡类散	401
Wèilíng Wán 胃苓丸	379	Xíngjūn Sǎn 行军散	355
Wèilíngxiān 威灵仙	203	Xíngxiāo Wán 醒消丸	404
Wúbèizi 五倍子	40	Xīnyì 辛夷	119
Wǔfú Huàdú Dān 五福化毒丹	335	Xióngdān 熊胆	304
Wúgōng 蜈蚣	292	Xiónghuáng 雄黄	273
Wūjī Báifēng Wán 乌鸡白凤丸	342	Xixian Wán 稀莪丸	403
Wūjī Sǎn 五积散	337	Xixiancao 稀莪草	302
Wújiāpí 五加皮	37	Xixin 细辛	174

Xuāncǎogēn 萱草根	263	Zǎojiǎocì 皂角刺	146
Xuānfùhuā 旋复花	246	Zélán 泽兰	146
Xuánjīngshí 玄精石	59	Zéxié 泽泻	147
Xuánmíngfēn 玄明粉	58	Zhébèimǔ 浙贝母	213
Xuánshēn 玄参	58	Zhēnzhū 珍珠	179
Xùduàn 续断	260	Zhěshí 赭石	305
Xuèyútàn 血余炭	115	Zhībǎi Dìhuáng Wán 知柏地黄丸	375
Yādǎnzi 鸦胆子	197	Zhǐhóng Chángqū Wán 止红肠癖丸	333
Yánghé Jiěníng Gāo 阳和解凝膏	356	Zhǐjīzi 枳椇子	195
Yángjīnhuā 洋金花	175	Zhǐlòu Wán 痔漏丸	392
Yángqǐshí 阳起石	106	Zhīnǚ 蜘蛛	170
Yǎngyīn Qīngfèi Gāo 养阴清肺膏	385	Zhǐqiào 枳壳	194
Yánhúsuo 延胡索	109	Zhīshí 枳实	195
Yīnmǔcǎo 益母草	222	Zhǐzi 枳子	254
Yīnmǔcǎo Gāo 益母草膏	385	Zhǐzi Jīnhuā Wán 枳子金花丸	391
Yíncháihú 银柴胡	257	Zhōuchē Wán 舟车丸	357
Yínchén 茵陈	191	Zhūhuáng 竹黄	113
Yīngsùqiào 罂粟壳	305	Zhūhuáng Sǎn 珠黄散	386
Yīngtáohé 樱桃核	307	Zhūjiéxiāngfù 竹节香附	112
Yīnqiào Jiědú Wán 银翘解毒丸	391	Zhūlǐng 猪苓	259
Yīnyángguò 淫羊藿	243	Zhūmágēn 芋艿根	157
Yīxián Wán 医痫丸	364	Zhūrú 竹茹	112
Yīyīrén 薏苡仁	305	Zhūsha 朱砂	111
Yīyuán Sǎn 益元散	385	Zhūsha Ānshén Wán 朱砂安神丸	357
Yìzhì 益智	222	Zhūyázǎo 猪牙皂	259
Yōngquán Sǎn 涌泉散	383	Zǐbèichī 紫贝齿	276
Yóusōngjié 油松节	148	Zǐcǎo 紫草	281
Yuánhuā 芫花	128	Zǐcǎo Gāo 紫草膏	395
Yuǎnzhì 远志	121	Zǐcǎoróng 紫草茸	281
Yǔbáifù 禹白附	210	Zǐhéché 紫河车	280
Yuèjīhuā 月季花	51	Zǐjīn Dīng 紫金锭	395
Yuèjù Wán 越鞠丸	396	Zìránóng 自然铜	114
Yùjīn 郁金	163	Zǐshāomā 紫梢花	282
Yǔliángshí 禹粮石	211	Zǐshí yīng 紫石英	277
Yùlǐrén 郁李仁	162	Zǐsūgēng 紫苏梗	279
Yúnmǔshí 云母石	37	Zǐsūyè 紫苏叶	278
Yúxīngcǎo 鱼腥草	171	Zǐsūzi 紫苏子	278
Yùzhēn Sǎn 玉真散	347	Zǐxuě 紫雪	399
Yùzhú 玉竹	61	Zǐwǎn 紫苑	282
Zàizào Wán 再造丸	353	Zōnglǔ 棕榈	272
Zànglián Wán 脏连丸	389	Zōngrǔshí 钟乳石	204
		Zuǒjīn Wán 左金丸	384

目 次

中药材

丁香	1
刀豆	1
人参	2
八角茴香	4
九节菖蒲	4
九香虫	5
儿茶	6
广防己	6
广豆根	7
三七	8
三棱	8
干姜	9
干漆	10
土茯苓	11
土鳖虫	11
大风子	12
大皂角	13
大豆黄卷	13
大枣	14
大青盐	15
大黄	15
大腹皮	17
马宝	17
马齿苋	18
马勃	19
马钱子	19
马兜铃	20
马鞭草	21
小薊	21
山柰	22
山药	23
山茱萸	24
山楂	24
千金子	25
川乌	26

川贝母	27
川木香	28
川木通	28
川牛膝	29
川芎	30
川楝子	30
女贞子	31
火麻仁	32
王不留行	32
天门冬	33
天仙子	34
天花粉	34
天南星	35
天麻	36
六神行	37
五加皮	37
五灵脂	38
五味子	39
五倍子	40
木瓜	40
木香	41
木贼	42
木通	42
木槿花	43
木蝴蝶	44
木鳖子	44
瓦松	45
瓦楞子	46
太子参	46
车前子	47
巴豆	48
巴戟天	48
水蛭	49
丹参	50
月季花	51
凤凰衣	51

牛黄	52
牛蒡子	53
牛膝	53
升麻	54
乌药	55
乌梅	56
乌梢蛇	56
片姜黄	57
玄参	58
玄明粉	58
玄精石	59
半边莲	60
半夏	60
玉竹	61
甘松	62
甘草	63
甘遂	64
艾叶	64
石决明	65
石膏	66
石莲子	67
石斛	67
石菖蒲	69
石楠叶	69
石膏	70
石榴皮	71
龙齿	71
龙胆	72
龙骨	73
龙眼肉	73
北沙参	74
生姜	75
冬瓜子	75
冬瓜皮	76
冬虫夏草	77
仙茅	77
仙鹤草	78
白皮	79
白朮	79
白头翁	80
白芍	81

白芷	82
白芥子	83
白花蛇	83
白花菜子	84
白果	84
白矾	85
白茅根	86
白前	86
白扁豆	87
白胡椒	88
白狼毒	89
白梅花	89
白鲜皮	90
白薇	91
白薇	91
排丁香	92
决明子	93
冰片	93
关木通	94
关白附	94
灯心草	95
地龙	96
地肤子	97
地骨皮	98
地黄	98
地榆	100
老鹤草	100
西河柳	101
芒硝	102
百合	102
百草霜	103
百部	104
防己	104
防风	105
阳起石	106
当归	106
肉桂	107
肉苁蓉	108
延胡索	109
合欢皮	110
全蝎	110

朱砂	111
竹节香附	112
竹茹	112
竹黄	113
伏龙肝	113
自然铜	114
血余炭	115
红大戟	115
红花	116
红豆蔻	117
沉香	117
沙苑子	118
辛夷	119
诃子	119
补骨脂	120
远志	121
连翘	121
麦门冬	122
麦芽	123
赤小豆	124
赤石脂	124
赤芍	125
豆蔻	126
芦荟	126
苏根	127
芫花	128
苏木	128
苍朮	129
苍耳子	130
芥子	131
芡实	131
花蕊石	132
杜仲	133
鸡内金	134
鸡冠花	134
阿魏	135
陈皮	136
附子	136
忍冬藤	138
吴茱萸	138
旱莲草	139

谷芽	140
谷精草	141
牡丹皮	141
牡蛎	142
龟板	143
何首乌	141
佛手	144
伸筋草	145
皂角刺	146
泽兰	146
泽泻	147
油松节	148
羌活	148
卷柏	149
炉甘石	150
玫瑰花	151
青木香	151
青皮	152
青果	153
青箱子	153
青蒿	154
青黛	155
青礞石	155
刺猬皮	156
苧麻根	157
苦竹叶	157
苦杏仁	158
苦参	159
苦楝皮	159
枇杷叶	160
松花粉	161
松香	161
郁李仁	162
郁金	163
虎骨	161
昆布	165
明党参	166
金果榄	166
金钱白花蛇	167
金银花	168
金樱子	168

金礞石	169
知母	170
鱼腥草	171
使君子	171
侧柏叶	172
佩兰	173
狗脊	173
细辛	174
洋金花	175
穿山甲	176
扁豆花	176
姜黄	177
前胡	178
首乌藤	178
珍珠	179
玳瑁	180
南沙参	180
南鹤虱	181
胡芦巴	182
胡桃仁	182
胡黄连	183
羌活子	181
荆芥	181
毕拔	185
毕澄茄	186
黄草	187
荔枝核	187
草乌	188
草豆蔻	189
草果	190
肉苁蓉	191
茴香	191
茯苓	192
柿蒂	193
枳壳	194
枳实	195
枳椇子	195
枸杞子	196
柏子仁	197
鸦胆子	197
牵牛子	198

厚朴	199
厚朴花	200
砂仁	200
轻粉	201
韭菜子	202
蛇虫	202
威灵仙	203
复盆子	204
钟乳石	204
钩藤	205
香加皮	206
香附	206
香薷	207
香橼	208
急性子	209
胖大海	209
胆矾	210
禹白附	210
禹粮石	211
独活	212
丝瓜络	213
浙贝母	213
蜜罗子	214
浮小麦	215
浮石	215
海马	216
海龙	217
海狗砂	218
海螵蛸	218
肉蓯蓉	219
高良姜	220
凌霄花	220
卷参	221
益母草	222
益母	222
秦皮	223
秦艽	224
莲子	224
莲子心	225
莲花	226
莲房	226

莪朮	227
荷叶	228
苘麻子	228
桂枝	229
桔梗	230
栝楼	230
诃梨子	231
桃仁	232
夏枯草	233
桑叶	233
桑白皮	234
桑枝	235
桑椹	235
桑螵蛸	236
柴胡	237
通草	238
党参	238
骨碎补	239
射干	240
鬼箭羽	241
淡竹叶	241
淡豆豉	242
淫羊藿	243
密蒙花	244
寄生	244
商陆	245
旋复花	246
麻黄	247
麻黄根	247
鹿角	248
鹿角霜	249
鹿茸	249
鹿衔草	251
羚羊角	251
羊脂子	252
菊花	253
葶藶	254
梔子	254
常山	255
蛇床子	256
蛇蜕	257

银柴胡	257
甜瓜子	258
猪牙皂	259
猪苓	259
续断	260
斑蝥	261
琥珀	261
款冬花	262
粟芽	263
亢旱根	263
草薢子	264
蒺藜	265
黄芩	265
黄连	266
黄柏	267
黄药子	268
黄耆	269
黄精	270
葛花	270
葛根	271
棕榈	272
楮实子	272
雄黄	273
硫黄	274
硫砂	274
犀角	275
黑芝麻	276
紫贝肉	276
紫石英	277
紫苏子	278
紫苏叶	278
紫苏梗	279
紫河车	280
紫草	280
紫草茸	281
紫苑	282
紫梢花	282
蛤壳	283
蛤蚧	284
番红花	284
锁阳	285

鵝不食草	286
滑石	286
雷丸	287
蒲公英	288
蒲黃	288
疾藜	289
蓖麻子	290
椿皮	290
路路通	291
蜈蚣	292
蜂房	293
蜂蜜	293
蜂蟻	294
漏芦	295
酸枣仁	296
酸漿	296
莖刺子	297
檳榔	298
榧子	299
槐米	299
槐花	300
槐角	301
磁石	301
繡莖草	302
蟬蛻	303
罌粟壳	303
熊胆	304
鴉虱	305
赭石	305
薏仁	306
櫻桃核	307
薄荷	307
薏苡仁	308
薤白	309
橘紅	309
橘絡	310
橘核	311
藥本	312
檀香	312
殭蚕	313
藕节	314

瞿麦	314
翻白草	315
藿香	316
蟾酥	316
鳖甲	317
麝香	318

中药成方制剂

二龙膏	321
二冬膏	321
二陈丸	322
二妙丸	322
十全大补丸	322
十灰散	323
十香丸	323
七宝丹	324
七珍丹	324
七厘散	324
七液丹	325
人參養榮丸	325
八宝红灵丹	326
八宝坤顺丹	326
八珍丸	327
八珍益母丸	327
九气拈痛丸	328
九分散	328
三黄宝蜡丸	328
寸金丹	329
万应锭	329
万应膏	330
大补阴丸	330
大活络丹	331
大黄廋虫丸	332
小金丹	332
小活络丹	332
千金止带丸	333
千金散	333
川芎茶调散	334
女金丹	334
六一散	334
六合定中丸	335

六味地黄丸	335
开胸顺气丸	336
天王补心丹	336
天麻丸	336
五苓散	337
五积散	337
五福化毒丹	338
木香槟榔丸	338
止红肠癖丸	338
内消瘰癧丸	339
午时茶	339
牛黄上清丸	340
牛黄抱龙丸	340
牛黄清心丸(万氏方)	341
牛黄清心丸(局方)	341
牛黄镇惊丸	342
乌鸡白凤丸	342
乌金丸	343
乌梅丸	343
亿风丹	344
化虫丸	344
化腐回生丹	345
分清五淋丸	346
半贝丸	346
半硫丸	346
玉真散	347
甘露消毒丹	347
艾附暖宫丸	347
左金丸	348
石斛夜光丸	348
龙胆泻肝丸	349
四红丹	349
四神丸	349
史国公药酒	350
归脾丸	350
生肌散	351
白降丹	351
安宫牛黄丸	352
神和散	352
冰硼散	353
再进丸	353

西黄丸	354
耳聾左慈丸	354
百合固金丸	355
导赤丹	355
防风通圣丸	355
阳和解凝膏	356
当归龙荟丸	357
朱砂安神丸	357
舟车丸	357
行军散	358
如意金黄散	358
红升丹	359
沉香化气丸	359
沉香化滞丸	360
启脾丸	360
补中益气丸	360
连翘败毒丸	361
麦味地黄丸	361
坎离砂	362
更衣丸	362
两仪膏	362
苏合香丸	363
杞菊地黄丸	363
医病丸	364
局方至宝丹	364
阿胶	365
阿魏化痔膏	365
附子理中丸	366
龟板胶	366
龟鹿二仙胶	367
兔脑丸	367
纯阳正气丸	367
河车大造丸	368
青果膏	368
青娥丸	369
拔毒膏	369
拔云散	370
虎骨木瓜丸	370
虎骨木瓜酒	371
虎骨酒	371
虎骨胶	372

虎潜丸	372
明日上清丸	373
明目地黄丸	373
金不换膏	374
金银花露	374
金匱肾气丸	375
知柏地黄丸	375
肥儿丸	376
狗皮膏	376
参苏丸	377
参苓白朮散	377
参茸膏	377
济生肾气丸	378
神犀丹	378
茴香橘核丸	379
柏子养心丸	379
胃苓丸	379
香连丸	380
香附丸	380
香苏正胃丸	381
香砂六君子丸	381
香砂养胃丸	381
保和丸	382
独活寄生丸	382
绛矾丸	383
涌泉散	383
消痞顺气散	383
烫火散	384
调经养血膏	384
养阴清肺膏	385
益元散	385
益母草膏	385
珠黄散	386
荷叶丸	386
夏枯草膏	387
桑椹膏	387
通关散	387
通经甘露丸	388
通宣理肺丸	388
逍遥丸	389
铁笛丸	389
脏连丸	389
健胃丸	390
清宁丸	391
清血抽火丸	391

清胃黄连丸	391
清眩丸	391
痔漏丸	392
麻仁丸	392
鹿角胶	393
控涎丹	393
梅花点舌丹	393
梔子金花丸	394
银翘解毒丸	394
痧气丸	395
琼玉膏	395
越鞠丸	396
搜风顺气丸	396
黄连羊肝丸	396
黄连膏	397
黑锡丹	397
紫金锭	398
紫雪膏	398
紫雪	399
跌打回生丹	399
舒肝丸	400
锁阳固精丸	400
暖脐膏	401
锡类散	401
解肌宁嗽丸	402
赛金化毒散	402
槐角丸	403
益寿丸	403
稀莩丸	403
醒消丸	404
避瘟散	404
珠珀滚痰丸	405
藿香正气丸	405
麝香丸	406
麝酥锭	406
鳖甲胶	407
鳖甲煎丸	407

附录

中药材炮炙通则	附录 1
中药成方制剂通则	附录 4

索引

中文索引	索引 2
中药材拉丁文索引	索引 14
汉语拼音索引	索引 20

17266

671
5048

中华人民共和国药典

一九六三年版

一部

中华人民共和国卫生部药典委员会 编

中华人民共和国药典 1963 年版(一部)主編及主要协作单位

主 編 单 位

中华人民共和国卫生部药典委员会

主要协作单位

卫生部中医研究院	南京中医学院
卫生部中医研究院中药研究所	沈阳中医学院
卫生部中医研究院内科研究所	成都中医学院
卫生部药品生物制品检定所	上海中医学院
北京市公共卫生局药品检验所	广州中医学院
天津市药政管理局药品检验所	中国药材公司
中国医学科学院药物研究所	北京市药材公司
中国科学院动物研究所	天津市药材公司
中国科学院植物研究所	上海市药材公司
中国科学院地质研究所	重庆市药材公司
中国科学院昆虫研究所	武汉市药材公司
中国科学院微生物研究所	广州市药材公司
沈阳药学院	北京同仁堂制药厂
北京医学院药理学系	天津达仁堂制药厂
北京中医学院	

前 言

药品是人们同疾病作斗争的一项重要武器。药品质量的好坏是关系着千百万人民的身体健康和生命的大事。制定药品标准是保证人民用药安全有效、促进药品生产发展的一项重要措施。药品标准是对药品的质量规格及其检验方法所作的技术规定，中西药品的生产、供应、使用、检验等单位都必须切实遵照执行。1953年和1957年曾先后出版了中华人民共和国药典及其增补本，并在全国试行。为了适应我国卫生事业发展的需要，本委员会遵照中华人民共和国卫生部的指示，从1957年开始组织编订本版药典。

本版药典共收载药品一千三百一十种，分为“一部”、“二部”两册出版。“一部”正文收载我国宝贵的医药遗产中广大人民常用的中药材四百四十六种及中药成方制剂一百九十七种，附录概述中药材炮炙通则和中药成方制剂通则。“二部”正文收载我国人民广泛使用的化学药品、抗菌素、生物制品等各类药品及制剂等六百六十七种，附录概述制剂通则与生物制品通则，一般检验法与测定法等。

本版药典的药品名称均列有汉语拼音，为了使用方便，“一部”按药品中文名称笔画顺序排列，“二部”按药品拉丁名称的字母排列，制剂(除复方制剂外)排在原药后面。在每个药品项下扼要说明主要作用和用途(或功能与主治)作为用药的参考。

本版药典经向全国各地广泛征求意见后曾多次加以修改，前后得到医药生产、供应、研究部门、医药院校、医疗机构、药品检验所及有关专家、技术人员给以大力协助，并承中国文字改革委员会对中西药品名称的汉语拼音和简化字体进行了审定，特此致谢。本版药典仍不免有不够完善之处，希望各有关方面予以指正，以便修订。

中华人民共和国卫生部药典委员会

一九六三年十月

凡 例

中华人民共和国药典 1963 年版, 简称中国药典 1963 年版, 分一、二两部, 一部收载中药材及中药成方制剂, 二部收载化学药、抗菌素、生物制品及制剂等。

一部内容分正文与附录两部分, 正文记载各类中药材及中药成方制剂, 附录记载中药材炮炙通则及中药成方制剂通则。正文中收载的中药材及中药成方制剂分别按药品中文名称笔画顺序排列。

使用本版药典一部时应注意以下各点:

(一) 中药材规定下列各项: (1) 中文名称、汉语拼音名称与拉丁名称; (2) 来源; (3) 鉴别; (4) 炮炙; (5) 性味; (6) 功能; (7) 主治; (8) 用法与用量; (9) 注意; (10) 贮藏。以上各项根据具体情况决定, 必要时可以增减。

(二) 来源主要说明中药材的基源、药用部位、产地、产季及产地加工。产地系指主要的或比较大量生产的地区; 产季月份系指公历, 需要注意采集季节的则记明节令; 产地加工系指在产地进行加工的主要过程和要求, 生产时可结合当地传统经验进行加工, 但必须保证质量。

(三) 鉴别主要根据传统经验规定中药材的形、色、气、味及品质优劣, 尽量采用经验鉴别的通用术语叙述。

(四) 中药成方制剂规定下列各项: (1) 中文名称、汉语拼音名称; (2) 处方; (3) 制法; (4) 功能; (5) 主治; (6) 用法与用量; (7) 注意; (8) 贮藏。以上各项根据具体情况决定, 必要时可以增减。

(五) 中药成方制剂中所用的中药材应符合本版药典一部的规定, 本版药典一部未收载的中药材, 可按卫生部或各省、市(自治区)卫生厅(局)的规定使用。

(六) 中药成方制剂中所用的中药材, 注有“制”或其他炮炙的, 可参照本版药典一部中药材炮炙项下的方法加工, 其用量系指炮炙后的分量。未注明炮炙的或与当地习惯不同的, 可根据各省、市(自治区)卫生厅(局)的规定加工。

(七) 中药成方制剂的制法, 系指制造时的基本要求, 可参照本版药典一部附录中药成方制剂通则中的方法进行。大量生产时可根据生产设备条件酌情变通, 但必须保证质量。

(八) 中药材项下规定的炮炙法以全国多数地区通用并有代表性者为主。炮炙品名称以常用处方用名并注意明确简短。若只经治制者不另列名。除毒性较大的品种和个别中药材在原名前加“生”字外, 其余不加“生”字者均指生用药材。炮炙法采用传统通用术语

叙述。

水制法的浸泡或水漂的时间，由于各地气候、温度以及中药材的质地大小粗细不同，只规定基本要求，暂不规定时间长短。火制法的温度，由于各地燃料以及容器的不同，均以传统经验描述炮炙火候程度，暂不规定温度与时间。

炮炙辅料的用量系参照多数地区的经验加以规定，有的并留有幅度。

各炮炙品的饮片因各地经验不一，暂不规定厚度，均以切片(薄)、切段(咀)、切小块(丁)等加以区别。

(九)中药材的性味、功能、主治及中药成方制剂的功能、主治系根据传统文献及现代实际经验，用中医通用术语叙述。中药材性味一般均指未经炮炙的药材，至于炮炙对药性的影响，则于炮炙通则中作一般说明。

(十)中药材的用法与用量，除另有规定者外，用法一般系指煎汤内服，用量系指成人一日的常用剂量；中药成方制剂的用量，系指成人的常用剂量；应用时均得根据具体病情酌量增减，儿童用量可按年龄递减。

(十一)注意中注明忌用或忌内服者系指一般情况不宜使用；注明慎用或内服宜慎者系指一般情况虽仍可用，但须特别谨慎；注明畏、恶、反者系指一般情况不宜同用。

(十二)贮藏系指关于药品贮存与保管的基本要求。

(十三)药品包装应有标签或说明书，中药成方制剂须标明(1)名称；(2)处方；(3)装量；(4)功能；(5)主治；(6)用法与用量；(7)注意(或禁忌)；(8)生产单位名称、批号、出厂日期。中药材须标明(1)名称；(2)装量；(3)原产地及生产单位名称等项。以上各项可按实际需要酌情增减。

(十四)温度以摄氏温度计单位表示。

(十五)中药材及中药成方制剂所采用的计量单位，按国务院的规定，采用旧市制。

1 斤 = 16 两 = 500 克	1 两 = 10 钱 = 31.25 克
1 钱 = 10 分 = 3.125 克	1 分 = 10 厘 = 0.3125 克
1 尺 = 10 寸 = 33.33 厘米	1 寸 = 10 分 = 3.33 厘米