中华人民共和国药典

一九七七年版

一 部

中华人民共和国卫生部药典委员会 编

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

中华人民共和国药典

一九七七年版

一　部

中华人民共和国卫生部药典委员会　编

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

中华人民共和国药典一九七七年版一部

中华人民共和国卫生部药典委员会　编

人民卫生出版社出版

外文印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

787×1092毫米16开本　64印张　4插页　1222千字

1978年12月第1版第1次印刷

印数：1—90,000

统一书号：14048·3628　　定价：5.70元

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

前　言

在英明领袖华主席为首的党中央的亲切关怀下，为适应我国卫生事业发展的需要，遵循伟大领袖和导师毛主席独立自主，自力更生，中西医药结合的方针，在商业部、石油化学工业部、卫生部、中国人民解放军总后勤部卫生部等有关部门的共同协作下，组织编制了本版药典。

本版药典共收载常用药物一千九百二十五种，制剂通则、检验方法通则七十四个。为了方便使用，分为一、二两部，各依药物中文名称笔划次序编排。

希望各有关单位在实践过程中，不断总结经验，提出改进意见，以使药典更好地为保障人民健康，为社会主义革命和社会主义建设服务。

中华人民共和国卫生部药典委员会

一九七七年十月

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

凡　例

（一）中华人民共和国药典 1977 年版，简称«中国药典 1977 年版»，分一、二两部。本书为一部，内容分正文与附录，正文记载中草药（包括少数民族药材，下同）、中草药提取的药物、植物油脂及成方制剂（包括少数民族成方，下同）；附录记载中草药检定通则、制剂通则、炮制通则、中草药及成方显微鉴别法，一般的检验法与测定法、试药、试液、指示剂、当量液、附表以及成方制剂中处方采用的本版药典未收载的中草药及炮制品等。

（二）正文部份分为中草药及其提取物（包括植物油脂）及成方制剂，分为两大类，分别按中文名称笔画顺序排列，单味制剂排在原药材后面。

（三）中草药的质量标准，一般均按干品规定。特殊需用鲜品者，同时规定了鲜品的标准或在用法与用量项下规定鲜品的用量。如使用鲜品更能发挥药物的疗效时，有条件的可尽量使用鲜品。

（四）中草药的植（动）物的科名、植（动）物名、学名、药材部位（矿物药注明晶系、主要成分）及采收季节和产地加工等，均属各该药材的来源。

药材部位系指已除去非药用部份的商品药材，本版药典中的采收（采挖等）和产地加工即对药材部位而言，故不再规定除去非药用部份。

（五）中草药产地加工（包括炮制项）规定的“除去杂质”，系指除去混入的非药用部份及杂草、泥沙等。规定的干燥方法：（1）凡烘干、晒干、阴干都可以，而不影响质量的用“干燥”；（2）不宜用较高温度烘干的用“晒干或低温干燥（一般不超过 60°）”；（3）烘干、晒干均不适宜的用“阴干”或“晾干”；（4）少数药材需要短时间内干燥的用“曝晒”或“及时干燥”。

（六）对同一名称有多种来源的中草药，其性状有明显区别的均分别描述。先重点描述一种，其他种只分别写出区别点。

分写品种的标题，一般采用习用的中草药名。没有习用名称者，采用原植（动）物名，但性状系按药材部位描述，而不是原植（动）物的性状。

（七）鉴别项下包括经验鉴别、显微鉴别和理化鉴别。显微鉴别中的横切面、表面观及粉末鉴别，均指经过一定方法制备后在显微镜下观察的特征。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

（八）检查项下规定的各种杂质检查，系指药物在加工生产和贮藏过程中可能含有并需要控制的杂质。

（九）含量百分数如规定上限为100%以上时，均系指用本药典内规定的分析方法测定时，可能达到的数值，并非实际含有量；如未规定上限时，均系指不超过101.0%。

（十）中草药性味项下的规定有的与性状的气味不尽相同，一般系按中医理论对该药材性能的概括。

（十一）中草药及成方制剂的功能与主治系以中医（少数民族医）辨证施治的理论和复方配伍用药的经验为主，在临床实践的基础上适当增加中西医结合的新用途。

（十二）用法与用量除另有规定外，未注明用法的均指水煎内服。用量系指成人一日常用剂量，必要时得根据需要酌情增减；极量系指允许使用的最高剂量，除特殊情况外，一般不得超过。

（十三）注意项下所述的禁忌症和副作用，系指主要的禁忌和副作用。属一般中医常规禁忌者从略。

（十四）贮藏项下的规定系指药物贮存与保管的基本要求。矿物药一般不规定贮藏条件。

“遮光”系指用棕色玻璃容器、黑纸包裹的无色玻璃容器或其他不透光的容器包装。

“密闭”系指将容器密闭，以防止尘土及异物混入。

“密封”系指将容器密封，以防止风化、吸潮、挥发或异物污染。

“熔封”或“严封”系指将容器熔封或用适宜的材料严封，以防止空气与水分的侵入或细菌污染。

（十五）成方制剂中使用的中草药，应符合本版药典的规定，本版药典未收载者，应符合卫生部或省（市、自治区）卫生局的有关规定。

（十六）成方制剂的处方项下注有炮制要求的药材，除另有规定外，应照本版药典该药材项下的方法加工炮制；处方规定的用量系指炮制品的分量，未注有炮制要求的均指生用的药材，个别毒性较大或必须注明生用者，在药材名前加注“生”字，以免误用。

（十七）成方制剂制法项下，不论单独粉碎或混合粉碎的药材，其投料量均系按处方规定量以净粉投料。

（十八）各类药物的性状、鉴别、检查、炮制、注意及贮藏等项根据具体情况决定增删。

有些中草药未列炮制项者，均应按附录《中草药炮制通则》的有关规定进行净选处理。

（十九）本版药典收载的中草药及成方制剂等，均应按照规定的方法进行检验，如需

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

采用其他方法，应将该方法与规定的方法作比较试验，根据试验结果掌握使用，但在仲裁时仍以本版药典规定的方法为准。

试验用的化学试剂均应符合中华人民共和国国家标准或石油化学工业部部颁标准。试验用的试液、指示剂、当量液、缓冲液与标准比色液等均应符合附录的规定或按照附录的规定制备。试验用的计量仪器均应符合国家标准计量局的规定，必要时应进行校正。

（二十）其他与检验有关事项：

（1）度量衡采用公制，用下列符号表示：

度：M＝米　　cm＝厘米＝百分之一米

mm＝毫米＝千分之一米

μm＝微米＝百万分之一米

nm＝毫微米＝十亿分之一米

量：L＝升　　ml＝毫升＝千分之一升

μl＝微升＝百万分之一升

衡：g＝克　　kg＝公斤＝一千克

mg＝毫克＝千分之一克

μg＝微克＝百万分之一克。

（2）液体的"滴"系指在 20°时 1 ml 水相当于 20 滴。

（3）温度以摄氏温标表示。

水浴温度，除另有规定外，均指 98～100°。

"热水"系指 70～80°。

"微温"或"温水"系指 40～50°。

（4）溶解度是药品的一种物理性质，可在一定程度上反映药品的纯度。本版药典药品的溶解度以下列名词表示：

极易溶解……指溶质 1 份能在溶剂不到 1 份中溶解。

易溶……指溶质 1 份能在溶剂 1～不到 10 份中溶解。

溶解……指溶质 1 份能在溶剂 10～不到 30 份中溶解。

略溶……指溶质 1 份能在溶剂 30～不到 100 份中溶解。

微溶……指溶质 1 份能在溶剂 100～不到 1000 份中溶解。

极微溶解……指溶质 1 份能在溶剂 1000～不到 10000 份中溶解。

几乎不溶或不溶……指溶质 1 份在溶剂 10000 份中不能完全溶解。

溶解度测定法：准确称取供试品一定量（准确度为±2%，固体供试品应先研细），加

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

入一定量的溶剂，在25°±2°，每隔5分钟振摇30秒钟，半小时内观察溶解情况。一般看不到溶质颗粒或液滴时，即认为已完全溶解。

(5) 药筛和粉末的分等如下：

筛　号	筛孔内径mm（平均值）
一号筛	2.000±0.025
二号筛	0.800±0.015
三号筛	0.355±0.01
四号筛	0.250±0.01
五号筛	0.180±0.01
六号筛	0.154±0.01
七号筛	0.125±0.006
八号筛	0.100±0.006
九号筛	0.071±0.004

最粗粉　指能全部通过一号筛，但混有能通过三号筛不超过20%的粉末。

粗粉　指能全部通过二号筛，但混有能通过四号筛不超过40%的粉末。

中粉　指能全部通过四号筛，但混有能通过五号筛不超过60%的粉末。

细粉　指能全部通过五号筛，并含能通过六号筛不少于95%的粉末。

最细粉　指能全部通过六号筛，并含能通过七号筛不少于95%的粉末。

(6) 百分比用"%"符号表示，纯度百分比系指重量的比例。溶液的百分比系指溶液100 ml中含有溶质若干g；醇的百分比系指在20°时容量的比例，此外，根据需要采用下列符号：

%(g/g)　表示100 g　中含有若干g。

%(ml/ml)表示100 ml中含有若干ml。

%(ml/g)　表示100 g　中含有若干ml。

%(g/ml)　表示100 ml中含有若干g。

100%系指99.5～100.5%，100.0%系指99.95～100.05%，其余类推。

(7) 溶液后记示的"(1→10)"等符号，系指固体溶质1 g或液体溶质1 ml加溶剂使成10 ml等的溶液。

两种或多种液体间所记示的":"符号，系指各液体相混合时的容量比例。【规格】项下的":"符号，例如1 ml:10 mg，系指1 ml中含有药品10 mg的制品。

(8) 乙醇未指明浓度时，均系指用95%(ml/ml)的乙醇。

(9) 规定取用量为"约"若干时，系指取用量不得超过规定量的±10%。规定"精密

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

称定"时，系指称重的准确度为所取重量的千分之一。

（10）恒重系指供试品连续两次炽灼或干燥后的重量差异在0.3 mg以下的重量。干燥至恒重的第二次及以后各次的称重均应在规定条件继续干燥1小时后进行，炽灼至恒重的第二次称重应在继续炽灼30分钟后进行。

（11）试验用的水，除另有规定外，均指用蒸馏水或去离子水，溶液未指明用何种溶剂时，均系指水溶液。酸碱度检查所用的水，均系指新沸过的冷蒸馏水。

（12）酸碱性试验时，如未指明用何种指示剂，均系指用石蕊试纸。

（13）试验时的温度，未注明者，可在10～30°进行，遇有温度高低对试验结果有显著影响者，除另有规定外，应以25°±2°为准。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

目　　次

中草药及其制品

一枝黄花……1
一点红……1
丁公藤……2
丁公藤注射液……3
丁香罗勒油……4
人参……5
八角枫……6
八角茴香……7
八角茴香油……8
八厘麻……9
八厘麻毒素……9
八厘麻毒素片……10
八厘麻毒素注射液……11
儿茶……12
九节菖蒲……13
九头狮子草……14
九里香……14
九香虫……15
了哥王……16
了哥王片……17
刀豆……17
三七……18
三叉苦……19
三分三……20
三分三浸膏……21
三白草……22
三棱……22
三颗针……23
干姜……24
姜流浸膏……24
姜酊……25
土贝母……26
土荆皮……26
土茯苓……27
土党参……28
土鳖虫……28
大头陈……29
大血藤……30
大红袍……30
大豆黄卷……31
大皂角……32
大青叶……32
大青盐……33
大枣……34
大黄……34
大黄流浸膏……36
大黄药……37
大蒜……37
大蓟……38
大腹皮……39
小叶莲……40
小红参……40
小驳骨……41
小茴香……42
小通草……42
小野鸡尾……43
小蓟……44
山芝麻……45
山豆根……45
山柰……46
山茱萸……47
山药……48
山栀茶……48
山楂……49
山蜡梅叶……50

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

山蜡梅茶……51
千日红……51
千年健……52
千里光……53
千里光片……53
千金子……54
川木香……55
川木通……55
川贝母……56
川牛膝……57
川乌……58
川芎……59
川桐皮……60
川楝子……61
广地丁……61
广防己……62
广枣……63
广金钱草……63
石淋通片……64
广藿香……65
女贞子……66
飞扬草……67
马兰草……67
马尿泡……68
马齿苋……69
马勃……69
马钱子……70
马兜铃……72
马兜铃藤……72
马槟榔……73
马鞭草……74
王不留……74
天冬……75
天花粉……76
天南星……77
天麻……78
天葵子……79
元宝草……79
元胡……80
云母石……81
云实皮……82
木瓜……82
木香……83
木贼……84
木棉花……85
木蹙子……85
木槿花……86
木蝴蝶……86
木鳖子……87
五加皮……88
五灵脂……89
五味子……89
五指毛桃……90
五倍子……91
支柱蓼……92
车前子……92
车前草……93
瓦松……94
瓦楞子……94
水牛角……95
水牛角浓缩粉……96
水半夏……96
水红花子……97
水杨梅……98
水蛭……98
水蜈蚣……99
水蓼菁……100
贝母花……100
贝母花片……101
贝母花流浸膏……102
牛至……103
牛黄……103
牛蒡子……104
牛膝……105
手参……106
毛冬青……107
毛冬青片……108
毛冬青注射液……108
毛诃子……109
升麻……110
升登……111
月季花……111

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

丹皮酚…… 112
丹皮酚注射液…… 113
丹参…… 114
丹参注射液…… 115
乌药…… 116
乌韭…… 116
乌桕…… 117
乌梢蛇…… 118
乌梅…… 118
凤仙透骨草…… 119
凤尾草…… 120
凤凰衣…… 120
六月雪…… 121
文冠木…… 121
火炭母…… 122
火麻仁…… 123
巴豆…… 123
巴戟天…… 124
玉竹…… 125
玉米须…… 126
玉葡萄根…… 127
打破碗花花…… 127
功劳木…… 128
甘青青蓝…… 129
甘松…… 129
甘草…… 130
甘草浸膏…… 131
甘草流浸膏…… 132
甘遂…… 133
艾叶…… 134
艾叶油…… 135
艾叶油气雾剂…… 136
艾叶油胶囊…… 136
古山龙…… 137
石韦…… 138
石见穿…… 138
石灰华…… 139
石吊兰…… 140
石吊兰素…… 141
石吊兰素片…… 142
石决明…… 143
石钻子…… 143
石菖蒲…… 144
石斛…… 145
石椒草…… 146
石楠叶…… 147
石榴子…… 147
石榴皮…… 148
石膏…… 149
布渣叶…… 149
龙齿…… 150
龙骨…… 151
龙胆…… 152
龙眼肉…… 153
龙脷叶…… 153
龙葵…… 154
平贝母…… 155
北豆根…… 155
北豆根片…… 156
北沙参…… 157
北野菊…… 158
四方藤…… 158
四叶参…… 159
四季青…… 160
四季青片…… 161
四季青药水…… 161
四季青搽剂…… 162
生姜…… 162
代代花…… 163
仙茅…… 163
仙桃草…… 164
仙鹤草…… 165
白及…… 166
白云花根…… 166
白术…… 167
白头翁…… 168
白芍…… 169
白芷…… 170
白花菜子…… 171
白附子…… 171
白英…… 172
白茅根…… 173

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

白矾…… 174
白果…… 175
白屈菜…… 176
白药子…… 176
白前…… 177
白首乌…… 178
白扁豆…… 178
白薇…… 179
白鲜皮…… 180
白薇…… 180
瓜子金…… 181
瓜蒌…… 182
瓜蒌子…… 182
瓜蒌皮…… 183
瓜蒌片…… 184
冬瓜子…… 184
冬瓜皮…… 185
冬虫夏草…… 185
冬凌草…… 186
冬葵果…… 187
玄明粉…… 187
玄参…… 188
半支莲…… 189
半边莲…… 189
半夏…… 190
汉肌松…… 191
汉肌松注射液…… 192
汉桃叶…… 193
汉桃叶片…… 194
汉桃叶注射液…… 194
丝瓜络…… 195
老鹳草…… 196
老鹳草软膏…… 197
地龙…… 197
地耳草…… 198
田基黄注射液…… 199
地枫皮…… 200
地肤子…… 201
地骨皮…… 201
地胆草…… 202
地黄…… 203
地椒…… 204
地榆…… 205
地锦草…… 205
芒硝…… 206
亚乎奴…… 207
亚麻子…… 208
亚硫酸氢钠穿心莲内酯…… 209
亚硫酸氢钠穿心莲内酯注射液…… 211
过岗龙…… 211
西瓜皮…… 212
西河柳…… 213
百合…… 213
百部…… 214
百蕊草…… 215
光枝勾儿茶…… 216
光慈姑…… 217
当归…… 217
当归流浸膏…… 218
当药…… 219
当药片…… 219
虫白蜡…… 220
肉苁蓉…… 220
肉桂…… 221
肉桂油…… 222
朱砂…… 223
朱砂根…… 224
丢了棒…… 225
竹节参…… 225
竹节香附…… 226
竹茹…… 227
竹黄…… 227
华山参…… 228
华山参气雾剂…… 229
华山参片…… 230
自然铜…… 231
伊贝母…… 232
血余炭…… 233
向天盏…… 233
全叶青兰…… 234
全蝎…… 234
合欢皮…… 235

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

合欢花…… 236
冰片…… 236
冰凉花…… 237
冰凉花甙…… 238
冰凉花甙片…… 239
冰凉花甙注射液…… 240
决明子…… 241
羊耳菊…… 241
关木通…… 242
关白附…… 243
灯心草…… 244
灯台叶…… 245
灯盏细辛…… 245
灯盏细辛注射液…… 246
安息香…… 248
农吉利…… 249
农吉利碱…… 250
盐酸农吉利碱注射液…… 251
寻骨风…… 251
阳起石…… 252
阴地蕨…… 253
阴行草…… 254
防己…… 254
防风…… 255
红大戟…… 256
红毛七…… 257
红头草…… 257
红花…… 258
红花龙胆…… 259
红豆蔻…… 260
红根草…… 260
红粉…… 261
红景天…… 262
红管药…… 262
红管药片…… 263
麦冬…… 264
麦芽…… 265
远志…… 265
远志流浸膏…… 266
远志酊…… 267
赤小豆…… 267
赤石脂…… 268
赤芍…… 269
块根木蓝…… 270
芙蓉叶…… 270
芫花…… 271
芸香草…… 272
芸香草油…… 272
芸香草油气雾剂…… 273
苣荬菜…… 274
花椒…… 275
花蕊石…… 275
芥子…… 276
苍术…… 277
苍耳子…… 278
芡实…… 278
苎麻根…… 279
苎麻浸膏…… 280
苎麻片…… 281
芦荟…… 282
芦根…… 283
苏木…… 283
杠板归…… 284
杜仲…… 285
杜衡…… 286
杨树花…… 287
两面针…… 287
连钱草…… 288
连翘…… 288
吴茱萸…… 289
岗松…… 290
岗梅…… 291
牡丹皮…… 291
牡荆叶…… 292
牡荆油…… 293
牡荆油胶丸…… 294
牡蛎…… 294
仲筋草…… 295
皂角刺…… 296
佛手…… 297
佛甲草…… 297
余甘子…… 298

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

谷精草…… 298
龟板…… 299
龟板胶…… 300
辛夷…… 300
羌活…… 301
沙苑子…… 302
沙枣…… 302
沙枣叶…… 303
沙棘…… 303
沉香…… 304
补骨脂…… 305
诃子…… 306
灵芝片…… 306
阿胶…… 307
阿魏…… 308
陈皮…… 309
附子…… 309
忍冬藤…… 311
鸡内金…… 311
鸡矢藤…… 312
鸡血藤…… 312
鸡冠花…… 313
鸡骨草…… 314
青木香…… 315
青风藤…… 315
青叶胆…… 316
青叶胆片…… 317
青叶胆注射液…… 317
青皮…… 318
青果…… 319
青葙子…… 319
青蒿…… 320
青黛…… 320
青礞石…… 321
玫瑰花…… 322
苦木…… 323
苦地丁…… 323
苦杏仁…… 324
苦豆草…… 325
苦豆草片…… 326
苦参…… 326
苦楝皮…… 327
苘麻子…… 328
茅莓…… 329
茅莓根…… 329
枇杷叶…… 330
枇杷叶膏…… 331
板栗壳…… 331
板蓝根…… 332
松节油…… 333
松花粉…… 333
松塔…… 334
松醇…… 334
枫香脂…… 335
刺五加…… 336
刺五加浸膏…… 337
郁李仁…… 338
郁金…… 338
虎耳草…… 339
虎杖…… 340
虎刺…… 341
虎骨…… 341
虎掌草…… 343
昆布…… 343
明党参…… 345
岩白菜…… 345
岩白菜素…… 346
岩陀…… 347
罗布麻叶…… 348
罗汉果…… 349
败酱草…… 349
败酱片…… 350
知母…… 351
垂盆草…… 352
垂盆草片…… 353
委陵菜…… 353
使君子…… 354
侧柏叶…… 355
佩兰…… 355
金龙胆草…… 356
金龙胆草片…… 357
金佛草…… 358

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

金果榄…… 358
金荞麦…… 359
金莲花…… 359
金莲花片…… 360
金钱白花蛇…… 361
金钱草…… 361
金铁锁…… 362
金银花…… 363
金锦香…… 364
金樱子…… 364
金礞石…… 365
脬形草…… 366
肿节风…… 366
肿节风片…… 367
鱼腥草…… 368
狗肝菜…… 369
狗脊…… 369
京大戟…… 370
卷柏…… 371
炉甘石…… 372
油松节…… 373
泡桐果…… 373
波棱瓜子…… 374
泽兰…… 375
泽泻…… 375
空心莲子草…… 376
空心莲子草注射液…… 377
降香…… 379
细辛…… 379
珙瑁…… 380
珍珠…… 381
珍珠母…… 382
荆芥…… 382
茜草…… 383
茅莓…… 384
茅澄茄…… 385
草乌…… 385
草乌叶…… 387
草血竭…… 387
草红藤…… 388
草豆蔻…… 389
草果…… 389
茵陈…… 390
茯苓…… 391
茶油…… 392
茺蔚子…… 393
胡芦巴…… 393
胡黄连…… 394
胡颓子叶…… 395
荔枝草…… 395
荔枝核…… 396
南五味子根…… 396
南沙参…… 397
南鹤虱…… 398
枳壳…… 399
枳实…… 399
柏子仁…… 400
栀子…… 401
枸杞子…… 402
枸骨叶…… 402
柿蒂…… 403
威灵仙…… 403
厚朴…… 404
厚朴花…… 406
砂仁…… 406
砂仁叶油…… 407
牵牛子…… 408
轻粉…… 409
鸦胆子…… 410
韭菜子…… 410
骨碎补…… 411
钟乳石…… 412
钩藤…… 412
钩藤片…… 413
香加皮…… 414
香附…… 415
香青兰…… 416
香青草…… 417
香青片…… 417
香青糖浆…… 418
香果脂…… 418
香橼…… 419

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

香薷…… 420
重楼…… 421
复盆子…… 422
禹粮土…… 422
禹粮石…… 423
胆木…… 424
胆矾…… 424
胆南星…… 425
匍伏堇…… 426
独活…… 426
急性子…… 427
姜黄…… 428
前胡…… 429
首乌…… 430
首乌藤…… 431
洪连…… 432
洋地黄叶…… 432
洋地黄片…… 433
洋金花…… 434
穿山龙…… 435
穿山甲…… 436
穿心莲…… 437
穿心莲片…… 438
穿心莲内酯…… 439
穿心莲内酯片…… 440
穿心莲甙…… 441
穿心莲甙酯片…… 442
穿破石…… 443
扁豆花…… 444
祖司麻…… 445
孩儿参…… 445
络石藤…… 446
秦艽…… 446
秦皮…… 447
珠子参…… 448
素馨花…… 449
盐酸八角枫碱…… 450
盐酸八角枫碱注射液…… 451
盐酸川芎嗪…… 452
盐酸川芎嗪注射液…… 453
盐酸黄连素…… 454
盐酸黄连素片…… 455
盐酸麻黄碱…… 456
盐酸麻黄碱片…… 457
盐酸麻黄碱注射液…… 458
菜菔子…… 458
莲子…… 459
莲子心…… 460
莲房…… 460
莲须…… 461
莪大夏…… 461
莪术…… 462
莪术油…… 463
莪术油注射液…… 464
莪术油乳注射液…… 464
莓叶委陵菜…… 465
莓叶委陵菜片…… 466
荷叶…… 467
莨菪子…… 468
桂枝…… 468
桔梗…… 469
桃儿七…… 470
桃仁…… 471
桃金娘根…… 471
核桃仁…… 472
桉油…… 473
索骨丹根…… 473
夏天无…… 474
夏天无片…… 475
夏枯草…… 475
夏枯草膏…… 476
烈香杜鹃…… 477
柴胡…… 477
党参…… 478
鸭跖草…… 479
铁苋菜…… 480
积雪草…… 480
称钩风…… 481
倒扣草…… 482
臭灵丹草…… 482
臭梧桐叶…… 483
射干…… 484

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

徐长卿…… 484
豹骨…… 485
狼把草…… 486
狼毒…… 487
凌霄花…… 488
高良姜…… 489
拳参…… 489
粉条儿菜…… 490
粉萆薢…… 491
益母草…… 492
益母草注射液…… 493
益母草流浸膏…… 494
益母草膏…… 495
益智…… 495
浙贝母…… 496
浙贝流浸膏…… 497
浙桐皮…… 498
绞罗子…… 499
海马…… 499
海风藤…… 500
海龙…… 501
海芋…… 502
海金沙…… 502
海桐皮…… 503
海螵蛸…… 503
海藻…… 504
浮石…… 505
浮海石…… 506
浮萍…… 506
通关藤…… 507
通草…… 508
预知子…… 508
桑叶…… 509
桑白皮…… 510
桑枝…… 511
桑寄生…… 511
桑椹…… 512
桑螵蛸…… 513
黄芫花…… 514
黄芩…… 515
黄芪…… 516
黄连…… 517
黄芦…… 518
黄柏…… 519
黄精…… 520
黄藤…… 521
黄藤素…… 522
黄藤素片…… 523
黄藤素注射液…… 524
荭黄…… 524
菟丝子…… 525
菊苣…… 526
菊花…… 526
梧桐片…… 527
梅花…… 528
槲木叶…… 528
救必应…… 529
雪上一枝蒿…… 530
雪胆…… 531
雪胆素…… 532
雪胆素片…… 533
常山…… 534
野马追…… 535
野马追片…… 536
野木瓜…… 537
野木瓜片…… 538
野木瓜注射液…… 538
野菊花…… 539
蛇床子…… 540
蛇蜕…… 541
啤酒花浸膏…… 541
三合素软膏…… 542
三合素胶丸…… 543
银杏叶…… 543
银柴胡…… 544
甜瓜子…… 545
甜瓜蒂…… 545
甜地丁…… 546
猪牙皂…… 547
猪苓…… 548
猪殃殃…… 548
猪鬃草…… 549

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

猫爪草…… 550
猫眼草…… 550
猕猴桃根…… 551
麻油…… 552
麻黄…… 553
麻黄根…… 554
鹿角…… 555
鹿角胶…… 556
鹿角霜…… 556
鹿茸…… 557
鹿衔草…… 558
商陆…… 559
旋复花…… 560
断血流…… 561
断血流片…… 561
淫羊藿…… 562
淡竹叶…… 563
淡豆豉…… 563
密蒙花…… 564
续断…… 565
绵马贯众…… 566
绵萆薢…… 566
琥珀…… 567
蚱蝉…… 568
款冬花…… 568
葫芦…… 569
葫芦茶…… 570
葛根…… 570
葶苈子…… 571
萱草根…… 572
蒴蓄…… 573
朝天罐…… 574
楮实子…… 574
椰馏油…… 575
椰馏油癣药水…… 576
棕板…… 576
硫黄…… 577
雄黄…… 578
紫贝齿…… 579
紫石英…… 579
紫花地丁…… 580
紫花杜鹃…… 581
紫花杜鹃浸膏…… 582
紫花杜鹃片…… 583
紫苏子…… 583
紫苏叶…… 584
紫苏梗…… 585
紫河车…… 585
紫金龙…… 586
紫草…… 587
紫草茸…… 587
紫珠叶…… 588
紫茉贯众…… 589
紫菀…… 589
景天三七…… 590
景天三七糖浆…… 591
蛤壳…… 592
蛤蚧…… 592
黑风藤…… 593
黑老虎根…… 594
黑芝麻…… 595
黑胡椒…… 595
黑种草子…… 596
锁阳…… 597
鹅不食草…… 597
筋骨草…… 598
筋骨草片…… 599
橡胶松…… 599
橡胶松注射液…… 601
滑石…… 602
滑石粉…… 602
薯草…… 603
蓝布正…… 604
蓝花参…… 604
蓖麻子…… 605
蓖麻油…… 606
蔗蔾…… 606
蒲公英…… 607
蒲公英片…… 608
蒲黄…… 608
椿皮…… 609
槐米…… 610

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

槐花…… 611
槐角…… 612
雷丸…… 612
照山白…… 613
路路通…… 614
鳀蛄…… 614
蜂房…… 615
蜂蜡…… 616
蜂蜜…… 616
锦灯笼…… 617
矮地茶…… 618
鼠曲草…… 619
满山红…… 619
满山红油…… 620
满山红油胶丸…… 621
裸花紫珠…… 621
裸花紫珠片…… 622
蔓荆子…… 623
蓣菜…… 624
蓣菜素…… 625
蓣菜素片…… 626
蓼大青叶…… 627
榧子…… 627
榜嘎…… 628
槟榔…… 629
酸枣仁…… 630
碱花…… 631
磁石…… 631
豨莶草…… 632
豨莶丸…… 633
蜘蛛香…… 633
蝉蜕…… 634
罂粟壳…… 634
鲜竹沥…… 635
辣蓼…… 636
漏芦…… 636
熊胆…… 637
赭石…… 638
薤仁…… 639
蕲蛇…… 639
槲寄生…… 640
暴马子皮…… 641
墨旱莲…… 642
稻芽…… 642
僵蚕…… 643
鹤虱…… 644
鹤草芽…… 644
鹤草芽浸膏…… 645
鹤草酚…… 646
鹤草酚片…… 647
薤白…… 648
薯蓣…… 648
薯蓣片…… 649
薏苡仁…… 650
薄荷…… 650
薄荷油…… 651
薄荷脑…… 653
颠茄草…… 654
颠茄酊…… 655
颠茄流浸膏…… 656
颠茄浸膏…… 657
颠茄片…… 658
橘红…… 658
橘核…… 659
糙苏…… 659
藏木香…… 660
藏糙苏…… 661
藁本…… 662
爵床…… 662
翼首草…… 663
藕节…… 664
瞿麦…… 664
鳖甲…… 667
蟾酥…… 668
糯稻根…… 669
麝香…… 669

成方及复方制剂

一捻金…… 671
二冬膏…… 671

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

二至丸…… 672
二陈丸…… 672
二妙丸…… 673
十一味能消丸…… 673
十二味翼首散…… 674
十三味榜嘎散…… 675
十五味沉香丸…… 675
十六味杜鹃丸…… 676
十全大补丸…… 677
十味石榴丸…… 677
丁公藤风湿药酒…… 678
七味广枣丸…… 679
七味铁屑丸…… 679
七味葡萄散…… 680
七味榄藤子丸…… 681
七珍丸…… 681
七厘散…… 682
七雄丸…… 683
八味沉香散…… 683
八味清心沉香散…… 684
八味檀香散…… 684
八宝眼药…… 685
八珍丸…… 686
八珍益母丸…… 686
九气拈痛丸…… 687
九分散…… 688
九味石灰华散…… 689
九味羌活丸…… 689
九胜散…… 690
三子散…… 690
三妙丸…… 691
三味蒺藜散…… 691
大山楂丸…… 692
大补阴丸…… 693
大黄䗪虫丸…… 693
万氏牛黄清心丸…… 694
上清丸…… 695
小儿化毒散…… 696
小儿四症丸…… 696
小儿至宝丸…… 697
小儿惊风散…… 698
小儿紫草丸…… 699
小青龙合剂…… 700
小金丸…… 700
小建中合剂…… 701
小活络丸…… 702
千金散…… 702
川芎茶调散…… 703
女金丸…… 704
开胸顺气丸…… 705
天麻丸…… 705
木瓜丸…… 706
木耳舒筋丸…… 707
木香槟榔丸…… 707
五子补肾丸…… 708
五苓散…… 709
五虎散…… 709
五味沙棘散…… 710
五味麝香丸…… 710
止红肠澼丸…… 711
止带丸…… 712
牛黄上清丸…… 712
牛黄保婴丸…… 713
牛黄消炎丸…… 714
牛黄解毒丸…… 715
牛黄解毒片…… 715
牛黄镇惊丸…… 716
毛鸡药酒…… 717
化毒丸…… 718
分清丸…… 719
风湿骨痛丸…… 719
乌贝散…… 720
乌鸡白凤丸…… 721
六一散…… 722
六合定中丸…… 722
六味木香散…… 723
六味地黄丸…… 723
六味安消散…… 724
玉真散…… 725
艾附暖宫丸…… 725
左金丸…… 726
石黄抗菌片…… 727

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

石斛夜光丸…… 727
戊己丸…… 728
龙胆泻肝丸…… 729
归芍地黄丸…… 730
归脾丸…… 730
四君子丸…… 731
四味土木香散…… 732
四逆汤…… 732
四神丸…… 733
生脉饮…… 733
失笑散…… 734
白带丸…… 734
半贝丸…… 735
头风痛丸…… 735
耳聋佐磁丸…… 736
芝蕉枯痔液…… 737
再造丸…… 738
西黄丸…… 739
百合固金丸…… 740
当归龙荟丸…… 740
朱砂安神丸…… 741
伤湿止痛膏…… 742
行军散…… 742
冲服凉茶…… 743
冰硼散…… 744
羊胆丸…… 744
安胃片…… 745
安宫牛黄丸…… 746
安宫牛黄散…… 746
安神补心丸…… 747
导赤丸…… 748
阳和解凝膏…… 749
防风通胜丸…… 749
妇女痛经丸…… 750
妇科分清丸…… 751
红灵散…… 751
麦味地黄丸…… 752
抗风湿合剂…… 753
抗痨丸…… 753
苏合香丸…… 754
杜仲降压片…… 755
杞菊地黄丸…… 756
医痫丸…… 756
沉香化气丸…… 757
良附丸…… 758
启脾丸…… 758
补中固经汤…… 759
补中益气丸…… 759
补心丸…… 760
补益豆蔻丸…… 761
局方至宝散…… 762
阿魏化痞膏…… 762
附子理中丸…… 763
妙济丸…… 763
鸡血藤膏…… 764
驱寒止痛砂…… 765
坤顺丸…… 766
拨云退翳丸…… 766
虎骨酒…… 767
明目地黄丸…… 768
固经丸…… 769
知柏地黄丸…… 770
和中糖浆…… 770
金鸡冲剂…… 771
金黄散…… 772
肥儿丸…… 772
狗皮膏…… 773
炎宁冲剂…… 774
河车大造丸…… 775
降压丸…… 775
参苏丸…… 776
参苓白术散…… 777
茴香橘核丸…… 777
胡蜂酒…… 778
药艾条…… 779
枳术丸…… 779
枳实导滞丸…… 780
柏子养心丸…… 781
栀子金花丸…… 782
香苏正胃丸…… 782
香连丸…… 783
香附丸…… 784

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

香砂六君丸…… 784
复方大黄酊…… 785
复方龙胆酊…… 786
复方地锦片…… 786
复方百部止咳糖浆…… 787
复方羊角冲剂…… 787
复方阴阳莲片…… 788
复方杜鹃片…… 789
复方岗稔片…… 789
复方岩白菜素片…… 790
复方垂盆草糖浆…… 791
复方鸭跖草溶液…… 791
复方紫参冲剂…… 792
保赤散…… 793
保和丸…… 793
追风膏…… 794
胆黄片…… 795
养阴清肺膏…… 795
首乌丸…… 796
洁白丸…… 797
活血止痛散…… 797
济生肾气丸…… 798
冠心苏合丸…… 799
祛风舒筋丸…… 799
珠黄吹喉散…… 800
盐蛇散…… 801
荷叶丸…… 802
桂附地黄丸…… 803
逍遥丸…… 803
健步丸…… 804
健胃归津散…… 805
健脾丸…… 805
健腰丸…… 806
脏连丸…… 806
痞积散…… 807
益元散…… 808
益母丸…… 808
调经丸…… 809
通关散…… 810
通宣理肺丸…… 811
桑菊感冒片…… 812
桑麻丸…… 812
控涎丸…… 813
黄连羊肝丸…… 813
梅花点舌丸…… 814
蛇胆川贝散…… 815
蛇胆陈皮散…… 816
婴儿保肺散…… 816
婴儿散…… 817
银黄注射液…… 817
银翘解毒丸…… 819
银翘解毒片…… 819
麻仁丸…… 820
痔漏丸…… 821
清气化痰丸…… 821
清宁丸…… 822
清肺抑火丸…… 823
清胃黄连丸…… 823
清热丸…… 824
清热凉血膏…… 825
清眩丸…… 825
清凉眼药膏…… 826
清喉咽合剂…… 827
清瘟解毒丸…… 827
越鞠丸…… 828
散风活络丸…… 829
葛根芩连片…… 830
雅叫哈顿散…… 830
紫金锭…… 831
紫草膏…… 832
紫雪…… 832
暑症片…… 833
暑湿正气丸…… 834
跌打丸…… 834
跌打活血散…… 835
锁阳固精丸…… 836
鹅掌风药水…… 837
舒肝丸…… 838
舒肝止痛丸…… 838
舒筋活络酒…… 839
舒筋散…… 840
痧药…… 841

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

痛经丸…… 841
滋肾丸…… 842
槐角丸…… 843
感冒退热冲剂…… 843
感冒清热冲剂…… 844
暖脐膏…… 845
催汤丸…… 845
腰痛丸…… 846
腰痛片…… 847
解肌宁嗽丸…… 848
槟榔四消丸…… 848
磁朱丸…… 849
震灵丸…… 850
橘贝半夏…… 851
橘红丸…… 851
醒消丸…… 852
礞石滚痰丸…… 853
蟾蜍丸…… 853
藿香正气丸…… 854
藿香正气水…… 855
鳖甲煎丸…… 855
蟾酥丸…… 856

附录与附表

制剂通则……附录 1
丸剂……附录 1
散剂……附录 3
膏药……附录 4
煎膏剂……附录 4
酒剂……附录 4
胶剂……附录 5
冲剂……附录 5
片剂……附录 6
注射剂……附录 7
酊剂……附录10
流浸膏剂与浸膏剂……附录11
胶囊剂……附录12
软膏剂……附录12
眼膏剂……附录13
中草药检定通则……附录13
中草药炮制通则……附录17
中草药及成方显微鉴别法……附录19
成方制剂中本药典未收载的中草药及炮制品……附录21
比重测定法……附录26
沸程测定法……附录27
熔点测定法……附录28
凝点测定法……附录30
旋光度测定法……附录31
折光率测定法……附录32
分光光度法与比色法……附录32
层析法……附录35
一般鉴别试验……附录40
pH 值测定法……附录42
氯化物检查法……附录44
干燥失重测定法……附录44
炽灼残渣检查法……附录45
铁盐检查法……附录45
重金属检查法……附录46
砷盐检查法……附录47
乙醇量测定法……附录48
脂肪与脂肪油检验法……附录51
热原检查法……附录53
无菌检查法……附录55
注射剂用玻璃容器检验法……附录58
电位滴定法与永停滴定法……附录59
桉油精含量测定法……附录61
洋地黄生物检定法……附录62
试药……附录63
试液……附录71
试纸……附录78
指示剂与指示液……附录78
缓冲液……附录80
标准比色液……附录81
当量液与克分子液……附录83
毒剧药表……附录90
老幼剂量折算表……附录91
原子量表……附录92
红外光吸收图谱……附录93

索引

中文索引……索引 2
汉语拼音索引……索引23
拉丁名索引……索引38

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

中草药及其制品

一枝黄花

Yizhihuanghua

HERBA SOLIDAGINIS

本品为菊科植物一枝黄花 Solidago decurrens Lour. 的干燥全草。秋季花果期采挖，除去泥沙，晒干。

【性状】 本品长 30～100 cm。根茎短粗，簇生淡黄色细根。茎圆柱形，直径 0.2～0.5 cm；表面黄绿色、灰棕色或暗紫红色，有棱线，上部被毛；质脆，易折断，断面纤维性，有髓。单叶互生，多皱缩、破碎，完整叶片展平后呈卵形或披针形，长 1～9 cm，宽 0.3～1.5 cm；先端稍尖或钝，全缘或有不规则疏锯齿，基部下延成柄。头状花序直径约 0.7 cm，排成总状，偶有黄色舌状花残留，多皱缩扭曲，苞片 3 层，卵状披针形。瘦果细小，冠毛黄白色。气微香，味微苦辛。

以叶多、色绿者为佳。

【炮制】 除去杂质，喷淋清水，切段，干燥。

【性味】 微苦、辛，平。

【功能与主治】 疏风清热，抗菌消炎。用于感冒，急性咽喉炎，扁桃体炎，疮疖肿毒。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置干燥处。

一点红

Yidianhong

HERBA EMILIAE

本品为菊科植物一点红 Emilia sonchifolia (L.) DC. 的干燥全草。夏、秋二季采

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

挖，晒干，或趁鲜切段，晒干。

【性状】 本品长 10～50 cm。根细而弯曲，有须根。茎细圆柱形，表面暗绿色，下部被茸毛。叶多皱缩，展平后基生叶呈琴状分裂，长 5～10 cm，宽 2.5～5 cm，灰绿色或暗绿色，先端裂片大，近三角形，基部抱茎，边缘具疏钝齿；茎生叶渐狭。头状花序 2～3 个排成聚伞状，总苞圆柱形，苞片 1 层，呈条状披针形或近条形，长约 1 cm；管状花棕黄色，冠毛白色。瘦果狭矩圆形，长约 3 mm，有棱。气微，味苦。

【炮制】 未切段者除去杂质，切段。

【性味】 微苦，凉。

【功能与主治】 清解热毒，消炎，利尿。用于肠炎，痢疾，尿路感染，上呼吸道感染，结膜炎，口腔溃疡，疮痈。

【用法与用量】 6～15 g，鲜品 15～30 g；外用鲜品适量，捣烂敷患处。

【贮藏】 置通风干燥处。

丁　公　藤

Dinggongteng

CAULIS ERYCIBES

本品为旋花科植物丁公藤 Erycibe obtusifolia Benth. 的干燥藤茎。全年均可采收，切段或片，晒干。

【性状】 本品为斜切的段或片，直径 1～4 cm。外皮灰黄色、灰褐色或浅棕褐色，稍粗糙，有浅沟槽及不规则的纵裂纹或龟裂纹。皮孔点状或疣状，黄白色。老的栓皮可呈薄片状剥落。质坚硬，不易折断。切面椭圆形，黄褐色或浅黄棕色，木部宽广，有不规则的花纹（异型维管束）及多数小孔，中心有髓，有的不明显。无臭，味淡。

以粗壮、质坚者为佳。

【鉴别】 (1) 本品横切面：木栓层为数列细胞，外壁及内壁木化增厚，或夹有石细胞层。皮层有纤维束及石细胞群，石细胞壁极厚，层纹明显；薄壁细胞含草酸钙方晶和细小簇晶。老茎异型维管束发达，韧皮部有大的纤维及多数细小簇晶。木质部导管直径约至 350 μm；木纤维甚多。有髓部。薄壁细胞含淀粉粒。

(2) 取本品粉末 2 g，加乙醇 20 ml，加热回流约半小时，滤过，浓缩至约 5 ml。取滤液 2 ml，加盐酸羟胺试液与氢氧化钾试液的等容混合液 1 ml，置水浴上加热 1～2 分钟，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

放冷后，滴加1%三氯化铁的盐酸溶液1～2滴，即显紫红色。

（3）取鉴别(2）项下的乙醇提取液，点于滤纸上，置紫外光灯下观察，显蓝色荧光，遇碱荧光加强。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，蒸至透心，晒干。

【性味】 辛，温；有小毒。

【功能与主治】 祛风除湿，消肿止痛。用于风湿痹痛，半身不遂，跌扑肿痛。

【用法与用量】 3～6 g，用作配制酒剂，内服或外擦。

【注意】 本品有强烈发汗作用，虚弱者慎服；孕妇忌服。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

【制剂】 丁公藤注射液

丁公藤注射液

Dinggongteng Zhusheye

INJECTIO ERYCIBES

本品为丁公藤经提取制成的灭菌水溶液。

【处方】

丁公藤	2500 g
吐温 80	10 g
苯甲醇	10 ml
注射用水	适量

【制法】 取丁公藤，加水煎煮二次，第一次3小时，第二次2小时，合并煎液，滤过，滤液减压浓缩至约250 ml，用乙醇沉淀处理2次，第一次溶液中含乙醇量为75%，第二次为85%，每次均放置24小时后滤过，回收乙醇。加注射用水使成950 ml，冷藏48小时，滤过，滤液加活性炭6 g，煮沸10分钟，滤过，测定溶液中总固体含量（丁公藤提取物），用10%氢氧化钠溶液调节pH值至4.5～5.0，加吐温80与苯甲醇，并加注射用水使每1 ml中含提取物0.05 g，滤过，灌封，灭菌，即得。

【性状】 本品为棕色的澄明液体。

【鉴别】 （1）取本品，点于滤纸上，置紫外光灯下观察，显浅蓝色荧光。

（2）取本品1 ml，加三氯化铁试液1滴，即显墨绿色。

【检查】 **pH值** 应为4.0～5.5(附录42页)。

其他 应符合注射剂项下有关的各项规定(附录7页)。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 驱风，消肿，止痛。用于风湿性关节炎。

【用法与用量】 肌内注射，一次 2 ml，一日 1～2 次。

【注意】 孕妇忌用。

【规格】 2ml

【贮藏】 密闭保存。

丁香罗勒油

Dingxiang Luoleyou

OLEUM OCIMI GRATISSIMI

本品为唇形科植物丁香罗勒 Ocimum gratissimum L. 的全草经蒸气蒸馏得到的挥发油。含丁香酚($C_{10}H_{12}O_2$)不得少于 85.0%(ml/ml)。

【性状】 本品为淡黄色的澄清液体；有类似丁香的香气，味辛辣，而有麻胀感；露置空气中或贮存日久，渐变棕色，质渐浓稠。

本品在乙醇、乙醚或冰醋酸中易溶，在水中几乎不溶。

比重 本品的比重(附录26页)在 25°时为 1.038～1.060。

折光率 本品的折光率(附录32页)为 1.530～1.540。

【鉴别】 取本品约 0.5 ml，加乙醇约 1 ml 溶解后，加新制的 5% 香草醛的盐酸溶液 5～10 滴，摇匀，即显墨绿色。

【检查】 **水溶性酚类** 取本品 1 ml，加热水 20 ml 振摇后，放冷，用水湿润的滤纸滤过，滤液中加三氯化铁试液 1 滴，除显易消失的灰绿色外，不得显蓝色或紫色。

重金属 取本品 10 ml，加水 10 ml 与盐酸 1 滴振摇后，通硫化氢气使饱和，水层与油层均不得变色。

【含量测定】 精密量取本品 10 ml(A)，置 100 ml 的测醛瓶中，加 *N*/1 氢氧化钾液 75 ml，振摇 5 分钟，置水浴上加热 10 分钟，放冷使分层，添加 *N*/1 氢氧化钾液适量，使油层浮升至瓶颈的刻度处，放置俟澄清(约 18 小时)，检读析出油层的 ml 数(B)，(A－B)×10即为本品中丁香酚的含量百分数。

【功能与主治】 局部镇痛、防腐药。用于龋齿等。

【贮藏】 遮光，满装，密封，置阴凉处保存。

小红网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

人　　参

Renshen

RADIX GINSENG

本品为五加科植物人参 Panax ginseng C. A. Mey. 的干燥根。栽培者为"园参"，野生者为"山参"。多于秋季采挖，洗净；园参经晒干或烘干，称"生晒参"，蒸制后干燥，称"红参"；山参经晒干，称"生晒山参"。

【性状】 **生晒参**　主根呈纺锤形或圆柱形，长 3～15 cm，直径 1～2 cm；表面灰黄色，上部或全体有疏浅断续的粗横纹及明显的纵皱，下部有侧根 2～3 条，并着生多数细长的须根，须根上偶有不明显的细小疣状突起。根茎（芦头）长 1～4 cm，直径 0.3～1.5 cm，多拘挛而弯曲，具不定根（芽）和稀疏的凹窝状茎痕（芦碗）。质较硬，断面淡黄白色，显粉性，有 1 明显的棕黄色环纹，皮部有黄棕色的点状树脂道及放射状裂隙。气特异，味微苦、甘。

红参　全长 6～17 cm。主根长 3～10 cm；表面半透明，红棕色，偶有不透明的暗褐色斑块，具纵沟、皱纹及细根痕，上部可见环纹，下部有 2～3 条扭曲交叉的侧根。根茎上有茎痕及 1～2 条完整或折断的不定根。质硬而脆，断面平坦，角质样。

生晒山参　主根与根茎等长或较短，呈人字形、菱形或圆柱形，长 2～10 cm；表面灰黄色，具纵纹，上端有紧密而深陷的环状横纹，侧根多为 2 条，须根细长，清晰不乱，有明显的疣状突起，习称"珍珠疙瘩"。根茎细长，上部具密集的茎痕，不定根较粗，形似枣核。通常以"芦长碗密枣核芽，紧皮细纹珍珠须"概述其外形。

均以条粗、质硬、完整者为佳。

【鉴别】 （1）本品横切面：木栓层为数列细胞。皮层窄。韧皮部外侧有裂隙，内侧薄壁细胞排列较紧密，有树脂道散在，内含黄色分泌物。形成层成环。木质部射线宽广，导管单个散在或数个相聚，断续排列成放射状，导管旁偶有非木化的纤维。薄壁细胞含草酸钙簇晶。

生晒参粉末淡黄白色。树脂道碎片易见，含黄色块状分泌物。草酸钙簇晶直径 20～68 μm，棱角锐尖。木栓细胞类方形或多角形，壁薄，细波状弯曲。网纹及梯纹导管直径 10～56 μm。淀粉粒甚多，单粒类球形、半圆形或不规则多角形，直径 4～20 μm，脐点点状或裂缝状；复粒由 2～6 粒组成。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

（2）取本品粉末约 0.5 g，加乙醇 5 ml，振摇 5 分钟，滤过。取滤液少量，置蒸发皿中蒸干，滴加三氯化锑的氯仿饱和溶液，再蒸干，呈紫色。

【炮制】 **生晒参** 去芦，润透，切片，干燥。

红参 去芦；切段或润透切片干燥，或用时捣碎。

生晒山参 去芦，用时粉碎或捣碎。

【性味】 甘、微苦，温。

【功能与主治】 大补元气，强心固脱，安神生津。用于虚脱，心衰，气短喘促，自汗肢冷，心悸怔忡，久病体虚，神经衰弱。

【用法与用量】 1.5～9 g。

【注意】 不宜与藜芦同用。

【贮藏】 置阴凉干燥处，密闭保存，防蛀。

八　角　枫

Bajiaofeng

RADIX ALANGII

本品为八角枫科植物八角枫 Alangium chinense (Lour.) Harms 的干燥细根及须根。夏、秋二季采挖，除去泥沙，晒干。

【性状】 本品细根呈长圆柱形，略弯曲，有分枝，长短不一，直径 2～8 mm；表面黄棕色或灰褐色，具细纵纹，有的外皮纵裂。须根纤细。质硬而脆，断面黄白色。气微，味淡。

以须根多者为佳。

【鉴别】 （1）本品粉末淡灰色。韧皮纤维多单个散在，黄色，长梭形，长约至 600 μm，直径 35～50 μm，壁极厚，木化，孔沟细密。石细胞黄色，长方形、类方形或类圆形，直径 20～64 μm。草酸钙簇晶甚多，直径 12～50 μm；方晶较少，直径约 30 μm。淀粉粒甚多，单粒椭圆形、卵形或类圆形，直径 3～10 μm；复粒多由 2～3 粒组成。

（2）取本品 5 g，切成约 2 mm的小段，加 1%盐酸溶液约 30 ml，置水浴上加热 20 分钟，滤过。取滤液 3 ml，分置三支试管中，一管加碘化铋钾试液 2～3 滴，即发生橙红色沉淀；一管加三硝基苯酚试液 2～3 滴，即发生黄色沉淀；另一管加硅钨酸试液 2～3 滴，即发生乳白色沉淀。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

（3）取鉴别（2）项下的滤液 2 ml，用 10%氢氧化钠溶液调节 pH 值至 9～10，加氯仿 2 ml 提取，吸取氯仿液 1 ml，置蒸发皿中，加 2,4-二硝基氯苯结晶少量，自然挥干后，加乙醇制氢氧化钾试液 3～4 滴，即显紫色，并迅即消失。

【炮制】 除去杂质，洗净，稍闷，切段，干燥。

【性味】 辛，微温；有小毒。

【功能与主治】 祛风除湿，舒筋活络，散瘀止痛。用于风湿痹痛，四肢麻木，跌扑损伤。

【用法与用量】 3～9 g。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

八 角 茴 香

Bajiaohuixiang

FRUCTUS ANISI STELLATI

本品为木兰科植物八角茴香 Illicium verum Hook. f. 的干燥成熟果实。秋、冬二季果实由绿变黄时采摘，置沸水中略烫后干燥或直接干燥。

【性状】 本品为聚合果，多由 8 个蓇葖果组成，放射状排列于中轴上。蓇葖果长 1～2 cm，宽 0.3～0.5 cm，高 0.6～1 cm；外表面红棕色，有不规则皱纹，顶端呈鸟喙状，上侧多开裂，内表面淡棕色，平滑有光泽；质硬而脆。果梗长 3～4 cm，连于果实的一端，弯曲，常脱落。每个蓇葖果含种子 1 粒，扁卵圆形，长约 6 mm，红棕色或黄棕色，光亮，尖端有种脐；胚乳白色，富油性。气芳香，味辛、甜。

以个大、完整、色红棕、香气浓者为佳。

【鉴别】 （1）本品粉末红棕色。内果皮栅状细胞 1 列，长柱形，长 200～546 μm，壁稍厚，纹孔口十字状或人字状。种皮石细胞黄色，表面观类多角形，壁极厚，波状弯曲，胞腔分枝状，内含棕黑色物；断面观长方形，壁不均匀增厚。果皮石细胞类长方形、长圆形或分枝状，壁极厚或稍厚。纤维长，单个散在或成束，直径 29～60 μm；壁木化，有纹孔。中果皮细胞红棕色，有油细胞，内胚乳细胞多角形，含脂肪油滴和糊粉粒。

（2）取除去种子的粗粉约 1 g，加乙醇 5 ml，置水浴中煮沸 2 分钟，放冷，滤过，滤液加水 25 ml，即发生显著浑浊；移至分液漏斗中，加石油醚 10 ml，振摇，分层后，分取

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

石油醚液，蒸干，残渣加醋酸 2 ml使溶解，加三氯化铁试液少量，摇匀，沿管壁缓缓加硫酸使成二液层，接界处即显持久的棕色。

(3) 取本品粗粉约 0.1 g，加 5 %氢氧化钾溶液 4 ml，煮沸 2 分钟，放冷，加水稀释至 10 ml，溶液显血红色。

【含量测定】 照挥发油测定法项下(附录16页)测定。

本品含挥发油不得少于 4 % (ml/g)。

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 温中散寒，理气止痛。用于胃寒呕吐，疝气腹痛，腰痛。

【用法与用量】 3～6 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

八角茴香油

Bajiao Huixiangyou

OLEUM ANISI STELLATI

本品为木兰科植物八角茴香 Illicium verum Hook. f. 的新鲜枝叶或成熟果实经蒸气蒸馏得到的挥发油。

【性状】 本品为无色或淡黄色的澄清液体；气味与八角茴香类似。冷时常发生浑浊或析出结晶，加温又澄清。

本品在乙醇(90%)中易溶。

比重 本品的比重(附录26页)在 25°时为 0.978～0.988。

凝点 本品的凝点(附录30页)不低于 15°。

旋光度 取本品，置 1 dm 的管中，依法测定(附录31页)，旋光度为－2°至＋1°。

折光率 本品的折光率(附录32页)为 1.553～1.560。

【检查】 **乙醇中不溶物** 取本品 1 ml，加 90%乙醇 3 ml，应溶解成澄清溶液。

重金属 取本品 10 ml，加水 10 ml 与盐酸 1 滴振摇后，通硫化氢气使饱和，水层与油层均不得变色。

【功能与主治】 芳香调味药及健胃药。

【用法与用量】 口服，一次 0.02～0.2 ml，一日 0.06～0.6 ml。

【注意】 本品如显浑浊或析出结晶，应置水浴上微温溶解后，摇匀应用。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【贮藏】 遮光，满装，密封，置阴凉处保存。

八　厘　麻

Balima

FRUCTUS RHODODENDRI MOLLIS

本品为杜鹃花科植物羊踯躅 Rhododendron molle G. Don 的干燥成熟果实。9～10月果实成熟而未开裂时采收，晒干，或置水中稍浸后晒干。

【性状】 本品呈长椭圆形，略弯曲，长 2～4 cm，直径 0.5～1 cm。表面黄棕色、红棕色或棕褐色，有纵沟 5 条，顶端尖或稍开裂，基部有宿存花萼，有的有果梗。质硬而脆，易折断，断面 5 室。种子多数，长扁圆形，棕色或棕褐色，边缘具膜质翅。气微，味涩、微苦，有刺舌感。

以色红棕、未开裂者为佳。

【鉴别】 (1) 本品粉末黄棕色。外果皮细胞棕色，类多角形。内果皮石细胞类圆形、三角形或形状不规则，有的分枝状，直径 20～55 μm，含红棕色物。内果皮纤维长梭形或棒状，直径 10～32 μm，有的含棕色物。种皮细胞狭长，壁微木化，密布细小纹孔。

(2) 取本品粉末 1 g，加氯仿 5 ml，加热回流半小时，放冷，滤过，滤液蒸干，加 5% 硫酸溶液 1 ml，置水浴上加热，溶液显红色。

【性味】 苦、辛，温；有毒。

【功能与主治】 活血散瘀，镇痛。用于跌扑损伤，风湿痹痛。

【用法与用量】 1.5～4.5 g。

【注意】 本品易使心率减慢，血压下降；孕妇慎服。

【贮藏】 置干燥处。

八厘麻毒素　　【剧】

Balima Dusu

RHOMOTOXINUM

本品为杜鹃花科植物羊踯躅 Rhododendron molle G. Don 的干燥成熟果实中提取

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

得到的结晶性粉末。

【性状】 本品为白色结晶或结晶性粉末；无臭，对鼻粘膜有强烈的刺激性。

本品在乙醇中略溶，在水、丙酮或氯仿中微溶，在乙醚或石油醚中几乎不溶。

熔点 本品的熔点(附录28页)为265～268°。

比旋度 取本品，加乙醇制成每1 ml中含10 mg的溶液，依法测定(附录31页)，在25°时比旋度为－50°至－60°。

【鉴别】 (1) 取本品约2 mg，加稀硫酸10 ml溶解后，置水浴中加热10分钟，溶液显橙红微带紫色，继续加热，渐变为橙黄色。

(2) 取本品与八里麻毒素对照品，各加丙酮制成每1 ml中含1 mg的溶液，照薄层层析法(附录38页)试验，取上述溶液各20 μl，分别点于同一硅胶G(含12～15%煅石膏)薄层板上，以氯仿-丙酮-甲醇(7:2:1)为展开剂，展开后，晾干，喷以硫酸-丁醇(5:100)，在120°加热至呈现明显的斑点。本品所显主斑点的颜色与位置，应与对照品所显的主斑点相同。

【检查】 有关杂质 取鉴别(2)所得本品的薄层层析谱，除主斑点外，不得显其他斑点。

【功能与主治】 本品有减慢心率和降低血压的作用。用于各种室上性心动过速(包括阵发性室上性心动过速，多发性房性早搏，快速型心房颤动，窦性心动过速)和高血压病。

【用法与用量】 常用量，口服，一次0.5～0.75 mg，一日1.5～2.25 mg。极量，口服，一次1 mg。

【注意】 宜空腹服用。危重及垂危患者(包括严重心力衰竭、心肌病变、房室传导阻滞和较重的室性节律失常等)禁用。较大剂量可有胃部烧灼感和全身麻木等短暂不良反应，用氢氧化铝可减轻胃部不适。

【贮藏】 遮光，密封保存。

【制剂】 (1) 八厘麻毒素片 (2) 八厘麻毒素注射液

八厘麻毒素片 【剧】

Balima Dusu Pian

TABELLAE RHOMOTOXINI

本品含八厘麻毒素应为标示量的90.0～110.0%。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 本品为白色片。

【鉴别】 (1) 取本品的细粉适量(约相当于八厘麻毒素 5 mg)，加丙酮 50 ml，搅拌，滤过。取滤液 20 ml，置水浴上蒸干，照八厘麻毒素项下的鉴别法(1) 项(9 页)试验，显相同的反应。

(2) 取鉴别(1) 项下剩余的丙酮溶液 10 ml，置水浴中浓缩至 1 ml，照八厘麻毒素项下的鉴别法(2) 项(9 页)试验，本品所显主斑点的颜色与位置，应与对照品所显的主斑点相同。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(附录 6 页)。

【含量测定】 **对照品溶液的制备与标准曲线的制备** 均照八厘麻毒素注射液项下的方法(11页)制备。

测定法 取本品 50 片，精密称定，研细，精密称出适量(约相当于八厘麻毒素 5 mg)，置 100 ml 量瓶中，加氯仿 80 ml，振摇 20 分钟，使八厘麻毒素溶解后并稀释至刻度，摇匀，用干燥滤纸滤过，弃去初滤液 20 ml，精密量取续滤液 20 ml，置大试管中，在 65°水浴中蒸干，照标准曲线的制备项下的方法，自"精密加稀硫酸 10 ml"起，依法测定吸收度，从标准曲线中读出供试量中八厘麻毒素的含量，计算，即得。

【功能与主治】【用法与用量】【注意】 同八厘麻毒素。

【规格】 0.25 mg

【贮藏】 遮光，密封保存。

八厘麻毒素注射液 【剧】

Balima Dusu Zhusheye

INJECTIO RHOMOTOXINI

本品为八厘麻毒素的灭菌水溶液。含八厘麻毒素应为标示量的 90.0～110.0%。

【性状】 本品为无色的澄明液体。

【鉴别】 (1) 取本品 2 ml，加稀硫酸 10 ml，置水浴中加热 10 分钟，溶液显橙红微带紫色，继续加热，渐变为橙黄色。

(2) 取本品 1 ml，置水浴上蒸干，照八厘麻毒素项下的鉴别法(2) 项(9 页)试验，本品所显主斑点的颜色与位置，应与对照品所显的主斑点相同。

【检查】 **pH 值** 应为 5.0～7.0(附录42页)。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

其他 应符合注射剂项下有关的各项规定(附录 7 页)。

【含量测定】 **对照品溶液的制备** 精密称取八厘麻毒素对照品 50 mg, 置 100 ml 量瓶中，加丙酮 80 ml, 振摇溶解后并稀释至刻度，摇匀，即得(每 1 ml 中含八厘麻毒素 0.5 mg)。

标准曲线的制备 精密量取对照品溶液 1.0、2.0、3.0 与 4.0 ml, 分别置于大试管中，置水浴中蒸去丙酮，分别精密加稀硫酸 10 ml, 置水浴中加热 10 分钟，在冷水浴中冷却 3 分钟后，照分光光度法(附录32页)，在 500 nm 的波长处测定吸收度，以吸收度为纵座标，浓度为横座标，绘制标准曲线。

测定法 精密量取本品 1 ml, 置大试管中，在水浴中蒸干，照标准曲线的制备项下的方法，自"精密加稀硫酸 10 ml"起，依法测定吸收度，从标准曲线中读出供试量中八厘麻毒素的含量，计算，即得。

【功能与主治】 同八厘麻毒素。

【用法与用量】 常用量，肌内注射，一次 0.5～1 mg。极量，肌内注射，一次 1 mg。

静脉滴注，1.5～2.0 mg, 加入 5 %或 10%葡萄糖注射液 200～500 ml 中，于半小时至 3 小时滴完。

【注意】 注射过程中密切观察血压及心律变化。血压过低时可以阿拉明或麻黄碱等、心率过缓时可以阿托品对抗之。继发性高血压及恶性高血压患者慎用。危重及垂危患者(包括严重心力衰竭、心肌病变、房室传导阻滞和严重的室性节律失常等)禁用。肌内注射易引起局部疼痛。较大剂量可有胃部烧灼感和全身麻木等短暂不良反应，加服氢氧化铝可减轻胃部不适。

【规格】 1 ml:1 mg

【贮藏】 遮光，密闭保存。

儿　茶

Ercha

CATECHU

本品为豆科植物儿茶 Acacia catechu (L.) Willd. 的去皮枝、干的干燥煎膏。冬季采收枝、干，除去外皮，砍成大块，加水煎煮，浓缩，干燥。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 本品呈方形或不规则块状，大小不一。表面棕褐色或黑褐色，光滑而稍有光泽。质硬，易碎，断面不整齐，具光泽，有细孔，遇潮有粘性。无臭，味涩、苦，略回甜。

以色黑略棕、涩味重者为佳。

【鉴别】 (1) 本品粉末棕褐色。可见多数成簇的针状结晶及黄棕色块状物。

(2) 取火柴杆浸于本品水浸液中，使轻微着色，待干燥后，再浸入盐酸中立即取出，置火焰附近烘烤，杆上即显深红色。

(3) 取本品约 0.2 g，加水 50 ml 使溶解，加盐酸 5 ml 与甲醛试液 10 ml，置水浴中加热，发生黄棕色沉淀，放冷，滤过。取滤液加三氯化铁试液数滴与醋酸钠 5 g，下部显棕红色，不得显蓝色。

【检查】 水溶性浸出物 不得少于 70%(附录16页热浸法)。

【炮制】 除去杂质，用时打碎。

【性味】 苦、涩，微寒。

【功能与主治】 生津化痰，止血敛疮。用于痰热咳嗽，咯血，口渴；外治溃疡久不收口，湿疹，口疮，痔肿，外伤出血。

【用法与用量】 1～3 g；外用适量。

【贮藏】 置干燥处，防潮。

九 节 菖 蒲

Jiujiechangpu

RHIZOMA ANEMONES ALTAICAE

本品为毛茛科植物阿尔泰银莲花 Anemone altaica Fisch. ex C. A. Mey. 的干燥根茎。夏季采挖，除去泥沙，干燥，再除去须根及杂质。

【性状】 本品略呈纺锤形，稍弯曲，长 1～4 cm，直径0.3～0.5 cm。表面棕黄色至暗棕色，具多数半环状突起的节(鳞叶痕)，斜向交互排列，节上有 1～3 个突起的根痕。质硬而脆，易折断，断面平坦，白色，有粉性，可见淡黄色小点(维管束)6～9 个，排列成环。气微，味微酸。

以表面色棕黄、断面色白者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，干燥。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 开窍化痰，醒脾安神。用于热病神昏，癫痫，神经官能症，耳鸣耳聋，胸闷腹胀，食欲不振；外治痈疽疮癣。

【用法与用量】 1.5～6g。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

九头狮子草

Jiutou Shizicao

HERBA PERISTROPHIS

本品为爵床科植物九头狮子草 Peristrophe japonica (Thunb.) Bremek. 的干燥全草。夏、秋二季采收，除去杂质，晒干。

【性状】 本品长达 50 cm。根须状，浅棕褐色。地上部分暗绿色，被毛。茎有棱，节膨大。叶对生，有柄，叶片多皱缩，展平后呈卵形、卵状长椭圆形或披针形，长 5～10cm，宽 3～4 cm，先端渐尖，基部楔形，全缘。聚伞花序集生于枝梢的叶腋，总梗短，叶状苞片 2 片，大小不等，花冠常脱落。气微，味微苦、涩。

以叶多、色绿者为佳。

【炮制】 除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，干燥。

【性味】 辛、微苦，凉。

【功能与主治】 发汗解表，清解热毒。用于感冒，咽喉肿痛，小儿高热；外治痈疖肿毒，毒蛇咬伤。

【用法与用量】 15～30g；外用鲜品适量，捣烂敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

九里香

Jiulixiang

FOLIUM ET CACUMEN MURRAYAE

本品为芸香科植物九里香 Murraya paniculata (L.) Jack. 的干燥叶和带叶嫩枝。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

全年均可采收，除去老枝，阴干。

【性状】 本品嫩枝呈圆柱形，直径1～4 mm；表面深绿色，被茸毛；质韧，不易折断，断面不平坦。羽状复叶有小叶3～9片，小叶片多卷缩、破碎，完整者展平后呈卵形、匙状倒卵形、椭圆形或近菱形，长2～7cm，宽1～3.5cm；深绿色，先端钝或短尖，基部楔形或略偏斜，全缘，上表面有透明腺点，小叶柄短或近无柄；质脆。有的带有顶生或腋生的聚伞花序，花冠直径约4 cm。气香，味苦、辛，有麻舌感。

以叶多、色绿、香气浓者为佳。

【炮制】 除去杂质，切碎。

【性味】 辛、微苦，温；有小毒。

【功能与主治】 行气止痛，活血散瘀。用于胃痛，风湿痹痛；外治牙痛，跌扑肿痛，蛇虫咬伤。

【用法与用量】 6～12g；外用鲜品适量，捣烂敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

九　香　虫

Jiuxiangchong

ASPONGOPUS

本品为蝽科昆虫九香虫 Aspongopus chinensis Dallas 的干燥体。11月至次年3月前捕捉，置适宜容器内，用酒少许将其闷死，取出阴干，或置沸水中烫死，取出，干燥。

【性状】 本品略呈六角状扁椭圆形，长1.6～2 cm，宽约1 cm。表面棕褐色或棕黑色，略有光泽。头部小，与胸部略呈三角形，顶端具眼1对，并有1对具5个节的触角，多已脱落。胸部背面有翅2对，上面的一对基部较硬，内部一对为膜质，透明；胸部有足3对，多已脱落。腹部棕红色至棕黑色，每节近边缘处有突起的小点。质脆，折断后腹内有浅棕色的内含物。气特异，味微咸。

以个完整均匀、色棕褐、发亮者为佳。

【炮制】 九香虫　除去杂质。

炒九香虫　取净九香虫，照清炒法(附录18页)炒至有香气。

【性味】 咸，温。

【功能与主治】 理气止痛，温中助阳。用于胃脘气滞胀痛，肾虚腰膝无力。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置木箱内衬以油纸，防潮、防蛀。

了 哥 王

Liaogewang

RADIX WIKSTROEMIAE INDICAE

本品为瑞香科植物了哥王 Wikstroemia indica C. A. Mey. 的干燥根或根皮。全年均可采挖，洗净，晒干，或剥取根皮，晒干。

【性状】 本品根呈弯曲的长圆柱形，常有分枝，直径 0.5～3 cm；表面黄棕色或暗棕色，有略突起的支根痕、不规则的纵沟纹及少数横裂纹，有的可见横长皮孔状突起；质硬而韧，断面皮部类白色，易剥离，木部淡黄色。根皮呈扭曲的条带状，厚 1.5～4 mm；栓皮或有剥落，强纤维性，纤维绒毛状。气微，味微苦甘，嚼后有持久的灼热不适感。

以条粗、皮厚者为佳。

【鉴别】 (1) 本品根的横切面：木栓层为 10～20 余列细胞，有的充满黄棕色或红棕色物。皮层较窄；纤维多，成束或单个散在，类圆形，直径 7～22μm，壁厚，非木化至微木化。韧皮部宽广，射线宽 1～3 列细胞；纤维甚多，与薄壁细胞交互排列。形成层成环。木质部发达，射线细胞壁稍厚，纹孔明显；导管多单个散在，类圆形，直径 26～85 μm；木纤维多。薄壁细胞含淀粉粒。

(2) 取本品根皮，切制横切面，置紫外光灯下观察，显亮蓝色荧光；用氨气熏后，在日光下变为黄色，紫外光灯下显黄绿色荧光。

【炮制】 除去杂质，洗净，切片，干燥。

【性味】 苦、辛，微温；有毒。

【功能与主治】 消炎解毒，散瘀逐水。用于支气管炎，肺炎，腮腺炎，淋巴结炎，风湿痛，晚期血吸虫病腹水，疮疖痈疽。

【用法与用量】 根 15～30g；根皮 9～21g，久煎后服用；外用鲜根捣烂敷或干根浸酒敷患处。

【注意】 孕妇忌服。粉碎或煎煮时易引起皮肤过敏，宜注意防护。

【贮藏】 置干燥处。

【制剂】 了哥王片

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

了哥王片

Liaogewang Pian

TABELLAE WIKSTROEMIAE INDICAE

本品为了哥王浸膏片。每片含干浸膏 0.22 g。

【制法】 取了哥王，加水煎煮二次，每次 5 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩成稠膏状，干燥成干浸膏，加适量辅料，制成颗粒，压片，包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；味微苦。

【鉴别】 (1) 取本品 2 片，除去糖衣，加乙醇 10ml，研磨，滤过。取滤液点于滤纸上，置紫外光灯下观察，显亮蓝色荧光；用氨气熏后，显黄绿色荧光。

(2) 取本品 2 片，除去糖衣，研细，加甲醇 15ml，温热提取，滤过，滤液置水浴上蒸干，残渣加氯仿 2ml 使溶解，移置试管中，沿管壁注意加硫酸 1ml，两液接界处显棕色环，氯仿层显蓝紫色荧光。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(附录 6 页)。

【功能与主治】 消炎，解毒。用于支气管炎，肺炎，扁桃体炎，腮腺炎，乳腺炎，蜂窝组织炎。

【用法与用量】 口服，一次 3 片，一日 3 次。

【贮藏】 密封保存。

刀　豆

Daodou

SEMEN CANAVALIAE

本品为豆科植物刀豆 Canavalia gladiata (Jacq.) DC. 的干燥成熟种子。秋季采收成熟果实，剥取种子，晒干。

【性状】 本品呈扁卵形或扁肾形，长 2～3.5 cm，宽 1～2 cm，厚 0.5～1.2 cm。表面淡红色至红紫色，微皱缩，略有光泽。边缘具黑色种脐，习称"黑眉"，长约 2cm，种脐

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

上有白色细纹3条。质硬，难破碎。种皮革质，破开后种皮内表面棕绿色而光亮；子叶2片，黄白色，油润。无臭，味淡，嚼之有豆腥气。

以粒大、饱满、色淡红者为佳。

【炮制】 除去杂质，用时捣碎。

【性味】 甘，温。

【功能与主治】 温中，下气，益肾。用于虚寒呃逆，呕吐，肾虚腰痛。

【用法与用量】 4.5～9g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

三　七

Sanqi

RADIX NOTOGINSENG

本品为五加科植物三七 Panax notoginseng (Burk.) F. H. Chen 的干燥根。秋季花开前采挖，洗净，除去支根、须根及茎基，干燥。

【性状】 本品为类圆锥形或圆柱形，长 1～6 cm，直径 1～4 cm。顶端有茎痕，周围有瘤状突起。表面灰褐色或灰黄色，有断续的纵皱纹及支根痕。体重，质坚实，断面灰绿色、黄绿色或灰白色，微显放射状纹理。气微，味苦回甜。

以体重、质坚、表面光滑、断面色灰绿或黄绿者为佳。

【鉴别】 (1) 本品粉末灰黄色。淀粉粒甚多，单粒圆形、半圆形或圆多角形，直径4～30μm；复粒由2～10余粒组成。树脂道碎片含黄色分泌物。梯纹、网纹及螺纹导管直径15～55μm。草酸钙簇晶少见，直径50～80μm。

(2) 取本品粗粉1g，加水10 ml，置50～60°的水浴中温浸30分钟(或冷浸振摇1小时)，滤过。取滤液2 ml，分置二支试管中，一管加氢氧化钠试液2ml，另一管加5%盐酸溶液2ml，塞紧，用力振摇1分钟，两管均产生高度相近的持久泡沫。

(3) 取本品粗粉2g，加甲醇15ml，置50～60°水浴中温浸30分钟(或冷浸振摇1小时)，滤过。取滤液1ml，置水浴上蒸干，加醋酐1ml与硫酸1～2滴，显黄色，渐变为红色、紫色、青色、污绿色；另取滤液数滴，点于滤纸上，干后置紫外光灯下观察，显淡蓝色荧光，滴加硼酸的丙酮饱和溶液与10%枸橼酸溶液各6滴，干后，置紫外光灯下观察，有强烈的黄绿色荧光。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

(4) 取本品粗粉约 10g，置脂肪提取器中，用乙醚 100ml 提取 12 小时以上，将乙醚提取物弃去，继用乙醇 100ml 提取 12 小时以上，除去乙醇，提取物加水 20 ml 溶解后，用正丁醇振摇提取 3 次，合并提取液，减压回收溶媒，将提取物溶于少量的甲醇(或乙醇)中，滤过，缓缓倾入大量丙酮中使沉淀，抽滤，置真空干燥器中干燥。取干燥品 0.5g，用含 7%盐酸的 50%乙醇 25ml，加热回流 4 小时，溶液加水稀释至原体积的 1.5 倍，减压蒸去乙醇，用氯仿提取 3 次，提取液用无水硫酸钠脱水。照薄层层析法(附录38页)试验，吸取上述氯仿液 10μl，点于硅胶G(含 25%煅石膏)薄层层析板上，以苯-醋酸乙酯(1:1)为展开剂，展开后，晾干，喷以醋酐-硫酸(12:1)使显色，并以齐墩果酸、人参二醇、人参三醇为对照品，同时点样展开。本品提取液有 5 个色点，其中两个色点与人参二醇、人参三醇的斑点相对应，但没有与齐墩果酸相对应的斑点。

【炮制】 **三七粉** 取三七，洗净，干燥，碾细粉。

熟三七粉 取净三七，打碎，分大小块，用食油炸至表面棕黄色，取出，碾细粉。

【性味】 甘、微苦，温。

【功能与主治】 生品：散瘀止血，消肿定痛。用于咯血，吐血，胸腹刺痛，崩漏，跌扑肿痛，外伤出血。熟品：补血和血。用于失血，贫血。

【用法与用量】 生用 3～9g，熟用 9～15g；外用粉末适量，敷患处。

【注意】 孕妇忌服生品。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防蛀。

三 叉 苦

Sanchaku

FOLIUM ET RAMULUS EUODIAE LEPTAE

本品为芸香科植物三叉苦 Euodia lepta (Spreng.) Merr. 的干燥枝叶。夏、秋二季采收，晒干。

【性状】 本品枝呈圆柱形，直径 0.5～1.5 cm；表面灰棕色或绿灰色，有细纵皱纹；嫩枝呈方柱形，表面灰绿色至绿褐色，质硬而脆，易折断。三出复叶对生，叶柄长 3～5 cm；小叶片多皱缩、破碎，完整者展平后呈长圆状披针形，长 6～15 cm，宽 2～5 cm；先端渐尖，全缘或不规则浅波状，基部稍偏斜，狭尖延长成短的小叶柄；上表面褐绿色，下表面色较浅，两面光滑无毛，有透明腺点。气微，味苦。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

以枝嫩、叶绿者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，稍润，切段，晒干。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清解热毒，消炎止痛。用于感冒发热，流行性脑脊髓膜炎，乙型脑炎，扁桃体炎，咽喉炎，跌扑肿痛，风湿痹痛；外治疮肿，皮肤瘙痒。

【用法与用量】 9～15 g；外用适量，煎汤洗患处。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

三 分 三

Sanfensan

RADIX ANISODI ACUTANGULI

本品为茄科植物三分三 Anisodus acutangulus C. Y. Wu et C. Chen、丽江山莨菪 Anisodus luvidus Link et Otto var. ficheriana (Pacher) C. Y. Wu et C. Chen、小赛莨菪 Scopolia carniolicoides C. Y. Wu et C. Chen var. dentata C. Y. Wu et C. Chen 或赛莨菪 Scopolia carniolicoides C. Y. Wu et C. Chen 的干燥根。秋季采挖，除去泥沙，切成块片，晒干。

【性状】 本品为圆形、卵圆形或不规则的块片，直径 2～12 cm，厚 0.5～2 cm。外皮棕褐色或黑褐色，有皱纹。切面灰白色至微黄色，可见年轮和放射状纹理及数层同心性环纹。质硬，断面颗粒状，有粉性。气微，味甘、微苦麻。

【鉴别】 取本品细粉 10 g，加氯仿 150 ml，浸渍 10 分钟后，加浓氨试液 4 ml，振摇半小时，静置半小时，滤过。取滤液 5 ml，置蒸发皿中，蒸去氯仿，加发烟硝酸数滴，蒸干后残渣呈黄色，再加乙醇制氢氧化钾试液，则呈紫蓝色，随即变紫红色。

【性味】 苦、辛，温；有大毒。

【功能与主治】 解痉止痛。用于胃、十二指肠溃疡，胆绞痛，肾绞痛，肠痉挛，震颤麻痹，风湿痹痛。

【用法与用量】 0.6～0.9 g。

【注意】 本品有大毒，慎用；青光眼患者忌服。

【贮藏】 置干燥处。

【制剂】 三分三浸膏

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

三分三浸膏 【剧】

Sanfensan Jingao

EXTRACTUM ANISODI ACUTANGULI

本品含生物碱作为莨菪碱($C_{17}H_{23}O_3N$)计算，应为0.27～0.33%。

【处方】

三分三（粗粉）	1000 g
乙醇（82～85%）	适量
淀粉（100°干燥）	适量

【制法】 取三分三粉，照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法（附录11页），用82～85%乙醇作溶剂，浸渍48～72小时后，缓缓渗滤，俟生物碱完全漉出，收集漉液，在65°以下减压浓缩成稀糖浆状，将浓缩液用水调节比重至1.17左右，静置分层，除去上层树脂状物质，取下层清液，加5倍量的淀粉，混匀，过三号筛，60°干燥后，用四号筛筛过，取出适量，照含量测定项下的方法，测定生物碱含量后，余膏加淀粉适量，使生物碱的含量符合规定，混匀，过筛，即得。

【性状】 本品为类黄白色的粉末；微有特臭。

【鉴别】 取含量测定项下滴定后的溶液适量，加氨试液使成碱性，用氯仿适量振摇提取，分取氯仿液，蒸干；残渣显托烷生物碱类的鉴别反应（附录42页）。

【含量测定】 取本品约10 g，精密称定，置具塞锥形瓶中，加70%乙醇70 ml，密塞，强力振摇1小时，放置过夜，滤过，滤渣再用70%乙醇提取，至生物碱完全提尽为止，滤过，合并滤液，置蒸发皿中，在60～80°水浴上蒸发至约剩15 ml，移置分液漏斗中，蒸发皿用$N/5$硫酸液15 ml分次洗涤，洗液并入分液漏斗中，加氨试液5 ml，用氯仿分次振摇提取，第一次40 ml，以后每次各20 ml，至生物碱完全提尽为止，合并氯仿液，加$N/5$硫酸液20 ml振摇提取后，分取酸层，氯仿层再用$N/10$硫酸液分次振摇提取，至生物碱完全提尽为止，合并酸液，加过量的氨试液使成碱性，再用氯仿分次振摇提取，至生物碱完全提尽为止，每次得到的氯仿液均用同一的水10 ml洗涤，弃去洗液，合并氯仿液，置水浴上蒸干，提取物中加无水乙醇3 ml，蒸干，并在80°干燥2小时，加氯仿2 ml，精密加$N/50$硫酸液10 ml，置水浴上加热，除去氯仿，放冷，加甲基红指示液2滴，用$N/50$氢氧化钠液滴定，并将滴定的结果用空白试验校正，即得（每1 ml的$N/50$硫酸液相当于5.788 mg的$C_{17}H_{23}O_3N$）。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 同三分三。

【用法与用量】 常用量，口服，一次 10～15 mg，一日 30～50 mg。极量，口服，一次 50 mg，一日 150 mg。

【注意】 青光眼患者忌服。

【贮藏】 密封保存。

三 白 草

Sanbaicao

RHIZOMA SEU HERBA SAURURI

本品为三白草科植物三白草 Saururus chinensis (Lour.) Baill. 的干燥根茎或全草。根茎秋季采挖，全草全年均可采挖，洗净，晒干。

【性状】 本品根茎呈圆柱形，稍弯曲，有分枝，长短不等；表面灰褐色，粗糙，有节及纵皱纹，节呈环状，有须根，节间长约 2 cm；质硬而脆，易折断，断面类白色，粉性。茎圆柱形，有纵沟 4 条，一条较宽大，断面黄色，纤维性，中空。单叶互生，叶片卵形或卵状披针形，长 4～15 cm，宽 2～10 cm；先端渐尖，基部心形，全缘，基出脉 5 条；叶柄较长，有纵皱纹。总状花序于枝顶与叶对生，花小，棕褐色。蒴果近球形。气微，味淡。

【鉴别】 取本品粉末 2 g，加石油醚 10 ml，浸渍过夜，滤过，滤液置蒸发皿内，自然挥干，有特异的芳香气，加 1%香草醛的硫酸溶液，即显红色，放置变为蓝紫色。

【炮制】 除去杂质，洗净，切段，晒干。

【性味】 甘、辛，寒。

【功能与主治】 清热解毒，利尿消肿。用于尿路感染，肾炎水肿，白带；外治疮痈肿毒，皮肤湿疹。

【用法与用量】 15～30 g；外用鲜品适量，捣烂敷患处。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

三 棱

Sanleng

RHIZOMA SPARGANII

本品为黑三棱科植物黑三棱 Sparganium stoloniferum Buch.-Ham. 的干燥块茎。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

冬季至次春采挖，洗净，削去外皮，晒干。

【性状】 本品呈圆锥形，略扁，长 2～6 cm，直径 2～4 cm。表面黄白色或灰黄色，有刀削痕，小点状须根痕略呈横向环状排列。体重，质坚实。无臭，味淡，嚼之微有麻辣感。

以体重、质坚实、色黄白者为佳。

【鉴别】 本品横切面：皮层为通气组织，薄壁细胞分枝状，枝端彼此相连，形成大的细胞间隙；内皮层细胞排列紧密。中柱薄壁细胞类圆形，壁略厚，内含淀粉粒；维管束外韧型及周木型，散列，导管非木化。皮层及中柱均散有分泌细胞，内含棕红色分泌物。

【炮制】 三棱 除去杂质，浸泡，润透，切片，干燥。

醋三棱 取三棱片，照醋炒法（附录18页）用醋炒至黄色。

【性味】 苦，平。

【功能与主治】 破血，行气，消积，止痛。用于腹中胀痛，腹部肿块，肝脾肿大，血瘀经闭。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

三 颗 针

Sankezhen

RADIX BERBERIDIS

本品为小檗科植物拟豪猪刺 Berberis soulieana Schneid.、小黄连刺 Berberis wilsonae Hemsl.、细叶小檗 Berberis poiretii Schneid. 或匙叶小檗 Berberis vernae Schneid. 等同属数种植物的干燥根。春、秋二季采挖，除去泥沙及须根，晒干或切片晒干。

【性状】 本品呈类圆柱形，稍扭曲，有少数分歧，长 10～15 cm，直径 1～3 cm。根头粗大，向下渐细。外皮灰棕色，有细皱纹，易剥落。质坚硬，不易折断，断面不平坦，鲜黄色。切片近圆形或长圆形，稍显放射状纹理，髓部棕黄色。气微，味苦。

以色黄、苦味重者为佳。

【炮制】 除去杂质；未切片者，喷淋清水，润透，切片，晒干。

【性味】 苦，寒。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 清热燥湿，泻火解毒。用于痢疾，肠炎，黄疸，上呼吸道感染，急性中耳炎。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置干燥处。

干　　姜

Ganjiang

RHIZOMA ZINGIBERIS

本品为姜科植物姜 Zingiber officinale (Willd.) Rosc. 的干燥根茎。冬季采挖，除去须根及泥沙，晒干或低温干燥。

【性状】 本品呈不规则的块状，略扁，具指状分枝，长 3～7 cm，厚 1～2 cm。表面灰棕色或浅黄棕色，粗糙，具纵皱纹及明显的环节。分枝处常有鳞叶残存，分枝顶端有茎痕或芽。质坚实，断面黄白色或灰白色，显粉性和颗粒性，内皮层环纹明显，维管束散在，可见黄色油点。气香特异，味辛辣。

以质坚实、断面色黄白、粉性足、气味浓者为佳。

【炮制】 干姜　除去杂质，略泡，洗净，润透，切片，晒干。

炮姜　取干姜，分开大小或切块，照烫法（附录19页）用砂子炒至鼓起，筛去砂子，再炒至表面微黑色、内部棕黄色。

【性味】 辛，热。

【功能与主治】 温中祛寒，回阳通脉。用于肢冷脉微，脘腹胀满冷痛，恶心呕吐，痰饮喘咳。炮姜化瘀止血。用于虚寒吐血、便血，产后瘀血腹痛。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防蛀。

【制剂】 姜流浸膏

姜 流 浸 膏

Jiang Liujingao

EXTRACTUM ZINGIBERIS LIQUIDUM

本品含醚溶性物质不得少于 4.5%。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【处方】　干姜(最粗粉)　1000 g

乙醇(90%)　适量

【制法】 取干姜，照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法（附录11页），用90%乙醇作溶剂，浸渍24小时后，以每分钟1～3 ml的速度缓缓渗漉，收集初漉液850 ml，另器保存，继续渗漉至漉液接近无色、姜的香气和辣味已淡薄为止，停止渗漉，收集续漉液在60°以下浓缩至稠膏状，加入初漉液850 ml，混和，滤过，分取20 ml，依法测定含量，余液加90%乙醇稀释，使含量与乙醇量符合规定，静置，俟澄清，滤过，即得。

【性状】 本品为棕色的液体；有姜的香气，味辣。

【检查】 乙醇量　应为72～80%(附录48页第一法)。

其他　应符合流浸膏剂与浸膏剂项下有关的各项规定(附录11页)。

【含量测定】 精密量取本品20 ml，置水浴上蒸发，至乙醇全部挥散，放冷，加乙醚50 ml，用玻璃棒搅拌，使醚溶性物质溶解，倾取乙醚液，滤过，残液继续用乙醚提取2～3次，每次50 ml，滤过，合并乙醚液，低温回收乙醚，残渣置硫酸干燥器中干燥24小时，精密称定，即得供试量中含有醚溶性物质的重量。

【功能与主治】 健胃驱风药。

【用法与用量】 口服，一次0.5～2 ml，一日1.5～6 ml。

【贮藏】 密封保存。

【制剂】 姜酊

姜　　酊

Jiang Ding

TINCTURA ZINGIBERIS

【处方】　姜流浸膏　200 ml

乙醇(90%)　适量

【制法】 取姜流浸膏，加90%乙醇使成1000 ml，混合后，静置，滤过，即得。

【性状】 本品为淡黄色的液体；有姜的香气，味辣。

【检查】 乙醇量　应为80～88%(附录48页第一法)。

其他　应符合酊剂项下有关的各项规定(附录10页)。

【功能与主治】 健胃驱风药。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【用法与用量】 口服，一次 2～4 ml，一日 6～12 ml。

【贮藏】 密封保存。

土 贝 母

Tubeimu

RHIZOMA BOLBOSTEMMAE

本品为葫芦科植物土贝母 Bolbostemma paniculatum (Maxim.) Franquet 的干燥块茎。秋季采挖，洗净，掰开，煮至无白心，取出，晒干。

【性状】 本品为不规则的块状，大小不等。表面淡红棕色或暗棕色，凹凸不平。质坚硬，不易折断，断面角质样，光亮而平滑。气微，味微苦。

以质坚实、色淡红棕、断面角质样者为佳。

【性味】 苦，微寒。

【功能与主治】 散结，消肿，解毒。用于乳痈肿，颈淋巴结炎，淋巴结结核，乳腺炎，肥厚性鼻炎。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

土 荆 皮

Tujingpi

CORTEX PSEUDOLARICIS

本品为松科植物金钱松 Pseudolarix kaempferi Gord. 的干燥根皮或近根树皮。多于 5 月采收剥取，晒干。

【性状】 本品根皮呈不规则的长条状，扭曲而稍卷，大小不一，厚 2～5 mm。外表面灰黄色，粗糙，有皱纹及灰白色横向皮孔，粗皮常呈鳞片状剥落，剥落处红棕色。内表面黄棕色至红棕色，平坦，有细致的纵向纹理。质韧，折断面呈裂片状，可层层剥离。气微，味苦而涩。

小林网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

树皮呈板片状，厚约至 8 mm，粗皮较厚，表面龟裂状，内表面较粗糙。

【鉴别】 本品粉末淡棕色或棕红色。石细胞多，类长方形、类圆形或不规则分枝状，直径 30～96 μm，含黄棕色块状物。筛管大多成束，直径 20～40 μm，侧壁上有多数椭圆形筛域。粘液细胞类圆形，直径 100～300 μm。树脂细胞纵向连接成管状，含红棕色至黄棕色树脂状物，有时埋有草酸钙方晶。木栓细胞壁稍厚，有的木化，并有纹孔。

【炮制】 洗净，略润，切丝，晒干。

【性味】 辛，温；有毒。

【功能与主治】 祛湿止痒。外用于体癣，手足癣，神经性皮炎。

【用法与用量】 浸醋或酒涂擦或研末调敷。

【贮藏】 置干燥处。

土 茯 苓

Tufuling

RHIZOMA SMILACIS GLABRAE

本品为百合科植物光叶菝葜 Smilax glabra Roxb. 的干燥根茎。夏、秋二季采挖，除去须根，洗净，干燥，或趁鲜切成薄片，干燥。

【性状】 本品略呈圆柱形，稍扁或呈不规则条块，有结节状隆起，具短分枝，长5～22 cm，直径 2～5 cm；表面黄棕色或灰褐色，凹凸不平，有坚硬的须根残基，分枝顶端有圆形芽痕，有的外皮现不规则裂纹，并可见残留的鳞叶；质坚硬。切片呈长圆形或形状不规则，厚 1～5 mm，边缘不整齐；切面类白色至淡红棕色，有粉性，可见多数小亮点（粘液质）；质略韧，折断时有粉尘飞扬，以水湿润后有粘滑感。无臭，味微甘、涩。

以断面色淡棕、粉性足者为佳。

【鉴别】 本品粉末淡棕色。淀粉粒甚多，单粒类球形、多角形或类方形，直径 8～48 μm，脐点裂缝状、星状、三叉状或点状，大粒可见层纹；复粒由 2～4 粒组成。草酸钙针晶束存在于粘液细胞中或散在，针晶长 40～144 μm，直径约 5 μm。石细胞类椭圆形、类方形或三角形，直径 25～128 μm，孔沟细密；另有深棕色石细胞，长条形，直径约 50 μm，壁三面极厚，一面非薄。纤维成束或散在，直径 22～67 μm。具缘纹孔导管及管胞多见，具缘纹孔大多延长成梯状。

【炮制】 除去杂质；未切片者，浸泡，洗净，润透，切片，干燥。

【性味】 甘、淡，平。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 清热，除湿，解毒。用于钩端螺旋体病，关节酸痛，尿路感染，白带，疮疡。

【用法与用量】 15～60 g；用于钩端螺旋体病可达 250 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

土 党 参

Tudangshen

RADIX CAMPANUMOEAE

本品为桔梗科植物土党参 Campanumoea javanica Bl. 或小花土党参 Campanumoea javanica Bl. var. japonica Makino 的干燥根。秋、冬二季采挖，除去须根，晒至半干，洗净，晒干。

【性状】 本品呈圆柱形，多具四棱，稍弯曲，下部有分枝，长 8～20 cm，直径 1～2 cm。表面灰黄色，有不规则的纵皱纹及多数疙瘩状突起。质硬，易折断，断面颗粒状，类白色或黄白色。气微，味微甜。

以条粗、断面色类白者为佳。

【鉴别】 (1) 取本品 2 g，加水 10 ml，浸渍过夜，滤过。取滤液 1 ml，加碱性酒石酸铜试液 4～5 滴，置水浴中加热 5 分钟，发生棕红色沉淀。

(2) 取鉴别(1)项下剩余的滤液 1 ml，加 5%α-萘酚的乙醇溶液 2～3 滴，摇匀，沿管壁缓缓加入硫酸 0.5 ml，两液接界处显紫红色环。

【炮制】 除去杂质，洗净，稍润，切片，晒干。

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 健脾补肺。用于体倦乏力，肺虚咳嗽，脾虚腹泻，乳汁稀少。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防霉、防蛀。

土 鳖 虫（蛰虫）

Tubiechong

EUPOLYPHAGA SEU STELEOPHAGA

本品为鳖蠊科昆虫地鳖 Eupolyphaga sinensis Walk. 或冀地鳖 Steleophaga plancyi

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

(Bol.)的雌虫干燥体。夏、秋二季捕捉，置沸水中烫死，晒干或烘干。

【性状】 **地鳖** 呈扁平卵形，长 1.3～3 cm，宽 1.2～2.4 cm。前端较窄，后端较宽，背部紫褐色，具光泽，无翅。前胸背板较发达，盖住头部；腹背板 9 节，呈覆瓦状排列。腹面红棕色，头部较小，有丝状触角 1 对，常脱落。胸部有足 3 对，具细毛和刺。腹部有横环节。质松脆，易碎。气腥臭，味微咸。

冀地鳖 长 2.2～3.7 cm，宽 1.4～2.5 cm。背部黑棕色，通常在边缘带有淡黄褐色斑块及黑色小点。

均以完整、色紫褐者为佳。

【性味】 咸，寒；有小毒。

【功能与主治】 破瘀血，续筋骨。用于筋骨折伤，腹部肿块，经闭，瘀血腹痛。

【用法与用量】 3～9 g。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

大　头　陈

Datouchen

HERBA ADENOSMAE

本品为玄参科植物球花毛麝香 Adenosma indianum (Lour.) Merr. 的干燥全草。秋季花开时采挖，除去杂质，晒干。

【性状】 本品根呈须状，地上部分被毛。茎类方柱形，有分枝，长 15～60 cm，直径 0.1～0.3 cm；表面棕褐色或黑褐色，具细纵纹，节稍膨大。质稍韧，断面黄白色，中空。叶对生，有柄；叶片多脱落或皱缩、破碎，完整者展平后呈卵形或长卵圆形，长 1.5～6 cm，宽 0.5～1.5 cm；先端钝，基部宽楔形，边缘有钝齿。穗状花序顶生或腋生，呈球状或长圆状。花萼筒状 5 裂，花冠多脱落。气香，味辛凉、微苦。

以叶多、带花、香气浓者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，切段，晒干。

【性味】 辛，微温。

【功能与主治】 疏风解表，化湿消滞。用于风寒感冒，咳嗽，头痛，消化不良，腹胀泄泻。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【用法与用量】 15～30 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

大　血　藤

Daxueteng

CAULIS SARGENTODOXAE

本品为木通科植物大血藤 Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils. 的干燥藤茎。秋、冬二季采收，除去侧枝，截段，干燥。

【性状】 本品呈圆柱形，略弯曲，长 30～60 cm，直径 1～3 cm。表面灰棕色，粗糙，外皮常呈鳞片状剥落，剥落处显暗红棕色，有的可见膨大的节及略凹陷的枝痕或叶痕。质硬，断面皮部红棕色，有数处向内嵌入木部，木部黄白色，有多数细孔及红棕色放射状纹理。气微，味微涩。

【鉴别】 本品横切面：木栓层为多列细胞，含棕红色物。皮层石细胞常数个成群，有的含草酸钙方晶。维管束外韧型。韧皮部分泌细胞常切向排列，与筛管群相间隔；有少数石细胞群散在。束内形成层明显。木质部导管多单个散在，类圆形，直径约至 400 μm，周围有木纤维。射线宽广，外侧石细胞较多，有的含数个草酸钙方晶。髓部可见石细胞群。薄壁细胞含棕色或棕红色物。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。

【性味】 苦，平。

【功能与主治】 消炎，祛风活血。用于阑尾炎，四肢麻木、酸痛，经闭腹痛。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

大　红　袍

Dahongpao

RADIX CAMPYLOTROPIS HIRTELLAE

本品为豆科植物毛杭子梢 Campylotropis hirtella (Franch.) Schindl. 的干燥根。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

秋、冬二季采挖，除去泥沙，晒干。

【性状】 本品略呈圆柱形，稍弯曲，少分枝，长30～70 cm，直径0.5～3 cm。表面棕褐色或红褐色，粗糙，有细根或细根痕，常有黑褐色油脂状物。质硬而韧，不易折断，断面淡棕色，纤维性。气微，味微苦、涩。

【鉴别】 (1) 取本品，置小火上烘烤，皮部有棕红色油状物渗出，易点燃。

(2) 本品粉末淡红棕色。淀粉粒甚多，单粒多圆球形，脐点点状或线状，直径2～20 μm；复粒由2～3粒组成。纤维多，长约至2500 μm，无色或黄色，壁厚，其外常有含草酸钙柱晶的薄壁细胞。草酸钙柱晶长14～36 μm。薄壁细胞多含橙色物。木栓细胞多角形，含红棕色物。

(3) 取本品粉末5 g，加水50 ml，浸泡过夜，置约60°水浴中加热10分钟，滤过。取滤液1 ml，加氯化钠明胶试液1～2滴，发生白色沉淀；另取滤液1 ml，加1%三氯化铁溶液1～2滴，显蓝黑色。

【炮制】 除去杂质，喷淋清水，润透，切片，干燥。

【性味】 微苦、涩，温。

【功能与主治】 活血调经，止血，止痛。用于月经不调，痛经，崩漏，胃、十二指肠溃疡。

【用法与用量】 15～45 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

大豆黄卷

Dadouhuangjuan

SEMEN SOJAE GERMINATUM

本品为豆科植物大豆Glycine max (L.) Merr. 的成熟种子经发芽干燥而得。将大豆用水浸泡至膨胀，将水放出，用湿布覆盖，每日用清水冲洗一次，待芽长至0.5～1 cm时，摊开，晒干。

【性状】 本品略呈肾形，长约8 mm，宽约6 mm。表面黄色或黑色，微皱缩，一侧有明显的脐点；一端有1卷曲胚根。外皮质脆，多破裂或脱落。子叶2片，黄色。无臭，嚼之有豆腥味。

以粒大、饱满者为佳。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 利湿，解热。用于暑湿感冒，胸闷，肢体酸重，小便不利。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

大 皂 角

Dazaojiao

FRUCTUS GLEDITSIAE SINENSIS

本品为豆科植物皂荚Gleditsia sinensis Lam. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收，干燥。

【性状】 本品呈剑鞘状，有的略弯曲，长 15～40 cm，宽约 4 cm，厚 1～1.5 cm。表面红褐色或紫褐色，被灰色粉霜，擦去后有光泽，种子所在处隆起。两端略尖，基部多渐窄而弯曲，有短果梗或果梗痕，两侧有明显的纵棱线。质硬，摇之有声，破开后显黄色，种子多数，扁椭圆形，黄棕色，光滑。气微，有刺激性，味辛辣。

以肥厚、质硬、色紫褐者为佳。

【炮制】 除去杂质，用时捣碎。

【性味】 辛，温；有小毒。

【功能与主治】 开窍，祛痰，解毒。用于突然昏厥，中风牙关紧闭，喘咳痰壅，癫痫；外治痈疮肿毒。

【用法与用量】 1～1.5 g，多入丸散服；外用适量，研末吹鼻取嚏或调敷患处，或煎汤洗。

【注意】 孕妇及咯血、吐血患者忌服。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

大 青 叶

Daqingye

FOLIUM ISATIDIS

本品为十字花科植物菘蓝 Isatis tinctoria L. 的干燥叶。夏、秋二季分 2～3 次采

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

收，除去杂质，晒干。

【性状】 本品多皱缩卷曲，有的破碎。完整叶片展平后呈长椭圆形至长圆状倒披针形，长5～20 cm，宽2～6 cm；上表面暗灰绿色，有的可见色较深稍突起的小点；先端钝，全缘或微波状，基部狭窄下延至叶柄呈翼状。叶柄长4～10 cm，淡棕黄色。质脆。气微，味微酸、苦、涩。

以完整、色暗灰绿者为佳。

【鉴别】 本品粉末绿褐色。下表皮细胞垂周壁稍弯曲，略成连珠状增厚；气孔不等式，副卫细胞3～4个。叶肉断面栅栏组织与海绵组织无明显区分。

【炮制】 除去杂质，略洗，切碎，干燥。

【性味】 苦、咸，寒。

【功能与主治】 清热，解毒，凉血。用于温病发热，发斑发疹，风热感冒，咽喉肿痛，肺炎，腮腺炎，流行性脑脊髓膜炎，乙型脑炎，丹毒，痈肿。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防霉。

大　青　盐

Daqingyan

HALITUM

本品为立方晶系湖盐结晶，主含氯化钠。采收后沥尽母液，干燥。

【性状】 本品为立方体、八面体或菱形的结晶，有的为歪晶，直径0.5～1.5 cm。白色至灰白色，半透明，具玻璃样光泽。质硬，易砸碎，断面光亮。气微，味咸、微涩苦。

以色白、结晶整齐、洁净明亮者为佳。

【鉴别】 (1) 取本品粉末少量，置无色火焰中燃烧，火焰即呈亮黄色。

(2) 取本品水溶液，滴加硝酸银试液，即发生白色凝乳状沉淀。

【性味】 咸，寒。

【功能与主治】 清热凉血。用于目赤肿痛，吐血，衄血，牙龈肿痛出血。

【用法与用量】 1.5～4.5 g。

【注意】 肾脏病患者忌服。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【贮藏】 置干燥处，防潮。

大　　枣

Dazao

FRUCTUS ZIZIPHI JUJUBAE

本品为鼠李科植物枣 Ziziphus jujuba Mill. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收，晒干。

【性状】 本品呈椭圆形或圆形，长 2～3.5 cm，直径 1.5～2.5 cm。表面暗红色，略带光泽，有不规则皱纹。顶端有 1 小突点，基部凹陷，有短果梗。外果皮薄，中果皮棕黄色或淡褐色，肉质，柔软，富糖性而油润。果核纺锤形，两端锐尖，质坚硬。气微香，味甜。

以个大、色紫红、油润者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，晒干。

【性味】 甘，温。

【功能与主治】 补脾胃，调和诸药。用于脾虚食少，体倦乏力，紫癜。

【用法与用量】 6～15 g。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

大　　黄

Dahuang

RADIX ET RHIZOMA RHEI

本品为蓼科植物掌叶大黄 Rheum palmatum L.、唐古特大黄 Rheum tanguticum Maxim. ex Balf. 或药用大黄 Rheum officinale Baill. 的干燥根及根茎。秋末茎叶枯萎或次春发芽前采挖，除去细根，刮去外皮，切瓣或段，绳穿成串干燥或直接干燥。

【性状】 本品呈类圆柱形、圆锥形或不规则块状，长 3～17 cm，直径 3～10 cm。表面黄棕色至红棕色，有部分外皮残留，多具绳孔及粗皱纹，偶见“星点”(异型维管束)及

千金网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

网纹。质坚实，断面淡红棕色或黄棕色，根茎髓部宽广，有星点环列或散在，颗粒性；根木部发达，具放射状纹理及明显的环纹。气清香，味苦而微涩，嚼之粘牙，有沙粒感。

以质坚实、气清香、味苦而微涩者为佳。

【鉴别】（1）本品根的横切面：木栓层及皮层大多已除去，偶有残留。韧皮部筛管群明显；薄壁组织发达。形成层成环。木质部射线较密，宽 1～2 列细胞，内含棕色物；导管非木化，常 1 至数个相聚，稀疏排列。薄壁细胞含草酸钙簇晶，并含多数淀粉粒。

根茎髓部宽广，其中常见粘液腔，内有红棕色物；异型维管束散在，形成层成环，木质部位于形成层外方，韧皮部位于形成层内方，射线呈星状射出。

粉末黄棕色。草酸钙簇晶直径 40～140 μm，有的至 190 μm。具缘纹孔、网纹、螺纹及环纹导管非木化。淀粉粒甚多，单粒类球形或多角形，直径 2～25 μm，脐点星状；复粒由 2～8 粒组成。

（2）取本品粉末少量，进行微量升华，可见菱状针晶或羽状结晶。

（3）取本品粉末 0.1 g，加水 50 ml，置水浴上加热 30 分钟，滤过，滤液中加盐酸 2 滴，用乙醚提取 2 次，每次 20 ml，除去乙醚层，水层加盐酸 5 ml，置水浴中加热 30 分钟，冷后，再用乙醚 20 ml 提取，分取乙醚层，加碳酸氢钠试液 10 ml，振摇，水层显红色。

（4）取本品的稀乙醇浸出液，点于滤纸上，滴加稀乙醇扩散后，呈黄色至淡棕色环，置紫外光灯下观察，显棕色至棕红色荧光，不得显亮蓝紫色荧光。

【炮制】 **大黄** 除去杂质，洗净，润透，切厚片或小块，晒干。

酒大黄 取大黄片，照酒炒法（附录 18 页）用黄酒微炒。

每大黄 100 kg，用黄酒 10 kg。

熟大黄 取大黄小块或片，照酒炖法（附录 18 页）用黄酒炖至内外均呈黑色。

每大黄 100 kg，用黄酒 30～50 kg。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 泻实热，下积滞，行瘀，解毒。用于实热便秘，积滞腹痛，湿热黄疸，急性阑尾炎，不完全性肠梗阻，血瘀经闭，痈疖疔疮，化脓性皮肤病，烧、烫伤。

【用法与用量】 3～12 g，用于泻下不宜久煎；外用适量研末，油调敷患处。

【注意】 孕妇慎服。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

【制剂】 大黄流浸膏

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

大黄流浸膏

Dahuang Liujingao

EXTRACTUM RHEI LIQUIDUM

【处方】 大黄（最粗粉） 1000 g

乙醇（60%） 适量

【制法】 取大黄，照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法(附录11页)，用60%乙醇作溶剂，浸渍24小时后，以每分钟1～3 ml的速度缓缓渗漉，收集初漉液850 ml另器保存，继续渗漉，俟有效成份完全漉出，收集续漉液，浓缩至稠膏状，加入初漉液850 ml，混合后，再加60%乙醇稀释，使成1000 ml，静置，俟澄清，滤过，即得。

【性状】 本品为棕色的液体；味苦而涩。

【鉴别】 (1) 取本品1 ml，加氢氧化钠溶液(1→100)10 ml后，煮沸，放冷，滤过。取滤液2 ml，加稀盐酸数滴使显酸性，加乙醚10 ml，振摇，乙醚层显黄色，分取乙醚液，加氨试液5 ml，振摇，乙醚液仍显黄色，氨液层显持久的樱红色。

(2) 取本品1 ml，置瓷坩埚中，在水浴上蒸干后，坩埚上覆以载玻片，置石棉网上直火徐徐加热，至载玻片上呈现升华物后，取下载玻片，放冷，置显微镜下观察，有梭形针状、羽状和不规则晶体，滴加氢氧化钠试液，结晶溶解，溶液显紫红色。

【检查】 **异种大黄** 取本品适量，点于圆形层析滤纸上，以45%乙醇为展开剂，展开后，显淡棕色环，在紫外光灯下显棕色至红棕色荧光环带，不得显蓝色或紫色荧光环。

乙醇量 应为40～50%(附录48页第一法)。

总固体 取本品约1 g，置称定重量的蒸发皿中，精密称定，置水浴上蒸干后，在105°干燥3小时，移置干燥器中，冷却30分钟，迅速称定重量，即得。含总固体不得少于30.0%(g/g)。

其他 应符合流浸膏剂与浸膏剂项下有关的各项规定（附录11页）。

【功能与主治】 刺激性泻药，增强结肠的蠕动。用于便秘及健胃。

【用法与用量】 口服，一次0.5～1 ml，一日1～3 ml。

【贮藏】 密封保存。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

大　黄　药

Dahuangyao

HERBA ELSHOLTZIAE PENDULIFLORAE

本品系苗族习用药材，苗文名为 Mbat nchangt dok(板插多)；为唇形科植物大黄药 Elsholtzia penduliflora W. W. Sm. 的干燥地上部分。夏、秋二季采割，除去杂质，阴干。

【性状】 本品茎呈方柱形，长约 1 M；表面紫褐色，节稍膨大，幼枝疏被白柔毛；质脆，易折断，断面中部有髓。叶对生，有短柄；叶片多皱缩、破碎，完整者展平后呈披针形，长 7～18 cm，宽1.5～3 cm；先端渐尖，基部宽楔形或钝，边缘具细锯齿；上表面棕褐色，下表面黄棕色。轮伞花序排成假穗状，长 8～12 cm，顶生或腋生；花萼钟状，倒垂。小坚果倒卵形。气微香，味辛、凉。

以叶多、香气浓者为佳。

【炮制】 除去杂质，喷淋清水，润透，切段，阴干。

【性味】 辛，凉。

【功能与主治】 清热解毒，止咳。用于炭疽病，流感，肺炎，支气管炎，扁桃体炎，乳腺炎，尿路感染，外伤感染。

【用法与用量】 15～30 g；外用适量，煎汤洗或用鲜品捣烂敷患处。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

大　蒜

Dasuan

BULBUS ALLII

本品为百合科植物大蒜 Allium sativum L. 的鳞茎。夏季采收，除去泥沙，通风晾晒或烘烤至外皮干燥。

【性状】 本品呈类球形。多由 6～10 个肉质鳞茎瓣抱合而成，直径 3～6 cm。外包

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

白色或淡紫红色的膜质鳞皮。顶端略尖，中间有残留花葶，基部有多数须根或须根痕。鳞茎瓣略呈卵圆形，外皮膜质，先端略尖，一面弓状隆起，除去外皮，内白色，肉质。气特异，味辛辣。

以个大、肥厚、味辛辣者为佳。

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 抗菌消炎。用于防治感冒、菌痢、肠炎，阿米巴痢疾，痈肿疮疡。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

大　　蓟

Daji

HERBA SEU RADIX CIRSII JAPONICI

本品为菊科植物蓟 Cirsium japonicum DC. 的干燥地上部分或根。夏、秋二季花开时割取地上部分，或秋末挖根，除去杂质，晒干。

【性状】 **大蓟草** 茎呈圆柱形，基部直径可达 1.2 cm；表面绿褐色或棕褐色，有数条纵棱，被丝状毛；断面灰白色，髓部疏松或中空。叶皱缩，多破碎，完整叶片展平后呈倒披针形或倒卵状椭圆形，羽状深裂，边缘具不等长的针刺；上表面灰绿色或黄棕色，下表面色较浅，两面均具灰白色丝状毛。头状花序顶生，球形或椭圆形，总苞黄褐色，羽状冠毛灰白色。气微，味淡。

以色灰绿、叶多者为佳。

大蓟根 呈长纺锤形，常簇生而扭曲，长 5～15 cm，直径 0.2～0.6 cm。表面暗褐色，有不规则的纵皱纹。质硬而脆，易折断，断面粗糙，灰白色。气微，味甘、微苦。

以条粗、芦头短者为佳。

【鉴别】 本品根的横切面：表皮细胞壁木栓化，有时脱落。皮层较宽，紧靠内皮层处有类圆形分泌道，直径 80～130 μm，较密地排列成环；内皮层明显。韧皮部较窄。形成层断续成环。木质部射线较宽；导管少数，放射状排列，周围常伴有木纤维束。有髓。薄壁细胞含菊糖。

叶的表面观：上表皮细胞多角形；下表皮细胞类长方形，壁波状弯曲。气孔不定式或不等式，副卫细胞 3～5 个。非腺毛 4～18 细胞，顶端细胞细长而扭曲，直径约 7 μm，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

壁具交错的角质纹理。

【炮制】 **大蓟草** 洗净，润软，切段，晒干。

大蓟根 洗净，润透，切片，晒干。

大蓟炭 取大蓟段或片，照炒炭法(附录 19 页)炒至表面焦黑色。

【性味】 甘、苦，凉。

【功能与主治】 凉血止血，祛瘀消肿。用于衄血，吐血，便血，尿血，崩漏，痈肿疮疖。

【用法与用量】 9～15 g；外用鲜品适量，捣烂敷患处。

【贮藏】 置通风干燥处。

大　腹　皮

Dafupi

PERICARPIUM ARECAE

本品为棕榈科植物槟榔 Areca cathecu L. 的干燥果皮。冬季至次春采收未成熟的果实，煮后干燥，纵剖两瓣，剥取果皮，习称“大腹皮”；春末至秋初采收成熟果实，煮后干燥，剥取果皮，打松，晒干，习称“大腹毛”。

【性状】 **大腹皮** 略呈椭圆形或长卵形瓢状，长 4～7 cm，宽 2～3.5 cm，厚 0.2～0.5 cm。外皮深棕色至近黑色，具不规则的纵皱纹及隆起的横纹，顶端有花柱残痕，基部有果柄及残存萼片。内壁凹陷，褐色或深棕色，光滑呈硬壳状。体轻，质硬，可纵向撕裂，裂面呈棕毛状，黄白色或淡棕色。气微，味微涩。

以色深褐、皱皮结实者为佳。

大腹毛 呈乱丝团状，长 4～7 cm。黄白色或淡棕色，可见粘附的外果皮及内果皮碎片。体轻松，质柔韧。无臭，味淡。

以色黄白、质柔韧者为佳。

【炮制】 **大腹皮** 除去杂质，洗净，切段，干燥。

大腹毛 除去杂质，洗净，干燥。

【性味】 辛，微温。

【功能与主治】 下气，宽中，行水。用于脘腹胀满，水肿，小便不利。

【用法与用量】 4.5～9 g。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【贮藏】 置干燥处。

小 叶 莲

Xiaoyelian

FRUCTUS PODOPHYLLI

本品系藏族习用药材，藏文名为 ཨཻ་ཡེ་ཨཻ (奥勒·莫色)；为小檗科植物鬼臼 Podophyllum emodi Wall. var. chinensis Sprague 或藏鬼臼 Podophyllum emodi Wall. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采摘，除去杂质，干燥。

【性状】 本品呈椭圆形或近圆形，多压扁，长 3～5.5 cm，直径 2～4 cm。表面紫红色或紫褐色，皱缩，有的可见露出的种子。顶端稍尖，果梗黄棕色，多脱落。果皮与果肉粘连成薄片，易碎，内具多数种子。种子近卵形，长约 4 mm；表面红紫色，具细皱纹，一端有小突起；质硬。种仁白色，有油性。气微，味酸甜、涩；种子味苦。

以完整、色红紫、味酸甜者为佳。

【性味】 甘，平；有小毒。

【功能与主治】 调经活血。用于血瘀经闭，死胎、胎盘不下。

【用法与用量】 3～9 g，多入丸散服。

【贮藏】 置干燥处。

小 红 参

Xiaohongshen

RADIX RUBIAE YUNNANENSIS

本品为茜草科植物小红参 Rubia yunnanensis (Franch.) Diels 的干燥根及根茎。秋季采挖，除去泥沙，晒干。

【性状】 本品根茎略呈圆柱状，节密，长 0.5～2 cm，直径 0.3～0.8 cm，着生多数根。根呈圆柱形，长 10～25 cm，直径 0.2～0.5 cm，表面红棕色，有纵沟。质脆，易折断，断面皮部棕红色，易剥离，木部橙黄色。气微，味苦、涩、微甜。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

以条粗、断面色棕红者为佳。

【鉴别】 (1) 本品粉末红棕色。草酸钙针晶成束或散在，长 60～140 μm。具缘纹孔导管直径 25～60 μm。木纤维多碎断，直径约至 22 μm，壁厚，孔沟明显。

(2) 取本品粉末少量，置于间隙约 2 mm 的两玻片间，在酒精灯上缓缓加热，上玻片出现棕红色物，加氢氧化钠试液 1 滴，显红色，再加稀盐酸 1 滴，渐变棕黄色。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性味】 甘、微苦，温。

【功能与主治】 活血通经，镇静，止痛。用于月经不调，跌扑损伤，风寒湿痹，胃痛，心烦失眠。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置干燥处。

小　驳　骨

Xiaobogu

HERBA GENDARUSSAE

本品为爵床科植物小驳骨 Gendarussa vulgaris Nees 的干燥地上部分。全年均可采割，除去杂质，晒干。

【性状】 本品茎呈圆柱形，有分枝，长 40～90 cm，直径 0.3～0.6 cm；表面黄绿色，稍带紫绿色，有稀疏的黄色小皮孔，节膨大，嫩枝有细棱线；质脆，易折断，断面黄白色。叶对生，有柄；叶片多卷缩、破碎，完整者展平后呈狭披针形至条状披针形，长 5～17 cm，宽 0.5～3.5 cm；黄绿色，先端渐尖，基部渐狭，全缘，叶脉稍带紫色。穗状花序顶生或生于上部叶腋，棕黄色，苞片窄细，花冠二唇形。气微，味辛、酸。

以叶多、色绿者为佳。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性味】 辛、微酸，平。

【功能与主治】 活血祛瘀，续筋骨，祛风湿。用于骨折，跌扑扭伤，风湿痹痛。

【用法与用量】 15～30 g；外用适量，研末酒调敷患处。

【注意】 孕妇慎服。

【贮藏】 置干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

小　茴　香

Xiaohuixiang

FRUCTUS FOENICULI

本品为伞形科植物茴香 Foeniculum vulgare Mill. 的干燥成熟果实。秋季果实初熟时采割植株，晒干，打下果实，除去杂质。

【性状】 本品为双悬果，呈圆柱形，有的稍弯曲，长 4～8 mm，直径 1.5～2.5 mm。表面黄绿色或淡黄色，两端略尖，顶端残留有黄棕色突起的花柱基，基部有时带有细小的果梗。悬果瓣呈长椭圆形，背面有纵棱 5 条，接合面平坦而较宽。横切面略呈五边形，背面的四边约等长。有特异香气，味微甜、辛。

以色黄绿、气味浓者为佳。

【鉴别】 本品悬果瓣横切面：外果皮为 1 列扁平细胞，外被角质层。中果皮纵棱中部有维管束，其周围有多数木化网纹细胞；背面纵棱间各有大的椭圆形棕色油管 1 个，接合面有油管 2 个，共有 6 个。内果皮为 1 列扁平薄壁细胞，细胞长短不一。种皮细胞扁长，含棕色物。胚乳细胞多角形，含多数糊粉粒，每个糊粉粒中含有细小草酸钙簇晶。

【炮制】 小茴香　除去杂质。

盐小茴香　取净小茴香，照盐水炙法(附录 19 页)用盐水炒至微黄色。

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 祛寒止痛，理气和胃。用于胃寒胀痛，少腹冷痛，痛经，疝痛，睾丸肿痛，鞘膜积液，早期血吸虫病。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

小　通　草

Xiaotongcao

MEDULLA STACHYURI SEU HELWINGIAE

本品为旌节花科植物喜马山旌节花 Stachyurus himalaicus Hook. f. et Thoms.、中

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

国旌节花 Stachyurus chinensis Franch. 或山茱萸科植物青荚叶 Helwingia japonica (Thunb.) Dietr. 的干燥茎髓。秋季割取茎，截成段，趁鲜取出髓部，理直，晒干。

【性状】 旌节花 呈细圆柱形，长 30～50 cm，直径 0.5～1 cm。表面白色或淡黄色。体轻，质松软，捏之能变形，稍有弹性，易折断，断面平坦，显银白色光泽。水浸后有粘滑感。无臭，无味。

青荚叶 表面有浅纵条纹。质较硬，捏之不易变形。水浸后无粘滑感。

均以色白、无斑点者为佳。

【鉴别】 本品横切面：

旌节花 全为薄壁细胞，椭圆形或类圆形，纹孔稀疏；有粘液细胞散在。中国旌节花有少数草酸钙簇晶；喜马山旌节花无簇晶。

青荚叶 全为薄壁细胞，椭圆形、类圆形或多角形，纹孔较明显，含无色液滴，有少数簇晶；无粘液细胞。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性味】 甘、淡，寒。

【功能与主治】 清热，利尿，下乳。用于小便不利，尿路感染，乳汁不下。

【用法与用量】 2.5～4.5 g。

【贮藏】 置干燥处。

小 野 鸡 尾

Xiaoyejiwei

FOLIUM ONYCHII

本品为中国蕨科植物野鸡尾 Onychium japonicum (Thunb.) Kunze. 的干燥叶。夏、秋二季采收，除去根茎及根，晒干。

【性状】 本品叶柄细长，略呈方柱形。表面绿黄色至浅棕黄色，具纵沟。叶片卵圆状披针形或三角状披针形，浅黄绿色或棕褐色，略有光泽；三至五回羽状分裂，末回裂片梭形，先端短尖，全缘，有的下表面边缘生有孢子囊群，囊群盖短条形，浅棕色。叶片草质。无臭，味苦。

以色淡绿者为佳。

【炮制】 除去杂质，切段。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清热解毒。用于砷中毒，沙门氏菌所致食物中毒，野菰、木薯中毒，肠炎，痢疾，肝炎。

【用法与用量】 30～60 g；鲜品 120～240 g，捣烂冲服。

【贮藏】 置通风干燥处，防霉。

小　　蓟

Xiaoji

HERBA CEPHALANOPLORIS

本品为菊科植物刺儿菜 Cephalanoplos segetum (Bge.)Kitam. 或刻叶刺儿菜Cephalanoplos setosum (Willd.) Kitam. 的干燥地上部分。夏、秋二季花开时采割，除去杂质，晒干。

【性状】 本品茎呈圆柱形，近顶部有的有分枝，长 5～30 cm，直径 0.2～0.5 cm；表面绿色或带紫色，具纵棱及白色柔毛；质脆，易折断。叶互生，无柄；叶片皱缩或破碎，完整者展平后呈长椭圆形或长圆状披针形，长 3～12 cm，宽0.5～3 cm；全缘或微齿裂至羽状深裂，具针刺；上表面绿褐色，下表面灰绿色，两面均具白色柔毛。头状花序单个或数个生于茎顶；总苞钟状，苞片 5～8 层，黄绿色；花紫红色。气微，味微苦。

以叶多、色绿者为佳。

【鉴别】 本品叶的表面观：下表皮细胞垂周壁波状弯曲；气孔不定式。非腺毛 5～10 细胞，长至 2 mm 以上，细胞成竹节状排列，顶端细胞长而扭曲。叶肉组织中含草酸钙簇晶。

【炮制】 小蓟　除去杂质，洗净，稍润，切段，干燥。

小蓟炭　取小蓟段，照炒炭法(附录 19 页)炒至黑褐色。

【性味】 甘，凉。

【功能与主治】 凉血，止血，祛瘀。用于衄血鼻塞，尿血，崩漏；外治外伤出血。

【用法与用量】 4.5～9 g；外用鲜品适量，捣烂敷患处。

【贮藏】 置通风干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

山　芝　麻

Shanzhima

RADIX HELICTERIS

本品为梧桐科植物山芝麻 Helicteres angustifolia L. 的干燥根。夏、秋二季采挖，除去须根，洗净，截段，晒干。

【性状】 本品呈圆柱形，稍弯曲，长短不一，直径 0.3～1.5 cm。表面黑褐色、灰棕色或灰黄色，有不规则的纵皱纹及细根痕，部分外皮呈膜状脱落。质坚硬，不易折断，断面不平整，皮部浅棕色，纤维性，木部黄白色。气微，味苦。

以条粗、坚实、皮厚者为佳。

【鉴别】 本品横切面：木栓层为 20 余列细胞，有时含棕色物。皮层甚窄。韧皮部宽广，纤维束断续排列成环，纤维壁厚，微木化至木化；薄壁细胞常充满黄棕色物。形成层明显。木质部均木化，射线宽 1～5 列细胞；导管类圆形，直径 8～50 μm，多单个作放射状排列；木纤维发达。薄壁细胞含淀粉粒。皮层、韧皮部薄壁细胞含草酸钙簇晶。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清热解毒。用于感冒高热，扁桃体炎，咽喉炎，腮腺炎，皮肤湿疹。

【用法与用量】 9～15 g；外用适量，煎汤洗或研末敷患处。

【注意】 孕妇慎服。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

山　豆　根（广豆根）

Shandougen

RADIX SOPHORAE SUBPROSTRATAE

本品为豆科植物柔枝槐 Sophora subprostrata Chun et T. Chen 的干燥根及根茎。秋季采挖，除去杂质，洗净，干燥。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 本品根茎呈不规则的结节状，顶端常残存茎基，其下着生数条根。根呈长圆柱形，常有分枝，长短不等，直径 0.7～1.5 cm；表面棕色至棕褐色，有不规则的纵皱纹及突起的横向皮孔。质坚硬，难折断，断面皮部浅棕色，木部淡黄色。有豆腥气，味极苦。

以条粗壮、质坚硬者为佳。

【鉴别】 (1) 本品横切面：木栓层为数列至 10 数列细胞。皮层外侧的 1～2 列细胞含草酸钙方晶，断续形成含晶细胞环，含晶细胞的壁木化增厚。皮层与韧皮部均散有纤维束。形成层成环。木质部发达，射线宽 1～8 列细胞；导管类圆形，大多单个散在，或 2 至数个相聚，有的含黄棕色物；木纤维成束散在。薄壁细胞含淀粉粒，少数含方晶。

(2) 取 10 %氢氧化钠溶液滴于本品表皮，颜色由橙红色变为血红色，久置不褪。

(3) 取本品粉末约 2 g，加 70%乙醇 20 ml，加热回流半小时，滤过，滤液置水浴上蒸干，残渣加 1%盐酸溶液 5 ml 使溶解，滤过。取滤液 1 ml，加碘化汞钾试液 1 滴，发生明显的淡黄色沉淀。

【炮制】 除去残茎及杂质，浸泡，洗净，润透，切片，晒干。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清热解毒，消肿止痛。用于咽喉肿痛，肺热咳嗽，齿龈肿痛，痈疮，肿瘤。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置干燥处。

山　　柰

Shannai

RHIZOMA KAEMPFERIAE

本品为姜科植物山柰 Kaempferia galanga L. 的干燥根茎。冬季采挖，洗净，除去须根，切片，晒干。

【性状】 本品多为圆形或近圆形的横切片，直径 1～2 cm，厚 0.3～0.5 cm。外皮浅褐色或黄褐色，皱缩，有的有根痕或残存须根；切面类白色，富粉性，常鼓凸，习称“缩皮凸肉”。质脆，易折断。气香特异，味辛辣。

小小网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

以色白、粉性足、气味浓者为佳。

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 行气，温中，止痛。用于胸脘胀满，腹中冷痛。

【用法与用量】 6～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

山　茱　萸

Shanzhuyu

FRUCTUS CORNI

本品为山茱萸科植物山茱萸 Cornus officinalis Sieb. et Zucc. 的干燥成熟果肉。秋末冬初果皮变红时采收果实，用文火烘或置沸水中略烫后，及时除去果核，干燥。

【性状】 本品呈不规则的片状或囊状，长 1～1.5 cm，宽 0.5～1 cm。表面紫红色至紫黑色，皱缩，有光泽。顶端有的可见圆形的宿萼痕迹，基部有果梗痕。质柔软。气微，味酸、涩、微苦。

以肉厚、柔软、色紫红者为佳。

【鉴别】 本品粉末红褐色。果皮表皮细胞表面观多角形或类长方形，直径 16～30 μm，垂周壁连珠状增厚，外平周壁颗粒状角质增厚，胞腔含淡橙黄色物。中果皮组织橙棕色，细胞多皱缩。草酸钙簇晶较少见，直径 12～32 μm。石细胞类方形、卵圆形或长方形，纹孔明显，胞腔大。

【炮制】 山萸肉　除去杂质和残留果核。

制山茱萸　(1) 取山萸肉，照酒炖法(附录 18 页)炖至酒吸尽。

(2) 取山萸肉，照蒸法(附录 18 页)蒸 4～6 小时，焖 6～8 小时，使颜色紫黑。

【性味】 酸、涩，微温。

【功能与主治】 补肝肾，涩精，敛汗。用于耳鸣眩晕，腰膝酸软，自汗盗汗，小便频数，遗精，月经过多。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

山　　药

Shanyao

RHIZOMA DIOSCOREAE

本品为薯蓣科植物薯蓣 Dioscorea opposita Thunb. 的干燥根茎。冬季茎叶枯萎后采挖，切去芦头，洗净，除去外皮及须根，用硫黄熏后，干燥；也有选择肥大顺直的干燥山药，置清水中，浸至无干心，闷透，用硫黄熏后，用木板搓成圆柱状，切齐两端，晒干，打光，习称"光山药"。

【性状】 本品略呈圆柱形，弯曲而稍扁，长 15～30 cm，直径 1.5～6 cm。表面黄白色或淡黄色，有纵沟、纵皱纹及须根痕，偶有浅棕色外皮残留。质坚实，不易折断，断面白色，粉性，可见发亮的小点。无臭，味淡、微酸，嚼之发粘。光山药呈圆柱形，两端平齐，长 9～18 cm，直径 1.5～3 cm。表面光滑，白色或黄白色。

以条粗、质坚实、粉性足、色白者为佳。

【炮制】 山药　除去杂质，分开大小个，略泡，润透，切片，干燥。

炒山药　取山药片，照麸炒法(附录 18 页)炒至黄色。

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 补脾胃，益肺肾。用于脾虚腹泻，肺虚咳嗽，糖尿病，小便频数，遗精，白带。

【用法与用量】 9～18 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

山　栀　茶

Shanzhicha

RADIX PITTOSPORI

本品为海桐科植物莽草海桐 Pittosporum illicioides Makino 的干燥根。全年均可采挖，洗净，晒干，或趁鲜切片，晒干。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 本品呈圆柱形，具分枝，有的略扭曲，长 10～20 cm，直径 1～3 cm。表面灰黄色至黑褐色，顶端有茎基。质硬，不易折断，切面黄白色，可见环纹。气微，味微苦涩。

以条粗、皮厚者为佳。

【炮制】 除去杂质；未切片者，洗净，润透，切片，晒干。

【性味】 苦、辛，温。

【功能与主治】 镇静，降血压。用于神经衰弱，失眠多梦，高血压症。

【用法与用量】 15～30 g，泡酒或水煎服。

【贮藏】 置干燥处。

山　　楂

Shanzha

FRUCTUS CRATAEGI

本品为蔷薇科植物山里红 Crataegus pinnatifida Bge. var. major N. E. Br.、山楂 Crataegus pinnatifida Bge. 或野山楂 Crataegus cuneata Sieb. et Zucc. 的干燥成熟果实。前二种习称“北山楂”，后一种习称“南山楂”。秋季果实成熟时采收，北山楂切片，干燥；南山楂置沸水中略烫后干燥或直接干燥。

【性状】 **北山楂** 为圆形片，皱缩不平，直径 1～2.5 cm，厚 0.2～0.4 cm。外皮红色，具皱纹，有灰白色小斑点。果肉深黄色至浅棕色。中部横切片具 5 粒浅黄色果核，但核多脱落而中空。有的片上可见短而细的果梗或花萼残迹。气微清香，味酸、微甜。

以片大、皮红、肉厚者为佳。

南山楂 果实较小，类球形，直径 0.8～1.4 cm，有的压成饼状。表面棕色至棕红色，并有细密皱纹，顶端凹陷，有花萼残迹，基部有果梗或已脱落。质硬，果肉薄。无臭，味微酸涩。

以个匀、色棕红者为佳。

【炮制】 **山楂** 除去杂质及脱落的核。

炒山楂 取净山楂，照清炒法(附录 18 页)炒至色变深。

焦山楂 取净山楂，照炒焦法(附录 18 页)炒至外面焦褐色，内部黄褐色。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性味】 酸、甘，微温。

【功能与主治】 消食化积，散瘀。用于肉积停乳，脘腹胀满，痛经，产后瘀血腹痛，高血脂症。

【用法与用量】 6～12 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

山 蜡 梅 叶（毛山茶）

Shanlameiye

FOLIUM CHIMONANTHI NITENTIS

本品为蜡梅科植物山蜡梅 Chimonanthus nitens Oliv. 的干燥叶。夏、秋二季采收，干燥。

【性状】 本品呈椭圆形或狭椭圆形，长 5～15 cm，宽 3～6 cm。先端渐尖，基部楔形，上表面灰绿色至棕绿色，下表面色较浅，两面均较糙，触之有单向的粗糙感，具密布的透明腺点。主脉浅褐色，于下表面凸出。叶柄长 0.5～1 cm。叶片薄革质。气清香，味微苦而辛凉。

以完整、香气浓者为佳。

【鉴别】 (1) 本品横切面：上表皮细胞略扁平，外壁增厚，有时可见纹孔沟，并被角质层；下表皮细胞较小，外壁亦增厚，有气孔；上下表皮均有单细胞非腺毛，壁厚。栅栏组织由 2 列短柱状细胞组成；海绵组织中散有多数油细胞，直径 40～60 μm。主脉明显向下突出，维管束外韧型，外围有淀粉鞘，上下方有纤维束。

(2) 取本品粉末 0.5 g，加乙醇 5 ml，置水浴中加热 2 分钟，取上清液点于滤纸上，挥干，置紫外光灯下观察，显黄绿色或蓝色荧光，喷洒 1%三氯化铝的乙醇溶液后，荧光加强。

(3) 取本品粉末 2 g，加稀盐酸 20 ml，煮沸 5 分钟后滤过，滤液置分液漏斗中，加氨试液调节 pH 值至 8～9 后，用氯仿振摇提取。取氯仿液挥干，残渣加稀盐酸 1 ml 使溶解，加碘化铋钾试液，即发生橘红色沉淀。

【性味】 微苦、辛，凉。

【功能与主治】 解表祛风，清热解毒。用于防治感冒，流行性感冒。

【用法与用量】 18 g。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【贮藏】 置阴凉干燥处。

【制剂】 山蜡梅茶

山 蜡 梅 茶

Shanlamei Cha

SPECIES CHIMONANTHI NITENTIS

本品每块相当于山蜡梅叶 6.25 g。

【制法】 取山蜡梅叶，粉碎成粗粉，过筛，加适量粘合剂制成颗粒，压制成块，在60°以下干燥，即得。

【性状】 本品为褐色长方形小块；气香，味微苦。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：表皮细胞垂周壁波状弯曲，不均匀地增厚。非腺毛单细胞，长 35～240 μm，多弯曲，层纹明显。气孔平轴式。油细胞类圆形，直径 40～60 μm，含油滴。

(2) 取本品粉末，照山蜡梅叶项下的鉴别法 (2)、(3) 项 (50 页) 试验，显相同的反应。

【检查】 水分 照水分测定法项下甲苯法 (附录 15 页) 测定，不得过 5.0%。

【功能与主治】 同山蜡梅叶。

【用法与用量】 开水冲服，一次 1 块，一日 3 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

千 日 红

Qianrihong

FLOS GOMPHRENAE

本品为苋科植物千日红 Gomphrena globosa L. 的干燥头状花序。夏、秋二季花开时采收，晒干。

【性状】 本品呈类球形，由多数小花密集而成，直径 1.5～2 cm。基部常有叶状总

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

苞片2片，绿色，下表面密被细长柔毛。小花基部有膜质小苞片3片，外轮一片，卵形，内轮两片，三角状披针形，紫红色。花被5片，紫红色，外面密被白色细长柔毛。胞果类球形。气微，味淡。

以花序大、色紫红者为佳。

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 祛痰，平喘。用于慢性支气管炎，喘息性支气管炎。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置干燥处。

千　年　健

Qiannianjian

RHIZOMA HOMALOMENAE

本品为天南星科植物千年健 Homalomena occulta (Lour.) Schott 的干燥根茎。春、秋二季采挖，洗净，除去外皮，晒干。

【性状】 本品呈圆柱形，稍弯曲，有的略扁，长 15～40 cm，直径 0.8～1.5 cm。表面黄棕色至红棕色，粗糙，有多数扭曲的纵沟纹，可见突起的圆形根痕及黄色针状纤维束。质硬而脆，断面红褐色，黄色针状纤维束多而明显。气香，味辛、微苦。

以质硬、色红棕、香气浓者为佳。

【鉴别】 本品横切面：木栓细胞数列，棕色。基本组织中散有大的分泌腔，内含黄色至棕色分泌物；粘液细胞较大，内含草酸钙针晶束；草酸钙簇晶散在；维管束外韧型及周木型，散列，维管束旁常伴有纤维束，纤维壁较厚，木化。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，晒干。

【性味】 苦、辛，温。

【功能与主治】 祛风湿，健筋骨。用于风寒湿痹，腰膝冷痛，下肢拘挛麻木。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

千　里　光

Qianliguang

HERBA SENECIONIS SCANDENTIS

本品为菊科植物千里光 Senecio scandens Buch.-Ham. 的干燥地上部分。秋季枝叶茂盛、花将开放时采割，晒干。

【性状】 本品茎细长，稍折曲，上部有分枝，基部木质，长达 1 M 以上；表面灰绿色或紫褐色，具纵棱，密被灰白色柔毛。叶互生，多卷缩，展平后呈类三角形、卵圆形或卵状披针形，边缘有不规则锯齿、微波状或近全缘，有的深裂，两面有细柔毛。头状花序多数，排成伞房状，花黄色。气微，味苦。

以叶多、色绿者为佳。

【鉴别】 本品粉末淡棕褐色。花粉粒球形，直径 22～29 μm，表面有刺，长约 3 μm，有 3 个萌发孔。冠毛多碎断，边缘细胞先端突出成刺状。纤维成束，壁厚，木化。木薄壁细胞类长方形，壁稍厚，纹孔明显。非腺毛多细胞，常断裂，直径 10～50 μm，于叶片上较多见。

【炮制】 除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，晒干。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清热解毒，明目，止痒。用于风热感冒，目赤肿痛，泄泻痢疾，皮肤湿疹，疮疖。

【用法与用量】 15～30 g；外用适量，煎水熏洗。

【贮藏】 置干燥处。

【制剂】 千里光片

千　里　光　片

Qianliguang Pian

TABELLAE SENECIONIS SCANDENTIS

本品为千里光浸膏片。每片相当于千里光 2 g。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【制法】 取千里光 240 g，粉碎成细粉，过筛。另取千里光 1760 g，加水煎煮二次，每次 2 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至约 900 ml，加 85% 乙醇 900 ml，随加随即搅拌，混匀后，静置 12 小时以上，取上清液滤过，滤液浓缩成稠膏状，加上述千里光细粉，制成颗粒，压制成 1000 片，包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；味苦。

【鉴别】 取本品 2 片，除去糖衣，研细，加乙醇 10 ml，加热回流半小时，放冷，滤过，滤液置紫外光灯下观察，显黄色荧光；分取滤液 1 ml，加三氯化铁试液 1 滴，显黄褐色。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定（附录 6 页）。

【功能与主治】 抗菌消炎。用于菌痢，肠炎，结膜炎，上呼吸道感染。

【用法与用量】 口服，一次 4 片，一日 3 次。

【贮藏】 密封保存。

千　金　子

Qianjinzi

SEMEN EUPHORBIAE LATHYRIDIS

本品为大戟科植物续随子 Euphorbia lathyris L. 的干燥成熟种子。夏秋间果实成熟时采割地上部分，晒干，打下种子，再晒干，除去杂质。

【性状】 本品呈椭圆形或卵圆形，长 5～6 mm，直径约 4 mm。表面灰褐色，有网状皱纹，上有暗褐色的斑点。一端有黄白色种阜或种阜脱落后的圆形疤痕。一侧有纵沟状的种脊。种皮薄而脆，内表面灰白色，有光泽。种仁(胚乳)黄白色，富油性。无臭，味淡、后辛辣。

以粒饱满、种仁色白、油性足者为佳。

【炮制】 **千金子** 除去杂质，用时捣碎。

千金子霜 取净千金子，除去外壳，碾碎，压榨去油，碾细，过筛。

【性味】 辛，温；有毒。

【功能与主治】 行水消肿，破血散结。用于水肿，痰饮，积滞胀满，二便不通，血瘀经闭；外治顽癣，疣赘。

【用法与用量】 1～2 g，去壳、去油用，多入丸散服；外用适量，捣烂敷患处。

小林网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【注意】 孕妇及体弱便泻者忌服。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

川　木　香

Chuanmuxiang

RADIX VLADIMIRIAE

本品为菊科植物川木香 Vladimiria souliei (Franch.) Ling 或灰毛川木香 Vladimiria souliei (Franch.) Ling var. cinerea Ling 的干燥根。秋季采挖，除去须根、泥沙及根头上的胶状物，干燥。

【性状】 本品呈圆柱形或有纵槽的半圆柱形，稍弯曲，长 10～30 cm，直径 1～3 cm。表面黄褐色或棕褐色，具纵皱纹，外皮脱落处可见丝瓜络状细筋脉；根头偶有黑色发粘的胶状物，习称"油头"。体较轻，质硬而脆，易折断，断面黄白色或黄色，有深黄色稀疏油点及裂隙，木部宽广，有放射状纹理；有的中心呈枯朽状。气微香，味苦，嚼之粘牙。

以条粗、质硬、香气浓者为佳。

【鉴别】 本品横切面：木栓层为数列棕色细胞。韧皮部射线较宽；筛管群与纤维束以及木质部的导管群与纤维束均呈交互径向排列，组成整齐放射状。形成层环波状弯曲。纤维束黄色，木化，并伴有石细胞。有髓或已破裂。油室散在于射线及髓部薄壁组织中。薄壁细胞含菊糖。

【炮制】 除去杂质及"油头"，洗净，润透，切片，晒干。

【性味】 辛、苦，温。

【功能与主治】 行气，止痛，消胀。用于腹胀肠鸣，腹痛，痢疾里急后重。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

川　木　通

Chuanmutong

CAULIS CLEMATIDIS ARMANDII

本品为毛茛科植物小木通 Clematis armandii Franch. 或绣球藤 Clematis montana

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Buch.-Ham. 的干燥藤茎。春、秋二季采收，除去粗皮，晒干，或趁鲜切薄片，晒干。

【性状】 本品呈长圆柱形，略扭曲，长 50～100 cm，直径 2～3.5 cm。表面黄棕色或黄褐色，有纵向凹沟及棱线；节处多膨大，有叶痕及侧枝痕。残存皮部易撕裂。质坚硬，不易折断。切片厚 0.2～0.4 cm，边缘不整齐，残存皮部黄棕色，木部浅黄棕色或浅黄色，有黄白色放射状纹理及裂隙，其间布满小孔，髓部较小，类白色或黄棕色，偶有空腔。无臭，味淡。

以切面色黄白、无黑心者为佳。

【鉴别】 取本品粉末 1 g，置试管中，加乙醇 6～7 ml，浸泡 1 小时，置水浴中加热 3 分钟，放冷，滤过。取滤液 0.5 ml，置小瓷皿中，在水浴上蒸干，残渣加 2% 磷钼酸溶液 2 滴使溶解，滴加浓氨试液 1 滴，显蓝色。

【炮制】 未切片者，略泡，润透，切片，晒干。

【性味】 淡、微苦，微寒。

【功能与主治】 清热利尿，通利血脉。用于水肿，小便不利，尿路感染，关节酸痛，乳汁不通。

【用法与用量】 3～9 g。

【注意】 孕妇慎服。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮。

川　贝　母

Chuanbeimu

BULBUS FRITILLARIAE CIRRHOSAE

本品为百合科植物川贝母 Fritillaria cirrhosa D. Don、暗紫贝母 Fritillaria unibracteata Hsiao et K. C. Hsia、甘肃贝母 Fritillaria przewalskii Maxim. 或梭砂贝母 Fritillaria delavayi Franch. 的干燥鳞茎。前三者按性状不同分别习称“松贝”和“青贝”，后者习称“炉贝”。夏、秋二季或积雪融化时采挖，除去须根、粗皮及泥沙，晒干或低温干燥。

【性状】 松贝　呈类圆锥形或近球形，高 0.3～0.8 cm，直径 0.3～0.9 cm。表面类白色。外层鳞叶 2 瓣，大小悬殊，大瓣紧抱小瓣，未抱部分呈新月形，习称“怀中抱月”；顶部闭合，内有类圆柱形、顶端稍尖的心芽和小鳞叶 1～2 枚；先端钝圆或稍尖，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

底部平，微凹入，中心有1灰褐色的鳞茎盘，偶有残存须根。质硬而脆，断面白色，富粉性。气微，味微苦。

青贝 呈类扁球形，高0.4～1.4 cm，直径0.4～1.6 cm。外层鳞叶2瓣，大小相近，相对抱合，顶部开裂，内有心芽和小鳞叶2～3枚及细圆柱形的残茎。

炉贝 呈长圆锥形，高0.7～2.5 cm，直径0.5～2.5 cm。表面类白色或浅棕黄色，有的具棕色斑点。外层鳞叶2瓣，大小相近，顶部开裂而略尖，基部稍尖或较钝。

均以质坚实、粉性足、色白者为佳。

【鉴别】 本品粉末类白色。

松贝、青贝 淀粉粒甚多，广卵形、长圆形或不规则圆形，有的边缘不平整或略作分枝状，直径5～64 μm，脐点短缝状、点状、人字状或马蹄状，层纹隐约可见。表皮细胞类长方形，垂周壁微波状弯曲，偶见不定式气孔，圆形或扁圆形。螺纹导管直径5～26 μm。

炉贝 淀粉粒广卵形、贝壳形、肾形或椭圆形，直径约至60 μm；脐点人字状、星状或点状，层纹明显。螺纹及网纹导管直径可达64 μm。

【性味】 苦、甘，微寒。

【功能与主治】 润肺，止咳，化痰。用于阴虚燥咳，咯痰带血。

【用法与用量】 3～9 g，研末冲服。

【注意】 不宜与乌头类药材同用。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

川 牛 膝

Chuanniuxi

RADIX CYATHULAE

本品为苋科植物川牛膝 Cyathula officinalis Kuan 的干燥根。秋、冬二季采挖，除去芦头、须根及泥沙，炕或晒至半干，堆放回润，再炕或晒干。

【性状】 本品呈近圆柱形，微扭曲，向下略细或有少数分枝，长30～60 cm，直径0.5～3 cm。表面黄棕色或灰褐色，具纵皱纹和支根痕，有多数横向突起的皮孔。质韧，不易折断，断面浅黄色或棕黄色，可见多数浅黄色筋脉点（维管束），排列成数轮同心环。气微，味甜。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

以条粗壮、质柔韧、分枝少、断面色浅黄者为佳。

【炮制】 **川牛膝** 除去杂质及芦头，洗净，润透，切段或片，干燥。

酒牛膝 取川牛膝段或片，照酒炒法（附录 18 页）用黄酒炒至微干。

【性味】 甘、微苦，平。

【功能与主治】 活血祛瘀，通利关节。用于经闭，尿血，关节酸痛，跌扑损伤。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防潮。

川　　乌

Chuanwu

RADIX ACONITI

本品为毛茛科植物乌头 Aconitum carmichaeli Debx. 的干燥母根。6 月下旬至 8 月上旬采挖，除去子根、须根及泥沙，晒干。

【性状】 本品呈不规则的圆锥形，稍弯曲，顶端常有残茎，中部多向一侧膨大，长 2～7.5 cm，直径 1.2～2.5 cm。表面棕褐色或灰棕色，皱缩，有小瘤状侧根及摘离附子后的痕迹。质坚实，断面类白色或浅灰黄色，可见多角形的环纹（形成层）。气微，味辛辣、麻舌。

以饱满、质坚实、断面色白者为佳。

【鉴别】 （1）本品横切面：后生皮层为棕色木栓化细胞；皮层薄壁组织偶见石细胞，单个散在或数个成群，类长方形、方形或长椭圆形，胞腔较大；内皮层不甚明显。韧皮部散有筛管群；内侧偶见纤维束。形成层类多角形，其内外偶有 1 至数个异型维管束。木质部导管多为数列呈径向或略呈“V”形排列。髓部明显。薄壁细胞充满淀粉粒。

（2）取本品粉末约 0.1 g，加乙醇 5 ml，浸渍 1 小时，时时振摇，滤过，滤液置水浴上蒸干，残渣加 2%醋酸 2 ml，搅拌，滤过，滤液加碘化汞钾试液 2 滴，即发生黄白色沉淀。

（3）取本品粉末约 5 g，加乙醚 30 ml 与氨试液 3 ml，浸渍 1 小时，时时振摇，滤过。取滤液 6 ml，蒸干，残渣加 7%盐酸羟胺的甲醇溶液 10 滴与 0.1% 麝香草酚酞的甲醇溶液 2 滴，滴加氢氧化钾的甲醇饱和溶液至显蓝色后，再多加 4 滴，置水浴中加热 1 分钟，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

用冷水冷却，滴加稀盐酸调节 pH 值至 2～3，加 10%三氯化铁溶液 1～2 滴与氯仿 1 ml，振摇，上层液显紫色。

【炮制】 **制川乌** 取净川乌，大小个分开，用水或饱和的生石灰水浸泡至内无干心，取出，加水煮沸 4～6 小时，至取大个及实心者切开内无白心、口尝微有麻舌感时，取出，晾至六成干或闷润后切片，干燥。照下法试验，应符合规定：

取制川乌粗粉 20 g，置 250 ml 碘瓶中，加乙醚 150 ml，振摇 10 分钟，加氨试液 10 ml，振摇半小时，放置 1～2 小时，分取醚液，蒸干，加无水乙醇 2 ml 使溶解。照薄层层析法（附录 38 页）试验，吸取上述溶液 6 μl，点于碱性氧化铝薄层板上，以已烷-醋酸乙酯（1:1）为展开剂，展开后，喷洒碘化钾碘试液与碘化铋钾试液的等容混合液显色，用乌头碱 10 μg 作对照，在相同的位置上出现的斑点应小于对照的斑点或不出现斑点。

【性味】 辛、苦，热；有大毒。

【功能与主治】 祛风湿，散寒，止痛。用于风寒湿痹，肢体、关节冷痛，坐骨神经痛，腹中寒痛，跌扑剧痛。

【用法与用量】 3～9 g，一般炮炙后用，宜先煎、久煎；外用适量。

【注意】 孕妇忌服；生品内服宜慎。不宜与川贝母、浙贝母、半夏、白及、白蔹、天花粉、瓜蒌、犀角同用。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

川　　芎

Chuanxiong

RHIZOMA LIGUSTICI CHUANXIONG

本品为伞形科植物川芎 Ligusticum chuanxiong Hort. 的干燥根茎。夏季当茎上的节盘显著突出，并略带紫色时采挖，除去泥沙，晒后炕干，再去须根。

【性状】 本品为不规则结节状拳形团块，直径 2～7 cm。表面黄褐色，粗糙皱缩，有多数平行隆起的轮节，其顶端有凹陷的类圆形茎痕，下侧及轮节上有多数小瘤状根痕。质坚实，不易折断，断面黄白色或灰黄色，可见波状环纹或不规则多角形的纹理（形成层），散有黄棕色的小油点（油室）。气浓香，味苦辛，稍有麻舌感，微回甜。

以个大、质坚实、断面色黄白、油性大、香气浓者为佳。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【鉴别】 (1) 本品横切面：木栓层为10余列细胞。皮层狭窄，散有根迹维管束，其形成层明显。韧皮部宽广。形成层环成波状或不规则多角形。木质部导管多角形或类圆形，大多单列或排成“V”形，偶有木纤维束。髓部较大。薄壁组织中散有多数油室，类圆形、椭圆形或形状不规则，淡黄棕色，靠近形成层的油室小，向外渐大；薄壁细胞中富含淀粉粒。

(2) 取本品干燥细粉约1 g，加石油醚（沸程30～60°）5 ml，密闭，放置10小时，时时振摇，静置，取上清液1 ml，挥干后，残渣加甲醇1 ml使溶解，再加2%3，5-二硝基苯甲酸的甲醇溶液2～3滴与氢氧化钾的甲醇饱和溶液2滴，显红紫色。

【炮制】 除去杂质，分开大小，略泡，洗净，润透，切薄片，干燥。

【性味】 辛、微苦，温。

【功能与主治】 活血行气，祛风止痛。用于头痛，胸胁痛，经闭腹痛，风湿痛，跌扑损伤。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防蛀。

川　桐　皮

Chuantongpi

CORTEX KALOPANACIS

本品为五加科植物刺楸 Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz. 的干燥树皮。初夏剥取有钉刺的树皮，晒干。

【性状】 本品呈片状或微卷曲的不规则块片，厚0.6～1 cm。外表面黑褐色，粗糙，多呈不规则鳞片状裂纹，并有分布较密的钉刺；钉刺扁圆锥形，纵向着生，高约1 cm，顶尖，基部直径1～2 cm。内表面棕褐色，有斜网状的细条纹。质脆，易折断，断面略呈层片状，层间有白色粉霜。气香，味微辣而麻。

以皮薄、带钉刺、气香者为佳。

【炮制】 洗净，润透，切块，干燥。

【性味】 辛、微苦，平；有小毒。

【功能与主治】 祛风湿，通络，止痛。用于风湿性关节炎，腰膝酸痛；外治皮肤湿疹。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【用法与用量】 9～15 g；外用适量。

【贮藏】 置通风干燥处。

川 楝 子

Chuanlianzi

FRUCTUS MELIAE TOOSENDAN

本品为楝科植物川楝 Melia toosendan Sieb. et Zucc. 的干燥成熟果实。冬季果实成熟呈黄色时采收，除去杂质，干燥。

【性状】 本品呈类球形，直径 2～3.2 cm。表面金黄色至棕黄色，微有光泽，少数凹陷或皱缩，具深棕色小点。顶端有花柱残痕，基部凹陷有果梗痕。外果皮革质，与果肉间常成空隙，果肉松软，淡黄色，遇水润湿显粘性。果核球形或卵圆形，质坚硬，两端平截，有 6～8 条纵棱，内有黑棕色长圆形的种子 6～8 粒。气特异，味酸、苦。

以个大、饱满、外皮色金黄、果肉色黄白者为佳。

【炮制】 川楝子 除去杂质，用时捣碎。

炒川楝子 取净川楝子，照清炒法（附录 18 页）炒至外皮焦黄色，用时捣碎。

【性味】 苦，寒；有小毒。

【功能与主治】 疏肝，止痛，驱虫。用于胸、胁、腹痛，疝痛，蛔虫症。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

广 地 丁

Guangdiding

HERBA GENTIANAE LOUREIRI

本品为龙胆科植物华南龙胆 Gentiana loureiri (D. Don) Griseb. 的干燥全草。春季花开时采收，除去杂质，干燥。

【性状】 本品长 3～8 cm，地上部分被细柔毛，根短小。茎丛生，紫红色。叶交互对

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

生，多皱缩破碎，完整叶片展平后呈长椭圆形至倒卵状披针形，长 1～2 cm，宽 0.3～0.5 cm，先端尖，基部稍下延，全缘。花单生于茎顶，花萼 5 裂；花冠钟状，淡黄色或淡紫色，筒长 1.4～1.7 cm，先端 5 裂，裂片三角状卵形，其间有 5 皱褶，长约为裂片的 1/2。气微，味微苦。

【性味】 微苦，寒。

【功能与主治】 清解热毒。用于痈肿疮毒。

【用法与用量】 6～15 g。

【贮藏】 置干燥处。

广　防　己

Guangfangji

RADIX ARISTOLOCHIAE FANGCHI

本品为马兜铃科植物广防己 Aristolochia fangchi Y. C. Wu ex L. D. Chow et S. M. Hwang 的干燥根。秋、冬二季采挖，洗净，除去或不除去粗皮，切段，个大者再纵切，晒干。

【性状】 本品呈圆柱形或半圆柱形，略弯曲，长 6～18 cm，直径 1.5～4.5 cm。表面灰棕色，粗糙，有纵沟纹；除去粗皮的呈淡黄色，有刀刮的痕迹。体重，质坚实，不易折断，断面粉性，有灰棕色与类白色相间排列的放射状纹理。无臭，味苦。

以块大、质坚实、粉性足者为佳。

【鉴别】 本品横切面：木栓层为 10～15 列细胞。栓内层为 3～5 列细胞。石细胞环带与栓内层连接，其下有多列薄壁细胞。韧皮部射线宽广；筛管群皱缩；有少数石细胞散在。形成层环不甚明显。木质部射线宽 20～30 余列细胞；导管较大，直径 45～220 μm；木纤维束位于导管旁，纤维直径约 20 μm，壁较厚。薄壁细胞含少数草酸钙簇晶；并含淀粉粒。

【炮制】 除去杂质及粗皮，稍浸，洗净，润透，切片，干燥。

【性味】 苦、辛，寒。

【功能与主治】 祛风止痛，清热利水。用于关节红肿热痛，下肢浮肿，小便不利。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置干燥处，防霉、防蛀。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

广　　枣

Guangzao

FRUCTUS CHOEROSPONDIATIS

本品系蒙古族习用药材，蒙古文名为 ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ（吉如罕·芍沙）；为漆树科植物南酸枣 Choerospondias axillaris (Roxb.) Burtt et Hill 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收，除去杂质，干燥。

【性状】 本品呈椭圆形或近卵形，长 2～3 cm，直径 1.4～2 cm。表面黑褐色或棕褐色，稍有光泽，具不规则的皱褶；基部有果梗痕。果肉棕褐色。核近卵形，红棕色或黄棕色，顶端有 5 个（偶有 4 或 6 个）明显的小孔，质坚硬。种子 5 粒，长圆形。无臭，味酸。

以个大、肉厚、色黑褐者为佳。

【性味】 甘、酸，平。

【功能与主治】 行气活血，养心，安神。用于气滞血瘀，心区作痛，心跳气短，心神不安。

【用法与用量】 1.5～2.5 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

广 金 钱 草

Guangjinqiancao

HERBA DESMODII STYRACIFOLII

本品为豆科植物广金钱草 Desmodium styracifolium (Osb.) Merr. 的干燥地上部分。夏、秋二季采割，除去杂质，晒干。

【性状】 本品茎呈圆柱形，长可达 1 M，密被黄色伸展的短柔毛；质稍脆，断面中部有髓。叶互生，小叶 1～3 片，圆形或矩圆形，直径 2～5 cm；先端微凹，基部心形，全缘；上表面黄绿色或灰绿色，无毛，下表面具灰白色紧贴的绒毛，侧脉羽状；叶柄长

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

1～2 cm，托叶 1 对，披针形，长约 0.8 cm。气微香，味微甘。

以叶多、色绿者为佳。

【鉴别】（1）取本品粗粉 2 g，加水 30 ml，煮沸 10 分钟，滤过，滤液蒸干后，加乙醇 2 ml 使溶解，再加镁粉少量与盐酸 0.5 ml，即显红棕色。

（2）取本品粗粉 2 g，加含 1%盐酸的乙醇（70%）20 ml，置水浴上回流 10 分钟，滤过，滤液浓缩至乙醇挥尽，加水适量使溶解，滤过。取滤液分置二支试管中，每支各 1 ml，分别加碘化铋钾试液 2 滴或三硝基苯酚试液 2 滴，均发生黄色沉淀。

【炮制】除去杂质，洗净，切段，晒干。

【性味】甘、淡，微寒。

【功能与主治】清湿热，利尿，排石。用于尿路结石、感染，肾炎水肿，胆囊结石，黄疸型肝炎。

【用法与用量】15～60 g。

【贮藏】置干燥处。

【制剂】石淋通片

石 淋 通 片

Shilintong Pian

TABELLAE DESMODII STYRACIFOLII

本品为广金钱草浸膏片。每片含干浸膏 0.12 g。

【制法】取广金钱草，加水煎煮二次，每次 1.5 小时，合并煎液，滤过。滤液减压浓缩，加 85%乙醇 5 倍量，充分搅拌，静置 24 小时，滤过，滤液浓缩成稠膏状，干燥成干浸膏，加适量辅料，制成颗粒，压片，即得。

【性状】本品为棕褐色片；味苦。

【鉴别】（1）取本品粉末约 1 g，加乙醇 10 ml，温热 10 分钟，滤过，取滤液置白瓷皿中，加镁粉少量与盐酸数滴，即显红棕色。

（2）取本品粉末约 1 g，加含 1%盐酸的乙醇(70%)10 ml，温热 10 分钟，滤过，滤液浓缩至乙醇挥尽，加水适量使溶解，滤过。取滤液各 1 ml，分别加碘化铋钾试液 2 滴或三硝基苯酚试液 2 滴，均即发生黄色沉淀。

【检查】应符合片剂项下有关的各项规定（附录 6 页）。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 清湿热，利尿，排石。用于尿路结石，肾盂肾炎，胆囊炎。

【用法与用量】 口服，一次5片，一日3次。

【贮藏】 密闭保存。

广 藿 香

Guanghuoxiang

HERBA POGOSTEMONIS

本品为唇形科植物广藿香 Pogostemon cablin (Blanco) Benth. 的干燥地上部分。枝叶茂盛时采割，日晒夜闷，反复至干。

【性状】 本品茎略呈方柱形，多分枝，枝条稍曲折，长30～60 cm，直径0.2～0.7 cm；表面灰褐色、灰黄色或带红棕色，被柔毛，节间长3～13 cm；质脆，易折断，断面中部有髓；老茎类圆柱形，直径1～1.2 cm，被灰褐色栓皮。叶对生，皱缩成团，展平后叶片呈卵形或椭圆形，长4～9 cm，宽3～7 cm；灰绿色、灰褐色或浅棕褐色，两面均被灰白色茸毛；先端短尖或钝圆，基部楔形或钝圆，边缘具大小不规则的钝齿，叶柄细，长2～5 cm，被柔毛。气香特异，味微苦。

以叶多、香气浓者为佳。

【鉴别】 (1) 本品粉末淡棕色。叶的气孔直轴式。非腺毛1～6细胞，平直或尖端弯如钩状，长90～590 μm，壁具小刺状突起，胞腔含黄棕色物。腺毛头部单细胞，圆形或椭圆形，直径37～70 μm；柄单细胞。间隙腺毛存在于栅栏组织或薄壁组织的细胞间隙内，头部单细胞，不规则囊状，直径37～75 μm，长约120 μm；柄极短，1～2细胞。具缘纹孔导管端壁有显著的尾状突起。叶肉及薄壁细胞中有时可见细小草酸钙针晶。

(2) 取本品粉末10 g，加水约500 ml，直火蒸馏，先收集馏液150 ml为第一份蒸馏液，另器保存；再继续收集馏液150 ml为第二份蒸馏液。取第一份蒸馏液，用氯仿25 ml振摇提取，分取氯仿层，浓缩至1～2 ml，滴加5%溴的氯仿溶液数滴，先褪色，继渐显蓝紫色或墨绿色。取第二份蒸馏液，加饱和醋酸铜溶液2 ml，摇匀，加石油醚20 ml振摇提取，待分层后，弃去石油醚层；水层再加氯仿25 ml振摇提取，分取氯仿层，蒸干，残渣滴加乙醇0.5～1 ml，吸取乙醇液滴于载玻片上，挥干，必要时再滴加无水乙醇1～2滴，挥干，置显微镜下观察，可见浅灰蓝色针状结晶。此结晶溶于氯仿、苯、乙醇等，不溶于水、石油醚。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【炮制】 除去残根及杂质，先抖下叶筛净另放，茎洗净，润透，切段，晒干，再与叶混匀。

【性味】 辛，微温。

【功能与主治】 祛暑解表，化湿和胃。用于暑湿感冒，胸闷，腹痛吐泻。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防潮。

女　贞　子

Nüzhenzi

FRUCTUS LIGUSTRI LUCIDI

本品为木犀科植物女贞 Ligustrum lucidum Ait. 的干燥成熟果实。冬季果实成熟时采收，除去枝叶，稍蒸或置沸水中略烫后，干燥；或直接干燥。

【性状】 本品呈卵形、椭圆形或肾形，长 6～8.5 mm，直径 3.5～5.5 mm。表面黑紫色或灰黑色，皱缩不平，基部有果梗痕或具宿萼及短梗。体轻。外皮薄；果肉较松软，易剥离；果核黄棕色，具纵棱，破开后种子多 1 粒，似肾形，外皮紫黑色，里面灰白色，油性。无臭，味甘而微苦涩。

以粒大、饱满、色黑紫者为佳。

【鉴别】 取本品粗粉 1 g，加乙醇 3 ml，振摇 5 分钟，滤过，滤液置蒸发皿中，蒸干，残渣加醋酐 1 ml 使溶解，加硫酸 1 滴，先显桃红色，继变紫红色，最后呈污绿色；置紫外光灯下观察，显黄绿色荧光。

【炮制】 **女贞子** 除去杂质，洗净，干燥。

酒女贞子 取净女贞子，照酒炖法（附录 18 页）用黄酒炖至酒吸尽。

【性味】 甘、苦，微寒。

【功能与主治】 滋补肝肾。用于头眩，目昏，耳鸣，头发早白，腰膝酸软，慢性苯中毒白细胞减少。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

飞　扬　草

Feiyangcao

HERBA EUPHORBIAE HIRTAE

本品为大戟科植物飞扬草 Euphorbia hirta L. 的干燥全草。夏、秋二季采挖，洗净，晒干。

【性状】 本品长 15～50 cm，地上部分被长粗毛。根细长而弯曲。茎近圆柱形，直径 1～3 mm；表面黄褐色或浅棕红色；质脆，易折断，断面中空。叶对生，皱缩，展平后叶片椭圆状卵形或略近菱形，长 1～4 cm，宽 0.5～1.3 cm；绿褐色，先端急尖或钝，基部偏斜，边缘有细锯齿，有 3 条较明显的叶脉。杯状聚伞花序密集成头状，腋生。蒴果卵状三棱形。无臭，味淡、微涩。

以叶多、色绿者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，切段，晒干。

【性味】 微辛、酸，凉。

【功能与主治】 清热解毒，收敛止痒。用于肠炎，痢疾；外治皮炎，湿疹。

【用法与用量】 15～30 g；外用鲜品适量，捣烂敷或煎汤洗患处。

【贮藏】 置干燥处。

马　兰　草（鱼鳅串）

Malancao

HERBA KALIMERIDIS

本品为菊科植物马兰 Kalimeris indica (L.) Sch.-Bip. 的干燥全草。夏、秋二季采挖，除去杂质，晒干。

【性状】 本品长 8～55 cm。根茎圆柱形，多弯曲，着生多数浅棕黄色细根。茎类圆柱形，直径 1～3 mm；表面灰绿色或紫褐色，略具纵纹，断面中部有髓。叶互生，近无柄；叶片皱缩卷曲，多已破碎，完整者展平后呈椭圆形至披针形，长 1～7 cm，宽

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

0.5～2.5 cm，边缘有疏粗齿或羽状浅裂，茎上部小叶常全缘，叶缘及叶面被疏毛。头状花序顶生。气微，味淡。

【炮制】 除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，干燥。

【性味】 苦、辛，平。

【功能与主治】 理气，消食，清利湿热。用于胃脘胀痛，痢疾，水泻，尿路感染。

【用法与用量】 9～30 g。

【贮藏】 置干燥处。

马 尿 泡

Maniaopao

RADIX PRZEWALSKIAE TANGUTICAE

本品系藏族习用药材，藏文名为 ཐང་ཀཱ་དཀར་པོ （唐冲嘎薄）；为茄科植物马尿泡 Przewalskia tangutica Maxim. 的干燥根。秋末果实成熟后采挖，洗净，干燥。

【性状】 本品呈长圆柱形，稍弯曲，长 10～25 cm，直径 1.3～3 cm。表面暗棕色或淡棕黄色，顶端有数个圆柱状的茎基及少数叶柄痕，近根头部常有环纹。主根于根头下部或于离根头数厘米处常分为 2～3 枝，具细纵皱纹，并有多数明显横长的皮孔。质较硬，断面粗糙而疏松，类白色至黄白色，有放射状裂隙。气微，味苦。

以条粗、色淡棕黄者为佳。

【鉴别】 （1）本品粉末淡黄棕色。淀粉粒甚多，单粒圆形或椭圆形，直径 2～24 μm，脐点点状或裂缝状；复粒由 2～5 粒组成。薄壁细胞含草酸钙砂晶，直径 2～6 μm。木栓细胞多角形，棕黄色。网纹及具缘纹孔导管直径 20～104 μm。

（2）取本品粉末 0.5 g，置试管中，加乙醚 5 ml 与 10%氨溶液 2 滴，密塞，振摇，放置。吸取醚液少量，置载玻片上，挥干，加碘化钾碘试液 2 滴，2～3 分钟后，置显微镜下观察，可见红棕色蝶翅状结晶，长 16～26 μm。

（3）取本品粉末 1 g，加氨水湿润后，加氯仿浸渍。取氯仿液置紫外光灯下观察，显淡蓝紫色荧光。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。

【性味】 微苦，平；有毒。

【功能与主治】 镇痛，解痉，杀虫，消炎。用于胃肠痉挛疼痛，白喉，炭疽；外治

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

疮疡皮肤瘙痒。

【用法与用量】 多入丸散用；外用适量，研末冷开水调敷。

【注意】 本品有毒，慎用。

【贮藏】 置干燥处。

马 齿 苋

Machixian

HERBA PORTULACAE

本品为马齿苋科植物马齿苋 Portulaca oleracea L. 的干燥地上部分。夏、秋二季采收，除去残根及杂质，洗净，略蒸或烫后晒干。

【性状】 本品多皱缩卷曲，常结成团。茎圆柱形，长可达 30 cm，直径 0.1～0.2 cm；表面黄褐色，有明显纵沟纹。叶对生或互生，易破碎，完整叶片倒卵形，长 1～2.5 cm，宽 0.5～1.5 cm；绿褐色，先端钝平或微缺，全缘。花小，3～5 朵生于枝端，花瓣 5 片，黄色。蒴果圆锥形，长约 5 mm，内含多数细小种子。气微，味微酸。

【鉴别】 取本品粉末 2 g，加 5%盐酸的乙醇溶液 15 ml，加热回流 10 分钟，趁热滤过。取滤液 2 ml，加 3%碳酸钠溶液 1 ml，置水浴中加热 3 分钟后，在冰水中冷却，加新制的重氮对硝基苯胺试液 2 滴，显红色。

【炮制】 除去杂质，洗净，稍润，切段，晒干。

【性味】 酸，寒。

【功能与主治】 清热，解毒。用于痢疾，疔疮疖肿，虫蛇咬伤。

【用法与用量】 9～15 g；鲜品 30～150 g，捣汁服或煎服；外用鲜品适量，捣烂敷患处。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮。

马 勃

Mabo

LASIOSPHAERA SEU CALVATIA

本品为灰包科真菌脱皮马勃 Lasiosphaera fenzlii Reich.、大马勃 Calvatia gigantea

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

(Batsch ex Pers.) Lloyd 或紫色马勃 Calvatia lilacina (Mont. et Berk.) Lloyd 的干燥子实体。夏、秋二季子实体成熟时及时采收，除去泥沙，干燥。

【性状】 **脱皮马勃** 呈扁球形或类球形，无不孕基部，直径 15～20 cm。包被灰棕色至黄褐色，纸质，常破碎呈块片状，或已全部脱落。孢体灰褐色或浅褐色，紧密，有弹性，用手撕之，内有灰褐色棉絮状的丝状物。触之则孢子呈尘土样飞扬，手捻有细腻感。气似尘土，无味。

大马勃 不孕基部很小或无。残留的包被由黄棕色的膜状外包被和较厚的灰黄色的内包被所组成，光滑，质硬而脆，成块脱落。孢体浅青褐色，手捻有润滑感。

紫色马勃 呈陀螺形，或已压扁呈扁圆形，直径 5～12 cm，不孕基部发达。包被薄，两层，紫褐色，粗皱，有圆形凹陷，外翻，上部常裂成小块或已部分脱落。孢体紫色。

均以个大、皮薄、饱满、松泡有弹性者为佳。

【鉴别】 (1) 取本品置火焰上，轻轻抖动，即可见微细的火星飞扬，熄灭后，发生大量白色浓烟。

(2) **脱皮马勃** 粉末灰褐色。孢丝长，淡褐色，有分枝，相互交织，直径 2～4.5 μm，壁厚。孢子褐色，球形，直径 4.5～5 μm，有小刺，长 1.5～3 μm。

大马勃 粉末淡青褐色。孢丝稍分枝，有稀少横隔，直径 2.5～6 μm。孢子淡青黄色，光滑或有时具微细疣点，直径 3.5～5 μm。

紫色马勃 粉末灰紫色。孢丝分枝，有横隔，直径 2～5 μm，壁厚。孢子直径 4～5.5 μm，有小刺。

【炮制】 除去杂质，剪成小块。

【性味】 辛，平。

【功能与主治】 清热，利咽，止血。用于咽喉肿痛，咳嗽，音哑；外治鼻衄，外伤出血。

【用法与用量】 1.5～3 g；外用适量，敷患处。

【贮藏】 置干燥处，防尘。

马　钱　子（番木鳖）

Maqianzi

SEMEN STRYCHNI

本品为马钱子科植物云南马钱 Strychnos pierriana A. W. Hill 的干燥成熟种子。冬

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

季采收成熟果实，取出种子，晒干。

【性状】 本品呈扁椭圆形或扁圆形，直径 1.2～3.5 cm，厚 0.3～1 cm。表面密被灰黄色或浅灰棕色的绢状茸毛，自中间向四周呈辐射状排列，略有丝样光泽。边缘较中部微薄并向上翘，有 1 小疣状物；常一面隆起，一面稍凹下，其中一面近中心处有 1 突起的点状种脐。质坚硬，平行剖面可见淡黄白色或灰白色的胚乳，角质状，子叶卵形，上有微凸起的叶脉 3 条。无臭，味苦。

以饱满、质坚、色灰黄、有光泽者为佳。

【鉴别】 (1) 本品粉末灰黄色。非腺毛单细胞，多碎断，壁极厚，木化，基部膨大似石细胞。胚乳细胞多角形，壁厚，内含脂肪油及糊粉粒。

(2) 取本品干燥种子的胚乳部分作切片，加 1%钒酸铵的硫酸溶液 1 滴，胚乳即显紫色；另取胚乳切片，加发烟硝酸 1 滴，即显橙红色。

【含量测定】 取本品粉末（通过三号筛）约 7 g，精密称定，置碘瓶中，加乙醚 3 份与氯仿 1 份的混合液 60.0 g，摇匀，加浓氨试液 3 ml，称定重量，用力振摇 10 分钟，在 15°以下放置过夜，称定重量，补足浸渍过程中可能损失的溶剂量，振摇放置后，用脱脂棉滤过。取滤液 40.0 g，置锥形瓶中，加硫酸溶液(3→100)15 ml，轻轻旋摇，置水浴上加热至无乙醚、氯仿臭为止（加热时间勿过长），放冷，加硝酸与亚硝酸钠溶液（1→20）的等容混合液 3 ml，旋摇 10 分钟，放置 20 分钟，移入分液漏斗中，加氢氧化钠溶液（1→5）使成碱性，用氯仿分次振摇提取，第一次 20 ml，以后每次 10 ml，至士的宁提尽为止（用碘化铋钾试液检查），合并氯仿液，用水猛力振摇洗涤 2 次，每次 10 ml，分取氯仿液，置盛有无水硫酸钠 3 g 的锥形瓶中，缓缓振摇，放置 10 分钟，滤过，滤渣用氯仿洗涤至无生物碱反应为止，洗液与滤液合并，置水浴上蒸至近干（注意防止崩溅损失），精密加 $N/10$ 硫酸液 10 ml，置水浴上加热，除尽氯仿，放冷，加甲基红指示液 2 滴，用 $N/10$ 氢氧化钠液滴定剩余的酸液，按供试品量乘以 2/3 计算士的宁含量百分数，即得（每 1 ml 的 $N/10$ 硫酸液相当于 33.44 mg 的 $C_{21}H_{22}O_2N_2$）。

本品含士的宁($C_{21}H_{22}O_2N_2$)以干燥品计算，不得少于 1.15%。

【炮制】 制马钱子 取净马钱子，照烫法（附录 19 页）用砂子炒至鼓起并显棕褐色或深棕色。

马钱子粉 取制马钱子，粉碎成细粉，照上述含量测定的方法测定士的宁的含量后，加淀粉混合调节使士的宁的含量为 0.80%。

【性味】 苦，寒；有大毒。

【功能与主治】 通络，止痛，消肿。用于肢体软瘫，小儿麻痹后遗症，类风湿性关节痛，跌扑损伤，痈疽。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【用法与用量】 0.3～0.6 g，炮制后入丸散用。

【注意】 不宜多服、久服；孕妇忌服。

【贮藏】 置干燥处。

马 兜 铃

Madouling

FRUCTUS ARISTOLOCHIAE

本品为马兜铃科植物北马兜铃 Aristolochia contorta Bge. 或马兜铃 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc. 的干燥成熟果实。秋季果实由绿变黄时采收，干燥。

【性状】 本品呈卵圆形，长 3～7 cm，直径 2～4 cm。表面黄绿色、灰绿色或棕褐色，有纵棱线 12 条，由棱线分出多数横向平行的细脉纹。顶端平钝，基部有细梗。果皮轻而脆，易裂为 6 瓣，果梗也分裂为 6 条。果皮内表面平滑而带光泽，有较密的横向脉纹。果实分 6 室，每室种子多数，平叠整齐排列。种子扁平而薄，钝三角形或扇形，长 6～10 mm，宽 8～12 mm，边缘有翅，淡棕色。气特异，味微苦。

以完整、色黄绿、种子充实者为佳。

【鉴别】 取本品的乙醇浸出液，置紫外光灯下观察，显黄绿色荧光。

【炮制】 马兜铃 除去杂质，搓碎，筛去灰屑。

蜜马兜铃 取净马兜铃，照蜜炙法（附录 19 页）用蜜水炒至放凉后不粘手。

【性味】 苦、微辛，寒。

【功能与主治】 清肺祛痰，止咳平喘。用于肺热咳嗽，痰喘。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置干燥处。

马 兜 铃 藤（天仙藤）

Madoulingteng

HERBA ARISTOLOCHIAE

本品为马兜铃科植物马兜铃 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc. 或北马兜铃 Aristo-

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

lochia contorta Bge. 的干燥地上部分。秋季采割，除去杂质，晒干。

【性状】 本品茎呈细长圆柱形，略扭曲，直径 1～3 mm；表面黄绿色或淡黄褐色，有纵棱及节，节间不等长；质脆，易折断，断面有数个大小不等的维管束。叶互生，多皱缩、破碎，完整叶片展平后呈三角状狭卵形或三角状宽卵形，基部心形，暗绿色或淡黄褐色，基生叶脉明显，叶柄细长。气清香，味淡。

以带叶、色绿者为佳。

【鉴别】 本品茎的横切面：表皮细胞类方形，外被角质层。皮层较窄。中柱鞘纤维有 6～10 余层，连接成环带，外侧的纤维壁厚，内侧逐渐变薄。维管束数个，大小不等。形成层成环。导管类圆形，直径 10～170 μm。有髓部。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性味】 苦，温。

【功能与主治】 行气，利水，消肿。用于妊娠水肿，关节肿痛。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置干燥处，防霉。

马 槟 榔

Mabinglang

SEMEN CAPPARIS

本品为白花菜科植物马槟榔 Capparis masaikai Lévl. 的干燥成熟种子。冬季采收成熟果实，除去果壳及果肉，收集种子，干燥。

【性状】 本品呈不规则扁圆形，直径 1～2 cm。表面棕褐色，常有黑褐色果肉残留，边缘有凸出的种脐。外种皮质硬而脆，种仁黄白色，子叶交叉折叠，盘旋卷曲，如蜗牛状。气微，味微涩而甜。

以个大、饱满、种仁色黄白、味甜者为佳。

【鉴别】 (1) 取本品粉末 5 g，加水 50 ml，置水浴中温浸 1～2 小时，滤过。取滤液 2 ml，置带塞试管中，用力振摇 1 分钟，产生大量蜂窝状泡沫，放置 10 分钟，无明显消失。

(2) 取本品粉末 10 g，置玻璃塞锥形瓶中，加乙醚 50 ml，浸泡 2 小时，滤过。取滤液 2 ml，置玻璃皿上挥干，加无水硫酸钠少量共热，发生气泡并有刺激性臭气的白色气

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

体。

【炮制】 除去杂质，用时去壳取仁。

【性味】 苦、甘，寒。

【功能与主治】 清解热毒。用于热病咽喉肿痛，疮疡肿毒。

【用法与用量】 3～9 g，嚼细后冷开水送服。

【贮藏】 置干燥处。

马 鞭 草

Mabiancao

HERBA VERBENAE

本品为马鞭草科植物马鞭草 Verbena officinalis L. 的干燥地上部分。6～8月花正开时采割，除去杂质，晒干。

【性状】 本品茎呈方柱形，多分枝，四面均有纵沟，长 0.5～1 M；表面绿褐色，粗糙；质硬而脆，断面有髓或中空。叶对生，皱缩，绿褐色，展平后叶片 3 深裂，边缘有齿裂。穗状花序细长，有小花多数。无臭，味苦。

以色绿者为佳。

【炮制】 除去残根及杂质，洗净，稍润，切段，晒干。

【性味】 苦，微寒。

【功能与主治】 凉血，破血，消肿。用于水肿腹胀，痈肿，疮毒，经闭，腹部肿块。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 置干燥处。

王 不 留

Wangbuliu

SEMEN VACCARIAE

本品为石竹科植物麦蓝菜 Vaccaria segetalis (Neck.) Garcke 的干燥成熟种子。夏

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

季果实成熟、果皮尚未开裂时采割植株，晒干，打下种子，除去杂质，再晒干。

【性状】 本品呈球形，直径约 2 mm。表面黑色，少数红棕色，略有光泽，有细密颗粒状突起，一侧有 1 凹陷的纵沟。质硬，破开后可见胚乳白色，胚弯曲成环，子叶 2 片。无臭，味微涩苦。

以粒饱满、色黑者为佳。

【炮制】 除去杂质，照清炒法（附录 18 页）炒至大多数爆开白花。

【性味】 苦，平。

【功能与主治】 活血通经，下乳消肿。用于乳汁不下，血瘀经闭，痈肿。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【注意】 孕妇慎服。

【贮藏】 置干燥处。

天　　冬

Tiandong

RADIX ASPARAGI

本品为百合科植物天门冬 Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr. 的干燥块根。秋、冬二季采挖，洗净，除去根头和须根，置沸水中煮或蒸至透心，趁热除去外皮，洗净，干燥。

【性状】 本品呈长纺锤形或圆柱形，两端渐细，略弯曲，长 5～18 cm，直径 0.5～2 cm。表面黄白色至黄棕色，半透明，光滑或具细纵纹及纵沟，偶有残存的灰棕色外皮。对光照视，有 1 条不透明的细心。质硬或柔润，有粘性，断面角质样，中柱黄白色。气微，味甜、微苦。

以条粗壮、色黄白、半透明者为佳。

【鉴别】 本品横切面：根被有时残存，细胞壁波状。皮层宽广，外侧有多数石细胞断续排列成环；粘液细胞散在，内含草酸钙针晶束；内皮层明显。中柱韧皮部束与木质部束各 31～36 个，粗的约至 80 个，间隔排列，少数导管深入至髓部。髓部薄壁细胞亦含针晶束。

粉末黄白色。石细胞长方形、长条形、长椭圆形或类圆形，完整者长 85～460 μm，直径 32～110 μm，纹孔及孔沟极细密。草酸钙针晶成束或散在。长 40～99 μm。木薄壁

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

细胞长方形，有的一端倾斜，壁稍厚，纹孔大。具缘纹孔导管直径 18～110 μm。

【炮制】 除去杂质，迅速洗净，切段或切片，干燥。

【性味】 甘、苦，寒。

【功能与主治】 养阴润燥，清肺生津。用于咽干口渴，燥咳痰粘，咯血，百日咳，咽白喉，干燥性鼻炎。

【用法与用量】 6～12 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防霉。

天　花　粉

Tianhuafen

RADIX TRICHOSANTHIS

本品为葫芦科植物栝楼 Trichosanthes kirilowii Maxim. 或日本栝楼 Trichosanthes japonica Regel 的干燥根。秋、冬二季采挖，洗净，除去外皮，切段或纵剖成瓣，干燥。

【性状】 本品呈不规则圆柱形、纺锤形或瓣块状，长 8～16 cm，直径 1.5～5.5 cm。表面黄白色或淡棕黄色，有纵皱纹及略凹陷的横长皮孔。有的有黄棕色外皮残留。质坚实，断面白色或淡黄色，富粉性，横切面可见黄色小孔(导管)，略呈放射状排列，纵切面可见黄色筋脉纹。无臭，味微苦。

以色白、质坚实、粉性足者为佳。

【鉴别】 本品粉末类白色。淀粉粒甚多，单粒类球形、半圆形或盔帽形，直径 6～48 μm，脐点点状、短缝状或人字状，层纹隐约可见；复粒由 2～8 粒组成。具缘纹孔导管大，多破碎，有的具缘纹孔呈六角形或方形，排列紧密。石细胞黄绿色，长方形、椭圆形、类方形、多角形或纺锤形，直径 27～72 μm，壁较厚，纹孔细密。

【炮制】 略泡，润透，切片，干燥。

【性味】 甘、微苦，微寒。

【功能与主治】 生津止渴，排脓消肿。用于热病口渴，消渴，痈肿。

【用法与用量】 9～12 g。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

天　南　星

Tiannanxing

RHIZOMA ARISAEMATIS

本品为天南星科植物天南星 Arisaema consanguineum Schott、异叶天南星 Arisaema heterophyllum Bl. 或东北天南星 Arisaema amurense Maxim. 的干燥块茎。秋、冬二季茎叶枯萎时采挖，除去须根及外皮，干燥。

【性状】 本品呈扁球形，高 1～2 cm，直径1.5～6.5 cm。表面类白色或淡棕色，较光滑，有的皱缩，顶端有凹陷的茎痕，周围有麻点状根痕，有的块茎周边有球状侧芽。质坚硬，不易破碎，断面不平坦，色白，粉性，有的可见筋脉(维管束)。气微辛，味麻辣。

以个大、色白、粉性足者为佳。

【鉴别】 本品粉末淡黄白色。淀粉粒甚多，单粒类圆形、半圆形或椭圆形，直径 4～32 μm，脐点点状、裂缝状或星状，大粒层纹明显；复粒由 2～8 粒组成。草酸钙针晶成束或散在，长 20～90 μm。螺纹及环纹导管直径 8～60 μm。

【炮制】 **生天南星**　除去杂质，洗净，晒干。

制天南星　取净天南星，大小个分开，用水浸泡，每天换水 2～3 次，如起白沫时，每天南星 100 kg 加白矾 2 kg，泡一天后再换水，直至口尝微有麻辣感时，取出，与生姜片及白矾层层均匀铺入容器内，加水淹没，约 3～4 星期，倒入锅内煮至内无白心，取出，除去姜片，晾至六成干，润透后切片，晒干。

每天南星 100 kg，用生姜 25 kg、白矾 12.5～25 kg。

【性味】 苦、辛，温；有毒。

【功能与主治】 祛风定惊，化痰，散结。用于中风，口眼歪斜，半身不遂，癫痫，破伤风；生用外治痈肿。

【用法与用量】 一般炮制后用，3～9 g；外用生品适量。

【注意】 孕妇慎服。

【贮藏】 置通风干燥处，防霉、防蛀。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

天　　麻

Tianma

RHIZOMA GASTRODIAE

本品为兰科植物天麻 Gastrodia elata Bl. 的干燥块茎。冬季花茎枯萎至次年夏初花茎未出土或刚出土时采挖，趁鲜除去外皮，洗净，蒸透，低温干燥。

【性状】 本品呈长椭圆形，略扁，皱缩而稍弯曲，长 3～13 cm，宽 2～6 cm，厚 0.5～2 cm。顶端有残留茎基或红棕色干枯的芽，习称"鹦哥嘴"；末端有圆脐形疤痕。表面淡黄白色至淡黄棕色，略透明，有纵皱纹，有时可见多轮由点状斑痕组成的横环纹。质坚硬，不易折断，断面较平坦，黄白色至淡棕色，角质样。气微，味甘。

以个大、质坚实、色黄白、断面半透明无空心者为佳。

【鉴别】 (1) 本品横切面：表皮有时残存。基本组织外侧为数列厚壁细胞，有纹孔；薄壁组织中可见草酸钙针晶束；维管束周韧型及外韧型，散列，木质部导管 2 至数个，直径 8～30 μm，非木化。

粉末黄白色至淡棕黄色。厚壁细胞多角形或长多角形，直径 70～180 μm，壁较厚，微木化，纹孔明显。草酸钙针晶成束或散在，长 25～93 μm。螺纹、网纹及环纹导管直径 8～30 μm。含糊化多糖类物的组织碎片，遇碘液显棕色或淡棕紫色。

(2) 取本品粉末 1 g，加水 10 ml，浸渍 4 小时，随时振摇，滤过。滤液加碘试液 2～4 滴，显紫红色至酒红色。

(3) 取本品粉末 1 g，加 45% 乙醇 10 ml，浸渍 4 小时，随时振摇，滤过。滤液加硝酸汞溶液（取汞 1 份，加发烟硝酸 1 份溶解后，加水 2 份稀释制成）0.5 ml，加热，溶液显玫瑰红色，并发生黄色沉淀。

【炮制】 洗净，润透或蒸软，切片，干燥。

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 平肝熄风，祛风定惊。用于头晕目眩，肢体麻木，小儿惊风，癫痫，高血压病，耳源性眩晕。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

天　葵　子

Tiankuizi

RADIX SEMIAQUILEGIAE

本品为毛茛科植物天葵 Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino 的干燥块根。夏初采挖，洗净，干燥，除去须根。

【性状】 本品呈不规则短柱状、纺锤状或块状，略弯曲，长 1～3 cm，直径 0.5～1 cm。表面暗褐色至灰黑色，具不规则的皱纹及须根或须根痕。顶端常有茎叶残基，外被数层黄褐色鞘状鳞片；中部通常较膨大。质较软，易折断，断面皮部类白色，木部黄白色或黄棕色，略显放射状纹理。气微，味甘、微苦辛。

以个大、断面皮部色白者为佳。

【鉴别】 (1) 本品横切面：木栓层为多列细胞，含棕色物。皮层较窄。韧皮部宽广。形成层成环。木质部射线宽至 20 余列细胞，导管作放射状排列。有的可见细小髓部。

(2) 本品断面置紫外光灯下观察，显黄白色荧光，加酸或加碱后荧光不明显。

(3) 取本品 1 g，切碎，加稀盐酸 5 ml，浸泡 15 分钟，滤过。取滤液 1 ml，加碘化铋钾试液 1 滴，发生橘红色沉淀。

【炮制】 除去杂质，洗净，干燥。

【性味】 甘、苦，寒。

【功能与主治】 散结消肿，解毒。用于痈肿，乳腺炎，淋巴结结核，毒蛇咬伤。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

元　宝　草

Yuanbaocao

HERBA HYPERICI SAMPSONII

本品为金丝桃科植物元宝草 Hypericum sampsonii Hance 的干燥全草。夏、秋二

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

季采挖，除去泥沙，晒干。

【性状】 本品长 30～80 cm。根细圆柱形，稍弯曲，长 5～15 cm，淡棕色。茎圆柱形，直径 0.2～0.5 cm，表面棕黄色至深棕色，断面中空。叶对生，两叶基部完全合生，棕褐色，多皱缩破碎，完整者两叶长 7～13 cm，宽 0.5～2 cm，全缘，茎自中部贯穿，下表面有多数黑色腺点。聚伞花序，顶生，花小，黄色。蒴果卵圆形，种子细小，多数。气微，味淡。

以叶多、带花果者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切段，干燥。

【性味】 微苦、微辛，凉。

【功能与主治】 调经通络，止血，解毒。用于月经不调，跌扑损伤，风湿腰痛，吐血，咯血，痈肿，毒蛇咬伤。

【用法与用量】 9～15 g；外用适量。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 置干燥处。

元　　胡（延胡索）

Yuanhu

RHIZOMA CORYDALIS

本品为罂粟科植物延胡索 Corydalis turtschaninovii Bess. f. yanhusu Y. H. Chow et C. C. Hsü 的干燥块茎。夏初茎叶枯萎时采挖，除去须根，洗净，置沸水中煮至恰无白心时，取出，晒干。

【性状】 本品呈不规则的扁球形，直径 0.5～1.5 cm。表面黄色或黄褐色，有不规则网状皱纹。顶端有略凹陷的茎痕，底部常有疙瘩状凸起。质硬而脆，断面黄色，角质样，有蜡样光泽。气微，味苦。

以个大、饱满、质坚实、断面色黄者为佳。

【鉴别】 （1）本品粉末绿黄色。糊化淀粉粒团块淡黄色或近无色。下皮厚壁组织绿黄色，细胞多角形、类方形或长条形，壁稍弯曲，木化，有的成连珠状增厚，纹孔细密。石细胞淡黄色，类圆形或长圆形，直径约至 60 μm，壁较厚，纹孔细密。螺纹导管直径 16～32 μm。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

(2) 取本品粉末 2 g, 加 $N/2$ 硫酸液 20 ml, 振摇片刻，滤过。取滤液 2 ml, 加 1%铁氰化钾溶液 0.4 ml 与 1% 三氯化铁溶液 0.3 ml 的混合液，即显深绿色，渐变深蓝色，放置后底部有较多深蓝色沉淀。另取滤液 2 ml, 加重铬酸钾试液 1 滴，即发生黄色沉淀。

【炮制】 **元胡** 除去杂质，洗净，干燥，用时捣碎。

醋元胡 取净元胡，照醋蒸法（附录 19 页）用醋蒸透或照醋炒法（附录 18 页）炒干，用时捣碎。

【性味】 苦、微辛，温。

【功能与主治】 活血，利气，止痛。用于胸、胁、脘、腹疼痛，跌扑损伤，瘀血作痛，痛经，产后腹痛。

【用法与用量】 3～9 g。

【注意】 孕妇慎服。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

云　母　石

Yunmushi

MUSCOVITUM

本品为单斜晶系白云母的矿石，主含含水硅铝酸钾。采挖后，除去杂质。

【性状】 本品呈不规则片状，大小不一。无色或略带浅黄棕色、浅绿色、浅灰色，具珍珠样或玻璃样光泽。质韧，可层层剥离，薄片光滑透明，具弹性。气微，无味。

【炮制】 **云母石** 除去杂质。

煅云母石 取净云母石，照煅法（附录 19 页）煅至红透。

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 下气，补中，敛疮，止血。用于虚损气弱，眩晕；外治痈疽疮毒，金疮出血。

【用法与用量】 9～12 g；外用适量，研末涂敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

云　实　皮（倒挂牛）

Yunshipi

CORTEX CAESALPINIAE RADICIS

本品为豆科植物云实 Caesalpinia sepiaria Roxb. 的干燥根皮。秋末或春初采挖根部，除去泥沙，剥取根皮，晒干。

【性状】 本品呈卷筒状、槽状或板片状，长 3～10 cm，厚 0.2～0.5 cm。外表面灰褐色，较粗糙，具疣状突起及横长皮孔，有的有环纹；内表面浅灰棕色，具纵纹，偶有木部残留。质硬而脆，断面不平坦，棕黄色或淡紫褐色，可见色较浅的筋脉点（纤维束）。气微，味涩、微苦。

以条大、皮厚者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，晒干。

【性味】 辛、苦，微温。

【功能与主治】 解表散寒，止咳祛痰。用于防治感冒、支气管炎。

【用法与用量】 15～30 g。

【贮藏】 置干燥处。

木　瓜

Mugua

FRUCTUS CHAENOMELIS

本品为蔷薇科植物贴梗海棠 Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai 或木瓜 Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne 的干燥成熟果实。前者习称“皱皮木瓜”，后者习称“光皮木瓜”。夏、秋二季果实绿黄时采摘，皱皮木瓜置沸水中烫至外皮灰白色，对半纵剖后晒干；光皮木瓜纵剖成二或四瓣后再置沸水中烫后，晒干。

【性状】 **皱皮木瓜** 多呈纵剖对半的长圆形，长 4～9 cm，宽 2～5 cm，厚 1～2.5 cm。外表面紫红色或红棕色，有不规则的深皱纹；剖面边缘向内卷曲，果肉红棕色，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

中心部分凹陷，棕黄色。种子扁长三角形，多脱落，脱落处平滑光亮。质坚硬。气微清香，味酸。

光皮木瓜 多呈瓣状或条状，厚2～3.5 cm。外表面红棕色，平滑不皱；剖面平坦，果肉颗粒性。种子多数，密集。气微，味涩、微酸，嚼之有沙粒感。

均以质坚实、味酸者为佳。

【鉴别】 取本品粉末1 g，加70%乙醇10 ml，加热回流1小时，滤过，滤液照下述方法试验：

(1) 取滤液1 ml，蒸干，残渣加醋酐1 ml使溶解，倾入试管中，沿管壁加硫酸1～2滴，两液接界处显紫红色环；上层液显棕黄色（皱皮木瓜）或显污绿色（光皮木瓜）。

(2) 取滤液滴于滤纸上，待干，喷洒1%三氯化铝的乙醇溶液，干燥后，置紫外光灯下观察，皱皮木瓜显蓝色荧光，光皮木瓜显鲜黄色荧光。

【炮制】 洗净，润透或蒸透后切片，晒干。

【性味】 酸，温。

【功能与主治】 舒筋，化湿，和胃。用于腓肠肌痉挛，吐泻腹痛，风湿性关节痛，腰膝酸重。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防潮、防蛀。

木　　香

Muxiang

RADIX AUCKLANDIAE

本品为菊科植物木香 Aucklandia lappa Decne. 的干燥根。秋、冬二季采挖，除去泥沙及须根，切段，大的再纵剖成瓣，干燥后撞去粗皮。

【性状】 本品呈圆柱形或半圆柱形，长5～10 cm，直径0.5～5 cm。表面黄棕色至灰褐色，有明显的皱纹、纵沟及侧根痕。质坚，不易折断，断面灰褐色至暗褐色，周边灰黄色或浅棕黄色，有1色较深的环及放射状纹理，并可见散在的褐色油点。气香特异，味微苦。

以质坚实、油性足、香气浓者为佳。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【鉴别】（1）本品粉末黄绿色。菊糖多见，表面现放射状纹理。木纤维多成束，长梭形，直径16～24 μm，纹孔口横裂孔状、十字状或人字状。网纹导管多见，也有具缘纹孔导管，直径30～90 μm。油室碎片有时可见，内含黄色或棕色分泌物。

（2）取本品经70%乙醇浸软后的切片，加15%α-萘酚溶液与硫酸各1滴，即显紫色。

【炮制】除去杂质，洗净，闷透，切片，晾干。

【性味】辛、苦，温。

【功能与主治】行气止痛，温中和胃。用于胸腹胀痛，呕吐，腹泻，痢疾里急后重。

【用法与用量】1.5～4.5 g。

【贮藏】置干燥处，防潮。

木　贼

Muzei

HERBA EQUISETI HIEMALIS

本品为木贼科植物木贼 Equisetum hiemale L. 的干燥地上部分。夏、秋二季采割，除去杂质，晒干或阴干。

【性状】本品呈长管状，不分枝，长40～60 cm，直径约0.6 cm。表面灰绿色或黄绿色，有18～30条纵棱，粗糙，节明显，节间长2.5～9 cm，节上着生筒状鳞叶，叶鞘基部和鞘齿深棕色，中部淡黄色，可见棱上有多数细小光亮的疣状突起。质脆，易折断，断面中空，周边有多数圆形的小空腔，排列成环状。气微，味甘淡、微涩，嚼之有沙粒感。

以粗长、色绿、不脱节者为佳。

【炮制】除去枯茎及残根，喷淋清水，稍润，切段，干燥。

【性味】甘、微苦，平。

【功能与主治】散风热，退目翳。用于目赤肿痛，迎风流泪，角膜炎，角膜云翳。

【用法与用量】3～9 g。

【贮藏】置干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

木　棉　花

Mumianhua

FLOS GOSSAMPINI

本品为木棉科植物木棉 Gossampinus malabarica (DC.) Merr. 的干燥花。春季花盛开时采收，除去杂质，晒干。

【性状】 本品常皱缩成团。花萼厚，杯状，3或5浅裂，裂片钝圆形，反曲；外表面棕褐色，有细皱纹，内表面灰黄色，密被有光泽的绢毛。花瓣5片，椭圆状倒卵形或披针状椭圆形，长6～8 cm，宽2.5～3.5 cm；外表面灰褐色，密被短星状毛，内表面紫棕色，有疏毛。雄蕊多数，卷曲，花柱稍粗，略长于雄蕊。质脆，遇潮后变软。气微，味淡、微涩。

以朵大、完整、色鲜者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，干燥。

【性味】 甘、淡，凉。

【功能与主治】 清利湿热。用于泄泻，痢疾，痔疮出血。

【用法与用量】 6～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

木　腰　子（榼藤子）

Muyaozi

SEMEN ENTADAE

本品为豆科植物榼藤 Entada phaseoloides (L.) Merr. 的干燥成熟种子。秋、冬二季采收成熟果实，取出种子，晒干。

【性状】 本品呈扁圆形或扁椭圆形，直径4～6 cm，厚约1 cm。表面棕褐色至紫褐色，具光泽，有细密的网纹，有的被棕黄色细粉。种脐近圆形，微凹，种皮厚约1.5mm，种仁乳白色，子叶2片，每片厚3～4 mm。质坚硬。气微，味淡，嚼之有豆腥味。

以个大、饱满者为佳。

【炮制】 炒熟后去壳，研粉。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 解痉止痛。用于胃痛，痔痛。

【用法与用量】 研末口服，一次 1～3 g，一日 3 次。

【贮藏】 置干燥处。

木　槿　花

Mujinhua

FLOS HIBISCI

本品为锦葵科植物木槿 Hibiscus syriacus L. 的干燥花。夏季花初开放时采摘，晒干。

【性状】 本品皱缩成团，常留有短花梗，全体被毛，长 1.5～3 cm，宽 1～2 cm。苞片 6～7 片，条形。花萼钟状，黄绿色，先端 5 裂，裂片三角形。花冠类白色、黄白色或浅棕黄色，单瓣 5 片或重瓣 10 余片。雄蕊多数，花丝连合成筒状。气微香，味淡。

以朵大、完整、色白者为佳。

【鉴别】 本品粉末淡黄棕色。花粉粒球形，直径 105～160 μm，外壁有钝头锥形的刺，长 25～34 μm，具散孔。非腺毛有两种：星状毛及簇生毛有 2～14 个分枝，每分枝为单细胞，长约至 820 μm，木化，表面偶见螺状纹理；另一种非腺毛单细胞，长约至 1000 μm，微木化至木化。腺毛短棒状，长 80～150 μm，头部多细胞，柄单细胞。草酸钙簇晶较多，直径 15～37 μm。

【性味】 甘、淡，凉。

【功能与主治】 清湿热，凉血。用于痢疾，腹泻，痔疮出血，白带；外治疖肿。

【用法与用量】 3～9 g；外用鲜品适量，捣烂敷患处。

【贮藏】 置通风干燥处，防压、防蛀。

木　蝴　蝶

Muhudie

SEMEN OROXYLI

本品为紫葳科植物木蝴蝶 Oroxylum indicum (L.) Vent. 的干燥成熟种子。秋、

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

冬二季采收呈褐色的果实，曝晒至果实开裂，取出种子，晒干。

【性状】 本品为蝶形薄片，种皮三面延长成宽大菲薄的翅。长 5～8 cm，宽 3.5～4.5 cm。表面浅黄白色，翅半透明，有绢丝样光泽，上有放射状纹理，边缘多破裂。体轻，剖开后，子叶 2 片，蝶形，黄绿色或黄色，长径 1～1.5 cm。无臭，味微苦。

以色白、柔软、有光泽者为佳。

【性味】 微甘、苦，凉。

【功能与主治】 润肺，疏肝，和胃。用于咽喉炎，肺热咳嗽，胁痛，胃痛。

【用法与用量】 1.5～3 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

木　鳖　子

Mubiezi

SEMEN MOMORDICAE

本品为葫芦科植物木鳖 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. 的干燥成熟种子。冬季采收成熟果实，剖开，晒至半干，除去果肉，取出种子，干燥。

【性状】 本品呈扁平圆板状，中间稍隆起或微凹下，形似鳖，长 2～4 cm，宽 1.5～3.5 cm，厚 0.4～0.6 cm。表面灰棕色至黑褐色，有网状花纹，周边有粗齿状的纵楞突起，其中有 1 浅灰色种脐凹点。外壳（外种皮）质硬而脆，破开后，内种皮薄膜状，灰绿色，绒毛样。除去薄膜，可见肥大子叶 2 片，黄白色，富油性。有特殊的油腻气，味苦。

以饱满、外壳无破裂、种仁色黄白者为佳。

【鉴别】 (1) 本品粉末黄灰色。厚壁细胞椭圆形或类圆形，边缘波状，直径 51～117 μm，壁厚，木化，胞腔明显，有的狭窄。子叶薄壁细胞多角形，内含脂肪油块及糊粉粒；脂肪油块类圆形，直径 27～73 μm，表面可见网状纹理。

(2) 取本品粗粉 2 g，加乙醚 20 ml，温浸半小时，滤过。取醚液 2 ml，置玻璃皿中，挥尽乙醚，残渣加无水硫酸钠少量，直接加热，发生气泡及具刺激性的浓白色气体。

(3) 取本品粗粉 2 g，加水 20 ml，置水浴中加热半小时，滤过。取带塞试管二支，各加滤液 1 ml，一管加 5%氢氧化钠溶液 2 ml，另管加 5%盐酸溶液 2 ml，密塞，用力振摇 1 分钟，两管产生高度相近的大量蜂窝状泡沫。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【炮制】 木鳖子　去壳取仁，捣碎。

木鳖子霜　取净仁，炒热，研末，用纸包裹，加压去油。

【性味】 苦、微甘，温；有毒。

【功能与主治】 消肿散结。用于痈疮肿毒，颈淋巴结结核，乳腺炎。

【用法与用量】 0.9～1.2 g；外用适量，研末醋调敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

五　加　皮

Wujiapi

CORTEX ACANTHOPANACIS RADICIS

本品为五加科植物细柱五加 Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith 的干燥根皮。夏、秋二季采挖根部，洗净，剥取根皮，晒干。

【性状】 本品呈不规则卷筒状，长 5～15 cm，直径 0.4～1.4 cm，厚约 0.2 cm。外表面灰褐色，有稍扭曲的纵皱纹及横长皮孔。内表面淡黄色或灰黄色，有细纵纹。体轻，质脆，易折断，断面不整齐，灰白色。气微香，味微辣而苦。

以肉厚、气香、断面色灰白者为佳。

【鉴别】 本品横切面：木栓层为数列细胞。皮层窄，有少数分泌道散在。韧皮部宽广，外侧有裂隙，射线宽 1～5 列细胞；分泌道较多，周围分泌细胞 4～11 个。薄壁细胞含草酸钙簇晶及细小淀粉粒。

粉末灰白色。草酸钙簇晶直径 8～64 μm，有时含晶细胞连接，簇晶排列成行。木栓细胞长方形或多角形，壁薄；老根皮的木栓细胞有时壁不均匀增厚，有少数纹孔。分泌道碎片含无色或淡黄色分泌物。淀粉粒甚多，单粒多角形或类球形，直径 2～8 μm；复粒由 2 至数十粒组成。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，晒干。

【性味】 辛、苦，温。

【功能与主治】 祛风湿，强筋骨，益气。用于风寒湿痹，关节酸痛，四肢拘挛，腰膝软弱，小儿行迟，体虚乏力。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置干燥处，防霉、防蛀。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

五　灵　脂

Wulingzhi

FAECES TROGOPTERORUM

本品为鼯鼠科动物复齿鼯鼠 Trogopterus xanthipes Milne-Edwards 的干燥粪便。全年均可采收，除去杂质，晒干。根据外形的不同常分为"灵脂块"及"灵脂米"。

【性状】 **灵脂块**　呈不规则的块状，大小不一。表面黑棕色、红棕色或灰棕色，凹凸不平，有油润性光泽。粘附的颗粒呈长椭圆形，表面常裂碎，显纤维性。质硬，断面黄棕色或棕褐色，不平坦，有的可见颗粒，间或有黄棕色树脂状物质。气腥臭。

以色黑棕、有油润性光泽者为佳。

灵脂米　为长椭圆形颗粒，长 5～15 mm，直径 3～6 mm。表面黑棕色、红棕色或灰棕色，较平滑或微粗糙，常可见淡黄色的纤维残痕，有的略具光泽。体轻，质松，易折断，断面黄绿色或黄褐色，不平坦，纤维性。气微。

以体轻、色黑棕、断面色黄绿者为佳。

【炮制】 **五灵脂**　除去杂质，块状者砸成小块。

醋五灵脂　取净五灵脂，照醋炒法（附录 18 页）用醋炒至微干。

【性味】 苦，温。

【功能与主治】 活血，散瘀，止痛。用于胸痛，脘腹疼痛，痛经，经闭，产后血瘀疼痛。跌扑损伤，蛇虫咬伤。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【注意】 孕妇慎服。

【贮藏】 置干燥处。

五　味　子

Wuweizi

FRUCTUS SCHISANDRAE

本品为木兰科植物五味子 Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. 或华中五味子 Schi-

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

sandra sphenanthera Rehd. et Wils. 的干燥成熟果实。前者习称"北五味子"，后者习称"南五味子"。秋季果实成熟时采摘，晒干或蒸后晒干，除去果梗及杂质。

【性状】 **北五味子** 呈不规则的球形或扁球形，直径 5～8 mm。表面红色、紫红色或暗红色，皱缩，显油润，果肉柔软。种子 1～2 粒，肾形，表面棕黄色，有光泽，种皮薄而脆。果肉气微，味酸；种子破碎后，有香气，味辛、微苦。

南五味子 粒较小。表面棕红色至暗棕色，干瘪，皱缩，果肉常紧贴种子上。

均以粒大、肉厚者为佳。

【鉴别】 取本品粗粉约 1 g，加水 10 ml，浸渍 10 分钟，时时振摇，滤过，滤液浓缩至 2～3 ml，加 5 倍量乙醇，强烈振摇 5 分钟左右，滤过，滤液挥去乙醇，加水稀释至 10 ml，加活性炭少量，振摇后滤过。取滤液 2 ml，加氢氧化钠试液中和后，加硫酸汞试液 1 滴，煮沸，滤过，滤液加高锰酸钾试液 1 滴，紫红色即消失，并发生白色沉淀。

【炮制】 **五味子** 除去杂质。

醋五味子 取净五味子，照醋蒸法（附录 19 页）用醋蒸至黑色。

【性味】 酸，温。

【功能与主治】 敛肺，滋肾，生津，止泻。用于肺虚喘嗽，津亏口渴，自汗，盗汗，慢性腹泻，神经衰弱。

【用法与用量】 1.5～6 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防霉。

五 指 毛 桃

Wuzhimaotao

RADIX FICI SIMPLICISSIMAE

本品为桑科植物五指毛桃 Ficus simplicissima Lour. 的干燥根。全年均可采挖，除去须根，洗净，切片，晒干。

【性状】 本品为不规则的块片，直径 0.5～3 cm。外皮红褐色或灰棕色，有纵皱纹、须根痕及横向细小皮孔；有的外皮脱落，脱落处黄白色；质硬。切面皮部易撕裂，纤维性；木部黄白色，有较密的同心性环纹。气微香，味甘。

以皮厚、气香者为佳。

【鉴别】 本品横切面：木栓层为 10 余列细胞。皮层窄，石细胞群排列成环，少数

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

散离；薄壁细胞含草酸钙方晶。韧皮部宽广，有少数乳汁细胞；纤维甚多，单个或成束，壁极厚，非木化；有石细胞及方晶。形成层环明显。木质部射线宽 1～3 列细胞；导管类圆形，直径 30～200 μm，单个散在或数个相聚，木纤维束与木薄壁细胞常交互排列成同心环状。薄壁细胞含淀粉粒。细根几无草酸钙方晶。

【炮制】 除去杂质，洗净，晒干。

【性味】 辛、甘，平。

【功能与主治】 健脾益气，化湿舒筋。用于脾虚浮肿，自汗，慢性支气管炎，风湿痹痛，腰痛。

【用法与用量】 15～30 g。

【贮藏】 置干燥处。

五　倍　子

Wubeizi

GALLA CHINENSIS

本品为漆树科植物盐肤木 Rhus chinensis Mill.、青麸杨 Rhus potaninii Maxim. 或红麸杨 Rhus punjabensis Stew. var. sinica (Diels) Rehd. et Wils. 叶上的虫瘿，主要由五倍子蚜 Melaphis chinensis (Bell) Baker 寄生而形成。秋季采摘，置沸水中略煮或蒸至表面呈灰色，杀死蚜虫，取出，干燥。按外形不同，分为"肚倍"和"角倍"。

【性状】 **肚倍** 呈长圆形或纺锤形囊状，长 2.5～9 cm，直径 1.5～4 cm。表面灰褐色或灰棕色，有柔毛。质硬而脆，易破碎，断面角质样，有光泽，壁厚 0.2～0.3 cm，内壁平滑，有黑褐色死蚜虫及灰色粉状排泄物。气特异，味涩。

角倍 呈菱形，具不规则的角状分枝，柔毛较明显，壁较薄。

均以个大、完整、壁厚、色灰褐者为佳。

【鉴别】 取本品粉末约 0.5 g，加水 4 ml，微热，滤过。取滤液 1 ml，加三氯化铁试液 1 滴，即发生蓝黑色沉淀；另取滤液 1 ml，加 10% 酒石酸锑钾溶液 2 滴，即发生白色沉淀。

【炮制】 敲开，除去杂质。

【性味】 酸、涩，平。

【功能与主治】 敛肺，涩肠，止血。用于久咳，久泻，消渴；外治盗汗，手足多汗

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

症，湿疹，外伤出血，疮疡肿毒，口腔溃疡，脱肛。

【用法与用量】 3～6 g；外用适量，研末涂敷或煎汤洗患处。

【贮藏】 置通风干燥处，防压。

支　柱　蓼

Zhizhuliao

RHIZOMA POLYGONI SUFFULTI

本品为蓼科植物支柱蓼 Polygonum suffultum Maxim. 的干燥根茎。秋季采挖，除去须根及泥沙，晒干。

【性状】 本品呈连珠形结节状，有的稍弯曲，长 2～7 cm，直径 0.5～2 cm。顶端有棕色茎叶残基，表面红褐色至紫褐色，有点状须根痕及残留须根。质硬，易折断，断面浅粉红色，近边缘处维管束呈白色点状排列成环。无臭，味涩。

以个大、须根少者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。

【性味】 微苦、涩，平。

【功能与主治】 散瘀止血，理气止痛。用于跌扑损伤，腰痛，胃痛，崩漏，外伤出血。

【用法与用量】 9～15 g，煎服或泡酒服；外用适量，研末涂敷或鲜品捣烂敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

车　前　子

Cheqianzi

SEMEN PLANTAGINIS

本品为车前科植物车前 Plantago asiatica L. 或平车前 Plantago depressa Willd. 的干燥成熟种子。夏、秋二季种子成熟时采收果穗，晒干，搓出种子，除去杂质。

【性状】 本品呈椭圆形、不规则长圆形或三角状长圆形，略扁，长约 2 mm，宽约

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

1 mm。表面黄棕色至黑褐色，有细皱纹，一面有灰白色凹点状种脐。质硬。气微，味淡。

【鉴别】 取本品约 1 g，加水 5 ml，煮沸半分钟，冷后呈粘稠状。

【炮制】 **车前子** 除去杂质，筛去灰屑。

炒车前子 取净车前子，照清炒法(附录 18 页)炒至起爆裂声。

盐车前子 取净车前子，照盐水炙法(附录 19 页)炒至起爆裂声时，喷洒盐水，炒干。

【性味】 甘，寒。

【功能与主治】 清热，利尿，明目，祛痰。用于小便黄少，暑湿泄泻，尿路感染，目赤涩痛，痰多咳嗽。

【用法与用量】 9～15 g，包煎。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮。

车　前　草

Cheqiancao

HERBA PLANTAGINIS

本品为车前科植物车前 Plantago asiatica L. 或平车前 Plantago depressa Willd. 的干燥全草。夏季采挖，除去泥沙，晒干。

【性状】 **车前** 根丛生，须状。叶基生，具长柄；叶片皱缩，展平后呈卵状椭圆形或宽卵形；长 6～13 cm，宽 2.5～8 cm；表面灰绿色或污绿色，具明显弧形脉 5～7 条；先端钝或短尖，基部宽楔形，全缘或有不规则波状浅齿。穗状花序数条，花茎长。蒴果盖裂，萼宿存。气微香，味微苦。

平车前 主根直而长。叶片较狭，长椭圆形或椭圆状披针形，长 5～14 cm，宽 2～3 cm。

均以叶片完整、色灰绿者为佳。

【鉴别】 本品叶的表面观：

车前 上、下表皮细胞类长方形，上表皮细胞具角质线纹。气孔不定式，副卫细胞 3～4 个。腺毛头部 2 细胞，椭圆形，柄单细胞。非腺毛少见，2～5 细胞，长 100～320 μm，壁稍厚，微具疣状突起。

平车前 非腺毛 3～7 细胞，长 350～900 μm。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【炮制】 除去杂质，洗净，切段，晒干。

【性味】 甘，寒。

【功能与主治】 清热，利尿，凉血，祛痰。用于小便黄少，尿路感染，暑湿泄泻，痰多咳嗽。

【用法与用量】 9～30 g，鲜品 30～60 g，煎服或捣汁服。

【贮藏】 置通风干燥处。

瓦　松

Wasong

HERBA OROSTACHYOS

本品为景天科植物瓦松 Orostachys fimbriatus (Turcz.) Berg. 的干燥地上部分。夏、秋二季花开时采收，除去根及杂质，晒干。

【性状】 本品茎呈细长圆柱形，长 5～15 cm，直径 0.3～0.6 cm；表面灰棕色，具多数凸起的残留叶基，有明显的纵棱线。叶多脱落、破碎或卷曲，灰绿色。圆锥花序穗状，小花白色或粉红色，先端棕红色，花梗长约 5 mm。体轻，质脆，易碎。气微，味酸。

以花穗完整、带红色者为佳。

【炮制】 除去残根及杂质，切段。

【性味】 酸，平。

【功能与主治】 止血，敛疮。用于血痢，便血；外治疮口久不愈合。

【用法与用量】 3～9 g；外用适量，研末涂敷患处。

【贮藏】 置通风干燥处。

瓦　楞　子

Walengzi

CONCHA ARCAE

本品为蚶科动物毛蚶 Arca subcrenata Lischke、泥蚶 Arca granosa L. 或魁蚶 Arca

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

inflata Reeve 的贝壳。秋、冬至次春捕捞，洗净，置沸水中略煮，去肉，干燥。

【性状】 **毛蚶** 略呈三角形或扇形，长 3～4 cm，宽 4～5 cm。壳外面隆起，有棕褐色茸毛或已脱落；壳顶突出，向内卷曲；自壳顶至腹面有延伸的放射肋（直楞）30～34 条，似瓦楞状。壳内面平滑，白色，壳缘有与壳外面直楞相对应的凹陷，铰合部具小齿 1 列。质坚。无臭，味淡。

泥蚶 长 2～3 cm，宽 2.5～4 cm。壳外面无棕褐色茸毛，放射肋 18～21 条，肋上有颗粒状突起。

魁蚶 长 6～8 cm，宽 7～9 cm。壳外面放射肋 42～48 条。

【炮制】 **瓦楞子** 洗净，晒干，碾碎或碾粉。

煅瓦楞子 取净瓦楞子，照煅法(附录 19 页)煅至红透。

【性味】 甘、咸，平。

【功能与主治】 软坚，散瘀，制酸，化痰。用于胃痛泛酸，腹部肿块，咳嗽痰粘。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置干燥处。

水　牛　角

Shuiniujiao

CORNU BUBALI

本品为牛科动物水牛 Bubalus bubalis L. 的角。取下角后，水煮以除去角塞，干燥。

【性状】 本品呈稍扁平而弯曲的锥形，长短不一。表面棕黑色或灰黑色，一侧有数条横向的沟槽，另一侧有密集的横向凹陷条纹。上部渐尖，有纵纹，下部略呈三角形，中空。角质，坚硬。气微腥，味淡。

【炮制】 洗净，镑片或锉成粗粉。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清热，解毒，凉血，止血。用于高热，流行性乙型脑炎，精神分裂症，原发性血小板减少性紫癜，肝炎。

【用法与用量】 15～30 g，宜先煎 3 小时以上。

【贮藏】 置干燥处，防霉。

【制剂】 水牛角浓缩粉

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

水牛角浓缩粉

Shuiniujiao Nongsuofen

PULVIS CORNUS BUBALI CONCENTRATUS

本品为水牛角的半浓缩粉。

【制法】 取水牛角，洗净，锯断，除去角塞，劈成小块。选取尖部实芯部分（习称"角尖"），用75%乙醇浸泡或蒸气消毒后，粉碎成细粉。其余部分（习称"角桩"）磨成粗粉或锉成薄片。取角桩粗粉或锉片810 g，加水10倍量煎煮二次，每次7～10小时，煎煮过程中随时补充蒸去的水分，合并煎出液，滤过，滤液浓缩至80～160 ml，加入上述角尖细粉190 g，混匀，在80°以下干燥后，粉碎成细粉，过筛，即得。

【性状】 本品为淡灰色粉末；气微腥，味微咸。

【检查】 **水分** 照水分测定法项下烘干法（附录15页）测定，含水分不得超过11.0%。

其他 应符合散剂项下有关的各项规定（附录3页）。

【功能与主治】 同水牛角。

【用法与用量】 冲服，一次1.5～3 g，一日2次。

【贮藏】 置干燥处密闭保存，防潮。

水　半　夏

Shuibanxia

RHIZOMA TYPHONII FLAGELLIFORMIS

本品为天南星科植物水半夏 Typhonium flagelliforme (Lodd.) Bl. 的干燥块茎。冬末春初采挖，除去外皮及须根，晒干。

【性状】 本品略呈椭圆形、圆锥形或半圆形，直径0.5～1.5 cm，高0.8～3 cm。表面类白色或淡黄色，略有皱纹，并有多数隐约可见的细小根痕，上端类圆形，有凸起的叶痕或芽痕，呈黄棕色。有的下端略尖。质坚实，断面白色，粉性。气微，味辛辣，麻

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

舌而刺喉。

以质坚实、粉性足者为佳。

【鉴别】 本品粉末类白色。淀粉粒甚多，单粒圆形、半圆形或多角形，直径4～18 μm，脐点点状、裂缝状或人字状；复粒由2～5粒组成。草酸钙针晶成束或散在，长35～85 μm。螺纹及环纹导管直径10～32 μm。

【炮制】 **水半夏** 除去杂质及灰屑。

制水半夏 (1) 取净水半夏，大小分档，用水浸泡，至内无白心时，取出，沥干，大个的切厚片，加姜汁拌至吸尽，再加白矾粗粉，反复搅拌使匀透，置缸内腌48小时，然后沿缸边加入清水至超过水半夏平面约10 cm，注意不使白矾粉冲沉缸底，继续腌2～4天，至口嚼无麻辣感时，取出，洗去白矾粉，干燥。

每水半夏100 kg，用生姜18 kg、白矾20 kg。

(2) 取净水半夏，照上法浸泡至内无白心，另取生姜切片煎汤，加白矾与半夏共煮透，取出，干燥。

每水半夏100 kg，用生姜25 kg、白矾12.5 kg。

【性味】 辛，温；有毒。

【功能与主治】 燥湿，化痰，止咳。用于咳嗽痰多，支气管炎。

【用法与用量】 6～15 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

水 红 花 子

Shuihonghuazi

FRUCTUS POLYGONI ORIENTALIS

本品为蓼科植物红蓼 Polygonum orientale L. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时割取果穗，晒干，打下果实，除去杂质。

【性状】 本品呈扁圆形，直径2～3.5 mm，厚1～1.5 mm。表面棕黑色，有的红棕色，有光泽，两面微凹，中部略有纵向隆起。顶端有短突尖，基部有浅棕色略突起的果梗痕，有的有膜质花被残留。质硬。气微，味淡。

以粒大、饱满、色棕黑者为佳。

【性味】 咸，微寒。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 清热，软坚。用于腹部肿块，颈淋巴结结核，糖尿病。

【用法与用量】 6～9 g。

【贮藏】 置干燥处。

水　杨　梅

Shuiyangmei

FRUCTUS ADINAE

本品为茜草科植物水杨梅 Adina rubella Hance 的干燥带花的果序。9～11 月果实未完全成熟时采摘，除去枝叶及杂质，干燥。

【性状】 本品由多数小花果密集而成，呈球形，形似杨梅，直径 0.3～1 cm。表面棕黄色，粗糙，细刺状。轻搓小蒴果即脱落，露出球形坚硬的果序轴。小蒴果楔形，长 0.3～0.4 cm，淡黄色，顶端有棕色的花萼，5 裂，裂片突出成刺状，内有种子数粒。气微，味微苦涩。

以个大、完整、色棕黄者为佳。

【鉴别】 取本品 5 g，加乙醇 20 ml，置水浴上回流 10 分钟，滤过，滤液照下述方法试验：

(1) 取滤液 1 ml，置蒸发皿中，挥去乙醇，残渣加醋酐数滴使溶解，再加硫酸 1 滴，先显桃红色，继转紫红色，最后呈污绿色；置紫外光灯下观察，显黄绿色荧光。

(2) 取滤液 1 ml，加 1% 三氯化铁溶液 1 滴，显墨绿色。

【性味】 苦、涩，凉。

【功能与主治】 清解热毒。用于菌痢，肝炎，阴道滴虫病。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

水　蛭

Shuizhi

HIRUDO

本品为水蛭科动物蚂蟥 Whitmania pigra Whitman、柳叶蚂蟥 Whitmania acra-

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

nulata Whitman 或水蛭 Hirudo nipponica Whitman 的干燥体。夏、秋二季捕捉，用沸水烫死，晒干或低温干燥。

【性状】 **蚂蟥** 呈扁平纺锤形，由多数环节组成，长 4～10 cm，宽 0.5～2 cm。背部黑褐色或黑棕色，稍隆起。腹面平坦，有多条黑棕色纵列的断续斑点。两侧及腹面为棕黄色，前端略尖，后端钝圆，两端各具 1 吸盘，前吸盘不显著，后吸盘较大。质脆，易折断，断面胶质状，有光泽。气微腥。

柳叶蚂蟥 狭长而扁，多在加工时拉长，长 5～12 cm，宽 0.1～0.5 cm。

水蛭 扁长圆柱形，体多弯曲扭转，长 2～5 cm，宽 0.2～0.3 cm。

【炮制】 **水蛭** 洗净，切段，干燥。

制水蛭 取水蛭段，照烫法(附录 19 页)用滑石粉炒至微鼓起。

【性味】 咸、苦，平；有毒。

【功能与主治】 破瘀血，通经。用于腹部肿块，血瘀经闭。

【用法与用量】 1.5～3 g。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

水 蜈 蚣

Shuiwugong

HERBA KYLLINGAE

本品为莎草科植物水蜈蚣 Kyllinga brevifolia Rottb. 的干燥全草。夏、秋二季花期采挖，洗净，晒干。

【性状】 本品长 10～30 cm，淡绿色至灰绿色。根茎近圆柱形，细长，直径 0.1～0.2 cm；表面棕红色至紫褐色，节明显，节处有残留的叶鞘及须根；断面类白色，粉性。茎细，三棱形。单叶互生，线形，长短不一，有的长于茎，基部叶鞘呈紫褐色。头状花序顶生，球形，直径 0.5 cm，基部有狭长叶状苞片 3 片。坚果扁卵形，褐色。气微，味淡。

以根茎粗、叶绿、带花者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，切段，晒干。

【性味】 微辛，平。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 截疟，止咳，化痰，祛风利湿。用于疟疾，感冒咳嗽，关节酸痛，乳糜尿；外治皮肤瘙痒。

【用法与用量】 12～18 g；外用适量，煎汤洗患处。

【贮藏】 置干燥处。

水 蔓 菁（勒马回）

Shuimanjing

HERBA VERONICAE DILATATAE

本品为玄参科植物水蔓菁 Veronica linariifolia Pall. ex Link subsp. dilatata (Nakai et Kitag.) Hong 的干燥全草。夏、秋二季采挖，除去杂质，干燥。

【性状】 本品长 20～100 cm。根呈须状，浅灰褐色。地上部分被细绒毛。茎圆柱形，质脆，易折断，断面中空。叶对生或互生，无柄或有柄，叶片多卷缩、破碎，完整者展平后呈狭卵形或宽披针形，长 2.5～6 cm，宽 0.6～2 cm，黄绿色或暗绿色，基部渐狭，边缘有锯齿。穗状花序顶生，蒴果扁圆形，种子细小。气微，味苦。

以色绿、带花果者为佳。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性味】 苦，微寒。

【功能与主治】 清热解毒，利尿，止咳化痰。用于支气管炎，肺脓疡，急性肾炎，尿路感染，疖肿。

【用法与用量】 15～30 g。

【贮藏】 置干燥处。

贝 母 花

Beimuhua

FLOS FRITILLARIAE THUNBERGII

本品为百合科植物浙贝母 Fritillaria thunbergii Miq. 的干燥带茎梢的花。3～4 月

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

植株最下两朵花开放时采摘，干燥。

【性状】 本品多皱缩，完整的花呈钟状，花梗长 1～2 cm。花被 6 片，棕黄色，分 2 轮排列；被片长倒卵形至卵圆形，长 2～3 cm，宽约 2 cm，外面有棕色条纹。雄蕊 6 个，着生于花被基部；雌蕊 1 个，柱头 3 歧。茎梢干瘪，紫棕色。气微，味苦。

【鉴别】 (1) 本品粉末黄棕色。花粉粒甚多，椭圆形、类圆形或圆三角形，直径 27～61 μm，外壁有网状雕纹，具单沟。花粉囊内壁细胞类长方形，具点状或条状纹理。

(2) 取本品粗粉 3 g，加 2%醋酸溶液 50 ml，不断振摇，煮沸 3 分钟，滤过。取滤液 3～5 ml，加碘化汞钾试液数滴，发生黄白色浑浊；另取滤液 3～5 ml，加碘化铋钾试液 3 滴，发生棕黄色沉淀；再取滤液 3～5 ml，加硅钨酸试液，发生黄白色絮状沉淀。

(3) 取鉴别(2)项下的滤液 2 滴，点于滤纸上，置紫外光灯下观察，可见亮淡绿色荧光。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 止咳，化痰。用于咳嗽痰多，支气管炎。

【贮藏】 置干燥处。

【制剂】 (1) 贝母花片 (2) 贝母花流浸膏

贝 母 花 片

Beimuhua Pian

TABELLAE FLORIS FRITILLARIAE

本品为贝母花浸膏片。每片相当于贝母花 1 g。

【制法】 取贝母花 200 g，粉碎成细粉，过筛。另取贝母花 800 g，加水煎煮二次，每次 2 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至约 500 ml，放冷，加乙醇 1000 ml，搅拌，静置 48 小时，取上清液浓缩成稠膏状，加上述贝母花细粉与适量辅料，制成颗粒，压制成 1000 片，包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕黑色；味苦。

【鉴别】 (1) 取本品 1 片，除去糖衣，研细，置显微镜下观察：花粉粒众多，椭圆形、类圆形或圆三角形，直径 27～61 μm，外壁有网状雕纹，具单沟，花粉囊内壁细胞

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

类长方形，具点状或条状纹理。

（2）取本品2片，除去糖衣，研成粗粉，加2%醋酸溶液10 ml，煮沸3分钟，滤过，滤液加硅钨酸试液，即发生黄白色絮状沉淀。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(附录6页)。

【功能与主治】 同贝母花。

【用法与用量】 口服，一次3片，一日1次。

【贮藏】 密封保存。

贝母花流浸膏

Beimuhua Liujingao

EXTRACTUM FLORIS FRITILLARIAE LIQUIDUM

本品含总生物碱不得少于0.085%。

【制法】 取贝母花1000 g，加水煎煮二次，每次2小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至约500 ml，放冷，缓缓加乙醇500 ml，密闭，静置3～4天，取上清液滤过，再加乙醇使成1000 ml，即得。

【性状】 本品为棕褐色的液体；味苦。

【鉴别】 取本品5 ml，置蒸发皿中，在水浴上蒸干，加1%盐酸溶液4 ml，搅拌，滤过，滤液加硅钨酸试液，即发生黄白色絮状沉淀。

【检查】 **总固体** 精密量取本品10 ml，置恒重的蒸发皿中，于水浴上蒸干后，在105°干燥至恒重，遗留总固体不得少于1 g。

乙醇量 应为45～55%(附录48页第一法)。

其他 应符合流浸膏剂与浸膏剂项下有关的各项规定(附录11页)。

【含量测定】 精密量取本品20 ml，置水浴上蒸至近干，加1%盐酸溶液20 ml，搅拌，浸渍2小时，滤过，滤渣用1%盐酸溶液10～15 ml洗涤数次，至洗液无生物碱反应为止。合并滤液与洗液，移至分液漏斗中，加氨试液使成微碱性，用氯仿提取四次(20、15、15、10 ml)，合并提取液，置恒重的蒸发皿中，在水浴上蒸干，加无水乙醚少量，自然挥散后，在60°干燥3小时，置干燥器中，冷却至室温时，精密称定，即得。

【功能与主治】 同贝母花。

【用法与用量】 口服，一次2～5 ml，一日3次。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【贮藏】 密封保存。

牛　至

Niuzhi

HERBA ORIGANI

本品为唇形科植物牛至 Origanum vulgare L. 的干燥全草。夏、秋二季花开时采收，除去杂质，晒干。

【性状】 本品长 20～60 cm。根较细小，直径 0.2～0.4 cm；表面灰棕色，稍弯曲而略有韧性，断面黄白色。茎方柱形，上部稍有分枝，紫棕色或黄棕色，密被下伏细绒毛。叶对生，稍皱缩，展平后叶片卵形至宽卵形，长 0.6～1.8 cm，宽 0.4～1.2 cm；黄绿色或灰绿色，全缘，两面被棕黑色腺点；叶柄长 1.5～2.5 mm，被毛。聚伞花序顶生，花萼钟状，5 裂。小坚果扁卵形，红棕色。气微香，味微苦。

以叶多、香气浓者为佳。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性味】 辛，微温。

【功能与主治】 清暑解表，利水消肿。用于中暑，感冒，头痛身重，急性胃肠炎，腹痛吐泻，水肿。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

牛　黄

Niuhuang

CALCULUS BOVIS

本品为牛科动物牛 Bos taurus domesticus Gmelin 干燥的胆结石。宰牛时，如发现有牛黄，即滤去胆汁，将牛黄取出，除去外部薄膜，阴干。

【性状】 本品多呈卵形、类球形或三角形，直径 1～3 cm。表面金黄色至棕黄色，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

深浅不一，较细腻而稍有光泽，有的外部挂有一层黑色光亮的薄膜，习称“乌金衣”，有的粗糙，有裂纹。体轻，质松脆，易分层剥离，断面色较浅，可见紧密细腻的同心层纹。气清香，味苦而后甘，有明显的清香凉感，嚼之易碎，不粘牙。

以完整、色棕黄、质松脆、断面层纹清晰而细腻者为佳。

【鉴别】 (1) 取本品少量，加清水调和，涂于指甲上，能将指甲染成黄色，习称“挂甲”。

(2) 取本品粉末少量，加氯仿 1 ml，摇匀，再加硫酸与 30%过氧化氢溶液各 2 滴，振摇，即显绿色。

(3) 取本品粉末约 0.2 g，加盐酸 1 ml，再加乙醚 20 ml 振摇提取，放置，分取乙醚液，滤过，置分液漏斗中，加氢氧化钡饱和溶液 20 ml，振摇，即发生黄色沉淀。分离除去水层及沉淀，醚层用氢氧化钡饱和溶液洗涤 2 次，每次 10 ml。分取醚层，滤过，蒸干，残渣加氯仿 1 ml 使溶解，加醋酐 1 ml 与硫酸 2 滴，振摇，放置约 10 分钟，即显绿色。

(4) 取本品约 0.1 g，加 60%醋酸 4 ml，研磨，滤过。取滤液 1 ml，加新制的糠醛(新蒸馏至几乎无色)溶液(1→100)1 ml 与硫酸溶液(取硫酸 50 ml，加水 65 ml，混合) 10 ml，置 70°水浴中加热 10 分钟，即显蓝紫色。

【检查】 水分　照水分测定法项下烘干法(附录 15 页)测定，不得过 9%。

【性味】 苦、甘，凉。

【功能与主治】 清心，解热，豁痰，镇痉，解毒。用于热病高热神昏，谵语，烦躁不安，小儿惊风抽搐，痰热壅盛，咽喉肿痛，口舌生疮，痈肿疔疮。

【用法与用量】 0.15～0.35 g，多入丸散服；外用适量，研末敷患处。

【贮藏】 置阴凉干燥处，遮光，密闭保存，防潮、防压。

牛　蒡　子

Niubangzi

FRUCTUS ARCTII

本品为菊科植物牛蒡 Arctium lappa L. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收果序，晒干，打下果实，除去杂质，再晒干。

【性状】 本品呈长倒卵形，略扁，微弯曲，长 5～7 mm，宽 2～3 mm。表面灰褐

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

色，带紫黑色斑点，有数条纵棱，通常中间1～2条较明显。顶端钝圆，稍宽，顶面有圆环，中间具点状花柱残迹；基部略窄，着生面较淡。果皮较硬，破开后可见子叶2片，淡黄白色，富油性。无臭，味苦后微辛而稍麻舌。

以粒大、饱满、色灰褐者为佳。

【鉴别】 (1) 本品粉末灰褐色。中果皮薄壁细胞纺锤形或长条形，长45～600 μm，直径6～20 μm，多具细网状纹理。内果皮组织碎片含淡棕色色素及草酸钙方晶，方晶直径6～18 μm。种皮栅状细胞表面观长多角形或短梭形，侧面观斜长方形，长120～180 μm，直径40～65 μm，壁较厚，微木化。

(2) 取本品粉末少量，置紫外光灯下观察，显绿色荧光。

【炮制】 **牛蒡子** 除去杂质，洗净，晒干。

炒牛蒡子 取净牛蒡子，照清炒法（附录18页）炒至略鼓起、微有香气。

【性味】 辛、苦，寒。

【功能与主治】 散风热，利咽，透疹，消肿解毒。用于风热感冒，咽喉肿痛，咳嗽，麻疹，荨麻疹，腮腺炎，痈肿疮毒。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

牛　　膝（怀牛膝）

Niuxi

RADIX ACHYRANTHIS BIDENTATAE

本品为苋科植物牛膝 Achyranthes bidentata Bl. 的干燥根。冬季茎叶枯萎时采挖，除去须根及泥沙，捆成小把，晒至干皱后，用硫黄熏2次，将顶端切齐，晒干。

【性状】 本品呈细长圆柱形，有的稍弯曲，上端稍粗，下端较细，长15～50 cm，最长可达90 cm，直径0.4～1 cm。表面灰黄色或淡棕色，有略扭曲而细微的纵皱纹、横长皮孔及稀疏的细根痕。质硬而脆，易折断，受潮则变柔软，断面平坦，黄棕色，微呈角质样而油润，木部黄白色，其周围有多数点状的维管束，排列成2～4轮。气微，味微甜而稍苦涩。

以条粗长、皮细、色灰黄者为佳。

【鉴别】 (1) 本品横切面：木栓层为数列细胞。皮层较窄。维管束断续排列成2～

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

4轮；最外轮维管束较小，有时仅1至数个导管；形成层几连接成环；向内维管束较大，木质部由导管、木纤维及木薄壁细胞组成；中心木质部集成2～3群。薄壁细胞含草酸钙砂晶。

（2）取本品的断面，置紫外光灯下观察，显黄白色荧光。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，除去残留芦头，切段，晒干。

【性味】 苦、酸，平。

【功能与主治】 补肝肾，强筋骨，通血脉，降血压。用于腰膝酸痛，下肢拘挛，经闭，高血压症。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【注意】 孕妇慎服。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防潮。

手　　参

Shoushen

RHIZOMA GYMNADENIAE

本品为兰科植物手参 Gymnadenia conopsea R. Br. 的干燥块茎。夏、秋二季采收，除去须根及泥沙，晒干；置沸水中烫或煮至内无白心，晒干。

【性状】 本品略呈手状，长1～4.5 cm，直径1～3 cm。表面浅黄色至褐色，有细皱纹，顶端有茎的残基或残痕，其周围有点状痕。下部有2～12指状分枝，分枝长0.3～2.5 cm，直径0.2～0.8 cm。质坚硬，不易折断，断面黄白色，角质样。无臭，味淡，嚼之发粘。

以色黄白、质坚实、断面角质样者为佳。

【鉴别】 （1）取本品粉末0.5 g，加水10 ml，摇匀，放置15分钟，呈冻胶状，取出少量，置载玻片上，加墨汁1～2滴，置显微镜下观察，冻胶不被染成黑色。

（2）取本品粉末少量，加水适量，煮沸，放冷，滴加碘试液，显深蓝色。

【炮制】 除去杂质，洗净，干燥，用时捣碎。

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 滋养，生津，止血。用于久病体虚，肺虚咳嗽，失血，久泻，阳痿。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

毛 冬 青

Maodongqing

RADIX ILICIS PUBESCENTIS

本品为冬青科植物毛冬青 Ilex pubescens Hook. et Arn. 的干燥根。全年均可采挖，洗净，砍成块片，晒干。

【性状】 本品呈块片状，大小不等，厚 0.5～1 cm。外皮灰褐色或棕褐色，稍粗糙，有细皱纹和横向皮孔。切面皮部薄，老根稍厚，木部黄白色或淡黄棕色，有致密的纹理。质坚实，不易折断。气微，味苦、涩而后甘。

【鉴别】 (1) 本品横切面：木栓层为8～10 列细胞。皮层石细胞单个散在或数个成群，有的含棕色物；薄壁细胞含油滴。形成层不明显。木质部射线宽 1～8 列细胞，向外渐变宽；导管多单个散在，直径 20～55 μm，也有 2～4 个相聚；木纤维发达。薄壁细胞含淀粉粒。

(2) 取本品粗粉约 5 g，加乙醇 40 ml，置水浴上回流 15 分钟，趁热滤过。取滤液 10 ml，置蒸发皿中，在水浴上小心蒸干，放冷后，残渣加醋酐 1 ml 使溶解，再加硫酸 2～3 滴，即显紫色。

(3) 取鉴别(2) 项下剩余的滤液 1 滴，点于滤纸上，置紫外光灯下观察，显淡紫色荧光，再滴加三氯化铝的甲醇溶液 (1→100) 1 滴，点于荧光点邻近，置紫外光灯下观察，两液交界处有明显的黄色荧光。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，晒干。

【性味】 苦、涩，寒。

【功能与主治】 凉血，活血，通脉，消炎解毒。用于血栓闭塞性脉管炎，冠状动脉硬化性心脏病；外治烧、烫伤。

【用法与用量】 60～120 g；外用适量，煎成 1:1 煎剂，敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

【制剂】 (1) 毛冬青片 (2) 毛冬青注射液

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

毛 冬 青 片

Maodongqing Pian

TABELLAE ILICIS PUBESCENTIS

本品为毛冬青提取物片。含毛冬青提取物作为无水芦丁计算，应为标示量的85.0～115.0%。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；味苦。

【鉴别】 取本品2片，除去糖衣，加30%乙醇10 ml研磨使溶解，滤过，滤液照毛冬青注射液项下的鉴别法（108页）试验，显相同的反应。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定（附录6页）。

【含量测定】 **对照品溶液的制备** 照毛冬青注射液项下的方法（108页）制备。

供试品溶液的制备 取本品10片，注意除去糖衣，加30%乙醇适量，置乳钵中研磨，移入100 ml量瓶中，加30%乙醇稀释至刻度，摇匀，用干燥滤纸滤过，弃去初滤液，精密量取续滤液1 ml，置100 ml量瓶中，加30%乙醇稀释至刻度，摇匀，即得。

测定法 照毛冬青注射液项下的方法（108页）测定，计算，即得。

【功能与主治】 心血管疾病用药，有扩张血管及抗菌消炎作用。用于冠状动脉硬化性心脏病，血栓闭塞性脉管炎，并用于中心性视网膜炎。

【用法与用量】 口服，一次4～5片，一日3次。

【规格】 0.1 g

【贮藏】 密封保存。

毛冬青注射液

Maodongqing Zhusheye

INJECTIO ILICIS PUBESCENTIS

本品为毛冬青提取物的灭菌水溶液。含毛冬青提取物作为无水芦丁计算，应为标示量的90.0～110.0%。

【性状】 本品为黄棕色的澄明液体。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【鉴别】（1）取本品1滴，点于滤纸上，置紫外光灯下观察，显黄绿色荧光；喷以1%三氯化铝的乙醇溶液，干燥后，置紫外光灯下观察，荧光加强。

（2）取本品1滴，加水1 ml与20%磷钼酸的乙醇溶液1滴，即显绿色。

（3）取本品1滴，加水1 ml与三氯化铁试液1滴，即显绿色。

【检查】 pH值 应为5.0～6.5（附录42页）。

溶血试验 取本品0.3 ml，加生理盐水2.2 ml与2%兔红细胞生理盐水混悬液2.5 ml，摇匀，置36.5°±0.5°恒温水浴中，观察半小时，不得有溶血现象。

其他 应符合注射剂项下有关的各项规定（附录7页）。

【含量测定】 对照品溶液的制备 精密称取芦丁对照品适量（另取芦丁对照品，在120°减压干燥至恒重，按减失重量折算为干燥品20 mg），置100 ml量瓶中，加60%乙醇，置80°水浴中加热使溶解，放冷，用60%乙醇稀释至刻度，摇匀，精密量取25 ml，置50 ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，即得（每1 ml中含无水芦丁0.1 mg）。

供试品溶液的制备 精密量取本品1 ml，照上述对照品溶液的制备方法制备，即得。

测定法 精密量取供试品溶液与对照品溶液各4 ml，分别置10 ml量瓶中，各精密加入亚硝酸钠溶液（1→20）0.3 ml，摇匀，放置6分钟，再各精密加入硝酸铝溶液（1→10 ml）0.3 ml，摇匀，放置6分钟，各加*N*/1氢氧化钠液4 ml，分别用30%乙醇稀释至刻度，摇匀，放置10分钟，另取供试品溶液与对照品溶液各4 ml，分别加30%乙醇稀释至10 ml作空白，照比色法（附录32页），分别在510 nm的波长处测定吸收度，计算，即得。

【功能与主治】 心血管疾病用药，有扩张血管及抗菌消炎作用。用于冠状动脉硬化性心脏病，血栓闭塞性脉管炎，并用于中心性视网膜炎，小儿肺炎。

【用法与用量】 肌内注射，一次2 ml，一日1～2次。

【规格】 2 ml:40 mg

【贮藏】 遮光，密闭保存。

毛 诃 子

Maohezi

FRUCTUS TERMINALIAE BILLERICAE

本品系藏族习用药材，藏文名为 ཀྱེ་རུ་རུ （帕如拉）；为使君子科植物毛诃子 Termi-

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

nalia billerica Roxb. 的干燥成熟果实。冬季果实成熟时采收，除去杂质，晒干。

【性状】 本品呈倒卵形或椭圆形，直径 1.5～3 cm。表面棕褐色，被红棕色绒毛，略平滑或具 5 棱脊及少数不规则皱纹，质坚硬。果肉厚 2～5 mm，暗棕色或浅绿黄色。果核淡棕黄色。种子 1 粒，棕黄色，种仁黄白色，有油性。气微，味涩、苦。

以个大、肉厚、涩味浓者为佳。

【性味】 甘、涩，平。

【功能与主治】 清热解毒，调和诸药，收敛养血。用于各种热症，泻痢，黄水病，肝胆病，病后虚弱。

【用法与用量】 3～9 g，多入丸散服。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

升　　麻

Shengma

RHIZOMA CIMICIFUGAE

本品为毛茛科植物大三叶升麻 Cimicifuga heracleifolia Kom.、兴安升麻 Cimicifuga dahurica (Turcz.) Maxim. 或升麻 Cimicifuga foetida L. 的干燥根茎。秋季采挖，除去泥沙，晒至须根干时，燎去或除去须根，晒干。

【性状】 本品为不规则的长形块状，多分枝，呈结节状，长 10～20 cm，直径 2～4 cm。表面黑褐色或棕褐色，粗糙不平，有坚硬的细须根残留，上面有数个圆形空洞的茎基痕，洞内壁显网状沟纹；下面凹凸不平，具须根痕。体轻，质坚硬，不易折断，断面不平坦，有裂隙，纤维性，黄绿色或淡黄白色。气微，味微苦而涩。

以个大、质坚、表面色黑褐者为佳。

【炮制】 除去杂质，略泡，洗净，润透，切片，干燥。

【性味】 微甘、苦，微寒。

【功能与主治】 散风热，透疹，升提中气。用于风热头痛，齿龈肿痛，麻疹不透，胃下垂，久泻，脱肛，子宫脱垂，慢性苯中毒血小板减少。

【用法与用量】 1.5～4.5 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

升　　登

Shengdeng

LIGNUM RHAMNELLAE

本品系藏族习用药材，藏文名为 རིང་སྡེང (升登)；为鼠李科植物升登 Rhamnella gilgitica Mansfeld et Melchior 的干燥木材。全年均可采收，除去树皮，锯段，劈开，晒干。

【性状】 本品呈条状，长 60～70 cm，宽 2～5 cm。表面棕黄色，间有黑褐色，有顺直纹理及刀削痕。质坚硬，横切面可见同心性环纹，有的可见深棕色髓部。气微，味淡。

以色棕黄、质坚实者为佳。

【炮制】 **升登片** 取升登，劈成碎片。

升登膏 取升登片，加水 2 倍，用文火煨 3～4 天，煮沸 4 小时，滤过。残渣加水 1.5 倍，煮、滤 2 次，合并滤液，用文火浓缩成膏。

【性味】 微苦，凉。

【功能与主治】 凉血，利湿消肿。用于类风湿性关节炎，黄水病，高原性红细胞增多症。

【用法与用量】 9～15 g，升登膏 1.5～3 g；外用膏剂涂敷患处。

【注意】 升登膏易引起腹泻或胃痛，不宜多服或久服。

【贮藏】 置干燥处。升登膏密闭保存。

月　季　花

Yuejihua

FLOS ROSAE CHINENSIS

本品为蔷薇科植物月季 Rosa chinensis Jacq. 的干燥花。全年均可采收，花微开时采摘，阴干或低温干燥。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 本品呈类球形，直径 1.5～2.5 cm。花托长圆形；萼片 5 片，暗绿色，先端尾尖；花瓣覆瓦状排列，有的散落，长圆形，紫红色或粉红色，脉纹明显；雄蕊多数，黄色。体轻，质脆，易碎。气清香，味淡、微苦。

以完整、色紫红、气清香者为佳。

【性味】 甘，温。

【功能与主治】 活血调经。用于月经不调，痛经。


【用法与用量】 1.5～4.5 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防压、防蛀。

丹　皮　酚

Danpifen

PAEONOLUM



[$C_9H_{10}O_3$=166.18]

本品按干燥品计算，含 $C_9H_{10}O_3$ 不得少于 97.0～103.0%。

【性状】 本品为白色或微黄色带有光泽的针状结晶；气特异，味微辣。

本品在甲醇或乙醇中易溶，在热水中溶解，在水中不溶。

熔点 本品的熔点（附录 28 页）为 49～51°。

【鉴别】 (1) 取本品约 5 mg，置小试管中，加水 1 ml，管口盖一块用水湿润的滤纸，滤纸上加氯亚胺基-2，6-二氯醌 1 份与四硼酸钠 32 份的混合粉末少量，摊匀，将试管加热至微沸，滤纸即显蓝色。

(2) 取本品约 5 mg，加乙醇 1 ml 溶解后，加重氮苯磺酸试液 3 滴，摇匀，加碳酸氢钠试液 1 滴，渐显橙红色。

(3) 取本品约 5 mg，加乙醇 1 ml 溶解后，加乙醇制氨试液 2 滴与硫酸铜试液 1 滴，即发生绿色沉淀。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

(4) 取含量测定项下制备的溶液，照分光光度法（附录32页）测定，在211±1 nm与274±1 nm的波长处有最大吸收。

【检查】 **干燥失重** 取本品，置五氧化二磷干燥器中减压干燥至恒重，减失重量不得过1.0%（附录44页）。

炽灼残渣 不得过0.1%（附录45页）。

重金属 取本品0.5 g，加乙醇30 ml溶解后，加稀醋酸2 ml与硫化氢试液10 ml，如显色，与标准铅溶液1 ml用同一方法处理后的颜色比较，不得更深，即含重金属不得过百万分之二十。

【含量测定】 精密称取本品适量，用无水乙醇制成每1 ml中含丹皮酚5 μg的溶液，照分光光度法（附录32页），在274±1 nm的波长处测定吸收度，按$C_9H_{10}O_3$的吸收系数（$E_{1cm}^{1\%}$）为908计算，即得。

【功能与主治】 祛风，镇痛。用于肌肉痛，关节痛，风湿痛，神经痛，腹痛，也可用于瘙痒症。

【贮藏】 遮光，密闭保存。

【制剂】 丹皮酚注射液

丹皮酚注射液

Danpifen Zhusheye

INJECTIO PAEONOLI

本品为丹皮酚的灭菌水溶液。含丹皮酚($C_9H_{10}O_3$)应为标示量的95.0～105.0%。

【性状】 本品为无色或微黄色的澄明液体。

【鉴别】 (1) 取本品1 ml，照丹皮酚项下的鉴别法(1)项(112页)试验，显相同的反应。

(2) 取本品1 ml，加重氮苯磺酸试液3滴，摇匀，加碳酸氢钠试液1滴，渐显橙红色。

(3) 取本品约1 ml，加乙醇制氨试液2滴与硫酸铜试液1滴，即发生绿色沉淀。

【检查】 **pH值** 应为3.5～5.5(附录42页)。

【其他】 应符合注射剂项下有关的各项规定(附录7页)。

【含量测定】 精密量取本品适量，照丹皮酚项下的方法(112页)测定，即得。

【功能与主治】 同丹皮酚。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【用法与用量】 肌内注射，一次 10～20 mg，一日 1～2 次。

【规格】 2 ml:10 mg

【贮藏】 遮光，密闭保存。

丹　　参

Danshen

RADIX SALVIAE MILTIORRHIZAE

本品为唇形科植物丹参 Salvia miltiorrhiza Bge. 的干燥根及根茎。春、秋二季采挖，除去泥沙，干燥。

【性状】 本品根茎短粗，顶端有时残留茎基。根数条，长圆柱形，略弯曲，有的分枝并具须状细根，长 10～20 cm，直径 0.3～1 cm。表面棕红色或暗棕红色，粗糙，具纵皱纹。老根外皮疏松，多显紫棕色，常呈鳞片状剥落。质硬而脆，断面疏松，有裂隙或略平整而致密，皮部棕红色，木部灰黄色或紫褐色，可见黄白色点状维管束。气微，味微苦涩。

栽培品较粗大肥实，直径 0.5～1.5 cm。表面红棕色，具纵皱，外皮紧贴不易剥落。质坚实，断面较平整，略显角质样。

以条粗壮、色紫红者为佳。

【鉴别】 取本品粉末 5 g，加水 50 ml，煎煮 15～20 分钟，放冷，滤过。滤液置水浴上浓缩至粘稠状，放冷后，加乙醇 3～5 ml 使溶解，滤过，滤液照下述方法试验：

(1) 取滤液数滴，点于滤纸条上，干后，置紫外光灯下观察，显亮蓝灰色荧光。将此纸条悬挂在氨水瓶中(不接触液面)，20 分钟后取出，置紫外光灯下观察，显淡亮蓝绿色荧光。

(2) 取滤液 0.5 ml，加三氯化铁试液 1～2 滴，显污绿色。

【炮制】 除去杂质及残茎，洗净，润透，切片，干燥。

【性味】 苦，微寒。

【功能与主治】 祛瘀止痛，活血调经，养心除烦。用于月经不调，经闭，宫外孕，肝脾肿大，心绞痛，心烦不眠，疮疡肿毒。

【用法与用量】 9～15 g。

【注意】 不宜与藜芦同用。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【贮藏】 置干燥处。

【制剂】 丹参注射液

丹参注射液

Danshen Zhusheye

INJECTIO SALVIAE MILTIORRHIZAE

本品为丹参经提取制成的灭菌水溶液。每 1 ml 相当于丹参 1.5 g。

【制法】 取丹参 1500 g，加水煎煮三次，第一次 2 小时，第二、三次各 1.5 小时，合并煎液，滤过，滤液减压浓缩至约 750 ml，用乙醇沉淀处理二次，第一次溶液中含乙醇量为 75%，第二次为 85%，每次均冷藏放置后，滤过，滤液浓缩至约 250 ml。然后加注射用水稀释至 400 ml，冷藏放置后，滤过，用 10%氢氧化钠溶液调节 pH 值至 6.8，煮沸半小时，滤过，加注射用水使成 1000 ml，灌封，灭菌，即得。

【性状】 本品为棕色的澄明液体。

【鉴别】 (1) 取本品，加水稀释使每 1 ml 中含丹参 1.5～2 mg 的溶液，照分光光度法(附录 32 页)测定，在 281±3 nm 的波长处有最大吸收。

(2) 取本品 2 滴，加水 2 滴，摇匀后，加三氯化铁试液 1 滴，即显污绿色。

(3) 取本品 1 滴，加水 3～4 滴，摇匀后，吸附在滤纸上，过量的溶液用滤纸吸干，悬挂在氨水瓶中(不接触液面)20 分钟后，取出，置紫外光灯下观察，微显淡蓝绿色荧光。

【检查】 pH 值 应为 5.0～7.0(附录 42 页)。

热原 取本品，依法检查 (附录 53 页)，剂量按家兔体重每 1 kg 注射 0.5 ml，应符合规定。

其他 应符合注射剂项下有关的各项规定(附录 7 页)。

【功能与主治】 活血化瘀，通脉养心。用于冠心病胸闷，心绞痛。

【用法与用量】 肌内注射，一次 2～4 ml，一日 1～2 次；静脉注射，一次 4 ml，用 50%葡萄糖注射液 20 ml 稀释后应用，一日 1～2 次；静脉滴注，一次 10 ml，用 5%葡萄糖注射液 100～500 ml 稀释后应用，一日 1 次。

【规格】 2 ml

【贮藏】 遮光，密闭保存。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

乌　　药

Wuyao

RADIX LINDERAE

本品为樟科植物乌药 Lindera strychnifolia (Sieb. et Zucc.) Vill. 的干燥块根。全年均可采挖，除去细根，洗净，趁鲜切片，晒干，或直接晒干。

【性状】 本品多呈纺锤状，略弯曲，有的中部收缩成连珠状，长 6～15 cm，直径 1～3 cm；表面黄棕色或黄褐色，有纵皱纹及稀疏的细根痕；质坚硬。切片厚 0.2～2 mm，切面类白色至淡黄棕色而微红，有放射状纹理及环纹，中心颜色较深。气香，味微苦、辛，有清凉感。

以断面色白、香气浓者为佳。质老、不呈纺锤状的直根，不可供药用。

【鉴别】 本品粉末黄白色。淀粉粒甚多，单粒类球形、长圆形或卵圆形，直径 4～39 μm，脐点叉状、人字状或裂缝状；复粒由 2～4 粒组成。木纤维淡黄色，多成束，直径 20～30 μm，壁厚约 5 μm，有单纹孔，胞腔含淀粉粒。韧皮纤维近无色，长梭形，多单个散在，直径 15～17 μm，壁极厚，孔沟不明显。具缘纹孔导管直径约至 68 μm，具缘纹孔排列紧密。木射线细胞壁稍增厚，纹孔较密。油细胞长圆形，含棕色分泌物。

【炮制】 除去杂质；未切片者，除去细根，大小分开，浸透，切片，干燥。

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 顺气，散寒，止痛。用于脘腹胀痛，小便频多，痛经，疝气。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防蛀。

乌　　韭

Wujiu

FOLIUM STENOLOMAE

本品为鳞始蕨科植物乌蕨 Stenoloma chusanum (L.) Ching 的干燥叶。夏、秋二季

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

采收，除去根茎及根，晒干。

【性状】 本品叶柄细长，类圆柱形，表面浅棕褐色，一面具纵沟。叶片卵状披针形，绿棕色或棕褐色，略有光泽，三至四回羽状分裂，末回裂片宽楔形，先端截形，具不明显的小齿，有的下表面顶部生有 1～2 枚圆形孢子囊群，囊群盖杯状，向外开裂。叶片草质。无臭，味淡。

以带绿色者为佳。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性味】 微苦，寒。

【功能与主治】 清热解毒。用于砷中毒，沙门氏菌所致食物中毒，野菰、木薯中毒，肠炎，痢疾。

【用法与用量】 30～60 g；鲜品 120～240 g，捣烂冲服。

【贮藏】 置通风干燥处，防霉。

乌　　桕

Wujiu

CORTEX SAPII RADICIS

本品为大戟科植物乌桕 Sapium sebiferum (L.) Roxb. 的干燥根皮。全年均可采挖，挖出根部，除去泥沙，剥取根皮，晒干。

【性状】 本品呈长槽状或筒状，长 10～40 cm，厚约 0.1 cm。外表面浅黄棕色，有细纵皱纹及圆形或横长的皮孔，栓皮薄，易呈片状脱落。内表面黄白色至浅黄棕色，具细密纵直纹理。质硬而韧，不易折断，断面纤维性。气微，味微苦涩。

以条大、皮厚者为佳。

【炮制】 洗净，润透，切厚片，晒干。

【性味】 苦，微温。

【功能与主治】 泻下逐水，利尿消肿。用于水肿胀满，二便不通，晚期血吸虫病。

【用法与用量】 9～12 g。

【注意】 溃疡病患者忌服。

【贮藏】 置干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

乌　梢　蛇

Wushaoshe

ZAOCYS

本品为游蛇科动物乌梢蛇 Zaocys dhumnades (Cantor) 的干燥体。多于夏、秋二季捕捉，剖开蛇腹或先剥去蛇皮，除去内脏，盘成圆盘状，干燥。

【性状】 本品卷呈圆盘状，盘径约 16 cm。表面黑褐色或绿黑色，密被菱形鳞片，无光泽。头盘在中间，形扁圆，似龟头，口内有多数刺状牙齿，眼大不陷而有光泽。脊部高耸成屋脊状。腹部剖开边缘向内卷曲，脊肌肉厚，黄白色或淡棕色，可见排列整齐的肋骨。尾部渐细而长。气腥，味淡。剥皮者仅留头、尾皮部，中间较光滑。

以头尾齐全、肉色黄白、体坚实者为佳。

【炮制】 **乌梢蛇**　去头及鳞片，切断。

乌梢蛇肉　去头及鳞片后，用黄酒闷透，除去皮骨，干燥。

制乌梢蛇　取乌梢蛇肉段，照酒炒法(附录 18 页)炒至微黄色。

每乌梢蛇 100 kg, 用黄酒 20 kg。

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 祛风活络，镇痉。用于风湿痹痛，四肢麻木，抽搐痉挛，皮肤瘙痒，麻风。

【用法与用量】 6～15 g；亦可浸酒或研粉吞服。

【贮藏】 置干燥处，防霉、防蛀。

乌　梅

Wumei

FRUCTUS MUME

本品为蔷薇科植物梅 Prunus mume (Sieb.) Sieb. et Zucc. 的干燥近成熟果实。夏季果实近成熟时采收，低温烘干后闷至色变黑。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 本品呈类球形或扁球形，两端略尖，直径 2～2.5 cm。表面乌黑色或棕黑色，皱缩不平，基部有圆形果梗痕。果核坚硬，椭圆形，棕黄色，表面有凹点；破开后，内有淡黄色种子 1 粒。气微，味极酸。

以个大、肉厚、柔润者为佳。

【炮制】 **乌梅** 除去杂质。

乌梅炭 取净乌梅，照炒炭法(附录 19 页)炒至皮肉鼓起。

【性味】 酸、涩，温。

【功能与主治】 敛肺，涩肠，生津，安蛔。用于肺虚久咳，口干烦渴，胆道蛔虫症，慢性腹泻，痢疾，崩漏。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防潮。

凤仙透骨草

Fengxian Tougucao

CAULIS IMPATIENTIS

本品为凤仙花科植物凤仙花 Impatiens balsamina L. 的干燥茎。夏、秋二季采割，除去杂质，干燥。

【性状】 本品略呈长圆柱形，稍弯曲，多分枝，长 30～60 cm，直径 1～2 cm。表面黄棕色至红棕色，具纵沟纹，节膨大，有深棕的叶痕。体轻，质脆，易折断，断面中空或有髓。气微，味微酸。

以色红棕者为佳。

【鉴别】 本品茎表皮表面观：非腺毛 4～20 细胞，单列或有 1 个单细胞的分枝，表面有角质纹理，有的细胞含黄棕色物。表皮细胞长多角形，充塞有草酸钙针晶；并有方晶。

【炮制】 除去杂质，洗净，稍润，切段，干燥。

【性味】 苦、辛，平；有小毒。

【功能与主治】 祛风湿，活血，止痛。用于风湿性关节痛，屈伸不利。

【用法与用量】 6～9 g；外用适量，煎水熏洗患处。

【贮藏】 置干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

凤　尾　草

Fengweicao

HERBA PTERIDIS MULTIFIDAE

本品为凤尾蕨科植物凤尾草 Pteris multifida Poir. 的干燥全草。夏、秋二季采挖，洗净，晒干。

【性状】 本品长 25～70 cm。根茎短，稍扭曲，有棕褐色条状披针形鳞片及弯曲的细根。叶二型，丛生，灰绿色或草绿色，叶柄细而有棱，长 10～30 cm，黄绿色或棕绿色，孢子叶叶片为一回羽状复叶，下部羽片常 2～3 叉，羽片及小羽片均为长条形，边缘有锯齿或全缘，叶轴有狭翅；营养叶羽片较宽，边缘均有细锯齿。孢子囊群着生叶缘，棕色。气微，味淡或稍涩。

以色绿、叶多者为佳。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性味】 微苦，凉。

【功能与主治】 清湿热解毒，止血。用于痢疾，黄疸，肝炎，胃肠炎，乳腺炎，白带，崩漏；外治外伤出血，烧、烫伤。

【用法与用量】 9～30 g；外用鲜品适量，捣烂敷患处。

【贮藏】 置通风干燥处。

凤　凰　衣

Fenghuangyi

MEMBRANA FOLLICULARIS OVI

本品为雉科动物家鸡 Gallus gallus domesticus Briss. 的蛋壳内的干燥卵膜。取孵小鸡后蛋壳内的软膜，洗净，阴干。

【性状】 本品为皱折状的薄膜，大小不一。外表面白色，内表面淡黄白色，具棕色线样血丝。边缘不整齐。体轻，略有韧性，易破碎。气微，味淡。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

以色白、不破碎者为佳。

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 润肺，止咳。用于久咳，声音嘶哑。

【用法与用量】 1.5～2.5 g。

【贮藏】 置干燥处，防霉、防蛀。

六　月　雪

Liuyuexue

HERBA SERISSAE

本品为茜草科植物六月雪 Serissa serissoides (DC.) Druce 或白马骨 Serissa foetida Comm. 的干燥全株。全年均可采挖，除去泥沙，晒干。

【性状】 **六月雪** 长 40～100 cm。根细长，灰白色。茎圆柱形，多分枝，直径 0.3～0.8 cm，表面深灰色，有纵裂隙，外皮易剥离；嫩枝灰色，微有茸毛。叶对生或丛生，有短柄；叶片卵形至长卵圆形，长 1.5～3 cm，宽 0.8～1 cm，绿黄色，全缘。小花无梗，苞片及萼片刺毛状，灰绿色，花冠漏斗状，白色。核果近球形。气微，味淡。

白马骨 叶较小，狭卵形，长 0.7～1.5 cm。苞片与萼片非刺毛状。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切段，干燥。

【性味】 淡、微辛，凉。

【功能与主治】 健脾利湿，疏肝活血。用于小儿疳积，急、慢性肝炎，经闭，白带，风湿腰痛。

【用法与用量】 15～30 g。

【贮藏】 置干燥处。

文　冠　木

Wenguanmu

LIGNUM XANTHOCERATIS

本品系蒙古族习用药材，蒙古文名为 ᠰᠢᠯᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ（西拉·森登）；为无患子科植物文冠果 Xanthoceras sorbifolia Bge. 的茎干或枝条的干燥木部。春、夏二季采收，除去树皮，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

截段，或再劈成块，干燥。

【性状】 本品呈圆柱形或不规则的块状，大小不等。茎干木部的表面黄褐色或红棕色，断面红棕色，有同心性环纹。枝条木部的表面黄白色或黄绿色，断面外部黄白色，内部红棕色。质坚硬。气微，味微甘、涩、苦。

以质坚实、色红棕者为佳。

【鉴别】 本品粉末红棕色、棕黄色或黄白色。木纤维多数，无色或淡黄色，有的纤维束周围细胞中含草酸钙方晶。具缘纹孔或网纹导管易见。

【炮制】 劈成小块或小段。

【性味】 甘、微苦，凉。

【功能与主治】 祛风湿，消肿止痛，敛干黄水。用于风湿性关节炎，风湿内热，皮肤风湿。

【用法与用量】 9～15 g；外用煎汤洗患处。

【贮藏】 置干燥处。

火 炭 母

Huotanmu

HERBA POLYGONI CHINENSIS

本品为蓼科植物火炭母 Polygonum chinense L. 或粗毛火炭母 Polygonum chinense L. var. hispidum Hook. f. 的干燥全草。夏、秋二季采挖，除去泥沙，晒干。

【性状】 **火炭母** 根呈须状，褐色。茎扁圆柱形，有分枝，长 30～100 cm，节稍膨大，下部节上有须根；表面淡绿色或紫褐色，无毛，有细棱；质脆，易折断，断面灰黄色，多中空。叶互生，多卷缩、破碎，完整叶片展平后呈卵状矩圆形，长 5～10 cm，宽 2～4.5 cm；先端短尖，基部截形或稍圆，全缘；上表面暗绿色，下表面色较浅，两面近无毛；托叶鞘筒状，膜质，先端偏斜。无臭，味酸、微涩。

粗毛火炭母 茎较粗，茎叶均被粗毛。

【鉴别】 取本品粗粉约 5 g，加乙醇 50 ml，置水浴上回流 30 分钟，稍冷，加活性炭少量，滤过，滤液浓缩至约 5 ml，照下述方法试验：

(1) 取滤液 2 ml，加镁粉少量与盐酸 5 滴，置水浴中加热 3 分钟，显橙色或橙红色。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

(2) 取滤液点于滤纸上，干后，置紫外光灯下观察，显黄色荧光，再喷以1%三氯化铝的乙醇溶液，荧光加强。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性味】 酸、涩，凉。

【功能与主治】 清热解毒，利湿止痒，明目退翳。用于痢疾，肠炎，扁桃体炎，咽喉炎；外治角膜云翳，子宫颈炎，霉菌性阴道炎，皮炎湿疹。

【用法与用量】 15～30 g；外用适量。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

火　麻　仁

Huomaren

FRUCTUS CANNABIS

本品为桑科植物大麻 Cannabis sativa L. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收，除去杂质，晒干。

【性状】 本品呈卵圆形，长 4～5.5 mm，直径 2.5～4 mm。表面灰绿色或灰黄色，有微细的白色或棕色网纹，两边有棱，顶端略尖，基部钝圆，有 1 微凹的果梗痕。果皮薄而脆，易破碎。种皮绿色，内有乳白色种仁(子叶)，富油性。气微，味淡。

以粒饱满、种仁色乳白者为佳。

【炮制】 除去杂质，打碎或去壳。

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 润燥，通便。用于肠燥便秘。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防热、防蛀。

巴　豆

Badou

FRUCTUS CROTONIS

本品为大戟科植物巴豆 Croton tiglium L. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

堆置2～3天，摊开，干燥。

【性状】 本品呈卵圆形，一般具三棱，长1.8～2.2 cm，直径1.4～2 cm。表面灰黄色或稍深，粗糙，有纵线6条，顶端平截，基部有果梗痕。破开果壳，可见3室，每室含种子1粒。种子呈略扁的椭圆形，长1.2～1.5 cm，直径0.7～0.9 cm；表面棕色或灰棕色，一端有小点状的种脐及种阜的疤痕，另端有微凹的合点，其间有隆起的种脊；外种皮薄而脆，内种皮呈白色薄膜；种仁黄白色，油质。无臭，味辛辣。

以粒饱满、种仁色黄白者为佳。

【鉴别】 取本品约0.5 g，磨碎，加乙醚10 ml，浸泡2小时，并时时振摇，滤过，滤液置试管中挥干后，加盐酸羟胺的甲醇饱和溶液0.5 ml及0.1%麝香草酚酞指示液1滴，再加氢氧化钾的甲醇饱和溶液至显蓝色后，再多加4滴，加热至沸腾，冷却，加稀盐酸调节pH值至2～3，加10%三氯化铁溶液3滴及氯仿1 ml，振摇，下层溶液显紫红色。

【含量测定】 取本品约5 g，精密称定，研细，置回流浸出器内，用乙醚作溶剂，加热回流至脂肪油完全提取，蒸去乙醚，在100°干燥1小时，放冷，精密称定重量。

本品含脂肪油不得少于50%。

【炮制】 **生巴豆** 去皮取仁，外用。

巴豆霜 取净巴豆仁，碾成细末或捣烂如泥，压榨去油，至松散成粉不再粘结成饼。或取净巴豆仁研细后，照含量测定项下的方法，测定脂肪油含量，加适量的淀粉，混匀，使含油量为18～20%。

【性味】 辛，热；有大毒。

【功能与主治】 峻下积滞，逐水消肿。用于寒积停滞，胸腹胀痛，水肿，喉风，喉痹；外治疮癣，疣，痣。

【用法与用量】 巴豆霜0.1～0.3 g，多入丸散分服；外用生品适量，研末涂或捣烂以绢包擦患处。

【注意】 孕妇忌服；不宜与牵牛子同用。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

巴 戟 天

Bajitian

RADIX MORINDAE OFFICINALIS

本品为茜草科植物巴戟天 Morinda officinalis How 的干燥根。全年均可采挖，洗

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

净，除去须根，晒至六、七成干，轻轻捶扁，晒干。

【性状】 本品为扁圆柱形，略弯曲，长短不等，直径 1～2 cm。表面暗灰色，具纵纹及横裂纹，有的皮部横向断离露出木心，形似连珠。质硬，肉厚易剥落，断面皮部紫色或淡紫色，木部齿轮状，黄棕色或黄白色。无臭，味甘而微涩。

以条粗壮、连珠状、肉厚色紫者为佳。

【鉴别】 本品横切面：木栓层为数列细胞。皮层有石细胞，断续排列成环；薄壁细胞含草酸钙针晶束。韧皮部内侧薄壁细胞大多含草酸钙针晶束。形成层成环。木质部导管单个散在或 2～3 个相聚；偶有非木化的木薄壁细胞群。

【炮制】 **巴戟天** 除去杂质，照蒸法（附录 18 页）蒸透，趁热除去木心，切段，干燥。

盐巴戟天 取净巴戟天，照盐水炙法（附录 19 页）用盐水蒸透，趁热除去木心，切段，干燥。

制巴戟天 取甘草，捣碎，加水煎汤，去渣，加入净巴戟天拌匀，照蒸法（附录 18 页）蒸透，趁热除去木心，切段，干燥。

每巴戟天 100 kg，用甘草 6.4 kg。

【性味】 甘、辛，微温。

【功能与主治】 补肾阳，强筋骨。用于腰膝无力，关节酸痛，少腹冷痛，阳痿，遗精。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防霉、防蛀。

玉　竹

Yuzhu

RHIZOMA POLYGONATI ODORATI

本品为百合科植物玉竹 Polygonatum odoratum（Mill.）Druce 的干燥根茎。秋季采挖，除去须根，洗净，晒至柔软后，反复揉搓、晾晒至无硬心，晒干；或蒸透后，揉至半透明，晒干。

【性状】 本品呈长圆柱形，略扁，少有分枝，长 4～18 cm，直径 0.3～1.6 cm。表面黄白色或淡黄棕色，半透明，具纵皱纹及微隆起的环节，有白色圆点状的须根痕，偶

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

有圆盘状的茎痕。质硬而脆或稍软，易折断，断面角质样或显颗粒性。气微，味甘，嚼之发粘。

以条长、肥壮、色黄白者为佳。

【鉴别】 本品横切面：表皮细胞扁圆形或扁长方形，外壁稍厚，角质化。基本组织中散有多数粘液细胞，直径80～140 μm，内含草酸钙针晶束；维管束外韧型，稀有周木型，散列。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片或段，干燥。

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 养阴润燥，生津止渴。用于热病口燥咽干，干咳少痰，心烦心悸，糖尿病。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防霉、防蛀。

玉　米　须

Yumixu

STIGMA MAYDIS

本品为禾本科植物玉蜀黍 Zea mays L. 的干燥花柱和柱头。夏、秋二季果实成熟时收集，除去杂质，晒干。

【性状】 本品呈线状或须状，常集结成团。花柱长达30 cm，淡黄色至棕红色，有光泽；柱头短，2裂。质柔软。气微，味微甜。

以柔软、光亮者为佳。

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 利尿消肿，降血压。用于肾炎水肿，小便不利，湿热黄疸，高血压症。

【用法与用量】 15～30 g。

【贮藏】 置干燥处，防霉、防蛀。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

玉 葡 萄 根

Yuputaogen

RADIX AMPELOPSIS DELAVAYANAE

本品为葡萄科植物玉葡萄 Ampelopsis delavayana (Franch.) Planch. 的干燥根。秋季采挖，除去泥沙，晒干。

【性状】 本品呈圆柱形，略弯曲，长 13～30 cm，直径 0.5～1.5 cm。表面暗褐色，有纵皱纹。质硬而脆，易折断，断面皮部较厚，红褐色，粉性，木部色较淡，纤维性，皮部与木部易脱离。气微，味涩。

以条粗、皮厚者为佳。

【鉴别】 (1) 本品粉末棕色。草酸钙针晶成束或散在，长 48～130 μm。草酸钙簇晶可见，直径 18～35 μm。韧皮纤维壁厚，木化。木纤维有明显斜纹孔。木射线细胞类方形，纹孔明显，含淡橙色物。梯纹或网纹导管直径 32～130 μm。木栓细胞多角形，含黄棕色物。有棕色树脂块。淀粉粒肾形、卵圆形或圆形，直径 3～32 μm，脐点点状或裂缝状。

(2) 取本品粗粉 2 g，加 30%乙醇 10 ml，浸渍半小时，滤过。取滤液 3 ml，分置三支试管中，一管加醋酸铅试液 2 滴，发生灰白色沉淀；一管加氯化钠明胶试液 1～2 滴，发生白色沉淀；另一管加三氯化铁试液 2 滴，显蓝黑色。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，晒干，或研成细粉。

【性味】 涩、微苦，温。

【功能与主治】 散瘀止痛，消炎，止血。用于肠炎腹泻，跌扑损伤；外治烧、烫伤，外伤出血，骨折。

【用法与用量】 9～15 g；外用干粉撒敷或用蛋清调拌敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

打 破 碗 花 花

Dapowanhuahua

HERBA ANEMONES HUPEHENSIS

本品为毛茛科植物打破碗花花 Anemone hupehensis V. Lem. 的新鲜全草。夏、

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

秋二季茎叶茂盛时采挖，除去泥沙。

【性状】 本品长可达 1 M。根粗壮，常弯曲，表面深褐色。基生叶具长柄，为三出复叶或单叶，长 10～40 cm;小叶卵形或狭卵形，长 4～12 cm, 宽 2.5～12 cm，3 或 5 浅裂，边缘具齿，两面疏生短毛，下表面沿叶脉处较密；茎生叶多为单叶，少有三出复叶。花茎长 20～80 cm, 被短毛。聚伞花序顶生，二至三回分枝或成单花；总苞苞片叶状，2～3 片，具短梗，花被 5 片，瓣状，倒卵形或椭圆形，长 1～3 cm, 红紫色, 外面密被白色丝状毛，雄蕊多数。聚合果球形，瘦果长约 3 mm, 密被白色长柔毛。气微，味微苦。

【功能与主治】 去湿，杀虫。用于灭蛆，杀孑孓；外治体癣、脚癣。

【用法与用量】 取鲜品适量，捣烂投粪坑或污水坑中，或捣烂取汁，加水或浸水喷洒；外用茎、叶适量，捣汁涂患处。

功　劳　木

Gonglaomu

CAULIS MAHONIAE

本品为小檗科植物阔叶十大功劳 Mahonia bealei (Fort.) Carr. 或细叶十大功劳 Mahonia fortunei (Lindl.) Fedde 的干燥茎。全年均可采收，切块片，干燥。

【性状】 本品为不规则的块片，大小不等。外皮灰黄色至棕褐色，有明显的纵沟纹及横向细裂纹，有的外皮较光滑，有光泽，或有叶柄残基。切面皮部薄，棕褐色，木部黄色，可见数个同心性环纹及排列紧密的放射状纹理，髓部色较深。质硬。无臭，味苦。

以断面色鲜黄者为佳。

【鉴别】 取本品粗粉约 1 g, 加 1 %盐酸溶液 10 ml, 置水浴中加热 30 分钟，滤过，滤液照下述方法试验：

(1) 取滤液 1 ml, 加碘化铋钾试液 1～2 滴，发生红棕色沉淀。

(2) 取滤液 5 ml, 加 10 %氢氧化钠溶液 1 ml, 用乙醚 5 ml 振摇提取，分取醚液，蒸干，残渣加乙醇 0.5 ml 使溶解，加盐酸 1 ml 与漂白粉约 0.1 g, 显樱红色。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清湿热，解毒。用于痢疾，黄疸型肝炎，感冒，支气管炎，目赤肿

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

痛，烧、烫伤。

【用法与用量】 9～15 g；外用适量。

【贮藏】 置干燥处。

甘青青兰

Ganqingqinglan

HERBA DRACOCEPHALI TANGUTICI

本品系藏族习用药材，藏文名为[illegible]（知羊故）；为唇形科植物甘青青兰 Dracocephalum tanguticum Maxim. 的干燥地上部分。幼苗期或花初开时采收，除去杂质，阴干。

【性状】 本品茎呈方柱形，表面灰绿色或蓝紫色，四面有纵沟，具节；质脆，断面有髓或中空。叶对生，多破碎，完整者长 2～5 cm，羽状深裂至全裂，裂片常皱缩扭曲呈针状，展平后呈狭披针形，灰绿色；叶柄长 0.2～1 cm。轮伞花序顶生，苞片叶状；花萼筒状，长 1～1.4 cm，具 5 齿；花冠二唇形，蓝色，长 2～3 cm。气清香，味辛、微苦。

以色绿、香气浓者为佳。

【鉴别】 取本品粗粉 2 g，加水 20 ml，浸泡过夜后煮沸 5 分钟，滤过。取滤液 3 ml，蒸干，残渣加乙醇 3～5 ml，微热使溶解，再加镁粉少量与盐酸数滴，显红色。

【性味】 甘、苦，寒。

【功能与主治】 清肝胃热。用于肝炎，胃炎，黄水类病，便血，疮口不愈；幼苗用于腹水，浮肿。

【用法与用量】 9～15 g，多入丸散服。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

甘　松

Gansong

RHIZOMA NARDOSTACHYOS

本品为败酱科植物甘松 Nardostachys chinensis Batal. 或匙叶甘松 Nardostachys

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

jatamansi DC. 的干燥根茎及根。春、秋二季采挖，除去泥沙，晒干。

【性状】 本品略呈圆锥形，多弯曲，长 5～18 cm。根茎短小，上端有茎、叶残基，呈狭长的膜质片状或纤维状。外层黑棕色，内层棕色或黄色。主根单一或数条交结，分枝或并列，直径 0.3～1 cm。表面皱缩，棕褐色，有细根及须根。质松脆，易折断，断面粗糙，皮部深棕色，成层，常裂成片状，木部黄白色。气特异，味苦而辛，有清凉感。

以条长、主根较粗、香气浓者为佳。

【性味】 甘，温。

【功能与主治】 理气止痛，开郁醒脾。用于脘腹胀痛，呕吐，食欲不振；外治牙痛，脚肿。

【用法与用量】 2.5～4.5 g；外用适量，泡汤漱口或研末敷患处或煎汤洗脚。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防潮、防蛀。

甘　　草

Gancao

RADIX GLYCYRRHIZAE

本品为豆科植物甘草 Glycyrrhiza uralensis Fisch.、胀果甘草 Glycyrrhiza inflata Bat. 或光果甘草 Glycyrrhiza glabra L. 的干燥根及根茎。春、秋二季采挖，除去须根，晒干。

【性状】 本品根呈圆柱形，长 30～100 cm，直径 0.6～3.5 cm。外皮松紧不一。表面红棕色或灰棕色，具显著的纵皱纹、沟纹及稀疏的细根痕。质坚实，断面略显纤维性，黄白色，粉性，有 1 较明显的环及放射状纹理，有的有裂隙。根茎呈圆柱形，表面有芽痕，断面中部有髓。气微，味甜而特殊。

以皮细紧、色红棕、质坚实、断面色黄白、粉性足者为佳。

【鉴别】 (1) 本品横切面：木栓层为数列棕色细胞。皮层较窄。韧皮部射线宽广，多弯曲，常现裂隙；纤维多成束，非木化或微木化，周围薄壁细胞常含草酸钙方晶；筛管群常因压缩而变形。束内形成层明显。木质部射线宽 3～5 列细胞；导管较多，直径约至 160 μm；木纤维成束，周围薄壁细胞亦含草酸钙方晶。根中心无髓；根茎中心有髓。

粉末淡棕黄色。纤维成束，直径 8～14 μm，壁厚，微木化，周围薄壁细胞含草酸

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

钙方晶，形成晶纤维。草酸钙方晶多见。具缘纹孔导管较大，稀有网纹导管。木栓细胞红棕色，多角形；微木化。

(2) 取本品粉末少量，置白瓷板上，加80%硫酸溶液数滴，即显黄色，渐变为橙黄色。

【炮制】 **甘草** 除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。

蜜甘草 取甘草片，照蜜炙法(附录19页)用蜜水炒至黄色、放凉后不粘手。

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 清热解毒，止咳祛痰，补脾和胃，调和诸药。用于咽喉肿痛，咳嗽，心悸，脘腹虚痛，溃疡病，疮疡。

【用法与用量】 1.5～9 g。

【注意】 不宜与大戟、芫花、甘遂同用。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

【制剂】 甘草浸膏

甘草浸膏

Gancao Jingao

EXTRACTUM GLYCYRRHIZAE

本品含甘草酸不得少于20%。

【制法】 取甘草，用60°以下温水泡至易切碎为度，切成0.5 cm以下的薄片，加8倍量的水，逆流循环煮沸提取3次后，将浸液置沉降槽中，自然沉降3小时，取上清液浓缩至稠膏状，取出适量，照含量测定项下的方法，测定甘草酸含量，调节使符合规定，即得。

【性状】 本品为棕褐色的固体；有微弱的特臭和持久的特殊甜味；遇热软化，易吸潮。

【鉴别】 (1) 取本品细粉约1～2 mg，置白瓷板上，加硫酸溶液(8→10)数滴，即显黄色，渐变为橙黄色至橙红色。

(2) 取本品约1 g，加水10 ml搅拌溶解后，分为2等份；取1份，置试管中，强力振摇，应产生持久性的泡沫；另1份中，加稀硫酸，即产生大量沉淀，再加过量的氨试液，沉淀又复溶解。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【检查】 水中不溶物 精密称取本品约 1 g，加水 25 ml 搅拌溶解后，置离心管中，以每分钟 1000 转的速度，离心 60 分钟(或每分钟 2000 转，离心沉淀 30 分钟)，弃去上清液，沉淀加水少量，搅匀，再照上法，离心洗涤，每次用水 25 ml，直至洗液无色澄明为止，沉淀用水少量洗入已干燥至恒重的玻璃器皿中，置水浴上蒸干，并在 105°干燥至恒重，遗留残渣不得过 5.0%。

干燥失重 取本品，在 110°干燥 7 小时，减失重量不得过 13.5%(附录44页)。

灰分 不得过 12.0%(附录 15 页)。

【含量测定】 取本品约 6 g，精密称定，加水 50 ml 溶解后，移置 100 ml 量瓶中，用乙醇稀释至刻度，混匀，静置 12 小时，精密吸取上清液 25 ml，置烧杯中，加氨试液 3 滴，置水浴上蒸发至稠膏状，加水 30 ml 使溶解，缓缓加入盐酸溶液(3→10)5 ml，在冰水中静置约半小时，滤过，沉淀用冰水洗涤 4 次，每次 5 ml，弃去洗液及滤液，沉淀在滤纸上放置约 2～3 小时，使水分自然挥散，再用预先加热至约 60～70°的乙醇 10 ml，使沉淀溶解，滤过，滤器用热乙醇洗涤，至洗液无色，合并乙醇液，置已干燥至恒重的烧杯中，在水浴上蒸干，并在 105°干燥 3 小时，精密称定，即得供试量中含有甘草酸的重量。

【功能与主治】 缓和药，常与化痰止咳药配伍应用，能减轻对咽部粘膜的刺激，并有缓解胃肠平滑肌痉挛与去氧皮质酮样作用。用于消化性溃疡病及慢性肾上腺皮质功能减退症的辅助治疗。

【注意】 本品连续服用较大剂量时，可出现水肿和血压升高等副作用，停药后症状自行消失。

【贮藏】 密封，置阴凉干燥处保存。

【制剂】 甘草流浸膏

甘草流浸膏

Gancao Liujingao

EXTRACTUM GLYCYRRHIZAE LIQUIDUM

本品含甘草酸不得少于 7.0%。

【处方】 甘草浸膏 300～400 g

氨溶液 适量

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

乙醇	适量
水	适量

【制法】 取甘草浸膏，加水适量，不断搅拌，并加热使溶化，滤过，在滤液中缓缓加入85%乙醇，随加随搅拌，直至溶液中含乙醇量达65%左右，静置过夜，仔细取出上清液，遗留沉淀再加65%的乙醇，充分搅拌，静置过夜，取出上清液，再用65%乙醇提取1次，合并3次提取液，滤过，回收乙醇，测定甘草酸含量后，加入水与乙醇适量，使甘草酸和乙醇量均符合规定，加氨溶液适量调节pH值，静置，使澄清，取出上清液，滤过，即得。

【性状】 本品为棕色或红褐色的液体；味甜、略苦涩。

【鉴别】 取本品10 ml，加稀盐酸，产生大量沉淀，滤过，沉淀用水洗涤，弃去洗液与滤液，沉淀再用氨试液溶解，置水浴上蒸干，残渣有甜味，溶于水后，强力振摇，产生持久性的泡沫。

【检查】 **pH值** 应为7.5～8.5(附录42页)。

乙醇量 应为20～25%(附录48页第一法)。

其他 应符合流浸膏剂与浸膏剂项下有关的各项规定(附录11页)。

【含量测定】 精密量取本品5 ml，置烧杯中，照甘草浸膏项下的方法(131页)，自"加氨试液3滴"起，依法测定，即得供试量中含有甘草酸的重量。

【功能与主治】【注意】 同甘草浸膏。

【用法与用量】 口服，一次2～5 ml，一日6～15 ml。

【贮藏】 密封保存。

甘　遂

Gansui

RADIX EUPHORBIAE KANSUI

本品为大戟科植物甘遂 Euphorbia kansui T. N. Liou ex T. P. Wang 的干燥块根。春季开花前或秋末茎叶枯萎后采挖，撞去外皮，晒干。

【性状】 本品呈椭圆形、长圆柱形或连珠形，长1～5 cm，直径0.5～2.5 cm。表面类白色或黄白色，凹陷处有棕色外皮残留。质脆，易折断，断面粉性，白色，木部微显放射状纹理；长圆柱状者纤维性较强。气微，味微甘而辣。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

以肥大、色白、粉性足者为佳。

【鉴别】 本品粉末类白色。淀粉粒甚多，单粒球形或半球形，直径 5～34 μm，脐点点状、裂缝状或星状；复粒由 2～8 粒组成，无节乳管含淡黄色微细颗粒状物。厚壁细胞长方形、梭形、类三角形或多角形，壁微木化或非木化。具缘纹孔导管多见，常伴有纤维束。

【炮制】 醋甘遂 取甘遂，照醋炒法(附录 18 页)用醋炒至微干。

每甘遂 100 kg，用醋 30～50 kg。

【性味】 苦，寒；有毒。

【功能与主治】 泻水逐痰。用于重症水肿，胸水，腹水，癫痫。

【用法与用量】 0.6～1.5 g，炮制后多入丸散用。

【注意】 孕妇及体虚者忌服；不宜与甘草同用。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

艾　　叶

Aiye

FOLIUM ARTEMISIAE ARGYI

本品为菊科植物艾 Artemisia argyi Lévl. et Vant. 的干燥叶。夏季花未开时采摘，除去杂质，晒干。

【性状】 本品多皱缩、破碎，有短柄。完整叶片展平后呈卵状椭圆形，羽状深裂，裂片椭圆状披针形，边缘有不规则的粗锯齿，上表面灰绿色或深黄绿色，有稀疏的柔毛及白色腺点，下表面密生灰白色的绒毛。质柔软。气清香，味苦。

以质柔软、香气浓者为佳。

【鉴别】 本品粉末绿褐色。非腺毛有两种：一种为 T 字形毛，顶端细胞长而弯曲，两臂不等长，柄 2～4 细胞；另一种为单列性非腺毛，3～5 细胞，顶端细胞特长而扭曲，常断落。腺毛表面观鞋底形，由 4、6 细胞相对叠合而成，无柄。草酸钙簇晶，直径 3～7 μm，存在于叶肉细胞中。

【炮制】 艾叶 除去杂质及梗，筛去灰屑。

醋艾叶 取净艾叶，照醋炒法(附录 18 页)用醋炒至微焦。

醋炒艾炭 取净艾叶，照炒炭法(附录 19 页)用醋炒至表面焦黑色。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

每艾叶 100 kg，用醋 15 kg。

炒艾炭 取净艾叶，照炒炭法(附录19页)炒至表面焦黑色。

【性味】 苦、辛，温；有小毒。

【功能与主治】 散寒，止痛，止血。用于痛经，崩漏，胎动不安；外治关节酸痛，腹中冷痛，皮肤瘙痒。

【用法与用量】 3～6 g；外用适量，供灸或熏洗。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

艾 叶 油

Aiyeyou

OLEUM ARGYI

本品为菊科植物艾 Artemisia argyi Lévl. et Vant. 的干燥叶经蒸气蒸馏得到的挥发油。

【性状】 本品为淡黄绿色或淡黄色的澄清液体；具艾的特异香气，味苦、辛。

本品能与乙醇或乙醚任意混合，在氯仿中溶解。

比重 本品的比重(附录 26 页)在 25°时为 0.899～0.919。

折光率 本品的折光率(附录 32 页)在 25°时为 1.465～1.477。

【鉴别】 (1) 取本品 0.5 ml，加 60%硫酸溶液数滴，显棕黄色，加水稀释后，有淡黄绿色或淡黄色油状物析出。

(2) 取本品 2 滴，置白瓷板上，加香草醛试液 1 滴，即显深红色至玫瑰红色。

【检查】 **重金属** 取本品 10 ml，加水 10 ml 与盐酸 1 滴，振摇后，通硫化氢气使饱和，水层与油层颜色均不得变深。

【功能与主治】 平喘，镇咳，祛痰，消炎。用于慢性支气管炎，肺气肿，支气管哮喘。

【贮藏】 遮光，密封保存。

【制剂】 (1) 艾叶油气雾剂 (2) 艾叶油胶囊

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

艾叶油气雾剂

Aiyeyou Qiwuji

AEROSOLUM OLEI ARGYI

本品为艾叶油的乙醇溶液，加适宜的抛射剂与食用香精等制成的气雾剂。每瓶含艾叶油不得少于 2.7 ml。

【性状】 本品为淡黄色液体；喷出时具艾的特异香气，味微苦、微甜。

【鉴别】 取含量测定项下所得的挥发油，照艾叶油项下的鉴别法(135页)试验，显相同的反应。

【含量测定】 取本品 1 瓶，冷却至 5°左右，用微孔排气法(取橡胶管 1 根，两端各套上 6 号或 7 号注射针头，一端放入水中；在铝盖下穿一小孔，将另端注射针头插入瓶中，针头勿与液面接触)，待抛射剂缓缓排出后，除去铝盖、喷头等，用饱和氯化钠溶液分次洗出瓶内的挥发油，置 50 ml 滴定管中，加饱和氯化钠溶液使全量为 50 ml，静置，待充分分层后，读取上层挥发油 ml 数，即得。

【功能与主治】 同艾叶油。

【用法与用量】 用时将本品药瓶倒置，喷头圆孔对准口腔，在用力吸气的同时，立即揿压阀门上端喷雾头，溶液即成雾状喷入口腔，闭口数分钟。一次喷吸 2～3 下，一日 3 次。

【注意】 切勿受热，避免撞击。

【贮藏】 遮光，置阴凉处保存。

艾叶油胶囊

Aiyeyou Jiaonang

CAPSULAE OLEI ARGYI

本品为艾叶油与淀粉制成的胶囊。每粒含艾叶油 0.075 ml。

【性状】 本品除去胶囊后，内容物为淡黄色的潮湿颗粒；具艾的特异香气，味微

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

苦。

【鉴别】 取含量测定项下所得的挥发油，照艾叶油项下的鉴别法（135 页）试验，显相同的反应。

【检查】 应符合胶囊剂项下有关的各项规定(附录 12 页)。

【含量测定】 取本品 20 粒，照挥发油测定法(附录 16 页)测定。含挥发油不得少于 1.275 ml。

【功能与主治】 同艾叶油。

【用法与用量】 口服，一次 2 粒，一日 3 次。

【贮藏】 遮光，置阴凉干燥处密闭保存。

古 山 龙

Gushanlong

CAULIS ARCANGELISIAE

本品为防己科植物古山龙 Arcangelisia loureiri (Pierre) Diels 的干燥藤茎。全年均可采收，截段，晒干。

【性状】 本品呈圆柱形，直径 3～6 cm。外皮灰褐色或棕褐色，有纵皱纹及浅沟纹。质坚韧，横切面皮部菲薄，木部棕黄色或淡黄色，有数个同心性环纹及放射状纹理，其间多有数小孔，中心有髓；折断面易自环纹及放射状纹理处成片状剥裂。气微，味苦。

以断面色黄、味苦者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，晒干。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清热泻火，解毒。用于热盛心烦，肠炎，细菌性痢疾；外治眼结膜炎，疖肿。

【用法与用量】 9～15 g；外用适量。

【贮藏】 置干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

石　　韦

Shiwei

FOLIUM PYRROSIAE

本品为水龙骨科植物庐山石韦 Pyrrosia sheareri (Bak.) Ching、石韦 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell 或有柄石韦 Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching 的干燥叶。全年均可采收，除去根茎及根，晒干或阴干。

【性状】 **庐山石韦**　叶片略皱缩，展平后呈披针形，长 10～25 cm，宽 3～5 cm。先端渐尖，基部耳状偏斜，全缘，边缘常向内卷曲。上表面黄绿色或灰绿色，散布有黑色圆形小凹点；下表面密生红棕色星状毛，有的侧脉间布满棕色圆点状的孢子囊群。叶柄具四棱，长 10～20 cm，直径 1.5～3 mm，略扭曲，有纵槽。叶片厚，革质。气微，味微涩苦。

石韦　叶片披针形或长圆披针形，长 8～12 cm，宽 1～3 cm。基部楔形，对称。孢子囊群在侧脉间，排列紧密而整齐。叶柄长 5～10 cm，直径约 1.5 mm。

有柄石韦　叶片多卷曲呈筒状，展平后呈长圆形或卵状长圆形，长 3～8 cm，宽 1～2.5 cm。基部楔形，对称。下表面侧脉不明显，布满孢子囊群。叶柄长 3～12 cm，直径约 1 mm。

均以叶厚、完整者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，切段，晒干，筛去细屑。

【性味】 苦、甘，微寒。

【功能与主治】 利尿，泄热，清肺。用于小便不利，尿路感染，急性肾炎浮肿，肺热咳嗽。

【用法与用量】 6～12 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

石　见　穿

Shijianchuan

HERBA SALVIAE CHINENSIS

本品为唇形科植物华鼠尾草 Salvia chinensis Benth. 的干燥地上部分。夏、秋二季花

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

期采割，除去杂质，晒干。

【性状】 本品茎呈方柱形，有的有分枝，长 20～70 cm，直径 0.1～0.4 cm；表面灰绿色至暗紫色，被白色柔毛；质脆，易折断，断面黄白色。叶对生，有柄，为单叶或三出复叶；叶片多皱缩、破碎，完整者展平后呈卵形至披针形，长 1.5～8 cm，宽 0.8～4.5 cm，边缘有钝圆齿；两面被白色柔毛。轮伞花序多轮，每轮有花约 6 朵，组成假总状花序，萼筒外面脉上有毛，筒内喉部有长硬毛；花冠二唇形，蓝紫色。气微，味微苦涩。

以叶多、色绿、带花者为佳。

【鉴别】 本品叶的表面观：上表皮细胞多角形，垂周壁略呈连珠状增厚；下表皮细胞垂周壁波状弯曲；上下表皮均有角质线纹。气孔直轴式或不定式。腺毛两种：一为腺鳞，头部 4 细胞，直径 30～45 μm，柄单细胞；另一种头部单细胞，直径约 19 μm，柄单细胞。非腺毛 1～10 细胞，壁有疣状突起。草酸钙方晶直径 5～14 μm。

【炮制】 除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，干燥。

【性味】 苦、辛，平。

【功能与主治】 清解热毒，活血，利气，止痛。用于脘胁胀痛，痈肿。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置干燥处，防潮。

石　灰　华

Shihuihua

CALCIOSINTER

本品系藏族习用药材，藏文名为 ཀུ་ཀཿ（久康）；为一种主含碳酸钙的粉状块。采收后除去泥沙及杂石，阴干。

【性状】 本品呈不规则块状，大小不一。白色或微黄色。体较轻，捏之易成粉，有滑润感。无臭，味微甘。

以色白、体轻、滑润、嚼之味甘者为佳。

【鉴别】 本品显钙盐(附录 40 页)与碳酸盐(附录 42 页)的鉴别反应。

【性味】 微甘，寒。

【功能与主治】 清热补肺。用于各种肺热病。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【用法与用量】 3 g，多入丸散服。

【贮藏】 置干燥处，密闭保存。

石　吊　兰

Shidiaolan

HERBA LYSIONOTI

本品为苦苣苔科植物吊石苣苔 Lysionotus pauciflorus Maxim. 的干燥地上部分。夏、秋二季叶茂盛时采割，除去杂质，晒干。

【性状】 本品茎呈圆柱形，长 25～60 cm，直径 0.2～0.5 cm；表面淡棕色或灰褐色，有纵皱纹，节膨大，常有不定根；质脆，易折断，断面黄绿色至黄棕色，中心有空隙。叶轮生或对生，有短柄；叶片披针形至狭卵形，长 1.5～6 cm，宽 0.5～1.5 cm，边缘反卷，边缘上部有齿，两面灰绿色至灰棕色。气微，味苦。

以叶多、茎细者为佳。

【鉴别】 (1) 本品茎的横切面：表皮常残存。木栓层由多列细胞组成。皮层宽广，外侧散有石细胞；内皮层明显。韧皮部狭窄。形成层环不明显。木质部连结成环，均木化。髓部较大。

叶的横切面：上表皮细胞长方形，外被菲薄角质层；其下方为 2～3 列大形细胞，类方形或长方形；下表皮细胞较小，有气孔。栅栏组织 2～3 列，穿过主脉；海绵组织细胞类圆形，排列疏松。主脉维管束外韧型，近下表面处偶见单个石细胞。

(2) 取本品粉末 3 g，加水 50 ml，煮沸 30 分钟，趁热滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇 2 ml 使溶解，滤过，滤液加镁粉少量与盐酸 5～6 滴，溶液显深红色。

(3) 取本品粉末 3 g，加水 50 ml，煮沸 30 分钟，趁热滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇 2 ml 使溶解，滤过，滤液浓缩至约 0.2 ml。另取石吊兰素对照品，加乙醇制成每 1 ml 含 10 mg 的溶液，照薄层层析法(附录 38页)试验，分别点于硅胶G(含 15%煅石膏)的薄层板上，以氯仿-丙酮(15:1)的混合液为展开剂，展开后，晾干，喷以 1% 三氯化铝的乙醇溶液使显色，在石吊兰素对照品相应的位置上有同样颜色的色斑。

【炮制】 除去杂质，洗净，切段，晒干。

【性味】 苦，温。

【功能与主治】 软坚散结，止咳化痰。用于淋巴结结核，慢性支气管炎。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com


【用法与用量】 30～60 g。

【贮藏】 置干燥处。

石 吊 兰 素（岩豆素）

Shidiaolansu

LYSIONOTINUM



[$C_{18}H_{16}O_7$=344.32]

本品按干燥品计算，含 $C_{18}H_{16}O_7$ 不得少于 97.0～103.0%。

【性状】 本品为黄色针状结晶或淡黄色粉末；无臭，无味。

本品在氯仿中略溶，在甲醇、乙醇或醋酸乙酯中微溶，在乙醚中极微溶解，在水中不溶，在 5%碳酸钠溶液、氢氧化钾溶液或氢氧化钠溶液中溶解。

熔点 本品的熔点(附录 28页)为 197～199°。

【鉴别】 (1) 取本品约 20 mg，加乙醇 5 ml，微热溶解后，加镁粉少量与盐酸 1 ml，渐显樱红色。

(2) 取本品约 5 mg，加无水乙醇 5 ml 溶解后，加 5%二氯氧化锆溶液 5 滴，溶液呈鲜黄色，再加稀盐酸数滴，即恢复原来的淡黄色。

(3) 取含量测定项下本品的无水乙醇溶液，照分光光度法(附录 32 页)测定，在 285±2 nm 与 332±2 nm 的波长处有最大吸收。

【检查】 **酸度** 取本品 1 g，加水 50 ml，煮沸，放冷，滤过，滤液加酚酞指示液 2 滴，应无色；滴加 $N/50$ 氢氧化钠液 0.2 ml，应呈半分钟内不消失的粉红色。

干燥失重 取本品，在 105°干燥至恒重，减失重量不得过 0.2%(附录 44 页)。

炽灼残渣 不得过 0.2%(附录 45 页)。

【含量测定】 取本品约 100 mg，精密称定，置 100 ml量瓶中，加无水乙醇使溶解并稀

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

释至刻度，摇匀，精密量取 10 ml，置 100 ml 量瓶中，加无水乙醇稀释至刻度，摇匀，精密量取稀释液 5 ml，置 50 ml 量瓶中，加含 0.3%的冰醋酸的无水乙醇 0.2 ml，用无水乙醇稀释至刻度，摇匀。照分光光度法(附录 32 页)，在 286±1 nm 的波长处测定吸收度，按 $C_{18}H_{16}O_7$ 的吸收系数（$E_{1cm}^{1\%}$）为 682 计算，即得。

【功能与主治】 祛痰，止咳，软坚。用于支气管炎，淋巴结结核。

【用法与用量】 口服，一次 50～100 mg，一日 3 次。

【贮藏】 密闭保存。

【制剂】 石吊兰素片

石吊兰素片

Shidiaolansu Pian

TABELLAE LYSIONOTINI

本品含石吊兰素（$C_{18}H_{16}O_7$）应为标示量的 90.0～110.0%。

【性状】 本品为黄色片。

【鉴别】 取本品 1 片，研细，加无水乙醇适量，微热，使石吊兰素溶解，滤过，滤液照石吊兰素项下的鉴别法（141 页）试验，显相同的反应。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(附录 6 页)。

【含量测定】 取本品 10 片，精密称定，研细，精密称出适量(约相当于石吊兰素 100 mg)，置 200 ml 量瓶中，加无水乙醇约 100 ml，置水浴上加热，振摇，使石吊兰素溶解，放冷，加无水乙醇至刻度，摇匀，静置。精密量取上层清液 10 ml，置 50 ml 量瓶中，加无水乙醇稀释至刻度，摇匀，精密量取稀释液 5 ml，置 50 ml量瓶中，加含 0.3%冰醋酸的无水乙醇 0.2 ml，用无水乙醇稀释至刻度，摇匀。照分光光度法(附录 32 页)，在 286±1 nm 的波长处测定吸收度，按 $C_{18}H_{16}O_7$ 的吸收系数（$E_{1cm}^{1\%}$）为 682 计算，即得。

【功能与主治】【用法与用量】 同石吊兰素。

【规格】 50 mg

【贮藏】 密闭保存。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

石　决　明

Shijueming

CONCHA HALIOTIDIS

本品为鲍科动物杂色鲍 Haliotis diversicolor Reeve、盘大鲍 Haliotis gigantea discus Reeve 或羊鲍 Haliotis ovina Chemnitz 的贝壳。前者习称“光底石决明”，后二者习称“毛底石决明”。夏、秋二季捕捉，去肉，洗净，干燥。

【性状】 **光底石决明**　呈扁平卵圆形，内面观略呈耳形，长 3～8 cm，宽 2～5 cm。壳外面灰棕色，略平滑，具右旋的螺旋状纹理；壳顶钝，略凸出，从近壳顶处向右排列有 30 余个由小渐大的疣状突起的呼吸孔，末端 8～9 个呈孔状，孔口与壳面平。壳内面具彩色光泽。质坚硬，不易破碎。无臭，味微咸。

毛底石决明　长 5～14 cm，宽 3～9 cm。壳外面灰白色、灰棕色或灰黄色，常附有苔藓类或石灰虫等，凹凸不平，或有顺螺层旋转排列的粗大隆起和不甚明显的螺旋肋纹，或纹理不明显。从近壳顶处向右排列有 20 余个疣状突起，末端 4～5 个呈孔状，孔口突出于壳面。

均以壳厚、内面光彩鲜艳者为佳。

【炮制】 **石决明**　除去杂质，洗净，干燥，碾碎或碾粉。

煅石决明　取净石决明，照煅法(附录 19 页)煅至灰白色(供内服)或白色(供外用)。

【性味】 咸，平。

【功能与主治】 平肝潜阳，明目。用于头痛，眩晕，目昏，角膜炎，视神经炎，视神经萎缩。

【用法与用量】 9～30 g，先煎。

【贮藏】 置干燥处。

石　钻　子

Shizuanzi

RADIX SABIAE SCHUMANNIANAE

本品为清风藤科植物四川清风藤 Sabia schumanniana Diels 的干燥根。夏、秋二季

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

采挖，除去杂质，晒干。

【性状】 本品呈圆柱形，弯曲而稍扭，长 10～25 cm，直径 0.5～2 cm。表面红棕色、浅棕黄色或灰褐色，有细密的纵皱纹及深浅不等的横裂，有的可见支根痕。质硬而脆，断面较平，类白色，有 1 浅棕色环，木部有放射状纹理。无臭，味苦、辛。

【鉴别】 本品横切面：木栓层为 8～20 余列细胞。皮层窄。韧皮部宽广，颓废筛管群与薄壁细胞交互成层排列；有木化厚壁细胞；射线明显，细胞含黄色物。木质部发达，射线宽 1～6 列细胞，有纹孔；导管较大，多单个散在，有的含金黄色物。薄壁细胞充满淀粉粒。

粉末淡黄白色。淀粉粒甚多，单粒椭圆形、卵形或半圆形，直径 5～30 μm，脐点点状、裂缝状、人字状，有的层纹明显；具缘纹孔导管直径 28～76 μm，含黄色块状物。木纤维成束，直径约 10 μm，壁较厚，有人字形或短线形纹孔。厚壁细胞类圆形或类长方形，直径 32～50 μm，壁稍厚，有稀疏纹孔。木栓细胞多角形，黄棕色。射线细胞长椭圆形，有多数纹孔。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。

【性味】 微苦、辛，温。

【功能与主治】 祛痰，止咳，平喘。用于慢性支气管炎。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

石　菖　蒲

Shichangpu

RHIZOMA ACORI GRAMINEI

本品为天南星科植物石菖蒲 Acorus gramineus Soland. 的干燥根茎。秋、冬二季采挖，除去须根及泥沙，晒干。

【性状】 本品呈扁圆柱形，多弯曲，常有分枝，长 3～20 cm，直径 0.3～1 cm。表面棕褐色或灰棕色，粗糙，有疏密不匀的环节，节间长 0.2～0.8 cm，具细纵纹，一面残留须根或圆点状根痕；叶痕呈三角形，左右交互排列，有的其上有毛鳞状的叶基残余。质硬，断面纤维性，类白色或微红色，可见环状的内皮层及棕色的油点。气芳香，味苦、微辛。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

以条粗、断面色类白、香气浓者为佳。

【鉴别】 本品横切面：表皮细胞外壁增厚，棕色，有的含红棕色物。皮层宽广，散有纤维束及叶迹维管束；叶迹维管束外韧型，维管束鞘纤维成环，木化；内皮层明显。中柱维管束周木型及外韧型，维管束鞘纤维较少。纤维束及维管束鞘纤维周围细胞中含草酸钙方晶，形成晶纤维。薄壁组织中散有类圆形油细胞；并含淀粉粒。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，晒干。

【性味】 苦、辛，温。

【功能与主治】 开窍，豁痰，化湿，和胃。用于痰浊蒙蔽，昏厥舌强，胸腹胀闷，食欲不振。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置干燥处，防霉。

石　　斛

Shihu

HERBA DENDROBII

本品为兰科植物环草石斛 Dendrobium loddigesii Rolfe.、黄草石斛 Dendrobium chrysanthum Wall.、马鞭石斛 Dendrobium fimbriatum Hook. var. oculatum Hook.、金钗石斛 Dendrobium nobile Lindl. 或铁皮石斛 Dendrobium candidum Wall. ex Lindl. 的新鲜或干燥茎。全年均可采收，鲜用者除去根及泥沙；干用者采收后，除去杂质，用开水略烫或烘软，再边搓边烘晒，至叶鞘搓净，干燥。铁皮石斛剪去部分须根后，边炒边扭成螺旋形或弹簧状，烘干，习称"耳环石斛"。

【性状】 **鲜石斛** 呈圆柱形或扁圆柱形，长约 30 cm，直径 0.4～1.2 cm。表面黄绿色，光滑或有纵纹，节明显，色较深，节上有膜质叶鞘。肉质，多汁，易折断。气微，味微苦而回甜，嚼之有粘性。

环草石斛 呈细长圆柱形，常弯曲或盘绕成团，长 15～35 cm，直径 0.1～0.3 cm，节间长 1～2 cm。表面金黄色，有光泽，具细纵纹。质柔韧而实，断面较平坦。无臭，味淡。

黄草石斛 长 30～80 cm，直径 0.3～0.5 cm，节间长 2～3.5 cm。表面金黄色至淡黄褐色，具纵沟。体轻，质实，易折断，断面略呈纤维性。嚼之有粘性。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

马鞭石斛 呈长圆锥形，长 40～120 cm，直径 0.5～0.8 cm，节间长 3～4.5 cm。表面黄色至暗黄色，有深纵槽。质疏松，断面呈纤维性。味微苦。

金钗石斛 呈扁圆柱形，长 20～40 cm，直径 0.4～0.6 cm，节间长 2.5～3 cm。表面金黄色或黄中带绿色，有深纵沟。质硬而脆，断面较平坦。味苦。

耳环石斛 呈螺旋形或弹簧状，一般为 2～4 个旋纹，茎拉直后长 3.5～8 cm，直径 0.2～0.3 cm。表面黄绿色，有细纵皱纹，一端可见茎基部留下的短须根。质坚实，易折断，断面平坦。嚼之有粘性。

干品以色金黄、有光泽、质柔韧者为佳；耳环石斛以色黄绿、饱满、结实者为佳。

【炮制】 干品除去残根，洗净，切段，干燥。

【性味】 甘、淡，微寒。

【功能与主治】 养阴益胃，生津止渴。用于热病伤津，口干烦渴，病后虚热。

【用法与用量】 鲜品 15～30 g；干品 6～12 g。

【贮藏】 干品置通风干燥处，防潮；鲜品置阴凉潮湿处，防冻。

石 椒 草

Shijiaocao

HERBA BOENNINGHAUSENIAE

本品为芸香科植物石椒草 Boenninghausenia sessilicarpa Lévl. 的干燥全草。夏、秋二季采挖，阴干或晒干。

【性状】 本品长 30～50 cm。根类圆柱形，黄色。茎圆柱形，多分枝，表面暗紫红色。叶互生，多卷曲，为二至三回羽状复叶，小叶三出，小叶片呈倒卵形至椭圆形，长 0.8～1 cm，宽 0.5～0.7 cm；先端圆形，微凹，基部楔形，全缘；上表面绿色，下表面灰绿色，有透明油点。花小，稀疏。气特异，味苦辛。

以叶多、气味浓者为佳。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性味】 辛、苦，温。

【功能与主治】 抗菌消炎。用于上呼吸道感染，尿路感染。

【用法与用量】 15～30 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

千金网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

石　楠　叶

Shinanye

FOLIUM PHOTINIAE

本品为蔷薇科植物石楠 Photinia serrulata Lindl. 的干燥叶。夏、秋二季采收，晒干。

【性状】 本品呈长椭圆形或长倒卵形，长 8～16 cm，宽 3～6 cm。先端短尖，基部近圆形或宽楔形，边缘有细密尖锐的锯齿。上表面浅绿棕色至紫棕色，较光滑；下表面色较浅，主脉突起。革质而脆。气微，味苦、涩。

【炮制】 除去杂质，洗净，稍润，切丝，晒干。

【性味】 辛、苦，平；有小毒。

【功能与主治】 祛风，通络，益肾。用于风湿痹痛，腰背酸痛，足膝无力，偏头痛。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置干燥处。

石　榴　子

Shiliuzi

SEMEN GRANATI

本品系藏族习用药材，藏文名为 ནར་རྒྱ (森珠)；为石榴科植物石榴 Punica granatum L. 的干燥种子。秋季采摘成熟果实，置通风干燥处，待果皮风干后，剥取种子，晒干。

【性状】 本品为略长而具棱的颗粒，常粘连成团块。单粒一端较大，长 5～9 mm，直径 3～4 mm。外层为黄红色至暗褐色的肉质外种皮，有皱纹，富糖性而粘。中层为淡黄棕色至淡红棕色的内种皮，质较硬。种仁乳白色。气微，味酸、微甜。

以粒大、色红、味浓者为佳。

【鉴别】 本品粉末红棕色。石细胞甚多，不规则形、类圆形或长圆形，直径 16～

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

104 μm, 壁厚或稍厚。油滴多。淀粉粒少见，类圆形，直径 3～10 μm, 脐点裂缝状。

【性味】 酸、甘，温。

【功能与主治】 温中健胃。用于食欲不振，胃寒痛，胀满，消化不良，泄泻。

【用法与用量】 6～9 g，多入丸散服。

【贮藏】 置干燥处。

石　榴　皮

Shiliupi

PERICARPIUM GRANATI

本品为石榴科植物石榴 Punica granatum L. 的干燥果皮。秋季果实成熟后收集果皮，晒干。

【性状】 本品呈不规则的片状或瓢状，大小不一，厚 1.5～3 mm。外表面红棕色、棕黄色或暗棕色，略有光泽，粗糙，有麻点。有的有突起的筒状宿萼，有的有粗短果梗或果梗痕。内表面黄色或红棕色，有种子脱落后的小凹坑及隔瓤残迹。质硬而脆，断面黄色，略显颗粒状。无臭，味苦涩。

以块大、皮厚、外表面色红棕者为佳。

【鉴别】 (1) 本品粉末红棕色。石细胞类圆形、长方形或形状不规则，少数分枝状，直径 27～102 μm, 壁较厚，胞腔大，有的含棕色物。表皮细胞类方形或类长方形，壁略厚。草酸钙簇晶直径 10～25 μm; 稀有方晶。螺纹及网纹导管直径 12～18 μm。纤维少数，细长，直径约 20 μm。淀粉粒类圆形，直径 2～10 μm。

(2) 取本品粉末 1 g, 加水 10 ml, 置 60° 水浴中加热 10 分钟，趁热滤过。取滤液 1 ml, 加 1%三氯化铁的乙醇溶液 1 滴，即显墨绿色。

【炮制】 除去杂质，洗净，切块，晒干。

【性味】 酸、涩，温。

【功能与主治】 涩肠，止血，驱虫。用于慢性腹泻，痢疾，便血，脱肛，崩漏，白带，蛔虫病。

【用法与用量】 2.5～4.5 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

石　　膏

Shigao

GYPSUM FIBROSUM

本品为单斜晶系石膏矿石，主含含水硫酸钙。采挖后，除去泥沙及杂石。

【性状】 本品为纤维状的结晶聚合体，呈长块状或不规则块状，大小不一。白色、灰白色或淡黄色，有的半透明，或附有蓝灰色或灰黄色片状杂质。体重，质脆，易纵向断裂，手捻能碎，纵断面具纤维状纹理，并有丝样光泽。无臭，味淡。

以色白、半透明、纵断面如丝者为佳。

【鉴别】 (1) 取本品一小块约 2 g，置具有小孔软木塞的试管内，灼烧，管壁有水生成，小块变为不透明体。

(2) 取本品粉末约 0.2 g，加稀盐酸 10 ml，加热使溶解，溶液显钙盐(附录 40 页) 与硫酸盐 (附录41页) 的鉴别反应。

【检查】 **重金属** 取本品 16 g，加冰醋酸 4 ml 与水 96 ml，煮沸 10 分钟，冷后，加水至原体积，滤过。取滤液 25 ml，依法检查(附录46页第一法)，含重金属不得过百万分之十。

砷盐 取本品 1 g，加盐酸 5 ml，加水至 23 ml，加热溶解，冷后，依法检查 (附录 47 页)，含砷量不得过百万分之二。

【炮制】 **生石膏** 洗净，晒干，打碎，除去杂石，研粗粉。

煅石膏 取净石膏，照煅法 (附录 19 页) 煅至红透。

【性味】 甘、辛，大寒。

【功能与主治】 生用清热泻火，除烦止渴；煅用生肌收口。用于热病高热、大汗、口渴、烦躁，肺热咳喘，胃火头痛，牙痛；外治溃疡不敛，湿疹，烧、烫伤。

【用法与用量】 内服多用生石膏，15～60 g，先煎；外用多用煅石膏，研末掺敷患处。

布　渣　叶

Buzhaye

FOLIUM MICROCOTIS

本品为椴树科植物破布树 Microcos paniculata L. 的干燥叶。夏、秋二季采收，除去

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

枝梗及杂质，干燥。

【性状】 本品多皱缩、破碎。完整者展平后呈卵状长圆形或倒卵圆形，长 10～15cm，宽 4～8 cm。绿褐色或黄棕色。先端渐尖，基部钝圆，稍偏斜，边缘具细齿。基出脉 3 条，侧脉羽状，小脉网状。叶脉及叶柄有柔毛。气微，味淡、微涩。

以叶大、完整、色绿者为佳。

【鉴别】 本品表面观：表皮细胞多角形；气孔不定式，副卫细胞 3～5 个。非腺毛有两种：一种星状毛有 2～24 个分枝，每分枝有数个分隔；另一种非腺毛单细胞，有的具分隔。腺毛头部 5～10 余细胞，椭圆形，柄单细胞。草酸钙方晶甚多，直径 10～26 μm；并有细小簇晶，存在于主脉薄壁细胞中。

【炮制】 除去杂质，洗净，干燥。

【性味】 微酸，凉。

【功能与主治】 清热消食。用于感冒食滞，食欲不振。

【用法与用量】 15～30 g。

【贮藏】 置干燥处。

龙　　齿

Longchi

DENS DRACONIS

本品为古代哺乳动物如三趾马、犀类、鹿类、牛类、象类等的牙齿化石。采挖后，除去泥沙及牙床。

【性状】 本品呈齿状或破碎成不规则的块状，可分为犬齿及臼齿。完整者犬齿呈圆锥形，先端较细或略弯曲，直径 0.8～3.5 cm，近尖端处断面常中空；臼齿呈圆柱形或方柱形，略弯曲，一端较细，长 2～20 cm，直径 1～9 cm，多有深浅不同的沟棱。表面呈浅蓝灰色或暗棕色者，习称“青龙齿”，呈黄白色者，习称“白龙齿”。有的表面可见具光泽的釉质层（珐琅质）。质坚硬，断面粗糙，凹凸不平，或有不规则的凸起棱线，有吸湿性。无臭，无味。

以断面吸湿性强者为佳。断面无吸湿性、烧之发烟有异臭者，不可供药用。

【鉴别】 取本品粉末约 2 g，滴加稀硝酸 10 ml，即泡沸，发生二氧化碳气；将此气通入氢氧化钙试液中，即发生白色沉淀。待泡沸停止，滴加氢氧化钠试液中和后，滤过，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

滤液显钙盐（附录 40 页）与磷酸盐（附录 42 页）的鉴别反应。

【炮制】 **龙齿** 除去泥沙，打碎。

煅龙齿 取净龙齿，照煅法（附录 19 页）煅至红透，放凉，取出，碾碎。

【性味】 甘、涩，凉。

【功能与主治】 安神镇惊。用于心悸易惊，心烦，失眠多梦。

【用法与用量】 9～15 g，先煎。

【贮藏】 置干燥处，防潮。

龙　　骨

Longgu

OS DRACONIS

本品为古代哺乳动物如三趾马、犀类、鹿类、牛类、象类等的骨骼化石或象类门齿的化石，前者习称“龙骨”，后者习称“五花龙骨”。挖出后除去泥沙及杂质。五花龙骨极易破碎，常用毛边纸粘贴。

【性状】 **龙骨** 呈骨骼状或已破碎呈不规则的块状，大小不一。表面白色、灰白色或淡棕色，多较平滑，有的具纹理与裂隙或棕色条纹和斑点。质硬，断面不平坦，关节处有多数蜂窝状小孔。吸湿性强。无臭，无味。

五花龙骨 呈不规则块状，大小不一；有的呈圆柱状，长短不一，直径 5～25 cm。淡灰白色、淡黄白色或淡黄棕色，夹有蓝灰色及红棕色深浅粗细不同的花纹，偶有不具花纹者。表面平滑，时有小裂隙。质硬，较酥脆，易成片状剥落。

龙骨以质硬、色白、吸湿性强者为佳。五花龙骨以体较轻、质酥脆、分层、有花纹、吸湿性强者为佳。断面无吸湿性、烧之发烟有异臭者不可供药用。

【鉴别】 取本品粉末约 2 g，滴加稀硝酸 10 ml，即泡沸，发生二氧化碳气；将此气通入氢氧化钙试液中，即发生白色沉淀。待泡沸停止，滴加氢氧化钠试液中和后，滤过，滤液显钙盐（附录 40 页）与磷酸盐（附录 42 页）的鉴别反应。

【炮制】 **龙骨** 除去杂质及泥沙，打碎。

煅龙骨 取净龙骨，照煅法（附录 19 页）煅至红透，放凉，取出，碾碎。

【性味】 甘、涩，平。

【功能与主治】 安神，固涩；外用生肌敛疮。用于心悸易惊，失眠多梦，自汗，盗

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

汗，遗精，白带，崩漏；外治溃疡久不收口，阴囊湿痒。

【用法与用量】 15～30 g，先煎；外用适量，研末敷患处。

【贮藏】 置干燥处，防潮。

龙　　胆

Longdan

RADIX GENTIANAE

本品为龙胆科植物条叶龙胆 Gentiana manshurica Kitag.、龙胆 Gentiana scabra Bge.、三花龙胆 Gentiana triflora Pall. 或坚龙胆 Gentiana regescens Franch. 的干燥根及根茎。前三种习称"龙胆"，后一种习称"坚龙胆"。春、秋二季采挖，洗净，干燥。

【性状】 **龙胆** 根茎呈不规则的块状，长 1～3 cm，直径 0.3～1 cm；表面暗灰棕色或深棕色，上端有茎痕或残留茎基，周围和下端着生多数细长的根。根圆柱形，略扭曲，长 10～20 cm，直径 0.2～0.5 cm；表面淡黄色或黄棕色，上部多有显著的横皱纹，下部较细，有纵皱纹及支根痕。质脆，易折断，断面略平坦，皮部黄白色或淡黄棕色，木部色较浅呈点状排列。气微，味甚苦。

坚龙胆 表面无横皱纹，表皮膜质，易脱落，木部黄白色，易与皮部分离。

均以条粗长、色黄或色黄棕者为佳。

【鉴别】 本品横切面：

龙胆 表皮细胞有时残存，外壁较厚。皮层窄；外皮层细胞类方形，壁稍厚，木栓化；内皮层细胞切向延长，每一细胞由纵向壁分隔成数个类方形小细胞。韧皮部宽广，有裂隙。形成层不甚明显。木质部导管 3～10 个群束。髓部明显。薄壁细胞含细小草酸钙针晶。

坚龙胆 内皮层以外组织多已脱落。木质部导管均匀密布。无髓部。

粉末淡黄棕色：

龙胆 外皮层细胞表面观纺锤形，每一细胞由横壁分隔成数个小细胞。内皮层细胞表面观类长方形，甚大，每一细胞由纵壁分隔成数个小细胞。薄壁细胞含细小草酸钙针晶。网纹及梯纹导管直径约至 45 μm。

坚龙胆 无外皮层细胞。内皮层细胞纵横分隔成多数小细胞。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切段，干燥。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清利肝胆湿热，健胃。用于黄疸，胁痛，肝炎，胆囊炎，食欲不振，目赤，中耳炎，尿路感染，带状疱疹，急性湿疹，阴部湿痒。

【用法与用量】 2.5～4.5 g。

【贮藏】 置干燥处。

龙　眼　肉(桂圆肉)

Longyanrou

ARILLUS LONGAN

本品为无患子科植物龙眼 Euphoria longan (Lour.) Steud. 的假种皮。夏、秋二季采收成熟果实，干燥，除去壳、核，晒至干爽不粘。

【性状】 本品为纵向破裂的不规则薄片，常数片粘结。片长约 1.5 cm，宽 2～4 cm，厚约 0.1 cm。棕褐色，半透明。一面皱缩不平，一面光亮而有细纵皱纹。质柔润。气微香，味甜。

以片肥厚、柔润、色棕褐、甜味浓者为佳。

【性味】 甘，温。

【功能与主治】 补益心脾，养血安神。用于心悸怔忡，健忘，失眠，贫血，月经过多。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮、防蛀。

龙　脷　叶

Longliye

FOLIUM SAUROPI

本品为大戟科植物龙脷叶 Saurepus changianus S. Y. Hu 的干燥叶。夏、秋二季采收，晒干。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 本品常皱缩，展平后叶片呈倒卵状披针形，长 5～14 cm，宽 2.5～4.5 cm。先端钝或浑圆，基部楔形而稍圆，全缘。上表面灰绿色至墨绿色，下表面黄绿色。中脉突起，羽状侧脉 5～7 对，于近叶缘处合成边脉。叶柄短。气微，味淡、微甘。

以叶大、色绿者为佳。

【性味】 甘、淡，平。

【功能与主治】 润肺止咳。用于肺燥咳嗽。

【用法与用量】 9～30 g。

【贮藏】 置干燥处。

龙　葵

Longkui

HERBA SOLANI NIGRI

本品为茄科植物龙葵 Solanum nigrum L. 的干燥地上部分。夏、秋二季采割，除去杂质，干燥。

【性状】 本品茎呈圆柱形，有分枝，长 20～60 cm，直径 0.2～1 cm；表面绿色或黄绿色，抽皱呈沟槽状；质硬而脆，断面黄白色，中空。叶对生，皱缩或破碎，完整者展平后呈卵形，长 2.5～10 cm，宽 1.5～5.5 cm；暗绿色，全缘或有不规则的波状粗齿；两面光滑或疏被短柔毛；叶柄长 1～2 cm。聚伞花序侧生，花 4～10 朵，多脱落，花萼杯状，棕褐色，花冠棕黄色。浆果球形，直径约 6 mm，表面棕褐色或紫黑色，皱缩。种子多数，棕色。气微，味淡。

以茎叶色绿、带果者为佳。

【炮制】 除去老梗及杂质，喷淋清水，切段，干燥。

【性味】 苦、微甘，寒；有小毒。

【功能与主治】 清解热毒，消肿散结，消炎利尿。用于疮疖肿痛，尿路感染，小便不利，肿瘤。

【用法与用量】 9～30 g；外用适量，鲜品捣烂外敷，干品熬膏外敷或煎汤洗患处。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

平　贝　母

Pingbeimu

BULBUS FRITILLARIAE USSURIENSIS

本品为百合科植物平贝母 Fritillaria ussuriensis Maxim. 的干燥鳞茎。夏初采挖，除去须根及泥沙，用草木灰拌匀，晒干或低温干燥，筛去灰屑。

【性状】 本品呈扁圆形，高 0.5～0.8 cm，直径 1～2 cm。表面类白色或微棕黄色，外层鳞叶 2 瓣，肥厚，大小相似，相对抱合，顶端常开裂，内有小鳞叶和心芽。质硬而脆，断面白色，粉性。气微，味微苦。

以个均匀、饱满、色白、粉性足者为佳。

【鉴别】 (1) 本品粉末类白色。淀粉粒甚多，不规则卵形、圆柱形或类圆形，直径 6～40 μm，脐点点状、裂缝状或人字状，层纹明显。表皮细胞长方形或类多角形，壁淡黄棕色。气孔不定式，保卫细胞黄绿色，副卫细胞 4～6 个。螺纹及环纹导管直径 8～15 μm。

(2) 取本品粗粉 5 g，加含 0.5%盐酸的乙醇溶液 35 ml，置水浴上回流 10 分钟，趁热滤过，取滤液 15 ml，加氨试液使成中性，置水浴上蒸干，残渣加 5% 硫酸溶液 3 ml 使溶解，滤过。取滤液 1 ml，加碘化铋钾试液 2 滴，发生红棕色沉淀；另取滤液 1 ml，加碘化汞钾试液 2 滴，发生淡黄色沉淀；再取滤液 1 ml，加硅钨酸试液 2 滴，发生白色沉淀。

【性味】 微苦，微寒。

【功能与主治】 清肺，化痰，止咳。用于肺热咳嗽，痰多胸闷。

【用法与用量】 3～9 g。

【注意】 不宜与乌头类药材同用。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

北　豆　根

Beidougen

RHIZOMA MENISPERMI

本品为防己科植物蝙蝠葛 Menispermum dauricum DC. 的干燥根茎。春、秋二季

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

采挖，除去须根及泥沙，干燥。

【性状】 本品呈细长圆柱形，弯曲，有分枝，长可达 50 cm，直径 0.3～0.8 cm。表面黄棕色至暗棕色，多有弯曲的细根，并可见突起的根痕及纵皱纹，外皮易剥落。质韧，不易折断，断面不整齐，纤维性，木部淡黄色，呈放射状排列，中心有髓。气微，味苦。

以条粗长、外皮色黄棕、断面色淡黄者为佳。

【鉴别】 取本品粉末约 5g，加氨试液 5ml，拌匀，放置 20 分钟，加氯仿 50ml，振摇，放置 1 小时，滤过，滤液置分液漏斗中，加 10% 盐酸溶液 5ml，振摇提取。分取酸液，置二支试管中，一管加碘化铋钾试液，发生橙红色沉淀；另一管加碘试液，发生棕色沉淀。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。

【性味】 苦，寒；有小毒。

【功能与主治】 清热解毒，消肿止痛。用于咽喉肿痛，肺热咳嗽。

【用法与用量】 6～9 g。

【贮藏】 置干燥处。

【制剂】 北豆根片

北 豆 根 片

Beidougen Pian

TABELLAE MENISPERMI

本品为北豆根中提取的北豆根总碱片。每片含总碱作为山豆根碱（$C_{38}H_{44}O_6N_2$）计算，应为标示量的 90.0～110.0%。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显黑棕色；味苦。

【鉴别】 取本品 4 片，除去糖衣，研细，加稀盐酸 10ml，振摇提取 30 分钟，滤过。取滤液 2ml，加碘化钾碘试液 2 滴，即发生红棕色沉淀；另取滤液 2ml，加三硝基苯酚试液 2 滴，即发生黄色沉淀。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定（附录 6 页）。

【含量测定】 取本品 10 片，注意研细后，移入磨口塞锥形瓶中，精密加含有浓氨试液 1 滴的苯 30 ml，振摇 4 小时，用脱脂棉滤过，精密量取滤液 20 ml（相当于北豆根总碱 100mg），置分液漏斗中，用 $N/1$ 盐酸液分次振摇提取，每次 10ml，至生物碱提尽

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

为止，合并酸液，加氨试液使成碱性，用氯仿分次振摇提取，每次 10ml，至生物碱提尽为止，每次氯仿液均用同一的水 10ml 洗涤，合并氯仿液，置水浴上蒸干，加无水乙醇 5 ml，再蒸干，再加无水乙醇 5ml 使溶解，精密加 $N/50$ 硫酸液 25ml 与甲基红指示液 1 滴，用 $N/50$ 氢氧化钠液滴定，即得（每 1ml 的 $N/50$ 硫酸液相当于 6.248 mg 的 $C_{38}H_{44}O_6N_2$）。

【功能与主治】 清热解毒，止咳，祛痰。用于咽喉肿痛，扁桃体炎，慢性支气管炎。

【用法与用量】 口服，一次 4 片，一日 3 次。

【规格】 15mg

【贮藏】 密封保存。

北　沙　参

Beishashen

RADIX GLEHNIAE

本品为伞形科植物珊瑚菜 Glehnia littoralis Fr. Schmidt ex Miq. 的干燥根。夏、秋二季采挖，除去须根，洗净，稍晾，置沸水中烫后，除去外皮，干燥。

【性状】 本品呈细长圆柱形，偶有分枝，长 15～45cm，直径 0.4～1.2cm。顶端常留有黄棕色根茎残基，上端稍细，中部略粗，下部渐细。表面淡黄白色，略粗糙，偶有残存外皮，全体有细纵皱纹或纵沟，并有棕黄色点状细根痕。质脆，易折断，断面皮部浅黄白色，木部黄色。气特异，味微甘。

以质紧密、色白者为佳。

【鉴别】 本品横切面：皮层为数列薄壁细胞，有分泌道散在。韧皮部宽广，射线明显；外侧筛管群颓废作条状；分泌道散列，直径 20～65μm，内含黄棕色分泌物，周围分泌细胞 5～8 个。形成层成环。木质部射线宽 2～5 列细胞；导管大多成“V”形排列；薄壁细胞含糊化淀粉粒。

【炮制】 除去残茎及杂质，略润，切段，晒干。

【性味】 甘、微苦，微寒。

【功能与主治】 润肺止咳，养胃生津。用于肺燥干咳，热病伤津口渴。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【注意】 不宜与藜芦同用。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

北　野　菊

Beiyeju

HERBA CHRYSANTHEMI LAVANDULAEFOLII

本品为菊科植物细裂野菊 Chrysanthemum lavandulaefolium (Fisch.) Makino 的干燥地上部分。秋季花期采割，晒干。

【性状】 本品茎呈圆柱形，有分枝，长 20～140 cm，直径 0.1～0.5 cm；表面黄绿色至淡棕色，具细纵棱，小枝被疏柔毛。叶片皱缩或破碎，完整者展平后呈卵形或椭圆状卵形，羽状深裂，长约 6 cm，暗绿色或棕褐色；叶柄极细，长 1～1.5 cm。头状花序排成伞房状，着生枝顶，花序小球形，直径 0.2～0.8 cm，黄色。气清香，味微苦。

【鉴别】 取本品粗粉 5 g，置滤纸筒内，加乙醚 50ml，加热回流 1 小时，醚液弃去，滤纸筒与残渣挥尽乙醚后，再加甲醇 25ml，加热回流半小时，甲醇液加活性炭 0.3g 脱色，滤过，滤液照下述方法试验：

(1) 取滤液，点于滤纸上，喷洒 2%三氯化铝的乙醇溶液，干燥后，置紫外光灯下观察，显黄绿色荧光。

(2) 取滤液 1ml，加镁粉少量与盐酸 4～5 滴，置水浴中加热，显红色。

【炮制】 除去老梗及杂质，喷淋清水，稍润，切段，干燥。

【性味】 微苦、辛，凉。

【功能与主治】 清热解毒，凉肝明目。用于防治流行性感冒、感冒，头痛，目赤，肺炎；外治痈疖疔疮，宫颈糜烂。

【用法与用量】 9～30g；外用适量，煎汤洗或用鲜品捣烂敷患处。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防潮、防蛀。

四　方　藤

Sifangteng

CAULIS CISSI

本品为葡萄科植物四方藤 Cissus pteroclada Hayata 的干燥藤茎。秋季采割，截段，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

晒干。

【性状】 本品呈四棱形，长短不等，直径 0.5～2cm。表面灰棕色至黑褐色，粗糙，具突起皮孔、细纵纹及横裂纹，节膨大，有的棱上有翅。质硬，断面纤维性，皮部灰褐色至棕红色，木部灰棕色或黄棕色，髓部方形，淡紫色或灰褐色。气微，味酸、微苦。

【鉴别】 (1) 取本品粗粉约 5g，加水 50ml，置 50～60°水浴上加热 1 小时，趁热滤过。取滤液 1ml，加氯化钠明胶试液 2 滴，发生大量白色沉淀。

(2) 取本品粗粉约 5g，加甲醇 40ml，置水浴上回流 10 分钟，趁热滤过，放冷，滤液用 4%明胶溶液使鞣质沉淀，滤过，滤液蒸发至约 2ml，加无水乙醇 8ml，滤过。取滤液 1ml，加 3%碳酸钠溶液 1ml，置水浴中加热 3 分钟，再在冰水浴中冷却，加新制的重氮对硝基苯胺试液 2 滴，即显红色。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，晒干。

【性味】 酸、辛，平。

【功能与主治】 祛风湿，舒筋络。用于风湿痹痛，腰肌劳损。

【用法与用量】 15～30g。

【贮藏】 置干燥处。

四　叶　参

Siyeshen

RADIX CODONOPSIS LANCEOLATAE

本品为桔梗科植物羊乳 Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv. 的干燥根。秋季采挖，除去须根，晒干，或晒至半干时，每天揉搓一次，直至全干，或趁鲜切片，晒干。

【性状】 本品呈纺锤形、倒卵状纺锤形或类圆柱形，有的稍分枝，长 6～15cm，直径 2～6cm。表面灰棕色或灰黄色，皱缩不平，顶端具根茎(芦头)，常见密集的芽痕和茎痕；芦下有多数环纹，密集而明显，向下渐疏浅，环纹间有细纵裂纹。质稍松，易折断，断面不平坦，多裂隙。切片大小不一，切面灰黄色或浅棕色，皮部与木部无明显区分。气微，味甜、微苦。

以个大、味甜者为佳。

【炮制】 除去杂质；未切片者，洗净，润透，切片，晒干。

【性味】 甘，温。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 补血通乳，清解热毒，消肿排脓。用于病后体虚，乳汁不足，痈肿疮毒，乳腺炎。

【用法与用量】 15～30g；鲜品 30～60g。

【贮藏】 置通风干燥处。

四　季　青

Sijiqing

FOLIUM ILICIS CHINENSIS

本品为冬青科植物冬青 Ilex chinensis Sims 的干燥叶。秋、冬二季采收，晒干。

【性状】 本品呈长椭圆形，长 6～12cm，宽 2～3.5 cm；先端急尖或渐尖，基部楔形，边缘具疏浅锯齿；上表面棕褐色或灰绿色，有光泽，下表面色较浅。叶柄长约 1cm。革质。微有清香气，味苦、涩。

【鉴别】 (1) 本品横切面：上表皮细胞扁长方形，被角质层；下表皮细胞较小，有多数气孔。栅栏组织为 2～4 列细胞；海绵组织含草酸钙簇晶，直径 18～40μm。主脉维管束外韧型；中柱鞘纤维排列成环；薄壁细胞含簇晶。

(2) 取本品粗粉 0.5g，加水适量，温浸 2 小时，滤过。取滤液点于蓝色石蕊试纸上，即显红色；另取滤液，加三氯化铁试液 1 滴，即显墨绿色。

(3) 取本品粗粉 8g，加水适量，煮沸 20 分钟，滤过，滤液加热浓缩至 8ml，加乙醚 8ml 振摇提取，醚液置水浴上蒸干，残渣加乙醇 4ml 使溶解。取溶液 2ml，加氨制硝酸银试液 5～6 滴，显棕褐色，置水浴上加热后，呈银镜反应；另取溶液 2ml，加二硝基苯肼试液 5～6 滴，显橙红色。

【炮制】 除去杂质，洗净，切丝，干燥。

【性味】 苦、涩，凉。

【功能与主治】 清热解毒，消肿祛瘀。用于肺炎，急性咽喉炎，痢疾，胆道感染，尿路感染；外治烧伤，下肢溃疡，麻风溃疡。

【用法与用量】 15～60g；外用适量，水煎外涂。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

【制剂】 (1) 四季青片　(2) 四季青药水　(3) 四季青搽剂

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

四 季 青 片

Sijiqing Pian

TABELLAE ILICIS CHINENSIS

本品为四季青浸膏片。每片相当于四季青4g。

【制法】 取四季青4000g，洗净，除留一部分烘干后粉碎成细粉外，余量加水煎煮二次，每次2小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至约2000ml，加乙醇4000ml，搅匀，静置，取上清液浓缩成膏，再加4倍量水搅匀，浸渍，沉定后，取上清液浓缩成稠膏状，加四季青细粉，混匀烘干，粉碎，制成颗粒，压制成1000片，包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；味苦、涩。

【鉴别】 取本品4片，除去糖衣，研细，加水15ml，微热搅拌提取后，滤过，滤液照四季青药水项下的鉴别法（161页）试验，显相同的反应。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定（附录6页）。

【功能与主治】 收敛，抗菌。用于急性咽喉炎，痢疾，尿路感染。

【用法与用量】 口服，一次5片，一日3次。

【贮藏】 密封保存。

四 季 青 药 水

Sijiqing Yaoshui

LIQUOR ILICIS CHINENSIS

本品为四季青的煎液。

【制法】 取四季青1000g，洗净，加水煎煮二次，每次2小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至1000ml，加适宜的防腐剂，搅匀，即得。

【性状】 本品为棕红色的液体。

【鉴别】 （1）取本品5滴，加水1ml稀释后，用蓝色石蕊试纸试验，即显红色；溶液中加三氯化铁试液1滴，即显墨绿色。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

(2) 取本品 4ml，加乙醚 4ml 振摇提取，醚液置水浴上蒸干，残渣加乙醇 4ml 使溶解，取溶液 2ml，加氨制硝酸银试液 5～6 滴，显棕褐色，置水浴上加热后，呈银镜反应；另取溶液 2ml，加二硝基苯肼试液 5～6 滴，显橙红色。

【功能与主治】 收敛，抗菌。用于二度烧伤，大疱性皮肤病。

【用法与用量】 烧伤面清创后，反复喷雾或涂布适量，直至结痂为止；皮肤疾患外搽。

【贮藏】 密封，置阴凉处保存。

四季青搽剂

Sijiqing Chaji

LINIMENTUM ILICIS CHINENSIS

【处方】

四季青	1800 g
吐温 80	200ml
麻油	200ml

【制法】 取四季青，洗净，加水煎煮二次，每次 2 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至 900ml，加入乙醇 1800ml，搅匀，静置，取上清液浓缩使成 600ml，加适宜的防腐剂，再加吐温 80 与麻油，用高速搅拌使成乳化液，即得。

【性状】 本品为棕红色的乳状液体。

【功能与主治】 收敛，抗菌。用于深二度三度烧、烫伤，皮肤溃疡。

【用法与用量】 临用前摇匀。清创后，外搽或用纱布浸湿后贴敷于创面。

【贮藏】 密封，置阴凉处保存。

生　　姜

Shengjiang

RHIZOMA ZINGIBERIS RECENS

本品为姜科植物姜 Zingiber officinale (Willd.) Rosc. 的新鲜根茎。秋、冬二季采挖，除去须根及泥沙。

【性状】 本品呈不规则块状，略扁，具指状分枝，长 4～18 cm，厚 1～3 cm。表面

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

黄褐色或灰棕色，有环节，分枝顶端有茎痕或芽。质脆，易折断，断面浅黄色，内皮层环纹明显，维管束散在。气香特异，味辛辣。

以块大、粗壮、气味浓者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，用时切片。

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 解表散寒，温中止呕。用于风寒感冒、咳嗽，胃寒呕吐。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置阴凉潮湿处，或埋入湿沙内，防冻。

代 代 花

Daidaihua

FLOS CITRI AURANTII

本品为芸香科植物代代花 Citrus aurantium L. var. amara Engl. 的干燥花蕾。5～6月花未开放时分批采摘，及时干燥。

【性状】 本品略呈长卵形，顶端稍膨大，长 1～2 cm，有梗。花萼基部联合，先端5裂，灰绿色，有凹陷的小油点。花瓣 5 片，覆瓦状抱合，黄白色或灰黄色，可见棕色油点和纵脉。雄蕊多数，基部联合成数束。子房倒卵形。体轻，质脆。气香，味微苦。

以完整、色黄白、香气浓者为佳。

【性味】 甘、微苦，平。

【功能与主治】 理气宽胸，开胃。用于胸脘胀闷，恶心，食欲不振。

【用法与用量】 1.5～2.5 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，密闭保存，防霉、防蛀。

仙 茅

Xianmao

RHIZOMA CURCULIGINIS

本品为石蒜科植物仙茅 Curculigo orchioides Gaertn. 的干燥根茎。秋、冬二季采

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

挖，除去根头和须根，洗净，干燥。

【性状】 本品呈圆柱形，略弯曲，长3～10 cm，直径0.4～0.8 cm。表面黑褐色或棕褐色，粗糙，有细孔状的须根痕及纵横皱纹。质硬而脆，易折断，断面不平坦，淡褐色或棕褐色，近中心处色较深。气微香，味微苦、辛。

以条粗、表面色黑褐者为佳。

【鉴别】 本品横切面：木栓细胞5～6列，壁较厚。基本组织中散有粘液细胞，直径60～160 μm，内含草酸钙针晶束，针晶长10～20 μm；中心部维管束周木型及外韧型，散列。薄壁细胞充满淀粉粒。

【炮制】 除去杂质，洗净，切段，干燥。

【性味】 辛，温；有小毒。

【功能与主治】 补肾阳，祛寒湿。用于腰膝冷痛，四肢麻痹，阳痿。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置干燥处，防霉、防蛀。

仙　桃　草

Xiantaocao

HERBA VERONICAE PEREGRINAE

本品为玄参科植物蚊母草 Veronica peregrina L. 带虫瘿的干燥全草。虫瘿内的小虫为象虫科昆虫仙桃草直喙象 Gymnetron miyoshii Miyoshi。5～6月间虫瘿膨大略带红色时采收，立即干燥。

【性状】 本品长10～20 cm，呈黄褐色，根须状。茎多分枝，直径0.5～2 mm，表面有细纵纹，断面中空。叶对生，无柄，易脱落；叶片皱缩、卷曲，质脆，易碎，完整者展平后呈倒披针形或条状披针形，长0.5～1.5 cm，宽0.2～0.4 cm，全缘或有疏浅齿。花小，宿萼4深裂。蒴果扁圆倒心形，长约0.2 cm，直径约0.3 cm，果皮膜质；种子多数，细小。果内常有小虫寄生，形成虫瘿，肿胀似桃，黑色。气微，味淡。

以虫瘿多内有小虫者为佳。

【鉴别】 (1) 取本品粉末2 g，加甲醇15 ml，置水浴上回流10分钟，滤过。取滤液2 ml，加镁粉少量与盐酸0.5 ml，置水浴中，加热3分钟，显红色。

(2) 取鉴别 (1) 项下剩余的滤液1 ml，加3% 碳酸钠溶液1 ml，置水浴中加热3

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

分钟后，在冰水浴中冷却后，加新制的重氮对硝基苯胺试液 2 滴，显红色。

【炮制】 除去杂质，喷淋清水，切段，干燥。

【性味】 甘、苦，温。

【功能与主治】 活血消肿，止血，止痛。用于吐血，咯血，衄血，便血，跌扑损伤。

【用法与用量】 6～15 g；外用适量，研末加白酒调敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

仙　鹤　草

Xianhecao

HERBA AGRIMONIAE

本品为蔷薇科植物龙牙草 Agrimonia pilosa Ledeb. 的干燥地上部分。夏、秋二季茎叶茂盛时采割，除去杂质，干燥。

【性状】 本品长 50～100 cm，全体被白色柔毛。茎下部圆柱形，直径 4～6 mm，红棕色，上部方柱形，四面略凹陷，绿褐色，有纵沟及棱线，有节；体轻，质硬，易折断，断面中空。单数羽状复叶互生，暗绿色，皱缩卷曲；质脆，易碎；叶片有大小 2 种，相间生于叶轴上，顶端小叶较大，完整小叶片展平后呈卵形或长椭圆形，先端尖，基部楔形，边缘有锯齿；托叶 2 片，抱茎，斜卵形。总状花序细长，花萼下部呈筒状，萼筒上部有钩刺，先端 5 裂，花瓣黄色。气微，味微苦。

以质嫩、叶多者为佳。

【鉴别】 本品叶的粉末暗绿色。上表皮细胞多角形；下表皮细胞壁波状弯曲，气孔不定式或不等式。非腺毛单细胞，长短不一，壁厚，木化，具疣状突起，少数有螺旋纹理。小腺毛头部 1～4 细胞，卵圆形，柄 1～2 细胞；另有少数腺鳞，头部单细胞，直径约至 68 μm，含挥发油滴，柄单细胞。草酸钙簇晶甚多，直径 9～50 μm。

【炮制】 除去残根及杂质，洗净，稍润，切段，干燥。

【性味】 苦，平。

【功能与主治】 止血。用于咯血，吐血，尿血，血痢。

【用法与用量】 6～12 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

白　　及

Baiji

RHIZOMA BLETILLAE

本品为兰科植物白及 Bletilla striata (Thunb.) Reichb. f. 的干燥块茎。夏、秋二季采挖，除去须根，洗净，置沸水中煮或蒸至无白心，晒至半干，撞去外皮，晒干。

【性状】 本品呈不规则扁圆形，多有 2～3 个爪状分枝，长 1.5～5 cm，厚 0.5～1.5 cm。表面灰白色或黄白色，有数圈同心环节和棕色点状须根痕，上面有凸起的茎痕，下面有连接另一块茎的痕迹。质坚硬，不易折断，断面类白色，角质样。无臭，味苦，嚼之有粘性。

以个大、饱满、色白、质坚者为佳。

【鉴别】 本品粉末淡黄白色。表皮细胞垂周壁波状弯曲，略增厚，木化，孔沟明显。草酸钙针晶束存在于大的类圆形粘液细胞中，或随处散在，针晶长 18～88 μm。纤维成束，直径 11～30 μm，壁木化，具人字形或椭圆形纹孔。梯纹、具缘纹孔及螺纹导管直径 10～32 μm。糊化淀粉粒团块无色。

【炮制】 洗净，润透，切片，晒干。

【性味】 苦、涩，微寒。

【功能与主治】 收敛止血，消肿生肌。用于肺结核咳血，溃疡病出血，外伤出血，手足皲裂。

【用法与用量】 6～15 g；外用粉末适量，敷患处。

【注意】 不宜与乌头类药材同用。

【贮藏】 置通风干燥处。

白 云 花 根

Baiyunhuagen

RADIX HERACLEI RAPULAE

本品为伞形科植物白云花 Heracleum rapula Franch. 的干燥根。秋末冬初采挖，除

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

去泥沙，阴干。

【性状】 本品略呈圆柱形，稍弯曲，有的有分枝，长 20～60 cm，直径 1.5～3.5 cm。根头部膨大，呈圆锥形，顶端有残留茎基及叶鞘残痕，周围有环纹。表面淡黄褐色或棕灰色，有纵皱纹、皮孔及须根痕。质脆，易折断，断面皮部白色，有红棕色斑点，木部淡黄色。气浓香，味苦、麻。

以条粗、香气浓者为佳。

【鉴别】 (1) 本品粉末淡黄色。淀粉粒甚多，单粒圆形、多角形或半圆形，直径 2～16 μm，脐点点状或裂缝状；复粒由 2～5 粒组成。薄壁细胞类圆形，含黄棕色油滴。网纹导管直径 20～120 μm。分泌腔碎片可见，完整者直径 64～120 μm。木栓细胞多角形，淡棕色。

(2) 取本品粗粉 2 g，加乙醚 20 ml，密塞，浸渍半小时，滤过。取滤液 1～2 ml，置白瓷皿中，在室温挥散乙醚，残留有特异香气的油滴状物，加热时油状物逐渐减少。

(3) 取本品粗粉 5 g，加甲醇约 30 ml，置 60～70° 的水浴中浸渍约 1 小时，滤过。取滤液 1 ml，加 7% 盐酸羟胺的甲醇溶液与 10% 氢氧化钾溶液各 3～4 滴，加热至微沸，放冷，再加 1% 三氯化铁的乙醇溶液 2～3 滴，显橙红色。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，晒干。

【性味】 苦、辛，温。

【功能与主治】 止咳平喘，祛风湿，止痛。用于风寒咳喘，风湿痹痛，脘腹痛。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置干燥处，防潮、防蛀。

白　　术

Baizhu

RHIZOMA ATRACTYLODIS MACROCEPHALAE

本品为菊科植物白术 Atractylodes macrocephala Koidz.的干燥根茎。冬季下部叶枯黄、上部叶变脆时采挖，除去泥沙，烘干或晒干，再除去须根。

【性状】 本品为不规则的肥厚团块，长 3～13 cm，直径 1.5～7 cm。表面灰黄色或灰棕色，有瘤状突起及断续的纵皱和沟纹，并有须根痕，顶端有残留茎基和芽痕。质坚硬，不易折断，断面不平坦，黄白色至淡棕色，有棕黄色的油点。烘干者断面角质样。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

色较深或有裂隙。气清香，味甘、微辛，嚼之略带粘性。

以个大、质坚实、断面色黄白、香气浓者为佳。

【鉴别】（1）本品粉末淡黄棕色。草酸钙针晶细小，长 10～32 μm，不规则地聚集于薄壁细胞中，少数针晶直径至 4 μm。纤维黄色，大多成束，长梭形，直径约至 40 μm，壁甚厚，木化，孔沟明显。石细胞淡黄色，类圆形、多角形、长方形或少数纺锤形，直径 37～64 μm。薄壁细胞含菊糖，表面现放射状纹理。导管分子短小，为网纹及具缘纹孔，直径至 48 μm。

（2）取本品粗粉 2 g，置 100 ml 带塞锥形瓶中，加乙醚 20 ml，振摇 10 分钟，滤过。取滤液 10 ml 挥干后，加 10% 香草醛的硫酸溶液，显紫色；另取滤液 1 滴，点于滤纸上，挥干后，喷洒 1% 香草醛硫酸溶液，呈桃红色。

【检查】 色度 取本品，切成约 0.2 cm 小粒，精密称取 2 g，置 100 ml 玻璃塞烧瓶中，加 55% 乙醇 50 ml，用稀盐酸调节 pH 值至 2～3，连续振摇 1 小时，用每分钟 4000 转的离心机，离心 15 分钟，吸取上清液 10 ml，置比色管中，与同量的对照液（取比色用三氯化铁液 5 ml，加比色用氯化钴液 3 ml 与比色用硫酸铜液 0.6 ml，用水稀释至 10 ml 制成），同置白纸上，自上面透视，显色不得较深。

【炮制】 白术 除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。

炒白术 取白术片，照麸炒法（附录 18 页）炒至色变深。

【性味】 甘、苦，温。

【功能与主治】 健脾燥湿。用于脾虚食少，腹胀，腹泻，痰饮眩晕，水肿，胎动不安。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防蛀。

白　头　翁

Baitouweng

RADIX PULSATILLAE

本品为毛茛科植物白头翁 Pulsatilla chinensis (Bge.) Regel 的干燥根。春、秋二季采挖，除去泥沙，干燥。

【性状】 本品呈类圆柱形或圆锥形，稍扭曲，长 6～20 cm，直径 0.5～2 cm。表面

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

黄棕色或棕褐色，具不规则纵皱纹或纵沟，皮部易脱落，露出黄色的木部，有的有网状裂纹或裂隙，近根头处常有朽状凹洞。根头部稍膨大，有白色绒毛，有的可见鞘状叶柄残基。质硬而脆，断面皮部黄白色或淡黄棕色，木部淡黄色。气微，味微苦涩。

以条粗长、质坚实者为佳。

【鉴别】 (1) 本品粉末灰棕色。韧皮纤维梭形或纺锤形，长 100～390 μm，直径 16～42 μm，壁木化。非腺毛单细胞，直径 13～33 μm，基部稍膨大，壁大多木化，有的可见螺状或双螺状纹理。具缘纹孔、网纹及螺纹导管直径 10～72 μm。

(2) 取本品粉末 4 g，加乙醇 20 ml，加热回流提取 1 小时，滤过，滤液置水浴上浓缩至约 6 ml，放冷，加丙酮适量，则析出沉淀，滤过，速取沉淀少量（约 5 mg），置试管中，加醋酐 1 ml 使溶解，沿管壁加硫酸 1 ml，两液接界处显红色或红紫色环。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清热解毒，凉血止痢。用于阿米巴痢疾，细菌性痢疾，白带。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

白　　芍

Baishao

RADIX PAEONIAE ALBA

本品为毛茛科植物芍药 Paeonia lactiflora Pall. 的干燥根。夏、秋二季采挖，洗净，除去头尾及细根，置沸水中煮后除去外皮或去皮后再煮，晒干。

【性状】 本品呈圆柱形，平直或稍弯曲，两端平截，长 5～18 cm，直径 1～2.5 cm。表面类白色或淡红棕色，光洁或有纵皱纹及细根痕，偶有残存的棕褐色外皮。质坚实，不易折断，断面较平坦，类白色或微带棕红色，有明显的环纹和放射状纹理。气微，味微苦酸。

以条粗、质坚实、无白心或裂隙者为佳。

【鉴别】 (1) 本品粉末黄白色。糊化淀粉团块甚多。草酸钙簇晶直径 11～35 μm，有时排列成行，或一个细胞中含数个簇晶。具缘纹孔及网纹导管直径 20～65 μm。纤维长梭形，直径 15～40 μm，壁厚，微木化，具大的圆形纹孔。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

(2) 取本品粉末 5 g，加乙醚 50 ml，加热回流 10 分钟，滤过。取滤液 10 ml，置水浴上蒸干，加醋酐 1 ml 与硫酸 4～5 滴，先显黄色，渐变成红色、紫色，最后呈绿色。

【炮制】 白芍 洗净，润透，切片，干燥。

炒白芍 取白芍片，照清炒法(附录 18 页)炒至微黄色。

酒白芍 取白芍片，照酒炒法(附录 18 页)用黄酒炒至微黄色。

【性味】 苦、酸，微寒。

【功能与主治】 养血柔肝，缓急止痛。用于头痛眩晕，胸胁疼痛，胃肠痉挛性疼痛，泻、痢腹痛，手足拘挛疼痛，腓肠肌痉挛，月经不调，痛经，崩漏。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【注意】 不宜与藜芦同用。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

白　　芷

Baizhi

RADIX ANGELICAE DAHURICAE

本品为伞形科植物白芷 Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. 或杭白芷 Angelica dahurica(Fisch. ex Hoffm.)Benth. et Hook. f. var. taiwaniana(Boiss.) Shan et Yuan 的干燥根。夏、秋间叶黄时采挖，除去须根及泥沙，晒干或低温干燥。

【性状】 本品呈长圆锥形，长 10～25 cm，直径 1.5～2.5 cm。顶端有凹陷的茎痕，表面灰棕色或黄棕色，根头部钝四棱形或近圆形，具纵皱纹、支根痕及皮孔样的横向突起，习称"疙瘩丁"，有的排列成四纵列。质坚实，断面白色或灰白色，粉性，可见近方形或近圆形的棕色环，皮部散有多数棕色油点。气芳香，味辛、微苦。

以条粗壮、体重、粉性足、香气浓郁者为佳。

【鉴别】 (1) 取本品粉末 0.5 g，加乙醚 3 ml，振摇 5 分钟后，静置 20 分钟，分取上清液 1 ml，加 7%盐酸羟胺的甲醇溶液与 20%氢氧化钾的甲醇溶液各 2～3 滴，摇匀，置水浴上微热，冷却后，加稀盐酸调节 pH 值至 3～4，再加 1%三氯化铁的乙醇溶液 1～2 滴，显紫红色。

(2) 取本品粉末 0.5 g，加水 3 ml，振摇后滤过。取滤液 2 滴，点于滤纸上，置紫外光灯下观察，显蓝色荧光。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【炮制】 除去杂质，分开大小个，略浸，润透，切片，干燥。

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 散风祛湿，排脓止痛。用于感冒头痛，鼻塞，眉棱骨痛，鼻炎，鼻窦炎，牙痛，白带，痈肿疮疡。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防蛀。

白花菜子

Baihuacaizi

SEMEN CLEOMIS

本品为白花菜科植物白花菜 Cleome gynandra L. 的干燥成熟种子。夏、秋二季采摘成熟果实或拔取全株，晒干，打下种子，除去杂质。

【性状】 本品呈扁球形，直径 1～1.5 mm，厚约 1 mm。表面黄褐色或黑褐色，粗糙不平，有凸起的同心环状网纹，种脐凹入。破开后内有子叶 2 片，黄白色。气微，味微苦。

以粒饱满、色黑者为佳。

【性味】 苦、辛，温；有小毒。

【功能与主治】 散寒，消肿，止痛。用于肢体、关节冷痛。

【用法与用量】 外用适量，研末敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

白附子（禹白附）

Baifuzi

RHIZOMA TYPHONII

本品为天南星科植物独角莲 Typhonium giganteum Engl. 的干燥块茎。秋季采挖，除去须根及外皮，用硫黄熏 1～2 次，晒干。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 本品呈椭圆形或卵圆形，长 2～5 cm，直径 1～3 cm。顶端有茎痕或芽痕，表面白色或黄白色，略粗糙，有环纹及根痕。质坚硬，不易折断，断面白色，富粉性。无臭，味淡，麻辣刺舌。

以个大、质坚实、色白、粉性足者为佳。

【鉴别】 本品横切面：木栓细胞有时残存。基本组织中散有大的粘液腔，向中心渐小而少；粘液细胞随处可见，内含草酸钙针晶束；维管束外韧型及周木型，散列；薄壁细胞含淀粉粒。

粉末黄白色。淀粉粒甚多，单粒球形、半圆形或多面形，直径 2～20 μm，脐点点状或裂缝状；复粒大多由 2～4 粒组成。草酸钙针晶束多存在于粘液细胞中，针晶长约 70 μm，有的可至 136 μm。螺纹、环纹导管直径 14～45 μm。

【炮制】 生白附子 除去杂质。

制白附子 取净白附子，分开大小个，浸泡，每日换水 2～3 次，数日后，如起粘沫，换水时加白矾少许，再泡一日后换水，泡至口尝稍有麻辣感取出，加捣碎的生姜、白矾和水适量，煮透，取出，晾至六成干，切片，干燥。

每白附子 100 kg，用生姜 25 kg、白矾 12.5 kg。

【性味】 辛、甘，大温；有毒。

【功能与主治】 祛风痰，镇痉。用于中风口眼歪斜，面神经麻痹，偏头痛，破伤风，淋巴结结核，痈肿。

【用法与用量】 一般炮制后用，3～4.5 g；外用适量，熬膏敷患处。

【注意】 孕妇忌服。生品内服宜慎。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

白　　英

Baiying

HERBA SOLANI LYRATI

本品为茄科植物白英 Solanum lyratum Thunb. 的干燥全草。夏、秋二季采挖，洗净，晒干。

【性状】 本品长 1～4 M，全体被毛，幼枝及叶上尤多。根较细，稍弯曲，浅棕黄色。茎圆柱形，稍有棱，灰绿色或灰黄色。叶互生，叶片皱缩易碎，完整者展平后呈长卵形，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

长 3～8 cm，宽 1～3.5 cm；先端渐尖，基部心形，全缘或下部 2 浅裂至中裂，裂片耳状或戟状；上表面棕绿色，下表面绿灰色；叶柄长 2～4 cm。聚伞花序与叶对生，花序梗折曲状，花冠 5 裂，长约 5 mm，棕黄色。浆果球形，直径约 1.2 cm，绿棕色。种子近圆形，扁平。气微，味淡。

【炮制】 除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，晒干。

【性味】 微苦，平。

【功能与主治】 清湿热解毒，消肿。用于风热感冒，发热，咳嗽，黄疸型肝炎，胆囊炎；外治痈肿，风湿性关节炎。

【用法与用量】 9～15 g，鲜品 15～30 g；外用鲜品适量，捣烂敷患处。

【贮藏】 置通风干燥处。

白　茅　根

Baimaogen

RHIZOMA IMPERATAE

本品为禾本科植物白茅 Imperata cylindrica Beauv. var. major (Nees) C. E. Hubb. 的干燥根茎。春、秋二季采挖，洗净，晒干，除去须根及膜质叶鞘，捆成小把。

【性状】 本品呈长圆柱形，长 30～60 cm，直径 0.2～0.4 cm。表面黄白色或淡黄色，微有光泽，具纵皱纹，节明显，稍突起，偶有须根残留，节间长短不等，通常长 1.5～3 cm。体轻，质略脆，断面皮部白色，多有裂隙，放射状排列，中柱淡黄色，皮部与中柱易剥离。无臭，味微甜。

以条粗、色白、味甜者为佳。

【鉴别】 (1) 取本品粗粉 5 g，加苯 30 ml，加热回流 1 小时，滤过。取滤液 5 ml，蒸干，残渣加醋酐 1 ml 使溶解，再加硫酸 1～2 滴，即显红色，后渐变成紫红色、蓝紫色，最后呈污绿色。

(2) 取本品粗粉 1 g，加水 10 ml，煮沸 5～10 分钟，滤过，滤液浓缩成 1 ml，加新制的碱性酒石酸铜试液 1 ml，置水浴中加热，发生棕红色沉淀。

【炮制】 **白茅根** 洗净，微润，切段，干燥，除去碎屑。

茅根炭 取白茅根段，照炒炭法(附录 19 页)炒至焦褐色。

【性味】 甘，寒。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 凉血，止血，清热，利尿。用于内热烦渴，衄血，咳血，吐血，尿血，急性肾炎水肿。

【用法与用量】 9～30 g，鲜品 30～60 g。

【贮藏】 置干燥处。

白　　矾（明矾）

Baifan

ALUMEN

本品为三方晶系矾石或其他铝矿石经加工提炼制成的硫酸铝钾结晶。

【性状】 本品呈不规则的块状或粒状，大小不一。无色或淡黄白色，透明或半透明。表面略平滑或凹凸不平，具细密纵棱，有玻璃样光泽。质硬而脆。气微，味酸、微甘而极涩。

以无色、透明者为佳。

【鉴别】 本品水溶液显铝盐（附录 41 页）、钾盐（附录 41 页）与硫酸盐（附录 41 页）的鉴别反应。

【检查】 **铵盐** 取本品 0.1 g，加无氨蒸馏水 100 ml 使溶解，取出 10 ml，置比色管中，加无氨蒸馏水 40 ml 与碱性碘化汞钾试液 2 ml，如显色，与氯化铵溶液（取氯化铵 31.5 mg，加无氨蒸馏水使成 1000 ml）1 ml、碱性碘化汞钾试液 2 ml 及无氨蒸馏水 49 ml 的混合液比较，不得更深。

铜盐与锌盐 取本品 1 g，加水 100 ml 与稍过量的氨试液，煮沸，滤过，滤液不得显蓝色，滤液中加醋酸使成酸性后，再加硫化氢试液，不得发生浑浊。

铁盐 取本品 0.35 g，加水 20 ml 溶解后，加硝酸 2 滴，煮沸 5 分钟，滴加氢氧化钠试液中和至微显浑浊，加稀盐酸 1 ml、亚铁氰化钾试液 1 ml 与水适量使成 50 ml，摇匀，1 小时内不得显蓝色。

重金属 取本品 1 g，加稀醋酸 2 ml 与水适量使溶解成 25 ml，依法检查（附录 46 页第一法），含重金属不得过百万分之二十。

【含量测定】 取本品约 0.3 g，精密称定，加水 20 ml 溶解后，加醋酸-醋酸铵缓冲液 10 ml，再精密加 $M/20$ 乙二胺四醋酸二钠液 25 ml，煮沸 10 分钟，放冷至室温，加入与溶液等容的乙醇，再加二苯硫代偕肼腙指示液 2 ml，用 $M/20$ 锌液滴定至溶液由绿

网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

黄色转为红色，即得（每 1 ml 的 $M/20$ 乙二胺四醋酸二钠液相当于 23.72 mg 的 $AlK(SO_4)_2 \cdot 12\ H_2O$）。

本品含 $AlK(SO_4)_2 \cdot 12\ H_2O$ 不得少于 99.0%。

【炮制】 **白矾** 除去杂质，用时捣碎。

枯矾 取净白矾，照煅法（附录 19 页）煅至质松脆。

【性味】 酸，寒。

【功能与主治】 祛痰，燥湿，防腐消毒。用于黄疸，癫痫；并用于净化饮水。枯矾收敛。用于慢性腹泻，便血，湿疹，中耳炎，溃疡久不收口，痔漏。

【用法与用量】 0.6～1.5 g；外用适量，研末敷或化水洗患处。

【贮藏】 置干燥处。

白　　果（银杏）

Baiguo

SEMEN GINKGO

本品为银杏科植物银杏 Ginkgo biloba L. 的干燥成熟种子。秋季种子成熟时采收，除去肉质外种皮，洗净，稍蒸或略煮后，烘干。

【性状】 本品略呈椭圆形，长 1.5～2.5 cm，宽 1～2 cm，厚约 1 cm。表面黄白色或淡棕黄色，平滑。一端稍尖，另端钝，边缘有 2 或 3 条棱线。壳（中种皮）质硬。种仁宽卵形或椭圆形，一端有淡棕色内种皮，横断面外层黄色，内部淡黄色或淡绿色，粉性，中间有空隙。无臭，味甘、微苦。

以壳色黄白、种仁饱满、断面色淡黄者为佳。

【炮制】 **白果仁** 除去杂质，去壳。

熟白果 取净白果，蒸熟或炒熟，去壳。

【性味】 甘、苦、涩，平；有小毒。

【功能与主治】 敛肺，定喘，止遗尿、白带。用于肺虚喘咳，遗尿，白带。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

白　屈　菜

Baiqucai

HERBA CHELIDONII

本品为罂粟科植物白屈菜 Chelidonium majus L. 的干燥全草。夏、秋二季采挖，除去泥沙，阴干或迅速晒干。

【性状】 本品根呈圆锥状，多有分枝，密生须根。茎干瘪中空，表面黄绿色，有白粉。叶互生，多皱缩、破碎，完整者为一至二回羽状分裂，裂片近对生，先端钝，边缘具不整齐的缺刻；上表面黄绿色，下表面绿灰色，具白色柔毛，脉上尤多。花瓣 4 片，卵圆形，黄色，雄蕊多数，雌蕊 1 个。蒴果细圆柱形；种子多数，卵形，细小，黑色。气微，味微苦。

以主根粗、茎叶色黄绿者为佳。

【鉴别】 取本品粗粉 10 g，加氯仿 50 ml，置水浴上回流 1 小时，放冷，滤过，滤液蒸干后，加 1%硫酸溶液 10 ml，加热使溶解，滤过。取滤液 1 ml，加碘化铋钾试液，即发生橙红色沉淀；另取滤液 1 滴，点在滤纸上，置紫外光灯下观察，显黄色荧光。

【炮制】 除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，晒干。

【性味】 苦，凉；有毒。

【功能与主治】 止咳，平喘，镇痛，消炎。用于慢性支气管炎，百日咳，胃痛。

【用法与用量】 9～18 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

白　药　子

Baiyaozi

RADIX STEPHANIAE CEPHARANTHAE

本品为防己科植物头花千金藤 Stephania cepharantha Hayata 的干燥块根。秋、冬二季采挖，除去须根，洗净，切片，干燥。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 本品为不规则的片块，直径 2～7 cm，厚 0.2～1.5 cm。外皮暗褐色，有皱纹及须根痕。切面类白色或灰白色，可见筋脉纹(维管束)，有的略呈环状排列。质硬而脆，易折断，断面显粉性。气微，味苦。

以片大、断面色白、粉性足者为佳。

【鉴别】 (1) 本品横切面：木栓层为 10 余列细胞，含棕色物。外有落皮层。皮层散有少数石细胞。维管束外韧型，略呈轮状排列，木质部不发达；中心木质部可见纤维束。薄壁细胞含草酸钙方晶及细小针晶；并含多数淀粉粒。

(2) 取本品粗粉 5 g，加乙醇 25 ml，置水浴上回流 10 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加稀盐酸 2 ml 使溶解，滤过。取滤液 1 ml，加碘化汞钾试液 2 滴，有大量黄白色沉淀。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切块，干燥。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 散瘀消肿，止痛。用于痈疽肿毒，腮腺炎，毒蛇咬伤，跌扑肿痛。

【用法与用量】 9～15 g；酒泡治跌扑肿痛。外用适量，研末涂敷患处。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

白　　前

Baiqian

RHIZOMA CYNANCHI STAUNTONII

本品为萝藦科植物柳叶白前 Cynanchum stauntonii (Decne.) Schltr. ex Lévl. 或芫花叶白前 Cynanchum glaucescens (Decne.) Hand.-Mazz. 的干燥根茎及根。秋季采挖，洗净，晒干。

【性状】 **柳叶白前** 根茎呈细长圆柱形，有分枝，稍弯曲，长 4～15 cm，直径 1.5～4 mm；表面黄白色或黄棕色，节明显，节间长 1.5～4.5 cm，顶端有残茎；质脆，断面中空。根纤细弯曲，长可达 10 cm，直径不及 1 mm，有多次分枝呈毛须状，常盘曲成团。气微，味微甜。

芫花叶白前 根茎较短小或略呈块状；表面灰绿色或灰黄色，节间长 1～2 cm；质较硬。根稍弯曲，直径约 1 mm，分枝少。

均以根茎粗者为佳。

【鉴别】 取本品粗粉 1g，加 70%乙醇 10 ml，加热回流 1 小时，滤过。取滤液 1 ml，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

置蒸发皿内蒸干，残渣加醋酐 1 ml 使溶解，再加硫酸 1 滴，柳叶白前显红紫色，放置后变为污绿色；芫花叶白前显棕红色，放置后不变色。

【炮制】 白前 除去杂质，洗净，润透，切段，晒干。

蜜白前 取净白前，照蜜炙法(附录 19 页)用蜜水炒至表面黄棕色、放凉后不粘手。

【性味】 辛、甘，平。

【功能与主治】 化痰，止咳，平喘。用于咳喘多痰。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

白 首 乌

Baishouwu

RADIX CYNANCHI BUNGEI

本品为萝藦科植物白首乌 Cynanchum bungei Decne. 的干燥块根。春初或秋末采挖，除去外皮，晒干，或趁鲜切片，晒干。

【性状】 本品呈纺锤形或不规则的团块，长 3～10 cm，直径 1.5～4 cm。表面类白色，多沟纹，凹凸不平，并有横向疤痕及须根痕。体轻。切片大小不一，切面类白色，粉性，有辐射状纹理及裂隙。气微，味微甘苦。

以块大、粉性足者为佳。

【炮制】 除去杂质；未切片者，洗净，润透，切片，干燥。

【性味】 甘、苦，微温。

【功能与主治】 补肝肾，强筋骨，益精血。用于肝肾不足，腰膝酸软，失眠，健忘。

【用法与用量】 6～12 g。

【贮藏】 置干燥处。

白 扁 豆

Baibiandou

SEMEN DOLICHORIS ALBUM

本品为豆科植物扁豆 Dolichos lablab L. 的干燥成熟种子。秋、冬二季采收成熟果

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

实，晒干，取出种子，再晒干。

【性状】 本品呈扁椭圆形或扁卵圆形，长 0.8～1.3 cm，宽 0.6～0.9 cm，厚约 0.7 cm。表面淡黄白色或淡黄色，平滑，略有光泽，一端有隆起的白眉状种阜。质坚硬。种皮薄而脆，内有肥厚子叶 2 片，黄白色。气微，味淡，嚼之有豆腥气。

以粒大、饱满、色白者为佳。

【炮制】 **白扁豆** 除去杂质，用时捣碎。

炒白扁豆 取净白扁豆，照清炒法(附录 18 页)炒至微黄色具焦斑，用时捣碎。

【性味】 甘、淡，平。

【功能与主治】 健脾胃，清暑湿。用于脾胃虚弱，暑湿泄泻，白带。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

白　　薇

Bailian

RADIX AMPELOPSIS

本品为葡萄科植物白薇 Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino 的干燥块根。春、秋二季采挖，除去泥沙及细根，纵切成瓣或切成斜片，晒干。

【性状】 本品纵切瓣呈长圆形或近纺锤形，长 4～10 cm，直径 1～2 cm；切面周边常向内卷曲，中部有 1 凸起的棱线；外皮红棕色或红褐色，有纵皱纹、细横纹及横长皮孔，易层层脱落，脱落处呈淡红棕色。斜切片呈卵圆形，长 2.5～5 cm，宽 2～3 cm，切面粉白色或浅红棕色，可见放射状纹理，周边较厚，微翘起或略弯曲。体轻，易折断，折断时，有粉尘飞出。气微，味甘。

以断面色粉白、粉性足者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切成小块，晒干。

【性味】 苦，微寒。

【功能与主治】 清热，解毒，消肿。用于痈肿疮疡，淋巴结结核。

【用法与用量】 2.5～4.5 g；外用 适量，研末涂敷患处。

【注意】 不宜与乌头类药材同用。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

白　鲜　皮

Baixianpi

CORTEX DICTAMNI RADICIS

本品为芸香科植物白鲜 Dictamnus dasycarpus Turcz. 的干燥根皮。春、秋二季采挖根部，除去泥沙及粗皮，剥取根皮，干燥。

【性状】 本品呈卷筒状，长 5～15 cm，直径 1～2 cm，厚 0.2～0.5 cm。外表面灰白色或淡灰黄色，具细纵皱纹及细根痕，常有突起的颗粒状小点；内表面类白色，有细纵纹。质脆，折断时有粉尘飞扬，断面不平坦，略呈层片状，剥去外层，迎光可见闪烁的小亮点。有羊膻气，味微苦。

以条大、肉厚、色灰白者为佳。

【鉴别】 本品横切面：木栓层为 10 余列细胞。皮层狭窄，纤维多单个散在，黄色，直径 25～100 μm，壁厚，层纹明显。韧皮部宽广，射线宽 1～3 列细胞；纤维单个散在。薄壁组织中有多数草酸钙簇晶，直径 5～30 μm。

【炮制】 除去杂质，洗净，稍润，切片，干燥。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清热燥湿，祛风止痒。用于皮肤瘙痒，荨麻疹，湿疹，黄水疮，黄疸，阴部瘙痒。

【用法与用量】 4.5～9 g；外用适量，煎汤洗或研成极细粉敷患处。

【贮藏】 置通风干燥处。

白　薇

Baiwei

RADIX CYNANCHI ATRATI

本品为萝藦科植物白薇 Cynanchum atratum Bge. 或蔓生白薇 Cynanchum versicolor Bge. 的干燥根及根茎。春、秋二季采挖，洗净，干燥。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 本品略呈马尾状，多弯曲。根茎粗短，有结节，呈疙瘩状，上面有圆形的茎痕，下面簇生多数细长的根。根长 10～25 cm，直径 0.1～0.2 cm，表面棕黄色；质脆，易折断，断面皮部黄白色，木部黄色。气微，味微苦。

以根粗长、色棕黄者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切段，干燥。

【性味】 苦、咸，寒。

【功能与主治】 清热，凉血。用于阴虚发热，血虚昏厥，小便涩痛。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

瓜　子　金

Guazijin

HERBA POLYGALAE JAPONICAE

本品为远志科植物瓜子金 Polygala japonica Houtt. 的干燥全草。春末花开时采挖，除去泥沙，晒干。

【性状】 本品根呈圆柱形，直径可达 3 mm；表面黄褐色，有细纵纹；质硬，断面黄白色。茎丛生，少分枝，长 12～30 cm，黄褐色，有的下部呈紫褐色，被细柔毛。叶互生，具短柄；叶片卵形或椭圆形，有的卵状披针形，长 1～2.5 cm，宽 0.3～1.5cm；先端短尖或急尖，基部圆形或楔形，全缘，上表面灰绿色至黄绿色，下部叶片常呈紫褐色；叶片革质。总状花序腋生，最上的花序低于茎端，花蝶形。蒴果宽卵形而扁，直径约 5 mm，边缘具膜质宽翅，黄绿色，无毛，萼片宿存。种子扁卵形，表面棕褐色。气微，根味辛，叶微苦。

以叶多、带根者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，切段，晒干。

【性味】 辛、苦，平。

【功能与主治】 祛痰止咳，活血消肿，解毒止痛。用于咳嗽，痰多，慢性咽喉炎；外治跌扑损伤，疔疮疖肿，毒蛇咬伤。

【用法与用量】 15～30 g；外用鲜品适量，捣烂敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

瓜　蒌

Gualou

FRUCTUS TRICHOSANTHIS

本品为葫芦科植物栝楼 Trichosanthes kirilowii Maxim. 或双边栝楼 Trichosanthes uniflora Hao 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时，连果梗剪下，置通风处阴干。

【性状】 本品呈类球形或宽椭圆形，长 7～15 cm，直径 6～10 cm。表面橙红色或橙黄色，皱缩或较光滑，顶端有圆形的花柱残基，基部略尖，具残存的果梗。轻重不一。剖开后内表面黄白色，有红黄色丝络，果瓤橙黄色，粘稠，与多数种子粘结成团。具焦糖气，味微酸甜。

以完整不破、皱缩、皮厚、糖性足者为佳。

【炮制】 除去梗及泥沙，压扁，切丝或切块。

【性味】 甘、苦，寒。

【功能与主治】 宽胸散结，清化热痰，润肺，滑肠。用于痰热咳嗽，心胸闷痛，乳腺炎，便秘。

【用法与用量】 9～15 g。

【注意】 不宜与乌头类药材同用。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防霉、防蛀。

瓜　蒌　子

Gualouzi

SEMEN TRICHOSANTHIS

本品为葫芦科植物栝楼 Trichosanthes kirilowii Maxim. 或双边栝楼 Trichosanthes uniflora Hao 的干燥成熟种子。秋季采摘成熟果实，剖开，取出种子，洗净，晒干。

【性状】 栝楼　呈扁平椭圆形，长 12～15 mm，宽 6～10 mm，厚约 3.5 mm。表面浅棕色至棕褐色，平滑，沿边缘有 1 圈沟纹。一端较尖，有种脐，另一端钝圆或较狭。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

种皮坚硬。破开后可见子叶2片，黄白色，富油性，外被灰绿色薄膜。气微，味淡。

双边栝楼 较大而扁，长15～19 mm，宽8～10 mm，厚约2.5 mm。表面棕褐色，沟纹明显而靠内。种脐一端较宽。

均以饱满、油性足者为佳。

【炮制】 **瓜蒌子** 除去杂质及干瘪的种子，洗净，晒干，用时捣碎。

炒瓜蒌子 取净瓜蒌子，照清炒法(附录18页)炒至微鼓起。

【性味】 甘、苦，寒。

【功能与主治】 润肺化痰，滑肠。用于咳嗽痰粘不易咯出，便秘。

【用法与用量】 9～15 g。

【注意】 不宜与乌头类药材同用。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防霉、防蛀。

瓜 蒌 皮

Gualoupi

PERICARPIUM TRICHOSANTHIS

本品为葫芦科植物栝楼 Trichosanthes kirilowii Maxim. 或双边栝楼 Trichosanthes uniflora Hao 的干燥成熟果皮。秋季采摘成熟果实，剖开，除去果瓤及种子，阴干。

【性状】 本品常切成2至数瓣，边缘向内卷曲，长6～12 cm。外表面橙红色或橙黄色，皱缩，有的有残存果梗，内表面黄白色。质较脆，易折断。具焦糖气，味淡、微酸。

以外表面色橙红、内表面色黄白、皮厚者为佳。

【炮制】 洗净，稍晾，切丝，晒干。

【性味】 甘、苦，寒。

【功能与主治】 宽胸散结，清化热痰。用于痰热咳嗽，心胸闷痛，乳腺炎。

【用法与用量】 9～15 g。

【注意】 不宜与乌头类药材同用。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防霉、防蛀。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

瓜　蒌　片

Gualou Pian

TABELLAE TRICHOSANTHIS

本品为瓜蒌皮与瓜蒌子的混合浸膏片。每片含混合干浸膏 0.26 g。

【制法】 取瓜蒌子 65 份，压碎去油后，与瓜蒌皮 35 份混合，加水煎煮二次，每次 1 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩成稠膏状，在 80°以下减压干燥成干浸膏，加适量辅料，制成颗粒，压片，包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；味微苦。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(附录 6 页)。

【功能与主治】 宽胸，理气。用于冠心病胸闷，心绞痛。

【用法与用量】 口服，一次 4 片，一日 3 次。

【贮藏】 密封保存。

冬　瓜　子

Dongguazi

SEMEN BENINCASAE

本品为葫芦科植物冬瓜 Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. 的干燥成熟种子。食用冬瓜时收集成熟的种子，晒干。

【性状】 本品呈扁平卵圆形，长 1～1.4 cm，宽 0.5～0.8 cm。表面淡黄白色，一端较尖，尖端一侧有小突起的种脐，另端钝圆。边缘光滑，或两面外缘各有 1 环纹。体轻，剥去种皮，可见白色子叶 2 片，有油性。无臭，味微甜。

以粒色白、仁饱满者为佳。

【炮制】 冬瓜子　除去杂质。

炒冬瓜子　取净冬瓜子，照清炒法(附录 18 页)炒至黄白色。

【性味】 甘，微寒。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 清热化痰，排脓利湿。用于痰热咳嗽，肺脓疡，阑尾炎，白带。

【用法与用量】 9～30 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

冬　瓜　皮

Dongguapi

EXOCARPIUM BENINCASAE

本品为葫芦科植物冬瓜 Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. 的干燥外果皮。食用冬瓜时，洗净，削取外层果皮，晒干。

【性状】 本品为不规则的碎片，常向内卷曲，大小不一。外表面灰绿色或黄白色，被有白霜，有的较光滑不被白霜；内表面较粗糙，有的可见筋脉纹(维管束)。体轻，质脆。无臭，味淡。

以片薄、色灰绿者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，切成小块或宽丝，晒干。

【性味】 甘，微寒。

【功能与主治】 利尿，消肿。用于水肿，尿少。

【用法与用量】 9～30 g。

【贮藏】 置干燥处。

冬 虫 夏 草

Dongchongxiacao

CORDYCEPS

本品为麦角菌科真菌冬虫夏草 Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc. 寄生在蝙蝠蛾科昆虫幼虫上的子座及幼虫尸体的干燥物。夏初子座出土、孢子未发散时挖取，晒至 6～7 成干，除去似纤维状的附着物及杂质，晒干或低温干燥。

【性状】 本品由虫体及从虫头部长出的真菌子座相连而成。虫体似蚕，长 3～5 cm，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

直径 0.3～0.8 cm；表面深黄色至黄棕色，有环纹 20～30 个，近头部的环纹较细；头部红棕色，足 8 对，中部四对较明显；质脆，易折断，断面略平坦，淡黄白色。子座细长圆柱形，长 4～7 cm，直径约 0.3 cm；表面深棕色至棕褐色，有细小纵皱纹，上部稍膨大；质柔韧，断面类白色。气微腥，味微苦。

以完整、虫体肥壮、色黄、子座短者为佳。

【性味】 甘，温。

【功能与主治】 补肺益肾。用于气短喘咳，腰膝软弱。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防蛀。

冬 凌 草

Donglingcao

HERBA RABDOSIAE RUBESCENTIS

本品为唇形科植物碎米桠 Rabdosia rubescens（Hemsl.）Hara 的干燥地上部分。夏、秋二季采割，晒干。

【性状】 本品茎呈方柱形，长 30～70 cm。表面红褐色，有柔毛；质硬，断面淡绿色或黄白色。叶对生，有柄；叶片皱缩，展平后呈卵形或宽卵形，长 6.5～13 cm，宽 3～6 cm；先端渐尖，基部宽楔形、截形或近心形，急缩下延至柄，边缘有粗锯齿；上表面绿棕色，有腺点，下表面绿色，沿叶脉被疏柔毛。聚伞状圆锥花序顶生，花小，花萼筒状钟形，5 齿裂，花冠二唇形。小坚果宽倒卵形，顶端无毛。气微香，味苦、甘。

以叶多、色绿者为佳。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性味】 苦、甘，微寒。

【功能与主治】 清热解毒，活血止痛。用于咽喉肿痛，扁桃体炎，蛇虫咬伤。

【用法与用量】 30～60 g；外用适量。

【贮藏】 置干燥处，防霉。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

冬　葵　果

Dongkuigua

FRUCTUS MALVAE VERTICILLATAE

本品系蒙古族习用药材，蒙古文名为 ᠲᠤᠮᠰᠢᠯ ᠮᠣᠭᠣ （萨嘎日木克·扎木巴）；为锦葵科植物冬葵 Malva verticillata L. 的干燥成熟果实。夏、秋二季果实成熟时采收，除去杂质，阴干。

【性状】 本品呈扁球状盘形，直径 4～7 mm，外被膜质宿萼。宿萼钟状，黄绿色或黄棕色，有的带紫色，先端 5 齿裂，裂片内卷；其外有条状披针形的苞片 3 片，果梗细短。果实有分果瓣 10～12 枚，在圆锥形中轴周围，排成 1 轮，表面黄白色或黄棕色，具隆起的环向细脉纹。种子肾形，棕黄色或黑褐色。气微，味涩。

以完整、色黄绿者为佳。

【鉴别】 本品粉末黄绿色。有星状毛和单细胞非腺毛。草酸钙簇晶甚多。

【性味】 甘、涩，凉。

【功能与主治】 清热利尿，消肿。用于尿路感染，尿闭，水肿，口渴。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

玄　明　粉（干燥硫酸钠）

Xuanmingfen

NATRII SULFAS EXSICCATUS

本品为芒硝经风化干燥制得。

【性状】 本品为白色粉末；无臭，味苦、咸；有引湿性。

以干燥、色白、粉细者为佳。

【鉴别】 本品的水溶液显钠盐（附录 40 页）与硫酸盐（附录 41 页）的鉴别反应。

【检查】 **铁盐与锌盐、镁盐** 照芒硝项下的方法（206页）检查，但取用量减半，应符

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

合规定。

重金属 取本品 1 g，加稀醋酸 2 ml 与适量的水溶解使成 25 ml，依法检查(附录46页第一法)，含重金属不得过百万分之二十。

砷盐 取本品 0.2 g，加水 23 ml 溶解后，加盐酸 5 ml，依法检查(附录 47 页)，含砷盐不得过百万分之二十。

【含量测定】 取本品，用 105°干燥至恒重后，取出约 0.3 g，精密称定，照芒硝项下的方法(206 页)测定，即得。

本品按干燥品计算，含 Na_2SO_4 不得少于 99.0%。

【性味】 咸、苦，寒。

【功能与主治】 泻热，软坚，通便。用于实热积滞，大便秘结；外治咽喉肿痛，口疮龈肿，目赤，痈肿，丹毒。

【用法与用量】 3～6 g；外用适量，水化洗敷或研末吹敷患处。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 密封保存，防潮。

玄　　参

Xuanshen

RADIX SCROPHULARIAE

本品为玄参科植物玄参 Scrophularia ningpoensis Hemsl. 的干燥根。冬季茎叶枯萎时采挖，除去芦头、子芽、须根及泥沙，晒或烘至半干，堆放 3～6 天，反复数次至干燥。

【性状】 本品呈类圆柱形，中间略粗或上粗下细，有的弯曲似羊角，长 6～20 cm，直径 1～3 cm。表面灰黄色或灰褐色，有不规则的纵沟、横向皮孔及稀疏的横裂纹和须根痕。质坚实，不易折断，断面黑色，微有光泽。气特异似焦糖，味甘、微苦。

以条粗壮、质坚实、断面色黑者为佳。

【鉴别】 本品横切面：皮层较宽，石细胞单个散在或 2～5 个成群，多角形、类圆形或类方形，壁较厚，层纹明显，韧皮射线多裂隙。形成层成环。木质部射线宽广，亦多裂隙；导管少数，类多角形，直径约至 113 μm，伴有木纤维。薄壁细胞含核状物。

【炮制】 除去残留芦头及杂质，洗净，润透，切片，干燥；或微泡，蒸透，稍晾，切片，干燥。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性味】 甘、苦、咸，微寒。

【功能与主治】 滋阴降火，凉血解毒。用于热病烦渴、发斑，咽喉肿痛，咽白喉，便秘，淋巴结结核，痈肿。

【用法与用量】 6～12 g。

【注意】 不宜与藜芦同用。

【贮藏】 置干燥处，防霉、防蛀。

半　支　莲

Banzhilian

HERBA SCUTELLARIAE BARBATAE

本品为唇形科植物半支莲 Scutellaria barbata D. Don 的干燥全草。夏、秋二季茎叶茂盛时采挖，洗净，晒干。

【性状】 本品长 15～35 cm，无毛或花轴上疏被毛。根纤细。茎丛生，较细，方柱形，表面暗紫色或棕绿色。叶对生，有短柄；叶片多皱缩，展平后呈三角状卵形或披针形，长 1.5～3 cm，宽 0.5～1 cm；先端钝，基部宽楔形，全缘或有少数不明显的钝齿；上表面暗绿色，下表面灰绿色。花单生于茎枝上部叶腋，花萼裂片钝或较圆，花冠二唇形，棕黄色或浅蓝紫色，长约 1.2 cm，被毛。果实扁球形，浅棕色。气微，味微苦。

以色绿、味苦者为佳。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性味】 微苦，凉。

【功能与主治】 清热解毒，活血祛瘀。用于阑尾炎，肝炎；外治痈疖疔毒，跌扑肿痛，毒蛇咬伤。

【用法与用量】 15～30 g，鲜品 30～60 g；外用鲜品适量，捣烂敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

半　边　莲

Banbianlian

HERBA LOBELIAE RADICANTIS

本品为桔梗科植物半边莲 Lobelia radicans Thunb. 的干燥全草。夏季采收，除去泥

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

沙，洗净，晒干。

【性状】 本品常缠结成团。根茎直径 1～2 mm，表面淡棕黄色，平滑或有细纵纹。根细小，黄色，侧生纤细须根。茎细长，有分枝，灰绿色，节明显，有的可见附生的细根。叶互生，无柄，多皱缩或脱落，绿褐色，展平后叶片呈狭披针形，长 1～2.5 cm，宽 0.2～0.5 cm，边缘具疏而浅的微齿。花梗细长，花小，单生于叶腋，花冠基部筒状，上部 5 裂，偏向一边，浅紫红色，花冠筒内有白色茸毛。气微特异，味微甘而辛。

以茎叶色绿、根黄者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，切段，晒干。

【性味】 辛，平。

【功能与主治】 清热解毒，利尿消肿。用于晚期血吸虫病腹水，肝硬化腹水，毒蛇咬伤，疮疖痈肿。

【用法与用量】 9～15 g，鲜品 30～90 g；外用鲜品适量，捣烂敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

半　　夏

Banxia

RHIZOMA PINELLIAE

本品为天南星科植物半夏 Pinellia ternata (Thunb.) Breit. 的干燥块茎。夏、秋二季采挖，洗净，除去外皮及须根，晒干。

【性状】 本品呈类球形，有的稍偏斜，直径 1～1.5 cm。表面白色或浅黄色，顶端有凹陷的茎痕，周围密布麻点状根痕；下面钝圆，较光滑。质坚实，断面洁白，富粉性。无臭，味辛辣、麻舌而刺喉。

以色白、质坚实、粉性足者为佳。

【鉴别】 本品粉末类白色。淀粉粒甚多，单粒类圆形、半圆形或圆多角形，直径 2～20 μm，脐点裂缝状、人字状或星状；复粒由 2～6 粒组成。草酸钙针晶束存在于椭圆形粘液细胞中，或随处散在，针晶长 20～110 μm。螺纹导管直径 10～24 μm。

【炮制】 **生半夏** 除去杂质。

制半夏 (1) 取净半夏，大小分档，用水浸泡，至内无白心时，取出，沥干，切厚片，加姜汁拌至吸尽，再加白矾粗粉，反复搅拌使匀透，置缸内腌 48 小时，然后沿缸

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

边加入清水至超过半夏平面约 10 cm，注意不使白矾粉冲沉缸底，继续腌 2～4 天，至口嚼无麻辣感时，取出，洗去白矾粉，干燥。

每半夏 100 kg，用生姜 18 kg、白矾 20 kg。

(2) 取净半夏，照上法浸泡至内无白心，另取生姜切片煎汤，加白矾与半夏共煮透，取出，干燥。

每半夏 100 kg，用生姜 25 kg、白矾 12.5 kg。

【性味】 辛，温；有毒。

【功能与主治】 燥湿化痰，止呕。用于痰饮，咳喘，胸脘痞闷，恶心呕吐，眩晕；生用外治痈肿。

【用法与用量】 3～9 g；外用生品适量，研末用酒调敷患处。


【注意】 不宜与乌头类药材同用。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

汉 肌 松

Hanjisong

TETRANDRINI DIMETHIODIDUM



[$C_{40}H_{48}O_6N_2I_2$=906.64]

本品为碘化二甲基粉防己碱。按干燥品计算，含 $C_{40}H_{48}O_6N_2I_2$ 应为 97.0～103.0%。

【性状】 本品为白色或类白色的结晶性粉末；无臭，味苦；干燥品微有引湿性，遇光渐变为黄色。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

本品在甲醇中溶解，在水、乙醇或丙酮中微溶，在醋酸乙酯中不溶。

熔点 本品的熔点（附录28页）为260～263°，熔融时同时分解。

比旋度 取本品，精密称定，加甲醇制成每1 ml中含25 mg的溶液，依法测定(附录31页)，按干燥品计算，比旋度为+177°至+182°。

【鉴别】 (1) 本品的饱和水溶液，滴加碘化铋钾试液，发生橙色沉淀；滴加$M/100$四苯硼钠液，发生白色沉淀。

(2) 取本品4 mg，加水2 ml溶解后，加氯仿2 ml与过氧化氢试液数滴，振摇，水层产生黄色浑浊，续加过氧化氢试液约15 ml，剧烈振摇，氯仿层显玫瑰红色。

(3) 取本品，加水制成每1 ml中含60 μg的溶液，照分光光度法（附录32页）测定，在279±1 nm的波长处有最大吸收，在257±2nm的波长处有最小吸收。

(4) 本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱一致(附录93页)。

【检查】 **有关杂质** 取本品，加甲醇制成每1 ml中含5 mg的溶液，照薄层层析法(附录38页)试验，取10 μl，点于氧化铝（中性，活度Ⅱ～Ⅲ级）薄层板上，以氯仿-甲醇-醋酸（17:4:0.3）为展开剂，展开后，晾干，立即喷以稀碘化铋钾试液使显色，除主斑点外，不得显其他斑点。

干燥失重 取本品，在105°干燥至恒重，减失重量不得过8.0%（附录44页）。

炽灼残渣 不得过0.1%（附录45页）。

【含量测定】 取本品适量，精密称定，加水制成每1 ml中含60 μg的溶液，照分光光度法（附录32页），在279±1 nm的波长处测定吸收度，按$C_{40}H_{48}O_6N_2I_2$的吸收系数（$E^{1\%}_{1cm}$）为72.5计算，即得。

【功能与主治】 横纹肌松弛药。用于外科手术中使横纹肌松弛。

【贮藏】 遮光，密闭保存。

【制剂】 汉肌松注射液

汉肌松注射液

Hanjisong Zhusheye

INJECTIO TETRANDRINI DIMETHIODIDI

本品为汉肌松的灭菌水溶液。含汉肌松（$C_{40}H_{48}O_6N_2I_2$）应为标示量的93.0～107.0%。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 本品为无色的澄明液体。

【鉴别】 取本品 1 ml，照汉肌松项下鉴别法(1)、(3)项(191页)试验，显相同的反应。

【检查】 pH 值 应为 4.5～6.0（附录 42 页）。

其他 应符合注射剂项下有关的各项规定（附录 7 页）。

【含量测定】 精密量取本品适量（约相当于汉肌松 30 mg），置 50 ml 量瓶中，加醋酸-醋酸钠缓冲液（pH 3.7）10 ml，精密加入 $M/100$ 四苯硼钠液 20 ml，加水稀释至刻度，摇匀，滤过，弃去初滤液，精密量取续滤液 25 ml，加溴酚蓝指示液 0.5 ml，用半微量滴定管，以 $M/100$ 烃铵盐液滴定，并将滴定结果用空白试验校正，即得（每 1 ml 的 $M/100$ 烃铵盐液相当于 4.533 mg 的 $C_{40}H_{48}O_6N_2I_2$）。

【功能与主治】 同汉肌松。

【用法与用量】 静脉注射，一次按体重每 kg 0.6～0.8 mg，于 1～2 分钟缓慢注入。

【注意】 大剂量可引起呼吸肌松弛及血压下降，乙醚麻醉时慎用。

【规格】 10 ml:30 mg

【贮藏】 遮光，密闭保存。

汉 桃 叶

Hantaoye

CAULIS SCHEFFLERAE KWANGSIENSIS

本品为五加科植物广西鹅掌柴 Schefflera kwangsiensis Merr. ex Li 的干燥茎枝或带叶茎枝。全年均可采收，洗净，切段，干燥。

【性状】 本品茎枝呈圆柱形，长 1～3 cm，直径 0.4～3 cm；表面灰白色至淡黄棕色，具纵皱纹及点状皮孔，有的可见半环状叶痕。体稍轻，质较硬，断面黄白色，木部宽广，有不明显的放射状纹理，中心有髓或成空洞。叶多切碎，完整者为掌状复叶；小叶片披针形，革质，长 5～10 cm，宽 1.5～4 cm；先端渐尖，基部楔形，全缘，稍反卷；上表面深绿色，有光泽，下表面色较淡，羽状网脉于两面明显凸出；小叶柄长 1～3 cm。气微，味微苦涩。

以枝嫩者为佳。

【鉴别】 本品茎的横切面：表皮细胞外壁增厚。木栓层为 10 余列细胞，有的内壁增厚。皮层较宽广，有分泌道；散存石细胞群，近木栓层处石细胞连接成环层，石细胞直

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

径 10～25 μm，壁稍厚。较细的茎皮层内尚有外韧维管束，其韧皮部外侧有发达的纤维束。中柱鞘纤维束呈半圆形或类圆形。韧皮部较窄，亦有分泌道及纤维束。形成层成环。木质部射线宽 1～4 列细胞；导管多角形，直径约至 50 μm。髓部外侧有少数分泌道。薄壁细胞含草酸钙方晶及簇晶。

【性味】 微苦、涩，温。

【功能与主治】 祛风止痛，舒筋活络。用于三叉神经痛，神经性头痛，坐骨神经痛，风湿关节痛。

【用法与用量】 15～30 g。

【贮藏】 置干燥处，防霉、防蛀。

【制剂】 (1) 汉桃叶片 (2) 汉桃叶注射液

汉 桃 叶 片

Hantaoye Pian

TABELLAE SCHEFFLERAE KWANGSIENSIS

本品为汉桃叶浸膏片。每片含干浸膏 0.3 g。

【制法】 取汉桃叶，加水煎煮二次，每次 1.5 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至每 1 ml 相当于汉桃叶 2 g，加乙醇至含乙醇量达 60%，静置沉淀，滤过，滤液浓缩成稠膏状，干燥成干浸膏，加适量辅料，制成颗粒，压片，包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕色；味苦。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定（附录 6 页）。

【功能与主治】 同汉桃叶。

【用法与用量】 口服，一次 3～5 片，一日 3 次。

【贮藏】 密封保存。

汉桃叶注射液

Hantaoye Zhusheye

INJECTIO SCHEFFLERAE KWANGSIENSIS

本品为汉桃叶经提取制成的灭菌水溶液。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【处方】

汉桃叶	5000 g
吐温80	10 g
苯甲醇	10 ml
乌拉坦	10 g
注射用水	加至 1000 ml

【制法】 取汉桃叶，加水煎煮二次，每次 1.5 小时，合并煎液，滤过，滤液减压浓缩，用乙醇沉淀处理二次，第一次溶液中含乙醇量为 60%，第二次为 85%，每次均滤过，蒸去乙醇。然后加水稀释，用 6 *N* 盐酸液调节 pH 值至 2.0，冷藏放置沉淀，滤过，滤液用 20% 氢氧化钠溶液调节 pH 值至 6.5～7.0，再加乙醇使含乙醇量为 85%，滤过，滤液减压浓缩至稠膏状。加注射用水 500 ml，搅拌使溶解，滤过，用 2 *N* 氢氧化钠液调节 pH 值至 7.5～8.0，加吐温 80、苯甲醇及乌拉坦，并加注射用水使成 1000 ml，滤过，灌封，灭菌，即得。

【性状】 本品为棕色的澄明液体。

【检查】 **pH 值** 应为 5.0～7.0（附录 42 页）。

溶血试验 取本品 0.3 ml，加生理盐水 2.2 ml 与 2% 兔红细胞生理盐水混悬液 2.5 ml，置 36.5°±0.5°恒温水浴内，观察半小时，不得有溶血现象。

其他 应符合注射剂项下有关的各项规定（附录 7 页）。

【功能与主治】 祛风止痛，舒筋活络，解痉。用于三叉神经痛，神经性头痛，坐骨神经痛，胃肠痉挛，胆绞痛。

【用法与用量】 肌内注射，一次 2 ml，一日 1～2 次。

【规格】 2 ml

【贮藏】 遮光，密闭保存。

丝　瓜　络

Sigualuo

RETINERVUS LUFFAE FRUCTUS

本品为葫芦科植物丝瓜 Luffa cylindrica (L.) Roem. 的干燥成熟果实的维管束。夏、秋二季果实成熟、果皮变黄、内部干枯时采摘，除去外皮及果肉，洗净，晒干，除去种子。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 本品为筋络（维管束）交织而成的网状物，多呈长梭形，略弯曲，长 30～70 cm，直径 7～10 cm。表面淡黄白色。体轻，质韧，有弹性，不能折断。横切面有腔室 3 个。气微，味淡。

以筋络清晰、质韧、色淡黄白者为佳。

【炮制】 除去残留种子及外皮，切段。

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 通络，活血。用于胸胁胀闷，肢体酸痛，乳汁不通。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置干燥处。

老 鹳 草

Laoguancao

HERBA ERODII SEU GERANII

本品为牻牛儿苗科植物牻牛儿苗 Erodium stephanianum Willd. 或老鹳草 Geranium wilfordii Maxim. 的干燥地上部分，前者习称“长嘴老鹳草”，后者习称“短嘴老鹳草”。夏、秋二季果实近成熟时采割，捆成把，晒干。

【性状】 **长嘴老鹳草** 茎长 30～50 cm，直径 0.3～0.7 cm，多分枝，节膨大；表面灰绿色或带紫色，有纵沟纹及稀疏茸毛；质脆，断面黄白色，有的中空。叶对生，具细长叶柄；叶片卷曲皱缩，质脆易碎，完整者为二回羽状深裂，裂片披针线形。果实长圆形，长 0.5～1 cm，宿存花柱长 2.5～4 cm，形似鹤喙，习称“长嘴”，有的裂成 5 瓣呈螺旋形卷曲。无臭，味淡。

短嘴老鹳草 茎较细，略短。叶片圆形，3 或 5 深裂，裂片较宽，边缘具缺刻。果实球形，长 0.3～0.5 cm。花柱长 1～1.5 cm，有的 5 裂向上卷曲呈伞形。

均以色灰绿、花果多者为佳。

【炮制】 除去残根及杂质，略洗，切段，晒干。

【性味】 苦、微辛，平。

【功能与主治】 祛风湿，活络。用于肢体、关节疼痛、麻木，腹泻。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【制剂】 老鹳草软膏

老鹳草软膏

Laoguancao Ruangao

UNGUENTUM GERANII

【处方】		
	老鹳草	1000 g
	对羟基苯甲酸乙酯	0.3 g
	羊毛脂	50 g
	凡士林	适量
	全　量	1000 g

【制法】 取老鹳草，加水煎煮二次，每次1小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩后，加1倍量乙醇使沉淀，静置12～24小时，滤取上清液，浓缩至比重为1.20，加对羟基苯甲酸乙酯、羊毛脂与凡士林，混匀，即得。

【性状】 本品为褐紫色软膏。

【鉴别】 取本品5 g，加乙醇10 ml，置水浴上搅拌使溶解，滤过，滤液照下述方法试验：

(1) 取滤液1 ml，加三氯化铁试液1～2滴，即显深蓝色，放置后变蓝黑色。

(2) 取滤液2 ml，加0.25%硫酸铜溶液，即发生白色沉淀。

(3) 取滤液2 ml，加氯化钙试液，即发生白色沉淀。

【检查】 应符合软膏剂项下有关的各项规定（附录12[1]页）。

【功能与主治】 消炎解毒，收敛生肌。用于湿疹，痈、疔、疮、疖，小面积水、火烫伤。

【用法与用量】 外用，涂敷患处，每日1次。

【贮藏】 密闭保存。

地　龙

Dilong

LUMBRICUS

本品为钜蚓科动物参环毛蚓 Pheretima aspergillum (Perrier) 或缘蚯蚓 Allolobo-

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

phora caliginosa (Savigny) trapezoides (Ant. Degés) 的干燥体。前者习称"广地龙"，后者习称"土地龙"。春季至秋季捕捉，广地龙及时剖开腹部，洗去内脏及泥沙，晒干或低温干燥；土地龙用草木灰呛死后，去灰晒干或低温干燥。

【性状】 **广地龙** 呈长条状薄片，弯曲，边缘略卷，长 15～20 cm，宽 1～2 cm。全体具环节，背部棕褐色至紫灰色，腹部浅黄棕色；第 14～16 环节为生殖环带，习称"白颈"，较光亮。体前端稍尖，尾端钝圆，刚毛圈粗糙而硬，色稍浅。体轻，略呈革质，不易折断。气腥，味微咸。

土地龙 呈弯曲的圆柱形，长 5～10 cm，直径 3～7 cm。外皮灰褐色或灰棕色，多抽缩不平，生殖环带多不明显。体轻脆，易折断，肉薄，中间充满泥土。

均以条大、肉厚者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，切段，干燥。

【性味】 咸，寒。

【功能与主治】 清热，定惊，平喘，通络。用于高热惊风抽搐，肢体麻木，半身不遂，关节红肿疼痛，小便不利，支气管哮喘，高血压症。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防霉、防蛀。

地　耳　草（田基黄）

Di'ercao

HERBA HYPERICI JAPONICI

本品为藤黄科植物地耳草 Hypericum japonicum Thunb. 的干燥全草。春、夏二季花开时采挖，除去杂质，晒干。

【性状】 本品长 20～40 cm。根须状，黄褐色。茎单一或基部分枝，黄绿色或黄棕色；质脆，易折断，断面中空。叶对生，无柄；展平叶片卵形或卵圆形，长 0.4～1.6 cm，全缘，具腺点，基出脉 3～5 条。聚伞花序顶生，花小，橙黄色，萼片、花瓣均为 5 片。无臭，味微苦。

以色黄绿、带花者为佳。

【鉴别】 取本品粉末 1 g，加水 20 ml，煮沸 10 分钟，趁热滤过。取滤液 0.5 ml，加镁粉少量与盐酸 4～5 滴，置水浴上加热数分钟，显红色。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【炮制】 除去杂质，切段。

【性味】 苦、辛，平。

【功能与主治】 清利湿热，散瘀消肿。用于急、慢性肝炎，疮疖痈肿。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置干燥处。

【制剂】 田基黄注射液

田基黄注射液

Tianjihuang Zhusheye

INJECTIO HYPERICI JAPONICI

本品为地耳草（田基黄）经提取制成的灭菌水溶液。

【处方】

地耳草	1000 g
苯甲醇	15 ml
注射用水	加至1000 ml

【制法】 选取黄绿色的地耳草，切段，加水煎煮二次，合并煎液，滤过，滤液减压浓缩至约 500 ml，用乙醇沉淀处理二次，第一次溶液中含乙醇量为 60%，第二次为 75%，每次均滤过，蒸去乙醇。然后加水 5 倍量稀释，滤过，加新制的明胶溶液适量使沉淀完全，冷藏放置后，滤过。再加乙醇沉淀处理一次，溶液中含乙醇量为 85%，滤过，蒸去乙醇后，加注射用水至约 800 ml，调节 pH 值至 5.0～6.0，加苯甲醇与注射用水使成 1000 ml，滤过，灌封，灭菌，即得。

【性状】 本品为黄色或棕黄色的澄明液体。

【鉴别】 (1) 取本品 0.5 ml，加镁粉少量与盐酸溶液(1→2)0.5 ml，置水浴上加热数分钟，显红色。

(2) 取本品 0.5 ml，加 30%乙醇 3 ml 与 5%亚硝酸钠溶液 0.3 ml，混匀，放置 5 分钟，加 10%硝酸铝溶液 0.3 ml，放置 5 分钟后，加氢氧化钠试液 2 ml，摇匀，即显红色。

【检查】 pH 值 应为 4.0～7.0 (附录 42 页)。

鞣质类 取本品 0.2 ml，加新制的 1%鸡蛋清的生理盐水溶液 5 ml，放置 10 分钟，不得显浑浊。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

明胶 取本品 1 ml，加钼酸铵试液 1 ml，5 分钟内不得显浑浊。

热原 取本品，依法检查(附录 53 页)，剂量按家兔每 1 kg 注射 1 ml，应符合规定。

其他 应符合注射剂项下有关的各项规定(附录 7 页)。

【功能与主治】 清热利湿，散瘀消肿。用于病毒性肝炎。

【用法与用量】 肌内注射，一次 2 ml，一日 1～2 次。

【规格】 2 ml

【贮藏】 遮光，密闭保存。

地　枫　皮

Difengpi

CORTEX ILLICII

本品为木兰科植物地枫皮 Illicium difengpi K. I. B. et K. I. M. 的干燥树皮。春、秋二季剥取，干燥。

【性状】 本品呈卷筒状或槽状，长 5～15 cm，直径 1～4 cm，厚 0.2～0.3 cm。外表面灰棕色至深棕色，有的可见灰白色地衣斑，粗皮易剥离或脱落，脱落处棕红色。内表面棕色或棕红色，具明显的纵沟纹。质松脆，易折断，断面颗粒性。气微香，味微涩。

以质松脆、气香者为佳。

【鉴别】 (1) 本品横切面：木栓层为数列细胞，其内壁较厚，含红棕色物。皮层散有石细胞群，其间嵌有少数纤维束；有分泌细胞分布。韧皮部射线宽 1 列细胞；亦有分泌细胞，较皮层处为小。薄壁细胞含红棕色物；并含淀粉粒。

(2) 取本品粗粉 2 g，加氯仿 5 ml，振摇，浸泡半小时，滤过。取滤液点于滤纸上，待干，置紫外光灯下观察，显猩红色至淡猩红色荧光。

【炮制】 除去杂质，洗净，打碎，晒干。

【性味】 微辛、涩，温；有小毒。

【功能与主治】 祛风湿，行气止痛。用于风湿关节痛，腰肌劳损。

【用法与用量】 6～9 g。

【贮藏】 置干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

地　肤　子

Difuzi

FRUCTUS KOCHIAE

本品为藜科植物地肤 Kochia scoparia (L.) Schrad. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收植株，晒干，打下果实，除去杂质。

【性状】 本品呈扁球状五角星形，直径 1～3 mm。外被宿存花被，表面灰绿色或浅棕色，周围具膜质小翅 5 枚。背面中心有微突起的点状果梗痕及放射状脉纹 5～10 条；剥离花被，可见膜质果皮，半透明；种子扁卵形，长约 1 mm，黑色。气微，味微苦。

以饱满、色灰绿者为佳。

【性味】 甘、苦，寒。

【功能与主治】 清利湿热，止痒。用于皮肤瘙痒，荨麻疹，湿疹，小便不利。

【用法与用量】 9～15 g；外用适量，煎水洗患处。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

地　骨　皮

Digupi

CORTEX LYCII RADICIS

本品为茄科植物枸杞 Lycium chinense Mill. 或宁夏枸杞 Lycium barbarum L. 的干燥根皮。春初或秋后采挖根部，洗净，剥取根皮，晒干。

【性状】 本品呈筒状或槽状，长 3～10 cm，宽 0.5～1.5 cm，厚 0.1～0.3 cm。外表面灰黄色至棕黄色，粗糙，有不规则纵裂纹，易成鳞片状剥落。内表面黄白色至灰黄色，较平坦，有细纵纹。体轻，质脆，易折断，断面不平坦，外层黄棕色，内层灰白色。气微，味微甘而后苦。

【鉴别】 本品横切面：木栓层为 4～10 余列细胞，其外有较厚的落皮层。韧皮部射

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

线大多宽1列细胞；纤维单个散在或2至数个成束。薄壁细胞含草酸钙砂晶；并含多数淀粉粒。

【炮制】 除去杂质及残余木心，洗净，稍润，切段，晒干。

【性味】 甘、淡，寒。

【功能与主治】 清虚热，凉血。用于阴虚潮热，盗汗，心烦，口渴，咳嗽，咯血。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置干燥处。

地　胆　草

Didancao

HERBA ELEPHANTOPI

本品为菊科植物地胆草 Elephantopus scaber L. 的干燥全草。夏、秋间花期前采挖，洗净，晒干。

【性状】 本品全长 15～40 cm。根茎长 2～5 cm，直径 0.5～1 cm；具环节，密被紧贴的灰白色茸毛，着生多数须根。叶多基生，皱缩，完整叶片展平后呈匙形或倒披针形，长 6～20 cm，宽 1～4.5 cm；黄绿色或暗绿色，多有腺点，先端钝或急尖，基部渐狭，边缘稍具钝齿；两面均被紧贴的灰白色粗毛，幼叶尤甚；叶柄短，稍呈鞘状，抱茎。茎圆柱形，常二歧分枝，密被紧贴的灰白色粗毛，茎生叶少而小。气微，味苦。

以叶多、色绿者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，切段，晒干。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清热泻火，凉血解毒。用于感冒高热，咽喉肿痛，肺热咳嗽，目赤，痢疾，痈疮肿毒。

【用法与用量】 15～30 g。

【贮藏】 置干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

地　　黄

Dihuang

RADIX REHMANNIAE

本品为玄参科植物地黄 Rehmannia glutinosa Libosch. 的新鲜或干燥块根。秋季采挖，除去芦头及须根，洗净，鲜用者习称"鲜生地"；将鲜生地缓缓烘焙至约八成干时，捏成团块，习称"生地"。

【性状】 **鲜生地**　呈纺锤形或条状，长 9～15 cm，直径 1～6 cm。外皮薄，表面浅红黄色，具弯曲的皱纹、横长皮孔及不规则疤痕。肉质，断面淡黄白色，可见橘红色油点，中部有放射状纹理。气微，味微甜、微苦。

以粗壮、色红黄者为佳。

生地　多呈不规则的团块状或长圆形，中间膨大，两端稍细，长 6～12 cm，直径 3～6 cm。有的细小，长条状，稍扁而扭曲。表面灰黑色或棕灰色，极皱缩，具不规则的横曲纹。体重，通常质较软，不易折断，断面灰黑色或棕黑色，有的呈乌黑色，有光泽，具粘性。无臭，味微甜。

以块大、体重、断面色乌黑者为佳。

【鉴别】 本品横切面：木栓层为数列细胞。皮层薄壁细胞排列疏松；散有较多分泌细胞，含橘黄色油滴；偶有石细胞。韧皮部较宽，分泌细胞较少。形成层成环。木质部射线宽广；导管稀疏，排列成放射状。

【炮制】 **生地**　除去杂质，洗净，闷润，切片，干燥。

生地炭　取生地片，照炒炭法(附录 19 页)炒至发泡鼓起。

熟地黄　(1) 取净生地，照酒燉法(附录 18 页)用黄酒燉至酒吸尽，取出，晒至外皮粘液稍干时，切片，晒干。

每生地 100 kg，用黄酒 50 kg。

(2) 取净生地，照蒸法(附录 18 页)蒸至黑润，取出，晒至约八成干时，切片，再晒干。

【性味】 **鲜生地**　甘，寒。

生地　甘，寒。

熟地黄　甘、微苦，微温。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 **鲜生地** 清热，凉血，生津。用于热病热盛，烦躁口渴，发斑发疹，吐血，衄血，尿血，咽喉肿痛。

生地 滋阴清热，凉血止血。用于热病烦躁，发斑发疹，阴虚低热，消渴，吐血，衄血，尿血，崩漏。

熟地黄 滋阴，补血。用于阴虚血少，目昏耳鸣，腰膝酸软，消渴，遗精，经闭，崩漏。

【用法与用量】 **鲜生地** 12～30 g。

生地 9～15 g。

熟地黄 9～15 g。

【贮藏】 鲜生地埋在砂土中，防冻；生地置通风干燥处，防霉、防蛀。

地　　椒

Dijiao

HERBA THYMI

本品为唇形科植物百里香 Thymus mongolicus (Ronn.) Ronn. 或兴凯百里香 Thymus przewalskii(Kom.) Nakai 的干燥地上部分。夏、秋二季花盛开时采收，除去杂质，阴干或晒干。

【性状】 本品茎呈方柱形，略弯曲，多分枝，长 5～15 cm，直径约 0.1 cm；表面紫红色或灰棕色，节明显，下部节上有细根。叶对生，近无柄；叶片展平后呈椭圆状披针形或长卵形，长 0.4～1.2 cm，宽 0.1～0.3 cm，全缘，微反卷；上表面绿色，下表面灰绿色，两面密布油点。小花顶生，密集成圆头状；花冠暗紫红色或棕色。气芳香，味辛。

以花叶多、色绿、香气浓者为佳。

【炮制】 除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，晾干。

【性味】 辛，温；有小毒。

【功能与主治】 祛风解表，行气止痛。用于感冒，头痛，牙痛，遍身疼痛，腹胀冷痛。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

地　　榆

Diyu

RADIX SANGUISORBAE

本品为蔷薇科植物地榆 Sanguisorba officinalis L. 的干燥根。春季将发芽时或秋季植株枯萎后采挖，除去须根，洗净，干燥，或趁鲜切片，干燥。

【性状】 本品呈不规则纺锤形或圆柱形，稍弯曲，长 5～13 cm，直径 0.5～2 cm；表面灰褐色至暗紫色，粗糙，有纵皱纹；质硬，断面粉红色或淡黄色，木部略呈放射状排列。切片呈不规则圆形或椭圆形，厚 0.2～0.5 cm；切面紫红色或棕褐色。无臭，味微苦涩。

以条粗、质硬、断面色粉红者为佳。

【鉴别】 (1) 取本品粉末 2 g，加乙醇 20 ml，加热回流约 10 分钟，滤过，滤液滴加氨试液调节 pH 值至 8～9，滤过，滤液蒸干，残渣加水 10 ml 使溶解，滤去不溶物，取滤液 5 ml，蒸干后，加醋酐 1 ml 与硫酸 2 滴，溶液呈红紫色，放置后转为棕褐色。

(2) 取鉴别(1) 项下加氨试液调节后所得的沉淀少量，加水 2 ml 使溶解，加三氯化铁试液 2 滴，显蓝黑色。

【炮制】 **地榆** 除去杂质；未切片者，洗净，除去残茎，润透，切片，干燥。

地榆炭 取地榆片，照炒炭法（附录 19 页）炒至表面焦黑色、内部棕黄色。

【性味】 苦、酸、涩，微寒。

【功能与主治】 凉血，止血，解毒。用于胃肠出血，痔疮出血，血痢，崩漏；外治烧、烫伤，疖肿。

【用法与用量】 9～15 g；外用适量，研末涂敷患处。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

地　锦　草

Dijincao

HERBA EUPHORBIAE HUMIFUSAE

本品为大戟科植物地锦 Euphorbia humifusa Willd. 或斑地锦 Euphorbia supina

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Rafin. 的干燥全草。夏、秋二季采收，除去杂质，晒干。

【性状】 **地锦** 常皱缩卷曲，根细小。茎细，呈叉状分枝，表面带紫红色，光滑无毛或疏生白色细柔毛；质脆，易折断，断面黄白色，中空。单叶对生，具淡红色短柄或几无柄；叶片多皱缩或已脱落，展平后呈长椭圆形，长 5～10 mm，宽 4～6 mm；绿色或带紫红色，通常无毛或疏生细柔毛；先端钝圆，基部偏斜，边缘具小锯齿或呈微波状。杯状聚伞花序腋生，细小。蒴果三棱状球形，表面光滑。种子细小，卵形，褐色。无臭，味微涩。

斑地锦 叶上表面具红斑，蒴果被稀疏白色短柔毛。

均以叶色绿、茎色紫红者为佳。

【鉴别】 本品粉末绿褐色。叶表皮细胞外壁呈乳头状突出。叶肉组织中，细脉末端周围的细胞，放射状排列成圆形。非腺毛 3～8 细胞，直径约 14 μm，多碎断。无节乳管中可见细小骨片状淀粉粒。

【炮制】 除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，晒干。

【性味】 辛，平。

【功能与主治】 清热解毒，凉血止血。用于痢疾，肠炎，咳血，尿血，便血，崩漏，痈肿疮疖。

【用法与用量】 9～30 g，鲜品 30～60 g；外用适量。

【贮藏】 置干燥处。

芒　　硝（硫酸钠）

Mangxiao

NATRII SULFAS

本品为单斜晶系芒硝（习称“皮硝”），主含硫酸钠，经精制制得。

【性状】 本品为棱柱状、长方形或不规则的结晶，大小不一。无色透明，露置空气中则表面渐风化而覆盖一层白色粉末。质脆易碎，断面常不整齐，显玻璃样光泽。无臭，味苦、咸。

以无色、透明、呈结晶块者为佳。

【鉴别】 本品的水溶液显钠盐（附录 40 页）与硫酸盐（附录 41 页）的鉴别反应。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【检查】 铁盐与锌盐 取本品 5 g，加水 20 ml 溶解后，加硝酸 2 滴，煮沸 5 分钟，滴加氢氧化钠试液中和，加稀盐酸 1 ml、亚铁氰化钾试液 1 ml 与适量的水使成 50 ml，摇匀，放置 10 分钟，不得发生浑浊或显蓝色。

镁盐 取本品 2 g，加水 20 ml 溶解后，加氨试液与磷酸氢二钠试液各 1 ml，5 分钟内，不得发生浑浊。

干燥失重 取本品，在 105°干燥至恒重，减失重量应为 51～57%（附录 44 页）。

重金属 取本品 2 g，加稀醋酸 2 ml 与适量的水溶解使成 25 ml，依法检查（附录46页第一法），含重金属不得过百万分之十。

砷盐 取本品 0.2 g，加水 23 ml 溶解后，加盐酸 5 ml，依法检查（附录 47 页），含砷量不得过百万分之十。

【含量测定】 取本品约 0.4 g，精密称定，加水 200 ml 溶解后，加盐酸 1 ml，煮沸，不断搅拌，并缓缓加入热氯化钡试液（约20 ml），至不再发生沉淀，置水浴上加热 30 分钟，静置 1 小时，用无灰滤纸或称定重量的古氏坩埚滤过，沉淀用水分次洗涤，至洗液不再显氯化物的反应，干燥，并炽灼至恒重，精密称定，与 0.6086 相乘，即得供试量中含有 Na_2SO_4 的重量。

本品按干燥品计算，含 Na_2SO_4 不得少于 99.0%。

【性味】 咸、苦，寒。

【功能与主治】 泻热，软坚，通便。用于实热积滞，大便秘结，解可溶性钡盐中毒；外用回乳，阑尾炎。

【用法与用量】 6～18 g；外用适量，包敷乳房或患处。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 密闭，在 30°以下保存，防风化。

亚 乎 奴（锡生藤）

Yahunu

HERBA CISSAMPELORIS

本品系傣族习用药材，西双版纳傣文名为 ᦟᧃᦵᦅᦲᦓᦺᦈᦺ（亚乎奴）；为防己科植物亚乎奴 Cissampelos pareira L. 的干燥全株。春、夏二季采挖，除去泥沙，晒干。

【性状】 本品根呈扁圆柱形，多弯曲，长短不一，直径约 1 cm；表面棕褐色或暗

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

褐色，有皱纹及支根痕；断面枯木状。匍匐茎圆柱形，节略膨大，常有根痕或细根；表面棕褐色，节间有扭旋的纵沟纹；易折断，折断时有粉尘飞扬，断面具放射状纹理；缠绕茎纤细，有分枝，表面被黄棕色绒毛。叶互生，有柄，微盾状着生；叶片多皱缩，展平后呈心状扁圆形，先端微凹，具小突尖，上表面疏被白色柔毛，下表面密被褐黄色绒毛。气微，味苦、微甜。

【鉴别】 (1) 本品粉末灰棕色。淀粉粒甚多，单粒圆形、半圆形或多角形，直径2～21 μm，脐点点状或裂缝状；复粒由2～4粒组成。石细胞多，淡黄色，类方形、椭圆形或多角形，直径30～65 μm；另有类梭形，长30～180 μm。具缘纹孔导管直径24～140 μm。纤维细长，可至1000 μm，直径约24 μm，壁厚，木化。草酸钙方晶较少，极细小。非腺毛1～5细胞，长220～1260 μm。

(2) 取本品粗粉5 g，加乙醇40 ml，浸泡2小时，滤过。取滤液约20 ml，置水浴上蒸干，残渣用稀醋酸溶解后，加水适量，置分液漏斗中，加氨试液使成碱性，用氯仿振摇提取，分取氯仿液，再加稀醋酸振摇提取。分取醋酸液2 ml，加碘化汞钾试液2滴，发生红棕色沉淀；另取醋酸液2 ml，加碘化铋钾试液2滴，发生红棕色沉淀。

【性味】 甘、苦，温。

【功能与主治】 止痛，止血，生肌。用于外伤肿痛，创伤出血。

【用法与用量】 外伤肿痛：干粉加酒或蛋清调敷患处。创伤出血：外用适量，每日1～2次。

【贮藏】 置干燥处。

亚　麻　子（胡麻子）

Yamazi

SEMEN LINI

本品为亚麻科植物亚麻 Linum usitatissimum L. 的干燥成熟种子。秋季果实成熟时采收植株，晒干，打下种子，除去杂质，再晒干。

【性状】 本品呈扁平卵圆形，长4～6 mm，宽2～3 mm。表面红棕色或灰褐色，平滑有光泽，一端钝圆，另端尖而略偏斜。种脐位于尖端的凹入处；种脊浅棕色，位于一侧边缘。种皮薄，胚乳棕色，薄膜状，子叶2片，黄白色，富油性。无臭，嚼之有豆腥味。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

以饱满、色红棕、光亮者为佳。

【鉴别】 (1) 取本品，用温水浸泡后，表皮粘液层膨胀而成一透明粘液膜。

(2) 取本品粉末约 0.5 g，置试管中，加水 3 ml，管口放一条浸有 10% 碳酸钠溶液的三硝基酚试纸，塞紧(试纸勿接触溶液和管壁)，将试管置水浴中加热 3～5 分钟，纸条即呈明显的砖红色。

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 润燥，祛风。用于皮肤瘙痒，麻风，眩晕，便秘。

【用法与用量】 4.5～9 g。


【注意】 大便滑泄者忌用。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

亚硫酸氢钠穿心莲内酯

Yaliusuanqingna Chuanxinlianneizhi

ANDROGRAPHOLIDI NATRII BISULFIS



[$C_{20}H_{30}O_5 \cdot NaHSO_3 = 454.51$]

本品为穿心莲内酯的亚硫酸氢钠加成物。按干燥品计算，含 $C_{20}H_{30}O_5 \cdot NaHSO_3$ 应为 95.0～105.0%。

【性状】 本品为白色或几乎白色的粉末；无臭，味苦；略具引湿性。

本品在水中易溶，在甲醇中溶解，在乙醇中略溶，在氯仿中微溶。

【鉴别】 (1) 取本品约 1 mg，加水 1 ml 溶解后，加 1%3,5-二硝基苯甲酸的乙醇溶液与 5%氢氧化钾的乙醇溶液各 10 滴，摇匀后，即显紫红色。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

(2) 取本品约 10 mg，加无水碳酸钠 0.2 g 与浓过氧化氢溶液 0.5 ml，置水浴上蒸干，炽热至炭化，放冷，加水 5 ml，搅拌滤过，滤液加稀盐酸使成酸性后，显硫酸盐的鉴别反应(附录 41 页)。

(3) 本品的水溶液显钠盐的鉴别反应(附录 40 页)。

(4) 取本品与亚硫酸氢钠穿心莲内酯对照品，分别加水制成每 1 ml 中含 10 mg 的溶液，照薄层层析法（附录 38 页）试验，取上述溶液各 10 μl，分别点于同一硅胶G (含 13%煅石膏)薄层层析板上，以氯仿-丙酮-乙醇-水 (5:5:5:1) 为展开剂，展开后，晾干，喷以 2%3,5-二硝基苯甲酸的乙醇溶液与 5% 氢氧化钾的乙醇溶液的等量混合液(临用前混合)使显色。本品所显主斑点的颜色与位置，应与对照品主斑点相同。

【检查】 **澄清度** 取本品 0.1 g，加水 10 ml 溶解后，溶液应澄清。

其他内酯 取鉴别 (4) 所得本品的薄层层析谱，除主斑点外，不得显其他斑点。

易氧化物 取上述澄清度检查项下的溶液，加 $N/10$ 碘液 1 滴，微黄色不得消退。

干燥失重 取本品 1 g，在 105° 干燥至恒重，减失重量不得过 5.0%（附录 44 页）。

【含量测定】 **对照品溶液的制备** 精密称取在 105° 干燥至恒重的亚硫酸氢钠穿心莲内酯对照品 50 mg，置 50 ml 量瓶中，用 60%乙醇稀释至刻度，摇匀，精密量取 10 ml，置 50 ml 量瓶中，用 60%乙醇稀释至刻度，摇匀，即得（每 1 ml 中含亚硫酸氢钠穿心莲内酯 0.2 mg)。

标准曲线的制备 精密量取对照品溶液 1.0、2.0、3.0、4.0 与 5.0 ml，分别置 25ml 量瓶中，分别加 60%乙醇至 15 ml，置 25°水浴中，加 2%3,5-二硝基苯甲酸的乙醇溶液 3 ml，混匀，各精确加入 2%氢氧化钾溶液 3.0 ml，摇匀，放置 25 分钟后，用 60%乙醇稀释至刻度，摇匀。另用 60%乙醇代替对照品溶液按同法处理作为空白，照分光光度法(附录 32 页)，在 540 nm 的波长处测定吸收度，以吸收度为纵座标，浓度为横座标，绘制标准曲线。

测定法 取本品约 20 mg，精密称定，置 100 ml 量瓶中，用 60%乙醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取 3.0 ml，置 25 ml 量瓶中，照标准曲线的制备项下的方法，自“加 60%乙醇至 15 ml”起，依法测定，从标准曲线中读出供试量中含 $C_{20}H_{30}O_5 \cdot NaHSO_3$ 的量，即得。

【功能与主治】 清热解毒，抗菌消炎。用于细菌性痢疾，肺炎，急性扁桃体炎。

【贮藏】 密封保存。

【制剂】 亚硫酸氢钠穿心莲内酯注射液

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

亚硫酸氢钠穿心莲内酯注射液

Yaliusuanqingna Chuanxinlianneizhi Zhusheye

INJECTIO ANDROGRAPHOLIDI NATRII BISULFITIS

本品为亚硫酸氢钠穿心莲内酯的灭菌水溶液。含亚硫酸氢钠穿心莲内酯（$C_{20}H_{30}O_6 \cdot NaHSO_3$）应为标示量的90.0～110.0%。

【性状】 本品为无色澄明液体。

【鉴别】 取本品，照亚硫酸氢钠穿心莲内酯项下的鉴别法(209页）试验，显相同的反应。

【检查】 **pH值** 应为4.5～6.5（附录42页）。

其他 应符合注射剂项下有关的各项规定（附录7页）。

【含量测定】 **对照品溶液的制备与标准曲线的制备** 均照亚硫酸氢钠穿心莲内酯项下的方法（209页）制备。

测定法 精密量取本品2 ml，置100 ml量瓶中，加60%乙醇稀释至刻度，摇匀，精密量取20 ml，置100 ml量瓶中，加60%乙醇稀释至刻度，摇匀，再精密量取3.0 ml，照亚硫酸氢钠穿心莲内酯项下的方法(209页)，自“置25 ml量瓶中”，依法测定，即得。

【功能与主治】 同亚硫酸氢钠穿心莲内酯。

【用法与用量】 肌内注射，一次0.1～0.2 g，一日2次；静脉滴注，一日0.4～0.75 g，加于5%葡萄糖注射液或氯化钠注射液中滴注。

【规格】 (1) 2 ml:0.1 g (2) 5 ml:0.25 g

【贮藏】 密闭保存。

过 岗 龙

Guoganglong

CAULIS ENTADAE

本品为豆科植物榼藤 Entada phaseoloides (L.) Merr. 的干燥藤茎。全年均可采收，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

洗净，切片，蒸后晒干。

【性状】 本品呈不规则的块片状，斜而扭曲，大小不等，厚 1～2 cm。外皮棕褐色或灰棕色，粗糙，有地衣斑，具明显纵皱纹或沟纹，可见侧枝痕和皮孔，常有 1 条棱脊状突起。切面皮部深棕色，有红棕色或棕黑色树脂状物，木部棕色或浅棕色，有多数小孔，可见红棕色树脂状物环绕髓部呈偏心环纹，髓部呈小空洞状，偏于有棱脊的一侧。质坚硬，不易折断。气微，味微涩。

以树脂状物多者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，切碎，干燥。

【性味】 涩、微苦，凉；有小毒。

【功能与主治】 祛风湿，活络行瘀。用于风湿痹痛，腰腿疼痛，跌扑肿痛。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置干燥处。

西　瓜　皮

Xiguapi

EXOCARPIUM CITRULLI

本品为葫芦科植物西瓜 Citrullus vulgaris Schrad. 的干燥外部果皮。夏、秋二季食用西瓜后，削取外部果皮，洗净，干燥。

【性状】 本品呈不规则的条状或片状，边缘常向内卷曲，有的皱缩，厚约 1 mm。外表面深绿色、灰黄色或黄棕色，有的有深绿色条纹。内表面黄白色至黄棕色，有网状筋脉(维管束)。质脆，易折断。无臭，味淡。

【炮制】 除去杂质，喷淋清水，略润，切段，干燥。

【性味】 甘、淡，凉。

【功能与主治】 清解暑热，利尿。用于暑热烦渴，尿少色黄。

【用法与用量】 12～21 g。

【贮藏】 置干燥处，防霉。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

西　河　柳（山川柳）

Xiheliu

CACUMEN TAMARICIS

本品为柽柳科植物柽柳 Tamarix chinensis Lour. 的干燥细嫩枝叶。夏季花未开时采收，阴干。

【性状】 本品茎枝呈细圆柱形，直径 0.5～1.5 mm。表面灰绿色，有多数互生的鳞片状小叶。质脆，易折断。稍粗的枝表面红褐色，叶片常脱落而残留突起状叶基，断面黄白色，中心有髓。气微，味淡。

以枝叶细嫩、色绿者为佳。

【炮制】 除去老枝及杂质，洗净，稍润，切段，晒干。

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 散风，透疹。用于麻疹不透；外治皮肤瘙痒。

【用法与用量】 2.5～6 g；外用适量，煎汤洗浴。

【贮藏】 置干燥处。

百　合

Baihe

BULBUS LILII

本品为百合科植物卷丹 Lilium lancifolium Thunb.、百合 Lilium brownii F. E. Brown var. viridulum Baker 或细叶百合 Lilium pumilum DC. 的干燥肉质鳞片。秋季采挖，洗净，剥取鳞片，置沸水中略烫，干燥。

【性状】 本品呈长椭圆形，长 2～5 cm，宽 1～2 cm，中部厚 1.3～4 mm。顶端稍尖，基部较宽，边缘薄，微波状，略向内弯曲。表面类白色、淡棕黄色或微带紫色，有纵脉纹 5～9 条。质硬而脆，断面较平坦，角质样。无臭，味微苦。

以肉厚、质硬、色白者为佳。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【炮制】 百合 除去杂质。

蜜百合 取净百合，照蜜炙法（附录 19 页）用蜜水炒至放凉后不粘手。

每百合 100 kg，用炼蜜 6 kg。

【性味】 微苦，平。

【功能与主治】 养阴润肺，清心安神。用于阴虚久咳，痰中带血，虚烦惊悸。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

百　　部

Baibu

RADIX STEMONAE

本品为百部科植物直立百部 Stemona sessilifolia (Miq.) Miq.、蔓生百部 Stemona japonica (Bl.) Miq. 或对叶百部 Stemona tuberosa Lour. 的干燥块根。春、秋二季采挖，除去须根，洗净，置沸水中略烫或蒸至无白心，取出，晒干。

【性状】 **直立百部** 呈纺锤形，上端较细长，皱缩弯曲，长 5～12 cm，直径 0.5～1 cm。表面黄白色或淡棕黄色，有不规则深纵沟，间或有横皱纹。质脆，易折断，断面平坦，角质样，淡黄棕色或黄白色，皮部较宽，中柱扁缩。气微，味甘、苦。

蔓生百部 两端稍狭细，表面多不规则皱褶及横皱纹。

对叶百部 呈长纺锤形或长条形，长 8～24 cm，直径 0.8～2 cm。表面浅黄棕色至灰棕色，具浅纵皱纹或不规则纵槽。质坚实，断面黄白色至暗棕色，中柱较大，髓部类白色。

均以条粗壮、质坚实者为佳。

【鉴别】 (1) 本品横切面：

直立百部 根被为 3～4 列细胞，壁木栓化及木化，具致密的细条纹。皮层较宽。中柱韧皮部束与木质部束各 19～27 个，间隔排列，韧皮部束内侧有少数非木化纤维；木质部束导管 2～5 个，并有木纤维及管胞，导管类多角形，径向直径约至 48 μm，偶有导管深入至髓部。髓部散有少数细小纤维。

蔓生百部 根被为 3～6 列细胞。韧皮部纤维木化。导管径向直径约至 184 μm，通常深入至髓部，与外侧导管束作 2～3 轮状排列。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

对叶百部 根被为3列细胞，细胞壁无细条纹，其内层细胞的内壁特厚。皮层外侧散有纤维，类方形，壁微木化。中柱韧皮部束36～40个。木质部束导管圆多角形，直径至107 μm，其内侧与木纤维及微木化的薄壁细胞连接成环层。

(2) 取本品粉末5 g，加80%乙醇50 ml，加热回流1小时，滤过，滤液蒸去乙醇，残留物加浓氨溶液调节pH值至10～11，再加氯仿5 ml振摇提取，分取氯仿层，蒸干，残渣加1%盐酸溶液5 ml使溶解，滤过。滤液分作二份，一份中滴加碘化铋钾试液，发生橙红色沉淀；另一份中滴加硅钨酸试液，发生乳白色沉淀。

【炮制】 **百部** 除去杂质，洗净，润透，切段，干燥。

蜜百部 取百部段，照蜜炙法（附录19页）用蜜水炒至放凉后不粘手。

每百部100 kg，用炼蜜12.5 kg。

【性味】 甘、苦，微温。

【功能与主治】 润肺止咳，杀虫。用于新久咳嗽，肺结核，百日咳，蛲虫病；外用灭虱。

【用法与用量】 3～9 g；外用适量，水煎或酒浸。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮。

百 蕊 草

Bairuicao

HERBA THESII

本品为檀香科植物百蕊草Thesium chinense Turcz.的干燥全草。春、夏二季采挖，除去泥沙，晒干。

【性状】 本品根呈圆锥形，直径1～4 mm；表面棕黄色，有纵皱纹，具细支根。茎丛生，纤细，长12～30 cm，暗黄绿色，具纵棱；质脆，易折断，断面中空。叶互生，叶片条形，长1～3 cm。小花单生于叶腋，近无梗。坚果球形，直径约2 mm，表面有凹凸不平的花纹。气微，味淡。

【炮制】 除去杂质，洗净，切段，晒干。

【性味】 辛、微苦、涩，寒。

【功能与主治】 清热解毒，消肿。用于感冒发热，扁桃体炎，咽喉炎，支气管炎，肺炎，肺脓疡，乳腺炎，疖肿。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【用法与用量】 15～30 g。

【贮藏】 置干燥处。

光枝勾儿茶

Guangzhi Gou'ercha

HERBA BERCHEMIAE POLYPHYLLAE

本品为鼠李科植物光枝勾儿茶 Berchemia polyphylla Wall. var. leioclada Hand.-Mazz. 的干燥地上部分。夏、秋二季茎叶茂盛时采割，干燥。

【性状】 本品茎呈圆柱形，直径可达 1.5 cm；表面棕褐色至暗紫色，外被蜡质；质坚硬，折断面不整齐，皮部薄，木部浅黄色，可见同心性环纹，髓明显。叶互生，有短柄；叶片卵圆形，长 2～4 cm，宽 1～2 cm，先端渐尖或钝圆，顶处有芒尖，全缘；上表面灰绿色，下表面黄绿色，羽状侧脉 7～9 对；近革质。气微，味微苦涩。

以叶多者为佳。

【鉴别】 (1) 本品嫩茎横切面：表皮细胞外壁增厚，角质化。皮层窄，有少数石细胞。中柱鞘纤维束与石细胞断续排列成环，部分纤维壁极厚，木化。韧皮部射线有少数石细胞；纤维较多，壁稍厚，木化。形成层成环。木质部射线宽 1～4 列细胞；导管单个散在或 2～4 个相聚。有髓部。薄壁细胞含草酸钙方晶及棕黄色分泌物；并含淀粉粒。

(2) 取本品粗粉 2 g，加乙醇 30 ml，煮沸，滤过，滤液置水浴上蒸干，残渣加水 5 ml 使溶解，滤过，滤液置水浴上蒸干，残渣加乙醇 5 ml 溶解后，再加镁粉 0.2 g 与盐酸 2 ml，即显桃红色。

【炮制】 除去杂质，洗净，稍润，切段，干燥。

【性味】 微苦、涩，平。

【功能与主治】 祛痰止咳，活络止痛。用于急、慢性支气管炎，小儿疳积，风湿关节痛。

【用法与用量】 15～90 g。

【贮藏】 置干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

光　慈　姑

Guangcigu

BULBUS TULIPAE

本品为百合科植物老鸦瓣 Tulipa edulis Baker 的干燥鳞茎。春、夏二季采挖，除去须根及外皮，洗净，晒干。

【性状】 本品呈类圆锥形，高 1～2 cm，直径 0.5～1 cm。表面类白色、黄白色或浅棕色，光滑，顶端尖，基部圆平而凹陷，一侧有纵沟，自基部伸向顶端。质硬而脆，断面白色，富粉性，内有 1 圆锥形心芽。气微，味淡。

以质硬、色白、粉性足者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，晒干，用时打碎。

【性味】 辛、甘，寒；有小毒。

【功能与主治】 消肿散结，解毒。用于淋巴结结核，痈肿。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置干燥处。

当　归

Danggui

RADIX ANGELICAE SINENSIS

本品为伞形科植物当归 Angelica sinensis (Oliv.) Diels 的干燥根。秋末采挖，除去须根及泥沙，待水分稍蒸发后，捆成小把，上棚，用烟火慢慢熏干。

【性状】 本品略呈圆柱形，下部有支根 3～5 条或更多，长 15～25 cm。表面黄棕色至棕褐色，具纵皱纹及横长皮孔。根头（归头）直径 1.5～4 cm，具环纹，上端圆钝，有紫色或黄绿色的茎及叶鞘的残基；主根（归身）表面凹凸不平；支根（归尾）直径 0.3～1 cm，上粗下细，多扭曲，有少数须根痕。质柔韧，断面黄白色或淡黄棕色，可见 1 黄棕色环，皮部厚，有裂隙及多数棕色点状分泌腔，木部色较淡。有浓郁的香气，味甘、辛、微苦。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

以主根粗长、油润、外皮色黄棕、断面色黄白、气味浓厚者为佳。柴性大、干枯无油或断面呈绿褐色者不可供药用。

【鉴别】 本品横切面：木栓层为数列细胞。皮层窄，有少数油室。韧皮部宽广，多裂隙，油室及油管类圆形，直径25～160 μm，外侧较大，向内渐小，周围分泌细胞6～9个。形成层成环。木质部射线宽3～5列细胞；导管单个散在或2～3个相聚，成放射状排列；薄壁细胞含淀粉粒。

粉末淡黄棕色。韧皮薄壁细胞纺锤形，壁略厚，表面有极微细的斜向交错纹理，有时可见菲薄的横隔。梯纹及网纹导管多见，直径约至80 μm。有时可见油室碎片。

【炮制】 **当归** 除去杂质，洗净，润透，切片，晒干或低温干燥。

酒当归 取当归片，照酒炒法（附录18页）用黄酒微炒。

【性味】 甘、辛，温。

【功能与主治】 补血活血，调经止痛。用于贫血，月经不调，经闭，痛经，崩漏，产后腹痛，血虚便秘，跌扑损伤，痈疽疮疡。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防潮、防蛀。

【制剂】 当归流浸膏

当归流浸膏

Danggui Liujingao

EXTRACTUM ANGELICAE LIQUIDUM

【处方】

当归(粗粉)	1000 g
乙醇(70%)	适量

【制法】 取当归，照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法（附录11页），用70%乙醇作溶剂，浸渍48小时后，缓缓渗漉，收集初漉液850 ml另器保存，继续渗漉，俟有效成分完全漉出，至漉液无色或微黄色为止，收集续漉液，在60°以下浓缩至稠膏状，加入初漉液850 ml，混合后，用70%乙醇稀释，使全量成1000 ml，静置数天，滤过，即得。

【性状】 本品为棕褐色的液体；气特异，味先微甜后转苦麻。

【检查】 **乙醇量** 应为45～50%（附录48页第一法）。

总固体 精密量取本品10 ml，置称定重量的蒸发皿中，于水浴上蒸干后，在100°

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

干燥3小时，遗留的残渣不得少于3.6 g。

其他 应符合流浸膏剂与浸膏剂项下有关的各项规定（附录11页）。

【功能与主治】 调经药。用于月经不调，痛经。

【用法与用量】 口服，一次3～5 ml，一日9～15 ml。

【贮藏】 密封，置阴凉处保存。

当　　药

Dangyao

HERBA SWERTIAE

本品为龙胆科植物瘤毛獐牙菜 Swertia pseudochinensis Hara 的干燥全草。夏、秋二季采挖，除去杂质，晒干。

【性状】 本品长10～40 cm。根呈圆锥形，长2～7 cm，黄色或黄褐色，断面类白色。茎方柱形，多分枝，直径1～2.5 mm；黄绿色或黄棕色带紫色，节处略膨大；质脆，易折断，断面中空。叶对生，无柄；完整叶片展平后呈条状披针形，长2～4 cm，宽0.3～0.9 cm，先端渐尖，基部狭，全缘。圆锥状聚伞花序顶生或腋生，花冠蓝紫色或暗黄色，5深裂，裂片内侧基部有2腺体，腺体周围有长毛。蒴果椭圆形。气微，味苦。

以花多、味苦者为佳。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清湿热，健胃。用于传染性肝炎，急、慢性细菌性痢疾，食欲不振。

【用法与用量】 6～12 g，儿童酌减。

【贮藏】 置干燥处，防潮。

【制剂】 当药片

当　药　片（肝复灵片）

Dangyao Pian

TABELLAE SWERTIAE

本品为当药的浸膏片。每片相当于当药1.2 g。

【制法】 取当药1110 g，加水煎煮二次，第一次加12倍量的水，煮3小时，第二次

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

加7倍量的水，煮1.5小时，合并煎液，滤过，滤液减压浓缩至稠膏状，加入当药细粉90 g与淀粉12 g，混匀，在70°以下干燥，粉碎，过筛，用80%乙醇制成颗粒，压制成1000片，包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显暗黄棕色；味苦。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定（附录6页）。

【功能与主治】 清湿热，健胃。用于急、慢性肝炎，黄疸型肝炎。

【用法与用量】 口服，一次5片，一日2次；小儿酌减。

【贮藏】 密封保存。

虫白蜡

Chongbaila

CERA CHINENSIS

本品为介壳虫科昆虫白蜡虫 Ericerus pela (Chavannes) Guerin 的雄虫群栖于木犀科植物白蜡树 Fraxinus chinensis Roxb.、女贞 Ligustrum lucidum Ait. 或女贞属他种植物枝干上分泌的蜡，经精制而成。

【性状】 本品呈块状，白色或类白色。表面平滑或稍有皱纹，具光泽。体轻，质硬而稍脆，搓捻则粉碎。断面呈针状或颗粒状。气微，无味。

熔点 本品的熔点（附录28页）为81～85°。

皂化值 本品的皂化值（附录52页）不少于70。

酸值 本品的酸值（附录51页）不大于1。

碘值 本品的碘值（附录52页）不大于9。

【用途】 作为赋形剂，制丸、片的润滑剂。

【贮藏】 置阴凉处，密闭保存。

肉苁蓉

Roucongrong

HERBA CISTANCHIS

本品为列当科植物肉苁蓉 Cistanche deserticola Y. C. Ma 的干燥带鳞片的肉质茎。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

多于春季苗未出土或刚出土时采挖，除去花序，切段，晒干。

【性状】 本品呈扁圆柱形，稍弯曲，长 3～15 cm，直径 2～8 cm。表面棕褐色或灰棕色，密被覆瓦状排列的肉质鳞片，通常鳞片先端已断。体重，质硬，微有柔性，不易折断。断面棕褐色，有淡棕色点状维管束，排列成波状环纹。气微，味甜、微苦。

以条粗壮、密被鳞片、色棕褐、质柔润者为佳。

【鉴别】 取本品粗粉 1 g，加含 0.5%盐酸的乙醇 8 ml，置水浴上微沸浸渍 10 分钟，趁热滤过，滤液加氨试液调节至中性，置水浴上蒸干，残渣加 1%盐酸溶液 3 ml 使溶解，滤过。取滤液 1 ml，加碘化铋钾试液 1～2 滴，发生橘红色或红棕色沉淀。

【炮制】 **肉苁蓉** 除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。

酒苁蓉 取肉苁蓉片，照酒炖法（附录18页）用黄酒炖至酒吸尽。

【性味】 甘、咸，温。

【功能与主治】 补肾阳，益精血，润肠。用于腰膝痿软，阳痿，女子不孕，肠燥便秘。

【用法与用量】 6～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

肉　桂

Rougui

CORTEX CINNAMOMI

本品为樟科植物肉桂 Cinnamomum cassia Presl 的干燥树皮。多于秋季剥取，阴干。

【性状】 本品呈槽状或卷筒状，长 30～40 cm，宽或直径 3～10 cm，厚 0.2～0.8 cm。外表面灰棕色，稍粗糙，有不规则的细皱纹及横向突起的皮孔，有的可见灰白色的斑纹；内表面红棕色，略平坦，有细纵纹，划之显油痕。质硬而脆，易折断，断面不平坦，外层棕色而较粗糙，内层红棕色而油润，两层间有 1 条黄棕色的线纹。气香浓烈，味甜、辣。

以肉厚、体重、油性大、香气浓、嚼之渣少者为佳。

【鉴别】 本品横切面：木栓层为数列细胞，最内层细胞外壁增厚，木化。皮层散有石细胞及分泌细胞。中柱鞘部位有石细胞群，断续排列成环，外侧伴有纤维束，石细胞通常外壁较薄。韧皮部射线宽 1～2 列细胞，含细小草酸钙针晶；纤维常 2～3 个成束；

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

油细胞随处可见。薄壁细胞含淀粉粒。

粉末红棕色。纤维大多单个散在，长梭形，长195～920 μm，直径约至 50 μm，壁厚，木化，纹孔不明显。石细胞类方形或类圆形，直径 32～88 μm，壁厚，有的一面菲薄。油细胞类圆形或长圆形，直径 45～108 μm。草酸钙针晶细小，散在于射线细胞中。木栓细胞多角形，含红棕色物。

【炮制】 除去杂质及粗皮，用时捣碎。

【性味】 辛、甘，大热。

【功能与主治】 补阳，温肾，祛寒，通脉，止痛。用于肢冷脉微，脘腹、腰膝冷痛，虚喘，虚寒腹泻，痛经，经闭，低血压，寒性脓疡。

【用法与用量】 1～4.5 g。

【注意】 有出血倾向者及孕妇慎服。不宜与石脂同用。

【贮藏】 置阴凉干燥处，密闭保存。

肉　桂　油

Rouguiyou

OLEUM CINNAMOMI

本品为樟科植物肉桂 Cinnamomum cassia Presl 的干燥枝、叶经蒸气蒸馏得到的挥发油。含桂皮醛（C_9H_8O）不得少于 85.0%（ml/ml）。

【性状】 本品为黄色或黄棕色的澄清液体；有肉桂的特异香气，味甜、辛。露置空气中或存放日久，色渐变深，质渐浓稠。

本品在乙醇或冰醋酸中易溶。

比重 本品的比重（附录26页）在 25°时为 1.045～1.063。

折光率 本品的折光率（附录32页）为 1.602～1.614。

【鉴别】 取本品，冷却至 0°，加等容的硝酸振摇后，即析出结晶性沉淀。

【检查】 **酚类** 取本品 0.2 ml，加乙醇 10 ml 溶解后，加三氯化铁试液 1 滴，除棕色外，不得显绿色或紫色。

重金属 取本品 10 ml，加水 10 ml 与盐酸 1 滴，振摇后，通硫化氢气使饱和，水层与油层均不得变色。

【含量测定】 精密量取本品 10 ml(A)，置 100 ml 测醛瓶中，加中性亚硫酸钠饱和

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

溶液(取亚硫酸钠饱和溶液，以酚酞为指示剂，滴加30%亚硫酸氢钠溶液使成中性。临用新制)50 ml，振摇使混合，加酚酞指示液2滴，随即置水浴中不断加热振摇，当显红色时，滴加30%亚硫酸氢钠溶液，使红色消失，置水浴中重复加热振摇，当不再显红色时，再加入酚酞指示液数滴，继续置水浴中加热15分钟，如不再显红色时，取出冷却至室温；如仍显红色，则再置水浴中，重复加热并滴加30%亚硫酸氢钠溶液使红色消失，取出冷却至室温，俟分层，添加中性亚硫酸钠饱和溶液适量，使油层浮升至瓶颈的刻度处，放置俟澄清(约18小时)，检读析出油层的ml数(B)，(A－B)×10即为本品中桂皮醛的含量百分数。

【功能与主治】 驱风药及健胃药。

【用法与用量】 口服，一次0.02～0.2 ml，一日0.06～0.6 ml。

【贮藏】 遮光，满装，密封，置阴凉处保存。

朱　　砂

Zhusha

CINNABARIS

本品为六方晶系辰砂的矿石，主含硫化汞。采挖后，选取纯净者，用水淘去杂石和泥沙，并用磁铁吸去含铁的杂质。

【性状】 本品呈大小不一的块片状、颗粒状或粉末状。鲜红色或暗红色，有光泽。体重，质脆，片状者易破碎，粉末状者有闪烁的光泽。无臭，无味。

以色鲜红、有光泽、体重、质脆者为佳。

【鉴别】 (1) 取本品粉末，用盐酸湿润后，在光洁的铜片上摩擦，铜片表面即显银白色光泽，加热烘烤后，银白色即消失。

(2) 取本品粉末2 g，加盐酸3份与硝酸1份的混合液2 ml使溶解，蒸干，加水2 ml溶解后，溶液显汞盐(附录40页)与硫酸盐(附录41页)的鉴别反应。

【检查】 铁　取本品1 g，加稀盐酸20 ml，加热煮沸10分钟，滤入250 ml量瓶中，加氢氧化钠试液中和后，用水稀释至刻度。取稀释液10 ml，照铁盐检查法(附录45页)检查，如显颜色，与标准铁溶液4 ml制成的对照液比较，不得更深(0.1%)。

【含量测定】 取本品约0.3 g，精密称定，置250 ml烧瓶中，加硫酸10 ml与硝酸钾1.5 g，加热使溶解，放冷，加水50 ml，并加1%高锰酸钾溶液至显粉红色，再滴加

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

2%硫酸亚铁溶液至红色消失后，加硫酸铁铵指示液 2 ml，用 $N/10$ 硫氰酸铵液滴定，即得(每 1 ml 的 $N/10$ 硫氰酸铵液相当于 11.63 mg 的 HgS)。

本品含硫化汞(HgS)不得少于 96%。

【炮制】 用磁铁吸去铁屑，研成细粉，或照水飞法(附录17页)水飞，晾干。

【性味】 甘，微寒。

【功能与主治】 镇惊，安神，解毒。用于癫痫，惊风，心悸易惊，失眠多梦，目昏；外治疮疡肿毒，口舌生疮。

【用法与用量】 0.3～1.5 g；外用适量。多入丸散用。

【注意】 不宜多服、久服，以免慢性汞中毒。肝、肾功能不正常者慎用。

【贮藏】 置干燥处。

朱　砂　根

Zhushagen

RADIX ARDISIAE CRENATAE

本品为紫金牛科植物朱砂根 Ardisia crenata Sims 的干燥根。秋、冬二季采挖，洗净，晒干。

【性状】 本品根茎略膨大。根丛生，支根呈圆柱形，稍弯曲，长短不一，直径 2～10 mm；表面暗棕色或暗褐色，具纵皱纹及横向断裂痕；质硬而脆，易折断，断面皮部易与木部分离，皮部厚，约占横断面的 1/2～2/3，类白色或粉红色，有散在的“朱砂点”，木部淡黄色。气微，味微苦辛。

以条粗、皮厚者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切段，晒干。

【性味】 微苦、辛，平。

【功能与主治】 消炎止痛，活血散瘀，祛风除湿。用于咽喉肿痛，跌扑损伤，风湿痹痛。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

丢 了 棒

Diuliaobang

RAMULUS ET FOLIUM CLAOXYLI

本品为大戟科植物白桐树 Claoxylon polot (Burm.) Merr. 的干燥带叶嫩枝。全年均可采收，晒干。

【性状】 本品嫩枝呈圆柱形，表面黄绿色，有时可见紫晕，具细纵条纹，被细茸毛，有多数菱形或圆形突起的黄白色皮孔，枝皮内面常呈紫红色；体轻，质脆，易折断，髓部占断面的 1/2～2/3。叶互生，多皱缩、脱落，完整叶片展平后呈宽卵形至卵状矩圆形，长 10～20 cm，宽 6～12 cm；先端尖，基部浑圆，有 2 个不甚明显的腺体，边缘具不规则的粗齿；下表面被细绒毛，叶脉隆起，常呈紫红色；叶柄长 5～18 cm。气微香，味微咸而涩。

以枝嫩、色黄绿、叶多者为佳。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性味】 淡，平；有小毒。

【功能与主治】 祛风除湿，散瘀止痛。用于风湿痹痛，外伤瘀痛。

【用法与用量】 12～18 g。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 置通风干燥处。

竹 节 参（竹节七）

Zhujieshen

RHIZOMA PANACIS JAPONICI

本品为五加科植物竹节参 Panax japonicus C. A. Mey. 的干燥根茎。秋季采挖，除去主根及外皮，干燥。

【性状】 本品略呈圆柱形，稍弯曲，长 5～22 cm，直径 0.8～2.5 cm。表面黄色或

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

黄褐色，粗糙，有致密的皱纹及明显的节结。节间长 0.8～2 cm，每节有 1 凹陷的茎痕。质硬而脆，易折断，断面不平坦，黄白色至淡黄棕色，可见黄色点状维管束。无臭，味苦、微甜。

以条粗、质硬、断面色黄白者为佳。

【鉴别】（1）取本品粉末 0.2 g，加醋酐 2 ml，置水浴上加热 2 分钟，滤过。取滤液 1 ml，沿管壁缓缓滴加硫酸 2～4 滴，在两液接界处显红紫色。

（2）取本品粉末 0.5 g，加水 10 ml，剧烈振摇，发生持久性泡沫。

【炮制】除去杂质，用时打碎。

【性味】甘、微苦，温。

【功能与主治】滋补强壮，散瘀止痛，止血，祛痰。用于病后虚弱，肺结核咯血，咳嗽痰多，跌扑损伤。

【用法与用量】6～9 g。

【贮藏】置通风干燥处，防蛀。

竹节香附（两头尖）

Zhujiexiangfu

RHIZOMA ANEMONES RADDEANAE

本品为毛茛科植物多被银莲花 Anemone raddeana Regel 的干燥根茎。秋季采挖，除去须根，洗净，晒干。

【性状】本品呈长纺锤形，略弯曲，长 1～3 cm，直径 0.2～0.7 cm。表面棕褐色至棕黑色，具细纵皱纹，有略突起的节及分枝。质硬而脆，易折断，断面略平坦，类白色或淡棕色至红棕色，角质样。无臭，味淡后微麻辣。

以质硬、断面类白色者为佳。

【鉴别】（1）取本品粗粉 2 g，加甲醇 10 ml，置水浴上微温振摇 10 分钟，滤过。取滤液 2 ml，加 1%氢氧化钠溶液 2 ml，置水浴上加热 3 分钟，溶液呈澄明的鲜黄色；再加 1%盐酸溶液使成酸性，溶液的鲜黄色消退而呈乳白色浑浊。

（2）取本品粗粉 2 g，加乙醇或无水乙醇 10 ml，微温振摇 10 分钟，滤过，滤液置水浴上浓缩至 5 ml。取浓缩液 1 ml，置试管中，沿管壁缓缓加入硫酸 1 ml，两液接界处显红紫色环。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性味】 辛，热；有毒。

【功能与主治】 祛风湿，消痈肿。用于风寒湿痹，四肢拘挛，骨节疼痛，痈肿。

【用法与用量】 1.5～3 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

竹　　茹

Zhuru

CAULIS BAMBUSAE IN TAENIAM

本品为禾本科植物青秆竹 Bambusa breviflora Munro、大头典竹 Sinocalamus beecheyanus (Munro) McClure var. pubescens P. F. Li 或淡竹 Phyllostachys nigra var. henonis Stapf 的茎的干燥中间层。全年均可采制，取新鲜茎，除去外皮，将稍带绿色的中间层刮成丝条，阴干。

【性状】 本品为不规则的丝条，卷曲成团状。宽窄厚薄不等。浅绿色或黄绿色。体轻松，质柔软，有弹性。气微，味淡。

以丝细均匀、色绿、质柔软、有弹性者为佳。

【炮制】 竹茹　除去杂质，切段或揉成小团。

姜竹茹　取竹茹，照姜汁炙法（附录19页）用姜汁微炒至黄色。

【性味】 甘，微寒。

【功能与主治】 清热，除烦，止呕。用于胃热呕吐，胸膈烦闷。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置干燥处，防霉、防蛀。

竹　　黄

Zhuhuang

CONCRETIO SILICEA BAMBUSAE

本品为禾本科植物青皮竹 Bambusa textilis McClure 或华思劳竹 Schizostachyum

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

chinense Rendle 等杆内的分泌液干燥后的块状物。秋、冬二季采收。

【性状】 本品为不规则的片块或颗粒，大小不一。表面灰蓝色、灰黄色或灰白色，有的洁白色，半透明，略带光泽。体轻，质硬而脆，易破碎，吸湿性强。无臭，味淡。

以片块大、色灰白、质细、体轻、吸湿性强者为佳。

【鉴别】 (1) 取本品，炽灼灰化后，残渣中加盐酸 1 份与硝酸 1 份的混合液，滤过，滤液加钼酸铵试液，振摇，再加硫酸亚铁试液，即显蓝色。

(2) 取滤纸一片，加亚铁氰化钾试液 1 滴，待干后，再加本品盐酸溶液 1 滴、水 10 滴与茜红的乙醇溶液 1 滴，用氨气熏后，滤纸上可见紫色斑中有红色的环。

【检查】 **体积比** 取本品通过四号筛的粉末 10 g，轻轻装入量筒内，体积不得少于 35 ml。

吸水量 取本品 5 g，加水 50 ml，放置片刻，用湿润后的滤纸滤过，所得滤液不得过 44 ml。

【性味】 甘，寒。

【功能与主治】 清热，豁痰，定惊。用于痰热蒙蔽，神昏谵语，小儿高热抽搐，中风不语。

【用法与用量】 2.5～6 g。

【贮藏】 置干燥处，密闭保存。

华　山　参（热参）

Huashanshen

RADIX PHYSOCHLAINAE

本品为茄科植物漏斗泡囊草 Physochlaina infundibularis Kuang 的干燥根。春季采挖，除去须根，洗净，晒干。

【性状】 本品呈长圆锥形或圆柱形，略弯曲，有的有分枝，长 10～20 cm，直径 1～2.5 cm。顶端常有 1 至数个根茎，其上有茎痕及疣状突起。表面棕褐色，有黄白色横长皮孔、须根痕及纵皱纹，上部有环纹。质硬，断面类白色或黄白色，皮部狭窄，木部宽广，可见细密的放射状纹理。气微，味微苦，稍麻舌。

以体实、断面色白者为佳。

【鉴别】 (1) 本品横切面：木栓层为数列至 10 余列木栓细胞，最外层细胞黄棕色。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

皮层及韧皮部有含砂晶细胞。形成层环明显。木质部占根的大部分，导管数个相聚，有的导管旁有细小筛管群，为木间韧皮部。木薄壁组织及射线有含砂晶细胞。近中心的导管或导管群四周有时围有数层至10余层棕色扁平形木栓化细胞，内含黄棕色分泌物。薄壁细胞充满淀粉粒。

粉末灰白色。淀粉粒甚多，单粒类圆形或半圆形，直径3～15 μm，脐点点状、裂缝状或叉状；复粒由2～7粒组成。草酸钙砂晶多存在于薄壁细胞中，箭头状、颗粒状或短棒状。网纹导管直径17～85 μm。

(2) 取本品细粉4 g，加85%乙醇15 ml，振摇15分钟，滤过，滤液蒸干后，加1%硫酸溶液2 ml，搅拌，滤过，滤液加氨试液使成碱性，再加氯仿2 ml振摇提取，分取氯仿液蒸干，残渣加发烟硝酸5滴，置水浴上蒸干，放冷，残渣加乙醇制氢氧化钾试液3～4滴与氢氧化钾一小块，即显紫堇色。

【炮制】 除去杂质，洗净，晒干，用时捣碎。

【性味】 甘、微苦，热；有毒。

【功能与主治】 定喘，温中，安神。用于慢性支气管炎，虚寒腹泻，心悸失眠。

【用法与用量】 0.1～0.2 g。

【注意】 本品有毒，不宜多服、久服。青光眼患者忌服。孕妇慎服。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

【制剂】 (1) 华山参气雾剂 (2) 华山参片

华山参气雾剂

Huashanshen Qiwuji

AEROSOLUM PHYSOCHLAINAE

本品为华山参提取物的乙醇溶液，加适宜的抛射剂与食用香精等制成的气雾剂。每1 ml溶液中含生物碱以莨菪碱（$C_{17}H_{23}O_3N$）计算，应为4.5～5.5 mg。

【性状】 本品为淡黄色液体。

【鉴别】 取本品的喷出液，置水浴上蒸干，残渣加5%硫酸溶液2 ml使溶解，滤过。取滤液1 ml，加碘化汞钾试液1～2滴，发生淡黄色沉淀；另取滤液1 ml，加稀碘化铋钾试液1～2滴，发生棕红色沉淀。

【含量测定】 取本品1瓶，冷却至5°左右，用微孔排气法(取橡胶管1根，两端各

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

套上6号或7号注射针头，一端放入水中；在铝盖下穿一小孔，将另端注射针头插入瓶中，针头勿与液面接触)，待抛射剂缓缓排出后，除去铝盖、喷头等，放置至室温。精密量取溶液4 ml，置水浴上蒸干，残渣加$N/1$硫酸液10 ml，温热使生物碱溶解，滤过，滤渣用$N/1$硫酸液洗涤，至洗液不呈生物碱反应为止。合并酸液，用氯仿振摇洗涤2次，第一次10 ml，第二次5 ml，弃去氯仿液。酸液加浓氨试液使成碱性后，用氯仿25 ml、15 ml、10 ml、5 ml分次振摇提取，至生物碱提尽为止。每次得到的氯仿液均用同一的水10 ml洗涤，合并氯仿液，置水浴上蒸干，加乙醚数滴，再蒸干，精密加$N/50$硫酸液10 ml，置水浴上稍温热，加甲基红指示液数滴，用$N/50$氢氧化钠液滴定，即得(每1 ml的$N/50$硫酸液相当于5.787 mg的$C_{17}H_{23}O_3N$)。

【功能与主治】 定喘，止咳，祛痰。用于慢性支气管炎，喘息型气管炎。

【用法与用量】 用时将本品药瓶倒置，喷头圆孔对准口腔，在用力吸气的同时，立即揿压阀门上端喷雾头，溶液即成雾状喷入口腔，闭口数分钟，一次喷吸3～4下，一日3～4次。

【注意】 使用后咳喘症状反而加重者，应停药；青光眼患者忌用。

【贮藏】 遮光，在阴凉处保存。

华山参片 【剧】

Huashanshen Pian

TABELLAE PHYSOCHLAINAE

本品为华山参浸膏片。每片含生物碱以莨菪碱($C_{17}H_{23}O_3N$)计算，应为0.18～0.27 mg。

【制法】 取华山参，粉碎成粗粒，照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法(附录11页)，用含0.1%盐酸的乙醇作溶剂，浸渍24小时后进行渗漉，至漉液色淡为止，漉液减压浓缩至稠膏状，测定生物碱含量，加适量辅料，制成颗粒，压片，包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕色；味苦。

【鉴别】 取本品10片，加乙醇4 ml，温热10分钟，滤过，滤液置水浴上蒸干，残渣加5%硫酸溶液5 ml使溶解，滤过。取滤液1 ml，加碘化汞钾试液1～2滴，发生淡黄色沉淀；另取滤液1 ml，加稀碘化铋钾试液1～2滴，发生棕红色沉淀。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(附录6页)。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【含量测定】 对照品溶液的制备 精密称取在120°干燥2小时的硫酸阿托品25 mg，置25 ml量瓶中，加0.6%硫酸溶液使溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取溶液15ml，置100 ml量瓶中，加水稀释至刻度，即得(每1 ml中含无水硫酸阿托品150 μg)。

供试品溶液的制备 取本品20片，注意除去糖衣，精密称定，研细，精密称出适量(约相当于6片的重量)，置10 ml量瓶中，加0.6%硫酸溶液至刻度，密塞，振摇1小时，滤过，弃去初滤液，分取续滤液，即得。

测定法 精密量取供试品溶液与对照品溶液各1 ml，分别置分液漏斗中，各加醋酸-醋酸钠缓冲液(pH 3.7)5 ml，再精密加入0.15%橙黄Ⅳ溶液15 ml，摇匀，各用氯仿8ml轻轻振摇提取3分钟，静置半小时，分取氯仿液，用氯仿湿润的滤纸滤入50 ml量瓶中，再用氯仿提取4次，每次8 ml，依次滤入量瓶中，精密加入含1%硫酸的甲醇溶液6 ml，加氯仿稀释至刻度，摇匀。照比色法（附录32页），分别在545 nm的波长处测定吸收度，计算，即得。

【功能与主治】 同华山参气雾剂。

【用法与用量】 常用量，口服，一次1～2片，一日3～6片。极量，口服，一次4片，一日12片。

【注意】 青光眼患者忌用。

【贮藏】 密封保存。

自 然 铜

Zirantong

PYRITUM

本品为等轴晶系黄铁矿的矿石，主含硫化铁。采挖后，除去杂质。

【性状】 本品多呈方块形，直径0.2～2.5 cm。表面亮黄色，有金属光泽，有的黄棕色或棕褐色，无金属光泽；具棕黑色或墨绿色细条纹及砂眼。体重，质坚硬或稍脆，易砸碎；断面黄白色，有金属光泽，或断面棕褐色，可见银白色亮星。无臭，无味。

以块整齐、色黄而光亮、断面有金属光泽者为佳。

【鉴别】 取本品粉末约2 g，置25 ml坩埚中，于500°灼烧，产生蓝色火焰，并发生刺激性的二氧化硫气体，可使湿润的蓝色石蕊试纸变红色，残渣冷后呈暗褐色。取残渣约1/10量，于100 ml锥形瓶中，加盐酸10 ml，温热溶解，滤过，滤液呈铁盐（附录

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

41页）的鉴别反应。

【炮制】 **煅自然铜** 取自然铜，照煅法（附录19页）煅至红透，立即倒入醋内浸淬，取出，再煅烧、醋淬，至色变黑褐、表面光泽消失并酥松。

每自然铜 100 kg，用醋 25～30 kg。

【性味】 辛，平。

【功能与主治】 散瘀，接骨，止痛。用于跌扑肿痛，筋骨折伤。

【用法与用量】 3～9 g，多入丸散服；外用适量。

【贮藏】 置干燥处。

伊　贝　母

Yibeimu

BULBUS FRITILLARIAE PALLIDIFLORAE

本品为百合科植物新疆贝母 Fritillaria walujewii Regel 或伊犁贝母 Fritillaria pallidiflora Schrenk 的干燥鳞茎。5～7 月间采挖，除去泥沙，晒干，再去须根及外皮。

【性状】 **新疆贝母** 呈扁球形，高 0.5～1.5 cm。表面类白色，光滑。外层鳞叶 2 瓣，月牙形，肥厚，大小相近而紧靠。顶端平展而开裂，基部圆钝，内有较大的鳞片及残茎、心芽各 1 枚。质硬而脆，断面白色，富粉性。气微，味微苦。

伊犁贝母 呈圆锥形，较大。表面稍粗糙，淡黄白色。外层鳞叶心脏形，肥大，大小悬殊而紧密抱合。顶端稍尖，少有开裂，基部微凹陷。

均以质坚实、粉性足、味苦者为佳。

【鉴别】 本品粉末类白色。

新疆贝母 淀粉粒甚多，广卵形、卵形或贝壳形，直径 5～40 μm，脐点点状、人字状或短缝状，层纹明显。表皮细胞类长方形，垂周壁微波状弯曲。气孔不定式，副卫细胞 4～5 个。螺纹及环纹导管直径 9～56 μm。

伊犁贝母 淀粉粒三角状卵形、贝壳形或不规则圆形，直径约至 60 μm，脐点点状、人字状或十字状。导管直径约至 50 μm。

【性味】 苦、甘，微寒。

【功能与主治】 止咳，化痰，清肺，散结。用于肺热咳嗽，胸闷痰粘，淋巴结结核，痈肿。

【用法与用量】 3～9 g。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【注意】 不宜与乌头类药材同用。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

血 余 炭

Xueyutan

CRINIS CARBONISATUS

本品为人头发制成的炭化物。取头发，除去杂质，碱水洗去油垢，清水漂净，晒干，焖煅成炭，放凉。

【性状】 本品呈不规则块状，乌黑光亮，有多数细孔。体轻，质脆。用火烧之有焦发气，味苦。

以体轻、色黑光亮者为佳。

【性味】 苦，微温。

【功能与主治】 止血，化瘀。用于崩漏，尿血；外治鼻衄。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置干燥处。

向 天 盏

Xiangtianzhan

HERBA SCUTELLARIAE INDICAE

本品为唇形科植物向天盏 Scutellaria indica L. 的干燥全草。夏、秋二季采挖，晒干。

【性状】 本品长 10～40 cm，全体被毛，叶上尤多。根纤细。茎方柱形，灰绿色。叶对生，叶片较厚，多皱缩，展平后呈卵圆形，长 1.5～3 cm，宽 1～2.5 cm；灰绿色或暗紫色，先端圆钝，基部浅心形或平截，边缘有钝齿；叶柄长 0.5～2.5 cm。总状花序顶生，花偏向一侧；萼片条状披针形，花冠二唇形，长约 1.6 cm，被毛。果实卵圆形，淡棕色。气微，味微苦。

【炮制】 除去杂质，切段。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性味】 辛、微苦，平。

【功能与主治】 清热解毒，活血，疏肝。用于胸胁闷痛，肺脓疡，痢疾，肠炎，白带；外治痈疮，蛇咬伤。

【用法与用量】 15～30 g，鲜品 30～45 g；外用鲜品适量，捣烂敷患处。

【贮藏】 置通风干燥处。

全叶青兰

Quanyeqinglan

HERBA DRACOCEPHALI INTEGRIFOLII

本品为唇形科植物全叶青兰 Dracocephalum integrifolium Bge. 的干燥地上部分。夏季花期采割，除去杂质，阴干。

【性状】 本品茎呈方柱形，少分枝；长 20～60 cm，表面黄棕色或红棕色。叶对生，有短柄；叶片多皱缩破碎，完整者展平后呈长披针形，长 1～3 cm，宽 0.2～0.5 cm，绿色，全缘，边缘反卷；叶腋有一束短缩的小枝。轮伞花序顶生，花具短梗；苞片长卵形，暗紫红色，两侧具 2～3 小齿；花萼筒状，花冠二唇形，暗紫红色。气微香，味苦。

以色绿、叶多、有花、气香者为佳。

【鉴别】 取本品 2 g，加 60%乙醇 20 ml，加热回流 10 分钟，滤过。取滤液 1 ml，加镁粉少量与盐酸 3～4 滴，即显橙红色。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性味】 辛，平。

【功能与主治】 止咳，祛痰，平喘。用于咳嗽，痰喘，慢性支气管炎。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

全蝎

Quanxie

SCORPIO

本品为钳蝎科动物东亚钳蝎 Buthus martensii Karsch 的干燥体。春末至秋初捕捉，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

除去泥沙，置沸水或沸盐水中，煮至身挺腹硬，脊背抽沟，捞出，置通风处，阴干。

【性状】 本品头胸部与前腹部呈扁平长椭圆形，后腹部呈尾状，皱缩弯曲，完整者体长约 6 cm。头胸部呈绿褐色，前面有 1 对短小的螯肢及 1 对较长大的锯状脚须，形似蟹螯，背面覆有梯形背甲，腹面有足 4 对，均为 7 节，末端各具 2 爪钩；前腹部由 7 节组成，第七节色深，背甲上有 5 条隆脊线。背面绿褐色，后腹部棕黄色，6 节，节上均有纵沟，末节有锐钩状毒刺，毒刺下方无距。气微腥，味咸。

以完整、色黄褐、盐霜少者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，干燥。

【性味】 甘、辛，平；有毒。

【功能与主治】 熄风镇痉，祛风攻毒。用于小儿惊风，抽搐痉挛，面神经麻痹，脑血管痉挛，半身不遂，破伤风，淋巴结结核，疮疡肿毒。

【用法与用量】 2.5～4.5 g。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

合　欢　皮

Hehuanpi

CORTEX ALBIZIAE

本品为豆科植物合欢 Albizia julibrissin Durazz. 或山合欢 Albizia kalkora (Roxb.) Prain 的干燥树皮。夏、秋二季剥取，晒干。

【性状】 合欢　卷曲呈筒状或半筒状，长 40～80 cm，厚 0.1～0.3 cm。外表面灰棕色至灰褐色，稍有纵皱纹，有的成浅裂纹，密生明显棕色或棕红色的椭圆形横向皮孔，习称"珍珠疙瘩"，偶有突起的横棱或较大的圆形枝痕，常附有地衣斑；内表面淡黄棕色或黄白色，平滑，有细密纵纹。质硬而脆，易折断，断面呈纤维性片状，淡黄棕色或黄白色。气微香，味淡、微涩、稍刺舌，而后喉头有不适感。

山合欢　外表面较粗糙，有细密皱纹及不规则纵向棱纹，皮孔通常明显。老皮极粗糙，有不规则的纵裂口。气微，味淡。

均以皮细嫩、珍珠疙瘩（皮孔）明显者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切丝或块，干燥。

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 安神，活血，消痈。用于失眠，肺脓疡，痈肿，折伤疼痛。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【用法与用量】 6～12 g；外用适量，研末调敷。

【贮藏】 置通风干燥处。

合　欢　花

Hehuanhua

FLOS ALBIZIAE

本品为豆科植物合欢 Albizia julibrissin Durazz. 的干燥花序。夏季花开放时择晴天采收，及时晒干。

【性状】 本品为头状花序，皱缩成团。花细长而弯曲，长 0.7～1 cm，淡黄棕色至淡黄褐色，具短梗。花萼筒状，先端有 5 小齿；花冠筒长约为萼筒的 2 倍，先端 5 裂，裂片披针形。雄蕊多数，花丝细长，黄棕色至黄褐色，下部合生，上部分离，伸出花冠筒外。气微香，味淡。

以色淡黄棕、梗短者为佳。

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 安神解郁。用于心烦，郁闷少眠。


【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

冰　　片（合成龙脑）

Bingpian

BORNEOLUM SYNTHETICUM



[$C_{10}H_{18}O$=154.25]

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 本品为无色透明或白色半透明的片状松脆结晶；有清香气，味辛、凉；具挥发性，点火能发生多烟、有光的火焰。

本品在乙醇、氯仿或乙醚中易溶，在水中几乎不溶。

熔点 本品的熔点（附录28页）为205～209°（供内服）或205～210°（供外用）。

【鉴别】 (1) 取本品约10 mg，加乙醇数滴溶解后，加新制的1%香草醛的硫酸溶液1～2滴，即显紫色。

(2) 取本品3 g，加硝酸10 ml，即发生红棕色的气体，待气体发生停止后，加水20 ml，振摇，滤过，滤渣用水洗净后，有樟脑臭。

【检查】 **酸碱度** 取本品2.5 g，研细，加新沸过的冷水25 ml，振摇，滤过，分取滤液二份，每份10 ml，一份加甲基红指示液2滴，另一份加酚酞指示液2滴，均不得显红色。

不挥发物 取本品10 g，置称定重量的蒸发皿中，置水浴上加热，使挥发后，在105°干燥至恒重，遗留残渣不得过3.5 mg (0.035%)。

水分 取本品1 g，加石油醚10 ml，振摇使溶解，溶液应澄清。

重金属 取本品2 g，加乙醇23 ml溶解后，加稀醋酸2 ml，依法检查（附录46页第一法），含重金属不得过百万分之五。

砷盐 取本品1 g，加氢氧化钙0.5 g与水2 ml，混匀，置水浴上加热使本品挥发后，放冷，加盐酸中和，再加盐酸5 ml与水适量使成28 ml，依法检查(附录47页)，含砷量不得过百万分之二。

【性味】 辛、苦，凉。

【功能与主治】 通窍散热，消炎，止痛。用于热病神昏，中暑；外治咽喉、牙龈肿痛，口舌生疮，目赤，中耳炎，痈肿，痱子。

【用法与用量】 0.15～0.3 g，入丸散用；外用研粉点敷患处。

【注意】 孕妇慎服。

【贮藏】 密封，置凉处保存。

冰 凉 花

Binglianghua

HERBA ADONIDIS

本品为毛茛科植物冰凉花 Adonis amurensis Regel et Radde 的干燥全草。初春花

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

开时采挖，洗净，及时晒干。

【性状】 本品根茎短粗，长 1～3 cm，直径 0.3～0.7 cm；密生多数细根呈疏松团状。根长 3～8 cm，直径约 0.1 cm；表面黄棕色或暗褐色，稍有皱纹。茎细弱，黄白色，基部具黄白色膜质鳞叶数片。叶互生，二回羽状复叶，多未展开。花顶生，黄色，花萼 6～8 片，与花瓣相似，倒卵形，外面显暗绿色，花瓣 12～16 片，雄蕊多数。质脆，易碎。气微，味苦。

以根多而色棕褐、味苦者为佳。

【鉴别】 (1) 本品根的横切面：表皮细胞外壁增厚，棕黄色。皮层薄壁细胞形大，含淀粉粒；内皮层明显。中柱鞘为 1 列径向延长的细胞。初生木质部三原型。

(2) 取本品少量，加氯仿 10 ml，密塞，浸渍 12 小时，滤过。滤液分置二支试管中。一管沿试管壁缓缓滴加硫酸数滴，静置片刻，两液接界处先呈现黄色环，逐渐变棕色；另一管加 10%氢氧化钠溶液与 2%3,5-二硝基苯甲酸的乙醇溶液各 5 滴，上层液即显紫红色。

【功能与主治】 强心，利尿，镇静及减慢心率。用于急性和慢性心功能不全。

【用法与用量】 口服全草细粉，一次 25 mg，一日 1～3 次。

【注意】 本品毒性较大，应慎用。

【贮藏】 置通风干燥处，防霉。

冰凉花甙 【剧】

Binglianghuadai

ADONISIDUM

本品为毛茛科植物冰凉花 Adonis amurensis Regel et Radde 中提取的总甙。按干燥品计算，含量不得少于 95.0%

【性状】 本品为浅黄色的粉末；味苦；有引湿性。

本品在水、乙醇或氯仿中易溶。水溶液呈中性反应。

【鉴别】 (1) 取本品少量，置试管中，加氯仿 2 ml 溶解后，沿管壁缓缓滴加硫酸数滴，静置片刻，两液接界处先现黄色环，后变为棕色。

(2) 取本品少量，加氯仿 2 ml 溶解后，加 10%氢氧化钠溶液与 2%3,5-二硝基苯甲酸的乙醇溶液各 5 滴，上层液即显紫红色。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【检查】 干燥失重 取本品，在105°干燥至恒重，减失重量不得过1.5%（附录44页）。

【含量测定】 对照品溶液的制备 精密称取冰凉花甙对照品25 mg，置100 ml量瓶中，加40%乙醇使溶解并稀释至刻度，摇匀，即得（每1 ml中含冰凉花甙0.25 mg）。

标准曲线的制备 精密量取对照品溶液0.5、1.0、2.0、3.0与4.0 ml，分别置10 ml量瓶中，各加40%乙醇至5 ml，另取40%乙醇5 ml作空白，再各加1%三硝基苯酚溶液17容与10%氢氧化钠溶液1容的混合液5 ml，摇匀，放置30分钟后，照分光光度法（附录32页），在500 nm的波长处测定吸收度，以吸收度为纵座标，浓度为横座标，绘制标准曲线。

测定法 取本品25 mg，精密称定，置100 ml量瓶中，加40%乙醇使溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取1 ml，照标准曲线的制备项下的方法，自"置10 ml量瓶中，加40%乙醇至5 ml"起，测定吸收度，从标准曲线中读出每1 ml中的含量，计算，即得。

【功能与主治】 强心，利尿，镇静，减慢心率。用于急性和慢性心功能不全。

【用法与用量】 常用量，口服，一次0.5 mg，一日1～1.5 mg。极量，口服，一次2 mg，一日4 mg。

【注意】 用本品期间忌用钙注射剂。

【贮藏】 遮光，密封保存。

【制剂】 (1) 冰凉花甙片 (2) 冰凉花甙注射液

冰凉花甙片 【剧】

Binglianghuadai Pian

TABELLAE ADONISIDI

本品含冰凉花甙应为标示量的90.0～110.0%。

【性状】 本品为白色片。

【鉴别】 取本品5片，加水5 ml，搅拌使溶解，滤过，滤液分置二支试管中，一管加氯仿3 ml，振摇，待分层后，沿管壁缓缓滴加硫酸数滴，静置片刻，两液接界处先现黄色环，后变为棕色；另一管加10%氢氧化钠溶液与2%3,5-二硝基苯甲酸的乙醇溶液各5滴，即显紫红色。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定（附录6页）。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【含量测定】 对照品溶液的制备与标准曲线的制备 均照冰凉花甙项下的方法(238页)制备。

测定法 取本品25片，研细，加40%乙醇分次注意研磨提取，提取液滤入50 ml量瓶中，并用40%乙醇稀释至刻度，摇匀，精密量取1 ml，照冰凉花甙项下的方法(238页)测定，即得。

【功能与主治】【注意】 同冰凉花甙。

【用法与用量】 常用量，口服，一次0.5 mg，一日1～1.5 mg。极量，口服，一次2 mg，一日4 mg。

【规格】 0.5 mg

【贮藏】 遮光，密封保存。

冰凉花甙注射液 【剧】

Bingliánghuādài Zhùshèyè

INJECTIO ADONISIDI

本品为冰凉花甙灭菌稀乙醇溶液。含冰凉花甙应为标示量的90.0～110.0%。

【性状】 本品为无色澄明液体。

【鉴别】 取本品2 ml，置试管中，加氯仿3 ml，振摇，待分层后，沿管壁缓缓滴加硫酸数滴，静置片刻，两液接界处先现黄色环，后变为棕色，振摇后，水层显黄色。

【检查】 应符合注射剂项下有关的各项规定(附录7页)。

【含量测定】 对照品溶液的制备与标准曲线的制备 均照冰凉花甙项下的方法(238页)制备。

测定法 精密量取本品1 ml，照冰凉花甙项下的方法(238页)测定，即得。

【功能与主治】【注意】 同冰凉花甙。

【用法与用量】 常用量，静脉注射，一次0.5 mg，一日0.5～1 mg。极量，静脉注射，一次1.0 mg，一日2 mg。

【规格】 2 ml:0.5 mg

【贮藏】 遮光，密闭保存。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

决　明　子

Juemingzi

SEMEN CASSIAE

本品为豆科植物决明 Cassia obtusifolia L. 或小决明 Cassia tora L. 的干燥成熟种子。秋季采收成熟果实，晒干，打下种子，除去杂质。

【性状】 **决明**　略呈棱方形或短圆柱形，两端平行倾斜，形似马蹄，长 3～7 mm，宽 2～4 mm。表面绿棕色或暗棕色，平滑有光泽。一端较平坦，另端斜尖，背腹面各有 1 条突起的棱线，棱线两侧各有 1 条斜向对称而色较浅的线形凹纹。质坚硬，不易破碎。横切面可见种皮薄，中间有"S"形折曲的黄色子叶，2 片重叠。气微，味微苦。

小决明　呈短圆柱形，较小，长 3～5 mm，宽 2～3 mm。表面棱线两侧各有 1 片宽广的浅黄棕色带。

均以粒饱满、色绿棕者为佳。

【鉴别】 取本品粉末约 0.5 g，加 10%硫酸 20 ml 与氯仿 10 ml，置水浴上微沸回流 15 分钟，放冷后，移入分液漏斗中，分取氯仿层，加氢氧化钠试液 10 ml，振摇，放置，碱液层显红色。如显棕色，则分取碱液层加过氧化氢试液 1～2 滴，再置水浴中加热 4 分钟，即显红色。

【炮制】 **决明子**　除去杂质，洗净，晒干。

炒决明子　取净决明子，照清炒法（附录18页）炒至微有香气。

【性味】 苦，微寒。

【功能与主治】 清肝，明目，通便。用于头痛眩晕，目赤昏花，大便秘结。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置干燥处。

羊　耳　菊

Yang'erju

HERBA INULAE CAPPAE

本品为菊科植物羊耳菊 Inula cappa DC. 的干燥全草。夏、秋二季采挖，除去泥沙，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

晒干。

【性状】 本品长 40～150 cm。根略呈圆柱形，有分枝，长 2～20 cm，直径 0.1～1.5 cm；表面深褐色，断面黄白色，有的中部黑色。茎圆柱形，少分枝，直径 0.3～1 cm；表面黄绿色或黄棕色，密被茸毛。叶互生，有短柄；叶片长椭圆形至披针形，长 10～15 cm，宽 3～5 cm；先端渐尖，基部楔形，边缘有疏齿；上表面深绿色，下表面密被灰白色茸毛。头状花序多数，排成圆锥状，花淡黄色。瘦果具棱，有刺状冠毛。气微，味苦、微甜。

以根多、茎叶色绿者为佳。

【鉴别】 取本品粉末 10 g，加含 0.5%盐酸的乙醇 70 ml，置水浴上回流 10 分钟，趁热滤过，滤液照下述方法试验：

(1) 取滤液 2 ml，加碘化铋钾试液 2 滴，发生红棕色沉淀。

(2) 取滤液 2 ml，加硅钨酸试液 2 滴，发生黄色沉淀。

(3) 取滤液 1 ml，加 1%三氯化铁的乙醇溶液 1～2 滴，显蓝绿色。

【炮制】 除去杂质，喷淋清水，润透，切段，晒干。

【性味】 辛，凉。

【功能与主治】 散风清热，解毒消肿。用于感冒发热，咽喉肿痛，风湿疼痛，痈疮疔毒，乳腺炎。

【用法与用量】 30～60 g；外用鲜品适量，捣烂敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

关 木 通

Guanmutong

CAULIS ARISTOLOCHIAE MANSHURIENSIS

本品为马兜铃科植物东北马兜铃 Aristolochia manshuriensis Kom. 的干燥藤茎。秋、冬二季采截，除去粗皮，晒干。

【性状】 本品呈长圆柱形，稍扭曲，长 1～2 M，直径 1～3 cm。表面灰黄色或浅棕黄色，有浅纵沟及棕褐色残余粗皮的斑点。节部稍膨大，有 1 枝痕。体轻，质硬，不易折断，断面黄色或黄白色，皮部薄，木部宽广，有多层整齐环状排列的小孔（大型导管）及放射状纹理，形如蜘蛛网，髓部不明显。摩擦残余粗皮，有樟脑样臭。气微，味

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

苦。

以断面鲜黄色者为佳；断面颜色变黑者不可供药用。

【鉴别】 (1) 本品粉末淡黄色。纤维管胞大多成束，长梭形，直径 11～20 μm，壁有明显的具缘纹孔，纹孔口斜裂缝状或十字状。分隔纤维直径 21～42 μm，斜纹孔明显。石细胞少见，类方形或类多角形，壁较厚。草酸钙簇晶直径约至 40 μm。具缘纹孔导管大，直径约至 328 μm，多破碎，具缘纹孔类圆形，排列紧密；具缘纹孔管胞少见。

(2) 取本品粉末约 1 g，加乙醇 20 ml，置水浴上回流 15 分钟，放冷，滤过。取滤液 10 ml，置水浴上蒸干，残渣加 5%硫酸溶液 3 ml 使溶解，滤过，滤液分置二支试管中，一管加碘化铋钾试液 1～2 滴，发生橘红色沉淀；另一管加碘化汞钾试液 1～2 滴，发生棕色沉淀。

(3) 取鉴别(2) 项下的乙醇提取液，点于滤纸上，干后置紫外光灯下观察，显天蓝色荧光；于点样处加稀盐酸 1 滴，干后显黄绿色荧光，用氨试液熏后复显天蓝色荧光。

【炮制】 洗净，润透，切片，晒干。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清心火，利尿，通乳。用于口舌生疮，尿路感染，水肿，白带，乳汁不通。

【用法与用量】 1.5～4.5 g。

【注意】 孕妇慎服。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮。

关 白 附

Guanbaifu

RADIX ACONITI COREANI

本品为毛茛科植物黄花乌头 Aconitum coreanum (Lévl.) Raipaics 的干燥子根及母根。秋季采挖，除去须根，洗净，干燥。

【性状】 本品子根呈长卵形、卵形或长圆锥形，长 1.5～5 cm，直径 0.7～2 cm；表面灰褐色或棕褐色，有皱纹和侧根痕，有的有瘤状突起的侧根；质较硬，不易折断，断面类白色，较平坦，富粉性。母根呈长圆锥形，长 2～5 cm，直径 0.5～1.5 cm；顶端有茎基，表面棕褐色或黄棕色，具纵皱、沟纹及横长突起的根痕。体轻，质松，断面有裂

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

隙，粉性小。气微，味辛而麻舌。

【鉴别】（1）本品子根的横切面：皮层为6～8列切向延长的薄壁细胞；内皮层明显。中柱散有筛管群；并有数个至10数个复合的外韧维管束，呈环状排列。薄壁细胞含淀粉粒。

母根多裂隙；薄壁组织中散有石细胞，壁稍厚。

（2）取本品粉末2 g，加乙醇15 ml，置水浴上回流15分钟，放冷，滤过，滤液置蒸发皿内，在水浴上蒸干，残渣加5%硫酸溶液3 ml，滤过，滤液分置三支试管中，一管加碘化铋钾试液1～2滴，发生橘红色沉淀；一管加硅钨酸试液1～2滴，发生黄白色沉淀；另一管加碘化汞钾试液1～2滴，发生黄白色沉淀。

【炮制】 **生关白附** 除去杂质，洗净，干燥。

制关白附 取净关白附，用水浸漂，每天换水1～3次，至切开口尝无麻辣感时，取出，置锅内加白矾与水适量，煮透，取出，晾至半干，再稍润，切片，干燥。

每关白附100 kg，用白矾15 kg。

【性味】 辛、甘，温；有毒。

【功能与主治】 祛寒湿，止痛。用于腰膝关节冷痛，头痛，口眼歪斜，冻疮。

【用法与用量】 1.5～4.5 g。

【注意】 孕妇忌服。生关白附内服宜慎。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

灯　心　草

Dengxincao

MEDULLA JUNCI

本品为灯心草科植物灯心草 Juncus effusus L. 的干燥茎髓。夏末至秋季割取茎，晒干，取出茎髓，理直，扎成小把。

【性状】 本品呈细圆柱形，长达90 cm，直径0.1～0.3 cm。表面白色或淡黄白色，有细纵纹。体轻，质软，略有弹性，易拉断，断面白色。无臭，无味。

以条长、色白、有弹性者为佳。

【炮制】 **灯心草** 除去杂质，剪段。

灯心炭 取净灯心草，照焖炭法（附录19页）制炭。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性味】 甘、淡，寒。

【功能与主治】 清心火，利尿。用于心烦少眠，尿少涩痛；外治咽炎，口疮。

【用法与用量】 1.5～2.5 g；外用适量，烧炭研末敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

灯 台 叶

Dengtaiye

FOLIUM ALSTONIAE SCHOLARIS

本品为夹竹桃科植物灯台树 Alstonia scholaris (L.) R. Br. 的干燥叶。全年均可采收，晒干。

【性状】 本品呈长圆形或倒卵状长圆形，长 12～16 cm，宽 4～6 cm。灰绿色，全缘，上表面具光泽，侧脉 40～50 条，近平行，于边缘处连接。革质。无臭，味微苦。

以叶厚、色灰绿者为佳。

【鉴别】 (1) 取本品粉末 10 g，加乙醇 50 ml，浸泡过夜，不时振摇，滤过，滤液加活性炭 1 g，置水浴上回流半小时，滤过。取滤液 20 ml，置水浴上蒸干，残渣加稀盐酸 20 ml 使溶解，滤过。取滤液 1 ml，加碘化铋钾试液 2 滴，发生红棕色絮状沉淀；另取滤液 1 ml，加碘化汞钾试液 2 滴，发生粉白色絮状沉淀。

(2) 取鉴别(1)项下剩余的醇浸液点于滤纸上，挥干，置紫外光灯下观察，无荧光反应，加 1%三氯化铝的乙醇溶液湿润后，烘干，再置紫外光灯下观察，则显亮黄色荧光。

【性味】 苦，凉。

【功能与主治】 止咳，祛痰，消炎。用于慢性支气管炎，百日咳。

【用法与用量】 6～9 g。

【贮藏】 置干燥处。

灯 盏 细 辛 (灯盏花)

Dengzhanxixin

HERBA ERIGERONTIS

本品为菊科植物短葶飞蓬 Erigeron breviscapus (Vant.) Hand.-Mazz. 的干燥全草。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

秋季花萎时采挖，除去杂质，晒干。

【性状】 本品长 15～25 cm。根茎长 1～3 cm，表面凹凸不平，着生多数圆柱形细根，直径约 0.1 cm，淡褐色至黄褐色。茎圆柱形，直径 0.1～0.2 cm，黄绿色至淡棕色，具细纵棱线，被白色短柔毛；质脆，断面黄白色，有髓或中空。基生叶叶片皱缩、破碎，完整者展平后呈倒卵状披针形或匙形，长 1.5～9 cm，宽 0.5～1.3 cm；黄绿色，先端钝圆，有短尖，基部渐狭，全缘；茎生叶互生，披针形，长 1～6 cm，宽 0.3～1 cm，基部抱茎。头状花序顶生。瘦果扁倒卵形。气微香，味辛、微苦。

以根多、叶色黄绿者为佳。

【鉴别】 (1) 本品叶的表面观：表皮细胞壁波状弯曲，有角质线纹。气孔不定式。非腺毛有两种：一种 1～8 细胞，基部直径 34～85 μm，壁稍厚，有角质纹理；另一种 4～8 细胞，直径 12～17 μm，壁薄，顶端细胞延长成尾状并弯曲。腺毛头部 1～4 细胞；柄 3 至多细胞，单列或两列。

(2) 取本品粗粉约 2 g，加甲醇约 16 ml，置 60°水浴上浸渍 1 小时，滤过，滤液呈淡草绿色；取滤液约 1 ml，加镁粉少量与盐酸 5～6 滴，溶液变为红棕色，置水浴上加热 1～2 分钟，红色更为明显。

(3) 取鉴别(2)项下剩余的滤液约 1 ml，加 1%盐酸羟胺的甲醇溶液与 10% 氢氧化钾的甲醇溶液各 3 滴，置水浴上微热，冷却后用稀盐酸调节 pH 值至 3～4，加 1% 三氯化铁的乙醇溶液 1 滴，显橙红色至紫红色。

【性味】 辛、微苦，温。

【功能与主治】 散寒解表，祛风除湿，活络止痛。用于瘫痪，风湿痹痛，跌扑损伤，胃痛，牙痛，感冒。

【用法与用量】 9～15 g，水煎或研末蒸鸡蛋服；外用适量。

【贮藏】 置通风干燥处。

【制剂】 灯盏细辛注射液

灯盏细辛注射液

Dengzhanxixin Zhusheye

INJECTIO ERIGERONTIS

本品为灯盏细辛乙醇提取物的灭菌水溶液。每 1 ml 中含总黄酮作为无水芦丁计算，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

应为2.25～2.75 mg。

【处方】

灯盏细辛乙醇提取物(以总黄酮计算)	2.5 g
氯化钠	8.0 g
吐温80	2.0 g
苯甲醇	10 ml
注射用水	加至1000 ml

【制法】 取灯盏细辛，切碎，用80%乙醇浸渍提取数次，蒸去乙醇，加乙醇使含乙醇量为90%以上，滤过，滤液减压浓缩成糖浆状，照含量测定法项下的方法测定总黄酮的含量后，取出一定量(相当于含总黄酮2.5 g)，加注射用水溶解后，冷藏过夜，滤过，滤液中加氯化钠与活性炭适量，煮沸，滤过，滤液调节pH值至6.0～7.0，再加吐温80与苯甲醇，煮沸，滤过，滤液加注射用水使成1000 ml，灌封，灭菌，即得。

【性状】 本品为黄色的澄明液体。

【鉴别】 (1) 取本品6 ml，置水浴上蒸干，残渣加甲醇3 ml使溶解，滤过。取滤液数滴，点于滤纸上，置紫外光灯下观察，显淡蓝色荧光。

(2) 取鉴别(1)项下剩余的滤液1 ml，加镁粉少量与盐酸4～5滴，置水浴上稍加热，即显橙红色，放置后，红色更明显。

(3) 取鉴别(1)项下剩余的滤液1 ml，加7%盐酸羟胺的甲醇溶液与10%氢氧化钾的甲醇溶液各2～3滴，置水浴上稍加热，放冷，加稀盐酸调节pH值至3～4，再加1%三氯化铁的甲醇溶液1～2滴，即显紫红色至紫色。

【检查】 **pH值** 应为6.0～7.0(附录42页)。

其他 应符合注射剂项下有关的各项规定(附录7页)。

【含量测定】 **对照品溶液的制备** 精密称取芦丁对照品适量(另取一份芦丁对照品，在120°减压干燥至恒重，按减失重量折算为干燥品20 mg)，置100 ml量瓶中，加60%乙醇适量，置水浴上微热使溶解，放冷，用60%乙醇稀释至刻度，摇匀，精密量取25 ml，置50 ml量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，即得(每1 ml中含无水芦丁0.1 mg)。

标准曲线的制备 精密量取对照品溶液0.0、1.0、2.0、3.0、4.0与5.0 ml，分别置10 ml量瓶中，各加30%乙醇至5.0 ml，精密各加亚硝酸钠溶液(1→20)0.3 ml，摇匀，放置6分钟，加硝酸铝溶液(1→10)0.3 ml，摇匀，再放置6分钟，加氢氧化钠试液4 ml，分别用水稀释至刻度，摇匀，放置15分钟，照比色法(附录32页)，分别在510 nm的波长处测定吸收度，以吸收度为纵座标，浓度为横座标，绘制标准曲线。

测定法 精密量取本品1 ml，照标准曲线的制备项下的方法，自“加30%乙醇至5.0 ml”起，依法测定吸收度，从标准曲线中读出供试液中总黄酮的含量，即得。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 扩张血管，有对抗脑垂体后叶素所致缺血、缺氧作用。用于脑血管意外所致后遗症——瘫痪，风湿痛，冠心病。

【用法与用量】 肌内注射，一次 5～10 mg，一日 10～20 mg；穴位注射，每穴 2.5～5 mg，多穴总量 10～20 mg。

【规格】 2 ml

【贮藏】 遮光，密闭保存。

安 息 香

Anxixiang

BENZOINUM

本品为安息香科植物青山安息香 Styrax tonkinensis Pierre 或粉背安息香 Styrax hypoglaucus Perk. 的干燥树脂。夏、秋二季割裂树干，收集流出的树脂，阴干。

【性状】 本品为不规则的小块，稍扁平。表面橙黄色，具蜡样光泽。质脆，易碎，破碎面平坦，白色。放置后逐渐变为淡黄棕色、黄棕色至红棕色。加热则软化熔融。气芳香，味微辛，嚼之有沙粒感。

【鉴别】 (1) 取本品约 0.25 g，置干燥试管中，缓缓加热，即发生刺激性香气，并产生多数棱柱状结晶的升华物。

(2) 取本品约 0.1 g，加乙醇 5 ml 研磨，滤过，滤液加 5% 三氯化铁的乙醇溶液 0.5 ml，即显亮绿色，后变为黄绿色。

【检查】 **干燥失重** 取本品的粗粉，置硫酸真空干燥器内，干燥至恒重，减失重量不得过 2%(附录44页)。

灰分 不得过 0.5%(附录15页)。

醇中不溶物 精密称取本品细粉 2.5 g，置回流浸出器中，用乙醇浸出，至醇溶性物质全部被浸出为止，残渣用 100°干燥至恒重，计算样品中所含乙醇中不溶物，不得过 2%。

【含量测定】 取本品粉末约 1.5 g，精密称定，置锥形瓶中，加 N/2 乙醇制氢氧化钾液 25 ml，置水浴中回流 1.5 小时，在低温除去乙醇，残渣加热水 50 ml，使均匀散裂，放冷，加水 150 ml 与硫酸镁溶液(1→20)50 ml，搅匀，静置 10 分钟后，抽气滤过，滤渣用水 20 ml 洗涤，合并洗液与滤液，加盐酸使成酸性后，移置分液漏斗中，用乙醚分

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

次振摇提取，第一次 50 ml，第二次 40 ml，第三、四次各 30 ml，合并乙醚液，用碳酸氢钠溶液(1→20)分次用力振摇提取，第一、二次各 20 ml，第三、四、五次各 10 ml，每次分出的水液均用同一的乙醚 20 ml 洗涤，合并水液，加盐酸使成酸性，再用乙醚分次振摇提取，第一次 30 ml，第二次 20 ml，第三、四次各 10 ml，合并乙醚液，置称定重量的烧瓶中，放置，待大部分的乙醚挥散，转动烧瓶，使残渣均匀散布在烧瓶内壁，置硫酸真空干燥器中干燥至恒重，精密称定，算出供试品中含有的百分数，再根据供试品的水分与乙醇中不溶物含量，改算成醇溶性浸出物的干燥品中含有的百分数，即为总香脂酸含量。

本品含总香脂酸以醇溶性浸出物的干燥品计算，不得少于 30%。

【性味】 苦、辛，平。

【功能与主治】 开窍清神，行气活血，止痛。用于突然昏厥，中风痰壅，心腹疼痛，小儿惊风；外用作防腐及收敛药。

【用法与用量】 0.6～1.5 g，多入丸散用。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

农　吉　利

Nongjili

HERBA CROTALARIAE

本品为豆科植物野百合 Crotalaria sessiliflora L. 的干燥地上部分。秋季果实成熟时采割，除去杂质，晒干。

【性状】 本品茎呈圆柱形，稍有分枝，长 20～90 cm；表面灰绿色，密被灰白色茸毛。单叶互生，叶片多皱缩，展平后呈宽披针形或条形，暗绿色，全缘，下表面有丝状长毛。花萼 5 裂，外面密生棕黄色长毛。荚果矩形，包于宿存花萼内，果壳灰褐色。种子肾状圆形，深棕色，有光泽。无臭，味淡。

以色绿、果多者为佳。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性味】 淡，平。

【功能与主治】 滋阴益肾，抗癌。用于皮肤癌，耳鸣耳聋，头目眩晕。

【用法与用量】 15～30 g，必要时可增至 60 g；外用鲜品捣烂或干品研细末醋调外

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com


敷。

【贮藏】 置干燥处。

农吉利碱

Nongjilijian

MONOCROTALINUM



[$C_{16}H_{23}O_6N$=325.37]

本品按干燥品计算，含 $C_{16}H_{23}O_6N$ 不得少于 98.0%。

【性状】 本品为白色结晶性粉末；微有异臭，味苦。

本品在氯仿中易溶，在甲醇或无水乙醇中溶解，在丙酮或乙醚中略溶，在水或苯中微溶。

熔点 本品的熔点(附录28页)为 196～198°。

【鉴别】 取本品少量，加 N/10 盐酸液 1 ml 使溶解，加碘化铋钾试液 1～2 滴，即发生棕红色沉淀。

【检查】 **干燥失重** 取本品，在 105° 干燥至恒重，减失重量不得过 0.2%(附录44页)。

【含量测定】 取本品约 0.3 g，精密称定，精密加入 N/10 盐酸液 20 ml，微温振摇溶解后，加甲基红指示液 2 滴，用 N/10 氢氧化钠液滴定，即得(每 1 ml 的 N/10 盐酸液相当于 32.54 mg 的 $C_{16}H_{23}O_6N$)。

【功能与主治】 抗癌药。用于皮肤癌，子宫颈癌。

【贮藏】 遮光，密闭保存。

【制剂】 盐酸农吉利碱注射液

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

盐酸农吉利碱注射液

Yansuan Nongjilijian Zhusheye

INJECTIO MONOCROTALINI HYDROCHLORIDI

本品为农吉利碱的盐酸性灭菌水溶液。含农吉利碱以盐酸农吉利碱（$C_{16}H_{23}O_6N \cdot HCl$）计算，应为标示量的90.0～110.0%。

【性状】 本品为无色或几乎无色的澄明液体。

【鉴别】 取本品0.5 ml，加水0.5 ml摇匀，加碘化铋钾试液1～2滴，即发生棕红色沉淀。

【检查】 **pH值** 应为5.5～6.5(附录42页)。

其他 应符合注射剂项下有关的各项规定(附录7页)。

【含量测定】 精密量取本品适量(约相当于盐酸农吉利碱0.125 g)，置分液漏斗中，加水10 ml，再加氨试液7～8滴，摇匀，用氯仿分次振摇提取，每次10 ml，至生物碱提尽为止，合并氯仿液，置水浴上蒸干，加乙醚3 ml，蒸干。精密加$N/10$盐酸液20 ml，微温振摇使溶解，加甲基红指示液2滴，用$N/10$氢氧化钠液滴定，即得(每1 ml的$N/10$盐酸液相当于36.18 mg的$C_{16}H_{23}O_6N \cdot HCl$)。

【功能与主治】 同农吉利碱。

【用法与用量】 肿瘤基底部注射，一次2 ml，一日1次；肌内注射，一次2 ml，一日1次。治疗15日后休息7日。

【注意】 治疗期间定期检查肝功能。

【规格】 2 ml:50 mg

【贮藏】 遮光，密闭保存。

寻　骨　风

Xungufeng

HERBA ARISTOLOCHIAE MOLLISSIMAE

本品为马兜铃科植物绵毛马兜铃 Aristolochia mollissima Hance 的干燥全草。夏、

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

秋二季采收，除去泥沙，干燥。

【性状】 本品根茎呈细圆柱形，多分枝，长短不一，直径0.2～0.5 cm；表面棕黄色，有细纵纹及节，节处有须根，有的有芽痕；质韧，断面黄白色，有放射状纹理。茎细长，淡绿色，密被白柔毛。叶互生，叶柄长1.5～3 cm；叶片灰绿色，皱缩，展平后呈卵圆形或卵状心形，先端钝圆或短尖，基部心脏形，两面密被白柔毛，下表面更多，全缘，脉网状。气微香，味苦而辛。

以叶色绿、根茎多、香气浓者为佳。

【鉴别】 (1) 本品茎的横切面：表皮细胞类方形，外壁稍突出，被角质层；多细胞非腺毛甚多。皮层较窄。中柱鞘纤维6～10余列连接成环带，壁木化。维管束6～8个，大小不等。韧皮部细胞皱缩。形成层成环。木质部导管类圆形，直径17～72 μm。髓部明显。薄壁细胞含草酸钙簇晶；并含淀粉粒。

(2) 取本品粉末1 g，加乙醚30 ml，浸渍过夜，滤过。取滤液5 ml，蒸干，残渣加乙醇1 ml使溶解，再加2%间二硝基苯的乙醇溶液与10%氢氧化钾的乙醇溶液各1 ml，加热2分钟，显血红色。

【炮制】 除去杂质，洗净，切段，干燥。

【性味】 辛、苦，平。

【功能与主治】 祛风，活络，止痛。用于风湿痹痛，关节酸痛。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

阳　起　石

Yangqishi

ACTINOLITUM

本品为单斜晶系透闪石或透闪石石棉的矿石，主含含水硅酸钙镁。采挖后，除去泥沙及杂石。

【性状】 本品呈不规则柱状或块状，大小不一。灰白色、暗灰色或浅绿色，多夹有浅黄棕色条纹或花纹，具丝样光泽。体重，质较松软。断面不整齐，纵向破开呈丝状。无臭，味淡。

以色灰白、有光泽、质松软者为佳。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【炮制】 阳起石 洗净，砸碎。

煅阳起石 取阳起石，除去杂质，照煅法（附录19页）煅至红透。

【性味】 咸，微温。

【功能与主治】 温肾壮阳。用于阳痿，腰膝酸软。

【用法与用量】 4.5～9 g，多入丸剂服。

【贮藏】 置干燥处。

阴 地 蕨

Yindijue

HERBA BOTRYCHII

本品为阴地蕨科植物阴地蕨 Botrychium ternatum (Thunb.) Sw. 的干燥全草。冬季至次春采挖，除去泥沙，干燥。

【性状】 本品根茎长 0.5～1 cm，直径 2～3 mm；表面棕褐色或灰褐色，下部簇生数条细根。根长约 5 cm，直径 1.5～2.5 mm，棕褐色，具横皱纹，易折断，断面白色，粉性。总叶柄长 1.8～4 cm，棕黄色，上部分两枝；营养叶叶柄长 6～10 cm，扁平而扭曲，淡红棕色，具纵条纹，叶片卷缩，黄绿色，展平后呈宽三角形，三回羽状分裂，侧生羽叶 3～4 对；孢子叶绿黄色，有的脱落或仅留叶柄。气微，味微甘。

以根多、叶绿者为佳。

【鉴别】 本品粉末灰绿黄色。淀粉粒甚多，单粒类圆形，直径 3～9 μm，脐点点状或叉状；复粒多由 3 粒组成，有的可至 10 余粒。营养叶表皮气孔大，保卫细胞哑铃状。孢子囊碎片细胞多角形，壁略呈连珠状增厚。孢子类三角形、圆形或椭圆形，直径约 32 μm，外壁疣状隆起。具缘纹孔管胞细长，大多碎断，具缘纹孔排列整齐。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性味】 甘、微苦，微寒。

【功能与主治】 清热解毒。用于痈肿疮毒，淋巴结结核，角膜云翳，小儿高热惊风。

【用法与用量】 6～15 g。

【贮藏】 置干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

阴　行　草

Yinxingcao

HERBA SIPHONOSTEGIAE

本品为玄参科植物阴行草 Siphonostegia chinensis Benth. 的干燥全草。秋季采挖，除去杂质，晒干。

【性状】 本品长 30～80 cm，全体被短毛。根短而弯曲，稍有分枝。茎圆柱形，有棱，有的上部分枝，表面棕褐色至黑棕色；质脆，易折断，断面黄白色，中空。叶对生，易脱落破碎，完整者羽状深裂，长 2～4 cm，宽约 2 cm，黑绿色。总状花序顶生，花有短梗，花萼筒状，宿存，长约 1.5 cm，直径约 3 mm；黄棕色至黑棕色，有明显的 10 条纵棱，先端 5 裂，花冠棕黄色，多脱落。蒴果狭卵状椭圆形，较萼稍短，棕黑色。种子细小，多数。气微，味淡。

以带果实者为佳

【炮制】 除去杂质，切段。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清利湿热，凉血祛瘀。用于黄疸型肝炎，尿路结石，小便不利，便血，外伤出血。

【用法与用量】 6～9 g；外用适量，研末调敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

防　　己（粉防己）

Fangji

RADIX STEPHANIAE TETRANDRAE

本品为防己科植物粉防己 Stephania tetrandra S. Moore 的干燥根。秋季采挖，洗净，除去粗皮，晒至半干，切段，个大者再纵切，干燥。

【性状】 本品呈不规则圆柱形、半圆柱形或块状，多弯曲，长 5～10 cm，直径 1～

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

5 cm。表面淡灰黄色，在弯曲处有深陷的横沟。体重，质坚实，断面平坦，灰白色，富粉性，有排列较稀疏的放射状纹理。气微，味苦。

以质坚实、粉性足者为佳。

【鉴别】 (1) 本品横切面：木栓层有时残存。皮层散有石细胞群，常切向排列。韧皮部较宽。形成层成环。木质部占大部分，射线较宽；导管稀少，呈放射状排列；导管旁有木纤维。薄壁细胞充满淀粉粒，并可见细小杆状草酸钙结晶。

(2) 取本品粗粉约 2 g，加 *N*/1 硫酸液 20 ml，置水浴中加热 10 分钟，滤过，滤液加氨试液调节 pH 值至 9，移入分液漏斗中，加苯 25 ml 振摇提取。分取苯液 5 ml，置瓷蒸发皿中，蒸干，残渣加钼硫酸试液数滴，即显蓝紫色，渐变绿色至污绿色，放置，色渐加深。

【炮制】 除去杂质，稍浸，洗净，润透，切片，干燥。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 利水，祛风，消肿，止痛，降血压。用于水肿，小便不利，肢体疼痛，风湿性关节炎，高血压症，痈肿疮毒，湿疹，下肢溃疡。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置干燥处，防霉、防蛀。

防　　风

Fangfeng

RADIX LEDEBOURIELLAE

本品为伞形科植物防风 Ledebouriella divaricata (Turcz.) Hiroe 的干燥根。春、秋二季采挖未抽花茎植株的根，除去须根及泥沙，晒干。

【性状】 本品呈长圆柱形，下部渐细，有的略弯曲，长 15～30 cm，直径 0.5～2 cm。根头部有明显密集的环纹，习称"蚯蚓头"，环纹上有的有棕褐色毛状残存叶基。表面灰棕色，粗糙，有纵皱纹、多数横长皮孔及点状突起的细根痕。体轻，质松，易折断，断面不平坦，皮部浅棕色，有裂隙，木部浅黄色。气特异，味微甘。

以条粗壮、断面皮部色浅棕、木部色浅黄者为佳。

【鉴别】 本品横切面：木栓层为 5～30 列细胞。栓内层窄，有较大的椭圆形油管。韧皮部较宽，有多数类圆形油管，周围分泌细胞 4～8 个，管内可见金黄色分泌物；射线

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

多弯曲，外侧常成裂隙。形成层明显。木质部导管甚多，呈放射状排列。根头处有髓，薄壁组织中偶见石细胞。

粉末淡棕色。油管直径 17～60 μm，充满金黄色分泌物。叶基维管束常伴有纤维束。网纹导管直径 14～85 μm。石细胞少见，黄绿色，长圆形或类长方形，壁较厚。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。

【性味】 辛、甘，温。

【功能与主治】 解表，散风胜湿。用于风寒感冒，头痛，关节痛，皮肤瘙痒，荨麻疹。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防蛀。

红　大　戟

Hongdaji

RADIX KNOXIAE

本品为茜草科植物红大戟 Knoxia valerianoides Thorel et Pitard 的干燥块根。秋、冬二季采挖，除去须根，洗净，置沸水中略烫，干燥。

【性状】 本品略呈纺锤形，偶有分枝，稍弯曲，长 3～10 cm，直径 0.6～1.2 cm。上端常有细小的茎痕。表面红褐色或红棕色，粗糙，有扭曲的纵皱纹。质坚实，断面皮部红褐色，木部棕黄色。无臭，味甘、微辛。

以个大、质坚实、色红褐者为佳。

【鉴别】 (1) 本品横切面：木栓层为数列细胞。皮层与韧皮部分界不甚明显，均散有含草酸钙针晶束的粘液细胞及含红棕色物的分泌细胞。形成层成环。木质部射线较宽，亦有草酸钙针晶束及分泌细胞；靠近形成层的导管群由数列导管组成，逐渐向内成单列或单个散在。

(2) 取本品细粉 1 g，置试管中加水 10 ml，煮沸 10 分钟，滤过，滤液加氢氧化钠试液 1 滴，显樱红色，再滴加盐酸酸化后，变为橙黄色。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。

【性味】 苦，寒；有小毒。

【功能与主治】 泻水，解毒散结。用于胸水，腹水，痈肿。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【用法与用量】 1.5～3 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

红　毛　七

Hongmaoqi

RADIX CAULOPHYLLI

本品为小檗科植物类叶牡丹 Caulophyllum robustum Maxim. 的干燥根及根茎。秋季采挖，除去杂质，晒干。

【性状】 本品根茎呈结节状，横生，多扭曲，长 2～10 cm，直径 0.5～1.8 cm，表面棕褐色或红褐色，有环纹；上有大而凹陷的茎痕，茎痕处稍膨大，常有残留的茎基；质坚硬。须根丛生，细长圆柱形，下部有分枝，长 5～20 cm，直径约 0.1 cm，棕褐色或红棕色；质韧，折断时可抽出黄色木心。气微，味苦辛、微涩。

以须根多、色棕褐、味苦者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切段，干燥。

【性味】 苦、辛，温；有小毒。

【功能与主治】 散瘀止血，祛风止痛。用于跌扑损伤，风湿痹痛，月经不调，产后瘀血腹痛，脘腹疼痛。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置干燥处。

红　头　草

Hongtoucao

HERBA BLUMEAE MOLLIS

本品为菊科植物柔毛艾纳香 Blumea mollis (D. Don) Merr. 的干燥地上部分。花期采割，除去泥沙，阴干。

【性状】 本品茎呈圆柱形，有的基部分枝，长 20～60 cm；表面绿褐色或带紫红色，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

密被淡黄色长柔毛和腺毛。基生叶常脱落，茎生叶互生，有短柄或近无柄；叶片皱缩，展平后呈椭圆形或矩状倒卵形，长 2～6 cm，宽 0.8～2.5 cm；先端稍尖或钝，基部楔形，两面密被长柔毛和腺毛，边缘有细锯齿。花棕紫色，头状花序近无梗，生于茎顶及上部叶腋，排列紧密成近圆锥状，总苞半球形，苞片 4～5 层，条形，被毛，均为管状花。瘦果矩圆形，细小，冠毛白色。气香，味淡。

以带花、香气浓者为佳。

【鉴别】 取本品粗粉 3 g，加水 30 ml，置 60°水浴中加热 10 分钟，趁热滤过，滤液照下述方法试验：

(1) 取滤液 1 ml，加碱性酒石酸铜试液 4～5 滴，置水浴中加热，发生棕红色沉淀。

(2) 取滤液 1 ml，加 1%三氯化铁的乙醇溶液 1～2 滴，显蓝绿色。

(3) 取滤液 1 ml，加 5%α-萘酚的乙醇溶液 2～3 滴，摇匀，沿试管壁缓缓加入硫酸 0.5～1 ml，两液接界处显紫红色环。

【炮制】 除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，阴干。

【性味】 微苦，平。

【功能与主治】 消炎，解毒。用于肺炎，腮腺炎，口腔炎，乳腺炎。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

红　　花

Honghua

FLOS CARTHAMI

本品为菊科植物红花 Carthamus tinctorius L. 的干燥花。夏季花由黄变红时采摘，阴干或晒干。

【性状】 本品为不带子房的管状花，长约 1.5 cm。表面红黄色或红色。花冠筒细长，先端 5 裂，裂片呈狭线形，长 5～7 mm。雄蕊 5 个，花药聚合成筒状，黄白色。柱头长圆柱形，顶端微分叉。质柔软。气微香，味微苦。

以色红黄、鲜艳、质柔软者为佳。

【鉴别】 (1) 本品粉末橙黄色。花冠、花丝、柱头碎片多见，有红棕色或黄棕色分

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

泌管，直径 5～39 μm。花柱表皮细胞分化成圆锥形而尖的单细胞毛。花粉粒球形或椭圆形，直径约 60 μm，外壁有短刺及疣状雕纹，具 3 个萌发孔。

(2) 取本品 2 g，加水 20 ml，浸渍过夜，溶液显金黄色。滤过，残渣加 10% 碳酸钠溶液 8 ml，浸渍，滤过，滤液加醋酸使成酸性，即发生红色沉淀。

【检查】 水分　照水分测定法项下烘干法（附录15页）测定，不得过 13%。

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 活血，散瘀，通经。用于经闭，痛经，恶露不行，腹部肿块，跌扑损伤。

【用法与用量】 3～6 g。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防潮、防蛀。

红 花 龙 胆

Honghualongdan

HERBA GENTIANAE RHODANTHAE

本品为龙胆科植物红花龙胆 Gentiana rhodantha Franch. 的干燥全草。秋、冬二季采挖，除去泥沙，晒干。

【性状】 本品长 30～60 cm。根细条形，稍肉质，表面浅棕色或黄白色，直径约 1 mm。茎具棱，直径 1～2 mm，黄绿色或带紫色，质脆，断面中空。基生叶丛生，披针形或卵状匙形；茎生叶对生，卵形或卵状三角形，长 0.7～2 cm，宽 0.5～1.5 cm，先端尖，边缘有细锯齿，反卷，基部无柄抱茎，主脉 3 条。花单生于枝顶及上部叶腋，花萼筒状，5 裂；花冠喇叭状，长 3～3.5 cm，淡紫红色或浅黄棕色，有深紫色条纹，先端 5 裂，裂片间褶流苏状。蒴果狭长，2 瓣裂。种子扁卵形，具狭翅。气微清香，茎叶味微苦，根味极苦。

以花叶多、色绿者为佳。

【炮制】 除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，晒干。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清湿热，消炎，止咳。用于肝炎，支气管炎，小便不利。

【用法与用量】 9～15 g。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【贮藏】 置干燥处。

红 豆 蔻

Hongdoukou

FRUCTUS GALANGAE

本品为姜科植物大高良姜 Alpinia galanga Willd. 的干燥成熟果实。秋季果实变红时采收，除去杂质，阴干。

【性状】 本品呈长球形，中部略细，长 0.7～1.2 cm，直径 0.5～0.7 cm。表面红棕色或暗红色，略皱缩，顶端有黄白色管状宿萼，基部有果梗痕。果皮薄，易破碎。种子多为 6 粒，呈扁圆形或三角状多面形，黑棕色或红棕色，外被黄白色薄膜状假种皮，胚乳灰白色。气香，味辛辣。

以粒大、饱满、不破碎、气味浓者为佳。

【炮制】 除去杂质，用时捣碎。

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 燥湿散寒，健脾消食。用于脘腹冷痛，食滞胀满，呕吐，腹泻。

【用法与用量】 1～6 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

红 根 草

Honggencao

HERBA SALVIAE PRIONITIDIS

本品为唇形科植物黄堉鼠尾草 Salvia prionitis Hance 的干燥全草。秋季采收，除去杂质，晒干。

【性状】 本品根呈须状，长可达 10 cm，表面棕褐色。茎方柱形，长 20～40 cm，直径0.1～0.2 cm；被白色长毛，断面灰白色。基生叶为单叶或三出羽状复叶，有的为羽状 5 深裂，叶片多皱缩卷曲，展平后呈矩圆形或椭圆形，长 2～6 cm，宽 1～3.5 cm，黑

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

褐色，先端钝，边缘有粗齿，两面均有白色长柔毛，叶柄长 1～4 cm；茎生叶对生，均为单叶。气微，味微苦。

【鉴别】 本品叶表面观：表皮细胞含棕褐色物；气孔直轴式或不定式。非腺毛甚多，2～10 细胞，平直或弯曲，基部 1～3 细胞较粗短，有的中部一个细胞缢缩状，壁稍厚，有角质纹理。腺毛头部单细胞，直径 24～34 μm，柄单细胞或无；另有腺鳞头部 4 或多细胞，直径约 40 μm，柄单细胞。

【炮制】 除去杂质，洗净，切段，晒干。

【性味】 微苦，凉。

【功能与主治】 清解热毒。用于急性扁桃体炎，咽喉炎，支气管炎，肠炎，细菌性痢疾。

【用法与用量】 15～45 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

红　　粉

Hongfen

HYDRARGYRI OXYDUM RUBRUM

本品为红氧化汞。

【性状】 本品为橙红色片状或粉状结晶，体重；无臭；遇光颜色逐渐变深。

以色橙红、片状者为佳。

【鉴别】 取本品约 0.5 g，加水 10 ml，搅匀，缓缓滴加适量的盐酸溶解后，溶液显汞盐(附录40页)的鉴别反应。

【检查】 **亚汞化合物** 取本品约 0.5 g，加稀盐酸 25 ml，溶解后，溶液只许显微浊。

氯化物 取本品约 0.5 g，加水适量与硝酸 3 ml，溶解后，加水稀释使至约 40 ml，依法检查（附录44页）。如显浑浊，与标准氯化钠溶液 3 ml 制成的对照液比较，不得更浓（0.006%）。

【含量测定】 取本品约 0.2 g，精密称定，加稀硝酸 25 ml 溶解后，加水 80 ml 与硫酸铁铵指示液 2 ml，用 $N/10$ 硫氰酸铵液滴定，即得（每 1 ml 的 $N/10$ 硫氰酸铵液相当于 10.83 mg 的HgO）。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

本品按干燥品计算，含氧化汞（HgO）不得少于99.0%。

【功能与主治】 拔毒，去腐，生肌。用于痈疽疮疡，腐肉不净，神经性皮炎，牛皮癣，扁平疣，黄褐斑。

【用法与用量】 外用，用时研极细粉，遵医嘱应用。

【注意】 本品有毒，不可内服。

【贮藏】 置干燥处，遮光，密闭保存。

红 景 天

Hongjingtian

RADIX RHODIOLAE

本品系藏族习用药材，藏文名为 གཙང་(尕都尔)；为景天科植物大株红景天 Rhodiola kirilowii (Regel) Regel 或唐古特红景天 Rhodiola algida (Ledeb.) Fu var. tangutica (Maxim.) Fu 的干燥根及根茎。秋季采挖，除去粗皮，晒干。

【性状】 本品略呈圆锥形，多有分枝；长3～12 cm，直径1～4 cm。表面红棕色或棕色，具不规则的纵沟纹。根茎膨大，具残留茎基，表面凹凸不平；质硬，断面可见筋脉纹。根表面较光滑，具须根痕；质脆，易折断，断面不整齐，淡红色，粉性。气微，味苦、涩。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，晒干。

【性味】 微苦、涩，寒。

【功能与主治】 清热解毒，燥湿。用于肺热，脉热，瘟病，四肢肿胀。

【用法与用量】 0.6～1.2 g。

【贮藏】 置干燥处。

红 管 药

Hongguanyao

HERBA ASTERIS AGERATOIDIS

本品为菊科植物宽序紫菀 Aster ageratoides Turcz. var. laticorymbus Hand.-Mazz.

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

或异叶紫菀 Aster ageratoides Turcz. var. heterophyllus Maxim. 的干燥全草。秋季茎叶茂盛、花开放时采收，除去杂质，干燥。

【性状】 本品长 50～170 cm。根茎横生，有多数浅棕黄色须状根。茎圆柱形，有细毛，上部分枝，呈暗绿色，下部暗紫色；质脆，易折断，断面不整齐，中部有髓。叶互生，叶片多皱缩或破碎，完整者展平后呈长椭圆形至披针形，长 6～12 cm，宽 3～5 cm；灰绿色，边缘具疏锯齿，两面均被粗毛，下表面有 3 条明显叶脉。头状花序排成伞房状，顶生，舌状花淡黄色，管状花淡棕色。瘦果具长冠毛。气微，味微苦。

以叶多、带花者为佳。

【鉴别】 (1) 取本品粉末 2 g，加乙醇 10 ml，加热回流 10 分钟，滤过，滤液加镁粉少量与盐酸 4～5 滴，加热，即发生粉红色泡沫。

(2) 取本品粉末 2 g，加水 20 ml，置水浴中加热 10 分钟，滤过，滤液置试管中强力振摇后，产生的泡沫放置 15 分钟不消失。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性味】 微苦、辛，微温。

【功能与主治】 止咳，祛痰。用于慢性支气管炎。

【用法与用量】 60 g，分二次服。

【贮藏】 置干燥处。

【制剂】 红管药片

红 管 药 片

Hongguanyao Pian

TABELLAE ASTERIS AGERATOIDIS

本品为红管药浸膏片。每片相当于红管药 4.2 g。

【制法】 取红管药 4200 g，粉碎成粗粉，照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法(附录11页)，用 70%乙醇作溶剂，浸渍 24 小时后进行渗漉，收集漉液，减压浓缩成稠膏状，加热水稀释，静置 24 小时，滤过，滤液浓缩成稠膏状，加适量辅料，制成颗粒，压制成 1000 片，包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；味苦涩。

【鉴别】 (1) 取本品 4 片，除去糖衣，研细，加 70%乙醇 10 ml 回流加热 10 分钟，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

滤过，滤液浓缩成膏状，加少量水溶解后，加醋酸乙酯 10 ml 振摇提取，提取液蒸干，残渣加 70% 乙醇少量使溶解，再加镁粉少量与盐酸 3～5 滴，加热，即发生粉红色泡沫。

(2) 取本品 1 片，除去糖衣，研细，加水 10 ml 使溶解，滤过，滤液置试管中强力振摇，生成的泡沫放置 15 分钟不完全消失。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定（附录 6 页）。

【功能与主治】 同红管药。

【用法与用量】 口服，一次 5 片，一日 3 次。

【贮藏】 密封保存。

麦　　冬

Maidong

RADIX OPHIOPOGONIS

本品为百合科植物麦冬 Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker-Gawl. 的干燥块根。夏季采挖，洗净，反复暴晒、堆置，至七八成干，除去须根，干燥。

【性状】 本品呈纺锤形，两端略尖，长 1.5～3 cm，直径 0.3～0.6 cm。表面黄白色或淡黄色，有细纵纹。质柔韧，断面黄白色，半透明，中柱细小，习称“木心”。气微香，味甘、微苦。

以肥大、色黄白者为佳。

【鉴别】 (1) 本品横切面：根被为 3～5 列木化细胞。皮层宽广，薄壁细胞含草酸钙针晶束，有的针晶直径至 10 μm；紧接内皮层为 1 列石细胞，其内壁及侧壁增厚，纹孔细密；内皮层细胞壁均匀增厚，木化。中柱较小，韧皮部束 16～22 个，各位于木质部束的星角间，木质部束内侧由木化组织连接成环层。

(2) 取本品的薄片，置紫外光灯下观察，显浅蓝色荧光。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，轧扁，干燥。

【性味】 甘、微苦，微寒。

【功能与主治】 养阴，生津，润肺，止咳。用于肺燥干咳，津少口渴，心烦，咽白喉。

【用法与用量】 6～12 g。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【贮藏】 置阴凉干燥处，防潮。

麦　　芽

Maiya

FRUCTUS HORDEI GERMINATUS

本品为禾本科植物大麦 Hordeum vulgare L. 的成熟果实，经发芽干燥而得。将麦粒用水浸泡后，保持适宜温、湿度，待胚芽长至约 0.5 cm 时，晒干或低温烘干。

【性状】 本品呈梭形，长 8～12 mm，直径 3～4 mm。表面淡黄色，背面浑圆，为外稃包围，具 5 脉，先端长芒已断落；腹面为内稃包围，有 1 条纵沟。除去内外稃后，基部胚根处生出胚芽及须根，胚芽长披针状线形，黄绿色，长约 0.5 cm，须根数条，纤细而弯曲。质硬，断面白色，粉性。无臭，味微甘。

以色淡黄、有胚芽者为佳。

【炮制】 **麦芽** 除去杂质。

炒麦芽 取净麦芽，照清炒法（附录18页）炒至棕黄色。

焦麦芽 取净麦芽，照炒焦法（附录18页）炒至焦黄色。

【性味】 甘，温。

【功能与主治】 消食，回乳。用于食积不消，脘腹胀满。

【用法与用量】 9～15 g；回乳炒用 60 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

远　　志

Yuanzhi

RADIX POLYGALAE

本品为远志科植物远志 Polygala tenuifolia Willd. 或卵叶远志 Polygala sibirica L. 的干燥根。春、秋二季采挖，除去须根及泥沙，晒干。

【性状】 本品呈圆柱形，具支根，多弯曲，长 10～25 cm，直径 0.3～1 cm。表面灰

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

黄色至灰棕色，有较密并深陷的横皱纹、纵皱纹及裂纹，老根的横皱纹较密更深陷，略呈结节状。质硬而脆，易折断，断面皮部棕黄色，木部黄白色，皮部易与木部剥离。气微，味苦、微辛，嚼之有刺喉感。

以条粗、皮厚者为佳。

【鉴别】 (1) 本品横切面：木栓层为 10 余列细胞。皮层为 20 余列薄壁细胞，有横向裂隙。韧皮部较宽广，常现径向裂隙。形成层成环。木质部发达，均木化，射线宽 1～3 列细胞。薄壁细胞含脂肪油滴；有时可见草酸钙簇晶及方晶。

(2) 取本品粗粉约 0.5 g，置带塞试管中，加热水 10 ml，强力振摇 1 分钟，产生持续性的泡沫，10 分钟内不消失。

【炮制】 **远志** 除去杂质，略洗，润透，切段，干燥。

制远志 取甘草，加水煎汤，去渣，加入净远志，用文火煮至汤吸尽，取出，干燥。

每远志 100 kg，用甘草 6 kg。

【性味】 苦、辛，温。

【功能与主治】 安神，祛痰。用于心悸易惊，健忘，失眠多梦，咳痰不爽。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

【制剂】 远志流浸膏

远志流浸膏

Yuanzhi Liujingao

EXTRACTUM POLYGALAE LIQUIDUM

【处方】

远志(中粉)	1000 g
氨溶液	适量
乙醇(60%)	适量

【制法】 取远志，照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法（附录11页），用 60% 乙醇作溶剂，浸渍 24 小时后，以每分钟 1～3 ml 的速度缓缓渗漉，收集初漉液 850 ml，另器保存，继续渗漉，俟有效成分完全漉出，收集续漉液，在 60° 以下浓缩至稠膏状，加入初漉液 850 ml，混合后，滴加氨溶液适量使微显碱性，并有氨臭，再加 60%乙醇稀释使

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

成 1000 ml，静置，俟澄清，滤过，即得。

【性状】 本品为棕色的液体；与水振摇起多量泡沫。

【检查】 乙醇量 应为 38～48%（附录48页第三法）。

其他 应符合流浸膏剂与浸膏剂项下有关的各项规定（附录11页）。

【功能与主治】 祛痰药。用于咳痰不爽。

【用法与用量】 口服，一次 0.5～2 ml，一日 1.5～6 ml。

【贮藏】 密封保存。

【制剂】 远志酊

远 志 酊

Yuanzhi Ding

TINCTURA POLYGALAE

【处方】 远志流浸膏 200ml

乙醇(60%) 适量

【制法】 取远志流浸膏，加 60%乙醇使成 1000ml，混合后，静置，滤过，即得。

【性状】 本品为棕色的液体；与水振摇起多量的泡沫。

【检查】 乙醇量 应为 50～58%(附录48页第一法)。

其他 应符合酊剂项下有关的各项规定(附录10页)。

【功能与主治】 同远志流浸膏。

【用法与用量】 口服，一次 2～5 ml，一日 6～15 ml。

【贮藏】 密封保存。

赤 小 豆

Chixiaodou

SEMEN PHASEOLI

本品为豆科植物赤小豆 Phaseolus calcalatus Roxb. 或赤豆 Phaseolus angularis

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Wight 的干燥成熟种子。秋季果实成熟而未开裂时拔取全株，晒干，打下种子，除去杂质，再晒干。

【性状】 **赤小豆** 呈长圆形而稍扁，长 5～8 mm，直径 3～5 mm。表面紫红色，无光泽或微有光泽，种脐线形突起，偏向一端，白色，约为全长 2/3，中间凹陷成纵沟。背面有 1 条不明显的棱脊。质坚硬，不易破碎，破开后可见乳白色子叶 2 片。无臭，味微甘。

赤豆 呈短圆柱形，两端较平截或钝圆，直径 4～6mm。表面暗棕红色，有光泽，种脐不突起。

均以粒饱满、色紫红者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，晒干。

【性味】 甘、酸，平。

【功能与主治】 利水，清热解毒。用于水肿，肾炎，热毒痈肿。

【用法与用量】 9～30g。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

赤 石 脂

Chishizhi

HALLOYSITUM RUBRUM

本品为三斜晶系多水高岭土，主含含水硅酸铝。采挖后，除去杂质。

【性状】 本品呈不规则的块状，大小不一。粉红色、红色至紫红色，或有红白相间的花纹。质较软，滑腻如脂，易砸碎。吸水性强。气微，嚼之无沙粒感。

以色红、细腻、易碎、吸水性强者为佳。

【炮制】 **赤石脂** 除去杂质，打碎或研细粉。

煅赤石脂 取赤石脂细粉，用醋调匀，搓条，切段，晒干，照煅法(附录19页)煅至红透。

【性味】 甘、涩，温。

【功能与主治】 涩肠，止血。用于久泻，久痢，便血，崩漏；外治溃疡不敛。

【用法与用量】 9～12g；外用适量，研末敷患处。

【注意】 不宜与肉桂、桂皮同用。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【贮藏】 置干燥处，防潮。

赤　芍

Chishao

RADIX PAEONIAE RUBRA

本品为毛茛科植物芍药 Paeonia lactiflora Pall.、草芍药 Paeonia obovata Maxim.或川赤芍 Paeonia veitchii Lynch 的干燥根。春、秋二季采挖，除去根茎、须根及泥沙，晒干。

【性状】 本品呈圆柱形，稍弯曲，长 5～40cm，直径 0.8～3cm。表面棕褐色，粗糙，有纵沟及皱纹，并有须根痕及横向凸起的皮孔，有的外皮易脱落。质硬而脆，易折断，断面粉白色或粉红色，皮部窄，木部放射状纹理明显，有的现裂隙。气微香，味微苦、酸涩。

以条粗长、断面粉白色、粉性大者为佳。

【鉴别】 (1) 本品横切面：木栓层为数列棕色细胞。皮层薄壁细胞切向延长。韧皮部较窄。形成层成环。木质部射线较宽；导管群作放射状排列，导管旁有木纤维。薄壁细胞含草酸钙簇晶，并含淀粉粒。

(2) 取本品粉末 0.5g，加水 10ml，煮沸，滤过，滤液加三氯化铁试液 1 滴，发生蓝黑色沉淀。

(3) 取本品粉末 1g，加乙醚 10ml，随时振摇约 2 小时，滤过，滤液浓缩。取浓缩液点于滤纸上，喷洒 0.1%溴酚蓝的乙醇(70%)溶液，呈现黄色斑点。

【炮制】 除去杂质，分开大小条，洗净，润透，切片，干燥。

【性味】 苦，微寒。

【功能与主治】 散瘀血，清血热。用于胸胁疼痛，腹痛，目赤，痛经，经闭，吐血，衄血，痈肿，跌扑损伤。

【用法与用量】 4.5～9g。

【注意】 不宜与藜芦同用。

【贮藏】 置通风干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

块根木蓝

Kuaigenmulan

RADIX INDIGOFERAE NEOPOLYGALOIDIS

本品系佤族习用药材，佤文名为 Nyasamdon(娘三端)；为豆科植物块根木蓝 Indigofera neopolygaloides Hu 的干燥块根。秋末果实成熟时采挖，除去泥沙，晒干。

【性状】 本品呈椭圆形或圆锥形，长 2～5 cm，直径 1～3 cm，常有 1～2 个指状分枝。表面灰褐色或棕褐色，有不规则的纵皱纹及槽纹，上端有环纹。质硬，不易折断，断面白色，粉性，有数个纵向裂槽分成数瓣。气微，味苦。

以条粗壮、质坚实、断面色白、苦味重者为佳。

【炮制】 除去杂质，捣碎或研粉。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 止痛，消炎。用于胃痛，胃肠炎，咽喉痛，扁桃体炎。

【用法与用量】 15～30g；研末口服，一次 2～3g，一日 3 次。

【贮藏】 置通风干燥处，防霉。

芙蓉叶

Furongye

FOLIUM HIBISCI

本品为锦葵科植物木芙蓉 Hibiscus mutabilis L. 的干燥叶。夏、秋二季采收，晒干。

【性状】 本品被毛。叶片多卷缩、破碎，完整者展平后呈卵圆状心形，直径 10～20cm，掌状 3～7 浅裂，裂片三角形，边缘有钝齿。上表面暗黄绿色，下表面灰绿色，叶脉 7～11 条，于两面突起。叶柄长 5～20cm。气微，味微辛。

【炮制】 除去杂质，喷淋清水，稍润，切碎，晒干；或研粉。

【性味】 微辛，凉。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 清肺凉血，消炎解毒，消肿排脓。用于肺热咳嗽，肥厚性鼻炎，淋巴结炎，阑尾炎；外治痈疖脓肿，急性中耳炎，烧、烫伤。

【用法与用量】 10～30g；外用适量，鲜品捣烂敷患处，干品研末油调或熬膏，用于耳及烧、烫伤。

【贮藏】 置通风干燥处。

芫　　花

Yuanhua

FLOS GENKWA

本品为瑞香科植物芫花 Daphne genkwa Sieb. et Zuce. 的干燥花蕾。春季花未开放时采收，除去杂质，干燥。

【性状】 本品常 3～7 朵簇生于短花轴上，基部有苞片 1～2 片，多脱落为单朵。单朵呈棒槌状，多弯曲，长 1～1.7cm，直径约 1.5mm；萼筒表面淡紫色或灰绿色，密被短柔毛，先端 4 裂似花瓣状，裂片淡紫色或黄棕色。质软。气微，味辛辣。

以色淡紫者为佳。

【鉴别】 (1) 本品表面观：花粉粒黄色，类球形，直径 23～45 μm，表面有较明显的网状雕纹。花被下表面有非腺毛，单细胞，多弯曲，长 88～780 μm，直径 15～23μm，壁较厚，微具疣状突起。

(2) 取本品粉末 1g，加乙醇 10ml，置水浴上回流 1 小时，滤过。取滤液 1 滴，点于滤纸上，加 1%三氯化铁溶液 1 滴，显污绿色；另取滤液 2 ml，加镁粉少量与盐酸 1 滴，放置或稍加热，显红色。

【炮制】 **芫花** 除去杂质。

醋芫花 取净芫花，照醋炒法(附录18页)用醋炒至醋吸尽。

每芫花 100 kg，用醋 30 kg。

【性味】 辛、苦，温；有毒。

【功能与主治】 泻水消肿。用于重症水肿，胸水，腹水。

【用法与用量】 1.5～3g；醋芫花研末吞服，一次 0.6～0.9g，一日 1 次。

【注意】 身体虚弱者及孕妇忌服；不宜与甘草同用。

【贮藏】 置通风干燥处，防霉、防蛀。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

芸　香　草

Yunxiangcao

HERBA CYMBOPOGONIS

本品为禾本科植物芸香草 Cymbopogon distans (Nees) A. Camus 的干燥地上部分。夏、秋二季花开前采割，阴干或晒干。

【性状】 本品茎长 40～110 cm，直径约 0.3 cm；表面灰绿色或棕绿色，有的带紫色，节处膨大；质脆，易折断。叶片狭条形，长 30～70 cm，宽 0.1～0.6 cm；叶鞘包茎，茎基的叶鞘多破裂，离茎内卷，上部的叶鞘短于节间；叶舌钝圆，长 0.2～0.4cm，膜质，先端多不规则破裂。气香特异，味辛辣，有麻凉感。

【炮制】 除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，晒干。

【性味】 辛、苦，温。

【功能与主治】 散寒渗湿，止咳平喘，行气宽中。用于风寒感冒，喘咳，风湿痹痛，胸腹胀痛。

【用法与用量】 15～60 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

芸　香　草　油

Yunxiangcao You

OLEUM CYMBOPOGONIS

本品为禾本科植物芸香草 Cymbopogon distans (Nees) A. Camus 的全草经蒸气蒸馏得到的挥发油。含胡椒酮（$C_{10}H_{16}O$）不得少于 88.0%（g/g）。

【性状】 本品为无色或微黄色的澄清液体；有类似薄荷香气，味苦，微清凉。

本品与乙醇、氯仿或乙醚能任意混合，在水中几乎不溶。

比重 本品的比重（附录26页）在 25°时为 0.930～0.936。

折光率 本品的折光率（附录32页）为 1.483～1.485。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【鉴别】 (1)取本品 0.5 ml，加 2,4-二硝基苯肼的高氯酸溶液（取 2,4-二硝基苯肼 0.24 g，加 30%高氯酸使溶解成 10 ml）1～2 滴，油层显橙红色或红色。

(2) 取含量测定项下的溶液，照分光光度法（附录32页）测定，在 234±1 nm 的波长处有最大吸收。

【检查】 **碱度** 取本品 5 ml，加中性乙醇（对溴麝香草酚蓝指示液显中性）5 ml，摇匀，加溴麝香草酚蓝指示液 2 滴，不得显绿色。

重金属 取本品 1 ml，加乙醇 9 ml，摇匀，加稀醋酸 2 ml，通硫化氢气使饱和，如显色，与标准铅溶液 1 ml，用同一方法制成的对照液比较，不得更深（百万分之十）。

【含量测定】 取本品，精密称定，加乙醇制成每 1 ml 中约含 5 μg 的溶液，照分光光度法（附录32页），在 234±1 nm 的波长处测定吸收度，按 $C_{10}H_{16}O$ 的吸收系数（$E^{1\%}_{1cm}$）为 884 计算，即得。

【功能与主治】 平喘药，松弛支气管平滑肌。用于慢性支气管炎，支气管哮喘等。

【贮藏】 遮光，密封保存。

【制剂】 芸香草油气雾剂

芸香草油气雾剂

Yunxiangcaoyou Qiwuji

AEROSOLUM OLEI CYMBOPOGONIS

本品为芸香草油的乙醇溶液，加适宜的抛射剂与食用香精等制成的气雾剂。每瓶含胡椒酮（$C_{10}H_{16}O$）不得少于 1.1 g。

【性状】 本品为淡黄色的澄明液体；喷射时有特异的香气，味先辛辣而后凉甜。

【鉴别】 (1)取本品 1 瓶，冷却至 5°左右，用微孔排气法（取橡胶管 1 根，两端各套上 6 号或 7 号注射针头，一端放入水中；在铝盖下穿一小孔，将另端注射针头插入瓶中，针头勿与液面接触），待抛射剂缓缓排出后，瓶内余液移置蒸发皿中，在水浴上蒸去乙醇，余存的油状物照芸香草油项下的鉴别法(1)项(272页）试验，显相同的反应。

(2) 取含量测定项下的乙醇稀释液，照分光光度法（附录32页）测定，在 234±1 nm 的波长处有最大吸收。

【含量测定】 取本品 1 瓶，照鉴别(1)项下微孔排气法，将抛射剂缓缓排出后，移入 100 ml 量瓶中，用乙醇洗涤容器，洗液并入量瓶中，加乙醇稀释至刻度，摇匀，精

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

密量取 1 ml，置 100 ml 量瓶中，加乙醇稀释至刻度，摇匀，再精密量取 2 ml，置 50 ml 量瓶中，加乙醇稀释至刻度，摇匀，照分光光度法（附录32页），在 234±1 nm 的波长处测定吸收度，按 $C_{10}H_{16}O$ 的吸收系数（$E_{1cm}^{1\%}$）为 884 计算，即得。

【功能与主治】 同芸香草油。

【用法与用量】 用时将本品药瓶倒置，喷头圆孔对准口腔，在用力吸气同时，立即揿压阀门上端喷雾头，溶液即成雾状喷入口腔，闭口数分钟，一次喷吸 2～3 下，一日 3 次。

【注意】 切勿受热，避免撞击。

【规格】 每瓶装15ml（含芸香草油 1.4 g）

【贮藏】 遮光，在阴凉处保存。

苣　荬　菜（北败酱）

Qumaicai

HERBA SONCHI ARVENSIS

本品为菊科植物苣荬菜 Sonchus arvensis L. 的干燥全草。春、夏二季花开前采挖，除去杂质，晒干。

【性状】 本品根茎呈长圆柱形，下部渐细，长 3～10 cm，上部直径 0.2～0.5 cm；表面淡黄棕色，有纵皱纹，上部有近环状突起的叶痕。基生叶卷缩或破碎，完整者展平后呈长圆状披针形，边缘有稀疏缺刻或羽状浅裂，裂片三角形，边缘有细尖齿，上表面灰绿色，下表面色较浅，基部渐窄成短柄，有的带幼茎，长 3～6 cm；茎生叶互生，基部耳状，无柄，抱茎。质脆。气微，味微咸。

以叶多、色绿、无花者为佳。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清湿热，消肿排脓，化瘀解毒。用于阑尾炎，肠炎，痢疾，疮疖痈肿，产后瘀血腹痛，痔疮。

【用法与用量】 9～15 g；外用鲜品适量，捣烂敷患处，煎汤熏洗痔疮。

【贮藏】 置通风干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

花　　椒

Huajiao

PERICARPIUM ZANTHOXYLI

本品为芸香科植物青椒 Zanthoxylum schinifolium Sieb. et Zucc. 或花椒 Zanthoxylum bungeanum Maxim. 的干燥成熟果皮。秋季采收成熟果实，晒干，除去种子及杂质。

【性状】 **青椒**　为2～3个上部离生的小蓇葖果，集生于小果梗上，每一蓇葖果沿腹缝线开裂，直径3～4 mm。外表面灰绿色或暗绿色，散有多数油点及细密的网状隆起的皱纹；内表面类白色，光滑。内果皮与外果皮常由基部分离。残存种子呈卵形，长3～4 mm，直径2～3 mm，表面黑色，有光泽。气香，味微甜而辛。

以粒匀、色灰绿者为佳。

花椒　粒较大，直径4～5 mm。外表面紫红色或棕红色，散有多数疣状突起的油点，油点直径0.5～1 mm，对光观察半透明；内表面淡黄色。香气浓，味麻辣而持久。

以粒大、色紫红、香气浓烈者为佳。

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 温中，散寒，驱虫，止痒。用于脘腹冷痛，呕吐，腹泻，蛔虫病；外治皮肤瘙痒。

【用法与用量】 3～6 g；外用适量。

【贮藏】 置通风干燥处。

花　蕊　石

Huaruishi

OPHICALCITUM

本品为蛇纹大理岩的岩石。采挖后，除去杂石及泥沙。

【性状】 本品为不规则的块状，具楞角，大小不一。表面较粗糙，类白色或黄白色，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

有黄色和黄绿色花纹相夹其间，习称“彩晕”。对光观察有闪星状亮光。体重，质坚硬，不易破碎。无臭，味淡。

以质坚硬、色白带“彩晕”者为佳。

【炮制】 **花蕊石** 洗净，晒干，砸成小块。

煅花蕊石 取净花蕊石，照煅法(附录19页)煅至红透。

【性味】 酸、涩，平。

【功能与主治】 化瘀止血。用于咯血；外治外伤出血。

【用法与用量】 4.5～9 g，炮制后用，多研末服；外用煅制品适量，研末敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

芥　　子

Jiezi

SEMEN SINAPIS

本品为十字花科植物白芥 Sinapis alba L. 或芥 Brassica juncea (L.) Gzern. et Coss. 的干燥成熟种子。前者习称“白芥子”，后者习称“黄芥子”。夏末秋初果实成熟时采割植株，晒干，打下种子。除去杂质。

【性状】 **白芥子** 呈球形，直径 1.5～2.5 mm。表面灰白色至淡黄色，具细微的网纹，一端有明显的点状种脐。种皮薄而脆，破开后内有白色折叠的子叶，有油性。无臭，味辛辣。

黄芥子 较小，直径 1～2 mm。表面黄色至棕黄色，少数呈暗红棕色。研碎后加水浸湿，则发生辛烈的特异臭气。

均以粒大、饱满者为佳。

【鉴别】 本品横切面：

白芥子 种皮表皮为粘液细胞，有粘液质纹理；下皮为 2 列厚角细胞；栅状细胞层为 1 列石细胞，内壁及侧壁增厚，外壁菲薄。内胚乳为 1 列类方形细胞，含糊粉粒。子叶及胚根薄壁细胞含脂肪油滴和糊粉粒。

黄芥子 种皮表皮细胞切向延长；下皮为 1 列菲薄的细胞。

【炮制】 **芥子** 除去杂质。

炒芥子 取净芥子，照清炒法(附录18页)炒至深黄色并发出香辣气。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 温化寒痰，通络止痛。用于寒痰喘咳，胸胁胀满，寒性脓疡；外治关节疼痛。

【用法与用量】 3～9 g；外用适量，研末醋调敷患处。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮。

苍　　术

Cangzhu

RHIZOMA ATRACTYLODIS

本品为菊科植物茅苍术 Atractylodes lancea (Thunb.) DC. 或北苍术 Atractylodes chinensis (DC.) Koidz. 的干燥根茎。春、秋二季采挖，除去泥沙，晒干，撞去须根。

【性状】 **茅苍术** 呈不规则连珠状或结节状圆柱形，略弯曲，偶有分枝，长 3～10 cm，直径 1～2 cm。表面灰棕色，有皱纹、横曲纹及残留须根，顶端具茎痕或残留茎基。质坚实，断面黄白色或灰白色，散有多数橙黄色或棕红色油点，习称"朱砂点"，暴露稍久，可析出白毛状的结晶，习称"起霜"。气香特异，味微甘、辛、苦。

北苍术 呈疙瘩块状或结节状圆柱形，长 4～9 cm，直径 1～4 cm。表面黑棕色，除去外皮者黄棕色。质较疏松，断面散有黄棕色油点。香气较淡，味辛、苦。

均以质坚实、断面朱砂点多、香气浓者为佳。

【鉴别】 (1) 本品粉末棕色。草酸钙针晶细小，长 5～30 μm，不规则地充塞于薄壁细胞中。纤维大多成束，长梭形，直径约至 40 μm，壁甚厚，木化。石细胞甚多，有时与木栓细胞连结，多角形、类圆形或类长方形，直径 20～80 μm。壁极厚。菊糖多见，表面现放射状纹理。

(2) 取本品粉末 1 g，加乙醚 3 ml，浸渍约 5 分钟，滤过。取滤液数滴，置白瓷滴板上，待乙醚挥散后，加新制的对二甲氨基苯甲醛 2 g、硫酸 3.3 ml 与水 0.4 ml 的混合溶液 1～2 滴，再加乙醇 2 滴，显玫瑰红色。

【炮制】 **苍术** 除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。

炒苍术 取苍术片，照清炒法(附录18页)炒至微黄色。

【性味】 辛、苦，温。

【功能与主治】 燥湿，健脾，明目。用于脘腹胀满，吐泻，水肿，痰饮，肢体、关

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

节酸重，夜盲症。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

苍 耳 子

Cang'erzi

FRUCTUS XANTHII

本品为菊科植物苍耳 Xanthium sibiricum Patr. 的干燥成熟带总苞的果实。秋季果实成熟时采收，干燥，除去梗、叶等杂质。

【性状】 本品呈纺锤形或卵圆形，长 1～1.5 cm，直径 0.4～0.7 cm。表面黄棕色或黄绿色，全体有钩刺。顶端有 2 枚较粗的刺，分离或相连，基部有梗痕。质硬而韧，横切面可见中间有 1 隔膜，内各有 1 枚瘦果。瘦果略呈纺锤形，一面较平坦，顶端具 1 突起的花柱基，果皮薄，灰黑色，具纵纹。种皮膜质，浅灰色，除去种皮，可见子叶 2 片，有油性。气微，味微苦。

以粒大、饱满、色黄棕者为佳。

【炮制】 除去杂质，照清炒法(附录18页)炒至黄褐色，去刺，筛净。

【性味】 辛、苦，温；有小毒。

【功能与主治】 散风湿，通鼻窍。用于鼻炎，鼻窦炎，头痛，过敏性鼻炎，皮肤瘙痒，风湿痹痛。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置干燥处。

芡 实

Qianshi

SEMEN EURYALES

本品为睡莲科植物芡 Euryale ferox Salisb. 的干燥成熟种仁。秋末冬初采收成熟果

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

实，除去果皮，取出种子，洗净，再除去硬壳(外种皮)，晒干。

【性状】 本品呈类球形，多为破粒。完整者直径5～8 mm；表面有棕红色内种皮，一端黄白色，约占全体1/3，有凹点状的种脐痕，除去内种皮显白色。质较硬，断面白色，粉性。无臭，味淡。

以断面色白、粉性足、无碎末者为佳。

【鉴别】 本品粉末类白色。主为淀粉粒，单粒类圆形，直径1～4 μm，大粒脐点隐约可见；复粒多数由百余粒组成，类球形，直径13～35 μm，少数由2～3粒组成。

【炮制】 **芡实** 除去杂质。

炒芡实 取净芡实，照清炒法(附录18页)炒至微黄色。

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 益肾固精，补脾止泻。用于遗精，白带，泄泻，尿频，遗尿。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

苎　麻　根

Zhumagen

RADIX BOEHMERIAE

本品为荨麻科植物苎麻 Boehmeria nivea (L.) Gaud. 的干燥根及根茎。冬季至次春采挖，除去泥沙，晒干。

【性状】 本品呈不规则圆柱形，稍弯曲，长8～25 cm，直径0.8～2 cm。表面灰棕色，有纵皱纹及横长皮孔，并有多数疣状突起、残留细根及根痕。质硬而脆，断面纤维性，皮部灰褐色，木部淡棕色，有的中间有数个同心环纹；根茎髓部棕色或中空。气微，味淡，嚼之略有粘性。

以色灰棕、无空心者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。

【性味】 甘，寒。

【功能与主治】 止血，安胎。用于胎动不安，先兆流产，尿血；外治痈肿初起。

【用法与用量】 9～30 g；外用适量，捣烂敷患处。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

苎麻浸膏（血凝）

Zhumajingao

EXTRACTUM BOEHMERIAE

本品为荨麻科植物苎麻 Boehmeria nivea (L.) Gaud. 干燥叶、茎的提取物。每1 g相当于苎麻叶、茎1000 g。

【制法】 取苎麻叶、茎，加水煎煮二次，第一次加水4.5倍量，煮沸1小时，第二次加水1.5倍量，煮沸15分钟，合并煎液，滤过，滤液中加盐酸调节pH值至5.0，减压浓缩至稠膏状，加乙醇4.5～5倍量，搅拌后离心除去沉淀物，浓缩并回收乙醇，在10°以下放置24小时，滤过，加水4倍量，搅拌，用醋酸乙酯提取4次，合并提取液，浓缩回收醋酸乙酯，即得。

【性状】 本品为棕褐色的粘稠液体；具特殊香气，味苦。

【鉴别】 (1) 取本品少量，加水2 ml振摇后，加三氯化铁试液1滴，即显墨绿色。

(2) 取本品少量，置小试管中，加氯化铵与锌粉各约20 mg，加热至干，管口置以对二甲氨基苯甲醛的试纸(取对二甲氨基苯甲醛0.25 g，加20%三氯醋酸的苯溶液5 ml使溶解，将滤纸条浸入溶液中，取出晾干，即得)，用小火在管底持续加热，试纸上显红紫色斑点。

(3) 取本品，加无水乙醇制成每1 ml中含0.1 g的溶液。另取原儿茶酸对照品加无水乙醇制成每1 ml中含1 mg的溶液。照薄层层析法(附录38页)试验，分别吸取上述溶液各10 μl，点于同一硅胶(含羧甲基纤维素)薄层板上，以氯仿-丙酮-甲醇(7:2:1)为展开剂，展开后，晾干，置紫外光灯下观察，供试品溶液显3～5个荧光斑点；再以1%三氯化铁溶液喷雾显色后，另显现3～5个有色斑点，其中墨绿色斑点与原儿茶酸斑点的位置应相同。

【检查】 **酸度** 取本品1 g，加新沸过的冷水20 ml搅拌后，依法测定(附录42页)，pH值应为3.0～5.0。

醚溶性浸出物 取本品约0.4 g，精密称定，置分液漏斗中，加水20 ml，振摇使分散，加乙醚20 ml，振摇提取，俟分层，分取乙醚液，置称定重量的具塞烧瓶中，再用乙醚提取4次，第一次20 ml，以后每次各15 ml，醚液并入烧瓶中，置水浴上蒸至近干，加无水乙醇2 ml，蒸干，在80°干燥3小时，放冷，精密称定，即得。含醚溶性浸出物

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

不得少于50.0%。

炽灼残渣 取本品0.5 g，依法检查(附录45页)，遗留残渣不得过0.5%。

铁盐 取本品0.5 g，置坩埚中，缓缓炽灼至完全炭化，放冷，加硫酸0.5 ml使湿润，用小火加热至硫酸蒸气除尽，在500～600°炽灼使完全灰化，放冷，加盐酸1 ml与水15 ml，搅拌使溶解，移置50 ml纳氏比色管中，加水稀释至35 ml，依法检查(附录45页)，如显色，与标准铁溶液1.5 ml用同一方法制成的对照液比较，不得更深(0.003%)。

重金属 取炽灼残渣项下遗留的残渣，依法检查(附录46页)，含重金属不得过百万分之五十。

【功能与主治】 止血。用于节育后经期延长或流血量增多及月经过多症，亦可用于鼻衄、痔疮等出血。

【贮藏】 密闭保存。

【制剂】 苎麻片

苎　麻　片(血凝片)

Zhuma Pian

TABELLAE BOEHMERIAE

本品为苎麻浸膏片。

【性状】 本品为淡棕色片。

【鉴别】 取本品10片，研细，加无水乙醇10 ml，振摇使溶解，滤过，滤液照下述方法试验：

(1) 取滤液1 ml，加三氯化铁试液2滴，即显墨绿色。

(2) 取滤液3滴，照苎麻浸膏项下的鉴别法(2)项(280页)试验，显相同的反应。

(3) 取滤液5 ml，置水浴上蒸干，残渣加无水乙醇1 ml溶解后，照苎麻浸膏项下的鉴别法(3)项(280页)试验，显相同的结果。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(附录6页)。

【功能与主治】 同苎麻浸膏。

【用法与用量】 口服，一次2～4片，一日3次。

【规格】 20 mg

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【贮藏】 遮光，密闭保存。

芦　　荟

Luhui

ALOE

本品为百合科植物芦荟 Aloe vera L. var. chinensis (Haw.) Berger 或同属植物的叶汁干燥品。夏末秋初将叶自基部切断，收集流出的汁液，干燥。

【性状】 本品为不规则团块或破碎的颗粒，棕褐色或墨绿色。质松脆，易破碎，破碎面光滑，具玻璃样光泽。有特异臭气，味极苦。

以色墨绿、质脆、有光泽、气味浓者为佳。

【鉴别】 取本品 0.5 g，加水 50 ml，煮沸至几乎溶解，冷后加硅藻土 0.5 g，振摇后，滤过。取滤液 5 ml，加硼砂 0.2 g，加热溶解后，取溶液数滴加于水 10 ml 中，显绿色荧光；另取滤液 1 ml，加水 9 ml，加 5%醋酸铜溶液 1 滴、饱和氯化钠溶液 5 ml 与乙醇 1 ml，微热，显淡红色。

【检查】 **水分** 照水分测定法项下烘干法（附录15页）测定，不得过 10%。

灰分 不得过 4%（附录15页）。

水溶性浸出物 取本品细粉约 1 g，精密称定，置 100 ml 量瓶中，加水 50 ml，于 80° 振摇至尽可能完全溶解，放冷，加水稀释至刻度，振摇后，放置过夜。加入硅藻土 1 g，振摇后滤过，精密量取滤液 25 ml，置称定重量的蒸发皿中，蒸干，在 105°干燥 3 小时，称定重量。含水溶性浸出物不得少于 60%。

【炮制】 除去杂质，用时捣碎。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清肝热，通便。用于便秘，小儿疳积，惊风；外治湿癣。

【用法与用量】 1.5～4.5 g，多入丸散服；外用适量，研末敷患处。

【注意】 孕妇慎服。

【贮藏】 置阴凉干燥处，密闭保存。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

芦　　根

Lugen

RHIZOMA PHRAGMITIS

本品为禾本科植物芦苇 Phragmites communis (L.) Trin. 的新鲜或干燥根茎。全年均可采挖，除去芽、须根及膜状叶，鲜用或晒干。

【性状】 **鲜芦根**　呈长圆柱形，有的略扁，长短不一，直径 1～2 cm。表面黄白色，有光泽，外皮疏松可剥离。节呈环状，有残根及芽痕。体轻，质韧，不易折断。切断面黄白色，中空，壁厚 1～2 mm，有小孔排列成环。无臭，味甘。

干芦根　呈扁圆柱形。节处较硬，节间有纵皱纹。

均以条粗、色黄白、有光泽者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，切段或切后晒干。

【性味】 甘，寒。

【功能与主治】 清热，生津，止呕。用于胃热烦渴、呕吐，麻疹发热，肺脓疡。

【用法与用量】 15～30 g。

【贮藏】 干芦根置干燥处；鲜芦根埋于湿沙中。

苏　　木

Sumu

LIGNUM SAPPAN

本品为豆科植物苏木 Caesalpinia sappan L. 的干燥心材。多于秋季采伐，除去白色边材，干燥。

【性状】 本品呈长圆柱形或对剖半圆柱形，稍弯，有的呈疙瘩状，长 10～100 cm，直径 3～12 cm。表面黄红色至棕红色，具刀削痕和枝痕，常见纵向裂缝。横截面略具光泽，有明显的同心环（年轮），有的可见暗棕色、质松、带亮星的髓部。质坚硬。无臭，味微涩。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

以粗大、质坚、色黄红者为佳。

【鉴别】（1）取本品一小块，滴加石灰水，显深红色。

（2）本品横切面：射线宽1～2列细胞。导管类圆形，直径约至160 μm，常含黄棕色或红棕色物。木纤维多角形，壁极厚。木薄壁细胞壁厚，木化，有的含草酸钙方晶。髓部薄壁细胞不规则多角形，大小不一，壁微木化，具纹孔。

（3）取本品粉末10 g，置带塞试管中，加水50 ml，密塞，反复振摇并放置约4小时，滤过，滤液显橘红色，置紫外光灯下观察，显黄绿色荧光；取滤液加氢氧化钠试液2滴，显猩红色，置紫外光灯下观察，显蓝色荧光，再加盐酸使成酸性后，溶液变为橙色，置紫外光灯下观察，显黄绿色荧光。

【炮制】锯成长约3 cm的段，再劈成片。

【性味】甘、咸，平。

【功能与主治】行血祛瘀，消肿止痛。用于胸腹痛，经闭，产后瘀血胀痛，外伤血肿。

【用法与用量】3～9 g。

【注意】孕妇忌服。

【贮藏】置干燥处。

杠　板　归

Gangbangui

HERBA POLYGONI PERFOLIATI

本品为蓼科植物杠板归 Polygonum perfoliatum L. 的干燥地上部分。夏季花开时采割，晒干。

【性状】本品茎略呈方柱形，有棱角，多分枝，直径可达2 mm；表面紫红色或紫棕色，棱角上有倒生钩刺，节略膨大，节间长2～6 cm，断面纤维性，黄白色，有髓或中空。叶互生，有长柄，盾状着生；叶片多皱缩，展平后呈近等边三角形，灰绿色至红棕色，下表面叶脉及叶柄均有倒生钩刺；托叶鞘包于茎节上或脱落。短穗状花序顶生或生于上部叶腋，苞片圆形，花小，多萎缩或脱落。气微，茎味淡，叶味酸。

以叶多者为佳。

【炮制】除去杂质，略洗，切段，干燥。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性味】 酸，微寒。

【功能与主治】 利水消肿，清解热毒，止咳。用于肾炎水肿，上呼吸道感染，百日咳，泻痢，湿疹，疖肿，毒蛇咬伤。

【用法与用量】 15～30 g；外用适量，煎汤熏洗或取鲜品捣烂敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

杜　仲

Duzhong

CORTEX EUCOMMIAE

本品为杜仲科植物杜仲 Eucommia ulmoides Oliv. 的干燥树皮。4～6 月剥取，刮去粗皮，堆置"发汗"至内皮呈紫褐色，晒干。

【性状】 本品呈板片状或两边稍向内卷，大小不一，厚 3～7 mm。外表面淡棕色或灰褐色，有明显的皱纹或纵裂槽纹；有的树皮较薄，未去粗皮，可见明显的皮孔；内表面暗紫色，光滑。质脆，易折断，断面有细密、银白色、富弹性的橡胶丝相连。气微，味稍苦。

以皮厚、内表面色暗紫者为佳。

【鉴别】 本品粉末棕色。橡胶丝成条或扭曲成团，表面现颗粒性。石细胞甚多，大多成群，类长方形、类圆形、长条形或形状不规则，直径 20～80 μm，长约至 180 μm，壁厚，有的胞腔内含橡胶团块。木栓细胞表面观多角形，直径 15～40 μm，壁不均匀增厚，木化，有细小纹孔；侧面观长方形，壁三面增厚，一面薄，孔沟明显。

【炮制】 **杜仲** 洗净，刮去残留粗皮，切块，干燥。

盐杜仲 取杜仲块，照盐水炙法（附录19页）炒至表面焦黑色。

【性味】 甘、微辛，温。

【功能与主治】 补肝肾，强筋骨，安胎，降血压。用于肾虚腰痛，腰膝无力，胎动不安，先兆流产，高血压症。

【用法与用量】 6～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

杜　　衡

Duheng

HERBA ASARI FORBESII

本品为马兜铃科植物杜衡 Asarum forbesii Maxim. 的干燥全草。春夏间采挖，除去泥沙，晒干。

【性状】 本品根茎呈圆柱形，直径 0.2～0.3 cm；表面灰棕色或淡棕色，粗糙，有环节，节间长 1～9 mm。根细圆柱形，略弯曲，长可达 7 cm，直径 0.1～0.2 cm，表面具细纵纹；质脆，易折断，断面黄白色或类白色。基生叶 1～2 片，灰绿色，多皱缩，易碎，完整叶片展平后呈宽心形至肾状心形，长宽均为 3～8 cm；先端钝或圆，基部心形；叶柄长 7～15 cm。花 1～2 朵，腋生，多皱缩，花被钟状。气芳香，味辛辣，略有麻舌感。

以根多、香气浓者为佳。

【鉴别】 (1) 本品粉末暗绿色。分泌细胞类圆形至椭圆形，直径 20～42 μm，内含黄绿色油滴，周围 4～7 细胞作放射状排列。气孔不定式，副卫细胞 4～5 细胞。非腺毛 2～10 细胞，壁有疣状突起。花粉囊内壁细胞的壁网状增厚。花粉粒类圆形，直径约 30 μm，具 3 个萌发孔。淀粉粒单粒类圆形或半圆形，直径 3～13 μm，脐点大多不明显；复粒由 2～10 余粒组成。

(2) 取本品 10 g，切碎，通水蒸气蒸馏，取馏液约 50 ml，加乙醚 20～25 ml，振摇提取，分取醚液，自然挥干后，加 10%氢氧化钠溶液 1 ml 与新制的重氮对硝基苯胺试液数滴，即显橙红色。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性味】 辛，温；有小毒。

【功能与主治】 祛风，散寒，止痛。用于风寒头痛，关节疼痛，痰饮咳喘；外治牙痛。

【用法与用量】 1.5～3 g；外用适量。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

杨　树　花

Yangshuhua

FLOS POPULI

本品为杨柳科植物毛白杨 Populus tomentosa Carr.、加拿大杨 Populus canadensis Moench 或同属数种植物的干燥雄花序。春季花开时采集，除去杂质，晒干。

【性状】 **毛白杨**　呈长条状圆柱形，长 6～10 cm，直径 0.4～1 cm。表面棕红色或红褐色，多破碎。苞鳞片多紧抱而有光泽，鳞片边缘有细毛，单个鳞片长 0.3～1.3 cm。花序轴上残存的花盘呈深褐色；苞片卵圆形，边缘深尖裂，具长柔毛。体轻。无臭，味微苦。

加拿大杨　表面黄绿色或黄褐色。苞鳞片分离成梭形，长 0.5～2.5 cm，光滑无毛。花序轴上残存的花盘为黄棕色。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 化湿止痢。用于细菌性痢疾，急性肠炎。

【用法与用量】 50～100 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

两　面　针

Liangmianzhen

RADIX ZANTHOXYLI

本品为芸香科植物两面针 Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC. 的干燥根。全年均可采挖，洗净，切片，晒干。

【性状】 本品为不规则的块片或段，大小不一。外皮浅黄色或浅棕黄色，有散在的黄色小点，外皮脱落处呈浅褐色至褐色。切面皮部浅棕色，厚 1～4 mm，木部浅黄色，可见同心性环纹及密集的小孔。质硬。气微香，味苦而辛辣、麻舌。

以根皮厚、气味浓者为佳。

【鉴别】 取本品粗粉 5 g，加含 0.5%盐酸的乙醇 40 ml，置水浴上回流 10 分钟，趁

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

热滤过，取滤液 15 ml，加氨试液使成中性，蒸干，残渣加 5% 硫酸溶液 5 ml 使溶解，滤过。取滤液 1 ml，加碘化铋钾试液 2 滴，发生红棕色沉淀。

【性味】 辛、苦，温；有小毒。

【功能与主治】 行气止痛，活血散瘀。用于跌扑肿痛，风湿痹痛，胃痛，牙痛。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

连 钱 草

Lianqiancao

HERBA GLECHOMAE LONGITUBAE

本品为唇形科植物活血丹 Glechoma longituba (Nakai) Kupr. 的干燥地上部分。春至秋季采收，除去杂质，晒干。

【性状】 本品长 10～20 cm，疏被短柔毛。茎呈方柱形，细而扭曲；表面黄绿色或紫红色，节上有不定根；质脆，易折断，断面常中空。叶对生，叶片多皱缩，展平后呈肾形或近心形，长 1～3 cm，宽 1.5～3 cm，灰绿色或绿褐色，边缘具圆齿；叶柄纤细，长 4～7 cm。轮伞花序腋生，花冠二唇形，长达 2 cm。搓之气芳香，味微苦。

以叶多、色绿、香气浓者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，切段，干燥。

【性味】 辛、微苦，微寒。

【功能与主治】 清热解毒，利尿排石，散瘀消肿。用于尿路结石，肝胆结石，湿热黄疸，跌扑损伤。

【用法与用量】 15～30 g；外用适量，煎汤洗或取鲜品捣烂敷患处。

【贮藏】 置干燥处，防霉。

连 翘

Lianqiao

FRUCTUS FORSYTHIAE

本品为木犀科植物连翘 Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl 的干燥果实。秋季果实

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

初熟尚带绿色时采收，除去杂质，蒸熟，晒干，习称“青翘”；果实熟透时采收，晒干，除去杂质，习称“老翘”。

【性状】 本品呈长卵形至卵形，稍扁，长 1.5～2.5 cm，直径 0.5～1.3 cm。顶端锐尖，基部有小果梗或已脱落。表面有不规则的纵皱纹及多数凸起的小斑点，两面各有 1 条明显的纵沟。“青翘”多不开裂，表面绿褐色，凸起的灰白色小斑点较少；质硬；种子多数，黄绿色，细长，一侧有翅。“老翘”自顶端开裂或裂成两瓣，表面黄棕色或红棕色，内表面多为浅黄棕色，平滑，具一纵隔；质脆；种子棕色，多已脱落。气微香，味苦。

“青翘”以色较绿、不开裂者为佳；“老翘”以色较黄、瓣大、壳厚者为佳。

【鉴别】 本品果皮横切面：外果皮为 1 列表皮细胞，外壁及侧壁增厚，被角质层。中果皮外侧薄壁组织中散有维管束；中果皮内侧为多列石细胞，长条形、类圆形或长圆形，壁厚薄不一，多切向排列成镶嵌状，并延伸至纵隔壁；内果皮为 1 列薄壁细胞。

【性味】 苦，微寒。

【功能与主治】 清热解毒，散结消肿。用于热病，发热，心烦，咽喉肿痛，发斑发疹，疮疡，丹毒，淋巴结结核，尿路感染。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置干燥处。

吴　茱　萸

Wuzhuyu

FRUCTUS EUODIAE

本品为芸香科植物吴茱萸 Euodia rutaecarpa (Juss.) Benth.、石虎 Euodia rutaecarpa (Juss.) Benth. var. officinalis (Dode) Huang 或疏毛吴茱萸 Euodia rutaecarpa (Juss.) Benth. var. bodinieri (Dode) Huang 的干燥将近成熟果实。8～11 月果实尚未开裂时，剪下果枝，晒干或低温干燥，除去枝、叶、果梗等杂质。

【性状】 本品呈球形或略呈五角状扁球形，直径 2～5 mm。表面暗黄绿色至褐色，粗糙，有许多点状突起或凹下的油点。顶端有五角星状的裂隙，基部残留被有黄色茸毛的果梗。质硬而脆，横切面可见子房 5 室，每室有淡黄色种子 1～2 粒。气芳香浓郁，味辛辣而苦。

以饱满、色绿、香气浓郁者为佳。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【鉴别】 (1) 本品粉末褐色。非腺毛 2～6 细胞，长 140～350 μm，壁疣明显，有的胞腔内含棕黄色至棕红色物。腺毛头部 7～14 细胞，椭圆形，常含黄棕色内含物；柄 2～5 细胞。草酸钙簇晶较多，直径 10～25 μm；偶有方晶。石细胞类圆形或长方形，直径 35～70 μm，胞腔大。油室碎片有时可见，淡黄色。

(2) 取本品粉末 0.5 g，加 10% 醋酸溶液 10 ml，用力振摇数分钟，滤过。取滤液 2 ml，加碘化汞钾试液 1 滴，振摇后，发生黄白色沉淀；另取滤液 1 ml，缓缓加入对二甲氨基苯甲醛试液 2 ml，置水浴上加热，两液接界处生成红褐色环状带。

【炮制】 **吴茱萸** 除去杂质。

制吴茱萸 取甘草捣碎，加水适量，煎汤，去渣，加入净吴茱萸，稍润后，炒至微干，取出，晒干。

每吴茱萸 100 kg，用甘草 6.5 kg。

【性味】 辛、苦，热；有小毒。

【功能与主治】 温中散寒，疏肝止痛。用于脘腹冷痛，呃逆吞酸，呕吐，腹泻，痄痛，痛经；外治口疮。

【用法与用量】 1.5～6 g；外用适量，研末醋调敷脚心。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

岗　松

Gangsong

FOLIUM BAECKEAE

本品为桃金娘科植物岗松 Baeckea frutescens L. 带有花果的干燥叶。夏季花开时将叶及花、果捋下，阴干。

【性状】 本品叶有短柄，叶片条形或条状锥形，长 0.5～1 cm，宽 0.3～0.5 mm；黄绿色，先端急尖，基部渐狭，全缘；密生透明圆形腺点，上表面有槽，下表面隆起。花小，黄白色，具短梗。蒴果长约 1 mm。气微香，味苦、涩。

以叶色绿、气香者为佳。

【性味】 苦、涩，寒。

【功能与主治】 清利湿热，杀虫止痒。用于急性胃肠炎；外治滴虫性阴道炎，皮肤湿疹。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【用法与用量】 3～9 g；外用适量。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

岗　梅

Gangmei

RADIX ILICIS ASPRELLAE

本品为冬青科植物岗梅 Ilex asprella(Hook. et Arn.) Champ. ex Benth. 的干燥根。全年均可采挖，洗净，切片、段或劈成小块，晒干。

【性状】 本品为近圆形片、段或类长方形块，直径 1.5～5 cm。外皮浅棕褐色或浅棕红色，稍粗糙，有细纵皱纹、细根痕及皮孔。外皮薄，不易剥落，剥去外皮处显灰白色至灰黄色，可见较密的点状或短条状突起。质坚硬，不易折断，断面有微细的放射状纹理。气微，味苦而后甘。

以质坚、色白者为佳。

【鉴别】 本品横切面：木栓层为 10 余列细胞，无色。皮层窄，有石细胞群，断续排列成环，有的含草酸钙方晶。韧皮部细胞较皱缩。形成层环不明显。木质部射线宽 3～10 余列细胞，壁木化，纹孔明显，少数细胞壁略增厚，含草酸钙方晶；导管多单个散在，也有 2～3 个相聚；木纤维较发达。薄壁细胞及射线含淀粉粒和少量油滴。

【炮制】 除去杂质；未切片者，洗净，润透，切片，晒干。

【性味】 苦、微甘，凉。

【功能与主治】 清热解毒，生津，利咽，散瘀止痛。用于感冒发热口渴，咽喉肿痛，外伤瘀血肿痛。

【用法与用量】 15～30 g。

【贮藏】 置干燥处。

牡　丹　皮

Mudanpi

CORTEX MOUTAN RADICIS

本品为毛茛科植物牡丹 Paeonia suffruticosa Andr. 的干燥根皮。秋季采挖根部，除

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

去细根，剥取根皮，晒干。

【性状】 本品呈筒状或半筒状，有纵剖开的裂缝，略向内卷曲或张开，长5～20 cm，直径0.5～1.2 cm，厚0.1～0.4 cm。外表面灰褐色或黄褐色，有多数横长皮孔及细根痕，栓皮脱落处粉红色；内表面淡灰黄色或浅棕色，有明显的细纵纹，常见发亮的结晶。质硬而脆，易折断，断面较平坦，粉性，淡粉红色。气芳香，味微苦而涩。

以条粗、肉厚、断面色白、粉性足、香气浓者为佳。

【鉴别】 (1) 本品粉末淡红棕色。淀粉粒甚多，单粒类圆形或多角形，直径3～16 μm，脐点点状、裂缝状或飞鸟状；复粒由2～6粒组成。草酸钙簇晶直径9～45 μm，有时含晶细胞连接，簇晶排列成行，或一个细胞含数个簇晶。木栓细胞长方形，壁稍厚，浅红色。

(2) 取本品粗粉约0.1 g，置小试管中，加水约1 ml，管口盖一块用水湿润的滤纸，滤纸上加氯亚胺基-2，6-二氯醌1份与四硼酸钠32份的混合粉末少量，摊匀，将试管加热至微沸，滤纸即显蓝色。

【炮制】 迅速洗净，润后切片，晒干。

【性味】 苦、辛，微寒。

【功能与主治】 清血热，散瘀血。用于热病发斑、发疹、吐血、衄血，潮热，痛经，经闭，痈肿。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

牡荆叶

Mujingye

FOLIUM VITICIS NEGUNDO

本品为马鞭草科植物牡荆 Vitex negundo L. var. cannabifolia(Sieb. et Zucc.)Hand.-Mazz. 的干燥叶。夏、秋二季枝叶茂盛时采收，晒干。

【性状】 本品多皱缩、破碎，完整者为掌状五出或三出复叶，暗绿色，叶柄长2～5 cm，有细沟纹，密被灰白色或淡褐色短茸毛。小叶片展平后呈椭圆状披针形，长6～9 cm，宽2～3 cm；先端渐尖，基部楔形，边缘具粗锯齿；上表面叶脉被细毛，下表面主脉明显突起，脉上毛较密，中间3片小叶有小叶柄。气香，味微苦辛。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

以色绿、香气浓者为佳。

【鉴别】 本品横切面：上表皮细胞排列较整齐，下表皮有较多凹陷，上下表皮均有毛茸，以下表皮为多。腺鳞着生于凹陷处，头部4细胞，直径约50 μm，柄极短。小腺毛头部2～4细胞，柄1～2细胞。非腺毛1～5细胞。叶肉栅栏组织为2～4列细胞，海绵组织的细胞间隙较小；侧脉维管束上下方的薄壁细胞大多直达表皮。主脉维管束外韧型，下侧散有少数纤维，上方有时可见3个小的维管束。

【性味】 微苦、辛，平。

【功能与主治】 祛痰，止咳，平喘。用于慢性支气管炎。

【用法与用量】 15～30 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

牡 荆 油

Mujingyou

OLEUM VITICIS NEGUNDO

本品为马鞭草科植物牡荆Vitex negundo L. var. cannabifolia (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz. 的新鲜叶经蒸气蒸馏得到的挥发油。

【性状】 本品为淡黄色至深黄色的澄清液体；具特殊的香气，味微辛辣。

本品能与无水乙醇、氯仿或乙醚任意混合。

比重 本品的比重（附录26页）在25°时为0.890～0.910。

折光率 本品的折光率（附录32页）为1.490～1.500。

【鉴别】 取亚硝酸钠约0.1 g，加水1～2滴使溶解，加入本品0 .3 ml与稀硫酸0.5 ml，振摇，油层显翠绿色。

【功能与主治】 祛痰，止咳，平喘。用于慢性支气管炎。

【用法与用量】 口服，一次20～40 mg，一日3次。

【贮藏】 遮光，置阴凉处密封保存。

【制剂】 牡荆油胶丸

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

牡荆油胶丸

Mujingyou Jiaowan

CAPSULAE OLEI VITICIS NEGUNDO

本品为牡荆油与稀释剂适量制成的胶丸。含牡荆油应为标示量的85.0～115.0%。

【性状】 本品为黄棕色透明胶丸，剥开后内含黄色油质液体；有特殊的香气。

【鉴别】 (1) 取含量测定项下的挥发油，照牡荆油项下的鉴别法(293页)试验，显相同的反应。

(2) 取含量测定项下的挥发油，依法测定(附录32页)，折光率为1.490～1.500。

【检查】 **装量差异** 取本品100丸，任意取出20丸，精密称定，注意切开丸壳，取出内容物，丸壳用乙醚洗涤3～4次，置通风处，使乙醚挥散，再精密称定，算出每丸内容物的平均重量。再自剩余的80丸中，选取本品最大与最小胶丸各10丸，分别按前法测出大丸与小丸内容物的平均重量。大丸与小丸内容物的平均重量不得超过前述20丸内容物的平均重量的±15%。

其他 应符合胶囊剂项下有关的各项规定(附录12页)。

【含量测定】 取本品100丸，照挥发油测定法(附录16页)测定，所得油量按比重为0.897计算，即得。

【功能与主治】 同牡荆油。

【用法与用量】 口服，一次1～2丸，一日3次。

【规格】 20 mg

【贮藏】 遮光，置阴凉处密封保存。

牡　　蛎

Muli

CONCHA OSTREAE

本品为牡蛎科动物长牡蛎Ostrea gigas Thunb.、大连湾牡蛎Ostrea talienwhanen-

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

sis Crosse 或近江牡蛎 Ostrea rivularis Gould 的贝壳。全年均可采收，去肉，洗净，晒干。

【性状】 **长牡蛎** 呈长片状，背腹缘几平行，长 10～50 cm，宽 4～15 cm。右壳鳞片坚厚，层状或层纹状排列，壳外面平坦或具数个凹陷，淡紫色、灰白色或黄褐色，内面瓷白色，壳顶二侧无小齿。左壳凹下很深，鳞片较右壳粗大，壳顶附着面小。质硬，断面层状，洁白。无臭，味微咸。

大连湾牡蛎 呈类三角形，背腹缘呈八字形。右壳外面淡黄色，具疏松的同心鳞片，鳞片起伏成波浪状，内面白色。左壳同心鳞片坚厚，自壳顶部放射肋数个，明显，内面凹下呈盒状，铰合部小。

近江牡蛎 呈圆形、卵圆形或三角形等。右壳较小，壳外面稍不平，有灰、紫、棕、黄等色，环生同心鳞片，幼体者鳞片薄而脆，多年生长后鳞片层层相叠，内面白色，边缘有时淡紫色。左壳较右壳坚硬、厚大。

均以质坚、内面光洁、色白者为佳。

【炮制】 **牡蛎** 洗净，晒干，碾碎。

煅牡蛎 取净牡蛎，照煅法（附录19页）煅至红透。

【性味】 咸、涩，微寒。

【功能与主治】 潜阳，固涩，软坚，制酸。用于眩晕，心悸失眠，自汗，盗汗，遗精，白带，淋巴结结核，甲状腺肿大，胃酸过多。

【用法与用量】 9～30 g，先煎。

【贮藏】 置干燥处。

伸筋草

Shenjincao

HERBA LYCOPODII

本品为石松科植物石松 Lycopodium clavatum L. 的干燥全草。夏、秋二季茎叶茂盛时采收，除去杂质，晒干。

【性状】 本品匍匐茎弯曲而细长，可达 2 M，直径 1～3 mm，可见黄白色细根。茎呈二歧分枝。鳞叶皱而弯曲，密生，条状披针形或条形，长 3～5 mm，宽 0.3～0.5 mm，黄绿色至浅黄棕色，无毛，先端渐尖呈芒状，全缘。质柔韧，不易折断，断面浅黄色，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

木心类白色。无臭，味淡。

以色黄绿者为佳。

【鉴别】 本品茎横切面：表皮为1列细胞。皮层宽广，外侧及内侧各有10余列厚壁细胞，两者间为4～5列薄壁细胞，有叶迹维管束散在。内皮层明显。中柱鞘为2～3列薄壁细胞。韧皮部与木质部成不规则片状间隔排列。

【炮制】 除去杂质，洗净，切段，干燥。

【性味】 微苦、辛，温。

【功能与主治】 祛风湿，舒筋活络。用于关节酸痛，屈伸不利。

【用法与用量】 9～12 g。

【贮藏】 置干燥处。

皂　角　刺

Zaojioci

SPINA GLEDITSIAE

本品为豆科植物皂荚 Gleditsia sinensis Lam. 的干燥棘刺。全年均可采收，干燥，或趁鲜切片，干燥。

【性状】 本品为主刺及1～2次分枝的棘刺。主刺长3～15 cm或更长，直径0.3～1 cm；分枝刺长1～6 cm，由下向上逐渐细小，刺端锐尖。表面紫棕色或棕褐色。体轻，质坚硬，不易折断。切片厚0.1～0.3 cm，常带有尖细的刺端；木部黄白色，髓部疏松，淡红棕色；质脆，易折断。无臭，味淡。

以外皮色紫棕者为佳。

【炮制】 除去杂质；未切片者略泡，润透，切片，干燥。

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 托毒，溃痈。用于痈肿初起或脓成不溃；外治疮癣。

【用法与用量】 3～9 g；外用适量，醋煎涂患处。

【贮藏】 置干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

佛　　手

Foshou

FRUCTUS CITRI SARCODACTYLIS

本品为芸香科植物佛手 Citrus medica L. var. sarcodactylis Swingle 的干燥果实。秋季果实尚未变黄或变黄时采收，纵切成薄片，晒干或低温干燥。

【性状】 本品为类椭圆形或卵圆形的薄片，长 6～10 cm，宽 3～7 cm，厚 0.2～0.4 cm。顶端稍宽，常有 3～5 个手指状的裂瓣，基部略窄，有的可见果梗痕。外皮黄绿色或橙黄色，有皱纹及油点。果肉浅黄白色，有凹凸不平的筋脉点或线纹(维管束)。质硬而脆，受潮后柔韧。气香，味微甜后苦。

以片大、果肉色黄白、香气浓者为佳。

【性味】 辛、苦、酸，温。

【功能与主治】 行气，开郁，化痰。用于脘闷胁胀，恶心，痰多咳嗽。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防霉、防蛀。

佛　甲　草

Fojiacao

HERBA SEDI LINEARIS

本品为景天科植物佛甲草 Sedum lineare Thunb. 的干燥全草。夏、秋二季采收，洗净，置沸水中烫后晒干。

【性状】 本品根细小。茎弯曲，长 7～12 cm，直径约 0.1 cm；表面淡褐色至棕褐色，有明显的节，偶有残留的不定根。叶轮生，无柄；叶片皱缩卷曲，多脱落，展平后呈条形或条状披针形，长 1～2 cm，宽约 0.1 cm。聚伞花序顶生，花小，浅棕色。果实为蓇葖果。气微，味淡。

以叶多者为佳。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性味】 甘、微酸，寒。

【功能与主治】 清解热毒，消肿，止血。用于咽喉肿痛，目赤，痢疾，漆疮，带状疱疹，痈肿，丹毒，烫、火伤，外伤出血。

【用法与用量】 9～15 g，鲜品加倍；外用鲜品适量，捣烂敷患处。

【贮藏】 置通风干燥处。

余 甘 子

Yuganzi

FRUCTUS PHYLLANTHI

本品系藏族习用药材，藏文名为ཡུ་ཀ་ར(久如拉)；为大戟科植物余甘子 Phyllanthus emblica L. 的干燥成熟果实。冬季至次春果实成熟时采收，除去杂质，干燥。

【性状】 本品呈球形或扁球形，直径 1.2～2 cm。表面棕褐色至墨绿色，有浅黄色颗粒状突起，具皱纹及不明显的 6 棱，果梗长约 1 mm。果肉(中果皮)厚 1～4 mm，质硬而脆。内果皮黄白色，硬核样，3 室，表面略具 6 棱，背缝线的偏上部有数条筋脉纹(维管束)，干后可裂成 6 瓣。种子 6 粒，近三棱形，棕色。气微，味酸涩，回甜。

以个大、肉厚、回甜味浓者为佳。

【性味】 甘、酸、涩，凉。

【功能与主治】 清血热，消食健胃，生津止咳。用于血热血瘀，肝胆病，消化不良，腹痛，咳嗽，喉痛，口干。

【用法与用量】 3～9 g，多入丸散服。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

谷 精 草

Gujingcao

FLOS ERIOCAULI

本品为谷精草科植物谷精草 Eriocaulon buergerianum Koern. 的干燥带花茎的头状

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

花序。秋季采收，将花序连同花茎拔出，晒干。

【性状】 本品头状花序呈半球形，直径 4～5 mm；底部有苞片层层紧密排列，苞片淡黄绿色，有光泽，上部边缘密生白色短毛；花序顶部灰白色。用手揉碎花序，可见多数黑色花药及细小黄绿色未成熟的果实。花茎纤细，长短不一，直径不及 1 mm，淡黄绿色，有光泽，稍扭曲，有棱线数条。质柔软。无臭，味淡。

以珠(花序)大而紧、色灰白、花茎短、色淡黄者为佳。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性味】 辛、甘，平。

【功能与主治】 散风，明目，退翳。用于风热目赤，结膜炎，角膜云翳，眼干燥症，夜盲症。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

龟　　板

Guiban

PLASTRUM TESTUDINIS

本品为龟科动物乌龟 Chinemys reevesii (Gray) 的腹甲。全年均可捕捉，以秋、冬二季为多，捕捉后杀死，或用沸水烫死，剥取腹甲，除去残肉，晒干。

【性状】 本品呈板片状，近长方椭圆形，长 8～15 cm，宽 5～8 cm。外表面淡黄色，具紫褐色放射状纹理或大部呈紫褐色，可见角板 12 块；内表面黄白色，有的略带血迹或残肉，除净后可见骨板 9 块，呈锯齿状嵌接。前端钝圆或截形，后端具三角形缺刻；两侧均有呈翼状向斜上方弯曲的甲桥(墙板)，有的已除去。质坚硬，可自骨板缝处断裂。气微腥，味微咸。

以块大、无残肉者为佳。

【炮制】 **龟板** 浸泡，去净皮肉，洗净，日晒夜露至无臭气。

醋龟板 取净龟板，照烫法(附录19页)用砂子炒至表面淡黄色，取出，筛去砂子，醋淬，取出，晒干。

每龟板 100 kg，用醋 20 kg。

【性味】 咸、甘，微寒。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 滋阴潜阳，益肾健骨。用于阴虚潮热，盗汗，结核病，热病后期阴伤抽搐，腰膝酸软，崩漏，痔漏。

【用法与用量】 9～24 g。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

【制剂】 龟板胶

龟 板 胶

Guibanjiao

COLLA PLASTRI TESTUDINIS

本品为龟板经煎熬、浓缩制成的固体胶。

【制法】 取漂泡后的净龟板，分次水煎，滤过，合并滤液(或加入明矾细粉少许)，静置，滤取胶液，用文火浓缩(或加黄酒适量)至稠膏状，冷凝，切块，阴干。

【性状】 本品为长方形或方形的扁块，深褐色。质硬而脆，断面光亮，对光照视，透明。气微腥，味淡。

【检查】 应符合胶剂项下有关的各项规定(附录 5 页)。

【性味】 甘、咸，平。

【功能与主治】 滋阴，养血。用于阴虚潮热，腰膝酸软，贫血，崩漏。

【用法与用量】 3～9 g，溶化兑服。

【贮藏】 置阴凉干燥处，密闭保存。

辛 夷

Xinyi

FLOS MAGNOLIAE

本品为木兰科植物望春花 Magnolia biondii Pamp.、玉兰 Magnolia denudata Desr. 或木兰 Magnolia liliflora Desr. 的干燥花蕾。冬末春初花未开放时采收，除去枝梗，阴干。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 本品呈长卵形，似毛笔头，有的基部具短梗。花蕾长1.5～3 cm，直径1～1.5 cm。苞片2～3层，每层2片，两层苞片之间有小鳞芽。苞片外表面密被灰白色或淡黄白色茸毛，内表面棕紫色或棕褐色，无毛。剥去苞片后，可见小形萼片3片与花瓣6片，或萼片与花瓣大小相似，轮状排列，每轮3片。除去花被，内有多数棕黄色或黄绿色的雄蕊和雌蕊呈螺旋状排列。体轻，质脆。有特异的香气，味辛而稍苦。

以完整、内瓣紧密、香气浓者为佳。

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 散风寒，通鼻。用于鼻塞，头痛，鼻炎，鼻窦炎。

【用法与用量】 3～9 g；外用适量。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

羌　　活

Qianghuo

RHIZOMA SEU RADIX NOTOPTERYGII

本品为伞形科植物羌活 Notopterygium incisum Ting ex H. T. Chang 或宽叶羌活 Notopterygium forbesii Boiss. 的干燥根茎及根。按性状不同分为“蚕羌”、“条羌”等。春、秋二季采挖，除去须根及泥沙，晒干。

【性状】 **蚕羌** 为略弯曲的根茎，环节紧密形似蚕，长4～13 cm，直径0.6～2.5 cm。表面棕褐色至棕黑色，有点状根痕及棕色破碎鳞片，外皮脱落处呈棕黄色。体轻，质脆，易折断，断面不平整，有放射状裂隙，皮部棕黄色，可见黄棕色分泌腔，习称“朱砂点”，木部黄白色，髓部黄色至黄棕色。气香，味微苦而辛。环节疏生似竹节状者，习称“竹节羌”。

条羌 为根茎及根，近圆柱形或类圆锥形，长10～15 cm，直径1～3 cm。根茎部具茎基及叶鞘残基，根部具纵皱纹及皮孔。气味较淡。有的根茎粗大，呈不规则环节状，多分歧者，习称“大头羌”。

均以条粗、表面色棕褐、断面朱砂点多、香气浓者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，晒干。

【性味】 辛、苦，温。

【功能与主治】 解表散风寒，除湿止痛。用于风寒感冒，头痛，身疼，四肢酸痛。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防蛀。

沙　苑　子

Shayuanzi

SEMEN ASTRAGALI COMPLANATI

本品为豆科植物扁茎黄芪 Astragalus complanatus R. Br. 的干燥成熟种子。秋末冬初果实成熟尚未开裂时采割植株，晒干，打下种子，除去杂质，再晒干。

【性状】 本品略呈肾形而稍扁，长 2～2.5 mm，宽 1.5～2 mm，厚约 1 mm。表面绿褐色至灰褐色，边缘一侧微凹处具圆形种脐。质坚硬，除去种皮，可见淡黄色子叶 2 片，胚根弯曲，长约 1 mm。无臭，味淡，嚼之有豆腥味。

以粒饱满、色绿褐者为佳。

【炮制】 沙苑子　除去杂质，洗净，晒干。

盐沙苑子　取净沙苑子，照盐水炙法(附录19页)用盐水微炒。

【性味】 甘，温。

【功能与主治】 补肾，固精，养肝，明目。用于头晕，目昏，腰膝酸软，尿频余沥，遗精，早泄，白带。

【用法与用量】 6～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

沙　枣

Shazao

FRUCTUS ELAEAGNI ANGUSTIFOLIAE

本品为胡颓子科植物沙枣 Elaeagnus angustifolia L. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收，除去杂质，干燥。

【性状】 本品呈矩圆状椭圆形或近球形，长 1～2.5 cm，直径 0.7～1.5 cm。表面

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

黄色、黄棕色或红棕色，具光泽，被稀疏银白色鳞毛，两端各有 8 条放射状纵沟。果肉淡黄白色，疏松，微有弹性；内含长卵圆形枣核状果核，表面有 8 条灰白色至灰棕色的棱线，两端有小突尖。气微香，味甜、酸、涩。

【性味】 酸、甘，平。

【功能与主治】 健脾止泻。用于脾虚消化不良，腹泻。

【用法与用量】 15～30 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防霉、防蛀。

沙　枣　叶

Shazaoye

FOLIUM ELAEAGNI ANGUSTIFOLIAE

本品为胡颓子科植物沙枣 Elaeagnus angustifolia L. 的干燥叶。夏、秋二季采收，除去杂质，干燥。

【性状】 本品多皱缩、卷曲，展平叶片呈矩圆状椭圆形或椭圆状披针形，长 2～10 cm，宽 1～3.5 cm。先端锐或钝，基部楔形至宽楔形，全缘或微波状，上表面灰绿色，两面均有银白色鳞毛，下表面较密。叶柄长 0.5～1.2 cm，密被银白色鳞毛。质脆。气微香，味微辛、涩。

【性味】 甘、微涩，凉。

【功能与主治】 清热解毒。用于痢疾，腹泻，肠炎。

【用法与用量】 15～30 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

沙　棘

Shaji

FRUCTUS HIPPOPHAE

本品系蒙古族、藏族习用药材，蒙古文名为 ᠴᠣᠷᠣᠭᠠᠨᠠ（其察日嘎纳），藏文名为 གཟེར་བུ（达日布）；为胡颓子科植物沙棘 Hippophae rhamnoides L. 的干燥成熟果实。秋、冬

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

二季果实成熟时或果实冻硬时采收，除去杂质，干燥。

【性状】 本品呈类球形，有的数个粘连，直径5～8 mm。表面棕红色，皱缩，多具短小果梗。果肉油润，质柔软。种子1粒，卵形，长约4 mm，宽约2 mm；表面褐色，有光泽，中间有1纵沟；种皮较硬，种仁乳白色，有油性。气微，味酸、涩。

以粒大、肉厚、油润者为佳。

【鉴别】 (1) 本品用水浸泡后，取表皮和果肉，置显微镜下观察：可见多数鳞片状毛和鲜黄色油滴；果肉薄壁细胞含多数红棕色颗粒状杂色体。

(2) 取本品粉末约1 g，加乙醇10 ml，振摇10分钟，滤过。将滤液点于滤纸上，滴加1%三氯化铝的乙醇溶液，置紫外光灯下观察，显淡黄绿色荧光；再用氨溶液熏后，呈黄色荧光。

【性味】 酸、涩，温。

【功能与主治】 止咳祛痰，消食化滞，活血散瘀。用于咳嗽痰多，慢性支气管炎，胸满，消化不良，胃痛，跌扑瘀肿，经闭。

【用法与用量】 3～6 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防霉、防蛀。

沉　　香

Chenxiang

LIGNUM AQUILARIAE RESINATUM

本品为瑞香科植物白木香 Aquilaria sinensis (Lour.) Gilg 含有树脂的木材。全年均可采收，割取含树脂的木材，除去不含树脂的部分，阴干。

【性状】 本品呈不规则块片状或盔帽状，有的为小碎块。表面凹凸不平，有刀痕，偶有孔洞，可见黑褐色与黄白色相间的斑纹。孔洞及凹窝表面多呈朽木状。质较坚实，断面刺状。气芳香，味苦。

以体重、色棕黑油润、燃之有油渗出、香气浓烈者为佳。

【鉴别】 (1) 本品横切面：射线宽1～2列细胞，充满棕色树脂。导管圆多角形，直径42～128 μm，有的含棕色树脂。木纤维多角形，直径20～45 μm，壁稍厚，木化。木间韧皮部扁长椭圆状或条带状，常与射线相交，细胞壁薄，非木化，内含棕色树脂；其间散有少数纤维，有的薄壁细胞含草酸钙柱晶。

网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

(2) 取检查项下醇溶性浸出物，进行微量升华，得黄褐色油状物，香气浓郁；于油状物上加盐酸1滴与香草醛颗粒少量，再滴加乙醇1～2滴，渐显樱红色，放置后颜色加深。

【检查】 **醇(95%)溶性浸出物** 照醇溶性浸出物测定法项下的热浸法（附录16页）测定，不得少于15%。

【炮制】 除去枯废白木，劈成小块，用时捣碎或研成细粉。

【性味】 辛，微温。

【功能与主治】 降气，温中，暖肾。用于脘腹冷痛，呕吐，呃逆，肾虚气喘。

【用法与用量】 1.5～4.5 g. 可研末冲服；入煎剂宜后下。

【贮藏】 置阴凉干燥处，密闭保存。

补骨脂

Buguzhi

FRUCTUS PSORALEAE

本品为豆科植物补骨脂 Psoralea corylifolia L. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收果序，晒干，搓出果实，除去杂质。

【性状】 本品呈肾形，略扁，长3～5 mm，宽2～4 mm，厚约1.5 mm。表面黑色、黑褐色或灰褐色，具细微网状皱纹。顶端圆钝，有1小突起，凹侧近基部处有果梗痕。质硬，破开后可见子叶2片，黄白色，有油性。气香，味辛、微苦。

以粒大、饱满、色黑者为佳。

【炮制】 **补骨脂** 除去杂质。

盐补骨脂 取净补骨脂，照盐水炙法(附录19页)用盐水炒至微鼓起。

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 温补肾阳。用于腰膝冷痛，老人尿频，遗尿，黎明泄泻；外治白癜风，鸡眼。

【用法与用量】 3～9 g；外用20～30%酊剂，涂患处，或将鸡眼划破，塞入。

【贮藏】 置干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

诃　　子

Hezi

FRUCTUS CHEBULAE

本品为使君子科植物诃子 Terminalia chebula Retz. 或绒毛诃子 Terminalia chebula Retz. var. tomentella Kurt. 的干燥成熟果实。秋、冬二季果实成熟时采收，除去杂质，晒干。

【性状】 本品为长圆形或卵圆形，长 2～4 cm，直径 2～2.5 cm。表面黄棕色或暗棕色，略具光泽，有 5～6 条纵棱线及不规则的皱纹，基部有圆形果梗痕。质坚实。果肉厚 0.2～0.4 cm，黄棕色或黄褐色。果核 1 枚，长 1.5～2.5 cm，直径 1～1.5 cm，浅黄色，粗糙，坚硬。种子 1 粒，狭长纺锤形，长约 1 cm，直径 0.2～0.4 cm；种皮黄棕色，子叶 2 片，白色，相互重叠卷旋。无臭，味酸涩后甜。

以肉厚、质坚、表面色黄棕者为佳。

【鉴别】 取本品粉末 3 g，加水 30 ml，浸泡 3 小时，滤过。取滤液 2 ml，加三氯化铁试液 1 滴，发生深蓝色沉淀；另取滤液 2 ml，加明胶试液 1 滴，发生白色沉淀。

【炮制】 **诃子**　除去杂质，洗净，干燥，用时打碎。

诃子肉　取净诃子，略浸，闷润，去核，干燥。

【性味】 苦、涩，温。

【功能与主治】 涩肠，敛肺。用于久泻，久痢，脱肛，便血，白带，久咳，慢性喉炎，音哑。

【用法与用量】 2.5～4.5 g。

【贮藏】 置干燥处。

灵　芝　片

Lingzhi Pian

TABELLAE GANODERMATIS

本品为多孔菌科植物灵芝 Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fr.) Karst. 干燥担子果

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

的浸膏片。每片相当于灵芝1 g。

【制法】 取灵芝1000 g，除去杂质，洗净，加水煎煮二次，每次3小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩成稠膏状，加适量辅料，制成颗粒，压制成1000片，包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕黄色；味苦、微涩。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(附录6页)。

【功能与主治】 镇静，健胃。用于神经衰弱，失眠，食欲不振。

【用法与用量】 口服，一次3片，一日3次。

【贮藏】 密封保存。

阿　　胶

Ejiao

COLLA CORII ASINI

本品为驴皮经煎熬、浓缩制成的固体胶。

【制法】 将驴皮漂泡，去毛，切成小块，再漂泡洗净，分次水煎，滤过，合并滤液，用文火浓缩(或加适量黄酒、冰糖、豆油)至稠膏状，冷凝，切块，阴干。

【性状】 本品为长方形或方形块，黑褐色，有光泽。质硬而脆，断面光亮，碎片对光照视呈棕色半透明。气微，味微甘。

【检查】 **水分** 取本品1 g，精密称定，加水2 ml，加热溶解后，置水浴上蒸干，使厚度不超过2～3 mm，照水分测定法项下烘干法(附录15页)测定，不得过15%。

灰分 取本品1 g，依法测定(附录15页)，不得过1%。

重金属 取检查灰分项下的残渣，依法检查(附录46页第二法)，含重金属不得过百万分之三十。

砷盐 取本品2 g，加氢氧化钙1 g，混合，加水少量，搅匀，干燥后，先用小火烧灼使炭化，再在500～600°烘灼使完全灰化，放冷，加盐酸3 ml与水适量使溶解成30 ml，分取溶液10 ml，加盐酸4 ml与水14 ml，依法检查(附录47页)，含砷量不得过百万分之三。

其他 应符合胶剂项下有关的各项规定(附录5页)。

【炮制】 阿胶　捣成碎块。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

阿胶珠 取阿胶丁，照烫法(附录19页)用蛤粉炒至全部鼓起。

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 滋阴润燥，补血，止血。用于贫血，心悸，燥咳，咯血，崩漏，先兆流产，产后血虚，肌瘦无力。

【用法与用量】 3～9 g，溶化兑服，或打碎以煎好的药汁溶化后服。

【贮藏】 置阴凉干燥处，密闭保存。

阿　　魏

Awei

RESINA FERULAE

本品为伞形科植物新疆阿魏 Ferula sinkiangensis K. M. Shen 或阜康阿魏 Ferula fukanensis K. M. Shen 的树脂。春末夏初盛花期至初果期，分次由茎上部往下斜割，收集渗出的乳状树脂，阴干。

【性状】 本品为不规则的块状和脂膏状。颜色深浅不一，表面蜡黄色至棕黄色。块状者体轻、质地似蜡，断面稍有孔隙；新鲜切面颜色较浅，放置后色渐深。脂膏状者粘稠，灰白色。具强烈而持久的蒜样特异臭气，味辛辣，嚼之有灼烧感。

以块状、气味浓厚、无杂质者为佳。

【鉴别】 (1) 取本品少量，加硫酸 3～5 滴使溶解后，显红棕色，再滴加氨试液使成碱性，显蓝紫色荧光。

(2) 取本品少量，加盐酸 0.5 ml，煮沸，显粉红色，再加间苯三酚少量，颜色即消退，继续煮沸，变为紫红色。

(3) 取本品少量，涂于白瓷皿上，使成一薄层，加硝酸 1 滴，由草绿色渐变为黄褐色。

【检查】 **灰分** 不得过 7%(附录15页)。

【含量测定】 照挥发油测定法项下的方法(附录16页)测定。

本品含挥发油不得少于 10%。

【性味】 辛，微温。

【功能与主治】 消积，杀虫。用于腹部肿块，肝脾肿大，脘腹冷痛，虫积，肉积。

【用法与用量】 1～1.5 g，多入膏药外用；亦可入丸散内服。

【注意】 孕妇忌服。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【贮藏】 置阴凉干燥处，密闭保存。

陈　　皮

Chenpi

PERICARPIUM CITRI RETICULATAE

本品为芸香科植物橘 Citrus reticulata Blanco 的干燥成熟果皮。药材分为"陈皮"和"广陈皮"。冬季至次春采摘成熟果实，剥取果皮，晒干或低温干燥。

【性状】 **陈皮** 常剥成数瓣，基部相连，有的破裂分离为不规则的片状。外表面橙红色或红棕色，有细皱纹及圆形小油点，对光照视，油点略清晰。内表面浅黄白色，粗糙，有小麻点。质稍硬而脆，易折断。气香，味辛、苦。

广陈皮 常剖成整齐3瓣，基部相连。外表面棕紫色或浅红色，稍粗糙，皱缩，有多数较大的油点，对光照视，油点更加透明清晰。内表面类白色，小麻点较多。质稍柔软，不易折断。气香浓郁，味辛、甘而略苦。

均以片大、香气浓者为佳。

【鉴别】 本品横切面：外果皮为1列细小的表皮细胞，外被角质层，有气孔。中果皮薄壁组织中有大的油室1～2列，卵圆形或椭圆形；维管束细小，纵横散在；薄壁细胞含草酸钙方晶，并含橙皮甙结晶。

【炮制】 除去杂质，喷淋清水，闷润，切丝，阴干。

【性味】 苦、辛，温。

【功能与主治】 理气，燥湿，化痰。用于胸脘胀满，嗳气呕吐，咳嗽痰多。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防霉、防蛀。

附　　子

Fuzi

RADIX ACONITI PRAEPARATA

本品为毛茛科植物乌头 Aconitum carmichaeli Debx. 的子根的加工品。6月下旬至

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

8月上旬采挖，除去母根、须根及泥沙，习称“泥附子”，加工成下列品种：

（1）选择个大、均匀的泥附子，洗净，浸入食用胆巴的水溶液中，过夜，再加食盐，继续浸泡，每日取出晒晾，并逐渐延长晒晾时间，直到附子表面出现大量结晶盐粒（盐霜）、体质变硬为止，习称“盐附子”。

（2）取泥附子，按大小分别洗净，浸入食用胆巴的水溶液中数日，连同浸液煮至透心，捞出，水漂，纵切成约0.5 cm的厚片，再用水浸漂，用调色液使附片染成浓茶色，取出，蒸到出现油面、光泽后，烘至半干，再晒干或继续烘干，习称“黑顺片”。

（3）选择大小均匀的泥附子，洗净，浸入食用胆巴的水溶液中数日，连同浸液煮至透心，捞出，剥去外皮，纵切成约0.3 cm的薄片，用水浸漂，取出，蒸透，晒至半干，以硫黄熏后晒干，习称“白附片”。

【性状】 **盐附子** 呈圆锥形，长4～7 cm，直径3～5 cm。表面灰黑色，被盐霜，顶端有凹陷的芽痕，周围有瘤状突起的支根或支根痕。体重。横切面灰褐色，可见充满盐霜的小空隙及多角形环纹（形成层），环纹内侧筋脉点排列不整齐。气微，味咸而麻，刺舌。

以个大、体重、色灰黑、表面起盐霜者为佳。

黑顺片 为纵切片，上宽下窄，长1.7～5 cm，宽0.9～3 cm，厚0.2～0.5 cm。外皮黑褐色，切面暗黄色，油润具光泽，半透明状，并有纵向筋脉纹。质硬而脆，断面角质样。气微，味淡。

以片大、厚薄均匀、切面油润有光泽者为佳。

白附片 无外皮，黄白色，半透明，厚约0.3 cm，余同黑顺片。

以片大、色白、油润、半透明状者为佳。

【鉴别】 取本品粉末约1 g，加乙醇10 ml，置水浴上回流15分钟，放冷，滤过，滤液置水浴上蒸干，残渣加2%醋酸溶液1 ml，搅拌，滤过，滤液加碘化汞钾试液2滴，即发生黄白色沉淀。

【炮制】 **附片** 黑顺片、白附片直接入药。

炮附片 取附片，照烫法（附录19页）用砂子烫至体积膨胀并微变色。

淡附片 取盐附子，用清水浸漂，每日换水2～3次，至盐分漂尽，与甘草、黑豆加水共煮透心，至切开后口尝无麻辣感时，取出，除去甘草、黑豆，切片，晒干。

每盐附子100 kg，用甘草5 kg、黑豆10 kg。

【性味】 辛，大热；有毒。

【功能与主治】 回阳，温里逐寒，止痛。用于亡阳虚脱，四肢厥冷，汗出脉微，虚寒泄泻，脘腹冷痛，寒湿痹痛，阳虚水肿，心力衰竭，慢性肾炎水肿。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【用法与用量】 3～15 g，久煎，至入口无麻辣感为度。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 盐附子置阴凉干燥处，密闭保存；黑顺片及白附片置干燥处，防潮。

忍　冬　藤（金银藤）

Rendongteng

CAULIS LONICERAE

本品为忍冬科植物忍冬 Lonicera japonica Thunb. 的干燥茎枝。秋、冬二季采割，晒干。

【性状】 本品呈长圆柱形，多分枝，常缠绕成束，直径 1.5～6 mm。表面棕红色至暗棕色，有的灰绿色，光滑或被茸毛；外皮易剥落。枝上多节，节间长 6～9 cm，有残叶及叶痕。质脆，易折断，断面黄白色，中空。无臭，老枝味微苦，嫩枝味淡。

以表面色棕红、质嫩者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，闷润，切段，干燥。

【性味】 甘，寒。

【功能与主治】 清热解毒，通络。用于温病发热，关节红肿疼痛，痈肿疮疡。

【用法与用量】 9～30 g。

【贮藏】 置干燥处。

鸡　内　金

Jineijin

ENDOTHELIUM CORNEUM GIGERIAE GALLI

本品为雉科动物家鸡 Gallus gallus domesticus Briss. 的干燥沙囊内壁。剖开沙囊，剥下内壁，洗净，干燥。

【性状】 本品为不规则卷片。表面黄色、黄绿色或黄褐色，薄而半透明，具明显的条状皱纹。质脆，易碎，断面角质样，有光泽。气微腥，味微苦。

以色黄、少破碎者为佳。

【炮制】 鸡内金　洗净，干燥。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

炒鸡内金　取净鸡内金，照清炒法(附录18页)炒至鼓起。

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 健胃，消食。用于食欲不振，积滞腹胀，小儿疳积。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

鸡　矢　藤

Jishiteng

HERBA PAEDERIAE

本品为茜草科植物鸡矢藤 Paederia scandens (Lour.) Merr. 的干燥地上部分。夏、秋二季采割，阴干。

【性状】 本品茎呈扁圆柱形，直径 2～5 mm；老茎灰白色，无毛，有纵皱纹或横裂纹，嫩茎黑褐色，被柔毛；质韧，不易折断，断面纤维性，灰白色或浅绿色。叶对生，有柄；多卷缩或破碎，完整叶片展平后呈卵形或椭圆状披针形，长 5～10 cm，宽 3～6 cm；先端尖，基部圆形，全缘，两面被柔毛或仅下表面被毛，主脉明显。气特异，味甘、涩。

以叶多、气浓者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，切段，晒干。

【性味】 甘、涩，平。

【功能与主治】 除湿，消食，止痛，解毒。用于消化不良，胆绞痛，脘腹疼痛；外治湿疹，疮疡肿痛。

【用法与用量】 30～60 g；外用适量。

【贮藏】 置通风干燥处。

鸡　血　藤

Jixueteng

CAULIS SPATHOLOBI

本品为豆科植物密花豆 Spatholobus suberectus Dunn 的干燥藤茎。秋、冬二季采

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

收，除去枝叶，切片，晒干。

【性状】 本品为椭圆形、长矩圆形或不规则的斜切片，厚 0.3～1 cm。外皮灰棕色，有的可见灰白色斑，栓皮脱落处现红棕色。切面木部淡棕色或棕色，有多数小孔；树脂状分泌物红棕色至黑棕色，与木部相间排列呈 3～8 个偏心性半圆形环；髓部偏向一侧。质坚硬。气微，味涩。

以树脂状分泌物多者为佳。

【鉴别】 本品横切面：木栓层为数列细胞，含棕红色物。皮层较窄，散有石细胞群，胞腔内充满棕红色物；薄壁细胞含草酸钙方晶。维管束异型，由韧皮部与木质部相间排列成数轮。韧皮部最外侧为石细胞群与纤维束组成的厚壁细胞层；射线多被挤压；分泌细胞甚多，充满棕红色物，常数个至 10 多个切向排列成层；纤维束较多，非木化至微木化，周围细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维，含晶细胞壁木化增厚；石细胞群散在。木质部射线有时含棕红色物；导管多单个散在，类圆形，直径约至 400 μm；木纤维束亦为晶纤维；木薄壁细胞少数含棕红色物。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切碎，晒干。

【性味】 甘、涩，平。

【功能与主治】 活血，补血，通络。用于肢体麻木、瘫痪，腰膝酸痛，月经不调，贫血。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防霉、防蛀。

鸡 冠 花

Jiguanhua

FLOS CELOSIAE CRISTATAE

本品为苋科植物鸡冠花 Celosia cristata L. 的干燥花序。秋季花盛开时采收，晒干。

【性状】 本品为穗状花序，多呈鸡冠状，肥厚而扁，长 5～10 cm，宽 5～12 cm。表面紫色、红色或黄白色。顶端较宽，有皱折，下部渐窄而薄。上缘密生线状鳞片，中部以下密生多数小花，各花有膜质苞片及花被片。成熟果实盖裂，种子黑色，细小，略显肾形，表面有光泽。体轻，质柔韧。无臭，味淡。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

以朵大、色泽鲜艳者为佳。

【炮制】 除去杂质及残茎，切段。

【性味】 甘，凉。

【功能与主治】 清湿热，止血，止带。用于崩漏，白带，吐血，痢疾，痔疮出血。

【用法与用量】 6～12 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

鸡 骨 草

Jigucao

HERBA ABRI

本品为豆科植物鸡骨草 Abrus cantoniensis Hance 的干燥全株。全年均可采挖，除去泥沙，干燥。

【性状】 本品根多呈圆柱形，上粗下细，有分枝，长短不一，直径 0.5～1.5 cm；表面灰棕色，粗糙，具疣状突起；质硬。茎丛生，长 50～100 cm，直径约 0.2 cm，灰棕色至紫褐色；小枝纤细，疏被茸毛。双数羽状复叶互生，小叶矩形，长 0.8～1.2 cm，先端平截，有小突尖，下表面被伏毛。气微香，味微苦。

【鉴别】 (1) 本品粉末灰绿色。非腺毛单细胞，长 60～970 μm，直径 12～22 μm，壁较厚，表面光滑或有细小疣点。气孔平轴式。纤维束周围薄壁细胞中含草酸钙方晶，形成晶纤维。石细胞类圆形、类方形或长圆形，直径 16～40 μm，有的壁稍厚。木栓细胞黄棕色。草酸钙方晶直径 8～11 μm。有网纹、具缘纹孔及螺纹导管。

(2) 取本品粗粉约 10 g，加 70%乙醇 100 ml，置水浴中回流 30 分钟，滤过，滤液置水浴上挥尽乙醇，残渣加 1%盐酸溶液 10 ml 使溶解，滤过。取滤液 1 ml，加碘化铋钾试液 1 滴，即发生橙红色沉淀。

(3) 取鉴别(2) 项下加 1%盐酸溶液后滤出的不溶物，加 10%氢氧化钠溶液 10 ml，置水浴中回流 30 分钟，放冷，移至分液漏斗中，加乙醚 20 ml 振摇提取，分取乙醚液，蒸干，残渣加冰醋酸 1 ml 使溶解，加醋酐 19 份与硫酸 1 份的混合液 1 ml，即显黄色，渐变为污绿色。

【炮制】 除去杂质及荚果，切段。

【性味】 微苦，凉。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 清热利湿，舒肝止痛。用于急、慢性肝炎，乳腺炎。

【用法与用量】 30～60 g。

【贮藏】 置干燥处。

青　木　香

Qingmuxiang

RADIX ARISTOLOCHIAE

本品为马兜铃科植物马兜铃 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc. 的干燥根。春、秋二季采挖，除去须根及泥沙，晒干。

【性状】 本品呈圆柱形或扁圆柱形，略弯曲，长 3～15 cm，直径 0.5～1.5 cm。表面黄褐色或灰棕色，粗糙不平，有纵皱纹及须根痕。质脆，易折断，断面不平坦，皮部淡黄色，有类白色与黄棕色相间排列的放射状纹理，皮部与木部间有 1 明显的黄棕色环纹(形成层)。气香特异，味苦。

以条粗、质坚实、香气浓者为佳。

【鉴别】 本品横切面：木栓层为多列棕色细胞。皮层散有油细胞，内含黄棕色油滴。韧皮部较宽，亦有油细胞。形成层成环。木质部射线宽广，薄壁组织较发达；导管常单个散在或 3～4 个相聚，四周有管胞及木纤维。薄壁细胞含淀粉粒。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，晒干。

【性味】 辛、苦，寒。

【功能与主治】 解毒，消肿，降血压。用于痈疖，湿疹，蛇虫咬伤，高血压症。

【用法与用量】 3～9 g；外用适量，捣烂或研末涂敷患处。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

青　风　藤

Qingfengteng

CAULIS SINOMENII

本品为防己科植物青藤 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils. 及毛青藤 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils. var. cinereum Rehd. et Wils. 的干燥藤

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

茎。秋末冬初采割，扎把或切长段，晒干。

【性状】 本品呈长圆柱形，常微弯曲，长 20～70 cm 或更长，直径 0.5～2 cm。表面绿褐色至棕褐色，有的灰褐色，有细纵纹及皮孔。节部稍膨大有分枝。体轻，质硬而脆，易折断，断面不平坦，灰黄色或淡灰棕色，皮部窄，木部有放射状纹理，习称"车轮纹"，其间具多数小孔，髓部淡黄白色。气微，味苦。

以条匀、外皮色绿褐者为佳。

【炮制】 除去杂质，略泡，润透，切片，干燥。

【性味】 辛、苦，温。

【功能与主治】 祛风湿，通络，止痛。用于风湿性关节炎，关节肿大，肢体疼痛、麻木。

【用法与用量】 6～12 g，煎服或泡酒服。

【贮藏】 置干燥处。

青 叶 胆

Qingyedan

HERBA SWERTIAE MILEENSIS

本品为龙胆科植物青叶胆 Swertia mileensis T. N. He et W. L. Shi 的干燥全草。秋季花果期采收，除去泥沙，晒干。

【性状】 本品长 15～45 cm。根长圆锥形，长 2～7 cm，有的有分枝；表面黄色或棕黄色。茎方柱形，四棱具极狭的翅，直径 1～2 mm；表面黄绿色或黄棕色，下部常显红紫色，断面中空。叶对生，无柄；叶片多皱缩或有破碎，完整者展平后呈条形或狭披针形，长 1～4 cm，宽 0.2～0.7 cm。圆锥状聚伞花序，萼片 4 片，条形，黄绿色，花冠 4 深裂，黄色，裂片卵状披针形，雄蕊 4 个。蒴果狭卵形，种子多数，细小，棕褐色。气微，味苦。

以色绿、花多、味苦者为佳。

【鉴别】 取本品粉末 2 g，加甲醇 20 ml，浸泡过夜，滤过，滤液照下述方法试验：

(1) 取滤液 1 滴，点于滤纸上，烘干，加 1%三氯化铝的乙醇溶液 1 滴，待干后，置紫外光灯下观察，显蓝绿色荧光。

(2) 取滤液 2 ml，加 7%盐酸羟胺的甲醇溶液 2～3 滴，再加 10%氢氧化钾的甲醇溶液 2～3 滴，置水浴上微热，冷却后，加稀盐酸调节pH值至 3～4，滤过，滤液加 1% 三氯化

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

铁的乙醇溶液 1～2 滴，显紫色。

【炮制】 除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，晾干。

【性味】 苦、甘，寒。

【功能与主治】 清肝胆湿热。用于急性黄疸型肝炎。

【用法与用量】 15～30 g。

【注意】 虚寒者慎服。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

【制剂】 (1) 青叶胆片 (2) 青叶胆注射液

青 叶 胆 片

Qingyedan Pian

TABELLAE SWERTIAE MILEENSIS

本品为青叶胆浸膏片。每片相当于青叶胆 1.57 g。

【制法】 取青叶胆粗粉 1500 g，加水煎煮二次，第一次 4 小时，第二次 3 小时，合并煎液，滤过，滤液减压浓缩成稠膏状，加青叶胆细粉 70 g，混匀，干燥，用 50%乙醇制成颗粒，压制成 1000 片，包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕绿色；味苦。

【鉴别】 取本品 2 片，除去糖衣，研细，加甲醇 10 ml，振摇数分钟，滤过，滤液照青叶胆项下的鉴别法(316页)试验，显相同的反应。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(附录 6 页)。

【功能与主治】 同青叶胆。

【用法与用量】 口服，一次 4～5 片，一日 4 次。

【贮藏】 密封保存。

青叶胆注射液

Qingyedan Zhusheye

INJECTIO SWERTIAE MILEENSIS

本品为青叶胆乙醇提取物的灭菌水溶液。每 1 ml 相当于青叶胆 1 g。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 本品为棕色的澄明液体。

【鉴别】 取本品 10 ml，置水浴上蒸干，残渣加甲醇 10 ml 使溶解，滤过，滤液照青叶胆项下的鉴别法(316页)试验，显相同的反应。

【检查】 pH 值 应为 5.0～7.0（附录42页）。

其他 应符合注射剂项下有关的各项规定(附录 7 页)。

【功能与主治】 同青叶胆。

【用法与用量】 肌内注射，一次 2～4 ml，一日 2 次。

【规格】 2 ml

【贮藏】 遮光，密闭保存。

青　　皮

Qingpi

PERICARPIUM CITRI RETICULATAE VIRIDE

本品为芸香科植物橘 Citrus reticulata Blanco 的干燥幼果或未成熟果实的外层果皮。春末、夏、秋采摘未成熟果实或收集脱落的幼果，个小者直接晒干，习称“个青皮”；较大者将外层果皮剖成四瓣至基部，除尽内瓤，晒干，习称“四花青皮”。

【性状】 **个青皮** 呈类球形，直径 0.5～2 cm。表面灰绿色或黑绿色，微粗糙皱缩，有细密凹下的油点，顶端有稍突起的花柱基，基部有圆形果梗痕。质硬，横切面外层果皮黄白色或淡黄棕色，厚 1.5～4 mm，外缘有油点 1～2 列。气清香，味苦、辛。

以质硬、香气浓者为佳。

四花青皮 外层果皮剖成 4 裂瓣，裂瓣长椭圆形，长 2.5～5 cm，宽 1.5～2.5 cm。外表面灰绿色或黑绿色，密生多数油点，内表面类白色或黄白色。

以外皮色黑绿、内面色黄白、香气浓者为佳。

【炮制】 **青皮** 除去杂质，洗净，闷润，切片或丝，晒干。

醋青皮 取青皮片，照醋炒法(附录18页)炒至微黄色。

【性味】 苦、辛，温。

【功能与主治】 破气，散结。用于胸胁胀痛，食积腹痛，乳腺炎，疝气。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

青　果

Qingguo

FRUCTUS CANARII

本品为橄榄科植物橄榄 Canarium album Raeusch. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收，干燥。

【性状】 本品呈纺锤形，两头钝尖，长 2.5～4 cm，直径 1～1.5 cm。表面棕黄色或黑褐色，有不规则皱纹。果肉灰棕色或棕褐色，质硬。果核梭形，暗红棕色，具纵棱；破开后，内多分 3 室，各有种子 1 粒。无臭，果肉味涩，久嚼微甜。

以肉厚、味先涩后甜者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，晒干，用时打碎。

【性味】 甘、酸，平。

【功能与主治】 清热，利咽，生津。用于咽喉肿痛，口渴。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

青　葙　子

Qingxiangzi

SEMEN CELOSIAE

本品为苋科植物青葙 Celosia argentea L. 的干燥成熟种子。秋季果实成熟时采割植株或摘取果穗，晒干，收集种子，除去杂质。

【性状】 本品呈扁圆形，少数呈圆肾形，直径 1～1.5 mm。表面黑色或红黑色，光亮，中间微隆起，侧边微凹处有种脐。种皮薄而脆。无臭，无味。

以粒饱满、色黑、光亮者为佳。

【性味】 苦，微寒。

【功能与主治】 清肝，明目。用于目赤肿痛，角膜炎，角膜云翳，虹膜睫状体炎，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

眩晕。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【注意】 青光眼患者慎服。

【贮藏】 置干燥处。

青　　蒿

Qinghao

HERBA ARTEMISIAE CHINGHAO

本品为菊科植物黄花蒿 Artemisia annua L. 或青蒿 Artemisia apiacea Hance 的干燥地上部分。夏季花开前枝叶茂盛时采割，除去老茎，阴干。

【性状】 **黄花蒿** 茎呈圆柱形，上部多分枝，长 30～80 cm，直径 0.2～0.6 cm；表面黄绿色或棕黄色，具纵棱线；质略硬，易折断，断面中部有髓。叶互生，暗绿色或棕绿色，卷缩易碎，完整者展平后为三回羽状深裂，裂片及小裂片矩圆形或长椭圆形，两面被短毛。气香特异，味微苦。

青蒿 叶为二回羽状深裂，裂片矩圆状条形，二次裂片条形，两面无毛。

均以色绿、叶多、香气浓者为佳。

【炮制】 除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，晒干。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 解暑，清热。用于伤暑，疟疾，低热。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

青　　黛

Qingdai

INDIGO NATURALIS

本品为爵床科植物马蓝 Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek.、豆科植物野青树

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Indigofera suffruticosa Mill.、蓼科植物蓼蓝 Polygonum tinctorium Ait. 或十字花科植物菘蓝 Isatis tinctoria L. 的叶或茎叶，经加工制得的干燥粉末或团块。

【性状】 本品为深蓝色的粉末，体轻，易飞扬；或呈不规则多孔性的团块，用手搓捻即成细末。微有草腥气，味淡。

以色蓝、体轻能浮于水面、火烧紫红色烟雾发生时间较长者为佳。

【鉴别】 (1) 取本品少量，用微火灼烧，有紫红色的烟雾发生。

(2) 取本品少量，滴加硝酸，产生气泡并显棕红色或黄棕色。

【检查】 **水溶性色素及碱度** 取本品 0.5 g，加水 10 ml，振摇后放置片刻，水层不得显深蓝色，并应呈中性反应。

【含量测定】 取干燥的本品 1～2 g，研细，精密称定，置 150 ml 锥形瓶中，缓缓加入硫酸 10～15 ml，轻轻摇匀，或用玻璃棒搅匀，加硫酸 15 ml，在 80°水浴中磺化 1 小时，随时搅拌，冷却，将溶液缓缓移入已盛有适量水的 100 ml量瓶中，残液用水洗涤，并入量瓶中，冷却，加水至刻度，摇匀，滤过。精密吸取滤液 20 ml，置 100 ml烧杯中，加氯化钠 10～15 g，搅拌后放置 1 小时，用干燥滤纸收集盐析物，并用饱和氯化钠溶液洗涤多次，用沸水(约 300 ml)将盐析物洗涤于 800 ml 的烧杯中，加硫酸 1 ml，搅匀，趁热用 $N/50$ 高锰酸钾液滴定，至溶液变为黄色，即得（每 1 ml 的 $N/50$ 高锰酸钾液相当于 1.47 mg 的 $C_{16}H_{10}O_2N_2$）。

本品含靛蓝（$C_{16}H_{10}O_2N_2$）不得少于 2%。

【性味】 咸，寒。

【功能与主治】 清热解毒，凉血。用于温病发热，发斑发疹，咯血，腮腺炎，口疮，湿疹，黄水疮，丹毒。

【用法与用量】 1.5～3 g；外用适量，涂敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

青　礞　石

Qingmengshi

LAPIS CHLORITI

本品为绿泥石片岩的岩石。采挖后，除去杂石及泥沙。

【性状】 本品呈不规则的扁斜块状，或斜棱状的小碎块，大小不一。黑绿色或灰绿

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

色，微带珍珠样光泽。体重，质软，用指甲即可划下碎粉末，断面呈层片状，可见闪闪发光的星点。无臭，味淡。

以色黑绿、块整齐、破开面有星点者为佳。

【炮制】 **煅青礞石** 取净青礞石，加等量的火硝混和，照煅法（附录19页）煅至烟尽，水飞成极细粉；或将青礞石煅至红透，除去沙石。

【性味】 甘、咸，平。

【功能与主治】 逐痰，平肝。用于痰涎壅塞喘急，癫痫，精神狂躁。

【用法与用量】 3～6 g，多入丸散服。

【贮藏】 置干燥处。

玫　瑰　花

Meiguihua

FLOS ROSAE RUGOSAE

本品为蔷薇科植物玫瑰 Rosa rugosa Thunb. 的干燥花蕾。春末夏初花将要开放时分批采摘，及时低温干燥。

【性状】 本品略呈半球形或不规则团状，直径 1～2.5 cm。花托半球形，与花萼基部合生。萼片 5 片，披针形，黄绿色或棕绿色，被有细柔毛。花瓣宽卵形，多皱缩，紫红色，有的黄棕色。雄蕊多数，黄褐色，着生于花托周围。体轻，质脆。气芳香浓郁，味微苦涩。

以朵大、完整、色紫红、不露芯、香气浓者为佳。

【鉴别】 本品萼片表面观：非腺毛较密，单细胞，多弯曲，长 136～680 μm，壁厚，木化。腺毛头部多细胞，扁球形，直径 64～180 μm，柄部多列性，长 50～340 μm，基部有时可见单细胞分枝。草酸钙簇晶直径 9～25 μm。

【性味】 甘、微苦，温。

【功能与主治】 理气，解郁，和血。用于脘胁胀痛，月经不调。

【用法与用量】 1.5～3 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，密闭保存，防潮。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

苦　木

Kumu

RAMULUS ET FOLIUM PICRASMAE

本品为苦木科植物苦木 Picrasma quassioides (D. Don) Benn. 的干燥枝及叶。夏、秋二季采收，干燥。

【性状】 本品枝呈圆柱形，长短不一，直径 0.5～2 cm；表面灰绿色或棕绿色，有细密的纵纹及多数点状皮孔；质脆，易折断，断面不平整，淡黄色，嫩枝色较浅且髓部较大。叶为单数羽状复叶，易脱落；小叶卵状长椭圆形或卵状披针形，近无柄，长 4～16 cm，宽 1.5～6 cm；先端锐尖，基部偏斜或稍圆，边缘具钝齿；两面通常绿色，有的下表面淡紫红色，沿中脉有柔毛。气微，味极苦。

【炮制】 除去杂质。枝洗净，润透，切片，晒干；叶喷淋清水，稍润，切丝，晒干。

【性味】 苦，寒；有小毒。

【功能与主治】 抗菌消炎，祛湿解毒。用于感冒，急性扁桃体炎，咽喉炎，肠炎，细菌性痢疾，湿疹，疮疖，毒蛇咬伤。

【用法与用量】 枝 3～4.5 g；叶 1～3 g。外用适量。

【贮藏】 置干燥处。

苦　地　丁

Kudiding

HERBA CORYDALIS BUNGEANAE

本品为罂粟科植物紫堇 Corydalis bungeana Turcz. 的干燥全草。夏、秋二季花果期采收，除去杂质，晒干。

【性状】 本品多皱缩成团状，长 10～25 cm。茎多分枝，纤细有纵棱。叶卷曲或破碎；基生叶成丛，茎生叶互生，有长柄；完整叶片三至四回羽状全裂，最终裂片展平后

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

呈狭卵形至条状披针形，灰绿色。花有距，淡棕黄色，花瓣带紫色。蒴果扁长圆形，呈荚果状。种子近肾形，黑色，有光泽。气微，味苦。

以带花果、色绿、味苦者为佳。

【炮制】 除去杂质，切段，干燥。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清热解毒。用于痈肿疔疮，风热感冒，支气管炎，肝炎，肠炎。

【用法与用量】 9～15 g；外用适量，煎汤洗患处。

【贮藏】 置干燥处。

苦　杏　仁

Kuxingren

SEMEN ARMENIACAE AMARUM

本品为蔷薇科植物山杏 Prunus armeniaca L. var. ansu Maxim.、西伯利亚杏 Prunus sibirica L.、东北杏 Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne 或杏 Prunus armeniaca L. 味苦的干燥成熟种子。夏季采收成熟果实，除去果肉及核壳，取出种子，晒干。

【性状】 本品呈扁心形，长 1～1.9 cm，宽 0.8～1.5 cm，厚 0.5～0.8 cm。表面黄棕色至深棕色，一端尖，另端钝圆，肥厚，左右不对称。尖端一侧有短线形种脐，圆端合点处向上具多数深棕色的脉纹。种皮薄，除去种皮，可见乳白色子叶 2 片，富油性。无臭，味苦。

以粒饱满、完整者为佳。

【鉴别】 (1) 取本品数粒，加水共研，发生苯甲醛的特殊香气。

(2) 取本品数粒，捣碎，即取约 0.1 g，置试管中，加水数滴使湿润，试管中悬挂一条用碳酸钠试液湿润过的三硝基苯酚试纸，用软木塞塞紧，置 40～50°的水浴中，10 分钟内，试纸显砖红色。

【含量测定】 取本品，置乳钵中捣碎成粗粉，取出约 15 g，精密称定，置凯氏烧瓶中，加水 150 ml，立即密塞，静置 2 小时，附冷凝管，通水蒸气蒸馏，馏出液导入水 10 ml 与氨试液 2 ml 的吸收液中，接收瓶置冰浴中冷却，至馏出液无氢氰酸反应（取馏出液 2 ml，加氢氧化钠试液使成弱碱性，加三硝基苯酚试液数滴，溶液应不显红色），

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

停止蒸馏，馏出液中加碘化钾试液 2 ml，用 $N/10$ 硝酸银液缓缓滴定，至溶液显出的黄白色浑浊不消失，即得（每 1 ml 的 $N/10$ 硝酸银液相当于 91.48 mg 的 $C_{20}H_{27}O_{11}N$）。

本品含苦杏仁甙（$C_{20}H_{27}O_{11}N$）不得少于 3.0%。

【炮制】 除去杂质，用时捣碎。

【性味】 苦，温；有小毒。

【功能与主治】 止咳，平喘，润肠。用于咳嗽，气喘，便秘。

【用法与用量】 4.5～9 g，宜后下。

【注意】 服用勿过量，婴儿慎用。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防蛀。

苦　豆　草

Kudoucao

HERBA SOPHORAE ALOPECUROIDIS

本品为豆科植物苦豆子 Sophora alopecuroides L. 的干燥地上部分。夏季花开时采割，除去杂质，晒干。

【性状】 本品茎呈圆柱形，上部分枝，长 15～80 cm，密被白色柔毛；质硬，折断面皮部黄绿色，髓部类白色。叶互生，单数羽状复叶，长 6～15 cm，有小叶 15～25 片；小叶片多脱落或破碎，完整者椭圆状矩形，长 1～2 cm，灰绿色，两面有白色柔毛，稍革质。总状花序顶生，花冠蝶形，黄白色。气微，味苦。

以叶色灰绿、花叶多者为佳。

【鉴别】 取本品粗粉 5 g，加含 0.5%硫酸的乙醇 50 ml，置水浴上回流 10 分钟，趁热滤过。取滤液 15 ml，加氨试液使成中性，置水浴上蒸干，加 5%硫酸溶液 3 ml 使溶解，滤过。取滤液 1 ml，加碘化汞钾试液 1～2 滴，即发生白色沉淀。

【炮制】 除去杂质，喷淋清水，润透，切段，晒干。

【性味】 苦，寒；有毒。

【功能与主治】 清肠，燥湿。用于急性菌痢，肠炎。

【用法与用量】 3～5 g。

【注意】 本品种子毒性较大，不得混用。

【贮藏】 置干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【制剂】 苦豆草片

苦豆草片

Kudoucao Pian

TABELLAE SOPHORAE ALOPECUROIDIS

本品为苦豆草的浸膏片。每片相当于苦豆草 1 g。

【制法】 取苦豆草粗粉 1000 g，照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法（附录11页），用0.5%硫酸溶液作溶剂，浸渍 24 小时后进行渗漉，收集漉液，浓缩成稠膏状，加 4 倍量乙醇，搅拌，静置，滤过，滤液浓缩成稠膏状，加适量辅料，制成颗粒，压制成 1000 片，包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显褐色；味苦。

【鉴别】 取本品 1 片，除去糖衣，研细，加水 10 ml 使溶解，滤过。取滤液 1 ml，加硅钨酸试液 1～2 滴，发生白色沉淀；另取滤液 1 ml，加碘化铋钾试液 1～2 滴，发生橙黄色沉淀。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(附录 6 页)。

【功能与主治】 同苦豆草。

【用法与用量】 口服，一次 3～5 片，一日 3～4 次。

【贮藏】 密封保存。

苦　　参

Kushen

RADIX SOPHORAE FLAVESCENTIS

本品为豆科植物苦参 Sophora flavescens Ait. 的干燥根。春、秋二季采挖，除去根头及小支根，洗净，干燥，或趁鲜切片，干燥。

【性状】 本品呈长圆柱形，下部常有分枝，长 10～30 cm，直径 1～2 cm。表面灰棕色或棕黄色，具纵皱纹及横长皮孔。外皮薄，多破裂反卷，易剥落，剥落处显黄色，光

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

滑。质硬，不易折断，断面纤维性。切片厚3～6 mm；切面黄白色，具放射状纹理及裂隙，有的可见同心性环纹。气微，味极苦。

以条匀，断面色黄白者为佳。

【鉴别】（1）取本品横切片，加氢氧化钠试液数滴，栓皮部即呈橙红色，渐变为血红色，久置不消失。木质部不呈现颜色反应。

（2）取本品粗粉1 g，加含0.5%盐酸的乙醇20 ml，置水浴上回流1小时，滤过，滤液加氨试液使成中性，置水浴上蒸干，残渣加1%盐酸溶液10 ml使溶解，滤过。取滤液分置三支试管中，一管加碘化铋钾试液，发生红棕色沉淀；一管加碘化汞钾试液，发生黄白色沉淀；另一管加碘化钾碘试液，发生棕褐色沉淀。

【炮制】除去残留根头，大小分开，洗净，浸泡约六成透时，润透，切片，干燥。

【性味】苦，寒。

【功能与主治】清热，燥湿，杀虫。用于痢疾，黄疸，皮肤瘙痒，疮疡；外治滴虫性阴道炎，外阴瘙痒。

【用法与用量】4.5～9 g；外用适量，煎汤洗患处。

【注意】不宜与藜芦同用。

【贮藏】置干燥处。

苦　楝　皮

Kulianpi

CORTEX MELIAE

本品为楝科植物川楝 Melia toosendan Sieb. et Zucc. 或楝 Melia azedarach L. 的干燥树皮及根皮。春、秋二季剥取，晒干，或除去粗皮，晒干。

【性状】本品呈不规则板片状、槽状或半卷筒状，长宽不一，厚2～6 mm。外表面灰棕色或灰褐色，粗糙，有交织的纵皱纹及点状灰棕色皮孔，除去粗皮者淡黄色。内表面类白色或淡黄色。质韧，不易折断，断面纤维性，呈层片状，易剥离。无臭，味苦。

【鉴别】（1）任取本品一段，用手折迭揉搓，可分为多层薄片，层层黄白相间，每层薄片有极细的网纹。

（2）取本品粉末约1 g，加乙醚10 ml，浸渍2小时，并时时振摇，滤过。取滤液1

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

ml，挥干后，滴加对二甲氨基苯甲醛试液数滴，显红色；另取滤液 1 ml，置试管中，挥干后，加醋酐 1 ml，搅拌，沿管壁加硫酸数滴，醋酐层显绿色，硫酸层显红色至紫红色。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切丝，干燥。

【性味】 苦，寒；有小毒。

【功能与主治】 驱虫。用于蛔虫病；外治疮癣瘙痒。

【用法与用量】 4.5～9 g，1～2 次分服；外用适量，研末，用猪脂调敷患处。

【注意】 肝炎、肾炎患者慎服。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮。

苘　麻　子（冬葵子）

Qingmazi

SEMEN ABUTILI

本品为锦葵科植物苘麻 Abutilon theophrastii Medic. 的干燥成熟种子。秋季采收成熟果实，晒干，打下种子，除去杂质。

【性状】 本品呈三角状肾形，长 3.5～6 mm，宽 2.5～4.5 mm，厚 1～2 mm。表面灰黑色或暗褐色，有白色稀疏绒毛，凹陷处有类椭圆状种脐，淡棕色，四周有放射状细纹。种皮坚硬，子叶 2 片，重叠折曲，富油性。气微，味淡。

以饱满、色灰黑者为佳。

【鉴别】 本品粉末黄白色。种皮栅状细胞 1 列，壁甚厚，下半部微木化。种皮表皮细胞多角形，壁薄；有非腺毛，其残基似石细胞。非腺毛单细胞，长 43～239 μm，壁厚，微木化。色素细胞类多角形，壁稍厚，胞腔含黄棕色至红棕色物。胚乳细胞壁略连珠状增厚。子叶细胞含脂肪油滴及糊粉粒；并含少数草酸钙簇晶。

【性味】 苦，平。

【功能与主治】 清湿热，解毒，退翳。用于痢疾，痈肿，目翳，小便涩痛。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

茅　莓

Maomei

HERBA RUBI PARVIFOLII

本品为蔷薇科植物茅莓 Rubus parvifolius L. 的干燥地上部分。春、夏二季花开时采割，除去杂质，晒干。

【性状】 本品茎呈细长圆柱形，直径 1～4 mm；表面红棕色或暗绿色，散生短刺；质脆，易折断，断面黄白色，中部有髓。叶多卷缩、破碎，完整者为单数羽状复叶，小叶 3 或 5 片，展平后呈宽卵形或椭圆形，上表面黄绿色，下表面灰白色，密被茸毛。聚伞状圆锥花序顶生或生于上部叶腋，小花棕黄色，花瓣 5 片。气微，味微苦涩。

以叶多、色绿者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，稍润，切段，晒干。

【性味】 苦、涩，微寒。

【功能与主治】 活血消肿，清解热毒，祛风湿。用于跌扑损伤，风湿痹痛，疮疡肿毒。

【用法与用量】 15～30 g；外用鲜品适量，捣烂敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

茅　莓　根

Maomeigen

RADIX RUBI PARVIFOLII

本品为蔷薇科植物茅莓 Rubus parvifolius L. 的干燥根。冬季至次春采挖。除去须根及泥沙，晒干。

【性状】 本品呈圆柱形，多扭曲，长 10～30 cm，直径 0.3～1.2 cm。根头粗大，有残留茎基或茎痕，表面灰棕色或棕褐色，有纵皱纹。质硬，断面淡黄棕色，可见放射状纹理。气微，味微苦涩。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

以条粗长、色灰棕者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，晒干。

【性味】 苦、涩，微寒。

【功能与主治】 活血消肿，祛风利湿。用于跌扑损伤，痈肿，风湿痹痛。

【用法与用量】 30～60 g。

【贮藏】 置干燥处。

枇 杷 叶

Pipaye

FOLIUM ERIOBOTRYAE

本品为蔷薇科植物枇杷 Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 的干燥叶。全年均可采摘，晒至七、八成干时，扎成小把，再晒干。

【性状】 本品呈长圆形或倒卵形，长 12～30 cm，宽 4～9 cm。先端尖，基部楔形，边缘有疏锯齿，近基部全缘。上表面灰绿色、黄棕色或红棕色，有光泽，下表面密被黄色绒毛，主脉于下表面显著突起，侧脉羽状。叶柄极短，被棕黄色绒毛。革质而脆，易折断。无臭，味微苦。

以完整、色灰绿者为佳。

【鉴别】 本品横切面：上表皮细胞扁方形，外被厚的角质层；下表皮有多数单细胞非腺毛，常弯曲，近主脉处多弯成人字形；气孔可见。栅栏组织为 3～4 列细胞，海绵组织疏松，均含草酸钙方晶及簇晶。主脉维管束外韧型，近环状；中柱鞘纤维束排列成不连续的环，壁木化，其周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维；薄壁组织中散有粘液细胞，并有草酸钙方晶。

【炮制】 **枇杷叶** 除去绒毛，用水喷润，切丝，干燥。

蜜枇杷叶 取枇杷叶丝，照蜜炙法(附录 19 页)用蜜水炒至放凉后不粘手。

每枇杷叶丝 100 kg，用炼蜜 20 kg。

【性味】 苦，平。

【功能与主治】 清肺止咳，和胃降气。用于肺热咳嗽，胃热呕逆。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【制剂】 枇杷叶膏

枇 杷 叶 膏

Pipaye Gao

EXTRACTUM FOLII ERIOBOTRYAE INSPISSATUM

本品为枇杷叶制成的煎膏。

【制法】 取枇杷叶，加水煎煮三次，合并煎液，滤过，滤液浓缩成比重1.21～1.25(80～85°热测)的清膏。每 100 g 清膏加炼蜜 200 g 或蔗糖 200 g，加热溶化，混匀，浓缩至规定的比重，即得。

【性状】 本品为黑褐色稠厚的半流体；味甜、微涩。

比重 取本品 10 g，加水 20 ml 稀释后，依法测定(附录 26 页)，比重为 1.10～1.12。

【检查】 应符合煎膏剂项下有关的各项规定(附录 4 页)。

【功能与主治】 清肺，止咳，化痰。用于肺热咳嗽，痰少咽干。

【用法与用量】 口服，一次 9～15 g，一日 2 次。

【贮藏】 密闭，防热。

板 栗 壳

Banlike

INVOLUCRUM CASTANEAE

本品为壳斗科植物板栗 Castanea mollissima Bl. 的干燥总苞。秋季采收成熟果实时剥取刺壳，晒干。

【性状】 本品呈刺球形，略扁，连刺直径 4～8 cm，高 3～4 cm，多纵向裂开成 2～4 瓣。外表面黄棕色或棕色，密布自基部分枝成束的鹿角状利刺，刺长 1～1.5 cm；外表面及刺上密被灰白色至灰绿色柔毛，多有粗壮果梗。内表面密被紧贴的黄棕色有丝光的长绒毛，基底有 2～3 个坚果脱落后的疤痕。质坚硬，断面颗粒状，暗棕褐色。气微，味

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

微涩。

以个大、质坚、色黄棕者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，晒干。

【性味】 甘、涩，平。

【功能与主治】 止咳，化痰，消炎。用于慢性支气管炎，咳嗽痰多，百日咳，淋巴结炎，腮腺炎。

【用法与用量】 30～60 g。

【贮藏】 置干燥处。

板　蓝　根

Banlangen

RADIX ISATIDIS

本品为十字花科植物菘蓝 Isatis tinctoria L. 的干燥根。秋季采挖，除去泥沙，晒干。

【性状】 本品呈圆柱形，稍扭曲，长 10～20 cm，直径 0.5～1 cm。根头部略膨大，可见暗绿色或暗棕色轮状排列的叶柄残基和密集的疣状突起；表面淡灰黄色或淡棕黄色，有纵皱纹及横生皮孔，并有支根或支根痕。体实，质略软，断面皮部黄白色，木部黄色。气微，味微甜后苦涩。

以条长、粗大、体实者为佳。

【鉴别】 (1) 本品横切面：木栓层为数列细胞。皮层狭。韧皮部宽广，射线明显。形成层成环。木质部导管黄色，类圆形，直径约至 80 μm；有木纤维束。薄壁细胞含淀粉粒。

(2) 取本品水煎液，置紫外光灯下观察，显蓝色荧光。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清热，解毒，凉血。用于温病发热、发斑，风热感冒，咽喉肿烂，流行性乙型脑炎，肝炎，腮腺炎。

【用法与用量】 6～12 g。

【贮藏】 置干燥处，防霉、防蛀。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

松　节　油

Songjieyou

OLEUM TEREBINTHINAE

本品为松科植物松属若干植物中渗出的油树脂经蒸馏或提取得到的挥发油。

【性状】 本品为无色至微黄色的澄清液体；臭特异；久贮或暴露空气中，臭渐增强，色渐变黄；本品易燃，燃烧时发生浓烟。

本品在乙醇中易溶，与氯仿、乙醚或冰醋酸能任意混合，在水中不溶。

比重 本品的比重（附录 26 页）在 25°时为 0.852～0.870。

沸程 取本品，照沸程测定法（附录27页）测定，在 154～165° 馏出的数量不得少于 90.0%（ml/ml）。

折光率 本品的折光率（附录32页）为 1.466～1.477。

【检查】 **乙醇中不溶物** 取本品 1 ml，加 90% 乙醇 7 ml，振摇使溶解，溶液应澄清。

【功能与主治】 皮肤刺激药。用于肌肉痛或关节痛等。

【贮藏】 遮光，密封，置阴凉处保存。

松　花　粉

Songhuafen

POLLEN PINI

本品为松科植物马尾松 Pinus massoniana Lamb.、油松 Pinus tabulaeformis Carr. 或同属数种植物的干燥花粉。春季花刚开时，采摘花穗，晒干，收集花粉，除去杂质。

【性状】 本品为淡黄色的细粉。体轻，易飞扬，手捻有滑润感。气微，味淡。

以体轻、色淡黄者为佳。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：花粉粒椭圆形，长 45～55 μm，直径 29～40 μm，表面光滑，两侧各有 1 膨大的气囊，气囊壁有明显的网状纹理，网眼多角形。

【性味】 甘，温。

【功能与主治】 燥湿收敛。用于黄水疮，皮肤湿疹、糜烂，婴儿尿布性皮炎。

【用法与用量】 外用适量，撒敷患处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【贮藏】 置干燥处，防潮。

松　　塔

Songta

STROBILUS PINI

本品为松科植物白皮松 Pinus bungeana Zucc. 或油松 Pinus tabulaeformis Carr. 的干燥成熟果实。秋季采收，晒至种鳞开裂，除去种子，阴干。

【性状】 本品呈类球形，由木质化螺旋状排列的种鳞组成，直径 4～6 cm。表面黄绿色至棕褐色，基部有果柄或果柄痕。种鳞背面先端宽厚隆起，为菱形有横脊的鳞盾，鳞脐生于鳞盾的中央，有的具刺尖；腹面偶有倒卵圆形的种子及种翅残存。质硬，不易折断。有松脂的特殊气，味微苦涩。

以果鳞肥厚、色黄绿、松脂气浓者为佳。

【炮制】 除去杂质，打碎。

【性味】 微苦、涩，温。

【功能与主治】 祛痰，止咳，平喘。用于慢性支气管炎。


【用法与用量】 60～90 g，饭后服用。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

松　　醇（咳宁醇）

Songchun

PINITOLUM



[$C_7H_{14}O_6$=194.18]

本品按干燥品计算，含 $C_7H_{14}O_6$ 不得少于 98.0%。

【性状】 本品为白色粉末；无臭，味甜。本品在水中易溶，在甲醇中极微溶解。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

熔点 本品的熔点(附录28页)为185～188°。

比旋度 取本品，精密称定，加水制成每1 ml中含10 mg的溶液，依法测定(附录31页)，按干燥品计算，比旋度为+63°至+66°。

【鉴别】 (1) 取本品约0.1 g，置试管中，加冰醋酸与氢碘酸各1 ml及沸石1小块，管口用醋酸铅布卷[取醋酸铅1 g，加水10 ml溶解后，加*N*/1硫代硫酸钠液60 ml与甘油1 ml，再加水至100 ml。将纱布(长45 cm、宽2 cm)浸泡于醋酸铅溶液约5 ml中，取出，晾干]塞紧，布卷上放一块与管口同样大小的硝酸汞试纸(取饱和的硝酸汞溶液5 ml，加硝酸2滴，摇匀，将滤纸浸泡在此溶液中，取出，干燥)，然后将试管置盛有石蜡的烧杯中，煮沸片刻，试纸显橘红色。

(2) 取本品约30 mg，加水1～2滴溶解后，加5%高碘酸溶液2～3滴与*N*/1硫酸液1滴，摇匀，放置5分钟，再加亚硫酸饱和溶液使溶液成无色，然后加入二硝基苯肼试液1～2滴，摇匀，即发生橙黄色沉淀。

【检查】 **氯化物** 取本品0.5 g，依法检查(附录44页)，如发生浑浊，与标准氯化钠溶液10 ml制成的对照液比较，不得更浓(0.02%)。

重金属 取本品0.5 g，加水23 ml溶解后，加稀醋酸2 ml，依法检查(附录46页第一法)，含重金属不得过百万分之二十。

干燥失重 取本品，在105°干燥至恒重，减失重量不得过0.5%(附录44页)。

【含量测定】 取本品约1 g，精密称定，置烧瓶中，加无水醋酸钠1 g与醋酸15 ml，置油浴(浴温150～160°)中回流45分钟，放冷，倾入冷水中，用氯仿提取6次(30、25、20、15、10、10 ml)，合并氯仿液，用5%碳酸钠溶液10 ml洗涤一次，再用水10 ml洗一次，将氯仿液移置105°恒重的锥形瓶中，蒸去氯仿，在105°干燥至恒重，精密称定，与0.4801相乘，即得供试量中含有$C_7H_{14}O_6$的重量。

【功能与主治】 镇咳，消痰。用于慢性支气管炎。

【用法与用量】 口服，一次0.06～0.18 g，一日3次，十天为一疗程。

【贮藏】 密封保存。

枫　香　脂(白云香)

Fengxiangzhi

RESINA LIQUIDAMBARIS

本品为金缕梅科植物枫香树 Liquidambar formosana Hance 的干燥树脂。7、8月

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

间割裂树干，使树脂流出，10月至次年4月采收，阴干。

【性状】 本品呈不规则块状，淡黄色至黄棕色，半透明或不透明。质脆，破碎面具光泽。气香，味淡。

以色黄亮、质脆、无杂质者为佳。

【鉴别】 (1) 取本品，燃烧，有多烟火焰，具特异香气。

(2) 取本品约50 mg，置试管中，加四氯化碳5 ml，振摇使溶解，沿管壁加硫酸2 ml，两液接界处显红色环。

(3) 取本品约0.2 g，加四氯化碳5 ml，振摇使成混悬液，加硝酸3 ml，轻轻摇匀，待分层，上层液显淡红色至红橙色。

【性味】 辛、微苦，平。

【功能与主治】 活血，生肌，止痛，解毒。用于跌扑损伤，牙痛，痈疽。

【用法与用量】 1.5～3 g，多入丸散用；外用适量，研末涂敷或水煎洗患处。

【贮藏】 置阴凉处，密闭保存。

刺　五　加

Ciwujia

RADIX ACANTHOPANACIS SENTICOSI

本品为五加科植物刺五加 Acanthopanax senticosus (Rupr. et Maxim.) Harms 的干燥根及根茎。春、秋二季采挖，洗净，干燥。

【性状】 本品根茎呈结节状不规则圆柱形，直径1.4～4.2 cm。根呈圆柱形，多扭曲不直，长3.5～12 cm，直径0.3～1.5 cm；表面灰褐色或黑褐色，粗糙，有细纵沟及皱纹，皮较薄，有的剥落，剥落处呈灰黄色。质硬，断面黄白色，纤维性。有特异香气，味微辛，稍苦、涩。

以香气浓者为佳。

【鉴别】 本品根的横切面：木栓层为数十列细胞。皮层菲薄，散有分泌道；薄壁细胞大多含草酸钙簇晶，直径11～64 μm。韧皮部外侧散有较多纤维束，向内渐稀少；分泌道类圆形或椭圆形，径向25～51 μm，切向48～97 μm；薄壁细胞含簇晶。形成层成环。木质部占大部分，射线宽1～3列细胞；导管壁较薄，大多数个相聚；木纤维发达。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

根茎的横切面：韧皮部纤维束较根为多；有髓部。

【性味】 辛、微苦，温。

【功能与主治】 益气健脾，补肾安神。用于脾肾阳虚，腰膝酸软，体虚乏力，失眠，多梦，食欲不振。

【用法与用量】 9～27 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮。

【制剂】 刺五加浸膏

刺五加浸膏

Ciwujia Jingao

EXTRACTUM ACANTHOPANACIS SENTICOSI

【处方】 刺五加（粗粉） 1000 g

乙醇（75%） 适量

【制法】 取刺五加，置连续回流提取器中，加7倍量的75%乙醇，加热连续回流提取，至取提取液1 ml，加10% α-萘酚的乙醇溶液不显反应为止。提取液浓缩成浸膏50 g，即得。

【性状】 本品为黑褐色的稠膏状物；味略苦涩。

【鉴别】 取本品0.5 g，置水浴上蒸干，加甲醇20 ml，振摇10分钟，滤过。取滤液1 ml，加10% α-萘酚的乙醇溶液1～2滴，摇匀，沿管壁加硫酸1 ml，显紫红色环；另取滤液1 ml，加3%碳酸钠溶液1 ml与新制的重氮对硝基苯胺试液1～2滴，即显红色。

【检查】 **干燥失重** 取本品0.5 g，在105°干燥至恒重，减失重量不得过20%（附录44页）。

甲醇浸出物 精密称取本品5 g，加甲醇100 ml，置水浴上回流1小时，放置2小时，滤过。取滤液20 ml，置水浴上蒸干，在105°干燥至恒重，含甲醇浸出物不得少于60%。

【功能与主治】 同刺五加。

【用法与用量】 口服，一次0.3～0.45 g，一日3次。

【贮藏】 遮光，密封保存。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

郁　李　仁

Yuliren

SEMEN PRUNI

本品为蔷薇科植物欧李 Prunus humilis Bge. 或郁李 Prunus japonica Thunb. 的干燥成熟种子。夏、秋二季采收成熟果实，除去果肉及核壳，取出种子，干燥。

【性状】 本品呈卵形，长 5～7 mm，直径 3～5 mm。表面黄白色或浅棕色，一端尖，另端钝圆。尖端一侧有线形种脐，圆端合点处向上具纵向脉纹。种皮薄，除去种皮可见乳白色子叶 2 片，富油性。气微，味微苦。

以粒饱满、完整、色黄白者为佳。

【鉴别】 (1) 取本品粉末 0.5 g，置带塞试管中，加 5% 硫酸溶液 3 ml，充分混合。试管口放一用三硝基苯酚钠溶液（取 1% 三硝基苯酚溶液加热至 60°时，与等量的 10% 碳酸钠溶液混合）湿润的滤纸条，注意勿使滤纸条与溶液接触，塞紧，将试管置水浴中加热 10 分钟，滤纸条由黄色变为红色。

(2) 取本品粉末 1 g，加乙醇 5 ml，置水浴上加热 5 分钟，滤过。取滤液 1 ml，加镁粉少量与盐酸 3～4 滴，振摇，显红色。

【炮制】 除去杂质，用时捣碎。

【性味】 辛、苦、甘，平。

【功能与主治】 缓泻，利尿。用于大便秘结，水肿，尿少。

【用法与用量】 3～9 g。

【注意】 孕妇慎服。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防蛀。

郁　　金

Yujin

RADIX CURCUMAE

本品为姜科植物郁金 Curcuma aromatica Salisb.、广西莪术 Curcuma kwangsiensis

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

S. Lee et C. F. Liang、姜黄 Curcuma longa L. 或莪术 Curcuma zedoaria Rosc. 的干燥块根。冬季茎叶枯萎后采挖，除去泥沙及细根，蒸或煮至透心，取出干燥。

【性状】 本品呈卵圆形至长纺锤形，有的稍扁或弯曲，长 2～6 cm，直径 0.5～2 cm。表面灰黄棕色至灰褐色，具纵直或杂乱的皱纹，纵纹隆起处色较浅。质坚实，断面角质样，浅灰黄色至灰黑色，中部有 1 颜色较浅的内皮层环纹。气微，味淡。

以质坚实、外皮皱纹细、断面色黄者为佳。

【炮制】 洗净，润透，切片，干燥；或洗净，干燥，打碎。

【性味】 辛、苦，寒。

【功能与主治】 解郁，行气，止痛，化瘀，利胆。用于胸胁胀痛，黄疸，痛经，癥症。

【用法与用量】 3～9 g。

【注意】 不宜与丁香、母丁香同用。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

虎　耳　草

Hu'ercao

HERBA SAXIFRAGAE

本品为虎耳草科植物虎耳草 Saxifraga stolonifera Meerb. 的干燥全草。春、夏二季采收，除去杂质，洗净，干燥。

【性状】 本品多卷缩成团状，全体被毛。根茎短，丛生细短须状根，灰褐色；匍匐枝线状。基生叶数片，密被黄棕色茸毛；叶柄长 2～10 cm，稍扭曲，有纵皱纹，基部鞘状；叶片稍厚，展平后呈圆形或肾形，红棕色或棕褐色，长 2～6 cm，宽 3～7 cm，边缘具不规则钝齿。狭圆锥花序顶生，花有梗，花瓣 5 片，其中 2 片较大。无臭，味微苦。

以叶厚、色红棕者为佳。

【鉴别】 本品叶的表面观：表皮细胞多角形，垂周壁较平直，有的壁孔较明显，或具角质线纹。下表皮气孔不定式，副卫细胞 4～8 个，较表皮细胞为小，垂周壁波状弯曲。腺毛头部 1～8 细胞，椭圆形，含棕黄色分泌物；柄有多列和单列两种，多列者长 1300～5600 μm，其上部单列，向基部逐渐增粗至 7 列；单列者 1～4 细胞，长 70～110 μm。草酸钙簇晶直径 25～56 μm，棱角长尖。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【炮制】 除去杂质，洗净，切段，干燥。

【性味】 辛、苦，寒。

【功能与主治】 消炎，解毒。用于急性中耳炎，风热咳嗽；外治大泡性鼓膜炎，风疹瘙痒。

【用法与用量】 9～15 g；外用鲜品适量，捣烂取汁滴耳或涂敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

虎　　杖

Huzhang

RHIZOMA POLYGONI CUSPIDATI

本品为蓼科植物虎杖 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc. 的干燥根茎和根。春、秋二季采挖，除去须根，洗净，趁鲜切短段或厚片，晒干。

【性状】 本品多为圆柱形短段或不规则厚片，长 1～7 cm，直径 0.5～2.5 cm。外皮棕褐色，有纵皱纹及须根痕。切面皮部较薄，木部宽广，棕黄色，有放射状纹理，皮部与木部较易分离。根茎髓中有隔或呈空洞状。质坚硬。气微，味微苦、涩。

以粗壮、坚实、断面色黄者为佳。

【鉴别】 (1) 取本品粗粉 5 g，加乙醇 25 ml，浸渍 2 小时，滤过，滤液蒸干，残渣加水约 5 ml，充分搅拌，取上清液，加氯仿 10 ml，振摇提取，分取氯仿液，蒸干，加氢氧化钠试液 2 滴，显樱红色。

(2) 取鉴别(1) 项下氯仿提取后的水液，加醋酸乙酯 10 ml，振摇提取，分取醋酸乙酯液，蒸干，残渣加水约 5 ml，再用乙醚 5 ml 提取。分取乙醚液，蒸干，残渣加乙醇 1 ml 溶解后，点于滤纸上，置紫外光灯下观察，显亮蓝色荧光；取水层液，加三氯化铁试液 2 滴，显污绿色。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。

【性味】 微苦，微凉。

【功能与主治】 活血定痛，清利湿热，止咳化痰。用于关节疼痛，经闭，湿热黄疸，慢性支气管炎，高血脂症；外治烫、火伤，跌扑损伤。

【用法与用量】 9～15 g；外用适量，制成煎液或油膏涂敷。

【注意】 孕妇慎服。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【贮藏】 置干燥处，防霉、防蛀。

虎　　刺

Huci

HERBA DAMNACANTHI

本品为茜草科植物虎刺 Damnacanthus indicus (L.) Gaertn. f. 的干燥全株。全年均可采挖，除去杂质，洗净，干燥。

【性状】 本品根近圆柱形，有的呈连珠状，暗棕色。茎圆柱形，直径可达 1 cm，表面灰褐色，有纵皱纹；质硬，不易折断，断面不整齐，皮部薄，木部灰白色，有髓。小枝着生多数成对的细针刺，刺长 1～1.5 cm。叶对生，有短柄；叶片卵圆形，长 1～1.5 cm，宽 0.5～1 cm，先端短尖，基部圆形，全缘，侧脉 3～4 对；革质。气微，味微苦甘。

以根多、粗壮者为佳。

【鉴别】 (1) 本品茎的横切面：木栓层为多列细胞，含棕色物。皮层细胞含草酸钙针晶束；内皮层明显。中柱鞘纤维与石细胞数个成群，断续排列成环。韧皮部薄壁细胞亦含针晶。木质部发达，可见数圈年轮；木射线宽 1～3 列细胞；导管作放射状排列。髓部明显，有的细胞有纹孔，含少数针晶。

(2) 取本品粗粉 1 g，加 0.1% 氢氧化钾溶液 10 ml，煮沸，加水 10 ml，滤过，滤液加盐酸使成微酸性，放冷后，加乙醚 10 ml，振摇，分取醚层，加入等量的氨试液，氨液层显棕红色。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切段，干燥。

【性味】 甘、苦，平。

【功能与主治】 祛风湿，活络，止痛。用于风湿痹痛，腰痛。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置干燥处。

虎　　骨

Hugu

OS TIGRIS

本品为猫科动物虎 Panthera tigris L. 的干燥骨骼。将获取的虎剥去皮肉，剔净残

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

余的筋、肉，阴干。

【性状】 本品头骨较圆，额骨平，前额上部有1浅槽，顶骨后面常有1脊棱，两侧颧骨弓向外展出，略呈三角形，眼眶下面各有1椭圆形透孔，孔面斜向，上腭骨生有门齿3对，犬齿1对，臼齿4对，下腭骨生有门齿3对，犬齿1对，臼齿3对，共有牙齿30个。门齿较小，犬齿呈圆锥形，粗大而锐利，略向内弯曲，臼齿呈山字形，锯齿状。上腭最后一对臼齿幼虎常不显著，均呈白色或黄白色，有光泽。

颈椎7节，第一节环椎呈蝶形，第二节枢椎形状特异，第三至七节颈椎呈马鞍形。胸椎13节，每节上面有1较长的棘状突起，前十节棘突向后倾斜，两侧联结有肋骨13对，近脊处呈圆形，两端向内弯曲作弓背状，近胸部呈扁形，顺直，下端与胸骨8块相连接。腰椎7节，两侧有较长的棘状突起，上下棘突皆向前倾斜。荐椎3节常愈合成一块，后端两侧有2个较长突起，节间两侧各有2孔。尾椎22～29节，前六节带有翅状棘突，以下渐呈圆柱形，前端稍粗，逐节渐细小，连排成鞭状。盆骨1具，呈长方形，左右对称，锁骨2块，形状细小而弯曲，习称"虎威"。

肩胛骨2块，呈扇状半圆形，近中部很薄，在外面有1条斜向脊状突起。腿骨有明显的棱，上节均为独骨，下节均为2骨合成。前肢上节的下端靠近骨环处侧面有1扁长孔，习称"风眼"。下节两骨相似而并立，形略扁，略呈扭曲状，但一根较长，呈卡尺形。后肢上节圆柱形，习称"棒骨"，能四侧放平而不幌动，上端内侧有1圆轴称"股骨头"，下端有长圆形的凹槽，为膝盖骨的所在处。膝盖骨习称"虎胫"，略呈圆形，内面光滑，厚而坚重，常带有舌状筋，下节主骨粗大，呈三棱柱状，另一根很细，习称"邦骨"。前足5趾，后足4趾，趾端均具短爪钩。

虎骨表面均呈黄白色或淡黄白色，细腻而稍显油润。体重，质坚实。棒骨横断面中间空隙约占1/3，其内形成丝络网状，灰黄色。

以体重、质坚实、色黄白者为佳。

【炮制】 **虎骨** 除去残余筋肉，洗净，阴干，临用时敲碎。

制虎骨 (1) 取净虎骨，照烫法(附录19页)用砂子炒至黄色，取出，筛去砂子，将虎骨趁热倒入醋内淬酥，取出，晾干。

每虎骨100 kg，用醋20～30 kg。

(2) 取净虎骨，用麻油炸酥，或抹麻油后用火烤酥。

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 强筋骨，祛风湿，止痛。用于关节筋骨疼痛，腰腿软弱无力。

【用法与用量】 3～6 g，入丸剂或浸酒服。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

虎　掌　草

Huzhangcao

RADIX ANEMONES RIVULARIS

本品为毛茛科植物草玉梅 Anemone rivularis Buch.-Ham. 的干燥根。秋季采挖，除去泥沙，晒干。

【性状】 本品呈长圆柱形或长类圆锥形，稍弯曲，有的扭曲或分枝，长 5～12 cm，直径 2～3 cm。表面黑褐色或棕褐色，粗糙，具不规则的裂纹及皱纹。根头部略膨大，有残留的叶基、茎痕及灰白色绒毛。质硬而脆，易折断，断面不整齐，黄绿色。气微，味微苦。

【鉴别】 (1) 本品横切面：木栓层为数列细胞，黄绿色。皮层较窄，细胞含黄棕色物。韧皮部宽广，筛管群径向排列。形成层成环。木质部导管散列；射线宽广，含黄棕色物。薄壁细胞含多数淀粉粒。

(2) 取本品粉末 4 g，加水 20 ml，置热水浴中浸渍 20～30 分钟，滤过。取滤液 5 ml，置试管中，振摇 1 分钟，发生持久性的蜂窝状泡沫，再加碱式醋酸铅试液 2～3 滴，发生类白色沉淀。

(3) 取本品粉末 2 g，加 75%乙醇 5 ml，温浸 10～20 分钟，滤过。取滤液 2 ml，加 7%盐酸羟胺的甲醇溶液 4～5 滴，再加 10%氢氧化钾的甲醇溶液 2～3 滴，置水浴上加热数分钟，冷却后加稀盐酸调节 pH 值至 3～4，再加 1%三氯化铁的乙醇溶液 2～4 滴，显橙红色至紫红色。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，晒干。

【性味】 辛、苦，寒；有小毒。

【功能与主治】 清解热毒，止咳，祛痰。用于咽喉肿痛，咳嗽痰多，淋巴结炎，痢疾。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置干燥处。

昆　布

Kunbu

THALLUS LAMINARIAE SEU ECKLONIAE

本品为海带科植物海带 Laminaria japonica Aresch. 或翅藻科植物昆布 Ecklonia

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

kurome Okam. 的干燥叶状体。夏、秋二季采捞，晒干。

【性状】 **海带** 卷曲折叠成团状，或缠结成把。全体呈黑褐色或绿褐色，表面附有白霜。用水浸软则膨胀成扁平长带状，长 50～150 cm，宽 10～40 cm，中部较厚，边缘较薄而呈波状。类革质，残存柄部扁圆柱状。气腥，味咸。

昆布 卷曲皱缩成不规则团状。全体呈黑色，较薄。用水浸软则膨胀呈扁平的叶状，长宽均为 16～26 cm，厚约 1.6 mm；两侧呈羽状深裂，裂片呈长舌状，边缘有小齿或全缘。质柔滑。

均以色黑褐、体厚者为佳。

【鉴别】 (1) 本品体厚，以水浸泡即膨胀，表面粘滑，附着透明粘液质。手捻不分层者为海带，分层者为昆布。

(2) 取本品约 10 g，剪碎，加水 200 ml，浸泡数小时，滤过，滤液浓缩至约 100 ml。取浓缩液 2～3 ml，加硝酸 1 滴与硝酸银试液数滴，即发生黄色乳状沉淀，在氨试液中微溶解，在硝酸中不溶解。

【含量测定】 取本品 10 g，剪碎，精密称定，置瓷皿中，缓缓加热炽灼，温度每上升 100°维持 10 分钟，升温至 400～500°时维持 40 分钟，取出放冷。炽灼残渣置烧杯中，加水 100 ml，煮沸约 5 分钟，滤过，残渣用水重复处理 2 次，每次 100 ml，滤过，滤液合并，残渣再用热水洗涤 3 次，洗液与滤液合并，加热浓缩至约 80 ml，放冷，浓缩液全量移入 100 ml 量瓶中，用水稀释至刻度。精密量取 5 ml，置玻璃塞烧瓶中，加水 50 ml 与甲基橙指示液 2 滴，滴加 10%硫酸溶液至显红色，加新制的饱和溴水 5 ml，加热至沸，沿瓶壁加 20%甲酸钠溶液 5 ml，再加热 10～15 分钟，以热水洗瓶壁，放冷，加 10%硫酸溶液 5 ml 与 15%碘化钾溶液 5 ml，立即用 $N/100$ 硫代硫酸钠液滴定至淡黄色，加淀粉指示液 1 ml，继续滴定至蓝色消失，即得(每 1 ml 的 $N/100$ 硫代硫酸钠液相当于 0.2115 mg 的 I)。

本品以干燥品计算，海带含碘(I)不得少于 0.35%，昆布含碘(I)不得少于 0.2%。

【炮制】 除去杂质，漂净，稍晾，切宽丝，晒干。

【性味】 咸，寒。

【功能与主治】 软坚，散结。用于地方性甲状腺肿，淋巴结结核，睾丸肿痛。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

明　党　参

Mingdangshen

RADIX CHANGII

本品为伞形科植物明党参 Changium smyrnioides Wolff 的干燥根。4～5 月采挖，除去须根，洗净，置沸水中煮至无白心，取出，刮去外皮，漂洗，干燥。

【性状】 本品呈细长圆柱形、长纺锤形或不规则条块，长 6～20 cm，直径 0.5～2 cm。表面黄白色或淡棕色，光滑或有纵沟纹及须根痕，有的具红棕色斑点。质硬而脆，断面角质样，皮部黄白色，较易剥离，木部类白色。气微，味淡。

以条匀、体重、质硬脆、色黄白、断面角质样者为佳。

【炮制】 洗净，润透，切片，干燥。

【性味】 甘、微苦，微寒。

【功能与主治】 润肺，和胃。用于肺燥咳嗽，呕逆。

【用法与用量】 6～12 g。

【注意】 脾虚泄泻者慎服。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮、防蛀。

岩　白　菜

Yanbaicai

RHIZOMA SEU HERBA BERGENIAE

本品系纳西族习用药材，纳西语称“埃苏蒙”；为虎耳草科植物岩白菜 Bergenia purpurascens (Hook. f. et Thoms.) Engl. 或云南岩白菜 Bergenia purpurascens (Hook. f. et Thoms.) Engl. var. delavayi (Franch.) Engl. et Irm. 的干燥根茎或全草。秋、冬二季采挖根茎，除去外皮，晒干；夏季采挖全草，除去泥沙，晒干。

【性状】 本品根茎呈圆柱形，略弯曲，少分枝，长 10～30 cm，直径 1～2 cm；表面黑褐色，具环节及残留须状根，除去外皮者浅棕色至棕褐色；质硬而脆，易折断，断

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

面类白色或淡红色，粉性。叶基生，皱缩卷曲，展平后叶片呈倒卵形或长椭圆形，长6.5～15 cm，宽3.5～10 cm；先端钝圆，基部渐狭，边缘微波状或有小齿；上表面绿褐色，下表面色较浅；叶柄长，基部扩大呈鞘状。花茎圆柱形。聚伞花序顶生，花暗紫色。气微，味苦、涩。

以根茎粗、断面色白者为佳。

【鉴别】 取本品粉末1 g，加甲醇10 ml，置水浴上加热浸渍10分钟，滤过，滤液照下述方法试验：

(1) 取滤液1 ml，加7%盐酸羟胺的甲醇溶液与10%氢氧化钾的甲醇溶液各3滴，置水浴上微热，放冷，加稀盐酸使成酸性，再加1%三氯化铁的甲醇溶液1滴，显紫红色。

(2) 取滤液1 ml，加5%碳酸钠溶液0.5 ml，置水浴中加热2～3分钟，冷却，加新制的重氮对硝基苯胺试液数滴，显血红色。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切段，晒干。

【性味】 苦、涩，平。

【功能与主治】 收敛止泻，止血止咳，舒筋活络。用于腹泻，痢疾，食欲不振，内外伤出血，肺结核咳嗽，气管炎咳嗽，风湿疼痛，跌扑损伤。


【用法与用量】 6～12 g；外用适量。

【贮藏】 置干燥处。

岩白菜素（矮茶素）

Yanbaicaisu

BERGENINUM



[$C_{14}H_{16}O_9$=328.27]

本品按干燥品计算，含$C_{14}H_{16}O_9$不得少于97.0～103.0%。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 本品为白色疏松的针状结晶或结晶性粉末；无臭，味苦；遇光和热渐变色。

本品在甲醇中溶解，在水或乙醇中微溶。

熔点 取本品，在110°干燥后，依法测定（附录28页），熔点为232～240°。

比旋度 取本品，精密称定，加甲醇制成每1 ml中含20 mg的溶液，依法测定(附录31页)，按干燥品计算，比旋度为－38°至－45°。

【鉴别】 (1) 取本品含量测定项下制备的溶液，照分光光度法（附录32页）测定，在275 nm与220 nm的波长处有最大吸收。

(2) 取本品约50 mg，加水10 ml，加热使溶解，放冷，分取溶液1 ml，加每1 ml中含三氯化铁试液1滴的铁氰化钾试液2滴，显翠绿色。

(3) 取本品约5 mg，加甲醇1 ml使溶解，加7%盐酸羟胺的甲醇溶液数滴，再加10%氢氧化钾的甲醇溶液使成碱性，置水浴中加热至微微沸腾，放冷，加稀盐酸使成酸性，加1%三氯化铁的乙醇溶液1～2滴，显紫红色。

【检查】 **干燥失重** 取本品，在110°干燥至恒重，减失重量不得过5.2%(附录44页)。

【炽灼残渣】 不得过0.1%（附录45页）。

【含量测定】 取本品约20 mg，精密称定，置50 ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取1 ml，置25 ml量瓶中，加甲醇至刻度，摇匀。照分光光度法(附录32页)，在275±1 nm的波长处测定吸收度，按$C_{14}H_{16}O_9$的吸收系数（$E^{1\%}_{1cm}$）为248计算，即得。

【功能与主治】 镇咳祛痰。用于慢性支气管炎。

【用法与用量】 口服，一次0.125 g，一日3次。

【贮藏】 遮光，密闭保存。

【制剂】 复方岩白菜素片

岩　　陀

Yantuo

RHIZOMA RODGERSIAE

本品系傈僳族、苗族习用药材，傈僳文名为Airtot（埃陀），苗文名为Dub Shaok

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

ab lub gat（都绍阿路嘎）；为虎耳草科植物羽叶岩陀 Rodgersia pinnata Franch. 或岩陀 Rodgersia sambucifolia Hemsl. 的干燥根茎。秋季采挖，除去粗皮及须根，晒干。

【性状】 本品呈扁圆柱形，长 8～30 cm，直径 1.5～6 cm。表面暗褐色，常有纵皱纹，上侧有数个黄褐色的茎痕，其周围有棕褐色鳞片及残留叶基，下侧有残存须状根及根痕。质硬，不易折断，断面粉红色或黄白色，有纤维状突起及多数白色闪亮小点。气微，味涩、苦。

以条粗、断面色红、白色闪亮点多者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切薄片，晒干。

【性味】 苦、涩，平。

【功能与主治】 解热，祛风，收敛。用于感冒头痛，风湿骨痛，肠炎，菌痢，外伤出血。

【用法与用量】 9～15 g；外用适量，研末敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

罗布麻叶

Luobumaye

FOLIUM APOCYNI VENETI

本品为夹竹桃科植物罗布麻 Apocynum venetum L. 的干燥叶。夏季采收，除去杂质，干燥。

【性状】 本品多皱缩卷曲，有的破碎。完整叶片展平后呈椭圆形或长圆披针形，长 2～5 cm，宽 0.5～2 cm；淡绿色或灰绿色，先端钝，顶处有小芒尖，基部钝圆或楔形，边缘具细齿，常反卷；两面无毛，叶脉于下表面突起；叶柄细，长约 4 mm。质脆。气微，味淡。

以完整、色绿者为佳。

【性味】 淡、涩，凉。

【功能与主治】 清热利水，平肝安神。用于高血压，头晕，心悸，失眠。

【用法与用量】 水煎服或开水冲泡，一次 3～9 g，一日 2 次。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

罗　汉　果

Luohanguo

FRUCTUS MOMORDICAE

本品为葫芦科植物罗汉果 Momordica grosvenori Swingle 的干燥果实。秋季果实由嫩绿变深绿色时采摘，晾数天后，低温干燥。

【性状】 本品呈卵形、椭圆形或球形，长 4.5～8.5 cm，直径 3.5～6 cm。表面褐色、黄褐色或绿褐色，有深色斑块及黄色柔毛，有的有 6～11 条纵纹。顶端有花柱残痕，基部有果梗痕。体轻，质脆，果皮薄，易破。果瓤海绵状，浅棕色。种子扁圆形，多数，长约 1.5 cm，宽约 1.2 cm；浅红色至棕红色，两面中间微凹陷，四周有放射状沟纹，边缘有槽。气微，味甜。

以个大、完整、色褐、手摇不响者为佳。

【性味】 甘，凉。

【功能与主治】 清解暑热，润肺止咳。用于暑热口渴，肺燥咳嗽，咽喉干痛。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置干燥处，防霉、防蛀。

败　酱　草

Baijiangcao

HERBA PATRINIAE

本品为败酱科植物黄花败酱 Patrinia scabiosaefolia Fisch. 或白花败酱 Patrinia villosa Juss. 的干燥全草。夏季花开前采挖，晒至半干，扎成束，再阴干。

【性状】 **黄花败酱** 全长 50～100 cm。根茎呈圆柱形，多向一侧弯曲，直径 0.3～1 cm；表面暗棕色至紫棕色，有节，节间长多不超过 2 cm，节上有细根。茎圆柱形，直径 0.2～0.8 cm；表面黄绿色至黄棕色，节明显，常有倒生粗毛；质脆，断面中部有髓或呈细小空洞。叶对生，叶片薄，多卷缩或破碎，完整者展平后呈羽状深裂至全裂，有

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

5～11 裂片，先端裂片较大，长椭圆形或卵形，两侧裂片狭椭圆形至条形，边缘有粗锯齿，上表面深绿色或黄棕色，下表面色较浅，两面疏生白毛，叶柄短或近无柄，基部略抱茎；茎上部叶较小，常 3 裂，裂片狭长，有的枝端带有伞房状聚伞圆锥花序。气特异，味微苦。

白花败酱 根茎节间长 3～6 cm，着生数条粗壮的根。茎不分枝，表面有倒生的白色长毛及纵向纹理，断面中空。茎生叶多不分裂，基生叶常有 1～4 对侧裂片；叶柄长 1～4 cm，有翼。

均以根长、叶多而色绿、气浓者为佳。

【鉴别】 (1) 本品叶的表面观：

黄花败酱 上表皮细胞表面有角质线纹，垂周壁多平直，略呈连珠状增厚；下表皮细胞垂周壁略弯曲。气孔不定式。非腺毛多存在于叶缘及叶脉，单细胞，长 200～1250 μm，壁厚，表面有细小颗粒状突起；腺毛多存在于下表皮，头部 4 细胞，近球形，直径 25～40 μm；柄短，单细胞。海绵组织中含草酸钙簇晶，直径约 30 μm。

白花败酱 非腺毛长约至 550 μm，壁较薄；无草酸钙簇晶。

(2) 取本品叶的粗粉 0.5 g，加水 10 ml，置水浴上加热 10 分钟，滤过。取滤液 2 ml，置带塞试管中，强力振摇 1 分钟，产生持久性泡沫，放置 10 分钟不消失。

(3) 取鉴别(2)项下剩余的滤液，点于滤纸上，干后，置紫外光灯下观察，显浅紫蓝色荧光，再加 1 %氢氧化钠溶液 1 滴，则显绿黄色荧光。

【炮制】 除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，晒干。

【性味】 辛、苦，凉。

【功能与主治】 清热解毒，祛瘀排脓。用于阑尾炎，痢疾，肠炎，肝炎，眼结膜炎，产后瘀血腹痛，痈肿疔疮。

【用法与用量】 9～15 g；外用鲜品适量，捣烂敷患处。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

败 酱 片 (眠尔静片)

Baijiang Pian

TABELLAE PATRINIAE

本品为败酱科植物黄花败酱 Patrinia scabiosaefolia Fisch. 的根茎及根的浸膏片。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

每片相当于败酱根茎及根 1 g。

【制法】 取败酱根茎及根 1000 g，粉碎成粗粉，照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法（附录11页），用 60%乙醇作溶剂，浸渍 24 小时后进行渗漉，收集漉液，在 70°以下浓缩成稠膏状，加适量辅料，制成颗粒，压制成 1000 片，包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显深棕色；有败酱气，味微苦。

【鉴别】 (1) 取本品 1 片，除去糖衣，研细，置试管中，加水 5 ml，密塞，强力振摇 1 分钟，放置，产生的泡沫为液体量的 1/3 以上，静置 10 分钟不消失。

(2) 取本品 1 片，除去糖衣，研细，取粉末少量，置白瓷板上，加硫酸 1 滴，搅匀，放置约 5 分钟，渐变紫红色。

(3) 取鉴别(2)项下剩余的本品粉末约 0.1 g，置试管中，加甲醇约 1 ml，摇匀，浸渍约 5 分钟，取醇液点于滤纸上，置紫外光灯下观察，显淡紫蓝色荧光；再加 1 %氢氧化钠溶液 1 滴，变为黄绿色荧光。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(附录 6 页)。

【功能与主治】 中枢神经镇静药。用于以失眠为主要症状的神经衰弱或精神病患者。

【用法与用量】 口服，一次 2～4 片，一日 2～3 次。

【贮藏】 遮光，密封保存。

知　　母

Zhimu

RHIZOMA ANEMARRHENAE

本品为百合科植物知母 Anemarrhena asphodeloides Bge. 的干燥根茎。春、秋二季采挖，除去须根及泥沙，晒干，习称“毛知母”；除去外皮，晒干，习称“知母肉”。

【性状】 **毛知母** 呈长条状，微弯曲，略扁，偶有分枝，长 3～15 cm，直径 0.8～1.5 cm。一端有浅黄色的茎叶残痕。表面黄棕色至棕色，上面有 1 凹沟，具紧密排列的环状节，节上密生黄棕色的残存叶基，由两侧向根茎上方生长；下面隆起而略皱缩，并有凹陷或突起的点状根痕。质硬，易折断，断面黄白色。气微，味微甜、略苦，嚼之带粘性。

知母肉 表面黄白色，有扭曲的沟纹，有的可见叶痕及根痕。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

均以条粗、质硬、断面色黄白者为佳。

【鉴别】（1）取本品粉末 0.5 g，置试管中，加水 5 ml，用力振摇 1 分钟，发生持久性泡沫，放置 10 分钟不消失。

（2）取本品粉末 2 g，加乙醇 8 ml，振摇后放置 20 分钟，吸取上清液 1 ml，置水浴上蒸干，残渣加硫酸 1 滴，初显黄色，继变红色、紫堇色，最后呈棕色。

【炮制】 **知母** 除去杂质，洗净，润透，切片，干燥，除去毛状物。

盐知母 取知母片，照盐水炙法(附录19页)用盐水炒干。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清热，除烦，滋阴。用于烦热口渴，肺热燥咳，消渴，午后潮热。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮。

垂 盆 草

Chuipencao

HERBA SEDI SARMENTOSI

本品为景天科植物垂盆草 Sedum sarmentosum Bge. 的干燥全草。夏、秋二季采挖，除去杂质，晒干。

【性状】 本品根细小。茎纤细，长 4～7 cm，直径 0.1～0.2 cm；表面黄绿色至淡褐色，节部明显，偶有残留的不定根；质脆或较柔韧，断面中心淡黄色。叶常皱缩、破碎或脱落，完整叶片展平后呈倒披针形至矩圆形，长约 1.5 cm，宽约 0.4 cm，黄绿色至暗绿色。有的带花，聚伞状花序顶生，小花黄白色。气微，味微苦。

【鉴别】 本品茎横切面：表皮细胞长方形，外壁增厚；老茎有木栓层。皮层约为 10 列薄壁细胞，壁稍厚，表皮下及中柱外的 1～2 列细胞较小，角隅处壁尤增厚。中柱小，维管束外韧型，导管类圆形。髓部细胞多角形，壁甚厚，非木化，有孔沟。薄壁细胞含淀粉粒。

【炮制】 除去泥沙及杂质，切段。

【性味】 甘、淡，凉。

【功能与主治】 清利湿热，有降低谷丙转氨酶作用。用于急性肝炎及迁延性肝炎、慢性肝炎的活动期。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【用法与用量】 15～30 g；鲜品 250 g。

【贮藏】 置干燥处。

【制剂】 垂盆草片

垂盆草片

Chuipencao Pian

TABELLAE SEDI SARMENTOSI

本品为垂盆草浸膏片。每片含垂盆草干浸膏 0.32 g。

【制法】 取垂盆草，加水煎煮二次，第一次 2 小时，第二次 1 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩干燥成干浸膏，加适量辅料，制成颗粒，压片，包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕色；味苦。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(附录 6 页)。

【功能与主治】 同垂盆草。

【用法与用量】 口服，一次 6 片，一日 3 次。

【贮藏】 密封保存。

委陵菜

Weilingcai

HERBA POTENTILLAE CHINENSIS

本品为蔷薇科植物委陵菜 Potentilla chinensis Ser. 的干燥全草。春季未抽茎时采挖，除去泥沙，晒干。

【性状】 本品根呈圆柱形或类圆锥形，略扭曲，有的有分枝，长 5～17 cm，直径 0.5～1 cm；表面暗棕色或暗紫红色，有纵纹，粗皮易成片状剥落，根头部稍膨大；质硬，易折断，断面皮部薄，暗棕色，常与木部分离，木部可见放射状纹理。叶基生，单数羽状复叶，有柄；小叶狭长椭圆形，边缘羽状深裂，下表面及叶柄均密被灰白色柔毛。气微，味涩、微苦。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【鉴别】 本品根的粉末红棕色。木栓细胞类多角形，含黄棕色物。草酸钙簇晶甚多，常数个排列成行。木纤维较细长，直径 10～15 μm，壁略作连珠状增厚。网纹导管多见，直径约至 85 μm。根头非腺毛单细胞，长约至 3 mm，直径 12～32 μm，壁较厚，均木化，基部稍膨大。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片或段，晒干。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清热解毒，凉血。用于痢疾，痔疮出血，痈疮肿毒。

【用法与用量】 9～15 g；外用鲜品适量，煎水洗或捣烂敷患处。

【贮藏】 置通风干燥处。

使　君　子

Shijunzi

FRUCTUS QUISQUALIS

本品为使君子科植物使君子 Quisqualis indica L. 的干燥成熟果实。秋季果皮变紫黑时采收，除去杂质，干燥。

【性状】 本品呈椭圆形或卵圆形，具 5 条纵棱，偶有 4～9 棱，长 2.5～4 cm，直径约 2 cm。表面黑褐色至紫黑色，平滑，微具光泽。顶端狭尖，基部钝圆，有明显圆形的果梗痕。质坚硬，横切面多呈五角星形，棱角处壳较厚，中间呈类圆形空腔。种子 1 粒，长椭圆形或纺锤形，长约 2 cm，直径约 1 cm；表面棕褐色或黑褐色，有多数纵皱纹；种皮薄，易剥离；子叶 2 片，黄白色，有油性，断面有裂纹。气微香，味微甜。

以个大、表面紫黑色具光泽、仁饱满、色黄白者为佳。

【炮制】 **使君子** 除去杂质，用时捣碎。

使君子仁 取使君子，除去外壳，取净仁。

【性味】 甘，微温。

【功能与主治】 驱虫。用于蛔虫病，小儿疳积。

【用法与用量】 使君子 9～12 g，捣碎入煎剂；使君子仁 6～9 g，多入丸散服或单用作 1～2 次分服。

【注意】 服药时忌饮热茶。

【贮藏】 置通风干燥处，防霉、防蛀。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

侧　柏　叶

Cebaiye

CACUMEN BIOTAE

本品为柏科植物侧柏 Biota orientalis (L.) Endl. 的干燥枝梢及叶。多在夏、秋二季采收，阴干。

【性状】 本品多分枝，小枝扁平。叶细小鳞片状，交互对生，贴伏于枝上，深绿色或黄绿色。质脆，易折断，断面黄白色。气清香，味苦涩、微辛。

以枝嫩、色深绿者为佳。

【鉴别】 本品粉末黄绿色。上表皮细胞长方形，壁略厚。下表皮细胞类方形；气孔甚多，凹陷型，保卫细胞较大，侧面观呈哑铃状。薄壁细胞含油滴。纤维细长，直径约 18 μm。具缘纹孔管胞有时可见。

【炮制】 **侧柏叶**　除去杂质。

侧柏炭　取净侧柏叶，照炒炭法（附录19页）炒至表面焦褐色、内部焦黄色。

【性味】 苦、涩，寒。

【功能与主治】 凉血，止血，止咳。用于咳嗽痰中带血，支气管炎，鼻血，吐血，便血，崩漏，关节炎。

【用法与用量】 6～12 g。

【贮藏】 置干燥处。

佩　兰

Peilan

HERBA EUPATORII

本品为菊科植物佩兰 Eupatorium fortunei Turcz. 的干燥地上部分。夏、秋二季分两次采割，除去杂质，晒干。

【性状】 本品茎呈圆柱形，长 30～100 cm，直径 0.2～0.5 cm；表面黄棕色或黄绿色，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

有的带紫色，有明显的节及纵棱线；质脆，断面髓部白色或中空。叶对生，有柄，叶片多皱缩、破碎，绿褐色；完整叶片3裂或不分裂，分裂者中间裂片较大，展平后呈披针形或长圆状披针形，基部狭窄，边缘有锯齿；不分裂者展平后呈卵圆形、卵状披针形或椭圆形。气芳香，味微苦。

以质嫩、叶多、色绿、香气浓者为佳。

【鉴别】 取本品叶的粉末1 g，加乙醇10 ml，置水浴上温浸20分钟，滤过。取滤液2 ml，加3%碳酸钠溶液2 ml，加热至沸，放冷后，加新制的重氮对硝基苯胺试液2滴，即显樱红色。

【炮制】 除去杂质，洗净，稍润，切段，晒干。

【性味】 辛，平。

【功能与主治】 化湿，醒脾。用于伤暑头重，胸脘胀闷，食欲不振，口中甜腻，口臭。

【用法与用量】 6～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

金龙胆草

Jinlongdancao

HERBA CONYZAE

本品为菊科植物苦蒿 Conyza blinii Lévl. 的干燥地上部分。夏、秋二季采割，除去杂质，晒干。

【性状】 本品茎呈圆柱形，少分枝，长30～100 cm，直径0.2～0.6 cm；表面黄绿色或浅棕黄色，有纵棱及多数白色长绒毛；质硬而脆，易折断。单叶互生，叶片多卷缩、破碎，完整者展平后呈羽状深裂至全裂，裂片披针形，黄绿色，两面密被白色绒毛；下部叶具柄，上部叶几无柄。头状花序直径约1 cm，花黄白色。瘦果浅黄色，扁平，冠毛长5～6 mm。气微，味极苦。

【鉴别】 (1) 本品叶的表面观：腺毛头部2～8细胞，椭圆形或长椭圆形，直径20～26 μm；柄部细胞1～2列，每列3～7细胞。非腺毛4～13细胞，长3000～4000 μm，细胞相接处略膨大似竹节状。气孔不定式，副卫细胞4～5个。

(2) 取本品粗粉2 g，加水40 ml，置水浴中浸渍10分钟，滤过。取滤液10 ml，置带

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

塞试管中，振摇1分钟，产生持续性泡沫，15分钟内不消失；另取滤液10 ml，置水浴上蒸干，残渣加适量乙醇，搅拌，滤过，滤液蒸干，残渣加冰醋酸0.5 ml溶解后，移置试管中，加醋酐0.5 ml，混匀，沿管壁加硫酸1～2滴，即显红色，迅即变为紫红色。

【炮制】 除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，干燥。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 消炎，祛痰，止咳，平喘。用于慢性支气管炎。

【用法与用量】 6～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

【制剂】 金龙胆草片

金龙胆草片

Jinlongdancao Pian

TABELLAE CONYZAE

本品为金龙胆草浸膏片。每片含金龙胆草干浸膏0.1 g。

【制法】 取金龙胆草，粉碎成粗粉，照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法(附录11页)，用70%乙醇作溶剂，浸渍24小时后进行渗漉，收集漉液，在70°以下浓缩成稠膏状，干燥后，加适量辅料，制成颗粒，压片，包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显绿黑色；味极苦。

【鉴别】 取本品5片，除去糖衣，研细，加乙醇10 ml搅拌浸渍10分钟，滤过，滤液置水浴上蒸干，加水25 ml，搅拌，滤过，滤液照下述方法试验：

(1) 取滤液5 ml，置试管中，密塞，强力振摇1分钟，即生成持续性的泡沫，在15分钟内不消失。

(2) 取滤液5 ml，置水浴上蒸干，加冰醋酸0.5 ml溶解后，移置试管中，加醋酐0.5 ml混匀，沿管壁加硫酸1～2滴，即显红色，迅即变为紫红色。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定（附录6页）。

【功能与主治】 同金龙胆草。

【用法与用量】 口服，一次2～4片，一日3次，饭后服。

【贮藏】 密封保存。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

金　佛　草

Jinfocao

HERBA INULAE

本品为菊科植物线叶旋复花 Inula linariaefolia Turcz. 或旋复花 Inula japonica Thunb. 的干燥地上部分。夏、秋二季采割，晒干。

【性状】 **线叶旋复花**　茎呈圆柱形，上部分枝，长 30～70 cm，直径 0.2～0.5 cm；表面绿褐色或棕褐色，疏被短柔毛，有多数细纵纹；质脆，断面黄白色，髓部中空。叶互生，叶片条形或条状披针形，长 5～10 cm，宽 0.5～1 cm；先端尖，基部抱茎，全缘，边缘反卷；上表面近无毛，下表面被短柔毛。头状花序顶生，直径 0.5～1 cm，冠毛白色，长约 0.2 cm。气微，味苦。

旋复花　叶片椭圆状披针形，宽 1～2.5 cm，边缘不反卷。头状花序较大，直径 1～2 cm，冠毛长约 0.5 cm。

均以色绿褐、叶多、带花者为佳。

【炮制】 除去杂质，略洗，切段，干燥。

【性味】 咸、微苦，温。

【功能与主治】 化痰，止咳。用于咳喘痰粘；外治疔疮肿毒。

【用法与用量】 9～12 g；外用鲜叶适量，捣汁涂患处。

【贮藏】 置干燥处。

金　果　榄

Jinguolan

RADIX TINOSPORAE

本品为防己科植物青牛胆 Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep. 或金果榄 Tinospora capillipes Gagnep. 的干燥块根。秋、冬二季采挖，除去须根，洗净，晒干。

【性状】 本品呈不规则圆块状，长 5～10 cm，直径 3～6 cm。表面棕黄色或淡褐色，粗糙不平，有深皱纹。质坚硬，不易击碎，破开，横断面淡黄白色，有略呈放射状的深

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

色花纹，粉性。无臭，味苦。

以体重、质坚实者为佳。

【炮制】 除去杂质，浸泡，润透，切片，干燥。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清热，解毒，利咽。用于咽喉肿痛，风热咳嗽，痈疖。

【用法与用量】 3～9 g；外用适量，研末吹喉或醋磨涂敷患处。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

金　荞　麦

Jinqiaomai

RHIZOMA FAGOPYRI CYMOSI

本品为蓼科植物野荞麦 Fagopyrum cymosum (Trev.) Meisn. 的干燥根茎。冬季采挖，除去须根，洗净，晒干。

【性状】 本品呈不规则块状或圆柱状，稍有分枝，分枝基部呈瘤状，长 3～15 cm，直径 1～4 cm。顶端有的有茎的残基，表面棕褐色，有纵皱纹，密布点状皮孔，可见横向环节、凹陷的圆形根痕及残存须根。质坚硬，不易折断，断面木部黄白色或淡棕红色，有放射状纹理，髓部色较深。气微，味微涩。

以个大、质坚硬者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，晒干。

【性味】 微辛、涩，凉。

【功能与主治】 清热解毒，排脓去瘀。用于肺脓疡，肺炎，急性会厌炎，扁桃体周围脓肿。

【用法与用量】 15～45 g，用水或黄酒隔水密闭煎服。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

金　莲　花

Jinlianhua

FLOS TROLLII

本品为毛茛科植物金莲花 Trollius chinensis Bge. 的干燥花。夏季花开放时采摘，除

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

去杂质，阴干。

【性状】 本品呈不规则团状，皱缩，直径 1～2.5 cm。金黄色或棕黄色。萼片花瓣状，通常 10～16 片，卵圆形或倒卵形，长 1.8～3 cm，宽 0.9～2 cm。花瓣多数，条形，长 1.4～2.5 cm，宽 0.1～0.3 cm；先端渐尖，近基部有蜜槽。雄蕊多数，长 0.7～1.5 cm，淡黄色。雌蕊多数，具短喙，棕黑色。花梗灰绿色。体轻，疏松。气芳香，味微苦。

以完整、色金黄、香气浓者为佳。

【鉴别】 取本品粉末约 1 g，加乙醇 10 ml，置水浴上回流 1 小时，放冷，滤过。取滤液点于滤纸上，喷洒 2%三氯化铝的乙醇溶液，干后，置紫外光灯下观察，显黄绿色荧光。

【性味】 苦，微寒。

【功能与主治】 抗菌消炎。用于上呼吸道感染，咽炎，扁桃体炎，中耳炎，急性结膜炎，急性淋巴管炎。

【用法与用量】 3～6 g。

【贮藏】 置干燥处，防潮、防蛀。

【制剂】 金莲花片

金 莲 花 片

Jinlianhua Pian

TABELLAE TROLLII

本品为金莲花浸膏片。每片相当于金莲花 1.5 g。

【制法】 取金莲花 1500 g，加水煎煮三次，每次 1.5 小时，合并煎液，滤过，滤液减压浓缩，浓缩液喷雾干燥后，加适量辅料，用 60%乙醇制成颗粒，压制成 1000 片，包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；味苦。

【鉴别】 (1) 取本品 1 片，除去糖衣，研细，加乙醇 5 ml，置水浴中加热约 10 分钟，放冷，滤过。取滤液 1 ml，加三氯化铁试液 1 滴，即显棕褐色。

(2) 取鉴别 (1) 项下剩余的滤液 1 ml，加镁粉少量与盐酸 4～5 滴，置水浴中，加热 3 分钟，即显红色。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(附录 6 页)。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 抗菌消炎。用于上呼吸道感染，咽炎，扁桃体炎。

【用法与用量】 口服，一次3～4片，一日3次。

【贮藏】 密封保存。

金钱白花蛇

Jinqian Baihuashe

BUNGARUS PARVUS

本品为眼镜蛇科动物银环蛇 Bungarus multicinctus multicinctus Blyth 的干燥体。夏、秋二季捕捉，剖开蛇腹，除去内脏，擦净血迹，用乙醇浸泡处理后，盘成圆形，用竹签固定，干燥。

【性状】 本品卷呈圆盘状，盘径3～15 cm，蛇体直径0.3～2 cm。头盘在中间，尾细，常纳口内。背部黑色或灰黑色，有多数白色环纹，并有1条显著突起的脊棱，鳞片细密，有光泽。腹部黄白色，鳞片稍大。气微腥，味微咸。

以头尾齐全、肉色黄白、盘径小者为佳。

【炮制】 除去灰屑，切段。

【性味】 甘、咸，温；有毒。

【功能与主治】 祛风，活络，镇痉，攻毒。用于半身不遂，四肢麻木，抽搐痉挛，破伤风，关节酸痛，类风湿性关节痛，麻风。

【用法与用量】 3～4.5g；研粉吞服1～1.5 g。

【贮藏】 置干燥处，防霉、防蛀。

金　钱　草

Jinqiancao

HERBA LYSIMACHIAE

本品为报春花科植物过路黄 Lysimachia christinae Hance 的干燥全草。夏、秋二季采收，除去杂质，晒干。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 本品茎扭曲，表面棕色或暗棕红色，有纵纹，节上有的具须根，断面实心。叶对生，多皱缩，展平后呈宽卵形或心形，长1～3.5cm，宽1～3.5 cm，基部微凹，全缘；上表面灰绿色或棕褐色，下表面色较浅，主脉明显突起，用水浸后，对光透视可见黑色或褐色条纹；叶柄长1～4 cm。有的带花，花黄色，单生叶腋，具长梗。蒴果球形。气微，味淡。

以叶大、须根少者为佳。

【鉴别】 本品茎的横切面：表皮细胞外被角质层，有时可见腺毛，头部单细胞，柄1～2细胞。皮层宽广，细胞中有时含红棕色分泌物；分泌道散在，周围分泌细胞5～10个，内含红棕色块状分泌物。内皮层明显。中柱鞘纤维断续排列成环，壁微木化。韧皮部狭窄。形成层不明显。木质部连接成环。髓常成空腔。薄壁细胞含淀粉粒。

叶的表面观：腺毛红棕色，头部单细胞，类圆形，直径约25 μm；柄单细胞。分泌道散在于叶肉组织内，直径约45 μm，含红棕色分泌物。

【炮制】 除去杂质，略洗，切段，晒干。

【性味】 淡，微寒。

【功能与主治】 清热，利胆，排石，利尿。用于湿热黄疸，肝胆结石，尿路结石、感染。

【用法与用量】 15～60 g，鲜品加倍。

【贮藏】 置干燥处。

金　铁　锁

Jintiesuo

RADIX PSAMMOSILENES

本品为石竹科植物金铁锁 Psammosilene tunicoides W. C. Wu et C. Y. Wu 的干燥根。秋季采挖，除去外皮，晒干。

【性状】 本品呈长圆锥形，有的略扭曲，长8～25 cm，直径0.6～2 cm。表面黄白色，有多数纵皱纹及褐色横孔纹。质硬，易折断，断面不平坦，粉性，皮部白色，木部黄色，有放射状纹理。气微，味辛、麻，有刺喉感。

以条粗、质硬、断面粉性者为佳。

【鉴别】 （1）本品粉末类白色。网纹导管多见，偶有螺纹或具缘纹孔导管，直径

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

16～45 μm。

(2) 取本品粉末 5 g，加水 20 ml，煮沸 10 分钟，放冷，滤过。取滤液 4 ml，置试管中，加冰醋酸 0.5 ml，振摇后呈黄色冻状物，置紫外光灯下观察，显乳蓝色荧光。

【性味】 辛，温；有小毒。

【功能与主治】 散瘀，消炎，祛风湿，止痛。用于跌扑损伤，风湿痹痛，胃寒痛；外治疮疖，蛇咬伤。

【用法与用量】 0.3 g，多入丸散服。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 置干燥处。

金　银　花

Jinyinhua

FLOS LONICERAE

本品为忍冬科植物忍冬 Lonicera japonica Thunb.、红腺忍冬 Lonicera hypoglauca Miq.、山银花 Lonicera confusa DC. 或毛花柱忍冬 Lonicera dasystyla Rehd. 的干燥花蕾或带初开的花。夏初花开放前采收，干燥；或用硫黄熏后干燥。

【性状】 **忍冬** 呈棒状，上粗下细，略弯曲，长 2～3 cm，上部直径约 3 mm，下部直径约 1.5 mm。表面黄白色或绿白色，贮久色渐深，密被短柔毛。偶见叶状苞片。花萼绿色，先端 5 裂，裂片有毛，长约 2 mm。开放者花冠筒状，先端二唇形；雄蕊 5 个，附于筒壁，黄色；雌蕊 1 个，子房无毛。气清香，味淡、微苦。

红腺忍冬 长 2.5～4.5 cm，直径 0.8～2 mm。表面黄白色至黄棕色，无毛或疏被毛。萼筒无毛，先端 5 裂，裂片长三角形，被毛。开放者，花冠下唇反转。花柱无毛。

山银花 长 1.6～3.5 cm，直径0 .5～2 mm。萼筒和花冠密被灰白色毛。子房有毛。

毛花柱忍冬 长 2.5～4 cm，直径 1～2.5 mm。表面淡黄色微带紫色，无毛。花萼裂片短三角形。开放者花冠上唇常不整齐，花柱下部多密被长柔毛。

均以花蕾多、色淡、气清香者为佳。

【性味】 甘，寒。

【功能与主治】 清热，解毒。用于温病发热，风热感冒，咽喉肿痛，肺炎，痢疾，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

痈肿疮疡，丹毒，蜂窝组织炎。

【用法与用量】 6～15 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防潮、防蛀。

金　锦　香

Jinjinxiang

HERBA OSBECKIAE

本品为野牡丹科植物金锦香 Osbeckia chinensis L. 的干燥全草。夏末秋初果期采挖，除去杂质，晒干。

【性状】 本品长约 60 cm。根较粗壮，木质。茎方柱形，黄绿色，被紧贴的金黄色粗伏毛，老茎略呈圆柱形，褐色。叶对生，有短柄；叶片条形或条状披针形，长 2～5 cm，宽 0.2～0.6 cm；先端渐尖，基部圆钝，上表面黄绿色，下表面色较浅，两面均被金黄色毛；基出脉 3～5 条，侧脉不明显。花数朵，无梗，排成顶生的头状花序；花冠暗紫红色，皱缩，易脱落。蒴果钟状，浅棕黄色或黄棕色，顶端截平。气微，味涩、微甘。

以叶多、带果者为佳。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性味】 甘、淡，凉。

【功能与主治】 清湿热，解毒。用于泄泻，痢疾。

【用法与用量】 15～30 g。

【贮藏】 置干燥处。

金　樱　子

Jinyingzi

FRUCTUS ROSAE LAEVIGATAE

本品为蔷薇科植物金樱子 Rosa laevigata Michx. 的干燥成熟果实。10～11 月果实

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

成熟变红时采摘，干燥，除去毛刺。

【性状】 本品呈倒卵形，长 2.2～3.5 cm，直径 1.2～1.8 cm。表面红黄色或红棕色，有突起的棕色小点。顶端有宿存花萼如盘状，基部渐尖，间有残留果梗。质硬。切开，肉厚 1～2 mm，内有多数坚硬的小瘦果，内壁及瘦果均有淡黄色绒毛。无臭，味甘、微涩。

以个大、色红黄者为佳。

【炮制】 **金樱子** 除去杂质及残留的毛刺，洗净，干燥。

金樱子肉 取净金樱子，略浸，润透，纵切两瓣，除去毛、核，干燥。

【性味】 酸、甘、涩，平。

【功能与主治】 益肾，涩精，止泻。用于滑精，尿频，遗尿，久泻。

【用法与用量】 6～12 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

金　礞　石

Jinmengshi

LAPIS MICAE AUREUS

本品为云母片岩的岩石。采挖后，除去杂石及泥沙。

【性状】 本品呈不规则的块状、粒状或碎片状，大小不一。棕黄色，带有闪烁的金黄色光泽。质脆，易碎。气微，味淡。

以块整、色金黄者为佳。

【炮制】 **煅金礞石** 取净金礞石，加等量的火硝混和，照煅法（附录19页）煅至烟尽，水飞成极细粉；或将金礞石煅至红透，除去沙石。

【性味】 甘、咸，平。

【功能与主治】 逐痰，平肝。用于痰涎壅塞喘急，癫痫，精神狂躁。

【用法与用量】 3～6 g，多入丸散服。

【贮藏】 置干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

肺形草

Feixingcao

HERBA TRIPTEROSPERMI

本品为龙胆科植物双蝴蝶 Tripterospermum affine (Wall.) H. Smith 的干燥全草。夏、秋二季采挖，晒干。

【性状】 本品长 13～17 cm。根细小。匍伏茎纤细，黄棕色至黄褐色。叶对生，多卷曲成团。基生叶 4 片，2 大 2 小，无柄，叶片展平后呈卵圆形，长 4～11 cm，宽 2～7 cm，全缘或微波状，上表面灰绿色至绿褐色，间有绿黑色网脉，下表面紫红色，三出脉明显；茎生叶对生，有短柄，叶片展平后呈披针形至卵状披针形，长 3～4 cm，全缘。花顶生或腋生，长达 5 cm，黄棕色，花冠多破碎。气微香，味微辛。

以茎嫩、叶绿者为佳。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性味】 辛、甘，寒。

【功能与主治】 清热解毒，祛痰止咳。用于支气管炎，肺脓疡，肺结核，小儿高热；外治疔疮疖肿。

【用法与用量】 9～15 g；外用鲜品适量，捣烂敷患处。

【贮藏】 置通风干燥处。

肿节风

Zhongjiefeng

HERBA SARCANDRAE

本品为金粟兰科植物草珊瑚 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai 的干燥全株。夏、秋二季采挖，除去杂质，晒干。

【性状】 本品长 50～120 cm。根茎较粗大，密生细根。茎圆柱形，多分枝；表面暗绿色或暗褐色，有明显纵纹，散有纵向皮孔，节膨大；质脆，易折断，断面有髓或中

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

空。叶对生，叶片卵状披针形至卵状椭圆形，长 5～15 cm，宽 3～6 cm；表面光滑，边缘有粗锯齿，叶柄长约 1 cm；近革质。穗状花序顶生，常分枝。气微香，味微辛。

以叶色绿者为佳。

【鉴别】 (1) 本品茎的横切面：表皮细胞长方形，外被角质层；局部有木栓及皮孔。皮层约 10 余列细胞，外侧厚角细胞含叶绿粒；石细胞偶有散在。韧皮部甚窄，射线宽 5～9 列细胞；外侧有木化纤维束。束内形成层明显。木质部导管较小，成行排列。髓部大，常可见石细胞群。

(2) 取本品粉末 0.5 g，置试管中，加锌粉少量与 0.5%氯化铵溶液 2 滴，微火加热至干，在试管口上盖一小片用含 5%对二甲氨基苯甲醛与 20%三氯醋酸的苯溶液浸润过的滤纸，继续微火加热约 1 分钟，滤纸显粉红色至紫色的斑点。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切段，晒干。

【性味】 苦、辛，微温。

【功能与主治】 抗菌消炎，祛风通络，活血散结。用于肺炎，阑尾炎，急性蜂窝组织炎，风湿痹痛，跌扑损伤，肿瘤。

【用法与用量】 9～30 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

【制剂】 肿节风片

肿节风片

Zhongjiefeng Pian

TABELLAE SARCANDRAE

本品为肿节风浸膏片。每片含肿节风干浸膏 0.25 g。

【制法】 取肿节风，切碎，加水煎煮三次，每次 1 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩成稠膏状，在 85°以下减压干燥成干浸膏，加适量辅料，制成颗粒，压片，包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；味苦、微涩。

【鉴别】 (1) 取本品 2 片，除去糖衣，研细，取细粉适量（约相当于肿节风干浸膏 0.1 g），照肿节风项下的鉴别法 (2) 项(366 页)试验，显相同的反应。

(2) 取鉴别 (1) 项下剩余的细粉适量（约相当于肿节风干浸膏 0.2 g），加乙醇 0.5

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

ml，置水浴中微热搅拌，取乙醇溶液少量，点于滤纸上，自然干燥后，置紫外光灯下观察，显亮蓝绿色荧光；用氨气熏后，显黄色斑点，荧光增强。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定（附录 6 页）。

【功能与主治】 消肿散结，清热解毒。用于肿瘤，亦可用于肺炎，阑尾炎，蜂窝组织炎。

【用法与用量】 口服，一次 3 片，一日 3 次。

【贮藏】 遮光，密封保存。

鱼　腥　草

Yuxingcao

HERBA HOUTTUYNIAE

本品为三白草科植物蕺菜 Houttuynia cordata Thunb. 的干燥地上部分。夏季茎叶茂盛花穗多时采割，除去杂质，晒干。

【性状】 本品茎呈扁圆柱形，扭曲，长 20～35 cm，直径 0.2～0.3 cm；表面棕黄色，具纵棱数条，节明显，下部节上有残存须根；质脆，易折断。叶互生，叶片卷折皱缩，展平后呈心形，长 3～5 cm，宽 3～4.5 cm；先端渐尖，全缘；上表面暗黄绿色至暗棕色，下表面灰绿色或灰棕色；叶柄细长，基部与托叶合生成鞘状。穗状花序顶生，黄棕色。搓碎有鱼腥气，味微涩。

以叶多、色灰绿、有花穗、鱼腥气浓者为佳。

【鉴别】 (1) 取本品粉末适量，置小试管中，用玻璃棒压紧，滴加品红亚硫酸试液少量至上层粉末湿润，放置片刻，自侧壁观察，湿粉末显粉红色或红紫色。

(2) 取本品粉末约 1 g，加甲醇 10 ml，置水浴中加热 3 分钟后，滤过。取滤液 2 ml，加镁粉少量与盐酸 3 滴，置水浴中加热，即显红棕色。

【炮制】 除去杂质，迅速洗净，切段，晒干。

【性味】 辛，微寒。

【功能与主治】 清热，解毒，利湿。用于肺脓疡，痰热咳嗽，白带，尿路感染，痈疖。

【用法与用量】 15～25 g，不宜久煎；鲜品用量加倍，水煎或捣汁服。外用适量，捣烂敷或煎汤熏洗患处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【贮藏】 置干燥处。

狗 肝 菜

Gougancai

HERBA DICLIPTERAE CHINENSIS

本品为爵床科植物狗肝菜 Dicliptera chinensis (L.) Ness 的干燥全草。夏、秋二季采挖，洗净，晒干。

【性状】 本品根呈须状，淡黄色。茎多分枝，折曲状，长 30～80 cm，直径 0.2～0.3 cm；表面灰绿色，被疏柔毛，有 4～6 条钝棱，节稍膨大。叶对生，叶片多皱缩、破碎，完整者展平后呈卵形或宽卵形，长 2.5～6 cm，宽 1.5～3.5 cm；暗绿色或灰绿色，先端渐尖，基部宽楔形或稍下延，全缘；两面近无毛或下表面中脉上被疏柔毛；叶柄长 0.2～2.5 cm。有的带花，花腋生，由数个头状花序组成聚伞状或圆锥状花序；总苞片对生，叶状，宽卵形或近圆形，大小不等，长 0.6～1 cm，其内有数朵二唇形的花。气微，味淡、微甘。

以叶多、色绿者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，切段，晒干。

【性味】 甘、淡，凉。

【功能与主治】 清热，解毒，凉血，生津。用于感冒，斑疹发热，暑热烦渴，眼结膜炎。

【用法与用量】 15～30 g。

【贮藏】 置干燥处。

狗 脊

Gouji

RHIZOMA CIBOTII

本品为蚌壳蕨科植物金毛狗脊 Cibotium barometz (L.) J. Sm. 的干燥根茎。秋、冬

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

二季采挖，除去泥沙，干燥；或去硬根、叶柄及金黄色绒毛，切片，干燥，为“生狗脊片”；蒸后，晒至六、七成干，再切片，干燥，为“熟狗脊片”。

【性状】 本品呈不规则的长块状，长 10～30 cm，直径 2～10 cm。表面深棕色，残留金黄色绒毛；上面有数个红棕色的木质叶柄，下面残存黑色细根。质坚硬，不易折断。无臭，味淡、微涩。生狗脊片呈不规则长条形或圆形，长 5～20 cm，直径 2～10 cm，厚 1.5～5 mm；切面浅棕色，较平滑，近外皮 1～4 mm 处有 1 条明显隆起的棕黄色环纹或条纹，周边不整齐，偶有金黄色绒毛残留；质脆，易折断，有粉性。熟狗脊片呈黑棕色，质坚硬。

【炮制】 **狗脊** 除去杂质；未切片者除去绒毛，略泡，洗净，润透，切片，干燥。

炒狗脊 取狗脊片，照烫法（附录19页）用砂子烫至鼓起并显棕黄色，放凉后除去残存绒毛。

【性味】 苦、甘，温。

【功能与主治】 补肝肾，强筋骨，祛风湿。用于腰脊酸痛，下肢无力，肌肉、关节疼痛，白带。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮。

京　大　戟（龙虎草）

Jingdaji

RADIX EUPHORBIAE PEKINENSIS

本品为大戟科植物大戟 Euphorbia pekinensis Rupr. 的干燥根。秋、冬二季采挖，洗净，晒干。

【性状】 本品呈不整齐的长圆锥形，略弯曲，常有分枝，长 10～20 cm，直径 1.5～4 cm。顶端略膨大，有多数圆形的茎痕，表面灰棕色或棕褐色，粗糙，有纵皱纹、横向皮孔及支根痕。质坚硬，不易折断，断面类白色或淡黄色，纤维性。气微，味微苦涩。

以条粗、断面色白者为佳。

【鉴别】 （1）本品粉末淡黄色。淀粉粒单粒类圆形或卵圆形，直径 3～15 μm，脐点点状或裂缝状；复粒由 2～3 粒组成。草酸钙簇晶直径 19～40 μm。具缘纹孔及网纹导管

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

较多见，直径 26～50 μm。纤维单个或成束，壁较厚，非木化。无节乳管多碎断，内含黄色微细颗粒状乳汁。

(2) 取本品手切薄片 2 片，一片加冰醋酸与硫酸各 1 滴，置显微镜下观察，在韧皮部乳管群处呈现红色，5 分钟后渐退去；另一片加氢氧化钾试液，呈棕黄色。

【炮制】 **京大戟** 除去杂质，洗净，润透，切片，晒干。

醋京大戟 取净京大戟，照醋煮法（附录19页）用醋煮至醋吸尽。

每京大戟 100 kg，用醋 30～50 kg。

【性味】 苦，寒；有毒。

【功能与主治】 泻水逐饮。用于水肿胀满，痰饮，胸膜炎积水，晚期血吸虫病、肝硬变腹水。

【用法与用量】 1.5～3 g；研粉吞服 0.3～1 g。

【注意】 孕妇忌服，体弱者慎用。不宜与甘草同用。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

卷　　柏

Juanbai

HERBA SELAGINELLAE

本品为卷柏科植物卷柏 Selaginella tamariscina (Beauv.) Spr. 的干燥全草。全年均可采收，除去须根及泥沙，晒干。

【性状】 本品卷缩似拳状，长 3～10 cm。绿色或黄绿色，枝丛生，扁而有分枝，枝上密生鳞片状小叶，叶先端具长芒，叶缘膜质，有细尖的锯齿。基部残留棕色至棕褐色须根。质脆，易折断。无臭，味淡。

以色绿、叶多、完整不碎者为佳。

【炮制】 **卷柏** 除去残留须根及杂质，洗净，切段，晒干。

卷柏炭 取净卷柏，照炒炭法（附录19页）炒至外表显焦黑色。

【性味】 辛，平。

【功能与主治】 生用活血；炒炭止血。用于经闭，崩漏，便血，脱肛。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【注意】 孕妇忌服。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【贮藏】 置干燥处。

炉 甘 石

Luganshi

CALAMINA

本品为三方晶系菱锌矿的矿石，主含碳酸锌。采挖后，洗净，晒干，除去杂石。

【性状】 本品呈不规则的块状，有的略呈圆形或扁平形，大小不一。表面白色、淡红色或黄褐色，凹凸不平，多孔，似蜂窝状。体轻，质松，易碎，断面灰白色或淡棕色，颗粒性。无臭，味微涩。

以体轻、质松、色白者为佳。

【鉴别】 (1) 取本品粗粉 1 g，加稀盐酸 10 ml，即泡沸。将此气体通入氢氧化钙试液中，即发生白色沉淀。

(2) 取本品粗粉 1 g，加稀盐酸 10 ml 使溶解，滤过，滤液加亚铁氰化钾试液，即发生白色沉淀，或杂有微量的蓝色沉淀。

【含量测定】 取本品细粉约 0.1 g，用 105°干燥 1 小时，放冷，精密称定，置 250 ml 烧杯中，加氨-氯化铵混合液(取氯化铵 32 g，加水 120 ml 溶解，加浓氨试液 80 ml，混匀)30 ml，盖以表面皿，置 90～95°恒温水浴上（每 20 分钟搅动一次）保温 1 小时，放冷，表面皿用水少量冲洗，滤过，滤液置 250 ml 锥形瓶中，残渣与烧杯用 5%氯化铵溶液洗涤 5 次，每次 10 ml，洗液与滤液合并。加铬黑 T 指示液 6 滴，用*M*/20 乙二胺四醋酸二钠液滴定，至溶液自紫红色转变为纯蓝色，即得（每 1 ml的*M*/20 乙二胺四醋酸二钠液相当于 4.069 mg 的 ZnO)。

本品含锌量以氧化锌（ZnO）计算，不得少于 45%。

【炮制】 **炉甘石** 除去杂质，打碎。

煅炉甘石 取净炉甘石，煅红，照水飞法（附录17页）水飞，晒干。

黄连水拌炉甘石 取黄连，加水煎汤，加入上述煅炉甘石细粉，拌匀，并使吸尽，烘干。

每炉甘石细粉 100 kg，用黄连 12.5 kg。

三黄汤飞炉甘石 取净炉甘石，煅红，照水飞法（附录17页）用三黄汤水飞。

每净炉甘石 100 kg，用黄连、黄柏、黄芩各 2.5 kg。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 除湿生肌，明目去翳。用于睑缘炎，角膜云翳，溃疡不敛，急性湿疹，皮肤瘙痒。

【用法与用量】 外用，用量随方配合。

【贮藏】 置干燥处。

油　松　节

Yousongjie

LIGNUM PINI NODI

本品为松科植物油松 Pinus tabulaeformis Carr. 或马尾松 Pinus massoniana Lamb. 的干燥瘤状节或分枝节。全年均可采收，锯取后晒干。

【性状】 本品呈不规则的块状，大小粗细不一。表面黄棕色或红棕色。体较重，质坚硬，横断面具圆形环纹，显油性。有松节油香气，味微辛。

以色红棕、油性足者为佳。

【炮制】 锯成短段，劈碎。

【性味】 苦，温。

【功能与主治】 祛风湿，止痛。用于关节疼痛，屈伸不利。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

泡　桐　果

Paotongguo

FRUCTUS PAULOWNIAE

本品为玄参科植物锈毛泡桐 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. 的干燥近成熟果实。秋季果实近成熟时采收，晒干。

【性状】 本品呈卵圆形，长 3～4 cm，直径 2～3 cm。表面红褐色或黑褐色，顶端尖

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

嘴状，基部圆形，两侧各有纵沟 1 条，另两侧各有棱线 1 条，常沿棱线裂成 2 瓣；内表面淡棕色，各有 1 纵隔。果皮较硬而脆，革质。宿萼 5 中裂，呈五角星形，裂片三角形。果梗扭曲，长 2～3 cm，近果实一端较粗壮。种子多数，细小，扁而有翅。气微，味微甘、苦。

以个大、开裂少、带宿萼者为佳。

【性味】 淡、微甘，温。

【功能与主治】 止咳，祛痰，平喘。用于慢性支气管炎，咳喘痰多。

【用法与用量】 60～90 g。

【贮藏】 置干燥处。

波 棱 瓜 子

Bolengguazi

SEMEN HERPETOSPERMI

本品系藏族习用药材，藏文名为ཀཱཏཱ་ཀི་ཏཱ་ཀི(色吉美多)；为葫芦科植物波棱瓜 Herpetospermum caudigerum Wall. 的干燥成熟种子。秋季采收成熟果实，晒干，取出种子。

【性状】 本品略呈扁长方形，长 1～1.5 cm，宽 0.4～0.7 cm。表面棕褐色至黑褐色，粗糙不平，有人字形皱纹。一端有三角形突起，另端渐薄，略呈楔形，微凹；两侧稍平截，边缘呈微波状凸起，中间有 1 条棱线。种皮硬，革质；子叶 2 片，乳白色，富油性，外被暗绿色薄膜。气微，味苦。

以粒饱满、色黑褐、苦味浓者为佳。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 泻肝火，解毒。用于黄疸型传染性肝炎，胆囊炎，消化不良。

【用法与用量】 0.5～1 g，多入丸散服。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防霉、防蛀。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

泽　　兰

Zelan

HERBA LYCOPI

本品为唇形科植物毛叶地瓜儿苗 Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel 的干燥地上部分。夏、秋间茎叶茂盛时采割，晒干。

【性状】 本品茎呈方柱形，少分枝，四面均有浅纵沟，长 50～100 cm，直径 0.2～0.6 cm；表面黄绿色或带紫，节处紫色明显，有白色茸毛；质脆，断面黄白色，髓部中空。叶对生，有短柄；叶片多皱缩，展平后呈披针形或长圆形，长 5～10 cm；上表面黑绿色，下表面灰绿色，密具腺点，两面均有短毛；先端尖，边缘有锯齿。花簇生叶腋成轮状，花冠多脱落，苞片及花萼宿存，黄褐色。无臭，味淡。

以质嫩、叶多、色绿者为佳。

【炮制】 除去杂质，略洗，润透，切段，干燥。

【性味】 苦、辛，微温。

【功能与主治】 活血化瘀，行水消肿。用于月经不调，经闭，水肿，产后瘀血腹痛。

【用法与用量】 6～12 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

泽　　泻

Zexie

RHIZOMA ALISMATIS

本品为泽泻科植物泽泻 Alisma orientalis (Sam.) Juzep. 的干燥块茎。冬季茎叶开始枯萎时采挖，洗净，干燥，除去须根及粗皮。

【性状】 本品呈类球形、椭圆形或卵圆形，长 2～7 cm，直径 2～6 cm。表面黄白色或淡黄棕色，有不规则的横向环状浅沟纹及多数细小突起的须根痕，底部有的有瘤状芽

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

痕。质坚实，断面黄白色，粉性，有多数细孔。气微，味微苦。

以个大、质坚、色黄白、粉性足者为佳。

【鉴别】 本品粉末淡黄棕色。淀粉粒甚多，单粒长卵形、类球形或椭圆形，直径3～14 μm，脐点人字状、短缝状或三叉状；复粒由2～3粒组成。薄壁细胞类圆形，具多数椭圆形纹孔，集成纹孔群。内皮层细胞垂周壁波状弯曲，较厚，木化，有稀疏细孔沟。油室大多破碎，完整者类圆形，直径54～110 μm，分泌细胞中有时可见油滴。

【炮制】 泽泻　除去杂质，稍浸，润透，切片，干燥。

盐泽泻　取泽泻片，照盐水炙法(附录19页)用盐水炒至表面略显黄色。

【性味】 甘，寒。

【功能与主治】 利尿，清湿热。用于小便不利，尿路感染，水肿，痰饮，眩晕。

【用法与用量】 6～12 g。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

空心莲子草

Kongxin Lianzicao

HERBA ALTERNANTHERAE

本品为苋科植物空心莲子草 Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. 的新鲜地上部分。10～11月采割，洗净，除去杂质。

【性状】 本品茎呈圆柱形，有分枝；表面绿色，光滑，有纵直条纹及节，下部节上有棕褐色须状根，断面中空。叶对生，无柄；叶片长圆形或倒卵状披针形，长2.5～6 cm，宽0.7～2 cm，先端尖，基部楔形，全缘，深绿色。头状花序顶生或腋生，花白色，较小。气微，味淡、微涩。

【鉴别】 取本品10 g，切碎，加甲醇25 ml，加热回流10分钟，滤过，取滤液10 ml，蒸干，残渣加乙醚10 ml，搅拌，滤过，不溶物再以乙醚5 ml同上处理2次。不溶物加甲醇5 ml溶解后，滤过，滤液照下述方法试验：

(1) 取滤液1 ml，加新制的7 %盐酸羟胺的甲醇溶液与10%氢氧化钾的甲醇溶液各3滴，置水浴上微热，冷却后，加1 %三氯化铁的盐酸(1 %)溶液2滴，显橙红色。

(2) 取滤液1 ml，加3 %碳酸钠溶液1 ml，煮沸3分钟，放冷，加新制的重氮对硝基苯胺试液1滴，显红色。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

(3) 取滤液 1 ml，加 2 %间二硝基苯的乙醇溶液与 10%氢氧化钾溶液各 2 滴，置水浴上加热，显橙红色。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清热，凉血，解毒。对于某些病毒感染性疾患有缩短病程与减轻中毒症状的作用。用于流行性乙型脑炎早期，流行性出血热初期，麻疹。

【制剂】 空心莲子草注射液

空心莲子草注射液（螃蜞菊注射液）

Kongxin Lianzicao Zhusheye

INJECTIO ALTERNANTHERAE

本品为空心莲子草提取制成的灭菌水溶液。每 1 ml 相当于鲜空心莲子草 5 g。

【制法】 取鲜空心莲子草 5000 g，洗净，加水煎煮 1 小时，滤过，滤液浓缩至 1000 ml，静置 48 小时，滤取上清液，浓缩至约 100 ml，放冷，用乙醇沉淀处理二次，第一次溶液中含乙醇量为 65%，第二次为 80%，每次静置 48 小时，滤过，滤液减压浓缩至约 100 ml，放冷。浓缩液中加 20%醋酸铅溶液至不再发生沉淀，滤过，滤液加 10%硫酸溶液调节 pH 值至 3.0，滤去硫酸铅后，再通入硫化氢使铅沉淀完全，滤过，滤液置水浴上加热去尽硫化氢，加注射用水使成 1000 ml，加活性炭 5 g，置 70～80°水浴上加热搅拌 30 分钟，放冷，置冰箱中冷藏 24 小时，滤过，滤液再用活性炭 5 g 处理一次，立即滤过，滤液加 5 %氢氧化钠溶液调节 pH 值至 8.5～9.0，滤过，灌封，灭菌，即得。

【性状】 本品为棕红色的澄明液体。

【鉴别】 取本品 4 ml，置水浴上蒸干，残渣加甲醇 4 ml 使溶解，滤过，滤液照空心莲子草项下的鉴别法(376 页)试验，显相同的反应。

【检查】 **pH 值** 应为 6.0～8.0(附录42页)。

重金属 取本品 25 ml，置坩埚中，在水浴上浓缩成糖浆状，缓缓炽灼至完全炭化，放冷，加硫酸 1 ml，使均匀湿润，加热至硫酸除尽，放冷，加硝酸 0.5 ml，炽灼至氧化氮除尽后，在 500～600°炽灼至完全灰化，放冷，加盐酸 2 ml，置水浴上蒸干，精密加水 25 ml 使残渣完全溶解。精密量取溶液 20 ml，置 50 ml 比色管中，加氢氧化钠试液使对石蕊试纸呈中性后，加维生素 C 0.5 g 与稀醋酸 2 ml，加水至 25 ml，再加硫化氢试液 10 ml，摇匀，如显色，与标准铅溶液 1.4 ml 用同一方法处理后的颜色比较，不得更深，即

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

含重金属不得过千万分之七。

钾盐 精密量取重金属检查项下留在坩埚中的溶液 1 ml，置 20 ml 量瓶中，加水至刻度，摇匀，根据钾含量多少，精密量取稀释液 0.4～1 ml（使钾含量在 25～50 μg 之间），滴加于四苯硼钠溶液（取四苯硼钠 2 g，加水 100 ml 溶解后，加活性炭 0.5 g，搅拌 10 分钟，滤过，滤液用稀盐酸调节 pH 值至 7.0，备用。临用前再加等体积的 *N*/10 醋酸钠液 90 ml 与 *N*/100 醋酸液 10 ml 制成的缓冲液，混匀，即得）4 ml 与水适量的混合液中，使滴加后的总体积恰为 5 ml，滴加时注意不断振摇，放置 5 分钟。照分光光度法（附录32页），以四苯硼钠溶液 4 ml 加水 1 ml 的溶液为空白，在 480 nm 的波长处测定吸收度。另精密量取标准钾溶液（精密称取干燥至恒重的硫酸钾 0.7805 g，置 100 ml 量瓶中，加水使溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取 10 ml，置 1000 ml 量瓶中，加水至刻度，摇匀。每 1 ml 中含钾 35 μg）1 ml，照上述方法加入四苯硼钠溶液 4 ml 中，测定吸收度。根据两者测定值，计算出供试液中钾的含量。本品每 100 ml 中含钾盐量以钾计算，不得过 200 mg。

热原 取本品，依法检查（附录53页），剂量按家兔体重每 1 kg 注射 10 ml，应符合规定。

安全试验 取体重 17～20 g 的健康小白鼠 5 只，分别由尾静脉注射本品 0.5 ml，在 48 小时内不得有死亡。如有死亡时，应另取体重 18～19 g 的小白鼠 10 只重新试验，全部小白鼠在 48 小时内不得有死亡。

溶血试验 取本品 0.3 ml，加生理盐水 2.2 ml 及2%兔红细胞生理盐水混悬液 2.5 ml，摇匀，置 36.5°±0.5°恒温水浴中，观察 3 小时，不得有溶血现象。

其他 应符合注射剂项下有关的各项规定（附录 7 页）。

【功能与主治】 同空心莲子草。

【用法与用量】 静脉滴注，按体重每 1 kg 注射 2～4 ml，用等渗或高渗葡萄糖注射液稀释 5 倍后，每分钟滴注 20～40 滴。

【注意】 对已造成病理性损害及其它合并症的病人，应配合其它药物治疗，以提高疗效。使用本品后出现荨麻疹，应对症处理，重复使用再次出现者应停药。

【规格】 20 ml

【贮藏】 遮光，密闭保存。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

降　　香

Jiangxiang

LIGNUM DALBERGIAE ODORIFERAE

本品为豆科植物降香檀 Dalbergia odorifera T. Chen 树干和根的干燥心材。全年均可采收，除去边材，阴干。

【性状】 本品呈扭曲长条形或不规则碎块。表面紫红色或红褐色，有致密的纹理，纵断面常不整齐。质硬，有油性。气香，味微苦。

以色紫红、质坚实、富油性、香气浓者为佳。

【鉴别】 (1) 本品粉末棕紫色。具缘纹孔导管大多破碎，完整者直径 56～204 μm，含红棕色块状物。纤维成束，淡紫棕色，直径 8～26 μm，周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。射线宽 1～3 列细胞，高 2～8 细胞，壁稍厚，有纹孔。草酸钙方晶直径 6～17 μm。

(2) 取本品粉末约 1 g，加石油醚 10 ml，浸渍 15 分钟，时时振摇，滤过，滤液挥干后，残渣加 5 %香草醛的硫酸溶液 1～2 滴，即显棕红色，放置后渐变紫红色。

(3) 取本品粉末约 3 g，加水 50 ml，置水浴上加热 20 分钟，滤过，滤液加醋酸乙酯 10 ml，振摇，分取醋酸乙酯层，蒸干，残渣加乙醇 10 ml 使溶解，滤过。取滤液 1 ml，加镁粉少量与盐酸数滴，微热，即显紫红色。

【炮制】 除去杂质，劈成小块，碾成细粉或镑片。

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 行气止痛，活血止血。用于心胸闷痛，脘胁刺痛；外治跌扑出血。

【用法与用量】 9～15 g；外用适量，研末敷患处。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

细　　辛

Xixin

HERBA ASARI

本品为马兜铃科植物北细辛 Asarum heterotropoides Fr. Schmidt var. mandshuricum

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

(Maxim.) Kitag. 或华细辛 Asarum sieboldii Miq. 的干燥全草。夏季果熟期采挖，除去泥沙，阴干。

【性状】 **北细辛** 常卷缩成团。根茎横生呈不规则圆柱形，具短分枝，长1～10 cm，直径0.2～0.4 cm；表面灰棕色，粗糙，有环形的节，节间长2～3 mm，分枝顶端有碗状的茎痕。根细长，密生节上，长10～20 cm，直径0.1 cm；表面灰黄色，平滑或有纵皱纹；质脆，易折断，断面黄白色。基生叶1～3片，具长柄；叶片心形至肾状心形，全缘，先端急尖，基部深心形，长4～10 cm，宽6～12 cm，表面淡绿色。有的有花，花多皱缩，钟形，暗紫色；蒴果半球形。气辛香，味辛辣、麻舌。

栽培品的根茎多分枝，长5～15 cm，直径0.2～0.6 cm。根长15～40 cm，直径0.1～0.2 cm。叶甚多。

华细辛 根茎长5～20 cm，叶片较薄，心形，先端渐尖。气味较弱。

均以根多、色灰黄、叶色绿、气味浓者为佳。

【炮制】 除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，阴干。

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 祛风散寒，止痛。用于风寒头痛，痰饮咳喘，关节疼痛，鼻塞，牙痛。

【用法与用量】 1～3 g。

【注意】 肾功能不正常者慎服。不宜与藜芦同用。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

玳瑁

Daimao

CARAPAX ERETMOCHELYDIS

本品为海龟科动物玳瑁 Eretmochelys imbricata (L.) 的背甲。多于春末夏初捕捉，用沸水烫后，剥下甲片；或将玳瑁倒悬，用沸醋浇泼，使甲片脱落；洗净，干燥。

【性状】 本品呈近长方形、菱形或扇形板片状，长8～35 cm，宽5～25 cm，中间较厚，可达0.4 cm。外表面光滑，淡黄棕色，对光透视可见深棕色条状或点状云彩，边缘较薄，呈不整齐的锯齿状，有近平行的层状沟纹。内表面有纵横交错的白色沟纹，排成云彩状图案。脊角板中间有隆起的棱脊。气微腥，味淡。

千金网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

以片大而厚、半透明、斑纹显著者为佳。

【鉴别】 取本品的醇浸液，置紫外光灯下观察，显淡蓝绿色荧光。

【炮制】 刷净，磨成细粉或用温水浸软，切成细丝，干燥。

【性味】 甘，寒。

【功能与主治】 定惊，清热解毒。用于热病神昏、谵语、痉厥。

【用法与用量】 3～6 g，多入丸散或水磨服。

【贮藏】 置干燥处。

珍　　珠

Zhenzhu

MARGARITA

本品为珍珠贝科动物合浦珠母贝 Pteria martensii (Dunker)、蚌科动物三角帆蚌 Hyriopsis cumingii (Lea)、褶纹冠蚌 Cristaria plicata (Leach)或背角无齿蚌 Anodonta woodiana (Lea) 等双壳类动物受刺激形成的珍珠。自动物体内取出，洗净，干燥。

【性状】 本品呈类球形、长圆形、卵圆形或棒形，直径 1.5～8 mm。表面类白色、浅粉红色、浅黄绿色或浅蓝色，半透明，光滑或微有凹凸，具特有的彩色光泽。质坚硬，破碎面现层纹。无臭，无味。

以纯净、质坚、有彩光者为佳。

【鉴别】 (1) 本品粉末类白色，不规则碎块半透明，有光泽，表面观颗粒性，有的可见细密波状纹理。

本品磨片具同心层纹。

(2) 取本品置紫外光灯下观察，显浅蓝紫色或亮黄绿色荧光，通常环周部分较明亮。

【炮制】 取洗净的珍珠，捣碎，照水飞法（附录17页）水飞或研成极细粉。

【性味】 甘、咸，寒。

【功能与主治】 平肝，定惊，安神，解毒，生肌。用于癫痫，小儿惊风，心悸失眠；外治角膜云翳，咽喉、口舌肿痛糜烂，溃疡久不收口。

【用法与用量】 0.3～1 g；外用适量。多入丸散用。

【贮藏】 密闭保存。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

珍　珠　母

Zhenzhumu

CONCHA MARGARITIFERA USTA

本品为蚌科动物三角帆蚌 Hyriopsis cumingii (Lea)、射线裂脊蚌 Schistodesmus lampreyanus (Baird et Adams)、背角无齿蚌 Anadonta woodiana (Lea)、褶纹冠蚌 Cristaria plicata (Leach)、背瘤丽蚌 Lamprotula leai (Griffith et Pidgeon) 的蚌壳或珍珠贝科动物合浦珠母贝 Pteria martensii (Dunker) 的贝壳经煅烧而成。

【性状】 本品呈不规则的片块状，多破碎，大小厚薄不一。一面浅粉红色，有彩色光泽，习称"珠光"，有的有瘤状突起，偶有黑色外皮残留；另一面乳白色，平滑，有光泽，有的有小凹陷或圆形、半圆形的孔洞。质松脆，易碎成片状或可层层剥离。无臭，味淡。

以块大、色白、有"珠光"者为佳。

【鉴别】 取本品，加稀盐酸，即发生大量气泡，滤过，滤液显钙盐的各种鉴别反应(附录40页)。

【炮制】 除去杂质，敲碎。未煅者照煅法（附录19页）煅至酥松。

【性味】 甘、咸，寒。

【功能与主治】 平肝，潜阳，定惊。用于头目眩晕，耳鸣，心悸失眠，烦躁不安，惊风，衄血。

【用法与用量】 10～25 g，先煎。

【贮藏】 置干燥处，防尘。

荆　芥

Jingjie

HERBA SCHIZONEPETAE

本品为唇形科植物荆芥 Schizonepeta tenuifolia Briq. 的干燥地上部分。夏、秋二

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

季花开到顶、穗绿时采割，除去杂质，晒干。

【性状】 本品茎呈方柱形，上部有分枝，长 50～80 cm，直径 0.2～0.4 cm；表面淡黄绿色或淡紫红色，被短柔毛；体轻，质脆，断面类白色。叶对生，多已脱落，叶片3～5 羽状分裂，裂片细长。穗状轮伞花序顶生，长 2～9 cm，直径约 7 mm。花冠多脱落，宿萼钟状，先端 5 齿裂，淡棕色或黄绿色，被短柔毛；小坚果棕黑色。气芳香，味微涩而辛凉。

以色淡黄绿、穗长而密、香气浓者为佳。

【鉴别】 本品粉末黄棕色。宿萼表皮细胞垂周壁深波状弯曲。腺鳞头部 8 细胞，直径 96～112 μm；柄单细胞，棕黄色。小腺毛头部 1～2 细胞；柄单细胞。非腺毛 1～6 细胞，大多具壁疣。外果皮细胞表面观多角形，壁粘液化，胞腔含棕色物。内果皮石细胞淡棕色，垂周壁深波状弯曲，密具纹孔。纤维直径 14～43 μm，壁平直或微波状。

【炮制】 **荆芥** 除去杂质，喷淋清水，切段，晒干。

荆芥炭 取荆芥段，照炒炭法(附录19页)炒至表面黑褐色。

荆芥穗 摘取花穗。

【性味】 辛，微温。

【功能与主治】 生用解表散风，透疹；炒炭止血。用于感冒，头痛，麻疹不透，荨麻疹初期，疮疖；炒炭治便血，崩漏。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

茜　草

Qiancao

RADIX RUBIAE

本品为茜草科植物茜草 Rubia cordifolia L. 的干燥根及根茎。春、秋二季采挖，除去泥沙，干燥。

【性状】 本品根茎呈结节状，丛生粗细不等的根。根呈圆柱形，略弯曲，长 10～25 cm，直径 0.2～1 cm；表面红棕色或暗棕色，具细纵皱纹及少数细根痕；皮部脱落处呈黄红色。质脆，易折断，断面平坦，皮部狭，紫红色，木部宽广，浅黄红色，可见多数小孔。无臭，味微苦，久嚼刺舌。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

以条粗长、外皮色红棕、断面色黄红者为佳。

【鉴别】 本品根的横切面：木栓层为6～12列细胞，含棕色物。皮层薄壁细胞有时含红棕色颗粒状物。韧皮部细胞较小。形成层不甚明显。木质部占根的主要部分，全部木化，射线不明显。薄壁细胞含草酸钙针晶束。

【炮制】 茜草 除去杂质，洗净，润透，切片或段，干燥。

茜草炭 取茜草片或段，照炒炭法(附录19页)炒至内部焦黑色。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 凉血，止血，祛瘀，通经。用于吐血，衄血，崩漏，经闭，跌扑损伤。

【用法与用量】 6～9 g。

【贮藏】 置干燥处。

荜　　茇

Bibo

FRUCTUS PIPERIS LONGI

本品为胡椒科植物荜茇 Piper longum L. 的干燥未成熟或成熟果穗。9月果穗由绿变黑时采收，除去杂质，晒干。

【性状】 本品呈圆柱形，稍弯曲，由多数小浆果集合而成，长1.5～3.5 cm，直径0.3～0.5 cm。表面黑褐色或棕色，有斜向排列整齐的小突起，基部有果穗梗残存或脱落。质硬而脆，易折断，断面不整齐，颗粒状。小果球形，直径约1 mm。有特异香气，味辛辣。

以肥大、饱满、坚实、色黑褐、气味浓者为佳。

【鉴别】 (1) 本品粉末灰褐色。石细胞类圆形、长卵形或多角形，直径25～61 μm，长至170 μm，壁较厚，有的层纹明显。油细胞类圆形，直径25～66 μm。种皮细胞红棕色，长多角形，壁连珠状增厚。淀粉粒细小，常聚集成团块。

(2) 取本品粉末少量，加硫酸1滴，呈鲜红色，渐变红棕色，后转棕褐色。

【炮制】 除去杂质，用时捣碎。

【性味】 辛，热。

【功能与主治】 温中，散寒，止痛。用于胸腹冷痛，呕吐，腹泻，牙痛。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【用法与用量】 1.5～3 g；外用适量，研末塞龋齿孔中。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防蛀。

荜　澄　茄

Bichengqie

FRUCTUS LITSEAE

本品为樟科植物山鸡椒 Litsea cubeba (Lour.) Pers. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收，除去杂质，晒干。

【性状】 本品呈类球形，直径 4～6 mm。表面棕褐色至黑褐色，有网状皱纹。基部偶有宿萼及细果梗。除去外皮可见硬脆的果核，破开后，内含种子 1 粒，具肥厚子叶 2 片，黄棕色，富油性。气芳香，味稍辣而微苦。

以粒大、油性足、香气浓者为佳。

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 温中，祛寒，健胃。用于脘腹冷痛，呕吐腹泻，食欲不振。

【用法与用量】 1.5～3 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

草　乌

Caowu

RADIX ACONITI KUSNEZOFFII

本品为毛茛科植物北乌头 Aconitum kusnezoffii Reichb. 的干燥块根。秋季茎叶枯萎时采挖，除去须根及泥沙，干燥。

【性状】 本品呈不规则圆锥形，略弯曲，长 2～7 cm，直径 0.6～1.8 cm。顶端常有茎痕或残茎，表面灰褐色或黑褐色，皱缩，有纵皱纹。质硬，断面灰白色或暗灰色，可见多角形的形成层环纹。无臭，味辛辣、麻舌。

以个大、质坚实、断面色灰白者为佳。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【鉴别】（1）本品横切面：后生皮层为棕黄色木栓化细胞；皮层薄壁组织有的可见石细胞，单个散在或2～5个成群，类长方形、方形或长圆形，胞腔大；内皮层明显。韧皮部宽广，筛管群随处可见。形成层不规则多角形。木质部导管1～4列或数个相聚，位于形成层角隅的内侧。髓部较大。薄壁细胞充满淀粉粒。

粉末棕褐色。淀粉粒甚多，单粒类球形或半圆形，直径3～28 μm，脐点点状、裂缝状或星状；复粒由2～10余粒组成。石细胞单个散在或2～5个成群，类方形、长方形或长圆形，直径37～160 μm，长74～221 μm，壁稍厚，纹孔明显，有的含棕色物。具缘纹孔及网纹导管多见。

（2）取本品粉末约5 g，加乙醚50 ml，振摇均匀后，加氨试液2 ml，强力振摇10分钟，滤过。取滤液10 ml，置白瓷皿中，徐徐挥尽乙醚，残渣加磷酸6～8滴，置小火上微热，呈紫堇色；另取滤液10 ml，置分液漏斗中，加$N/2$硫酸液20 ml，振摇提取，分取酸液适量，加$N/2$硫酸液稀释约10倍后，以$N/2$硫酸液作空白，照分光光度法（附录32页）测定，在233±1 nm与274±1 nm的波长处有最大吸收。

【炮制】 **生草乌** 除去杂质，洗净，干燥。

制草乌 取净草乌，大小个分开，用水或饱和的生石灰水浸泡至内无干心，取出，加水煮沸4～6小时，至取大个及实心者切开内无白心、口尝微有麻舌感时，取出，晾至六成干或闷润后切片，干燥。照下法试验，应符合规定：

取制草乌粗粉20 g，置250 ml碘瓶中，加乙醚150 ml，振摇10分钟，加氨试液10 ml，振摇30分钟，放置1～2小时，分取醚液，蒸干，加无水乙醇2 ml使溶解。照薄层层析法（附录38页）试验，吸取上述溶液6 μl，点于碱性氧化铝薄层板上，以己烷-醋酸乙酯（1:1）为展开剂，展开后，喷以碘化钾碘试液与碘化铋钾试液的等容混合液显色，用乌头碱10 μg作对照，在相同的位置上出现的斑点应小于对照的斑点或不出现斑点。

【性味】 辛、苦，热；有大毒。

【功能与主治】 祛风湿，散寒，止痛。用于风寒湿痹，肢体、关节冷痛，坐骨神经痛，腹中寒痛，跌扑剧痛。

【用法与用量】 1.5～4.5 g，一般炮制后用，宜先煎、久煎。

【注意】 生品内服宜慎。孕妇忌服。不宜与半夏、天花粉、瓜蒌、白蔹、白及、贝母、犀角同用。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

草　乌　叶

Caowuye

FOLIUM ACONITI KUSNEZOFFII

本品系蒙古族习用药材，蒙古文名为 ᠪᠣᠤᠯᠠᠭ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠠᠭᠤᠪᠤ（泵瓦音·那布其）；为毛茛科植物北乌头 Aconitum kusnezoffii Reichb. 的干燥叶。夏季叶茂盛花未开时采收，除去杂质，及时干燥。

【性状】 本品多皱缩卷曲、破碎，完整叶片展平后3全裂，长5～12cm，宽10～17cm，灰绿色或黄绿色。中间裂片菱形，渐尖，近羽状深裂，侧裂片2深裂；小裂片披针形或卵状披针形。上表面微被柔毛，下表面无毛。叶柄长2～6cm。质脆。气微，味微咸辛。

以色绿者为佳。

【鉴别】 （1）本品粉末黄绿色。气孔为不定式。表皮毛多呈镰刀状，壁具疣状突起。

（2）取本品粉末约1g，加含0.5%盐酸的乙醇20ml，热浸10分钟，滤过，滤液加氨试液使成中性，置水浴上蒸干，残渣加2%盐酸溶液1～2ml使溶解，滤过。将滤液分置二支试管中，一管加碘化铋钾试液1滴，发生棕黄色沉淀；另一管加硅钨酸试液1滴，发生灰白色沉淀。

【性味】 辛、涩，平；有小毒。

【功能与主治】 清热，消炎，止痛。用于温热病发热，肠炎，头痛，牙痛。

【用法与用量】 1～1.2g，多入丸散用。

【注意】 孕妇慎服。

【贮藏】 置干燥处。

草　血　竭

Caoxuejie

RHIZOMA POLYGONI PALEACEI

本品为蓼科植物草血竭 Polygonum paleaceum Wall. 的干燥根茎。秋季采挖，除去

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

须根及泥沙，干燥。

【性状】 本品呈扁圆柱形，常弯曲，两端略尖，长2～6 cm，直径0.8～2 cm。表面紫褐色至黑褐色，一面隆起，另一面稍有凹槽，通体密具粗环纹，有残留须根或根痕。质硬，断面红棕色或灰棕色，可见筋脉点(维管束)排列成环。无臭，味涩、微苦。

以条粗、表面色紫褐、断面色红棕者为佳。

【炮制】 除去杂质，略泡，洗净，润透，切片，晒干。

【性味】 苦、涩，微温。

【功能与主治】 破瘀，调经，止血，消食。用于跌扑损伤，血瘀经闭，食积胃痛；外治外伤出血。

【用法与用量】 3～9 g；外用适量，研粉撒敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

草　红　藤

Caohongteng

HERBA SHUTERIAE

本品为豆科植物有毛宿苞豆 Shuteria pampaniniana Hand.-Mazz. 的干燥全草。夏、秋二季茎、叶茂盛时采收，除去杂质，扎成小把，晒干。

【性状】 本品根细小。茎圆柱形，弯曲，多节，节上分枝，长50～200 cm，直径约0.1 cm；表面紫褐色、深棕色或棕红色；老茎略粗糙，微具纵皱纹，无毛或有稀疏柔毛；嫩茎有明显的纵棱及灰白色柔毛；质脆，易折断，断面灰白色。三出复叶互生，总柄细长，棕色，具长柔毛；小叶宽椭圆形或菱状倒卵形，长0.5～3 cm，宽0.4～2.5 cm；先端钝圆，顶处有小凸尖，全缘；上表面黄绿色，下表面浅绿色，主脉棕色或浅棕色，两面均被白色伏贴柔毛，下表面尤密；总柄及两侧小叶柄基部各具托叶2片。花少见。荚果扁平，棕褐色或黄绿色。种子3～5粒，矩圆形，暗绿色，有黑斑，具光泽。气微，味微苦。

【炮制】 除去杂质，稍润，切段，晒干。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 消炎，解毒，清肺。用于阑尾炎，乳腺炎，腮腺炎，肺结核咳嗽。

【用法与用量】 9～30 g。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【贮藏】 置干燥处。

草豆蔻

Caodoukou

SEMEN ALPINIAE KATSUMADAI

本品为姜科植物草豆蔻 Alpinia katsumadai Hayata 的干燥近成熟种子。夏、秋二季采收略变黄的果实，晒至九成干，或用沸水略烫，晒至半干，除去果皮，取出种子团，晒干。

【性状】 本品种子团呈圆球形，直径 1.5～2.7 cm。表面灰褐色，中有黄白色的隔膜，将种子团分成 3 瓣，每瓣有种子多数，粘连紧密，略光滑，不易散落。种子为卵圆状多面体，长 3～5 mm，直径约 3 mm，外被淡棕色膜质的假种皮，种脊为 1 条纵沟，一端有种脐；质硬，破开后可见灰白色种仁(胚乳)。气香，味辛、微苦。

以个大、饱满、气味浓者为佳。

【鉴别】 本品横切面：假种皮有时残存，为多角形薄壁细胞。种皮表皮细胞类圆形，壁较厚；下皮为 1～3 列薄壁细胞，略切向延长；色素层为数列棕色细胞，其间散有类圆形油细胞 1～2 列，直径约 50 μm；内种皮为 1 列栅状石细胞，棕红色，内壁与侧壁极厚，胞腔小，内含硅质块。外胚乳细胞含淀粉粒及草酸钙方晶和少数细小簇晶。内胚乳细胞含糊粉粒。

【炮制】 除去杂质，用时捣碎。

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 燥湿，暖胃。用于脘腹胀满、冷痛，嗳气呃逆，寒湿吐泻。[1]

【用法与用量】 3～6 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

草果

Caoguo

FRUCTUS TSAOKO

本品为姜科植物草果 Amomum tsao-ko Crevost et Lemaire 的干燥成熟果实。秋季

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

果实成熟时采收，除去杂质，晒干或低温干燥。

【性状】 本品呈长椭圆形，具三钝棱，长 2～4 cm，直径 1～2.5 cm。表面灰棕色至红棕色，具纵沟及棱线，顶端有 1 宿萼脱落的圆形突起，基部有果梗或果梗痕。果皮质坚韧，易纵向撕裂。剥去外皮，中间有黄棕色隔膜，将种子团分成 3 瓣，每瓣有种子多为 8～11 粒。种子圆锥状多面体，直径约 5 mm；表面红棕色，外被灰白色膜质的假种皮，种脊为 1 条纵沟，尖端有凹状的种脐；质硬，破开后可见灰白色种仁（胚乳）。有特异香气，味辛、微苦。

以个大、饱满、色红棕、气味浓者为佳。

【鉴别】 本品种子横切面：假种皮薄壁细胞含淀粉粒。种皮表皮细胞棕色，长方形，壁较厚；下皮为 1 列薄壁细胞，含黄色物；油细胞层为 1 列油细胞，类方形或长方形，切向 42～162 μm，径向 48～68 μm，含黄色油滴；色素层为数列棕色细胞，皱缩。内种皮为 1 列栅状石细胞，棕红色，内壁与侧壁极厚，胞腔小，内含硅质块。外胚乳细胞含淀粉粒及少数细小草酸钙簇晶及方晶。内胚乳细胞含糊粉粒及淀粉粒。

【炮制】 **草果仁** 取草果，照清炒法（附录18页）炒至焦黄色并微鼓起，用时捣碎，取仁。

姜草果仁 取净草果仁，照姜汁炙法（附录19页）用姜汁微炒。

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 燥湿健脾，除痰截疟。用于脘腹胀满冷痛，反胃，呕吐，食积，痰饮，疟疾。

【用法与用量】 2.5～4.5 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

茵　　陈

Yinchen

HERBA ARTEMISIAE SCOPARIAE

本品为菊科植物滨蒿 Artemisia scoparia Waldst. et Kit. 或茵陈蒿 Artemisia capillaris Thunb. 的干燥幼苗。春季幼苗高 6～10 cm 时采收，除去老茎及杂质，晒干。

【性状】 本品多卷缩成团状，灰白色或灰绿色，全体密被白色茸毛，绵软如绒。茎细小，长 1.5～2.5 cm，直径 0.1～0.2 cm，除去表面白色茸毛后可见明显纵纹；质脆，易

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

折断。叶具柄，展平后叶片呈一至三回羽状分裂，叶片长 1～3 cm，宽约 1 cm；小裂片呈卵形或稍呈倒披针形、条形，先端锐尖。气清香，味微苦。

以质嫩、绵软、色灰白、香气浓者为佳。

【鉴别】 取本品粗粉 1 g，加乙醇 20 ml，置水浴中回流半小时，滤过，滤液呈淡黄绿色，置紫外光灯下观察，显紫红色荧光。

【炮制】 除去残根及杂质，搓碎，筛去灰屑。

【性味】 苦、辛，微寒。

【功能与主治】 清温热，利胆退黄。用于黄疸，肝炎，尿少色黄。

【用法与用量】 6～18 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防潮。

茯　　苓

Fuling

PORIA

本品为多孔菌科真菌茯苓 Poria cocos (Schw.) Wolf 的干燥菌核。多于 7～9 月采挖，挖出后除去泥沙，堆置"发汗"后，摊开晾至表面干燥，再"发汗"，反复数次至现皱纹、内部水分大部散失后，阴干，称为"茯苓个"；或将鲜茯苓按不同部位切制，阴干，分别称为"茯苓皮"及"茯苓块"。

【性状】 **茯苓个** 呈类球形、椭圆形、扁圆形或不规则团块，大小不一。外皮薄而粗糙，棕褐色至黑褐色，有明显的皱缩纹理。体重，质坚实，断面颗粒性，有的具裂隙，外层淡棕色，内部白色，少数淡红色，有的中间抱有松根。无臭，味淡，嚼之粘牙。

以体重坚实、外皮色棕褐、无裂隙、断面色白细腻、嚼之粘性强者为佳。

茯苓皮 为削下的茯苓外皮，形状大小不一。外面棕褐色至黑褐色，内面白色或淡棕色。质较松软，略具弹性。

茯苓块 为去皮后切制的茯苓，呈块片状，大小不一。白色、淡红色或淡棕色。

【鉴别】 (1) 本品粉末灰白色。不规则颗粒状团块及分枝状团块无色，遇水合氯醛液渐溶化。菌丝无色或淡棕色，细长，稍弯曲，有分枝，直径 3～8 μm，少数至 16 μm。

(2) 取本品粉末 1 g，加丙酮 10 ml，置水浴上边加热边振摇，10 分钟后，滤过，滤液蒸干，残渣加冰醋酸 1 ml 使溶解，再加硫酸 1 滴，显淡红色，后变淡褐色。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

(3) 取茯苓片或粉末少量，加碘化钾碘试液1滴，显深红色。

【炮制】 取茯苓个，浸泡，洗净，润后稍蒸，及时切取茯苓皮和茯苓块，晒干。

【性味】 甘、淡，平。

【功能与主治】 渗湿，健脾，宁心。用于痰饮，水肿，小便不利，泄泻，心悸，眩晕。

茯苓皮 利水消肿。用于水湿浮肿。

【用法与用量】 茯苓块9～15 g。茯苓皮15～30 g。

【贮藏】 置干燥处，防潮。

茶　　油

Chayou

OLEUM CAMELLIAE

本品为山茶科植物油茶 Camellia oleifera Abel 或小叶油茶 Camellia meiocarpa Hu, ms. 的成熟种子用压榨法得到的脂肪油。

【性状】 本品为淡黄色的澄清液体。

本品在氯仿、乙醚或二硫化碳中易溶，在乙醇中微溶。

比重 本品的比重(附录26页)在25°时为0.909～0.915。

折光率 本品的折光率(附录32页)在25°时为1.466～1.470。

碘值 本品的碘值(附录52页第一法)为80～88。

皂化值 本品的皂化值(附录52页)为185～196。

酸值 本品的酸值(附录51页)不大于3。

【鉴别】 取本品2 ml，小心加入新制放冷的发烟硝酸-硫酸-水(1:1:1)10 ml中，放置片刻，接界处显蓝绿色。

【检查】 **桐油** 取本品3 ml，加石油醚3 ml，溶解成澄清液，加亚硝酸钠结晶少量与稀硫酸数滴，即有气泡发生，强力振摇后，静置观察，油液层应澄清，油液与酸液两液层分界处亦不得显浑浊。

棉子油 取本品5 ml，置试管中，加含硫黄的二硫化碳溶液(1→100)与戊醇的等容混合液5 ml，置饱和食盐水浴中，注意缓缓加热至泡沫停止(除去二硫化碳)，继续加热使水浴保持沸腾，2小时内不得显红色。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【用途】 作为注射用茶油的原料及软膏基质。

【贮藏】 遮光，密封，置阴凉处保存。

茺 蔚 子

Chongweizi

FRUCTUS LEONURI

本品为唇形科植物益母草 Leonurus heterophyllus Sweet 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采割地上部分，晒干，打下果实，除去杂质。

【性状】 本品呈三棱形，长 2～3 mm，宽约 1.5 mm。表面灰棕色至灰褐色，有深色斑点，一端稍宽，平截状，另一端渐窄而钝尖。果皮薄，子叶类白色，富油性。无臭，味苦。

以粒大、饱满者为佳。

【性味】 辛、苦，微寒。

【功能与主治】 活血调经，清肝明目。用于月经不调，经闭，痛经，目赤肿痛，结膜炎，前房出血，头晕胀痛。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

胡 芦 巴

Huluba

SEMEN TRIGONELLAE

本品为豆科植物胡芦巴 Trigonella foenum-graecum L. 的干燥成熟种子。夏、秋二季果实成熟时采割植株，晒干，打下种子，除去杂质。

【性状】 本品略呈斜方形，长 3～4 mm，宽 2～3 mm。表面淡黄色至淡黄棕色，两侧各具深斜沟 1 条，相交处有点状种脐。质坚硬。气香，味微苦。

以粒大、饱满、坚实者为佳。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【炮制】 **胡芦巴** 除去杂质，洗净，晒干。

炒胡芦巴 取净胡芦巴，照清炒法(附录18页)微炒。

【性味】 苦，温。

【功能与主治】 温肾，祛寒，止痛。用于下腹冷痛，疝气。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置干燥处。

胡 黄 连

Huhuanglian

RHIZOMA PICRORHIZAE

本品为玄参科植物胡黄连 Picrorhiza scrophulariflora Pennell 的干燥根茎。秋季采挖，除去须根及泥沙，晒干。

【性状】 本品呈圆柱形，多弯曲，偶有分枝，长 3～12 cm，直径 0.3～1 cm。表面灰棕色至暗棕色，有环纹及隆起的芽痕或根痕，上端密被暗棕色鳞片状的叶柄残基，外皮易剥落。体轻，质硬而脆，易折断，断面略平坦，棕黄色至暗棕色，有 4～10 个类白色点状维管束，排列成环。气微，味极苦。

以条粗、体轻、质脆、苦味重者为佳。

【鉴别】 (1) 本品粉末经微量升华后，置显微镜下观察，可见针状、针簇状、棒状、板状结晶及球状物。

(2) 取本品粉末 5 g，加水 50 ml，置 60°水浴中温浸 20 分钟，滤过。取滤液 1 ml，加三氯化铁的乙醇溶液 2 滴，发生暗绿色沉淀；另取滤液 1 ml，加 5%α-萘酚的乙醇溶液 2 滴，摇匀，发生黄白色浑浊，缓缓沿管壁加硫酸 0.5 ml，两液接界处显紫色环，振摇后颜色变深，加水稀释发生暗紫色沉淀。

【炮制】 除去杂质，切片或用时捣碎。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清热燥湿。用于低热，目赤，痢疾，黄疸，疳积，痔疮。

【用法与用量】 1.5～9 g。

【贮藏】 置干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

胡颓子叶

Hutuiziye

FOLIUM ELAEAGNI

本品为胡颓子科植物胡颓子 Elaeagnus pungens Thunb. 的干燥叶。秋季采收，晒干。

【性状】 本品稍皱缩，展平后呈椭圆形或长椭圆形，长 4～10 cm，宽 2～5 cm。先端钝或稍尖，基部圆形，边缘微波状而反卷，上表面黄绿色，有光泽，下表面灰白色，被白色鳞片，散生点状褐色鳞斑；叶柄长 0.6～1.2 cm。厚革质。气微，味微涩。

以叶大、色黄绿、上表面具光泽者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，切丝，晒干。

【性味】 酸，平。

【功能与主治】 敛肺，平喘，止咳。用于咳嗽气喘，咯血。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置干燥处。

荔枝草

Lizhicao

HERBA SALVIAE PLEBEIAE

本品为唇形科植物荔枝草 Salvia plebeia R. Br. 的干燥地上部分。夏、秋二季花开穗绿时采收，晒干或鲜用。

【性状】 本品茎呈方柱形，多分枝，长 15～90 cm，直径 0.2～0.8 cm；表面灰绿色至棕褐色，被短柔毛；断面类白色，中空。叶对生，下部常脱落；叶片多皱缩，展平后呈长椭圆状卵形或披针形，长 2～6 cm，边缘有钝齿，两面疏被短柔毛；叶柄长 0.4～1.5 cm。穗状轮伞花序顶生或腋生，花冠多脱落；宿萼钟状，长约 3 mm，灰绿色至淡棕色，被短柔毛；内藏棕色小坚果。体轻，质脆。气芳香，味苦、辛。

以色绿、叶多、穗长、香气浓者为佳。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【炮制】 除去杂质，洗净，稍润，切段，干燥。

【性味】 苦、辛，凉。

【功能与主治】 清热，解毒，凉血，利尿。用于咽喉肿痛，支气管炎，肾炎水肿，痈肿；外治乳腺炎，痔疮肿痛、出血。

【用法与用量】 9～30 g，鲜品 15～60 g，可取汁内服；外用适量，捣烂外敷、塞鼻或煎汤洗。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

荔 枝 核

Lizhihe

SEMEN LITCHI

本品为无患子科植物荔枝 Litchi chinensis Sonn. 的干燥成熟种子。夏季采摘成熟果实，除去果皮及肉质假种皮，洗净，晒干。

【性状】 本品呈长圆形或卵圆形，略扁，长 1.5～2.2 cm，直径 1～1.5 cm。表面棕红色或紫棕色，平滑，有光泽，略有凹陷及细波纹。一端有类圆形黄棕色的种脐，直径约 7 mm。质硬，破开后可见肥厚子叶 2 片，棕黄色。气微，味微甘、苦、涩。

以粒大、饱满、光亮者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，晒干，用时捣碎。

【性味】 甘、微苦，温。

【功能与主治】 理气，祛寒，止痛。用于疝气痛，睾丸肿痛。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

南五味子根

Nanwuweizigen

RADIX KADSURAE LONGIPEDUNCULATAE

本品为木兰科植物南五味子 Kadsura longipedunculata Finet et Gagnep. 的干燥根。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

全年均可采挖，除去泥沙，晒干。

【性状】 本品呈圆柱形，常弯曲，长短不一，直径 1～2.5 cm。表面淡灰棕色至紫褐色，有纵皱纹及深陷的横裂纹，有的皮部断裂露出木部，形成长短不等的节。断面皮部淡紫褐色，纤维性，木部淡棕黄色，可见明显的小孔。气香，味微苦，有辛凉感。

以皮厚、香气浓者为佳。

【鉴别】 本品粉末棕褐色。淀粉粒单粒类圆形或长圆形，直径 7～30 μm，脐点点状、三叉状或裂缝状，有的可见层纹；复粒由 2～5 粒组成。嵌晶纤维甚多，多碎断，直径 25～42 μm，壁极厚或较厚，外层次生壁中密布细小草酸钙方晶，直径 3～8 μm，有的结晶偏靠于一边。嵌晶石细胞单个散在，类长圆形或类方形，直径 60～80 μm，壁极厚，次生壁中亦密布方晶，直径约至 10 μm。木栓细胞及薄壁细胞均含黄棕色或红棕色树脂状物。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 祛风活血，理气止痛。用于胃、十二指肠溃疡，痛经，腹痛，风湿性关节痛，跌扑损伤。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

南　沙　参

Nanshashen

RADIX ADENOPHORAE

本品为桔梗科植物轮叶沙参 Adenophora tetraphylla (Thunb.) Fisch.、杏叶沙参 Adenophora stricta Miq. 或同属数种植物的干燥根。春、秋二季采挖，除去须根，洗后趁鲜刮去粗皮，洗净，干燥。

【性状】 本品呈圆锥形或圆柱形，略弯曲，长 7～27 cm，直径 0.8～3 cm。顶端具 1 或 2 个根茎(芦头)，表面黄白色或淡棕黄色，凹陷处常有残留粗皮，上部多有深陷横纹，呈断续的环状，下部有纵纹及纵沟。体轻，质泡，易折断，断面不平坦，黄白色，多裂隙。无臭，味微甘。

以条粗长、色黄白者为佳。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【鉴别】 取本品粗粉 2 g，加水 20 ml，置水浴中加热 10 分钟，滤过，滤液照下述方法试验：

(1) 取滤液 2 ml，加 5% α-萘酚的乙醇溶液 2～3 滴，摇匀，沿试管壁缓缓加入硫酸 0.5 ml，两液接界处即显紫红色环。

(2) 取滤液 2 ml，加新制的碱性酒石酸铜试液 4～5 滴，置水浴中加热 5 分钟，发生红棕色氧化亚铜沉淀。

【炮制】 除去芦头，洗净，润透，切片，干燥。

【性味】 甘，微寒。

【功能与主治】 润肺，化痰，止咳。用于咳嗽痰粘，口燥咽干。

【用法与用量】 9～15 g。

【注意】 不宜与藜芦同用。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

南 鹤 虱

Nanheshi

FRUCTUS DAUCI CAROTAE

本品为伞形科植物野胡萝卜 Daucus carota L. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时割取果枝，晒干，打下果实，除去杂质。

【性状】 本品为双悬果，椭圆形，多裂为悬果瓣。果瓣长 3～4 mm，宽 1.5～2.5 mm；表面淡绿棕色或棕黄色，先端有花柱残基，基部钝圆；背面隆起，具 4 条突起的棱线，沿棱线密生 1 列黄白色的钩刺，刺长达 1.5 mm，棱线间的凹下处散生短柔毛；接合面平坦，有 3 条脉纹，上具柔毛。体轻，质韧。搓碎时有特异香气，味微辛苦。

以粒大、饱满者为佳。

【性味】 辛，平；有小毒。

【功能与主治】 驱虫。用于蛔虫病，虫积腹痛，慢性痢疾。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

枳　　壳

Zhiqiao

FRUCTUS AURANTII

本品为芸香科植物酸橙 Citrus aurantium L. 的干燥未成熟果实。7月果皮尚绿时采收，自中部横切为两半，晒干或低温干燥。

【性状】 本品呈半球形，直径3～5 cm。外皮绿褐色或棕褐色，有颗粒状突起，每个突起的顶端有小凹点，有明显的花柱残痕或果梗痕。果肉厚0.6～1.3 cm，黄白色。质坚硬，不易折断。切面光润而稍隆起，边缘散有1～2列棕黄色的油点，瓤囊7～12瓣，囊内汁胞干缩呈紫黑色，内藏种子。气清香，味苦、微酸。

以外皮色绿褐、果肉厚、质坚硬、香气浓者为佳。

【鉴别】 本品粉末棕色。中果皮细胞形状不一，壁大多不均匀地增厚。瓤囊组织皱缩，淡棕色。草酸钙方晶成片存在于中果皮及瓤囊薄壁组织中。

【炮制】 枳壳　除去杂质，洗净，润透，切片，干燥后筛去碎落的瓤核。

炒枳壳　取枳壳片，照麸炒法(附录18页) 炒至色变深。

【性味】 苦、酸，微寒。

【功能与主治】 行气宽中，消食，化痰。用于胸腹满闷胀痛，食积不化，痰饮，胃下垂，脱肛，子宫脱垂。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防蛀。

枳　　实

Zhishi

FRUCTUS AURANTII IMMATURUS

本品为芸香科植物酸橙 Citrus aurantium L. 的干燥幼果。6月收集脱落的果实，除去杂质，自中部横切为两半，晒干或低温干燥，较小者直接晒干或低温干燥。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 本品呈半球形，少数为球形，直径 0.5～2.5 cm。外皮灰绿色、黑绿色或暗棕绿色，具颗粒状突起和皱纹，有果梗痕或花柱残迹。切面略隆起，黄白色或黄褐色，果肉厚 0.3～1 cm，边缘有油点，中心有紫黑色的瓤，呈车轮形。质坚硬。气清香，味苦、微酸。

以质坚硬、香气浓者为佳。

【炮制】 **枳实** 除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。

炒枳实 取枳实片，照麸炒法(附录18页) 炒至淡黄色。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 行气宽中，消食，化痰。用于胸腹痞满胀痛，食积不化，痰饮，胃下垂，脱肛，子宫脱垂。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防蛀。

柏　子　仁

Baiziren

SEMEN BIOTAE

本品为柏科植物侧柏 Biota orientalis (L.) Endl. 的干燥成熟种仁。秋、冬二季采收成熟种子，晒干，除去种皮，收集种仁。

【性状】 本品呈长卵形或长椭圆形，长 4～7 mm，直径1.5～3 mm。表面黄白色或淡黄棕色，外包膜质的内种皮，顶端略尖有深褐色的小点，基部钝圆。质软油润，断面黄白色，富油性。气微香，味淡。

以粒饱满、色黄白者为佳。

【炮制】 **柏子仁** 除去杂质及残留的种皮。

柏子仁霜 取净柏子仁，碾碎，用纸包裹，加热微炕，压榨去油，碾细。

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 养心，安神，润肠。用于心悸怔忡，失眠，便秘。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防热、防蛀。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

栀　　子

Zhizi

FRUCTUS GARDENIAE

本品为茜草科植物小果栀子 Gardenia jasminoides Ellis var. radicans(Thunb.) Makino 的干燥成熟果实。9～11 月果实成熟呈红黄时采收，除去果梗及杂质，蒸至上气或置沸水中略烫，取出，干燥。

【性状】 本品呈长卵圆形或椭圆形，长 1.5～3.5 cm，直径 1～1.5 cm。表面红黄色或棕红色，具 6 条翅状纵棱，棱间常有 1 条明显的纵脉纹，并有分枝。顶端残存萼片，基部稍尖，有残留果梗。果皮薄而脆，略有光泽；破开后内表面色较浅，有光泽，具 2～3 条隆起的假隔膜。种子多数，集结成团。种子扁卵圆形，深红色或红黄色，表面密具细小疣状突起。气微，味微酸而苦。

以皮薄、饱满、色红黄者为佳。

【鉴别】 (1) 本品粉末红棕色。果皮石细胞类长方形，直径约 10 μm，长约至 110 μm，斜向镶嵌状排列；含晶石细胞类圆形或多角形，直径 17～31 μm，壁厚，胞腔内含草酸钙方晶，直径约 8 μm。种皮石细胞黄色或淡棕色，长多角形、长方形或形状不规则，直径 60～112 μm，长至 230 μm，壁厚，纹孔甚大，胞腔棕红色。草酸钙簇晶直径 19～34 μm。

(2) 取本品粉末 0.2 g，加水 5 ml，置水浴中加热 3 分钟，滤过。取滤液 5 滴，置瓷蒸发皿中，烘干后，加硫酸 1 滴，即显蓝绿色，迅速变为褐色，继转为紫褐色。

【炮制】 **栀子**　除去杂质，打碎。

炒栀子　取净栀子，照清炒法(附录18页)炒至黄褐色。

焦栀子　取净栀子，照炒焦法(附录18页)炒至焦黑色。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 泻火除烦，清热利湿，凉血散瘀。用于热病心烦，黄疸，目赤，衄血，吐血，尿血，热毒疮疡；外治扭挫伤，瘀血肿痛。

【用法与用量】 6～9 g；外用适量，研末调敷。

【贮藏】 置通风干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

枸　杞　子

Gouqizi

FRUCTUS LYCII

本品为茄科植物宁夏枸杞Lycium barbarum L.的干燥成熟果实。夏、秋二季果实呈橙红时采收，晾至皮皱后，再曝晒至外皮干硬、果肉柔软，除去果梗。

【性状】 本品呈类纺锤形，略扁，长6～18 mm，直径3～8 mm。表面鲜红色或暗红色，顶端有小凸起状的花柱痕，基部有白色的果梗痕。果皮柔韧，皱缩；果肉肉质，柔润而有粘性，内含多数扁肾形种子。无臭，味甜、微酸。

以粒大、色红、肉厚、质柔润、籽少、味甜者为佳。

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 滋补肝肾，益精明目。用于目昏，眩晕，耳鸣，腰膝酸软，糖尿病。

【用法与用量】 6～12 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防闷热、防潮、防蛀。

枸　骨　叶（功劳叶）

Gouguye

FOLIUM ILICIS CORNUTAE

本品为冬青科植物枸骨Ilex cornuta Lindl.的干燥叶。秋季采收，除去杂质，晒干。

【性状】 本品呈类长方形或椭圆状长方形，偶有卵圆形，长3～8 cm，宽1.5～4cm。边缘反卷，有硬尖刺5～11个，先端的3刺常等大，边缘至基部各有刺1～4个，大小相间排列，顶端和中部较小的刺常反曲，卵圆形叶无刺。上表面黄绿色或灰绿色，有光泽，下表面灰绿色或灰黄色。叶脉羽状，叶柄长约2 cm。革质，厚而硬。无臭，味微苦。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

以叶大、色绿者为佳。

【性味】 苦，凉。

【功能与主治】 凉血平肝，益肾阴。用于头晕头痛，耳鸣目眩，腰痛，高血压症。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置干燥处。

柿　　蒂

Shidi

CALYX KAKI

本品为柿树科植物柿 Diospyros kaki L. f. 的干燥宿萼。冬季果实成熟时采摘或食用时收集，洗净，晒干。

【性状】 本品呈扁圆形，直径 1.5～2.5 cm。背面黄褐色或红棕色，中部微隆起，中心有果梗或已脱落。边缘较薄，4 裂，裂片多反卷，易碎。腹面黄棕色，密被细绒毛，果实脱落处突起，无毛。质硬而脆。无臭，味涩。

以个大而厚、质硬、色黄褐者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，去柄，晒干或打碎。

【性味】 苦，温。

【功能与主治】 降逆气。用于呃逆。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

威　灵　仙

Weilingxian

RADIX CLEMATIDIS

本品为毛茛科植物威灵仙 Clematis chinensis Osbeck、棉团铁线莲 Clematis hexapetala Pall. 或东北铁线莲 Clematis manshurica Rupr. 的干燥根及根茎。秋季采挖，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

除去泥沙，晒干。

【性状】 **威灵仙** 根茎呈柱状，长 1.5～10 cm，直径 0.3～1.5 cm；表面淡棕黄色，顶端残留茎基，质较坚韧，断面纤维性，下侧着生多数细根。根呈细长圆柱形，稍弯曲，长 7～15 cm，直径 0.1～0.3 cm；表面黑褐色，有细纵纹，有的皮部脱落，露出黄白色木部。质硬脆，易折断，断面皮部较广，木部淡黄色，略呈方形，皮部与木部间常有裂隙。气微，味淡。

棉团铁线莲 根茎呈短柱状，长 1～4 cm，直径 0.5～1 cm。根长 4～20 cm，直径 0.1～0.2 cm；表面棕褐色至棕黑色，断面木部圆形。味咸。

东北铁线莲 根茎呈柱状，长 1～11 cm，直径 0.5～2.5 cm。根较密集，长 5～23 cm，直径 0.1～0.4 cm；表面棕黑色，断面木部近圆形。味辛辣。

均以条长、色黑者为佳。

【鉴别】 本品根的横切面：

威灵仙 表皮细胞外壁增厚，棕黑色。皮层宽，均为薄壁细胞，外皮层切向延长；内皮层明显。韧皮部外侧常有纤维束及石细胞，纤维直径 18～43 μm。形成层明显。木质部全部木化。薄壁细胞含淀粉粒。

棉团铁线莲 外皮层细胞多径向延长，紧接外皮层的 1～2 列细胞壁稍增厚；韧皮部外侧无纤维束及石细胞。

东北铁线莲 外皮层细胞径向延长，老根略切向延长；韧皮部外侧偶有纤维及石细胞；纤维直径 20～32 μm。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切段，干燥。

【性味】 辛、咸，温。

【功能与主治】 祛风湿止痛，通络。用于风湿性关节痛，腰膝酸痛，骨哽咽喉。

【用法与用量】 6～9 g。

【贮藏】 置干燥处。

厚　朴

Houpo

CORTEX MAGNOLIAE OFFICINALIS

本品为木兰科植物厚朴 Magnolia officinalis Rehd. et Wils. 或凹叶厚朴 Magnolia

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

officinalis Rehd. et Wils. var. biloba Rehd. et Wils. 的干燥干皮、根皮及枝皮。4～6月剥取，根皮及枝皮直接阴干；干皮置沸水中微煮后，堆置阴湿处，"发汗"至内表面变紫褐色或棕褐色时，蒸软，取出，卷成筒状，干燥。

【性状】 **干皮** 呈卷筒状或双卷筒状，长 30～35 cm，厚 0.2～0.7 cm，习称"筒朴"；近根部的干皮一端展开如喇叭口，长 13～25 cm，厚 0.3～0.8 cm，习称"靴筒朴"。外表面灰棕色或灰褐色，粗糙，有时呈鳞片状，较易剥落，有明显椭圆形皮孔和纵皱纹，刮去粗皮者显黄棕色；内表面紫棕色或深紫褐色，较平滑，具细密纵纹，划之显油痕。质坚硬，不易折断。断面颗粒性，外层灰棕色，内层紫褐色或棕色，有油性，有的可见多数小亮星。气香，味辛辣、微苦。

根皮(根朴) 呈单筒状或不规则块片；有的弯曲似鸡肠，习称"鸡肠朴"。质硬，较易折断，断面呈纤维性。

枝皮(枝朴) 呈单筒状，长 10～20 cm，厚 0.1～0.2 cm。质脆，易折断，断面呈纤维性。

均以内表面色紫棕、油性足、断面有小亮星，香气浓者为佳。

【鉴别】 (1) 本品横切面：木栓层为 10 余列细胞；有的可见落皮层。皮层外侧有石细胞环带，内侧散有多数油细胞及石细胞群。韧皮部射线宽 1～3 列细胞；纤维多数个成束；亦有油细胞散在。

粉末棕色。纤维甚多，直径 15～32 μm，壁甚厚，有的呈波浪形或一边呈锯齿状，木化，孔沟不明显。石细胞类方形、椭圆形、卵圆形或不规则分枝状，直径 11～65 μm，有时可见层纹。油细胞椭圆形或类圆形，直径 50～85 μm，含黄棕色油状物。

(2) 取本品粗粉 3 g，加氯仿 30 ml，加热回流半小时，滤过，取滤液 15 ml，蒸去氯仿，残渣加乙醇 10 ml 使溶解，滤过。取滤液 3 ml，分置三支试管中，一管加 5%三氯化铁的甲醇(50%)溶液 1 滴，显棕黑色或蓝黑色；一管加硝酸汞溶液(取汞 1 份，加发烟硝酸 1 份溶解后，加水 2 份稀释制成) 1 滴，发生棕色沉淀；另一管加间苯三酚的盐酸溶液(取 10%间苯三酚醇溶液 1 ml，加盐酸 9 ml 制成) 5 滴，显红色。

【炮制】 **厚朴** 洗净，润透，刮去粗皮，切丝，晒干。

姜厚朴 取厚朴丝，照姜汁炙法(附录19页)炒至姜汁吸尽。

【性味】 苦、辛，温。

【功能与主治】 燥湿，导滞，下气，除满。用于脘腹满痛，食积气滞，腹泻，痢疾，气逆喘咳。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

厚　朴　花

Houpohua

FLOS MAGNOLIAE OFFICINALIS

本品为木兰科植物厚朴 Magnolia officinalis Rehd. et Wils. 或凹叶厚朴 Magnolia officinalis Rehd. et Wils. var. biloba Rehd. et Wils. 的干燥花蕾。春季花未开放时采摘，稍蒸后，晒干或低温干燥。

【性状】 本品呈长圆锥形，长 4～7 cm，基部直径 1.5～2.5 cm。红棕色至棕褐色。花被多为 12 片，肉质，外层的呈长方倒卵形，内层的呈匙形。雄蕊多数，花药条形，淡黄棕色，花丝宽而短。心皮多数，分离，螺旋状排列于圆锥形的花托上。花梗长0.5～2 cm，密被灰黄色绒毛。质脆，易破碎。气香，味淡。

以完整、色棕红、香气浓者为佳。

【性味】 苦，微温。

【功能与主治】 理气，化湿。用于胸脘痞闷胀满。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置干燥处，防霉、防蛀。

砂　仁

Sharen

FRUCTUS AMOMI

本品为姜科植物阳春砂 Amomum villosum Lour. 或海南砂 Amomum longiligulare T. L. Wu 的干燥成熟果实。夏、秋间果实成熟时采收，晒干或低温干燥。

【性状】 **阳春砂** 呈椭圆形或卵圆形，有不明显的三棱，长 1.5～2 cm，直径 1～1.5 cm。表面棕褐色，密生刺状突起，顶端有花被的残基，基部常有果梗。果皮薄而软。种子结集成团，具三钝棱，中有白色隔膜，将种子团分成 3 瓣，每瓣有种子 6～15 粒。种子为不规则的多面体，直径 2～3 mm；表面棕红色或暗褐色，有细皱纹，外被淡

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

棕色膜质的假种皮；质硬，破开后可见灰白色种仁(胚乳)。气芳香而浓烈，味辛凉、微苦。

海南砂 呈长椭圆形或卵圆形，有明显的三棱，长 1.5～2 cm，直径 0.8～1.2 cm。表面被片状、分枝的短软刺，基部具果梗痕。果皮厚而硬。种子团较小，每瓣有种子 5～17 粒。种子直径 1.5～2 mm。气味稍淡。

均以个大、坚实、仁饱满、气味浓者为佳。

【鉴别】 本品种子横切面：假种皮有时残存，为长形薄壁细胞。种皮表皮细胞椭圆形，壁较厚；下皮为 1 列薄壁细胞，含黄褐色色素。油细胞层为 1 列油细胞，长方形，切向 76～106 μm，径向 16～25 μm，含黄色油滴；色素层为数列棕色细胞，细胞多角形，排列不规则；内种皮为 1 列栅状石细胞，黄棕色，内壁及侧壁极厚，胞腔小，内含硅质块。外胚乳细胞含淀粉粒及糊粉粒，并有少数细小草酸钙方晶。内胚乳细胞亦含淀粉粒及糊粉粒。

【炮制】 除去杂质，用时捣碎。

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 行气止痛，健脾消胀，安胎止呕。用于脘腹胀痛，食欲不振，恶心呕吐，胎动不安。

【用法与用量】 1.5～6 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

砂 仁 叶 油

Sharenyeyou

OLEUM FOLII AMOMI

本品为姜科植物阳春砂 Amomum villosum Lour. 的新鲜叶经蒸气蒸馏得到的挥发油。

【性状】 本品为无色或淡黄色的澄清液体；有砂仁的香气，味辣。

本品能与无水乙醇、氯仿、石油醚(30～60°)、苯或冰醋酸任意混合，在水中不溶。

比重 本品的比重(附录26页)为 0.860～0.875。

比旋度 本品的比旋度(附录31页)为－25°至－27°。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

折光率 本品的折光率(附录32页)为1.470～1.480。

沸程 取本品，依法测定(附录27页)，在155～177°馏出的数量不得少于80%(ml/ml)。

【检查】 不挥发物 取本品5 ml，置水浴上蒸干，并在150°干燥3小时，遗留残渣不得过3.0%。

重金属 取本品10 ml，加水10 ml与盐酸1滴，振摇后，通硫化氢气使饱和，水层与油层均不得显色。

【功能与主治】 行气，健胃，消胀，止呕。用于脾胃虚寒，脘腹胀痛，恶心呕吐，消化不良。

【用法与用量】 口服，一次0.1～0.3 ml。

【贮藏】 遮光，在阴凉处密封保存。

牵　牛　子（黑、白丑）

Qianniuzi

SEMEN PHARBITIDIS

本品为旋花科植物裂叶牵牛 Pharbitis nil (L.) Choisy 或圆叶牵牛 Pharbitis purpurea (L.) Voigt 的干燥成熟种子。秋末果实成熟、果壳未开裂时采割植株，晒干，打下种子，除去杂质。

【性状】 本品似橘瓣状，长4～8 mm，宽3～5 mm。表面灰黑色(黑丑)或淡黄白色(白丑)。背面有1条浅纵沟，腹面棱线的近端处有1点状种脐，微凹。质硬，横切面可见淡黄色或黄绿色皱缩折叠的子叶，微显油性。无臭，味辛、苦，有麻感。

以粒饱满者为佳。

【鉴别】 (1) 取本品，加水浸泡后种皮呈龟裂状，手捻有明显的粘滑感。

(2) 本品粉末淡黄棕色。种皮表皮细胞深棕色，形状不规则，壁微波状。非腺毛单细胞，黄棕色，稍弯曲，长50～240 μm。子叶碎片中有分泌腔，圆形或椭圆形，直径35～106 μm。草酸钙簇晶直径10～25 μm。栅状组织碎片及光辉带有时可见。

【炮制】 牵牛子 除去杂质。

炒牵牛子 取净牵牛子，照清炒法(附录18页)炒至稍鼓起。

【性味】 苦，寒；有小毒。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 泻水，驱虫。用于腹水，腹胀便秘，蛔虫症。

【用法与用量】 3～6 g。

【注意】 体虚者及孕妇忌服；不宜与巴豆同用。

【贮藏】 置干燥处。

轻　　粉（甘汞）

Qingfen

CALOMELAS

本品为氯化亚汞。

【性状】 本品为白色有光泽的鳞片状或雪花状结晶，或结晶性粉末；无臭，几乎无味；遇光颜色缓缓变暗。

【鉴别】 (1) 本品遇氢氧化钙试液、氨试液或氢氧化碱的溶液，即变成黑色。

(2) 取本品，加等量的无水碳酸钠，混合后，置干燥试管中，加热，即分解析出金属汞，凝集在试管壁上，管中遗留的残渣加稀硝酸溶解后，滤过，滤液显氯化物的鉴别反应(附录42页)。

【检查】 **升汞** 取本品 2 g，加乙醚 20 ml，振摇 5 分钟后，滤过，滤液放置，使乙醚自然挥散，残渣加水 10 ml 与稀硝酸 2 滴溶解后，照氯化物检查法项下的方法(附录44页)检查，如发生浑浊，与标准氯化钠溶液 7 ml 用同一方法制成的对照液比较，不得更浓。

汞珠 取本品约 1 g，平铺于白纸上，用扩大镜检视，不应有汞珠存在。

炽灼残渣 不得过 0.1%(附录45页)。

【含量测定】 取本品约 0.5 g，精密称定，置碘瓶中，加水 10 ml，摇匀，再精密加 $N/10$ 碘液 50 ml，密塞，强力振摇至供试品大部分溶解后，再加入碘化钾溶液(5→10) 8 ml，密塞，强力振摇至供试品完全溶解，用 $N/10$ 硫代硫酸钠液滴定，至近终点时，加淀粉指示液，继续滴定至蓝色消失，即得（每 1 ml 的 $N/10$ 碘液相当于 23.61 mg 的 Hg_2Cl_2）。

本品含 Hg_2Cl_2 不得少于 99.0%。

【性味】 辛，寒；有毒。

【功能与主治】 攻毒，去腐。用于痈疽溃疡，酒糟鼻，慢性湿疹，神经性皮炎。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【用法与用量】 外用适量，研末掺敷患处。

【贮藏】 置干燥处，遮光，密闭保存。

鸦 胆 子

Yadanzi

FRUCTUS BRUCEAE

本品为苦木科植物鸦胆子 Brucea javanica (L.) Merr. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收，除去杂质，晒干。

【性状】 本品呈卵形，长 6～10 mm，直径 4～7 mm。表面黑色或棕色，有隆起的网状皱纹，网眼呈不规则的多角形，两侧有明显的棱线，顶端渐尖，基部有凹陷的果梗痕。果壳质硬而脆，内含卵形种子 1 粒，长 5～6 mm，直径 3～5 mm，表面类白色或黄白色，具网纹；种皮薄，种仁(子叶)乳白色，富油性。无臭，味极苦。

以粒大、饱满、种仁色白、油性足者为佳。

【鉴别】 本品果皮粉末棕褐色。表皮细胞多角形，含棕色物。薄壁细胞多角形，含草酸钙簇晶及方晶，簇晶直径约至 30 μm。石细胞类圆形或多角形，直径 14～38 μm。

种子粉末黄白色。种皮细胞略呈多角形，稍延长。胚乳和子叶细胞含糊粉粒。

【炮制】 除去果壳及杂质。

【性味】 苦，寒；有小毒。

【功能与主治】 杀原虫。用于阿米巴痢疾，疟疾；外治赘疣，鸡眼。

【用法与用量】 0.5～2 g，用龙眼肉包裹或装胶囊吞服，一日 3 次；外用适量，捣烂敷患处。

【注意】 有溃疡病及慢性胃炎患者慎服。

【贮藏】 置干燥处。

韭 菜 子

Jiucaizi

SEMEN ALLII TUBEROSI

本品为百合科植物韭菜 Allium tuberosum Rottl. 的干燥成熟种子。秋季果实成熟

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

时采收果序，晒干，搓出种子，除去杂质。

【性状】 本品呈半圆形或半卵圆形，略扁，长 3～4 mm，宽约 2 mm。表面黑色，一面凸起，粗糙，有细密的皱纹，另一面微凹，皱纹不甚明显，周边略厚。质硬。气特异，味微辛。

以粒饱满、色黑者为佳。

【炮制】 **韭菜子** 除去杂质。

盐韭菜子 取净韭菜子，照盐水炙法(附录19页)用盐水炒至有香气。

【性味】 辛、甘，温。

【功能与主治】 补肾助阳，固精。用于遗尿，小便频数，腰膝酸软，阳痿，遗精。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置干燥处。

骨 碎 补

Gusuibu

RHIZOMA DRYNARIAE

本品为水龙骨科植物槲蕨 Drynaria fortunei (Kunze) J. Sm. 或中华槲蕨 Drynaria baronii (Christ) Diels 的干燥根茎。全年均可采挖，除去泥沙，干燥，或再燎去茸毛(鳞片)。

【性状】 **槲蕨** 呈扁平长条状，多弯曲，有分枝，长 5～15 cm，宽 1～1.5 cm，厚 0.2～0.5 cm。表面密被深棕色至暗棕色的小鳞片，柔软如毛，经火燎者呈棕褐色或暗褐色，两侧及上表面均具凸起或凹下的圆形叶痕，少数有叶柄残基及须根残留。体轻，质脆，易折断，断面红棕色，维管束呈黄色点状，排列成环。无臭，味淡、微涩。

中华槲蕨 较直而细长，分枝少，长 5～17 cm，宽 0.6～1 cm。表面小鳞片黄棕色，易脱落，脱落后呈黄色至淡棕色。质较硬，断面黄色。

均以条粗大、色棕者为佳。

【炮制】 **骨碎补** 除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。

炒骨碎补 取净骨碎补或片，照烫法（附录 19 页）用砂子炒至鼓起并毛呈焦黄色，放凉后撞去毛。

【性味】 苦，温。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 补肾，强骨，活血止痛。用于跌扑损伤，牙齿松动，耳鸣；外治斑秃。

【用法与用量】 3～9 g，鲜品 6～15 g；外用鲜品适量，切断摩擦或捣烂敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

钟　乳　石

Zhongrushi

STALACTITUM

本品为钟乳状的岩石，主含碳酸钙。采收后，除去杂石，洗净，晒干。

【性状】 本品略呈圆锥形或圆柱形，长 5～15 cm，有的可达 30 cm 以上，直径 2～7 cm。表面白色、灰白色或棕黄色，粗糙，凹凸不平。体重，质坚，断面显闪烁的亮光，中心带有 1 圆孔，圆孔周围有多数圈层。无臭，味微咸。

以圆锥形、色白或灰白、断面有亮光者为佳。

【鉴别】 取本品，滴加稀盐酸，即发生大量气泡，溶液显钙盐的鉴别反应（附录40页）。

【炮制】 钟乳石　洗净，砸成小块，晒干。

煅钟乳石　取钟乳石块，照煅法（附录 19 页）煅至红透。

【性味】 甘，温。

【功能与主治】 温肺，益肾，制酸。用于喘咳，腰膝无力，胃酸过多。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置干燥处。

钩　藤

Gouteng

RAMULUS UNCARIAE CUM UNCIS

本品为茜草科植物钩藤 Uncaria rhynchophylla (Miq.) Jacks.、大叶钩藤 Uncaria macrophylla Wall.、毛钩藤 Uncaria hirsuta Havil.、华钩藤 Uncaria sinensis (Oliv.) Havil. 或无柄果钩藤 Uncaria sessilifructus Roxb. 的干燥带钩茎枝。秋、冬二季采收，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

去叶，切段，晒干。

【性状】 本品茎枝呈圆柱形或类方柱形，长 2～3 cm，直径 0.2～0.5 cm；表面红棕色至紫红色者具细纵纹，光滑无毛，黄绿色至灰褐色者有时可见白色点状皮孔，被黄褐色柔毛。多数枝节上对生两个向下弯曲的钩(不育花序梗)，或仅一侧有钩，另一侧为凸起的疤痕；钩略扁或稍圆，先端细尖，基部较阔；钩基部的枝上可见叶柄脱落后的窝点状痕迹和环状的托叶痕。质坚韧，断面黄棕色，皮部纤维性，髓部黄白色或中空。无臭，味淡。

以茎细、带钩、色紫红者为佳。

【鉴别】 取本品粉末约 5 g，加 80%乙醇 30 ml，加热回流 20 分钟，滤过，滤液置水浴上蒸去乙醇，残留物加 1%盐酸溶液 10 ml 使溶解，滤过。取滤液 1 ml，加碘化汞钾试液 1 滴，发生淡黄色沉淀。

【性味】 甘，微寒。

【功能与主治】 清热平肝，熄风定惊，降血压。用于头晕目眩，风热头痛，小儿烦热惊厥，高血压症。

【用法与用量】 6～12 g，不宜久煎。

【贮藏】 置干燥处。

【制剂】 钩藤片

钩　藤　片

Gouteng Pian

TABELLAE UNCARIAE

本品为钩藤中提取的钩藤总碱片。含总碱作为钩藤碱（$C_{22}H_{28}O_4N_2$）计算，应为标示量的 90.0～110.0%。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显灰棕色。

【鉴别】 取本品细粉适量（约相当于钩藤总碱 10 mg），加 80%乙醇 20 ml，振摇提取 10 分钟，滤过，滤液置水浴上蒸干，残渣加 1%盐酸溶液 10 ml 使溶解，滤过，滤液照下述方法试验：

(1) 取滤液 1 ml，加碘化汞钾试液 1 滴，即发生淡黄色沉淀。

(2) 取滤液 1 ml，加碘化铋钾试液 1 滴，即发生红色沉淀。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

(3) 取滤液 1 ml，加碘化钾碘试液 1 滴，即发生棕红色沉淀。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定（附录 6 页）。

【含量测定】 取本品 5 片（10 mg）或 10 片(5 mg)，注意研细，加浓氨试液湿润，再加硅藻土适量拌匀，装入滤纸筒，置脂肪提取器中，用乙醚加热回流提取，至生物碱提尽（约 2.5～3 小时），提取液移入分液漏斗中，用 $N/2$ 硫酸液振摇提取，每次 25 ml，至生物碱提尽为止，合并酸液，加浓氨试液调节 pH 值至 10 左右，用乙醚振摇提取，每次 30 ml，至生物碱提尽为止，每次乙醚液均用同一的水 10 ml 洗涤，洗液再用乙醚 10 ml 洗涤，合并乙醚液，置水浴上蒸干，残渣加无水乙醇 2 ml 使溶解，再蒸干，残渣加乙醚 2 ml 使溶解，精密加 $N/50$ 硫酸液 25 ml，置水浴上除去乙醚，放冷至室温，加甲基红-亚甲蓝混合指示液 2 滴，用 $N/50$ 氢氧化钠液滴定，至溶液由橙红色转变为黄绿色，即得（每 1 ml 的 $N/50$ 硫酸液相当于 7.68 mg 的 $C_{22}H_{28}O_4N_2$）。

【功能与主治】 降血压。用于各期高血压病。

【用法与用量】 口服，一次 10～20 mg，一日 30～60 mg。

【规格】 (1) 5 mg (2) 10 mg

【贮藏】 遮光，密封保存。

香 加 皮

Xiangjiapi

CORTEX PERIPLOCAE RADICIS

本品为萝藦科植物杠柳 Periploca sepium Bge. 的干燥根皮。春、秋二季采挖根部，剥取根皮，晒干。

【性状】 本品呈卷筒状或槽状，少数呈不规则的块片状，长 3～10 cm，直径 1～2 cm，厚 0.2～0.4 cm。外表面灰棕色或黄棕色，栓皮松软常呈鳞片状，易剥落；内表面淡黄色或淡黄棕色，较平滑，有细纵纹。体轻，质脆，易折断，断面不整齐，黄白色。有特异香气，味苦。

以皮厚、香气浓者为佳。

【鉴别】 (1) 本品粉末淡棕色。草酸钙方晶少数，直径 9～20 μm。石细胞长方形或类多角形，直径 24～70 μm。乳管含无色油滴状粒。木栓细胞棕黄色，多角形。淀粉粒甚多，单粒类圆形或长圆形，直径 3～11 μm；复粒由 2～6 粒组成。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

(2) 取本品 10 g，置 250 ml 圆底烧瓶中，加水 150 ml，加热蒸馏，馏液具特异香气；收集馏出液 10 ml，分置二支试管中，一管加 1%三氯化铁溶液 1 滴，即显红棕色；另一管加硫酸肼饱和溶液 5 ml 与醋酸钠结晶少量，稍加热，放冷，发生淡黄绿色沉淀，此沉淀置紫外光灯下观察，显强烈的黄色荧光。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，晒干。

【性味】 辛、苦，温；有毒。

【功能与主治】 祛风湿，壮筋骨，强心。用于风寒湿痹，关节炎，腰膝酸软，轻度心力衰竭，心慌，气短，脚肿。

【用法与用量】 3～6 g，并可浸酒内服。

【注意】 本品有毒，服用不可过量。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

香　附

Xiangfu

RHIZOMA CYPERI

本品为莎草科植物莎草 Cyperus rotundus L. 的干燥根茎。秋季采挖，燎去毛须，置沸水中略煮或蒸透后晒干，或燎后直接晒干。

【性状】 本品多呈纺锤形，有的略弯曲，长 2～3.5 cm，直径 0.5～1 cm。表面棕褐色或黑褐色，有纵皱纹，并有 6～10 个略隆起的环节，节上有棕色的毛须，并残留根痕；去净毛须者较光滑，环节不明显。质硬，经蒸煮者断面黄棕色或红棕色，角质样；生晒者断面色白而显粉性，内皮层环纹明显，中部色泽较深，可见点状维管束散在。气香，味微苦。

以个大、质坚实、色棕褐、香气浓者为佳。

【鉴别】 本品粉末浅棕色。分泌细胞类圆形，直径 35～72 μm，内含淡黄棕色至红棕色分泌物，其周围 5～8 个细胞作放射状环列。表皮细胞多角形，常带有下皮纤维束及厚壁细胞。下皮纤维成束，深棕色或红棕色，直径 7～22 μm，壁厚。厚壁细胞类方形、类圆形或形状不规则，壁稍厚，纹孔明显。石细胞少数，类方形、类圆形或类多角形，壁较厚。

【炮制】 **香附**　除去毛须及杂质，碾碎。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

醋香附 取香附粒，照醋炒法（附录 18 页）用醋炒至色变深。

每香附粒 100 kg，用醋 20 kg。

【性味】 辛、微苦、微甘，平。

【功能与主治】 理气解郁，调经止痛。用于胸、胁、脘、腹疼痛，痛经，月经不调。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防蛀。

香 青 兰

Xiangqinglan

HERBA DRACOCEPHALI

本品系蒙古族、维吾尔族习用药材，蒙古文名为 ᠬᠣᠩᠬᠢᠷᠠᠢ ᠪᠣᠭᠤᠮᠠ（昂凯鲁莫勒·毕日阳古），维吾尔文名为 Badranji buya（巴德兰吉·布牙）；为唇形科植物香青兰 Dracocephalum moldavica L. 的干燥地上部分。夏季花盛开时采割，阴干。

【性状】 本品茎呈方柱形，长 20～40 cm，直径 0.3～0.5 cm；表面紫红色或黄绿色，密被倒向短毛；体轻，质脆，易折断，断面中心有髓。叶对生，有柄；叶片多破碎或脱落，完整者展平后呈披针形或条状披针形，长 1.5～4 cm，黄绿色，边缘具三角形齿或锯齿，基部齿尖具长刺毛，下表面有黑色腺点。轮伞花序顶生，苞片矩圆形，萼筒具纵纹，密被黄色腺点，先端 5 齿裂，花冠二唇形，淡蓝紫色。气香，味辛。

以花多、叶色绿、香气浓者为佳。

【鉴别】 取本品 5 g，加无水乙醇 20 ml，置水浴上浸渍半小时，滤过。取滤液 2 ml，加 5%氢氧化钠溶液使成碱性，加氨制硝酸银试液 2.5 ml，置水浴中加热 1～2 分钟，即有明显的银镜生成。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性味】 甘、苦，凉。

【功能与主治】 泻肝火，清胃热，止血。用于头痛咽痛，黄疸，吐血，衄血。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

香　青　草

Xiangqingcao

HERBA ANAPHALIDIS

本品为菊科植物翅茎香青 Anaphalis sinica Hance f. pterocaulon (Franch. et Sav.) Ling 的干燥全草。秋末冬初采挖，除去泥沙，晒干。

【性状】 本品密被白色绵毛。根灰褐色。茎长 25～70 cm，灰白色，基部毛脱落处显淡棕色，有纵沟纹；质脆，易折断，断面中部有髓。叶互生，无柄；叶片皱缩，展平后呈倒披针形，长 2～7 cm；先端急尖，基部常下延成四棱状狭翅。头状花序排成伞房状，顶生，淡黄白色。瘦果细小，矩圆形，冠毛白色。气香，味微苦。

以色灰白、香气浓者为佳。

【鉴别】 取本品 10 g，加水煮沸 1 小时，滤过，滤液浓缩至 5 ml，加等量的醋酸乙酯振摇提取 2 次，合并醋酸乙酯液，浓缩至约 2 ml。取浓缩液 1 滴，点于滤纸上，待干，加三氯化铁试液 1 滴，显污绿色。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性味】 微苦、辛，微温。

【功能与主治】 祛痰，镇咳，平喘，消炎。用于急、慢性支气管炎，感冒。

【用法与用量】 15～30 g。

【贮藏】 置干燥处，防潮。

【制剂】 (1) 香青片　(2) 香青糖浆

香　青　片

Xiangqing Pian

TABELLAE ANAPHALIDIS

本品为香青草浸膏片。每片相当于香青草 4 g。

【制法】 取香青草 4000 g，加水煎煮二次，第一次 2 小时，第二次 1 小时，合并煎

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

液，静置，滤过，滤液浓缩至适量，放冷，加乙醇使含乙醇量达80%，充分搅拌，静置24小时，取上清液浓缩成稠膏状，加适量辅料，制成颗粒，压制成1000片，包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；味苦、微涩。

【鉴别】 取本品2片，除去糖衣，研细，加热水10 ml溶解后，滤过。取滤液5 ml，加稀盐酸使成酸性后，用乙醚10 ml振摇提取，醚液置水浴上蒸干，残渣加三氯化铁试液1～2滴，即显污绿色。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定（附录6页）。

【功能与主治】 同香青草。

【用法与用量】 口服，一次4片，一日2～3次。

【贮藏】 密封保存。

香青糖浆

Xiangqing Tangjiang

SYRUPUS ANAPHALIDIS

【处方】 香青草 1560 g　蔗糖 300 g　苯甲酸钠 3 g

【制法】 取香青草，加水煎煮二次，第一次2小时，第二次1小时，合并煎液，静置，滤过，滤液浓缩后，加入蔗糖，继续浓缩至1000 ml，再加苯甲酸钠，搅拌，滤过，静置24小时以上，吸取上清液，即得。

【性状】 本品为棕褐色的液体；气微香，味甜、微苦。

【鉴别】 取本品5 ml，加稀盐酸使成酸性后，用乙醚10 ml振摇提取，醚液置水浴上蒸干，残渣加三氯化铁试液1～2滴，即显污绿色。

【功能与主治】 同香青草。

【用法与用量】 口服，一次10 ml，一日2～3次。

【贮藏】 密封保存。

香果脂

Xiangguozhi

OLEUM LINDERAE

本品为樟科植物香果树 Lindera communis Hemsl. 的成熟种子压榨提取得到的固体

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

脂肪，经精制而成。

【性状】 本品为白色结晶性粉末或淡黄白色块状物；质轻；气微，味淡。

本品在氯仿、乙醚或沸无水乙醇中易溶，在乙醇中极微溶解，在水中不溶。

熔点 本品的熔点（附录28页）为30～34°。

折光率 本品的折光率（附录32页）在40°时为1.446～1.451。

碘值 本品的碘值（附录52页第一法）为1～5。

皂化值 本品的皂化值（附录52页）为260～280。

酸值 本品的酸值（附录51页）不大于3。

【用途】 用作栓剂基质。

【贮藏】 遮光，密闭，置阴凉处保存。

香　　橼

Xiangyuan

FRUCTUS CITRI

本品为芸香科植物枸橼 Citrus medica L. 或香圆 Citrus wilsonii Tanaka 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收，趁鲜切片，晒干或低温干燥。香圆亦可整个或对剖两瓣后，晒干或低温干燥。

【性状】 **枸橼** 为圆形或长圆形片，直径4～10 cm，厚0.2～0.5 cm。横切片外果皮黄色或黄绿色，边缘呈波状，散有凹入的油点；中果皮厚1～3 cm，黄白色，有不规则的网状突起的维管束；瓤囊10～17室，呈车轮状。纵切片中心柱较粗壮。质柔韧。气清香，味微甜而苦辛。

以片色黄白、香气浓者为佳。

香圆 为类球形、半球形或圆片，直径4～7 cm。表面黑绿色或黄棕色，密被凹陷的小油点及网状隆起的粗皱纹，顶端有花柱残痕及隆起的环圈，基部有果梗残基。质坚硬。剖面或横切薄片，边缘油点明显，中果皮厚约5 mm，瓤囊9～11室，棕色或淡红棕色，间或有黄白色种子。气香，味酸而苦。

以个大、皮粗、色黑绿、香气浓者为佳。

【炮制】 未切片者，打成小块；切片者润透，切丝，晾干。

【性味】 辛、苦、酸，温。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 理气，宽中，化痰。用于胸闷脘痛，腹胀，嗳气，呕吐，痰多咳嗽。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防霉、防蛀。

香　　薷

Xiangru

HERBA ELSHOLTZIAE SEU MOSLAE

本品为唇形科植物海州香薷 Elsholtzia splendens Nakai ex F. Maekawa 及石香薷 Mosla chinensis Maxim. 的干燥地上部分，前者习称“江香薷”，后者习称“青香薷”。夏、秋二季茎叶茂盛、花初开时采割，除去杂质，晒干。

【性状】 **江香薷** 长 30～50 cm，基部紫红色，上部黄绿色或淡黄色，全体密被白色茸毛。茎方柱形，直径 1～2 mm，节明显，节间长 4～7 cm；质脆，易折断。叶对生，多皱缩或脱落，叶片展平后呈长卵形或披针形，暗绿色或黄绿色，边缘有疏锯齿。穗状花序顶生及腋生；苞片宽卵形，脱落或残存；花萼宿存，钟状，淡紫红色或灰绿色，先端 5裂，密被茸毛。小坚果 4 枚，近卵圆形。气清香而浓，味凉而微辛。

青香薷 较短小，长 20～40 cm，节间长 3～5 cm。叶灰绿色至绿色，花序较短。气香而微浊，味辛凉。

均以枝嫩、穗多、香气浓者为佳。

【鉴别】 本品叶的表面观：

江香薷 上、下表皮均有毛茸；气孔直轴式。非腺毛有两种：一种为 3～8 细胞，有时细胞缢缩，壁较薄；另一种为单细胞，基部弯曲，长 120～140 μm，直径 20～25 μm，壁较厚。腺鳞头部 8 或 10 细胞，柄单细胞；偶有头部 1～2 细胞、柄单细胞的小腺毛。

青香薷 非腺毛稀少，多为 2～5 细胞，基部较宽，壁增厚；单细胞者长 22～74 μm，直径 15～41 μm。

【炮制】 除去残根及杂质，切段。

【性味】 辛，微温。

【功能与主治】 发汗解表，和中利湿。用于暑湿感冒，恶寒发热无汗，腹痛，吐泻。

【用法与用量】 3～9 g。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【贮藏】 置阴凉干燥处。

重　　楼

Chonglou

RHIZOMA PARIDIS

本品为百合科植物云南重楼 Paris yunnanensis Franch. 或七叶一枝花 Paris chinensis Franch. 的干燥根茎。秋季采挖，除去须根，洗净，晒干。

【性状】 本品呈结节状扁圆柱形，略弯曲，长 5～12 cm，直径 1.5～3.5 cm。顶端具鳞叶及茎的残基，表面黄棕色或灰棕色，外皮脱落处呈白色；密生层状凸起的粗环纹，一面结节明显，结节上具椭圆形凹陷茎痕，另一面有疏生的须根或疣状须根痕。质坚实，断面平坦，白色至黄白色，有粉性。无臭，味微苦、麻。

以粗壮、质坚实、断面色白、粉性足者为佳。

【鉴别】 (1) 本品粉末白色。淀粉粒甚多，类圆形、长椭圆形或肾形，直径 3～18 μm。草酸钙针晶成束或散在，长 80～250 μm。梯纹及网纹导管直径 10～25 μm。

(2) 取本品粗粉 2 g，加水 20 ml 浸渍 24 小时，滤过。取带塞试管二支，各加滤液 1 ml，一管加 5%氢氧化钠溶液 2 ml，另一管加 5%盐酸溶液 2 ml，密塞，振摇 1 分钟，产生大量蜂窝状泡沫，加碱管比加酸管的泡沫高 2 倍以上。

(3) 取本品粗粉 2 g，加乙醚 20 ml，置水浴上回流提取 10 分钟，滤过。滤液分为二份，挥干，一份加醋酐 1 ml 使溶解，加硫酸 2 滴，显黄色、红色、紫色、青色、污绿色；另一份加冰醋酸 1 ml 使溶解，加乙酰氯 5 滴与氧化锌少量，稍加热，显淡红色或紫红色。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，晒干。

【性味】 苦，微寒。

【功能与主治】 清热解毒，镇惊止痛。用于咽喉肿痛，小儿惊风，毒蛇咬伤，疔疮肿毒；外治疖肿，腮腺炎。

【用法与用量】 3～9 g；外用适量，研末调敷患处。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防蛀。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

复　盆　子

Fupenzi

FRUCTUS RUBI

本品为蔷薇科植物华东复盆子 Rubus chingii Hu 的干燥果实。夏初果实由绿变绿黄时采收，除去梗、叶，置沸水中略烫或略蒸，取出，干燥。

【性状】 本品为聚合果，由多数小核果聚合而成，呈圆锥形或扁圆锥形，长 0.6～1.3 cm，直径 0.5～1.2 cm。表面黄绿色或淡棕色，顶端钝圆，基部中心凹入。宿萼棕褐色，上有残存棕色花丝，下有果梗痕。小果易剥落，每个小果呈半月形，背面密被灰白色茸毛，两侧有明显的网纹，腹部有突起的棱线。体轻，质硬。气微，味微酸涩。

以粒完整、饱满、色黄绿、具酸味者为佳。

【鉴别】 本品粉末棕黄色。非腺毛单细胞，长 60～450 μm，直径 12～20 μm，壁甚厚，木化，大多数具双螺纹，有的胞腔不明显。毛茸易脱落，残痕表面观圆多角形或长圆形，直径约至 23 μm，胞腔分枝，似石细胞状。草酸钙簇晶较多见，直径 18～50 μm。果皮纤维黄色，上下层纵横或斜向交错排列。

【性味】 甘、酸，温。

【功能与主治】 益肾，固精，缩尿。用于肾虚尿频，遗尿，滑精。

【用法与用量】 6～12 g。

【贮藏】 置干燥处。

禹　粮　土

Yuliangtu

LIMONITERRA

本品系蒙古族、藏族习用药材，蒙古文名为 ᠲᠡᠷᠪᠡᠨᠵᠢ（申都拉），藏文名为 ཞི་འདུ་རྩ（申都拉）；为一种含铁粘土。采挖后，除去杂石。

【性状】 本品呈不规则块状或粉末。红棕色至赭色。块状者易碎，易为指甲刻划或

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

剥落，断面略平坦，色较深，显层纹，粘舌。手捻有光滑感。无臭，味淡，嚼之粘牙有沙粒感。

以色红、细腻、嚼之粘牙而沙粒感少者为佳。

【鉴别】 (1) 取本品沾水少许，涂于指甲上，有凉感。

(2) 取本品粉末约 0.1 g，加稀盐酸 5 ml，煮沸 1 分钟，静置，待分层后，取上清液 1 ml，加亚铁氰化钾试液 1 滴，即发生黑蓝色沉淀。

【炮制】 除去杂石，研细，过筛。

【性味】 甘，凉。

【功能与主治】 清热凉血，祛瘀生新，消肿止痛。用于脉热，脏伤；外治烧、烫伤。

【用法与用量】 1.5～3 g；外用适量，研细，灭菌后撒布或调敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

禹 粮 石

Yuliangshi

LIMONITUM

本品为褐铁矿的矿石，主含三氧化二铁。采挖后，除去泥沙。

【性状】 本品呈不规则块状，大小不一。表面红黄色或红棕色，多凹凸不平，或覆有黄色粉末。质硬，易击碎，断面多显红棕色与灰棕色相间的层纹。无臭，无味。

【炮制】 **禹粮石** 除去杂质。

煅禹粮石 取净禹粮石，打碎，照煅法(附录19页)煅至红透，立即倒入醋内淬酥，取出，干燥。

每禹粮石 100 kg，用醋 30 kg。

【性味】 甘、涩，微寒。

【功能与主治】 涩肠，止血。用于久泻，崩漏，白带。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

胆　　木

Danmu

LIGNUM ET RADIX NAUCLEAE

本品为茜草科植物乌檀 Nauclea officinalis Pierre ex Pitard 的干燥茎干及根。全年均可采收，砍成块片，晒干。

【性状】 本品为不规则的小块或片，黄色或棕黄色。有的带皮部，其外皮黄褐色，粗糙，易剥落。皮部断面棕褐色或棕黄色，纤维性。质坚硬。无臭，味苦。

以色鲜黄、味苦者为佳。

【鉴别】 (1) 取本品粉末约 3 g，加水 40 ml，煮沸 10 分钟，放冷，滤过，滤液加醋酸乙酯 10 ml 振摇提取。取醋酸乙酯液，点于滤纸片上，置紫外光灯下观察，显蓝紫色荧光，加碱液后荧光增强。

(2) 取鉴别(1)项下剩余的醋酸乙酯液，蒸干，残渣加乙醇 2 ml 使溶解，再加5%亚硝酸钠溶液与 10%硝酸铝溶液各 3 滴及氢氧化钠试液 1 ml，即显橙红色。

(3) 取本品粉末约 3 g，加水 40 ml，加稀盐酸使成酸性后，煮沸 10 分钟，滤过。取滤液分置三支试管中，每管 2 ml，一管中加硅钨酸试液 3 滴，即发生黄色沉淀；一管中加碘化汞钾试液 3 滴，即发生橙黄色沉淀；另一管中加碘化铋钾试液 3 滴，即发生棕褐色沉淀。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清解热毒。用于感冒发热，咽喉肿痛，外耳道疖肿，急性结膜炎，皮肤疖肿。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置干燥处。

胆　　矾

Danfan

CHALCANTHITUM

本品为三斜晶系胆矾的矿石，主含含水硫酸铜。开采铜、铅、锌等矿时选取或用化

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

学方法制得。

【性状】 本品呈不规则块状，大小不一。深蓝色或淡蓝色，半透明，有玻璃样光泽。质脆，易碎，碎块呈棱柱状。无臭，味涩。

以块大、色深蓝、半透明者为佳。

【鉴别】 (1) 取本品，加热灼烧，变为白色，遇水则又变蓝色。

(2) 取本品约 1 g，加水 20 ml 溶解后，滤过，滤液显铜盐(附录41页)与硫酸盐（附录41页）的鉴别反应。

【炮制】 除去杂质，砸成小块。

【性味】 酸、辛，寒；有毒。

【功能与主治】 涌吐风痰，收敛。用于风痰壅塞，急性咽喉炎，癫狂烦躁；外治口疮，牙疳。

【用法与用量】 0.3～0.6 g，研末服；外用适量，煅后研末敷患处。

【贮藏】 置干燥处，密闭保存，防风化。

胆 南 星

Dannanxing

ARISAEMA CUM BILE

本品为制天南星的细粉与牛、羊或猪胆汁经加工而成，或为生天南星细粉与牛、羊或猪胆汁经发酵加工而成。

【性状】 本品呈方块状或圆柱状，棕黄色、灰棕色或棕黑色。质硬。气微腥，味苦。

【鉴别】 (1) 本品粉末淡黄棕色。薄壁细胞类圆形，充满糊化淀粉粒。草酸钙针晶束长 20～90 μm。螺纹及环纹导管直径 8～60 μm。

(2) 取本品粉末 0.2 g，加水 5 ml，振摇，滤过。取滤液 2 ml，置试管中，加新制的糠醛溶液(1→100)0.5 ml，沿管壁加硫酸 2 ml，两液接界处即显棕红色环。

【性味】 苦、微辛，平。

【功能与主治】 清化痰热，祛风镇惊。用于中风痰壅，高热痉厥，癫狂。

【用法与用量】 1.5～4.5 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

匍　伏　堇

Pufujin

HERBA VIOLAE DIFFUSAE

本品为堇菜科植物匍伏堇 Viola diffusa Ging. 的干燥全草。夏、秋二季采挖，晒干。

【性状】 本品长 5～12 cm，全体被白毛。匍伏茎细弱，长 3～6 cm，有细棱线及须根。叶基生，叶片薄而皱缩，展平后呈卵形至卵状椭圆形，长 2～6 cm，宽 1.5～3 cm；黄绿色或灰绿色，先端钝，边缘有钝圆齿，基部宽楔形，下延于柄呈狭翅状，长 1.5～5 cm。花梗长 5～9 cm，中部有披针形苞片 2 片，花冠黄白色或淡紫色，有距。蒴果长椭圆形，3 瓣裂。种子细小，棕黄色。气微，稍有黄瓜味。

以色绿、叶多者为佳。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清热解毒，消肿止痛。用于肝炎，百日咳，目赤肿痛；外治跌扑损伤，蛇虫咬伤，烫伤。

【用法与用量】 9～15 g，鲜品 15～30 g；外用鲜品适量，捣烂敷患处。

【贮藏】 置通风干燥处。

独　　活

Duhuo

RADIX ANGELICAE PUBESCENTIS

本品为伞形科植物重齿毛当归 Angelica pubescens Maxim. f. biserrata Shan et Yuan 的干燥根。春初苗刚发芽或秋末茎叶枯萎时采挖，除去须根及泥沙，烘至半干，堆置 2～3 天，发软后，再烘至全干。

【性状】 本品主根略呈圆柱形，下部 2～3 分枝或较多，长 10～30 cm。根头部膨

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

大，多横皱纹，直径 1.5～3 cm，顶端有茎、叶的残基或凹陷，表面灰褐色或棕褐色，具纵皱纹，有隆起的横长皮孔及稍突起的细根痕。质较硬，回潮则变软，断面有 1 棕色环，皮部灰白色，可见多数散在的棕色油点，木部灰黄色至黄棕色。有特异香气，味苦辛、微麻舌。

以条粗壮、油润、香气浓者为佳。

【鉴别】（1）本品横切面：木栓层为数列细胞。栓内层窄，有少数油室。韧皮部宽广，油管较多，排列成 3～8 轮，周围分泌细胞 6～10 个。形成层成环。木质部射线宽 3～10 列细胞；导管多单个散在或 2～3 个相聚。薄壁细胞含淀粉粒。

（2）取本品粉末 3 g，加乙醚 30 ml，加热回流 1 小时，滤过，滤液蒸去乙醚，残渣加石油醚 3 ml，振摇，滤过。滤渣加乙醇 3 ml 溶解后，置紫外光灯下观察，显蓝紫色荧光。

（3）取鉴别(2)项下的乙醇液 1 ml，加新制的 7%盐酸羟胺的甲醇溶液与 10%氢氧化钾的甲醇溶液各 3 滴，置水浴上微热，冷却后加 1%三氯化铁的盐酸(1%)溶液 2滴，摇匀，显橙黄色。

（4）取鉴别(2) 项下的乙醇液 0.5 ml，加 3%碳酸钠溶液 1ml，煮沸 3 分钟，放冷，加新制的重氮对硝基苯胺试液 1 滴，显紫红色。

（5）取鉴别(2) 项下的乙醇液 1 ml，加 2%间二硝基苯的乙醇溶液与 10%氢氧化钾溶液各 2 滴，振摇，显橙红色。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切薄片，晒干或低温干燥。

【性味】 辛、苦，微温。

【功能与主治】 祛风，除湿，散寒，止痛。用于风寒湿痹，腰膝酸痛，风湿性关节痛，风寒头痛。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置干燥处，防霉、防蛀。

急 性 子

Jixingzi

SEMEN IMPATIENTIS

本品为凤仙花科植物凤仙花 Impatiens balsamina L. 的干燥成熟种子。秋季采收尚

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

未开裂的成熟果实，晒干，打下种子，除去果皮及杂质。

【性状】 本品呈扁圆形或卵圆形，直径 1.5～3 mm。表面灰褐色或棕褐色，粗糙，除去表皮，则显光泽。种脐位于狭端，稍突出。质坚实，种皮薄，子叶灰白色，半透明，油质。无臭，味淡、微苦。

以粒饱满、色棕褐者为佳。

【性味】 微苦，温；有小毒。

【功能与主治】 软坚，消积。用于噎膈，骨哽咽喉，腹部肿块，经闭。

【用法与用量】 3～4.5 g。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 置干燥处。

姜　　黄

Jianghuang

RHIZOMA CURCUMAE LONGAE

本品为姜科植物姜黄 Curcuma longa L. 的干燥根茎。冬季茎叶枯萎时采挖，洗净，煮或蒸至透心，晒干，除去须根。

【性状】 本品呈不规则卵圆形、圆柱形或纺锤形，常弯曲，有的呈叉状分枝，长 2～5 cm，直径 1～3 cm。表面深黄色，粗糙，有皱缩纹理和留有叶痕的明显环节，并有圆形分枝痕及须根痕。质坚实，不易折断，断面棕黄色至金黄色，角质状，有蜡样光泽；内皮层环纹明显，维管束呈点状散在。气香特异，味苦、辛。

以质坚实、断面色金黄、气味浓者为佳。

【鉴别】 (1) 取硫酸与乙醇各 1 滴，置点滴板中，加本品粉末少量于混合液上，粉末变为紫红色。

(2) 取本品粉末少量，置滤纸上，滴加乙醇与乙醚各 1 滴，待干，除去粉末，滤纸染成黄色，加热硼酸饱和溶液 1 滴，则渐变为橙红色，再加氨试液 1 滴，则变成蓝黑色，后渐变为褐色，久置，则又变成橙红色。

【炮制】 除去杂质，略泡，洗净，润透，切片，晒干。

【性味】 辛、苦，温。

【功能与主治】 破血，行气，止痛。用于胸胁刺痛，经闭，腹部肿块，跌扑肿痛，

千众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

痈肿。

【用法与用量】 3～9 g；外用适量。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

前　　胡

Qianhu

RADIX PEUCEDANI

本品为伞形科植物白花前胡 Peucedanum praeruptorum Dunn 或紫花前胡 Peucedanum decursivum Maxim. 的干燥根。冬季至次春茎叶枯萎或未抽花茎时采挖，除去须根，洗净，晒干或低温干燥。

【性状】 **白花前胡** 呈不规则的圆柱形、圆锥形或纺锤形，稍扭曲，下部常有分枝，长 3～15 cm，直径 1～2 cm。表面黑褐色或灰黄色，根头部多有茎痕及纤维状叶鞘残基，上端有密集的细环纹，下部有纵沟、纵皱纹及横向皮孔。质较柔软，干者质硬，易折断，断面不整齐，淡黄白色，可见 1 棕色环(形成层)及放射状纹理，皮部散有多数棕黄色油点。气芳香，味微苦辛。

紫花前胡 根头顶端有的有残留茎基，茎基周围常有膜状叶鞘基部残留。断面类白色，放射状纹理不明显。

均以条粗壮、质柔软、香气浓者为佳。

【鉴别】 (1) 取本品粉末 1 g，加乙醚 10 ml，浸渍 2 小时后，取乙醚液 2 滴，分别点于两张小滤纸片上，置紫外光灯下观察，显淡天蓝色荧光。然后滴加 15% 氢氧化钠溶液数滴，2 分钟后荧光消失。将一张滤纸片避光保存，另一张滤纸片曝光，约 3 小时后，置紫外光灯下观察，曝光者天蓝色荧光加强，避光者不显荧光。

(2) 取本品粉末 5 g，加甲醇 30 ml，加热回流 10 分钟，滤过。取滤液 2 ml，蒸干，残渣加冰醋酸 1 ml 使溶解，再加乙酰氯 5 滴和氯化锌数粒，置水浴中加热 1～2 分钟，溶液显红色。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，晒干。

【性味】 苦、辛，微寒。

【功能与主治】 化痰止咳，散风热。用于风热咳嗽，痰多气喘，胸膈满闷。

【用法与用量】 4.5～9 g。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【贮藏】 置阴凉干燥处，防霉、防蛀。

首　　乌

Shouwu

RADIX POLYGONI MULTIFLORI

本品为蓼科植物何首乌 Polygonum multiflorum Thunb. 的干燥块根。秋、冬二季叶枯萎时采挖，削去两端，洗净，个大的切成块，干燥。

【性状】 本品呈团块状或不规则纺锤形，长 6～15 cm，直径 4～12 cm。表面红棕色或红褐色，皱缩不平，有浅沟，并有横长皮孔及细根痕。体重，质坚实，不易折断，断面浅黄棕色或浅红棕色，显粉性，皮部有 4～11 个类圆形异型维管束环列，形成云锦状花纹，中央木部较大，有的呈木心。气微，味微苦而甘涩。

以体重、质坚、粉性足者为佳。

【鉴别】 (1) 本品横切面：木栓层为数列细胞，充满棕色物。韧皮部较宽，散有类圆形异型维管束 4～11 个，为外韧型，导管稀少。根的中央形成层成环；木质部导管较少，周围有管胞及少数木纤维。薄壁细胞含草酸钙簇晶，直径 10～110 μm；并含淀粉粒。

(2) 取本品粉末约 0.1 g，加氢氧化钠溶液(1→10)10 ml，煮沸 3 分钟，冷后滤过。取滤液，加盐酸使成酸性，再加等量乙醚，振摇，醚层应显黄色。分取醚层 4 ml，加氨试液 2 ml，振摇，氨液层显红色。

(3) 取本品粉末约 0.2 g，加乙醇 5 ml，置水浴中煮沸 3 分钟，不断振摇，趁热滤过，放冷。取滤液 2 滴，置蒸发皿中蒸干，趁热加三氯化锑的氯仿饱和溶液 1 滴，即显紫红色。

【炮制】 **生首乌**　除去杂质，洗净，稍浸，润透，切片或方块，晒干。

制首乌　取首乌片或块，照炖法(附录18页)用黑豆汁拌匀，置非铁质的适宜容器内，炖至汁液吸尽并显棕红色。

每首乌片(块)100 kg，用黑豆 10 kg。

黑豆汁的制法：取黑豆 10 kg，加水适量，约煮 4 小时，熬汁约 15 kg，豆渣再加水煮约 3 小时，熬汁约 10 kg，合并得黑豆汁约 25 kg。

【性味】 苦、甘，温、涩。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 生首乌 润肠，解疮毒。用于肠燥便秘，痈疽，淋巴结结核。

制首乌 补肝肾，益精血，壮筋骨。用于头晕耳鸣，头发早白，腰膝酸软，肢体麻木，高血脂症。

【用法与用量】 6～12 g。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

首 乌 藤

Shouwuteng

CAULIS POLYGONI MULTIFLORI

本品为蓼科植物何首乌 Polygonum multiflorum Thunb. 的干燥茎。秋、冬二季采割，除去残叶，捆成把，干燥。

【性状】 本品呈长圆柱形，稍扭曲，具分枝，长短不一，直径 4～7 mm，细枝直径约 1 mm。表面紫红色至紫褐色，粗糙，具扭曲的纵皱纹。节部略膨大，有侧枝痕。外皮菲薄，可剥离。质脆，易折断，断面皮部紫红色，木部黄白色或淡棕色，具多数小孔，髓部疏松，类白色。无臭，味微苦涩。

以表面色紫红者为佳。

【鉴别】 本品横切面：表皮细胞有时残存。木栓层为 3～4 列细胞，含棕色色素。皮层较窄。中柱鞘纤维束断续排列成环，纤维壁甚厚，木化；在纤维束间时有石细胞群。韧皮部较宽。形成层成环。木质部导管类圆形，直径约至 204 μm，单个散列或数个相聚。髓较小。薄壁细胞含草酸钙簇晶。

【炮制】 除去杂质，洗净，切段，晒干。

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 安神，养血，活络。用于失眠多梦，血虚身痛；外治皮肤瘙痒。

【用法与用量】 9～15 g；外用适量，煎汤洗患处。

【贮藏】 置干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

洪　　连

Honglián

HERBA LAGOTIS

本品系藏族习用药材，藏文名为 དཔང་ཁུ་ (洪连)；为玄参科植物兔耳草 Lagotis glauca Gaertn. 或短管兔耳草 Lagotis brevituba Maxim. 的干燥全草。夏、秋二季花开时采挖，除去杂质，洗净，阴干。

【性状】 **兔耳草**　长 10～15 cm。根茎呈圆柱形，略弯曲，节间紧密，形似蚕，长 2～10 cm，直径 0.4～0.6 cm；表面灰褐色或紫褐色，质脆，易折断，断面灰黄色或棕褐色，有 3～7 个白色的点状维管束，排列成环。叶基生，具长柄；叶片多卷曲破碎，完整者展平后呈卵状椭圆形，长 3～5 cm，宽 2～3 cm；灰绿色或黄绿色，先端急尖，基部宽楔形，边缘有疏锯齿。穗状花序顶生，长 2～4 cm；苞片叶状，花小，淡紫色，花萼佛焰苞状，具 2 浅齿，花冠管弯曲，上端二唇形。气微，味微苦。

短管兔耳草　长 5～15 cm。茎紫红色。基生叶圆形或卵圆形，先端钝圆，中部边缘具圆齿，基部楔形。花序长 2～6 cm，花紫红色，花萼呈大形苞片状，顶端微凹。

均以叶多而色绿带紫者为佳。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清热解毒，行血调经。用于五脏有热，血分热毒，急、慢性肝炎，月经不调，高血压。

【用法与用量】 1.5～3 g，多入丸散服。

【贮藏】 置通风干燥处，防霉。

洋 地 黄 叶　　【剧】

Yangdihuangye

FOLIUM DIGITALIS

本品为玄参科植物紫花洋地黄 Digitalis purpurea L. 的干燥叶。初夏花未开放时采

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

收，在60°以下迅速干燥。每1g的效价不得少于10个洋地黄单位。

【性状】 本品多皱缩、破碎，完整叶片展平后呈卵状披针形至宽卵形，长10～40 cm，宽4～10 cm。叶缘具钝锯齿，上表面暗绿色，微有毛，叶脉下凹；下表面淡灰绿色，多毛，叶脉显著突出呈网状。基生叶有长柄，茎生叶有短柄或无柄，叶柄有翼，横切面扁三角形。质脆。气微，味苦。

【鉴别】 (1) 本品横切面：叶肉栅栏细胞1列，较短，海绵细胞5～6列。主脉上面凹陷，下面显著突出，维管束外韧型，中柱鞘厚角细胞外侧有1～2列含淀粉粒的薄壁细胞；上下表皮内方有厚角细胞2～5列。

本品的粉末黄绿色或灰绿色。非腺毛2～7细胞，表面有细小疣状突起，顶端细胞钝圆，中部常有1～2细胞缢缩。腺毛头部2细胞、柄1～2细胞及头部单细胞、柄1～4细胞。下表皮细胞垂周壁弯曲。气孔不定式，副卫细胞3～4个。

(2) 取本品的细粉约0.5 g，加稀乙醇30 ml，煮沸2分钟，放冷，加碱式醋酸铅试液5滴，滤过。滤液加氯仿10 ml，振摇，分取氯仿层，注意蒸干。残渣中加含三氯化铁的冰醋酸液(取冰醋酸10 ml，加三氯化铁试液1滴制成) 2 ml，溶解后，移置小试管中，沿管壁缓缓加硫酸2 ml，使成二液层，接界处即显红棕色，数分钟后，冰醋酸层渐变为蓝绿色。

【检查】 水分 照水分测定法项下烘干法(附录15页)测定，含水分不得过8.0%。

灰分 不得过10.0%(附录15页)。

【效价测定】 照洋地黄生物检定法项下的方法(附录62页)测定，应符合规定。

【功能与主治】 强心药。

【注意】 本品仅供制造制剂用。

【贮藏】 密闭，置干燥处保存。

【制剂】 洋地黄片

洋地黄片 【剧】

Yangdihuang Pian

TABELLAE DIGITALIS

本品为洋地黄叶粉的片，效价应为标示量的83.0～115.0%。

【性状】 本品为暗灰绿色片。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【鉴别】 取本品5片，研细后，照洋地黄叶项下的鉴别法(2)项(432页)试验，显相同的反应。

【检查】 除崩解时限应在30分钟内崩解外，其他应符合片剂项下有关的各项规定(附录6页)。

【效价测定】 照洋地黄生物检定法项下的方法(附录62页)测定，应符合规定。

【功能与主治】 强心药，加强心肌收缩力，减慢心率，抑制传导。用于充血性心功能不全。

【用法与用量】 口服，一次0.05～0.2 g；饱和量，0.7～1.2 g于48～72小时内分次口服；维持量，一日0.07～0.1 g。极量，口服，一次0.4 g，一日1 g。

【注意】 有蓄积性。可能引起恶心、呕吐、心律失常等中毒反应。用药期间忌用钙注射剂。

【规格】 1个单位(0.1 g)

【贮藏】 遮光，密封保存。

洋　金　花 (风茄花)

Yangjinhua

FLOS DATURAE

本品为茄科植物白曼陀罗 Datura metel L. 的干燥花。4～11月花初开时采收，晒干或低温干燥。

【性状】 本品多皱缩成条状，完整者长9～15 cm。花萼呈筒状，长为花冠的2/5，灰绿色或灰黄色，先端5裂，基部具纵脉纹5条，表面微有茸毛；花冠呈喇叭状，黄棕色或灰棕色，先端5浅裂，裂片有短尖，短尖下有明显的纵脉纹3条，两裂片之间微凹；雄蕊5个，花丝贴生于花冠筒内，长为花冠的3/4；雌蕊1个，柱头棒状。烘干品质柔韧，气特异；晒干品质脆，气微，味微苦。

以朵大、不破碎者为佳。

【鉴别】 (1) 本品表面观，花粉粒类球形或长圆形，直径42～65 μm，表面有条纹状雕纹。花萼非腺毛1～3细胞，壁具疣状突起，腺毛头部1～5细胞；柄1～5细胞。花冠裂片边缘非腺毛1～10细胞，壁微具疣状突起。花丝基部非腺毛粗大，1～5细胞，基部直径约至128 μm，顶端钝圆。花萼、花冠有草酸钙砂晶、方晶及簇晶。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

(2) 取本品粉末 0.5 g，加浓氨溶液 0.5 ml，混匀，再加氯仿 3 ml，浸泡半小时，滤取氯仿液作为供试品溶液，以 0.5%阿托品的氯仿溶液与 0.5%东莨菪碱的氯仿溶液作对照，分别点样于同一硅胶 G 层析板上(4×20 cm)，用丁酮-甲醇-7.5%氨溶液 (30:15:5)展开 10～12 cm，先以碘化铋钾试液喷雾，再用 2%亚硝酸钠溶液喷雾，供试品出现的两个斑点应与对照品一致。

【含量测定】 取本品细粉约 10 g，精密称定，置回流提取器中，加乙醇-浓氨溶液-乙醚(1:0.8:2)的混合液适量，浸渍 12 小时后，加适量乙醚作溶剂，回流提取约 3 小时，至生物碱完全提出，提取液置水浴上蒸发，除去部分乙醚后，移置分液漏斗中，用 $N/1$ 硫酸液分次轻缓振摇提取(防止严重乳化现象)，每次 10 ml，至生物碱提尽为止，合并酸液，用氯仿分次振摇，每次 10 ml，至氯仿液不再染色，合并氯仿液，用 $N/1$ 硫酸液 10 ml 振摇提取，弃去氯仿，合并前后两次所得的酸液，加过量浓氨溶液使呈碱性，再用氯仿分次振摇提取，至生物碱提尽为止，每次所得到的氯仿液均用同一的水 10 ml 洗涤，合并氯仿液，置水浴上蒸干，残渣加中性乙醇 3 ml 使溶解，蒸干后继续加热 15 分钟，残渣加氯仿 2 ml 溶解后，精密加 $N/50$ 硫酸液 20 ml，置水浴上加热，除去氯仿，放冷至室温，加甲基红指示液 2～3 滴，用 $N/50$ 氢氧化钠液滴定，即得 (每 1 ml 的 $N/50$ 硫酸液相当于 6.068 mg 的 $C_{17}H_{21}O_4N$)。

本品含生物碱作为东莨菪碱($C_{17}H_{21}O_4N$)计算，不得少于 0.3%。

【性味】 辛，温；有毒。

【功能与主治】 平喘镇咳，止痛。用于哮喘咳嗽，胃痛。

【用法与用量】 0.3～0.6 g；亦可作卷烟燃吸(分次用，每日量最多不超过 1.5 g)。

【注意】 青光眼、外感初起的喘咳患者忌用；心脏病或高血压患者、肝肾功能不正常或体弱者以及孕妇慎用。

【贮藏】 置干燥处，防霉、防蛀。

穿山龙

Chuanshanlong

RHIZOMA DIOSCOREAE NIPPONICAE

本品为薯蓣科植物穿龙薯蓣 Dioscorea nipponica Makino 的干燥根茎。春、秋二季采挖，除去须根及外皮，晒干。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 本品呈类圆柱形，弯曲，常有分枝，长 10～15 cm，直径 0.3～1.5 cm。表面黄白色或棕黄色，有纵沟、刺状残根及偏于一侧的突起茎痕，偶有膜状外皮和细根。质坚硬，断面平坦，白色或黄白色，有淡棕色的点状维管束。气微，味微苦涩。

以条粗、质坚实、断面色白者为佳。

【鉴别】 本品横切面：木栓细胞数列，棕色。皮层窄，有较大的粘液细胞，于中柱交界处尤多，内含草酸钙针晶束。中柱基本组织发达，细胞壁稍厚，木化，有纹孔，含淀粉粒；外侧有石细胞环层；维管束甚多，外韧型，散列于基本组织间。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。

【性味】 甘、苦，温。

【功能与主治】 祛风湿，止痛，舒筋活血，止咳平喘祛痰。用于风湿性关节炎，腰腿疼痛、麻木，大骨节病，跌扑损伤，闪腰岔气，慢性支气管炎，咳嗽气喘。

【用法与用量】 9～15 g，鲜品 30～45 g；也可制成酒剂用。

【注意】 粉碎加工时，注意防护，以免发生过敏反应。

【贮藏】 置干燥处。

穿　山　甲

Chuanshanjia

SQUAMA MANITIS

本品为鲮鲤科动物穿山甲 Manis pentadactyla L. 的鳞甲。全年均可捕捉，杀死后置沸水中略烫，取下鳞甲，洗净，晒干。

【性状】 本品呈扇面形、三角形、菱形或盾形的扁平片状或半折合状，中间较厚，边缘较薄，大小不一。外表面黑褐色或黄褐色，有光泽，较宽的一端有数十条排列整齐的纵纹及数条横线纹；较窄的一端光滑。内表面色较浅，中部有 1 条明显突起的弓形横向棱线，其下方有数条与棱线相平行的细纹。角质，半透明，坚韧而有弹性，不易折断。气微腥，味淡。

以半透明、不带皮肉者为佳。

【炮制】 穿山甲　除去杂质，洗净，晒干。

炮山甲　取净穿山甲片，照烫法(附录19页)用砂子炒至鼓起呈黄色。

醋山甲　将上述炮山甲，趁热倒入醋内，搅拌，略浸，捞出，晒干。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

每穿山甲片 100 kg，用醋 20～25 kg。

【性味】 咸，微寒。

【功能与主治】 活血，下乳，消肿，排脓。用于乳汁不通，痈肿疮毒，经闭，关节肿痛。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置干燥处。

穿 心 莲

Chuanxinlian

HERBA ANDROGRAPHITIS

本品为爵床科植物穿心莲 Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees 的干燥地上部分。秋初茎叶茂盛时采割，晒干。

【性状】 本品茎呈方柱形，多分枝，长 50～70 cm，节稍膨大；质脆，易折断。单叶对生，叶柄短或近无柄；叶片皱缩、易碎，完整者展开后呈披针形或卵状披针形，长 3～12 cm，宽 2～5 cm，先端渐尖，基部楔形下延，全缘或波状；上表面绿色，下表面灰绿色，两面光滑。气微，味极苦。

以色绿、叶多者为佳。

【鉴别】 (1) 取本品少量，口尝，味初不苦，逐渐苦至喉部，苦味持久。

(2) 本品叶的横切面：表面细胞类方形，大小不等，有多数圆形、长椭圆形或棒状的钟乳体，直径约至 48 μm；非腺毛 1～4 细胞，顶端钝圆，长约至 160 μm；基部直径约 30 μm，壁有角质纹理；腺鳞头部扁球形，4 或 8 细胞，直径 28～40 μm，柄单细胞。栅栏组织为 1～2 列细胞，贯穿主脉上方。主脉略呈三角形，维管束外韧型，木质部上方薄壁组织中有钟乳体。

(3) 取本品粉末约 1 g，加乙醇 20 ml，置水浴中加热至沸，滤过，滤液加活性炭 0.3g，搅拌，滤过。取滤液 1 ml，加 2 % 3,5-二硝基苯甲酸的乙醇溶液与乙醇制氢氧化钾试液的等容混合液 1～2 滴，即显紫红色；另取滤液 1 ml，加碱性三硝基苯酚试液 1 滴，逐渐显棕色；再取滤液 1 ml，加乙醇制氢氧化钾试液数滴，逐渐显红色，放置后变为黄色。

【炮制】 除去杂质，切段。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清热，消炎，解毒。用于风热感冒，扁桃体炎，咽喉炎，支气管炎，肺炎，肠炎，痢疾，尿路感染，痈疖疮疡；外治外伤感染，化脓性中耳炎。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置干燥处。

【制剂】 穿心莲片

穿 心 莲 片

Chuanxinlian Pian

TABELLAE ANDROGRAPHITIS

本品为穿心莲浸膏片。每片含穿心莲干浸膏 0.105g。

【制法】 取穿心莲粗粉，用 85%乙醇热浸提取二次，每次 2 小时，合并提取液，滤过，滤液回收乙醇，浓缩成稠膏状，干燥至干浸膏，加适量辅料，制成颗粒，压片，包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显暗绿色；味苦。

【鉴别】 取本品 2 片，除去糖衣，研细，加乙醇 30 ml 使溶解，加活性炭少量，微热后滤过，滤液照下述方法试验：

(1) 取滤液数滴，加氢氧化钾 1 小粒，渐显红棕色。

(2) 取滤液 2 ml，加 2% 3,5-二硝基苯甲酸的乙醇溶液与 5 %氢氧化钾的乙醇溶液各 2 滴，显紫红色。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(附录 6 页)。

【功能与主治】 同穿心莲。

【用法与用量】 口服，一次 5 片，一日 3～4 次。


【贮藏】 密封保存。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

穿心莲内酯

Chuanxinlianneizhi

ANDROGRAPHOLIDUM



[$C_{20}H_{30}O_5$=350.45]

本品按干燥品计算，含 $C_{20}H_{30}O_5$ 应为 95.0～105.0%。

【性状】 本品为无色方形、长方形或棱柱状的结晶；无臭，味苦。

本品在沸乙醇中溶解，在甲醇或乙醇中略溶，在氯仿中极微溶解，在水中几乎不溶。

熔点 本品的熔点(附录28页)为 224～230°，熔融时同时分解。

【鉴别】 (1) 取本品约 10 mg，加乙醇 2 ml 溶解后，加 2% 3,5-二硝基苯甲酸的乙醇溶液与 5% 氢氧化钾的乙醇溶液各 2 滴，摇匀后，即显紫红色。

(2) 取本品约 10 mg，加乙醇 2 ml溶解后，加乙醇制氢氧化钾试液 2～3 滴，渐显红色，放置后变为黄色。

(3) 取本品，加无水乙醇制成每 1 ml 中含 10 μg 的溶液，照分光光度法(附录32页)测定，在 224±1 nm 的波长处有最大吸收。

【检查】 **其他内酯** 取本品，加无水乙醇制成每 1 ml 中含 2 mg 的溶液，照薄层层析法(附录 38 页)试验，取溶液 10 μl，点于硅胶 G (含 15%煅石膏)薄层板上，以氯仿-甲醇(19:1)为展开剂，展开后，晾干，喷以 2%3,5-二硝基苯甲酸的乙醇溶液与 5% 氢氧化钾的乙醇溶液的等量混合液(临用前混合)使显色，除主斑点外，不得显其他斑点。

干燥失重 取本品，在 105°干燥至恒重，减失重量不得过 1.0%(附录44页)。

炽灼残渣 不得过 0.1%(附录45页)。

【含量测定】 **对照品溶液的制备** 精密称取经 105° 干燥至恒重的穿心莲内酯对照

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

品 50 mg，置 50 ml 量瓶中，加无水乙醇适量，置温水浴中使溶解，放冷，加无水乙醇至刻度，摇匀，即得(每 1 ml 中含穿心莲内酯 1 mg)。

供试品溶液的制备 取本品约 50 mg，照上述对照品溶液的制备方法制备，即得。

测定法 精密量取对照品溶液与供试品溶液各10 ml，分别置 25 ml 量瓶中，各加二硝基苯试液与*N*/5 氢氧化钾液各 2.0 ml，立即摇匀，15 分钟后(以停表计时)，各加枸橼酸溶液(取枸橼酸与枸橼酸氢二铵各 5 g，加稀乙醇溶解成 100 ml) 4 ml，再加稀乙醇至刻度，摇匀，放置 15 分钟，照比色法(附录32页)，在 450 nm 的波长处测定吸收度，计算，即得。

【功能与主治】 清热解毒，抗菌消炎。用于上呼吸道感染，细菌性痢疾。

【用法与用量】 口服，一次 0.1～0.15 g，一日 3～4 次。

【贮藏】 遮光，密闭保存。

【制剂】 (1) 穿心莲内酯片 (2) 穿心莲甙酯片

穿心莲内酯片

Chuanxinlianneizhi Pian

TABELLAE ANDROGRAPHOLIDI

本品含穿心莲内酯 ($C_{20}H_{30}O_5$) 应为标示量的 90.0～110.0%。

【性状】 本品为白色片；味苦。

【鉴别】 取本品 1 片，研细，加乙醇 10 ml，置水浴中加热，并不断振摇，使穿心莲内酯溶解，放冷，滤过，滤液照穿心莲内酯项下的鉴别法(1)、(2)项(439页)试验，显相同反应。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(附录 6 页)。

【含量测定】 **对照品溶液的制备** 照穿心莲内酯项下的方法(439页)制备，即得。

供试品溶液的制备 取本品 10 片，精密称定，研细，精密称出适量(约相当于穿心莲内酯 50 mg)，置 50 ml 量瓶中，加无水乙醇约 40 ml，置水浴中加热 30 分钟，并不断振摇，使穿心莲内酯溶解，放冷，加无水乙醇至刻度，摇匀，用干燥滤纸滤过，弃去初滤液，分取续滤液，即得。

测定法 照穿心莲内酯项下的方法(439页)测定，计算，即得。

【功能与主治】 **【用法与用量】** 同穿心莲内酯。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com


【规格】 50 mg

【贮藏】 遮光，密闭保存。

穿心莲甙

Chuanxinliandai

NEOANDROGRAPHOLIDUM



[$C_{26}H_{40}O_8 \cdot H_2O = 498.61$]

本品按无水物计算，含 $C_{26}H_{40}O_8$ 应为 95.0～105.0%。

【性状】 本品为白色细柱状结晶；无臭，无味。

本品在甲醇、无水乙醇或丙酮中略溶，在氯仿中极微溶解，在水中几乎不溶。

熔点 本品的熔点(附录28页)为 171～175°。

【鉴别】 (1) 取本品约 5 mg，加无水乙醇 2 ml，微温溶解后，加盐酸 0.5 ml 与 5% α-萘酚的乙醇溶液 2～3 滴，置水浴中加热，显蓝紫色。

(2) 取本品与穿心莲甙对照品，分别加无水乙醇制成每 1 ml 中含 2 mg 的溶液，照薄层层析法(附录 38 页)试验，取上述溶液各 20 μl，点于硅胶 G (含 13%煅石膏) 薄层板上，以氯仿-无水乙醇 (30:2) 为展开剂，展开后，晾干，喷以 2 %3,5-二硝基苯甲酸的乙醇溶液与 5 %氢氧化钾的乙醇溶液的等量混合液(临用前混合)使显色，本品所显主斑点的颜色与位置，应与对照品主斑点相同。

【检查】 **氯化物** 取本品 2 g，加水 100 ml，振摇 15 分钟，滤过。取滤液 35 ml，依法检查(附录44页)，如发生浑浊，与标准氯化钠溶液 7 ml 制成的对照液比较，不得更浓(0.014%)。

穿心莲内酯 取本品 5 mg，加无水乙醇 2 ml，微温溶解后，加 10%氢氧化钠的乙醇溶液 4 滴，不得显红色。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

干燥失重 取本品，在120°干燥至恒重，减失重量不得过6.0%(附录44页)。

炽灼残渣 不得过0.1%(附录45页)。

【含量测定】 **对照品溶液的制备** 精密称取在120°干燥至恒重的穿心莲甙对照品30 mg，置100 ml量瓶中，加盐酸的乙醇溶液(1→5)溶解并稀释至刻度，摇匀，即得(每1 ml中含无水穿心莲甙0.3 mg)。

标准曲线的制备 精密量取对照品溶液1.0、2.0、3.0、4.0与5.0 ml，分别置10 ml安瓿中，各加10%二苯胺的乙醇溶液1 ml，分别用盐酸的乙醇溶液(1→5)稀释成10 ml，熔封后，置水浴上加热煮沸90分钟，迅速冷却至室温，照分光光度法(附录32页)，在646 nm的波长处测定吸收度，以吸收度为纵坐标，浓度为横坐标，绘制标准曲线。

测定法 取本品约15 mg，精密称定，置100 ml量瓶中，加盐酸的乙醇溶液(1→5)溶解并稀释至刻度，摇匀。精密量取5 ml，置10 ml安瓿中，加10%二苯胺的乙醇溶液1 ml，用盐酸的乙醇溶液(1→5)稀释成10 ml，熔封，照标准曲线的制备项下的方法，自"置水浴上加热煮沸90分钟"起，依法测定吸收度，从标准曲线中读出供试液中$C_{26}H_{40}O_8$的含量，即得。

【功能与主治】 清热解毒，抗菌消炎。用于细菌性痢疾。

【用法与用量】 口服，一次0.1～0.2 g，一日4次。

【贮藏】 密闭保存。

【制剂】 穿心莲甙酯片

穿心莲甙酯片

Chuanxinliandaizhi Pian

TABELLAE NEOANDROGRAPHOLIDI ET ANDROGRAPHOLIDI

本品每片含穿心莲甙$C_{26}H_{40}O_8 \cdot H_2O$应为0.063～0.077 g。

【处方】 穿心莲甙 70 g　穿心莲内酯 30 g

【制法】 取穿心莲甙与穿心莲内酯混匀，制成颗粒，压制成1000片，即得。

【性状】 本品为白色片；味苦。

【鉴别】 取本品1片，研细，加无水乙醇30 ml，加热回流15分钟，滤过，蒸去无

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

水乙醇，所得白色结晶照下述方法试验：

（1）取上述结晶，照穿心莲甙项下的鉴别法(1)项(441页)试验，显相同反应。

（2）取上述结晶约 2 mg，加无水乙醇 2 ml 使溶解，滴加氢氧化钠的乙醇溶液（1→10)0.1 ml，显鲜红色。

（3）取上述结晶约 5 mg，加无水乙醇 2 ml，温热使溶解，另取穿心莲甙对照品 7 mg 与穿心莲内酯对照品 3 mg，加无水乙醇 4 ml，温热使溶解，照薄层层析法(附录38页)试验，取上述溶液各 20 μl，点于同一硅胶 G（含 13% 煅石膏）薄层板上，以氯仿-无水乙醇(30:2)为展开剂，展开后，晾干，喷以 2%3,5-二硝基苯甲酸的乙醇溶液与 5%氢氧化钾的乙醇溶液的等量混合液(临用前混合)使显色，本品所显两个主斑点的颜色与位置，应与对照品主斑点相同。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(附录 6 页)。

【含量测定】 **对照品溶液的制备与标准曲线的制备** 均照穿心莲甙项下的方法(441页）制备。

测定法 取本品 10 片，精密称定，研细，精密称取适量（约相当于穿心莲甙 30 mg)，置锥形瓶中，加无水乙醇 100 ml，置水浴上回流约 15 分钟，滤过，滤液置 200 ml 量瓶中，用少量热无水乙醇洗涤锥形瓶及漏斗，洗液并入量瓶中，加盐酸 40 ml，加无水乙醇稀释至刻度，摇匀，照穿心莲甙项下的方法(441页)，自“精密量取溶液 5 ml”起，依法测定，从标准曲线中读出供试量中 $C_{26}H_{40}O_8$ 的含量，乘以 1.037 计算出 $C_{26}H_{40}O_8 \cdot H_2O$ 的量，即得。

【功能与主治】 同穿心莲甙。

【用法与用量】 口服，一次 1～2 片，一日 4 次。

【贮藏】 密闭保存。

穿　破　石

Chuanposhi

RADIX CUDRANIAE

本品为桑科植物构棘 Cudrania cochinchinensis (Lour.) Kudo et Masam. 或柘树 Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur. 的干燥根。全年均可采挖，除去须根，洗净，切片或段，晒干。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 本品呈不规则的块片状，大小厚薄不一。外皮橙黄色或橙红色，具多数纵皱纹，有的密布细小类白色点状或横长的疤痕，栓皮菲薄，多成层状，极易脱落，脱落处显灰黄色或棕褐色。质坚硬，不易折断，切面淡黄色或淡黄棕色，皮部薄，纤维性；木部宽广，有小孔。气微，味淡。

以外皮橙黄者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，晒干，或润透，切片，晒干。

【性味】 微苦，凉。

【功能与主治】 止咳，退黄，活血，通络。用于肺结核，湿热黄疸，胁肋疼痛，跌扑瘀痛，风湿痹痛。

【用法与用量】 15～30 g。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

扁　豆　花

Biandouhua

FLOS DOLICHORIS

本品为豆科植物扁豆 Dolichos lablab L. 的干燥花。夏、秋二季采摘未全开放的白花，除去杂质，晒干。

【性状】 本品多皱缩，展开后呈不规则扁三角形。花萼钟状，深黄色至深棕色，5齿裂，外被白色短毛，尤以萼的边缘为多。花瓣黄白色至深黄色，5片，其中两瓣合抱，弯曲成虾状。雄蕊10个，其中9个基部联合；雌蕊1个，黄绿色，弯曲，先端有白色绒毛。体轻。气微，味微甜。

以完整、未完全开放、色黄白者为佳。

【鉴别】 本品粉末上黄色。花粉粒类圆形至长圆形，直径35～50 μm，表面有细网状雕纹，具3个萌发孔。非腺毛甚多，1～3细胞，顶端细胞较长，先端多锐尖。腺毛头部4～8细胞，倒卵形，柄1～3细胞。

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 消暑，化湿，和中。用于暑湿泄泻，痢疾。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮、防蛀。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

祖　司　麻

Zusima

CORTEX DAPHNES

本品为瑞香科植物黄瑞香 Daphne giraldii Nitsche、陕甘瑞香 Daphne tangutica Maxim. 或凹叶瑞香 Daphne retusa Hemsl. 的干燥茎皮及根皮。春、秋二季采收剥取，干燥。

【性状】 本品呈长条状，卷曲，厚 0.5～2 mm。外表面褐黄色或灰褐色，根皮较粗糙，茎皮光滑，具纵皱纹及横长皮孔，栓皮易成片脱落。内表面浅灰黄色或灰白色，较光滑。质韧，不易折断，断面纤维性，黄白色。气微，味微苦，具持久的麻舌感。

以条宽长、皮厚者为佳。

【性味】 辛、苦，温；有小毒。

【功能与主治】 祛风湿，活血止痛。用于风湿痹痛，关节炎，类风湿性关节痛。

【用法与用量】 3～6 g。

【贮藏】 置干燥处。

孩　儿　参

Hai'ershen

RADIX PSEUDOSTELLARIAE

本品为石竹科植物孩儿参 Pseudostellaria heterophylla (Miq.) Pax ex Pax et Hoffm. 的干燥块根。夏季茎叶大部分枯萎时采挖，洗净，除去须根，置沸水中略烫后晒干或直接晒干。

【性状】 本品呈细长纺锤形或细长条形，稍弯曲，长 3～10 cm，直径 0.2～0.6 cm。顶端有茎痕，表面黄白色，较光滑，微有纵皱纹，凹陷处有须根痕。质硬而脆，断面平坦，淡黄白色，角质样；或类白色，有粉性。气微，味微甘。

以条粗、色黄白者为佳。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性味】 甘、苦，平。

【功能与主治】 益气，健脾，生津。用于脾虚体倦，食欲不振，病后虚弱，心悸口干。

【用法与用量】 6～12 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮、防蛀。

络　石　藤

Luoshiteng

CAULIS TRACHELOSPERMI

本品为夹竹桃科植物络石 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. 的干燥带叶藤茎。冬季至次春采割，除去杂质，晒干。

【性状】 本品茎呈圆柱形，弯曲，多分枝，长短不一，直径 1～5 mm；表面红褐色，有点状皮孔及不定根；质硬，断面淡黄白色，常中空。叶对生，有短柄；展平后叶片呈椭圆形或卵状披针形，长 1～8 cm，宽 0.7～3.5 cm；全缘，略反卷，上表面暗绿色或棕绿色，下表面色较淡，革质。气微，味微苦。

以叶多而色绿者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，稍润，切段，干燥。

【性味】 苦，微寒。

【功能与主治】 祛风通络，活血消肿。用于风湿性关节痛，腰膝酸痛，扁桃体肿大，痈肿。

【用法与用量】 6～12 g；外用鲜品适量，捣烂敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

秦　艽

Qinjiao

RADIX GENTIANAE MACROPHYLLAE

本品为龙胆科植物秦艽 Gentiana macrophylla Pall.、麻花秦艽 Gentiana stra-

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

minea Maxim.、粗茎秦艽 Gentiana crassicaulis Duthie ex Burk. 或小秦艽 Gentiana dahurica Fisch. 的干燥根。前三种按性状不同分别习称"秦艽"和"麻花艽"，后一种习称"小秦艽"。春、秋二季采挖，除去泥沙；秦艽及麻花艽晒软，堆置"发汗"至表面呈红黄色或灰黄色时，摊开晒干，或不经"发汗"直接晒干；小秦艽趁鲜时搓去黑皮，晒干。

【性状】 **秦艽** 呈类圆柱形，上粗下细，扭曲不直，长 10～30 cm，直径 1～3 cm。顶端有残存茎基及纤维状叶鞘。表面黄棕色或灰黄色，有纵向或扭曲的纵皱纹。质硬而脆，易折断，断面柔润，皮部黄色或棕黄色，木部黄色。气特异，味苦、微涩。

麻花艽 呈类圆锥形，多由数个小根纠聚而膨大，直径可达 7 cm。表面棕褐色，粗糙，有裂隙呈网状孔纹。质松脆，易折断，断面多呈枯朽状。

小秦艽 呈类圆锥形或类圆柱形，长 8～15 cm，直径 0.2～1 cm。表面棕黄色。主根通常 1 个，残存的茎基有纤维状叶鞘，下部多分枝。断面黄白色。

均以质实、色棕黄、气味浓厚者为佳。

【鉴别】 (1) 取本品粗粉 2 g，加氯仿-甲醇-浓氨溶液(75:25:5)混合液 30 ml，浸泡 2 小时，滤过，滤液置水浴上浓缩至约 1 ml，加*N*/1 盐酸液 2 ml，继续蒸除氯仿，放冷，滤过。取滤液分置二支试管中，一管加碘化汞钾试液，即发生淡黄白色沉淀；另一管加碘化铋钾试液，即发生棕红色沉淀。

(2) 取本品横断面，置紫外光灯下观察，显黄白色或金黄色荧光。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，晒干。

【性味】 苦、辛，平。

【功能与主治】 祛风湿，退虚热，止痛。用于风湿性关节炎，低热，小儿疳积发热。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

秦　　皮

Qinpi

CORTEX FRAXINI

本品为木犀科植物苦枥白蜡树 Fraxinus rhynchophylla Hance、白蜡树 Fraxinus chinensis Roxb. 或宿柱白蜡树 Fraxinus stylosa Lingelsh. 的干燥枝皮或干皮。春、秋

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

二季剥取，晒干。

【性状】 **枝皮** 呈卷筒状或槽状，长 10～60 cm，厚 1.5～3 mm。外表面灰白色、灰棕色至黑棕色或相间呈斑状，平坦或稍粗糙，并有灰白色圆点状皮孔及细斜皱纹，有的具分枝痕。内表面黄白色或棕色，平滑。质硬而脆，断面纤维性，黄白色。无臭，味苦。

干皮 为长条状块片，厚 3～6 mm。外表面灰棕色，具龟裂状沟纹及红棕色圆形或横长的皮孔。质坚硬，断面纤维性较强。

均以条长呈筒状、外皮薄而光滑者为佳。

【鉴别】 (1) 取本品，加热水浸泡，浸出液在日光下可见碧蓝色荧光。

(2) 本品横切面：木栓层为 5～10 余列细胞。栓内层为数列多角形厚角细胞。皮层较宽，纤维及石细胞单个散在或成群。中柱鞘部位有石细胞及纤维束组成的环带，偶有间断。韧皮部射线宽 1～3 列细胞；纤维束及少数石细胞成层状排列，中间贯穿射线，形成井字形。薄壁细胞含草酸钙砂晶。

(3) 取本品粉末约 1 g，加乙醇 10 ml，置水浴上回流 10 分钟，滤过。取滤液 1ml，滴加 1%三氯化铁溶液 2～3 滴，显暗绿色，再加氨试液 3 滴与水 6 ml，摇匀，对光观察，显深红色。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切丝，晒干。

【性味】 苦、涩，寒。

【功能与主治】 清热燥湿。用于痢疾，白带，目赤肿痛，结膜炎，角膜翳，关节酸痛。

【用法与用量】 4.5～9 g；外用适量，煎汤洗眼。

【贮藏】 置通风干燥处。

珠　子　参（纽子七）

Zhuzishen

RHIZOMA PANACIS MAJORIS

本品为五加科植物珠子参 Panax japonicus C. A. Mey. var. major (Burk.) C. Y. Wu et K. M. Feng 或疙瘩七 Panax japonicus C. A. Mey. var. bipinnatifidus (Seem.) C. Y. Wu et K. M. Feng 的干燥根茎。秋季采挖，除去粗皮及须根，干燥；或蒸（煮）透后干

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

燥。

【性状】 本品略呈扁球形、圆锥形或不规则菱角形，偶有呈连珠状的，长0.8～5 cm，直径0.5～2.8 cm。表面棕黄色或黄褐色，有明显的疣状突起及皱纹，两端略凸出或呈短圆柱状，偶有圆形凹陷的茎痕。质坚硬，断面不平坦，淡黄白色，粉性。气微，味苦微甘，嚼之刺喉。蒸、煮者断面黄白色或黄棕色，略呈角质样，味微苦、微甘，嚼之不刺喉。

以个大、质坚实者为佳。

【鉴别】 取本品粉末1 g，加水10 ml，浸泡过夜，置60°水浴中热浸10分钟，立即滤过。取带塞试管两支，各加滤液1 ml，分别加5%氢氧化钠溶液和5%盐酸溶液各2 ml，用力振摇1分钟，加酸管发生的泡沫比加碱管高出约1～2倍。

【炮制】 除去杂质，用时打碎。

【性味】 苦、甘，微温。

【功能与主治】 舒筋活络，补血止血。生品用于跌扑损伤，外伤出血，腰腿疼痛，月经不调，吐血，便血；熟品用于气血双亏，虚劳咳嗽。

【用法与用量】 9～15 g；外用适量，研末敷患处。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

素馨花

Suxinhua

FLOS JASMINI

本品为木犀科植物素方花 Jasminum officinale L. 或素馨花 Jasminum officinale L. var. grandiflorum (L.) Kobuski 的干燥花蕾。夏、秋二季花未开放时于清晨采摘，除去花梗、花萼及杂质，蒸软，晒干。

【性状】 本品略呈毛笔状，长2～3 cm。表面金黄色至淡黄棕色，皱缩。花冠管长1～2 cm，直径1～1.5 mm，花冠裂片5片，呈覆瓦状紧裹，形如毛笔头，直径2～3 mm。雄蕊2个，着生于花冠管的上部，花丝短，花药长圆形；花柱细柱状，柱头稍膨大。质稍脆，遇潮变软。气香，味苦、微涩。

以色金黄、香气浓者为佳。

【性味】 微苦，平。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 疏肝解郁。用于肝气郁滞，胸脘胁肋疼痛。


【用法与用量】 6～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

盐酸八角枫碱

Yansuan Bajiaofengjian

ANABASINI HYDROCHLORIDUM



[$C_{10}H_{14}N_2 \cdot HCl = 198.70$]

本品按干燥品计算，含 $C_{10}H_{14}N_2 \cdot HCl$ 不得少于 97.0～103.0%。

【性状】 本品为白色或微黄色针状结晶；无臭，味咸苦；有引湿性。

本品在水、乙醇或氯仿中易溶，在丙酮中微溶。

熔点 本品的熔点(附录28页)为 187～191°。

【鉴别】 (1) 取本品 20 mg，加水 2 ml 溶解后，分置二支试管中，一管加碘化铋钾试液数滴，即发生红色沉淀；另一管加三硝基苯酚试液数滴，即发生黄色沉淀。

(2) 取本品约 4 mg，加 2,4-二硝基氯苯 5 mg，研匀，置试管中，缓缓加热熔化后，继续加热数秒钟，放冷，加乙醇制氢氧化钾试液 3 ml，即显深红色。

(3) 本品的水溶液显氯化物的鉴别反应(附录42页)。

【检查】 **干燥失重** 取本品，在 105°干燥至恒重，减失重量不得过 1.0% (附录44页)。

其他生物碱 取本品的干燥品，加氯仿制成每 1 ml 中含 10 mg 的溶液，照薄层层析法(附录 38 页)试验，吸取上述溶液 10 μl，点于氧化铝(中性，活度Ⅱ～Ⅲ级)薄层板上，以醋酸乙酯-氯仿-甲醇(2:2:1)为展开剂，展开后，晾干，喷以稀碘化铋钾试液使显色，除主斑点外，不得显其他斑点。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【含量测定】 取本品适量，精密称定，加 $N/100$ 盐酸液制成每 1 ml 中含 15 μg 的溶液，照分光光度法（附录32页），在 259±1 nm 的波长处测定吸收度，按 $C_{10}H_{14}N_2 \cdot HCl$ 的吸收系数（$E^{1\%}_{1cm}$）为 280 计算，即得。

【功能与主治】 横纹肌松弛药。用于外科手术中使横纹肌松弛。

【贮藏】 遮光，密闭保存。

【制剂】 盐酸八角枫碱注射液

盐酸八角枫碱注射液

Yansuan Bajiaofengjian Zhusheye

INJECTIO ANABASINI HYDROCHLORIDI

本品为盐酸八角枫碱的灭菌水溶液。含盐酸八角枫碱（$C_{10}H_{14}N_2 \cdot HCl$）应为标示量的 95.0～105.0%。

【性状】 本品为无色的澄明液体。

【鉴别】 取本品 5 ml，蒸干后，照盐酸八角枫碱项下的鉴别法(1)、(2) 项(450页)试验，显相同的反应。

【检查】 pH 值 应为 5.0～7.0(附录42页)。

其他 应符合注射剂项下有关的各项规定(附录 7 页)。

【含量测定】 精密量取本品 2 ml，置 250 ml 量瓶中，加 $N/100$ 盐酸液稀释至刻度，精密量取稀释液 20 ml，置 50 ml 量瓶中，用 $N/100$ 盐酸液稀释至刻度，照分光光度法（附录32页），以 0.9% 氯化钠溶液 2 ml 同样稀释为空白，在 259± 1 nm 的波长处测定吸收度，按 $C_{10}H_{14}N_2 \cdot HCl$ 的吸收系数（$E^{1\%}_{1cm}$）为 280 计算，即得。

【功能与主治】 同盐酸八角枫碱。

【用法与用量】 静脉滴注，一次按每公斤体重 0.5 mg 于 10 分钟左右滴入。

【规格】 5 ml:25 mg


【贮藏】 遮光，密闭保存。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

盐酸川芎嗪

Yansuan Chuanxiongqin

LIGUSTRAZINI HYDROCHLORIDUM



[$C_8H_{12}N_2 \cdot HCl \cdot 2H_2O = 208.69$]

本品为2,3,5,6-四甲基吡嗪盐酸盐。含$C_8H_{12}N_2 \cdot HCl \cdot 2H_2O$不得少于98.5%。

【性状】 本品为白色或类白色结晶性粉末；气特异，味苦。

本品在水中易溶，在乙醇或氯仿中溶解，在苯中极微溶解。

熔点 取本品，不经干燥，依法测定（附录28页），熔点为87～90°。

【鉴别】 (1) 取本品约10 mg，加水5 ml溶解后，加碘化铋钾试液2滴，即发生橘红色沉淀。

(2) 取本品，加水制成每1 ml中含0.02 mg的溶液，照分光光度法（附录32页）测定，在296±1 nm的波长处有最大吸收。

(3) 本品的水溶液显氯化物的鉴别反应（附录42页）。

【检查】 **氯化物限度** 取本品约0.15 g，精密称定，加水25 ml溶解后，加溴酚蓝指示液5滴，用$N/10$硝酸银液滴定，至显灰紫色（每1 ml的$N/10$硝酸银液相当于3.545 mg的Cl），含氯化物应为16.5～17.5%。

干燥失重 取本品，置五氧化二磷真空干燥器中（压力在约130 mm汞柱）干燥24小时，减失重量应为16.5～18.5%（附录44页）。

炽灼残渣 不得过0.1%（附录45页）。

重金属 取本品1 g，加稀醋酸2 ml与水适量使溶解成25 ml，依法检查（附录46页第一法），含重金属不得过百万分之二十。

【含量测定】 取本品约0.15 g，精密称定，加冰醋酸10 ml溶解后，加醋酸汞试液5 ml与结晶紫指示液1滴，用$N/10$高氯酸液滴定，至溶液显蓝绿色；并将滴定结果用

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

空白试验校正，即得（每 1 ml 的 $N/10$ 高氯酸液相当于 20.87 mg 的 $C_8H_{12}N_2 \cdot HCl \cdot 2\,H_2O$）。

【功能与主治】 活血化瘀，有抗血小板凝集，扩张小动脉作用。用于闭塞性脑血管病，如脑血栓形成，脑栓塞等。

【贮藏】 遮光，密封保存。

【制剂】 盐酸川芎嗪注射液

盐酸川芎嗪注射液

Yansuan Chuanxiongqin Zhusheye

INJECTIO LIGUSTRAZINI HYDROCHLORIDI

本品为盐酸川芎嗪的灭菌水溶液。含盐酸川芎嗪（$C_8H_{12}N_2 \cdot HCl \cdot 2\,H_2O$）应为标示量的 90.0～110.0%。

【性状】 本品为无色的澄明液体。

【鉴别】 取本品，照盐酸川芎嗪项下的鉴别法(452页)试验，显相同的反应。

【检查】 pH 值 应为 2.0～3.0 (附录42页)。

其他 应符合注射剂项下有关的各项规定(附录 7 页)。

【含量测定】 精密量取本品 5 ml，置 250 ml 量瓶中，加 $N/10$ 盐酸液稀释至刻度，摇匀，再精密量取稀释液 5 ml，置 200 ml 量瓶中，加 $N/10$ 盐酸液稀释至刻度，摇匀，照分光光度法(附录32页)，在 302±1 nm 的波长处测定吸收度，按 $C_8H_{12}N_2 \cdot HCl \cdot 2\,H_2O$ 的吸收系数（$E_{1cm}^{1\%}$）为 541 计算，即得。

【功能与主治】 同盐酸川芎嗪。

【用法与用量】 静脉滴注，一次 40～80 mg，用 5% 葡萄糖注射液或氯化钠注射液 250～500 ml 稀释后滴注，一日一次；穴位注射，选 3～4 穴位，每穴10～20 mg，隔日一次。

【注意】 脑出血及有出血倾向的患者忌用。

【规格】 2 ml:40 mg


【贮藏】 遮光，密闭保存。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

盐酸黄连素

Yansuan Huangliansu

BERBERINI HYDROCHLORIDUM



$[C_{20}H_{17}O_4N \cdot HCl \cdot 2H_2O = 407.85]$

本品按干燥品计算，含 $C_{20}H_{17}O_4N \cdot HCl$ 不得少于 96.0%(提取品)或 98.0% (合成品)。

【性状】 本品为黄色结晶性粉末；无臭，味极苦。

本品在热水中溶解，在水或乙醇中微溶，在氯仿中极微溶解，在乙醚中不溶。

【鉴别】 (1) 取本品约 50 mg，加水 5 ml，缓缓加热溶解后，加氢氧化钠试液 2 滴，显橙红色，放冷，加丙酮 4 滴，即发生浑浊，放置后，生成黄色沉淀；取上清液，加丙酮 1 滴，如仍发生浑浊，再加丙酮适量使沉淀完全，滤过，滤液显氯化物的鉴别反应(附录42页)。

(2) 取本品约 5 mg，加稀盐酸 2 ml，搅拌，加漂白粉少量，即显樱红色。

(3) 取本品约 2 mg，置白瓷皿中，加硫酸 1 ml 溶解后，加 5 % 没食子酸的乙醇溶液 5 滴，置水浴上加热，即显翠绿色。

【检查】 **干燥失重** 取本品，在 100°干燥至恒重，减失重量不得过 12.0%(附录44页)。

炽灼残渣 取本品 1 g，依法检查(附录45页)，遗留残渣不得过 0.3%(提取品)或 0.1%(合成品)。

重金属 取炽灼残渣项下遗留的残渣，依法检查(附录46页第二法)，含重金属不得过百万分之二十(提取品不检查此项)。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【含量测定】 取本品约 0.5 g，精密称定，置烧杯中，加热水 150 ml 与 $N/10$ 氢氧化钠液 15 ml，搅拌使溶解，放冷，移置 250 ml 量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，用干燥滤纸滤过，弃去初滤液，精密量取续滤液 100 ml，加 $N/10$ 盐酸液 10 ml，在不断搅拌下，立即缓缓加入三硝基苯酚试液 30 ml，静置 2 小时以上，用称定重量的 4 号垂熔玻璃漏斗滤过，沉淀用三硝基苯酚黄连素的饱和水溶液洗涤，继用水 15 ml 分次洗涤，并在 100°干燥至恒重，精密称定，与 0.6587 相乘，即得供试量中含有 $C_{20}H_{17}O_4N \cdot HCl$ 的重量。

【功能与主治】 抗菌药。用于痢疾杆菌等的肠道感染。

【用法与用量】 口服，一次 0.1～0.3 g，一日 0.3～0.9 g。

【贮藏】 密闭保存。

【制剂】 盐酸黄连素片

盐酸黄连素片

Yansuan Huangliansu Pian

TABELLAE BERBERINI HYDROCHLORIDI

本品含盐酸黄连素（$C_{20}H_{17}O_4N \cdot HCl \cdot 2\,H_2O$）应为标示量的 93.0～107.0%。

【性状】 本品为黄色片。

【鉴别】 取本品的细粉适量（约相当于盐酸黄连素 0.1 g），加水 10 ml，缓缓加热使盐酸黄连素溶解，滤过。取滤液，照盐酸黄连素项下的鉴别法（454 页）试验，显相同的反应。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定（附录 6 页）。

【含量测定】 取本品 10 片，精密称定，研细，精密称出适量（约相当于盐酸黄连素 0.3 g），置烧杯中，加沸水 150 ml 使盐酸黄连素溶解，放冷，移置 250 ml 量瓶中，精密加 $N/10$ 重铬酸钾液 50 ml，用水稀释至刻度，振摇 5 分钟，用干燥滤纸滤过，弃去初滤液，精密量取续滤液 100 ml，置 250 ml 碘瓶中，加碘化钾 2 g，振摇使溶解，加盐酸溶液（1→2）10 ml，密塞，摇匀，在暗处放置 10 分钟，用 $N/10$ 硫代硫酸钠液滴定，至近终点时，加淀粉指示液 2 ml，继续滴定至蓝色消失，溶液显亮绿色，并将滴定的结果用空白试验校正，即得（每 1 ml 的 $N/10$ 重铬酸钾液相当于 13.59 mg 的 $C_{20}H_{17}O_4N \cdot HCl \cdot 2\,H_2O$）。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】【用法与用量】 同盐酸黄连素。


【规格】 0.1 g

【贮藏】 遮光，密闭保存。

盐酸麻黄碱 【剧】

Yansuan Mahuangjian

EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM



[$C_{10}H_{15}ON \cdot HCl = 201.70$]

本品为*l*-N,*α*-二甲基-*β*-羟基苯乙胺的盐酸盐。按干燥品计算，含 $C_{10}H_{15}ON \cdot HCl$ 不得少于 99.0%。

【性状】 本品为白色针状结晶或结晶性粉末；无臭，味苦。

本品在水中易溶，在乙醇中溶解，在氯仿或乙醚中不溶。

熔点 本品的熔点(附录28页)为 217～220°。

比旋度 取本品，精密称定，加水制成每 1 ml 中含 50 mg 的溶液，依法测定（附录31页），按干燥品计算，比旋度为－33°至－35.5°。

【鉴别】 (1) 取本品约 10 mg，加水 1 ml 溶解后，加硫酸铜试液 2 滴与氢氧化钠溶液(1→5) 1 ml，即显蓝紫色，加乙醚 1 ml，振摇后，放置，乙醚层即显紫红色，水层变成蓝色。

(2) 本品的水溶液显氯化物的鉴别反应(附录42页)。

【检查】 **澄清度** 取本品 1 g，加水 20 ml 溶解后，溶液应澄清。

酸碱度 取本品 1 g，加新沸过的冷水 20 ml 溶解后，加甲基红指示液 1 滴，如显黄色，加*N*/50 硫酸液 0.1 ml，应变为红色；如显淡红色，加*N*/50 氢氧化钠液 0.1 ml，应变为黄色。

硫酸盐 取本品 0.1 g，加水 40 ml 溶解后，加稀盐酸 1 ml 与氯化钡试液 5 ml，10 分钟内，不得发生浑浊。

草酸盐 取本品 0.5 g，加水 10 ml 溶解后，加氨试液使成弱碱性，再加氯化钙试液

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

1 ml，不得发生浑浊。

干燥失重 取本品，在105°干燥至恒重，减失重量不得过0.5%(附录44页)。

炽灼残渣 不得过0.1%(附录45页)。

重金属 取本品1 g，加水23 ml溶解后，加稀醋酸2 ml，依法检查(附录46页第一法)，含重金属不得过百万分之二十。

【含量测定】 取本品约0.15 g，精密称定，加冰醋酸10 ml，加热溶解后，加醋酸汞试液4 ml与结晶紫指示液1滴，用N/10高氯酸液滴定，至溶液显翠绿色，并将滴定的结果用空白试验校正，即得(每1 ml的N/10高氯酸液相当于20.17 mg的$C_{10}H_{15}ON\cdot HCl$)。

【功能与主治】 拟肾上腺素药，松弛支气管平滑肌，收缩血管及兴奋大脑皮层。用于支气管哮喘，过敏性反应，低血压症等。

【用法与用量】 常用量，口服，一次15～30 mg，一日45～90 mg。极量，口服，一次60 mg，一日150 mg。

【注意】 高血压病、冠状动脉病及甲状腺机能亢进患者忌用。

【贮藏】 密闭保存。

【制剂】 (1) 盐酸麻黄碱片 (2) 盐酸麻黄碱注射液

盐酸麻黄碱片 【剧】

Yansuan Mahuangjian Pian

TABELLAE EPHEDRINI HYDROCHLORIDI

本品含盐酸麻黄碱($C_{10}H_{15}ON\cdot HCl$)应为标示量的93.0～107.0%。

【性状】 本品为白色片。

【鉴别】 取本品的细粉适量(约相当于盐酸麻黄碱50 mg)，加水5 ml，搅拌，滤过，滤液照盐酸麻黄碱项下的鉴别法(456页)试验，显相同的反应。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(附录6页)。

【含量测定】 取本品15片(30 mg或25 mg)或25片(15 mg)，精密称定，研细，精密称出适量(约相当于盐酸麻黄碱0.15 g)，置锥形瓶中，加水15 ml，振摇使盐酸麻黄碱溶解，加溴酚蓝指示液2滴，滴加醋酸使溶液由紫色变成黄绿色，再加溴酚蓝指示液10滴与糊精溶液(1→50)5 ml，用N/10硝酸银液滴定，至氯化银沉淀与乳状液显灰紫

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

色，即得(每 1 ml 的$N/10$ 硝酸银液相当于 20.17 mg 的 $C_{10}H_{15}ON \cdot HCl$)。

【功能与主治】【用法与用量】【注意】 同盐酸麻黄碱。

【规格】 (1) 15 mg (2) 25 mg (3) 30 mg

【贮藏】 遮光，密闭保存。

盐酸麻黄碱注射液 【剧】

Yansuan Mahuangjian Zhusheye

INJECTIO EPHEDRINI HYDROCHLORIDI

本品为盐酸麻黄碱的灭菌水溶液。含盐酸麻黄碱 ($C_{10}H_{15}ON \cdot HCl$) 应为标示量的 95.0～105.0%。

【性状】 本品为无色的澄明液体。

【鉴别】 取本品，照盐酸麻黄碱项下的鉴别法(456页)试验，显相同的反应。

【检查】 **pH 值** 应为 4.5～6.5(附录42页)。

其他 应符合注射剂项下有关的各项规定(附录 7 页)。

【含量测定】 精密量取本品适量(约相当于盐酸麻黄碱 0.15 g)，置水浴上蒸干，并在 105°干燥 1 小时，放冷，加冰醋酸 10 ml 溶解后，加醋酸汞试液 5 ml、醋酐 2 ml 与结晶紫指示液 1 滴，用$N/10$ 高氯酸液滴定，至溶液显翠绿色，并将滴定的结果用空白试验校正，即得(每 1 ml 的$N/10$ 高氯酸液相当于 20.17 mg 的 $C_{10}H_{15}ON \cdot HCl$)。

【功能与主治】【注意】 同盐酸麻黄碱。

【用法与用量】 常用量，皮下或肌内注射，一次 15～30 mg，一日 45～60 mg。极量，皮下或肌内注射，一次 60 mg，一日 150 mg。

【规格】 1 ml:30 mg

【贮藏】 遮光，密闭保存。

莱 菔 子

Laifuzi

SEMEN RAPHANI

本品为十字花科植物萝卜 Raphanus sativus L. 的干燥成熟种子。夏季果实成熟时

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

采割植株，晒干，搓出种子，除去杂质，再晒干。

【性状】 本品呈类卵圆形或椭圆形，稍扁，长 2.5～4 mm，宽 2～3 mm。表面黄棕色、红棕色或灰棕色。一端有深棕色圆形种脐，一侧有数条纵沟。种皮薄而脆，破开后可见黄白色折叠的子叶，有油性。无臭，味淡、微苦辛。

以粒饱满者为佳。

【鉴别】 (1) 取本品粉末少量，置硬质试管内，加氢氧化钠 1 小粒，置酒精灯上灼热，放冷，加水 2 ml 使溶解，滤过。取滤液 1 ml，加 5%盐酸溶液酸化，即有硫化氢产生，遇新制的醋酸铅试纸，则显有光泽的棕黑色。

(2) 取亚硝基铁氰化钠 1 小粒，置白瓷板上，加水 1～2 滴使溶解，加鉴别 (1) 项下剩余的滤液 1～2 滴，即显紫红色。

【炮制】 **莱菔子** 除去杂质，洗净，干燥，用时捣碎。

炒莱菔子 取净莱菔子，照清炒法(附录18页)炒至微鼓起并有香气。

【性味】 辛、甘，平。

【功能与主治】 消食，除胀，降气，化痰。用于食积嗳气，胸闷腹胀，咳嗽痰喘，肠梗阻胀气。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

莲　　子

Lianzi

SEMEN NELUMBINIS

本品为睡莲科植物莲 Nelumbo nucifera Gaertn. 的干燥成熟种子。秋季果实成熟时采割莲房，取出果实，除去果皮，干燥。

【性状】 本品略呈椭圆形或类球形，长 1.2～1.8 cm，直径 0.8～1.4 cm。表面浅黄棕色至红棕色，有细纵纹和较宽的脉纹。一端中心呈乳头状突起，深棕色，多有裂口，其周边略下陷。种皮薄，不易剥离。质硬，破开后可见黄白色子叶 2 片，肥厚，中有空隙，具绿色莲子心。无臭，味甘、微涩。

以个大、饱满者为佳。

【炮制】 略浸，润透，切开，去心，晒干。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性味】 甘，平、澹。

【功能与主治】 补脾，涩精。用于脾虚腹泻，遗精，白带。

【用法与用量】 6～15 g。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

莲 子 心

Lianzixin

PLUMULA NELUMBINIS

本品为睡莲科植物莲 Nelumbo nucifera Gaertn. 的成熟种子中的干燥幼叶及胚根。取出，晒干。

【性状】 本品略呈细棒状，长 1～1.4 cm，直径约 0.2 cm。幼叶绿色，一长一短，卷成箭形，向下反折，两幼叶间可见细小胚芽。胚根圆柱形，长约 3 mm，黄白色。质脆，易折断，断面有数个小孔。气微，味苦。

以整齐、色绿者为佳。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清心热。用于心烦少眠，口舌生疮，高血压症。

【用法与用量】 1.5～3 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮、防蛀。

莲 房

Lianfang

RECEPTACULUM NELUMBINIS

本品为睡莲科植物莲 Nelumbo nucifera Gaertn. 的干燥花托。秋季果实成熟时采收，除去果实，晒干。

【性状】 本品呈平顶的圆锥状，形似漏斗，多撕裂，直径 5～8 cm，高 4.5～6 cm。表面灰棕色至紫棕色，具细纵纹及皱纹，顶面有多数圆形孔穴，基部圆柱形，长约 1 cm。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

质疏松，破碎面海绵样，棕色。气微，味微涩。

以个大、完整、色紫棕者为佳。

【炮制】 莲房 除去灰屑，切块。

莲房炭 取净莲房，照炯炭法(附录19页)制炭。

【性味】 苦、涩，温。

【功能与主治】 止血，消瘀。用于崩漏，产后恶露不尽，瘀血腹痛。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置干燥处，防潮。

莲　　须

Lianxu

STAMEN NELUMBINIS

本品为睡莲科植物莲 Nelumbo nucifera Gaertn. 的干燥雄蕊。夏季花开时选晴天采收，盖纸晒干或阴干。

【性状】 本品呈线形。花药扭转，纵裂，长 1.2～1.5 cm，直径约 0.1 cm，淡黄色或棕黄色。花丝纤细，稍弯曲，长 1.5～1.8 cm，淡紫色。气微香，味涩。

以完整、花药色淡黄者为佳。

【性味】 甘、涩，平。

【功能与主治】 固肾。用于遗精，白带。

【用法与用量】 2.5～4.5 g。

【贮藏】 置干燥处，防霉。

莪　大　夏

Edaxia

HERBA OXYTROPIS

本品系藏族习用药材，藏文名为 རྩི་སྐྱེ་ག (莪大夏)；为豆科植物轮叶棘豆 Oxytropis

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

chiliophylla Royle 或镰形棘豆 Oxytropis falcata Bge. 的干燥全草。夏末秋初采挖，除去杂质，晒干。

【性状】 **轮叶棘豆** 根呈圆柱形，下部多分枝，表面黑褐色。茎短粗，丛生。羽状复叶，多破碎，完整小叶椭圆形，长 3～5 mm，宽约 2 mm，对生或 3 片以上簇生，近轮生状，被柔毛；托叶密被白色柔毛。总状花序顶生，花 5～15 朵，蓝紫色；花萼管状，密被柔毛和腺体。果序梗长 4～10 cm，被毛；荚果长圆形，略弯，长 2～3 cm，顶端具短喙。种子肾形，棕黑色。气特异，味微苦。

镰形棘豆 根黄棕色。小叶条状披针形，长 4～10 mm，宽 1～2 mm，对生或互生，托叶大。头状的总状花序顶生，花 3～7 朵，紫红色。荚果镰形。

【性味】 微苦，寒；有毒。

【功能与主治】 清热解毒，生肌。用于高烧，喉炎，痢疾，创伤出血。

【用法与用量】 0.3～0.5 g，多入丸散服；外用敷患处。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

莪　　术

Ezhu

RHIZOMA ZEDOARIAE

本品为姜科植物莪术 Curcuma zedoaria Rosc.、郁金 Curcuma aromatica Salisb. 或广西莪术 Curcuma kwangsiensis S. Lee et C. F. Liang 的干燥根茎。冬季茎叶枯萎后采挖，洗净，蒸或煮至透心，干燥后除去须根及杂质。

【性状】 本品呈卵圆形、圆锥形或长纺锤形，长 2～8 cm，直径 1.5～4 cm。表面灰黄色至黄棕色，环节明显，节上有圆形稍凹下的须根痕或有残留须根，有的可见刀削痕。体重，质坚实，断面黄绿色至棕褐色，蜡样，可见黄白色的内皮层环及淡黄棕色的点状维管束。气微香，味微苦而辛。

以质坚实、气香者为佳。

【炮制】 **莪术** 除去杂质，略泡，洗净，润透，切片，干燥。

醋莪术 取净莪术，照醋煮法(附录19页)用醋与适量的热水淹没，煮至醋尽透心，取出，稍晾，切片，干燥。

【性味】 苦、辛，温。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 行气破瘀，消积止痛。用于腹部肿块，积滞胀痛，血瘀经闭，跌扑损伤。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

莪　术　油

Ezhuyou

OLEUM CURCUMAE AROMATICAE

本品为姜科植物郁金 Curcuma aromatica Salisb. 的根茎（习称“温莪术”）经蒸气蒸馏得到的挥发油。

【性状】 本品为淡棕色至深棕色的澄清液体；气特异，味微苦而辛。

本品能与甲醇、乙醇、丙酮、醋酸乙酯、氯仿、乙醚、苯或石油醚任意混合，在水中微溶。

比重 本品的比重（附录26页）为 0.970～0.990。

比旋度 取本品，加乙醇制成每 1 ml 中含 50 mg 的溶液，依法测定（附录31页），比旋度为＋20°至＋25°。

折光率 本品的折光率（附录32页）为 1.500～1.510。

【鉴别】 取本品与莪术油对照品，分别加石油醚制成每 1 ml 中含 20 mg 的溶液，照薄层层析法（附录 38 页）试验，分别吸取本品溶液与对照品溶液各 10 μl，分别点于两块硅胶G（含 16%煅石膏，在 80°活化 1 小时）的薄层板上，一块以石油醚为展开剂，另一块以石油醚-醋酸乙酯（90:10）为展开剂，展开后，晾干，各均匀喷以 1%香草醛的硫酸溶液，两种展开剂所得的本品主斑点的颜色与位置，均应与对照品一致。

【功能与主治】 抗癌药。用于早期子宫颈癌。

【贮藏】 遮光，满装，置阴凉处密封保存。

【制剂】 （1）莪术油注射液　（2）莪术油乳注射液

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

莪术油注射液

Ezhuyou Zhusheye

INJECTIO OLEI CURCUMAE AROMATICAE

本品为莪术油与适宜的助溶剂制成的灭菌水溶液。含莪术油应为标示量的85.0～115.0%。

【性状】 本品为淡黄色的澄明液体，但稍有乳光。

【鉴别】 取本品5 ml，置分液漏斗中，加石油醚10 ml，振摇，静置，分取石油醚层，浓缩至1/4量，照莪术油项下的鉴别法（463页）试验，显相同的结果。

【检查】 **pH值** 应为3.5～5.0(附录42页)。

热原 取本品，依法检查（附录53页），剂量按家兔体重每1 kg缓慢注射2 ml(用5%葡萄糖注射液稀释5倍后，以每分钟注射5 ml的速度注入)，应符合规定。

其他 应符合注射剂项下有关的各项规定（附录7页）。

【含量测定】 精密量取本品1 ml，照莪术油乳注射液项下的方法（464页）测定，但供试液不另加吐温80溶液（1→10）1ml。

【功能与主治】 同莪术油。

【用法与用量】 局部瘤体注射，一次5～10 ml，一日1次；静脉滴注，一次20 ml，用5%葡萄糖注射液500 ml稀释后滴注；或由医师斟酌情况决定。

【规格】 (1) 5 ml:0.05 g (2) 20 ml:0.2 g

【贮藏】 遮光，置阴凉处密闭保存。

莪术油乳注射液

Ezhuyouru Zhusheye

INJECTIO EMULSIONIS OLEI CURCUMAE AROMATICAE

本品为莪术油与适宜的乳化剂制成的灭菌乳状液。含莪术油应为标示量的85.0～

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

115.0%。

【性状】 本品为乳白色的均匀乳状液体。

【鉴别】 取本品 5 ml，置分液漏斗中，加石油醚 10 ml，振摇，静置，分取石油醚层，浓缩至 1/2 量。照莪术油项下的鉴别法（463页）试验，显相同的结果。

【检查】 pH 值 应为 3.5～5.0（附录42页）。

颗粒细度 取本品，摇匀后，取出 1 滴，置载玻片上，覆以盖玻片，移至具有测微尺的显微镜（320～400 倍）下检视，最大颗粒应不超过 5 μm。

其他 应符合注射剂项下有关的各项规定（附录 7 页）。

【含量测定】 取莪术油对照品约 0.25 g，精密称定，置 25 ml 量瓶中，加乙醇至刻度，摇匀。精密量取 1 ml，置 50 ml 量瓶中，加吐温 80 溶液（1→10）1 ml，加乙醇稀释至刻度，摇匀，作为对照液。精密量取本品 0.5 ml，置 50 ml 量瓶中，加吐温 80 溶液（1→10）1 ml，加乙醇稀释至刻度，摇匀，作为供试液。精密量取吐温 80 的乙醇溶液（0.2→100）、对照液及供试液各 1 ml，分别置 50 ml 量瓶中，各加香草醛的硫酸（18*N*）溶液（0.2→100）至刻度，摇匀，在 20～25°放置 1 小时，立即照比色法（附录32页），在 520 nm 的波长处测定吸收度，计算，即得。

【功能与主治】 同莪术油。

【用法与用量】 局部瘤体注射，一次 5～10 ml，一日 1 次；用前振摇，缓缓注射。

【规格】 5 ml:0.1 g

【贮藏】 遮光，置阴凉处密闭保存。

莓叶委陵菜

Meiye Weilingcai

RADIX POTENTILLAE FRAGARIOIDIS

本品为蔷薇科植物莓叶委陵菜 Potentilla fragarioides L. 的干燥根及根茎。秋、冬二季采挖，除去泥沙，晒干。

【性状】 本品根茎呈短圆柱状或块状，有的略弯曲，长 0.5～2 cm，直径 0.3～1.5 cm。表面棕褐色，粗糙，周围着生多数须状根，或有圆形的根痕；顶端有棕色叶基，有的可见密被淡黄色茸毛的芽，叶基边缘膜质被有淡黄色茸毛。质坚硬，断面黄棕色至棕色，皮部较薄，木部可见淡棕色小点排列成断续的环状，中心有髓。根细长，弯曲，长

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

5～10 cm，直径 0.1～0.4 cm，表面具纵沟纹；质脆，易折断，断面略平坦，黄棕色至棕色。无臭，味涩。

以质坚实、色棕褐者为佳。

【鉴别】（1）本品横切面：木栓层约 10 列细胞，外有落皮层，细胞内充满棕色物。皮层窄。韧皮部较宽。形成层成环。木质部占大部分，射线宽窄不一，导管直径 21～45 μm，单个散在或 3～4 个相聚。薄壁细胞含草酸钙簇晶及少数方晶；并含淀粉粒。

（2）取火柴梗数根，浸于本品的 1%煎液中煮沸若干分钟，取出，稍干后，加盐酸数滴，火柴梗被染成暗红色或紫红色。

（3）取本品粉末 1 g，加乙醇 10 ml，加热回流 10 分钟，滤过，滤液置水浴上蒸干，残渣加乙醇 0.5 ml 使溶解。另取 d-儿茶素对照品，加乙醇制成每 1 ml 中含 1 mg 的溶液。照薄层层析法（附录38页）试验，吸取本品溶液与对照品溶液，分别点于同一硅胶 G（含 15%煅石膏）薄层板上，以醋酸乙酯为展开剂，展开后，晾干，喷以香草醛试液使显色，在与 d-儿茶素对照品相应的位置上应有同样颜色的斑点。

【性味】 甘、微苦，平。

【功能与主治】 止血。用于月经过多，功能性子宫出血，子宫肌瘤出血。

【用法与用量】 3～6 g。

【贮藏】 置干燥处，防霉。

【制剂】 莓叶委陵菜片

莓叶委陵菜片（雉子筵片）

Meiye Weilingcai Pian

TABELLAE POTENTILLAE FRAGARIOIDIS

本品为莓叶委陵菜浸膏片。每片含莓叶委陵菜干浸膏 0.2 g。

【制法】 取莓叶委陵菜，粉碎，加 2.5 倍量的乙醇，加热回流 1.5 小时，同法提取二次，合并乙醇提取液，滤过，滤液浓缩成稠膏状，在 90°以下减压干燥成干浸膏，加适量辅料，制成颗粒，压片，包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显红棕色；味涩、微酸。

【鉴别】 取本品 2 片，除去糖衣，研细，加乙醇 5 ml，加热回流 10 分钟，滤过，滤液照下述方法试验：

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

(1) 取滤液 2 ml，滴加铁氰化钾与三氯化铁混合液（取 1%铁氰化钾溶液与 1% 三氯化铁溶液，临用时等容混合），即显蓝色。

(2) 取滤液与 0.1%d-儿茶素的乙醇溶液各 20 μl，照薄层层析法（附录38页）试验，点于同一硅胶G薄层板上，以醋酸乙酯为展开剂，展开后，晾干，喷以香草醛试液使显色，应有与 d-儿茶素比移值相一致的斑点。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定（附录 6 页）。

【功能与主治】 同莓叶委陵菜。

【用法与用量】 口服，一次 2～3 片，一日 3 次。

【贮藏】 遮光，密封保存。

荷　　叶

Heye

FOLIUM NELUMBINIS

本品为睡莲科植物莲 Nelumbo nucifera Gaertn. 的干燥叶。夏、秋二季采摘，晒至七、八成干时，除去叶柄，折成半圆形或折扇形，干燥。

【性状】 本品呈半圆形或折扇形，展开后呈类圆形，直径 20～50 cm，全缘或稍呈波状。上表面深绿色或黄绿色，较粗糙，下表面淡灰棕色，较光滑，有粗脉 21～22 条自中心向四周射出；中心有突起的叶柄残基。质脆，易破碎。稍有清香气，味微苦。

以叶大、色绿、无斑点者为佳；破碎如败絮者不可供药用。

【鉴别】 本品粉末灰绿色。上表皮细胞多角形，外壁乳头状或短绒毛状突起；气孔不定式，副卫细胞 5～8 个。下表皮细胞垂周壁略波状弯曲，有时可见连珠状增厚。草酸钙簇晶多见，直径约至 40 μm。

【炮制】 **荷叶** 喷水，稍润，切丝，干燥。

荷叶炭 取净荷叶，照煅炭法（附录19页）煅成炭。

【性味】 微苦，平。

【功能与主治】 清热，解暑，升清，止泻；炒炭止血。用于暑湿泄泻，眩晕，吐血，衄血，崩漏。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

莨　菪　子（天仙子）

Langdangzi

SEMEN HYOSCYAMI

本品为茄科植物莨菪 Hyoscyamus niger L. 的干燥成熟种子。夏末秋初果实成熟时割取果枝，晒干，打下种子，除去杂质。

【性状】 本品略呈肾形或卵圆形，稍扁，直径约 1 mm。表面棕黄色或灰黄色，有细密隆起的网纹，脐点处突出。无臭，味微辛。

以粒大、饱满者为佳。

【鉴别】 取本品粉末 0.5 g，置试管中，加乙醚 5 ml 与 10%氨溶液 2 滴，密塞，不时振摇，2 小时后，吸取醚液少量，在载玻片上挥干后，滴加碘化钾碘试液 2 滴，3 分钟后，置显微镜下观察，可见黄紫色、似飞鸟状的结晶。

【性味】 苦，温；有大毒。

【功能与主治】 解痉，止痛，安神。用于胃痉挛疼痛，喘咳，癫狂。

【用法与用量】 0.06～0.6 g。

【注意】 心脏病、心动过速、青光眼患者及孕妇忌服。

【贮藏】 置通风干燥处。

桂　枝

Guizhi

RAMULUS CINNAMOMI

本品为樟科植物肉桂 Cinnamomum cassia Presl 的干燥嫩枝。春、夏二季采收，除去叶，晒干，或切片晒干。

【性状】 本品呈长圆柱形，多分枝，长 30～75 cm，粗端直径 0.3～1 cm。表面棕色至红棕色，有纵棱线、细皱纹及小疙瘩状的叶痕、枝痕、芽痕，皮孔点状或点状椭圆形。质硬而脆，易折断。切片厚 2～4 mm，断面皮部红棕色，木部黄白色至浅黄棕色，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

髓部略呈方形。有特异香气，味甜、微辛，皮部味较浓。

以枝嫩、色红棕、香气浓者为佳。

【鉴别】 本品横切面：表皮为1列细胞，嫩枝可见单细胞非腺毛。木栓层为3～5列细胞，最内1列细胞外壁增厚。皮层有油细胞及石细胞散在。中柱鞘石细胞群断续排列成环，并伴有纤维束。韧皮部有分泌细胞及纤维散在。形成层明显。木质部射线宽1～2列细胞，含棕色物；导管单个散列或2至数个相聚；木纤维壁较薄，与木薄壁细胞不易区别。髓部细胞壁略厚，木化。射线细胞含细小草酸钙针晶。

【炮制】 除去杂质，稍泡，洗净，润透，切片，晾干。

【性味】 辛、甘，温。

【功能与主治】 发汗解肌，温通经脉。用于风寒感冒，肌肉、关节酸痛，经闭腹痛。

【用法与用量】 3～9 g。

【注意】 各种出血患者禁服。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

桔　梗

Jiegeng

RADIX PLATYCODI

本品为桔梗科植物桔梗 Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC. 的干燥根。春、秋二季采挖，洗净，除去须根，趁鲜剥去外皮或不去外皮，干燥。

【性状】 本品呈圆柱形或略呈纺锤形，下部渐细，有的有分枝，略扭曲，长7～20 cm，直径1～1.5 cm。顶端有较短的根茎，其上有数个半月形茎痕。表面白色或淡黄白色，不去外皮的表面黄棕色至灰棕色；具扭皱纵沟，并有横长的皮孔样斑痕及支根痕。上部有横纹。质脆，断面不平坦，有1浅棕色环，皮部类白色，有裂隙，木部淡黄白色。无臭，味微甜后苦。

以条肥大、色白、体实、味苦者为佳。

【鉴别】 (1) 本品横切面：木栓细胞有时残存，不去外皮的有栓皮层，细胞中含草酸钙小棱晶。皮层窄，常见裂隙。韧皮部乳管群散在，壁略厚，内含微细颗粒状黄棕色物。形成层成环。木质部导管单个散在或数个相聚，呈放射状排列。薄壁细胞含菊糖。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

(2) 本品干药材的直接切片，用稀甘油装置，置显微镜下观察，可见扇形或类圆形的菊糖结晶。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。

【性味】 甘、苦、辛，微温。

【功能与主治】 祛痰，利咽，排脓。用于痰多咳嗽，咽喉肿痛，肺脓疡，咳吐脓血。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

桃 儿 七

Tao'erqi

RADIX PODOPHYLLI

本品为小檗科植物鬼臼 Podophyllum emodi Wall. var. chinensis Sprague 的干燥根及根茎。秋季采挖，洗净，晒干。

【性状】 本品根茎呈结节状，长 0.5～3 cm，直径 0.5～1 cm；表面淡黄色或暗灰棕色，上端具茎痕或残留茎基；质硬。根丛生，圆柱形，长 10～30 cm，直径 0.2～0.4 cm；表面棕褐色或棕黄色，具纵皱纹及须根痕；质脆，易折断，断面平坦，类白色或黄白色，粉性，木部淡黄色或黄色。气微，味苦、微辛。

以色棕褐、断面色白、粉性足者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切段，晒干。

【性味】 苦，微温；有小毒。

【功能与主治】 祛风湿，利气活血，止痛，止咳。用于风湿痹痛、麻木，跌扑损伤，风寒咳嗽，月经不调，解铁棒锤中毒。

【用法与用量】 煎服，每次 3～6 g，多配伍用；酒浸服，每次 0.6～0.9 g。外用适量，研末撒布或用水、醋调敷患处。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

桃　　仁

Taoren

SEMEN PERSICAE

本品为蔷薇科植物桃 Prunus persica (L.) Batsch 或山桃 Prunus davidiana (Carr.) Franch. 的干燥成熟种子。夏、秋二季采收成熟果实或收集果核，除去果肉及核壳，取出种子，晒干。

【性状】 **桃仁** 呈扁长卵形，长 1.2～1.8 cm，宽 0.8～1.2 cm，厚 0.2～0.4 cm。表面黄棕色至红棕色，一端尖，中部膨大，另端钝圆稍偏斜，边缘较薄。尖端一侧有 1 短线形种脐，圆端合点处向上具多数凹脉纹。种皮薄，除去种皮，可见类白色子叶 2 片，富油性。气微，味微苦。

山桃仁 呈类卵圆形，较小而肥厚，长约 0.9 cm，宽约 0.7 cm，厚约 0.5 cm。

均以粒饱满、完整者为佳。

【鉴别】 本品种皮表面观：石细胞单个或数个相聚，散列于表皮组织中，黄色至黄棕色，类圆形的直径 60～140 μm，贝壳形、椭圆形的长径 70～160 μm，壁常一边增厚，具纹孔。

【炮制】 除去杂质，置沸水中煮至外皮微皱，捞出，放在冷水中浸漂，去皮，晒干。

【性味】 苦、甘，平。

【功能与主治】 活血，祛瘀，润肠。用于经闭，痛经，腹部肿块，跌扑损伤，肠燥便秘。

【用法与用量】 3～9 g。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防蛀。

桃 金 娘 根（岗稔根）

Taojinnianggen

RADIX RHODOMYRTI

本品为桃金娘科植物桃金娘 Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk. 的干燥根。全

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

年均可采挖，洗净，切片或段，晒干。

【性状】 本品为不规则的片或短段，直径 0.5～4 cm。外皮黑褐色，粗糙，常脱落，脱落处呈赭红色或棕红色，有粗糙的纵纹。质硬而致密，不易折断，断面淡棕色，中部颜色较深，老根可见同心性环纹。气微，味涩。

以质坚、色赭红者为佳。

【鉴别】 本品横切面：木栓层为 10 余列细胞，内壁增厚。皮层甚窄。韧皮部外侧有较多石细胞及纤维；薄壁细胞含草酸钙方晶。木质部射线宽 1～3 列细胞；导管多单个散在，偶有数个相聚；木纤维甚多。薄壁细胞含棕色鞣质类物质，遇三氯化铁试液变蓝黑色；并含淀粉粒。

【炮制】 除去杂质，洗净，晒干，或润透，切片，晒干。

【性味】 甘、涩，平。

【功能与主治】 养血，通络。用于慢性肝炎，崩漏，风湿痹痛，腰肌劳损。

【用法与用量】 15～30 g。

【贮藏】 置干燥处。

核　桃　仁

Hetaoren

SEMEN JUGLANDIS

本品为胡桃科植物胡桃 Juglans regia L. 的干燥成熟种子。秋季采收成熟果实，除去肉质果皮，晒干，再除去核壳。

【性状】 本品多破碎为不规则的块状，有屈曲的沟槽，大小不一，完整者类圆形，直径 2～3 cm。种皮淡黄色或黄褐色，膜状，可见深棕色脉纹(维管束)。子叶类白色。质脆，富油性。无臭，味甘，种皮味涩、微苦。

以个大、饱满、断面色白者为佳。

【性味】 甘，温。

【功能与主治】 温肺，定喘，补肾固精。用于虚寒喘嗽，腰膝酸软，遗精阳痿。

【用法与用量】 6～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防蛀。

小红网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

桉　　油

Anyou

OLEUM EUCALYPTI

本品为桃金娘科植物蓝桉 Eucalyptus globulus Labill.、樟科植物樟 Cinnamomum camphora (L.) Sieb. 或上述两科同属其他植物经蒸气蒸馏得到的挥发油。含桉油精($C_{10}H_{18}O$)不得少于70.0%(g/g)。

【性状】 本品为无色或微黄色的澄清液体；有特异的芳香气，微似樟脑，味辛、凉；贮存日久，色稍变深。

本品在70%乙醇中易溶。

比重 本品的比重（附录26页）在25°时为0.900～0.923。

折光率 本品的折光率（附录32页）为1.458～1.468。

【检查】 **水茴香烃** 取本品2.5 ml，加石油醚（沸程60～90°）12.5 ml，摇匀后，加亚硝酸钠溶液(5→8)5 ml，再缓缓加入冰醋酸5 ml，搅拌后，10分钟内不得析出结晶。

重金属 取本品10 ml，加水10 ml与盐酸1滴振摇后，通硫化氢气使饱和，水层与油层均不得变色。

【含量测定】 取本品，照桉油精含量测定法（附录61页）测定，即得。

【功能与主治】 皮肤刺激药。用于神经痛。

【贮藏】 遮光，满装，密封，置阴凉处保存。

索 骨 丹 根

Suogudangen

RHIZOMA RODGERSIAE AESCULIFOLIAE

本品为虎耳草科植物老蛇盘 Rodgersia aesculifolia Batal. 的干燥根茎。秋季采挖，除去粗皮及须根，切片，晒干。

【性状】 本品呈圆片状，多卷缩不平，直径2～4 cm，厚0.2～0.5 cm。外皮棕褐色，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

皱缩，有的有点状根痕，偶有黄色鳞毛。切面红棕色或暗黄色，有多数筋脉点(维管束)，呈同心环状排列，并有多数白色闪亮小点。质脆，易折断，断面粉性。气微，味涩、苦。

以片薄、色红棕、白色闪亮点多者为佳。

【性味】 苦、涩，平。

【功能与主治】 消炎解毒，收敛止血。用于腹泻，菌痢，便血；外治子宫脱垂，外伤出血。

【用法与用量】 9～15 g；外用适量，研末撒布或用油、醋调敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

夏　天　无

Xiatianwu

RHIZOMA CORYDALIS DECUMBENTIS

本品为罂粟科植物伏生紫堇 Corydalis decumbens (Thunb.) Pers. 的干燥块茎。5月前采挖，除去须根，洗净，干燥。

【性状】 本品呈类球形、长圆形或不规则块状，长 0.5～2 cm，直径 0.5～1 cm。表面灰黄色或暗绿色，有瘤状突起和不明显的皱纹，顶端圆钝，常有淡黄色叶柄残基。质硬，断面黄白色或黄色，颗粒状或角质样，有的略带粉性。无臭，味苦。

以个大、质硬、断面色黄白者为佳。

【鉴别】 取本品粗粉 4 g，加 1%碳酸钠溶液 25 ml，置近沸的水浴中浸渍 5 分钟，滤过，滤液用稀盐酸调节 pH 值至 6，加氯仿 15 ml 振摇提取。分取氯仿液 2 ml，加硫酸 1 ml，振摇，硫酸层即显棕红色，放置后呈棕黑色。

【性味】 苦、微辛，温。

【功能与主治】 通络，活血，止痛。用于高血压偏瘫，小儿麻痹后遗症，坐骨神经痛，风湿性关节痛，跌扑损伤。

【用法与用量】 6～12 g，研末分三次服。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

【制剂】 夏天无片

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

夏 天 无 片

Xiatianwu Pian

TABELLAE CORYDALIS DECUMBENTIS

本品为夏天无浸膏片。每片相当于夏天无 0.6 g。

【制法】 取夏天无 300 g，加水煎煮二次，每次 4 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至约 300 ml，加夏天无粉 300 g，拌匀，在 60°以下烘干，粉碎，加适量辅料，制成颗粒，压制成 1000 片，包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕黄色至棕褐色；味苦。

【鉴别】 取本品 5 片，除去糖衣，研细，加 1%碳酸钠溶液 25 ml，置水浴中加热 5 分钟，滤过，滤液用稀盐酸调节 pH 值至 6，加氯仿 15 ml 提取，分取氯仿液 1 ml，加硫酸 0.5 ml，振摇，硫酸层即显棕红色，放置后呈棕黑色。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(附录 6 页)。

【功能与主治】 同夏天无。

【用法与用量】 口服，一次 4～6 片，一日 3 次。

【贮藏】 密封保存。

夏 枯 草

Xiakucao

SPICA PRUNELLAE

本品为唇形科植物夏枯草 Prunella vulgaris L. 的干燥带花的果穗。夏季穗呈棕红时采收，除去杂质，晒干。

【性状】 本品呈棒状，略扁，长 1.5～8 cm，直径 0.8～1.5 cm。淡棕色至棕红色，少数基部带有短茎。全穗由 4～13 轮宿存的花萼与苞片组成，每轮有对生苞片 2 片，呈扇形，先端尖尾状，脉纹明显，外表面有白毛。每一苞片内有花 3 朵，花冠多已脱落，花萼二唇形，上唇 3 齿裂，下唇 2 裂，内有小坚果 4 枚。果实卵圆形，棕色，尖端有白

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

色突起。体轻。气微，味淡。

以穗大、色棕红者为佳。

【鉴别】 取本品粉末 1 g，加乙醇 15 ml，加热回流 1 小时，滤过。滤液照下述方法试验：

(1) 取滤液约 1 ml，置蒸发皿内在水浴上蒸干，残渣加醋酐 1 滴使溶解，再加硫酸微量，即显紫色，后变暗绿色。

(2) 取滤液少量，点于滤纸上，喷洒0.9%三氯化铁溶液与 0.6%铁氰化钾溶液的等容混合液，即显蓝色斑点。

【性味】 苦、辛，寒。

【功能与主治】 清肝火，散郁结。用于头痛眩晕，目赤肿痛，淋巴结结核，甲状腺肿大，乳腺炎，高血压症。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置干燥处。

【制剂】 夏枯草膏

夏 枯 草 膏

Xiakucao Gao

EXTRACTUM PRUNELLAE INSPISSATUM

本品为夏枯草制成的煎膏。

【制法】 取夏枯草，加水煎煮三次，每次 1～3 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩成比重 1.29～1.31 (80～85°热测)的清膏。每 100 g 清膏加炼蜜 200 g 或蔗糖 200 g，加热溶化，混匀，浓缩至规定的比重，即得。

【性状】 本品为黑褐色稠厚的半流体；味甜、微涩。

比重 取本品 10 g，加水 20 ml 稀释后，依法测定(附录 26 页)，比重为 1.10～1.12。

【检查】 应符合煎膏剂项下有关的各项规定(附录 4 页)。

【功能与主治】 清火，散结，消肿。用于头昏目眩，甲状腺肿大，淋巴结结核，乳腺小叶增生症，高血压症。

【用法与用量】 口服，一次 9 g，一日 2 次。

【贮藏】 密闭，防热。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

烈 香 杜 鹃

Liexiangdujuan

FOLIUM RHODODENDRI ANTHOPOGONOIDIS

本品为杜鹃花科植物烈香杜鹃 Rhododendron anthopogonoides Maxim. 的干燥叶。秋、冬二季采收，阴干。

【性状】 本品多反卷，展平叶片呈卵形或椭圆形，长 2～3 cm，宽 1.5～2 cm。先端尖，基部圆形，全缘，上表面暗绿色，下表面被棕色茸毛。叶柄长 3～5 mm，疏被茸毛。气香特异，味辛、苦。

【鉴别】 (1) 本品横切面：上表皮细胞切向延长，外被厚的角质层，有的可见稀疏盾状毛。下表皮细胞多分化为单细胞非腺毛；散生盾状腺毛，直径 120～200 μm；另有盘形和杯形的盾状非腺毛，直径 197～295 μm，柄多细胞，1～4 列。栅栏组织为 3～5 列细胞，海绵组织排列疏松，细胞含草酸钙簇晶。主脉维管束外韧型，周围有纤维束。

(2) 取本品粉末 2 g，加水 20 ml，浸泡过夜后煮沸 5 分钟，滤过。取滤液 3 ml，蒸干，残渣加乙醇 3～5 ml，微热使溶解，再加镁粉少量与盐酸数滴，显红色。

【性味】 辛、苦，温。

【功能与主治】 祛痰，止咳，平喘。用于慢性支气管炎。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防潮。

柴 胡

Chaihu

RADIX BUPLEURI

本品为伞形科植物柴胡 Bupleurum chinense DC.、狭叶柴胡 Bupleurum scorzonerifolium Willd. 或同属数种植物的干燥根。按性状不同，分别习称“北柴胡”、“南柴胡”。春、秋二季采挖，除去茎叶及泥沙，干燥。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 北柴胡 呈圆锥形，常有分枝，长 6～15 cm，直径 0.3～0.8 cm。顶端多带有残留的茎基或短纤维状的叶基。表面黑褐色或浅棕色，具纵皱纹、支根痕及皮孔。质硬而韧，不易折断，断面显片状纤维性，皮部浅棕色，木部黄白色。气微香，味微苦。

南柴胡 根较细，多不分枝或下部稍分枝，根头顶端密被纤维状叶基残余。表面红棕色或黑棕色，靠近根头处多具明显的横向疣状突起。质稍软，易折断，断面略平坦，具败油气。

均以条粗长、须根少者为佳。

【炮制】 柴胡 除去杂质及残茎，洗净，润透，切片，干燥。

醋柴胡 取柴胡片，照醋炒法（附录 18 页）用醋炒干。

【性味】 苦，微寒。

【功能与主治】 和解退热，疏肝解郁，升提中气。用于感冒发热，寒热往来，胸胁胀痛，疟疾，脱肛，子宫脱垂，月经不调。

【用法与用量】 3～9 g。

【注意】 大叶柴胡 Bupleurum longiradiatum Turcz. 的干燥根，表面密生环节，有毒，不可当柴胡用。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

党　　参

Dangshen

RADIX CODONOPSIS PILOSULAE

本品为桔梗科植物党参 Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf. 的干燥根。秋季采挖，洗净，晒干。

【性状】 本品呈长圆柱形，稍弯曲，长 10～35 cm，直径 0.4～2 cm。表面黄棕色至灰棕色，根头部有多数疣状突起的茎痕及芽，习称“狮子盘头”，每个茎痕的顶端呈凹下的圆点状；根头下有致密的环状横纹，向下渐稀疏，有的达全长的一半，栽培品环状横纹少或无；全体有纵皱纹及散在的眉状疤痕，支根断落处常有黑褐色胶状物。质稍硬或略带韧性，断面稍平坦，有裂隙或放射状纹理，皮部淡黄白色至淡棕色，木部淡黄色。有特殊香气，味微甜。

以条粗壮、质柔润、气味浓、嚼之无渣者为佳。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【鉴别】 本品横切面：木栓层为数列至10数列细胞，外侧有石细胞，单个或成群。皮层窄。韧皮部宽广，外侧常现裂隙，散有淡黄色乳管群，并常与筛管群交互排列。形成层成环。木质部导管单个散在或数个相聚，成放射状排列。薄壁细胞含菊糖。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切段，干燥。

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 益气补脾。用于气短心悸，体倦乏力，食少便溏。

【用法与用量】 9～15 g。

【注意】 不宜与藜芦同用。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

鸭 跖 草

Yazhicao

HERBA COMMELINAE

本品为鸭跖草科植物鸭跖草 Commelina communis L. 的干燥地上部分。夏、秋二季采收，晒干。

【性状】 本品长可达 60 cm，黄绿色或黄白色，较光滑。茎有纵棱，直径约 0.2 cm，多有分枝或须根，节稍膨大，节间长 3～9 cm；质柔软，断面中部有髓。叶互生，多皱缩、破碎，完整叶片展平后呈卵状披针形或披针形，长 3～9 cm，宽 1～2.5 cm；先端尖，全缘，基部下延成膜质叶鞘，抱茎，叶脉平行。花多脱落，佛焰苞心状卵形，折合状，两边不相连；花瓣皱缩，蓝色。气微，味淡。

以色黄绿者为佳。

【鉴别】 本品叶的表面观：非腺毛有两种，均为 2 细胞，一种短锥形，长 45～60 μm，壁较厚，基部细胞直径约 45 μm，顶端细胞短尖；另一种棒形，基部细胞长 45～60 μm，壁稍厚，顶端细胞较长，先端钝圆，壁薄，常脱落。草酸钙针晶较多，长至 74 μm。

【炮制】 除去杂质，洗净，切段，晒干。

【性味】 甘、淡，寒。

【功能与主治】 清热解毒，利水消肿。用于上呼吸道感染，咽喉肿痛，尿路感染，肾炎浮肿，痈疖疔毒。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【用法与用量】 15～30 g，鲜品 60～90 g；外用适量。

【贮藏】 置通风干燥处，防霉。

铁 苋 菜

Tiexiancai

HERBA ACALYPHAE

本品为大戟科植物铁苋菜 Acalypha australis L. 的干燥地上部分。夏、秋二季采割，除去杂质，晒干。

【性状】 本品长 20～40 cm，全体被灰白色细柔毛，粗茎近无毛。茎类圆柱形，有分枝，表面棕色，有纵条纹；质硬，易折断，断面黄白色，有髓。叶互生，有柄；叶片多皱缩、破碎，完整者展平后呈卵形或卵状菱形，长 2.5～5.5 cm，宽 1.2～3 cm，黄绿色，边缘有钝齿。花序腋生，苞片三角状肾形，合时如蚌。蒴果小，三角状扁圆形。气微，味淡。

以叶多、色绿者为佳。

【鉴别】 取本品 5 g，加甲醇 35 ml，置水浴上回流 10 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加热水 3 ml 使溶解，滤过。取滤液 1 ml，加醋酸铅试液，发生浅黄色沉淀；剩余的滤液蒸干，残渣加甲醇 3 ml 使溶解，滤过。取滤液 1 ml，加镁粉少量与盐酸 4～5 滴，置水浴中加热，显红色。

【炮制】 除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，晒干。

【性味】 苦、涩，凉。

【功能与主治】 清解热毒，利湿，收敛止血。用于肠炎，痢疾，吐血，衄血，便血，尿血，崩漏；外治痈疖疮疡，皮炎湿疹。

【用法与用量】 15～30 g；外用鲜品适量，捣烂敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

积 雪 草（落得打）

Jixuecao

HERBA CENTELLAE

本品为伞形科植物积雪草 Centella asiatica (L.) Urb. 的干燥全草。夏、秋二季采收，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

除去泥沙，晒干。

【性状】 本品常卷缩成团状。根圆柱形，长 2～4 cm，直径 1～1.5 mm，表面浅黄色或灰黄色。茎细长弯曲，黄棕色，有细纵皱纹，节上常着生须状根。叶片多皱缩、破碎，完整者展平后呈近圆形或肾形，直径 1～4 cm，灰绿色，边缘有粗钝齿，叶柄长 3～6 cm，扭曲。伞形花序腋生，短小。双悬果扁圆形，有明显隆起的纵棱及细网纹，果梗甚短。气微，味淡。

以叶多、色绿者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，切段，晒干。

【性味】 苦、辛，寒。

【功能与主治】 清湿热，解毒消肿。用于湿热黄疸，痈疮肿毒，跌扑损伤。

【用法与用量】 15～30 g；鲜品加倍。

【贮藏】 置干燥处。

称　钩　风

Chenggoufeng

RADIX DIPLOCLISIAE

本品为防己科植物中华称钩风 Diploclisia chinensis Merr. 的干燥根、根茎及老茎。秋季采挖，除去嫩茎及枝叶，干燥。

【性状】 本品呈不规则圆柱形或集结成疙瘩状，长 10～30 cm，直径 1.5～6 cm。表面灰棕色至暗棕色，粗糙，有不规则的沟纹、裂隙和疤痕。外皮脱落后呈黄白色，具明显纵沟，凹陷处可见多数纵向排列的小孔洞。质坚硬，不易折断，切断面有多数小孔及 2～7 层偏心性环纹。茎与根茎断面有髓。气微，味微苦。

以条粗、断面色灰褐者为佳。

【鉴别】 (1) 本品根的横切面：木栓层为 10 余列细胞，壁木化增厚，孔沟明显。皮层石细胞单个散在或数个成群。中柱鞘与维管束交互排列成 2～7 轮同心环。中柱鞘由厚壁细胞与石细胞群断续排列成环，厚壁细胞有含数个草酸钙方晶。韧皮部射线细胞木化增厚，含方晶；散有石细胞。形成层明显。木质部射线较宽；导管多单个散在，类圆形，直径 30～280 μm；木纤维发达。薄壁细胞含淀粉粒；有的含棕色物。

(2) 取本品粉末 1 g，加稀盐酸 5 ml，浸泡 15 分钟，滤过。取滤液 1 ml，加碘化铋

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

钾试液1滴，发生橘红色沉淀。

【炮制】 除去杂质，洗净，稍泡，润透，切片，干燥。

【性味】 微苦，平。

【功能与主治】 祛风湿，活血，利尿。用于风湿关节痛，跌扑损伤，小便不利。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置干燥处。

倒 扣 草

Daokoucao

HERBA ACHYRANTHIS ASPERAE

本品为苋科植物倒扣草 Achyranthes aspera L. 的干燥全草。夏、秋二季花果期采挖，除去杂质，晒干。

【性状】 本品根呈圆柱形，弯曲，表面灰黄色。茎呈类圆柱形，嫩枝略呈方柱形，有分枝，长 40～100 cm，直径 0.5～0.8 cm；表面紫棕色或褐绿色，有纵棱，节膨大，嫩枝被短柔毛；质脆，易折断，断面黄绿色。叶对生，有柄；叶片皱缩卷曲，展平后呈卵圆形或长椭圆形，长 3～10 cm，宽 1.5～5 cm；先端急尖或钝，基部狭，全缘；上表面深绿色，下表面灰绿色，两面均被柔毛。穗状花序细长，花反折如倒钩。胞果卵形，黑色。气微，味甘。

以根粗、带花者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，稍润，切段，晒干。

【性味】 甘、淡，凉。

【功能与主治】 解表清热，利湿。用于外感发热，咽喉肿痛，烦渴，风湿性关节痛。

【用法与用量】 15～30 g。

【贮藏】 置干燥处。

臭 灵 丹 草

Choulingdancao

HERBA LAGGERAE

本品为菊科植物臭灵丹 Laggera pterodonta (DC.) Benth. 的干燥地上部分。秋季

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

茎叶茂盛时采割，阴干。

【性状】 本品长 50～150 cm，全体密被淡黄色腺毛及柔毛。茎圆柱形，具 4～6 纵翅，翅缘锯齿状，易折断。叶互生，有短柄；叶片椭圆形，暗绿色，先端短尖或渐尖，基部楔形，下延成翅，边缘有锯齿。气特异，味苦。

以叶多、色绿、气味浓者为佳。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性味】 辛、苦，凉。

【功能与主治】 清热解毒，止咳祛痰。用于风热感冒，咽喉肿痛，肺热咳嗽。

【用法与用量】 9～15 g，鲜品 15～30 g。

【注意】 低血压、白细胞偏低者慎服。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

臭梧桐叶

Chouwutongye

FOLIUM CLERODENDRI TRICHOTOMI

本品为马鞭草科植物海州常山 Clerodendrum trichotomum Thunb. 的干燥叶。夏季结果前采摘，晒干。

【性状】 本品多皱缩、卷曲，展平后叶片呈宽卵形或椭圆形，长 5～16 cm，宽 3～13 cm；灰绿色或黄棕色，先端急尖，基部宽楔形或截形，全缘或有波状齿；两面均被茸毛，尤以下表面叶脉处为多；叶柄长 2～8 cm，具纵沟，密被茸毛。气清香，味苦、涩。

以色绿者为佳。

【鉴别】 本品横切面：表皮细胞椭圆形或类圆形；非腺毛 2～12 细胞，多弯曲，壁有疣状突起；腺鳞头部 8 细胞，扁球形，柄单细胞。栅栏组织为 1 列细胞。主脉明显向下突出，维管束外韧型，呈新月状。

【性味】 甘、苦，平。

【功能与主治】 祛风湿，止痛，降血压。用于风湿痹痛，高血压症。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

射　干

Shegan

RHIZOMA BELAMCANDAE

本品为鸢尾科植物射干 Belamcanda chinensis (L.) DC. 的干燥根茎。春初刚发芽或秋末茎叶枯萎时采挖，除去须根及泥沙，干燥。

【性状】 本品呈不规则结节状，长 3～10 cm，直径 1～2 cm。表面黄褐色、棕褐色或黑褐色，皱缩，有排列较密的环纹。上面有数个圆盘状凹陷的茎痕，偶有茎基残存；下面有残留细根及根痕。质硬，断面黄色，颗粒性。气微，味苦、微辛。

以粗壮、质硬、断面色黄者为佳。

【鉴别】 本品横切面：表皮有时残存。木栓细胞多列。皮层稀有叶迹维管束；内皮层不明显。中柱维管束周木型及外韧型，靠外侧排列较紧密。薄壁组织中有草酸钙柱晶；并含淀粉粒及油滴。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切薄片，干燥。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清热解毒，利咽消痰。用于咽喉肿痛，痰咳气喘。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置干燥处。

徐　长　卿

Xuchangqing

RADIX CYNANCHI PANICULATI

本品为萝藦科植物徐长卿 Cynanchum paniculatum (Bge.) Kitag. 的干燥根及根茎。秋季采挖，除去泥沙，阴干。

【性状】 本品根茎呈不规则柱状，有节，长 0.5～3 cm，直径 0.2～0.4 cm；四周着生多数细长的根。根呈圆柱形，弯曲，长 10～16 cm，直径 1～1.5 mm；表面淡褐色或

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

淡棕黄色，具微细的纵皱纹，并有纤细的须根；质脆，易折断，断面皮部黄白色，木部细小，黄棕色，有粉性。气香，味辛。

以香气浓者为佳。

【鉴别】 (1) 取本品粉末约 0.1 g，加无水乙醇 1 ml，振摇数分钟，滤过。取滤液，加三氯化铁试液 1 滴，即显紫红色。

(2) 取本品粉末 2 g，加乙醚 20 ml，充分振摇数分钟，滤过。取滤液，置水浴上蒸干，残渣加硝酸数滴，初显棕黄色，稍加热后，变为蓝绿色。

(3) 取本品粉末 0.5 g，置 50 ml 锥形瓶中，加水 15 ml，加热煮沸，蒸气导入盛有氯亚胺基-2,6-二氯醌 1 份与四硼酸钠 32 份的混合粉末 0.1 g 与水 2 ml 的溶液中，溶液即显蓝色。

【炮制】 除去杂质，略洗，切段，阴干。

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 祛风化湿，行气通络。用于风湿痹痛，胃痛胀满，牙痛，痛经，跌扑肿痛。

【用法与用量】 3～12 g，不宜久煎。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

豹　　骨

Baogu

OS PARDI

本品为猫科动物豹 Panthera pardus L. 的干燥骨骼。将获取的豹剥去皮肉，剔净残余筋肉，阴干。

【性状】 本品头骨呈长圆形，额骨平，中部凹陷不明显，额嵴在额骨的后 1/3 处合并，颅顶骨长小于宽，顶部中间有 1 明显的矢状嵴，眼眶下面各有 1 孔，孔面平直，上下部不倾斜，嘴部略细尖。上下门齿各 3 对，较小，排列呈一横列，犬齿上下各 1 对，大而锐利；臼齿上腭 4 对，下腭 3 对，呈山字形。

颈椎 7 节，第一节背面观呈蝶形，第二节较长，背面有长而高的左右侧扁的棘突；第三至七节略呈马鞍形，椎体的长度由前至后逐渐减短，胸椎 13 节，每节背面皆有较高的棘突，两侧连接有肋骨 13 对，细瘦，近脊处略呈圆柱形，近胸骨处扁条形，微向

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

内弯曲，连接胸骨。腰椎7节，骶椎3节愈合，尾椎24～26节，尾长约为体长的3/5至7/10，椎骨由前到后逐渐变短减细，排成长鞭状；盆骨1具，长方形，左右对称。

四肢骨较细长，完整者足趾上带有灰黄色的皮毛，其上有黑色圆斑；趾爪向内弯曲，略似钩形。前肢骨上部为肩胛骨，呈扇状半圆形，背面中部有1条斜向脊状突起，内面平整。肱骨的下端内侧有1狭长形"凤眼"(髁上孔)，后肢骨的正骨(胫骨)粗大，骨干呈微弧形，帮骨(腓骨)较细，骨干呈弧形，中部极为扁平似月形，正骨约大于帮骨4倍。膝盖骨(膑骨)呈扁椭圆形，略弯，上端厚，下端较薄，外部中间隆起，常附有肌腱，体重，质坚。

豹骨表面呈淡黄白色，外表稍带干枯的筋肉，断面类白色；骨质细致坚实，稍显油质。长骨横断面骨腔较大，约占断面直径1/2，骨髓呈疏松丝瓜络状。气微腥。

以体重、质坚实、色浅黄白者为佳。

【炮制】 **豹骨** 除去残留筋肉，洗净，阴干，锯成寸段，捣碎。

制豹骨 (1) 取净豹骨，照烫法(附录19页)用砂子炒至黄色，除去砂子，碾成细粉。

(2) 取净豹骨，用麻油炸至黄色、质酥时，取出捣碎，或用麻油涂抹豹骨，在无烟火上烤，边涂边烤至黄酥，捣碎。

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 强筋骨，祛风湿，止痛。用于风寒湿痹，筋骨疼痛，腰膝软弱无力。

【用法与用量】 3～6 g，多作酒剂。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

狼把草

Langbacao

HERBA BIDENTIS TRIPARTITAE

本品为菊科植物狼把草 Bidens tripartita L. 的干燥全草。夏、秋二季花期采挖，除去泥沙，干燥。

【性状】 本品根呈圆柱形，灰黄色，多分枝，有须根。茎圆柱形，长30～60 cm，表面暗绿色或暗紫色，有纵纹。叶对生，多皱缩或破碎，完整叶片展平后呈椭圆形或长

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

圆状披针形，长 6～12 cm；上部叶常 3 裂，下部叶常 5 裂，绿色，边缘有锯齿，叶柄有狭翅。头状花序顶生或腋生，总苞片多数，外层叶状，有毛。管状花黄色。瘦果扁平，两侧边缘各有一列倒钩刺，冠毛芒状，多为 2 枚。气微，味苦。

以色绿、叶多、有花者为佳。

【炮制】 除去杂质，喷淋清水，稍润，切段。

【性味】 苦，平。

【功能与主治】 清利湿热。用于咽喉疼痛，肠炎，痢疾，尿路感染；外治疖肿，皮癣。

【用法与用量】 9～15 g；外用鲜品适量。

【贮藏】 置通风干燥处。

狼　毒

Langdu

RADIX EUPHORBIAE EBRACTEOLATAE

本品为大戟科植物月腺大戟 Euphorbia ebracteolata Hayata 或狼毒大戟 Euphorbia fischeriana Steud. 的干燥根。春、秋二季采挖，洗净，切片，晒干。

【性状】 **月腺大戟** 为类圆形或长圆形的块片，直径 1.5～8 cm，厚 0.3～4 cm。外皮薄，黄棕色或灰棕色，易剥落而露出黄色皮部。切面黄白色，有黄色不规则大理石样纹理或环纹。体轻，质脆，易折断，断面有粉性。气微，味微辛。

狼毒大戟 外皮棕黄色，切面纹理或环纹显黑褐色。水浸后有粘性，撕开可见粘丝。

均以片大、粉性足者为佳。

【鉴别】 (1) **月腺大戟** 粉末黄白色。淀粉粒甚多，单粒球形、长圆形或半圆形，直径 3～34 μm，脐点裂缝状、人字状或星状，大粒层纹隐约可见；复粒由 2～5 粒组成；半复粒易见。网状具缘纹孔导管 18～80 μm。无节乳管多碎断，所含的油滴状分泌物散在，有时可见乳管内充满黄色分泌物。

狼毒大戟 粉末黄棕色。淀粉粒单粒直径至 24 μm，复粒由 2～7 粒组成，半复粒少见；网状具缘纹孔导管直径至 102 μm；乳汁无色。

(2) 取本品粉末 5 g，加乙醇 50 ml，加热回流 1 小时，滤过。取滤液 2 ml，加 3%

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

碳酸钠溶液 1 ml，置水浴中加热 3 分钟，冷却后，加入新制的重氮对硝基苯胺试液 2 滴，显红色。

【炮制】 生狼毒　除去杂质，洗净，润透，切片，晒干。

醋狼毒　取净狼毒片，照醋炒法(附录 18 页)用醋炒至微干。

每狼毒片 100 kg，用醋 30～50 kg。

【性味】 辛，平；有毒。

【功能与主治】 散结，杀虫。外用于淋巴结结核，皮癣；灭蛆。[1]

【用法与用量】 多熬膏外敷。

【注意】 不宜与密陀僧同用。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

凌　霄　花

Lingxiaohua

FLOS CAMPSIS

本品为紫葳科植物凌霄 Campsis grandiflora (Thunb.) K. Schum. 的干燥花。夏、秋二季花盛开时采摘，晒干或低温干燥。

【性状】 本品多皱缩卷曲，完整者长约 5 cm。花萼钟状，长 2 cm，暗棕色，先端 5 深裂，裂片顶端长而锐尖，有 5 条明显的纵脉纹。花冠黄棕色，先端 5 裂，裂片半圆形，下部联合呈漏斗状，表面具棕红色细脉纹。雄蕊 4 个，着生在花冠上，2 长 2 短，花药个字形，花柱 1 个。气微香，味微苦而略酸。

以完整、色黄棕者为佳。

【性味】 甘、酸，寒。

【功能与主治】 凉血，去瘀。用于经闭小腹胀痛，腹部肿块，产后乳肿，血热生风，皮肤瘙痒，酒糟鼻，痤疮。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

高　良　姜

Gaoliangjiang

RHIZOMA ALPINIAE OFFICINARUM

本品为姜科植物高良姜 Alpinia officinarum Hance 的干燥根茎。夏末秋初采挖，除去须根及残留的鳞片，洗净，切段，晒干。

【性状】 本品呈圆柱形，多弯曲，有分枝，长 5～9 cm，直径 1～1.5 cm。表面棕红色至暗褐色，有细密的纵皱纹及灰棕色的波状环节，每节长 0.5～1 cm，下面有圆形的根痕。质坚韧，不易折断，断面灰棕色或红棕色，纤维性，中柱约占 1/3。气香，味辛辣。

以分枝少、色红棕、气味浓者为佳。

【鉴别】 本品横切面：表皮细胞外壁增厚，偶含红棕色非晶形物。皮层中散有多数分泌细胞，内含黄色油质及红棕色树脂状物；叶迹维管束较多；内皮层明显。中柱维管束甚多，外韧型，排列紧密，维管束鞘纤维成环，木化。薄壁细胞含大的淀粉粒。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切薄片，晒干。

【性味】 辛，热。

【功能与主治】 祛寒温中，止痛。用于脘腹冷痛，胃寒呕吐。

【用法与用量】 2.5～6 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

拳　　参

Quanshen

RHIZOMA BISTORTAE

本品为蓼科植物拳参 Polygonum bistorta L. 的干燥根茎。春初发芽时或秋季茎叶将枯萎时采挖，除去泥沙，晒干，再去须根。

【性状】 本品呈扁长条形或扁圆柱形而弯曲，两端略尖，或一端渐细，有的对折卷

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

曲，长 6～13 cm，直径 1～2.5 cm。表面紫褐色或紫黑色，粗糙，一面隆起，一面稍平坦或略具凹槽，全体密具粗环纹，有残留须根或根痕。质硬，断面浅棕红色或棕红色，维管束呈黄白色点状排列成环。无臭，味苦、涩。

以个大、质硬、断面浅棕红色者为佳。

【鉴别】 (1) 本品粉末淡棕红色。木栓细胞多角形，含棕红色物。草酸钙簇晶甚多，直径 15～65 μm。具缘纹孔导管直径 20～55 μm，也有网纹及螺纹导管。纤维长梭形，直径 10～20 μm，壁较厚，木化，孔沟明显。淀粉粒椭圆形、卵形或类圆形，直径 5～12 μm。

(2) 取本品 1 薄片(或粉末少量)，加乙醇 2 滴与 1%三氯化铁的乙醇溶液 1 滴，显蓝黑色。

【炮制】 除去杂质，洗净，略泡，润透，切片，干燥。

【性味】 苦、涩，微寒。

【功能与主治】 清热，解毒，收敛。用于肠炎，痢疾，肝炎；外治口腔糜烂，咽喉溃疡。

【用法与用量】 4.5～9 g；外用适量，煎汤含漱。

【贮藏】 置干燥处。

粉 条 儿 菜

Fentiao'ercai

HERBA ALETRIDIS

本品为百合科植物粉条儿菜 Aletris spicata (Thunb.) Franch. 的干燥全草。夏、秋二季采挖，除去杂质，晒干。

【性状】 本品长 40～80 cm。根茎短，须根丛生，纤细弯曲，有的着生多数白色细小块根，习称"金线吊白米"。叶基生，带状，稍反曲，长 10～20 cm，宽 0.3～0.5 cm；灰绿色，先端尖，全缘。花茎细柱形，稍波状弯曲，直径0 .2～0.3 cm，被毛；总状花序穗状，花几无梗，棕黄色，花被 6 裂，长约 0.5 cm，裂片条状披针形。蒴果倒卵状三棱形。气微，味淡。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性味】 甘、微辛，平。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 清肺，养心安神。用于支气管炎，咳嗽，咳痰不爽，神经衰弱。

【用法与用量】 9～30 g，鲜品 30～60 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

粉萆薢

Fenbixie

RHIZOMA DIOSCOREAE HYPOGLAUCAE

本品为薯蓣科植物粉背薯蓣 Dioscorea hypoglauca Palibin 的干燥根茎。秋、冬二季采挖，除去须根，洗净，切片，晒干。

【性状】 本品为不规则的薄片，边缘不整齐，大小不一，厚约 0.5 mm。有的有棕黑色或灰棕色的外皮。切片黄白色或淡灰棕色，有黄色筋脉点或筋脉纹（维管束）散在。质松，略有弹性。气微，味苦、微辛。

以片大而薄、切面色黄白者为佳。

【鉴别】 （1）本品粉末黄白色。淀粉粒单粒圆形、卵圆形或长椭圆形，直径 5～32 μm，长至 40 μm，脐点点状或裂缝状；复粒少数，多由 2 粒组成。厚壁细胞众多，壁木化，纹孔明显，有的类似石细胞，多角形、梭形或类长方形，直径 40～80 μm，长至 224 μm。草酸钙针晶束长 64～84 μm。

（2）取本品粗粉约 10 g，加水 100 ml，浸泡过夜，置 60°水浴中加热 10 分钟，趁热滤过。取滤液各 2 ml，分置二支试管中，一管加 5% 氢氧化钠溶液 2 ml，另一管加 5% 盐酸溶液 2 ml，密塞，用力振摇 1 分钟，含碱液管的泡沫比含酸液管高达数倍。

【性味】 苦，平。

【功能与主治】 祛风，利湿。用于尿路感染，小便浑浊，乳糜尿，白带，风湿性关节痛，腰膝酸痛。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

益　母　草

Yimucao

HERBA LEONURI

本品为唇形科植物益母草 Leonurus heterophyllus Sweet 的干燥地上部分。夏、秋二季茎叶茂盛、花初开时采割，晒干，或切段晒干。

【性状】 本品茎呈方柱形，上部多分枝，四面凹下成纵沟，长 30～60 cm，直径约 0.5 cm；表面灰绿色或黄绿色；体轻，质韧，断面中部有髓。叶交互对生，有柄；叶片灰绿色，多皱缩、破碎，易脱落；完整者下部叶掌状 3 裂，上部叶羽状深裂或浅裂成 3 片，裂片全缘或具少数锯齿。轮伞花序腋生，小花淡紫色，花萼筒状，花冠二唇形。切段者长约 2 cm。气微，味微苦。

以质嫩、叶多、色灰绿者为佳；质老、枯黄、无叶者不可供药用。

【鉴别】 (1) 本品茎的横切面：表皮细胞外被角质层，有毛茸；腺鳞头部 4、6 或 8 细胞，柄单细胞；非腺毛 1～4 细胞。下皮厚角细胞在棱角处较多。皮层为数列薄壁细胞；内皮层明显。中柱鞘纤维束微木化。韧皮部较窄。形成层不明显。木质部在棱角处较发达。髓部薄壁细胞较大。薄壁细胞含细小草酸钙针晶及小方晶。

(2) 取本品粗粉 5 g，加 80% 乙醇 50 ml，加热回流 1 小时，滤过，取滤液 20 ml，蒸去乙醇，残渣加 1% 盐酸溶液 5 ml 使溶解，滤过。取滤液分置三支试管中，每支 1 ml，一管加碘化铋钾试液 1～2 滴，发生橙红色沉淀；一管加碘化汞钾试液 1～2 滴，发生黄白色沉淀；另一管加硅钨酸试液 1～2 滴，发生灰白色沉淀。

【炮制】 除去杂质，迅速洗净，润透，切段，干燥。

【性味】 苦、辛，微寒。

【功能与主治】 活血调经，利尿消肿。用于月经不调，痛经，经闭，恶露不尽，急性肾炎水肿。

【用法与用量】 9～30 g。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 置干燥处。

【制剂】 (1) 益母草注射液　(2) 益母草流浸膏　(3) 益母草膏

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

益母草注射液

Yimucao Zhusheye

INJECTIO LEONURI

本品为唇形科植物益母草制成的灭菌水溶液。含总生物碱以盐酸水苏碱($C_7H_{13}O_2N \cdot HCl$)计算，应为标示量的90.0～110.0%。

本品可加0.5～1.0%的苯甲醇。

【性状】 本品为无色的澄明液体。

【鉴别】 (1) 取本品1 ml，加稀盐酸使成酸性后，加碘化铋钾试液数滴，发生橙红色沉淀。

(2) 取本品1 ml，置水浴上蒸干，残渣加乙醇数滴使溶解；另取盐酸水苏碱对照品约20 mg，加水少量溶解后，滴加碳酸钠试液，调节pH值至8.0，在水浴上蒸干，残渣加乙醇数滴使溶解。照薄层层析法(附录38页)试验，取上述两种溶液各10 μl，分别点于同一不含粘合剂的氧化铝(中性，活度Ⅱ～Ⅲ级)薄层板上，以丙酮-甲醇(1:1)为展开剂，展开后，晾干，喷以稀碘化铋钾试液-碘化钾碘试液(1:1)显色后，供试品溶液即出现橙黄色与灰紫红色两个斑点，其中橙黄色斑点的位置应与对照品溶液相同。

【检查】 **pH值** 应为4.5～6.5(附录42页)。

其他 应符合注射剂项下有关的各项规定(附录7页)。

【含量测定】 **对照品溶液的制备** 精密称取在105°干燥至恒重的盐酸水苏碱50 mg，置50 ml量瓶中，加$N/10$盐酸液使溶解并稀释至刻度，摇匀，即得(每1 ml中含盐酸水苏碱1 mg)。

标准曲线的制备 精密量取对照品溶液4.0、6.0、8.0与10.0 ml，分别置于25 ml烧杯中，均用$N/10$盐酸液稀释至10 ml，置冰浴中，分别加入新制的硫氰酸铬铵溶液(1→50) 6 ml，搅匀，放置1小时，减压滤过，沉淀用冰冷的水10 ml，分次洗涤，抽干，用丙酮适量将沉淀溶解后，移入10 ml量瓶中，并用丙酮稀释至刻度，摇匀，照比色法(附录32页)，在525 nm的波长处测定吸收度，以吸收度为纵坐标，浓度为横坐标，绘制标准曲线。

测定法 精密量取本品适量(约相当于益母草总生物碱盐酸盐100 mg)，置100 ml量瓶中，加$N/10$盐酸液稀释至刻度，摇匀，再精密量取稀释液7.0 ml，置25 ml烧杯

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

中，加 $N/10$ 盐酸液稀释至 10 ml，照标准曲线的制备项下的方法，自“置冰浴中”起，测定吸收度，从标准曲线中读出供试品溶液中的含量，计算，即得。

【功能与主治】 子宫收缩药。用于止血调经。

【用法与用量】 肌内注射，一次 20～40 mg，一日 20～80 mg。

【注意】 胎盘未排出前禁用，孕妇忌用。

【规格】 1 ml:20 mg

【贮藏】 遮光，密闭保存。

益母草流浸膏

Yimucao Liujingao

EXTRACTUM LEONURI LIQUIDUM

【处方】

益母草	1000 g
乙　醇	适　量
水	适　量

【制法】 取益母草，切碎，加水煎煮三次，合并煎液，滤过，滤液浓缩至约 500 ml，放冷，加入等量的乙醇，搅匀，静置，沉淀，滤过，滤渣用 45% 乙醇洗涤，洗液与滤液合并，减压回收乙醇，放冷，滤过，调整乙醇量使符合规定并使总体积为 1000 ml，静置，俟澄清，滤过，即得。

【性状】 本品为棕褐色的液体；味略苦。

【鉴别】 取检查总固体项下的残渣，加 80% 乙醇 20 ml，置水浴上加热 10 分钟，并不断搅拌，放冷，滤过，滤液置水浴上蒸干，残渣加 $N/10$ 盐酸液 5 ml 溶解后，滤过，滤液照下述方法试验：

(1) 取滤液 1 ml，加碘化铋钾试液 1～2 滴，即发生橙红色沉淀。

(2) 取滤液 1 ml，加硅钨酸试液 1～2 滴，即发生灰白色沉淀。

【检查】 乙醇量 应为 16～20%(附录 48 页第一法)。

总固体 精密量取本品澄清液 5 ml，置称定重量的蒸发皿中，于水浴上蒸干，在 105° 干燥至恒重，遗留残渣不得少于 0.375 g。

其他 应符合流浸膏剂与浸膏剂项下有关的各项规定(附录 11 页)。

【功能与主治】 子宫收缩药。用于调经及产后子宫出血，子宫复原不全等。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【用法与用量】 口服，一次 5～10 ml，一日 15～30 ml。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 密封保存。

益 母 草 膏

Yimucao Gao

EXTRACTUM LEONURI INSPISSATUM

本品为益母草制成的煎膏。

【制法】 取益母草，切碎，加水煎煮二次，每次 2 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩成比重 1.21～1.25(80～85°热测) 的清膏。每 100 g 清膏加红糖 200 g，加热溶化，混匀，浓缩至规定的比重，即得。

【性状】 本品为棕黑色稠厚的半流体；气微，味苦、甜。

比重 取本品 10 g，加水 20 ml 稀释后，依法测定(附录 26 页)，比重为 1.10～1.12。

【鉴别】 取本品约 15 g，置烧杯中，加硅藻土 4～4.5 g，搅拌均匀，加酸性乙醇 50 ml (含盐酸 0.25 ml)，移置带塞锥形瓶中，振摇 5 分钟，放置过夜，滤过，滤液置水浴上浓缩至稠膏状，再加酸性乙醇 25 ml，重复操作至稠膏状，加含盐酸 1 滴的水 10 ml，搅拌均匀，滤过。取滤液 1 ml，加硅钨酸试液 1～2 滴，即发生白色沉淀；另取滤液 1 ml，加碘化铋钾试液 3～5 滴，即发生橙红色沉淀。

【检查】 应符合煎膏剂项下有关的各项规定(附录 4 页)。

【功能与主治】 活血调经。用于经闭，痛经及产后瘀血腹痛。

【用法与用量】 口服，一次 9～15 g，一日 2～3 次。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 密闭，防热。

益 智

Yizhi

FRUCTUS ALPINIAE OXYPHYLLAE

本品为姜科植物益智 Alpinia oxyphylla Miq. 的干燥成熟果实。夏、秋间果实由绿

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

变红时采收，晒干或低温干燥。

【性状】 本品呈椭圆形，两端略尖，长 1.2～2 cm，直径 1～1.3 cm。表面棕色或灰棕色，有纵向凹凸不平的突起棱线 13～20 条，顶端有花被残基，基部常残存果梗。果皮薄而稍韧，与种子紧贴，种子结集成团，中有隔膜，将种子团分为 3 瓣，每瓣有种子 6～11 粒。种子呈不规则的扁圆形，略有钝棱，直径约 3 mm，表面灰褐色或灰黄色，外被淡棕色膜质的假种皮；质硬，破开后可见白色种仁(胚乳)。有特异香气，味辛、微苦。

以个大、饱满、气味浓者为佳。

【鉴别】 本品种子横切面：假种皮薄壁细胞有时残存。种皮表皮细胞类圆形，略径向延长，壁较厚；下皮为 1 列薄壁细胞，含棕色物；油细胞层为 1 列油细胞，类方形，直径约 25 μm；色素层为数列棕色细胞，其间散有类圆形油细胞 2～3 列；内种皮为 1 列栅状石细胞，棕黄色，内壁与侧壁极厚，胞腔小，内含硅质体。外胚乳细胞含淀粉粒及细小草酸钙方晶。内胚乳细胞含淀粉粒及糊粉粒。

【炮制】 盐益智仁 取净益智，先照烫法（附录 19 页）用砂子炒至外壳鼓起并显焦黄色后，去壳取仁，再照盐水炙法(附录 19 页)用盐水拌匀，微炒。

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 温脾，暖肾。用于脾虚腹痛，唾液过多，肾虚遗尿，遗精，夜尿频数，尿后余沥。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

浙　贝　母

Zhebeimu

BULBUS FRITILLARIAE THUNBERGII

本品为百合科植物浙贝母 Fritillaria thunbergii Miq. 的干燥鳞茎。初夏植株枯萎后采挖，洗净，大小个分开，大者除去心芽，习称“大贝”，小者不去心芽，习称“珠贝”。分别撞擦，除去外皮，拌以贝壳灰粉，吸去擦出的浆汁，干燥。

【性状】 大贝 为鳞茎外层的单瓣鳞叶，略呈菱肉状，高 1～2 cm，直径 2～3.5 cm。外表面类白色至淡黄色，内表面白色或淡棕色，被有白色粉末。质硬而脆，易折断，断

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

面白色至黄白色，富粉性。气微，味微苦。

珠贝 为完整的鳞茎，呈扁圆形，高 1～1.5 cm，直径 1～2.5 cm。表面类白色，外层鳞叶 2 瓣，肥厚，略呈肾形，互相抱合，内有小鳞叶 2～3 枚及干缩的残茎。

均以鳞叶肥厚、质坚实、粉性足、断面色白者为佳。

【鉴别】 (1) 本品粉末淡黄白色。淀粉粒甚多，单粒卵形、广卵形或椭圆形，直径 6～56 μm，脐点点状、裂缝状、人字状或马蹄状，位于较小端，层纹大多明显；偶见半复粒及复粒，复粒由 2 粒组成。表皮细胞类多角形或长方形，垂周壁连珠状增厚；有时可见气孔，副卫细胞 4～5 个。草酸钙结晶细小，多呈颗粒状，有的呈梭形、方形或细杆状。导管多为螺纹，直径至 18 μm。

(2) 取本品横切片，加碘试液 2～3 滴，即显蓝紫色，但边缘一圈仍为类白色。

(3) 取本品粗粉 2 g，加 2% 醋酸溶液 40 ml，不断振摇，浸泡半小时，滤过。取滤液 5 ml，加碘化铋钾试液 3 滴，发生橙黄色沉淀；另取滤液 5 ml，加硅钨酸试液，即发生白色絮状沉淀。

(4) 取本品粉末，置紫外光灯下观察，显亮淡绿色荧光。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，干燥；或打成碎块。

【性味】 苦，微寒。

【功能与主治】 清肺止咳化痰，散结消肿。用于感冒咳嗽，溃疡病，淋巴结结核，痈肿。

【用法与用量】 4.5～9 g，煎服或研末冲服。

【注意】 不宜与乌头类药材同用。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

【制剂】 浙贝流浸膏

浙贝流浸膏

Zhebei Liujingao

EXTRACTUM FRITILLARIAE LIQUIDUM

【处方】

浙贝母(粗粉)	1000 g
乙醇(70%)	适量

【制法】 取浙贝母，照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法（附录 11 页），用 70%乙醇

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

作溶剂，浸渍 18 小时后，以每分钟 1～3 ml 的速度，缓缓渗漉，收集初漉液 850 ml，另器保存，继续渗漉，俟可溶性成分完全漉出，收集续漉液在 60°以下浓缩至成稠膏状，加入初漉液 850 ml，混合后，加 70%乙醇稀释使成 1000 ml，静置俟澄清，滤过，即得。

【性状】 本品为棕黑色的液体；味苦。

【检查】 **乙醇量** 应为 45～55%(附录 48 页第一法)。

其他 应符合流浸膏剂与浸膏剂项下有关的各项规定(附录 11 页)。

【功能与主治】 镇咳、祛痰药。用于上感咳嗽，多痰。

【用法与用量】 口服，一次 2～5 ml，一日 3 次。

【贮藏】 密封，置阴凉干燥处保存。

浙　桐　皮

Zhetongpi

CORTEX ZANTHOXYLI

本品为芸香科植物椿叶花椒 Zanthoxylum ailanthoides Sieb. et Zucc. 或朵椒 Zanthoxylum molle Rehd. 的干燥树皮。初夏剥取有钉刺的树皮，晒干。

【性状】 **椿叶花椒** 呈片状或板片状，两边略卷曲，厚约 0.1 cm。外表面灰褐色，具纵裂纹，并有分布较密的钉刺；钉刺类圆形，高 1～1.5 cm，顶尖，基部直径 1～1.5 cm。内表面棕黄色，光滑，在钉刺相对的皮内有印痕。质硬而韧，不易折断，断面不整齐。气微香，味微麻辣。

朵椒 外表面灰褐色，粗糙，钉刺稍大，刺尖多脱落。

均以皮薄、带钉刺者为佳。

【炮制】 洗净，润透，切块，干燥。

【性味】 辛、微苦，温。

【功能与主治】 祛风湿，通络，止痛。用于腰膝疼痛；外治湿疹。

【用法与用量】 6～9 g；外用适量。

【贮藏】 置通风干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

娑 罗 子

Suoluozi

FRUCTUS AESCULI

本品为七叶树科植物七叶树 Aesculus chinensis Bge. 或天师栗 Aesculus wilsonii Rehd. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收，晒干或低温干燥。

【性状】 本品呈圆球形、卵形或倒卵形，直径 2.5～4 cm，有的可达 8 cm。表面棕褐色，粗糙，密布黄棕色的斑纹，有 3 条纵向沟纹，形成三瓣状；顶端扁平或突起而尖，基部有果梗痕。果皮硬而脆。种子 1 枚，扁圆形，表面深棕色，凹凸不平，略抽皱，种脐色较浅，约占种子的 1/2 或 1/3；种皮硬而脆，种仁坚硬，形似栗，黄白色或淡棕色，粉质。无臭，味先苦后甜。

以饱满、种仁色黄白者为佳。

【炮制】 除去外壳及杂质，用时打碎。

【性味】 甘，温。

【功能与主治】 理气，宽中，止痛。用于胃脘胀痛。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置干燥处，防霉、防蛀。

海 马

Haima

HIPPOCAMPUS

本品为海龙科动物线纹海马 Hippocampus kelloggi Jordan et Snyder、刺海马 Hippocampus histrix Kaup、大海马 Hippocampus kuda Bleeker、三斑海马 Hippocampus trimaculatus Leach 或小海马(海蛆)Hippocampus japonicus Kaup 的干燥体。夏、秋二季捕捞，洗净，晒干；或除去皮膜及内脏，晒干。

【性状】 线纹海马 体呈扁长形而弯曲，体长约 30 cm。黄白色。头略似马头，有

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

冠状突起，前方有1管状长吻，口小，无牙，两眼深陷。躯干部七棱形，尾部四棱形，渐细卷曲，体上有瓦楞形的节纹并具短棘。通常以"马头，蛇尾，瓦楞身"概述其外形。体轻，骨质，坚硬。气微腥，味微咸。

刺海马 体长15～20 cm，黄白色头部及体上环节间的棘细而尖。

大海马 体长20～30 cm，黑褐色。

三斑海马 体侧背部第1、4、7节的短棘基部各有1黑斑。

小海马(海蛆) 体形小，长7～10 cm，黑褐色节纹及短棘均较细小。

均以体大、坚实、头尾齐全者为佳。

【炮制】 除去灰屑，用时捣碎或碾粉。

【性味】 甘，温。

【功能与主治】 温肾壮阳，散结消肿。用于阳痿，腹部肿块，淋巴结结核，跌扑损伤；外治痈肿疔疮。

【用法与用量】 3～9 g；外用适量，研末敷患处。

【注意】 孕妇慎服。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防蛀。

海　风　藤

Haifengteng

CAULIS PIPERIS FUTOKADSURAE

本品为胡椒科植物风藤 Piper futokadsura Sieb. et Zucc. 的干燥藤茎。夏、秋二季采割，除去根、叶，晒干。

【性状】 本品呈扁圆柱形，微弯曲，长15～60 cm，直径0.3～2 cm。表面灰褐色或褐色，粗糙，有纵向棱状纹理及明显的节。节间长3～12 cm，节部膨大，上生不定根。体轻，质脆，易折断，断面不整齐，皮部窄，木部宽广，有灰黄色与灰白色相间排列的放射状纹理及多数小孔，皮部与木部交界处常有裂隙，中心有灰褐色髓。气香，味微苦辛。

以香气浓者为佳。

【炮制】 除去杂质，浸泡，润透，切片，晒干。

【性味】 辛，微温。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 祛风湿，通络，止痛。用于风寒湿痹，关节酸痛，腰膝屈伸不利。

【用法与用量】 6～12 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

海　龙

Hailong

SYNGNATHUS

本品为海龙科动物刁海龙 Solenognathus hardwickii (Gray)、拟海龙 Syngnathoides biaculeatus (Bloch) 或尖海龙 Syngnathus acus L. 的干燥体。多于夏、秋二季捕捞，刁海龙、拟海龙除去皮膜及内脏，洗净，晒干；尖海龙直接洗净，晒干。

【性状】 刁海龙　体狭长侧扁，全长 30～50 cm。表面黄白色或灰褐色。头部前方具 1 管状长吻，口小，无牙，两眼圆而深陷，头与体轴略呈钝角。躯干部宽 3 cm，五棱形，尾部前方六棱形，后方渐细，四棱形，尾端卷曲。背棱两侧各有 1 列灰黑色斑点状色带。全体被以具花纹的骨环及细横纹，各骨环内有突起粒状棘。胸鳍短宽，背鳍较长，有的不明显，无尾鳍。骨质，坚硬。气微腥，味微咸。

拟海龙　体长平扁，躯干部略呈四棱形，全长 20～22 cm。表面灰黄色，头常与体轴成一直线。

尖海龙　体细长，呈鞭状，全长 10～30 cm，未去皮膜。表面黄褐色，有的腹面可见育儿囊，有尾鳍。质较脆弱，易撕裂。

均以体长、头尾齐全者为佳。

【炮制】 除去灰屑，用时捣碎或切段。

【性味】 甘，温。

【功能与主治】 温肾壮阳，散结消肿。用于阳痿，腹部肿块，淋巴结结核，跌扑损伤；外治痈肿疔疮。

【用法与用量】 3～9 g；外用适量，研末敷患处。

【注意】 孕妇慎服。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防蛀。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

海　　芋（痕芋头）

Haiyu

RHIZOMA ALOCASIAE ODORAE

本品为天南星科植物海芋 Alocasia odora (Roxb.) C. Koch 的干燥根茎。全年均可采挖，除去鳞片，洗净，切片，晒干。

【性状】 本品为近圆形或不规则的薄片，卷曲或皱缩，厚 1～3 mm。外皮棕黄色，有的有残存鳞叶，切面白色或黄白色，有颗粒状突起及波状皱纹。质脆，易折断，富粉性。气微，味淡，嚼之麻舌而刺喉。

以断面色白、粉性足者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，晒干。

【性味】 辛，寒；有毒。

【功能与主治】 清热解毒，消肿散结。用于热病高热，流行性感冒，肠伤寒；外治疔疮肿毒。

【用法与用量】 9～30 g；外用鲜品适量，捣烂敷患处。

【注意】 本品有毒，内服须煎 3～5 小时。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

海　金　沙

Haijinsha

SPORA LYGODII

本品为海金沙科植物海金沙 Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. 的干燥成熟孢子。秋季孢子未脱落时采割藤叶，晒干，搓揉或打下孢子，除去藤叶。

【性状】 本品呈粉末状，棕黄色或浅棕黄色。体轻，手捻有光滑感，置手中易由指缝滑落。气微，味淡。

以色棕黄、体轻、手捻光滑者为佳。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【鉴别】（1）取本品少量，撒于火上，即发出轻微爆鸣及明亮的火焰。

（2）本品粉末棕黄色。孢子为四面体，三角状圆锥形，顶面观三面锥形，可见三叉状裂隙，侧面观类三角形，底面观类圆形，直径60～85 μm，外壁有颗粒状雕纹。

【性味】甘，寒。

【功能与主治】清利湿热。用于尿少涩痛，尿路结石、感染。

【用法与用量】6～15 g。

【贮藏】置干燥处。

海　桐　皮

Haitongpi

CORTEX ERYTHRINAE

本品为豆科植物刺桐 Erythrina variegata L. var. orientalis (L.) Merr. 或乔木刺桐 Erythrina arborescens Roxb. 的干燥树皮。初夏剥取有钉刺的树皮，晒干。

【性状】本品呈板片状，两边略卷曲，厚0.3～1 cm。外表面淡棕色，常有宽窄不等的纵凹纹，并散布钉刺；钉刺长圆锥形，高0.5～0.8 cm，顶锐尖，基部直径0.5～1 cm。内表面黄棕色，较平坦，有细密网纹。质硬而韧，断面裂片状。气微香，味微苦。

以皮薄、带钉刺者为佳。

【炮制】洗净，润透，切块，干燥。

【性味】苦，平。

【功能与主治】祛风湿，通络，止痛。用于腰膝肩臂疼痛；外治皮肤湿疹。

【用法与用量】3～9 g；外用适量。

【贮藏】置通风干燥处。

海　螵　蛸

Haipiaoxiao

OS SEPIELLAE SEU SEPIAE

本品为乌贼科动物无针乌贼 Sepiella maindroni de Rochebrune 或金乌贼 Sepia

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

esculenta Hoyle 的干燥内壳。收集乌贼鱼的骨状内壳，洗净，干燥。

【性状】 **无针乌贼** 呈扁长椭圆形，中间厚，边缘薄，长 9～14 cm，宽 2.5～3.5 cm，厚约 1.3 cm。背面有淡白色脊状隆起，两侧略显微红色，有不甚明显的细小疣点；腹面白色，自尾端到中部有细密波状横层纹；角质缘半透明，尾部较宽平，无骨针。体轻，质松，易折断，断面粉质，显疏松层纹。气微腥，味微咸。

金乌贼 长 13～23 cm，宽约至 6.5 cm。背面疣点明显，略作层状排列；腹面的细密波状横层纹占全体大部分，中间有纵向浅槽；尾部角质缘渐宽，向腹面翘起，末端有 1 骨针，多已断落。

均以色白、洁净者为佳。

【鉴别】 本品粉末类白色。多数为不规则透明薄片，有的具细条纹；另有不规则碎块，表面现网状或点状纹理。滴加稀盐酸，产生气泡。

【炮制】 除去杂质，砸成小块。

【性味】 咸，微温。

【功能与主治】 收敛，制酸，止血。用于溃疡病，胃酸过多，吐血，崩漏，白带；外治擦伤出血，溃疡久不愈合。

【用法与用量】 4.5～9 g；外用适量，研末敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

海　藻

Haizao

SARGASSUM

本品为马尾藻科植物海蒿子 Sargassum pallidum (Turn.) C. Ag. 或羊栖菜 Sargassum fusiforme (Harv.) Setch. 的干燥藻体。前者习称“大叶海藻”，后者习称“小叶海藻”。夏、秋二季采捞，除去杂质，洗净，晒干。

【性状】 **大叶海藻** 皱缩卷曲，黑褐色，有的被白霜，长 30～60 cm。主干呈圆柱状，具圆锥形突起，主枝自主干两侧生出，侧枝自主枝叶腋生出，具短小的刺状突起。初生叶披针形或倒卵形，长 5～7 cm，宽约 1 cm，全缘或具粗锯齿。次生叶条形或披针形，叶腋间有着生条状叶的小枝。气囊黑褐色，球形或卵圆形，有的有柄，顶端钝圆，有的具细短尖。质脆，潮润时柔软；水浸后膨胀，肉质，粘滑。气腥，味微咸。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

小叶海藻 较小，长 15～40 cm。分枝互生，无刺状突起。叶条形或细匙形，先端稍膨大，中空。气囊腋生，纺锤形或球形，囊柄较长。质较硬。

均以色黑褐、白霜少者为佳。

【鉴别】 取本品 1 g，剪碎，加水 20 ml，冷浸数小时后，滤过，滤液浓缩至 3～5 ml 后，加三氯化铁试液 3 滴，发生棕色沉淀，再加$N/10$氢氧化钠液 3 滴，振摇，沉淀即溶解。

【炮制】 除去杂质，洗净，稍晾，切段，晒干。

【性味】 咸，寒。

【功能与主治】 软坚，散结。用于地方性甲状腺肿，淋巴结结核，腹部肿块，睾丸肿痛。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置干燥处。

浮　　石

Fushi

PUMEX

本品为火山喷出的岩浆凝固形成的多孔状石块。多于夏、秋二季收集，洗净，晒干。

【性状】 本品呈海绵样的不规则块状，大小不等。表面灰白色或灰黄色，具多数细孔。体轻，质硬而脆，断面疏松，常有玻璃或绢丝样光泽。气微，味微咸。

以体轻、色灰白者为佳。

【炮制】 洗净，晒干，用时打碎。

【性味】 咸，寒。

【功能与主治】 清肺化痰，软坚散结。用于肺热咳嗽痰稠，淋巴结结核。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

浮　海　石

Fuhaishi

OS COSTAZIAE

本品为胞孔科动物脊突苔虫 Costazia aculeata Ganu et Bassler 的干燥骨骼。多于夏、秋二季收集，洗净，晒干。

【性状】 本品呈珊瑚样的不规则块状，大小不等。灰白色或灰黄色，表面多突起呈叉状分枝，中部交织如网状。体轻，质硬而脆，表面与断面均有多数细小孔道。气微腥，味微咸。

以体轻、色灰白者为佳。

【炮制】 打成小块，漂洗，除去杂质，晒干。

【性味】 咸，寒。

【功能与主治】 清肺化痰，软坚散结。用于肺热咳嗽痰稠，淋巴结结核。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置干燥处。

浮　萍

Fuping

HERBA SPIRODELAE

本品为浮萍科植物紫萍 Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. 的干燥全草。6～9月采收，洗净，除去杂质，晒干。

【性状】 本品呈扁平鳞片状卵形或卵圆形，长径 2～5 mm。上表面淡绿色至灰绿色，偏侧有1小凹陷，边缘整齐或微卷曲。下表面紫绿色至紫棕色，着生数条须根。体轻，手捻易碎。气微，味淡。

以色绿、背紫者为佳。

【性味】 辛，寒。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 散风，透疹，利尿。用于麻疹不透，荨麻疹，皮肤瘙痒，浮肿，尿少。

【用法与用量】 3～9 g；外用适量，煎汤浸洗。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮。

通　关　藤

Tongguanteng

CAULIS MARSDENIAE TENACISSIMAE

本品为萝藦科植物通关藤 Marsdenia tenacissima (Roxb.) Wight et Arn. 的干燥藤茎。秋、冬二季采收，晒干。

【性状】 本品呈扁圆柱形，略扭曲，直径 2～5 cm。表面灰褐色，粗糙，粗皮松软较厚，节膨大，节间两侧各有 1 条明显纵沟，于节处交互对称。质硬而韧，不易折断，断面不平整，黄白色，密布细孔，中空。气微，味苦回甜。

以条粗、味苦回甜者为佳。

【鉴别】 (1) 本品横切面：木栓层为 10～20 余列细胞。皮层较宽，细胞含黄棕色物，石细胞群及非木化纤维束甚多，近韧皮部处断续排列成环；乳管甚多，单个散在，类圆形。维管束双韧型。韧皮部稍窄。木质部发达，导管直径 27～280 μm，多散列。髓部常中空。薄壁细胞大多含草酸钙簇晶；并含淀粉粒。

(2) 取本品粗粉 2 g，加水 10 ml，温浸半小时，滤过。取滤液 2 ml，分置带塞试管中，一管加 5%氢氧化钠溶液 2 ml，另一管加 5%盐酸溶液 2 ml，密塞，用力振摇 1 分钟，含碱管比含酸管的泡沫高约 3～4 倍。

(3) 取本品粗粉 2 g，加乙醇 10 ml，置 60°水浴中浸渍 1 小时，滤过。取滤液 2 ml，置水浴上蒸干，残渣加冰醋酸 1 ml 使溶解，再加醋酐 1 ml 与硫酸 1 滴，溶液即由黄色变为紫色，渐变为蓝色，最后变为墨绿色；另取滤液 2 ml，置水浴上蒸干，残渣加氯仿 1 ml 使溶解，再加硫酸 1 ml，轻轻振摇，氯仿层显红棕色，两液接界处红棕色更深，置紫外光灯下观察，硫酸层显绿色荧光。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，晒干。

【性味】 苦，微寒。

【功能与主治】 止咳，祛痰，平喘。用于慢性气管炎，支气管哮喘。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【用法与用量】 24～30 g。

【贮藏】 置干燥处。

通　　草

Tongcao

MEDULLA TETRAPANACIS

本品为五加科植物通脱木 Tetrapanax papyriferus (Hook.) K. Koch 的干燥茎髓。秋季割取茎，截成段，趁鲜取出髓部，理直，晒干。

【性状】 本品呈圆柱形，长 20～40 cm，直径 1～2.5 cm。表面白色或淡黄色，有浅纵沟纹。体轻，质松软，稍有弹性，易折断，断面平坦，显银白色光泽，中部有直径 0.3～1.5 cm 的空心或半透明的薄膜，纵剖面呈梯状排列，实心者少见。无臭，无味。

以条粗、色白者为佳。

【鉴别】 本品横切面：全部为薄壁细胞，椭圆形、类圆形或近多角形，外侧的细胞较小，纹孔明显，有的细胞含草酸钙簇晶，直径 15～64 μm。

【炮制】 除去杂质，切片。

【性味】 甘、淡，寒。

【功能与主治】 清热，利尿，下乳。用于小便不利，尿路感染，乳汁不下。

【用法与用量】 2.5～4.5 g。

【贮藏】 置干燥处。

预　知　子

Yuzhizi

FRUCTUS AKEBIAE

本品为木通科植物木通 Akebia quinata (Thunb.) Decne.、三叶木通 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. 或白木通 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. var. australis (Diels) Rehd. 的干燥成熟果实。夏、秋二季果实将变黄时采摘，晒干，或置沸水中略烫

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

后晒干。

【性状】 本品呈长椭圆形，稍弯曲，长3～9 cm，直径1.5～3.5 cm。表面黄棕色或黑褐色，有不规则的深皱纹，顶端钝圆，基部有果梗痕。质硬，破开后，果瓤淡黄色或黄棕色；种子多数，扁长卵形，黄棕色或紫褐色，具光泽，有条状纹理。气微香，味苦。

以个大、色黄棕、质硬、皮皱者为佳。

【炮制】 洗净，晒干，用时打碎。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 舒肝理气，活血止痛，利尿。用于脘胁胀痛，痛经，小便不利。

【用法与用量】 3～9 g。

【注意】 孕妇慎服。

【贮藏】 置通风干燥处。

桑　叶

Sangye

FOLIUM MORI

本品为桑科植物桑 Morus alba L. 的干燥叶。初霜后采收，除去杂质，晒干。

【性状】 本品多皱缩、破碎。完整者有柄，叶片展平后呈卵形或宽卵形，长8～15 cm，宽7～13 cm；先端渐尖，基部截形、圆形或心脏形，边缘有锯齿或钝锯齿，有的不规则分裂。上表面黄绿色或浅黄棕色，有的有小疣状突起；下表面颜色稍浅，叶脉突起，小脉网状，脉上被疏毛，叶腋具簇毛。质脆。气微，味淡、微苦涩。

以叶大、色黄绿者为佳。

【鉴别】 本品粉末黄绿色或黄棕色。上表皮有含钟乳体的大细胞，钟乳体直径47～77 μm。下表皮气孔不定式，副卫细胞4～6个。非腺毛单细胞，长50～230 μm。草酸钙簇晶直径5～16 μm；偶见方晶。

【炮制】 除去杂质，搓碎，去柄，筛去灰屑。

【性味】 苦、甘，寒。

【功能与主治】 散风热，清肝明目。用于风热感冒，咳嗽，头晕头痛，目赤。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置干燥处。

桑 白 皮

Sangbaipi

CORTEX MORI RADICIS

本品为桑科植物桑 Morus alba L. 的干燥根皮。秋末叶落时至次春发芽前采挖根部，刮去黄棕色粗皮，纵向剖开，剥取根皮，晒干。

【性状】 本品呈扭曲的卷筒状、槽状或板片状，长短宽窄不一，厚 1～4 mm。外表面白色或淡黄白色，较平坦，有的残留橙黄色或棕黄色鳞片状粗皮；内表面黄白色或灰黄色，有细纵纹。体轻，质韧，纤维性强，难折断，易纵向撕裂，撕裂时有粉尘飞扬。气微，味微甘。

以色白、粉性足者为佳。

【鉴别】 本品横切面：韧皮部射线宽 2～6 列细胞；散有乳管；纤维单个散在或成束，非木化或微木化；薄壁细胞含淀粉粒，有的细胞含草酸钙方晶。较老根皮散在夹有石细胞的厚壁细胞群，胞腔大多含方晶。

本品粉末淡灰黄色。纤维甚多，多碎断，直径 13～26 μm，壁厚，非木化至微木化，孔沟不明显。草酸钙方晶直径 11～32 μm。石细胞类圆形、类方形或形状不规则，直径 22～52 μm，壁较厚或极厚，纹孔及孔沟明显，胞腔内有的含方晶。另有含晶厚壁细胞，纹孔不明显。淀粉粒甚多，类圆形，直径 4～16 μm。

【炮制】 **桑白皮** 洗净，稍润，切丝，干燥。

蜜桑白皮 取桑白皮丝，照蜜炙法(附录 19 页)用蜜水炒至黄色、放凉后不粘手。

【性味】 甘，寒。

【功能与主治】 泻肺，利水。用于肺热喘咳，面目浮肿，尿少。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮、防蛀。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

桑　　枝

Sangzhi

RAMULUS MORI

本品为桑科植物桑 Morus alba L. 的干燥嫩枝。春末夏初采收，去叶，晒干，或趁鲜切片，晒干。

【性状】 本品呈长圆柱形，少有分枝，长短不一，直径 0.5～1.5 cm。表面灰黄色或黄褐色，有多数黄褐色点状皮孔及细纵纹，并有灰白色略呈半圆形的叶痕和黄棕色的腋芽。质坚韧，不易折断，断面纤维性。切片厚 0.2～0.5 cm，皮部较薄，木部黄白色，有放射状纹理，髓部白色或黄白色。气微，味淡。

以枝细质嫩、断面色黄白者为佳。

【炮制】 **桑枝**　未切片者，洗净，润透，切片，晒干。

炒桑枝　取桑枝片，照清炒法(附录 18 页)炒至微黄色。

【性味】 微苦，平。

【功能与主治】 祛风湿，利关节。用于肩臂、关节酸痛麻木。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置干燥处。

桑　寄　生

Sangjisheng

RAMULUS LORANTHI

本品为桑寄生科植物桑寄生 Loranthus parasiticus (L.) Merr. 的干燥带叶茎枝。冬季至次春采割，除去粗茎，切段，干燥，或蒸后干燥。

【性状】 本品茎枝呈圆柱形，长 3～4 cm，直径 0.2～1 cm；表面红褐色或灰褐色，具细纵纹，并有多数细小凸起的棕色皮孔，嫩枝有的可见棕褐色茸毛；质坚硬，断面不整齐，皮部红棕色，木部色较浅。叶多卷曲，具短柄；叶片展平后呈卵形或椭圆形，长

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

3～8 cm，宽 2～5 cm；表面黄褐色，幼叶被细茸毛，先端钝圆，基部圆形或宽楔形，全缘；革质。无臭，味涩。

以枝细嫩、色红褐、叶多者为佳。

【鉴别】 本品茎横切面：表皮细胞有时残存。木栓层为 10 余列细胞，有的含棕色物。皮层窄，老茎有石细胞群，薄壁细胞含棕色物。中柱鞘部位有石细胞群及纤维束，断续环列。韧皮部甚窄，射线散有石细胞。束内形成层明显。木质部射线宽 1～4 列细胞，近髓部也可见石细胞；导管单个散列或 2～3 个相聚。髓部有石细胞群，薄壁细胞含棕色物。有的石细胞含草酸钙方晶或棕色物。

粉末淡黄棕色。石细胞类方形、类圆形，偶有分枝，有的壁三面厚，一面薄，含草酸钙方晶。纤维成束，直径约 17 μm。具缘纹孔、网纹及螺纹导管多见。星状毛分枝碎片少见。

【检查】 强心甙 取本品粗粉 10 g，加 80%乙醇 50 ml，加热回流 30 分钟，滤过，滤液置水浴上蒸干，残渣加热水 10 ml 使溶解，滤过，滤液加乙醚振摇提取四次，每次 15 ml，弃去乙醚层，取下层水溶液加醋酸铅饱和溶液至沉淀完全，滤过，滤液加乙醇 10 ml，加硫酸钠饱和溶液脱铅，滤过，滤液加氯仿振摇提取三次，每次 15 ml，合并氯仿液，置水浴上浓缩至 1 ml。取浓缩液点于滤纸上，干后，滴加碱性 3,5-二硝基苯甲酸溶液(取 2% 3,5-二硝基苯甲酸的乙醇溶液与 $N/1$ 氢氧化钠液各 1 ml，混合)，不得显紫红色。

【炮制】 除去杂质，略洗，润透，切成厚片，干燥。

【性味】 苦，平。

【功能与主治】 补肝肾，祛风湿，强筋骨，养血，安胎，降血压。用于风湿痹痛，腰膝酸软，下肢麻木，胎动不安，先兆流产，高血压症。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

桑　　椹

Sangren

FRUCTUS MORI

本品为桑科植物桑 Morus alba L. 的干燥果穗。4～6 月果实变红时采收，晒干，或

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

略蒸后晒干。

【性状】 本品为聚花果，由多数小瘦果集合而成，呈长圆形，长 1～2 cm，直径 0.5～0.8 cm。黄棕色、棕红色至暗紫色，有短梗。小瘦果卵圆形，稍扁，长约 2 mm，宽约 1 mm，外包肉质花被片 4 片。气微，味微酸而甜。

以个大、色暗紫、肉厚者为佳。

【性味】 甘、酸，温。

【功能与主治】 补肝益肾，养血生津。用于头晕，目眩，耳鸣，心悸，头发早白，血虚便秘。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

桑 螵 蛸

Sangpiaoxiao

OÖTHECA MANTIDIS

本品为螳螂科昆虫大刀螂 Tenodera sinensis Saussure、小刀螂 Statilia maculata (Thunb.) 或巨斧螳螂 Hierodula patellifera (Serrille) 的干燥卵块。分别习称“团螵蛸”、“长螵蛸”及“黑螵蛸”。深秋至次春采收，除去杂质，蒸死虫卵，干燥。

【性状】 **团螵蛸** 略呈圆柱形或半圆形，由多数膜状薄层叠成，长 2.5～4 cm，宽 2～3 cm，厚 1.5～2 cm。表面浅黄褐色，上面隆起带不很明显，底面平坦或有凹沟。体轻，质松而韧，横断面可见外层为海绵状物，内层为许多放射状排列的小室，室内各有 1 细小椭圆形卵，深棕色，有光泽。气微腥，味淡或微咸。

长螵蛸 略呈长条形，一端较细，长 2.5～5 cm，宽 1～1.5 cm，厚约 1 cm。表面灰黄色，上面有 1 带状隆起，带的两侧各有 1 条暗棕色浅沟及斜向纹理，底面平坦或凹入。质硬而脆。

黑螵蛸 略呈平行四边形，长 2～4 cm，宽 1.5～2 cm，厚 1～1.5 cm。表面灰褐色，上面有 1 带状隆起，两侧有斜向纹理，近尾端微向上翘。质硬而韧。

【炮制】 除去杂质，蒸透，干燥，用时剪碎。

【性味】 甘、咸，平。

【功能与主治】 益肾，固精，缩尿，止带。用于遗尿，尿频，白带，遗精。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

黄 芫 花

Huangyuanhua

FOLIUM ET FLOS WIKSTROEMIAE CHAMAEDAPHNIS

本品为瑞香科植物河朔荛花 Wikstroemia chamaedaphne Meisn. 的干燥叶及花蕾。夏季花未开放时采收，干燥。

【性状】 本品叶多卷缩，完整叶片展平后呈披针形或狭长披针形，长 2～6 cm，宽 0.4～1 cm；先端尖或稍尖，全缘，边缘略向下翻卷，基部渐狭成短柄；两面无毛，上表面绿色，下表面淡绿色，主脉突出；折断时可见叶脉处有白色棉状纤维。花多单个散在或聚集成束，花被棒状或细长筒状，长 0.3～0.8 cm，灰绿色或灰黄色，密被白色短柔毛，上部较粗，有的先端 4 裂；雄蕊 8 个。气微香，花味辛。

以叶色绿、花蕾多者为佳。

【鉴别】 (1) 本品粉末黄绿色。非腺毛单细胞多弯曲，长 60～580 μm。花粉粒类球形，直径约 22 μm，表面可见网状雕纹，具细小散孔。草酸钙簇晶甚多，细小，直径约 4 μm；偶见小方晶。叶表皮细胞多角形；下表皮有多数不定式气孔，副卫细胞 4～8 个。纤维单个散在，细长，约至 3000 μm，直径 10～20 μm，两端渐尖，壁非木化或微木化。

(2) 取本品粉末 1 g，加 45%乙醇 10 ml，振摇提取，滤过，滤液置水浴上蒸干，加甲醇适量使溶解，滤过。取滤液 1 ml，加镁粉少量与盐酸 3～4 滴，显橘红色；另取滤液 1 ml，加醋酸铅试液 2 滴，发生黄色沉淀。

(3) 取鉴别(2)项下剩余的滤液 1 滴，点于洁净滤纸上，喷洒 1%三氯化铝的甲醇溶液，待干后，置紫外光灯下观察，显黄绿色荧光。

【性味】 辛、苦，寒；有小毒。

【功能与主治】 泻下逐水。用于水肿胀满，痰饮咳喘，急、慢性肝炎，精神分裂症，癫痫。

【用法与用量】 1.5～3 g。

【注意】 发热体弱、溃疡病患者及孕妇忌服。不宜与甘草同用。

【贮藏】 置通风干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

黄　　芩

Huangqin

RADIX SCUTELLARIAE

本品为唇形科植物黄芩 Scutellaria baicalensis Georgi 的干燥根。春、秋二季采挖，除去须根及泥沙，晒后撞去粗皮，晒干。

【性状】 本品呈圆锥形，扭曲，长 8～25 cm，直径 1～3 cm。表面棕黄色或深黄色，有稀疏的疣状细根痕，上部较粗糙，有扭曲的纵皱或不规则的网纹，下部有顺纹和细皱。质硬而脆，易折断，断面黄色，中间红棕色；老根中间呈暗棕色或棕黑色，枯朽状或已成空洞。气微，味苦。

以条长、质坚实、色黄者为佳。

【鉴别】 (1) 本品粉末黄色。韧皮纤维单个散在或数个成束，梭形，长 60～250 μm，直径 9～33 μm，壁厚，孔沟细。石细胞类圆形、类方形或长方形，壁较厚或甚厚。木栓细胞棕黄色，多角形。网纹导管多见，直径 24～72 μm。木纤维多碎断，直径约 12 μm，有稀疏斜纹孔。淀粉粒甚多，单粒类球形，直径 2～10 μm，脐点明显，复粒由 2～3 粒组成。

(2) 取本品粉末 2 g，置 100 ml 锥形瓶中，加乙醇 20 ml，置水浴上回流 15 分钟，滤过。取滤液 1 ml，加醋酸铅试液 2～3 滴，即发生橘黄色沉淀；另取滤液 1 ml，加镁粉少量与盐酸 3～4 滴，显红色。

【炮制】 **黄芩**　除去杂质，置沸水中煮 10 分钟，取出，闷透，切片，干燥；或蒸 1 小时，取出，切片，干燥(注意避免暴晒)。

酒黄芩　取黄芩片，照酒炒法(附录 18 页)用黄酒微炒。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清湿热，泻火，解毒，安胎。用于温病发热，肺热咳嗽，肺炎，咯血，黄疸，肝炎，痢疾，目赤，胎动不安，高血压症，痈肿疔疮。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

黄　芪

Huangqi

RADIX ASTRAGALI SEU HEDYSARI

本品为豆科植物膜荚黄芪 Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge. 蒙古黄芪 Astragalus membranaceus Bge. var. mongholicus (Bge.) Hsiao 或多序岩黄芪 Hedysarum polybotrys Hand.-Mazz. 的干燥根。前二者习称"黄芪"，后者习称"红芪"。春、秋二季采挖，除去须根及根头，晒干。

【性状】 **黄芪** 呈圆柱形，有的有分枝，上端较粗，长 30～90 cm，直径 1～3.5 cm。表面淡棕黄色或淡棕褐色，有不整齐的纵皱纹或纵沟。质硬而韧，不易折断，断面纤维性强，并显粉性，皮部黄白色，木部淡黄色有放射状纹理及裂隙，老根中心偶有枯朽状，黑褐色或呈空洞。气微，味微甜，嚼之微有豆腥味。

红芪 长 10～50 cm，直径 0.6～2 cm。表面灰红棕色，外皮易剥落，剥落处淡黄色。

均以条粗长、皱纹少、断面色黄白、粉性足、味甜者为佳。

【鉴别】 (1) 本品横切面：

黄芪 木栓层为多列细胞。栓内层为 3～5 列厚角细胞。韧皮部射线外侧常弯曲，有裂隙；纤维成束，壁厚，木化或微木化，与筛管群交互排列；近栓内层处有时可见石细胞。形成层成环。木质部导管单个散在或 2～3 个相聚；导管间有木纤维；射线中有时可见单个或 2～4 成群的石细胞。薄壁细胞含淀粉粒。

红芪 韧皮纤维束及木纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶；组织中无石细胞。

(2) 黄芪粉末黄白色。纤维成束或散离，直径 8～30 μm，壁厚，表面有纵裂纹，初生壁常与次生壁分离，两端常断裂成须状，或较平截。具缘纹孔导管无色或橙黄色，具缘纹孔排列紧密。石细胞少见，圆形、长圆形或形状不规则，壁较厚。

【炮制】 **黄芪** 除去杂质，洗净，润透，切厚片，晒干。

蜜黄芪 取黄芪片，照蜜炙法(附录 19 页)用蜜水炒至黄色、放凉后不粘手。

【性味】 甘，微温。

【功能与主治】 补气固表，利尿，托毒排脓，生肌。用于气短心悸，虚脱，自汗，体虚浮肿，慢性肾炎，久泻，脱肛，子宫脱垂，痈疽难溃，疮口久不愈合。

【用法与用量】 9～30 g。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【贮藏】 置通风干燥处，防潮、防蛀。

黄　　连

Huanglian

RHIZOMA COPTIDIS

本品为毛茛科植物黄连 Coptis chinensis Franch.、三角叶黄连 Coptis deltoidea C. Y. Cheng et Hsiao 或云连 Coptis teetoides C. Y. Cheng 的干燥根茎。以上三种分别习称"味连"、"雅连"、"云连"。秋季采挖，除去须根及泥沙，干燥，撞去残留须根。

【性状】 **味连**　多集聚成簇，常弯曲，形如鸡爪，单枝根茎长 3～6 cm，直径 0.3～0.8 cm。表面灰黄色或黄褐色，粗糙，有不规则结节状隆起、须根及须根残基，有的节间表面平滑如茎杆，习称"过桥"。上部多残留褐色鳞叶，顶端常留有残余的茎或叶柄。质硬，断面不整齐，皮部橙红色或暗棕色，木部鲜黄色或橙黄色，呈放射状排列，髓部有时中空。气微，味极苦。

雅连　多为单枝，略呈圆柱形，微弯曲，长 4～8 cm，直径 0.5～1 cm。"过桥"较长。顶端有少许残茎。

云连　弯曲呈钩状，多为单枝，较细小。

均以条粗壮、质坚实、断面红黄色者为佳。

【鉴别】 (1) 本品横切面：

味连　木栓层为数列细胞。皮层较宽，石细胞单个或成群散在。中柱鞘纤维成束，或伴有少数石细胞，均显黄色。维管束外韧型，环列。束间形成层不明显。木质部黄色，均木化，木纤维较发达。髓部均为薄壁细胞，无石细胞。

雅连　髓部有石细胞。

云连　皮层、中柱鞘及髓部均无石细胞。

(2) 取本品粗粉约 1 g，加乙醇 10 ml，置水浴中加热至沸腾，放冷，滤过。取滤液 5 滴，加稀盐酸 1 ml 与漂白粉少量，即显樱红色；另取滤液 5 滴，加 5% 五倍子酸的乙醇溶液 2～3 滴，置水浴上蒸干，趁热加硫酸数滴，即显深绿色。

【含量测定】 取本品粉末(通过三号筛)约 3 g(同时另取本品粉末在 100° 测定干燥失重)，精密称定，置回流提取器中，用乙醇 100～150 ml 回流浸出，至浸出液无色为止，将浸出液置水浴上蒸发至 3～4 ml，加水 80 ml 与滑石粉 2 g，继续置 60～70° 水浴

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

上加热，并时时振摇，15 分钟后，趁热滤过，滤器用热水洗涤 3 次，每次 10 ml，洗液并入滤液中，放冷，加 20%碘化钾溶液 5 ml，搅匀，放置片刻，滤过，弃去滤液，沉淀用 2% 碘化钾溶液洗涤，弃去洗液，用水 100 ml 将沉淀移入 250 ml 碘瓶中，置 60～70° 水浴上加热，并时时振摇，持续 5 分钟，加丙酮 50 ml，密塞后振摇 10 分钟，迅速加入 10%氢氧化钠溶液 3 ml，猛烈振摇 20 分钟，至有大量沉淀产生，溶液显著浑浊时，再置 50～60°水浴上加热，振摇 2 分钟，冷却后于冰箱中放置一夜，析出的丙酮小檗碱结晶，用恒重的垂熔玻璃坩埚滤过，滤液另器收集，沉淀用水洗涤 3 次，每次 5 ml，抽干，在 100°干燥 2 小时，精密称定，根据沉淀的重量与滤液的容量算出本品含小檗碱的总量，即得（每 1 g 的沉淀相当于 898.2 mg 的 $C_{20}H_{19}O_5N$，每 1 ml 的滤液相当于 0.1 mg 的 $C_{20}H_{19}O_5N$）。

本品含小檗碱($C_{20}H_{19}O_5N$)按干燥品计算不得少于 4.0%。

【炮制】 **黄连** 除去杂质，捣碎，或润透后切片，晾干。

酒黄连 取净黄连，照酒炒法(附录 18 页)加黄酒微炒。

每黄连 100 kg，用黄酒 12.5 kg。

姜黄连 取净黄连，照姜汁炙法(附录 19 页)用姜汁微炒。

每净黄连 100 kg，用生姜 12.5 kg。

黄黄连 取吴茱萸加适量水煎煮，煎液与净黄连拌匀，待液吸尽，用文火微炒，取出，晾干。

每净黄连 100 kg，用吴茱萸 10～15 kg。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 泻火，解毒，清热，燥湿。用于温病热盛心烦，吐血，衄血，湿热痞满呕恶，痢疾，肠炎，目赤肿痛，口舌生疮，中耳炎，痈疖疮疡，黄水疮。

【用法与用量】 3～9 g；外用适量。

【贮藏】 置通风干燥处。

黄　　栌

Huanglu

FOLIUM ET RAMULUS COTINI

本品为漆树科植物红叶 Cotinus coggygria Scop. var. cinerea Engl. 的干燥叶及嫩枝。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

夏季枝叶茂盛时采割，截段，干燥。

【性状】 本品嫩枝呈圆柱形，直径 1.5～4 mm；表面紫红色或灰绿色，具灰色短柔毛及淡褐色小皮孔；质硬而脆，易折断，断面边缘黄绿色，中间淡紫红色。叶互生，叶片多皱缩、破碎，完整者展平后呈近圆形，长 3～8 cm，宽 2.5～7 cm；灰绿色，两面均被灰白色短柔毛，下表面和沿叶脉处较密；叶柄长 1.5～7.5 cm。气微香，味涩、微苦。

以叶多、枝嫩、色灰绿者为佳。

【炮制】 除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，干燥。

【性味】 苦，微寒。

【功能与主治】 清利湿热。用于急性传染性肝炎。

【用法与用量】 一次 30 g，小儿减半。

【贮藏】 置干燥处。

黄　　柏

Huangbo

CORTEX PHELLODENDRI

本品为芸香科植物黄皮树 Phellodendron chinense Schneid. 或黄檗 Phellodendron amurense Rupr. 的干燥树皮。前者习称“川黄柏”，后者习称“关黄柏”。剥取树皮后，除去粗皮，晒干。

【性状】 **川黄柏** 呈板片状或浅槽状，长宽不一，厚 3～6 mm。外表面黄褐色或黄棕色，平坦或具纵沟纹，有的可见皮孔及残存的灰褐色粗皮。内表面暗黄色或淡棕色，具细密的纵棱纹。体轻，质硬，断面纤维性，呈裂片状分层，深黄色。气微，味甚苦，嚼之有粘性。

关黄柏 厚 2～4 mm。外表面黄绿色或淡棕黄色，较平坦，有不规则的纵裂纹，皮孔小而少见，偶有灰白色的粗皮残留。内表面黄色或黄棕色。体轻，质较硬，断面鲜黄色或黄绿色。

均以皮厚、断面色黄者为佳。

【鉴别】 (1) 本品粉末绿黄色或黄色。纤维鲜黄色，直径 16～38 μm，常成束，周围细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维；含晶细胞壁木化增厚。石细胞鲜黄色，类圆形或纺锤形，直径 35～128 μm，有的呈分枝状，枝端锐尖，壁厚，层纹明显。草酸钙方晶直径

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

约至 24 μm。

(2) 取本品粉末约 0.1 g，加乙醇 10 ml，振摇数分钟，滤过，滤液加硫酸 1 ml，沿管壁滴加氯试液 1 ml，在两液接界处显红色环。

(3) 取本品粉末约 1 g，加乙醚 10 ml，振摇后，分取浸出液，挥干后，残渣加冰醋酸使溶解，再加硫酸 1 滴，放置，溶液显紫棕色。

(4) 取本品横切片，置紫外光灯下观察，显亮黄色荧光。

【炮制】 **黄柏** 除去杂质，喷淋清水，润透，切丝，晒干。

盐黄柏 取黄柏丝，照盐水炙法(附录 19 页)用盐水微炒。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 泻火解毒，清湿热。用于尿路感染，前列腺炎，黄疸，痢疾，肠炎，湿热痿痹，白带，痔漏；外治疮疡，口疮，湿疹，黄水疮，烧、烫伤。

【用法与用量】 6～9 g；外用适量，研末敷患处。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮。

黄　　精

Huangjing

RHIZOMA POLYGONATI

本品为百合科植物滇黄精 Polygonatum kingianum Coll. et Hemsl.、黄精 Polygonatum sibiricum Red. 或多花黄精 Polygonatum cyrtonema Hua 的干燥根茎。按形状不同，习称“大黄精”、“鸡头黄精”、“姜形黄精”。春、秋二季采挖，除去须根，洗净，置沸水中略烫或蒸至透心，干燥。

【性状】 **大黄精** 呈肥厚肉质的结节块状，结节长可达 10 cm 以上，宽 3～6 cm，厚 2～3 cm。表面淡黄色至黄棕色，具环节，有皱纹及须根痕，每个结节有 1 圆盘状茎痕，习称“鸡眼”。质稍硬而韧，不易折断，断面淡黄色至黄棕色，半透明。微带焦糖气，味甜，嚼之有粘性。

鸡头黄精 结节略呈圆锥状，形似鸡头，常数个相连，呈分枝状，长 3～10 cm，直径 0.5～1.5 cm。茎痕较小。

姜形黄精 结节分枝短，较瘦，形似姜，长 2～18 cm，宽 2～4 cm，厚 1～2.5 cm。表面粗糙，有明显疣状突起的须根痕。茎痕大而突出。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

均以块大、肥润、色黄、断面透明者为佳。

【鉴别】 本品横切面：表皮细胞外壁较厚。基本组织中散有大的粘液细胞，内含草酸钙针晶束。维管束周木型及外韧型，散列。

【炮制】 **黄精** 除去杂质，洗净，略润，切片，晒干。

制黄精 (1) 取净黄精，照蒸法（附录 18 页）反复蒸至内外呈滋润黑色，取出，稍晾，切片或段，干燥。

(2) 取净黄精，照酒制法（附录 18 页）用黄酒炖透或蒸透，取出，稍晾，切片或段，干燥。

每黄精 100 kg，用黄酒 20 kg。

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 补脾润肺，益气养阴。用于体虚乏力，心悸气短，肺燥干咳，糖尿病。

【用法与用量】 9～12 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防霉、防蛀。

黄　　藤（大黄藤）

Huangteng

CAULIS FIBRAUREAE

本品为防己科植物黄藤 Fibraurea recisa Pierre. 的干燥藤茎。秋、冬二季采收，切段，晒干。

【性状】 本品呈长圆柱形，稍扭曲，直径 0.6～8 cm。表面灰褐色，粗糙，有纵棱。老茎外皮较易剥落。质硬，不易折断，断面黄色，具放射状纹理，中心多为空腔。无臭，味苦。

以条粗、断面色黄者为佳。

【鉴别】 (1) 本品横切面：木栓层为数十列细胞，有的壁木化增厚，似石细胞状，并含棕色物。老茎的皮层有石细胞群。维管束外韧型。韧皮部外侧有弧形纤维束，纤维壁木化。束内形成层明显。木质部导管大，直径可至 300 μm；木纤维壁厚。射线宽，有石细胞群。髓部多破碎，有纤维。草酸钙方晶以石细胞内及石细胞、纤维群周围的细胞中为多见。薄壁细胞含淀粉粒。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

(2) 取本品粗粉 2 g，加 45%乙醇 20 ml，浸泡 10～24 小时，取浸液 1 滴，置载玻片上，晾至略干，加 30% 硝酸 1 滴，立即置显微镜下观察，可见短棒状结晶聚集或散在，数分钟后开始逐渐消失。

(3) 取本品横切片，置紫外光灯下观察，显黄绿色荧光。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清热解毒。用于妇科炎症，外科感染，菌痢，肠炎，呼吸道及泌尿道感染，眼结膜炎。

【用法与用量】 30～60 g；外用适量。

【贮藏】 置通风干燥处，防霉。

黄 藤 素

Huangtengsu

FIBRAURETINUM

本品为防己科植物黄藤 Fibraurea recisa Pierre. 的茎中提取得到的生物碱。按干燥品以无水盐酸棕榈碱 ($C_{21}H_{21}O_4N \cdot HCl$) 计算，不得少于 95.0%。

【性状】 本品为黄色的针状结晶；无臭，味极苦。

本品在热水中易溶，在水中略溶，在乙醇或氯仿中微溶，在乙醚中几乎不溶。

熔点 本品的熔点（附录 28 页）为 198～201°，熔融时同时分解。

【鉴别】 (1) 取本品，加硫酸，显黄绿色，微热后，颜色仍不变。

(2) 取本品约 50 mg，加水 5 ml，缓缓加热溶解后，加氢氧化钠试液 2 滴，显橙红色，放冷，滤过，取滤液，加丙酮 4 滴，即发生浑浊，放置后，生成橙黄色沉淀。取上清液，加丙酮 1 滴，如仍发生浑浊，再加丙酮适量使沉淀完全，滤过，滤液显氯化物的鉴别反应(附录 44 页)。

【检查】 **干燥失重** 取本品，在 80°干燥至恒重，减失重量不得过 15.0%(附录 44 页)。

炽灼残渣 不得过 0.5%（附录 45 页）。

【含量测定】 取本品约 0.5 g，精密称定，置烧杯中，加热水 150 ml 与 $N/10$ 氢氧化钠液 15 ml，搅拌使溶解，放冷，移置 250 ml 量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，用干燥滤纸滤过，弃去初滤液，精密量取续滤液 100 ml，加 $N/10$ 盐酸液 10 ml，在不断

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

搅拌下立即缓缓加入三硝基苯酚试液 30 ml，静置过夜，用称定重量的垂熔坩埚滤过，沉淀用三硝基苯酚黄藤素的饱和水溶液洗涤，再用水 15 ml 分次洗涤，并在 100°干燥至恒重，精密称定，与 0.6682 相乘，即得供试量中含有 $C_{21}H_{21}O_4N \cdot HCl$ 的重量。

【功能与主治】 清热解毒。用于妇科炎症，菌痢，肠炎，呼吸道及泌尿道感染，外科感染，眼结膜炎。

【用法与用量】 口服，一次 0.2～0.4 g，一日 0.6～1.2 g。

【贮藏】 密闭保存。

【制剂】 (1) 黄藤素片 (2) 黄藤素注射液

黄 藤 素

Huangtengsu Pian

TABELLAE FIBRAURETINI

本品含黄藤素按盐酸棕榈碱 ($C_{21}H_{21}O_4N \cdot HCl \cdot 3H_2O$) 计算，应为标示量的 90.0～110.0%。

【性状】 本品为黄色片。

【鉴别】 (1) 取本品细粉适量 (约相当于黄藤素 0.2 g)，加水 20 ml，缓缓加热使黄藤素溶解，滤过，滤液蒸干后，照黄藤素项下的鉴别法 (522 页)试验，显相同的反应。

(2) 取本品 1 片，研碎，加 70%乙醇 5 ml，搅拌，滤过。取滤液 1 滴，点于载玻片上，加 30% 硝酸溶液 1 滴，置显微镜下观察，可见黄色细长的针状结晶。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(附录 6 页)。

【含量测定】 取本品 10 片(0.3 g)或 15 片(0.1 g)，精密称定，研细，精密称出适量 (约相当于黄藤素 0.5 g)，置烧杯中，照黄藤素项下的方法(522 页)，自"加热水 150 ml 与 *N*/10 氢氧化钠液 15 ml"起，依法测定，结果与 0.7612 相乘，即得供试量中含有 $C_{21}H_{21}O_4N \cdot HCl \cdot 3H_2O$ 的重量。

【功能与主治】【用法与用量】 同黄藤素。

【规格】 (1) 0.1 g (2) 0.3 g

【贮藏】 密闭保存。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

黄藤素注射液

Huangtengsu Zhusheye

INJECTIO FIBRAURETINI

本品为黄藤素的灭菌水溶液。含黄藤素按盐酸棕榈碱（$C_{21}H_{21}O_4N \cdot HCl \cdot 3H_2O$）计算，应为标示量的95.0～105.0%。

【性状】 本品为黄色的澄明液体。

【鉴别】 取本品10 ml，蒸干，用乙醇浸渍，滤过，滤液照黄藤素项下的鉴别法（522页）试验，显相同的反应。

【检查】 **pH值** 应为3.5～6.5（附录42页）。

其他 应符合注射剂项下有关的各项规定（附录7页）。

【含量测定】 精密量取本品20 ml（约相当于黄藤素0.2 g），置烧杯中，加水75 ml与$N/10$盐酸液5 ml，照黄藤素项下的方法（522页），自"在不断搅拌下立即缓缓加入三硝基苯酚试液30 ml"起，依法测定，结果与0.7612相乘，即得供试量中含有$C_{21}H_{21}O_4N \cdot HCl \cdot 3H_2O$的重量。

【功能与主治】 同黄藤素。

【用法与用量】 肌内注射，一次20 mg，一日40～80 mg。

【规格】 2 ml:20 mg

【贮藏】 遮光，密闭保存。

荠　　菁（苏败酱）

Ximing

HERBA THLASPIS

本品为十字花科植物荠菁Thlaspi arvense L.的干燥地上部分。夏季果实成熟时采割，晒干。

【性状】 本品茎呈圆柱形，长20～30 cm，直径0.2～0.5 cm；表面黄绿色或灰黄色，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

有细棱线；质脆，易折断，断面中部有髓。叶互生，多脱落。总状果序生于茎枝顶端，果实卵圆形而扁平，直径 0.5～1.3 cm；表面灰绿色或灰黄色，中心略隆起，边缘有翅，两面中间各有 1 条纵棱线；先端凹陷，基部有细果梗，长约 1 cm；果实内分 2 室，中间有纵隔膜，每室种子 5～7 粒。种子扁卵圆形，直径约 0.2 cm；表面棕黑色，两面均有同心性环纹。气微，味淡。

以色黄绿、果实完整者为佳。

【炮制】 除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，晒干。

【性味】 辛，微温。

【功能与主治】 清肝明目，和中，解毒。用于目赤肿痛，消化不良，脘腹胀痛，肝炎，阑尾炎，疮疖痈肿。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

菟　丝　子

Tusizi

SEMEN CUSCUTAE

本品为旋花科植物菟丝子 Cuscuta chinensis Lam. 的干燥成熟种子。秋季果实成熟时采收植株，晒干，打下种子，除去杂质。

【性状】 本品呈类球形，细小，直径 1～1.5 mm。表面灰棕色或黄棕色，具细密网状皱纹，一端有微凹的线形种脐。质坚实，不易以指甲压碎。气微，味淡。

以粒饱满者为佳。

【鉴别】 取本品少量，加沸水适量浸泡后，表面有粘性；加热煮至种皮破裂时，可露出黄白色卷旋状的胚，形如吐丝。

【炮制】 除去杂质，洗净，晒干。

【性味】 甘、辛，平。

【功能与主治】 补肝肾，明目，益精，安胎。用于目昏，耳鸣，腰膝酸软，遗精，尿频余沥，先兆流产，胎动不安。

【用法与用量】 6～12 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

菊　苣

Juju

HERBA CICHORII

本品系维吾尔族习用药材，维吾尔文名为 Kasinə（卡斯纳）；为菊科植物毛菊苣 Cichorium glandulosum Boiss. et Hout 及菊苣 Cichorium intybus L. 的地上部分。秋季采割，除去杂质，晒干。

【性状】 **毛菊苣**　全体被硬毛。茎呈圆柱形，稍弯曲，表面灰绿色或带紫色，具纵棱；断面黄白色，中空。叶多破碎，灰绿色，茎中部的完整叶片呈大头羽裂。头状花序5～13成短总状排列。总苞圆筒状，直径5～6 mm；苞片2层，外层稍短或近等长，有腺毛。舌状花蓝色。瘦果倒卵形，有棱，顶端截形，被鳞片状冠毛，长1～2 mm，黄褐色或棕褐色。气微，味咸、微苦。

菊苣　茎近光滑。茎生叶少或退化，长圆状披针形。头状花序少数，簇生；苞片2层，外短内长，无毛。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性味】 微苦、咸，凉。

【功能与主治】 清热解毒，利尿消肿，健胃。用于肝炎食少，肾炎水肿，胃脘疼痛。

【用法与用量】 9～18 g，多入露剂用。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

菊　花

Juhua

FLOS CHRYSANTHEMI

本品为菊科植物菊 Chrysanthemum morifolium Ramat. 的干燥头状花序。9～11月花盛开时分批采收，干燥。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 本品呈扁球形或不规则球形，直径 1.5～4 cm。总苞由 3～4 层苞片组成，苞片卵形或长椭圆形，中部棕黄色或黄绿色，被毛，边缘膜质。舌状花数轮，类白色或黄色，有的类白色微带紫色，花瓣紧密或松散，有的散离；管状花多数，淡黄色、黄色或深黄色。体轻，质柔润，有的松软。气清香，味甘、微苦。

以完整、色鲜艳、清香气浓者为佳。

【性味】 甘、苦，微寒。

【功能与主治】 散风清热，平肝明目。用于风热感冒，头痛，眩晕，目赤肿痛，高血压症。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，密闭保存，防霉、防蛀。

梧　桐　片

Wutong Pian

TABELLAE FIRMIANAE

本品为梧桐科植物梧桐 Firmiana simplex (L.) Wight 的干燥叶浸膏片。每片相当于梧桐叶 1.4 g。

【制法】 取梧桐叶 1400 g，加 10 倍量水，冷浸数小时后，煮沸 1 小时，滤过，滤渣再加水煎煮一次。合并滤液，浓缩至流浸膏状，放冷，缓缓搅拌加入乙醇至含乙醇量为 80%，微热，搅拌，静置，滤过，滤液浓缩至稠膏状，加淀粉适量，制成颗粒，压制成 1000 片，包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕黑色；味苦。

【鉴别】 (1) 取本品 1 片，除去糖衣，研细，加水 20 ml，置水浴上加热，趁热滤过，滤液加盐酸使成酸性，用少量醋酸乙酯提取二次，合并提取液，置水浴上蒸干，残渣加乙醇 10 ml使溶解，滤过。取滤液 1 ml，加镁粉少量与盐酸 4～5 滴，显棕红色。

(2) 取鉴别(1)项下剩余的滤液 1 ml，加 7%盐酸羟胺的甲醇溶液与 10% 氢氧化钾的甲醇溶液各 2～3 滴，置水浴上微热，放冷，加稀盐酸调节 pH 值至 3～4，再加 1%三氯化铁溶液 1～2 滴，显橙红色。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定（附录 6 页）。

【功能与主治】 降低血清胆固醇。用于高脂血症。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【用法与用量】 口服，一次 4 片，一日 3 次，饭后服。

【贮藏】 密封保存。

梅　　花

Meihua

FLOS MUME

本品为蔷薇科植物梅 Prunus mume (Sieb.) Sieb. et Zucc. 的干燥花蕾。初春花未开放时采摘，及时低温干燥。

【性状】 本品呈类球形，直径 3～6 mm，有短梗。苞片数层，鳞片状，棕褐色。花萼 5 片，灰绿色或棕红色。花瓣 5 片或多片，黄白色或淡粉红色。雄蕊多数，丝状，雌蕊 1 枚，子房密被细柔毛。体轻。气清香，味微苦、涩。

以完整、气清香者为佳。

【性味】 微酸、涩，平。

【功能与主治】 开郁，和中，生津，解毒。用于郁闷心烦，口干，咽部异物感，痈疖疮毒。

【用法与用量】 2.5～4.5 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防霉、防蛀。

檵　木　叶

Jimuye

FOLIUM LOROPETALI

本品为金缕梅科植物檵木 Loropetalum chinense (R. Br.) Oliv. 的干燥叶。夏、秋二季枝叶茂盛时采收，干燥。

【性状】 本品呈椭圆形或卵形，长 1.5～3 cm，宽 1～2.5 cm。先端锐尖，基部稍偏斜，全缘或有细锯齿。上表面灰绿色或浅棕褐色，下表面色较浅，两面疏生短茸毛。叶柄被棕色茸毛。气微，味涩、微苦。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

以色绿者为佳。

【鉴别】（1）本品横切面：上表皮细胞扁长方形，外被角质层；有单细胞非腺毛。下表皮细胞较小，外壁乳突状。上下表皮均有星状毛，壁木化。栅栏组织为1～2列，有的细胞较大，含草酸钙方晶；海绵组织亦有方晶。主脉有上下两个外韧维管束，一大一小，有时两端相联成环，韧皮部外方有木化纤维束；薄壁细胞有含草酸钙方晶。

（2）取本品粉末5 g，加水50 ml，置50～60°的水浴上加热约1小时，滤过。取滤液点于滤纸上，喷洒0.1%溴麝香草酚蓝的乙醇溶液，即在蓝色背景中显黄色斑点。

【性味】苦、涩，凉。

【功能与主治】清热解毒，收敛，止血。用于烧、烫伤，外伤出血，吐血，崩漏，腹泻。

【用法与用量】15～30 g；外用鲜品适量，捣烂敷患处。

【贮藏】置干燥处。

救必应

Jiubiying

CORTEX ILICIS ROTUNDAE

本品为冬青科植物铁冬青 Ilex rotunda Thunb. 的干燥树皮。夏、秋二季剥取，晒干。

【性状】本品呈卷筒状或略卷曲的长片状，长短不一，厚0.3～1 cm。外表面灰白色、灰黄色或淡褐色，粗糙，常有横皱纹；内表面棕褐色至黑褐色，有细纵皱纹。质硬而脆，断面平坦，稍呈颗粒性，黄白色或淡黄褐色。气微香，味苦、微涩。

以皮厚、苦味浓者为佳。

【鉴别】（1）本品横切面：木栓层为数列细胞，无色。皮层石细胞单个散在或成群，内侧石细胞群断续排列成环，有的含草酸钙方晶，石细胞群周围薄壁细胞常含草酸钙方晶。韧皮部射线宽3～10列细胞；有石细胞群；薄壁细胞含草酸钙方晶，最内侧细胞常含黄褐色物。薄壁细胞内含淀粉粒。

（2）取本品粉末约2 g，加乙醇10 ml，浸渍半小时，时时振摇，滤过。取滤液2 ml，加三氯化铁试液，显绿蓝色，或发生沉淀。

（3）取鉴别（2）项下的乙醇浸液5 ml，置水浴上蒸干，残渣加醋酐数滴，再加硫酸

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

1～2 滴，即显蓝紫色或红紫色。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，晒干。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清热凉血，消炎，止痛。用于暑湿感冒发热，咽喉肿痛，脘腹胀痛，腹泻，痢疾；外治烧、烫伤。

【用法与用量】 9～30 g；外用适量，煎浓汤涂敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

雪上一支蒿

Xueshang Yizhihao

RADIX ACONITI BRACHYPODI

本品为毛茛科植物雪上一支蒿 Aconitum brachypodum Diels 的干燥块根。秋末冬初采挖，除去须根及泥沙，晒干。

【性状】 本品呈长圆柱形或圆锥形，长 3～8 cm，直径 0.5～2 cm。表面黑褐色或黄褐色，有细纵皱纹及须根痕。质硬而脆，易折断，断面白色，粉性，有黑褐色环。气微，味苦、麻。

以质硬脆、断面色白、粉性足者为佳。

【鉴别】 (1) 本品粉末灰棕色。淀粉粒甚多，单粒类圆形、卵圆形或半圆形，直径 3～34 μm，脐点点状、人字状或裂缝状，大粒层纹隐约可见；复粒由 2～6 粒组成。网纹导管直径 17～48 μm。

(2) 取本品细粉约 2 g，置分液漏斗中，加氯仿 30 ml，摇匀后，加氨试液 1.5 ml，强烈振摇半小时，加水 1 ml，再强烈振摇 10 分钟，分离氯仿液，再加氯仿 10 ml 提取一次，合并氯仿液，滤入分液漏斗中，加 $N/20$ 盐酸液 4 ml，充分振摇，分离氯仿液，依法再用酸液提取一次，合并两次酸液，加氨试液调节 pH 值至 9～11，用氯仿液提取二次，每次 15 ml，合并氯仿液。分取氯仿液 10 ml，置瓷皿中，徐徐挥尽氯仿，残渣加磷酸 1～2 ml，小火加热，由红色变成紫色。

(3)取鉴别(2)项下剩余的氯仿液，置瓷皿中，徐徐挥尽氯仿，残渣加硫酸数滴，加热，显微红色，再加间苯二酚结晶数粒，继续加热，先呈黄色，渐变红色。

【含量测定】 取本品细粉约 5 g，精密称定，置干燥的 125 ml 分液漏斗中，加氯仿

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

50 ml，摇匀后，加氨试液 2.5 ml，振摇 10 分钟，放置 4 小时以上，加水 2 ml，强烈振摇 10 分钟，分取氯仿液，滤入 250 ml 锥形瓶中，残渣再用氯仿振摇提取至少八次，每次 15 ml，最后再用氯仿 30 ml 洗涤器皿，每次氯仿液滤入同一锥形瓶中，置不超过 60° 的水浴中蒸干后，再加氯仿 5 ml，徐徐蒸至近干，取出，使自然挥干，至无氯仿气，加中性醇 15 ml 与洁净的玻璃珠数粒，再精密加入 $N/50$ 盐酸液 30 ml，振摇使其溶解后，加甲基红指示液 4 滴，用 $N/50$ 氢氧化钠液滴定至溶液显浅粉红色，再用 $N/50$ 盐酸液回滴至显红色，即得(每 1 ml 的 $N/50$ 盐酸液相当于 8.752 mg 的 $C_{24}H_{39}O_6N$)。

本品含总生物碱以雪上一支蒿乙素（$C_{24}H_{39}O_6N$）计算，不得少于 0.80%。

【性味】 苦、辛，温；有大毒。

【功能与主治】 祛风，镇痛。用于风湿疼痛，跌扑损伤。

【用法与用量】 常用量，口服，一次 25～50 mg。极量，一次 70 mg。

【注意】 本品剧毒，应在医师指导下服用。孕妇、心脏病、溃疡病患者及小儿忌服。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

雪　　胆

Xuedan

RADIX HEMSLEYAE

本品为葫芦科植物雪胆 Hemsleya amabilis Diels 及其同属数种植物的干燥块根。秋末叶黄时采挖，除去泥沙，切片，干燥。

【性状】 本品为类圆形的厚片，稍卷曲，厚 4～8 mm。外皮棕褐色或灰褐色，有的有茎基，切面淡黄色或灰白色。质坚实。气微，味极苦。

以切面色淡黄、质坚实者为佳。

【鉴别】 取本品粉末 2 g，加乙醇 20 ml，置水浴上回流 1 小时，滤过，滤液置水浴上浓缩至约 5 ml，照薄层层析法(附录 38 页)试验，吸取上述浓缩液 10 μl，点于中性氧化铝薄层板上，以氯仿-乙醇（95:5）作展开剂，展开后，晾干，喷以 5% 磷钼酸的乙醇溶液使显色。在 120° 加热数分钟，同时用雪胆素对照品点样展开对照，本品所显主斑点的颜色与位置，应与对照品主斑点相同。

【性味】 苦，寒。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 清热解毒，抗菌消炎。用于菌痢，肠炎，支气管炎，急性扁桃体炎。

【用法与用量】 研粉口服， 一次 0.6～0.9 g， 一日 2～3 次。


【注意】 心脏病患者慎服。

【贮藏】 置干燥处，防潮。

雪 胆 素

Xuedansu

HEMSLEYADINUM



雪胆素甲 R＝$COCH_3$

雪胆素乙 R＝H

[$C_{32}H_{50}O_8$＝562.74
$C_{30}H_{48}O_7$＝520.71]

本品为葫芦科雪胆属植物中提取的雪胆素甲和雪胆素乙的混合物，以雪胆素甲为主。按干燥品以雪胆素甲($C_{32}H_{50}O_8$)计算，不得少于 95.0%。

【性状】 本品为白色的结晶性粉末；无臭，味苦；遇碱不稳定。

本品在乙醇、甲醇或氯仿中易溶，在丙酮或醋酸乙酯中溶解，在乙醚中微溶，在水、石油醚或环已烷中不溶。

熔点 本品的熔点(附录 28 页)为 222～227°。

比旋度 取本品，精密称定，加乙醇制成每 1 ml 中含 10 mg 的溶液，依法测定(附录 31 页)，按干燥品计算，比旋度为＋54°至＋60°。

吸收系数 取本品，加无水乙醇制成每 1 ml 中含 1 mg 的溶液，照分光光度法(附录 32 页)，在 286±1 nm 的波长处测定吸收度，吸收系数 ($E_{1cm}^{1\%}$) 为 2.0～2.4。

【鉴别】 (1) 取本品少量，加对二甲氨基苯甲醛硫酸溶液(取硫酸 10 ml，缓缓加入

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

无水乙醇 10 ml 中，摇匀，放冷，再加 10% 对二甲氨基苯甲醛的无水乙醇溶液 20 ml，充分混合，放冷）2 ml，置水浴上加热 1～3 分钟，显红色。

（2）取本品少量，加香草醛的磷酸乙醇溶液（取香草醛 0.2 g，加磷酸 1 ml 与乙醇 3 ml 使溶解）2 ml，置水浴中加热 2～5 分钟，显黄色。

【检查】 **还原性物质** 取本品 10 mg，加乙醇 1 ml 使溶解，加 5%α-萘酚的乙醇溶液 1～2 滴，振摇，沿管壁滴加硫酸，两液交界处不得显红色、紫红色。

【含量测定】 **对照品溶液的制备** 精密称取雪胆素甲对照品 10 mg，置 10 ml 量瓶中，加无水乙醇使溶解并稀释至刻度，摇匀，即得（每 1 ml 中含雪胆素甲 1 mg）。

标准曲线的制备 精密量取对照品溶液 0.5、1.0、1.5 与 2.0 ml，分别置 10 ml 量瓶中，各加对二甲氨基苯甲醛硫酸溶液 4 ml，再加无水乙醇至刻度，摇匀，置 65° 水浴中加热 30 分钟，取出，放置约 30 分钟，照比色法（附录32页），在 525 nm 的波长处测定吸收度，以吸收度为纵座标，浓度为横座标，绘制标准曲线。

测定法 取本品约 10 mg，精密称定，置 10 ml 量瓶中，加无水乙醇使溶解并稀释至刻度，摇匀。精密量取 1 ml，照标准曲线的制备项下的方法，自“加对二甲氨基苯甲醛硫酸溶液 4 ml”起测定吸收度，从标准曲线中读出供试液中雪胆素甲的含量，即得。

【功能与主治】 清热解毒，抗菌消炎。用于菌痢，肠炎，支气管炎，急性扁桃体炎。

【用法与用量】 口服，一次 2～10 mg，一日 6～30 mg。

【注意】 心脏病患者慎用。

【贮藏】 遮光，密闭保存。

【制剂】 雪胆素片

雪 胆 素 片

Xuedansu Pian

TABELLAE HEMSLEYADINI

本品含雪胆素以雪胆素甲（$C_{32}H_{50}O_8$）计算，应为标示量的 90.0～110.0%。

【性状】 本品为白色片。

【鉴别】 取本品细粉适量（约相当于雪胆素 20 mg），加乙醇 20 ml，微热使雪胆素溶

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

解，滤过，照雪胆素项下的鉴别法（532 页）试验，显相同的反应。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定（附录 6 页）。

【含量测定】 供试品溶液的制备与标准曲线的制备 均照雪胆素项下的方法（532 页）制备。

测定法 取本品 10 片(10 mg)、15 片(5 mg)或 30 片(2 mg)，精密称定，研细，精密称出适量（约相当于雪胆素 25 mg)，置 25 ml 具塞锥形瓶中，加氯仿 25 ml，摇匀，放置过夜，滤过，精密量取滤液 1 ml，置蒸发皿中，蒸干，残渣加无水乙醇使溶解，定量地移入 10 ml 量瓶中，照雪胆素项下的方法(532 页)，自“加对二甲氨基苯甲醛硫酸溶液 4 ml”起，依法测定，计算，即得。

【功能与主治】【用法与用量】【注意】 同雪胆素。

【规格】 (1) 2 mg (2) 5 mg (3) 10 mg

【贮藏】 遮光，密闭保存。

常　　山

Changshan

RADIX DICHROAE

本品为虎耳草科植物常山 Dichroa febrifuga Lour. 的干燥根。秋季采挖，除去须根，洗净，晒干。

【性状】 本品呈圆柱形，常弯曲扭转，或有分枝，长 9～15 cm，直径 0.5～2 cm。表面棕黄色，具细纵纹，外皮易剥落，剥落处露出淡黄色木部。质坚硬，不易折断，折断时有粉尘飞扬；横切面黄白色，有放射状纹理。无臭，味苦。

以质坚硬、断面色淡黄者为佳。

【鉴别】 (1) 本品横切面：木栓层为数列细胞。栓内层窄，有少数粘液细胞，内含草酸钙针晶束。韧皮部较窄，草酸钙针晶束较多。形成层显不规则波状环。木质部占主要部分，均木化，射线宽窄不一；导管多角形，单个散在或数个相聚，有的含黄色侵填体。薄壁细胞含淀粉粒。

(2) 取本品约 2 g，加乙醇 10 ml，置水浴上回流 15 分钟，放冷，滤过，滤液蒸干，残渣加稀盐酸 2 ml，搅拌，滤过。取滤液加碘化铋钾试液 2 滴，即发生棕红色沉淀。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【炮制】 常山 除去杂质，分开大小条，浸泡，润透，切片，晒干。

酒常山 取常山片，照酒炒法（附录 18 页）用黄酒微炒。

【性味】 苦，微寒；有小毒。

【功能与主治】 抗疟。用于疟疾。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【注意】 孕妇慎服。

【贮藏】 置通风干燥处。

野 马 追

Yemazhui

HERBA EUPATORII LINDLEYANI

本品为菊科植物轮叶泽兰 Eupatorium lindleyanum DC. 的干燥地上部分。秋季花初开时采割，晒干。

【性状】 本品茎呈圆柱形，长 30～90 cm，直径可达 0.5 cm；表面黄绿色或紫褐色，有纵棱，密被灰白色茸毛；质硬，易折断，断面纤维性，髓部白色。叶对生，无柄；叶片多皱缩，展平后叶片 3 全裂，似轮生，裂片条状披针形，中间裂片较长；先端钝圆，边缘具疏锯齿，上表面绿褐色，下表面黄绿色，两面被毛，有腺点。头状花序顶生。气微，叶味苦、涩。

以叶多、色绿、带初开的花者为佳。

【鉴别】 取本品粉末 10 g，加乙醇 50 ml，加热回流 1 小时，滤过，滤液蒸干，残渣加水 10 ml，煮沸，趁热滤过，冷却，待沉淀完全后，再滤过，滤液和滤渣照下述方法试验：

（1）取滤液，分置三支试管中，一管加硅钨酸试液，发生乳黄色沉淀；一管加碘化铋钾试液，发生红棕色沉淀；另一管加碘化汞钾试液，发生乳白色沉淀。

（2）取滤渣，加乙醇少量使溶解，再加镁粉少量与盐酸数滴，溶液显樱红色。

【炮制】 除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，晒干。

【性味】 苦，平。

【功能与主治】 化痰，止咳，平喘。用于慢性支气管炎，痰多咳喘。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【用法与用量】 30～60 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

【制剂】 野马追片

野 马 追 片

Yemazhui Pian

TABELLAE EUPATORII LINDLEYANI

本品为野马追浸膏片。每片含黄酮作为无水芦丁计算，不得少于 4 mg。

【制法】 取野马追 5000 g，粉碎成粗粉，用 80% 乙醇加热回流提取三次，每次 3 小时，合并提取液，滤过，滤液蒸去乙醇，趁热保温滤过，滤液浓缩成稠膏状，减压干燥，加适量辅料，制成颗粒，压制成 1000 片，包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；味苦、涩。

【鉴别】 (1) 取本品 1 片，除去糖衣，研细，加 5%盐酸溶液 5 ml，振摇片刻，滤过。滤液照野马追项下的鉴别法(1)项 (535 页)试验，显相同的反应。

(2) 取本品 1 片，除去糖衣，研细，加水 5 ml，煮沸，趁热滤过，滤液加等量的醋酸乙酯提取，提取液置水浴上蒸干，残渣加少量乙醇使溶解，再加镁粉少量与盐酸4～5滴，显樱红色。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定 (附录 6 页)。

【含量测定】 **对照品溶液的制备** 精密称取芦丁对照品适量(另取一份芦丁对照品，在 120°减压干燥至恒重，按减失重量折算为干燥品 50 mg)，置 50 ml 量瓶中，加 85% 乙醇适量，置水浴上加热溶解后，放冷，用 85% 乙醇稀释至刻度，摇匀，精密量取 10 ml，置 100 ml 量瓶中，用 30% 乙醇稀释至刻度，摇匀，即得 (每 1 ml 中含无水芦丁 0.1 mg)。

标准曲线的制备 精密量取对照品溶液 0.0、1.0、2.0、3.0、4.0 与 5.0 ml，分别置 10 ml 量瓶中，各加 30% 乙醇使成 5 ml，加 *M*/1 三氯化铝液 0.3 ml，摇匀，放置 6 分钟，再加 2 *M* 醋酸钠液 2.5 ml，各用 30% 乙醇稀释至刻度，摇匀，放置 40 分钟，照比色法(附录 32 页)，在 460 nm 的波长处测定吸收度，以吸收度为纵座标，浓度为横座标，绘制标准曲线。

测定法 取本品 10 片，注意研碎，置锥形瓶中，加水约 30 ml，煮沸，稍冷，用醋

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

酸乙酯 40、30 与 20 ml，在锥形瓶中分次提取，滤过，合并提取液，分出水层，再用醋酸乙酯 20 ml 洗涤，洗液并入提取液中，蒸干，残渣加 85% 乙醇使溶解，滤入 50 ml 量瓶中，用 85% 乙醇洗涤滤器，并稀释至刻度，摇匀。精密量取 10 ml，置 100 ml 量瓶中，加 30%乙醇稀释至刻度，摇匀(必要时滤过)，再精密量取稀释液 4 ml，置 10 ml 量瓶中，照标准曲线的制备项下的方法，自"加 30% 乙醇使成 5 ml"起，依法测定吸收度，从标准曲线中读出供试品溶液中含黄酮的量，计算，即得。

【功能与主治】 同野马追。

【用法与用量】 口服，一次 3～4 片，一日 3 次，小儿酌减。

【贮藏】 密封保存。

野　木　瓜

Yemugua

CAULIS ET FOLIUM STAUNTONIAE

本品为木通科植物野木瓜 Stauntonia chinensis DC. 的干燥茎及叶。全年均可采割，洗净，切段，干燥。

【性状】 本品茎呈圆柱形，长 3～5 cm，直径 0.2～3 cm。粗茎表面灰黄色或灰棕色，有粗纵纹，外皮常块状脱落；细茎表面深棕色，具光泽，纵纹明显，可见小枝痕或叶痕。切面皮部狭窄，深棕色，木部宽广，浅棕黄色，有密集的放射状纹理及成行小孔，髓部明显。质硬或稍韧。掌状复叶互生，小叶片长椭圆形，革质，长 5～10 cm，宽 2～4 cm，先端尖，基部近圆形，全缘，上表面深棕绿色，有光泽，下表面浅棕绿色，网脉明显；小叶柄长约 1.5 cm。气微，味微苦涩。

【鉴别】 本品茎的横切面：木栓层为 10 余列细胞，间或夹有石细胞。皮层散布石细胞群，近木栓层处几连接成环层，石细胞类方形，壁甚厚。中柱鞘纤维排列成新月形，与石细胞群连接成环；薄壁细胞含草酸钙方晶。射线细胞壁木化，纹孔明显；近形成层处射线有石细胞群。木质部均木化，导管直径 60～180 μm，与木薄壁细胞、木纤维间隔排列。髓部细胞类圆形，壁木化，纹孔明显。薄壁细胞含淀粉粒。

【性味】 微苦，平。

【功能与主治】 祛风止痛，舒筋活络。用于三叉神经痛，坐骨神经痛，神经性头痛，风湿关节痛。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置干燥处。

【制剂】 (1) 野木瓜片 (2) 野木瓜注射液

野 木 瓜 片

Yemugua Pian

TABELLAE STAUNTONIAE

本品为野木瓜浸膏片。每片含干浸膏 0.4 g。

【制法】 取野木瓜，加水煎煮二次，每次 2 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩成稠膏状，干燥成干浸膏，加适量辅料，制成颗粒，压片，包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显深棕褐色；味苦。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(附录 6 页)。

【功能与主治】 同野木瓜。

【用法与用量】 口服，一次 4 片，一日 3 次。

【贮藏】 密封保存。

野木瓜注射液

Yemugua Zhusheye

INJECTIO STAUNTONIAE

本品为野木瓜经提取制成的灭菌水溶液。

【处方】

野木瓜	2500 g
吐温 80	10 g
苯甲醇	10 ml
注射用水	加至 1000 ml

【制法】 取野木瓜，加水煎煮三次，每次 2 小时，合并煎液，滤过，减压浓缩至约 1000 ml，加乙醇 5000 ml，搅匀，冷藏放置沉淀，滤过，滤液减压浓缩后，加水至 500ml，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

用 6 *N* 盐酸液调节 pH 值至 2.0 左右，冷藏放置沉淀，滤过，用 20% 氢氧化钠溶液调节至中性，减压浓缩成稠膏状。加 8～10 倍量乙醇，搅匀，冷藏放置沉淀，滤过，滤液减压蒸去乙醇，加注射用水 500 ml，用 8% 氢氧化钠溶液调节 pH 值至 7.0～7.5，加吐温 80 与苯甲醇，并加注射用水使成 1000 ml，滤过，灌封，灭菌，即得。

【性状】 本品为棕色的澄明液体。

【检查】 **pH 值** 应为 5.5～7.0(附录 42 页)。

溶血试验 取本品 0.3 ml，加生理盐水 2.2 ml 与 2% 兔红细胞生理盐水混悬液 2.5 ml，摇匀，置 36.5°±0.5°恒温水浴内，观察半小时，不得有溶血现象。

其他 应符合注射剂项下有关的各项规定(附录 7 页)。

【功能与主治】 祛风止痛，舒筋活络。用于三叉神经痛，坐骨神经痛。

【用法与用量】 肌内注射，一次 2～4 ml，一日 2 次。

【规格】 2 ml

【贮藏】 遮光，密闭保存。

野　菊　花

Yejuhua

FLOS CHRYSANTHEMI INDICI

本品为菊科植物野菊 Chrysanthemum indicum L. 的干燥头状花序。秋、冬二季花初开放时采摘，晒干，或蒸后晒干。

【性状】 本品呈类球形，直径 0.3～1 cm，棕黄色。总苞由 4～5 层苞片组成，外层苞片卵形或条形，外表面中部灰绿色或淡棕色，通常被有白毛，边缘膜质；内层苞片长椭圆形，膜质，外表面无毛。总苞基部有的残留花梗。舌状花 1 轮，黄色，皱缩卷曲；管状花多数，深黄色。体轻。气芳香，味苦。

以完整、色黄、香气浓者为佳。

【鉴别】 取本品粉末 3 g，加乙醇 40 ml，置水浴上回流 1 小时，滤过，滤液照下述方法试验：

(1) 取滤液 1 滴，点于滤纸上，喷洒 2% 三氯化铝的乙醇溶液，干后，置紫外光灯下观察，显黄绿色荧光。

(2) 取滤液 2 ml，加镁粉少量与盐酸 4～5 滴，加热，显棕红色。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性味】 苦，微寒。

【功能与主治】 清热解毒，平肝。用于痈疖疔疮，目赤肿痛，头痛眩晕。

【用法与用量】 9～15 g；外用适量，煎汤洗或制成浸膏涂敷患处。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防潮、防蛀。

蛇　床　子

Shechuangzi

FRUCTUS CNIDII

本品为伞形科植物蛇床 Cnidium monnieri (L.) Cuss. 的干燥成熟果实。夏、秋二季果实成熟时采收，除去杂质，晒干。

【性状】 本品为双悬果，呈椭圆形，长 2～4 mm，直径约 2 mm。表面灰黄色或灰褐色，顶端有小突起，基部偶有细梗。悬果瓣的背面有薄而突起的纵棱 5 条，接合面平坦，可见 2 条棕色略突起的纵棱线。果皮松脆，种子细小，灰棕色，显油性。气香，味辛凉，有麻舌感。

以粒饱满、色灰黄、香气浓者为佳。

【鉴别】 (1) 本品悬果瓣横切面：外果皮为 1 列扁平细胞，外被角质层。中果皮较厚，纵棱异常突出，中部有维管束，其周围有厚壁木化网纹细胞；背面纵棱间各有椭圆形油管 1 个，接合面有油管 2 个，共有 6 个。内果皮为 1 列扁平细胞，壁呈连珠状。种皮为 1 列淡棕色细胞。胚乳细胞含多数糊粉粒，每个糊粉粒中含有细小草酸钙簇晶。

(2) 取本品粉末 2 g，加乙醇 20 ml，置水浴上回流提取 30 分钟，滤过。取滤液数滴，点于白瓷板上，置紫外光灯下观察，显蓝紫色荧光；另取滤液 2 ml，加等量的 3% 碳酸钠溶液，置水浴中加热 5 分钟，放冷，再加新制的重氮对硝基苯胺试液 1～2 滴，即显樱红色。

【性味】 辛、苦，温；有小毒。

【功能与主治】 燥湿，杀虫，止痒，壮阳。用于阴痒白带，阴道滴虫，湿疹，皮肤瘙痒，阳痿。

【用法与用量】 3～9 g；外用适量，研末涂敷或煎汤洗患处。

【贮藏】 置干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蛇　　蜕

Shetui

PERIOSTRACUM SERPENTIS

本品为游蛇科动物黑眉锦蛇 Elaphe taeniura Cope、锦蛇 Elaphe carinata (Guenther) 或乌梢蛇 Zaocys dhumnades (Gantor) 等蜕下的干燥表皮膜。春末夏初或冬初采集，除去泥沙，干燥。

【性状】 本品呈圆筒形，多压扁而皱缩，完整者形似蛇，长可达 1 M 以上。背部银灰色或淡灰棕色，有光泽，具菱形或椭圆形鳞迹，鳞迹衔接处呈白色，略抽皱或凹下；腹部乳白色或略显黄色，鳞迹长方形，呈覆瓦状排列。体轻，质微韧，手捏有润滑感和弹性，轻轻搓揉，沙沙作响。气微腥，味淡或微咸。

以皮膜完整、具光泽者为佳。

【炮制】 **蛇蜕**　除去杂质，切段。

酒蛇蜕　取蛇蜕段，照酒炒法（附录 18 页）用黄酒炒至微干。

【性味】 咸、甘，平。

【功能与主治】 祛风，止痒，退翳，定惊。用于小儿惊风，抽搐痉挛，角膜云翳，皮肤瘙痒。

【用法与用量】 1.5～3 g；研末吞服 0.3～0.6g。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

啤 酒 花 浸 膏

Pijuhua Jingao

EXTRACTUM LUPULI

本品为桑科植物忽布 Humulus lupulus L. 的未经授粉的雌花（习称“啤酒花”）提取的浸膏。含啤酒花软树脂不得少于 45.0%。

【制法】 取啤酒花粗粉，加乙醇浸泡三次，每次 48 小时，合并浸出液，在 60°左右

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

减压浓缩成稠膏，即得。

【性状】 本品为褐绿色的稠膏。

【含量测定】 取本品约 0.5 g，精密称定，置 250 ml 分液漏斗中，加中性乙醇 50 ml 使溶解，加 2% 氯化钠溶液 100 ml，摇匀，用石油醚分次振摇提取，每次 20 ml，至石油醚提取液无色，合并石油醚液，加中性乙醇 10 ml，再加酚酞指示液 0.5 ml，用 $N/20$ 乙醇制氢氧化钠液(50% 乙醇)滴定，滴定时剧烈振摇至显橘红色，即得(每 1 ml 的 $N/20$ 乙醇制氢氧化钠液相当于 20 mg 的啤酒花软树脂)。

【功能与主治】 抗菌，消炎。用于肺结核病，结核性胸膜炎，麻风。

【贮藏】 密封保存。

【制剂】 (1) 三合素软膏 (2) 三合素胶丸

三合素软膏

Sanhesu Ruangao

UNGUENTUM OLEORESINAE LUPULI

本品含啤酒花软树脂不得少于 8.0%。

【处方】

啤酒花浸膏	200 g
无水羊毛脂	100 g
凡士林	700 g
全量	1000 g

【制法】 取啤酒花浸膏，置乳钵中，加入已灭菌后放冷至 60° 左右的凡士林与无水羊毛脂，研匀，即得。

【性状】 本品为黑绿色的软膏；具特异的清香气。

【检查】 应符合软膏剂项下有关的各项规定（附录 12 页）。

【含量测定】 取本品约 1 g，精密称定，置烧杯中，加中性乙醇反复提取，至提取液无色为止，合并醇液，置分液漏斗中，照啤酒花浸膏项下的方法（541 页），自“加 2% 氯化钠溶液 100 ml”起，依法测定，即得。

【功能与主治】 拔毒，消炎，抗菌，加速伤口愈合。用于淋巴结结核破溃，卡介苗强烈淋巴结反应破溃，麻风溃疡，皮肤溃疡，痈疖。

【用法与用量】 外敷患处，每日或隔日 1 次。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【贮藏】 遮光，密闭保存。

三合素胶丸

Sanhesu Jiaowan

CAPSULAE OLEORESINAE LUPULI

本品为啤酒花浸膏用花生油稀释制成的胶丸。含啤酒花软树脂应为标示量的90.0～110.0%。

【性状】 本品为球形胶丸，剥开后内含褐绿色油质液体；有特异香气。

【检查】 **装量差异** 取本品100丸，任意取出20丸，精密称定，注意切开丸壳，取出内容物，丸壳用乙醚洗涤3～4次，置通风处，使乙醚挥散，再精密称定，算出每丸内容物的平均重量。再自剩余的80丸中，选取本品最大与最小胶丸各10丸，分别按前法测出大丸与小丸内容物的平均重量，大丸与小丸内容物的平均重量不得超过前述20丸内容物平均重量的±15%。

其他 应符合胶囊剂项下有关的各项规定(附录12页)。

【含量测定】 取本品10丸，加中性乙醇40 ml使内含物溶解，置250 ml分液漏斗中。照啤酒花浸膏项下的方法(541页)，自"加2%氯化钠溶液100 ml"起，依法测定，即得。

【功能与主治】 同啤酒花浸膏。

【用法与用量】 口服，每丸含软树脂18 mg，一次服25～30丸；每丸含软树脂36 mg，一次服12～15丸，一日3次；饭后服，或遵医嘱。

【规格】 (1) 每丸含软树脂18 mg (2) 每丸含软树脂36 mg

【贮藏】 遮光，置阴凉干燥处密封保存。

银杏叶

Yinxingye

FOLIUM GINKGO

本品为银杏科植物银杏 Ginkgo biloba L. 的干燥叶。秋季叶尚绿时采收，及时干

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

燥。

【性状】 本品多皱折或破碎，完整者呈扇形，长3～5 cm，宽5～8 cm。黄绿色或淡棕黄色，上缘呈不规则的波状弯曲，有的中间凹入，可达2 cm。具二叉状平行叶脉，叶基楔形，叶柄长2～6 cm。体轻。气微，味微涩。

以色黄绿者为佳。

【鉴别】 (1) 取本品碎片10 g，加水100 ml，煮沸15分钟，趁热滤过。取滤液2 ml，加镁粉少量与盐酸3～4滴，置水浴上加热数分钟，显棕红色。

(2) 取鉴别(1)项下剩余的滤液适量，点于滤纸上，喷洒2%三氯化铝的乙醇溶液，干燥后，置紫外光灯下观察，显黄绿色荧光。

【性味】 甘、苦、涩，平。

【功能与主治】 敛肺，平喘，止痛。用于肺虚咳喘，冠心病，心绞痛。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

银 柴 胡

Yinchaihu

RADIX STELLARIAE

本品为石竹科植物银柴胡Stellaria dichotoma L. var. lanceolata Bge. 的干燥根。春、夏间植株萌发或秋后茎叶枯萎时采挖，除去须根及泥沙，晒干。

【性状】 本品呈类圆柱形，偶有分枝，长15～40 cm，直径1～2.5 cm。顶端有密集的疣状突起的茎痕，习称"珍珠盘"，表面淡黄色或黄白色，有扭曲的纵皱纹及支根痕，具孔状凹陷，习称"沙眼"，从沙眼处折断有粉沙散出，并可见棕色裂隙。质硬而脆，易折断，断面有裂隙，皮部甚薄，木部有黄、白相间的放射状纹理。气微，味甘。

以条长、外皮色淡黄、断面色黄白者为佳。

【鉴别】 (1) 本品横切面：木栓层为数列至10余列细胞。皮层较窄。韧皮部筛管群明显。形成层成环。木质部发达，射线宽至10余列细胞。薄壁细胞含草酸钙砂晶，以射线细胞中为多见。

(2) 取本品粉末约1 g，加无水乙醇10 ml，浸渍15分钟，滤过。取滤液2 ml，置紫外光灯下观察，显亮蓝微紫色的荧光。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。

【性味】 甘，微寒。

【功能与主治】 清虚热。用于阴虚发热，疳积发热。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

甜　瓜　子

Tianguazi

SEMEN MELO

本品为葫芦科植物甜瓜 Cucumis melo L. 的干燥成熟种子。夏、秋二季果实成熟时收集，洗净，晒干。

【性状】 本品呈扁平长卵形，长 5～7 mm，宽 2～4 mm。表面黄白色或浅棕红色，平滑，微有光泽。一端稍尖，另端钝圆。种皮较硬而脆，内有膜质胚乳及子叶 2 片。无臭，味淡。

以粒饱满、色黄白者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，晒干，用时捣碎。

【性味】 甘，寒。

【功能与主治】 清热，排脓。用于肺热咳嗽，肺脓疡，阑尾炎。

【用法与用量】 9～30 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防霉、防蛀。

甜　瓜　蒂

Tianguadi

PEDICELLUS MELO

本品为葫芦科植物甜瓜 Cucumis melo L. 的干燥果柄。夏、秋二季果实成熟时采收，除去杂质，阴干。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 本品呈圆柱形，多扭曲，长 3～5 cm，直径 0.2～0.4 cm。表面黄褐色或黄绿色，具纵棱，微皱缩，一端渐膨大，边缘反卷。质硬而韧，不易折断，断面纤维性。无臭，味苦。

以色黄褐、味苦者为佳。

【性味】 苦，寒；有毒。

【功能与主治】 催吐。用于食物中毒，痰涎不化，癫痫。

【用法与用量】 0.6～1.5 g，研末吞服。

【注意】 体弱、心脏病患者忌服。

【贮藏】 置通风干燥处。

甜　地　丁

Tiandiding

HERBA GUELDENSTAEDTIAE

本品为豆科植物米口袋 Gueldenstaedtia verna (Georgi) A. Bor. 的干燥全草。春、夏二季采挖，除去杂质，晒干。

【性状】 本品根茎簇生或单一，圆柱形，长 1～3 cm，直径 0.2～0.7 cm。根呈长圆锥形，有的略扭曲，长 9～18 cm，直径 0.3～0.8 cm；表面红棕色或灰黄色，有纵皱纹、横向皮孔及细长的侧根；质硬，断面黄白色，边缘绵毛状。茎短而细，灰绿色，有茸毛。单数羽状复叶，丛生，具托叶，叶多皱缩、破碎，完整小叶片展平后呈椭圆形或长椭圆形，长 0.5～2 cm，宽 0.2～1 cm，灰绿色，有茸毛。蝶形花冠紫色。荚果圆柱形，长 1.5～2.5 cm，棕色，有茸毛；种子黑色，细小。气微，味淡、微甜，嚼之有豆腥味。

以根粗长、叶色灰绿者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，稍润，切段，晒干。

【性味】 甘、苦，寒。

【功能与主治】 清解热毒。用于痈肿疔疮，外耳道疖肿，阑尾炎。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

猪　牙　皂

Zhuyazao

FRUCTUS GLEDITSIAE ABNORMALIS

本品为豆科植物皂荚 Gleditsia sinensis Lam. 的干燥不育果实。秋季采收，除去杂质，干燥。

【性状】 本品呈圆柱形，略扁而弯曲，长 5～11 cm，宽 0.7～1.5 cm。表面紫棕色或紫褐色，被灰白色蜡质粉霜，擦去后有光泽，并有细小的疣状突起及线状或网状的裂纹。顶端有鸟喙状花柱残基，基部具果梗残痕。质硬而脆，易折断，断面棕黄色，中间疏松，有淡绿色或淡棕黄色的丝状物，偶有发育不全的种子。气微，有刺激性，味先甜而后辣。

以个小、饱满、色紫褐、有光泽者为佳。

【鉴别】 (1) 本品粉末棕黄色。石细胞众多，类圆形、长圆形或形状不规则，直径 15～53 μm。纤维大多成束，直径 10～25 μm，壁微木化，周围细胞含草酸钙方晶及少数簇晶，形成晶纤维；纤维束旁常伴有类方形厚壁细胞。草酸钙方晶直径 6～15 μm；簇晶直径 6～14 μm。木化薄壁细胞甚多，纹孔及孔沟明显。果皮表皮细胞红棕色，表面观类多角形，壁较厚，表面可见颗粒状角质纹理。

(2) 取本品粉末约 1 g，加乙醇 8 ml，煮沸 2～3 分钟，放冷，滤过。取滤液 0.5 ml，置小瓷皿中，蒸干，放冷，加醋酐 3 滴，搅匀，沿皿壁加硫酸 2 滴，渐呈红紫色。

(3) 取本品粉末约 1 g，加水 10 ml，煮沸 10 分钟，滤过，滤液强烈振摇，即产生持久的泡沫(持续 15 分钟以上)。

【炮制】 除去杂质，洗净，晒干，用时捣碎。

【性味】 辛，温；有小毒。

【功能与主治】 开窍，祛痰，解毒。用于突然昏厥，中风牙关紧闭，喘咳痰壅，癫痫；外治痈疮肿毒。

【用法与用量】 1～1.5 g，多入丸散服；外用适量，研末吹鼻取嚏，或研末调敷，或熬膏贴患处。

【注意】 孕妇及咯血、吐血患者忌服。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

猪　　苓

Zhuling

POLYPORUS UMBELLATUS

本品为多孔菌科真菌猪苓 Polyporus umbellatus (Pers.) Fries 的干燥菌核。春、秋二季采挖，除去泥沙，干燥。

【性状】 本品呈条形、类圆形或扁块状，长 5～25 cm，直径 2～6 cm。表面黑色、灰黑色或棕黑色，皱缩或有瘤状突起。体轻，质硬，断面类白色或黄白色，略呈颗粒状。气微，味淡。

以个大、外皮色黑、断面色白、体较重者为佳。

【鉴别】 (1) 本品切面：全体为菌丝紧密交织而成，外层厚 27～54 μm，菌丝棕色，不易分离，内部菌丝无色透明，菌丝弯曲，有分枝及结节状膨大部分，直径 2～10 μm，草酸钙单晶及复晶散在。

(2) 取本品粉末 1 g，加稀盐酸 10 ml，置水浴上煮沸 15 分钟，搅拌，呈粘胶状。另取本品粉末少量，加氢氧化钠溶液(1→5)适量，搅拌，呈悬浮状。

【炮制】 除去杂质，浸泡，洗净，润透，切片，干燥。

【性味】 甘、淡，平。

【功能与主治】 渗湿，利尿。用于小便不利，水肿，泄泻，尿路感染，白带。

【用法与用量】 6～12 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

猪　殃　殃

Zhuyangyang

HERBA GALII APARINIS

本品为茜草科植物猪殃殃 Galium aparine L. 的干燥全草。夏季花果期采收，除去泥沙，晒干。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 本品根细小。茎呈方柱形，多分枝，直径约 1 mm；表面灰绿色或绿褐色，四棱上有倒生小刺；质脆，易折断，断面中空。叶 6～8 片，轮生，无柄；叶片多卷缩、破碎，完整者展平后呈披针形或条状倒披针形，长 1～2 cm，宽 0.2～0.4 cm，边缘及下表面中脉有倒生小刺。聚伞花序腋生或顶生，花小，易脱落。果小，常呈二半球形，绿褐色，密生白色钩毛。气微，味淡。

以色绿、有花果者为佳。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性味】 辛，微寒。

【功能与主治】 清解热毒，利尿消肿。用于水肿，尿路感染，痢疾，跌扑损伤，痈肿疔疮，虫蛇咬伤。

【用法与用量】 15～30 g，鲜品 30～90 g；外用鲜品适量，捣烂敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

猪 鬃 草

Zhuzongcao

HERBA ADIANTI

本品为铁线蕨科植物铁线蕨 Adiantum capillus-veneris L. 的干燥全草。秋季采挖，晒干。

【性状】 本品长 15～40 cm。根茎横生，密被棕色披针形鳞片及较疏纤细须根。叶近生，一至三回羽状复叶，叶柄长 9～15 cm，棕黑色，稍有光泽；羽片及小羽片均为互生，微皱缩，展平后呈斜扇形或斜方形，长 1～2 cm，宽近于长，灰绿色或棕黄色，先端 3～5 浅裂，裂片边缘有细齿，基部宽楔形，叶脉细；羽片及小羽片均有细柄。孢子囊群矩圆形，着生小羽片上部边缘。气微，味淡。

以柄黑、叶多而色绿者为佳。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性味】 微苦，凉。

【功能与主治】 清热，消炎，利尿。用于感冒发热，肺热咳嗽，咯血，乳腺炎，急性肾炎，膀胱炎；外治疔疮。

【用法与用量】 9～30 g，水煎服或炖肉服；外用鲜品适量，捣烂敷患处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【贮藏】 置干燥处。

猫 爪 草

Maozhaocao

RADIX RANUNCULI TERNATI

本品为毛茛科植物小毛茛 Ranunculus ternatus Thunb. 的干燥块根。春、秋二季采挖，除去须根及泥沙，晒干。

【性状】 本品呈纺锤形，常 5～6 个簇生，形似猫爪，长 3～7 mm，直径 2～3 mm。顶端有黄棕色圆形茎基，表面黄褐色或灰黄色，久存色变深，微有纵皱纹，有的具残留须根。质坚实，断面类白色，粉性。无臭，味甘。

以色黄褐、质坚实者为佳。

【鉴别】 本品横切面：表皮细胞切向延长，棕色，有分化为表皮毛，微木化。皮层约为 20 余列细胞，壁稍厚，有纹孔；内皮层明显。中柱甚小，中柱鞘为 1～2 列薄壁细胞；木质部韧皮部各 2 束，间隔排列。薄壁细胞充满淀粉粒。

【性味】 甘、辛，温。

【功能与主治】 散结，消肿。用于淋巴结结核未溃。

【用法与用量】 120 g，加水煎沸后，微火再煎半小时，滤过，药汁加黄酒 50～100 ml，睡前温服；次日，将药渣照上法再煎一次，不加黄酒，空腹服下。每日一剂，连服 4 日为一疗程，间隔 3～5 天再续服。老年及小儿用量酌减。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

猫 眼 草

Maoyancao

HERBA EUPHORBIAE LUNULATAE

本品为大戟科植物猫眼草 Euphorbia lunulata Bge. 的干燥地上部分。夏季采割，除去杂质，晒干。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 本品茎呈圆柱形，长 20～40 cm，表面黄绿色，基部多呈紫红色，有纵纹；体轻，质脆，易折断。叶互生，无柄；叶片多皱缩破碎，易脱落，完整者展平后呈狭条形，长 2.5～5 cm，宽 0.2～0.3 cm，茎上部的分枝处有数叶轮生。多歧聚伞花序，花序顶生及生于上部叶腋，基部的叶状苞片呈扇状半月形至三角状肾形。蒴果三棱状卵圆形，光滑。气特异，味淡。

以色黄绿、花多者为佳。

【鉴别】 取本品粗粉约 3 g，加乙醇 20 ml，置水浴上回流 15 分钟，滤过，滤液照下述方法试验：

(1) 取滤液 2 ml，加镁粉少量与盐酸 4～5 滴，微热，显樱红色。

(2) 取滤液 1 ml，加三氯化铁试液 1 滴，即显墨绿色。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性味】 苦，微寒；有毒。

【功能与主治】 祛痰，散结消肿。用于慢性支气管炎咳嗽、痰多；外治淋巴结结核。

【用法与用量】 供制剂用；外用煎熬成膏，取适量敷患处。

【注意】 本品有毒，内服宜慎。

【贮藏】 置通风干燥处。

猕猴桃根

Mihoutaogen

RADIX ACTINIDIAE CHINENSIS

本品为猕猴桃科植物猕猴桃 Actinidia chinensis Planch. 的干燥根。全年均可采挖，洗净，砍成块片，晒干。

【性状】 本品为不规则的块片，厚 0.5～1 cm。外皮棕褐色或灰棕色，具纵沟及横裂纹。切面皮部棕褐色，有白色结晶状物，木部淡棕色，有多数小孔。质坚硬。气微，味淡、微涩。

以皮厚、色红棕者为佳。

【鉴别】 本品粉末淡棕色。草酸钙针晶甚多，成束或散在，长 43～208 μm，直径 2～4 μm。淀粉粒单粒类圆形，脐点点状或裂缝状，直径 3～16 μm；复粒由 2～4 粒组

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

成。石细胞类方形、类圆形或梭形，直径 28～96 μm。具缘纹孔及网纹导管直径 20～80 μm。木栓细胞多角形，棕黄色。

【炮制】 除去杂质，劈成小块。

【性味】 苦、涩，凉。

【功能与主治】 清解热毒，活血散结，祛风利湿。用于风湿性关节炎，淋巴结结核，跌扑损伤，痈疖。

【用法与用量】 30～60 g。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

麻　　油

Mayou

OLEUM SESAMI

本品为脂麻科植物脂麻 Sesamum indicum L. 的成熟种子用压榨法得到的脂肪油。

【性状】 本品为淡黄色或棕黄色的澄明液体；气微或带有熟芝麻的香气，味淡。

本品与氯仿、乙醚、石油醚或二硫化碳能任意混合，在乙醇中微溶。

比重 本品的比重(附录 26 页)为 0.917～0.923。

折光率 本品的折光率(附录 32 页)为 1.471～1.475。

碘值 本品的碘值(附录 52 页第一法)为 103～116。

皂化值 本品的皂化值(附录 52 页)为 188～195。

酸值 本品的酸值(附录 51 页)不大于 2.5。

【鉴别】 取本品 1 ml，置试管中，加含蔗糖 0.1 g 的盐酸 10 ml，振摇半分钟，酸层即染成粉红色，静置后，渐变为红色。

【检查】 **加热试验** 取本品 50 ml，依法试验(附录 52 页)，不得有沉淀析出。

杂质 不得过 0.2%(附录 53 页)。

水分与挥发物 不得过 0.2%(附录 53 页)。

【功能与主治】 润滑剂及赋形剂。内服可润肠、润肺；外用作为软膏及硬膏基质。

【用法与用量】 口服，一次 17～68 ml。

【贮藏】 遮光，密封，置阴凉处保存。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

麻　　黄

Mahuang

HERBA EPHEDRAE

本品为麻黄科植物草麻黄 Ephedra sinica Stapf、中麻黄 Ephedra intermedia Schrenk et C. A. Mey. 或木贼麻黄 Ephedra equisetina Bge. 的干燥草质茎。秋季采割绿色的草质茎，晒干。

【性状】 **草麻黄**　呈细长圆柱形，少分枝；直径 1～2 mm。有的带少量棕色木质茎。表面淡绿色至黄绿色，有细纵脊线，触之微有粗糙感。节明显，节间长 2～6 cm。节上有膜质鳞叶，长 3～4 mm；裂片 2(稀 3)，锐三角形，先端灰白色，反曲，基部联合成筒状，红棕色。体轻，质脆，易折断，断面略呈纤维性，周边绿黄色，髓部红棕色，近圆形。气微香，味涩、微苦。

中麻黄　多分枝，直径 1.5～3 mm，有粗糙感。节间长 2～6 cm，膜质鳞叶长 2～3 mm，裂片 3(稀 2)，先端锐尖。断面髓部呈三角状圆形。

木贼麻黄　较多分枝，直径 1～1.5 mm，无粗糙感。节间长 1.5～3 cm。膜质鳞叶长 1～2 mm；裂片 2(稀 3)，上部为短三角形，灰白色，先端多不反曲，基部棕红色至棕黑色。

均以色淡绿或黄绿、内心色红棕、手拉不脱节、味苦涩者为佳。色变枯黄脱节者不可供药用。

【鉴别】 (1) 本品横切面：

草麻黄　表皮细胞外被厚的角质层；脊线较密，有蜡质疣状凸起，两脊线间有下陷气孔。下皮纤维束位于脊线处，壁厚，非木化。皮层较宽，纤维成束散在。中柱鞘纤维束新月形。维管束外韧型，8～10 个。形成层环类圆形。木质部呈三角状。髓部薄壁细胞含棕色块；偶有环髓纤维。表皮细胞外壁、皮层薄壁细胞及纤维均有多数微小草酸钙砂晶或方晶。

中麻黄　维管束 12～15 个。形成层环类三角形。环髓纤维成束或单个散在。

木贼麻黄　维管束 8～10 个。形成层环类圆形。无环髓纤维。

(2) 取本品的纵剖面，置紫外光灯下观察，边缘显亮白色荧光，中心显亮棕色荧光；本品粉末和药材的表面均显亮棕色荧光。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

(3) 取本品粉末约 0.2 g，加水 5 ml 与稀盐酸 1～2 滴，煮沸 2～3 分钟，滤过。滤液置分液漏斗中，加氨试液数滴使成碱性，再加氯仿 5 ml，振摇提取。分取氯仿液，置二支试管中，一管加氮制氯化铜试液与二硫化碳各 5 滴，振摇，静置，氯仿层显棕黄色；另一管为空白，以氯仿 5 滴代替二硫化碳 5 滴，振摇后氯仿层无色或显微黄色。

【含量测定】 取本品细粉约 5 g，精密称定，置脂肪提取器中，加浓氨水 3 ml、乙醇 10 ml 与乙醚 20 ml，浸泡一天，置水浴上用乙醚回流提取至少 4 小时，将提取液移至分液漏斗中，容器用少量乙醚洗涤，洗液并入分液漏斗中，用 $N/2$ 盐酸液振摇提取 5 次，第一次 20 ml，以后每次 10 ml，合并酸液，滤过，滤液加氢氧化钠试液使成碱性，加氯化钠饱和，用乙醚振摇提取 5 次，第一次 20 ml，以后每次 10 ml，合并乙醚液，用氯化钠饱和溶液洗涤 3 次，每次 5 ml，合并洗液，再用乙醚 10 ml 振摇提取，合并前后二次乙醚液，精密加入 $N/50$ 硫酸液 30 ml，振摇提取，静置使分层。分取酸液，乙醚液再用水提取 3 次，每次 5 ml，合并酸液与水液，置水浴上加热，除去微量乙醚，放冷，加甲基红指示液 2 滴，用 $N/50$ 氢氧化钠液滴定，即得(每 1 ml 的 $N/50$ 硫酸液相当于 3.3047 mg 的 $C_{10}H_{15}ON$)。

本品含生物碱作为麻黄碱($C_{10}H_{15}ON$)计算，不得少于 0.8%。

【炮制】 **麻黄** 除去木质茎、残根及杂质，洗净，闷润，切段，干燥。

蜜麻黄 取麻黄段，照蜜炙法(附录 19 页)用蜜水炒至放凉后不粘手。

每麻黄段 100 kg，用炼蜜 12.5 kg。

【性味】 辛、苦，温。

【功能与主治】 发汗，散寒，平喘，利水。用于风寒感冒，喘咳，支气管哮喘，支气管炎，水肿。

【用法与用量】 1.5～9 g。

【注意】 高血压病、心功能不全患者慎用。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮。

麻　黄　根

Mahuanggen

RADIX EPHEDRAE

本品为麻黄科植物草麻黄 Ephedra sinica Stapf 或中麻黄 Ephedra intermedia

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Schrenk et C. A. Mey. 的干燥根。秋末采挖，除去根头及须根，干燥。

【性状】 本品呈圆柱形，略弯曲，长 8～25 cm，直径 0.5～1.5 cm。上端偶有残存的根头，下部较细，常扭曲。表面红棕色或灰棕色，有纵皱纹及支根痕。外皮粗糙，易呈片状剥落。体轻，质硬而脆，断面皮部黄白色，木部淡黄色或黄色，有放射状纹理。无臭，味微苦。

以质硬、外皮色红棕、断面色黄白者为佳。

【鉴别】 (1) 本品根的横切面：

草麻黄 木栓层为 10 余列细胞，其外有落皮层。皮层为数列薄壁细胞，含草酸钙砂晶。中柱鞘由纤维及石细胞组成。韧皮部窄。形成层成环。木质部发达，由导管、管胞及木纤维组成；射线宽广，含砂晶。髓部有纤维；薄壁细胞有纹孔。

中麻黄 无石细胞。

(2) 取本品纵剖面置紫外光灯下观察，皮部显蓝白色荧光，木部显黄色荧光，有的中心显金黄色或棕色荧光。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 止汗。用于自汗，盗汗。

【用法与用量】 3～9 g；也可研粉外扑。

【贮藏】 置干燥处。

鹿　　角

Lujiao

CORNU CERVI

本品为鹿科动物马鹿 Cervus elaphus L. 已骨化的角。多于春季拾取脱角，除去泥沙，风干。

【性状】 本品呈分枝状，通常分成 4～6 枝，全长 50～90 cm。主枝弯曲，直径 3～6 cm，基部具盘状突起，习称"珍珠盘"，周边常有稀疏细小的孔洞，侧枝多向一面伸展，第一枝与珍珠盘相距较近，第二枝靠近第一枝着生。表面灰褐色或灰黄色，有光泽，角尖平滑，中、下部常具疣状突起，习称"骨钉"，并有纵棱。质坚硬，断面外圈骨质，灰白色或微带淡褐色，中部多呈灰褐色，具蜂窝状孔。无臭，味微咸。

以粗壮、坚实、有光泽者为佳。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【炮制】 锯段，用温水浸泡，捞出，镑片，晾干；或锉成粗末。

【性味】 咸，温。

【功能与主治】 温肾，行血，消肿。用于畏寒无力，腰脊冷痛，乳腺炎初起，瘀血肿痛，寒性脓疡，骨、关节结核。

【用法与用量】 6～15 g。

【贮藏】 置干燥处。

【制剂】 (1) 鹿角胶 (2) 鹿角霜

鹿 角 胶

Lujiaojiao

COLLA CORNUS CERVI

本品为鹿角经水煎熬，浓缩制成的固体胶。

【制法】 将鹿角锯成长 6～10 cm 的段，漂泡至水清，分次水煎，滤过，合并滤液(或加入明矾细粉少量)，静置，滤取胶液，用文火浓缩(或加适量豆油、冰糖、黄酒)至稠膏状，冷凝，切块，阴干。

【性状】 本品为扁方块，长 3～4 cm，厚约 0.6 cm。黄棕色或红棕色，半透明，上部有黄白色泡沫层。质脆，易碎，断面光亮。气微，味微甜。

【检查】 应符合胶剂项下有关的各项规定(附录 5 页)。

【性味】 甘、咸，温。

【功能与主治】 补血益精。用于腰膝无力，阳痿滑精，虚寒崩漏。

【用法与用量】 3～6 g，溶化兑服。

【贮藏】 置阴凉干燥处，密闭保存。

鹿 角 霜

Lujiaoshuang

CORNU CERVI DEGELATINATUM

本品为鹿角去胶质的角块。春、秋二季生产，将骨化角熬去胶质，取出角块，干

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

燥。

【性状】 本品呈长圆柱形或不规则的块状，大小不一。表面灰白色，显粉性，常具纵棱。体轻，质酥，断面外层较致密，白色或灰白色，内层有蜂窝状小孔，灰黄色或灰黑色，有吸湿性。气微，味淡，嚼之有粘牙感。

以色白、体轻、质酥者为佳。

【炮制】 用时捣碎。

【性味】 咸，温。

【功能与主治】 活血，消肿，益肾。用于乳房胀痛，乳腺炎，关节肿胀，尿频，遗尿。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置干燥处。

鹿　茸

Lurong

CORNU CERVI PANTOTRICHUM

本品为鹿科动物梅花鹿 Cervus nippon Temminck 或马鹿 Cervus elaphus L. 的雄鹿未骨化密生茸毛的幼角。前者习称“花鹿茸”，后者习称“马鹿茸”。夏、秋二季锯取鹿茸，经加工后，阴干或烘干。

【性状】 **花鹿茸** 呈圆柱状分枝，具一个分枝者习称“二杠”，主枝习称“大挺”，长 17～20 cm，锯口直径 4～5 cm，离锯口约 1 cm 处分出侧枝，习称“门庄”，长 9～15 cm，直径较大挺略细。外皮红棕色或棕色，多光润，表面密生红黄色或棕黄色细茸毛，上端较密，下端较疏；分岔间具 1 条灰黑色筋脉，皮茸紧贴。锯口黄白色有蜂窝状细孔，外围无骨质。体轻。气微腥，味微咸。具二个分枝者，习称“三岔”，大挺长 23～33 cm，直径较二杠细，略呈弓形，微扁，枝端略尖，下部多有纵棱筋及突起疙瘩；皮红黄色，茸毛较稀而粗。

二茬茸与头茬茸相似，但挺长而不圆或下粗上细，下部有纵棱筋。皮灰黄色，茸毛较粗糙，锯口外围多已骨化。体较重。无腥气。

以粗壮、挺圆、顶端丰满、毛细柔软色红黄、皮色红棕、有油润光泽者为佳。

马鹿茸 较花鹿茸粗大，分枝较多，侧枝一个者习称“单门”，二个者习称“莲花”，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

三个者习称"三岔"，四个者习称"四岔"或更多。按产地分为"东马鹿茸"和"西马鹿茸"。

东马鹿茸"单门"大挺长25～27 cm，直径约3 cm。外皮灰黑色，茸毛灰褐色或灰黄色，锯口面外皮较厚，灰黑色，中部有蜂窝状细孔，质嫩；"莲花"大挺长可达33 cm，下部有棱筋，锯口面蜂窝状小孔稍大；"三岔"皮色深，质较老；"四岔"茸毛粗而稀，大挺下部具棱筋及疙瘩，分枝顶端多无毛，习称"捻头"。

西马鹿茸，大挺多不圆，顶端圆扁不一，长30～100 cm。表面有棱，多抽缩干瘪，分枝较长且弯曲，茸毛粗长，灰色或黑灰色。锯口色较深，常见骨质。气腥臭，味咸。

以饱满、体轻、毛色灰褐、下部无棱线者为佳。

【鉴别】 取本品粉末约0.1 g，加水4 ml，置水浴中加热15分钟，放冷，滤过。滤液照下述方法试验：

(1) 取滤液1 ml，加2%茚三酮溶液3滴，摇匀，加热煮沸数分钟，显蓝紫色。

(2) 取滤液1 ml，加10%氢氧化钠溶液2滴，摇匀，滴加0.5%硫酸铜溶液，显蓝紫色。

【炮制】 **鹿茸片** 取鹿茸，燎去茸毛，刮净，以布带缠绕茸体，自锯口面小孔灌入热白酒，并不断添酒，至润透或灌酒稍蒸，横切薄片，压平，干燥。

鹿茸粉 取鹿茸，燎去茸毛，刮净，劈成碎块，研成细粉。

【性味】 甘、咸，温。

【功能与主治】 温肾壮阳，生精益血，补髓健骨。用于阳痿滑精，畏寒无力，血虚眩晕，腰膝痿软，虚寒血崩。

【用法与用量】 1～2.5 g，一次冲服。

【注意】 高血压病、肾炎、肝炎及肝肾功能不正常者忌服。

【贮藏】 置阴凉干燥处，密闭，防蛀。

鹿　衔　草

Luxiancao

HERBA PYROLAE

本品为鹿蹄草科植物卵叶鹿蹄草 Pyrola decorata H. Andres、鹿蹄草 Pyrola rotundifolia L. subsp. chinensis H. Andres 或圆叶鹿蹄草 Pyrola rotundifolia L. 的干燥全草。全年均可采挖，除去杂质，晒至叶片较软时，堆置至叶片变成紫红色或紫褐色，晒干。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 本品根细小，须状。茎略呈圆柱形或具棱角，有纵纹。叶基生，叶片长卵圆形或圆形，长 2～8 cm，紫红色或紫褐色，先端钝圆或稍尖，全缘或有稀疏的小锯齿，边缘略反卷，叶脉明显，革质；叶柄长，扁平而中间凹下，两边膜质。茎端常有小花或扁球形蒴果。气微，味淡、微苦。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性味】 苦，平。

【功能与主治】 祛风湿，强筋骨，止血。用于腰膝关节酸痛，月经过多。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置干燥处，防潮。

商　　陆

Shanglu

RADIX PHYTOLACCAE

本品为商陆科植物商陆 Phytolacca acinosa Roxb. 或垂序商陆 Phytolacca americana L. 的干燥根。秋季至次春采挖，除去须根及泥沙，切成块或片，晒干或阴干。

【性状】 本品为横切或纵切的不规则块片，厚薄不等。外皮灰黄色或灰棕色。横切片弯曲不平，边缘皱缩，直径 2～8 cm。切面浅黄棕色或黄白色，木部隆起，形成数个突起的同心性环轮。纵切片弯曲或卷曲，长 5～8 cm，宽 1～2 cm，木部呈平行条状突起。质硬。气微，味稍甜，久嚼麻舌。

以块片大、色白者为佳。

【鉴别】 本品横切面：木栓层为数至 10 余列细胞。皮层窄。维管束排列成数轮，形成层连接成环；外方为韧皮部；内方为木质部，导管较少，大小不一，直径约至 156 μm。薄壁细胞含草酸钙针晶束，并含淀粉粒。

【炮制】 **商陆** 除去杂质，洗净，润透，切条或块，干燥。

醋商陆 取净商陆，照醋炒法(附录 18 页)用醋炒至微干。

每商陆 100 kg，用醋 30～50 kg。

【性味】 苦，寒；有毒。

【功能与主治】 逐水，解毒。用于水肿尿少，腹水胀满；外治外伤出血，痈肿疮毒。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【用法与用量】 煎剂 9～15 g；散剂 1.5～4.5 g；外用鲜品捣烂或干品研末涂敷。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 置干燥处，防霉、防蛀。

旋 复 花

Xuanfuhua

FLOS INULAE

本品为菊科植物旋复花 Inula japonica Thunb. 的干燥头状花序。夏、秋二季花开放时采收，除去杂质，阴干或晒干。

【性状】 本品呈扁球形或类球形，直径 1～1.5 cm。总苞由多数苞片组成，作覆瓦状排列，苞片披针形或条形，灰黄色，长 4～6 mm；总苞基部有时残留花梗，苞片及花梗表面被白色茸毛。舌状花 1 列，黄色，长约 1 cm，多卷曲，常脱落，先端 3 齿裂；管状花多数，棕黄色，长约 5 mm，先端 5 齿裂；子房顶端有多数白色冠毛，长约 5 mm。有的可见椭圆形小瘦果。体轻，易散碎。气微，味微苦。

以完整、色黄绿者为佳。

【鉴别】 本品各部分表面观：苞片非腺毛 1～8 细胞，多细胞者基部膨大，顶端细胞特长；内层苞片另有 2～3 细胞并生的非腺毛。冠毛为多列性非腺毛，边缘细胞稍向外突出。子房表皮细胞含草酸钙柱晶，长约至 48 μm，直径约 5 μm；子房非腺毛 2 列性，一列为单细胞，另列通常 2 细胞，长约至 163 μm。苞片、花冠腺毛棒槌状，头部多细胞，多排成 2 列，围有角质囊；柄多细胞，2 列。花粉粒类球形，直径 24～32 μm，外壁有刺，长约 3 μm，具 3 个萌发孔。

【炮制】 **旋复花** 除去梗叶及杂质。

蜜旋复花 取净旋复花，照蜜炙法(附录 19 页)用蜜水炒至放凉后不粘手。

【性味】 微苦、咸，温。

【功能与主治】 降气，化痰。用于咳喘痰粘，呃逆呕吐，胸闷胁痛。

【用法与用量】 6～9 g，包煎。

【贮藏】 置干燥处，防潮。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

断　血　流

Duanxueliu

HERBA CLINOPODII

本品为唇形科植物荫风轮 Clinopodium polycephalum (Vant.) C. Y. Wu et Hsuan 或风轮菜 Clinopodium chinense (Benth.) O. Kuntze 的干燥地上部分。夏季花开前采割，除去泥沙，晒干。

【性状】 **荫风轮**　茎呈方柱形，有对生分枝，长 20～70 cm，直径 1.5～4 mm；表面棕褐色或暗紫色，密被灰白色茸毛，有节，节间长 2～8 cm；质脆，易折断，断面有髓或中空。叶对生，有柄；叶片多皱缩、破碎，完整者展平后呈卵形，长 1～5 cm，边缘有锯齿，上表面绿褐色，下表面灰绿色，两面均密被灰白色茸毛。气微香，味涩、微苦。

风轮菜　分枝较多；茸毛稀而短，多集生于四棱上。

【炮制】 除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，晒干。

【性味】 涩、微苦，凉。

【功能与主治】 止血。用于崩漏，子宫肌瘤出血，鼻衄，牙龈出血，尿血，创伤出血。

【用法与用量】 9～15 g；外用适量研末或取鲜品捣烂敷患处。

【贮藏】 置干燥处，防潮。

【制剂】 断血流片

断　血　流　片

Duanxueliu Pian

TABELLAE CLINOPODII

本品为断血流浸膏片。每片相当于断血流 7 g。

【制法】 取断血流 7000 g，切段，加水煎煮二次，每次 1 小时，合并煎液，滤过，滤

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

液浓缩至比重 1.14～1.16，加 1.7 倍量乙醇，搅匀，静置，取上清液浓缩成稠膏状，加适量辅料，制成颗粒，压制成 1000 片，包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；味苦、微涩。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(附录 6 页)。

【功能与主治】 止血。用于月经过多，功能性子宫出血；亦可用于产后出血，上消化道出血，原发性血小板减少性紫癜等。

【用法与用量】 口服，一次 3～5 片，一日 3 次。

【贮藏】 密封保存。

淫 羊 藿

Yinyanghuo

HERBA EPIMEDII

本品为小檗科植物淫羊藿 Epimedium brevicornum Maxim.、朝鲜淫羊藿 Epimedium koreanum Nakai 或箭叶淫羊藿 Epimedium sagittatum (Sieb. et Zucc.) Maxim. 的干燥地上部分。夏、秋间叶呈鲜绿色时采割，除去粗梗及杂质，晒干或阴干。

【性状】 **淫羊藿** 茎细圆柱形，长约 20 cm，绿黄色。茎生叶 2 片对生，二回三出复叶；小叶片卵圆形，长 3～8 cm，宽 2～6 cm；先端微尖或钝，边缘具黄色刺毛状细锯齿；顶生小叶基部心形，对称，两侧小叶较小，叶基偏斜，外裂片较大；上表面黄绿色，下表面叶脉基部有稀疏细长毛，主脉 7～9 条，细脉两面均隆起；小叶柄长 1～5 cm。叶片近革质。无臭，味微苦。

朝鲜淫羊藿 小叶较大，长 4～10 cm，宽 3.5～7 cm，先端长尖。叶片较薄。

箭叶淫羊藿 为一回三出复叶，小叶片长卵形，长 4～12 cm，宽 2.5～5 cm；先端急尖或渐尖成细长尖头，两侧小叶基部外侧呈箭形。叶片革质。

均以叶多、色黄绿者为佳。

【炮制】 **淫羊藿** 除去杂质，喷淋清水，稍润，切丝，晒干。

炙淫羊藿 取羊脂油加热熔化，加入淫羊藿丝，用文火炒至微黄时，取出，放凉。每淫羊藿 100 kg，用羊脂油(炼油)20 kg。

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 补肾阳，强筋骨，祛风湿。用于阳痿，腰膝痿弱，四肢麻痹，神疲

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

健忘，更年期高血压症。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

淡 竹 叶

Danzhuye

HERBA LOPHATHERI

本品为禾本科植物淡竹叶 Lophatherum gracile Brongn. 的干燥茎叶。夏季未抽花穗前采割，晒干。

【性状】 本品长 25～75 cm。茎呈圆柱形，有节，表面淡黄绿色，断面中空。叶鞘开裂。叶片披针形，有的皱缩卷曲，长 5～20 cm，宽 1～3.5 cm；表面浅绿色或黄绿色，叶脉平行，具横行小脉，形成长方形的网格状，下表面尤为明显。体轻，质柔韧。气微，味淡。

以叶多、色绿者为佳。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性味】 甘、淡，寒。

【功能与主治】 清热，利尿。用于烦热，小便黄少。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置干燥处。

淡 豆 豉

Dandouchi

SEMEN SOJAE PRAEPARATUM

本品为豆科植物大豆 Glycine max (L.) Merr. 的成熟种子的发酵加工品。

【制法】 取桑叶、青蒿各 70～100 g，加水煎煮，滤过，煎液拌入净大豆 1000 g 中，俟吸尽后，蒸透，取出，稍晾，再置容器内，用煎过的桑叶、青蒿渣覆盖，闷使发

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

酵至黄衣上遍时，取出，除去药渣，洗净，置容器内再闷15～20天，至充分发酵、香气溢出时，取出，略蒸，干燥，即得。

【性状】 本品呈椭圆形，略扁，长0.6～1 cm，直径0.5～0.7 cm。表面黑色，皱缩不平。质柔软，断面棕黑色。气香，味微甘。

以质柔、气香、无糟粒者为佳。

【鉴别】 取本品1 g，研碎，加水10 ml，加热至沸，滤过。取滤液1 ml，加1%吲哚醌的丙酮溶液1 ml，置水浴中加热5分钟，溶液显褐绿色，放置后变为紫红色。

【性味】 苦，凉。

【功能与主治】 解表，除烦，助消化。用于感冒，寒热头痛，心烦不眠，胃脘胀闷。

【用法与用量】 6～12 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

密蒙花

Mimenghua

FLOS BUDDLEJAE

本品为马钱科植物密蒙花 Buddleja officinalis Maxim. 的干燥花蕾及其花序。春季花未开放时采收，除去杂质，干燥。

【性状】 本品多为花蕾密聚的花序小分枝，呈不规则圆锥状，长1.5～3 cm。表面灰黄色或棕黄色，密被茸毛。花蕾呈短棒状，上端略大，长0.3～1 cm，直径0.1～0.2 cm；花萼钟状，先端4齿裂；花冠筒状，与萼等长或稍长，先端4裂，裂片卵形；雄蕊4个，着生在花冠管中部。质柔软。气微香，味微苦辛。

以花蕾密聚、色灰黄、茸毛多者为佳。

【鉴别】 (1) 本品花萼及花冠表面观：下表面密被非腺毛，通常为4细胞，基部2细胞单列；上部2细胞并列，每细胞又分2叉，成4叉状，每分叉长250～500 μm，壁甚厚，胞腔线形。花冠上表面有少数非腺毛，单细胞，长200～600 μm，壁具多数刺状突起。花粉粒球形，直径13～20 μm，表面光滑，有3个萌发孔。

(2) 取本品粉末0.5 g，加乙醇10 ml，置70～75°水浴中浸渍30分钟，放冷，滤过。取滤液2 ml，加镁粉少量与盐酸5滴，显淡棕黄色。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性味】 甘，微寒。

【功能与主治】 清肝，明目。用于目赤肿痛，多眵羞明，角膜炎。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮。

续　　断

Xuduan

RADIX DIPSACI

本品为川续断科植物川续断 Dipsacus asper Wall. 的干燥根。秋季采挖，除去根头及须根，用微火烘至半干，堆置"发汗"至内部变绿色时，再烘干。

【性状】 本品呈圆柱形，略扁，有的微弯曲，长 5～15 cm，直径 0.5～2 cm。表面黄褐色或灰褐色，有明显扭曲的纵皱及沟纹，可见横裂的皮孔及少数须根痕。质软，久置后变硬，易折断，断面不平坦，皮部外缘褐色或淡褐色，内墨绿色或棕色，木部黄褐色，有黄色花纹。气微香，味苦、微甜而后涩。

以条粗、质软、断面带墨绿色者为佳。

【鉴别】 本品横切面：木栓层为数列细胞。皮层较窄。韧皮部筛管群稀疏散在。形成层成环。木质部射线宽广，导管近形成层处分布较密，向内渐稀少，常单个散在或 2～3 个相聚。髓部小。薄壁细胞含草酸钙簇晶。

粉末黄棕色。草酸钙簇晶甚多，直径 15～45 μm，存在于皱缩的薄壁细胞中，常数个排列成行。木栓细胞棕黄色，表面观类方形。纺锤形薄壁细胞有斜向交错的细纹理。木纤维直径约 17 μm，壁较厚，有斜纹孔。具缘纹孔导管直径约至 68 μm。

【炮制】 洗净，润透，切薄片，干燥。

【性味】 苦、辛、甘，微温。

【功能与主治】 补肝肾，续筋骨，止血，止痛。用于腰膝酸软，关节酸痛，崩漏，先兆流产，跌扑损伤。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

绵马贯众

Mianmaguanzhong

RHIZOMA DRYOPTERIS CRASSIRHIZOMAE

本品为鳞毛蕨科植物绵马鳞毛蕨 Dryopteris crassirhizoma Nakai 的干燥根茎及叶柄基部。秋季采挖，削去叶柄、须根及泥沙，干燥。

【性状】 本品呈倒卵形，稍弯曲，有的纵剖为两半，长 10～20 cm，直径 5～8 cm。表面黄棕色至黑棕色。根茎粗壮，略偏斜，密被排列整齐的叶柄基部及鳞片，并有弯曲的须根。叶柄基部呈扁圆柱形，略弯曲，长 3～5 cm，宽 0.5～1 cm；表面棕黑色，有纵棱线；质硬而脆，断面略平坦，淡棕色，有黄白色横长的点状维管束 6～11 个，排列成环；每一叶柄基部外侧常有 3 条须根。鳞片条状披针形，全缘，常脱落。气特异，味初甜而后苦辛、微涩。

【鉴别】 本品叶柄基部横切面：表皮为 1 列外壁稍厚的小形细胞，常脱落；下皮为 10 余列棕色多角形厚壁细胞。基本组织细胞排列疏松，细胞间隙大，其中有短柄的间隙腺毛，头部单细胞，球形或梨形，内含棕色分泌物；周韧维管束 5～13 个，环列，每个维管束周围有 1 列扁小的内皮层细胞；薄壁细胞含棕色物和淀粉粒。

【炮制】 **绵马贯众** 除去杂质，用时打碎。

绵马贯众炭 取净绵马贯众，照炒炭法(附录 19 页)炒至表面焦黑色。

【性味】 苦，微寒；有小毒。

【功能与主治】 清热解毒，驱虫，止血。用于防治流感，虫积腹疼，崩漏(用炭)。

【用法与用量】 4.5～9 g。预防流感时，放入水缸内，饮用其水。

【贮藏】 置干燥处。

绵萆薢

Mianbixie

RHIZOMA DIOSCOREAE SEPTEMLOBAE

本品为薯蓣科植物绵萆薢 Dioscorea septemloba Thunb. 或福州薯蓣 Dioscorea fut-

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

schauensis Uline 的干燥根茎。秋、冬二季采挖，除去须根，洗净，切片，晒干。

【性状】 本品为不规则的斜切片，边缘不整齐，大小不一，厚 2～5 mm。外皮黄棕色至黄褐色，有稀疏的根痕，其基部呈圆锥状凸起。切面灰白色至浅灰棕色，可见黄棕色点状维管束散在。质疏松，略呈海绵状。气微，味苦、微辛。

以片大、切面色灰白者为佳。

【性味】 苦，平。

【功能与主治】 祛风，利湿。用于尿路感染，小便浑浊，乳糜尿，白带，风湿性关节痛，腰膝酸痛。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

琥　　珀

Hupo

SUCCINUM

本品为古代松科松属植物的树脂埋藏地下经年久转化而成。全年均可采收，从地下挖出称"琥珀"或从煤中选出称"煤珀"，除去泥沙及煤屑。

【性状】 **琥珀** 呈不规则的块状、颗粒状或多角形。表面黄棕色、血红色及黑褐色，有的具光泽。质硬而脆，断面光亮，有的颜色不一，手捻有涩感。无臭，味淡。

以色红、质脆、断面光亮者为佳。

煤珀 呈不规则多角形块状或颗粒状，少数滴乳状，大小不一。表面淡黄色、黄棕色、红褐色及黑褐色，有光泽。质硬，断面有玻璃样光泽。

以色黄棕、断面有玻璃样光泽者为佳。

【鉴别】 **琥珀** 燃之易熔，稍冒黑烟，刚熄灭时冒白烟，微有松香气。

煤珀 燃之冒黑烟，刚熄灭时冒白烟，有似煤油的臭气。

【炮制】 除去杂质，用时研成细粉。

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 安神镇惊，活血利尿。用于心悸失眠，惊风抽搐，癫痫，小便不利，尿血，尿痛。

【用法与用量】 1～2 g，研末吞服或入丸散服。

【贮藏】 置干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

斑　蝥

Banmao

MYLABRIS

本品为芫青科昆虫南方大斑蝥 Mylabris phalerata Pall. 或黄黑小斑蝥 Mylabris cichorii L. 的干燥体。夏、秋二季捕捉，闷死或烫死，晒干。

【性状】 **南方大斑蝥** 呈长圆形，长 1.5～2.5 cm，宽 0.5～1 cm。头及口器向下垂，有较大的复眼及触角各 1 对，触角多已脱落。背部具革质鞘翅 1 对，黑色，有 3 条黄色或棕黄色的横纹；鞘翅下面有棕褐色薄膜状透明的内翅 2 片。胸腹部乌黑色，胸部有足 3 对。有特殊的臭气。

黄黑小斑蝥 体型较小，长 1～1.5 cm。

均以个大、完整、色鲜明者为佳。

【炮制】 **生斑蝥** 除去头、足、翅及杂质。

米斑蝥 将米置锅内加热，喷水少许，至米贴锅上，待烟冒出时，加入净斑蝥，轻轻翻炒，至米呈黄棕色，取出，除去米粒，放凉。

每斑蝥 10 kg，用米 2 kg。

【性味】 辛，寒；有大毒。

【功能与主治】 攻毒，破血，引赤，发泡。用于狂犬病，肝癌；外治神经性皮炎，寻常疣，颈淋巴结结核。

【用法与用量】 0.05～0.1 g，炮制后煎服或入丸散服；外用生品适量，研末或浸酒、醋涂患处，不宜大面积应用。

【注意】 孕妇及心脏、肾脏功能不全者忌服。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

款　冬　花

Kuandonghua

FLOS FARFARAE

本品为菊科植物款冬 Tussilago farfara L. 的干燥花蕾。12 月或地冻前当花尚未出

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

土时采挖，除去花梗及泥沙，阴干。

【性状】 本品呈长圆棒状。单生或2～3个基部连生，长1～2.5 cm，直径0.5～1 cm。上端较粗，下端渐细或带有短梗，外面被有多数鱼鳞状苞片。苞片外表面紫红色或淡红色，内表面密被白色絮状茸毛。体轻，撕开后可见白色茸毛。气香，味微苦而辛。

以朵大、色紫红、花梗短者为佳。木质老梗及已开花者不可供药用。

【炮制】 款冬花 除去杂质及残梗。

蜜冬花 取净款冬花，照蜜炙法（附录19页）用蜜水炒至微黄色、放凉后不粘手。

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 止咳化痰。用于新久咳嗽，喘息，痰中带血。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置干燥处，防潮、防蛀。

葫　芦

Hulu

PERICARPIUM LAGENARIAE

本品为葫芦科植物瓢葫芦 Lagenaria siceraria (Molina) Standl. var. depressa (Ser.) Hara 的干燥果皮。秋季采收成熟果实，除去果瓤及种子，晒干。

【性状】 本品呈瓢状，多碎成块片，厚0.5～1.5 cm。外表面黄棕色，较光滑；内表面黄白色或灰黄色，松软。体轻，质硬，断面黄白色。气微，味淡。

【炮制】 洗净，干燥，打碎。

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 利尿消肿。用于四肢、面目浮肿，腹水。

【用法与用量】 15～30 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防霉、防蛀。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

葫　芦　茶

Hulucha

HERBA DESMODII TRIQUETRI

本品为豆科植物葫芦茶 Desmodium triquetrum (L.) DC. 的干燥全株。夏、秋二季采挖，晒干，或趁鲜切段，晒干。

【性状】 本品长 40～120 cm。根近圆柱形，扭曲，表面灰棕色或棕红色，质硬稍韧，断面黄白色。茎基部圆柱形，灰棕色至暗棕色，木质，上部三棱形，草质，疏被短毛。叶矩状披针形，薄革质，长 6～15 cm，宽 1.5～3 cm；灰绿色或棕绿色，先端尖，基部钝圆或浅心形，全缘，两面稍被毛；叶柄长约 1.5 cm，有阔翅；托叶披针形，与叶柄近等长，淡棕色。有的带花、果；总状花序腋生，长 15～30 cm，蝶形花多数，长不及 1 cm，花梗较长；荚果扁平，长 2～4 cm，有 5～8 近方形的荚节。气微，味淡。

以带根、叶多色绿者为佳。

【炮制】 除去杂质；未切段者，切段。

【性味】 微苦，凉。

【功能与主治】 清解热毒，利湿。用于预防中暑，感冒发热，咽喉肿痛，肠炎，菌痢，急性肾炎水肿，小儿疳积。

【用法与用量】 15～30 g，鲜品 30～60 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

葛　根

Gegen

RADIX PUERARIAE

本品为豆科植物野葛 Pueraria lobata (Willd.) Ohwi 或甘葛藤 Pueraria thomsanii Benth. 的干燥根。秋、冬二季采挖，野葛多趁鲜切成厚片或小块，干燥；甘葛藤多除去外皮，用硫黄熏后，稍干，截段或再纵切两瓣，干燥。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 **野葛** 呈纵切的长方形厚片或小方块，长 5～35 cm，厚 0.5～1 cm。外皮淡棕色，有纵皱纹，粗糙。切面黄白色，纹理不明显。质韧，纤维性强。无臭，味微甜。

甘葛藤 呈圆柱形、类纺锤形或半圆柱形，长 12～15 cm，直径 4～8 cm；有的为纵切或斜切的厚片，大小不一。表面黄白色或淡棕色，未去外皮的呈灰棕色。横切面可见由纤维形成的棕色同心性环纹，纵切面可见由纤维形成的数条纵纹。体重，质硬，富粉性。

均以质坚实、粉性足、纤维少者为佳。

【鉴别】 本品粉末黄白色或淡黄色。淀粉粒甚多，单粒球形、半圆形或多角形，直径 3～37 μm，脐点点状、裂缝状或星状；复粒由 2～10 余粒组成。纤维多成束，壁厚，木化，周围细胞大多含草酸钙方晶，形成晶纤维，含晶细胞壁木化增厚。石细胞少见，类圆形或多角形，直径 38～70 μm。具缘纹孔导管较大，具缘纹孔六角形或椭圆形，排列极为紧密。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，晒干。

【性味】 甘、辛，平。

【功能与主治】 解肌退热，生津，透疹。用于温病发热，头痛，项背牵强，口渴泻痢，麻疹初起，早期突发耳聋。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

葶苈子

Tinglizi

SEMEN LEPIDII SEU DESCURAINIAE

本品为十字花科植物独行菜 Lepidium apetalum Willd. 或播娘蒿 Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl 的干燥成熟种子。前者习称“北葶苈子”，后者习称“南葶苈子”。夏季果实成熟时采割植株，晒干，搓出种子，除去杂质。

【性状】 **北葶苈子** 呈扁卵形，长 1～1.5 mm，宽 0.5～1 mm。表面棕色或红棕色，微有光泽，具纵沟 2 条，其中一条较明显。一端钝圆，另端尖而微凹，类白色，种脐位于凹入端。无臭，味微辛辣，粘性较强。

南葶苈子 呈长圆形略扁，长约 1 mm，宽约 0.5 mm。一端钝圆，另端微凹或较

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

平截。味微辛苦，略带粘性。

【鉴别】（1）取本品少量，加水浸泡后，用扩大镜观察，北葶苈子透明状粘液层较厚，厚度可超过种子宽度的1/2以上。南葶苈子透明状粘液层薄，厚度约为种子宽度的1/5以下。

（2）本品种皮表面观：

北葶苈子 下皮细胞多角形，少数长多角形，直径15～42 μm，壁厚5～8 μm。

南葶苈子 下皮细胞黄色，长多角形，少数多角形，直径10～30 μm，壁厚3～4 μm。

【炮制】 **葶苈子** 筛去杂质及灰屑。

炒葶苈子 取净葶苈子，照清炒法（附录18页）炒至微鼓起并有香气。

【性味】 辛、苦，寒。

【功能与主治】 泻肺定喘，利尿消肿。用于痰饮喘咳，胸胁胀痛，水肿尿少，肺源性心脏病。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置干燥处。

萱 草 根

Xuancaogen

RADIX HEMEROCALLIS

本品为百合科植物萱草 Hemerocallis fulva L.、金针菜 Hemerocallis citrina Baroni 或小萱草 Hemerocallis minor Mill. 的干燥根及根茎。春、秋二季采挖，洗净，略烫，晒干。

【性状】 **萱草** 根茎圆柱形，顶端有的残留叶基。根簇生，干瘪皱缩，长5～10 cm，直径0.3～0.5 cm；末端或中部常肥大呈纺锤形，表面灰黄色或淡灰棕色，有多数横纹及纵皱纹，末端残留细须根。体轻，质松软，不易折断，断面灰褐色或灰棕色，多裂隙。气微香，味淡。

金针菜 根长8～20 cm，偶有纺锤形的小块根，表面灰褐色或灰棕色。

小萱草 根较细，直径2～3 mm，无纺锤形的块根。

【鉴别】 取本品粗粉2 g，加70%乙醇15 ml，置水浴上回流15分钟，滤过。取滤液

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

0.5 ml，加氢氧化钠试液 1～2 滴，即显红色；另取滤液 0.5 ml，加 1%醋酸镁的甲醇溶液 5～6 滴，上层液显橙红色。

【炮制】 除去杂质，洗净，切段，干燥。

【性味】 甘，凉；有小毒。

【功能与主治】 利尿消肿。用于浮肿，小便不利。

【用法与用量】 3～6 g。

【注意】 多服损目、小便失禁。

【贮藏】 置干燥处。

萹　蓄

Bianxu

HERBA POLYGONI AVICULARIS

本品为蓼科植物萹蓄 Polygonum aviculare L. 的干燥地上部分。夏季叶茂盛时采收，除去根及杂质，晒干。

【性状】 本品茎呈圆柱形而略扁，有分枝，长 15～40 cm，直径 1.5～3 mm。表面灰绿色或棕红色，有细密微突起的纵纹；节部稍膨大，有浅棕色膜质的托叶鞘，节间长约 3 cm；质硬，易折断，断面髓部白色。叶互生，近无柄或具短柄，叶片多脱落或皱缩、破碎，完整者展平后呈披针形，全缘，无毛，两面均呈棕绿色或灰绿色。无臭，味微苦。

以质嫩、叶多、色灰绿者为佳。

【鉴别】 本品粉末灰绿色。叶上、下表皮细胞垂周壁近平直，平周壁有角质线纹。气孔主为不等式，副卫细胞 3 个。叶肉断面观为两面栅栏式，薄壁细胞含草酸钙簇晶，直径 18～43 μm。

【炮制】 除去杂质，洗净，切段，干燥。

【性味】 苦，平。

【功能与主治】 清热，利尿，杀虫。用于尿路感染，黄疸，湿疹，女阴溃疡，阴道滴虫。

【用法与用量】 9～15 g；外用适量，煎汤洗患处。

【贮藏】 置干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

朝　天　罐

Chaotianguan

RADIX OSBECKIAE CRINITAE

本品为野牡丹科植物朝天罐 Osbeckia crinita Benth. ex C. B. Clarke 的干燥根。夏、秋二季采挖，除去杂质，洗净，晒干，或趁鲜切片，晒干。

【性状】 本品根头部膨大呈团块状，顶端有茎痕或茎基。根数条，长圆锥形或近圆柱形，略弯曲。长 10～20 cm，直径 1～3 cm。表面浅棕黄色至黄棕色，有皱纹及细裂纹，粗皮易脱落。质硬，不易折断，切面浅灰白色，可见环纹。气微，味酸、涩。

以条粗、质坚实、切面色白者为佳。

【鉴别】 (1) 本品横切面：木栓层为 1 至数列细胞，其外有落皮层。韧皮部外侧有少数类圆形厚壁细胞；薄壁细胞含草酸钙簇晶，直径 14～51 μm，有的细胞含棕黄色分泌物。木质部占根的大部分，木射线宽 1～2 列细胞；导管单个散在或 2～3 个相聚，有的含棕黄色分泌物；木纤维壁稍厚；木薄壁细胞偶含簇晶。

(2) 取本品粉末 1 g，加水 10 ml，置 60°水浴中加热 10 分钟，趁热滤过。取滤液 1 ml，加 1%三氯化铁的乙醇溶液 1 滴，显蓝黑色。

【炮制】 除去杂质；未切片者，洗净，润透，切片，晒干。

【性味】 酸、涩，微寒。

【功能与主治】 清肠，收敛止泻。用于痢疾，肠炎。

【用法与用量】 30～60 g。

【贮藏】 置干燥处。

楮　实　子

Chushizi

FRUCTUS BROUSSONETIAE

本品为桑科植物构树 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. 的干燥成熟果实。秋季果

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

实成熟时采摘，洗净，晒干，除去灰白色膜状宿萼及杂质。

【性状】 本品略呈球形或卵圆形，稍扁，直径约 1.5 mm。表面红棕色，有网状皱纹或颗粒状突起，一侧有棱，一侧有凹沟，有的具果柄，偶有未除净的灰白色膜状的宿萼。胚乳类白色，富油性。质硬而脆，易压碎。无臭，味淡。

以色红、饱满者为佳。

【性味】 甘，寒。

【功能与主治】 健脾，益肾。用于水肿胀满，腰膝无力，目翳。

【用法与用量】 3～12 g。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

椰 馏 油 【剧】

Yeliuyou

PIX COCOIS

本品为棕榈科植物椰树 Cocos nucifera L. 的成熟果壳经干馏收集 150～260°馏出液制得。含酚类的总量，作为苯酚（C_6H_6O）计算，应为 60.0～70.0%(g/g)。

【性状】 本品为红棕色至暗棕色的液体；有特异臭气。

本品能与乙醇、丙酮、氯仿或乙醚任意混合，在水中微溶，在氢氧化钾或氢氧化钠溶液中溶解。

比重 本品的比重(附录26页)在 25°时为 1.050～1.065。

【鉴别】 (1) 取本品 1 滴，加水 50 ml，振摇，滤过。取滤液 2 ml，滴加溴试液，发生瞬即溶解的白色沉淀，但溴试液过量时，发生淡黄色沉淀。

(2) 取本品 1 滴，置白色点滴板上，加重氮苯磺酸试液与4%α-萘胺的乙醇溶液各 1 滴，即显橙红色。

【检查】 pH 值 应为 3.0～5.0(附录42页)。

【含量测定】 取本品约 0.5 g，精密称定，置 250 ml 量瓶中，加氢氧化钠试液 8 ml 使溶解，再加水稀释至刻度。精密量取 25 ml，置碘瓶中，精密加N/10 溴液 30 ml，再加盐酸 5 ml，立即密塞，振摇 30 分钟，静置 15 分钟后，注意微开瓶塞，加碘化钾试液 6 ml，立即密塞，充分振摇后，加氯仿 1 ml，摇匀，用 N/10 硫代硫酸钠液滴定，至近终点时，加淀粉指示液 2 ml，继续滴定至蓝色消失，并将滴定结果用空白试验校正，即

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

得(每 1 ml 的 $N/10$ 硫代硫酸钠液相当于 1.569 mg 的 C_6H_6O)。

【功能与主治】 抗霉菌药。

【贮藏】 遮光，密封保存。

【制剂】 椰馏油癣药水

椰馏油癣药水

Yeliuyou Xuanyaoshui

LIQUOR PICIS COCOIS PROTINEA

本品为椰馏油的乙醇溶液。每 100 ml 中含椰馏油应为 18～22 ml。

【制法】 取椰馏油 200 ml，加乙醇 640 ml 溶解后，再加水稀释至 1000 ml，滤过，即得。

【性状】 本品为红棕色的澄清液体；有特异臭气。

【鉴别】 取本品，照椰馏油项下的鉴别法(575页)试验，显相同的反应。

【检查】 pH 值 应为 3.0～5.0(附录42页)。

【含量测定】 取本品 10 ml，置具塞量筒中，加氯化钠溶液(15→100)15 ml，振摇，静置 30 分钟，待分层后，检读上层椰馏油的体积，即得。

【功能与主治】 抗霉菌药。用于各种表皮霉菌病。

【用法与用量】 涂擦患处。

【贮藏】 遮光，密封保存。

棕　　板

Zongban

PETIOLUS TRACHYCARPI

本品为棕榈科植物棕榈 Trachycarpus fortunei H. Wendl. 的干燥叶柄。采棕时割取旧叶柄下延部分及鞘片，除去纤维状的棕毛，晒干。

【性状】 本品呈长条板状，一端较窄而厚，另端较宽而稍薄，大小不等。表面红棕

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

色，粗糙，有纵直皱纹；一面有明显的凸出筋脉，筋脉的两侧着生多数棕色茸毛。质硬而韧，不易折断，断面纤维性。无臭，味淡。

以片大而厚、色红棕者为佳。

【鉴别】 取本品粉末约 1 g，加水 20 ml，置水浴上加热 5 分钟，滤过，滤液用水稀释成 20 ml。取滤液 1 ml，加三氯化铁试液 2～3 滴，即发生污绿色絮状沉淀；另取滤液 1 ml，加氯化钠明胶试液 3 滴，即显白色浑浊。

【炮制】 **棕板炭** 取棕板块，照制炭法(附录19页)炒炭或焖炭。

【性味】 苦、涩，平。

【功能与主治】 止血。用于崩漏，便血，尿血。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置干燥处。

硫　　黄

Liuhuang

SULFUR

本品为斜方晶系硫黄的矿石，采挖后，加热熔化，除去杂质；或用含硫矿物经加工制得。

【性状】 本品呈不规则块状，大小不一。黄色或略呈黄绿色。表面不平坦，有光泽，常有多数小孔。质松脆，易碎，断面常呈针状结晶形。有特异的臭气，味淡。

以色黄、光亮、质松脆者为佳。

【炮制】 **硫黄** 除去杂质，敲成小块。

制硫黄 取净硫黄块，与豆腐同煮，至豆腐显黑绿色时，取出，漂净，阴干。

每硫黄 100 kg，用豆腐 200 kg。

【性味】 酸，温；有毒。

【功能与主治】 通便，杀虫。用于便秘；外治疥癣，脂溢性皮炎。

【用法与用量】 1.5～3 g，炮制后入丸散服；外用生品适量，研末油调涂敷患处。

【注意】 孕妇忌服；不宜与芒硝同用。

【贮藏】 置干燥处，防火。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

雄　　黄

Xionghuang

REALGAR

本品为单斜晶系雄黄的矿石，主含硫化砷。采挖后，除去杂质。

【性状】 本品为不规则的块或粉末，深红色或橙红色。块状者表面常覆有淡橘红色粉末；质脆，易碎，断面具树脂样光泽，晶面有金刚石样光泽，或断面暗红色，具细砂孔。体较重，手触之易被染成橙黄色。微有特异的臭气，味淡。

以块大、质脆、色红、有光泽者为佳。

【鉴别】 (1) 取本品约 10 mg，加水润湿后，加氯酸钾的硝酸饱和溶液 2 ml，溶解后，加氯化钡试液，发生大量白色沉淀。放置后，倾出上层酸液，再加水 2 ml，振摇，沉淀不溶解。

(2) 取本品 0.2 g，置坩埚内，加热熔融，产生白色或黄白色火焰，伴有白色浓烟。取玻片覆盖后，有白色冷凝物，刮取少量，置试管内加水煮沸使溶解，必要时滤过，溶液加硫化氢试液数滴，即显黄色，加稀盐酸后发生黄色絮状沉淀，再加碳酸铵试液，沉淀复溶解。

【检查】 **三氧化二砷** 取本品适量，研细，精密称取 0.94 g，加稀盐酸 20 ml，不断搅拌 30 分钟，滤过，残渣再洗涤两次，每次用稀盐酸 10 ml 搅拌 10 分钟。合并滤液，置 500 ml 量瓶中，加水至刻度，摇匀，精密吸取 10 ml，置 100 ml 量瓶中，加水至刻度，摇匀，精密吸取 2 ml，照砷盐检查法（附录42页）检查，所显砷斑颜色不得深于标准砷斑。

【含量测定】 取本品约 0.1 g，精密称定，置 250 ml 锥形瓶中，加硫酸钾 1 g、硫酸铵 2 g 与硫酸 8 ml，用直火加热至溶液澄明，放冷后，缓缓加水 50 ml，加热微沸 3～5 分钟，放冷，加酚酞指示液 2 滴，用 $N/2$ 氢氧化钠液中和至显微红色，放冷，以 $N/2$ 硫酸液中和至褪色，加碳酸氢钠 5 g，摇匀后，用 $N/10$ 碘液滴定，至近终点时，加淀粉指示液 2 ml，滴定至显紫蓝色，即得（每 1 ml 的 $N/10$ 碘液相当于 5.348 mg 的 As_2S_2）。

本品含二硫化二砷（As_2S_2）不得少于 90%。

【炮制】 研成极细粉或照水飞法（附录17页）水飞，晾干。

【性味】 辛，温；有毒。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 解毒，燥湿，杀虫。用于咽喉肿痛；外治疥癣，带状疱疹，疔疮痈肿，蛇虫咬伤。

【用法与用量】 0.3～1 g，多入丸散服；外用适量，涂敷患处。

【注意】 内服宜慎，孕妇忌服。

【贮藏】 置干燥处，密闭保存。

紫　贝　齿

Zibeichi

CONCHA MAURITIAE

本品为宝贝科动物阿拉伯绶贝 Mauritia (Arabica) arabica (L.) 的贝壳。夏季捕捉，除去贝肉，洗净，晒干。

【性状】 本品呈卵圆形，长 4～7 cm，宽 2～4 cm，高 2～3 cm。表面紫棕色，上有多数暗紫棕色与白色交错的斑纹或圆形小点，背部隆起，通常有 1 条褐色或灰蓝色的色带，平滑而有光泽，腹面扁平，前端略宽，前后两端均凹入呈圆口状。壳口两边均向内卷曲形成狭长的沟，沟缘有细齿。壳内紫蓝色。质坚硬。无臭，无味。

以壳厚、有光泽者为佳。

【炮制】 **紫贝齿** 除去杂质，洗净，晒干，用时打碎。

煅紫贝齿 取净紫贝齿，照煅法(附录19页)煅透。

【性味】 咸，平。

【功能与主治】 明目，潜阳。用于目赤肿痛，角膜云翳，头胀眩晕。

【用法与用量】 9～15 g，先煎。

【贮藏】 置干燥处。

紫　石　英

Zishiying

FLUORITUM

本品为立方晶系萤石的矿石，主含氟化钙。采挖后，除去杂石。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 本品呈不规则的块状，具棱角，大小不一。紫色或绿色，深浅不等，半透明至透明，有玻璃样光泽，表面常有裂纹。体重，质坚硬，但用小刀可刻划，易击碎。无臭，味淡。

以色紫、透明者为佳。

【炮制】 **紫石英** 除去杂石，砸成小块。

煅紫石英 取净紫石英块，照煅法(附录19页)煅至红透，立即倒入醋中淬酥，取出，再煅淬一次，晾干。

每紫石英 100 kg，用醋 30～40 kg。

【性味】 甘，温。

【功能与主治】 镇心，安神，温肝肾。用于心悸易惊，虚喘。

【用法与用量】 6～12 g。

【贮藏】 置干燥处。

紫 花 地 丁

Zihuadiding

HERBA VIOLAE

本品为堇菜科植物紫花地丁 Viola yedoensis Makino 的干燥全草。春、秋二季采收，除去杂质，晒干。

【性状】 本品多皱缩成团。主根长圆锥形，直径 1～3 mm；淡黄棕色，有细纵皱纹。叶基生，灰绿色，展平后叶片呈披针形或卵状披针形，长 1.5～6 cm，宽 1～2 cm；先端钝，基部截形或稍心形，边缘具钝锯齿，两面有毛；叶柄细，长 2～6 cm，上部具明显狭翅。花茎纤细；花瓣 5 片，紫堇色或淡棕色；花距细管状。蒴果椭圆形或 3 裂，内有多数淡棕色种子。气微，味微苦而稍粘。

以色绿者为佳。

【鉴别】 本品叶的横切面：上表皮细胞较大，切向延长，外壁较厚，内壁粘液化，常膨胀呈半圆形；下表皮细胞较小，偶有粘液细胞；上、下表皮有单细胞非腺毛，长 32～240 μm，直径 24～32 μm，具角质短线纹。栅栏组织为 2～3 列细胞；海绵组织细胞类圆形，含草酸钙簇晶，直径 11～40 μm。主脉维管束外韧形，上、下表皮内方有厚角细胞 1～2 列。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【炮制】 除去杂质，洗净，切碎，干燥。

【性味】 苦、辛，寒。

【功能与主治】 清热，解毒，消肿。用于疔痈疮疖，丹毒，蜂窝组织炎，毒蛇咬伤，黄疸，尿路感染。

【用法与用量】 15～30 g；外用鲜品适量，捣烂敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

紫 花 杜 鹃

Zihuadujuan

FOLIUM ET CACUMEN RHODODENDRI MARIAE

本品为杜鹃花科植物紫花杜鹃 Rhododendron mariae Hance 的干燥叶或带叶嫩枝。全年均可采收，晒干。

【性状】 本品叶呈椭圆状披针形、椭圆形或倒卵形，长 1.2～9 cm，宽 1～3.5 cm；先端急尖，有短硬尖头，基部楔形；上表面灰绿色，有稀疏的伏毛，下表面淡绿色，散生黄棕色伏毛，均以主脉处较多；叶柄长 0.3～1 cm，密被黄棕色糙伏毛。嫩枝呈圆柱形，直径 2～4 mm；表面褐色，密被黄棕色糙伏毛；质脆，易折断，断面不平整，淡黄色。无臭，味微涩。

以叶多、色绿、枝嫩者为佳。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性味】 微辛，微温。

【功能与主治】 止咳，祛痰。用于慢性支气管炎，咳嗽痰多。

【用法与用量】 30 g～45 g。

【贮藏】 置干燥处。

【制剂】 紫花杜鹃浸膏

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

紫花杜鹃浸膏

Zihuadujuan Jingao

EXTRACTUM RHODODENDRI MARIAE

本品含黄酮作为无水芦丁计算，不得少于2.0%。

【制法】 取紫花杜鹃，洗净，加水煎煮二次，第一次2小时，第二次1.5小时，合并煎液，滤过，滤液在80°以下减压浓缩成稠膏状，并在80°以下干燥，粉碎，过筛，即得。

【性状】 本品为褐色至棕褐色粉末；味涩；有引湿性。

【鉴别】 取本品约0.5 g，加乙醇10 ml，温热10分钟，滤过。取滤液置白瓷皿中，加镁粉少量与盐酸数滴，显红棕色。

【检查】 **干燥失重** 取本品，在105°干燥3小时，减失重量不得过7.0%（附录44页）。

【含量测定】 **对照品溶液的制备** 精密称取芦丁对照品适量（另取一份芦丁对照品，在120°减压干燥至恒重，按减失重量折算为干燥品6 mg），置100 ml量瓶中，加乙醇适量，置80°水浴上加热使溶解，放冷，用乙醇稀释至刻度，摇匀，即得（每1 ml中含无水芦丁60 μg）。

标准曲线的制备 精密量取对照品溶液0.0、0.5、1.0、1.5与2.0 ml，分别用乙醇稀释至5.0 ml，精密加入2.5%三氯化铝溶液3.0 ml与醋酸钾溶液（取醋酸钾9.82 g，加水适量使溶解，加醋酸2 ml与水适量使成100 ml）5.0 ml，摇匀，放置40分钟，照比色法（附录32页），在420 nm的波长处测定吸收度，以吸收度为纵座标，浓度为横座标，绘制标准曲线。

测定法 取本品约1 g，精密称定，置100 ml锥形瓶中，加乙醇25 ml，置80°水浴上回流2小时，滤过，滤渣再加入乙醇25 ml，置80°水浴上继续加热1小时，放冷，滤过，合并滤液，置100 ml量瓶中，用乙醇稀释至刻度，摇匀。精密量取3 ml，置50 ml量瓶中，用乙醇稀释至刻度，摇匀，再精密量取5 ml，照标准曲线的制备项下的方法，自"精密加入2.5%三氯化铝溶液3.0ml"起，测定吸收度，以供试品溶液5 ml加水8 ml为空白，从标准曲线中读出供试品溶液中含黄酮的量，计算，即得。

【功能与主治】 止咳，祛痰。用于支气管炎。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【用法与用量】 口服，一次 1.0～1.5 g，一日 3 次。

【贮藏】 密封保存。

【制剂】 紫花杜鹃片

紫花杜鹃片

Zihuadujuan Pian

TABELLAE RHODODENDRI MARIAE

本品为紫花杜鹃浸膏片。每片含黄酮作为无水芦丁计算，不得少于 5 mg。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显褐色至棕褐色；味涩。

【鉴别】 取本品 2 片，除去糖衣，研细，照紫花杜鹃浸膏项下的鉴别法(582 页) 试验，显相同的反应。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(附录 6 页)。

【含量测定】 **对照品溶液的制备与标准曲线的制备** 均照紫花杜鹃浸膏项下的方法(582页)制备。

测定法 取本品 10 片，注意除去糖衣，精密称定，研细，精密称取适量(约相当于含黄酮 20 mg)，照紫花杜鹃浸膏项下的方法(582页)，自“置 100 ml 锥形瓶中”起，测定吸收度，计算，即得。

【功能与主治】 同紫花杜鹃浸膏。

【用法与用量】 口服，一次 5 片，一日 3 次。

【规格】 0.25 g

【贮藏】 密封保存。

紫　苏　子

Zisuzi

FRUCTUS PERILLAE

本品为唇形科植物紫苏 Perilla frutescens (L.) Britt. var. acuta (Thunb.) Kudo

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收，除去杂质，晒干。

【性状】 本品呈卵圆形或类球形，直径约 1.5 mm。表面灰棕色或灰褐色，有微隆起的暗紫色网纹，基部稍尖，有灰白色点状果梗痕。果皮薄而脆，易压碎。种子黄白色，种皮膜质，内有类白色的子叶 2 片，有油性。压碎有香气，味微辛。

以粒饱满、色灰棕、油性足者为佳。

【炮制】 **紫苏子** 除去杂质，洗净，晒干。

炒紫苏子 取净紫苏子，照清炒法(附录18页)炒至有香气或起爆裂声。

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 降气，消痰。用于咳逆上气，痰多喘急。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

紫　苏　叶

Zisuye

FOLIUM PERILLAE

本品为唇形科植物紫苏 Perilla frutescens (L.) Britt. var. acuta (Thunb.) Kudo 的干燥叶(或带嫩枝)。夏季枝叶茂盛时采收，除去杂质，晒干。

【性状】 本品叶片多皱缩卷曲、破碎，完整者展平后呈卵圆形，长 4～11 cm，宽 2.5～9 cm。先端长尖或急尖，基部圆形或宽楔形，边缘具圆锯齿。两面紫色或上表面绿色下表面紫色，疏生灰白色毛，下表面有多数凹点状的腺鳞。叶柄长 2～7 cm，紫色或紫绿色。质脆。带嫩枝者，枝的直径 2～5 mm，紫绿色，断面中部有髓。气清香，味微辛。

以叶完整、色紫、香气浓者为佳。

【鉴别】 本品叶的表面制片：表皮细胞中某些细胞内含有紫色素，滴加 10% 盐酸溶液，立刻显红色；或滴加 5%氢氧化钾溶液，即显鲜绿色，后变为黄绿色。

【炮制】 除去杂质及老梗；或喷淋清水，切碎，干燥。

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 解表散寒，行气和胃。用于风寒感冒，咳嗽，胸腹胀满，恶心呕吐。解鱼蟹毒。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

紫　苏　梗

Zisugeng

CAULIS PERILLAE

本品为唇形科植物紫苏 Perilla frutescens (L.) Britt. var. acuta (Thunb.) Kudo 的干燥茎。秋季果实成熟后采割，除去杂质，晒干，或趁鲜切片，晒干。

【性状】 本品呈方柱形，四棱钝圆，四面有纵沟，长短不一，直径 0.5～1.5 cm。表面紫棕色或暗紫色，有细纵纹，节部稍膨大，有对生的枝痕和叶痕。体轻，质硬，断面裂片状。切片厚 2～5 mm，常呈斜长方形，木部黄白色，有细密的放射状纹理，髓部白色，疏松或脱落。气微香，味淡。

以外皮色紫棕、有香气者为佳。

【炮制】 除去杂质，稍浸，润透，切片，干燥。

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 理气宽中。用于胸脘胀闷，嗳气呕吐，胎动不安。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

紫　河　车

Ziheche

PLACENTA HOMINIS

本品为健康人的干燥胎盘。将新鲜胎盘，除去羊膜及脐带，反复冲洗至去净血液，蒸或置沸水中略煮后，干燥。

【性状】 本品呈圆形或碟状椭圆形，直径 9～15 cm，厚薄不一。黄色或黄棕色，一面凸起抽皱，另一面较平滑，常附有残余的脐带，四周有细血管。质硬脆。有腥气。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

以完整、色黄、血管内无残血者为佳。

【炮制】 除去灰屑，砸成小块。

【性味】 甘、咸，温。

【功能与主治】 补气，养血，益精。用于体质虚弱，久病体虚，虚喘，盗汗，遗精。

【用法与用量】 1.5～3 g，研末吞服。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

紫　金　龙

Zijinlong

RADIX DACTYLICAPNI

本品系白族习用药材，白族语称“滋坚轮”；为罂粟科植物紫金龙 Dactylicapnos scandens (D. Don) Hutchins. 的干燥根。秋季采挖，除去杂质，晒干。

【性状】 本品呈圆柱形，略弯曲，有的有分枝，长 5～30 cm，直径 0.5～4 cm。根头部稍粗大而扭曲，有数个残留茎基。表面暗灰棕色至暗紫褐色，有明显纵沟纹。质硬而脆，折断时有粉尘飞扬，断面浅灰棕色至暗紫褐色，可见放射状纹理。气微，味苦、微麻。

以条粗长、苦味浓者为佳。

【鉴别】 (1) 取本品粗粉 2 g，加氨试液湿润，用苯 20 ml 浸渍，随时振摇，滤取苯液，用 3%盐酸溶液 5 ml 多次反复提取至无生物碱反应，合并酸液，放置后析出结晶，滤过。取结晶，加硫酸 3 滴，显紫色，逐渐变成草绿色。

(2) 取鉴别(1)项下滤去结晶后的滤液，加氯仿 10 ml 振摇提取，至氯仿提取液无生物碱反应，用无水硫酸钠脱水后，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 5 ml 溶解后，加 1%三氯化铁的乙醇溶液 2 滴，即显绿色。

【炮制】 除去杂质，洗净，晒干，研粉。

【性味】 苦、辛，凉。

【功能与主治】 镇痛，止血。用于胃痛，神经性头痛，牙痛，外伤肿痛、出血。

【用法与用量】 研末口服，每次 1～3 g；外用适量，研末撒敷患处。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

紫　　草

Zicao

RADIX ARNEBIAE SEU LITHOSPERMI

本品为紫草科植物新疆紫草 Arnebia euchroma (Royle) Johnst. 或紫草 Lithospermum erythrorhizon Sieb. et Zucc. 的干燥根。前者习称"软紫草"，后者习称"硬紫草"。春、秋二季采挖，除去泥沙，干燥。

【性状】 **软紫草** 呈不规则的长圆柱形，多扭曲，长 7～20 cm，直径 1～2.5 cm。顶端有的可见分歧的茎残基。表面紫红色或紫褐色，皮部疏松，呈条形片状，常 10 余层重叠，易剥落。体轻，质松软，易折断，断面不整齐，中心木部较小，黄白色或黄色。气特异，味微苦、涩。

硬紫草 呈圆锥形，扭曲，有分枝，长 7～14 cm，直径 1～2 cm。表面紫红色或紫黑色，粗糙有纵纹，皮部薄，易剥落。质硬而脆，易折断，断面皮部深紫色，木部较大，灰黄色。

均以条粗大、色紫、皮厚者为佳。

【鉴别】 (1) 本品用手捻之，可将手指染成紫红色，明显，且不易褪色。

(2) 取本品粉末少量，加乙醚 2 ml，振摇，乙醚液呈红色；分取醚液，挥去乙醚，残渣加氢氧化钠试液，即显蓝色，再加稀盐酸使成酸性，则变红色，并发生红色沉淀或浑浊。

【炮制】 软紫草除去杂质，切段；硬紫草除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清热凉血，化斑解毒。用于发斑发疹，肝炎，痈肿；外治冻伤，湿疹，烧、烫伤。

【用法与用量】 4.5～9 g；外用适量，煎汁或熬膏涂敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

紫　草　茸

Zicaorong

LACCA

本品为胶蚧科昆虫紫胶虫 Laccifer lacca Kerr 所分泌的胶质。夏、秋二季采收，干

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

燥。

【性状】 本品呈槽状或块状，长 1～7 cm，厚 0.5～2 cm。表面红棕色或紫褐色，凹凸不平，有皱纹、小虫眼及孔隙，一面凹入成沟。质硬而脆，断面有放射状排列的长圆形虫窝，其内常见白色粉末或紫黑色的虫体。气微，味微涩。

以块大、色紫、有光泽者为佳。

【鉴别】 本品遇热即软化、熔化，并放出大量气泡，体积膨胀；燃烧时产生黑烟和特异臭气。

【炮制】 除去枝梗及杂质。

【性味】 甘、咸，平。

【功能与主治】 凉血，和血，敛疮。用于月经过多；外治外伤出血，湿疹，溃疡不敛。

【用法与用量】 1.5～6 g；外用适量，多作油膏用。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

紫　珠　叶

Zizhuye

FOLIUM CALLICARPAE PEDUNCULATAE

本品为马鞭草科植物杜虹花 Callicarpa pedunculata R. Br. 的干燥叶。夏、秋二季枝叶茂盛时采摘，干燥。

【性状】 本品多皱缩、卷曲，有的破碎。完整叶片展平后呈卵状椭圆形，长 4～19 cm，宽 2.5～9 cm；先端渐尖或钝圆，基部宽楔形或钝圆，边缘有细锯齿，近基部全缘；上表面灰绿色或棕绿色，被星状毛和短粗毛，下表面淡绿色或淡棕绿色，被棕黄色茸毛，主脉和侧脉突起，小脉伸入齿端。叶柄长 0.5～1.5 cm。无臭，味微苦涩。

【鉴别】 本品粉末淡棕黄色。非腺毛有两种：一种为迭式星状毛，大多碎断，中轴直径至 60 μm，壁厚至 14 μm，木化，完整者 1 至数轮，每轮 1～6 侧生细胞；另一种非腺毛 1～3 细胞，直径 25～33 μm，壁较厚。两种毛茸的细胞壁表面常可见螺旋状纹理。腺鳞头部 8～11 细胞，扁球形，直径 61～94 μm；柄极短。小腺毛头部 2～4 细胞，直径 25～32 μm；柄 1～2 细胞。草酸钙簇晶直径 4～17 μm。

【性味】 苦、涩，平。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 止血，散瘀，消肿。用于创伤出血，咳血，鼻衄，胃出血，拔牙出血。

【用法与用量】 3～15 g，粉末 1.5～3 g；外用适量，敷于患处。

【贮藏】 置通风干燥处。

紫萁贯众

Ziqiguanzhong

RHIZOMA OSMUNDAE

本品为紫萁科植物紫萁 Osmunda japonica Thunb. 的干燥根茎及叶柄基部。春、秋二季采挖，洗净，除去须根，晒干。

【性状】 本品略呈棒状或圆锥状，稍弯曲，顶端有的分枝，长 5～30 cm，直径 3～8 cm。表面棕褐色至棕黑色。根茎横生或斜生，下部多着生黑色而硬的细根；叶柄残基近扁圆形，斜向上，长不及 4 cm，直径 0.2～0.6 cm，表面暗棕色，切断面有马蹄形筋脉纹（维管束），常与皮部分开。质硬，不易折断。气微，味甘、微涩。

【鉴别】 本品叶柄基部横切面：表皮多脱落。下皮为 10 余列棕色多角形厚壁细胞。内皮层明显。周韧维管束“U”形，木质部导管为 8～11 个导管群；维管束凹入处有厚壁组织。薄壁细胞含淀粉粒。

【炮制】 除去杂质，略泡，洗净，润透，切片，晒干。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清热解毒，止血。用于防治感冒，鼻衄头晕，痢疾，崩漏。

【用法与用量】 4.5～9 g；本品作预防用，放入水缸内，饮用其水。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

紫菀

Ziwan

RADIX ASTERIS

本品为菊科植物紫菀 Aster tataricus L. f. 的干燥根及根茎。春、秋二季采挖，除去

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

有节的根茎（习称"母根"）和泥沙，编成辫状晒干，或直接晒干。

【性状】 本品根茎呈不规则的疙瘩头状，大小不一，顶端有茎、叶的残基，下端偶有未除尽的母根，质稍硬。根茎簇生多数细根，长3～15 cm，直径0.1～0.3 cm，多编成辫状；表面紫红色或灰红色，有纵皱纹；质较柔韧。气微香，味甜、微苦。

以根长、色紫红、质柔韧者为佳。

【鉴别】 (1)本品横切面：表皮细胞有时脱落。下皮细胞略切向延长，含紫色色素。皮层宽广，有细胞间隙；油室4～6个，位于皮层内侧；内皮层明显。中柱小，形成层不明显。木质部略成环状。有髓。

(2) 取本品粗粉2 g，加水20 ml，置60°水浴上加热10分钟，趁热滤过，放冷。取滤液2 ml，置带塞试管中，用力振摇1分钟，产生持久性泡沫，10分钟内不消失。

【炮制】 **紫菀** 除去杂质，洗净，稍润，切片，干燥。

蜜紫菀 取紫菀片，照蜜炙法（附录19页）用蜜水炒至放凉不粘手。

【性味】 辛、苦，温。

【功能与主治】 祛痰止咳。用于新久咳嗽，咯痰不爽，痰中带血。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防潮。

景天三七

Jingtiansanqi

HERBA SEDI AIZOON

本品为景天科植物景天三七 Sedum aizoon L. 的干燥全草。夏、秋二季采挖，除去泥沙，晒干。

【性状】 本品根茎短小，略呈块状；表面灰棕色，根数条，粗细不等；质硬，断面呈暗棕色或类灰白色。茎圆柱形，长15～40 cm，直径0.2～0.5 cm；表面暗棕色或紫棕色，有纵棱；质脆，易折断，断面常中空。叶互生或近对生，几无柄；叶片皱缩，展平后呈长披针形至倒披针形，长3～8 cm，宽1～2 cm；灰绿色或棕褐色，先端渐尖，基部楔形，边缘上部有锯齿，下部全缘。聚伞花序顶生，花黄色。气微，味微涩。

【鉴别】 (1) 本品根的横切面：木栓层为10余列细胞，棕色。皮层较薄。韧皮部宽广。形成层成环。木质部导管类圆形，直径约至56 μm，多单个散在，分布较密。薄壁

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

细胞含草酸钙砂晶。

(2) 取本品粉末 4 g，加水适量，煮沸 10 分钟，滤过，滤液浓缩至 6 ml，加等量醋酸乙酯提取，提取液置水浴上蒸干，残渣加水 2 ml 使溶解。溶液分为二份，一份加碳酸钾少量，片刻后显黄绿色；另一份加浓氨溶液 2 滴，显橙红色。

【炮制】 除去杂质，洗净，切段，晒干。

【性味】 甘、微酸，平。

【功能与主治】 散瘀，止血，安神。用于溃疡病、肺结核、支气管扩张及血小板减少性紫癜等血液病的中小量出血，外伤出血，烦躁不安。

【用法与用量】 30～60 g；鲜品 60～90 g，煎或捣汁内服。

【贮藏】 置通风干燥处。

【制剂】 景天三七糖浆

景天三七糖浆

Jingtiansanqi Tangjiang

SYRUPUS SEDI AIZOON

【处方】 景天三七 2000 g　蔗糖 350 g　苯甲酸钠 3g　枸橼酸　适量

【制法】 取景天三七，加水煎煮二次，第一次 2 小时，第二次 1 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩，加乙醇搅拌使含乙醇量达 60%，静置沉淀，取上清液浓缩成清膏。取蔗糖，加水溶解，滤过，与清膏合并，浓缩至 1000 ml，滤过，加苯甲酸钠与枸橼酸使溶解，放冷，即得。

【性状】 本品为棕红色粘稠液体；味甜、微涩。

【鉴别】 取本品 5 ml，加醋酸乙酯 5 ml 振摇提取，提取液照景天三七项下的鉴别法(2)项(590页)试验，显相同的反应。

【检查】 **pH 值**　应为 3.5～4.5（附录42页）。

比重　应为 1.160 以上（附录26页）。

【功能与主治】 止血。用于溃疡病、肺结核、支气管扩张及血小板减少性紫癜等血液病的中小量出血，外伤出血。

【用法与用量】 口服，一次 15～25 ml，一日 3 次。

【贮藏】 密封保存。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蛤　　壳

Geqiao

CONCHA MERETRICIS SEU CYCLINAE

本品为帘蛤科动物文蛤 Meretrix meretrix L. 或青蛤 Cyclina sinensis Gmelin 的贝壳。夏、秋二季捕捞，去肉，洗净，晒干。

【性状】 **文蛤**　扇形或类圆形，背缘略呈三角形，腹缘呈圆弧形，长 2～8 cm，宽 3～10 cm。壳顶突出，位于背面，稍靠前方。壳外面光滑，黄褐色，同心生长纹清晰，通常在背部有锯齿状或波纹状褐色花纹。壳内面白色，边缘无齿纹，前后壳缘有时略带紫色，铰合部较宽，右壳有主齿 3 个及前侧齿 2 个；左壳有主齿 3 个及前侧齿 1 个。质坚硬，断面有层纹。无臭，味淡。

青蛤　类圆形，壳顶突出，位于背侧近中部。壳外面淡黄色或棕红色，同心生长纹凸出壳面略呈环肋状。壳内面白色或淡红色，边缘常带紫色并有整齐的小齿纹，铰合部左右两壳均具主齿 3 个，无侧齿。

均以光滑、色黄白、紫口者为佳。

【炮制】 **蛤壳**　洗净，晒干，碾碎或碾粉。

煅蛤壳　取净蛤壳，照煅法（附录19页）煅至红透。

【性味】 咸，寒。

【功能与主治】 清化热痰，软坚，制酸。用于热痰喘嗽，胃痛泛酸，淋巴结结核，白带；外治湿疹。

【用法与用量】 6～12 g；外用煅制品适量，研末油调涂患处。

【贮藏】 置干燥处。

蛤　　蚧

Gejie

GECKO

本品为守宫科动物蛤蚧 Gekko gecko L. 的干燥体。全年均可捕捉，除去内脏，拭

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

净，用竹片撑开，使全体扁平顺直，低温干燥。

【性状】 本品呈扁片状，头颈部及躯干部长 9～18 cm，头颈部约占三分之一，腹背部宽 6～11 cm，尾长 6～12 cm。头稍扁，略呈三角形，两眼多凹陷成穹窿，口内有细齿，生于颚的边缘，为大牙。腹背部呈椭圆形，腹薄。背部呈灰黑色或银灰色，有黄白色或灰绿色斑点散在或密集成不显著的斑纹，脊椎骨及两侧肋骨突起。四足均具 5 趾；趾间仅具蹼迹，足趾底有吸盘。尾细而坚实，微现骨节，与背部颜色相同，有 7 个明显的银灰色环带。全身密被圆形或多角形微有光泽的细鳞。气腥，味微咸。

以体大、尾全、不破碎者为佳。

【炮制】 **蛤蚧** 除去鳞片及头足，切成小块。

酒蛤蚧 取蛤蚧块，用酒浸润后，烘干。

【性味】 咸，微温。

【功能与主治】 补肺益肾，定喘助阳。用于喘促气短，咯血，阳痿。

【用法与用量】 3～6 g，多入丸散或酒剂。

【贮藏】 用木箱严密封装，常用花椒拌存，置阴凉干燥处，防蛀。

黑　风　藤

Heifengteng

CAULIS FISSISTIGMAE

本品为番荔枝科植物多花瓜馥木 Fissistigma polyanthum (Hook. f. et Thoms.) Merr. 的干燥藤茎。全年均可采割，切片，晒干。

【性状】 本品为椭圆形或不规则的块片，直径 3～6 cm。外皮灰褐色至黑褐色，略粗糙，具纵向裂纹及突起的皮孔，外皮剥落处呈红棕色。切面皮部棕色至红棕色，木部淡黄色至浅红棕色，有密集的小孔、放射状纹理及偏心性环纹，质硬，气微，味微

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

(2) 取滤液点于滤纸上，依次喷以1%硫酸铁铵溶液与1%铁氰化钾溶液，即显蓝色斑点。

【性味】 涩、微辛，温。

【功能与主治】 祛风湿，强筋骨，活血止痛。用于小儿麻痹后遗症，风湿性关节痛。

【用法与用量】 60～120 g；外用适量。

【贮藏】 置干燥处。

黑老虎根

Heilaohugen

RADIX KADSURAE COCCINEAE

本品为木兰科植物厚叶五味子 Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith 的干燥根。全年均可采挖，洗净，晒干。

【性状】 本品呈圆柱形，弯曲，直径1～3 cm。表面深褐色或黑褐色，粗糙，皮部多横向断离，呈串珠状，皮部与木部易剥离。质坚韧，不易折断，断面皮部厚，浅蓝灰色，有密集的小白点和放射状的细条纹；木部黄白色或浅棕色，可见多数小孔。气微香，味微辛。

以皮厚、香气浓者为佳。

【鉴别】 本品横切面：木栓层为10余列细胞。皮层甚窄。韧皮部射线宽1～3列细胞，含棕色物；纤维单个散在或2～6个相聚，壁极厚，胞腔难察见，其与薄壁细胞毗接一侧的外层壁中嵌有多数细小草酸钙方晶；油细胞较多，含淡黄绿色油滴；薄壁细胞含淀粉粒，有的含棕色物。形成层成环。木质部主为木纤维；导管大多单个散在，类圆形，直径约至280 μm；射线细胞亦含棕色物。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切段，晒干。

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 行气活血，祛风止痛。用于风湿痹痛，痛经，脘腹痛，跌扑瘀痛。

【用法与用量】 9～18 g。

【贮藏】 置干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

黑　芝　麻

Heizhima

SEMEN SESAMI

本品为脂麻科植物脂麻 Sesamum indicum L. 的干燥成熟种子。秋季果实成熟时采割植株，晒干，打下种子，除去杂质，再晒干。

【性状】 本品呈扁卵圆形，长约 3 mm，宽约 2 mm。表面黑色，平滑或有网状皱纹。一端尖，有棕色点状种脐，另端圆。种皮薄，种仁(子叶)白色，富油性。气微，味甘、有油香气。

以粒饱满、色黑者为佳。

【鉴别】 取本品约 1 g，研碎，加石油醚(沸程 60～90°)10 ml，浸泡 1 小时，倾取上清液，置试管中，加含蔗糖 0.1 g 的盐酸 10 ml，振摇半分钟，酸层显粉红色，静置后，渐变为红色。

【炮制】 除去杂质，洗净，晒干。

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 补肝肾，润燥。用于头晕，眼花，耳鸣，头发早白，病后脱发，体虚便秘。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

黑　胡　椒

Heihujiao

FRUCTUS PIPERIS NIGRI

本品为胡椒科植物胡椒 Piper nigrum L. 的干燥近成熟果实。秋末至次春果实呈暗绿时采摘，晒干。

【性状】 本品呈球形，直径 3.5～5 mm。表面黑褐色，具隆起网状皱纹，顶端有细

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

小花柱残迹，基部有自果轴脱落的疤痕。质硬，外果皮可剥离，中果皮呈灰白色或淡黄色。切断面黄白色，粉性，中有小空隙。气芳香，味辛辣。

以粒大、色黑、气味浓者为佳。

【鉴别】 (1) 本品粉末暗灰色。外果皮石细胞类方形、长方形或形状不规则，直径19～66 μm，壁较厚。内果皮石细胞表面观类多角形，直径20～30 μm，侧面观方形，壁一面薄。种皮细胞棕色，多角形，壁连珠状增厚。油细胞较少，类圆形，直径51～75 μm。淀粉粒细小，常聚集成团块。

(2) 取本品粉末少量，加硫酸1滴，显红色，渐变红棕色，后转棕褐色。

【炮制】 除去杂质及灰屑，用时粉碎成细粉。

【性味】 辛，热。

【功能与主治】 温中，散寒，健胃。用于风寒感冒，脘腹冷痛，腹泻，食欲不振，癫痫；外治受寒腹痛，肢体疼痛。

【用法与用量】 0.6～1.5 g，吞服；外用适量，研末，加于膏药上贴脐及患处。

【贮藏】 置阴凉干燥处，密闭保存。

黑种草子

Heizhongcaozi

SEMEN NIGELLAE

本品系维吾尔族习用药材，维吾尔文名为 Siyadan（斯亚旦）；为毛茛科植物瘤果黑种草 Nigella glandulifera Freyn 的干燥种子。秋季采收成熟果实，除去泥沙及果皮，晒干。

【性状】 本品呈三角状卵形，长2.5～3 mm，宽约1.5 mm。表面黑色，粗糙，具3～5纵棱及不规则的突起。断面灰白色，有油性。气微香，味辛。

以粒大、饱满、色黑、辛味浓者为佳。

【性味】 甘、辛，温。

【功能与主治】 补脑肾，通经，通乳，利尿。用于尿路结石，耳鸣，乳汁缺少，闭经。

【用法与用量】 1.5～6 g。

【注意】 孕妇及热性病患者忌服。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【贮藏】 置阴凉干燥处。

锁　　阳

Suoyang

HERBA CYNOMORII

本品为锁阳科植物锁阳Cynomorium songaricum Rupr.的干燥肉质茎。春季采挖，除去花序，切段，晒干。

【性状】 本品呈扁圆柱形，微弯曲，长5～15 cm，直径1.5～5 cm。表面棕色或棕褐色，粗糙，具明显纵沟，有的残存三角形的黑棕色鳞片。体重，质硬，难折断，断面浅棕色或棕褐色，有黄色三角状维管束。气微，味甘而涩。

以条粗壮、体重、质硬、断面显油润者为佳。

【鉴别】 取本品粉末0.5 g，加水4 ml，浸渍15分钟，振摇，滤过，照纸层析法（附录36页），取滤液在层析纸上点样，用正丙醇-冰醋酸-乙醇-水(4:1:1:2)为展开剂，按上行法展开至溶剂前缘距离点样线5 cm时取出，晾干，浸入吲哚醌丙酮溶液（取α，β-吲哚醌0.1 g，加丙酮10 ml使溶解，再加冰醋酸1 ml）内使显色，迅速取出，干后，在100°烘半分钟，纸上即显一蓝绿色斑点。

【炮制】 洗净，润透，切片，干燥。

【性味】 甘，温。

【功能与主治】 补肾阳，益精，润肠。用于腰膝痿软，阳痿，滑精，肠燥便秘。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

鹅 不 食 草

Ebushicao

HERBA CENTIPEDAE

本品为菊科植物鹅不食草Centipeda minima (L.) A. Braun et Aschers.的干燥全

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

草。夏、秋二季花开时采收，除去泥沙，晒干。

【性状】 本品扭集成团。须根纤细，淡黄色。茎细，多分枝；质脆，易折断，断面黄白色。叶小，近无柄；叶片多皱缩、破碎，完整者展平后呈匙形，表面灰绿色或棕褐色，边缘有3～5个锯齿。头状花序黄色或黄褐色。气微香，久臭有刺激感，味苦、微辛。

以色灰绿、刺激性气强者为佳。

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 通鼻窍，止咳。用于鼻塞不通，头痛，百日咳，慢性气管炎；外治肥厚性鼻炎，结膜炎，疟疾。

【用法与用量】 6～9 g；外用适量，研末吸鼻，或取鲜品揉搓后塞鼻。

【注意】 有胃病者慎用。

【贮藏】 置通风干燥处。

筋 骨 草（白毛夏枯草）

Jingucao

HERBA AJUGAE

本品为唇形科植物筋骨草 Ajuga decumbens Thunb. 的干燥全草。春季花开时采收，除去泥沙，晒干。

【性状】 本品长 10～35 cm。根细小，暗黄色。地上部分灰黄色或暗绿色，密被白柔毛。细茎丛生，质较柔韧，不易折断。叶对生，多皱缩、破碎，完整叶片展平后呈匙形或倒卵状披针形，长 3～6 cm，宽 1.5～2.5 cm，绿褐色，边缘有波状粗齿，叶柄具狭翅。轮伞花序腋生，小花二唇形，黄棕色。气微，味苦。

以色绿、花多者为佳。

【鉴别】 取本品粉末 1 g，加水 20 ml，浸泡过夜后，煮沸 5 分钟，滤过。取滤液 1 ml，加 10%亚硝酸钠溶液与 10%硝酸铝溶液各 3 滴，摇匀，再加氢氧化钠试液 1 ml，显橙红色。

【炮制】 除去杂质，洗净，切段，晒干。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清热解毒，止咳祛痰，养筋和血。用于急、慢性支气管炎，咽炎，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

扁桃体炎，关节疼痛；外治外伤出血。

【用法与用量】 9～15 g。

【注意】 孕妇慎服。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

【制剂】 筋骨草片

筋 骨 草 片（白毛夏枯草片）

Jingucao Pian

TABELLAE AJUGAE

本品为筋骨草浸膏片。每片相当于筋骨草 2.5 g。

【制法】 取筋骨草 2400 g，粉碎成粗粉，用 90%乙醇加热回流提取二次，每次 1 小时，合并提取液，蒸去乙醇，浓缩膏加 3 倍量的热水搅匀，放冷，冷藏 12 小时，滤过，滤渣用热水洗涤，洗液并入滤液中，浓缩至稠膏状，放冷，加筋骨草细粉 100 g，混匀，在 85°以下干燥，制成颗粒，压制成 1000 片，包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显黑褐色；味苦。

【鉴别】 取本品 10 片，除去糖衣，加水 20 ml，煮沸 5 分钟，滤过。取滤液 1 ml，加 5%亚硝酸钠溶液与 10%硝酸铝溶液各 3 滴，再加氢氧化钠试液 1 ml，显浅红色。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(附录 6 页)。

【功能与主治】 清热解毒，止咳，祛痰，平喘。用于急、慢性支气管炎，肺脓疡。

【用法与用量】 口服，一次 4～6 片，一日 3 次。

【贮藏】 密封保存。


傣 肌 松

Daijisong

CISSAMPELINI METHIODIDUM

本品为防己科植物亚乎奴 Cissampelos pareira L. 的根及茎中提取得到亚乎奴碱的碘甲烷盐。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



[$C_{38}H_{44}O_6N_2I_2$=878.59]

【性状】 本品为淡黄色的结晶性粉末；无臭，味微苦。

本品在热水中略溶，在水或乙醇中极微溶解，在氯仿或乙醚中不溶。

熔点 本品的熔点（附录28页）为277～281°，熔融时同时分解。

吸收系数 取本品，精密称定，加水制成每1 ml中含50 μg的溶液，照分光光度法（附录32页），在281±1 nm的波长处测定吸收度，按干燥品计算，吸收系数（$E_{1cm}^{1\%}$）为84.0～89.0。

【鉴别】 (1) 取本品约2 mg，加水2 ml与硝酸汞溶液（取汞1份，加发烟硝酸1份溶解后，加水2份稀释制成）2～3滴，煮沸，溶液显暗红色，放冷，析出褐色沉淀。

(2) 取本品约2 mg，加水2 ml，温热使溶解，加硝酸银试液2～3滴，发生淡黄色沉淀。

【检查】 **游离碘** 取本品1 g，加碘化钾试液30 ml，振摇半小时，滤过，加淀粉指示液2～3滴，如显蓝色，加*N*/10硫代硫酸钠液1滴，蓝色应即消失。

干燥失重 取本品，在105°干燥至恒重，减失重量不得过6.0%（附录44页）。

炽灼残渣 不得过0.2%（附录45页）。

【功能与主治】 横纹肌松弛药。用于外科手术中使横纹肌松弛。

【贮藏】 遮光，密闭保存。

【制剂】 氯肌松注射液

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

傣肌松注射液

Daijisong Zhusheye

INJECTIO CISSAMPELINI METHIODIDI

本品为傣肌松的灭菌水溶液。含傣肌松应为标示量的90.0～110.0%。

本品中可加烟酰胺为助溶剂。

【性状】 本品为黄色的澄明液体。

【鉴别】 取本品1 ml，照傣肌松项下的鉴别法(599页)试验，显相同的反应。

【检查】 pH值 应为4.5～7.0(附录42页)。

其他 应符合注射剂项下有关的各项规定(附录7页)。

【含量测定】 对照品溶液的制备 精密称取在105°干燥2小时的傣肌松对照品25 mg，加水30 ml，置水浴上微热溶解后，移置50 ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，即得（每1 ml中含傣肌松0.5 mg)。

标准曲线的制备 精密量取对照品溶液0.3、0.6、0.9、1.2与1.5 ml，分别置试管中，各加水稀释至2 ml，再分别加硫酸汞溶液（取硫酸汞15 g，加5 *N*硫酸液100 ml使溶解)1.5 ml，置水浴中加热25分钟，放冷至室温，各加7 *N*硫酸液1 ml与新制的亚硝酸钠溶液(1→500)1 ml，再分别加水至6.0 ml，摇匀，放置20分钟。照分光光度法(附录32页)，在510 nm波长处测定吸收度，以吸收度为纵座标，浓度为横座标，绘制标准曲线。

测定法 精密量取本品5 ml，置100 ml量瓶中，加水至刻度，摇匀，精密量取2 ml，置试管中，照标准曲线项下的方法，自"加硫酸汞溶液"起测定吸收度，从标准曲线中读出供试液中傣肌松的含量，计算，即得。

【功能与主治】 同傣肌松。

【用法与用量】 静脉注射，一次10～20 mg。

【规格】 2 ml:10 mg

【贮藏】 遮光，密闭保存。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

滑　　石

Huashi

TALCUM

本品为单斜晶系滑石的矿石，主含含水硅酸镁。采挖后，除去泥沙及杂石。

【性状】 本品呈扁平形、斜方形或不规则的块状，大小不一。白色、黄白色或淡蓝灰色，有蜡样光泽。体较重，质细腻，手摸有滑润感，无吸湿性，置水中不崩散。无臭，无味。

以色白、滑润者为佳。

【鉴别】 取本品约 0.2 g，研碎，加无水碳酸钠 0.9 g 与无水碳酸钾 1.3 g，研匀后，置铂或镍坩埚中，炽灼，至完全熔融，放冷，熔融物用热水约 50 ml 移至烧杯中，加盐酸适量至泡沸停止，再多加盐酸 10 ml，置水浴上蒸干，放冷，加水 20 ml，煮沸，滤过。滤液中加氯化铵约 2 g 与氨试液 5 ml，必要时滤过，滤液中加磷酸氢二钠试液，即发生白色结晶性沉淀。

【炮制】 除去杂石，洗净，砸成小块，研成细粉，或照水飞法(附录17页)水飞，晾干。

【性味】 甘，寒。

【功能与主治】 清暑，渗湿。用于暑热烦渴，尿少涩痛，水泻；外治皮肤湿疹、溃疡。

【用法与用量】 9～24 g；外用适量。

【贮藏】 置干燥处。

滑　石　粉

Huashifen

PULVIS TALCI

本品系天然滑石经粉碎、净化，干燥制成。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 本品为白色或类白色、微细、无砂性的粉末，手摸有滑腻感。无臭，无味。

本品在水、稀矿酸或稀氢氧化碱溶液中均不溶解。

【鉴别】 取本品，照滑石项下的鉴别法（602页）试验，显相同的反应。

【检查】 **酸碱度与水中可溶物** 取本品 10 g，加水 50 ml，煮沸 30 分钟，放冷，补充蒸失的水分，滤过，滤液遇石蕊试纸应显中性反应。取滤液 25 ml，蒸干，并在 105°干燥至恒重，遗留残渣不得过 6 mg(0.12%)。

酸中可溶物 取本品 1 g，加稀盐酸 20 ml，在 50° 浸渍 15 分钟，滤过，分取滤液 10 ml，加稀硫酸 1 ml，蒸干，炽灼至恒重，遗留残渣不得过 7.5 mg(1.5%)。

铁盐 取本品 10 g，加水 30 ml，加热煮沸 30 分钟，随时补充蒸失的水分，放冷，滤过，滤液加稀盐酸与亚铁氰化钾试液各 1 ml，不得即时显蓝色。

炽灼失重 取本品，在 600～700°炽灼至恒重，减失重量不得过 5.0%。

【功能与主治】【用法与用量】 同滑石。

【贮藏】 密闭保存。

蓍　草

Shicao

HERBA ACHILLEAE

本品为菊科植物蓍草 Achillea alpina L. 的干燥地上部分。夏、秋二季花未开放时采割，晒干。

【性状】 本品茎呈圆柱形，上部有分枝，长 30～100 cm；表面具纵棱，被白色柔毛。叶互生，无柄；叶片多破碎，完整者展平后呈条状披针形，羽状深裂，长 2～6 cm，宽 0.5～1.5 cm；暗绿色，两面均被柔毛；叶基半抱茎。头状花序密集成复伞房状。气微，味微辛。

以叶色绿、花蕾多者为佳。

【鉴别】 本品茎的横切面：表皮细胞类方形，角质层呈细齿状突起；有非腺毛。皮层较窄，外侧为厚角组织；内侧有树脂道散在。维管束外韧型。射线较宽。形成层成环。木质部不发达，导管常单行排列。髓部大。

【炮制】 除去杂质，切段，晒干。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性味】 苦、酸，平。

【功能与主治】 抗菌消炎，解毒，镇痛。用于扁桃体炎，肠炎，痢疾，阑尾炎，肾盂肾炎，盆腔炎，毒蛇咬伤。

【用法与用量】 15～45 g，必要时日服二剂；外用鲜品适量，捣烂敷患处。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

蓝 布 正

Lanbuzheng

HERBA GEI

本品为蔷薇科植物草本水杨梅 Geum aleppicum Jacq. 或南水杨梅Geum japonicum Thunb. var. chinense Bolle 的干燥全草。夏、秋二季采收，洗净，晒干。

【性状】 本品长 90～100 cm。主根短，有多数细根，褐棕色。茎圆柱形，被毛或近无毛。基生叶有长柄，羽状全裂或近羽状复叶，顶裂片较大，卵形或宽卵形，边缘有大锯齿，两面被毛；侧生裂片小，边缘有不规则的粗齿；茎生叶互生，卵形，3 浅裂或羽状分裂。花顶生，常脱落。聚合瘦果近球形。气微，味辛、微苦。

【鉴别】 (1) 取本品粗粉 2 g，加水 10 ml，浸渍 12 小时，滤过。取滤液 2 ml，加1%三氯化铁的乙醇溶液 1～2 滴，显蓝绿色。

(2) 取鉴别(1)项下剩余的滤液 2 ml，加氢氧化钙饱和溶液1～2滴，即发生棕色沉淀。

【炮制】 除去杂质，洗净，切段，晒干。

【性味】 微苦，温。

【功能与主治】 益气补血，养阴，健脾胃，润肺化痰。用于虚损痨伤，虚弱咳嗽，白带。

【用法与用量】 9～30 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

蓝 花 参

Lanhuashen

HERBA WAHLENBERGIAE

本品为桔梗科植物蓝花参 Wahlenbergia marginata (Thunb.) A. DC. 的干燥全草。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

夏、秋二季采挖，除去杂质，晒干。

【性状】 本品长 10～30 cm。根细长，稍扭曲，有的有分枝，长 4～8 cm，直径 0.3～0.7 cm；表面棕褐色或浅棕黄色，具细纵纹，断面黄白色。茎丛生，纤细。叶互生，无柄；叶片多皱缩，展平后呈条形或倒披针状匙形，长 1～3 cm，宽 0.2～0.4 cm；灰绿色或棕绿色。花单生于枝顶，浅蓝紫色。蒴果圆锥形，长约 5 mm。种子多数，细小。气微，味微甜，嚼之有豆腥味。

以根粗、茎叶色绿者为佳。

【炮制】 除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，晒干。

【性味】 甘、微苦，温。

【功能与主治】 补虚健脾，止咳化痰。用于小儿疳积，自汗盗汗，白带，咳嗽痰多。

【用法与用量】 15～30 g。

【贮藏】 置干燥处。

蓖　麻　子

Bimazi

SEMEN RICINI

本品为大戟科植物蓖麻 Ricinus communis L. 的干燥成熟种子。秋季采摘成熟果实，晒干，除去果壳，收集种子。

【性状】 本品呈椭圆形或卵形，稍扁，长 0.9～1.8 cm，宽 0.5～1 cm。表面光滑，有灰白色与黑褐色或黄棕色与红棕色相间的花斑纹。一面较平，一面较隆起，较平的一面有 1 条隆起的种脊；一端有灰白色或浅棕色突起的种阜。种皮薄而脆，胚乳肥厚，白色，富油性，子叶 2 片，菲薄。无臭，味微苦辛。

以饱满、光亮、花纹明显者为佳。

【炮制】 除去杂质，用时去壳，捣碎。

【性味】 甘、辛，平；有毒。

【功能与主治】 消肿，拔毒。外用于疮疖、肿毒未溃。

【用法与用量】 外用适量，捣烂敷患处。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蓖　麻　油

Bimayou

OLEUM RICINI

本品为大戟科植物蓖麻 Ricinus communis L. 的成熟种子中榨取并精制得到的脂肪油。

【性状】 本品为几乎无色或微带黄色的澄清粘稠液体；气微；味淡而后微辛。

本品在乙醇中易溶，与无水乙醇、氯仿、乙醚或冰醋酸能任意混合。

比重 本品的比重（附录26页）在 25°时为 0.956～0.969。

折光率 本品的折光率（附录32页）为 1.478～1.480。

碘值 本品的碘值（附录52页第二法）为 82～90。

皂化值 本品的皂化值（附录52页）为 176～186。

酸值 本品的酸值（附录51页）不大于 2.0。

【检查】 **他种油类** 取本品 1 g，加乙醇 4 ml，应澄清溶解，再加乙醇 15 ml，溶液不得发生浑浊。

【功能与主治】 刺激性泻药。用于导泻。

【用法与用量】 口服，一次 10～20 ml。

【注意】 忌与脂溶性驱肠虫药同用，孕妇忌服。

【贮藏】 遮光，密闭保存。

蒺　藜（刺蒺藜）

Jili

FRUCTUS TRIBULI

本品为蒺藜科植物蒺藜 Tribulus terrestris L. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采割植株，晒干，打下果实，除去杂质。

【性状】 本品为分果，由 5 个分果瓣聚合而成，呈放射状五棱形，直径 7～12 mm。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

常裂为单一的分果瓣，分果瓣呈斧状，长3～6 mm；背部黄绿色，隆起，中间有纵棱及多数小刺，中部两侧各有粗大硬刺1枚，呈八字形分开；基部有稍短的硬刺2枚，两侧面粗糙，有网纹，灰白色。质坚硬。无臭，味苦、辛。

以饱满坚实、背部色黄绿者为佳。

【鉴别】 本品粉末黄绿色。纤维木化，上下层纵横交错排列，少数单个散在，有的纤维形似石细胞。石细胞长椭圆形或类圆形，成群。种皮细胞多角形或类方形，直径约20 μm，壁网状增厚，木化。草酸钙方晶直径8～20 μm。

【炮制】 蒺藜 除去硬刺及杂质。

盐蒺藜 取去刺的蒺藜，照盐水炙法（附录19页）炒至微黄色。

【性味】 苦、辛，平。

【功能与主治】 散风，平肝，明目。用于头痛，眩晕，角膜炎，角膜云翳，胸胁胀闷，皮肤瘙痒。

【用法与用量】 6～9 g。

【贮藏】 置干燥处，防霉。

蒲 公 英

Pugongying

HERBA TARAXACI

本品为菊科植物蒲公英 Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz.、碱地蒲公英 Taraxacum sinicum Kitag. 或异苞蒲公英 Taraxacum heterolepis Nakai et H. Koidz. 的干燥全草。春至秋季花初开时采挖，除去杂质，洗净，晒干。

【性状】 本品呈皱缩卷曲的团状。根呈圆锥状，多弯曲，长3～7 cm；表面棕褐色，抽皱；根头部有棕色或黄白色的茸毛，有的已脱落。叶基生，易破碎，完整叶片呈倒披针形，暗灰绿色或绿褐色，先端尖或钝，边缘浅裂或羽状分裂，基部渐狭，下延呈柄状，下表面主脉明显。花茎1至数条，头状花序顶生，黄褐色或淡黄白色。有的可见多数具白色冠毛的长椭圆形瘦果。气微，味微苦。

以叶多、色绿、根长者为佳。

【鉴别】 本品根横切面：木栓层为数列棕色细胞。韧皮部宽广，乳管群断续排列成数轮。形成层成环。木质部较小，射线不明显；导管较大，散列。薄壁细胞含菊糖。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【炮制】 除去杂质，洗净，切段，晒干。

【性味】 苦、甘，寒。

【功能与主治】 清热，解毒，散结。用于急性乳腺炎，痈肿疮疡，慢性胃炎，尿路感染。

【用法与用量】 12～30 g；外用鲜品适量，捣烂敷患处。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮、防蛀。

【制剂】 蒲公英片

蒲公英片

Pugongying Pian

TABELLAE TARAXACI

本品为蒲公英的浸膏片。每片含干浸膏 0.3 g。

【制法】 取蒲公英，加水煎煮 1.5 小时，滤过，滤液浓缩，加 2.5 倍量的乙醇，静置使沉淀，滤取上清液浓缩，在 80°以下干燥成干浸膏，加适量的辅料，制成颗粒，压片，包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；味微咸、苦涩。

【鉴别】 取本品，除去糖衣，研细，取粉末少量，置白瓷比色板上，加 5%α-萘酚的乙醇溶液及硫酸各 1 滴，即显紫红色。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定（附录 6 页）。

【功能与主治】 清热消炎。用于上呼吸道感染，急性扁桃体炎，疖肿，乳腺炎。

【用法与用量】 口服，一次 3～5 片，一日 4 次。

【贮藏】 密封。

蒲　黄

Puhuang

POLLEN TYPHAE

本品为香蒲科植物水烛香蒲 Typha angustifolia L.、东方香蒲 Typha orientalis

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Presl 或同属植物的干燥花粉。夏季采收蒲棒上部的黄色雄花穗，晒干后碾轧，筛取花粉。

【性状】 本品为黄色粉末。体轻，放水中则飘浮水面。手捻有滑腻感，易附着手指上。气微，味淡。

以粉细、体轻、色鲜黄、滑腻感强者为佳。

【鉴别】 (1) 本品粉末黄棕色。花粉粒类圆形或椭圆形，直径 17～29 μm，表面有拟网状雕纹，单孔不甚明显。

(2) 取本品 0.1 g，加乙醇 5 ml，温浸，滤过。取滤液 1 ml，加镁粉少量与盐酸 2～3 滴，溶液渐显樱红色。

(3) 取本品 0.2 g，加水 10 ml，温浸，滤过。取滤液 1 ml，加三氯化铁试液 1 滴，显淡绿棕色。

【炮制】 蒲黄 揉碎结块。

蒲黄炭 取蒲黄，照炒炭法（附录19页）炒至黑褐色。

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 止血，祛瘀。用于咯血，吐血，尿血，崩漏，脘腹刺痛，外伤出血，跌扑损伤。

【用法与用量】 4.5～9 g；外用适量，敷患处。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮、防蛀。

椿 皮

Chunpi

CORTEX AILANTHI

本品为苦木科植物臭椿 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 的干燥根皮或干皮。全年均可剥取，晒干，或刮去粗皮晒干。

【性状】 本品根皮呈不整齐的片状或卷片状，长宽不一，厚 0.3～1 cm。外表面灰黄色或黄褐色，粗糙，有多数突起的纵向皮孔及不规则纵、横裂纹，除去粗皮者显黄白色；内表面淡黄色，较平坦，密布梭形小孔或小点。质硬而脆，断面外层颗粒性，内层纤维性。气微，味苦。

干皮呈不规则板片状，大小不一，厚 0.5～2 cm。外表面灰黑色，极粗糙，有深裂

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

以肉厚、无粗皮、色黄白者为佳。

【鉴别】（1）本品根皮粉末灰黄白色。石细胞甚多，类圆形、类方形或形状不规则，直径24～96 μm，壁厚，或三面较厚，一面较薄，有的胞腔内含草酸钙方晶。纤维直径20～40 μm，壁极厚，木化。草酸钙方晶直径11～48 μm；簇晶直径约至48 μm。淀粉粒类球形或卵圆形，直径3～13 μm。

干皮粉末灰黄色。木栓细胞碎片较多，草酸钙簇晶偶见，无淀粉粒。

（2）取本品粉末10 g，加甲醇50 ml，加热回流30分钟，趁热滤过。取滤液1 ml，置水浴上蒸干，残渣加冰醋酸1 ml使溶解，再加醋酐-硫酸溶液（19:1）1 ml，溶液由黄绿色迅速变为污绿色。

【炮制】 **椿皮** 除去粗皮，洗净，润透，切丝或段，晒干。

炒椿皮 取椿皮丝，照麸炒法（附录18页）炒至微黄色。

【性味】 苦、涩，寒。

【功能与主治】 清湿热，涩肠，止血。用于白带，崩漏，腹泻，久痢，便血。

【用法与用量】 6～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

槐　　米

Huaimi

FLOS SOPHORAE IMMATURUS

本品为豆科植物槐Sophora japonica L.的干燥花蕾。夏季花蕾形成时采收，及时干燥，除去枝、梗及杂质。

【性状】 本品呈卵形或椭圆形，长2～6 mm，直径约2 mm。花萼钟状，黄绿色，先端5浅裂，下部有数条纵纹。萼的上方为黄白色未开放的花瓣。花梗细小。体轻，手捻即碎。无臭，味微苦涩。

以粒大、紧缩、色黄绿者为佳。

【鉴别】（1）本品粉末黄绿色。花粉粒类球形或钝三角形，直径14～19 μm。具3个萌发孔。非腺毛1～3细胞，长86～660 μm。气孔不定式，副卫细胞4～8个。草酸钙方晶少见。

（2）取本品粉末0.1 g，加乙醇10 ml，置水浴上加热5分钟，滤过。取滤液1 ml，加

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

镁粉少量与盐酸 2～3 滴，即显樱红色。

【炮制】 **槐米** 除去杂质及灰屑。

炒槐米 取净槐米，照清炒法（附录18页）炒至表面呈深黄色并有香气。

槐米炭 取净槐米，照炒炭法（附录19页）炒至表面焦黑色，内部深棕色。

【性味】 苦，微寒。

【功能与主治】 凉血，止血，清热。用于吐血，衄血，便血，痔疮出血，崩漏，风热目赤。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置干燥处，防潮、防蛀。

槐　　花

Huaihua

FLOS SOPHORAE

本品为豆科植物槐 Sophora japonica L. 的干燥花。夏季花开放时采收，及时干燥，除去枝、梗及杂质。

【性状】 本品皱缩而卷曲，花瓣多散落。完整者花萼钟状，黄绿色，先端 5 浅裂；花瓣 5 片，黄色或黄白色，1 片较大，近圆形，先端微凹，其余 4 片长圆形。雄蕊 10 个，其中 9 个基部连合，花丝细长。雌蕊 1 个，圆柱形，弯曲。体轻。无臭，味微苦。以色黄者为佳。

【鉴别】 (1) 本品粉末黄棕色。花粉粒类球形或钝三角形，直径 14～19 μm，具 3 个萌发孔。非腺毛 1～3 细胞，长 86～660 μm。气孔不定式，副卫细胞 4～8 个。草酸钙方晶少见。

(2) 取本品约 0.1 g，剪碎，加乙醇 10 ml，置水浴上加热 5 分钟，滤过。取滤液 1ml，加镁粉少量与盐酸 2～3 滴，即显樱红色。

【炮制】 **槐花** 除去杂质。

炒槐花 取净槐花，照清炒法（附录18页）炒至色变深。

槐花炭 取净槐花，照炒炭法（附录19页）炒至表面黑褐色。

【性味】 苦，微寒。

【功能与主治】 凉血，止血，清热。用于吐血，衄血，便血，痔疮出血，崩漏，风

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

热目赤。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置干燥处，防潮、防蛀。

槐　　角

Huaijiao

FRUCTUS SOPHORAE

本品为豆科植物槐 Sophora japonica L. 的干燥成熟果实。冬季采收，除去杂质，干燥。

【性状】 本品呈连珠状，形似豆荚，长 1～6 cm，直径 0.6～1 cm。表面黄绿色或黄褐色，皱缩而粗糙，一侧有 1 条黄色带。质柔润，半透明，角质样，易在收缩处折断，断面黄绿色，有粘性。种子 1～6 粒，扁椭圆形，长约 8 mm，表面光滑，棕黑色，一侧有灰白色圆形种脐；质坚硬，子叶 2 片，黄绿色。果肉气微，味苦，种子嚼之有豆腥气。

以饱满、色黄绿、质柔润者为佳。

【炮制】 槐角　除去杂质。

蜜槐角　取净槐角，照蜜炙法（附录19页）用蜜水炒至外皮光亮、放凉后不粘手。每槐角 100 kg，用炼蜜 3～5 kg。

槐角炭　取净槐角，照炒炭法（附录19页）炒至表面焦黑色，内部深黄色。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清热，凉血，止血。用于肠热便血，痔疮出血。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

雷　　丸

Leiwan

OMPHALIA

本品为白蘑科真菌雷丸 Omphalia lapidescens Schroet. 的干燥菌核。秋季采挖，洗

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

净，晒干。

【性状】 本品为类球形或不规则团块，直径 1～3 cm。表面黑褐色或灰褐色，有略隆起的网状细纹。质坚实，不易破裂，断面不平坦，白色或浅灰黄色，似粉状或颗粒状，常有黄棕色大理石样纹理。无臭，味微苦，嚼之有颗粒感，微带粘性，久嚼无渣。

以个大、断面色白粉状者为佳。断面色褐呈角质样者，不可供药用。

【鉴别】 (1) 本品粉末淡灰色。菌丝粘结成大小不一的不规则团块，无色，少数黄棕色或棕红色。散在的菌丝较短，有分枝，直径约 4 μm。草酸钙方晶细小，直径约至 8μm，有的聚集成群。加硫酸后可见多量针状结晶。

(2) 刮取本品外层黑褐色菌丝体少量，加氢氧化钠试液 1 滴，即显樱红色，再加盐酸使呈酸性，则变黄色。

【炮制】 洗净，晒干，粉碎。不得蒸煮或高温烘烤。

【性味】 微苦，寒。

【功能与主治】 杀虫。用于绦虫病，钩虫病，蛔虫病。

【用法与用量】 15～21 g，研粉，每日 2～3 次，饭后开水调服，连服三天。

【注意】 可与适量碳酸氢钠同服。不宜入煎剂。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

照 山 白

Zhaoshanbai

FOLIUM RHODODENDRI MICRANTHI

本品为杜鹃花科植物照山白 Rhododendron micranthum Turcz. 的干燥叶或带叶枝梢。秋、冬二季采收，除去杂质，晒干。

【性状】 本品叶多反卷，有的破碎，完整叶片展平后呈长椭圆形或倒披针形，长 2～5 cm，宽 0.6～1.5 cm，全缘；上表面暗绿色或棕褐色，有白色腺鳞，下表面淡黄绿色，密被淡棕色腺鳞；叶柄长 2～5 mm；革质。枝梢圆柱形，顶端有短总状花序，外被多数淡棕色卵状苞片。气芳香，味微苦、微辛。

以叶片完整、色暗绿者为佳。

【鉴别】 取本品细粉约 1 g，加水 20 ml，置水浴上加热 10 分钟，滤过，滤液照下述方法试验：

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

(1) 取滤液 2 滴，点于滤纸上，加 1%三氯化铝溶液 1 滴，显鲜黄色。

(2) 取滤液 5 ml，加镁粉少量与盐酸 4～5 滴，显樱红色。

【性味】 酸、辛，温；有大毒。

【功能与主治】 止咳，祛痰。用于支气管炎。

【用法与用量】 3～4.5 g。

【注意】 本品有大毒，做成制剂方可供内服。

【贮藏】 置通风干燥处，防霉。

路 路 通

Lulutong

FRUCTUS LIQUIDAMBARIS

本品为金缕梅科植物枫香树 Liquidambar formosana Hance 的干燥成熟果序。冬季果实成熟后采收，除去杂质，干燥。

【性状】 本品为聚花果，由多数小蒴果集合而成，呈球形，直径 2～3 cm。表面灰棕色或棕褐色，有多数尖刺及鸟嘴状小钝刺，长 5～9 mm，常折断，除去针刺则现多数蜂窝状小孔。果序基部有小梗。体轻，质硬，不易破开。气微，味淡。

【性味】 微苦，平。

【功能与主治】 通络，利水。用于关节疼痛，小便不利，乳汁不下。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置干燥处。

蜈 蚣

Wugong

SCOLOPENDRA

本品为蜈蚣科动物少棘巨蜈蚣 Scolopendra subspinipes mutilans L. Koch 的干燥体。春、夏二季捕捉，用竹片插入头尾，绷直，干燥。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 本品呈扁平长条形，长 9～17 cm，宽 0.5～1 cm。全体由 22 个环节组成，最后一节略细小。头部两节暗红色，有触角及毒钩各 1 对；背部棕绿色或墨绿色，有光泽，并有纵棱 2 条；腹部淡黄色或棕黄色，皱缩；自第二节起每体节有脚 1 对，生于两侧，黄色或红褐色，弯作钩形。质脆，断面有裂隙。气微腥，并有特殊刺鼻的臭气，味辛而微咸。

以条大、完整、腹干瘪者为佳。

【性味】 辛，温；有毒。

【功能与主治】 熄风镇痉，祛风攻毒。用于小儿惊风、痉挛抽搐，面神经麻痹，破伤风，骨结核，淋巴结结核，溃疡、瘘管久不收口。

【用法与用量】 1～3 g；外用适量，研末或油浸涂敷患处。

【贮藏】 置干燥处，防霉、防蛀。

蜂　房

Fengfang

NIDUS VESPAE

本品为胡蜂科昆虫普通长脚胡蜂 Polistes olivaceous (DeG.)、日本长脚胡蜂 Polistes japonicus Sauss. 或异腹胡蜂 Parapolybia varia Fabr. 的巢。秋、冬二季采收，晒干，或略蒸，除去死蜂死蛹，晒干。

【性状】 本品呈圆盘状或不规则的扁块状，有的似莲蓬状，大小不一。表面灰白色或灰褐色。腹面有多数整齐的六角形房孔，孔径 3～4 mm 或 6～8 mm；背面有 1 个或数个黑色凸起的短柄。体轻，质韧，稍有弹性，似纸质。气微，味辛淡。

以体轻、略有弹性者为佳。质酥脆或坚硬者不可供药用。

【炮制】 除去杂质，剪块。

【性味】 甘，平；有小毒。

【功能与主治】 祛风，攻毒。用于皮肤瘙痒，急性乳腺炎，淋巴结结核，惊风，牙痛，疮疡肿毒，瘘管，鹅掌风，蜂螫肿痛。

【用法与用量】 2.5～4.5 g，煎服或烧存性研末服；外用适量，研末油调敷或煎水漱、洗患处。

【贮藏】 置通风干燥处，防压、防蛀。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蜂　　蜡

Fengla

CERA FLAVA

本品为蜜蜂科昆虫中华蜜蜂 Apis cerana Fabr. 或意大利蜂 Apis mellifera L. 分泌的蜡质。将蜂巢置水中加热，滤过，冷凝取蜡或再精制而成。

【性状】 本品为不规则团块，大小不一。呈黄色、淡黄棕色或黄白色，不透明或微透明，表面光滑。体较轻，蜡质，断面砂粒状，用手搓捏能软化。有蜂蜜样香气，味微甘。

以色黄、质较软而有油腻感、有蜂蜜样香气者为佳。

【炮制】 用时熔化，澄清，除去杂质。

【性味】 甘，微温。

【功能与主治】 收涩，生肌，止痛。外用于溃疡不敛，诸疮糜烂，臁疮，创伤，烧、烫伤。

【用法与用量】 外用适量，熔化敷患处；常作成药赋型剂及油膏基质。

【贮藏】 置阴凉处，防热。

蜂　　蜜

Fengmi

MEL

本品为蜜蜂科昆虫中华蜜蜂 Apis cerana Fabr. 或意大利蜂 Apis mellifera L. 所酿的蜜。春至秋季采收，滤过。

【性状】 本品为半透明、带光泽、浓稠的液体，白色至淡黄色或橘黄色至黄褐色，放久或遇冷渐有白色颗粒状结晶析出。气芳香，味极甜。

比重 本品如有结晶析出，可置于不超过 60°的水浴中，待结晶全部融化后，搅匀，冷至 25°，照比重测定法项下的威氏比重秤法（附录26页）测定，比重应在 1.349 以

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

上。

【检查】 酸度 取本品 10 g，加新沸过的冷水 50 ml，混匀，加酚酞指示液 2 滴与 $N/10$ 氢氧化钠液 4 ml，应显粉红色，10 秒钟不退。

淀粉和糊精 取本品 2 g，加水 10 ml，加热煮沸，放冷，加碘试液 1 滴，不得显蓝色、绿色或红褐色。

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 滋养，润燥，解毒。用于肺燥干咳，肠燥便秘，解乌头毒；外治口疮，疮疡，烧、烫伤。

【用法与用量】 15～30 g。

【贮藏】 置阴凉处。

锦 灯 笼（酸浆）

Jindenglong

CALYX SEU FRUCTUS PHYSALIS

本品为茄科植物酸浆 Physalis alkekengi L. var. franchetii (Mast.) Makino 的干燥宿萼或带果实的宿萼。秋季果实成熟、宿萼呈红色或橙红色时采收，干燥。

【性状】 本品略呈灯笼状，多压扁，长 3～4.5 cm，宽 2.5～4 cm。表面橙红色或橙黄色，有 5 条明显的纵棱，棱间有网状的细脉纹。顶端渐尖而开裂，基部略平截，中心凹陷有果梗。体轻，质柔韧，中空，或内有棕红色或橙红色果实 1 枚。果实球形，多压扁，直径 1～1.5 cm，果皮皱缩，内含种子多数。气微，宿萼味苦，果实味甘、微酸。

以个大、色橙红者为佳。

【性味】 苦、酸，寒。

【功能与主治】 清热解毒，利咽，化痰。用于咽喉肿痛，肺热咳嗽。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【注意】 孕妇慎服。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

矮　地　茶

Aidicha

HERBA ARDISIAE JAPONICAE

本品为紫金牛科植物紫金牛 Ardisia japonica (Thunb.) Bl. 的干燥全株。夏、秋二季茎叶茂盛时采挖，除去泥沙，干燥。

【性状】 本品根茎匍匐状，疏生须根。茎略呈扁圆柱形，稍扭曲，长 10～30 cm，直径 0.2～0.5 cm；表面红棕色，有细纵纹、叶痕及节；质硬，易折断。叶互生，集生于茎梢；叶片略卷曲或破碎，完整者展平后呈椭圆形，长 3～7 cm，宽 1.5～3 cm，灰绿色、棕褐色或浅红棕色，先端尖，基部楔形，边缘具细锯齿；近革质。茎顶偶有红色球形核果。气微，味微涩。

以茎色红棕、叶色绿者为佳。

【鉴别】 (1) 本品茎的横切面：表皮细胞壁厚，有腺毛；老茎有木栓层。皮层较宽，外侧为数列厚角细胞；有含草酸钙方晶；有分泌腔；内皮层明显。韧皮部甚窄，外侧有少数纤维。形成层环不明显。木质部均木化，导管多单行排列。髓部大，有分泌腔。薄壁细胞含方晶；并含淀粉粒，有的含棕色物。

(2) 取本品粉末 10 g，加水 50 ml，置水浴中加热 15 分钟，滤过，滤液置水浴上蒸干，残渣加甲醇 10 ml 使溶解，滤过。取滤液 1 ml，加 3% 三氯化铝溶液 2 滴，置紫外光灯下观察，显黄色荧光。

(3) 取本品粉末 10 g，加甲醇 50 ml，加热回流 10 分钟，滤过，滤液加少量活性炭脱色，滤过。取滤液 1 ml，加亚硝酸钠少量与硫酸 1 ml，温热，放置后呈红色。

【炮制】 除去杂质，洗净，切段，干燥。

【性味】 辛、微苦，平。

【功能与主治】 化痰止咳，利湿，活血。用于新久咳嗽，痰中带血，慢性支气管炎，湿热黄疸，跌扑损伤。

【用法与用量】 15～30 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

鼠　曲　草（佛耳草）

Shuqucao

HERBA GNAPHALII AFFINIS

本品为菊科植物鼠曲草 Gnaphalium affine D. Don 的干燥全草。春、夏二季花开时采收，除去杂质，晒干。

【性状】 本品密被灰白色绵毛。根较细，灰棕色。茎常自基部分枝成丛，长 15～30 cm，直径 0.1～0.2 cm。基生叶已脱落；茎生叶互生，无柄，叶片皱缩，展平后呈条状匙形或倒披针形，长 2～6 cm，宽 0.3～1 cm，全缘，两面均密被灰白色绵毛。头状花序多数，金黄色或棕黄色。气微，味微甘。

以色灰白、叶及花多者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，切段，干燥。

【性味】 微甘，平。

【功能与主治】 祛痰，止咳，平喘，祛风湿。用于咳嗽，痰喘，风湿痹痛。

【用法与用量】 9～30 g。

【贮藏】 置干燥处，防霉、防蛀。

满　山　红

Manshanhong

FOLIUM RHODODENDRI DAURICI

本品为杜鹃花科植物兴安杜鹃 Rhododendron dauricum L. 的干燥叶。夏、秋二季采收，阴干。

【性状】 本品多反卷成筒状，有的皱缩破碎。完整叶片展平后呈椭圆形或长倒卵形，长 2～7.5 cm，宽 1～3 cm；先端钝，基部近圆形或宽楔形，全缘；上表面暗绿色至褐绿色，散生浅黄色腺鳞；下表面灰绿色，腺鳞甚多。叶柄长 3～10 mm。近革质。气芳香特异，味较苦、微辛。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【鉴别】 (1) 取本品粉末 5 g，加乙醚 50 ml，加热回流 1 小时，滤过，滤液蒸干，残渣加碳酸钠饱和溶液 10 ml，置水浴上加热使溶解，加氯化钠与无水碳酸钠各 1 g，充分振摇，滤过，滤液加盐酸调节 pH 值至 2～3，滤过，沉淀用水洗涤至洗液呈中性后，自滤纸上加乙醚 4 ml 使溶解。取醚液 1 ml，加等量的乙醇摇匀，分为二份，一份中加醋酸铅饱和溶液 1～2 滴，振摇放置，析出黄色结晶；另一份中加镁粉少量与盐酸 4 滴，振摇，显淡红色至淡棕红色。

(2) 取鉴别(1)项下剩余的乙醚溶液 30 μl，点于硅胶羧甲基纤维素钠薄层板上，热风吹干，以己烷-醋酸乙酯-甲醇(6:4:0.2)为展开剂，展开后，置紫外光灯下观察，最前沿的红色斑点的下方显暗棕色斑点，刮取此斑点，加 4% 氢氧化钠溶液，即显黄色。

【性味】 辛、苦，温。

【功能与主治】 止咳，祛痰。用于急、慢性支气管炎。

【用法与用量】 水煎服 25～50 g；用 40%乙醇浸服 6～12 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防潮、防热。

满 山 红 油

Manshanhongyou

OLEUM RHODODENDRI DAURICI

本品为杜鹃花科植物兴安杜鹃 Rhododendron dauricum L. 的干燥叶经蒸气蒸馏得到的挥发油。

【性状】 本品为淡黄绿色至黄棕色的澄清液体；有强烈刺激性香气，味清凉而辛辣。放冷至－10°以下，即析出结晶。

本品能与甲醇、乙醇、丙酮、氯仿或乙醚任意混合，在水中微溶。

比重 本品的比重（附录26页）为 0.940～0.950。

折光率 本品的折光率（附录32页）为 1.510～1.520。

【鉴别】 取本品 0.1 ml，加乙醇 0.5 ml，摇匀，加 1% 香草醛的硫酸溶液 2 滴，振摇，显紫红色至暗紫红色。

【功能与主治】 止咳，祛痰。用于急、慢性支气管炎。

【用法与用量】 口服，一次 0.05～0.1 g，一日 2～3 次。

【贮藏】 遮光，在阴凉处密封保存。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【制剂】 满山红油胶丸

满山红油胶丸

Manshanhongyou Jiaowan

CAPSULAE OLEI RHODODENDRI DAURICI

本品为满山红油与稀释剂适量制成的胶丸。

【性状】 本品为黄棕色透明胶丸，剥开后内含黄棕色油质液体；有特异香气。

【鉴别】 取本品的内容物适量（相当于满山红油 1 ml），加水蒸馏，所得挥发油，照满山红油项下的鉴别法（620页）试验，显相同的反应。

【检查】 **装量差异** 取本品 100 丸，任意取出 20 丸，精密称定，注意切开丸壳，取出内容物，丸壳用乙醚洗涤 3～4 次，置通风处，使乙醚挥散，再精密称定，算出每丸内容物的平均重量。再自剩余的 80 丸中选取本品最大和最小胶丸各 10 丸，分别按前法测出大丸与小丸内容物的平均重量，大丸与小丸的平均重量不得超过前述 20 丸内容物平均重量的±15%。

其他 应符合胶囊剂项下有关的各项规定（附录12页）。

【功能与主治】【用法与用量】 同满山红油。

【规格】 (1) 0.05 g (2) 0.1 g

【贮藏】 遮光，在阴凉处密封保存。

裸花紫珠

Luohuazizhu

FOLIUM CALLICARPAE NUDIFLORAE

本品为马鞭草科植物裸花紫珠 Gallicarpa nudiflora Hook. et Arn. 的干燥叶。全年均可采收，除去杂质，晒干。

【性状】 本品常皱缩卷曲，展平后呈卵状披针形或矩圆形，长 6～18 cm，宽 4～8 cm。全缘或边缘有疏齿。上表面黑色，下表面密披浓厚的黄褐色星状毛。侧脉羽状，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

小脉近平行与侧脉几成直角。叶柄长0 .5～1 cm，被星状毛。气微香，味涩、微苦。

【鉴别】（1）本品粉末灰棕色。非腺毛有两种：一种为迭生星状毛，大多碎断，中轴直径 18～36 μm，壁薄，非木化，完整者 1～10 余轮，每轮 1～7 个侧生细胞；另一种 1～2 细胞，壁薄。腺鳞头部 6～8 细胞，扁球形，直径 50～60 μm，柄极短，单细胞。小腺毛头部 4 细胞，直径 22～27 μm；柄 1～2 细胞。上表皮细胞多角形，壁连珠状增厚。

（2）取本品粗粉约 10 g，加水 100 ml，煮沸半小时，放冷，滤过。取滤液 2 ml，加三氯化铁试液 2～3 滴，即显墨绿色；另取滤液 2 ml，加 1% 明胶溶液 2～3 滴，即发生浑浊。

（3）取鉴别(2)项下剩余的滤液 20 ml，加稀盐酸使成酸性，用乙醚 10 ml 振摇提取，分取醚液，点于滤纸上，置紫外光灯下观察，显淡蓝紫色荧光，用氨气熏后显亮黄色荧光；剩余的乙醚液挥干后，残渣加乙醇 2 ml 使溶解，再加 5% 亚硝酸钠溶液与 10% 硝酸铝溶液各 3 滴及 4% 氢氧化钠溶液 1 ml，即显红色。

【炮制】 除去杂质，切碎。

【性味】 苦、微辛，平。

【功能与主治】 消炎，解毒，收敛，止血。用于化脓性炎症，急性传染性肝炎；外治烧、烫伤，外伤出血。

【用法与用量】 9～30 g；外用适量，煎浓汤，涂敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

【制剂】 裸花紫珠片

裸花紫珠片

Luohuazizhu Pian

TABELLAE CALLICARPAE NUDIFLORAE

本品为裸花紫珠浸膏片。每片含干浸膏 0.2 g。

【制法】 取裸花紫珠，加水煎煮二次，第一次 2 小时，第二次 1 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩成稠膏状，干燥成干浸膏，加适量辅料，制成颗粒，压片，包糖衣，即得。

【鉴别】 取本品 5 片，除去糖衣，加水 30 ml，研磨使溶解，滤过，滤液照裸花紫珠

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

项下的鉴别法(2)、(3)项（621页）试验，显相同的反应。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定（附录 6 页）。

【功能与主治】 消炎，解毒，收敛，止血。用于细菌感染引起的炎症，急性传染性肝炎，呼吸道和消化道出血。

【用法与用量】 口服，一次 3～5 片，一日 3～4 次。

【贮藏】 密封保存。

蔓 荆 子

Manjingzi

FRUCTUS VITICIS

本品为马鞭草科植物单叶蔓荆 Vitex trifolia L. var. simplicifolia Cham. 或蔓荆 Vitex trifolia L. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收，除去杂质，晒干。

【性状】 本品呈球形，直径 4～6 mm。表面灰黑色或黑褐色，被灰白色粉霜状茸毛，有纵向浅沟 4 条，顶端微凹，基部有灰白色宿萼及短果梗。萼长为果实的⅓～⅔，5 齿裂，其中 2 裂较深，形成两瓣，密被茸毛。体轻，质坚韧，不易破碎。横切面果皮外层灰黑色，内层黄白色，两层间有棕褐色油点排列成环；内分 4 室，每室有种子 1 粒。气特异而芳香，味淡、微辛。

以粒大、饱满、气味浓者为佳。

【鉴别】 本品粉末灰褐色。花萼表皮细胞类圆形，壁多弯曲；非腺毛 2～3 细胞，顶端细胞茎部稍粗，有疣状突起。外果皮细胞多角形，有角质纹理和毛茸脱落后的痕迹，并有腺毛与非腺毛：腺毛分头部单细胞、柄 1～2 细胞及头部 2～6 细胞、柄单细胞两种；非腺毛 2～4 细胞，长 14～68 μm，多弯曲，有壁疣。中果皮细胞长圆形或类圆形，壁微木化，纹孔明显。油管多破碎，含分泌物，周围细胞有淡黄色油滴。内果皮石细胞椭圆形或近方形，直径 10～35 μm。种皮细胞圆形或类圆形，直径 42～73 μm，壁有网状纹理，木化。

【炮制】 蔓荆子 除去杂质。

炒蔓荆子 取净蔓荆子，照清炒法（附录18页）微炒。

【性味】 辛、苦，微寒。

【功能与主治】 散风热，清头目。用于头痛，头晕，两目胀痛，眶上神经痛，肌肉

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

神经痛。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

蔊　　菜

Hancai

HERBA RORIPPAE

本品为十字花科植物蔊菜 Rorippa indica (L.) Hiern 的干燥全草。夏、秋二季花期采挖，除去泥沙，晒干。

【性状】 本品长 15～35 cm。根细长，弯曲，直径 1.5～3 cm；表面淡黄色，有不规则纵皱纹及须根痕；质脆，易折断，断面类白色，木部黄色。茎纤细，近基部有分枝，淡绿色，有的带紫色。叶多卷缩或破碎，完整叶片展平后呈长椭圆形至卵形，黄绿色，有的呈大头羽状分裂，有疏齿或全缘。总状花序顶生，小花黄色。长角果细圆柱形，长 1.5～2 cm。无臭，味淡。

以色绿、带花果者为佳。

【鉴别】 (1) 本品茎的横切面：表皮细胞长方形，外被角质层；嫩茎可见非腺毛，1～2 细胞。皮层为数列薄壁细胞，内皮层明显。中柱鞘纤维成束。韧皮部窄。形成层不明显。木质部均木化，导管、纤维及薄壁细胞连成环状；导管圆形，直径 10～35 μm。髓部较大。薄壁细胞含淀粉粒。

(2) 取本品细粉 10 g，加水 100 ml，煮沸 15 分钟，滤过。滤液浓缩至 3 ml，加无水乙醇 7 ml，滤过，滤液蒸干，残渣加少量氯仿使溶解。另取蔊菜素对照品，加氯仿制成每 1 ml 中含 20 mg 的溶液。照薄层层析法（附录37页）试验，吸取上述本品溶液与对照品溶液分别点于硅胶G（含 15% 煅石膏）薄层板上，以醋酸乙酯为展开剂，展开后，晾干，喷以碘化铋钾试液使显色，在与蔊菜素对照品相应的位置上有同样颜色的斑点。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 祛痰，止咳。用于迁延期慢性支气管炎。

【用法与用量】 15～30 g。


【贮藏】 置干燥处。

千金网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蕪　菜　素

Hancaisu

RORIFONUM



[$C_{11}H_{21}O_2NS$=231.35]

本品为 10-甲磺酰基癸腈。含 $C_{11}H_{21}O_2NS$ 应为 98.5～101.5%。

【性状】 本品为白色或类白色结晶性粉末；无臭或几乎无臭，味微苦。

本品在醋酸乙酯或氯仿中易溶，在甲醇或无水乙醇中溶解，在乙醚中微溶，在水中几乎不溶。

熔点 本品的熔点(附录28页)为 44～47°。

【鉴别】 (1) 取本品约 50 mg，加盐酸溶液(1→2)10 ml，加热回流水解 2 小时，放冷，滤过，沉淀用水洗净，再用乙醇少量淋洗，在 60°减压干燥后，依法测定(附录28页)，熔点为 96～102°。

(2) 取本品约 10 mg 与淀粉约 20 mg，混匀，置小试管中，管口以湿润的醋酸铅试纸覆盖，在小火上加热，逸出的气体使试纸显灰黑色斑点。

(3) 取本品约 5 mg 与二氧化锰约 50 mg，混匀，置小试管中，管口以湿润的醋酸铜联苯胺试纸覆盖，在小火上加热，逸出的气体使试纸显蓝色斑点。

(4) 本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱一致(附录 93 页)。

【检查】 **有关杂质** 取本品，加氯仿制成每 1 ml 中含 20 mg 的溶液，照薄层层析法(附录37页)试验，吸取上述溶液 10 μl，点于硅胶G(含 15%煅石膏)薄层板上，以氯仿-丙酮(4:1)为展开剂，展开后，晾干，置碘蒸气中显色，除主斑点外，不得显其他斑点。

含氯化合物 取本品 0.1 g，用无灰滤纸折叠包裹，固定于 250ml 燃烧瓶瓶塞的铂丝圈上，燃烧瓶内加含有浓过氧化氢 2 滴的 $N/2$ 氢氧化钠液 10ml 的吸收液，小心通入氧气 1～2 分钟，立即用表面皿覆盖瓶口，点燃滤纸，迅速放入燃烧瓶中，塞紧。待燃烧完毕后，充分振摇，使生成的烟雾完全吸入吸收液内。依法检查(附录44页)，如发生浑浊，与标准氯化钠溶液 5 ml 制成的对照液比较，不得更浓(0.05%)。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【含量测定】 取本品约 50 mg，精密称定，照上述含氯化合物项下的方法，用 1％过氧化氢溶液 15 ml 为吸收液，燃烧吸收，待生成的烟雾完全吸入吸收液后，将吸收液加热浓缩至约 5 ml，放冷，加乙醇 20 ml、高氯酸溶液（取 70％高氯酸 1 ml，加水稀释至 25 ml）1 滴与吐啉指示液 2 滴，用 $M/100$ 氯化钡液滴定至显樱红色，并将滴定结果用空白试验校正，即得（每 1 ml 的 $M/100$ 氯化钡液相当于 2.314 mg 的 $C_{11}H_{21}O_2NS$）。

【功能与主治】 祛痰，止咳。用于慢性支气管炎。

【用法与用量】 口服，一次 75～100 mg，一日 3～4 次。

【贮藏】 密闭保存。

【制剂】 蔊菜素片

蔊 菜 素 片

Hancaisu Pian

TABELLAE RORIFONI

本品含蔊菜素（$C_{11}H_{21}O_2NS$）应为标示量的 93.0～107.0％。

【性状】 本品为白色片。

【鉴别】 取本品 2 片，研细，照蔊菜素项下的鉴别法（2）、（3）项（625页）试验，显相同的反应。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定（附录 6 页）。

【含量测定】 取本品 20 片，精密称定，研细，精密称出适量（约相当于蔊菜素 0.15 g），置磨口圆底烧瓶中，加盐酸溶液（1→2）40 ml，加热回流 4 小时后，加无氨蒸馏水 400 ml、氢氧化钠溶液（1→2）50 ml 与正辛醇 10 ml，加热蒸馏，用硼酸溶液（1→25）20 ml 为吸收液，待馏出液近 300 ml 时，停止蒸馏，加甲基红、溴甲酚绿混合指示液 4 滴，用 $N/20$ 硫酸液滴定，并将滴定的结果用空白试验校正，即得（每 1 ml 的 $N/20$ 硫酸液相当于 11.57 mg 的 $C_{11}H_{21}O_2NS$）。

【功能与主治】 同蔊菜素。

【用法与用量】 口服，一次 3～4 片，一日 3 次。

【规格】 25 mg

【贮藏】 密闭保存。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蓼大青叶

Liaodaqingye

FOLIUM POLYGONI TINCTORII

本品为蓼科植物蓼蓝 Polygonum tinctorium Ait. 的干燥叶。夏、秋二季枝叶茂盛时采收两次，除去茎枝及杂质，干燥。

【性状】 本品多皱缩、破碎，完整者展平后呈椭圆形，长 3～8 cm，宽 2～5 cm。蓝绿色或黑蓝色，先端钝，基部渐狭，全缘。叶脉浅黄棕色，于下表面略突起。叶柄扁平，偶带膜质叶鞘。质脆。气微，味微涩而稍苦。

以叶厚、色黑蓝者为佳。

【鉴别】 本品叶的表面观：表皮细胞多角形，垂周壁平直或微波状弯曲；气孔平轴式，少数不等式。腺毛头部 4～8 细胞；柄 2 个细胞并列，亦有多细胞构成多列的。非腺毛多列性，壁木化增厚，常见于叶片边缘及主脉处。叶肉组织含多量蓝色至蓝黑色色素颗粒。草酸钙簇晶多见，直径 12～80 μm。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清热，解毒，凉血。用于温病发热，发斑发疹，风热感冒，肺炎，咽喉肿痛，腮腺炎，流行性脑脊髓膜炎，乙型脑炎，丹毒，痈肿。

【用法与用量】 9～15 g；外用鲜品适量，捣烂敷患处。

【贮藏】 置通风干燥处。

榧　子

Feizi

SEMEN TORREYAE

本品为红豆杉科植物榧 Torreya grandis Fort. 的干燥成熟种子。秋季种子成熟时采收，除去肉质假种皮，洗净，晒干。

【性状】 本品呈卵圆形或长卵圆形，长 2～3.5 cm，直径 1.3～2 cm。表面灰黄色或

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

淡黄棕色，有纵皱纹，一端钝圆，可见椭圆形的种脐，另一端稍尖。壳(内种皮)质硬，厚约1 mm。种仁表面皱缩，外胚乳灰褐色，膜质；内胚乳黄白色，肥大，富油性。气微，味微甜而涩。

以完整、种仁饱满、色黄白者为佳。

【炮制】 去壳取仁，用时捣碎。

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 消积，驱虫。用于小儿疳积，虫积腹痛。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防蛀。

榜　嘎

Bangga

HERBA ACONITI BONGA

本品系藏族习用药材，藏文名为 ཐང་དཀར (榜嘎)；为毛茛科植物船形乌头 Aconitum naviculare Stapf 或甘青乌头 Aconitum tanguticum(Maxim.)Stapf 的干燥全草。夏末秋初花开时采挖，除去杂质，阴干。

【性状】 本品块根细小，纺锤形，长 2～4 cm；表面棕褐色，断面白色。茎圆柱形，长 7～50 cm，直径 1.5～3 mm；表面灰绿色至暗绿色，略带光泽，疏被茸毛；质脆，易折断，断面中空。叶柄长 3～20 cm，叶片多破碎，完整者呈肾形，长 1.2～3.5 cm，宽 1.2～3.8 cm，掌状深裂，裂片再浅裂。总状花序顶生，花蓝绿色至蓝紫色，花梗短，花萼 5 片，上萼片船形，花瓣 2 片，雄蕊多数。气微，味苦。

【性味】 苦，凉；有小毒。

【功能与主治】 清热解毒。用于传染病发热，肝、胆热病，肺热，肠热，流行性感冒，食物中毒。

【用法与用量】 0.6～1.2 g，多入丸散服。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

槟　　榔

Binglang

SEMEN ARECAE

本品为棕榈科植物槟榔 Areca cathecu L. 的干燥成熟种子。春末至秋初采收成熟果实，用水煮后，干燥，除去果皮，取出种子，干燥。

【性状】 本品呈扁球形或圆锥形，长 1.5～3.5 cm，底部直径 1.5～3 cm。表面淡黄棕色或淡红棕色，具稍凹下的网状沟纹，底部中心有 1 凹窝（珠孔），其侧缘有 1 明显疤痕（肿脐）。质坚硬，不易破碎，断面呈棕、白色相间的大理石样花纹。气微，味涩、微苦。

以个大、体重、质坚、无破裂者为佳。

【鉴别】 （1）本品横切面：种皮外层为数列切向延长的扁平石细胞，内含红棕色物，石细胞形状、大小不一，常有细胞间隙；种皮内层为数列薄壁细胞，含棕红色物，并散有少数维管束。胚乳细胞白色，多角形，壁厚，纹孔大。种皮内层伸入胚乳组织中，形成棕、白色相间的大理石样花纹。

（2）取本品粉末约 0.5 g，加水 3～4 ml，加稀硫酸 1 滴，微热数分钟，滤过。取滤液 1 滴，点于载玻片上，加碘化铋钾试液 1 滴，即发生浑浊，放置后，置显微镜下观察，可见石榴红色的结晶。

【含量测定】 取本品的粗粉约 8 g，精密称定，置磨口塞玻璃烧瓶中，加乙醚 80 ml，振摇后，加氨试液 4 ml，振摇 10 分钟，加无水硫酸钠 10 g，振摇 5 分钟，静置俟沉淀，分取乙醚液，置分液漏斗中，残渣用乙醚洗涤 3 次，每次 10 ml，合并醚液，加滑石粉 0.5 g，振摇 3 分钟，加水 2.5 ml，振摇 3 分钟，静置，至上层醚液澄明时，分取醚液，水层用少量乙醚洗涤，合并醚液，低温蒸发至约 20 ml，移置分液漏斗中，精密加入 $N/50$ 硫酸液 20 ml，振摇提取，静置俟分层，分取酸层，醚层用水振摇洗涤 3 次，每次 5 ml，合并洗液与酸液，滤过，滤器用水洗涤，合并洗液与酸液，加甲基红指示液数滴，用 $N/50$ 氢氧化钠液滴定，即得（每 1 ml 的 $N/50$ 硫酸液相当于 3.104 mg 的 $C_8H_{13}O_2N$）。

本品含醚溶性生物碱以槟榔碱（$C_8H_{13}O_2N$）计算，不得少于 0.3%。

【炮制】 **槟榔**　除去杂质，浸泡，润透，切片，阴干；或取净槟榔打碎。

焦槟榔　取槟榔片，照炒焦法（附录18页）炒至焦黄色。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性味】 苦、辛，温。

【功能与主治】 消积，驱虫，降气，行水。用于食积腹胀，绦虫病，姜片虫病，蛔虫病，痢疾后重，疟疾，水肿。

【用法与用量】 3～9 g；驱绦虫、姜片虫 30～54 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

酸 枣 仁

Suanzaoren

SEMEN ZIZIPHI SPINOSAE

本品为鼠李科植物酸枣 Ziziphus spinosa Hu 的干燥成熟种子。秋末冬初采收成熟果实，除去果肉及核壳，收集种子，晒干。

【性状】 本品呈扁圆形或扁椭圆形，长 5～9 mm，宽 5～7 mm，厚约 3 mm。表面紫红色或紫褐色，平滑有光泽，有的有裂纹。一面较平坦，中间有 1 条隆起的纵线纹；另一面稍凸起。一端有小凹陷，可见白色线形种脐；另端有 1 细小凸起的合点。种皮较脆，除去后可见白色胚乳及浅黄色子叶 2 片，富油性。气微，味淡。

以粒大、饱满、外皮色紫红、种仁色黄白者为佳。

【鉴别】 本品粉末棕红色。种皮栅状细胞棕红色，表面观多角形，直径约 15 μm，壁厚，木化，胞腔小。内种皮细胞棕黄色，表面观长方形或类方形，壁连珠状增厚，木化。子叶表皮细胞含细小草酸钙簇晶及方晶。

【炮制】 酸枣仁 除去残留核壳，用时捣碎。

炒酸枣仁 取净酸枣仁，照清炒法(附录18页)炒至外皮鼓起、色微变深。

【性味】 甘、酸，平。

【功能与主治】 安神，养心，敛汗。用于失眠多梦，易惊，心烦心悸，健忘，虚汗，神经衰弱。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防蛀。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

碱　　花

Jianhua

TRONA

本品系藏族习用药材，藏文名为 ཇམ་ཏག（浦多）；为咸水湖边一种主含碳酸钠的分枝状结晶。采收后，干燥。

【性状】 本品为结晶性粉末，白色或淡黄白色。体较轻。无臭，味咸苦、微甘。

以色白、体轻者为佳。

【鉴别】 本品的水溶液显钠盐（附录40页）、碳酸盐（附录42页）、碳酸氢盐（附录42页）及硫酸盐（附录41页）的鉴别反应。

【性味】 甘、咸，温。

【功能与主治】 消滞。用于胃寒，消化不良。

【用法与用量】 0.6～1.8 g，多入丸散服。

【注意】 腹泻病人慎服。

【贮藏】 置干燥处，密闭保存。

磁　　石

Cishi

MAGNETITUM

本品为等轴晶系磁铁矿的矿石，主含四氧化三铁。采挖后，除去杂石。

【性状】 本品呈不规则块状，或略带方形，多具棱角，大小不一。表面灰黑色或棕褐色，具金属光泽。体重，质坚硬，致密，断面不整齐。具磁性，日久磁性渐弱。有土腥气，无味。

以色灰黑、断面致密有光泽、能吸铁者为佳。

【鉴别】 取本品，加盐酸溶解后，溶液呈橙黄色，加亚铁氰化钾试液数滴，发生蓝色沉淀，在稀盐酸中不溶，但加氢氧化钠试液，即分解发生棕色沉淀。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【炮制】 磁石 除去杂质，砸碎。

煅磁石 取净磁石，照煅法(附录19页)煅至红透，立即倒入醋内淬酥，取出，干燥，碾成粗粉。

每磁石 100 kg，用醋 20～30 kg。

【性味】 辛，寒。

【功能与主治】 潜阳纳气，镇惊安神。用于目昏，耳鸣耳聋，心悸失眠，肾虚气喘。

【用法与用量】 9～30 g。

豨 莶 草

Xixiancao

HERBA SIEGESBECKIAE

本品为菊科植物豨莶 Siegesbeckia orientalis L.、腺梗豨莶 Siegesbeckia pubescens Makino 或毛梗豨莶 Siegesbeckia glabrescens Makino 的干燥地上部分。夏、秋二季花开前及花期均可采割，除去杂质，晒干。

【性状】 本品茎略呈方柱形，多分枝，长 30～110 cm，直径 0.3～1 cm；表面灰绿色、黄棕色或紫棕色，有纵沟及细纵纹，被灰色柔毛；节明显，略膨大；质脆，易折断，断面黄白色或带绿色，髓部宽广，类白色，中空。叶对生，叶片多皱缩、卷曲，展平后呈卵圆形，灰绿色，边缘有钝锯齿，两面皆有白色柔毛，主脉 3 出。有的可见黄色头状花序，总苞片匙形。气微，味微苦。

以叶多、枝嫩、色深绿者为佳。

【炮制】 除去残根及杂质，先抖下叶另放，将梗洗净，润透后再与叶一起切段，晒干。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 祛风湿，利关节。用于风湿性关节炎，肩臂酸痛，腰膝无力，四肢麻木。

【用法与用量】 9～12 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

【制剂】 豨莶丸

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

豨　莶　丸

Xixian Wan

PILULAE SIEGESBECKIAE

【制法】 取豨莶草 1000 g，切碎，取出 500 g，分次加水煎煮，合并煎液，滤过，滤液浓缩成稠膏。其余 500 g 用黄酒 1000 g(或白酒 500 g) 浸拌，置罐中，加盖封闭，隔水加热至酒吸尽，取出，拌入上述稠膏，干燥，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 160～190 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为黑色的大蜜丸；气微，味甜、微苦。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 同豨莶草。

【用法与用量】 口服，一次 1 丸，一日 2～3 次。

【规格】 每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

蜘　蛛　香(马蹄香)

Zhizhuxiang

RHIZOMA VALERIANAE JATAMANSI

本品为败酱科植物蜘蛛香 Valeriana jatamansi Jones 的干燥根茎及根。秋季采挖，除去泥沙，晒干。

【性状】 本品根茎呈圆柱形，略扁，稍弯曲，有分枝，长 2～5 cm，直径 1～2 cm；表面灰褐色，有紧密的环节及突起的点状根痕，顶端略膨大，具茎、叶残基；质坚实，不易折断，断面灰棕色，可见筋脉点(维管束) 排列成环。根多数，长 4～10 cm，直径约 0.2 cm；质脆。气特异，味微苦辛。

【鉴别】 本品粉末灰棕色。淀粉粒甚多，单粒类圆形、长圆形或广卵形，有的一端尖突，直径 5～39 μm，脐点裂缝状、三叉状或点状，有的可见层纹；复粒由 2～4 粒组

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

成。薄壁组织含黄棕色物。有网纹及具缘纹孔导管。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，晒干。

【性味】 微苦、辛，温。

【功能与主治】 理气止痛，消炎止泻，祛风除湿。用于脘腹胀痛，消化不良，腹泻，痢疾，风湿痹痛，腰膝酸软。

【用法与用量】 3～6 g。

【贮藏】 置干燥处，防潮、防蛀。

蝉　　蜕

Chantui

PERIOSTRACUM CICADAE

本品为蝉科昆虫黑蚱 Cryptotympana pustulata Fabr. 的若虫羽化时脱落的皮壳。夏、秋二季收集，除去泥沙，晒干。

【性状】 本品形似蝉，长约 3.5 cm，宽约 2 cm。表面黄棕色，半透明，有光泽。头部有丝状触角 1 对，多已脱落，横生 2 目，略突出。额部先端突出，口吻发达，上唇宽短，下唇伸长成管状。脊背呈十字形裂开，裂口向内卷曲。胸部背面两旁具翅芽 2 对，腹面有足 3 对，前 1 对足粗壮具齿，后 2 对足稍细长，均被黄棕色细毛。腹部圆而丰满有曲纹，尾部钝尖，由腹部至尾端共 9 节。体轻，中空，易碎。无臭，味淡。

以体轻、完整、色黄亮者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，晒干。

【性味】 咸、甘，寒。

【功能与主治】 散风热，透疹，止痒，退翳，解痉。用于风热感冒，咽痛，音哑，麻疹不透，风疹，皮肤瘙痒，目翳，抽搐，痉挛。

【用法与用量】 2.5～4.5 g。

【贮藏】 置干燥处，防压。

罂　粟　壳（米壳）

Yingsuqiao

PERICARPIUM PAPAVERIS

本品为罂粟科植物罂粟 Papaver somniferum L. 的干燥果壳。夏季采摘已除去浆汁

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

的果实，破开，除去种子，晒干。

【性状】 本品呈椭圆形或卵圆形，有的破碎成片状，完整者长4～7 cm，直径3～6 cm。表面黄白色或淡棕色，平滑略带光泽，有刀痕。顶端有8～14条放射状排列的残留柱头，呈圆盘状；基部有短柄。体轻，质脆，破开后，内表面浅黄色，微有光泽，有隔膜及棕黑色突起的小点。气微，味微苦。

以个大、皮厚者为佳。

【鉴别】 (1) 取本品粗粉1 g，加水20 ml，煮沸5分钟，滤过。取滤液5 ml，加碘化汞钾试液，即发生灰白色沉淀。

(2) 取本品，置紫外光灯下观察，显紫色荧光。

【炮制】 罂粟壳 除去杂质，去柄，捣碎。

蜜罂粟壳 取罂粟壳碎块，照蜜炙法(附录19页)用蜜水炒至放凉后不粘手。

【性味】 酸、涩，微寒；有小毒。

【功能与主治】 敛肺，涩肠，止痛。用于久咳，久泻，脱肛，脘腹疼痛。

【用法与用量】 2.5～6 g。

【注意】 本品易成瘾，不宜常服。

【贮藏】 置干燥处，防霉、防蛀。

鲜 竹 沥

Xianzhuli

SUCCUS BAMBUSAE

本品为禾本科植物粉绿竹 Phyllostachys glauca McClure、净竹 Phyllostachys nuda McClure及同属数种植物的鲜杆经加热后自然沥出的液体，煮沸，加适量防腐剂制得。

【性状】 本品为淡黄色至淡红棕色的液体；具竹香气，味微甘。

【检查】 pH值 应为5.0～6.0(附录42页)。

【性味】 甘，寒。

【功能与主治】 清热化痰。用于肺热咳嗽痰多，气喘胸闷，中风舌强，痰涎壅盛，小儿痰热惊风。

【用法与用量】 15～30 ml，亦可作制药辅料用。

【规格】 (1) 30 ml (2) 60 ml (3) 100 ml

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【贮藏】 置遮光容器中，在阴凉处密闭保存。

辣　蓼

Laliao

HERBA POLYGONI HYDROPIPERIS

本品为蓼科植物水辣蓼 Polygonum hydropiper L. 或旱辣蓼 Polygonum flaccidum Meisn. 的干燥全草。夏、秋二季花开时采挖，除去杂质，晒干。

【性状】 **水辣蓼** 根须状，表面紫褐色。茎圆柱形，有分枝，长 30～70 cm；表面灰绿色或棕红色，有细棱线，节膨大；质脆，易折断，断面浅黄色。叶互生，有柄；叶片皱缩或破碎，完整者展平后呈披针形或卵状披针形，长 5～10 cm，宽 0.7～1.5 cm；先端渐尖，基部楔形，全缘；上表面棕褐色，下表面褐绿色，有棕黑色斑点及细小半透明的腺点；托叶鞘筒状，长 0.8～1.1 cm，紫褐色，缘毛长 1～3 mm。总状花序顶生或腋生，长 5～10 cm，稍弯曲，下部间断着花，淡绿色，花被 5 裂，裂片密被腺点。气微，味辛辣。

旱辣蓼 茎多呈淡红紫色。叶宽披针形，托叶鞘长 1.1～1.6 cm，缘毛长 5～8 mm。

均以叶多、带花、辣味浓者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，切段，晒干。

【性味】 辛，温；有小毒。

【功能与主治】 除湿，化滞。用于痢疾，肠炎，食滞；外治皮肤瘙痒；灭蛆。[1]

【用法与用量】 15～30 g；外用适量，煎汤洗患处。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 置干燥处。

漏　芦

Loulu

RADIX RHAPONTICI SEU ECHINOPSIS

本品为菊科植物祁州漏芦 Rhaponticum uniflorum (L.) DC. 或禹州漏芦 Echinops

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

latifolius Tausch. 的干燥根。春、秋二季采挖，除去须根及泥沙，晒干。

【性状】 祁州漏芦　呈圆锥形或破裂成片块状，多扭曲，长短不一，直径 1～2 cm。表面灰褐色或暗棕色，粗糙，时有浮皮，具纵沟及菱形的网状裂隙。根头部膨大，有残茎及鳞片状叶基，顶端有灰白色绒毛。体轻，质脆，易折断，断面不整齐，灰黄色，有裂隙，中心灰黑色或棕黑色。气特异，味微苦。

以条粗、色灰褐、不裂者为佳。

禹州漏芦　呈类圆柱形，稍扭曲，长 10～25 cm，直径 0.5～1.5 cm。表面灰黄色或灰褐色，具纵皱纹，顶端有纤维状棕色硬毛。质硬，不易折断，断面皮部褐色，木部呈黄黑相间的放射状纹理。气微，味微涩。

以条粗、质硬、色灰黄者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，晒干。

【性味】 苦、咸，寒。

【功能与主治】 清热解毒，排脓通乳。用于乳腺炎，乳汁不通，腮腺炎，痈疖。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

熊　　胆

Xiongdan

FEL URSI

本品为熊科动物黑熊 Selenarctos thibetanus Cuvier 或棕熊 Ursus arctos L. 的干燥胆。猎取动物后，立即割取胆囊，扎紧囊口，剥去油脂，悬挂通风处阴干，或用夹板将胆囊夹扁，阴干或置石灰缸中干燥。

【性状】 本品呈囊状，上部狭细中空，下部膨大，长10～20 cm，宽 5～10 cm；有的呈扁卵圆形，厚 0.5～1.5 cm。表面灰褐色、黑褐色或棕黄色，有皱褶或微有皱褶。囊皮纤维性。干燥胆汁习称"胆仁"，呈不规则的块状或硬膏状，色泽深浅不一：金黄色、有光泽、半透明、质松脆者，习称"铜胆"或"金胆"；黑褐色或黑绿色、质硬脆或呈硬膏状者，习称"铁胆"或"墨胆"；黄绿色、质脆者，习称"菜花胆"。气清香，味苦、清凉回甜，有钻舌感。

以个大、胆仁多、色金黄、半透明、味苦回甜者为佳。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【鉴别】 (1) 取胆仁小粒，置水面上，逐渐溶解可见明显的黄线下降，而不扩散。

(2) 取胆仁少量，置铁片上，直火加热，只起泡而无腥气。

(3) 取胆仁细粉，置紫外光灯下观察，显黄白色荧光。

【检查】 牛羊胆 取胆仁约 0.1 g，加 7%醋酸溶液 20 ml 溶解后，置紫外光灯下观察，溶液不得显淡蓝色乳浊荧光。

【炮制】 除去皮膜。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清热，平肝，明目。用于惊风抽搐；外治目赤肿痛，咽喉肿痛。

【用法与用量】 0.3～1 g，多入丸散服；外用适量，研末或水调涂敷患处。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

赭　　石

Zheshi

HAEMATITUM

本品为三方晶系赤铁矿的矿石，主含三氧化二铁。采挖后，除去杂石。

【性状】 本品多呈不规则的扁平块状，大小不一。暗棕红色或灰黑色，表面附有少量棕红色粉末，有的有金属光泽。一面有圆形乳头状的突起，习称"钉头"，另一面与突起相对应处有同样大小的凹窝。摸之有棕红色粉末粘手。体重，质坚硬，不易砸碎，断面显层叠状。气微，味淡。

以色棕红、断面显层叠状、有"钉头"者为佳。

【鉴别】 取本品粉末 0.5 g，置试管中，加盐酸 2 ml，振摇后放置 10 分钟。取上层清液 1 ml，加亚铁氰化钾试液 1 滴，即发生绿蓝色沉淀。

【炮制】 赭石 除去杂质，砸碎，碾细。

煅赭石 取净赭石，砸碎，照煅法(附录19页)煅至红透，立即倒入醋内淬酥。

每赭石 100 kg，用醋 20～30 kg。

【性味】 甘、淡，寒。

【功能与主治】 镇逆，平肝，止血。用于呃逆，呕吐，头目眩晕，耳鸣，吐血。

【用法与用量】 9～30 g。

【注意】 孕妇慎服。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蕊　　仁

Ruiren

NUX PRINSEPIAE

本品为蔷薇科植物蕤核 Prinsepia uniflora Batal. 的干燥成熟果核。夏、秋间采摘成熟果实，除去果肉，洗净，晒干。

【性状】 本品呈类卵圆形，稍扁，长 6～10 mm，宽 6～8 mm，厚 3～5 mm。表面淡黄棕色或深棕色，有明显的网状沟纹，间有棕褐色果肉残留，顶端尖，两侧略不对称。质坚硬。破核后可见扁平卵圆形种子，种皮薄，浅棕色；子叶 2 片，乳白色。无臭，味微苦。

以完整、色淡黄棕、仁饱满者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，晒干，用时捣碎。

【性味】 甘，微寒。

【功能与主治】 养肝，明目。用于目赤肿痛，睑缘炎，角膜炎，视物昏暗，早期白内障，玻璃体浑浊。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置干燥处。

蕲　　蛇

Qishe

AGKISTRODON

本品为蝰科动物五步蛇 Agkistrodon acutus (Guenther) 的干燥体。多于夏、秋二季捕捉，剖开蛇腹，除去内脏，洗净，用竹片撑开腹部，盘成圆盘状，干燥后拆除竹片。

【性状】 本品卷呈圆盘状，盘径 17～34 cm，体长可达 2 M。头在中间稍向上，呈三角形而扁平，吻端向上，习称"翘鼻头"。背部两侧各有黑褐色与浅棕色组成的"V"形

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

大斑纹 24 个，其“V”形的顶端在背中线上相接，习称“方胜纹”，有的左右不相接，呈交错排列。腹部撑开或不撑开，灰白色，鳞片较大，有黑色类圆形的斑点，习称“连珠斑”，腹内壁黄白色，脊椎骨显露突起，两侧具有多数肋骨。尾部骤细，末端有三角形深灰色的角质鳞片 1 枚。气腥，味微咸。

以头尾齐全、条大、花纹斑块明显者为佳。

【炮制】 **蕲蛇** 去头，鳞，切成小块。

蕲蛇肉 去头，用黄酒润透后，除去鳞、骨，干燥。

每蕲蛇 100 kg，用黄酒 20 kg。

【性味】 甘、咸，温；有毒。

【功能与主治】 祛风，活络，镇痉，攻毒。用于半身不遂，四肢麻木，抽搐痉挛，破伤风，关节酸痛，类风湿性关节炎，小儿麻痹症恢复期。

【用法与用量】 3～9 g；研末吞服 1～1.5 g。

【贮藏】 置干燥处，防霉、防蛀。

槲寄生

Hujisheng

RAMULUS VISCI

本品为桑寄生科植物槲寄生 Viscum coloratum (Komar.) Nakai 的干燥带叶茎枝。冬季至次春采割，除去粗茎，切段，干燥，或蒸后干燥。

【性状】 本品茎枝呈圆柱形，2～5 叉状分枝，长约 30 cm，直径 0.3～1 cm；表面黄绿色、金黄色或黄棕色，有纵皱纹；节膨大，节上有分枝或枝痕。体轻，质脆，易折断，断面不平坦，皮部黄色，木部色较浅，有放射状纹理，髓部常偏向一边。叶对生于枝梢，易脱落，无柄；叶片呈长椭圆状披针形，长 2～7 cm，宽 0.5～1.5 cm；先端钝圆，基部楔形，全缘；表面黄绿色，有细皱纹，主脉 5 出，中间 3 条明显。革质。浆果球形，皱缩。无臭，味微苦，嚼之有粘性。

以枝嫩、色黄绿、叶多者为佳。

【鉴别】 本品茎的横切面：表皮细胞长方形，外被黄绿色角质层，厚 19～80 μm。皮层较宽广，纤维数十个成束，微木化；老茎石细胞甚多，单个散在或数个成群。韧皮部较窄，老茎散有石细胞，形成层不明显。木质部射线散有纤维束；导管周围纤维甚

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

多，并有少数异形细胞。髓明显。薄壁细胞含草酸钙簇晶及少数方晶。

本品茎的粉末淡黄色。表皮碎片黄绿色，细胞类方形，可见气孔。纤维成束，直径10～34 μm，壁较厚，略成波状，微木化。异形细胞形状不规则，壁较厚，微木化，胞腔大。草酸钙簇晶17～45 μm；方晶较少，直径8～30 μm。石细胞类方形、类多角形或形状不规则，直径42～102 μm。

【炮制】 除去杂质，略洗，润透，切成厚片，干燥。

【性味】 苦，平。

【功能与主治】 祛风湿，补肝肾，强筋骨。用于风湿痹痛，腰膝酸软，胎动不安。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

暴马子皮

Baomazipi

CORTEX SYRINGAE

本品为木犀科植物暴马丁香 Syringa reticulata (Bl.) Hara var. mandshurica (Maxim.) Hara 的干燥干皮或枝皮。春、秋二季剥取，干燥。

【性状】 本品呈槽状或卷筒状，长短不一，厚2～4 mm。外表面暗灰褐色，皱皮平滑，有光泽，老皮粗糙，有横纹；横向皮孔椭圆形，暗黄色；外皮薄而韧，可横向撕剥，剥落处显暗黄绿色。内表面淡黄褐色。质脆，易折断，断面不整齐。气微香，味苦。

【鉴别】 (1) 本品横切面：木栓层为多列细胞，黄棕色。皮层窄，细胞切向延长。韧皮部射线宽1～3列细胞，含细小棒状草酸钙结晶；石细胞群断续排列成环，石细胞分枝状，分枝细长。薄壁细胞含淀粉粒。

(2) 取本品粗粉5 g，置锥形瓶中，加水80 ml，煎煮30分钟，滤过，滤液浓缩至约10 ml，冷却，加乙醚10 ml，用力振摇5分钟，吸取醚液3 ml，加10%氢氧化钠溶液0.5 ml，振摇，水层显棕色，加热后，色变深，呈棕红色。

【炮制】 除去杂质，喷淋清水，稍润，切丝，干燥。

【性味】 苦，微寒。

【功能与主治】 清肺祛痰，止咳平喘。用于慢性支气管炎。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【用法与用量】 30～45 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮。

墨 旱 莲

Mohanlian

HERBA ECLIPTAE

本品为菊科植物鳢肠 Eclipta prostrata L. 的干燥地上部分。花开时采割，晒干。

【性状】 本品全体被白色茸毛。茎呈圆柱形，有纵棱，直径 2～5 mm；表面绿色或墨绿色。叶对生，近无柄，叶片皱缩卷曲或破碎，完整者展平后呈长披针形，全缘或具浅齿，墨绿色。头状花序直径 2～6 mm。瘦果椭圆形而扁，长 2～3 mm，棕色或浅褐色。气微，味微咸。

以色墨绿、叶多者为佳。

【鉴别】 (1) 取本品，浸水后，搓其茎叶，显墨绿色。

(2) 本品叶的表面观：非腺毛多为 3 细胞，长 260～700 μm，基部细胞稍膨大，中部细胞较长，壁增厚，有明显疣状突起，顶端细胞急尖而短，近三角形。气孔不定式，副卫细胞 3～4 个。

【炮制】 除去杂质，略洗，切段，晒干。

【性味】 甘、酸，微寒。

【功能与主治】 凉血止血，补阴益肾。用于牙龈出血，尿血，血痢，崩漏，头发早白，脱发，眩晕耳鸣，腰酸；外治鼻衄，外伤出血，水田皮炎。

【用法与用量】 6～12 g；外用鲜品适量，捣烂塞鼻或取汁搽患处。

【贮藏】 置通风干燥处。

稻 芽（谷芽）

Daoya

FRUCTUS ORYZAE GERMINATUS

本品为禾本科植物稻 Oryza sativa L. 的成熟果实，经发芽干燥而得。将稻粒用水

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

浸泡后，保持适宜的温、湿度，待须根(习称"芽")长至约 1 cm 时，干燥。

【性状】 本品呈扁长椭圆形，两端略尖，长 7～9 mm，直径约 3 mm。外稃黄色，两面各有纵棱 2 条与白色细茸毛；一端有 2 片对称的锥形浆片，长 2～3 mm，于一个浆片内侧伸出弯曲的须根 1～3 条，长 0.5～1.2 cm。质硬，断面白色，粉性。无臭，味淡。

以色黄、有幼芽者为佳。

【炮制】 稻芽 除去杂质。

炒稻芽 取净稻芽，照清炒法(附录18页)炒至深黄色。

【性味】 甘，温。

【功能与主治】 开胃，和中。用于食欲不振，消化不良。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

僵　蚕

Jiangcan

BOMBYX BATRYTICATUS

本品为蚕蛾科昆虫家蚕 Bombyx mori L. 4～5 龄的幼虫感染(或人工接种)白僵菌 Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. 而致死的干燥体。多于夏季生产，将感染白僵菌病死的蚕，干燥。

【性状】 本品略呈圆柱形，多弯曲皱缩，长 2～5 cm，直径 0.5～0.7 cm。表面灰黄色，被有白色粉霜状的气生菌丝和分生孢子。头部较圆，足 8 对，体节明显，尾部略呈二分歧状。质硬而脆，易折断，断面平坦，外层白色，中间有亮棕色或亮黑色的丝腺环 4 个。气微腥，味微咸。

以条粗、质硬、色白、断面光亮者为佳。表面无白色粉霜、中空者不可入药。

【炮制】 僵蚕 除去杂质。

炒僵蚕 取净僵蚕，照麸炒法(附录18页)炒至表面黄色。

【性味】 咸、辛，平。

【功能与主治】 祛风定惊，化痰散结。用于惊风抽搐，咽喉肿痛，颌下淋巴结炎，面神经麻痹，皮肤瘙痒。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

鹤　虱

Heshi

FRUCTUS CARPESII

本品为菊科植物天名精 Carpesium abrotanoides L. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收，晒干，除去杂质。

【性状】 本品呈圆柱状，细小，长 3～4 mm，直径不及 1 mm。表面黄褐色或暗褐色，具多数细纵棱。顶端较细呈短喙状，顶面扩展成灰白色圆环；基部稍尖，有着生痕迹。果皮薄，种仁类白色，稍有油性。气微，味微苦。

以粒均匀、饱满者为佳。

【性味】 苦、辛，凉；有小毒。

【功能与主治】 驱虫。用于蛔虫病，蛲虫病，绦虫病，虫积腹痛。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

鹤　草　芽

Hecaoya

GEMMA AGRIMONIAE

本品为蔷薇科植物龙牙草 Agrimonia pilosa Ledeb. 的干燥带短小根茎的芽。秋末茎叶枯萎后至次春植株萌发前采挖根茎，掰下带短小根茎的芽，洗净，晒干或低温干燥。

【性状】 本品略呈圆锥形，常弯曲，长 2～4 cm，直径 0.5～1 cm。芽由数片黄棕色披针形的膜质芽鳞包被，芽鳞上有数条叶脉；剥去芽鳞，可见黄色或黄绿色的幼芽，密被白毛；质脆，易碎。短小根茎圆柱形，长 1～2 cm；表面棕褐色，有紧密的环状节，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

着生棕色细小的鳞叶及须根；质硬，断面平坦，黄白色。气微，味先微甜而后苦涩。

【鉴别】 (1) 本品粉末灰黄棕色。芽鳞表皮细胞不规则长方形，垂周壁略连珠状增厚；有气孔。腺毛有两种：一种头部单细胞，类球形，直径约至 50 μm，柄 2～4 细胞；另一种棒状，长 50～90 μm，头部 2～4 细胞，柄 1～4 细胞。非腺毛单细胞，长短不一，以长 77～450 μm 为多见，壁厚。淀粉粒较多，单粒椭圆形，直径 2～5 μm，脐点裂隙状，复粒由 2～4 粒组成。草酸钙簇晶直径 10～45 μm。木栓细胞黄棕色，不规则多角形。具缘纹孔及螺纹导管直径 6～25 μm。

(2) 取本品粉末 0.5 g，置干燥试管中，加乙醚 5 ml，振摇 5 分钟，滤取醚液，挥去乙醚，残渣加无水乙醇 2～3 滴与硫酸 1 滴，置水浴上加热，即显红色，并发生酯类的香气。

【检查】 石油醚氢氧化钙提取物 取本品粗粉 25 g，置脂肪抽提器内，用石油醚 150 ml 加热回流提取 3 小时左右，至回流液无色为止。石油醚液浓缩至约 4 ml 时，加入 40 倍量的氢氧化钙饱和溶液振摇提取，提取液滤入分液漏斗中，并用少量氢氧化钙饱和溶液冲洗残渣，滤液与洗液合并，置分液漏斗内，滴加稀盐酸调节 pH 值至 2～3，静置 5 分钟后，用乙醚 30、25、20 ml 再提取 3 次，用恒重的容器收集提取液，挥尽乙醚，在 105°干燥至恒重。提取物不得少于 1%。

【功能与主治】 驱绦虫药。用于绦虫感染，对其头节、体节均有致死性的痉挛作用。

【用法与用量】 内服时，须剪去须根，用水闷湿，搓去根茎上的外皮，晒干，磨成细粉服用。成人 30 g，儿童按体重每公斤 0.7～0.8 g，晨空腹一次顿服(不需服泻药)。

【注意】 本品遇热失效不宜煎服。

【贮藏】 置通风干燥处，防霉、防蛀。

【制剂】 鹤草芽浸膏

鹤草芽浸膏

Hecaoya Jingao

EXTRACTUM GEMMAE AGRIMONIAE

本品为鹤草芽提取的浸膏。含酚类物质不得少于 45.0%。

【性状】 本品为黄棕色的稠膏状物；味苦涩。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【鉴别】（1）取本品约 5 mg，加无水乙醇 2 ml 溶解后，加 1% 三氯化铁的乙醇溶液 1 滴，即显棕色。

（2）取本品约 5 mg，置干燥试管中，加无水乙醇 15 滴与硫酸 3 滴，直火加热，内容物变成红色，同时逸出酯的香气。

【检查】 干燥失重 取本品，在 105°干燥 8 小时，减失重量不得过 10.0%(附录44页)。

【含量测定】 取本品约 1 g，精密称定，用乙醚 10 ml 全量移入分液漏斗中，加氢氧化钙饱和溶液振摇提取(随时补充失去的乙醚)，至提取液无黄绿色为止，合并提取液，加乙醚 20 ml 振摇，分取碱液，加盐酸调节 pH 值至 1～2，用氯仿 15、15 与 5 ml 分次用力振摇提取，合并氯仿提取液，加水 20 ml 用力振摇洗涤，分取氯仿液，置 105°恒重的蒸发皿中，在水浴上蒸干后，再于 105°干燥 8 小时，精密称定重量，即为供试量中含酚性物质的量。

【功能与主治】 同鹤草芽。

【用法与用量】 装入胶囊内服，成人 1.5 g，儿童按体重每公斤 40 mg，但对牛肉绦虫病剂量应增加二分之一。晨空腹一次顿服，并常规导泻。

【贮藏】 遮光，密封保存。

鹤 草 酚

Hecaofen

AGRIMOPHOLUM

本品为蔷薇科植物龙牙草 Agrimonia pilosa Ledeb. 的带根茎的芽中提取的酚类物质。含量以鹤草酚($C_{26}H_{34}O_8$)计算，不得少于 80.0%。

【性状】 本品为浅黄色粉末；味苦涩；遇热或长期见光渐变质。

本品在氯仿或苯中易溶，在乙醇、甲醇、丙酮或乙醚中溶解，在石油醚中略溶，在水中几乎不溶。

【鉴别】（1）取本品约 5 mg，加无水乙醇 2 ml 溶解后，加 1% 三氯化铁的乙醇溶液 1 滴，即显棕色。

（2）取本品约 5 mg，置干燥试管中，加无水乙醇 15 滴与硫酸 3 滴，直火加热，内容物变成红色，同时逸出酯的香气。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【检查】 干燥失重 取本品，在105°干燥至恒重，减失重量不得过1.0%(附录44页)。

炽灼残渣 不得过0.5%(附录45页)。

【含量测定】 取本品，研细，取出约20 mg，精密称定，置100 ml量瓶中，加环己烷70 ml，振摇半小时，再加环己烷稀释至刻度，摇匀，精密量取溶液5 ml，置100 ml量瓶中，加环己烷稀释至刻度，摇匀，照分光光度法(附录32页)，在292±1 nm的波长处测定吸收度，按$C_{26}H_{34}O_8$的吸收系数($E^{1\%}_{1cm}$)为541计算，即得。

【功能与主治】 驱虫药，对绦虫头节、体节有致死性痉挛作用。用于绦虫、滴虫感染。

【用法与用量】 治疗绦虫病：口服，成人0.8 g，儿童按每公斤体重25 mg。但对牛肉绦虫病剂量应增加二分之一。晨空腹一次顿服，并常规导泻。

治疗滴虫性肠炎：口服，一次0.3 g，一日3次，七日为一疗程，连续二疗程，儿童酌减。

治疗滴虫性阴道炎：每晚临睡前置阴道深部0.3 g，七日为一疗程，必要时连续三疗程。

【贮藏】 遮光，密闭保存。

【制剂】 鹤草酚片

鹤草酚片

Hecaofen Pian

TABELLAE AGRIMOPHOLI

本品含鹤草酚($C_{26}H_{34}O_8$)应为标示量的90.0～110.0%。

【性状】 本品为淡黄色片。

【鉴别】 取本品1片，研细，取出适量(约相当于鹤草酚20 mg)，加氯仿4 ml振摇使鹤草酚溶解，滤过，滤液挥尽氯仿，照鹤草酚项下的鉴别法(646页)试验，显相同的反应。

【检查】 除崩解时限应在5分钟内崩解外，其他应符合片剂项下有关的各项规定(附录6页)。

【含量测定】 取本品10片，精密称定，研细，精密称取适量(约相当于鹤草酚20

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

mg)，置 100 ml 量瓶中，加环己烷 70 ml，振摇半小时，再加环己烷稀释至刻度，摇匀，滤过，弃去初滤液 10 ml，精密量取续滤液 5 ml，置 100 ml 量瓶中，加环己烷稀释至刻度，摇匀，照分光光度法(附录32页)，在 292±1 nm 的波长处测定吸收度，按 $C_{26}H_{34}O_8$ 的吸收系数($E_{1cm}^{1\%}$)为 541 计算，即得。

【功能与主治】【用法与用量】 同鹤草酚。

【规格】 0.1 g

【贮藏】 遮光，密闭保存。

薤　　白

Xiebai

BULBUS ALLII MACROSTEMI

本品为百合科植物小根蒜 Allium macrostemon Bge. 的干燥鳞茎。夏、秋二季采挖，洗净，除去须根，蒸透或置沸水中烫透，晒干。

【性状】 本品呈不规则卵圆形，高 0.5～1.5 cm，直径 0.5～1.8 cm。表面黄白色或淡黄棕色，半透明，具皱纹及纵沟，有类白色膜质鳞片包被，底部钝圆，有小而突起的鳞茎盘。质硬，角质样，断面黄白色。有蒜臭，味微辣。

以个大、质硬、饱满、色黄白、半透明者为佳。

【性味】 辛、苦，温。

【功能与主治】 通阳理气，宽胸。用于胸闷胸痛，痰饮咳喘。

【用法与用量】 4.5～9 g。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

薯　　蓣（红孩儿）

Shuliang

RHIZOMA DIOSCOREAE CIRRHOSAE

本品为薯蓣科植物薯蓣 Dioscorea cirrhosa Lour. 的干燥块茎。多于夏、秋二季采

小林网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

挖，洗净，切片，干燥。

【性状】 本品为不规则圆形或长卵形片，直径1.5～10 cm，厚0.2～0.7 cm。外皮深褐色或褐棕色，凹凸不平，有点状突起的须根痕。切面暗红色或棕红色，有多数黄色斑点或斑纹。质硬而实，断面多呈颗粒状突起，显暗红与黄色交错的花纹，有的可见亮星。气微，味涩、苦。

【鉴别】 (1) 取本品粉末0.5 g，加水10 ml，煮沸，滤过，滤液加三氯化铁试液1滴，即发生污绿色沉淀。

(2) 取本品粉末0.5 g，加丙酮5 ml，振摇，滤过。取滤液点于滤纸上，放置干燥后，加香草醛试液1滴，即显鲜红色斑点。

【性味】 微苦、涩，微寒。

【功能与主治】 止血，活血，养血。用于崩漏，产后出血，咯血，尿血，上消化道出血，贫血。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防霉、防蛀。

【制剂】 薯蓣片

薯　蓣　片（红孩儿片）

Shuliang Pian

TABELLAE DIOSCOREAE CIRRHOSAE

本品为薯蓣浸膏片。每片含干浸膏0.25 g。

【制法】 取薯蓣，切片，加水煎煮三次，每次1小时，合并煎液，滤过，滤液在80°减压浓缩成稠膏状，再在90°减压干燥成干浸膏，加适量辅料，制成颗粒，压片，包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕红色；味微酸、涩。

【鉴别】 (1) 取本品2片，除去糖衣，研细，加水15 ml，振摇后，滤过。滤液分置三支试管中，一管加三氯化铁试液1滴，即发生蓝绿色沉淀；一管加4%明胶溶液1滴，即发生红色沉淀；另一管加1.5%咖啡因溶液1滴，即发生橙红色沉淀。

(2) 取本品1片，除去糖衣，研细，加丙酮少量，振摇后，滤过。取滤液点于滤纸上，放置干燥后，加香草醛试液1滴，即显鲜红色斑点。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(附录6页)。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 止血。用于月经过多，功能性子宫出血，产后出血。

【用法与用量】 口服，一次4片，一日3次。

【贮藏】 遮光，密封保存。

薏苡仁

Yiyiren

SEMEN COICIS

本品为禾本科植物薏苡 Coix lacryma-jobi L. var. ma-yuen (Roman.) Stapf 的干燥成熟种仁。秋季果实成熟时采割植株，晒干，打下果实，再晒干，除去外壳、黄褐色种皮及杂质，收集种仁。

【性状】 本品呈宽卵形或长椭圆形，长4～8 mm，宽3～6 mm。表面乳白色，光滑，偶有残存的淡棕色种皮。一端钝圆，另端较宽而微凹，有1淡棕色点状种脐。背面圆凸，腹面有1条较宽而深的纵沟。质坚实，断面白色，粉性。气微，味微甜。

以粒大、饱满、色白者为佳。

【鉴别】 本品粉末类白色。主为淀粉粒，单粒类圆形或多面形，直径2～20 μm，脐点星状；复粒少见，一般2～3粒组成。加碘试液淀粉粒显棕红色。

【炮制】 薏苡仁 除去杂质。

炒薏苡仁 取净薏苡仁，照清炒法(附录18页)炒至微黄色。

【性味】 甘、淡，微寒。

【功能与主治】 健脾，渗湿，排脓。用于脾虚腹泻，肌肉酸重，关节疼痛，水肿，白带，肺脓疡，阑尾炎。

【用法与用量】 9～30 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

薄　荷

Bohe

HERBA MENTHAE

本品为唇形科植物薄荷 Mentha haplocalyx Briq. 的干燥地上部分。夏、秋二季茎

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

叶茂盛或花开至三轮时，选晴天，分次采割，晒干或阴干。

【性状】 本品茎呈方柱形，有对生分枝，长 15～40 cm，直径 0.2～0.4 cm；表面紫棕色或淡绿色，棱角处具茸毛，节间长 2～5 cm；质脆，断面白色，髓部中空。叶对生，有短柄；叶片皱缩卷曲，完整者展平后呈宽披针形、长椭圆形或卵形，长 2～7 cm，宽 1～3 cm；上表面深绿色，下表面灰绿色，稀被茸毛，有凹点状腺鳞。轮伞花序腋生，花萼钟状，先端 5 齿裂，花冠黄棕色。揉搓后有特殊清凉香气，味辛凉。

以叶多、色深绿、气味浓者为佳。

【鉴别】 (1) 本品叶的表面观：腺鳞头部 8 细胞，直径约至 90 μm，柄单细胞；小腺毛头部及柄部均为单细胞。非腺毛 1～8 细胞，常弯曲，壁厚，微具疣状突起。下表皮气孔多见，直轴式。

(2) 取本品叶的粉末少量，经微量升华得油状物，加硫酸 2 滴及香草醛结晶少量，初显黄色至橙黄色，再加水 1 滴，即变紫红色。

【检查】 茎 不得过 65%。

【含量测定】 照挥发油测定法项下（附录16页）测定。

本品含挥发油不得少于 0.8%(ml/g)。

【炮制】 除去老茎及杂质，喷淋清水，稍润，切段，晾干。

【性味】 辛，凉。

【功能与主治】 散风热，清头目。用于风热感冒，头痛，目赤，咽喉肿痛，口舌生疮，牙痛，荨麻疹，风疹，麻疹初起。

【用法与用量】 1.5～6 g，后下。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

薄　荷　油（薄荷素油）

Boheyou

OLEUM MENTHAE

本品为唇形科植物薄荷 Mentha haplocalyx Briq. 的新鲜的茎和叶经蒸气蒸馏得到的挥发油。含酯量按醋酸薄荷酯（$C_{12}H_{22}O_2$）计算，应为 2.0～8.0%（g/g）；含总醇量按薄荷脑（$C_{10}H_{20}O$）计算，不得少于 50.0%（g/g）。

【性状】 本品为无色或淡黄色的澄清液体；有特殊清凉香气，味初辛、后凉；存放

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

日久，色渐变深。

本品与乙醇、氯仿或乙醚能任意混合。

比重 本品的比重（附录26页）在25°时为0.890～0.910。

旋光度 本品的旋光度（附录31页）在25°时为－16°至－28°。

折光率 本品的折光率（附录32页）为1.458～1.471。

【鉴别】 取本品1滴，加硫酸3～5滴及香草醛结晶少量，应显橙红色，再加水1滴，即变紫色。

【检查】 **乙醇中不溶物** 取本品1 ml，加70%乙醇3.5 ml，溶液应澄清。

重金属 取本品1 g，依法检查(附录46页第二法)，含重金属不得过百万分之二十。

【含量测定】 **含酯量** 取本品约5 g，精密称定，置烧瓶中，加中性乙醇（对酚酞指示液显中性）10 ml混合后，加酚酞指示液2滴，先用$N/10$乙醇制氢氧化钾液将游离酸中和，再精密加$N/2$乙醇制氢氧化钾液25 ml，置水浴上回流1小时后，放冷，再加酚酞指示液0.5 ml，用$N/2$盐酸液滴定剩余的氢氧化钾，同时作一空白试验，即得(每1 ml的$N/2$乙醇制氢氧化钾液相当于99.15 mg的$C_{12}H_{22}O_2$)。

总醇量 （1）乙酰化 取本品10 ml，置乙酰化瓶中，加醋酐10 ml与新熔制的无水醋酸钠2 g，附空气回流冷凝管，于145°±3°油浴内加热75分钟，取出放冷，加水50 ml，置水浴上，时时振摇，加热15分钟，放冷。移置分液漏斗中，除去下层的酸液。遗留的乙酰化油依次用氯化钠饱和溶液、以碳酸钠饱和的氯化钠饱和溶液与氯化钠饱和溶液各洗涤1次，每次各约50 ml，再用水洗涤，每次约50 ml，至洗液对酚酞指示液显中性为止。将所得乙酰化油置25 ml烧瓶中，加无水硫酸钠粉末3 g，密塞，并时时振摇使脱水，至取1滴乙酰化油加入二硫化碳10滴中不发生浑浊为止，再用干燥滤纸滤过。

（2）皂化 取干燥乙酰化油约2.5 g，精密称定，置250 ml锥形瓶中，精密加$N/2$乙醇制氢氧化钾液50 ml，照含酯量测定项下自“置水浴上回流1小时后”起，依法操作，以乙酰化油消耗$N/2$盐酸液的ml数作为A，空白消耗$N/2$盐酸液的ml数作为B，照下列公式计算，即得。

$$\text{总醇量}\% = \frac{(B-A)\times N\times 0.1563}{W-(B-A)\times N\times 0.04204}\times\left(1-0.2119\times\frac{E}{100}\right)\times 100\%$$

W 为乙酰化油的g数

E 为供试品含酯量

N 为盐酸液的当量浓度

【功能与主治】 芳香药、调味药及驱风药。可用于皮肤或粘膜产生清凉感以减轻不适及疼痛。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com


【用法与用量】 口服，一次 0.02～0.2 ml，一日 0.06～0.6 ml。

【贮藏】 遮光，密封，置阴凉处保存。

薄　荷　脑

Bohenao

MENTHOLUM



[$C_{10}H_{20}O$=156.27]

本品为薄荷油中得到的一种饱和的环状醇。

【性状】 本品为无色针状或棱柱状结晶或白色结晶性粉末；有薄荷的特殊香气，味初灼热后清凉；乙醇溶液显中性反应。

本品在乙醇、氯仿、乙醚、液状石蜡或挥发油中极易溶解，在水中极微溶解。

熔点 本品的熔点（附录28页）为 42～44°。

比旋度 取本品，精密称定，加乙醇制成每 1 ml 中含 0.1 g 的溶液，依法测定（附录31页），比旋度为－49°至－50°。

【鉴别】 (1) 取本品 1 g，加硫酸 20 ml 溶解后，即显橙红色，24 小时后析出无薄荷脑香气的无色油层（与麝香草脑的区别）。

(2) 取本品 50 mg，加冰醋酸 1 ml 溶解后，加硫酸 6 滴与硝酸 1 滴的冷混合液，仅显淡黄色（与麝香草脑的区别）。

【检查】 **不挥发物** 取本品 2 g，置水浴上加热使缓缓挥散，如有残渣，在 105°干燥至恒重，遗留残渣不得过 1 mg。

【功能与主治】 同薄荷油。

【用法与用量】 口服，一次 0.02～0.1 g，一日 3 次。

【贮藏】 密封，置阴凉处保存。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

颠　茄　草　　【剧】

Dianqiecao

HERBA BELLADONNAE

本品为茄科植物颠茄 Atropa belladonna L. 的干燥全草。在开花至结果期内采挖，除去粗茎及泥沙，切段干燥。含生物碱以莨菪碱（$C_{17}H_{23}O_3N$）计算，不得少于0.3%。

【性状】 本品根呈圆柱形，直径5～15 mm，表面浅灰棕色，具纵皱纹；老根木质，细根易折断，断面平坦，皮部狭，灰白色，木部宽广，棕黄色，其间有1明显环圈。髓部白色。茎扁圆柱形，直径3～6 mm，表面黄绿色，有细纵皱纹及稀疏的细点状皮孔，中空，幼茎有毛。叶多皱缩破碎，完整叶片卵状椭圆形，黄绿色至深棕色。花萼5裂，花冠钟状。果实球形，直径5～8 mm，具长梗，内含种子多数。气微，味微苦、辛。

【鉴别】 (1) 本品粉末浅绿色或浅棕绿色。草酸钙砂晶甚多，直径3～10 μm，含砂晶细胞中有的可见簇晶，直径15～28 μm。叶表皮细胞垂周壁波状弯曲，具角质条纹；气孔不等式。腺毛头部单细胞、柄2～4细胞及头部5～6细胞、柄单细胞；淀粉粒众多，呈类圆形、盔帽形或多角形，直径8～26 μm，脐点点状或裂缝状，大粒层纹明显。具缘纹孔及网纹导管，直径24～40 μm。亦可见木纤维、波状弯曲的种皮石细胞与花粉粒等。

(2) 取本品的细粉4 g，加乙醇15 ml，振摇15分钟，滤过，滤液蒸干，加1%硫酸溶液2 ml，搅拌后滤过，滤液中加氨试液使成碱性，再用氯仿2 ml振摇提取，分取氯仿液，蒸干，残渣显托烷生物碱类的鉴别反应(附录42页)。

【检查】 **水分** 照水分测定法项下的烘干法（附录25页）测定，含水分不得过13.0%。

有机杂质 颜色不正常(黄色、棕色或近黑色)的颠茄叶不得过4%；直径超过1cm的颠茄茎不得过3%。

【含量测定】 取本品的4号粉末约10 g，精密称定，置回流浸出器中，加乙醇10 ml、浓氨试液8 ml与乙醚20 ml的混合液，静置12小时后，用乙醚作溶媒，回流浸出3小时，至生物碱完全浸出，将浸出液置水浴上蒸发，除去一部份乙醚，移置分液漏斗中，用$N/1$硫酸液分次振摇提取，每次10 ml，至生物碱提尽为止，合并酸液，用氯仿

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

分次振摇，每次 10 ml，至氯仿层不再染色，合并氯仿液，用 $N/1$ 硫酸液 10 ml 振摇提取，弃去氯仿，合并前后两次得到的酸液，滤过，滤器用 $N/1$ 硫酸液洗涤，合并洗液与滤液，加过量的浓氨试液使成碱性，迅速用氯仿分次振摇提取，至生物碱提尽为止。如发生乳化现象，可加乙醇数滴，每次得到的氯仿液均用同一的水 10 ml 洗涤，弃去洗液，合并氯仿液，置水浴上蒸干后，加乙醇 3 ml，蒸干，并在 80° 干燥 2 小时，残渣加氯仿 2 ml，必要时，微热使溶解，精密加 $N/50$ 硫酸液 20 ml，置水浴上加热，除去氯仿，放冷至室温，加甲基红指示液 1～2 滴，用 $N/50$ 氢氧化钠液滴定，即得（每 1 ml 的 $N/50$ 硫酸液相当于 5.788 mg 的 $C_{17}H_{23}O_3N$）。

【功能与主治】 抗胆碱药。

【贮藏】 置干燥处。

【制剂】 (1) 颠茄酊 (2) 颠茄流浸膏 (3) 颠茄浸膏

颠 茄 酊 【剧】

Dianqie Ding

TINCTURA BELLADONNAE

本品含生物碱作为莨菪碱（$C_{17}H_{23}O_3N$）计算，应为 0.028～0.032%（g/ml）。

【处方】

颠茄草（粗粉）	1000 g
乙醇 (85%)	适量

【制法】 取颠茄草，照颠茄浸膏项下的制法（657页）制得稠膏状体，经测定生物碱的含量后，再加 85% 乙醇适量并用水稀释，使含生物碱和乙醇量均符合规定，静置，俟澄清，滤过，即得。

【性状】 本品为棕红色或棕绿色的液体；有微臭。

【鉴别】 取含量测定项下滴定后的溶液适量，照颠茄浸膏项下的鉴别法（657页）试验，显相同的反应。

【检查】 乙醇量 应为 60～70%（附录48页第一法）。

其他 应符合酊剂项下有关的各项规定（附录10页）。

【含量测定】 精密量取本品 100 ml，置蒸发皿中，在水浴上蒸发至约 10 ml，如有沉淀析出，可加乙醇适量使溶解，移置分液漏斗中，蒸发皿用 $N/5$ 硫酸液 10 ml 分次洗净，洗液并入分液漏斗中，用氯仿分次振摇，每次 10 ml，至氯仿层不再染色，合并氯

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

仿液，用 $N/5$ 硫酸液 10 ml 振摇洗涤，洗液并入酸液中，照颠茄草项下的方法(654页)，自"加过量的浓氨试液使成碱性"起，依法测定，即得（每 1 ml 的 $N/50$ 硫酸液相当于 5.788 mg 的 $C_{17}H_{23}O_3N$）。

【功能与主治】 抗胆碱药，解除平滑肌痉挛，抑制腺体分泌。用于胃及十二指肠溃疡病，胃肠道、肾、胆绞痛等。

【用法与用量】 常用量，口服，一次 0.3～1 ml，一日 1～3 ml。极量，口服，一次 1.5 ml，一日 4.5 ml。

【注意】 青光眼患者忌服。

【贮藏】 密封，置阴凉处保存。

颠茄流浸膏 【剧】

Dianqie Liujingao

EXTRACTUM BELLADONNAE LIQUIDUM

本品含生物碱作为莨菪碱（$C_{17}H_{23}O_3N$）计算，应为 0.70～0.80%（g/ml）。

【处方】

颠茄草（粗粉）	1000 g
乙醇（85%）	适量

【制法】 取颠茄草，照颠茄浸膏项下的制法（657页），制得稠膏状体，经测定生物碱的含量后，再加 85%乙醇适量并用水稀释，使含生物碱和乙醇量均符合规定，静置，俟澄清，滤过，即得。

【性状】 本品为棕色的液体；有微臭。

【鉴别】 取含量测定项下滴定后的溶液适量，照颠茄浸膏项下的鉴别法（657页）试验，显相同反应。

【检查】 乙醇量 应为 52～66%(附录48页第一法)。

其他 应符合流浸膏剂与浸膏剂项下有关的各项规定(附录11页)。

【含量测定】 精密量取本品 10 ml，置分液漏斗中，加水与 $N/5$ 硫酸液各 10 ml，用氯仿分次振摇，每次 10 ml，至氯仿层不再染色，合并氯仿液，用 $N/5$ 硫酸液 10 ml 振摇洗涤，洗液并入酸液中，照颠茄草项下的方法(654页)，自"加过量的浓氨试液，使成碱性"起，依法测定，即得(每 1 ml 的 $N/50$ 硫酸液相当于 5.788 mg 的 $C_{17}H_{23}O_3N$)。

【功能与主治】【注意】 同颠茄酊。

【用法与用量】 常用量，口服，一次 0.01～0.03 ml，一日 0.03～0.1 ml。极量，口

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

服，一次 0.06 ml，一日 0.7 ml。

【贮藏】 密封，置阴凉处保存。

颠茄浸膏 【剧】

Dianqie Jingao

EXTRACTUM BELLADONNAE

本品含生物碱作为莨菪碱（$C_{17}H_{23}O_3N$）计算，应为 0.95～1.05%。

【处方】

颠茄草(粗粉)	1000 g
稀释剂	适量
乙醇(85%)	适量

【制法】 取颠茄草，照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法（附录 11 页），用 85%乙醇作溶剂，浸渍 48 小时，以每分钟 1～3 ml 的速度缓缓渗漉，收集初漉液约 3000 ml另器保存，继续渗漉，俟生物碱完全漉出，续漉液作下次渗漉的溶剂用。将初漉液在 60°减压蒸馏，回收乙醇，放冷至室温，分离除去叶绿素，滤过，滤液在 60～70°蒸发至稠膏状，再加10倍量的乙醇，搅拌均匀，静置，俟沉淀完全，吸取上清液，在 60°减压蒸馏，回收乙醇后，浓缩至成浓膏状，取出约 3 g，照下述含量测定项下的方法，测定生物碱的含量后，加稀释剂适量，使生物碱的含量符合规定，研细，用 4 号筛筛过，即得。

【性状】 本品为灰绿色的细粉。

【鉴别】 取含量测定项下滴定后的溶液适量，加氨试液使成碱性，用氯仿适量振摇提取，取氯仿液，蒸干，残渣显托烷生物碱类的鉴别反应（附录42页）。

【含量测定】 取本品约 3 g，精密称定，用稀乙醇 12 ml，洗入分液漏斗中，时时振摇 30 分钟后，加氨试液 2 ml，迅速用氯仿振摇提取至少 6 次，每次 25 ml，至生物碱提尽为止，合并氯仿液，用$N/5$ 硫酸液-乙醇(3:1)分次振摇提取，至生物碱提尽为止，合并酸液，照颠茄草项下的方法（654页）自“用氯仿分次振摇，每次 10 ml”起，依法测定，即得（每 1 ml 的$N/50$ 硫酸液相当于 5.788 mg 的 $C_{17}H_{23}O_3N$）。

【功能与主治】【注意】 同颠茄酊。

【用法与用量】 常用量，口服，一次 10～30 mg，一日 30～90 mg。极量，口服，一次 50 mg，一日 150 mg。

【贮藏】 密封，置阴凉处保存。

【制剂】 颠茄片

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

颠 茄 片 【剧】

Dianqie Pain

TABELLAE BELLADONNAE

本品为颠茄浸膏片。

【性状】 本品为淡棕色或棕色片。

【鉴别】 取本品 10 片，研细，加乙醇 10 ml，研磨浸取，滤过，蒸干，加 1 %硫酸溶液 5 ml 使溶解，滤过，加氨试液使成碱性，用氯仿提取 2 次，每次 2 ml，合并氯仿液，蒸干，残渣显托烷生物碱类的鉴别反应(附录42页)。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(附录 6 页)。

【功能与主治】【用法与用量】【注意】 同颠茄浸膏。

【规格】 10 mg

【贮藏】 密闭，置阴凉处保存。

橘 红

Juhong

EXOCARPIUM CITRI GRANDIS

本品为芸香科植物化州柚 Citrus grandis Osbeck var. tomentosa Hort. 或柚 Citrus grandis Osbeck 的干燥未成熟外果皮。夏季采摘未成熟的果实，置沸水中略烫后，将果皮割成 5 或 7 瓣，除去果瓤及部分中果皮，压制成形，干燥。

【性状】 **化州柚** 呈对折的七角或展平的五角星状，单片呈柳叶形。完整者展平后直径 15～28 cm，厚 0.2～0.5 cm。外表面黄绿色，密布茸毛，有皱纹及小油点，内表面黄白色或淡黄棕色，有脉络纹。质脆，易折断，断面不整齐，外缘有 1 列不整齐的下凹的油点，内侧稍柔而有弹性。气芳香，味苦、微辛。

柚 外表面黄绿色至黄棕色，无毛。

均以片薄均匀、气味浓者为佳。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【炮制】 除去杂质，洗净，闷润，切丝或块，晒干。

【性味】 苦、辛，温。

【功能与主治】 燥湿，消痰，利气。用于风寒咳嗽，胸膈胀闷，嗳气恶心。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防蛀。

橘　　核

Juhe

SEMEN CITRI RETICULATAE

本品为芸香科植物橘 Citrus reticulata Blanco 的干燥成熟种子。加工或食用橘时收集，洗净，晒干。

【性状】 本品略呈卵形，长 0.8～1.2 cm，直径 0.4～0.6 cm。表面淡黄白色或淡灰白色，光滑，一侧有 1 条棱线，一端钝圆，另端渐尖成小柄状。外种皮薄而韧，剥去后可见淡棕色菲薄的内种皮，子叶 2 片，黄绿色，有油性。气微，味苦。

以粒饱满、色黄白者为佳。

【炮制】 盐橘核　取净橘核，照盐水炙法(附录19页)用盐水炒至微黄色并有香气，用时捣碎。

【性味】 苦，平。

【功能与主治】 理气，止痛。用于疝气，睾丸肿痛，脘胁胀痛。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置干燥处，防霉、防蛀。

糙　　苏

Caosu

HERBA PHLOMIDIS

本品为唇形科植物糙苏 Phlomis umbrosa Turcz. 的干燥地上部分。7～8 月间花开

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

时采割，除去杂质，晒干。

【性状】 本品茎呈方柱形，长 50～150 cm，表面绿褐色，疏被短硬毛；质硬而脆，断面中部有髓。叶对生，绿色，叶片多皱缩，展平后近圆形，长 6～12 cm，先端短尖，基部心形，边缘锯齿状，两面疏被星状短毛，叶柄长 2～12 cm。轮伞花序多轮，密被白毛，花萼宿存呈蜂窝状。气微香，味涩。

【鉴别】 (1) 取本品粉末 5 g，加甲醇 35 ml，置水浴上回流 15 分钟，滤过。取滤液 2 ml，置水浴上蒸干，残渣加水 2 ml 使溶解，滴加 10%α-萘酚的乙醇溶液 2 滴，振摇，沿管壁缓缓加入硫酸 0.5 ml，两液接界处显紫红色环。

(2) 取鉴别(1)项下的甲醇提取液 1 ml，加饱和硼酸的丙酮溶液与 10% 枸橼酸的丙酮溶液各 0.5 ml，置水浴上蒸干，残渣置紫外光灯下观察，显黄绿色荧光。

【炮制】 除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，晒干。

【性味】 辛、涩，平。

【功能与主治】 散风，解毒，止咳，祛痰。用于防治感冒，慢性支气管炎，疖肿。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置干燥处。

藏木香

Zangmuxiang

RADIX INULAE RACEMOSAE

本品系藏族习用药材，藏文名为 ཨ་བྲོ (玛奴)；为菊科植物总状青木香 Inula racemosa Hook. f. 的干燥根。秋末采挖，除去泥沙，晒干。

【性状】 本品呈圆锥形，略弯曲，长 5～20 cm；根头粗大，上有花茎及叶鞘残基，周围有多数圆柱形支根，表面暗棕色，有纵皱纹及须根痕。质坚硬，不易折断，断面略平坦，黄白色至浅灰黄色，有凹点状油室及少数白色光亮的针状结晶。气微香，味苦、辛。

以条粗、色棕黄、香气浓者为佳。

【鉴别】 本品横切面：木栓层为数列细胞，含少数细小草酸钙方晶。栓内层窄。韧皮部宽广，射线宽；薄壁细胞含草酸钙方晶及大量菊糖。形成层成环。木质部射线宽 8～25 列细胞；导管少，径向散列。有的细胞含菊糖；油室多，直径 80～280 μm，分布

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

于韧皮部与木质部。

粉末淡黄棕色。菊糖团块形状不规则，可见放射状纹理。薄壁细胞含草酸钙小方晶，直径 3～5 μm。网纹导管直径 16～56 μm。木栓细胞多角形，黄棕色，木纤维长梭形，具斜纹孔。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，晒干。

【性味】 辛、苦，温。

【功能与主治】 健脾和胃，调气解郁，止痛。用于慢性胃炎，胃肠功能紊乱，肋间神经痛，胸壁挫伤和岔气作痛，胎动不安。

【用法与用量】 3～9 g，多入丸散服。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

藏 糙 苏（螃蟹甲）

Zangcaosu

RADIX PHLOMIDIS YOUNGHUSBANDII

本品系藏族习用药材，藏文名为 ཀླུ་ཤིང་ （露木尔）；为唇形科植物藏糙苏 Phlomis younghusbandii Mukerjee 的干燥块根。9～10 月间采挖，洗净，晒干，或切片晒干。

【性状】 本品呈不规则的球形或长椭圆形，长3～8 cm，直径 1～3 cm。表面黄色或黄褐色，有纵皱纹或明显抽沟，两端有略突起的细根或细根痕。体轻，质较硬，切面白色，粉性。气微，味甜。

以个大、质较实者为佳。

【炮制】 除去杂质；未切片者，洗净，润透，切片，晒干。

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 祛风清热，止咳化痰，生肌敛疮。用于感冒咳嗽，支气管炎，疮疡久不愈合。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

藁　本

Gaoben

RHIZOMA LIGUSTICI

本品为伞形科植物藁本 Ligusticum sinense Oliv. 或辽藁本 Ligusticum jeholense Nakai et Kitag. 的干燥根茎及根。秋季茎叶枯萎或次春出苗时采挖，除去泥沙，晒干或烘干。

【性状】 **藁本**　根茎呈不规则结节状圆柱形，稍扭曲，有分枝，长 3～10 cm，直径 1～2 cm。表面棕褐色或暗棕色，粗糙，有纵皱纹，上侧残留数个凹陷的圆形茎基，下侧有多数点状突起的根痕及残根。体轻，质较硬，易折断，断面黄色或黄白色，纤维状。气浓香，味辛、苦、微麻。

辽藁本　较小，根茎呈不规则的团块状或柱状，有多数细长弯曲的根。

均以香气浓者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，晒干。

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 祛风，散寒，止痛。用于风寒感冒，头顶疼痛。

【用法与用量】 3～9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防潮、防蛀。

爵　床

Juechuang

HERBA JUSTICIAE

本品为爵床科植物爵床 Justicia procumbens L. 的干燥全草。夏、秋二季茎叶茂盛时采挖，除去杂质，干燥。

【性状】 本品长 20～60 cm。根细而弯曲。茎多具纵棱 6 条，表面绿黄色至浅棕黄色，有毛，节膨大成膝状，近基部节上有须状根；质韧。叶对生，具柄；叶片多皱缩，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

易脱落，展平后叶片椭圆形或卵形，长 1.5～3.5 cm，宽 0.5～2 cm，浅绿色，先端尖，全缘，有毛。穗状花序顶生或腋生，苞片条状披针形，被白色长毛。蒴果长卵形，上部有种子 4 粒，下部实心似柄状。气微，味微苦。

以茎叶色绿者为佳。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性味】 微苦，寒。

【功能与主治】 清热解毒，消疳积。用于感冒发热，咽喉肿痛，小儿疳积；外治痈疮疖肿。

【用法与用量】 9～30 g。

【贮藏】 置干燥处。

翼首草

Yishoucao

HERBA PTEROCEPHALI

本品系藏族习用药材，藏文名为 ཐང་སྐྱ་དོག (榜姿多乌)；为川续断科植物翼首草 Pterocephalus hookeri (C. B. Clarke) Höeck 的干燥全草。夏末秋初采挖，除去杂质，阴干。

【性状】 本品根呈类圆柱形，长 5～20 cm，直径 1～2 cm；表面棕褐色至黑褐色，外皮易脱落；顶端常有数个麻花状的根茎丛生；体轻，质脆，易折断，断面不平坦，木部白色。叶基生，灰绿色，多破碎，完整叶片长披针形至长椭圆形，全缘至羽状全裂，两面均被粗毛。花茎被毛，头状花序近球形，直径 1.5～2.5 cm；花白色至淡红色，萼片为羽状刚毛，多数。气微，味苦。

【性味】 苦，寒；有小毒。

【功能与主治】 清热解毒，祛风湿，止痛。用于感冒发烧，关节炎，痢疾，心热，血热。

【用法与用量】 0.6～1.2 g，多入丸散服。

【贮藏】 置干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

藕　节

Oujie

NODUS NELUMBINIS RHIZOMATIS

本品为睡莲科植物莲 Nelumbo nucifera Gaertn. 的干燥根茎节部。秋、冬二季采挖根茎(藕)，切取节部，洗净，晒干，除去须根。

【性状】 本品呈短圆柱形，中部稍膨大，长 2～4 cm，直径约 2 cm。表面灰黄色至灰棕色，有残存的须根及须根痕，偶见暗红棕色的鳞叶残基。两端有残留的藕，表面皱缩有纵纹。质硬，断面有多数类圆形的孔。气微，味微甘、涩。

以表面色灰黄、断面类白色者为佳。

【炮制】 **藕节** 除去杂质，洗净，干燥。

藕节炭 取净藕节，照炒炭法（附录 19 页）炒至表面焦黑色、内部黄褐色。

【性味】 甘、涩，平。

【功能与主治】 止血，消瘀。用于衄血，咳血，尿血，崩漏。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置干燥处，防潮、防蛀。

瞿　麦

Qumai

HERBA DIANTHI

本品为石竹科植物瞿麦 Dianthus superbus L. 或石竹 Dianthus chinensis L. 的干燥地上部分。夏、秋二季花果期采割，除去杂质，干燥。

【性状】 **瞿麦** 茎呈圆柱形，上部有分枝，长 30～60 cm；表面淡绿色或黄绿色，光滑无毛，节明显，略膨大，断面中空。叶对生，多皱缩，展平叶片呈条形至条状披针形。枝端具花及果实，花萼筒状，长 2.7～3.7 cm；苞片 4～6 片，宽卵形，长约为萼筒的 1/4；花瓣棕紫色或棕黄色，卷曲，先端深裂成细条状。蒴果长筒形，与宿萼等长。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

种子细小，多数。无臭，味淡。

石竹　萼筒长 1.4～1.8 cm，苞片长约为萼筒的 1/2；花瓣先端浅齿裂。

均以色黄绿、穗及叶多者为佳。

【鉴别】 取本品粗粉 0.5 g，加水 10 ml，置水浴中加热 10 分钟，趁热滤过，放冷。取滤液 2 ml，置带塞试管中，用力振摇 1 分钟，产生持久性泡沫，10 分钟内不消失。

【炮制】 除去杂质，洗净，稍润，切段，干燥。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 清热利尿，活血。用于尿路感染、结石，痈肿，经闭。

【用法与用量】 9～15 g。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 置通风干燥处。

蟛蜞菊

Pengqiju

HERBA WEDELIAE

本品为菊科植物蟛蜞菊 Wedelia chinensis (Osb.) Merr. 的干燥全草。夏、秋二季茎叶茂盛时采收，干燥。

【性状】 本品茎呈圆柱形，弯曲，长可达 40 cm，直径 1.5～2 mm；表面灰绿色或淡紫色，有纵皱纹，节上有的有细根，嫩茎被短毛。叶对生，近无柄；叶片多皱缩，展平后呈椭圆形或长圆状披针形，长 3～7 cm，宽 0.7～1.3 cm；先端短尖或渐尖，边缘有粗锯齿或呈波状；上表面绿褐色，下表面灰绿色，两面均被白色短毛。头状花序通常单生于茎顶或叶腋，花序梗及苞片均被短毛，苞片 2 层，长 6～8 mm，宽 1.5～3 mm，灰绿色。舌状花和管状花均为黄色。气微，味微涩。

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 清热解毒，泻火养阴。用于急性咽炎，扁桃体炎。

【用法与用量】 15～45 g。

【贮藏】 置干燥处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

翻　白　草

Fanbaicao

HERBA POTENTILLAE DISCOLORIS

本品为蔷薇科植物翻白草 Potentilla discolor Bge. 的干燥全草。夏、秋二季花开前采挖，除去杂质，干燥。

【性状】 本品块根呈纺锤形或圆柱形，长 4～8 cm，直径 0.4～1 cm；表面暗褐色，有不规则扭曲沟纹；质硬而脆，折断面平坦，灰白色。基生叶丛生，单数羽状复叶皱缩而卷曲，展平后长 4～13 cm；小叶 5～9 片，矩圆形或狭长椭圆形，顶端小叶片较大，上表面暗绿色，下表面密生白色绒毛，边缘有粗锯齿。气微，味甘、微涩。

以根肥大、叶色灰绿者为佳。

【炮制】 除去杂质，洗净，稍润，切段，干燥。

【性味】 甘、微苦，平。

【功能与主治】 止血，止痢，解毒。用于吐血，便血，崩漏，痢疾，疟疾，痈疖。

【用法与用量】 9～15 g。

【贮藏】 置干燥处。

藿　　香（土藿香）

Huoxiang

HERBA AGASTACHIS

本品为唇形科植物藿香 Agastache rugosus (Fisch. et Mey.) O. Ktze. 的干燥地上部分。夏、秋二季枝叶茂盛或花初开时采割，阴干，或趁鲜切段阴干。

【性状】 本品茎呈方柱形，常有对生的分枝，四面平坦或凹入成宽沟；长 30～90 cm，直径 0.2～1 cm；表面绿色或黄绿色；质脆，易折断，断面白色，髓部中空。叶对生，叶片较薄，多皱缩、破碎，完整者展平后呈卵形或长卵形，长 2～8 cm，宽 1～5 cm；上表面深绿色，下表面浅绿色；先端尖或短渐尖，基部圆形或心形，边缘有钝锯齿；叶

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

柄长 1～4 cm。穗状轮伞花序顶生。切段者长 1～2 cm。气香而特异，味淡、微凉。

以茎枝色绿、叶多、香气浓者为佳。

【鉴别】 本品叶的表面观：表皮细胞垂周壁波状弯曲；气孔及毛茸较多。气孔直轴式。非腺毛 1～4 细胞，表面有疣状突起。腺鳞头部 8 细胞，罕为 4 细胞，直径 60～90 μm，柄单细胞，棕色；小腺毛头部 1～2 细胞，柄单细胞。

茎的横切面：表皮细胞外被角质层，并有腺毛及非腺毛。下皮厚角组织位于棱角处。皮层狭窄。中柱鞘纤维束断续排列成环，壁木化。韧皮部窄。形成层环不明显。木质部在棱角处较发达，均木化；射线宽窄不一。髓部薄壁细胞纹孔明显，有时可见细小草酸钙柱晶。

【炮制】 未切段者，除去老茎及杂质，先抖下叶，筛净另放，茎洗净，润透，切段，晒干，再与叶混匀。

【性味】 辛，微温。

【功能与主治】 祛暑解表，化湿和胃。用于暑湿感冒，胸闷，腹痛吐泻。

【用法与用量】 6～12 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防潮。

鳖　甲

Biejia

CARAPAX TRIONYCIS

本品为鳖科动物鳖 Trionyx sinensis Wiegmann 的背甲。全年均可捕捉，以秋、冬二季为多，捕捉后杀死，置沸水中烫至背甲上的硬皮能剥落时，取出，剥取背甲，除去残肉，晒干。

【性状】 本品呈椭圆形或卵圆形，背面隆起，长 10～15 cm，宽 9～14 cm。外表面黑褐色或墨绿色，略有光泽，具细网状皱纹及灰黄色或灰白色斑点，中间有 1 条纵棱，两侧各有左右对称的横凹纹 8 条，外皮脱落后，可见锯齿状嵌接缝。内表面类白色，中部有突起的脊椎骨，颈骨向内卷曲，两侧各有肋骨 8 条，伸出边缘。质坚硬。气微腥，味淡。

以块大、无残肉者为佳。

【炮制】 鳖甲　浸泡，去净皮肉，洗净，日晒夜露至无臭气。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

醋鳖甲 取净鳖甲，照炙法(附录19页)用砂子炒至表面淡黄色，取出，筛去砂子，醋淬，取出，晒干。

每鳖甲 100 kg，用醋 20 kg。

【性味】 咸，微寒。

【功能与主治】 滋阴退热，软坚散结。用于阴虚潮热，盗汗，热病后期伤阴抽搐，腹部肿块，肝脾肿大，经闭。

【用法与用量】 9～24 g。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

蟾　　酥

Chansu

VENENUM BUFONIS

本品为蟾蜍科动物中华大蟾蜍 Bufo bufo gargarizans Cantor 或黑眶蟾蜍 Bufo melanostictus Schneider 的干燥分泌物。多于夏、秋二季捕捉蟾蜍，洗净，挤取耳后腺及皮肤腺的白色浆液，加工，干燥。

【性状】 本品呈扁圆形团块状或片状。棕褐色或红棕色。团块状者质坚，不易折断，断面棕褐色，角质状，微有光泽；片状者质脆，易碎，断面红棕色，半透明。气微腥，味初甜而后有持久的麻辣感，粉末嗅之作嚏。

以色红棕、断面角质状、半透明、有光泽者为佳。

【鉴别】 (1) 本品断面沾水，即呈乳白色隆起。

(2) 取本品粉末约 0.1 g，加甲醇 5 ml，浸泡 1 小时，滤过，滤液中加对二甲氨基苯甲醛固体少量，滴加硫酸数滴，即显蓝紫色。

(3) 取本品粉末 0.1 g，加氯仿 5 ml，浸泡 1 小时，滤过，滤液蒸干，残渣加醋酐少量使溶解，滴加硫酸，初显蓝紫色，渐变为蓝绿色。

【炮制】 **蟾酥** 粉碎成细粉。

酒蟾酥 捣碎，加约 2 倍量的白酒，时常搅动至呈稠膏状，干燥，粉碎。

【性味】 甘、辛，温；有毒。

【功能与主治】 解毒，消肿，止痛。用于痈疖，疔毒，咽喉肿痛，龋齿疼痛。

【用法与用量】 15～30 mg，多入丸散用；外用适量。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【注意】 孕妇慎用。

【贮藏】 置干燥处，防潮。

糯 稻 根

Nuodaogen

RADIX ORYZAE GLUTINOSAE

本品为禾本科植物糯稻 Oryza sativa L. var. glutinosa Matsum. 的干燥根及茎基。秋季采挖，洗净，晒干。

【性状】 本品常集结成疏松的团。上端有多数分离的残茎；茎圆柱形，中空，长2.5～6.5 cm，外包数层黄白色的叶鞘。下端簇生细长而弯曲的须根；须根直径约1 mm，黄白色至黄棕色，略具纵皱纹。体轻，质软。气微，味淡。

【炮制】 除去残茎，洗净，晒干。

【性味】 甘，平。

【功能与主治】 止汗。用于自汗，盗汗。

【用法与用量】 30～60 g。

【贮藏】 置干燥处。

麝 香

Shexiang

MOSCHUS

本品为鹿科动物林麝 Moschus berezovskii Flerov、马麝 Moschus sifanicus Przewalski 或原麝 Moschus moschiferus L. 成熟雄体香囊中的干燥分泌物。野麝多在冬季至次春猎取，猎获后，割取香囊，阴干，习称"毛壳麝香"；剖开香囊，除去囊壳，习称"麝香仁"。家麝直接从其香囊中取出麝香仁，阴干或用干燥器密闭干燥。

【性状】 毛壳麝香 为扁圆形或类椭圆形的囊状体，直径3～7 cm，厚2～4 cm。开口面的革质皮，棕褐色，略平，残存密生或稀疏的白色或灰棕色短毛，从两侧围绕中心排

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

列，中间有1小孔(囊孔)。另一面为棕褐色略带紫的皮膜，微皱缩，偶显肌肉纤维，略有弹性，剖开后可见中层皮膜呈棕褐色或灰褐色，半透明，内层皮膜呈棕色，内含颗粒状、粉末状的麝香仁和少量细毛及脱落的内层皮膜(习称"银皮")。

以饱满、皮薄、有弹性、香气浓烈者为佳。

麝香仁 野生者质柔，油润，疏松；其中颗粒状者习称"当门子"，呈不规则圆形或颗粒状，表面多呈紫黑色，油润光亮，微有麻纹，断面深棕色或黄棕色；粉末状者多呈棕褐色或黄棕色，并有少量脱落的内层皮膜和细毛。饲养者呈颗粒状、短条形或不规则的团块；表面不平，紫黑色或深棕色，显油性，微有光泽，并有少量毛和脱落的内层皮膜。气香浓烈而特异，味微辣、微苦带咸。

以颗粒色紫黑、粉末色棕褐、质柔油润、香气浓烈者为佳。

【鉴别】 (1) 取毛壳麝香用特制槽针从囊孔插入，转动槽针，撮取麝香仁，立即检视，槽内的麝香仁应有逐渐膨胀高出槽面的现象，习称"冒槽"。麝香仁油润，颗粒疏松，无锐角，香气浓烈。不应有纤维等异物或异常气味。

(2) 取麝香仁粉末少量，置手掌中，加水润湿，用手搓之能成团，再用手指轻揉即散，不应沾手、染手、顶指或结块。

(3) 取麝香仁少量，撒于炽热的坩埚中灼烧，初则并裂，随即融化膨胀起泡似珠，香气浓烈四溢，应无毛、肉焦臭，无火焰或火星出现。灰化后，残渣呈白色或灰白色。

(4) 麝香仁粉末棕褐色或黄棕色。为无数不定形颗粒状物集成的半透明或透明团块，淡黄色或淡棕色；团块中包埋或散在有方形、柱状、八面体或不规则的晶体；并可见圆形油滴，偶见毛及内皮层膜组织。

【炮制】 取毛壳麝香，除去囊壳，取出麝香仁，除去杂质，用时研细。

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 开窍醒神，活血通络，散结止痛。用于热病、惊风、中风神志昏迷，心腹暴痛，心绞痛，腹部肿块，肢体麻木、疼痛，跌扑损伤，痈疽疮疡。

【用法与用量】 0.03～0.1 g，多入丸散服；外用适量。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 密闭，置阴凉干燥处，遮光，防潮、防蛀。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

成方及复方制剂

一 捻 金

Yinianjin

【处方】 大黄 100 g 牵牛子(炒) 200 g 槟榔 100 g 人参 100 g 朱砂 30 g

【制法】 以上五味，朱砂水飞或粉碎成极细粉；其余大黄等四味粉碎成细粉，与上述粉末配研，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为黄棕色至黄褐色的粉末；气微，味微苦而涩。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：草酸钙簇晶大，直径 60～140 μm。草酸钙簇晶直径 20～68 μm，棱角锐尖。种皮栅状细胞淡棕色或棕色，长 48～80 μm。内胚乳碎片无色，壁较厚，有较多大的类圆形纹孔。不规则细小颗粒暗棕红色，有光泽，边缘暗黑色。

(2) 取本品约 0.5 g，用水淘洗，可得少量朱红色沉淀，取出，用盐酸湿润，在光洁的铜片上轻轻摩擦，铜片表面即显银白色光泽，加热烘烤后，银白色即消失。

(3) 取本品约 0.5 g，加水 5 ml 浸渍，滤过，滤液加氢氧化钠试液数滴，显樱红色。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录 3 页)。

【功能与主治】 消食导滞，祛痰，通便。用于小儿停乳停食，腹满便秘，痰涎壅盛。

【用法与用量】 口服，一次 0.6 g，一日 2 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

二 冬 膏

Erdong Gao

【处方】 天冬 500 g 麦冬 500 g

【制法】 以上二味，加水煎煮三次，第一次 3 小时，第二、三次各 2 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩成比重 1.21～1.25 (80～85°热测)的清膏。每 100 g 清膏加炼蜜 50 g，混匀，即得。

小林网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 本品为棕黄色稠厚的半流体；味甜、微苦。

【检查】 应符合煎膏剂项下有关的各项规定(附录 4 页)。

【功能与主治】 养阴清肺。用于燥咳痰少，咽喉干痛，干燥性鼻炎。

【用法与用量】 口服，一次 9～15 g，一日 2 次。

【贮藏】 密闭，防热。

二 至 丸

Erzhi Wan

【处方】 女贞子(蒸) 500 g 墨旱莲 500 g

【制法】 以上二味，女贞子粉碎成细粉，过筛。墨旱莲加水煎煮二次，合并煎液，滤过，滤液浓缩至适量，加炼蜜 60 g 及适量的水，与上述粉末泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为黑褐色的水蜜丸；气微，味甘而苦。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：果皮表皮细胞表面观类多角形，垂周壁厚薄不匀，胞腔含淡棕色物；内果皮纤维束上下层斜向或垂直交错排列。

(2) 取本品约 0.5 g，研细，置带塞锥形瓶中，加氯仿 10 ml，振摇 3 分钟，用干燥滤纸滤过。取氯仿液 1 ml，加醋酐 10 滴，摇匀，加硫酸 5 滴，即显桃红色，继变为紫红色，最后呈污绿色。

【检查】 除崩解时限检查应在 2 小时内崩解外，其他应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 滋阴，补肝肾，止血。用于头晕目眩，耳鸣，咽干，鼻燥易出血，腰膝酸软。

【用法与用量】 口服，一次 9 g，一日 2 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

二 陈 丸

Erchen Wan

【处方】 陈皮 250 g 半夏(制) 250 g 茯苓 150 g 甘草 75 g

【制法】 以上四味，粉碎成细粉，过筛，混匀。另取生姜 50 g，捣碎加水适量压榨

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

取汁，与上述粉末泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为灰棕色至黄棕色的水丸；气微香，味甘、微辛。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。草酸钙针晶成束，长 32～144 μm，存在于粘液细胞中或散在。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 除湿化痰，调气和胃。用于咳嗽痰稀，脘胀呕恶，头眩心悸。

【用法与用量】 口服，一次 6～9 g，一日 2 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

二 妙 丸

Ermiao Wan

【处方】 苍术 500 g 黄柏 500 g

【制法】 以上二味，先取苍术三分之一量，粉碎成细粉，过筛，作起模用。剩余的苍术与黄柏粉碎成细粉，过筛，混匀，用水泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为灰黄色的水丸；气微香，味苦涩。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：草酸钙针晶细小，长 10～32 μm，不规则地充塞于薄壁细胞中。纤维束鲜黄色，周围细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维，含晶细胞的壁木化增厚。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录 1 页）。

【功能与主治】 燥湿清热。用于湿热下注，足膝红肿热痛，下肢丹毒，白带，阴囊湿疹。

【用法与用量】 口服，一次 6～9 g，一日 2 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

十一味能消丸

Shiyiwei Nengxiao Wan

本品系藏族验方，藏文名为 ཞི་ཇེད་བཅུ་གཅིག (西吉久计)。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【处方】 藏木香 30 g　小叶莲 50 g　野姜 40 g　沙棘膏 38 g
诃子(去核) 75 g　蛇肉(麝香制) 25 g　大黄 90 g　方海 25 g
寒水石(煅) 100 g　硇砂 17 g　碱花 125 g

【制法】 以上十一味，粉碎成细粉，过筛，混匀，用水泛丸，晒干，即得。

【性状】 本品为棕黄色至黄褐色的水丸；气微，味咸、微苦、涩。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：果皮纤维层淡黄色，斜向交错排列，壁较薄，有纹孔。草酸钙簇晶大，直径 60～140 μm。

(2) 取本品粉末 1 g，加水 5 ml，振摇，滤过，滤液呈棕红色，pH 值约为 9；加盐酸使成酸性，红色消退成棕黄色。

(3) 取鉴别 (2) 项下的滤液 1 ml，加硝酸银试液 2 滴，发生凝胶状沉淀，沉淀在氨试液中溶解，在硝酸中不溶。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录 1 页）。

【功能与主治】 化瘀行血，通经催产。用于经闭，月经不调，难产，胎盘不下，产后瘀血腹痛。

【用法与用量】 口服，一次 1 丸，一日 2 次。

【注意】 孕妇忌服。

【规格】 每丸重 1.5 g

【贮藏】 密闭，防潮。

十二味翼首散

Shi'erwei Yishou San

本品系藏族验方，藏文名为 ཟངས་རྡོ་བཅུ་གཉིས (榜姿久尼)。

【处方】 翼首草 150 g　榜嘎 150 g　角茴香 150 g　戟大戟 100 g　黑草乌叶 100 g
石灰华 50 g　牛黄 50 g　麝香 5 g　安息香 50 g　五灵脂膏 50 g
檀香 50 g　红花 50 g

【制法】 以上十二味，除牛黄、麝香外，其余翼首草等十味粉碎成细粉，过筛。将牛黄、麝香研细，再与上述粉末配研，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为灰棕色的粉末；气香，味苦，有麻舌感。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定（附录 3 页）。

【功能与主治】 清热解毒。用于流行性感冒，痢疾，热病发烧。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【用法与用量】 口服，一次 1～1.5 g，一日 2 次。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 密闭，防潮。

十三味榜嘎散

Shisanwei Bangga San

本品系藏族验方，藏文名为 བཅོ་ལྔ་བང་དགུ་ཁྲིགས། （榜嘎久松）。

【处方】 榜嘎 38 g　波棱瓜子 20 g　麻花秦艽花 70 g　迭达 30 g
直立紫堇 42 g　苦菜 70 g　洪连 40 g　三棵针皮 50 g
柴胡草 100 g　甘青青蓝 100 g　五灵脂膏 40 g　细叶白前子 34 g
红景天 83 g

【制法】 以上十三味，粉碎成细粉，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为绿黄色的粉末；气微香，味苦。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定（附录 3 页）。

【功能与主治】 清肝热，退黄疸。用于黄疸型肝炎，胆囊炎。

【用法与用量】 口服，一次 1～1.5 g，一日 2 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

十五味沉香丸

Shiwuwei Chenxiang Wan

本品系藏族验方，藏文名为 ཨ་གག་བཅོ་ལྔ （阿嘎久扼）。

【处方】 沉香 100 g　藏木香 150 g　檀香 50 g
紫檀香 150 g　红花 100 g　肉豆蔻 25 g
高山辣根菜 150 g　悬钩子茎（去皮、心）200 g　木藤蓼（去皮）100 g
野姜 50 g　石灰华 100 g　广枣 50 g
诃子（去核）150 g　毛诃子（去核）80 g　余甘子 100 g

【制法】 以上十五味，粉碎成细粉，过筛，混匀，用水泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为黄褐色、棕红色至棕褐色的水丸，气香，味苦。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【鉴别】（1）取本品粉末约 0.5 g，加水 10 ml，微温，滤过。滤液加热，发出明显的檀香香气，放冷，加三氯化铁试液 1 滴，即显蓝黑色，再加硫酸 1 滴，蓝黑色消失。

（2）取本品粉末约 0.5 g，加 0.1%氢氧化钾溶液 5 ml，煮沸，放冷，加水 5 ml，滤过，滤液加稀盐酸使成微酸性，加乙醚 5 ml，振摇，分取乙醚液，加氨试液 5 滴，即显棕红色。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录 1 页）。

【功能与主治】 调和气血，止咳，安神。用于气血郁滞，胸痛，干咳气短，失眠。

【用法与用量】 口服，一次 3 丸，一日 3 次。


【注意】 肾病患者慎服。

【规格】 每丸重 0.5 g

【贮藏】 密闭，置阴凉干燥处。

十六味杜鹃丸

Shiliuwei Dujuan Wan

本品系蒙古族验方，蒙古文名为  （哈日布尔·阿日苯吉日嘎）。

【处方】

杜鹃叶 150 g	石榴 25 g	石膏 75 g	肉桂 50 g	豆蔻 50 g
木香 50 g	丁香 50 g	甘草 50 g	白葡萄干 125 g	山沉香 75 g
拳参 75 g	茜茅 50 g	红花 50 g	广枣 50 g	肉豆蔻 50 g
方海 50 g				

【制法】 以上十六味，除白葡萄干外，其余杜鹃叶等十五味粉碎成粗粉，加白葡萄干，粉碎，烘干，再粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 110～130 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为棕褐色的大蜜丸；气微香，味甘辛、微苦而涩。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录 1 页）。

【功能与主治】 宽胸顺气，止嗽定喘。用于胸满腹胀，头昏浮肿，寒嗽痰喘。

【用法与用量】 口服，一次 1 丸，一日 2～3 次。

【规格】 每丸重 6 g

【贮藏】 密闭，防潮。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

十全大补丸

Shiquan Dabu Wan

【处方】 党参 80 g　白术(炒)80 g　茯苓 80 g　甘草(蜜炙) 40 g
当归 120 g　白芍(酒炒)80 g　川芎 40 g　熟地黄 120 g
黄芪(蜜炙)80 g　肉桂 20 g

【制法】 以上十味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 35～50 g 与适量的水泛丸，干燥；或加炼蜜 100～120 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为棕褐色至黑褐色的水蜜丸或大蜜丸；气香，味甘而微辛。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。联结乳管直径 12～15 μm，含细小颗粒状物。薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。纤维成束或散离，壁厚，表面有纵裂纹，两端断裂成帚状或较平截。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。草酸钙针晶细小，长 10～32 μm，不规则地充塞于薄壁细胞中。草酸钙簇晶直径 18～32 μm，存在于薄壁细胞中，常排列成行，或一个细胞中含有数个簇晶。薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。石细胞类圆形或类长方形，壁一面菲薄。螺纹导管直径 8～23 μm，加厚壁互相连结，似网状螺纹导管。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 温补气血。用于气血两虚，面色苍白，气短心悸，体倦乏力，四肢不温。

【用法与用量】 口服，水蜜丸一次 6 g，大蜜丸一次 1 丸；一日 2～3 次。

【规格】 大蜜丸每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

十味石榴丸

Shiwei Shiliu Wan

本品系蒙古族验方，蒙古文名为 ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷᠪᠠ (阿那尔·阿日巴)。

【处方】 石榴 250 g　肉桂 25 g　白及 75 g　茜茛 100 g　红花 75g
豆蔻 125 g　玉竹 100 g　黄精 75 g　菱角 75 g　天花粉 75 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【制法】 以上十味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 100～110 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为黑褐色的大蜜丸；气香，味辛、甘。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：石细胞无色，椭圆形或类圆形，壁厚，孔沟细密。石细胞淡黄色，多角形，壁较厚，有的层纹明显。内种皮石细胞黄棕色或棕红色，表面观类多角形，壁厚，胞腔含硅质块。纤维单个散在，长梭形，直径 17～34 μm，木化。花粉粒球形或椭圆形，直径约 60 μm，外壁有刺，有 3 个萌发孔。草酸钙针晶成束，长 27～88 μm；表皮细胞垂周壁波状弯曲，壁厚 3～6 μm，有纹孔。具缘纹孔导管大，多破碎，有的具缘纹孔六角形或斜方形，排列紧密。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 温中健胃，暖肾祛寒。用于胃寒腹泻，腰酸腿疼，遗精。

【用法与用量】 口服，一次 1 丸，一日 2 次。

【规格】 每丸重 6 g

【贮藏】 密闭，防潮。

丁公藤风湿药酒

Dinggongteng Fengshi Yaojiu

【处方】

丁公藤 1000 g	桂枝 30 g	麻黄 37.5 g	羌活 3 g	当归 3 g
川芎 3 g	白芷 3 g	补骨脂 3 g	乳香 3 g	猪牙皂 3 g
陈皮 13 g	苍术 3 g	厚朴 3 g	香附 3 g	木香 3 g
枳壳 20 g	白术 3 g	山药 3 g	黄精 8 g	菟丝子 3 g
小茴香 3 g	苦杏仁 3 g	泽泻 3 g	五灵脂 3 g	蚕砂 6.5 g

【制法】 以上二十五味，丁公藤蒸 2 小时后，与桂枝等二十四味，置容器内，加入白酒 4250 ml，密闭浸泡，浸泡期间加温 2 至 5 次，每次使浸液达 35°，浸泡 40 天，滤过，即得。

【性状】 本品为棕黄色至红棕色的溶液；气香，味微苦、甘。

【鉴别】 取本品，置紫外光灯下观察，显浅蓝色荧光。

【检查】 **总固体** 精密量取本品 25 ml，置称定重量的蒸发皿中，于水浴上蒸干，在 105° 干燥至恒重，遗留残渣不得少于 1.5%。

乙醇量 应为 35～45%(附录 48 页第一法)。

其他 应符合酒剂项下有关的各项规定(附录 4 页)。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 祛风除湿，消瘀止痛。用于风寒湿痹，手足麻木，腰腿酸痛，跌扑损伤。

【用法与用量】 口服，一次 10～15 ml，一日 2～3 次；外用擦患处。若有肿痛黑瘀，用生姜捣碎炒热，加入药酒适量，擦患处。

【注意】 孕妇可外擦患处，但忌擦腹部和忌内服。

【贮藏】 密封。

七味广枣丸

Qiwei Guangzao Wan

本品系蒙古族验方，蒙古文名为 ᠴᠢᠭᠤᠯᠠᠭᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠤᠵᠢᠷᠠᠨ (吉如拿芍沙·道洛)。

【处方】 广枣 450 g　肉豆蔻 75 g　丁香 75 g　木香 75 g
枫香脂 75 g　沉香 75 g　牛心粉 75 g

【制法】 以上七味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 80～100 g 制成大蜜丸，另取朱砂粉末包衣，即得。

【性状】 本品为红色的大蜜丸，除去外衣后，显棕褐色；气香，味甘、苦、辛、微酸。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 养心益气，安神。用于胸闷疼痛，心跳气短，心神不安，失眠健忘。

【用法与用量】 口服，一次 1 丸，一日 2～3 次。

【规格】 每丸重 6 g

【贮藏】 密闭，防潮。

七味铁屑丸

Qiwei Tiexie Wan

本品系藏族验方，藏文名为 ཇག་ཚ་བདུན་པ (茄切顿巴)。

【处方】 铁屑(诃子制)250 g　寒水石(奶制) 300 g　藏木香 150 g　木香 100 g
甘青青蓝 150 g　红花 150 g　五灵脂膏 80 g

【制法】 以上七味，除五灵脂膏外，其余铁屑等六味，粉碎成细粉，过筛，混匀，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

取五灵脂膏与水泛丸，另用适量的铁屑浆(取诃子制铁屑1份，加水4份，和匀成浆)打光，干燥，即得。

【性状】 本品为黑色的水丸；气香，味苦。

【鉴别】 取本品粉末约0.5 g，加水10 ml，微温，滤过。取滤液2 ml，加稀盐酸使成微酸性，加亚铁氰化钾试液5滴，放置，溶液显蓝绿色，再加氢氧化钠试液3滴，则蓝绿色消失。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录1页)。

【功能与主治】 行气活血，平肝清热止痛。用于肝区疼痛，肝脏肿大。

【用法与用量】 口服，一次1丸，一日2次。

【规格】 每丸重1 g

【贮藏】 密闭，防潮。

七味葡萄散

Qiwei Putao San

本品系蒙古族验方，蒙古文名为[illegible]（乌珠玛·道洛）。

【处方】 白葡萄干180 g　石膏90 g　红花90 g　甘草90 g
香附60 g　肉桂60 g　石榴60 g

【制法】 以上七味，除白葡萄干外，其余石膏等六味粉碎成粗粉，加白葡萄干，粉碎，烘干，再粉碎成细粉，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为黄棕色的粉末；气香，味甘、微涩。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：花冠碎片黄色，有红棕色或黄棕色分泌管。分泌细胞类圆形，含淡黄棕色至红棕色分泌物。石细胞类方形或类圆形，壁一面菲薄。石细胞无色，椭圆形或类圆形，壁厚，孔沟细密。不规则片状结晶无色，有平直纹理。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录3页)。

【功能与主治】 清肺，止嗽，定喘。用于虚劳咳嗽，年老气喘，胸满郁闷。

【用法与用量】 口服，一次3 g，一日2～3次。

【规格】 每袋重18 g

【贮藏】 密闭，防潮。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

七味榄藤子丸

Qiwei Ketengzi Wan

本品系傣族验方，西双版纳傣文名为ᦅᦵᧁᦷᧁᦸᦎᦹᦎᦷᦎᦵ(雅沙哩门挪)，德宏傣文名为ꪗꪫꪱꪗꪾꪫꪱꪗꪫ(雅沙哩门挪)。

【处方】 榄藤子仁(炒)250 g　毛叶巴豆根 250 g　蔓荆子及叶 250 g
黑种草子 250 g　阿魏 3 g　胡椒 15 g
墨旱莲草汁　适量

【制法】 以上七味，除墨旱莲草汁外，其余榄藤子仁等六味，粉碎成细粉，过筛，混匀。用墨旱莲草汁泛小丸，晒干或低温干燥，即得。

【性状】 本品为黑褐色的小丸；有蒜样臭气，味辛、微苦。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 祛暑，和中，解痉止痛。用于吐泻腹痛，胸闷，肋痛，头痛发热。

【用法与用量】 口服，一次 3～6 g，一日 3 次；外用研末以麻油调敷患处。

【贮藏】 密闭，防潮。

七　珍　丸

Qizhen Wan

【处方】 僵蚕(炒)160 g　全蝎 160 g　麝香 16 g　朱砂 80 g　雄黄 80 g
胆南星 80 g　竹黄 80 g　巴豆霜 32 g　寒食曲 160 g

【制法】 以上九味，除麝香、巴豆霜外，雄黄、朱砂分别水飞或粉碎成极细粉；其余僵蚕等五味粉碎成细粉；将麝香研细，与上述粉末(取出朱砂适量作包衣用)配研，过筛，混匀。用水泛丸，阴干，朱砂粉末包衣，即得。

【性状】 本品为朱红色的水丸；气芳香浓郁，味辣、微苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：不规则块片无色透明，边缘多平直，有棱角，遇水合氯醛液溶化。草酸钙簇晶直径 8～24 μm，存在于类圆形薄壁细胞中。体壁碎片无色，表面有极细的菌丝体。体壁碎片淡黄色至黄色，有网状纹理及圆形毛窝，有时可见棕褐色刚毛。不规则碎块金黄色或橙黄色，有光泽。不规则细小颗粒暗棕红色，有光

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

泽，边缘暗黑色。无定形团块淡黄棕色，埋有细小方形结晶。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 定惊，豁痰，消积，通便。用于急惊风，痰涎壅盛，停乳停食，大便秘结。

【用法与用量】 口服，小儿三至四个月，一次 3 粒；五至六个月，一次 4～5 粒；周岁，一次 6～7 粒；一日 1～2 次。周岁以上及体实者酌加用量，或按医嘱。

【规格】 每 200 粒约重 3 g

【贮藏】 密封。

七 厘 散

Qili San

【处方】 血竭 500 g 乳香(制)75 g 没药(制)75 g 红花 75 g
儿茶 120 g 冰片 6 g 麝香 6 g 朱砂 60 g

【制法】 以上八味，除麝香、冰片外，朱砂水飞或粉碎成极细粉；其余血竭等五味粉碎成细粉；将麝香、冰片研细，与上述粉末配研，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为朱红色至紫红色的粉末或易松散的块状；气香，味辛、苦，有清凉感。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：花冠碎片黄色，有红棕色或黄棕色分泌管；花粉粒球形或椭圆形，直径约 60 μm，外壁有刺，具 3 个萌发孔。不规则块片血红色，周围液体显姜黄色，渐变红色。不规则碎块淡黄色，表面及周围扩散出众多细小颗粒，久置溶化。不规则碎块淡黄色，半透明，渗出油滴，加热后油滴溶化，现正方形草酸钙结晶。无定形团块淡黄棕色，埋有细小方形结晶。

(2) 取本品少量，进行微量升华，升华物置显微镜下观察，呈不定形的无色片状结晶。

(3) 取本品约 0.5 g，用水淘洗，可得少量朱红色沉淀，取出，用盐酸湿润，在光洁的铜片上轻轻摩擦，铜片表面即显银白色光泽，加热烘烤后，银白色即消失。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录 3 页)。

【功能与主治】 活血化瘀，止痛止血。用于跌扑损伤，血瘀疼痛，外伤出血。

【用法与用量】 口服，一次 1～1.5 g，一日 1～3 次；外用调敷患处。

【注意】 孕妇忌服。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【贮藏】 密封。

七 雄 丸

Qixiong Wan

本品系蒙古族验方，蒙古文名为 ᠲᠡᠭᠦᠮᠡᠨ ᠬᠣᠶᠢᠷᠬᠠᠢ (巴特尔·道洛)。

【处方】 草乌芽 250 g 诃子 250 g 多叶棘豆 100 g 茜草 100 g
安息香 100 g 麝香 25 g 朱砂 100 g

【制法】 以上七味，除麝香外，朱砂水飞或粉碎成极细粉；其余草乌芽等五味粉碎成细粉；将麝香研细，与上述粉末(取出朱砂半量作包衣用)配研，过筛，混匀。每 100 g 粉末用面粉 10 g 与适量的水制成稀糊泛丸，朱砂粉末包衣，干燥，即得。

【性状】 本品为红色的糊丸，除去外衣后，显棕褐色；气香，味咸、酸、涩。

【鉴别】 (1)取本品，置显微镜下观察：非腺毛单细胞，镰刀形，直径 15～30 μm，壁较薄，密具疣点。非腺毛单细胞，甚长，壁较厚，光滑。果皮纤维层淡黄色，斜向交错排列，壁较薄，有纹孔。草酸钙针晶成束或散在，长达 72 μm。无定形团块淡黄棕色，埋有细小方形结晶。不规则细颗粒暗棕红色，有光泽，边缘暗黑色。

(2)取本品粉末约 1 g，加温水 10 ml，浸渍 20 分钟，滤过。取滤液 1 ml，加三氯化铁试液 1 滴，显黑蓝色。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 清热解毒，散郁开结，通窍，止痛。用于瘟毒热盛，时令瘟疫，肠痧转筋。

【用法与用量】 口服，一次 9～13 粒，一日 2 次。

【注意】 孕妇忌服。

【规格】 每 10 粒重约 1.4 g

【贮藏】 密闭，防潮。

八味沉香散

Bawei Chenxiang San

本品系藏族验方，藏文名为 ཨ་གད་བཅུད་པ (阿嘎杰巴)。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【处方】 沉香 200 g　肉豆蔻 100 g　广枣 100 g　石灰华 100 g
乳香 100 g　木香 100 g　诃子(煨) 100 g　木棉花 100 g

【制法】 以上八味，粉碎成细粉，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为黄褐色的粉末；气芳香，味咸涩、微苦。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录 3 页)。


【功能与主治】 清心热，养心，安神，开窍。用于热病攻心，神昏谵语，冠心病心绞痛。

【用法与用量】 口服，一次 0.9～1.5 g，一日 2～3 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

八味清心沉香散

Bawei Qingxin Chenxiang San

本品系蒙古族验方，蒙古文名为  (阿嘎如·乃莫)。

【处方】 沉香 180 g　广枣 180 g　檀香 90 g　紫檀香 90 g
红花 90 g　肉豆蔻 60 g　竹黄 60 g　北沙参 60 g

【制法】 以上八味，粉碎成细粉，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为浅棕红色的粉末；气香，味微酸苦。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录 3 页)。

【功能与主治】 清心肺，理气，镇静安神。用于心肺火盛，胸闷不舒，胸胁闷痛，心跳气短。


【用法与用量】 口服，一次 3 g，一日 2～3 次。

【规格】 每袋重 18 g

【贮藏】 密闭，防潮。

八味檀香散

Bawei Tanxiang San

本品系蒙古族验方，蒙古文名为  (赞丹·乃莫)。

【处方】 檀香 200 g　石膏 100 g　红花 100 g　甘草 100 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

丁香 100 g　北沙参 100 g　拳参 100 g　白葡萄干 100 g

【制法】 以上八味，除檀香、丁香、白葡萄干外，其余石膏等五味粉碎成粗粉，加白葡萄干，粉碎，烘干，再加檀香、丁香粉碎成细粉，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为棕黄色的粉末；气香，味甘、微涩而凉。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：草酸钙簇晶直径约 40 μm。含晶细胞方形或长方形，壁厚，木化，胞腔含草酸钙方晶。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。花粉粒球形或椭圆形，直径约 60 μm，外壁有刺，有 3 个萌发孔。花粉粒三角形，直径约 16 μm。油管含棕黄色分泌物。

(2) 取本品约 0.1 g，加水 2 ml，振摇，加三氯化铁试液 1 滴，溶液显黄绿色。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录 3 页)。

【功能与主治】 清热润肺，止咳化痰。用于肺热咳嗽，痰中带脓。

【用法与用量】 口服，一次 2～3 g，一日 2～3 次。

【规格】 每袋重 18 g

【贮藏】 密闭，防潮。

八 宝 眼 药

Babao Yanyao

【处方】 珍珠 9 g　麝香 9 g　熊胆 9 g　海螵蛸(去壳) 60 g
硼砂(炒) 60 g　朱砂 10 g　冰片 20 g　炉甘石(三黄汤飞) 300 g
地栗粉 200 g

【制法】 以上九味，珍珠、朱砂分别水飞或粉碎成极细粉；海螵蛸、硼砂粉碎成极细粉，将麝香、冰片、熊胆研细，与上述粉末及地栗粉、炉甘石粉末配研，过九号筛，混匀，即得。

【性状】 本品为淡橙红色至淡红色的极细粉末；有明显的冰片香气。

【鉴别】 (1) 取本品 0.5 g，平铺于瓷皿上，置水浴上加热至无冰片香气后，加 60% 醋酸 3 ml，搅拌，滤过。取滤液 1 ml，加新制的糠醛溶液(1→100)1 ml 与硫酸溶液(硫酸 50 ml 与水 65 ml 混合)13 ml，于 70～80°水浴中加热片刻，即显淡紫红色。

(2) 取本品 0.5 g，用水淘洗，可得少量朱红色沉淀，取出，用盐酸湿润，在光洁铜片上轻轻摩擦，铜片表面即显银白色光泽，加热烘烤后，银白色即消失。

(3) 取本品少量，加硫酸混合后，加甲醇，点火燃烧。即发生边缘带绿色的火焰。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录3页)。

【功能与主治】 消肿，明目。用于目赤肿痛，眼缘溃烂，畏光怕风，眼角涩痒。

【用法与用量】 每用少许，点入眼角，一日2～3次。

【贮藏】 密封。

八　珍　丸

Bazhen Wan

【处方】 党参100 g　白术(炒)100 g　茯苓100 g　甘草50 g
当归150 g　白芍100 g　川芎75 g　熟地黄150 g

【制法】 以上八味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每100 g粉末加炼蜜40～50 g与适量的水泛丸，干燥；或加炼蜜110～140 g制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为棕黑色的水蜜丸或黑褐色至黑色的大蜜丸；味甜、微苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径4～6 μm。联结乳管直径12～15 μm，含细小颗粒状物。草酸钙针晶细小，长10～32 μm，不规则地充塞于薄壁细胞中。草酸钙簇晶直径18～32 μm，存在于薄壁细胞中，常排列成行，或一个细胞中含有数个簇晶。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录1页)。

【功能与主治】 调补气血。用于气血两虚，面色萎黄，食欲不振，四肢乏力。

【用法与用量】 口服，水蜜丸一次6 g，大蜜丸一次1丸；一日2次。

【规格】 大蜜丸每丸重9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

八珍益母丸

Bazhen Yimu Wan

【处方】 益母草200 g　党参50 g　白术(炒)50 g　茯苓50 g　甘草25 g
当归100 g　白芍(酒炒)50 g　川芎50 g　熟地黄100 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【制法】 以上九味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 40～50 g 与适量的水泛丸，干燥；或加炼蜜 120～140 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为棕黑色的水蜜丸或大蜜丸；微有香气，味甜而微苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。联结乳管直径 12～15 μm，含细小颗粒状物。非腺毛 1～3 细胞，稍弯曲，壁有疣状突起。草酸钙针晶细小，长 10～32 μm，不规则地充塞于薄壁细胞中。草酸钙簇晶直径 18～32 μm，存在于薄壁细胞中，常排列成行，或一个细胞中含有数个簇晶。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 补气血，调月经。用于妇女气血两虚，体弱无力，月经不调。

【用法与用量】 口服，水蜜丸一次 6 g，大蜜丸一次 1 丸；一日 2 次。

【规格】 大蜜丸每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

九气拈痛丸

Jiuqi Niantong Wan

【处方】 香附(醋制) 300 g　木香 75 g　高良姜 75 g　陈皮 150 g
郁金 150 g　莪术(醋制) 600 g　元胡(醋制) 300 g
槟榔 150 g　甘草 75 g　五灵脂(醋炒) 300 g

【制法】 以上十味，粉碎成细粉，过筛，混匀，用水泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为黄褐色至棕褐色的水丸；气香，味苦、辣。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：糊化淀粉团块淡黄色或几无色；厚壁组织碎片绿黄色，细胞类多角形或略延长，壁稍弯曲，有的连珠状增厚，纹孔细密。木纤维长梭形，直径 16～24 μm，壁稍厚，纹孔口横裂缝状、十字状或人字状。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。分泌细胞类圆形，含淡黄棕色至红棕色分泌物。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。内胚乳碎片无色，壁较厚，有较多大的类圆形纹孔。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 理气，活血，止痛。用于脘腹、两胁胀满疼痛，痛经。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【用法与用量】 口服，一次 6～9 g，一日 2 次。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 密闭，防潮。

九 分 散

Jiufen San

【处方】 马钱子粉(调制)250 g 麻黄 250 g 乳香(制)250 g 没药(制)250 g

【制法】 以上四味，除马钱子粉外，其余麻黄等三味粉碎成细粉，与马钱子粉配研，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为黄褐色至深黄褐色的粉末，遇热或重压易粘结；气微香，味微苦。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：不规则团块无色或淡黄色，表面及周围扩散出众多细小颗粒，久置溶化。不规则碎块淡黄色，半透明，渗出油滴，加热后油滴溶化，现正方形草酸钙结晶。非腺毛单细胞，多碎断，壁极厚，形似纤维，基部膨大似石细胞。气孔特异，保卫细胞侧面观似电话筒状。

(2) 取本品 10 g，加 *N*/10 硫酸液 100 ml，加热煮沸，滤过，滤液浓缩至 10～15 ml，加氢氧化钠溶液(1→5)2 ml，再加乙醇至不发生白色沉淀为止(约 60 ml)，滤过，滤液置水浴上蒸干，残渣加硫酸 1 ml 溶解后，加水 15～20 ml，滤过，滤液移置分液漏斗中，加硝酸及亚硝酸钠溶液(1→20)的混合液 3 ml，加氯仿 10 ml，振摇静置，弃去氯仿层，酸液加氢氧化钠溶液(1→5)使成碱性后，再加氯仿 15 ml 振摇提取，分取氯仿层，置水浴上蒸干，残渣加硫酸 1 ml 与重铬酸钾数粒，显紫堇色。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录 3 页)。

【功能与主治】 活血散瘀，消肿止痛。用于跌扑损伤，瘀血肿痛。

【用法与用量】 饭后服，一次 1 包，一日只服 1 次；外用适量，创伤青肿未破者以酒调敷。

【注意】 高血压、心肾病患者及孕妇忌服，小儿及体弱者须按医嘱服用。本品含剧毒药，不可多服，破伤出血者不可外敷。

【规格】 每包 2.5 g

【贮藏】 密闭，防潮。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

九味石灰华散

Jiuwei Shihuihua San

本品为藏族验方，藏文名为 ཇ་ཁང་དགུ་པ（久康格哇）。

【处方】 石灰华 100 g　红花 80 g　牛黄 4 g　红景天 80 g　榜嘎 100 g
甘草(去皮) 80 g　高山辣根菜 80 g　檀香 100 g　洪连 100 g

【制法】 以上九味，除牛黄外，其余石灰华等八味粉碎成细粉。将牛黄研细，再与上述粉末配研，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为淡黄色的粉末；气香，味甘、微苦。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录 3 页)。

【功能与主治】 清热，解毒，止咳，安神。用于小儿肺炎，高热烦躁，咳嗽。

【用法与用量】 口服，一次 0.6～0.9 g，一日 2 次，三岁以下小儿酌减。

【贮藏】 密闭，防潮。

九味羌活丸

Jiuwei Qianghuo Wan

【处方】 羌活 150 g　防风 150 g　苍术 150 g　细辛 50 g　川芎 100 g
白芷 100 g　黄芩 100 g　甘草 100 g　地黄 100 g

【制法】 以上九味，粉碎成细粉，过筛，混匀，用水泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为棕褐色的水丸；气香，味辛、微苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：淀粉粒复粒由 8～12 粒组成。油管含棕黄色分泌物，直径约 100 μm。油管含金黄色分泌物，直径约 30 μm。草酸钙针晶细小，长 10～32 μm，不规则地充塞于薄壁细胞中。纤维周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。螺纹导管直径 8～23 μm，加厚壁互相连接，似网状螺纹导管。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 发汗，除湿，清里，止痛。用于恶寒发热，无汗，头痛身重，口干，肢体酸痛。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【用法与用量】 用姜葱汤或温开水送服，一次 6～9 g，一日 2～3 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

九　胜　散

Jiusheng San

【处方】 苍术 150 g　黄柏 200 g　紫苏叶 200 g　杏仁 400 g　薄荷 200 g
乳香 120 g　没药 120 g　轻粉 50 g　红粉 50 g

【制法】 以上九味，除轻粉、红粉外，其余苍术等七味粉碎成细粉；将轻粉、红粉分别粉碎成极细粉，与上述粉末配研，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为棕黄色至浅棕色的粉末；气清香。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：不规则团块无色或淡黄色，表面及周围扩散出众多细小颗粒，久置溶化。不规则碎块淡黄色，半透明，渗出油滴，加热后油滴溶化，现正方形草酸钙结晶。叶肉组织中有细小草酸钙簇晶，直径 4～8 μm。草酸钙针晶细小，不规则地充塞于薄壁细胞中。纤维束鲜黄色，周围细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维，含晶细胞的壁木化增厚。石细胞橙黄色，贝壳形，壁较厚，较宽一边纹孔明显。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定（附录 3 页）。

【功能与主治】 解毒消肿，渗湿止痒。用于湿疹，黄水疮，足癣。

【用法与用量】 用花椒油或食用植物油调敷或撒布患处。

【注意】 不可内服。

【贮藏】 密闭，防潮。

三　子　散

Sanzi San

本品系蒙古族验方，蒙古文名为 ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠡᠮᠡ（古日苯·乌仁汤）。

【处方】 诃子 200 g　川楝子 200 g　栀子 200 g

【制法】 以上三味，粉碎成粗粉，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为姜黄色的粉末；气微，味苦涩、微酸。

【鉴别】 （1）取本品，置显微镜下观察：纤维束鲜黄色，周围薄壁细胞含草酸钙方

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

晶，形成晶纤维。种皮石细胞黄色或淡棕色，多破碎，完整者长多角形、长方形或形状不规则，壁厚，有大的圆形纹孔，胞腔棕红色。果皮纤维层淡黄色，斜向交错排列，壁较薄，有纹孔。

(2) 取本品约 0.1 g，加水 10 ml，滤过。取滤液 1 ml，加 1 %三氯化铁溶液 2～3 滴，显黑绿色。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录 3 页)。

【功能与主治】 清热凉血，解毒。用于温热，血热，新久热。

【用法与用量】 水煎服，一次 3～4.5 g，一日 2～3 次。

【规格】 每袋重 18 g

【贮藏】 密闭，防潮。

三 妙 丸

Sanmiao Wan

【处方】 苍术 600 g 黄柏 400 g 牛膝 200 g

【制法】 以上三味，粉碎成细粉，过筛，混匀，用水泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为灰黄色的水丸；味苦、辛。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：草酸钙针晶细小，长 10～32 μm，不规则地充塞于薄壁细胞中。纤维束鲜黄色，周围细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维，含晶细胞的壁木化增厚。草酸钙砂晶存在于薄壁细胞中。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 燥湿清热。用于湿热下注，小便黄少，足膝红肿热痛，下肢无力。

【用法与用量】 口服，一次 6 g，一日 3 次。

【注意】 孕妇慎服。

【贮藏】 密闭，防潮。

三味蒺藜散

Sanwei Jili San

本品系蒙古族验方，蒙古文名为 ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤᠭᠡ (章古·古日苯汤)。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【处方】 蒺藜 250 g　冬葵果 150 g　方海 150 g

【制法】 以上三味，粉碎成粗粉，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为灰黄色的粉末；气微腥，味苦、微咸。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：石细胞长椭圆形或类圆形，黄色，成群或散在，壁孔明显；纤维长梭形，淡黄色，散在或成束，长 250～360 μm。多细胞星状毛，多破碎。

(2) 取本品约 0.5 g，加稀硝酸 5 ml，置水浴上加热 30 分钟，滤过。取滤液 1 ml，加钼酸铵试液 1 ml，加热，发生黄色沉淀，滤过，沉淀用稀硝酸 2 ml 与钼酸铵试液 1 ml 的混合液冲洗后，加过量的氨试液，则沉淀溶解。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录 3 页)。

【功能与主治】 清湿热，利尿。用于湿热下注，小便热痛。

【用法与用量】 水煎服，一次 3～4.5 g，一日 2～3 次。

【规格】 每袋重 15 g

【贮藏】 密闭，防潮。

大 山 楂 丸

Dashanzha Wan

【处方】 山楂 1000 g　六曲(焦)150 g　麦芽(炒)150 g

【制法】 以上三味，粉碎成细粉，过筛，混匀。另取蔗糖 600 g，加水 270 ml 后，与炼蜜 600 g混合炼至比重约为 1.38(70°热测)时，滤过，与上述粉末混匀，制成大蜜丸，干燥，即得。

【性状】 本品为棕红色或褐色的大蜜丸；味酸甜。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：淀粉粒类圆形或椭圆形，直径 8～40 μm，脐点裂缝状。果皮石细胞淡紫红色、红色或黄棕色，类圆形或多角形，直径约至 125 μm。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 开胃消食。用于食欲不振，消化不良，脘腹胀满。

【用法与用量】 口服，一次 1～2 丸，一日 1～3 次；小儿减半。

【规格】 每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

大 补 阴 丸

Dabuyin Wan

【处方】 熟地黄 120 g　知母(盐炒)80 g　黄柏(盐炒)80 g
龟板(制)120 g　猪脊髓 160 g

【制法】 以上五味，熟地黄、黄柏、龟板、知母粉碎成粗粉，猪脊髓置沸水中略煮，除去外皮，与上述粗粉拌匀，干燥，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 10～15 g 与适量的水泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为深棕黑色的水蜜丸；味苦、微甜带涩。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。纤维束鲜黄色，周围细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维，含晶细胞的壁木化增厚。不规则块片灰黄色，表面有微细纹理或孔隙。草酸钙针晶成束或散在，长 26～110 μm。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 滋肾阴，降虚火。用于阴虚火旺，潮热盗汗，咳嗽咯血，耳鸣耳聋。

【用法与用量】 口服，一次 6 g，一日 2～3 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

大 黄 䗪 虫 丸

Dahuang Zhechong Wan

【处方】 熟大黄 300 g　土鳖虫(炒) 30 g　水蛭(制) 60 g　虻虫(去翅足、炒) 45 g
蛴螬(炒) 45 g　干漆(煅) 30 g　桃仁 120 g　苦杏仁(炒) 120 g
黄芩 60 g　地黄 300 g　白芍 120 g　甘草 90 g

【制法】 以上十二味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 30～45 g 与适量的水泛丸，干燥；或加炼蜜 80～100 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为黑色的水蜜丸或大蜜丸；气浓，味甘、微苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：草酸钙簇晶大，直径 60～140 μm。草酸钙簇

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

晶直径 18～32 μm，存在于薄壁细胞中，常排列成行，或一个细胞中含数个簇晶。薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。体壁碎片黄色或棕红色，有圆形毛窝，直径 8～24 μm，有的具长短不一的刚毛。体壁碎片金黄色或棕色，毛窝双圈状，有时表面可见疣状或针尖状突起。体壁碎片淡黄色，毛窝边缘为重叠圈状。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 破血，逐瘀，通经。用于血瘀经闭，腹部肿块，肌肤甲错，目眶发黑，潮热消瘦。

【用法与用量】 口服，水蜜丸一次 3 g，大蜜丸一次 1 丸，一日 1～2 次。

【注意】 孕妇忌服。

【规格】 大蜜丸每丸重 3 g

【贮藏】 密闭，防潮。

万氏牛黄清心丸

Wanshi Niuhuang Qingxin Wan

【处方】 牛黄 10 g　朱砂 60 g　黄连 200 g　黄芩 120 g　栀子 120 g　郁金 80 g

【制法】 以上六味，除牛黄外，朱砂水飞或粉碎成极细粉；其余黄连等四味粉碎成细粉；将牛黄研细，与上述粉末配研，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 100～120 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为红棕色至棕褐色的大蜜丸；气特异，味甜微涩、苦。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：糊化淀粉粒团块几无色。种皮石细胞黄色或淡棕色，多破碎，完整者长多角形、长方形或形状不规则，壁厚，有大的圆形纹孔，胞腔棕红色。纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。纤维束鲜黄色，壁稍厚，纹孔明显。不规则细小颗粒暗棕红色，有光泽，边缘暗黑色。

(2) 取本品 1.5 g，捣碎，加醋酸乙酯 10 ml，浸渍 1 小时，不断研磨，滤过，滤液用活性炭脱色后，滤过，滤液置水浴上蒸干，残渣中加 60%醋酸溶液 1～2 ml，搅拌使溶解，滤过，滤液中加新制的糠醛溶液(1→100)1 ml 及硫酸溶液(硫酸 50 ml 与水 65 ml 混合)13 ml，在 70～80°水浴中加热片刻，即显淡红紫色。

(3) 取本品 1.5 g，用水淘洗，可得少量朱红色沉淀，取出，用盐酸湿润，在光洁铜片上轻轻摩擦，铜片表面即显银白色光泽，加热烘烤后，银白色即消失。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

(4) 取本品 0.5 g，捣碎，加稀盐酸 5 ml，浸渍 10 分钟，不断研磨，滤过。取滤液 2 ml，加漂白粉少量，即显红色。

(5) 取本品 0.5 g，捣碎，加 70%乙醇 5 ml，浸渍 10 分钟，不断研磨，滤过。取滤液 1 ml，置瓷蒸发皿中，在水浴上蒸干，残渣中加硫酸 1 滴，即显蓝色。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

小儿化毒散

Xiao'er Huadu San

【处方】 牛黄 8 g　珍珠 16 g　雄黄 40 g　大黄 80 g
黄连 40 g　甘草 30 g　天花粉 80 g　川贝母 40 g
赤芍 80 g　乳香(制)40 g　没药(制) 40 g　冰片 10 g

【制法】 以上十二味，除牛黄、冰片外，雄黄、珍珠分别水飞或粉碎成极细粉；其余乳香等八味粉碎成细粉；将牛黄、冰片研细，与上述粉末配研，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为杏黄色至棕黄色的粉末；味苦，有清凉感。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：纤维束鲜黄色，壁稍厚，纹孔明显。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。具缘纹孔导管大，多破碎，有的具缘纹孔六角形或斜方形，排列紧密。草酸钙簇晶大，直径 60～140 μm。不规则团块无色或淡黄色，表面及周围扩散出众多细小颗粒，久置溶化。不规则碎块淡黄色，半透明，渗出油滴，加热后油滴溶化，现正方形草酸钙结晶。不规则碎块金黄色或橙黄色，有光泽。不规则碎块无色或淡绿色，半透明，有光泽，有时可见细密波状纹理。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定（附录 3 页）。

【功能与主治】 清热化毒，活血消肿。用于小儿疹后余毒未净，烦躁口渴，口疮便秘，疖肿溃烂。

【用法与用量】 口服，一次 0.6 g，一日 1～2 次，三岁以内小儿酌减；外用敷患处。

【贮藏】 密闭，防潮。

小儿四症丸

Xiao'er Sizheng Wan

【处方】 广藿香 32 g　紫苏叶 48 g　苍术 32 g　白术(炒) 32 g　白芷 16 g
木香 6.4 g　砂仁 16 g　厚朴(姜制)32 g　陈皮 32 g　山楂 24 g
泽泻 24 g　麦芽(炒) 32 g　半夏(制)24 g　桔梗 16 g　茯苓 32 g
天花粉 24 g　琥珀 16 g　六曲(炒)24 g　猪苓 24 g　滑石 16 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【制法】 以上二十味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 140～150 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为深褐色至黑色的大蜜丸；气芳香，味微苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。草酸钙针晶成束，长 32～144 μm，存在于粘液细胞中或散在。草酸钙方晶正八面体形，直径 32～60 μm。草酸钙针晶细小，长 10～32 μm，不规则地充塞于薄壁细胞中。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。叶肉组织中散有细小草酸钙针晶。叶肉组织中有细小草酸钙簇晶，直径 4～8 μm。内种皮石细胞黄棕色或棕红色，表面观类多角形，壁厚，胞腔含硅质块。果皮石细胞淡紫红色、红色或黄棕色，类圆形或多角形，直径约至 125 μm。具缘纹孔导管大，多破碎，有的具缘纹孔六角形或斜方形，排列紧密。表皮细胞纵列，常有 1 个长细胞与 2 个短细胞相间连接，长细胞壁厚，波状弯曲，木化。油细胞圆形或椭圆形，直径 60～80 μm。不规则碎块淡黄绿色或棕黄色，透明或半透明。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录 1 页）。

【功能与主治】 健脾消导，止泻。用于小儿暑湿泄泻，呕吐腹痛，身热尿少。

【用法与用量】 口服，一次 1 丸，周岁以内一次半丸，一日 2 次。

【规格】 每丸重 3 g

【贮藏】 密闭，防潮。

小儿至宝丸

Xiao'er Zhibao Wan

【处方】

紫苏叶 50 g	广藿香 50 g	薄荷 50 g	羌活 50 g	陈皮 50 g
白附子(制)50 g	胆南星 50 g	白芥子(炒) 30 g	川贝母 50 g	槟榔 50 g
山楂(炒) 50 g	茯苓 200 g	六曲(炒)200 g	麦芽(炒) 50 g	琥珀 30 g
冰片 4 g	天麻 50 g	钩藤 50 g	僵蚕(炒) 50 g	蝉蜕 50 g
全蝎 50 g	麝香 4 g	牛黄 6 g	雄黄 50 g	滑石 50 g
朱砂 10 g				

【制法】 以上二十六味，除牛黄、麝香、冰片外，雄黄、朱砂分别水飞或粉碎成极细粉；其余紫苏叶等二十一味粉碎成细粉；将牛黄、麝香、冰片研细，与上述粉末配研，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 110～140 g 制成大蜜丸，即得。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 本品为橙黄色至棕黄色的大蜜丸；气微香，味微苦，有辛凉感。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：淀粉粒广卵形或贝壳形，直径 40～64 μm，脐点短缝状、人字状或马蹄状，层纹可察见。含糊化多糖类物的组织碎片遇碘液显棕色或淡棕紫色。不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。叶肉组织中有细小草酸钙簇晶，直径 4～8 μm。橙皮甙结晶稍带黄色，存在于叶肉组织中，栅栏细胞中尤多。叶肉组织中散有细小草酸钙针晶。草酸钙针晶束长约至94 μm。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。草酸钙砂晶存在于薄壁细胞中，有时含晶细胞连接成行。油管含棕黄色分泌物，直径约 100 μm。几丁质皮壳碎片淡黄棕色，半透明，密布乳头状或短刺状突起。叶肉栅栏细胞 1 列，长 64～80 μm。果皮石细胞单个散在或少数成群，淡紫红色、红色或黄棕色，类圆形或多角形。表皮细胞纵列，常有 1 个长细胞与 2 个短细胞相间连接，长细胞壁厚，波状弯曲，木化。内胚乳碎片无色，壁较厚，有较多大的类圆形纹孔。种皮栅状细胞表面观细小多角形，壁厚，侧面观类长方形，侧壁及内壁增厚。体壁碎片无色，表面有极细的菌丝体。体壁碎片淡黄色至黄色，有网状纹理及圆形毛窝，有时可见棕褐色刚毛。不规则碎块金黄色或橙黄色，有光泽。不规则细小颗粒暗棕红色，有光泽，边缘暗黑色。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 解表祛风，化痰导滞。用于小儿伤风受凉，发热流涕，咳嗽痰多，停食停乳，呕吐腹泻。

【用法与用量】 口服，一次 1 丸，一日 2～3 次。

【规格】 每丸重 1.5 g

【贮藏】 密闭，防潮。

小儿惊风散

Xiao'er Jingfeng San

【处方】 全蝎 130 g　僵蚕(炒)224 g　雄黄 40 g　朱砂 60 g　甘草 60 g

【制法】 以上五味，雄黄、朱砂分别水飞或粉碎成极细粉；其余全蝎等三味粉碎成细粉，与上述粉末配研，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为橘黄色或棕黄色的粉末；气特异，味甜、咸。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：体壁碎片淡黄色至黄色，有网状纹理及圆形毛窝，有时可见棕褐色刚毛。体壁碎片无色，表面有极细的菌丝体。纤维束周围薄壁细胞

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

含草酸钙方晶，形成晶纤维。不规则细小颗粒暗棕红色，有光泽，边缘暗黑色。不规则碎块金黄色或橙黄色，有光泽。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录 3 页)。

【功能与主治】 清热，解毒，熄风，镇静。用于小儿惊风，四肢抽搐。

【用法与用量】 口服，周岁小儿一次 1.5 g，一日 2 次，周岁以内酌减。

【规格】 每袋重 1.5 g

【贮藏】 密闭，防潮。

小儿紫草丸

Xiao'er Zicao Wan

【处方】

紫草 50 g	西河柳 25 g	升麻 25 g	羌活 30 g	金银花 200 g
菊花 100 g	甘草 100 g	甜地丁 200 g	青黛 30 g	玄参 50 g
浙贝母 30 g	核桃仁 200 g	乳香(制) 30 g	没药(制) 30 g	冰片 5 g
琥珀 30 g	牛黄 2.5 g	石决明 30 g	雄黄 30 g	朱砂 10 g

【制法】 以上二十味，除牛黄、青黛、冰片、琥珀外，朱砂、雄黄分别水飞或粉碎成极细粉；金银花、菊花、甜地丁、甘草、核桃仁五味，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成稠膏状，其余紫草等九味粉碎成细粉，加入上述稠膏，混匀，在 60～70° 烘干，粉碎成细粉；将牛黄、青黛、冰片、琥珀研细，与上述粉末配研，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 70～100 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为褐色至黑褐色的大蜜丸；味苦、辛。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：淀粉粒卵圆形，直径 35～48 μm，脐点点状、人字状或马蹄状，位于较小端，层纹细密。薄壁组织碎片紫红色，用甘油醋酸液装片色素不扩散，遇水合氯醛液色素扩散。叶表面细胞呈乳头状突起，叶肉组织含草酸钙簇晶成片。油管含棕黄色分泌物，直径约 100 μm。石细胞黄棕色或无色，类长方形、类圆形或形状不规则，直径约至 94 μm。不规则团块无色或淡黄色，表面及周围扩散出众多细小颗粒，久置溶化。不规则块片或颗粒蓝色。不规则团块暗灰色，不透明，加酸发生气泡。不规则细小颗粒暗棕红色，有光泽，边缘暗黑色。不规则碎块淡黄绿色或棕黄色，透明或半透明。不规则碎块金黄色或橙黄色，有光泽。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 透疹解毒。用于麻疹初起，疹毒内盛不透，发热咳嗽，小便黄少。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【用法与用量】 口服，一次1丸，一日2次，三岁以内小儿酌减。

【规格】 每丸重1.8 g

【贮藏】 密闭，防潮。

小青龙合剂

Xiaoqinglong Heji

【处方】 麻黄100 g　桂枝100 g　白芍100 g　干姜100 g
细辛50 g　甘草(蜜炙)100 g　半夏(制)150 g　五味子100 g

【制法】 以上八味，细辛、桂枝分别蒸馏挥发油，另器保存。残渣及馏液加入白芍、麻黄、五味子、甘草，分次加水煎煮至味尽，合并煎液，滤过，滤液浓缩至约800 ml。半夏、干姜照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法（附录11页），用70%乙醇作溶剂，浸渍24小时后进行渗漉，漉液浓缩后，与上液合併，静置，滤过，滤液浓缩至800 ml，加入苯甲酸钠0.25 g与细辛、桂枝挥发油搅匀，即得。

【性状】 本品为棕黑色的液体；气微香，味甜、微辛。

【功能与主治】 解表化饮，止咳平喘。用于外感风寒，内停水饮，恶寒发热，无汗，喘咳痰稀。

【用法与用量】 口服，一次15～20 ml，一日3次。

【注意】 用时摇匀。

【贮藏】 遮光，密封保存。

小金丸

Xiaojin Wan

【处方】 麝香30 g　木鳖子(去壳去油)150 g　草乌(制)150 g
白胶香150 g　乳香(制)75 g　没药(制)75 g
五灵脂(醋炒)150 g　当归(酒炒)75 g　地龙150 g　香墨12 g

【制法】 以上十味，除麝香外，其余木鳖子等九味粉碎成细粉，将麝香研细，与上述粉末配研，过筛。每100 g粉末加淀粉25 g，混匀，另用淀粉5 g制稀糊泛丸，阴干或低温干燥，即得。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 本品为黑褐色的糊丸；气香，味微苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：石细胞长方形或类方形，壁稍厚。子叶细胞长方形或多角形，含糊粉粒及脂肪油块。薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。无定形团块淡黄棕色，埋有细小方形结晶。肌纤维成层，无色、微黄色或淡棕色，微波状弯曲，有时呈垂直交错排列。

【检查】 除崩解时限不检查外，其他应符合丸剂项下有关的各项规定（附录1页）。

【功能与主治】 散结消肿，化瘀止痛。用于阴疽初起，皮色不变，肿硬作痛，多发性脓肿，甲状腺腺瘤，淋巴结炎，淋巴结结核，慢性囊性乳腺病。

【用法与用量】 打碎后口服，一次2～5丸，一日2次，小儿酌减。

【注意】 孕妇忌服。

【规格】 每丸重0.6 g

【贮藏】 密封。

小建中合剂

Xiaojianzhong Heji

【处方】 桂枝90 g　白芍180 g　甘草(蜜炙)60 g　生姜90 g　大枣90 g

【制法】 以上五味，桂枝蒸馏挥发油，另器保存，残渣及馏液与甘草、大枣加水煎煮3次，合并煎液，滤过，滤液浓缩至约450 ml。白芍、生姜照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法（附录11页），用50％乙醇作溶剂，浸渍24小时后进行渗漉，漉液浓缩后，与上液合并，静置，滤过，另加饴糖300 g，再浓缩至810 ml，加入苯甲酸钠2.55 g与桂枝挥发油，搅匀，即得。

【性状】 本品为棕黄色的液体；气微香，味甜、微辛。

【功能与主治】 温中补虚，和里缓急。用于脾胃虚寒，溃疡病，脘腹牵痛，食少，心悸。

【用法与用量】 口服，一次20～30 ml，一日3次。

【注意】 用时摇匀。

【贮藏】 遮光，密封保存。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

小 活 络 丸

Xiaohuoluo Wan

【处方】 胆南星 180 g　川乌(制)180 g　草乌(制)180 g　地龙 180g
乳香(制)66 g　没药(制)66 g

【制法】 以上六味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 120～130 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为黑褐色至黑色的大蜜丸；气腥，味苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：不规则团块无色或淡黄色，表面及周围扩散出众多细小颗粒，久置溶化。不规则碎块淡黄色，半透明，渗出油滴，加热后油滴溶化，现正方形草酸钙结晶。石细胞长方形或类方形，壁稍厚。草酸钙针晶成束或散在，长 20～90 μm。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 祛风活络，除湿止痛。用于风寒湿痹，肢体疼痛，麻木拘挛。

【用法与用量】 用黄酒或温开水送服，一次 1 丸，一日 2 次。

【注意】 孕妇忌服。

【规格】 每丸重 3 g

【贮藏】 密闭，防潮。

千 金 散

Qianjin San

【处方】 全蝎 120 g　僵蚕 120 g　牛黄 24 g　朱砂 160 g　冰片 20 g
黄连 160 g　胆南星 80 g　天麻 16 g　甘草 80 g

【制法】 以上九味，除牛黄、冰片外，朱砂水飞或粉碎成极细粉；其余全蝎等六味粉碎成细粉；将牛黄、冰片研细，与上述粉末配研，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为棕红色的粉末；气芳香，味辛凉而苦。

【鉴别】 (1)取本品，置显微镜下观察：体壁碎片淡黄色至黄色，有网状纹理及圆形毛窝，有时可见棕褐色刚毛。体壁碎片无色，表面有极细的菌丝体。厚壁细胞多角形

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

或长多角形，直径 70～180 μm，壁较厚，微木化，纹孔明显。纤维束鲜黄色，壁稍厚，纹孔明显。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。不规则细小颗粒暗棕红色，有光泽，边缘暗黑色。

(2)取本品少量，进行微量升华，升华物置显微镜下观察，呈不定形的无色片状结晶。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录 3 页)。

【功能与主治】 清解热毒，镇痉定惊。用于小儿惊风高热，手足抽搐，痰涎壅盛，神昏谵语。

【用法与用量】 口服，一次 0.6～0.9 g，一日 2～3 次，三岁以内小儿酌减。

【贮藏】 密封。

川芎茶调散

Chuanxiong Chatiao San

【处方】 川芎 120 g　白芷 60 g　羌活 60 g　细辛 30 g
防风 45 g　薄荷 240 g　荆芥 120 g　甘草 60 g

【制法】 以上八味，粉碎成细粉，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为暗黄色的粉末；气香，味辛、微苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：淀粉粒复粒由 8～12 粒组成。螺纹导管直径 8～23 μm，加厚壁互相连接，似网状螺纹导管。腺鳞头部 8 细胞，扁球形，直径约至 90 μm，柄单细胞。外果皮细胞表面观多角形，壁粘液化，胞腔含棕色物。油管含棕黄色分泌物，直径约 100 μm。油管含金黄色分泌物，直径约 30 μm。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。下皮细胞长方形，壁细波状弯曲，夹有类方形或长圆形分泌细胞。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录 3 页)。

【功能与主治】 解表止痛。用于风寒感冒，恶寒无汗，头痛鼻塞。

【用法与用量】 饭后浓茶冲服，一次 3～6 g，一日 2 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

女　金　丸

Nüjin Wan

【处方】

当归 140 g	白芍 70 g	川芎 70 g	熟地黄 70 g
党参 55 g	白术(炒) 70 g	茯苓 70 g	甘草 70 g
肉桂 70 g	益母草 200 g	牡丹皮 70 g	没药(制) 70 g
元胡(醋制) 70 g	藁本 70 g	白芷 70 g	黄芩 70 g
白薇 70 g	香附(醋制)150 g	砂仁 50 g	陈皮 140 g
赤石脂(煅) 70 g	鹿角霜 150 g	阿胶 70 g	

【制法】 以上二十三味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g粉末加炼蜜 120～150 g制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为棕褐色至黑棕色的大蜜丸；气芳香，味甜、微苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：淀粉粒复粒由 8～12 粒组成。糊化淀粉团块淡黄色。不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6μm。不规则碎块淡黄色，半透明，渗出油滴，加热后油滴溶化，现正方形草酸钙结晶。不规则透明块片微黄色，有圆孔及细小孔点，并有油滴渗出，放置较久后溶化。木栓细胞黄棕色，壁薄，微波状弯曲，多层重叠。木栓细胞淡红色至微紫色，壁稍厚。草酸钙针晶细小，不规则地充塞于薄壁细胞中。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。石细胞类圆形或类长方形，壁一面非薄。内种皮石细胞黄棕色或棕红色，表面观类多角形，壁厚，胞腔含硅质块。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。纤维成束，深棕色或红棕色，壁厚。薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。不规则块片半透明，边缘折光较强，表面有纤细短纹理和小孔及细裂隙。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 调经养血，理气止痛。用于月经不调，腰腿酸痛，腹痛胀满。

【用法与用量】 口服，一次 1 丸，一日 2 次。

【注意】 孕妇慎服。

【规格】 每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

开胸顺气丸

Kaixiong Shunqi Wan

【处方】 槟榔 300 g　牵牛子(炒)400 g　陈皮 100 g　木香 75 g
厚朴(姜制) 100 g　三棱(醋制)100 g　莪术(醋制) 100 g　猪牙皂 50 g

【制法】 以上八味，粉碎成细粉，过筛，混匀，用水泛丸，晒干或低温干燥，即得。

【性状】 本品为浅棕色至棕色的水丸；味微苦、辛。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：糊化淀粉粒团块淡黄色。菊糖团块形状不规则，有时可见微细放射状纹理，加热后溶解。内胚乳碎片无色，壁较厚，有较多大的类圆形纹孔。种皮栅状细胞淡棕色或紫棕色，长 48～80 μm。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。纤维束淡黄色，周围细胞含草酸钙方晶及少数簇晶，形成晶纤维，并常伴有类方形厚壁细胞。石细胞分枝状，壁厚，层纹明显。分泌细胞含红棕色或黄棕色分泌物。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 消积化滞，行气止痛。用于停食停水，气郁不舒，胸腹胀满，胃脘疼痛。

【用法与用量】 口服，一次 3～9 g，一日 1～2 次。

【注意】 孕妇及年老体弱者忌服。

【贮藏】 密闭，防潮。

天　麻　丸

Tianma Wan

【处方】 天麻 60 g　羌活 100 g　独活 50 g　杜仲(盐炒)70 g　牛膝 60 g
草薢 60 g　附子(制)10 g　当归 100 g　地黄 160 g　玄参 60 g

【制法】 以上十味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 40～50 g 与适量的水泛丸，干燥；或加炼蜜 90～110 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为黑褐色的水蜜丸或黑色的大蜜丸；气微香，味微甜、略苦麻。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：草酸钙针晶成束或散在，长 40～75 μm。石细

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

胞黄棕色或无色，类长方形、类圆形或形状不规则，直径约至 94 μm。橡胶丝条状或扭曲成团，表面带颗粒性。薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。油管含棕黄色分泌物，直径约 100 μm。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 祛风湿，舒筋通络，活血止痛。用于肢体拘挛，手足麻木，腰腿酸痛。

【用法与用量】 口服，水蜜丸一次 6 g，大蜜丸一次 1 丸；一日 2～3 次。

【注意】 孕妇慎服。

【规格】 大蜜丸每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

木　瓜　丸

Mugua Wan

【处方】

木瓜 80 g	当归 80 g	川芎 80 g	白芷 80 g
威灵仙 80 g	狗脊(制) 40 g	牛膝 160 g	鸡血藤 40 g
海风藤 80 g	人参 40 g	川乌(制) 40 g	草乌(制)40 g

【制法】 以上十二味，将木瓜、威灵仙、鸡血藤、牛膝、川乌、草乌、人参粉碎成细粉，过筛，混匀。其余当归等五味加水煎煮二次，合并煎液，滤过，滤液浓缩，与上述粉末泛丸，干燥，包糖衣，打光，即得。

【性状】 本品为糖衣浓缩丸，除去糖衣后，显黄褐色至黑褐色；味酸、苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：草酸钙砂晶存在于薄壁细胞中。草酸钙簇晶直径 20～68 μm，棱角锐尖。石细胞长方形或类方形，壁稍厚。石细胞圆形、长圆形或类多角形，壁厚，胞腔含橙红色或棕色物。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 散风祛寒，活络止痛。用于风寒湿痹，四肢麻木，遍身疼痛，腰膝无力，行步艰难。

【用法与用量】 口服，一次 30 粒，一日 2 次。

【注意】 孕妇忌服。

【规格】 每 10 粒重 1.8 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【贮藏】 密闭，防潮。

木耳舒筋丸

Mu'er Shujin Wan

【处方】 木耳 200 g　当归 100 g　川芎 50 g　枸杞子 100 g
苍术(炒) 100 g　杜仲(盐炒) 50 g　牛膝 50 g　白巨胜子 100 g

【制法】 以上八味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 130 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为棕黑色的大蜜丸；气微香，味甘、辛。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：子实体碎片淡灰棕色至棕褐色，菌丝错综交织。种皮石细胞淡黄色，壁波状弯曲，胞腔含棕色物。草酸钙针晶细小，长10～32 μm，不规则地充塞于薄壁细胞中。薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。螺纹导管直径 8～23 μm，加厚壁互相连接，似网状螺纹导管。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 舒筋活血，祛风湿，补肝肾。用于腰膝酸痛无力，肢体麻木、抽筋。

【用法与用量】 用黄酒或温开水送服，一次 1 丸，一日 2 次。

【规格】 每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

木香槟榔丸

Muxiang Binglang Wan

【处方】 木香 50 g　槟榔 50 g　枳壳(炒) 50 g　陈皮 50 g
青皮(醋炒) 50 g　香附(醋制) 150 g　三棱 50 g　莪术(醋制) 50 g
黄连 50 g　黄柏(酒炒) 150 g　大黄 150 g　牵牛子(炒) 200 g
芒硝 100 g

【制法】 以上十三味，粉碎成细粉，过筛，混匀，用水泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为灰棕色的水丸；味苦、微咸。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：木纤维长梭形，直径 16～24 μm，壁稍厚，纹

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

孔口横裂缝状、十字状或人字状，纤维束鲜黄色，周围细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维，含晶细胞的壁木化增厚。内胚乳碎片无色，壁较厚，有较多大的类圆形纹孔。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。草酸钙簇晶大，直径 60～140 μm。分泌细胞类圆形，含淡黄棕色至红棕色分泌物。种皮栅状细胞淡棕色或棕色，长 48～80 μm。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 行气导滞，泻热通便。用于痢疾里急后重，胃肠积滞，脘腹胀痛。

【用法与用量】 口服，一次 3～6 g，一日 3～4 次。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 密闭，防潮。

五子补肾丸

Wuzi Bushen Wan

【处方】 枸杞子 400 g　菟丝子(炒)400 g　复盆子 200 g
五味子(蒸)50 g　车前子(盐炒) 100 g

【制法】 以上五味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 35～50 g 与适量的水泛丸，干燥；或加炼蜜 90～110 g 制成小蜜丸或大蜜丸，即得。

【性状】 本品为棕褐色的水蜜丸、棕黑色的小蜜丸或大蜜丸；味甜、酸、微苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：种皮石细胞淡黄色，壁波状弯曲，胞腔含棕色物。种皮表皮石细胞淡黄棕色，表面观类多角形，壁较厚，孔沟细密，胞腔含暗棕色物。种皮栅状细胞 2 列，内列较外列长，有光辉带。种皮下皮细胞表面观狭长，壁稍波状，以数个细胞为一组，略作镶嵌状排列。非腺毛单细胞，壁厚，木化，脱落后残迹似石细胞状。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 补肾益精。用于肾虚腰痛，尿后余沥。

【用法与用量】 口服，水蜜丸一次 6 g，小蜜丸一次 9 g，大蜜丸一次 1 丸；一日 2 次。

【规格】 大蜜丸每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

五　苓　散

Wuling San

【处方】 茯苓 180 g　泽泻 300 g　猪苓 180 g　肉桂 120 g　白术(炒)180 g

【制法】 以上五味，粉碎成细粉，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为淡黄色的粉末；气微香，味微辛。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。菌丝粘结成团，大多无色；草酸钙方晶正八面体形，直径 32～60 μm。薄壁细胞类圆形，有椭圆形纹孔，集成纹孔群。草酸钙针晶细小长 10～32 μm，不规则地充塞于薄壁细胞中。纤维单个散在，长梭形，直径 17～34 μm，木化；石细胞类方形或类圆形，壁一面非薄。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录 3 页)。

【功能与主治】 化气行水。用于浮肿腹胀，呕逆泄泻，渴不思饮，小便不利。

【用法与用量】 口服，一次 6～9 g，一日 2 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

五　虎　散

Wuhu San

【处方】 当归 350 g　红花 350 g　防风 350 g　天南星(制)350 g　白芷 240 g

【制法】 以上五味，粉碎成细粉，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为橘黄色至暗黄色的粉末；气微香，味微辛。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：淀粉粒复粒由 8～12 粒组成。薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。花冠碎片黄色，有红棕色或黄棕色分泌管；花粉粒球形或椭圆形，直径约 60 μm，外壁有刺，具 3 个萌发孔。油管含金黄色分泌物，直径约 30 μm。草酸钙针晶成束或散在，长约至 90 μm。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录 3 页)。

【功能与主治】 活血散瘀，消肿止痛。用于跌扑损伤，瘀血肿痛，扭伤。

【用法与用量】 用温黄酒或温开水送服，一次 6 g；外用白酒调敷患处。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 密闭，防潮。

五味沙棘散

Wuwei Shaji San

本品系蒙古族验方，蒙古文名为 ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤ（其察日嘎纳·塔布）。

【处方】 沙棘膏 180 g　木香 150 g　白葡萄干 120 g　甘草 90 g　栀子 60 g

【制法】 以上五味，除沙棘膏、白葡萄干外，其余木香等三味粉碎成粗粉，加白葡萄干，粉碎，烘干，粉碎成细粉，混匀后，加沙棘膏和匀，烘干，再粉碎成细粉，过筛，即得。

【性状】 本品为深棕色的粉末；气香，味酸甘而苦涩。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录 3 页)。

【功能与主治】 清热祛痰，止咳定喘。用于慢性支气管炎，肺热久嗽，喘促痰多，胸中满闷，胸胁作痛。

【用法与用量】 口服，一次 3 g，一日 2～3 次。

【规格】 每袋重 18 g

【贮藏】 密闭，防潮。

五味麝香丸

Wuwei Shexiang Wan

本品系藏族验方，藏文名为 ཚ་ཧོ་ལ་བ（拉孜扼巴）。

【处方】 麝香 10 g　诃子(去核) 300 g　黑草乌 300 g　木香 100 g　藏菖蒲 60 g

【制法】 以上五味，除麝香外，其余诃子等四味粉碎成细粉。将麝香研细，再与上述粉末配研，过筛，混匀，用安息香的饱和水溶液泛丸，晾干，即得。

【性状】 本品为棕褐色的小丸；具麝香特异的香气，味微苦、涩、麻。

【鉴别】 (1)取本品，置显微镜下观察：果皮纤维层淡黄色，斜向交错排列，壁较薄，有纹孔。石细胞长方形或类方形，壁稍厚。油细胞圆形，直径约至 50 μm，含黄色或黄棕色油状物。菊糖团块形状不规则，有时可见微细放射状纹理，加热后溶解。无定

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

形团块淡黄棕色，埋有细小方形结晶。

(2)取本品 2 g，研细，加60%乙醇 20 ml，加热回流 15 分钟，稍冷，放置片刻，滤入小烧杯中，用宽 2.4 cm、长 12 cm 的滤纸条，一端垂于杯底吸收溶液，至不再上行时，将滤纸取出，干燥后，置紫外光灯下观察，上部显黄色荧光，中部显蓝色荧光。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 消炎，止痛，祛风。用于扁桃体炎，咽喉炎，流行性感冒，炭疽病，风湿性关节炎，神经痛，胃痛，牙痛。

【用法与用量】 睡前服或含化，一次 2～3 丸，一日 1 次；极量 5 丸。

【注意】 本品有毒，慎用，孕妇忌服。

【规格】 每 10 粒重 0.3 g

【贮藏】 密封，防潮。

止红肠澼丸

Zhihong Changpi Wan

【处方】 栀子 84 g　黄连 24 g　黄芩 96 g　槐花 64 g　当归 96 g
白芍 72 g　地黄(炭) 96 g　阿胶 64 g　乌梅 10 g　荆芥穗 64 g
地榆(炭) 84 g　侧柏叶(炭) 64 g　升麻 5 g

【制法】 以上十三味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 120～130 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为黑色的大蜜丸；味微苦、甜。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。果皮石细胞镶嵌排列成层。纤维束鲜黄色，壁稍厚，纹孔明显。纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。纤维细长，微弯曲，壁稍厚，非木化。花瓣下表皮细胞多角形，有不定式气孔；薄壁细胞中含草酸钙方晶。草酸钙簇晶直径 18～32 μm，存在于薄壁细胞中，常排列成行，或一个细胞含数个簇晶。非腺毛 2～3 细胞，壁有疣状突起。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 清肠，凉血，止血。用于便血，痔疮出血。

【用法与用量】 口服，一次 1 丸，一日 1～2 次。

【规格】 每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

止　带　丸

Zhidai Wan

【处方】

党参 50 g	白术(炒)50 g	当归 100 g	白芍 50 g
川芎 100 g	香附(醋制)200 g	木香 50 g	砂仁 50 g
小茴香(盐炒) 50 g	元胡(醋制)50 g	杜仲(盐炒) 50 g	续断 50 g
补骨脂(盐炒) 50 g	鸡冠花 200 g	青黛 50g	椿皮(炒)200 g
牡蛎(煅)50g			

【制法】 以上十七味，粉碎成细粉，过筛，混匀，用水泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为灰黑色的水丸；气微香，味涩、微苦。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：联结乳管直径 12～15 μm，含细小颗粒状物。分泌细胞类圆形，含淡黄棕色至红棕色分泌物。种皮栅状细胞淡棕色或棕红色，表面观类多角形，壁稍厚，胞腔含红棕色物。草酸钙针晶细小，长 10～32 μm，不规则地充塞于薄壁细胞中。橡胶丝呈条状或扭曲成团，表面带颗粒性。石细胞类圆形或类多角形，胞腔含草酸钙方晶。内种皮石细胞黄棕色或棕红色，表面观类多角形，壁厚，胞腔内含硅质块。厚壁组织碎片绿黄色，细胞类多角形或略延长，壁稍弯曲，有的连珠状增厚，纹孔细密。花粉粒球形，直径约至 37 μm，外壁有细小疣点，有散孔。不规则块片或颗粒蓝色。

(2) 取本品约 0.5 g，研碎，置试管中，加盐酸立即产生多量气泡，将产生的气泡通入氢氧化钙试液中，即发生白色沉淀；再加水 2 ml，搅拌，滤过。滤液用氨试液调节至弱碱性，滴加草酸铵试液，即发生白色沉淀。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 补虚止带，和血调经。用于赤白带下，月经不调，腹痛腰酸。

【用法与用量】 口服，一次 6～9 g，一日 2～3 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

牛黄上清丸

Niuhuang Shangqing Wan

【处方】 牛黄 2 g　薄荷 30 g　菊花 40 g　荆芥穗 16 g　白芷 16 g　川芎 16 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

栀子 50 g　黄连 16 g　黄柏 10 g　黄芩 50 g　大黄 80 g　连翘 50 g
赤芍 16 g　当归 50 g　地黄 64 g　桔梗 16 g　甘草 10 g　石膏 80 g
冰片 10 g

【制法】 以上十九味，除牛黄、冰片外，其余薄荷等十七味粉碎成细粉；将牛黄、冰片研细，与上述粉末配研，过筛，混匀。每 100 g粉末加炼蜜 120～130 g制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为红褐色至黑褐色的大蜜丸，气芳香，味苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：纤维束鲜黄色，壁稍厚，纹孔明显。纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。内果皮纤维上下层纵横交错，纤维短梭形。石细胞鲜黄色，分枝状，壁厚，层纹明显。种皮石细胞黄色或淡棕色，多破碎，完整者长多角形、长方形或形状不规则，壁厚，有大的圆形纹孔，胞腔棕红色。薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。草酸钙簇晶大，直径 60～140 μm。花粉粒类圆形，直径 24～34 μm，外壁有刺，长 3～5 μm，具 3 个萌发孔。腺鳞头部 8 细胞，扁球形，直径约至 90 μm；柄短，单细胞。不规则片状结晶无色，有平直纹理。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 清热散风，泻火通便。用于头痛眩晕，目赤耳鸣，咽喉肿痛，口舌生疮，牙龈肿痛，大便燥结。

【用法与用量】 口服，一次 1 丸，一日 2 次。

【注意】 孕妇慎服。

【规格】 每丸重 6 g

【贮藏】 密闭，防潮。

牛黄保婴丸

Niuhuang Baoying Wan

【处方】 牛黄 8 g　胆南星 200 g　竹黄 70 g　茯苓 100 g　琥珀 50 g
麝香 4 g　全蝎 30 g　僵蚕(炒)60 g　雄黄 50 g　朱砂 30 g

【制法】 以上十味，除牛黄、麝香外，朱砂、雄黄分别水飞或粉碎成极细粉；其余胆南星等六味粉碎成细粉；将牛黄、麝香研细，与上述粉末配研，过筛，混匀。每 100g粉末加炼蜜 90～100 g 制成大蜜丸，即得。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 本品为黄棕色至红棕色的大蜜丸；气微香，味略苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。体壁碎片淡黄色至黄色，有网状纹理及圆形毛窝，有时可见棕褐色刚毛。体壁碎片无色，表面有极细的菌丝体。不规则碎块淡黄绿色或棕黄色，透明或半透明。不规则碎块金黄色或橙黄色，有光泽。不规则细小颗粒暗棕红色，有光泽，边缘暗黑色。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 清热镇惊，祛风化痰。用于小儿风痰壅盛，高热神昏，惊风抽搐。

【用法与用量】 口服，一次 1 丸，一日 1～2 次，周岁以内酌减。

【规格】 每丸重 1.5 g

【贮藏】 密闭，防潮。

牛黄消炎丸

Niuhuang Xiaoyan Wan

【处方】 牛黄 50 g　珍珠母 100 g　蟾酥 30 g　青黛 40 g
天花粉 100 g　大黄 100 g　雄黄 100 g

【制法】 以上七味，雄黄、珍珠母分别水飞或粉碎成极细粉；大黄、天花粉粉碎成细粉；将牛黄研细，与雄黄、珍珠母及大黄等粉末配研，过筛；蟾酥加白酒研成糊状，与上述粉末混匀，干燥，研细，过筛。用白酒泛丸至一半时，加入研细的青黛泛至成丸，另取百草霜粉末适量包衣，打光，晒干或低温干燥，即得。

【性状】 本品为黑色的细小水丸，除去外衣，显棕黄色；味苦，有麻辣感。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：淀粉粒类球形、半圆形或盔帽形，直径 27～48 μm，脐点点状、短缝状、人字状或星状，层纹隐约可见。草酸钙簇晶大，直径 60～140 μm。不规则块片或颗粒蓝色。不规则碎块金黄色或橙黄色，有光泽。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 清热解毒，消肿止痛。用于咽喉肿痛，疔，痈，疮疖。

【用法与用量】 口服，一次 10 粒，一日 3 次，小儿酌减；外用研末调敷患处。

【注意】 孕妇忌服。

【规格】 每 60 粒重 0.3 g

【贮藏】 密闭，防潮。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

牛黄解毒丸

Niuhuang Jiedu Wan

【处方】 牛黄 5 g　雄黄 50 g　石膏 200 g　冰片 25 g
大黄 200 g　黄芩 150 g　桔梗 100 g　甘草 50 g

【制法】 以上八味，除牛黄、冰片外，雄黄水飞或粉碎成极细粉；其余石膏等五味粉碎成细粉；将牛黄、冰片研细，与上述粉末配研，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 100～110 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为棕黄色的大蜜丸；有冰片香气，味微甜而后苦、辛。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。草酸钙簇晶大，直径 60～140 μm。联结乳管直径 14～25 μm，含淡黄色颗粒状物。不规则碎块金黄色或橙黄色，有光泽。不规则片状结晶无色，有平直纹理。

(2) 取本品约 3 g，加氯仿 10 ml，研磨，倾取氯仿液，蒸干，残渣加乙醇 50 ml 使溶解，加活性炭适量脱色，滤过，滤液蒸干，残渣加 60%醋酸溶液 1 ml 使溶解，加新制的 1%糠醛溶液 1 ml，再加 50%硫酸溶液 5 ml，在 70°保温 10 分钟，溶液由淡红色渐变为紫褐色。

(3) 取本品，进行微量升华，升华物置显微镜下观察，呈不定形的无色片状结晶。

(4) 取本品约 2 g，加氯仿 5 ml，研磨，倾取氯仿液，蒸干，残渣加 1%氢氧化钠溶液 1 ml，即显红色，加入 30%过氧化氢溶液，加热后红色不退，加酸至酸性时，则红色消退，变为黄色。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 清解热毒。用于热病咽喉肿痛，牙痛，口舌生疮，目赤肿痛。

【用法与用量】 口服，一次 1 丸，一日 2～3 次。

【注意】 孕妇忌服。

【规格】 每丸重 3 g

【贮藏】 密封。

牛黄解毒片

Niuhuang Jiedu Pian

【处方】 牛黄 5 g　雄黄 50 g　石膏 200 g　冰片 25 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

大黄 200 g　黄芩 150 g　桔梗 100 g　甘草 50 g

【制法】 以上八味，雄黄水飞或粉碎成极细粉；取石膏 50 g 及大黄分别粉碎成细粉，过筛；牛黄、冰片研细；其余黄芩等三味及石膏 150 g 加水煎煮二次，每次 2 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩成稠膏，加入大黄、雄黄粉末，制成颗粒，干燥，再加入牛黄、冰片粉末，混匀，压制成 1000 片。用上述石膏粉末包衣，再包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，表层显白色，内层显棕黄色；有冰片香气，味微苦、辛。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：草酸钙簇晶大，直径 60～140 μm。不规则碎块金黄色或橙黄色，有光泽。不规则片状结晶无色，有平直纹理。

(2) 取本品 3 片，除去糖衣，研细，加氯仿 10 ml，研磨，滤过，滤液蒸干，残渣加 60%醋酸溶液 1 ml 使溶解，加新制的 1%糠醛溶液 1 ml，再加 50%硫酸溶液 5 ml，即显橙红色，在 70°保温 10 分钟，逐渐变成紫褐色。

(3) 取本品 1 片，除去糖衣，研细，进行微量升华，升华物置显微镜下观察，呈不定形的无色片状结晶。

(4) 取本品 6 片，除去糖衣，研细，加乙醇 10 ml，温热 10 分钟，滤过。取滤液 5ml，加镁粉少量与盐酸 0.5 ml，加热，即显红色；另取滤液 4 ml，加氢氧化钠试液，即显红色，再加 30%过氧化氢溶液，加热红色不退，加酸成酸性时，则红色消退，变为黄色。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(附录 6 页)。

【功能与主治】 清解热毒。用于热病咽喉肿痛，牙痛，口舌生疮，目赤肿痛。

【用法与用量】 口服，一次 2 片，一日 2～3 次。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 密封。

牛黄镇惊丸

Niuhuang Zhenjing Wan

【处方】 牛黄 8 g　全蝎 30 g　僵蚕(炒) 10 g　珍珠 10 g　麝香 4 g
朱砂 10 g　雄黄 10 g　天麻 20 g　钩藤 10 g　防风 20 g
琥珀 6 g　胆南星 10 g　白附子(制) 10 g　半夏(制) 10 g　竹黄 10 g
冰片 4 g　薄荷 10 g　甘草 40 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【制法】 以上十八味，除牛黄、麝香、冰片外，雄黄、朱砂、珍珠分别水飞或粉碎成极细粉；其余全蝎等十二味粉碎成细粉；将牛黄、麝香、冰片研细，与上述粉末配研，过筛，混匀。每 100 g粉末加炼蜜 35～50 g 与适量的水泛丸，阴干；或加炼蜜 110～140 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为黄棕色的水蜜丸或大蜜丸；气微香，味甜、微凉略苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：厚壁细胞多角形或长多角形，直径 70～180 μm，壁较厚，微木化，纹孔明显。油管含金黄色分泌物。草酸钙砂晶存在于薄壁细胞中，有时含晶细胞连接成行。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。腺鳞头部 8 细胞，扁球形，直径约至 90 μm，柄短，单细胞。不规则碎块无色或淡绿色，半透明，有光泽，有时可见细密波状纹理。不规则碎块淡黄绿色或棕黄色，透明或半透明。不规则碎块金黄色或橙黄色，有光泽。不规则细小颗粒暗棕红色，有光泽，边缘暗黑色。体壁碎片无色，表面有极细的菌丝体。体壁碎片淡黄色至黄色，有网状纹理及圆形毛窝，有时可见棕褐色刚毛。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 镇惊安神，祛风豁痰。用于小儿惊风，高热抽搐，牙关紧闭，烦躁不安。

【用法与用量】 口服，水蜜丸一次 1 g，大蜜丸一次 1 丸；一日 1～3 次。三岁以内小儿酌减。

【规格】 大蜜丸每丸重 1.5 g

【贮藏】 密闭，防潮。

毛 鸡 药 酒

Maoji Yaojiu

【处方】 干毛鸡 160 g(或鲜毛鸡 320 g，均除去毛、内脏) 当归 160 g
川芎 160 g 白芷 160 g 红花 160 g 赤芍 15 g
桃仁 15 g 千年健 160 g 茯苓 20 g

【制法】 以上九味，干毛鸡用蒸气蒸 15 分钟(鲜毛鸡不蒸制)，放冷，用白酒适量浸泡 25 天后，与当归等八味置容器内，加白酒(前后两次共 16960 ml)密闭浸泡 45～55 天，滤过，即得。

【性状】 本品为橙黄色至浅棕色的澄清溶液；气香，味辛、微甘。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【鉴别】 取本品，置紫外光灯下观察，显黄色的荧光。

【检查】 总固体 精密量取本品 25 ml，置称定重量的蒸发皿中，于水浴上蒸干，在 105°干燥至恒重，遗留残渣不得少于 1.2%。

乙醇量 应为 35～45%(附录 48 页第一法)。

其他 应符合酒剂项下有关的各项规定(附录 4 页)。

【功能与主治】 温经祛风，活血化瘀。用于产后眩晕，四肢酸痛无力，痛经。

【用法与用量】 口服，一次 15～30 ml，一日 3～4 次。

【注意】 感冒发热，喉痛，眼赤等忌服。

【贮藏】 密封。

化 毒 丸

Huadu Wan

【处方】 水牛角浓缩粉 20 g 连翘 60 g 青黛 20 g 黄连 5 g
牛蒡子(炒) 50 g 玄参 60 g 地黄 50 g 桔梗 50 g
芒硝 5 g 赤芍 50 g 甘草 60 g

【制法】 以上十一味，除水牛角浓缩粉外，其余连翘等十味粉碎成细粉；将水牛角浓缩粉研细，与上述粉末配研，过筛，混匀。每 100 g粉末加炼蜜 45～55 g 与适量的水泛丸，干燥；或加炼蜜 100～120 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为黑色的水蜜丸或大蜜丸；味甜、微苦咸。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：不规则块片或颗粒蓝色。菊糖团块不规则形，有时可见放射状纹理，加热后溶解。石细胞黄棕色或无色，类长方形、类圆形或形状不规则，直径约至 94 μm。种皮栅状细胞表面观短梭形，侧面观斜长方形，壁较厚，微木化，常附有棕色内果皮细胞，内含草酸钙方晶。纤维束鲜黄色，壁稍厚，纹孔明显。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。内果皮纤维上下层纵横交错，纤维短梭形。薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 凉血，清解热毒。用于小儿疮疖，痱毒，腮腺炎，咽喉肿痛，口舌生疮。

【用法与用量】 口服，水蜜丸一次 2 g，大蜜丸一次 1 丸；一日 2～3 次。

【规格】 大蜜丸每丸重 3 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【贮藏】 密闭，防潮。

分 清 丸

Fenqing Wan

【处方】 关木通 80 g　车前子(盐炒) 40 g　黄芩 80 g　茯苓 40 g　猪苓 40 g
黄柏 40 g　大黄 120 g　萹蓄 40 g　瞿麦 40 g　知母 40 g
泽泻 40 g　栀子 40 g　甘草 20 g　滑石 80 g

【制法】 以上十四味，除滑石外，其余关木通等十三味粉碎成细粉，过筛，混匀。用水泛丸，干燥，将滑石粉碎成极细粉包衣，打光，干燥，即得。

【性状】 本品为白色至灰白色光亮的水丸；味甘、苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。菌丝粘结成团，大多无色。具缘纹孔导管大，直径约至 328 μm，具缘纹孔类圆形，排列紧密。种皮下皮细胞表面观狭长，壁稍波状，以数个细胞为一组，略作镶嵌状排列。纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。纤维束鲜黄色，周围细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维，含晶细胞的壁木化增厚。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。草酸钙簇晶大，直径 60～140 μm。草酸钙针晶成束或散在，长 26～110 μm。草酸钙结晶类圆形，直径 19～36 μm，存在于叶脉薄壁组织中，多个排列成行。叶肉组织断面观为两面栅栏式。薄壁细胞类圆形，有椭圆形纹孔，集成纹孔群。种皮石细胞黄色或淡棕色，多破碎，完整者长多角形、长方形或不规则形，壁厚，有大的圆形纹孔，胞腔棕红色。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 清湿热，利尿。用于湿热下注，小便不利、涩痛，尿路感染。

【用法与用量】 口服，一次 6 g，一日 2～3 次。

【注意】 孕妇慎服。

【贮藏】 密闭，防潮。

风湿骨痛丸

Fengshi Gutong Wan

【处方】 桑枝 400 g　千斤拔 50 g　宽筋藤 50 g　黑老虎 18 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【制法】 以上四味，黑老虎粉碎成细粉，其余桑枝等三味，加水煎煮二次，第一次4小时，第二次2小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至比重1.2，加入黑老虎粉末，混匀，干燥，研细，过筛。每100 g粉末加炼蜜60～70 g制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为黑棕色的大蜜丸，味微甜而微苦涩。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：嵌晶纤维直径34～56 μm，壁厚，嵌有多数细小方晶，直径约6 μm。

(2) 取本品约2 g，加石油醚5 ml，研磨后，浸渍15分钟，时加振摇，滤过，滤液挥尽石油醚，残渣加5%香草醛的硫酸溶液2滴，即显棕红色，放置后，渐变为紫色。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录1页)。

【功能与主治】 祛风除湿，舒筋活络。用于风湿骨痛，四肢关节疼痛。

【用法与用量】 口服，一次2丸，一日2次。

【规格】 每丸重3 g

【贮藏】 密闭，防潮。

乌　贝　散（胃溃疡粉）

Wubei San

【处方】 海螵蛸(去壳)850 g　浙贝母150 g

【制法】 以上二味，粉碎成细粉，过筛，另加橙皮油3.5 ml，混匀，即得。

【性状】 本品为淡黄白色的粉末；气微香，味咸、微苦。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：淀粉粒卵圆形，直径35～48 μm，脐点点状、人字状或马蹄状，位于较小端，层纹细密。不规则透明薄片大多具细密条纹，滴加稀盐酸产生气泡。

(2) 取本品1 g，置试管中，加稀盐酸5 ml，即发生大量气泡；加热3分钟，滤过。取滤液2 ml，加碘化汞钾试液3～5滴，即发生白色沉淀。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录3页)。

【功能与主治】 制酸止痛，收敛止血。用于胃痛泛酸，胃、十二指肠溃疡。

【用法与用量】 饭前口服，一次3 g，一日3次；十二指肠溃疡可加倍服用。

【贮藏】 密闭，防潮。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

乌鸡白凤丸

Wuji Baifeng Wan

【处方】

乌鸡(去毛爪肠) 640 g	鹿角胶 128 g	鳖甲(制) 64 g	牡蛎(煅) 48 g
桑螵蛸 48 g	人参 128 g	黄芪 32 g	当归 144 g
白芍 128 g	香附(醋制) 128 g	天冬 64 g	甘草 32 g
地黄 256 g	熟地黄 256 g	川芎 64 g	银柴胡 26 g
丹参 128 g	山药 128 g	芡实(炒) 64 g	鹿角霜 48 g

【制法】 以上二十味，熟地黄、地黄、川芎、鹿角霜、银柴胡、芡实、山药、丹参八味粉碎成粗粉，其余乌鸡等十二味，分别酌予碎断，置罐中，另加黄酒 1500 g，加盖封闭，隔水炖至酒尽，取出，与上述粗粉掺匀，晒干或低温干燥，再粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 90～120 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为黑褐色至黑色的大蜜丸；味甜、微苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：草酸钙簇晶直径 20～68 μm，棱角锐尖，草酸钙簇晶直径 18～32 μm，存在于薄壁细胞中，常排列成行，或一个细胞中含有数个簇晶。草酸钙针晶束存在于粘液细胞中，长 80～240 μm，针晶直径 2～8 μm。薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。纤维成束或散离，壁厚，表面有纵裂纹，两端断裂成帚状或较平截。纤维成束，深棕色或红棕色，壁厚。石细胞长方形或长条形，直径 50～110 μm，纹孔极细密。木栓细胞黄棕色，壁薄，微波状弯曲，多层重叠。不规则块片无色或淡黄褐色，表面具细纹理。不规则碎块淡灰黄色，表面有裂隙或细纹理。不规则块片半透明，边缘折光较强，表面有纤细短纹理和小孔以及细裂隙。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录 1 页）。

【功能与主治】 补气养血，调经止带。用于气血两虚，身体瘦弱，腰膝酸软，月经不调，崩漏带下。

【用法与用量】 口服，一次 1 丸，一日 2 次。

【规格】 每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

六　一　散

Liuyi San

【处方】 滑石 600 g　甘草 100 g

【制法】 以上二味，粉碎成细粉，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为浅黄白色的粉末；具甘草甜味，手捻有润滑感。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：不规则块片无色，有层层剥落痕迹。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定（附录 3 页）。

【功能与主治】 清暑利湿。用于暑热身倦，口渴泄泻，小便黄少；外治痱子刺痒。

【用法与用量】 调服或包煎服汤，一次 6～9 g，一日 1～2 次；外用扑撒患处。

【贮藏】 密闭，防潮。

六合定中丸

Liuhe Dingzhong Wan

【处方】

广藿香 16 g	紫苏叶 16 g	香薷 16 g	木香 36 g
檀香 36 g	厚朴(姜制) 48 g	枳壳(炒)48 g	陈皮 48 g
桔梗 48 g	甘草 48 g	茯苓 48 g	木瓜 48 g
白扁豆(炒) 16 g	山楂(炒) 48 g	六曲(炒)192 g	麦芽(炒)192 g
稻芽(炒)192 g			

【制法】 以上十七味，粉碎成细粉，过筛，混匀，用水泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为黄褐色的水丸；气微香，味微酸、苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：淀粉粒广肾形，直径约至 36 μm，脐点点状或裂缝状，层纹隐约可见。淀粉粒复粒卵圆形或类圆形，由多数多角形分粒组成。不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。叶肉组织中散有细小草酸钙针晶。叶肉组织含细小草酸钙簇晶，直径 4～8 μm。含晶细胞方形或长方形，壁厚，木化，胞腔含草酸钙方晶。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。木纤维长梭形，直径 16～24 μm，壁稍厚，纹

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

孔口横裂缝状、十字状或人字状。联结乳管直径 14～25μm，含淡黄色颗粒状物。表皮细胞纵列，常有 1 个长细胞与 2 个短细胞相连接，长细胞壁厚，波状弯曲，木化。果皮石细胞淡紫红色、红色或黄棕色，类圆形或多角形，直径约至125 μm。石细胞分枝状，壁厚，层纹明显。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 祛暑除湿，和中消食。用于夏伤暑湿，宿食停滞，寒热头痛，胸闷恶心，吐泻腹痛。

【用法与用量】 口服，一次 3～6 g，一日 2～3 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

六味木香散

Liuwei Muxiang San

本品系蒙古族验方，蒙古文名为 ᠳᠠᠭᠤᠷᠠ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯᠠᠭ (如达·吉日嘎)。

【处方】 木香 200 g　栀子 150 g　石榴 100 g　闹羊花 100 g　豆蔻 70 g　草茇 70 g

【制法】 以上六味，粉碎成细粉，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为黄色的粉末；气香，味辛、苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：种皮石细胞黄色或淡棕色，多破碎，完整者长多角形、长方形或形状不规则，壁厚，有大的圆形纹孔，胞腔含棕红色物。石细胞无色，椭圆形或类圆形，壁厚，孔沟细密。内种皮石细胞黄棕色或棕红色，表面观类多角形，壁厚，胞腔含硅质块。种皮细胞红棕色或黄棕色，长多角形，壁略作波状或连珠状增厚。网纹导管直径 32～90 μm。花粉粒呈四面体形的四合体，有 3 个萌发孔。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录 3 页)。

【功能与主治】 开郁行气，止痛。用于胃痛，腹痛，嗳气呕吐。

【用法与用量】 口服，一次 2～3 g，一日 3 次。

【规格】 每袋重 18g

【贮藏】 密闭，防潮。

六味地黄丸

Liuwei Dihuang Wan

【处方】 熟地黄 160 g　山茱萸(制) 80 g　牡丹皮 60 g　山药 80 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

茯苓 60 g　泽泻 60 g

【制法】 以上六味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100g 粉末加炼蜜 35～50 g 与适量的水泛丸，干燥；或加炼蜜 80～110 g 制成小蜜丸或大蜜丸，即得。

【性状】 本品为棕黑色的水蜜丸、黑褐色的小蜜丸或大蜜丸；味甜而酸。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：淀粉粒三角状卵形或矩圆形，直径 24～40μm，脐点短缝状或人字状。不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。草酸钙簇晶存在于无色薄壁细胞中，有时数个排列成行。果皮表皮细胞橙黄色，表面观类多角形，垂周壁略连珠状增厚。薄壁细胞类圆形，有椭圆形纹孔，集成纹孔群。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 滋补肾阴。用于肾阴亏损，头晕耳鸣，腰膝酸软，盗汗遗精，消渴。

【用法与用量】 口服，水蜜丸一次 6g，小蜜丸一次 9g，大蜜丸一次 1 丸；一日 2 次。

【规格】 大蜜丸每丸重 9g

【贮藏】 密闭，防潮。

六味安消散

Liuwei Anxiao San

本品系蒙古族、藏族验方，蒙古文名为 ᠵᠢᠭᠡᠳᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (西吉德·吉日嘎)，藏文名为 ཞི་རྒྱ་སྦྱར་པ (西吉足巴)。

【处方】 土木香 50 g　大黄 200 g　山柰 100 g
寒水石(煅)250g　诃子 150 g　碱花 300 g

【制法】 以上六味，粉碎成细粉，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为灰黄色或黄棕色的粉末；气香，味苦涩、微咸。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：淀粉粒扁平的广卵形、三角状卵形或类圆形，有尖突，长 10～40 μm，脐点及层纹不明显。草酸钙簇晶大，直径 60～140 μm。薄壁细胞无色，长圆形或长多角形，含扁形菊糖团块。

(2) 取本品 0.1 g，加稀硫酸 5ml，有气泡产生。煮沸，趁热滤过，放冷，加乙醚 5ml，振摇，乙醚层染成黄色，分取乙醚液，加氨试液 2ml，振摇，氨液层染成红色。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录 3 页)。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 和胃健脾，导滞消积，行血止痛。用于胃痛胀满，消化不良，便秘，痛经。

【用法与用量】 口服，一次 1.5～3 g，一日 2～3 次。

【注意】 孕妇忌服。

【规格】 每袋重 18 g

【贮藏】 密闭，防潮。

玉 真 散

Yuzhen San

【处方】 生白附子 600 g 防风 50 g 白芷 50 g
生天南星 50 g 天麻 50 g 羌活 50 g

【制法】 以上六味，粉碎成细粉，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为黄白色至淡黄色的粉末；气香，味麻辣。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：淀粉粒复粒由 8～12 粒组成。草酸钙针晶束多存在于粘液细胞中，针晶长约至 136 μm。石细胞黄绿色，长卵形、长圆形或类长方形，壁较厚，孔沟明显。厚壁细胞成片，多角形或长多角形，直径 70～180μm，壁较厚，微木化，纹孔明显。油管含棕黄色分泌物，直径约 100μm。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录 3 页)。

【功能与主治】 祛风解痉，止痛。用于破伤风；外治跌扑损伤，刀伤出血。

【用法与用量】 口服，一次 1～1.5 g，或遵医嘱；外用适量敷患处。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 密闭，防潮。

艾附暖宫丸

Aifu Nuangong Wan

【处方】 艾叶(炭) 120 g 香附(醋制) 240 g 吴茱萸(制) 80 g 肉桂 20 g
当归 120 g 川芎 80 g 白芍(酒炒) 80 g 地黄 40 g
黄芪(蜜炙)80g 续断 60 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【制法】 以上十味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每100g粉末加炼蜜110～130 g制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为深褐色至黑色的大蜜丸；气微，味甘而后苦、辛。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：T字形毛棕色或焦黑色，弯曲，柄1～3细胞，常脱落。腺毛头部多细胞，椭圆形，含棕黄色至棕红色物，柄2～5细胞。分泌细胞类圆形，含淡黄棕色至红棕色分泌物。薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。草酸钙簇晶存在于淡棕黄色皱缩的薄壁细胞中，常数个排列成行。纤维直径15～35μm，壁厚，微木化，有大的圆形纹孔。纤维成束或散离，壁厚，表面有纵裂纹，两端断裂成帚状或较平截。石细胞类方形或类圆形，壁一面菲薄。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录1页)。

【功能与主治】 理气补血，暖宫调经。用于子宫虚寒，月经不调，经来腹痛，腰酸带下。

【用法与用量】 口服，一次1丸，一日2～3次。

【规格】 每丸重9g

【贮藏】 密闭，防潮。

左　金　丸

Zuojin Wan

【处方】 黄连600 g　吴茱萸100 g

【制法】 以上二味，粉碎成细粉，过筛，混匀，用水泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为黄褐色的水丸；气特异，味苦、辛。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：纤维束鲜黄色，壁稍厚，纹孔明显。非腺毛1～9细胞，有的充满红棕色物；腺毛头部多细胞，椭圆形，含棕黄色至棕红色物，柄2～5细胞。

(2) 取本品约0.1 g，研细，加水10ml，煮沸3分钟，滤过。取滤液少量，置载玻片上，加30%硝酸1滴，放置30分钟后，开始出现金黄色簇状结晶或针状结晶，随放置时间而增多。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录1页)。

【功能与主治】 泻火，舒肝，和胃，止痛。用于脘胁疼痛，呕吐酸水。

【用法与用量】 口服，一次3～6 g，一日2次。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【贮藏】 密闭，防潮。

石黄抗菌片

Shihuang Kangjun Pian

【处方】 石榴皮干膏粉 148 g　黄芩干膏粉 78 g　地榆干膏粉 108 g　黄芩细粉 16 g

【制法】 取石榴皮、黄芩、地榆，分别加水煎煮二次，石榴皮每次煮沸 10 分钟，黄芩、地榆每次煮沸 40 分钟，均分别合并煎液，静置 24 小时，滤过，滤液分别浓缩至比重 1.30 以上，粉碎成细粉，即得三种干膏粉。按处方量与黄芩细粉混匀，制成颗粒，压制成 1000 片，包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显褐色；有焦糖气，味涩、苦。

【鉴别】 取本品，除去糖衣，置显微镜下观察：石细胞淡黄色，类方形、长方形或类圆形，直径 24～48 μm，壁较厚；纤维淡黄色，短梭形，壁厚，孔沟细。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(附录 6 页)。

【功能与主治】 抗菌消炎。用于菌痢，上呼吸道感染，扁桃体炎，尿路感染。

【用法与用量】 口服，一次 4～5 片，一日 4 次，小儿酌减。

【贮藏】 密封。

石斛夜光丸

Shihu Yeguang Wan

【处方】 石斛 30 g　人参 120 g　山药 45 g　茯苓 120 g
甘草 30 g　肉苁蓉 30 g　枸杞子 45 g　菟丝子 45 g
地黄 60 g　熟地黄 60 g　五味子 30 g　天冬 120 g
麦冬 60 g　苦杏仁 45 g　防风 30 g　川芎 30 g
枳壳(炒) 30 g　黄连 30 g　牛膝 45 g　菊花 45 g
蔓藜(盐炒) 30 g　青葙子 30 g　决明子 45 g　水牛角浓缩粉 60 g
羚羊角 30 g

【制法】 以上二十五味，除水牛角浓缩粉外，羚羊角锉研成细粉；其余石斛等二十三味粉碎成细粉；将水牛角浓缩粉研细，与上述粉末配研，过筛，混匀。每 100 g 粉末

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

加炼蜜 35～50 g 与适量的水泛丸，干燥；或加炼蜜 100～120 g 制成小蜜丸或大蜜丸，即得。

【性状】 本品为棕色的水蜜丸、棕黑色的小蜜丸或大蜜丸；味甜而苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。纤维表面类圆形细胞中含细小圆形硅质块，排列成行。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。纤维束鲜黄色，壁稍厚，纹孔明显。种皮石细胞淡黄色，壁波状弯曲，有时内含棕色物。种皮表皮石细胞淡黄棕色，表面观类多角形，壁较厚，孔沟细密，胞腔含暗棕色物。石细胞长方形或长条形，直径 50～110 μm，纹孔较细密。石细胞橙黄色，贝壳形，壁较厚，较宽一边纹孔明显。草酸钙簇晶直径 20～68 μm，棱角锐尖。草酸钙针晶束存在于粘液细胞中，长 80～240 μm，针晶直径 2～8 μm。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。种皮细胞暗红棕色，表面观多角形至长多角形，有网状增厚纹理。种皮栅状细胞一列，其下细胞中含草酸钙簇晶及方晶。花粉粒类圆形，直径 24～34 μm，外壁有刺，长 3～5 μm，具 3 个萌发孔。薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。油管含金黄色分泌物。不规则碎块稍有光泽，均匀分布裂缝状或圆形孔隙。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 平肝，滋肾，明目。用于肝肾两亏，阴虚火旺，内障目暗，视物昏花。

【用法与用量】 口服，水蜜丸一次 3～6 g，小蜜丸一次 4.5～9 g，大蜜丸一次 1 丸；一日 2 次。

【规格】 大蜜丸每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

戊 己 丸

Wuji Wan

【处方】 黄连 300 g 吴茱萸(制)50 g 白芍(炒)300 g

【制法】 以上三味，粉碎成细粉，过筛，混匀，用水泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为棕黄色的水丸；味苦，稍有麻辣感。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：纤维束鲜黄色，壁稍厚，纹孔明显。草酸钙簇晶直径 18～32 μm，存在于薄壁细胞中，常排列成行，或一个细胞中含有数个簇晶。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

非腺毛1～9细胞，有的充满红棕色物。

(2) 取本品约0.5 g，研碎，加30%醋酸10 ml，煮沸，滤过。取滤液2 ml，置试管中，沿管壁滴加硫酸1 ml，再缓缓加入饱和氯水(或漂白粉少量)，两液接界处显樱红色。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录1页)。

【功能与主治】 泄肝火，和脾胃。用于肝胃不和，泛酸嘈杂，呕吐，腹痛泻痢。

【用法与用量】 口服，一次3～6 g，一日2次。

【贮藏】 密闭，防潮。

龙胆泻肝丸

Longdan Xiegan Wan

【处方】 龙胆120 g 柴胡120 g 黄芩60 g 栀子(炒)60 g
泽泻120 g 木通60 g 车前子(盐炒)60 g 当归(酒炒)60 g
地黄120 g 甘草(蜜炙)60 g

【制法】 以上十味，粉碎成细粉，过筛，混匀，用水泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为暗黄色的水丸；味苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。纤维管胞大多成束，有明显的具缘纹孔，纹孔口斜裂缝状或十字状。种皮石细胞黄色或淡棕色，多破碎，完整者长多角形、长方形或形状不规则，壁厚，有大的圆形纹孔，胞腔棕红色。薄壁细胞类圆形，有椭圆形纹孔，集成纹孔群。种皮下皮细胞表面观狭长，壁稍波状，以数个细胞为一组，略作镶嵌状排列。薄壁组织淡灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。外皮层细胞表面观纺锤形，每个细胞由横壁分隔成数个小细胞。油管含黄色或棕黄色分泌物。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录1页)。

【功能与主治】 清利肝胆湿热。用于肝热头晕，耳鸣耳痛，胁痛口苦，尿路感染，小便黄少涩痛，湿热白带。

【用法与用量】 口服，一次6 g，一日2次。

【注意】 孕妇慎服。

【贮藏】 密闭，防潮。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

归芍地黄丸

Guishao Dihuang Wan

【处方】 当归 40 g　白芍(酒炒) 40 g　熟地黄 160 g　山茱萸(制)80 g
牡丹皮 60 g　山药 80 g　茯苓 60 g　泽泻 60 g

【制法】 以上八味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 35～50 g 与适量的水泛丸，干燥；或加炼蜜 80～110 g 制成小蜜丸或大蜜丸，即得。

【性状】 本品为棕黑色的水蜜丸、黑褐色的小蜜丸或大蜜丸；味甜、微酸。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：糊化淀粉团块类白色。不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。果皮表皮细胞橙黄色，表面观类多角形，垂周壁略连珠状增厚。草酸钙针晶束存在于粘液细胞中，长 80～240 μm，针晶直径 2～8 μm。木栓细胞淡红色至微紫色，壁稍厚。薄壁细胞类圆形，有椭圆形纹孔，集成纹孔群。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 滋肾阴，补肝血。用于阴虚血少，头晕目眩，耳鸣咽干，午后低热，两胁作痛，腰腿酸痛。

【用法与用量】 口服，水蜜丸一次 6～9 g，小蜜丸一次 9 g，大蜜丸一次 1 丸；一日 2～3 次。

【规格】 大蜜丸每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

归　脾　丸

Guipi Wan

【处方】 党参 80 g　白术(炒)160 g　黄芪(蜜炙)80 g　甘草(蜜炙)40 g
茯苓 160 g　远志(制)160 g　酸枣仁(炒)80 g　龙眼肉 160 g
当归 160 g　木香 40 g　大枣(去核)40 g

【制法】 以上十一味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 25～40 g 与

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

适量的水泛丸，干燥；或加炼蜜 80～90 g 制成小蜜丸或大蜜丸，即得。

【性状】 本品为棕褐色的水蜜丸、小蜜丸或大蜜丸；气微，味甘而后微苦、辛。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。联结乳管直径 12～15 μm，含细小颗粒状物。内种皮细胞棕黄色，表面观多角形或类方形，垂周壁连珠状增厚。纤维成束或散离，多碎断，壁厚，表面有纵裂纹，两端断裂成帚状或较平截。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。网纹导管直径约至 90 μm。草酸钙针晶细小，不规则地充塞于薄壁细胞中。薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 补气养血，健脾安神。用于心脾两虚，气血不足，心悸失眠，食欲不振，崩漏便血。

【用法与用量】 用温开水或生姜汤送服，水蜜丸一次 6 g，小蜜丸一次 9 g，大蜜丸一次 1 丸；一日 3 次。

【注意】 忌生冷食物。

【规格】 大蜜丸每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

四君子丸

Sijunzi Wan

【处方】 党参 200 g　白术(炒)200 g　茯苓 200 g　甘草(蜜炙)100 g

【制法】 以上四味，粉碎成细粉，过筛，混匀。另取生姜 50 g、大枣 100 g 分次加水煎煮，滤过，用煎出液泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为棕色的水丸；味微甜。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。联结乳管直径 12～15 μm，含细小颗粒状物。草酸钙针晶细小，长 10～32 μm，不规则地充塞于薄壁细胞中。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 健脾益气。用于脾胃虚弱，食少便溏。

【用法与用量】 口服，一次 6 g，一日 3 次。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【贮藏】 密闭，防潮。

四味土木香散

Siwei Tumuxiang San

本品系蒙古族验方，蒙古文名为 ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠰᠤ (玛努·都日苯汤)。

【处方】 土木香 200 g　苦参(去粗皮)200 g　珍珠杆(去粗皮、心)100 g　山柰 50 g

【制法】 以上四味，粉碎成粗粉，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为黄白色的粉末；气香，味极苦、微辛。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：淀粉粒扁平的广卵形、三角状卵形或类圆形，有尖突，直径 9～30 μm，有的可见层纹。薄壁细胞无色，长圆形或长多角形，含扇形菊糖团块。纤维束无色，周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录 3 页)。

【功能与主治】 清瘟解表。用于瘟病初期，发冷发热，头痛咳嗽，咽喉肿痛，胸胁作痛。

【用法与用量】 水煎服，一次 2.5～3.6 g，一日 2～3 次。

【规格】 每袋重 20 g

【贮藏】 密闭，防潮。

四　逆　汤

Sini Tang

【处方】 附子（制）300 g　干姜 200 g　甘草（蜜炙）300 g

【制法】 以上三味，附子、甘草加水煎煮二次，第一次 2 小时，第二次 1.5 小时，合并煎液，滤过。干姜通蒸气蒸馏提取挥发油，另器保存，姜渣再加水煎煮 1 小时，煎液与蒸馏分离挥发油的溶液合并，滤过，再与附子、甘草的煎液合并，浓缩至约 400ml，放冷，加乙醇 1200 ml，搅匀，静置 24 小时，滤过，减压浓缩成稠膏状，加水适量稀释，冷藏 24 小时，滤过，加单糖浆 300 ml、防腐剂适量与上述挥发油，再加水至 1000ml，搅匀，灌装，熔封，即得。

【性状】 本品为棕黄色液体；气香，味甜、辛。

千金网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 温中逐寒，回阳救逆。用于亡阳虚脱，四肢厥冷，血压下降。

【用法与用量】 口服，一次 10 ml，一日 3 次。

【规格】 每支 10 ml

【贮藏】 密闭，置阴凉处保存。

四 神 丸

Sishen Wan

【处方】 肉豆蔻(煨)200 g 补骨脂(盐炒)400 g 五味子(醋制)200 g
吴茱萸(制)100 g 大枣(去核)200 g

【制法】 以上五味，粉碎成细粉，过筛，混匀。另取生姜 200 g，捣碎，加水适量压榨取汁，与上述粉末泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为浅褐色至褐色的水丸；气微香，味苦、咸而带酸、辛。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：脂肪油滴众多，放置后析出针簇状结晶。种皮栅状细胞淡棕色或红棕色，表面观类多角形，壁稍厚，胞腔含红棕色物。种皮表皮石细胞淡黄棕色，表面观类多角形，壁较厚，孔沟细密，胞腔含暗棕色物。腺毛头部多细胞，椭圆形，含棕黄色至棕红色物；柄 2～5 细胞。果皮表皮细胞黄棕色至红棕色，表面观类多角形，断面观角质层厚约至 10 μm。

(2) 取本品 2～3 g，研细，加乙醚 20 ml，密塞，振摇，滤过，滤液在室温下挥发至干后，残渣具特异香气，加少量无水硫酸钠，加热，即有气泡发生并有油类的焦糊臭气。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录 1 页）。

【功能与主治】 温暖脾肾，固肠止泻。用于脾肾虚寒，黎明泄泻或便溏腹痛，腰酸肢冷。

【用法与用量】 口服，一次 9 g，一日 1～2 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

生 脉 饮

Shengmaiyin

【处方】 党参 300 g 麦冬 200 g 五味子 100 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【制法】 以上三味，加水煎煮二次，第一次 2 小时，第二次 1.5 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至约 300 ml，放冷，加乙醇 600 ml，放置 24 小时，滤过，滤液减压浓缩成稠膏状，加水适量稀释，滤过，加单糖浆 300 ml 与防腐剂适量，再加水至 1000 ml，搅匀，灌装，熔封，即得。

【性状】 本品为淡棕黄色液体；气香，味甜。

【功能与主治】 益气复脉，养阴生津。用于气阴两伤，心悸气短，脉微虚汗。

【用法与用量】 口服，一次 10 ml，一日 3 次。

【规格】 每支 10 ml

【贮藏】 密闭，置阴凉处保存。

失 笑 散

Shixiao San

【处方】 蒲黄(炒)250 g　蒲黄 250 g　五灵脂(醋炒)500 g

【制法】 以上三味，粉碎成粗粉，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为黄绿色的粉末；味涩、微苦。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定（附录 3 页）。

【功能与主治】 祛瘀止痛。用于瘀血阻滞，胸胁脘腹疼痛。

【用法与用量】 布包煎服，一次 6～9 g，小儿酌减。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 密闭，防潮。

白 带 丸

Baidai Wan

【处方】 黄柏(酒炒)150 g　椿皮 300 g　白芍 100 g　当归 100 g
香附(醋制)50 g

【制法】 以上五味，除椿皮外，其余黄柏等四味粉碎成细粉，过筛，混匀。椿皮加水煎煮二次，合并煎液，滤过，滤液浓缩至适量(酌留部分包衣)，与适量的水泛丸，用浓缩液包衣，干燥，打光，即得。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 本品为棕黑色的水丸；味苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：纤维束鲜黄色，周围细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维，含晶细胞的壁木化增厚。草酸钙簇晶存在于薄壁细胞中，常排列成行，或一个细胞中含有数个簇晶。薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。分泌细胞类圆形，含淡黄棕色至红棕色分泌物。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录1页）。

【功能与主治】 清湿热，止带。用于赤白带下。

【用法与用量】 口服，一次6～9 g，一日2次。

【贮藏】 密闭，防潮。

半　贝　丸

Banbei Wan

【处方】 半夏(制)400 g　川贝母600 g

【制法】 以上二味，粉碎成细粉，过筛，混匀。另取生姜100 g，捣碎，加水适量压榨取汁，与上述粉末泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为米黄色的水丸；味微苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：淀粉粒广卵形或贝壳形，直径40～64 μm，脐点短缝状、人字状或马蹄状，层纹可察见。草酸钙针晶成束，长32～144 μm，存在于粘液细胞中或散在。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录1页)。

【功能与主治】 化痰止咳。用于痰多咳嗽。

【用法与用量】 口服，一次3～6 g，一日1～2次。

【贮藏】 密闭，防潮。

头　风　痛　丸

Toufengtong Wan

【处方】 白芷420 g　川芎60 g　绿茶30 g

【制法】 以上三味，粉碎成细粉，过筛，混匀，用水泛丸，晒干或低温干燥，即得。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 本品为灰白色的水丸；气芳香，味微辛。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：淀粉粒复粒由 8～12 粒组成。木栓细胞黄棕色，壁薄，微波状弯曲，多层重叠。非腺毛单细胞，较细长，直径 9～14 μm，壁厚，木化。

(2) 取本品 5 g，研细，加乙醚 10 ml，振摇，浸渍 20 分钟，取上清液，滤过，挥去乙醚，残渣加乙醇 3 ml 使溶解。取醇液 1 ml，加 7% 盐酸羟胺的甲醇溶液与 20% 氢氧化钾的甲醇溶液各 2 滴，置水浴上微热，冷却后，加 6 *N* 盐酸使成酸性，滤过，滤液加三氯化铁试液 1～2 滴，显紫红色。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录 1 页）。

【功能与主治】 祛风止痛。用于偏头痛，眉棱骨痛，额窦炎。

【用法与用量】 口服，一次 6～9 g，一日 2 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

耳聋佐磁丸

Erlong Zuoci Wan

【处方】 磁石(煅)20 g　熟地黄 160 g　山茱萸(制)80 g　牡丹皮 60 g
山药 80 g　茯苓 60 g　泽泻 60 g　竹叶柴胡 20 g

【制法】 以上八味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 35～50 g 与适量的水泛丸，干燥；或加炼蜜 90～110 g 制成小蜜丸或大蜜丸，即得。

【性状】 本品为棕黑色的水蜜丸、黑褐色的小蜜丸或大蜜丸；味甜、微酸。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。果皮表皮细胞橙黄色，表面观类多角形，垂周壁连珠状增厚。木栓细胞淡红色至微紫色，壁稍厚。薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色颗状物。薄壁细胞类圆形，有椭圆形纹孔，集成纹孔群。草酸钙针晶束存在于粘液细胞中，长 80～240 μm，针晶直径 2～8 μm。油管含黄色或棕黄色分泌物。

(2) 取本品约 0.1 g，加稀盐酸 5 ml，充分搅匀，加热煮沸 2～3 分钟，滤过，滤液显铁盐的鉴别反应(附录 41 页)。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 滋肾平肝。用于肝肾阴虚，耳鸣耳聋，头晕目眩。

【用法与用量】 口服，水蜜丸一次 6～9 g，小蜜丸一次 9 g，大蜜丸一次 1 丸；一

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

日 2 次。

【规格】 大蜜丸每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

芝蕉枯痔液

Zhijiao Kuzhiye

【处方】 山芝麻 4000 g　芭蕉叶(炭)500 g　石灰浆(比重约 1.5)500 ml
氢氧化钠适量

【制法】 取山芝麻，洗净，切片，加水煎煮二次，每次 1 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至适量，加芭蕉叶炭，充分搅拌，静置使沉淀，滤过。滤液浓缩后加入石灰浆，搅匀，蒸干，研细。按每 1 g干燥物加入新制的石灰澄清溶液 2.2 ml，浸渍，加热，再加活性炭脱色，滤过，滤液中加 50%氢氧化钠溶液，使溶液每 100 ml 约含氢氧化钠 1.5 g，热压加热 30 分钟，在冷处放置 1～2 天，滤过，灌封，灭菌，即得。

【性状】 本品为无色或淡黄色澄明液体。

【鉴别】 (1) 取本品 1 ml，加 $N/10$ 硫酸液使成酸性，加高锰酸钾试液 1 滴，振摇，红色即消失。

(2) 取本品 1 ml，加稀盐酸使成酸性，用毛细管吸取，点于滤纸上，依次滴加或喷洒 1%三氯化铁溶液与 1%铁氰化钾溶液，即显蓝色斑点。

(3) 本品显碳酸盐的鉴别反应(附录 42 页)。

【检查】 **碱度** 取本品 1 ml，加新沸过的冷水 5 ml 与甲基橙指示液 1 滴，用 $N/10$ 盐酸液滴定，消耗 $N/10$ 盐酸液应为 3～5 ml。

重金属 取本品 1 ml，加水使成 23 ml，摇匀，加稀醋酸 2 ml，依法检查(附录 46 页第一法)，含重金属不得过百万分之十。

砷盐 取本品 1 ml，加硝酸 0.4 ml 与硫酸 0.4 ml，缓缓炽灼，至黄烟消失，加水 1 ml，蒸干至产生白烟，加盐酸 5 ml 与水 23 ml，依法检查(附录 47 页)，含砷量不得过百万分之三。

【功能与主治】 枯痔消炎。用于痔疮。

【用法与用量】 局部注射，按痔核大小，每个痔核注入 0.5～2 ml，视痔核变灰黑色为度。

【贮藏】 置耐碱容器内，遮光，密闭保存。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

再　造　丸

Zaizao Wan

【处方】

蕲蛇肉 20 g	全蝎 15 g	地龙 5 g	僵蚕(炒)10 g
穿山甲(制)10 g	虎骨(制)10 g	麝香 5 g	水牛角浓缩粉 15 g
牛黄 2.5 g	龟板(制)10 g	朱砂 10 g	天麻 20 g
防风 20 g	羌活 20 g	白芷 20 g	川芎 20 g
葛根 15 g	麻黄 20 g	肉桂 20 g	细辛 10 g
附子(制)10 g	油松节 10 g	桑寄生 20 g	骨碎补(炒) 10 g
威灵仙(酒炒)15 g	革薢 20 g	当归 10 g	赤芍 10 g
片姜黄 2.5 g	血竭 7.5 g	三七 5 g	乳香(制) 10 g
没药(制)10 g	人参 20 g	黄芪 20 g	白术(炒) 18 g
茯苓 10 g	甘草 20 g	竹黄 10 g	首乌(制) 20 g
熟地黄 20 g	玄参 20 g	黄连 20 g	大黄 20 g
橘红 40 g	青皮(醋炒) 10 g	沉香 10 g	檀香 5 g
广藿香 20 g	母丁香 10 g	冰片 2.5 g	乌药 10 g
豆蔻 10 g	草豆蔻 20 g	香附(醋制)10 g	
竹节香附(醋制)20 g	建曲 40 g	红曲 5 g	

【制法】 以上五十八味，除麝香、水牛角浓缩粉、牛黄、冰片外，朱砂水飞或粉碎成极细粉；其余蕲蛇肉等五十三味粉碎成细粉；将麝香、水牛角浓缩粉、牛黄、冰片研细，与上述粉末配研，过筛，混匀。每 100 g粉末加炼蜜 120～150 g制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为棕褐色的大蜜丸；气香，味微甘、苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。油管含金黄色分泌物。纤维束鲜黄色，壁稍厚，纹孔明显。纤维成束，深棕色或红棕色，壁厚。纤维成束，周围细胞中含草酸钙方晶，形成晶纤维，含晶细胞的壁木化增厚。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。纤维成束或散离，多碎断，壁厚，表面有纵裂纹，两端断裂成帚状或较平截。气孔特异，保卫细胞侧面观似电话筒状。内种皮石细胞黄棕色或红棕色，表面观类多角形，壁厚，胞腔含硅质块。石细胞类圆形或类长方形，壁一面菲薄。石细胞黄棕色或无色，类

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

长方形、类圆形或形状不规则，直径约至 94 μm。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。草酸钙针晶细小，不规则地充塞于薄壁细胞中。非腺毛 1～6 细胞，壁有疣状突起。薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。薄壁细胞中充满棕色至红棕色物。具缘纹孔管胞成束，直径约 25 μm。不规则肌肉纤维块片淡棕色，密布有整齐的波状纹理。体壁碎片淡黄色至黄色，有网状纹理及圆形毛窝，有时可见棕褐色刚毛。鳞甲碎片无色，有大小不等圆孔。无定形团块淡黄棕色，埋有细小方形结晶。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 祛风化痰，活血通络。用于中风，口眼歪斜，半身不遂，手足麻木、疼痛、拘挛，言语不清。

【用法与用量】 口服，一次 1 丸，一日 2 次。

【注意】 孕妇忌服。

【规格】 每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

西　黄　丸

Xihuang Wan

【处方】 牛黄 15 g　麝香 75 g　乳香(制)500 g　没药(制)500 g

【制法】 以上四味，除牛黄、麝香外，另取黄米 350 g，蒸熟烘干，与乳香、没药粉碎成细粉；将牛黄、麝香研细，与上述粉末配研，过筛，混匀。用水泛丸，阴干，即得。

【性状】 本品为褐色至深褐色的水丸；气芳香，味微苦。

【鉴别】 (1)取本品，置显微镜下观察：无定形团块淡黄棕色，埋有细小方形结晶。不规则团块无色或淡黄色，表面及周围扩散出众多细小颗粒，久置溶化。不规则碎块淡黄色，半透明，渗出油滴，加热后油滴溶化，现正方形草酸钙结晶。

(2) 取本品约 2 g，研细，加氯仿 10 ml，充分振摇，滤过，滤液置水浴上稍浓缩，放冷，缓缓加等量的硫酸，两液接界处显红色环。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录 1 页）。

【功能与主治】 解毒散结，消肿止痛。用于痈疽疮疡，多发性脓肿，淋巴结炎，寒性脓疡。

【用法与用量】 口服，一次 3～6 g，一日 1 次。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 密封。

百合固金丸

Baihe Gujin Wan

【处方】 百合 100 g　地黄 200 g　熟地黄 300 g　麦冬 150 g　玄参 80 g
川贝母 100 g　当归 100 g　白芍 100 g　桔梗 80 g　甘草 100 g

【制法】 以上十味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 20～30 g 与适量的水泛丸，干燥；或加炼蜜 70～90 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为黑褐色的水蜜丸或大蜜丸；味微甜。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：联结乳管直径 14～25 μm，含淡黄色颗粒状物。石细胞类方形或长方形，直径 30～64 μm，壁较厚，有时一边薄，纹孔细密。石细胞黄棕色或无色，类长方形、类圆形或形状不规则，直径约至 94 μm。草酸钙簇晶直径 18～32 μm，存在于薄壁细胞中，常排列成行，或一个细胞中含有数个簇晶。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录 1 页）。

【功能与主治】 养阴，润肺止咳。用于肺肾阴虚，燥咳痰中带血，咽喉干痛。

【用法与用量】 口服，水蜜丸一次 6 g，大蜜丸一次 1 丸；一日 2 次。

【规格】 大蜜丸每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

当归龙荟丸

Danggui Longhui Wan

【处方】 当归(酒炒) 100 g　龙胆(酒炒)100 g　芦荟 50 g　青黛 50 g
栀子 100 g　黄连(酒炒)100 g　黄芩(酒炒)100 g　黄柏(盐炒)100g
大黄(酒炒) 50 g　木香 25 g　麝香 5 g

【制法】 以上十一味，除麝香外，当归等十味粉碎成细粉，将麝香研细，与上述粉

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

末配研，过筛，混匀。用水泛丸，阴干，即得。

【性状】 本品为黄绿色至深褐色的水丸；气微，味苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。纤维束鲜黄色，壁稍厚，纹孔明显。纤维束鲜黄色，周围细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维，含晶细胞的壁木化增厚。纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。种皮石细胞黄色或淡棕色，多破碎，完整者长多角形、长方形或形状不规则，壁厚，有大的圆形纹孔，胞腔棕红色。草酸钙簇晶大，直径60～140 μm。无定形团块淡黄棕色，埋有细小方形结晶。不规则块片或颗粒蓝色。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录1页)。

【功能与主治】 泻火通便。用于肝胆火旺，心烦不宁，头晕目眩，耳鸣耳聋，大便秘结。

【用法与用量】 口服，一次6 g，一日2次。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 密封。

朱砂安神丸

Zhusha Anshen Wan

【处方】 朱砂200 g　黄连300 g　地黄200 g　当归200 g　甘草100 g

【制法】 以上五味，朱砂水飞或粉碎成极细粉；其余黄连等四味粉碎成细粉，与上述粉末配研，过筛，混匀。每100 g粉末加炼蜜35～45 g与适量的水泛丸，干燥；或加炼蜜90～110 g制成小蜜丸或大蜜丸，即得。

【性状】 本品为红棕色的水蜜丸、小蜜丸或大蜜丸；味苦、微甜。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：纤维束鲜黄色，壁稍厚，纹孔明显。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。不规则细小颗粒暗棕红色，有光泽，边缘暗黑色。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录1页)。

【功能与主治】 镇惊安神，清心养血。用于心神不宁，失眠多梦，心悸易惊，胸中烦热。

【用法与用量】 口服，水蜜丸一次6 g，小蜜丸一次9 g，大蜜丸一次1丸；一日1～2

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

次。

【规格】 大蜜丸每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

伤湿止痛膏

Shangshi Zhitong Gao

【处方】 伤湿止痛流浸膏 50 g　水杨酸甲酯 15 g　薄荷脑 10 g　冰片 10 g
樟脑 20 g　芸香浸膏 12.5 g　颠茄流浸膏 30 g

【制法】 以上七味，伤湿止痛流浸膏系取生草乌、生川乌、乳香、没药、生马钱子、丁香各 1 份，肉桂、荆芥、防风、老鹳草、香加皮、积雪草、骨碎补各 2 份，白芷、山柰、干姜各 3 份，粉碎成粗粉，用 90 %乙醇制成比重约为 1.05 的流浸膏；按处方量称取各药，另加 3.7～4.0 倍重量由橡胶、松香等制成的基质，制成涂料。进行涂膏，切段，盖衬，切成小块，即得。

【性状】 本品为淡黄绿色至淡黄色的片状橡皮膏；气芳香。

【检查】 **含膏量** 取本品，除去贴面隔衬，精密称定重量，置有盖玻璃容器中，每张加乙醚 40 ml，浸泡 2～4 小时，将布洗后取出，再用乙醚洗三次(每次用乙醚 15 ml)，将布用 105°干燥半小时后，移置干燥器中放冷，精密称定重量，计算减失重量，按标示面积计算含膏量，每 100 cm^2应不低于 1.7 g。

【功能与主治】 祛风湿，活血止痛。用于风湿关节、肌肉痛，扭伤。

【用法与用量】 贴患处。

【注意】 孕妇慎用。

【贮藏】 密闭，避热。

行　军　散

Xingjun San

【处方】 姜粉 15 g　冰片 150 g　硼砂(炒) 150 g　硝石(精制) 9 g
雄黄 240 g　珍珠 150 g　牛黄 150 g　麝香 150 g

【制法】 以上八味，雄黄、珍珠分别水飞或粉碎成极细粉；硝石、硼砂粉碎成细粉；

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

将牛黄、麝香、冰片研细，与姜粉及上述粉末配研，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为淡黄色的粉末；气芳香，味辛凉。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：淀粉粒长卵形、广卵形或形状不规则，有的较小端略尖凸，直径 25～32 μm，长约至 50 μm。不规则碎块金黄色或橙黄色，有光泽。不规则碎块无色或淡绿色，半透明，具光泽，有时可见细密波状纹理。无定形团块淡黄棕色，埋有细小方形结晶。

(2) 取本品少量，进行微量升华，升华物置显微镜下观察，呈不定形的无色片状结晶。

(3) 取本品约 0.5 g，加水 5 ml，振摇，滤过。取滤液 2 ml，加盐酸使成酸性后，点于姜黄试纸上使润湿，即现橙红色，放置干燥，颜色变深，再用氨试液熏之，则变为绿黑色。

(4) 取铂丝，用盐酸润湿后，蘸取鉴别(3) 项下剩余的滤液，在无色火焰中燃烧，隔蓝色玻璃透视，火焰即显紫堇色。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录 3 页)。

【功能与主治】 辟瘟，解毒，开窍。用于夏伤暑热，头目眩晕，腹痛吐泻。

【用法与用量】 口服，一次 0.3～0.9 g，一日 1～2 次。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 密封。

冲服凉茶

Chongfu Liangcha

【处方】 岗梅 606 g　山芝麻 84 g　五指柑 114 g　淡竹叶 36 g　木蝴蝶 6 g
布渣叶 36 g　火炭母 90 g　金沙藤 204 g　广金钱草 54 g　金樱根 210 g

【制法】 以上十味，岗梅、山芝麻、五指柑、金樱根加水煎煮二次，第一次 3.5 小时，第二次 1.5 小时，其余淡竹叶等六味加水煎煮二次，第一次 2 小时，第二次 1 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩，喷雾干燥，即得。

【性状】 本品为棕色的粉末；味苦、微甘；易溶于水，溶液呈深棕色。

【功能与主治】 清热解暑，去湿生津。用于防治暑湿感冒，湿热积滞，发热喉痛，口干尿黄。

【用法与用量】 开水冲服，一次 3 g，一日 1～2 次。

【注意】 孕妇慎服。

【贮藏】 密封。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

冰　硼　散

Bingpeng San

【处方】 冰片 50 g　硼砂(炒) 500 g　朱砂 60 g　玄明粉 500 g

【制法】 以上四味，朱砂水飞或粉碎成极细粉，硼砂粉碎成细粉；将冰片研细，与上述粉末及玄明粉配研，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为粉红色的粉末；气芳香，味辛凉。

【鉴别】 (1) 取本品少量，进行微量升华，升华物置显微镜下观察，呈不定形的无色片状结晶。

(2) 取本品 0.5 g，加水 3 ml，振摇，滤过，滤液加盐酸使成酸性后，点于姜黄试纸上使润湿，即现橙红色，放置干燥，颜色变深，再用氨试液熏之，则变为绿黑色。

(3) 取本品约 1 g，置试管中，加水 10 ml，用力振摇，在试管底部很快出现朱红色沉淀。分取朱红色沉淀物少量，用盐酸湿润，在光洁的铜片上摩擦，铜片表面即显银白色光泽，加热烘烤后，银白色即消失。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录 3 页)。

【功能与主治】 解毒，消炎，止痛。用于咽喉、牙龈肿痛，口舌生疮。

【用法与用量】 吹敷患处，每次用少量。

【贮藏】 密封。

羊　胆　丸

Yangdan Wan

【处方】 羊胆干膏 53 g　百部 150 g　白及 200 g　浙贝母 100 g　甘草 60 g

【制法】 以上五味，甘草、白及分别粉碎成细粉；其余羊胆干膏等三味粉碎成细粉，过筛，混匀。取部分羊胆干膏等粉末起模，剩余的粉末与白及粉末混匀，用水泛丸，再用甘草粉末包衣，干燥，即得。

【性状】 本品为灰黄色的水丸；气微腥，味甘、苦。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察，淀粉粒卵圆形，直径 35～48 μm，脐点点状、人字状或马蹄状，位于较小端，层纹细密。草酸钙针晶成束，长 27～88 μm。纤维

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。导管旁木薄壁细胞类长方形，壁稍厚，有较大的圆形纹孔。

(2) 取本品粉末少量，加硫酸 2 滴，再加水 1 滴，显玫瑰红色。

【检查】 除崩解时限不检查外，其他应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 止咳化痰，止血。用于咳嗽，痰中带血，肺结核，百日咳。

【用法与用量】 口服，一次 3 g，一日 3 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

安　胃　片

Anwei Pian

【处方】 元胡(醋制) 63 g　白矾(煅)250 g　海螵蛸(去壳)187 g

【制法】 以上三味，粉碎成细粉，过筛，混匀，另取蜂蜜 125 g 与适量的水制成颗粒，压制成 1000 片，即得。

【性状】 本品为类白色至淡黄色的片；气微，味涩、微苦。

【鉴别】 (1) 取本品 5 片，研细，置烧瓶中，加乙醇 20 ml，在水浴上回流 10～15 分钟，放冷，滤过。将滤液点于滤纸上，置紫外光灯下观察，显黄绿色荧光。

(2) 取本品 2 片，研细，置试管中，加稀盐酸 10 ml，即泡沸，发放二氧化碳气体，此气遇氢氧化钙试液，即发生白色沉淀。将试管中的酸性液体滤过，取滤液 3 ml，加氨试液使成微碱性，即发生白色胶状沉淀，滤过。沉淀在盐酸、醋酸或过量的氢氧化钠试液中溶解；滤液中加草酸铵试液 2 滴，即发生白色沉淀，在盐酸中溶解，但在醋酸中不溶。

(3) 取本品 2 片，研细，置小烧杯中，加水 10 ml，充分搅拌，滤过。取滤液 2 ml，加氯化钡试液 2 滴，即发生白色沉淀，在盐酸或硝酸中均不溶解；另取滤液 2 ml，加亚硝酸钴钠试液 2 滴，即发生黄色沉淀。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(附录 6 页)。

【功能与主治】 制酸，止痛。用于胃及十二指肠溃疡，慢性胃炎。

【用法与用量】 口服，一次 5～7 片，一日 3～4 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

安宫牛黄丸

Angong Niuhuang Wan

【处方】 牛黄 100 g　水牛角浓缩粉 200 g　麝香 25 g　珍珠 50 g　朱砂 100 g　雄黄 100 g　黄连 100 g　黄芩 100 g　栀子 100 g　郁金 100 g　冰片 25 g

【制法】 以上十一味，除牛黄、水牛角浓缩粉、麝香、冰片外，朱砂、珍珠、雄黄分别水飞或粉碎成极细粉；其余黄连等四味粉碎成细粉；将牛黄、水牛角浓缩粉、麝香、冰片研细，与上述粉末配研，过筛，混匀。加适量炼蜜与水制成水蜜丸 600 粒，阴干；或加适量炼蜜制成大蜜丸 600 粒，即得。

【性状】 本品为黄橙色至红褐色的大粒水蜜丸或大蜜丸；气芳香浓郁，味微苦。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：糊化淀粉粒团块几无色。种皮石细胞黄色或淡棕色，多破碎，完整者长多角形、长方形或形状不规则，壁厚，有大的圆形纹孔，胞腔棕红色。纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。纤维束鲜黄色，壁稍厚，纹孔明显。不规则细小颗粒暗棕红色，有光泽，边缘暗黑色。不规则碎块无色或淡绿色，半透明，有光泽，有时可见细密波状纹理。不规则碎块金黄色或橙黄色，有光泽。无定形团块淡黄棕色，埋有细小方形结晶。

(2) 取本品少量，进行微量升华，升华物置显微镜下观察，呈不定形的无色片状结晶。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 清热解毒，镇惊，开窍。用于热病高热，昏迷，惊厥及脑炎、脑膜炎、中毒性脑病、脑出血、败血症等具有上述症状者。

【用法与用量】 口服，一次 1 丸，一日 1 次；小儿三岁以内一次 1/4 丸，四至六岁一次 1/2 丸，或按医嘱。

【注意】 孕妇慎服。

【贮藏】 密闭，防潮。

安宫牛黄散

Angong Niuhuang San

【处方】 牛黄 100 g　水牛角浓缩粉 200 g　麝香 25 g　珍珠 50 g　朱砂 100 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

雄黄 100 g　黄连 100 g　黄芩 100 g　栀子 100 g　郁金 100 g　冰片 25 g

【制法】 以上十一味，除牛黄、水牛角浓缩粉、麝香、冰片外，朱砂、珍珠、雄黄分别水飞或粉碎成极细粉；其余黄连等四味粉碎成细粉；将牛黄、水牛角浓缩粉、麝香、冰片研细，与上述粉末配研，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为黄色至黄橙色的粉末；气芳香浓郁，味苦。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：糊化淀粉粒团块几无色。种皮石细胞黄色或淡棕色，多破碎，完整者多角形、长方形或形状不规则，壁厚，有大的圆形纹孔，胞腔棕红色。纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。纤维束鲜黄色，壁稍厚，纹孔明显。不规则细小颗粒暗棕红色，有光泽，边缘暗黑色。不规则碎块无色或淡绿色，半透明，有光泽，有时可见细密波状纹理。不规则碎块金黄色或橙黄色，有光泽。无定形团块淡黄棕色，埋有细小方形结晶。

(2) 取本品少量，进行微量升华，升华物置显微镜下观察，呈不定形的无色片状结晶。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录 3 页)。

【功能与主治】 清热解毒，镇惊，开窍。用于热病高热，昏迷，惊厥及脑炎、脑膜炎、中毒性脑病、脑出血、败血症等具有上述症状者。

【用法与用量】 口服，一次 1 瓶，一日 1 次；小儿三岁以内一次 1/4 瓶，四至六岁一次 1/2 瓶，或按医嘱。

【注意】 孕妇慎服。

【规格】 每瓶重 1.6 g

【贮藏】 密封。

安神补心丸

Anshen Buxin Wan

【处方】 丹参 300 g　五味子(蒸) 150 g　石菖蒲 100 g　安神膏 560 g

【制法】 以上四味，丹参、五味子、石菖蒲三味粉碎成细粉；另取合欢皮、菟丝子、墨旱莲各 3 份、女贞子（蒸）4 份、首乌藤 5 份、地黄 2 份、珍珠母 20 份，混合，加水煎煮二次，第一次 3 小时，第二次 1 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至比重 1.21 (80～85°热测）制成安神膏。按处方量与上述粉末混合制丸，干燥，打光或包糖衣，即得。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 本品为棕褐色的浓缩丸或糖衣浓缩丸，除去糖衣后，显棕褐色；味涩、微酸。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：具缘纹孔导管直径 29～48 μm，具缘纹孔细密。种皮表皮石细胞淡黄棕色，表面观类多角形，壁较厚，孔沟细密，胞腔含暗棕色物。油细胞圆形，直径约至 50 μm，含黄色或黄棕色油状物。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 养心安神。用于心悸，失眠，头晕耳鸣。

【用法与用量】 口服，一次 15 粒，一日 3 次。

【规格】 每 15 粒重 2 g

【贮藏】 密闭，防潮。

导 赤 丸

Daochi Wan

【处方】 连翘 120 g　黄连 60 g　栀子(炒) 120 g　木通 60 g　玄参 120 g
天花粉 120 g　赤芍 60 g　大黄 60 g　黄芩 120 g　滑石 120 g

【制法】 以上十味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 120～140g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为黑褐色的大蜜丸；味甘、苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：淀粉粒类球形、半圆形或盔帽形，直径 27～48 μm，脐点点状、短缝状、人字状或星状，层纹隐约可见。石细胞黄棕色或无色，类长方形、类圆形或形状不规则，直径约至 94 μm，胞腔较大。种皮石细胞黄色或淡棕色，多破碎，完整者长多角形、长方形或形状不规则，壁厚，有大的圆形纹孔，胞腔棕红色。纤维束鲜黄色，壁稍厚，纹孔明显。纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。内果皮纤维上下层纵横交错，纤维短梭形。纤维管胞大多成束，有明显的具缘纹孔，纹孔口斜裂缝状或十字状。具缘纹孔导管非木化。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 清热泻火，利尿通便。用于口舌生疮，咽喉疼痛，心胸烦热，小便黄少，大便秘结。

【用法与用量】 口服，一次 1 丸，一日 2 次，周岁以内小儿酌减。

【规格】 每丸重 3 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【贮藏】 密闭，防潮。

阳和解凝膏

Yanghe Jiening Gao

【处方】 鲜牛蒡草 480 g(或干品 120 g)　鲜凤仙透骨草 40 g(或干品 10 g)
生川乌 20 g　桂枝 20 g　大黄 20 g　当归 20 g　生草乌 20 g　生附子 20 g
地龙 20 g　僵蚕 20 g　赤芍 20 g　白芷 20 g　白蔹 20 g　白及 20 g
川芎 10 g　续断 10 g　防风 10 g　荆芥 10 g　五灵脂 10 g　木香 10 g
香橼 10 g　陈皮 10 g　肉桂 20 g　乳香 20 g　没药 20 g　苏合香 40 g
麝香 10 g

【制法】 以上二十七味，除苏合香外，肉桂、乳香、没药粉碎成细粉，与麝香配研，过筛，混匀。其余牛蒡草等二十二味，酌予碎断，与食用植物油 2400 g 同置锅内炸枯，去渣，滤过，炼至滴水成珠；另取黄丹 750～1050 g，加入油内搅匀，收膏，将膏浸泡于水中。

取膏用文火熔化后，加入苏合香及上述粉末，搅匀，分摊于纸上，即得。

【性状】 本品为摊于纸上的黑膏药。

【检查】 应符合膏药项下有关的各项规定(附录 4 页)。

【功能与主治】 散寒湿，行气血。用于阴疽初起，多发性脓肿，淋巴结结核未溃，寒湿痹痛。

【用法与用量】 加温软化，贴于患处。

【规格】 每张净重(1) 1.5 g　(2) 3 g　(3) 6 g　(4) 9 g

【贮藏】 置阴凉干燥处。

防风通胜丸

Fangfeng Tongsheng Wan

【处方】 防风 50 g　荆芥穗 25 g　薄荷 50 g　麻黄 50 g　大黄 50 g　芒硝 50 g
栀子 25 g　滑石 300 g　桔梗 100 g　石膏 100 g　川芎 50 g　当归 50 g
白芍 50 g　黄芩 100 g　连翘 50 g　甘草 200 g　白术(炒) 25 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【制法】 以上十七味，除滑石外，其余防风等十六味粉碎成细粉，过筛，混匀。用水泛丸，干燥，将滑石粉碎成极细粉包衣，打光，干燥，即得。

【性状】 本品为白色至灰白色光亮的水丸；味甘、咸、微苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：油管含金黄色分泌物。草酸钙簇晶直径18～32 μm，存在于薄壁细胞中，常排列成行，或一个细胞中含有数个簇晶。草酸钙簇晶大，直径60～140 μm。草酸钙针晶细小，不规则地充塞于薄壁细胞中，气孔特异，保卫细胞侧面观似电话筒状。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。花萼表皮细胞淡黄色，垂周壁波状弯曲。联结乳管直径14～25 μm，含淡黄色颗粒状物。不规则片状结晶，无色，有平直纹理。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录1页)。

【功能与主治】 解表通里，清热解毒。用于外感内热，表里俱实，恶寒壮热，头痛咽干，大便秘结，小便黄少，疮疡初起，湿疹、荨麻疹瘙痒。

【用法与用量】 口服，一次6 g，一日2次。

【注意】 孕妇慎服。

【贮藏】 密闭，防潮。

妇女痛经丸

Funü Tongjing Wan

【处方】 元胡(醋制)300 g　丹参300 g　五灵脂(醋炒)300 g　蒲黄(炭)300 g

【制法】 以上四味，取五灵脂100 g，用水热浸，丹参加水煎煮二次，合并浸液及煎液，滤过，滤液浓缩；将剩余的五灵脂与元胡、蒲黄粉碎成细粉，过筛，混匀。用上述浓缩液泛丸，干燥，包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣浓缩丸，除去糖衣后，显黑棕色至黑褐色；味苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：厚壁组织碎片绿黄色，细胞类多角形或略延长，壁稍弯曲，有的连珠状增厚。花粉粒类圆形，直径约至30 μm，外壁有网状雕纹。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录1页)。

【功能与主治】 活血，调经，止痛。用于气血凝滞，小腹胀疼，经期腹痛。

【用法与用量】 口服，一次50粒，一日2次。

【注意】 孕妇忌服。

【规格】 每10粒重1.8 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【贮藏】 密闭，防潮。

妇科分清丸

Fuke Fenqing Wan

【处方】 当归 200 g　白芍 100 g　川芎 150 g　地黄 200 g　栀子 100 g　黄连 50g　石韦 50 g　海金沙 25 g　甘草 100 g　关木通 100 g　滑石 150 g

【制法】 以上十一味，石韦加水煎煮二次，滤过；其余当归等十味粉碎成细粉，过筛，混匀。用石韦煎液泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为黄色的水丸；味苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。草酸钙簇晶直径18～32 μm，存在于薄壁细胞中，常排列成行，或一个细胞含数个簇晶。纤维管胞大多成束，有明显的具缘纹孔，纹孔口斜裂缝状或十字状。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。纤维束鲜黄色，壁稍厚，纹孔明显。种皮石细胞黄色或淡棕色，多破碎，完整者长多角形、长方形或形状不规则，壁厚，有大的圆形纹孔，胞腔棕红色。孢子黄色，圆锥体状，表面有颗粒状突起。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 清利湿热，活血止痛。用于膀胱湿热，小便频数，尿道刺痛，尿路感染。

【用法与用量】 口服，一次 9 g，一日 2 次。

【注意】 孕妇慎服。

【贮藏】 密闭，防潮。

红灵散

Hongling San

【处方】 麝香 60 g　雄黄 120 g　朱砂 200 g　硼砂 120 g　金礞石(煅) 80 g　硝石(精制) 200 g　冰片 60 g

【制法】 以上七味，除麝香、冰片外，雄黄、朱砂水飞或粉碎成极细粉；其余硼砂

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

等三味粉碎成细粉；将麝香、冰片研细，与上述粉末配研，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为棕色至赤棕色的粉末；气芳香浓郁，味微苦。

【鉴别】 (1) 取本品少量，置光洁的铜片上，加盐酸数滴湿润后，用绸布用力摩擦，铜面即变为银白色。

(2) 取本品约 0.5 g，加硫酸混合后，加甲醇少量，点火燃烧，即发生边缘带绿色的火焰。

(3) 取本品 0.5～1.0 g，置瓷皿中，用表面皿覆盖，小火加热，有白色及红色升华物。放冷，取表面皿，嗅之有显著的凉感和香气。

(4) 取本品约 0.5 g，加水约 5 ml，加热，滤过。取滤液适量，置试管中，缓缓加硫酸 3 ml，放冷，沿管壁加硫酸亚铁试液，两液接界处显棕色环。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录 3 页)。

【功能与主治】 祛暑，开窍，辟瘟，解毒。用于中暑昏厥，头晕胸闷，腹痛吐泻。

【用法与用量】 口服，一次 0.6 g，一日 1 次。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 密封。

麦味地黄丸

Maiwei Dihuang Wan

【处方】 麦冬 60 g　五味子 40 g　熟地黄 160 g　山茱萸(制) 80 g　牡丹皮 60 g
山药 80 g　茯苓 60 g　泽泻 60 g

【制法】 以上八味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 35～50 g 与适量的水泛丸，干燥；或加炼蜜 80～110 g 制成小蜜丸或大蜜丸，即得。

【性状】 本品为棕黑色的水蜜丸、黑褐色的小蜜丸或大蜜丸；味微甜而酸。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：淀粉粒三角状卵形或矩圆形，直径 24～40 μm，脐点短缝状或人字状。不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。草酸钙针晶成束或散在，长 24～50 μm，直径约 3 μm。草酸钙簇晶存在于无色薄壁细胞中，有时数个排列成行。果皮表皮细胞橙黄色，表面类多角形，垂周壁略连珠状增厚。种皮表皮石细胞淡黄棕色，表面观类多角形，壁较厚，孔沟细密，胞腔含暗棕色物。薄壁细胞类圆形，有椭圆形纹孔，集成纹孔群。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录1页)。

【功能与主治】 滋养肺肾。用于肺肾阴虚，潮热盗汗，咳嗽咯血，头晕目眩，耳鸣口干，遗精，消渴。

【用法与用量】 口服，水蜜丸一次6 g，小蜜丸一次9 g，大蜜丸一次1丸；一日2次。

【规格】 大蜜丸每丸重9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

抗风湿合剂

Kangfengshi Heji

【处方】 章表根 1540 g　山龙眼 1540 g　如意花根 1026 g　龙舟花根 1026 g
过山风 1026 g　羊耳菊 1026 g　红蓖麻根 1026 g　芙蓉根 1026 g
丁公藤 200 g

【制法】 以上九味，切碎，加水煎煮二次，每次2小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至约2500 ml，静置，取上清液，再浓缩至约1000 ml，加适宜的防腐剂，搅拌使溶解，煮沸，放冷后，加水使成1000 ml，即得。

【性状】 本品为黑褐色澄明液体；味微苦。

【功能与主治】 活血通络，祛风除湿，消炎止痛。用于急、慢性风湿性关节炎，类风湿性关节炎。

【用法与用量】 口服，一次30 ml，一日1次。

【贮藏】 密封保存。

抗痨丸

Kanglao Wan

【处方】 矮地茶 500 g　百部 200 g　桑白皮 100 g　穿破石 200 g
五指毛桃 200 g　白及粉 200 g

【制法】 以上六味，除白及粉外，其余矮地茶等五味加水煎煮二次，每次3小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩成稠膏状，放冷，加白及粉，混匀，在60～80°干燥，粉碎

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

成细粉，过筛。每 100 g 粉末加炼蜜 60～65 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为褐黑色的大蜜丸；味微苦、甜。

【鉴别】 (1) 取本品 3 g(或 1 丸)，研碎，加乙醇 20 ml 与盐酸 2 滴，置水浴上回流半小时，滤过，取滤液 10 ml，滴加氨试液至中性，蒸干，加水 4 ml，温热使成混悬液。取混悬液 2 ml，加硫酸 1 滴，搅拌，滤过，滤液加碘化铋钾试液 2 滴，即发生红色沉淀。

(2) 取鉴别(1)项下剩余的混悬液 2 ml，加 20%醋酸铅溶液至不再产生沉淀，滤过，滤液中加无水碳酸钠使溶液的 pH 值约为 9，滤过，滤液加重氮对硝基苯胺试液数滴，即显红色或橙红色。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 活血止血，散瘀生新，祛痰止咳。用于浸润型肺结核，痰中带血。

【用法与用量】 口服，一次 1 丸，一日 3 次，小儿酌减。

【规格】 每丸重 3 g

【贮藏】 密闭，防潮。

苏 合 香 丸

Suhexiang Wan

【处方】

苏合香 50 g	安息香 100 g	冰片 50 g	水牛角浓缩粉 200 g
麝香 75 g	檀香 100 g	沉香 100 g	丁香 100 g
香附 100 g	木香 100 g	乳香(制) 100 g	荜茇 100 g
白术 100 g	诃子肉 100 g	朱砂 100 g	

【制法】 以上十五味，除苏合香、麝香、冰片、水牛角浓缩粉外，朱砂水飞或粉碎成极细粉；其余安息香等十味粉碎成细粉；将麝香、冰片、水牛角浓缩粉研细，与上述粉末配研，过筛，混匀。再将苏合香炖化，加适量炼蜜与水制成水蜜丸 960 粒，阴干；或加适量炼蜜制成大蜜丸 960 粒；即得。

【性状】 本品为赭红色的大粒水蜜丸或赭色的大蜜丸；气芳香，味微苦、辛。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：不定形团块淡黄棕色，埋有细小方形结晶。分泌细胞类圆形，含淡黄棕色至红棕色分泌物，其周围细胞作放射状环状。含晶细胞方形或长方形，壁厚，木化，胞腔含草酸钙方晶。木纤维淡黄色，壁稍厚，常伴有纹孔较细密的射线细胞。果皮纤维层淡黄色，斜向交错排列，壁较薄，有纹孔。花粉粒三角形，直径约

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

16 μm。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 芳香开窍，行气止痛。用于中风，中暑，痰厥昏迷，心绞痛。

【用法与用量】 口服，一次 1 丸，一日 1～2 次。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 密封。

杜仲降压片

Duzhong Jiangya Pian

【处方】 杜仲(炒) 469 g　黄芩 281 g　钩藤 281 g　夏枯草 281 g　益母草 469 g

【制法】 以上五味，黄芩粉碎成细粉，过筛；钩藤粉碎后，与黄芩粉碎后剩余的粗粉，照流浸膏剂与浸膏剂项下的浸渍法(附录 11 页)，用 75% 乙醇浸渍，滤过，滤液浓缩成稠膏；药渣加水煎煮二次，每次 2 小时，合并煎液，滤过。再将益母草、夏枯草与杜仲加水煎煮三次，第一次 3 小时，第二次 2 小时，第三次 1 小时，合并煎液，滤过，滤液与上述钩藤煎液合并，浓缩至比重约为 1.40(80～85° 热测)时，加上述钩藤稠膏与黄芩细粉，混匀，烘干，制成颗粒，压制成 1000 片，包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；味涩、微苦。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：韧皮纤维淡黄色，梭形，直径 9～33 μm，壁厚，孔沟细。

(2) 取本品 3 片，研细，加石油醚 5 ml 浸渍 1 小时，取浸出液 1 ml，自然挥干后，残渣加少量氯仿使溶解，加香草醛硫酸试液 1 滴，初显黄棕色，迅速变为红色、红褐色，最后呈紫褐色。

(3) 取本品 3 片，研细，加用冰醋酸酸化的乙醚 5 ml 浸渍，取浸出液 3 ml，自然挥干后，残渣加甲醇 1 ml 使溶解。溶液分置二支试管中，一管中加钼酸铵固体少量与硫酸 1 滴，初显棕黄色，后变紫红色；另一管中加三氯化铁试液，显灰褐色。

(4) 取鉴别(3)项下乙醚浸渍后的残渣，加乙醇 5 ml 浸渍 1 小时，分取浸出液 0.5 ml，加镁粉少量与盐酸数滴，待气泡消失后，溶液呈樱红色，加热煮沸颜色更为明显。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(附录 6 页)。

【功能与主治】 清肝热，降血压。用于高血压症。

【用法与用量】 口服，一次 5 片，一日 3 次。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【贮藏】 密封。

杞菊地黄丸

Qiju Dihuang Wan

【处方】 枸杞子 40 g　菊花 40 g　熟地黄 160 g　山茱萸(制) 80 g
牡丹皮 60 g　山药 80 g　茯苓 60 g　泽泻 60 g

【制法】 以上八味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 35～50 g 与适量的水泛丸，干燥；或加炼蜜 80～110 g 制成小蜜丸或大蜜丸，即得。

【性状】 本品为棕黑色的水蜜丸、黑褐色的小蜜丸或大蜜丸；味甜而酸。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：淀粉粒三角状卵形或矩圆形，直径 24～40 μm，脐点短缝状或人字状。不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。草酸钙簇晶存在于无色薄壁细胞中，有时数个排列成行。果皮表皮细胞橙黄色，表面观类多角形，垂周壁略连珠状增厚。薄壁细胞类圆形，有椭圆形纹孔，集成纹孔群。种皮石细胞淡黄色，壁波状弯曲，胞腔含棕色物。花粉粒类圆形，直径 24～34 μm，外壁有刺，长 3～5 μm，具 3 个萌发孔。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 滋肾养肝。用于肝肾阴虚，头晕目眩，耳鸣，畏光流泪，视物昏花。

【用法与用量】 口服，水蜜丸一次 6 g，小蜜丸一次 9 g，大蜜丸一次 1 丸；一日 2 次。

【规格】 大蜜丸每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

医痫丸

Yixian Wan

【处方】 生白附子 40 g　天南星(制) 80 g　半夏(制) 80 g　猪牙皂 400 g
僵蚕(炒) 80 g　乌梢蛇(制) 80 g　蜈蚣 2 g　全蝎 16 g
白矾 120 g　雄黄 12 g　朱砂 16 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【制法】 以上十一味，朱砂、雄黄分别水飞或粉碎成极细粉；其余生白附子等九味粉碎成细粉，与上述粉末配研，过筛，混匀。用水泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为棕色至棕褐色的水丸；味咸、涩、微腥。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 祛风化痰，定痫止搐。用于癫痫抽搐，时发时止。

【用法与用量】 口服，一次 3 g，一日 2 次，小儿酌减。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 密闭，防潮。

沉香化气丸

Chenxiang Huaqi Wan

【处方】 沉香 25 g　木香 50 g　广藿香 100 g　香附(醋制) 50 g
砂仁 50 g　陈皮 50 g　莪术(醋制) 100 g　六曲(炒) 100 g
麦芽(炒) 100 g　甘草 50 g

【制法】 以上十味，粉碎成细粉，过筛，混匀，用水泛丸，晒干或低温干燥，即得。

【性状】 本品为灰棕色至黄棕色的水丸；气香，味微甜、苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：糊化淀粉粒团块淡黄色。纤维管胞壁略厚，有具缘纹孔，纹孔口人字状或十字状。木纤维长梭形，直径 16～24 μm，壁稍厚，纹孔口横裂缝状、十字状或人字状。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。非腺毛 1～6 细胞，壁有疣状突起。分泌细胞类圆形，含淡黄棕色至红棕色分泌物。内种皮石细胞黄棕色或棕红色，表面观类多角形，壁厚，胞腔含硅质块。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。表皮细胞纵列，常由 1 个长细胞与 2 个短细胞相间连接，长细胞壁厚，波状弯曲，木化。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 宽中降气，消积。用于肝胃气滞，脘腹胀痛，胸胁痞满，不思饮食，嗳气泛酸。

【用法与用量】 口服，一次 3～6 g，一日 2 次。

【注意】 孕妇慎服。

【贮藏】 密闭，防潮。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

良　附　丸

Liangfu Wan

【处方】 高良姜 500 g　香附(醋制) 500 g

【制法】 以上二味，粉碎成细粉，过筛，混匀，用水泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为棕黄色至黄褐色的水丸；气微香，味辣。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：淀粉粒棒槌形、肾形或长卵形，长 24～44 μm 或更长，脐点点状、短缝状或三叉状。纤维成束，深棕色或红棕色，壁厚。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 温中，理气。用于寒凝气滞，胃痛呕吐，脘腹胀满。

【用法与用量】 口服，一次 3～6 g，一日 2 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

启　脾　丸

Qipi Wan

【处方】 人参 100 g　白术(炒) 100 g　茯苓 100 g　甘草 50 g
陈皮 50 g　山药 100 g　莲子(炒) 100 g　山楂(炒) 50 g
六曲(炒) 80 g　麦芽(炒) 50 g　泽泻 50 g

【制法】 以上十一味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 120～140 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为棕色的大蜜丸；味甜。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。草酸钙簇晶直径 20～68 μm，棱角锐尖。草酸钙针晶细小，长 10～32 μm，不规则地充塞于薄壁细胞中。草酸钙针晶束存在于粘液细胞中，长 80～240 μm，针晶直径 2～8 μm。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。种皮细胞黄棕色或红棕色，形状不规则。内皮层细胞垂周壁波状弯曲，较厚，木化，有稀疏细孔沟。果皮石细胞淡紫红色、红色或黄棕色，类圆形或多角形，直径约至 125 μm。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 健脾和胃。用于脾胃虚弱，消化不良，腹胀便溏。

【用法与用量】 口服，一次1丸，一日2～3次，三岁以内小儿酌减。

【规格】 每丸重3g

【贮藏】 密闭，防潮。

补中固经汤

Buzhong Gujing Tang

【处方】 紫珠叶30g 野牡丹15g 升麻8g 艾叶(醋炒)10g
赤石脂15g 桃金娘根15g 牛大力15g

【制法】 以上七味，加水煎煮二次，每次30分钟，滤过，合并滤液，加水使成400ml，搅匀，即得。

【性状】 本品为棕色的液体；味涩而苦甘。

【功能与主治】 补气益肾，固经止血。用于崩漏，先兆流产，产后恶露不净。

【用法与用量】 口服，一次200ml，一日2次。

【注意】 本品应临用新制。

补中益气丸

Buzhong Yiqi Wan

【处方】 黄芪(蜜炙)200g 党参60g 甘草(蜜炙)100g 白术(炒)60g
当归60g 升麻60g 柴胡60g 陈皮60g

【制法】 以上八味，粉碎成细粉，过筛，混匀。另取生姜20g、大枣40g分次加水煎煮，滤过，用煎出液泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为棕色的水丸；味微甜带辛。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：纤维成束或散离，壁厚，表面有纵裂纹，两端断裂成帚状或较平截。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。草酸钙针晶细小，长10～32μm，不规则地充塞于薄壁细胞中。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。联结乳管直径12～15μm，含细小颗粒状物。薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。油管含黄色或棕黄色分泌物。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录1页)。

【功能与主治】 调补脾胃，益气升阳。用于脾胃虚弱，中气下陷，体倦乏力，食少，久泻，脱肛，子宫脱垂。

【用法与用量】 口服，一次6 g，一日2～3次。

【贮藏】 密闭，防潮。

补 心 丸

Buxin Wan

【处方】

丹参 25 g	当归 50 g	石菖蒲 25 g	党参 25 g
茯苓 25 g	五味子 50 g	麦冬 50 g	天冬 50 g
地黄 200 g	玄参 25 g	远志(制) 25 g	酸枣仁(炒) 50 g
柏子仁 50 g	桔梗 25 g	甘草 25 g	朱砂 10 g

【制法】 以上十六味，朱砂水飞或粉碎成极细粉；其余丹参等十五味粉碎成细粉，与上述粉末配研，过筛，混匀。每100 g粉末加炼蜜20～30 g与适量的水泛丸，干燥；或加炼蜜50～70 g制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为棕黑色的水蜜丸或褐黑色的大蜜丸；气微香，味甜微苦，略有刺喉感。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径4～6 μm。石细胞斜方形或多角形，一端稍尖，壁较厚，纹孔稀疏。石细胞黄棕色或无色，类长方形、类圆形或形状不规则，直径约至94 μm。石细胞长方形或长条形，直径50～110 μm，纹孔极细密。种皮表皮石细胞淡黄棕色，表面观类多角形，壁较厚，孔沟细密，胞腔含暗棕色物。草酸钙针晶成束或散在，长24～50 μm，直径约3 μm。木栓细胞红棕色，多角形，壁薄。联结乳管直径14～25 μm，含淡黄色颗粒状物。薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。油细胞圆形，含黄色或黄棕色油状物。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。内种皮细胞棕黄色，表面观长方形或类方形，垂周壁连珠状增厚。不规则细小颗粒暗棕红色，有光泽，边缘暗黑色。

(2) 取本品1 g(或半丸)，捣碎，平铺于坩埚中，上盖一长柄漏斗，徐徐加热，至粉末微焦时停止加热，放冷，取下漏斗，用水5 ml冲洗内壁，洗液置紫外光灯下观察，显淡蓝绿色荧光。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

(3) 取本品 1 g（或半丸），用水淘洗，得少量朱红色沉淀，取出，用盐酸湿润，在光洁铜片上轻轻摩擦，铜片表面即显银白色光泽，加热烘烤后，银白色即消失。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录 1 页）。

【功能与主治】 养心，安神。用于心阴不足，心悸失眠，多梦，健忘，口舌生疮。

【用法与用量】 口服，水蜜丸一次 6 g，大蜜丸一次 1 丸；一日 2 次。

【规格】 大蜜丸每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

补益豆蔻丸

Buyi Doukou Wan

本品系蒙古族验方，蒙古文名为 ᠪᠤᠶᠢ ᠳᠤᠤᠭᠤᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ （图力吉·苏格木勒·道洛）。

【处方】 豆蔻 300 g　黄精 50 g　白及 50 g　手参 50 g

丁香 50 g　沉香 50 g　肉豆蔻 50 g

【制法】 以上七味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 100～110 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为黑褐色的大蜜丸；气香，味微苦、辛。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：内种皮石细胞黄棕色或棕红色，表面观类多角形，壁厚，胞腔含硅质块。花粉粒三角形，直径约 16 μm。纤维管胞壁稍厚，有具缘纹孔，纹孔口人字状或十字状。脂肪油滴甚多，放置后析出针簇状结晶。

(2) 取本品约 2 g，加氯仿 10 ml，浸 15 分钟，吸取氯仿液 2～3 滴，置载玻片上，迅即加 3%氢氧化钠的氯化钠饱和溶液 1 滴，加盖玻片，置显微镜下观察，可见成簇的细针状结晶。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录 1 页）。

【功能与主治】 调经养血，暖宫止带。用于月经不调，经期腹痛，赤白带下。

【用法与用量】 口服，一次 1 丸，一日 2 次。

【规格】 每丸重 6 g

【贮藏】 密闭，防潮。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

局方至宝散

Jufang Zhibao San

【处方】 水牛角浓缩粉 200 g　牛黄 50 g　玳瑁 100 g　麝香 10 g　朱砂 100 g
雄黄 100 g　琥珀 100 g　安息香 150 g　冰片 10 g

【制法】 以上九味，玳瑁、安息香、琥珀分别粉碎成细粉；朱砂、雄黄分别水飞或粉碎成极细粉，将水牛角浓缩粉、牛黄、麝香、冰片研细，与上述粉末配研，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为橘黄色至浅褐色的粉末；气芳香浓郁，味微苦。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定（附录 3 页）。

【功能与主治】 清热解毒，芳香开窍，定惊。用于温病高热，神昏，谵语，惊厥，脑血管意外、肝昏迷及各种急性热病具有上述症状者。

【用法与用量】 口服，一次 2 g，一日 1 次；小儿三岁以内一次 0.5 g，四至六岁一次 1 g，或按医嘱。

【注意】 孕妇慎服。

【规格】 每瓶重 2 g

【贮藏】 密封。

阿魏化痞膏

Awei Huapi Gao

【处方】 香附 20 g　厚朴 20 g　三棱 20 g　莪术 20 g　当归 20 g
生草乌 20 g　生川乌 20 g　大蒜 20 g　使君子 20 g　白芷 20 g
穿山甲 20 g　木鳖子 20 g　蜣螂 20 g　胡黄连 20 g　大黄 20 g
蓖麻子 20 g　乳香 3 g　没药 3 g　芦荟 3 g　血竭 3 g
雄黄 15 g　肉桂 15 g　樟脑 15 g　阿魏 20 g

【制法】 以上二十四味，除阿魏、樟脑外，乳香、没药、芦荟、血竭、肉桂粉碎成细粉，雄黄水飞或粉碎成极细粉，与上述粉末配研，过筛，混匀。其余香附等十六味酌予碎断，与食用植物油 2400 g 同置锅内炸枯，去渣，滤过，炼至滴水成珠；另取黄丹 750～1050 g，加入油内搅匀，收膏，将膏浸泡于水中。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

取膏用文火熔化，将阿魏、樟脑及上述粉末加入搅匀，分摊于布上，即得。

【性状】 本品为摊于布上的黑膏药。

【检查】 应符合膏药项下有关的各项规定(附录 4 页)。

【功能与主治】 化痞消积。用于气滞血凝，腹部肿块，肝脾肿大，胸胁胀满。

【用法与用量】 加温软化，贴于脐上或患处。

【注意】 孕妇忌用。

【规格】 每张净重(1) 6 g (2) 12 g

【贮藏】 置阴凉干燥处。

附 子 理 中 丸

Fuzi Lizhong Wan

【处方】 附子(制)100 g 党参 200 g 白术(炒)150 g 干姜 100 g 甘草 100 g

【制法】 以上五味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 35～50 g 与适量的水泛丸，干燥；或加炼蜜 100～120 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为棕黑色的水蜜丸或黑褐色的大蜜丸；气微，味微甜而辛辣。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：淀粉粒长卵形、广卵形或形状不规则，有的较小端略尖凸，直径 25～32 μm，长约至 50 μm，脐点点状，位于较小端。糊化淀粉团块类白色。联结乳管直径 12～15 μm，含细小颗粒状物。草酸钙针晶细小，长 10～32 μm，不规则地充塞于薄壁细胞中。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录 1 页）。

【功能与主治】 温中，健脾。用于脾胃虚寒，脘腹冷痛，呕吐泄泻，手足不温。

【用法与用量】 口服，水蜜丸一次 6 g，大蜜丸一次 1 丸；一日 2～3 次。

【注意】 孕妇慎服。

【规格】 大蜜丸每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

妙 济 丸

Miaoji Wan

【处方】 黑木耳(醋制) 300 g 当归 32 g 白芍(酒炒) 10 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

川芎 12 g	木瓜 16 g	杜仲(盐炒) 20 g
续断 32 g	川牛膝(酒蒸) 32 g	苍术 32 g
小茴香(盐炒) 8 g	木香 6 g	丁香 6 g
母丁香 6 g	乳香(制) 8 g	茯苓 50 g
土茯苓 32 g	龟板(制) 50 g	

【制法】 以上十七味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 200 g、酥油(加热熔化后滤过)16.6 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为黑褐色的大蜜丸；气特异，味微甜，后苦辛。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。草酸钙针晶束长 40～144 μm。草酸钙针晶细小，长 10～32 μm，不规则地充塞于薄壁细胞中。草酸钙簇晶直径 18～32 μm，存在于薄壁细胞中，常排列成行，或一个细胞中含有数个簇晶。草酸钙簇晶细小，直径 7～11 μm，存在于薄壁细胞中，常排列成行。草酸钙砂晶存在于薄壁细胞中。橡胶丝呈条状或扭曲成团，表面带颗粒性。不规则块片灰黄色，表面有微细纹理或孔隙。子实体碎片淡灰棕色至棕褐色，菌丝错综交织。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 强筋壮骨，祛湿通络，活血止痛。用于四肢麻木拘挛，骨节疼痛，腰腿酸软。

【用法与用量】 用黄酒送服，一次 1～2 丸，一日 2 次。

【规格】 每丸重 6 g

【贮藏】 密闭，防潮。

鸡 血 藤 膏

Jixueteng Gao

【处方】 滇鸡血藤煎膏 500 g　鲜川牛膝 75 g　鲜续断 75 g　红花 2 g　黑豆 5 g

【制法】 以上五味，除滇鸡血藤煎膏(比重 1.06～1.08)外，其余鲜川牛膝、鲜续断、红花、黑豆等四味加水煎煮三次，每次 2～3 小时，滤过，合并煎液，加入滇鸡血藤煎膏，煮沸，逐渐加入糯米浆(取糯米 380 g，用水浸泡后磨成米浆)，不断搅拌 5 分钟，再用文火加热浓缩，至挂片呈丝状，加入饴糖 120 g，拌匀，晒干或阴干，即得。

【性状】 本品为黑色的干膏块；气糊香，味涩、微苦而后略甜。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【鉴别】 取本品约 2 g，加水 20 ml 温浸，滤过，滤液照下述方法试验：

（1）取滤液数滴，加水 4 ml 稀释后，加 1%三氯化铁的乙醇溶液 1～2 滴，即显暗黑色。

（2）取滤液数滴，加水 4 ml 稀释后，分置二支试管中，一管加盐酸 0.5 ml，置水浴上加热 10 分钟，与另一管比较，显明显的红色。

（3）取滤液数滴，加水 4 ml 稀释后，分置二支试管中，一管加浓氨试液 0.5 ml，与另一管比较，显棕黄色。

【检查】 **干燥失重** 取本品，用 105°干燥至恒重，减失重量不得过 14.0%（附录 44页）。

【功能与主治】 补血，活血，调经，壮筋骨。用于贫血，手足麻木，关节酸痛，月经不调，白带。

【用法与用量】 将膏研碎，用水、酒各半炖化服，一次 9～15 g，一日 2 次。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防潮。

驱寒止痛砂

Quhan Zhitongsha

【处方】 当归 37.5 g　川芎 50 g　防风 50 g　透骨草 50 g　铁屑 10 kg

【制法】 以上五味，除铁屑外，其余当归等四味煎煮二次，第一次加入米醋 600 g 与 3 倍药量的水煮沸 2 小时，滤过，滤渣加水适量同前法煎煮，滤过，合并滤液。将铁屑置炉内煅至变为暗红色时取出，立即将上述滤液倒入铁屑中，搅匀，晾干，粉碎成粗粉，过筛，即得。

【性状】 本品为黑褐色的粗粉；质重，稍有醋的酸气。

【检查】 **热效应** 取本品约 250 g，置烧杯内，加 3.5%醋酸 15 ml，，拌匀，装入适宜布袋中，插入温度计，使水银球置于中央，扎紧袋口，适以能透入空气为度，置木质台面上，用毛巾覆盖三层，数分钟后，开始升温，最高温度不得低于 75°。

【功能与主治】 驱寒止痛。用于腰腿、脘腹冷痛。

【用法与用量】 每 250 g 加米醋 15 g，立即拌匀，装入布袋，外包棉垫，待发热后，熨患处，药凉后取下。再用时仍按前法拌醋，可反复使用数次，每日熨患处 1～3 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

坤　顺　丸

Kunshun Wan

【处方】 熟地黄 80 g　地黄 80 g　白芍 80 g　当归 80 g　川芎 80 g　人参 40 g　白术 80 g　茯苓 80 g　甘草 40 g　益母草 40 g　黄芩 80 g　牛膝 40 g　橘红 80 g　沉香 40 g　木香 16 g　砂仁 40 g　琥珀 40 g

【制法】 以上十七味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 110～130 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为黑褐色的大蜜丸；味微苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。草酸钙簇晶直径 18～32 μm，存在于薄壁细胞中，常排列成行，或一个细胞中含数个簇晶。草酸钙针晶细小，长 10～32 μm，不规则地充塞于薄壁细胞中。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。螺纹导管直径 8～23 μm，加厚壁互相连接，似网状螺纹导管。内种皮石细胞黄棕色或棕红色，表面观类多角形，壁厚，胞腔含硅质块。非腺毛 1～3 细胞，稍弯曲，壁有疣状突起。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录 1 页）。

【功能与主治】 调经养血。用于月经不调，经痛，腰腿酸痛，经期浮肿。

【用法与用量】 口服，一次 1 丸，一日 2 次。

【规格】 每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

拔云退翳丸

Boyun Tuiyi Wan

【处方】 密蒙花 80 g　蒺藜(盐炒)60 g　菊花 20 g　木贼 80 g　蛇蜕 12 g　蝉蜕 20 g　荆芥穗 40 g　蔓荆子 80 g　薄荷 20 g　当归 60 g　川芎 60 g　黄连 20 g　地骨皮 40 g　花椒 28 g　楮实子 20 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

天花粉 24 g　甘草 12 g

【制法】 以上十七味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 140～160 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为黑褐色至黑色的大蜜丸；气芳香，味苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：花粉粒类圆形，直径 24～30 μm，外壁有刺，长 3～5 μm，具 3 个萌发孔。宿萼表皮非腺毛 2～3 细胞，顶端细胞的基部稍粗，壁有疣状突起。星状毛基部 2 细胞，单列，顶端 2 细胞各 2 分叉，成 4 叉状，每分叉长 250～500 μm。内果皮石细胞淡黄棕色，表面观形状不规则，垂周壁波状弯曲。果皮纤维上下层纵横交错排列。草酸钙簇晶直径 12～24 μm，存在于果皮细胞中。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。纤维束鲜黄色，壁稍厚，纹孔明显。表皮细胞长方形，壁厚，密波状弯曲，内含砂粒状硅酸盐结晶；气孔特异，保卫细胞壁放射状增厚。具缘纹孔导管大，多破碎，有的具缘纹孔六角形或斜方形，排列紧密。几丁质皮壳碎片淡黄棕色，半透明，密布乳头状或短刺状突起。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录 1 页）。

【功能与主治】 散风明目，消障退翳。用于目翳外障，视物不清，隐痛流泪。

【用法与用量】 口服，一次 1 丸，一日 2 次。

【注意】 忌食辛辣物。

【规格】 每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

虎　骨　酒

Hugu Jiu

【处方】

虎骨 80 g	薏苡仁 80 g	草藤 80 g	淫羊藿 80 g	熟地黄 80 g
陈皮 80 g	玉竹 80 g	牛膝 80 g	当归 5 g	五加皮 5 g
青皮 5 g	川芎 5 g	白芍 5 g	草乌(制) 5 g	木瓜 5 g
枸杞子 5 g	红花 5 g	紫草 5 g	川乌(制) 5 g	续断 5 g
羌活 5 g	苍术 5 g	独活 5 g	白芷 5 g	补骨脂 5 g
蕲蛇 5 g	杜仲 5 g	乌药 5 g	防风 5 g	牡丹皮 5 g
佛手 5 g	人参 5 g	砂仁 5 g	檀香 5 g	肉桂 5 g
豆蔻 5 g	木香 5 g	丁香 5 g	鹿茸 5 g	油松节 40 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

没药 20 g　　乳香 20 g　　麝香 0.2 g　　红曲 200 g

【制法】 以上四十四味，除红曲外，将虎骨分次加水煎煮，至胶尽，合并煎液，滤过，滤液浓缩至稠膏状。乳香、没药粉碎成细粉，与麝香配研，过筛。其余薏苡仁等三十九味粉碎成粗粉。另取白酒 17600 g、红糖 960 g、蜂蜜 1600 g 与上述稠膏、红曲及粉末共置罐中，加盖，加热炖至酒沸，倾入缸内，密封，静置至少三个月，取清液；或用渗滤法配制，即得。

【性状】 本品为棕红色的澄清液体；气香，味微甜，略苦、辛。

【检查】 乙醇量　应为 48～56%(附录 48 页第一法)。

其他　应符合酒剂项下有关的各项规定（附录 4 页）。

【功能与主治】 祛风除湿。用于风寒湿痹，手足麻木，筋骨疼痛，腰膝无力。

【用法与用量】 口服，一次 15 g，一日 2 次。

【注意】 孕妇及阴虚火旺者忌服。

【贮藏】 密封。

明目地黄丸

Mingmu Dihuang Wan

【处方】 熟地黄 160 g　山茱萸(制)80 g　牡丹皮 60 g　山药 80 g
茯苓 60 g　泽泻 60 g　枸杞子 60 g　菊花 60 g
当归 60 g　白芍 60 g　蔓荆 60 g　石决明(煅) 80 g

【制法】 以上十二味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 35～50 g 与适量的水泛丸，干燥；或加炼蜜 90～110 g 制成小蜜丸或大蜜丸，即得。

【性状】 本品为黑褐色至黑色的水蜜丸、黑色的小蜜丸或大蜜丸；气微香，味先甜而后苦、涩。

【鉴别】 (1)取本品，置显微镜下观察：淀粉粒三角状卵形或矩圆形，直径 24～40 μm，脐点短缝状或人字状。不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。薄壁组织灰棕色至黑棕色。细胞多皱缩，内含棕色核状物。果皮表皮细胞橙黄色，表面观类多角形，垂周壁略连珠状增厚。薄壁细胞类圆形，有椭圆形纹孔，集成纹孔群。种皮石细胞淡黄色，壁波状弯曲，胞腔含棕色物。花粉粒类圆形，直径 24～34 μm，外壁有刺，长 3～5 μm，具 3 个萌发孔。纤维直径 15～35 μm，壁厚，微木化，有大的圆形纹孔。果皮纤维上下层纵横交错排列。不规则团块暗灰色，不透明，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

加酸发生气泡。

(2) 取本品 1 g(或半丸)，捣碎，平铺于坩埚中，上盖一长柄漏斗，徐徐加热，至粉末微焦时，停止加热，放冷，取下漏斗，用水 5 ml 冲洗内壁，洗液置紫外光灯下观察，显淡蓝绿色荧光。

(3) 取本品 2 g，置烧杯中，用水淘洗，于杯底可得少量灰白色沉淀，取出，加稀盐酸 2 滴，即泡沸，发放二氧化碳气体，此气遇氢氧化钙试液，即发生混浊；再加水 2 ml，搅拌，滤过，滤液用氨试液调节至弱碱性，加草酸铵试液 1 滴，即生成白色沉淀。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录 1 页）。

【功能与主治】 滋肾，养肝，明目。用于肝肾阴虚，目涩怕光，视物模糊，迎风流泪。

【用法与用量】 口服，水蜜丸一次 6 g，小蜜丸一次 9 g，大蜜丸一次 1 丸；一日 2 次。

【规格】 大蜜丸每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

固 经 丸

Gujing Wan

【处方】 黄柏(盐炒)300 g　黄芩(酒炒)200 g　椿皮(炒)150 g
香附(醋制)150 g　白芍(炒)300 g　龟板(制)400 g

【制法】 以上六味，粉碎成细粉，过筛，混匀，用水泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为米黄色的水丸；味苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：纤维束鲜黄色，周围细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维，含晶细胞的壁木化增厚。纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。草酸钙簇晶存在于薄壁细胞中，常排列成行，或一个细胞中含有数个簇晶。石细胞类圆形或类多角形，胞腔含草酸钙方晶。不规则块片灰黄色，表面有微细纹理或孔隙。分泌细胞类圆形，含淡黄棕色至红棕色分泌物。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录 1 页）。

【功能与主治】 滋阴，清热，固经。用于月经先期，量多色紫黑，赤白带下。

【用法与用量】 口服，一次 6 g，一日 2 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

知柏地黄丸

Zhibai Dihuang Wan

【处方】 知母 40 g　黄柏 40 g　熟地黄 160 g　山茱萸(制) 80 g　牡丹皮 60 g
山药 80 g　茯苓 60 g　泽泻 60 g

【制法】 以上八味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 35～50 g 与适量的水泛丸，干燥；或加炼蜜 80～110 g 制成小蜜丸或大蜜丸，即得。

【性状】 本品为棕黑色的水蜜丸、黑褐色的小蜜丸或大蜜丸，味甜而带酸苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：淀粉粒三角状卵形或矩圆形，直径 24～40 μm，脐点短缝状或人字状。不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。草酸钙针晶成束或散在，长 26～110 μm。草酸钙簇晶存在于无色薄壁细胞中，有时数个排列成行。果皮表皮细胞橙黄色，表面观类多角形，垂周壁略连珠状增厚。薄壁细胞类圆形，有椭圆形纹孔，集成纹孔群。纤维束鲜黄色，周围细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维，含晶细胞的壁木化增厚。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录 1 页）。

【功能与主治】 滋阴降火。用于阴虚火旺，潮热盗汗，口干，咽痛，耳鸣，尿黄涩痛。

【用法与用量】 口服，水蜜丸一次 6 g，小蜜丸一次 9 g，大蜜丸一次 1 丸；一日 2次。

【规格】 大蜜丸每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

和中糖浆

Hozhong Tangjiang

【处方】 锡叶藤 1026 g　布渣叶 400 g　火炭母 400 g　枇杷叶 306 g
青皮 200 g　甘草 100 g　薄荷油 0.48 ml

【制法】 以上七味，除薄荷油外，其余锡叶藤等六味切碎，加水煎煮二次，第一次 2 小时，第二次 1.5 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至约 2500 ml，静置，滤过，滤液再浓缩至约 900 ml，加入蔗糖 300 g 与适量防腐剂，煮沸使溶解，滤过，滤液继续浓缩至

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

约 980 ml，放冷。取薄荷油，加乙醇适量溶解后，加入上述糖浆溶液中，随加随搅拌，再加水至 1000 ml，搅匀，即得。

【性状】 本品为棕褐色的液体；味甜。

【功能与主治】 清肠，消食。用于消化不良，腹泻，痢疾。

【用法与用量】 口服，一次 30 ml，一日 3 次。

【贮藏】 密封保存。

金 鸡 冲 剂

Jinji Chongji

【处方】 金樱根 800 g　功劳木 800 g　鸡血藤 1500 g
两面针 300 g　千斤拔 800 g　穿心莲 250 g

【制法】 以上六味，加水煎煮二次，每次 2 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩成稠膏状，加矫味剂、辅料及乙醇适量，制成颗粒，干燥，分装成 100 包，即得。

【性状】 本品为棕红色至棕褐色的颗粒；味苦、微甜。

【鉴别】 (1) 取本品 2 包，加 2%盐酸溶液 80 ml，置带塞锥形瓶中，振摇使充分溶解，静置半小时，滤过，滤液另器保存。滤渣用水洗至 pH 值为 3～4，在 80°干燥后，用丙酮 20 ml 浸渍，并时时振摇，滤过，滤液用毛细管在干燥滤纸上点样，滴加 1%硫酸铁铵溶液，显深灰色斑点，放置颜色不退。另取干燥滤纸，用毛细管点样，滴加香草醛试液，即显玫瑰红色斑点。

(2) 取鉴别(1) 项下留存的滤液，置分液漏斗中，加浓氨溶液调节 pH 值至 10，用氯仿提取二次，每次 15 ml，合并氯仿液，用无水硫酸钠脱水后，滤入小锥形瓶中，在水浴上浓缩至 1～0.5 ml(注意如有结晶析出，可加氯仿微温使溶解)。照薄层层析法（附录 37 页）试验，取氯仿液 10～20 μl，点于中性氧化铝薄层板上，以氯仿-甲醇(9:1)为展开剂，展开距离 20 cm 后，取出，立即置紫外光灯下观察，荧光图谱为：原点呈绿色，紧接出现一紫色荧光竖条，竖条顶端为明显的黄色荧光斑点（荧光随溶剂挥散而减退或消失），再前为中心显棕色的天蓝色荧光长斑点，近前沿一端为不规则荧光。观察荧光后的薄层板，喷以 2%3,5-二硝基苯甲酸的乙醇溶液与 5% 氢氧化钠的乙醇溶液的等量混合液（临用前混合），应显 3 个紫红色斑点。

【检查】 应符合冲剂项下有关的各项规定(附录 5 页)。

【功能与主治】 清热解毒，健脾除湿，通络活血。用于附件炎，子宫内膜炎，盆腔炎。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【用法与用量】 开水冲服，一次1包，一日2次，十日为一疗程，必要时可连服2～3疗程。

【贮藏】 密闭，防潮。

金　黄　散

Jinhuang San

【处方】 姜黄160 g　大黄160 g　黄柏160 g　苍术64 g　厚朴64 g
陈皮64 g　甘草64 g　生天南星64 g　白芷160 g　天花粉320 g

【制法】 以上十味，粉碎成细粉，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为黄色至金黄色的粉末；气微香，味苦、微甘。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：糊化淀粉粒团块黄色。草酸钙簇晶大，直径60～140 μm。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。草酸钙针晶细小，不规则地充塞于薄壁细胞中。草酸钙针晶成束或散在，长约至90 μm。纤维束鲜黄色，周围细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维，含晶细胞壁木化增厚。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。石细胞无色，分枝状，壁厚，层纹明显。具缘纹孔导管大，多破碎，有的具缘纹孔呈六角形或斜方形，排列紧密。油管碎片含黄棕色分泌物。

(2) 取本品0.5 g，加水5～10 ml，加硫酸6～10滴，置水浴上加热10分钟，放冷，滤过。取滤液1～2 ml，加乙醚2 ml，振摇，醚层显黄色；吸取醚层置另一试管中，加氢氧化钠试液1 ml，振摇，则醚层为无色，水层为红色。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录3页)。

【功能与主治】 消肿止痛。外用于痈疖肿痛，暑湿流注，跌扑扭挫伤，急性淋巴结炎，乳腺炎。

【用法与用量】 红热肿痛，用清茶调敷；漫肿无头，用醋或葱酒调敷；一日数次。

【贮藏】 密闭，防潮。

肥　儿　丸

Fei'er Wan

【处方】 肉豆蔻(煨) 50 g　木香20 g　六曲(炒) 100 g　麦芽(炒) 50 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

胡黄连 100 g　　槟榔 50 g　使君子仁 100 g

【制法】 以上七味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 100～130 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为黑棕色至黑褐色的大蜜丸；味微甜、苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：淀粉粒类圆形或椭圆形，直径 8～40 μm，脐点裂缝状。菊糖团块形状不规则，有时可见微细放射状纹理，加热后溶解。脂肪油滴众多，放置后析出针簇状结晶。种皮表皮细胞淡黄色，多角形，壁薄，下方叠合有网纹细胞。双螺纹导管直径 14～17 μm，壁厚约 5 μm。内胚乳碎片无色，壁较厚，有较多大的类圆形纹孔。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 健脾，消积，驱虫。用于小儿消化不良，面黄肌瘦，虫积腹痛，食少腹胀泄泻。

【用法与用量】 口服，一次 1～2 丸，一日 1～2 次，三岁以内小儿酌减。

【规格】 每丸重 3 g

【贮藏】 密闭，防潮。

狗　皮　膏

Goupi Gao

【处方】

枳壳 10 g	青皮 10 g	大风子 10 g	赤石脂 10 g	赤芍 10 g
天麻 10 g	甘草 10 g	乌药 10 g	牛膝 10 g	羌活 10 g
黄柏 10 g	补骨脂 10 g	威灵仙 10 g	生川乌 10 g	续断 10 g
白薇 10 g	桃仁 10 g	生附子 10 g	川芎 10 g	生草乌 10 g
杜仲 10 g	远志 10 g	穿山甲 10 g	香附 10 g	白术 10 g
川楝子 10 g	僵蚕 10 g	小茴香 10 g	蛇床子 10 g	当归 10 g
细辛 10 g	菟丝子 10 g	陈皮 10 g	清风藤 10 g	木香 10 g
肉桂 10 g	轻粉 5 g	儿茶 5 g	丁香 5 g	乳香 5 g
没药 5 g	血竭 5 g	樟脑 5 g		

【制法】 以上四十三味，除樟脑外，木香、肉桂、轻粉、儿茶、丁香、乳香、没药、血竭粉碎成细粉，过筛，混匀。其余枳壳等三十四味，酌予碎断，与食用植物油 2400 g 同置锅内炸枯，去渣，滤过，炼至滴水成珠。另取黄丹 750～1050 g，加入油内搅匀，收

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

膏，将膏浸泡于水中。

取膏用文火熔化，将樟脑及上述粉末加入搅匀，分摊于狗皮（或其他兽皮）上，即得。

【性状】 本品为摊于兽皮上的黑膏药。

【检查】 应符合膏药项下有关的各项规定(附录 4 页)。

【功能与主治】 祛风散寒，舒筋活血，止痛。用于风寒湿痹，腰腿疼痛，肌体麻木，跌扑损伤。

【用法与用量】 加温软化，贴于患处。

【规格】 每张净重(1) 15 g (2) 30 g

【贮藏】 置阴凉干燥处。

炎宁冲剂

Yannin Chongji

【处方】 鹿茸草 500 g 白花蛇舌草 250 g 鸭跖草 250 g

【制法】 以上三味，加水煎煮二次，第一次 1.5 小时，第二次 1 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至比重约为 1.10，加乙醇使含乙醇量为 60%，搅匀，静置 12 小时，滤过，滤液浓缩至比重为 1.32 的清膏。取清膏 1 份，加糖粉 3 份与糊精 1.25 份，制成颗粒，干燥，喷入香精，混匀，即得。

【性状】 本品为褐色至深褐色的颗粒；气香，味甜、微涩。

【鉴别】 (1) 取本品 10 g，加乙醇 20 ml，浸渍数分钟后，滤过。取滤液 2 ml，加三氯化铁试液 1～2 滴，即显墨绿色。

(2) 取鉴别(1)项下剩余的滤液 5 ml，加氯仿 5 ml，振摇数分钟，分取氯仿液，加硫酸 2 滴，放置后显微黄色，置水浴中加热，变为粉红色。

【检查】 应符合冲剂项下有关的各项规定(附录 5 页)。

【功能与主治】 清热解毒，消炎止痛。用于上呼吸道感染，扁桃体炎，尿路感染，急性菌痢，肠炎。

【用法与用量】 开水冲服，一次 14 g，一日 3～4 次。

【规格】 每袋重 14 g

【贮藏】 密闭，防潮、避热。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

河车大造丸

Heche Dazao Wan

【处方】 紫河车 100 g　熟地黄 200 g　天冬 100 g　麦冬 100 g
杜仲(盐炒) 150 g　牛膝(盐炒) 100 g　黄柏(盐炒) 150 g　龟板(制) 200 g

【制法】 以上八味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 30～40 g 与适量的水泛丸，干燥；或加炼蜜 80～100 g 制成小蜜丸或大蜜丸，即得。

【性状】 本品为黑褐色的水蜜丸、小蜜丸或大蜜丸；气微香，味苦、甘。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：纤维束鲜黄色，周围细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维，含晶细胞的壁木化增厚。石细胞长方形或长条形，直径 50～110 μm，纹孔极细密。石细胞类方形或长方形，直径 30～64 μm，壁较厚，有时一边薄，纹孔细密。草酸钙砂晶存在于薄壁细胞中。薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。橡胶丝呈条状或扭曲成团，表面带颗粒性。无定形团块表面凹凸不平，有时可见同心性环纹。不规则块片灰黄色，表面有微细纹理或孔隙。

(2) 取本品 10g，加少量水捣碎，再加水 100～200 ml，搅拌，待沉淀后，倾出药液与浮在上层的药渣，取下层黄色的沉淀，加水 10 ml，煮沸，滤过。取滤液 2～3 ml，加等量的 10%氢氧化钠溶液，充分摇匀，滴加 0.5%硫酸铜溶液，随滴随振摇，即发生紫色或紫红色。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 补肺益肾。用于肺肾阴虚，潮热咳嗽，盗汗，腰膝乏力。

【用法与用量】 口服，水蜜丸一次 6 g，小蜜丸一次 9 g，大蜜丸一次 1 丸；一日 2 次。

【规格】 大蜜丸每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

降　压　丸

Jiangya Wan

【处方】 珍珠母 200 g　龙胆 60 g　槐米 200 g
夏枯草 200 g　地黄 100 g　牛膝 80 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【制法】 以上六味，取珍珠母 140 g，打碎，加水煎煮 2 小时，再加入夏枯草 40 g、地黄、牛膝同煎煮二次，合并煎液，滤过，滤液浓缩。将剩余的珍珠母、夏枯草与龙胆、槐米粉碎成细粉，过筛，混匀，与上述浓缩液泛丸，干燥，用明胶包衣，打光，即得。

【性状】 本品为棕褐色至黑褐色的浓缩丸；味苦、涩。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：薄壁细胞中含草酸钙方晶；花粉粒类圆形，直径约 15 μm，有 3 个萌发孔。花萼表皮细胞壁厚而极度弯曲；非腺毛 1～12 细胞，壁具疣状突起，有时其中 1 个或数个细胞呈缢缩状。草酸钙针晶细小，充塞于薄壁细胞中。

(2) 取本品约 0.3 g，研细，加 10 %盐酸 2～3 滴，有气泡发生。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 降血压。用于高血压症，头痛眩晕，耳鸣目胀。

【用法与用量】 口服，一次 6 g，一日 2 次。

【注意】 孕妇慎服。

【贮藏】 密闭，防潮。

参　苏　丸

Shensu Wan

【处方】 党参 75 g　紫苏 75 g　葛根 75 g　前胡 75 g　茯苓 75 g
半夏(制) 75 g　陈皮 50 g　枳壳(炒) 50 g　桔梗 50 g　甘草 50 g
木香 50 g

【制法】 以上十一味，粉碎成细粉，过筛，混匀。另取生姜 30 g、大枣 30 g 分次加水煎煮、滤过，用煎出液泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为棕褐色的水丸；气微，味微苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。草酸钙针晶成束，长 32～144 μm，存在于粘液细胞中或散在。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。叶肉组织中有细小草酸钙簇晶，直径 4～8 μm。油管含金黄色分泌物。联结乳管直径 14～25 μm，含淡黄色颗粒状物。石细胞类斜方形或多角形，一端稍尖，壁较厚，纹孔稀疏。纤维成束，周围细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维，含晶细胞的壁木化增厚。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。木纤维长梭形，直径 16～24 μm，壁稍厚，纹孔口横裂缝状、十字状或人字状。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 益气解表。用于体虚感冒，恶寒发热，咳嗽痰多，胸闷呕逆。

【用法与用量】 口服，一次 6～9 g，一日 2～3 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

参苓白术散

Shenling Baizhu San

【处方】 人参 100 g　茯苓 100 g　白术(炒)100 g　山药 100 g
白扁豆(炒) 75 g　莲子 50 g　薏苡仁(炒)50 g　砂仁 50 g
桔梗 50 g　甘草 100 g

【制法】 以上十味，粉碎成细粉，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为黄色至灰黄色的粉末；气香，味甜。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。草酸钙簇晶直径 20～68 μm，棱角锐尖。草酸钙针晶细小，长 10～32 μm，不规则地充塞于薄壁细胞中。草酸钙针晶束存在于粘液细胞中，长80～240 μm，针晶直径 2～8 μm。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。种皮细胞黄棕色或红棕色，形状不规则。种皮栅状细胞长 80～150 μm。内种皮石细胞黄棕色或棕红色，表面观类多角形，壁厚，胞腔含硅质块。联结乳管直径 14～25 μm，含淡黄色颗粒状物。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录 3 页)。

【功能与主治】 调补脾胃。用于脾胃虚弱，食少便溏，消瘦乏力。

【用法与用量】 口服，一次 6～9 g，一日 1～2 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

茴香橘核丸

Huixiang Juhe Wan

【处方】 小茴香（盐炒）40 g　八角茴香 40 g　橘核（盐炒)40 g　荔枝核 80 g
补骨脂（盐炒）20 g　肉桂 16 g　川楝子 80 g　元胡（醋制)40 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

莪术（醋制）20 g　木香20 g　香附(醋制)40 g　青皮（醋炒)40 g
昆布 40 g　槟榔 40 g　乳香(制)20 g　桃仁 16 g
穿山甲（制）20 g

【制法】 以上十七味，粉碎成细粉，过筛，混匀，用水泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为黄褐色至棕褐色的水丸；气香，味微酸、辛苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：不规则团块无色或淡黄色，表面及周围扩散出众多细小颗粒，久置溶化。草酸钙簇晶细小，直径约 5 μm，一个细胞含多个簇晶。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。种皮石细胞类多角形，壁极厚，波状弯曲，胞腔分枝。纤维壁稍厚，表面有斜向交错的纹理。纤维束鲜黄色，周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。纤维成束，深棕色或红棕色，壁厚。木纤维长梭形，直径 16～24 μm，壁较厚，纹孔口横裂缝状、十字状或人字状。厚壁组织碎片绿黄色，细胞类多角形或略延长，壁稍弯曲，有的连珠状增厚，纹孔细密。种皮栅状细胞淡棕色或红棕色，表面观类多角形，壁稍厚，胞腔含红棕色物。种皮细胞黄棕色，表面观类多角形，壁较厚。内胚乳碎片无色，壁较厚，有较多大的类圆形纹孔。藻体碎片橄榄褐色。鳞甲碎片无色，有大小不等圆孔。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录 1 页）。

【功能与主治】 散寒行气，消肿止痛。用于小肠疝气，睾丸肿痛。

【用法与用量】 口服，一次 6～9 g，一日 2 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

胡　蜂　酒

Hufeng Jiu

本品系景颇族验方，景颇文名为 Gatshang Ghyaru（嘎尚知如）；为胡蜂科昆虫胡蜂 Vespa manifica Smith 的虫体酒浸液。

【制法】 取鲜胡蜂 100 g，加白酒 1000 ml，浸泡 15 天，滤过，即得。

【性状】 本品为棕色的澄清液体；有特异腥香气，味苦、麻、微辛。

【检查】 pH 值　应为 4.0～5.0(附录42页)。

总固体　精密量取本品 25 ml，置称定重量的蒸发皿中，于水浴上蒸干，在 100°干燥 3 小时，遗留残渣不得少于 2.5%。

乙醇量　应为 40～50%(附录48页)。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 祛风除湿。用于急性风湿病，风湿性关节炎。

【用法与用量】 口服，一次 15～25 ml，一日 2 次。

【注意】 服后偶有皮肤瘙痒，次日可自行消失。

【贮藏】 密封，置阴凉处。

药 艾 条

Yao'aitiao

【处方】 艾叶 2400 g　桂枝 125 g　高良姜 125 g　广藿香 50 g
降香 175 g　香附 50 g　白芷 100 g　陈皮 50 g
丹参 50 g　生川乌 75 g　雄黄 12.5 g

【制法】 以上十一味，艾叶碾至成艾绒，雄黄水飞或粉碎成极细粉；其余桂枝等九味粉碎成细粉，与雄黄粉末配研，过筛，混匀。先取艾绒 20 g，均匀平铺在一张长 28 cm、宽 15 cm 的白棉纸上，再均匀散布上述粉末 8 g，将棉纸两端折叠约 6 cm，卷紧成条，粘合封闭，晒干，即得。

【性状】 本品呈圆柱状，长 20～21 cm，直径 1.7～1.8 cm；气香，点燃后发出持久的、气特异的烟，而不熄灭。

【功能与主治】 行气血，逐寒湿。用于风寒湿痹，肌肉酸麻，关节四肢疼痛，脘腹冷痛。

【用法与用量】 直射灸法，一次适量，红晕为度，一日 1～2 次。

【规格】 每支约重 29.6 g

【贮藏】 密闭，防潮。

枳 术 丸

Zhizhu Wan

【处方】 枳实（炒）250 g　白术（炒）500 g

【制法】 以上二味，粉碎成细粉，过筛，混匀。另取荷叶 75 g 加水煎煮，滤过，用煎出液泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为褐色的水丸；气微香，味微苦。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。草酸钙针晶细小，不规则地充塞于薄壁细胞中。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录 1 页）。

【功能与主治】 健脾消食，行气化湿。用于脾胃虚弱，饮食不化，脘腹痞满。

【用法与用量】 口服，一次 6 g，一日 2 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

枳实导滞丸

Zhishi Daozhi Wan

【处方】 枳实（炒）100 g　大黄 200 g　黄连(姜汁炒)60 g　黄芩 60 g
六曲(炒)100 g　白术(炒)100 g　茯苓 60 g　泽泻 40 g

【制法】 以上八味，粉碎成细粉，过筛，混匀，用水泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为浅褐色至深褐色的水丸；气微香，味苦。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。草酸钙簇晶大，直径 60～140 μm。草酸钙针晶细小，不规则地充塞于薄壁细胞中。纤维束鲜黄色，壁稍厚，纹孔明显。纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。薄壁细胞类圆形，有椭圆形纹孔，集成纹孔群。

(2) 取本品约 0.2 g，捣碎，加乙醇 5 ml，搅拌，浸渍 10 分钟，滤过。取滤液 1 ml，加氢氧化钠试液 1 滴，即显红色。

(3) 取本品约 1 g，捣碎，用氨试液湿润后，加氯仿 10ml浸渍 10 分钟，不断搅拌，滤过，滤液置分液漏斗中，加稀盐酸 5 ml 振摇提取，滤过。取滤液 2 ml，加漂白粉少量，溶液即显红色。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录 1 页）。

【功能与主治】 消导积滞，清利湿热。用于脘腹胀痛，不思饮食，大便秘结，痢疾里急后重。

【用法与用量】 口服，一次 6～9 g，一日 2 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

柏子养心丸

Baizi Yangxin Wan

【处方】 柏子仁 25 g　党参 25 g　黄芪(蜜炙)100 g　川芎 100 g
当归 100 g　茯苓 200 g　远志(制)25 g　酸枣仁 25 g
肉桂 25 g　五味子(蒸)25 g　半夏曲 100 g　甘草(蜜炙)10 g
朱砂 30 g

【制法】 以上十三味，朱砂水飞或粉碎成极细粉；其余柏子仁等十二味粉碎成细粉，与上述粉末配研，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 25～40 g 与适量的水泛丸，干燥；或加炼蜜 100～130 g 制成小蜜丸或大蜜丸，即得。

【性状】 本品为棕色的水蜜丸、棕色至棕褐色的小蜜丸或大蜜丸；味先甜而后苦，微麻。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。纤维成束或散离，壁厚，表面有纵裂纹，两端断裂成帚状或较平截。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。石细胞类圆形或类长方形，壁一面菲薄。种皮表皮石细胞淡黄棕色，表面观类多角形，壁较厚，孔沟细密，胞腔含暗棕色物。内种皮细胞黄色，表面观长方形或长多角形，壁微波状弯曲。内种皮细胞棕黄色，表面观长方形或类方形，垂周壁连珠状增厚。联结乳管直径 12～15 μm，含细小颗粒状物。草酸钙结晶不规则圆形，存在于薄壁细胞中。草酸钙针晶成束，长 32～144 μm，存在于粘液细胞中或散在。不规则细小颗粒暗棕红色，有光泽，边缘暗黑色。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 补气，养血，安神。用于心气不足，气短畏寒，心悸易惊，失眠健忘。

【用法与用量】 口服，水蜜丸一次 6 g，小蜜丸一次 9 g，大蜜丸一次 1 丸；一日 2 次。

【规格】 大蜜丸每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

栀子金花丸

Zhizi Jinhua Wan

【处方】 栀子 116 g　黄连 4.8 g　黄芩 192 g　黄柏 60 g
大黄 116 g　金银花 40 g　知母 40 g　天花粉 60 g

【制法】 以上八味，粉碎成细粉，过筛，混匀，用水泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为黄色至黄褐色的水丸；味苦。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。纤维束鲜黄色，壁稍厚，纹孔明显。纤维束鲜黄色，周围细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维，含晶细胞的壁木化增厚。草酸钙针晶成束或散在，长 26～110 μm。草酸钙簇晶大，直径 60～140 μm。种皮石细胞黄色或淡棕色，多破碎，完整者长多角形、长方形或形状不规则，壁厚，有大的圆形纹孔，胞腔棕红色。非腺毛单细胞，壁有疣状突起，具缘纹孔导管大，多破碎，有的具缘纹孔呈六角形或斜方形，排列紧密。

(2) 取本品约 1 g，研细，加甲醇 10 ml，缓缓加热并振摇，滤过。取滤液 2 ml，加镁粉少量与盐酸数滴，置水浴上加热片刻，溶液显红色。

(3) 取本品少量，加热，升华，出现针状结晶，常簇集成丛。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 清热，降火，解毒。用于口舌生疮，牙龈肿痛，目赤咽痛，鼻衄，便秘。

【用法与用量】 口服，一次 9 g，一日 1 次。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 密闭，防潮。

香苏正胃丸

Xiangsu Zhengwei Wan

【处方】 广藿香 80 g　紫苏叶 160 g　香薷 80 g
陈皮 40 g　厚朴(姜制)80 g　枳壳(炒)20 g
砂仁 20 g　白扁豆(炒)40 g　山楂(炒)20 g
六曲(炒)20 g　麦芽(炒)20 g　茯苓 20 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

甘草 11 g　　滑石 66 g　　朱砂 3.3 g

【制法】 以上十五味，朱砂水飞或粉碎成极细粉；其余广藿香等十四味粉碎成细粉；与上述粉末配研，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 120～150 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为黑褐色的大蜜丸；味微甜、略酸苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。叶肉组织中有细小草酸钙簇晶，直径 4～8 μm。叶肉组织中散有细小草酸钙针晶。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。石细胞分枝状，壁厚，层纹明显。种皮石细胞淡黄色至棕黄色，类圆形或卵圆形，直径 16～56 μm，壁厚，孔沟细密。内种皮石细胞黄棕色或棕红色，表面观类多角形，壁厚，胞腔含硅质块。不规则细小颗粒暗棕红色，有光泽，边缘暗黑色。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 解表和中，消食行滞。用于小儿暑湿感冒，停乳停食，头痛发热，呕吐泄泻，腹痛腹胀，小便不利。

【用法与用量】 口服，一次 1 丸，一日 1～2 次，周岁以内小儿酌减。

【规格】 每丸重 3 g

【贮藏】 密闭，防潮。

香　连　丸

Xianglian Wan

【处方】 黄连(吴茱萸制)800 g　木香 200 g

【制法】 以上二味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加米醋 8 g 与适量的水泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为淡黄色至黄褐色的水丸；气微，味苦。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：菊糖块不规则，有时可见微细放射状纹理，加热后溶解；网纹导管直径约至 90 μm。纤维束鲜黄色，壁稍厚，纹孔明显。

(2) 取本品粉末少量，置载玻片上，加乙醇 1～2 滴与 30%硝酸 1 滴，加盖玻片，数分钟后置显微镜下观察，有黄色针状或针簇状结晶析出。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 清肠化湿，行气止痛。用于肠炎，痢疾，腹痛里急后重。

【用法与用量】 口服，一次 3～6 g，1 日 2～3 次，小儿酌减。

【贮藏】 密闭，防潮。

香 附 丸

Xiangfu Wan

【处方】 香附(醋制)300 g 当归 200 g 川芎 50 g 白芍(炒)100 g 熟地黄 100 g 白术(炒)100 g 砂仁 25 g 陈皮 50 g 黄芩 50 g

【制法】 以上九味，粉碎成细粉，过筛，混匀。用适量的黄酒泛丸，晒干或低温干燥，即得。

【性状】 本品为暗黄色至深褐色的小丸；气芳香，味苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：草酸钙簇晶直径 18～32 μm，存在于薄壁细胞中，常排列成行，或一个细胞中含有数个簇晶。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。草酸钙针晶细小，长 10～32 μm，不规则地充塞于薄壁细胞中。薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。内种皮石细胞黄棕色或棕红色，表面观类多角形，壁厚，胞腔含硅质块。分泌细胞类圆形，含淡黄棕色至红棕色分泌物。纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 调和气血。用于血虚气滞，胸闷胁痛，痛经。

【用法与用量】 黄酒或温开水送服，一次 6～9 g，一日 2 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

香砂六君丸

Xiangsha Liujun Wan

【处方】 木香 70 g 砂仁 80 g 党参 100 g 白术(炒)200 g 茯苓 200 g 甘草(蜜炙)70 g 陈皮 80 g 半夏(制)100 g

【制法】 以上八味，粉碎成细粉，过筛，混匀。另取生姜 10 g、大枣 20 g 分次加水煎煮，滤过，用煎出液泛丸，晒干或低温干燥，即得。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 本品为黄棕色的水丸；气微香，味微甜、辛。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。联结乳管直径 12～15 μm，含细小颗粒状物。木纤维长梭形，直径 16～24 μm，壁稍厚，纹孔口横裂缝状、十字状或人字状。内种皮石细胞黄棕色或棕红色，表面观类多角形，壁厚，胞腔含硅质块。草酸钙针晶细小，长 10～32 μm，不规则地充塞于薄壁细胞中。草酸钙针晶成束，长 32～144 μm，存在于粘液细胞中或散在。草酸钙方晶成片存在于薄壁细胞中。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 健脾益气，消胀和胃。用于脾虚气滞，消化不良，食少嗳气，脘腹痞满，肠鸣便溏。

【用法与用量】 口服，一次 6～9 g，一日 2～3 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

复方大黄酊

Fufang Dahuang Ding

【处方】 大黄(最粗粉)100 g　橙皮(最粗粉)20 g
草豆蔻(最粗粉)20 g　乙醇(60%)适量

【制法】 取大黄、橙皮与草豆蔻，照酊剂项下的渗漉法（附录10页），用 60%乙醇作溶剂，浸渍 24 小时后，以每分钟 3～5 ml 的速度缓缓渗漉，收集漉液 1000 ml，静置，俟澄清，滤过，即得。

【性状】 本品为黄棕色的液体；有香气，味苦、微涩。

【鉴别】 取本品 2 ml，照大黄流浸膏项下的鉴别法(36页)试验，显相同的反应。

【检查】 **异种大黄** 取本品适量，照大黄流浸膏项下的方法（36页）检查，应符合规定。

乙醇量 应为 50～58%(附录48页第二法)。

其他 应符合酊剂项下有关的各项规定(附录10页)。

【功能与主治】 健胃药。

【用法与用量】 口服，一次 2～5 ml，一日 6～15 ml。

【贮藏】 密封保存。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

复方龙胆酊（苦味酊）

Fufang Longdan Ding

【处方】 龙胆（最粗粉）100 g　橙皮（最粗粉）40 g

草豆蔻（最粗粉）10 g　乙醇（60%）适量

【制法】 取龙胆、橙皮及草豆蔻，照酊剂项下的渗漉法（附录10页），用60%乙醇作溶剂，浸渍24小时后，以每分钟3～5 ml的速度渗漉，收集漉液1000 ml，静置，俟澄清，滤过，即得。

【性状】 本品为黄棕色的液体；有香气，味苦。

【检查】 乙醇量　应为50～58%（附录48页第二法）。

其他　应符合酊剂项下有关的各项规定（附录10页）。

【功能与主治】 苦味健胃药。

【用法与用量】 口服，一次2～4 ml，一日6～12 ml。

【贮藏】 密封保存。

复方地锦片

Fufang Dijin Pian

本品为地锦草、辣蓼、车前草的混合浸膏片。每片含混合干浸膏0.3 g。

【制法】 取地锦草3份、辣蓼3份及车前草1份，加水煎煮二次，每次2小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩、干燥成干浸膏，加适量辅料，制成颗粒，压片，包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显黑色；味涩、微苦。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定（附录6页）。

【功能与主治】 清热，利湿。用于细菌性痢疾，肠炎。

【用法与用量】 口服，一次2～4片，一日3次。

【贮藏】 密封保存。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

复方百部止咳糖浆

Fufang Baibu Zhike Tangjiang

【处方】 百部(蜜炙)100 g　苦杏仁 50 g　桔梗 50 g　桑白皮 50 g
麦冬 25 g　知母 25g　黄芩 100 g　陈皮 100 g
甘草 25 g　天南星(制)25 g　枳壳(炒)50 g

【制法】 以上十一味，加水煎煮二次，第一次 3 小时，第二次 2 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至适量。另取蔗糖 650 g 加水煮沸，溶解后，滤过，浓缩制成糖浆，与上述浓缩液混匀，煮沸，放冷，加入防腐剂与香精，并用冷开水稀释至 1000 ml，即得。

【性状】 本品为棕褐色的粘稠液体；味甜。

【检查】 pH 值应为 4.0～4.5(附录42页)。

比重　应为 1.26～1.28(附录26页)。

【功能与主治】 清肺止咳。用于肺热咳嗽，痰黄粘稠，百日咳。

【用法与用量】 口服，一次 10～20 ml，一日 2～3 次，小儿酌减。

【贮藏】 密封，置阴凉处。

复方羊角冲剂

Fufang Yangjiao Chongji

【处方】 羊角 300 g　川芎 100 g　白芷 100 g　川乌(制)75 g

【制法】 以上四味，羊角锉片或锉碎，加水煎煮二次，每次 3 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩成稠膏状。其余川芎等三味粉碎成粗粉，照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法(附录12页)，用 70%乙醇作溶剂，浸渍 24 小时后进行渗漉，漉液加入羊角稠膏中，搅拌，静置，滤过，滤液浓缩至约 115 ml，另加糖粉 345 g 与糊精 145 g，制成颗粒，干燥，即得。

【性状】 本品为棕黄色的颗粒；气香，味甜、微苦辛。

【鉴别】 取本品 4 g，加乙醇 5 ml，研磨后，滤过，滤液置水浴上浓缩至原体积的一半，点于滤纸上，分别照下述方法试验：

(1) 滴加 0.2%茚三酮的乙醇溶液 1 滴，在 105°干燥 5 分钟，显蓝紫色斑点。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

(2) 滴加碘化铋钾试液1滴，显橙红色斑点。

(3) 滴加2%间二硝基苯的乙醇溶液1滴与10%氢氧化钾的甲醇溶液1滴，显紫色至棕红色斑点。

【检查】 应符合冲剂项下有关的各项规定(附录5页)。

【功能与主治】 平肝，镇痛。用于偏头痛，血管性头痛，紧张性头痛，也可用于神经痛。

【用法与用量】 开水冲服，一次8 g，一日2～3次。

【规格】 每袋重8 g

【贮藏】 密闭，防潮、避热。

复方阴阳莲片

Fufang Yinyanglian Pian

【处方】 虎杖(阴阳莲)提取物140 g　功劳木提取物35 g
枇杷叶提取物35 g

【制法】 取虎杖，粉碎成粗粉，用乙醇加热回流提取二次，合并提取液，滤过，滤液浓缩成稠膏状，在70°以下干燥。取功劳木，粉碎成粗粉，照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法(附录11页)，用1%盐酸溶液作溶剂，浸渍24小时后进行渗漉，漉液用氢氧化钠饱和溶液调节pH值至约9，按总体积每100 ml加食盐15 g，充分搅拌使完全溶解，静置48小时以上，滤过，沉淀物用水洗涤后，干燥。取枇杷叶，加水煎煮三次，每次1.5小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩后，加乙醇使含乙醇量为60%，放置使沉淀，取上清液，浓缩成稠膏状，在90～95°干燥。将三种提取物按处方量混合，粉碎，加适量滑石粉，过筛，用乙醇适量制成颗粒，压制成1000片，包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；味苦、咸。

【鉴别】 取本品10片，除去糖衣，研细，加乙醇20 ml搅拌，滤过。滤液照下述方法试验：

(1) 取滤液1 ml，加氢氧化钠试液数滴，即显紫红色，加过氧化氢溶液少量，加热煮沸，紫红色不消退，加酸使成酸性，红色即消失，加碱成碱性后，紫红色又复现。

(2) 取滤液10 ml，蒸干，加沸水15 ml，搅匀，趁热滤过，滤液放冷，用氯仿振摇提取二次，每次20 ml，弃去氯仿液，水液再用醋酸乙酯10 ml振摇提取，提取液点于滤纸上，置紫外光灯下观察，显亮蓝色荧光。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

(3) 取滤液 5 ml，蒸干，加水 2 ml 使溶解，加氢氧化钠试液 1 ml 与乙醚 5 ml，振摇，分取醚液，蒸干，加乙醇 1 ml 使溶解，加盐酸数滴与溴白粉少量，即显樱红色。

(4) 取滤液 1 ml，加稀盐酸使成酸性，加碘化铋钾试液 1～2 滴，即发生橙红色沉淀。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(附录 6 页)。

【功能与主治】 清热，祛痰，止咳，平喘。用于慢性支气管炎。

【用法与用量】 口服，一次 3～4 片，一日 3 次。十日为一疗程。

【贮藏】 密封保存。

复方杜鹃片

Fufang Dujuan Pian

【处方】 烈香杜鹃 5200 g　蒲公英 520 g　黄芪 520 g

【制法】 以上三味，烈香杜鹃通蒸气蒸馏提取挥发油，另器保存。将馏去挥发油后的烈香杜鹃加水煎煮二次，合并煎液，浓缩成稠膏状，放冷后加乙醇适量，搅拌，滤过，滤液浓缩成膏。再将黄芪、蒲公英加水煎煮数次，合并煎液，浓缩成稠膏状，与上述烈香杜鹃膏及适量辅料混匀，制成颗粒，拌入烈香杜鹃挥发油，压制成 1000 片，包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；气香特异，味涩、苦。

【检查】 挥发油量　取本品 100 片，照挥发油测定法项下的方法(附录16页)测定，含挥发油不得少于 0.6 ml。

其他　应符合片剂项下有关的各项规定(附录 6 页)。

【功能与主治】 止咳，祛痰，平喘，补气，消炎。用于慢性支气管炎。

【用法与用量】 口服，一次 4 片，一日 3 次。

【贮藏】 密封保存。

复方岗稔片

Fufang Gangnian Pian

【处方】 桃金娘根干浸膏 153.33 g　虎杖总蒽醌 15.56 g

【制法】 取桃金娘根，加水煎煮二次，每次 4 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩成

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

稠膏状，在80°以下干燥成干浸膏，粉碎。另取虎杖，粉碎成粗粉，照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法(附录11页)，用乙醇作溶剂，浸渍24小时后进行渗漉，漉液浓缩至原药材重量的一半时，静置，滤过，沉淀物加85%乙醇30倍量及活性炭适量，加热回流30分钟，趁热滤过，放冷，析出虎杖总蒽醌，滤过，干燥。取上述制得的桃金娘根干浸膏与虎杖总蒽醌，照处方量混合，研细，过筛，加适量辅料，制成颗粒，压制成1000片，包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；味苦、微涩。

【鉴别】 (1) 取本品2片，除去糖衣，研细，加乙醚6 ml，振摇，滤过。取滤液2 ml，加氢氧化钠试液1 ml，振摇，静置，碱液层显樱红色，挥尽乙醚后，加30%过氧化氢溶液1 ml，加热，樱红色不退，加盐酸使成酸性，则樱红色消退。

(2) 取本品2片，除去糖衣，研细，加水5 ml，置水浴上加热10分钟，滤过，滤液加三氯化铁试液1～2滴，即显墨绿色。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(附录6页)。

【功能与主治】 清利湿热，养血，通络。用于急、慢性肝炎。

【用法与用量】 口服，一次3片，一日3次。

【贮藏】 密封保存。

复方岩白菜素片 (复方矮茶素片)

Fufang Yanbaicaisu Pian

本品含岩白菜素($C_{14}H_{16}O_9$)应为标示量的93.0～107.0%。

【处方】 岩白菜素125 g　扑尔敏2 g

【制法】 取岩白菜素与扑尔敏，制成颗粒，压制成1000片，即得。

【性状】 本品为白色片；味苦。

【鉴别】 (1) 取本品含量测定项下制备的溶液，照分光光度法(附录32页)测定，在275 nm与220 nm的波长处有最大吸收。

(2) 取本品的细粉适量(约相当于岩白菜素5 mg)，加甲醇1 ml，振摇，滤过，滤液中加7%盐酸羟胺的甲醇溶液数滴，再加10%氢氧化钾的甲醇溶液使成碱性，置水浴中加热至微微沸腾，放冷，加稀盐酸使成酸性，加1%三氯化铁的乙醇溶液1～2滴，显紫红色。

(3) 取本品1片，研细，加水1 ml振摇后，滤过，滤液中加溴试液与2%氰化钾溶

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

液各 0.5 ml，混匀，再加含 1%醋酸钠的联苯胺饱和水溶液 0.5 ml，摇匀，数分钟后，显杨梅红色。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(附录 6 页)。

【含量测定】 取本品 10 片，精密称定，研细，精密称出适量（约相当于岩白菜素 20 mg)，置 50 ml 量瓶中，加甲醇适量，振摇，使岩白菜素溶解后，加甲醇至刻度，摇匀，用干燥滤纸滤过，弃去初滤液，精密量取续滤液 1 ml，置 25 ml 量瓶中，加甲醇至刻度，摇匀。照分光光度法(附录32页)，在 275±1 nm 的波长处测定吸收度，按 $C_{14}H_{16}O_9$ 的吸收系数（$E_{1cm}^{1\%}$）为 248，计算，即得。

【功能与主治】 镇咳祛痰。用于慢性支气管炎。

【用法与用量】 口服，一次 1 片，一日 3 次。

【贮藏】 遮光，密闭保存。

复方垂盆草糖浆

Fufang Chuipencao Tangjiang

【处方】 鲜垂盆草 1250 g　矮地茶 320 g　蔗糖 300 g

【制法】 取鲜垂盆草，加水煎煮二次，第一次 1 小时，第二次半小时；矮地茶加水煎煮二次，第一次 2 小时，第二次 1 小时；煎液分别浓缩、滤过，合并，加入蔗糖与适量防腐剂溶解后，滤过，再加水至 1000 ml，搅匀，即得。

【性状】 本品为棕色的液体；味甜、微涩。

【功能与主治】 清热解毒，活血利湿，有降低谷丙转氨酶的作用。用于急性肝炎及迁延性肝炎、慢性肝炎的活动期。

【用法与用量】 口服，一次 50 ml，一日 2 次。

【贮藏】 密封保存。

复方鸭跖草溶液

Fufang Yazhicao Rongye

【处方】 鸭跖草 1000 g　山指甲 1000 g　蒲公英 1000 g　白背叶 1000 g

【制法】 以上四味，切碎，加水煎煮二次，合并煎液，滤过，滤液浓缩至 1000 ml，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

加适宜的防腐剂，搅匀，即得。

【性状】 本品为棕褐色的粘稠液体。

【鉴别】 (1) 取本品 5 ml，加稀醋酸使成酸性，加石油醚 10 ml，振摇，分取石油醚液 3 ml，蒸干，加醋酐 3～4 滴使溶解，再加硫酸 2 滴，即显紫红色。放置后，逐渐变为污绿色。

(2) 取鉴别(1)项下石油醚提取后剩余的水溶液，加醋酸乙酯 10 ml 与乙醇 1 ml，振摇，分取醋酸乙酯液，蒸干，残渣加乙醇 10 ml 使溶解，滤过。取滤液 1 ml，加碳酸钠溶液(3→100)1 ml，置水浴中加热数分钟，放冷后，加新制的重氮对硝基苯胺试液 2～3 滴，即显红色；另取滤液 2 ml，加镁粉少量与盐酸 4～5 滴，显橙红色。

【功能与主治】 消炎，收敛，去腐生新。用于子宫颈糜烂。

【用法与用量】 按常法冲洗阴道，擦干，用消毒棉花浸取药液，填塞，一日 1 次，当晚取出，一周 2～3 次。

【贮藏】 密封保存。

复方紫参冲剂

Fufang Zishen Chongji

【处方】 石见穿 250 g　丹参 250 g　鸡血藤 250 g　当归 150 g
香附 150 g　郁金 150 g　红花 100 g　鳖甲 150 g

【制法】 以上八味，鳖甲加水煎煮二次，每次 4 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩。其余石见穿等七味加水煎煮二次，每次 1.5 小时，合并煎液，滤过，滤液适当浓缩后，加乙醇使沉淀，滤过，滤液回收乙醇后，加入鳖甲浓缩液中，浓缩至比重为 1.38～1.40(80～85°热测)的清膏。取清膏 1 份，加糖粉 3 份、糊精 1 份与乙醇适量，制成颗粒，干燥，即得。

【性状】 本品为黄棕色的颗粒；味甜、微涩。

【检查】 应符合冲剂项下有关的各项规定(附录 5 页)。

【功能与主治】 舒肝理气，活血散结。用于晚期血吸虫病引起的肝脾肿大。

【用法与用量】 开水冲服，一次 22 g，一日 3 次。

【规格】 每袋重 22 g

【贮藏】 密闭，防潮、避热。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

保　赤　散

Baochi San

【处方】 六曲(炒)250 g　巴豆霜 150 g　天南星(制)400 g　朱砂 250 g

【制法】 以上四味，除巴豆霜外，朱砂水飞或粉碎成极细粉；其余六曲等二味粉碎成细粉；将巴豆霜研细，与上述粉末配研，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为粉红色至橙红色的粉末；味淡、微辛。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：草酸钙针晶成束或散在，长约至 90 μm。草酸钙簇晶直径 8～24 μm，存在于类圆形薄壁细胞中。不规则细小颗粒暗棕红色，有光泽，边缘暗黑色。

(2) 取本品约 0.5 g，用水淘洗，可得少量朱红色沉淀，取出，用盐酸湿润，在光洁铜片上轻轻摩擦，铜片表面即显银白色光泽，加热烘烤后，银白色即消失。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录 3 页)。

【功能与主治】 消食导滞，化痰镇惊。用于小儿冷积，停乳停食，腹部胀满，大便秘结，痰多，惊悸不安。

【用法与用量】 口服，小儿六个月至一岁一次 0.09 g，二至四岁一次 0.18 g。

【注意】 泻泄者忌服。

【规格】 每瓶 0.09 g

【贮藏】 密闭，防潮。

保　和　丸

Baohe Wan

【处方】 山楂(焦)300 g　六曲(炒)100 g　半夏(制)100 g　茯苓 100 g
陈皮 50 g　连翘 50 g　莱菔子(炒)50 g　麦芽(炒)50 g

【制法】 以上八味，粉碎成细粉，过筛，混匀，用水泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为灰棕色至褐色的水丸；气微香，味微酸、涩。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。果皮石细胞淡紫红色、红色或黄棕色，类圆形或多

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

角形，直径约至 125 μm。草酸钙针晶成束，长 32～144 μm，存在于粘液细胞中或散在。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。内果皮纤维上下层纵横交错，纤维短梭形。表皮细胞纵列，常由 1 个长细胞与 2 个短细胞相间连接，长细胞壁厚，波状弯曲，木化。种皮碎片黄色或棕红色，细胞小，多角形，壁厚。

【检查】 除崩解时限检查应在 2 小时内崩解外，其他应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 消食，导滞，和胃。用于食滞，脘腹胀满，嗳腐吞酸，厌食腹泻。

【用法与用量】 口服，一次 6 g，一日 2 次，小儿酌减。

【贮藏】 密闭，防潮。

追　风　膏

Zhuifeng Gao

【处方】 牛膝 50 g　桃仁 50 g　麻黄 50 g　当归 50 g　生草乌 50 g
红大戟 50 g　天麻 50 g　羌活 50 g　穿山甲 50 g　细辛 50 g
乌药 50 g　白芷 50 g　高良姜 50 g　独活 50 g　赤芍 50 g
海风藤 50 g　红花 50 g　蛇蜕 12 g　苏木 24 g　蜈蚣 15 g
威灵仙 50 g　地黄 24 g　熟地黄 24 g　续断 24 g　五加皮 12 g
生川乌 12 g　肉桂 50 g　冰片 2.4 g　没药 7.4 g　雄黄 7.4 g
血竭 7.4 g　麝香 2.4 g　乳香 7.4 g　丁香 2.4 g　檀香 7.4 g

【制法】 以上三十五味，肉桂、没药、血竭、乳香、丁香、檀香粉碎成细粉，雄黄水飞或粉碎成极细粉，与冰片、麝香配研，过筛，混匀。其余牛膝等二十六味，酌予碎断，与食用植物油 4800 g 同置锅内炸枯，去渣，滤过，炼至滴水成珠；另取黄丹 1500～2100 g，加入油内搅匀，收膏，将膏浸泡于水中。

取膏用文火熔化后，加入上述粉末，搅匀，分摊于布或纸上，即得。

【性状】 本品为摊于布或纸上的黑膏药。

【检查】 应符合膏药项下有关的各项规定(附录 4 页)。

【功能与主治】 祛风散寒，活血止痛。用于风湿痹痛，腰背酸痛，四肢麻木。

【用法与用量】 加温软化，贴于患处。

【注意】 孕妇忌贴腰腹部。

【规格】 每张净重 12 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【贮藏】 置阴凉干燥处。

胆 荚 片

Danjia Pian

【处方】 猪胆汁干膏 100 g 大皂角、拳参混合干浸膏 244 g

【制法】 取鲜猪胆汁，滤过，滤液浓缩干燥成干膏。另取大皂角 3 份、拳参 10 份，加水煎煮二次，第一次 2 小时，第二次 1 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩干燥成混合干浸膏。将以上二种干膏，照处方量混合粉碎，加适量辅料，制成颗粒，干燥，压制成 1000 片，包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕黑色；味苦、微腥。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定（附录 6 页）。

【功能与主治】 清热化痰，平喘止咳。用于慢性支气管炎。

【用法与用量】 口服，一次 5 片，一日 3 次。

【贮藏】 密封保存。

养阴清肺膏

Yangyin Qingfei Gao

【处方】 地黄 100 g 麦冬 60 g 玄参 80 g 川贝母 40 g
白芍 40 g 牡丹皮 40 g 薄荷 25 g 甘草 20 g

【制法】 以上八味，将川贝母粉碎后，照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法（附录11页），用 70%乙醇作溶剂，浸渍 24 小时后进行渗漉，收集漉液，蒸去乙醇，静置。牡丹皮与薄荷粉碎成粗粉，分别用蒸气蒸馏法蒸取挥发性成份，另器保存；药渣与其余地黄等五味加水煎煮二次，每次 2 小时，合并煎液，静置，滤过。倾取上述两种澄清液，另加预热至 116° 的蜂蜜 500 g，混匀，滤过，滤液浓缩至比重为 1.40～1.42（50° 热测）时，放冷，加入上述牡丹皮等的挥发性成份，混匀，即得。

【性状】 本品为棕褐色稠厚的半流体；有薄荷及牡丹皮的香气，味甜，有清凉感。

【鉴别】 (1) 取本品约 10 ml，加水 20 ml 及碳酸钠试液 5 ml，搅匀，置分液漏斗中，用乙醚分二次振摇提取，每次 10 ml，合并乙醚液，再用 2%盐酸溶液 6 ml 振摇提

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

取，取盐酸液，分置三支试管中。一管加碘化铋钾试液1滴，发生红棕色沉淀；一管加碘化汞钾试液1滴，显黄色浑浊；另一管加硅钨酸试液1滴。显白色浑浊。

(2) 取本品约2 g，置100 ml烧杯中，加水10 ml，搅匀，烧杯口平铺一张用水湿润的滤纸，滤纸上加少量氯亚胺基-2,6-二氯醌1份与四硼酸钠32份的混合粉末，稍铺匀，上盖一表玻璃，小火加热至微沸时，停止加热，滤纸即显蓝色。

【检查】 应符合煎膏剂项下有关的各项规定（附录4页）。

【功能与主治】 养阴润燥，清肺利咽。用于咽喉干燥、疼痛，鼻干唇燥，口渴，咳嗽，痰中带血，慢性扁桃体炎。

【用法与用量】 口服，一次10～20 ml，一日2～3次。

【贮藏】 密闭，避热。

首　乌　丸

Shouwu Wan

【处方】

首乌(制)306 g	地黄20g	牛膝(酒制)40 g	桑椹清膏70 g
女贞子(酒制)40 g	墨旱莲清膏48 g	桑叶(制)10 g	黑芝麻16 g
菟丝子(酒蒸)80 g	金樱子清膏70 g	补骨脂(盐炒)40 g	豨莶草(制)80g
金银花(制)20 g			

【制法】 以上十三味，除三种清膏外，其余首乌等十味粉碎成细粉，过筛，混匀。用金樱子清膏、桑椹清膏和部分墨旱莲清膏，加炼蜜10 g与适量的水泛丸，稍干后，再用剩余的墨旱莲清膏，加炼蜜10 g包衣，打光，干燥，即得。

【性状】 本品为黑色的水蜜丸；味甜、微苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：草酸钙簇晶直径约至80 μm。草酸钙簇晶存在于叶肉组织中，偶见方晶。木纤维成束，壁较薄，非木化，纹孔斜裂缝状、人字状或十字状。果皮表皮细胞表面观类多角形，垂周壁厚薄不匀，胞腔含淡棕色物。种皮表皮细胞淡黄色，表面观多角形，垂周壁厚6～10 μm，木化，胞腔含类圆形草酸钙结晶。种皮栅状细胞2列，内列较外列长，有光辉带。种皮栅状细胞淡棕色或红棕色，表面观类多角形，壁稍厚，胞腔含红棕色物。非腺毛3～4细胞，其中常有1个细胞稍皱缩。花粉粒类圆形，直径约至76 μm，外壁有刺状雕纹，具3个萌发孔。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录1页)。

【功能与主治】 补肝肾，强筋骨，乌须发。用于肝肾两虚、头晕目花，耳鸣，腰酸

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

肢麻，头发早白，高血脂症。

【用法与用量】 口服，一次 6 g，一日 2 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

洁 白 丸

Jiebai Wan

本品为藏族验方，藏文名为 རྒྱས་དཀར （日格尔）。

【处方】 诃子(煨)370 g 寒水石(平制)210 g 翼首草 85 g 五灵脂膏 178 g
藏木香 26 g 石榴子 26 g 木瓜 26 g 沉香 19 g
丁香 20 g 石灰华 13 g 红花 6 g 肉豆蔻 13 g
草豆蔻 13 g 草果仁 13 g

【制法】 以上十四味，除五灵脂膏外，其余诃子等十三味粉碎成细粉，过筛，混匀，加五灵脂膏、炼蜜 370 g 及适量的水泛丸，干燥，打光，即得。

【性状】 本品为暗褐色的水蜜丸；气香，味涩、苦、辛。

【检查】 除崩解时限不检查外，其他应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 健脾和胃，止痛止吐，分清泌浊。用于胸腹胀满，胃脘疼痛，消化不良，呕逆泄泻，小便不利。

【用法与用量】 嚼碎吞服，一次 1 丸，一日 2～3 次。

【规格】 每丸重 0.8 g

【贮藏】 密闭，防潮。

活 血 止 痛 散

Huoxue Zhitong San

【处方】 当归 400 g 三七 80 g 乳香(制)80 g 冰片 20 g
土鳖虫 200 g 自然铜(煅)120 g

【制法】 以上六味，除冰片外，其余当归等五味粉碎成细粉；将冰片研细，与上述粉末配研，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为灰褐色粉末；气清凉，味辛、苦。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【鉴别】（1）取本品，置显微镜下观察：薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。树脂道碎片含棕黄色滴状或块状分泌物。体壁碎片黄色或棕红色，有圆形毛窝，直径 8～24 μm，有的具长短不一的刚毛。

（2）取本品约 0.1 g，加稀盐酸 1 ml，加热煮沸数分钟，滤过，滤液显铁盐(附录41页)的鉴别反应。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 活血散瘀，消肿止痛。用于跌扑损伤，瘀血肿痛。

【用法与用量】 用温黄酒或温开水送服，一次 1.5 g，一日 2 次。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 密封。

济生肾气丸

Jisheng Shenqi Wan

【处方】 熟地黄 160 g　山茱萸(制)80 g　牡丹皮 60 g　山药 80 g　茯苓 120 g
泽泻 60 g　肉桂 20 g　附子(制)20 g　牛膝 40 g　车前子 40 g

【制法】 以上十味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 35～50 g 与适量的水泛丸，干燥；或加炼蜜 90～110 g 制成小蜜丸或大蜜丸，即得。

【性状】 本品为棕褐色至黑褐色的水蜜丸、小蜜丸或大蜜丸；味酸而微甘苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：糊化淀粉粒团块类白色。不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。薄壁细胞类圆形，有椭圆形纹孔，集成纹孔群。草酸钙砂晶存在于薄壁细胞中。草酸钙针晶束存在于粘液细胞中，长 80～240 μm，针晶直径 2～8 μm。果皮表皮细胞橙黄色，表面观类多角形，垂周壁略连珠状增厚。种皮下皮细胞表面观狭长，壁稍波状，以数个细胞为一组，略作镶嵌状排列。石细胞类圆形或类长方形，壁一面菲薄。木栓细胞淡红色至微紫色，壁稍厚。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 温补肾阳，化气行水。用于肾虚水肿，腰酸腿软，尿频量少，痰饮喘咳，慢性肾炎。

【用法与用量】 口服，水蜜丸一次 6 g，小蜜丸一次 9 g，大蜜丸一次 1 丸；一日 2～3 次。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【规格】 大蜜丸每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

冠心苏合丸

Guanxin Suhe Wan

【处方】 苏合香 50 g　冰片 105 g　乳香(制)105 g　檀香 210 g　青木香 210 g

【制法】 以上五味，除苏合香、冰片外，其余乳香等三味粉碎成细粉；将冰片研细，与上述粉末配研，过筛，混匀。另取炼蜜适量微温后，加入苏合香，搅匀，再与上述粉末混匀，制成 1000 丸，即得。

【性状】 本品为深棕色至棕褐色大蜜丸；气芳香，味苦、凉。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：含晶细胞呈方形或长方形，壁甚厚，角隅处尤厚，木化，胞腔中含草酸钙方晶。

(2) 取本品 1 丸，置研钵中，加乙醚 5～10 ml研磨，滤过，滤液置蒸发皿中，使乙醚自然挥发后，覆盖表面皿，置水浴上加热，收集升华物，滴加 1% 香草醛的硫酸溶液 1～2 滴，液滴边缘渐显玫瑰红色。升华后的残渣加高锰酸钾试液 2 ml，以玻璃棒搅拌，即发生苯甲醛的臭气。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 理气，宽胸，止痛。用于心绞痛，胸闷，憋气。

【用法与用量】 含服或嚼碎后咽服，一次 1 丸，一日 1～3 次；也可于临睡前或发病时服用。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 密封。

祛风舒筋丸

Qufeng Shujin Wan

【处方】

防风 50 g	桂枝 50 g	麻黄 50 g
威灵仙 50 g	川乌(制) 50 g	草乌(制)50 g
苍术(炒) 50 g	茯苓 50 g	木瓜 50 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

秦艽 50 g　骨碎补(炒) 50 g　牛膝 50 g
甘草 50 g　海风藤 50 g　青风藤 50 g
穿山龙 50 g　老鹳草 50 g　茄根 50 g

【制法】 以上十八味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 160～180 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为黑褐色的大蜜丸；气微，味甜、苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。气孔特异，保卫细胞侧面观似电话筒状。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。草酸钙针晶细小，不规则地充塞于薄壁细胞中。油管含金黄色分泌物，直径约 30 μm。非腺毛单细胞，多破碎，直径 15～20 μm，壁有疣状突起。石细胞长方形或类方形，壁稍厚。石细胞圆形、长方形或类多角形，壁厚，胞腔含橙红色或棕色物。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 祛风散寒，舒筋活络。用于风寒湿痹，四肢麻木，腰腿疼痛。

【用法与用量】 口服，一次 1 丸，一日 2 次。

【规格】 每丸重 7 g

【贮藏】 密闭，防潮。

珠黄吹喉散

Zhuhuang Chuihou San

【处方】 珍珠 50 g　牛黄 30 g　硼砂(炒)250 g
西瓜霜 80 g　雄黄 40 g　儿茶 100 g
黄连 100 g　黄柏 150 g　冰片 50 g

【制法】 以上九味，除牛黄、冰片、西瓜霜外，珍珠、雄黄分别水飞或粉碎成极细粉；其余硼砂等四味粉碎成细粉；将牛黄、冰片研细，与上述粉末配研，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为淡黄色的粉末；具冰片特有香气，味苦，有清凉感。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：纤维束鲜黄色，周围细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维，含晶细胞的壁木化增厚。纤维束鲜黄色。壁稍厚，纹孔明显。不规则碎块无色或淡绿色，半透明，具光泽，有时可见细密波状纹理。不规则碎块金黄色或橙黄

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

色，有光泽。

（2）取本品少量，进行微量升华，升华物置显微镜下观察，呈不定形的无色片状结晶。

（3）取本品约 0.2 g，加水 5 ml，振摇，滤过，滤液加少量蔗糖，溶解后，沿管壁加硫酸 2 ml，两液接界处显红色环，振摇后溶液呈红色。

（4）取本品 1 g，加水 5 ml，振摇滤过，滤液加盐酸使成酸性后，点于姜黄试纸上使润湿，则现橙红色，放置干燥，颜色变深，再用氨试液熏之，则变为绿黑色。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定（附录 3 页）。

【功能与主治】 解毒化腐。用于咽喉口舌肿痛、糜烂。

【用法与用量】 外用适量，吹于患处。

【贮藏】 密封。

盐　蛇　散

Yanshe San

【处方】 盐蛇（炭）312 g　蛇胆汁 18 g　地龙（炭）468 g　珍珠 12 g
牛黄 12 g　麝香 12 g　冰片 12 g　陈皮（蒸）180 g
琥珀 180 g　朱砂 180 g

【制法】 以上十味，除牛黄、麝香、冰片外，珍珠、琥珀、朱砂分别水飞或粉碎成极细粉；陈皮粉碎成细粉，与蛇胆汁混匀，干燥，再与盐蛇、地龙共粉碎成细粉，将牛黄、麝香、冰片研细，与上述粉末配研，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为棕褐色的粉末；具麝香、冰片特异香气，味微苦、辛。

【鉴别】 （1）取本品，置显微镜下观察：草酸钙方晶成片存在于薄壁细胞中。不规则碎块淡黄绿色或棕黄色，透明或半透明。不规则碎块无色或淡绿色，具光泽，有时可见细密波状纹理。无定形团块淡黄棕色，埋有细小方形结晶。

（2）取本品约 1 g，加水少量，振摇，取朱红色沉淀，用盐酸湿润，在光洁铜片上轻轻摩擦，铜片表面即显银白色光泽，加热烘烤后，银白色即消失。

（3）取本品少量，进行微量升华，升华物置显微镜下观察，呈不定形的无色片状结晶。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定（附录 3 页）。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 定惊解痉，清热除痰。用于小儿惊风，痰涎壅盛。

【用法与用量】 口服，小儿六个月以内一次 0.4 g，半岁至一岁 1.6 g，一岁以上 3.2 g；一日 1～2 次。

【规格】 每瓶重 0.8 g

【贮藏】 密封。

荷 叶 丸

Heye Wan

【处方】 荷叶 320 g　藕节 64 g　大蓟(炭) 48 g　小蓟(炭) 48 g
知母 64 g　黄芩(炭) 64 g　地黄(炭) 96 g　棕榈(炭) 96 g
栀子(焦) 64 g　白茅根(炭) 96 g　玄参 96 g　白芍 64 g
当归 32 g　香墨 8 g

【制法】 以上十四味，将荷叶取出一半炒炭，一半用黄酒 240 g 浸拌，置罐中，加盖封闭，隔水炖至酒尽，取出，低温干燥，与其余藕节等十三味粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 140～150 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为黑色的大蜜丸；气微，味甘，后微苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：淀粉粒类长圆形，一端较大，有的一边凸出，直径约至 30 μm，脐点人字状或短缝状，位于较大端，层纹明显。叶上表皮细胞多角形，外壁乳头状突起；草酸钙簇晶直径约至 40 μm，存在于叶肉组织中。草酸钙针晶成束或散在，长 26～110 μm。草酸钙簇晶直径 18～32 μm，存在于薄壁细胞中，常排列成行，或一个细胞中含有数个簇晶。纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。纤维束棕色，表面圆形细胞中含硅质块。种皮石细胞黄色或淡棕色，多破碎，完整者长多角形、长方形或形状不规则，壁厚，有大的圆纹孔，胞腔棕红色。石细胞黄棕色或无色，类长方形、类圆形或形状不规则，直径约至 94 μm。表皮细胞纵列，常由 1 个长细胞与 2 个短细胞相间连接，长细胞壁波状弯曲，稍增厚，木化。不规则团块棕黑色或黑色。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)

【功能与主治】 凉血，去瘀，止血。用于咯血，衄血，尿血，便血，崩漏。

【用法与用量】 口服，一次 1 丸，一日 2～3 次。

【规格】 每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

桂附地黄丸

Guifu Dihuang Wan

【处方】 肉桂 20 g　附子(制) 20 g　熟地黄 160 g　山茱萸(制) 80 g
牡丹皮 60 g　山药 80 g　茯苓 60 g　泽泻 60 g

【制法】 以上八味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 35～50 g 与适量的水泛丸，干燥；或加炼蜜 80～110 g 制成小蜜丸或大蜜丸，即得。

【性状】 本品为黑棕色的水蜜丸、黑褐色的小蜜丸或大蜜丸；味甜而带酸辛。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：淀粉粒三角状卵形或矩圆形，直径 24～40μm，脐点短缝状或人字状。糊化淀粉粒团块类白色。不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。草酸钙簇晶存在于无色薄壁细胞中，有时数个排列成行。果皮表皮细胞橙黄色，表面观类多角形，垂周壁略连珠状增厚。薄壁细胞类圆形，有椭圆形纹孔，集成纹孔群。石细胞类方形或类圆形，壁一边菲薄。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 温补肾阳。用于肾阳不足，腰膝酸软，肢冷，浮肿，小腹胀满，小便不利、频数，痰饮喘咳。

【用法与用量】 口服，水蜜丸一次 6 g，小蜜丸一次 9 g，大蜜丸一次 1 丸；一日 2 次。

【规格】 大蜜丸每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

逍　遥　丸

Xiaoyao Wan

【处方】 柴胡 100 g　当归 100 g　白芍 100 g　白术(炒) 100 g
茯苓 100 g　甘草(蜜炙) 80 g　薄荷 20 g

【制法】 以上七味，粉碎成细粉，过筛，混匀。另取生姜 100 g 分次加水煎煮，滤过，用煎出液泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为黄棕色至棕色的水丸；味甜。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。草酸钙簇晶存在于薄壁细胞中，常排列成行，或一个细胞中含数个簇晶。草酸钙针晶细小，不规则地充塞于薄壁细胞中。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。油管含黄色或棕黄色分泌物。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 疏肝和中，养血调经。用于肝气不舒，胸胁胀痛，头晕目眩，食欲减退，月经不调。

【用法与用量】 口服，一次 6～9 g，一日 1～2 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

健　步　丸

Jianbu Wan

【处方】

黄柏(盐炒) 40 g	知母(盐炒) 20 g	熟地黄 20 g	当归 10 g
白芍(酒炒) 15 g	牛膝 35 g	豹骨(制) 10 g	龟板(制) 40 g
陈皮(盐炒) 7.5 g	干姜 5 g	锁阳 10 g	羊肉 320 g

【制法】 以上十二味，将羊肉洗净，剔去筋、膜、油，加黄酒 40 g 煮烂，与黄柏等十一味捣和，干燥，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末用 糯米粉 5～10 g 调稀糊泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为棕褐色至深褐色的糊丸；气微腥，味微苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：纤维束鲜黄色，周围细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维，含晶细胞的壁木化增厚。草酸钙针晶成束或散在，长 26～110 μm，草酸钙方

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

健胃归津散

Jianwei Guijin San

本品系蒙古族验方，蒙古文名为 ᠤᠨᠴᠢᠭᠠᠨ ᠠᠷ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠ（通嘎拉克温·塔拉哈）。

【处方】 石榴 400 g　红花 200 g　豆蔻 50 g　肉桂 50 g　草芨 50 g

【制法】 以上五味，粉碎成细粉，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为黄棕色的粉末；气香，味酸辛、微涩。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：石细胞无色，椭圆形或类圆形，壁厚，孔沟细密。石细胞类方形或类圆形，壁一面菲薄。内种皮石细胞黄棕色或棕红色，表面观类多角形，壁厚，胞腔含硅质块。种皮细胞红棕色或黄棕色，长多角形，壁略作波状或连珠状增厚。花粉粒圆球形或椭圆形，直径约 60 μm，外壁有刺，有 3 个萌发孔。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录 3 页)。

【功能与主治】 开郁消食，暖胃。用于食欲不振，消化不良，胃脘冷痛，满闷嗳气，腹胀泄泻。

【用法与用量】 口服，一次 2～3 g，一日 3 次。

【规格】 每袋重 18 g

【贮藏】 密闭，防潮。

健　脾　丸

Jianpi Wan

【处方】 党参 200 g　　白术(炒) 300 g　陈皮 200 g
枳实(炒) 200 g　山楂(炒) 150 g　麦芽(炒) 200 g

【制法】 以上六味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 130～160 g 制成小蜜丸或大蜜丸，即得。

【性状】 本品为棕褐色至黑褐色的小蜜丸或大蜜丸；味微甜、微苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：淀粉粒类圆形或椭圆形，直径 8～40 μm，脐点裂缝状。联结乳管直径 12～15 μm，含细小颗粒状物。草酸钙针晶细小，长 10～32 μm，不规则地充塞于薄壁细胞中。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。果皮石细胞淡紫红色、

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

红色或黄棕色，类圆形或多角形，直径约至 125 μm。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 健脾开胃。用于脾胃虚弱，脘腹胀满，食少便溏。

【用法与用量】 口服，小蜜丸一次 9 g，大蜜丸一次 1 丸；一日 2 次，小儿酌减。

【规格】 大蜜丸每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

健 腰 丸

Jianyao Wan

【处方】 杜仲(盐炒) 480 g 补骨脂(盐炒) 240 g 核桃仁(炒) 150 g 大蒜 120 g

【制法】 以上四味，将大蒜蒸熟，干燥，与杜仲、补骨脂粉碎成细粉，过筛，再将核桃仁捣烂，与上述粉末掺研，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 20～30 g 与适量的水泛丸，干燥；或加炼蜜 50～70 g，制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为棕褐色至黑褐色的水蜜丸或大蜜丸；气微香，味苦、甘而辛。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：橡胶丝呈条状或扭曲成团，表面带颗粒性；石细胞类长方形或长条形，有的胞腔含橡胶团块。种皮栅状细胞淡棕色或红棕色，表面观类多角形，壁稍厚，胞腔含红棕色物。种皮表皮细胞多角形，有时可见扁圆形气孔，宽约 66 μm，保卫细胞广肾形；脂肪油滴甚多。

【检查】 本品水蜜丸除崩解时限检查应在 2 小时内崩解外，其他应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 温肾，壮筋骨。用于肾虚腰痛，膝软乏力。

【用法与用量】 口服，水蜜丸一次 6～9 g，大蜜丸一次 1 丸；一日 2～3 次。

【规格】 大蜜丸每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

脏 连 丸

Zanglian Wan

【处方】 黄连 25 g 黄芩 150 g 地黄 75 g 赤芍 50 g 当归 50 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

槐角 100 g　槐花 75 g　荆芥穗 50 g　地榆(炭) 75 g　阿胶 50 g

【制法】 以上十味，粉碎成粗粉，装入猪大肠中，置适宜的容器内，蒸熟后切碎，干燥，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 6～10 g 与适量的水泛丸，干燥；或加炼蜜 80～110 g 制成小蜜丸或大蜜丸，即得。

【性状】 本品为棕褐色至黑褐色的水蜜丸、黑褐色的小蜜丸或大蜜丸；味苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：纤维束鲜黄色，壁稍厚，纹孔明显。纤维淡黄色，棱形，壁厚，孔沟细。纤维细长，微弯曲，壁稍厚，非木化。薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。内果皮细胞含草酸钙方晶；种皮栅状细胞 1 列，长 100～190 μm。花瓣下表皮细胞多角形，有不定式气孔；薄壁细胞含草酸钙方晶。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 清肠止血。用于便血，肛门灼热，痔疮出血肿痛。

【用法与用量】 口服，水蜜丸一次 6～9 g，小蜜丸一次 9 g，大蜜丸一次 1 丸；一日 2 次。

【规格】 大蜜丸每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

疳 积 散

Ganji San

【处方】 石燕（煅） 100 g　石决明（煅） 100 g　使君子仁 100 g
鸡内金(炒) 50 g　谷精草 50 g　威灵仙 50 g
茯苓 100 g

【制法】 以上七味，粉碎成细粉，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为灰黄色的粉末，味微涩。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。网纹细胞椭圆形或长圆柱形，壁不规则网状增厚，微木化。腺毛头部 1～3 细胞，梨形，壁密具微细疣状突起，柄多为单细胞。

(2) 取本品约 0.5 g，置试管中，加稀盐酸 2 ml，即泡沸，发放二氧化碳气体，此气遇氢氧化钙试液，即发生白色沉淀；滤过，滤液用氢氧化钠试液中和后，显钙盐的鉴别反应（附录40页）。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定（附录 3 页）。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 消积治疳。用于小儿疳积，面黄肌瘦，腹部胀满，消化不良，目翳夜盲。

【用法与用量】 用米汤加食糖少许蒸后调服，一次 9 g；三岁以内小儿酌减。

【贮藏】 密闭，防潮。

益 元 散

Yiyuan San

【处方】 滑石 600 g 甘草 100 g 朱砂 30 g

【制法】 以上三味，朱砂水飞或粉碎成极细粉；滑石、甘草粉碎成细粉，与上述粉末配研，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为浅粉红色的粉末；具甘草的甜味，手捻有润滑感。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：不规则块片无色，有层层剥落痕迹。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。不规则细小颗粒暗棕红色，有光泽，边缘暗黑色。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定（附录 3 页）。

【含量测定】 取本品约 2.5 g，精密称定，置 250 ml 烧瓶中，加硫酸 10 ml 与硝酸钾 1.5 g，小心加热使朱砂溶解，放冷，加 1%硝酸溶液 10 ml，摇匀，再冷却后，用垂熔漏斗滤过，漏斗和烧瓶用 1%硝酸溶液 40 ml 分次洗涤，洗液并入滤液中，滴加 1% 高锰酸钾溶液，至显 2 分钟内不消失的粉红色，再滴加 2% 硫酸亚铁溶液恰至红色消失，加硫酸铁铵指示液 2 ml，用 $N/10$ 硫氰酸铵液滴定，即得（每 1 ml 的 $N/10$ 硫氰酸铵液相当于 11.63 mg 的 HgS）。

本品含朱砂按 HgS 计算，应为 3.5～4.2%。

【功能与主治】 清暑利湿，除烦。用于暑热身倦，心烦口渴，小便黄少。

【用法与用量】 调服或煎服汤，一次 6 g，一日 1～2 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

益 母 丸

Yimu Wan

【处方】 益母草 480 g 当归 240 g 川芎 120 g 木香 45 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【制法】 以上四味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 170～190 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为黄褐色的大蜜丸；气香，味苦、微甜。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：菊糖团块形状不规则，有时可见微细放射状纹理，加热后溶解。非腺毛 1～3 细胞，锥形，稍弯曲，壁有疣状突起。薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。螺纹导管直径 8～23 μm，有的加厚壁互相连接，似网状螺纹导管。

(2) 取本品 2 丸，加乙醇少量，研磨，移入 100 ml 锥形瓶中，再加乙醇 15 ml，振摇，浸渍 15 分钟，取上清液滤过。取滤液 1 滴，点于滤纸上，挥干后，滴加碘化铋钾试液，显橘红色斑点。

(3) 取鉴别(2)项下剩余滤液 1 ml，加亚硝基铁氰化钠试液 1 滴及饱和氢氧化钾溶液 1 滴，即发生红色沉淀。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录 1 页）。

【功能与主治】 活血调经，行气止痛。用于气滞血瘀，月经不调，痛经，产后瘀血腹痛。

【用法与用量】 口服，一次 1 丸，一日 2 次。

【注意】 孕妇及月经过多者忌服。

【规格】 每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

调　经　丸

Tiaojing Wan

【处方】

当归 75 g	白芍（酒炒） 75 g	川芎 50 g
熟地黄 100 g	艾叶（炭） 50 g	香附（醋制） 200 g
陈皮 50 g	半夏（制） 50 g	茯苓 59 g
甘草 15 g	白术（炒） 75 g	吴茱萸（制） 25 g
小茴香（盐炒） 25 g	元胡（醋制） 25 g	没药（制） 25 g
益母草 100 g	牡丹皮 50 g	续断 50 g
黄芩（酒炒） 50 g	麦冬 50 g	阿胶 100 g

【制法】 以上二十一味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 100～120g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为深褐色至黑色的大蜜丸；气微，味苦、微甘辛。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：淀粉粒类球形或半球形，直径约至 30 μm，脐点裂缝状、人字状或星状。不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。分泌细胞类圆形，含淡黄棕色至红棕色分泌物。薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。草酸钙针晶成束或散在，长 24～50 μm，直径约 3 μm。草酸钙簇晶直径约至 45 μm，存在于淡黄棕色皱缩的薄壁细胞中，常数个排列成行。草酸钙方晶成片存在于薄壁细胞中。草酸钙针晶细小，不规则地充塞于薄壁细胞中。纤维直径 15～35 μm，壁厚，微木化，有大的圆形纹孔。纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。薄壁细胞灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。厚壁组织碎片绿黄色，细胞类多角形或略延长，壁稍弯曲，有的连珠状增厚，纹孔细密，非腺毛 1～3 细胞，锥形，稍弯曲，壁有疣状突起。“T”形毛棕色或焦黑色，弯曲，柄 1～3 细胞，常脱落。木栓细胞淡红色至微紫色，壁稍厚，多层重叠。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录 1 页）。

【功能与主治】 理气和血，调经止痛。用于气郁血滞，月经不调，经来腹痛，崩漏白带。

【用法与用量】 口服，一次 1 丸，一日 2～3 次。

【规格】 每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

通　关　散

Tongguan San

【处方】 猪牙皂 500 g　鹅不食草 250 g　细辛 250 g

【制法】 以上三味，粉碎成细粉，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为浅黄褐色的粉末；气香，味辛，有刺鼻感。

【鉴别】 （1）取本品，置显微镜下观察：果皮表皮细胞红棕色，表面观类多角形，壁较厚，表面有微细颗粒；纤维束淡黄色，周围细胞含草酸钙方晶及少数簇晶，形成晶纤维，并常伴有类方形厚壁细胞。叶的组织碎片有不定式气孔，直径约 14 μm，副卫细胞纤细。下皮细胞类长方形，壁细波状弯曲，夹有类方形或长圆形分泌细胞。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

(2) 取本品约 0.5 g，加水适量煮沸，滤过。取滤液放冷，振摇，产生持久性泡沫。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定（附录 3 页）。

【功能与主治】 取嚏，开窍。用于突然昏厥，不省人事。

【用法与用量】 每用少许，吹鼻取嚏。

【注意】 脑实质性病变和孕妇忌用。

【贮藏】 密闭，防潮。

通宣理肺丸

Tongxuan Lifei Wan

【处方】 紫苏叶 144 g　前胡 96 g　桔梗 96 g　苦杏仁 72 g
麻黄 96 g　甘草 72 g　陈皮 96 g　半夏(制) 72 g
茯苓 96 g　枳壳(炒) 96 g　黄芩 96 g

【制法】 以上十一味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 130～160 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为黑棕色至黑褐色的大蜜丸；味微甜、略苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。气孔特异，保卫细胞侧面观似电话筒状。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。草酸钙针晶成束，长 32～144 μm，存在于粘液细胞中或散在。石细胞橙黄色，贝壳状，壁较厚，较宽一边纹孔明显。联结乳管直径 14～25 μm，含淡黄色颗粒状物。油管含金黄色分泌物。叶肉组织中有细小草酸钙簇晶，直径 4～8 μm。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录 1 页）。

【功能与主治】 解表散寒，宣肺止嗽。用于感冒咳嗽，发热恶寒，头痛无汗，肢体酸痛。

【用法与用量】 口服，一次 2 丸，一日 2～3 次。

【规格】 每丸重 6 g

【贮藏】 密闭，防潮。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

桑菊感冒片

Sangju Ganmao Pian

【处方】 桑叶 465 g　菊花 185 g　连翘 280 g　薄荷油 1 ml
苦杏仁 370 g　桔梗 370 g　甘草 150 g　芦根 370 g

【制法】 以上八味，除薄荷油外，桔梗粉碎成细粉，过筛。连翘提取挥发油后，再与其余桑叶等五味加水煎煮二次（苦杏仁在水沸时加入），每次 2 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩成稠膏，加桔梗粉末及辅料，搅匀，制成颗粒，干燥，放冷，喷加薄荷油等挥发油，混匀，压制成 1000 片，即得。

【性状】 本品为浅棕色至棕褐色的片；气微香，味微苦。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：联结乳管直径 14～25 μm，含淡黄色颗粒状物。

(2) 取本品粉末约 1 g，加石油醚 5 ml，浸渍 15 分钟，时加振摇，滤过，滤液挥尽石油醚，残渣加香草醛试液 2～3 滴，即显棕色，放置，逐渐变成红紫色。

(3) 取本品粉末约 1 g，加乙醇 5 ml，温热 10 分钟，滤过，滤液蒸去乙醇，残渣加水适量使溶解，加三氯化铁试液 2～3 滴，即显污绿色。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定（附录 6 页）。

【功能与主治】 疏风清热，宣肺止咳。用于风热感冒初起，头痛，咳嗽，口干，咽痛。

【用法与用量】 口服，一次 4～8 片，一日 2～3 次。

【贮藏】 密封。

桑　麻　丸

Sangma Wan

【处方】 桑叶 800 g　黑芝麻（炒）200 g

【制法】 以上二味，粉碎成细粉，过筛，混匀，用水泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为灰绿色的水丸；味微苦带涩。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：草酸钙簇晶存在于叶肉组织中，偶见方晶。种皮表皮细胞淡黄色，表面观多角形，垂周壁厚 6～10 μm，木化，胞腔含类圆形草酸钙

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

结晶。

（2）取本品约5 g，研细，用乙醚提取，滤过，滤液蒸去乙醚，加含1%蔗糖的盐酸溶液，放置片刻，酸层显红色。

【检查】 本品除崩解时限检查应在2小时内崩解外，其他应符合丸剂项下有关的各项规定（附录1页）。

【功能与主治】 滋养肝肾，祛风明目。用于肝肾不足，头晕眼花，视物不清，迎风流泪。

【用法与用量】 口服，一次6 g，一日3次。

【贮藏】 密闭，防潮。

控　涎　丸

Kongxian Wan

【处方】 甘遂（醋制）300 g　红大戟300 g　白芥子300 g

【制法】 以上三味，粉碎成细粉，过筛，混匀。另取米粉或黄米粉240 g调稀糊泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为棕褐色带有淡黄色斑点的糊丸；味微辛辣。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：无节乳管存在于薄壁组织中。色素细胞黄棕色或红棕色，长圆形或延长成管状；草酸钙针晶成束或散在。种皮栅状细胞表面观细小，多角形，壁厚；侧面观类长方形，侧壁及内壁增厚。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录1页）。

【功能与主治】 涤痰逐饮。用于痰饮咳喘胁痛，胸腔积水。

【用法与用量】 用温开水或枣汤、米汤送服，一次1～3 g，一日1～2次。

【注意】 孕妇忌服，体虚者慎服。

【贮藏】 密闭，防潮。

黄连羊肝丸

Huanglian Yanggan Wan

【处方】 黄连20 g　胡黄连40 g　黄芩40 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

黄柏 20 g	龙胆 20 g	柴胡 40 g
青皮(醋炒) 40 g	木贼 40 g	密蒙花 40 g
菟蔚子 40 g	决明子(炒) 40 g	石决明（煅） 40 g
夜明砂 40 g	鲜羊肝 160 g	

【制法】 以上十四味，将鲜羊肝切碎蒸熟，干燥，与黄连等十三味掺匀，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 120～150 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为黑褐色的大蜜丸；味苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：纤维束鲜黄色，壁稍厚，纹孔明显。纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。纤维束鲜黄色，周围细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维，含晶细胞的壁木化增厚。星状毛顶端 2 细胞各 2 分叉，成 4 叉状，每分叉长 250～500 μm，基部 2 细胞易断落。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。种皮栅状细胞 1 列，长 40～72 μm，其下数列细胞含草酸钙簇晶及方晶。油管含黄色或棕黄色分泌物。不规则团块暗灰色，不透明，加酸发生气泡。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录 1 页）。

【功能与主治】 清火，明目，用于肝火旺盛，目赤，羞明，翳膜遮睛

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【性状】 本品为朱红色的水丸，除去外衣，显棕黄色至棕色；气香，味苦、麻舌。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：种皮下皮细胞黄色，多角形或长多角形，壁稍厚。木纤维淡黄色，纤维管胞壁稍厚，有具缘纹孔，纹孔口人字状或十字状。不规则块片血红色，周围液体显姜黄色，渐变红色。不规则碎块无色或淡绿色，半透明，具光泽，有时可见细密波状纹理。无定形团块淡黄棕色，埋有细小方形结晶。不规则碎块金黄色或橙黄色，透明或半透明，有光泽。

(2) 取本品5粒，研细，平铺于瓷皿中，置水浴上加热至无冰片香气后，加醋酸乙酯10 ml浸渍10分钟，不断搅拌，滤过，滤液用活性炭脱色，滤过，滤液在水浴上蒸干，残渣中加60%醋酸3 ml，搅拌使溶解，滤过，滤液中加新制的糠醛溶液（1→100）1 ml与硫酸溶液（硫酸50 ml与水65 ml混合）13 ml，于70～80°水浴中加热片刻，即显淡紫红色。

(3) 取本品1粒，研细，加硫酸混合后，加甲醇，点火燃烧，即发生边缘带绿色的火焰。

(4) 取本品1粒，研细，进行微量升华，升华物置显微镜下观察，呈不定形的无色片状结晶。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录1页）。

【功能与主治】 清解热毒，消肿止痛。用于疔疮痈肿初起，咽喉、龈、舌肿痛。

【用法与用量】 口服，一次3粒，一日1～2次；外用时用醋化开，敷于患处。

【注意】 孕妇忌服。

【规格】 每10粒重1 g

【贮藏】 密封。

蛇胆川贝散

Shedan Chuanbei San

【处方】 蛇胆汁100 g　川贝母600 g

【制法】 以上二味，川贝母粉碎成细粉，与蛇胆汁混匀，干燥，粉碎，过筛，即得。

【性状】 本品为浅黄色至浅棕黄色的粉末；味甘、微苦。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：淀粉粒广卵形或贝壳形，直径40～64 μm，脐点短缝状、人字状或马蹄状，层纹可察见。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

(2) 取本品约 1 g，加乙醇 5 ml，研磨，滤过，滤液蒸干，残渣加 60% 醋酸溶液 1 ml 溶解，加新制的 1% 糠醛溶液 1 ml，再加 50% 硫酸溶液 5 ml，在 70° 保温 10 分钟。溶液由淡红色逐渐变为紫蓝色。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定（附录 3 页）。

【功能与主治】 清肺，止咳，除痰。用于肺热咳嗽，痰多。

【用法与用量】 口服，一次 0.3～0.6 g，一日 2～3 次。

【规格】 每瓶重 0.3 g

【贮藏】 密封。

蛇胆陈皮散

Shedan Chenpi San

【处方】 蛇胆汁 100 g　　陈皮（蒸） 600 g

【制法】 以上二味，陈皮粉碎成细粉，与蛇胆汁混匀，干燥，粉碎，过筛，即得。

【性状】 本品为黄棕色至红棕色的粉末；气微香，味甘、辛、微苦。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。

(2) 取本品约 1 g，加乙醇 10 ml，温热 10 分钟，滤过，滤液加镁粉少量，缓缓滴加盐酸 0.5 ml，即显红色。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定（附录 3 页）。

【功能与主治】 顺气化痰，祛风健胃。用于风寒咳嗽，痰多呕逆。

【用法与用量】 口服，一次 0.3～0.6 g，一日 2～3 次。

【规格】 每瓶重 0.3 g

【贮藏】 密封。

婴儿保肺散

Ying'er Baofei San

【处方】 川贝母 160 g　　橘红 120 g　　半夏(制) 80 g
紫苏子(炒) 50 g　　紫苏梗 50 g　　桔梗 50 g
竹黄 40 g　　百部 50 g　　冰片 40 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

硼砂 30 g　　石膏 30 g　　滑石 30 g

赭石 60 g

【制法】 以上十三味，除冰片外，其余川贝母等十二味粉碎成细粉；将冰片研细，与上述粉末配研，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为粉红色至淡棕色的粉末；气清凉，味苦。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定（附录 3 页）。

【功能与主治】 清肺化痰，止咳降逆。用于肺热咳嗽，痰多呕吐。

【用法与用量】 口服，一至二岁一次 0.6 g，一日 1 次，周岁以内酌减。

【贮藏】 密闭，防潮。

婴　儿　散

Ying'er San

【处方】 白扁豆(炒) 400 g　　鸡内金(炒) 120 g　　川贝母 8 g

山药(炒) 120 g　　白术(炒) 120 g　　木香 120 g

牛黄 0.25 g　　碳酸氢钠 120 g

【制法】 以上八味，除牛黄、碳酸氢钠外，其余白扁豆等六味粉碎成细粉；将牛黄研细，与碳酸氢钠及上述粉末配研，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为淡黄色的粉末；气香，味咸、微苦。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定（附录 3 页）。

【功能与主治】 健脾，消食，止泻。用于消化不良，乳食不进，腹痛腹泻。

【用法与用量】 口服，不满周岁一次 0.25 g，一至三岁一次 0.5～1 g，一日 2 次。

【规格】 每包重 0.5 g

【贮藏】 密闭，防潮。

银 黄 注 射 液

Yinhuang Zhusheye

本品为金银花提取物与黄芩提取物的灭菌水溶液。每 2 ml 含金银花提取物以绿原酸（$C_{16}H_{18}O_9$）计算，不得少于 22.5 mg；含黄芩提取物以黄芩甙（$C_{21}H_{18}O_{11}$）计算，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

不得少于 36 mg。

【处方】	金银花提取物（以绿原酸计）	12.5 g
	黄芩提取物（以黄芩甙计）	20 g
	苯甲醇	10 ml
	注射用水	加至 1000 ml

【制法】 取金银花提取物与黄芩提取物，分别加注射用水与 8% 氢氧化钠溶液适量溶解后，合并二液，加注射用水使成 980 ml，用 8% 氢氧化钠溶液调节 pH 值至 7.2，加活性炭适量，置水浴上加热 1 小时，放冷，加入苯甲醇与注射用水使成 1000 ml，滤过，灌封，灭菌，即得。

【性状】 本品为棕黄色或棕红色的澄明液体。

【鉴别】 (1) 取本品 1 ml，加 5% 硝酸钠溶液与 10% 硝酸铝溶液各 0.3 ml，即发生黄色沉淀，再加 5% 氢氧化钠溶液使成碱性，沉淀即溶解，溶液显棕红色。

(2) 取本品 0.1 ml，加水 10 ml，摇匀，取稀释液 2 ml，加 5% 二氯氧化锆溶液 1～2 滴，溶液显黄色，再加盐酸 1～2 滴，黄色不退。

(3) 取本品 2 ml，加 1% 明胶溶液 0.5 ml，混匀，滴加20%氯化钠溶液，即发生沉淀。

【检查】 **pH 值** 应为 6.0～7.0（附录42页）。

溶血试验 取本品 0.3 ml，加生理盐水 2.2 ml 与兔红细胞生理盐水混悬液 2.5 ml，置 36.5°±0.5°恒温水浴中，观察半小时，不得有溶血现象。

其他 应符合注射剂项下有关的各项规定（附录 7 页）。

【含量测定】 精密量取本品 1 ml，置 100 ml 量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，精密量取稀释液 5 ml，置 200 ml 量瓶中，加 $N/5$ 盐酸液稀释至刻度，摇匀。照分光光度法（附录32页），在 276±1 nm 与 324±1 nm 的波长处分别测定吸收度，按下式计算，即得。

$$C_1 = 2.599 \times E_{324} - 1.522 \times E_{276}$$

$$C_2 = 2.121 \times E_{276} - 0.9169 \times E_{324}$$

$$\text{绿原酸 } (C_{16}H_{18}O_9) \text{ 的含量 (mg/ml)} = \frac{C_1 \times 200 \times 100}{100 \times 5 \times 1}$$

$$\text{黄芩甙 } (C_{21}H_{18}O_{11}) \text{ 的含量(mg/ml)} = \frac{C_2 \times 200 \times 100}{100 \times 5 \times 1}$$

C_1＝供试品溶液中绿原酸浓度（mg/100ml）

C_2＝供试品溶液中黄芩甙浓度（mg/100ml）

E_{276}＝供试品溶液在 276 nm 波长处测得的吸收度

E_{324}＝供试品溶液在 324 nm 波长处测得的吸收度

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 清热，解毒，消炎。用于上呼吸道感染，急性扁桃体炎，咽炎。

【用法与用量】 肌内注射，一次 2～4 ml，一日 1～2 次。

【规格】 2 ml

【贮藏】 遮光，密闭保存。

银翘解毒丸

Yinqiao Jiedu Wan

【处方】 金银花 160 g 连翘 160 g 薄荷 96 g 荆芥 64 g 淡豆豉 80 g
牛蒡子 96 g 桔梗 96 g 淡竹叶 64 g 芦根 96 g 甘草 80 g

【制法】 以上十味，荆芥、薄荷及半量的连翘分别提取挥发油后，药渣再与金银花、牛蒡子、淡竹叶、芦根、淡豆豉加水煎煮二次，每次 2 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩成稠膏。其余桔梗、甘草及剩余的连翘粉碎成细粉，加入稠膏，混匀，干燥，研细，过筛，再喷加上述连翘、薄荷、荆芥挥发油，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 80～90 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为棕褐色的大蜜丸；气芳香，味微甜而苦、辛。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：石细胞类多角形、类长方形或类圆形，直径 36～48 μm，壁厚，有的一边菲薄。联结乳管直径 14～25 μm，含淡黄色颗粒状物。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。

(2) 取本品 2 g，加石油醚 5 ml，研磨后浸渍 15 分钟，时加振摇，滤过，滤液挥尽石油醚，残渣加香草醛试液 2～3 滴，显紫色，放置后，渐变为紫红色。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录 1 页）。

【功能与主治】 辛凉解表，清热解毒。用于风热感冒，发热头痛，咳嗽口干，咽喉疼痛。

【用法与用量】 口服，一次 1 丸，一日 2～3 次。

【规格】 每丸重 3 g

【贮藏】 密封。

银翘解毒片

Yinqiao Jiedu Pian

【处方】 金银花 200 g 连翘 200 g 薄荷油 1.2ml 荆芥 80 g 淡豆豉 100 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

牛蒡子 120 g　桔梗 120 g　淡竹叶 80 g　芦根 120 g　甘草 100 g

【制法】 以上十味，除薄荷油外，桔梗粉碎成细粉，过筛；连翘、荆芥提取挥发油后，药渣再与金银花、淡竹叶、芦根、淡豆豉、甘草加水煎煮二次，每次 2 小时，合并煎液，滤过；牛蒡子用 60% 乙醇加热提取二次，每次 4 小时，滤过，滤液合併，回收乙醇。合併以上各药液，浓缩成稠膏，加入桔梗粉末及辅料，搅匀，制成颗粒，干燥，放冷，喷加薄荷油等挥发油，混匀，压制成 1000 片，即得。

【性状】 本品为浅棕色至棕褐色的片；气芳香，味苦、辛。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：联结乳管直径 14～25 μm，含淡黄色颗粒状物。

(2) 取本品粉末约 1 g，加乙醇 5 ml，浸渍 15 分钟，时加振摇，滤过，滤液蒸去乙醇，残渣加水 3 ml 使溶解，加三氯化铁试液 2～3 滴，即显污绿色。

(3) 取本品粉末约 2 g，加石油醚 5 ml，浸渍 15 分钟，时加振摇，滤过，滤液挥尽石油醚，残渣加香草醛试液，即显棕色，放置后，渐渐变为紫红色。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定（附录 6 页）。

【功能与主治】 辛凉解表，清热解毒。用于风热感冒，发热头痛，咳嗽，口干，咽喉疼痛。

【用法与用量】 口服，一次 4 片，一日 2～3 次。

【贮藏】 密封。

麻　仁　丸

Maren Wan

【处方】 火麻仁 200 g　苦杏仁 100 g　大黄 200 g

枳实(炒) 200 g　厚朴(姜制) 100 g　白芍(炒) 200 g

【制法】 以上六味，除火麻仁、苦杏仁外，大黄等四味粉碎成细粉，再与火麻仁、苦杏仁掺研成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 30～40 g 与适量的水泛丸，干燥；或加炼蜜 90～110 g 制成小蜜丸或大蜜丸，即得。

【性状】 本品为黄褐色的水蜜丸、小蜜丸或大蜜丸；味苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：果皮石细胞淡黄色至红棕色，表面观多角形，壁厚。石细胞橙黄色，贝壳形，壁较厚，较宽一边纹孔明显。草酸钙簇晶大，直径 60～140 μm。草酸钙簇晶直径 18～32 μm，存在于薄壁细胞中，常排列成行，或一个细胞中

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

含数个簇晶。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。油细胞圆形或椭圆形，含棕黄色油状物。

【检查】 除水蜜丸的崩解时限检查应在2小时内崩解外，其他应符合丸剂项下有关的各项规定(附录1页)。

【功能与主治】 润肠通便。用于肠燥便秘。

【用法与用量】 口服，水蜜丸一次6 g，小蜜丸一次9 g，大蜜丸一次1丸；一日1～2次。

【规格】 大蜜丸每丸重9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

痔漏丸

Zhilou Wan

【处方】 刺猬皮(制)20 g　穿山甲(制)20 g　象牙屑60 g　石决明60 g
胡黄连80 g　槐花(炒)80 g　地榆(炭)40 g　荆芥穗10 g
当归80 g　乳香(制)20 g　没药(制)20 g　桃仁60 g
郁李仁60 g　大黄80 g　芒硝60 g　滑石20 g
雄黄10 g

【制法】 以上十七味，雄黄水飞或粉碎成极细粉；其余大黄等十六味粉碎成细粉，与上述粉末配研，过筛，混匀。每100 g粉末加炼蜜70～80 g制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为黑褐色至黑色的大蜜丸；气微腥，味苦。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录1页)。

【功能与主治】 清肠解毒消肿，通便。用于痔疮肿痛，便秘下血。

【用法与用量】 口服，一次1丸，一日2次。

【注意】 孕妇忌服。

【规格】 每丸重9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

清气化痰丸

Qingqi Huatan Wan

【处方】 黄芩(酒炒)100 g　瓜蒌仁霜100 g　半夏(制)150 g　胆南星150 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

陈皮 100 g　　苦杏仁 100 g　　枳实 100 g　　茯苓 100 g

【制法】 以上八味，除瓜蒌仁霜外，其余黄芩等七味粉碎成细粉，与瓜蒌仁霜混匀，过筛。另取生姜 100 g，捣碎，加水适量压榨取汁，与上述粉末泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为灰黄色的水丸；气微，味苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：糊化淀粉团块无色。不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。草酸钙针晶成束，长 32～144 μm，存在于粘液细胞中或散在。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。网纹细胞椭圆形

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【注意】 孕妇忌服。

【规格】 大蜜丸每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

清肺抑火丸

Qingfei Yihuo Wan

【处方】 黄芩 140 g　栀子 80 g　知母 60 g　浙贝母 90 g　黄柏 40 g
苦参 60 g　桔梗 80 g　前胡 40 g　天花粉 80 g　大黄 120 g

【制法】 以上十味，粉碎成细粉，过筛，混匀，用水泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为淡黄色至黄褐色的水丸；气微，味苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：淀粉粒卵圆形，直径 35～48 μm，脐点点状、人字状或马蹄状，位于较小端，层纹细密。纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。纤维束鲜黄色，周围细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维，含晶细胞的壁木化增厚。纤维束无色，周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。草酸钙针晶成束或散在，长 26～110 μm。草酸钙簇晶大，直径 60～140 μm。具缘纹孔导管大，多破碎，有的具缘纹孔呈六角形或斜方形，排列紧密。联结乳管直径 14～25 μm，含淡黄色颗粒状物。种皮石细胞黄色或淡棕色，多破碎，完整者长多角形、长方形或形状不规则，壁厚，有大的圆形纹孔，胞腔棕红色。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 清肺热，止咳，化痰，通便。用于肺热燥咳，痰黄稠粘，口干咽痛，鼻衄，便秘。

【用法与用量】 口服，一次 6 g，一日 2～3 次。

【注意】 孕妇慎服。

【贮藏】 密闭，防潮。

清胃黄连丸

Qingwei Huanglian Wan

【处方】 黄连 80 g　石膏 80 g　桔梗 80 g　甘草 40 g　知母 80 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

玄参 80 g　地黄 80 g　牡丹皮 80 g　天花粉 80 g　连翘 80 g
栀子 200 g　黄柏 200 g　黄芩 200 g　赤芍 80 g

【制法】 以上十四味，粉碎成细粉，过筛，混匀，用水泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为黄色至深黄色的水丸；味微苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：联结乳管直径 14～25 μm，含淡黄色颗粒状物。薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。纤维束鲜黄色，周围细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维，含晶细胞的壁木化增厚。纤维束鲜黄色，壁稍厚，纹孔明显。纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。纤维束几无色，周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。内果皮纤维上下层纵横交错，纤维短梭形。草酸钙针晶成束或散在，长 26～110 μm。具缘纹孔导管大，多破碎，有的具缘纹孔六角形或斜方形，排列紧密。果皮石细胞镶嵌排列成层。石细胞黄棕色或无色，类长方形、类圆形或形状不规则，直径约至 94 μm。木栓细胞淡红色至微紫色，壁稍厚。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 清胃降火，解毒消炎。用于口舌生疮，齿龈肿痛，咽炎，扁桃体炎。

【用法与用量】 口服，一次 9 g，一日 2 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

清 热 丸（万应锭）

Qingre Wan

【处方】 胡黄连 100 g　黄连 100 g　儿茶 100 g　冰片 6 g　香墨 200 g
熊胆 20 g　麝香 5 g　牛黄 5 g　牛胆汁 160 g

【制法】 以上九味，胡黄连、黄连、儿茶、香墨粉碎成细粉，将牛黄、冰片、麝香研细，与上述粉末配研，过筛，混匀。熊胆加适量温水溶化，牛胆汁浓缩至适量，滤过，与熊胆液混合泛丸，阴干，即得。

【性状】 本品为黑色光亮的水丸；气芳香，味苦、有清凉感。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 清热，镇惊，解毒，祛暑。用于小儿高热，烦躁易惊，中暑，口舌生疮，牙龈、咽喉肿痛，痈肿。

【用法与用量】 口服，一次 10～20 粒，一日 1～2 次，小儿酌减；外用醋调敷患

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

处。

【注意】 孕妇慎服。

【规格】 每 10 粒重 1.5 g

【贮藏】 密封。

清热凉血膏

Qingre Liangxue Gao

【处方】 黄芩 500 g　地黄 500 g

【制法】 以上二味，加水煎煮三次，每次 3 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩成比重为 1.21～1.25(80～85°热测)的清膏。每 100 g 清膏加炼蜜 200 g，混匀，即得。

【性状】 本品为褐色稠厚的半流体；气清香，味微苦。

【鉴别】 取本品 5 ml，置乳钵内，加醋酸乙酯 10 ml，研磨，取上清液蒸发，除去醋酸乙酯，加甲醇 2 ml 溶解，残渣加镁粉少量与盐酸数滴，置水浴上加热 3 分钟，溶液显橙红色。

【检查】 应符合煎膏剂项下有关的各项规定(附录 4 页)。

【功能与主治】 清热消炎，凉血滋阴。用于孕妇头晕目眩，耳鸣牙痛，口舌生疮，干酪性鼻炎。

【用法与用量】 口服，一次 30 g，一日 2 次。

【贮藏】 密闭，避热。

清　眩　丸

Qingxuan Wan

【处方】 川芎 200 g　白芷 200 g　薄荷 100 g　荆芥穗 100 g　石膏 100 g

【制法】 以上五味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 110～130 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为黑褐色的大蜜丸；气微香，味微甜而后辛凉。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：淀粉粒复粒由 8～12 粒组成。螺纹导管直径 8～23 μm，有的加厚壁互相连接，似网状螺纹导管。腺鳞头部 8 细胞，扁球形，直径约

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

至 90 μm，柄短，单细胞。花萼表皮细胞淡黄色，垂周壁波状弯曲。不规则片状结晶，无色，有平直纹理。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 散风清热。用于头晕目眩，偏正头痛，鼻塞不通，牙痛。

【用法与用量】 口服，一次 1～2 丸，一日 2 次。

【规格】 每丸重 6 g

【贮藏】 密闭，防潮。

清凉眼药膏

Qingliang Yanyaogao

【处方】 熊胆 5 g　冰片 20 g　薄荷脑 3 g　西瓜霜 20 g
硼砂 10 g　炉甘石 50 g　凡士林 620 g

【制法】 以上七味，冰片、薄荷脑分别粉碎成极细粉；炉甘石煅红后，用黄连 5 g 煎汤水飞成极细粉；熊胆、硼砂、西瓜霜粉碎成极细粉，与炉甘石粉末配研，过筛，混匀。将凡士林加热至 150°约 1 小时，滤过，冷至约 90°时加入熊胆等粉末，研匀，待温度下降至约 60°时加入冰片、薄荷脑，搅匀，即得。

【性状】 本品为灰黄色的软膏；气香特异，入眼有凉感。

【鉴别】 (1) 取本品，进行微量升华，升华物置显微镜下观察，呈不定形的无色片状结晶，遇醇即溶解。

(2) 取本品 15 g，置试管中，加石油醚 30 ml，振摇，再加水 20 ml，振摇，微温，振摇，放置 4～8 小时（或放入冰箱中），俟分层，弃去上层石油醚液，水液层反复滤过至澄明。分取滤液，点于姜黄试纸上，显深棕色，加稀盐酸 1 滴，显红棕色；加氨试液 1 滴，显绿黑色。另取滤液 1 ml，加氯化钡试液 2 滴，即发生白色沉淀，在盐酸或硝酸中均不溶解。

(3) 取鉴别(2)项下水液滤出的沉淀少量，加稀硫酸振摇，滤过，滤液中加亚铁氰化钾试液，发生浅蓝白色沉淀。

【检查】 应符合眼膏剂项下有关的各项规定（附录13页）。

【功能与主治】 消炎，抑菌，收敛。用于结膜炎，睑缘炎，砂眼，麦粒肿。

【用法与用量】 用玻璃棒挑取少许，点入眼睑内，一日 2～3 次。

【贮藏】 密封。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

清喉咽合剂

Qinghouyan Heji

【处方】 地黄 180 g　麦冬 160 g　玄参 260 g　连翘 315 g　黄芩 315 g

【制法】 以上五味，粉碎成粗粉，照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法（附录11页），用 57%乙醇作溶剂，浸渍 24 小时后，以每分钟约 1 ml 的速度缓缓渗漉，收集漉液约 6000 ml，减压回收乙醇，并浓缩至约 1400 ml，取出，加水 800 ml，煮沸 30 分钟，放置 48 小时，滤过，滤渣用少量水洗涤一次，洗液并入滤液中，减压浓缩至约 1000 ml，加苯甲酸钠 4 g，搅匀，放置 24 小时，滤过，加水使成 1000 ml，搅匀，即得。

【性状】 本品为棕褐色的澄明液体；味苦。

【检查】 比重　本品的比重（附录26页）应为 1.20～1.24。

pH 值　应为 4.0～6.0（附录42页）。

【功能与主治】 养阴，清咽，解毒。用于局限性咽白喉，轻度中毒型白喉，急性扁桃体炎，咽峡炎。

【用法与用量】 口服，第一次 20 ml，以后每次 10～15 ml，一日 4 次，小儿酌减。

【贮藏】 密封保存。

清瘟解毒丸

Qingwen Jiedu Wan

【处方】

大青叶 100 g	连翘 75 g	玄参 100 g	天花粉 100 g
桔梗 75 g	牛蒡子（炒）100 g	羌活 75 g	防风 50 g
葛根 100 g	柴胡 50 g	黄芩 100 g	白芷 50 g
川芎 50 g	赤芍 50 g	甘草 25 g	淡竹叶 100 g

【制法】 以上十六味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 150～170 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为黑褐色的大蜜丸；气微香，味甘、苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：表皮细胞狭长，垂周壁深波状弯曲，有气孔，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

保卫细胞哑铃状；非腺毛单细胞，基部钝圆。种皮栅状细胞表面观短梭形，侧面观斜长方形，壁较厚，微木化，常附有棕色内果皮细胞，内含草酸钙方晶。石细胞黄棕色或无色，类长方形、类圆形或形状不规则，直径约至 94 μm。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。纤维成束，周围细胞中含草酸钙方晶，形成晶纤维，含晶细胞的壁木化增厚。纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。内果皮纤维上下层纵横交错，纤维短梭状。具缘纹孔导管大，多破碎，有的具缘纹孔呈六角形或斜方形，排列紧密。联结乳管直径 14～25 μm，含淡黄色颗粒状物。油管含金黄色分泌物。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录 1 页）。

【功能与主治】 清热解毒。用于温病发热，无汗头痛，口渴咽干，流行性感冒，腮腺炎。

【用法与用量】 口服，一次 2 丸，一日 2 次，小儿酌减。

【规格】 每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

越 鞠 丸

Yueju Wan

【处方】 香附(醋制)200 g　川芎 200 g　栀子(炒)200 g
苍术(炒)200 g　六曲(炒)200 g

【制法】 以上五味，粉碎成细粉，过筛，混匀，用水泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为深棕色至棕褐色的水丸；气香，味微涩、苦。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：分泌细胞类圆形，含淡黄棕色至红棕色分泌物。木栓细胞黄棕色，壁薄，微波状弯曲，多层重叠。草酸钙针晶细小，不规则地充塞于薄壁细胞中。种皮石细胞黄色或淡棕色，多破碎，完整者长多角形、长方形或形状不规则，壁厚，有大的圆形纹孔，胞腔棕红色。

(2) 取本品 0.2 g，捣碎，加 70%乙醇 5 ml，浸渍 10 分钟，滤过。取滤液 1 ml，置瓷蒸发皿中，在水浴上蒸干，残渣中加硫酸 1 滴，即显蓝色。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录 1 页）。

【功能与主治】 理气解郁，消胀宽中。用于脘闷腹胀，食滞反酸。

【用法与用量】 口服，一次 6～9 g，一日 2 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

散风活络丸

Sanfeng Huoluo Wan

【处方】

乌梢蛇(酒制)40 g	蜈蚣 20 g	地龙 20 g	胆南星 20 g
牛黄 6.88 g	冰片 2.58 g	防风 60 g	威灵仙(酒制)40 g
骨碎补(炒)40 g	海风藤 40 g	牛膝 40 g	麻黄 30 g
桂枝 30 g	细辛 20 g	草乌(制)40 g	附子(制)30 g
白附子(制)20 g	当归 40 g	川芎 60 g	红花 30 g
桃仁 30 g	赤芍 60 g	乳香(制)40 g	熟大黄 30 g
黄芩 60 g	熟地黄 60 g	党参 60 g	白术(炒)40 g
木香 40 g	菖蒲 30 g	香附(醋制)40 g	草豆蔻 60 g
茯苓 30 g	赭石 40 g		

【制法】 以上三十四味，除牛黄、冰片外，其余乌梢蛇等三十二味粉碎成细粉；将牛黄、冰片研细，与上述粉末配研，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 120～140 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为红棕色至棕褐色的大蜜丸；气微香，味先甜后苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。油管含金黄色分泌物，直径约 30 μm。分泌细胞类圆形，含淡黄棕色至红棕色分泌物，其周围 7～8 细胞作放射状环列。内种皮石细胞黄棕色或棕红色，表面观类多角形，壁厚，胞腔含硅质块。纤维直径约 9 μm，纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。草酸钙砂晶细小，散在于薄壁细胞中。花冠碎片黄色，有红棕色或黄棕色分泌管。薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。气孔特异，保卫细胞侧面观似电话筒状。条状肌肉纤维淡黄色，现横波状纹理；不规则鳞片密布深棕色或棕黑色颗粒状色素。不规则块片淡棕色，具有圆乳突状毛或尖突的毛。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录 1 页）。

【功能与主治】 祛风除湿，舒筋活络。用于中风瘫痪，口眼㖞斜，半身不遂，手足麻木，筋脉拘挛，行步艰难，风寒湿痹，腰腿疼痛。

【用法与用量】 用温黄酒或温开水送服，一次 1 丸，一日 2 次。

【注意】 孕妇忌服。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【规格】 每丸重 6 g

【贮藏】 密闭，防潮。

葛根芩连片

Gegen Qinlian Pian

【处方】 葛根 1000 g　黄芩 375 g　黄连 375 g　甘草 250 g

【制法】 以上四味，取葛根 50 g 与甘草粉碎成细粉，过筛，剩余的葛根分次加水煎煮至味尽，滤过，滤液适当浓缩。黄芩、黄连照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法（附录11页），用 50%乙醇渗漉，漉液浓缩后并入上述浓缩液中，浓缩成稠膏状。加入葛根、甘草粉末，制成颗粒，压制成 1000 片，即得。

【性状】 本品为暗黄色的片；气微，味苦。

【鉴别】 (1) 取本品 3 片，研细，加乙醇 10 ml，煮沸，滤过，滤液加镁粉少量与盐酸 1 ml，放置，即显红色。

(2) 取本品 2 片，研细，加乙醇 10 ml，煮沸，滤过，滤液蒸干，残渣加 2%醋酸溶液 10 ml，煮沸，放冷，滤过，滤液加碘化汞钾试液，发生黄色沉淀。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定（附录 6 页）。

【功能与主治】 解表，清热，解毒。用于肠炎，痢疾，口渴烦热。

【用法与用量】 口服，一次 3～4 片，一日 3 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

雅叫哈顿散

Yajiao Hadun San

本品系傣族验方，西双版纳傣文名为 ᦅᦱᧃᦀᧁᦵᦉᧁᦷᦅᧁᦷᦉᧁᦷᦅᧁᦷᦉᧁᦷ（雅叫哈顿），德宏傣文名为 ᦅᦱᧃᦀᧁᦵᦉᧁᦷ（雅叫哈顿）。

【处方】 小百部 100 g　藤苦参 100 g　苦冬瓜 100 g
羊耳菊根 100 g　蔓荆子根 100 g　箭根薯 100 g

【制法】 以上六味，粉碎成细粉，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为暗灰色的粉末；气微香，味微苦。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定（附录 3 页）。

【功能与主治】 清热解毒，止痛止血。用于感冒发热，喉炎，胸腹胀痛，虚痨心悸，月经不调，产后流血。

【用法与用量】 口服，一次 3～9 g，一日 3 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

紫 金 锭

Zijin Ding

【处方】 山慈姑 200 g　红大戟 150 g　千金子霜 100 g　五倍子 100 g
麝香 30 g　朱砂 40 g　雄黄 20 g

【制法】 以上七味，朱砂、雄黄分别水飞或粉碎成极细粉；山慈姑、五倍子、红大戟粉碎成细粉；将麝香研细，与上述粉末及千金子霜配研，过筛，混匀。另取糯米粉 320 g 加水做成团块，蒸熟后与粉末混匀，压制成锭，阴干，即得。

【性状】 本品为暗棕色至褐色的长方形或棍状的块体；气特异，味辛而苦。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：草酸钙针晶成束或散在，长约至 128 μm，直径约 2 μm。色素细胞红棕色或黄棕色，长圆形或延长成管状。非腺毛 1 至数细胞，有的顶端稍弯曲。无定形团块淡黄棕色，埋有细小方形结晶。不规则细小颗粒暗棕红色，有光泽，边缘暗黑色。不规则碎块金黄色或橙黄色，有光泽。

(2) 取本品约 0.5 g，研细，置试管内，加入氢氧化钠试液 1～2 ml 和锌粉少量，管口覆盖以硝酸银试液湿润的滤纸，将试管置水浴中加热，硝酸银试纸由黄转棕，最后变成黑色。

【功能与主治】 辟瘟解毒，消肿止痛。用于中暑，脘腹胀闷疼痛，呕吐泄泻，小儿痰厥；外治疔疮疖肿，腮腺炎，淋巴结炎。

【用法与用量】 口服，一次 0.6～1.5 g，一日 2 次；外用醋磨调敷患处。

【注意】 孕妇忌服。

【规格】 每锭重(1) 0.3 g (2) 3 g

【贮藏】 密闭，防潮。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

紫　草　膏

Zicao Gao

【处方】 紫草 50 g　当归 15 g　防风 15 g　地黄 15 g
白芷 15 g　乳香 15 g　没药 15 g

【制法】 以上七味，除紫草外，乳香、没药粉碎成细粉，过筛。其余当归等四味，酌予碎断，另取食用植物油 600 g，同置锅内炸枯，去渣，将紫草用水湿润，置锅内炸至油呈紫红色，去渣，滤过。另加蜂蜡适量（每油 10 g 加蜂蜡 2～4 g）熔化，待温，加入上述粉末搅匀，即得。

【性状】 本品为紫红色的软膏；具有特殊的油腻气。

【检查】 应符合软膏剂项下有关的各项规定（附录12页）。

【功能与主治】 化腐生肌，止痛。用于疮疡已溃，疼痛不止。

【用法与用量】 摊于纱布上贴患处或涂患处，每隔一、二日换药一次。

【贮藏】 密闭，防潮。

紫　雪

Zixue

【处方】

石膏 144 g	寒水石 144 g	滑石 144 g	磁石 144 g
玄参 48 g	木香 15 g	沉香 15 g	升麻 48 g
甘草 24 g	丁香 3 g	芒硝(制)480g	硝石(精制)96 g
水牛角浓缩粉 9 g	羚羊角 4.5 g	麝香 3.6 g	朱砂 9 g

【制法】 以上十六味，石膏、寒水石、滑石、磁石砸成小块，加水煎煮三次。玄参、木香、沉香、升麻、甘草、丁香用石膏等煎液煎煮三次，合并煎液，滤过，滤液浓缩成膏，芒硝、硝石粉碎兑入膏中，搅匀，干燥，粉碎成细粉；羚羊角锉研成细粉，朱砂水飞或粉碎成极细粉；将水牛角浓缩粉、麝香研细，与芒硝等粉末 288 g 及上述羚羊角、朱砂粉末配研，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为棕红色至灰棕色的粉末；气芳香，味咸、微苦。

【鉴别】 取本品少量，加水适量，振摇，滤过，滤液按下述方法试验，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

（1）取滤液 2 ml，加等量硫酸混合，放冷，加新制的硫酸亚铁试液，使成二液层，接界处显棕色。

（2）取滤液 2 ml，加氯化钡试液数滴，即发生白色沉淀，在盐酸及硝酸中均不溶解。

（3）取铂丝，用盐酸湿润后，蘸取滤液，在无色火焰中燃烧，火焰显鲜黄色。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录 3 页)。

【功能与主治】 清热解毒，止痉通便。用于热病，高热烦躁，惊风抽搐，热毒斑疹，大便秘结。

【用法与用量】 口服，一次 1.5 g～3 g，一日 2 次；周岁小儿一次 0.3 g，每增一岁递增 0.3 g；一日 1 次。五岁以上小儿酌情服用。

【注意】 孕妇忌服。

【规格】 每瓶重 1.5 g

【贮藏】 密封，避热。

暑 症 片

Shuzheng Pian

【处方】 猪牙皂 80 g　细辛 80 g　薄荷 69 g　广藿香 69 g　木香 46 g
白芷 23 g　防风 46 g　陈皮 46 g　半夏(制)46 g　桔梗 46 g
甘草 46 g　贯众 46 g　白矾(煅) 23 g　雄黄 57 g　朱砂 57 g

【制法】 以上十五味，朱砂、雄黄分别水飞或粉碎成极细粉；猪牙皂、细辛、白芷、白矾、木香五味粉碎成细粉，过筛。广藿香、薄荷、陈皮提取挥发油，并滤取药汁。桔梗、防风、贯众、半夏、甘草加水煎煮，煎液与上述药汁合并浓缩至适量，加淀粉成浆，加入雄黄、朱砂、猪牙皂等粉末，制成颗粒，低温干燥，加入广藿香等挥发油，混匀，压制成 1000 片，即得。

【性状】 本品为浅棕黄色的片；气香，味辛。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(附录 6 页)。

【功能与主治】 祛寒开窍，辟瘟解毒。用于中暑昏厥，牙关紧闭，腹痛吐泻，四肢发麻。

【用法与用量】 口服，一次 2 片，一日 2～3 次；必要时将片研成细粉，取少许吹入鼻内取嚏。

【注意】 孕妇忌服。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【贮藏】 密闭，防潮。

暑湿正气丸

Shushi Zhengqi Wan

【处方】 广藿香 100 g　半夏(制) 100 g　青木香 100 g　陈皮 100 g
丁香 100 g　肉桂 100 g　苍术 100 g　白术 100 g
茯苓 100 g　朱砂 10 g　硝石(精制) 10 g　硼砂 6 g
雄黄 6 g　金礞石(煅)4g　麝香 3 g　冰片 3 g

【制法】 以上十六味，除麝香、冰片、硝石外，朱砂、雄黄分别水飞或粉碎成极细粉；其余广藿香等十一味粉碎成细粉。将麝香、冰片研细，与上述粉末配研，再将硝石研细掺入，过筛，混匀。另取花椒 50 g，加水煎煮二次，取煎出液与上述粉末泛丸，阴干，即得。

【性状】 本品为棕黄色至棕红色的水丸；气芳香，味苦、辛。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。草酸钙针晶成束，长 32～144 μm，存在于粘液细胞中或散在。草酸钙针晶细小，不规则地充塞于薄壁细胞中。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。非腺毛 1～6 细胞，壁有疣状突起。石细胞类圆形或类长方形，壁一面非薄。具缘纹孔导管直径 72～112 μm。花粉粒三角形，直径约 16 μm。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 温中散寒。用于暑天受寒，腹痛吐泻，头痛恶寒，肢体酸重。

【用法与用量】 口服，一次 1.5～3 g，一日 1～2 次。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 密封。

跌打丸

Dieda Wan

【处方】 三七 64 g　当归 32 g　白芍 48 g　赤芍 64 g
桃仁 32 g　红花 48 g　血竭 48 g　刘寄奴 32 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

骨碎补(炒) 32 g　续断 320 g　苏木 48 g　牡丹皮 32 g
乳香(制) 48 g　没药(制)48g　姜黄 24 g　三棱(醋制)48g
甜瓜子 32 g　防风 32 g　枳实(炒)32g　桔梗 32 g
甘草 48 g　木通 32 g　自然铜(煅) 32 g　土鳖虫 32 g

【制法】 以上二十四味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 100～120g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为黑褐色至黑色的大蜜丸；气微腥，味苦。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 活血散瘀，消肿止痛。用于跌扑损伤，瘀血肿痛，闪腰岔气。

【用法与用量】 口服，一次 1 丸，一日 2 次。

【注意】 孕妇忌服。

【规格】 每丸重 3 g

【贮藏】 密闭，防潮。

跌打活血散

Dieda Huoxue San

【处方】 红花 120 g　当归 60 g　血竭 14 g　三七 20 g
骨碎补(炒) 60 g　续断 60 g　乳香(制) 60 g　没药(制) 60 g
儿茶 40 g　大黄 40 g　冰片 4 g　土鳖虫 40 g

【制法】 以上十二味，除冰片外，其余红花等十一味粉碎成细粉；将冰片研细，与上述粉末配研，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为红棕色的粉末；具冰片特有的香气，味微苦。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：不规则碎块淡黄色，半透明，渗出油滴，加热后油滴溶化，现正方形草酸钙结晶。不规则团块无色或淡黄色，表面及周围扩散出众多细小颗粒，久置溶化。不规则块片血红色，周围液体显姜黄色，渐变红色。花粉粒球形或椭圆形，直径约 60 μm，外壁有刺，具 3 个萌发孔。草酸钙簇晶直径约至 45 μm，存在于淡棕黄色皱缩薄壁细胞中，常数个排列成行。草酸钙簇晶大，直径 60～140 μm。体壁碎片黄色或棕红色，有圆形毛窝，直径 8～24 μm，有的具长短不一的刚毛。

(2) 取本品 5 g，加无水乙醇 10 ml，加热回流浸取半小时，滤过，滤液蒸干，残渣加冰醋酸少量使溶解，再加硫酸 1～2 滴，初显红色，渐变为紫色、棕色。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录 3 页)。

【功能与主治】 舒筋活血，散瘀止痛。用于跌扑损伤，瘀血疼痛，闪腰岔气。

【用法与用量】 用温黄酒或温开水送服，一次 3 g，一日 2 次；外用以黄酒或醋调敷患处(皮肤破伤处不宜敷)。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 密闭，防潮。

锁阳固精丸

Suoyang Gujing Wan

【处方】

锁阳 20 g	肉苁蓉(蒸)25 g	巴戟天(制)30 g	补骨脂(盐炒)25 g
菟丝子 20 g	杜仲(炭)25 g	八角茴香 25 g	韭菜子 20 g
芡实(炒) 20 g	莲子 20 g	莲须 25 g	牡蛎(煅)20 g
龙骨(煅)20 g	鹿角霜 20 g	熟地黄 56 g	山茱萸(制)17 g
牡丹皮 11 g	山药 56 g	茯苓 11 g	泽泻 11 g
知母 4 g	黄柏 4 g	牛膝 20 g	大青盐 25 g

【制法】 以上二十四味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 110～130 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为棕褐色至黑褐色的大蜜丸；气微，味苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。种皮栅状细胞 2 列，内列较外列长，有光辉带。种皮栅状细胞淡棕色或红棕色，表面观类多角形，壁稍厚，胞腔含红棕色物。种皮石细胞类多角形，壁极厚，波状弯曲，胞腔分枝。石细胞稍分枝或似纤维状。纤维束鲜黄色，周围细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维，含晶细胞的壁木化增厚。木纤维成束，壁较薄，非

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 温肾固精。用于目眩耳鸣，腰膝酸软，四肢无力，滑精。

【用法与用量】 口服，一次 1 丸，一日 2 次。

【规格】 每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

鹅掌风药水

Ezhangfeng Yaoshui

【处方】 土槿皮 250 g　蛇床子 125 g　大风子仁 125 g　百部 125 g
防风 50 g　当归 100 g　风仙透骨草 125 g　侧柏叶 100 g
吴茱萸 50 g　花椒 125 g　蝉蜕 75 g　斑蝥 3 g

【制法】 以上十二味，将斑蝥粉碎成细粉，其余土槿皮等十一味粉碎成粗粉，与斑蝥粉末混匀，照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法(附录11页)，用乙醇 3 容与冰醋酸 1 容的混合液作溶剂，浸渍 48 小时后，缓缓渗漉，收集渗漉液 2000 ml，静置，取上清液，加入香精适量搅匀，即得。

【性状】 本品为暗黄绿色的透明液体；具冰醋酸的特臭。

【检查】 **比重** 应为 0.86～0.92(附录26页)。

总固体 取本品适量，用干燥滤纸滤过，精密量取 25 ml，置称定重量的蒸发皿中，在水浴中蒸干后，于 105°干燥 3 小时，移置干燥器中，冷却半小时，迅速称定重量，遗留的固体物不得少于 0.75 g。

含醋酸量 精密量取本品 2 ml，置 100 ml 量瓶中，用新沸过的冷水稀释至刻度，精密量取稀释液 25 ml，加新沸过的冷水 10 ml 与酚酞指示液 2～3 滴，用 $N/10$ 氢氧化钠液滴定，至溶液显粉红色，即得 (每 1 ml 的 $N/10$ 氢氧化钠液相当于 6.005 mg 的 $C_2H_4O_2$)。含醋酸量不得低于 22%。

【功能与主治】 杀菌，祛湿，止痒。用于鹅掌风，灰指甲，湿癣，脚癣。

【用法与用量】 将患处洗净，一日搽 3～4 次，灰指甲除去空松部分，使药易渗入。

【注意】 外用药切忌入口，严防触及眼、鼻、口腔等粘膜处。

【贮藏】 密封，避免暴晒。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

舒　肝　丸

Shugan Wan

【处方】 川楝子 150 g　元胡(醋制)100g　白芍(酒炒)120g　片姜黄100g　木香80g
沉香 100 g　豆蔻仁 60 g　砂仁 80 g　厚朴(姜制)60 g
陈皮 80 g　枳壳(炒)100 g　茯苓 100 g　朱砂 27 g

【制法】 以上十三味，朱砂水飞或粉碎成极细粉；其余川楝子等十二味粉碎成细粉，与上述粉末配研，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 170～180 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为棕红色至棕色的大蜜丸；气微，味甘，后微苦。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。种皮细胞棕黄色，表面观多角形，直径 17～40 μm，壁极厚，平周壁现点状或不规则线形纹理。内种皮石细胞黄棕色或棕红色，表面观类多角形，壁厚，内含硅质块。石细胞分枝状，壁厚，层纹明显。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。草酸钙簇晶存在于薄壁细胞中，常排列成行，或一个细胞中含有数个簇晶。网纹导管直径约至 90 μm。不规则细小颗粒暗棕红色，有光泽，边缘暗黑色。

(2) 取本品 6 g(或 1 丸)，用水淘洗，可得少量朱红色沉淀，取出，用盐酸湿润，存光洁铜片上轻轻摩擦，铜片表面即显银白色光泽，加热烘烤后，银白色即消失。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 舒肝，理气，止痛。用于肝郁气滞，胸胁胀满，胃脘疼痛，呕逆嘈杂，嗳气泛酸。

【用法与用量】 口服，一次 1 丸，一日 2～3 次。

【注意】 孕妇慎服。

【规格】 每丸重 6 g

【贮藏】 密闭，防潮。

舒肝止痛丸

Shugan Zhitong Wan

【处方】 柴胡 60 g　当归 100 g　白芍 80 g　赤芍 60 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

白术(炒) 60 g　薄荷 40 g　甘草 40 g　生姜 40 g
香附(醋制) 80 g　郁金 60 g　元胡(醋制)40 g　川楝子 60 g
木香 60 g　陈皮 60 g　半夏(制) 60 g　黄芩 80 g
川芎 40 g　莱菔子(炒) 60 g

【制法】 以上十八味，薄荷、陈皮提取挥发油，蒸馏后的水溶液另器收集。将生姜压榨取汁，生姜渣同白术、赤芍、郁金、川芎、黄芩加水煎煮二次，合并煎液，滤过，滤液与上述水溶液合并，浓缩。其余柴胡等十味粉碎成细粉，过筛，混匀，与上述薄荷等挥发油、生姜汁、浓缩液泛丸，低温干燥或阴干；另取赭石粉末适量包衣，打光，即得。

【性状】 本品为棕褐色的浓缩丸，除去外衣后，显灰褐色至黑褐色；味苦涩。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：菊糖碎块形状不规则，有时可见微细放射状纹理。厚壁组织碎片绿黄色，细胞类多角形或略延长，壁稍弯曲，有的连珠状增厚。纤维成束，深棕色或红棕色，壁厚。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。草酸钙针晶成束，长 32～144 μm，存在于粘液细胞中或散在。草酸钙簇晶直径 18～32 μm，存在于薄壁细胞中，常排列成行，或一个细胞中含有数个簇晶。外果皮表皮细胞黄棕色，表面观多角形，壁略厚，胞腔内有细小颗粒状物。种皮碎片黄色或棕红色，细胞小，多角形，壁厚。薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 舒肝理气，和胃止痛。用于肝胃不和，肝气郁结，胸胁胀满，呕吐酸水，脘腹疼痛。

【用法与用量】 口服，一次 4～4.5 g，一日 2 次。

【注意】 孕妇慎服。

【贮藏】 密闭，防潮。

舒筋活络酒

Shujin Huoluo Jiu

【处方】 木瓜 45 g　桑寄生 75 g　玉竹 240 g　续断 30 g　川牛膝 90 g
当归 45 g　川芎 60 g　红花 45 g　独活 30 g　羌活 30 g
防风 60 g　白术 90 g　蚕砂 60 g　红曲 180 g　甘草 30 g

【制法】 以上十五味，除红曲外，其余木瓜等十四味粉碎成粗粉；另取红糖 555 g，

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

溶解于白酒 11100 g 中，照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法（附录11页），用红糖酒作溶剂，浸渍 48 小时后，以每分钟 1～3 ml 的速度缓缓渗漉，收集漉液，静置，滤过，即得。

【性状】 本品为棕红色的澄清液体；气香，味微甜、略苦。

【检查】 乙醇量 应为 50～57%（附录48页第一法）。

其他 应符合酒剂项下有关的各项规定（附录 4 页）。

【功能与主治】 祛风除湿，舒筋活络。用于风寒湿痹，筋骨疼痛，四肢麻木。

【用法与用量】 口服，一次 20～30 ml，一日 2 次。

【注意】 孕妇慎服。

【贮藏】 密封。

舒 筋 散

Shujin San

【处方】 蘑菇（酒制）750 g 木瓜 30 g 狗脊 30 g 续断 30 g 槲寄生 15 g
当归 10 g 川芎 10 g 杜仲（炭）5 g 枸杞子 10 g 牛膝 30 g
钩藤 30 g 防风 20 g 独活 30 g

【制法】 以上十三味，粉碎成细粉，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为棕黄色至浅黄色的粉末；味微苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：孢子淡黄色，长椭圆形或椭圆形，长 7～14 μm，表面平滑。草酸钙簇晶直径约至 45 μm，存在于淡棕色皱缩的薄壁细胞中，常数个排列成行。草酸钙结晶不规则圆形，存在于薄壁细胞中。草酸钙砂晶存在于薄壁细胞中。橡胶丝呈条状或扭曲成团，表面带颗粒性。梯纹管胞纹孔排列整齐。薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。韧皮纤维大多成束，淡黄色，直径 16～42 μm，壁极厚。石细胞圆形、长圆形或类多角形，壁厚，胞腔内含橙红色或棕色物。种皮石细胞淡黄色，垂周壁波状弯曲，有时含棕色物。油管含金黄色分泌物，直径约至 30 μm。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定（附录 3 页）。

【功能与主治】 舒筋活血，补益肝肾。用于风寒湿痹，腰腿疼痛，手足麻木拘挛。

【用法与用量】 口服，一次 9 g，一日 2 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

痧　药

Shayao

【处方】 丁香 21 g　　苍术 110 g　天麻 126 g　麻黄 126 g
大黄 210 g　　甘草 84 g　　冰片 0 5g　麝香 10.5 g
蟾酥(制) 63 g　雄黄 126 g　朱砂 126 g

【制法】 以上十一味，除麝香、蟾酥、冰片外，雄黄、朱砂分别水飞或粉碎成极细粉；其余丁香等六味粉碎成细粉。将麝香、蟾酥、冰片研细，与上述粉末(朱砂除外)配研，过筛，混匀。用水泛丸，阴干，朱砂粉末包衣，打光，即得。

【性状】 本品为朱红色光亮的水丸，除去外衣，显深黄色至黄棕色；气香，味甘、苦、麻舌。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：糊化多糖类物的组织碎片遇碘液显棕色或淡棕紫色。草酸钙簇晶细小，直径 7～11 μm，存在于薄壁细胞中，常数个排列成行。草酸钙针晶细小，不规则地充塞于薄壁细胞中。草酸钙簇晶大，直径 60～140 μm。气孔特异，保卫细胞侧面观似电话筒状。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。无定形团块淡黄棕色，埋有细小方形结晶。不规则碎块金黄色或橙黄色，有光泽。不规则块片淡棕色。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 祛暑，解毒，开窍。用于夏令中暑，腹痛吐泻，牙关紧闭，四肢逆冷。

【用法与用量】 口服，一次 10～20 粒，一日 1～2 次；外用研细吹鼻取嚏。

【注意】 孕妇忌服。

【规格】 每 33 粒重 1 g

【贮藏】 密封。

痛　经　丸

Tongjing Wan

【处方】 当归 75 g　　白芍 50 g　　川芎 37.5 g　熟地黄 100 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

香附(醋制) 75 g　木香 12.5 g　青皮 12.5 g　山楂(炭) 75 g
元胡 50 g　炮姜 12.5 g　肉桂 12.5 g　丹参 75 g
茺蔚子 25 g　红花 25 g　益母草 300 g　五灵脂(醋炒) 50 g

【制法】 以上十六味，益母草、茺蔚子、丹参和熟地黄 25 g 加水煎煮二次，合并煎液，滤过，滤液浓缩至适量，其余红花等十二味及熟地黄 75 g 粉碎成细粉，过筛，混匀。用浓缩液(酌留部分包衣)与适量的水泛丸，用浓缩液包衣，干燥，打光，即得。

【性状】 本品为棕黑色的水丸；味苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：花粉粒圆球形或椭圆形，直径约 60 μm，外壁有刺，具 3 个萌发孔。厚壁组织碎片绿黄色，细胞类多角形或略延长，壁稍弯曲，有的连珠状增厚，纹孔细密。分隔纤维壁稍厚，非木化，斜纹孔明显。果皮石细胞淡紫红色、红色或黄棕色，类圆形或多角形，直径约至 125 μm。石细胞类方形或类圆形，壁一面菲薄。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。草酸钙簇晶直径 18～32 μm，存在于薄壁细胞中，常排列成行，或一个细胞中含有数个簇晶。分泌细胞类圆形，含淡黄色至红棕色分泌物。薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 活血，理气，散寒止痛。用于寒凝气滞，经来腹痛。

【用法与用量】 口服，一次 6～9 g，一日 1～2 次，临经时服。

【贮藏】 密闭，防潮。

滋　肾　丸

Zishen Wan

【处方】 黄柏(盐炒) 400 g　知母(盐炒) 400 g　肉桂 40 g

【制法】 以上三味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 35～55 g 与适量的水泛丸，晒干或低温干燥，打光，即得。

【性状】 本品为黑褐色至黑色的水蜜丸；气微香，味微甜而后苦。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：纤维束鲜黄色，周围细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维，含晶细胞的壁木化增厚。草酸钙针晶成束或散在，长 26～110 μm。油细胞圆形或长圆形，直径 45～108 μm，含淡黄色或黄棕色油状物。

(2) 取本品 2 g，捣碎，用氨试液湿润后，加氯仿 10 ml，搅拌 10 分钟，滤过，滤液

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

置分液漏斗中，用稀盐酸 3 ml 振摇提取，收集盐酸液，滤过，滤液中加漂白粉少量，立即显樱红色。

（3）取本品 2 g，捣碎，加乙醚 10 ml，振摇后放置 2 小时，滤过。取滤液 2 ml，置瓷蒸发皿中，俟醚挥发后，加邻-联（二）茴香胺的冰醋酸饱和溶液 1 滴，即显绛红色，放置，变成紫色，后呈棕色。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 滋肾清热，化气通关。用于热蕴膀胱，小腹胀满，尿闭不通。

【用法与用量】 口服，一次 6～9 g，一日 2～3 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

槐　角　丸

Huaijiao Wan

【处方】 槐角(炒) 200 g　地榆(炭) 100 g　黄芩 100 g　枳壳(炒) 100 g
当归 100 g　防风 100 g

【制法】 以上六味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 45～55 g 与适量的水泛丸，干燥；或加炼蜜 130～150 g 制成小蜜丸或大蜜丸，即得。

【性状】 本品为黑褐色至黑色的水蜜丸、小蜜丸或大蜜丸；味苦、涩。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：种皮栅状细胞 1 列，长 100～190 μm。纤维细长，微弯曲，壁稍厚，非木化。纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。油管含金黄色分泌物，直径约 30 μm。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 清肠，凉血。用于痔疮肿痛，大便下血。

【用法与用量】 口服，水蜜丸一次 6 g，小蜜丸一次 9 g，大蜜丸一次 1 丸；一日 2 次。

【规格】 大蜜丸每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，防潮。

感冒退热冲剂

Ganmao Tuire Chongji

【处方】 大青叶 200 g　板蓝根 200 g　连翘 100 g　拳参 100 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【制法】 以上四味，加水煎煮二次，每次 1.5 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至比重约为 1.08，加等量的乙醇使沉淀，取上清液浓缩后，加水 1.5 倍量，搅拌，静置 8 小时，取上清液浓缩至比重为 1.38～1.40 的清膏。取清膏 1 份，加蔗糖粉 2.5 份、糊精 1.25 份及适量的乙醇，制成颗粒，干燥，即得。

【性状】 本品为棕黄色的颗粒；味甜、微苦。

【检查】 应符合冲剂项下有关的各项规定(附录 5 页)。

【功能与主治】 清热解毒。用于上呼吸道感染，急性扁桃体炎，咽喉炎。

【用法与用量】 开水冲服，一次 16～32 g，一日 3 次。

【规格】 每袋重 16 g

【贮藏】 密闭，防潮。

感冒清热冲剂

Ganmao Qingre Chongji

【处方】 荆芥穗 200 g　薄荷 60 g　防风 100 g　柴胡 100 g
紫苏叶 60 g　葛根 100 g　桔梗 60 g　苦杏仁 80 g
白芷 60 g　苦地丁 200 g　芦根 160 g

【制法】 以上十一味，荆芥穗、薄荷、紫苏叶提取挥发油，蒸馏后的水溶液另器收集；其余防风等八味，加水煎煮二次，每次 1.5 小时，合并煎液，滤过，滤液与上述水溶液合并；浓缩至比重 1.38～1.40 的清膏。取清膏 1 份、蔗糖粉 3 份、糊精 1 份及适量的乙醇，制成颗粒，干燥，加入上述荆芥穗等挥发油，混匀，即得。

【性状】 本品为黄白色的颗粒；味甜、微苦。

【检查】 应符合冲剂项下有关的各项规定(附录 5 页)。

【功能与主治】 解表清热。用于感冒头痛，发热恶寒，全身酸重，鼻流清涕，咳嗽咽干。

【用法与用量】 开水冲服，一次 12 g，一日 2 次。

【规格】 每袋重 12 g

【贮藏】 密闭，防潮。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

暖　脐　膏

Nuanqi Gao

【处方】 当归 80 g　白芷 80 g　乌药 80 g　小茴香 80 g　八角茴香 80 g
木香 40 g　香附 80 g　乳香 20 g　母丁香 20 g　没药 20 g
肉桂 20 g　沉香 20 g　麝香 3 g

【制法】 以上十三味，乳香、母丁香、没药、肉桂、沉香粉碎成细粉，与麝香配研，过筛，混匀。其余当归等七味，酌予碎断，与食用植物油 4800 g 同置锅内炸枯，去渣，滤过，炼至滴水成珠；另取黄丹 1500～2100 g，加入油内搅匀，收膏，将膏浸泡于水中。

取膏用文火熔化后，加入上述粉末，搅匀，分摊于布或纸上，即得。

【性状】 本品为摊于布或纸上的黑膏药。

【检查】 应符合膏药项下有关的各项规定（附录 4 页）。

【功能与主治】 行气止痛，祛寒止泻。用于脘腹痞满，少腹冷痛，大便溏泻。

【用法与用量】 加温软化，贴于脐上。

【注意】 孕妇忌用。

【规格】 每张净重(1) 3 g (2) 15 g (3) 30 g

【贮藏】 置阴凉干燥处。

催　汤　丸

Cuitang Wan

本品系藏族验方，藏文名为 ཇུག་ཐང་། （催汤）。

【处方】 藏木香膏 30 g　藏木香 20 g　悬钩子茎(去皮、心)90 g
木藤蓼(去皮)50 g　野姜 20 g　诃子(去核)36 g
余甘子 40 g　毛诃子(去核)20 g　块根糙苏 60 g

【制法】 以上九味，除藏木香膏外，其余藏木香等八味，粉碎成粗粉，过筛，混匀。用藏木香膏与水制丸，干燥，即得。

【性状】 本品为灰黄色的大丸；表面粗糙，纤维碎末明显；气香，味苦、辛、微

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

成。

【鉴别】 (1) 取本品粉末约 0.5 g，加水 10 ml，微温，滤过。取滤液 2 ml，加三氯化铁试液 1 滴，即显蓝黑色，再加硫酸 1 滴，蓝黑色消失。

(2) 取本品粉末约 0.5 g，加 0.1%氢氧化钾溶液 5 ml，煮沸，放冷，加水 5 ml，滤过，滤液加稀盐酸使成微酸性，加乙醚 5 ml，振摇，分取乙醚液，加氨试液 5 滴，即显棕红色。

【检查】 干燥失重 不得过 8.0%(附录44页)。

其他 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 清热解表，止咳止痛。用于感冒初起，咳嗽头痛，关节酸痛，防治流行性感冒。

【用法与用量】 水煎服，用冷水约 400 ml 浸泡 1～2 小时后，煎至约 300 ml，趁热服汤；一次 1～2 丸，一日 3 次。

【注意】 肾病患者慎服。

【规格】 每丸重 4 g

【贮藏】 密闭，防潮。

腰 痛 丸

Yaotong Wan

【处方】

杜仲叶(盐炒)100 g	补骨脂 (盐炒) 75 g	狗脊(制)75 g
续断 75 g	当归 100 g	赤芍 40 g
白术(炒)75 g	牛膝 75 g	泽泻 50 g
肉桂 25 g	乳香(制)25 g	土鳖虫(酒炒)40 g

【制法】 以上十二味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 15 g 与适量的水泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为褐色的水蜜丸；气微香，味微苦、甘、辛。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：橡胶丝条状或扭结成团，常连接叶肉组织。薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。草酸钙针晶细小，长 10～32 μm，不规则地充塞于薄壁细胞中。草酸钙砂晶存在于薄壁细胞中。草酸钙簇晶直径约至 45 μm，存在于淡棕黄色皱缩的薄壁组织中，常数个排列成行。石细胞类圆形或类长方形，壁一面非薄。种皮栅状细胞淡棕色或红棕色，表面观类多角形，壁稍厚，胞腔内含红棕

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

色物。薄壁细胞类圆形，有椭圆形纹孔，集成纹孔群。梯纹管胞纹孔排列整齐。体壁碎片黄色或棕红色，有圆形毛窝，直径 8～24 μm，有的具长短不一的刚毛。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 补肾，活血，止痛。用于肾虚腰痛，腰肌劳损。

【用法与用量】 口服，一次 9 g，一日 2 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

腰 痛 片

Yaotong Pian

【处方】

杜仲叶(盐炒)108 g	补骨脂(盐炒)81 g	狗脊(制)81 g
续断 81 g	当归 108 g	赤芍 43 g
白术(炒)81 g	牛膝 81 g	泽泻 54 g
肉桂 27 g	乳香(制)27 g	土鳖虫(酒炒)43 g

【制法】 以上十二味，先取泽泻、赤芍、肉桂与当归 43 g、续断 27 g，粉碎成细粉，过筛；剩余的当归 65 g 粉碎成粗粉，照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法(附录11页)，用 60%乙醇 5～6 倍量渗漉，乳香敲碎后，用 90%乙醇 5～6 倍量渗漉，分别制成浸膏，混匀。再取剩余的续断与杜仲叶等七味加水煎煮二次，滤过，滤液浓缩成浸膏。然后将上述粉末与浸膏拌匀，制成颗粒，压制成 1000 片，包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显褐色；气微香，味苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。薄壁细胞类圆形，有椭圆形纹孔，集成纹孔群。草酸钙簇晶直径约至 45 μm，存在于淡棕黄色皱缩的薄壁细胞中，常数个排列成行。石细胞类圆形或类长方形，壁一面非薄。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(附录 6 页)。

【功能与主治】 补肾，活血，止痛。用于肾虚腰痛，腰肌劳损。

【用法与用量】 口服，一次 6 片，一日 3 次。

【贮藏】 密封。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

解肌宁嗽丸

Jieji Ningsou Wan

【处方】 紫苏叶 48 g　前胡 80 g　葛根 80 g　苦杏仁 80 g　桔梗 80 g
半夏(制)80 g　陈皮 80 g　浙贝母 80 g　天花粉 80 g　枳壳 80 g
茯苓 64 g　木香 24 g　玄参 80 g　甘草 64 g

【制法】 以上十四味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 110 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为黑绿色的大蜜丸；味微苦、辛。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：淀粉粒卵圆形，直径 35～48 μm，脐点点状、人字状或马蹄状，位于较小端，层纹细密。不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。叶肉组织中有细小草酸钙簇晶，直径 4～8 μm。草酸钙针晶成束，长 32～144 μm，存在于粘液细胞中或散在，纤细。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。联结乳管直径 14～25 μm，含淡黄色颗粒状物。石细胞橙黄色，贝壳形，壁较厚，较宽一边纹孔明显。石细胞黄棕色或无色，类长方形、类圆形或形状不规则，直径约至 94 μm。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。纤维成束，周围细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维，含晶细胞的壁木化增厚。具缘纹孔导管大，直径约至400 μm，多破碎，有的具缘纹孔六角形或斜方形，排列紧密。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 解表宣肺，止嗽化痰。用于小儿急性支气管炎初期，痰多，咳嗽，发烧。

【用法与用量】 口服，小儿周岁一次 1/2 丸，二至三岁一次 1 丸；一日 2 次。

【规格】 每丸重 3 g

【贮藏】 密闭，防潮。

槟榔四消丸

Binglang Sixiao Wan

【处方】 槟榔 200 g　大黄(酒炒) 400 g　牵牛子(炒)400 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

猪牙皂(炒)50 g　香附(醋制)200 g　五灵脂(醋炒)200 g

【制法】 以上六味，粉碎成细粉。过筛，混匀。用水泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为浅褐色至褐色的水丸；气微香，味微苦、辛。

【鉴别】 (1) 取本品。置显微镜下观察：草酸钙簇晶大，直径 60～140 μm。分泌细胞类圆形，含黄棕色至红棕色分泌物。种皮栅状细胞淡棕色或棕色，长 48～80 μm。纤维束淡黄色，周围细胞含草酸钙方晶及少数簇晶，形成晶纤维，并常伴有类方形厚壁细胞。内胚乳碎片无色，壁较厚，有较多大的类圆形纹孔。

(2) 取本品约 2 g，研细，加水 20 ml，搅拌浸渍 20 分钟，滤过。取滤液 2 ml，加氢氧化钠试液数滴，显红色。

(3) 取鉴别(2)项下剩余的滤液 2 ml，置试管中，猛烈振摇，产生较持久性的泡沫。

(4) 取鉴别 (2) 项下剩余的滤液，点于滤纸上，置紫外光灯下观察，显红棕色荧光。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 消食导滞，行气泻水。用于食积痰饮，消化不良，脘腹胀满，嗳气吞酸，大便秘结。

【用法与用量】 口服，一次 6 g，一日 2 次。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 密闭，防潮。

磁　朱　丸

Cizhu Wan

【处方】 磁石(煅)200 g　朱砂 100 g　六曲(炒)400 g

【制法】 以上三味，朱砂水飞或粉碎成极细粉；磁石、六曲分别粉碎成细粉；取六曲粉末 350 g 与上述粉末配研，过筛，混匀。用剩余的六曲粉末调稀糊泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为赤褐色至棕褐色的糊丸；味淡。

【鉴别】 (1) 取本品约 1 g，研细，加稀盐酸 10 ml，加热 10 分钟，滤过，滤液显铁盐的鉴别反应(附录41页)。

(2) 取本品约 1 g，研细，加盐酸 2 ml 及铜丝或铜片少量，加热煮沸，铜片由黄色变为银白色。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【含量测定】 取本品约 1 g，研细，精密称定，置 250 ml 凯氏烧瓶中，加硝酸 6 ml与硫酸 8 ml，微微加热煮沸使朱砂溶解，放冷，用水 50 ml 冲洗烧瓶颈壁，加入 1%高锰酸钾溶液至溶液显红色，再加硫酸亚铁 1～2 粒，振摇，使红色消退，加硫酸铁铵指示液2 ml，用 $N/10$ 硫氰酸铵液滴定，即得（每 1 ml 的 $N/10$ 硫氰酸铵液相当于 11.63 mg 的HgS）。

本品含朱砂按 HgS 计算，应为 12.5～15.0%。

【功能与主治】 镇心，潜阳，明目。用于心悸怔忡，失眠，内障视物模糊，耳鸣耳聋。

【用法与用量】 口服，一次 3～6 g，一日 2 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

震 灵 丸

Zhenling Wan

【处方】 赤石脂(煅)200 g　禹粮石(煅)200 g　朱砂 50 g
紫石英(煅)200 g　赭石(煅)200 g　乳香(制)100 g
没药(制)100 g　五灵脂(醋炒)100 g

【制法】 以上八味，朱砂水飞或粉碎成极细粉；赤石脂、禹粮石、赭石、紫石英粉碎成极细粉，其余乳香等三味粉碎成细粉，另取糯米粉 200 g 炒熟，与上述粉末（朱砂除外）配研，过筛，混匀，用水泛丸，朱砂粉末包衣，干燥，即得。

【性状】 本品为朱红色的水丸；气微香，味苦涩。

【鉴别】 (1) 取本品 1～2 g，研细，置试管中，加盐酸 5 ml，振摇后，倾取上清液，加亚铁氰化钾试液 1～2 滴，发生蓝色沉淀。

(2) 取本品约 3 g，研细，置试管中，加硫酸 5 ml，管口盖玻璃片，放置半小时以上，玻璃被腐蚀呈乳白色。

(3) 取本品少量，研细，用盐酸湿润后，置光洁的铜片上轻轻摩擦，铜片表面即显银白色光泽，加热烘烤后，银白色即消失。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 止血化瘀。用于瘀血腹痛，崩漏。

【用法与用量】 口服，一次 6～9 g，一日 2 次。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【贮藏】 密闭，防潮。

橘贝半夏

Jubei Banxia

【处方】 橘红 15 g　川贝母 22 g　半夏(制)530 g　桔梗 15 g
远志(制)20 g　紫苏子(炒)10 g　紫菀 12 g　款冬花(炒)15 g
枇杷叶 150 g　前胡 10 g　苦杏仁霜 25 g　麻黄 7 g
肉桂 4 g　天花粉 10 g　木香 14 g　甘草 12 g

【制法】 以上十六味，将橘红、川贝母、半夏、桔梗、远志、苦杏仁霜、肉桂、天花粉、木香、甘草十味，粉碎成细粉，过筛，混匀。其余紫苏子等六味，加水煎煮 2 小时，滤过，滤液浓缩至适量，加入蔗糖 140 g溶化后，滤过，与上述粉末拌匀，制成颗粒或块，干燥，即得。

【性状】 本品为灰黄色的颗粒或块；味微甜带苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：淀粉粒广卵形或贝壳形，直径 40～64 μm，脐点短缝状、人字状或马蹄状，层纹可察见。草酸钙针晶成束，长 32～144 μm，存在于粘液细胞中或散在。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。草酸钙簇晶细小，直径 3～8 μm，存在于类圆形子叶细胞中。具缘纹孔导管大，多破碎，有的具缘纹孔呈六角形或斜方形，排列紧密。联结乳管直径 14～25 μm，含淡黄色颗粒状物。石细胞方形或类圆形，壁一面非薄。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。

【功能与主治】 化痰止咳，宽中下气。用于咳嗽痰多，胸闷气急。

【用法与用量】 口服，一次 3～6 g，一日 2 次。

【贮藏】 密闭，防潮。

橘红丸

Juhong Wan

【处方】 橘红 75 g　陈皮 50 g　半夏(制) 37.5 g　茯苓 50 g　甘草 25 g
桔梗 37.5 g　苦杏仁 50 g　紫苏子(炒) 37.5 g　紫菀 37.5 g　款冬花 25 g
瓜蒌皮 50 g　浙贝母 50 g　地黄 50 g　麦冬 50 g　石膏 50 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【制法】 以上十五味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 90～110 g 制成小蜜丸或大蜜丸，即得。

【性状】 本品为棕褐色的小蜜丸或大蜜丸；气微香，味甜、微苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：淀粉粒卵圆形，直径 35～48 μm，脐点点状、人字状或马蹄状，位于较小端，层纹细密。不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。草酸钙针晶成束或散在，长 32～144 μm，纤细。草酸钙针晶成束或散在，长 24～50 μm，直径约 3 μm。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。表皮细胞淡黄色，表面观类多角形，内含草酸钙方晶。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。石细胞橙黄色，贝壳形，壁较厚，较宽一边纹孔明显。薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。种皮细胞类圆形、长圆形或形状不规则，壁网状增厚似花纹样。花粉粒球形，直径约至 32 μm，外壁有刺，较尖。下皮细胞长方形，垂周壁波状弯曲，有的含紫色色素。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 清肺，化痰，止咳。用于咳嗽痰多，胸闷口干。

【用法与用量】 口服；小蜜丸一次 12 g，大蜜丸一次 2 丸；一日 2 次。

【规格】 大蜜丸每丸重 6 g

【贮藏】 密闭，防潮。

醒 消 丸

Xingxiao Wan

【处方】 雄黄 100 g　麝香 30 g　乳香(制) 200 g　没药(制) 200 g

【制法】 以上四味，雄黄水飞或粉碎成极细粉；另取黄米 150 g，蒸熟烘干，与乳香、没药粉碎成细粉；将麝香研细，与上述粉末配研，过筛，混匀。用水泛丸，阴干，即得。

【性状】 本品为棕黄色至暗黄色的水丸；气芳香，味微苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：无定形团块淡黄棕色，埋有细小方形结晶。不规则团块无色或淡黄色，表面及周围扩散出众多细小颗粒，久置溶化。不规则碎块淡黄色，半透明，渗出油滴，加热后油滴溶化，现正方形草酸钙结晶。不规则碎块金黄色或橙黄色，有光泽。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【功能与主治】 消肿止痛。用于痈疽肿毒，坚硬疼痛。

【用法与用量】 用温黄酒或温开水送服，一次 1.5～3 g，一日 2 次。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 密封。

礞石滚痰丸

Mengshi Guntan Wan

【处方】 金礞石(煅)40 g　沉香 20 g　黄芩 320 g　熟大黄 320 g

【制法】 以上四味，粉碎成细粉，过筛，混匀，用水泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为黄色至棕褐色的水丸；味苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：草酸钙簇晶大，直径 60～140 μm。纤维管胞壁略厚，有具缘纹孔，纹孔口人字形或十字形。纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。类长方形或不规则块片淡黄棕色。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 降火逐痰，通便。用于顽痰壅塞，咳喘痰稠，大便秘结，精神分裂症、狂躁。

【用法与用量】 口服，一次 9 g，一日 1 次。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 密闭，防潮。

礞铜丸

Litong Wan

【处方】 三七 100 g　血竭 100 g　阿魏 50 g　乳香(制) 100 g
没药(制) 100 g　藤黄(制) 100 g　竹黄 100 g　大黄 100 g
儿茶 100 g　冰片 12.5 g　雄黄 50 g　牛黄 12.5 g
麝香 12.5 g　山羊血 25 g

【制法】 以上十四味，除阿魏、麝香、冰片、牛黄外，雄黄水飞或粉碎成极细粉；其余三七等九味粉碎成细粉，将麝香、牛黄、冰片研细，与上述粉末及炒糯米粉 150 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

配研，过筛，混匀，再将阿魏加水微热熔化，滤过，加入糯米粉 25 g 调稀糊制成 740 丸，阴干或低温干燥，即得。

【性状】 本品为棕色的糊丸；具蒜样气，味微凉。

【检查】 除崩解时限不检查外，其他应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 活血祛瘀，消肿止痛。用于跌扑损伤，瘀血肿痛，闪腰岔气；外治痈肿疮毒。

【用法与用量】 嚼碎后温开水或黄酒送服，一日 1 丸；外用酒磨涂患处。

【注意】 本品有毒，服用不可过量。孕妇忌服。

【贮藏】 密封。

藿香正气丸

Huoxiang Zhengqi Wan

【处方】 广藿香 150 g　紫苏叶 50 g　白芷 50 g　白术(炒) 100 g
陈皮 100 g　半夏(制) 100 g　厚朴(姜制) 100 g　茯苓 50 g
桔梗 100 g　甘草 100 g　大腹皮 50 g

【制法】 以上十一味，除大腹皮外，其余广藿香等十味粉碎成细粉，过筛，混匀。另取大枣 25 g、生姜 15 g 与大腹皮加水煎煮二次，滤过，用煎出液泛丸，晒干或低温干燥，即得。

【性状】 本品为青黄色至棕黄色的水丸；气芳香，味甘、微苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4～6 μm。叶肉组织中散有细小草酸钙针晶。叶肉组织中有细小草酸钙簇晶，直径 4～8 μm。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。草酸钙针晶细小，长 10～32 μm，不规则地充塞于薄壁细胞中。草酸钙针晶成束，长 32～144 μm，存在于粘液细胞中或散在。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。石细胞分枝状，壁厚，层纹明显。果皮表皮细胞碎片黄棕色至红棕色，表面观多角形；断面观角质层厚约至 10 μm。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 祛暑解表，化湿和中。用于暑湿感冒，过食生冷，脘腹胀痛，呕吐泄泻。

【用法与用量】 口服，一次 6 g，一日 2 次。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【贮藏】 密闭，防潮。

藿香正气水

Huoxiang Zhengqi Shui

【处方】 苍术 160 g　陈皮 160 g　厚朴(姜制) 160 g　白芷 240 g
茯苓 240 g　大腹皮 240 g　生半夏 160 g　甘草浸膏 20 g
广藿香油 1.6 ml　紫苏叶油 0.8 ml

【制法】 以上十味，苍术、陈皮、厚朴、白芷分别照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法(附录11页)，用60%乙醇作溶剂，浸渍24小时后进行渗漉，前三种各收集初漉液400 ml，后一种收集初漉液500 ml，备用，收集继续渗漉的漉液，浓缩后併入初漉液中。茯苓加水煮沸后，80°温浸二次，第一次3小时，第二次2小时，取汁；生半夏用冷水浸泡，每8小时换水一次，泡至透心后，另加干姜13.5 g，加水煎煮二次，第一次3小时，第二次2小时；大腹皮加水煎煮3小时，甘草浸膏打碎后水煮化开；合併上述水煎液，滤过，滤液适当浓缩。广藿香油、紫苏叶油用乙醇适量使溶解。合并以上溶液，混匀；用乙醇与水调整含乙醇量使全量成2050 ml，静置，滤过，灌装，即得。

【性状】 本品为深棕色的澄明液体(久贮略有浑浊)；味辛、苦。

【检查】 乙醇量　应为40～50%(附录48页第一法)。

【功能与主治】 解表祛暑，化湿和中。用于四时外感，中暑头晕，脘腹胀痛，呕吐泄泻。

【用法与用量】 振摇后口服，一次5～10 ml，一日2次。

【规格】 每瓶10 ml

【贮藏】 密封，遮光保存。

鳖甲煎丸

Biejiajian Wan

【处方】 鳖甲胶 18 g　阿胶 30 g　蜂房(炒) 40 g　鼠妇虫 30 g
土鳖虫(炒) 50 g　蜣螂 60 g　硝石(精制) 120 g　柴胡 60 g
黄芩 30 g　半夏(制) 10 g　党参 10 g　干姜 30 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

厚朴(姜制) 30 g　桂枝 30 g　白芍(炒) 50 g　射干 30 g
桃仁 20 g　牡丹皮 50 g　大黄 30 g　凌霄花 30 g
葶苈子 10 g　石韦 30 g　瞿麦 20 g

【制法】 以上二十三味，除硝石、鳖甲胶、阿胶外，其余二十味酌于碎断，加黄酒 600 g 拌匀，加盖封闭，隔水炖至酒尽药熟，干燥，与硝石等三味混合粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 45～55 g 与适量的水泛丸，干燥；或加炼蜜 90～110 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为黑褐色的水蜜丸或大蜜丸；味苦、涩。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：纤维直径 15～35 μm，壁厚，微木化，有大的圆形纹孔。纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。联结乳管直径 12～15 μm，含细小颗粒状物。油管含黄色或棕黄色分泌物。石细胞分枝状，壁厚，层纹明显。石细胞类方形，壁一面非薄。石细胞橙黄色，贝壳形，壁较厚，较宽一边纹孔明显。草酸钙簇晶大，直径 60～140 μm。草酸钙结晶类圆形，直径 19～36 μm，存在于叶脉薄壁组织中，多个排列成行。草酸钙针晶成束，长 32～144 μm，存在于粘液细胞中或散在。草酸钙柱晶直径约至 34 μm。星状毛淡黄色，有 5～9 个分枝，柄数细胞。体壁碎片黄色或棕红色，具圆形突起。体壁碎片黄色或棕红色，有圆形毛窝，直径 8～24 μm，有的具长短不一的刚毛。体壁肌碎片无色或淡黄色，肌纤维长条状而平行排列，常上下层交错。

(2) 取本品 5 粒，研碎，加水 10 ml 研磨，滤过。取滤液 3 ml，缓缓加硫酸 3 ml，摇匀，放冷，沿管壁滴加硫酸亚铁试液，两液接界处显棕色环。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 活血化瘀，软坚散结。用于腹部肿块，肝脾肿大。

【用法与用量】 口服，水蜜丸一次 3 g，大蜜丸一次 2 丸；一日 2～3 次。

【注意】 孕妇忌服。

【规格】 大蜜丸每丸重 3 g

【贮藏】 密闭，防潮。

蟾　酥　丸

Chansu Wan

【处方】 蟾酥(制) 100 g　活蜈蚣 250 g　麝香 50 g　乳香(制) 50 g
没药(制) 50 g　铜绿 50 g　胆矾 50 g　白矾(煅) 50 g

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

寒水石 50 g　　朱砂 150 g　　雄黄 100 g　轻粉 25 g

【制法】 以上十二味，除麝香、蟾酥外，轻粉粉碎成细粉；雄黄、朱砂分别水飞或粉碎成极细粉；活蜗牛与其余乳香等六味掺研，干燥，粉碎成细粉。将麝香、蟾酥研细，与上述粉末配研，过筛，混匀。用水泛丸，阴干，即得。

【性状】 本品为棕黄色至深黄色的水丸；气香，味苦、麻舌。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 1 页)。

【功能与主治】 消解疮毒。用于痈疽，疔疮。

【用法与用量】 葱白汤或温开水送服，一次 5～15 粒，一日 1～2 次；外用研细醋调敷患处。

【注意】 本品有毒，服用不可过量；孕妇忌服。已溃烂者不宜外敷。

【规格】 每 33 粒重 1 g

【贮藏】 密封。

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

索　引

中文索引检字表

〔一画〕 一乙

〔二画〕 二十丁七人八几九了刀

〔三画〕 三干土大万上小山千川丸广女飞马

〔四画〕 王开天无云木五支车比瓦止中水贝牛手毛气升片化分月风丹乌凤六文火巴

〔五画〕 玉打功甘艾古左石布戊龙平北归电田四生失代仙白瓜冬玄半头汉丝

〔六画〕 老地耳芒亚芝过再西百成光当虫肉朱丢竹延伤华自伊血向行全合冲冰决羊关米灯 安农寻导阳阴防妇红

〔七画〕 麦远束赤折抗块芙芫芸苣花芥苍芡芦芒苏杠杜杞杨两医连吴岗牡伸皂佛余谷肝龟 辛羌沙沉怀良启补河灵层局阿陈附妙忍鸡驱纸纽

〔八画〕 青玫坤拔苦苘茅枇板松枫刺郁软虎昆明固岩罗败制知垂和委使侧佩金肺肿肥鱼 狗京卷炎炉河油泡注沸波泽空试降参细

〔九画〕 珉珍毒指荆茜茸草茵茴茯荠胡荔南药枳柏栀枸柱柿酊威厚砂牵轻鸦韭胃咳骨钙钟钠钩 香重复保禹追胆胭独急养姜前首炽洁洪活济洋穿冠扁祛祖孩络

〔十画〕 案珠盐热莱莲莪莓荷莨桂桔桃核桉索夏砷原烈柴逍党眠鸭钾铁积称值倒健臭射徐豹脂 脏胶狼凌高疳拳粉益浙酒娑海浮流调通预桑

〔十一画〕 控蔚勒黄菟菊梧梅棣救雪常眼野蛇啤婴铝铜银甜猪猫猕麻痔痕鹿商旋断清淫淡密续绵

〔十二画〕 琥斑款越葫散葛萝落萱葡朝椿椰棕硫雄雅紫暑景跌蛤黑锁氮鹅筋傣舒番粉痛滑滋缓

〔十三画〕 蒈蓝蓖蒺蒲椿槐感碘雷暖照路蜈蜂锡锦矮雉鼠催腰解煎满裸

〔十四画〕 蔻蔫蔓榧榄榜槟酸碱碳磁豁蜘蝉罂鲜膏辣熔漏熊

〔十五画〕 赭蕤蕲榭震暴墨稍僵鹤

〔十六画〕 薤薯薏薄颜橘醒螃凝糙

〔十七画〕 藏藁爵翼

〔十八画〕 藕礞檬礓蟛翻

〔十九画〕 藿鳖蟾

〔二十画〕 镭

〔二十一画〕 麝

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

中 文 索 引

（*号系指附录页码）

[一 画]

一枝黄花…… 1
一点红…… 1
一般鉴别试验…… *40
一捻金…… 671
乙醇比重表…… *50
乙醇量测定法…… *48

[二 画]

二冬膏…… 671
二至丸…… 672
二陈丸…… 672
二妙丸…… 673
十一味能消丸…… 673
十二味翼首散…… 674
十三味榜嘎散…… 675
十五味沉香丸…… 675
十六味杜鹃丸…… 676
十全大补丸…… 677
十味石榴丸…… 677
丁公藤…… 2
丁公藤注射液…… 3
丁公藤风湿药酒…… 678
丁香罗勒油…… 4
七味广枣丸…… 679
七味铁屑丸…… 679
七味葡萄散…… 680
七味榄藤子丸…… 681
七珍丸…… 681
七厘散…… 682
七雄丸…… 683
人参…… 5
八角枫…… 6
八角茴香…… 7
八角茴香油…… 8
八味沉香散…… 683
八味清心沉香散…… 684
八味檀香散…… 684
八宝眼药…… 685
八珍丸…… 686
八珍益母丸…… 686
八厘麻…… 9
八厘麻毒素…… 9
八厘麻毒素片…… 10
八厘麻毒素注射液…… 11
儿茶…… 12
九气拈痛丸…… 687
九分散…… 688
九节菖蒲…… 13
九头狮子草…… 14
九里香…… 14
九味石灰华散…… 689
九味羌活丸…… 689
九香虫…… 15
九胜散…… 690
了哥王…… 16
了哥王片…… 17
刀豆…… 17

[三 画]

三七…… 18
三子散…… 690
三叉苦…… 19
三分三…… 20
三分三浸膏…… 21
三白草…… 22
三合素软膏…… 542
三合素胶丸…… 543
三妙丸…… 691
三味蒺藜散…… 691
三棱…… 22

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

三颗针…… 23
干姜…… 24
干燥失重测定法…… *44
干燥硫酸钠…… 187
土贝母…… 26
土荆皮…… 26
土茯苓…… 27
土党参…… 28
土藿香…… 666
土鳖虫…… 28
大山楂丸…… 692
大头陈…… 29
大血藤…… 30
大红袍…… 30
大豆黄卷…… 31
大皂角…… 32
大补阴丸…… 693
大青叶…… 32
大青盐…… 33
大枣…… 34
大黄…… 34
大黄流浸膏…… 36
大黄药…… 37
大黄䗪虫丸…… 693
大黄藤…… 521
大蒜…… 37
大蓟…… 38
大腹皮…… 39
万氏牛黄清心丸…… 694
万应锭…… 824
上清丸…… 695
小儿化毒散…… 696
小儿四症丸…… 696
小儿至宝丹…… 697
小儿惊风散…… 698
小儿紫草丸…… 699
小叶莲…… 40
小红参…… 40
小驳骨…… 41
小青龙合剂…… 700
小金丸…… 700
小建中合剂…… 701
小茴香…… 42
小活络丸…… 702
小通草…… 42
小野鸡尾…… 43
小蓟…… 44
山川柳…… 213
山芝麻…… 45
山豆根…… 45
山柰…… 46
山茱萸…… 47
山药…… 48
山栀茶…… 48
山楂…… 49
山蜡梅叶…… 50
山蜡梅茶…… 51
千日红…… 51
千年健…… 52
千里光…… 53
千里光片…… 53
千金子…… 54
千金散…… 702
川木香…… 55
川木通…… 55
川贝母…… 56
川牛膝…… 57
川乌…… 58
川芎…… 59
川芎茶调散…… 703
川楝皮…… 60
川楝子…… 61
丸剂…… *1
二至丸…… 672
二陈丸…… 672
二妙丸…… 673
十一味能消丸…… 673
十五味沉香丸…… 675
十六味杜鹃丸…… 676
十全大补丸…… 677
十味石榴丸…… 677
七味广枣丸…… 679

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

七味铁屑丸…… 679
七味楤藤子丸…… 681
七珍丸…… 681
七雄丸…… 683
八珍丸…… 686
八珍益母丸…… 686
九气拈痛丸…… 687
九味羌活丸…… 689
三妙丸…… 691
大山楂丸…… 692
大补阴丸…… 693
大黄䗪虫丸…… 693
万氏牛黄清心丸…… 694
上清丸…… 695
小儿四症丸…… 696
小儿至宝丸…… 697
小儿紫草丸…… 699
小金丸…… 700
小活络丸…… 702
女金丸…… 704
开胸顺气丸…… 705
天麻丸…… 705
木瓜丸…… 706
木耳舒筋丸…… 707
木香槟榔丸…… 707
五子补肾丸…… 708
五味麝香丸…… 710
止红肠澼丸…… 711
止带丸…… 712
牛黄上清丸…… 712
牛黄保婴丸…… 713
牛黄消炎丸…… 714
牛黄解毒丸…… 715
牛黄镇惊丸…… 716
化毒丸…… 718
分清丸…… 719
风湿骨痛丸…… 719
乌鸡白凤丸…… 721
六合定中丸…… 722
六味地黄丸…… 723
艾附暖宫丸…… 725
左金丸…… 726
石斛夜光丸…… 727
戊己丸…… 728
龙胆泻肝丸…… 729
归芍地黄丸…… 730
归脾丸…… 730
四君子丸…… 731
四神丸…… 733
白带丸…… 734
半贝丸…… 735
头风痛丸…… 735
耳聋佐磁丸…… 736
再造丸…… 738
西黄丸…… 739
百合固金丸…… 740
当归龙荟丸…… 740
朱砂安神丸…… 741
羊胆丸…… 744
安宫牛黄丸…… 746
安神补心丸…… 747
导赤丸…… 748
防风通胜丸…… 749
妇女痛经丸…… 750
妇科分清丸…… 751
麦味地黄丸…… 752
抗痨丸…… 753
苏合香丸…… 754
杞菊地黄丸…… 756
医痫丸…… 756
沉香化气丸…… 757
良附丸…… 758
启脾丸…… 758
补中益气丸…… 759
补心丸…… 760
补益豆蔻丸…… 761
附子理中丸…… 763
妙济丸…… 763
坤顺丸…… 766
拨云退翳丸…… 766
明目地黄丸…… 768
固经丸…… 769

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

知柏地黄丸…… 770
肥儿丸…… 772
河车大造丸…… 775
降压丸…… 775
参苏丸…… 776
茴香橘核丸…… 777
枳术丸…… 779
枳实导滞丸…… 780
柏子养心丸…… 781
栀子金花丸…… 782
香苏正胃丸…… 782
香连丸…… 783
香附丸…… 784
香砂六君丸…… 784
保和丸…… 793
首乌丸…… 796
洁白丸…… 797
济生肾气丸…… 798
冠心苏合丸…… 799
祛风舒筋丸…… 799
荷叶丸…… 802
桂附地黄丸…… 803
逍遥丸…… 803
健步丸…… 804
健脾丸…… 805
健腰丸…… 806
脏连丸…… 806
益母丸…… 808
调经丸…… 809
通宣理肺丸…… 811
桑麻丸…… 812
控涎丸…… 813
黄连羊肝丸…… 813
梅花点舌丸…… 814
银翘解毒丸…… 819
麻仁丸…… 820
痔漏丸…… 821
清气化痰丸…… 821
清宁丸…… 822
清肺抑火丸…… 823
清胃黄连丸…… 823
清热丸…… 824
清眩丸…… 825
清瘟解毒丸…… 827
越鞠丸…… 828
散风活络丸…… 829
暑湿正气丸…… 834
跌打丸…… 834
锁阳固精丸…… 836
舒肝丸…… 838
舒肝止痛丸…… 838
痛经丸…… 841
滋肾丸…… 842
槐角丸…… 843
催汤丸…… 845
腰痛丸…… 846
解肌宁嗽丸…… 848
槟榔四消丸…… 848
磁朱丸…… 849
豨莶丸…… 633
震灵丸…… 850
橘红丸…… 851
醒消丸…… 852
礞石滚痰丸…… 853
蠓蜴丸…… 853
藿香正气丸…… 854
鳖甲煎丸…… 855
蟾酥丸…… 856
广地丁…… 61
广防己…… 62
广豆根…… 45
广枣…… 63
广金钱草…… 63
广藿香…… 65
女贞子…… 66
女金丸…… 704
飞扬草…… 67
马兰草…… 67
马尿泡…… 68
马齿苋…… 69
马勃…… 69
马钱子…… 70

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

马兜铃…… 72
马兜铃藤…… 72
马槟榔…… 73
马蹄香…… 633
马鞭草…… 74

[四　画]

王不留…… 74
开胸顺气丸…… 705
天仙子…… 468
天仙藤…… 72
天冬…… 75
天花粉…… 76
天南星…… 77
天麻…… 78
天麻丸…… 705
天葵子…… 79
元宝草…… 79
元胡…… 80
无菌检查法…… *55
云母石…… 81
云实皮…… 82
木瓜…… 82
木瓜丸…… 706
木耳舒筋丸…… 707
木香…… 83
木香槟榔丸…… 707
木贼…… 84
木棉花…… 85
木腰子…… 85
木槿花…… 86
木蝴蝶…… 86
木鳖子…… 87
五子补肾丸…… 708
五加皮…… 88
五灵脂…… 89
五苓散…… 709
五虎散…… 709
五味子…… 89
五味沙棘散…… 710
五味麝香丸…… 710
五指毛桃…… 90
五倍子…… 91
支柱蓼…… 92
车前子…… 92
车前草…… 93
比重测定法…… *26
瓦松…… 94
瓦楞子…… 94
止红肠澼丸…… 711
止带丸…… 712
中草药及成方显微鉴别法…… *19
中草药炮制通则…… *17
中草药检定通则…… *13
水牛角…… 95
水牛角浓缩粉…… 96
水半夏…… 96
水红花子…… 97
水杨梅…… 98
水蛭…… 98
水蜈蚣…… 99
水蓼苔…… 100
贝母花…… 100
贝母花片…… 101
贝母花流浸膏…… 102
牛至…… 103
牛黄…… 103
牛黄上清丸…… 712
牛黄保婴丸…… 713
牛黄消炎丸…… 714
牛黄解毒丸…… 715
牛黄解毒片…… 715
牛黄镇惊丸…… 716
牛蒡子…… 104
牛膝…… 105
手参…… 106
毛山茶…… 50
毛冬青…… 107
毛冬青片…… 108
毛冬青注射液…… 108
毛诃子…… 109
毛鸡药酒…… 717

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

气相层析法…… *39
升麻…… 110
升登…… 111
片剂…… *6
八厘麻毒素片…… 10
了哥王片…… 17
千里光片…… 53
贝母花片…… 101
牛黄解毒片…… 715
毛冬青片…… 108
石吊兰素片…… 142
石黄抗菌片…… 727
石淋通片…… 64
北豆根片…… 156
四季青片…… 161
白毛夏枯草片…… 599
瓜蒌片…… 184
汉桃叶片…… 194
当药片…… 219
华山参片…… 230
血凝片…… 281
冰凉花甙片…… 239
安胃片…… 745
红孩儿片…… 649
红管药片…… 263
苎麻片…… 281
杜仲降压片…… 755
肝复灵片…… 219
灵芝片…… 306
青叶胆片…… 317
苦豆草片…… 326
败酱片…… 350
垂盆草片…… 353
金龙胆草片…… 357
金莲花片…… 360
肿节风片…… 367
钩藤片…… 413
香青片…… 417
复方地锦片…… 786
复方阴阳莲片…… 788
复方杜鹃片…… 789
复方岗稔片…… 789
复方岩白菜素片…… 790
复方矮茶素片…… 790
胆英片…… 795
洋地黄片…… 433
穿心莲片…… 438
穿心莲内酯片…… 440
穿心莲甙酯片…… 442
盐酸黄连素片…… 455
盐酸麻黄碱片…… 457
毒叶委陵菜片…… 466
夏天无片…… 475
眠尔静片…… 350
桑菊感冒片…… 812
黄藤素片…… 523
梧桐片…… 527
雪胆素片…… 533
野马追片…… 535
野木瓜片…… 538
银翘解毒片…… 819
断血流片…… 561
葛根芩连片…… 830
紫花杜鹃片…… 583
昏症片…… 833
筋骨草片…… 599
蒲公英片…… 608
雄子筵片…… 466
腰痛片…… 847
裸花紫珠片…… 622
蔊菜素片…… 626
鹤草酚片…… 647
薯莨片…… 649
颠茄片…… 658
化毒丸…… 718
分光光度法与比色法…… *32
分清丸…… 719
月季花…… 111
风茄花…… 434
风湿骨痛丸…… 719
丹皮酚…… 112
丹皮酚注射液…… 113

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

丹参…… 114
丹参注射液…… 115
乌贝散…… 720
乌鸡白凤丸…… 721
乌药…… 116
乌韭…… 116
乌桕…… 117
乌梢蛇…… 118
乌梅…… 118
凤仙透骨草…… 119
凤尾草…… 120
凤凰衣…… 120
六一散…… 722
六月雪…… 121
六合定中丸…… 722
六味木香散…… 723
六味地黄丸…… 723
六味安消散…… 724
文冠木…… 121
火炭母…… 122
火麻仁…… 123
巴豆…… 123
巴戟天…… 124

〔五　画〕

玉竹…… 125
玉米须…… 126
玉真散…… 725
玉葡萄根…… 127
打破碗花花…… 127
功劳木…… 128
功劳叶…… 402
甘汞…… 409
甘青青蓝…… 129
甘松…… 129
甘草…… 130
甘草流浸膏…… 132
甘草浸膏…… 131
甘遂…… 133
艾叶…… 134
艾叶油…… 135
艾叶油气雾剂…… 136
艾叶油胶囊…… 136
艾附暖宫丸…… 725
古山龙…… 137
左金丸…… 726
石韦…… 138
石见穿…… 138
石灰华…… 139
石吊兰…… 140
石吊兰素…… 141
石吊兰素片…… 142
石决明…… 143
石钻子…… 143
石黄抗菌片…… 727
石菖蒲…… 144
石斛…… 145
石斛夜光丸…… 727
石淋通片…… 64
石榴草…… 146
石楠叶…… 147
石榴子…… 147
石榴皮…… 148
石膏…… 149
布渣叶…… 149
戊己丸…… 728
龙齿…… 150
龙虎草…… 370
龙骨…… 151
龙胆…… 152
龙胆泻肝丸…… 729
龙眼肉…… 153
龙脷叶…… 153
龙葵…… 154
平贝母…… 155
北豆根…… 155
北豆根片…… 156
北沙参…… 157
北败酱…… 274
北野菊…… 158
归芍地黄丸…… 730
归脾丸…… 730

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

电位滴定法与永停滴定法…… *59
田基黄…… 198
田基黄注射液…… 199
四方藤…… 158
四叶参…… 159
四君子丸…… 731
四味土木香散…… 732
四季青…… 160
四季青片…… 161
四季青药水…… 161
四季青搽剂…… 162
四逆汤…… 732
四神丸…… 733
生脉饮…… 733
生姜…… 162
失笑散…… 734
代代花…… 163
仙茅…… 163
仙桃草…… 164
仙鹤草…… 165
白及…… 166
白云花根…… 166
白云香…… 335
白毛夏枯草…… 598
白毛夏枯草片…… 599
白术…… 167
白头翁…… 168
白芍…… 169
白芷…… 170
白花菜子…… 171
白附子…… 171
白英…… 172
白茅根…… 173
白矾…… 174
白果…… 175
白屈菜…… 176
白带丸…… 734
白药子…… 176
白前…… 177
白首乌…… 178
白扁豆…… 178
白蔹…… 179
白鲜皮…… 180
白薇…… 180
瓜子金…… 181
瓜蒌…… 182
瓜蒌子…… 182
瓜蒌片…… 184
瓜蒌皮…… 183
冬瓜子…… 184
冬瓜皮…… 185
冬虫夏草…… 185
冬凌草…… 186
冬葵子…… 328
冬葵果…… 187
玄明粉…… 187
玄参…… 188
半支莲…… 189
半贝丸…… 735
半边莲…… 189
半夏…… 190
头风痛丸…… 735
汉肌松…… 191
汉肌松注射液…… 192
汉桃叶…… 193
汉桃叶片…… 194
汉桃叶注射液…… 194
丝瓜络…… 195

[六　画]

老幼剂量折算表…… *91
老鹳草…… 196
老鹳草软膏…… 197
地龙…… 197
地耳草…… 198
地枫皮…… 200
地肤子…… 201
地骨皮…… 201
地胆草…… 202
地黄…… 203
地椒…… 204
地榆…… 205

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

地锦草…… 205
耳聋佐磁丸…… 736
芒硝…… 206
亚乎奴…… 207
亚汞盐(鉴别反应)…… *40
亚铁盐(鉴别反应)…… *41
亚麻子…… 208
亚硫酸氢钠穿心莲内酯…… 209
亚硫酸氢钠穿心莲内酯注射液…… 211
芝蓝枯痔液…… 737
过岗龙…… 211
再造丸…… 738
西瓜皮…… 212
西河柳…… 213
西黄丸…… 739
百合…… 213
百合固金丸…… 740
百部…… 214
百蕊草…… 215
成方制剂中本药典未收载的中草药
及炮制品…… *21
光枝勾儿茶…… 216
光慈姑…… 217
当归…… 217
当归龙荟丸…… 740
当归流浸膏…… 218
当药…… 219
当药片…… 219
当量液与克分子液…… *83
虫白蜡…… 220
肉苁蓉…… 220
肉桂…… 221
肉桂油…… 222
朱砂…… 223
朱砂安神丸…… 741
朱砂根…… 224
丢了棒…… 225
竹节七…… 225
竹节参…… 225
竹节香附…… 226
竹茹…… 227
竹黄…… 227
延胡索…… 80
伤湿止痛膏…… 742
华山参…… 228
华山参气雾剂…… 229
华山参片…… 230
自然铜…… 231
伊贝母…… 232
血余炭…… 233
血凝…… 280
血凝片…… 281
向天盏…… 233
行军散…… 742
全叶青兰…… 234
全蝎…… 234
合成龙脑…… 236
合欢皮…… 235
合欢花…… 236
冲服凉茶…… 743
冲剂…… *5
金鸡冲剂…… 771
炎宁冲剂…… 774
复方羊角冲剂…… 787
复方紫参冲剂…… 792
感冒退热冲剂…… 843
感冒清热冲剂…… 844
冰片…… 236
冰凉花…… 237
冰凉花甙…… 238
冰凉花甙片…… 239
冰凉花甙注射液…… 240
冰硼散…… 744
决明子…… 241
羊耳菊…… 241
羊胆丸…… 744
关木通…… 242
关白附…… 243
米壳…… 634
灯心草…… 244
灯台叶…… 245
灯盏花…… 245

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

灯盏细辛…… 245
灯盏细辛注射液…… 246
安胃片…… 745
安宫牛黄丸…… 746
安宫牛黄散…… 746
安神补心丸…… 747
安息香…… 248
农吉利…… 249
农吉利碱…… 250
寻骨风…… 251
导赤丸…… 748
阳和解凝膏…… 749
阳起石…… 252
阴地蕨…… 253
阴行草…… 254
防己…… 254
防风…… 255
防风通胜丸…… 749
妇女痛经丸…… 750
妇科分清丸…… 751
红大戟…… 256
红毛七…… 257
红外光吸收图谱…… *93
红头草…… 257
红花…… 258
红花龙胆…… 259
红豆蔻…… 260
红灵散…… 751
红孩儿…… 648
红孩儿片…… 649
红根草…… 260
红粉…… 261
红景天…… 262
红管药…… 262
红管药片…… 263

[七　画]

麦冬…… 264
麦芽…… 265
麦味地黄丸…… 752
远志…… 265
远志酊…… 267
远志流浸膏…… 266
汞盐(鉴别反应)…… *40
赤小豆…… 267
赤石脂…… 268
赤芍…… 269
折光率测定法…… *32
抗风湿合剂…… 753
抗痨丸…… 753
块根木蓝…… 270
芙蓉叶…… 270
芫花…… 271
芸香草…… 272
芸香草油…… 272
芸香草油气雾剂…… 273
苣荬菜…… 274
花椒…… 275
花蕊石…… 275
芥子…… 276
苍术…… 277
苍耳子…… 278
芡实…… 278
苎麻片…… 281
苎麻根…… 279
苎麻浸膏…… 280
芦荟…… 282
芦根…… 283
苏木…… 283
苏合香丸…… 754
苏败酱…… 524
杠板归…… 284
杜仲…… 285
杜仲降压片…… 755
杜衡…… 286
杞菊地黄丸…… 756
杨树花…… 287
两头尖…… 226
两面针…… 287
医痫丸…… 757
连钱草…… 288
连翘…… 288

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

吴茱萸…… 289
岗松…… 290
岗梅…… 291
岗稔根…… 471
牡丹皮…… 291
牡荆叶…… 292
牡荆油…… 293
牡荆油胶丸…… 294
牡蛎…… 294
伸筋草…… 295
皂化值的测定…… *52
皂角刺…… 296
佛手…… 297
佛甲草…… 297
佛耳草…… 619
余甘子…… 298
谷芽…… 642
谷精草…… 298
肝复灵片…… 219
龟板…… 299
龟板胶…… 300
辛夷…… 300
羌活…… 301
沙苑子…… 302
沙枣…… 302
沙枣叶…… 303
沙棘…… 303
沉香…… 304
沉香化气丸…… 757
怀牛膝…… 105
良附丸…… 758
启脾丸…… 758
补中固经汤…… 759
补中益气丸…… 759
补心丸…… 760
补骨脂…… 305
补益豆蔻丸…… 761
诃子…… 306
灵芝片…… 306
层析法…… *35
局方至宝散…… 762
阿胶…… 307
阿魏…… 308
阿魏化痞膏…… 762
陈皮…… 309
附子…… 309
附子理中丸…… 763
妙济丸…… 763
忍冬藤…… 311
鸡内金…… 311
鸡矢藤…… 312
鸡血藤…… 312
鸡血藤膏…… 764
鸡冠花…… 313
鸡骨草…… 314
驱寒止痛砂…… 765
纸层析法…… *36
纽子七…… 448

[八　画]

青木香…… 315
青风藤…… 315
青叶胆…… 316
青叶胆片…… 317
青叶胆注射液…… 317
青皮…… 318
青果…… 319
青葙子…… 319
青蒿…… 320
青黛…… 320
青礞石…… 321
玫瑰花…… 322
坤顺丸…… 766
拨云退翳丸…… 766
苦木…… 323
苦地丁…… 323
苦杏仁…… 324
苦豆草…… 325
苦豆草片…… 326
苦味酊…… 786
苦参…… 326
苦楝皮…… 327

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

苘麻子…… 328
茅莓…… 329
茅莓根…… 329
枇杷叶…… 330
枇杷叶膏…… 331
板栗壳…… 331
板蓝根…… 332
松节油…… 333
松花粉…… 333
松塔…… 334
松醇…… 334
枫香脂…… 335
刺五加…… 336
刺五加浸膏…… 337
刺蒺藜…… 606
郁李仁…… 338
郁金…… 338
软膏剂…… *12
三合素软膏…… 542
老鹳草软膏…… 197
虎耳草…… 339
虎杖…… 340
虎刺…… 341
虎仗…… 341
虎骨酒…… 767
虎掌草…… 343
昆布…… 343
明目地黄丸…… 768
明矾…… 174
明党参…… 345
固经丸…… 769
岩白菜…… 345
岩白菜素…… 346
岩豆素…… 141
岩陀…… 347
罗布麻叶…… 348
罗汉果…… 349
败酱片…… 350
败酱草…… 349
知母…… 351
知柏地黄丸…… 770
垂盆草…… 352
垂盆草片…… 353
和中糖浆…… 770
委陵菜…… 353
使君子…… 354
侧柏叶…… 355
佩兰…… 355
金龙胆草…… 356
金龙胆草片…… 357
金佛草…… 358
金鸡冲剂…… 771
金果榄…… 358
金荞麦…… 359
金莲花…… 359
金莲花片…… 360
金钱白花蛇…… 361
金钱草…… 361
金铁锁…… 362
金黄散…… 772
金银花…… 363
金银藤…… 311
金锦香…… 364
金樱子…… 364
金礞石…… 365
肺形草…… 366
肿节风…… 366
肿节风片…… 367
肥儿丸…… 772
鱼腥草…… 368
鱼鳅串…… 67
狗皮膏…… 773
狗肝菜…… 369
狗脊…… 369
京大戟…… 370
卷柏…… 371
炎宁冲剂…… 774
炉甘石…… 372
河车大造丸…… 775
油松节…… 373
泡桐果…… 373
注射剂…… *7

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

丁公藤注射液…… 3
八厘麻毒素注射液…… 11
毛冬青注射液…… 108
丹皮酚注射液…… 113
丹参注射液…… 114
田基黄注射液…… 199
汉肌松注射液…… 192
汉桃叶注射液…… 194
亚硫酸氢钠穿心莲内酯注射液…… 211
冰凉花甙注射液…… 240
灯盏细辛注射液…… 246
青叶胆注射液…… 317
空心莲子草注射液…… 377
盐酸八角枫碱注射液…… 451
盐酸川芎嗪注射液…… 453
盐酸农吉利碱注射液…… 251
盐酸麻黄碱注射液…… 458
莪术油注射液…… 464
莪术油乳注射液…… 464
益母草注射液…… 493
黄藤素注射液…… 524
野木瓜注射液…… 538
银黄注射液…… 817
傣肌松注射液…… 601
蟛蜞菊注射液…… 377
注射剂用玻璃容器检验法…… *58
沸程测定法…… *27
波棱瓜子…… 374
泽兰…… 375
泽泻…… 375
空心莲子草…… 376
空心莲子草注射液…… 377
试纸…… *78
试药…… *63
试液…… *71
降压丸…… 775
降香…… 379
参苏丸…… 776
参苓白术散…… 777
细辛…… 379

[九　画]

珊瑚…… 380
珍珠…… 381
珍珠母…… 382
毒剧药表…… *90
指示剂与指示液…… *78
荆芥…… 382
茜草…… 383
荜茇…… 384
荜澄茄…… 385
草乌…… 385
草乌叶…… 387
草血竭…… 387
草红藤…… 388
草豆蔻…… 389
草果…… 389
茵陈…… 390
茴香橘核丸…… 777
茯苓…… 391
茶油…… 392
莞蔚子…… 393
胡芦巴…… 393
胡黄连…… 394
胡麻子…… 208
胡蜂酒…… 778
胡颓子叶…… 395
荔枝草…… 395
荔枝核…… 396
南五味子糕…… 396
南沙参…… 397
南鹤虱…… 398
药艾条…… 779
标准比色液…… *81
枳术丸…… 779
枳壳…… 399
枳实…… 399
枳实导滞丸…… 780
柏子仁…… 400
柏子养心丸…… 781
栀子…… 401

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

栀子金花丸…… 782
枸杞子…… 402
枸骨叶…… 402
柱层析法…… *35
柿蒂…… 403
酊剂…… *10
远志酊…… 267
苦味酊…… 786
复方大黄酊…… 785
复方龙胆酊…… 786
姜酊…… 25
颠茄酊…… 655
威灵仙…… 403
厚朴…… 404
厚朴花…… 406
砂仁…… 406
砂仁叶油…… 407
牵牛子…… 408
轻粉…… 409
鸦胆子…… 410
韭菜子…… 410
胃溃疡粉…… 720
咳宁醇…… 334
骨碎补…… 411
钙盐(鉴别反应)…… *40
钟乳石…… 412
钠盐(鉴别反应)…… *40
钩藤…… 412
钩藤片…… 413
香加皮…… 414
香苏正胃丸…… 782
香连丸…… 783
香附…… 415
香附丸…… 784
香青片…… 417
香青兰…… 416
香青草…… 417
香青糖浆…… 418
香果脂…… 418
香砂六君丸…… 784
香橼…… 419
香薷…… 420
重金属检查法…… *46
重楼…… 421
复方大黄酊…… 785
复方龙胆酊…… 786
复方地锦片…… 786
复方百部止咳糖浆…… 787
复方羊角冲剂…… 787
复方阴阳莲片…… 788
复方杜鹃片…… 789
复方岗稔片…… 789
复方岩白菜素片…… 790
复方垂盆草糖浆…… 791
复方鸭跖草溶液…… 791
复方紫参冲剂…… 792
复方矮茶素片…… 790
复盆子…… 422
保赤散…… 793
保和丸…… 793
禹白附…… 171
禹粮土…… 422
禹粮石…… 423
追风膏…… 794
胆木…… 424
胆矾…… 424
胆荚片…… 795
胆南星…… 425
匍伏堇…… 426
独活…… 426
急性子…… 427
养阴清肺膏…… 795
姜酊…… 25
姜流浸膏…… 24
姜黄…… 428
前胡…… 429
首乌…… 430
首乌丸…… 796
首乌藤…… 431
炽灼残渣检查法…… *45
洁白丸…… 797
洪连…… 432

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

活血止痛散…… 797
济生肾气丸…… 798
洋地黄片…… 433
洋地黄叶…… 432
洋地黄生物检定法…… *62
洋金花…… 434
穿山龙…… 435
穿山甲…… 436
穿心莲…… 437
穿心莲片…… 438
穿心莲内酯…… 439
穿心莲内酯片…… 440
穿心莲戊…… 441
穿心莲戊酯片…… 442
穿破石…… 443
冠心苏合丸…… 799
扁豆花…… 444
祛风舒筋丸…… 799
祖司麻…… 445
孩儿参…… 445
络石藤…… 446

[十　画]

秦艽…… 446
秦皮…… 447
珠子参…… 448
珠黄吹喉散…… 800
紫菀花…… 449
盐蛇散…… 801
盐酸八角枫碱…… 450
盐酸八角枫碱注射液…… 451
盐酸川芎嗪…… 452
盐酸川芎嗪注射液…… 453
盐酸农吉利碱注射液…… 251
盐酸黄连素…… 454
盐酸黄连素片…… 455
盐酸麻黄碱…… 456
盐酸麻黄碱片…… 457
盐酸麻黄碱注射液…… 458
热参…… 228
热原检查法…… *53
莱菔子…… 458
莲子…… 459
莲子心…… 460
莲房…… 460
莲须…… 461
莪大夏…… 461
莪术…… 462
莪术油…… 463
莪术油注射液…… 464
莪术油乳注射液…… 464
莓叶委陵菜…… 465
莓叶委陵菜片…… 466
荷叶…… 467
荷叶丸…… 802
莨菪子…… 468
桂附地黄丸…… 803
桂枝…… 468
桂圆肉…… 153
桔梗…… 469
桃儿七…… 470
桃仁…… 471
桃金娘根…… 471
核桃仁…… 472
桉油…… 473
桉油精含量测定法…… *61
索骨丹根…… 473
夏天无…… 474
夏天无片…… 475
夏枯草…… 475
夏枯草膏…… 476
砷盐检查法…… *47
原子量表…… *92
烈香杜鹃…… 477
柴胡…… 477
逍遥丸…… 803
党参…… 478
眠尔静片…… 350
鸭跖草…… 479
钾盐(鉴别反应)…… *41
铁苋菜…… 480
铁盐(鉴别反应)…… *41

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

铁盐检查法…… *45
积雪草…… 480
秤钩风…… 481
pH 值测定法 …… *42
倒扣草…… 482
倒挂牛…… 82
健步丸…… 804
健胃归津丸…… 805
健脾丸…… 805
健腰丸…… 806
臭灵丹草…… 482
臭梧桐叶…… 483
射干…… 484
徐长卿…… 484
豹骨…… 485
脂肪与脂肪油检验法…… *51
脂肪酸凝点的测定…… *51
脏连丸…… 806
胶剂…… *5
龟板胶…… 300
阿胶…… 307
鹿角胶…… 556
胶囊剂…… *12
三合素胶丸…… 543
艾叶油胶囊…… 136
牡荆油胶丸…… 294
满山红油胶丸…… 621
狼把草…… 486
狼毒…… 487
凌霄花…… 488
高良姜…… 489
疳积散…… 807
拳参…… 489
粉防己…… 254
粉条儿菜…… 490
粉萆薢…… 491
益元散…… 808
酒剂…… *4
丁公藤风湿药酒…… 678
毛鸡药酒…… 717
虎骨酒…… 767
胡蜂酒…… 778
舒筋活络酒…… 839
益母丸…… 808
益母草…… 492
益母草注射液…… 493
益母草流浸膏…… 494
益母草膏…… 495
益智…… 495
浙贝母…… 496
浙贝流浸膏…… 497
浙桐皮…… 498
娑罗子…… 499
海马…… 499
海风藤…… 500
海龙…… 501
海芋…… 502
海金沙…… 502
海桐皮…… 503
海螵蛸…… 503
海藻…… 504
浮石…… 505
浮海石…… 506
浮萍…… 506
流浸膏剂与浸膏剂…… *11
三分三浸膏…… 21
大黄流浸膏…… 36
贝母花流浸膏…… 102
甘草流浸膏…… 132
甘草浸膏…… 131
当归流浸膏…… 218
远志流浸膏…… 266
苎麻浸膏…… 280
刺五加浸膏…… 337
姜流浸膏…… 24
益母草流浸膏…… 494
浙贝流浸膏…… 497
啤酒花浸膏…… 541
紫花杜鹃浸膏…… 582
鹤草芽浸膏…… 645
颠茄流浸膏…… 656
颠茄浸膏…… 657

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

调经丸…… 809
通关散…… 810
通关藤…… 507
通草…… 508
通宣理肺丸…… 811
预知子…… 508
桑叶…… 509
桑白皮…… 510
桑枝…… 511
桑菊感冒片…… 812
桑麻丸…… 812
桑寄生…… 511
桑椹…… 512
桑螵蛸…… 513

[十 一 画]

控涎丸…… 813
薪蓂…… 524
勒马回…… 100
黄芫花…… 514
黄芩…… 515
黄芪…… 516
黄连…… 517
黄连羊肝丸…… 813
黄栌…… 518
黄柏…… 519
黄精…… 520
黄藤…… 521
黄藤素…… 522
黄藤素片…… 523
黄藤素注射液…… 524
菟丝子…… 525
菊苣…… 526
菊花…… 526
梧桐片…… 527
梅花…… 528
梅花点舌丸…… 814
椎木叶…… 528
败必应…… 529
雪上一支蒿…… 530
雪胆…… 531
雪胆素…… 532
雪胆素片…… 533
常山…… 534
眼膏剂…… *13
清凉眼药膏…… 826
野马追…… 535
野马追片…… 536
野木瓜…… 537
野木瓜片…… 538
野木瓜注射液…… 538
野菊花…… 539
蛇床子…… 540
蛇胆川贝散…… 815
蛇胆陈皮散…… 816
蛇蜕…… 541
啤酒花浸膏…… 541
婴儿保肺散…… 816
婴儿散…… 817
铝盐(鉴别反应)…… *41
铜盐(鉴别反应)…… *41
银杏…… 175
银杏叶…… 543
银柴胡…… 544
银黄注射液…… 817
银翘解毒丸…… 819
银翘解毒片…… 819
甜瓜子…… 545
甜瓜蒂…… 545
甜地丁…… 546
猪牙皂…… 547
猪苓…… 548
猪殃殃…… 548
猪鬃草…… 549
猫爪草…… 550
猫眼草…… 550
猕猴桃根…… 551
麻仁丸…… 820
麻油…… 552
麻黄…… 553
麻黄根…… 554
痔漏丸…… 821

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

疯芋头…… 502
鹿角…… 555
鹿角胶…… 556
鹿角霜…… 556
鹿茸…… 557
鹿衔草…… 558
商陆…… 559
旋光度测定法…… *31
旋复花…… 560
断血流…… 561
断血流片…… 561
清气化痰丸…… 821
清宁丸…… 822
清肺抑火丸…… 823
清胃黄连丸…… 823
清热丸…… 824
清热凉血膏…… 825
清眩丸…… 825
清凉眼药膏…… 826
清喉咽合剂…… 827
清瘟解毒丸…… 827
淫羊藿…… 562
淡竹叶…… 563
淡豆豉…… 563
密蒙花…… 564
续断…… 565
绵马贯众…… 566
绵萆薢…… 566

[十 二 画]

琥珀…… 567
斑蝥…… 568
款冬花…… 568
越鞠丸…… 528
葫芦…… 569
葫芦茶…… 570
散风活络丸…… 829
散剂…… *3
十二味翼首散…… 674
十三味榜嘎散…… 675
七味葡萄散…… 680
七厘散…… 682
八味沉香散…… 683
八味清心沉香散…… 684
八味檀香散…… 684
九分散…… 688
九味石灰华散…… 689
九胜散…… 690
三子散…… 690
三味蒺藜散…… 691
小儿化毒散…… 696
小儿惊风散…… 698
千金散…… 702
川芎茶调散…… 703
五苓散…… 709
五虎散…… 709
五味沙棘散…… 710
乌贝散…… 720
六一散…… 722
六味木香散…… 723
六味安消散…… 724
玉真散…… 725
四味土木香散…… 732
失笑散…… 734
行军散…… 742
冰硼散…… 744
安宫牛黄散…… 746
红灵散…… 751
局方至宝散…… 762
金黄散…… 772
参苓白术散…… 777
保赤散…… 793
活血止痛散…… 797
珠黄吹喉散…… 800
盐蛇散…… 801
健胃归津散…… 805
疳积散…… 807
益元散…… 808
通关散…… 810
蛇胆川贝散…… 815
蛇胆陈皮散…… 816
婴儿保肺散…… 816

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

婴儿散…… 817
雅叫哈顿散…… 830
跌打活血散…… 835
舒筋散…… 840
葛根…… 570
葛根芩连片…… 830
葶苈子…… 571
落得打…… 480
萤草根…… 572
蔊菜…… 573
朝天罐…… 574
楮实子…… 574
椰馏油…… 575
椰馏油癣药水…… 576
棕板…… 576
硫黄…… 577
雄黄…… 578
雅叫哈顿散…… 830
紫贝齿…… 579
紫石英…… 579
紫花地丁…… 580
紫花杜鹃…… 581
紫花杜鹃片…… 583
紫花杜鹃浸膏…… 582
紫苏子…… 583
紫苏叶…… 584
紫苏梗…… 585
紫金龙…… 586
紫金锭…… 831
紫河车…… 585
紫草…… 587
紫草茸…… 587
紫草膏…… 832
紫珠叶…… 588
紫茉贯众…… 589
紫菀…… 589
紫雪…… 832
暑症片…… 833
暑湿正气丸…… 834
景天三七…… 590
景天三七糖浆…… 591
跌打丸…… 834
跌打活血散…… 835
蛤壳…… 592
蛤蚧…… 592
黑风藤…… 593
硫酸钠…… 206
硫酸盐(鉴别反应)…… *41
黑白丑…… 408
黑老虎根…… 594
黑芝麻…… 595
黑胡椒…… 595
黑种草子…… 596
锁阳…… 597
锁阳固精丸…… 836
氯化物(鉴别反应)…… *42
氯化物检查法…… *44
鹅不食草…… 597
鹅掌风药水…… 837
筋骨草…… 598
筋骨草片…… 599
傣肌松…… 599
傣肌松注射液…… 601
舒肝丸…… 838
舒肝止痛丸…… 838
舒筋活络酒…… 839
舒筋散…… 840
番木鳖…… 70
疥药…… 841
痛经丸…… 841
滑石…… 602
滑石粉…… 602
滋肾丸…… 842
缓冲液…… *80

[十 三 画]

薯草…… 603
蓝布正…… 604
蓝花参…… 604
蓖麻子…… 605
蓖麻油…… 606
蒺藜…… 606

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蒲公英…… 607
蒲公英片…… 608
蒲黄…… 608
椿皮…… 609
槐米…… 610
槐花…… 611
槐角…… 612
槐角丸…… 843
感冒退热冲剂…… 843
感冒清热冲剂…… 844
碘值的测定…… *52
雷丸…… 612
暖脐膏…… 845
照山白…… 613
路路通…… 614
蜈蚣…… 614
蜂房…… 615
蜂蜡…… 616
蜂蜜…… 616
锡生藤…… 207
锦灯笼…… 617
矮地茶…… 618
矮茶素…… 346
雄子筮片…… 466
鼠曲草…… 619
催汤丸…… 845
腰痛丸…… 846
腰痛片…… 847
解肌宁嗽丸…… 848
煎膏剂…… *4
二冬膏…… 671
鸡血藤膏…… 764
枇杷叶膏…… 331
养阴清肺膏…… 795
夏枯草膏…… 476
益母草膏…… 495
清热凉血膏…… 825
满山红…… 619
满山红油…… 630
满山红油胶丸…… 621
裸花紫珠…… 621
裸花紫珠片…… 622

[十 四 画]

蔓荆子…… 623
蓼菜…… 624
蓼菜素…… 625
蓼菜素片…… 626
蓼大青叶…… 627
槜子…… 627
槟藤子…… 85
榜嘎…… 628
槟榔…… 629
槟榔四消丸…… 848
酸枣仁…… 630
酸值的测定…… *51
酸浆…… 617
碱花…… 631
碳酸盐与碳酸氢盐(鉴别反应)…… *42
磁石…… 631
磁朱丸…… 849
豨莶丸…… 633
豨莶草…… 632
蜘蛛香…… 633
蝉蜕…… 634
罂粟壳…… 634
鲜竹沥…… 635
膏药…… *4
阳和解凝膏…… 749
阿魏化痞膏…… 762
狗皮膏…… 773
追风膏…… 794
暖脐膏…… 845
辣蓼…… 636
熔点测定法…… *28
漏芦…… 636
熊胆…… 637

[十 五 画]

赭石…… 638
薤仁…… 639
蕲蛇…… 639

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

槲寄生…… 640
震灵丸…… 850
暴马子皮…… 641
墨旱莲…… 642
稻芽…… 642
僵蚕…… 643
鹤虱…… 644
鹤草芽…… 644
鹤草芽浸膏…… 645
鹤草酚…… 646
鹤草酚片…… 647

[十 六 画]

薤白…… 648
薯蓣…… 648
薯蓣片…… 649
薏苡仁…… 650
薄层层析法…… *38
薄荷…… 650
薄荷油…… 651
薄荷素油…… 651
薄荷脑…… 653
颠茄片…… 658
颠茄草…… 654
颠茄酊…… 655
颠茄流浸膏…… 656
颠茄浸膏…… 657
橘贝半夏…… 851
橘红…… 658
橘红丸…… 851
橘核…… 659
醒消丸…… 852
螃蜞菊注射液…… 377
螃蟹甲…… 661
凝点测定法…… *30
糖苏…… 659

[十 七 画]

藏木香…… 660
藏糖苏…… 661
藁本…… 662
爵床…… 662
蜜虫…… 28
翼首草…… 663

[十 八 画]

藕节…… 664
礞石滚痰丸…… 853
檫峒丸…… 853
瞿麦…… 664
蟛蜞菊…… 665
翻白草…… 666

[十 九 画]

藿香…… 666
藿香正气丸…… 854
藿香正气水…… 855
鳖甲…… 667
鳖甲煎丸…… 855
蟾酥…… 668
蟾酥丸…… 856

[二 十 画]

糯稻根…… 669

[二十一画]

麝香…… 669

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

汉语拼音索引

Aidicha 矮地茶 …… 618
Aifu Nuangong Wan 艾附暖宫丸 …… 725
Aiye 艾叶 …… 134
Aiyeyou 艾叶油 …… 135
Aiyeyou Jiaonang 艾叶油胶囊 …… 136
Aiyeyou Qiwuji 艾叶油气雾剂 …… 136
Angong Niuhuang San 安宫牛黄散 …… 746
Angong Niuhuang Wan 安宫牛黄丸 …… 746
Anshen Buxin Wan 安神补心丸 …… 747
Anwei Pian 安胃片 …… 745
Anxixiang 安息香 …… 248
Anyou 核油 …… 473
Awei 阿魏 …… 308
Awei Huapi Gao 阿魏化痞膏 …… 762
Babao Yanyao 八宝眼药 …… 685
Badou 巴豆 …… 123
Baibiandou 白扁豆 …… 178
Baibu 百部 …… 214
Baidai Wan 白带丸 …… 734
Baifan 白矾 …… 174
Baifuzi 白附子 …… 171
Baiguo 白果 …… 175
Baiji 白及 …… 166
Baijiangcao 败酱草 …… 349
Baijiang Pian 败酱片 …… 350
Bailian 白蔹 …… 179
Baimaogen 白茅根 …… 173
Baihe 百合 …… 213
Baihe Gujin Wan 百合固金丸 …… 740
Baihuacaizi 白花菜子 …… 171
Baiqian 白前 …… 177
Baiqucai 白屈菜 …… 176
Bairuicao 百蕊草 …… 215
Baishao 白芍 …… 169
Baishouwu 白首乌 …… 178
Baitouweng 白头翁 …… 168
Baiwei 白薇 …… 180
Baixianpi 白鲜皮 …… 180
Baiyaozi 白药子 …… 176
Baiying 白英 …… 172
Baiyunhuagen 白云花根 …… 166
Baizhi 白芷 …… 170
Baiziren 柏子仁 …… 400
Baizi Yangxin Wan 柏子养心丸 …… 781
Baizhu 白术 …… 167
Bajiaofeng 八角枫 …… 6
Bajiaohuixiang 八角茴香 …… 7
Bajiao Huixiang You 八角茴香油 …… 8
Bajitian 巴戟天 …… 124
Banbei Wan 半贝丸 …… 735
Banbianlian 半边莲 …… 189
Bangga 榜嘎 …… 628
Banmao 斑蝥 …… 568
Banlangen 板蓝根 …… 332
Banlike 板栗壳 …… 331
Banxia 半夏 …… 190
Banzhilian 半支莲 …… 189
Baochi San 保赤散 …… 793
Baogu 豹骨 …… 485
Baohe Wan 保和丸 …… 793
Baomazipi 暴马子皮 …… 641
Balima 八厘麻 …… 9
Balima Dusu 八厘麻毒素 …… 9
Balima Dusu Pian 八厘麻毒素片 …… 10
Balima Dusu Zhusheye 八厘麻毒素注射液 …… 11
Bawei Chenxiang San 八味沉香散 …… 683
Bawei Qingxinchenxiang San 八味清心沉香散 …… 684
Bawei Tanxiang San 八味檀香散 …… 684
Bazhen Wan 八珍丸 …… 686
Bazhen Yimu Wan 八珍益母丸 …… 686
Beidougen 北豆根 …… 155
Beidougen Pian 北豆根片 …… 156

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Beimuhua 贝母花 …… 100
Beimuhua Pian 贝母花片 …… 101
Beimuhua Liujingao 贝母花流浸膏 …… 102
Beishashen 北沙参 …… 157
Beiyeju 北野菊 …… 158
Biandouhua 扁豆花 …… 444
Bianxu 萹蓄 …… 573
Bibo 荜茇 …… 384
Bichengqie 荜澄茄 …… 385
Biejia 鳖甲 …… 667
Biejiajian Wan 鳖甲煎丸 …… 855
Bimayou 蓖麻油 …… 606
Bimazi 蓖麻子 …… 605
Binglang 槟榔 …… 629
Binglang Sixiao Wan 槟榔四消丸 …… 848
Binglianghua 冰凉花 …… 237
Binglianghuadai 冰凉花甙 …… 238
Binglianghuadai Pian 冰凉花甙片 …… 239
Binglianghuadai Zhusheye 冰凉花甙注射液 …… 240
Bingpeng San 冰硼散 …… 744
Bingpian 冰片 …… 236
Bohe 薄荷 …… 650
Bohenao 薄荷脑 …… 653
Boheyou 薄荷油 …… 651
Bolengguazi 波棱瓜子 …… 374
Boyun Tuiyi Wan 拨云退翳丸 …… 766
Buguzhi 补骨脂 …… 305
Buxin Wan 补心丸 …… 760
Buyi Doukou Wan 补益豆蔻丸 …… 761
Buzhaye 布渣叶 …… 149
Buzhong Gujing Tang 补中固经汤 …… 759
Buzhong Yiqi Wan 补中益气丸 …… 759
Cang'erzi 苍耳子 …… 278
Cangzhu 苍术 …… 277
Caodoukou 草豆蔻 …… 389
Caoguo 草果 …… 389
Caohongteng 草红藤 …… 388
Caosu 糙苏 …… 659
Caowu 草乌 …… 385
Caowuye 草乌叶 …… 387
Caoxuejie 草血竭 …… 387
Cebaiye 侧柏叶 …… 355
Chaihu 柴胡 …… 477
Changshan 常山 …… 534
Chansu 蟾酥 …… 668
Chansu Wan 蟾酥丸 …… 856
Chantui 蝉蜕 …… 634
Chaotianguan 朝天罐 …… 574
Chayou 茶油 …… 392
Chenggoufeng 称钩风 …… 481
Chenpi 陈皮 …… 309
Chenxiang 沉香 …… 304
Chenxiang Huaqi Wan 沉香化气丸 …… 757
Cheqiancao 车前草 …… 93
Cheqianzi 车前子 …… 92
Chishao 赤芍 …… 269
Chishizhi 赤石脂 …… 268
Chixiaodou 赤小豆 …… 267
Chongbaila 虫白蜡 …… 230
Chongfu Liangcha 冲服凉茶 …… 743
Chonglou 重楼 …… 421
Chongweizi 茺蔚子 …… 393
Choulingdancao 臭灵丹草 …… 482
Chouwutongye 臭梧桐叶 …… 483
Chuanbeimu 川贝母 …… 56
Chuanlianzi 川楝子 …… 61
Chuanmutong 川木通 …… 55
Chuanmuxiang 川木香 …… 55
Chuanniuxi 川牛膝 …… 57
Chuanposhi 穿破石 …… 443
Chuanshanjia 穿山甲 …… 436
Chuanshanlong 穿山龙 …… 435
Chuantongpi 川桐皮 …… 60
Chuanwu 川乌 …… 58
Chuanxinlian 穿心莲 …… 437
Chuanxinlian Pian 穿心莲片 …… 438
Chuanxinliandai 穿心莲甙 …… 441
Chuanxinliandaizhi Pian 穿心莲甙酯片 … 442
Chuanxinlianneizhi 穿心莲内酯 …… 439
Chuanxinlianneizhi Pian 穿心莲内酯片 … 440
Chuanxiong 川芎 …… 59

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Chuanxiong Chatiao San 川芎茶调散…… 703
Chuipencao 垂盆草…… 352
Chuipencao Pian 垂盆草片 …… 353
Chunpi 椿皮 …… 609
Chushizi 楮实子 …… 574
Cishi 磁石 …… 631
Ciwujia 刺五加 …… 336
Ciwujia Jingao 刺五加浸膏 …… 337
Cizhu Wan 磁朱丸…… 849
Cuitang Wan 催汤丸…… 845
Dabuyin Wan 大补阴丸 …… 693
Dadouhuangjuan 大豆黄卷 …… 31
Dafupi 大腹皮…… 39
Dahongpao 大红袍 …… 30
Dahuang 大黄…… 34
Dahuang Liujingao 大黄流浸膏 …… 36
Dahuang Zhechong Wan 大黄䗪虫丸 …… 693
Daokoucao 倒扣草 …… 482
Daoya 稻芽 …… 642
Dapowanhuahua 打破碗花花 …… 127
Daqingyan 大青盐 …… 33
Daqingye 大青叶 …… 32
Dashanzha Wan 大山楂丸 …… 692
Dasuan 大蒜 …… 37
Datouchen 大头陈 …… 29
Daxueteng 大血藤 …… 30
Dazao 大枣 …… 34
Dazaojiao 大皂角 …… 32
Dengtaiye 灯台叶 …… 245
Dengxincao 灯心草…… 244
Dengzhanxixin 灯盏细辛 …… 245
Dengzhanxixin Zhusheye 灯盏细辛注射液…… 246
Dianqingcao 癫茄草 …… 654

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Dongguazi 冬瓜子 …… 184
Dongkuiguo 冬葵果 …… 187
Donglingcao 冬凌草 …… 186
Duanxueliu 断血流 …… 561
Duanxueliu Pian 断血流片 …… 561
Duheng 杜衡 …… 286
Duhuo 独活 …… 426
Duzhong 杜仲 …… 285
Duzhong Jiangya Pian 杜仲降压片 …… 755
Ebushicao 鹅不食草 …… 597
Edaxia 莪大夏 …… 461
Ejiao 阿胶 …… 307
Ercha 儿茶 …… 12
Erchen Wan 二陈丸 …… 672
Erdong Gao 二冬膏 …… 671
Erlong Zuoci Wan 耳聋佐磁丸 …… 736
Ermiao Wan 二妙丸 …… 673
Erzhi Wan 二至丸 …… 672
Ezhangfeng Yaoshui 鹅掌风药水 …… 837
Ezhu 莪术 …… 462
Ezhuyou 莪术油 …… 463
Ezhuyou Zhusheye 莪术油注射液 …… 464
Ezhuyouru Zhusheye 莪术油乳注射液 … 464
Fanbaicao 翻白草 …… 666
Fangfeng 防风 …… 255
Fangfeng Tongsheng Wan 防风通胜丸 … 749
Fangji 防己 …… 254
Fei'er Wan 肥儿丸 …… 772
Feixingcao 肺形草 …… 366
Feiyangcao 飞扬草 …… 67
Feizi 榧子 …… 627
Fenbixie 粉萆薢 …… 491
Fengfang 蜂房 …… 615
Fenghuangyi 凤凰衣 …… 120
Fengla 蜂蜡 …… 616
Fengmi 蜂蜜 …… 616
Fengshi Gutong Wan 风湿骨痛丸 …… 719
Fengweicao 凤尾草 …… 120
Fengxian Tougucao 凤仙透骨草 …… 119
Fengxiangzhi 枫香脂 …… 335
Fenqing Wan 分清丸 …… 719
Fentiao'ercai 粉条儿菜 …… 490
Fojiacao 佛甲草 …… 297
Foshou 佛手 …… 297
Pufang Baibu Zhike Tangjiang 复方百部止咳糖浆 …… 787
Pufang Chuipencao Tangjiang 复方垂盆草糖浆 …… 791
Pufang Dahuang Ding 复方大黄酊 …… 785
Pufang Dijin Pian 复方地锦片 …… 786
Pufang Dujuan Pian 复方杜鹃片 …… 789
Pufang Gangnian Pian 复方岗稔片 …… 789
Pufang Longdan Ding 复方龙胆酊 …… 786
Pufang Yanbaicaisu Pian 复方岩白菜素片 …… 790
Pufang Yangjiao Chongji 复方羊角冲剂 … 787
Pufang Yazhicao Rongye 复方鸭跖草溶液 …… 791
Pufang Yinyanglian Pian 复方阴阳莲片 … 788
Pufang Zishen Chongji 复方紫参冲剂 … 792
Fuhaishi 浮海石 …… 506
Fuke Fenqing Wan 妇科分清丸 …… 751
Foling 茯苓 …… 391
Funü Tongjing Wan 妇女痛经丸 …… 750
Fupenzi 复盆子 …… 422
Fuping 浮萍 …… 506
Furongye 芙蓉叶 …… 270
Fushi 浮石 …… 505
Fuzi 附子 …… 309
Fuzi Lizhong Wan 附子理中丸 …… 763
Gancao 甘草 …… 130
Gancao Jingao 甘草浸膏 …… 131
Gancao Liujingao 甘草流浸膏 …… 132
Gangbangui 杠板归 …… 284
Gangmei 岗梅 …… 291
Gangsong 岗松 …… 290
Ganjiang 干姜 …… 24
Ganji San 疳积散 …… 807
Ganmao Qingre Chongji 感冒清热冲剂 … 844
Ganmao Tuire Chongji 感冒退热冲剂 … 843
Ganqingqinglan 甘青青蓝 …… 129
Gansong 甘松 …… 129

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Gansui 甘遂 …… 133
Gaoben 藁本 …… 662
Gaoliangjiang 高良姜 …… 489
Gegen 葛根 …… 570
Gegen Qinlian Pian 葛根芩连片 …… 830
Gejie 蛤蚧 …… 592
Geqiao 蛤壳 …… 592
Gonglaomu 功劳木 …… 128
Gougancai 狗肝菜 …… 369
Gouguye 枸骨叶 …… 402
Gouji 狗脊 …… 369
Goupi Gao 狗皮膏 …… 772
Gouqizi 枸杞子 …… 402
Gouteng 钩藤 …… 412
Gouteng Pian 钩藤片 …… 413
Gualou 瓜蒌 …… 182
Gualou Pian 瓜蒌片 …… 184
Gualoupi 瓜蒌皮 …… 183
Gualouzi 瓜蒌子 …… 182
Guanbaifu 关白附 …… 243
Guangcigu 光慈姑 …… 217
Guangdiding 广地丁 …… 61
Guangfangji 广防己 …… 62
Guanghuoxiang 广藿香 …… 65
Guangjinqiancao 广金钱草 …… 63
Guangzao 广枣 …… 63
Guangzhi Gou'ercha 光枝勾儿茶 …… 216
Guanmutong 关木通 …… 242
Guanxin Suhe Wan 冠心苏合丸 …… 799
Guazijin 瓜子金 …… 181
Guiban 龟板 …… 299
Guibanjiao 龟板胶 …… 300
Guifu Dihuang Wan 桂附地黄丸 …… 803
Guipi Wan 归脾丸 …… 730
Guishao Dihuang Wan 归芍地黄丸 …… 730
Guizhi 桂枝 …… 468
Gujingcao 谷精草 …… 298
Gujing Wan 固经丸 …… 769
Guoganglong 过岗龙 …… 211
Gushanlong 古山龙 …… 137
Gusuibu 骨碎补 …… 411
Hai'ershen 孩儿参 …… 544
Haifengteng 海风藤 …… 500
Hailong 海龙 …… 501
Haijinsha 海金沙 …… 502
Haima 海马 …… 499
Haipiaoxiao 海螵蛸 …… 503
Haitongpi 海桐皮 …… 503
Haiyu 海芋 …… 502
Haizao 海藻 …… 504
Hancai 蔊菜 …… 624
Hancaisu 蔊菜素 …… 625
Hancaisu Pian 蔊菜素片 …… 626
Hanjisong 汉肌松 …… 191
Hanjisong Zhusheye 汉肌松注射液 …… 192
Hantaoye 汉桃叶 …… 193
Hantaoye Pian 汉桃叶片 …… 194
Hantaoye Zhusheye 汉桃叶注射液 …… 194
Hecaofen 鹤草酚 …… 646
Hecaofen Pian 鹤草酚片 …… 647
Hecaoya 鹤草芽 …… 644
Hecaoya Jingao 鹤草芽浸膏 …… 645
Heche Dazao Wan 河车大造丸 …… 775
Hehuanhua 合欢花 …… 236
Hehuanpi 合欢皮 …… 235
Heifengteng 黑风藤 …… 593
Heihujiao 黑胡椒 …… 595
Heilaohugen 黑老虎根 …… 594
Heizhima 黑芝麻 …… 595
Heizhongcaozi 黑种草子 …… 596
Heshi 鹤虱 …… 644
Hetaoren 核桃仁 …… 472
Heye 荷叶 …… 467
Heye Wan 荷叶丸 …… 802
Hezi 诃子 …… 306
Hongdaji 红大戟 …… 256
Hongdoukou 红豆蔻 …… 260
Hongfen 红粉 …… 261
Honggencao 红根草 …… 260
Hongguanyao 红管药 …… 262
Hongguanyao Pian 红管药片 …… 263
Honghua 红花 …… 258

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Honghualongdan 红花龙胆 …… 259
Hongjingtian 红景天 …… 262
Honglian 洪连 …… 432
Hongling San 红灵散 …… 751
Hongmaoqi 红毛七 …… 257
Hongtoucao 红头草 …… 257
Houpo 厚朴 …… 404
Houpohua 厚朴花 …… 406
Hozhong Tangjiang 和中糖浆 …… 770
Huadu Wan 化毒丸 …… 718
Huaihua 槐花 …… 611
Huaijiao 槐角 …… 612
Huaijiao Wan 槐角丸 …… 843
Huaimi 槐米 …… 610
Huajiao 花椒 …… 275
Huangbo 黄柏 …… 519
Huangjing 黄精 …… 520
Huanglian 黄连 …… 517
Huanglian Yanggan Wan 黄连羊肝丸 …… 813
Huanglu 黄芦 …… 518
Huangqi 黄芪 …… 516
Huangqin 黄芩 …… 515
Huangteng 黄藤 …… 521
Huangtengsu 黄藤素 …… 522
Huangtengsu Pian 黄藤素片 …… 523
Huangtengsu Zhusheye 黄藤素注射液 …… 524
Huangyuanhua 黄芫花 …… 514
Huaruishi 花蕊石 …… 275
Huashanshen 华山参 …… 228
Huashanshen Pian 华山参片 …… 230
Huashanshen Qiwuji 华山参气雾剂 …… 229
Huashi 滑石 …… 602
Huashifen 滑石粉 …… 602
Huci 虎刺 …… 341
Hu'ercao 虎耳草 …… 339
Hufeng Jiu 胡蜂酒 …… 778
Hugu 虎骨 …… 341
Hugu Jiu 虎骨酒 …… 767
Huhuanglian 胡黄连 …… 394
Huixiang Juhe Wan 茴香橘核丸 …… 777
Hujisheng 槲寄生 …… 640
Hulu 葫芦 …… 569
Huluba 胡芦巴 …… 393
Hulucha 葫芦茶 …… 570
Huomaren 火麻仁 …… 123
Huotanmu 火炭母 …… 122
Huoxiang 藿香 …… 666
Huoxiang Zhengqi Shui 藿香正气水 …… 855
Huoxiang Zhengqi Wan 藿香正气丸 …… 854
Huoxue Zhitong San 活血止痛散 …… 797
Hupo 琥珀 …… 567
Hutuiziye 胡颓子叶 …… 395
Huzhang 虎杖 …… 340
Huzhangcao 虎掌草 …… 343
Jianbu Wan 健步丸 …… 804
Jiangcan 僵蚕 …… 643
Jiang Ding 姜酊 …… 25
Jiang Linjingao 姜流浸膏 …… 24
Jianghuang 姜黄 …… 428
Jiangxiang 降香 …… 379
Jiangya Wan 降压丸 …… 775
Jianhua 碱花 …… 631
Jianpi Wan 健脾丸 …… 805
Jianwei Guijin San 健胃归津散 …… 805
Jianyao Wan 健腰丸 …… 806
Jiebai Wan 洁白丸 …… 797
Jiegeng 桔梗 …… 469
Jieji Ningsou Wan 解肌宁嗽丸 …… 848
Jiezi 芥子 …… 276
Jiguanhua 鸡冠花 …… 313
Jigucao 鸡骨草 …… 314
Jili 蒺藜 …… 606
Jimuye 槲木叶 …… 528
Jindengiong 锦灯笼 …… 617
Jineijin 鸡内金 …… 311
Jinfocao 金佛草 …… 358
Jingdaji 京大戟 …… 370
Jingjie 荆芥 …… 382
Jingtiansanqi 景天三七 …… 590
Jingtiansanqi Tangjiang 景天三七糖浆 …… 591
Jingucao 筋骨草 …… 598
Jingucao Pian 筋骨草片 …… 599

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Jinguolan 金果榄 …… 358
Jinhuang San 金黄散 …… 772
Jinji Chongji 金鸡冲剂 …… 771
Jinjinxiang 金锦香 …… 364
Jinlianhua 金莲花 …… 359
Jinlianhua Pian 金莲花片 …… 360
Jinlongdancao 金龙胆草 …… 356
Jinlongdancao Pian 金龙胆草片 …… 357
Jinmengshi 金礞石 …… 365
Jinqian Baihuashe 金钱白花蛇 …… 361
Jinqiancao 金钱草 …… 361
Jinqiaomai 金荞麦 …… 359
Jintiesuo 金铁锁 …… 362
Jinyingzi 金樱子 …… 364
Jinyinhua 金银花 …… 363
Jisheng Shenqi Wan 济生肾气丸 …… 798
Jishiteng 鸡矢藤 …… 312
Jiubiying 救必应 …… 529
Jiucaizi 韭菜子 …… 410
Jiufen San 九分散 …… 688
Jiujiechangpu 九节菖蒲 …… 13
Jiulixiang 九里香 …… 14
Jiuqi Niantong Wan 九气拈痛丸 …… 637
Jiusheng San 九胜散 …… 690
Jiutou Shizicao 九头狮子草 …… 14
Jiuwei Qianghuo Wan 九味羌活丸 …… 689
Jiuwei Shihuihua San 九味石灰华散 …… 689
Jiuxiangchong 九香虫 …… 15
Jixingzi 急性子 …… 427
Jixuecao 积雪草 …… 480
Jixueteng 鸡血藤 …… 312
Jixueteng Gao 鸡血藤膏 …… 764
Juanbai 卷柏 …… 371
Jubei Banxia 橘贝半夏 …… 851
Juechuang 爵床 …… 662
Juemingzi 决明子 …… 241
Jufang Zhibao San 局方至宝散 …… 762
Juhe 橘核 …… 659
Juhong 橘红 …… 658
Juhong Wan 橘红丸 …… 851
Juhua 菊花 …… 526
Juju 菊苣 …… 526
Kaixiong Shunqi Wan 开胸顺气丸 …… 705
Kangfengshi Heji 抗风湿合剂 …… 753
Kanglao Wan 抗痨丸 …… 753
Kongxian Wan 控涎丸 …… 813
Kongxin Lianzicao 空心莲子草 …… 376
Kongxin Lianzicao Zhusheye 空心莲子草注射液 …… 377
Kuaigenmulan 块根木蓝 …… 270
Kuandonghua 款冬花 …… 568
Kudiding 苦地丁 …… 323
Kudoucao 苦豆草 …… 325
Kudoucao Pian 苦豆草片 …… 326
Kulianpi 苦楝皮 …… 327
Kumu 苦木 …… 323
Kunbu 昆布 …… 343
Kunshun Wan 坤顺丸 …… 766
Kushen 苦参 …… 326
Kuxingren 苦杏仁 …… 324
Laifuzi 莱菔子 …… 458
Laliao 辣蓼 …… 636
Lanbuzheng 蓝布正 …… 604
Langbacao 狼把草 …… 486
Langdangzi 莨菪子 …… 468
Langdu 狼毒 …… 487
Lanhuashen 蓝花参 …… 604
Laoguancao 老鹳草 …… 196
Laoguancao Ruangao 老鹳草软膏 …… 197
Leiwan 雷丸 …… 612
Lianfang 莲房 …… 460
Liangfu Wan 良附丸 …… 758
Liangmianzhen 两面针 …… 287
Lianqiancao 连钱草 …… 288
Lianqiao 连翘 …… 288
Lianxu 莲须 …… 461
Lianzi 莲子 …… 459
Lianzixin 莲子心 …… 460
Liaodaqingye 蓼大青叶 …… 627
Liaogewang 了哥王 …… 16
Liaogewang Pian 了哥王片 …… 17
Liexiangdujuan 烈香杜鹃 …… 477

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Lingxiaohua 凌霄花 …… 488
Lingzhi Pian 灵芝片 …… 306
Litong Wan 鳖蝎丸 …… 853
Liuhe Dingzhong Wan 六合定中丸 …… 722
Liuhuang 硫黄 …… 577
Liuwei Anxiao San 六味安消散 …… 724
Liuwei Dihuang Wan 六味地黄丸 …… 723
Liuwei Muxiang San 六味木香散 …… 723
Liuyi San 六一散 …… 722
Liuyuexue 六月雪 …… 121
Lizhicao 荔枝草 …… 395
Lizhihe 荔枝核 …… 396
Longchi 龙齿 …… 150
Longdan 龙胆 …… 152
Longdan Xiegan Wan 龙胆泻肝丸 …… 729
Longgu 龙骨 …… 151
Longkui 龙葵 …… 154
Longliye 龙荆叶 …… 153
Longyanrou 龙眼肉 …… 153
Loulu 漏芦 …… 636
Luganshi 炉甘石 …… 372
Lugen 芦根 …… 283
Luhui 芦荟 …… 282
Lujiao 鹿角 …… 555
Lujiaojiao 鹿角胶 …… 556
Lujiaoshuang 鹿角霜 …… 556
Lulutong 路路通 …… 614
Luobumaye 罗布麻叶 …… 348
Luohanguo 罗汉果 …… 349
Luohuazizhu 裸花紫珠 …… 621
Luohuazizhu Pian 裸花紫珠片 …… 622
Luoshiteng 络石藤 …… 446
Lurong 鹿茸 …… 557
Luxiancao 鹿衔草 …… 558
Mabiancao 马鞭草 …… 74
Mabinglang 马槟榔 …… 73
Mabo 马勃 …… 69
Machixian 马齿苋 …… 69
Madouling 马兜铃 …… 72
Madoulingteng 马兜铃藤 …… 72
Mahuang 麻黄 …… 553
Mahuanggen 麻黄根 …… 554
Maidong 麦冬 …… 264
Maiwei Dihuang Wan 麦味地黄丸 …… 752
Maiya 麦芽 …… 265
Malancao 马兰草 …… 67
Mangxiao 芒硝 …… 206
Maniaopao 马尿泡 …… 68
Manjingzi 蔓荆子 …… 623
Manshanhong 满山红 …… 619
Manshanhongyou 满山红油 …… 620
Manshanhongyou Jiaowan 满山红油胶丸 … 621
Maodongqing 毛冬青 …… 107
Maodongqing Pian 毛冬青片 …… 108
Maodongqing Zhusheye 毛冬青注射液 …… 108
Maohezi 毛诃子 …… 109
Maoji Yaojiu 毛鸡药酒 …… 717
Maomei 茅莓 …… 329
Maomeigen 茅莓根 …… 329
Maoyancao 猫眼草 …… 550
Maozhaocao 猫爪草 …… 550
Maqianzi 马钱子 …… 70
Maren Wan 麻仁丸 …… 820
Mayou 麻油 …… 552
Meiguihua 玫瑰花 …… 322
Meihua 梅花 …… 528
Meihua Dianshe Wan 梅花点舌丸 …… 814
Meiye Weilingcai 莓叶委陵菜 …… 465
Meiye Weilingcai Pian 莓叶委陵菜片 …… 466
Mengshi Guntan Wan 礞石滚痰丸 …… 853
Mianbixie 绵萆薢 …… 566
Mianmaguanzhong 绵马贯众 …… 566
Miaoji Wan 妙济丸 …… 763
Mihoutaogen 猕猴桃根 …… 551
Mimenghua 密蒙花 …… 564
Mingdangshen 明党参 …… 345
Mingmu Dihuang Wan 明目地黄丸 …… 768
Mohanlian 墨旱莲 …… 642
Mubiezi 木鳖子 …… 87
Mudanpi 牡丹皮 …… 291
Mu'er Shujin Wan 木耳舒筋丸 …… 707
Mugua 木瓜 …… 82

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Mugua Wan 木瓜丸 …… 706
Muhudie 木蝴蝶 …… 86
Mujingye 牡荆叶 …… 292
Mujingyou 牡荆油 …… 293
Mujingyou Jiaowan 牡荆油胶丸 …… 294
Mujinhua 木槿花 …… 86
Muli 牡蛎 …… 294
Mumianhua 木棉花 …… 85
Muxiang 木香 …… 83
Muxiang Binglang Wan 木香槟榔丸 …… 707
Muyaozi 木腰子 …… 85
Muzei 木贼 …… 84
Nanheshi 南鹤虱 …… 398
Nanshashen 南沙参 …… 397
Nanwuweizigen 南五味子根 …… 396
Niubangzi 牛蒡子 …… 104
Niuhuang 牛黄 …… 103
Niuhuang Baoying Wan 牛黄保婴丸 …… 713
Niuhuang Jiedu Pian 牛黄解毒片 …… 715
Niuhuang Jiedu Wan 牛黄解毒丸 …… 715
Niuhuang Shangqing Wan 牛黄上清丸 …… 712
Niuhuang Xiaoyan Wan 牛黄消炎丸 …… 714
Niuhuang Zhenjing Wan 牛黄镇惊丸 …… 716
Niuxi 牛膝 …… 105
Niuzhi 牛至 …… 103
Nongjili 农吉利 …… 249
Nongjilijian 农吉利碱 …… 250
Nuanqi Gao 暖脐膏 …… 845
Nüjin Wan 女金丸 …… 704
Nuodaogen 糯稻根 …… 669
Nüzhenzi 女贞子 …… 66
Oujie 藕节 …… 664
Paotongguo 泡桐果 …… 373
Peilan 佩兰 …… 355
Pengqiju 蓬蘽菊 …… 665
Pijiuhua Jingao 啤酒花浸膏 …… 541
Pingbeimu 平贝母 …… 155
Pipaye 枇杷叶 …… 330
Pipaye Gao 枇杷叶膏 …… 331
Pufujin 匍伏堇 …… 426
Pugongying 蒲公英 …… 607
Pugongying Pian 蒲公英片 …… 608
Puhuang 蒲黄 …… 608
Qiancao 茜草 …… 383
Qianghuo 羌活 …… 301
Qianhu 前胡 …… 429
Qianjin San 千金散 …… 702
Qianjinzi 千金子 …… 54
Qianliguang 千里光 …… 53
Qianliguang Pian 千里光片 …… 53
Qiannianjian 千年健 …… 52
Qianniuzi 牵牛子 …… 408
Qianrihong 千日红 …… 51
Qianshi 芡实 …… 278
Qiju Dihuang Wan 杞菊地黄丸 …… 756
Qili San 七厘散 …… 682
Qingdai 青黛 …… 320
Qingfei Yihuo Wan 清肺抑火丸 …… 823
Qingfen 轻粉 …… 409
Qingfengteng 青风藤 …… 315
Qingguo 青果 …… 319
Qinghao 青蒿 …… 320
Qinghouyan Heji 清喉咽合剂 …… 827
Qingliang Yanyaogao 清凉眼药膏 …… 826
Qingmazi 苘麻子 …… 328
Qingmengshi 青礞石 …… 321
Qingmuxiang 青木香 …… 315
Qingning Wan 清宁丸 …… 822
Qingpi 青皮 …… 318
Qingqi Huatan Wan 清气化痰丸 …… 821
Qingre Liangxue Gao 清热凉血膏 …… 825
Qingre Wan 清热丸 …… 824
Qingwei Huanglian Wan 清胃黄连丸 …… 823
Qingwen Jiedu Wan 清瘟解毒丸 …… 827
Qingxiangzi 青葙子 …… 319
Qingxuan Wan 清眩丸 …… 825
Qingyedan 青叶胆 …… 316
Qingyedan Pian 青叶胆片 …… 317
Qingyedan Zhusheye 青叶胆注射液 …… 317
Qinjiao 秦艽 …… 446
Qinpi 秦皮 …… 447
Qipi Wan 启脾丸 …… 758

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Qishe 蕲蛇 …… 639
Qiwei Guangzao Wan 七味广枣丸 …… 679
Qiwei Ketengzi Wan 七味榼藤子丸 …… 681
Qiwei Putao San 七味葡萄散 …… 680
Qiwei Tiexie Wan 七味铁屑丸 …… 679
Qixiong Wan 七雄丸 …… 683
Qizhen Wan 七珍丸 …… 681
Quanshen 拳参 …… 489
Quanxie 全蝎 …… 234
Quanyeqinglan 全叶青兰 …… 234
Qufeng Shujin Wan 祛风舒筋丸 …… 799
Quhan Zhitongsha 驱寒止痛砂 …… 765
Qumai 瞿麦 …… 664
Qumaicai 苣荬菜 …… 274
Rendongteng 忍冬藤 …… 311
Renshen 人参 …… 5
Roucongrong 肉苁蓉 …… 220
Rougui 肉桂 …… 221
Rouguiyou 肉桂油 …… 222
Ruiren 蕊仁 …… 639
Sanbaicao 三白草 …… 22
Sanchaku 三叉苦 …… 19
Sanfeng Huoluo Wan 散风活络丸 …… 829
Sanfensan 三分三 …… 20
Sanfensan Jingao 三分三浸膏 …… 21
Sangbaipi 桑白皮 …… 510
Sangjisheng 桑寄生 …… 511
Sangju Ganmao Pian 桑菊感冒片 …… 812
Sangma Wan 桑麻丸 …… 812
Sangpiaoxiao 桑螵蛸 …… 513
Sangren 桑椹 …… 512
Sangye 桑叶 …… 509
Sangzhi 桑枝 …… 511
Sanhesu Jiaowan 三合素胶丸 …… 543
Sanhesu Ruangao 三合素软膏 …… 542
Sankezhen 三颗针 …… 23
Sanleng 三棱 …… 22
Sanmiao Wan 三妙丸 …… 691
Sanqi 三七 …… 18
Sanwei Jili San 三味蒺藜散 …… 691
Sanzi San 三子散 …… 690
Shaji 沙棘 …… 303
Shandougen 山豆根 …… 45
Shanglu 商陆 …… 559
Shangqing Wan 上清丸 …… 695
Shangshi Zhitong Gao 伤湿止痛膏 …… 742
Shanlamei Cha 山蜡梅茶 …… 51
Shanlameiye 山蜡梅叶 …… 50
Shannai 山柰 …… 46
Shanyao 山药 …… 48
Shanzha 山楂 …… 49
Shanzhicha 山栀茶 …… 48
Shanzhima 山芝麻 …… 45
Shanzhuyu 山茱萸 …… 47
Sharen 砂仁 …… 406
Sharenyeyou 砂仁叶油 …… 407
Shayao 痧药 …… 841
Shayuanzi 沙苑子 …… 302
Shazao 沙枣 …… 302
Shazaoye 沙枣叶 …… 303
Shechuangzi 蛇床子 …… 540
Shedan Chenpi San 蛇胆陈皮散 …… 816
Shedan Chuanbei San 蛇胆川贝散 …… 815
Shegan 射干 …… 484
Shengdeng 升登 …… 111
Shengjiang 生姜 …… 162
Shengma 升麻 …… 110
Shengmaiyin 生脉饮 …… 733
Shenjincao 伸筋草 …… 295
Shenling Baizhu San 参苓白术散 …… 777
Shensu Wan 参苏丸 …… 776
Shetui 蛇蜕 …… 541
Shexiang 麝香 …… 669
Shicao 蓍草 …… 693
Shichangpu 石菖蒲 …… 144
Shidi 柿蒂 …… 403
Shidiaolan 石吊兰 …… 140
Shidiaolansu 石吊兰素 …… 141
Shidiaolansu Pian 石吊兰素片 …… 142
Shi'erwei Yishou San 十二味翼首散 …… 674
Shigao 石膏 …… 149
Shihu 石斛 …… 145

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Shihu Yeguang Wan 石斛夜光丸 …… 727
Shihuang Kangjun Pian 石黄抗菌片…… 727
Shihuihua 石灰华 …… 139
Shijianchuan 石见穿 …… 138
Shijiaocao 石椒草 …… 146
Shijueming 石决明 …… 143
Shijunzi 使君子 …… 354
Shilintong Pian 石淋通片 …… 64
Shiliupi 石榴皮 …… 148
Shiliuwei Dujuan Wan 十六味杜鹃丸…… 676
Shiliuzi 石榴子 …… 147
Shinanye 石楠叶 …… 147
Shiquan Dabu Wan 十全大补丸…… 677
Shisanwei Bangga San 十三味榜嘎散…… 675
Shiwei 石韦 …… 138
Shiwei Shiliu Wan 十味石榴丸 …… 677
Shiwuwei Chenxiang Wan 十五味沉香丸… 675
Shixiao San 失笑散 …… 734
Shiyiwei Nengxiao Wan 十一味能消丸…… 673
Shizuanzi 石钻子 …… 143
Shouwu 首乌 …… 430
Shouwu Wan 首乌丸 …… 796
Shouwuteng 首乌藤 …… 431
Shoushen 手参 …… 106
Shugan Wan 舒肝丸 …… 838
Shugan zhitong Wan 舒肝止痛丸 …… 838
Shuibanxia 水半夏 …… 96
Shuihonghuazi 水红花子 …… 97
Shuimanjing 水蔓菁 …… 100
Shuiniujiao 水牛角 …… 95
Shuiniujiao Nongsuofen 水牛角浓缩粉…… 96
Shuiwugong 水蜈蚣 …… 99
Shuiyangmei 水杨梅 …… 98
Shuizhi 水蛭 …… 98
Shujin Huoluo Jiu 舒筋活络酒 …… 839
Shujin San 舒筋散 …… 840
Shuliang 薯蓣 …… 648
Shuliang Pian 薯蓣片 …… 649
Shuqucao 鼠曲草 …… 619
Shushi Zhengqi Wan 暑湿正气丸 …… 834
Shuzheng Pian 暑症片 …… 833
Sifangteng 四方藤 …… 158
Sigualuo 丝瓜络 …… 195
Sijiqing 四季青 …… 160
Sijiqing Chaji 四季青搽剂 …… 162
Sijiqing Pian 四季青片 …… 161
Sijiqing Yaoshui 四季青药水 …… 161
Sijunzi Wan 四君子丸 …… 731
Sini Tang 四逆汤 …… 732
Sishen Wan 四神丸 …… 733
Siweitumuxiang San 四味土木香散…… 732
Siyeshen 四叶参 …… 159
Songchun 松醇 …… 334
Songhuafen 松花粉 …… 333
Songjieyou 松节油 …… 333
Songta 松塔 …… 334
Suanzaoren 酸枣仁 …… 630
Suhexiang Wan 苏合香丸 …… 754
Sumu 苏木 …… 283
Suogudangen 索骨丹根 …… 473
Suoluozi 娑罗子 …… 499
Suoyang 锁阳 …… 597
Suoyang Gujing Wan 锁阳固精丸 …… 836
Suxinhua 素馨花 …… 449
Tao'erqi 桃儿七 …… 470
Taojinniangggen 桃金娘根 …… 471
Taoren 桃仁 …… 471
Tiandiding 甜地丁 …… 546
Tiandong 天冬 …… 75
Tianguadi 甜瓜蒂 …… 545
Tianguazi 甜瓜子 …… 545
Tianhuafen 天花粉 …… 76
Tianjihuang Zhusheye 田基黄注射液…… 199
Tiankuizi 天葵子 …… 79
Tianma 天麻 …… 78
Tianma Wan 天麻丸 …… 705
Tiannanxing 天南星 …… 77
Tiaojing Wan 调经丸 …… 809
Tiexiancai 铁苋菜 …… 480
Tinglizi 葶苈子 …… 571
Tongcao 通草 …… 508
Tongguan San 通关散 …… 810

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tongguanteng 通关藤 …… 507
Tongjing Wan 痛经丸 …… 841
Tongxuan Lifei Wan 通宣理肺丸 …… 811
Toufengtong Wan 头风痛丸 …… 735
Tubeimu 土贝母 …… 26
Tubiechong 土鳖虫 …… 28
Tudangshen 土党参 …… 28
Tufuling 土茯苓 …… 27
Tujingpi 土荆皮 …… 26
Tusizi 菟丝子 …… 525
Walengzi 瓦楞子 …… 94
Wangbuliu 王不留 …… 74
Wanshi Niuhuang Qingxin Wan 万氏牛黄清心丸 …… 694
Wasong 瓦松 …… 94
Weilingcai 委陵菜 …… 353
Weilingxian 威灵仙 …… 403
Wenguanmu 文冠木 …… 121
Wubei San 乌贝散 …… 720
Wubeizi 五倍子 …… 91
Wugong 蜈蚣 …… 614
Wuhu San 五虎散 …… 709
Wujiapi 五加皮 …… 88
Wuji Baifeng Wan 乌鸡白凤丸 …… 721
Wujiu 乌韭 …… 116
Wujiu 乌桕 …… 117
Wuji Wan 戊己丸 …… 728
Wuling San 五苓散 …… 709
Wulingzhi 五灵脂 …… 89
Wumei 乌梅 …… 118
Wushaoshe 乌梢蛇 …… 118
Wutong Pian 梧桐片 …… 527
Wuwei Shaji San 五味沙棘散 …… 710
Wuwei Shexiang Wan 五味麝香丸 …… 710
Wuweizi 五味子 …… 89
Wuyao 乌药 …… 116
Wuzhimaotao 五指毛桃 …… 90
Wuzhuyu 吴茱萸 …… 289
Wuzi Bushen Wan 五子补肾丸 …… 708
Xiakucao 夏枯草 …… 475
Xiakucao Gao 夏枯草膏 …… 476
Xiangfu 香附 …… 415
Xiangfu Wan 香附丸 …… 784
Xiangguozhi 香果脂 …… 418
Xiangjiapi 香加皮 …… 414
Xianglian Wan 香连丸 …… 783
Xiangqingcao 香青草 …… 417
Xiangqinglan 香青兰 …… 416
Xiangqing Pian 香青片 …… 417
Xiangqing Tangjiang 香青糖浆 …… 418
Xiangru 香薷 …… 420
Xiangsha Liujun Wan 香砂六君丸 …… 784
Xiangsu Zhengwei Wan 香苏正胃丸 …… 782
Xiangtianzhan 向天盏 …… 233
Xiangyuan 香橼 …… 419
Xianhecao 仙鹤草 …… 165
Xianmao 仙茅 …… 163
Xiantaocao 仙桃草 …… 164
Xianzhuli 鲜竹沥 …… 635
Xiaobogu 小驳骨 …… 41
Xiao'er Huadu San 小儿化毒散 …… 696
Xiao'er Jingfeng San 小儿惊风散 …… 698
Xiao'er Sizheng Wan 小儿四症丸 …… 696
Xiao'er Zhibao Wan 小儿至宝丸 …… 697
Xiao'er Zicao Wan 小儿紫草丸 …… 699
Xiaohuixiang 小茴香 …… 42
Xiaohuoluo Wan 小活络丸 …… 702
Xiaoji 小蓟 …… 44
Xiaojianzhong Heji 小建中合剂 …… 701
Xiaojin Wan 小金丸 …… 700
Xiaoqinglong Heji 小青龙合剂 …… 700
Xiaohongshen 小红参 …… 40
Xiaotongcao 小通草 …… 42
Xiaoyao Wan 逍遥丸 …… 803
Xiaoyejiwei 小野鸡尾 …… 43
Xiaoyelian 小叶莲 …… 40
Xiatianwu 夏天无 …… 474
Xiatianwu Pian 夏天无片 …… 475
Xiebai 薤白 …… 648
Xiguapi 西瓜皮 …… 212
Xiheliu 西河柳 …… 213
Xihuang Wan 西黄丸 …… 739

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Ximing 薪荑 …… 524
Xingjun San 行军散 …… 742
Xingxiao Wan 醒消丸 …… 852
Xinyi 辛夷 …… 300
Xiongdan 熊胆 …… 637
Xionghuang 雄黄 …… 578
Xixian Wan 豨莶丸 …… 633
Xixiancao 豨莶草 …… 632
Xixin 细辛 …… 379
Xuancaogen 萱草根 …… 572
Xuanfuhua 旋复花 …… 560
Xuanmingfen 玄明粉 …… 187
Xuanshen 玄参 …… 188
Xuchangqing 徐长卿 …… 484
Xuduan 续断 …… 565
Xuedan 雪胆 …… 531
Xuedansu 雪胆素 …… 532
Xuedansu Pian 雪胆素片 …… 533
Xueshang Yizhihao 雪上一支蒿 …… 530
Xueyutan 血余炭 …… 233
Xungufeng 寻骨风 …… 251
Yadanzi 鸦胆子 …… 410
Yahunu 亚乎奴 …… 207
Yajiao Hadun San 雅叫哈顿散 …… 830
Yaliusuanqingna Chuanxinlianneizhi 亚硫酸氢钠穿心莲内酯 …… 209
Yaliusuanqingna Chuanxinlianneizhi Zhusheye 亚硫酸氢钠穿心莲内酯注射液 … 211
Yamazi 亚麻子 …… 208
Yanbaicai 岩白菜 …… 345
Yanbaicaisu 岩白菜素 …… 346
Yangdan Wan 羊胆丸 …… 744
Yangdihuang Pian 洋地黄片 …… 433
Yangdihuangye 洋地黄叶 …… 432
Yang'erju 羊耳菊 …… 241
Yanghe Jiening Gao 阳和解凝膏 …… 749
Yangjinhua 洋金花 …… 434
Yangqishi 阳起石 …… 252
Yangshuhua 杨树花 …… 287
Yangyin Qingfei Gao 养阴清肺膏 …… 795
Yannin Chongji 炎宁冲剂 …… 774
Yanshe San 盐蛇散 …… 801
Yansuan Bajiaofengjian 盐酸八角枫碱 … 450
Yansuan Bajiaofengjian Zhusheye 盐酸八角枫碱注射液 …… 451
Yansuan Chuanxiongqin 盐酸川芎嗪 …… 452
Yansuan Chuanxiongqin Zhusheye 盐酸川芎嗪注射液 …… 453
Yansuan Huangliansu 盐酸黄连素 …… 454
Yansuan Huangliansu Pian 盐酸黄连素片 …… 455
Yansuan Mahuangjian 盐酸麻黄碱 …… 456
Yansuan Mahuangjian Pian 盐酸麻黄碱片 …… 457
Yansuan Mahuangjian Zhusheye 盐酸麻黄碱注射液 …… 458
Yansuan Nongjilijian Zhusheye 盐酸农吉利碱注射液 …… 251
Yantuo 岩陀 …… 347
Yao'aitiao 药艾条 …… 779
Yaotong Pian 腰痛片 …… 847
Yaotong Wan 腰痛丸 …… 846
Yazhicao 鸭跖草 …… 479
Yejuhua 野菊花 …… 539
Yeliuyou 椰馏油 …… 575
Yeliuyou Xuanyaoshui 椰馏油癣药水 …… 576
Yemazhui 野马追 …… 535
Yemazhui Pian 野马追片 …… 536
Yemugua 野木瓜 …… 537
Yemugua Pian 野木瓜片 …… 538
Yemugua Zhusheye 野木瓜注射液 …… 533
Yibeimu 伊贝母 …… 232
Yidianhong 一点红 …… 1
Yimucao 益母草 …… 492
Yimucao Gao 益母草膏 …… 495
Yimucao Liujingao 益母草流浸膏 …… 494
Yimucao Zhusheye 益母草注射液 …… 493
Yimu Wan 益母丸 …… 803
Yinchaihu 银柴胡 …… 544
Yinchen 茵陈 …… 390
Yindijue 阴地蕨 …… 253
Ying'er Baofei San 婴儿保肺散 …… 816

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Ying'er San 婴儿散 …… 817
Yingsuqiao 罂粟壳 …… 634
Yinhuang Zhusheye 银黄注射液 …… 817
Yinianjin 一捻金 …… 671
Yinqiao Jiedu Pian 银翘解毒片 …… 819
Yinqiao Jiedu Wan 银翘解毒丸 …… 819
Yinxingcao 阴行草 …… 254
Yinxingye 银杏叶 …… 543
Yinyanghuo 淫羊藿 …… 562
Yishoucao 翼首草 …… 633
Yijian Wan 医痫丸 …… 756
Yiyiren 薏苡仁 …… 650
Yiyuan San 益元散 …… 808
Yizhi 益智 …… 495
Yizhihuanghua 一枝黄花 …… 1
Yousongjie 油松节 …… 373
Yuanbaocao 元宝草 …… 79
Yuanhu 元胡 …… 80
Yuanhua 芫花 …… 271
Yuanzhi 远志 …… 265
Yuanzhi Ding 远志酊 …… 267
Yuanzhi Liujingao 远志流浸膏 …… 266
Yuejihua 月季花 …… 111
Yueju Wan 越鞠丸 …… 828
Yuganzi 余甘子 …… 298
Yujin 郁金 …… 338
Yuliangshi 禹粮石 …… 423
Yuliangtu 禹粮土 …… 422
Yuliren 郁李仁 …… 338
Yumixu 玉米须 …… 126
Yunmushi 云母石 …… 81
Yunshipi 云实皮 …… 82
Yunxiangcao 芸香草 …… 272
Yunxiangcaoyou 芸香草油 …… 272
Yunxiangcaoyou Qiwuji 芸香草油气雾剂 … 273
Yuputaogen 玉葡萄根 …… 127
Yuxingcao 鱼腥草 …… 368
Yuzhen San 玉真散 …… 725
Yuzhizi 预知子 …… 508
Yuzhu 玉竹 …… 125
Zaizao Wan 再造丸 …… 738
Zangcaosu 藏糙苏 …… 661
Zanglian Wan 脏连丸 …… 806
Zangmuxiang 藏木香 …… 660
Zaojioci 皂角刺 …… 296
Zelan 泽兰 …… 375
Zexie 泽泻 …… 375
Zhaoshanbai 照山白 …… 613
Zhebei Liujingao 浙贝流浸膏 …… 497
Zhebeimu 浙贝母 …… 496
Zhenling Wan 震灵丸 …… 850
Zhenzhu 珍珠 …… 381
Zhenzhumu 珍珠母 …… 382
Zheshi 赭石 …… 638
Zhetongpi 浙桐皮 …… 498
Zhibai Dihuang Wan 知柏地黄丸 …… 770
Zhidai Wan 止带丸 …… 712
Zhihong Changpi Wan 止红肠澼丸 …… 711
Zhijiao Kuzhiye 芝蕉枯痔液 …… 737
Zhilou Wan 痔漏丸 …… 821
Zhimu 知母 …… 351
Zhiqiao 枳壳 …… 399
Zhishi 枳实 …… 399
Zhishi Daozhi Wan 枳实导滞丸 …… 780
Zhizhu Wan 枳术丸 …… 779
Zhizhuliao 支柱蓼 …… 92
Zhizhuxiang 蜘蛛香 …… 633
Zhizi 栀子 …… 401
Zhizi Jinhua Wan 栀子金花丸 …… 782
Zhongjiefeng 肿节风 …… 366
Zhongjiefeng Pian 肿节风片 …… 367
Zhongrushi 钟乳石 …… 412
Zhuhuang 竹黄 …… 227
Zhuhuang Chuihou San 珠黄吹喉散 …… 800
Zhuifeng Gao 追风膏 …… 794
Zhujieshen 竹节参 …… 225
Zhujiexiangfu 竹节香附 …… 226
Zhuling 猪苓 …… 548
Zhuma Jingao 苎麻浸膏 …… 280
Zhuma Pian 苎麻片 …… 281
Zhumagen 苎麻根 …… 279
Zhuru 竹茹 …… 227

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Zhusha 朱砂 …… 223
Zhusha Anshen Wan 朱砂安神丸 …… 741
Zhushagen 朱砂根 …… 224
Zhuyangyang 猪殃殃 …… 548
Zhuyazao 猪牙皂 …… 547
Zhuzishen 珠子参 …… 448
Zhuzongcao 猪鬃草 …… 549
Zibeichi 紫贝齿 …… 579
Zicao 紫草 …… 587
Zicao Gao 紫草膏 …… 832
Zicaorong 紫草茸 …… 587
Ziheche 紫河车 …… 585
Zihuadiding 紫花地丁 …… 580
Zihuadujuan 紫花杜鹃 …… 581
Zihuadujuan Jingao 紫花杜鹃浸膏 …… 582
Zihuadujuan Pian 紫花杜鹃片 …… 583
Zijin Ding 紫金锭 …… 831
Zijinlong 紫金龙 …… 586
Ziqiguanzhong 紫荠贯众 …… 589
Zirantong 自然铜 …… 231
Zishen Wan 滋肾丸 …… 842
Zishiying 紫石英 …… 579
Zisugeng 紫苏梗 …… 585
Zisuye 紫苏叶 …… 584
Zisuzi 紫苏子 …… 583
Ziwan 紫菀 …… 589
Zixue 紫雪 …… 832
Zizhuye 紫珠叶 …… 583
Zongban 棕板 …… 576
Zuojin Wan 左金丸 …… 726
Zusima 祖司麻 …… 445

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

拉丁名索引

Actinolitum 阳起石 …… 252
Adonisidum 冰凉花武 …… 238
Aerosolum Olei Argyi 艾叶油气雾剂 …… 136
Aerosolum Olei Cymbopogonis 芸香草油气雾剂 …… 273
Aerosolum Physochlainae 华山参气雾剂 … 229
Agkistrodon 蕲蛇 …… 639
Agrimopholum 鹤草酚 …… 646
Alumen 白矾 …… 174
Aloe 芦荟 …… 282
Anabasini Hydrochloridum 盐酸八角枫碱 …… 450
Andrographolidi Natrii Bisulfis 亚硫酸氢钠穿心莲内酯 …… 209
Andrographolidum 穿心莲内酯 …… 439
Arillus Longan 龙眼肉 …… 153
Arisaema cum Bile 胆南星 …… 425
Aspongopus 九香虫 …… 15
Benzoinum 安息香 …… 248
Berberini Hydrochloridum 盐酸黄连素 … 454
Bergeninum 岩白菜素 …… 346
Bombyx Batryticatus 僵蚕 …… 643
Borneolum Syntheticum 冰片 …… 236
Bulbus Allii 大蒜 …… 37
Bulbus Allii Macrostemi 薤白 …… 643
Bulbus Fritillariae Cirrhosae 川贝母 …… 56
Bulbus Fritillariae Pallidiflorae 伊贝母 … 232
Bulbus Fritillariae Thunbergii 浙贝母 … 496
Bulbus Fritillariae Ussuriensis 平贝母 … 155
Bulbus Lilii 百合 …… 213
Bulbus Tulipae 光慈姑 …… 217
Bungarus Parvus 金钱白花蛇 …… 361
Cacumen Biotae 侧柏叶 …… 353
Cacumen Tamaricis 西河柳 …… 213
Calamina 炉甘石 …… 372
Calciosinter 石灰华 …… 139
Calculus Bovis 牛黄 …… 103
Calomelas 轻粉 …… 409
Calyx seu Fructus Physalis 锦灯笼 …… 617
Calyx Kaki 柿蒂 …… 403
Capsulae Olei Argyi 艾叶油胶囊 …… 136
Capsulae Olei Rhododendri Daurici 满山红油胶丸 …… 621
Capsulae Olei Viticis Negundo 牡荆油胶丸 …… 294
Capsulae Oleoresinae Lupuli 三合素胶丸 … 543
Carapax Eretmochelydis 玳瑁 …… 380
Carapax Trionycis 鳖甲 …… 667
Catechu 儿茶 …… 12
Caulis Arcangelisiae 古山龙 …… 137
Caulis Aristolochiae Manshuriensis 关木通 …… 242
Caulis Bambusae in Taeniam 竹茹 …… 227
Caulis Cissi 四方藤 …… 153
Caulis Clematidis Armandii 川木通 …… 55
Caulis Entadae 过岗龙 …… 211
Caulis Erycibes 丁公藤 …… 2
Caulis et Folium Stauntoniae 野木瓜 … 537
Caulis Fibraureae 黄藤 …… 521
Caulis Fissistigmae 黑风藤 …… 593
Caulis Impatientis 凤仙透骨草 …… 119
Caulis Lonicerae 忍冬藤 …… 311
Caulis Mahoniae 功劳木 …… 128
Caulis Marsdeniae Tenacissimae 通关藤 … 507
Caulis Perillae 紫苏梗 …… 585
Caulis Piperis Futokadsurae 海风藤 …… 500
Caulis Polygoni Multiflori 首乌藤 …… 431
Caulis Sargentodoxae 大血藤 …… 30
Caulis Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶 … 193
Caulis Sinomenii 青风藤 …… 315
Caulis Spatholobi 鸡血藤 …… 312
Caulis Trachelospermi 络石藤 …… 446
Cera Chinensis 虫白蜡 …… 320
Cera Flava 蜂蜡 …… 616

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Chalcanthitum 胆矾 …… 424
Cinnabaris 朱砂 …… 223
Cissampelini Methiodidum 傣肌松 …… 599
Colla Corii Asini 阿胶 …… 307
Colla Cornus Cervi 鹿角胶 …… 556
Colla Plastri Testudinis 龟板胶 …… 300
Concha Arcae 瓦楞子 …… 94
Concha Haliotidis 石决明 …… 143
Concha Margaritifera Usta 珍珠母 …… 382
Concha Mauritiae 紫贝齿 …… 579
Concha Meretricis seu Cyclinae 蛤壳 … 592
Concha Ostreae 牡蛎 …… 294
Concretio Silicea Bambusae 竹黄 …… 227
Cordyceps 冬虫夏草 …… 185
Cornu Bubali 水牛角 …… 95
Cornu Cervi 鹿角 …… 555
Cornu Cervi Degelatinatum 鹿角霜 …… 556
Cornu Cervi Pantotrichum 鹿茸 …… 557
Cortex Acanthopanacis Radicis 五加皮 … 88
Cortex Ailanthi 椿皮 …… 609
Cortex Albiziae 合欢皮 …… 235
Cortex Caesalpiniae Radicis 云实皮 …… 82
Cortex Cinnamomi 肉桂 …… 221
Cortex Daphnes 祖司麻 …… 445
Cortex Dictamni Radicis 白鲜皮 …… 180
Cortex Erythrinae 海桐皮 …… 503
Cortex Eucommiae 杜仲 …… 285
Cortex Fraxini 秦皮 …… 447
Cortex Ilicis Rotundae 救必应 …… 529
Cortex Illicii 地枫皮 …… 200
Cortex Kalopanacis 川桐皮 …… 60
Cortex Lycii Radicis 地骨皮 …… 201
Cortex Magnoliae Officinalis 厚朴 …… 404
Cortex Meliae 苦楝皮 …… 327
Cortex Mori Radicis 桑白皮 …… 510
Cortex Moutan Radicis 牡丹皮 …… 291
Cortex Periplocae Radicis 香加皮 …… 414
Cortex Phellodendri 黄柏 …… 519
Cortex Pseudolaricis 土荆皮 …… 26
Cortex Sapii Radicis 乌桕 …… 117
Cortex Syringae 暴马子皮 …… 641
Cortex Zanthoxyli 浙椒皮 …… 498
Crinis Carbonisatus 血余炭 …… 233
Dens Draconis 龙齿 …… 150
Endothelium Corneum Gigeriae Galli 鸡内金 …… 311
Ephedrini Hydrochloridum 盐酸麻黄碱 … 456
Eupolyphaga seu Steleophaga 土鳖虫 …… 28
Exocarpium Benincasae 冬瓜皮 …… 185
Exocarpium Citri Grandis 橘红 …… 658
Exocarpium Citrulli 西瓜皮 …… 212
Extractum Acanthopanacis Senticosi 刺五加浸膏 …… 337
Extractum Angelicae Liquidum 当归流浸膏 …… 218
Extractum Anisodi Acutanguli 三分三浸膏 …… 21
Extractum Belladonnae 颠茄浸膏 …… 657
Extractum Belladonnae Liquidum 颠茄流浸膏 …… 656
Extractum Boehmeriae 苎麻浸膏 …… 280
Extractum Floris Fritillariae Liquidum 贝母花流浸膏 …… 102
Extractum Folii Eriobotryae Inspissatum 枇杷叶膏 …… 331
Extractum Fritillariae Liquidum 浙贝流浸膏 …… 497
Extractum Gemmae Agrimoniae 鹤草芽浸膏 …… 645
Extractum Glycyrrhizae 甘草浸膏 …… 131
Extractum Glycyrrhizae Liquidum 甘草流浸膏 …… 132
Extractum Leonuri Inspissatum 益母草膏 …… 495
Extractum Leonuri Liquidum 益母草流浸膏 …… 494
Extractum Lupuli 啤酒花浸膏 …… 541
Extractum Polygalae Liquidum 远志流浸膏 …… 266
Extractum Prunellae Inspissatum 夏枯草膏 …… 476
Extractum Rhei Liquidum 大黄流浸膏 … 36

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Extractum Rhododendri Mariae 紫花杜鹃浸膏 582
Extractum Zingiberis Liquidum 姜流浸膏 24
Faeces Trogopterorum 五灵脂 89
Fel Ursi 熊胆 637
Fibrauretinum 黄藤素 522
Flos Albiziae 合欢花 236
Flos Buddlejae 密蒙花 564
Flos Campsis 凌霄花 488
Flos Carthami 红花 258
Flos Celosiae Cristatae 鸡冠花 313
Flos Chrysanthemi 菊花 526
Flos Chrysanthemi Indici 野菊花 539
Flos Citri Aurantii 代代花 163
Flos Daturae 洋金花 434
Flos Dolichoris 扁豆花 444
Flos Eriocauli 谷精草 298
Flos Farfarae 款冬花 568
Flos Fritillariae Thunbergii 贝母花 100
Flos Genkwa 芫花 271
Flos Gomphrenae 千日红 51
Flos Gossampini 木棉花 85
Flos Hibisci 木槿花 86
Flos Inulae 旋复花 560
Flos Jasmini 素馨花 449
Flos Lonicerae 金银花 363
Flos Magnoliae 辛夷 300
Flos Magnoliae Officinalis 厚朴花 405
Flos Mume 梅花 528
Flos Populi 杨树花 287
Flos Rosae Chinensis 月季花 111
Flos Rosae Rugosae 玫瑰花 322
Flos Sophorae 槐花 611
Flos Sophorae Immaturus 槐米 610
Flos Trollii 金莲花 359
Fluoritum 紫石英 579
Folium Aconiti Kusnezoffii 草乌叶 387
Folium Alstoniae Scholaris 灯台叶 245
Folium Apocyni Veneti 罗布麻叶 348
Folium Artemisiae Argyi 艾叶 134
Folium Baeckeae 岗松 290
Folium Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠 621
Folium Callicarpae Pedunculatae 紫珠叶 588
Folium Chimonanthi Nitentis 山蜡梅叶 50
Folium Clerodendri Trichotomi 臭梧桐叶 483
Folium Digitalis 洋地黄叶 432
Folium Elaeagni 胡颓子叶 395
Folium Elaeagni Angustifoliae 沙枣叶 303
Folium Eriobotryae 枇杷叶 330
Folium et Cacumen Murrayae 九里香 14
Folium et Cacumen Rhododendri Mariae 紫花杜鹃 581
Folium et Flos Wikstromiae Chamaedaphnis 黄芫花 514
Folium et Ramulus Cotini 黄栌 518
Folium et Ramulus Euodiae Leptae 三叉苦 19
Folium Ginkgo 银杏叶 543
Folium Hibisci 芙蓉叶 270
Folium Ilicis Chinensis 四季青 160
Folium Ilicis Cornutae 枸骨叶 402
Folium Isatidis 大青叶 32
Folium Loropetali 檵木叶 528
Folium Microcotis 布渣叶 149
Folium Mori 桑叶 509
Folium Nelumbinis 荷叶 467
Folium Onychii 小野鸡尾 43
Folium Perillae 紫苏叶 584
Folium Photiniae 石楠叶 147
Folium Polygoni Tinctorii 蓼大青叶 627
Folium Pyrrosiae 石韦 138
Folium Rhododendri Anthopogonoidis 烈香杜鹃 477
Folium Rhododendri Daurici 满山红 619
Folium Rhododendri Micranthi 照山白 613
Folium Sauropi 龙脷叶 153
Folium Stenolomae 乌韭 116
Folium Viticis Negundo 牡荆叶 292
Fructus Adinae 水杨梅 98
Fructus Aesculi 娑罗子 499
Fructus Akebiae 预知子 508

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Fructus Alpiniae Oxyphyllae 益智 …… 495
Fructus Amomi 砂仁 …… 406
Fructus Anisi Stellati 八角茴香 …… 7
Fructus Arctii 牛蒡子 …… 104
Fructus Aristolochiae 马兜铃 …… 72
Fructus Aurantii 枳壳 …… 399
Fructus Aurantii Immaturus 枳实 …… 399
Fructus Broussonetiae 楮实子 …… 574
Fructus Bruceae 鸦胆子 …… 410
Fructus Canarii 青果 …… 319
Fructus Cannabis 火麻仁 …… 123
Fructus Carpesii 鹤虱 …… 644
Fructus Chaenomelis 木瓜 …… 82
Fructus Chebulae 诃子 …… 306
Fructus Choerospondiatis 广枣 …… 63
Fructus Citri 香橼 …… 419
Fructus Citri Sarcodactylis 佛手 …… 297
Fructus Cnidii 蛇床子 …… 540
Fructus Corni 山茱萸 …… 47
Fructus Crataegi 山楂 …… 49
Fructus Crotonis 巴豆 …… 123
Fructus Danci Carotae 南鹤虱 …… 398
Fructus Elaeagni Angustifoliae 沙枣 …… 302
Fructus Euodiae 吴茱萸 …… 289
Fructus Foeniculi 小茴香 …… 42
Fructus Forsythiae 连翘 …… 288
Fructus Galangae 红豆蔻 …… 260
Fructus Gardeniae 栀子 …… 401
Fructus Gleditsiae Abnormalis 猪牙皂 … 547
Fructus Gleditsiae Sinensis 大皂角 …… 32
Fructus Hippophae 沙棘 …… 303
Fructus Hordei Germinatus 麦芽 …… 265
Fructus Kochiae 地肤子 …… 201
Fructus Leonuri 茺蔚子 …… 393
Fructus Ligustri Lucidi 女贞子 …… 66
Fructus Liquidambaris 路路通 …… 614
Fructus Litseae 荜澄茄 …… 385
Fructus Lycii 枸杞子 …… 402
Fructus Malvae Verticillatae 冬葵果 …… 187
Fructus Meliae Toosendan 川楝子 …… 61
Fructus Momordicae 罗汉果 …… 349
Fructus Mori 桑椹 …… 512
Fructus Mume 乌梅 …… 118
Fructus Oryzae Germinatus 稻芽 …… 642
Fructus Paulowniae 泡桐果 …… 373
Fructus Perillae 紫苏子 …… 583
Fructus Phyllanthi 余甘子 …… 298
Fructus Piperis Longi 荜茇 …… 384
Fructus Piperis Nigri 黑胡椒 …… 595
Fructus Podophylli 小叶莲 …… 40
Fructus Polygoni Orientalis 水红花子 …… 97
Fructus Psoraleae 补骨脂 …… 305
Fructus Quisqualis 使君子 …… 354
Fructus Rhododendri Mollis 八厘麻 …… 9
Fructus Rosae Laevigatae 金樱子 …… 364
Fructus Rubi 复盆子 …… 422
Fructus Schisandrae 五味子 …… 89
Fructus Sophorae 槐角 …… 612
Fructus Terminaliae Billericae 毛诃子 …… 109
Fructus Tribuli 蒺藜 …… 606
Fructus Trichosanthis 瓜蒌 …… 182
Fructus Tsaoko 草果 …… 389
Fructus Viticis 蔓荆子 …… 623
Fructus Xanthii 苍耳子 …… 278
Fructus Ziziphi Jujubae 大枣 …… 34
Galla Chinensis 五倍子 …… 91
Gecko 蛤蚧 …… 592
Gemma Agrimoniae 鹤草芽 …… 644
Gypsum Fibrosum 石膏 …… 149
Haematitum 赭石 …… 638
Halitum 大青盐 …… 33
Halloysitum Rubrum 赤石脂 …… 268
Hemsleyadinum 雪胆素 …… 532
Herba Abri 鸡骨草 …… 314
Herba Acalyphae 铁苋菜 …… 480
Herba Achilleae 蓍草 …… 603
Herba Achyranthis Asperae 倒扣草 …… 482
Herba Aconiti Bonga 榜嘎 …… 628
Herba Adenosmae 大头陈 …… 29
Herba Adianti 猪鬃草 …… 549
Herba Adonidis 冰凉花 …… 237
Herba Agastachis 藿香 …… 666

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Herba Agrimoniae 仙鹤草 …… 165
Herba Ajugae 筋骨草 …… 598
Herba Aletridis 粉条儿菜 …… 490
Herba Alternantherae 空心莲子草 …… 376
Herba Anaphalidis 香青草 …… 417
Herba Andrographitis 穿心莲 …… 437
Herba Anemones Hupehensis 打破碗花花 …… 127
Herba Ardisiae Japonicae 矮地茶 …… 618
Herba Aristolochiae 马兜铃藤 …… 72
Herba Aristolochiae Mollissimae 寻骨风 … 251
Herba Artemisae Chinghao 青蒿 …… 320
Herba Artemisiae Scopariae 茵陈 …… 390
Herba Asari 细辛 …… 379
Herba Asari Forbesii 杜衡 …… 286
Herba Asteris Ageratoidis 红管药 …… 262
Herba Belladonnae 颠茄草 …… 654
Herba Berchemiae Polyphyllae 光枝勾儿茶 …… 216
Herba Bidentis Tripartitae 狼把草 …… 486
Herba Blumeae Mollis 红头草 …… 257
Herba Boenninghauseniae 石椒草 …… 146
Herba Botrychii 阴地蕨 …… 253
Herba Centellae 积雪草 …… 480
Herba Centipedae 鹅不食草 …… 597
Herba Cephalanoploris 小蓟 …… 44
Herba Chelidonii 白屈菜 …… 176
Herba Chrysanthemi Lavandulaefolii 北野菊 …… 158
Herba Cichorii 菊苣 …… 526
Herba Cissampeloris 亚乎奴 …… 207
Herba Cistanchis 肉苁蓉 …… 220
Herba Clinopodii 断血流 …… 561
Herba Commelinae 鸭跖草 …… 479
Herba Conyzae 金龙胆草 …… 356
Herba Corydalis Bungeanae 苦地丁 …… 323
Herba Crotalariae 农吉利 …… 249
Herba Cymbopogonis 芸香草 …… 272
Herba Cynomorii 锁阳 …… 597
Herba Damnacanthi 虎刺 …… 341
Herba Dendrobii 石斛 …… 145
Herba Desmodii Styracifolii 广金钱草 … 63
Herba Desmodii Triquetri 葫芦茶 …… 570
Herba Dianthi 瞿麦 …… 664
Herba Diclipterae Chinensis 狗肝菜 …… 369
Herba Dracocephali 香青兰 …… 416
Herba Dracocephali Integrifolii 全叶青兰 …… 234
Herba Dracocephali Tangutici 甘青青兰 … 129
Herba Ecliptae 墨旱莲 …… 642
Herba Elephantopi 地胆草 …… 202
Herba Elsholtziae Penduliflorae 大黄药 … 37
Herba Elsholtziae seu Moslae 香薷 …… 420
Herba Emiliae 一点红 …… 1
Herba Ephedrae 麻黄 …… 553
Herba Epimedii 淫羊藿 …… 562
Herba Equiseti Hiemalis 木贼 …… 84
Herba Erigerontis 灯盏细辛 …… 245
Herba Erodii seu Geranii 老鹳草 …… 196
Herba Eupatorii Lindleyani 野马追 …… 535
Herba Euphorbiae Hirtae 飞扬草 …… 67
Herba Euphorbiae Humifusae 地锦草 … 205
Herba Euphorbiae Lunulatae 猫眼草 … 550
Herba Eupatorii 佩兰 …… 355
Herba Galii Aparinis 猪殃殃 …… 548
Herba Gei 蓝布正 …… 604
Herba Gendarussae 小驳骨 …… 41
Herba Gentianae Loureiri 广地丁 …… 61
Herba Gentianae Rhodanthae 红花龙胆 … 259
Herba Glechomae Longitubae 连钱草 … 288
Herba Gnaphali Affinis 鼠曲草 …… 619
Herba Gueldenstaedtiae 甜地丁 …… 546
Herba Houttuyniae 鱼腥草 …… 368
Herba Hyperici Japonici 地耳草 …… 198
Herba Hyperici Sampsonii 元宝草 …… 79
Herba Inulae 金佛草 …… 358
Herba Inulae Cappae 羊耳菊 …… 241
Herba Justiciae 爵床 …… 662
Herba Kalimeridis 马兰草 …… 67
Herba Kyllingae 水蜈蚣 …… 99
Herba Laggerae 臭灵丹草 …… 482
Herba Lagotis 洪连 …… 432

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Herba Leonuri 益母草 …… 492
Herba Lobeliae Radicantis 半边莲…… 189
Herba Lophatheri 淡竹叶 …… 563
Herba Lycopi 泽兰…… 375
Herba Lycopodii 伸筋草 …… 295
Herba Lysimachiae 金钱草 …… 361
Herba Lysionoti 石吊兰 …… 140
Herba Menthae 薄荷 …… 650
Herba Origani 牛至 …… 103
Herba Orostachyos 瓦松 …… 94
Herba Osbeckiae 金锦香 …… 364
Herba Oxytropis 蓝大戟 …… 461
Herba Paederiae 鸡矢藤 …… 312
Herba Patriniae 败酱草 …… 349
Herba Peristrophis 九头狮子草 …… 14
Herba Phlomidis 糙苏 …… 659
Herba Plantaginis 车前草 …… 98
Herba Pogostemonis 广藿香 …… 65
Herba Polygalae Japonicae 瓜子金…… 181
Herba Polygoni Avicularis 萹蓄 …… 573
Herba Polygoni Chinensis 火炭母 …… 122
Herba Polygoni Hydropiperis 辣蓼 …… 636
Herba Polygoni Perfoliati 杠板归…… 284
Herba Portulacae 马齿苋 …… 69
Herba Potentillae Chinensis 委陵菜 …… 353
Herba Potentillae Discoloris 翻白草 …… 666
Herba Pteridis Multifidae 凤尾草…… 120
Herba Pterocephali 翼首草 …… 663
Herba Pyrolae 鹿衔草 …… 558
Herba Rabdosiae Rubescentis 冬凌草…… 186
Herba Rorippae 蔊菜 …… 624
Herba Rubi Parvifolii 茅莓 …… 329
Herba Salviae Chinensis 石见穿…… 138
Herba Salviae Plebeiae 荔枝草 …… 395
Herba Salviae Prionitidis 红根草 …… 260
Herba Sarcandrae 肿节风…… 366
Herba Saxifragae 虎耳草…… 339
Herba Schizonepetae 荆芥 …… 382
Herba Scutellariae Barbatae 半支莲 …… 189
Herba Scutellariae Indicae 向天盏…… 233
Herba Sedi Aizoon 景天三七 …… 590
Herba Sedi Linearis 佛甲草 …… 297
Herba Sedi Sarmentosi 垂盆草 …… 352
Herba Selaginellae 卷柏 …… 371
Herba Senecionis Scandentis 千里光…… 53
Herba Serissae 六月雪 …… 121
Herba seu Radix Cirsii Japonici 大蓟…… 38
Herba Shuteriae 草红藤 …… 388
Herba Siegesbeckiae 豨莶草…… 632
Herba Siphonostegiae 阴行草 …… 254
Herba Solani Lyrati 白英 …… 172
Herba Solani Nigri 龙葵 …… 154
Herba Solidaginis 一枝黄花…… 1
Herba Sonchi Arvensis 苣荬菜 …… 274
Herba Sophorae Alopecuroidis 苦豆草 … 325
Herba Spirodelae 浮萍 …… 506
Herba Swertiae 当药…… 219
Herba Swertiae Mileensis 青叶胆 …… 316
Herba Taraxaci 蒲公英…… 607
Herba Thesii 百蕊草 …… 215
Herba Thlaspis 菥蓂 …… 524
Herba Thymi 地椒 …… 204
Herba Tripterospermi 肺形草 …… 366
Herba Verbenae 马鞭草 …… 74
Herba Veronicae Dilatatae 水蔓菁 …… 100
Herba Veronicae Peregrinae 仙桃草 …… 164
Herba Violae 紫花地丁 …… 580
Herba Violae Diffusae 匍伏堇 …… 426
Herba Wahlenbergiae 蓝花参 …… 604
Herba Wedeliae 蟛蜞菊 …… 665
Hippocampus 海马 …… 499
Hirudo 水蛭 …… 98
Hydrargyri Oxydum Rubrum 红粉 …… 261
Indigo Naturalis 青黛 …… 320
Injectio Adonisidi 冰凉花甙注射液…… 240
Injectio Alternantherae 空心莲子草
注射液…… 377
Injectio Anabasini Hydrochloridi 盐酸八
角枫碱注射液…… 451
Injectio Andrographolidi Natrii Bisulfitis
亚硫酸氢钠穿心莲内酯注射液…… 211
Injectio Cissampelini Methiodidi 像肌松

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

注射液…… 601
Injectio Emulsionis Olei Curcumae Aromaticae 莪术油乳注射液 …… 464
Injectio Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱注射液…… 458
Injectio Erigerontis 灯盏细辛注射液…… 246
Injectio Erycibes 丁公藤注射液 …… 3
Injectio Fibrauretini 黄藤素注射液 …… 524
Injectio Hyperici Japonici 田基黄注射液…… 199
Injectio Ilicis Pubescentis 毛冬青注射液…… 108
Injectio Leonuri 益母草注射液 …… 493
Injecito Ligustrazini Hydrochloridi 盐酸川芎嗪注射液…… 453
Injectio Monocrotalini Hydrochloridi 盐酸农吉利碱注射液…… 251
Injectio Olei Curcumae Aromaticae 莪术油注射液…… 464
Injectio Paeonoli 丹皮酚注射液 …… 113
Injectio Rhomotoxini 八厘麻毒素注射液… 11
Injectio Salviae Miltiorrhizae 丹参注射液…… 114
Injectio Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶注射液…… 104
Injectio Stauntoniae 野木瓜注射液 …… 538
Injectio Swertiae Mileensis 青叶胆注射液…… 317
Injectio Tetrandrini Dimethiodidi 汉肌松注射液…… 192
Involucrum Castaneae 板栗壳 …… 331
Lacca 紫草茸 …… 587
Lapis Chloriti 青礞石 …… 321
Lapis Micae Aureus 金礞石…… 365
Lasiosphaera seu Calvitia 马勃 …… 69
Lignum Aquilariae Resinatum 沉香 …… 364
Lignum Dalbergiae Odoriferae 降香…… 379
Lignum et Radix Naucleae 胆木 …… 424
Lignum Pini Nodi 油松节 …… 373
Lignum Rhamnellae 升登 …… 111
Lignum Sappan 苏木…… 283
Lignum Xanthoceratis 文冠木 …… 121
Ligustrazini Hydrochloridum 盐酸川芎嗪…… 452
Limoniterra 禹粮土 …… 477
Limonitum 禹粮石 …… 423
Linimentum Ilicis Chinensis 四季青搽剂…… 162
Liquor Ilicis Chinensis 四季青药水 …… 161
Liquor Picis Cocois Protinea 椰馏油癣药水…… 576
Lumbricus 地龙 …… 197
Lysionotinum 石吊兰素…… 141
Magnetitum 磁石 …… 631
Margarita 珍珠 …… 381
Medulla Junci 灯心草 …… 244
Medulla Stachyuri seu Helwingiae 小通草…… 42
Medulla Tetrapanacis 通草 …… 508
Mel 蜂蜜 …… 616
Membrana Follicularis Ovi 凤凰衣 …… 120
Mentholum 薄荷脑 …… 653
Monocrotalinum 农吉利碱 …… 250
Moschus 麝香 …… 669
Muscovitum 云母石 …… 81
Mylabris 斑蝥 …… 568
Natrii Sulfas 芒硝 …… 206
Natrii Sulfas Exsiccatus 玄明粉…… 187
Neoandrographolidum 穿心莲甙 …… 441
Nidus Vespae 蜂房…… 615
Nodus Nelumbinis Rhizomatis 藕节 …… 664
Nux Prinsepiae 蓖仁…… 639
Oleum Anisi Stellati 八角茴香油 …… 8
Oleum Argyi 艾叶油 …… 135
Oleum Camelliae 茶油 …… 392
Oleum Cinnamomi 肉桂油 …… 222
Oleum Curcumae Aromaticae 莪术油…… 463
Oleum Cymbopogonis 芸香草油 …… 272
Oleum Eucalypti 桉油 …… 473
Oleum Folii Amomi 砂仁叶油…… 407
Oleum Linderae 香果脂 …… 418
Oleum Menthae 薄荷油 …… 651

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Oleum Ocimi Gratissimi 丁香罗勒油…… 4
Oleum Rhododendri Daurici 满山红油… 620
Oleum Ricini 蓖麻油 …… 606
Oleum Sesami 麻油 …… 552
Oleum Terebinthinae 松节油 …… 333
Oleum Viticis Negundo 牡荆油 …… 293
Omphalia 雷丸 …… 612
Oötheca Mantidis 桑螵蛸…… 513
Ophicalcitum 花蕊石 …… 275
Os Costaziae 浮海石 …… 506
Os Draconis 龙骨 …… 151
Os Pardi 豹骨…… 485
Os Sepiellae seu Sepiae 海螵蛸 …… 503
Os Tigris 虎骨 …… 341
Paeonolum 丹皮酚 …… 112
Pedicellus Melo 甜瓜蒂…… 545
Pericarpium Arecae 大腹皮 …… 39
Pericarpium Citri Reticulatae 陈皮 …… 309
Pericarpium Citri Reticulatae Viride
青皮…… 318
Pericarpium Granati 石榴皮 …… 148
Pericarpium Lagenariae 葫芦 …… 569
Pericarpium Papaveris 罂粟壳 …… 634
Pericarpium Trichosanthis 瓜蒌皮 …… 183
Pericarpium Zanthoxyli 花椒 …… 275
Periostracum Cicadae 蝉蜕 …… 634
Periostracum Serpentis 蛇蜕 …… 541
Petiolus Trachycarpi 棕板 …… 576
Pilulae Siegesbeckiae 豨莶丸 …… 633
Pinitolum 松醇 …… 334
Pix Cocois 椰馏油 …… 575
Placenta Hominis 紫河车…… 585
Plastrum Testudinis 龟板 …… 299
Plumula Nelumbinis 莲子心 …… 460
Pollen Pini 松花粉 …… 333
Pollen Typhae 蒲黄 …… 608
Polyporus Umbellatus 猪苓 …… 548
Poria 茯苓 …… 391
Pulvis Cornus Bubali Concentratus
水牛角浓缩粉…… 96
Pulvis Talci 滑石粉 …… 602
Pumex 浮石 …… 505
Pyritum 自然铜 …… 231
Radix Acanthopanacis Senticosi 刺五加… 336
Radix Achyranthis Bidentatae 牛膝 …… 105
Radix Aconiti 川乌 …… 58
Radix Aconiti brachypodi 雪上一支蒿… 530
Radix Aconiti Coreani 关白附…… 243
Radix Aconiti Kusnezoffii 草乌…… 385
Radix Aconiti Praeparata 附子 …… 309
Radix Actinidiae Chinensis 猕猴桃根… 551
Radix Adenophorae 南沙参 …… 397
Radix Alangii 八角枫 …… 6
Radix Ampelopsis 白蔹 …… 179
Radix Ampelopsis Delavayanae 玉葡萄根… 127
Radix Anemones Rivularis 虎掌草 …… 343
Radix Angelicae Dahuricae 白芷 …… 170
Radix Angelicae Pubescentis 独活 …… 426
Radix Angelicae Sinensis 当归 …… 217
Radix Anisodi Acutanguli 三分三 …… 20
Radix Ardisiae Crenatae 朱砂根…… 224
Radix Aristolochiae 青木香 …… 315
Radix Aristolochiae Fangchi 广防己 …… 62
Radix Arnebiae seu Lithospermi 紫草… 537
Radix Asparagi 天冬 …… 75
Radix Asteris 紫菀…… 539
Radix Astragali seu Hedysari 黄芪 …… 516
Radix Aucklandiae 木香 …… 83
Radix Berberidis 三颗针 …… 23
Radix Boehmeriae 苎麻根 …… 279
Radix Bupleuri 柴胡 …… 477
Radix Campanumoeae 土党参 …… 28
Radix Campylotropis Hirtellae 大红袍… 30
Radix Caulophylli 红毛七…… 257
Radix Changii 明党参 …… 345
Radix Clematidis 威灵仙 …… 403
Radix Codonopsis Lanceolatae 四叶参… 159
Radix Codonopsis Pilosulae 党参…… 478
Radix Cudraniae 穿破石 …… 443
Radix Curcumae 郁金 …… 338
Radix Cyathulae 川牛膝 …… 57
Radix Cynanchi Atrati 白薇 …… 180

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Radix Cynanchi Bungei 白首乌 …… 178
Radix Cynanchi Paniculati 徐长卿 …… 484
Radix Dichroae 常山 …… 534
Radix Diploclisiae 秤钩风 …… 481
Radix Dipsaci 续断 …… 565
Radix Dactylicapni 紫金龙 …… 586
Radix Ephedrae 麻黄根 …… 554
Radix et Rhizoma Rhei 大黄 …… 34
Radix Euphorbiae Ebracteolatae 狼毒 … 487
Radix Euphorbiae Kansui 甘遂 …… 133
Radix Euphorbiae Pekinensis 京大戟 … 370
Radix Fici Simplicissimae 五指毛桃 …… 90
Radix Gentianae 龙胆 …… 152
Radix Gentianae Macrophyllae 秦艽 …… 446
Radix Ginseng 人参 …… 5
Radix Glehniae 北沙参 …… 157
Radix Glycyrrhizae 甘草 …… 130
Radix Helicteris 山芝麻 …… 45
Radix Hemerocallis 萱草根 …… 572
Radix Hemsleyae 雪胆 …… 531
Radix Heraclei Rapulae 白云花根 …… 166
Radix Ilicis Asprellae 岗梅 …… 291
Radix Ilicis Pubescentis 毛冬青 …… 107
Radix Indigoferae Neopolygaloidis
块根木蓝 …… 270
Radix Inulae Racemosae 藏木香 …… 660
Radix Isatidis 板蓝根 …… 332
Radix Kadsurae Cocoineae 黑老虎根 …… 594
Radix Kadsurae Longipedunculatae
南五味子根 …… 396
Radix Knoxiae 红大戟 …… 256
Radix Ledebouriellae 防风 …… 255
Radix Linderae 乌药 …… 116
Radix Morindae Officinalis 巴戟天 …… 124
Radix Notoginseng 三七 …… 18
Radix Ophiopogonis 麦冬 …… 264
Radix Oryzae Glutinosae 糯稻根 …… 669
Radix Osbeckia Crinitae 朝天罐 …… 574
Radix Paeoniae Alba 白芍 …… 169
Radix Paeoniae Rubra 赤芍 …… 269
Radix Peucedani 前胡 …… 429
Radix Phlomidis Younghusbandii 藏糙苏 … 661
Radix Physochlainae 华山参 …… 228
Radix Phytolaccae 商陆 …… 559
Radix Pittospori 山栀茶 …… 48
Radix Platycodi 桔梗 …… 469
Radix Podophylli 桃儿七 …… 470
Radix Polygalae 远志 …… 265
Radix Polygoni Multiflori 首乌 …… 430
Radix Potentillae Fragarioidis 莓叶
委陵菜 …… 465
Radix Przewalskiae Tanguticae 马尿泡 … 68
Radix Psammosilenes 金铁锁 …… 362
Radix Pseudostellariae 孩儿参 …… 445
Radix Puerariae 葛根 …… 570
Radix Pulsatillae 白头翁 …… 168
Radix Ranunculi Ternati 猫爪草 …… 550
Radix Rehmanniae 地黄 …… 203
Radix Rhapontici seu Echinopsis 漏芦 … 636
Radix Rhodiolae 红景天 …… 262
Radix Rhodomyrti 桃金娘根 …… 471
Radix Rubiae 茜草 …… 383
Radix Rubiae Yunnanensis 小红参 …… 40
Radix Rubi Parvifolii 茅莓根 …… 329
Radix Sabiae Schumannianae 石钻子 …… 143
Radix Salviae Miltiorrhizae 丹参 …… 114
Radix Sanguisorbae 地榆 …… 205
Radix Scrophulariae 玄参 …… 188
Radix Scutellariae 黄芩 …… 515
Radix Semiaquilegiae 天葵子 …… 79
Radix Sophorae Flavescentis 苦参 …… 326
Radix Sophorae Subprostratae 山豆根 … 45
Radix Stellariae 银柴胡 …… 544
Radix Stemonae 百部 …… 214
Radix Stephaniae Cepharanthae 白药子 … 176
Radix Stephaniae Tetrandrae 防己 …… 254
Radix Tinosporae 金果榄 …… 358
Radix Trichosanthis 天花粉 …… 76
Radix Vladimiriae 川木香 …… 55
Radix Wikstroemiae Indicae 了哥王 …… 16
Radix Zanthoxyli 两面针 …… 287
Ramulus Cinnamomi 桂枝 …… 468

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Ramulus et Folium Claoxyli 丢了棒 …… 225
Ramulus et Folium Picrasmae 苦木 …… 323
Ramulus Loranthi 桑寄生 …… 511
Ramulus Mori 桑枝 …… 511
Ramulus Uncariae cum Uncis 钩藤 …… 412
Ramulus Visci 槲寄生 …… 640
Realgar 雄黄 …… 578
Receptaculum Nelumbinis 莲房 …… 460
Resina Ferulae 阿魏 …… 308
Resina Liquidamberis 枫香脂 …… 335
Retinervus Luffae Fructus 丝瓜络 …… 195
Rhizoma Acori Graminei 石菖蒲 …… 144
Rhizoma Alismatis 泽泻 …… 375
Rhizoma Alocasiae Odorae 海芋 …… 592
Rhizoma Alpiniae Officinarum 高良姜… 489
Rhizoma Anemarrhenae 知母 …… 351
Rhizoma Anemones Altaicae 九节菖蒲… 13
Rhizoma Anemones Raddeanae 竹节香附…… 226
Rhizoma Arisaematis 天南星 …… 77
Rhizoma Atractylodis 苍术 …… 277
Rhizoma Atractylodis Macrocephalae 白术…… 167
Rhizoma Belamcandae 射干 …… 484
Rhizoma Bistortae 拳参 …… 489
Rhizoma Bletillae 白及 …… 166
Rhizoma Bolbostemmae 土贝母 …… 26
Rhizoma Cibotii 狗脊 …… 369
Rhizoma Cimicifugae 升麻 …… 110
Rhizoma Coptidis 黄连 …… 517
Rhizoma Corydalis 元胡 …… 80
Rhizoma Corydalis Decumbentis 夏天无… 474
Rhizoma Curculiginis 仙茅 …… 163
Rhizoma Curcumae Longae 姜黄 …… 428
Rhizoma Cynanchi Stauntonii 白前 …… 177
Rhizoma Cyperi 香附 …… 415
Rhizoma Dioscoreae 山药 …… 48
Rhizoma Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣 …… 648
Rhizoma Dioscoreae Hypoglaucae 粉萆薢…… 491
Rhizoma Dioscoreae Nipponicae 穿山龙… 435
Rhizoma Dioscoreae Septemlobae 绵萆薢… 566
Rhizoma Drynariae 骨碎补 …… 411
Rhizoma Dryopteris Crassirhizomae 绵马贯众…… 566
Rhizoma Fagopyri Cymosi 金荞麦 …… 359
Rhizoma Gastrodiae 天麻 …… 78
Rhizoma Gymnadeniae 手参 …… 106
Rhizoma Homalomenae 千年健 …… 52
Rhizoma Imperatae 白茅根 …… 173
Rhizoma Kaempferiae 山柰 …… 46
Rhizoma Ligustici 藁本 …… 662
Rhizoma Ligustici Chuanxiong 川芎…… 59
Rhizoma Menispermi 北豆根 …… 155
Rhizoma Nardostachyos 甘松 …… 129
Rhizoma Osmundae 紫萁贯众 …… 589
Rhizoma Panacis Japonici 竹节参 …… 225
Rhizoma Panacis Majoris 珠子参 …… 448
Rhizoma Paridis 重楼 …… 421
Rhizoma Phragmitis 芦根 …… 283
Rhizoma Picrorhizae 胡黄连 …… 394
Rhizoma Pinelliae 半夏 …… 190
Rhizoma Polygonati 黄精 …… 520
Rhizoma Polygonati Odorati 玉竹 …… 125
Rhizoma Polygoni Cuspidati 虎杖 …… 340
Rhizoma Polygoni Paleacei 草血竭 …… 387
Rhizoma Polygoni Suffulti 支柱蓼 …… 92
Rhizoma Rodgersiae 岩陀 …… 347
Rhizoma Rodgersiae Aesculifoliae 索骨丹根…… 473
Rhizoma seu Herba Bergeniae 岩白菜… 345
Rhizoma seu Herba Saururi 三白草 …… 22
Rhizoma seu Radix Notopterygii 羌活… 301
Rhizoma Smilacis Glabrae 土茯苓 …… 27
Rhizoma Sparganii 三棱 …… 22
Rhizoma Typhonii 白附子 …… 171
Rhizoma Typhonii Flagelliformis 水半夏…… 96
Rhizoma Valerianae Jatamansi 蜘蛛香… 633
Rhizoma Zedoariae 莪术 …… 462
Rhizoma Zingiberis 干姜 …… 24
Rhizoma Zingiberis Recens 生姜 …… 162

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Rhomotoxinum 八厘麻毒素 …… 9
Rorifonum 蔊菜素 …… 625
Sargassum 海藻 …… 504
Scolopendra 蜈蚣 …… 614
Scorpio 全蝎 …… 234
Semen Abutili 苘麻子 …… 328
Semen Allii Tuberosi 韭菜子 …… 410
Semen Alpiniae Katsumadai 草豆蔻 …… 389
Semen Arecae 槟榔 …… 629
Semen Armeniacae Amarum 苦杏仁 …… 324
Semen Astragali Complanati 沙苑子 …… 302
Semen Benincasae 冬瓜子 …… 184
Semen Biotae 柏子仁 …… 400
Semen Canavaliae 刀豆 …… 17
Semen Capparis 马槟榔 …… 73
Semen Cassiae 决明子 …… 741
Semen Celosiae 青葙子 …… 319
Semen Citri Reticulatae 橘核 …… 659
Semen Cleomis 白花菜子 …… 171
Semen Coicis 薏苡仁 …… 650
Semen Cuscutae 菟丝子 …… 525
Semen Dolichoris Album 白扁豆 …… 178
Semen Entadae 木鳖子 …… 85
Semen Euphorbiae Lathyridis 千金子 … 54
Semen Euryales 芡实 …… 278
Semen Ginkgo 白果 …… 175
Semen Granati 石榴子 …… 147
Semen Herpetospermi 波棱瓜子 …… 374
Semen Hyoscyami 莨菪子 …… 468
Semen Inpatientis 急性子 …… 427
Semen Juglandis 核桃仁 …… 472
Semen Lepidii seu Descurainiae 葶苈子 … 571
Semen Lini 亚麻子 …… 208
Semen Litchi 荔枝核 …… 396
Semen Melo 甜瓜子 …… 545
Semen Momordicae 木鳖子 …… 87
Semen Nelumbinis 莲子 …… 459
Semen Nigellae 黑种草子 …… 596
Semen Oroxyli 木蝴蝶 …… 86
Semen Persicae 桃仁 …… 471
Semen Pharbitidis 牵牛子 …… 408
Semen Phaseoli 赤小豆 …… 267
Semen Plantaginis 车前子 …… 92
Semen Pruni 郁李仁 …… 338
Semen Raphani 莱菔子 …… 458
Semen Ricini 蓖麻子 …… 605
Semen Sesami 黑芝麻 …… 595
Semen Sinapis 芥子 …… 276
Semen Sojae Germinatum 大豆黄卷 …… 31
Semen Sojae Praeparatum 淡豆豉 …… 563
Semen Strychni 马钱子 …… 70
Semen Torreyae 榧子 …… 627
Semen Trichosanthis 瓜蒌子 …… 182
Semen Trigonellae 胡芦巴 …… 393
Semen Vaccariae 王不留 …… 74
Semen Ziziphi Spinosae 酸枣仁 …… 630
Species Chimonanthi Nitentis 山蜡梅茶 … 51
Spica Prunellae 夏枯草 …… 475
Spina Gleditsiae 皂角刺 …… 296
Spora Lygodii 海金沙 …… 502
Squama Manitis 穿山甲 …… 436
Stalactitum 钟乳石 …… 412
Stamen Nelumbinis 莲须 …… 461
Stigma Maydis 玉米须 …… 126
Strobilus Pini 松塔 …… 334
Succinum 琥珀 …… 567
Succus Bambusae 鲜竹沥 …… 635
Sulfur 硫黄 …… 577
Syngnathus 海龙 …… 501
Syrupus Anaphalidis 香青糖浆 …… 418
Syrupus Sedi Aizoon 景天三七糖浆 …… 591
Tabellae Adonisidi 冰凉花甙片 …… 239
Tabellae Agrimopholi 鹤草酚片 …… 647
Tabellae Ajugae 筋骨草片 …… 599
Tabellae Anaphalidis 香青片 …… 417
Tabellae Andrographitis 穿心莲片 …… 438
Tabellae Andrographolidi 穿心莲内酯片 … 440
Tabellae Asteris Ageratoidis 红管药片 … 263
Tabellae Belladonnae 颠茄片 …… 658
Tabellae Berberini Hydrochloridi 盐酸黄连素片 …… 455
Tabellae Boehmeriae 苎麻片 …… 281

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Tabellae Callicarpae Nudiflorae 裸花紫珠片…… 622
Tabellae Clinopodii 断血流片 …… 561
Tabellae Conyzae 金龙胆草片 …… 357
Tabellae Corydalis Decumbentis 夏天无片…… 475
Tabellae Desmodii Styracifolii 石淋通片… 64
Tabellae Digitalis 洋地黄片 …… 433
Tabellae Dioscoreae Cirrhosae 薯蓣片 … 649
Tabellae Ephedrini Hydrochloridi 盐酸麻黄碱片…… 457
Tabellae Eupatorii Lindleyani 野马追片… 536
Tabellae Fibrauretini 黄藤素片 …… 523
Tabellae Firmianae 梧桐片 …… 527
Tabellae Floris Fritillariae 贝母花片…… 101
Tabellae Ganodermatis 灵芝片 …… 306
Tabellae Hemsleyadini 雪胆素片…… 533
Tabellae Ilicis Chinensis 四季青片 …… 161
Tabellae Ilicis Pubescentis 毛冬青片 …… 108
Tabellae Lysionotini 石吊兰素片 …… 142
Tabellae Menispermi 北豆根片 …… 156
Tabellae Neoandrographolidi et Andrographolidi 穿心莲甙酯片 …… 442
Tabellae Patriniae 败酱片 …… 350
Tabellae Physochlainae 华山参片 …… 230
Tabellae Potentillae Fragarioidis 蛇莓委陵菜片…… 466
Tabellae Rhododendri Mariae 紫花杜鹃片…… 583
Tabellae Rhomotoxini 八厘麻毒素片 …… 10
Tabellae Rorifoni 蔊菜素片…… 626
Tabellae Sarcandrae 肿节风片…… 367
Tabellae Schefflerae Kwangsiensis 汉桃叶片…… 194
Tabellae Scophorae Alopecuroidis 苦豆草片…… 326
Tabellae Sedi Sarmentosi 垂盆草片 …… 353
Tabellae Senecionis Scandentis 千里光片…… 53
Tabellae Stauntoniae 野木瓜片 …… 538
Tabellae Swertiae 当药片 …… 219
Tabellae Swertiae Mileensis 青叶胆片… 317
Tabellae Taraxaci 蒲公英片…… 608
Tabellae Trichosanthis 瓜蒌片 …… 184
Tabellae Trollii 金莲花片…… 360
Tabellae Uncariae 钩藤片…… 413
Tabellae Wikstroemiae Indicae 了哥王片…… 17
Talcum 滑石 …… 602
Tetrandrini Dimethiodidum 汉肌松 …… 191
Thallus Laminariae seu Ecklioniae 昆布… 343
Tinctura Belladonnae 颠茄酊 …… 655
Tinctura Polygalae 远志酊 …… 267
Tinctura Zingiberis 姜酊 …… 25
Trona 碱花 …… 631
Unguentum Geranii 老鹳草软膏…… 197
Unguentum Oleoresinae Lupuli 三合素软膏…… 542
Venenum Bufonis 蟾酥…… 668
Zaocys 乌梢蛇 …… 118

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com