

广东科技出版社（全国优秀出版社）

全三册 450种

中草药

野外识别手册

谭树辉 詹若挺 主编





内容： 识别要点
入药部位
性味功效
临床应用

特点： 简明扼要
携带方便
图文对照
快速识别

ISBN 7-5359-3429-3



9 787535 934291

中草药

野外识别手册 (二)



责任编辑 苏北建 封面设计 林少娟 版式设计 余笑文

ISBN 7-5359-3429-3/R·601 定价：23.00 元

中草药野外识别手册

(二)



0301215

主编 谭树辉 詹若挺

广东科技出版社

图书在版编目(CIP)数据

中草药野外识别手册(二)/ 谭树辉, 詹若挺主编. - 广州:
广东科技出版社, 2004.1
ISBN 7-5359-3429-3

I. 4... II. ①谭...②詹... III. 中草药-识别-手册
IV. R282.71

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 090011 号

出版发行: 广东科技出版社

(广州市环市东路水荫路 11 号 邮编: 510075)

E-mail: gdkjzbb@21cn.com http://www.gdstp.com.cn

经 销: 广东新华发行集团

印 刷: 洛德加印刷(番禺)有限公司

(广州市番禺区榄核镇民生工业区 邮编: 511480)

版 次: 2004 年 1 月第 1 版

2004 年 1 月第 1 次印刷

开 本: 889mm × 1 194mm 1/64 印张 5.25 字数 105 千

印 数: 1 ~ 10000 册

定 价: 23.00 元

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

内 容 提 要

本手册以实用可靠、简明扼要、外出携带方便为特色,采取图文对照形式,按植物分类学哈钦松分类系统顺序编排,收集了常见药用植物450种,共分3册。本册收载了双子叶植物150种野外常见的植物药。每种均附有彩色植物写真照片,大部分附有识别特征放大图。文字描述包括了植物名、药名、药用部位(包括来源和原植物拉丁学名)、识别特征、性味功效(包括用量)、应用等,主要识别特征在文字下加线标示。

本手册文字简练、图像清晰、内容丰富、版本袖珍、便于携带,具有很好的实用性和普及性。适合于中医药院校的师生、临床医生、科研人员、药业界专业人士以及广大中草药爱好者在学习、识别中草药时参考使用。

编 委 名 单

主 编:	谭树辉	詹若挺			
副主编:	潘超美	徐焱琛			
编 委:	黄海波	楼步青	文惠玲	姚幼玲	肖省娥
	魏 平	张德培	叶宇辉		
摄 影:	黄海波	徐焱琛			

在编著本书过程中,得到广州致信药业有限公司和广州致信中药饮片有限公司的大力支持,在此表示感谢!

编写说明

1. 本手册共分3册出版。收录的植物药种类均为我国常见药用品种。依据植物学分类系统进行分类。主要内容、一册：蕨类植物、裸子植物、双子叶植物；二册：双子叶植物；三册：双子叶植物、单子叶植物。药用植物的排列顺序以科为单位，按植物学分类系统（哈钦松分类系统）次序编排。科内种的次序按属的拉丁学名第一字母顺序编排。受篇幅限制，藻类植物、菌类植物和苔藓植物暂不收编在本书内。

2. 每种植物药包括文字和彩色照片两部分。每一种药以植物名为正名。文字内容包括：植物中文名、别名、药名、拉丁学名、入药部位、采收时间、形态特征、生境分布、性味功效和应用。每种植物药最多只描述3个常用的别名。形态特征着重描述在野外感官能识别到的特征，重点识别特征用下划线加注。植物形态特征、性味功效及应用等内容的编写主要参考《中华人民共和国药典》、《中药大辞典》、《中国高等植物图鉴》、《广东药用植物手册》、《广东植物志》等。

3. 凡有毒植物药，不论毒性大小，均在性味功效中注明“有毒”二字，无

毒性的植物药则不再标明“无毒”。

4. 性味功效包括性味、功效、用法和用量。用量为成人的一日量。应用时必须根据具体情况灵活掌握，对有毒性的药尤其要慎重。

5. 本书后附有植物名和药名的中文名索引和拉丁学名索引。中文名索引按笔画顺序排列，植物正名以黑体字表示，其余以宋体字表示。

前 言

在我国，植物药在民间用于防病、治病和保健方面已有数千年历史，由于其疗效可靠、副作用小，一直流传至今，并受到世界越来越多的人所关注。

我国地大物博，自然环境复杂，给植物的生长提供了极其有利的条件，因此植物药资源甚为丰富。据资源调查和文献记载，目前，我国有中草药资源达1万多种，其中临床上最常用的有600多种。要想准确鉴定一个植物药的种名，需要细致观察其各个器官的形态特征，其中繁殖器官，即花和果实的特征是分类的主要依据。但在野外，受季节限制，往往只能见到植物的营养器官，不易马上确认。因此，我们根据多年的教学和科研工作以及同行们积累的经验和方法，从观察茎的形状、节间特点、茎上的刺及卷须、叶的独特形状、特殊叶脉、叶片上的腺体和毛等附属物，有无托叶及托叶的形态、叶序、特定的花序特征；或嗅闻气味、观察折断后的乳汁、尝试特有味道；或观察其生长的特定环境等内容入手来编写此套书，以帮助读者快速识别常见药用植物。

参加本手册的编写人员为广州中医药大学从事教学和药用植物研究、中药鉴

定、中药炮制研究的专家学者；以及医院药剂科、药材公司等在岗的管理人员。
由于我们水平和资料有限，书中错漏在所难免。恳请广大读者提出宝贵意见。

谭树辉

2003.9, 于广州

注：谭树辉 广州中医药大学教授、华南药用植物学、中药鉴定学专家，广州市药学会中药鉴定工作部副主任，《广州药讯》杂志编委、广州中医药大学教学基地、广州致信药业有限公司、广州致信中药饮片有限公司质量总监。从事教学与科研工作40多年，成绩卓越，被称为“药用植物与中药材的活字典”。曾参编《中华人民共和国药典》(一部)，全国高等医药院校教材《药用植物学》和《中药鉴定学》，发表学术论文多篇。

目 录

三、双子叶植物

交让木科

牛耳枫(南岭虎皮楠)..... 2

鼠刺科

长圆叶鼠刺(矩形叶鼠刺)..... 4

绣球花科

黄常山(土常山)..... 6

蔷薇科

仙鹤草(龙芽草)..... 8

蛇莓(野杨梅、地莓)..... 10

枇杷..... 12

梅(青梅)..... 14

桃(毛桃、桃子)..... 16

车轮梅(春花木)..... 18

小果蔷薇(小金樱)..... 20

金樱子(刺糖果、糖罐子、大金樱)
..... 22

大叶蛇泡筋(粗叶悬钩子)..... 24

白花悬钩子(泡藤)..... 26

茅莓(三月泡、蛇泡筋)..... 28

七裂叶悬钩子..... 30

蔷薇莓(白花三月泡、空心泡、青
麻泡)..... 32

三花悬钩子..... 34

含羞草科

楸树..... 36

天香藤..... 38

槲藤子(过岗龙、过江龙、眼镜豆)
..... 40

含羞草(知羞草、喝呼草).....	42
猴耳环(围涎树、三不正、洗头树)	
.....	44
亮叶猴耳环(亮叶围涎树、水肿木、火烫木).....	46
苏木科	
龙须藤(九龙藤、燕子尾、乌藤).....	48
南蛇簕(南蛇藤、石莲子、猫爪簕).....	50
华南云实(假老虎簕).....	52
望江南(野扁豆).....	54
草决明(决明).....	56
蝶形花科	
鸡骨草(广州相思子).....	58
土甘草(地栗子、痲子薯、土附儿)	
.....	60
藤黄檀(藤檀).....	62

小槐花(羊带归、山蚂蝗、拿身草)	
.....	64
假花生(异国山绿豆).....	66
广金钱草(金钱草、广东金钱草).....	68
葫芦茶(银板茶).....	70
刺桐(山芙蓉、鸡桐木、海桐)....	
.....	72
鸡眼草(三叶人字草).....	74
截叶铁扫帚.....	76
美丽胡枝子(马扫帚).....	78
山鸡血藤(香花岩豆藤).....	80
大叶千斤拔(千斤红、蔓性千斤拔、一条根).....	82
鸡血藤(昆明鸡血藤、网络崖豆藤)	
.....	84
排钱草(亚婆钱、钱串木).....	86
野葛.....	88

鹿藿(山黑豆、老鼠眼)..... 90

金缕梅科

枫香(枫树)..... 92

榧木(鱼骨柴)..... 94

杨梅科

杨梅(青梅、火梅)..... 96

榆科

狭叶山黄麻..... 98

山黄麻(山角麻、山麻木)..... 100

朴树..... 102

桑科

木菠萝(菠萝蜜、婆那娑、树婆罗)

..... 104

白桂木(将军木、胭脂木、狗卵果)

..... 106

藤构(小构树、葡蟠、谷沙藤)....

..... 108

构树(楮、沙纸树)..... 110

柘树(莨苳、金蝉脱壳)..... 112

无花果..... 114

黄毛榕..... 116

对叶榕(大种牛奶树、牛奶稔)....

..... 118

小叶榕(榕树)..... 120

琴叶榕(倒吊葫芦)..... 122

薜荔(凉粉果、王不留行、馒头果)

..... 124

粗叶榕(五指毛桃)..... 126

桑..... 128

大麻科

苧草(割人藤、拉拉秧)..... 130

荨麻科

苎麻(青麻)..... 132

糯米团..... 134

紫麻(水麻)..... 136

赤车..... 138

透明草 (小叶冷水花、玻璃草)	140
雾水葛 (啜脓膏)	142
冬青科	
岗梅 (梅叶冬青、柃星木)	144
毛冬青 (毛披树、细叶冬青、山熊胆)	146
救必应 (铁冬青、熊胆木、白银香)	148
卫矛科	
南蛇藤 (过山风)	150
疏花卫矛 (土杜仲)	152
桑寄生科	
鞘花 (枫鞘花寄生、杉寄生) ...	154
桑寄生 (广寄生)	156
扁枝槲寄生	158
檀香科	

寄生藤	160
檀香	162
鼠李科	
大叶铁包金 (勾儿茶)	164
铁包金 (老鼠耳)	166
马甲子 (铁篙笆)	168
矩圆叶冻绿 (黄药、苦李根) ...	170
血风藤 (铁牛入石、翼核果) ...	172
胡颓子科	
蔓胡颓子	174
葡萄科	
粤蛇葡萄 (山葡萄)	176
乌敛莓 (五爪龙、五叶藤、地五加)	178
白粉藤 (白薯藤、白面水鸡、假葡萄)	180
三叶崖爬藤 (三叶扁藤、小扁藤、丝线吊金钟)	182

扁担藤 (扁藤、扁茎崖爬藤、过江扁藤)..... 184

网脉葡萄 (大叶山天萝)..... 186

芸香科

降真香 (山油柑、山橘)..... 188

黄皮..... 190

三丫苦 (三叉苦)..... 192

九里香 (千里香、七经通)..... 194

飞龙掌血 (飞龙掌叶、血见飞、上山虎)..... 196

簕欓 (狗花椒、画眉架)..... 198

蚌壳花椒 (大叶花椒、山枇杷)....

..... 200

两面针 (入地金牛、光叶花椒)....

..... 202

竹叶花椒 (竹叶椒、贝椒子、山巴椒)..... 204

楝科

苦楝 (森树)..... 206

无患子科

龙眼 (桂圆、圆眼)..... 208

荔枝..... 210

省沽油科

山香圆 (两指剑、千打槌、五寸刀)

..... 212

漆树科

芒果..... 214

盐肤木 (盐肤木、五倍子树)... 216

野漆树 (漆木、痒漆树、木蜡树),

..... 218

牛栓藤科

红叶楸 (牛栓藤、牛见愁、荔枝藤)

..... 220

商陆科

商陆..... 222

美洲商陆 (垂穗商陆)..... 224

八角枫科

八角枫 (华瓜木、大枫树)..... 226

五加科

刚毛白勒花 (三叶五加、三加皮、刺五加)..... 228

黄毛櫟木 (乌不企)..... 230

长刺櫟木 (刺叶櫟木)..... 232

鸭脚木 (鹅掌柴、鸭母树、伞托树)
..... 234

伞形科

崩大碗 (积雪草、雷公根、铁蓄菜)
..... 236

鸭儿芹 238

刺芫荽 (洋芫荽、假芫荽、野芫荽)
..... 240

天胡荽 (盆上芫荽、满天星).. 242

紫花前胡 (前胡)..... 244

鹅脚板 (异叶茴芹)..... 246

杜鹃花科

杜鹃花 (满山红、映山红)..... 248

柿科

柿 250

紫金牛科

朱砂根 (交脚罗伞、大罗伞、珍珠伞)..... 252

紫金牛 (矮地茶)..... 254

虎舌红 (乳毛紫金牛、红毛毡、老虎脬)..... 256

沿海紫金牛 (小罗伞、腺点紫金牛、血党)..... 258

罗伞树 (五脚紫金牛)..... 260

酸藤果 (信筒子、入地龙、酸藤子)
..... 262

白花酸藤果 (早禾酸)..... 264

鲫鱼胆 (空心花)..... 266

山矾科

华山矾(土常山)..... 268

马钱科

醉鱼草(毒鱼草、公鸡尾)..... 270

断肠草(葫蔓藤、大茶药、钩吻)..... 272

木犀科

山指甲(板子茶、蚊仔树、苦枕)..... 274

扭肚藤(白花茶、青藤、毛毛茶)..... 276

樟叶茉莉(光叶清香)..... 278

桂花(木犀、金桂、银桂)..... 280

夹竹桃科

三叶念珠藤(念珠藤、链珠藤、春根藤)..... 282

长春花(日日新)..... 284

尖山橙(竹藤)..... 286

红花夹竹桃(夹竹桃)..... 288

鸡蛋花..... 290

羊角拗(羊角扭)..... 292

络石..... 294

萝藦科

杠柃回(白叶藤、脱皮藤)..... 296

匙羹藤..... 298

娃儿藤(卵叶娃儿藤、三十六荡)..... 300

中文名索引.....

拉丁学名索引.....

三、双子叶植物



交让木科

牛耳枫 (南岭虎皮楠)

【药名】牛耳枫。

【药用部位】交让木科植物牛耳枫 *Daphniphyllum calycinum* Benth. 的果实、根、枝叶。果实、叶秋季采收；根全年采收。

【识别特征】常绿灌木，高1~5米。单叶互生，上部叶柄渐短；叶片宽椭圆形、长椭圆形或倒卵形，先端钝或近圆形，有时急尖，基部宽楔形或近圆形，全缘，侧脉明显，下面有白色细小乳头状突起。总状花序腋生，雌雄异株；花小，花萼盘状，无花瓣；雄花梗较雌花梗长，花萼3~4片，雄蕊9~10；雌花萼同雄花，子房为不完全2室，花柱极短，柱头2分枝。卵圆形核果成熟时呈蓝黑色，被白粉。花期4~7月；果期6~8月。生于平原、丘陵的疏林下和灌木丛中。分布于江西、广东、广西等地。

【性味功效】苦、平。活血消肿、祛风止痛、清热解毒。治跌打损伤、感冒发热、咽喉肿痛、风湿骨痛、毒蛇咬伤等。煎服10~15克。外用适量，煎洗。孕妇忌服。

【应用】1.根单味煎服，治感冒发热、扁桃体炎。2.鲜叶捣敷或煎洗，治蛇伤或骨折。



鼠刺刺

长圆叶鼠刺（矩形叶鼠刺）

【药名】鼠刺根。

【药用部位】鼠刺科植物长圆叶鼠刺 *Itea chinensis* Hook. et Arn. 的根及花。秋、冬季采收。

【识别特征】常绿灌木或小乔木。幼枝有时有微柔毛。叶互生，薄革质，矩圆形，长7~13厘米，宽3~6厘米，边缘密生小锯齿，两面无毛，侧脉5对；叶柄长1~2厘米。总状花序腋生，长7~11厘米，花序轴和花梗通常有微柔毛；花两性，白色；花萼5裂，裂片狭披针形，长约1毫米；花瓣5，长约2.5毫米；雄蕊5，长于花瓣；子房上位，有白色短柔毛，2室。蒴果狭针形，长7~9毫米，顶端有喙，2瓣裂。花、果期8~10月。生于林下或灌木丛中。分布于安徽南部至四川以南、广东、广西等地。

【性味功效】苦、涩，寒。散瘀活血、祛风止痛。治跌打损伤、咽喉肿痛。煎服15~20克。

【应用】1.民间用根治跌打、骨折等。2.花煎汁，冲黄酒，加砂糖，调服，治虚性咳嗽和喉干。

叶背



绣球花科

黄常山 (土常山)

【药名】常山。

【药用部位】绣球花科植物黄常山 *Dichroa febrifuga* Lour.的根。秋季采收。

【识别特征】落叶灌木，高2米。茎枝圆形，幼时被棕黄色短毛。叶对生；叶片椭圆形、广披针形或长方形倒卵形，先端渐尖，基部楔形，边缘有锯齿，幼时两面疏被棕黄色短毛；具柄。伞房花序，着生于枝顶或上部的叶腋；花浅蓝色；花萼管状，淡蓝色，先端5~6齿，三角形，管外密被棕色短毛；花瓣5~6，蓝色，长圆状披针形或卵形；雄蕊10~12，花丝长短不等，雌蕊1，子房半下位，1室，花柱4。浆果圆形，蓝色。花期6~7月；果期8~9月。生于山野阴湿地方。分布于广东、浙江、福建等地。

【性味功效】苦、辛，寒。有毒。涌吐痰饮、截疟。治疟疾、痰积等。煎服5~10克，或入丸散。久病体弱者忌服。

【应用】1.单味煎服，治蓝氏贾第鞭毛虫病。2.配半夏、柴胡等，治现症疟疾或抗复发。



蔷薇科

仙鹤草 (龙茅草)

【药名】仙鹤草。

【药用部位】蔷薇科植物仙鹤草 *Agrimonia pilosa* Ledeb. 的全草或芽。全草夏、秋季采收。芽冬、春季新株萌发前采收。

【识别特征】多年生草本。根茎短，基部常有1个或数个地下芽。茎被疏柔毛。奇数羽状复叶互生；托叶镰形，先端急尖或渐尖，边缘有锐锯齿或裂片；小叶有大小2种，相间生于叶轴上，较大的小叶3~4对，稀2对，向上减少至3小叶，小叶几无柄，倒卵状披针形，先端急尖至圆钝，基部楔形，边缘有急尖到圆钝锯齿，被疏柔毛，脉上伏生疏柔毛，有显著腺点。总状花序单一或2~3个生于茎顶，苞片通常3深裂，花萼5，花瓣5，雄蕊5~15。瘦果倒卵圆锥形，顶端有数层钩刺。花、果期5~12月。生于荒野山坡及路旁。分布遍及全国。

【性味功效】苦、涩，平。收敛止血、补虚止痢、解毒疗疮、消积杀虫。治各种出血症、小儿疳积、疟疾等。煎服10~15克。

【应用】1. 单味煎服，治各种病因引起的出血症。2. 配藕节、侧柏叶、大蓟等，治血热出血症。3. 配火炭母、番石榴叶、金花草等，治痢疾。



蔷薇科

蛇莓（野杨梅、地莓）

【药名】蛇莓。

【药用部位】蔷薇科植物蛇莓 *Duchesnea indica* (Andr.) Focke 的全草。夏、秋季采收。

【识别特征】多年生草本。长匍匐茎，全株被白色绢毛。3出复叶基生或互生，有长柄；基部有2枚广披针形托叶，与叶柄分离；小叶通常3，菱状卵形，膜质，先端钝，基部宽楔形，边缘具钝圆齿牙，上面近秃净，下面被疏长毛。花单生于叶腋，花柄甚长；花萼两轮；花瓣5，黄色，倒卵形；雄蕊多数。瘦果小，多数，扁圆形，生于花托上聚合成卵状球形的聚合果，红色。花期4月，果期5月，生于路旁较潮湿肥沃之地，分布于我国东部至西南部各地。

【性味功效】甘、苦、寒。有小毒。清热解毒、凉血消肿、化痰止咳。治血热出血症、痈疮肿毒等。煎服10~15克（鲜品30~60克）外用适量，捣敷或捣汁涂。

【应用】1.单味鲜品煎服，治血热吐血、咯血及白喉等。2.鲜品配蒲公英捣汁调黄酒服，治热毒痈肿疔疮初起未成脓者。3.配青天葵、玄参、水牛角等，治温热病入营血之高热烦躁、急惊抽搐。



蔷薇科

枇杷

【药名】枇杷叶。

【药用部位】蔷薇科植物枇杷 *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl. 的叶。全年采收。

【识别特征】常绿乔木。小枝密生锈色茸毛。叶互生，革质；叶片长倒卵圆形至长椭圆形，先端尖，边缘上有疏锯齿，基部楔形，表面多皱，下面及叶柄密被锈色茸毛。圆锥花序顶生，具淡黄色茸毛，花芳香；萼片5；花瓣5，白色；雄蕊20；子房下位，常5室，花柱5，离生。梨果卵形、扁圆形或长圆形，果皮橙黄色，果肉甜；种子棕褐色，有光泽。花期9~10月，果期次年4~5月。全国各地有栽培。

【性味功效】苦，微寒。祛痰止咳、和胃降逆。治肺热咳嗽、风热咳嗽、胃热口渴等。煎服10~12克（鲜品15~30克）。止咳宜炙用，止呕宜生用。

【应用】1. 鲜叶煎服，治蛲虫病。2. 配桑白皮、杏仁、甘草等，治肺热咳嗽。3. 配竹茹、芦根等，治胃热口渴、呕叶。



蔷薇科

梅 (青梅)

【药名】乌梅。

【药用部位】蔷薇科植物梅 *Prunus mume* Sieb. et Zucc. 的近成熟果实。5~6月果实黄色时采收。

【识别特征】落叶乔木。多分枝。单叶互生，有叶柄，叶基有腺体；嫩枝叶柄基部有线形托叶2；叶片卵形至长圆状卵形，先端长尾尖，基部阔楔形，边缘具细锐锯齿，沿脉背呈褐黄色。花单生或2朵簇生，白色或粉红色，芳香，通常先叶开放，有短梗，苞片鳞片状，萼筒钟状，裂片5，基部与花托合生；花瓣单瓣或重瓣，通常5，阔倒卵形；雄蕊多数，生于花托边缘；雌蕊1。核果球形，绿色，熟时黄色，核硬，有槽纹。花期1~2月，果期5月。全国各地有栽培。

【性味功效】酸、涩，平。敛肺止咳、涩肠止泻、安蛔止痛、生津止渴。治肺虚久咳、脾虚久痢、久泻、虚热消渴、蛔虫病等。煎服10~30克。外用适量。止泻止血宜炒炭用。

【应用】1. 单味浓煎顿服或分2次服，治病毒性肝炎。2. 配人参、麦冬、天花粉等，治虚热消渴。3. 配干姜、细辛、花椒等，治蛔虫引起的腹痛、呕吐。



蔷薇科

桃(毛桃、桃子)

【药名】桃仁。

【药用部位】蔷薇科植物桃 *Prunus persica* (L.) Batsch 的成熟种子。果实成熟后采收。

【识别特征】落叶乔木。树皮暗褐色，粗糙。具线状托叶1对，宿存；叶互生；叶柄具腺体；叶片椭圆状披针形或倒卵状披针形，先端渐尖，基部阔楔形，边缘具细锯齿。花单生，先叶开放；花梗极短；萼片5，外面密被白色短柔毛；花瓣5，基部具短爪，粉红色或白色；雄蕊多数；子房1室，胚珠2个，通常只有一个发育。核果近球形或卵形，密被短毛。花期4月，果期7~9月。

全国各地均有栽培。

【性味功效】苦、甘，平。有小毒。活血祛瘀、润肠通便、止咳平喘。治血瘀经痛、腹痛、肠痈、跌打肿痛、肠燥便秘、气逆咳喘等。煎服6~10克，宜捣碎入煎。

【应用】1. 提取液治血吸虫病性肝硬化 2. 配茜草、益母草、牛膝等，治血瘀经闭、痛经。3. 配柏子仁、何首乌，治阴虚血少之肠燥便秘。



蔷薇科

车轮梅（春花木）

【药名】春花木、车轮梅

【药用部位】蔷薇科植物车轮梅 *Rhaphiolepis indica* (L.) Lindl. 的枝叶或根。全年采收。

【识别特征】直立灌木，近秃净，高 1~4 米。单叶互生，革质；叶片卵形至矩圆形或披针形，先端短渐尖或略钝，基部渐狭成短柄，两面均秃净而上面光亮，边缘有小锯齿，叶背具有清晰的网状叶脉（似车轮状）；托叶锥尖，脱落。花白色而染粉红，顶生、稍稠密的伞房花序或圆锥花序；花瓣 5，约与萼片等长；雄蕊 15~20；子房下位，2 室。果球形，大小不等，顶冠以萼枝的基部而成一环。花期春、夏季，果期 10~11 月。生于山坡、路旁、疏林缘，分布于我国南部各地。

【性味功效】微苦、涩，寒。活血祛瘀、清热解毒。治跌打损伤、血瘀阻滞之关节疼痛，疮疡红肿等。煎服 6~10 克；或浸酒服。外用适量，煎洗。

【应用】鲜根适量煎洗，治跌打之红肿热痛。



蔷薇科

小果蔷薇（小金樱）

【药名】小金樱、小果蔷薇。

【药用部位】蔷薇科小果蔷薇 *Rosa cymosa* Tratt. 的根及嫩叶。10~11月采收。

【识别特征】落叶蔓生灌木。小枝纤细，具弯生皮刺。单数羽状复叶互生；小叶3~7，椭圆形或卵状披针形，先端渐尖或钝，基部楔形或圆形，边缘具锯齿，两面光滑；叶柄细；托叶尖形，与叶柄离生，早落。花白色，常数朵集生枝顶，形成伞房花序；萼片5，背面生刺状毛；花瓣5，卵形，与萼片互生；雄蕊多数，外侧花丝长，内侧花丝短，药黄色；雌蕊多数，子房上位，花柱突出萼筒，具短柔毛。蔷薇果小，圆球形，成熟时红色。花期4~5月；果期6~7月。生于灌木丛中。分布于我国华东、华南、西南各地。

【性味功效】苦、平。散瘀止血、解毒消肿、活血祛瘀。治血瘀出血、外伤出血、血滞月经不调、跌打损伤等。煎服15~30克，或浸酒服。外用适量，捣敷。

【应用】1. 根皮制粉外用，治四肢浅表裂伤等。2. 配岗梅、龙船花、青皮等，治血滞月经不调。3. 配穿破石、大罗伞、排钱草根，治跌打损伤。

历代中医书籍大全分享

你好，我是**逢原**，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com

二、加我 QQ/微信：**2049346637**

三、关注微信公众平台——逢原中医，经常有中医文章更新。

四、关注我的空间：<http://user.qzone.qq.com/2049346637>

不管哪种方式，看到你的信息我会第一时间回复，尽全力帮您！

加微信可以扫描以下二维码加我！



私人微信号：2049346637



公众平台：逢原中医





金樱子（刺糖果、糖罐子、大金樱）

【药名】金樱子。

【药用部位】蔷薇科金樱子 *Rosa laevigata* Michx. 的成熟果实。秋季采收。

【识别特征】常绿攀缘灌木。茎红褐色，有倒钩状皮刺和刺毛。单数羽状复叶互生，小叶多为3，有时5；叶柄有棕色腺点及细刺；托叶条状披针形与叶柄分离，早落；叶片椭圆状卵形，革质，先端渐尖，基部阔楔形，边缘有锐尖锯齿，叶柄和叶轴具小皮刺和刺毛。花单生于侧枝顶端；萼片先端有时扩大呈叶状，被腺毛；花冠白色，芳香；花瓣5；雄蕊多数。蔷薇果黄红色，长倒卵形，外被刺毛，冠具宿萼。花期5月，果期9~10月。生于向阳的山坡上，分布于我国华中、华东、华南各地。

【性味功效】酸、涩，平。固精缩尿、涩肠止泻。治肾虚遗精、遗尿、带下、子宫脱垂及脾虚肠滑之久泻、久痢。煎服6~18克。

【应用】1. 单味120克煎服，治子宫下垂。2. 配芡实、莲子等，治肾虚遗精、遗尿、带下等。3. 配党参、白术、芡实，治脾虚肠滑之久泻。



蔷薇科

大叶蛇泡筋（粗叶悬钩子）

【药名】大叶蛇泡筋、粗叶悬钩子

【药用部位】蔷薇科大叶蛇泡筋 *Rubus alceaefolius* Poir.的根。全年采收。

【识别特征】藤状灌木。枝、叶柄和花序柄均有小钩刺并密生黄色茸毛。单叶互生；托叶大，早落；叶片心状卵形或心状圆形，大小极不等，不整齐3~7浅裂，裂片通常圆钝或急尖，边缘有细浅圆齿，上面有粗毛和囊泡状小凸起或平坦，下面密生灰色或浅黄色长柔毛，3~5出掌状叶脉，锈色。圆锥花序或总状花序顶生及腋生；苞片较大，叶状；萼被毛，花瓣宽圆、白色；雄蕊多数；心皮着生于膨大凸起的花托上。聚合果浆果状球形，红色，上有多数肉质小核果。花期秋季。生于路旁、灌木丛中。分布于广东、广西、江西等地。

【性味功效】甘、淡，微凉。活血祛瘀、清热利湿。治风湿骨痛、跌打损伤、乳痈、湿热黄疸、泻痢、口舌生疮等。煎服15~30克，外用适量，研末调敷。

【应用】1. 单味煎服，治嗜盐菌食物中毒。2. 单味研末调敷，治乳腺炎。



泡藤

白花悬钩子（泡藤）

【药名】白花悬钩子。

【药用部位】蔷薇科植物白花悬钩子 *Rubus leucanthus* Hance. 的根 全年采收

【识别特征】攀缘灌木。小枝无毛，有钩状皮刺。羽状复叶，小叶3，上部的叶常为单叶，卵形或椭圆形，稀矩圆状卵形，顶端小叶片较大，先端渐尖，基部近圆形，边缘有尖锯齿；叶柄长，叶柄、叶轴散生小皮刺；托叶锥形。花2~5朵成伞房花序，有时单生；花白色，直径1~1.5厘米；萼裂片卵形，锐尖或有短尖头，边缘有茸毛。聚合果近球形，红色。花、果期8~11月。生于低海拔疏林中，分布于广东、广西等地。

【性味功效】苦，平。治腹泻、痢疾。煎服15~20克

【应用】单味煎服，治腹泻、赤痢。



蔷薇科

茅莓 (三月泡、蛇泡藕)

【药名】三月泡、茅莓。

【药用部位】蔷薇科植物茅莓 *Rubus parvifolius* L. 的全草。夏、秋季采收。

【识别特征】落叶小灌木。枝条呈拱形弯曲，具短柔毛和倒生皮刺。单数羽状复叶互生，小叶通常3，有时5；顶生小叶菱状卵形至阔倒卵形，侧生小叶常为宽倒卵形，较小，先端钝，基部楔形；上面和下面均被柔毛，但下面较上面密；托叶针状。花数朵成伞房花序或短总状花序，萼片5，具茸毛，绿色；花瓣5，直立，阔倒卵形，紫色或粉红色；雄蕊、雌蕊均多数，花柱宿存。聚合果球形，红色。花期5~6月，果期7~8月。生于疏林下较潮湿肥沃的地方。分布于我国北部、东部、中部至西南部各地。

【性味功效】苦、涩，微寒。泻火解毒、清热利湿、活血消肿、祛风止痒。治高热不退、热毒咽喉肿痛、痈肿疮疖、跌打损伤肿痛、湿热痹痛等。煎服15~30克。

【应用】1. 鲜根或全草120克切碎，加酒或醋120克、水适量煎服，治泌尿系结石。2. 配崩大碗、倒扣草等，治温病气分实热之高热不退。3. 配车前草、溪黄草、田基黄等，治湿热黄疸。



七裂叶悬钩子

【药名】七裂叶悬钩子、七爪风、七指风。

【药用部位】蔷薇科七裂叶悬钩子 *Rubus reflexus* Ker. var. *lanceoloba* Metc. 的根 秋季采收。

【识别特征】落叶灌木。枝、叶上面脉上和下面、叶柄、托叶、花序密生锈色茸毛，皮刺散生。单叶互生，宽卵形，先端钝圆或锐尖，基部近心形，边缘5~7浅裂，有不规则锯齿，基出5脉，上面脉上有柔毛，下面有灰色茸毛，中脉及叶柄常有小钩刺；叶柄长；托叶线形，贴生于叶柄上。花单生或数朵生于小枝上，白色，直径约3厘米；萼片5，外面有毛；花瓣5，长圆形；雄蕊多数，分离，聚合果熟时鲜红色，多汁。花期5~6月，果期7~8月。生于向阳山坡、溪边、灌丛中。分布于我国华南、华东各地。

【性味功效】淡、甘，平。凉血清热、解毒止痛。治驳骨、痢疾、腹痛、发热头痛。煎服15~25克。

【应用】单味煎服，治风湿痛。



蔷薇科

蔷薇莓 (白花三月泡、空心泡、青麻泡)

【药名】蔷薇莓、空心泡。

【药用部位】蔷薇科植物蔷薇莓 *Rubus rosaeifolius* Smith. 的根。夏、秋季采收。

【识别特征】灌木，高2~3米。茎直立或倾斜，具扁平皮刺，嫩枝密被白茸毛。单数羽状复叶，互生；小叶3~9，矩圆状披针形或披针形，先端短尖，基部平截或圆形，边缘有重锯齿，两面疏生茸毛，具黄色腺点；总叶柄长4~12厘米；小托叶2，线状至披针形。花1~2单生，或为短总状花序；萼片5裂，被短柔毛，外面具腺毛；花瓣5，白色。聚合果球形或卵形，成熟后红色。花期4~5月，果期7~8月。生于山坡林中。分布于福建、广东、广西等地。

【性味功效】甘、苦、涩，凉。祛风止痛、收敛止汗、固带涩精。治筋骨疼痛、盗汗、白带增多、遗精、滑精等。煎服15~30克。

【应用】单味煎服，治小腿抽筋、虚火牙痛。



三花悬钩子

三花悬钩子

【药名】三花悬钩子。

【药用部位】蔷薇科植物三花悬钩子 *Rubus trianthus* Focke.的全株。全年采收。

【识别特征】落叶灌木。茎细瘦，小枝无毛，常有白粉，具散生向上弯曲的皮刺。单叶，纸质，卵状披针形或卵形，有时3浅裂，顶端裂片卵状披针形，先端渐尖至尾尖，基部浅心形稀截形，边缘有缺刻状锯齿，无毛，下面苍绿色或带白色；叶柄长，散生下弯皮刺；托叶条形，全缘。花常3朵，白色，直径1~2厘米；萼裂片三角形，先端尾状渐尖，外面无毛，内面有白色茸毛。聚合果球形，红色。花、果期8~11月。生于山坡林中。分布于广东、安徽、浙江等地。

【性味功效】苦，寒。活血散瘀、止血。治吐血、痔疮出血、跌打。煎服15~25克。外用适量、煎洗。

【应用】煎水热敷，治跌打损伤等。



合羞草科

楤树

【药名】楤树。

【药用部位】含羞草亚科植物楤树 *Albizia chinensis* (Osbeck) Merr.的树皮。秋、冬季采收。

【识别特征】落叶乔木。2回羽状复叶，羽片6~18对；小叶20~40对，狭矩圆形，长6~8毫米，宽约2毫米，先端急尖，基部近截形，背面粉绿而疏生毛；托叶膜质，半心形，长2.5厘米，早落。头状花序3~6个，呈圆锥状排列，顶生或腋生，总花梗密生茸毛；花黄绿色，连雄蕊长12~25毫米；雄蕊绿白色。荚果条形，扁平，长7~15厘米，宽约2厘米。花、果期3~8月。各地有栽培。分布于福建、湖南、广西、广东等地。

【性味功效】淡、涩。固涩止泻、收敛生肌。治肠炎、疮疡溃烂久不收口、外伤出血等。煎服10~15克。

【应用】1. 根茎单味煎服，治肺结核。2. 鲜根炖鸡或鸭，治结核性脓胸、风湿性关节炎。



含羞草科

天香藤

【药名】天香藤。

【药用部位】含羞草科植物天香藤 *Albizzia corniculata* (Lour.) Druce 的心材。全年采收。

【识别特征】藤本。在叶柄下部通常有一个粗短刺。2回羽状复叶；叶柄基部具1枚压扁的腺体；羽片3~6对；小叶4~10对，矩圆形或倒卵形，先端圆或浅凹，具小短尖，基部偏斜，中脉以下为圆形，以上为阔楔形，两面无毛或疏生短柔毛。花6~12朵聚成头状花序；花序多个，呈圆锥状排列；总花梗无毛；花无梗；萼小，长不及1毫米，花冠白色，连雄蕊长约18毫米。荚果扁平、条形，棕色，具种子7~11个。生于水边或潮湿处。分布于广东、广西等地。

【性味功效】甘、平。民间作降香用。行气散瘀、止血。煎服25~50克，或研末服。

【应用】单味煎服，治跌打损伤、创伤出血等。



含羞草科

榼藤子（过岗龙、过江龙、眼镜豆）

【药名】榼藤子。

【药用部位】含羞草科植物榼藤子 *Entada phaseoloides* (Linn.) Merr. 的藤及种子。果实 8~9 月采收。

【识别特征】木质大藤本。2 回羽状复叶，长 10~25 厘米，通常有羽片 2 对，顶生一对羽片变为卷须；小叶 2~4 对，长椭圆形，偏斜，先端钝、微凹，基部楔形，无毛。穗状花序单生或排列成圆锥状，长 12~25 厘米，花序轴密生黄色茸毛；花淡黄色，有香味，花萼阔钟状，萼齿 5；花瓣 5，基部稍连合。荚果木质，长达 1 米，宽 8~12 厘米，弯曲，由多数的节组成，成熟时逐节脱落，每节内有 1 粒种子，种子近圆形，直径 4~6 厘米，扁平。花期 5~7 月，果期 8~9 月。生于林中。分布于福建、台湾、广东等地。

【性味功效】甘、涩、微苦。活血祛风、壮腰固肾。煎服 10~15 克。外用适量，煎洗或捣敷。种子有毒。

【应用】单味煎水热敷，治风湿痹痛、腰肌劳损、跌打、皮肤湿疹等。



含羞草科

含羞草 (知羞草、喝呼草)

【药名】含羞草。

【药用部位】含羞草科植物含羞草 *Mimosa pudica* L.的全草。夏、秋季采收。

【识别特征】直立或蔓生或攀缘半灌木。有散生利刺及多数倒生刺毛。羽片通常4，掌状排列；小叶多数，触之即闭合而下垂，矩圆形，先端短尖，有散生刺毛，无柄。头状花序具长柄，生于叶腋，花淡红色，极多；萼钟形，短齿裂；花冠下部合生，上部4裂，三角形；雄蕊4，花丝长；子房有短柄，花柱丝状，柱头顶生。荚果扁平，稍外弯。花期8月。生于山坡丛林中、路旁、潮湿湿地等。分布于我国华东、华南、西南等地。

【性味功效】甘、寒、镇静安神、清肝消积、清热利湿、解毒消肿。治失眠多梦、肝热之目赤肿痛、羞明流泪、湿热呕吐、泄泻、热毒疮痈等。煎服10~15克。有小毒，有一定的麻醉作用，故内服用量不宜过大。孕妇忌服。

【应用】1. 单味煎服，治神经衰弱、失眠。2. 鲜叶捣敷，治带状疱疹。3. 鲜根煎服，治慢性支气管炎。



含羞草科

猴耳环（围涎树、三不正、洗头树）

【药名】猴耳环、三角青。

【药用部位】含羞草科植物猴耳环 *Pithecellobium clypearia* Benth. 的树皮。秋季采收。

【识别特征】乔木，小枝有明显的棱角，疏生黄色细小短茸毛。2回羽状复叶，羽片4~6对；叶柄中部以下具1个腺体；在叶轴上每对羽片间具1个腺体；小叶轴上面通常在3~5对小叶间具1个腺体；小叶6~16对，对生，近不等的四边形，先端急尖或渐尖，基部近截形，偏斜。头状花序排列成圆锥状或聚伞状，腋生或顶生；花具柄；白色或淡黄色；花萼与花瓣有柔毛。荚果条形，旋卷呈环状，外缘呈波状。种子8~9个，椭圆形，长约1厘米，种柄丝状。花期4~6月。果期7~9月。生于森林中、山坡平坦处及路旁。分布于我国华南及浙江、福建等地。

【性味功效】苦、涩，凉。清热解毒、祛湿敛疮。治疮痈、疮疖。煎服10~20克。外用适量，煎洗。

【应用】1. 单味煎服，治疮痈疖肿。2. 鲜树皮煎洗，治烫伤、烂脚。





亮叶猴耳环（亮叶围涎树、水肿木、火烫木）

【药名】亮叶猴耳环

【药用部位】含羞草科植物亮叶猴耳环 *Pithecellobium lucidum* Benth. 的枝叶 全年采收。

【识别特征】灌木或小乔木。幼枝、叶柄、花序均被褐色短茸毛。2回羽状复叶，羽片2~4个；在叶柄近基部、叶轴上每对羽片之间及在小叶轴上每对小叶之间各有腺体1个；小叶4~10，互生，近不等四边形的、椭圆形或倒披针形，先端急尖或渐尖，基部楔形，头状花序排列成圆锥状，腋生或顶生；花无柄；苞片倒卵形或卵形，急尖或渐尖；萼钟状，有短齿牙；花冠白色，裂片5，矩匙形，急尖；雄蕊约全长的1/3处合生，子房无柄，无毛。荚果带形，弯曲为圆圈，种子间狭窄，无毛，种子黑色。花期4~6月，果期7~9月。生于林中、灌木丛、山坡、路旁等。分布于浙江、福建、广东等。

【性味功效】寒、凉。凉血、消肿，治烫伤、风湿痛、跌打。煎服10~20克。外用适量，煎洗。

【应用】单味煎洗，治风湿痛、水火烫伤。



苏木科

龙须藤（九龙藤、燕子尾、乌藤）

【药名】龙须藤。

【药用部位】苏木科植物龙须藤 *Bauhinia championi* Benth. 的根和老藤。全年采收。

【识别特征】常绿攀缘木质藤本。幼枝浅黄色，密布锈黄色皮孔，嫩枝、花序、叶背均被短茸毛。单叶互生；叶片卵圆形、矩圆形或心脏形，半革质，前端分裂，或凹头，全缘。总状花序，顶生或腋生；萼筒5裂，长三角状，表面具短茸毛；花瓣5，白色，离生；雄蕊10，雌蕊1。荚果表面有细网状纹，熟时开裂；种子黑色，扁圆形。花期9~10月，果期翌年1~2月。生于混交林或阔叶林中。分布于广东、广西、福建等地。

【性味功效】甘、辛，平。祛风除湿、散瘀止痛、续筋接骨。治风湿骨痛、跌打损伤、骨折等。煎服10~15克（鲜品30~60克）。

【应用】1. 根单味煎服，治关节风痛、小儿疳积、心胃气痛。2. 老藤配两面针，治胃、十二指肠溃疡。





苏木科

南蛇 筋 (南蛇藤、石莲子、猫爪筋)

【药名】南蛇筋。

【药用部位】苏木科植物南蛇筋 *Caesalpinia minax* Hance 根及种子。根秋、冬季采收。种子8~9月采收。

【识别特征】有刺藤本。全株被短柔毛。2回双数羽状复叶，羽片5~8对，托叶锥状；小叶12~24枚，近无柄，矩形或倒卵形，先端急尖成细尖，基部圆形，全缘。圆锥花序顶生，花序轴有刺，被柔毛；苞片大，椭圆形、倒披针形，两面有茸毛；花萼管阔倒卵形，裂片5，花瓣5，红紫色，倒卵形，雄蕊10，不等长，花丝分离，子房密生细刺。荚果椭圆状矩形，密被棕色针状刺，先端圆形而有尖喙，内有种子4~8粒。花期3~4月，果期5~9月。生于山沟中空旷的溪旁、路边或灌木丛中。分布于广西、四川、广东等地。

【性味功效】种子：苦，寒。散瘀止痛、清热去湿。煎服6~9克。外用适量，煎洗或捣敷。根：苦，寒。清热、解毒、散瘀。煎服9~12克。外用适量，捣敷。

【应用】1. 种子煎服或捣敷，治哮喘、痢疾、淋浊、尿血、跌打损伤等。2. 根煎服或捣敷，治外感发热、风湿骨痛、疮肿、跌打损伤等。



苏木科

华南云实（假老虎筋）

【药名】华南云实。

【药用部位】苏木科植物华南云实 *Caesalpinia nuga* Ait. 的根。全年采收。

【识别特征】藤本。枝有倒钩刺；小枝被红棕色茸毛。2回羽状复叶具羽片4~10枚；小叶4~8，长椭圆形，革质，长3~12厘米，宽1.5~6.5厘米，先端钝或微缺，基部近楔形，无毛。圆锥花序顶生或腋生，有许多花；花梗细瘦，长11~13毫米；花萼长约10毫米，萼管阔倒圆锥形，萼齿5；花瓣5，黄色；雄蕊10，子房有短柄，无毛。荚果阔矩圆形，偏斜，顶端急尖，棕黑色，革质，先端有喙，有1粒种子，花、果期5~9月。生于山坡、林中、路旁或潮湿处。分布于台湾、湖北、广东、广西等地。

【性味功效】苦、寒。消肿、止痛、利尿。煎服9~12克。种子有止咳功效。

【应用】根单味煎服，治跌打筋骨痛。



苏木科

望江南 (野扁豆)

【药名】望江南、假决明。

【药用部位】苏木科植物望江南 *Cassia occidentalis* L. 的茎和叶。夏季采收。

【识别特征】一年生半灌木状草本或多年生小灌木。茎直立，基部木质化。偶数羽状复叶互生；叶柄基部有大腺体1个；托叶早落；小叶片卵形或椭圆状披针形，先端渐尖，基部浑圆，全缘，仅边缘被细毛。伞房状总状花序顶生或腋生；花萼5裂；花瓣5，倒卵形，黄色；雄蕊10；子房线形而扁。荚果呈略扁的圆柱形，形似羊角，黄棕色；种子多数，稍扁卵形。花期8~9月，果期10月。生于平缓旷野、村边或丘陵的疏林中。分布于我国东南部和西南部各地。

【性味功效】苦、涩，寒。清热解毒、平肝和胃、止咳平喘。治肺热咳嗽、哮喘、目赤肿痛、痢疾、腹痛及蛇虫咬伤、疮疮肿毒等。煎服6~9克。外用适量，捣敷。根有毒，误食会引起腹泻、呕吐。

【应用】1. 单味捣敷，治蛇伤、肿毒。2. 鲜叶煎服，治一般外科炎症如乳腺炎、蜂窝织炎、毛囊炎等。



苏木科

草决明 (决明)

【药名】草决明、决明了。

【药用部位】苏木科植物草决明 *Cassia tora* L. 的成熟种子和全草。秋末采收。

【识别特征】一年生半灌木状草本。叶互生，羽状复叶，叶柄无腺体，在叶轴上两小叶间有1个棒状腺体；小叶3对，膜质；托叶线形，被柔毛，早落；叶片倒卵形或倒卵状长椭圆形，先端圆钝而有小尖头，基部渐狭，偏斜，上面被稀疏柔毛，下面被柔毛。花通常2朵生于叶腋；萼片5，花黄色，花瓣5，雄蕊10，能育雄蕊7；子房线状，无柄。果纤细，近扁，呈弓形弯曲；种子多数，菱形，灰绿色，有光泽。花期6~8月，果期9~10月。生于山坡、河边、村旁。分布于我国长江以南各地。

【性味功效】苦、甘，微寒。清肝明目、平肝潜阳、润肠通便。治肝火上攻目赤肿痛、羞明多泪、夜盲症、热结便秘、肠燥便秘等。煎服10~15克。外用适量，研末调敷。

【应用】1. 煎水代茶饮，治高血压。2. 配菊花、蔓荆子、木贼，治急性结膜炎。3. 全草配甘草，治流感、感冒。



蝶形花科

鸡骨草 (广州相思子)

【药名】鸡骨草。

【药用部位】蝶形花科植物鸡骨草 *Abrus cantoniensis* Hance 的全草。全年采收。

【识别特征】木质藤本，常披散在地上或缠绕于其他植物上。主根粗壮。茎细，深红紫色，幼嫩部分密被黄褐色毛。双数羽状复叶；小叶7~12对，倒卵状矩圆形，先端截形而有小锐尖，基部浅心形，膜质，上面疏生粗毛，下面被紧贴的粗毛。总状花序腋生，萼钟状；花冠突出，淡紫红色；雄蕊9，合生呈管状，与旗瓣贴连，上部分离；花柱短。荚果矩圆形，扁平，疏生淡黄色毛，先端有尾状凸尖。花期春、夏季，生于山坡草丛中或小灌木林中。分布于广东、广西等地。

【性味功效】甘、凉。清热解毒、舒肝散瘀。治湿热黄疸、乳痈、瘰癧、胃痛、跌打伤瘀血疼痛等。煎服9~15克。外用适量，捣敷。种子有毒，不能入药。

【应用】1. 单味煎服，治急性传染性肝炎。2. 配红枣煎服，治黄疸。



蝶形花科

土甘草 (地栗子、痲子薯、土圪儿)

【药名】土甘草。

【药用部位】蝶形花科植物土甘草 *Apios fortunei* Maxim. 的块根。秋后采收。

【识别特征】缠绕草本，有球状块根。茎有稀疏白色短柔毛。羽状复叶；小叶3~7，卵形或宽披针形，长3~7厘米，宽1.5~4厘米，先端急尖，有短尖头，基部圆形；小叶柄有时有疏毛；托叶及小托叶早落。总状花序腋生，苞片及小苞片条形，有白色短毛；萼为二唇形，无毛；花冠绿白色，旗瓣圆形，雄蕊(9+1)2体；荚果条形，长约8厘米，有短柔毛。生于旷野草地或灌木丛中。分布于四川、贵州、广东等地。

【性味功效】甘、微苦，平。清热解毒、理气散结。治感冒咳嗽、百日咳、咽喉肿痛、疝气、痈肿、瘰癧等。煎服9~15克。外用适量，捣敷或磨汁涂。

【应用】1. 单味磨水服，治急性咽喉肿痛。2. 配小茴香，治疝气。3. 配海带、海藻、玄参，治瘰癧。



藤黃檀

藤黄檀（藤檀）

【药名】藤黄檀。

【药用部位】蝶形花科植物藤黄檀 *Dalbergia hancei* Benth. 的茎或根。夏、秋季采收。

【识别特征】灌木状藤本，或攀缘于大树上。小枝呈钩状或螺旋状。单数羽状复叶，小叶9~13，长圆形或长椭圆形，长15~19毫米，宽6~9毫米，先端钝而微凹，基部楔形或圆形，下面有伏贴柔毛。圆锥花序腋生，总花梗及花梗密被短柔毛；花小黄白色，芳香；小苞片卵形，副萼状小苞片披针形，均被锈色柔毛，脱落；萼钟状，萼齿5，花瓣有长爪，旗瓣圆形；雄蕊单体或2体；子房具柄，被短柔毛。荚果矩圆形，扁平。种子肾形，扁平。花期3~4月，果期7~9月。生于林缘及灌木丛中。分布于安徽、浙江、江西、广东等地。

【性味功效】辛、涩、温。根：强筋活络。茎：理气止痛、止血、破积。用量9~12克。

【应用】1. 根单味煎服，治风湿关节痛等。2. 茎单味煎服，治胸胁痛，胃痛、腹痛、腰痛、腰腿关节痛。



蝶形花科

小槐花 (羊带归、山蚂蝗、拿身草)


【药名】小槐花。

【药用部位】蝶形花科植物小槐花 *Desmodium caudatum* (Thunb.) DC. 的全草。9~10月采收。

【识别特征】灌木，3出复叶，顶生小叶披针形或阔披针形，侧生小叶较小，顶部渐狭呈急尖或短渐尖，基部楔形，两面被毛；叶柄扁；托叶披针状线形；总状花序腋生；花绿白色；花萼钟状，萼齿二唇形，上面2齿儿连合，下面3齿披针形；花冠蝶形，旗瓣椭圆形，龙骨瓣有爪；雄蕊10，2体；雌蕊1，子房在缝线处密被绢状毛。荚果稍弯，被短毛，荚节4~6，矩形。花期7~9月，果期8~10月。生于山坡旱坡、村旁、路旁较肥沃之地。分布于安徽、浙江、江西、广东等地。

【性味功效】苦、甘，凉。清热解毒、利湿消食、止咳散瘀。治咳嗽吐血、水肿、小儿疳积、痈疮溃瘍、跌打损伤等。煎服9~15克（鲜品15~30克）外用适量，煎洗、捣敷或研末撒。

【应用】1. 单味煎服，治小儿疳积。2. 根配六月雪根、野荞麦根，治风湿腰痛。3. 根配虎刺根、三叶木通根、淡竹叶，治黄疸型肝炎。





假花生

假花生（异果山绿豆）

【药名】假花生。

【药用部位】蝶形花科植物假花生 *Desmodium heterocarpum* (L.) DC. 的全株。夏、秋季采收。

【识别特征】半灌木或小灌木。嫩枝有疏长柔毛。小叶3；顶生小叶椭圆形至宽倒卵形，长2.5~6厘米，宽1.3~2.5厘米，上面无毛，下面有白色长柔毛，侧生小叶较小；叶柄长2厘米，有柔毛；托叶披针形，长约7毫米。圆锥花序腋生，花序轴有淡黄色开展长柔毛；花萼宽钟状，萼齿宽披针形，短于萼筒或等长；花冠紫色，长约5毫米。荚果长12~25毫米，宽约3毫米，有4~9荚节，有小钩状毛，腹缝线直，背缝线波状。

生于山谷、水旁、灌丛或林中。分布于云南、四川、贵州、广东等地。

【性味功效】甘、涩，平。全草：消痈解毒，清热利尿。根：健胃、消痰止咳。煎服15~20克。外用适量，捣敷。

【应用】1. 单味煎服，治流行性乙型脑炎、防治腮腺炎等 2. 根单味煎服，治虚寒性咳嗽及小儿疳积等。



蝶形花科

广金钱草（金钱草、广东金钱草）

【药名】广金钱草。

【药用部位】蝶形花科植物广金钱草 *Desmodium styracifolium* (Osbeck) Merr.的枝叶。夏、秋季采收。

【植物形态】灌木状草本。茎直立，枝圆柱形，密被伸展的黄色短柔毛。通常有小叶1，有时3，圆形或椭圆形，上面无毛，下面密被贴伏的茸毛，脉上最密。总状花序顶生或腋生，极稠密，花小，紫色，有香气；花萼被粗毛，萼齿长为萼筒的2倍；花冠蝶形；雄蕊10，2体。荚果线状长圆形，被短毛，腹缝线直，背缝线浅波状，有节4~5，每节近方形。花、果期6~9月。生于旷野、荒草坡地。分布于福建、广东、广西、湖南等地。

【性味功效】甘、淡，平。清热去湿、利尿通淋。治热淋、石淋、小便涩痛、尿路感染、湿热黄疸、肝胆结石、疳积、乳痈、咽喉肿痛等。煎服15~30克（鲜品30~60克）。外用适量，捣敷。

【应用】1. 单味煎服，治黄疸、小儿疳积、口腔炎。2. 配海金沙，治膀胱结石。3. 配小茴香、大茴香、大黄、扁蓄等，治肾结石。





葫芦茶

葫芦茶（楸板茶）

【药名】葫芦茶。

【药用部位】蝶形花科植物葫芦茶 *Desmodium triquetrum* (L.) DC.的全草。4~10月采收。

【识别特征】半灌木。直立，多分枝，枝四棱，棱上被粗毛，后变秃净。单叶互生，卵状矩圆形，下具宽翅的柄，形似倒转葫芦；托叶2，披针形。总状花序顶生或腋生；花多数，淡紫色；萼阔钟形，冠蝶形，旗瓣圆形、先端微凹，翼瓣贴生于龙骨瓣；雄蕊10，2体；雌蕊1，花柱内弯。荚果扁平或矩圆形，5~8节，被毛，节间略收缩而呈波状。花期7月；果期8~10月。生于荒坡、低陵地草丛中。分布于广西、广东、湖南等地。

【性味功效】微苦、涩，微寒。清热消滞、解暑去湿、杀虫、利水消肿。治感冒、咽痛、肺病咳血、肠炎、痢疾、黄疸、风湿关节痛、钩虫病、妊娠呕吐、小儿疳积等。煎服15~60克。外用适量，鲜品捣敷或煎洗。

【应用】1. 茎叶单味煎服，治荨麻疹、风湿性关节酸痛 2. 根单味煎服，治肺痛、黄疸病、3. 根配南蛇藤、山芝麻、粗叶榕干根，治骨痹。



蝶形花科

刺桐 (山芙蓉、鸡桐木、海桐)

【药名】海桐皮、钉桐皮、鼓桐皮、刺桐皮。

【药用部位】蝶形花科植物刺桐 *Erythrina variegata* L. var. *orientalis* (L.) Merr. 的树皮 春季采收。

【识别特征】高大乔木。树皮灰棕色、枝淡黄色至土黄色，密被灰色茸毛，具黑色圆锥状刺。3出复叶，互生，或簇生于枝顶；小叶片阔卵形至斜方状卵形，全缘，上面深绿色，下面粉绿色，两面叶脉均有稀疏毛茸。总状花序，长约15厘米，被茸毛；花萼佛焰状，萼口偏斜，由背开裂至基部；花冠蝶形，大红色，旗瓣长5~6厘米，翼瓣与龙骨瓣近相等，短于萼；雄蕊10，两束，花丝淡紫色，荚果串珠状，微弯曲；种子1~8粒，球形，暗红色。花、果期3~5月。多栽培。分布于广东、广西、云南等地。

【性味功效】苦、辛，平。祛风湿、通经络、祛湿止痢、杀毒止痒。煎服6~12克。外用适量，煎洗或研末调敷。血虚者不宜服。

【应用】1. 单味煎服，治风湿痹证之四肢拘挛、腰膝疼痛、痢疾。2. 单味适量煎洗，治疥疮、癣疮、湿疮。



鸡眼草 (三叶人字草)

【药名】鸡眼草。

【药用部位】蝶形花科植物鸡眼草 *Kummerowia striata* (Thunb.) Schindl. 的全草。7~8月采收。

【识别特征】一年生草本。茎平卧，长5~30厘米，茎和分枝有白色向下的毛。叶互生，3小叶；托叶长卵形，宿存；小叶倒卵形、倒卵矩圆形或矩圆形，长5~15毫米，宽3~8毫米，主脉和叶缘疏生白色毛。花1~3，腋生；小苞片4，1个生于花梗的关节上，另3个生于萼下；萼钟状，深紫色，长2.5~3毫米；花冠淡红色。荚果卵状矩圆形，通常较萼稍长或长不超过萼的1倍，外面有细短毛。花期7~9月，果期9~10月。生于山坡、路旁、田边、林边和林下。分布于我国东北地区及河北、江苏、广东等地。

【性味功效】苦、凉。清热解毒、健脾利湿。治感冒发热、暑湿吐泻、疟疾、痢疾、传染性肝炎、热淋、白浊等。煎服9~15克。

【应用】1. 鲜品捣烂冲开水服，治中暑发痧。2. 单味煎服，治小儿疳积。3. 鲜品捣敷，治跌打损伤。



蝶形花科

截叶铁扫帚

【药名】截叶铁扫帚。

【药用部位】蝶形花科植物截叶铁扫帚 *Lespedeza cuneata* (Dum.Cours.) G. Don.的全草。春、夏季采收。

【识别特征】直立小灌木。分枝有白色短柔毛。小叶3，矩圆形，长10~30毫米，宽3~5毫米，先端截形，微凹，有短尖，基部楔形，上面无毛，下面密生白色柔毛，侧生小叶较小；叶柄长约10毫米，有柔毛；托叶条形。总状花序生于叶腋，有2~4朵花，无关节；无瓣花簇生于叶腋；小苞片2，花萼浅杯状，萼齿5；花冠白色至淡红色。花、果期4~8月。生于山坡、旷野地上，分布于山东、河南、陕西中部、广东等地。

【性味功效】甘、涩，凉。益肝明目、活血清热、利尿解毒。治痢疾、腹泻、疳积、夜盲、小便混浊、结膜炎、慢性支气管炎、坐骨神经痛等。煎服6~12克。

【应用】单味煎服，治腹泻。



美丽胡枝子 (马扫帚)

【药名】美丽胡枝子。

【药用部位】蝶形花科植物美丽胡枝子 *Lespedeza formosa* (Vog.) Koehne. 的根或茎、叶、花、根全年采收；茎叶春季至秋季采收；花秋季采收。

【识别特征】直立灌木。幼枝有细毛。复叶有小叶3片，卵形、卵状椭圆形或椭圆状披针形，先端急尖，圆钝或微凹，有小尖，基部楔形，下面密生短柔毛。总状花序腋生，单生或数个排成圆锥状；总花梗密生短柔毛；小苞片卵状披针形、狭矩形或线形，被长柔毛；花冠紫红色或白色，龙骨瓣在花盛开时较旗瓣为长；花梗短，有毛。荚果卵形、矩圆形，稍偏斜，有短尖，密被锈色短柔毛。花期7~9月，果期9~10月。生于山坡林下或杂草丛中。分布于我国华北、华东、西南地区至广西等地。

【性味功效】根：苦、平。清肺热、祛风湿、散瘀血。治肺癰、风湿疼痛、跌打损伤等。茎叶：苦、平。治小便不利。花：苦、平。清热凉血。治肺热咳血、便血。煎服10~15克。

【应用】1. 鲜根和酒糟捣敷，治扭伤、脱臼、骨折。2. 根配朱砂根，治跌打损伤。3. 茎叶配金丝草，治小便不利。



蝶形花科

山鸡血藤（香花岩豆藤）

【药名】山鸡血藤。

【药用部位】蝶形花科植物山鸡血藤 *Millettia dielsiana* Harms. 的藤茎。全年采收。

【识别特征】攀缘灌木 幼枝和花序被金黄色茸毛。羽状复叶互生，小叶5，狭椭圆形或披针形，长5~15厘米，宽2.5~5厘米，先端钝尖，基部圆楔形，下面疏生短毛或无毛；小托叶锥形。圆锥花序顶生，长15厘米，萼钟形，密生锈色毛；花蝶形、紫色，长1.2~2厘米；旗瓣椭圆形，基部有短爪，外面白色，密被锈色丝状毛；雄蕊成9+1的两组；雌蕊的子房密被长茸毛。荚果条形，长7~12厘米，宽约2厘米，近木质，密被黄褐色茸毛。种子扁长圆形。花期夏季，果期秋季。生于山坡灌丛中。分布于浙江、江西、广东等地。

【性味功效】苦、甘，温。活血、舒筋。治腰膝酸痛、麻木瘫痪、月经不调等。煎服9~15克。

【应用】1. 藤茎煎服，治闭经等。2. 根单味煎服，治关节风湿痛。3. 根配猪骨煎服，治腰痛。



大叶千斤拔

大叶千斤拔（千斤红、蔓性千金拔、一条根）

【药名】大叶千斤拔根

【药用部位】蝶形花科植物大叶千斤拔 *Moghania macrophylla* (Willd) O. Ktze. 的根。秋季采收。

【识别特征】直立半灌木。嫩枝密生黄色短柔毛。小叶3，顶生小叶宽披针形，上面几无毛，下面沿叶脉有黄色柔毛，叶柄有狭翅，有短柔毛。总状花序腋生，花多而密，序轴及花梗均密生淡黄色短柔毛；萼钟状，萼齿5，披针形，花冠紫红色，荚果椭圆形，褐色，有短柔毛；种子1~2粒，球形，黑色。花期7~9月。生于空旷草地或灌丛中。分布于四川、云南、广东、广西等地。

【性味功效】甘、涩，平，祛风除湿、舒筋活络、补虚壮骨。治风湿骨痛、上呼吸道感染、腰肌劳损、偏瘫、阳痿等。煎服15~30克（鲜品30~60克）。

【应用】单味泡酒服，治肾虚阳痿。



蝶形花科

鸡血藤（昆明鸡血藤、网络崖豆藤）

【药名】鸡血藤。

【药用部位】蝶形花科植物鸡血藤 *Millettia reticulata* Benth. 的茎。8~9月采收。

【识别特征】攀缘状灌木。茎皮灰白色。羽状复叶，长10~20厘米；小叶5~9；矩圆形或卵状矩圆形，纸质，先端钝，微凹，全缘，基部圆形或钝形，上面深绿，光滑，下面绿色；网脉两面均明显；小叶柄长4~5毫米；小托叶长约3毫米，针刺状。圆锥花序，顶生，下垂，花序梗有黄短毛；花多数，密生，苞片2，矩圆形；萼钟形，5裂；花冠秃净，暗紫色。荚果扁条形，薄而硬，秃净，长至15厘米，果瓣近木质，种子3~6，扁圆形。花期5~6月，果期11~12月，生于灌木丛中或山野间。分布于我国华东、华南地区及湖北、云南等地。

【性味功效】苦、涩，温。养血祛风、通经活络。治腰膝酸痛麻木、遗精、盗汗、月经不调、跌打损伤等。煎服15~20克。

【应用】1. 单味煎服，治闭经、体虚盗汗等。2. 配枫荷梨、山胡椒、八角枫等，治关节痛。



排钱草

排钱草（亚婆钱、钱串木）

【药名】排钱草。

【药用部位】蝶形花科植物排钱树 *Phyllodium pulchellum* (L.) Benth. 的全株。夏、秋季采收。

【识别特征】灌木。枝纤细，被柔毛。3出复叶，顶端小叶矩圆形，侧生小叶比顶生的小2倍，先端钝，基部浑圆形，边缘稍作波浪形，革质，两面均被小柔毛。总状花序顶生或腋生，由12~16个伞形花序组成，每一伞形花序隐藏在2个长1~3厘米的圆形、叶状的苞片内；花柄与萼同被短柔毛；花冠蝶形。荚果矩圆形，秃净或被小柔毛，边缘具睫毛，通常有节2个。花期7~9月，果期8~10月。生于荒地、山坡疏林下。分布于我国南部各地。

【性味功效】根：甘、淡、涩，凉。活血祛瘀、除湿消肿。治癰疽肿块、跌打瘀肿、血瘀经闭、风湿痹痛等，外用治痈疮肿毒。煎服15~30克（鲜品60~90克）外用适量。地上部分：淡、苦，平。祛风利水、散瘀消肿。治感冒、风湿痹痛、水肿膨胀、喉风、牙痛、跌打肿痛等。

【应用】1. 地上部分单味煎服，治感冒、发热、牙痛等。2. 根配瘦猪肉煎服，治风湿性关节炎。



蝶形花科

野葛

【药名】葛根

【药用部位】蝶形花科植物野葛 *Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi 的根或花序、秋季采收。

【识别特征】藤本 块根肥厚。各部有黄色长硬毛。小叶3，顶生小叶棱状卵形，先端渐尖，基部圆形，有时浅裂，下面为粉霜，两面有毛，侧生小叶宽卵形，基部斜形；托叶盾形，小托叶针状。总状花序腋生；小苞片卵形或披针形；萼齿5，披针形，有黄色柔毛；花冠紫红色，长约1.5厘米。荚果条形，长5~10厘米，扁平，密生黄色长硬毛。生于草坡、路边或疏林中 我国除新疆、西藏外，其余地区均有分布

【性味功效】根：甘、辛，凉。解肌退热、生津、透疹、升阳止泻。治外感发热头痛、恶寒、头痛鼻干、口微渴或恶寒无汗、麻疹不透、热痢、高血压颈项强痛等 花：甘、平 退热、解酒 治发热口渴、酒醉。煎服10~15克，大剂量可用至30克。

【应用】1. 单味煎服，治高血压病颈项强痛。2. 鲜根捣汁服，治鼻衄终日不止。3. 花配人参、陈皮等，治饮酒太过面致呕吐痰逆、心神烦躁。



鹿藿 (山黑豆、老鼠眼)

【药名】鹿藿。

【药用部位】蝶形花科植物鹿藿 *Rhynchosia volubilis* Lour 的根、叶。5~6月采收。

【识别特征】多年生缠绕草本，各部密被淡黄色柔毛。茎蔓长，3出羽状复叶；侧生小叶斜阔卵形，或斜阔椭圆形，长2~6厘米，阔1.5~4.5厘米，先端短急尖，基部圆形；顶生小叶近圆形，长2.5~6厘米，阔2.5~5.5厘米，先端急尖或短渐尖；小叶纸质，上面疏被短柔毛，下面密被长柔毛和淡黄色透明腺点；托叶线状披针形，不脱落。总状花序腋生，有花10余朵；花黄色；花萼钟状，5裂；花冠蝶形，龙骨瓣有长喙；雄蕊10，2体，花药1室；子房上位。荚果短矩形，红紫色；有黑色具光泽的种子1~2。花、果期5~9月。生于杂草中或附攀树上。分布于江苏、安徽、广东等地。

【性味功效】苦、平。凉血、解毒。治头痛、腰疼腹痛、产褥热、瘰疬、痈肿等。煎服9~15克。外用适量，捣敷。

【应用】1. 茎叶单味煎服，用治习惯性头痛、妇女产褥热。2. 叶捣烂加酒敷，治痈肿。



金缕梅科

枫香（枫树）

【药名】路路通。

【药用部位】金缕梅科植物枫香 *Liquidambar formosana* Hance 的果实。冬季采收。

【识别特征】落叶乔木。树皮幼时灰白、平滑，老时褐色、粗糙。叶4生，叶柄长；叶片心形，常3裂，幼时及萌发枝上的叶多为掌状5裂，裂片卵状三角形或卵形，边缘有细锯齿。花单性，雌雄同株，无花被；雄花淡黄绿色，总状花序，雄蕊多数，密生成球形；雌花呈圆球形头状花序，被毛，子房半下位。聚合果圆球形，下垂，表面有刺，蒴果多数，密集于复果内，长椭圆形；种子多数，细小，扁平。花期3~4月，果期9~10月。生于平原或丘陵地区。分布于我国黄河以南地区及广东、广西等地。

【性味功效】苦、平。祛风通络、疏肝解郁、利水除湿。治肢体痹痛、手足拘挛、胃痛、水肿胀满、经闭、乳少、疥癣、湿疹等。煎服3~6克。外用适量，煅炭存性研末调敷。

【应用】1. 果实配秦艽、桑枝、海风藤、橘络、薏米等，治风湿肢节痛。2. 树皮单味煎服，治痢疾。





榧木 (鱼骨柴)

【药名】榧木花、榧木根。

【药用部位】金缕梅科植物榧木 *Loropetalum chinense* (R.Br.) Oliv. 的花及根。花夏季采收；根秋、冬季采收。

【识别特征】落叶灌木或小乔木。树皮深灰色；嫩枝、新叶、花序、花萼背面和果，均有淡棕黄色星状短柔毛。叶互生，卵形或卵状椭圆形，先端短尖头，基部钝，不对称，全缘，革质。花6~8，簇生小枝端；无柄；花萼短，4裂；花瓣4，淡黄白色，条形；雄蕊4，花丝极短；雌蕊倒卵形，子房半下位，2室。蒴果球形，褐色，室背开裂；种子椭圆形，白色。花期5月，果期10月。生于山坡矮林间。分布于我国长江中、下游以南地区。

【性味功效】花：微甘、涩，平。清暑解热、止咳、止血。治咳嗽、咯血、烦渴、鼻衄、血痢、泄泻、妇女血崩等。根：苦、涩，微温。治咳血、腹痛泄泻、脱肛、肢节酸痛、白带、产后恶露不畅、跌打吐血等。煎服9~12克。

【应用】1. 花单味煎服，治鼻衄、血崩、遗精。2. 根单味煎服，治咳血、产后恶露不畅。3. 花配骨碎补、荆芥、青木香，治痢疾。



杨梅

杨梅（青梅、火梅）

【药名】杨梅、杨梅根、杨梅皮。

【药用部位】杨梅科植物杨梅 *Myrica rubra* Sieb. et Zucc. 的果实、根、树皮。果实初夏采收；根全年采收；树皮春初采收。

【识别特征】常绿乔木。树冠球形，树皮灰色，小枝较粗壮，单叶互生，楔状倒卵形或长楔状倒披针形，革质，先端稍钝，基部狭楔形，全缘，或先端有少数钝锯齿，下面有金黄色腺体。花雌雄异株；穗状雄花序单生，雄蕊4~6；雌花序常单生于叶腋。核果球形，外果皮未成熟前绿色，成熟后深红色、紫红色或白色，由多数囊状体密生而成，内果皮坚硬。花期4月，果期初夏。生于山谷疏林内或山坡村落的灌木丛中。分布于我国长江以南各地。

【性味功效】果实：甘、酸、温。生津解渴、和胃消食。治烦渴、吐泻、痢疾、腹痛等。根：辛、温。理气止痛、化瘀止血。治胃痛、膈食呕吐、吐血、血崩、痔血、跌打损伤等。树皮：苦、辛、涩、温。治痢疾、跌打损伤等。煎服15~30克。

【应用】1. 果实浸酒服，治痢疾及预防中暑。2. 根配青木香，治胃、十二指肠溃疡病、功能性胃痛。3. 树皮配南天竹、橘子皮，治菌痢。



榆科

狭叶山黄麻

【药名】狭叶山黄麻。

【药用部位】榆科植物狭叶山黄麻 *Trema angustifolia* Bl. 的根、叶。根秋、冬季采收；叶全年采收。

【识别特征】灌木或小乔木。一年生枝条红褐色，密被短硬毛，后毛渐脱落。叶卵状披针形或披针形，长2~13厘米，先端长渐尖，基部圆形，近对称或稍歪斜，具3出脉，侧脉3~4对，边缘有不规则小锯齿，上面粗糙，密被乳头状突起，下面密被浅灰色柔毛。花单性，雌雄异株，成腋生聚伞花序；花被片和雄蕊各5；子房无毛，柱头2，被毛。核果近球形或卵球形，长2.5~3毫米；果柄被柔毛。花、果期3~8月。生于山坡、山脚、荒坡的灌木丛中。分布于广西、广东、云南等地。

【性味功效】涩、平。清凉、止血、止痢。治跌打损伤、外伤出血等。煎服15~25克，外用适量，煎洗或捣敷。

【应用】根单味煎服，治跌打损伤。



榆科

山黄麻 (山角麻、山麻木)

【药名】山黄麻。

【药用部位】榆科植物山黄麻 *Trema orientalis* (L.) Bl. 的根、叶。根秋、冬季采收；叶全年采收。

【识别特征】小乔木。当年枝密被白色柔毛，叶卵形、卵状披针形或披针形，长6~18厘米，先端长渐尖，基部心形或近截形，常稍斜，基部3出脉明显，侧出的一对达叶的中上部，侧部5~7对，边缘有小锯齿，上面有短硬毛而粗糙，下面密被银灰色或微带淡黄色柔毛。聚伞花序常成对腋生；花单性；花被片5；雄蕊5，与花被片对生；核果卵圆形，花、果期3~8月。生于阴湿沟谷和林中，或空旷的山坡。分布于云南、贵州、广东等地。

【性味功效】涩、平。收敛止血、散瘀消肿。治跌打损伤、外伤出血等。煎服15~25克，外用适量，煎洗或捣敷。

【应用】根单味煎服，治跌打损伤。



榆科

朴树

【药名】朴树。

【药用部位】榆科植物朴树 *Celtis sinensis* Pers.的根皮、果实。根皮秋、冬季采收。果实9~10月成熟时采收。

【识别特征】落叶灌木。树皮平滑，灰色；一年生被密毛。叶革质，宽卵形至狭卵形，长3~10厘米，中部以上边缘有浅锯齿，3出脉，下面无毛或有毛；叶柄长3~10毫米。花杂性（两性花或单性花同株），1~3朵生于当年枝的叶腋；花被片4，被毛；雄蕊4；柱头2。核果近球形，直径4~5毫米，红褐色；果核有穴和突肋。花期5月，果期10月。生于山坡、林缘或村边、路旁的疏林中。分布于我国长江以南地区及河南、山东等地。

【性味功效】苦、涩，平。根皮：散瘀止泻。治跌打扭伤、痔疮下血、食滞腹泻、下痢不止。果实：清热利喉。治感冒风寒、咳嗽声哑等。煎服10~15克，外用适量，煎汁涂敷。

【应用】1. 根皮配苦参，治腰痛。2. 叶煎汁，热敷洗或涂搽，治漆疮。



桑科

木菠萝 (菠萝蜜、婆那婆、树菠萝)

【药名】菠萝蜜。

【药用部位】桑科植物木菠萝 *Artocarpus heterophyllus* Lam. 的叶、树液、果实和种仁。夏、秋季采收。

【识别特征】常绿乔木。全体有乳汁。叶互生；厚革质：椭圆形至倒卵形，先端钝而短尖，基部楔形，全缘，幼枝上的叶有时3裂，两面无毛，上面有光泽，下面略粗糙；托叶佛焰苞状。花单性，雌雄同株；雄花序顶生或腋生，圆柱形，花被2裂，雄蕊1；雌花序圆柱形或矩圆形，生于枝干上的球形花托内。成熟聚花果长25~60厘米，大者重达20千克，外皮有瘤状突起。花期2~3月。生于热带地区，在我国广东、广西、云南、台湾等地均有栽培。

【性味功效】甘，微酸，平。生津、止渴解烦、醒酒、散结消肿、止痛、益气、通乳。果肉鲜服，适量。种仁煎服60~120克。树液、叶外用适量，研末撒或调敷。

【应用】1. 果肉生吃，生津、止渴、助消化。2. 叶研末，治溃疡。3. 鲜树液涂，治疮疖红肿，或疮疖红肿引起的淋巴结炎。4. 种仁与猪肉炖服，治产后乳少或乳汁不能、补中益气。



桑科

白桂木（将军木、胭脂木、狗卵果）

【药名】白桂木。

【药用部位】桑科植物白桂木 *Artocarpus hypargyrea* Hance 的根。秋、冬季采收。

【识别特征】常绿乔木。有乳汁。根表面有多层膜质红色的木栓层，可剥落。幼枝和叶柄有锈色短柔毛。叶革质，椭圆形或倒卵状矩圆形，长7~15厘米，宽5~8厘米，先端渐尖，基部楔形或近圆形，全缘或具波状齿，上面无毛，有光泽，下面有白色短茸毛；托叶早落。花单性，雌雄同株，与盾形苞片混生，密集于倒卵形或球形的花序托上；总花梗长1~3厘米，有茸毛；雄花序长1.2~1.6厘米；花被片2~3，雄蕊1；雌花序较小，花被管状。聚花果球形，直径约1.5厘米，外被褐色短柔毛。生于常绿阔叶林中。分布于云南、广东、广西等地。

【性味功效】甘、淡，微温。祛风活血、除湿消肿。治风湿性关节炎、腰膝酸软、胃脘痛、黄疸肝炎、肝硬化腹水等。煎服15~30克。

【应用】单味煎服，治风湿性关节炎。



根

桑科

藤构 (小构树、葡蟠、谷沙藤)

【药名】藤构。

【药用部位】桑科植物藤构 *Broussonetia kazinoki* Sieb. et Zucc. 的嫩枝叶、根皮。叶春、夏季采收；根夏、秋季采收。

【识别特征】落叶灌木。枝蔓生或攀缘，有乳汁。叶卵形或卵状椭圆形，长6~12厘米，宽2~5厘米，先端渐尖，基部近心形，边缘有锯齿，上面有糙伏毛，下面有细毛，3出脉；叶柄长1~2厘米。花单性，雌雄同株；雄勤荑花序圆筒状，长约1厘米；花被片和雄蕊均为4；雌花序头状，径5~6毫米；苞片高脚碟状。聚花果球形，径5~6毫米，肉质，成熟时红色。生于山坡、灌丛或次生杂木林中。分布于我国华南、华中各地。

【性味功效】淡、涩，凉。消肿止痛。治头痛、伤寒、痧症、肝炎、咽喉肿痛、风热感冒、跌打损伤、刀伤出血、无名肿毒等。煎服12~15克。外用适量。

【应用】1. 嫩叶煎服，治虚弱浮肿。2. 树汁擦患处，治局限性皮炎、牛皮癣。3. 根皮配苦参根，治跌打损伤。



构树

构树（楮、沙纸树）

【药名】楮实子、楮叶。

【药用部位】桑科植物构树 *Broussonetia papyrifera* (L.) Vent. 的果实、叶，果实 8~10 月采收；叶夏、秋季采收。

【识别特征】落叶乔木。茎、叶具乳汁；嫩枝被柔毛，后脱落。叶互生；叶片卵形，不分裂或 3~5 深裂，先端尖，基部圆形或心脏形，有时不对称，边缘锯齿状，具粗糙伏毛，托叶膜质，早落。花单性、雌雄异株；雄花为腋生柔荑花序，雄蕊 4；雌花为球形头状花序，紫色，子房筒状，为花萼所包被。聚花果肉质，球形，橙黄色。花期 5 月，果期 9 月。多生于村旁旷地上。分布于我国西南、东南及华北地区。

【性味功效】甘，寒。果实：滋肾、清肝明目。治虚劳目昏、目翳等。叶：凉血止血、利水消肿、解毒消疮。治吐血、衄血、血崩、外伤出血、癣疮等。煎服 6~15 克。外用适量，捣敷或研末调敷。

【应用】1. 果实用黑豆炮制，治脾肾肝三脏阴虚之吐血咳血、骨蒸夜汗、口苦烦渴、梦中遗精。2. 果实配荆芥穗、地骨皮，治目昏。3. 叶配艾叶，治坐骨神经痛。



桑科

柘树（葇芝、金蝉脱壳）

【药名】穿破石。

【药用部位】桑科植物柘树 *Cudrania cochinchinensis* (Lour.) Kudo et Masam.的根。全年采收。

【识别特征】直立或攀缘状灌木。枝有皮孔，叶腋有锐利的刺，略弯。叶互生，革质；倒卵形、椭圆状卵形或长圆状倒披针形，顶端钝或近短尖，基部楔尖，全缘，深绿色，无毛；侧脉纤细，每边8~10。花小，单性，雌雄异株，排成单生或成对腋生的头状花序，总花梗很短；雄花有萼片3~5，聚花果球形，直径5厘米，成熟时红黄色，有毛，多汁。花期4~5月，果期9~10月。生于山坡、溪边、灌丛中。分布于我国东南部至西南部各地。

【性味功效】微苦，微寒。活血通经、舒筋活络、清热利湿、化痰止咳。治风湿关节疼痛、黄疸、淋浊、闭经、劳伤咳血、跌打损伤、疔疮痈肿等。煎服6~12克。

【应用】1. 单味煎服，治体虚白带。2. 配铁包金、甘草，治肺癆、风湿。3. 配石菖蒲等，治由肾虚引起的耳聋耳鸣。



桑科

无花果

【药名】无花果。

【药用部位】桑科植物无花果 *Ficus carica* L. 的干燥花托。秋季采收。

【植物形态】灌木或小乔木，具乳汁。多分枝，小枝粗壮，表面褐色，被稀短毛。叶互生；叶片倒卵形或近圆形，宽与长几相等，3~5裂，少有不分裂者，基部心脏形，裂片通常倒卵形，顶端钝，有不规则齿，掌状叶脉明显，上面深绿色，粗糙，下面有毛，厚革质；叶柄光滑或有长毛。隐头花序；花托单生于叶腋间，梨形，常绿色或褐青色，光滑，肉质而厚；花单性同株，小花白色，着生于总花托的内壁上；花期夏季，隐花果成熟期秋季。我国南方各地均有栽培。

【性味功效】甘、酸，寒。润肺镇咳、清热润肠、开胃消食。治热毒咽燥喉痛、痔疮出血、痈疮肿毒、脾虚泄泻、痢疾、便秘、产后气血虚弱乳汁不行等。煎服 15~30 克。

【应用】1. 单味煎调冰糖服，治肺热声嘶。2. 鲜果晒干、研末后吹喉，治咽喉刺痛。3. 煎服，治久泻不止。



桑科

黄毛榕

【药名】黄毛榕。

【药用部位】桑科植物黄毛榕 *Ficus fulva* Reinw. 的根、树皮。根秋、冬季采收；树皮春、夏季采收。

【识别特征】小乔木或灌木。小枝圆柱形，中空，密生锈色长硬毛。叶卵形或宽卵形，长16~33厘米，宽15~27厘米，先端骤尖，3~5浅裂或深裂，基部心形，边缘有锯齿，基出脉5~7，上面无毛，下面密生短柔毛，在脉上有褐色或黄褐色长硬毛；叶柄长3~8厘米，密生长硬毛。花序托成对腋生，无梗，球形，直径约1.5厘米，具明显脐状突起，密生锈色或褐色糙毛。生于溪边、山谷林中。分布于福建、广西、广东等地。

【性味功效】甘，平。消肿、止泻、强筋骨、健脾益气、活血祛风。治风湿、气血虚弱、子宫下垂、脱肛、水肿、便溏、支气管炎、咳嗽等。煎服6~12克。

【应用】1.单味煎服，治气血虚弱、中气不足所致的子宫下垂、脱肛、泄泻等症。2.单味煎服，治风湿痹症之筋骨疼痛。



桑科

对叶榕（大种牛奶树、牛奶稔）

【药名】对叶榕。

【药用部位】桑科植物对叶榕 *Ficus hispida* Linn. 的根、叶。全年采收。

【识别特征】灌木或小乔木。具乳汁。幼枝被刚毛，中空。叶革质，常对生；叶片卵形、倒卵形或长圆形，基部圆形或阔楔形，先端短尖或具短尾尖，全缘或具不规则细锯齿，或仅顶部具锯齿，两面均粗糙，上面疏被稀刚毛，下面密被粗毛；托叶阔披针形，早落。花托（隐头花序）聚生于老树下或由树干发出的无叶枝条；扁球形或陀螺形，成熟时黄色，具柄，被粗毛；中部以下常具数枚苞片，基部苞片3；小坚果，骨质。花期6~7月。生于平原、丘陵、山谷和溪边。分布于广东、广西、云南等地。

【性味功效】甘、凉。疏风解热、清积化痰、行气散瘀、清热利湿。治感冒发热、支气管炎、消化不良、痢疾、跌打肿痛等。煎服15~30克（鲜品30~60克）。外用适量，捣敷或煎洗。

【应用】1. 根单味煎服，治百日咳。2. 鲜叶适量，捣敷，另用根煎服，治背痛。



桑科

小叶榕（榕树）

【药名】榕树须、榕树叶。

【药用部位】桑科植物小叶榕 *Ficus microcarpa* L.的气生根、叶。全年采收。

【识别特征】常绿大乔木。树干多分枝扩散，树冠扩大成伞状；具白乳汁；由枝干抽出气根，可垂及地，挺直如柱。叶互生，革质，阔倒卵形或倒卵状长圆形，基部楔形或圆形，先端钝、短渐尖，全缘，两面均无毛，侧脉5~6对，表面不明显；叶柄长7~15毫米。隐头花序单生或双生于叶腋内，倒卵球形，直径5~10毫米，初乳白色，熟时黄色或淡红色。花期5~6月，果期9~10月。生于村边坡地、河边，有时塔顶及峭壁亦有生长。分布于台湾、福建、广东、广西等地。

【性味功效】气生根：苦、涩，平。祛风清热、活血解毒。治流感、百日咳、麻疹不透、扁桃体炎、风湿骨痛、跌打损伤等。叶：淡，凉。化痰止咳、消肿止痛。治慢性气管炎、百日咳等。煎服9~15克。外用适量，捣敷。

【应用】1. 气生根单味酒水煎服，治关节风湿痛；捣敷，治神经性皮炎。2. 气生根配樟树皮，治跌打损伤。3. 鲜叶配陈皮、白糖，治慢性气管炎。



桑科

琴叶榕（倒吊葫芦）

【药名】琴叶榕。

【药用部位】桑科植物琴叶榕 *Ficus pandurata* Hance 的根、叶。根全年采收；叶 6~10 月采收。

【植物形态】落叶小灌木。小枝及叶柄幼时被白色短柔毛，后无毛，常呈红紫色。单叶互生；叶片小提琴形或倒卵形，两面无毛，有时下面被短柔毛。花序托单生或成对腋生，卵圆形或梨形，熟时紫红色，顶端有脐状凸起；基部有苞片 3；雌花与瘿花同生于一花序托内，花被 4，花柱侧生。花期 6~7 月。生于山谷、沟边、山野间或村郊旷地上。分布于广东、广西、云南等地。

【性味功效】辛、甘，温。祛风利湿、活血调经、清热解毒。治百日咳、黄疸、乳痈、腰痛、胃痛、疟疾、月经不调、闭经、肺虚咳嗽等。煎服 15~30 克（鲜品 30~60 克）。外用适量，捣敷。

【应用】1. 捣敷，治风湿热痹、跌打损伤。2. 单味煎服，治湿热中阻、胆失疏泄而致的全身皮肤黄染、恶心不欲食之症。3. 单味煎服，治瘀血阻滞所致月经不调、经来腹痛、量少色暗之症。



桑科

薜荔 (凉粉果、王不留行、馒头果)

【药名】广东王不留行、络石藤。

【药用部位】桑科植物薜荔 *Ficus pumila* L.的花序托、带叶茎枝。茎枝4~6月采收；花序托秋季采收。

【识别特征】常绿攀缘灌木。有乳汁、茎灰褐色，多分枝，叶2型，不育幼枝的叶薄而小，互生，心状卵形，叶基歪斜；在繁殖枝上的叶大而近革质，卵状椭圆形，先端钝，全缘，下面有短柔毛，侧脉和网状脉在下面隆起，呈小蜂窝状；叶柄粗短。隐头花序，花单性，小花多数，着生在肉质花托的内壁上；雄花托长椭圆形；雌花托稍大，倒卵形，表面紫绿色。花期5~6月，果期10月。生于山坡树木间或断墙破壁上。分布于我国华东、华南和西南等地。

【性味功效】花序托（广东王不留行）：甘，平。通乳、利湿、活血消肿。治乳汁不下、遗精、淋浊、久痢、痔血、痈肿、疔疮等。茎（在广州等地作“络石藤”用）：酸、苦，凉。祛风、利湿、活血、解毒。治风湿痹痛、跌打损伤、痈肿疮疖等。煎服9~15克。

【应用】1. 茎叶单味煎服，治风湿痛、手脚关节不利。2. 茎叶配甘草，治尿血、小便不利、尿道刺痛等。



桑科

粗叶榕（五指毛桃）

【药名】五爪龙、五指毛桃。

【药用部位】桑科植物粗叶榕 *Ficus simplicissima* Lour. 的根。秋季采收。

【识别特征】灌木或小乔木。全株具贴伏短硬毛和白色乳汁。茎直立，很少分枝。单叶互生，纸质，多型，长椭圆状披针形或广卵形，先端急尖或渐尖，基部圆形或心形，常具3~5深裂片或有锯齿或全缘，两面均粗糙，基出脉3~7条。夏季花序托球形，成对腋生，无梗；花序托熟时由红变黑。生于山坡、沟谷、路旁的灌木丛中。分布于我国南部及西南部。

【性味功效】辛、甘，微温，气香。补气健脾、祛痰平喘、祛风湿、止痹痛。治肺癆咳嗽、盗汗、肢倦无力、食少腹胀、水肿、风湿痹痛、肝炎、白带、产后无乳等。煎服15~30克。

【应用】1. 配牛大力、黄芪，煎服，治脾虚型重症肌无力。2. 配穿破石、葫芦茶，煎服，治急性黄疸型肝炎。3. 配千斤拔、过江龙、黑老虎，煎服，治风湿痹痛。



桑科

桑


【药名】桑椹子、桑叶、桑枝、桑白皮。

【药用部位】桑科植物桑 *Morus alba* L. 的果穗、叶、嫩枝、根皮 4~6 月果实变红时采收；叶春、夏季采收；枝春末夏初采收；根皮冬季采收。

【识别特征】落叶灌木或小乔木 根皮红黄色至黄棕色，纤维性甚强。茎皮孔明显。叶互生，具柄；叶片卵圆形，先端尖或长尖，基部近心形，边缘有粗锯齿，下面脉上有疏毛，基出 3 脉。花单性，雌雄异株，均为穗状花序，腋生；雄花花被片 4，雄蕊 4，中央有不育雌蕊；雌花花被片 4。瘦果外被肉质花被，多数密集成卵圆形聚合果，初绿色，成熟后变肉质，黑紫色。花期 4~5 月，果期 6~7 月。全国各地有栽培。

【性味功效】桑椹子：甘、寒。补肝肾、息风生津。桑叶：苦、甘、微寒。疏散风热、清肝明目、凉血止血。桑枝：苦、平。祛风通络、利水消肿。桑白皮：甘、寒。泻肺平喘、行水消肿。煎服 10~30 克。

【应用】1. 桑椹子，治肝肾阴亏、便秘等。2. 叶煎服，治发热、头痛、口渴、肺热咳嗽等。3. 桑枝煎服，治风寒湿痹、四肢拘挛等。4. 桑白皮煎服，治肺热喘咳、水肿、小便不利等。



大麻藤

葎草 (割人藤、拉拉秧)

【药名】葎草

【药用部位】大麻科植物葎草 *Humulus scandens* (Lour.) Merr. 的全草。夏、秋季采收。

【识别特征】一年生或多年生蔓生草本。长数米，有倒钩刺。叶对生，掌状5深裂，稀有3~7裂，边缘有锯齿，上面生刚毛，下面有腺点，脉上有刚毛；叶柄长。花单性，雌雄异株；花序腋生；雄花呈圆锥花序，有多数淡黄绿色小花，萼片5，披针形；雄蕊5；雌花10余朵集成短穗，腋生。果穗呈绿色；瘦果卵圆形，质坚硬。花期7~8月，果期8~9月。生于沟边和路旁荒地上。我国除新疆、青海外大部分地区有分布。

【性味功效】甘、苦，寒。清热解毒、利水通淋。治五淋之证、小便不利、疟疾、痢疾、腹泻、肺痈、痈肿、瘰癧、痔疮及蛇蝎螫伤等。煎服9~18克(鲜品60~120克)。外用适量，捣敷或煎水熏洗。

【应用】1. 鲜品煎服，治痢疾或小便淋沥、尿血。2. 鲜叶煎水熏洗，治皮肤瘙痒、痔疮脱肛等。3. 单味煎服，治小儿腹泻。



苧麻

苧麻 (青麻)

【药名】苧麻根、苧麻叶。

【药用部位】苧麻科植物苧麻 *Boehmeria nivea* (L.) Gaud. 的根、叶。根冬、春季采收；叶全年采收。

【识别特征】多年生半灌木。茎多分枝，青褐色，密生粗长毛。叶互生，托叶2，分离，早落；叶片宽卵形或卵形，先端渐尖或近尾状，基部宽楔形或截形，边缘密生齿牙，上面绿色，粗糙，并散在疏毛，下面密生交织的白色柔毛；基出脉3。花单性，雌雄通常同株；花序呈圆锥状，腋生；雄花序通常位于雌花序之下；瘦果小，椭圆形，密生短毛，为宿存花被包裹，内有种子1。花期9月，果期10月。生于山坡、山沟、路旁等处。分布于山东、河南、陕西以南各省区地。

【性味功效】甘，寒。根：清热解毒、止血、散瘀。治热病大渴、血淋、吐血、赤白带下、痈肿、跌打损伤、蛇虫咬伤等。叶：凉血、止血、散瘀。治咯血、吐血、血淋、尿血、跌扑瘀血、创伤出血等。煎服10~30克。

【应用】1. 根单味煎服，治肠风、血热崩漏、哮喘。2. 根配莲子、怀山药，治习惯性流产。3. 叶配苏叶，治诸伤瘀血不散。



荨麻科

糯米团

【药名】糯米团。

【药用部位】荨麻科植物糯米团 *Memorialis hirta* (Bl.) Wedd.的全草。全年采收。

【识别特征】多年生草本。直立或斜倾，或下部卧地而顶部上伸，通常有刚毛。主根粗肥，圆锥形。叶对生，卵圆形或椭圆状披针形，长3.5~7厘米，宽1~2厘米，先端钝尖或渐尖，基部圆形至近心形，全缘，基脉3出，网脉在叶背者明显，有刚毛，上面粗糙，或有刚毛；无柄或有短柄；托叶阔卵形。花小，单性，雌雄同株，簇生于叶腋，黄绿色；雄花被裂片3~5，雄蕊5；雌花花萼筒状，瘦果阔卵形，先端尖，纵棱突起，黑色，光滑。花期7~8月。生于溪谷林下阴湿处，山麓水沟边。分布于我国长江以南地区。

【性味功效】甘、苦、凉。清热解毒、健脾、止血、治疗疮、痈肿、痢疾、妇女白带、小儿疳积、外伤出血等。煎服9~15克。外用捣敷。

【应用】1. 全草单味煎服，治湿热白带、小儿积食胀满、痢疾、痛经。2. 鲜根加食盐捣敷，治血管神经性水肿。3. 配三角泡、桉树叶，治下肢慢性溃疡。



荨麻科

紫麻（水麻）

【药名】水麻。

【药用部位】荨麻科植物紫麻 *Oxypcnide frutescens* (Thunb.) Miq.的全草。全年采收。

【识别特征】直立草本，茎上有纵槽。单叶互生；叶片卵状长圆形或卵状披针形，先端渐尖或尾尖，边缘有锯齿，基部楔形、阔楔形或浑圆形，上面淡绿色，下面被短毛，具托叶披针形，早落。花雌雄异株，呈腋生小型头状的一簇；雄花花球近无柄，花被片3，花丝突出；雌花花球有小花8~11，子房上位，1室，柱头盾状。瘦果卵圆形。花期春季，果期6~7月。生于山谷、溪边、林下潮湿处。分布于云南、广西、广东等地。

【性味功效】甘，凉。疏风解表、散瘀消肿。治透发麻疹、跌打损伤、止血等。煎服15~30克。

【应用】1. 配金钱草、红牛藤、酸浆草煎服，治跌打损伤。2. 配西河柳、红牛皮菜煎服，治小儿麻疹。3. 配马鞭草、刘寄奴等煎服，治月痕病。



三棱草

赤车

【药名】赤车。

【药用部位】苧麻科植物赤车 *Pellionia radicans* (Sieb. et Zucc.) Wedd. 的全草。春、秋季采收。

【识别特征】多年生草本。茎肉质，上部渐升，下部铺地生不定根，无毛或疏生微柔毛，叶基不对称，狭卵形或卵形，长1.4~4.5厘米，宽0.7~2厘米，先端短渐尖至长渐尖，基部一侧楔形，一侧耳形，边缘在基部或中部以上疏生浅牙齿状，下面无毛或沿脉疏生微柔毛；叶柄长1.5~4毫米。雌雄异株；雄花序分枝稀疏；花被片5，倒卵形，雄蕊5；雌花序无柄或具短柄，近球形，具多数密集的花。生于山谷沟边、林下或阴处石上。分布于广西、广东、贵州等地。

【性味功效】辛、苦，温。祛瘀消肿、解毒止痛。煎服25~50克。

【应用】1. 鲜品加食盐捣敷，治毒蛇咬伤、挫伤血肿。2. 鲜品煎服，治牙痛。



荨麻科

透明草 (小叶冷水花、玻璃草)

【药名】透明草。

【药用部位】荨麻科植物透明草 *Pilea microphylla* (Linn.) Liebm.的全草。全年采收。

【识别特征】一年生肉质草本。茎具棱，透明状，多分枝，匍匐状向上生长。叶2型，排成2列。大型叶倒卵形至广披针形，长0.3~0.6厘米，先端短尖，全缘；小型叶生于节部。花簇生于短枝叶腋，聚伞花序，雌雄同株或异株。花绿白色或微带红色，细小。雄花有雄蕊4，花萼片4；雌花萼片3。瘦果长椭圆形。生于沟边、湿墙、路旁潮湿处。分布于广西、广东、台湾等地。

【性味功效】淡，涩，凉。清热解毒、利湿、安胎。治肺病、肝炎、无名肿毒、痈疮疖肿、烧烫伤等。外用适量，捣敷。

【应用】1. 鲜品捣敷，治痈疮肿毒。2. 鲜品捣敷，治烧烫伤。



荨麻科

雾水葛 (啜脓膏)

【药名】雾水葛。

【药用部位】荨麻科植物雾水葛 *Pouzolzia zeylanica* (L.) Benn. 的全草。全年采收。

【植物形态】多年生草本。茎披散或多少匍匐状，秃净或多少被疏毛。叶具短柄，膜质，大部互生，或生于下部的有时对生；叶片卵形至卵状披针形，全缘，先端短尖，基部浑圆或钝，3出脉，两面均粗糙而薄被疏毛。花小，4数，为腋生的花束；雌雄花混生；雄花淡绿色或染紫，花萼4裂，雄蕊白色，突出；雌花花萼结果时长不及2毫米，有棱，被毛，瘦果卵形而尖，黑色，有光泽。花、果期夏、秋季。生于田野、旷地、沟边、村边路旁等湿润地。分布于广东、广西、福建等地。

【性味功效】甘、淡，寒。清热利湿、解毒排脓。治痢疾、肠炎、尿路感染；外用治疮痈疖肿、乳腺炎、风火牙痛等。用量15~30克（鲜品30~60克）。

【应用】1. 鲜品煎服，治尿路感染、肠炎、痢疾、乳痈等。2. 鲜叶捣敷，治外科骨折（复位、固定后）。3. 配葫芦茶，煎洗，治硬皮病。



冬青科

岗梅 (梅叶冬青、枰星木)

【药名】岗梅根。

【药用部位】冬青科植物岗梅 *Ilex asprella* (Hook. et Arn.) Champ. ex Benth. 的根、叶。根秋、冬季采收。叶全年采收。

【识别特征】落叶灌木。茎上有白色点状皮孔。叶互生；叶片卵形、倒卵形或椭圆形，纸质，先端急尖至渐尖，边缘具小锯齿，基部广楔形至浑圆形，上面秃净或略被短毛，下面无毛，主脉隆起。叶片拉开可见丝状物。花白色，雌雄异株；雄花2~3朵，簇生或单生于叶腋；雌花4~6，单生于叶腋，有纤细的花梗，雌蕊1。果球形，成熟时黑色。花期4~5月，果期7~8月。生于荒山坡地疏林下或灌木丛中。分布于广西、江西、福建、广东等地。

【性味功效】苦、甘，寒。清热解毒、利尿消肿、生津止渴。根：治感冒、头痛眩晕、热病燥渴、肺痈、咳血、喉痛、痔血、跌打损伤等。叶：治感冒、跌打损伤、痈毒、疔疮等。煎服30~60克（鲜品50~100克）。外用适量，捣敷。

【应用】1. 根、叶单味煎服，治肺痈、流感、感冒高热、急性扁桃体炎、咽喉炎。2. 根配金银花、凤尾草，治食野菌或砒霜中毒。3. 根配鸡矢藤，治偏头痛。



冬青科

毛冬青（毛披树、细叶冬青、山熊胆）

【药名】毛冬青。

【药用部位】冬青科植物毛冬青 *Ilex pubescenes* Hook. et Arn. 的根。夏、秋季采收。

【识别特征】常绿灌木。小枝具棱，被粗毛，干后黑褐色。单叶互生；纸质或膜质；椭圆形或倒卵状椭圆形，先端尖，通常有小凸尖，基部阔楔形或略钝，下面被疏粗毛，边缘具稀疏的小尖齿，中脉上面凹陷，被疏毛，侧脉每边4~5；叶柄长3~4毫米。花淡紫色或白色，雌雄异株；花序簇生；雄花序每枝有1花，稀为3花；花瓣4或6，雌花序每枝花1~3；萼深6~7裂，被短柔毛；花瓣5~8，长椭圆形。浆果球形，熟时红色。花期夏季。生于山野坡地、丘陵的灌木丛中。分布于我国华东、华南地区及台湾等地。

【性味功效】微苦、甘，平。清热解毒、活血通脉。治风热感冒、肺热喘咳、扁桃体炎、冠心病、脑血管意外所致的偏瘫、血栓闭塞性脉管炎、皮肤急性化脓性炎症等。煎服25~20克。

【应用】1. 单味煎服，治感冒、扁桃体炎、痢疾、肺热喘咳。2. 煎液涂，治刀枪伤及跌打肿痛。



冬青科

救必应（铁冬青、熊胆木、白银香）

【药名】救必应。

【药用部位】冬青科植物救必应 *Ilex rotunda* Thunb. 的树皮或根皮。夏季采收。

【识别特征】常绿乔木或灌木，枝灰色，小枝多少有棱，红褐色，叶互生，卵圆形至椭圆形，两端短尖，全缘，上面有光泽；叶柄长7~12毫米。花单性，雌雄异株，伞形花序；雄花序梗长2~8毫米，花瓣4~5，绿白色，卵状矩圆形；雄蕊4~5；雌花较小，花柄较粗壮；子房上位。核果球形至椭圆形，长4.5~6毫米，熟时红色，顶端有宿存柱头。花期5~6月，果期9~10月。生于山谷、溪边的疏林中，分布于江苏、浙江、广西、广东等地。

【性味功效】苦，寒。清热解毒、利湿、消肿止痛。治感冒发热、扁桃体炎、咽喉肿痛、急慢性肝炎、急性肠胃炎、胃及十二指肠溃疡、风湿关节痛、跌打损伤等。煎服12~15克。

【应用】1. 单味煎服，治外感风热头痛、急慢性肝炎、喉痛。2. 配山豆根、龙牙草、路边菊，治斑痧。3. 配海螵蛸、绯红南五味子、竹叶椒，治胃、十二指肠溃疡。



卫矛科

南蛇藤 (过山风)

【药名】过山风、南蛇藤。

【药用部位】卫矛科植物南蛇藤 *Celastrus orbiculatus* Thunb. 的藤茎。全年采收。

【识别特征】落叶攀缘灌木。小枝圆柱形，灰褐色或暗褐色。单叶互生；叶片近圆形至广倒卵形、长椭圆状倒卵形，边缘有钝齿，下面叶脉隆起，有时具有短柔毛。腋生短聚伞花序，花淡黄绿色，雌雄异株；花萼裂片5，卵形；花瓣5，卵状长椭圆形；雌花具5雄蕊，花药2室，雌蕊1，子房上位，近球形，花柱短，柱头3裂。蒴果球形；种子卵形至椭圆形。花期4~5月，果熟期9~10月。生于山沟、山坡灌木丛中。分布于我国东北、华北、西北、西南地区及湖北、广西、广东等地。

【性味功效】微辛，温。祛风除湿、活血通经。治风寒湿痹、四肢麻木、小儿惊风、血瘀经闭、痔疮、痢疾等。煎服9~15克。

【应用】1. 根和果壳，治无名肿毒。2. 果实，治失眠症。3. 配石楠藤、八角枫根、千年健等，治风湿骨痛。



卫矛科

疏花卫矛（土杜仲）

【药名】土杜仲，疏花卫矛。

【药用部位】卫矛科植物疏花卫矛 *Euonymus laxiflorus* Champ. 的树皮。春、夏季采收。

【识别特征】常绿灌木。叶对生，薄革质，卵形、椭圆形至窄椭圆形，长5~10厘米，宽2.5~6厘米，先端渐尖，边缘有浅锯齿或近全缘，侧脉少而疏，不明显；叶柄长3~5毫米。聚伞花序有花5~9，总花梗长2~5厘米，分枝及花梗一般长1厘米左右；花紫红色至淡红色，直径约1厘米，5数，雄蕊无花丝，雌蕊无花柱。蒴果紫红色，倒锥形，先端平截，有5浅裂；种子每室1~2，红褐色，假种皮红色，杯状，仅包围种子基部约1/4。生于山谷林下、林缘及水边较阴湿处。分布于广西、贵州、云南、广东等地。

【性味功效】甘、微辛，微温。滋补活血、强壮筋骨。治风湿骨痛、腰腿酸痛、跌打、骨折等。煎服15~30克；或泡酒服。外用适量，研末调敷。

【应用】煎服或泡酒服，治跌打损伤。



桑寄生科

鞘花（枫鞘花寄生、杉寄生）

【药名】寄生。

【药用部位】桑寄生科植物鞘花 *Elytranthe fordii* (Hance) Merr. 的全株。夏季采收。

【识别特征】半寄生灌木，枝和小枝近4棱，灰色，无毛，叶对生，革质，矩圆形或矩圆状披针形，长3.5~13厘米，宽2~6厘米，顶端钝，中脉在两面凸出，无毛；叶柄长约1厘米。总状花序有时呈伞形花序状，腋生，具花2~5；总花梗长8~15毫米；花柄长3~5毫米；花两性，基部有苞片1与小苞片2；花萼筒状，顶端截形或具小齿；花冠筒状，长8~12毫米，黄色，顶端时具红色斑点，6裂，裂片向外反折，里面被短柔毛；雄蕊6；花柱与花冠近等长。浆果近球形，径约5毫米，顶端有冠状凸出物。生于海拔50~1600米的山地和平原，寄生于各种常绿阔叶林树上。分布于广东、广西、云南和四川等地。

【性味功效】微涩、淡，平。清热止咳、补肝肾、祛风湿。治瘵痧、痢疾、咳血、肾脏病等。煎服15~25克。

【应用】1. 单味煎服，治肺热咳嗽。2. 同猪肉炖服，肾虚腰痛。



桑寄生科

桑寄生 (广寄生)

【药名】桑寄生。

【药用部位】桑寄生科植物桑寄生 *Loranthus parasiticus* (L.) Merr. 的茎、叶。夏季采收。

【识别特征】常绿寄生小灌木。枝无毛，具凸起皮孔。叶近对生或互生，革质，卵形至矩圆状卵形，长3~8厘米，宽2.5~5厘米，除幼叶外均无毛；叶柄长约1厘米，聚伞花序1~3聚生于叶腋，具花1~3；总花梗连同花柄、花萼和花冠均被红褐色星状短柔毛；花两性；花萼杯状；花冠狭筒状，紫红色，长2~2.5厘米，4裂；雄蕊4，生于裂片上；子房下位，1室。浆果椭圆形，具小疣状突起。花期8~10月，果期9~10月。生于海拔20~400米的丘陵、平原或低山。常寄生于山茶科、壳斗科等植物上。分布于广西、福建、广东等地。

【性味功效】苦、甘，平。补肝肾、强筋骨、祛风湿、安胎元。治风湿痹痛、腰膝酸软、筋骨无力、崩落经多、妊娠漏血、胎动不安、高血压症。煎服9~15克。

【应用】1. 配独活、杜仲、牛膝等，治肾气虚弱所致肢体关节疼痛、腰膝酸软、筋骨乏力等症。2. 配艾叶、阿胶，治妊娠胎动不安。



桑寄生科

扁枝槲寄生

【药名】枫香寄生。

【药用部位】桑寄生科植物扁枝槲寄生 *Viscum articulatum* Burm.f.的茎、叶。夏季采收。

【识别特征】常绿半寄生小灌木。茎基部圆柱形，具2棱，小枝扁平，绿色，每一节间呈矩圆状倒披针形或近条形，两面具多条脉。叶退化成鳞片状突起，花单性，雌雄异株，生于关节上端凹陷处，基部有2片合生成盘状的小苞片；雄花小，花被4裂；雄蕊4，无花丝，花药多室，贴生于花被上；雌花长约1.5毫米；花柱短，圆锥形。果实近卵形，基部具宿存小苞片。生于山地、平原。常寄生于果树、枫香和栎树上。分布于台湾、福建、广东等地。

【性味功效】辛、苦，温。祛风去湿、舒筋活络、止咳祛痰。治腰肢酸痛、风湿骨痛，劳伤咳嗽、赤白痢疾、崩漏带下、疮疥。煎服15~25克；炖肉服50~100克；或浸酒服。外用适量，煎洗或研末调涂。

【应用】1.配螃蟹夹、醪糟炖服，治产后血气痛。2.全株研末吹患处，治小儿牙疳。3.全株研末，用鸡蛋油调匀搽，治牛皮癣。



藤藤科

寄生藤

【药名】寄生藤。

【药用部位】檀香科植物寄生藤 *Henslowia frutescens* Champ. 的全株 全年采收

【识别特征】寄生性灌木，直立或藤本状。枝有纵纹和黑褐色皮孔。叶互生，近肉质，倒卵形或椭圆形，基部渐狭而下延，两面无毛，基出脉3。花小，单性，雌雄异株；雄花球形，径不及2毫米，数朵集成腋生小伞形花序；花萼5，裂片三角形；雄蕊5，生于裂片基部；雌花单生于叶腋，卵形，子房下位，1室，核果卵形，黄褐色。花、果期冬季，生于山地疏林或丘陵灌木丛中。分布于广西、福建、云南、广东等地。

【性味功效】苦、涩、凉。散瘀、消肿、止痛。治跌打、刀伤、骨折、高血压等。煎服9~12克。外用适量，磨汁涂。

【应用】捣汁涂擦，治刀伤、跌打。



檀香科

檀香

【药名】檀香。

【药用部位】檀香科植物檀香 *Santalum album* L.的心材。夏季采收。

【识别特征】常绿小乔木。具寄生根。树皮褐色，粗糙或有纵裂；多分枝，幼枝光滑无毛。叶对生；叶片椭圆状卵形或卵状披针形，顶端锐尖，基部楔形或阔楔形，上面绿色，下面苍白色，无毛。花腋生和顶生，为3歧式聚伞状圆锥花序；花多数，小型，最初为淡黄色，后变为深锈紫色；花被钟形，先端4裂；雄蕊4；子房半下位。核果球形，成熟时黑色，肉质多汁；种子圆形，光滑无毛。花期5~6月，果期7~9月，在我国南部和西南部各地有栽培。

【性味功效】辛、温。行气止痛、散寒调中。治寒凝气滞的胸痹心痛、胃脘冷痛呕吐食少等。煎服2~5克，宜后下；或入丸散服。外用适量，磨汁涂擦。

【应用】配干姜或丹参、砂仁煎服，治心腹冷痛。



鼠李科

大叶铁包金（勾儿茶）

【药名】大叶铁包金。

【药用部位】鼠李科植物大叶铁包金 *Benchemia giraldiana* Schneid. 的根。全年采收。

【识别特征】藤状灌木。全体无毛。小枝黄绿色。叶互生，卵形，长3.7~7厘米，宽1.8~3厘米，先端钝而有小锐尖，基部浑圆或微心形，上面秃净，下面常有极微小的乳突点，侧脉9~12对，直而平行；叶柄长1~2厘米。圆锥花序顶生，长6~20厘米；花白色，具柄，3~5朵聚生，间有单生的；萼片长约2毫米，裂片三角状披针形。果矩圆形。花期冬季。生于向阳的山坡灌丛或路旁。分布于我国南部各地。

【性味功效】微涩，平。祛风湿、活血通络、止咳化痰、健脾益气。治风湿关节痛、腰痛、痛经、肺结核、小儿疳积、肝炎、胆道蛔虫、毒蛇咬伤、跌打损伤等。煎服30~90克。

【应用】1. 单味煎服，治肺结核咳嗽、内伤咳血、肝炎。2. 同猪蹄炖服，治风湿关节痛、腰痛。3. 单味酒浸擦，治跌打损伤、蛇咬伤。



鼠李科

铁包金（老鼠耳）

【药名】铁包金

【药用部位】鼠李科植物铁包金 *Berchemia lineate* (L.) DC. 的根。全年采收。

【识别特征】藤状灌木。主根粗壮，表面褐黑色，里面黄色，故称“铁包金”；叶互生，具短柄；叶片阔卵形或近圆形，先端钝有小凸点，基部心形，全缘，上面深绿色，下面苍白色，侧脉5对，直而平行。花两性，簇生叶腋或枝顶；萼片5，线形；花瓣5，线状披针形；雄蕊5；子房上位、肉质果，熟时紫色。花期秋季。生于山野沟边疏林、丘陵路旁、灌木丛中。分布于我国南部各地。

【性味功效】涩、淡，平。散瘀止血、化痰止咳、消滞。治跌打肿痛、肺癆久咳、咳血、肺燥咳嗽、风湿痹痛、小肠气痛、痈疮肿毒等症。煎服30~90克。

【应用】1. 根及枝叶单味煎服，治小儿疳积、小儿胃纳呆滞。2. 配十大功劳、百部、穿破石等，治肺癆久咳、咳血。3. 配五指毛桃、石仙桃、龙脷叶等，治肺燥咳嗽。



鼠李科

马甲子 (铁篱笆)

【药名】马甲子。

【药用部位】鼠李科植物马甲子 *Paliurus ramosissimus* (Lour.) Poir. 的根、叶。根 10~11 月采收；叶全年采收。

【识别特征】灌木。小枝具直而尖利的刺，刺由托叶变成。单叶互生；具柄；卵形或卵状椭圆形，长 3~5 厘米，宽 2.5~3 厘米，基部圆形，先端钝圆或微凹，上面深绿而具光泽，下面沿叶脉有细毛，边缘有细钝齿，叶脉 3 出。聚伞花序腋生，花细小，黄绿色；花萼 5 裂，裂片二角形；花瓣 5，匙形；雄蕊 5，与花瓣对生，花丝黄绿色；雌蕊花托连生，每室有 1 胚珠。核果盘状，周围有栓质薄翅。花期 7 月，果期 8 月。生于山地沟谷及平坦地区的酸碱性较强的湿土中，分布于我国华东、中南、西南地区及陕西等地。

【性味功效】苦、涩，寒，有毒。消炎解毒、杀虫止痒、收敛。治黄疸肝炎、疥疮、疥癣、湿疹、脓疱疮等。煎服 3~9 克。外用适量，煎洗。叶治骨折。

【应用】1. 根单味煎服，治肠风下血。2. 根浸酒服或敷，治风湿痛。3. 配黄葛树须、黑骨藤，浸酒服，治劳伤。



鼠李科

矩圆叶冻绿（黄药、苦李根）

【药名】矩圆叶冻绿。

【药用部位】鼠李科植物矩圆叶冻绿 *Rhamnus crenata* Sieb. et Zucc. 根、叶。全年采收。

【识别特征】落叶灌木。小枝和落叶都被锈色短柔毛。叶互生，有短柄；叶片椭圆状倒卵形，或披针状椭圆形，或倒卵形，先端尖，边缘具圆而向内弯的小锯齿，基部圆形或阔楔形，上面光绿色，下面色较淡，沿脉上有短柔毛，侧脉 7~12 对。伞形花序腋生，具短柔毛，有梗或无梗；花细小；萼片 5；花瓣 5，黄绿色，先端微凹；花盘衬贴在萼筒里面，花瓣与雄蕊着生在花盘边缘；雄蕊 5；雌蕊 1，子房上位。核果球形，成熟时由红变黑；种子青灰色，基部淡棕色。花期 6 月，果期 8 月。生于丘陵、向阳的山坡灌木中。分布于广东、安徽、浙江等地。

【性味功效】苦、凉，有毒。清热利湿、杀虫止痒、收敛。治疥疮、疥癣、湿疹、脓疱疮、黄疸肝炎等。煎服 3~9 克。外用适量，煎洗。

【应用】1. 根单味煎服，并煎汤洗擦皮肤，治癩痢头。2. 根研末敷，治烂脚疮。3. 根煎服，治小儿蛔虫。



鼠李科

血风藤（铁牛入石、翼核果）

【药名】血风藤。

【药用部位】鼠李科植物血风藤 *Ventilago leiocarpa* Benth. 的根，全年采收。

【识别特征】木质藤本。根粗壮，外皮暗紫红色。茎多分枝，有细纵纹，幼枝绿色。单叶互生，革质，具柄；卵形或矩圆形，顶端渐尖，基部阔楔形或近圆形，全缘或稍作波浪形，两面绿色，无毛，下面侧脉极明显。腋生聚伞形花序或有时成顶生圆锥花序；花小、绿白色；花萼5裂，裂片三角形；花瓣5，匙形；雄蕊5；子房2室。坚果球形，熟时红褐色，顶部有一鸭舌形膜质的薄翅。花、果期夏秋季。生于山野、沟边的疏林下或灌木丛中。分布于广西、福建、广东等地。

【性味功效】甘、涩，温。补益气血、舒筋活络。治气血亏损、风湿疼痛、跌打损伤。煎服 15～30 克。

【应用】单味煎服，治腰腿痛、风湿骨痛、四肢麻木、阳痿、贫血等。



胡颓子科

蔓胡颓子

【药名】蔓胡颓子。

【药用部位】胡颓子科植物蔓胡颓子 *Elaeagnus glabra* Thunb. 的果实、根及枝叶。果实、根春季采收；叶全年采收。

【识别特征】常绿蔓生或攀缘灌木，无刺，小枝密被锈色鳞片。叶互生，革质；卵状椭圆形，长5~7厘米，宽2~3厘米，先端渐尖，基部圆形，上面深绿色，下面黄褐色或青铜色，有锈色鳞片，侧脉6~8对。花淡白色，下垂，外面密被锈色鳞片，花3~7，聚生于叶片侧而成一短总状花序；花被筒漏斗状，上部4裂；雄蕊4。果椭圆形，密被锈色鳞片。花期冬季。生于山谷林缘或山坡、丘陵路旁灌木丛中。分布于我国长江中下游地区及河南、广西等地。

【性味功效】酸、微涩，平。果实：收敛止泻。根：清热、利湿、消肿、止血。叶：平喘止咳、退热。煎服鲜品9~15克。

【应用】1. 果实煎服，治肠炎腹泻。2. 根煎服，治痢疾、风湿痹痛、肝炎、胃热、痔血、血崩、跌打肿痛等。3. 叶煎服，治支气管哮喘、慢性支气管炎、感冒咳嗽等。



叶背

葡萄科

粤蛇葡萄 (山葡萄)

【药名】山葡萄、粤蛇葡萄。

【药用部位】葡萄科植物粤蛇葡萄 *Ampelopsis cantoniensis* (Planch.) 的根、枝叶。秋季采收。

【识别特征】木质藤本。全株无毛；卷须粗壮。1回羽状复叶，有小叶3~5，或为近2回羽状复叶（最下一对小叶再各分为3小叶）；小叶近革质，卵形或矩圆形，顶端短尖，基部圆钝，边缘有不明显的钝齿。3~4回2歧聚伞花序；花萼边缘不分裂；花瓣5；果倒卵状扁球形，成熟时紫黑色。花期6~7月，果期9~10月。生于灌丛中或山坡上。分布于广东、安徽、浙江、江西等地。

【性味功效】甘，平。根：清热解毒、祛风除湿、散瘀破结。治肺痈、肠痈、风湿痛、痈疮肿毒、烫伤等。煎服15~20克。茎叶：利尿解毒、化瘀止血。治慢性肾炎、肝炎、小便涩痛、胃热呕吐、外伤出血等。煎服30~60克。

【应用】1. 茎叶单味煎服，治小便不利涩痛、肝炎、胃热呕吐、风湿性关节炎。2. 根配细柱五加根、紫茉莉根、金银花藤，治关节肿痛。3. 根皮（去栓皮）配苦参、桑根皮，治结毒疮伤。



葡萄科

乌敛莓（五爪龙、五叶藤、地五加）

【药名】乌敛莓。

【药用部位】葡萄科植物乌敛莓 *Cayratia japonica* (Thunb.) Gagn.的全草。夏、秋季采收。

【识别特征】多年生蔓生草本。茎紫绿色，有纵棱，具卷须，幼枝有柔毛，后变光滑。叶为掌状复叶，具小叶5，排列成鸟爪状，中间小叶椭圆状卵形，长4~6厘米，宽2.5~3厘米，小叶柄长2~3厘米，先端短尖，基部楔形或圆形，两侧4小叶渐小，成对着生于同一小叶柄上，但又各具小分叶柄，小叶的边缘具较均匀的圆钝锯齿。聚伞花序腋生，花小，黄绿色，具短梗；萼杯状；花瓣4，雄蕊4，与花瓣对生；雌蕊1，子房上位，2室。浆果倒圆卵形，成熟时黑色；种子2~4。花期6月，果期8~9月。生于山坡、路旁草丛或灌木丛下。分布于我国华东、中南及华南各地。

【性味功效】苦、酸、寒。清热利湿、解毒消肿。治痈肿、疔疮、疔腮、风湿痛、黄疸、痢疾、尿血等。煎服25~50克。

【应用】1. 鲜根泡酒服，治风湿关节疼痛。2. 配生姜，治一切肿毒、乳痈、恶疮初起。3. 配五爪龙草、车前草，治喉痹。



葡萄科

白粉藤（白薯藤、白面水鸡、假葡萄）

【药名】独脚乌柏。

【药用部位】葡萄科植物白粉藤 *Cissus modecoides* Planch. var. *subintegra* Gagn. 的根及茎藤，秋、冬季采收。

【识别特征】草质藤本。全体无毛或幼时被白粉。幼茎稍肉质，钝四角形。单叶互生，心状卵形，长 5~10 厘米，常 3 浅裂，先端渐尖，边缘有稀疏的、尖锐的小锯齿；具长柄；叶腋有不分枝的卷须。聚伞花序与叶对生，具柄，伞房状；花小，淡绿色；雄蕊 4，花瓣 4 裂，子房 2 室。浆果倒卵形。花期秋季。生于荒野草丛、沟谷湿地，现多栽培。分布于我国南部大部分地区。

【性味功效】根：甘苦、凉。清热解毒、散结、行血。治肾炎、痈疽疮疡、淋巴结核、跌打损伤。煎服 10~15 克（鲜品 30~60 克）；或入丸、散服。外用适量，捣敷。孕妇忌服。叶：苦、寒，有小毒。外用适量，拔毒、消肿。治痈疮、瘰疬。

【应用】1. 茎藤配水蜈蚣各 30 克，水煎调蜜少许炖服，治痢疾。2. 茎藤捣汁和米煮粥服，治产后乳汁稀少。3. 配百合、冰糖煎服，治久咳不愈。4. 配白敛各 30 克煎服，治瘰疬。5. 鲜叶加红糖捣敷，治疮疡肿毒。



葡萄科

三叶崖爬藤（三叶扁藤、小扁藤、丝线吊金钟）

【药名】三叶崖爬藤。

【药用部位】葡萄科植物三叶崖爬藤 *Tetrastigma hemsleyanum* Diels et Gilg 的根。全年采收。

【识别特征】攀缘藤本。根粗壮，呈纺锤形或团块状，常数枚相连。茎细弱，下部节上生根。掌状复叶，互生；小叶3，狭椭圆形；中间1小叶较大，先端尖或短尖，基部渐狭；两侧2小叶较小，且不对称；卷须与叶对生，具吸盘。花单性异株，伞形花序腋生；花瓣4，花盘与子房基部合生；雄蕊1，柱头4深裂。小浆果，球形；种子卵状球形。生于林中阴处、缠绕树上。分布广东、浙江、福建等地。

【性味功效】苦、辛，凉。清热解毒、祛风止痛、活血祛瘀。治高热惊厥、肺炎、哮喘、肝炎、风湿、月经不调、咽痛、痈疔疮疖、跌打损伤等。煎服10~15克。外用适量，鲜品捣敷或干品研末敷。

【应用】1. 单味煎服，治小儿风热、惊风、疳气痛。2. 配钩藤、七叶一枝花根，治小儿高热惊厥。3. 配虎刺根、茜草根，治肝炎。



葡萄科

扁担藤 (扁藤、扁茎崖爬藤、过江扁藤)

【药名】扁担藤。

【药用部位】葡萄科植物扁担藤 *Tetrastigma planicaule* (Hook. f.) Gagn. 的藤茎、根、叶。全年采收。

【识别特征】木质大藤本。坚硬。茎扁平，扁担状，有节，卷须长而缠绕状，与叶对生。叶互生，具长柄；掌状，5小叶，小叶卵状长椭圆形，长9~15厘米，宽3~5厘米，先端突尖，基部宽楔形，边缘浅波状，两面绿色无毛。伞房状聚伞花序腋生，花淡绿色，花瓣宽卵状三角形；雄蕊比子房短；子房宽圆锥形，柱头4裂，辐射状。浆果肉质，卵圆形如雀卵大，熟时黄色。花期春季。生于山谷密林中，缠绕于其它树上。分布于广东、福建、广西等地。

【性味功效】辛、微涩，温。祛风燥湿、舒筋活络。治风湿性腰腿痛、半身不遂、肌肉风湿痛等。煎服15~30克（鲜品30~60克）。外用适量，捣敷。

【应用】1. 叶捣烂外敷，治下肢溃疡。2. 单味煎服，治腰腿痛。



葡萄科

网脉葡萄 (大叶山天萝)

【药名】野葡萄根。

【药用部位】葡萄科植物网脉葡萄 *Vitis wilsonae* Veitch 的根。全年采收。

【识别特征】木质藤本。幼枝近圆柱形，有白色蛛丝状柔毛，后变无毛。叶心形或心状卵形，长8~15厘米，宽5~10厘米，通常不裂，有时不明显3浅裂，边缘有小齿，下面沿脉有锈色蛛丝状毛，叶脉下面隆起，脉网明显，两面常有白粉；叶柄长4~7厘米。圆锥花序长8~15厘米；花小，淡绿色；花萼盘形，全缘；花瓣5；雄蕊5。浆果球形，蓝黑色，有白粉。生于山坡灌丛中。分布于四川、贵州、湖南、湖北、安徽、浙江等地。

【性味功效】甘，平。清热利湿、消炎解毒。治慢性骨髓炎。煎服6~9克。外用适量，捣敷。

【应用】鲜品去心、表皮，捣烂，加蛋清、麻油、酒调匀成膏，敷患处。另配阳和汤服，治慢性骨髓炎。



叶背

芸香香

降真香（山油柑、山橘）

【药名】降真香。

【药用部位】芸香科植物降真香 *Acronychia pedunculata* (L.) Miq. 的全株。全年采收。

【识别特征】乔木。单叶对生，纸质，矩圆形至长椭圆形，长6~15厘米，宽2.5~6厘米，全缘，上面青绿色，光亮，网脉两面浮凸；叶柄长1~2厘米，顶端有一结节。聚伞花序腋生，常生于枝的顶部，花两性，白色；花萼片4，花瓣4，条形或狭矩圆形，两侧边缘内卷，雄蕊8，子房密被毛。核果黄色，平滑，半透明，果柄长5~8毫米；种子黑色，有肉质胚乳。生于常绿阔叶林下。分布于广东、广西、云南等地。

【性味功效】辛、苦，温。行气活血、健脾止咳。治感冒咳嗽、支气管炎、心胃气痛、疝气痛、食欲不振、消化不良、腹痛等。煎服25~50克。外用适量，捣汁搽。

【应用】1. 鲜品捣敷，治刀伤出血、跌打损伤。2. 果煎服，治食欲不振、腹痛。



芸香科

黄皮

【药名】黄皮。

【药用部位】芸香科植物黄皮 *Clausena lansium* (Lour.) Skeels 的根、果实、叶。根、叶全年采收。果实 6~7 月采收。

【植物形态】常绿小灌木或小乔木。叶互生；单数羽状复叶，小叶 5~13，椭圆形或卵形，先端渐尖，基部楔形，不相等，全缘，略带微波状；硬纸质，密布透明腺点，上面深紫色，下面绿色。圆锥花序顶生或腋生，花黄白色；萼片 5，短三角形，外被短毛；花瓣 5，匙形；雄蕊 9~10（通常 10）；子房 5 室，花柱粗短，柱头扁圆呈盘状。浆果球形，黄褐色，有柔毛；种子绿色。花期 4 月，果期 6 月。在我国华南和西南地区广泛栽培。

【性味功效】根：辛、微苦，温。消肿止痛、利小便。治黄疸、疟疾、胃痛、预防流感等。煎服 30~60 克。果实：甘、酸，温。消食、化痰、理气。治食积不化、胸膈满痛、痰饮咳喘等。煎服 15~30 克。叶：辛、凉。疏风解表、除痰行气。治风热感冒、流感、温病身热、痰饮咳喘等。煎服 15~30 克。

【应用】1. 根煎服，治胃痛。2. 食鲜果，治由于吃荔枝过多而引起的食积胀满。3. 鲜叶煎服，治痰湿喘咳。



芸香科

三丫苦 (三叉苦)

【药名】三叉苦。

【药用部位】芸香科植物三丫苦 *Evodia lepta* (Spreng.) Merr. 的根、叶。全年采收。

【识别特征】常绿灌木或小乔木。全株味苦。树皮灰白色或青灰色，光滑，有淡黄色皮孔。茎多分枝。3小叶复叶对生于叶柄上；小叶矩圆状披针形，全缘，有腺点，两面光滑。伞房状圆锥花序腋生，小花黄白色；花单性，4数；花瓣4，雄花雄蕊4；雌花子房密被毛，4室，蓇葖果2~3，外果皮暗黄褐色至红褐色，有透明腺点；种子卵球形，黑色。花期5~6月，果期11~12月。生于丘陵、平原、溪边、林缘的疏林或灌木丛中。分布于我国南部各地。

【性味功效】苦、寒。清热解毒、祛风除湿。治咽喉肿痛、肺热咳嗽、肺脓疡、疟疾、黄疸型肝炎、风湿骨痛、湿疹、皮炎、疮疡等。煎服15~30克（鲜品30~60克）。外用适量，鲜品捣敷。

【应用】1. 叶单味煎服，治脑炎初期、慢性支气管炎急性发作，解钩吻中毒。2. 叶煎洗，治湿疹、皮炎、痔疮；或捣敷，治创伤、止血理口。3. 根煎服，治肺热咳嗽、肺脓疡、创伤感染发热。



芸香科

九里香 (千里香、七经通)

【药名】九里香。

【药用部位】芸香科植物九里香 *Murraya paniculata* (L.) Jack. 的根、枝叶。根秋季采收；枝叶全年采收。

【识别特征】常绿灌木或小乔木。单数羽状复叶；小叶互生，变异大，卵形、匙状倒卵形、椭圆形或近菱形，先端钝或钝渐尖，基部阔楔形或近圆形，全缘，纸质，擦之有香气。聚伞花序顶生或生于上部叶腋内，花白色，极芳香；萼小，5深裂；花瓣5，披针形或狭长圆形，有透明腺点；雄蕊8~10，子房1位，2室。果卵形或球形，肉质，红色，先端尖锐，有种子1~2，花期4~6月，果期9~11月。生于山野，亦有栽培。分布于广东、广西、湖南等地。

【性味功效】辛、苦，温，有小毒。行气散瘀、祛风除湿、消肿止痛、麻醉镇痛。治风湿痹痛、跌打肿痛、骨折、刀伤出血、牙痛、胃痛、湿疹、疥癣、皮肤瘙痒等。煎服9~15克（鲜品50~100克）。鲜品捣敷，治蛇伤、牙痛；煎洗，治疗湿疹。

【应用】1. 枝叶单味煎洗，治湿疹。2. 根煎服，治久年痛风、跌打损伤。3. 根配猪尾骨，治腰骨酸痛。



芸香科

飞龙掌血 (飞龙掌叶、血见飞、上山虎)

【药名】飞龙掌血。

【药用部位】芸香科植物飞龙掌血 *Toddalia asiatica* (L.) Lam. 的根。全年采收。

【识别特征】常绿木质半藤本。根粗壮，外皮褐黄色，内部赤红色。枝及分枝常有向下弯的皮刺，小枝常被有褐锈色的短柔毛和白色圆形皮孔。叶互生，3出复叶，具柄；小叶倒卵形、椭圆形或倒卵状矩圆形，先端急尖，基部窄楔形，边缘有细钝锯齿，两面无毛，下面中脉上有倒钩刺，齿缝处及叶片均有透明腺点，揉之有香气。花白色、青色或黄色，单性；萼片同花瓣均为4~5；伞房状圆锥花序，雄花雄蕊4~5，雌花花较少，不育雌蕊4~5，子房被毛。核果近球形，种子肾形，黑色，有光泽。花期10~12月，果期12月至翌年2月。生于山坡、路旁、灌丛中或疏林中。分布于我国华南、华东等地。

【性味功效】辛、苦，温。活血散瘀、祛风止痛、化瘀止血。治风湿疼痛、胃痛、跌打损伤、吐血、衄血、刀伤出血、经闭、痛经等。煎服10~30克。

【应用】1. 单味煎服，治经闭、胃痛、风湿肿痛、外伤疼痛、肋间神经痛。2. 配陈艾、陈棕炭、百草霜，治崩漏。3. 配冰片，治刀伤出血、伤口疼痛。



芸香科

筋枳（狗花椒、画眉架）

【药名】筋枳

【药用部位】芸香科植物筋枳 *Zanthoxylum avicennae* (Lam.) DC. 的根。全年采收。

【识别特征】常绿灌木或乔木。干和枝具红褐色的皮刺。叶互生；单数羽状复叶，小叶7~23；有少刺或无刺；小叶斜方状倒卵形或斜矩圆形，边全缘稍作波浪形，或中部以上有不明显的浅圆锯齿。圆锥花序顶生，疏散的3歧，或2~3次伞形花序式的分枝，花单性，萼片5，卵形；花瓣5，白色，雄花雄蕊5，雌花雄蕊退化为鳞片，心皮2。蓇葖果紫红色，有粗大腺点，种子黑色而亮。花期6~8月，果期9~10月。生于荒地、山坡、溪谷灌木丛中或疏林中。分布于广东、台湾、福建等地。

【性味功效】辛，温。祛风化湿、消肿止痛、活血散瘀、通黄利尿。治黄疸性肝炎、早期肝硬化、肾炎水肿、感冒咳嗽、百日咳、咽喉肿痛、风湿骨痛、跌打挫伤等。煎服15~20克。

【应用】1. 单味煎服，治慢性肝炎、肾炎性水肿、风湿骨痛、跌打瘀痛。2. 配小果蔷薇根、山花椒根，治跌打挫伤、腰部劳损、风湿关节痛、肥大性关节炎。



芸香科

蚌壳花椒 (大叶花椒、山枇杷)

【药名】单面针。

【药用部位】芸香科植物蚌壳花椒 *Zanthoxylum dissitum* Hemsl. 的根、茎皮或叶。秋季采收。

【识别特征】常绿近蔓生的灌木。根皮黄色，粗糙，断面呈“人”字形纹。茎有褐色皮刺。羽状复叶互生；小叶5~9，近对生，革质，长圆状披针形或卵状长圆形，先端渐尖，基部广楔形，全缘，两面光滑；有短的小叶柄；小枝、叶轴、总叶柄或叶片下面中肋上生有小而下曲的锐刺。聚伞状圆锥花序腋生；苞片小，卵圆形；花瓣4，黄色，心皮4。蓇葖果，扁椭圆形，密集成簇，淡褐色，有皱纹，稍似蚌壳状。种子球形。花期4~5月，果期6~8月。生于山坡林下灌木丛中，尤以石灰岩山坡多见。分布于广东、广西、云南等地。

【性味功效】根：辛、苦，温，有小毒。祛风除湿、行气散瘀、消肿止痛。治破伤风、风湿性关节痛、胃痛、跌打扭伤、龋齿痛、牙痛等。煎服9~15克。外用适量，捣敷或煎洗。

【应用】1. 茎叶单味煎服，治腰痛、妇女产后月经不调。2. 果实或种子配月月红、棣棠花，治妇女月经过多。3. 根配青鱼胆根、兔耳风根，治劳伤咳嗽。



芸香科

两面针（入地金牛、光叶花椒）

【药名】两面针。

【药用部位】芸香科植物两面针 *Zanthoxylum nitidum* (Roxb.) DC. 的根。全年采收。

【识别特征】木质藤本。秃净。幼枝、叶柄及小叶的中脉上有钩状小刺。单数羽状复叶，长7~15厘米；小叶3~9，具短柄，革质而亮，卵形至卵状矩圆形，长4~7厘米，宽2~3.5厘米，先端钝或短渐尖，基部浑圆，边缘有疏离的圆锯齿或几为全缘。花小，为腋生、无柄的圆锥花序，萼片4，卵状三角形；花瓣4，矩圆状卵形；雄花雄蕊4，雌花退化雄蕊极短小，心皮4。种子卵珠形，黑色光亮。花期3~4月，果期9~10月。生于较干燥的山坡、荒山、旷野、路旁的疏林灌木丛中。分布于广东、广西、福建等地。

【性味功效】辛、苦，温，有小毒。祛风通络、消肿止痛。治风湿骨痛、喉痹、胃痛、牙痛、跌打损伤、火烫伤等。煎服9~15克。外用适量，捣敷或煎洗。

【应用】1. 单味煎服，治牙痛、蛇咬伤。2. 单味泡酒服，治跌打劳伤、风湿骨痛。3. 配了哥王外用，治牙痛。



芸香科

竹叶花椒 (竹叶椒、贝椒子、山巴椒)

【药名】竹叶花椒。

【药用部位】芸香科植物竹叶花椒 *Zanthoxylum planispinum* Sieb. et Zucc. 的果实、根。根全年采收；果实8月采收。

【识别特征】灌木或小乔木。枝暗紫色，有对生的皮刺，老枝上的刺基部木栓化。单数羽状复叶，互生；叶轴无毛，具宽翼和皮刺；小叶3~9，对生，无柄或其极短的柄；小叶披针形或椭圆状披针形，先端尖，基部楔形，边缘有小圆齿，纸质，两面无毛而疏生透明腺点，主脉上具针刺，侧脉不明显。聚伞状圆锥花序腋生；花小，青绿色；花被片6~8，雌蕊心皮2~4，通常1~2个发育。蓇葖果1~2瓣，果皮薄。种子黑色，具光泽。花期3~5月，果期6~8月。生于低山疏林、灌丛中及路旁。分布于我国东南至西南、华南等地区。

【性味功效】辛，温。果实：散寒、止痛、祛蛔。治胃寒及蛔虫腹痛、牙痛、湿疮等。煎服6~9克。根：祛风散寒、活血止痛、治头痛感冒、咳嗽、吐泻、风湿关节痛、跌打损伤、牙痛等，煎服20~30克。

【应用】1. 果实单味煎服，治痧症腹痛。2. 果实配山姜根，治胃痛、牙痛。3. 根配透骨香、黑风藤、大血藤，治风湿痛。



楝科

苦楝 (森树)

【药名】苦楝皮。

【药用部位】楝科植物苦楝 *Melia azedarach* L. 的根皮、茎皮。春、秋季采收。

【识别特征】落叶乔木。树皮暗褐色，幼枝有星状毛，旋即脱落，老枝紫色，有多数细小皮孔。2~3回奇数羽状复叶互生，基部阔楔形或圆形，先端长尖，边缘有齿缺，幼时有星状毛，稍后除叶脉上有白毛外，余均无毛。圆锥花序腋生或顶生；花淡紫色；花萼5裂，两面均有毛；花瓣5，平展或反曲，倒披针形；雄蕊管通常暗紫色。核果圆卵形或近球形，淡黄色，4~5室，每室具种子1。花期4~5月，果期10~11月。生于低海拔的丘陵、旷野、村边、路旁的疏林或杂木林中。分布于我国黄河以南各地。

【性味功效】苦、寒，有毒。清热燥湿、杀虫、疗癣。治蛔虫、蛲虫、风疹、疥癣、水肿、烫伤、外伤出血等。煎服6~15克（鲜品15~30克），外用适量，煎洗或研末调敷。

【应用】1. 单味煎服，治小儿蛔虫。2. 配苦参、蛇床子、皂角，治蛲虫病。3. 配皂角，治疥疮。



无患子科

龙眼 (桂圆、圆眼)

【药名】龙眼肉、龙眼核、龙眼叶。

【药用部位】无患子科植物龙眼 *Dimocarpus longan* Lour. 的假种皮、种子、叶。假种皮、种子初秋采收；叶全年采收。

【识别特征】常绿乔木。幼枝被锈色柔毛。双数羽状复叶，互生；小叶2~5对，通常互生，革质，椭圆形至卵状披针形，先端短尖或钝，基部偏斜，全缘或波浪形，下面通常粉绿色。花两性，为顶生或腋生的圆锥花序；花黄白色，被锈色星状小柔毛；花萼5深裂；花瓣5，匙形，内面有毛；雄蕊通常8；子房2~3室，柱头2裂。核果球形，外皮黄褐色，粗糙，假种皮白色肉质，内有黑褐色种子1。花期3~4月，果期7~9月。在我国华南地区多栽培。

【性味功效】肉：甘、温。补益心脾、养血安神。治虚劳羸弱、失眠、健忘、惊悸等。煎服10~15克。核：涩、平。止血、定痛、理气化湿。治创伤出血、疝气、疥癣、湿疮等。煎服6~9克。叶：甘、淡、平。清热解毒、解表利湿。治感冒、疟疾、疔肿、痔疮、湿疹等。煎服9~15克。

【应用】1. 叶单味煎服，防治流感、流脑、肠炎。2. 肉配白术、茯苓、黄芪等，治思虑过度、劳伤心脾之健忘症。3. 根配土牛膝、枸骨根，治丝虫病。



无患子科

荔枝

【药名】荔枝核。

【药用部位】无患子科植物荔枝 *Litchi chinensis* Sonn. 的成熟种子。6~7月果实成熟时采收。

【识别特征】常绿乔木。树冠广阔，枝多拗曲。偶数羽状复叶，互生；小叶2~4对，革质或薄革质，色亮绿，披针形或卵状披针形，先端骤尖或尾状短渐尖，全缘，新叶橙绿红色。圆锥花序顶生，花小，青白色或淡黄色；花萼杯状，深5裂，雄蕊6~8，子房上位，倒心状；核果球形或卵形，外果皮革质，有瘤状突起，熟时赤红色；种子矩圆形，褐色而明亮，假种皮肉质，白色，半透明，与种子易分离。花期2~3月，果期6~7月。在我国华南地区多栽培。

【性味功效】甘、涩，温。行气消肿、散结止痛。治胃脘痛、疝气痛、睾丸炎、气滞经痛等。煎服9~15克。

【应用】1. 根单味煎服，治胃寒胀痛、喉痹肿痛。2. 核配木香，治心腹胃脘久痛者。3. 果实配山药、莲子，治老人五更泻。



省沽油科

山香圆 (两指剑、千打槌、五寸刀)

【药名】山香圆。

【药用部位】省沽油科植物山香圆 *Turpinia arguta* Seem. 的根、叶。根秋、冬季采收；叶春、夏季采收。

【识别特征】落叶灌木。老枝灰褐色，绿色，幼枝具灰褐色斑点。单叶，对生，椭圆形或长椭圆形，长7~22厘米，宽2~6厘米，渐尖，基部全缘；托叶生叶柄内侧。圆锥花序顶生；花长1~2厘米，白色，花梗中部具苞片2；萼片绿色，边缘具睫毛；花瓣白色，无毛；子房及花柱均有柔毛。果近球形，直径10~12毫米，有种子2~3。生于山谷疏林或溪边林缘灌木丛中。分布于广东、福建、广西、湖南等地。

【性味功效】苦，寒。活血散瘀、消肿止痛。治跌打损伤、脾脏肿大、疮痈肿毒等。煎服10~15克。

【应用】1. 叶捣敷，治跌打损伤。2. 根煲猪胰脏，治脾脏肿大。



漆树科

芒果

【药名】芒果核。

【药用部位】漆树科植物芒果 *Mangifera indica* L. 的果核、叶。食用芒果后，收集果核；叶全年可采。

【识别特征】常绿大乔木。树皮厚，灰褐色，有多数小裂孔，呈鳞片状脱落。单叶革质，簇生枝顶，叶片长圆形至长圆披针形，有光泽，先端尖或渐尖，边缘常呈波浪形，叶基楔形；叶柄基部膨大。圆锥花序顶生，被柔毛；花小，单性；萼片卵形或长椭圆形，5裂，被柔毛；花瓣5，淡黄色，长约为花萼的2倍；花盘肉质，5裂；雄蕊5，仅1发育；雌蕊1。核果椭圆形或肾形，微扁，熟时黄色；果核1，大，扁平，有纤维。花期春季，果期夏季。广东、广西等地有栽培。

【性味功效】酸、涩，平。行气、清热消滞、化痰。果核：治小儿食滞、腹胀腹痛，食少泄泻、外感咳嗽、疝气痛等。煎服15~25克，捣烂用。叶：治食滞、消化不良、皮炎、湿疹及抗肿瘤等。煎服9~15克。

【应用】1. 果核煎服，治小儿消化不良、食滞。2. 叶煎洗，治湿疹瘙痒。



漆树科

盐霜柏（盐肤木、五倍子树）

【药名】盐霜柏。

【药用部位】漆树科植物盐霜柏 *Rhus chinensis* Mill. 的根、叶、果实。根秋、冬季采收；果实 10 月采收；叶全年采收。

【识别特征】灌木或小乔木。小枝、叶柄及花序均密生柔毛。单数羽状复叶，互生，叶轴及叶柄无翅或有狭翅；小叶 7~13，卵形至椭圆形，长 5~12 厘米，宽 2~5 厘米，边缘有锯齿，上面近无毛，下面密生灰色或灰褐色柔毛。圆锥花序大，花序柄粗壮；花杂性，白色；萼片 5~6，卵形，有柔毛；花瓣 5~6，有缘毛；子房 1 室，花柱 3。核果近圆形，扁平，直径约 5 毫米，红色，有灰白色短柔毛。花期 8~9 月，果期 10 月。生于山坡、林缘疏林中或荒坡、旷地的灌木丛中。分布于我国中部、南部至西南部各地。

【性味功效】咸、凉。根与叶：凉血散瘀。治感冒发热、食滞腹泻、跌打、骨折、创伤出血、皮肤湿疹、牛皮癣、小儿盗汗等。果实：收敛镇咳、凉血解毒。治便血、脱肛、烧烫伤、痔疮等。

【应用】1. 根煎服，治咳嗽出血、麻疹不易出或不透。2. 鲜叶捣敷，治痛风。3. 果实配王不留行研末敷，治年久顽癣。



漆树科

野漆树 (漆木、痒漆树、木蜡树)

【药名】野漆树根。

【药用部位】漆树科植物野漆树 *Rhus sylvestris* Sieb. et Zucc. 的根。全年采收。

【识别特征】落叶乔木。嫩枝和冬芽具棕黄色毛。单数羽状复叶，互生；小叶7~13，卵形或卵状椭圆形，全缘，上面疏生柔毛或近光滑，下面有黄柔毛，侧脉18~25对显著；叶柄短，有毛。圆锥花序侧生；花细小，黄色；雌雄异株，或单性花与两性花共存；萼5裂；花瓣5；雄蕊5，在雌花中不完全；子房无柄，上位，1室，花柱3。核果偏斜而扁，宽大于高，淡棕黄色，光滑。花期5~6月，果熟期9~10月。本植物易使人过敏，在野外应避免直接接触。生于山坡、沟边灌木丛中。分布于我国华南、华东、西南等地。

【性味功效】苦、涩，温，有小毒。疏肝解郁、化瘀止血。治胁肋作痛、脘腹胀闷、瘀血疼痛、跌打损伤、咯血、吐血、便血等。煎服9~15克。外用适量，研末撒或捣敷。

【应用】1. 叶单味煎服，治蛔虫。2. 根煎服，治气郁呼吸不舒。



牛栓藤科

红叶楸 (牛栓藤、牛见愁、荔枝藤)

【药名】红叶藤

【药用部位】牛栓藤科植物红叶楸 *Rourea microphyllum* (Hook. et Arn.) Planch.的根、叶。全年采收。

【识别特征】多分枝藤本，无毛。羽状复叶，小叶通常11~17，稀有5~9，近革质，卵状长圆形，长1.5~4厘米，宽8~15毫米，基部阔楔形，常偏斜，先端渐尖钝，两面均无毛，上面光泽，下面粉绿色；小叶柄长约1毫米。嫩叶常呈红色。总状花序腋生，花序柄及花序均纤弱；花芳香，萼片5，圆形，花瓣5，白色；雄蕊10，心皮5，分离，常仅1个发育。蒴果；种子1，有假种皮。花期8~9月，果期10月。生于山坡干燥地方或灌木丛中，攀缘树上。分布于广东、福建、台湾等地。

【性味功效】苦、涩，微温。止血止痛，活血通经、收敛、埋口生肌。治风湿性关节炎痛、跌打刀伤、月经不调、闭经等。煎服10~15克。外用适量，煎洗或捣敷。

【应用】1. 根单味煎服，治风湿骨痛。2. 鲜叶捣敷，治跌打肿痛。



商陆科

商陆

【药名】商陆。

【药用部位】商陆科植物商陆 *Phytolacca acinosa* Roxb. 的根。秋、冬或春季采收。

【识别特征】多年生草本。根粗壮圆锥形，肉质，剖开可见同心形环纹即“罗盘纹”；外皮淡黄色，有横长皮孔；侧根多。茎多分枝，绿色或紫红色，具纵沟。单叶互生，具柄；叶片椭圆形或卵状椭圆形，先端急尖或渐尖，基部渐窄。总状花序顶生或侧生，花被片5，卵形或长方状椭圆形，初白色，后变淡红色；雄蕊8~10，心皮5~10。浆果扁球形，成熟时紫黑色；种子肾圆形，黑色。花期6~8月，果期8~10月。生于疏林下、林缘、路旁、山沟等湿润的地方。分布于全国。

【性味功效】苦，寒，有毒。泻下利水、消肿散结。治水肿、胀满、脚气、喉痹、痈肿、恶疮等。煎服5~10克。外用适量，捣敷。脾虚水肿者及孕妇忌服。

【应用】1. 配红糖煎服，治淋巴结核。2. 单味煎服，治消化道出血。3. 配赤小豆、鲫鱼，治水气肿满。



商陆科

美洲商陆（垂穗商陆）

【药名】美洋商陆。

【药用部位】商陆科植物美洲商陆 *Phytolacca americana* L. 的根。秋、冬季或春季采收。

【识别特征】多年生草本。分枝多，圆形而稍具棱角，嫩枝绿色，老枝带红色。叶互生；叶片卵状长椭圆形，或长椭圆状披针形，先端尖，基部渐窄，质软，羽状网脉；老叶柄及主脉带红色。总状花序顶生或侧生，花梗粉红色；花着生于鳞片状的苞片腋内；萼片5，覆瓦状排列，白色或淡粉红色；无花瓣；雄蕊10，花丝白色；雌蕊10，子房上位，胚珠弯生，花柱很短。果穗下垂，浆果球形，成熟时红紫色；种子黑色具光泽。花期夏季。全国大部分地区有栽培。

【性味功效】甘、微苦，平。有小毒。利水消肿、解毒杀虫。治肾炎水肿、心衰水肿、脚气、腹水及无名肿毒、皮肤寄生虫病等。煎服5~10克。外用适量，研末撒或煎洗。

【应用】本品有毒，用时宜慎。



八角枫科

八角枫（华瓜木、大枫树）

【药名】八角枫。

【药用部位】八角枫科植物八角枫 *Alangium chinense* (Lour.) Harms 的根、树皮或叶。全年采收。

【识别特征】落叶小乔林或灌木。树皮平滑，灰褐色。单叶互生，形状不一，卵形至圆形，长8~20厘米，宽5~12厘米，先端长尖，全缘或有2~3裂，裂片大小不一，基部偏斜，幼时两面均有毛，后仅脉腋处有丛毛和沿叶脉有短柔毛；主脉4~6。聚伞花序腋生，具小花8~30；苞片1，线形；萼钟状，有纤毛，萼齿6~8；花瓣与萼齿同数，白色，雄蕊6~8；雌蕊1，子房下位，2室。核果黑色，卵形，花期6~7月，果期9~10月。生于较阴湿的山谷、山坡的杂木林中。分布于我国长江流域及其以南各地。

【性味功效】辛，温，有毒。祛风通络、散瘀镇痛、麻醉及松弛肌肉。治风湿疼痛、麻木瘫痪、心力衰竭、劳伤腰痛、跌打损伤等。煎服5~8克。本品有毒，必须严格控制剂量。

【应用】1. 叶煎洗，治跌打接骨。2. 根配牛膝、生杜仲，治劳伤腰痛。3. 根配算盘子根、刺五加，治跌打损伤。



五加科

刚毛白勒花 (三叶五加、三加皮、刺五加)

【药名】三加皮。

【药用部位】五加科植物刚毛白勒花 *Acanthopanax trifoliatum* (L.) Merr. var. *setosum* Li 的根。9~10月采收。

【识别特征】多年生攀缘状灌木。树皮灰白色，枝条具皮孔，有刺。复叶互生；叶柄长2~6厘米，常有刺；小叶通常3，少有5，纸质，有短柄；小叶片长卵形或长椭圆形，先端渐尖，上面脉上刚毛较多边缘锯齿有长刚毛，基部楔形。伞形花序常单生，花萼5，花瓣5，白色带浅黄色，雄蕊5；雌蕊单一，子房下位，2室，果球形。黑色。花期7~8月，果期11~12月。生于溪边、山脚、路旁及丘陵地的灌木丛中，分布于我国华南、华中、西南等地。

【性味功效】苦、辛、凉。清热解毒、祛风利湿、舒筋活血。治感冒高热、咳痰带血、风湿性关节炎、黄疸、白带、尿路结石、跌打损伤、疖肿疮疡等。煎服20~50克。外用适量，煎洗，研末调敷或捣敷。

【应用】1. 单味煎服，治劳伤风湿。2. 配炒黑豆、秦归、陈皮，治手足麻木、筋骨疼痛、四肢无力。3. 鲜根配牛膝、朱砂莲、小血藤，治劳伤吐血。



五加科

黄毛櫟木（乌不企）

【药名】黄毛櫟木。

【药用部位】五加科植物黄毛櫟木 *Aralia decaisneana* Hance 的根 9~10 月采收。

【识别特征】灌木。有稀少的刺和黄褐色茸毛。叶大，2 回羽状复叶，叶轴各节有 1 对小叶，羽片有小叶 7~11；小叶革质，上面有黄褐色茸毛，下面毛密，卵形，先端渐尖，基部圆形至近心形，边缘有小锯齿，无柄至长 5 毫米的柄，顶生小叶柄长达 5 厘米。花序为许多伞形花序组成的大型顶生圆锥花序，有曲柔长茸毛，分枝长 50 厘米，伞形花序有花 30~50；萼 5 齿；花瓣 5；雄蕊 5；子房 5 室，果球形，有 5 角。花期 7~8 月，果期 9~10 月。生于山谷林中或林缘、路边灌木丛中。分布于广东、福建、广西等地。

【性味功效】甘、微苦，平。祛风除湿、利尿消肿、活血止痛。治风湿关节痛、腰腿痛、跌打损伤、胃痛、腹泻、痢疾、痈疽疔肿等。煎服 9~30 克。

【应用】1. 鲜根或鲜叶与瘦肉同炖服，治腹水肝炎。2. 鲜根煎服，治胃痛、胃溃疡、糖尿病。3. 鲜根配马尾松根、杜衡根、青木香根，捣敷，治跌打损伤、骨折。





五加科

长刺楸木 (刺叶楸木)

【药名】楸木。

【药用部位】五加科植物长刺楸木 *Aralia spinifolia* Merr. 的根。9~10月采收。

【识别特征】直立灌木，2回羽状复叶大，总叶轴、羽片轴和小叶的两面都有散生、长而几直的细刺和许多展开的细刚毛，刺长3~10毫米，刚毛长1.5~3毫米；羽片长约30厘米，有5~9片小叶；小叶膜质，无柄，矩圆状卵形，下面灰白色，两面都有许多散生刚毛，先端长渐尖，基部圆，常微斜，边缘有带细尖的锯齿。花序有散生的刺和密生的刚毛。伞形花序，总花梗有刺和刚毛；花梗也有刚毛；萼无毛，有5齿；花瓣5，三角状卵形；雄蕊5；子房5室，花柱5，分离。果球状卵形，无毛，有5棱和沟。花期7~8月，果期9~10月。生于山谷、溪旁、林缘的疏林或灌木丛中。分布于广东、广西、湖南、福建等地。

【性味功效】甘、微苦，平。祛风除湿、利尿消肿、活血止痛、治风湿关节痛、腰腿痛、跌打损伤、胃痛、腹泻、痢疾、痈疽疗肿等。煎服9~30克。孕服忌服。外用适量，捣烂。

【应用】作楸木根入药。配三白草、狭叶山胡椒、白敛各等量（均为鲜药），捣烂敷患处治骨髓炎、深部脓疡。



五加科

鸭脚木 (鵝掌柴、鴨母樹、傘托樹)

【药名】鸭脚木。

【药用部位】五加科植物鸭脚木 *Schefflera octophylla* (Lour.) Harms 的树皮、根皮、叶。树皮或根皮春、秋季采收；根全年采收；叶夏、秋季采收。

【识别特征】常绿乔木或大灌木。树皮灰白色，枝条粗壮。掌状复叶互生，有长柄；小叶6~9，小叶柄细长；叶革质或纸质，椭圆形或卵状椭圆形，先端渐尖，基部宽楔形或近圆形，全缘，上面深绿，下面灰白色，侧脉7~10对，网脉不明显。花小，白色，伞形花序排成顶生大型伞房状圆锥花序；花萼有细齿5~6；花瓣、雄蕊均为5；子房下位，5~7室。浆果球形。花期秋、冬季，果期冬季。生于绿阔叶林中或向阳山坡。分布于我国东南部至西南部各地。

【性味功效】树皮或根皮：苦、涩、凉。发汗解表、祛风除湿、舒筋活络。治感冒发热、咽喉肿痛、风湿关节痛、跌打损伤、骨折等。煎服9~15克。叶：涩，平。止痛、接骨、止血、消肿。用治风湿骨痛、跌打骨痛、骨折、刀伤、烧伤等。煎服9~15克。

【应用】1. 树皮或根皮浸酒服，治风湿骨痛。2. 树皮或根皮配生油，解木薯、大茶药中毒。3. 鲜叶捣敷，治烧伤。



伞形科

崩大碗（积雪草、雷公根、钱凿菜）

【药名】崩大碗、积雪草。

【药用部位】伞形科植物崩大碗 *Centella asiatica* (L.) Urban 的全草。夏、秋季采收。

【识别特征】多年生匍匐草本。茎光滑或稍被柔毛，节上生根。单叶互生；叶片圆形或肾形，边缘有钝齿；上面光滑，下面有细毛，花单生，伞形花序；伞梗生于叶腋，较叶柄短，每一花梗有花3~6，苞片2；花萼头状，花瓣5，红紫色，卵形；雄蕊5，短小，与花瓣互生；子房下位，花柱2。双悬果，扁圆形，光滑。花期夏季。生于路旁、沟边、田坎边稍湿润而肥沃的土地。分布于我国长江以南各地。

【性味功效】苦、辛、寒。清热泻火、清利湿热、活血消肿、解毒。治腹痛、暑泻、痢疾、湿热黄疸、吐血、衄血、咳血、目赤、喉肿、风疹、疥癣、疗疮肿毒、跌打损伤等。煎服15~30克(鲜品60~120克) 外用适量，鲜品捣敷或捣汁涂。

【应用】1. 全草单味煎服，治肝脏肿大、咳血、吐血、鼻出血等。2. 配冰糖，治湿热黄疸。3. 配胆矾，治误食砒霜、大茶药、木薯、野生菌等食物中毒。





伞形科

鸭儿芹

【药名】鸭儿芹。

【药用部位】伞形科植物鸭儿芹 *Cryptotaenia japonica* Hassk. 的根或全草。春、夏季采收。

【识别特征】多年生草本。根细长成簇。茎直立，呈叉式分枝。叶片广卵形，长5~18厘米，3出，中间小叶片菱状倒卵形，长3~10厘米，宽2.5~7厘米，先端短尖，基部楔形，两侧小叶片斜倒卵形，小叶片的边缘锯齿状或有时2~3浅裂，叶柄长5~17厘米；茎上部的叶无柄，叶片缩小，小叶片披针形。复伞形花序呈圆锥状；伞梗4~10个，不等长；总苞和小总苞各具1~3个线形早落的苞片和小苞片。小伞形花序有花2~4；花白色，有时带淡紫色；萼齿不显；双悬果线状长卵形。花期4~5月。生于林下阴湿处。分布于全国。

【性味功效】根：辛，温。发表散寒、止咳化痰。治风寒感冒、咳嗽、跌打损伤等。全草：辛、苦，平。消炎、解毒、活血、消肿。治肺炎、疝气、风火牙痛、痈疽疔肿、带状疱疹、皮肤瘙痒等。煎服10~20克。

【应用】1. 全草煎洗，治皮肤瘙痒。2. 全草配瓜子金、金银花藤，治流行性脑脊髓膜炎。3. 全草配鱼腥草、桔梗、瓜蒌根，治肺脓肿。



伞形科

刺芫荽 (洋芫荽、假芫荽、野芫荽)

【药名】刺芫荽。

【药用部位】伞形科植物刺芫荽 *Eryngium foetidum* L.的全草。全年采收。

【识别特征】多年生草本。因香气似芫荽，叶缘有刺，故称“刺芫荽”。基生叶披针形或倒披针形，基部渐窄而成一阔而扁平的叶柄，边缘有硬骨质和刺状齿，羽状脉达锯齿尖端成硬刺。花茎直立，粗壮，中部以上2分枝，具有疏锐齿的茎生叶；开白色或淡绿色小花，花极多，呈圆形或矩圆形头状花序，花序柄极短，生于花茎的分叉处；总苞片4~6，叶状，较小，有针刺；小苞片比花略长；萼齿硬而尖；花瓣狭；花盘厚。双悬果极小，有茶色小凸瘤。花期4月，果期5~6月。生于较肥沃、湿润的林边、路旁、山坡和空地上。分布于广东、广西、云南等地。

【性味功效】辛、微苦，温。气香。理气止痛、温中和胃、行气消肿、止痛。治感冒胸痛、消化不良、肠炎腹泻、毒蛇咬伤、胃寒呃逆、跌打肿痛、急性传染性肝炎、阑尾炎等。煎服9~15克(鲜品15~30克)。外用适量，捣敷。

【应用】1. 单味煎服，治感冒发热、止泻。2. 鲜草捣敷，治毒蛇咬伤。





伞形科

天胡荽（盆上芫荽、满天星）

【药名】天胡荽。

【药用部位】伞形科植物天胡荽 *Hydrocotyle sibthorpioides* Lam.的全草。夏、秋季采收。

【识别特征】多年生草本。茎纤弱细长，匍匐地上成片，茎节上生根。单叶互生；叶片圆形或近肾形，基部心形，5~7浅裂，裂片短，有钝齿2~3。伞形花序与叶对生，单生于节上，每伞形花序具花10~15，萼齿缺乏；花瓣卵形，呈镊合状排列，绿白色。双悬果略呈心脏形，分果侧面扁平，光滑或有斑点，背棱略锐。花、果期4~7月。生于湿润草地、沟边。分布于江苏、浙江、四川等地。

【性味功效】甘、淡、微辛，凉。清热利湿、消炎止血、凉血解毒、化痰止咳、透疹。治传染性黄疸型肝炎、肝硬化腹水、伤风感冒、咳嗽喉痛、扁桃体炎、结膜炎、急性肾炎、急性胆囊炎、小儿透疹发高热等。煎服9~15克。

【应用】1. 煎服，治急性黄疸型肝炎、肾结石、小儿疳积等。2. 配茵陈蒿，治肝炎发黄。3. 捣烂炒热外敷，治跌打瘀肿。



伞形科

紫花前胡（前胡）

【药名】紫花前胡。

【药用部位】伞形科植物紫花前胡 *Peucedanum decursivum* Maxim. 的根。冬季至次年茎叶枯萎或未抽花茎时采收。

【植物形态】多年生草本。茎紫色、有棱，上部分枝。叶纸质，1~2回羽状全裂，1回裂片3~5，再裂3~5，叶轴翅状，茎上部叶简化成叶梢；叶柄基部扩大成鞘状；复伞形花序顶生或腋生；总苞片1~2，伞10~20，花紫色；雄蕊5，花药卵圆形；子房无毛，花柱2枚，极短。双悬果椭圆形，侧棱有窄翅。花期8~9月，果期9~10月。生于荒坡、路旁、草地或灌木丛中。主产于我国东部、中南至西南部等地。

【性味功效】苦、辛，微寒。降气化痰、宣散风热。治咳嗽痰多色黄、外感风热而咳嗽有痰、月经不调、胸胁痛、呃逆等。煎服9~12克。

【应用】1. 配麦冬、贝母、桑白皮、杏仁、甘草，治咳嗽痰多色黄，心胸不利而时有烦热。2. 配贝母、白前、麦冬、枳壳、芍药、麻黄等，治肺热咳嗽、痰壅、气喘不安。



伞形科

鹅脚板 (异叶茴芹)

【药名】鹅脚板。

【药用部位】伞形科植物鹅脚板 *Pimpinella diversifolia* DC.的全草。秋季采收。

【识别特征】二年生草本、稀为多年生草本。根纤细，有臭气。茎直立。叶片卵状心形，不裂或3浅裂；茎中部叶多为1~2回3出复叶；先端渐尖，两侧裂片的基本部偏斜，边缘具圆齿或锐齿；茎上部叶为3出复叶，下面叶脉上有柔毛。秋季开白花或绿色花，总苞片2~4，线形；复伞形花序，被毛；萼齿不显；花瓣5，卵形，先端内折，背部有粗毛；雄蕊5，子房下位，被毛。双悬果球状卵形，分果各具线状棱5。花期8月，果期9~10月，生于山坡灌木草丛中。分布于华东、中南、西南、华南各地。

【性味功效】辛、甘、微温。散瘀消肿、祛风散寒、止痛、解毒。治感冒、胃痛、痢疾、毒蛇咬伤、跌打损伤、皮肤瘙痒等。煎服9~15克。外用适量，捣敷或煎洗。

【应用】配夏枯草，煎洗，治皮肤瘙痒。



杜鹃花属

杜鹃花（满山红、映山红）

【药名】杜鹃花。

【药用部位】杜鹃花科植物杜鹃花 *Rhododendron simsii* Planch. 的茎、叶、花。4~5月采收。

【识别特征】落叶灌木。分枝多，茎上有亮棕色或褐色扁平糙伏毛。叶纸质，卵形、椭圆状卵形或倒卵形，先端锐尖，基部楔形，上面疏生糙伏毛，下面毛较密；叶柄长3~5毫米，密生糙伏毛。花2~6，簇生枝顶；花萼长4毫米，5深裂，密生糙伏毛和睫毛；花冠鲜红色或深红色，宽漏斗状，裂片5，上方1~3裂片里面有深红色斑点；雄蕊10，花丝中部以下有微毛；子房10室。蒴果卵圆形，密生糙伏毛。花期春季。生于山坡、丘陵的疏林或灌木丛中。分布于我国长江流域地区。

【性味功效】花：酸甘，温。和血调经、祛风湿。治月经不调、闭经、崩漏、风湿痛等。茎叶：酸，平。清热解毒、止咳、止血。治痈疮、外伤出血、慢性支气管炎等。煎服15~30克。

【应用】1. 花单味煎服，治老年人慢性支气管炎。2. 嫩叶捣敷，治各种外伤出血、荨麻疹。3. 根配香茶菜根、益母草、月月红花，治月经不调。





柿科

柿

【药名】柿子、柿叶、柿花、柿蒂、柿根、柿霜。

【药用部位】柿科植物柿 *Diospyros kaki* L. f. 和根、叶、花、果实等。花、果实秋、冬季采收；其余全年采收。

【识别特征】落叶乔木。树皮鳞片状开裂，灰黑色，枝具棕色皮孔，嫩枝有柔毛。叶互生；叶柄有柔毛；叶片椭圆形至倒卵形，先端渐尖，基部阔楔形，全缘，革质，主脉疏生柔毛，下面淡绿色，沿叶脉密生淡褐色茸毛。花单性同株，黄白色，子房上位8室。浆果卵圆球形，基部有宿存萼片。花期5月，果期9~10月。多为栽培。分布于全国大部分地区。

【性味功效】柿蒂、柿根：苦、涩，平。降逆气，凉血止血。止呕啰、血痢。煎服10~20克（根鲜用50~100克）；或入丸、散服。柿霜、柿子、柿叶、柿花：甘、涩，寒。清热润燥。治肺热燥咳、各种出血、消渴、口疮。煎服或冲服5~15克；或配他药作丸嚙化。外用，撒敷或研末敷。风寒咳嗽者忌服。

【应用】1. 柿叶配马蓝、阿胶、侧柏叶煎服，治血小板减少症。2. 柿蒂配乌梅核仁，加糖煎服，治百日咳。3. 柿蒂、柿霜等分，烧研敷患处，治臁胫烂疮。4. 未成熟柿子捣汁冲服，治甲状腺肿大。5. 柿根配红斑鸠窝煎服，治血痢。





紫金牛科

朱砂根（高脚罗伞、大罗伞、珍珠伞）

【药名】朱砂根。

【药用部位】为紫金牛科植物朱砂根 *Ardisia crenata* Sims 的根、全株。秋后采收。

【识别特征】灌木。叶厚纸质至革质，椭圆状披针形至倒披针形，先端短尖或渐尖，基部短尖或楔尖，两面均秃净，有降起的黑色腺点，边缘有钝圆波状齿，背卷，有腺体；伞形花序顶生或腋生，花白色或淡红色；萼片5裂；花冠5裂，与萼片均有稀疏的腺点；雄蕊5，花丝极短；子房上位。核果球形，熟时红色，有黑色斑点。花期6~7月。生于山地林下、沟边、路旁。分布广东、广西、四川、福建等地。

【性味功效】苦、辛，凉。清热解毒，散瘀止痛。治上感，扁桃体炎，急性咽炎，白喉，丹毒，淋巴结炎，劳伤吐血，心胃气痛，风湿骨痛，跌打损伤。煎服15~25克；或研末为丸、浸酒。外用适量，捣敷。

【应用】1.根单味水煎服，治上呼吸道感染，扁桃体炎，白喉，丹毒，淋巴结炎。2.根配木通、虎骨、鸡骨香、大血藤、桑寄生浸酒服，治风湿骨节痛。3.根水煎或冲黄酒服，治跌打损伤，关节风痛。



紫金牛科

紫金牛 (矮地茶)

【药名】紫金牛。

【药用部位】紫金牛科植物紫金牛 *Ardisia japonica* (Hornsted) Blume 的全株。秋季采收。

【识别特征】半灌木、少分枝，匍匐生根。有褐色柔毛，根红色。叶对生或轮生，椭圆形或长椭圆形，先端钝尖，边缘具细齿，两面有腺点，下面中脉及叶柄有微柔毛。花序近伞形，腋生或近顶生；花萼5裂，有腺点；花冠5裂，白色，有红色腺点；雄蕊5，短于花冠裂片，花药背面有腺点；雌蕊约与花冠裂片等长。核果球形，熟时红色。花期8~9月，果期9~11月。生于林下阴湿处。分布于我国长江流域至华南、西南各地。

【性味功效】微苦，平。活血散瘀、解毒消肿、止咳、止血。煎服10~30克。

【应用】单味煎服，治肺结核、咯血、咳嗽、慢性支气管炎、跌打、风湿、慢性肝炎、睾丸炎、白带、尿路感染、闭经、疳积、流感等。





紫金牛科

虎舌红 (乳毛紫金牛、红毛毡、老虎脬)

【药名】虎舌红。

【药用部位】紫金牛科植物虎舌红 *Ardisia mamillata* Hance 的全草。夏、秋季采收。

【识别特征】常绿矮小亚灌木，根状茎粗，长柱状，横走，常弯曲，外皮红褐色，断面灰褐色，茎绿棕色，粗糙，具纵走细皱纹，密被深棕色粗毛。单叶互生，叶柄被毛；叶片椭圆形或倒卵形，先端钝，基部渐窄缩成楔形，常稍偏斜，边缘全缘或近浅波状，上面粗糙，密被暗红紫色糙伏毛，下面色浅，毛较稀疏，具多数突起的黑色小腺点，侧脉不明显。夏季开粉红色小花，顶生或腋生伞形花序，被糙毛；花萼5裂，花瓣5裂，雄蕊5，核果球形，红色。生于山坡密林下和水旁，耐阴好湿。分布于我国南部及西南部各地。

【性味功效】苦、微辛，凉。散瘀止血、清热利湿。治痢疾、肝炎、胆囊炎、风湿、跌打劳伤、咳血、吐血、妇女痛经、血崩、小儿疳积、疮疖痈肿疼痛等。煎服9~15克。外用适量，研末调敷。孕妇忌服。

【应用】1. 单味泡酒，治外伤出血、跌打劳伤。2. 配淫羊藿，治虚劳咳嗽。3. 配玉竹，治产后心悸、虚弱。





紫金牛科

沿海紫金牛 (小罗伞、腺点紫金牛、血党)

【药名】小罗伞。

【药用部位】紫金牛科植物沿海紫金牛 *Ardisia punctata* Lindl. 的根、叶。全年采收。

【识别特征】常绿直立灌木。根柔软肥壮。茎幼时被褐色小毛，除花枝外不分枝。叶互生，革质，矩圆形至椭圆状披针形，长7~14厘米，宽1.5~3厘米，先端短尖或钝，基部阔楔形，上面深绿色，秃净，下面淡绿色，被暗褐色小毛，全叶具无数黑色腺点，边缘处连成一明显的边脉，叶边缘有腺体。伞形花序，花冠内部白色，外被紫色斑点，裂片钝头，浆果球形，熟时深红色，径6~8毫米，有腺点。花期6~9月。生于深山林下或灌木丛中。分布于广东、浙江、江西等地。

【性味功效】苦、甘、辛，温。活血调经、祛风除湿。治月经不调、经闭、不孕症、痛经、风湿痹痛、跌打损伤、扁桃体炎、牙痛等。煎服25~20克。

【应用】配姜黄、茜草、黄花倒水莲等，治痛经。



紫金牛科

罗伞树（五脚紫金牛）

【药名】罗伞树。

【药用部位】紫金牛科植物罗伞树 *Ardisia quinquegonu* Bl. 的根、叶。全年采收。

【识别特征】灌木。有分枝。叶坚纸质，矩圆状椭圆形、矩圆状披针形或倒披针形，长7~10厘米，宽2~3厘米，基部急尖或渐窄而成一短柄，先端渐尖，全缘，下面有暗褐色鳞片，侧脉多数，联结成不明显的边脉。花序侧生或腋生，聚伞状或近于伞形，长1~6厘米；花长3~4毫米；萼裂片卵形，1/3合生，有疏散或相当密的腺点；有睫毛；花冠裂片卵形，钝或急尖，有腺点；雄蕊短于花瓣，雌蕊长于花瓣，常伸出花蕾外。果扁球形。生于山坡，山谷杂木林中，分布于广东、福建、台湾、广西等地。

【性味功效】微辛，微温。清咽消肿、散瘀止痛。治咽喉肿痛、风湿性关节痛、跌打损伤、疖肿，煎服15~25克。外用适量。捣敷或煎洗。

【应用】根煎服，治跌打、骨折、外伤出血、脚软无力等。



紫金牛科

酸藤果（信筒子、入地龙、酸藤子）

【药名】酸藤果。

【药用部位】紫金牛科植物酸藤果 *Embelia laeta* (L.) Mez 的果实、枝叶、果实夏季采收；枝叶全年采收。

【识别特征】落叶藤状灌木或藤本。枝灰色或褐红色，秃净。单叶互生；纸质；倒卵形至狭矩圆形，长3~6厘米，宽1~2厘米，先端钝或浑圆，基部楔尖，全缘，两面秃净；叶柄长约5毫米。花单性异株；稠密的总状花序腋生或侧生；花序长5~10厘米，有花3~8；花柄长约2毫米；萼片4裂，花瓣4，白色，雄蕊4，子房在雄花中退化。浆果球形，径约5毫米，熟时暗红色。花期春季。生于山坡灌木丛及山地疏林中向阳之处。分布于我国南部各地。

【性味功效】果实：酸、甘，平。强壮补血。治胃酸缺乏、食欲不振等。枝叶：酸、涩，平。消炎杀菌、散瘀止痛、清热解毒、收敛止泻。治咽喉肿痛、牙龈出血、脾虚泄泻、跌打瘀痛、痔疮等。煎服9~15克。

【应用】鲜果单味煎服，治胃酸缺乏、牙龈出血。



紫金牛科

白花酸藤果 (早禾酸)

【药名】白花酸藤果

【药用部位】紫金牛科植物白花酸藤子 *Embelia ribes* Burm. f. 的根。秋季采收。

【识别特征】攀缘灌木。老枝有明显的皮孔。叶互生，厚纸质；叶片倒卵状椭圆形或近椭圆形，顶端钝头，基部圆或近楔尖，全缘，两面无毛，下面略粉白色，侧脉不明显；叶柄有狭翅。花白色，单性，组成顶生圆锥花序；萼片5~4，花瓣5~4，离生，雄花中的雄蕊与花瓣等长，雌花中的雌蕊与花瓣等长或稍短。浆果近球形，成熟时红色或深紫色，干时有皱纹和凸起的腺点。花期春、夏季。生于阳光充足的山坡林缘或丘陵灌木丛中。分布于我国南部各地。

【性味功效】甘、酸，平。活血祛瘀、消肿止痛。煎服10~15克。外用适量，捣敷。

【应用】1. 根单味煎服，治痢疾、急性胃肠炎、妇女经闭、外伤出血等。2. 鲜叶捣敷，治外伤肿痛。



紫金牛科

鲫鱼胆（空心花）

【药名】空心花。

【药用部位】紫金牛科植物鲫鱼胆 *Maesa perlarius* (Lour.) Merr. 的全株，全年采收。

【识别特征】灌木。叶柄有长硬毛或疏柔毛，长5~10毫米；叶膜质或薄纸质，椭圆形，急尖或渐尖，长7~12厘米，宽2.5~6厘米，上部边缘有粗锯齿，下部全缘，两面有长硬毛或疏柔毛，侧脉约7对，总状或圆锥花序腋生，长2~4厘米，有疏柔毛、长硬毛或微柔毛；花白色，香，小苞片披针形或卵形；花萼裂片宽卵形；花冠长约为萼片的2倍。果球形或卵球形，长3毫米，有纵条纹。生于林旁、林缘灌丛中。分布于广东、台湾、福建、广西等地。

【性味功效】苦，平。消肿接骨、生肌去腐。治跌打、刀伤、疔疮。外用适量，捣敷。

【应用】外用捣敷，治跌打刀伤、疔疮肺病。



山矾科

华山矾 (土常山)

【药名】华山矾。

【药用部位】山矾科植物华山矾 *Symplocos chinensis* (Lour.) Drucer 的根、叶。夏、秋季采收。

【识别特征】落叶灌木。树皮灰白色，嫩枝密被白色柔毛。单叶4生，具短柄；叶片近革质，长圆形或倒卵形，先端短尖，基部宽楔形或近圆形，边缘有细锯齿，齿端细尖。上面被短细毛，下面密生白色长柔毛，叶脉在背面突起，有白色柔毛。花白色，排成圆锥花序，顶生及腋生；花瓣5，长圆形；雄蕊多数，雌蕊1，子房下位，2室。核果卵圆形，熟时蓝黑色，花期6~7月，果期10~11月。生于丘陵、荒坡、旷野、灌木丛中。分布于我国长江流域以南各地。

【性味功效】甘、微苦，凉。解表退热、解毒、除烦、清热利湿、止血生肌。治疟疾、痢疾、感冒、肾炎、牙痛、便秘、皮肤瘙痒、外伤出血等。煎服6~15克（鲜品15~30克）。外用适量，捣敷或研末调敷。

【应用】1. 鲜叶捣敷，治烫火伤、疮疡。2. 嫩叶配野南瓜叶、枫树叶、凤尾草叶等，治痢疾。



马钱科

醉鱼草 (毒鱼草、公鸡尾)

【药名】醉鱼草。

【药用部位】马钱科植物醉鱼草 *Buddleia lindleyana* Fort.的全草。4~6月采收。

【识别特征】落叶灌木。树皮茶褐色，嫩枝具四棱而稍有翅，并有短白茸毛。单叶对生；卵圆形至矩状披针形，纸质，先端尖，全缘或有小齿，基部浑圆至钝形或楔形；嫩叶密被绵毛，老时无毛，全缘或有小齿。总状花序顶生；总苞片1，披针形，有茸毛；花萼钟状，4或5浅裂；花冠紫色，4裂，裂片卵圆形；雄蕊4，雌蕊1，子房上位。蒴果椭圆形；种子细小，花期4~7月，果期10~11月。生于山地、路旁、山谷溪旁。分布于江苏、浙江、广东等地。

【性味功效】辛、苦，温。有毒。杀虫、祛风除湿、活血祛瘀、化痰止咳平喘。治流行性感胃、咳嗽、哮喘、风湿性关节痛、蛔虫病、钩虫病、跌打、外伤出血、疔腮、瘰癧等。煎服10~15克（鲜品15~30克）。

【应用】1.单味煎服，治流行性感胃、瘰癧。2.配枫球、荠菜，治疔腮。3.花配蛇葡萄根、马鞭草，治痈疽疔毒。



马钱科

断肠草（胡蔓藤、大茶药、钩吻）

【药名】断肠草、大茶药。

【药用部位】马钱科植物断肠草 *Gelsemium elegans* (Gardn.et Dhamp.) Benth.的全草。全年采收。

【识别特征】缠绕藤本，枝光滑。叶对生，卵形至卵状披针形，长7~12厘米，宽2~6厘米，顶端渐尖，基部渐狭或近圆形，全缘。聚伞花序顶生或腋生；花小，淡黄色；苞片小而狭；萼片5，分离；花冠漏斗状，内面有淡红色斑点，裂片5；雄蕊5，子房2室，有胚珠多颗。蒴果卵形，种子有膜质的翅。生于向阳的山坡、路边的草丛或灌丛中。分布于我国华南大部分地区。

【性味功效】苦、辛，温。有大毒。攻毒拔毒、散瘀止痛、杀虫止痒。外用治皮肤湿疹、体癣、脚癣、跌打损伤、骨折、痔疮、疔疮、麻风。外用适量，鲜品捣敷，或煎洗。只作外用，禁止内服。

【应用】1.单味煎洗，治体癣、脚癣和湿疹。2.鲜叶适量捣敷，治骨折、跌打损伤。





木犀科

山指甲（板子茶、蚊仔树、苦枕）

【药名】山指甲。

【药用部位】木犀科植物山指甲 *Ligustrum sinense* Lour.的叶。全年采收。

【识别特征】灌木，枝条密生短柔毛，单叶对生，叶薄革质，椭圆形至椭圆状矩圆形，长3~7厘米，顶端锐尖或钝，基部圆形或宽楔形，下面沿中脉有短柔毛，圆锥花序长4~10厘米，有短柔毛；花白色，花梗明显；花冠筒比花冠裂片短；雄蕊超出花冠裂片。核果近圆状，直径4~5毫米。生于山地疏林下或路旁、沟边。分布于我国长江以南各地。园林上多有栽培。

【性味功效】苦，寒、凉。清热凉血、消肿祛瘀。治肺热咳嗽、斑痧发热、跌打肿痛、烧烫伤。煎服20~40克。外用适量，捣敷。

【应用】1.单味煎服，治肺热咳嗽、斑痧发热。2.枝叶煎洗，治烧烫伤、疮疡肿毒。



木犀科

扭肚藤（白花茶、青藤、毛毛茶）

【药名】扭肚藤。

【药用部位】木犀科植物扭肚藤 *Jasminum amplexicaule* Buch. Ham. 的茎叶。夏、秋季采收。

【识别特征】藤状灌木。小枝微有毛。单叶对生；叶片卵状披针形，被微毛或近秃净或沿背脉上有柔毛，具短柄。聚伞花序稠密，常生于侧枝之顶，多少被柔毛；花柄极短；萼被毛，裂片线形；花冠白色，芳香，高脚碟状，裂片矩圆形；雄蕊2，内藏；子房上位，2室，果球形，花期7月。生于路旁、林缘或疏林中，常攀缘于灌木丛中。分布于广东、广西、贵州等地。

【性味功效】微苦，微寒。清热解毒、利湿止泻。治湿热腹痛、肠炎、痢疾、四肢麻痹肿痛、瘰癧、疥疮等。煎服15~30克（鲜品30~60克）。外用适量，捣敷或煎洗。

【应用】配火炭母、救必应、车前草、石榴皮，治急性胃肠炎及消化不良引起的腹痛、泄泻、呕吐。



木犀科

樟叶茉莉（光叶清香）

【药名】樟叶茉莉。

【药用部位】木犀科植物樟叶茉莉 *Jasminum laurifolium* Roxb. 的枝叶。全年采收。

【识别特征】缠绕木质藤本。幼枝及叶无毛。单叶，对生，革质，矩圆形、狭椭圆形、披针形或条状披针形，长3~10厘米，有明显的3脉，细脉两面都不显；叶柄有节。聚伞花序有花3~5，顶生或有长梗而腋生；花梗长8~20毫米；花萼无毛，裂片线形而尖，长3~6毫米；花冠白色或绿黄色，花冠筒长17~20毫米，裂片条形，锐尖，和花冠筒的长度略等。果卵状，直径约4毫米，绿黄色（未成熟）。生于山地、河边杂木或灌木丛中。分布于安徽、台湾、福建、广东等地。

【性味功效】苦，寒。清热解毒、消炎利尿、消肿脓瘀。治痢疾、尿路感染、膀胱炎、尿道炎、肾炎水肿、跌打伤、扭挫伤等。煎服20~31克。外用适量，捣敷。

【应用】配木通、海金沙、车前草，治尿路感染。



木犀科

桂花 (木犀、金桂、银桂)

【药名】桂花、桂花子、桂花树根。

【药用部位】木犀科植物桂花 *Osmanthus fragrans* Lour. 的全株。花 9~10 月开花时采收，其余全年采收。

【识别特征】常绿灌木或小乔木。树皮灰白色。叶对生，革质；叶片椭圆形或长椭圆状披针形，先端尖或渐尖，基部楔形，全缘或有锐细锯齿，叶脉 6~8 对，向下而突出；叶柄短。花簇生于叶腋，雌雄异株；花萼 4 裂，花冠 4 裂，白色或黄色，芳香；雄花雄蕊 2，雌花雌蕊 1，子房 2 室。核果长椭圆形，种子 1。花期 9~10 月。在我国大部分地区有栽培。

【性味功效】芳香。甘、辛，温。化痰止咳、散瘀止痛。治寒痰壅滞之咳嗽气喘、胸满胁痛、痰饮喘咳等；瘀滞疼痛、疝气、牙痛、肠风血痢、口臭等。煎服：花 3~9 克；果 6~12 克；根 9~15 克。外用适量，煎水含漱或蒸热敷。

【应用】1. 桂花水煎漱口或泡茶饮，治口臭。2. 桂花子（果实）煎服，治虚寒胃痛；或配香附 9 克、砂仁 6 克、高良姜 9 克煎服，治胃痛。3. 根 60 克泡酒 500 克（10 天）早晚服 10 克，治筋骨疼痛。4. 枝叶煎浓汁温洗敷，每日数次，治风湿筋骨痛。



夹竹桃科

三叶念珠藤（念珠藤、链珠藤、春根藤）

【药名】三叶念珠藤。

【药用部位】夹竹桃科植物三叶念珠藤 *Alyxia sinensis* Champ. 的根、茎，全年采收。

【识别特征】藤状灌木。具乳汁。叶对生或3叶轮生，革质，具短柄，通常圆形或卵形、倒卵形，长1.5~3.5厘米，宽0.8~2厘米，顶端圆或微凹，两面无毛，边缘反卷；侧脉不明显。总状聚伞花序腋生或近顶生，花序长不及1.5厘米；花小，长5~6毫米；花萼5深裂，内无腺体；花冠先淡红色后变白色，高脚碟状，花冠筒内面无毛，花冠裂片5，向左覆盖；雄蕊5，着生于花冠筒中部以上。核果卵形，长约1厘米，直径0.5厘米，2~3颗连成链珠状。生于矮林或灌木丛中。分布于贵州、广东、广西等地。

【性味功效】苦，平，有毒。舒筋活络、驱风镇痛、清热解毒。煎服30~60克。

【应用】1.配地桃花、忍冬藤各30克，鸡血藤18克，煎服，治风湿性关节痛、筋骨不舒、跌打损伤。2.配骨碎补15克，煎服，治腰痛。3.配山苍子、马齿苋各15克，治腹泻。



夹竹桃科

长春花（日日新）

【药名】长春花。

【药用部位】夹竹桃科植物长春花 *Catharanthus roseus* (L.) G. Don 的全草，全年采收。

【识别特征】常绿亚灌木。茎直立，节稍膨大，叶交互对生；先端浑圆而具短尖，基部渐窄而成一短柄，全缘或微波状，主脉基部淡红紫色。夏秋间于叶腋开紫红色或粉红色花，单生或成对生；花萼小，5深裂；花冠高脚碟状，裂片5，旋卷，阔倒卵形，基部窄长；雄蕊5，内藏；心皮2，子房离生，花柱合生。蒴果通常成对，圆柱形，被毛。花期近全年。多栽培。分布于广东、广西、云南等地。

【性味功效】微苦，凉。有毒。抗癌、镇静、安神、平肝、降压、清热解毒、凉血。用提取的长春花碱制成的注射剂治高血压、何杰金氏病、恶性肿瘤、绒毛膜上皮癌、儿童淋巴性白血病、痈疮肿痛、烧烫伤等。注意本品大毒，忌内服。

【应用】1.鲜叶适量，捣敷，治烧烫伤。2.鲜叶适量，加红糖少许，捣敷，治痈疮肿毒。





夹竹桃科

尖山橙（竹藤）

【药名】尖山橙。

【药用部位】夹竹桃科植物尖山橙 *Melodinus fusiformis* Champ. ex Benth. 的全株。全年采收。

【识别特征】木质藤本，具乳汁。幼枝、嫩叶、叶柄、花序被短微毛，渐变无毛。叶对生，近革质，椭圆形或短圆形，稀椭圆状披针形，基部楔形。花序顶生；花萼5深裂，裂片矩圆形，顶端急尖；花冠白色，高脚碟状，花冠裂片5，长卵圆形或倒披针形，比花冠筒长，向左覆盖；雄蕊5，生花冠筒下部。浆果椭圆形，橙黄色，顶端短尖，基部圆形或钝。花期4~9月，果期6月至翌年3月。生于海拔300~1400米的山地疏林中或山坡、山谷水沟边。分布于广东、福建、广西和贵州等地。

【性味功效】苦，凉。活血、祛风、补肺、通乳。煎服6~9克。果实有毒，误食能致呕吐。

【应用】单味煎服，治风湿性心脏病。



夹竹桃科

红花夹竹桃（夹竹桃）

【药名】红花夹竹桃。

【药用部位】夹竹桃科植物红花夹竹桃 *Nerium indicum* Mill. 的全株。全年采收。

【识别特征】常绿灌木。叶具短柄，3叶轮生，少有对生，厚革质；叶片长披针形，全缘，上面深绿色，下面淡绿色，平行羽状脉。聚伞花序顶生，花紫红色或白色，芳香；萼紫色，外面密被柔毛；花冠漏斗状；雄蕊5；子房2室，花柱圆柱状，柱头僧帽状。长蒴果2，长15~18厘米。花期8~10月。原产伊朗，现广泛分布于热带及亚热带地区；我国南部各地均有栽培。

【性味功效】苦，寒。有毒。祛痰定喘、活血止痛、强心利尿。治喘息咳嗽、癫痫、跌打损伤肿痛、经闭、心脏病心力衰竭等。煎服0.3~1克。外用适量，捣敷。孕妇忌服。

【应用】本品中含有类似洋地黄的强心作用，且生物效价较高，临床上曾试用于风湿性心脏病等所引起的心力衰竭，疗效较好。



夹竹桃科

鸡蛋花

【药名】鸡蛋花。

【药用部位】夹竹桃科植物鸡蛋花 *Plumeria rubra* L. cv. *Acutifolia* 的花。夏、秋季采收

【识别特征】灌木至小乔木。有乳汁。小枝肥厚多肉质。叶互生，厚纸质，矩圆状椭圆形或矩圆状倒卵形，长20~40厘米，宽7~11厘米，秃净，羽状网脉，常聚集于枝上部。聚伞花序顶生，花大，多数，极香；花萼小，5裂，裂片钝头；花冠外面白而略带淡红色，内面基部黄色，裂片倒卵形，彼此覆盖；雄蕊5，着生于冠管基部，子房上位，心皮2，分离。蓇葖果双生，条状披针形；种子矩圆形，扁平，顶端具矩圆形膜质翅。花期8月。在广东、福建、广西、云南等地有栽培。

【性味功效】甘，微寒。清热利湿、止痢、润肺止咳。治肺炎、肝炎、消化不良、急性支气管炎、疳积、痢疾、肠炎、感冒发热等。煎服15~30克。

【应用】1. 单味煎服，治痢疾、夏季腹泻。2. 配金银花、槐花、葛花、木棉花煎服，治湿热、肠炎。



夹竹桃科

羊角拗 (羊角扭)

【药名】羊角扭。

【药用部位】夹竹桃科植物羊角拗 *Strophanthus divaricatus* (Lour.) Hook. et Arn. 的种子、茎叶。茎叶四季采收；种子秋、冬季采收。

【识别特征】直立或攀缘状灌木。小枝棕褐色有白色皮孔。全株有乳汁。叶对生，具短柄；叶片椭圆形或矩形，先端渐尖，基部楔形，全缘，厚纸质，两面无毛。花黄白色，顶生或3花合生成聚伞花序；有苞片1对，狭线形；花萼5裂，裂片披针形，淡黄色；花冠黄色，漏斗形，上部5裂；雄蕊5，子房2室半下位，蓇葖果木质，双出扩展，长披针形，形似“羊角”，内含种子多数；种子线形而扁，顶端有一束白色丝状长毛。花期3~4月，果期8~9月。生于山坡或丛林中。分布于广东、贵州、广西等地。

【性味功效】苦，寒。有毒。祛风湿、通经络、解疮毒、杀虫、治风湿肿痛、小儿麻痹后遗症、跌打损伤、痈疮、疥癣等。本品有毒，禁内服，只外用，适量，捣敷或煎洗。

【应用】1. 叶适量煎洗，治风湿肿痛、小儿麻痹后遗症、疥癣。2. 叶粉末适量，用酒水调和温敷，治多发性脓肿、毒蛇咬伤、跌打骨折。



夹竹桃科

络石

【药名】络石藤

【药用部位】夹竹桃科植物络石 *Trachelospermum jasminoides* (Lindl.) Lem. 的茎叶，秋末冬初叶未脱落前采收。

【识别特征】常绿攀缘木质藤本。茎圆柱形，节稍膨大，表面有点状皮孔，幼枝带绿色，密被褐色短柔毛。叶对生，叶片老时革质，椭圆形或卵状披针形，全缘，上面深绿色，无毛，下面淡绿色，被细柔毛。聚伞花序，花白色，芳香，花萼小，5深裂；花冠5裂，雄蕊5。蓇葖果2个，长圆柱形；种子多数，线形而扁，褐色，顶端有一束白色细簇毛。花期4~5月，果期10月。生于山野、溪边、坑谷、路旁杂木林中，常攀缘树上或墙壁、岩石上。分布于华南、华中、西南等各地。

【性味功效】苦、微涩，微寒。通络除痹、凉血消痈、清利湿热。治风湿痹痛、筋脉拘挛、痈肿、喉痹、吐血、跌打损伤、产后恶露不行等。煎服6~15克。

【应用】1. 单味浸酒服，治筋骨痛；晒干研末撒敷，治外伤出血。2. 配五加根皮、牛膝根，治关节炎。3. 配地稔，治肺结核。



萝藦科

杠棺回（白叶藤、脱皮藤）

【药名】杠棺回。

【药用部位】萝藦科植物杠棺回 *Cryptolepis sinensis* (Lour.) Merr.的全株。全年采收。

【识别特征】木质藤本。具乳汁。小枝通常红褐色，无毛。叶对生，矩圆形，长1.5~6厘米，宽0.8~2.5厘米，两端圆形，顶端具小尖头，上面深绿色，下面苍白色，无毛；侧脉每边5~9条。聚伞花序顶生或腋生，比叶长；花蕾矩圆形，顶端尾状渐尖；花萼5裂，内有腺体10；花冠淡黄色，裂片条状披针形，比花冠筒长2倍，向右覆盖；副花冠生于花冠筒内面，卵圆形；雄蕊5。蓇葖果长披针形，种子顶端具种毛。生于丘陵山地灌木丛中。分布于广东、贵州、云南、广西等地。

【性味功效】甘、淡，凉。有小毒。凉血止血、清热解毒。煎服3~10克，外用适量，捣敷。

【应用】1.单味煎服，治肺结核咯血、胃出血。2.鲜叶捣敷，治毒蛇咬伤、疥疮等。



萝藦科

匙羹藤

【药名】匙羹藤。

【药用部位】萝藦科植物匙羹藤 *Gymnema sylvestre* (Retz.) Schult. 的枝叶。全年采收。

【识别特征】木质藤本。具乳汁。茎皮灰褐色，具皮孔，幼枝被微毛。叶对生，倒卵形或卵状矩圆形，长3~8厘米，宽1.5~4厘米，仅叶脉和叶柄被微毛，叶柄顶端具丛腺体。聚伞花序腋生，比叶短；萼片5，花冠绿白色，钟状，裂片5，向右覆盖；雄蕊着生于花冠的基部，并与雌蕊合生为合蕊柱。蓇葖果羊角状，长5~9厘米，宽2厘米，顶端渐尖，基部膨大；种子顶端轮生白绢质种毛。生于林中或灌木丛中。分布于广东、广西、福建、浙江等地。

【性味功效】平，苦。有毒。消肿止痛、生肌。治风湿关节痛、扁桃体炎、乳腺炎、湿疹、跌打损伤。煎服9~30克。外用适量，捣敷。

【应用】1.配马兰各15克煎服，治急性扁桃体炎。2.配徐长卿、忍冬藤煎服，治风湿关节痛。3.配土茯苓、稀莪草、杠板归、路路通，治湿疹。4.鲜叶配酢浆草，炒热敷，治跌打损伤。



萝藦科

娃儿藤（卵叶娃儿藤、三十六荡）

【药名】娃儿藤、三十六荡。

【药用部位】萝藦科植物娃儿藤 *Tylophora ovata* (Lindl.) Hook. ex Steud. 的根。夏季开花前或秋季采收。

【识别特征】多年生藤本。全株被锈黄色柔毛。根茎短，根细长。茎圆柱形，上部缠绕。单叶对生；叶片长卵形，全缘，侧脉明显。聚伞花序伞房状，腋生；花小，淡黄色或黄绿色；花萼裂片5，卵形，有缘毛；花冠辐状，裂片5深裂，长圆披针形，两面被微毛副冠裂5个，卵圆形，贴生于合蕊冠上；子房由2个离生心皮组成，无毛；柱头盘状五角形。蓇葖果双生，卵状窄披针形；种子卵形。花期4~8月；果期8~12月。生于灌木丛或杂木林中。分布于台湾、湖南、广东、广西等地。

【性味功效】辛，温。有小毒。祛风除湿、散瘀止痛、止咳定喘、解蛇毒。治风湿痹痛、哮喘、支气管炎、跌扑肿痛、毒蛇咬伤、肿瘤等。煎服3~10克。外用适量，捣敷。孕妇及体弱者忌用。

【应用】1. 鲜品捣敷，治毒蛇咬伤。2. 配大蓟、金不换、小罗伞，治哮喘顽痰。



中文名索引

一画

一条根 82

二画

匕爪风 30

匕经通 194

七裂叶悬钩子 30

九龙藤 48

九里香 194

入地龙 262

入地金牛 202

八角枫 226

三画

三十六荡 300

三丫苦 192

三叉苦 192

三不正 44

三月泡 28

三加皮 228

三叶人字草 74

三叶五加 228

三叶念珠藤 282

三叶扁藤 182

三叶崖爬藤 182

三花悬钩子 34

三角青 44

上山虎 196

千斤红 82

千打槌 212

千里香 194

土甘草 60

土杜仲 152

土常山 268

土常山 6

土圉儿 60

大叶千斤拔 82

大叶千斤拔根 82

大叶花椒 200

大叶铁包金 164

大叶蛇泡官 24

大枫树 226

大罗伞 252

大金英 22

大种牛奶树 118

大茶药 272

山巴椒 204

山芙蓉 72

山角麻 100

山鸡血藤 80

山枇杷 200

山油柑 188

山指甲 274

山蚂蝗 64

山香圆 212

山麻木 100

山黄麻 100

山葡萄 176

山黑豆 90

山熊胆 146

小叶冷水花 140

小叶榕 120

小构树 108

小果蔷薇 20

小罗伞 258

小金樱 20

小扁藤 182

小柘树 112

小槐花 64

广东王不留行 124

广东金钱草 68

广州相思子 58

广金钱草 68

广寄生 156

飞龙掌叶 196

飞龙掌血 196

马甲子 168

马扫帚 78

四画

王不留行 124

五寸刀 212

五爪龙 126

五爪龙 178

五叶藤 178

五指毛桃 126

五倍子树 216

五脚紫金牛 260

天胡荽 242

天香藤 38

无花果 114

木波罗 104

木犀 280

木蜡树 218

车轮梅 18

日日新 284

贝椒子 204

公鸡尾 270

勾儿茶 164

毛毛茶 276

毛冬青 146

毛披树 146

毛桃 16

火煨木 46

火梅 96

牛见愁 220

牛奶糙 118

牛耳枫 2

牛肚子果 104

牛栓藤 220

乌敛莓 178

乌梅 14

乌藤 48

水肿木 46

水麻 136

水麻叶 136

长刺楸木 232

长春花 284

五画

东南葡萄 186

车轮梅 18

石莲子 50

龙芽草 8

龙须藤 48

龙眼 208

龙眼叶 208

龙眼肉 208

龙眼核 208

仙鹤草 8
白叶藤 296
白花三月泡 32
白花茶 276
白花悬钩子 26
白花酸藤子 264
白面水鸡 180
白桂木 106
白粉藤 180
白银香 148
白薯藤 180
鸚不企 230
对叶榕 118
丝线吊金钟 182

六画

老鼠耳 166
老鼠眼 90

老虎刺 256
芒果 214
芒果核 214
亚婆钱 86
地五加 178
地栗子 60
地莓 10
夹竹桃 288
刚毛白勒花 228
旱禾酸 264
网络崖豆藤 84
伞托树 234
光叶花椒 202
光叶清香 278
决明 56
决明子 56
华山矾 268
华瓜木 226

华南云实 52
尖山橙 286
异叶茴芹 246
异果山绿豆 66
扛棺回 296
朱砂根 252
朴树 102
竹叶花椒 204
竹叶椒 204
竹藤 286
红毛毡 256
红叶楸 220
红叶藤 220
红花夹竹桃 288
羊角拗 292
羊带归 164
血见飞 196
血风藤 172

血党 258
过山风 150
过江龙 40
过江扁藤 184
过岗龙 40

七画

赤车 138
两指剑 212
两面针 202
苎麻 132
苎麻叶 132
苎麻根 132
扭肚藤 276
杜鹃花 248
杨梅 96
杨梅皮 96
杨梅根 96

围涎树 44
 岗梅 144
 岗梅根 144
 卵叶娃儿藤 300
含羞草 42
 沙纸树 110
 谷沙藤 108
鸡血藤 84
鸡骨草 58
 鸡桐木 72
鸡眼草 74
鸡蛋花 290
 乳毛紫金牛 256
 洗头树 44

八画

青梅 14
 青梅 96

青麻 132
 青麻泡 32
 青藤 276
 苦李根 170
 苦枕 274
苦楝 206
 苦楝皮 206
茅莓 28
 刺五加 228
 刺叶榕木 232
刺芫荽 240
刺桐 72
 刺桐皮 72
 刺糖果 22
 拉拉秧 130
 板子茶 274
构树 110
枇杷 12

枇杷叶 12
 枫树 92
枫香 92
 画眉架 198
罗伞树 260
虎舌红 256
 昆明鸡血藤 84
 单面针 200
沿海紫金牛 258
 泡藤 26
 波罗蜜 104
 狗卵果 106
 狗花椒 198
 知羞草 42
 念珠藤 282
 金桂 280
 金钱草 68
 金蝉脱壳 112

金樱子 22
 鱼骨柴 94
 空心花 266
 空心泡 32
 细叶冬青 146

九画

春花木 18
 春根藤 282
 枰尾木 144
柿 250
柿子 250
 柿叶 250
 柿花 250
 柿根 250
 柿蒂 250
 柿霜 250
 树婆罗 104

毒鱼草 270
 降真香 188
 亮叶围涎树 46
 亮叶猴耳环 46
 信筒子 262
 前胡 244
 南岭虎皮楠 2
 南蛇勒 50
 南蛇藤 150
 南蛇藤 50
 胡蔓藤 272
 草决明 56
 荔枝 210
 荔枝核 210
 荔枝藤 220
 娃儿藤 300
 将军木 106
 扁担藤 184

扁枝槲寄生 158
 扁茎崖爬藤 184
 扁藤 184
 映山红 248
 洋芫荽 240
 独脚乌桕 180
 狭叶山黄麻 98
 玻璃草 140
 珍珠伞 252
 病子薯 60
 盆上芫荽 242
 矩圆叶冻绿 170
 矩圆叶鼠刺 4
 穿破石 112
 络石 294
 络石藤 124
 美丽胡枝子 78
 美洲商陆 224

钩吻 272
 香花岩豆藤 80

十画

桂花 280
 桂圆 208
 桃 16
 桃子 16
 桃仁 16
 盐肤木 216
 盐霜柏 216
 鸭儿芹 238
 鸭母树 234
 鸭脚木 234
 圆眼 208
 倒吊葫芦 122
 凉粉果 124
 拿身草 64

桑 128
 桑叶 128
 桑白皮 128
 桑枝 128
 桑寄生 156
 桑棋子 128
 海桐 72
 海桐皮 72
 积雪草 236
 胭脂木 106
 蚊仔树 274
 蚌壳花椒 200
 透明草 140
 钱串木 86
 钱蒿菜 236
 铁牛入石 172
 铁冬青 148
 铁包金 166

铁篱笆 168
高脚罗伞 252

十一画

黄药 170
黄常山 6
黄毛榕 116
黄皮 190
黄毛榕木 230
排钱树 86
排钱草 86
救必应 148
蛇泡勒 28
蛇莓 10
野杨梅 10
野茺蓂 240
野扁豆 54
野葛 88

野漆树 218
野漆树根 218
假决明 54
假老虎勒 52
假茺蓂 240
假花生 66
假葡萄 180
筋柎 198
匙羹藤 298
商陆 222
暖脓膏 142
婆那婆 104
寄生 154
寄生藤 160
崩大碗 236
常山 6
断肠草 272
望江南 54

梅 14
梅叶冬青 144
猫爪勒 50
痒漆树 218
眼镜豆 40
粗叶悬钩子 24
粗叶榕 126
脱皮藤 296
银桂 280
鹿藿 90

十二画

葎草 130
葛根 88
葡蟠 108
蓑芝 112
葫芦茶 70
割人藤 130

喝呼草 42
森树 206
楮 110
楮叶 110
楮实子 110
琴叶榕 122
紫花前胡 244
紫金牛 254
紫麻 136
链珠藤 282
鹅脚板 246
鹅掌柴 234
猴耳环 44
粤蛇葡萄 176
疏花卫矛 152

十三画

榕木 232
楮树 36
鼓桐皮 72
满山红 248
满天星 242
矮地茶 254
腺点紫金牛 258
路路通 92
雷公根 236
雾水葛 142
鼠刺根 4

十四画

截叶铁扫帚 76
榕树 120
榕树叶 120
榕树须 120
檀藤子 40

漆木 218
熊胆木 148
蔓性千斤拔 82
蔓胡颓子 174
蔷薇莓 32
酸藤子 262
酸藤果 262
欏板茶 70
馒头果 124

十五画

樟叶茉莉 278
醉鱼草 270
鲫鱼胆 266

十六画

燕子尾 48
糖罐子 22

薜荔 124
鞘花 154
鞘花寄生 154
檀香 162

十七画以上

翼核果 172
榧木 94
榧木花 94
榧木根 94
藤构 108
藤黄檀 62
藤檀 62
糯米团 134

拉丁学名索引

A

Abrus cantoniensis Hance 58
Acanthopanax trifoliatum (L.) Merr.
 var. *setosus* Li. 228
Acronychia pedunculata (L.) Miq. 188
Agrimonia pilosa Ledeb. 8
Alangium chinense (Lour.) Harms 226
Albizia chinensis (Osbeck) Merr. 36
Albizia corniculata (Lour.) Druce 38
Alyxia sinensis Champ. 282
Ampelopsis cantoniensis Planch. 176
Apios fortunei Maxim. 60
Aralia decaisneana Hance 230

Aralia spinifolia Merr. 232
Ardisia crenata Sims 252
Ardisia japonica (Hornsted) Blume 254
Ardisia mamillata Hance 256
Ardisia punctata Lindl. 258
Ardisia quinqueгона Bl. 260
Artocarpus heterophyllus Lam. 104
Artocarpus hypargyrea Hance 106

B

Bauhinia championi Benth. 48
Berchemia giraldiana Schneid. 164
Berchemia lineate (L.) D.C. 166
Boehmeria nivea (L.) Gaud. 132
Broussonetia kazinoki Sieb. et Zucc. 108

Broussonetia papyrifera (L.) Vent. 110

Buddleia lindleyana Fort. 270

C

Caesalpinia minax Hance 50

Caesalpinia nuga Ait. 52

Cassia occidentalis L. 54

Cassia tora L. 56

Catharanthus roseus (L.) G. Don 284

Cayratia japonica (Thunb.) Gagn. 178

Celastrus orbiculatus Thunb. 150

Celtis sinensis Pers. 102

Centella asiatica (L.) Urban 236

Cissus modecoides Planch. var. *subintegra*
Gagn. 180

Clausena lansium (Lour.) Skeels 190

Cryptolepis sinensis (Lour.) Merr. 296

Cryptotaenia japonica Hassk. 238

Cudrania cochinchinensis (Lour.) Kudo
et Masam. 112

D

Dalbergia hancei Benth. 62

Daphniphyllum calycinum Benth. 2

Desmodium caudatum (Thunb.) DC. 64

Desmodium heterocarpum (L.) DC. 66

Desmodium styracifolium (Osbeck) Merr.
68

Desmodium triquetrum (L.) DC. 70

Dichroa febrifuga Lour. 6

Dimocarpus longan Lour. 208

Diospyros kaki L. f. 250

Duchesnea indica (Andr.) Focke 10

E

Elaeagnus glabra Thunb. 174

Elytranthe fordii (Hance) Merr. 154

Embelia laeta (L.) Mez 262

Embelia ribes Burm. f. 264

Entada phaseoloides (Linn.) Merr. 40

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 12

Eryngium foetidum L. 240

Erythrina variegata L. var. *orientalis* (L.)
Merr. 72

Euonymus laxiflorus Champ. 152

Evodia lepta (Spreng.) Merr. 192

F

Ficus carica L. 114

Ficus fulva Reinw. 116

Ficus hispida Linn. 118

Ficus microcarpa L. 120

Ficus pandurata Hance 122

Ficus pumila L. 124

Ficus simplicissima Lour. 126

G

Gelsemium elegans (Gardn. et Champ.)
Benth. 272

Gynmema sylvestre (Retz.) Schult. 298

Henslowia frutescens Champ. 160

Humulus scandens (Lour.) Merr. 130

Hydrocotyle sibthorpioides Lam. 242

I

Ilex asprella (Hook. et Arn.) Champ. ex
Benth. 144

Ilex pubescens Hook. et Arn. 146

Ilex rotunda Thunb. 148

Itea chinensis Hook. et Arn. 4

J

Jasminum amplexicaule Buch. Ham. 276
Jasminum laurifolium Roxb. 278

K

Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
 74

L

Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.
 Don. 76

Lespedeza formosa (Vog.) Kochne. 78

Liquidambar formosana Hance 92

Ligustrum sinense Lour. 274

Litchi chinensis Sonn. 210

Loranthus parasiticus (L.) Merr. 156

Loropetalum chinense (R.Br.) Oliv. 94

M

Maesa perlaris (Lour.) Merr. 266

Mangifera indica L. 214

Melia azedarach L. 206

Melodinus fusiformis Champ. ex Benth.
 286

Memoralis hirta (Bl.) Wedd. 134

Millettia dielsiana Harms. 80

Millettia reticulata Benth. 84

Mimosa pudica L. 42

Moghania macrophylla (Willd) O. Ktze.
 82

Morus alba L. 128

Murraya paniculata (L.) Jack. 194

Myrica rubra Sieb. et Zucc. 96

N

Nerium indicum Mill 288

O

Oreocnide frutescens (Thunb.) Miq. 136
Osmanthus fragrans Lour. 280

P

Paliurus ramosissimus (Lour.) Poir. 168
Pellionia radicans (Sieb. et Zucc.) Wedd. 138
Peucedanum decursivum Maxim. 244
Phyllodium pulchellum (L.) Benth. 86
Phytolacca acinosa Roxb. 222
Phytolacca americana L. 224
Pilea microphylla (Linn.) Liebm. 140
Pimpinella diversifolia DC. 246
Pithecellobium clypearia Benth. 44
Pithecellobium lucidum Benth. 46
Plumeria rubra L. cv. *Acutifolia* 290

R

Pouzolzia zeylanica (L.) Benn. 142
Prunus mume Sieb. et Zucc. 14
Prunus persica (L.) Batsch 16
Pueraria lobata (Willd.) Ohwi 88
Rhamnus crenata Sieb. et Zucc. 170
Rhaphiolepis indica (L.) Lindl. 18
Rhododendron simsii Planch. 248
Rhus chinensis Mill. 216
Rhus sylvestris Sieb. et Zucc. 218
Rhynchosia volubilis Lour. 90
Rosa cymosa Tratt. 20
Rosa laevigata Michx. 22
Rourea microphyllum (Hook. et Arn.) Planch. 220
Rubus alceaefolius Poir. 24
Rubus leucanthus Hance. 26

Rubus parvifolius L. 28

Rubus reflexus Ker. var *lanceoloba* Metc.
30

Rubus rosaeifolius Smith. 32

Rubus trianthus Hance. 34

S

Santalum album L. 162

Schefflera octophylla (Lour.) Harms 234

Strophanthus divaricatus (Lour.) Hook.
et Arn. 292

Symplocos chinensis (Lour.) Drucet 268

T

Tetrastigma hemsleyanum Diels et Gilg
182

Tetrastigma planicaule (Hook. f.) Gagn.
184

Toddalia asiatica (L.) Lam. 196

Trachelospermum jasminoides (Lindl.)
Lem. 294

Trema angustifolia Bl. 98

Trema orientalis (L.) Bl. 100

Turpinia arguta Seem. 212

Tylophora ovata (Lindl.) Hook. ex Steud.
300

Ventilago leiocarpa Benth. 172

Viscum articulatum Burm.f. 158

Vitis chunganensis Hu 186

Z

Zanthoxylum avicennae (Lam.) DC. 198

Zanthoxylum dissitum Hemsl. 200

Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC. 202

Zanthoxylum planispinum Sieb. et Zucc.
204

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名 = 中草药野外识别手册 第二册

作者 =

页数 = 3 1 4

S S 号 = 0

出版日期 =

历代中医书籍大全分享

你好，我是**逢原**，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com

二、加我 QQ/微信：**2049346637**

三、关注微信公众平台——逢原中医，经常有中医文章更新。

四、关注我的空间：<http://user.qzone.qq.com/2049346637>

不管哪种方式，看到你的信息我会第一时间回复，尽全力帮您！

加微信可以扫描以下二维码加我！



私人微信号：2049346637



公众平台：逢原中医