

中藥名大典

正名 别名 商品名 处方名

主编 刘道清

中原农民出版社



101320



主编 刘道清

正名 别名 商品名 处方名

中 药 大 典

中原农民出版社



C0169145

(豫)新登字07号

中 药 名 大 典

(正名 别名 商品名 处方名)

主编 刘道清

责任编辑 张新涛 刘培英

中原农民出版社出版 (郑州市农业路73号)

河南省新华书店发行 河南第一新华印刷厂印刷

850×1168毫米大32开本 31.375 印张 987 千字

1994年6月第1版 1994年6月第1次印刷

印数1—4000册

ISBN7-80538-628-5/R·64 定价32.00元

主编 刘道清
编者 刘道清 秦恩甲 冯世纶
王嘉善 张俊生 周 震
余作章 李建国 云雷霖

中府名大典

新本草

聲單

劉渡舟

書

中華名大典刊行紀念

機器集

癸未菊月

焦樹德



祝中药名大典出版

订正 品名防止混淆
保健治病造福人民

癸酉十月 頴正華



序

我国幅员辽阔，历史悠久，中药材十分丰富。这些中药材在不同地区、不同历史时期有不同的名称，这就使得每味中药有许多个别名。再加上它的商品名、处方名，往往一味中药就有十几个、甚至几十个、上百个名称，给了解和使用这些中药造成了困难。

为了确切地使用这些中药材，刘道清等同志查阅大量文献资料，进行深入调查研究，编纂成这部《中药名大典》。书中除详细介绍每味中药的正名、别名、商品名和处方名外，还介绍该药的功效、主治、慎忌、用量等，是一部非常实用的工具书。它不仅对中医医师和司药有用，而且对中药材采购、销售和炮制人员也适用。它的出版将受到中医药界的欢迎。

崔月犁

1993年国庆节

内 容 提 要

中医药学是一个伟大的宝库,被称作中国科技的“五大发明”之一。中药是中医防治疾病的主要武器。中药的应用经历了数千年的实践,形成了“理、法、方、药”一整套完整的理论体系。然因中国历史悠久,地域广袤,中药名称则有古今之异、区域之别,或同名异物,或同物异名,或彼此混称,或张冠李戴,造成许多混乱,甚至出现医疗事故。为了给中药研究、种植、采制、经销、使用提供翔实可靠的依据,作者参阅了大量古今文献,逐一甄别,去伪存真,编写了这部辞典。该书收编常用中药700余种,收录别名、商品名、处方名2万余个。同时,还分别介绍了其性味、归经、功效、主治、慎忌、用量及注意问题等。书后附有各类名称索引备查。全书共分20篇,计80余万字,是我国第一部中药名大典,被誉为“本草新声”。

本书由原卫生部部长崔月犁、前卫生部中医局局长吕炳奎分别作序,著名中医药大师焦树德、刘渡舟、颜正华等题词。该书既是中医医师、司药、研究人员的案头工具书,也是药品经营、药材炮制和采集人员的良师益友。

序

中药名称的混乱由来已久。在古代本草著作中，羌活与独活不分，至唐代甄权的《药性论》才将二者区分开来。泽兰与佩兰不分，至明代李时珍的《本草纲目》才把二者区分开来，但至今仍有个别地区混用。冬葵子是锦葵科植物冬葵的种子，可目前药材市场销售的大多为苘麻的种子。二者功效不同，为何混用？同是一味刘寄奴，南方使用的是菊科植物奇蒿，北方使用的却是玄参科植物阴行草。同是一味透骨草，有的地区使用的是大戟科植物地构叶，有的地区使用的却是凤仙科植物凤仙草。同是一味败酱草，正品应是败酱科植物黄花败酱或白花败酱，可南方却习惯以十字花科植物菥蓂作败酱草用，而北方则习惯以菊科植物苣荬菜作败酱草用。所有这些，以前没有任何一部书交待得清楚，一任混乱下去。

有些中医医师，在一张处方中，使得牛蒡子与大力子同时出现，天花粉与瓜蒌根同时出现，寻骨风与猴儿草同时出现，乌贼骨与海螵蛸同时出现，暴露出某些医师在中药别名方面的知识欠缺。赤小豆别名红豆，相思子别名亦称红豆。相思子有毒，有人误将相思子作赤小豆使用，造成中毒事故。这也是缺乏中药别名知识造成的后果。

中药的混称混用若不予以澄清，中药别名若无详细准确的介绍，中药的疗效就难以保证和提高，中医经验就难以总结与升华。这是历史留下来的一个急待解决的重大问题。

刘道清等医家抓住这一重大问题，查阅大量文献，深入调查研究，历经三个寒暑，编纂成这部《中药名大典》。该书既介绍每味

中药的别名、商品名和处方名，又介绍每味中药在各地（或各历史时期）的混称混用或误称误用情况，指出哪些品种是正品，哪些品种是副品，产于何地者品质最优，产于何地者品质较次等等。这对于提高中药质量、中医疗效和中医学的科学价值，都有很大好处。它的出版必将澄清药材市场的混乱现象，有利于中医药事业的蓬勃发展。它是广大中医药人员必备的教材和工具书，特此为序。

吕炳奎

1993年11月

前　　言

一次我去医院，见到一位副主任医师，他在一张处方中，既写了乌贼骨，又写了海螵蛸；在另一张处方中，既写了路路通，又写了狼目。他不知道海螵蛸乃是乌贼骨的别名，狼目乃是路路通的别名，结果闹出了笑话。于是我便萌发了编写一部中药名大典的念头。

又有一次我去中药房，见到一张处方中写有“一活”、“人羌”，被司药用笔圈去，说是无药，让医师调换。我说，这两种药你们这里都有，怎么说没有呢？原来司药不知道“一活”就是独活，“人羌”就是秦羌。于是加强了编写中药名大典的念头。

还有一次我去药材公司，想问一下这里羌活的品种，我怕口音出现差误，就用笔写在纸上：川羌、西羌、蚕羌、条羌、大头羌、鸡头羌、疙瘩羌、竹节羌……。营业员是一位年轻女士，她接过纸一看，不耐烦地说：什么这“枪”那炮的，我们这里只有羌活，其它“羌”大概没有。我碰了一鼻子灰。从药材公司出来，一直在想，像这样缺乏专业知识的人，如何能做生意？于是更坚定了编写一部中药名大典的决心。

有的中药是同名而异物。如赤小豆别名红豆，相思子别名亦称红豆。龙胆科植物秦羌别名大羌，毛茛科植物草地乌头的药材名亦称大羌。相思子、草地乌头都有毒，不可混作赤小豆和秦羌入药。而因混用出现的中毒事故却时有发生。诸多事实迫使我们必须立即编写一部中药名大典，供有关人员学习和使用。

以前曾见到过几本介绍中药材别名的书。但有的因别名收录不全而缺乏参考价值；有的因不辨真伪盲目乱收，搞得真假难分，

更无参考意义。如菊科植物黄花蒿常被误作茵陈入药，而某些“中药别名”书籍就将黄花蒿的别名也算作茵陈的别名，搞得本来就十分混乱的药材名称越发混乱了。

为了给医疗、药材人员提供一本可靠的教学参考书，也为了去伪存真，我们集中精力花费了3年多的时间，参阅大量古今文献，编写了这部《大典》。但因有些药材的混称或混用是由古代延传下来的，现在要想一下子统一认识，恐怕也难。不过我们还是为此目标而努力。

本书在高等医药院校教材《中医学》493种常用中药的基础上，又增加220种，合计713种，收录别名、商品名及处方名2万多个。基本上能够满足医疗和药材人员的需要。每一味中药均按概述、别名、商品名、处方名、注意点、性味归经、功效主治、用量慎忌等几个方面介绍，既使读者对该药材的各种名称有一个全面的了解，又使读者对该药材的功用慎忌等有一个整体的认识。其中的“注意”一项，是提醒读者，哪些药物易混作（或误作）该药物使用？混用或误用后会出现哪些毒副作用？哪些地区的药材市场易将何种药物混作（或误作）该药材使用？哪些医药古籍所载的该药实际上是指的另一种药材？哪些品种是该药材正品？哪些品种是该药材副品？等等。在购销和使用过程中应提醒注意。书后附有药材正名索引和别名（包括商品名和处方名）索引，以便查找。

在本书编纂过程中，得到了河南省中医药研究院及长垣县医药局等单位领导和同志的大力支持和帮助，在此一并致谢。

刘道清

1993年10月于郑州

凡 例

一、本书是在高等医药院校教材《中医学》493种常用中药的基础上，又增加220种，合计713种（涉及的中药近4000种）。收载别名、商品名、处方名2万余个。

二、同一味中药有许多名称，有的同名异物，有的同物异名。为了避免名实混淆，本书在每味中药名称之后标有拉丁学名，以便统一认识。

三、为了便于学习，本书采用教材的编写方式，按药物功效分为20篇。如解表药、清热药、泻下药等等。

四、每味中药以正名、概述、别名、商品名、处方名、注意、性味归经、功效主治、慎忌、用量顺序介绍。

五、正名以高等医药院校《中医学》教材及《中华人民共和国药典》、《中药大辞典》为准。

六、别名在这里指古名、原名、俗名、土名、地方名等。出处主要是历代本草专书，少数为中文辞书或其他书籍。经过反复考证，去伪存真（剔除混称或误称），然后入选。

七、商品名指古今药材市场、商店、商行、公司等所使用的名称。或以产地命名，或以品种命名，或以规格命名，或以形状命名，或以采集季节命名等等。

八、处方名是中医师处方使用的名称。或以炮制方法命名，或以产地命名，或用正名，或用同音或谐音。

九、别名、商品名、处方名有时难以截然分开，允许有交叉。

十、“注意”是提醒读者在名称方面应注意的问题，如古今文献记载之差异、各地药材市场之混称等。

十一、性味、归经、功效、主治、慎忌、用量是为全面了解药物而设，非本书重点，仅作扼要介绍。

十二、为了查阅方便，本书后附有正名笔画索引及音序索引、别名商品名处方名笔画索引及音序索引4套检索方法。笔画索引按笔画及字数多少顺序排列，笔画相同者按起笔横（一）、竖（丨）、撇（丿）、折（フ）、点（丶）顺序排列。音序索引按汉语拼音顺序排列。

目 录

一、解表药

(一) 辛温解表药

麻黄(1)
桂枝(2)
紫苏(附: 苏梗 苏叶)(3)
生姜(附: 生姜皮)	...(4)
香薷(5)
荆芥(6)
防风(7)
羌活(9)
白芷(10)
藁本(11)
苍耳子(附: 苍耳草 苍耳虫)(11)
辛夷(13)
葱白(14)
胡荽(14)
柽柳(15)

(二) 辛凉解表药

薄荷(15)
牛蒡子(16)
蝉蜕(17)
淡豆豉(18)
大豆黄卷(19)
桑叶(19)
菊花(附: 野菊花)(21)
蔓荆子(22)
葛根(附: 葛花)(23)
柴胡(24)
升麻(26)
浮萍(27)
木贼(28)
樱桃桂(29)
落新妇(30)

二、清热药

(一) 清热泻火药

石膏(30)
寒水石(31)
知母(32)
芦根(33)
竹叶(附:竹叶卷心)(34)
天花粉(35)
梔子(36)
猫爪草(37)
夏枯草(37)
鴨跖草(38)
谷精草(39)
密蒙花(40)
青葙子(41)
夜明砂(42)
狗尾草(42)
苦丁茶(43)
千里光(44)
鬼臼(45)
苘麻子(46)
秋石(46)
玄精石(47)
人中白(48)

(二) 清热燥湿药

黄芩(48)
----	-----------

黄连(50)

黄柏(52)

龙胆草(54)

苦参(55)

翻白草(56)

(三) 清热凉血药

犀角(附:

水牛角)(57)

生地黄(58)

玄参(59)

牡丹皮(60)

赤芍(62)

紫草(63)

(四) 清热解毒药

金银花(附:

忍冬藤)(65)

连翘(67)

蒲公英(68)

紫花地丁(附:

米口袋)(69)

大青叶(70)

板蓝根(71)

青黛(72)

穿心莲(73)

牛黄(74)

蚤休(75)

拳参	(77)	四季青	(102)
半边莲	(78)	金荞麦	(103)
垂盆草	(79)	地锦草	(104)
土茯苓	(79)	筋骨草	(105)
鱼腥草	(80)	绿豆	(106)
射干	(81)	乌蔹莓	(106)
山豆根	(82)	绞股蓝	(107)
马勃	(83)	仙人掌	(108)
金果榄	(84)	草珊瑚	(108)
藏青果	(85)	两面针	(109)
蜀羊泉	(86)	了哥王	(110)
喉咙草	(86)	狼把草	(111)
角茴香	(87)	爵床	(111)
无花果	(88)	土大黄	(112)
锦灯笼	(88)	柳叶(附: 柳枝 柳根)	(113)
马齿苋	(89)	紫荆皮(附: 紫荆花)	(114)
白头翁	(89)	松萝	(115)
委陵菜	(91)	蜗牛	(116)
秦皮	(92)	喜树	(117)
鸦胆子	(93)	长春花	(118)
红藤	(93)	半支莲	(118)
败酱草	(94)	佛甲草	(119)
墓头回	(95)	农吉利	(120)
白花蛇舌草	(96)	猪殃殃	(120)
熊胆	(97)	狗舌草	(121)
白蔹	(98)	龙葵	(122)
白鲜皮	(99)	天葵	(122)
漏芦	(100)		
山慈姑	(101)		

虎耳草	(123)	白药子	(132)
绶草	(124)	人中黄	(133)
十大功劳叶	(124)	紫草茸	(134)
飞廉	(126)	食盐	(135)
苜蓿菜	(127)	戎盐	(135)
茅莓	(127)	石花	(136)
蛇莓	(128)	(五) 清虚热药		
鬼羽箭	(129)	青蒿	(136)
瓦松	(129)	白薇	(138)
蔷薇花	(130)	地骨皮	(139)
木槿花	(131)	银柴胡	(140)
红药子	(131)	胡黄连	(142)

三、泻下药

(一) 攻下药					
大黄	(143)	甘遂	(151)
芒硝(附:玄明粉)	…	(145)	芫花	(152)
番泻叶	(147)	巴豆	(153)
芦荟	(147)	大戟	(154)
(二) 润下药			牵牛子	(155)
火麻仁	(148)	商陆	(156)
郁李仁	(149)	千金子	(157)
(三) 攻下逐水药			乌柏木根皮	(158)
			狼毒	(159)

四、祛风湿药

独活	(161)	防己	(164)
威灵仙	(162)	秦艽	(166)

豨莶草	(167)	透骨草	(183)
臭梧桐	(169)	老鹳草	(185)
木瓜	(169)	络石藤	(186)
徐长卿	(170)	海风藤	(187)
桑枝	(171)	青凤藤	(188)
桑寄生	(172)	天仙藤	(190)
五加皮	(173)	石南藤	(190)
虎骨	(175)	松节	(192)
豹骨	(176)	胡颓子根	(193)
白花蛇	(177)	辣蓼	(193)
乌梢蛇	(178)	荭草	(194)
海桐皮	(179)	糙苏	(194)
蚕沙	(180)	月见草	(195)
钻地风	(180)	夏天无	(195)
千年健	(181)	鹅不食草	(196)
寻骨风	(182)	黄花蒿	(197)
伸筋草	(182)	过江龙	(197)

五、芳香化湿药

苍术	(198)	白豆蔻(附: 豆蔻壳)	(206)
厚朴(附:厚朴花)	(200)	草豆蔻	(208)
藿香	(202)	草果	(208)
佩兰	(203)	零陵香	(209)
砂仁(附:砂仁壳)	(204)		

六、利水渗湿药

茯苓（附：茯苓皮	瞿麦 (234)
赤茯苓 茯神) … (210)	灯心草 (235)
猪苓	冬葵子 (236)
泽泻	向日葵花托 (237)
薏苡仁	向日葵茎髓 (238)
车前子（附：	糠谷老 (238)
车前草)	玉米须 (239)
滑石	问荆 (239)
木通	狗狗秧 (240)
通草	铁苋菜 (241)
金钱草	酢浆草 (241)
石韦	地耳草 (242)
海金沙（附：	葎草 (243)
海金沙藤)	黄藤 (243)
积雪草	凤尾草 (244)
牛筋草	含羞草 (245)
萆薢	万年青 (245)
茵陈蒿	六月雪 (246)
地肤子	水蜈蚣 (247)
冬瓜皮（附：	水菖蒲 (247)
冬瓜子)	萱草根 (248)
葫芦	夹竹桃 (249)
赤小豆	榆白皮 (250)
泽漆	榆叶 (250)
萹蓄	蟋蟀 (251)
	蝼蛄 (251)

石燕 (252) | 鱼脑石 (253)

七、温里药

附子(附: 乌头 天雄) (254)	丁香(附: 母丁香) (265)
干姜 (256)	高良姜 (266)
肉桂 (257)	红豆蔻 (267)
吴茱萸 (258)	小茴香 (267)
细辛 (260)	八角茴香 (268)
花椒(附: 椒目) ... (262)	胡椒 (269)
荜茇 (263)	山柰 (270)
荜澄茄 (264)	钟乳石 (270)

八、理气药

橘皮(附: 橘核 橘络 橘叶 橘红 橘白) (271)	沉香 (285)
青皮 (273)	川楝子 (286)
枳实 (275)	荔枝核 (287)
枳壳 (276)	青木香 (288)
佛手(附: 佛手花) (277)	薤白 (289)
香橼 (278)	韭菜 (290)
枸橘 (280)	檀香 (291)
木香 (280)	刀豆 (291)
香附 (282)	柿蒂 (292)
乌药 (283)	甘松 (293)
	娑罗子 (293)
	八月札 (294)
	玫瑰花 (295)

绿萼梅 (296)	大腹皮 (297)
九香虫 (296)	

九、消食药

山楂 (298)	谷芽 (302)
神曲 (附: 建神曲)	莱菔子 (303)
半夏曲 (采云曲) (300)	鸡内金 (303)
麦芽 (301)	胡颓子 (304)

十、驱虫药

使君子 (305)	鹤虱 (310)
苦楝皮 (305)	榧子 (312)
槟榔 (307)	芫荑 (312)
南瓜 (308)	贯众 (313)
南瓜子 (309)	土槿皮 (315)
鹤草芽 (309)	打破碗花花 (316)
雷丸 (310)	

十一、止血药

大蓟 (316)	地榆 (322)
小蓟 (318)	侧柏叶 (324)
芥菜 (319)	卷柏 (325)
紫珠 (320)	地柏枝 (326)
苎麻根 (321)	松花粉 (326)
白茅根 (321)	鸡冠花 (327)

槐花(附: 槐枝 槐耳) (327)	景天三七) (333)
槐角 (329)	茜草 (335)
仙鹤草 (329)	蒲黄 (337)
白及 (330)	花蕊石 (338)
棕榈皮 (331)	艾叶 (338)
血余炭 (332)	伏龙肝 (340)
百草霜 (332)	羊蹄(附: 金不换) (340)
三七(附: 菊叶三七	藕节 (342)

十二、活血祛瘀药

川芎 (343)	茜草花 (359)
延胡索 (344)	水红花子 (360)
郁金 (345)	桃仁 (360)
姜黄 (347)	红花 (361)
莪术 (347)	番红花 (363)
三棱 (348)	月季花 (363)
丹参 (349)	凌霄花 (364)
刘寄奴 (351)	牛膝 (365)
泽兰 (352)	土牛膝 (366)
虎杖 (354)	王不留行 (367)
铁树叶 (354)	毛冬青 (368)
益母草(附: 茺蔚子) (355)	路路通 (369)
凤仙草 (357)	鹿衔草 (370)
凤仙花 (357)	穿山龙 (371)
急性子 (358)	石见穿 (372)
仙桃草 (359)	鬼箭羽 (372)
	鸡血藤 (373)

乳香(374)	穿山甲(381)
没药(376)	麝虫(382)
降香(377)	水蛭(383)
苏木(378)	虻虫(385)
接骨木(378)	红娘子(385)
干漆(379)	青娘子(386)
五灵脂(380)	自然铜(387)

十三、化痰止咳平喘药

(一) 化痰药

半夏(388)
天南星(390)
白附子(392)
白芥子(393)
皂莢(附: 皂角刺)(393)
桔梗(395)
柿霜(396)
茶叶(396)
地骨髓(398)
水莎草(399)
旋复花(附: 金沸草)(399)
白前(401)
前胡(402)
瓜蒌(404)
川贝母(405)
浙贝母(407)

天竹黃(408)
竹茹(409)
竹沥(409)
海浮石(410)
海蛤壳(411)
礞石(412)
海藻(413)
昆布(414)
黄药子(415)
胖大海(416)
猪胆汁(417)
薄菜(417)

(二) 止咳平喘药

杏仁(附: 甜杏仁)(418)
百部(419)
紫菀(421)
款冬花(423)
苏子(424)

桑白皮(425)
葶苈子(426)
枇杷叶(427)
马兜铃(428)
矮地茶(430)
白果(430)
白果叶(431)
胡颓子叶(432)
满山红(432)
照山白(433)

白松塔(433)
暴马丁(434)
瓜蒌子(434)
木槿子(436)
木蝴蝶(436)
瓜子金(437)
黄荆(438)
洋金花(439)
鶗片(440)

十四、安神药

朱砂(441)
磁石(442)
铁落(443)
紫石英(443)
龙骨(444)
龙齿(445)
象牙(445)
马宝(446)
猴枣(447)

蜣螂(447)
琥珀(448)
酸枣仁(449)
柏子仁(450)
远志(450)
合欢皮(452)
合欢花(452)
榆钱(453)

十五、平肝息风药

羚羊角(附： 山羊角)(454)
石决明(455)
牡蛎(456)

珍珠(457)
珍珠母(458)
玳瑁(459)
紫贝齿(459)

代赭石	(460)	蜈蚣	(467)
钩藤	(461)	白僵蚕	(468)
天麻	(462)	地龙	(469)
刺蒺藜	(463)	蛇蜕	(470)
决明子	(465)	罗布麻	(471)
稽豆衣	(465)	猪毛菜	(472)
全蝎	(466)	芹菜	(472)

十六、开窍药

麝香	(473)	安息香	(476)
冰片	(474)	石菖蒲	(477)
苏合香	(475)		

十七、补虚药

(一) 补气药

人参	(478)
西洋参	(481)
党参	(482)
太子参	(485)
灵芝	(485)
黄芪	(486)
白术	(489)
山药	(490)
扁豆(附: 鹿豆衣 扁豆花)	(492)
甘草	(493)
大枣(附:	

枣树皮)	(495)
------	-------

饴糖	(496)
----	-------

蜂蜜	(497)
----	-------

(二) 补阳药

鹿茸(附: 鹿角 鹿 角胶 鹿角霜)	(498)
鹿鞭	(501)
巴戟天	(501)
肉苁蓉	(503)
仙茅	(504)
淫羊藿	(505)
胡芦巴	(506)
杜仲	(507)

续断	(508)
狗脊	(509)
骨碎补	(510)
补骨脂	(512)
益智仁	(513)
冬虫夏草	(514)
蛤蚧	(514)
胡桃肉	(515)
紫河车	(516)
菟丝子	(517)
沙苑子	(518)
锁阳	(520)
黄狗肾	(520)
海狗肾	(521)
海马	(522)
海龙	(523)
韭子	(524)
葱实	(524)
阳起石	(525)
(三) 补血药	
当归	(526)
熟地黄	(528)
何首乌(附:	
夜交藤)	(529)
藏角蒿	(530)
白芍	(531)
阿胶	(532)
鱼鳔	(533)
龙眼肉	(534)

(四) 补阴药	
沙参	(535)
珠儿参	(537)
珠子参	(537)
西瓜(附: 西瓜翠衣 西瓜皮 西瓜霜)	(538)
甘蔗	(539)
麦门冬	(540)
天门冬	(542)
石斛	(543)
玉竹	(546)
黄精	(547)
百合	(550)
荸荠	(552)
黑脂麻	(552)
亚麻子	(553)
向日葵子	(554)
龙葵子	(554)
枸杞子	(555)
桑椹	(556)
女贞子	(557)
橄榄	(558)
猕猴桃	(558)
罗汉果	(559)
楮实	(559)
枳椇子	(560)
凤凰衣	(561)
白木耳	(561)

墨旱莲(562)	鳖甲(564)
龟板(563)		

十八、收涩药

五味子(565)	莲子心(577)
乌梅(566)	荷花(578)
五倍子(568)	莲须(578)
浮小麦(附： 小麦)(568)	莲房(579)
糯米根须(569)	荷叶(579)
麻黄根(570)	荷梗(580)
椿皮(570)	荷蒂(580)
石榴皮(571)	芡实(581)
诃子(572)	山茱萸(582)
肉豆蔻(573)	金樱子(583)
赤石脂(574)	桑螵蛸(584)
禹余粮(575)	覆盆子(585)
罂粟壳(575)	乌贼骨(586)
莲子(576)	刺猬皮(587)
		没食子(588)

十九、涌吐药

瓜蒂(589)	胆矾(591)
常山(590)	藜芦(592)
蜀漆(591)	石蒜(593)

二十、外用及其它药

硫黄	(594)	大风子	(612)
雄黄	(595)	马钱子	(613)
砒石	(596)	蛇床子	(614)
水银	(597)	相思子	(615)
银朱	(597)	蓖麻子	(616)
轻粉	(598)	木鳖子	(616)
升药	(599)	藤黄	(617)
白降丹	(599)	松香	(618)
铅丹	(600)	孩儿茶	(619)
铅粉	(600)	血竭	(620)
硼砂	(601)	樟脑	(621)
硝砂	(602)	斑蝥	(622)
明矾	(603)	蟾酥(附:蟾皮)	(623)
皂矾	(603)	露蜂房	(624)
铜绿	(604)	蜂蜡	(625)
密陀僧	(605)	壁虎	(626)
无名异	(605)	壁钱	(626)
炉甘石	(606)	壁钱幕	(627)
石灰	(607)	瓦楞子	(627)
毛茛	(607)	象皮	(628)
大蒜	(608)	正名笔画索引	(631)
雪上一枝蒿	(609)	正名音序索引	(638)
雷公藤	(610)	别名商品名处方名	
木槿皮	(610)	笔画索引	(645)
木芙蓉叶	(611)	别名商品名处方名	
丝瓜络	(612)	音序索引	(958)

一、解 表 药

(一) 辛温解表药

麻 黄

出自《神农本草经》。为麻黄科多年生草本状小灌木草麻黄 *Ephedra sinica* Stapf. 或木贼麻黄 *E. equisetina* Bunge 和中麻黄 *E. intermedia* Schrenk et Mey. 的草质茎。主产于河北、山西、内蒙古、甘肃、辽宁、四川等地。立秋至霜降之间采收，阴干切段，生用或蜜炙用。

【别名】龙沙，卑相，卑监，狗骨，色道麻，结力根，麻黄草，草麻黄，中麻黄，木贼麻黄，山麻黄，川麻黄，田麻黄，华麻黄，木麻黄，西麻黄，朱芯麻。

【商品名】草麻黄：又名田麻黄、川麻黄、朱芯麻。为植物草麻黄的草质茎。

木贼麻黄：又名木麻黄、山麻黄。为植物木贼麻黄的草质茎。

中麻黄：为植物中麻黄的草质茎。

西麻黄：产于山西、甘肃、陕西、青海、新疆等地的麻黄。

以上商品以茎粗、干燥、色淡绿、内心充实、味苦涩者为佳。

【处方名】麻黄，生麻黄，炙麻黄，麻黄绒，净麻黄，水炙麻黄，蜜炙麻黄等。

处方中写麻黄、生麻黄均指净麻黄。为原药材除去木质茎及残根，并予去节，单用麻黄节间的茎质部分入药者。

炙麻黄是净麻黄（或生麻黄）加水清炒，或加蜜拌炒而入药

者。加水清炒者称水炙麻黄，加蜜拌炒者称蜜炙麻黄。

麻黄绒是指净麻黄经开水浸泡，待水面起沫便捞起晒干，再入碾槽碾至纤维疏松成绒状入药者。

【注意】在目前药材商品市场上，除上述三个品种外，尚有同属植物矮麻黄（山岭麻黄）*Ephedra gerardiana* Wall.（主产于云南、四川、西藏）、丽江麻黄（小麻黄）*E. likiangensis* Florin（主产于云南、四川）、膜果麻黄*E. przewalskii* Stapf（主产于甘肃、青海、新疆和内蒙古）、双穗麻黄*Ephedra distachya* L.（主产于我国东北和新疆地区）、藏麻黄*E. saxatiles* Royle（主产于四川、云南、西藏）、单子麻黄*E. monosperma* C.A.Mey.（主产于我国东北、西北和西南等地）等的草质茎，亦作麻黄入药使用，但非正品。多在当地自产自销。

【性味归经】辛、微苦，温。归肺、膀胱经。

【功效主治】发汗，平喘，利水。主治外感风寒、恶寒发热、头身疼痛、鼻塞、无汗、脉浮紧等表实证；风寒外束、肺气壅遏所致的喘咳证；水肿兼有表证。

【用量】1.5~10克。

【慎忌】表虚自汗及阴虚盗汗，喘咳由于肾不纳气者均忌用。

桂 枝

出自《神农本草经》。为樟科植物肉桂 *Cinnamomum cassia* Presl. 的嫩枝。主产于广西、广东、云南等地。春季割下嫩枝，晒干或阴干，切成薄片或小段入药。

【别名】柳桂，桂木枝，梗枝，木桂枝，桂树枝，糠桂枝，嫩桂枝，细桂枝，川桂枝，广眉尖。

【商品名】桂枝：又名桂枝段。为桂枝原药材切成的瓜子片。

桂木：又名桂枝木。为粗枝剥去皮，再切成柳叶片状的药材。

桂尖：又名桂枝尖。为桂枝梢削成的小段。

广眉尖：产于广东、广西的桂枝尖。因形状似眉，故名。

以上商品以枝嫩、外表棕红、断面白色、香气浓者为佳。

【处方名】桂枝，桂尖，桂枝尖，嫩桂枝，川桂枝等。

【性味归经】辛、甘，温。归心、肺、膀胱经。

【功效主治】发汗解肌，温经通阳。主治外感风寒引起的发热、头痛、恶风等证；风寒湿痹，肩背肢节酸痛；心脾阳虚，阳气不行，水湿内停而致的痰饮证；胸痹，胸痛或心悸证；经寒瘀滞所致的经闭、痛经及痛瘕等证。

【用量】3～10克。

【禁忌】温热病及阴虚阳亢，血热妄行诸证均忌用。孕妇及月经过多者慎用。

紫苏（附：苏梗 苏叶）

出自《本草经集注》。为唇形科1年生草本植物皱紫苏 *Perilla frutescens* (L.) Britt. var. *crispa* (Thunb.) Hand.-Mazz. 的带叶嫩枝。我国各地均产。每年7～9月采收，阴干使用。

【别名】苏，赤苏，红紫苏，皱紫苏，干紫苏，叶紫苏，野紫苏（野生者），家紫苏（家种者），桂桂，红苏，桂子，水状元。

【商品名】紫苏，赤苏。以紫棕色、分枝少、香气浓者为佳。

【处方名】紫苏。

【性味归经】辛，温。归肺、脾经。

【功效主治】发表散寒，行气宽中，解鱼蟹毒。主治风寒感冒，发热恶寒，头痛鼻塞，咳嗽多痰，胸闷不舒；脾胃气滞，呕吐；鱼蟹中毒引起的腹痛、吐泻等证。

【用量】3～10克。

【禁忌】风热外感慎用。

附：苏梗 苏叶

苏梗为紫苏或同属植物白苏 *P. frutescens* (L.) Britt. 的茎。又名紫苏梗、紫苏茎、老苏梗、紫苏杆、白苏梗、白苏茎、白苏杆、苏茎、苏杆等。商品以分枝少、色棕紫、香气浓者为佳。夏末采收者为嫩苏梗，秋末采收者为老苏梗。性味辛甘微温，归肺、脾、胃经。有宽胸利膈，顺气安胎的功效。主治胸腹气滞、痞闷作胀、胸腹疼痛及胎动不安等证。

苏叶为紫苏的叶片。又名紫苏叶、赤苏叶、红苏叶、红紫苏叶、皱紫苏叶、嫩苏叶、老苏叶、青苏叶、香苏叶等。商品上把铺平、晒干、扎成小把的苏叶称为“齐苏叶”。商品以色紫、叶片完整、香气浓者为佳。性味功效与紫苏略同，但其温胃散寒作用较强。主治胃寒胃痛，鱼蟹中毒等证。

生姜（附：生姜皮）

出自《名医别录》。为姜科多年生草本植物 姜 *Zingiber officinale* Rosc. 的鲜根茎。除东北地区外，其它大部分地区均产。夏秋二季采挖，除去茎叶和须根，洗净，切片入药。

【别名】姜，鲜姜，鲜生姜，老姜，炎凉小子，百辣云。

【商品名】生姜。以块大、丰满、质嫩者为佳。

【处方名】生姜，鲜姜，生姜片，煨姜，煨生姜。

生姜即鲜姜、生姜片。指原药洗净切片入药者。

煨生姜即煨姜。是将生姜用草纸包好，置灰火中煨至草纸焦黄，除去焦纸，切片入药者。

【性味归经】辛，微温。归肺、脾经。

【功效主治】发汗解表，温中止呕，温肺止咳。主治风寒感冒引起的恶寒发热、头痛鼻塞，胃寒呕吐；风寒（或虚寒）咳嗽，能

解半夏、南星、鱼蟹毒。

【用量】 3～10克。

【慎忌】 阴虚内热及热盛之证忌用。

附：生姜皮

为生姜根茎刮下的栓皮及附着的部分皮层。又名生姜衣、鲜姜皮、姜皮、鲜姜衣、姜衣等。性味辛微温。有和脾行水的功效。主治水肿。用量2～3克，鲜品6～9克。慎忌同生姜。

香 薺

出自《名医别录》。为唇形科多年生草本植物海洲香薷 *Elsholtzia splendens* Nakai ex F. Maekawa 的全草。主产于江西、河南、河北等地。果实成熟后割取全草，晒干，切段。

【别名】 香薷，香菜，香戎，香茸，香菇，紫花香薷，蜜蜂草，铜草，华莽苧，石莽宁，陈香薷，蚊子草，华荆芥，白花香薷，无花香薷，青香薷，江香薷，西香薷，南香薷，海洲香薷，窄叶香薷，细叶香薷。

【商品名】 江香薷：产于江西、河南、河北者。产量大，品质佳，销往全国，并供出口。

西香薷：产于江西宜春者。品质最佳，主要供出口。

青香薷：产于广西、湖南、湖北者。品质稍次，多自产自销或供附近地区，亦有少量出口。

以上商品以干燥、质嫩、茎基部紫红、叶青绿、气香辛烈者为佳。

【处方名】 香薷，香菇。

【注意】 各地民间所用香薷还有以下品种：

四川、陕西、山东等地以同属植物香薷 *Elsholtzia ciliata*

(Thunb.) Hyland 的干燥全草作“香薷”入药。四川称之为德昌香薷或土香薷。《本草衍义》所载之香薷，即此品种。但目前药材商品中很少使用。

福建、江西、贵州、两广、两湖等地，以同科植物石香薷 *Mosla chinensis* Maxim. 的全草作“香薷”使用。海洲香薷乃石香薷的栽培型。

云、贵、川等地以同科植物牛至 *Origanum vulgare* L. 的全草误作“香薷”使用。

新疆地区以同科植物萼果香薷 *Elsholtzia densa* Benth. var. *calycocarpa* (Diels) C.Y.Wu 的全草作“香薷”入药。

西藏有些地区以密花香薷 *Elsholtzia densa* Benth. 及其变种 *E. densa* Benth. var. *inathina* (Maxim.) C.Y. Wu 的全草作“香薷”入药，又称密香薷。

以上这些品种均非正品。正品应是海洲香薷。

【性味归经】辛，微温。归肺、胃经。

【功效主治】发汗解表，和中化湿，利水消肿。主治暑湿外感而引起的发热、恶寒、头痛、无汗、腹痛、吐泻；水肿，小便不利。

【用量】 6～12克。

【慎忌】 表虚有汗者忌用。

荆 芥

出自《神农本草经》。为唇形科1年生草本植物荆芥 *Schizonepeta tenuifolia* Briq. 的带花序的全草或花穗。主产于江苏、安徽、浙江、江西等地。其它省区也有分布，多为人工栽培。秋冬采收，阴干切段，生用、炒用或炒炭用。

【别名】假苏，鼠蓂，鼠实，姜芥，稳齿菜，四棱杆蒿，香荆芥，线芥，全荆芥。

【商品名】荆芥，荆芥穗。以色紫、茎细、穗多而密、香气浓者为佳。

【处方名】荆芥，荆芥穗，芥穗，炒荆芥，炒芥穗，荆芥炭，黑荆芥等。

荆芥指生荆芥。是未经炒制的带花序的全草。

荆芥穗或称芥穗、生芥穗。是未经炒制的花穗。

炒荆芥是将荆芥切段后，用文火微炒后入药者。

炒芥穗是将芥穗切段后，用文火微炒后入药者。

荆芥炭又名黑荆芥。是将荆芥切段后，用武火炒至焦黑色，存性，少喷清水，取出晾干入药者。

芥穗炭是将芥穗炒炭入药者。方法同荆芥炭。

【性味归经】辛，微温。归肺、肝经。

【功效主治】祛风解表，止血。主治风寒感冒引起的发热恶寒、无汗、头痛；风疹瘙痒或麻疹透发不畅；疮疡初起有表证者；炒炭可治便血、衄血和崩漏下血等证。

【用量】3～10克。

【慎忌】风热外感忌用。

防 风

出自《神农本草经》。为伞形科多年生草本植物防风 *Saposhnikovia divaricata* (Turcz.) Schischk. 的根。主产于我国东北三省。秋末至第二年春初采挖，除去芦头上之棕毛，晒干，润透切片使用。

【别名】铜芸，茴芸，茴草，百枝，百蜚，旁风，屏风，风肉，莞根，山芹菜根，白毛草根，黄风，北风，苏风。

【商品名】关防风：又名东防风、北风、苏风。产于辽宁、吉林、黑龙江及内蒙古东部。品质最优，销全国，并出口。

口防风：产于河北省承德、张家口一带。品质亦优。销全国，亦供出口。

西防风：为产于山西省者。质次于上。

山防风：又名黄防风、青防风。为产于河北省保定、唐山及山东省者。质次于关防风。

水防风：又名汜水防风。为产于郑州及洛阳汜水者。质次于关防风。

北防风：以上防风通称北防风。亦即正品防风。以区别非正品的川防风和云防风等。

公防风：又名软防风。为防风植株在只生叶、不开花、不结实时的根。此时的防风根浆足而丰满，有菊花心，质佳。

母防风：又名硬防风。为防风植株已开花结实后的根。此时根心变硬，根浆不足，柴性较大，质次，一般不入药。

以上商品以皮细而紧、根条粗壮、整齐、无须毛、质柔软、断面黄白色、中心黄色者为佳。

【处方名】防风。

【注意】同科植物川防风（短裂藁本）*Ligusticum brachylobum* Franch.、云防风（松叶防风）*Seseli yunnanense* Franch.、竹叶防风*S. mairei* Wolff 和新疆防风（伊犁防风、细叶防风）*S. iliense* (Reg. et Schmalh.) Lipsky、岩防风（石防风）*Peucedanum terebinthacoum* (Fisch) Fisch ex Turcz. 等的根在某些地区也作“防风”入药，但非正品。

在甘肃省部分地区，把同科植物黄蒿（小防风、马樱子）*Carum carvi* L. 的根误作“防风”使用。在青海个别地区，把迷果芹 *Sphallerocarpus gracilis* (Bess.) K-Pol. [*S. cyninum* Bess.] 的根误作“防风”使用。应予以纠正。

【性味归经】辛、甘，微温。归肝、脾、膀胱经。

【功效主治】祛风解表，胜湿，止痛，解痉。主治外感风寒所致的头痛、身痛、恶寒，风寒湿痹，关节疼痛，四肢挛急；破伤风角弓反张，牙关紧闭，抽搐痉挛等证。

【用量】3～10克。

【慎忌】血虚发痉及阴虚火旺者慎用。

羌 活

出自《药性论》。为伞形科多年生草本植物羌活 *Notopterygium incisum* Ting. 及同属植物宽叶羌活 *N. forbesii* Boiss. 或川羌活 *N. franchetii* Boiss. 的根茎及根。主产于四川、甘肃及云南等地。初春及秋季采挖，除去茎叶须根，晒干，切片入药。

【别名】羌青，护羌使者，胡王使者，退风使者，羌滑，黑药，宽叶羌活，川羌活，川羌，鄂羌活，鄂羌，西羌活，西羌，曲药。

【商品名】蚕羌：又名螺丝羌。为干燥的根茎部，形状似蚕，故名蚕羌，品质最优，销往全国，并供出口。

竹节羌：根茎的环节较稀，如竹节状，似蚕羌而略大。品质次之。

大头羌：又名疙瘩羌、鸡头羌。根茎的环节特别膨大，呈不规则团块状，大小不等，顶端残留有茎基。余皆与蚕羌同。品质又次之。

条羌：为干燥的根及支根，形如猪尾。

川羌活：简称川羌。为产于四川者。销往全国，并供出口。

西羌活：简称西羌。为产于甘肃、青海者。销往全国，并供出口。

以上商品以根条粗长、表面棕褐色、断面紧密、有环轮、油点多、气味纯正者为佳。

【处方名】川羌，羌活，川羌活等。

【性味归经】辛、苦，温。归肾、膀胱经。

【功效主治】解表散寒，祛风胜湿，止痛。主治外感风寒引起的发热恶寒，头痛身痛；风寒湿痹，关节肌肉酸痛麻木等。

【用量】3～10克。

【慎忌】阴虚火旺者慎用。

白 芷

出自《神农本草经》。为伞形科多年生草本植物兴安白芷 *Angelica dahurica* Benth. et Hook. 或川白芷 *A. anomala* Lallemand 和杭白芷 *A. taiwaniana* Boiss. 的根。主产于浙江、湖北、辽宁、四川等地，多系栽培。夏秋间叶黄时采挖，除去须根，晒干，切片入药。

【名别】 蘑，药蘑，茈，芷，芳香，苻蓠，泽芬，蘼，白茈，香白芷，兴安白芷，库页白芷，杭白芷，川白芷，香棒。

【商品名】 杭白芷：又名浙白芷、香白芷。为产于浙江者。

川白芷：又名库页白芷。为产于四川者。

祁白芷：又名兴安白芷。为产于河北安国、定县者。

禹白芷：又名会白芷。为产于河南禹州、长葛者。

以上商品以干燥、根条肥大、体坚实、粉性足、香气浓郁者为佳。

【处方名】 白芷，香白芷。

【注意】 目前在药材商品市场上，白芷的市售品种比较混乱。河北省有些地方把河北独活 *Heracleum moellendorffii* Hance 的根误作“白芷”使用；云南省个别地区把糙叶白芷（滇白芷、云南牛防风、粗糙独活）*H. scabridum* Franch. 当作“白芷”使用；湖北省和四川省的一些地区则把川鄂独活 *H. hemsleyanum* Diels 的根当作“白芷”使用。以上均非正品，应注意鉴别。

【性味归经】 辛，温。归肺、胃经。

【功效主治】 解表，祛风燥湿，消肿排脓，止痛。主治外感风寒，头痛鼻塞，阳明经头痛，眉棱骨痛，齿痛及头风疼痛；疮疡肿痛，皮肤风湿瘙痒；寒湿带下证等。

【用量】 3～10克。

【慎忌】 风热头痛慎用。

藁 本

出自《神农本草经》。为伞形科多年生草本植物藁本 *Ligusticum sinense* Oliv. 和辽宁藁本 *L. jeholense* Nakai et Kitag. 的根茎。主产于湖南、四川、辽宁、河北等地。初春采挖，除去芦头和须根，晒干，切片使用。

【别名】藁苲，鬼卿，地新，山茝，蔚香，微茎，藁板，山园荽，辽藁本，水藁本，家藁本，西芎藁本，北藁本，香藁本，净藁本，西芎，茶芎，热河藁本，野藁本，野芹菜，辽宁藁本，土芎，儿卿。

【商品名】藁本：又名川藁本、香藁本、西藁本、西芎藁本、西芎、茶芎。为植物藁本的干燥根茎。产于四川、湖南等地。

北藁本：又名辽藁本、辽宁藁本、热河藁本、香藁本。为植物辽宁藁本的干燥根茎。产于辽宁、河北等地。

以上商品以根茎体长、干燥、根苗少、质坚、香气浓者为佳。

【处方名】藁本、川藁本、北藁本。

【性味归经】辛，温。归膀胱经。

【功效主治】发表散寒，祛风胜湿，止痛。主治外感风寒所致的头痛、巅顶痛，风寒湿邪所致的痹痛、肢节痛等证。

【用量】3～10克。

【禁忌】血虚头痛和风热头痛慎用。

苍耳子（附：苍耳草 苍耳虫）

出自《神农本草经》。为菊科1年生草本植物苍耳 *Xanthium sibiricum* Patr. et Widd. 的果实。我国各地均有分布，多为野生。秋季果实成熟时采收，晒干，除去杂质，炒用。

【别名】藁耳实，牛虱子，胡寝子，胡苍子，苍郎种，棉蠧

螂，苍子，胡苍子，蛾虱子，苍棵子，苍耳蒺藜，老苍子，苍刺头，毛苍子，痴头猛，羊带归，羊负来，野茄子，敞子，刺儿棵子，刺耳果。

【商品名】苍耳子。以粒实硕大、饱满、色黄绿者为佳。

【处方名】苍耳子，苍耳仁，炒苍耳子。

写苍耳子、苍耳仁均指炒苍耳子。为净苍耳子用文火炒至外表略带焦斑入药者。

【性味归经】辛、苦，温。有小毒。归肺经。

【功效主治】通鼻窍，祛风湿，止痛。主治鼻渊引起的香臭不闻、流黄浊臭涕、头痛、眉棱骨痛等证和风湿痹痛、四肢拘挛等证。

【用量】3～10克。

【禁忌】血虚头痛慎用。过量服用易中毒，引起呕吐、腹痛、腹泻等证。

附：苍耳草

苍耳草为苍耳的茎叶。又名苍耳、卷耳、苓耳、枲耳、爵耳、佛耳、施，胡葵，常枲、常思、常思菜、地葵、白胡荽、耳珰草、羊负来、只刺、进贤菜、道人头、喝起草、繖丝草、野繖丝、野茄、野紫菜、野落苏、猪耳、痴头婆、虱麻头、粘粘葵、白痴头婆、刺儿棵、假矮瓜、白猪母络、疔疮草、狗耳朵草、狗子耳、苍子棵等。性味辛苦微寒，有小毒。有祛风、清热、解毒之功效。主治风湿痹痛，四肢拘挛，麻风，疔毒，皮肤瘙痒等证。因本品有毒，故内服不宜多用，常用量3～6克。

附：苍耳虫

苍耳虫为寄生于苍耳植株茎中的一种昆虫的幼虫。又名麻虫、苍耳螽虫。夏秋间捉取。焙干入药。有解毒散肿之功效。主治痈

肿、疔毒、痔疮等证。专供外用。

辛 夷

出自《神农本草经》。为木兰科落叶植物 辛夷 *Magnolia liliiflora* Desr. 和同属乔木植物玉兰 *M. denudata* Desv. 的花蕾。主产于安徽、四川、河南等地。多为栽培。早春花蕾未开放时采摘，晒干，去尽枝梗。

【别名】 辛矧，侯桃，房木，新雉，迎春，木笔，木笔花，毛辛夷，辛夷桃，姜朴花，林兰，木兰，木兰花，木莲花，桂花，紫玉兰，玉兰，玉兰花，白木莲，玉堂春，白玉兰，应春花，春花，辛夷花，毛笔头，生春花，会春花，白花树花，迎春花，辛夷，毛桃，喉桃，杜春花。

【商品名】 辛夷，辛夷花。以花蕾硕大、未开放、色黄绿、无枝叶杂质者为佳。

【处方名】 辛夷，辛夷花，辛夷苞，毛笔头，辛一。

【注意】 在药材商品市场上，辛夷的市售品种除上述两种外，下列同属植物的花蕾也作“辛夷”使用，但非正品。

望春花 *M. fargesii* Cheng 的花蕾，在河南某些地方作“辛夷”使用。

线萼辛夷 *M. biondii* Pamp. [*M. fargesii* (Fin et Gagnep.) Cheng] 的花蕾，在河南某些地区作辛夷使用。

滇藏玉兰（滇藏木兰）*M. campbellii* Hook. f. et Thoms. 的花蕾，在西藏地区作“辛夷”使用。

应春花（二月花）*M. diva* Stapf [*M. denudata* Desr. var. *purpurascens* Rehd. et Wils.] 的花蕾，在四川省川东地区作“辛夷”使用。

【性味归经】 辛，温。归肺、胃经。

【功效主治】 散风寒，通鼻窍。主治鼻渊引起的鼻塞不通、香

臭不闻、流黄臭浊涕、头痛及眉棱骨痛等证。

【用量】3～10克。

【慎忌】风火头痛慎用。

葱 白

出自《神农本草经》。为百合科多年生草本植物葱 *Allium fistulosum* L. 近根部的鳞茎。我国各地均有种植，随时可采，鲜用。

【别名】大葱白，葱白头，葱茎白，和事草白，芤白，菜伯白。

【商品名】葱白。以鳞茎粗大而长、气味辛烈者为佳。

【处方名】葱白，大葱白，鲜葱白，葱白头。

【注意】有些地方将细香葱（又名香葱、火葱、四季葱）*Allium ascalonicum* L. 的全草作“葱白”使用。功效相近，但非正品。

【性味归经】辛，温。归肺、胃经。

【功效主治】发汗解表，散寒通阳，解毒散结。主治风寒感冒，阴寒内盛，格阳于外所致的腹痛腹泻、厥冷脉微；痈疖疗毒。

【用量】3～10克。

【慎忌】不宜与蜂蜜同服。

胡 萝

出自《嘉祐本草》。为伞形科1年生草本植物胡荽 *Coriandrum sativum* L. 的全草。我国各地均有种植。八月果实成熟时采集。鲜用或晒干切段用。

【别名】园荽，臙荽，芫荽，延荽，莞荽，蕹荽菜，香荽，香菜，胡菜，胡荽，蕹葛草，满天星，荽，荽，菱。

【商品名】胡荽，芫荽，园荽。以棵大叶肥、香气浓郁者为佳。

【处方名】胡荽，芫荽，园荽，鲜胡荽。

【性味归经】辛，温。归肺、胃经。

【功效主治】发汗透疹。主治麻疹初期，透出不畅。

【用量】3～6克。

【禁忌】因热毒壅盛所致的疹出不透忌服。

柽 柳

出自《开宝本草》。为柽柳科落叶灌木或小乔木柽柳 *Tamarix chinensis* Lour. 的嫩枝叶。全国各地均有分布。5～6月开花时采集，鲜用或晒干切段用。

【别名】殷柳，殷柳条，殷柽，红筋条，三春柳，观音柳，西湖柳，山川柳，桧柽柳，柽，河柳，山川春，雨师，赤杨，人柳，赤柽，春柳，三眠柳，櫓落，长寿仙人柳，蜀柳，垂丝柳，赤柳，西河柳，赤柽柳，红柳，华北柽柳，桧叶柽柳，钻天柳，溪河柳，香椿柳，多枝柽柳，红荆条，丝柳，川山柳。

【商品名】柽柳，山川柳。以枝嫩叶肥者为佳。

【处方名】柽柳，西河柳，鲜柽柳。

【性味归经】辛，平。归肺、胃、心经。

【功效主治】发表透疹。主治麻疹初期，透发不畅；风寒外束，疹毒内陷。

【用量】3～10克。

【禁忌】疹已透者不宜用。用量过大令人心烦。

(二) 辛凉解表药

薄 荷

出自《新修本草》。为唇形科多年生草本植物薄荷 *Mentha haplocalyx* Benth.

plocalyx Briq. 和家薄荷的茎叶。我国南北均产，尤以江苏、安徽、浙江、江西产者最为著名。茎叶肥盛时采收，每年可采收2～3次。阴干，切段入药。

【别名】蕃荷菜，番荷菜，蓑蒿，吴蓑蒿，南薄荷，猫儿薄荷，升阳菜，薄苛，藿荷，夜息花，家薄荷，苏薄荷，野薄荷，龙脑薄荷，鸡苏，人丹草，薄荷草，英生，金钱薄荷，冰侯尉。

【商品名】太仓薄荷：产于江苏太仓者。为地道药材，品质最优。又可分为白种薄荷、黄种薄荷、青种薄荷、秧薄荷、臭薄荷5个品种。

苏薄荷：产于江苏苏州、常熟、嘉定、南通等地者。品质亦优。

南薄荷：产于我国南方者，如江西、江苏、浙江、安徽等省。

杭薄荷：又名苋桥薄荷。产于浙江杭州地区者。

薄荷：各种薄荷的统称。以叶多而肥、色绿、无根、干燥、香气浓者为佳。

【处方名】薄荷，卜荷，薄荷叶（薄荷之叶片，长于疏风透疹），薄荷梗（薄荷之梗茎，长于下气宽胸），卜可等。

【性味归经】辛，凉。归肝、肺经。

【功效主治】疏散风热，清利头目，利咽，透疹。主治外感风热及温病初起，头痛，发热，恶寒；风热上攻所致的头痛、目赤及咽喉干痛等证；麻疹初期，风热外束引起的疹发不畅；肝郁气滞引起的胸闷胁痛。

【用量】3～10克。

【禁忌】表虚自汗者忌服。

牛 莽 子

出自《名医别录》。为菊科2年生草本植物牛蒡 *Arctium lappa* L.的成熟种子。主产于河北、浙江等地。秋季采收，晒干，去杂

质。生用或炒用，捣碎。

【别名】鼠粘子，大力子，恶实，牛蒡，黍粘子，蝙蝠刺，毛然然子，黑风子，毛锥子，粘苍子，鼠尖子，弯巴钩子，万把钩，大牛子，牛子，鼠粘，鼠粘草子，夜叉头子，蒡翁菜子，便牵牛子，饿死囊中草子，象耳朵子，老母猪耳朵子，疙瘩菜子，老鼠愁子，鼠见愁子，牛菜子，老鼠燃燃子，老母猪豁子，老母猪哼哼。

【商品名】杜大力：产于浙江嘉兴、乌镇等地者。子粒饱满，呈青灰色，品质最优，为地道药材。

关大力：又名北大力。产于东北辽宁等地者。品质亦优。

川大力：主产于四川者。

汉大力：主产于湖北者。因集散于汉口而得名。

牛蒡子：或称牛子、大力子。为各种牛蒡子的统称。以粒大饱满、色灰褐、无杂质者为佳。

【处方名】牛子，牛蒡，牛蒡子，大力子，炒牛子，炒牛蒡子。

处方中写牛子、牛蒡、牛蒡子、大力子均指生牛蒡子。为原药去杂质后生用入药者。

炒牛蒡子为生牛蒡子用文火微炒，见外表略有焦斑，取出晾凉入药者。

【性味归经】辛、苦，寒。归肺、胃经。

【功效主治】疏散风热，解毒透疹，利咽散肿。主治外感风热，咽喉疼痛；麻疹初期，疹出不畅；热毒疮肿，痄腮等证。

【用量】3～10克。

【慎忌】本品能滑肠，故气虚便溏者慎用。

蝉 蜕

出自《名医别录》。为蝉科昆虫黑蚱（蝉）*Cryptotympana atrata* Fabr. 羽化时的蜕壳。我国大部分地区均产。夏秋时自树上采

收，清水冲洗干净，晒干入药。

【别名】蝉衣，蝉皮，楷蝉，蝉退，蝉肚，蜩虫壳，虫蜕，虫退，蜩甲，蝉壳，蝉蜕壳，蝉退壳，金牛儿，催米虫壳，唧唧猴皮，唧唧皮，唧猴皮，唧了皮，唧蠟皮，知了皮，麻儿鸟皮，麻蠟皮，麻唧蠟皮，爬儿猴皮，热皮，黑蚱皮，蚱蝉皮，鸣蜩壳，蜩壳，马蜩壳，螗壳，鸣蝉壳，秋蝉壳，蜘蠟皮，蚱蠟皮，土蝉衣，齐女衣，仙人衣，虫衣，点儿猴皮，点蠟子皮，麻了皮，雷震子，枯蝉，伏蜻，蜩蠟退皮。

【商品名】蝉蜕，蝉衣。以色泽黄亮、干燥、体轻、完整、无杂质者为佳。

【处方名】蝉蜕，蝉退，蝉衣，虫蜕，虫退，虫衣，金衣，金蝉衣，净蝉衣等。

【性味归经】甘，寒。归肺、肝经。

【功效主治】疏散风热，透疹，明目退翳，息风止痉。主治外感风热及温病初期，发热头痛；麻疹初期，疹出不畅；因肝经风热引起的眼赤、目翳、多泪、耳鸣；小儿夜啼；破伤风等。

【用量】3～10克。

淡豆豉

出自《名医别录》。为豆科植物大豆 *Glycine max*(L.) Merr. 的成熟种子经蒸罨加工发酵制成的加工品。我国各地均有生产。

【别名】豉，香豉，豆豉，淡豉，香豆豉，清豆豉，杜豆豉。

【商品名】淡豆豉。以色黑、质柔、气香、无糟粒者为佳。

【处方名】淡豆豉，香豉，豆豉，炒豆豉等。

处方中写淡豆豉、香豉、豆豉均指生淡豆豉。为淡豆豉未经炒制入药者。

炒豆豉即炒淡豆豉。为淡豆豉用文火微炒，至外表略带焦斑，取出晾凉入药者。

【性味归经】辛、甘、微苦，寒。归肺、胃经。

【功效主治】解表，除烦。主治外感发热、头痛、恶寒；热病胸中烦闷、不眠等证。

【用量】10~15克。

大豆黄卷

出自《神农本草经》。为豆科植物大豆 *Glycine max*(L.) Merr. 的黑色种子（黑大豆）经发芽晒干而成。

【别名】大豆卷，大豆蘖，黄卷，黄豆卷，豆黄卷，黄卷皮，卷蘖，豆蘖，菽蘖，豆卷，清豆卷，清水豆卷，淡豆卷，黑豆芽。

【商品名】大豆黄卷，清水豆卷，大豆卷。以粒大饱满、干燥、显皱纹、有短芽者为佳。

【处方名】豆卷，大豆卷，大豆黄卷，豆黄卷，黄豆卷，清水豆卷，清豆卷，淡豆卷，炒豆卷，制豆卷等。

清水豆卷简称清豆卷。为黑大豆发芽1厘米左右晒干入药者。

处方中写豆卷、大豆卷、大豆黄卷、豆黄卷、黄豆卷均指淡豆卷。为清水豆卷用麻黄水拌匀，待吸尽后晒干入药者。

炒豆卷又名炒淡豆卷、制淡豆卷、制豆卷。为淡豆卷用文火微炒至黄色入药者。

【性味归经】甘，平。归脾、胃经。

【功效主治】清解表邪，分利湿热。主治湿温初起，湿热不化，汗少；麻疹不透；胸痞；水肿胀满，少便不利；湿痹，筋挛，筋骨疼痛；解乌头毒。

【用量】10~15克。

桑叶

出自《神农本草经》。为桑科落叶小乔木植物桑树 *Morus alba*

L.的叶片。分布于我国南北各省。秋末至冬初经霜后采收。晒干，生用，炒用或蜜炙用。

【别名】铁扇子，家桑叶，枯桑叶，荆桑叶，桑椹树叶，桑树叶，黄桑叶，霜桑叶，冬桑叶，白桑叶，鸡桑叶，子桑叶，山桑叶，金桑叶，晚桑叶，老桑叶，双叶，双桑叶，童桑叶，神仙叶。

【商品名】冬桑叶：又名霜桑叶、晚桑叶、老桑叶。为晚秋至初冬经霜后采收的桑叶。以叶大而肥、色黄橙者为佳。

嫩桑叶：又名新桑叶。为春季桑叶茂盛时采收的桑叶。长于清肝明目。以叶大而肥、色碧绿者为佳。

【处方名】桑叶，霜桑叶、冬桑叶、双叶、双桑叶、炙桑叶、蜜桑叶、炒桑叶等。

处方中写桑叶、霜桑叶、冬桑叶、双叶、双桑叶均指生桑叶。为原药材去杂质生用入药者。

炒桑叶为桑叶用文火微炒，至深黄色取出摊晾入药者。

炙桑叶又名蜜桑叶。为桑叶用蜂蜜炙后入药者。

【注意】在目前药材商品市场上，下列同属植物的叶片，在不同地区也作桑叶入药，作用相同，药材通用。

鸡桑 *M. australis* Poir.，分布于东北、华北、中南、西南等地。

蒙桑 *M. monglica* Schneid.，分布于内蒙古、辽宁、河北、山西、山东、河南等地。

华桑（又名葫芦桑）*M. cathayana* Hemsl.，分布于黄河流域。

长果桑 *M. laevigata* Wall.，分布于西藏。

【性味归经】甘、苦，寒。归肺、肝经。

【功效主治】疏风清热，清肝明目。主治外感风热引起的发热、头昏痛、咳嗽及咽喉肿痛；风热上攻或肝经实热引起的目赤、涩痛、多泪等证。

【用量】 6～12克。

【慎忌】 风寒咳嗽不宜服用。

菊花(附：野菊花)

出自《神农本草经》。为菊科多年生草本植物菊 *Chrysanthemum morifolium* Ramat. 的头状花序。主产于浙江、安徽、河南、四川等地。花期采收，阴干。

【别名】 节华，金精，甘菊，真菊，家菊，馒头菊，簪头菊，甜菊，药菊，茶菊，甘菊花，甜菊花，怀菊花，杭菊花，黄甘菊，白菊花，黄菊花，白茶菊，干菊花，怀菊，杭菊，毫菊，滁菊，白菊，池菊，贡菊，德菊，川菊，济菊，黄菊，徽菊，绿蒂菊，箱菊，药菊花，祁菊，平江菊，女节，女华，治蔷，甘精，傅延，阴成，金蕊。

【商品名】 白菊花：又名白菊、甘菊、甘菊花。为白色头状花序，经加工入药者。

毫菊：为产于安徽亳县、萧县、涡阳及河南永城一带的白菊花。品质最佳。

箱菊：毫菊采收时连茎叶割下，倒挂于阴凉通风处，阴干，分档装箱，称作“箱菊”。

怀菊：又名药菊、怀菊花。为产于河南沁阳、武陟、博爱、温县一带（旧时怀庆府）的白菊花。品质亦佳。

滁菊：为产于安徽省滁县的白菊花。品质亦佳。

祁菊：为产于河北安国的白菊花。

川菊：为产于四川中江的白菊花。

济菊：为产于山东济宁的白菊花。

平江菊：为产于湖南平江的白菊花。

贡菊：包括徽菊和德菊两个品种。徽菊又名绿蒂菊，是产于安徽歙县（旧时徽州）的白菊花。德菊是产于浙江德清县的白菊花。

黄菊花：为黄色头状花序，经加工入药者。

杭菊：又名杭菊花。为主产于浙江杭州一带的菊花。包括杭白

菊和杭黄菊两个品种。杭白菊又称白茶菊、杭甘菊、茶菊等名称。杭黄菊又称黄甘菊，有大黄菊、小黄菊两种。均为品质优良的佳品。

以上商品均以花序完整、干燥、不散瓣、无梗叶、香气浓郁者为佳。

【处方名】杭菊花，怀菊花，菊花，甘菊。

【性味归经】辛、甘、苦，微寒。归肝、肺经。

【功效主治】疏散风热，清肝明目，解毒。主治外感风热及温病初起引起的头痛、头昏、发热；肝经风热或肝火上攻所致的目赤肿痛；肝风内动及肝阳上亢所致的头痛、眩晕等证。

【用量】6～30克。

附：野菊花

野菊花为同属近缘植物野菊 *C. indicum* L. 等的头状花序。又名野菊、苦薏、北野菊、岩野菊等。性味苦辛微寒。归肝肺经。有清热解毒之功效。主治痈肿、疔毒、咽喉肿痛、风火赤眼、皮肤瘙痒等证。用量10～20克。

蔓 荆 子

出自《神农本草经》。为马鞭草科落叶小灌木植物单叶蔓荆 *Vitex rotundifolia* L. 和蔓荆 *V. trifolia* L. 的果实。主产于山东、江西、浙江、福建等地。多系野生。夏季采收，阴干，炒至焦黄色入药。

【别名】蔓荆实，荆子，万荆子，万京子，蔓青子，京子，单叶蔓荆子，万金子，荆条子，白背木耳子，小刀豆藤子，白背风子，白背草子，白背杨子，水捻子，白布荆子，蔓京子。

【商品名】蔓荆子。以粒大饱满、气味浓者为佳。

【处方名】京子，荆子，蔓荆子，炒蔓荆子。

处方中写京子、荆子、蔓荆子均指生蔓荆子。为原药材去杂质生用入药者。

炒蔓荆子为蔓荆子用文火炒至焦黄色入药者。

【性味归经】辛、苦，平。归膀胱、肝、胃经。

【功效主治】疏散风热，清利头目。主治外感风热所致的头昏头痛及偏头痛；风热上扰所致的目昏、多泪及目赤肿痛等证。

【用量】6～10克。

【禁忌】风寒头痛不宜用。

葛根(附：葛花)

出自《神农本草经》。为豆科多年生落叶藤本植物*Pueraria lobata*(Willd.) Ohwi的根。我国南北各地均有分布。秋末至春初采挖，切片，晒干，生用。

【别名】干葛，甘葛，粉葛，粉葛根，粉干葛，葛麻茹，葛子根，黄葛根，葛条根，葛藤根，田葛藤根，粉颗粒，刈头茹根，黄斤，黄斤根，生葛根，葛麻，麇藿，鸡脐根，干葛根。

【商品名】粉葛根：主产于广东、广西，多为栽培品。

北葛根：主产于河南、安徽、江苏，多为野生。

以上商品以块大、色白、质坚、粉性足、纤维少者为佳。

【处方名】葛根，粉葛根，粉葛，干葛，甘葛。

【性味归经】甘、辛，凉。归脾、胃经。

【功效主治】发表解肌，升阳透疹，生津止渴。主治外感风热所致的头痛、项背强痛；麻疹初起，发热恶寒，疹出不畅；湿热泻痢及脾虚泄泻；热病烦渴及消渴证口渴多饮。

【用量】6～15克。

附：葛花

葛花为葛的未开放花蕾。又名葛条花。春季花蕾未开放时采收，晒干，生用。商品以花蕾肥大、未完全开放、色淡紫、香气浓者为佳。性味甘平，有解酒醒脾之功效。主治由于饮酒过度引起的头痛、头昏、恶心、呕吐、烦渴、胸膈饱胀及便血等证。用量3~12克。

柴 胡

出自《神农本草经》。为伞形科多年生草本植物柴胡（北柴胡）*Bupleurum chinense* DC.和狭叶柴胡（南柴胡）*B. scorzonerifolium* Willd.的根或全草。春秋两季采挖，晒干，切短节。生用，或酒炒醋炒入药。

【别名】地熏，茈胡，山菜，茹草，柴草，津柴胡，南柴胡（又称软柴胡、软苗柴胡、狭叶柴胡、香柴胡、红柴胡、细叶柴胡），北柴胡（又称硬柴胡、硬苗柴胡、竹叶柴胡、圭叶柴胡、蛇叶柴胡、铁苗柴胡、蚂蚱腿、山根菜、黑柴胡、山柴胡）。

【商品名】 北柴胡：又名硬柴胡、津柴胡。为植物北柴胡的根。主产于辽宁、甘肃、河北、河南等地。此外，陕西、山东、内蒙古亦产。

南柴胡：又名南胡、软柴胡、香柴胡。为植物狭叶柴胡的根及全草。主产于湖北、安徽、江苏、四川等地。

竹叶柴胡：又名秋柴胡。为夏末秋初采收的柴胡干燥全草。

春柴胡：又名芽胡、春胡、麦苗柴胡。为春季采收的幼嫩的柴胡全草。

以上商品均以根条粗长、干燥、整齐、无残留茎叶及须根者为生

【处方名】柴胡，软柴胡，硬柴胡，酒柴胡，醋柴胡。

处方中写柴胡指生柴胡。为原药材去杂质切短节入药者。软柴胡指南柴胡，硬柴胡指北柴胡。

酒柴胡为柴胡切段后用黄酒淋酒，闷透，文火微炒入药者。

醋柴胡为柴胡晒干切段后用米醋喷洒，闷透，用文火微炒入药者。

【注意】目前在药材商品市场上，柴胡品种除上述两种外，还有以下几种同属植物的根及全草，也作“柴胡”入药，但非正品。

空心柴胡 *B. longicaule* Wall. ex DC. Var. *franchetii* Boiss. 产于陕西、甘肃、湖北、四川、云南等地。

膜缘柴胡 *B. marginatum* Wall. ex DC. 产于云南、四川、贵州、广西等地。

长白柴胡 *B. komarovianum* L. 产于黑龙江、吉林、辽宁等地。

密花柴胡 *B. densiflorum* Rupr. 产于宁夏。

八伞柴胡 *B. octoradiatum* Bunge 产于宁夏。

兴安柴胡 *B. sibiricum* Vest 产于我国东北和华北地区。

马尾柴胡 *B. microcephalum* Diels 产于四川地区。

双茎柴胡 *B. bicaule* Helm 产于四川、内蒙古、甘肃等地。

多脉柴胡 *B. multinerve* DC. 产于内蒙古、四川、甘肃等地。

小柴胡 *B. tenue* Buch Ham. 产于我国西南各地区。

新疆柴胡 *B. krylovianum* Schischk. 产于新疆地区。

金黄柴胡（贯叶柴胡） *B. aureum* Fisch. 产于新疆。

异叶柴胡 *B. jucundum* Kurz 产于西藏。

此外，还有一种叫做“土柴胡”的中草药，是菊科艾属植物牡黄 *Artemisia japonica* Thunb.（产于福建、广西等地）和一枝黄花属植物一枝黄花 *Solidago decurrens* Lour.（产于福建、四川等地）的全草。其药物功效与柴胡不同，不能混用，应注意鉴别。

【性味归经】苦、辛，微寒。归心包络、肝、三焦、胆经。

【功效主治】和解退热，疏肝解郁，升举阳气。主治伤寒邪在少阳经，寒热往来，胁痛，胸满，口苦，咽干，目眩；肝气郁结引起的胁痛、头痛、月经不调、痛经；气虚下陷所致的肛脱、子宫下垂以及气短、乏力等证。

【用量】 3~10克。

【禁忌】 阴虚阳亢所致的头痛及高血压患者慎用。

升 麻

出自《神农本草经》。为毛茛科多年生草本植物大三叶升麻 *Cimicifuga heracleifolia* Kom. 或兴安升麻 *C. dahurica* (Turcz.) Maxim 和升麻 *C. foetida* L. 的根茎。夏秋两季采挖，晒干，除去须根，润透切片，生用或炙用。

【别名】 周升麻，周麻，窟窿芽根，苦老菜根，花升麻，鸡骨升麻，鬼脸升麻，绿升麻，龙眼根，莽牛犬架，雉麻，黑蛇根，东北升麻，马尿杆，火筒杆，兴安升麻，地龙芽，苦龙芽菜，苦菜秧，苦力芽，苦壮菜，达呼尔升麻，大三叶升麻，既济公，黑升麻。

【商品名】 西升麻：又名川升麻、绿升麻、绿色升麻、鬼脸升麻。为植物升麻的干燥根茎。主产于陕西、四川、青海、云南。此外贵州、新疆、河南亦产。

北升麻：又名窟窿芽根、苦老菜根。为植物兴安升麻的干燥根茎。主产于辽宁、黑龙江、河北、山西。此外，内蒙古等地亦产。

关升麻：为植物大三叶升麻的干燥根茎。主产于吉林、黑龙江、辽宁。

鸡骨升麻：西升麻的一种。因其体状细瘦，故名鸡骨升麻。主产于青海。

亳升麻：产于安徽亳县者。

以上商品均以根茎肥大、质坚、干燥、外皮黑褐色、断面黄绿

色、无须根及泥土者为佳。

广东升麻：为菊科植物麻花头 *Serratula chinensis* S. Moore. 的根。主产于广东、福建。在当地作升麻使用，此属混用，非升麻正品。

【处方名】升麻，炙升麻。

处方中写升麻指生升麻。为原药材去杂质及须根，润透切片入药者。

炙升麻又名炒升麻。为升麻片用文火微炒入药者。增强升阳举陷之功效。

【注意】福建、广东的一些地方，将菊科植物麻花头 *Serratula chinensis* S. Moore. 的根作升麻使用，习称“广东升麻”，此属混用。

四川某些地区将同属植物单穗升麻 *Cimicifuga simplex* Wormsk. 的根茎作升麻使用，四川南川县称之为“绿豆升麻”。

陕西、甘肃、云南个别地区把虎耳草科植物落新妇 *Astilbe chinensis* (Maxim.) Franch. et Sav. 的根茎作升麻入药，称为“红升麻”、“土升麻”、“杆升麻”。

以上均非升麻正品。

【性味归经】辛、甘，微寒。归肺、脾、大肠、胃经。

【功效主治】发表透疹，清热解毒，升阳举陷。主治外感风热所致的头痛；麻疹初期，疹出不畅；阳明热邪所致的头痛、牙龈肿痛、口舌生疮；风热上壅所致的咽喉肿痛；温病发斑；中气不足所致的气短乏力、久泻脱肛、子宫脱垂等。

【用量】3～10克。

【禁忌】阴虚阳浮，喘满气逆及高血压等病证忌用。

浮萍

出自《神农本草经》。为浮萍科多年生水生漂浮草本植物紫萍

Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. 的全株。全国各地均有分布。夏季捞取，除去杂质，晒干使用。

【别名】萍，萍，水萍，水花，浮萍，薸，萍子草，水白，水苏，小萍子，浮萍草，水藓，水帘，九子萍，田萍，紫萍（又称紫背浮萍、紫浮萍），青萍（又称绿背浮萍），水萍草，水上漂。

【商品名】紫萍：又名紫背浮萍。腹面呈淡绿色至灰绿色，背面呈棕绿色至紫棕色者。以色绿、背紫、干燥、完整、无杂质者为佳。

青萍：又名绿背浮萍。叶状体腹背两面均呈绿色者。以色绿、干燥、完整、无杂质者为佳。

【处方名】浮萍，浮萍草。

【注意】天南星科浮水草本植物大薸（水浮莲、母猪莲）*Pistia Stratiotes* L.的叶在广西作“浮萍”入药，此为混用，应该纠正。

【性味归经】辛，寒。归肺、膀胱经。

【功效主治】发汗解表，透疹，祛风止痒，利水消肿。主治外感风热，发热无汗；麻疹透发不畅；风热瘾疹，皮肤瘙痒；水肿兼有表证者。

【用量】3～10克。

【禁忌】风寒外感忌用。

木 賊

出自《嘉祐本草》。为木贼科多年生常绿草本隐花植物木贼 *Equisetum hiemale* L.的全草。产于东北、华北及内蒙古和长江流域各省。夏季采收，除去须根，切段使用。

【别名】木贼草，锉草，节骨草，擦草，无心草，笔头草，笔简草，木夕草，木膝草，节股草，旱木贼。

【商品名】木贼，木贼草。以茎粗长、干燥、色绿、质厚、不

脱节者为佳。

【处方名】木贼，木贼炭。

处方中写木贼指生木贼。为原药材去杂质生用入药者。

木贼炭为木贼段用武火炒至焦黑，存性，喷洒清水灭尽火星，取出晾干入药者。

【注意】广东、广西、云南等地以同属植物纤细木贼（又名笔管草、纤弱木贼）*E. debile* Roxb.的全草作“木贼”入药，习称水木贼。还有一些地区以同属植物节节草（问荆）*E. arvense* L.的全草作木贼入药。以上二者均非木贼正品，应注意鉴别。

【性味归经】甘、苦，平。归肺、肝经。

【功效主治】疏散风热，明目退翳，止血。主治外感风热所致的目赤多泪，目生云翳；便血，痔疮出血，崩漏等证。

【用量】3～10克。

樱 桃 核

出自《名医别录》。为蔷薇科植物樱桃 *Prunus pseudocerasus* Lindl. 的成熟果核。分布于河南、安徽、山西、陕西、河北、山东、江苏、贵州、江西等地。夏季果实成熟时采摘，果肉可食，留取果核，洗净晒干。

【别名】含桃核，荆桃核，朱櫻核，朱果核，朱樱桃核，櫻珠核，家樱桃核。

【商品名】樱桃核。以色灰黄、干燥、无杂质者为佳。

【处方名】樱桃核。

【性味归经】辛，平。归肺、肝经。

【功效主治】清热透疹。主治麻疹不透，睾丸肿痛。

【用量】6～10克。

落 新 妇

出自《本草经集注》。为虎耳草科植物落新妇 *Astilbe chinensis* (Maxim.) Franch. et Sav. 或华南落新妇 *A. austrosinensis* Hand-Mazz. 等的全草。主产于辽宁、河北、山东、河南、安徽、浙江、江西、四川等地。秋季采收，晒干切段。

【别名】 小升麻，红升麻，术活，马尾参，山花七，阿根八，铁火钳，金毛三七，阴阳虎，虎麻，铁杆升麻。

【商品名】 落新妇，红升麻。以色黄绿、干燥、无泥土者为佳。

【处方名】 红升麻，落新妇，小升麻等。

【性味归经】 辛、苦，凉。归肺、肝经。

【功效主治】 祛风，清热，止咳。主治风热感冒，头身疼痛，咳嗽。

【用量】 10~15克。

二、清 热 药

(一) 清热泻火药

石 膏

出自《神农本草经》。为含水硫酸钙($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)。我国各地均产。主产于安徽、湖北、甘肃、四川等地。以安徽、湖北产者品质最佳。挖出后去净泥土、碎石，研细生用或煅用。

【别名】细石，细理石，软石膏，大石膏，纤维石膏，石羔，白虎，冰石，玉大石，玉火石。

【商品名】石膏。以色白、块大、半透明、纵断面如丝者为佳。

【处方名】生石膏，石膏，石羔，煅石膏，熟石膏。

处方中写石羔、石膏均指生石膏，为原药去杂石和泥土，研细生用入药者。

煅石膏又称熟石膏。将石膏置瓦罐内，放入无烟炉火中煅至酥松，取出放凉，碾碎入药者。

【注意】有些书籍将石膏与寒水石相混。二者结构及功效有差异，不应混淆。

【性味归经】辛、甘，大寒。归肺、胃经。

【功效主治】清热泻火，除烦止渴。主治温热病邪在气分，大热，大渴，大汗出，脉洪大；肺经实热咳喘，吐黄稠痰、胃火头痛，牙痛。外用治疗疮疡溃而不敛、湿疹、水火烫伤等。

【用量】10~120克。

【慎忌】脾胃虚寒及阴虚内热者忌服。

寒 水 石

出自《神农本草经》。为硫酸盐类矿石芒硝Mirabilite的天然晶体。主产于山西、河北等地，多见于卤地积盐之下。采挖后除去泥土及碎石，研细生用。

【别名】凝水石，白水石，凌水石，水石，冰石，鹤石，方解石（又名分解石），红石膏，泥精，盐精，盐精石，盐根，盐枕，盐消。

【商品名】红石膏：又名红石膏寒水石。为硫酸盐矿石。主产于山东，以山东潍坊地区安丘县产者品质最好。北方多用。以纯净、片状、肉红色、有细丝纹、有光泽者为佳。

方解石：又名分解石、方解石寒水石。为碳酸盐矿石。主产于中南、西南、华东等地区。南方多用。以色白透明、有光泽，击碎后呈方形，具有棱角者为佳。

【处方名】寒水石。

【注意】有的书籍将寒水石作为石膏的别名，实际上是把寒水石与石膏混用，混为一谈。这是错误的。二者是两种药物，不能合二为一。

冰石既是石膏的别名，又是寒水石的别名，最易混淆。应尽量避免使用这一别名，以免混乱弄错。

【性味归经】咸，大寒。归肾、胃经。

【功效主治】清热泻火。主治温热病邪在气分，壮热，大渴，脉洪大；外用治疗风热火眼，咽喉肿痛，口舌生疮，烧伤烫伤。

【用量】10~15克。外用适量。

【慎忌】脾胃虚寒者忌用。

知 母

出自《神农本草经》。为百合科多年生草本植物知母 *Anemarrhenes asphodeloides* Bge. 的根茎。主产于河北、山西、广东等地。初春或秋末采挖，除去须根及杂质，洗净晒干，去皮切片，生用或盐炒用。

【别名】连母，蛾母，货母，蠾母，芨母，提母，葛母，毛知母，光知母，知母肉，野蓼，地参，水参，水浚，女雷，女理，儿草，鹿列，韭逢，儿踵草，东根，水须，苦心，昌支，蓐，穿地龙，蒼蕪，大芦水，兔子油草，蒜瓣子草，羊胡子草，马马草，妈妈草，羊胡子根，老娘脚后跟，老娘脚后跟，孝梗。

【商品名】毛知母：为带皮的干燥根茎。多销于西南及中南地区。以身条肥大、外皮附金黄色细绒毛、质坚实而柔润、断面色白，

嚼之味苦粘腻者为佳。

光知母：又名知母肉、京知母。为去皮的干燥根茎。多销于华北及东北地区。以身条肥大、滋润、质坚、色白、嚼之发粘者为佳。

西陵知母：产于河北省历县（西陵）者。品质最优。销往全国，并供出口。

【处方名】知母，知母肉，肥知母，盐知母。

处方中写知母、知母肉、肥知母均指生知母。为原药材洗净，晒干切片，生用入药者。

盐知母又称盐炒知母。为知母片用盐水拌炒入药者。

【性味归经】苦、甘，寒。归胃、肺、肾经。

【功效主治】清热泻火，滋阴润燥。主治温热病邪热亢盛，壮热烦渴，脉象洪大等肺胃实热证；肺热咳嗽或肺阴不足燥咳，阴虚火旺，肺肾阴亏所致的骨蒸潮热、盗汗、心烦等证；阴虚消渴证。

【用量】6～12克。

【慎忌】脾胃虚寒，胃痛、腹痛、便溏者不宜服用。

芦 根

出自《名医别录》。为禾本科多年生草本植物芦苇 *Phragmites communis* Trin. 的地下茎。我国南北各地均有分布。春末夏初和秋季均可采挖，除去须根及皮膜，洗净，鲜用或晒干用。

【别名】苇根，芦苇根，芦茅根，芦茹根，顺江龙，水葫蘆，芦柴根，芦通，苇子根，芦芽根，芦头，甜梗子，葭根，芦竹根，蒲苇根，苇子草根，禾杂竹根，水芦竹根，芦草根，茨。

【商品名】鲜芦根：又名生芦根、活芦根、活水芦根。为芦根鲜品。

干芦根：为芦根晒干品。

以上商品以根条粗大均匀、色黄白、有光泽、无须根者为佳。

【处方名】芦根，鲜芦根。

【性味归经】甘，寒。归肺、胃经。

【功效主治】清热润肺，生津止渴，除烦止呕。主治肺热咳嗽；胃热呕逆；热病伤津而致口渴烦热；小便短赤涩痛。

【用量】干品用10~30克，鲜品用30~60克。

【慎忌】肺胃寒证忌用。

竹叶（附：竹叶卷心）

出自《名医别录》。为禾本科植物淡竹 *Phyllostachys nigra* (Lodd.) Munro var. *henonis* (Mitf.) Stapf ex Rendle 的叶。主要分布于长江流域。随时可采。鲜用或晒干用。

【别名】淡竹叶，竹叶门冬青，竹叶麦冬，野麦冬，土麦冬，金竹叶，长竹叶，淡竹米，林下竹，碎骨子，金鸡米，山鸡米，迷身草，山冬，地竹，甘竹叶。

【商品名】竹叶，淡竹叶。以叶嫩、完整、干燥、色绿、无杂质者为佳。

【处方名】竹叶，淡竹叶，鲜竹叶，鲜淡竹叶等。

【注意】鸭跖草科植物鸭跖草 *Commelina communis* L. 的全草，在江苏一些地区误作淡竹叶入药，二者功效不同，不能混用，故应予以纠正。

【性味归经】甘、淡，寒。归心、肺、胃经。

【功效主治】清热除烦，生津利尿。主治热病烦热口渴，热淋及泌尿系统感染；心火上炎，口舌生疮。

【用量】6~10克。鲜品15~30克。

【慎忌】脾胃虚寒者慎服。

附：竹叶卷心

竹叶卷心为淡竹之初生嫩叶卷而未放者。又名竹心、竹叶心、

竹针、竹卷心等。有清心除烦、消暑止渴的功效。主治暑热烦渴及温病神昏谵语等证。用量6~10克，鲜品15~30克。

天 花 粉

出自《神农本草经》。为葫芦科多年生宿根草质藤本植物栝楼 *Trichosanthes kirilowii* Maxim. 的干燥块根。我国各地均产，多为栽培。秋末或冬初采挖，洗去泥土，刮去外皮，切段、块、片，晒干。

【别名】栝楼根，瓜蒌根，栝蒌根，萎根，屎瓜根，大瓜萎根，地楼根，玉露根，生牛蛋子根，白药，花粉，天瓜粉，萎粉，栝楼粉，栝蒌粉，瑞雪，瑞香，苦瓜根，苦瓜萎根。

【商品名】安阳天花粉：又名安阳花粉。为产于河南安阳一带者。品质最优。

双边天花粉：又名双边栝楼根、双边花粉。为同科植物双边栝楼 *Trichosanthes uniflora* Hao的块根。在广西作天花粉用。

天花粉：各地天花粉的统称。以块大、色白、干燥、粉性足、质坚细腻、纤维少者为佳。

【处方名】天花粉，花粉。

【注意】马交儿属植物茅瓜 *Melothria heterophylla* (Lour.) Cogn. 的根，在福建一些地区误作天花粉入药，应予以纠正。

【性味归经】苦、微甘，寒。归肺、胃经。

【功效主治】清热生津，消肿排脓。主治热病伤津，口干舌燥，烦渴或消渴多饮，肺热咳嗽或燥咳或咳血；痈肿疮疡，赤肿焮痛；恶性葡萄胎及绒毛上皮癌。

【用量】10~15克。

【慎忌】脾胃虚寒，大便滑泻者忌用。

梔子

出自《神农本草经》。为茜草科常绿灌木植物梔子 *Gardenia jasminoides* Ellis. 的成熟果实。我国长江以南地区多有分布。秋季果实成熟时采收。生用、炒焦黄或炒炭用。

【别名】 山梔，山梔子，黑梔，黑梔子，枝子，山枝，红梔子，小梔子，黄梔，黄梔子，黄鸡子，山黄梔，山黄枝，水横梔，水横枝，小卮子，卮子，支子，鲜支，鲜子，木丹，楮桃，越桃，黄荑子，黄叶下，白蟾，黄果树子，林兰子。

【商品名】 梔子，山梔，山梔子，红梔子，黄梔子。以个小而饱满、干燥、色红黄、完整者为佳。

【处方名】 山梔，山梔子，梔子，枝子，支子，生梔子，炒梔子，焦梔子，姜梔子，黑梔子，梔子炭等。

处方中写梔子、枝子、支子、山梔、山梔子均指生梔子。为原药材去杂质碾碎生用入药者。

炒梔子为净梔子用文火炒至金黄色入药者。

姜梔子为净梔子用姜汁拌匀，吸干后再用文火炒至金黄色入药者。

黑梔子又称梔子炭。为净梔子用武火炒至黑褐色，存性，喷洒清水灭尽火星，取出晾干入药者。

焦梔子为净梔子用大火炒至焦糊色入药者。

【注意】 同科植物水梔子（大花梔子）*Gardenia jasminoides* Ellis var. *grandiflora* Nakai的果实，在某些地区也作梔子入药。其形态、功效与山梔子相似。非梔子正品。多用作染料。

海桐科小乔木植物光叶海桐 *Pittosporum glabratum* Lindl. 的成熟干燥种子，称为“山梔仁”，产于四川、贵州等地，当地作山梔子入药。其功效与山梔子不同，不能混用，应予以纠正。

【性味归经】 苦，寒。归心、肺、胃、三焦经。

【功效主治】 清火除烦，清热利湿，凉血解毒。主治热病心烦、郁闷、躁扰不宁；肝胆郁热所致之黄疸、发热、小便短赤；血热妄行所致之衄血、吐血、尿血。外用治疗疖肿和外伤肿痛。

【用量】 3～10克。外用适量。

【慎忌】 脾虚便溏，食少纳差者忌服。

猫爪草

出自《中药材手册》。为毛茛科植物小毛茛 *Ranunculus ternatus* Thunb. 的块根。主产于河南、江苏、安徽、浙江、广西等地。全年可采挖，除去茎及须根，晒干。

【别名】 小毛茛，小毛茛根，猫爪。

【商品名】 猫爪草，小毛茛。以体大坚实、干燥、色黄褐者为佳。

【处方名】 猫爪草。

【性味归经】 辛，平。归肺、肝经。

【功效主治】 解毒，散结。主治肺结核，淋巴结结核，淋巴结炎，咽喉炎等。

【用量】 10～15克。外用适量。

夏枯草

出自《神农本草经》。为唇形科多年生植物夏枯草 *Prunella vulgaris* L. 的带花果穗。我国各地均产，主产于江苏、浙江、安徽、河南等地。夏季采收，晒干。

【别名】 夏枯头，夏枯球，夏枯花，铁线夏枯，麦穗夏枯草，麦夏枯，铁色草，铁色花，榔头草，白花草，胀饱草，干叶叶，牛枯草，广谷草，棒槌草，锣槌草，羊胡草，牛抵草，炮仗草，棒头柱，地牯牛，棒柱头花，大头花，滚子花，灯笼头，六月干，东风，乃东，夕旬，燕面，羊肠菜，郁臭，山苏子，枯草穗。

【商品名】夏枯草。以穗粗长、干燥、红棕色、无梗叶杂质者为佳。

【处方名】夏枯草，下枯草。

【注意】同属植物粗毛夏枯草(刚毛夏枯草)*Prunella hispida* Benth.的带花果穗，在云南、西藏的一些地方也作“夏枯草”入药。此非正品。

唇形科植物筋骨草*Ajuga decumbens* Thunb的全草在云南、福建、江苏的部分地区亦作“夏枯草”入药。此为混用，应予以纠正。因二者形态、功效均不相同，故不能混用。

【性味归经】苦、辛，寒。归肝、胆经。

【功效主治】清肝火，散郁结，降血压。主治肝火上炎，目赤肿痛，目珠胀痛，头痛眩晕；痰火郁结所致的瘰疬、瘿瘤；急性乳腺炎，急性扁桃体炎和一切痈肿热毒，肝经实火所致之高血压。

【用量】6～15克。

【禁忌】风寒头痛忌用。

鸭 跖 草

出自《本草拾遗》。为鸭跖草科1年生草本植物鸭跖草*Commelinia communis* L.的全草。全国各地均有分布。夏秋季采收，洗净，鲜用，或晒干用。

【别名】鸡舌草，鼻研草，碧竹子，碧竹草，青耳环草，碧蟾蜍，竹叶草，耳环草，地地藕，蓝姑草，淡竹叶菜，竹鸡草，竹叶菜，淡竹叶，碧蝉花，水竹子，露草，帽子花，三笑子菜，竹叶兰，竹鸡苋，竹根菜，三角菜，牛耳朵草，鸭食草，水浮草，鸭子菜，菱角伞，碧蝉蛇，竹管草，竹节草，竹节菜，竹剪草，鸭脚草，兰花草，野靛青，靛青花草，萤火虫草，鸭角青，挂兰青，鸦雀草，兰紫草，哥哥啼草，竹叶活血丹，竹叶水草，水竹叶草，竹叶青菜，鸭脚板草，竹夹菜，翠蝴蝶，鹅儿菜，鸡冠菜，蓝花

姑娘，鸭子草，鸭跖草，蓝花菜，三莢菜，桂竹草，蓝花水竹草。

【商品名】鸭跖草。以肥壮、干燥、色绿、无泥土杂质者为佳。

【处方名】鸭跖草，鸭脚草，鲜鸭跖草。

【注意】同属植物波叶鸭跖草 *Commelina undulata* Brown 的全草（主产于西藏），在西藏作“鸭跖草”入药。此非正品。

【性味归经】甘、苦，寒。归肺、胃、膀胱经。

【功效主治】清热，解毒，利尿。主治热病发热，热淋小便短赤或水肿有热者；咽喉肿痛，痈肿疮毒或蛇咬伤等证。

【用量】10~30克。鲜品30~60克。外用适量。

【慎忌】脾虚泄泻者忌服。

谷 精 草

出自《开宝本草》。为谷精草科1年生草本植物谷精草 *Eriocaulon buergerianum* Koern. 和赛谷精草 *E. sieboldtianum* Seib. et Zucc. 的全草或花序。主产于安徽、浙江、江苏、江西、湖南、广东、广西等地。秋季采收，割取全草或花序，晒干，切段用。

【别名】戴星草，文星草，流星草，移星草，天星草，珍珠草，鱼眼草，佛顶珠，灌耳草，谷精珠，耳朵刷子，挖耳朵草，鼓槌草，衣纽草，卜氏谷精草，赛谷精草，华南谷精草，华南谷精珠，毛谷精草，毛谷精珠。

【商品名】谷精草：为谷精草科1年生草本植物谷精草或赛谷精草的全草或花序。以花序大而紧密、干燥、色灰白，花茎短、无杂质者为佳。

谷精珠：为植物华南谷精草 *E. sexangulare* L. 及毛谷精草 *E. australe* R. Br. 的头状花序。此非正品。

【处方名】谷精草，谷精珠。

【注意】华南谷精草和毛谷精草的头状花序通称“谷精珠”，

在广东、广西、福建等地亦作“谷精草”入药，此非正品。

石竹科植物鹅不食 *Arenaria serpyllifolia* L.的全草，在河南的一些地区作谷精草入药，此为误用，应该纠正。

【性味归经】甘，平。归肝、胃经。

【功效主治】疏散风热，明目退翳。主治肝经风热所致的目赤肿痛，羞明多泪及目生云翳。

【用量】6～15克。

密 蒙 花

出自《开宝本草》。为马钱科落叶灌木密蒙花树 *Buddleia officinalis* Maxim.的花蕾。主产于湖北、四川、甘肃、河南、陕西、广东、广西、云南、贵州等地。春季采收，晒干。

【别名】小锦花，蒙花，黄饭花，疙瘩皮树花，鸡骨头花，羊耳朵花，羊春条花，绵糊条子花，黄花醉鱼草花，绵条子花，虫见死草花，老蒙花，蒙花珠，水锦花，羊耳朵朵尖花，蜜蒙花，草春条花，老密蒙花，结香花，寒不凋。

【商品名】密蒙花：又名蒙花、老蒙花。为马钱科落叶灌木密蒙花树的花蕾。以花蕾密聚、干燥、色灰绿、茸毛多、无梗叶杂质者为佳。

新蒙花：又名蒙花珠、梦花。为瑞香科植物结香 *Edgeworthia chrysanthra* Lindl.的花蕾。此非正品。

【处方名】蒙花，密蒙花。

【注意】瑞香科植物结香的花蕾，在湖北、四川、广西的一些地区作“密蒙花”入药，商品习称“新蒙花”或“蒙花珠”，在四川称为“梦花”。此非密蒙花正品。

【性味归经】甘，微寒。归肝经。

【功效主治】清肝，明目，退翳。主治肝热引起的目赤肿痛，羞明多泪及目生云翳等证。

【用量】 6～10克。

青 荚 子

出自《神农本草经》。为苋科1年生草本植物青葙 *Celosia argentea* L.的成熟种子。产于我国中部及南部各省。秋季种子成熟时采集，晒干用。

【别名】青葙，草蒿子，葵蒿子，昆仑草子，野鸡冠子，鸡冠苋子，鸡冠菜子，鸡冠子，野鸡冠花子，犬尾鸡冠花子，土鸡冠子，狼尾巴果，狐狸尾子，指天笔子，牛尾花子，牛尾巴花子，狗尾花子，狗尾苋子，草决明。

【商品名】青葙子。以粒实饱满、干燥、色黑光亮者为佳。

【处方名】青葙，青葙子，炒青葙子。

处方中写青葙、青葙子均指生青葙子。为原药材去杂质生用入药者。

炒青葙子为净青葙子用文火炒至有香气而入药者。

【注意】同属植物鸡冠花 *Celosia cristata* L.的种子，有些地方作“青葙子”入药，此非正品。

苋属植物反枝苋 *Amaranthus retroflexus* L.的种子，在内蒙古、华北及西北部分地区，误作青葙子入药，应该纠正。

繁穗苋 *Amaranthus paniculatus* L.及苋菜 *A. tricolor* L.的种子和藜科植物藜 *Chenopodium album* L.的果实在华北个别地区误作青葙子入药，亦应予以纠正。

本品别名草决明，豆科植物决明 *Cassia tora* L.的种子决明子的别名亦称草决明，名称极易混淆，应注意鉴别。

【性味归经】苦，微寒。归肝经。

【功效主治】清泄肝火，退翳明目。主治肝火上炎引起的目赤肿痛、目生翳膜、视物昏暗，肝阳上亢或肝火旺盛引起的高血压，瞳孔缩小等证。

【用量】3～15克。

【慎忌】瞳孔散大及青光眼患者忌用。肝肾亏虚者慎用。

夜 明 砂

出自《日华子本草》。为蝙蝠科动物蝙蝠 *Vespertilio superans* Thomas 等多种蝙蝠的干燥粪便。全国大部分山区均产，主产于浙江、江苏、安徽、河南、广西、甘肃、辽宁等地。全年可采，到山洞中铲取，除去泥土和杂质，晒干。

【别名】蝙蝠粪，蝙蝠屎，燕蝙蝠屎，燕蝙蝠粪，挂鼠屎，挂鼠粪，天蝠屎，天蝠粪，天鼠屎，天鼠粪，鼠法，石肝，黑砂星，檐老鼠屎。

【商品名】夜明砂，蝙蝠屎。以质轻、干燥、色棕褐、无泥沙等杂质者为佳。

【处方名】夜明砂，天鼠屎，天鼠粪。

【性味归经】辛，寒。归肝经。

【功效主治】清热明目，散血消积。主治夜盲症，白内障，角膜云翳，疳积。

【用量】入丸散内服每次1～3克。外用适量。

【慎忌】产妇忌服。恶白蔹、白薇。

狗 尾 草

出自《本草纲目》。为禾本科植物狗尾草 *Setaria viridis* (L.) Beauv. 的全草。我国各地均产。夏秋采收，鲜用或晒干生用。

【别名】莠，莠草，莠子草，光明草，阿罗汉草，狗尾半支，谷莠子，洗草，犬尾草，犬尾曲，金毛狗尾草，毛毛草，毛嘟嘟，狗毛尾，毛姑姑，狗尾，狗尾巴。

【商品名】狗尾草：为植物狗尾草的全草。使用于全国各地。

为狗尾草正品。以色绿、肥壮者为佳。

金狗尾草：为同属植物金狗尾草 *S. glauca* (L.) Beauv. 的全草。使用于西藏地区。为狗尾草副品。

【处方名】 狗尾草。

【性味归经】 淡，平。归肝、胆经。

【功效主治】 祛风明目，清热利尿。主治目赤肿痛，砂眼，小便不利，黄疸型肝炎，疮肿。

【用量】 10~15克。鲜品加倍。外用适量。

苦 丁 茶

出自《本经逢原》。为冬青科植物枸骨 *Ilex cornuta* Lindl. 和大叶冬青 *I. latifolia* Thunb. 的叶。春季采集嫩叶，晒干生用。

【别名】 苦灯茶，大叶茶，六角茶，八角茶，枸骨叶，大叶冬青叶。

【商品名】 枸骨叶：又名角刺茶、八角茶、八角刺、六角茶、六角刺、羊角刺、老鼠刺、猫儿刺、老虎刺、枸骨刺、狗青芳、散血丹、木蜜叶、枢木叶、功劳叶、土功劳叶、十大功劳叶、鸟不宿、鹅掌簕等。为植物枸骨的干燥嫩叶。主产于安徽、河南、浙江、江苏等地。

大叶冬青叶：又名苦灯茶。为植物大叶冬青的干燥嫩叶。主产于浙江、福建、广西等地。

以上商品均以叶肥、完整、干燥、色绿、无杂质者为佳。

【处方名】 苦丁茶，苦灯茶。

【注意】 在药材商品市场上，苦丁茶品种异常混乱。除上述品种外，四川地区用木犀科植物序梗女贞 *Ligustrum pedunculare* Rehd. 的叶，贵州地区用日本毛女贞 *L. japonicum* Thunb. var. *pubescens* Koidz. 的叶作苦丁茶使用，均非正品。另外，本品别名功劳叶、十大功劳叶，易与小檗科植物十大功劳叶名称相混，应引

起注意。

【性味归经】甘、苦，大寒。归肝、肺、胃经。

【功效主治】散风热，清头目，除烦渴。主治头痛，目赤，齿痛，聤耳，热病烦渴，痢疾，肺结核引起的咳嗽咯血。

【用量】3～10克。外用适量。

【慎忌】风寒头痛忌用。

千里光

出自《本草图经》。为菊科植物千里光 *Senecio scandens* Buch.-Ham. 的全草。主产于安徽、江苏、浙江、江西、广西、四川等地。夏、秋采收，鲜用，或晒干生用。

【别名】千里及，千里急，千里明，九里光，九里明，九岭光，九领光，九龙光，九龙明，七里光，一扫光，眼明草，黄花演，黄花草，黄花母，黄花枝草，软藤黄花草，金钗草，百花草，粗糠花，野菊花，天青红，白苏杆，箭草，青龙梗，木莲草。

【商品名】千里光，千里及。以带有花序、肥壮、色棕黄、无泥土等杂质者为佳。

【处方名】千里光，千里明，千里及，九里光，九里明，七里光，一扫光，鲜千里光等。

【性味归经】苦、辛，凉。归肝、肺经。

【功效主治】清热解毒，清肝明目，凉血消肿。主治上呼吸道感染，扁桃体炎，咽喉炎，肺炎，眼结膜炎，痢疾，肠炎，阑尾炎，急性淋巴管炎，丹毒，疖肿，湿疹，过敏性皮炎，痔疮，毒血症，败血症，烫伤，滴虫性阴道炎。

【用量】10～15克。鲜品加倍。外用适量。

【慎忌】中焦虚寒泄泻者忌服。

鬼 白

出自《神农本草经》。为小檗科植物八角莲 *Dysosma versipellis* (Hance) M. Cheng 的根茎。主产于长江流域。生于山坡、林下等阴湿处。秋季采挖，洗净，切片晒干。

【别名】九白，天白，爵犀，马目毒公，马目公，八角鸟，八角盘，八角镜，金星八角，独角莲，八角莲，独荷莲，独脚莲，独荷草，羞天花，羞寒花，旱荷，山荷叶，千斤锤，一碗水，江边一碗水，解毒，术律草，害母草，独叶一枝花，一把伞，六角莲，八角七，八角兵盘七。

【商品名】鬼白，八角莲。以块大、干燥、无杂质者为佳。

【处方名】鬼白。

【注意】在药材商品市场上，下列同属植物的根茎，在不同地区亦作鬼白入药，但非正品。

八角金盘 *D. chengii* (Chien) Keng f. [*Podophyllum chengii* Chien] 分布于安徽、浙江、河南、江西、湖南、广东、云南等地。

川八角莲（血丝金盆）*D. veitchii* (Hemsl. et Wils.) Fu [*Podophyllum veitchii* Hemsl. et Wils.] 分布于四川、云南、贵州等地。

西南八角莲 *D. delavayi* (Franch.) Hu [*Podophyllum delavayi* Franch.] 分布于云南、广西、贵州等地。

七角莲 *D. aurantiocaula* (Hand. -Mazz.) Hu [*Podophyllum aurantiocaula* Hand. -Mazz.] 分布于湖南、云南等地。

【性味归经】苦、辛，平。归肺、脾经。

【功效主治】祛痰散结，解毒祛瘀。主治痨伤咳嗽吐血，胃痛，瘰疬，淋巴结核，痈肿，疔疮，跌打损伤，毒蛇咬伤，腮腺炎，乳腺癌。

【用量】6~10克。外用适量。

【禁忌】阳盛热极者及孕妇忌服。

苘 麻 子

出自《圣济总录》。为锦葵科植物苘麻 *Abutilon theophrasti* Medic. 的种子。主产于河南、江苏、湖北、四川、安徽等地。冬季果实成熟时采收，打下种子，筛去果皮及杂质。

【别名】蕡麻子，空麻子，磨盘树子，蒜实，青麻子，野棉花子，白麻子，苘实，蕡子，蕡种子，苘麻实，野苧麻子，八角乌子，孔麻子，蕡种。

【商品名】苘麻子，苘实，苘麻实。以粒实饱满、干燥、色灰褐、无杂质者为佳。

【处方名】苘麻子，苘实，蕡子。

【注意】本品在药材商品市场上，大多被误作“冬葵子”入药。而历代本草书籍所载之冬葵子则为锦葵科植物冬葵 *Malva verticillata* L. 的种子。苘麻子与冬葵子在历代本草书中分属两种不同品名的药材，形态、功效各不相同，不能混用。

【性味归经】甘、微苦，平。归肝、脾经。

【功效主治】利湿热，退云翳。主治湿热痢疾，痈肿，瘰疬，角膜云翳。

【用量】10~15克。

秋 石

出自《品汇精要》。为人中白和食盐的加工品。有淡秋石和咸秋石二种。

【别名】秋丹石，淡秋石，咸秋石，盆秋石，童秋石。

【商品名】淡秋石：又名块秋石、童秋石。为漂净晒干的人中

白粉末，加白及浆水拌和，用模型托成小方块，晒干而成。主产于华东地区。以块整、干燥、无咸臭味者为佳。

咸秋石：又名盆秋石、秋石霜。用食盐加泉水煮煎，过滤，再将过滤液加热蒸发，干燥成粉霜，称为“秋石霜”。再将秋石霜置于有盖的瓷碗内，放炉火上煅 2 小时，冷却后凝成块状固体即成。主产于安徽。以色白、块整不碎者为佳。

【处方名】秋石，淡秋石，咸秋石，盆秋石。（处方中写秋石指咸秋石）

【性味归经】咸，寒。归肺、肾经。

【功效主治】滋阴降火。主治骨蒸劳热，咳嗽，咳血，咽喉肿痛，噎食反胃，遗精，白浊，膏淋，赤白带下。

【用量】3～5 克。外用适量。

【慎忌】脾胃虚寒者慎服，阴虚无热者忌服。

玄 精 石

出自《本草纲目》。为年久所结的小形片状石膏矿石。主产于内蒙古阿拉善旗的盐池附近。此外青海、四川、陕西、云南等地亦产。全年可采，除去泥土及杂石。

【别名】太阴玄精，太阴玄精石，太乙玄精石，龟背玄精石，阴精石，元精石，玄英石，元英石。

【商品名】玄精石，元精石，太乙玄精石，阴精石。以片薄、块整、色灰白者为佳。

【处方名】玄精石，元精石，阴精石，玄英石。

【性味归经】咸，寒。归肾经。

【功效主治】滋阴，降火，软坚，消痰。主治壮热烦渴，头风脑痛，目赤障翳，重舌，木舌，口舌生疮。

【用量】10～15 克。外用适量。

【慎忌】脾胃虚寒者忌服。

人 中 白

出自《日华子本草》。为人尿自然沉结的白色固体物。铲取年久的尿壶、尿桶等内面沉结的尿垢，除去杂质，晒干。

【别名】 尿碱，尿硷，尿垢，溺塗，溺白塗，白秋霜，秋白霜，粪霜，尿壶垢，尿干子，中白，中白丹，万年冰，万年霜，溺桶塗，尿霜，尿塗白，尿渍，尿积。

【商品名】 人中白。以色白无杂质者为佳。

【处方名】 人中白，中白，漂人中白，生人中白，煅人中白。

处方中写中白、人中白、生人中白均指漂人中白。为人中白在清水中浸漂后取出晒干入药者。功偏清热除蒸。

煅人中白为漂人中白置于坩埚内放炉火上煅烧至红色，然后取出放凉成灰白色入药者。功偏祛瘀止血。

【性味归经】 咸，寒。归肺、肝、膀胱经。

【功效主治】 清热，降火，消瘀。主治劳热，肺痿，衄血，吐血，喉痹，牙疳，口舌生疮。

【用量】 入丸散内服1.5~3克。外用适量。

【慎忌】 阳虚便溏者忌服。

(二) 清热燥湿药

黄 茜

出自《神农本草经》。为唇形科多年生草本植物黄芩 *Scutellaria baicalensis* Georgi 的根。主产于河北、河南、山西、内蒙古、陕西等地。以山西的产量最高，河北承德地区产的质量最好。秋末至春初采挖，除去残茎及须根，晒干，切片，生用、酒炒用或炒炭。

用。

【别名】腐肠，荟，黄文，虹胜，经芩，印头，内虚，耗蕡，空肠，元芩，土金茶根，空心草根，山茶根，黄芩茶，鼠尾芩，黄金茶，黄金茶根，烂心草根，宿芩，妒妇，苦督邮，狗尾芩，烂心子。

【商品名】枯黄芩：又名枯芩、片芩、片黄芩。为老根断面中央呈暗棕色或棕黑色朽片状者。

黄芩瓣：为中空而不坚实，呈劈破状者。

条芩：又名条黄芩、子黄芩、子芩、嫩黄芩、嫩芩。为外呈黄色、中实色青的细条嫩根。

大枝芩：为体形粗大、空心多者。

枝芩：为形体较小、空心少者。

尖芩：为形体细小或折断的尾部。

瓣芩：为黄芩破碎的片块。

热河黄芩：又称北芩。为产于河北承德和内蒙古昭蒙者。品质最优。销往全国，并供出口。其中最上等者称“大条”，主供出口。

东芩：为产于山东者。品质亦佳。主销江浙一带，亦销全国。

以上商品以根条粗长、干燥、坚实、色黄者为佳。

【处方名】黄芩，条芩，子芩，枯芩，淡芩，淡黄芩，酒芩，酒黄芩，黄芩炭。

处方中写黄芩、条芩、子芩、枯芩、淡芩、淡黄芩均指生黄芩。为原药材去杂质晒干，蒸透（或清水润透）切片，生用入药者。偏于清热。

酒黄芩又名酒芩。为黄芩片用黄酒喷洒拌匀，稍润，放锅内微炒入药者。偏清上焦。

黄芩炭为黄芩片放锅内炒至外面呈黑色，里面带黄心，存性，喷洒清水灭尽火星，取出晾干入药者。偏于止血。

【注意】同属植物西南黄芩（又名滇黄芩）*S. amoena* C.H.

Wright或甘肃黄芩*S. rehderiana* Diels.或粘毛黄芩(又名黄花黄芩)*S. viscidula* Bge.和丽江黄芩*S. likiangensis* Diels或薄叶黄芩*S. ikonnikouii* Juz.或川黄芩*S. hypericifolia* Lev.等的根，均作黄芩使用，但非正品，品质较次。

【性味归经】苦，寒。归肺、胆、胃、大肠经。

【功效主治】清热燥湿，泻火解毒，止血，安胎。主治湿热所致的湿温证、黄疸、泻痢、热淋、痈肿疮毒等；肺热咳嗽，内热炽盛所致的吐血、衄血、咳血、便血、血崩等；胎热引起的胎动不安或胎漏。

【用量】 3～10克。

【慎忌】脾胃虚寒，食少便溏者忌服。

黄 连

出自《神农本草经》。为毛茛科多年生草本植物黄连*Coptis chinensis* Franch. 和三角叶黄连 *C. deltoidea* C.Y. Cheng et Hsiao或云连*C. teeioides* C.Y. Cheng或峨嵋野连*Coptisome nsis* (Chen) C.Y. Cheng的根茎。主产于我国中部及西南各省区。以四川、云南产量最大。秋季采挖5～7年的植株，除去苗叶及须根，晒干，生用或姜炒、酒炒用。

【别名】王连，支连，三角叶黄连，云南黄连(又名云黄连、云连)，峨嵋野连，川连，鸡爪连，光连，鸡爪黄连，雅连，峨嵋连，嘉定连，刺盖连，野连，野黄连，凤尾连，岩黄连，上草。

【商品名】味连：又名川连、川黄连、尾连、西连、鸡爪连、鸡爪黄连、鹰爪连、鹰爪黄连、光连。为植物黄连的干燥根茎，多分枝，常3～6枝成束，形如鸡爪或鹰爪，故有鸡爪黄连和鹰爪黄连之称。主产于四川、湖北、陕西等地。

雅连：又名川雅连、雅川连、洪雅连、峨嵋连、嘉定连、刺盖连。为植物三角叶黄连的根茎。主产于四川省峨嵋、洪雅地区。

云连：又名云南黄连、云黄连、原云连。为植物云南黄连的干燥根茎。主产于云南。

野连：又名野黄连、岩黄连、凤尾连。为植物峨嵋野连的干燥根茎。主产于四川。均为野生，品质最优。

家连：雅连的一种。为在峨嵋山人工栽培者。

南岸连：味连的一种。为产于四川涪陵及湖北来凤、恩施等地者。产量大，但质较次。

北岸连：味连的一种。为产于四川万县、巫山及湖北房县、巴东、秭归等地者。产量小，但品质优。

古勇连：简称古连。云连的一种。为产于云南古勇山者。

上川连：又名真川连、小川连、细川连。为川连中质优者。

田鸡头：为产于碧江等地的条短多枝岔的一种黄连。品质较次。

以上商品云连以条细节多、须根少、色黄绿者为佳。其余均以肥壮、连珠形、质坚体重、断面红黄色者为佳。

土黄连：又名土川连。为植物短萼黄连 *Coptis chinensis* Franch. var. *brevisepala* W.T. Wang et Hsiao 的干燥根。产于广西、广东、安徽、福建等地。非属正品。

黄连须：黄连的根须。

剪口连：黄连叶柄基部。

千子连：黄连叶的全部叶柄。

【处方名】黄连，川连，姜连，姜黄连，姜制黄连，萸连，萸黄连，吴萸黄连，酒连，酒黄连，酒饮连，猪胆汁炒黄连，盐炒黄连，黄连炭等。

处方中写黄连、川连指生黄连。为原药材去杂质洗净晒干，切片生用入药者。

姜连又称姜黄连、姜制黄连。为黄连片用姜汁酒拌均匀，待姜汁吸尽，晾干入药者。

萸连又称萸黄连、吴萸黄连。为黄连片用吴茱萸水煎液浸泡，

捞出晾干入药者。

酒连又称酒黄连、酒饮连。为黄连片用黄酒喷洒拌匀，晾干入药者。

猪胆汁炒黄连为黄连片用猪胆汁淋洒拌匀，再用文火微炒入药者。

盐炒黄连为黄连片用盐水喷洒拌匀，再用文火微炒入药者。

黄连炭为黄连片用武火炒至外黑里焦黄，存性，用清水灭尽火星，然后晒干入药者。

【注意】在药材商品市场上，产于广西、广东、安徽等地的短萼黄连和产于云南东南部的五裂黄连*Coptis quinquesecta* W.T. Wang亦作黄连入药，但非正品。

【性味归经】苦，寒。归心、肝、胃、大肠经。

【功效主治】清热燥湿，泻火解毒。主治肠胃湿热引起的腹泻、痢疾、呕吐；热盛火炽引起的壮热、烦躁、神昏谵语；痈肿疮毒，疗毒，耳目肿痛，胃火牙痛和消谷善饥、烦渴多饮的中消证。

【用量】3～10克。外用适量。

【慎忌】胃寒呕吐、脾虚泄泻者忌服。

黄 柏

出自《神农本草经》。为芸香科落叶乔木植物黄檗（关黄柏）*Phellodendron amurense* Rupr. 和黄皮树（川黄柏）*P. chinense* Schneid. 除去栓皮的树皮。清明前后剥取树皮，刮去粗皮，晒干压平。切丝生用或盐炒用。

【别名】檗木，檗皮，黄檗，黄波罗，黄柏栗，黄皮树皮，灰皮柏，华黄柏，元柏，蘖木，蘖皮，黄蘖，黄柏，黄波椤，黄檗皮，黄树皮，柏皮，小黄连树皮，黄波罗树皮。

【商品名】关黄柏：又名关柏、东黄柏。为植物黄柏的树皮。主产于我国东北地区。

川黄柏：又名川柏。为植物黄皮树及其变种变型的树皮。主产于四川、贵州等地。

以上商品均以皮厚、干燥、色鲜黄、无栓皮者为佳。

【处方名】黄柏，川柏，柏皮，盐黄柏，酒黄柏，黄柏炭。

处方中写黄柏、柏皮、川柏指生黄柏。为原药材刮去粗皮，晒干压平，切丝生用入药者。

盐黄柏为黄柏丝用盐水喷洒拌匀，待吸干，文火微炒入药者。

酒黄柏为黄柏丝用黄酒喷洒拌匀，稍闷，文火微炒入药者。

黄柏炭为黄柏丝用武火炒至外面呈黑色，里面呈黄褐色，存性，取出喷酒清水灭尽火星，晾干入药者。

【注意】分布于贵州、四川、湖北等地的秃叶黄皮树 *Phellodendron chinense* Schneid. var. *glabriuscum* Schneid 及分布于四川的峨嵋黄皮树 *P. chinense* Schneid. var. *omeiense* Huang 或分布于云南的云南黄皮树 *P. chinense* Schneid. var. *ynnanense* Huang 和镰刀黄皮树 *P. chinense* Schneid. var. *falcatum* Huang 等都是黄皮树的变种，其树皮也作黄柏入药，功效相似，但非正品。

小檗科小檗属(Berberis)和十大功劳属(Mahonia)多种植物的树干内皮在青海、山西、四川和河南的个别地区称山黄柏、土黄柏或黄柏，并作黄柏入药。这些药材是否与黄柏功效相同，值得进一步研究。这种混用现象应该纠正。

【性味归经】苦，寒。归肾、膀胱、大肠经。

【功效主治】清热燥湿，泻火解毒，退虚热。主治湿热痢疾、黄疸、白带、足膝肿痛及热淋；疮疡肿毒及湿疹；阴虚发热、骨蒸盗汗及遗精等证。

【用量】3~10克。外用适量。

【慎忌】脾胃虚寒者忌服。

龙 胆 草

出自《神农本草经》。为龙胆科多年生草本植物龙胆 *Gentiana scabra* Bunge. 和三花龙胆 *G. triflora* Pall. 或东北龙胆 *G. manshurica* Kitag. 的根。我国南北各地均有分布。秋季采挖，晒干，切段。生用。

【别名】 龙胆，草龙胆，胆草，胆草根，苦龙胆草，地胆草，山龙胆，水龙胆，三花龙胆，东北龙胆，粗糙龙胆，条叶龙胆，苦胆草，陵游，四叶胆，山胆草，达各都（蒙古族名），撒花料淡（朝鲜族名）。

【商品名】 关龙胆：又名东龙胆、北龙胆、东胆草。为产于我国东北地区者。产量大，品质优。销往全国，并且出口。

云龙胆：又名云胆草、西龙胆。为产于云南、广西、四川、贵州等地者。品质稍次。

严龙胆：产于浙江金华、嘉兴者。品质最优，但产量小。

苏龙胆：产于江苏者。

以上商品均以根条粗长、干燥、黄色或黄棕色、无断碎者为佳。

【处方名】 龙胆草，胆草，苦胆草。

【注意】 分布于云南等地的同属植物滇龙胆（又名坚龙胆）*Gentiana rigescens* Franch. 及其变种点花滇龙胆 *G. rigescens* Franch. var. *stictantha* Marquand 的根及全草有些地方作龙胆草入药，商品名称为贵州龙胆。此非正品。

另外，龙胆科扁蓄属植物湿生扁蓄 *Gentianopsis paludosa* (Munro) Ma 的全草，在西藏地区作龙胆草入药，此属混用，应该纠正。

【性味归经】 苦，寒。归胆、肝、胃经。

【功效主治】 清热燥湿，泻肝胆火。主治湿热黄疸，阴肿阴

痒，白带增多，湿疹；肝经热盛所致的高热惊厥、手足抽搐；肝胆实热所致的头痛、胁痛、口苦、目赤、耳鸣、耳聋、头昏等证。

【用量】 3～6克。外用适量。

【慎忌】 脾胃虚寒者忌服。

苦 参

出自《神农本草经》。为豆科多年生落叶亚灌木植物苦参 *Sophora flavescens* Ait. 的根。我国各地均产。春初或秋末采挖，除去芦头、须根，洗净，切片，晒干。

【别名】 黛苦骨，川参，凤凰爪，牛参，苦参根，水槐根，地槐根，菟槐根，骄槐根，白茎根，虎麻根，岑茎根，禄白根，陵郎根，野槐根，山槐根，山槐子根，山槐树根，白萼根，好汉枝根，地骨，地参。

【商品名】 苦参。以根条均匀、不带疙瘩头、干燥、皮细无须根者为佳。

【处方名】 苦参，炒苦参，苦参炭。

处方中写苦参指生苦参。为原药材去杂质及芦头和须根，洗净晒干，切片入药者。

炒苦参为苦参片用麸炒至微黄入药者。

苦参炭为苦参片用武火炒至外面焦黑，里面焦黄，存性，而后入药者。

【性味归经】 苦，寒。归心、肝、胃、大肠、膀胱经。

【功效主治】 清热燥湿，祛风杀虫，利尿。主治湿热引起的黄疸、泻痢、带下、阴痒；皮肤瘙痒，脓疱疮，疥癣，麻风；湿热蕴结，小便不利，灼热涩痛。

【用量】 3～10克。外用适量。

【慎忌】 脾胃虚寒者忌服。反藜芦。

翻白草

出自《救荒本草》。为薔薇科植物翻白草 *Potentilla discolor* Bge. 的带根全草。主产安徽、河北等地。其他地区亦有分布。夏秋未开花前连根拔起，洗净晒干。

【别名】 鸡腿儿，鸡脚草，鸡腿根，鸡腿子，鸡距草，湖鸡腿，鸭脚参，鸡爪参，鸡脚爪，白鸡爪草，野鸡坝，天藕儿，乌皮浮儿，崎角草，土菜，茯苓草，郁苏参，土人参，金线吊葫芦，细沙扭，兰溪白头翁，黄花地丁，千锤打，天青地白，土洋参，叶下白，白头翁，地栗。

【商品名】 翻白草。以无花萼、无杂质、干燥、色灰白者为佳。

【处方名】 翻白草，番白草、反白草。

【注意】 在药材商品市场上，同属植物委陵菜 *P. chinensis* Ser. 在我国东北、华北及西北地区被混作“翻白草”使用；亚洲委陵菜 *P. asiatica* Juz. 在新疆地区被混作“翻白草”使用；亮叶委陵菜 *P. fulgens* Wall. 在西藏地区被混作“翻白草”使用。均应纠正。

【性味归经】 苦，寒。归胃、大肠经。

【功效主治】 清热燥湿，凉血解毒。主治湿热痢疾所致的腹痛下坠，便下脓血；鼻衄；崩漏及痔漏下血；皮肤慢性溃疡及下肢溃疡（瘭疽腿）；肺脓疡；瘰疬。

【用量】 6～12克。鲜品加倍。外用适量。

【慎忌】 脾胃虚寒者慎用或少用。

(三) 清热凉血药

犀 角(附：水牛角)

出自《神农本草经》。为脊椎动物犀科犀牛的角。分暹罗角和广角两类。暹罗角的原动物为亚洲产的印度犀 *Rhinoceros unicornis* L. 或爪哇犀 *R. sondaicus* Desmarest 和苏门答腊犀 *R. sumatrensis* (Fischer)，广角的原动物为非洲产的黑犀 *R. bicornis* L. 和白犀 *R. simus* Burchell。暹罗角主产于印度、尼泊尔、缅甸、马来西亚和印度尼西亚等地。广角主产于非洲东部及东南部。均系进口药材。锉成细末或磨汁服。

【别名】 乌犀角，香犀角，白犀角，黑犀角。印度犀角，爪哇犀角，苏门犀角，独角犀角，双角犀角，方吻犀角，亚洲犀角，非洲犀角，犀牛角，兜角，柱角，天马角，暹罗角，低云，低密。

【商品名】 暹罗角：又名亚洲犀角。为印度犀、爪哇犀、苏门犀的角。主产于南亚及东南亚国家的原始森林中。

广角：又名柱角，兜角，广犀角、天马角、非洲犀角。为黑犀和白犀的角。主产于非洲东部及东南部国家的原始森林中。

小犀角：又名蘑菇头。为犀牛顶上的小角。

犀角条：先将犀角锯成片状，再锯成粗细如筷状的小条。

犀角片：又名犀角花、犀角屑。将犀角用沸水浸（或蒸软）后，锯成的薄片。

犀角粉：又名犀角末、犀角面。将犀角蒸软后，锉成的细末。

广角个：未经锯、锉的整个完好的广角。

广角瓣：为“广角个”的加工品。即“广角个”锯成的小块。

犀角尖：又名乌犀角尖、乌犀尖。即犀角的尖部。

暹罗角和广角均以无裂隙、外表灰黑色、断面四周灰白而中心

乌黑者为佳。

【处方名】犀角，广角，乌犀尖，犀角粉。

【性味归经】苦、咸，寒。归肝、心、胃经。

【功效主治】泻火解毒，安神定惊，凉血止血。主治温热病热盛火炽，壮热不退，神昏谵语；温热病热毒炽盛，身热，发斑疹其色紫暗；血热妄行所致的吐血、衄血。

【用量】1·5~6克。

【禁忌】孕妇慎用。畏川乌、草乌。

附：水牛角

出自《名医别录》。为牛科动物水牛 *Bubalus bubalis* L. 的双角。又名牛角。主产于我国华东、华南地区。以油润、明亮、半透明者为佳。性味咸寒。有清热、凉血、解毒功效。主治热病壮热，热盛出血、神昏及斑疹等证。功效与犀角近似，常作为犀角的代用品。常用量6~15克。锉末冲服或水煎服。慎忌同犀角。

生 地 黄

出自《神农本草经》。为玄参科多年生草本植物怀庆地黄 *Rehmannia glutinosa* Libosch. f. *hueichingensis* (Chao et Schih) Hsiao 或地黄 *R. glutinosa* (Gaertn.) Libosch. 的根。主产于河南、河北、内蒙古及东北等地。野生和栽培均有。秋末采挖，除去须根，鲜用或干燥后使用。

【别名】生地，干地黄，干生地，地黄，地黄根，原生地，地髓，芍根，芭根，牛奶子根，婆婆奶根，狗奶子根，山烟根，山白菜根，酒壺花根，酒盅盅花根，甜酒棵根，蜜罐棵根，蜜蜜罐根，蜜蜜罐棵根，山旱烟根，山烟棵根，炮掌根，婆婆妮根，阳精。

【商品名】怀生地：又名怀地黄、怀庆地黄。为产于河南温

县、博爱、孟县、沁阳、武陟（旧时怀庆府）一带者。品质最优，产量最大。

干地黄：又名生地、生地黄、干生地等。为鲜地黄洗净，切片晒干或烘干而成。

大生地：指根茎肥大体重者。品质较优。

小生地：又名细生地、根生地、次生地。指药材个体细小如根者。品质稍次。

以上商品以块根肥大、味甜者为佳。

【处方名】生地，生地黄，鲜地黄，干生地，干地黄，大生地，细生地，怀生地，淮生地，生地炭。

处方中写生地、干生地、干地黄、大生地、细生地、怀生地、淮生地均指干地黄。为鲜生地洗净，切片晒干或烘干入药者。

鲜地黄为新从地下挖出汁液饱满的地黄根。

生地炭又名生地黄炭。为干生地炒成的炭。

【性味归经】甘、苦，寒。归心、肝、肾经。

【功效主治】清热凉血，养阴生津。主治温热病热入营血，身热口干，舌绛红，吐血，衄血，尿血，血崩；热病伤阴，舌红口干，或口渴多饮以及消渴证烦渴多饮或肠燥便秘等。

【用量】10~15克。鲜品20~40克。

【禁忌】脾虚便溏者慎用。

玄参

出自《神农本草经》。为玄参科多年生草本植物玄参 *Scrophularia ningpoensis* Hemsl. 的根。产于我国长江流域及陕西、福建等地。野生及家种均有。立冬后采挖，晒干，切片生用。

【别名】元参，乌元参，黑元参，黑参，黑玄参，北玄参，浙玄参，乌玄参，润玄参，大玄参，角参，重台，鬼藏，正马，鹿肠，玄台，逐马，馥草，野脂麻，野芝麻，端，咸。

【商品名】玄参，元参。以根条粗壮、皮细、质坚实、干燥、断面黑色者为佳。

【处方名】玄参，元参，黑参。

【注意】在药材商品市场上，湖北、内蒙古以及华北、东北等部分地区，把同属植物北玄参*S. buergeriana* Miq.的根作玄参入药。功效相似，但非正品。

【性味归经】甘、苦、咸，寒。归肺、肾、胃经。

【功效主治】清热，解毒，养阴。主治温热病热入营分，耗伤津液，身热不扬，口干舌绎；或温热病血热壅盛，发斑，或咽喉肿痛，神昏谵语；痈肿疮毒，瘰疬痰核等证。

【用量】8～15克。

【慎忌】脾胃虚寒，胃脘满闷少食者不宜服用。反藜芦。

牡 丹 皮

出自《神农本草经》。为毛茛科多年生落叶小灌木植物牡丹 *Paeonia suffruticosa* Andr.的根皮。主产于安徽、山东等地。秋季采挖，除去须根及外皮，趁鲜剥去木心，晒干，生用或炒用。

【别名】丹皮，牡丹，牡丹根皮，丹根，吴牡丹皮，条丹皮，鹿韭根皮，鼠姑根皮，百两金皮，木芍药皮，花王根皮，花相根皮，洛阳花根皮，铁角牛根皮，富贵花根皮，天香国色根皮。

【商品名】原丹皮：又名丹皮、牡丹皮、连丹皮。为植物牡丹未刮去外皮的较粗大的根皮。

细丹皮：为选过原丹皮后，下余的较细者。

骨丹皮：为细丹皮未抽去木心者。

刮丹皮：又名粉丹皮。为植物牡丹根皮刮去外皮者。

凤丹皮：又名凤丹。为产于安徽铜陵地区凤凰山者。品质最优。

瑶丹皮：又名瑶丹、姚丹。为产于安徽南陵地区者。品质亦

优。

川丹皮：又名垫丹。为产于四川省垫江、灌县者。

西丹皮：又名西北丹皮。为产于甘肃、陕西及四川康定、庐定等地者。

西昌丹皮：为产于四川西昌者。品质较次。

湖丹皮：又名湖丹。为产于湖南邵阳等地者。

东丹皮：又名东丹。为产于山东菏泽等地者。

云丹皮：又名云南丹皮。为产于云南的多种牡丹皮的统称。

茂丹皮：为产于四川的茂纹牡丹 *Paeonia thalictrumifolia* C. Hoets. Y. Chen 的根皮。

以上商品以根条粗长、皮厚、干燥、无木心、无须根、断面粉白色、粉性足、香气浓、亮银星多者为佳。

【处方名】丹皮，牡丹皮，粉丹皮，凤丹皮，炒丹皮。

处方中写丹皮、牡丹皮、粉丹皮、凤丹皮均指生牡丹皮。为原药材去除杂质，切段入药者。

炒丹皮为丹皮段用文火炒至微黄入药者。

【注意】在药材商品市场上，下列同属植物的根皮在不同地区也作牡丹皮入药，功效近似，但非正品。

矮牡丹 *Paeonia suffruticosa* Andr. var. *Spontanea* Rehd. 产于陕西。

紫斑牡丹 *P. papaveracea* Andr. 产于陕西。

黄牡丹 *P. lutea* Franch 产于陕西、云南。

野牡丹 *P. delavayi*-Franch 产于陕西。

保氏牡丹 *P. potanini* Kom. 产于陕西。

四川牡丹 *P. szechuanica* Fang 产于四川。

茂纹牡丹（见上）产于四川。

云南牡丹 *P. yunnanensis* Fang 产于云南。

【性味归经】苦、辛，微寒。归肝、心、肾经。

【功效主治】清热凉血，活血调经。主治热入血分引起的发

斑、吐血、衄血；热病后期，阴分伏热发热，或夜热早凉，或阴虚内热；血瘀经闭、痛经、癥瘕；痈肿疮毒及内痈。

【用量】 6～12克。

【慎忌】 血虚有寒、孕妇及月经过多者不宜服用。

赤 荀

出自《神农本草经》。为毛茛科多年生草本植物毛果赤芍（川赤芍）*Paeonia veitchii* Lynch. 和卵叶赤芍*P. obovata* Maxim. 或赤芍*P. lactiflora* Pall. 的根。主产于内蒙古、四川及东北各地。秋季采挖，除去茎秆、芦头、须根，刮去粗皮，晒干，切片入药。

【别名】 毛果赤芍，卵叶赤芍，赤芍药，木芍，草赤芍，木芍药，木赤芍，红芍，红芍药，臭牡丹根，草芍药，山芍药，卵叶芍药，野芍药，参幌子，川赤芍，芍药，狭叶赤芍，铁杆赤芍，多伦赤芍，京赤芍，西赤芍，北赤芍。

【商品名】 北赤芍：又名赤芍、赤芍药、草芍药。为植物赤芍和卵叶赤芍的根。主产于我国东北和内蒙古等地。其中以多伦产者品质最优。

多伦赤芍：为内蒙古多伦地区产的北赤芍。产量大，品质优，全国销售并且出口。

京赤芍：为产于北京近郊西山一带的北赤芍。

西赤芍：又名西芍药、川赤芍。为植物川赤芍（毛果赤芍）的根。主产于四川西昌、甘孜、凉山、阿坝等地。此外，云南、贵州亦产。其中以西昌产者为最优。

原皮赤芍：为赤芍药未刮去外皮者。

刮皮赤芍：为赤芍药已刮去外皮者。

以上商品以根条粗长、质松（俗称糟皮粉渣）者为佳。

【处方名】 赤芍，赤芍药，炒赤芍。

处方中写赤芍、赤芍药指生赤芍。为原药材去杂质，刮去粗

皮，晒干，润透切片生用入药者。

炒赤芍为赤芍片用文火炒至黄色，略见焦斑摊晾，然后入药者。

【注意】在药材商品市场上，下列同属植物的根或块根，在不同地区亦作赤芍入药，功效相近，但非正品。

变叶赤芍（又名西北草赤芍）*P. anomala* L. 分布于陕西、甘肃。

美丽赤芍*P. mairei* Levl. 分布于四川。

毛叶赤芍*P. obovata* Maxim. var. *Willmottiae* (Stapf) Stern 分布于四川。

块根芍药*P. hybrida* Pall. 分布于新疆。

【性味归经】苦，微寒。归肝经。

【功效主治】清热凉血，祛瘀止痛。主治热入血分所致的身热、斑疹、吐血、衄血；血滞经闭、痛经及跌打损伤瘀滞肿痛；痈肿；目赤肿痛；血热所致的热淋、血淋及热痢下血。

【用量】 1~15克。

【慎忌】虚寒经闭忌用。反藜芦。

紫 草

出自《神农本草经》。为紫草科多年生草本植物紫草 *Lithospermum erythrorhizon* Sieb. et Zucc. 和新疆紫草 *Macrotomia euchroma* (Royle.) Pauls. 或滇紫草(大紫草) *Onosma paniculatum* Bur. et Franch. 的根。主产于新疆、辽宁、湖南、湖北、云南等地。秋末采挖，除去茎叶，洗净晒干，切片入药。

【别名】藐，茈，茈草，紫丹、紫根，紫芨，地血，茈芨，紫草蔃，鵝衔草，紫草根，山紫草，红石根，新疆紫草，新疆假紫草，滇紫草，大紫草，软紫草，软苗紫草，硬紫草，硬苗紫草，细紫草，老紫草，东紫草，东北紫草。

【商品名】硬紫草：又名硬苗紫草、红条紫草、东北紫草。为植物紫草的干燥根。主产于我国东北及湖南、湖北等地。质佳。

软紫草：又名软苗紫草、老紫草、新疆紫草、新疆假紫草。为植物新疆紫草的干燥根。主产于新疆。一般认为品质最优。销往全国。

滇紫草：又名大紫草、云南紫草。为植物滇紫草的干燥根。主产于云南。品质较次。销售地区不广，多自产自销。

以上商品以根条粗长、肥壮、色紫、皮厚、木心小者为佳。

【处方名】紫草，紫草根。

【注意】在药材商品市场上。下列同属植物的根，在某些地区亦作紫草入药，功效近似，但非正品。

天山紫草 *Lithospermum tschimganicum* B. Fedtsch. 分布于新疆。

帕米尔假紫草 *Arnebia thomsonii* Clarke 分布于新疆。

内蒙古紫草（又名假紫草、黄花紫草）*Arnebia guttata* Bunge 分布于内蒙古、甘肃及新疆等地。

西藏紫草（又名哲磨、山紫草、长花滇紫草）*Onosma hookeri* Clarke var. *longiflorum* Duthie 分布于西藏。

此外，广东商品中的“北紫草”，实际上是白头翁的一个品种。功效与紫草不同，不能误作紫草使用。应当注意。

【性味归经】甘，寒。归心、肝经。

【功效主治】凉血活血，解毒透疹。主治麻疹或温热病发斑疹，因热毒内盛而致斑疹不畅或色紫暗；疮疡、湿疹、阴痒及烧伤烫伤等证。

【用量】 6～15克。外用适量，油浸或熬膏用。

【慎忌】脾虚便溏者忌服。

(四) 清热解毒药

金 银 花(附：忍冬藤)

出自《名医别录》。为忍冬科多年生半常绿缠绕性木质藤本植物忍冬 *Lonicera japonica* Thunb. 的花蕾。我国各地均有分布。夏初当花含苞未放时采摘，阴干，生用。

【别名】 忍冬花，金花，银花，二花，密二花，双花，双苞花，二宝花，金藤花，苏花，鹭鸶花，努间努碾，吊坡胶姿，胶都颠（侗族名），羔热马耨（布依族名），阿拉塔蒙根其其格（蒙族名），抛捏，婵人防，勤人墙，美亲晒，琴严扁，善然效（瑶族名），精因发。

【商品名】 南银花：又名密银花。主产于河南省密县、登封、荥阳、尉氏等县。品质最优，但产量较小，主供出口。

东银花：又名济银花。主产于山东省费县、平邑、苍山等县。产量较大，品质亦佳。销往全国，并供出口。

怀银花：又名淮银花。产于河南省温县、博爱、沁阳、武陟、孟县一带（旧时怀庆府）者。品质亦佳，销往全国，并有出口。

山银花：又名土银花、杜银花。产于安徽、江苏、山西、陕西、浙江、江西、四川、湖北、湖南、贵州等地。品质较次，多在当地销售。

以上商品以花蕾未开放、干燥、黄白色者为佳。

【处方名】 二花，双花，金银花，金因花。

【注意】 在药材商品市场上，下列同属植物的花蕾，在某些地区亦作金银花入药，其茎和叶作忍冬藤入药，功效近似，但非正品。

山银花（又名土银花、毛萼忍冬）*Lonicera confusa* DC. 分布

于广东、广西、云南等地。

腺叶忍冬 *L. hypoglauca* Miq. 分布于湖南、广东、广西等地。

毛花柱忍冬 *L. dasystyla* Rehd. 分布于广西。

细苞忍冬(又名岩银花) *L. similis* Hemsl. 分布于四川、云南、湖南、广西等地。

肚子银花 *L. fuchsoides* Hemsl. 分布于四川。

光冠银花(又名淡红忍冬、淡红银花) *L. henryi* Hemsl. 分布于西藏。

小叶金银花(又名小叶忍冬) *L. lanceolata* Wall. 分布于西藏。

盘叶忍冬(当地称杜银花、土银花) *L. tragophylla* Hemsl. 分布于山西、陕西、甘肃、四川等地。

假大花忍冬 *L. macranthoides* Hand Mazz. 分布于湖南、广西、广东、贵州等地。

硬毛忍冬 *L. hispida* (Steph) Pall. 分布于河北、山西、陕西、甘肃、新疆、四川等地。

【性味归经】 甘，寒。归肺、胃、大肠经。

【功效主治】 清热解毒。主治外感风热或温热病初起，发热，微恶风寒；疮痈疖肿；热毒泻痢，下痢脓血；夏季伤暑所致的头昏头痛等证。

【用量】 5～30克。外用适量。

【慎忌】 素体虚寒者慎用。

附：忍冬藤

忍冬藤为忍冬的茎叶。又名银花藤、二花藤、金花藤、忍冬、鸳鸯藤、双花藤、苏花藤、鹭鸶花藤、二宝花藤、双苞花藤等。秋末冬初割取带叶的嫩枝，晒干，生用。以质嫩、带叶、干燥无杂质者为佳。性味功效与金银花相似，多用于痈肿疮毒。本品又能清经

络中的风湿热邪而疗风湿热痹。常用量10~30克。水煎服或浸酒饮用。

连 翘

出自《神农本草经》。为木犀科落叶灌木植物连翘*Forsythia suspensa*(Thunb.) Vahl的果实。产于我国东北、华北、长江流域和云南等地。野生和家种均有。白露至寒露期间采摘，生用。

【别名】连轺，翹，连召，连乔，连，连壳，连翘壳，旱连子，大翹子，空壳，异翹，兰华，轵，折根，三廉，连草，大翹，黄花杆，黄寿丹，黄花瓣，黄花条，黃链条花，黄奇丹，黄翹，黄连翹，青翹，青壳，青连翹，落翹，老翹，连翹衣，空翹。

【商品名】青翹：又名青连翹。为白露前采摘的初成熟的颜色青绿的果实。品质较优。以色绿、不开裂者为最佳。

黄翹：又名黄连翹、老连翹、老翹。为寒露前采摘的熟透的颜色发黄的果实。品质较青翹次。以色黄、瓣大壳厚者为佳。

连翹心：又名连召心。青翹采摘后，蒸熟晒干，筛取籽实即为连翹心。

带心连翹：连翹壳和籽实俱存者。

北连翹：产于河南、山西、陕西、山东等北方地区者。

【处方名】连翹，连召，青翹，连翹壳，连翹心。

【性味归经】苦，微寒。归肺、心、胆经。

【功效主治】清热解毒，消痈散结。主治外感风热和温病初起，发热、口渴、头痛；热毒蕴结所致的各种疮毒痈肿，瘰疬结核等证。

【用量】 6~15克。

【慎忌】 素体虚寒者慎用。

蒲 公 英

出自《新修本草》。为菊科多年生草本植物蒲公英 *Taraxacum mongolicum* Hand.-Mazz. 及其多种同属植物的带根全草。全国各地均有分布。夏秋两季采收，洗净，鲜用或晒干生用。

【别名】公英，鬼公英，卜公英，仆公英，仆公瞿，蒲公草，耩耨草，金簪草，地丁，孛孛丁，孛孛丁菜，黄花苗，黄花郎，鹁鸪英，婆婆丁，白鼓丁，黄花地丁，蒲公丁，耳瓣草，狗乳草，奶汁草，残飞坠，黄狗头，卜地蜈蚣，鬼灯笼，羊奶奶草，双英卜地，黄花草，茅萝卜，黄花三七，蒲蒲丁，古古丁，姑姑丁，碱地蒲公英，异苞蒲公英，热河蒲公英，红梗蒲公英，角状蒲公英，白花蒲公英，淡黄花蒲公英，东北蒲公英，多裂蒲公英，亚洲蒲公英，雾灵蒲公英，把儿英。

【商品名】蒲公英。以叶多、色灰绿、花黄、根完整、干燥、无杂质者为佳。

【处方名】蒲公英，公英，鲜公英。

【注意】《本草衍义》将本品称地丁，《本草纲目》将本品的别名称黄花地丁，均易与地丁（紫花地丁）名称相混，使用时应注意。

在药材商品市场上，蒲公英的销售品种比较混乱。如广西的某些地区把菊科植物一点红 *Emilia sonchifolia* (L.) DC. 作蒲公英入药；广东的某些地区把地胆草 *Elephantopus scaber* L. 作蒲公英入药；福建某些地区把野苦荬菜属植物 *Lxeris* spp 和苦荬菜属植物 *Sonchus* spp 作蒲公英入药；江西、广西的一些地区还把山莴苣属植物 *Lactuca* spp 作蒲公英入药。这些植物在当地称“土公英”，形态及功效均与蒲公英不尽相同，非真正的蒲公英，不能混淆，应注意鉴别。

【性味归经】甘、苦，寒。归肝、胃经。

【功效主治】清热解毒，利湿。主治热毒痈肿疮疡及内痈；湿热黄疸及小便淋沥涩痛等证。

【用量】10~30克。鲜品30~60克。

【慎忌】脾虚便溏者慎用。

紫 花 地 丁(附：米口袋)

出自《本草纲目》。为堇菜科多年生草本植物紫花地丁 *Viola yedoensis* Mak. 的带根全草。我国南北各省均有分布，以河南、安徽、江苏、山东为最多。夏季采收，洗净，鲜用或晒干生用。

【别名】地丁，紫地丁，地丁草，堇堇菜，辽堇菜，堇菜地丁，光瓣堇菜，兔耳草，箭头草，羊角子，独行虎，如意草，玉如意，铧头草，剪刀花，疗毒草，见肿消，剪刀菜，海地丁。

【商品名】紫花地丁，地丁。以色绿、叶整、茎叶及蒴果皆生茸毛、干燥者为佳。

【处方名】地丁，地丁草。

【注意】目前在药材商品市场上，各地作紫花地丁使用的药材，品种比较混乱。华北、东北、山东、江苏等地，将豆科多年生草本植物米口袋（又名甜地丁）*Gueldenstaedtia multiflora* Bge. 和小米口袋*G. pauciflora* (Pall.) Fish. 的带根全草作地丁入药；甘肃、江苏、浙江、广东、陕西、新疆等地，将堇菜科一年生草本植物犁头草*Viola japonica* Langsd. 或长萼堇菜*V. inconspicua* Bl. 和白花堇菜*V. patrinii* DC. 或香堇*V. oxycentra* Juz. 的带根全草作地丁入药；西北、华北、东北等地，将罂粟科一年或二年生草本植物紫堇*Corydalis bungeana* Turcz. 的全草作地丁入药；两广地区还将龙胆科一年生草本植物华南龙胆（又名龙胆地丁、华南地丁、广地丁、土地丁）*Gentiana lourteiri* Griseb. 的全草作地丁入药。以上这些，均非正品。有些属于混用，有些属于误用。有些与紫花地丁不同科属，功效也不相同，不能混用。应注意鉴别。

【性味归经】苦、辛，寒。归心、肝经。

【功效主治】清热解毒。主治痈肿、疔毒、乳痈、肠痈、丹毒等热毒疮疡；毒蛇咬伤；目赤肿痛。

【用量】10~20克。鲜品15~30克。外用适量。

附：米口袋

米口袋为豆科多年生草本植物米口袋 *Gueldenstaedtia multiflora* Bge. 的带根全草。又名甜地丁、小丁黄、地丁花、米口袋地丁、萝卜地丁、老鼠尾根。主产于河南、河北、山西、陕西、山东、江苏等地。野生。商品以叶绿、根大、干燥、顶端有紫花者为佳。功效与紫花地丁近似，在许多地区作紫花地丁使用。用量同紫花地丁。

大青叶

出自《名医别录》。为十字花科2年生草本植物菘蓝 *Isatis tinctoria* L. 和草大青 *I. indigotica* Fort. 或爵床科多年生灌木状草本植物马蓝 *Baphicacanthus cusia* Bremek. 或蓼科1年生草本植物蓼蓝 *Polygonum tinctorium* Ait. 或马鞭草科落叶灌木路边青 *Clerodendron cyrtophyllum* Turcz. 等的叶或枝叶。均于夏、秋采收叶片或枝叶，鲜用，或晒干生用。

【别名】大青，路边青叶，菘蓝叶，马蓝叶，草大青叶，蓼蓝叶，蓝靛叶，大青木叶，靛青叶，靛叶，板蓝叶，板蓝根叶，水红花叶，山蓝叶，球山蓝叶，大蓝叶，臭菜叶，猪屎青，猪子菜，青草心，淡婆婆，山尾草，山尾花叶，山漆叶，鸭公青，鸡屎菜，鬼灯火，牛耳青，绿豆青，臭大青，大百解。

【商品名】路边青叶：又名大青叶、淡婆婆叶、青草心叶、山尾草叶、山尾花叶、山漆叶、猪屎青叶、鸭公青叶、鸡屎菜叶、鬼

灯火叶、牛耳青叶、绿豆青叶、臭大青叶、大百解叶。为植物路边青的叶及嫩枝。主产于安徽、江苏、湖南、湖北、江西等地。

蓼蓝叶：又名靛青叶、蓝靛叶、靛叶、水红花叶。为植物蓼蓝的叶。主产于河北、山西等地。

菘蓝叶：又名板蓝根叶。为植物菘蓝的叶。主产于安徽、江苏、河南、河北等地。

马蓝叶：又名山蓝叶、大青叶、球山蓝叶、大蓝叶。为植物马蓝的叶和嫩枝。主产于我国长江以南的广大地区。

以上商品均以叶片完整、干燥、色青黑者为佳。

【处方名】 大青叶，鲜大青叶等。

【注意】 产于江苏、山东、安徽、广东、广西、福建等地的豆科木蓝属植物木蓝（又名野槐树、槐蓝、野青靛）*Indigofera tinctoria* L. 的叶片，在江西、福建个别地区作大青叶入药。产于广东的爵床科马蓝属植物山蓝*Strobilanthes dalzielii* W. W. Smith. 的叶片，在当地作大青叶入药。功效近似，但非正品。

蓼科酸模属植物土大黄（又名牛舌头棵、牛大黄）*Rumex madaio* Makino [*R. daiboo* Makino] 的叶子，在江苏苏州作大青叶用。此为混用，应该纠正。

【性味归经】 苦，大寒。归心、肺、胃经。

【功效主治】 清热解毒，凉血消斑。主治温热病热入血分所致的发斑、神昏、壮热；血热毒盛所致的丹毒、口疮、咽喉肿痛等证。

【用量】 6～10克。鲜品10～20克。外用适量。

【慎忌】 脾胃虚寒者忌服。

板 蓝 根

出自《本草纲目》。为十字花科2年生草本植物菘蓝*Isatis tinctoria* L. 和草大青*I. indigotica* Fort. 或爵床科多年生灌木状

草本植物马蓝 *Baphicacanthus cusia* Bremek. 的根茎及根。主产于河北、安徽、江苏及湖南、江西、广东、广西等地。初冬霜降后采挖，除去茎叶，洗净切片，晒干，生用。

【别名】靛青根，蓝靛根，靛根，大蓝根，大青根，马蓝根，菘蓝根，蕡根，大叶冬蓝根，青蓝根，山蓝根，草大青根，蓝龙根，土龙根，板兰根，兰根，蓝根，大青叶根。

【商品名】大蓝根；又名北板蓝根、菘蓝根、草大青根。为植物菘蓝或草大青的根。主产于河北、安徽、江苏等地。以根条长而均匀、干燥、质油润者为佳。

马蓝根；又名南板蓝根、蓝龙根、土龙根。为植物马蓝的根。主产于湖南、江西、广东、广西等地。以根条长而均匀干燥者为佳。

【处方名】兰根，蓝根，板兰根，板蓝根，大青根。

【性味归经】苦，寒。归心、胃经。

【功效主治】清热解毒，凉血，利咽。主治温热病发热、头痛、咽痛、发斑疹；痄腮，痈肿疮毒，黄疸，大头瘟等证。

【用量】6～12克。

【慎忌】脾胃虚寒者忌用。

青 黛

出自《药性论》。为菘蓝、马蓝、蓼蓝、木蓝和草大青等叶中的色素，经加工制取，干燥而成。或水飞后入药。主产于福建、河北、云南、河南、安徽、江苏等地。

【别名】靛，靛青，靛花，靛沫，靛沫花，青蛤粉，青缸花，蓝露，淀花，蓝靛，蓝青，螺青，靛蓝粉，靛蓝花，青黛粉，沉花，花青。

【商品名】建青黛：产于福建者。品质最优。

青黛：各种青黛的统称。以粉细、色蓝、质轻而松、能浮于水

面、以火烧之呈紫红色火焰、嚼之无砂石感者为佳。

【处方名】青黛。

【性味归经】咸，寒。归肝、肺、胃经。

【功效主治】清热解毒，凉血散肿。主治热毒发斑及血热妄行所致的吐血、咯血、衄血；小儿惊风、发热、痉挛；肺热咳嗽、气急痰稠，痄腮肿痛及痈肿疮毒。

【用量】1.5~3克。外用适量。

【慎忌】胃寒者慎用。

穿心莲

出自《岭南采药录》。为爵床科1年生草本植物穿心莲 *Andrographis paniculata* (Burm.f.) Nees 的全草。原产于亚热带地区，现我国华南、华东及西南地区均有栽培。秋初刚开花时采收，切段，晒干生用，或鲜用。

【别名】一见喜，苦胆草，春莲秋柳，榄核莲，斩蛇剑，圆锥须药草，日行千里，四方莲，金香草，金耳钩，春莲夏柳，印度草，苦草，四方草，万病仙草。

【商品名】穿心莲。以植株肥壮、带有花、无泥土者为佳。

【处方名】穿心莲，一见喜。

【注意】海南岛产的一种植物白花穿心莲 *Andrographis tenebra* (Nees) O. Kuntze. 的全草，当地作穿心莲入药。功效相近，但非正品。

【性味归经】苦，寒。归肺、胃、大肠、小肠经。

【功效主治】清热解毒，燥湿。主治温病初起，发热头痛；肺热喘咳，肺痈，咽喉肿痛；湿热泻痢，热淋，湿疹。鲜品捣烂外敷可治疖肿及毒蛇咬伤。

【用量】6~10克。鲜品10~20克。外用适量。

【慎忌】脾胃虚寒者忌服。

牛 黄

出自《神农本草经》。为牛科动物牛 *Bos taurus domesticus* Gmelin 的胆囊结石或胆管结石，称天然牛黄。主产于我国西北、东北及河南、山东、河北等地。由牛胆汁或猪胆汁经提取加工而成的称人工牛黄。研末冲服或入丸散。

【别名】犀黄，犀牛黄，心黄，肝黄，各一旺（蒙语名），丑宝，乌金黄，果黄，丑黄，天然牛黄，人工牛黄。

【商品名】西牛黄：又称西黄。为产于我国西北者。

东牛黄：又称东黄。为产于我国东北者。

京牛黄：又名京管牛黄。为产于北京、天津者。

金山牛黄：又称金山黄。为产于加拿大、阿根廷、乌拉圭、巴拉圭、智利、玻利维亚等地者。为进口牛黄之一，品质不及国产优良。

印度牛黄：又称印度黄。为产于印度者。为进口牛黄之一。品质不及国产优良。

人工牛黄：由牛胆汁或猪胆汁经人工提取加工而成者。品质较次。

天然牛黄：直接从牛胆囊或胆管中取出的结石。品质优良。

国产牛黄：为产于国内者。

进口牛黄：为产于印度、加拿大、阿根廷、乌拉圭、巴拉圭、智利、玻利维亚等地者。品质不及国产牛黄优良。

胆牛黄：又名胆黄、乌金黄、果黄。生于牛胆囊中的结石。个体大，色泽亮，气味浓，品质最好。

管牛黄：又名管黄、碎片黄、空心黄。生于牛胆管中的结石。个体较小，品质较次。

肝牛黄：又名肝黄。生于牛肝胆管中的结石。个体最小，品质最次。

以上商品以表面光泽细腻、断面层纹薄而整齐、干燥、味苦而甘、清香而凉、无杂质者为佳。挂乌金衣（表面挂有一层黑色光亮的薄膜）尤佳。

【处方名】牛黄，西黄，犀黄，丑宝，真牛黄，正牛黄。

【注意】水牛、野牛、牦牛等动物的胆囊结石，亦作牛黄入药，功效相同，但非正品。

人工牛黄与天然牛黄功效基本相同，但品质较次。

【性味归经】苦，凉。归心、肝经。

【功效主治】清热解毒，息风止痉，化痰开窍。主治温热病及小儿惊风，壮热神昏，痉挛抽搐；温热病热入心包、痰火阻闭所致的神昏、口噤；热毒郁结所致的咽喉肿痛、溃烂、口舌生疮、痈疽疗毒等证。

【用量】0.2~0.5克。白开水冲服或入丸散剂。外用适量。

【禁忌】虚证及孕妇慎用。

蚤 休

出自《神农本草经》。为百合科多年生草本植物蚤休（七叶一枝花）*Paris polyphylla* Smith 及其同属多种植物的根茎。我国南北各地均产，主产于长江流域及南方各省。秋末冬初采挖，除去须根，洗净晒干，切片入药。

【别名】重楼，七叶一枝花，重台，嵒休，草甘遂，鬱休，草河车，重楼金线，白甘遂，白蚤休，重台草，独脚莲，三层草，九道鞭，铁灯盏，七叶一盏灯，鸳鸯虫，双层楼，多叶重楼，七子莲，铁灯台，枝花头，九层楼，螺丝七，海螺七，灯台七，七层塔，八角盘，孩儿掏伞，金盘托荔枝，金盘托珠，红重楼，白河车，七叶遮花，金丝两重楼，独叶一枝花，阔瓣蚤休，毛脉蚤休，狭叶蚤休，云南重楼，华重楼，宽瓣重楼、短梗重楼、球药隔重楼，长柄重楼，长药隔重楼，光叶七叶一枝花，金线重楼，虫萎。

【商品名】蚤休，七叶一枝花。以根茎粗壮、干燥、质坚实、断面色白、粉性足、无泥沙等杂质者为佳。

【处方名】蚤休，重楼，七叶一枝花。

【注意】在药材商品市场上，下列同属植物的根茎，均与蚤休同等入药：

金线重楼 *P. chinensis* Franch. 分布于云南、广东。

阔瓣蚤休 *P. polyphylla* Smith var. *Platypetala* Franch. 分布于四川。

毛脉蚤休 *P. polyphylla* Smith var. *pubescens* Hand.-Mazz. 分布于云南、四川。

狭叶蚤休 *P. polyphylla* Smith var. *stenophylla* Franch. 分布于四川、云南。

云南重楼 *P. polyphylla* Smith var. *tunnanensis* (Franch.) Hand.-Mazz. 分布于云南、贵州、四川。

短梗重楼 *P. polyphylla appendiculata* Hara 分布于湖南、湖北、四川、贵州、云南等地。

长柄重楼 *P. fargesii* Franch. var. *petiolata* (Baker ex C. H. Wright) Wang et Tang 分布于广西、贵州、四川、江西等地。

长药隔重楼 *P. thibetica* Franch. 分布于四川、贵州、云南。

金沙重楼(滇王孙) *P. delavayi* Franch. 分布于云南、四川。

轮叶王孙 *P. quadrifolia* L. 分布于山西等地。

球药隔重楼 *P. fargesii* Franch. 分布于江西、广东、湖北、四川、贵州等地。

有些地区把蓼科植物拳参 *Polygonum bistorta* L. 的根茎作蚤休入药，此属混用，应予以纠正。

本品与拳参均有草河车、重楼之别名，极易混淆，应注意鉴别。

【性味归经】苦，微寒，有小毒。归肝经。

【功效主治】清热解毒，消肿止痛，息风定惊。主治肝热生风、惊痫以及热病神昏、抽搐；痈肿疮毒及毒蛇咬伤；外伤出血，瘀肿疼痛。

【用量】6～10克。

【慎忌】虚寒证患者忌服。

拳参

出自《本草图经》。为蓼科多年生植物拳参 *Polygonum bistorta* L. 的根茎。主产于东北、华北及山东、江苏、湖北等地。秋末采挖，除去须根，洗净晒干，切片入药。

【别名】紫参，草河车，重楼，虾参，回头参，倒根草，破伤药，刀剪药，刀箭药，疙瘩参，山柳柳，石蚕，刀枪药，马峰七，地虾，山虾，铜罗，莺头鸡，山虾子，红蚤休。

【商品名】拳参。以根条粗大、干燥、质坚实、皮黑、断面浅棕红色、无杂质者为佳。

【处方名】拳参，虾参。

【注意】在目前药材商品市场上，下列同属植物的根茎均作拳参入药：

石生蓼 *P. lapidosum* Kitag.

珠芽蓼 *P. viviparum* L.

耳叶蓼 *P. manshuriense* V. Patr.

狐尾蓼 *P. alopecuroides* Turcz.

圆穗蓼 *P. sphaerostachyum* Meissn.

倒根蓼 *P. ochotense* V. petrov.

本品又名紫参，唇形科植物石见穿也称紫参，二者同名异物，宜区别应用。

本品与蚤休都有草河车、重楼之别名，极易混淆，应引起注

意。

【性味归经】苦，凉。归胃、大肠、心经。

【功效主治】清热解毒，去湿，散痈肿。主治湿热泻痢，大便脓血，里急后重；热毒痈疮，口舌生疮。

【用量】4～10克。外用适量。

【慎忌】非实热证忌服。

半 边 莲

出自《本草纲目》。为桔梗科多年生蔓生草本植物半边莲 *Lobelia chinensis* Lour. 的全草。我国各地均有分布。主产于安徽、江苏、河南、浙江、湖南、湖北、江西、四川、广东等地。夏季采收，拔起全草，洗净泥土，用鲜品或晒干用。

【别名】急解索，蛇利草，细米草，蛇舌草，鱼尾花，半边菊，奶儿草，半边花，箭豆草，半边旗，顺风旗，单片芽，小莲花草，绵蜂草，吹血草，腹水草，疳积草，白腊滑草，金菊草，金鸡舌，片花莲，偏莲，偏头草，瓜仁草，蛇啄草，长虫草，单片芽。

【商品名】半边莲。以叶绿、根黄、干燥、无泥沙等杂质者为佳。

【处方名】半边莲，蛇舌草。

【注意】本品别名半边旗，易与凤尾蕨科植物半边旗 *Pteris semi pinnata* L. 相混。二者同名异物，宜区别使用。

【性味归经】辛，寒。归心、小肠、肺经。

【功效主治】清热解毒，利尿消肿。主治大腹水肿，面足浮肿，毒蛇咬伤，蜂蝎螫伤以及疔疮初起肿痛等证。

【用量】10～15克。鲜品30～60克。外用适量。

【慎忌】虚证水肿忌用。

垂 盆 草

出自《四川中药志》。为景天科多年生肉质草本植物垂盆草 *Sedum sarmentosum* Bunge. 的全草。我国大部分地区均有野生。多于夏季或秋季采集生长茂盛的植株，切段晒干或烘干备用，也可随时采取鲜品入药。

【别名】石指甲，狗牙瓣，半枝莲，瓜子草，佛指甲，狗牙草，三七仔，土三七，黄瓜子草，鸡舌草，白蜈蚣，狗牙齿，太阳花，枉开口，养鸡草，狗牙半支，三甲佛甲草。

【商品名】垂盆草。以肥壮、植株完整、干燥、无泥土杂质者为佳。

【处方名】垂盆草，石指甲。

【注意】本品有的地方称半枝莲，易与唇形科植物半枝莲 *Scutellaria barbata* D. Don 名称相混。二者同名异物，应注意鉴别使用。

【性味归经】甘、淡、微酸，凉。归肝、胆、小肠经。

【功效主治】清热解毒，利湿。主治痈肿疮疡，毒蛇咬伤。水火烫伤，湿热黄疸，小便不利。

【用量】10~30克。鲜品50~100克。外用适量。

【慎忌】阳虚黄疸（阴黄）慎用。

土 荻 苓

出自《本草纲目》。为百合科多年生常绿藤本植物土荻苓（光叶菝葜）*Smilax glabra* Roxb. 的块茎。长江流域南部各省均有分布。秋末采收，除去残茎及须根，洗净泥土，切成薄片，晒干。

【别名】禹余粮，白余粮，草禹余粮，刺猪苓，过山龙，硬饭，仙迹粮，土草薢，冷饭团，山猪粪，山地栗，过冈龙，山牛，冷饭头，山

归米，久老薯，毛尾薯，地胡苓，狗老薯，饭团根，硬饭头薯，土苓，山遗粮，狗朗头，尖光头，山硬硬，奇良，白薯，连饭，红土苓，山奇良，山奇粮，土大片，光叶菝葜，白土苓，鲜土苓，地茯苓。

【商品名】白土茯苓：简称土苓。为百合科植物肖菝葜 *Heterosmilax japonica* Kunth. 的根茎。主产于四川、广西、陕西等地。为土茯苓副品。使用于宁夏地区。

红土茯苓：简称红土苓。为植物光叶菝葜的根。主产于广东、广西、江苏、浙江、湖南等地。为土茯苓正品。以块大、干燥、粉性大、筋脉少、断面呈淡棕色者为佳。

【处方名】土苓，土茯苓。

【注意】下列几种同属植物的根茎在少数地区也作土茯苓使用，但非正品。

暗色菝葜（又名白土苓）*Smilax lanceaefolia* Roxb. var. *qpaca* A. DC. 分布于四川。

无刺菝葜*S. mairei* Lkvl. 分布于西藏、云南。在西藏作“土茯苓”入药，在云南作“红草薢”入药。

防己叶菝葜*S. menispermoidea* DC. 分布于西藏。

土茯苓在江苏和浙江的一些地方称“禹余粮”或“白余粮”，与涩肠止泻药褐铁矿的矿石禹余粮（又名白禹粮）名称相同，极易混淆。两药同名异物，宜区别使用。

【性味归经】甘、淡，平。归肝、胃经。

【功效主治】解毒，除湿，利关节。主治梅毒或因梅毒服用汞剂而致的肢体拘挛；火毒内盛所致的痈疖、热淋、小便黄赤涩痛等证。

【用量】15~60克。

【禁忌】脾胃虚寒者慎用。

鱼腥草

出自《名医别录》。为三白草科植物蕺菜 *Houttuynia cordata*

Thunb.的全草。分布于长江流域以南各省。夏秋间采集，洗净，晒干。

【别名】岑草，蕺，蘋子，蘋菜，蕺菜，蕺儿根，阿玉，马哇，戈便外，紫背鱼腥草，紫蕺，蕺子，臭猪巢，侧耳根，猪鼻孔，九节莲，重药，鸡虱草，狗贴耳，狗耳菜，肺形草，鱼鳞真珠草，猪姆耳，秋打尾，狗子耳，臭草，野花麦，窝丢，臭菜，热草，臭质草，臭星草，臭牡丹，臭灵丹，辣子草，奶头草，草掇，红桔朝，臭蕺，鱼鳞草，鱼新草，狗腥草，狗绳子草，蕺足根，十药，茶喂，哦声嘈（朝鲜族名），笔色，臭荞麦，臭积草，臭腥草，臭鼻孔，菜伪，斤克，则车。

【商品名】鱼腥草，蕺菜。以茎叶完整、色灰绿、有花穗、鱼腥气浓者为佳。

【处方名】鱼腥草，鱼腥草。

【性味归经】辛，微寒。归肺经。

【功效主治】清热解毒，排脓，利尿。主治肺痈咳吐脓血，肺热咳嗽、痰稠，热毒疮疡，热淋所致的小便涩痛。

【用量】15~30克。外用适量。

【禁忌】风寒咳嗽及一切虚寒证不宜服用。

射干

出自《神农本草经》。为鸢尾科多年生草本植物射干 *Belamcanda chinensis* (L.) DC. 的根茎。主产于河南、湖北、安徽、江苏等地。秋季采挖，除去苗茎、须根，洗净，晒干，切片。

【别名】乌扇，乌蒲，乌蓬，乌韭，乌吹，黄远，夜干，草姜，凤翼，仙人掌，紫金牛，野萱花，扁竹，地萹竹，萹竹，较剪草，黄花萹蓄，开喉箭，黄知母，较剪兰，剪刀桔，剪刀草，金绞剪，绞剪草，冷水丹，冷水花，扁竹兰，金蝴蝶，紫良姜，铁扁担，六甲花，扇把草，山蒲扇，老君扇，老鸹扇，寸干老鸹扇，玉燕鬼子扇，鬼扇，寸干，鱼翅草，高搜山，凤凰草，偏竹梁，扁竹

梁。

【商品名】射干，扁竹。以根茎肥壮、干燥、断面色黄、无须根、无泥土者为佳。

【处方名】射干，寸干。

【注意】在药材商品市场上，以下几种同科植物的根茎，在不同地区也混作射干入药：

蝴蝶花*Iris japonica* Thunb. 又称花菖蒲、土知母。在四川某些地区作射干入药。

鸢尾*I. tectorum* Maxim. 为陕西、贵州地区所习用。

百射干(扁蒲扇) *I. dichotoma* Pall. 为陕西地区所习用。

射干别名仙人掌，与仙人掌科植物仙人掌同名，极易混淆。在处方时，射干最好不要不使用“仙人掌”这一别名，以免搞错。

【性味归经】苦，寒。归肺经。

【功效主治】清热解毒，祛痰利咽。主治咽喉肿痛，热痰壅盛，痰盛咳嗽。

【用量】 6～12克。

【禁忌】孕妇慎用。

山豆根

出自《开宝本草》。为豆科植物柔枝槐(广豆根)*Sophora subprostrata* Chun et T. Chen的根。主产于广西、广东、江西、贵州等地。秋季采挖，洗净泥土，晒干，切片生用。

【别名】苦豆根，山大豆根，广豆根，南豆根，柔枝槐根，黄结，解毒，中药。

【商品名】山豆根：又名广豆根、南豆根。为植物柔枝槐的根。质量好，产量高，全国销售并且出口，为山豆根之正品。以质坚、干燥、无须根、无泥土等杂质者为佳。

北豆根：又名蝙蝠葛根、蝙蝠藤根、狗葡萄根、磨石头根、黄

条香根、黄根、山豆秧根、山地瓜秧根、山花子根、光光叶根。为防己科植物蝙蝠葛 *Menispermum dahuricum* DC. 的根茎。为北方所习用。

土豆根：为豆科植物华东木蓝、多花木蓝、宜昌木蓝、苏木蓝、陕西木蓝以及花木蓝等的根及根茎。

云豆根：为豆科植物野豇豆等的根。为云南地区所习用。

后三种均非正品，仅在个别地区使用。

【处方名】豆根，山豆根，广豆根，南豆根，北豆根，苦豆根等。

【性味归经】苦，寒。归肺经。

【功效主治】清热解毒，散肿止痛，清利咽喉。主治热毒蕴结所致的咽喉肿痛，湿热所致的黄疸；肺热咳嗽，痈肿疮毒。

【用量】6～10克。外用适量。

【慎忌】脾胃虚寒、食少、腹痛、便溏者慎服。

马 勃

出自《名医别录》。为马勃科植物大颓马勃 *Calvatia gigantea* (Batsch ex Pers.) Lloyd、紫颓马勃 *C. lilacina* (Mont. et Berk.) Lloyd 与脱皮马勃 *Lasiosphaera fenzlii* Reich. 的干燥子实体。秋季采收，除去外层硬皮，研粉用。

【别名】马疮，马包，马疮菌，马勃绒，马屁勃，马屁包，马粪包，马勃菌，脱皮马勃，大颓马勃，紫颓马勃，大马勃，紫色马勃，有柄马勃，无柄马勃，小圆子马勃，小马勃，南马勃，北马勃，轻马勃，灰菰，灰菇，牛屎菇，灰包菌，人头菌，牛屎菌，大气菌，灰菌，鸡肾菌，药苞，地烟，灰包，地呼雷，呼雷泡，忽雷炮。

【商品名】北马勃：又名脱皮马勃。主产于内蒙古、甘肃、河北、新疆等地。品质较优，全国销售。

南马勃：又名紫颓马勃、紫色马勃、有柄马勃。主产于安徽、江苏、福建、广西、海南、四川等地。

大马勃：又名大颓马勃、无柄马勃。主产于辽宁、内蒙古、甘肃、吉林、河北、山西、新疆等地。个大质优，全国销售，并供出口。

小马勃：又名小圆子马勃。因其呈小圆球状或不规则球状而得名。主产于河南洛阳、嵩县及湖北利川等地。个小质次，多在当地销售。

以上商品以个大、完整饱满、色深者为佳。

【处方名】 马勃，马卜，轻马勃，马勃绒。

【性味归经】 辛，平。归肺经。

【功效主治】 清肺，利咽，解毒，止血。主治肺热咳嗽、失音、咽喉肿痛；血热妄行所致的吐血、衄血。

【用量】 3～6克。外用适量。

金 果 榄

出自《本草纲目拾遗》。为防己科植物金果榄 *Tinospora capillipes* Gagn. 或青牛胆 *T. sagittata* Gagn. 或覆瓦叶金果榄 *T. imbricata* S.Y. Hu 的块根。9～11月挖取，除去茎及须根，洗净，晒干，切片入药。

【别名】 金楷榄，金苦榄，金榄，果榄，金牛胆，金线吊葫芦，金锁匙，玉锁匙，药锁匙，地胆，地苦胆，地蛋，天鹅蛋，铜秤锤，金银袋，破石珠，山茨菇，山慈姑，九牛子，九牛胆，九龙胆，黄鸡蛋，黄金古，雪里开，青牛胆，赛迟姑，破岩尖，黄金肚，金狗胆，拉静反，范轩肺，坐罗，血乔，秀播脸，乌骚雷奴，日吉单。

【商品名】 金果榄：又名圆叶金果榄、圆角金果榄、金苦榄。为植物金果榄的块茎。主产于广东、广西、贵州、云南、湖南、湖

北等地。

青牛胆：又名箭叶青牛胆、金古榄。为植物青牛胆的块茎。主产于广西、陕西、四川、湖南、湖北、贵州等地。

覆瓦叶金果榄：为植物覆瓦叶金果榄的块茎。主产于广西。

以上商品均以块茎个大、干燥、体重、质坚实、色青黄、皮细而有细皱纹者为佳。

【处方名】金果榄，金果兰。

【注意】在药材商品市场上，湖南、贵州等地将本品称作“山慈姑”，并作山慈姑入药。此为混用，应予以纠正。

【性味归经】苦，寒。归脾、肾经。

【功效主治】清热解毒。主治急性及慢性扁桃体炎，急性咽喉炎，口腔炎，腮腺炎，乳腺炎，阑尾炎，急性及慢性肠炎，菌痢，胃痛，热嗽失音，痈疽疔疮，淋巴结结核。外用治疗毒蛇咬伤。

【用量】4～10克。鲜品8～20克。外用适量。

【禁忌】脾胃虚弱者慎服。无实热者忌服。

藏 青 果

出自《中药材手册》。为使君子科植物诃子 *Terminalia chebula* Retz. 的幼果。9～10月采摘，经蒸煮后晒干入药。

【别名】西青果，西藏青果，西藏橄榄，嫩诃子，诃子幼果，随风子。

【商品名】藏青果，西青果，西藏青果。以果个均匀、干燥、质坚实、断面无空心者为佳。

【处方名】藏青果，西青果。

【性味归经】苦、酸、涩，寒。归肺、胃经。

【功效主治】清热生津，利咽解毒。主治虚证白喉，喉炎，扁桃体炎，菌痢，咽炎，音哑。

【用量】3～6克。

【慎忌】脾虚便溏者慎服。

蜀 羊 泉

出自《神农本草经》。为茄科植物白英 *Solanum lyratum* Thunb. 的全草。主产于安徽、江苏、河南、浙江等地。夏、秋割取全草，洗净，晒干。

【别名】白英，白毛藤，荷，谷菜，鬼目草，鬼目菜，白草，白幕，排风，天灯笼，和尚头草，望冬红，酸尖菜，排风藤，土防风，耳坠菜，金线绿毛龟草，葫芦草，毛风藤，毛老人，红道士，毛和尚，野毛耳朵，胡毛藤，羊仔耳，生毛梢，龙毛龟，毛燕仔，红麦禾，小儿拳，野茄，毛千里光，毛秀才，葫芦草，金线绿毛龟。

【商品名】蜀羊泉，白英，白毛藤。以肥壮无泥土者为佳。

【处方名】蜀羊泉，白毛藤，白英。

【注意】同属植物千年不烂心（又名苦茄）*S. dulcamara* L. 的全草，也作“蜀羊泉”同等入药。但非正品。

【性味归经】苦，寒。归肺、肝、脾经。

【功效主治】清热，利湿，祛风，解毒。主治热毒疮肿，咽喉肿痛，皮肤痒疹，疟疾，黄疸，水肿，淋证，风湿性关节炎，丹毒。

【用量】10~15克。鲜品加倍。外用适量。

【慎忌】体虚无湿热者忌服。

喉 咙 草

出自《中国药植志》。为报春花科植物点地梅 *Androsace umbellata* (Lour.) Merr. 的全草或果实。主产于长城以南广大地区。清明前后采收全草，洗净，晒干。

【别名】点地梅草，点地梅，喉癬草，喉蛾草，佛顶珠，地胡椒，五岳朝天，小虎耳草，铜钱草，白花草，索河花，五朵云，汉先桃草，汉仙桃草，小一口血，清明花，白花珍珠草，五角星草，天星草，天吊冬，顶珠草，仙牛桃，金牛草。

【商品名】喉咙草，点地梅。以质嫩、肥大、无泥土者为佳。

【处方名】喉咙草，点地梅，喉蛾草。

【性味归经】辛、甘，微寒。归肺、胃、肝经。

【功效主治】祛风，清热，消肿，解毒。主治咽喉肿痛，口疮，目赤，目生云翳，偏正头痛，牙痛，风湿痛，哮喘，淋证，白浊，白带，崩漏，疔疮肿毒，跌打损伤，烫火伤。

【用量】6～10克。鲜品加倍。外用适量。

【慎忌】风寒头痛慎用。

角 茜 香

出自《河南中草药手册》。为罂粟科植物细叶角茴香 *Hypecoum erectum* L. 的根及全草。主产于河南、江苏、安徽、山东、河北、陕西、山西、内蒙古及新疆等地。春季开花前采集，洗净晒干。

【别名】咽喉草，细叶角茴香，麦黄草，黄花草，雪里青，野茴香，山黄连，亮帽英。

【商品名】咽喉草，角茴香。以质嫩、肥壮、完整、无杂质者为佳。

【处方名】咽喉草，角茴香。

【注意】同属植物细果角茴香(又名节裂角茴香、八八打) *H. leptocarpum* Hook. f. et Thoms. 的带根全草功效与前种相同，同等入药。

【性味归经】苦、辛，凉。归肺、肝经。

【功效主治】清热，利咽，明目。主治急性咽喉炎，气管炎咳嗽，目赤肿痛。

【用量】 6~10克。鲜品加倍。

【慎忌】 风寒咳嗽忌服。

无 花 果

出自《救荒本草》。为桑科植物无花果*Ficus carica* L.的花托。南方各地多有栽培。秋季采集，鲜用或反复晒干用。

【别名】 阿驵，阿驿，底珍，天生子，映日果，优昙钵，蜜果，文仙果，奶浆果，晶仙果，文先果，树地瓜，明目果，文冠果，密果。

【商品名】 无花果。以个大、完整、洁净者为佳。

【处方名】 无花果，文先果，文仙果。

【性味归经】 甘，平。归肺、脾、大肠经。

【功效主治】 健胃清肠，解毒消肿。主治肠炎，痢疾，便秘，痔疮，喉痛，痈疮疥癣，咳嗽。

【用量】 15~30克。鲜品30~60克。外用适量。

锦 灯 笼

出自《陆川本草》。为茄科植物灯笼草*Physalis peruviana* L.的连根全草。我国各地均有分布，生长于田间、路旁或村边。夏秋采收带果实之全株，鲜用或晒干生用。

【别名】 灯笼草，灯笼泡，灯笼果，鬼灯笼，苦灯笼草，天灯笼草，金灯笼，金灯草，金灯，灯笼儿，挂金灯，叶下灯，打头泡，打额泡，打卜草，打扑草，爆卜草，荷卜草，荷扑，泡泡草，响铃子，铃儿草，泡子草，扑扑子草，天泡草，心不干，红姑娘，红娘子，花姑娘，姑娘菜，姑娘花，酸浆，酸浆棵，酸浆果，酸浆巴子，浆巴子，香浆巴子，醋浆，寒浆，苦酸浆草，苦藏，苦萌，苦耽，藏，皮弁草，珊瑚架，珊瑚柳，九古牛。

【商品名】 锦灯笼，灯笼草，酸浆棵，酸浆果。以果丰叶多者

为佳。

【处方名】锦灯笼，灯笼草，鬼灯笼，酸浆果，酸浆棵。

【性味归经】苦，寒。归肺经。

【功效主治】清热，利尿，化痰，利咽。主治咽痛，音哑，肺热咳嗽，急性扁桃体炎，小便不利。外用治疗天疱疮，湿疹。

【用量】10~15克。鲜品15~30克。外用适量。

马齿苋

出自《新修本草》。为马齿苋科1年生肉质草本植物马齿苋 *Portulaca oleracea* L.的全草。我国南北各地均产。夏季采收，鲜用，或开水烫后晒干用。

【别名】马齿草，马苋，马齿菜，马齿龙芽，马蛇子菜，马踏菜，马苋菜，马蜂菜，马凤菜，马屈菜，马子菜，马齿长命菜，马苋，马食菜，马生菜，马苋长命菜，五行草，五行菜，五方草，长命菜，长命苋，九头狮子草，酸苋，酸味菜，安乐菜，瓜子菜，酱瓣草，酱瓣豆草，酱瓣头草，猪母菜，狮子草，狮岳菜，地马菜，蚂蚁菜，长寿菜，瓜仁菜，蛇草，纯阳菜，马马菜，马舌菜，耐旱菜。

【商品名】马齿苋。以肥壮、酸味浓、无杂质者为佳。

【处方名】马齿苋，马齿菜，鲜马齿苋。

【性味归经】酸，寒。归肝、大肠经。

【功效主治】清热解毒，凉血止血。主治湿热痢疾引起的下痢脓血、里急后重；赤白带下；火毒痈疖；热淋、血淋。

【用量】30~60克。鲜品60~120克。

【慎忌】虚寒泄泻者忌服。

白头翁

出自《神农本草经》。为毛茛科多年生草本植物白头翁 *Pulsatilla*

chinensis Reg. 的根。分布于我国东北、内蒙古及华北等地。秋末至春初采挖，除去茎、叶和须根，保留根头白绒毛，洗净晒干，生用。

【别名】野人杖，胡王使者，大将军草根，白头公，奈何草，粉乳草，粉草，白头草，老和尚头，老冠花，老姑草，毫笔花，犄角花，耗子尾巴花，猫爪子花，菊花苗，老翁花，山棉花根，毛姑朵花，老婆子花，老公花，老白毛，野丈人，翁草，老人发根，老观花根，耗子花根，大碗花根。

【商品名】白头翁。以根条粗长、整齐不碎、干燥、色灰黄、头部有白绒毛者为佳。

【处方名】白头翁，白头公。

【注意】目前，市售白头翁品种比较混乱，下列几种同属植物的根也作白头翁入药，但非正品。

兴安白头翁 *Pulsatilla dahurica* (Fisch.) Spreng. 分布于黑龙江、吉林等地。

朝鲜白头翁 *P. koreana* Nakai ex Mari. 分布于吉林、辽宁等地。

新疆白头翁(又名蒙古白头翁) *P. ambigua* Turcz. ex Pritz. 分布于新疆北部和内蒙古地区。

细叶白头翁 *P. turczaninovii* Krylov et Serg. 分布于我国东北及内蒙古、河北等地。

除此之外，甘肃个别地区使用当地产的大火草根和野棉花根作白头翁；中南、西南、华东及内蒙古的一些地区，使用蔷薇科植物委陵菜的根或带根全草作白头翁；河南、安徽、江苏、江西、广东、广西的一些地区，使用蔷薇科植物翻白草作白头翁；内蒙古（巴盟、呼市）、江苏（盐城、南通、淮阴）、湖南（零陵、衡阳）等地，使用菊科植物漏芦的根作白头翁；云南的一些地区，使用菊科植物毛大丁草的根或全草作白头翁。这都是错误的，均属误用，应予以纠正。因为这些药物与白头翁功效不同，不能混用。

【性味归经】苦，寒。归大肠经。

【功效主治】清热，解毒，凉血。主治湿热泻痢或热毒泻痢引起的发热、腹痛、下痢脓血、里急后重等证。

【用量】6～10克。

【禁忌】虚寒泄泻忌用。

委陵菜

出自《救荒本草》。为薔薇科植物委陵菜 *Potentilla chinensis* Ser. 的根或带根全草。主产于安徽、山东、辽宁、河南、河北、江苏、内蒙古、湖北、广西、福建等地。4～10月间采挖，鲜用，或晒干用。

【别名】翻白菜，翻白草，根头菜，野鸡旁花，黄州白头翁，龙牙草，天青地白，青天白地根，小毛药，虎爪菜，蛤蟆草，老鸦翎，老鸦爪，地区草，毛鸡腿子，野鸡膀子，山萝卜，白头翁，痈疾草，鸡爪草。

【商品名】委陵菜。以表面红棕色、断面淡棕红色、干燥、根头部有白色毛茸者为佳。

【处方名】委陵菜，青天白地根，天青地白。

【注意】本品在大多数地区作翻白草入药，在少数地区作白头翁入药，称为黄州白头翁。使用时应注意。同属植物粘委陵菜 *P. viscosa* Donn. 的带根全草在西藏亦作委陵菜入药，功效相似，但非正品。

【性味归经】苦，平。归肝、大肠经。

【功效主治】清热解毒，止血止痢。主治风湿性筋骨疼痛，瘫痪，痢疾，肠炎，功能性子宫出血，咽喉炎，百日咳。外用治疗外伤出血，疥疮，痈肿疮疖。

【用量】10～15克。解品20～30克。外用适量。

【禁忌】脾虚泄泻者慎服。

秦　　皮

出自《神农本草经》。为木犀科落叶乔木植物苦枥白蜡树 *Fraxinus rhynchophylla* Hance 或小叶白蜡树 *F. bungeana* DC. 的茎皮。主产于辽宁、吉林及河南等地，春秋两季剥取干皮，晒干，生用。

【别名】岑皮，桦皮，樊楨皮，秦白皮，蜡树皮，苦櫟皮，苦枥白蜡树皮，小叶白蜡树皮，桦木皮，苦櫟木皮，石檀皮，苦树皮，盆桂皮，樊鸡木皮，秦木皮，秤星树皮，大叶桦皮，大叶白蜡树皮，白蜡树皮，秦岭白蜡树皮，鸡糠树皮，青榔木皮，白荆树皮，大叶苦櫟皮，花曲柳皮，苦櫟皮，北秦皮，小叶苦櫟皮，小叶桦皮，水曲柳皮，柟木皮。

【商品名】秦皮，北秦皮，蜡树皮。以条长、整齐、干燥、色灰白、有斑点者为佳。

【处方名】秦皮，秦白皮，北秦皮。

【注意】目前在药材商品市场上，下列同属植物的茎皮在有些地区也作秦皮入药，功效相似，但非正品。

秦岭白蜡树 *F. paxiana* Lingelsh.

尖叶白蜡树 *F. acuminata* Ling [*F. chinensis* Roxb var. *acuminata* Lingel.]

此外，有些地区还将胡桃科植物核桃楸 *Juglans mandshurica* Maxim. 的枝皮误作秦皮入药，应予以纠正。

【性味归经】苦，寒。归肝、胆、大肠经。

【功效主治】清热解毒，清肝明目。主治热毒泻痢、血痢、下痢脓血及里急后重；肝经郁热所致的目赤肿痛、目生云翳等证。

【用量】 4～10克。

【慎忌】虚寒泻痢忌服。

鸦胆子

出自《本草纲目拾遗》。为苦木科常绿灌木或小乔木植物鸦胆子 *Brucea javanica* (L.) Merr. 的成熟种子。产于广东、广西等地。秋季果实成熟时采收，晒干。用时去壳取仁，包于易吸水的草纸里，压去油，以免刺激胃而作呕。或将仁用龙眼肉包裹吞服，或装在空心胶囊内吞服。

【别名】老鸦胆，鸦胆，苦榛子，苦参子，鸦蛋子，鸭蛋子，鸭胆子，解苦榛，小苦榛，雅旦子，雅胆子，鸭旦子，鸦旦子，丫蛋子。

【商品名】鸦胆子，苦参子。以粒大饱满、种仁色白、油性足者为佳。

【处方名】鸦胆子，鸭蛋子，雅旦子，鸦旦子，鸭旦子。

【注意】广西个别地区以交让木科植物牛耳枫 *Daphniphyllum calycinum* Benth. 的果实误作鸦胆子入药，此系错用，应予以纠正。

【性味归经】苦，寒。归肝、大肠经。

【功效主治】清热解毒，截疟治痢，外用腐蚀赘疣鸡眼。主治热毒血痢，痢下脓血，里急后重。外用治寻常疣、瘊瘤、鸡眼。

【用量】治疟疾每次10~15粒，治热毒血痢每次10~30粒，用桂圆肉包裹吞服。外用适量。

【慎忌】本品对肠胃和肝肾有损害，故不宜多用久服。肠胃出血及肝肾损伤者忌服或慎服。

红 藤

出自《图经本草》。为大血藤科落叶木质藤本植物大血藤 *Sargentodoxa cuneata* Rehd. et Wils. 的藤茎。主产于江西、江

苏、安徽、河南、湖北、湖南等地。夏秋季采收藤茎，除去枝叶，砍成短节，趁鲜切片，晒干。

【别名】大血藤，血通，大血通，大活血，槟榔钻，血藤，红皮藤，千年健，五花血藤，赤沙藤，蕨心藤，穿尖龙，半血莲，过血藤，血灌肠，花血藤，活血藤，血木通，黄梗藤，八卦藤，黄鸡藤，血陈根，红牛鼻陈，山红藤，五花七，五花血通，红血藤，黄省藤，鱼藤，红菊花心，省藤，见血飞。

【商品名】大血藤，红藤。以藤茎均匀、不老不嫩、无枝叶者为佳。

【处方名】红藤，血藤，大血藤，省藤。

【注意】北京、江西、陕西、山西、河北、山东、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、湖北、四川的一些地区，将本品误作鸡血藤入药，此为错用，应予以纠正。

本品别名“千年健”，易与天南星科植物千年健 *Homalomena occulta* (Lour.) Schott 名称相混，二者是两种不同的药物，不能混用。在处方时，红藤尽量不用“千年健”这个别名，以免混淆。

【性味归经】苦，平。归大肠经。

【功效主治】清热解毒，活血止痛。主治肠痈腹痛，跌打损伤，妇女痛经，风湿关节疼痛。

【用量】15～30克。

【禁忌】虚寒性腹痛忌用。

败 酱 草

出自《新修本草》。为败酱科多年生草本植物黄花败酱 *Patrinia scabiosaeefolia* Fisch. ex Link. 和白花败酱 *P. villosa* Juss. 的带根全草。产于我国东北、华东、华中、华南及四川、贵州等地。秋季采收，洗净，阴干，切段。

【别名】败酱，龙芽败酱，黄花败酱，白花败酱，泽败，鹿

酱，鹿肠，鹿首，马草，酸益，苦菜，苦蘗，野苦菜，苦猪菜，苦斋，苦斋公，豆豉草，豆渣草，白苦爹，苦苴，胭脂麻，黄花龙芽，野黄花，野芹，山白菜，黄花草，鸡肠子草，女郎花。

【商品名】败酱草。以根长叶多、干燥、色绿、无杂质者为佳。

【处方名】败酱，败酱草。

【注意】我国北方地区习惯以菊科多年生草本植物苣荬菜 *Sonchus brachyotus* DC. 的带根全草作败酱草用，商品名称为北败酱；南方地区习惯以十字花科一年生草本植物菥蓂 *Thlaspi arvense* L. 的带果全草作败酱草用，商品名称为南败酱或苏败酱；有些地区用蓼科植物油滴菜作败酱草用。这些均属混用，应该纠正。

在药材商品市场上，败酱草的下列同属植物的全草，在某些地区亦作败酱草入药，功效相似，但非正品。

狭叶败酱草 *Patrinia angustifolia* Hemsl. 分布于安徽、浙江、江苏、湖北等地。

岩败酱 *P. rupestris* Juss. 分布于吉林、黑龙江等地。

单药败酱 *P. monandra* Clarke. 分布于云南等地。

【性味归经】辛、苦，微寒。归肝、胃、大肠经。

【功效主治】清热解毒，消痈排脓，祛瘀止痛。主治热毒痈肿、肠痈；血滞之胸腹疼痛。

【用量】10~30克。外用适量。

墓头回

出自《本草纲目》。为败酱科多年生草本植物异叶败酱 *Patrinia heterophylla* Bunge. 及糙叶败酱 *P. scabra* Bunge. 的根。主产于山西、河南、河北、广西等地。秋季采挖，去净秧苗，晒干。

【别名】木头回，臭脚跟，老婆子臭脚跟，气布袋棵，见肿消，盆棵，墓头茴，墓头灰，鼓头灰，追风箭，虎牙草，摆子草，

铜斑道，脚汗草，箭头风，异叶败酱，糙叶败酱。

【商品名】墓头回。以根粗壮、臭脚气味浓、无泥土等杂质者为佳。

【处方名】墓头茴，墓头回。

【注意】江苏省的个别地区误将菊科植物苦荬菜*Ixeris denticalata* (Houtt.) Stebb. 作墓头回入药；还有些地区误将同属植物岩败酱（见前“败酱草”条）的根作墓头回入药，这都是错误的，应该纠正。

【性味归经】辛、苦，微寒。归胃、大肠、肝经。

【功效主治】清热利湿，消痈排脓，去瘀止痛，止崩止带。主治痈肿疮毒，血瘀痛经，崩漏下血，赤白带下，子宫颈糜烂，湿疮，赤痢等病证。

【用量】6～12克。

【禁忌】脾胃虚寒者慎用或忌用。

白 花 蛇 舌 草

出自《广西中药志》。为茜草科1年生草本植物白花蛇舌草*Oldenlandia diffusa* (Willd.) Roxb. 的全草。产于我国长江以南各省。夏秋季采收，洗净，晒干，切段。

【别名】蛇舌草，矮脚白花蛇利草，蛇舌癀，目目生珠草，节节结蕊草，鹩哥利，千打捶，羊须草，蛇总管，鹤舌草，细叶柳子，二叶葎，蛇针草，尖刀草，甲猛草，龙舌草，蛇脚草，白花十字草，短脚白花蛇舌草，鹩哥舌。

【商品名】白花蛇舌草，蛇舌草。以植株完整、带有花果、干燥无杂质者为佳。

【处方名】白花蛇舌草，蛇舌草，蛇总管等。

【注意】在广西和福建的一些地区，把同属植物水线草（伞房花耳草、伞花蛇舌草）*O. corymbosa* L. 和纤花耳草*O. tenelliflo-*

ra(Bl.) O. Ktze. 及松叶耳草(了哥王) *O. pinifolia* (Wall.) K. Schum. 等的全草作白花蛇舌草使用。这些药材与白花蛇舌草功效是否相同，值得研究。非白花蛇舌草正品。

【性味归经】微苦、甘，寒。入胃、大肠、小肠经。

【功效主治】清热利湿，解毒消痈。主治痈肿疮毒，咽喉肿痛，毒蛇咬伤；热淋小便不利；胃癌、食管癌、直肠癌等。

【用量】15~60克。外用适量。

【禁忌】脾胃虚寒者慎服。

熊 胆

出自《新修本草》。为脊椎动物熊科棕熊 *Ursus arctos* L. 和黑熊 *Selenarctos thibetanus* G. Cuvier 的干燥胆汁。棕熊胆主产于我国东北、华北地区。陕西、四川、云南、青海、新疆、甘肃等地也有分布。黑熊胆主产于东北及华北地区。夏秋季猎取为宜，立即取出胆囊，风干。

【别名】狗熊胆，马熊胆，人熊胆，黑瞎子胆，登仓胆，狗驼子胆，黑熊胆，棕熊胆，东胆，吊胆，油胆，金胆，菜胆，墨胆，扁胆，毛熊胆，猪熊胆，黑胆，黄熊胆，缎黑胆，熊瞎子胆。

【商品名】毛胆：又名毛熊胆。为带膜皮的熊胆。即内有胆汁块的完整熊胆囊。

胆仁：又名熊胆仁。为破开熊胆囊后取出的干燥胆汁块。

金胆：又名铜胆。胆仁的一种。金黄色，透明光亮，质松脆，易压碎，碎粒呈玻璃样光泽。品质最优。

墨胆：又名铁胆、黑胆。胆仁的一种。乌黑色，质坚而脆，或呈稠膏状。品质稍次。

菜胆：又名菜花胆。胆仁的一种。黄绿色，呈菜青色，光亮较差，质较脆。

油胆：胆囊内胆仁呈稠膏状的熊胆。

扁胆：产于西北和西南地区的熊胆。

东胆：又名吊胆。为吉林、黑龙江所产之熊胆。

云胆：为云南所产之熊胆。

以上商品以个大、胆仁多、金黄色、半透明、味苦回甘者为佳。

【处方名】熊胆。

【性味归经】苦，寒。归肝、胆、心经。

【功效主治】清热，止痉，解毒，明目。主治邪热内盛所致的惊风、癫痫、抽搐，目赤肿痛、羞明和目生云翳；疮痈肿痛，痔疮肿痛。

【用量】1～3克。外用适量。

【禁忌】因血虚所致的抽搐忌用。多作丸、散内服，一般不入煎剂。

白 薯

出自《神农本草经》。为葡萄科多年生藤本植物白蔹 *Ampelopsis japonica* (Thunb.) Makino 的块根。产于我国东北、华北、华东及河北、河南、湖北、四川等地。秋末或春初采挖。洗净，剥去外皮，切片晒干用。

【别名】白根，昆仑，猫儿卵，鹅抱蛋，见肿消，穿山老鼠，白水罐，土地瓜，山地瓜，铁老鼠，母鸡带仔，老鼠瓜薯，山栗子，八卦牛，白浆罐，狗天天，癞痢茶，菟核根，白草根，野葡萄秧根，小老鸹眼根，七角莲根，上竹龙根，旱黄铅根，白天天秧根，野红薯，五爪藤根，野葡萄根，穿山鼠，地老鼠，九牛力。

【商品名】白蔹。以块根肥大、干燥、断面粉红色、粉性足者为佳。

【处方名】白蔹，白蔹片，白蔹根。

【注意】在商品市场上，白蔹的销售非常混乱。河南南阳地区以掌裂草葡萄 *Ampelopsis aconitifolia* Bunge var. *glabra* Diels

的根充当白蔹入药，云南大理和剑川以同科崖爬藤属植物粉背崖爬藤 *Tetrastigma hypoglauicum* Pl. 的根充当白蔹入药；四川的一些地方以萝藦科牛皮消属植物飞来鹤 *Cynanchum auriculatum* Royle 的根充当白蔹入药；湖北恩施地区以隔山消 *Cynanchum wilfordii* Hemsl. 的根充当白蔹入药；云南昆明以青洋参 *Cyuanchum otophyllum* Schneid. 的根充当白蔹入药；福建省的一些地区以葫芦科马交儿属植物茅瓜 *Melothria heterophylla* (Lour.) Cogn. 的根充当白蔹入药；贵州省贵阳及遵义地区以紫茉莉花根（胭脂花根）充当白蔹入药。这些都是错误的，应予以纠正。

【性味归经】苦、辛，微寒。归心、胃、肝经。

【功效主治】清热解毒，敛疮生肌。主治疮痈肿毒及烧烫伤。

【用量】5～10克。外用适量。

【慎忌】反乌头。

白 鲜 皮

出自《神农本草经》。为云香科多年生草本植物白鲜 *Dictamnus dasycarpus* Turcz. 的根皮。主产于辽宁、河北、四川、江苏等地。秋末或春初采挖，洗净，除去细根及外表糙皮，纵向剖开，抽去木心，切片，晒干用。

【别名】北鲜皮，白藓皮，白羶皮，白舌皮，白羊鲜皮，金雀儿椒皮，地羊羶皮，地羊鲜皮，八圭牛皮，野花椒皮，八股牛皮，白羊鲜皮北藓皮，白羊藓皮，羊鲜草，山牡丹皮，北藓皮，臭根皮，大赶杖叶根。

【商品名】白鲜皮，北鲜皮，古藓皮或骨藓皮（为白鲜不去木心的根）。以条长、肉厚、干燥、色灰白、断面分层、无木心者为佳。

【处方名】白鲜皮，白藓皮。

【注意】在药材市场上，新疆地区以同属植物狭叶白鲜 *D. angustifolius* G. Don 的根皮作白鲜皮入药。此非白鲜皮正品。

还有些地区误将豆科植物锦鸡儿 *Caragana sinica* (Buchoz) Rehd. 和白皮锦鸡儿 *C. leucophloca* Pojark. 以及萝藦科牛皮消属植物鹅绒藤 *Cynanchum chinense* R. Br. (*C. pubescens* Bunge) 等的根皮充当白鲜皮入药，这都是错误的，应该纠正。

【性味归经】苦；寒。归脾、胃经。

【功效主治】清热解毒，除湿止痒。主治湿热疮疹，多脓或黄水淋漓，肌肤湿烂，皮肤瘙痒；湿热痹证及黄疸。

【用量】6～15克。外用适量。

【禁忌】脾胃虚寒及阴黄患者慎用。

漏 芦

出自《神农本草经》。为菊科多年生草本植物祁州漏芦 *Rhaponticum uniflorum* (L.) DC. 或禹州漏芦 *Echinops latifolius* Taussch. 的根。秋末采挖，除去残茎及须根，洗净晒干，切片入药。

【别名】野兰，鬼油麻，榔头花，郎头花，狼头花，牛慎头根，驴粪蛋子花，独花山牛蒡，和尚头，大脑袋花，蓝刺头，华州漏芦，球花漏芦，祁州漏芦，禹州漏芦，白头漏芦，蓝头漏芦。

【商品名】祁州漏芦：又名白头漏芦、和尚头、大脑袋花、独花山牛蒡。为祁州漏芦的根。主产于东北、华北、西北地区。以条粗、干燥、外皮灰黑色、质坚实、不破裂者为佳。

禹州漏芦：又名蓝头漏芦、华州漏芦、球花漏芦、蓝刺头、毛头、龙葱根等名称。为禹州漏芦的根。主产于安徽、河南、江苏、湖北等地。以粗大、干燥、质坚者为佳。

【处方名】漏芦。

【注意】在药材商品市场上，漏芦的品种较乱。江苏等地有以菊科植物华东蓝刺头 *Echinops grijsii* Hance 的根作禹州漏芦入药者。在新疆等地，有以新疆蓝刺头 *Echinops ritro* L. 的根作漏芦入药者。在内蒙古伊盟地区，有以砂蓝刺头 *Echinops gmelini*

Turcz. 作漏芦入药者。这些药材是否与漏芦功效相同，值得进一步研究。这些药材均非漏芦正品。

还有些地方，如广东省的某些地区，误将藜芦 *Veratrum nigrum* L. 当作漏芦使用；黑龙江和吉林的某些地区，误将白头翁 *Pulsatilla chinensis* Reg. 当作漏芦入药；陕西省的某些地区，误将毛茛科植物野棉花 *Anemone hupehensis* Lem. 和秋牡丹 *A. japonica* Sieb. et Zucc. 的根当作漏芦入药；河南省的部分地区误将菊科植物罗罗葱 *Scorzonera austriaca* Willd. 的根当作漏芦入药；山西省南部的一些地区误将菊科植物鸦葱（雅葱） *Scorzonera glabra* Rupr. 的根误作漏芦入药。以上均属误用，应该纠正。

另外，毛茛科植物牛扁的根，形色与祁州漏芦相似，唯有顶端没有白色毛茸，味辛苦，有大毒，应注意分辨，以免误用中毒。

【性味归经】苦，寒。归胃经。

【功效主治】清热解毒，消痈肿，下乳汁。主治乳痛，乳汁不通，乳房胀痛。

【用量】 6～15克。

山慈姑

出自《嘉祐本草》。为兰科植物杜鹃兰 *Cremastra variabilis* (Bl.) Nakai 和独蒜兰 *Pleione bulbocodioides* (Franch.) Rolfe 的假球茎。杜鹃兰分布于黄河流域至西南、华南等地，独蒜兰分布于西南地区。5～6月间挖取假球茎，除去茎叶、须根，洗净，晒干。

【别名】毛慈姑，金灯，鹿蹄草，山茨菰，山茨菇，朱姑，鬼灯檠，毛姑，泥冰子，处姑，白地栗，白毛姑，冰球子，茅慈姑，泥宾子，毛茨姑，茅姑，无义草，猪心姑。

【商品名】毛慈姑：为兰科植物杜鹃兰的假球茎。为正品山慈

冰球子：为兰科植物独蒜兰的假球茎。亦为正品山慈姑。

以上商品以个大、坚实、干燥、无杂质者为佳。

光慈姑：又名光茹。为百合科多年生纤弱草本植物老鸦瓣的鳞茎。为副品山慈姑。

【处方名】 山慈姑，毛慈姑，冰球子。

【注意】 在药材商品市场上，百合科多年生纤弱草本植物老鸦瓣 *Tulipa edulis* (Miq.) Bak. 的鳞茎，亦作山慈姑用，商品称作光慈姑。独蒜兰属植物云南独蒜兰（大花独蒜兰）*Pleione yunnanensis* (Rolfe) Rolfe 及山兰属植物冰球子 *Oreorchis patens* (Lindl.) Lindl. 和 *O. foliosa* Lindl. 等的假球茎，亦作山慈姑入药，但非山慈姑正品。

广西个别地区尚有以天南星科植物犁头尖 *Typhonium divaricatum* (L.) Decne. 的块茎误作山慈姑入药者，其功效与山慈姑迥异，不能混用。广西南宁、桂林、梧州等地还把马兜铃科细辛属植物长花轴土细辛 *Asarum longe pedunculatum* O. C. Schmidt 误作山慈姑入药；广东的一些地区把大块瓦 *Asarum geopilum* Hemsl. 和花脸细辛 *A. maximum* Hemsl. 的全草或根或根状茎误作山慈姑入药。这都是错误的，应予以纠正。还有的地区将金果榄（青牛胆）的块根混作山慈姑入药，也应该纠正。

【性味归经】 辛，寒。有小毒。归肝、胃经。

【功效主治】 清热解毒，消痈散结。主治痈疽发背，疔肿恶疮。

【用量】 4～10克。外用适量。

四 季 青

出自《本草纲目》。为冬青科常绿乔木冬青 *Ilex chinensis* Sims 的叶。主产于江苏、浙江、广西、广东和西南各省。秋冬季采收，晒干用。

【别名】红冬青，油叶树，树顶子，冬青叶，四季青叶，冬青，红冬青叶，野冬青，野冬青叶，中国冬青，中国冬青叶，小叶冬青。

【商品名】四季青叶，冬青叶。以色绿、干燥、完整、洁净者为佳。

【处方名】四季青，冬青叶。

【性味归经】苦、涩，寒。归肺、心经。

【功效主治】清热解毒，凉血，敛疮。主治烧烫伤、下肢溃疡、湿疹、热毒疮疡等证。鲜品捣烂外敷可治疗外伤出血。

【用量】10~30克。外用适量。

金 莠 麦

出自《新修本草》。为蓼科多年生草本植物野荞麦（天荞麦）*Eagopyrum cymosum* Meissn.的根茎和块根。产于河南、安徽、江苏、浙江、江西、湖南、湖北、广东、广西、云南、四川等地。秋季采挖，洗净，晒干。切成段或小块用。

【别名】野荞麦，天荞麦，金锁银开，苦荞头，野荞子，铁石子，透骨消，蓝荞头，荞麦三七，开金锁，苦荞麦根，五毒草，五截，蛇罔，野南荞，酸荞麦，野三角麦，天松散，花麦，铁花麦，万年荞，铁拳头，铁甲将军草，透鬼消，甜荞。

【商品名】金荞麦，野荞麦，天荞麦。以个体大、粉性足、干燥无杂质者为佳。

【处方名】金荞麦，野荞麦，天荞麦，开金锁。

【性味归经】苦，平。归肺、脾、胃经。

【功效主治】清热解毒，清肺化痰，健脾消食。主治肺痈咯痰浓稠腥臭，瘰疬疮疖；肺热咳嗽、咽喉肿痛；脾失健运所致的腹胀少食或疳积消瘦等证。

【用量】15~30克。

地 锦 草

出自《嘉祐本草》。为大戟科1年生草本植物地锦草 *Euphorbia humifusa* Willd.的全草。全国各地均有分布，尤以长江流域及南方各省为多。夏秋间采集，洗净，晒干，切段用。生用或鲜用。

【别名】铺地锦，铺地红，小虫卧单，血见愁，花手绢，奶浆草，粪脚草，地锦，卧蛋草，雀儿卧蛋，小虫儿卧蛋，地联，夜光，承夜，地噤，酱瓣草，草血竭，血风草，马蝗草，雀儿卧单，猢狲头草，扑地锦，奶花草，奶草，奶汁草，斑鸠窝，天瓜叶，三月黄花，地莲草，铁线马齿苋，蜈蚣草，奶疳草，红茎草，红斑鸠窝，地马桑，红沙草，凉帽草，小苍蝇翅草，红丝草，小红筋草，仙桃草，莲子草，软骨莲子草，九龙吐珠草，地瓣草，粪触脚，花被单，血经基，麻雀蓑衣，雀扑拉，地蓬草，红莲草。

【商品名】地锦草。以植株完整、无泥土者为佳。

【处方名】地锦，地锦草，铺地锦。

【注意】在药材商品市场上，华东地区将同科植物斑地锦 *Euphorbia maculata* L.作地锦草入药；东北地区将同科植物毛地锦 *E. humifusa* Willd var. *pilosa* Thell.作地锦入药。以上均非地锦草正品。

本品别名“血见愁”，与藜科植物血见愁（大叶藜）*Chenopodium hybridum* L.同名而异物，二者是两种不同的药材。从名称上极易混淆，因此地锦草最好避开“血见愁”这个别名，以免混淆。

【性味归经】苦、辛，平。归肝、胃、大肠经。

【功效主治】清热解毒，止血，活血，利湿。主治热毒泻痢、痈肿，毒蛇咬伤；便血、尿血、崩漏及外伤出血等多种出血证，湿热黄疸及小便不利。

【用量】10~30克。外用适量。

筋 骨 草

出自《本草拾遗》。为唇形科多年生草本植物筋骨草 *Ajuga decumbens* Thunb. 的全株。产于华东、华南、中南及西南地区。夏秋季节采收，晒干，切段。或用鲜品。

【别名】苦草，苦地胆，青鱼胆草，白毛夏枯草，叶下红，雪里青，散血草，金疮小草，土犀角，见血青，白头翁，石灰菜，紫背金盘，破血丹，退血草，伏地筋骨草、白夏枯草，散血丹，白毛串，白喉草，四季春草，大叶刀旗草，透骨消，四时春，地龙胆，活血草，雪里开花，青石藤，朋花，一盏灯，野鹿衔花，天青地红，爬爬草，白调羹，和胶毒草。

【商品名】筋骨草，白毛夏枯草。以植株完整、带有花蕾、干燥无杂质者为佳。

【处方名】筋骨草，白毛夏枯草，雪里青。

【注意】筋骨草的别名甚多，有一别名叫“白头翁”，易与毛茛科植物白头翁 *Pulsatilla chinensis* Reg. 的名称相混。筋骨草还有一别名叫“散血丹”，易与胡椒科豆瓣绿属植物散血丹（狗骨豆瓣绿） *Peperomia heyneana* Miq. 的名称相混。所以筋骨草尽量不用别名，尤其不要用“白头翁”、“散血丹”这些别名，以免与其他药材混淆，发生差错。

在药材商品市场上，江西把同属植物散瘀草 *Ajuga nippone-n sis* Makino 作筋骨草入药；西藏把同属植物西藏筋骨草 *Ajuga lupulina* Maxim. 作筋骨草入药。这些均非正品。

【性味归经】苦，寒。归肺、肝、心经。

【功效主治】清热解毒，祛痰止咳，凉血止血。主治咽喉肿痛，痈肿疮疡；肺痈，肠痈；肺热咳嗽，血热咳血、衄血及外伤出血。

【用量】10~30克，外用适量。

绿 豆

出自《开宝本草》。为豆科1年生草本植物绿豆 *Phaseolus radiatus* L.的种子。全国大部分地区均产。立秋后种子成熟后采收。除去荚皮，晒干。

【别名】青小豆。

【商品名】绿豆。以色绿鲜艳、粒大饱满、干燥无杂质者为佳。

【处方名】绿豆。

【性味归经】甘，寒。归心、胃经。

【功效主治】清热解毒，消暑。主治暑热烦渴；痈肿疮毒；由巴豆、附子、乌头等引起的中毒。

【用量】30~60克。外用适量。

乌 敖 莓

出自《新修本草》。为葡萄科植物乌蔹莓 *Cayratia japonica* (Thunb.) Gagn.的带根全草。主产于华东、中南及西南等地。夏、秋采收，鲜用或晒干用。

【别名】拔，茏葛，龙尾，龙尾草，笼草，五爪龙草，五爪龙，五龙草，五叶葛，血五甲，过山龙，五爪藤，五爪金龙，五甲藤，五将草，过江龙，地五加，虎葛，乌蔹草，赤葛，赤泼藤，母猪藤，绞股兰，猪婆藤，鸡丝藤，小母猪藤，地老鼠，铁散仙，酸甲藤，铁称陀，野葡萄藤，老鸦眼睛藤，老鸦藤，黄眼藤，鲫鱼藤，止血藤，红母猪藤。

【商品名】乌蔹莓，绞酸兰，乌蔹草。以植株完整、带有花果、无杂质者为佳。

【处方名】乌蔹莓，乌蔹草，五爪龙草，绞股兰，鲜乌蔹莓，

鲜乌蔹草。

【注意】本品的变种毛叶乌蔹莓 *C. japonica* (Thunb.) Gagn. var. *pubifolia* Merr. et Chun 的全草，广西民间称为“红母猪藤”，亦作乌蔹莓入药。

【性味归经】苦、酸，寒。归心、肝、胃经。

【功效主治】清热利湿，解毒消肿。主治痈肿疮疡，痄腮，丹毒，风湿痛，黄疸，痢疾，尿血，白浊，咽喉疼痛，目翳，咯血，毒蛇咬伤。

【用量】10~15克。鲜品加倍。外用适量。

绞 股 蓝

出自《救荒本草》。为葫芦科植物绞股蓝 *Gynostemma pentaphyllum* (Thunb.) Mak. 的根状茎或全草。分布于我国南部各地。8~9月份采集，鲜用或晒干用。

【别名】七叶胆，小苦药，遍地生根，公罗锅底，福音草，甘茶蔓，五叶参，绞股兰。

【商品名】绞股蓝，绞股兰。以根茎粗大、粉性足、无泥土者为佳。全草以带有花果、植株完整、无泥土等杂质者为佳。

【处方名】绞股蓝，绞股兰，绞古兰，绞骨兰等。

【注意】葡萄科植物乌蔹莓的带根全草，亦称绞股兰，易与本品混淆，应注意鉴别。

【性味归经】苦，寒。归肺、肝经。

【功效主治】清热解毒，祛痰止咳。主治慢性支气管炎、慢性胃炎、肝炎、高血压、糖尿病等。近年来研究证明有防癌抗癌作用，对化疗和放疗后引起的白细胞和血小板减少有增升作用。

【用量】研末内服每次2~3克，每日3次。

【慎忌】脾胃虚寒、便溏腹泻患者慎服。

仙人掌

出自《本草纲目拾遗》。为仙人掌科植物仙人掌 *Opuntia dillenii* Haw. 的全株。分布于云南、四川、贵州、广东、广西、福建等地。随时可采，鲜用或切片晒干用。

【别名】神仙掌，观音掌，观音刺，凤尾笏，龙舌，平舌草，老鸦舌，霸王，仙巴掌，霸王树，火焰，火掌，玉芙蓉。

【商品名】仙人掌。以色绿、肉厚、质嫩者为佳。

【处方名】仙人掌，鲜仙人掌。

【注意】同属植物绿仙人掌 *O. manacantha* Haw. 亦同等入药。

【性味归经】苦，寒。归心、肺、胃经。

【功效主治】清热解毒，散瘀消肿，止痛止咳。主治胃脘痛，痞块，痢疾，痔血，咳嗽，喉痛，急性流行性腮腺炎，乳腺炎，疮痈肿毒，蛇咬伤，烫火伤，胃及十二指肠溃疡，肺脓疡。

【用量】鲜品煎汤内服30~60克。外用适量。

【禁忌】脾胃虚寒者忌服。忌铁器。忌用其汁点眼。

草珊瑚

出自《汝南圃史》。为金粟兰科植物草珊瑚 *Sarcandra glabra* (Thunb.) Nakai 的枝叶。分布于华东、中南及西南地区。夏季采收，鲜用或晒干生用。

【别名】九节茶，九节风，九节兰，九节红，九节蒲，九节花，十月红，山石兰，山鸡茶，山胡椒，观音茶，接骨木，接骨茶，接骨兰，接骨莲，接骨金粟兰，竹节茶，驳节茶，嫩头子，草珠兰，鸡膝风，骨风消，大威灵仙，青甲子，满山香，隔年红，鸡骨香，鱼子兰，肿节风。

【商品名】草珊瑚，九节茶，肿节风。以枝叶肥壮、带有花者为佳。

【处方名】草珊瑚，九节茶，肿节风等。

【性味归经】辛，平。归肺、大肠、肝经。

【功效主治】抗菌消炎，祛风胜湿，活血止痛。主治流行性感冒，麻疹，肺炎，流行性乙型脑炎，细菌性痢疾，急性阑尾炎，疮疡肿毒，骨折，跌打损伤，风湿性关节炎。

【用量】10~15克。鲜品加倍。外用适量。

【禁忌】孕妇及阴虚火旺者慎用。

两 面 针

出自《本草求原》。原名入地金牛。为芸香科植物两面针 *Zanthoxylum nitidum* (Roxb.) DC. 的根及茎叶。主产于广东、广西、福建、台湾、云南、四川等地。全年可采，鲜用，或切片晒干用。

【别名】入地金牛，金牛公，蔓椒，豕椒，猪椒，彘椒，狗椒，豨椒，金椒，山椒，花椒刺，胡椒穷，出山虎，入山虎，上山虎，下山虎，入地虎，红心刺刀根，红倒钩簕，两背针，两边针，双面针，双面刺，叶下穿针，大叶猫枝簕。

【商品名】两面针，入地金牛。根以肥壮、坚实、粉性足、嚼之味苦而有麻舌感者为佳。茎叶以质嫩、洁净者为佳。

【处方名】两面针，双面针，双面刺，两背针，入地金牛。

【性味归经】辛、苦，温。有小毒。归肝、胃经。

【功效主治】祛风，通络，消肿，止痛。主治风湿性关节痛，跌打肿痛，腰肌劳损，胃痛，牙痛，咽喉肿痛，毒蛇咬伤，烫火伤，颈淋巴结核。

【用量】6~9克。外用适量。

【禁忌】孕妇慎服。

了 哥 王

出自《岭南采药录》。为瑞香科植物了哥王 *Wikstroemia indica* (L.) C.A. Mey. 的茎叶、根和根内皮。主产于广东、广西、福建、台湾、浙江、江西、湖南、四川等地。夏季采叶，秋季采根及根内皮。叶晒干用。根及根内皮蒸熟切片晒干用。

【别名】 南岭蕘花，九信菜，九信草，鸡子麻，鸡忙头，鸡儿苦藤，鸡浙肠，山黄皮，山埔嵩，埔嵩；蒲嵩，大黄头树，地棉麻树，桐皮子，山雁皮，了哥麻，消山药，铺银草，雀儿麻，雀子麻，铁鸟散，山石榴，千年矮，乌子麻，地巴麻，山棉皮，石棉皮，火索木，毒鱼藤，毒除根，曝牙郎，熟薯，假黄皮，山六麻，山豆了，铁骨伞，狗颈树，狗信药，山麻皮，山之一，白棉儿，野麻朴，山络麻，小叶金腰带，石谷皮，金腰带，红灯笼，地棉根，地棉根皮，埔银，指皮麻，定元根，鱼胆根，地谷根，红赤七，七麻根，别南根，独薯根，狗信蔃。

【商品名】 了哥王，南岭蕘花。根以表西色棕黄、浙面色白、有丝状纤维、干燥无杂质者为佳。茎叶以质嫩、干燥、洁净者为佳。

【处方名】 了哥王，了哥王叶，了哥王根，了哥王根皮。

【性味归经】 苦，微辛，寒。有毒。归脾、肺经。

【功效主治】 清热解毒，消肿散结，止痛。茎叶主治瘰疬，痈肿，风微痛，百日咳，急性乳腺炎，蜂窝组织炎，跌打损伤。根及根内皮主治肺炎，腮腺炎，水肿微胀，瘰疬，疮疡肿毒，跌打损伤，扁桃体炎，淋巴结炎，支气管炎，哮喘，麻风，闭经，风湿性关节炎等。

【用量】 内服宜久煎4小时以上。茎叶6~9克；根及根内皮9~15克。外用适量。

【禁忌】 孕妇及素体虚寒者忌服。

狼 把 草

出自《本草纲目拾遗》。为菊科植物狼把草 *Bidens tripartita* L. 的全草。全国大部地区均有分布。夏秋间采集地上部分，晒干，生用。

【别名】 大狼把草，接力草，一包针，针线包，引线包，针包草，豆渣草，小鬼叉，郎耶草，乌把，乌阶，櫟，大鬼针草，狼尾棵。

【商品名】 狼把草，大狼把草。以植株完整、枝叶肥壮、无泥土者为佳。

【处方名】 狼把草，一包针，鬼针草。

【注意】 在药材商品市场上，下列同属植物的全草在不同地区作狼把草使用，但非正品。

大狼把草 *B. frondosa* L. 上海地区作狼把草使用。

三叶鬼针草 *B. pilosa* L. 在四川地区称“豆渣草”，作狼把草使用；而在广东、广西则作“金盏银盘”使用，应注意鉴别。

【性味归经】 苦、甘，平。归肺、大肠经。

【功效主治】 清热解毒，养阴敛汗。主治感冒，扁桃体炎，咽喉炎，支气管炎，肺结核，痢疾，肝炎，泌尿系统感染，经闭。外用治疗疖肿、湿疹、皮癣等。

【用量】 6～10克。鲜品15～30克。外用适量。

【慎忌】 素体虚寒者慎用。

爵 床

出自《神农本草经》。为爵床科植物爵床 *Rostellularia procumbens* (L.) Nees 的全草。主产于山东、江苏、河南、安徽、江西、浙江、广东、福建、台湾等地。立秋后采收，洗净，鲜用或晒干。

用。

【别名】爵卿，香苏，赤眼老母草，赤眼，小青草，蜻蜓草，苍蝇翅，鼠尾红，瓦子草，五累草，六角仙草，观音草，疳积草，肝火草，倒花草，山苏麻，四季青，蚱蜢腿，野万年青，毛泽兰，屈胶仔，麦穗红，六角英，大鸭草，六方疳积草，蛇食草，水竹笋，麦穗癀，鼠尾癀，阴牛郎，孩儿草，节节寒。

【商品名】爵床。以植株完整、肥壮无杂质者为佳。

【处方名】爵床，香苏，小青草，六角英等。

【性味归经】辛、苦，寒。归肝、胆经。

【功效主治】清热解毒，利湿消滞，活血止痛。主治感冒发热，咳嗽，咽喉疼痛，小儿疳积，疟疾，痢疾，肝炎，肾炎水肿，泌尿系感染，乳糜尿，筋骨疼痛。外用治疗痈肿疮疖，跌打损伤。

【用量】10~15克。鲜品20~30克。外用适量。

【慎忌】不宜多服久服，否则易伤脾胃。

土 大 黄

出自《植物名实图考》。为蓼科植物土大黄 *Rumex madaio* Mak.的根。主产于河南、山东、四川、安徽、江苏、贵州、福建、湖南等地。9~10月采收，洗净，鲜用或晒干生用。

【别名】吐血草，箭头草，救命王，金不换，红筋大黄，野蒿菜，广角，铁蒲扇，大晕药，包金莲，血当归，癖药，土三七，萝卜奇，止血草，化血莲，鲜大青，绿当归，野大黄，波叶大黄，台黄。

【商品名】土大黄。以根粗大、无泥土者为佳。

【处方名】土大黄。

【注意】下列同属或同科植物在不同地区也称土大黄，功效近似，但非土大黄正品。

羊蹄 *Rumex japonicus* Houtt

皱叶酸模 *R. crispus* L.

巴天酸模 *R. patientia* L.

牛耳大黄 *R. nepalensis* Spreng.

大黄属植物华北大黄(山大黄) *Rheum franzenbachii* Munt.

【性味归经】苦、辛，凉。归肺、大肠经。

【功效主治】清热，解毒，止血，祛瘀，通便，杀虫。主治肺脓疡，肺结核咯血，衄血，流行性乙型脑炎，急性或慢性肝炎，便秘，痈肿疮疡，腮腺炎，跌打损伤，烧烫伤，疥癣，湿疹。

【用量】6~15克。外用适量。

【禁忌】脾胃虚寒及身体虚弱者慎服。

柳 叶(附：柳枝 柳根)

出自《神农本草经》。为杨柳科植物垂柳 *Salix babylonica* L. 的叶。全国各地多有分布。春、夏采收，晒干。

【别名】柳树叶，垂柳叶，杨柳叶，垂杨柳叶，小杨叶，青丝柳叶，线柳叶，吊柳叶，水柳叶，清明柳叶。

【商品名】柳叶，垂柳叶。以色绿、质嫩、叶片肥大者为佳。

【处方名】柳叶，鲜柳叶。

【性味归经】苦，寒。归心、脾经。

【功效主治】清热，透疹，利尿，解毒。主治痧疹透发不畅，白浊，疔疮疖肿，乳腺炎，甲状腺肿，丹毒，烫伤，牙痛，高血压症，高血脂症，尿潴留。

【用量】10~30克。鲜品加倍。外用适量。

【禁忌】脾胃虚寒者慎服。

附：柳枝

柳枝为垂柳的枝条。又名杨柳枝、杨柳条、柳条、垂柳条、垂

柳枝、青丝柳枝、线柳枝、吊柳枝、水柳枝、清明柳枝等。以质嫩、条匀、洁净者为佳。性味苦寒。有祛风、利尿、消肿、止痛之功效。主治风湿痹痛，淋证，白浊，小便不通，传染性肝炎，风肿，疔疮，乳痈，丹毒，龋齿，龈肿。用量20~40克。鲜品加倍。外用适量。

附：柳根

柳根为垂柳的根及根须。又名杨柳须、杨柳根、杨柳根须、水柳须、水柳根、水柳根须、柳须、柳树根、柳树根须、垂柳根、垂柳须、垂柳根须，青丝柳根、青丝柳须、青丝柳根须、线柳根、线柳根须、线柳须、吊柳根、吊柳须、吊柳根须、青明柳根、清明柳须、清明柳根须、红龙须、分水翁、青龙须等。性味苦寒。有利水通淋、祛风除湿的功效。主治淋证，白浊，水肿，黄疸，风湿痹痛，热痢，黄水湿疮，牙痛，烫伤。用量15~30克。外用适量。

紫 荆 皮（附：紫荆花）

出自《日华子本草》。为豆科植物紫荆*Cercis chinensis* Bge. 的树皮或根皮。全国大部分地区均有分布。7~8月采收树皮。洗净泥沙，晒干。

【别名】肉红，内消，紫荆木皮，紫荆根皮，白林皮，满条红皮，乌桑皮，箩筐树皮，紫金盘皮，扁豆翁皮。

【商品名】紫荆皮，紫荆木皮。以条长、肉厚、干燥、无杂质者为佳。

【处方名】紫荆皮，紫今皮，紫金皮。

【注意】在药材商品市场上，紫荆皮除上述品种外，尚有同属植物云南紫荆*C. yunnanensis* Hu et Cheng（分布于云南、四川、湖北、陕西等地）的根皮，也作紫荆皮同等入药，但非正品。

有些地区将木兰科植物南五味子 *Kadsura longepedunculata* Fin. et Gagnep. 和千屈菜科植物紫葳 *Lagerstroemia indica* L. 以及大戟科植物余甘子（庵摩勒、望果、牛甘子、油甘子、橄榄子、鱼木果、滇橄榄、庵摩落迦果、喉甘子、余甘、油柑） *Phyllanthus emblica* L. 的树皮混作紫荆皮入药。北京市还将南五味子的根皮称作“川槿皮”。这种混乱现象应该调理和整顿。

【性味归经】苦，平。归肝、脾经。

【功效主治】活血通经，解毒消肿。主治风寒湿痹，妇人经闭及血气疼痛，喉痹，淋证，痈肿，疥癬，跌打损伤，蛇虫咬伤，痔疮。

【用量】6～12克。外用适量。

【禁忌】孕妇及脾胃虚寒者忌服。

附：紫荆花

紫荆花为紫荆的花。又名紫荆树花、满条红花、乌桑花、箩筐树花，紫金盘花、扁豆翁花等。有清热凉血、祛风解毒之功效。主治风湿性筋骨疼痛，鼻中疳疮，血热所致的吐血、衄血、便血及崩漏下血等。用量3～6克。鲜品加倍。外用适量。

松 萝

出自《神农本草经》。为松萝科植物长松萝 *Usnea longissima* Ach. 及破茎松萝 *U. diffracta* Vain. 的丝状体。春秋季采收，晒干。

【别名】女萝，节松萝，松落，天蓬草，天棚草，松上寄生，树挂，雪风藤，山挂面，龙须草，云雾草，金线草，海风藤，老君须，蜈蚣松萝，接筋草。

【商品名】长松萝：又名蜈蚣松萝、天蓬草。为植物长松萝的

丝状体。分布于黑龙江、吉林、辽宁、安徽，陕西、浙江、湖北、广东、四川、云南、西藏等地。

节松萝：又名破茎松萝、云雾草、接筋草、女萝。为植物破茎松萝的丝状体。分布于黑龙江、吉林、辽宁、陕西、江西、湖北、湖南，四川等地。

均以干燥无杂质者为佳。

【处方名】松萝，女萝，天蓬草。

【注意】在药材商品市场上，除上述2种松萝外，同属植物花松萝*U. florida* (L.) Wigg.的丝状体在某些地区也作松萝使用，功效相似，但非正品。

另外，松萝在四川、广西、江西、湖南、湖北等地误作海风藤使用，应该纠正。

【性味归经】苦、甘，平。归肝、肺经。

【功效主治】清肝，止血，化痰，解毒。主治头痛目赤，咳嗽痰多，疟疾，瘰疬，白带，崩漏，外伤出血，痈肿，毒蛇咬伤，肺结核，阴道滴虫等。

【用量】6～10克。外用适量。

蜗 牛

出自《名医别录》。为蜗牛科动物蜗牛*Eulota peliomphala* Pfr. 及其同科近缘种的全体。各地均有分布。夏季捕捉，用沸水烫死，晒干。生用、炒用或煅透用。

【别名】仆累，小牛螺，黄犊，蜗羸，螺蝓，蜗羸，螺羸，蠡羸，陵螺，山蜗，瓜牛，蠡牛，负壳蜒蚰，海羊，螺蚰羸，土牛儿，负壳蛞蝓，天螺，圆螺虫，天螺蛳，无厣螺，肌母螺，星牛，回型蜗牛。

【商品名】蜗牛。以个大、新鲜、干燥、无杂质者为佳。

【处方名】蜗牛，生蜗牛，鲜蜗牛，炒蜗牛，煅蜗牛。

处方中写蜗牛指炒蜗牛。为净蜗牛用文火炒黄入药者。减少毒性。

生蜗牛为原药洗净晒干捣碎入药者。多供外用。

鲜蜗牛为新鲜蜗牛洗净捣烂入药者。多供外用。

煅蜗牛为净蜗牛用武火炒至焦黑，存性，取出晾凉入药者。功偏收涩止血。

【性味归经】咸，寒。有小毒。归肺、肾经。

【功效主治】消肿，解毒，清热，利尿，收涩。主治痔疮，疮疖，脱肛，子宫脱垂，小便癃闭，风热惊痛，消渴，喉痹，痄腮，癫痫，蜈蚣咬伤。

【用量】4～6克。外用适量。

【禁忌】不宜久服。

喜树

出自《浙江民间常用草药》。为珙桐科植物喜树 *Camptotheca acuminata* Decne. 的果实或根或根皮。分布于江西、浙江、湖南、湖北、四川、云南、贵州、广东、广西等地。果实秋末至冬初采摘，晒干。根全年可采挖。

【别名】旱莲，水栗，水桐树，天梓树，旱莲子，千张树，野芭蕉，水漠子，旱莲木，南京梧桐，喜树根，喜树果。

【商品名】喜树，喜树根，喜树果。

【处方名】喜树，喜树根，喜树根皮，喜树果。

【性味归经】苦、涩，寒。有毒。归肝、大肠经。

【功效主治】抗癌解毒。主治各种癌症，急性及慢性白血病，银屑病，血吸虫病所致的肝脾肿大。

【用量】根皮 6～10克；果实 3～6克。

【禁忌】孕妇及身体虚弱者忌服。因有毒，故一般人使用时亦不宜超量。

长 春 花

出自《植物名实图考》。为夹竹桃科植物长春花 *Catharanthus roseus* (L.) G. Don 的全草。主产于云南、广西、广东等地。多为栽培。全年可采，洗净，鲜用或晒干生用。

【别名】日日新，雁来红，四时春，三万花。

【商品名】长春花。以植株完整、肥壮、无杂质者为佳。

【处方名】长春花。

【注意】在药材商品市场上，本品的变种白花长春花 *C. roseus* (L.) G. Don var. *albus* (Sweet) G. Don 和黄花长春花 *C. roseus* (L.) G. Don var. *flavus* (Tsiang) Metcalf 的全草亦同等入药。

【性味归经】微苦，凉。有毒。归肝、肺经。

【功效主治】抗癌，降血压。主治急性淋巴细胞性白血病，淋巴肉瘤，巨滤泡性淋巴瘤，高血压病；肺癌，绒毛膜上皮膜等。

【用量】6～15克。鲜品10～20克。

半 支 莲

出自《江苏植物志》。为唇形科植物半支莲 *Scutellaria barbata* Don 的全草。主产于我国南部、西南部及中部广大地区。夏季采集，鲜用或晒干生用。

【别名】并头草，狭叶韩信草，牙刷草，四方马兰，半枝莲，挖耳草，通经草，紫连草，小韩信草，小韩信，小耳挖草，金挖耳草，金挖耳，耳挖草，溪边黄芩，野夏枯草，方儿草，半向花，半面花，偏头草，四方草，小号向天盏，虎咬红，再生草，赶山鞭，狭叶向天盏。

【商品名】半支莲，半枝莲。以植株完整、肥壮、色绿、无泥

土者为佳。

【处方名】半支莲，半枝莲，鲜半支莲。

【注意】在药材商品市场上，有些地区把马齿苋科植物大花马齿苋 *Portulaca grandiflora* Hook. 的全草称作半支莲，又名松叶牡丹、金丝杜鹃、佛甲草、打砍不死、万年草等，并作半支莲使用，应注意鉴别。

另外，还有些地区把景天科植物鼠牙半支莲 *Sedum lineare* Thunb. 和珠芽半支莲 *S. bulbiferum* Makino 及石上瓜子菜 *S. alfredii* Hance 也称作“半支莲”，使用时应注意鉴别。

【性味归经】微苦，凉。归肝、肺经。

【功效主治】清热解毒，活血抵癌。主治各种癌肿，痈疽疮毒，乳腺炎，毒蛇咬伤，阑尾炎，肝炎，肝腹水，肺痈。

【用量】15~30克。鲜品加倍。外用适量。

佛 甲 草

出自《本草图经》。为景天科植物佛甲草 *Sedum lineare* Thunb. 的全草。主产于我国东南各省。生长于山野水湿地及岩石上。夏、秋季采收，洗净，鲜用或晒干生用。

【别名】佛指甲，铁指甲，小佛指甲，尖叶佛甲草，火烧草，火焰草，半支莲，半枝莲，狗牙半支，狗牙瓣，狗牙半支莲，鼠牙半支莲，猪牙齿，禾雀舌，禾雀脚，万年草，午时花，小叶刀斬草，金枪药，杠开口，土三七，养鸡草，指甲草，打不死，尖叶石指甲。

【商品名】佛甲草，指甲草，鼠牙半支。以植株完整、无杂质者为佳。

【处方名】佛甲草，佛指甲，指甲草。

【性味归经】甘，寒。归肺、脾经。

【功效主治】清热，解毒，消肿。主治咽喉肿痛，痈肿，疔疮，

丹毒，烫火伤，蛇咬伤，黄疸，痢疾，乳腺癌。

【用量】10~15克。鲜品加倍。外用适量。

【禁忌】脾虚泄泻者慎服。

农 茄 莉

出自《植物名实图考》。为豆科植物野百合 *Crotalaria sessiliflora* L. 的全草。分布于我国东北、华东、华南及西南各地。夏、秋采集，洗净，鲜用或晒干生用。

【别名】野百合，佛指甲，狸豆，狗铃草，蓝花野百合，山油麻，野芝麻，芝麻响铃草，鼠蛋草，响铃草，细叶芝麻铃，农吉利。

【商品名】农吉利，农吉利，野百合。以植株完整、新鲜无杂质者为佳。

【处方名】农吉利，农吉利，野百合，佛指甲，鲜农吉利。

【注意】本品在四川地区混作响铃草（豆科植物假地蓝 *Crotalaria ferruginea* Grah. 的全草，又名野花生、荷猪草、黄花野百合、马响铃、铃铛草，肾气草、响铃子、小狗响铃、假地豆、地响铃、野豌豆、马小莲、野毛豆、马铃草、响亮草、荷承草、假地蓝）入药，应注意鉴别。

【性味归经】苦、淡，平。归脾、肺经。

【功效主治】解毒，抗癌。主治疔疮，皮肤鳞状上皮癌，食管癌，宫颈癌，痢疾，小儿疳积。

【用量】10~20克。鲜品加倍。外用适量。

猪 秧 秧

出自《野菜谱》。为茜草科植物猪秧秧 *Galium aparine* L. var. *tenerum* (Gren. et Godr.) Reichb. 的全草。分布于我国南北。

各省。夏季采收，鲜用或晒干生用。

【别名】 拉拉藤，拉拉秧，锯锯藤，细叶茜草，锯子草，小锯子草，锯耳草，活血草，小禾镰草，八仙草，小茜草，细茜草，血见愁，红丝线，小飞扬藤，小锯藤，涩拉秧，桑恣噶尔布（藏名）。

【商品名】 猪秧秧，锯锯藤。以植株完整、触之拉手、无泥土者为佳。

【处方名】 猪秧秧，锯锯藤，涩拉秧，鲜猪秧秧。

【性味归经】 甘、辛、微苦，凉。归肝、膀胱经。

【功效主治】 清热解毒，利尿消肿，活血通络。主治泌尿系感染，水肿，牙龈出血，崩漏，痛经，白带，癌症，白血病，阑尾炎。外用治疗急性乳腺炎，痈肿疮疖，跌打损伤等。

【用量】 15~30克。鲜品加倍。外用适量。

【禁忌】 孕妇慎服。

狗 舌 草

出自《新修本草》。为菊科植物狗舌草 *Senecio integrifolius* (L.) Clairvill var. *fauriei* (Levl. et Vant.) Kitam. 的全草。我国从东北至西南各地均产。夏、秋采收，鲜用或晒干生用。

【别名】 狗舌头草，狗舌子草，白火丹草，铜交杯，糯米青，铜盘一枝香，血癌草。

【商品名】 狗舌草。以植株完整、带有花果、无泥土者为佳。

【处方名】 狗舌草，鲜狗舌草。

【性味归经】 苦、寒。归肺、脾经。

【功效主治】 清热，解毒，利水。主治肺脓疡，肾炎水肿，疖肿，尿路感染，小便不利，白血病，口腔炎，癌症。

【用量】 10~15克。鲜品加倍。外用适量。

龙 葵

出自《药性论》。为茄科植物龙葵 *Solanum nigrum* L. 的全草。全国各地均有分布。夏、秋采收，洗净，晒干。

【别名】苦菜，苦葵，天茄子，老鸹眼睛草，老鸦眼睛草，天茄苗儿，天天茄，救儿草，后红子，水茄，天泡草，老鸹酸浆草，天泡果，七粒扣，乌疔草，黑天棵，黑天天棵，黑天天，黑星星，野茄子，惹子草，野辣子，黑姑娘，野辣椒，野辣椒树，乌归菜，野海椒，龙眼草，黑笳，地泡子，地葫草，山辣椒，山海椒，耳坠菜，野葡萄，黑天地棵，天地豆，黑蛋蛋棵，甜豆茄棵。

【商品名】龙葵。以植株完整、色绿、叶多、带有花果、无泥土者为佳。

【处方名】龙葵，黑天天棵。

【性味归经】苦，寒。归肝、胃经。

【功效主治】清热解毒，活血消肿。主治急性肾炎，乳腺炎，疮疖肿毒，感冒发热，牙痛，慢性支气管炎，痢疾，泌尿系感染，白带，蛇咬伤，肺癌及消化系统癌症。

【用量】10~15克。鲜品加倍。外用适量。

【禁忌】脾胃虚弱者慎服。

天 葵

出自《滇南本草》。为毛茛科植物天葵 *Semiaquilegia adoxoides* (DC.) Mak. 的块根及全草。全国各地均产。秋季采收，洗净晒干，全草切段用，块根切片用。

【别名】紫背天葵，紫背天葵子，紫背天葵根，天葵子，天葵草，千年老鼠屎，千年耗子屎，金耗子屎，夏无踪，散血球，雷丸草，小乌头，老鼠屎草，旱铜钱草，地丁子，天吉子，野鸟头子，

天葵根，天葵棵，鸡腿，散血珠；菟葵，麦无踪，天去子。

【商品名】天葵草：为植物天葵的全草。以植株完整、肥粗、无泥土者为佳。

天葵子：为植物天葵的块根。以肥壮、干燥、无杂质者为佳。

【处方名】天葵，天葵子，天葵草，紫背天葵。

【性味归经】甘、苦，寒。有小毒。归肺、脾、膀胱经。

【功效主治】清热解毒，利尿消肿。主治疮疖肿，乳腺炎，扁桃体炎，淋巴结结核，疝气，小便不利，跌打损伤，毒蛇咬伤。

【用量】6～10克。鲜品10～20克。外用适量。

【禁忌】脾胃虚弱者慎用。

虎耳草

出自《履巉岩本草》。为虎耳草科植物虎耳草 *Saxifraga stolonifera* (L.) Meerb. 的全草。主产于河南、安徽、江苏、山东、浙江、江西、湖南、湖北、四川、云南、贵州、广东、广西、福建等地。生长于水边或潮湿处。开花时采集全草，洗净，鲜用或晒干用。

【别名】老虎耳，老虎耳草，狮子草，狮子耳，狮子耳草，猪耳草，猫耳朵草，猫耳朵，耳朵草，水耳朵，耳朵红，耳聋草，佛耳草，擦耳草，石荷叶，金丝荷叶，金丝吊芙蓉，天荷叶，金钱荷叶，金丝草，系系叶，丝棉吊梅，金线莲，石丹药，丝丝草，蟹壳草，红丝络，红线草，红线绳，月下红，铜钱草。

【商品名】虎耳草。以植株完整、带有花枝者为佳。

【处方名】虎耳草，老虎耳草，狮子草，狮子耳草，猫耳朵草，鲜虎耳草。

【性味归经】微苦、辛，寒。有小毒。归肺、大肠经。

【功效主治】清热，祛风，凉血，解毒。主治风疹，湿疹，中耳炎，丹毒，咳嗽吐血，肺痈，崩漏，痔疾。

【用量】 6~10克。鲜品加倍。外用适量。

绶 草

出自《植物名实图考》。为兰科植物绶草 *Spiranthes sinensis* (Pers.) Ames 的根或全草。全国大部分地区均有分布。生长于潮湿或山野阴坡。秋季挖根，春夏采集全草，洗净晒干，生用。

【别名】 盘龙参，盘龙草，盘龙棍，盘龙箭，盘龙花，龙抱柱，龙缠柱，红龙盘柱，过水龙，九龙蛇，笑天龙，醣，一线香，猪鞭草，猪潦子，猪辽参，猪牙参，小猪獠参，扭兰，胜杖草，海珠草，蛇崽草，一枝枪，一叶一枝花，双瑚草，镰刀草，大叶青，马牙七，鲤鱼草，反皮索。

【商品名】 绶草，盘龙参，盘龙草。全草以植株完整、肥嫩者为佳。根以粗长、干燥、无泥土者为佳。

【处方名】 绶草，盘龙参，盘龙草，盘龙棍，一枝枪。

【性味归经】 甘、苦，平。归肺、脾、肾经。

【功效主治】 兼阴清热，润肺止咳，凉血解毒。主治病后体虚，神经衰弱，肺结核咯血，咽喉肿痛，小儿夏季热，糖尿病，白带，腰酸，头晕，遗精。外用治疗蛇咬伤，疮疡痈肿。

【用量】 10~20克。鲜品加倍。外用适量。

【慎忌】 有湿热瘀滞者忌服。

十 大 功 劳 叶

出自《本草再新》。为小檗科常绿灌木植物阔叶十大功劳 *Mahonia bealei* (Fort.) Carr. 和细叶十大功劳 *M. fortunei* (Lindl.) Fedde 及华南十大功劳 *M. japonica* (Thunb.) DC. 的叶。秋季采收，晒干。

【别名】 功劳叶，阔叶十大功劳叶，细叶十大功劳叶，华南十

大功劳叶，狭叶十大功劳叶，黄天竹，土黄柏，刺黄柏，刺黄芩、木黄连。

【商品名】阔叶十大功劳叶；又名刺黄檗叶、犬叶黄柏叶、黄柏树叶、皮氏黄连竹叶、老鼠刺叶。为植物阔叶十大功劳的叶。主产于安徽、河南、陕西、浙江、湖北、四川、江西等地。

细叶十大功劳叶；又名狭叶十大功劳叶、猫儿头、刀瓜山树叶、黄天竹叶等。为植物细叶十大功劳的叶。主产于浙江、湖北、四川等地。

华南十大功劳叶，为植物华南十大功劳的叶。主产于云南、福建等地。

十大功劳叶：又名功劳叶。为各种十大功劳叶的统称。均以叶片大、完整、干燥、无杂质者为佳。

【处方名】十大功劳叶，功劳叶。

【注意】在目前商品市场上，下列同属植物的叶，在不同地区也作十大功劳叶入药。功效相似，但非正品。

细梗十大功劳 *M. gracilipes* (Oliv.) Fedde 分布于四川、云南等地。

甘平十大功劳（又名刺黄柏） *M. ganpinensis* (Leveille) Fedde 分布于湖北、四川、贵州等地。

西藏十大功劳 *M. calamicaulis* Spare et Fisch. 分布于西藏。

光叶十大功劳 *M. shenii* Chun 分布于广东。

黄十大功劳 *M. flavidia* Schneid. 分布于云南。

滇刺黄柏 *M. mairei* Takeda 分布于陕西、云南、贵州等地。

大叶刺黄柏 *M. fargesii* Takeda 分布于贵州。

另外需要注意的是，《植物名实图考》所载的十大功劳为阔叶十大功劳、细叶十大功劳、华南十大功劳。应该说此为正品。可是仅江西、浙江等少数地区使用此品种，而全国绝大多数地区使用的则是冬青科植物枸骨 *Ilex cornuta* Lindl. 的叶（见“苦丁茶”），宜鉴别使用。

【性味归经】苦，凉。归肺、肾经。

【功效主治】清热补虚，化痰止咳。主治肺结核咯血，骨蒸潮热，头晕耳鸣，腰酸腿软，心烦目赤，风热感冒。

【用量】10~15克。

【慎忌】脾虚便溏者忌服。

飞廉

出自《神农本草经》。为菊科植物飞廉 *Carduus crispus* L. 的全草或根。全国各地均有分布。多生长于山野道旁。冬季采挖其根，夏季花盛开时采割全草。鲜用或晒干生用。

【别名】飞轻，飞雉，飞廉蒿，飞帘，天荠，伏猪，伏兔，木禾，老牛错，老牛咤，大力王，大薊，刺盖，刺打草，雷公菜，枫头棵，红花草。

【商品名】飞廉：为植物飞廉的全草或根。为飞廉正品。销售及使用范围较广。以植株完整、带有花、无泥土者为佳。

藏飞廉：又名利刺飞廉。为同属植物利刺飞廉 *C. acanthoides* L. 的全草或根。分布于云南、西藏等地。为飞廉副品。销售及使用范围较窄，仅使用于西藏地区。

【处方名】飞廉，飞帘，大力王，老牛咤，鲜飞廉。

【性味归经】苦，平。归肺、肝、膀胱经。

【功效主治】清热，凉血，利湿，祛风，散瘀，消肿。主治吐血，衄血，尿血，功能性子宫出血，乳糜尿，泌尿系感染，白带。头风眩晕，风热痹痛，跌打瘀肿，疔疮肿毒，烫火伤。

【用量】20~30克。鲜品加倍。外用适量。

【慎忌】脾虚泄泻者忌服。不宜与麻黄配伍。

苣 莴 菜

出自《中药志》。为菊科植物苣荬菜 *Sonchus brachyotus* DC. 的全草。我国大部分地区均有分布。春季开花前连根拔起，洗净，鲜用或晒干生用。

【别名】 萝卜菜，野苦菜，野苦荬，苦葛麻，苦荬菜，取麻菜，苣菜，苦菜，苦苣菜。

【商品名】 苦苣菜。以肥壮、质嫩、完整、无泥土者为佳。

【处方名】 苦苣菜，苦荬菜，苦苣菜，鲜苦苣菜。

【注意】 本品在华北作败酱草入药，商品名称为北败酱；在东北作小蓟入药。以上均为混用。

同属植物裂叶苣荬菜（又名牛舌头、牛舌片、山苦荬）*S. arvensis* L. 功效相似，亦同等入药。

【性味归经】 苦，寒。归肺、大肠经。

【功效主治】 清热解毒，凉血利湿。主治细菌性痢疾，喉炎，咳嗽，内痔脱出，吐血，衄血，尿血，高血压病，高血脂症。

【用量】 20~30克。鲜品60~100克。外用适量。也可作菜食用。

【慎忌】 脾胃虚寒，泄泻腹痛者不宜服。

茅 莓

出自《本草拾遗》。为蔷薇科植物茅莓 *Rubus parvifolius* L. 的全草或根。主产于江苏、安徽、江西、广西、福建等地。7~8月采收，洗净，鲜用或晒干切段用。

【别名】 薤，薅田藨，薅秧藨，薅秧泡，栽秧泡，乳痈泡，三月泡，蛇泡果，蛇泡笏，鹰爪笏，牙藨笏，蛇泡簕，龙船藨，五月藨刺，五月红，陈刺波，虎波草，布田蓼草，播田花，天青地白草，

红梅消，红琐梅，红花脬笏，黑龙骨，过江龙，倒筑伞，倒生根，毛叶仙桥，种田蒲，细蛇菴，小还魂，两头粘，草杨梅，仙人搭桥。

【商品名】茅莓。以植株完整、肥壮、无杂质者为佳。

【处方名】茅莓，薅田藨，薅秧泡，薅秧藨，栽秧泡，蛇泡笏等。

【性味归经】甘、酸，平。归肝、脾、大肠经。

【功效主治】散瘀，止痛，解毒，杀虫。主治吐血，咯血，痢疾，肠炎，肝炎，肝脾肿大，肾炎水肿，泌尿系感染及结石，月经不调，白带增多，跌打肿痛，风湿性关节痛，崩漏下血，咽喉肿痛，产后血瘀腹痛。外用治疗皮炎及湿疹。

【用量】9～18克。鲜品15～30克。外用适量。

【禁忌】孕妇慎服。

蛇 莓

出自《名医别录》。为蔷薇科植物蛇莓 *Duchesnea indica* (Andr.) Focke 的全草。分布于黄河以南广大地区。夏秋采收，鲜用或晒干生用。

【别名】地莓，蚕莓，野杨莓，鸡冠果，蛇藨，三点红，龙吐珠，狮子尾，疗疮药，蛇蛋果，地锦，三匹风，蛇泡草，三皮风，三爪风，三爪龙，一点红，老蛇泡，蛇蓉草，三脚虎，蛇波藤，蛇八瓣，龙衔珠，小草莓，地杨梅，蛇不见，金蝉草，三叶藨，老蛇刺占，老蛇藨，龙球草，蛇葡萄，蛇果藤，蛇枕头，蛇盘草，蛇果草，宝珠草，三叶莓，红顶果，落地杨莓。

【商品名】蛇莓，地莓。以植株完整、带有花果、无杂质者为佳。

【处方名】蛇莓，地莓，蚕莓，野杨梅等。

【性味归经】甘、苦，寒。有毒。归肺、肝、脾经。

【功效主治】清热，凉血，消肿，解毒。主治热病，惊痫，咳嗽，吐血，咽喉肿痛，痢疾，痈肿，疔疮，蛇虫咬伤，烫火伤。

【用量】10~15克。鲜品加倍。外用适量。

鬼 羽 箭

出自《生草药性备要》。为玄参科植物鬼羽箭*Buchnera cruciata* Buch.-Ham.的全草。分布于广东、广西、湖南等地。生长于山坡、山谷、草丛等处。秋季采收，鲜用或晒干生用。

【别名】黑草，幼克草，克草，黑骨草，羽箭，羽箭草。

【商品名】鬼羽箭，黑草。以植株完整、带有花果、色乌黑、梗细嫩、干燥无杂质者为佳。

【处方名】鬼羽箭，羽箭，羽箭草，黑草。

【性味归经】苦，寒。归肝经。

【功效主治】清热，凉血，解毒。主治斑疹，伤寒，癫痫，皮肤风毒肿痛，蛛网膜下腔出血，荨麻疹。

【用量】10~15克。鲜品加倍。

【慎忌】孕妇及虚寒证患者忌服。

瓦 松

出自《新修本草》。为景天科植物瓦松*Orostachys fimbriatus* (Turcz.) Berger或晚红瓦松*O. erudescens* (Maxim.) Ohwi或黄花瓦松*O. spinosus* (L.) C.A.Mey.或狼爪瓦松*O. cartilaginea* A.Ber.的全草。夏秋采收，连根拔起全株，洗净晒干，切段生用。

【别名】昨叶荷草，屋上无根草，向天草，瓦花，石莲花，厝莲，干滴落，猫头草，瓦塔，天蓬草，瓦霜，瓦鬃，瓦葱，酸塔，塔松，兔子拐杖，干吊鳖，石塔花，狼爪子，酸溜溜，瓦宝塔，瓦莲花，岩松，屋松，岩笋，瓦玉，流苏瓦松，晚红瓦松，黄花瓦松，

狼爪瓦松。

【商品名】瓦松：又名流苏瓦松。为植物瓦松的全草。分布于全国各地。

晚红瓦松：为植物晚红瓦松的全草。主产于辽宁、浙江、江苏等地。

黄花瓦松：为植物黄花瓦松的全草。主产于西藏、新疆、内蒙古、吉林等地。

狼爪瓦松：为植物狼爪瓦松的全草。主产于我国东北及宁夏等地。

以质老、干燥、花穗带红色者为佳。

【处方名】瓦松。

【性味归经】酸、苦，凉。归肝、肺经。

【功效主治】清热解毒，止血，利湿，消肿。主治吐血，衄血，血痢，肝炎，疟疾，热淋，痔疮、湿疹，痈毒，疔疮，烧伤烫伤。

【用量】10~15克。鲜品20~30克。外用适量。

【禁忌】脾胃虚寒者慎服。据记载本品有毒，勿服过量。

蔷 薇 花

出自《医林纂要》。为蔷薇科植物多花蔷薇 *Rosa multiflora* Thunb. 的花朵。主产于江苏、浙江、安徽、河南、山东等地。5~6月花盛开时采集，晒干。

【别名】多花蔷薇花，刺花，白残花，柴米米花，墙麻花，牛棘花、墙薇花，牛勒花，山枣花、蔷蘼花，山棘花，玉鸡苗花，刺靡花，刺红花，野蔷薇花，倒钩刺花，和尚头花，七姊妹花，刺梅花，刺玫花，七星梅花，营实花，小金樱花，棘子花，荷花蔷薇花。

【商品名】蔷薇花，多花蔷薇花。以花朵完整、干燥、无杂质、

气清香者为佳。

【处方名】蔷薇花，野蔷薇花。

【性味归经】甘，凉。归胃、大肠经。

【功效主治】清暑，和胃，止血。主治口渴，暑热吐血，暑热胸闷，泻痢，刀伤出血等。

【用量】4～6克。鲜品6～15克。外用适量。

【禁忌】不宜久服。体虚者慎服。

木槿花

出自《日华子本草》。为锦葵科植物木槿 *Hibiscus syriacus* L. 的花。主产于河南、河北、陕西、江苏、湖北、四川等地。夏季花半开时采摘，晒干生用。

【别名】里梅花，朝开暮落花，疟子花，篱障花，喇叭花，白玉花，藩篱花，猪油花，打碗花，灯盏花，白饭花，白面花，舜花，朝菌花，椴花，棣花，日及花，槿树花，平条树花，白牡丹花，清明篱花，木桂花，菜花，篱沿树花，金漆树花，白布篱花，川槿花，鸡肉花，白槿花，花奴。

【商品名】木槿花，川槿花。以花朵大而完整、干燥、色白无杂质者为佳。

【处方名】木槿花，槿树花，鲜木槿花。

【性味归经】甘、微苦，凉。归脾、肺经。

【功效主治】清热利湿，凉血止血。主治肠风下血，赤白痢疾，小便不利。赤白带下。外用治疗疮疖肿毒，烫伤。

【用量】4～10克。鲜品30～60克。外用适量。

红药子

出自《本草图经》。为蓼科植物毛脉蓼 *Polygonum ciliinerve*

(Nakai) Ohwi的块根。主产于河南、甘肃、陕西等地。全年可采，挖出后，除去茎叶及须根，晒干。

【别名】红药，赤药，朱砂七，朱砂莲，猴血七，血三七，毛葫芦，毛脉蓼根，红要子，黄药子，白药子，金莽仁，雄黄连，莽馒头、血苕。

【商品名】红药于。以块根肥壮、干燥、粉性足、表面呈棕黄色、断面呈深黄色者为佳。

【处方名】红药子，生红药子，盐制红药子，醋制红药子，碱制红药子。

处方中写红药子指生红药子。为原药材去杂质，润切生用入药者。偏于抗菌消炎。

盐制红药子为红药子片用盐水拌匀，待吸尽，再用文火微炒入药者。偏于补肾。

醋制红药子为红药于片用米醋拌匀，待吸尽，再用文火炒干入药者。偏于止血。

碱制红药子为红药子片用碱水拌匀，待吸尽，再用文火炒干入药者。偏于健胃。

【注意】在药材商品市场上，还有些地方将蓼科植物翼蓼 *Pteroxygonum giraldii* Damm. et Diels. 的块根作红药子入药，功效相似，同等入药。

【性味归经】苦、涩，凉。归肝、大肠经。

【功效主治】清热解毒，凉血止血，止泻止痛。主治肠炎，痢疾，便血，崩漏，胃炎，胃溃疡，风湿性腰腿痛。外用治疗跌打损伤，烧烫伤，疮疖，狂犬咬伤。

【用量】6～10克。外用适量。

【禁忌】孕妇慎用。

白 药 子

出自《新修本草》。为防己科植物金线吊乌龟 *Stephania ce-*

pharantha Hayata的块根。主产于湖南、湖北、浙江、安徽、江西等地。生长于阴湿山坡、路旁或溪边、林缘。秋季采挖，洗净，切片晒干。

【别名】白药，白药根，白药脂，白药子根，金线吊乌龟，盘花地不容根，头花千金藤根，山乌龟，山乌龟根，金线吊葫芦，金丝吊蛤蟆，金丝吊蟹，白虾蟆，铁称铊，青藤根，细三角藤根。

【商品名】白药子。以个大、断面白色、粉性足者为佳。

【处方名】白药子，白药脂，山乌龟，白药子片。

【注意】白药子有异物同名品存在。除防己科植物金线吊乌龟外，西北地区有以蓼科植物翼蓼 *Pteroxygonum giraldii* Dammer et Diels 的根茎作白药子入药者；云南地区有以薯蓣科植物黄山药 *Dioscorea panthaea* Prain et Burkhill 的根茎作白药子入药者，商品名称为滇白药子；湖北有以防己科植物千金藤 *Stephania japonica* (Thunb.) Miers 的块根作白药子入药者。以上均非正品，使用时应注意鉴别。

【性味归经】苦、辛，凉。归脾、肺、肾经。

【功效主治】清热解毒，凉血止血，散瘀消肿。主治急性肝炎，细菌性痢疾，急性阑尾炎，胃痛，内出血，流行性腮腺炎，淋巴结炎，跌打损伤，毒蛇咬伤，吐血，衄血，咽喉疼痛，咳嗽，颈淋巴结结核，神经性皮炎。

【用量】10~15克。外用适量。

【禁忌】脾虚泄泻者慎服。

人 中 黄

出自《日华子本草》。为甘草末置竹筒内，浸渍于人粪坑中制成的暗黄色圆柱形固体。

【别名】甘草黄，甘中黄。

【商品名】人中黄，甘草黄。以干燥不霉者为佳。

【处方名】人中黄，甘草黄，甘中黄。

【性味归经】甘，寒。归心、胃经。

【功效主治】清热，凉血，解毒。主治伤寒热病，大热烦渴，热毒斑疹，丹毒，疮疡。

【用量】6～10克。

【禁忌】内无实热之邪者不宜服。

紫 草 茸

出自《本经逢原》。为紫胶虫科昆虫紫胶虫（胶虫）*Laccifer lacca* Kerr. 在树枝上所分泌的胶质。主产于云南、四川、台湾等地。西藏和广东部分地区亦产。国外产于印度、缅甸。7～8月间采收，将长有紫胶的枝条剪下，取胶去枝，风干。

【别名】紫胶，赤胶，紫矿，紫梗，紫虫胶，虫胶，棒状虫胶，胶质紫草茸，紫矿茸，紫铆（音矿），洋干漆。

【商品名】紫草茸，紫胶，赤胶，虫胶。因加工方法不同，又分为棒状虫胶、粒状虫胶、块状虫胶、片状虫胶四种规格。前一种供药用，后三种不入药，仅供工业原料。亦即是说，中药所用之紫草茸，实际仅指棒状虫胶。以块大、色紫、质坚者为佳。

【处方名】紫草茸，紫胶，赤胶，虫胶，紫矿。

【注意】紫草茸有同名异物存在。如治疗痘疮的紫草茸系指根头有白毛的紫草，亦即带有嫩苗的紫草，而非紫胶，应引起注意。

【性味归经】苦，寒。归肺、肝经。

【功效主治】清热，凉血，解毒。主治麻疹和斑疹不透，疮疖肿毒，产后血晕，带下。

【用量】煎汤内服2.5～4克。研末冲服1.5克。外用涂撒适量。

【禁忌】孕妇及脾胃虚寒者忌服。

食 盐

出自《名医别录》。为海水或盐井、盐池、盐泉中的盐水经煎晒而成的结晶体。

【商品名】食盐。以色白、纯净干燥者为佳。

【处方名】盐，食盐，炒食盐。

【性味归经】咸，寒。归胃、肾、大小肠经。

【功效主治】涌吐，清火，解毒，凉血。主治食停上脘，心腹胀痛，胸中痰癰。

【用量】 0.9~3克。作催吐用宜炒黄9~18克。外用适量。

【慎忌】 水肿患者忌眼或慎眼。

戎 盐

出自《神农本草经》。为卤化物类矿物石盐 *Halite* 结晶。产于炎热干燥地区的盐湖和海滨浅水泻湖中。主产于青海、内蒙古、新疆等地。全年可采。除去杂质，晒干备用。

【别名】石盐，青盐，大青盐，胡盐，秃登盐，阴土盐，寒盐，冰石，羌盐，岩盐。

【商品名】戎盐，青盐，大青盐。以纯净色青者为佳。

【处方名】青盐、戎盐。

【性味归经】咸，寒。归心、肾、膀胱经。

【功效主治】清热解毒，凉血明目。主治尿血，吐血，齿舌出血，目赤痛，风眼烂弦，牙痛等。

【用量】煎汤内服或入丸、散，每次1~1.5克。外用漱口或洗目适量。

【慎忌】水肿患者忌服或慎服。

石 花

出自《草木便方》。为梅花衣科植物藻纹梅花衣 *Parmelia saxatilis* Ach. 的叶状体。全国大部分地区均有分布。着生于岩石上。全年可采，从石上铲下，除净杂质，晒干。

【别名】石苔花，乳花，地衣，石衣，梅藓，藻纹梅花衣，道立克（蒙族名）。

【商品名】石花，藻纹梅花衣，石衣。以片大、肥厚、干燥、洁净者为佳。

【处方名】石花，石衣，地衣。

【注意】在药材商品市场上，牛皮叶科植物牛皮叶 *Sticta pulmonacea* Ach. 的叶状体，生于山间岩石上或树上，在有些地区也作石花同等入药。

【性味归经】甘，寒。归肝、肾经。

【功效主治】养血，明目，补肾，利尿，清热，解毒。主治目昏，吐血，血崩，腰膝疼痛，小便热痛，白浊，白带，黄疸。外用治疗皮肤瘙痒，脚癣，小儿口疮，烫伤，白癜风等。

【用量】10~15克。外用适量。

(五) 清虚热药

青 蒿

出自《神农本草经》。为菊科1年生草本植物青蒿 *Artemisia apiacea* Hance 和黄花蒿 *A. annua* L. 的全草。广布于全国各地。夏秋两季采收，鲜用或阴干，切段。

【别名】蒿，艾，草蒿，方溃，狹蒿，三庚草，野筒蒿，野兰蒿，黑蒿，白染艮，香蒿，蒿子，苦蒿，臭青蒿，臭蒿，香青蒿，细叶蒿，细青蒿，草青蒿，草蒿子，黄蒿，黄香蒿，黄花蒿，香丝草，酒饼草，马尿蒿，秋蒿，鸡虱草，香苦草，野苦草。

【商品名】青蒿：又名香蒿。为菊科植物青蒿的全草。主产于安徽、河南、江苏、河北、陕西、山西等地。

黄花蒿：为菊科植物黄花蒿的全草。全国大部分地区均产。

以上商品均以色青绿、干燥、质嫩、未开花、香气浓郁者为佳。

牡蒿：为菊科植物牡蒿 *A. japonica* Thunb. 的全草。全国大部分地区均产。在江苏、上海、四川等地药材市场上作“青蒿”使用。此非青蒿正品。

【处方名】青蒿，香蒿，香青蒿，鳖血青蒿等。

处方中写青蒿、香蒿、香青蒿均指生青蒿。为原药去杂质，洗净阴干切段入药者。

鳖血青蒿为净青蒿用鳖血拌匀，稍闷，再用文火炒干入药者。

【注意】目前在药材商品市场上，本品的销售品种比较混乱，山东省某些地区将同科植物茵陈蒿 *Artemisia capillaris* Thunb. 充当“青蒿”使用。还有些地区将同科植物滨蒿 *A. scoparia* Waldst. et Kitaib. 充当青蒿使用，这些都是错误的，应该纠正。

在上海、江苏、四川等地，将同科植物牡蒿作青蒿使用。牡蒿功效与青蒿相似，但非青蒿正品。

【性味归经】苦、辛，寒。归肝、胆、肾经。

【功效主治】退虚热，凉血，截疟，清暑解表。主治疟疾；温热病后期，湿热之邪侵入血分，夜热早凉，热退无汗；或温热病后期低血不退，阴虚发热而见骨蒸劳瘵，日晡潮热，手足心热；暑热外感，发热，头昏头痛等证。

【用量】4～12克。鲜用20～30克。

【慎忌】不宜久煎。

白 薇

出自《神农本草经》。为萝藦科多年生草本植物白薇 *Cynanchum atratum* Bge. 和蔓生白薇 *C. versicolor* Bge. 的根及根茎。我国各省均有分布。秋季采挖，洗净，晒干。

【别名】 萍，春草，芒草，白薇，白幕，薇草，骨美，龙胆白薇，直立白薇，三百根，牛角胆草，羊奶子，山烟，百荡草，老龙角，羊角细辛，上天梯，大向砂，九根角，九牛力，牛角风，节节空，大百砂，双角果，婆婆针线包，底线补，山老瓜瓢，蔓生白薇，变色白薇，白花牛皮消，拉瓜瓢，山烟根子，老水牛瓢，白马尾，白尾，白马薇，山白薇，硬白薇，实白薇，老瓜瓢根，香白薇，白薇根，马白薇，马尾白薇，知微老，嫩白薇。

【商品名】 东白薇：指产于山东、安徽、江苏一带者。品质最优。

白薇：又名龙胆白薇、实白薇、硬白薇、山白薇。为各地所产白薇的统称。以粗壮、干燥、无泥土等杂质者为佳。

【处方名】 白薇，白尾，香白薇，嫩白薇，东白薇，鲜白薇，炙白薇，炒白薇等。

处方中写白薇、白尾、香白薇、嫩白薇、东白薇均指生白薇。为原药去杂质，洗净晒干入药者。

炒白薇又名炙白薇。为净白薇用文火炒至微黄入药者。减缓苦寒之性。

鲜白薇为药材挖取后洗净以鲜品入药者。

【注意】 目前，在药材商品市场上，白薇的销售品种比较混乱。黑龙江及江西个别地区将同属植物合掌消 *Cynanchum amplexicaule* (Sieb. et Zucc.) Hemsl. 的根作“白薇”用；四川某些地区，将同属植物大羊角瓢（老君须） *C. inamoenum* (Maxim.) Loes. 的根作“白薇”用；陕西和河南的个别地区将同属植物徐长卿

C. paniculatum (Bunge) Kitag. 的根作“白薇”用；云南和西藏的一些地区将同属植物群虎草 *C. forrestii* Schltr. 的根作“白薇”用；云南、江苏、四川的一些地区把同科植物卵叶娃儿藤 *Tylophora ovata* (Lindl.) Hook. ex Steud. 和云南娃儿藤 *T. yunnanensis* Schltr. 及多花娃儿藤 *T. floribunda* Miq. 或粗毛娃儿藤 *T. hispida* Decne. 等的根作“白薇”用；广东、广西的一些地区把菊科植物毛大丁草（兔耳风）*Gerbera piloselloides* Cass. 的根作“白薇”用；四川个别地区把百合科植物竹凌霄（长蕊万寿竹）*Disporum bodinieri* (Levl. et Vant) Wang et Tang 或万寿竹 *D. sessile* (Thunb.) D. Don var. *flavens* (Kitag.) Y. C. Tang 的根作“白薇”用。以上都是错误的，应该纠正。另外，还有一些地区，把白前称作“白薇”，并把白前当作“白薇”使用，这也是错误的，也应纠正。白薇与白前的商品名称，正确的名称应该是：龙胆白薇（指根部丛生，状如龙胆草），鹅管白前（指根状茎中空如鹅管），硬白薇，软白前，实白薇，空白前，山白薇（指白薇生于山地或高坡），水白前（指白前生于水边或洼地）。这既是白薇与白前的正确名称，也是白薇与白前的区别之处。

【性味归经】苦、咸，寒。归胃、肝经。

【功效主治】清热凉血，利尿通淋，解毒疗疮。主治外感热病发热，热入营血，身热经久不退；肺热咳嗽，阴虚内热及产后虚热，热淋血淋，疮痈肿毒，咽喉肿痛以及毒蛇咬伤。

【用量】6～12克。

地 骨 皮

出自《神农本草经》。为茄科落叶灌木植物枸杞 *Lycium chinense* Mill. 的根皮。我国南北各省均有分布。初春或秋后采挖，洗净，剥取根皮，晒干，切段。

【别名】杞根，枸杞根，甜枸杞芽根，地骨，地铺，地节，苟

起根，枸杞根皮，枸杞菜根皮，山杞子根，甜齿芽根，红耳坠根，山枸杞根，狗奶子根皮，红榴根皮，狗地芽皮，枸櫞根，拘忌根，羊乳根，苦杞根，襦乳根，地筋根，象柴根，纯卢根，仙人杖根，却老根，天精根，却暑根，地仙根，拘棘根，狗地芽根，红榴榴根，石寿树根，骨皮，苟杞根皮，枸杞根白皮，甜菜芽根皮，甜薊菜芽根皮，狗秋芽根皮，狗噶子根皮，枸根，西王母杖根，白葛针。

【商品名】 地骨皮，枸杞根皮。以粗长、肉厚、无木心者为佳。

【处方名】 骨皮，地骨皮。

【注意】 目前地骨皮的市售品种比较混乱。福建一些地区以马鞭草科植物大青木 *Clerodendron cyrtophyllum* Turcz. 的根皮作“地骨皮”用，东北部分地区以细叶小檗 *Berberis poiretii* Schneid. 的根皮作地骨皮用，还有一些地区以木樨科植物荃皮（又称全皮、前皮） *Jasminum giraldii* Diels. 的干皮作“地骨皮”用。以上这些均属误用，应予以纠正。

【性味归经】 甘、淡，寒。归肺、肾经。

【功效主治】 凉血退蒸，清泄肝热。主治阴虚血热，小儿疳积发热，骨蒸潮热，盗汗，肺热咳喘，血热妄行引起的吐衄，消渴尿多等证。

【用量】 10~15克。

【慎忌】 外感风寒发热及脾虚便溏者忌用。

银 柴 胡

出自《本草纲目拾遗》。为石竹科多年生草本植物银柴胡 *Stellaria dichotoma* L. var. *lanceolata* Bge. 的根。主产于宁夏、甘肃、陕西、内蒙古及河南等地。秋分至立春之间采挖，除去残茎须根，洗净，晒干，切片。

【别名】银胡，牛肚根，沙参儿，白根子，土参、西银柴胡，山菜根，马蹄踏菜根，山马踏菜根。

【商品名】银柴胡：又名西银柴胡。为石竹科植物 银柴胡 的根。品质优良，销全国并出口。为银柴胡之正品。以条长、均匀、干燥、圆柱形、外皮棕黄色、断面黄白色者为佳。

山银柴胡：为同科植物丝石竹、锥花丝石竹、灯心草蚤缀、旱麦瓶草和蝇子草等的根。品质较次，多产地地销。为银柴胡副品。

铁柴胡：又名黄柴胡。为旱麦瓶草的根。属山银柴胡的一种。亦为银柴胡副品。

【处方名】银胡，银柴胡。

【注意】以前有些文献把同属植物 狭叶歧繁缕 *Stellaria dichotoma* L. var. *lanceolata* Bunge 的根当作“银柴胡”，此为鉴定上的错误，应该纠正。

在当今药材市场上，除正品银柴胡外，还有多种石竹科植物的根部，亦作“银柴胡”入药，统称“山银柴胡”，品质较差，非银柴胡正品。主要的有：产于山东、山西等地的丝石竹（又名霞草、欧石头花、山蚂蚱）*Gypsophila oldhamiana* Miq.；产于山西、甘肃、新疆等地的锥花丝石竹（又名线形瞿麦、圆叶丝石竹）*G. paniculata* L.；产于内蒙古、河北、辽宁、黑龙江等地的灯心草蚤缀 *Arenaria juncea* Bieb.；产于内蒙古、河北、山东、山西、黑龙江等地的旱麦瓶草（又名黄柴胡、铁柴胡）*Silene jenisseensis* Willd. 及产于甘肃、陕西等地的蝇子草（又名鹤草、脱力草）*S. fortunei* Vis. 等等。

【性味归经】甘，微寒。归肝、胃经。

【功效主治】退虚热，清疳热，除骨蒸。主治阴虚发热，骨蒸劳热，盗汗，小儿虫积发热，消瘦口渴等证。

【用量】6～15克。

【禁忌】外感风寒，血虚无热者忌用。

胡 黄 连

出自《新修本草》。为玄参科多年生草本植物胡黄连 *Picro-rhiza scrophulariaeflora* Pennell 的根茎。主产于我国云南、西藏等地。印度、越南等国也有出产。秋季采挖，除去泥土，晒干，切片。

【别名】割孤露泽，胡连，假黄连，黑连。

【商品名】胡黄连：为玄参科植物胡黄连的根茎。产于我国西藏、云南。印度、越南等国也有出产。以根茎条粗、折断时有粉尘、断面灰黑色、苦味浓者为佳。

西藏胡黄连：又名假黄连。为玄参科植物西藏胡黄连 *Picro-rhiza scrophulariaeflora* Punnell 的根茎。主产于西藏。以根茎粗大、体轻质脆、苦味浓者为佳。

【处方名】胡连，胡黄连。

【性味归经】苦，寒。归心、肝、胃、大肠经。

【功效主治】退虚热，除疳热，清湿热。主治骨蒸潮热，阴虚盗汗，小儿疳积，消化不良，腹胀体瘦，下痢，发热；胃肠湿热泻痢及痔疮肿痛。

【用量】3～10克。

【禁忌】外感风寒发热及脾虚泄泻者忌用。

三、泻 下 药

(一) 攻下药

大 黄

出自《神农本草经》。为蓼科多年生草本植物掌叶大黄（葵叶大黄）*Rheum palmatum* L.及唐古特大黄（鸡爪大黄、香大黄）*R. tanguticum* Maxim. ex Reg.或药用大黄*R. officinale* Baill.的根和根茎。秋末茎叶枯萎时采挖。除去须根，刮去外皮，切成瓣或段，干燥，生用、酒炒、炒炭或制熟用。

【别名】将军，黄良，火参，肤如，峻，川军，锦文，锦纹，锦纹大黄，西吉，蛋吉，片吉，中吉，苏吉，大大黄，北大黄，掌叶大黄，唐古特大黄，药大黄，药用大黄，葵叶大黄，天水大黄，西宁大黄，鸡爪大黄，香大黄，铨水大黄，水根大黄，马蹄大黄，四川大黄，南川大黄，雅黄，块黄，凉黄，马蹄黄，文大黄，庄黄，西庄黄，西中吉，大王，箱军，箱黄，香结，无声虎，破门，西锦纹，川锦纹，刷把头。

【商品名】北大黄：为掌叶大黄和唐古特大黄的根茎。包括西宁大黄和铨水大黄两大类。

南大黄：又名四川大黄、川军、川大黄、马蹄黄、马蹄大黄等名称。为药用大黄的根茎。状如马蹄。

西宁大黄：又名西大黄、西吉。主产于青海、甘肃。可分为蛋吉、片吉、中吉、苏吉四等。蛋吉是指个头匀称，形如鸭蛋者。片吉是指根头部纵切瓣呈片状者。中吉是指根茎叶部的横切段。苏吉

是指尾根部，稍加削光，并具原有的楔状形。多加工成圆锥形或腰鼓形。为北大黄的一种。品质优良，销往全国，并供出口。

凉州大黄：又名凉黄、狗头黄。属西宁大黄的一种。产于甘肃武威（凉州）、永登等地。形如狗头，故而得此名称。

河州大黄：属于西宁大黄的一种。

岷县大黄：属于西宁大黄的一种。

锦纹大黄：属于西宁大黄的一种。产于青海同仁、同德等地。因其外表有黄色至棕红色的弯曲线纹，故有“锦纹”和“锦纹大黄”之称。

天水大黄：属于西宁大黄的一种。产于甘肃天水一带。

铨水大黄：为北大黄的一种。产于甘肃铨水、西礼等地。

文县大黄：又名文大黄。为铨水大黄的一种。产于甘肃文县。

清水大黄：为铨水大黄的一种。产于甘肃清水地区。

庄浪大黄：为铨水大黄的一种。产于甘肃成县。

雅黄：为南大黄的一种。产于四川、云南、贵州等地。

块黄：为南大黄的一种。产地同雅黄。

南川大黄：为南大黄的一种。产于四川盆地南部边缘地区。

西藏大黄：产于西藏者。

水根大黄：为大黄的较细支根及主根尾段，经加工而成。

以上商品均以质坚实、干燥、断面显锦纹、稍有油性、气清香、味苦而微涩者为佳。

【处方名】大黄，西大黄，川大黄，西吉，川军，生大黄，生军，制军，熟军，熟大黄，酒大黄，酒军，黑大黄，大黄炭等。

处方中写大黄、西大黄、川大黄、西吉、川军均指生大黄。又称生军。为原药去杂质，润透切片生用入药者。偏于泻下。

酒大黄又名酒军。为大黄片用黄酒喷淋拌匀，闷润吸尽，再用文火微炒入药者。偏于活血。

熟大黄又名制大黄、熟军、制军。为大黄块用黄酒喷淋拌匀，放瓦罐内密封，再放入锅中隔水炖透，取出晾干入药者。偏于活

血。

黑大黄又名大黄炭。为大黄片放锅内用微火炒，待冒黄烟，大黄片呈棕黑色时，取出晾凉入药者。偏于止血。

【注意】产于新疆地区的新疆大黄 *Rheum wittrockii* Lundstr. 的根茎，在当地也作“大黄”使用，此非大黄正品。另外，还有一种山大黄（又名苦大黄），是同属植物波叶大黄 *R. franzenbachii* Mont. 的根茎，在药材市场上也充当“大黄”入药。此亦非大黄正品。

【性味归经】苦，寒。归胃、大肠、肝、心经。

【功效主治】泻下攻积，清热泻火，解毒，活血祛瘀。主治肠胃积滞，大便秘结，血热妄行引起的吐血衄血；热毒疮疡，烧伤烫伤；妇女瘀血经闭，痛经，产后恶露不下，癥瘕积聚；跌打损伤；湿热黄疸；热淋、血淋。

【用量】3～15克。外用适量。

【慎忌】孕妇及脾虚泄泻者忌用。用作泻下时勿久煎，否则泻下力减。

芒 硝（附：玄明粉）

出自《名医别录》。为含硫酸钠($\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)的天然矿物 Mirabilite 精制而成的结晶体。产于河北、河南、安徽、山东、江苏等省的碱土地区。将天然产品用热水溶解，过滤，放冷析出结晶，通称朴硝或皮硝。再取萝卜洗净切片，置锅内加水与朴硝共煮，取上层液，放冷析出结晶，即芒硝。芒硝经风化失去结晶水而成的白色粉末称玄明粉。

【别名】芒消，盆消，盆硝，马牙硝，毛硝，皮硝，朴硝，英硝，精芒硝，水硝，盐硝，海皮硝，海末，朴硝石，消石朴，硝石朴。

【商品名】芒硝：又名水硝、净芒硝、精芒硝、川芒硝、英硝、

马牙硝等。为棱柱状或长方形结晶状，两端不整齐，无色透明。条长成棱柱形圭角状明净者为马牙硝。状如白石英者为英硝。

朴硝：又名皮硝、毛硝、盐硝、海皮硝、海末、朴硝石、消石朴、硝石朴等。为矿物芒硝加工而得的粗制品。略透明，呈白色小块片粒状，对光可见灰屑等杂质。

土硝：为天然产不纯之芒硝。

玄明粉：又名元明粉、白龙粉、风化硝等。为芒硝经风化失去结晶水而成的白色粉末或纯净条块结晶体。

以上商品以色青白、清洁、透明块状结晶、无杂质者为佳。

【处方名】芒硝，朴硝，英硝，马牙硝等。

【注意】本品因加工不同，有朴硝（皮硝）、芒硝、玄明粉（元明粉）之分。三者功效大致相同，但朴硝含杂质较多，多作外敷用；芒硝质地较纯，可内服；玄明粉质地纯净，且已脱水，便于制成散剂，除内服外，常作口腔病、眼病外用药。部分地区药房配方时，芒硝与玄明粉不分，统配芒硝。

芒硝与火硝不同。火硝别名硝石，为硝酸钾(KNO_3)，是制火药的原料。芒硝为硫酸钠，二者绝对不同，不能混用。

【性味归经】咸、苦，寒。归胃、大肠经。

【功效主治】泻下，软坚，清热。主治实热积滞，大便燥结，咽喉疼痛，口疮，目赤，疮疡等证。

【用量】6～15克。外用适量。

【慎忌】孕妇忌用。体弱者慎用。

附：玄明粉

玄明粉为芒硝经风化失去结晶水而成的无水硫酸钠(Na_2SO_4)，别名元明粉、风化硝、白龙粉。以色白、纯净者为佳。性味咸苦大寒。有泻热通便、润燥软坚的功效。主治大便燥结，实热积滞，外用治疗目赤、口疮、咽喉红肿疼痛、痔疮肿痛等证。用量3～6克。

外用适量。

番 泻 叶

出自《中国药学大辞典》。为豆科草本状小灌木植物狭叶番泻 *Cassia angustifolia* Vahl 和尖叶番泻 *C. acutifolia* Del. 的小叶。通常于 9 月间采收，除去杂质，晒干，生用。

【别名】泻叶，弟兄叶，地熏叶，辛拿叶，泡竹叶，旃那叶，狭叶番泻叶，泻叶茶，通幽，通幽草，尖叶番泻叶，印度番泻叶，埃及番泻叶，丁内未利番泻叶，亚历山大番泻叶。

【商品名】印度番泻叶：又名丁内未利番泻叶。为植物狭叶番泻的干燥小叶。主产于印度。

埃及番泻叶：又名亚历山大番泻叶。为植物尖叶番泻的干燥小叶。主产于埃及。我国海南省及云南省有栽培。

以上商品均以干燥、色绿、叶狭尖而片大完整、枝梗少者为佳。

【处方名】泻叶，番泻叶。

【性味归经】甘、苦，寒。归大肠经。

【功效主治】泻下导滞。主治便秘。

【用量】缓下 1.5~3 克，攻下 5~10 克。用沸水泡服，入汤剂宜后下。

【慎忌】妇女哺乳期、月经期及孕妇忌用。

芦 荟

出自《药性论》。为百合科多年生常绿肉质植物库拉索芦荟 *Aloe vera* L. 及好望角芦荟 *A. ferox* Mill. 的液汁经浓缩而成的干燥物。主产于非洲。我国广东、广西和福建等地亦有栽培。全年可采，割取植物的叶片，收集其流出的液汁，置锅内熬成稠膏，倾入

容器，冷却凝固，备用。常入丸剂用或外用。

【别名】卢会，讷会，象胆，奴会，劳伟，库拉索芦荟，好望角芦荟。

【商品名】老芦荟：又名肝色芦荟。为植物库拉索芦荟的液汁浓缩（用文火熬炼至稠厚时停火，逐渐冷却）而成。表面呈红褐色或深褐色，发暗，遇热不熔化。

新芦荟：又名透明芦荟、好望角芦荟。为植物好望角芦荟的液汁浓缩（用武火熬炼至稠厚时立即停火，迅速冷却）而成。表面呈暗褐色，发绿而有光泽，遇热易熔化。

以上商品均以气味浓烈、溶于水后无杂质及泥沙者为佳。

【处方名】芦荟，老芦荟，新芦荟。

【注意】在药材商品市场上，还有一种斑纹芦荟（又名油葱、象鼻草、象鼻莲、罗帏草、罗帏花、篾草、龙篾草、龙角、乌七）*Aloe vera L. var. chinensis* (Haw.) Berger 的汁液经浓缩而成的干燥物，也作“芦荟”入药，此非芦荟正品。

【性味归经】苦，寒。归肝、大肠经。

【功效主治】泻下，清热，杀虫。主治习惯性便秘及热结便秘；小儿疳积及虫积。

【用量】1～2克。宜入丸散，不入汤剂。外用适量。

【慎忌】孕妇及脾胃虚寒、食少便溏者忌用。

(二) 润下药

火 麻 仁

出自《神农本草经》。为桑科1年生植物大麻 *Cannabis sativa L.* 的成熟果实。全国各地均有栽培。秋季果实成熟后采收，除去杂质，晒干，打碎，生用。

【别名】大麻仁，麻子仁，麻仁，麻子，麻实，大麻子，白麻子，冬麻子，火麻子，汉麻仁，黄麻仁，山丝苗仁，线麻子，线麻仁，黄麻子，汉麻子，冬麻仁，白麻仁。

【商品名】火麻仁，大麻仁。以籽粒饱满、干燥、色白、净仁无杂质者为佳。

【处方名】火麻仁，麻子仁，麻仁，生麻仁，炒麻仁。

处方中写火麻仁、麻子仁、麻仁均指生麻仁。为原药去杂质打碎生用入药者。

炒麻仁又称炒火麻仁。为净麻仁用文火炒至微黄入药者。兼有补虚之功。

【性味归经】甘，平。归脾、大肠经。

【功效主治】润肠通便。主治孕妇及年老体弱者之血虚津枯之便秘。

【用量】10~30克。

郁 李 仁

出自《神农本草经》。为蔷薇科落叶灌木欧李 *Prunus humilis* Bge. 和郁李 *P. japonica* Thunb. 的成熟种子。南北各地均产，主产于河北、辽宁、内蒙古等地，多系野生。秋季果实成熟时采摘，除去果肉，去壳取仁，晒干，去皮，捣碎用。

【别名】郁子，梢，郁仁肉，郁里仁，英梅仁，爵李仁，白棣仁，雀李仁，车下李仁，山李仁，爵梅仁，样藜仁，千金藤仁，秧李仁，穿心梅仁，侧李仁，酸丁仁，乌拉奈仁，欧梨仁，欧李仁，小李仁，李仁，李仁肉，郁李肉。

【商品名】小李仁：又名小郁李仁。为蔷薇科植物欧李和郁李的成熟种子。为郁李仁正品。品质优良。以饱满充实、整齐不碎、淡黄白色、不泛油者为佳。

大李仁：又名大郁李仁。为同属植物山樱桃 *Prunus tomentosa*

sa Thunb. 截形榆叶梅 *P. triloba* Lindl. var. *truncata* Kom. 等的成熟种子。有些地区作“郁李仁”使用。品质较次。非郁李仁正品。

【处方名】 郁李仁，小李仁，李仁，郁李肉，李仁肉，郁李仁肉，生郁李仁，炒郁李仁，朱郁李仁，蜜郁李仁等。

处方中写李仁、小李仁、郁李仁、郁李肉、李仁肉、郁李仁肉等均指生郁李仁。为原药材去皮后的净仁生用打碎入药者。

炒郁李仁为净郁李仁用文火炒至微黄入药者。滑肠功效减低，利水消肿功效增强。

朱郁李仁为净郁李仁用清水淋湿，撒入适量朱砂粉末，拌匀风干入药者。兼有宁心之功。

蜜郁李仁为净郁李仁用蜂蜜拌匀，再用文火炒至不粘手时取出放凉入药者。兼有健脾和胃之功。

【注意】 在药材商品市场上，上述品种叫“小李仁”的是郁李仁的正品。还有一种“大李仁”，又名山樱桃仁、梅桃仁、李仁、毛樱桃仁等，为同属植物山樱桃或截形榆叶梅的成熟种子，性味功用与“小李仁”相同。但习惯上认为大李仁没有小李仁（郁李仁）作用好，多把大李仁作为郁李仁的代用品。

宁夏以鄂李和毛叶欧李的种仁作“郁李仁”入药；内蒙古个别地方将柄扁桃的种仁作“郁李仁”入药；云南个别地区把滇樱桃的种仁作“郁李仁”入药。另外，四川、广西的个别地方，还把食用李和杏李（鸡血李）的种仁作“郁李仁”用。食用李仁和杏李仁与郁李仁性味、功用均不相同，故不应混用。

【性味归经】 辛、苦，平。归大肠、小肠经。

【功效主治】 润肠通便，利水消肿。主治肠燥便秘，水肿腹满，脚气浮肿。

【用量】 6～12克。

(三) 攻下逐水药

甘 遂

出自《神农本草经》。为大戟科多年生草本植物甘遂 *Euphorbia kansui* Linn. 的块根。主产于陕西、山西、河南等地。秋末或春初采挖，撞去外皮，晒干。醋炒，面裹煨熟，或与豆腐同煮，取出晒干用。

【别名】甘泽，重泽，黄甘遂，京甘遂，九头狮子草，肿手花根，猫儿眼根，化骨丹，萱根子，主田，苦泽，陵薰，甘薰，鬼丑，陵泽，随阳给事中。

【商品名】甘遂。以块根肥大、粉性足、色白、纤维少者为佳。

【处方名】甘遂，漂甘遂，生甘遂，制甘遂，煮甘遂，醋甘遂，煅甘遂等。

处方中写甘遂、漂甘遂指生甘遂。为原药去杂质在清水中反复浸漂，捞出切片晒干入药者。

制甘遂又名煮甘遂。为漂甘遂与豆腐同煮至无白心时捞出，晒干切片入药者。毒性减小，药效增强。

醋甘遂为漂甘遂片用米醋拌匀，稍闷，待醋吸干，再用文火炒至深黄色入药者。毒性减小。

煅甘遂为漂甘遂片用麦麸炒至深黄色取出晾凉入药者。

【注意】本品别名猫儿眼根，同属植物猫眼草 *Euphorbia lunulata* Bge. 的别名亦称猫儿眼。二者极易混淆，应注意分辨鉴别。

本品和大戟都有“九头狮子草”之别名，极易混淆。亦应注意分辨，以防弄错。

【性味归经】苦、甘，寒。有毒。归肺、肾、大肠经。

【功效主治】 泻水逐饮，消肿散结。主治身面浮肿，腹水及胸胁积液；重型肠梗阻；风痰癫痫；外用治痈肿疮疡。

【用量】 0.5~1克，入丸散剂服。外用适量。

【慎忌】 孕妇及体虚者忌用。反甘草。

芫 花

出自《神农本草经》。为瑞香科落叶灌木植物芫花（紫芫花）*Daphne genkwa* Sieb. et Zucc. 的花蕾或河朔芫花（黄芫花、北芫花）*Wikstroemia chamaedaphne* Meissn. 的花蕾。前者主产于安徽、江苏、山东、浙江、四川等地。后者主产于山西、陕西、河北和东北等地。春季花蕾绽出尚未开放前采摘，晒干或烘干。醋炒或醋蒸，晒干备用。

【别名】老鼠花，头痛花，药鱼花，癞头花，棉花条，芫条花，银腰带，金腰带，黄阳花，野丁香花，黄芫花，河朔芫花，黄闷头花，毒鱼草，闷头花，南芫花，芫花，紫芫花，鼠尾花，去水花，赤芫花，儿草花，闹鱼花，大米花，芫条花，九龙花，浮胀草花，地棉花，小叶金腰带花，南芫花，败花，败华，北芫花，杜芫，陈芫花。

【商品名】 紫芫花：又名南芫花。为瑞香科植物芫花的干燥花蕾。主产于安徽、江苏、山东、浙江、四川等地。

黄芫花：又名北芫花。为同科植物河朔芫花的干燥花蕾。主产于山西、陕西、河北和东北等地。

以上商品均以花蕾多而整齐、干燥、色淡紫、无杂质者为佳。

【处方名】 芫花，醋芫花。

处方中写芫花指生芫花。为原药去杂质生用入药者。

醋芫花为净芫花用米醋拌匀，再用文火炒干（或蒸后晒干）入药者。毒性减小。

【性味归经】 辛、苦，温。有毒。归肺、肾、大肠经。

【功效主治】泻水逐饮，祛痰止咳，外用杀虫疗疮。主治身面浮肿，腹水及胸水；外用治疗头疮、白秃、顽癣。

【用量】1.5~3克。散剂每次0.6克。外用适量。

【慎忌】孕妇及体虚者忌用。反甘草。

巴豆

出自《神农本草经》。为大戟科乔木植物巴豆*Croton tiglium* L.的成熟种子。多系栽培。产于四川、云南、贵州、广西等地。秋季种子成熟，果皮尚未开裂时采摘，破开果壳，取出种子。用仁或制霜用。

【别名】江子，刚子，日刚子，川江子，肥鼠子，巴果，双眼龙，猛子仁，毒鱼子，川巴，銮豆，红子仁，贡仔，八百力，芒子，巴菽，老阳子，巴米，双眼虾，豆贡，大叶双眼龙，巴仁，川巴豆，大巴豆，肥江子，豆贡，草兵。

【商品名】川巴豆：为四川产者。一般认为品质最优。

巴豆：各地所产巴豆的统称。以籽粒饱满、干燥、胚乳黄白色、不泛油者为佳。

【处方名】巴豆，巴豆仁，巴豆肉，大巴豆，肥江子，生巴豆，巴豆霜，炒巴豆仁。

处方中写巴豆、大巴豆、肥江子、巴豆仁、巴豆肉均指炒巴豆仁。为原药用粘稠米汤浸拌，置阳光下曝晒去皮，取净仁炒至焦黑入药者。毒性减小。

生巴豆为净巴豆仁生用入药者。有大毒，多外用。

巴豆霜为生巴豆仁碾碎，用多层草纸包裹，压去油，然后研细过筛入药者。

【性味归经】辛，热。有大毒。归肺、胃、大肠经。

【功效主治】泻下冷积，逐水退肿，祛痰利咽。主治寒邪食积，阻结肠道，突然腹满胀痛，大便不通，甚至气急暴厥者；腹

水，喉痹，痰涎壅塞气道，呼吸急促，甚至窒息欲死者。外用治疗疮痈脓成未溃及疥癣恶疮等证。

【用量】 内服0.1~0.3克，多入丸散。外用适量。

【慎忌】 孕妇及体弱者忌用。畏牵牛。

大 戟

出自《神农本草经》。为大戟科多年生草本植物大戟*Euphorbia pekinensis* Rupr.或茜草科多年生草本植物红芽大戟*Knoxia valerianoides* Thorel的根。前者称京大戟，后者称红大戟。于秋末茎叶枯萎时或春季发芽前采挖。除去残茎及须根，洗净，晒干。醋制或同豆腐一起煮过，晒干用。

【别名】 大吉，京大戟，京大吉，红大戟，红大吉，红芽戟，红芽大戟，下马仙，龙虎草，天平一枝香，草大戟，腹水草，将军草，震天雷，莽根，邛巨，九头狮子草，追水龙，大猫儿眼，黄花大戟，黄芽大戟，千层塔，搜山虎，穿山虎，一盘棋，紫大戟，红牙大戟，膨胀草，土人参，红心薯。

【商品名】 京大戟：又名草大戟。为大戟科植物大戟的根。主产于江苏。此外，四川、江西、广西等地亦产。以根条粗壮、断面色白者为佳。

红大戟：又名南大戟、红牙大戟、红芽大戟、红毛大戟、紫大戟、红芽戟。为茜草科植物红芽大戟的根。主产于广西、广东、云南、贵州等地。以根条粗长、质坚实、断面皮部红褐色者为佳。

【处方名】 大戟，大吉，京大戟，红大戟，醋大戟，煨大戟。

处方中写大戟、大吉、京大戟、红大戟等均指生大戟。为原药去杂质，洗净，润切晒干入药者。有毒，用量宜小。

醋大戟为大戟片用醋拌匀，至醋吸尽，再用文火炒干入药者。毒性减小。

煨大戟为大戟片用麸炒至深黄色时取出晾凉入药者。减缓毒

性。

【注意】传统所用的大戟，主要为京大戟。而茜草科红芽大戟，为目前药材市场中使用最广的一种。这两个品种均有逐水作用。但京大戟的逐水作用较红大戟强，而消肿解毒多用红大戟。

药材商品市场上还有一种绵大戟，又名北方绵大戟、棉大戟。为瑞香科植物瑞香狼毒*Stellera chamaejasme* L.的根，其功用与大戟不同，不能混作大戟使用，应引起注意。

本品和甘遂都有“九头狮子草”同一个别名，极易混淆，应避免使用这一别名，以免出现差误。

【性味归经】苦、辛，寒。有毒。归肺、肾、大肠经。

【功效主治】泻水逐饮，消肿散结。主治身面浮肿，腹水，胸胁积液；热毒痈肿疮疡；痰火瘰疬痰核。

【用量】1.5~3克。散剂每次1克。

【禁忌】孕妇及体虚者忌用。反甘草。

牵牛子

出自《名医别录》。为旋花科1年生攀援草本植物裂叶牵牛 *Pharbitis nil* (L.) Cnoisy 或圆叶牵牛 *P. purpurea* (L.) Voigt 的成熟种子。表面灰黑色者称黑丑，表面呈淡黄色者称白丑。黑丑和白丑功效相同，同等使用。全国大部分地区均产。秋季果实成熟时采摘，晒干，打下种子，除去杂质，生用或炒用。

【别名】黑丑，白丑，二丑，黑白丑，牵牛，黑牵牛，白牵牛，黑牵牛子，白牵牛子，江粱子，喇叭花子，丑牛，丑牛子，草金铃，金铃，盆甄草子，狗耳草子，牵牛花子，勤娘子，姜花子，裂叶牵牛子，圆叶牵牛子，打碗花子，江良棵子，常春藤叶牵牛子，牵牛仁，假君子。

【商品名】黑丑：又名黑牵牛、黑牵牛子。为种子表面颜色灰黑色者。

白丑：又名白牵牛、白牵牛子。为种子表面颜色浅黄色者。

二丑：又名黑白丑、牵牛子。为黑丑和白丑的混合品。

以上商品均以籽粒大而饱满、干燥、无杂质者为佳。

【处方名】二丑，黑白丑，牵牛子，炒二丑，黑丑，白丑。

处方中写二丑、黑白丑、牵牛子、黑丑、白丑等均指生牵牛子。为原药去杂质生用捣碎入药者。

炒二丑又名炒牵牛子。为净牵牛子用文火炒至微黄捣碎入药者。减缓毒性，增强消积功效。

【性味归经】苦，寒。有毒。归肺、肾、大肠经。

【功效主治】泻下，逐水，消积，杀虫。主治水饮停蓄，水肿腹胀，肠胃湿热积滞，大便秘结；虫积腹痛。

【用量】3~10克。入丸散每次1.5~3克。

【慎忌】孕妇及脾虚水肿忌用。

商 陆

出自《神农本草经》。为商陆科多年生草本植物商陆 *Phytolacca acinosa* Roxb. 的根。我国大部分地区均产。主产于安徽、河南、江苏、湖北等地。秋末或春初采挖，除去须根和泥土，切成片或块，晒干，备用。

【别名】花商陆，白母鸡，白章陆，张果老，张国老，长不老，见肿消，章柳根，牛大黄，地萝卜，山萝卜，金七娘，土冬瓜，抱母鸡，土母鸡，莪羊菜根，鹅羊菜根，募根，夜呼，当陆，苋陆，白菖，白昌，水萝卜、湿萝卜，牛萝卜，野萝卜，抓肿消，春牛头，下山虎，苋菜蓝，肥猪菜根，狗头三七，蘧蕷根，马尾根，常蓼根，蕷根，莉根，章蔴根，菩柳根，大苋菜根，湿苋菜根，山包谷根，红苋菜根，金鸡姆，猪姆耳根，商六，野胭脂。

【商品名】商陆，花商陆。以片大、干燥、色黄白、有罗盘纹及筋脉者为佳。

【处方名】商陆，生商陆，醋商陆。

处方中写商陆指生商陆。为原药除去杂质和泥土，切成块或片，晒干生用入药者。

醋商陆又名炙商陆、炒商陆。为商陆片用米醋拌匀，使醋吸尽，置锅内用文火炒至深黄色，略见焦斑时取出晾凉入药者。可使其毒性减小。

【注意】目前在药材商品市场上，商陆的品种比较混乱，江西、山东、浙江的一些地方，把同属植物垂序商陆（美商陆、洋商陆）*Phytolacca americana* L.的根作“商陆”使用。此非商陆正品。

广东地区曾用姜科植物闭鞘姜（樟柳头）*Costus speciosus* (Koenig) Smith的根茎作“商陆”用。辽宁、内蒙古、山西、湖北等地的一些地区，把石竹科植物丝石竹*Gypsophila oldhamiana* Miq.的根作“商陆”使用。黑龙江省的一些地区，把石竹科植物北丝石竹*G. dahurica* Turcz. 的根作“商陆”使用。广西个别地区将旋花科植物藤商陆（七爪龙）的根*Ipomoea digitata* L. 的根作“商陆”使用。四川的一些地区把野牡丹科植物野牡丹*Melastoma candidum* D. Don 和朝天罐*Osbeckia crinita* Benth. ex C. B. Clarke的根作“商陆”使用。这些均属于误用，都是错误的，都应该纠正。

【性味归经】苦，寒。有毒。归肺、肾、大肠经。

【功效主治】泻下利水，消肿散结。主治水肿胀满，大便秘结，小便不利；外用治疗痈肿。

【用量】4～10克。外用适量。

【禁忌】孕妇及脾虚水肿忌用。

千 金 子

出自《开宝本草》。为大戟科2年生草本植物续随子*Euphorbia*

lathyrus L. 的成熟种子。主产于河北、河南、浙江、安徽等地。夏秋间果实成熟时割取地上部分，晒干，打下种子，再晒干，除去杂质。用时去壳取仁，碾碎，置蒸器内蒸透，用吸油纸包裹压去油，即成续随子霜。取霜使用。

【别名】续随子，打鼓子，小巴豆，一把伞，看园老，千两金，菩萨豆，联步，滩板敷，拒冬子，半枝莲子，千层楼子，铁蜈蚣子。

【商品名】千金子，续随子。以籽粒饱满、干燥、种仁色白、油性足者为佳。

【处方品】千金子，续随子，千金子霜，续随子霜。

处方中写千金子、续随子指生千金子仁。为原药去壳取仁生用入药者。毒性大，多外用。

千金子霜又称续随子霜。为千金子仁碾碎蒸透，再用吸油纸包裹压去油，最后研面入药者。毒性减小，可供内服。

【注意】本品别名小巴豆，易与巴豆名称相混，使用时应注意分辨和鉴别。

【性味归经】辛，温。有毒。归肝、肾、大肠经。

【功效主治】逐水退肿，破血消癥。主治水肿腹满，二便不利，瘀滞癥瘕、经闭；外用可治顽癣、疣赘及毒蛇咬伤。

【用量】1～2克。制霜入丸散用。外用适量。

【慎忌】孕妇及体虚者忌用。

乌 柏 木 根 皮

出自《新修本草》。为大戟科植物乌桕 *Sapium sebiferum* (L.) Roxb. 的去掉栓皮的根皮或茎皮。主产于山东、安徽、江苏、陕西、浙江、江西、福建、台湾、河南、广东、广西、四川、贵州、云南等地。四季可采，切片，晒干。

【别名】乌柏，鸦柏，乌臼，卷根白皮，卷根皮，卷子根，乌

柏根皮，乌柏皮，鸦柏根皮，乌柏木皮，木子树根皮，木子树皮，琼树皮，琼树根皮，蜡子树皮，蜡子树根皮，虹模皮，虹模根皮，血血木皮，血血木根皮，柏子树皮，柏子树根皮，虹树皮，虹树根皮，棬子树皮，棬子树根皮，柏树皮，柏树根皮，木蜡树皮，木蜡树根皮，木油树皮，木油树根皮，木梓树皮，木梓树根皮，蜡烛树皮，蜡烛树根皮。

【商品名】 乌柏木皮，乌柏根皮，乌柏木根皮，乌柏根白皮。以条长整齐、色白、肉厚、干燥者为佳。

【处方名】 乌柏皮，乌柏根皮。

【性味归经】 苦，温。有毒。归肺、脾、肾经。

【功效主治】 利水消肿，疗疮解毒。主治水肿，小便涩少，晚期血吸虫病所致之腹水；毒蛇咬伤；外用治疗疔疮、湿疮、疥癣、鸡眼、乳腺炎、跌打损伤等。

【用量】 6～10克。鲜品10～20克。外用适量。

【禁忌】 孕妇及体虚者忌服。

狼 毒

出自《神农本草经》。为瑞香科植物瑞香狼毒 *Stellera chamaejasme* L. 或大戟科植物狼毒大戟 *Euphorbia fischeriana* Steud. 和月腺大戟 *E. ebiacteolata* Hayata 的根。秋末至春初采挖，去除茎叶，洗净泥沙，晒干，切片。

【别名】 川狼毒，续毒，达冷图如（蒙古族名），热加巴（藏族名），瑞香狼毒，狼毒大戟，月腺大戟，断肠草，打碗花，山丹花，闷头花，一把香。

【商品名】 红狼毒：又名狼毒、瑞香狼毒、绵大戟、山萝卜、大将军、西北狼毒。为植物瑞香狼毒的根。主产于山西、河南、内蒙古、甘肃、青海、陕西、四川等地。为狼毒正品。

白狼毒：又名东北狼毒、猫眼花狼毒、猫眼根狼毒、猫儿眼草

根、猫眼花根、猫眼根。为植物狼毒大戟和月腺大戟的根。前者主产于辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古和河北等地；后者主产于河南、山东、安徽、江苏、湖北等地。为狼毒副品。但为目前多数地区所使用。

以上商品均以根条肥壮、干燥、整齐、质轻、有粉性者为佳。

【处方名】狼毒，生狼毒，醋狼毒等。

处方中写狼毒指生狼毒。为原药去杂质，润切生用入药者。

醋狼毒为生狼毒片用米醋拌匀，待吸尽，用文火炒黄入药者。毒性减低。

【注意】在药材商品市场上，除上述品种外，下列植物的根在不同地区亦作狼毒入药，但非正品。

大戟科植物土瓜狼毒 *Euphorbia pinus* Lev. 使用于云南地区。

大戟科植物大狼毒 *E. nematocypha* Hand.-Mazz. 使用于云南地区。

大戟科植物小狼毒 *E. proliifera* Buch.-Ham. 使用于云南地区。

天南星科植物海芋（痕芋头） *Alocasia odora* (Roxb.) C. Koch 俗称广狼毒或土狼毒。使用于广东地区。

【性味归经】辛、苦，平。有毒。归肺、大肠经。

【功效主治】逐水，散结，止痛，祛痰，杀虫。主治水肿腹胀，痰、食、虫积，心腹疼痛，慢性支气管炎，咳嗽，气喘，淋巴结结核及骨结核、副睾结核等。外用治疗疥癣、痔瘘。

【用量】内服 1～3 克。外用适量。

【禁忌】孕妇及体弱者忌服。畏密陀僧。

四、祛 风 湿 药

独 活

出自《神农本草经》。为伞形科多年生草本植物重齿毛当归 *Angelica pubescens* Maxim. f. *biserrata* Shan et Yuan 的根。主产于湖北、四川等地。秋末至春初采挖，除去须根及泥土，烘至半干，堆置2~3天，发软后，再烘至全干。切片生用。

【别名】大活，一活，香独活，独摇草，肉独活，绩独活，川独活，独滑，长生草，重齿毛当归，紫独活。

【商品名】资丘独活：又名肉独活、川独活、巴东独活。为植物重齿毛当归的根及根茎。主产于湖北资丘、恩施、巴东及四川巫山、巫溪等地。品质优良。为独活正品。以根条粗壮、干燥、气香浓者为佳。

绩独活：又名浙独活、香独活。为植物毛当归 *Angelica pubescens* Maxim. 的干燥根茎及根。主产于安徽、浙江等地。

香大活：为植物兴安白芷 *Angelica dahurica* (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. ex Franch. et Sav. 的干燥根茎及根。主产于我国东北黑龙江、吉林、辽宁地区。

紫茎独活：又名紫独活。为植物紫茎独活 *Angelica porphyrocaulis* Nakai et kitag. 的干燥根茎及根。主产于河北。

牛尾独活：又名西大活。为植物牛尾独活 *Heracleum hemsleyanum* Diels 的干燥根茎及根。主产于四川。

山独活：为植物软毛独活 *Heracleum lanatum* Michx. 的干燥根茎及根，主产于四川、陕西等地。

九眼独活：为植物食用楤木 *Aralia cordata* Thunb. 的干燥根茎及根。主产于四川。

短茎独活：为植物短茎独活 *Angelica breuicaulis* L. 的干燥根茎及根。主产于新疆。

白根独活：为植物白根独活 *A. polyclada* Franch. 的根。主产于四川、陕西。

永宁独活：为植物永宁独活 *Heracleum yungningense* Hand.-Mazz. 的根。主产于陕西、四川。

白亮独活：又名白独活。为植物白亮独活 *H. candicans* Wall. ex DC. 的根。主产于四川、云南、西藏等地。

浓紫龙眼独活：为植物浓紫龙眼独活 *Aralia atropurpurea* Franch. 的根。主产于西藏。

小叶龙眼独活：又名九眼独活。为植物小叶龙眼独活 *A. henrui* Harms 的根。主产于云南、贵州、四川。

独活品种甚多，除资丘独活为正品外，其余品种均非正品，品质较次。

【处方名】 独活，大活，川独活，香独活。

【注意】 在《神农本草经》中，羌活与独活不分，说是独活一名羌活。至唐代甄权的《药性论》中才分开。阅读古文献时应注意。

【性味归经】 辛、苦，温。归肝、肾、膀胱经。

【功效主治】 祛风湿，止痛，解表。主治风湿痹痛，风寒表证兼有湿邪者，少阴头痛，皮肤湿痒。

【用量】 6～10克。

威灵仙

出自《新修本草》。为毛茛科植物威灵仙 *Clematis chinensis* Osbeck 的根及根茎。主产于安徽、江苏、浙江等地。秋季采挖，除

去泥沙，晒干，生用。

【别名】灵仙，铁脚威灵仙，铁丝灵仙，铁杆威灵仙，铁灵仙，华中威灵仙，杜灵仙，软灵仙，土灵仙，黑尾，黑薇，老虎须，铁扫帚，铁线根，铁丝根，能消，葳灵仙，葳苓仙，黑脚威灵仙，九草阶，风车，鲜须苗，黑骨头，黑木通，铁擦帚，七寸风，铁脚灵仙，牛闲草，牛杆草，辣椒藤，灵仙藤，黑灵仙，黑须公，芝查藤根，绵团铁线莲，东北铁线莲，灵仙根，赤茎威灵仙，百条根，寿祖，黑茜，药王草。

【商品名】威灵仙：又名粉灵仙。为毛茛科植物威灵仙的根及根茎。主产于安徽、江苏、河南、浙江等地。品质优良，为威灵仙之正品，销全国并出口。

棉团铁线莲：又名绵团铁线莲、山蓼、黑薇。为同属植物棉团铁线莲*Clematis hexapetala* Pall. 的根及根茎。在东北、华北、山东、江苏等地作“威灵仙”使用。

东北铁线莲：为同属植物东北铁线莲*C. manshurica* Rupr. 的根及根茎。在东北地区作“威灵仙”使用。

铁灵仙：又名铁丝根。为棉团铁线莲或东北铁线莲的根的统称。

小木通：为同属植物小木通*C. armandi* Franch. 的根及根茎。在湖南、云南、广西、浙江等地作“威灵仙”使用。

柱果铁线莲：又名老虎师藤。为同属植物柱果铁线莲*C. uncinata* Champ. ex Benth. 的根及根茎。在四川、广东、广西、贵州、江西、福建、浙江等地作“威灵仙”使用。

毛柱铁线莲：为同属植物毛柱铁线莲*C. meyeniana* Walp. 的根及根茎。在广西、福建、湖南等地作“威灵仙”使用。

单叶铁线莲：为同属植物单叶铁线莲*C. henryi* Oliv. 的根及根茎。在广西、江西、浙江、安徽的个别地区作“威灵仙”使用。

山木通：为同属植物山木通*C. finetiana* Lévl. et Vant. 的根及根茎。在广西、江西、浙江、安徽的个别地方作“威灵仙”使

用。

黄药子：为同属植物黄药子 *C. paniculata* Thunb. 的根及根茎。在江苏、浙江的某些地方作“威灵仙”入药。

以上商品以根粗大、均匀、干燥、断面灰白色、质坚实者为佳。

【处方名】 威灵仙，灵仙，铁灵仙，酒灵仙，炒灵仙，酒炒灵仙等。

处方中写灵仙、威灵仙、铁灵仙均指生威灵仙。为原药去杂质，切片生用入药者。

炒灵仙为净威灵仙片用微火炒至黄色，略带焦斑入药者。

酒灵仙即酒炒灵仙。为净灵仙片用黄酒喷淋，待吸尽，再用文火炒至微黄入药者。

【注意】 目前在药材商品市场上，威灵仙的品种比较混乱。除上面提到的品种外，京、津及河北、山东等地还将百合科植物华东菝葜（粘鱼须） *Smilax Sieboldii* Miq. 的根作“威灵仙”使用。云南的一些地区将菊科植物显脉旋复花（草威灵） *Inula nervosa* Wall. 的根作“威灵仙”使用。四川、广西的一些地区，将金粟兰科植物肿节风（草珊瑚）的根作“威灵仙”使用。以上这些品种，仅毛茛科植物威灵仙的干燥根及根茎为威灵仙正品，品质较优，销售面广；其余品种均非正品，仅在少数地区销售。

【性味归经】 辛、咸，温。归膀胱经。

【功效主治】 祛风湿，通经络，止痹痛，疗骨鲠。主治风湿痹痛，骨鲠，噎膈，痞积。

【用量】 6～10克。治骨鲠可用30克。

【慎忌】 体弱者慎服。

防 己

出自《神农本草经》。为防己科多年生木质藤本植物粉防己

Stephania tetrandra S. Moore或马兜铃科多年生缠绕草本植物广防己*Aristolochia fangchi* Wu的根。均于秋季采挖，洗净，除去粗皮，晒至半干，切段，个大者再纵切、干燥。切片生用。

【别名】汉防己，木防己，小防己，粉防己，广防己，粉寸己，金线钩葫芦根、独脚蟾蜍根、白木香，倒地拱，土防己、石蟾蜍，蟾蜍薯、猪大肠，防杞、汉中防己，解离，载君行，石解，山乌龟，金丝吊罄，防己马兜铃，青藤香，小青藤根，白山番薯，青檀香，青风藤根，小葛藤根，异叶马兜铃根，苦防己。

【商品名】汉防己：又名粉防己。为植物粉防己的根。主产于安徽、浙江、江西等地。因药材集散于汉口而得名。品质优良，销全国并出口。

木防己：又名广防己、藤防己、水防己、百解头、防己马兜铃。为植物广防己的根。主产于广东、广西等地。有些地方用防己科植物木防己*Cocculus trilobus* (Thunb.) DC.的根作“木防己”使用。后者产于河南、安徽、陕西、山东、江苏、浙江、湖北、四川、贵州、广东、福建等地。

汉中防己：为植物异叶马兜铃*Aristolochia heterophylla* Hemsl.的根。主产于陕西、甘肃、四川、贵州等地。品质较差。

以上商品以根粗大均匀、干燥、质坚实、粉性大者为佳。

【处方名】防己，汉防己，粉防己，广防己，炒防己。

【注意】在目前药材商品市场上，防己的品种比较混乱。汉防己和广防己为正品，品质较优，销售面较广。其余品种均非正品。

【性味归经】苦、辛，寒。归膀胱、肾、脾经。

【功效主治】祛风湿，止痛，利水。主治风湿痹痛，水肿，腹水，脚气浮肿。一般认为汉防己利水消肿作用较强，木防己祛风止痛作用较好。

【用量】5～10克。

【慎忌】胃气弱者慎服。阴虚无湿热者忌服。

秦 芫

出自《神农本草经》。为龙胆科多年生草本植物 秦艽 *Gentiana macrophylla* Pall.、麻花秦艽 *G. straminea* Maxim.、粗茎秦艽 *G. crassicaulis* Duthie ex Burk. 或小秦艽 *G. dahurica* Fisch. 的根。主产于甘肃、陕西、内蒙古、四川等地。秋末或春初采挖，除去泥沙，晒干，切片生用。

【别名】人艽，小秦艽，麻花秦艽，麻花艽，粗茎秦艽，西大艽，山大艽，秦胶，秦纠，左扭，左拧，左拧根，左秦艽，大艽，西秦艽，萝卜艽，辫子艽，山秦艽，狗秦艽，狗尾艽，川秦艽，鸡腿艽，秦爪，人交，纹秦艽。

【商品名】西秦艽：又名西大艽、鸡腿艽、大叶秦艽。为植物秦艽的干燥根。形似鸡腿状，故有“鸡腿艽”之名。主产于山西、甘肃、内蒙古等地。

川秦艽：又名云秦艽、萝卜艽、粗茎秦艽。为植物粗茎秦艽的干燥根。形似萝卜状，故有“萝卜艽”之名。主产于四川、云南、西藏等地。

麻花艽：又名津秦艽、辫子艽、麻花秦艽。为植物麻花秦艽的干燥根。常由数个根交错缠绕在一起，呈麻花状，故有“麻花艽”之名。主产于河北、陕西等地。

小秦艽：又名山秦艽、狗尾艽、狗秦艽。为植物小秦艽的干燥根。细小而多分枝，故有“小秦艽”之名。主产于河北、山西等地。

大秦艽：又名大艽。药材中习惯将西秦艽和川秦艽统称为“大秦艽”。

以上商品均以根粗壮、干燥、质坚实、色棕黄、气味浓者为佳。

【处方名】秦艽，人艽，大艽，酒秦艽，炒秦艽。

处方中写秦艽、人艽、大艽均指生秦艽。为原药去杂质，切片生用入药者。

炒秦艽为秦艽片用文火炒至黄色，略带焦斑入药者。

酒秦艽又名酒炒秦艽。为秦艽片用黄酒淋洒，稍闷，待吸干，再用文火微炒入药者。

【注意】本品市售商品除上述品种外，还有同属植物西藏秦艽 *Gentiana tibetica* King、管花秦艽 *G. siphonantha* Maxim. ex Kusnez.、北方秦艽 *G. walujewii* Reg. et Schmalh.、狭翅秦艽 *G. kaufmanniana* Reg. et Schmalh.、天山秦艽 *G. tianschanica* Ru. Pr.等的根，也作“秦艽”使用。这些品种虽然不是秦艽的正品，但功效相似，可以替代。然而内蒙古产的一种所谓“大艽”或“黑大艽”的药材，不是龙胆科秦艽，而是毛茛科乌头属植物草地乌头 *Aconitum umbrosum*(Korsh.) Komar. 和马尾大艽 *A. sibiricum* Poir.的根，有毒，不可混作“秦艽”使用。另外，还有一种黄秦艽，是龙胆科植物滇黄芩 *Veratrilla baillonii* Franch. 的根，功效与秦艽不同，也不可混作秦艽使用。应引起注意。

【性味归经】苦、辛，微寒。归胃、肝、胆经。

【功效主治】祛风湿，舒筋络，清虚热。主治风湿痹痛，周身或关节拘挛，手足不遂；骨蒸潮热；湿热黄疸等。

【用量】10~15克。

豨 荟 草

出自《新修本草》。为菊科1年生草本植物 豚莶 *Siegesbeckia orientalis* L. 或腺梗豨莶 *S. pubescens* Mak. 或毛梗豨莶(少毛豨莶) *S. glabrescens* Mak. 的地上部分。我国大部分地区均有分布。主产于湖南、湖北、江苏等地。夏秋季节花期或花开之前采割，除去杂质，晒干。切碎生用，或加黄酒蒸制用。

【别名】豨莶，希仙，豨莶草，粘糊草，粘糊菜，热沾粘，腺

梗豨莶，毛梗豨莶，肥猪苗，肥猪菜，粘苍子，黄花仔，粘不扎，感冒草，猪膏莓，虾钳草，风湿草，四棱麻，大叶草，少毛豨莶，火莶，虎膏，狗膏，火欓草，猪膏草，虎莶，黄猪母，母猪油，亚婆针，黄花草，猪母菜，棉苍狼，粘强子，棉黍棵，铜锤草，土伏虱，金耳钩，有骨消，猪冠麻叶，大接骨，老奶奶补补丁，野芝麻，毛擦拉子，珠草，老陈婆，油草子，老前婆，野向日葵，牛人参，绿豨莶，绿莶草。

【商品名】豨莶，豨莶草。以枝嫩叶多、肥壮、干燥、色绿、无杂质者为佳。

【处方名】豨莶，豨莶草，酒制豨莶草，制豨莶草等。

处方中写豨莶、豨莶草指生豨莶草。为原药材除去杂质，切碎生用入药者。

酒制豨莶草又称制豨莶草。为净豨莶草用黄酒淋洒拌匀，放笼内蒸2小时，取出晾七八成干，再蒸至深棕色，晾干入药者。

【注意】目前豨莶草的市售商品品种比较混乱，广西、广东的个别地区，将唇形科植物广防风（穗草、落马衣、防风草）*Ebimexedi indica* (L.) Rothm. 作“豨莶草”使用；北京地区有些地方将菊科植物刺针草*Bidens bipinnata* L. 或细叶刺针草*B. parviflora* Willd. 和狼把草*B. tripartita* L. 作“豨莶草”使用；云南的一些地方将唇形科植物糙苏（香苏）*Phlomis umbrosa* Turcz. 作“豨莶草”使用。以上这些药材均与豨莶草功效不同，不能混用，应注意鉴别。

【性味归经】苦，寒。归肝、肾经。

【功效主治】祛风湿，通经络，清热解毒。主治风湿痹证，骨节疼痛，四肢麻木，脚弱无力，中风手足不遂；痈肿疮毒，湿疹瘙痒；高血压病。

【用量】10~15克。

臭梧桐

出自《本草图经》。为马鞭草科落叶灌木或小乔木海州常山 *Clerodendron trichotomum* Thunb. 的嫩枝及叶。主产于安徽、江苏等地。夏季结果前采收，晒干，生用。

【别名】海州常山，八角梧桐，八角梧桐叶，楸叶常山，山梧桐，臭桐柴，楸茶叶，后庭花，海桐，臭桐，臭芙蓉，地梧桐，秋叶，凤眼子，泡花桐，矮桐子，岩桐子，臭梧桐叶。

【商品名】臭梧桐，臭梧桐叶。以枝嫩叶肥、干燥、色绿、无杂质者为佳。

【处方名】臭梧桐，臭梧桐叶，八角梧桐叶。

【性味归经】辛、苦、甘，凉。归肝经。

【功效主治】祛风湿。主治风湿痹痛，肢体麻木，半身不遂，高血压病。外用煎洗可治湿疹。

【用量】10~15克。外用适量。

木瓜

出自《名医别录》。为蔷薇科落叶灌木贴梗海棠 *Chaenomeles lagenaria* (Loisel.) Koidz. 和木瓜（榅桲）*C. sinensis* (Thouin) Koehne 的成熟果实。主产于安徽、浙江、湖北、四川等地。夏秋果实绿黄时采摘。剖开晒干，切片生用。

【别名】楙，木瓜实，铁脚梨，宣木瓜，皱皮木瓜，光皮木瓜，贴梗海棠，榅桲，木李，川木瓜，云木瓜，山木瓜，光木瓜，干木瓜，木瓜干，木瓜片，陈木瓜，榅桲，蛮楂，蠶楂。

【商品名】皱皮木瓜：为植物贴梗海棠的成熟果实。主产于安徽、浙江、湖北等地。

光皮木瓜：又名光木瓜、木瓜、木李、土木瓜、榅桲、蛮楂、

模楂、瘤楂。为植物模楂的成熟果实。主产于山东、云南等地。

宣木瓜：又名宣州木瓜。为产于安徽宣城者。品质最优，销往全国，并供出口。属于皱皮木瓜。

川木瓜：又名花木瓜。产于安徽、四川、浙江等地者。品质亦优，销全国。属于皱皮木瓜。

资木瓜：产于湖北资邱者。品质亦佳。销往全国。属于皱皮木瓜。

山木瓜：产于山东、湖北、湖南者。

云木瓜：产于云南、贵州、西藏者。

以上商品以外皮抽皱、色紫红、质坚实、味酸香浓者为佳。

【处方名】木瓜，宣木瓜，炒木瓜等。

处方中写木瓜、宣木瓜指生木瓜。为原药材剖开晒干，切片生用入药者。

炒木瓜为木瓜片用文火炒至略见焦斑时取出，摊晾后入药者。偏于和胃化湿。

【注意】在药材商品市场上，同属植物木桃 *C. lagenaria* (Loisel.) Koidz. var. *cathayensis* Rehd. 的果实在贵州、福建、陕西的一些地方作“木瓜”使用；同属植物木瓜海棠 *C. lagenaria* (Loisel.) Koidz. var. *wilsonii* Rehd. 的果实在甘肃作“木瓜”使用；同属植物西藏木瓜 *C. thibetica* Yu 的果实在西藏作“木瓜”使用。以上这些药材均非木瓜正品。

【性味归经】酸，温。归肝、脾经。

【功效主治】舒筋活络，化湿和胃。主治风湿痹痛，筋脉拘挛，脚气肿痛；吐泻转筋，消化不良等。

【用量】 6～15克。

徐 长 卿

出自《神农本草经》。为萝藦科多年生草本 植物徐长卿 *Cyn-*

nchum paniculatum (Bge.) Kitag.的根及根茎。主产于安徽、江苏、河北、湖南等地。秋季采挖，洗净泥沙，阴干，切碎生用。

【别名】寮刁竹，寥刁竹，了刁竹，铜锣草，柳叶细辛，柳枝癀，谷茬细辛，逍遙竹，对叶莲，一枝香，鬼督邮，老君须，石下长卿，逍遙竹道，瑤山竹，对节莲，竹叶细辛，英雄草，别仙踪，料刁竹，钓鱼竿，一枝箭，料吊，土细辛，九头狮子草，九头狮，铃柴胡，生竹，牙蛀消，线香草，小对叶草，对月草，中心草，天竹，溪柳，蛇草，黑薇，蜈蚣草，山刁竹，蛇利草，药王，香摇边，摇竹消，摇边竹，三百根，千云竹，痢止草，石下徐长卿，上天梯。

【商品名】徐长卿。以根粗壮均匀、干燥、质坚、无杂质者为佳。

【处方名】徐长卿。

【性味归经】辛，温。归肝、胃经。

【功效主治】祛风止痛、止痒。主治风湿痹痛，腰痛，跌打损伤疼痛，脘腹痛，牙痛，湿疹，风疹块，顽癣，毒蛇咬伤等。

【用量】4～10克。散剂1.5～3克。外用适量。

桑 枝

出自《本草图经》。为桑科落叶乔木桑树 *Morus alba* L. 的嫩枝。全国大部分地区均有分布，主产于安徽、河南、江苏、山东、河北、山西、陕西、湖南、四川等地。春末夏初采收，去叶晒干，或趁鲜切片晒干，生用，或麸炒或酒炒用。

【别名】双枝，双条，桑条，嫩桑枝，童桑枝，桑树枝。

【商品名】桑枝，桑条。以枝条肥嫩、干燥、断面呈黄白色者为佳。

【处方名】桑枝，桑条，嫩桑枝，炒桑枝，炙桑枝，酒桑枝，酒炒桑枝等。

处方中写桑枝、桑条、嫩桑枝均指生桑枝。为原药材去杂质切

片生用入药者。

炒桑枝为桑枝片用文火炒至淡黄色晾凉入药者。

炙桑枝为净桑枝片拌麦麸用文火炒至深黄色，筛去麸皮，晾凉入药者。

酒桑枝又称酒炒桑枝。为桑枝片用酒淋洒，微闷，待吸干，再用文火炒至微黄入药者。增强祛风通络之功。

【性味归经】苦，平。归肝经。

【功效主治】祛风通络。主治风湿痹痛，四肢拘挛，水肿。

【用量】10~30克。鲜品30~60克。

桑寄生

出自《神农本草经》。为桑寄生科常绿小灌木槲寄生*Viscum coloratum* (Komar.) Nakai或桑寄生*Loranthus parasiticus* (L.) Merr. 的带叶茎枝。前者主产于河南、河北、安徽、辽宁、吉林、内蒙古、浙江、湖南等地；后者主产于广东、广西等地。冬季至次春采割，除去粗茎，切断晒干，或蒸后晒干，生用。

【别名】双寄生，广寄生，老寄生，桑生，寄生，桑上寄生，槲寄生，柳寄生，北寄生，冬青，冻青，茑，茑木，宛童，寄屑，桑寄，寓木，寄生树，寄生草，冰粉树，蠹心宝，真寄生，桃木寄生，沙梨寄生，枇杷寄生，油茶寄生，寄居花童。

【商品名】北寄生：又名北桑寄生、黄寄生、柳寄生、冬青、冻青、槲寄生。为植物槲寄生的枝叶。主产于河北、辽宁、山西、内蒙古、吉林、河南等地。以枝细嫩、干燥、色黄绿、叶未脱落、嚼之发粘者为佳。

广寄生：又名桑寄生、桑上寄生、桃木寄生、沙梨桑生、枇杷寄生、油茶寄生。为植物桑寄生的枝叶。主产于广东、广西。以枝细嫩、干燥、色红褐、叶未脱落者为佳。

柿寄生：又名樟寄生。为植物毛叶桑寄生*Loramthus yadoriki*

Sieb.的枝叶。主产于陕西、四川、云南等地。

杜寄生：为产于安徽、浙江、江西的寄生。多为植物槲寄生的枝叶。

【处方名】桑寄生，寄生，炒寄生或炒桑寄生，酒寄生或酒制桑寄生。

处方中写桑寄生、寄生指生桑寄生。为原药去杂质，切片生用入药者。

炒桑寄生又名炒寄生。为桑寄生片用文火炒至微黄色入药者。

酒炒桑寄生又名酒寄生、酒制桑寄生等。为桑寄生片用黄酒淋洒，待吸尽，再用文火微炒入药者。

【注意】有三种槲寄生的变型植物黄果槲寄生 *Viscum coloratum* (Kom.) Nakai f. *lutescens* Kitag. 和红果槲寄生 *V. coloratum* (Kom.) Nakai f. *rubroaurantiacum* Kitag. 以及白果槲寄生 *V. album* L. 在某些地方也作“桑寄生”使用，但非正品。

【性味归经】苦，平。归肝、肾经。

【功效主治】祛风湿，补肝肾，壮筋骨，安胎。主治风湿痹痛，腰膝酸痛，胎动不安，胎漏下血。

【用量】15~30克。

五 加 皮

出自《神农本草经》。为五加科落叶小灌木细柱五加 *Acanthopanax gracilistylus* W.W.Smith 的根皮。主产于河南、安徽、湖北等地。夏秋季节采挖根部，剥取根皮，晒干，生用，酒洗或炒用。

【别名】五加，五夹，五夹皮，南五加，南五夹，南五加皮，刺五加，刺五夹，刺五甲，加皮，真五加皮，豺漆皮，豺节皮，文章草根皮，五花根皮，木骨根皮，追风使皮，刺通皮，白刺皮，茨五甲皮，白笏树皮，五叶路刺皮，细柱五加皮，老虎獠根皮，五花

眉根皮，水面油根皮，白芦刺根皮，五加花根皮，鸡脚风根皮，五佳皮。

【商品名】 南五加皮：又名南五加、真五加皮。为植物细柱五加的根皮。主产于河南、安徽、湖北等地。品质优良，为五加皮中的正品。以根皮厚、淡黄棕色、气香、无木心者为佳。

北五加皮：又名北五加、香加皮、杠柳皮。为萝藦科植物杠柳 *Periploca sepium* Bge. 的根皮。主产于山东、陕西、宁夏、四川等地。品质较次，为五加皮中的副品。以皮肉厚、灰棕色、气香浓者为佳。

川五加皮：又名红毛五加皮。为五加科植物红毛五加 *Acanthopanax giraldii* Harms 的茎皮。主产于四川。

无梗五加皮：为五加科植物无梗五加 *Acanthopanax sessiliflorus* (Rupr. et Maxim.) Seem. 的根皮。

刺五加：为五加科植物刺五加 *A. senticosus* (Rupr. et Maxim.) Harms 的根皮。

糙叶五加：为五加科植物糙叶五加 *A. henryi* (Oliv.) Harms 的根皮。

刺三甲：为五加科植物白芍 *A. trifoliatus* (L.) Merr. 的根皮。在西南地区民间作“五加皮”用。

乔木五加：为五加科植物乔木五加 *A. euodiaefolium* Franch. var. *ferrugineus* W.W.Smith 的根皮。在西藏地区作“五加皮”使用。

蜀五加：为五加科植物蜀五加 *A. setchuenensis* Harms 的根皮。在陕西等地作“五加皮”使用。

藤五加：为五加科植物藤五加 *A. leucorrhizus* (Oliv.) Harms 的根皮。在陕西等地作“五加皮”使用。

刺楸：为五加科植物刺楸 *Kalopanax septemlobus* Koidz. 的树皮。在河南登封作“五加皮”用。

轮伞五加：为五加科植物轮伞五加 *A. verticillatus* Hao 的根

皮。主产于西藏。在当地作“五加皮”用。

此外，还有一些五加科植物的根皮，在个别地区作“五加皮”使用。除南五加皮为正品外，其余品种均非五加皮正品，品质较次。

【处方名】 加皮，五加皮，五夹皮，酒加皮，酒五加皮，炒五加皮，姜五加皮，姜制五加皮等。

处方中写加皮、五加皮、五夹皮均指生五加皮。为原药材去杂质生用入药者。

酒五加皮又名酒加皮。为净五加皮用酒洗后晾干入药者。

炒五加皮又名炒加皮。为净五加皮用黄酒喷淋，待吸尽，再用文火微炒入药者。

姜五加皮又名姜制五加皮。为净五加皮用姜汁拌匀，待吸尽，再用文火炒干入药者。

【注意】 目前五加皮的市售商品品种比较紊乱。除上述药材品种外，过去广东的一些地方一度把茜草科植物牛白藤 *Hedyotis hedyotidea* DC. 的藤茎作“五加皮”使用，又称土五加、土加藤。该药与五加皮功效不同，不能混用。

【性味归经】 辛、苦，温。归肝、肾经。

【功效主治】 祛风湿，强筋骨。主治风湿痹痛，四肢拘挛，腰膝酸软，小儿行迟，水肿。

【用量】 6～10克。

虎 骨

出自《名医别录》。为猫科动物虎 *Panthera tigris* L. 的干燥骨骼。以头骨、四肢骨入药为优。雄虎的前胫骨更佳。分布于东北、华南等地。猎得后刮尽骨上附着的筋肉，在通风处阴干，锯成段，用砂炙或油炙酥。

【别名】 虎胫骨，老虎骨，大虫骨，东北虎骨，华南虎骨，孟

加拉虎骨，南方虎骨，北方虎骨，於菟骨，威骨，陆虎遗生。

【商品名】 虎头骨：为虎的头部骨骼。

虎身骨：为虎的全身骨骼。一般不包括头骨和四肢骨。

虎四肢骨：又名虎四腿骨。为虎的四肢骨干。包括邦骨。

虎邦骨：为虎的桡骨和腓骨。

虎胫骨：为虎的髌骨。

虎爪：又名骨爪钩。为虎的爪甲。其作用与虎骨不同。

虎全骨：又名虎整架。为虎的全身骨架。

北方虎骨：为东北虎的骨骼。主产于我国东北和内蒙古地区。

南方虎骨：为华南虎和孟加拉虎的骨骼。主产于华南、华东、西南地区。

以上均以质坚而重、断面细腻、色黄、中间空隙小、有丝络网状物、筋肉剔除干净者为佳。

【处方名】 虎骨，虎胫骨，炙虎骨，油虎骨，醋虎骨等。

处方中写虎骨、虎胫骨指炙虎骨、油虎骨或醋虎骨。炙虎骨为虎骨段用砂子炒至黄色入药者。油虎骨为虎骨段涂抹麻油，置炭火上烤酥入药者。醋虎骨为虎骨段在热砂中炒至黄色，然后取出趁热放入醋内淬酥，最后取出晾凉入药者。

【性味归经】 辛，温。归肝、肾经。

【功效主治】 祛风定痛，强筋壮骨。主治风湿痹痛，腰膝痿软。

【用量】 入丸散或浸酒服每次3～6克。

豹 骨

出自《名医别录》。为猫科动物金钱豹 *Panthera pardus* L. 及云豹和雪豹的骨骼。主产于四川、云南、河南、安徽、西藏、贵州、新疆、甘肃、湖北、湖南等地。猎杀后刮净骨上的筋肉，阴干，锯成短段，炮制同虎骨。

【别名】川四腿，金钱豹骨，银钱豹骨，雪豹骨，云豹骨，文豹骨，程骨，失刺孙。

【商品名】川四腿：又名豹四肢骨、豹四肢骨。为动物豹的四肢骨骼。品质较好。

豹头骨：为豹的头部骨骼。品质较次。

豹身骨：为豹的全身骨骼。

以质坚而重、浅黄白色、剔净筋肉者为佳。

【处方名】豹骨，川四腿，油豹骨，醋豹骨等。

处方中写豹骨、川四腿指油豹骨或醋豹骨。油豹骨为豹骨涂抹植物油后在炭火上烤酥入药者。醋豹骨为豹骨用砂子炒至黄色，取出趁热放入醋里淬酥，再取出晾干入药者。

【性味归经】辛、咸，温。归肝、肾经。

【功效主治】追风定痛，强筋壮骨。主治筋骨疼痛，风寒湿痹，四肢拘挛，麻木，腰膝酸痛等症。

【禁忌】血虚火盛者慎服。

白 花 蛇

出自《雷公炮炙论》。为蝮蛇科动物尖吻蝮（五步蛇）*Agkistrodon acutus* (Gunther)除去内脏的干燥全体。主产于湖北、浙江、江西、福建等地。于夏、秋二季捕捉，剖开蛇腹，除去内脏，盘成圆形，用竹片固定，干燥。以黄酒浸透去皮骨，切段用。

【别名】蕲蛇，五步蛇，五步龙，尖吻蝮，塞鼻蛇，百步蛇，盘蛇，棋盘蛇，五步跳，五步倒，龙蛇，祁蛇，白蛇，大白花蛇，聋婆蛇，塞鼻白花蛇。

【商品名】大白花蛇：为腹蛇科动物尖吻蝮（五步蛇）的干燥全体。主产于湖北、浙江、江西、福建等地。为白花蛇正品。以条大、干燥、头尾齐全、花纹斑块明显者为佳。

小白花蛇：又名金钱白花蛇、花蛇、小花蛇、百节蛇、银环蛇、

金钱蛇、金钱蕲蛇。为眼镜蛇科银环蛇（银报应、寸白蛇、白菊花、断肌甲、多条金甲带、百节蛇、白节蛇、手巾蛇）*Bungarus multicinctus* Blyth 的幼蛇。除去内脏，盘成圆形如钱大。功效与白花蛇相似，但用量较轻。主产于广东、广西等地。非白花蛇正品。以头尾齐全、干燥、色泽明亮、盘小者为佳。

蕲蛇鲞：为五步蛇用竹片撑开后焙干者。

蕲蛇棍：为五步蛇直接焙干者。

【处方名】 蕲蛇，白花蛇。

【注意】 在药材商品市场上，广西、广东等地的某些地方，将游蛇科百花锦蛇*Elaphe moellendorffi* (Boettger.)除去内脏的干燥全体作“白花蛇”使用。此非白花蛇正品。

小白花蛇别名“白菊花”，易与植物白菊花名称相混。应引起注意。

【性味归经】 甘、咸，温。有毒。归肝经。

【功效主治】 祛风，活络，定惊。主治风湿痹痛，筋脉拘挛，口眼喎斜，肢体麻木，中风后半身不遂，麻风，顽癣，皮肤瘙痒，破伤风，小儿急慢惊风等。

【用量】 3～6克。研末冲服每次1～1.5克。

乌 梢 蛇

出自《本草纲目》。为游蛇科动物乌梢蛇*Zaocys dhumnades* (Cantor)的除去内脏的干燥全体。主产于安徽、浙江、湖北、江苏、四川等地。4～11月间捕捉，剖开蛇腹，除去内脏，盘成圆形，用柴火熏干。

【别名】 乌蛇，剑脊乌梢，黑花蛇，黑蛇，乌峰蛇，青蛇，乌风蛇，黄风蛇，黄风梢，黑风蛇，青大将，剑脊蛇，黑乌梢，三棱子，青梢蛇，黑乌蛇，乌花蛇，剑脊乌枯蛇，剑脊乌梢蛇，剑脊乌蛇。

【商品名】乌蛇，乌梢蛇。以头尾齐全、外皮黑褐色、内里黄白色、背部有棱、蛇体坚实者为佳。

【处方名】乌蛇，乌梢蛇，乌蛇肉，炙乌蛇等。

处方中写乌蛇、乌梢蛇指乌蛇肉。为乌蛇去头后，用黄酒拌匀闷透，除去皮骨，晒干入药者。

炙乌蛇为乌蛇砍去头，用温水洗净，切段，用黄酒拌匀，闷透，置锅内用文火炒至微黄色，取出放凉入药者。

【性味归经】甘、咸，平。有小毒。归肺、脾经。

【功效主治】祛风湿，通经络。主治风湿顽痹，肌肤不仁，风疹疥癣，麻风，破伤风，小儿麻痹症，骨结核等病证。

【禁忌】血虚生风者忌用。

海 桐 皮

出自《开宝本草》。为豆科常绿乔木植物 刺桐 *Erythrina variegata* L. var. *orientalis* (L.) Merr. 的干燥树皮。主产于广西、云南、福建、湖北等地。初夏剥取有钉刺的树皮，晒干，生用。

【别名】刺桐皮，钉桐皮，丁桐皮，接骨药，鼓桐皮，空桐树皮，空桐皮，山芙蓉皮，丁皮，钉皮，刺通，梯枯皮，鸡桐木皮，鼓丁皮，川桐皮。

【商品名】海桐皮，刺桐皮，钉桐皮。以皮薄而宽长、钉刺多者为佳。

【处方名】海桐皮，丁桐皮。

【注意】目前市售海桐皮商品品种比较混乱。广西、四川、江苏、浙江及东北个别地区把五加科植物刺楸 *Kalopanax septemlobus* (Thunb.) Koidz. 的树皮作“海桐皮”使用，广西称鼓丁皮，东北称海桐皮。广东省个别地区把木棉科植物木棉(红棉、英雄树、攀枝花) *Bombax malabarica* L. (*Gossampinus malabarica* (L.) Merr.) 的树皮作“海桐皮”使用，亦称“丁桐皮”。福建和浙江

个别地方还把芸香科植物櫟叶花椒 *Zanthoxylum ailanthoides* Sieb et Zucc. 的树皮作“海桐皮”使用，亦称“丁桐皮”。以上均非海桐皮正品，应注意分辨。

【性味归经】苦、辛，平。归肝经。

【功效主治】祛风湿，通经络。主治风湿痹痛，四肢拘挛，腰膝疼痛。外用治疗疥癣、湿疹。

【用量】6～12克。外用适量。

蚕 沙

出自《名医别录》，为蚕蛾科昆虫 家蚕蛾 *Bombyx mori* L. 幼虫的粪便。育蚕地区均产。以江苏、浙江产量最大。6～8月收集，以二眠到三眠时的粪便为主，收集后晒干，簸净泥土，除去轻粒及桑叶碎屑。生用。

【别名】蚕矢，蚕屎，蚕粪，蚕砂，二蚕沙，晚蚕沙，晚蚕矢，原蚕矢，原蚕屎，原蚕沙，马鸣肝，虫沙，夏蚕沙。

【商品名】蚕沙，蚕矢。以色黑、大小均匀、干燥、无霉变者为佳。

【处方名】蚕沙，蚕矢，晚蚕沙。

【性味归经】甘、辛，温。归肝、脾、胃经。

【功效主治】祛风除湿，和胃化浊。主治风湿痹痛，肢体不遂，湿疹瘙痒；湿浊内阻而致的吐泻转筋。

【用量】5～10克。外用适量。

钻 地 风

出自《植物名实图考》。为虎耳草科植物钻地风 *Schizophragma integrifolium* (Franch.) Oliv. 的根皮。主产于安徽、浙江、湖南、湖北、四川、广西、广东、贵州、云南等地。全年可采，挖

取根部，剥取根皮，晒干。

【别名】追地风，占地风，追地枫，桐叶藤，利筋藤，全叶钻地风，地枫皮，地风，南京地枫皮。

【商品名】钻地风。以根皮肥厚、干燥、无杂质者为佳。

【处方名】钻地风，追地风，占地风，地风，追地枫，利筋藤等。

【注意】同属植物白背钻地风（散血藤）*S. hypoglauicum* Rehd.的根皮亦与钻地风同等入药。但非正品。

《滇南本草》中所载的钻地风（又名黄锁梅根、锁梅根、锁地风、黄泡刺根、红锁梅、乌泡、黄泡、倒竹伞、三月泡、雀不站、黄茨果、栽秧泡根、大红黄泡根、黄藨根）为蔷薇科植物栽秧泡（黄锁梅）*Rubus ellipticus* Smith var. *obcordatus* Focke的根，与虎耳科植物钻地风功效不同，不能混用，应注意鉴别。

【性味归经】淡，凉。归肝经。

【功效主治】舒筋活络，祛风活血。主治风湿筋骨疼痛，四肢关节疼痛，脚气。

【用法】6～12克。

千 年 健

出自《本草纲目拾遗》。为天南星科多年生草本植物千年健 *Homalomena occulta* (Lour.) Schott 的干燥根茎。主产于广西南部地区。秋末春初采挖，洗净，除去外皮，晒干，切片生用。

【别名】年健，年见，千年见，一包针，千颗针，丝棱线。

【商品名】千年健。以根茎肥大、红棕色、体坚实、干燥、无杂质、香气浓烈者为佳。

【处方名】千年健，千年见，年见，年健等。

【注意】千年健与菊科植物刺针草、细叶刺针草均有“一包针”之别名，极易混淆，应注意区分，并尽量避免使用“一包针”这一

别名。

【性味归经】苦、辛，温。归肝、肾经。

【功效主治】祛风湿，健筋骨。主治风湿痹痛，腰膝冷痛，下肢拘挛麻木。

【用量】6～10克。

寻 骨 风

出自《植物名实图考》。为马兜铃科多年生攀援草本植物绵毛马兜铃 *Aristolochia mollissima* Hance 的干燥根茎或全草。全国各地均产，以河南、安徽、江苏、浙江、湖南、湖北等省产量最大。夏秋采收，除去杂质，晒干，生用。

【别名】猴耳草，猴儿草，猫耳朵草，马蹄香，巡骨风，清骨风，白面风，白毛藤，黄木香，毛香，猫香，穿地节，地丁香，兔子耳，兔耳草，绵毛马兜铃，毛风草，穿地筋，猫耳根，老鼠眼，鸭娃根。

【商品名】寻骨风，猴耳草。以肥壮、干燥、无杂质者为佳。

【处方名】寻骨风，巡骨风，白面风，猴耳草等。

【性味归经】辛、苦，平。归肝经。

【功效主治】祛风湿，通经，止痛。主治风湿痹痛，肢体麻木，筋脉拘挛，跌打损伤疼痛，胃痛，牙痛。

【用量】10～15克。

伸 筋 草

出自《分类草药性》。为石松科植物石松 *Lycopodium clavatum* L. 的带根全草。主产于江苏、湖北、浙江、湖南、四川等地。夏季采收，连根拔起，洗净晒干，切段生用。

【别名】石松，过山龙，宽筋藤，火炭葛，金毛狮子草，金腰

带，狮子草，狮子毛草，立筋草，舒筋草，铺筋草，抽筋草，分筋草，过筋草，地棚窝草，筋骨草，绿毛筋草，小伸筋，风尾伸筋，蜈蚣藤，大地毛公，缠身龙，猫藤草，通筋草，山猫儿，老虎垫坐，盘龙草，烂腰蛇，宽筋草，穿山龙，绿毛伸筋，狮子尾，凤尾伸筋草，万岁藤。

【商品名】伸筋草，石松。以茎长、色黄绿、干燥、无杂质者为佳。

【处方名】伸筋草，石松。

【注意】在药材商品市场上，下列同属植物的全草在浙江、四川、江西等地的一些地方，亦称为伸筋草，并同等使用。

玉柏（又名玉遂、千年柏、万年松）*L. obscurum* L. 分布于全国大部分地区。

垂穗石松（又名马鹿角、铺地蜈蚣）*L. cernuum* L. 分布于浙江、江西、福建、台湾、广东、广西、四川、贵州、云南等地。

【性味归经】苦、辛，温。归肝、脾、肾经。

【功效主治】祛风散寒，除湿消肿，舒筋活血。主治风寒湿痹，关节酸痛，皮肤麻木，四肢软弱，水肿，跌打损伤，目赤肿痛，急性肝炎。

【用量】10~30克。外用适量。

【慎忌】孕妇及出血过多者慎服。

透 骨 草

出自《灵秘丹药笺》。为大戟科植物地构叶*Speranskia tuberculata* (Bge.) Ball. 或凤仙科植物凤仙*Impatiens balsamina* L. 的全草。前者5~6月间开花结实时采收，后者于夏、秋季种子成熟时采收，晒干生用。

【别名】地构叶，地构菜，凤仙草，珍珠透骨草；凤仙透骨草。

【商品名】珍珠透骨草：又名地构叶、地构菜、竹格叉、铁线草。为植物地构叶的全草。分布于吉林、辽宁、河北、山东、河南、安徽、江苏、山西、陕西、甘肃等地。以全草色绿、干燥、质嫩、无杂质者为佳。

凤仙透骨草：又名凤仙梗、凤仙花梗、凤仙花秆、凤仙花秸、凤仙草、凤仙花、指甲草、指甲花、染指甲草、小桃红、夹竹桃、海药、小粉团、满堂红、水指甲、指甲桃等。为植物凤仙的带果全草。分布于全国各地。多为人工栽种。以茎色棕红、不带叶、干燥、无杂质者为佳。

透骨草：各种透骨草的统称。

【处方名】透骨草。

【注意】目前在药材商品市场上，透骨草的品种比较复杂。除上述两种使用较广外，以下几种植物的全草在不同地区也作透骨草入药，但非正品。

紫葳科植物角蒿*Incarvillea sinensis* Lam. 分布于吉林、黑龙江、山东等地。习称羊角透骨草或角蒿透骨草。

毛茛科植物黄花铁线莲*Clematis intricata* Bge. 和细叶铁线莲（驴断肠）*C. aethusaeifolia* Turcz. 商品名称为铁线透骨草。分布于河北等地。

豆科植物山野豌豆（落豆秧）*Vicia amoena* Fisch. 和广布野豌豆 *V. cracca* L. 及假香野豌豆 *V. pseudoorobus* Fisch. et Mey. 商品名称为东北透骨草。分布于东北、华北、河南、山东、陕西、甘肃等地。

杜鹃花科植物云南白株树（滇白珠、满山香、小透骨草）*Gaultheria yunnanensis* (Franch.) Rehd. 的枝叶，在云南、贵州作透骨草使用。习称小透骨草。

萝藦科植物徐长卿*Cynanchum paniculatum* (Bunge) Kitag. 黑龙江、甘肃、山东部分地区作透骨草使用。

檀香科植物百蕊草*Thesium chinense* Turcz. 陕西部分地区作

透骨草使用。

【性味归经】苦、辛，平。归肝经。

【功效主治】祛风，除湿，舒筋，活血，止痛。主治风湿痹痛，筋脉挛缩，寒湿脚气。外用治疗疮痈肿毒。

【用量】10~15克。外用适量。

【禁忌】孕妇慎用。

老 鹳 草

出自《本草纲目拾遗》。为牻牛儿苗科植物牻牛儿苗 *Erodium stephanianum* Willd. 和老鹳草 *Geranium wilfordii* Maxim. 的带有果实的全草。夏秋季节果实将成熟时割取地上部分，洗净，晒干，切段生用。

【别名】老鸹草，老官草，老贯草，老鸹筋，老鸹嘴草，鸹子嘴草，五叶草，五瓣花，天罡草，五叶联，生扯拢，破铜钱，贯筋，五齿耙，牻牛儿苗（又名斗牛儿、牵巴巴、太阳花、狼巴巴草、土列列），老鹳嘴，老鸦嘴，老贯筋，老牛筋，勾链链，车车路，绵绵牛，铁灯碗，紫地榆，长嘴老鹳草，短嘴老鹳草，抓钩草，耙子草，耙子草。

【商品名】长嘴老鹳草：为植物牻牛儿苗的带有成熟果实的全草。主产于河南、河北、山西、陕西、山东、辽宁、吉林、黑龙江、新疆等地。使用本品种较为普遍。

短嘴老鹳草：为植物老鹳草的带有成熟果实的全草。主产于云南、湖北、四川等地。

以上均以叶多、花多、果多、色绿灰、干燥、无杂质者为佳。

【处方名】老鹳草。

【注意】在药材商品市场上，尚有下列多种同科植物的带果全草在不同地区也作老鹳草入药，但非正品。

尼泊尔老鹳草 *Geranium nepalense* Sweet 分布于福建、广西、

湖南、四川、云南、贵州等地。

西伯利亚老鹳草（又名鼠掌草、鼠掌老鹳草）*G. sibiricum* L. 分布于我国东北和新疆等地。

鸭脚老鹳草*G. wilfordii* Maxim. 分布于我国东北及河北、内蒙古、山东等地。

沙头老鹳草（又名金山老鹳草）*G. yezoense* Pranch. et Sav. 分布于四川。

块根老鹳草*G. dahuricum* DC. 及其变种高山块根老鹳草 *G. dahuricum* DC. var. *alpinum* Bar. et Skv. 分布于我国东北、西北及四川等地。

野老鹳草（鹭嘴草）*G. carolinianum* L. 分布于江苏、浙江等地。

毛蕊老鹳草*G. eriostemon* Fisch. 分布于黑龙江等地。

石岩酸角草（猫脚印）*G. robertianum* L. 分布于云南等地。

【性味归经】苦，微辛，平。归肝、大肠经。

【功效主治】祛风湿，活血通经，清热解毒。主治风湿性关节炎，拘挛麻木，肠炎，痢疾，坐骨神经痛，跌打损伤，月经不调，疱疹性角膜炎。

【用量】6～15克。外用适量。

络 石 藤

出自《神农本草经》为夹竹桃攀援木质藤本植物络石 *Trachelospermum jasminoides* (Lindl.) Lem. 的带叶藤茎。主产于安徽、江苏、湖北、山东等地。冬季至次春采割，晒干，切碎生用。

【别名】络石，石龙藤，捆石龙，沿壁藤，吸壁藤，白花藤，白花络石藤，爬山虎，爬墙虎，耐冬，石鲮，鲮石，明石，悬石，云花，云珠，云英，云丹，石磋，石血，喀石，领石，石龙藤，络石草，鬼系腰，石薜荔，过墙风，鹿角草，羊角藤，乳尸绳，石气

柑，万字金银，沿壁藤，铁线草，风藤，折骨草，交脚风，合掌藤，双合草，剃头草，石盘藤，过桥风，绿刺，酸树芭，膏链，软筋藤，地锦，地噤，石叶藤，常春藤。

【商品名】络石藤。以藤茎条长、叶多、色绿、干燥者为佳。

【处方名】络石，络石藤。

【注意】目前络石藤市售药材商品品种比较混乱。江苏、河南、陕西、湖北的一些地方用卫矛科植物扶芳藤 *Euonymus fortunei* Turcz.) Hand.-Mazz.的带叶藤茎作“络石藤”使用。广东地区以茜草科植物穿根藤 *Psychotria serpens* L.的带叶藤茎作“络石藤”使用。云南富民、安宁一带以木兰科植物华中五味子 *Schisandra schisandra* Rehd. et Wils. 的地上部分作“络石藤”使用。江苏徐州一带以葡萄科植物爬山虎 *Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. et Zucc.) Planch. 的藤叶作“络石藤”使用。贵州地区以桑科植物地枇杷 *Ficus tikoua* Bur. 的茎枝作“络石藤”使用。四川部分地区以豆科植物香花崖豆藤 *Millettia dielsiana* Harms ex Diels 的茎枝作“络石藤”使用。还有的地区以豆科植物山鸡血藤的茎枝作“络石藤”使用。这都是错误的，均属于误用，应予以纠正。

【性味归经】苦，微寒。归心、肝经。

【功效主治】祛风通络，凉血消肿。主治风湿痹痛，筋脉拘挛；喉痹，痈肿。

【用量】10~15克。鲜品20~30克。

海 风 藤

出自《本草再新》。为胡椒科常绿攀援藤本植物凤藤 *Piper futo kadsura* Sieb. 的藤茎。主产于广东、福建、浙江、台湾等地。夏秋采割，除去杂质，晒干，切片，生用。

【别名】风藤，巴岩香，爬岩香，青萎藤，海枫藤，细叶青萎藤。

【商品名】海风藤，风藤。以藤茎体轻、质硬、干燥、气辛香者为佳。

【处方名】风藤，海风藤。

【注意】目前市售商品海风藤品种比较混乱。浙江、福建、湖南的一些地方以同属植物山蒟 *Piper hancei* Maxim. 的藤茎作“海风藤”使用。浙江的一些地方以同属植物毛蒟 *P. puberulum* (Benth.) Maxim. 的藤茎作“海风藤”使用。湖南、福建的一些地方以同属植物石南藤 *P. wallichii* (Miq.) Hand.-Mazz. var. *hupehense* (DC.) Hand.-Mazz. 的藤茎作“海风藤”使用。以上同属植物均非海风藤正品。

四川、湖北、湖南、江西、广西、云南的一些地区，把松萝科植物节松萝 *Usnea diffracta* Vain 或其同属植物长松萝 *U. longissimo* Ach. 和花松萝 *U. florida* (L.) Wigg. 等作“海风藤”使用。广东、广西把木兰科植物异型南五味子 *Kadsura heteroclita* (Roxb.) Craib. 的茎藤作“海风藤”使用。江苏省把木通科植物五叶木通 *Akebia quinata* DC. 的带叶藤茎作“海风藤”使用。四川成都地区以木通科植物白木通 *A. trifoliata* (Thunb.) Koidz. var. *australis* (Diels) Rehd. 的带叶藤茎作“海风藤”使用。浙江个别地区以大血藤科植物大血藤 *Sargentodoxa cuneata* (Oliv.) Rehd. et Wils. 的藤茎或根作“海风藤”使用。上海某些地方还把海风藤作“老君须”使用。以上均为误用，应该纠正。

【性味归经】辛、苦，微温。归肝经。

【功效主治】祛风湿，通经络。主治风湿痹痛，关节不利，筋脉拘挛，腰酸疼痛，跌打损伤疼痛。

【用量】6～12克。鲜品15～30克。

青 风 藤

出自《中药志》。为防己科植物青藤 *Sinomenium acutum*

(Thunb.) Rehd. 及华防己 *Diploclisia chinensis* Merr. 和清风藤科植物清风藤 *Sabia japonica* Maxim. 等的藤茎。秋季采割，切段，晒干。

【别名】青藤，清风藤，寻风藤，华防己，大风藤，排风藤，吹风散，黑防己，青防己，追骨风，清藤，大叶青绳儿，大枫藤。

【商品名】青藤：又名大叶青藤、排风藤、大风藤、大青木香、土木通、土藤、岩见愁。为植物青藤的藤茎。主产于河南、安徽、江苏、浙江、湖北、陕西、福建、广东、广西、四川、贵州等地。

华防己藤：又名穿山藤、秤钩风、过山龙、湘防己。为植物华防己的藤茎。主产于湖南。

清风藤：为植物清风藤的藤茎。分布于安徽、江苏、浙江、江西、广西、湖南等地。

以上商品以藤茎条粗细均匀、干燥、外皮绿褐色者为佳。

【处方名】青风藤，清风藤，青藤，大风藤，排风藤，青屯，青风屯，清风屯。

【注意】目前在药材商品市场上，青风藤的品种异常混乱。除上述品种外，湖北和四川某些地区用防己科植物木防己 *Cocculus trilobus* (Thunb.) DC. 的茎作“青风藤”入药；福建某些地区用茜草科植物鸡矢藤 *Paederia scandens* (Lour.) Merr. 的茎作“青风藤”入药；浙江某些地区用五加科植物常春藤 *Hedera nepalensis* K. Koch var. *sinensis* (Tobl.) Rehd. 的茎作“青风藤”入药；还有一些地区用青藤的变种毛青藤（云南青藤、滇青藤、追风散）*Sinomenium acutum* (Thunb.) Rehd. et Wils. var. *cinerereum* (Diels) Rehd. et Wils. 的茎作“青风藤”入药。以上均非正品，使用时应注意鉴别。

【性味归经】苦、辛，温。归肝、膀胱经。

【功效主治】祛风湿，利小便，通经络。主治风湿痹痛，鹤膝风，水肿，脚气，跌打损伤。

【用量】6～9克。外用水煎洗适量。

天仙藤

出自《本草图经》。为马兜铃科植物马兜铃 *Aristolochia debilis* Sieb. et Zucc. 的茎叶。霜降前后叶未落时采收，晒干，切碎入药。

【别名】 马兜铃藤，兜铃藤，兜铃苗，青木香藤，香藤，都淋藤，长痧藤，三百两银，臭拉秧子，痒辣菜。

【商品名】 天仙藤，马兜铃藤，青木香藤。以藤茎带叶、干燥者为佳。

【处方品】 天仙藤，天仙屯，兜铃藤，兜铃屯，马兜铃藤，马兜铃屯等。

【注意】 在药材商品市场上，同属植物北马兜铃 *A. contorta* Bge. 的茎叶在少数地区亦作天仙藤入药，功效近似，但非正品。另外，广东个别地区用樟科植物无根藤 *Cassytha filiformis* L. 的藤充当“天仙藤”入药。此为混用，应该纠正。

【性味归经】 苦，温。归肝、肾经。

【功效主治】 行气化湿，活血止痛。主治风湿痹痛，胃脘疼痛，疝气痛，妊娠水肿，产后血气痛，胸腹痛。

【用量】 6～9克。外用水煎洗适量。

【禁忌】 体虚者慎服。

石南藤

出自《开宝本草》。为胡椒科植物巴岩香 *Piper wallichii* (Miq.) Hand.-Mazz. var. *hupehense* (DC.) Hand.-Mazz. 的茎叶。主产于湖北、湖南、广东、四川等地。夏秋采集，晒干，切段生用。

【别名】 爬岩香，巴岩香，南藤，湖北胡椒，丁父，丁公寄，

丁公藤，搜山壳，蓝藤。满天香，小风藤，石榴藤。

【商品名】石南藤，石榴藤。以藤茎带叶、色绿灰，气清香、嚼之辛辣者为佳。

【处方名】石南藤。

【注意】在药材商品市场上，下列同属植物的茎、叶，在不同地区也作石南藤使用，但非正品。

山蒟（绿藤、香藤、钻骨风、酒饼藤、石蒟、穿壁风、廿四症、上树风）*P. hancei* Maxim. 分布于江西、福建、广西、广东、贵州、云南等地。

风藤（海风藤、细叶青萎藤）*P. kadsura* (Chisy) Ohwi 分布于福建、浙江、台湾等地。

毛蒟（毛萎、石萎、绒毛胡椒）*P. puberulum* (Benth.) Maxim. 分布于四川、云南、贵州、广西、广东等地。

假蒟（蛤萎、假萎）*P. sarmentosum* Roxb. 分布于四川等地。

海南蒟（山胡椒）*P. hainanense* Hemsl. 分布于海南、广东、广西等地。

此外，下列植物的茎叶在某些地区误作石南藤入药，应该纠正。

蔷薇科植物石榴 *Photinia serrulata* Lindl. 在江苏、安徽、河北、浙江的个别地区误作石南藤使用。

夹竹桃科植物络石藤（白花藤）*Trachelospermum jasminoides* (Lindl.) Lem. 在吉林、陕西、河南、河北、江西、湖北的个别地区误作石南藤使用。

桑科植物薜荔 *Ficus pumila* L. 在江西九江地区误作石南藤使用。

【性味归经】辛，温。归肝、脾、小肠经。

【功效主治】祛风湿，通经络，强腰脚，止痛止咳。主治风寒湿痹，筋骨疼痛，腰痛，痛经，咳嗽气喘，手术后疼痛。

【用量】 6~10克。外用适量。

【禁忌】 阴虚火旺者慎服。

松 节

出自《名医别录》。为松科常绿大乔木油松 *Pinus tabulaeformis* Carr. 及马尾松 *P. massoniana* Lamb. 等枝干的结节。全国大部分地区均有产。多于采伐时或木器厂加工时锯取之，经过选择修整，晒干或阴干。用水浸润，切片，晒干。生用。

【别名】 黄松木节，油松节，马尾松节，松郎头，短叶松节，红皮松节，短叶马尾松节，东北黑松节，黑皮油松节，辽东赤松节，青松节，山松节，枞柏节，铁甲松节，台湾赤松节，云南松节，飞松节。

【商品名】 油松节：又名短叶松节、红皮松节、短叶马尾松节、东北黑松节、黑皮油松节、辽东赤松节等。为植物油松节枝干的结节。主产于辽宁、吉林、河北、内蒙古、甘肃、宁夏、青海、河南、山东、陕西等地。

马尾松节：又名青松节、山松节，台湾赤松节、铁甲松节、枞柏节。为植物马尾松枝干的结节。主产于安徽、河南、江苏、浙江、福建、台湾、广东、广西、湖南、湖北、四川、云南等地。

云南松节：又名飞松节。为植物云南松 *Pinus yunnanensis* Franch. 枝干的结节。主产于云南、贵州、广西、四川等地。

以块大、棕红色、油性足者为佳。

【处方名】 松节，油松节，松节片。

【性味归经】 苦，温。归肝经。

【功效主治】 祛风燥湿，止痛。主治风寒湿所致的痹痛，历节风，鹤膝风，跌打损伤疼痛。

【用量】 10~15克。

胡 颠 子 根

出自《本草拾遗》。为胡颓子科植物胡颓子 *Elaeagnus pungens* Thunb. 的根。四季可采挖，洗净，切片晒干。

【别名】牛奶根，贯樟根，叶刺头。

【商品名】胡颓子根。以根条长、粗细均匀、干燥、无泥土等杂质者为佳。

【处方名】胡颓子根。

【性味归经】酸、苦，平。归肺、肝、大肠经。

【功效主治】祛风利湿，止咳止血，行瘀消积。主治咳喘、吐血，咯血，便血，月经过多，风湿性关节炎，泻痢，白带，崩漏，小儿疳积，传染性肝炎，咽喉肿痛等。

【用量】10~15克。鲜品20~30克。外用适量。

辣 莼

出自《江苏植药志》。为蓼科植物柳叶蓼（绵毛酸模叶蓼） *Polygonum lapathifolium* L. var. *salicifolium* Sibth. 和辣蓼 *P. flaccidum* Meissn. 或水蓼 *P. hydropiper* L. 或假长尾蓼 *P. longisetum* De Bruyn 或丛枝蓼 *P. caespitosum* Blume 以及多穗蓼 *P. polystachyum* Wall. 的全草。分布于全国各地，生长于水边及湿地。夏秋采集，洗净，鲜用或晒干切段生用。

【别名】辣蓼草，柳叶蓼，绵毛酸模叶蓼，水蓼，假长尾蓼，丛枝蓼，多穗蓼，假长尾叶蓼，白胖棵，红辣蓼。

【商品名】辣蓼，柳叶蓼，水蓼，假长尾蓼，假长尾叶蓼，丛枝蓼，多穗蓼。以株体肥壮、干燥、无杂质者为佳。

【处方名】辣蓼，辣蓼草，鲜辣蓼草。

【性味归经】辛，温。归脾、大肠经。

【功效主治】 消肿止痛。主治肿疡，痈疖腹痛，风湿性关节痛，跌打损伤，功能性子宫出血。外用治疗皮肤湿疹，毒蛇咬伤。

【用量】 6~10克。鲜品加倍。外用适量。

荭 草

出自《名医别录》。为蓼科植物 红蓼 *Polygonum orientale* L. 的全草。分布于全国各地。生长于潮湿地及水边。秋末采集，洗净晒干，生用或鲜用。

【别名】 红蓼，荭蓼，红草，水红花，水红花棵，水荭花，水荭，水蓬棵，天蓼，大蓼，大毛蓼，东方蓼，八字蓼，辣蓼，家蓼，游龙，茏古，鸿蕡，石龙，茏蕡，九节龙，大接骨，果麻，追风草，捣花，丹药头，狗尾巴花，狼尾巴花。

【商品名】 蓼草，红蓼，荭蓼，大蓼。以株体肥壮、干燥、无杂质者为佳。

【处方名】 蓼草，红蓼，荭蓼，水红花棵。

【注意】 同属植物节蓼（大马蓼、马蓼）*P. nodosum* Pers.的全草，在有些地区亦作荭草入药，但非正品。

【性味归经】 辛，凉。有毒。归肝、脾经。

【功效主治】 祛风胜湿，活血止痛。主治风湿性关节炎，疝气，脚气，疮肿。

【用量】 10~15克。鲜品加倍。外用适量。

糙 苏

出自《内蒙古中草药》。为唇形科植物 糙苏 *Phlomis umbrosa* Turcz.的根或全草。主产于辽宁、吉林、内蒙古、河北等地。夏、秋间采割地上全草，秋末采挖地下根部，洗净，鲜用或晒干用。

【别名】 山苏子，大叶糙苏，山芝麻，续断。

【商品名】糙苏。根以粗长，红褐色、干燥、无杂质者为佳。全草以植株完整、带有花果、干燥无杂质者为佳。

【处方名】糙苏。

【性味归经】涩、辛，温。疏风活络，强筋壮骨，解毒消肿。主治痈肿疮毒，感冒，风湿性关节疼痛，腰痛，跌打损伤等。

【用量】6~12克。

月 见 草

出自《贵州草药》。为柳叶菜科植物红萼月见草 *Oenothera erythrosepala* Borb. 的根。主产于贵州，多为栽培。秋季采挖，洗净，晒干，切片入药。

【别名】夜来香，夜来香根，红萼月见草，月见草根。

【商品名】月见草，红萼月见草。以根条长、均匀、干燥、无杂质者为佳。

【处方名】月见草，夜来香。

【性味归经】甘，温。归肝经。

【功效主治】强筋壮骨，祛风除湿。主治风湿病，筋骨疼痛。

【用量】水煎服10~15克。泡酒服适量。

夏 天 无

出自《浙江民间常用草药》。为罂粟科植物伏生紫堇 *Corydalis decumbens* (Thunb.) Pers. 的块茎或全草。主产于浙江、安徽、江苏、江西、福建、台湾、湖南等地。春至初夏采挖块茎，洗净，鲜用或晒干切片生用。

【别名】伏地延胡索，伏地玄胡，伏地元胡，伏生紫堇，无柄紫堇，夏天无。

【商品名】夏天无，伏生紫堇，无柄紫堇。

【处方名】夏天无，夏天无草，夏天无根，鲜夏天无根，鲜夏天无草，鲜夏天无等。块茎以块大、肥壮、粉性足者为佳。全草以植株完整、肥壮、无泥土者为佳。

【性味归经】苦，凉。归肝经。

【功效主治】祛风湿，降血压。主治风湿性关节炎，腰肌劳损，高血压病，脑血管意外引起的偏瘫，小儿麻痹后遗症，坐骨神经痛。

【用量】6～15克。

鹅不食草

出自《食性本草》。为菊科植物鹅不食草 *Centipeda minima* (L.) A. Br. et Aschers. 的带花全草。分布于华北、华东、中南、西南各地。夏季采收，洗净，鲜用或晒干生用。

【别名】鹅不食，鹅儿不食，鹅儿不食草，石胡荽，野园荽，野芫荽，地芫荽，鸡肠草，满天星，沙飞草，地胡椒，大救驾，三节剑，山胡椒，连地稗，球子草，二郎戟，小救驾，杜网草，猪屎草，砂药草，白地茜，猪屎漏，通天窍，雾水沙，猫沙，小拳头，铁拳头，散星草，地杨梅，三牙钻，三牙戟，蚊子草，白珠子草，不食草，疟疾草，痧药草。

【商品名】鹅不食草，石胡荽。以带有花蕾、色青绿、干燥、无泥土等杂质、嗅之作嚏者为佳。

【处方名】鹅不食草，鹅不食，不食草，鲜鹅不食草，鲜石胡荽，石胡荽等。

【性味归经】辛，温。归肺、肝、大肠经。

【功效主治】祛风，散寒，胜湿，去翳，通窍。主治感冒鼻塞，急、慢性鼻炎，过敏性鼻炎，百日咳，慢性支气管炎，蛔虫病，跌打损伤，风湿性关节炎，毒蛇咬伤，急性胃肠炎，目翳涩痒，疟疾，喉痹等。

【用量】6～10克。鲜品加倍。外用适量。

【慎忌】风热外感慎服。

黄 花 蒿

出自《本草纲目》。为菊科植物黄花蒿 *Artemisia annua* L. 的全草。全国各地均有分布。秋季割取，晒干，切段生用。

【别名】臭蒿，草蒿，香丝草，香蒿，酒饼草，马尿蒿，苦蒿，黄香蒿，黄蒿，黄黄蒿，野筒蒿，鸡虱草，秋蒿，香苦草，野苦草。

【商品名】黄花蒿，黄蒿。以色黄绿、带有花果、干燥、无杂质、气香浓烈者为佳。

【处方名】黄蒿，黄花蒿。

【注意】黄蒿与青蒿在形态、性味、功效诸方面均不相同。然而目前在全国大部分地区将本品误作青蒿使用，应予以纠正。据《本草纲目》载：“香蒿、臭蒿，通可名草蒿。此蒿与青蒿相似，但此蒿色绿带淡黄，气臭，不可食，人家采以罨酱黄、酒曲者是也。”

【性味归经】苦，寒。有臭味。归肝经。

【功效主治】清热，祛风，解毒，止痒。主治风湿痹痛，恶疮疥癣。

【用量】4～10克。鲜品10～20克。外用适量。

【慎忌】脾胃虚弱者忌服。

过 江 龙

出自《滇南本草》。为石松科植物地刷子石松 *Lycopodium complanatum* L. 的全草。主产于我国东北、西南、华南等地。四季可采，洗净鲜用或晒干生用。

【别名】蒲地虎，地蜈蚣，地刷子，地刷子石松，伸筋草，小伸筋，扁心草，木金草，公鱼秧草，凤尾草，马尾松，猴子草，猴子尾巴，舒筋草，乌龙不过江，过山龙，扫天晴明草，扁叶石松。

【商品名】地刷子，地刷子石松，过江龙。以株体肥壮、干燥、无泥土等杂质者为佳。

【处方名】过江龙，地刷子，地刷子石松，舒筋草。

【注意】本品在四川与同属植物石子藤石松 *L. casuarinoides* Spring 的全草，通称“舒筋草”，且同等使用。

过江龙的同名异物品甚多，使用时应注意鉴别。

【性味归经】辛，温。归肝经。

【功效主治】疏风胜湿，舒筋活络，利尿散瘀。主治湿痹麻木不仁，筋骨疼痛，淋证，跌打损伤。

【用量】6～10克。

【禁忌】阴虚火旺者慎服。

五、芳 香 化 湿 药

苍 术

出自《神农本草经》。为菊科多年生草本植物茅苍术（茅术、南苍术）*Atractylodes lancea* (Thunb.) DC. 或北苍术 *A.chinensis* (DC.) Koidz. 的根茎。秋季采挖。挖取根茎后，除去残茎、须根及泥土，晒干。米泔水润透切片，炒微黄用。

【别名】茅苍术，茅术，南苍术，北苍术，仙术，毛苍术，山苍术，赤术，京苍术，津苍术，关苍术，枪头菜根，马齒，青术，山刺菜根，霜苍术。

【商品名】南苍术：为植物南苍术的干燥根茎。主产于安徽、浙江、江西、江苏、湖北等地。

北苍术：又名山苍术、华苍术。为植物北苍术（枪头菜、山刺

菜)的干燥根茎。主产于内蒙古、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江等地。

茅苍术：又名毛苍术、茅术、毛术、茅山苍术。属南苍术。因产于江苏茅山而得名。为地道药材。品质最优。销全国，并出口。

京苍术：又名京茅术。为南苍术集散于南京者。

汉苍术：为南苍术集散于汉口者。多产于湖北、江西。

津苍术：为北苍术集散于天津者。

关苍术：为同属植物关苍术 *Atractylodes japonica* Koidz. ex. Kitam. 的根茎。主产于我国东北地区。亦有称产于我国东北地区的北苍术为“关苍术”的。

朝鲜苍术：为同属植物朝鲜苍术 *A. koreana* Nakai 的根茎。主产于我国东北地区。

全毛苍术：为同属植物全毛苍术 *A. chinensis* Koidz. var. *Simplicifolia* Kitag. 的根茎。主产于华北、东北地区。

赤峰苍术：为同属植物赤峰苍术 *A. chinensis* var. *quinqueloba* 的根茎。主产于东北赤峰地区。

辽东苍术：为同属植物辽东苍术 *A. chinensis* var. *liactungensis* 的根茎。主产于辽东半岛。

以上南苍术、北苍术、茅苍术、京苍术、汉苍术、津苍术为苍术之正品，品质较优。朝鲜苍术、全毛苍术、赤峰苍术、辽东苍术为苍术之副品，品质较次。每个品种均以质坚实、断面朱砂点多、香气浓者为佳。

【处方名】苍术、茅术、茅苍术、大苍术、生苍术、炒苍术、焦苍术、制苍术、米泔水炒苍术等。

生苍术为原药材去杂质，润透切片生用入药者。

处方中写苍术、茅术、茅苍术、大苍术均指炒苍术，又名焦苍术。为苍术片用麸炒至黄色入药者。

制苍术又名米泔苍术、米泔水炒苍术。为苍术片用米泔水拌匀，待吸尽，再用文火炒至黄色入药者。

【性味归经】辛、苦，温。归脾、胃经。

【功效主治】燥湿健脾，祛风疗痹。主治湿阻中焦所致的脘腹胀满，食欲不振，恶心呕吐，倦怠乏力等；风寒湿痹，脚膝肿痛，痿软无力；夜盲症，角膜软化症，眼目昏涩等。

【用量】6～12克。

【禁忌】胃阴不足者慎服。

厚朴（附：厚朴花）

出自《神农本草经》。为木兰科落叶乔木植物厚朴 *Magnolia officinalis* Rehd. et Wils. 或凹叶厚朴 *M. biloba* (Rehd. et Wils) Cheng 的干皮、根皮及枝皮。主产于四川、湖北、浙江、贵州、湖南等地。4～6月剥取，根皮及枝皮直接阴干，干皮置沸水中微煮后堆置阴湿处，“发汗”至内表面变紫褐色或棕褐色时，蒸软取出，卷成筒状，干燥，姜汁制用。

【别名】川朴，川厚朴，姜厚朴，姜朴，厚皮，重皮，紫油厚朴，温厚朴，温朴，凹叶厚朴，紫朴，紫油朴，毛根朴，根朴，靴朴，筒朴，枝朴，鸡肠朴，脑朴，兜朴，蔸朴，如意朴，如意厚朴，靴角朴、庐山厚朴，庐山朴，赤朴，烈朴，淡柏，淡伯。

【商品名】紫油厚朴：又名紫油朴、川朴、川厚朴。为产于四川、湖北者。品质最优，销全国，并出口。

温厚朴：又名温朴、庐山厚朴。为产于浙江、福建者。因在温州交易，故名。质亦佳。

潜山厚朴：又名潜山朴。为产于安徽潜山者。品质优良。

筒朴：又名朴筒。为主干的干皮经加工后卷成筒状者。

双卷朴：又名如意卷厚朴、如意朴。筒朴的一种。加工后卷成双卷筒状，形似如意，故又名“如意朴”、“如意卷厚朴”。

单卷朴：为加工成单筒状的筒朴。

靴朴：又名靴角朴。为靠近根部的干皮。经加工后状如长筒靴

形，故名“靴朴”。

根朴：又名朴根。从主根上剥下的皮层，加工成单筒状。

毛根朴：又名鸡肠朴。从较细根上剥下的皮层，经加工而成。因弯曲如肠，故名“鸡肠朴”。

枝朴：是从较粗枝上剥下的皮层。皮薄，呈单筒状。

脑朴：又名朴脑、耳朴。为靠近根部的干皮。经加工后形似耳状，故名耳朴。

兜朴：又名蔸朴。为树蔸上下的干皮及根皮。为脑朴、靴朴的统称。

以皮厚肉细、断面色棕紫、有小亮星、油性大、气香浓厚者为佳。

【处方名】厚朴，川朴，姜朴，姜厚朴，姜苏朴，姜苏制厚朴等。

处方中写厚朴、川朴指生厚朴。为原药材除去杂质，润切成丝入药者。

姜朴又名姜厚朴。为厚朴丝用生姜汁拌匀，待吸尽，再用文火炒干入药者。

姜苏朴又名姜苏制厚朴。为厚朴丝用姜苏汤（生姜、紫苏煎汤）拌匀，然后晾干入药者。

【注意】在药材商品市场上，甘肃、陕西一些地方把同属植物木兰*Magnolia liliiflora* Desr.的树皮误作“厚朴”入药。在广西、云南、江西等地将木兰属多种植物(*Magnolia* spp.)及木莲属多种植物(*Manglietia* spp.)的根皮误作“厚朴”入药。这些药材与厚朴功效不同，不能混用。

【性味归经】苦、辛，温。归脾、胃、肺、大肠经。

【功效主治】行气，燥湿，消积，平喘。主治湿阻、食积、气滞而致的脾胃不和，脘腹胀满；痰涎壅盛，咳嗽气喘。

【用量】3～10克。

【禁忌】气虚者慎服。

附：厚朴花

厚朴花又名朴花、川朴花、调羹花。为厚朴的花蕾。春末夏初当花蕾未开放时采摘，焙干或烘干用。性味辛苦温。有芳香化湿，行气宽胸的功效。主治湿浊、气滞引起的脘腹胀痛等证。用量3～6克。

藿 香

出自《名医别录》。为唇形科多年生草本植物广藿香 *Pogostemon cablin* (Blanco) Benth. 或 藿香 *Agastache rugosa* (Fisch. et Mey.) O. Ktze. 的地上部分。春秋季节枝叶茂盛时采割。干燥，切段，生用或鲜用。

【别名】 广藿香，土藿香，枝香，川藿香，正香，肇庆香，禄步香，海藿香，海南藿香，石牌藿香，要高藿香，湛江藿香，鲜藿香，野藿香，排香草，兜婆婆香，钵怛罗香，玲珑藿去病。

【商品名】 广藿香：又名枝香、南藿香。为植物广藿香的地上部分。产于广东。一般认为本品种品质较优。

正香： 为广藿香中产于广州市郊者。品质最优。

石牌藿香： 为广藿香中产于广东石牌地区者。

肇庆香： 又名肇庆藿香、禄步香、禄步藿香、要高藿香。为广藿香中产于广东要高地区者。

海藿香： 又名海南藿香。为广藿香中产于海南万宁者。

湛江藿香： 为广藿香中产于湛江者。

藿香： 又名土藿香、杜藿香、野藿香、排香草、川藿香。为植物藿香的地上部分。全国大部分地区均产，主产于四川、江苏等地。

苏藿香： 为藿香中产于江苏苏州地区者。

杜藿香：为藿香中产于浙江者。

川藿香：为藿香中产于四川者。

以上均以茎枝青绿、叶多、不带根及泥土、香气浓者为佳。

【处方名】藿香，藿香叶，藿香梗，鲜藿香，合香等。

【注意】产于云南南部及西南部的同科植物冠唇花〔又名野藿香、班草刚（景颇语）、牙皮弯（傣语）〕*Microtoena insuavis* (Hance) Prain ex Dunn的全草，在当地作“藿香”入药。此药材非藿香正品，使用时应注意鉴别。

【性味归经】辛，微温。归脾、胃、肺经。

【功效主治】化湿，解暑，止呕。主治湿阻中焦所致之脘腹胀满，食欲不振，恶心呕吐；暑湿证及湿温证初起，恶寒发热，头痛头重，脘腹痞满，呕恶泄泻等。

【用量】6～10克。鲜品加倍。

【禁忌】胃阴不足者慎服。

佩 兰

出自《神农本草经》。为菊科多年生草本植物兰草*Eupatorium fortunei* Turcz.的地上部分。主产于江苏、浙江、河南、河北、山东等地。6月收割头刀，8月收割二刀。除去杂草，扎成小把，切段晒干，生用或鲜用。

【别名】省头草，兰草，香草，佩兰叶，蘭，兰，都梁香，大泽兰，燕尾香，香水兰，孩儿菊，千金草，女兰，醒头草，石瓣，针尾凤，乱尾凤，香佩兰，圆梗泽兰，水香，山兰，山竹兰，鸡骨香，尖佩兰。

【商品名】佩兰。以叶多、质嫩、色绿、干燥、无杂质、香气浓者为佳。

【处方名】佩兰，香佩兰，佩兰叶，佩兰梗，鲜佩兰，省头草等。

【注意】佩兰与泽兰在古代已有混淆。至明代李时珍的《本草纲目》才把二者明确地区分开来。但是，目前市售商品仍较混乱。山东、江苏个别地区把唇形科植物罗勒 *Ocimum basilicum* L. var *Pilosum* (Willd.) Benth. 的全草误作“佩兰”入药。黑龙江省个别地区把唇形科植物泽兰（地筭、地瓜儿苗、方梗泽兰）*Lycopus lucidus* Turcz. 的全草误作“佩兰”入药。有的地区把菊科植物旱莲草 *Eclipta prostrata* (L) L. (*E. alba* (L) Hassk.) 误作“佩兰”入药。有些地区把豆科植物草木樨 *Melilotus suaveolens* Leteb. 的全草误作“佩兰”入药。西藏地区把菊科植物大麻叶泽兰 *Eupatorium cannabinum* L. 的全草误作“佩兰”入药。湖北、湖南、福建、广东、广西的个别地区甚至把“佩兰”误作“泽兰”入药。以上这些都是错误的，均应予以纠正。

另外，佩兰和豆科植物草木樨、唇形科植物罗勒，都有“省头草”之别名。故处方时宜用正名，以防弄错。

【性味归经】辛，平。归脾、胃经。

【功效主治】化湿，解暑。主治湿阻中焦，脘腹胀满，食欲不振，呕吐恶心；脾经湿热，口中甜腻多涎之脾瘅证；外感暑湿或湿温初起，头痛头沉，恶寒发热，脘腹痞满，恶心烦闷等。

【用量】5～10克。鲜品加倍。

【禁忌】胃阴不足者慎服。

砂 仁(附：砂仁壳)

出自《开宝本草》。为姜科植物阳春砂 *Amomum villosum* Lour. 或海南砂 *A. longiligulare* T.L.Wu 或缩砂 *A. xanthoides* Wall. 的干燥成熟果实。均予夏秋间果实成熟时采收，晒干，打碎生用。

【别名】缩砂，缩砂仁，春砂仁，缩沙蜜，缩砂蔻，阳春砂，阳春砂仁，海南砂，海南砂仁，西砂，西砂仁，进口砂，进口砂

仁，壳砂仁，砂米，砂头，砂王，大砂王，原砂仁，白砂仁，奎砂仁，赛桂香，风味团头，罗定砂仁，蟠龙正春砂。

【商品名】阳春砂仁：又名阳春砂、春砂仁、春砂、蜜砂仁、土砂仁、土密砂。为植物阳春砂的干燥果实。主产于广东省阳春、信宜、高州等地。广西亦产。本品种品质最优。

海南砂仁：又名海砂仁。为植物海南砂的干燥果实。主产于海南岛及湛江地区。

西砂仁：又名缩砂仁、缩砂、进口砂仁、西砂米、绿壳砂、绿壳砂仁等。为植物缩砂的干燥果实。主产于越南、印度尼西亚、泰国等地。我国云南亦产。

以上均以果实个大、粒实饱满、无杂质、气味浓者为佳。

广砂：又名广砂仁。为阳春砂仁中产于广西者。品质较产于广东者为次。

壳砂仁：又名壳砂、砂果、连壳砂。果实成熟采收后，晒干或文火焙干的制品。也即砂仁剥去果皮前的完整果实。

砂仁：又称原砂仁。即剥去果皮的种子团。

砂米：将种子团搓开，单粒种子称砂米。

砂壳：又名砂仁壳。即砂果的外壳。亦即砂果取出砂仁后留下的果皮。

【处方名】砂仁，砂米，缩砂仁，春砂仁，阳春砂，盐砂仁等。

处方中写砂仁、砂米、缩砂仁、春砂仁、阳春砂均指生砂仁。为原药材去杂质及果壳，打碎生用入药者。

盐砂仁为净砂仁用盐水拌匀，待吸尽，然后用文火炒干入药者。引药走下，既养胃又温肾。

【性味归经】辛，温。归脾、胃经。

【功效主治】化湿，行气，温中，安胎。主治湿阻中焦，脾胃气滞，脘腹胀满疼痛，不思饮食，呕吐泄泻；妊娠恶阻，胎动不安。

【用量】 3～10克。

【慎忌】 胃阴不足者慎服。

附：砂仁壳

砂仁壳为砂仁之果壳。又名砂壳、春砂壳、阳春砂壳、海南砂壳、海砂壳、缩砂壳、西砂壳、绿砂壳、密砂壳、土砂壳、土密砂壳等。性味功效与砂仁相似，但温性略减，化湿、行气之力较弱。适用于脾胃气滞，脘腹胀满，呕恶食少等证。用量3～5克。胃阴不足者慎服。

白豆蔻（附：豆蔻壳）

出自《开宝本草》。为姜科多年生草本植物白豆蔻 *Amomum cardamomum* L. 的干燥成熟果实。主产于越南、泰国。我国广东、广西、云南亦有栽培。10～12月果实黄绿尚未开裂时采收，晒干，打碎生用。

【别名】 白蔻，白叩，白蔻仁，叩仁，蔻仁，豆蔻，豆叩，豆蔻仁，豆叩仁，叩米，扣仁，蔻米，圆豆蔻，十开蔻，十开叩，紫蔻，紫叩，小白蔻，小白叩，枫蔻，枫叩，三角蔻，三角叩，印度蔻，印度叩，多骨，壳蔻，原豆蔻，波扣，带壳蔻，东波蔻，脾家瑞气。

【商品名】 紫蔻：又名紫叩、紫豆蔻、紫豆叩、十开蔻。为姜科植物白豆蔻的干燥果实。其中个大饱满、壳薄无空皮、种皮呈暗棕色或灰棕色者，称为紫蔻。品质最佳。

枫蔻：又名枫叩、小白蔻、三角蔻、三角叩、印度蔻、印度叩。为姜科植物白豆蔻的干燥果实。其中个小瘦瘪，外皮较厚者，称为枫蔻。品质较差。

白豆蔻：又名白蔻、白叩、豆蔻、豆叩、圆豆蔻、圆豆叩、原

豆蔻、原豆叩。为本品带壳者。

以上均以个大、粒实饱满、果壳完整、香气浓厚者为佳。

蔻仁：又名叩仁、蔻球、叩球、白蔻仁、白叩仁、豆蔻仁、豆叩仁等。为本品去壳的种子团。

蔻米：又名叩米。将种子团打开，单粒种子称“蔻米”。

蔻壳：又名叩壳、白蔻壳、白叩壳、白豆蔻壳、豆蔻壳、豆叩壳、白蔻皮、白叩皮、豆蔻皮、豆叩皮、蔻皮、叩皮、白蔻衣。为本品果实的外壳。

小豆蔻：为姜科植物小豆蔻 *Elettaria cardamomum* White et Maton 的干燥果实。主产于印度、越南、斯里兰卡等国。该品种品质较次，非白豆蔻正品。

【处方名】白豆蔻，白豆叩，白叩，叩仁，白蔻，蔻仁，豆蔻仁，紫蔻，白扣等。

【性味归经】辛，温。归肺、脾、胃经。

【功效主治】化湿，行气，温中，止呕。主治寒湿阻滞中焦，脾胃气滞之脘腹胀满疼痛，不思饮食，恶心呕吐，湿温初起，胸闷不饥。

【用量】3～9克。

【慎忌】胃热及胃阴不足者忌服。

附：豆蔻壳

豆蔻壳为白豆蔻的果壳。又名白豆蔻壳、白豆叩壳、豆叩壳、蔻壳、叩壳、白蔻壳、白蔻皮、豆蔻皮、白蔻衣、枫蔻皮、紫蔻壳、紫蔻皮、紫蔻衣、枫蔻壳、三角蔻壳、印度蔻壳等。性味功效与白豆蔻相似，但湿性较减，力亦较弱。适用于湿阻气滞，胸脘痞闷，食欲不振，呕吐等证。用量3～5克。胃热及胃阴不足者忌服。

草豆蔻

出自《名医别录》。为姜科多年生草本植物草豆蔻 *Alpinia katsukadai* Hayata 的干燥成熟的种子团。主产于广西、广东等地。夏秋二季采收略变黄的果实，晒至半干，除去果皮，取出种子团，晒干，打碎生用。

【别名】草蔻，草叩，草扣，草叩仁，草蔻仁，假麻树子，假麻树仁，偶子，豆蔻，漏蔻，草果，大草蔻，飞雷子，弯子。

【商品名】草豆蔻，草蔻。以个大、饱满坚实、气味浓者为佳。

【处方名】草蔻，草叩，草豆蔻，草豆叩等。

【注意】本品与肉豆蔻、白豆蔻都有“豆蔻”之别名，极易混淆。应使用正名，以免弄错。

本品别名“草果”，与姜科植物草果 *Amomum tcao-ko* Crevost et Lem. 名称相同，二者易混，应注意分辨。并避免使用别名，以免弄错。

【性味归经】辛，温。归脾、胃经。

【功效主治】燥湿，温中，行气。主治寒湿阻滞脾胃所致的脘腹胀满疼痛，呕吐，泄泻等。

【用量】6～9克。

【慎忌】胃阴不足，口干舌燥者忌服。

草 果

出自《饮膳正要》。为姜科多年生草本植物草果 *Amomum tcao-ko* Crevost et Lem. 的干燥成熟果实。主产于云南、贵州、广西等地。秋季果实成熟时采收，除去杂质，晒干，去皮取仁，用时微炒，或加姜汁微炒。

【别名】草果仁，草果子，姜草果，姜草果仁。

【商品名】草果，草果仁。以个大、饱满、表面棕红色、气香浓者为佳。

【处方名】草果，草果仁，炒草果仁，姜草果仁，姜炒草果仁，煨草果，煨草果仁等。

处方中写草果、草果仁指炒草果仁。为净草果仁用文火微炒入药者。

姜草果仁又名姜炒草果仁。为净草果仁用姜汁拌匀，稍闷，待吸尽，然后用文火炒干入药者。

煨草果又名煨草果仁。为净草果外涂面粉糊，烘烤至面糊焦黑时，除去焦面，取出草果捣碎入药者。

【注意】姜科植物草豆蔻 *Alpinia ka'sumatai* Hayata 别名“草果”，与本品名称极易混淆，应注意分辨，并提倡使用正名，以免搞错。

【性味归经】辛，温。归脾、胃经。

【功效主治】燥湿，温中，截疟。主治寒湿阻滞脾胃所致的脘腹胀满疼痛，呕吐，泄泻，瘴疟，疟疾。

【用量】6～10克。

【慎忌】胃阴不足者忌服。

零陵香

出自《本草拾遗》。为报春花科植物灵香草 *Lysimachia foenum-graecum* Hance 的带根全草。主产于广西、广东、四川、云南、贵州等地。9～10月间采收，将植物连根拔起，去净根上泥沙，洗净，阴干或烘干。

【别名】熏草，燕草，熏香，香草，蕙草，铃铃香，铃子香，黄零草，陵草，灵香草，广零陵香，广灵香，平南香，满山香，驱蛔虫草，薰衣草，排草。

【商品名】零陵香，灵香草，广零陵香。以茎叶嫩细、干燥、色灰绿、香气浓、无泥沙者为佳。

【处方名】零陵香，香草。

【注意】在药材商品市场上，零陵香的市售品种异常混乱。据《证类本草》濠州零陵香及《植物名实图考》的零陵香附图，均似唇形科植物罗勒 *Ocimum basilicum* L. 或九层塔 *O. sanctum* L.，但目前仅江浙地区用罗勒作零陵香使用。九层塔仅在台湾及海南岛有分布。目前市售零陵香药材商品主要为灵香草。该种与《证类本草》所载之濠州零陵香相符。

另外，零陵香有同名异物商品存在，如菊科植物稀毛香青（又名灵香蒿、零陵香、五月霜）*Anaphalis hancockii* Maxim. 的全草，别名亦称零陵香，应注意鉴别。

【性味归经】辛、甘，温。归肺、脾、大肠经。

【功效主治】祛风寒，避秽浊，驱蛔虫，行气止痛。主治风寒感冒头痛，胸腹胀满，咽喉肿痛，牙痛，蛔虫症，下利，遗精，鼻塞。

【用量】6～10克。鲜品10～15克。外用适量。

【禁忌】不宜多服。宜与升麻、细辛配伍。

六、利 水 渗 湿 药

茯 苓(附：茯苓皮 赤茯苓 茯神)

出自《神农本草经》。为多孔菌科真菌茯苓 *Poria cocos* (Schw.) Wolf 的菌核。多寄生在松科植物赤松或马尾松等树的树根上。野生或人工栽培。主产于云南、四川、安徽、河南、湖北等省。7～9

月采挖，除去泥沙，切制阴干，生用。

【别名】白茯苓，云苓，大云苓，安苓，伏灵，伏兔，松腴，野苓，杜茯苓，个茯苓，个苓，皮苓，皮茯苓，平片，方苓，白苓片，茯灵，伏菟，伏蓼，茯菟，绎晨伏胎，茯兔，松薯，松木薯，松苓，云茯苓，平片苓，更生，福临，不死面。

【商品名】白茯苓：为茯苓菌核内部的白色部分。

赤茯苓：又名赤苓。为切成片状或小方块状的茯苓皮层下的赤色部分。

个苓：又名皮苓、个茯苓、茯苓个、皮茯苓。为未切开的整体茯苓。以体重坚实、外皮黑褐色而略带光泽、皱纹深而无裂隙、断面色白细腻、粘牙力强者为佳。

方苓：又名白苓块、茯苓块。为切成方形的片状的白茯苓。

骰方：为切成1立方厘米正方体的白茯苓。

平片苓：又名平片、片苓、白苓片。为切成薄片的白茯苓。

白碎苓：为白茯苓加工时留下的碎块或碎屑。

茯苓皮：又名苓皮。为茯苓菌核的黑色外皮。

连皮苓：为切成方块形的带有外皮的茯苓。

茯神：又名伏神、茯神块、抱茯神、抱木神、白茯神、抱木茯神等。为带有松根的茯苓。抱木而生。多切成正方形片状。

茯神木：又名茯神心、茯神心木、松节、黄松节。为茯神中的松根。

云茯苓：又名云苓。为产于云南的白茯苓。品质最优。

浙茯苓：又名浙苓。为产于浙江的白茯苓，品质亦佳。

安茯苓：又名安苓。为产于安徽的白茯苓。产量最大。

【处方名】茯苓，云苓，白茯苓，朱茯苓，朱衣茯苓，辰茯苓等。

处方中写茯苓、云苓、白茯苓均指生白茯苓。为原药去皮切片入药者。

朱茯苓又名朱衣茯苓、辰茯苓。为平片苓用清水喷湿，外用朱

砂粉涂红晾干入药者。

【性味归经】甘、淡，平。归脾、心、肾经。

【功效主治】利水渗湿，健脾，安神。主治小便不利，水肿，停饮，脾虚体倦，食少便溏，心悸，失眠等。

【用量】10~15克。

附：茯苓皮 赤茯苓 茯神

茯苓皮为茯苓菌核的黑色外皮，又名苓皮、云苓皮。性味同茯苓。有利水消肿的功能。主治水肿、小便不利等证。

赤茯苓是皮层下的赤色部分（除去赤茯苓后的白色部分称为白茯苓），又名赤苓。有利湿热、活血化瘀的功能。主治小便不利、湿热泄泻等证。

茯神是抱松根而生者（亦即白茯苓中心穿有细松木心者）。有宁心安神的功能。主治失眠、健忘，心悸怔忡等证。茯神片用清水喷湿，外用朱砂粉涂红，晾干入药，称为朱茯神、朱衣茯神或辰茯神。安神功效更佳。

猪 莹

出自《神农本草经》。为多孔菌科真菌猪苓 *Polyporus umbellatus* (Pers) Fr. 的菌核。寄生于桦树、枫树、槭树、柞树、柳树的腐朽根上。主产于河南、河北、陕西、四川、云南等地。春秋季采挖，去泥沙，晒干，切片，生用。

【别名】枫苓，朱苓，野猪粪，野猪食，豕苓，豕零，猩猪粪，豕橐，豨苓，地乌桃，猪屎苓，黑猪苓，粉猪苓，结猪苓。

【商品名】猪苓。以质坚体重、外皮乌黑光润、断面洁白者为佳。

【处方名】猪苓，朱苓。

【性味归经】甘、淡，平。归肾、膀胱经。

【功效主治】利水渗湿。主治小便不利，水肿，泄泻，淋浊，带下等。

【用量】6～12克。

泽 泻

出自《神农本草经》。为泽泻科多年生沼泽植物泽泻 *Alisma orientale* (Sam.) Juzep. 的块茎。主产于福建、四川、江西等地。冬季采挖，洗净，切片，晒干，生用，或麸炒或盐水炒用。

【别名】泽泄，川泽泻，建泽泻，广泽泻，水泻，水泽，及泻，芒芋，天秃，一枝花，天鹅蛋，车苦菜，如意花，泽夕，鹄泻，泽芝，萎，萎根，蒲，蒲根，葛，葛根，牛唇根，水菜根，蕕菜根，耳泽，小圆泻，建泻，建泄，泽下，川下，建下，宅下，文且，禹孙，宅夕，水白菜。

【商品名】建泽泻：又名福泽泻。为产于福建、江西者。个大，皮光滑呈圆形。品质优良，为本品地道药材。

川泽泻：为产于四川者。个小，皮粗糙。

光泽泻：除去细毛根，并用竹笼撞去须毛及粗皮而得的加工品。

以上商品以个大质坚、色黄白、粉性足者为佳。

【处方名】泽泻，泽泄，泽夕，炒泽泻，盐泽泻，盐水泽泻等。

处方中写泽泻、泽泄、泽夕指生泽泻。为原药去杂质切片生用入药者。

炒泽泻为泽泻片经麸炒或清炒后入药者。

盐泽泻又名盐水泽泻。为泽泻片用盐水喷淋，待吸尽，再用文火炒至微黄入药者。

【注意】有人在处方时将泽泻和泽漆都写成“泽夕”，容易混淆，应引起注意。

【性味归经】甘、淡，寒。归肾、膀胱经。

【功效主治】利水渗湿，泻热。主治小便不利，水肿，泄泻，淋浊，带下，痰饮。

【用量】6～10克。

【禁忌】孕妇慎服。

薏 莩 仁

出自《神农本草经》。为禾本科多年生草本植物薏苡 *Coix laevigata-jobi* L. 的成熟种仁。我国大部分地区均产，主产于福建、河北、辽宁等地。秋季种子成熟时采收，晒干，除去外壳及种皮，生用或炒用。

【别名】薏苡米，苡仁米，苡米仁，薏仁，薏米，玉米，苡仁，苡米，薏苡，药玉米，水玉米，米仁，沟子米，六谷米，薏仁米，薏米仁，六谷子，菩提珠，草珠子，蒲米仁，祁薏米，关米仁，蒲薏仁，祁薏仁，关薏仁，解蠡，起实，薏米，感米，薏珠子，回回米，草珠儿，草珠子，菩提子，薏珠，必提珠，芑实，珠珠米，胶念珠，尿塘珠，老鸦珠，菩提珠，裕米，尿端子，尿珠子，僵生子，蓼茶子，益米，屋葵子，玉秫子，草菩提子，薏黍子，鬼珠箭子，尿塘草子，铁玉蜀黍子，瞎眼子树子，桂珠黍子，便婆菊子，天谷，起目，玉珠。

【商品名】蒲薏仁：又名蒲米仁。为产于福建蒲城一带者。

祁薏仁：又名祁薏米。为产于河北安国一带者。

关薏仁：又名关米仁。为产于辽宁辽阳一带者。

壳米仁：薏苡种子未去壳者。

净米仁：薏苡种子已去壳者。

川谷：为薏苡的变种植物川谷 *Coix lacryma-jobi* L. var. *macrograna* (Roman) Stapf 的种仁。为薏苡仁副品，可替代薏苡仁入药。

以上商品以粒大、饱满、干燥、色白、无破碎者为佳。

【处方名】薏苡，苡仁，薏米，苡米，薏苡仁，生苡仁，生薏仁，炒薏仁，炒苡仁，焦薏仁，焦苡仁等。

处方中写薏苡仁、薏仁、苡仁、薏苡、薏米、苡米均指生薏苡仁，或称生薏仁、生苡仁。为原药去杂质生用入药者。

炒薏苡仁又名炒薏苡、炒薏仁、炒苡仁、炒薏米、炒苡米等。为净薏苡仁用文火炒至微黄，略带焦斑入药者。

焦薏仁又名焦苡仁。为净薏苡仁用文火炒至深黄色入药者。

【性味归经】甘、淡，微寒。归脾、胃、肺经。

【功效主治】利水渗湿，健脾除痹，清热排脓。主治小便不利，水肿，脚气，脾虚泄泻，风湿痹痛，筋脉挛急，肺痈，肠痈。

【用量】15~30克。

【禁忌】孕妇慎服。

车 前 子（附：车前草）

出自《神农本草经》。为车前科多年生草本植物车前 *Plantago asiatica* L. 或平车前 *P. depressa* Willd. 的成熟种子。前者产于全国各地，后者产于北方各省。夏秋季种子成熟时采收，晒干，除去杂质。生用，炒用，或盐水炒用。

【别名】猪耳朵胡子，猪耳朵棵子，牛舌头棵子，车轮菜子，车轱辘菜子，荷包叶子，鞋底片子，车前实，凤眼前仁，驴耳朵菜子，蟾蜍草子，牛舌草子，田菠草子，虾蟆衣子，猪耳草子，平车前子，小粒车前子，小车前子，大粒车前子，大车前子，江车，关车，猪耳朵穗子，凤眼前子，芣苢子，马舄子，当道子，陵舄子，车前草子，牛遗子，胜舄子，胜舄菜子，蛤蟆草子，虾蟆草子，钱贯草子，牛舄子，地胆头子，白貫草子，饭匙草子，七星草子，五根草子，黄蟆龟草子，猪肚菜子，灰盆草子，打官司草子，钱串草子，五斤草子，田菠菜子，医马草子，马蹄草子，鸭脚板子，牛甜菜子，黄蟆叶子，牛耳朵棵子，车前仁，前仁，乌乃巴。

【商品名】大粒车前子：又名大车前子、江车、江车前、江车前子、大车前等名称。为植物车前的种子。主产于江西、河南。此外，东北、华北、西南及华东等地亦产。

小粒车前子：又名小车前子、平车前子、秃车前子、小车前、平车前、秃车前等名称。为植物平车前的种子。主产于黑龙江、辽宁、河北等地。此外，山西、内蒙古、吉林、陕西、甘肃、青海、山东等地亦产。

关车前子：又名关车、关车前、大关车等。为大粒车前子产于辽宁者。

以上商品以粒大、饱满、干燥、色黑亮润、无杂质者为佳。

【处方名】车前子，生车前子，炒车前子，炙车前子，盐车前子，酒车前子等。

处方中写车前子指生车前子。为原药去杂质生用入药者。

炒车前子又名炙车前子。为净车前子用文火炒至微焦香时，取出晾凉入药者。

盐车前子又名盐水炒车前子。为净车前子用文火炒至微香时，喷洒盐水，翻炒均匀，取出晾凉入药者。

酒车前子为净车前子用黄酒淋洒拌匀，微闷，待吸尽，再用文火炒干入药者。

【性味归经】甘、微苦，寒。归肾、肝、肺经。

【功效主治】利水通淋，止泻，清肝明目，清肺化痰。主治小便不利，水肿，淋浊；暑湿泄泻；目赤，内障，视物昏暗；肺热咳嗽痰多。

【用量】5～10克。布包煎汤。

【慎忌】孕妇及肾虚滑精者慎服。

附：车前草

车前草又名箭、车前、蟾蜍草、牛舌草、田菠草、虾蟆衣、车轮

菜、车前菜、猪耳草、猪耳朵草、猪耳朵胡、猪耳朵棵、驴耳朵菜、牛舌头棵、车轱辘菜、荷包叶、鞋底片、凤眼前，猪耳朵穗、芣苢、芣苡、马舄、当道、陵舄、牛遗、胜舄、胜舄菜、蛤蟆草、虾蟆草、钱贯草、牛舄、地胆头、白贯草、饭匙草、七星草、五根草、黄蟆龟草、猪肚菜、灰盆草、打官司草、钱串草、五斤草、田菠菜、医马草、马蹄草、鸭脚板、牛甜菜、黄蟆叶、牛耳朵棵、牙烟育、鸡儿梗衣、立住、卡巴落、众挖、瓦那他、穷膜作车、构拿车、差真潮、塔冉、巴不吗、布靴娥、幼马地、亚沿脱、吗烈马、笃卡苦等等。夏季开花前采集，洗净晒干，或鲜用。其性味甘寒，有清热利尿、明目降压、祛痰止咳的功能，主治小便不利，淋浊，带下尿血，黄疸，水肿，热痢，泄泻，高血压，气管炎，百日咳，咽喉肿痛，目赤肿痛，疮毒等证。每次用10~30克。

滑 石

出自《神农本草经》。为单斜晶系滑石的矿石。主要含有含水硅酸镁。产于山东、江苏、安徽、陕西、山西、河北、江西、广西、广东、四川、云南、辽宁等地。采挖后，去净泥土和杂质，粉碎用。

【别名】滑石粉，西滑石，画石、活石，硬滑石，软滑石，液石，共石、脱石，番石，夕冷，脆石，留石，冷石，背。

【商品名】硬滑石：又名活石。为矿物学中的滑石，主含硅酸镁。主售华北、东北。

软滑石：又名高岭石。主含硅酸铝。主售华东及四川、湖北、贵州等地。

生滑石：又名滑石块、块滑石。为原药材洗净砸碎的小块。

滑石粉：为滑石块碾成的细粉。

以上商品以色白、滑腻、无杂质等杂质者为佳。

【处方名】滑石，滑石粉，西滑石，飞滑石或水飞滑石。

【性味归经】甘、淡，寒。归胃、膀胱经。

【功效主治】利水通淋，清热解暑。主治小便不利，淋沥涩痛，暑热烦渴，湿温胸闷，湿热泄泻。外用治疗痱子、湿疮、湿疹等皮肤病。

【用量】10~15克。外用适量。

【慎忌】寒证患者忌服。

木 通

出自《神农本草经》。为马兜铃科藤本植物木通马兜铃（东北马兜铃）*Aristolochia manshuriensis* Kom. 或毛茛科常绿攀援性灌木小木通*Clematis armandii* Franch. 及同属绣球藤*C. montana* Buch.-Ham. 的藤茎。均于春秋两季采收，除去粗皮，晒干，生用。

【别名】木通马兜铃，东北马兜铃，小木通，绣球藤，万年藤，马木通，白木通，川木通，关木通，细木通，淮木通，槐通，猪鬃藤，八月瓜藤，东北木通，大木通，花木通，通草，附支，丁翁，丁父，蓄藤，王翁，万年，四朵梅，燕麦，乌麦，地海参，老虎须，山铁线莲。

【商品名】关木通：又名马木通、东北木通、苦木通。为植物木通马兜铃的木质茎。主产于黑龙江、吉林、辽宁和山西、陕西、甘肃等地。以茎条均匀、无粗皮、断面色黄者为佳。

川木通：又名淮木通、白木通、油木通、山木通、土木通、花木通、白花木通、小木通。为植物小木通和绣球藤等的木质茎。主产于安徽、湖北、四川、陕西、贵州、云南等地。以茎条均匀、断面色黄白、无黑心者为佳。

淮通：为植物淮通马兜铃*Aristolochia moupinensis* Franch. 的木质茎或根。主产于四川、云南、贵州、湖北等地。

白木通：为木通科植物白木通*Akebia trifolia* (Thunb.) Koidz., var. *australis* (Diels) Rehd. 的木质茎。

潼木通：又名童木通。为产于陕西临潼一带者。

细木通：又名子木通、藤通。为枝细色白者，品质较佳。

大木通：为枝粗色黄者。品质较次。

匀木通：为枝条中等，不粗不细，色黄而无黑色者。品质逊于细木通而优于大木通，品质中等。

【处方名】木通，关木通，川木通，细木通，炒木通（木通片炒至见黑斑入药者）。

【注意】木通的市售商品品种比较混乱。湖南把植物女萎 *Clematis apiifolia* DC. 作“木通”使用。四川省南川地区把植物单叶铁线莲 *C. henryi* Oliv. 作“木通”使用。四川巴县把植物毛木通 *C. leschenaultiana* DC. 作木通使用。有些地区把植物黄藤通 *C. grata* Wall var. *argentilucida* (Levl. et Vant.) Rebd. 作“木通”使用，湖南称“木通”，四川称“毛木通”，云南称“大木通”。云南一些地区还把植物小蓑衣藤 *C. gouriana* Roxb. var. *finetii* Rehd. et Wils. 作木通使用。以上这些同属植物均非木通正品，应注意鉴别。

《神农本草经》把木通称为“通草”，应与五加科植物通草 *Tetrapanax papyriferus* (Hook.) K. Koch 相鉴别。阅读古代文献时应予以注意。

【性味归经】苦，寒。归心、小肠、膀胱经。

【功效主治】利水通淋，泄热，通乳。主治湿热蕴结膀胱所致的小便短赤，淋漓涩痛；心火上炎所致的口舌生疮，心烦尿赤；产后乳汁不多，乳腺炎；湿热痹证。

【用量】 3～6 克。

【禁忌】 不宜久服和大剂量服用。孕妇慎服。

通 草

出自《本草拾遗》。为五加科灌木植物通脱木 *Tetrapanax*

papyriferus (Hook.) K. Koch的茎髓。主产于云南、贵州、四川、广西、台湾等地。秋季采割地上茎，截成段，趁鲜取出茎髓，晒干。生用。

【别名】方通草，丝通草，通草丝，通脱木，通花，方通，通根，通草棍，小通草，空心通草，实心通草，大通草，白通草，泡通，寇通，寇脱，离南，活莞，倚商，葱草，花草，通大海，五加风，宽肠，宽草，大通塔，大木通，五角加皮，通花五加，大叶五加皮。

【商品名】大通草：又名通脱木、空心通草。为植物通脱木的茎髓。主产于云南、贵州、四川、广西、福建、台湾等地。以茎髓粗壮、干燥、洁白、空心有隔膜者为佳。

小通草：又名通棍、通草棍、通花、实心通草。为旌节花科植物喜马拉雅旌节花 *Stachyurus himalaicus* Hook. f. et Thoms. 的茎髓。以色白、干燥、无斑点者为佳。

方通草：又名方通。为通草经层叠压平，用一定尺寸的四方模板截成的方形薄片。

丝通草：又名丝通。为加工方通草时修裁下来的碎丝。

建方通：指福建、台湾产的方通草。性质柔软，品质优良。

川方通：产于贵州、云南而在四川重庆加工的方通草。

凤尾通草丝：又名凤尾丝。为加工方通草时头刀裁下的毛丝。

修边通草丝：又名修边丝。为加工方通草时最后修裁掉的细丝。

【处方名】通草，通花，通脱木，朱通草（通草片喷湿，拌入适量朱砂粉末，晾干入药者）。

【注意】古代医籍（如《神农本草经》）中把木通称“通草”，应与本品相鉴别。并在阅读古医籍时予以注意。

本品别名“大木通”，木通也有“大木通”之别名。二者名称易混。应使用正名，不用别名，以免搞错。

本品还有五角加皮、通花五加、大叶五加皮等别名，易与五加皮名称相混，也应引起注意。

【性味归经】甘、淡，微寒。归肺、胃经。

【功效主治】清热利水，通乳。主治小便不利，淋沥涩痛，小便短赤，产后乳汁不多。

【用量】3～5克。

【慎忌】孕妇慎服。

金 钱 草

出自《本草纲目拾遗》。为报春花科多年生草本植物过路黄 *Lysimachia christinae* Hance, 唇形科植物活血丹(连钱草) *Glechoma longituba* (Nakai) Kupr., 豆科植物金钱草 *Desmodium styracifolium* (Osbeck) Merr., 伞形科植物白毛天胡荽 *Hydrocotyle sibthorpioides* Lam. var. *batrachium* (Hance) Hand.-Mazz., 旋花科植物马蹄金 *Dichondra repens* Forst. 等的全草。夏、秋二季采收，除去杂质，晒干切碎使用，也可鲜用。

【别名】报春花科植物过路黄的别名为：大金钱草，神仙对座草，大叶金钱草，对坐草，路边黄，遍地黄，铜钱草，一串钱，寸骨七，蜈蚣草，过路黄，地蜈蚣，野花生，仙人对坐草，四川大金钱草，小茄，一面锣，金筋肺筋草，藤藤侧耳根，白侧耳根，铜钱花，水侧耳根，大连钱草，临时救。

唇形科植物活血丹的别名为：江苏金钱草，活血丹，连钱草，金钱草，马蹄草，金钱薄荷，透骨消，遍地香，地钱儿，钹儿草，铜钱草，白耳草，乳香藤，九里香，半池莲，千年冷，遍地金钱，金钱艾，透骨风，过墙风，巡骨风，蛮子草，胡薄荷，穿墙草，团经药，风草，肺风草，金钱薄荷，十八缺草，一串钱，钱苗草，钱苗王，野薄荷，马蹄筋骨草。

豆科植物金钱草的别名为：广金钱草，广东金钱草，假花生，落地金钱，银蹄草。

伞形科植物白毛天胡荽的别名为：江西金钱草，南昌金钱草，

满天星，明镜草，星宿草，小铜钱草，小金钱草，铜钱草，野芹菜，小金钱。

旋花科植物马蹄金的别名为：小金钱草，小叶金钱草，黄疸草，小迎风草，小马蹄草，马蹄草，金挖耳，荷包草，四川小金钱草，肉馄饨草，金钥匙，螺丕草，小铜钱，酒杯窝，鸡眼草，小灯盏菜，小碗碗草，小元宝草，小蛤蟆碗，九连环。

【商品名】大金钱草：又名大叶金钱草、四川大叶金钱草，川金钱草、神仙对座草。为报春花科植物过路黄的全草。主产于四川。这个品种为全国所通用。以叶片肥大、植株完整、干燥无杂质者为佳。

小金钱草：又名小叶金钱草、四川小叶金钱草、四川小金钱草。为旋花科植物马蹄金的全草。为四川部分地区习用。

江苏金钱草：为唇形科植物活血丹的全草。为江浙一带所习用。

广东金钱草：又名广金钱草。为豆科植物金钱草的全草。为广东所习用。

江西金钱草：为伞形科植物白毛天胡荽的全草。为江西所习用。

【处方名】金钱草，大金钱草。

【注意】《分类草药性》把金钱草称作透骨风、过墙风、巡骨风；《贵州民间方药集》把金钱草称为风草。金钱草没有祛风作用，这两种书是否把别的药物（如寻骨风）误作金钱草了，值得研究和注意。

【性味归经】甘、淡，平。归肝、胆、肾、膀胱经。

【功效主治】利水通淋，除湿退黄，解毒消肿。主治热淋，沙淋，石淋，泌尿系结石，湿热黄疸，肝胆结石，恶疮肿毒，毒蛇咬伤。

【用量】15~30克。鲜品60~90克。

石 韦

出自《神农本草经》。为水龙骨科多年生草本植物庐山石韦 *Pyrrosia sheareri* (Bak.) Ching. 和有柄石韦 *P. petiolosa* (Christ) Ching. 或石韦 *P. lingua* Thunb.) Farw. 的叶片。主产于浙江、河南、河北、江苏、安徽、湖北等地。四季均可采收。剪除根部，洗净晒干，切碎生用。也可鲜用。

【别名】石苇，石蠶，石皮，石兰，庐山石韦，光板石韦，有柄石韦，金背茶匙，金星草，生扯拢，虹霓剑草，石剑，潭剑，金汤匙，石背柳，飞刀剑，肺心草，肺筋（金）草，蜈蚣七，铺地蜈蚣七，七星剑，大号七星剑，一枝箭，山柴刀，木上蜈蚣，蛇舌风，大连天草，箭戟蕨，长柄石韦，石茶，金茶匙，飞惊草，单叶草，刀尖药，刀口药，刀箭药，石茶叶，金星石韦。

【商品名】大石韦：又名大叶石韦。为植物石韦、庐山石韦和毡毛石韦 *Pyrrosia drakeana* (Franch.) Ching. 的叶片。以叶大、质厚、背面有毛者为佳。

小石韦：又名小叶石韦。为有柄石韦（长柄石韦、石茶）、北京石韦 *Pyrrosia davidii* (Gies.) Ching 和西南石韦 *Pyrrosia gralla* (Gies.) Ching 的叶片。以叶厚、整齐、洁净为佳。

【处方名】石韦，石苇，石尾。

【注意】江苏、湖南、山西等地把瓦韦 *Lepisorus thunbergianus* (Kaulf.) Ching 的叶片误作石韦入药使用，这是错误的。因为二者形态和药效均有显著不同，故不能混用。应予以纠正。

【性味归经】苦、甘，微寒。归肺、膀胱经。

【功效主治】利水通淋，止咳。主治热淋，血淋，石淋；水肿；肺热咳嗽气喘；吐血，衄血，崩漏。

【用量】6～10克。鲜品15～30克。

海 金 沙(附：海金沙藤)

出自《嘉祐本草》。为海金沙科多年生攀援蕨类植物海金沙 *Lygodium japonicum* (Thunb.) SW. 的成熟孢子。主产于广东、浙江等地。秋季孢子未脱落时采割藤叶，晒干，搓掉或打下孢子，除去藤叶，生用。

【别名】左转藤灰，金沙粉，海金沙。

【商品名】海金沙。以光滑、质轻能浮于水面、色棕黄、干燥、无泥沙等杂质、引燃时有火焰响声者为佳。

【处方名】海金沙，金沙粉。

【性味归经】甘，寒。归膀胱、小肠经。

【功效主治】利水通淋。主治热淋，砂淋，血淋，膏淋，泌尿系结石，脾湿肿满。

【用量】6～12克。布包入煎。

附：海金沙藤

为海金沙植物的全草。别名左转藤、左篆藤、铁线藤、蔓蔓藤、蛤蟆藤、虾蟆藤、纺车藤、金金藤、见根藤、金沙藤、藤吊丝、罗网藤、鼎擦藤、毛须藤、猛古藤、蘑菇藤、塞窦藤、扫把藤、天仙草、松筋草、松筋藤、黑须草、满天云、硬筋藤、西牛藤、金线藤、攀谷藤、吐丝草、吐丝藤、鸡脚藤、爬古藤、洗碗藤、爬墙蕨、金沙蕨、竹芫荽、迷离网、鸡胶莽、斑鸠窝、金线风、破网巾、黄金塔、须须药、黑透骨、铁脚仙、乱头发、海金沙草等。性味及功效与海金沙相似，并能清热解毒。除用于淋病、水肿外，还可用于黄疸、痈肿、疮毒、腹泻、梦遗等。常用量15～30克。

积 雪 草

出自《神农本草经》。为伞形科植物积雪草 *Centella asiatica* (L.) Urban的全草。分布于安徽、江苏、浙江、江西、湖南、湖北、四川、贵州、云南、福建、广东、广西、台湾等地。夏、秋季采集，洗净，鲜用或晒干生用。

【别名】连钱草，地钱草，马蹄草，老公根，葵蓬菜，崩口碗，地棠草，大马蹄草，土细辛，崩大碗，钱凿口，复笔碗草，蚶壳草，鲎圭草，铜钱草，遍地香，雷公根，灯盏菜，牛浴菜，野芥菜，马脚迹，遍地金钱草，半边月，老鸦碗，酒杯菜，破铜钱，半边钱，地浮萍，野冬苋菜，盘龙草，节节连，大金钱草，大叶金钱草，大叶伤筋草，葫芦草，落地梅花，落得打，四芝麻棵，四棱草，铁灯盏。

【商品名】积雪草。以叶多而肥、植株完整、干燥无杂质者为佳。

【处方名】积雪草，连钱草，鲜积雪草，落得打等。

【注意】在药材商品市场上，有些地区将本品误作“金钱草”使用，应该纠正。

【性味归经】苦、辛，寒。归肝、脾、肾经。

【功效主治】清热利湿，消肿解毒。主治急性胃肠炎，暑泻，痢疾，湿热黄疸，砂淋，血淋，吐、衄、咯血，目赤，喉痛肿，风疹，疥癣，疔痈肿毒，跌打损伤。

【用量】10~15克。鲜品加倍。外用适量。

【慎忌】虚寒者慎服。

牛 筋 草

出自《本草纲目拾遗》。为禾本科植物牛筋草 *Eleusine indica* (L.) Gaertn.的带根全草。全国各省区均有分布。夏、秋季采

收，洗净晒干，切段生用，或用鲜品。

【别名】千金草，千斤草，千千踏，千人拔，千人踏，忝仔草，穆子草，牛顿草，鸭脚草，粟仔越，野鸡爪，野碱谷，粟牛茄草，扁草，萹草，水枯草，油葫芦草，蟋蟀草，稷子草，蹲倒驴，路边草，大屁股草，老牛拽。

【商品名】牛筋草。以质嫩、肥壮、色绿、干燥、无杂质者为佳。

【处方名】牛筋草，鲜牛筋草。

【性味归经】甘、淡，微寒。归肝经。

【功效主治】清热，利湿，解毒，止血。主治黄疸型肝炎，肠炎，痢疾，尿道炎，风湿性关节炎。外用治疗鼻衄、外伤出血、狗咬伤及跌打损伤。水煎内服可预防流行性乙型脑炎和流行性脑脊髓膜炎。

【用量】30~60克。鲜品100~200克。外用适量。

草 薹

出自《神农本草经》。为薯蓣科多年生蔓生草本植物粉背薯蓣 *Dioscorea hypoglauca* Palib. 或绵萆薢 *D. septemloba* Thunb. 等的干燥根茎。主产于浙江、湖北等地。秋季采挖，除去须根，洗净切片，晒干生用。

【别名】百枝，竹木，赤节，白藜蕷，粉萆薢，金刚，硬饭团，山田薯，土薯蕷，麻甲头，粉背薯蕷，黄萆薢，黄山姜，土黄连，黄薯，纤细薯蕷，纤细萆薢，铁菱刚，白姜，白薯，白连，山萆薢，又蕊薯蕷，蛇头草，苾夕，必也，蓖薢，必下，川太，毕解。

【商品名】粉萆薢：又名黄萆薢。为植物粉背薯蕷的干燥根茎。主产于广东、广西、浙江等地。以根茎块大、断面色黄白者为佳。

绵萆薢：又名白萆薢、川萆薢、棉萆薢。为植物绵萆薢的干燥

根茎。主产于浙江、湖北等地。以块大、断面色灰白者为佳。

【处方名】草薢，必也，贝也，必下等。

【注意】同属植物福州薯蓣 *Dioscorea futschauensis* R. Kunth 的根茎，亦作棉草薢入药。产于福建。

红草薢又称川萆薢和小萆薢。为百合科菝葜属植物无刺菝葜 *Smilax mairei* Lévl. 等的根茎，在云南、四川的一些地区亦作萆薢使用。有些地方把土茯苓 *S. glabra* Roxb. 混作萆薢入药，这是不对的，二者功效不同，不能混用。

【性味归经】苦，平。归肝、胃、膀胱经。

【功效主治】利湿浊，祛风湿。主治膏淋，白带，风湿痹痛。

【用量】10~15克。

菝 蕺

出自《名医别录》。为百合科植物菝葜 *Smilax china* L. 的根茎。主产于安徽、江苏、浙江、江西、湖南、湖北、四川、河南、陕西、山东等地。秋末或春初采挖，除去须根，洗净晒干，切片入药。

【别名】金刚根，金刚藤，金刚骨，金刚树，金刚树根，金刚刺，金刚头，金刚鞭，金巴斗，王瓜草，山梨儿，铁刷子，铁菱角，假萆薢，山菱角，霸王引，沟谷刺，豹狗刺，雀壳藤，马甲，硬饭头，冷饭头，龙爪菜，普贴，鸡肝根，路边刷，雀壳刺，铁刺苓，饭巴铎，冷饭巴，蓬灯果，马鞍宫，马加刺兜，马加勒，筋骨柱子，红灯果。

【商品名】金刚鞭：产于江苏的细而长者。

铁菱角：产于浙江的粗而短者。

菝葜：各地所产菝葜的统称。以肥壮、粉性足、无须根、干燥、无杂质者为佳。

【处方名】菝葜，菝葜片，鲜菝葜。

【性味归经】甘、淡，凉。归肝、肾经。

【功效主治】散瘀，解毒，利湿，祛风。主治风湿性关节炎，肌肉麻木，泄泻，痢疾，水肿，淋证，痈症，糖尿病，痈疽，毒蛇咬伤，扁桃体炎，淋巴结核，痔疮，乳糜尿。

【用量】10~15克。鲜品加倍。外用适量。

【慎忌】脾胃虚寒者不可量大或久服。

茵 陈 蒿

出自《神农本草经》。为菊科多年生草本植物茵陈蒿 *Artemisia capillaris* Thunb. 或滨蒿 *A. scoparia* Waldst. et Kitaib. 的幼苗。主产于安徽、河南、山西、陕西等地，我国其他大部分地区也有分布。春季幼苗高约10厘米时采收，除去老茎及杂质，鲜用或晒干生用。

【别名】茵陈，由胡，白蒿，刚蒿，茵蒿，陈茵，绒蒿，绵茵陈，绵陈，猴子毛，白蒿，滨蒿，猪毛蒿，北茵陈，山茵陈，因尘，马先，因陈蒿，茵藻蒿，细叶青蒿，细叶蒿，安昌蒿，安昌草，婆婆蒿，马新蒿，野兰蒿，白茵陈，白莲蒿，铁杆蒿。

【商品名】茵陈，茵陈蒿，北茵陈，西茵陈。以质嫩、干燥、色灰绿或灰白、软绵如绒、气清香浓郁者为佳。

【处方名】茵陈，茵陈蒿，因陈，绵茵陈。

【注意】目前茵陈的市售商品品种比较混乱。除上述品种外，西藏地区以同属植物短叶蒿（劲直蒿）*Artemisia stricta* Edgew. 的幼苗作“茵陈”入药。东北和新疆部分地区以白蒿（又名小白蒿、刚蒿）*Artemisia frigida* Willd. 的幼苗作“茵陈”入药。东北部分地区还以万年蒿（又名白莲蒿、铁杆蒿）*A. sacrorum* Ledeb. 的幼苗作“茵陈”入药。江西和广西部分地区把玄参科植物阴行草 *Siphonostegia chinensis* Benth. 作“土茵陈”入药，云南、贵州等地称之为“金钟茵陈”，安徽、江苏、浙江一带称之为“灵茵陈”。

或“角茵陈”，还有的地区称之为“黑茵陈”。阴行草在北方大部分地区作“刘寄奴”入药，应注意鉴别。

有些地区把有臭味的菊科植物黄花蒿（又名臭蒿、草蒿等）*Artemisia annua* L. 的全草作“茵陈”入药。这是不对的。因为臭蒿的主要功用是祛风解痉，茵陈的主要功用是清热利湿，二者性味功效均不同，不能混用。有些地区还把茵陈当作“黄花蒿”入药。这些混乱现象必须纠正，它直接影响中医药疗效和中医药事业的发展。

【性味归经】苦，微寒。归脾、胃、肝、胆经。

【功效主治】清利湿热，退黄疸。主治黄疸，湿疮。

【用量】15~30克。鲜品30~100克。

地 肤 子

出自《神农本草经》。为菊科一年生草本植物地肤 *Kochia scoparia* (L.) Schrad. 的成熟果实。主产于河南、河北、山东、安徽、江苏、山西、陕西等地。秋季种子成熟时，割取全草，晒干，打下种子，除去杂质，生用。

【别名】地夫子，荊，地葵，地脉，地麦，地麦子，地麦草子，益明，落帚子，竹帚子，千头子，帚菜子，铁扫把子，扫帚苗子，扫帚子，扫帚菜子，鸭舌草，独帚苗子，地华，地扫子，地菜子，汪王帚，玉帚，白地草，千心妓女，千心子，千风子，涎衣草子。

【商品名】地肤子。以籽粒饱满、色灰绿、干燥、无杂质者为佳。

【处方名】地肤子，地夫子，扫帚子，炒地夫子。

处方中写地肤子、地夫子、扫帚子均指生地肤子。为原药去杂质生用入药者。

炒地肤子为净地肤子用文火炒至微黄色，带有香气入药者。

【注意】在华东以及湖南、湖北、江西、福建、贵州等地，用

藜科植物藜 *Chenopodium album* L. 的胞果(俗称灰菜子)误作地肤子入药; 在云南、四川等地把豆科植物草木樨 *Melilotus suaveolens* Ledeb. 的荚果误作地肤子入药; 在广西等地用金桃娘科植物岗松 *Paeckia frutescens* L. 的蒴果作“地肤子”入药。以上三者均为误用, 并非地肤子正品, 应注意鉴别伪品。

【性味归经】苦, 寒。归膀胱经。

【功效主治】清热利水, 止痒。主治小便不利, 淋漓涩痛, 皮肤湿疮瘙痒。

【用量】15~30克。外用适量。

冬 瓜 皮(附: 冬瓜子)

出自《开宝本草》。为葫芦科1年生草本植物冬瓜 *Benincasa hispida* Cogn. 的果皮。我国各地均有栽培。夏末秋初果实成熟时采摘。食冬瓜时收集削下的瓜皮, 鲜用或晒干生用。

【别名】蔬皮, 白瓜皮, 水芝皮, 蔬垣皮, 白东瓜皮, 白冬瓜皮, 地芝皮, 濕瓜皮, 蔬蔬皮, 东瓜皮, 枕瓜皮。

【商品名】冬瓜皮, 单边冬瓜皮, 双边冬瓜皮。以色绿白、干燥、无杂质、无霉变者为佳。

【处方名】冬瓜皮。

【性味归经】甘, 微寒。归肺、小肠经。

【功效主治】利水消肿。主治水肿。

【用量】15~30克。鲜品60~100克。

附: 冬瓜子

冬瓜子为冬瓜的种子。别名白瓜子、瓜子、瓜瓣、冬瓜仁、瓜瓣、水芝子, 薏子、蔬垣子、白冬瓜子、地芝子、濕瓜子、蔬蔬子、甘瓜子、东瓜子, 枕瓜子。商品以籽实饱满、干燥、色黄白、无杂

质者为佳。性味甘寒。功效清肺化痰、排脓。主治肺热咳嗽、肺痈、肠痈。常用量10~30克。

葫 芦

出自《日华子本草》。为葫芦科1年生攀援草本植物瓢瓜 *Lagenaria siceraria* (Molina) Standl. var. *depressa* Ser. 的干燥果皮或果肉。我国中原地区多有栽培。夏秋季节采摘长大之果实，除去果瓢及种子，切片，鲜用或晒干生用。

【别名】壺卢，葫芦瓜，匏，匏瓜，瓢瓜，腰舟，甜瓠瓢，瓠匏，藤姑，抽葫芦，蒲芦。

【商品名】葫芦。以果大肉嫩、外表色绿、剖面色白、味甘者为佳。

【处方名】葫芦，陈葫芦，葫芦壳。

【注意】有些书籍将葫芦与匏瓜、瓠瓜混称，这是错误的。匏瓜即葫芦，然而瓠瓜却不是葫芦。应注意鉴别。瓠瓜又名瓠子，是葫芦科植物瓠子 *Lagenaria siceraria* (Molina) Standl. var. *clavata* Ser. 的果实。与葫芦为同科属植物，但不是一种药材。清代薛宝田《北行日记》关于匏瓜与瓠瓜的区别阐述得非常清楚，可以参考。

【性味归经】甘，平。归肺、小肠经。

【功效主治】利水消肿。主治水肿，腹水。

【用量】15~30克。鲜品60~100克。

赤 小 豆

出自《神农本草经》。为豆科1年生半缠绕草本植物赤小豆 *Phaseolus calcarius* Roxb. 或赤豆 *P. angularis* Wight 的干燥成熟种子。全国大部分地区均有种植。秋季荚果成熟发黄时采摘，打下

种子，晒干生用。

【别名】红小豆，赤豆，红豆，朱砂豆，红饭豆，小豆，朱赤豆，杜赤豆，小红绿豆，虱梅豆，金红小豆，朱小豆，猪肝赤，米赤豆，茅柴赤，米赤，红赤豆，饭赤豆。

【商品名】赤小豆：为植物赤小豆的干燥种子。主产于安徽、江苏、河南、山东、广东、广西等地。

赤豆：又名红饭豆。为植物赤豆的种子。全国大多数地区均产。

以上商品均以粒实饱满、色紫红、无杂质者为佳。

【处方名】赤小豆，赤豆，红小豆。

【注意】有些地区将同科植物相思子 *Abrus precatorius* L. 的种子误作“赤小豆”入药，应予纠正。因相思子的种子有大毒，在性状及功效等方面与赤小豆截然不同。

【性味归经】甘、酸，平。归心、小肠经。

【功效主治】利水消肿，解毒排脓。主治水肿胀满，脚气浮肿，热毒痈疮，乳痈，痄腮，丹毒，湿热黄疸等。

【用量】20~40克。

泽 漆

出自《神农本草经》。为大戟科2年生草本植物泽漆 *Euphorbia helioscopia* L. 的全草。我国大部分地区均产，以江苏、安徽、河南、浙江等地较多。4~5月开花时割取全草，去根及泥沙，晒干生用。

【别名】猫眼草，猫儿眼，猫儿眼草，猫儿眼睛草，黍茎，五凤灵枝，五凤草，绿叶绿叶草，凉伞草，五盏灯，五朵云，白种乳草，五点草，五灯头草，乳浆草，肿手棵，马虎眼，倒毒伞，一把伞，乳草，龙虎草，铁骨伞，灯台草，烂肠草。

【商品名】泽漆。以带有花、叶枝肥壮、色黄绿、干燥、无杂

质者为佳。

【处方名】泽漆，猫眼草，猫儿眼等。

【注意】《名医别录》言本品为大戟苗，《日华子本草》言本品为大戟花，其苗可食。这都是错误的。据《本草纲目》考证：“泽漆利水，功类大戟。故人见其茎有白汁，遂误以为大戟。”“泽漆是猫儿眼草，非大戟苗。”

【性味归经】辛、苦，微寒。有毒。归大肠、小肠、肺经。

【功效主治】利水消肿，化痰止咳，散结。主治腹水，四肢及面目浮肿，肺热咳嗽及痰饮喘嗽，瘰疬。

【用量】3～6克。外用适量。

【慎忌】孕妇及体虚者忌服。

篇 蓖

出自《神农本草经》。为蓼科1年生草本植物萹蓄 *Polygonum aviculare* L. 的干燥地上部分。全国各地均产，以安徽、河南、江苏等地较多。夏季叶茂时割取全草，除去根及杂质，鲜用或晒干生用。

【别名】竹，萹竹，扁竹草，萹蕡，扁蕡，扁蔓，扁辨，蓄辨，蓄蔓，扁蓄，地萹蓄，编竹，扁畜，粉节草，道生草，扁竹，扁竹蓼，乌蓼，大蓄片，野铁扫把，路柳，疳积药，斑鸠台，蚂蚁草，猪圈草，桌面草，路边草，七星草，铁片草，竹节草，扁猪牙，扁竹牙，猪牙草，残猪草，残竹草，妹子草，大铁马鞭，牛鞭草，牛筋草，大萹蓄，地蓼，路柳，藩水萹，藩萹竹，竹叶菜，边血草。

【商品名】萹蓄。以肥壮、叶多、质嫩、干燥、色绿、无杂质者为佳。

【处方名】萹蓄，扁蓄，萹蓄草。

【注意】分布于广东、云南、四川、福建等省的腋花蓼（小萹

蓄、习见蓼) *Polygonum plebeium* R. Brown 形态与萹蓄相似，故有小萹蓄之称，福建及四川的某些地方将其作“萹蓄”入药。此非正品。

另外，福建北部及东部个别地区还将豆科植物鸡眼草 *Kummerowia striata* (Thunb.) Schindl. 或竖毛鸡眼草(长萼鸡眼草) *K. stipulacea* (Maxim.) Makino 的全草作萹蓄入药。两广一带将鸢尾科植物射干 *Belamcanda chinensis* (L.) DC. 的根茎作萹蓄入药。这些都是错误的。因为它们的性状功效均与萹蓄不同，不能混用，应注意鉴别。

【性味归经】苦，微寒。归膀胱经。

【功效主治】利尿通淋，杀虫止痒。主治小便短赤，淋漓涩痛，皮肤湿疹，阴痒，湿热痢疾。

【用量】15~30克。鲜品30~60克。外用适量。

瞿 麦

出自《神农本草经》。为石竹科多年生草本植物瞿麦 *Cianthus superbus* L. 和石竹 *D. chinensis* L. 的带花全草。主产于河南、河北、江苏、安徽、湖北等地。夏秋二季花果期采割，除去杂质，鲜用或晒干生用。

【别名】石竹子花，十样景花，石竹花，洛阳花，石竹，石竹草，巨甸麦，大兰，山瞿麦，南天竺草，剪绒花，剪刀花，竹节草，大菊，蓬麦，地面，野麦，红花瞿麦，木蝶花，剪刀花，十样景，鹅毛花，鹅毛石竹，绣竹，石柱花，巨麦，十样锦，瞿麦穗，麦巨姜，麦句姜，麦蘧姜，陵苕，菱草。

【商品名】瞿麦，石竹瞿麦。以色青绿、茎嫩、叶密、花穗多者为佳。

【处方名】瞿麦，巨麦，瞿麦穗。

【注意】目前瞿麦的市售商品品种比较混乱。东北地区将同属

植物东北石竹 *Dianthus amurensis* Jacq. 的全草作“瞿麦”使用。宁夏地区将同属植物东方石竹 *D. orientalis* Adams. 的全草作“瞿麦”使用。甘肃省部分地区将同属植物线叶瞿麦 *D. amtifolia* Fisch. 的全草作“瞿麦”使用。以上这些同属植物，功效与瞿麦近似，但非瞿麦正品。

贵州地区把百合科植物肺筋草 *Aletris spicata* Franch. 的全草误作“瞿麦”使用。云南个别地区把石竹科植物红女萎菜 *Melandrium rubicundum* (Franch.) Hand-Mazz. 及禾本科植物野燕麦 *Avena fatua* L. 和蓼科植物萹蓄 *Polygonum aviculare* L. 的全草误作“瞿麦”使用。这都是错误的，应予以纠正。销售及使用时应注意鉴别。另外，《日华子本草》说瞿麦即燕麦，也是错误的。瞿麦和燕麦不是一物，不能混为一谈。

【性味归经】苦，寒。归心、小肠、膀胱经。

【功效主治】利水通淋，活血通经。主治小便短赤，淋漓涩痛，瘀滞经闭。

【用量】10~15克。鲜品30~60克。

【慎忌】孕妇忌服。

灯 心 草

出自《开宝本草》。为灯心草科多年生草本植物灯心草 *Juncus effusus* L. 的干燥茎髓。主产于江苏、四川、云南、贵州等地。夏末或秋季割取茎，晒干，取出茎髓，理直，扎成小把。生用，朱砂拌用或煅炭用。

【别名】虎须草，赤须，灯心，灯草，碧玉草，水灯心，铁灯心，猪矢草，洋牌洞，灯芯草，虎酒草，曲屎草，老虎须，秧草，野席草，龙须草，水葱，灯芯，白灯心。

【商品名】灯心：又名灯草心。为剥去外皮者，以洁白、粗细均匀、干燥、无杂质者为佳。

灯草：又名灯心草。为未剥去外皮者。

【处方名】灯芯草，灯草，灯心，灯心草，灯芯，朱灯心，黛灯心，灯心炭，煅灯心，轻圆炭等。

处方中写灯心、灯芯、灯心草、灯芯草、灯草均指生灯心草。为原药去杂质生用入药者。

朱灯心又名朱灯芯、朱灯心草。将剪好的灯心段，用水喷洒，使微湿润，放瓷罐内，加入朱砂细末，摇动至朱砂均匀敷布在灯心上为度。每5千克灯心，用朱砂300克。

黛灯心又名煅灯芯、黛灯心草。将灯心拌入青黛，方法同朱灯心。

灯心炭又名煅灯心、轻圆炭。为灯心草置锅内，上覆一口径略小的锅，贴以白纸在两锅交接处，用盐泥封固，不使泄气，加热煅至白纸呈焦黄色停火，凉透取出入药者。

【注意】有些地区将水茅草 *Juncus leschenaultii* Gay ex Laharpe 的茎髓和野灯心 *Juncus setchuenensis* Buchen. var. *effusoides* Buchen. 作灯心入药，此非正品，应注意鉴别。

【性味归经】甘、淡，微寒。归心、肺、小肠经。

【功效主治】利水通淋，清心除烦。主治热证小便不利，淋漓涩痛，心热烦躁，小儿夜啼，惊痫。外用吹喉可治喉痹。

【用量】3～5克。外用适量。

冬葵子

出自《神农本草经》。为锦葵科1年生草本植物 冬葵 *Malva verticillata* L. 的成熟种子。全国各地均有分布。春季种子成熟时采收，除去杂质，晒干，捣碎生用。

【别名】葵子，葵菜子，茴子，露葵子，冬葵菜子，滑菜子，卫足子，马蹄菜子，蕲菜子，滑肠菜子，金钱葵子，金钱紫花葵子，冬寒菜子，冬苋菜子，茴菜子，奇菜子，蕊菜巴巴子，冬葵

苗子，芥菜杷杷子，冬葵实，异子，终子，葵葵子，承露子，邱葵子，鸭脚葵子，揆葵子，繁露子，胡燕脂。

【商品名】冬葵子，冬葵实。以籽粒饱满、干燥无杂质者为佳。

【处方名】冬葵子。

【注意】目前大多数药店出售的冬葵子为锦葵科植物苘麻 *Abutilon theophrasti* Medic. 的成熟种子。苘麻始载于《新修本草》，其子名苘实。其后历代本草记载，冬葵子与苘实两者并不相混，功效也不一样。而现在药材部门将苘实作冬葵子入药，是否妥当，值得研究和注意。另外，山东济宁则以同科植物圆叶锦葵（土黄芪） *Malva rotundifolia* L. 的果实作冬葵子入药，非属正品，亦应注意。

【性味归经】甘，寒。归大肠、小肠、膀胱经。

【功效主治】利水通淋，下乳，滑肠。主治小便不利，水肿，淋漓涩痛；乳汁不行，乳房胀痛；大便燥结。

【用量】10~15克。

【禁忌】孕妇慎服。

向 日 葵 花 托

出自《浙江中药资源名录》。为菊科植物向日葵 *Helianthus annuus* L. 的花托。我国各地均有栽培。

【别名】向日葵花盘，向日葵盘，向日葵饼，葵房，葵花盘，葵花托，丈菊花托，西番菊花托，迎阳花托，一丈菊花托，草天葵花托，向阳花托，太阳花托，望日葵花托，朝阳花托，转日莲花托。

【商品名】向日葵花托，向日葵花盘。以盘大、完整、洁净者为佳。

【处方名】向日葵花托，向日葵花盘，葵花盘。

【性味归经】甘，温。归膀胱、肾经。

【功效主治】清湿热，利小便，通窍，祛风，滑胎，催产，降压，止痛。主治高血压，头痛目眩，耳鸣，牙痛，胃痛，腹痛，痛经，难产，胎衣不下，小便不利。

【用量】 10~30克。

【慎忌】 孕妇慎用。

向 日 葵 茎 髓

出自《江苏药材志》。为菊科植物向日葵的茎髓。原植物同向日葵花托。

【别名】 向日葵梗心，向日葵茎心，向日葵瓤，葵花瓤，向日葵瓤，望日葵瓤。

【商品名】 向日葵茎髓。以粗长、色白、干燥、洁净者为佳。

【处方名】 向日葵瓤，葵花瓤，向日葵茎髓。

【性味归经】 淡，平。归肺、膀胱经。

【功效主治】 清热利尿，祛痰平喘。主治血淋，小便不利，尿路结石，乳糜尿，咳嗽痰喘，浮肿，妇女白带增多。

【用量】 6~12克。

糠 谷 老

出自《山西中草药》。为禾本科植物粟 *Setaria italica* (L.) Beauv. 感染真菌类禾指梗霉 *Sclerospora graminicola* (Sacc.) Schroet. 而形成的糠秕病穗。华北、东北、西北种粟谷的地区均有分布。秋季收割粟谷时采收，晒干生用。

【别名】 看谷老，老谷穗，谷老，糠古老，枪谷，枪谷老，老枪谷。

【商品名】 糠谷老。以无谷粒的全部糠秕病穗为佳。

【处方名】糠谷老，看谷老，谷老。

【性味归经】咸，微寒。归大肠、膀胱经。

【功效主治】清湿热，利小便，止痢疾。主治尿道炎，痢疾，浮肿，小便不利涩痛。

【用量】10~15克。

玉 米 须

出自《四川中药志》。为禾本科植物玉米 *Zea mays* L. 的花柱。全国各地均有种植。夏、秋果穗成熟后采收，晒干。

【别名】玉麦须，玉蜀黍蕊，玉蜀黍须，玉蜀黍毛缨，玉米秫须，玉米秫毛缨，玉米毛缨，棒子毛，棒子毛缨，玉蜀秫须，玉高粱须，番麦须，御麦须、西番麦须，戎菽须，红须麦须，薏米须，包谷须，苞谷须，苞芦须，鹿角黍须，御米须，陆谷须，玉黍须，西天麦须，玉露秫须，纤粟须，珍珠米须，粟米须，包粟须，包麦米须，苞米须，蜀黍须，玉茭须。

【商品名】玉米须。以干燥、无杂质、红棕色者为佳。

【处方名】玉米须。

【性味归经】甘、淡，平。归肝、膀胱经。

【功效主治】利尿，泄热，平肝，利胆。主治肾炎水肿，脚气，黄疸型肝炎，高血压，胆囊炎，吐血衄血，乳痈，糖尿病。

【用量】30~40克。或烧存性研末冲服或外用。

问 荆

出自《本草拾遗》。为木贼科植物问荆 *Equisetum arvense* L. 的全草。主产于安徽、江南、江苏、山东、河北等地。5~7月间割取全草，鲜用或晒干用。

【别名】节节草，接骨草，接续草，公母草，搂接草，空心草，

马蜂草，猪鬃草，黄芩草，马草，笔头菜，笔头草，问津。

【商品名】问荆。以色绿、无断碎、粗壮、干燥、无杂质者为佳。

【处方名】问津，问荆，节节草，鲜节节草。

【性味归经】苦，凉。归肝、肺、膀胱经。

【功效主治】清热，凉血，止咳，利尿。主治吐血，衄血，便血，倒经，咳嗽气喘，淋证。

【用量】6～10克。鲜品15～30克。

【慎忌】风寒咳嗽慎服。

狗 狗 秧

出自《河南中草药手册》。为旋花科植物日本天剑 *Calystegia japonica* Choisy 的根及全草。主产于河南、江苏、安徽、河北、山东等地。夏秋采集，连根挖出，鲜用或晒干生用。

【别名】夫儿苗，匍匐苗，富富苗，狗儿秧，狗拉秧，狗娃秧，打碗花，匍子，富子，匍匐苗，荷富苗，日本天剑，面根藤，小旋花，盘肠参，铺地参。

【商品名】狗狗秧：又名打碗花。为植物日本天剑的带根全草。以色绿、质嫩、肥壮、无杂质者为佳。

狗狗秧根：又名富子、匍子、匍匐苗根、富富苗根。为植物日本天剑的根。以色白、粗大而长、粉性大者为佳。

【处方名】狗狗秧，富富苗，打碗花。

【性味归经】甘，寒。归大肠经。

【功效主治】清热，利尿，滑肠，降压。主治大便干结，小便不利，高血压，糖尿病。

【用量】15～30克。鲜品加倍。煎汤内服，亦可作野菜食用。民间荒年多以此充饥。

【慎忌】大便稀溏者不宜服。

铁 莴 菜

出自《植物名实图考》。为大戟科植物铁苋菜 *Acalypha australis* L. 的全草。全国各地均有分布。夏、秋采集，洗净晒干。

【别名】铁苋，人苋，海蚌含珠，撮斗撮金珠，六合草，半边珠，野麻黄，玉碗捧真珠，粪斗草，血见愁，凤眼草，肉草，喷水草，小耳朵草，大青草，猫眼草，蚬草，叶里藏珠，叶里含珠，痢疾草，野麻草，蚌壳草，铁灯碗，筒筒草，七箇灯，血布袋，布袋口，皮撮珍珠，珍珠草，瓢里珍珠，母螺草，海底藏珍珠，藏珠草，野六麻，野苦麻，猫眼菜，撮斗珍珠，撮斗装珍珠，萤火虫草，野棉花，寒热草，叶下双桃，叶里仙桃，金畚，野络麻，老鼠耳朵草，金盘野苋菜，含珠草，沙罐草，灯盏窝，草蚌含珠，山麻黄，麻子草，野麻草。

【商品名】铁苋，铁苋菜。以肥壮、植株完整、干燥无泥土者为佳。

【处方名】铁苋，铁苋菜，血见愁，人苋。

【性味归经】苦、涩，平。归心、肺、大肠、小肠经。

【功效主治】清热，利水，杀虫，止血。主治痢疾，腹泻，咳嗽吐血，便血，子宫出血，疳积，腹胀，皮炎，湿疹，创伤出血，肝炎，毒蛇咬伤。

【用量】10~20克。鲜品加倍。外用适量。

【禁忌】孕妇忌服。年老体弱者少用。

酢 萍 草

出自《新修本草》。为酢浆草科植物酢浆草 *Oxalis corniculata* L. 的全草。全国各地均有分布。夏、秋有花果时采集，洗净晒干。

【别名】酸箕，三叶酸草，醋母草，鳩酸草，小酸茅，雀舌草，酸浆，赤孙施，酸啾啾，田字草，酸浆草，雀儿草，酸母草，酸饺草，小酸苗，酸草，三叶酸，三角酸，雀儿酸，酸迷迷草，斑鳩草，酸味草，三叶酸浆，酸酸草，酸斑苋，咸酸草，酸酢草，酸得溜，铺地莲，酸梅草，三叶破铜钱，黄花梅，老鸭咀，满天星，黄花草，六叶莲，野王瓜草，王瓜酸，冲天泡，长血草，酸芝草，酸批子，东阳火草，水晶花，蒲瓜酸，鶲鵠酸，斑鳩酸。

【商品名】酢浆草。以棵大、肥壮、完整、带有花果、干燥无杂质、酸味浓者为佳。

【处方名】酢浆草。

【性味归经】酸，寒。归大肠、小肠经。

【功效主治】清热利湿，凉血散瘀，消肿解毒。主治泄泻，痢疾，黄疸，淋证，赤白带下，麻疹，吐血，衄血，咽喉肿痛，疔疮，痈肿，疥癣，痔疾，脱肛，跌打损伤，烫火伤，肺炎，肝炎，扁桃体炎，蛇咬伤。

【用量】6～12克。鲜品加倍。外用适量。

地耳草

出自《植物名实图考》。为藤黄科植物地耳草 *Hypericum japonicum* Thunb.的全草。分布于江苏、浙江、福建、湖南、江西、四川、云南、贵州、广东、广西等地。夏、秋采集，洗净，晒干。

【别名】田基黄，田基王，水榴子，香草，斑鳩窝，雀舌草，蛇喳口，蛇细草，合掌草，跌水草，七寸金，一条香，金锁匙，红孩儿，寸金草，田边菊，刘寄奴，痧子草，光明草，田基苋，莽壳草，小王不留行，细叶黄，观音莲，雷公箭，降龙草，七层塔，土防风，枫草儿，小元宝草，黄花仔，禾霞气，耳挖草，小田基黄，黄花草，对叶草。

【商品名】地耳草，田基黄。以植株完整、肥壮、干燥无泥土

者为佳。

【处方名】田基黄，地耳草。

【性味归经】甘、微苦，凉。归肝、肺经。

【功效主治】清热利湿，解毒消肿，散瘀止痛。主治肝炎，早期肝硬化，阑尾炎，眼结膜炎，扁桃体炎，痈肿疮疖，带状疱疹，毒蛇咬伤，跌打损伤，泻痢，小儿惊风，疳积。

【用量】10~20克。鲜品加倍。外用适量。

葎 草

出自《新修本草》。为桑科植物葎草 *Humulus scandens* (Lour.) Merr. 的全草。我国大部分地区均有分布。生长于路旁、荒地、沟边。夏秋采收，洗净，鲜用或晒干切碎用。

【别名】勒草，黑草，葛葎蔓，葛勒蔓，来莓草，葛葎草，葛勒子，涩萝蔓，涩拉秧，割人藤，假苦瓜，苦瓜藤，锯锯藤，五爪龙，牛跤迹，老虎藤，拉拉藤，拉拉秧，拉拉蔓，穿肠草，过沟龙，簕草，大叶五爪龙，拉狗蛋，搅谷恋，大涩拉秧，涩疙劳秧。

【商品名】葎草。以植株完整、肥壮、干燥无杂质者为佳。

【处方名】葎草，勒草，簕草，拉拉藤，锯锯藤，鲜葎草。

【性味归经】甘、苦，寒。归肺、小肠、大肠经。

【功效主治】清热，利尿，解毒，消瘀。主治淋证，小便不利，腹泻，痢疾，肺结核，肺脓疡，肺炎，癰疮，痔疾，痈肿，瘰疬。

【用量】10~20克。鲜品加倍。外用适量。

黄 藤

出自《本草图经》。为防己科植物 黄藤 *Fibraurea tinctoria* Lour. 的根或茎。主产于云南、广西、广东等地。秋后采集，洗净，切片晒干。

【别名】藤黄连，土黄连，黄连藤，伸筋藤，大黄藤，假黄藤，山大王。

【商品名】黄藤，黄连藤。以条长均匀、色黄、断面有菊花纹者为佳。

【处方名】黄藤，黄连藤，大黄藤等。

【性味归经】甘、苦，寒。有毒。归心、肝经。

【功效主治】清热解毒，利尿通便。主治饮食中毒，热结便秘，痢疾，传染性肝炎，咽喉肿痛，眼结膜炎，火热头痛。预防流行性脑脊髓膜炎。外用治疮疖，烧烫伤等。

【用量】6～12克。外用适量。

【禁忌】体质虚寒者忌服。

凤 尾 草

出自《植物名实图考》。为凤尾蕨科植物凤尾草 *Pteris multifida* Poir. 的带根全草。分布于河北、陕西、甘肃、安徽，江苏、云南、四川、广东、广西、湖南、江西、浙江、贵州、台湾等地。生长于半阴湿之岩缝中。全年可采，鲜用，或晒干生用。

【别名】小金星凤尾，凤尾蕨，小叶凤尾草，细叶凤尾草，小凤尾，凤凰草，井边凤尾，井边凤尾草，井口边草，井栏草，井阑草，井茜，井边茜，井栏茜，井口鸡胶舌，铁脚鸡，山鸡尾，旋鸡头，阉鸡尾，野鸡尾，鸡脚草，金鸡尾，金鸡爪，百脚鸡，百脚草，五指掌，石长生，青蕨，龙须草，腊肾草，背荫草，背阴草。

【商品名】凤尾草，细叶凤尾草，小叶凤尾草，凤凰草。以植株完整、干燥无杂质者为佳。

【处方名】凤尾草，凤凰草，鲜凤尾草。

【性味归经】淡、微苦，凉。归心、肝、肾、胃、大肠经。

【功效主治】清热利湿，凉血止血，消肿解毒。主治黄疸型肝炎，肠炎，菌痢，淋浊，带下，吐血，衄血，便血，尿血，崩漏，扁

桃体炎，腮腺炎，痈肿疮毒，湿疹，外伤出血，烧烫伤。

【用量】10~15克。鲜品加倍。外用适量。

【慎忌】虚寒证忌服。

含 羞 草

出自《岭南采药录》。为豆科植物含羞草 *Mimosa pudica* L. 的全草。分布于我国西南、华东、华南等地。生于山坡、路旁、潮湿地，或栽培。夏季采收，晒干用或鲜用。

【别名】知羞草，怕丑草，怕羞草，喝呼草，望江南，感应草。

【商品名】含羞草。以色绿鲜艳、植株完整、带有花、无泥土者为佳。

【处方名】含羞草，怕羞草，怕丑草，望江南。

【性味归经】甘、涩，寒。有小毒。归心、肺经。

【功效主治】清热利尿，化痰止咳，止痛安神。主治失眠，肠炎，胃炎，小儿疳积，目赤肿痛，深部脓肿，带状疱疹，泌尿系结石等。

【用量】6~10克。鲜品15~30克。外用适量。

【慎忌】孕妇忌服。

万 年 青

出自《药性考》。为百合科植物万年青 *Rohdea japonica* Roth 的根状茎或全草。主产于华东、华南、西南及河南、湖北等地。多为栽培。全年可采，洗净，鲜用或晒干生用。

【别名】斩蛇剑，开口剑，牛尾七，冲天七，竹根七，白河车，铁扁担，青龙胆，冬不凋草，九节莲。

【商品名】万年青。根状茎以粗大肥壮、无泥土者为佳。全草

以植株完整、肥壮、鲜艳、无杂质者为佳。

【处方名】万年青，万年青叶，万年青根，鲜万年青，斩蛇剑，白河车等。

【性味归经】甘、苦，寒。有毒。归肺经。

【功效主治】强心利尿，清热解毒，止血。主治心力衰竭，咽喉肿痛，白喉，水肿，臌胀，咯血，吐血，疔疮，丹毒，毒蛇咬伤，烫伤，乳腺炎，狂犬咬伤，细菌性痢疾，跌打损伤。

【用量】6~10克。鲜品30~60克。外用适量。

【禁忌】虚寒泄泻者慎服。

六月雪

出自《本草拾遗》。为茜草科植物六月雪 *Serissa foetida* Comm. 和白马骨 *S. Serissoides* (DC.) Druce 的全株。主产于我国中部和南部地区。全年可采，洗净鲜用或切段晒干。

【别名】路边金，路边鸡，路边荆，路边姜，过路黄荆，满天星，六月冷，曲节草，鱼骨刺，光骨刺，硬骨柴，鸡骨柴，鸡脚骨，鸡骨头草，天星木，凉粉草，细牙家，白头秤，千年勿大，白马里梢，白马骨，野黄杨树，永勿大，米筛花，冻米柴，月月有，朱米雪，日日有，白革蒲花，喷雪花，白雪丹，满山星。

【商品名】六月雪：为植物六月雪的全株。

白马骨：为植物白马骨的全株。

均以植株完整、鲜艳、肥壮、无泥土者为佳。

【处方名】六月雪，白马骨，六月冷，白雪丹。

【性味归经】苦、辛，凉。归肺、大肠、肝、脾经。

【功效主治】祛风，利湿，清热，解毒。主治风湿性腰腿痛，痢疾，水肿，目赤肿痛，喉痛，齿痛，白带，痈疽，瘰疬，急性及慢性肝炎，小儿疳积，高血压头痛。

【用量】10~15克。鲜品30~60克。外用适量。

水 蜈 蛇

出自《植物名实图考》。为莎草科植物水蜈蚣 *Kyllinga brevifolia* Rottb. 的全草。全国大部分地区均有分布。多生长在水边和潮湿地。夏、秋采集，洗净，鲜用或晒干生用。

【别名】牛毛粘，短叶水蜈蚣，金钮草，金钮子草，金钮子，三葵草，散寒草，球子草，疟疾草，金牛草，夜摩草，寒气草，十字草，姜虫草，露水草，水牛草，三步跳，寒筋草，姜芽草，水香附，燕含珠，发汗草，山蜈蚣，水乌梅，无头香附，龙吐珠，水香草，一粒雪，土柴胡，三角草，落地杨梅，三箭草，球头草，顶棍草，雷公草，地杨梅，三人扛珠，寒热头草，三角棱草，一粒珠，九头香，细竹草，杨梅草，苦香子，水竹钵，三棱环，一粒子草，黄古头草，水金钗，水土香，钢拳头，库鞠恣托（藏族名）。

【商品名】水蜈蚣。以植株完整、带有头状花序、芳香气浓、肥壮、无泥土者为佳。

【处方名】水蜈蚣，鲜水蜈蚣。

【性味归经】辛，平。归肺、大肠经。

【功效主治】疏风解表，清热利湿，止咳化痰，去瘀消肿。主治伤风感冒，支气管炎，百日咳，痢疾，黄疸型肝炎，乳糜尿，风湿性关节炎，跌打损伤，外用治疗蛇咬伤，皮肤瘙痒，疖肿。

【用量】15~30克。鲜品加倍。外用适量。

水 菖 蒲

出自《名医别录》。为天南星科植物水菖蒲 *Acorus calamus* L. 的根茎。除新疆、西藏外，全国各地均有分布。四季均可采挖，除去须根，洗净晒干。

【别名】白菖，白菖蒲，泥菖蒲，泥菖，臭菖，臭菖蒲，臭蒲根，水菖，水昌，水宿，大叶菖蒲，茎蒲，溪荪，兰荪，地心，蒲剑根，水八角草根，家菖蒲，土菖蒲，水见消，臭蒲，菖蒲。

【商品名】水菖蒲，白菖蒲，白菖。以根茎粗长、气味浓、干燥、无须根及泥土者为佳。

【处方名】水菖蒲，臭蒲根。

【注意】本品与石菖蒲功效不同，不能混用。

【性味归经】苦、辛，温。归心、肺、大肠经。

【功效主治】化痰，开窍，行气，利湿。主治癫痫，神识不清，慢性气管炎，痢疾，肠炎，腹胀腹痛，风寒湿痹，痈肿疥疮。

【用量】3～6克。外用适量。

【慎忌】阴虚阳亢、多汗、滑精者慎服。

萱 草 根

出自《本草拾遗》。为百合科植物萱草 *Hemerocallis fulva* L. 或黄花萱草 *H. flava* L. 或小萱草 *H. minor* Mill. 的根。全国各地均产。秋季采挖，除去茎苗及细根，洗净，鲜用或晒干生用。

【别名】漏芦果，漏芦根果，黄花菜根，金金菜根，金针菜根，地人参，谖草根，宜男根，鹿葱根，忘忧草根，丹棘根，漏芦根，芦葱根，疗愁根，益男草根，黄花草根，小萱草根，红萱根，黄花萱草根。

【商品名】萱草根：为植物萱草或黄花萱草的根茎。

小萱草根：又名红萱根。为植物小萱草（红萱）的根。

大花萱草根：为植物大花萱草 *H. middendorffii* Trautv. et Mey. 的根。主产于我国东北地区。

麝香萱根：为植物麝香萱 *H. thunbergii* Bak. 的根。主产于安徽、浙江、江苏等地。

黄金萱根：为植物黄金萱（柠檬萱草） *H. citrina* Baroni 的

根。主产于江苏等地。

褶叶萱草根：为根物褶叶萱草（连珠炮、下奶药）*H. plicata* Stapf的根。主产于四川、云南等地。

北黄花菜根：为植物北黄花菜（鹿葱）*H. lilioasphodelus* L. 的根。主产于长江以北各地。

以上商品均以根条粗大、干燥、无残茎及杂质者为佳。

【处方名】萱草根，金金菜根，黄花菜根，金针菜根。

【性味归经】甘，凉。有毒。入肺、脾经。

【功效主治】利水，凉血。主治水肿，小便不利，淋浊，带下，黄疸，衄血，便血，崩漏，乳痈，乳汁不通，腮腺炎。外敷治头风。

【用量】6～9克。鲜品10～20克。外用适量。

【慎忌】本品有些品种有毒，服用过量可致瞳孔扩大，呼吸抑制，甚至失明或死亡。故内服须慎，用量不宜超过30克。

夹竹桃

出自《植物名实图考》。为夹竹桃科植物夹竹桃 *Nerium indicum* Mill. 的叶或树皮。分布于广东、四川、广西、福建、云南、河北、河南、江苏、浙江等地。多为栽培。全年可采，鲜用或晒干用。

【别名】柳叶桃，红花夹竹桃，白花夹竹桃，白羊桃，拘那夷，拘擎儿，模那卫，叫出冬，水甘草，九节肿，大节肿，夹竹桃叶，夹竹桃皮，柳叶桃叶，柳叶桃皮。

【商品名】夹竹桃叶，夹竹桃皮。叶以色绿、片大、完整、洁净者为佳。皮以肉厚、干燥、无粗栓皮、无杂质者为佳。

【处方名】夹竹桃，夹竹桃叶，夹竹桃皮，柳叶桃叶，柳叶桃皮，柳叶桃，鲜夹竹桃叶等。

【性味归经】苦，寒，有毒。归肺、心经。

【功效主治】强心利尿，祛痰定喘，祛瘀镇痛。主治心脏病心

力衰竭，癫痫，喘息咳嗽，经闭，跌打损伤肿痛。外用治疗斑秃，甲沟炎等。

【用量】 0.3~1克。鲜品1~3克。外用适量。

【禁忌】 孕妇忌服。不宜多服久服，过量则中毒。

榆 白 皮

出自《药性论》。为榆科植物榆树 *Ulmus pumila* L. 树皮或根皮的韧皮部。我国大部分地区均有分布。剥取内皮，晒干入药。

【别名】 榆皮，榆树皮，榆根皮，榆树白皮，榆根白皮，粉皮，粉白皮，白粉皮，白榆皮，粉榆白皮，粉榆皮，家榆皮，家榆白皮，零榆皮，零榆白皮，钻天榆皮，钻天榆白皮，钱榆皮，钱榆白皮，粘柳树皮，粘柳树白皮，粘柳树根白皮，春榆皮，春榆白皮，春榆根白皮。

【商品名】 榆白皮。以色白、粉性大、肉厚、片大、干燥无杂质者为佳。

【处方名】 榆皮，榆白皮。

【性味归经】 甘，平。归膀胱、胃、大肠、小肠经。

【功效主治】 利水，通淋，消肿。主治小便不通，淋浊，水肿，痈疽发背，丹毒，疥癣。

【用量】 15~30克。外用适量。

榆 叶

为榆树的叶。来源同榆白皮。

【别名】 榆树叶，白榆叶，白粉叶，粉叶，粉榆叶，钱榆叶，零榆叶，钻天榆叶，家榆叶，春榆叶，粘柳树叶。

【商品名】 榆叶。以叶片大、色碧绿、完整洁净者为佳。

【处方名】 榆叶。

【性味归经】甘，平。归膀胱经。

【功效主治】利尿消肿。主治水肿，小便不利，石淋，神经衰弱。

【用量】10~30克。

蟋蟀

出自《本草纲目》。为蟋蟀科昆虫蟋蟀 *Gryllulus chinensis* Weber 的干燥全体。主产于河南、安徽、江苏、山东、浙江、河北等地。8~9月间捕捉，用沸水烫死，晒干或焙干入药。

【别名】蛩，螽，蚰蚰，促织，蜻𧈧，虹孙，蛩，吟蛩，将军，将军虫，叫鸡，斗鸡，唧唧，夜鸣虫，秋虫，将军干，将军虫干，秋虫干，突蝉子。

【商品名】蟋蟀。以色棕黑、干燥、虫体完整、无杂质者为佳。

【处方名】蟋蟀。

【性味归经】辛、咸，温。归膀胱经。

【功效主治】利尿。主治尿闭，水肿，臌胀。

【用量】2~4克。

【禁忌】孕妇忌服。

蝼蛄

出自《神农本草经》。为蝼蛄科昆虫蝼蛄 *Gryllotalpa africana* Pal. de Beauvois 及大蝼蛄 *G. unispina* Saussure 的干燥全体。主产于江苏、安徽、河南、河北、山东、浙江等地。夏、秋季耕地翻土时捕捉，或夜间点灯诱捕，用沸水烫死，晒干或焙干入药。

【别名】梧鼠，蝼蝈，天蝼，蟪蛄，螽，蝼室，嫁蛉，杜狗，蛄蝼，炙鼠，津姑，蝼蜮，硕鼠，螬姑，土狗，土狗子，地狗，拉

拉古，土狗崽，地牯牛，拉拉狗，拉站，天蠅蠅，石鼠，水狗拉拉站，地站。

【商品名】 蟼站：又名南方蝼蛄、非洲蝼蛄。为昆虫蝼蛄的干燥全体。

大蝼蛄：又名北方蝼蛄、华北蝼蛄。为昆虫大蝼蛄的干燥全体。

以上商品均以虫体完整、干燥、无杂质者为佳。

【处方名】 蟼站。

【性味归经】 咸，寒。归胃、膀胱经。

【功效主治】 利水，通便。主治水肿，小便不利，石淋，瘰疬，痈肿恶疮。

【用量】 3～5克。外用适量。

【禁忌】 孕妇及体虚者忌服。

石 燕

出自《新修本草》。为古生代腕足类石燕子科动物中华弓石燕 *Cyrtiospirifer sinensis* (Graban.) 及近缘动物的化石。主产于湖南、广西、四川、山西、江西等地。全年可采挖，洗净泥土，敲碎或水飞用。亦有煅后敲碎或水飞用者。

【别名】 石燕子，燕子石，燕石，中华弓石燕。

【商品名】 石燕，中华弓石燕。以状如蚶、色青黑、质坚硬、无杂石者为佳。

【处方名】 石燕，石燕子，燕子石，水飞石燕，煅石燕等。

处方中写石燕、石燕子、燕子石等均指生石燕。为原药洗净泥土晒干，敲碎或水飞入药者。

煅石燕为净石燕在火上煅烧红透，取出放凉，敲碎或水飞入药者。

【注意】 药用石燕的品种繁多，除上述品种外，还有石燕 Spi-

rifer sp. 或中国石燕 *Cyrtospirifer sinensis* Gr (*Sinospirifer sinensis*) 或弓石燕 *Cyrtiopsis* sp. 或对刀石燕 *Sinospirifer Cyltrijugatus* 或格别石燕 *S. paradoxus* 等等。

【性味归经】甘，凉。归肝、膀胱经。

【功效主治】除湿热，利小便，退云翳。主治小便不利，白带，尿血，肠风痔漏下血，目生云翳。

【用量】水煎服 6～9 克，磨汁服 3～5 克。水磨外用点眼适量。

【禁忌】孕妇及体虚无湿热者慎服。

鱼 脑 石

出自《药材资料汇编》。为石首鱼科动物大黄鱼 *Pseudosciaena crocea* (Rich.) 或小黄鱼 *P. polyactis* Bleeker 头骨中的耳石。主产于浙江。多为加工鱼鲞时的副产品。取头骨中最大的一块耳石，洗净，晾干。

【别名】石首鱼头石，石首鱼脑中枕，石首鱼蛇，石首鱼鳞，石首骨，黄鱼脑石，鱼首石，大黄鱼脑石，小黄鱼脑石，鱼枕石，鱼耳石，黄花鱼头石，石头鱼头石，鱠首石，江鱼首石，江鱼头石，江鱼脑石，鱠脑石，海鱼脑石，黄瓜鱼脑石，头中石蛇，大黄花鱼头石，花鱼脑石，小黄花鱼脑石，古鱼脑石，大眼脑石，鱼枕骨，鱼脑骨。

【商品名】鱼脑石，鱼首石，鱼枕石。以洁白，坚硬、无杂质者为佳。

【处方名】鱼脑石，鱼首石，石首骨，鱼枕石，煅鱼脑石。

处方中写鱼脑石、鱼首石、鱼枕石、石鱼骨等均指生鱼脑石。为原药洗净，晾干，捣成小块或碎块入药者。偏于利尿化石。

煅鱼脑石为净鱼脑石放铁勺内，上覆一盖，在烈火上煅至有爆裂声，取出放凉入药者。

【性味归经】咸，平。归肾、膀胱经。

【功效主治】化石，通淋，消炎。主治石淋，小便不利，中耳炎，鼻炎。解野蕈毒。

【用量】3～9克。外用适量。

【禁忌】阴虚者慎用。

七、温 里 药

附 子(附：乌头 天雄)

出自《神农本草经》。为毛茛科多年生草本植物乌头 *Aconitum carmichaeli* Debx. 的子根的加工品。其母根名乌头（川乌头），旁生一个或数个幼根，名附子；生于附子之侧的小幼根名侧子；不生幼根者名天雄。主产于四川。此外湖北、湖南等地也有栽培。6月下旬至8月上旬采挖，除去须根及泥沙，然后加工成盐附子、黑顺片及白附片。

【别名】侧子，附块，漏蓝子，奚毒，正坐丹砂，乌药，乌附子，乌附片，附瓣，附子瓣。

【商品名】盐附子：又名生附子、咸附子、超雄。为较大的泥附子洗净后用食用胆巴水溶液加工而成。以个大、体重、色灰黑、表面起盐霜者为佳。

黑顺片：又名黑附子、顺片、黑片、黑附块、黑附片。为中等大的泥附子洗净后用食用胆巴水溶液及调色剂加工而成。以片大、均匀、皮黑褐、切面油润有光泽者为佳。

白附子：又名白附片、白片、白顺片、明附片、雄片、明附片。为较小的泥附子洗净后用食用胆巴水溶液加工而成。以片大、均匀、

干燥、色黄白、油润半透明者为佳。

黄附片：用甘草、红花、生姜、去油牙皂等加水熬成染汁，将附片染成黄色即成。

熟附片：又名熟片、熟附子。以上几种饮片统称熟附片。

川附子：为附子产于四川者。为地道药材，产量大，品质优。

【处方名】附子，附片，盐附子，白附子，白附片，黑附子，黑顺片，黑片，顺片，熟附子，熟片，制附子，制附片，川附子，淡附子，淡附片，炮附片等。

淡附子又称淡附片。为盐附子经清水浸漂后，与甘草、黑豆加工炮制后入药者。

炮附片为附片用武火急炒至微鼓裂，取出晾凉入药者。

【注意】附子、乌头、天雄、乌喙、侧子五物同出而异名。《本经》：冬采为附子，春采为乌头。《广雅》：奚毒，附子也。一岁为侧子（又名蒟子、茛），二岁为乌喙，三岁为附子，四岁为乌头，五岁为天雄（又名白幕）。今以乌头侧附之根块为附子，主根为乌头，独根无附生者为天雄（一称侧根经加工成制盐附子者名天雄；或称附子、草乌头形细而长者为天雄）。《纲目》此条辨析甚详，可以参考。

【性味归经】辛，热。有毒。归心、肾、脾经。

【功效主治】回阳救逆，补火助阳，散寒止痛。主治冷汗自出，四肢厥逆，脉微欲绝之亡阳证；阳虚证；痹证。

【用量】4～10克。

【禁忌】孕妇忌服。

附：乌头 天雄

乌头为植物乌头的主块根。因其形似乌鸦头，故名乌头。分川乌、草乌两大类。川乌又名川乌头，草乌又名草乌头、北乌头。乌头别名奚毒、蒟、芨、堇、堇草、乌喙（乌头分两歧者）、两头尖、

鸡毒、耿子、郎子、千秋、帝秋、果负、金鸦、土附子、断肠草、独白草、毒公、五毒根、川乌头、川乌、草乌头、草乌、北乌头、射罔等。性味辛苦温，有大毒。归心、肝、脾经。功效祛风湿，散寒止痛。主治寒湿痹痛，心腹冷痛，偏头痛，跌打损伤疼痛等证。散寒止痛作用较附子为强。用量3～6克。若作散剂或酒剂，应减为1～2克。制过用。入汤剂应先煎30～60分钟。孕妇忌用。避免与半夏、瓜蒌、贝母、白及，白蔹等相反的药物同用。草乌又名草乌头，为毛茛科多年生野生植物北乌头 *Aconitum kusnezoffii* Rehb. 的块根。性味、功效、用法及注意事项等均与川乌同，而毒性更强。用量1.5～4.5克。

天雄为川乌头不生幼根者。性味归经，功效主治、用量、慎忌等均同川乌头。

干 姜

出自《神农本草经》。为姜科多年生草本植物姜 *Zingiber officinale* Rosc. 的干燥根茎。主产于四川、湖北、广东、广西、福建、贵州等地。均系栽培。冬季采挖，除去茎叶及须根，洗净，晒干或烘干。切片，生用或炮用。

【别名】干生姜，白姜，白干姜，均姜，台均姜，廉姜，蜀姜，茈姜，阳朴姜，北姜，淡姜。

【商品名】均姜：产于湖南均州者。旧时奉为地道药材，以为佳品。

川干姜：产于四川建版场者。块大，肥壮，皮细，肉白多粉，现时视为佳品。

【处方名】干姜，干姜片，淡干姜，泡姜，炮姜，炮干姜，炒干姜，黑姜，炮姜炭，干姜炭，黑姜炭，炒姜炭，姜炭等。

处方中写干姜指干姜片。又名淡干姜、泡姜。为原药除去杂质，洗净略泡，润透切片，晒干入药者。

炮姜又名黑姜、炮干姜、炒干姜、干姜炭、炮姜炭、黑姜炭、炒姜炭、姜炭等。为干姜炒至表面微黑，内成棕黄色而入药者。炮姜温里作用减弱，而长于温经止血。

【性味归经】辛，热。归脾、胃、心、肺经。

【功效主治】温中，回阳，温肺化饮。主治脘腹冷痛、呕吐泄泻之脾胃寒证；亡阳证；寒饮伏肺之咳嗽气喘，形寒背冷，痰多清稀等。

【用量】3～10克。

【禁忌】孕妇慎服。

肉 桂

出自《名医别录》。为樟科常绿乔木植物肉桂 *Cinnamomum cassia* Presl的干皮或粗枝皮。主产于广西、广东、云南等地。大暑节前割裂树皮，立秋后剥离，刮去栓皮，阴干，切片或研末生用。

【别名】桂，牡桂，紫桂，大桂，小桂，辣桂，桂皮，玉桂，桂木皮，梗皮，木桂，木桂皮，桂树皮，糠桂皮，紫油桂，菌桂，筒桂，板桂，油桂，官桂，安桂，薄桂，油肉桂，赤油桂，上肉桂，上油桂，上官桂，筒桂，箇桂，箭桂，月桂，跋趾桂，大板桂，安边桂，绿水桂，桂楠，刁安，丹阳木皮。

【商品名】官桂：又名上官桂、菌桂、箇桂，筒桂、桂尔通、桂通、油桂通、条桂、广条桂。指肉桂中品质优良者。按李时珍的解释，官桂“乃上等供官之桂”。

高山肉桂：进口肉桂中的野生品。

低山肉桂：进口肉桂中的栽培品。

企边桂：又名清化桂、清化玉桂、清化肉桂。是越南北圻清化所产的野生桂。又分为高山企边桂、低山企边桂等规格。

板桂：又名桂楠，平板桂。为15年以上老肉桂树的外皮。多压

成板状，故名板桂。

广肉桂：产于广西、广东的肉桂。

安南肉桂：又名安肉桂、安桂。产于越南（旧称安南）的肉桂。

黄瑶肉桂：又名黄瑶桂。产于大瑶山区的肉桂。

蒙自肉桂：又名蒙自桂。产于北圻与滇边接近的孟山，因在蒙自出售，故名蒙自肉桂。

桂心：刮去栓皮，表面较平滑，红棕色者，通称桂心。

以上商品均以皮薄、含油多、香气浓、味甜微辛、肉细，嚼之无渣者为佳。

【处方名】肉桂、桂心、桂皮、紫油桂、板桂、官桂。

【注意】商品桂皮系指同属植物天竺桂 *Cinnamomum japonicum* Sieb. (*C. pedunculatum* Nees) 或川桂皮 *C. mairei* Levl. 或细叶香桂（葛桂）*C. chingii* Metcalf 及柴桂 *C. wilsonii* Gamble 等的树皮。其树皮较薄，品质较差，一般作香料或调味品，入药用远不及肉桂质优。

【性味归经】辛、甘，热。归肾、脾、心、肝经。

【功效主治】补火助阳，散寒止痛，温经通脉。主治肾阳不足，命门火衰之畏寒肢冷，腰膝软弱，阳痿，尿频；脾肾阳衰之脘腹冷痛，食少便溏；血分有寒之寒瘀经闭，痛经；寒湿痹痛，腰痛；阴疽；气血虚寒所致之痈肿脓成不溃，或溃后久不敛口等外科疾患。

【用量】2～5克。研末冲服或入丸散每次1～2克。

【禁忌】孕妇及阴虚火旺、里有实热、血热妄行者忌服。

吴茱萸

出自《神农本草经》。为芸香科落叶灌木或小乔木植物吴茱萸 *Euodia rutaecarpa* (Juss.) Benth.、石虎 *E. rutaecarpa* (Juss.)

Benth. var. *officinalis* (Dode) Huang, 或疏毛吴茱萸 *E. rutaecarpa* (Juss.) Benth. var. *bodinieri* (Dode) Huang 的将近成熟果实。主产于贵州、广西、湖南、云南、陕西、浙江、四川等地。8~11月果实尚未开裂时，收集果实，晒干，除去杂质。用甘草汤制过使用。

【别名】吴萸，吴萸子，淡吴萸，吴芋，吴于，吴椒，蕤子，蕤煎，楤子，芥捺，捺子，欓子，樾子，椒子，蒸子，茱萸子，蘡子，丑茱子，茱子，辣子，漆辣子，米辣子，伏辣子，臭辣子，气辣子，茶辣子，石虎子，曲药子，疏毛吴茱萸，少毛搜涎，储油子，毛脉吴茱萸，纯幽子，臭泡子，左力。

【商品名】常吴萸：产于贵州铜仁、镇远一带，旧时集散于湖南常德者。粒子均匀，很少开裂，色碧绿，气味浓烈，品质最优。

川吴萸：产于四川、陕西者。品质稍次。

吴萸或吴茱萸：本品各品种的统称。以果实饱满、色绿、香气浓、无杂质者为佳。

【处方名】吴茱萸，吴萸，吴芋，吴于，吴萸子，吴于子，淡吴萸，炙吴萸，炒吴萸，黄连炒吴萸，姜汁炒吴萸，盐炒吴萸等。

处方中写吴茱萸、吴萸、吴芋、吴于、吴萸子、吴于子等均指生吴茱萸。为原药材去杂质生用入药者。

淡吴萸又名泡吴萸。系原药材经开水或甘草水浸泡，漂洗后晒干入药者。

炙吴萸为净吴萸用甘草汤浸泡，待吸尽汤液，用微火焙干入药者。

炒吴萸为净吴萸用文火炒至发泡，较原色稍深为度者。

黄连炒吴萸为净吴萸用黄连汁拌炒者。

姜汁炒吴萸为净吴萸用姜汁拌炒者。

盐炒吴萸为净吴萸用盐水拌炒者。

醋炒吴萸为净吴萸用醋拌炒者。

【性味归经】辛、苦，热。有小毒。归肝、脾、胃经。

【功效主治】 散寒止痛，疏肝下气，燥湿。主治脘腹冷痛，疝痛，头痛，虚寒泄泻；寒湿脚气疼痛或上冲入腹，困闷欲死，腹胀，呕吐吞酸。研末醋调敷足心可治疗口舌生疮。

【用量】 1.5~5克。外用适量。

【慎忌】 阴虚火旺者忌服。

细辛

出自《神农本草经》。为马兜铃科多年生草本植物北细辛 *Asarum heterotropoides* Fr. Schmidt var. *mandshuricum* (Maxim.) Kitag. 或华细辛 *A. sieboldii* Miq. 的带根全草。夏季果熟期采挖，除去泥土及杂质，阴干生用。

【别名】 小辛，细草，少辛，独叶草，金盆草，金盘草，山人参，山细辛，北细辛，辽细辛，东北细辛，烟袋锅花，细参，万病草，华细辛，白细辛，西细辛，细身，玉香丝，绿须姜，大药。

【商品名】 辽细辛：又名北细辛、东北细辛、细参、万病草、烟袋锅花。为植物北细辛的带根全草。主产于辽宁、吉林、黑龙江。产量大，销全国并出口。

华细辛：又名西细辛、白细辛。为植物华细辛的带根全草。主产于陕西。

以上两种为细辛正品。以根色灰黄、叶色绿、干燥、气辛香、嚼之辛辣麻舌者为佳。

马细辛：又名马辛、南细辛、土细辛、马蹄香、杜衡。为植物杜衡 *Asarum forbesii* Maxim. 的根茎及根。形似马蹄。在江苏、浙江等个别地区作“细辛”使用。

大花细辛：又名花脸细辛。为植物大花细辛 *A. maximum* Hemsl. 的根茎及根。在四川个别地区作“细辛”使用。

花叶细辛：为植物花叶细辛 *A. geophilum* Hemsl. 的根茎及根。在广东、广西等地作“细辛”使用。

圆叶细辛：为植物圆叶细辛 *A. caudigerum* Hance. 的根茎及根。在广西等地作“细辛”使用。

盆草细辛：又名水细辛、毛细辛、西南细辛、土癩蜘蛛香。为植物盆草细辛 *A. himalaicum* Hook. f. et Thoms. 的全草。在四川、陕西等地作“细辛”使用。

双叶细辛：为植物双叶细辛 *A. caulescens* Maxim. 的全草。在四川、陕西等地作“细辛”使用。

长花细辛：又名黄细辛。为植物长花细辛 *A. longiflorum* C. Y. cheng et C. S. Yang. 的根茎及根。在陕个别地区作“细辛”使用。

茨菇叶细辛：又名茨叶细辛。为植物茨菇叶细辛 *A. insigne* Diels 的带根全草。在湖北、广西等个别地区作“细辛”使用。

金耳环：为植物金耳环 *A. longipedunculatum* O. C. Schmidt 的全草。在广西个别地区作“细辛”使用。

毛柄细辛：又名汉城细辛。为植物毛柄细辛 *A. sieboldii* Miq var. *seoulense* Nakai. 的带根全草。主产于鸭绿江流域。在当地也作“细辛”使用。

以上10种为细辛副品。品质软次，功较较差。仅在个别地区使用。

【处方名】细辛，辽细辛，北细辛。

【性味归经】辛，温。归肺、肾经。

【功效主治】祛风，散寒止痛，温肺化饮，宣通鼻窍。主治头痛，牙痛，痹痛，鼻渊，外感风寒表证，寒饮伏肺所致的咳嗽气喘，痰多清稀等。外用细辛末敷脐并用黄连汁涂患处可治疗口舌生疮。

【用量】1～3克。外用适量。

【禁忌】气虚多汗，阴虚阳亢头痛，阴虚肺燥咳嗽忌服。反藜芦。

花 椒(附：椒目)

出自《神农本草经》。为芸香科灌木或小乔木植物花椒 *Zanthoxylum bungeanum* Maxim. 或青椒 *Z. schinifolium* Sieb. et Zucc. 的干燥成熟果皮。我国大部分地区均有出产，但以河南、河北、山西、陕西、甘肃产量最大，以四川产者品质最佳。秋季果实开裂时采摘，除去果柄、杂质及种子，晒干，生用。

【别名】 檉，樛，荳，川椒，蜀椒，蜀荳，秦椒，秦荳，荳荳，荳荳荳，荳荳荳荳，大椒，南椒，巴椒，蕘穀，汗椒，陆拔，汉椒，红花椒，红椒，大红袍，椒红，椒皮，椒壳，椒聊，香椒，香椒子，大花椒，狗椒，山椒，青花椒，小苏椒，点椒，崖椒，青椒，香花椒，天椒。

【商品名】 花椒：又名红椒、红花椒、大红袍、川椒、蜀椒等。为植物花椒的成熟果皮。主产于河南、河北、山西、陕西、甘肃、四川等地。品质优良，销全国并出口。以色红、干燥、无梗叶、无椒目、无杂质者为最佳。

青花椒：又名青椒、山椒、秦椒、狗椒、香椒、崖椒、香椒子、小花椒。为植物青椒的干燥成熟果皮。主产于河北、江苏、辽宁等地。品质较次。其中以色青绿、干燥、无梗叶、无椒目、无杂质者为佳。

此外，同属植物野花椒 *Z. simulans* Hance.、竹叶椒 *Z. planispinum* Sieb. et Zucc.、勒欓 *Z. avicennae* (Lam.) DC.、柄果花椒 *Z. simulans* Hance var. *podocarpum* (Hemsl.) Huang. 等的果皮，在个别地区也作“花椒”使用。称为“土花椒”。非属花椒正品，而是花椒副品，或称代用品。品质最次，功效亦差。

【处方名】 花椒，川椒，蜀椒。

【注意】 在四川乐山、峨眉，湖北襄阳以及西南部分地区有用异花吴茱萸 *Evodia berberi* Rehd. et Wils. 或其近种的成熟果实混

作“花椒”入药者。异花吴茱萸的果实与花椒功效不同，不能混用。混用现象应予以纠正。

【性味归经】辛，热。有小毒。归脾、胃、肾经。

【功效主治】温中，止痛，杀虫。主治脾胃虚寒所致之脘腹冷痛，呕吐，泄泻；蛔虫引起之腹痛、呕吐或吐蛔。

【用量】3～6克。外用适量。

【禁忌】阴虚火旺及内有实热者忌服。孕妇慎服。

附：椒目

椒目又名椒子、花椒目、川椒目、蜀椒目、櫟目、南椒目、巴椒目、大椒目、秦椒目、汗椒目、汉椒目、点椒目、红花椒目、红椒目、大红袍目、陆拔目、蕘蕘目等等。为花椒的种子。性味苦寒。归脾、膀胱经。功效行水平喘。主治水肿胀满、痰饮喘咳等证。用量3～6克。

草 茛

出自《新修本草》。为胡椒科藤本植物草荳 *Piper longum* L. 的未成熟果穗。产于我国云南、广东等地。此外印度尼西亚、菲律宾及越南等国亦有出产。9～10月间果穗由黄变黑时采摘，晒干，生用。

【别名】草拔，毕拔，草拔，草荳，草拔梨，阿梨河啦，堪圣，蛤蒌，鼠尾，草荳穗，毕荳，草荳，草荳，毕勃，逼拔，蒟酱。

【商品名】泗水草荳：为产于印度尼西亚的泗水地区者。表面棕褐色，条顺直，谷粒状小突起物紧密，香气浓，品质优。

安南草荳：又名越南草荳。为产于越南（古称安南）者。表面棕红色，条弯曲，谷粒状小突起物疏松，香味淡，品质次。

云南草芨：为产于我国云南者。形状气味与泗水草芨相似，品质亦佳。

草芨：为各种草芨的统称。以果穗肥大、干燥、饱满、坚实、气味浓者为佳。

【处方名】草芨，草拔，必卜。

【性味归经】辛，热。归胃、大肠经。

【功效主治】温中止痛。主治胃寒呕吐，呃逆，腹痛，腹泻。草芨粉涂于患处可治龋齿疼痛。

【用法】3～5克。外用适量。

【禁忌】阴虚阳亢者及内有实热者忌服。

草 澄 茄

出自《海药本草》。为胡椒科常绿攀援性藤本植物草澄茄 *Piper cubeba* L. 及樟科落叶小乔木或灌木山鸡椒（山苍子）*Litsea cubeba* (Lour.) Pers. 的果实。前者原产南洋各地，我国广东亦产。夏秋间果实长成而未成熟时采摘。后者产于我国长江以南地区，主产于安徽、江苏、浙江、广西等地。夏季果实成熟时采摘。去枝叶，晒干，生用。

【别名】澄茄，毗陵茄子，毕澄茄，毕茄，草茄，澄茄子。

【商品名】草澄茄：为胡椒科植物草澄茄的干燥未成熟果实。主产于印度尼西亚、马来西亚、印度等地。古时本草书中所载草澄茄均为此种。

山鸡椒：又名山苍子、香叶子、山香椒、山姜子、山胡椒、野胡椒、香柴子、香粉子、粉果、过山香、土澄茄、满山香、木香子、木筑子、味辣子、木姜子、豆豉姜、臭樟子等。为樟科植物山鸡椒的成熟果实。主产于安徽、江苏、浙江、广西等地。今时草澄茄药材商品均为此种。

以上商品以果实个大、油性足、香气浓、干燥无杂质者为佳。

【处方名】荜澄茄，毕澄茄，澄茄。

【性味归经】辛，温。归脾、胃、肾、膀胱经。

【功效主治】温中止痛。主治胃寒疼痛，呕吐，呃逆，寒疝疼痛，寒证小便不利或尿浊等。

【用量】3～5克。

【禁忌】实热呕吐、呃逆忌服。

丁 香(附：母丁香)

出自《药性论》。为桃金娘科常绿乔木植物丁香 *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. et Perry 的花蕾，称公丁香。主产于坦桑尼亚、马来西亚、印度尼西亚等地。我国广东、广西、海南等地亦有栽培。通常在9月至次年3月间，花蕾由青变为鲜红时采摘，除去花梗，干燥，生用。

【别名】公丁香，丁子香，支解香，雄丁香，大花丁香，紫丁香，公丁，丁子，大花，百里香，如字香，索瞿香，瘦香娇。

【商品名】丁香，公丁香。以花蕾干燥、个大、饱满、色棕紫而新鲜、香气浓烈、油性足者为佳。

【处方名】丁香，公丁，公丁香。

【注意】丁香应与白丁香、桂丁香、野丁香、苦丁香等区分开来，不能混为一谈。因为它们不是一种药物。白丁香为文鸟科动物麻雀的粪便，性味苦温，有化积消翳之功效。桂丁香又名肉桂子，为樟科植物肉桂的未成熟果实及花萼，有温中止痛之功效。野丁香为木犀科植物花叶丁香 *Syringa persica* L. 的花蕾或茜草科植物桂丁香(又名中型滇丁香) *Luculia intermedia* Hutch. 的花果。苦丁香即瓜蒂，为涌吐药。应注意区分。

【性味归经】辛，温。归脾、胃、肾经。

【功效主治】温中降逆，暖肾助阳。主治胃寒呕吐，呃逆，少食，腹泻；肾阳不足所致的阳痿、脚弱。

【用量】 2～5克。

【禁忌】 实热证患者忌服。畏郁金。

附：母丁香

母丁香为丁香的成熟果实。又名母丁、鸡舌香（该果实击破有顺理，常丝裂为两瓣，形如鸡舌，故名）、雌丁香、亭灵独生。商品以果实个大、粒实、油足、气味浓厚者为佳。性味功效与公丁香相似而力较弱。用量及禁忌同公丁香。

高 良 姜

出自《名医别录》。为姜科多年生草本植物高良姜 *Alpinia officinarum* Hance 的根茎。主产于广东、广西及台湾等地。夏末秋初，挖取生长4～6年的根茎，除去地上茎、须根及残留的鳞片，洗净，切片，晒干，生用。

【别名】 膏凉姜，良姜，蜜姜，佛手根，小良姜，风姜，理光乌药，海良姜，高凉姜。

【商品名】 良姜，高良姜。以根茎粗壮坚实、色棕红、分枝少、香辣味浓者为佳。

【处方名】 良姜，高良姜，良姜片。

【注意】 目前在药材商品市场上，有将同属植物大高良姜（大良姜） *Alpinia galanga* (L.) Willd. 的根茎作高良姜入药者。大高良姜的气与味均不如高良姜浓厚，品质较次，非高良姜正品。

【性味归经】 辛，热。归脾、胃经。

【功效主治】 温中止痛。主治胃寒胃痛，呕吐，虚寒腹痛，泄泻。

【用量】 4～12克。

【禁忌】 阴虚火旺及内有实热者忌服。

红 豆 窜

出自《药性论》。为姜科植物大高良姜 *Alpinia galanga* (L.) Swartz 的果实。主产于广西、广东、云南等地。秋季果实变红时采集，阴干或晒干。

【别名】红蔻，红叩，红扣，红豆叩，红豆，良姜子，高良姜子，大高良姜子，大良姜子，山姜子，山羌子。

【商品名】红豆蔻，大高良姜子，大良姜子，高良姜子。以果粒大、饱满、干燥、不破碎、无杂质、气味浓者为佳。

【处方名】红豆蔻，红蔻，红豆叩，红叩，红扣，红蔻仁，红叩仁。

【性味归经】辛，温。归肺、脾经。

【功效主治】散寒，消食，燥湿。主治脘腹冷痛，呕吐泄泻，噫膈反胃，疟疾，痢疾。

【用量】3～5克。外用适量。

【禁忌】阴虚有热者慎服。

小 茴 香

出自《新修本草》。为伞形科多年生草本植物茴香 *Foeniculum vulgare* Mill. 的干燥成熟果实。我国南北各地均有栽培。于夏末秋初果实成熟时割取全株，晒干后打下果实，除去杂质，生用或盐水炒用。

【别名】茴香，小茴，籽香，野茴香，谷茴香，谷香，香子，小香，香丝菜子，瘪谷香，慈蒌子，慈谋勒，茴香子，茨楼子，土茴香，大茴香，西茴，西茴香，西小茴，芥香子，瘪角茴香。

【商品名】小茴，小茴香，茴香。以粒大饱满，色黄绿、香气浓者为佳。

【处方名】小茴，小茴香，茴香，盐茴香或盐炒小茴香（为净小茴香加盐水拌炒而成。有引药下行之功）。

【注意】目前在药材商品市场上，甘肃庆阳地区以伞形科植物莳萝 *Anethum graveolens* L. 的果实充当“小茴香”入药，广西称之为“土茴香”。《本草纲目》亦说莳萝别名“小茴香”。可见莳萝子充当“小茴香”使用历史已久。二者虽然气味、功效相近，必要时可以替代，但不为同属植物，生药形态亦有差异，故名称上不宜混淆。作“小茴香”使用时，非为小茴香正品。

山西等省的个别地方，将田黄蒿 *Carum buraticum* Turcz. 的果实误作“小茴香”入药，称为“山茴香”。这是错误的，应予以纠正。

小茴香与莳萝子同有“土茴香”之别称；小茴香与八角茴香同有“大茴香”之别称。在名称上易引起混淆，所以应使用正名，不用别名，以免搞错。

【性味归经】辛，温。归肝、肾、脾、胃经。

【功效主治】理气和胃，散寒止痛。主治寒疝疼痛，睾丸偏坠，胃寒呕吐少食，脘腹胀痛。

【用量】4～10克。外用适量。

【禁忌】阴虚火旺及内有实热者忌服。

八 角 茴 香

出自《本草品汇精要》。为木兰科常绿小乔木八角茴香树 *Illicium verum* Hook. f. 的果实。产于亚热带地区，我国广东、广西、海南、台湾等地均有种植。多在9～10月间果实成熟后采收，除去杂质，生用或炒用。

【别名】茴香，八角，八角香，八角大茴，八角大茴香，大八角，大茴香，原油茴，舶茴香，船上茴香，茴香八角珠，八角珠，广茴香，五香八角。

【商品名】大茴，大茴香。以果实瓣大、干燥、完整无破碎、油性大、香气浓者为佳。

【处方名】大茴，大茴香，八角茴香，炒大茴（净大茴用微火炒至微黄入药者）。

【注意】本品别名“八角香”，名称易与菊科植物八角香（蜘蛛草）*Cacalia ainsliaeflora* (Franch.) Hand.-Mazz.混淆，应注意区分。

同属植物莽草*Ilicium lanceolatum* A. C. Smith.的果实，形状与八角茴香非常相似，极易混淆。莽草果实有毒，不可混用，应引起注意。

【性味归经】辛、甘，温。归肺、脾、胃经。

【功效主治】温阳散寒，理气止痛。主治胃寒胃痛，脘腹胀满，呕吐，寒疝腹痛，寒湿脚气等证。

【用量】3～6克。

【禁忌】阴虚火旺者忌服。

胡 椒

出自《新修本草》。为胡椒科常绿藤本植物胡椒*Piper nigrum* L. 的干燥果实。分布于热带、亚热带地区。我国海南、广东、广西、云南等地有引种。10月至次年4月当果穗基部的果实开始变红时，剪下果穗，晒干或烘干后，即成黑褐色，取下果实，通称黑胡椒。如在全部果实均变红时采收，用水浸渍数天，擦去外果皮，晒干，表面呈灰白色，通称白胡椒。生用。

【别名】昧履支，浮椒，玉椒，古月，黑川，白川，黑古月，白古月，黑胡椒，白胡椒。

【商品名】黑胡椒：又名黑川、黑古月。当果穗基部的果实开始变红时，剪下果穗，晒干或烘干后，变成黑褐色。然后取下果实，即为黑胡椒。

白胡椒：又名白川、白古月。在全部果实均变红时采收，用水浸渍数天，擦去外果皮，晒干，表面呈灰白色，即为白胡椒。

以上商品以粒大、饱满、干燥、油性大、气味浓者为佳。

【处方名】胡椒，白胡椒。

【性味归经】辛，热。归胃、大肠经。

【功效主治】温中止痛。主治肠胃有寒所致之脘腹疼痛，呕吐泄泻。研末贴脐部亦可治腹痛泄泻。

【用量】1～3克。研末吞服0.3～0.6克。外用适量。

【慎忌】阴虚内热或内有实热者忌服。

山 奈

出自《本草纲目》。为姜科植物山柰 *Kaempferia galanga* L. 的根茎。主产于台湾、广东、广西、云南等地。11月地上部分枯时挖取根状茎，去除须根，洗净，切片晒干。

【别名】三柰，三奈，山柰，三柰子，三辣，三藏，沙姜，香柰，三芳，山赖，三赖。

【商品名】山柰，山柰，三柰，三柰。以根茎干燥、肥壮、粉性足、色白、气味浓厚者为佳。

【处方名】山柰，山柰，三柰，三柰，山赖，山芳。

【性味归经】辛，温。归胃经。

【功效主治】温中，消食，止痛。主治心腹冷痛，停食不化，急性胃肠炎，风湿性关节痛，跌打损伤。

【用量】4～6克。外用适量。

【慎忌】阴虚血亏，胃有郁火者忌服。

钟 乳 石

出自《本草崇原》。为碳酸盐类矿物钟乳石 *Stalactite* 的矿石。

主产于广西、广东、云南、贵州、四川、湖北、陕西、山西、甘肃等地。采得后除去杂石，生用或煅用。

【别名】石钟乳，钟乳，公乳，留公乳，夏乳根，夏石，滴乳石，鹅管石，虚中，芦石，黄石砂，卢布，殷孽，孔公孽，石乳。

【商品名】钟乳石：呈圆柱或圆椎形，粗如酒杯者。

滴乳石：又名鹅管石、钟乳鹅管石。呈圆柱状或笔管状，细如笔管者。

以上两种均以色白、有光泽者为佳。

【处方名】钟乳石，钟乳，石钟乳，生钟乳石，煅钟乳石。

处方中写钟乳石、钟乳、石钟乳均指生钟乳石。为原药去杂质及泥砂后打成小块入药者。

煅钟乳石为净钟乳石置坩埚中烧至红透，取出放冷，碾细入药者。收敛温肾功效增强。

【性味归经】甘，温。归肺、肾经。

【功效主治】温肾气，壮元阳，下乳汁。主治虚劳咳喘，寒嗽，腰膝冷痛，阳痿遗精，乳汁不下。

【用量】6～12克。

【禁忌】阴虚火旺、肺热咳喘者忌服。

八、理 气 药

橘 皮（附：橘核 橘络 橘叶 橘红 橘白）

出自《神农本草经》。为芸香科常绿小乔木植物橘 *Citrus reticulata* Blanco 及其同属多种植物的成熟果实的果皮。主产于广东、福建、四川、江苏、浙江等省。江西、湖南、云南等省亦产。

秋季果实成熟时收集，干燥，生用。

【别名】陈皮，贵老，黄橘皮，红皮，陈橘皮，桔皮，陈桔皮，广陈皮，新会皮，广皮，会皮，橘子皮。

【商品名】陈皮：又名橘皮、真橘皮、建陈皮。为植物橘的成熟果皮。主产于四川、浙江、福建等地。为橘皮正品。

广陈皮：又名柑皮、柑子皮、广柑皮、广皮、陈广皮、陈柑皮、新会皮。为植物茶枝柑 *Citrus chachiensis* Hort. 等多种柑类的果皮。与陈皮同等入药。

土陈皮：又名土橘皮、橙皮。为植物甜橙 *Citrus sinensis* (L.) Osbeck. 等的成熟干燥果皮。功效与正品相似而力逊。为陈皮副品。

以上商品均以果皮片大、均匀、干燥、色鲜艳、油性大、香气浓者为佳。

【处方名】陈皮，橘皮，桔皮，广陈皮，炒陈皮（将陈皮切丝，微火轻炒入药者）。

【性味归经】辛、苦，温。归脾、肺经。

【功效主治】理气，调中，燥湿，化痰。主治脾胃气滞所致的脘腹胀满，嗳气，恶心，呕吐；湿浊中阻所致的胸闷腹胀，纳呆倦怠，大便溏薄；痰湿阻滞，肺失宣降引起的咳嗽痰多，喘满胸闷等证。

【用量】6～12克。

【慎忌】阴虚内热及内有实热者慎服。

附：橘核 橘络 橘叶 橘红 橘白

橘核：又名橘子仁、橘子核、橘米、橘仁、南橘核、桔核、桔仁、桔米、桔子核。为橘的种子。性味苦平。归肝经。有行气散结止痛之功效。主治疝气、睾丸肿痛及乳房结块等证。用量3～10克。

橘络：又名橘丝、橘筋、桔络、桔丝、桔筋。药材有风尾橘络、金丝橘络和铲络等品种。为橘的中果皮及内果皮之间的维管束群（俗称筋络）。性味甘苦平。归肝、肺经。有宣通经络、行气化痰之功效。主治痰滞经络，咳嗽胸胁作痛等证。用量3～5克。

橘叶：又名橘子叶、南橘叶、桔子叶、桔叶、金桔叶、金橘叶等。为橘树之叶。性味辛苦平。归肝经。有疏肝行气、消肿散结之功效。主治胁肋作痛、乳痈、乳房结块及癥瘕等证。用量6～10克。

橘红：商品有两种。一为橘类橘红，为芸香科植物橘及其同属多种植物成熟果实的果皮（陈皮）除去内层白色部分（橘白）后留下的外层红色果皮。习称广橘红、薄橘红、云红、芸红、云皮、芸皮、川云红、会红、桔红、去白陈皮等。一为柚类橘红，为芸香科植物柚*Citrus grandis* (L.) Osbeck或其变种化州柚*C. grandis* (L.) Osbeck var. *tomentosa* Hort.的未成熟或接近成熟的果皮。习称化橘红、化桔红。化橘红加工成五爪状者称五爪、大五爪、五爪红；加工成六爪状者称六爪、六爪红；加工成七爪者称七爪、七爪红、黄七爪、毛绿七爪红、光绿七爪红等。橘类橘红产于广东者称广橘红，产于四川者称川云红，产于广东赖家者称赖橘红。柚类橘红产于广东化州者称化橘红，或称化皮、化州橘红、毛化、尖化红等。橘红性味苦温。有理气宽中、燥湿化痰之功效。主治咳嗽吐痰、食积不化等证。用量6～10克。

橘白：又名桔白。为芸香科植物福橘*Citrus tangerina* Hort. et Tanaka或朱橘*C. erythrosa* Tanaka等多种橘类果皮的白色内层部分。除去橘络，晒干或晾干。性味辛苦温。有健脾和胃、化浊利湿之功能。主治脾胃虚弱引起的食欲不振、身体虚肿、脘腹胀满、咳吐稀痰等证。用量3～5克。

青 皮

出自《本草图经》。为芸香科常绿小乔木植物橘 *Citrus*

reticulata Blanco 及其同属多种植物的幼果或未成熟果实的果皮。5~6月间采集，洗净，晒干。较大者用沸水烫过后十字剖开，除去瓤肉，晒干，生用或醋拌炒用。

【别名】青橘皮，青桔皮，青柑皮，小青皮，细青皮，青皮片，大青皮，中青皮。

【商品名】四花青皮：又名花青皮、四花皮、四花青、四开青、四青、四开、四开青皮、四化青皮。个大者用刀将皮剖成四片至蒂部为止，除去瓤肉，即成四花青皮。以皮黑绿色、内面白色、油性足者为佳。

个青皮：又名均青皮、小青皮、个青。中等以下幼果不剖开，整个入药者。

青皮子：又名扣青。最小的幼果整个入药者。属于个青皮。

【处方名】青皮，炒青皮，酒青皮，醋青皮，青皮炭等。

处方中写青皮指生青皮。为原药去杂质生用入药者。

炒青皮为净青皮用麦麸炒至黄色，略带焦斑入药者。

酒青皮为净青皮用黄酒喷洒拌匀，待吸尽，再用文火微炒入药者。

醋青皮为净青皮用米醋喷洒拌匀，待吸尽，再用文火微炒入药者。

青皮炭为净青皮用武火炒至焦黑，存性，喷水灭尽火星，取出晾干入药者。破气之力减弱，但具消食化滞和胃之功。

【注意】在药材商品市场上，青皮除用橘类的未成熟果皮或幼果外，其同属植物甜橙 *Citrus sinensis* (L.) Osbeck. 和香橼 *C. wilsonii* Tanaka. 以及油茶柑 *C. chachiensis* Hort. 等未成熟果实的果皮及幼果也作“青皮”入药。功效相似，但非青皮正品。

【性味归经】苦、辛，温。归肝、胆、胃经。

【功效主治】疏肝破气，散结消滞。主治肝气郁滞所致的胁肋胀痛，乳胀胀痛，疝气疼痛，乳房结块，乳癖，乳痈，食积不化，胃脘痞闷胀痛；气滞血瘀所致的癥瘕积聚等。

【用量】3~10克。

【慎忌】气虚者慎服。

枳 实

出自《神农本草经》。为芸香科小乔木植物酸橙（皮头橙、钩头橙）*Citrus aurantium* L.或香橼*Citrus wilsonii* Tanaka,和枸橘（枳）*Poncirus trifoliata* (L.) Raf.的未成熟果实。主产于四川、江西、福建、浙江、江苏、湖南等省。7~8月采收，横剖成两半，晒干。用时将原药洗净，闷一夜使软，切片。生用或麸炒用。

【别名】酸橙枳实，皮头橙枳实，钩头橙枳实，香橼枳实，绿衣枳实，香圆枳实，枸橘实，枸枳实，臭橘实，洞庭。

【商品名】酸橙枳实：为植物酸橙的幼果。主产于四川、江西、浙江等地。

香橼枳实：为植物香橼的幼果。主产于江西、四川等地。

绿衣枳实：为植物枸橘的幼果。主产于福建、陕西等地。因幼果外表呈灰绿色，故而得名。

江枳实：为产于江西者。

川枳实：为产于四川者。

以上商品以果实外皮褐绿色、果肉厚而色白、瓢小、质坚实、香气浓、干燥者为佳。

片子枳实：幼果个体稍大，切成两半者。

鹅眼枳实：幼果个体小，不剖开，状如鹅眼者。

枪子枳实：幼果个体极小，不剖开，状如鸟枪弹子者。

【处方名】枳实，只实，枳实片，小枳实，陈枳实，炒枳实等。

处方中写枳实、只实、枳实片、小枳实、陈枳实均指生枳实。为原药润切生用入药者。偏于破气消滞。

炒枳实为枳实片用麸炒至微黄入药者。偏于散积消痞。

【注意】在药材商品市场上，除上述三个品种外，还有以甜橙 *Citrus sinensis* (L.) Osbeck 或 柚 *C. medica* L. 和 柚 *C. grandis* (L.) Osbeck 等的幼果作“枳实”入药者。功效相似，但非枳实正品。用甜橙等柑类幼果充当的“枳实”，称为“什果枳实”。

【性味归经】苦、辛，微寒。归脾、胃、大肠经。

【功效主治】破气消积，化痰除痞。主治食积停滞，腹痛便秘；痢疾引起的里急后重；痰浊阻滞气机引起的胸脘痞满；胃扩张，胃下垂，子宫脱垂，脱肛等。

【用量】4～10克。

【禁忌】气虚无实者及孕妇慎服。

枳壳

出自《雷公炮炙论》。为芸香科植物酸橙（皮头橙、钩头橙） *Citrus aurantium* L. 或 香橼 *Citrus wilsonii* Tanaka. 或 枳橘（枳） *Poncirus trifoliata* (L.) Raf. 和 琥珀花（代代花） *Citrus aurantium* L. var. *amara* Engl. 等的接近成熟的果实（去瓤）。

【别名】酸橙枳壳，皮头橙枳壳，钩头橙枳壳，香橼枳壳，绿衣枳壳，琥珀橼枳壳，琥珀花枳壳，代代花枳壳，代代橼枳壳，香圆枳壳，枸橘壳，枸枳壳，臭橘壳，什果枳壳，鹄壳，金球。

【商品名】酸橙枳壳：为植物酸橙的接近成熟的果实。主产于江西、浙江、四川等地。销全国并出口。

香橼枳壳：为植物香橼的接近成熟的果实。产于江西、四川等地。销全国并出口。

绿衣枳壳：为植物枸橘（枳）的接近成熟的果实。主产于福建、陕西等地。主要供出口。

琥珀橼枳壳：又名苏枳壳。为植物琥珀花的接近成熟的果实。主产于江苏、福建等地。行销于华北地区。

川枳壳：为产于四川的酸橙枳壳和香橼枳壳。品质最优。

江枳壳：又名西枳壳。为产于江西的酸橙枳壳和香橼枳壳。品质亦佳。

湘枳壳：为产于湖南的酸橙枳壳和香橼枳壳。品质较次。

以上商品均以果皮外表褐绿色、干燥、果肉厚、质坚实、香气浓者为佳。

【处方名】枳壳，只壳，大枳壳，陈枳壳，川枳壳，炒枳壳，蜜炙枳壳，焦枳壳，枳壳炭等。

处方中写枳壳、只壳、大枳壳、陈枳壳、川枳壳指生枳壳。为原药去杂质，润透切片，晒干生用入药者。偏于破气散结。

炒枳壳为枳壳片用麸炒至微焦黄入药者。偏于理气消食。

蜜炙枳壳为枳壳片用蜜炙后入药者。偏于利肺除痰。

枳壳炭又名焦枳壳。为枳壳片用武火炒至外呈焦黑内呈老黄色，取出用水喷洒，灭尽火星，晾干入药者。偏于止痛止血。

【注意】在药材商品市场上，除上述四个品种外，还有以甜橙 *Citrus sinensis* (L.) Osbeck 和枸橼 *C. medica* L. 等的将近成熟的果实作“枳壳”入药者。功效相似，但非枳壳正品。用甜橙等柑类将近成熟的果实充当的“枳壳”，称为“什果枳壳”。

【性味归经】苦、酸，微寒。归肺、脾、大肠经。

【功效主治】破气行痰，消积除滞。主治胸膈痰滞，胸痞，胁胀，食积，噫气，呕逆，下痢后重，脱肛，子宫脱垂及胃下垂等。

【用量】3～10克。

【慎忌】脾胃虚弱者及孕妇慎服。

佛 手（附：佛手花）

出自《本草图经》。为芸香科常绿小乔木或灌木植物佛手 *Citrus medica* L. var. *sarcodactylis* Swingle 的果实。主产于广东、福建、云南、四川等地。于10～12月果实成熟时采摘，切片晒干。

【别名】佛手柑，佛手香橼，手柑，五指柑，蜜罗柑，蜜箭柑，福寿柑，佛柑，手橘，佛手橘，手桔，佛手桔。

【商品名】鲜佛手：为新鲜的佛手果实。

陈佛手：为陈久的佛手果实。习惯认为陈久者良。

川佛手：为产于四川者。气香味厚，行气力强。质优。

广佛手：为产于广东者。气味较淡，行气力弱。质稍次。

以上商品以肥大、个整、绿边白瓤、质坚、油润、香气浓者为佳。

云佛手：又名云南佛手片。为云南产枸橼*Citrus medica* L. 的果实切片入药者。此为佛手货源紧缺时的替代混用品，非佛手真品。有时在天津地区作“佛手”使用。质最次。

【处方名】佛手，佛手片，陈佛手，川佛手。

【性味归经】辛、苦，温。归肝、脾、胃、肺经。

【功效主治】舒肝，理气，和中，化痰。主治肝郁气滞所致的胁痛，胸痛，胸闷，脾胃气滞所致的脘腹胀满，胃痛纳呆，嗳气呕恶；咳嗽痰多。

【用量】3～10克。

附：佛手花

佛手花又名佛柑花、佛手柑花、手柑花、五指柑花、蜜罗柑花，蜜箭柑花、福寿柑花、手橘花、手桔花、佛手橘花、佛手桔花。为芸香科植物佛手的花朵和花蕾。性味功效与佛手相近，但较缓和。用量3～6克。

香 檬

出自《本草图经》。为芸香科常绿小乔木植物枸橼*Citrus medica* L.或香橼*Citrus wilsonii* Tanaka的果实。主产于江苏、安

徽、浙江、广东、广西、湖北、湖南、福建、四川等地。10月果实将近成熟时摘下，洗净，晒干。

【别名】香圆，香元，枸橼，枸橼子，枸橼实，枸橼果，香泡果，香橼柑，西南香圆，粗皮香圆，香缘，粗皮香橼，陈香橼。

【商品名】枸橼：为植物枸橼的将近成熟的果实。主产于云南、四川、湖南、广东、福建等地。

香橼：又名香圆、粗皮香橼。为植物香橼的将近成熟的果实。主产于江苏、浙江、福建、广东等地。

以上商品均以果实个大、皮粗、色黑绿、香气浓者为佳。

【处方名】香橼，香圆，香元，香橼片，香橼皮，陈香橼，陈极香橼，炒香橼，炙香橼。

处方中写香橼、香圆、香元指生香橼。为原药去杂质，润透切片生用入药者。

香橼片又名香橼皮。为果实将近成熟时摘下，趁鲜剥去瓤及子，切片晒干入药者。

陈香橼又名陈极香橼。为香橼之陈久者。习以为佳。

炒香橼又名炙香橼。为香橼片用麸炒至微黄略带焦斑入药者。

【注意】在目前药材商品市场上，香橼的销售品种比较混乱。除上述两个品种外，湖北、湖南和江西的一些地区，把同科植物柚 *Citrus grandis* (L.) Osbeck 将近成熟的果实作“香橼”使用。贵州一些地区，把同科植物甜橙 *C. sinensis* (L.) Osbeck 的将近成熟的果实作“香橼”使用。河南、山西、陕西、青海、江苏的个别地区，把植物枳 *Poncirus trifoliata* Raf. 的将近成熟的果实作“香橼”使用。以上均为混用，应予以纠正。

有些地方把香橼当佛手使用，也是错误的，也应该纠正。

【性味归经】辛、微苦、酸，温。归肝、脾、肺经。

【功效主治】疏肝，理气，和中，化痰。主治肝失疏泄、脾胃气滞所致的胸闷，胁痛，脘腹胀痛，嗳气食少，呕吐；痰湿壅滞所致的咳嗽痰多等证。

【用量】 4～10克。

枸 橘

出自《本草纲目》。为芸香科常绿灌木或小乔木枸橘 *Poncirus trifoliata* (L.) Raf 未成熟的果实。主产于江苏、安徽、浙江、四川、江西等地。8～9月果实未成熟时采摘，干燥后入药。

【别名】 枸桔，臭橘，臭桔，枸橘李，臭棘，臭杞，枸棘子，野橙子，唐橘，钢橘子，枸棘李，野梨子，苦桶子，枳，铁篱笆果，铁篱寨果。

【商品名】 枸橘，枸桔。以个大、表面色黄绿、断面色黄白、皮厚、干燥、无杂质者为佳。

【处方名】 枸橘，枸桔，臭橘。

【注意】 枸橘自落的幼果即为枳实。其将近成熟的果实不去瓢，晒干入药，即为枸橘。

在河南、江苏、山西、陕西和青海的个别地区，把枸橘当作“香橼”使用，属于混用，应予以纠正。

【性味归经】 辛、苦，温。归肝、胃经。

【功效主治】 破气散结，疏肝行滞。主治肝气郁结所致的乳房结块（乳癖），疝气疼痛；食积不化，气滞不畅，脘腹胀满等。

【用量】 4～10克。

木 香

出自《神农本草经》。为菊科多年生草本植物云木香 *Saussurea lappa* Clarke 和 川木香 *Vladimiria souliei* (Franch.) Ling 的根。主产于云南、四川等地。国外印度、缅甸等地亦产。9～10月采挖。除去杂质，洗净，切片，生用或煨用。

【别名】 蜜香，青木香，五木香，南木香，广木香，五香，铁

杆木香，槽子木香，越木香，越隽木香，矩琵陀香。

【商品名】云木香：产于云南丽江地区者。为植物云木香的根。以质坚实、香气浓、油性大者为佳。

川木香：又名槽子木香、铁杆木香。产于四川省雅安、阿坝和凉山地区者。为植物川木香的根。以根条粗大、香气浓、含油多、少裂沟者为佳。

广木香：又名印木香、香木香、南木香、青木香。产于印度、缅甸等地者。因多从广州输入而得名。为植物云木香的根。品质优劣同云木香。

越西木香：又名越木香、越隽木香。为植物越西木香 *Vladimiria denticulata* Ling 的根。产于四川阿坝藏族自治州。为木香副品。

老木香：属广木香的一种。为印度老山所产者。质地坚实，质重，外表光洁，色棕褐，香气浓郁。品质优良。

新木香：为广木香的一种。为印度新山所产者。质地松疏，质轻，外表粗糙，香气淡浊。品质较次。

【处方名】木香，广木香，生木香，炒木香，煨木香，炙木香，酒木香等。

处方中写木香、广木香指生木香。为原药去杂质，洗净切片，晒干生用入药者。偏于行气止痛。

炒木香为木香片用麸轻炒后入药者。偏于行气温中。

煨木香又名炙木香。为木香片用麸拌炒至黄色，取出晾凉后入药者。偏于温中除滞。

酒木香为木香用黄酒润透，切片晾干入药者。增强行气止痛之功。

【注意】广木香又名“青木香”，菊科植物土木香的根茎在京、津一带亦称“青木香”，马兜铃科植物马兜铃 *Aristolochia contorta* Bge. 的根亦称青木香。三者名称易混，使用时应注意鉴别。

木兰科植物长梗南五味子的根称“红木香”，功效与本品不同，不能混用。

白木香是沉香的别名，与木香不是同一种药材。

同属植物木里木香 *Vladimiria muliensis* (Hand.-Mazz.) Ling 的根在四川某些地区作“木香”使用。同属植物大理木香 *V. edulis* (Franch.) Ling 的根在云南某些地区作“木香”入药。作用相似，但非木香正品。

【性味归经】辛、苦，温。归脾、胃、大肠、胆经。

【功效主治】行气，调中，止痛。主治脾胃气滞所致的食欲不振，食积不化，脘腹胀痛，肠鸣泄泻及下痢腹痛，里急后重等；脾运失常，肝失疏泄所致的湿热郁蒸，胁肋胀痛等；脾胃气虚，运化无力所致的脘腹胀满，不思饮食，呕吐泄泻，喜温喜按等。

【用量】3~10克。

【慎忌】阴虚火旺者慎服。不宜久服。

香 附

出自《名医别录》。为莎草科多年生草本植物莎草 *Cyperus rotundus* L. 的根茎。我国各地均有分布。主产于河南、安徽、江苏、河北、山东、浙江等地。9~10月采挖，洗净，晒干，除去须根及杂质，生用或醋炒用。

【别名】香附子，莎草根，莎草核，侯莎，地地蓼根，香附米，三棱草根，小三棱，雷公头，雀头香，猪通草茹，苦羌头，莎莎草根，香头草根，回头青根，地蓼根，棱草根，草附子，水香棱根，水莎根，莎结根，地毛，水巴戟，地蕨根，候莎根，夫须，抱灵居士，九蓬根，续根草，莎草疙瘩。

【商品名】东香附：为山东所产者。

南香附：为浙江所产者。质佳。

毛香附：为用火燎去须根，再用开水稍煮，然后晒干者。

光香附：又名香附米。为经石碾碾轧加工后除去须毛者。

金香附：产于浙江金华地区者。粒大肥厚，色紫红光润，质坚实，香气浓。品质最佳，为地道药材。

【处方名】香附，香附子，香附米，附米，生香附，碎香附，醋香附，制香附，四制香附，七制香附，香附炭，黑香附等。

处方中写香附、香附子、香附米、附米、碎香附均指生香附。为原药除去杂质，碾成细粒生用入药者。专于理气开郁。

醋香附为净香附用醋喷淋，拌匀稍闷，待吸尽，然后用文火微炒入药者。止痛作用增强。

制香附为用黄酒、醋、赤砂糖等加工后入药者。有破积聚、通经络之功。

四制香附为净香附用四种辅料（米醋、黄酒、炼蜜、童便或酒、盐、姜汁、童便）炒制后入药者。避免耗气伤阴之弊，增进行气通络之功。

七制香附为净香附用七种辅料（童便、姜汁、红砂糖、米醋、食盐、人乳、黄酒）炒制而成。功效同四制香附。七制香附现已少用。

香附炭又名黑香附。为净香附用武火炒至内部焦黄色，取出晾凉入药者。偏于行气止血。

【性味归经】辛、微苦、微甘，平。有小毒。归肝、三焦经。

【功效主治】疏肝理气，调经止痛。主治肝气郁滞所致的胁肋作痛，脘腹胀痛，月经不调，痛经，乳房胀痛等。

【用量】4～10克。

鸟 药

出自《本草拾遗》。为樟科灌木或小乔木植物鸟药（天台鸟药）*Lindera strychnifolia* (Sieb. et Zucc.) Villar的根。主产于浙江、安徽、江西、陕西等地。8月采挖，洗净，除去细根，刮

去外皮，切成薄片，晒干，筛去杂质，生用或麸炒用。

【别名】台乌，天台，台乌药，天台乌药，旁其，膀胱，香桂樟，铜钱柴，蔻皮柴，白叶柴，钱蜞柴，钱柴头，盐鱼子柴，青竹香，吹风散，矮樟，香叶子树根。

【商品名】天台乌药：又名台乌药、台乌、天台、台片、天台片。为浙江天台地区所产者。传统认为为地道药材，品质最佳。

乌药：为各种乌药的统称。

乌药个：又名乌药瓜。挖取后，除去须根，洗净晒干者。因其多为纺锤形，中部膨大，两头稍尖，形状如瓜，故俗称“乌药瓜”。

乌药片：刮去栓皮，切片，晒干或烘干者。

以上商品以质嫩、干燥、粉性大、形似链珠、断面浅棕色、香气浓者为佳。

【处方名】乌药，台乌药，天台乌药，台片，乌药片，生乌药，炒乌药，盐乌药，酒乌药等。

处方中写乌药、台乌药、天台乌药、台片、乌药片均指生乌药。为原药除去杂质及须根，刮去外皮，切成薄片生用入药者。

炒乌药为乌药片用麸炒后入药者。制其辛燥之弊，增强散寒之功。

盐乌药为乌药片拌入盐水，再用麸炒后入药者。可助温肾缩尿之功。

酒乌药为乌药片用黄酒淋喷拌匀，闷透，再用文火微炒入药者。可增强温经散寒作用。

【性味归经】辛，温。归肺、脾、肾、膀胱经。

【功效主治】行气止痛，温肾散寒。主治寒郁气滞所致的胸闷，胁痛，脘腹胀痛，寒疝腹痛，痛经；肾阳不足，膀胱虚寒所致的小便频数及遗尿。

【用量】3~10克。

沉 香

出自《名医别录》。为瑞香科常绿乔木植物沉香 *Aquilaria agallocha* Roxb. 及白木香 *A. sinensis* (Lour.) Gilg. 含有黑色树脂的木材。主产于我国广东、海南、广西及台湾等地。采取含有树脂的木部和根部，阴干。锉末或磨粉服。

【别名】沉水香，海南沉，番沉，落水沉，沉香木，海南香，舶沉，药沉，蜜番，海南沉香，白木香，莞香，女儿香，土沉香，全沉香，落水沉香，牙香树木，芽香树木，六麻树木，莞香，奇香南木，奇南香，奇楠，棋楠，远秀卿，角沉，黄沉，青桂，青桂香，龙解，黄脂沉，生结香，弄水香，鸡骨香，马蹄香，水盘香，蓬莱香，伽楠香，伽罗，栈香，崖香，牙香，香柴。

【商品名】进口沉香，又名全沉香。为植物沉香的含有黑色树脂的木材。主产于印度、马来西亚等国。

国产沉香：又名海南沉、海南沉香、白木香、莞香、女儿香、土沉香。为植物白木香的含有黑色树脂的木材。主产于海南岛。

伽楠香：又名奇南香、琪瓈、奇楠、伽南沉。为植物白木香或沉香近根部的含树脂量较多的木材。

绿油伽楠香：为外表呈绿褐色的伽楠香。

紫油伽楠香：为外表呈紫褐色的伽楠香。

盔沉香：又名盔沉。进口沉香药材多呈盔帽形，故名。

以上商品均以质坚体重、含树脂多、香气浓者为佳。

【处方名】沉香，海南沉香，海南沉，好沉香，上沉香，盔沉，沉香粉等。

【注意】沉香和木香都有“蜜香”之别名，容易混淆。应使用正名，以免搞错。

【性味归经】辛、苦，温。归脾、胃、肾经。

【功效主治】 行气止痛，降逆调中，温肾纳气。主治寒凝气滞所致的胸腹胀闷作痛，胃寒呕吐、呃逆，下元虚冷，肾不纳气之虚喘。

【用量】 研末冲服 1 ~ 1.5 克。

【慎忌】 阴虚火旺者慎服。

川 棱 子

出自《神农本草经》。为棱科落叶乔木川棱 *Melia toosendan* Sieb. et Zucc. 的成熟果实。我国南方各地均有分布，以四川产者品质最优。冬季采收，洗净，晒干。用时捣破。生用或麸炒用。

【别名】 金铃子，棱实，川棱实，練实，苦棱子，川若，仁枣，苦棱实。

【商品名】 川棱子：为植物川棱的干燥果实。产于南方各地。以四川产者品质最优，为地道药材。销全国并出口。

土棱子：又名苦棱子、棱子、棱实。为植物棱树 *Melia azedarach* L. 的干燥果实。个小质次，非川棱子正品。在川棱子缺货时作代用品。

以上商品均以个大饱满、外皮色黄、果肉色黄白者为佳。

【处方名】 川棱子，金铃子，生川棱子，炒川棱子，醋川棱子等。

处方中写川棱子、金铃子指生川棱子。为原药除去杂质，捣碎生用入药者。

炒川棱子为净川棱子用麸炒至黄色，略见焦斑取出晾凉入药者。可降其苦寒之性。

醋川棱子又名醋炒川棱子。为川棱子片用米醋洒淋拌匀，待吸干，入锅内用文火炒至黄色，略见焦斑取出晾凉入药者。可增强止痛作用。

【性味归经】 苦，寒。有小毒。归肝、胃、小肠、膀胱经。

【功效主治】行气止痛，杀虫，疗癣。主治肝郁气滞或肝胃不和所致的胁肋作痛，脘腹疼痛，疝气疼痛；虫积腹痛。外用治疗头癣。

【用量】3～10克。

【慎忌】脾胃虚寒及身体虚弱者忌服。一般人也不宜多服久服。

荔枝核

出自《本草衍义》。为无患子科常绿乔木植物荔枝树 *Litchi chinensis* Sonn. 的种子。产于福建、广东、广西、海南、台湾、四川等地。6～7月当果实成熟时采摘，去净皮肉，取出种子，洗净，晒干。用时捣破，生用或盐水炒用。

【别名】离子核，离枝核，荔枝核，丹荔核，火山荔核，丽枝核，勒荔核，荔仁，荔核，大荔核，枝核，大枝核。

【商品名】荔枝核。以粒大饱满、色泽光亮者为佳。

【处方名】荔核，力核，荔仁，荔枝核，盐炒荔枝核等。

处方中写荔核、力核、荔仁、荔枝核均指生荔枝核。为原药材去杂质，捣碎生用入药者。

盐炒荔枝核为净荔枝核用盐水拌匀，稍闷，待吸尽，再用文火微炒入药者。引药走下入肝。

【性味归经】甘、涩，温。归肝、胃经。

【功效主治】理气止痛，祛寒散滞。主治厥阴肝经寒凝气滞所致的疝痛，睾丸疼痛；肝气郁滞所致的脘腹疼痛；气滞血瘀所致的妇人经前腹痛或产后腹痛。

【用量】10～15克。

【慎忌】内有实热者慎服。

青木香

出自《新修本草》。为马兜铃科多年生缠绕草本植物马兜铃 *Aristolochia debilis* Sieb. et Zucc. 及北马兜铃 *Aristolochia contorta* Bge. 的根。主产于江苏、浙江及安徽等地。10~11月在茎叶枯萎时挖取根部，除去须根，洗净晒干，切片生用。

【别名】 独行根，独行木香，天仙藤根，土青木香，兜铃根，兜铃香，马兜铃根，青藤香，蛇参根，兜零根，云南根，百两金，土麝，铁扁担，痧药，野木香，臭拉秧子根，痒辣菜根。

【商品名】 青木香。以根粗壮坚实、粉性足、香气浓者为佳。

【处方名】 青木香。

【注意】 广木香又名青木香。菊科植物土木香(祁木香) *Inula helenium* L. 及其同属植物藏木香 *I. racemosa* Hook. f. 的根，在京津一带亦称青木香。大叶青木香(川南马兜铃) *Aristolochia autroszechuanica* C. P. Chien et C. Y. Cheng. Mss. 在四川也称青木香。此外，淮通 *A. moupinensis* Franch.、汉中防己 *A. heterophylla* Hemsl.、南瓜叶马兜铃 *A. Cucurbitifolia* Hayata.、弯唇马兜铃 *A. recurvibrabra* Hance. 等的根在不同地区也叫青木香。名称与木品极易混淆，应注意鉴别。

另外云南省一些地区把同属植物青香藤 *A. calcicola* C. Y. Wu. 和粉质青木香 *A. transsecta* (Chatterjee) C. Y. Wu. 以及大叶马兜铃 *A. Kaempferi* Willd.、云南土木香 *A. chuii* C. Y. Wu. 以及菊科植物菜木香(大理木香) *Vladimiria edulis* (Franch.) Ling.、膜缘木香 *V. forrestii* (Diels) Ling.、厚叶木香 *V. berardioides* (Franch.) Ling. 的根作“青木香”使用。这些均非青木香正品，应注意区分。

【性味归经】 辛、苦，微寒。归肝、胃经。

【功效主治】 行气止痛，解毒消肿。主治肝胃气滞所致的胸胁

胀痛，脘腹胀痛；夏令饮食不慎，秽浊内阻引起的腹痛，高血压病，毒蛇咬伤。

【用量】煎汤内服3~10克，散剂冲服每次1.5~2克。外用适量。

【慎忌】不宜多服，否则引起恶心呕吐。

薤 白

出自《神农本草经》。为百合科多年生草本植物小根蒜 *Allium macrostemon* Bge. 和薤 *A. chinense* G. Don. 的地下鳞茎。我国各地均有分布，以江苏、安徽、山东、浙江产者品质最优。5月挖取，去苗，洗净，晒干，生用。

【别名】薤根，藠头，藠子，野蒜，野蒜头，小独蒜，小蒜，宅蒜，泽蒜，大头菜子，小野蒜，也白头，南薤白，小根蒜，薤白头，野白头，菜芝根，芥子根，祥谷菜根，小根菜，夕白，野薤，子根蒜，野薤白，介白，九白，双芽，藠子，鸿芸，山薤，九白头，屁股锥子。

【商品名】南薤白：为产于江、浙一带者。习以为佳。

薤白：或称薤白头。为各种薤白的统称。以鳞茎个大、饱满、质坚、半透明、色黄白、干燥、无杂质者为佳。

【处方名】薤白，南薤白，茭白，蒸薤白，炒薤白等。

处方中写薤白、南薤白、茭白均指生薤白。为原药去杂质及须根，洗净晒干，生用入药者。

蒸薤白为净薤白蒸透后晒干入药者。

炒薤白为净薤白用文火炒至微黄，略带焦斑为度，取出晾凉入药者。

【注意】在目前药材商品市场上，除上述两个品种外，山东产的密花小根蒜 *Allium macrostemon* Bge. var. *uratense* (Franch.) Ariy-Shaw., 东北产的长梗薤白 *A. nerinifolium* Bak. 以及新疆产

的天蓝小根蒜（蓝花山蒜）*A. coeruleum* Pall.的鳞茎在少数地区亦作“薤白”使用，但非正品。上海地区把野葱*A. grayi* Regel (*A. nipponicum* Franch. et Savat.)的鳞茎作“薤白”使用，亦属混用。

江苏省个别地区把同科植物绵枣儿（天蒜）*Scilla sinensis* (Lour.) Merr.的鳞茎作“薤白”使用，此为误用，应予以纠正。因其功效与薤白不同，不能混用。

【性味归经】辛、微苦，温。归肺、胃、大肠经。

【功效主治】通阳散瘀，行气导滞。主治寒痰湿浊凝滞于胸中，阳气不得宣通所致的胸闷疼痛或兼见喘息咳嗽的胸痹证；泻痢后重。

【用量】5～10克。

【禁忌】气虚无滞者慎服。

韭 菜

出自《滇南本草》。为百合科植物韭菜*Allium tuberosum* Rottler 的叶。我国各地均有栽培。割取地上部分，洗净鲜用。

【别名】韭，丰本，草钟乳，起阳草，懒人菜，长生韭，壮阳草，扁菜，九菜。

【商品名】韭菜，鲜韭菜。以肥嫩、味辛辣者为佳。

【处方名】韭菜，鲜韭菜。

【性味归经】辛，温。归肝、肾、胃经。

【功效主治】温中，行气，散血，解毒。主治胸痹，噫膈，反胃，吐血，衄血，尿血，痢疾，消渴，痔漏，脱肛，跌打损伤。外用治疗虫、蝎螫伤。

【用量】30～60克捣汁内服。或作菜食。外用适量。

【禁忌】阴虚内热及疮疡、目疾者慎服。

檀 香

出自《名医别录》。为檀香科常绿小乔木檀香 *Santalum album* L. 的干燥木质心材。主产于东南亚、印度、澳洲、非洲等地。我国广东、海南、云南、台湾等省亦产。夏季采伐较佳。水洗后镑成片，或劈碎后入药。

【别名】自檀香，白檀木，白檀，黄檀香，黄檀，真檀，真香，真檀香，旃，旃檀，旃檀香，浴香，浴檀，老山檀，新山檀，雪梨檀，旃檀，檀香木，紫檀，紫真檀。

【商品名】白檀香：为表面呈黄白色或淡黄色者。

黄檀香：为表面呈淡棕色者。

檀香：为各种檀香的统称。

老山檀：为印度老山所产者。品质最优。

老山块：老山檀商品加工成块状者。

老山条：老山檀商品加工成条状者。

老山片：老山檀商品加工成片状者。

以上均以色黄、质坚实致密、油性大、香气浓厚者为佳。

【处方名】檀香，白檀香，真檀香等。

【性味归经】辛，温。芳香。归脾、胃、肺经。

【功效主治】理气调中，散寒止痛。主治寒凝气滞胸腹疼痛及胃脘疼痛，呕吐清水；气滞血瘀型冠心病心绞痛。

【用量】6～12克。

刀 豆

出自《救荒本草》。为豆科1年生缠绕草质藤本植物刀豆 *Canavalia gladiata* (Jacq.) DC. 的成熟种子。主产于安徽、江苏、湖北及四川等地。秋季种子成熟时采收果实，剥取种子，晒干入

药。

【别名】 换剑豆，刀豆子，大弋豆，大刀豆，关刀豆，刀鞘豆，刀巴豆，刀培豆，马刀豆，葛豆，刀把豆，刀坝豆，野刀板藤豆，刀侠豆，皂荚豆，刀豆角。

【商品名】 刀豆：为植物刀豆的种子。主产于安徽、江苏、湖北等地。为刀豆正品。以粒大饱满、干燥、色鲜艳、无杂质者为佳。

洋刀豆：又名刀侠豆、皂荚豆、葛豆。为豆科植物洋刀豆 *Canavalia ensiformis* (L.) DC. 的种子。主产于印度。为刀豆副品。

【处方名】 刀豆，刀豆子，大刀豆，关刀豆，炒刀豆等。

处方中鸟刀豆、刀豆子、大刀豆、关刀豆均指生刀豆。为原药去杂质生用入药者。

炒刀豆为净刀豆用文火炒至黄色略带焦斑为度，然后取出晾凉入药者。温中和胃功效增强。

【性味归经】 甘，温。归胃、肾经。

【功效主治】 降气止呃。主治虚寒呃逆，呕吐；肾虚腰痛。

【用量】 10~15克。

柿 蒂

出自《名医别录》。为柿树科落叶乔木植物 柿树 *Diospyros kaki* L. f. 的宿存花萼。主产于河南、山东。此外河北、山西、广东、福建、四川等地亦产。8~9月收集花萼，晒干，生用。

【别名】 柿萼，柿丁，柿钱，柿把，柿盖，柿子把，柿子疤，镇头迦蒂，镇头迦萼，朱果蒂，柿子蒂，柿子盖，椑柿，漆柿，绿柿，青椑，花椑，乌椑，赤棠椑。

【商品名】 柿蒂。以个大、干燥者为佳。

【处方名】 柿蒂，柿萼，柿丁。

【性味归经】苦，平。归胃经。

【功效主治】降气止呃。主治胃失和降所致的呃逆。

【用量】6～10克。

甘 松

出自《开宝本草》。为败酱科植物甘松香 *Nardostachys chinensis* Batal. 及宽叶甘松 *N. jatamansae* DC. 的根茎及根。秋季采挖，除去残茎、须根，洗净阴干，切段入药。

【别名】香松，香甘松，甘松香，川甘松，宽叶甘松，匙叶甘松，宽叶甘松香，匙叶甘松香，苦弥多，苦弥哆，麝男，鹿子草。

【商品名】甘松：又名甘松香。为植物甘松香的根及根茎。主产于四川、甘肃、青海。

宽叶甘松：又名宽叶甘松香、匙叶甘松、匙叶甘松香。为植物宽叶甘松的根及根茎。主产于四川、云南、青海等地。

以上均以根条长而肥壮、干燥、芳香气浓者为佳。

【处方名】甘松。

【注意】云南产的同属植物大花甘松香 *Nardostachys grandiflora* DC. 的根茎在个别地区也作甘松使用。香气较弱，品质较差，非甘松正品。

【性味归经】辛、甘，温。归脾、胃经。

【功效主治】行气止痛，开郁醒脾。主治思虑伤脾或寒郁气滞引起的胸闷腹胀，不思饮食及胃脘疼痛；煎汤洗足治疗脚气。

【用量】3～6克。外用适量。

婆 罗 子

出自《本草纲目》。为七叶树科植物七叶树 *Aesculus chinensis* Bge. 或天师栗 *A. wilsonii* Rehd. 的果实。霜降后采摘，先晒，

再用文火烘干。打碎使用。

【别名】苏罗子，开心果，莎婆子，武吉，莎罗子，索罗果，梭椤子，天师栗，梭罗子，苏噜子，苏鲁子，娑罗果，猴板栗，刺五加果，桫椤子。

【商品名】苏罗子：为植物七叶树的果实。主产于河南、江苏、浙江等地。

娑罗子：又名天师栗、猴板栗、刺五加果。为植物天师栗的果实。主产于陕西、四川、贵州、湖北等地。

以上均以果实饱满、种仁色黄白者为佳。

【处方名】娑罗子，莎婆子，苏罗子，苏噜子，苏鲁子等。

【性味归经】甘，温。归肝、胃经。

【功效主治】疏肝理气，宽中和胃。主治肝郁气滞所致的胸闷胁痛，胃痛腹胀，妇人经前乳房胀痛等。

【用量】3～10克。

八月札

出自《本草拾遗》。为木通科落叶或半常绿缠绕藤本植物木通 *Akebia quinata* (Thunb.) Decne. 及三叶木通 *A. trifoliata* (Thunb.) Koidz. 和白木通 *A. trifoliata* (Thunb.) Koidz. var. *australis* (Diels) Rehd. 的果实。主产于安徽、江苏、浙江和陕西等地。8～9月间果实成熟时采摘，晒干，切片或捣烂入药。

【别名】拿子，畜蓄子，蓄蓄子，八月炸，八月札，腊瓜，预知子，燕蓄子，桴核子，覆子，木通子，白木通子，三叶木通子，八月瓜，野毛蛋，野木瓜，冷饭包，野香蕉，羊开口，玉支子，狗腰藤，圣知子，圣先子，盍合子，仙沼子，压惊子，木通实，木遗果，白木通果，三叶木通果。

【商品名】八月札，预知子，木通子。以果实饱满、干燥、无杂质者为佳。

【处方名】八月札，预知子，八月扎，圣知子等。

【注意】同科植物五风藤 *Holboellia latifolia* Wall. 的果实，在西藏作“八月札”使用。同科植物狭叶八月瓜 *H. angustifolia* Wall. 的果实，在四川某些地区作“八月札”使用。五叶木通 *Akebia quinata* (Thunb.) Decne. 的果实，在某些地区亦作“八月札”使用。以上三种均非八月札正品。

【性味归经】苦，平。归肝、胃经。

【功效主治】疏肝理气散结。主治肝郁气滞所致的胁痛，肝胃气痛，疝气疼痛，癫痫，乳腺癌及消化道癌肿；小便不利，石淋等。

【用量】6～12克。

玫 蕊 花

出自《食物本草》。为蔷薇科植物玫瑰 *Rosa rugosa* Thunb. 的花蕾。主产于安徽、江苏、山东、浙江、河南、河北、福建、四川等地。4～6月间当花蕾将开放时分批采摘。除去花柄及蒂，用文火烘干，生用。

【别名】徘徊花，刺玫花，湖花，笔头花，蓓蕾花，红玫瑰。

【商品名】玫瑰花。以花色鲜艳、干燥、色紫红、花朵大、香气浓者为佳。

【处方名】玫瑰花，刺玫花。

【注意】同科植物山刺玫 *Rosa davurica* Pall. 的花蕾，在某些地区也作“玫瑰花”使用。功效相似，但非正品。

【性味归经】甘、微苦，温。归肝、脾经。

【功效主治】行气解郁，和血散瘀。主治肝胃不和所致的胁痛脘闷，胃脘胀痛，月经不调，经前乳房胀痛，损伤瘀痛等。

【用量】3～6克。

绿 莼 梅

出自《本草纲目》。为蔷薇科植物梅 *Prunus mume* (Sieb.) Sieb. et Zucc. 的花蕾。1~2月间采集含苞待放的花蕾，晒干或烘干，生用。

【别名】白梅花，绿梅花，绿萼梅花。红梅花，梅花。

【商品名】白梅花：又名绿梅花、绿萼梅。为花冠白色者。主产于浙江、江苏等地。药用以白梅花为主。

红梅花：为花冠红色者。主产于安徽、四川、湖北等地。

以上均以花蕾匀净、干燥、色泽鲜艳、含苞未放、气味芳香者为佳。

【处方名】白梅花，绿梅花，绿萼梅。

【性味归经】酸、涩，平。归肝、胃经。

【功效主治】疏肝解郁，理气和胃。主治肝胃气机不畅所致的胁肋胀痛，脘闷嗳气，胃脘疼痛，不思饮食；痰气交阻所致的梅核气，咽中如有物作梗等。

【用法】3~6克。

九 香 虫

出自《本草纲目》。为蝽科昆虫九香虫 *Aspongopus chinensis* Dallas. 的干燥全虫。主产于四川、贵州、云南、安徽、广西等地。冬春季捕捉，放罐内加酒盖严，将其闷死，取出晒干或烘干，生用或炒用。

【别名】黑兜虫，放屁虫，打屁虫，屁巴虫，屁板虫，酒香虫，瓜黑蝽，瓜里春，臭巴虫，臭虫，臭大姐，臭青龟虫，褐黄黑龟虫。

【商品名】九香虫。以虫体干燥、完整均匀、色泽棕褐光亮、油性大、无虫蛀者为佳。

【处方名】九香虫，生九香虫，炒九香虫。

处方中写九香虫指生九香虫。为原药去杂质生用入药者。

炒九香虫为净九香虫用文火炒至微黄入药者。

【注意】有的文献称九香虫为“蜣螂虫”，这是不对的。蜣螂虫与九香虫是两种不同的昆虫，不能混称。

以虫体干燥、完整均匀、色泽棕褐光亮、油性大、无虫蛀者为佳。

【性味归经】咸，温。归脾、肝、肾经。

【功效主治】行气止痛，温肾助阳。主治寒郁中焦或肝胃不和所致的脘闷腹胀，胁肋作痛，胃脘疼痛；肾阳不足所致的肾虚腰痛，阳痿等。

【用量】3～5克。

【禁忌】阴虚内热者忌服。

大 腹 皮

出自《名医别录》。为棕榈科常绿乔木植物槟榔 *Areca catechu* L. 的成熟果皮。

【别名】大腹毛，腹毛，夫毛，腹皮，槟榔果皮，槟榔皮，茯毛，伏毛，槟榔衣，大腹绒，吕宋毛，大毛，槟榔壳，槟榔毛。

【商品名】大腹皮：为槟榔未成熟的果皮，不经加工，剖成两瓣者。以皱皮结实、色深褐者为佳。

大腹毛：为槟榔老熟的果皮，经水浸后，晒干打松者。以质柔韧、色黄白者为佳。

【处方名】大腹皮，大腹毛，腹毛，伏毛，茯毛。

【性味归经】辛，微温。归脾、胃、大肠经。

【功效主治】下气，宽中，行水。主治水肿脚气，脘腹痞闷胀满，胎气恶阻等证。

【用量】6～15克。

【禁忌】气虚肿胀者慎服。

九、消 食 药

山 楂

出自《新修本草》。为蔷薇科落叶灌木或小乔木植物野山楂 *Crataegus cuneata* Sieb. et Zucc. 或山楂 *C. pinnatifida* Bge. var. *major* N. E. Br. 的成熟果实。秋末采收，晒干，生用或炒用。

【别名】赤爪实，赤爪子，棠棣子，棠球子，山查，山里果，山里红，酸里红，杌，杌子，杌果，杌实，梨梅，鼠楂，羊棣，赤枣子，山里红果，酸枣，鼻涕团，柿楂子，山里果子，茅楂，猴楂，映山红果，海红，酸梅子，山梨，酸查，山梨果，酸楂，山果子，南山楂，北山楂，药山楂，大山楂，小山楂，大果山楂，小果山楂，红果，红果子，山楂，小叶山楂。

【商品名】南山楂：又名猴楂、野山楂、药山楂、小果山楂、小山楂、小叶山楂、个山楂、山楂子、山楂粒。为植物野山楂的果实。主产于浙江、江苏、云南、贵州等地。

北山楂：又名大山楂、大果山楂、红果。为植物山楂的果实。主产于河南、河北、山东和辽宁、吉林等地。

东山楂：又称东楂、东查。为山东所产的北山楂。习以为佳。

青州楂片：产于山东省临朐、沂水等地（旧时青州）的北山楂片。习惯认为品质最佳。销全国，并出口。

石板楂片：产于河北省安国地区的北山楂片。品质亦佳。销全

国，并出口。

以上均以果大、肉厚、核少、皮红者为佳。

【处方名】山楂，山查，山楂片，生山楂，山楂肉，楂肉，生楂肉，生山楂肉，鲜山楂，炒山楂，焦山楂，焦楂，山楂炭，黑山楂等。

处方中写山楂、山查，山楂片均指生山楂。为原药去杂质切片晒干入药者。

山楂肉又名楂肉、生楂肉、生山楂肉。为生山楂去核，取净肉入药者。

鲜山楂为山楂鲜用入药者。

炒山楂又名焦山楂、焦楂、焦楂肉。为净山楂片用文火炒至黄色、略带焦斑入药者。

山楂炭又名黑山楂。为净山楂片用武火炒至外表黑褐色，内里棕黄色入药者。

【注意】目前在药材商品市场上，山楂除上述两个品种外，下列同属植物在不同地区也作“山楂”使用。作用相似，但非正品。

东北、华北及陕西、山东、江苏等地出产的山里红 *Crataegus pinnatifida* Bge. 的成熟果实。

我国中部及江苏、陕西等地出产的湖北山楂 *C. hupensis* Sarg. 的成熟果实。

东北及山西、内蒙古、新疆等地出产的辽山楂（辽宁山楂）*C. sanguinea* Pall. 的成熟果实。

云南、贵州、广东、广西等地出产的云南山楂（山林果）*C. scabrifolia* (Franch.) Rehd. 的成熟果实。

甘肃、陕西、山西、四川、贵州等地产的甘肃山楂 *C. kansuensis* Wils. 的果实。

此外，还有一些是误用的。如滇地海棠 *Malus yunnanensis* Schneid.、楸子 *M. prunifolia* (Willd.) Borkh.、花红 *M. asiatica* Nakai 和格栎 *Ducynia delavayi* (Franch.) Schneid. 等的果

实，在四川等地的某些地方，误作“山楂”使用。这是错误的，应予以纠正。

【性味归经】酸、甘，微温。归脾、胃、肝经。

【功效主治】消食化积，活血散瘀。主治食滞不化，肉积不消，脘腹胀满，腹痛泄泻；产后瘀阻腹痛，恶露不尽；疝气偏坠胀痛、高血压，冠心病，高血脂症等。

【用量】10～15克。大剂量30克。鲜品100克。

神曲(附：建神曲 半夏曲 采云曲)

出自《药性论》。为面粉与其他药物混合后经发酵而成的加工品。本品原主产于福建，现各地均能生产，而制法规格稍有出入。大致以大量麦粉、麸皮与杏仁泥、赤小豆粉以及鲜青蒿、鲜苍耳、鲜辣蓼自然汁等混合拌匀，使不干不湿，做成小块，放入筐内，复以麻叶或楮叶，保温发酵一周，长出菌丝（生黄衣）后，取出晒干即成。生用或炒至略具焦香气入药。

【别名】六神曲，六曲，六丁曲，麦曲，化米先生。

【商品名】神曲，六神曲，六曲。以陈久、洁净、无虫蛀者为佳。

【处方名】神曲，生神曲，生六曲，陈曲，陈神曲，神曲末，炒神曲，焦神曲，焦六曲，神曲炭等。

处方中写神曲、六曲、六神曲指生神曲，或称生六曲。为原药未经炒制生用入药者。

陈神曲又名陈曲。为放置陈久者。习以为佳。

神曲末为神曲打碎为末入药者。

炒神曲为神曲用麸炒至黄色入药者。

焦神曲又名神曲炭、焦六曲。为神曲炒成炭入药者。

【性味归经】甘、辛，温。归脾、胃经。

【功效主治】消食和胃。主治食积不化，脘腹胀满，不思饮食，肠鸣泄泻等。

【用量】 6～15克。

附：建神曲 半夏曲 采云曲

建神曲又名建曲、建胃曲、万应曲、范志曲、百草曲、泉州神曲。是采用面粉、枳壳、白扁豆、砂仁、杏仁、薄荷、山楂皮、麦芽、藿香、苍术等45种中药，碾碎混合拌匀，另取青蒿、赤柱草、苍耳草切碎煎汤，与上药混和，充分发酵，晒干而成。有消食化积，发散风寒之功能。主治食滞不化或兼感风寒等证。用量6～10克。

半夏曲又名夏曲、曲半夏。为半夏加面粉、姜汁等制成的曲剂。有化痰止咳，消食积的功效。主治泄泻、咳嗽痰多等病证。用量6～10克。

采云曲为六曲加桂枝、紫苏、陈皮、谷芽、山楂、苍术、白术、藿香、木香、半夏、枳壳、槟榔、川朴、云苓等25味中药加工制成。功效与建神曲相似，主治感冒食滞、暑热头疼、恶心呕吐等证。用量6～10克。

麦 芽

出自《名医别录》。为禾本科1年生草本植物大麦 *Hordeum vulgare* L. 的成熟果实经发芽干燥而成。我国各地均产。生用或炒黄用。

【别名】麦蘖，大麦蘖，大麦芽，大麦毛，秆麦蘖，草大麦。

【商品名】麦芽，大麦芽。以麦芽完整、干燥者为佳。

【处方名】麦芽，大麦芽，生麦芽，炒麦芽，焦麦芽等。

处方中写麦芽、大麦芽指生麦芽。为原药去杂质，不经炒制生用入药者。偏于回乳。

炒麦芽为净麦芽用文火炒至微黄入药者。偏于消食。

焦麦芽为净麦芽用武火炒至焦黄入药者。偏于止泻。

【性味归经】甘，平。归脾、胃、肝经。

【功效主治】消食和中，回乳。主治食积不化，消化不良，不思饮食，脘闷腹胀，回乳，乳汁郁积所致的乳房胀痛。

【用量】10~15克。大剂量30~120克。

【禁忌】授乳期妇女不宜服。

谷 芽

出自《本草纲目》。为禾本科1年生草本植物稻*Oryza sativa* L. 或粟谷*Setaria italica* (L.) Beauv. 的成熟果实发芽晒干而成。我国各地均产，随时可制备，生用或炒用。

【别名】粟芽，红谷芽，粟蘖，稻芽，稻谷芽，蘖米，稻蘖，谷蘖，香稻芽，水稻芽，裸子芽，香谷芽，稻谷芽。

【商品名】粟芽：又名谷芽、粟谷芽。为植物粟谷的成熟果实发芽干燥品。多在北方产销。

稻芽：又名谷芽、稻谷芽。为植物稻谷的成熟果实发芽干燥品。多在南方产销。

以上均以芽完整、干燥者为佳。

【处方名】谷芽，生谷芽，长须谷芽，炒谷芽，香谷芽，炙谷芽，焦谷芽等。

处方中写谷芽、长须谷芽指生谷芽。为原药去杂质不经炒制生用入药者。

炒谷芽又名香谷芽、炙谷芽。为净谷芽用文火炒至黄色入药者。

焦谷芽为净谷芽用武火炒至焦黄色入药者。

【性味归经】甘，平。归脾、胃经。

【功效主治】消食和中，健脾开胃。主治食积停滞，消化不良，脾虚食少等。

【用量】 10~15克。大剂量30克。

菜 萝 子

出自《日华子本草》。为十字花科1年生或2年生草本植物菜菔*Raphanus sativus* L.的种子。我国各地均产。主产于河南、河北、安徽、山东。初夏种子成熟时采收，晒干，除去杂质，生用或炒用。

【别名】 萝卜子，卜子，罗卜子，老卜子，萝卜子，唐菁子。

【商品名】 菜菔子，萝卜子。以籽粒饱满、色棕紫、干燥、无杂质者为佳。

【处方名】 菜菔子，萝卜子，卜子，炒卜子，炙卜子，炒菜菔子，生卜子，生菜菔子，盐卜子，盐菜菔子等。

处方中写菜菔子、萝卜子、卜子均指炒菜菔子，或称炒卜子、炙卜子、炙菜菔子等。为净菜菔子用文火炒至微黄入药者。偏于消食。

生菜菔子又名生卜子。为原药去杂质未经炒制入药者。偏于催吐。

盐菜菔子又名盐卜子。为净菜菔子用盐水淋洒拌匀，待吸尽，再用文火炒干入药者。偏于降气化痰。

【性味归经】 辛、甘，平。归脾、胃、肺经。

【功效主治】 消食化积，降气化痰。主治食积不化，中焦气滞，脘腹胀满，嗳腐吞酸，腹痛泄泻，泻而不畅；痰涎壅盛，气喘咳嗽。

【用量】 6~10克。

【慎忌】 无食积、无痰滞者慎服。

鸡 内 金

出自《神农本草经》。为雉科动物鸡*Gallus gallus domesticus*

Brisson.的砂囊的角质内壁。剥离后，洗净晒干，生用或炒用。

【别名】 鸡肫胫里黄皮，鸡中金，鸡肫皮，鸡肫子，鸡肫内黄皮，鸡黄皮，鸡食皮，鸡膝子，鸡合子，化石胆，化骨胆，鸡肫胫，内金，鸡胗皮，鸡针皮，鸡肚子，鸡屎皮，鸡灰皮，鸡内筋，鸡腊壳，鸡胃皮。

【商品名】 鸡内金，鸡中金。以个大、色黄、干燥、完整无破碎者为佳。

【处方名】 鸡内金，鸡中金，内金，生鸡内金，生内金，炒鸡内金，炙鸡内金等。

处方中写鸡内金、鸡中金、内金均指生鸡内金，或称生鸡中金、生内金。为原药去杂质，洗净晒干，生用入药者。

炒鸡内金又名炒鸡中金、炙鸡内金、炙鸡中金等。为净鸡内金用文火炒至黄色，略有焦斑，并有香气，取出晾凉入药者。

【性味归经】 甘，平。归脾、胃、小肠、膀胱经。

【功效主治】 运脾消食，固精止遗。主治消化不良，食积不化，小儿疳积，遗尿，遗精，泌尿系结石，胆结石，肝脾肿大，肝硬化等。

【用量】 10~15克。焙黄研末服每次2~3克。

胡 颠 子

出自《本草经集注》。为胡颓子科植物胡颓子 *Elaeagnus pungens* Thunb.的果实。主产于安徽、江苏、浙江、江西、福建、湖南、湖北、贵州、陕西、四川等地。立夏后果实成熟时采摘，鲜用或晒干生用。

【别名】 卢都子，蒲颓子，半春子，牛奶子，羊奶子，石滚子，羊母奶子，鸡卵子，清明子，大叶巴楂子，野枣子，蒲栗子，王婆奶，羊奶奶，雀儿酥，半含春，甜棒棰，糖罐头，咸匏头，棒蒲，灯蒲，土萸肉，补阴丹，瓶匏，田蒲，野荸荠，野枇杷，浆米

草，野水葡萄，大麦奶，白萹蓄，甜果儿，麦榄，斑楂，干茄，大麦前果，潘桑果，麦果果，四枣，柿模。

【商品名】胡颓子，蒲颓子。以个大、色紫红、甜味浓者为佳。

【处方名】胡颓子，蒲颓子，半春子，牛奶子，羊奶子，鲜胡颓子等。

【性味归经】酸、甘、涩，平。归肺、大肠经。

【功效主治】消食，止痢。主治泻痢，消渴，咳喘，消化不良。

【用量】10~15克。鲜品30~60克。

十、驱 虫 药

使 君 子

出自《开宝本草》。为使君子科落叶藤本状灌木植物使君子 *Quisqualis indica* L.的种子。主产于四川、广东、广西、云南等地。以四川产量最多。9~10月果皮变紫黑色时采收，晒干。去壳，取种仁生用，或炒香用。

【别名】史君子，留求子，五棱子，索子果，冬君子，冬均子，病柑子，留球子，建吊子，四君子。

【商品名】建使君子，又名建使君、建君子。为产于福建省福清、莆田地区者。形圆而果仁饱满，品质最佳。

川使君子：又名川使君、川君子。为产于四川者。品质较次。

使君子：为各地所产使君子的统称。以个大、果皮色黄、果仁饱满者为佳。

【处方名】使君子，君子，使君子仁，使君子肉，使君肉，使君仁，君子仁，君子肉，炒使君子仁，炒使君子肉。

处方中写使君子、君子指壳君子，或称壳使君。是指带壳的果实。

使君子仁又名使君子肉、使君肉、使君仁、君子仁、君子肉。是将使君子除去外壳，所得的净仁生用入药者。

炒使君子仁又名炒使君子肉、炒使君肉、炒使君仁。是使君子仁用文火炒至微黄有香气入药者。

【性味归经】甘，温。归脾、胃经。

【功效主治】杀虫消积。主治蛔虫病及小儿疳积。

【用置】6～10克。

【慎忌】大量服用可引起呃逆、眩晕、呕吐，与热茶同服也能引起呃逆。故不宜大量服和与热茶同服。

苦 棱 皮

出自《名医别录》。为楝科乔木植物楝树 *Melia azedarach* L. 和川楝树 *M. toosendan* S. et Z. 的根皮或树皮。全国大部分地区有分布，春、秋两季采收，刮去栓皮，洗净鲜用。或以干品润透切片用。

【别名】楝皮，楝树皮，楝根皮，楝树根皮，苦楝白皮，楝白皮，森树皮，翠树皮，紫花树皮，楝根白皮，楝枣树皮，火捻树皮，花心树皮，苦辣树皮，洋花森皮，川楝皮，川楝根皮，川楝白皮。

【商品名】苦楝皮：为植物楝树的树皮或根皮。

川楝皮：为植物川楝树的树皮或根皮。

以上均以皮厚、条大、干燥、无粗皮者为佳。

【处方名】苦楝皮，川楝皮，楝皮，楝白皮。

【注意】上海将川楝子的外皮作“苦楝皮”使用。与本草书籍

所载及全国各地所销苦棟皮不一致。

【性味归经】苦，寒。有毒。归脾、胃、肝经。

【功效主治】杀虫，疗癣。主治蛔虫病，钩虫病，蛲虫病。外用治疗头癣，疥疮。

【用量】6～15克。鲜品30克。外用适量。

【慎忌】不宜持续和过量服用。体虚者慎用。肝病患者及胃病患者忌用。

槟 榴

出自《名医别录》。为棕榈科常绿乔木植物槟榔 *Areca catechu* L. 的成熟种子。主产于海南岛、福建、云南等地。冬春两季果实成熟时采集，剥去果皮，晒干，浸透切片。

【别名】大白，大白片，大白槟，花大白，纳子，花片，吕宋槟，仁频，宾门，宾门药钱，白槟榔，橄榄子，槟榔仁，洗瘴丹，大腹子，大腹槟榔，槟榔子，马金南，青仔，槟榔玉，槟玉，榔玉，花槟榔，鸡心槟榔，槟榔尖，尖槟榔，尖槟，海南槟榔，海南槟，海南子，圈马，槟楠，槟榔钱。

【商品名】白槟榔：又名大白片。为鲜嫩果经沸水擦过，切片烘干者。

枣槟榔：又名枣儿槟、枣儿槟榔。为国产槟榔未成熟的幼嫩果实。

鲜槟榔：为槟榔鲜品入药者。

榔干：又名槟榔干。为未成熟槟榔幼果晒干者。

大白：为进口槟榔中个大形圆坚实者。

笋白：又名损白。为进口槟榔中残损破碎者。

鸡心槟榔：为进口槟榔中形似鸡心者。

四京子：为鸡心槟榔中个体较小者。

以上以个大、质坚、体重、断面鲜艳有花纹者为佳。

【处方名】 槟榔，生槟榔，槟榔片，大白，大白片，炒槟榔，炒大白，焦槟榔，焦大白。

处方中写槟榔、槟榔片、大白、大白片均指生槟榔。为原药材润透切成薄片或砸成小块颗粒生用入药者。

炒槟榔又名炒大白。为槟榔片或小块颗粒用文火微炒至黄色入药者。

焦槟榔又名焦大白。为槟榔片或小块颗粒用武火炒焦黄后入药者。

【性味归经】 辛、苦，温。归胃、大肠经。

【功效主治】 杀虫，消积，行气，利水。主治多种肠道寄生虫病，如绦虫、姜片虫、钩虫、蛔虫、蛲虫等；食积气滞，腹胀便秘，泻痢后重；水肿，脚气肿痛；疟疾。

【用量】 6～15克。单用杀虫可用60～120克。

【禁忌】 脾虚便溏者忌服。

南 瓜

出自《滇南本草》。为葫芦科植物南瓜*Cucurbita moschata* Duch. 的果实。全国各地均有栽培。夏、秋果实成熟时采摘。使用新鲜品。

【别名】 麦瓜，番南瓜，番瓜，倭瓜，北瓜，金冬瓜，冬瓜，伏瓜，金瓜，饭瓜，老缅瓜，窝瓜，番蒲。

【商品名】 南瓜。以个大、表面棕黄色并有白色粉霜、果肉淡黄色、瓜瓢黄色、新鲜饱满者为佳。

【处方名】 南瓜。

【性味归经】 甘，平。归脾、胃经。

【功效主治】 补中益气，消炎止痛，解毒杀虫。主治糖尿病，肺痈，蛔虫症。捣烂外敷治烫火伤。捣烂取汁内服可治鸦片中毒。

【用量】 蒸煮食用鲜品100～200克。外用适量。

【慎忌】气滞湿阻者慎服。

南 瓜 子

出自《现代实用中药》。为葫芦科植物南瓜 *Cucurbita moschata* Duch. 的种子。主产于浙江、江苏、河北、山东、山西、四川等地。夏秋间果熟时采收，取子洗净，晒干。研粉生用，以新鲜者良。

【别名】南瓜仁，白瓜子，金瓜米，方瓜子，北瓜子，窝瓜子，倭瓜子，麦瓜子，番南瓜子，番瓜子，金冬瓜子，伏瓜子，饭瓜子，老缅瓜子，番蒲子，老面瓜子。

【商品名】南瓜子。以粒籽肥大、饱满、干燥者为佳。

【处方名】南瓜子，南瓜仁，生南瓜子。

【性味归经】甘，平。归胃、大肠经。

【功效主治】杀虫。主治绦虫病，蛔虫病，血吸虫病等。

【用量】60~120克。

鹤 草 芽

出自《中华医学杂志》(6): 436, 1974。为蔷薇科多年生草本植物龙牙草(即仙鹤草) *Agrimonia pilosa* Ledeb. 的冬芽。深冬或早春采收，除去棕褐色绒毛，晒干。研粉用。

【别名】龙牙草芽，龙牙草根芽，仙鹤草芽，仙鹤草根芽，施州龙牙草芽，瓜香草芽，黄龙尾芽，铁胡蜂芽，金顶龙芽，老鹳嘴芽，子母草芽，毛脚茵芽，黄龙牙，草龙牙，地椒芽，黄花草芽，蛇疙瘩芽，龙头草芽，寸八节芽，过路黄芽，毛脚鸡芽，杰里花芽，线麻子花芽，脱力草芽，刀口药芽，大毛药芽，地仙草芽，蛇倒退芽，路边鸡芽，毛将军芽，鸡爪沙芽，路边黄芽，五蹄风芽，牛头草芽，泻痢草芽，黄花仔芽，异风颈草芽，子不离母芽，父子

草芽，毛鸡草芽，群兰败毒草芽，狼牙草芽，狼牙草根芽。

【商品名】鹤草芽，仙鹤草芽，龙牙草芽，狼牙草根芽，龙牙草根芽。以质嫩、肥壮、无棕色绒毛者为佳。

【处方名】鹤草芽，仙鹤草芽，龙牙草芽，狼牙草芽。

【性味归经】苦、涩，凉。归肝、小肠、大肠经。

【功效主治】杀虫。主治绦虫病。

【用量】不宜入煎。研粉吞服每次30~50克。小儿每千克体重服药0.7~0.8克。温开水冲服。

雷 丸

出自《神农本草经》。为多孔菌科雷丸菌 *Polyporus mylittae* Cook. et Mass. 的菌核。我国西北、西南、华南等地均产，以四川、湖北、云南、贵州等地产量最多。8~10月采收，洗净晒干。入丸散剂。

【别名】雷矢，雷实，竹苓，竹苓子，竹林子，竹铃芝，木连子。

【商品名】雷丸。以个大饱满、质坚、外表黑褐色、断面白色者为佳。

【处方名】雷丸，雷丸粉，来丸。

【性味归经】苦，寒。有小毒。归胃、大肠经。

【功效主治】杀虫。主治绦虫病，钩虫病，蛔虫病。

【用量】6~15克。

【慎忌】不宜入煎剂，宜入丸散剂。

鹤 虬

出自《新修本草》。为菊科多年生草本植物天名精 *Carpesium abrotanoides* L. 或伞形科2年生草本植物野胡萝卜 *Daucus*

carota L.的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收，晒干。生用或炒用。

【别名】鹤虱，鬼虱，北鹤虱，南鹤虱，天名精子，天名精实，野胡萝卜子，大鹤虱，小鹤虱，鹤虱子，窃衣子，赖毛子，莉蔬。

【商品名】北鹤虱：又名天名精子、大鹤虱。为植物天名精的干燥成熟果实。主产于华北各地。为本草书籍所载之正品。

南鹤虱：又名野胡萝卜子、小鹤虱。为植物野胡萝卜的干燥成熟果实。主产于安徽、江苏、浙江、湖南、四川等地。

均以籽粒饱满、干燥、无杂质者为佳。

【处方名】鹤虱，炒鹤虱，活虱。

【注意】目前在药材商品市场上，市售鹤虱品种较乱。北鹤虱除天名精果实外，尚有同属植物挖耳草（金挖耳）*Carpecium cernuum* L.和倒盖菊*C. divaricatum* Sieb. et Zucc. 的果实，也作“鹤虱”使用，但非正品。

南鹤虱除野胡萝卜果实外，江苏和湖南等地把同科植物香根芹（当地亦称野胡萝卜）*Osmorrhiza aristata* (Thunb.) Makino et Yabe的果实作“鹤虱”使用。

有些地区把伞形科植物窃衣*Torilis japonica* (Houtt.) DC. [*T. anthriscus* (L.) Gmel.] 的果实作“鹤虱”使用，称为“华南鹤虱”、窃衣子、破草子。

东北和青海地区把当地出产的紫草科植物赖毛子*Lappula echinata* Gilib. var. *heteracantha* O. Ktze. 的果实作“鹤虱”使用，称为东北鹤虱。宁夏和新疆地区把同属植物粘珠子*L. echinata* Gilib. 的果实作“鹤虱”使用。宁夏地区还把同属植物单列刺赖毛子*L. intermedia* (Ledeb.) M. Pop. 的果实作“鹤虱”使用，称为蒙古鹤虱。以上均非鹤虱正品。

【性味归经】苦、辛，平。有小毒。归脾、胃经。

【功效主治】杀虫。主治蛔虫病，蛲虫病，绦虫病等多种肠道

寄生虫病。

【用量】 3~10克。

榧 子

出自《名医别录》。为红豆杉科常绿乔木植物榧树 *Torreya grandis* Fort. 的成熟种子。主产于浙江、福建、安徽、湖北、江苏等地。冬季果实成熟时采收，晒干。生用或炒用。

【别名】榧实，彼子，榧子，墨子，玉榧，香榧子，木榧子，赤果，玉山果，野杉子，榧树子，大榧子。

【商品名】榧子，榧实。以种仁饱满、干燥、无杂质者为佳。

【处方名】榧子，榧子仁，榧子肉，炒榧子。

处方中写榧子、榧子仁和榧子肉均指生榧子仁（或称生榧子肉）。是将榧子去壳取得果仁入药者。

炒榧子是将榧子仁经文火轻炒至微黄色入药者。

【性味归经】甘，平。归肺、大肠经。

【功效主治】杀虫。主治钩虫、蛔虫、蛲虫等多种肠道寄生虫病；肺燥咳嗽。

【用量】 30~50克。

芜 蔴

出自《神农本草经》。为榆科落叶小乔木或灌木植物大果榆 *Ulmus macrocarpa* Hance 果实的加工品。主产于河北、山西等地。夏季采集成熟果实，晒干，搓去膜翅，取出种子浸于水中，待发酵后，加入家榆树皮粉、红土、菊花末，加温开水调成糊状，摊于平板上，切成小方块，晒干入药。

【别名】臭芫荑，白芫荑，无夷，瓣蕡，芫荑仁，山榆子，山榆仁，大果榆糊，大果榆子，无姑子，山粉榆子，姑榆子，进榆

子，黄榆子，扁榆子，毛榆子，柳榆子，无姑子，白贵子，蔻荑，藜蕡，母估子，菜蕡子。

【商品名】 芜荑。以方块整匀、表面色黄褐、断面色黄黑、体轻松脆、干燥、气特臭者为佳。

【处方名】 芜荑，白芜荑，臭芜荑。

【性味归经】 辛、苦，温。归脾、胃经。

【功效主治】 杀虫消疳。主治各种肠道寄生虫病，虫积腹痛，小儿疳积泄泻。外用治疗疥癣。

【用量】 3～10克。外用适量。

贯 众

出自《神农本草经》。为鳞毛蕨科多年生草本植物粗茎鳞毛蕨 *Dryopteris crassirhizoma* Nakai 或蹄盖蕨科多年生草本植物蛾眉蕨 *Lunathyrium acrostichoides* (Sw.) Ching 或乌毛蕨科多年生草本植物单芽狗脊 *Woodwardia unigemmata* (Makino) Nakai 或紫萁科多年生草本植物紫萁 *Osmunda japonica* Thunb. 等的根茎及叶柄基部。粗茎鳞毛蕨主产东北，蛾眉蕨主产华北、华中，单芽狗脊主产华东、华南，紫萁主产于河南及华东等地区。多在秋季挖取根茎，除去须根与部分叶柄，晒干，切片生用或炒炭用。

【别名】 贯仲，萹蓄，添，贯节，贯渠，百头，虎卷，扁符，贯中，贯钟，贯来，渠母，伯芹，药渠，黄钟，伯萍，乐藻，草鵝头，冷卷子疙瘩，伯药，萹藻，凤尾草，蕨薇菜根，神箭根，黑狗脊，管仲。

【商品名】 东北贯众；又名绵马贯众。为植物粗茎鳞毛蕨（又名绵马鳞毛蕨、鸡膀鳞毛蕨、野鸡膀子、绵马羊齿、东绵马、日本绵马、牛毛黄）的干燥根茎。主产于我国东北地区。

紫萁贯众：又名薇贯众、大贯众、高脚贯众。为紫萁科植物紫萁（又名高鳞贯众、老虎牙、水骨菜）的干燥根茎。主产于河南、

安徽、山东、江苏等地。

蛾眉蕨贯众：又名蹄盖蕨贯众。为植物蛾眉蕨（又名亚美蹄盖蕨）的干燥根茎。主产于河南、河北、甘肃等地。

葵果蕨贯众：又名小叶贯众。为植物葵果蕨 *Matteuccia struthiopteris* (L.) Todaro 的干燥根茎。主产于吉林、河北、河南、陕西等地。

乌毛蕨贯仲：为植物乌毛蕨（又名龙船蕨、赤蕨头）*Blechnum orientale* L. 的干燥根茎。主产于湖南、广东、广西等地。

苏铁脚贯仲：为植物苏铁蕨 *Brainea insignis* (Hook.) J. Sm. 的干燥根茎。主产于广东、广西等地。

狗脊蕨贯众：又名大叶贯众。为植物狗脊蕨 *Woodwardia japonica* (L. f.) Sm. 的干燥根茎。主产于浙江、湖南、四川等地。

单芽狗脊蕨贯众：为植物单芽狗脊蕨的干燥根茎。主产于华东、华南地区。

以上均以个大、整匀、须根少、无杂质者为佳。

此外，还有以下品种在不同地区亦作贯众入药：

辽东鳞毛蕨贯众：为植物辽东鳞毛蕨 *Dryopteris peninsulae* Kitag. 的根茎。在河南、山东、湖南的个别地区作贯众使用。

多鳞耳蕨贯众：为植物多鳞耳蕨 *Polystichum squarrosum* Fee 的根茎。在西藏作贯众使用。

欧洲鳞毛蕨贯众：为植物欧洲鳞毛蕨 *Dryopteris filixmas* (L.) Schott 的根茎。在新疆作贯众使用。

山地贯众：又名小贯众。为鳞毛蕨科植物山地贯众（小贯众）*Cyrtomium fortunei* J. Smith 的干燥根茎。在云南、贵州、四川的个别地区作贯众使用。《植物名实图考》中的贯众即为此种。

耳蕨贯众：为鳞毛蕨科植物耳蕨贯众 *Polystichum braunii* (Spenn.) Fee [*Aspidium braunii* Spenn.] 的干燥根茎。在黑龙江和山西等地作贯众使用。

刺叶耳蕨贯众：又名凤尾贯众。为鳞毛蕨科植物刺叶耳蕨 *P.*

acanthophyllum (Fries) Bedd. 的干燥根茎。在云南昆明作贯众使用。

对马耳蕨贯众，为鳞毛蕨科植物 对马耳蕨 *P. tsus-simense* (Hook.) J. Smith 的干燥根茎。在河南的一些地方作贯众使用。

【处方名】 贯众，贯仲，贯中，生贯众，生贯仲，贯众炭，贯仲炭等。

处方中写贯众、贯仲、贯中指生贯众或生贯仲。为原药去杂质，洞透切片晒干生用入药者。用于清热解毒，杀虫。

贯众炭（或贯仲炭）为贯众片用武火炒至焦黑，存性，喷洒凉水，取出晾干入药者。用于止血。

【性味归经】 苦，微寒。归肝、脾经。

【功效主治】 杀虫，清热解毒，止血。主治钩虫、蛲虫、蛔虫、绦虫等多种肠道寄生虫病；风热感冒，温热斑疹，痄腮，吐血、衄血、便血、崩漏等出血证。

【用量】 10~15克。驱虫及清热解毒宜生用；止血宜炒炭用。

土 槿 皮

出自《药材资料汇编》。为松科植物金钱松 *Pseudolarix kaempferi* Gord. 的树皮或根皮。主产于安徽、江苏、浙江、江西、湖南、广东等地。多为栽培。秋末采集，晒干。

【别名】 土荆皮，荆树皮，荆树根皮，金钱松皮，金钱松树皮，金钱松根皮，金松皮，金松树皮，金松根皮，水树皮，水树根皮，金叶松皮，金叶松树皮，金叶松根皮。

【商品名】 土槿皮，土荆皮。以皮厚、条长、干燥无杂质者为佳。

【处方名】 土槿皮，土荆皮，荆树皮。

【性味归经】 辛，温。有毒。归肺经。

【功效主治】 止痒杀虫。主治手脚癣，局限性神经性皮炎，湿

疹，癫痫头。

【用量】 外用适量。

【慎忌】 本品有毒，只供外用，严禁内服。

打破碗花花

出自《四川常用中草药》。为毛茛科植物打破碗花花 *Anemone hupehensis* Lem. 的根。主产于四川、陕西、甘肃等地。秋季采挖，洗净，切片，晒干生用。

【别名】 野棉花根，山棉花根，大头翁，拐角七，青水胆，一把抓，湖北秋牡丹。

【商品名】 打破碗花花。以根条粗长、干燥、无泥土者为佳。

【处方名】 打破碗花花，野棉花根，山棉花根。

【性味归经】 苦、辛，凉。有毒。归肺、脾经。

【功效主治】 杀虫，化积，散瘀，消肿。主治痢疾，肠炎，蛔虫症。外用治疗疮疖，痈肿疮疖，瘰疬，跌打损伤。

【用量】 6～10克。外用适量。

【慎忌】 孕妇忌服。

十一、止 血 药

大 薊

出自《名医别录》。为菊科多年生宿根草本植物 大 薿 *Cirsium japonicum* DC. 的根及全草。我国各地均产。夏秋花期时采集全草，秋末挖取根部，晒干，切段。生用或炒用。

【别名】 薤，马薤，虎薤，刺薤，山牛蒡，鸡项草，鸡脚刺，野红花，茨芥，牛触嘴，鼓椎，鸡姆刺，恶鸡婆，大牛喳口，山萝卜，猪姆刺，六月霜，蚊姆刺，牛口刺，老虎脚，刺萝卜，驴扎嘴，马刺刺，刺桔子，马刺草，马刺口，牛口舌，老虎刺，草鞋刺，刷把头，土红花，野刺菜，牛不嗅，猪妈菜，牛刺穷菜，穷菜，鸟不扑，大刺儿菜，大刺口菜，大刺刺菜，山刺儿菜，大刺盖，牛喳口，大恶鸡婆，大恶鸡，山老鼠簕，大薤草，将军草，马刺薤，千针草，大刺角牙。

【商品名】 大薤草：为大薤的地上部分。

大薤根：又名土人参、土洋参、六轮台。为大薤的根。

大薤：为大薤的带根全草。以色绿完整、带有花序、无杂质者为佳。

【处方名】 大薤，鲜大薤，大薤炭。

处方中写大薤指生大薤。为大薤带根全草去除杂质，切碎晒干入药者。

鲜大薤为大薤新鲜品入药者。

大薤炭为大薤切碎晒干，用武火炒至焦黑色（存性）入药者。止血作用增强。

【注意】 目前在药材商品市场上，大薤除以上品种外，下列同属植物在不同地区也作大薤入药，但非正品。

野薤 *Cirsium maackii* Maxim. [*C. japonicum* DC. var. *maackii* (Maxim) Nakai]，分布于东北地区。

虎薤 *C. spicatum* Matsum. 分布于广东地区。

烟管薤 *C. pendulum* Fisch. 分布于东北地区。

青刺薤（滇大薤、白马刺）*C. chlorolepis* Petrak. 分布于云南地区。

藏大薤 *C. eriophoroideum* (Hook. f.) Petrak. 分布于西藏。

此外，还有些根用品。如新疆、青海、陕西、甘肃等地的某些

地方把同科植物飞廉 *Carduus crispus* L. 的全草混作“大蓟”使用。山东某些地方把麝香飞廉 *C. nutans* L. 的全草混作“大蓟”使用。东北有些地区还把小蓟（刺儿菜及刻叶刺儿菜）混作“大蓟”使用。以上均属混用，应予以纠正。

【性味归经】甘、苦，凉。归心、肝经。

【功效主治】凉血止血，散瘀消肿。主治咯血，衄血，尿血，崩漏等由血热妄行所致的各种出血证；疮痈肿毒；高血压病；黄疸型肝炎。

【用量】10~15克。鲜品30~60克。外用适量。

【慎忌】脾胃虚寒者慎服。

小 蓼

出自《名医别录》。为菊科多年生草本植物刺儿菜 *Cephalanoplos segetum* (Bge.) Kitam. 或刻叶刺儿菜 *C. setosum* (Bieb.) Kitam. 的全草及地下茎。产于我国南北各地。夏季花期采集，洗净，晒干，切段。生用，尤以鲜品为佳。

【别名】刺刺芽，刺菜芽，猫蓼，青刺蓼，千针草，刺蓼菜，刺儿菜，青青菜，萋萋菜，萋萋芽，枪刀菜，野红花，刺角菜，刺角芽，木刺艾，刺杆菜，刺杀草，刺儿叶，莽莽毛，小恶鸡婆，刺萝卜，小薊姆，刺儿草，牛鬪刺，刺尖头草，刺菜，曲曲菜，白鸡角刺，小鸡角刺，小牛扎口，小薊草，小刺头，刻叶刺儿菜，莽莽菜，小刺盖，刺儿蓼。

【商品名】小蓼。以色绿、肥嫩、带有花序、无杂质者为佳。

【处方名】小蓼，鲜小蓼，小蓼炭。

处方中写小蓼指生小蓼。为原药除去杂质，晒干切碎入药者。鲜小蓼为本品的鲜品入药者。

小蓼炭为小蓼用武火炒至焦黑，存性，喷洒冷水熄灭火星，然后晾干入药者。

【注意】目前在药材商品市场上，小蓟的市售品种比较混乱。广西有些地区把轮薊 *Cirsium chinense* Gardn. et Champ. 作“小蓟”使用。湖南、湖北、广东等地的个别地区，把大薊 *C. japonicum* DC. 作“小蓟”使用。东北地区还把菊科植物苣荬菜 *Sonchus brachyotus* DC. 的全草充当“小蓟”使用。以上均属混用，应予以纠正。

【性味归经】甘，凉。归心、肝经。

【功效主治】凉血止血，解毒消痈。主治血热妄行所致的咯血、衄血、吐血、尿血、崩漏等一切出血证；热毒疮痈。

【用量】10~15克。鲜品30~60克。外用适量。

【慎忌】大便稀溏者忌服。

芥 菜

出自《千金要方·食治》。为十字花科植物芥菜 *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic. 的带根全草。全国大部分地区均产。3~5月采集，洗净，鲜用或晒干生用。

【别名】芥，芥只菜，香芥菜，香田芥，水芥菜，芥芥菜，芥菜，鸡心菜，菱角菜，地米菜，鸡脚菜，假水菜，地地菜，上巳菜，香善菜，榄豉菜，粽子菜，地菜，护生草，净肠草，烟盒草，清明草，饭锹头草，枕头草，三角草，蒲蝇花，香芹娘，香料娘，薪芥，马辛，大芥，老芥，太蕺，蔻菥，蔻芥，薹，蔻菥，蔻芥。

【商品名】芥菜。以色绿、肥嫩、无杂质者为佳。

【处方名】芥菜，鲜芥菜。

【性味归经】甘，平。归心、肺、肝、肾经。

【功效主治】和脾，利水，止血，明目。主治肾炎水肿，淋证，乳糜尿，泌尿系结石，吐血，便血，血崩，月经过多，目赤肿痛，肾结核尿血，肺结核咯血，高血压病等。

【用量】15~30克。鲜品加倍。外用适量。

紫 珠

出自《本草拾遗》。为马鞭草科多年生木本植物杜虹花 *Callicarpa pedunculata* R. Br. 及大叶紫珠 *C. macrophylla* Vahl. 或裸花紫珠 *C. nudiflora* Hook. et Arn. 的叶。长江以南各地均有分布。全年可采，以夏秋采收为佳，晒干。生用，或研粉用。

【别名】 杜虹花，大叶紫珠，裸花紫珠，紫珠草，止血草，紫荆，紫珠叶，紫株，粗糠仔，粗糠草，鸦鹊板，螃蟹目，雅目草，雅木草，白毛柴，白奶雪草。

【商品名】 紫珠。以叶片大、干燥、完整、无杂质者为佳。

【处方名】 紫珠，紫珠草，紫珠叶。

【注意】 目前在药材商品市场上，紫珠的市售品种，除上述三个品种外，还有下列同属植物也作“紫珠”入药，但非正品。

白棠子树 *Callicarpa dichotoma* (Lour.) K. Koch

长叶紫珠 *Callicarpa loureiri* Hook. et Arn.

大树紫珠（乔木紫珠） *Callicarpa arborea* Roxb.

广东紫珠 *Callicarpa kwangtungensis* Chun

红紫珠（红叶紫珠、小红米果） *Callicarpa rubella* Lindl.

华紫珠 *Callicarpa cathayana* H. T. Chang

珍珠风 *C. bodinieri* Lévl

老鸦糊 *C. bodinieri* Lévl var. *giraldii* (Rehd.) Rehd. [*C. giraldii* Hesse ex Rehd.]

钝齿红紫珠 *C. rubella* Lindl. f. *crenata* Péi

【性味归经】 苦、涩，凉。归肝、肺、胃经。

【功效主治】 收敛止血，解毒疗疮。主治衄血，咯血，吐血，尿血，便血，崩漏，牙龈出血，外伤出血等一切出血证；疮痈肿毒，烧烫伤。

【用量】 10~15克。研末冲服每次1.5~3克。外用适量。

苎 麻 根

出自《名医别录》。为蕁麻科多年生草本或亚灌木植物苎麻 *Boehmeria nivea* (L.) Gaud. 的根。各地均产，生于荒地、山坡；有栽培。夏、秋季采收，晒干，生用，用时润软切片。

【别名】野苎麻，野苎麻根，银麻根，苎根，苎麻头，红根，天青地白草根，川绵葱根，安卿根，银苎根，天名精根，园麻根，线麻根，白线麻根，白苎麻根，山麻根，红苎麻根，苧麻根，紵根，圆麻根，白麻根，家苎麻根，麻仔根，青麻根，山苎根，绩苎根。

【商品名】苎麻根。以根条均匀、色灰棕、无空心者为佳。

【处方名】苎麻根。

【性味归经】甘，寒。归心、肝经。

【功效主治】凉血止血，清热安胎，利尿，解毒。主治血分有热所致的咯血、吐血、衄血、尿血、崩漏、紫癜等出血证；胎热所致的胎动不安及胎漏下血；湿热下注所致的小便淋沥不畅；热毒疮痈，蛇虫咬伤。

【用量】10~30克。外用适量。

白 茅 根

出自《神农本草经》。为禾本科多年生草本植物白茅 *Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees.) C. E. Hubb. 的根茎。全国多数地区均有分布。春季苗未出土或秋后苗枯时采挖。洗净鲜用，或晒干切短节生用。

【别名】茅根，兰根，茹根，地菅，地筋，兼杜，白花茅根，地节根，茅草根，坚草根，甜草根，丝毛草根，寒草根，茅茅根，茅毛根，茅柴根，茅根肉，白毛菅根，丝茅根，万根草根，白茅草

根，丝茅草根，毛草根，毛根，白毛根，甜根。

【商品名】白茅根，茅根。以根条粗长、色白、甜味浓、无杂质者为佳。

【处方名】茅根，白茅根，茅柴根，茅根肉，鲜白茅根，茅根炭。

处方中写茅根、白茅根、茅柴根、茅根肉、干白茅根等均指生白茅根。为原药材去杂质晒干切段入药者。

鲜白茅根为刚从地下挖出未晒干，以新鲜品入药者。

茅根炭为干白茅根用武火炒至焦黑，存性，然后入药者。

【性味归经】甘，寒。归肺、胃、膀胱经。

【功效主治】凉血止血，清热利尿。主治血热妄行所致的尿血、咯血、衄血、吐血等出血证；热淋，小便不利，水肿，湿热黄疸；热病烦渴，胃热呕哕，肺热咳嗽。

【用量】15～30克。鲜品30～60克。鲜品为佳。

地 榆

出自《神农本草经》。为蔷薇科多年生草本植物地榆 *Sanguisorba officinalis* L. 的根。我国南北均有分布，以浙江、安徽、湖北、湖南、山东等省产量为多。春、秋季采挖，洗净泥土，除去茎叶及须根，晒干切片，生用或炒用。

【别名】地榆根，白地榆，涩地榆，赤地榆，紫地榆，红地榆，鼠尾地榆，花椒地榆，线形地榆，枣儿红，岩地芨，水模榔，山枣参，黄根子，黄瓜香，蕨苗参，马连鞍薯，山红枣根，水橄榄根，玉扎，玉豉根，酸楂，豚榆系，野升麻，红绣球，土儿红，山枣子根，山枣根，一枝箭根，紫朵苗子根，小紫草根，马猴枣根，鞭枣胡子根，血箭草根，无名印，包头花根。

【商品名】地榆。以质坚、干燥、断面色红者为佳。

【处方名】地榆，生地榆，炒地榆，地榆炭，醋地榆，醋炒地

榆，盐地榆，盐炒地榆。

处方中写地榆是指生地榆。为原药材除去杂质，润透切片，晒干入药者。

炒地榆即地榆炭。为地榆片用武火炒至外表焦黑，内里焦黄入药者。

醋炒地榆简称醋地榆。为地榆炒炭后再加醋拌炒入药者。

盐炒地榆简称盐地榆。为地榆炒炭后再加盐水拌炒入药者。

【注意】在目前药材商品市场上，除上述正品外，下列同属植物的根在不同地区也作地榆使用，但非正品。

小白花地榆 *S. parviflora* (Maxim.) Takeda 主产于东北和内蒙古地区。

细叶地榆（绵地榆、棉地榆）*S. tenuifolia* Fisch. et Link 主产于东北地区。

大花地榆 *S. grandiflora* (Maxim.) Mak. 主产于内蒙古。

长叶地榆 *S. longifolia* Bertol. 主产于东北、内蒙古。

阿拉善地榆 *S. alashanica* Lioce. et Li 主产于宁夏。

白花地榆 *S. sitchensis* C. A. Mey. 主产于山东。

此外，还有一些地区把另外的药材误作为“地榆”使用。如贵州遵义地区和四川重庆地区把虎杖 *Polygonum cuspidatum* Sieb. et Zucc. 的根误作“地榆”使用，遵义地区称黄地榆或地榆，重庆地区称土地榆。贵阳地区把拳参 *Polygonum bistorta* L. 的根误称“地榆”。云南个别地区把银毛委陵菜 *Potentilla fulgens* Wall. 和长梗委陵菜 *P. peduncularis* Don 的根称作白地榆，充当“地榆”使用。云南昆明地区把紫地榆 *Geranium strictipes* R. Kunth 的根称作地榆，并作地榆使用。以上均属误用，应予以纠正。

【性味归经】苦、酸，微寒。归肝、胃、大肠经。

【功效主治】凉血止血，解毒敛疮。主治便血，痔血，吐血，衄血，咯血，尿血，崩漏，烫伤，湿疹，皮肤溃烂等。

【用量】10~15克。外用适量。

【慎忌】大面积烧烫伤不宜用地榆制剂外涂，以免引起中毒性肝炎。

侧 柏 叶

出自《名医别录》。为柏科常绿乔木植物侧柏 *Biota orientalis* (L.) Endl. 的嫩枝及叶。各地均有栽培。全年可采收，剪下小枝，除去粗梗，阴干，切断。生用或炒炭用。

【别名】柏叶，侧柏，扁柏，扁柏叶，丛柏叶，柏树叶，香柏叶，柏子树叶，崖柏叶，黄心柏叶，扁松叶，云片柏叶，松蟠，片松叶，喜松叶，喜柏，喜柏叶。

【商品名】侧柏叶。以叶肥枝嫩、干燥、色绿、无杂质者为佳。

【处方名】侧柏，侧柏叶，柏叶，鲜侧柏叶，炒侧柏叶，侧柏叶炭，侧柏炭。

处方中写柏叶、侧柏或侧柏叶均指生侧柏叶。为原药去杂质，晒干，生用入药者。

炒侧柏叶简称炒侧柏。为侧柏叶晒干后用文火微炒后入药者。

侧柏叶炭简称侧柏炭。为侧柏叶晒干后用武火炒至焦褐色，存性，喷洒清水，晒干入药者。

鲜侧柏叶为新采集的侧柏叶鲜品入药者。

【注意】在药材商品市场上，市售侧柏叶除上述品种外，广东还将小罗汉松 *Podocarpus macrophylla* D. Don var. *maki* Endl. 的幼嫩枝叶作“侧柏叶”使用；湖北将柏树 *Cupressus funebris* Endl. 的幼嫩枝叶作“侧柏叶”使用。以上两种均非正品。

【性味归经】苦、涩，微寒。归肺、肝、大肠经。

【功效主治】凉血止血，祛痰止咳。主治内外各种出血证，如咯血、便血、吐血、衄血、尿血、崩漏等；咳喘痰多。鲜品用酒精浸泡外涂擦洗可治疗脂溢性皮炎、脂溢性脱发等。

【用量】10~15克。鲜品30~40克。外用适量。

卷 柏

出自《神农本草经》。为卷柏科植物卷柏 *Selaginella tamariscina* (Beauv.) Spring 或 垫状卷柏 *S. pulvinata* (Hook. et Grev.) Maxim. 的全草。我国大部分地区均有分布。生于向阳的岩石上或石缝中。全年可采，洗净，晒干。

【别名】豹足，求股，神投时，地侧柏，拳头草，阿木阿拉（哈尼族名），交时，石莲花，回阳草，还阳草，回生草，不死草，长生不死草，长生草，还魂草，万年松，石花，九死还魂草，见水还阳草，佛手草，万年青，老虎爪，山拳柏，打不死，铁拳头，岩松，垫状卷柏，一把抓，的哇三睦（布朗族名），玻吼冒，泼猴帽（崩龙族名），烧节（苗族名），茧北（傈僳族名），草亏豁（白族名），滚北（朝鲜族名），玛它月印浩莫，斯额泊斯（蒙古族名），莪曲森得莫（藏族名）。

【商品名】卷柏，垫状卷柏，岩松。以叶多、色绿、完整不碎者为佳。

【处方名】卷柏，生卷柏，卷柏炭。

处方中写卷柏指生卷柏。为原药去杂质生用入药者。偏于破血。

卷柏炭为净卷柏置锅内用武火炒至外面焦黑色，内呈焦黄色时，喷淋清水灭尽火星，然后取出晾干入药者。偏于止血。

【性味归经】辛，平。归心、肝经。

【功效主治】生用破血，炒炭止血。生用主治经闭，癥瘕，跌打损伤，腹痛，哮喘。炒炭用主治吐血，便血，尿血，脱肛，子宫出血，产后子宫收缩无力而出血不止等。

【用量】6~9克。外用适量。

【慎忌】孕妇忌服。

地 柏 枝

出自《草木便方》。为卷柏科植物江南卷柏 *Selaginella moellendorffii* Hieron. 的全草。分布于我国中部、南部及西南各省区，陕西及甘肃亦有分布。全年可采，洗净晒干，切段入药。

【别名】地柏；江南卷柏，石柏，岩柏，岩柏枝，岩柏草，油面风，铺地金牛，百叶草，烂皮蛇，孔雀毛，土黄连，石金花，山扁柏，红鸡草。

【商品名】地柏，地柏枝。以叶多、色绿、完整不碎者为佳。

【处方名】地柏，地柏枝，石柏，岩柏。

【注意】在药材商品市场上，下列两种同属植物在有些地区亦作地柏枝入药，但非正品。

兖州卷柏（金扁柏）*S. involvens* (Sw.) Spring

毛枝卷柏*S. braunii* Bak.

【性味归经】辛、微甘，平。归肺、肝经。

【功效主治】清热，利湿，止血。主治急性黄疸型肝炎，浮肿，肺结核咯血，便血，吐血，痔疮下血，血崩，创伤出血，烧伤烫伤，小儿惊风。

【用量】10~20克。鲜品加倍。外用适量。

【禁忌】孕妇慎服。

松 花 粉

出自《新修本草》。为松科植物马尾松 *Pinus massoniana* Lamb. 及其同属植物的花粉。4~5月开花时，将雄球花摘下，晒干，搓下花粉，除去杂质。

【别名】松花，松黄，松黄粉。

【商品名】松花粉，松花，松黄。以体轻、匀细、色淡黄、无

杂质者为佳。

【处方名】松花粉，松花。

【性味归经】甘，温。归肝、脾经。

【功效主治】祛风收湿，收敛止血。主治胃及十二指肠溃疡，咳血，虚寒胃痛，久痢不止，眩晕，诸疮湿烂，创伤出血。

【用量】3～6克。外用适量。

【慎忌】火热内盛者忌服。

鸡 冠 花

出自《滇南本草》。为苋科植物鸡冠花 *Celosia cristata* L. 的花序。全国大部分地区均产。8～10月间花序长至最大，并有部分果实成熟时剪下，鲜用，或晒干生用。

【别名】鸡冠苋花，鸡髻花，鸡公花，鸡角枪，鸡冠头。

【商品名】白鸡冠花：为鸡冠花序呈白色者。

红鸡冠花：为鸡冠花序呈红色者。

鸡冠花：各种鸡冠花的统称。均以花朵大、色泽鲜者为佳。

【处方名】鸡冠花，白鸡冠花，红鸡冠花，鲜鸡冠花。

【性味归经】苦、辛，寒。归大肠、肝、肾经。

【功效主治】凉血，止血，止带，止痢。主治痢疾，溃疡性非特异性结肠炎，功能性子宫出血，白带过多，痔漏下血，吐血，咳血，血淋等。

【用量】6～10克。鲜品加倍。外用适量。

槐 花(附：槐枝 槐耳)

出自《日华子本草》。为豆科落叶乔木槐树 *Sophora japonica* L. 的花及花蕾。南北大部分地区均有栽培。6～7月采花及花蕾，晒干。生用或炒用。

【别名】槐米，槐蕊，槐花米，豆槐花，白槐花，黑槐花，细叶槐花，金药树花，护房树花，槐树花，家槐花。

【商品名】槐花：为花初开时采收者。以花初开、干燥、色浅黄、无破碎、无梗叶杂质者为佳。

槐米：又名槐花米。为花蕾幼小时采收者。以花蕾幼小如米、色黄绿、干燥、无杂质者为佳。

陈槐米：又名陈槐花米。为槐米陈久者。习以为佳。

【处方名】槐花，槐米，炒槐花，炒槐米，槐花炭，槐米炭。

写槐花、槐米指生槐花、生槐米。为原药材除去杂质晒干入药者。

炒槐花（或炒槐米）为槐花（或槐米）用文火微炒而入药者。减缓苦寒之性。

槐花炭（或槐米炭）为槐花（或槐米）用文火炒至焦黑，存性，然后入药者。增强止血效能。

【性味归经】苦，微寒。归肝、大肠经。

【功效主治】凉血止血。主治便血，痔血，咯血，衄血，高血压病。

【用量】10~15克。

附：槐枝

槐枝为槐树的嫩枝。又名槐嫩蕊、黑槐枝、白槐枝、豆槐枝、细叶槐枝、金药树枝、护房树枝等。以质嫩、条长、均匀、干燥者为佳。性味苦平。有解毒、消肿、杀虫、止痒等功效。主治崩漏带下、目赤、痔疮、疥疮、外阴湿痒。烧取沥滴龋齿洞可治龋齿牙痛。用量10~30克。外用适量。

附：槐耳

槐耳为寄生于槐树上的木耳 *Auricularia auricula* (L.) ex

Hook.) Underw.。又名槐蠟、槐鵝、槐鸡、赤鸡、槐菌、槐櫻等。性味苦辛平。有收涩止血之功效。主治痔疮、便血、脱肛、崩漏、阴道炎等。用量6～10克。外用适量。

槐 角

为槐树的成熟果实。来源同槐花。

【别名】槐豆，槐实，槐子，槐角豆，槐角子，槐连豆，天豆，槐连灯，九连灯，黑槐角，白槐角，豆槐角，豆槐实，细叶槐角，金药树实，护房树实，家槐实。

【商品名】槐角，槐实。以果大、饱满、色黄绿、干燥、质柔润者为佳。

【处方名】槐角，槐实，槐豆，炒槐角，蜜槐角，槐角炭。

处方中写槐角、槐实、槐豆均指生槐角。为原药去杂质生用入药者。

炒槐角为净槐角用文火微炒至外表略带焦斑入药者。

蜜槐角为净槐角用蜜炙后入药者。

槐角炭为净槐角用武火炒至外表焦黑，内里焦黄，然后入药者。

【性味归经】苦，寒。归肝、大肠经。

【功效主治】清热，凉血，止血。主治肠风下血，痔疮下血，崩漏，血淋，血痢，阴疮湿痒。心胸烦闷，风眩欲倒。

【用量】3～6克。

【慎忌】脾胃虚寒者慎用。孕妇不宜服。

仙 鹤 草

出自《滇南本草》。为薔薇科多年生草本植物龙芽草 *Agrimonia pilosa* Ledeb. 的全草。产于我国南北各地。夏秋采收，洗净晒干，切段，生用。

【别名】龙牙草，龙芽草，施州龙牙草，瓜香草，黄龙尾，铁胡蜂，金顶龙芽，老鹳嘴，子母草，毛脚茵，黄龙牙，草龙牙，地椒，黄花草，蛇疙瘩，龙头草，寸八节，过路黄，毛脚鸡，杰里花，线麻子花，脱力草，刀口药，大毛药，地仙草，蛇倒退，路边鸡，毛将军，鸡爪沙，路边黄，五蹄风，牛头草，泻痢草，黄花仔，异风颈草，子不离母，父子草，毛鸡草，群兰败毒草，狼牙草，止血草，猴头草，鸡脚草，地蜈蚣，石打穿。

【商品名】仙鹤草，狼牙草，龙芽草，龙牙草。以叶多、质嫩、干燥、茎棕红色者为佳。

【处方名】仙鹤草，仙合草。

【注意】在药材商品市场上，同属植物钝齿龙牙草 *Agrimonia pilosa* Ledeb. var. *viscidula* komar. (主产于广东、广西) 和绒毛龙牙草 *A. pilosa* Ledeb. var. *nepalensis* D. Don (主产于山东、湖北、云南等地) 或疏毛龙牙草 *A. pilosa* Ledeb. 的全草也作仙鹤草同等入药。为仙鹤草副品。

【性味归经】苦、涩，平。归肺、肝、脾经。

【功效主治】收敛止血，止痢，杀虫。主治咯血、吐血、衄血、尿血、便血、崩漏等各种出血证；腹泻，痢疾；劳力过度所致的脱力劳伤，证见神疲乏力而纳食正常；滴虫性阴道炎所致的阴道湿痒；疟疾；疮疖痈肿，痔肿。

【用量】10~15克。大剂量可用30~60克。外用适量。

白及

出自《神农本草经》。为兰科多年生草本植物 白及 *Bletilla striata* (Thunb.) Reichb. f. 的地下块茎。产于我国长江流域至南部及西南各省区。夏秋季苗枯前采挖，除去残茎及须根，洗净，入沸水煮至内无白心，除去粗皮，晒干，切片或打粉用。

【别名】白芨，白及子，白给，白根，白鸟儿头，白鸡儿，白

鸡，白鸡娃，百芨，川白芨，甘根，冰球子，地螺丝，羊角七，千年棕，君球子，一兜棕，皺口药，利知子，连及，连及草，百笠，箬兰根，朱兰根，紫兰根，紫蕙根，扣子漆根，扣子七，明白及，雪如来，小白及。

【商品名】白及，白芨。以个大、质坚、色白、干燥、无须根者为佳。

【处方名】白及，白芨，白及粉，白及片，白芨片等。

【注意】产于陕西、甘肃、四川、云南等地的同属植物狭叶白及*B. ochracea* Schltr.的块根也作白及使用，但非正品。

【性味归经】苦、甘、涩，微寒。归肝、肺、胃经。

【功效主治】收敛止血，消肿生肌。主治咯血、吐血及外伤出血，疮痈肿毒，足手皲裂，肺痈。

【用量】3～10克。研末冲服每次1.5～3克。外用适量。

【禁忌】反乌头。

棕 榆 皮

出自《本草拾遗》。为棕榈科常绿植物棕榈树 *Trachycarpus wagnerianus* Becc.的叶鞘纤维(即叶柄基部之棕毛)。我国南方各地均产，以广东、福建等地为多。冬至前后采收。一般以陈棕煅炭用。

【别名】棕皮，棕毛，棕榈，棕榈皮，栟榈木皮，栟榈皮，棕衣树皮，百叶草皮，定海针皮。

【商品名】陈棕皮：又名陈棕。为棕榈皮陈久者。习以为佳。

棕骨：又名棕板。为叶柄削去外面纤维晒干者。

以片大、质厚、棕红色、陈久者为佳。

【处方名】棕榈炭，棕榈灰，棕灰，棕皮炭，棕炭，棕骨炭，棕板炭，陈棕炭，棕榈。

棕榈炭又名棕榈灰、棕皮炭、棕炭。为棕皮煅成炭入药者。

棕骨炭又名棕根炭。为棕骨煅成炭入药者。

陈棕炭为陈棕皮煅成炭入药者。

本品多煅成炭入药，以增强止血作用。所以处方中写棕榈也指棕榈炭。

【性味归经】苦、涩，平。归肺、肝、大肠经。

【功效主治】收敛止血。主治吐血、咯血、衄血、便血、崩漏等各种出血证。

【用量】3～10克。研末服每次1～1.5克。

血余炭

出自《名医别录》。为人发洗净后煅成的炭。研极细末用。

【别名】发炭，头发炭，发鬢炭，乱发炭，人退炭，毛发炭，人发炭，笄炭，笄发炭，童男发炭，壳（大人发）炭，髦（小孩发）炭，鬢鬚炭，披锡炭，鬚炭，发髦炭。

【商品名】血余炭：取人发用碱水洗净，再用清水冲洗，晒干，置煅锅内，上面覆盖一口稍小的锅，两锅接合处用黄泥封固，上面锅底上贴一张白纸，用文武火加热至上面锅底的白纸变焦黄为度，停火待冷，取出即得血余炭块。以色黑、光亮、体轻质脆者为佳。

【处方名】血余，血余炭，发炭等。

本品多煅成炭入药，以加强止血作用。故处方中写血余亦指血余炭。

【性味归经】苦，平。归肝、胃经。

【功效主治】止血散瘀，补阴利尿。主治衄血、尿血、咯血、吐血、便血、崩漏等各种出血证；小便不利，血淋。

【用量】6～10克。研末冲服每次1.5～3克。

百草霜

出自《本草图经》。为杂草经燃烧后附于灶突或烟囱内的烟

灰。乡村烧柴草处出产。将灶突或烟囱内的烟灰轻轻刮下，筛去杂质。

【别名】灶突墨，灶突中尘，灶额上墨，灶额墨，灶烟煤，灶煤，锅灰，锅底灰，锅烟子，锅煤子，锅底墨，釜底墨。

【商品名】百草霜。以色乌黑、体轻质细、无杂质者为佳。

【处方名】百草霜，百草双。

【性味归经】辛，温。归肝、肺、胃经。

【功效主治】止血，消积。主治吐血、衄血、便血、血崩等各種出血证；带下，泻痢，食积，咽喉口舌诸疮。

【用量】入丸散内服1～5克。外用适量。

【慎忌】阴虚火燥，咳嗽者慎服。

三 七(附：菊叶三七 景天三七)

出自《本草纲目》。为五加科多年生草本植物三七 *Panax notoginseng* (Burk.) F.H. Chen的根。主产于云南、广西等地。现已有许多省市引种栽培。采收栽培3年以上的植株。在8月上旬立秋前后10天结籽前采挖的为“春三七”，根饱满，质较好；在冬季11月种籽成熟后采挖的为“冬三七”，质较差。洗净泥土，剪下支根、须根及茎基，大小个分开，先曝晒至半干，边晒边搓，使其表皮光滑，体形圆整坚实，晒干。生用。

【别名】田七，田三七，三七参，参三七，山漆，金不换，昭参，田漆，血参，汉三七，滇七，旱三七，盘龙七，人参三七，滇七，猴三七。猴头三七。

【商品名】春三七：又名春七。为栽培3年以上植株，在8月上旬立秋前后10天结籽前采挖者。根饱满，品质优。

冬三七：又名冬七。为栽培3年以上植株，在冬季11月种籽成熟后采挖者。形瘦皱瘪，品质较次。

筋条三七：又名筋条七。为加工时剪下的粗支根。

剪口三七：又名剪口七。为加工时剪下的粗短根。

绒根三七：又名绒根七。为加工时剪下的细小支根及须根。

广三七：产于广西省。

田三七：产于广西田阳者。

狗头三七：个体肥大，质坚皮细，有皱纹横向隆起者。形似狗头，故名狗头三七。

以上均以个大、体重、质坚实、断面灰黑色、干燥、无裂隙者为佳。

【处方名】三七，田三七，田七，参三七，三七参，三七粉（洗净晒干后碾成的细粉）。

【注意】在药材商品市场上，西藏等少数地区把同属植物香丽假人参（竹节三七）*Panax pseudoginseng* Wall. var. *elegantior* (Burk.) Hoo & Tseng 和峨眉三七*P. pseudo-ginseng* Wall. var. *wangianus* (Sun) Hoo & Tseng 或羽叶三七 *P. pseudo-ginseng* Wall. var. *bipinnatifidus* (Seem.) Li 或竹节参*P. japonicum* C.A. Mey. 及其变种狭叶竹节参及大叶竹节参和羽叶竹节参 *P. bipinnatifidus* Seem. 以及大叶三七*P. major* (Burk.) Ting 的根茎作为“三七”使用，功效近似，但非正品。

景天三七和菊叶三七功效与三七差异较大，不宜混用。使用时应注意鉴别（详见附药景天三七及菊叶三七）。

【性味归经】甘、微苦，温。归肝、胃经。

【功效主治】化瘀止血，活血定痛。主治内外各种出血证；跌打损伤，瘀滞肿痛；冠心病心绞痛。

【用量】3~10克。研粉吞服每次1~1.5克。外用适量。

【禁忌】凡出血而见阴虚口干者，须配凉血药同用。

附：菊叶三七

菊叶三七为菊科多年生宿根草本植物菊叶三七*Gynura segetum*

(Lour.) Merr.的根及叶。又名菊三七、土三七、水三七、紫三七、血当归、血三七、血七、血格答、紫蓉三七、艾叶三七、艾三七、铁罗汉、血疙瘩、乌七、紫背三七、狗头三七等。性味甘、微苦，平。归肝、胃经。功能散瘀止血，解毒消肿。用于衄血、吐血、跌打伤痛、疮痈肿毒、乳痈等证；外敷治创伤出血。对痈肿亦可用鲜叶捣烂外敷。用量6～10克；粉剂（根）每次1.5～3克。外用适量。

附：景天三七

为景天科多年生肉质草本植物景天三七 *Sedum aizoon* L. 的根或全草。又名土三七、八仙草、蝎子草、血山草、吐血草、见血散、活血丹、长生景天、长生景天草、细叶费菜、生三七、广三七、小种三七、三百棒、墙头三七、根异名广三七等。性味甘、微酸，平。全草功能止血散瘀，养血安神。用于衄血、咯血、吐血、尿血、便血、崩漏、紫癜及心悸、失眠、烦躁、精神不安等证。其根功能止血，消肿，定痛。用于衄血、咯血、吐血及筋骨伤痛等证；外敷治创伤出血。全草用15～30克，鲜品加倍；根6～10克。外用适量。

茜 草

出自《神农本草经》。为茜草科多年生蔓生草本植物茜草 *Rubia cordifolia* L. 的根。南北各地均产。春秋两季均可采挖，去掉茎苗，洗净晒干，生用或炒用。

【别名】茹蕊，地苏木，活血丹，血见愁，过山龙，红龙须根，五爪龙，九龙根，小活血龙，小活血，小红根，红茜草，红茜根，红棵子根，四方红根，茜茹，满江红，沙茜秧根，小孩拳，娃娃拳，拉拉秧子根，土丹参，血茜草，茅蒐根，蒨草根，地血根，牛茜

根，红蓝根，染绯草根，染绛草根，西天王草根，四岳近阳草根，铁塔草根，风车草根，蒨藤根，五叶藤根，土茜苗根，八仙草根，金线草根，红线草根，红丝线根，锯子草根，屈据，离娄，漆头，四轮草根，穿骨草根，红髻巾根，麦珠子根，铁血藤根，活血草根，拉拉豆根，山龙草根，拈拈草根，涩涩草根，破血草根，大仙麻根，草本入骨丹，红根藤，鸭蛋藤根，染蛋草根，红内消根，红根草，拉拉藤根，牛人参，锯锯草根，粘蔓草根，粘草，大锯锯藤根，破血丹，小女儿红，挂拉豆，拉狗蛋，撚撚草根，茜根，捻捻草。

【商品名】茜草，茜草根。以根条粗长、表面红棕色、断面红黄色者为佳。

【处方名】茜草，茜草根，茜草炭。

处方中写茜草或茜草根指生茜草。为原药去杂质后，洗净润透，切片或切段，然后晒干入药者。

茜草炭为茜草片或段用武火炒至焦黑，存性，清水喷洒，然后晾干入药者。

【注意】在目前药材商品市场上，茜草的市售商品，除上述品种外，下列品种也作“茜草”入药，但非正品。

长叶茜草 *Rubia cordifolia* L. var. *logifolia* Hand.-Mazz. 使用于四川、贵州。

中华茜草 *R. chinensis* Regel et Maack 使用于四川及东北等地。

狭叶茜草 *R. truppeliana* Loes. 使用于山东地区。

黑果茜草(伏茜草) *R. cordifolia* L. var. *pratensis* Maxim. 使用于黑龙江、辽宁、甘肃等地。

肉叶茜草(小血藤) *R. cordifolia* L. var. *herbacea* Chun et How. mss. 使用于贵州等地。

四轮草 *R. cordifolia* L. var. *stenocephala* Franch. 使用于贵州等地。

大砧草 *R. chinensis* Regel 产于东北地区，当地作“茜草”使用。

大叶茜草 *R. leiocaulis* (Franch.) Diels 分布于云南、贵州，使用于云南曲靖地区。

林茜草 *R. sylvatica* Nakai 使用于吉林。

带褐茜草 *R. usitulata* Diels 使用于云南省昆明及丽江地区。

此外，同科植物蓬子菜（土茜草）*Galium verum* L. var. *asiaticum* Nakai 及麦仁珠 *G. tricorne* Stokes 的根，在江苏省某些地区误作“茜草”入药，应予以纠正。

【性味归经】苦，寒。归肝经。

【功效主治】凉血止血，活血祛瘀。主治血热所致的各种出血证，对于崩漏及月经过多作用尤佳；血滞经闭，跌打损伤及瘀滞作痛，痹证关节痛。

【用量】10~15克。

蒲 黄

出自《神农本草经》。为香蒲科水生草本植物狭叶香蒲 *Typha angustifolia* L. 或香蒲属其他植物的花粉。我国各地均产。以浙江、江苏、山东、安徽、湖北等地产量为多。5~6月花刚开放时，采收花序上的雄花，晒干碾压，筛取粉末，生用或炒用。

【别名】蒲花，蒲草黄，蒲厘花粉，蒲棒花粉，香蒲黄，水蜡烛蒲黄，蒙古香蒲黄，小香蒲黄，宽叶香蒲黄，水烛蒲黄，狭叶蒲黄，蒲棒粉，卜黄，长苞香蒲黄，达氏香蒲黄，细叶香蒲黄，中央粉，草蒲花。

【商品名】净蒲黄：又名蒲黄粉。为鲜黄色的细小花粉。

草蒲黄：为花粉与花丝的混合物。

以上均以粉细、体轻、纯净、色鲜黄、滑腻感强者为佳。

【处方名】蒲黄，卜黄，生蒲黄，炒蒲黄，蒲黄炭。

处方中写蒲黄、卜黄系指生蒲黄（生卜黄）。为原药除去杂质而入药者。生用破血。

炒蒲黄为生蒲黄用文火微炒而成。炒者活血。

蒲黄炭为生蒲黄炒至焦褐色，取出洒水灭尽火星，然后晒干入药者。炭用止血。

【性味归经】甘，平。归肝、心包经。

【功效主治】收敛止血，行血祛瘀。主治咯血、衄血、吐血、尿血、便血、崩漏及创伤出血等多种出血证；心腹疼痛，产后瘀痛，痛经；血淋，小便淋沥涩痛。

【用量】3～10克。外用适量。

【慎忌】孕妇忌服生蒲黄。

花蕊石

出自《嘉祐本草》。为矿石类含蛇纹石大理岩Ophicalcite之石块。产于江苏、浙江、陕西、山西、河南、山东等地。生用或煅用。

【别名】花乳石，白云石，花尔石。

【商品名】花蕊石。以块整匀、坚硬、有黄绿色斑纹者为佳。

【处方名】花蕊石，煅花蕊石。

处方中写花蕊石指生花蕊石。为原药洗净砸成小块入药者。

煅花蕊石为花蕊石用武火烧至红透，取出放凉，然后砸碎入药者。收敛作用增强。

【性味归经】酸、涩，平。归肝经。

【功效主治】止血，化瘀。主治咯血、吐血等内出血而兼有瘀滞者。外用可治创伤出血。

【用量】10～15克。研末冲服每次1～1.5克。外用适量。

艾叶

出自《名医别录》。为菊科多年生灌木状草本植物艾*Artemisia*

argyi Lévl. et Vant.的叶片。产于我国中部各省。春夏间花未开时采摘，晒干或阴干。生用或炒炭用。若连枝割下，晒干捣绒，名艾绒，供作艾条。

【别名】蕲艾，蕲艾叶，祁艾，艾，冰台，艾蒿，医草，灸草，黄草，家艾，甜艾，艾蓬，狼尾蒿，香艾，野蓬头，阿及艾，草蓬，肚里屏风。

【商品名】五月艾：为五月叶片肥盛尚未开花时采集者。品质较优。

陈艾叶：又名白艾。叶片背面呈灰白色，绒毛较多，香气浓郁，放置陈久者。习以为佳。

蕲艾：有的写作“祁艾”。为产于湖北蕲春者。为地道药材，品质最优。

北艾：为产于河南汤阴者。品质亦佳。

以上均以叶下面灰白色、绒毛多、香气浓、干燥、无杂质者为佳。

【处方名】艾叶，蕲艾，艾绒，醋艾叶，醋艾绒，艾炭，祁艾。

处方中写艾叶、蕲艾、祁艾指生艾叶、干艾叶。为原药去梗去杂质生用入药者。

艾绒为净艾叶及枝碾碎成绒者。

醋艾叶、醋艾绒又称醋炒艾叶或醋炒艾绒。为净艾叶或净艾绒用米醋拌匀，吸干后用文火炒至微焦而入药者。以增强温经散寒作用。

艾炭又称艾叶炭。为净艾叶用文火炒至焦褐色，取出喷洒浇水，灭尽火星，然后晒干入药者。既可温经散寒，又可收敛止血。

【注意】下列同属植物的叶，也作“艾叶”入药，但非正品，品质较次。

艾蒿 *Artemisia vulgaris* L.

野艾（细叶艾）*A. lavendulaefolia* DC.

黄花艾 *A. princeps* Pamp.

【性味归经】苦、辛，温。归肝、脾、肾经。

【功效主治】温经止血，散寒止痛。主治虚寒性出血证，对妇女崩漏下血尤为适宜；下焦虚寒引起的腹中冷痛，月经不调，经行腹痛，带下等；虚寒性咳嗽、痰多、喘息等。外用可治皮肤湿疹瘙痒。

【用量】3～10克。外用适量。

【禁忌】血热妄行引起的出血证不宜服。肺热咳喘及一切实热证忌服。

伏龙肝

出自《名医别录》。为烧杂柴草的土灶内底部中心的焦黄土块。

【别名】灶心土，釜下土，灶心黄土，灶中黄土，釜月下土，灶中土，釜月土。

【商品名】伏龙肝。以块大匀整、色红褐、断面细腻、质稍软者为佳。

【处方名】伏龙肝，灶心土。

【性味归经】辛，微湿。归脾、胃经。

【功效主治】温中止血，止呕，止泻。主治脾气虚寒，不能统血所致的吐血、衄血、便血、崩漏等出血证；中焦虚寒，胃失和降所致的呕吐及妊娠呕吐；脾虚久泻。

【用量】30～60克。袋装先煎。或用100～200克煎汤代水。

羊蹄(附：金不换)

出自《神农本草经》。为蓼科多年生草本植物羊蹄 *Rumex japonicus* Houtt. 和尼泊尔羊蹄 *R. nepalensis* Spr. 的根。全国大部

地区均产，生于山野、路旁或湿地。于8～9月挖取根部，洗净，晒干。切片入药。

【别名】羊蹄根，波叶大黄，野大黄，土大黄，牛舌头根，羊舌头根，野菠菜根，东方宿，连虫陆，鬼目，败毒菜根，羊蹄大黄，牛舌根，牛舌大黄，鸡脚大黄，蓬根，恶菜根，堇根，牛膝根，蓄根，秃菜根，秃叶根，天王叶根，牛舌菜根，水黄芹，牛舌片，野萝卜，野莙荙，大头黄，羊耳朵根，瓣草根，牛儿黄草根，牛儿大黄，尼泊尔羊蹄根，尼泊尔酸模根，尼泊尔羊蹄。

【商品名】羊蹄：又名羊蹄根。为植物羊蹄的根。

尼泊尔羊蹄：又名尼泊尔羊蹄根、尼泊尔酸模根、牛儿黄草根、牛儿大黄。为植物尼泊尔羊蹄的根。

以上均以根条粗长、干燥、匀整者为佳。

【处方名】羊蹄，羊蹄根。

【注意】目前在药材商品市场上，广西、广东及东北一些地区，把同科植物长刺酸模*R. maritimus* L.的根作“羊蹄”入药；云南省一些地区把同科植物齿果酸模*R. dentatus* L.的根作“羊蹄”入药；还有一些地区把同科植物皱叶酸模*R. crispus* L.的根作“羊蹄”入药。功效近似，但非正品。

【性味归经】苦、涩，寒。归心、肝、大肠经。

【功效主治】凉血止血，杀虫疗癣。主治衄血、咯血、便血、崩漏等多种出血证；疥癣；便秘；血小板减少性紫癜。

【用量】10～15克。外用适量。

附：金不换

金不换为蓼科多年生草本植物土大黄*Rumex madaio* Mak. 的根及鲜叶。别名土大黄、肺形草。性味苦辛凉。有清肺止血、解毒消肿之功效。主治肺热咳血。鲜叶捣烂外敷可散痈肿。用量4～10克。

这里应该引起注意的是：羊蹄和金不换的别名都叫土大黄；参三七、菊叶三七、景天三七和千金藤根的别名，有的地区也叫金不换，极易引起混淆，应注意区别。

藕 节

出自《药性论》。为睡莲科多年生水生草本植物莲 *Nelumbo nucifera* Gaertn. 的地下茎的节。秋冬季挖藕时，切下节部，洗净晒干。鲜用、生用或炒炭用。

【别名】藕节疤，南藕节，老藕节，光藕节，老节，斗节，雪藕节，干藕节，光旁节。

【商品名】南藕节：为产于湖北、浙江、安徽、江苏、福建、广东等南方各地者。又因本品多产于南方，故名。

老藕节：为冬季或春季采挖者。习以为佳。

雪藕节：为冬季采挖者。

藕节：各种藕节的统称。以个大、无泥沙者为佳。

【处方名】藕节，老藕节，鲜藕节，生藕节，藕节炭。

处方中写藕节、老藕节指生藕节，亦即干藕节。为藕节洗净晒干生用入药者。生用止血化瘀。

鲜藕节为藕节鲜品入药者。

藕节炭为干藕节用武火炒至焦黑，存性，然后喷洒清水，灭尽火星，取出晒干入药者。炒炭用收敛止血。

【性味归经】甘、涩，平。归肝、肺、胃经。

【功效主治】收敛止血。主治吐血、衄血等多种出血证。

【用量】15~30克。鲜品60克。

十二、活 血 祛 瘀 药

川 莪

出自《神农本草经》。为伞形科多年生草本植物川芎 *Ligusticum chuanxiong* Hort. 的根茎。为四川特产药材。主产于四川的灌县、崇庆、温江，此外云南、湖南、湖北、贵州、甘肃、陕西等省亦有出产，系人工栽培。五月下旬采挖，去茎叶，烘干，除去须根，用时润透切片。生用或酒炒、麸炒。

【别名】芎劳，九元蠚，山鞠芎，山鞠穷，胡莽，马衔芎劳，雀脑，雀脑芎，京芎，贯芎，抚芎，台芎，西芎，西川芎，小叶川芎，香果，芎穷，穹穷，云芎，坝芎，芎藶，营劳，鞠劳，江蓠，江离，芎藶，芎藶，蕲茝，蘚芜（苗族名）。

【商品名】京芎：为产于甘肃、陕西者。

云芎：为产于云南者。

抚芎：又名西抚芎、川抚芎、抚川芎。为产于江西者。

小抚芎：产于江西，抚芎中形体瘦小者。

川芎：又名川芎劳。为产于四川者。或指各类川芎的统称。

大芎：又名大川芎、正川芎、真川芎。产于四川，属川芎中个大肉多、油足气香者。为地道药材，品质最佳。

坝川芎：产于四川灌县者。产量大，品质好，销往全国，并供出口。

杜芎：产于四川省外的引种品。

山川芎：生长在山上者。或在山上育种，在山下栽培者。

以上均以个大、饱满、质坚、干燥、香气浓、油性大者为佳。

【处方名】川芎，西芎，西川芎，炒川芎，炙川芎，酒川芎，酒炒川芎。

处方中写川芎、西芎、西川芎指生川芎。为原药洗净切片晒干入药者。

炒川芎又名炙川芎。为生川芎片用文火微炒入药者。

酒川芎即酒炒川芎。为生川芎片用黄酒喷洒，待酒吸干，再用文火微炒，然后入药者。

【性味归经】辛，温。归肝，胆、心包经。

【功效主治】活血行气，祛风止痛。主治月经不调，痛经，闭经，难产，产后瘀滞腹痛，胁肋作痛，肢体麻木，跌打损伤，疮痈肿痛，头痛，风湿痹痛，冠心病心绞痛及缺血性脑血管病等。

【用量】3~10克。研末吞服每次1~1.5克。

【慎忌】阴虚火旺、舌红口干者不宜服用；出血性疾病及月经过多者不宜服用。

延胡索

出自《开宝本草》。为罂粟科多年生草本植物延胡索 *Corydalis tartschaninovii* Bess. f. *yanhusuo* Y. H. Chou et C. C. Hsu 的块茎。人工栽培，主产于浙江。亦有野生的。在立夏后采挖，除去苗叶和须根，洗净，分开大小，入沸水中烫煮约3分钟，见内外变黄时捞起晒干贮存。用时捣碎生用。或经醋制。

【别名】元胡，延胡，玄胡索，元胡索，玄胡，滴金卵。

【商品名】延胡索，元胡索，元胡。以个大、色黄、质坚、干燥、饱满、断面金黄发亮者为佳。

【处方名】延胡，元胡，玄胡，延胡索，醋元胡，酒元胡，盐炒元胡，制元胡等。

处方中写延胡、元胡、玄胡、延胡索均指生元胡。为原药材去杂质，捣碎或切片入药者。

醋元胡又名炙元胡。为元胡片用米醋淋酒闷透，再用文火炒至微黄入药者。

酒元胡为元胡片用黄酒淋酒闷透，再用文火微炒入药者。

盐炒元胡为元胡片用盐水喷淋，再炒至微焦，而后入药者。

制元胡为原药材用米醋或白矾水煮透，然后切片，晒干入药者。

【注意】延胡索的市售商品，除上述品种外，还有同属植物山延胡索（东北延胡索）*C. ambigua* Cham. et Schlecht. var *amurensis* Maxim.的块茎。在本草文献中最早提及的就是此种。另外还有迷延胡索*C. ambigua* Cham. et Schlecht.、齿瓣延胡索*C. remota* Fisch. ex Maxim.、粉绿延胡索*C. glaucescens* Regel和江苏产的苏延胡（土延胡）*C. hamosa* Migo的块茎，在一些地区也作“延胡索”入药，但功效较差。

【性味归经】辛、苦，温。归心、肝、脾经。

【功效主治】活血，行气，止痛。主治气血凝滞所致的心腹疼痛及肢体疼痛；冠心病心绞痛；心律失常；产后腹痛；胁痛。

【用量】6～10克。研末冲服每次1.5～3克。

【慎忌】无瘀滞者慎服。

郁 金

出自《新修本草》。为姜科多年生宿根草本植物郁金*Curcuma aromatica* Salisb.和莪术*Curcuma zedoaria* (Berg.) Rosc.或姜黄*Curcuma longa* L.或广西莪术*Curcuma kwangsiensis* S. Lee et C. F. Liang的块根。秋冬两季植株枯萎时采挖，摘取块根，除去须根，洗净泥土，入沸水中煮透，取出，晒干，切片用。

【别名】玉金，黄郁，马蓬，玉京，入金，乙金。

【商品名】黄郁金：又名黄丝郁金、广郁金。为植物姜黄的干燥块根。主产于四川。

黑郁金：又名温郁金、温益金、川郁金、川益金。为产于浙江温州的植物郁金的干燥块根。

白丝郁金：为植物郁金的干燥块根。外形较黄郁金瘦长，断面内心较黑郁金白。主产于四川。

绿丝郁金：为植物莪术的干燥块根。主产于四川、广西、广东。

桂郁金：又名莪苓。为植物毛莪术的干燥块根。主产于广西、云南。

以个大、肥壮、断面角质明亮者为佳。

【处方名】 郁金，玉金，广郁金，川郁金，醋郁金，酒郁金，制郁金等。

处方中写郁金、玉金、广郁金、川郁金均指生郁金。为原药材洗净晒干，打碎或润透切片入药者。

醋郁金为郁金片经醋蒸、醋炒、醋浸或醋煮等法炮制而入药者。

酒郁金为郁金片淋洒白酒润透，用文火炒至深黄色入药者。

炒郁金为郁金片用文火炒至深黄色入药者。

制郁金为郁金块根用白矾水煮透，切片晒干，微火炒至老黄色入药者。

【性味归经】 辛、苦，寒。归心、肝、胆经。

【功效主治】 活血止痛，行气解郁，凉血清心，利胆退黄。主治肝气瘀滞、血瘀内阻所致的胸腹胁肋胀痛，月经不调，痛经，癰瘕痞块；湿温病浊邪蒙蔽清窍所致的神志不清，胸脘痞闷；痰气壅阻所致的癫痫及癫狂；肝郁化热、迫血妄行所致的吐血、衄血、尿血及妇女经脉逆行兼有瘀滞者。

【用量】 6～12克。

【慎忌】 无瘀滞者忌服。畏丁香。不宜与丁香配伍。

姜 黄

出自《新修本草》。为姜科多年生宿根草本植物姜黄 *Curcuma longa* L. 的根茎。主产于四川、福建、台湾、江西、云南等地。秋冬两季采挖，洗净泥土，用水煮或蒸熟至透心为度，晒干。除去须根及外皮。切片生用。

【别名】 黄姜，毛姜黄，宝鼎香。

【商品名】 姜黄：又名色姜黄、广姜黄。为植物姜黄的根茎。主产于四川、福建。

蝉肚姜黄：为植物姜黄的主根茎。呈卵圆形或长圆形，表面鲜黄色，多皱缩，有环节，形状如蝉，故名蝉肚姜黄。

长条姜黄：为植物姜黄的侧生根。呈圆柱形或略扁，稍有弯曲，呈长条状，故名长条姜黄。

片姜黄：又名片子姜黄。为植物郁金 *Curcuma aromatica* Salisb. 的干燥根茎。主产于浙江。

以上以体形长圆、质坚实、断面橙黄色者为佳。

【处方名】 姜黄，片姜黄。

【性味归经】 辛、苦，温。归肝、脾经。

【功效主治】 破血行气，通经止痛。主治气滞血瘀所致的胸胁疼痛，经闭腹痛；风湿臂痛。外用治疗痈疮疖肿初起，红肿热痛。

【用量】 5～10克。外用适量。

莪 术

出自《药性论》。为姜科多年生草本植物莪术 *Curcuma zedoaria* (Berg.) Rosc. 和郁金 *C. aromatica* Salisb. 或广西莪术 *C. kwangsiensis* S. Lee et C. F. Liang 的根茎。主产于广西、四川、浙江、江西、广东、福建、云南等地。秋冬两季均可采挖。去净泥

土，蒸或煮至透心，干燥后除去须根及杂质。切片生用或醋制用。

【别名】蓬莪术，文术，蓬莪茂（音述）、蓬莪连，莲药，广莪，蓬术，莪连，蓬连，羌七，广术，黑心姜，山姜黄，绿黄，芋儿七，臭屎姜，蓬莪。

【商品名】蓬莪术；又名莪术、文术。为植物莪术和郁金的根茎。主产于四川。

桂莪术：又名广西莪术。为植物广西莪术的根茎。主产于广西等地。

温莪术：为同属植物温郁金 *Curcuma wenchowensis* Y. H. Chen 的根茎，蒸熟或煮熟，晒干入药者。主产于浙江。

以上均以个大均匀、干燥、质坚实、光滑、香气浓者为佳。

【处方名】莪术，文术，蓬莪术，炒莪术，醋莪术。

处方中写莪术、文术、蓬莪术均指生莪术。为原药材除去杂质，润透切片，晒干入药者。

炒莪术为莪术片用文火微炒入药者。

醋莪术又称醋炒莪术。为莪术片用米醋淋洒，稍闷，吸干，再用文火炒至深黄色，略见焦斑，然后入药者。增强止痛作用。

【性味归经】辛、苦，温。归肝、脾经。

【功效主治】破血祛瘀，行气止痛。主治气滞血瘀所致的经闭腹痛及癥瘕积聚；饮食不节，脾运失常所致的积滞不化，脘腹胀满疼痛。

【用量】 3~10克。

【慎忌】 孕妇及月经过多者忌服。体虚者忌服。

三 棱

出自《本草拾遗》。为黑三棱科植物黑三棱 *Sparganium stoloniferum* Buch.-Ham.的块茎。产于江苏、河南、山东、江西、安徽等地。冬春两季采挖，除去茎苗及须根，洗净泥土，削去外皮，

晒干。润透切片，生用或醋炒用。

【别名】京三棱，黑三棱，荆三棱，光三棱，蓼根，红蒲根，泡三棱，三棱草根，蓼草根，山棱，山林，草三棱，削尖都尉。

【商品名】荆三棱：又名京三棱、去皮三棱。为植物黑三棱的块根。主产于安徽、河南、江苏、山东、江西等地。

黑三棱：又名带皮三棱。为莎草科植物荆三棱 *Scirpus flavidus* (Torr.) A. Gray 的块根。

以上二者商品名称与其原植物恰好相反。

理三棱：产于云南大理地区的荆三棱。

以上均以质坚、体重、干燥、去净外皮、表面黄白色者为佳。

【处方名】三棱，京三棱，醋三棱。

处方中写三棱、京三棱均指生三棱。为原药材润透切片入药者。

醋三棱又名醋炒三棱。为三棱片用醋拌匀，稍闷吸干，用文火炒至黄色入药者。增强止痛作用。

【注意】在药材商品市场上，三棱除上述品种外，尚有黑三棱科植物小黑三棱 *S. simplex* Huds. 和细叶黑三棱 *S. stenophyllum* Maxim. 的块根，在有些地区也作三棱入药，功效近似，但非正品。

【性味归经】苦，平。归肝、脾经。

【功效主治】破血祛瘀，行气止痛。主治气滞血瘀所致的经闭腹痛及癥瘕积聚；食积气滞，脘腹胀痛。

【用量】3～10克。

【禁忌】孕妇及月经过多者忌服。

丹参

出自《神农本草经》。为唇形科多年生草本植物丹参 *Salvia miltiorrhiza* Bge. 的根。全国大部分地区均有出产。主产于河北、

安徽、江苏、四川等地。秋季采挖，除去茎叶，洗净泥土，润透切片，晒干。生用或酒炒用。

【别名】赤参，山参，紫丹参，红根，红暖药，紫党参，红参，血参，血参根，血丹参，红丹参，血生根，血山根，木羊乳，逐马，山红萝卜，活血根，靠山红，烧酒壶根，野苏子根，山苏子根，大红袍，蜜罐头，蜂糖罐，朵朵花根，鄰蝉草根，却蝉草根，郤蝉草根，奔马草根，长鼠尾草根，水羊草根。

【商品名】丹参。以根条粗壮、干燥、色紫红、无芦头及须根者为佳。

【处方名】丹参，赤参，紫丹参，炒丹参，酒丹参，醋丹参，丹参炭，鳖血丹参等。

处方中写丹参、赤参、紫丹参均指生丹参。为原药润透切片入药者。

炒丹参为丹参片用文火炒至深黄色，略见焦斑，取出摊晾，而后入药者。

酒丹参又名酒炒丹参。为丹参片用黄酒淋洒，闷透，文火微炒入药者。增强活血之功。

醋丹参又名醋炒丹参。为丹参片用米醋淋洒，微闷，文火微炒入药者。增强止痛之功。

丹参炭为丹参片用武火炒至焦黑，存性，清水灭尽火星，取出晾干，然后入药者。偏于止血。

鳖血丹参又名鳖血拌丹参。为丹参片用适量鳖血拌匀，晾干后入药者。偏于养血。

【注意】在目前药材商品市场上，尚有以下几种植物的根，也作“丹参”入药，但非正品。

甘肃丹参 *Salvia przewalskii* Maxim. 的根。使用于甘肃、宁夏、青海、西藏、云南等地。

褐毛丹参 *S. przewalskii* Maxim. var. *mandarinorum* (Diels) Stib. 的根。使用于甘肃、宁夏、青海、云南。

滇丹参(云南丹参、石山丹参、红青菜) *S. yunnanensis* C. H. Wright 的根。使用于云南地区。

土丹参(地鼠尾) *S. kiaometiensis* Lévl. f. *pubescens* Stib. 使用于四川。

白花丹参 *S. miltiorrhiza* Bunge var. *alba* C. Y. Wu, et H. W. Li. MSS. 使用于山东。

白背丹参 *S. digitaloides* Diels 使用于云南。

三对叶丹参 *S. trijuga* Diels 使用于云南。

小丹参 *S. plectranthoides* Griff. 使用于云南。

南丹参 *S. bowleyana* Dunn 使用于浙江、福建、江西、湖南、广东、广西的某些地区。

【性味归经】苦，微寒。归心、心包、肝经。

【功效主治】活血祛瘀，凉血消痈，养血安神。主治月经不调，血滞经闭，产后瘀滞腹痛。心腹疼痛，瘀瘕积聚，肢体疼痛，痈肿疮疡；温热病热入营血所致的高热、谵语、烦躁不寐，或斑疹隐隐、舌红绛等；失眠及心悸怔忡；肝脾肿大，冠心病。

【用量】10~30克。

【禁忌】反藜芦。

刘寄奴

出自《新修本草》。为菊科多年生草本植物奇蒿 *Artemisia anomala* S. Moore 的全草。秋季 8~9 月采割，晒干入药。

【别名】寄奴，化食丹，金寄奴，刘寄奴草，乌藤菜，六月雪，六月霜，一枝梅，九里光，白花尾，炭包包，千粒米，斑枣子，九牛草，苦连婆，细白花草，奇蒿。

【商品名】南刘寄奴：又名化食丹。为菊科植物奇蒿的全草。生产于江苏、浙江、江西等地。主销于江苏南部、浙江、江西、福建及上海地区。为刘寄奴正品。以枝叶整齐、干燥、带有花果者为

佳。

北刘寄奴：为玄参科植物阴行草（茶叶棵子、铁杆茵陈、铃茵陈、灵茵陈、葛茵陈、金钟茵陈、土茵陈草、角因陈、罐儿茶、鬼芝麻）*Siphonostegia chinensis* Benth. 的带果全草。主产于河北、山东、河南、吉林、黑龙江等地。为刘寄奴副品。功效与南刘寄奴不同。以枝叶整齐、干燥、带有果实者为佳。

【处方名】刘寄奴，寄奴。

【注意】目前在药材商品市场上，刘寄奴市售商品除上述品种外，四川还把菊科植物狭叶艾（红陈艾、芦蒿）*Artemisia Selengensis* Turcz. 的全草作“刘寄奴”使用；湖南把金丝桃科植物元宝草*Hypericum sampsonii* Hance 的地上全草作“刘寄奴”使用；湖北把金丝桃科植物湖南连翘（红旱莲）*H. ascyrion* L. 的地上全草作“刘寄奴”使用。

以上品种均非刘寄奴正品。

【性味归经】苦，温。归心、脾经。

【功效主治】破血通经，散瘀止痛。主治血滞经闭，产后瘀阻腹痛，折跌损伤，创伤出血，食积不化，脘腹胀痛，肠痈初起，妇女盆腔炎，一切热盛肿毒。

【用量】10~30克。外用适量。

【慎忌】孕妇忌服。

泽 兰

出自《神农本草经》。为唇形科多年生草本植物地瓜儿苗 *Lycopus lucidus* Turcz. 或毛叶地瓜儿苗 *Lycopus lucidus* Turcz. var. *hirtus* Regel. 的全草。我国各地都有分布。夏季茎叶生长茂盛时割取地上部分，晒干。切碎生用。

【别名】地瓜儿苗，毛叶地瓜儿苗，香芦子，虎兰，虎蒲，龙葵，风药，地笋，毛叶地笋，小泽兰，红梗草，奶孩儿，孩儿菊，

蛇王草，蛇王菊，地环秧，地溜秧，甘露秧，甘露子，草泽兰，香泽兰，泽兰叶，方梗泽兰，捕斗蛇草，接古草，水香，提娄。

【商品名】泽兰。以茎短、叶多、质嫩、色灰绿、干燥、完整不碎者为佳。

【处方名】泽兰，泽兰叶，香泽兰。

【注意】在目前药材商品市场上，泽兰品种非常混乱。除上述品种外，下列同属植物在少数地区也作“泽兰”使用，但非正品。

台湾地瓜儿苗 *L. lucidus* Turcz. var. *taiwanensis* Hayata 使用于山东一些地区。

小花地瓜儿苗 *L. parviflorus* Maxim. 使用于吉林一些地区。

秧叶地瓜儿苗 *L. maackianus* (Maxim.) Mak. 使用于吉林一些地区。

朝鲜地瓜儿苗 *L. coreanus* Lévl. 使用于吉林一些地区。

欧地瓜儿苗(羽裂地瓜儿苗、羽裂地笋、欧地笋) *L. europaeus* L. 使用于新疆一些地区。

除此之外，长江以南一些地区还把菊科泽兰属植物华泽兰 *Eupatorium chinense* L.、山兰 *E. japonicum* Thunb.、兰草(佩兰) *E. fortunei* Turcz. 等的全草作“泽兰”使用。此为混用，应该纠正。

泽兰与佩兰(兰草)混用自古有之，自李时珍《本草纲目》才将二者区分开来。但至今在个别地区仍有混用现象，应予以纠正。

【性味归经】苦、辛，微温。归肝、脾经。

【功效主治】活血祛瘀，行水消肿。主治血滞经闭，经行腹痛，月经不调，腹中包块，产后瘀滞腹痛，跌打损伤，胸胁疼痛，痈肿，产后小便不利，身面浮肿。

【用法】10~15克。外用适量。

【禁忌】孕妇慎服。

虎 杖

出自《名医别录》。为蓼科多年生草本植物虎杖 *Polygonum cuspidatum* Sieb. et Zucc. 的根茎和根。我国大部分地区均产。春、秋二季采挖，除去须根，洗净，趁鲜切片，晒干。

【别名】藜，苦杖，酸杖，斑杖，斑杖根，斑根，大虫杖，酸桶笋，斑庄根，鸟不踏，酸杆，酸石榴根，土地榆，酸通，酸秆，雄黄连，蛇总管，大活血，血藤，紫金龙，酸汤秆，黄地榆，号筒草，斑龙紫，野黄连，活血丹，活血龙，红贯脚，阴阳莲，猴竹根，金锁王，大叶蛇总管，九龙根，山茄子，斑草，搬倒甑，花斑竹，酸筒秆，酸汤梗，川金龙，铜筋铁骨草，川筋龙，舒筋龙，刚牙根，刚连根，九龙根，活血连。

【商品名】虎杖。以粗大、干燥、无须根、无泥土及杂质者为佳。

【处方名】虎杖，酒虎杖，酒炒虎杖。

处方中写虎杖指生虎杖。为原药材切片晒干入药者。

酒虎杖又名酒炒虎杖。为虎杖片淋洒黄酒，闷透，用文火微炒入药者。

【性味归经】苦，寒。归肝、胆、肺经。

【功效主治】活血定痛，清热利湿，化痰止咳，解毒。主治经闭，风湿痹痛，跌打损伤，湿热黄疸，淋浊带下，肺热咳嗽，热结便秘，胆石症，尿路结石，烧烫伤，蛇咬伤，疮痈肿毒。

【用量】10~30克。外用适量。

【慎忌】孕妇忌服。

铁 树 叶

出自《药性考》。为龙舌兰科植物朱蕉 *Cordyline fruticosa*

(L.) A. Cheval.的叶。分布于广东、海南、广西等地。全年可采，鲜用或晒干生用。

【别名】朱蕉叶，朱竹叶，铁连草，红叶铁树叶，红铁树叶，红叶。

【商品名】铁树叶，朱蕉叶。以叶大质嫩、色绿、完整者为佳。

【处方名】铁树叶，铁连草，鲜铁树叶。

【性味归经】甘、淡，凉。归肝、胃、大肠经。

【功效主治】清热，止血，散瘀。主治痢疾，胃痛，咯血，吐血，衄血，便血，月经过多，痔疮出血，肝炎，跌打肿痛。

【用量】15~30克。鲜品加倍。

益母草(附：茺蔚子)

出自《神农本草经》。为唇形科1年生或2年生草本植物益母草 *Leonurus heterophyllus* Sweet的全草。我国各地都有分布。通常在5~6月间花期采收，割取全草，晒干。生用或熬膏用。

【别名】坤草，茺蔚，茺蔚草，蕹，蕹菜，蕹菜，蕹菜，蕹佳，益母，益明，大札，臭秽，臭草，贞蔚，苦低草，郁臭草，土质汗，臭草天麻，野天麻，火杖，负担，辣母藤，郁臭苗，猪麻，益母艾，扒骨风，红花艾，枯草，苦草，田芝麻棵，小暑草，益母蒿，陀螺艾，地落艾，红花益母草，四棱草，月母草，旋风草，油耙菜，野油麻，夏枯草，藤，薹菜，三角胡麻，四棱子棵，蕹间，溪麻，益母夏枯，红梗玉米青。

【商品名】益母草：为5~6月开花期间采收者。以枝叶肥壮、色灰绿、带有紫红色花者为佳。

童子益母草：为3~4月间未开花前采收的幼株。

【处方名】益母草，坤草，制益母草，酒益母草。

处方中写益母草、坤草均指生益母草。为原药材晒干切段入药者。

制益母草为益母草切段后拌入酒、醋、盐、生姜等，然后蒸透入药者。

酒益母草为益母草切段后，用黄酒淋洒，闷透，用文火微炒（或蒸），然后入药者。

【注意】在药材商品市场上，下列同属植物也作“益母草”入药，但非正品。

白花益母草 *L. heterophyllus* Sweet. f. *leucanthus* C. Y. Wu. et H. W. Li 产于江苏、福建、广东、广西、贵州、云南、四川等地。

大花益母草（细叶益母草）*L. sibiricus* L. 产于内蒙古、河北、山西、陕西等地。

土耳其益母草 *L. turkestanicus* V. krecz. et kuprian. 产于新疆。

另外，本品别名夏枯草，名称易与唇形科植物夏枯草 *Prunella vulgaris* L.混淆。应注意区别。并禁止使用这一别名，以免弄错。

【性味归经】辛、苦，微寒。归心、肝、膀胱经。

【功效主治】活血祛瘀，利尿消肿。主治妇女血脉阻滞之月经不调，经行不畅，小腹胀痛，经闭，产后瘀阻腹痛，恶露不尽，跌打损伤所致之瘀血作痛；小便不利，水肿；冠心病；疮痈肿毒，皮肤痒疹。

【用量】10~15克。外用适量。

【慎忌】无瘀血阻滞者忌服。孕妇忌服。

附：茺蔚子

茺蔚子为益母草的果实。又名小胡麻、三角胡麻、三角子、益母草子、益母子、苦草子、茺玉子、冲玉子、野黄麻、六角天麻、坤草子、充蔚子。以粒籽饱满、色棕褐、干燥无杂质者为佳。味甘性微寒。活血调经之功与益母草相似，又能凉肝明目，适用于肝热

头痛、目赤肿痛等证，常与青葙子、决明子等同用，若与枸杞子、生地等滋补肝肾之品配伍，还可用治目昏暗而有翳膜者。用量5～10克。瞳孔散大、血虚无瘀者慎用。

凤仙草

出自《救荒本草》。为凤仙花科植物凤仙*Impatiens balsamina* L. 的全草。我国各地均有栽植。夏、秋采收，洗净晒干，切段生用。

【别名】凤仙，小桃红，夹竹桃，染指甲草，水指甲，指甲草，海蒴，旱珍珠，透骨草，透骨白，透骨红，小粉团，满堂红，指甲桃棵。

【商品名】凤仙草，凤仙。以枝叶肥壮、带有花朵者为佳。

【处方名】凤仙草，凤仙。

【注意】在药材商品市场上，本品在许多地区作“透骨草”使用。

【性味归经】辛、苦，温。归肝经。

【功效主治】祛风，活血，消肿，止痛。主治风湿性关节炎，跌打损伤，痛疽瘰疬，疔疮，经闭，下死胎。

【用量】10～15克。鲜品加倍。外用适量。

【禁忌】孕妇忌服。身体虚弱者慎服。

凤仙花

为凤仙花科植物凤仙的花。夏季开花期间采摘盛开的花朵，晾干入药。来源同凤仙草。

【别名】金凤花，灯盏花，好女儿花，指甲花，海莲花，指甲桃花，金童花，竹盏花，小桃红花，夹竹桃花，染指甲草花，水指甲花，指甲草花，海蒴花，旱珍珠花，满堂红花，凤仙草花，透骨

白花，透骨红花，菊婢，羽容，季季草。

【商品名】凤仙花。以花朵大、色鲜艳、干燥无杂质者为佳。

【处方名】凤仙花，指甲桃花。

【注意】在药材商品市场上，产于西藏、云南等地的同属植物锐齿凤仙花*I. arguta* Hook. f. et Thoms.的花，在西藏地区充当凤仙花入药，此非正品。

【性味归经】甘、微苦，温。归肝经。

【功效主治】祛风，活血，消肿，止痛。主治风湿性关节炎，经闭，跌打损伤，瘀血肿痛，痈疖疔疮，蛇咬伤，手癣，产后瘀血未尽，鹅掌风，灰指甲，下死胎。

【用量】1.5~3克。鲜品3~6克。外用适量。

【禁忌】孕妇忌服。

急 性 子

为凤仙科植物凤仙的成熟种子。秋季果实成熟后采收，除去果皮及杂质，晒干。来源同凤仙草。

【别名】凤仙子，凤仙花子，凤仙草子，金凤花子，灯盏花子，指甲花子，指甲桃子，竹盏花子，金童花子，小桃红子，夹竹桃子，染指甲草子，染指甲花子，水指甲花子，指甲草子，海藻子，旱珍珠子，满堂红子，透骨草子。

【商品名】急性子，凤仙子，凤仙花子。以籽粒饱满、干燥、无杂质者为佳。

【处方名】急性子，风仙子。

【性味归经】苦、辛，温。有小毒。归肝经。

【功效主治】破血，消积，软坚。主治经闭，积块，噎膈，难产，骨鲠不下，坚硬肿块。

【用量】煎汤或入丸散内服3~6克。外用适量。

【禁忌】孕妇忌服。内无积瘀者慎服。

仙 桃 草

出自《本草纲目拾遗》。为玄参科植物仙桃草 *Veronica peregrina* L. 的带虫瘿的全草。主产于安徽、江苏、浙江、江西等地。春、夏之间采收，洗净，蒸过晒干，切段入药。

【别名】接骨仙桃，接骨仙桃草，八卦仙桃，八卦仙桃草，蟠桃草，英桃草，夺命丹，活血丹，活血接骨丹，接骨草，无风自动草，小头红，蚊母草，本地老鸦草，蚁公草。

【商品名】接骨仙桃，接骨仙桃草，仙桃草。以枝叶肥嫩、干燥、带有虫瘿者为佳。

【处方名】接骨仙桃，接骨仙桃草，仙桃草，蚊母草。

【性味归经】辛，凉。入肺经。

【功效主治】活血，止血，清肺热，和肝胃，消肿止痛。主治吐血，衄血，咯血，便血，咽喉肿痛，肝胃气痛，痴痛，痛经。外用治疗跌打损伤，瘀血肿痛，骨折。

【用量】煎汤内服10~15克。鲜品加倍。外用适量。

荭 草 花

出自《本草纲目》。为蓼科植物红蓼 *Polygonum orientale* L. 的花序。

【别名】水红花，水荭花，红蓼花，荭蓼花，红草花，天蓼花，大蓼花，大毛蓼花，东方蓼花，八字蓼花，辣蓼花，家蓼花，游龙花，茺蔚花，鸿醣花，石龙花，茺蔚花，九节龙花，大接骨花，果麻花，追风草花，捣花，丹药头花，狗尾巴花，狼尾巴花。

【商品名】荭草花，红草花，大蓼花，红蓼花。以花序大、色鲜艳、干燥无杂质者为佳。

【处方名】荭草花，红草花，红蓼花，水红花。

【性味归经】甘、微苦，微寒。归肝、胃、大肠经。

【功效主治】散血，消积，止痛。主治胃气痛，痢疾，痞块，横痃。

【用量】3～6克。鲜品加倍。外用适量。

水 红 花 子

为蓼科植物红蓼 *Polygonum orientale* L. 的果实。

【别名】水荭花子，水红子，红蓼子，荭蓼子，荭草子，红草子，大蓼子，天蓼子，东方蓼子，狗尾巴花子，狼尾巴花子，大毛蓼子，八字蓼子，辣蓼子，家蓼子，游龙子，茏古子，鸿蕡子，石龙子，茺蔚子，九节龙子，大接骨子，果麻子，追风草子，捣花子，丹药头子。

【商品名】水红花子，红蓼子，荭蓼子，红草子，荭草子，大蓼子，天蓼子。以粒大饱满、干燥、无杂质者为佳。

【处方名】水红花子，水红子，红草子，荭草子，红蓼子等。

【性味归经】咸，凉。归胃、脾经。

【功效主治】活血，消积，止痛，利尿。主治胃痛，腹胀，脾肿大，肝硬化腹水，颈淋巴结核。

【用量】3～6克。

桃 仁

出自《神农本草经》。为蔷薇科落叶小乔木桃 *Prunus persica* (Linn.) Batsch. 或山桃 *Prunus davidiana* (Carr.) Franch. 的种仁。全国大部分地区均产，主产于四川、陕西、河北、山东、贵州等地。7～9月摘下成熟果实，除去果肉，击破果核，取出种子，晒干。除去种皮，生用或炒用。

【别名】脱桃仁，大桃仁，山桃仁，桃核仁，单桃仁，毛桃仁，

白桃仁，红桃仁，櫟桃仁，山毛桃仁，野桃仁，花桃仁，桃实。

【商品名】 桃仁：为植物桃的核仁。

山桃仁：为植物山桃的核仁。

兰溪桃仁：为浙江兰溪地区所产的桃仁。质佳。

苏北桃仁：为江苏北部地区所产的桃仁。质稍次。

光桃仁：为桃仁用清水浸泡，去皮晒干者。

以干燥、大小均匀、饱满不碎者为佳。

【处方名】 桃仁，山桃仁，熟桃仁，炒桃仁，炙桃仁，蜜桃仁，桃仁霜，桃仁泥。

处方中写桃仁、山桃仁均指生桃仁。为光桃仁生用入药者。

桃仁泥又名破桃仁。为生桃仁捣泥入药者。

熟桃仁为桃仁在沸水中烫20分钟后取出，晾干入药者。

炒桃仁为桃仁用文火炒至黄色，略见焦斑，然后入药者。

炙桃仁为桃仁用甘草水浸泡，略煮，去皮晾干，然后入药者。

蜜桃仁为光桃仁蜜炙后入药者。

桃仁霜为光桃仁榨去油，研细过筛成为细末，然后入药者。

【注意】 同属植物藏桃 *P. mira* Koehne 的种子在西藏地区作桃仁入药，功效相近，可以通用。

【性味归经】 苦，平。归心、肝、肺、大肠经。

【功效主治】 活血祛瘀，润肠通便。主治痛经，血滞经闭，产后瘀滞腹痛，癥瘕，跌打损伤，瘀阻疼痛，肺痈，肠痈，肠燥便秘。

【用量】 6～10克。

【禁忌】 月经过多者慎服；孕妇忌服。

红 花

出自《开宝本草》。为菊科2年生草本植物红花 *Carthamus tinctorius* L. 的筒状花冠。产于河南、湖北、四川、云南、浙江等地，均为栽培。夏季开花，当花色由黄转为鲜红时采摘，阴干。生

用。

【别名】红蓝花，刺红花，草红花，黄蓝花，红花毛，大红花。

【商品名】杜红花：产于浙江宁波者。质佳。

怀红花：又名淮红花。产于河南温县、沁阳、武陟、孟县一带（旧时怀庆府）者。质亦佳。

散红花：产于河南商丘一带者。质亦佳。

大散红花：产于山东者。

川红花：产于四川者。

南红花：产于我国南方者（一说指产于四川南充者）。

西红花：产于陕西者。

云红花：产于云南者。

以上均以花色红黄、鲜艳、干燥、质柔软者为佳。

红花饼：又名片红花。为红花趁鲜捣泥，摊成薄片状，晒干入药者。

【处方名】红花，杜红花，炒红花，醋红花。

处方中写红花、杜红花指生红花。为原药去杂质生用入药者。

炒红花为红花用文火微炒入药者。

醋红花为红花用米醋拌炒入药者。

【注意】红花与番红花均有“西红花”之别名，极易混淆，应注意鉴别。

【性味归经】辛，温。归心、肝经。

【功效主治】活血祛瘀，通经。主治血瘀痛经，经闭，产后瘀滞腹痛，癥瘕积聚，跌打损伤瘀血疼痛，关节疼痛，热郁血滞所致之斑疹色暗；冠心病心绞痛；血栓闭塞性脉管炎。

【用量】3～10克。

【慎忌】孕妇忌服。

番 红 花

出自《本草纲目拾遗》。为鸢尾科多年生草本植物番红花（藏红花）*Crocus sativus* L.的干燥花柱头。产于欧洲及中亚地区，以往多自印度、伊朗经西藏或香港输入，现在我国已有生产。

【别名】西藏红花，藏红花，西红花，撒法即，泊夫兰花，撒馥兰花。

【商品名】湿番红花：又名湿藏红花、湿红花。采收花柱头后，用白蜜加工成油润光亮的药材，即为湿番红花。

干番红花：又名干藏红花、干红花。采收花柱头后，用微火烘干，即为干番红花。

以上以花柱少、柱头暗红色或黄色、无杂质者为佳。

【处方名】番红花，藏红花。

【性味归经】甘，寒。归心、肝经。

【功效主治】活血祛瘀，通经，凉血解毒。主治温病热入血分引起的发斑证，斑疹大热，疹色不红活；肺炎，喉炎，扁桃体炎，菌痢；经闭，痛经，产后瘀血作痛，跌打损伤等证。

【用量】1.5~3克。

【禁忌】无瘀滞者及孕妇忌用。

月 季 花

出自《本草纲目》。为蔷薇科常绿或半常绿灌木月季*Rosa chinensis* Jacq. 的花蕾或初开放的花。产于河南、江苏、山东、山西、湖北、河北、四川、贵州，全国各地大多有栽培。6~7月择晴天采收花蕾，及时铺开，阴干或用文火烘干。

【别名】月月红，四季花，胜春，斗雪红，月贵红，月贵花，月记，月月开，长春花，月月花，艳雪红，绣春花，月季红，勒泡，

月光花，铜锤子，四季春，瘦容。

【商品名】月季花。以花蕾或初开花朵完整、干燥、色鲜艳、气清香者为佳。

【处方名】月季，月季花，月月红，四季花。

【性味归经】甘，温。归肝经。

【功效主治】活血调经，消肿。主治肝郁经阻所致的经行不畅，胸腹胀痛，经闭，癰疬等。

【用量】3～6克。鲜品6～15克。

【慎忌】孕妇慎服。多服久服则引起便溏腹泻。

凌霄花

出自《神农本草经》。为紫葳科多年生蔓性落叶木本植物凌霄 *Campsis grandiflora* (Thunb.) K. Schum. 的花。各省均有分布，以江苏产量为最多。花期采集。阴干或晒干入药。

【别名】紫葳，紫葳花，紫葳凌霄花，陵时花，苕之华，苕华，茈葳花，苕，苕华，女葳，白华苕，蓬麦花，黄华粟，藤罗花，吊墙花，堕胎花，菱华，武威花，瞿陵花，陵居腹花，鬼目花，陵苕花，陵苕花，藤萝草花，追罗花，倒挂金钟，上树蜈蚣，碎骨风，五爪龙花，红花倒水莲，上树龙花，白狗肠花，杜灵霄花，杜灵肖花，杜凌霄花。

【商品名】凌霄花，紫葳。以花朵完整、干燥、色棕黄、无杂质者为佳。

【处方名】紫葳，凌霄花。

【注意】目前药材市场上凌霄花品种有三种，除上述品种外，还有：

紫葳科植物硬骨凌霄 *C. radicans* (L.) Seem. 的花，与上述品种同等入药。

玄参科泡桐属植物锈毛泡桐 *Paulownia tomentosa* (Thunb.)

Steud.的花。此花形态、功效均与凌霄花不同，不能混用。凡混用的地方均应纠正。

【性味归经】辛，微寒。归肝、心包经。

【功效主治】活血破瘀，凉血祛风。主治血滞经闭，癥瘕，血热生风所致之周身瘙痒，皮肤湿疹等。

【用量】3～10克。外用适量。

【慎忌】孕妇忌服。

牛 膝

出自《神农本草经》。常用的有怀牛膝和川牛膝。怀牛膝为苋科多年生草本植物牛膝 *Achyranthes bidentata* Blume 的根；川牛膝包括苋科多年生草本植物头序杯苋（麻牛膝）*Cyathula capitata* (Wall.) Moq. 及川牛膝（甜牛膝）*C. officinalis* Kuan 的根。冬季苗枯时挖根，干燥或经硫磺熏后保存。切片生用或酒炒用。

【别名】牛夕，白牛膝，龙牛膝，拐牛膝，天全牛膝，百倍，鸡胶骨，牛髁膝（夕），山苋菜，山苋，头序怀苋，对节草，怀牛膝（又名怀牛夕、怀膝、怀夕、淮牛膝、淮牛夕、淮膝、淮夕），川牛膝（又名川牛夕、川膝、川夕、拐膝、拐夕、肉牛膝、甜牛膝、大牛膝），麻牛膝，牛茎，牛躄，通天柱杖。

【商品名】怀牛膝：为苋科植物牛膝的根。主产于河南省温县、武陟、博爱、沁阳、辉县（旧时怀庆府）。历史悠久，为地道药材，品质优良。以根条长、皮细、干燥、色黄白、味甘者为佳。

川牛膝：为苋科植物麻牛膝和甜牛膝的根。主产于四川、云南、贵州。以根条粗壮、分枝少、质柔韧、断面色浅黄者为佳。

天全牛膝：产于四川省天全地区的川牛膝。品质最优。

【处方名】牛膝，牛夕，牛七，怀牛夕，怀牛膝，淮膝，怀夕，川牛膝，酒牛膝（夕），盐牛膝（夕）。

处方中写牛膝、牛夕、牛七、怀牛夕、怀牛膝、怀膝、怀夕、

川牛膝均指生牛膝。为原药材去杂质，润透，切段晒干入药者。

酒牛膝又名酒牛夕、酒炒牛膝（夕）。为牛膝段喷淋黄酒，润透，用文火炒至微黄入药者。

盐牛膝又名盐炒牛膝。为牛膝段用盐水拌炒者。

【性味归经】苦、酸，平。归肝、肾经。

【功效主治】活血祛瘀，补肝肾，壮筋骨，利尿通淋，引血下行。主治瘀血阻滞引起的月经不调，痛经，经闭，产后瘀阻腹痛，跌打伤痛；腰膝酸痛，下肢无力；尿血，小便不利，尿道涩痛；经行吐衄，难产等。川牛膝与怀牛膝功效相似，但前者以活血祛瘀见长，后者以补益肝肾见长。

【用量】 6～15克。

【慎忌】 孕妇及月经过多者忌服。

土 牛 膝

为苋科植物牛膝的野生种及柳叶牛膝 *Achyranthes longifolia* Mak. 或粗毛牛膝 *A. aspera* L. 等的根和根茎。

【别名】 土牛夕，野牛膝（夕），杜牛膝（夕），柳叶牛膝（夕），狭叶牛膝（夕），粗毛牛膝（夕），山牛膝（夕），牛克膝（夕），苏木红，荔枝（支）红，透血红，剪刀牛膝（夕），红牛膝（夕），倒扣草，倒扣筋，倒钩草，鸡掇鼻，鸡骨癀，味牛膝（夕），末膝（夕），尾膝（夕），老鸹窝。

【商品名】 土牛膝，杜牛膝。以根粗长、干燥无泥土者为佳。

【处方名】 土牛膝（夕），杜牛膝（夕）。

【性味归经】 苦、酸，平。归肺、肝、膀胱经。

【功效主治】 活血散瘀，清热解毒，利尿。主治经闭，风湿痹痛，咽喉肿痛，白喉，脚气水肿，尿血，跌打损伤。

【用量】 10～15克。鲜品加倍。

【慎忌】 脾胃虚寒者慎服。

王不留行

出自《神农本草经》。为石竹科1年生或越年生草本植物麦蓝菜*Vaccaria segetalis* (Neck.) Garcke的成熟种子。除华南外，广布于我国各地。6～7月种子成熟时割取全草，晒干后果壳自然裂开，收集种子，干燥贮存。生用或炒用。

【别名】王不留，不留行，不留，留行子，面条棵子，王不留行，禁宫花，剪金花，剪金子，金剪刀草，金盏银台，麦蓝子，大麦牛，奶米，王母牛，王牡牛，麦蓝菜子，道灌草子，兔儿草子，麦加集子，麦加子，王牧牛，马不留，妈不留，麦连子，孩儿。

【商品名】王不留行，不留行，留行子。以籽粒均匀、饱满、色乌黑、干燥、无杂质者为佳。

【处方名】王不留行、王不留，炒王不留行，炒王不留，炒不留。

处方中写王不留行、王不留均指生王不留行。为原药材去杂质后生用入药者。多用于通乳消痈。

炒王不留行又称炒王不留、炒不留。为净王不留用文火炒至爆开花入药者。多用于活血通经。

【注意】在目前药材商品中，下列药材在一些地区误作王不留行入药，应该纠正。

桑科植物薜荔*Ficus pumila* L.的花托(果壳)，在广东、广西的一些地区误作“王不留行”使用；

金丝桃科植物元宝草*Hypericum sampsonii* Hance的全草，在四川误作“王不留行”使用；

锦葵科植物四川黄花稔*Sida szechuenensis* Matsuda的全草和粗叶梵天花*Urena lobata* L. var *Scabriuscula* DC.的果实，在云南一些地区误作“王不留行”使用；

豆科植物野豌豆*Vicia sativa* L.、四籽野豌豆*V. tetrasperma*

(L.) Moench、硬毛果野豌豆 *V. hirsuta* (L.) S. F. Gray 及窄叶野豌豆 *V. angustifolia* L. 的种子，在江苏、贵州等地的一些地方，误作“王不留行”使用；

野牡丹 *Melastoma candidum* D. Don. 的果实，在福建部分地区误作“王不留行”使用；

连翘 *Hypericum ascyron* L. 的带果全草，在广西部分地区误作“王不留行”使用；

地耳草 *Hypericum japonicum* Thunb. 的带花全草，广西部分地区误作“王不留行”使用。

【性味归经】苦，平。归肝、胃经。

【功效主治】活血通经，下乳。主治经闭，痛经，产后乳汁不下，乳痛，泌尿系结石，前列腺炎。

【用量】6～10克。

【禁忌】孕妇慎服。

毛 冬 青

出自《广西中草药》。为冬青科植物毛冬青 *Ilex pubescens* Hook. et Arn. 的根及叶。主产于安徽、广东、广西、福建、台湾、海南、浙江、江西等地。叶全年可采，根夏秋季采挖。鲜用或晒干生用。

【别名】乌尾丁，痴树，六月霜，细叶冬青，细叶青，苦田螺，山桐油，老鼠嘴，山冬青，毛披树，毛披树根，茶叶冬青，水火药，喉毒药，山熊胆，酸味木，毛冬青根，山冬青根。

【商品名】毛冬青，毛冬青根，毛冬青叶。以叶青绿、完整、无杂质者为佳。

【处方名】毛冬青，毛冬青根，毛冬青叶，鲜毛冬青，六月霜，山冬青，茶叶冬青。

【注意】本品的变种植物秃毛冬青 *I. pubescens* Hook. et

Arn. var. glabra Chang的根和叶亦供药用，功效近似，非属正品。

【性味归经】苦，平。归心、肺经。

【功效主治】清热解毒，活血通脉。主治风热感冒，肺热咳嗽，喉头水肿，扁桃体炎，痢疾，冠心病，脑血管意外所致的偏瘫，血栓闭塞性脉管炎，中心性视网膜炎，葡萄膜炎，丹毒，烫伤，冻伤及皮肤急性化脓性炎症。

【用量】20~40克。鲜品加倍。外用适量。

【禁忌】脾胃虚寒及月经过多者慎服。

路 路 通

出自《本草纲目拾遗》。为金缕梅科植物 枫香 *Liquidambar formosana* Hance 的果实。主产于河南、安徽、陕西、湖北、江苏、浙江等地。冬季采摘，除去杂质，洗净晒干。

【别名】狼目，狼眼，枫实，枫果，枫香果，枫球子，枫树球，枫木上球，六六通，榧子，九空子，九孔子，枫木果，枫树果，香枫果，枫宸果，枫仔树果，三角枫果，鸡枫果，鸡爪枫果，大叶枫果。

【商品名】路路通，狼目。以果大、干燥、无果梗、无泥土者为佳。

【处方名】路路通，狼目，狼眼。

【性味归经】苦，平。归肝经。

【功效主治】行气，活血，通络，利水。主治经闭，乳少，肢体痹痛，手足拘挛，胃痛，胀满，水肿，痈肿，疥癬，湿疹。

【用量】6~10克。煅存性外用适量。

【禁忌】孕妇及体虚者慎服。

鹿 衡 草

出自《滇南本草》。为鹿蹄草科植物鹿蹄草 *Pyrola rotundifolia* L. subsp. *chinensis* H. Andres 或圆叶鹿蹄草 *P. rotundifolia* L. 等的全草。主产于浙江、安徽、贵州、陕西等地。此外，黑龙江、四川、云南及海南等地亦产。夏、秋季采集，晒干生用或鲜用。

【别名】 鹿蹄草，圆叶鹿蹄草，破血丹，纸背金牛草，大肺筋草，红肺筋草，鹿寿茶，鹿安茶，冬绿，鹿含草，紫背金牛草，鹿寿草，试剑草，秦王试剑草，小秦王草。

【商品名】 鹿衔草，鹿含草，鹿蹄草。以茎叶肥壮、无泥土等杂质者为佳。

【处方名】 鹿衔草，鹿含草，鹿蹄草，鹿安茶，鹿寿茶。

【注意】 在药材商品市场上，下列同属植物的全草，在不同地区也作鹿衔草同等入药。

卵叶鹿蹄草（普通鹿衔草）*P. decorata* H. Andres 分布于安徽、浙江、陕西、江西、福建、台湾、湖北、湖南、四川、云南、西藏等地。使用于西藏、云南、贵州等地。

椭圆叶鹿衔草 *P. elliptica* Nutt. 使用于四川。

紫背鹿衔草 *P. atropurpurea* Franch. 使用于西藏。

短柱鹿蹄草 *P. minor* L. 分布于我国东北、西北及西南地区。

长叶鹿蹄草 *P. elegantala* H. Andres 分布于浙江、福建、湖南、广东等地。

肾叶鹿蹄草 *P. renifolia* Maxim. 分布于我国东北地区。

皱叶鹿蹄草 *P. rugosa* H. Andres 分布于陕西、甘肃、四川等地。

日本鹿蹄草 *P. japonica* (Sieb.) Klenze ex Alef. 分布于我国东北、华北地区。

四川鹿蹄草 *P. szechuanica* H. Andres 分布于四川。

云南鹿蹄草 *P. oreodoxa* H. Andres 分布于云南。

红花鹿蹄草 *P. incarnata* Fisch. 分布于我国东北、内蒙古、河北等地。

【性味归经】苦，温。归肝、肾经。

【功效主治】补虚，益肾，祛风胜湿，活血调经。主治虚劳咳嗽，劳伤吐血，风湿性关节炎，崩漏，白带，外伤出血，慢性痢疾。

【用量】15~30克。鲜品加倍。外用适量。

穿山龙

出自《东北药用植物志》。为薯蓣科植物穿龙薯蓣 *Dioscorea nipponica* Mak. 的根茎。主产于吉林、辽宁、黑龙江、山东、河南、河北、内蒙古等地。秋季采挖，除去细根，刮去栓皮，晒干。切片生用。

【别名】穿龙骨，穿地龙，穿山骨，穿山薯蓣，团扇薯蓣，爬山虎，狗山药，野山药，鸡骨头，金刚骨，山常山，火藤根，粉草薢，黄姜，土山薯，竹根薯，铁根薯，雄姜，黄鞭，地龙骨，山花啦，串山龙。

【商品名】穿山龙。以粗壮、粉性足者为佳。

【处方名】穿山龙。

【性味归经】苦，平。归肝、肺经。

【功效主治】活血舒筋，消食利水，祛瘀截疟，消肿止痛。主治风寒湿痹，慢性气管炎，消化不良，劳损扭伤，疟疾，痛肿，大骨节病。

【用量】6~12克。鲜品15~30克。外用鲜品捣敷适量。

石见穿

出自《本草纲目》。为唇形科植物紫参 *Salvia chinensis* Benth. 的全草。分布于华东、湖北、四川、广西、广东、湖南等地。夏至到处暑间采收，鲜用或晒干生用。

【别名】月下红，华鼠尾草，乌沙草，黑面风，大发汗，石打穿，石大川，紫参草，小丹参草，小红参草，紫丹花。

【商品名】石见穿。以枝叶肥壮、无泥土等杂质者为佳。

【处方名】石见穿，石打穿，石大川。

【性味归经】苦、辛，平。归肺、胃、肝经。

【功效主治】清热解毒，活血镇痛。主治急性及慢性肝炎，肾炎，癌症，痛经，白带，淋巴结结核，象皮肿，痰喘。外用治疗面神经麻痹，乳腺炎，疖肿。

【用量】20~30克。鲜品加倍。外用适量。

鬼箭羽

出自《日华子本草》。为卫矛科植物卫矛 *Euonymus alatus* (Thunb.) Sieb. 的具翅状物的枝条或翅状附属物。分布于我国北部、中部、华东及西南各地。生于山野，或栽培于庭园。全年可采，割取枝条后，除去嫩枝及叶，晒干。或收集其翅状物，晒干。

【别名】鬼箭，神箭，鬼见愁，鬼见羽，卫矛，六月凌，八树，四棱峰，芸杨，四面峰，篦其柴，风枪林，山鸡条子，四面戟，千层皮，刀尖茶，雁翎茶，四棱茶，麻药，篦梳风，六月棱，四棱树，卫肚边，鬼羽愁，鬼篦子。

【商品名】鬼箭羽，鬼箭，卫矛。以前箭羽齐全、干燥、条匀者为佳。

【处方名】鬼箭，鬼箭羽，卫矛，鬼见愁，四棱峰。

【注意】本品的变种毛腺卫矛 *E. alatus* (Thurb.) Sieb. var. *pubescens* Maxim. (分布于东北、华北) 及栓翅卫矛 *E. phellomanus* Loes. (分布于河南、陕西、甘肃、宁夏、四川等地) 的枝条及翅状物亦作鬼箭羽入药，但非正品。

【性味归经】苦，寒。归肝经。

【功效主治】破血，通经，杀虫。主治经闭，癥瘕，产后瘀滞腹痛，虫积腹痛。

【用量】4～10克。

【慎忌】孕妇忌服。

鸡 血 藤

出自《本草纲目拾遗》。为豆科攀援灌木密花豆(三叶鸡血藤) *Spatholobus suberectus* Dunn. 和香花崖豆藤(山鸡血藤) *Millettia dielsiana* Harms 等的藤茎。秋季割取藤茎晒干。润透切片生用，或熬制鸡血藤膏用。

【别名】血风藤，血风，血藤，血节藤，血枫藤，白花油麻藤，猪血藤，血龙藤，红血藤。

【商品名】三叶鸡血藤：又名密花豆藤、大血藤、血风藤、九层风。为植物密花豆的藤茎。主产于广西。

山鸡血藤：又名香花岩豆藤、香花崖豆藤、丰城鸡血藤、贯肠血藤、苦藤、猪婆藤、大活血、过山龙、野奶豆。为植物香花岩豆的藤茎。主产于广西、云南、福建等地。

白花油麻藤：为植物白花油麻藤(血枫藤、勃氏黎豆藤) *Mucuna birbwoodiana* Jutcher 的藤茎。主产于广西。

亮叶岩豆藤：又名血节藤、血藤、血筋藤、光叶崖豆藤。为植物亮叶岩豆藤 *Millettia nitida* Benth. 的藤茎。主产于广东、广西。

鸡血藤：各种鸡血藤的统称。以上品种前2种为正品，其余为副品。均以藤茎条匀、树脂状分泌物多者为佳。

【处方名】鸡血藤，血藤，血节藤。

【注意】目前在药材商品市场上，鸡血藤的市售品种十分混乱，除上述品种外，下列品种也作“鸡血藤”入药，但均非正品。

木通科植物大血藤 *Sargentodoxa cuneata* (Oliv.) Rehd. et Wils. 的藤茎。产于河南、福建、广东。使用范围较广。

豆科植物常绿油麻藤 *Mucuna sempervirens* Hemsl. 的藤茎。产于福建。

豆科植物昆明鸡血藤（网络鸡血藤） *Millettia reticulata* Benth. 的藤茎。产于广东、广西、甘肃等地。

除此之外，云南禄劝县把豆科植物巴豆藤作“鸡血藤”使用；云南凤庆县把木兰科植物异形南五味子和中间南五味子的藤茎作“鸡血藤”使用，这则是错误的，应予以纠正。

【性味归经】苦、微甘，温。归肝经。

【功效主治】行血补血，舒筋活络。主治月经不调，经行不畅，痛经，血虚经闭；关节酸痛，手足麻木，肢体瘫痪，风湿痹痛。

【用量】10~30克。

乳 香

出自《名医别录》。为橄榄科小乔木卡氏乳香树 *Boswellia carterii* Birdw. 及其同属植物皮部渗出的树脂。产于非洲的索马里、埃塞俄比亚及阿拉伯半岛南部，土耳其、利比亚、苏丹、埃及亦产。春、夏季将树干的皮部由下而上用刀顺序切伤，使树脂由伤口渗出，数天后凝成硬块，收集即得。入药多炒用。

【别名】熏乳香，滴乳香，滴香，滴乳，乳香珠，明乳香，明乳，乳头香，浴香，熏陆香，马尾香，塌香，乳塌，黑塌，西香，天泽香，摩勒香，多伽罗香，卡氏乳香，熏陆乳香，原乳香，杜鲁香，滴乳珠，乳香米，乳香末，南香。

【商品名】乳香：为植物卡氏乳香树及其同属植物皮部渗出的

树脂。

熏陆香：为漆树科植物粘胶乳香树 *Pistacia lentiscus* L. 树干切口流出的树脂。主产于希腊、土耳其及地中海南岸等地。

明乳香：乳香中色淡黄、无杂质、半透明者。品质最佳。

原乳香：长达5厘米的乳香块状物。

乳香珠：长达2厘米的卵形滴乳状乳香块。

拜药乳香：又名索马里乳香。为产于索马里者。以色淡黄白、质硬而脆，香气浓厚，断面半透明、无杂质者为佳。

美蒂乳香：又名埃塞俄比亚乳香。为产于埃塞俄比亚者。以色淡黄、半透明、嚼之粘牙、香气浓、无杂质者为佳。

【处方名】乳香，尔香，制乳香，炒乳香，醋炒乳香，炙乳香。

处方中写乳香、尔香指生乳香。为原药去杂质，捣成碎块入药者。

制乳香为原药捣成粉末后，置锅内炒至熔化，然后倒出，待微冷切成小块者。

炒乳香为原药用文火炒至表面稍见熔化点，略呈黄色，取出放凉入药者。

醋炒乳香又称炙乳香。为净乳香用文火炒至表面熔化时，喷洒米醋再炒至外层光亮，取出放凉入药者。

【注意】同属植物饱达乳香树（药胶香树）*Boswellia bhaw-dajana* Birdw. 及野乳香树*B. neglecta* M. Moore 的树脂，也作乳香同等入药。

【性味归经】辛、苦，温。归心、肝、脾经。

【功效主治】活血止痛，消肿生肌。主治痛经，经闭，胃脘疼痛，风湿痹痛，跌打损伤，痈疽肿痛，肠痈，疮疡溃破久不敛口等。

【用量】3~10克。外用适量。

【禁忌】胃弱者慎服，无瘀滞者及孕妇忌服。

没 药

出自《开宝本草》。为橄榄科植物没药树 *Commiphora myrrha* Engl. 或其他同属植物茎干皮部渗出的油胶树脂。主产于非洲索马里、埃塞俄比亚以及印度等地。采集由树皮裂缝处渗出的白色油胶树脂，于空气中变成红棕色而坚硬的圆块，打碎后，炒至焦黑色应用。

【别名】末药，狗没药，明没药，狗皮没药，马皮没药，净没药，真没药，爱伦堡没药，克香，黑香，没药珠，全没药。

【商品名】明没药：为红褐色至紫棕色块状物，略透明，无杂质，质佳。

狗没药：又名狗皮没药、马没药、马皮没药。为用狗皮或马皮包裹者。质次。

天然没药：表面呈黄棕色或红棕色的没药团块。

胶质没药：表面呈深棕色的没药团块。

没药：各类没药的统称。均以微透明、显油润、香气浓、味苦、无杂质者为佳。

【处方名】没药，末药，制没药，炙没药，醋炒没药。

处方中写没药、末药均指生没药。为原药去杂质，打成碎块入药者。

制没药又称炒没药。为净没药用文火炒制后入药者。

醋炒没药又称炙没药。为净没药炒至熔化时，淋洒米醋，炒干水分，取出，然后入药者。

【性味归经】苦，平。归心、肝、脾经。

【功效主治】活血止痛，消肿生肌。主治经闭，痛经，胃腹疼痛，跌打伤痛，痈疽肿痛，肠痈，疮疡溃破久不敛口等证。

【用量】3~10克。研末冲服每次1~1.5克。

【慎忌】同乳香。与乳香同用时，二药均须相应减少。

降 香

出自《海药本草》。为豆科常绿小乔木降香檀 *Dalbergia odorifera* T. Chen 的根部心材。全年可采，削去外皮，锯成短段，劈成小块，阴干。

【别名】降真香，降真，紫降香，紫藤香，降香檀，紫檀。

【商品名】降真香：又名番降、黄檀。为芸香科山油柑属植物降真香(山油柑、山橘) *Acronychia pedunculata* (L.) Miq 和印度黄檀 *Dalbergia sissoo* Roxb. 的心材。主产于印度、越南、泰国、菲律宾等地。我国云南、广西、广东等地也有分布。质地较重，纹理致密，色紫而润，味辛辣而气香浓，品质优良。为降香正品。

降香檀：又名花梨母、花榈木。为豆科植物降香檀的根部心材。产于我国云南、广西、广东等地。目前药材市场销售多为此品种。

均以色红紫、质坚实、无外皮及白木、油润、香气浓者为佳。

【处方名】降香，降真香。

【注意】过去进口的降香，为芸香科植物降真香树 *Acronychia pedunculata* (L.) Miq 的心材。产于印度、越南、泰国、菲律宾等地。我国云南、广西、广东等地虽有分布，但未供药用。其性状与目前药材市场所售的降香檀(花梨母、花榈木)心材相似，唯质较重，纹理致密，色紫而润，味辛辣而气香浓，品质优良，为降香正品，而降香檀则为副品。

【性味归经】辛，温。归心、肝经。

【功效主治】活血散瘀，止血定痛。主治气滞血瘀所致的胸胁作痛，跌打损伤出血，呕吐腹痛，心绞痛等。

【用量】3～6克。研末吞服每次1～2克。外用适量。

【慎忌】凡阴虚火旺，血热妄行而无瘀滞者忌服。

苏 木

出自《新修本草》。为豆科灌木或小乔木苏木 *Caesalpinia sappan* L.的心材。我国广东、广西、台湾、云南等地都有分布，国外主产于中南半岛及印度。四季可采，伐下树干，除去树皮及边材，留取中心部分，锯段，晒干。用时刨成薄片，或砍为小块，或经蒸软切片。

【别名】 苏枋，苏方，苏枋木，苏方木，红苏木，赤木，窟木，棕木，红柴，红木，苏莫，佐模兴（藏语名），苏门毛道（蒙语名），沃德印地（维族名）。

【商品名】 苏木，苏枋木。以木质坚实、色红黄者为佳。

【处方名】 苏木，苏枋木。

【性味归经】 甘、咸、微辛，平。归心、肝、脾经。

【功效主治】 活血通经，祛瘀止痛。主治血滞经闭，产后瘀阻腹痛，跌打损伤等。

【用法】 3～10克。外用适量。

【慎忌】 孕妇忌服。

接 骨 木

出自《新修本草》。为忍冬科植物接骨木 *Sambucus williamsi* Hance 的枝茎。主产于江苏。此外福建、四川、广西、浙江等地亦产。全年可采。晒干，切片入药。

【别名】 接骨草，接骨丹，接骨风，大接骨丹，大叶接骨木，大叶蒴藋，木蒴藋，续骨木，扦扦活，七叶黄荆，放棍行，珊瑚配，挺挺活，铁骨散，七叶金，透骨草，戳树枝，蒴树枝，公道老树枝，舒筋树枝，樟木树枝，公道老，马尿骚，樟木，顺筋枝。

【商品名】 接骨木。以枝条粗细均匀、干燥者为佳。

【处方名】接骨木，樟木。

【注意】在药材商品市场上，下列同属植物的枝茎，在不同地区也作接骨木同等入药。但非正品。

毛接骨木 *S. buergeriana* Bl. 分布于东北地区。

无梗接骨木 *S. sieboldiana* Bl. 分布于辽宁、内蒙古、河北、山东、山西、陕西、河南等地。

【性味归经】甘、苦，平。归肝、肾经。

【功效主治】祛风，利湿，活血，止痛。主治风湿筋骨疼痛，腰痛，水肿，急性及慢性肾炎，骨折，跌打损伤，大骨节病，风痒瘾疹，产后血晕，创伤出血。

【用量】内服煎汤 6～15克。外用捣敷或煎洗适量。

【慎忌】孕妇忌服。

干 漆

出自《神农本草经》。为漆树科落叶乔木漆树 *Rhus verniciflua* Stokes 树脂的干燥品。主产湖北、四川、云南、广东、安徽等省。夏季以铁器凿伤茎干树皮，有树脂渗出，谓之生漆。干漆系由浓稠生漆干涸而成。商品多系白漆店漆缸中取得之漆渣，或缸底之干燥者。用时捣碎，炒至烟尽或烧至烟尽存性用。

【别名】漆脚，漆渣，漆底，漆滓，黑干漆。

【商品名】干漆。以块整、色黑、坚硬、漆味浓者为佳。

【处方名】干漆，炒干漆。

处方中写干漆指炒干漆。为原药材敲碎去杂质，炒至烟尽，存性，放凉入药者。

【性味归经】辛、苦，温。有小毒。归肝、胃经。

【功效主治】破血祛瘀，通经，杀虫。主治瘀血阻滞引起的经闭，癥瘕，虫积腹痛。

【用量】入丸散内服每次0.06～0.1克。不宜久煎。

【慎忌】 孕妇及无瘀滞者忌服。虫证体虚者慎服。畏蟹。

五 灵 脂

出自《开宝本草》。为鼯鼠科动物复齿鼯鼠 *Trogopterus xanthipes* Milne-Edwards 或其他近缘动物的粪便。主产于河北、山西、甘肃等地。春、秋二季于其穴居处掏取，拣尽杂质，晒干。醋炒用。

【别名】 灵脂，药本，寒雀粪，寒号虫粪，橙足鼯鼠粪，飞鼠粪，鼯鼠粪，寒号鸟粪，寒搭拉虫粪，小飞鼠粪，五灵子，草灵脂，懒老婆屎，丹芝，白芝，龙芝，盍旦。

【商品名】 糖灵脂：又名灵脂块。为春季的粪便结成的块状物。

米灵脂：又名散灵脂、灵脂米。为秋季的粪便，呈长椭圆柱状颗粒。

以色黑褐、块状、有光泽、显油润、无杂质者为佳。

【处方名】 灵脂，五灵脂，酒灵脂，醋灵脂，炒灵脂，灵脂炭。

处方中写灵脂、五灵脂指生五灵脂。为原药材去杂质生用入药者。

酒灵脂为灵脂用黄酒喷洒，晾干入药者。

醋灵脂为灵脂用米醋喷洒，晾干入药者。

炒灵脂为灵脂用文火微炒入药者。

灵脂炭为灵脂用武火炒炭入药者。

【注意】 在药材商品市场上，云南个别地区把飞鼠科动物黑白飞鼠 *Hylopetes alboniger* Hodgson 的粪便作“五灵脂”使用，此非正品。

另外还有一些地区，把鼠兔科多种动物的粪便误作“五灵脂”使用，此属误用，应该纠正。这些鼠兔有：

鼠兔 *Ochotona davurica* (Pallas) 分布于内蒙古、青海、山西、陕西等地。

西藏鼠兔 *O. thibetana* Mine-Edwards 分布于西藏、云南、青海、甘肃、陕西等地。

红耳鼠兔 *O. erythrotis* Buechner 分布于西藏、青海、甘肃等地。

大耳鼠兔 *O. macrotis* Gunther 分布于甘肃、青海、新疆。

科氏鼠兔 *O. koslowi* Buechner 分布于新疆、青海。

福氏鼠兔 *O. forresti* Thomas 分布于云南等地。

蒙古鼠兔 *O. pallasii* Gray 分布于新疆等地。

云南、广西、四川等地还使用一种“血灵脂”，又名猴结、猴竭、申红。据说是猿猴的经血或分娩时排出的血液遗于地上，日久凝结而成的块状物，呈棕色或棕黑色。与五灵脂非属一种药材。

【性味归经】 苦、甘，温。归肝经。

【功效主治】 活血止痛，化瘀止血。主治瘀血阻滞所致的痛经，经闭，产后瘀阻腹痛，胸痛，腕腹疼痛；血瘀崩漏；蛇、蝎、蜈蚣咬伤等。

【用量】 3~10克。入丸散或外用适量。

【慎忌】 孕妇慎服。畏人参。

穿 山 甲

出自《名医别录》。为脊椎动物鳞鲤科穿山甲（食蚁鳞鲤）*Manis pentadactyla* L. 的鳞片。产于广西、贵州、广东、云南、湖南、福建、台湾等地。全年都可捕捉。捕捉后割下整张的甲壳，置沸水中烫过，取下鳞片，洗净晒干。防蛀。用时与砂同炒至松泡而呈黄色，或炒后再加入醋略浸，晒干备用。

【别名】 山甲，川山甲，山甲片，鲮鲤甲，鱗鲤甲，甲片，鱗片，麒麟片，随碱片，鳖鲤片，鲮鲤角，鱗鲤甲，石鲮鱼甲，尤鲤

甲。

【商品名】 小甲片：又名铁甲片。为外部呈褐色者。质佳。

大甲片：又名铜甲片。为外部呈灰黄色者。质次。

甲张：又名甲壳。为带有甲片的甲皮。

生甲片：将甲皮放入沸水中略煮，刮下甲片，晒干，即为生甲片。

以甲片均匀、表面光洁、色黄褐或黑褐、半透明、无腥气、不带皮肉者为佳。

【处方名】 穿山甲，山甲，甲片，炮山甲，炮甲，炮甲片，炙山甲，山甲珠，炮甲珠，醋山甲，醋甲片等。

处方中写穿山甲、山甲、甲片均指生穿山甲片。为原药去杂质，洗净，晒干，捣碎入药者。

炮山甲又称炮甲、炮甲片、炮甲珠、山甲珠、炙山甲。为山甲片用砂子炒至鼓起呈深黄色入药者。

醋山甲又名醋甲片。为炮山甲炒成后，筛去砂子，趁热放入醋内浸淬，再用清水漂洗干净，晒干入药者。

【性味归经】 咸，微寒。归肝、胃经。

【功效主治】 活血通经，下乳，消肿排脓。主治血滞经闭，癰瘕痞块，风湿痹痛，乳汁不通，痈肿初起或脓成未溃，瘰疬。

【用量】 4～10克。研末冲服每次1.5克。

【慎忌】 孕妇忌服。

蟇 虫

出自《神农本草经》。为鳖蠊科昆虫 地鳖 *Eupolyphaga sinensis* Walk. 或冀地鳖 *Steleophaga planyi* (Bol.) 的雌虫体。主产于湖南、湖北、江苏、河南，野生或人工饲养。夏季捕捉，入沸水烫死或盐水略煮过，晒干后放干燥处或与花椒同贮，以防腐防蛀。

【别名】 地鳖，土鳖，土别，土别虫，土元，地鳖虫，土鳖虫，

过街，簸箕虫，蚂蚁虫，地蝉虫，山蟻蟻，地乌龟，臭虫母，臭虫母子，盖子虫，土虫，节节虫，蚂蚁虎，地必虫，翼地鳖，土别虫，蠍，蟻，负盘，香娘子，茶婆虫，石姜，卢罿，滑虫，灰鳖虫，蛟虫，草虫负蠍，蠍虫，冒蠍，常羊，喫喫草虫，地虫，老婆虫。

【商品名】苏土元：个小体轻、腹中无泥者。产于江苏、浙江一带。质优。

大土元：又名汉土元。个大体重，腹中存泥土。质次。

以个小、体肥、干燥、色红褐、质轻、无泥、不破碎者为佳。

【处方名】土元：廧虫，炒廧虫。

处方中写土元、廧虫指生廧虫。为捕捉之廧虫用沸水烫死，捞出晒干入药者。

炒廧虫为晒干的净廧虫用文火炒至微黄入药者。

【注意】姬蠍科昆虫赤边水廧（又名金边地鳖虫、金边土鳖、药用光蠍）*Opisthoplatia orientalis* Burmeister的雌虫干燥体，在某些地区亦作“廧虫”入药，功效近似，但非正品。

另有一种水生甲壳昆虫龙虱，又名水鳖、水鳖虫，为龙虱科动物东方龙虱*Cybister tripunctatus orientalis* Gschwendtn. 的干燥虫体，有些地区曾作“廧虫”入药。此为混用，应该纠正。因为龙虱在两广地区盐渍后蒸熟或炒熟后食用，说是可以补肾缩小便，与廧虫功效不同。故不可混用。

【性味归经】咸，寒。有小毒。归肝经。

【功效主治】破血逐瘀，续筋接骨。主治经闭，产后瘀阻，癰瘕，骨折损伤，瘀滞疼痛，腰部扭伤。

【用量】3～10克。研末吞服每次1～1.5克。

【慎忌】孕妇忌服。

水 蝲

出自《神农本草经》。为环节动物水蛭科的蚂蟥 *Whitmania*

pigra (Whitman) 和水蛭 *Hirudo nipponica* Whitman 及柳叶蚂蟥 *Whitmania acranulata* (Whitman) 等的全体。我国各处都有。于夏季 5 ~ 6 月或秋季捕捉。晒干，放在石灰缸中或与花椒同放干燥处防蛀。用时研末或微火炙黄。

【别名】 蚂鳖，蚂蟥，蚂蝗，马鳖，马蟥，牛鳖，柳叶蚂蟥，医用蛭，宽水蛭，肉钻子，塔干，沙塔干，长条水蛭，蛭螺，至掌，虮，蚊，马蜞，马蛭，蜞，红蛭，蚂蝗蜞，黄蜞，水麻贴，门尔哥蚂里（朝语），日本医蛭，宽体金线蛭，茶色蛭，水痴，水蚂蝗。

【商品名】 小水蛭：又名医用水蛭、医用蛭、日本医蛭。为动物水蛭的干燥全体。

宽水蛭：又名宽体金线蛭。为动物蚂蟥的干燥全体。

长条水蛭：又名茶色蛭。为动物柳叶蚂蟥的干燥全体。

金边蚂蟥：为同科动物细齿金线蛭 *W. edentula* (Whitman) 的干燥全体。产于四川。当地作水蛭入药，认为品质最优。

以虫体整匀、干燥、无泥沙者为佳。

【处方名】 水蛭，炒水蛭，炙水蛭，油水蛭，醋水蛭。

处方中写水蛭指生水蛭。为原药材洗净晒干，生用入药者。

炒水蛭又称炙水蛭。为净水蛭用滑石粉炒至鼓起，并呈黄色而入药者。

油水蛭为净水蛭用油炸至焦黄色入药者。

醋水蛭为净水蛭用醋煮透，晒干入药者。

【性味归经】 咸、苦，平。有小毒。归肝经。

【功效主治】 破血逐瘀。主治血瘀经闭，癥瘕积聚，跌打损伤瘀血疼痛，血栓性静脉炎，脑血栓形成，血小板增多症等。

【用法】 3 ~ 6 克。焙干研末吞服每次 0.3 ~ 0.5 克。

【慎忌】 孕妇忌服。

蛇 虫

出自《神农本草经》。为昆虫类虻科复带虻 *Tabanus bivittatus* Mats. 的雌虫体。各地均有，而以畜牧区最多，夏季常栖息在牧场中。5~6月捕捉，沸水烫或稍蒸，晒干。生用或炒用。

【别名】牛虻，蠽虻，瞎蠓，瞎眼蠓，瞎虻虫，瞎蚂蜂，牛虻虫，牛蚊子，牛魔蚊，牛苍蝇，绿头猛钻，牛蝇，牛蝇子，复带虻，土虻虫。

【商品名】虻虫。以个大、干燥、完整者为佳。

【处方名】虻虫，炒虻虫。

处方中写虻虫指生虻虫。为原药材去足、去翅膀入药者。

炒虻虫为净虻虫同粳米用文火微炒，至米粒黄时，筛去粳米，放凉入药者。

【注意】同科昆虫鹿虻 *T. chrysurus* Loew. 或三角牛虻 *T. trigonus* Coq 和黧虻 *T. trigeminus* Coq 的干燥雌虻成虫也作“虻虫”同等入药。

【性味归经】苦，微寒。有小毒。归肝经。

【功效主治】破血逐瘀。主治血滞经闭，癥瘕积聚，跌打损伤瘀血疼痛。

【用量】1~2克。焙干研末吞服每次0.3克。

【慎忌】孕妇忌服。

红 娘 子

出自《本草图经》。为蝉科昆虫黑翅红娘子 *Huechys sanguinea* De Geer. 和褐翅红娘子 *H. philaemata* Fabricius 的干燥虫体。主产于河南、湖南、安徽、江苏、湖北、河北、四川等地。6~8月间捕捉，蒸死晒干。

【别名】 槲鸡，灰花蛾，红娘虫，么姑虫，红女，红姑娘，红娘，红蝉，花大鸡，山鸡腰，红盖虫，黑翅红娘子，褐翅红娘子。

【商品名】 红娘子，以个大、干燥、完整者为佳。

【处方名】 红娘子，红娘虫，红娘，炙红娘子，制红娘子，炒红娘子（炮制法参见“斑蝥”）。

【注意】 本品别名槲鸡，实际上红娘子与槲鸡是两种不同科属的昆虫，历代本草书籍多有混淆。槲鸡 *Lycorma delicatula* White. 较红娘子小，多群栖于槲、榆、刺槐、桐、枫、女贞等树上。目前药材只用红娘子，未见槲鸡入药。

【性味归经】 苦、辛，平。有毒。归肝经。

【功效主治】 攻毒，化瘀，破积。主治血瘀经闭，狂犬咬伤。淋巴结结核。外用治疗疥癣疮疡。

【用量】 炒后入丸散内服0.1~0.3克。外用适量。

【禁忌】 有剧毒。内服宜慎。孕妇及体虚者忌服。

青 娘 子

出自《本草纲目》。为芫青科昆虫绿芫青 *Lytta caraganae* Pall. 的干燥全体。主产于江苏、安徽、浙江等地。4~5月间捕捉，沸水烫死，取出晒干或烘干。

【别名】 绿芫青，芫青，芫靖，青虫，青娘，青娘虫，相思虫。

【商品名】 青娘子，绿芫青，芫青。以个大、干燥、完整者为佳。

【处方名】 青娘子，青娘虫，青虫，芫青，炒青娘子。

处方中写青娘子、青娘虫、青虫、芫青等均指炒青娘子。为净青娘子去头、足、翼，用米同炒至老黄色，取出晾凉入药者。

【性味归经】 辛，温。有毒。归肝、肾经。

【功效主治】 攻毒，逐瘀，利尿。主治淋巴结结核，狂犬咬伤，疥癣疮毒，小便不利，经闭，下死胎。

【用量】煎汤或入丸散内服1~2只。外用适量。

【慎忌】孕妇及体虚者忌服。

自然铜

出自《开宝本草》。为天然黄铁矿(Pyrite)的含硫化铁(FeS_2)矿石。产于四川、广东、湖南、云南、河北及辽宁等地。采挖后除去杂质及有黑锈者，以火煅透，醋淬，复煅复淬，反复二、三次，置地下退火毒，研末水飞。

【别名】然铜，石髓铅，黄铁矿，接骨丹，方块铜，川然铜。

【商品名】川然铜：为产于四川者。习惯认为产于四川灌县的自然铜品质最优。

自然铜：为各地所产自然铜的统称。以块整均匀、色黄亮、无杂质者为佳。

【处方名】自然铜，煅自然铜。

处方中写自然铜指生自然铜。为原药材去除泥土及碎石后，生用入药者。

煅自然铜又名煅然铜。为自然铜块烧至红透，放入米醋中浸淬，打碎入药者。

【注意】云南产品多为褐铁矿石，内外均呈褐色，无光泽，与黄铁矿石同等入药。

【性味归经】辛，平。归肝经。

【功效主治】散瘀止痛，接骨疗伤。主治跌扑骨折，瘀阻肿痛。

【用量】10~15克。煅研细末入散剂每次0.3克。

十三、化痰止咳平喘药

(一) 化痰药

半 夏

出自《神农本草经》。为天南星科多年生草本植物半夏 *Pinellia ternata* (Thurb.) Breit. 的块茎。主产于长江流域。夏秋间采挖，洗净，除去外皮及须根，晒干，为生半夏。用生姜、明矾等炮制后使用，称为制半夏。

【别名】地文，地星，水玉，守田，示姑，羊眼半夏，和姑，蝎子草，燕子尾，地珠半夏，麻芋果，麻玉果，三步跳，三叶老，三叶半夏，泛石子，地鵝鴟，地茨菇，老黄嘴，老和尚头，野芋头，老鸹头，老鸹眼，老鴟眼，捉嘴豆子，地巴豆，无心菜根，天落星，麻芋子，麻芋根，地雷公，老瓜蒜，狗芋头，珠半夏，裂刀菜，麻草子，药狗蛋。

【商品名】半夏。以个大、形圆、色白、皮净、干燥、质坚实、粉性足者为佳。

【处方名】半夏，半下，清半夏，法半夏，姜半夏，水半夏，仙半夏，青盐半夏，竹沥半夏，苏半夏，宋半夏，清夏，法夏，姜夏，生半夏，制半夏等。

生半夏为原药材去外皮及须根，晒干生用入药者。生半夏有毒，很少用于内服，多作外用药。

处方中写半夏、半下指制半夏或水半夏、姜半夏。为生半夏用生姜汁、白矾制过入药者。制后毒性降低，和胃止呕作用增强。

法半夏又称法夏、法下、黄法夏、京法夏、京夏、京半夏。为生半夏用白矾、甘草、石灰加工炮制后入药者。毒性降低，化痰作用增强。

清半夏又称清水半夏、清夏、清下、清夏片。为生半夏用白矾加工炮制后入药者。毒性及燥性降低，化痰作用增强。

仙半夏又名仙露半夏。为生半夏用甘草、五味子、青陈皮、枳壳、枳实、川芎、沉香等14味中药煎汁浸泡，待药汁吸干，再烘干入药者。毒性降低，理气化痰作用增强。

青盐半夏又称盐半夏。为清半夏用青盐水搅拌，晒干入药者。毒性降低，清热化痰作用增强。

竹沥半夏为清半夏用鲜竹沥淋洒拌匀，待竹沥被吸尽，晒干入药者。清热化痰止咳作用增强。

苏半夏又称苏夏。为清半夏再经加生姜、朴硝、甘草、皂角在水中浸泡取出，再用甘草、青盐、党参、川贝等进一步加工，晾干入药者。

宋制半夏又称宋半夏、京半夏或苏半夏。为清半夏用陈皮、苏子、青礞石、枇杷叶等药的煎汁拌和，使之吸尽晒干入药者。降气化痰平喘作用增强。

【注意】目前在药材商品市场上，半夏的市售商品品种比较混乱，除上述品种外，同属植物掌叶半夏 *Pinellia pedatisecta* Schott 的块茎，在江苏、河南、河北、山西等一些地区作半夏入药，此非正品。

同科植物犁头尖（土半夏）*Typhonium divaricatum* (L.) Decne 或裂叶犁头尖（三裂半夏）*T. trilobatum* (L.) Schott 和戟叶犁头尖（水半夏、土半夏）*T. Cuspidatum* Blume [*T. flagelliforme* Blume] 的块茎，在广东、广西和云南一些地区作“半夏”入药。此为误用，应予以纠正。因为其功效与半夏不同，不能混用。

【性味归经】辛，温。有毒。归脾、胃、肺经。

【功效主治】燥湿化痰，降逆止呕，消痞散结。主治咳嗽痰

多，气逆作喘；恶心呕吐；胸脘痞闷，梅核气，瘿瘤痰核，痈疽肿毒等。

【用量】 5～10克。外用生品适量。

【慎忌】 阴亏燥咳，血证，痰热内盛等均当忌服或慎服。反乌头。

天 南 星

出自《神农本草经》。为天南星多年生草本植物天南星 *Arisaema consanguineum* Schott. 或东北天南星 *A. amurense* Maxim. 或异叶天南星 *A. heterophyllum* Bl. 的干燥块茎。产于我国河南、河北、福建、四川等省。秋冬两季采挖，除去茎叶、须根和外皮，洗净晒干。

【别名】 虎掌，虎膏，虎掌南星，南星，白南星，蛇头天南星，蛇芋，蛇木芋，蛇包谷，蛇六谷，山芭米，山棒子，三棒子，野芋头，斑杖，掌叶半夏，半夏精，药狗丹，大扁老鸦芋头，一把伞根，东北天南星，异叶天南星，羹匙菜，大头参，独角莲，狗爪南星，母子半夏，狗爪半夏，虎掌半夏，独叶一枝枪，天老星。

【商品名】 禹南星：又称会南星、禹州天南星。为产于河南、集散于禹州者。品质最优。销往全国，并供出口。

天南星：为各地天南星的统称。以个大、匀整、无外皮、色白、粉性足者为佳。

【处方名】 南星，天南星，陈南星，生南星，制南星，姜南星，胆南星，胆星等。

生天南星为原药材去杂质，洗净晒干，切片入药者。毒性大，祛风止疼力强。

处方中写南星、陈南星、天南星均指制天南星。制天南星又称制南星、姜制天南星、姜南星。为生南星用清水浸泡数日，至无白心、无麻辣感时，再与生姜片、白矾层层均匀铺入容器内，加水淹

浸 3~4 周，然后煮透切片，晒干，再拌入生姜汁吸尽晾干入药者。毒性及燥性降低，化痰作用增强。

胆制南星又称胆南星、胆星。为生天南星研末，与牛胆汁混合经发酵加工成小方块或圆柱状入药者。性味苦凉，功偏清热化痰，息风定惊。

【注意】下列同属植物的块茎，在不同地区也作“天南星”入药，但非正品，应注意鉴别。

拟天南星 *Arisaema ambiguum* Engl. 分布于江苏、湖北。

朝鲜天南星 *A. peninsulae* Nakai 分布于吉林、辽宁。

虎掌 *A. thunbergii* Bl. 分布于安徽、江苏、湖南、湖北、福建、江西、陕西等地。

鬼蒟蒻（又名日本天南星）*A. japonicum* Bl. 分布于四川。

多疣天南星 *A. verrucosum* Schott 分布于四川。

偏叶天南星（又名花南星）*A. lobatum* Engl. var. *rosthornianum* Engl. 分布于陕西。

象天南星 *A. elephas* S. Buchet 分布于陕西。

黄苞天南星 *A. flavum* Schott 分布于西藏。

近缘天南星 *A. fraternum* Schott 分布于西藏。

滇南星 *A. yunnanense* Buch. 分布于云南等地。

油跋 *A. ringens* Schott，四川有些地方称之为狗爪南星，浙江衢州称衢南星。

黑南星：多疣天南星及滇南星的块茎，在四川统称为黑南星。

【性味归经】苦、辛，温。有毒。归肺、肝、脾经。

【功效主治】燥湿化痰，祛风止痉。主治顽痰咳嗽，胸膈胀闷，风痰眩晕，中风痰壅，口眼喁斜，癫痫，破伤风。外用生天南星可治疗痈疽痰核肿痛，子宫颈痛等。

【用量】制天南星水煎服5~10克。生天南星入丸散剂每次0.3~1克。外用适量。

【慎忌】孕妇忌服。生天南星一般不作内服药。

白附子

出自《中药志》。为天南星科多年生草本植物独角莲 *Typhonium giganteum* Engl. 的块茎。主产于河南、陕西、四川及甘肃等省。秋季采挖，除去残茎、须根及外皮，用硫黄熏一二次，晒干。或用白矾、生姜制后切片。

【别名】禹白附子，禹白附，独角莲根，牛奶白附，鸡心白附，疗毒豆，麻芋子，雷振子，野半夏，犁头尖根，剪刀草根，玉如意，野慈姑，副本一粒红，红南星。

【商品名】白附子，禹白附子，禹白附。以个匀、肥壮、质坚、体重、干燥、色白、粉性足者为佳。

【处方名】白附子，禹白附，生白附子，制白附子，制禹白附，姜白附等。

处方中写白附子、禹白附均指生白附子。为原药材去杂质，洗净，切片，晒干入药者。毒性大，祛风解痉作用强。

制白附子又称制白附、制禹白附、姜白附。为生白附子用清水漂后，再用白矾水泡至无麻辣感时取出，加捣碎的生姜、白矾和水适量，煮透，取出，晾至六七成干，切片，晒干入药者。制后毒性降低，祛风痰作用增强。

【注意】历代本草所用白附子均为今之所谓的关白附（又名竹节白附）。关白附为毛茛科植物黄花乌头 *Aconitum Coreanum* (Lévl.) Raipaics 的块茎，毒性很大，不应与禹白附（白附子）混用，应注意鉴别。

另外，白附子与川附子也不是同一种药材，功效不同，也不能混为一谈。

【性味归经】辛、甘，温。有毒。归脾、胃经。

【功效主治】燥湿化痰，祛风止痉，解毒散结。主治风痰壅盛，口眼喰斜，破伤风，偏头痛；毒蛇咬伤，瘰疬痰核。

【用量】3~5克。

【慎忌】孕妇忌服。生品一般不内服。

白 芥 子

出自《名医别录》。为十字花科植物白芥*Brassica alba* (L.) Boiss. 或芥*B. juncea* (L.) Czern. et Coss. 的成熟种子。夏秋间果实成熟时采收，取种子晒干，生用或炒用。

【别名】芥子，芥菜子，辣菜子，芥末子，白芥末子，苦芥子。

【商品名】白芥子：为植物白芥的成熟种子。主产于安徽、河南等地。

黄芥子：为植物芥的成熟种子。主产于安徽、河南等地。

北芥子：又名真白芥子。为产于北方的白芥子。习以为佳。

以上均以粒大、饱满、干燥、无杂质者为佳。

【处方名】白芥子，生白芥子，炒白芥子。

处方中写白芥子指炒白芥子。为净白芥子用文火炒至黄色入药者。

生白芥子为原药材去杂质生用入药者。多作外用。

【性味归经】辛，温。归肺经。

【功效主治】温肺祛痰，利气散结，通络止痛。主治寒痰壅滞，咳嗽气喘，胸满胁痛，渗出性胸膜炎，肢体关节疼痛或麻木，阴疽流注等。外用可移疮调炎。

【用量】3~6克。外用适量。

【慎忌】风热咳嗽或肺阴不足之干咳忌服。皮肤过敏者外用宜慎。

皂 荚(附：皂角刺)

出自《神农本草经》。为豆科植物皂荚树*Gleditsia sinensis*

Lam. 的果实。产于我国东北、华北、华东、中南和四川、贵州等地。秋季采摘成熟果实，晒干。切片（不去种子）生用。

【别名】大皂莢，猪牙皂，牙皂，皂角，大皂角，猪牙皂角，猪牙皂莢，牙皂角，小皂角，小牙皂，小皂莢，小皂，鸡栖子，长皂莢，长皂角，悬刀，眉皂，鸟犀，细牙皂。

【商品名】大皂莢；又名大皂角、悬刀。为植物皂莢树的成熟果实。形扁长个大。药用较少。

小皂莢：又名猪牙皂莢、猪牙皂、牙皂、眉皂、小皂角、小牙皂等。为植物皂莢树因受外伤等影响而结出的畸形小莢果。呈圆柱形而略扁曲。个体较小。药用较多。

以个小饱满、干燥有光泽者为佳。

【处方名】猪牙皂莢，猪牙皂角，猪牙皂，小牙皂，牙皂，皂莢，眉皂等。

【注意】同属植物新疆皂莢 *G. triacanthos* L. 的成熟果实。功效与皂莢类同，可作皂莢入药，但非正品。分布于新疆等地。

【性味归经】辛，温。有小毒。归肺、大肠经。

【功效主治】祛痰，开窍。主治顽痰阻塞，胸闷咳喘，咯痰不爽，卒然昏迷，口噤不开，癫痫痰盛。熬膏外涂可治疮肿未溃。

【用量】2~5克。焙焦研末冲服每次0.6~1克。

【慎忌】孕妇及体虚者、有出血倾向者均忌服。

附：皂角刺

皂角刺为皂莢树的棘刺。又名皂刺、皂针、皂角针、皂丁、天丁、皂莢刺、角针、角针片。全年可采，干燥或趁鲜切片后再干燥，生用。性味辛温。功能托毒排脓，活血消痈。适应于痈疽疮毒初起或脓成不溃者。用量3~10克。外用适量，醋煎涂患处。孕妇忌服。

桔 梗

出自《神农本草经》。为桔梗科多年生草本植物桔梗 *Platycodon grandiflorum* (Jacq.) A. DC. 的根。主产于安徽、江苏、山东等地。春秋二季采挖，而以秋季采者体重质实，品质优良。除去苗茎，洗净，刮去栓皮，晒干，切片。

【别名】苦桔梗，白桔梗，玉桔梗，苦梗，南桔梗，粉桔梗，符蘆，白药，利如，梗草，芦如，房图，大药，包袱花根，铃铛花根，道拉基，四叶菜根，沙油菜根，山铃铛花根，和尚花根，和尚头花根，土人参。

【商品名】南桔梗：又名苦桔梗。为产于安徽、江苏等南方地区者。

白桔梗：又名玉桔梗、粉桔梗。为体重质实、肥大肉白者。品质最优。

秋桔梗：为秋季采集者。质佳。

春桔梗：又称芽桔梗。为春季发芽时采集者。质次。

以根条肥大、质坚体重、干燥、断面色白、味苦者为佳。

【处方名】桔梗，苦桔梗，白桔梗，炒桔梗，炙桔梗。

处方中写桔梗、苦桔梗、白桔梗均指生桔梗。为原药洗净，刮去栓皮，晒干，切片入药者。

炒桔梗为桔梗片用文火炒至微黄色入药者。

炙桔梗又称蜜炙桔梗。为桔梗片用炼蜜一起拌炒至蜜尽色黄，取出放凉入药者。

【注意】同科植物荞麦 *Adenophora trachelioides* Maxim. 的根，称作甜桔梗、北桔梗。主产于华北及东北地区。古时曾一度与桔梗混用。现在仍有一些地区混用。二者性味功效不同，不能混用。混用是错误的，应予以纠正。

【性味归经】苦、辛，平。归肺经。

【功效主治】开宣肺气，祛痰，排脓。主治咳嗽痰多或咳痰不爽，胸膈痞闷，咽痛音哑；肺痈胸痛，咳吐脓血，痰黄腥臭。

【用量】3～10克。

柿 霜

出自《本草纲目》。为柿树的果实（柿子）制成柿饼时外表所生的白色粉霜。来源同柿蒂。

【别名】柿饼霜。

【商品名】柿霜：为柿饼表面的白色粉霜。以粉细、色白、无杂质者为佳。

柿霜饼：为柿霜经再加工制成的橙黄色小饼。

【处方名】柿霜。

【性味归经】甘，凉。归心、肺经。

【功效主治】清热，润燥，化痰，生肌。主治肺热燥咳，咽喉干痛，口舌生疮，吐血，咯血，消渴，声音嘶哑。

【用量】3～6克。外用适量。

【慎忌】风寒咳嗽慎服。

茶 叶

出自《本草便读》。为山茶科植物茶 *Camellia sinensis* O. Ktze. 的芽叶。原产我国南部山区，现安徽、江苏、河南、浙江、江西、福建、四川、湖北、陕西、贵州、云南等地均有栽培。种植三年以上的茶树即可采叶。于清明前后采集枝端初发之嫩芽或嫩叶，经加工后使用。

【别名】茶，荼，茗，荈，槚，荅，櫻，苦荼，苦櫻，暗茶，茶芽，芽茶，细茶，酪奴，花茶，大方茶。

【商品名】明前：又名明前茶。为清明前采集的嫩芽，经加工

而制成的茶叶。品质最优。

雨前：又名雨前茶。为谷雨前采摘的嫩叶或嫩芽，经加工后制成的茶叶。质优。

春茶：为春天采集的嫩叶或嫩芽，经加工制成的茶叶。品质较优。

绿茶：为鲜叶采集后，经过杀青，揉捻、干燥、精制等加工过程而制成的茶叶。

红茶：为鲜叶采集后，经过萎雕、揉捻、发酵、干燥、精制等加工过程而制成的茶叶。

信阳毛尖：为产于河南信阳地区的绿茶。

黄山茶：为产于安徽黄山的绿茶。

龙井茶：为产于杭州龙井的绿茶。

松罗茶：为产于安徽省歙县松罗地区的茶叶。

屯绿：为产于安徽省屯溪、休宁、歙县、宁国、绩溪等地的绿茶。

碧螺春：为产于江苏吴县太湖之滨洞庭山的绿茶。

武夷岩：为产于福建武夷山的绿茶。

白毫银针：为产于福建松溪、建阳等地的绿茶。

普洱：为产于云南普洱县的茶叶。

滇红：为产于云南的红茶。

祁红：为产于安徽祁门县的红茶。

君山银针：为产于湖南洞庭湖中君山上的绿茶。

黄山毛峰：为产于安徽黄山上绿茶。

六安瓜片：为产于安徽六安地区的绿茶。

乌龙茶：为产于福建安溪地区的绿茶。又分为一较春、铁观音等品种。

云雾茶：为产于高山云雾中的绿茶。有黄山云雾茶、庐山云雾茶等品种。

工夫红茶：为产于湖南的红茶。

茉莉花茶：又称花茶。为绿茶用茉莉花熏成的新品茶叶。其中以河南中州茉莉花茶、江苏苏州茉莉花茶、福建福州茉莉花茶、湖南猴王牌茉莉花茶品质最优。

茶砖：为用茶叶制成的长方体块状物。因形状大小像砖，故名茶砖。草原牧民喜欢饮此茶，畅销于内蒙古。

除此之外，茶叶还有许多品种，但最主要、最著名的就以上这些。以叶嫩、清香香气浓者为佳。

【处方名】茶叶，红茶，绿茶，花茶。

【性味归经】苦、甘，凉。归心、肺、胃经。

【功效主治】清头目，除烦渴，提精神，化痰，消食，利尿，解毒。主治肠炎，痢疾，小便不利，水肿，精神萎靡，头痛，目昏，心烦口渴，食积痰滞。

【用法】煎汤内服每次6～10克。泡茶或入丸散适量。

【禁忌】失眠患者睡前忌服。

地 骷 髏

出自《本草纲目拾遗》。为十字花科植物菜菔 *Raphanus sativus* L. 的老根。全国各地均产。在种子成熟后，连根拔起，剪除地上部分，取根洗净晒干。

【别名】仙人骨，仙人头，老萝卜头，老人头，地桔萝，气萝卜，枯萝卜，萝卜种，老萝卜种，空菜菔。

【商品名】地骷髅，桔萝卜。以个大、匀整、无泥土、无虫洞者为佳。

【处方名】地骷髅，桔萝卜，萝卜种，老萝卜种，老萝卜头。

【性味归经】甘、辛，平。归肺、胃、大肠经。

【功效主治】宣肺化痰，行气消食，利尿消肿。主治咳嗽痰多，食积气喘，脘腹痞闷胀痛，水肿喘满，噤口痢疾，肺脓疡，一氧化碳中毒。

【用量】 10~30克。外用煎洗适量。

水 莎 草

出自《中药大辞典》。为莎草科植物球形莎草 *Cyperus glomeratus* L. 的全草。分布于山东、河北、河南、江苏、安徽、浙江、青海、云南等地。生长于浅水中或水边湿地。夏秋采收，鲜用，或晒干生用。

【别名】 球形莎草，水莎莎草。

【商品名】 水莎草，球形莎草。以色绿、带有花序、无泥土等杂质者为佳。

【处方名】 水莎草。

【注意】 有些地区将同科植物扁秆荆三棱（又名三棱草） *Scirpus planiculmis* Fr. Schmidt 的块根作水莎草入药，应注意鉴别。

【性味归经】 苦，平。归肺经。

【功效主治】 化痰，止咳，平喘。主治慢性及老年性支气管炎。

【用量】 20~30克。鲜品加倍。

旋复花(附：金沸草)

出自《神农本草经》。为菊科多年生草本植物旋复花 *Inula britannica* L. var. *chinensis* (Rupr.) Reg. 的头状花序。主产于广东、华北、内蒙古等地及长江流域下游各省。夏秋两季花蕾开放时采收，晒干，生用或蜜炙用。

【别名】 蔴，伏花，复花，全福花，小黄花，金沸花，水葵花，金盏花，金钱花，黄熟花，野油花，猫耳朵花，驴耳朵花，羊耳朵花，艾菊，夏菊，金钱菊，六月菊，满天星，滴滴金，迭罗黄，盜庚，戴棋，盛棋，飞天蕊，全复花，旋福花，旋覆花，金沸

草花，鼓子花，驴儿菜花，驴儿草花，百叶草花，杨树草花。

【商品名】旋复花。以花朵大、花丝长、毛多、不散碎、色浅黄、无梗叶等杂质者为佳。

【处方名】复花，伏花，旋复花，炙复花，蜜炙旋复花。

处方中写复花、伏花、旋复花均指生旋复花。为原药材除去杂质及梗叶，生用入药者。

蜜炙旋复花又名炙旋复花、制旋复花、炙复花、制复花。为净旋复花用蜂蜜炙后入药者。

【注意】下列同属植物的头状花序，在不同地区亦作“旋复花”入药，但非正品。

日本旋复花 *I. britannica* L. var. *japonica* (Thunb.) French. et Savat. [*I. japonica* Thunb.]

线叶旋复花 *I. linariaefolia* Turcz.

毛旋复花（大旋复花）*I. britannica* L.

水朝阳花 *I. helianthus-aquatica* C. Y. Wu ex Ling

齿叶旋复花 *I. chrysanthia* Diels

【性味归经】苦、辛、咸，微温。归肺、脾、胃、大肠经。

【功效主治】消痰行水，降气止呕。主治痰涎壅肺，哮喘痰多，痰饮蓄结，胸膈痞闷；噫气，呕吐。

【用量】3～10克。

附：金沸草

来源同上，系用其地上部分，又名旋覆梗、旋复梗、旋复草、驴儿草、百叶草、金佛草、旋复杆、驴儿菜、杨树草、六月菊、白芷胡、黄花草、毛柴胡、黄柴胡等。夏秋二季采收，洗净，切段，晒干，生用。性味咸微苦，温。功能化痰，止咳，与旋覆花近似。用量8～12克。此外，鲜叶捣汁外敷，可治疗疮疡肿毒。

白 前

出自《名医别录》。为萝藦科多年生草本植物柳叶白前 *Cynanchum stauntoni* (Decne.) Schltr. ex Lev. 和芫花叶白前 *C. glaucescens* (Decne.) Hand-Mazz. 的根茎及根。秋季采挖，除去地上茎及泥土，洗净晒干。切段生用或蜜炙用。

【别名】嗽药，石蓝，柳叶白前，芫花叶白前，草白前，浙白前，鹅白前，鹅管白前，水杨柳根，大鹤瓢根，水柳根，溪瓢羹根，消结草根，乌梗仔根，水白前，空白前，软白前，白马鬃。

【商品名】柳叶白前：又名南白前、空白前、鹅白前、鹅管白前。为植物柳叶白前的根及根茎。其根茎中空，细长有节，状如鹅管，故有“鹅管白前”之称。主产于江南各地。

芫花叶白前：为植物芫花叶白前的根及根茎。主产于安徽、浙江等地。

以根条粗长、干燥、无泥土等杂质者为佳。

【处方名】白前，炙白前，蜜白前，蜜炙白前。

处方中写白前指生白前。为原药材去杂质，洗净切段，晒干入药者。

炙白前又名蜜白前、蜜炙白前。为白前切段，炼蜜炙后入药者。

【注意】有少数地区将白前与白薇颠倒错用，即以白前误当白薇，以白薇误当白前使用。白前与白薇的商品名称，应以鹅管白前、龙胆白薇，软白前、硬白薇，空白前、实白薇，水白前（指白前生长在水边）、山白薇（指白薇生长在山地）为正，反之为误。

白前的异物同品甚多，常见的有如下数种：

萝藦科牛皮消属植物徐长卿 *Cynanchum paniculatum* (Bunge) Kitag. 黑龙江省个别地区将其根误作白前使用。

石竹科植物瓦草（青骨藤、滇白前）*Melandrium viscidulum* (Bur. et Franch.) Williams var. *szechuanense* (Williams)

Hand.-Mazz. 云南个别地区以其根误作白前使用。

鸢尾科扁蒲扇（扁竹兰、白花射干）*Iris dichotoma* Pall. 江苏个别地区以其根误作白前使用。

百合科植物龙须菜 *Asparagus schoberioides* Kunth 河南个别地区以其根误作白前使用。

百合科植物多刺龙须菜 *A. pallasii* Printz. 山西及河南个别地区以其根误作白前使用。

此外，由于白前与白薇颠倒错用，某些白薇的异物同名药材，在个别地区亦误称白前或作白前使用。

【性味归经】辛、甘，平。归肺经。

【功效主治】祛痰，降气止咳。主治肺气壅实，痰多而咳嗽不爽，气逆喘促。

【用量】 3～10克。

前 胡

出自《名医别录》。为伞形科多年生草本植物白花前胡 *Paeoniae danum praeruptorum* Dunn. 和紫花前胡 *P. decursivum* Maxim. 的根。冬季至次春间采挖，除去茎叶，洗净晒干。刮去栓皮，温水浸润，切片生用。

【别名】 白花前胡（又名姨妈菜根、罗鬼菜根、水前胡、野芹菜根、岩风根、南石防风、坡地石防风、鸡脚前胡、岩川芎、岩棕根、岩风、官前胡、山独活），紫花前胡（又名土当归、鸭脚七、野辣菜、山芫荽、桑根子苗、鸭脚前胡、鸭脚板），云前胡，信前胡，南前胡，北前胡，冬前胡，嫩前胡，粉前胡，白前胡，酉尺蔓，射香菜。

【商品名】 白花前胡：又名云前胡、嫩前胡、信前胡。为植物白花前胡的根。主产于浙江、湖南、四川。

紫花前胡：为植物紫花前胡的根。主产于安徽、浙江、江西。

南前胡：指产于我国南方者。

北前胡：指产于我国北方者。

冬前胡：又名粉前胡、白前胡。为冬季采集者。质佳。

均以根条匀整、质嫩坚实、干燥、香气浓者为佳。

【处方名】前胡，嫩前胡，炒前胡，炙前胡。

处方中写前胡、嫩前胡指生前胡。为原药材去杂质，洗净晒干切片入药者。

炒前胡为净前胡切片用麸炒至微黄，筛去麸，而后入药者。缓和苦寒之性。

炙前胡又名蜜前胡、蜜炙前胡。为净前胡片炼蜜炙后入药者。润肺止咳化痰作用增强。

【注意】目前在药材商品市场上，除上述两个品种外，尚有下列植物的根也作前胡入药：

同属植物石防风 *Peucedanum terebinthaceum* (Fisch.) Fisch. ex Turcz. 的根，在陕西、河北、河南、广西、山东等地也作前胡使用，商品名称为“硬苗前胡”。分布于华北、东北及山东、河南、陕西、西藏等地。

同属植物华中前胡 *Peucedanum medium* Dunn 的根在湖北宜昌等地作前胡使用。分布于湖南、湖北、江西、四川、贵州等地。

以上两种虽可作前胡使用，但非正品。

隔山香 *Angelica citriodora* Hance 在福建作前胡使用，当地称“香前胡”。

大齿当归 *A. grosseserrata* Maxim. 在福建一些地区作前胡使用。

山芹当归 *A. miquelianum* Maxim. 在西川一些地区作前胡使用。

棱叶独活 *Heracleum tillifolium* Wolff 在湖南一些地区作前胡使用。

娘妈菜 *Conioselinum vaginatum* Thell. 在云南一些地区作前

胡使用。

短裂藁本(川防风) *Ligusticum brachylobum* Franch. 在云南一些地区作前胡使用。

羽裂藁本(滇前胡) *L. daucoides* (Franch.) Franch. 在云南一些地区作前胡使用。

田黄蒿 *Carum buriaticum* Turcz. 在青海一些地区作前胡使用。

硬阿魏(沙茴香) *Ferula borealis* Kuan [*Peucedanum rigidum* Bunge] 在内蒙古的一些地区作前胡使用。

东北峨参 *Anthriscus aemula* (Woron.) Schischk. 在东北地区作前胡使用。

以上均属误用，应该纠正。

【性味归经】苦、辛，微寒。归肺经。

【功效主治】降气祛痰，宣散风热。主治肺气不降，喘咳，痰稠；外感风热。

【用量】 6～10克。

瓜 萎

出自《名医别录》。为葫芦科多年生草质藤本植物栝楼 *Trichosanthes Ririlowii* Maxim. 和双边栝楼 *T. uniflora* Hao 的成熟果实。我国南北各地均产。秋季果实成熟时连柄剪下，悬挂凉干，或剖开去瓢，将壳与种子分别干燥。瓜蒌皮(壳)、瓜蒌仁(种子)生用或炒用。皮、仁合用称全瓜蒌。皮、仁、瓢合用称糖瓜蒌。

【别名】 贡，栝楼，栝蒌，地楼，全瓜蒌，全栝楼，瓜蒌全，果裸，果羸，果羸实，王菩，泽巨，泽治，泽姑，王白，天瓜、黄瓜，柿瓜，野苦瓜，杜瓜，大肚瓜，药瓜，鸭屎瓜，天圆子，糖瓜蒌，黄瓜蒌，瓜蒌实，蒌实，皱皮瓜蒌，光皮瓜蒌，瓢蒌，薜蒌，薜，薜蒌，王暮，油栝楼，油瓜蒌。

【商品名】 瓜蒌，栝楼，全瓜蒌，全栝楼。以个大皱缩、皮厚柔韧、杏黄或红黄色、糖性足、不破皮者为佳。

【处方名】 栝楼、瓜蒌、全瓜蒌、全栝楼、糖瓜蒌等。

【注意】 在药材商品市场上，下列几种同属植物的果实，亦作瓜蒌入药，但非正品。

大子瓜蒌 *T. truncata* Clarke 分布于广西、云南等地。

大苞瓜蒌 *T. bracteata* (Lam.) Voigt 分布于广东、广西、贵州和云南等地。

圆子瓜蒌 *T. hyalonoma* Hand-Mazz.

长萼瓜蒌 *T. sinopunctata* C. Y. et C. H. Yuch

另外，江苏和浙江的一些地方还把葫芦科植物王瓜（又名土瓜、吊瓜）*Trichosanthes cucumeroides* (Ser.) Maxim. 的果实误作瓜蒌入药，应该纠正。

【性味归经】 甘，寒。归肺、胃、大肠经。

【功效主治】 瓜蒌皮清肺化痰，利气宽胸；瓜蒌仁润肺化痰，滑肠通便；全瓜蒌兼具以上功效。主治肺热咳嗽，痰稠不易咯出；胸痹，结胸，胸膈痞闷或作痛；肠燥便秘；乳痈或乳汁不通。

【用量】 全瓜蒌 6~10克；糖瓜蒌 10~15克；瓜蒌皮 6~12克；瓜蒌仁 4~6克。

【慎忌】 脾虚便溏或泄泻者忌服。反乌头。

川 贝 母

出自《神农本草经》。为百合科多年生草本植物川贝母（卷叶贝母）*Fritillaria cirrhosa* D. Don. 或暗紫贝母 *F. unibracteata* Hsiao et K. C. Hsia 或甘肃贝母（西北贝母）*F. przewalskii* Maxim. 或梭砂贝母（雪山贝母、雪山贝）*F. delavayi* Franch. 的地下鳞茎。夏季采挖，晒或炕至上粉后，装入新麻布袋内，撞去泥土及须根，晒干。

【别名】 贝母，川贝，蛇，黄虻，茵，贝母，空草，贝父，药实，苦花，苦菜，勤母，尖贝母，尖贝，卷叶贝母，棱砂贝母，雪山贝，乌花贝母，暗紫贝母，甘肃贝母，小贝母，商草，母龙精，阿皮卡（藏族名）。

【商品名】 川贝母：又名京川贝、西贝母、西贝、新疆贝、伊贝、伊贝母、松贝、青贝、炉贝、岷贝、川贝、尖贝、平贝。为百合科植物川贝母、暗紫贝母、甘肃贝母、棱砂贝母、乌花贝母的地下鳞茎。主产于四川、云南、甘肃和西藏等地。以质坚、色白、粉性足者为佳。

松贝：又名松潘贝、松贝母。为产于四川松潘地区的川贝母。为植物卷叶贝母和暗紫贝母的鳞茎。品质最优。

珍珠贝：为松贝中个体较小者。

青贝：又名青贝母。为产于青海、四川、云南等地的川贝母。为卷叶贝母和暗紫贝母的鳞茎。品质亦优。

炉贝：又名知贝、知贝母、炉贝母、虎皮贝、虎皮贝母等。为产于甘肃等地的川贝母。为植物棱砂贝母的鳞茎。

岷贝：又名岷贝母。为产于甘肃地区的川贝母。为植物甘肃贝母的鳞茎。

平贝：又名平贝母。为产于东北地区的川贝母。为植物平贝母 *Fritillaria ussuriana* Maxim. 的鳞茎。

西贝：又名新疆贝、新疆贝母、伊犁贝母、天山贝母、伊贝、伊贝母、生贝、生贝母、西贝母。为植物伊贝母 *F. pallidiflora* Schrek. 或新疆贝母 *F. ferganensis* A. Log. 和滩贝母 *F. karelinii* Baker. 的鳞茎。

北贝：为植物一轮贝母 *F. maximowiczii* Freyn 的鳞茎。主产于华北等地。

冲松贝母：为同属植物冲松贝母 *F. cirrhosa* D. Don var. *paohsinensis* S. C. Chen 的鳞茎。主产于四川西部地区。

太贝：为同属植物太白贝母 *F. taipeiensis* P. Y. Li. 的鳞

茎。主产于陕西太白山。

【处方名】川贝，川贝母，贝母。

【性味归经】苦、甘，微寒。归肺、心经。

【功效主治】化痰止咳，清热散结。主治肺虚久咳，痰少咽燥；外感风热咳嗽；痰火郁结所致的咯痰黄稠；瘰疬疮痈肿毒及乳痈、肺痈、甲状腺腺瘤等。

【用量】3～10克。研细粉冲服每次1～1.5克。

【禁忌】反乌头。

浙 贝 母

出自《神农本草经》。为百合科多年生草本植物浙贝母 *Fritillaria verticillata* Willd. var. *thunbergii* Bak. 的地下鳞茎。于立夏植株枯萎后采挖，洗净泥土，按大小分开，大者摘去心芽，小者不去心芽，分别撞擦，除去外皮，干燥。

【别名】浙贝，象贝母，象贝，大贝母，大贝，苏贝母，元宝贝母，元宝贝，珠贝母，珠贝，宝贝，板贝。

【商品名】浙贝母：又名大贝母、象贝母、浙贝、大贝、象贝。为百合科植物浙贝母的地下鳞茎。主产于浙江、安徽、江苏、湖南等地。多为人工栽培。以鳞茎肥壮、质坚实、干燥、断面色白、粉性足者为佳。

象贝母：又名象贝。为浙贝母中产于浙江象山者。

元宝贝：为象贝中鳞瓣一面凹入形如元宝状者。品质最优。

珠贝母：又名珠贝。为象贝中鳞茎完整呈偏圆球形者。品质略次。

苏贝母：为浙贝母的野生种。其鳞茎较栽培者小。

【处方名】浙贝，象贝，大贝。

【注意】葫芦科多年生植物假贝母 *Bolbostemma paniculatum* (Maxim.) Franquet 的不规则球形鳞茎，称为土贝母，土大贝，

功效与浙贝母相似，可作为浙贝母的代用品。但二者不是同一种药材，不应混为一谈。

【性味归经】苦，寒。归肺、心经。

【功效主治】化痰止咳，清热散结。主治肺阴不足引起的干咳或久咳，或咳嗽痰少，咽干咽痛；疮痈肿毒，肺痈，乳痈，甲状腺腺瘤等。

浙贝母偏于清热散结，川贝母偏于化痰止咳。

【用量】 6～10克。

【禁忌】反乌头。

天 竹 黄

出自《开宝本草》。为禾本科植物青皮竹 *Bambusa textilis* Mc-Clure 等秆内的分泌液经干燥凝结而成的块状物。主产于云南、广东、广西等地。秋、冬二季采收，砍破竹杆，剖取竹黄，晾干。

【别名】竹黄，天竺黄，竹膏，竹糖，广竹黄，竺黄，空个玄。

【商品名】天竹黄，天竺黄，竹黄，竺黄。以块大、干燥、色灰白、体轻质硬而脆、吸湿性强者为佳。

【处方名】竹黄，竺黄，天竹黄，天竺黄。

【注意】浙江、安徽、江苏等地出售的竹黄，名叫竹三七，又名竹花。为肉座菌科真菌竹黄 *Shiraia bambusicola* Henn. 的子座，不能混作天竹黄入药。

【性味归经】甘，寒。归心、肝、胆经。

【功效主治】清热化痰，清心定惊。主治痰热抽搐，惊厥，中风痰塞，肺热咳喘。

【用量】 3～6克。研末吞服每次0.6～1克。

竹 茹

出自《名医别录》。为禾本科青秆竹 *Bambusa breviflora* Munro 和 淡竹 *Phyllostachys nigra* (Lodd.) Munro var. *henonis* (Miff.) Stapf ex Rendle 的秆的中间层，即去掉绿层后所刮下的纤维。产于长江流域和南部各省。四季可采，以冬季采者为佳。鲜用，晒干生用或姜汁炒用。

【别名】 竹皮，青竹茹，淡竹皮茹，淡竹茹，麻巴，竹二青，竹二皮，嫩竹茹，细竹茹，水竹茹，甘竹茹，金竹花，光若竹茹，钓鱼竹茹，白夹竹茹，如金竹茹，杜圆竹茹，斑真竹茹，荆竹茹，罗汉竹茹，慈竹茹，金竹茹，平竹茹。

【商品名】 竹茹，淡竹茹。以丝细均匀、干燥、色绿、质柔软、有弹性者为佳。

【处方名】 竹茹，鲜竹茹，姜竹茹。

处方中写竹茹指生竹茹。为原药材去杂质晒干入药者。长于清肺化痰。

鲜竹茹为竹茹鲜品入药者。长于清热化痰。

姜竹茹为竹茹用姜汁拌匀后再炒至黄色者。长于化痰止呕。

【性味归经】 甘，微寒。归肺、胃、胆经。

【功效主治】 清热化痰，除烦止呕。主治肺热咳嗽，咳痰黄稠；痰火内扰，心烦不安；胃热呕吐。

【用量】 4～10克。

竹 沥

出自《名医别录》。来源同竹茹，系新鲜的淡竹和青秆竹等竹秆经火烤所沥出的液汁。为淡黄色之澄清汁体。不能久藏。近年用安瓿密封装置，可以久藏。

【别名】淡竹沥，淡竹，竹油，竹沥油，竹汁，鲜竹沥，竹沥水，竹沥膏，苦竹沥，慈竹沥，火泉。

【商品名】竹沥，竹沥水，竹沥膏，鲜竹沥。以汁清、味甘、新鲜者为佳。

【处方名】竹沥，鲜竹沥。

【性味归经】甘，寒。归心、肺、胃经。

【功效主治】清热化痰。主治肺热咳嗽，痰稠；痰热蒙蔽清窍诸证，中风痰迷，惊痫癫狂；乙脑和流脑之高热、痰迷、呕吐等。

【用量】30～50克冲服。

【慎忌】寒嗽及脾虚泄泻者忌服。

海 浮 石

出自《日华子本草》。海浮石为通称，实际上有两类药材，一类为胞孔科动物脊突苔虫 *Costazia aculeata* Canu et Bassler 或 瘤苔虫 *C. costazii* Audouin 的干燥骨骼。为珊瑚样的不规则块状物，又名石花。另一类为火山喷出的岩浆形成的多孔状石块，又名海乳石。石花分布于我国南方沿海各地，在夏秋季捞起，洗去盐质及泥沙，漂净，晒干用。海乳石主产于广东沿海，捞出后洗净晒干。用时捣碎，或水飞用。

【别名】石花，海石花，海乳石，浮海石，海石，浮水石，水泡石，羊肚石，水花，岩浮石，黑浜珊瑚，海石，海南石。

【商品名】石花：又名海石花、浮海石、海浮石、黑浜珊瑚。为动物脊突苔虫或瘤苔虫的干燥骨骼，为珊瑚样不规则块状物。主产于广东、福建、浙江等南方沿海地区。

浮石：又名岩浮石、海乳石、大海浮石。为火山喷出的岩浆形成的多孔状石块。主产于山东、辽宁、广东、福建等沿海地区。

均以味咸、质轻、能浮于水面者为佳。

【处方名】海浮石，浮石，煅浮石。

处方中写浮石、海浮石、浮海石均指生海浮石。为原药去杂质，晒干敲碎成小颗粒入药者。

煅浮石又称煅海浮石。为净海浮石放砂罐内，置炉火中烧透，取出放凉入药者。

【注意】药材商品中还有一种“小海石”。为海滨石灰华。系为海水中溶解的碳酸钙等盐类围绕贝壳、贝壳碎片或其他砂砾等沉积而成。主产于山东烟台。非海浮石正品。

【性味归经】咸，寒。归肺经。

【功效主治】清肺化痰，软坚散结。主治痰热咳嗽，咳痰稠粘；瘰疬结核；砂淋小便涩痛。

【用量】6～10克。

海 蛤 壳

出自《神农本草经》。为軟體动物帘蛤科多种海蛤的贝壳。常用的是文蛤 *Meretrix meretrix* L. 和青蛤 *Cyclina sinensis* Gmelin 的贝壳。产沿海地区。春秋两季自海滩泥沙中淘取，去肉，洗净。生用或煅用。捣末，或水飞用（称蛤粉）。

【别名】文蛤，文蛤壳，青蛤，青蛤壳，蛤壳，海蛤，花蛤，花蛤壳，黄蛤，黄蛤壳，圆蛤，圆蛤壳，白利壳，紫蛤，紫蛤壳，蛤蜊，蛤蜊壳。

【商品名】文蛤：又名海蛤壳、白利壳、海蛤、花蛤壳、黄蛤壳。为軟體动物文蛤的贝壳。主产于广东、海南等地。

青蛤：又名青蛤壳、河蛤壳。为軟體动物青蛤的贝壳。主产于江苏、福建、山东、浙江等地。

以个大均匀、去净肉及泥沙、干燥者为佳。

【处方名】蛤壳，海蛤壳，文蛤，煅蛤壳，蛤粉，蛤壳粉，海蛤粉等。

处方中写蛤壳、海蛤壳、文蛤均指生蛤壳。为原药去杂质，洗净

晒干，碾碎入药者。

煅海蛤壳又名煅蛤壳。为净海蛤壳放无烟火上烧至红透，取出放凉，碾碎入药者。

蛤粉又名蛤壳粉、海蛤粉。为净海蛤壳水飞入药者。

【性味归经】苦、咸，寒。归肺、胃经。

【功效主治】清肺化痰，软坚散结。主治肺热痰稠，咳嗽气喘，癰瘤痰核；水气浮肿，小便不利；胃痛泛酸。研末外用可敛疮收口。

【用量】10~15克。外用适量。

【禁忌】风寒咳嗽患者不宜服用。

礞 石

出自《嘉祐本草》。为硅酸盐类矿石，分青礞石与金礞石两种。青礞石为绿泥石片岩 Chlorite-schist，应用较广；金礞石为云母片岩 Mica-schist。我国凡有云母矿山处均产，但以四川产者为佳。采后，击碎，与火硝共煅至礞石呈金黄色时为止，再水飞去其硝毒，阴干。

【别名】青礞石，金礞石，烂石，酥酥石，绿泥石片岩，云母片岩。

【商品名】青礞石：为绿泥石片岩的矿石。主产于江苏、浙江、湖南、湖北、河北等地。以色青、块整、断面有亮星点、无泥杂质者为佳。

金礞石：又名酥酥石、烂石。为云母片岩的矿石。主产于河南、河北、山西、四川等地。以块整均匀、色金黄、无杂质者为佳。

【处方名】礞石，青礞石，金礞石，煅礞石，煅青礞石，煅金礞石等。

处方中写礞石、青礞石、金礞石均指生礞石。为原药去杂质及

泥土，碾碎入药者。

煅礞石又称煅青礞石或煅金礞石。为净礞石敲碎，与火硝共煅至呈金黄色，再水飞去其硝毒，阴干后入药者。

【性味归经】甘、咸，平。归肺、肝经。

【功效主治】下气消痰，平肝镇惊。主治顽痰及老痰浓稠胶结，气逆喘咳的实证；痰积惊痫。

【用量】6～10克。入丸散剂每次1～2克。

【禁忌】孕妇及虚证患者忌服。

海 藻

出自《神农本草经》。为马尾藻科植物海蒿子（大叶海藻）*Sargassum pallidum* (Turn.) C. Ag. 和羊栖菜（小叶海藻）*S. fusiforme* (Harv.) Setch. 的全草。主产于浙江、福建、广东、山东及辽宁等沿海地区。夏季采收，除去杂质，用清水洗漂，稍晾，切段，晒干。

【别名】薅，藻，藻，海萝，海带花，海根菜，海草，海茜，海菜芽，海大麦，落首，乌菜，大谷穗，钓滚菜，灯笼菜，六角菜，秧菜，玉草，茜米，玉茜，龟鱼茜，鹿角尖，杨角子，羊奶子，海蒿子，大蒿子，羊栖菜，玉海草，灯笼藻，胡须泡，药茶，海菜，鹿尾菜，大叶海藻，小叶海藻，神马草，海汤草。

【商品名】大叶海藻：为植物海蒿子的干燥藻体。主产于山东、辽宁。

小叶海藻：为植物羊栖菜的干燥藻体。主产于福建、浙江、广东等地。

均以干燥、色黑褐、盐霜少、枝嫩、无泥沙等杂质者为佳。

【处方名】海藻，淡海藻。

【注意】在药材商品市场上，下列同属植物在不同地区亦作海藻使用，但非正品。

三角藻 *Sargassum tortile* C. Ag. 分布于辽宁、河北沿海地区。

鼠尾藻 *S. thunbergii* (Mert.) O. Ktze. 在甘肃等地作海藻使用。

海黍子 *S. kellmanianum* Yendo 在内蒙古、山东、贵州等地作海藻使用。

马尾藻 *S. ererve* C. Ag. 分布于我国各沿海地区。

闽粤马尾藻 *S. vachellianum* Grev. 在安徽一些地区作海藻使用。

此外，江西个别地区还用铁钉菜科植物铁钉菜 *Ishige okamurai* Yendo 的全草作海藻使用。此为误用，应该纠正。因铁钉菜与海藻形态、功效均不相同，不能混用。

【性味归经】咸，寒。归肝、胃、肾经。

【功效主治】消痰软坚，利水。主治瘿瘤，瘰疬，脚气，水肿。

【用量】10~15克。

【慎忌】反甘草。

昆 布

出自《名医别录》。为昆布科植物海带 *Laminaria japonica* Aresch. 和翅藻科植物昆布 *Ecklonia kurome* Okam. 的叶状体。主产于辽宁、山东及福建等地。夏秋两季采收。由海中捞出后，晒干。拣去杂质，用水漂净，捞出，稍晾，切成宽丝，阴干。

【别名】纶布，海昆布，海带，黑昆布，面其菜，鹅掌菜，五掌菜，裙带菜，海马藻，江白菜。

【商品名】海带：又名海菜。为海生植物海带的干燥叶状体。主产于山东、辽宁等海域。

黑昆布：又名面其菜、鹅掌菜。为植物昆布的干燥叶状体。主产于福建。

裙带菜：又名海芥菜。为翅藻科植物裙带菜 *Undaria pinnatifida* (Harv.) Sur. 的干燥叶状体。主产于浙江。在吉林、辽宁、河北等地作昆布入药。

均以色棕黑、干燥整齐、无杂质者为佳。

【处方名】昆布，淡昆布。

【注意】在药材商品市场上，国内个别地区将下列药材误作昆布入药，应该纠正。

绿藻类石尊科植物石尊（菜石尊、海白菜）*Ulva lactuca* L. 主产于福建、广东。

石尊科植物孔石尊 *U. pertusa* Kjellm. 主产于福建。

褐藻类萱藻科植物鹅肠菜 *Endarachne binghamiae* J. Ag. 湖南一些地区误作昆布使用。

【性味归经】咸，寒。归肝、胃、肾经。

【功效主治】消痰软坚，利水。主治瘿瘤，瘰疬，甲状腺肿，肿瘤，肝硬化，脚气浮肿或水肿等。

【用量】10~15克。

黄 药 子

出自《开宝本草》。为薯蓣科多年生宿根缠绕性藤本植物黄独 *Dioscorea bulbifera* L. 的块茎。产于我国南方各地。夏秋两季采挖，洗净泥土，去掉毛状的须根，切片，晒干。生用。

【别名】黄药，黄药根，黄药脂，黄独，黄独根，木药子，大苦，木药脂，金线吊蛤蟆，金线吊虾蟆，金丝吊蛋，红药子，零余薯，香芋，土芋，黄狗头，土卵，山慈姑，黄虾蟆，毛卵陀，铁秤陀，黄金山药，薯瓜乳藤根，黄座荔，板薯，淮山薯，苦茅薯，草莞薯，雷公薯，土首乌，草莞薯。

【商品名】黄药子，黄独。以片大、外皮棕黑色、断面黄色者为佳。

【处方名】黄药子。

【注意】目前在药材商品市场上，有少数地区把虎耳草科植物老蛇盘 *Rodgersia aesculifolia* Batal. 的根状茎和蓼科植物朱砂七（毛脉蓼）*Polygonum ciliinerve* (Nakai) Ohwi 的块根作黄药子用。此为误用，应该纠正。

【性味归经】苦，寒。归肺、肝经。

【功效主治】散结消癓，清热解毒，凉血止血。主治癰疾，甲状腺肿，疮疡肿毒，咽喉肿痛，毒蛇咬伤，血热妄行所致的吐血，衄血，咯血；咳嗽，气喘，百日咳等。

【用量】10~15克。

【禁忌】脾胃虚弱者及肝病患者慎服。

胖 大 海

出自《本草纲目拾遗》。为梧桐科植物胖大海 *Sterculia scaphigera* Wall. 的成熟种子。主产于越南、印度等地，我国广东、海南也有出产。于4~6月间，由开裂的果实上采取成熟种子，晒干，生用。

【别名】大海，大海子，大海榄，胡大海，通大海，安南子，大发，大洞果，膨大海，蓬大海。

【商品名】星大海：集散于新加坡者。品质较优。

胖大海：各地所产胖大海的通称。以个大、外皮细、淡黄棕色、有细皱纹及光泽、无破皮者为佳。

【处方名】大海，胖大海，遗大海。

【性味归经】甘，寒。归肺，大肠经。

【功效主治】清宣肺气，清肠通便。主治痰热咳嗽，肺热声哑，热结便秘，阳明头痛，目赤。

【用量】3~5枚。沸水浸泡冲服或水煎服。

【禁忌】脾虚便溏或泄泻者忌服。

猪 胆 汁

出自《名医别录》。为猪科动物猪 *Sus scrofa domestica* Brisson 的胆汁。各地均产。取得后挂起晾干，生用。

【别名】猪胆，猪苦胆，豕胆，豕胆汁，豨胆，豨胆汁，豚胆，豚胆汁，彘胆，彘胆汁，彘胆，彘胆汁。

【商品名】猪胆汁。以新鲜、色青蓝、苦味浓者为佳。

【处方名】猪胆汁。

【注意】除猪胆外，诸如羊胆、牛胆、鸡胆、鸭胆、蛇胆等均可应用，且具有相似的功效。但鱼胆（尤以青鱼、草鱼等毒鱼类的胆）不可轻率应用，以免中毒。

【性味归经】苦，寒。归肝、胆、肺经。

【功效主治】清肺化痰，清热解毒。主治肺热咳嗽，痰多不爽，百日咳，目赤肿痛，喉痹，黄疸，痢疾，疮疡肿毒，热结便秘。

【用量】2～4克。外用适量。

【慎忌】脾胃虚弱，食欲不振，便溏或腹泻者慎服。

蔊 菜

出自《本草拾遗》。为十字花科1年生草本植物蔊菜 *Rorippa montana* (Wall.) Small 的全草。主产于华东地区及河南、陕西、甘肃、湖南、广东等省。夏秋二季采收，洗净，晒干。鲜用或生用。

【别名】獐菜，辣米菜，野油菜，塘葛菜，干油菜，石豇豆，地豇豆，鸡肉菜，田葛菜，江剪刀草，野雪里蕻，野芥草，野菜花，山芥菜，独根菜，山萝卜，金丝葵，铁菜。

【商品名】蔊菜。以枝叶肥盛、无泥土等杂质者为佳。

【处方名】 荠菜，野油菜。

【注意】 在药材商品市场上，同属植物 印度荠菜 *Rorippa indica* (L.) Hiern与荠菜形态及功效极相似，常同等入药。

【性味归经】 辛、苦，平。归肺、肝经。

【功效主治】 祛痰止咳，清热解毒，利湿退黄。主治咳嗽痰喘，气管炎，咽喉肿痛，疮痈肿毒，湿热黄疸。

【用量】 10~20克。鲜品加倍。外用适量。

(二) 止咳平喘药

杏 仁 (附：甜杏仁)

出自《神农本草经》。为蔷薇科落叶乔木植物山杏 *Prunus armeniaca* L. var. *ansu* Maxim. 或辽杏(东北杏) *P. mandshurica* (Maxim.) Koehne 或西伯利亚杏 *P. sibirica* L. 及杏 *P. armeniaca* L. 的成熟种子。产于我国东北、内蒙古、华北、西北、新疆及长江流域各省。夏季果实成熟时收集种子，晒干。生用。用时捣碎。

【别名】 苦杏仁，杏核仁，山杏仁，东北杏仁，辽杏仁，西伯利亚杏仁，杏子，木落子，杏梅仁，北杏仁，杏人，杏核人，坎子，德儿，苦扁桃，草金丹。

【商品名】 杏仁，苦杏仁，北杏仁。以颗粒均匀、饱满、干燥、不破碎者为佳。

【处方名】 生杏仁，光杏仁，杏仁，苦杏仁，炒杏仁，蜜杏仁，炙杏仁，杏仁霜，杏仁泥。

因生杏仁有毒，很少使用。故处方中写杏仁、苦杏仁均指炒杏仁、蜜杏仁或炙杏仁。若需用生杏仁时，需写明“生杏仁”。

生杏仁又名原杏仁、囫囵杏仁。为杏仁原药材不去皮尖而入药者。有毒，用宜慎。

光杏仁又名净杏仁。为原杏仁用沸水浸泡后，搓去皮尖入药者。

炒杏仁为光杏仁用麸炒至微黄略带焦斑，筛去麸，然后入药者。

蜜杏仁又名蜜炙杏仁，为光杏仁炼蜂蜜炙后入药者。润肺止咳功效增强。

炙杏仁为生杏仁用甘草水浸泡，搓去皮尖，晒干入药者。

杏仁霜为光杏仁经压榨去油后制成霜入药者。

杏仁泥为光杏仁捣成泥入药者。

【性味归经】苦，微温。有小毒。归肺、大肠经。

【功效主治】止咳平喘，润肠通便。主治咳嗽气喘，肠燥便秘。

【用量】4～12克。

【禁忌】有小毒，勿服用过量。孕妇及小儿宜慎服。

附：甜杏仁

甜杏仁为蔷薇科植物杏或山杏的部分栽培种而其味甘甜的干燥种仁。又名叭杏仁、八斗杏仁、巴旦杏仁、叭达杏仁、大杏仁、南杏仁、南杏、京杏仁、梅杏仁、甜杏子、巴达杏仁等。主产于河北、北京、山东等地。性味甘平。功效与苦杏仁近似而长于滋润，故虚劳咳喘最宜用之。用量6～15克。

百 部

出自《名医别录》。为百部科多年生草本植物直立百部 *Stemona sessilifolia* (Miq) Franch. et Sav. 或蔓生百部(蔓草百部、百部草、百部根、婆媳草、药虱药) *S. japonica* (Bl.) Miq. 或对叶百部(野天门冬根、山百根) *S. tuberosa* Lour. 的干燥块根。

春秋二季采挖，洗净，除去须根，入沸水烫或蒸至无白心，晒干，切段。生用或蜜炙用。

【别名】直立百部，蔓生百部，对叶百部，百条根，百奶，百奶根，山百根，肥百部，百部根，百部袋，百部子，嗽药，野天门冬，九丛根，九虫根，一窝虎，九十九条根，牛虱鬼，闹虱药，虱药，水萝卜，百部草根，药虱药，婆媳草根，蔓草百部，百步，王富。

【商品名】直立百部：为植物直立百部的干燥块根。以粗壮肥润、坚实色白者为佳。主产于河南、山东、安徽、江苏等地。

蔓生百部：又名蔓草百部。为植物蔓生百部的干燥块根。以粗壮肥润、坚实色白者为佳。主产于安徽、山东、江苏、湖南、湖北、江西、陕西、四川等地。

对叶百部：为植物对叶百部的干燥根茎。以肥壮、色黄白者为佳。主产于湖北、广西、云南、四川、安徽等地。

百部：又名大百部。为以上三个品种的统称。均以块根粗壮、质坚实、干燥、无杂质者为佳。

【处方名】百部，肥百部，生百部，制百部，蒸百部，炒百部，蜜炙百部，炙百部。

百部有毒，生品很少内服，多作外用，灭虱杀虫。故处方中写百部、肥百部均指制百部或炙百部，用生品时需写“生百部”。

生百部为原药材去除杂质及须根，洗净晒干，再润透切片或切段入药者。

制百部为生百部置甘草水中浸泡后，晒干入药者。可消除或减缓其毒性。

蒸百部为原药材蒸透，至无白心，再晒干切片或切段入药者。

炒百部为制百部用文火炒至略黄，外带焦斑而入药者。

蜜炙百部又称炙百部。为生百部或制百部炼蜜炙后入药者。润肺止咳作用增强。

【注意】目前在药材商品市场上，百部的市售品种比较混乱，

除上述三个品种外，下列同属植物的根，在某些地区亦作百部入药，但非正品。

细花百部 *Stemona parviflora* C. H. Wright 在海南作百部入药。

多花百部 *S. japonica* (Blume) Miq. var. *multiflora* T. W. Shie var. Nov. 分布于江西，当地有作百部入药者。

狭叶百部 *S. vagula* W. W. Smith 在云南丽江作百部入药。

此外，四川、云南少数地区，用百合科植物羊齿天门冬 *Asparagus filicinus* Ham. ex D. Don 的块根作百部使用，名“土百部”；广西个别地区，用石刁柏 *A. officinalis* L. 的块根作百部使用，名“小百部”。这些均属误用，应予以纠正。

【性味归经】 甘、苦，平。归肺经。

【功效主治】 润肺止咳，灭虱杀虫。主治咳嗽，百日咳，肺劳咳嗽等一切咳嗽；煎汁灌肠可治蛲虫病；水煎剂涂搽可灭头虱、体虱。

【用量】 4～9克。外用适量。

【慎忌】 孕妇及脾胃虚弱，恶心呕吐，食欲不振，便溏或腹泻者宜慎用。

紫 菀

出自《神农本草经》。为菊科多年生草本植物紫菀 *Aster tataricus* L. f. 的根及根茎。主产于河北、安徽及东北、华北、西北等地。各地多有栽培。春秋二季采挖，洗净晒干，切段。生用或蜜炙用。

【别名】 紫蒨，紫倩，紫菀茸，紫菀头，软紫菀，北紫菀，瓣紫菀，青菀，青莞，返魂草根，小瓣儿，小瓣，夜牵牛，夹板菜根，驴耳朵花根，茈菀，紫苑，子元，子菀，关公须，甜紫菀。

【商品名】 毫紫菀：产于安徽省亳县者。以头大、须根粗者

为佳。

祁紫菀：产于河北省安国（旧时祁州）者。以须根粗无砂土者为佳。

辫紫菀：将地下根茎挖出后，洗净泥土，除去芦头残茎，然后将须根辫顺晒干者。

紫菀头：为紫菀的干燥根茎。因呈圆形疙瘩头状，故称紫菀头。

紫菀茸：又名软紫菀。为头部带有细根者。因其头部簇生许多细根，质柔软如茸毛而不易折断，故而得名。

北紫菀：指产于我国河北等北方省份者。以根茎粗壮、干燥、色紫、质柔软、去净泥土及茎叶者为佳。

【处方名】子菀，子苑，紫菀，紫苑，蜜紫菀，炙紫菀，蜜炙紫菀等。

处方中写紫菀、紫苑、子菀、子苑均指生紫菀。为原药材去杂质，润透切段入药者。偏于散寒祛痰。

蜜紫菀又名**炙紫菀**、**蜜炙紫菀**。为净紫菀段用蜂蜜拌匀，稍闷，用文火炒至不粘手取出，摊晾后入药者。偏于润肺祛痰。

【注意】目前药材商品市场上，紫菀的市售商品比较混乱。除上述一种外，还有许多品种在不同地区也作紫菀入药，但非正品，应注意鉴别。

阿尔泰狗哇花（阿尔泰紫菀）*Heteropappus altaicus* (Willd.) Novopokr.的根，在新疆地区作紫菀入药。

缘毛紫菀（西藏紫菀）*Aster souliei* Franch. 及重冠紫菀 *A. diplostephioides* (DC) C. B. Clarke的根及根茎，在西藏地区作紫菀入药。

紫菀千花 *A. flaccidus* Burge的根，在西藏地区作紫菀入药。

异叶三裂脉马兰 *A. ageratoides* Turcz. var. *heterophyllus* Maxim. 的根，在甘肃作紫菀入药。

菊科橐吾属植物肾叶橐吾（蹄叶橐吾）*Ligularia fischeri*

(Ledeb.) Turcz. 和西北利亚橐吾(葫芦七) *L. sibirica* (L.) Cass 或狭苞橐吾 *L. intermedia* Nakai 或四川橐吾(牛尾参) *L. hodgsonii* Hook var. *sutchuenensis* (Franch.) Henry 或大叶橐吾 *L. macrophylla* (Ledeb.) DC. 或裂叶橐吾 *L. przewalskii* (Maxim.) Diels 等的根, 在东北、华北、陕西、云南、四川和新疆等地作紫菀入药, 商品统称“山紫菀”或“土紫菀”、“硬紫菀”、“蹄叶紫菀”、“马蹄紫菀”、“肾叶紫菀”。

【性味归经】苦、甘, 微温。归肺经。

【功效主治】化痰止咳。主治咳喘痰多。

【用量】6~10克。

款冬花

出自《神农本草经》。为菊科多年生草木植物款冬 *Tussilago farfara* L. 的花蕾。主产于河南、甘肃、山西及四川等地。地冻前当花尚未出土时采摘, 阴干, 除去泥土及花梗。生用或蜜炙用。

【别名】冬花、款冬、款花、艾冬花、看灯花、九九花、菟葵花、兔溪花、菟葵花、颗冻花、颗冬、橐吾花、橐石花、虎须花、款冻花、苦萃花、氐冬花、钻冻花、八角乌花、酉冬花、钻冬花。

【商品名】灵台冬花; 产于甘肃灵台地区及陕西榆林地区者。品质最优。

款冬花: 又名冬花。各地所产款冬花的统称。以河南产量最大。以花蕾朵大饱满、干燥、色泽鲜艳紫红、无花梗及泥土者为佳。

【处方名】款冬花, 冬花, 款冬, 生冬花, 炙冬花。

处方中写冬花、款冬、款冬花均指生款冬花。为原药材去除杂质及枝, 阴干入药者。

炙冬花又名蜜冬花、蜜炙冬花、蜜炙款冬花等。为净冬花加蜂蜜及适量开水拌匀稍闷, 再炒至不粘手取出晾凉入药者。润肺止咳

作用增强。

【注意】在药材商品市场上，陕西、青海有些地方把同科植物蜂斗菜 *Petasites japonicus* (Sieb. et Zucc.) Fr. Schmidt 或毛裂蜂斗菜 *P. tricholobus* Franch. 的花蕾充当款冬花入药，这是错误的，应该纠正。因为其形态、功效均与款冬花不同，不能混用。

【性味归经】辛，温。归肺经。

【功效主治】润肺止咳，化痰平喘。主治各种咳嗽喘息。

【用量】10~15克。

苏 子

出自《名医别录》。为唇形科1年生植物紫苏(尖紫苏) *Perilla frutescens* (L.) Britt. var. *acuta* (Thunb.) Kudo 和皱紫苏 *P. frutescens* (L.) Britt var. *crispa* (Thunb.) Hand.-Mazz. 的成熟果实。秋季果实成熟时采收，晒干。生用或微炒用。用时捣碎。

【别名】紫苏子，白苏子，玉苏子，黑苏子，铁苏子，野麻子，红苏子，红紫苏子，皱紫苏子，野苏子，赤苏子，尖紫苏子，杜苏子，香苏子。

【商品名】紫苏子：又名赤苏子、皱紫苏子。为栽培种紫苏的成熟干燥种子。粒大质优。其中以粒籽饱满、色灰棕、油性足、干燥无杂质者为佳。

野苏子：又名尖紫苏子、青苏子。为野生种紫苏的成熟干燥种子。粒小质次。

白苏子：又名玉苏子、荏子。为植物白苏 *P. frutescens* (L.) Britt 的成熟干燥种子。

【处方名】苏子，紫苏子，生苏子，炒苏子，苏子霜。

处方中写苏子、紫苏子均指生苏子。为原药材去杂质后生用捣碎入药者。偏于降气祛痰、润肠通便。

炒苏子又名炒紫苏子。为净苏子用文火炒至有香气起爆声，取出摊晾，然后入药者。偏于温肺散寒，祛痰平喘。

苏子霜为净苏子碾碎压榨去油后成为粉末入药者。减少滑肠之弊。

【性味归经】辛，温。归肺、大肠经。

【功效主治】止咳平喘，润肠通便。主治痰壅气逆，咳嗽气喘；肠燥便秘。

【用量】4～10克。

【慎忌】肺肾虚喘忌服。

桑 白 皮

出自《神农本草经》。为桑科小乔木植物桑树 *Morus alba* L. 的根皮。冬季采挖，刮去表层黄色栓皮后剥离皮部，洗净，切段，晒干。生用或蜜炙用。

【别名】桑皮，桑根皮，桑根白皮，白桑皮，伏蛇皮，马额皮。

【商品名】亳桑皮：产于安徽亳县一带者。

严桑皮：产于浙江者。

北桑皮：产于江苏者。

桑白皮：各地所产桑白皮的统称。以无栓皮、色白、皮肉厚、质柔韧、嚼之有粘性可成丝团者为佳。

【处方名】桑皮，双皮，桑白皮，双白皮，炙桑皮等。

处方中写桑皮、双皮、双白皮、桑白皮指生桑皮。为原药材去杂质，生用切丝入药者。偏于泻肺利水。

炙桑皮又名蜜炙桑皮、炙桑白皮等。为桑皮丝用蜂蜜加适量开水拌匀，稍闷，再用文火炒至不粘手时，取出摊晾入药者。偏于清热润肺，止咳平喘。

【性味归经】甘、苦，寒。归肺经。

【功效主治】 泻肺平喘，利尿消肿。主治肺热咳喘而痰多者；水肿实证，高血压病。

【用量】 6～15克。

【禁忌】 肺肾虚喘慎服。

葶苈子

出自《神农本草经》。为十字花科草本植物播娘蒿（南葶苈子、麦蒿）*Descurainia sophia*(L.) Schur.和独行菜（北葶苈子、腺茎独行菜、宁津草）*Lepidium apetalum* Willd.的成熟种子。立夏前后果实成熟时，割取全株，干燥，打下或搓下种子。生用或微炒，捣碎用。

【别名】 葶力子，甜葶苈，野芥菜子，播娘蒿子，米米蒿子，密密蒿子，麦蒿子，米蒿子，眉毛蒿子，眉眉蒿子，婆婆蒿子，黄蒿子，南葶苈子，北葶苈子，葶苈，亭历，苦葶苈，独行菜子，腺茎独行菜子，辣辣根子，辣辣菜子，羊辣罐子，拉拉罐子，白花草子，辣蒿子，辣麻麻子，宁津草子，大适，大室，丁历，丁药，葍蒿，葍，帝力。

【商品名】 南葶苈子：又名甜葶苈、甜葶苈子、华东葶苈子。为植物播娘蒿的成熟种子。主产于安徽、山东、江苏等地。

北葶苈子：又名苦葶苈，苦葶苈子。为植物独行菜的成熟种子。主产于河北、辽宁、内蒙古等地。

以上两种葶苈子均以粒实饱满、红棕色、无杂质者为佳。

【处方名】 葶苈子，葶苈子，炒葶苈子，盐葶苈子，蜜葶苈子等。

处方中写葶苈子、葶苈子指生葶苈子。为原药材去杂质，捣碎入药者。偏于泻肺平喘。

炒葶苈子为净葶苈子用文火微炒入药者。偏于理肺定喘。

盐葶苈子为净葶苈子用盐水拌匀，稍闷，再用文火微炒入药者，

偏于走肾利水。

蜜葶苈子为净葶苈子用蜂蜜兑适量开水拌匀，再用文火微炒至不粘手，摊晾后入药者。偏于润肺定喘。

【注意】目前在药材商品市场上，葶苈子的品种比较混乱。下列同科植物在不同地区也作葶苈子入药：

琴叶独行菜 *Lepidium virginicum* L. 在东北及华北一带作葶苈子入药。

野独行菜（柱腺独行菜）*L. ruderale* L. 分布于东北及甘肃、宁夏、贵州等地。在甘肃作葶苈子入药。

宽叶独行菜 *L. latifolium* L. 在青海、甘肃作葶苈子入药。

以上品种与葶苈子功效相似，可以代用。但非正品。

蔊菜 *Rorippa montana* (Wall.) Small 在江西、安徽等地以其种子误作葶苈子入药。

菥蓂 *Thlaspi arvense* L. 在云南个别地区误作葶苈子使用。当地称“土葶苈”或“苦葶苈”或“甜葶苈”。

桂竹香糖芥（桂竹糖芥）*Erysimum cheiranthoides* L. 在河北、山东、内蒙古等地以其种子误作葶苈子入药。

【性味归经】苦、辛，大寒。归肺、膀胱经。

【功效主治】泻肺平喘，利水消肿。主治痰涎壅滞，咳嗽喘促之实证。渗出性胸膜炎；水肿之实证，胸腹积水，小便不利；研末冲服可治肺心病，心力衰竭，水肿喘满等。

【用量】3～10克。

【慎忌】虚喘无实者忌服。

枇杷叶

出自《名医别录》。为蔷薇科常绿小乔木植物枇杷 *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl. 的叶。主产长江流域及南部各省。春末夏初采收壮实的叶片，晒干，刷去毛，洗净切碎，生用或蜜炙用。

【别名】杷叶，巴叶，芭叶，毛枇杷叶，白沙枇杷叶，卢橘叶。

【商品名】广杷叶：产于广东者。形大而厚，表面光滑，背面毛易除去。品质较佳。

苏杷叶：产于江苏者。产量最大。形小而薄，表面皱缩，凸凹不平，背而毛不易除去。品质较次。

均以叶大、干燥、色绿或红棕、无黄叶、不破碎者为佳。

【处方名】巴叶，杷叶，枇杷叶，鲜枇杷叶，炙杷叶，蜜炙杷叶，姜炙杷叶等。

处方中写巴叶、杷叶、枇杷叶指生枇杷叶。为原药材刷去绒毛，洗净，切丝入药者。偏于清肺胃热，降逆化痰。

鲜枇杷叶又名鲜杷叶。为新鲜枇杷叶刷去绒毛，洗净切丝入药者。偏于清肺止咳，解毒。

炙杷叶一般指蜜炙杷叶，或称蜜杷叶。为杷叶丝用蜂蜜拌匀后用文火炒至不粘手时取出摊晾入药者。偏于润肺止咳。

姜炙杷叶为杷叶丝用生姜汁拌匀微炒入药者。偏于和胃止呕。

【性味归经】苦，平。归肺、胃经。

【功效主治】化痰止咳，和胃降逆。主治咳嗽痰稠，胃热呕哕及口渴。

【用量】6～10克。

马兜铃

出自《药性论》。为马兜铃科多年生落叶藤本植物北马兜铃 *Aristolochia contorta* Bge. 和马兜铃 *A. debilis* S. et Z. 的果实。秋季果实由绿变黄时采摘，晒干生用或蜜炙用。

【别名】马斗铃，斗铃，马斗令，斗令，刁铃，兜铃，马铃果，马兜零，马兜苓，水马香果，葫芦罐，臭铃铛，臭瓜蛋，蛇参果，臭罐罐，万丈龙，后老婆罐，臭葫芦，臭辣秧子，野木香果，

痒辣菜果，麻丢铃，骂结吨（仫佬族名），定海根（侗族名）。

【商品名】北马兜铃：又名圆叶马兜铃。为植物北马兜铃的果实。主产于黑龙江、吉林及河北等地。

马兜铃：为植物马兜铃的果实。主产于安徽、江苏、浙江等地。

均以果实完整、色绿、干燥、种子充实者为佳。

【处方名】兜铃，马兜铃，马斗铃，蜜炙马兜铃，炙马兜铃等。

处方中写兜铃、马兜铃、马斗铃均指生马兜铃。为原药材去杂质生用入药者。

蜜炙马兜铃又名炙马兜铃、蜜马兜铃。为净马兜铃炼蜜炙后入药者。润肺止咳作用增强。

【注意】在药材商品市场上，西藏地区以同属植物囊花马兜铃 *A. saccata* Wall. 的果实作马兜铃入药；甘肃一些地方以同属植物大叶马兜铃 *A. kaempferi* Willd. 的果实作马兜铃入药。此非正品。

此外还有一些混用误用的，如：云南和四川部分地区把百合科植物荞麦叶大百合 *Cardiocrinum cathayanum* (Wils.) Stearn 和心叶大百合 *C. giganteum* (Wall.) Makino 的果实或种子误作马兜铃入药，习称“杜兜铃”或“百合马兜铃”。四川个别地区以葫芦科植物纤花雪胆 *Hemsleya graciliflora* Cogn. 的果实称作土兜铃，把土贝母属植物土贝母 *Bolbostemma paniculatum* (Maxim.) Franq. 的果实混称马兜铃，误作马兜铃入药。以上均应纠正。

【性味归经】苦、微辛，寒。归肺、大肠经。

【功效主治】清肺化痰，止咳平喘。主治肺热咳嗽，痰壅气促，肺虚久咳，痔疮肿痛或出血，高血压头晕面赤等。

【用量】3～10克。

【禁忌】剂量不宜过大，否则易引起呕吐。风寒咳嗽忌服。

矮 地 茶

出自《本草图经》。为紫金牛科常绿小灌木植物紫金牛 *Ardisia japonica* (Horst.) Bl. 的全株。主产于长江流域及南部各省。全年可采，洗净晒干，切段。鲜用或生用。

【别名】 紫金牛，平地木，老勿大，老不大，矮茶风，矮脚樟，地青杠，四叶茶，五托香，火炭酸，千年不大，千年矮，千年茶，不出林，叶下红，叶底红，矮茶，矮山茶，矮脚草，地茶，矮茶荷，雪里珠，矮茶子，叶下珍珠，凉伞盖珍珠，铺地凉伞，矮郎伞，矮脚茶，阴山红，映山红，野枇杷叶，大地风消，小接骨茶，马台剪，石青子，地红消，破血珠。

【商品名】 矮地茶，紫金牛。以植株完整、无泥土等杂质者为佳。

【处方名】 矮地茶，紫金牛，映山红。

【注意】 同属植物小紫金牛 *A. chinensis* L. 的全草，在有些地区亦作矮地茶入药，功效相似，但非正品。

【性味归经】 苦，平。归肺、肝经。

【功效主治】 止咳祛痰，利水渗湿，活血祛瘀。主治咳嗽痰多，湿热黄疸，水肿，跌打损伤，风湿痹痛，经闭腹痛等。

【用量】 10~20克。鲜品30~60克。

白 果

出自《本草纲目》。为银杏科落叶乔木植物银杏 *Ginkgo biloba* L. 的成熟种子。我国各地均有分布。秋季种子成熟时采收，除去肉质的外种皮，洗净，晒干。用时去壳，捣碎。生用或蒸（煮）熟以后用。

【别名】 银杏，银杏仁，白果仁，灵眼，佛指柑，佛指甲，公

孙树果仁，鸭脚子，鸭脚果仁，鸭掌树果仁。

【商品名】白果，银杏。以个大均匀、种仁饱满、壳色白黄者为佳。

【处方名】白果，白果仁，蒸白果，炒白果，熟白果等。

处方中写白果指生白果仁。为原药材去外壳及仁外之薄衣，捣碎入药者。

蒸白果为净白果仁蒸后捣碎入药者。

炒白果为净白果仁用文火炒至深黄色，略有焦斑，捣碎入药者。

熟白果为蒸、煮、煅、炒白果的统称。

【性味归经】甘、微涩，平。有小毒。归肺、脾经。

【功效主治】敛肺止咳平喘，健脾收涩止带。主治喘咳，气逆，痰多；白浊，带下。

【用量】6～12克。

【禁忌】咳嗽痰稠吐出不利者慎服。不宜大剂量生服，否则易引起中毒。

白 果 叶

出自《品汇精要》。为银杏科植物 银杏 *Ginkgo biloba* L. 的叶。9～10月采收，鲜用或晒干生用。

【别名】银杏叶，白果树叶，银杏树叶，鸭脚，鸭脚叶，鸭掌树叶，公孙树叶，飞蛾叶。

【商品名】白果叶，银杏叶。以叶片大、完整、无杂质者为佳。

【处方名】白果叶，银杏叶，鲜白果叶。

【性味归经】甘、苦、涩，平。归肺、心、大肠经。

【功效主治】益心敛肺，化湿止泻。主治胸闷心痛，心悸怔忡，痰喘咳嗽，泻痢，白带。

【用量】4～9克。鲜品加倍。

【慎忌】有实邪者忌服。

胡 颠 子 叶

出自《本草拾遗》。为胡颓子科植物胡颓子 *Elaeagnus pungens* Thunb. 的叶。夏季采集，洗净，鲜用或晒干生用。

【别名】蒲颓叶，潘桑叶，野枇杷叶。

【商品名】胡颓子叶，胡颓叶。以叶片大、色绿、完整、无杂质者为佳。

【处方名】胡颓子叶，蒲颓叶，鲜胡颓子叶，胡颓叶等。

【性味归经】酸、微苦，平。归肺经。

【功效主治】止咳，平喘，止血。主治咳嗽，慢性支气管炎，咳血，气喘，痈疽，外伤出血。

【用量】10~15克。鲜品20~30克。外用适量。

满 山 红

出自《东北常用中草药手册》。为杜鹃花科植物兴安杜鹃 *Rhododendron dauricum* L. 的叶。主产于我国东北及内蒙古等地。秋冬采集，鲜用或晒干生用。

【别名】映山红，迎山红，靠山红，山崩子，兴安杜鹃叶，兴安杜鹃，东北满山红，红杜鹃。

【商品名】满山红，东北满山红，兴安杜鹃。以叶肥大、完整、无杂质者为佳。

【处方名】满山红，迎山红，映山红，满山红叶。

【性味归经】苦，寒。归肺经。

【功效主治】祛痰止咳。主治慢性支气管炎，支气管喘息。

【用量】10~15克。鲜品加倍。

照 山 白

出自《山东中草药手册》。为杜鹃花科植物照山白(小花杜鹃)*Rhododendron micranthum* Turcz.的枝叶或花。分布于东北、华北及山东等地。夏秋采收，晒干生用。

【别名】小花杜鹃，照白杜鹃，万斤，万经棵，万荆头，达里(藏语名)，铁石茶，白镜子，白杜鹃，照山海。

【商品名】照山白，照白杜鹃，小花杜鹃。花以鲜艳、干燥洁净者为佳。枝叶以干燥、洁净、夏秋采者为佳。

【处方名】照山白，小花杜鹃。

【注意】春季采收者较秋季采收者毒性大10倍左右。故不应春季采收。

【性味归经】酸、辛，温。有大毒。归心、肺、大肠经。

【功效主治】祛痰，止咳，通络，调经。主治慢性气管炎，风湿痹痛，腰痛，痛经，产后关节痛，痢疾，跌打骨折，疮肿，皮肤瘙痒。

【用量】内服煎汤3～6克。外用鲜品捣敷适量。

【禁忌】孕妇忌服。不宜超量及长期服用。

白 松 塔

出自《山西中草药》。为松科植物白皮松*Pinus bungeana* Zucc.的球果。主产于山西、陕西、河南、甘肃、湖北、四川、辽宁、河北、山东、江苏等地。初冬采收不带种子的球果，碾去木质硬壳。

【别名】松塔，松球，松果，松元，松实，白松球，白松果，三针松球，三针松果，三针松塔，白骨松塔，白骨松果，白骨松球，樟树核桃，蛇皮松塔，蛇皮松果，蛇皮松球，虎皮松塔，虎皮

松球，虎皮松果。

【商品名】白松塔，松塔。以果大、干燥者为佳。

【处方名】白松塔，松塔，松球，松果。

【注意】同属植物马尾松 *P. massoniana* Lamb. 的球果称红皮松塔，功效近似，亦可治疗慢性支气管炎，可作为白松塔的替代品。

【性味归经】苦，温。归肺经。

【功效主治】镇咳，平喘，消炎，祛痰。主治慢性支气管炎，咳嗽，吐白沫痰，哮喘。

【用量】10~15克。鲜品15~30克。

暴 马 子

出自《吉林中草药》。为木犀科植物暴马丁香 *Syringa amurensis* Rupr. 的树皮、树干及茎枝。主产于辽宁、吉林、黑龙江、河北、陕西、甘肃、宁夏等地。全年可采，鲜用或晒干生用。

【别名】暴马丁香，白丁香，荷花丁香，棒棒木。

【商品名】暴马子，暴马丁香。皮以肉厚、片大均匀、无杂质者为佳。茎枝以条长、均匀、无杂质者为佳。

【处方名】暴马子，棒棒木。

【性味归经】苦，微寒。归肺经。

【功效主治】消炎，镇咳，利水。主治慢性支气管炎，哮喘，心脏性浮肿，肺心病。

【用量】10~20克。

【禁忌】风寒咳嗽及脾虚浮肿者忌服。

瓜 萎 子

为葫芦科植物栝楼 *Trichosanthes kirilowii* Maxim. 或双边栝

楼 *T. uniflora* Hao 及大子栝楼 *T. truncata* C. B. Clarke 和大苞栝楼 *T. bracteata* (Lam.) Voigt 等的种子。9~11月采收果实，剖开取出种子。晒干。

【别名】瓜蒌仁，栝楼仁，栝楼子，果裸仁，果裸子，王菩仁，王菩子，地楼子，地楼仁，泽巨子，泽巨仁，泽治子，泽治仁，王白子，王白仁，天瓜子，天瓜仁，蕷子，蕷仁，泽姑子，泽姑仁，黄瓜子，黄瓜仁，天圆子，天圆子仁，柿瓜子，柿瓜仁，野苦瓜子，野苦瓜仁，杜瓜子，杜瓜仁，大肚瓜子，大肚瓜仁，药瓜子，药瓜仁，鸭屎瓜子，鸭屎瓜仁，栝蒌子，栝蒌仁。

【商品名】栝楼子：为植物栝楼的种子。主产于安徽、河南、山东、江苏等地。

双边栝楼子：为植物双边栝楼的种子。主产于广西、广东、四川等地。

大栝楼子：为植物大子栝楼的种子。主产于广西、云南等地。

大苞栝楼子：为植物大苞栝楼的种子。主产于云南、贵州、广西、广东等地。

均以干燥、粒实饱满、无杂质者为佳。

此外，尚有同属植物红花栝楼 *T. rubriflos* Thorel ex Cayla (分布于云南、贵州)、马干铃栝楼 *T. lepiniana* (Naud.) Cogn (主产于云南)、喜马拉雅栝楼 *T. himalensis* C. B. Clarke 和王瓜 *T. Cucumeroides* (Ser.) Maxim. 的种子，在不同地区也作瓜蒌子入药。

【处方名】栝楼子，瓜蒌子，栝楼仁，瓜蒌仁，蒌仁，蒌子，炒栝楼子，蒌仁霜。

处方中写栝楼子、瓜蒌子、栝楼仁、瓜蒌仁、楼仁、蒌子、蒌仁等均指生瓜蒌子。为原药去杂质，捣扁生用入药者。

炒瓜蒌子又称炒栝楼子、炒瓜蒌仁、炒栝楼仁、炒蒌仁等。为净瓜蒌子用文火炒至微鼓起，取出放凉入药者。

蒌仁霜又名楼仁霜、瓜蒌仁霜。为净瓜蒌子去壳取仁，碾细，

用吸油纸包裹，加热微炕，压榨去油，再碾细过筛入药者。

【性味归经】甘，寒。归肺、胃、大肠经。

【功效主治】润肺，化痰，滑肠。主治痰热咳嗽，燥结便秘，痈肿。乳少。

【用量】煎汤内服6～9克。研末入丸散或外用适量。

【禁忌】脾虚泄泻者忌服。恶干姜，畏牛膝，反乌头。

木槿子

出自《本草纲目》。为锦葵科植物木槿 *Hibiscus syriacus* L. 的果实。主产于江苏、广西等地。9～10月果实黄绿色时摘下晒干。

【别名】川槿子，朝天子，舜子，朝菌子，椴子，様子，日及子，槿树子，平条树子，白牡丹子，清明篱子，木桂子，篱沿树子，金漆树子，白布篱子，白槿子，木槿树子。

【商品名】木槿子，木槿树子，朝天子。以果大、干燥、色黄绿者为佳。

【处方名】木槿子，朝天子。

【性味归经】甘，平。归肺经。

【功效主治】清肺化痰，解毒止痛。主治咳嗽痰喘，音哑，神经性头痛。外用治黄水疮。

【用量】6～10克。外用适量。

木蝴蝶

出自《本草纲目拾遗》。为紫葳科植物木蝴蝶 *Oroxylum indicum* (L.) Vent. 的种子。产于广西、广东、福建、贵州、四川、云南等地。秋季种子成熟后采集，取出种子，晒干。

【别名】玉蝴蝶，千张纸，云故纸，破布子，白故子，白玉

纸，白千层，纸肉，故纸，洋胡纸，千纸肉，鸭船层纸，海船皮，海船果心，兜铃，三百两银药，千层纸，满天飞，朝简，老鸦船，千层故纸，白故纸，蝴蝶故纸。

【商品名】木蝴蝶，云故纸。以色白、干燥、种仁饱满、翅大而柔软如绢者为佳。

【处方名】木蝴蝶，玉蝴蝶，云故纸。

【注意】本品别名破布子、故子，易与补骨脂混淆。应引起注意。

【性味归经】微苦，凉。归肺、肝经。

【功效主治】润肺，舒肝，和胃，生肌。主治咳嗽，喉痹，音哑，胃痛，疮口不敛。

【用量】3～6克。外用适量。

瓜子金

出自《植物名实图考》。为远志科植物瓜子金 *Polygala japonica* Houtt. 的全草。主产于广东、广西、四川、江西、湖南、福建、安徽、云南、浙江等地。夏、秋间采集，洗净晒干。

【别名】金锁匙，神砂草，地藤草，远志草，小远志，辰砂草，惊风草，瓜米细辛，鱼胆草，蓝花草，产后草，山黄连，瓜子草，银不换，拦路枝，小金盆，鸡拍翅，竹叶地丁，铁线风，瓜子莲，女儿红，歼症草，小英雄，散血丹，见肿消，通性草，黄瓜仁草，接骨红，二月花，地风消，铁箭风，小叶地丁草，小叶瓜子草，柳叶紫花，高脚瓜子草，铁洗帚，瓜米草，金牛草。

【商品名】瓜子金。以植株肥大完整、无泥土等杂质者为佳。

【处方名】瓜子金，瓜子草。

【注意】同属植物卵叶远志 *P. Sibirica* L. 的全草在某些地区也作“瓜子金”入药。功效相似。

【性味归经】辛、苦，平。归心、肺经。

【功效主治】镇咳化痰，活血止血，安神解毒。主治咳嗽痰多，吐血便血，失眠怔忡，咽喉肿痛，痈肿疮毒，蛇咬伤，跌打损伤，乳腺炎，骨髓炎，泌尿系结石等。

【用量】10~15克。鲜品30~60克。外用适量。

黄 荆

出自《本草纲目拾遗》。为马鞭草科植物黄荆 *Vitex negundo* L. 的果实、叶、枝、根。主产于江苏、浙江、江西、湖南、四川、广西等地。

【别名】五指柑，山荆，山黄荆，黄荆条，七叶黄荆，蚊子柴，五指风，蚊烟柴，土柴胡，土常山，马藤，酱草，布荆子，黄金子，蚊枝叶，白背叶，姜荆叶，埔姜叶，姜子叶，黄金条，黄荆子，黄荆叶，黄荆根，荆条，黑荆条，臭荆，黄荆树条，黄荆木。

【商品名】黄荆，黄荆条，黄荆子，黄荆叶，黄荆根。果实以个大饱满者为佳。叶以质嫩洁净者为佳。根以肥壮而长、无泥土者为佳。枝以条长均匀者为佳。

【处方名】黄荆，黄荆子，黄荆根，黄荆叶，黄荆条。

【注意】在药材商品市场上，下列同属植物的果实和叶在不同地区亦作黄荆入药，但非属正品。

灰毛牡荆（灰白黄荆）*V. canescens* Kurz 分布于西藏等地。

牡荆 *V. negundo* L. var. *cannabifolia* (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz. 分布于长江流域及南部各省区。

刻叶黄荆 *V. negundo* L. var. *heterophylla* (Franch.) Rehd. [*V. chinensis* Mill.] 分布于我国东北、华北及山东等地。

山牡荆（山蚊荆、布荆）*V. quinata* A. N. Willd. 分布于广东、台湾、云南等地。

【性味归经】苦，平。归肺经。

【功效主治】解表发汗，祛风除痰，行气止痛。主治伤风感

冒，发热头痛，咳嗽，哮喘，风痹，疟疾，胃痛，疝痛，痔漏，痢疾，肠炎。外用治症脚癣，并可用来灭蚊、灭蛆。

【用量】 6～9克。外用适量。

洋 金 花

出自《本草纲目》。为茄科1年生草本植物白花曼陀罗 *Datura metel* L. 的花。多系栽培品。主产于江苏、福建、广东等地。4～11月间采收，于花初开时摘下，晒干或低温干燥。

【别名】 曼陀罗，曼陀罗花，凤茄花，凤茄花，山茄花，胡茄花，大闹杨花，马兰花，洋大麻子花，关东大麻子花，虎茄花，风麻花，酒醉花，押不芦，大颠茄花，颠茄花，闷陀罗花，野蓖麻花，猪颠茄花，猪波罗花，老鼠愁花，白曼陀罗花，金盘托荔枝花，羊惊花，枫茄花，醉仙桃花，醉心花，醉仙花，广东闹洋花，大喇叭花，洋喇叭花，假荔枝花，恶客，大麻子花。

【商品名】 南洋金花：为植物白曼陀罗（白花曼陀罗）的干燥花朵。主产于江苏、福建、广东等地。

北洋金花：为植物毛曼陀罗（毛花曼陀罗、软刺曼陀罗） *D. stramonium* Mill. 的干燥花朵。主产于河南、河北、山东等地。

洋金花：又名闹洋花、凤茄花、凤茄花、曼陀罗花。为各种洋金花之统称。以花朵大、不破碎、干燥、无杂质者为佳。

【处方名】 洋金花，曼陀罗花。

【注意】 下列同属植物的干燥花朵，与白花曼陀罗（南洋金花）和毛花曼陀罗（北洋金花）的干燥花朵功效相同，同等入药。

欧曼陀罗 *D. stramonium* L. 分布于长江流域各省。

紫花曼陀罗 *D. tatula* L. 分布于长江流域各省。习称“野洋金花”。

无刺曼陀罗 *D. inermis* Jacq. 分布于中南地区。

重瓣曼陀罗 *D. fastuosa* L. 分布于中南地区。

木曼陀罗 *D. arborea* L. 分布于中南地区。

【性味归经】辛，温。有毒。归心、肺、脾经。

【功效主治】止咳平喘，止痛镇痉。主治少痰或无痰之喘咳；心腹冷痛，风湿痹痛，跌打损伤，癫痫及慢惊风之痉挛抽搐。

【用量】入散剂吞服每次0.3~0.6克。卷烟分多次吸每日量不得超过1.5克。外用适量。

【慎忌】青光眼患者及表证未解者忌用；孕妇及心脏病、高血压患者慎服。不可过量服用，以免中毒。

鸦 片

出自《本草纲目》。为罂粟科植物罂粟 *Papaver somniferum* L. 果实中的液汁凝固而成的固体物。为麻醉毒品，多由国家控制定点种植。5~6月果实充分长成但尚未成熟时，用刀将果皮划破，流出乳白色液汁，于空气中逐渐变成微红色、进而成棕色的粘稠滴状物，翌晨用竹刀刮取，以罂粟叶包裹，置阴凉处阴干。

【别名】阿片，阿芙蓉，亚片，底野趣，大烟，老海，白面，痨海。

【商品名】鸦片，阿片。以纯净无杂质者为佳。

【处方名】鸦片，阿片，亚片。

【性味归经】苦，温。有毒，易成瘾。归肺、肾、大肠经。

【功效主治】止咳，镇痛，涩肠。主治久咳无痰 久泻，脱肛，胃肠疼痛及其他各种疼痛。

【用量】入丸散内服0.15~0.3克。

【慎忌】本品有毒，易成瘾，故不宜长期持续使用。肝功能严重损伤、肺原性心脏病、支气管哮喘、内有湿热积滞、婴幼儿及哺乳期妇女均忌服。

十四、安 神 药

朱 砂

出自《神农本草经》。为六方晶系辰砂Cinnabar的矿石，产于湖南、四川、贵州、云南的部分地区，随时可采。将辰砂矿石击碎后，除去石块杂质，水飞极细，装瓶备用。

【别名】辰砂，丹砂，汞砂，赤丹，片砂，劈砂，朱宝砂，镜面砂，硃砂，丹粟，肺砂，金星砂，箭镞砂，朱辰砂，朱神砂，真朱，神砂，泽光砂，云丹砂，光明砂。

【商品名】镜面砂：又名劈砂、片砂、光明砂。在加工除去石质后，将朱砂劈成斜方形或长条形片状者。

朱宝砂：又名洋尖砂、泽光砂。在加工除去石质后，将朱砂劈成碎小块片状或颗粒状者。

豆瓣砂：又名豆砂、个砂。在加工除去石质后，将朱砂劈成块粒状，如赤豆大小者。

贡朱砂：旧时进贡朝廷的朱砂。今指品质最优者。

辰砂：产于湖南沅陵（旧时辰州）者。品质最佳。为地道药材。

白岩朱砂：又名白岩、白岩砂。为从白色页岩中劈出的朱砂。可以为佳。

红镜朱砂：属镜面砂。色泽鲜红，质佳。

青镜朱砂：属镜面砂。色泽紫青，质次。

平口砂：又名银硃、灵砂、神砂、马牙砂、马齿砂。为人工合成者。

朱砂：为各种朱砂的统称。以色红、鲜艳、微透明、有光泽、无细粉、不染手、无杂石者为佳。

【处方名】朱砂，辰砂，丹砂，飞朱砂，水飞朱砂等。

【性味归经】甘，寒。归心经。

【功效主治】镇心安神，清热解毒。主治心火亢盛所致的心神不安，胸中闷热，惊悸不眠；疮疡肿毒，痔疮。

【用量】0.3~1克，研末冲服，或入丸散剂。

【慎忌】不可久服或大量服，以免汞中毒。肝肾功能异常者慎服。

磁 石

出自《神农本草经》。为天然的等轴晶系磁铁矿Magnetite的矿石。产河北、山东、辽宁、江苏等省。随时可采。采得后，除去泥沙杂质，置干燥处保存。击碎生用，或醋淬研细用。

【别名】玄石，磁君，慈石，处石，元武石，吸铁石，吸针石，燐石，摄石，铁石，戏铁石，磁铁矿石，磁铁石，指南石，灵磁石，死磁石，活磁石，呆磁石，协铁石。

【商品名】灵磁石：又名活磁石。为吸铁能力强者。品质较好。

呆磁石：又名死磁石。为吸铁能力弱者。品质较次。

磁石：各种磁石的统称。以铁黑色、有光泽、吸铁能力强者为佳。

【处方名】磁石，煅磁石。

处方中写磁石指生磁石。为原药去泥土碎石后，砸成碎块或颗粒入药者。

煅磁石又名磁石末。为净磁石置无烟炉火上煅至红透，迅速倒入醋内淬酥。如此两次。然后晒干研末入药者。

【性味归经】辛、咸，寒。归肝、心、肾经。

【功效主治】潜阳安神，聪耳明目，纳气平喘。主治阴虚阳亢引起的烦躁不宁，心悸，失眠，头晕头痛及癫痫；肝肾阴虚所致的耳鸣、耳聋、目昏；肾虚作喘。

【用量】10~30克。入丸散剂每次1~3克。

【禁忌】入丸散不宜多服久服。脾胃虚弱者慎服。

铁 落

出自《神农本草经》。为生铁煅至红赤，外层氧化时被锤落的铁屑。

【别名】生铁洛，生铁落，铁屑，铁屎，铁液，铁花，铁蛾。

【商品名】铁落，铁屑。以片大而薄、色青灰者为佳。

【处方名】铁落，铁屑，铁花，生铁落，煅铁落。

处方中写铁落、铁屑、铁花均指生铁落。为原药去杂质，洗净晒干入药者。

煅铁落为净铁落烧红后倒入醋中淬酥，晾干入药者。

【性味归经】辛，凉。归心、肝经。

【功效主治】平肝镇惊。主治癫痫，热病谵妄，心悸，易惊易怒，疮疡肿毒。

【用量】10~20克。外用适量。

【禁忌】肝虚及脾胃虚寒者忌服。

紫 石 英

出自《神农本草经》。为卤化物类含氟化钙的天然萤石的矿石。主产于甘肃、江苏、山西、湖北等地。采挖后挑选紫色者，除去杂质及泥土，生用或煅用。

【别名】萤石，氟石，赤石英。

【商品名】紫石英。以色紫、质坚、无杂质者为佳。

【处方名】紫石英，生紫石英，煅紫石英。

处方中写紫石英指生紫石英。为原药去杂质，打成碎块入药者。偏于镇惊安神。

煅紫石英为净紫石英块置无烟火上烧红透，趁热倒入醋中淬酥，反复2次，然后晾干入药者。温下功效增强。

【性味归经】甘，温。归心、肝经。

【功效主治】镇惊，安神，降逆气，暖胞宫。主治虚劳惊悸，咳逆上气，神经衰弱，癫痫，宫冷不孕。

【用量】6～12克。

【禁忌】阴虚火旺者忌服。

龙 骨

出自《神农本草经》。本品为古代哺乳动物如三趾马、犀类，鹿类、牛类、象类等的骨骼化石。产于山西、内蒙古、陕西、甘肃、河北、湖北等地。全年可采挖，除去泥沙杂质，贮于干燥处。用时打碎，生用或煅用。

【别名】白龙骨，土龙骨，粉龙骨。

【商品名】白龙骨：为表面呈灰白色或蓝白色者。

花龙骨：又名五花龙骨、青花龙骨、青化龙骨。为全体呈淡黄白色，夹有蓝灰色及红棕色花纹者。习以为质佳。

粉龙骨：为多种鳞兽的化石。品质较次。

龙骨：各种龙骨的统称。以质坚体重、吸湿力强者为佳。

【处方名】龙骨，生龙骨，煅龙骨。

处方中写龙骨指生龙骨。为原药材洗净晒干，粉碎入药者。偏于平肝潜阳，镇惊安神。

煅龙骨为净龙骨放无烟火上煅烧红透，取下待凉，粉碎入药者。偏于收涩。

【性味归经】甘、涩，微寒。归心、肝经。

【功效主治】平肝潜阳，镇静安神，收敛固涩。主治阴虚阳亢所致的烦躁易怒，头晕目眩，神志不安，心悸失眠，惊痫，癫狂，遗精，带下，虚汗，崩漏。外用治疗湿疮痒疹及疮疡溃后不愈合。

【用量】15～30克。外用适量。

龙 齿

龙齿来源与龙骨相同，为古代多种大型哺乳动物的牙齿骨骼化石。采挖龙骨时可收集龙齿，碾碎生用，或火煅用。

【别名】龙牙。

【商品名】青龙齿：又名青条牙、青条龙齿、青条龙牙。呈长条形青灰色有棕黄色条纹者。质佳。

白龙齿：又名白条龙齿、白条龙牙、白条牙。呈长条形黄白色无花纹者。质次。

龙牙埠：不呈长条形的较大白齿，并常带有部分骨质牙床。表面灰白色，粗糙。质最次。

均以不带牙床、吸湿力强者为佳。

【处方名】龙齿，龙牙，生龙齿，煅龙齿。

处方中写龙齿、龙牙指生龙齿。为原药材洗净晒干，粉碎入药者。

煅龙齿为净龙齿放无烟火上煅烧红透，取下待凉，粉碎入药者。

【性味归经】甘、涩，凉。归心经。

【功效主治】镇惊安神。主治惊痫，心悸，心烦，失眠，多梦。

【用量】15～30克。

象 牙

出自《药性论》。为象科动物亚洲象 *Elephas maximus* L. 和

非洲象 *E. africanus*, Blumenbach 的牙。前者主产于印度、印度尼西亚、斯里兰卡、泰国、缅甸、马来西亚及我国云南南部地区；后者主产于非洲。多采集雕刻象牙时剩下的碎屑供药用。

【别名】大象牙，亚洲象牙，印度象牙，非洲象牙，老象牙，象牙屑。

【商品名】象牙。以外表浅红色、内里银白色、显油性者为佳。

【处方名】象牙，象牙粉，象牙末，象牙屑。

【性味归经】甘，寒。归心、肾经。

【功效主治】清热镇惊，解毒生肌。主治癫痫惊厥，骨蒸痰热，痈肿疮毒，痔漏。

【用量】研末内服1.5~3克。外用适量。

马 宝

出自《饮片新参》。为马科动物马 *Equus caballus* (L.) 胃肠道中所生的结石。主产于河北、内蒙古、西藏、青海、新疆、辽宁、吉林、黑龙江、甘肃、云南、贵州等地。当马宰杀后，取出胃肠中之结石，洗净晾干。

【别名】蚌答，马结石，马粪石，赭丹。

【商品名】马宝。以体重质坚、色灰白、断面层纹明显者为佳。

【处方名】马宝，马宝粉。

【性味归经】甘、咸，凉。归心、肝经。

【功效主治】镇惊化痰，清热解毒。主治惊痫癫狂，痰热内盛，神志昏迷，吐血衄血，恶疮肿毒。

【用量】0.3~1克，入丸散内服。外用适量。

【慎忌】脾胃虚寒、痰湿内盛者慎服。

猴 枣

出自《饮片新参》。为猴科动物猕猴 *Macaca mulatta Zimmermann* 等内脏的结石。主产于印度、马来半岛及南洋群岛等地。

【别名】猴子枣，猴丹，申枣，羊肠枣，猕猴枣，沐猴枣，王孙枣，狙猴，猢孙枣，马留枣，黄猴枣，域枣。

【商品名】猴枣，印度猴枣，马来西亚猴枣。以个大均匀、有光泽、断面有层纹者为佳。

【处方名】猴枣，申枣，猴枣粉。

【性味归经】苦，寒。归心、肺经。

【功效主治】清痰镇惊，清热解毒。主治痰热喘嗽，小儿惊痫，瘰疬痰核。

【用量】研末冲服0.6~1克。外用适量。

【禁忌】虚寒证患者慎服。

蜣 蠼

出自《神农本草经》。为金龟子科昆虫屎壳螂 *Cathartes mossus* L. 和独角仙科昆虫独角仙 *Xylotropes dichotomus* L. 的干燥全体。主产于江苏、安徽、河南、河北、湖北、山东等地。6~8月间捕捉，沸水烫死，洗净，炭火焙干入药。

【别名】屎咯螂，屎壳螂，屎坷螂，屎蝴蝶，粪咯螂，屎蜣螂，站蜣，天社，转丸，推丸，弄丸，胡蜣螂，蜉蝣，黑牛儿，铁甲将军，大乌壳硬虫，夜游将军，滚屎虫，车屎客，牛屎虫，推车虫，推车客，推车郎，推粪虫，推粪爬，大将军，独角牛，独角虎，独角将军，铁角牛，粪球虫，独角仙，独角蜣螂，独角蜣螂虫，蜣螂虫，偷粪虫，矢甲，天仙子，蜣娘。

【商品名】蜣螂虫：为金龟子科昆虫屎壳螂的干燥全体。以体

色黑、完整、干燥、无泥土等杂质者为佳。

独角蜣螂虫：为独角仙科昆虫独角仙的干燥全体。以体色褐、完整、干燥、无泥土等杂质者为佳。

【处方名】 蜣螂，蜣螂虫，屎虼螂，屎虼螂，独角蜣螂，独角蜣螂虫，独角虎。

【性味归经】 咸，寒。有毒。归胃、大肠、肝经。

【功效主治】 定惊，消积，破瘀，攻毒。主治癫痫，惊痫，癰瘕，噎膈反胃，腹胀便秘，淋证，疳积，血痢，痔漏，疔肿恶疮。

【用法】 0.9~2.4克。外用适量。

【慎忌】 孕妇忌服。

琥 珀

出自《名医别录》。为古代松科松属植物的树脂，埋藏地层中经多年转化而成。从煤层中挖出者，特指煤珀。产于云南、广西、辽宁、河南等地。采得后，除杂质，研末用。

【别名】 血珀，血琥珀，红琥珀，光珀，云珀，虎珀，虎魄，琥魄，兽魄，顿牟，育沛，江珠，石珀，水珀，花珀，物象珀，翳珀，火珀，蜡珀，金珀，柳青，红松脂。

【商品名】 琥珀：为从地层中挖出者。呈不规则块状或颗粒状，色红黄。质佳。

血珀：琥珀中呈血红色者。质最佳。

煤珀：又名黑琥珀、抚顺珀、千金寨煤珀、烟煤精等。为从煤矿层中采掘而来。体重坚硬，色棕黑，燃之冒黑烟并有煤味。质次。

以上以色红，质脆、断面光亮者为佳。

【处方名】 琥珀，血珀，老琥珀，琥珀屑，琥珀末，琥珀面。琥珀屑又称琥珀末。为琥珀研磨而成的粗粉入药者。

琥珀面为琥珀经水飞或研磨而成的细粉入药者。

处方中写琥珀、血珀、老琥珀均指琥珀屑或琥珀面。

【注意】在云南、贵州一些地方，把“老材香”冒充琥珀混入药材商品市场，应注意鉴别。在云南、贵州一带，人死后用松香填棺材底，埋入地下。日久天长，松香由黄色变为棕色或棕黑色，呈不规则块状，半透明，无光泽，质松脆，易碎裂，燃之冒黑烟，充满松香气。研碎易粘手。当地人称之为“老材香”。实质上就是埋入地下时间较久的松香。

【性味归经】甘，平。归心、肝、膀胱经。

【功效主治】定惊安神，活血散瘀，利尿通淋。主治惊风癫痫，血滞经闭，癥瘕疼痛；小便不利，癃闭，血淋，热淋，石淋。

【用量】1.5~3克，研末冲服，不入煎剂。

酸枣仁

出自《神农本草经》。为鼠李科落叶灌木或乔木酸枣 *Ziziphus jujuba* Mill. 的成熟种子。产河北、陕西、辽宁、内蒙古、山东、山西、甘肃、河南等地。秋末冬初果实成熟时采收，除去枣肉，砸破核，取种子干燥。生用或炒用，入汤剂应捣碎。

【别名】枣仁，山枣仁，酸枣，酸枣核，酸枣子，棘仁，棘实，棘刺实，楡仁，楡枣仁，楡枣实，野枣仁，山酸枣仁，调睡参军，刺酸枣。

【商品名】酸枣仁，山枣仁。以粒大、饱满、外皮紫红色、干燥、无杂质者为佳。

【处方名】酸枣仁，枣仁，早人，枣人，生枣仁，炒枣仁，熟枣仁。

处方中写酸枣仁、枣仁、枣人、早人指生枣仁。为原药材去杂质，淘净晒干，捣碎生用入药者。

炒枣仁又名熟枣仁、炒酸枣仁。为净枣仁用文火炒至外皮鼓起，摊晾后捣碎入药者。

【性味归经】甘，平。归心、肝经。

【功效主治】养心安神，敛汗。主治失眠，惊悸，体虚自汗、盗汗等。

【用量】10~30克。研末吞服每次1.5~3克。

柏 子 仁

出自《神农本草经》。为柏科常绿乔木植物侧柏*Biota orientalis* (L.) Endl. 的种仁。全国大部分地区有产，主产山东、河南、河北等地。秋后种子成熟时采收，晒干，除去外壳，阴干。用时打碎。用纸包裹，加热微炕，压榨去油，称柏子仁霜。

【别名】柏实，柏仁，柏子，柏麦，侧柏子，香柏子，扁柏子，侧柏仁，香柏仁，扁柏仁。

【商品名】柏子仁，柏子。以粒大、饱满、黄白色、油性大、不泛油、干燥、无杂质者为佳。

【处方名】柏子仁，柏子霜，柏子仁霜。

柏子仁为原药材除净杂质，除去种皮入药者。

柏子霜又名柏子仁霜。为净柏子仁碾碎用吸水纸包好，外用白棉布包紧，压榨去油，研粉入药者。偏于养心安神。

【性味归经】甘，平。归心、肾、大肠经。

【功效主治】养心安神，润肠通便。主治虚烦不眠，惊悸怔忡；肠燥便秘。

【用量】10~18克。

【慎忌】便溏及多痰者慎服。

远 志

出自《神农本草经》。为远志科多年生草本植物远志*Polygala tenuifolia* Willd. 或宽叶远志*P. sibirica* L. 的根。主产于山西、

陕西、吉林、河南等省。春秋两季均可采挖。除去残茎、须根、泥土，洗净晒干。生用或炙用。

【别名】苦远志，棘菀，棘苑，棘蕘，蘚蕘，蘚蕘绕，蔓尧，小草根皮，细草根皮，小鸡腿皮，细叶远志（又名山茶叶根皮、光棍茶根皮、小鸡裸根皮、线茶根皮、山胡麻根皮、米儿茶根皮、燕子草根皮、草远志、十二月花根皮），线茶根皮，小鸡根，卵叶远志，宽叶远志，西伯利亚远志，醒心杖。

【商品名】苦远志：为植物细叶远志的根皮。

甜远志：为植物宽叶远志的根皮。习称“土远志”。

关远志：产于山西、陕西一带者。品质最优，为地道药材。

远志筒：又名远志通。为抽去木心的根皮。质优。以色黄、筒粗、肉厚、干燥者为最优。

远志肉：简称志肉。为破碎的根皮。品质较次。

远志棍: 又名远志梗、远志骨。为细小的中间有较硬木心的远志根。

【处方名】远志，制远志，炙远志。

处方中写远志指生远志。为原药材去杂质切段生用入药者。

制远志又名泡远志、清远志。为净远志在甘草煎液中浸泡后，捞出晒干入药者。偏于宁心安神。

炙远志又名蜜远志。为净远志用蜂蜜炙后入药者。偏于祛痰止咳。

【性味归经】辛、苦，微温。归肺、心经。

【功效主治】宁心安神，祛痰开窍，消痈肿。主治心神不安，惊悸，失眠，健忘，痰阻心窍所致的精神错乱，神志恍惚，惊痫，痈疽肿毒。

【用量】 3~10克。外用适量。

【慎忌】 胃炎及消化道溃疡患者慎服。

合 欢 皮

出自《神农本草经》。为豆科落叶乔木植物合欢 *Albizzia julibrissin* Durazz. 或山合欢 *A. kalkora* (Roxb.) Prain 的树皮。产长江流域各省。夏秋两季剥取树皮，切段用。

【别名】合昏皮，夜合皮，夜合欢树皮，合欢，合欢木皮，乌绒树皮，鸟赖树皮，芙蓉花树皮，缨花树皮，合欢树皮，绒树皮，绒花树皮，马缨花树皮，夜合花树皮，青裳，萌葛，肉痒树皮，夜花老皮。

【商品名】合欢皮：为植物合欢的树皮。为合欢皮正品。在全国广大地区使用。

山合欢皮：为植物山合欢的树皮。为合欢皮副品。在四川地区使用。

均以皮细嫩、无栓皮、干燥、皮孔明显者为佳。

【处方名】合欢皮，夜合皮。

【性味归经】甘，平。归心、肝经。

【功效主治】安神解郁，活血消肿。主治情志所伤所致的忿怒忧郁，虚烦不安，失眠健忘，跌打骨折及痈肿、内痈等。

【用量】10~15克。

合 欢 花

为植物合欢或山合欢的花。来源同合欢皮。夏季花半开时采收，干燥，生用。

【别名】夜合花，乌绒，乌绒花，乌绒树花，芙蓉树花，缨花，绒树花，绒花，马缨花，夜合树花，绒花树花。

【商品名】合欢花：又名夜合花。为植物合欢树的干燥花序。呈团块状，似棉絮状。以干燥色黄、无泥杂、花不碎者为佳。为合欢花正品。

合欢米：又名夜合米。为植物合欢树的干燥花蕾。呈米粒状，不散瓣，青绿色。以干燥、色黄绿、无杂质、花不碎者为佳。

山合花：又名山合欢花。为植物山合欢的花和花蕾。为合欢花副品。四川地区作合欢花入药。

【处方名】合欢花，合欢米，夜合花。

【性味归经】甘，平，有小毒。归心、肝经。

【功效主治】安神，解郁。主治虚烦不眠，抑郁不舒，健忘失眠等。

【用量】3～6克。

榆 钱

出自《神农本草经》。为榆科乔木植物榆树 *Ulmus pumila* L. 的果实。我国各地均产。春季采集绿色未成熟的翅果，鲜用或晒干生用。

【别名】榆荚，榆树荚，白榆钱，白榆荚，春榆钱，春榆荚，榆实，榆子，榆仁，榆果，粉钱，粉荚，白粉钱，白粉荚，零榆钱，零榆荚，粉榆钱，粉榆荚，钻天榆钱，钻天榆荚，家榆钱，家榆荚，粘榔树荚。

【商品名】榆钱，榆荚。以质嫩、色绿、无叶等杂质者为佳。

【处方名】榆钱，鲜榆钱，榆荚。

【注意】在药材商品市场上，下列同属植物的果实在不同地区也作榆钱入药，但非正品。

榔榆（秋榆、小叶榆、鸡瘤、蚊榔树）*U. parvifolia* Jacq. 分布于东北、华北、中南及贵州、云南、四川、西藏等地。

毛白榆（红榔木、棉榔树）*U. pumila* L. var. *pilosa* Rehd. 分布于云南地区。

滇榆（披针叶榆、常绿榆）*U. lanceolata* Roxb. 分布于广西及云南南部。

【性味归经】微辛，平。归心经。

【功效主治】益心安神，杀虫消瘧，清湿热，止带下。主治神经衰弱，失眠，食欲不振，白带增多，小儿疳积。

【用量】10～15克。

十五、平 肝 息 风 药

羚 羊 角(附：山羊角)

出自《神农本草经》。为洞角科动物赛加羚羊 *Saiga tatarica* L. 的角。主产于新疆、甘肃、青海等地。全年均可捕捉，但以秋季猎取者最佳。捕得后切取其角，用时磨汁、锉末，或镑为薄片。

【别名】零羊角，灵羊角，赛加羚羊角，高鼻羚羊角，嫩羚羊，嫩羚羊角，羚羊。

【商品名】大枝羚羊角：为长约15～25厘米、底部直径约3厘米的个体较大的羚羊角。

小枝羚羊角：为长约9～15厘米、底部直径约1～2厘米的个体较小的羚羊角。

大头鬼：又名紫羚羊角、紫羚羊。为幼小羚羊的角。

老劈柴：又名倒山货。为羚羊死后遗留在山中的经风吹日晒雨淋后的死角。质次。

羚羊角尖：又名羚羊尖。为羚羊角尖部约10厘米长的部分，品质最佳。

羚羊角片：又名羚羊片。羚羊角除骨塞后镑成的薄片。

羚羊角粉：又名羚羊粉。羚羊角除去骨塞后锉成的细粉。

羚羊角：为各种羚羊角的统称。以质嫩、坚硬、光润、有血

丝、无裂纹者为佳。

【处方名】 羚羊角，羚羊角粉，羚羊角片，羚羊角尖。

【注意】 在药材商品市场上，除赛加羚羊的角外，还有藏羚羊 *Panthotops hodgsoni* 和斑羚羊 *Naemorhedus goral goral* 或西藏瞪羚羊 *Gazella subgutturosa* 以及蒙古原羚羊（黄羊）*Procapra gutturosa* Pallas、鹅喉羚羊（长尾黄羊）*Gazella subguttarosa* Guldentstaedt. 等的角亦作羚羊角入药，此属混淆品，品质较次，应注意鉴别。

【性味归经】 咸，寒。归肝、心经。

【功效主治】 平肝熄风，清肝明目，清心解毒。主治惊风、癫痫所致的手足抽搐；肝阳上亢所致的头昏目眩；肝火炽盛所致的头痛目赤；温热病所致的壮热神昏，谵语，躁狂等证。

【用量】 1～3克，单独煎汁服；或磨汁、锉末服。每次0.3～0.5克。

附：山羊角

为牛科动物青羊 *Naemorhedus goral Hardwicke* 的角。又名青羊角、野羊角、斑羊角。性味咸寒。归肝经。有平肝、镇惊之功效。主治肝阳上亢，头目眩晕；肝火上炎，目赤肿痛；惊风抽搐等证。与羚羊角功用近似，但效力较差。用量10～15克。

石 决 明

出自《名医别录》。为鲍科动物杂色鲍（光底石决明）*Haliothis diversicolor* Reeve. 或盘大鲍（毛底石决明）*H. gigantea discus* Reeve. 的贝壳。多分布于沿海地区。夏秋捕取，去肉后，洗净贝壳，除去附着的杂质，晒干。打碎生用或煅用。

【别名】 杂色鲍壳、九孔鲍壳、九孔贝、鲍鱼壳、鲍鱼皮，鲍

螺壳，盘大鲍壳，光底石决明，毛底石决明，真珠母，真海决，蝮鱼甲，九孔螺，千里光，金蛤蜊皮，九孔石决明，石决，决明，九孔石决，九孔决明，九孔海决，朱子房，石厥明，海决明，海南决，大海决，冲海决，关海决，关决明，关决，大洋石决明。

【商品名】光底石决明：又名光底海决、南海决、海决明、耳片壳、真海决。为动物杂色鲍的贝壳。主产于广东、广西、海南沿海。品质最好。

毛底石决明：又名毛底海决、关海决、关决明、冲石决、鲍鱼片、鲍鱼壳。为动物盘大鲍的贝壳。主产于我国山东、辽宁、台湾。国外朝鲜、日本亦产。

大海决：为动物羊鲍 *H. ovina* Gmel. 的贝壳。主产于我国海南、台湾。国外印尼、非洲、澳洲亦产。

九孔石决明：又名九孔石决、九孔决明。为贝壳边有九孔者。习以为佳。

以壳厚、个大、匀整、无破碎、洁净而有光彩者为佳。

【处方名】石决明，生石决明，煅石决明等。

处方中写石决明指生石决明。为原药除去杂质，洗净晒干，捣碎生用入药者。

煅石决明为净石决明置于无烟炉火中煅至灰白色（内服）或白色（外用），取出待凉捣碎或研细粉入药者。兼有涩敛作用。

【性味归经】咸，寒。归肝经。

【功效主治】平肝潜阳，清肝明目。主治头痛，头晕目眩，目赤肿痛，翳膜遮睛，视物模糊。

【用量】15～30克。

牡 蠕

出自《神农本草经》。为牡蛎科动物长牡蛎 *Ostrea gigas* Thunb. 和大连湾牡蛎 *O. talienwhanensis* Crosse 或近江牡蛎 *O. rivularis*

Gould 等的贝壳。从东北至海南岛沿海均有分布，宜于冬、春采集。去肉留壳，淘净晒干。生用或煅用。用时捣碎。

【别名】 牡力，牡历，牡蛤，蛎蛤，蚝壳，海蛎，左壳，左牡蛎，左顾牡蛎，古贲，蛎房，蚝蒲，海蛎子壳，海蛎子皮，海蛎子，蠔莆，蠔壳，牡蛎壳，长牡蛎，近江牡蛎，大连湾牡蛎，大牡蛎，牡蛎，石牡蛎，真海，蠔山，蛎壳。

【商品名】 牡蛎。以个大、匀整、洁净、干燥者为佳。

【处方名】 牡蛎，牡力，生牡蛎，生牡力，煅牡蛎，煅牡力等。

处方中写牡蛎、牡力指生牡蛎（或写作生牡力）。为原药洗净晒干，碾碎入药者。

煅牡蛎又写作煅牡力。为净牡蛎置于无烟火上煅烧至灰白色，取出放凉，碾碎入药者。

【性味归经】 咸，微寒。归肝、肾经。

【功效主治】 平肝潜阳，软坚散结，收敛固涩。主治阴虚阳亢所致的烦躁不安，心悸失眠，头晕目眩，耳鸣；痰火郁结所致的瘰疬，痰核；盗汗，自汗，遗精，带下，崩漏；胃酸过多，胃及十二指肠溃疡。

【用量】 15~30克。

珍 珠

出自《开宝本草》。为珍珠贝科动物合浦珠母贝 *Pteria martensii* (Duaker) 与蚌科动物三角帆蚌 *Hyriopsis cumingii* (Lea) 或褶纹冠蚌 *Cristaria plicata* (Leach) 等双壳类动物受刺激所形成的珍珠。海产的珍珠贝以广东、海南、广西、台湾等地为主；淡水产的河蚌在各地均有生产。海产者以野生为主，淡水产者以养殖为主。用时研末水飞，或以豆腐同煮，然后取出研磨。

【别名】 真珠，真朱，真珠子，蚌珠，濂珠，廉珠（又名合浦

珠），蛤珠，珠子，新港珠，新光珠，老光珠，玉身珠，马牙珠，湖珠，花珠（曾钻孔作过装饰品者），米珠，明月。

【商品名】珍珠，真珠，珠子，天然珍珠，人工珍珠，养殖珍珠。以颗粒大而圆、色白光亮、破开面有层纹、无硬核者为佳。

【处方名】珍珠，珍珠粉，珠粉等。

处方中写珍珠指没有研磨的整个珍珠。但用时必须研成细粉。

珍珠粉简称珠粉。为原药水飞或研成极细末入药者。

【性味归经】甘、咸，寒。归心、肝经。

【功效主治】镇心定惊，清肝除翳，收敛生肌。主治惊悸，癫痫，惊风，目赤肿痛，翳障胬肉，创面久不愈合及溃疡、烂腐等证。

【用法】0.3~1克，入丸散服。外用适量。

珍 珠 母

出自《海药本草》。为蚌科动物三角帆蚌 *Hyriopsis cumingii* (Lea) 和褶纹冠蚌 *Cristaria plicata* (Leach) 或珍珠贝科合浦珠母贝 *Pteria martensi* (Dunker) 等贝类动物贝壳的珍珠层。全国各地江河湖泊均产。采集后去肉，洗净，晒干，生用或煅用。

【别名】真珠母，真朱母，濂珠母，珠子母，蚌珠母，珠母，珠牡，明珠母，珍珠贝壳，真珠贝壳，大蚌壳。

【商品名】珍珠母。以壳大匀整、无破碎、色白、表面无黑皮、质松脆者为佳。

【处方名】珍珠母，珍珠层粉。

处方中写珍珠母指生珍珠母。为原药洗净晒干，碾碎入药者。

珍珠层粉为珍珠母内层（有彩色光泽的一层）经水飞或研成极细粉末入药者。

【性味归经】咸，寒。归肝、心经。

【功效主治】平肝潜阳，清肝明目。主治肝阳上亢所致的头

痛，眩晕，耳鸣，烦躁，失眠；肝虚目昏或肝热目赤羞明。研细粉外用可治疗湿疮瘙痒。

【用量】 15~30克。外用适量。

玳 瑁

出自《开宝本草》。为海龟科动物玳瑁 *Eretmochelys imbricata* (L.) 的背甲。主产于南海。全年均可捕获。捕得后，将其倒悬，用沸醋浇泼，其甲即能逐片剥下。洗净，干燥。用时需经温水浸软，切成细丝或磨成细粉用。

【别名】 璇瑁，蠵龟，蠵瑁，璫玳，文甲，明玳瑁，代尾，班希。

【商品名】 玳瑁。以片大而厚、半透明、斑纹显著、干燥洁净者为佳。

【处方名】 玳瑁，玳瑁片，玳瑁粉。

处方中写玳瑁指玳瑁片。为原药洗净蒸软，切成方形薄片入药者。

玳瑁粉为原药洗净晒干，与滑石粉同炒至鼓起质酥，取出晾凉，碾成细粉入药者。

【性味归经】 甘、咸，寒。归心、肝经。

【功效主治】 平肝定惊，清热解毒。主治温热病高热烦躁，神昏谵语，中风，惊痫，痉厥，痘毒，疔疮。

【用量】 3~6克，水煎服。亦可入丸散或水磨汁服。

紫 贝 齿

出自《新修本草》。为宝贝科动物阿拉伯绶贝 *Mauritia arabica* (L.) 的贝壳。主产于福建以南沿海，如海南岛、西沙群岛、台湾等地。一般多于夏季捕捉，除去贝肉，洗净，晒干。用时打碎，

生用或煅用。

【别名】紫贝，阿拉伯绶贝，绶贝，研螺，文贝，贝齿，贝子，宝贝，猪仔螺。

【商品名】紫贝，紫贝齿。以壳厚、有光泽、干燥、洁净者为佳。

【处方名】紫贝，紫贝齿，生紫贝，煅紫贝等。

处方中写紫贝，紫贝齿均指生紫贝齿，简称生紫贝。为廉药洗净晒干，打碎入药者。

煅紫贝为净紫贝置无烟炉火上煅烧至灰白色，取出待冷，碾碎入药者。

【注意】在药材商品市场上，下列动物的贝壳在有些地区也作紫贝齿入药，功效近似，但非正品。

·山猫宝贝 *Cypraea lynx* (L.) 分布于海南岛、西沙群岛一带。

蛇首眼球贝 *Erosaria caputserpentis* (L.) 分布于海南岛、西沙群岛一带。

【性味归经】咸，平。归肝经。

【功效主治】镇惊安神，清肝明目。主治惊悸心烦，失眠多梦，小儿高烧抽搐，目赤肿痛，目翳，头痛，眩晕。

【用量】10~15克。

代赭石

出自《神农本草经》。为三方晶系赤铁矿 Hematite 的矿石，主含三氧化二铁。主产于山西、河北、河南、山东等地的多种矿床和岩石中。掘出后去土，洗净。打碎生用，或醋淬后粉碎晒干用。

【别名】赭石，代赭，赤赭石，丁赭石，钉赭石，钉头赭石，须丸，赤土，血师，紫朱，土朱，铁朱，老式赭石，新式赭石，无钉赭石，红石头，红砂石，卵状赭石，赤铁矿，美赭，石赭，蜀赭。

【商品名】钉赭石，又名钉头赭石、老式赭石。棕红或铁青色，表面有乳头状突起。质佳。销全国各地并且出口。为代赭石正品。

无钉赭石：又名新式赭石、红石头、红砂石。表面无乳头状突起。质次。为代赭石副品。仅作钉头赭石的代用品。

卵状赭石：为代赭石副品。销四川一带。

均以断面层叠状显著、每层多有钉头、赤红色、无杂质者为佳。

【处方名】赭石，代赭石，生赭石，煅赭石等。

处方中写赭石、代赭石指生赭石（或称生代赭石）。为原药去杂质及泥土，砸碎碾细入药者。偏于平肝潜阳，降逆止呕。

煅赭石为净赭石煅至红透，倒入醋内淬酥后入药者。偏于收敛止血。

【性味归经】苦，寒。归肝、心经。

【功效主治】平肝潜阳，降逆，止血。主治肝阳上亢所致的头痛眩晕；嗳气，呃逆，呕吐，气喘；吐血，衄血，崩漏等。

【用量】10~30克。

【禁忌】孕妇忌服。

钩 藤

出自《名医别录》。为茜草科常绿木质藤本棕物 钩藤 *Uncaria rhynchophylla* (Miq.) Jacks. 及其同属多种植物的带钩茎叶。主产于长江以南至福建、广东、广西等地。春秋两季采收，晒干，或先置锅内稍蒸，或于沸水中略烫后取出晒干。切段入药。

【别名】勾藤，勾丁，钩丁，双钩藤，双勾，双钩，钩钩，双钩钩，净钩钩，嫩钩钩，勾勾，双勾勾、金钩藤，金钩草，单钩藤，单勾，华钩藤，吊藤，钩钩藤，钩藤，钩钩，挂钩藤，嫩钩钩，钩藤钩子，倒挂金钩，钩耳，莺爪风，鹰爪风，鹰爪风，倒挂

刺，钩藤钩，吊藤钩，吊风藤，吊钩藤，类钩藤，披针叶钩藤，大叶钩藤，毛钩藤，无柄果钩藤，勾田，勾荇，双丁。

【商品名】钩藤，勾藤，双勾。以茎细、质嫩、带钩、色棕紫者为佳。

【处方名】钩藤，嫩钩藤，勾藤，勾丁，双勾。

【注意】在药材商品市场上，同属植物攀茎钩藤 *U. scandens* (Smith) Hutch. 的茎叶在云南、四川作钩藤用。此非正品。

【性味归经】甘，微寒。归肝、心包经。

【功效主治】息风止痉，清热平肝。主治惊痫抽搐，肝热头痛头胀，肝阳上亢头晕目眩，肝火炽盛或肝阳上亢型高血压病。

【用量】10~15克。宜后下。

天 麻

出自《神农本草经》。为兰科多年寄生草本植物天麻 *Gastrodia elata* Bl. 的块茎。主产于四川、云南、贵州等地。春季植株出芽时挖出者为“春麻”，质量较差；冬季茎枯时挖出者为“冬麻”，质量较好。挖得后，除去地上茎及须根，擦去外皮，洗净煮透或蒸熟，压平，微火烤干。用时润透切片。

【别名】赤箭，赤箭天麻，石箭，红梢，明天麻，定风草根，白龙皮，鬼督邮，水洋芋，冬彭，离草，商母，神草根，独摇芝，合离根，合离草根，分离草，独摇根，自动草根，独采芝，赤箭脂，赤箭芝，山地豆，山萝卜。

【商品名】冬麻：为冬季茎枯时采挖者。皱纹细而少，品质较好。

春麻：为春季植株出芽时采挖者。皱纹粗而多，品质较次。

明天麻：质地坚实，润泽明亮，呈半透明状者。品质最佳。

均以块茎个大、质坚体重、润泽明亮，色黄白、无空心、断面呈半透明状者为佳。

【处方名】 天麻，明天麻，天麻片，炒天麻，煨天麻，姜天麻等。

处方中写天麻、明天麻、天麻片均指生天麻。为原药去杂质，洗净晒干，再润透切片入药者。

炒天麻为天麻片用文火炒至黄色入药者。

煨天麻为天麻片用麸炒至黄色入药者。

姜天麻为天麻片用姜汁拌匀微炒入药者。

【注意】 在药材商品市场上，下列药材常伪充天麻入药，应注意鉴别：

角角天麻：为菊科蟹甲草属植物西南蟹甲草 *Cacalia davidii* (Franch.) Hand. -Mazz. 及其同属植物鸡多囊(猪肚子) *C. tangutica* (Maxim.) Hand. -Mazz. 的根，在四川、甘肃某些地方误作天麻入药。

羊角天麻(又名绿天麻)：为槭树科植物大九股牛 *Dobinea delavayi* (Baill.) Engl. 的根，在云南地区误作天麻入药。

紫茉莉科植物紫茉莉 *Mirabilis jalapa* L. 的根，刮去栓皮，蒸熟晒干，在贵州、湖南、湖北个别地区误作天麻入药。

此外还有些地区将茄科植物马铃薯(洋芋、土豆)的块茎，刮去外皮，蒸熟晒干，伪充天麻流入市场，应注意辨伪。

【性味归经】 甘，平。归肝经。

【功效主治】 息风止痉，平肝潜阳。主治肝风内动，惊痫抽搐；肝阳上亢，头晕头痛；风湿痹痛及肢体麻木，手足不遂，中风偏瘫等。

【用量】 6～15克。研末冲服每次1～1.5克。

刺 蕺 薜

出自《神农本草经》。为蒺藜科1年生或多年生草本植物蒺藜 *Tribulus terrestris* L. 的果实。全国各地均产。秋季果实成熟时采

收，割取全株，晒干，打下果实，炒黄或盐水炙用。

【别名】白蒺藜，蒺藜，硬蒺藜，茨，莽，蒺藜子，蒺梨子，旁通，屈人，止行，豺羽，升推，升推茨，即藜，杜蒺藜，休羽，旱草，三角蒺藜，三角刺，蒺骨子，野菱角，地菱，蒺藜荷菱，吉藜，蒺藜角，蒺藜狗，蒺藜拉子，八角刺，七厘，秦尖，拦路虎。

【商品名】硬蒺藜：为植物蒺藜的成熟果实。主产于长江以北广大地区。为蒺藜正品，全国通用。

软蒺藜：为同科滨藜属植物中亚滨藜 *Atriplex centralasiatica* Iljin 和西伯利亚滨藜 *A. sibirica* L. 的成熟果实。分布于东北、华北和西北广大地区。为刺蒺藜副品。山东、天津等地两种蒺藜均用。

均以颗粒均匀、坚实饱满、干燥无杂质、色黄白略带绿色者为佳。

另外，还有一种大花蒺藜 *Tribulus cistoides* L. 的果实，在云南地区混作刺蒺藜使用。该药材与刺蒺藜功效是否相同，值得研究。

【处方名】蒺藜，白蒺藜，炒蒺藜，生蒺藜，盐蒺藜等。

生蒺藜为原药去杂质、硬刺及外皮而入药者。

处方中写蒺藜、白蒺藜均指炒蒺藜。又称炒白蒺藜。为生白蒺藜用文火炒黄入药者。兼补肝肾。

盐蒺藜又名炙蒺藜、盐炒蒺藜。为生白蒺藜用盐水拌匀稍闷，再用文火炒黄入药者。偏于平肝补肾。

【性味归经】苦、辛，平。归肝经。

【功效主治】平肝疏肝，祛风明目。主治肝阳上亢所致的头痛眩晕；肝气郁结所致的胸胁不舒，乳闭不通；风疹瘙痒；风热目赤多泪等。

【用量】6～10克。

决明子

出自《神农本草经》。为豆科植物决明*Cassia tora* L.的成熟种子。生产于安徽、广西、四川、浙江、广东等地。南北各地均有栽培。秋季采收，晒干，打下种子，生用或炒用。

【别名】决明，草决明，草决明子，羊明，羊角，羊角豆，马蹄子，假绿豆，马蹄决明，纯叶决明，还瞳子，千里光，芹决，野青豆，猪骨明，猪屎豆，夜拉子，羊尾豆，猪屎蓝豆，细叶猪屎豆，狗屎豆，匏叶决明，夜关门子，羊触足子，假羊角菜子，假花生子，夜合草子，野花生子。

【商品名】决明子。以籽粒饱满、均匀、色棕绿、干燥无杂质者为佳。

【处方名】决明子，草决明，生决明子，炒决明子等。

处方中写草决明、决明子指生决明子。为原药去杂质生用入药者。偏于润便滑肠，清肝疏风。

炒决明子又名炒决明。为净决明子用文火微炒入药者。兼有补肾明目作用。

【注意】在药材商品市场上，同属植物望江南（羊角豆）*C. occidentalis* L.的种子在某些地区也混充决明子入药，称之为圆决明、圆草决。其种子不呈菱状方形，可以鉴别。

【性味归经】甘、苦，微寒。归肝、大肠经。

【功效主治】清肝明目，润便滑肠。主治目赤肿痛，羞明多泪，便秘；高血脂症，高血压病。

【用量】10~15克。

稽豆衣

出自《本草拾遗》。为豆科植物大豆*Glycine max* (L.) Merr.

的黑色种皮。习惯上用较小者，故又称黑小豆。多于夏、秋二季采收，晒干，生用。

【别名】 大豆皮，黑豆皮，黑小豆皮，稽豆皮，大豆衣，黑豆衣，黑小豆衣，黑料豆衣，黑料豆皮，黑大豆皮，黑大豆衣，乌豆皮，乌豆衣，冬豆皮，冬豆衣，冬豆子皮，菽皮，菽衣，大菽皮，大菽衣，黑菽皮，黑菽衣，乌菽皮，乌菽衣，野料豆皮，野料豆衣，马豆皮，马豆衣，马料豆皮，马料豆衣，细黑豆皮，细黑豆衣。

【商品名】 稽豆皮，大豆衣，黑豆衣，黑豆皮。以色黑、干燥、不破碎、无杂质者为佳。

【处方名】 稽豆衣，稽豆皮，大豆衣，大豆皮，黑豆衣，黑豆皮，稻豆衣，稻豆皮等。

【性味归经】 甘，平。归肝经。

【功效主治】 养血平肝，滋阴清热。主治血虚肝旺所致的头晕头痛，潮热盗汗等。

【用量】 6～10克。

全 蝎

出自《开宝本草》。为钳蝎科昆虫东亚钳蝎 *Buthus martensi* Karsch 的干燥体。如单用尾，名为蝎尾（蝎梢）。我国各地均产。长江以北较多。春、秋均可捕捉。捕得后，投入沸水中烫死晒干者，称淡全蝎；加盐煮后晒干者，称咸全蝎。

【别名】 全虫，蝎，蝎子，干蝎，茯背虫，蚕，蚕尾虫，蠍，蠍，蟛蜞，向荆蝎，东亚钳蝎，主簿虫，杜伯，杜白，钳蝎，蟹，薄虫。

【商品名】 南全蝎：又名南全虫。为产于河南者。习以为佳。

东全蝎：又名东全虫。为产于山东者。习以为次。

春蝎：为春季（清明至谷雨期间）捕捉者。产量小，品质优。

伏蝎：为伏天（夏季7～8月份）捕捉者。产量高，质稍次。

淡全蝎：又名淡全虫。为用清水洗净，沸水烫死，晒干，不入盐水煮的春蝎。质优。

盐全蝎：又名咸全蝎。为用清水洗净，再用盐水稍煮，阴干药用者。质次。

蝎尾：又名蝎梢。为蝎的后腹至尾部。质最优。

均以个大完整、色黄褐、干燥、味淡（或盐霜少）、无杂质者为佳。

【处方名】全蝎，全虫，制全蝎，酒全蝎，全蝎末等。

处方中写全蝎、全虫指生全蝎。为原药材洗净，晒干，生用入药者。

制全蝎又名制全虫。为净全虫喷洒薄荷水或葱白水或甘草水或生姜水，闷透，然后晾干入药者。

酒全蝎又名酒全虫。为净全虫喷洒95%酒精，闷透，晾干入药者。

全蝎末为制全蝎或酒全蝎碾成粉末入药者。

【性味归经】辛，平。有毒。归肝经。

【功效主治】息风止痉，解毒散结，通络止痛。主治急慢惊风，中风偏瘫，破伤风，痉挛抽搐，脑血管意外；疮疡肿毒，瘰疬结核，顽固性偏头痛，风湿痹痛等。

【用法】3～9克。研末吞服每次0.6～1克。外用适量。

【禁忌】血虚生风者慎服。

蜈 蚣

出自《神农本草经》。为蜈蚣科昆虫少棘巨蜈蚣 *Scolopendra subspinipes mutilans* L. Koch. 的干燥体。全国各地均产。春季捕捉。捕得后用两端削尖的长竹片插入头尾两部，晒干，或先用沸水烫过，干燥。生用或烘炙研末用。

【别名】少棘巨蜈蚣，吴公，吴蚣，天龙，百足虫，百脚，百

足，千足虫，金头蜈蚣，螂蛆，蜈蚣，蠍高姆（朝鲜族名）。

【商品名】赤足蜈蚣：为足呈棕红色者。质优。

大蜈蚣：为个大身长者，质佳。

川蜈蚣：又名川蚣、川足。为产于四川者。实际上没有江苏、安徽、浙江等地产者产量大、质量好，只是习惯上这样称呼而已。

均以条大、完整、腹部瘪、干燥者为佳。

【处方名】蜈蚣，酒蜈蚣，蜈蚣末等。

处方中写蜈蚣指生蜈蚣。为原药洗净，晒干生用入药者。

酒蜈蚣为净蜈蚣用黄酒喷洒，稍闷，再用文火焙黄入药者。毒性减小。

蜈蚣末为酒蜈蚣碾成粉末入药者。

【性味归经】辛，温。有毒。归肝经。

【功效主治】息风止痉，解毒散结，通络止痛。主治急慢惊风及破伤风等抽搐痉挛；疮疡肿毒，瘰疬溃烂，毒蛇咬伤，顽固性头痛，风湿痹痛。

【用量】1～3克。研末吞服每次0.6～1克。外用适量。

【禁忌】孕妇忌服。血虚生风者慎服。不宜用量太大，以免中毒。

白 僵 蚕

出自《神农本草经》。为蚕蛾科昆虫家蚕 *Bombyx mori* L. 的幼虫在未吐丝前因感染白僵菌而发病致死的僵化虫体。主产于浙江、江苏、四川等养蚕区。晒干生用，或炒用。

【别名】僵蚕，天虫，僵虫，姜虫，姜蚕，白僵虫，白姜蚕，白姜虫，江蚕。

【商品名】僵蚕，白僵蚕，白僵虫。以条直肥壮、色白质硬、断面明亮者为佳。

【处方名】僵蚕，僵虫，姜蚕，姜虫，白僵蚕，白僵虫，生僵

蚕，炒僵蚕，僵蚕末等。

处方中写僵蚕、僵虫、姜蚕、姜虫、白僵蚕、白僵虫均指生白僵蚕。为原药去杂质，洗净、晒干，生用入药者。偏于疏散风热。

炒僵蚕又名炙僵蚕、制僵蚕。为净白僵蚕用麸炒至深黄色入药者。一般多炒用。

僵蚕末为炒僵蚕碾成粉末入药者。

【性味归经】咸、辛，平。归肝、肺经。

【功效主治】息风止痉，祛风止痛，解毒散结。主治肝风内动与痰热壅盛所致的惊痛抽搐；风热或肝热所致的头痛目赤，咽喉肿痛，风虫牙痛；癫痫痰核，疔肿丹毒，风疹瘙痒等。

【用量】3～10克。碾成粉末吞服每次1～1.5克。

地 龙

出自《神农本草经》。为巨蚓科环节动物参环毛蚓 *Pheretima aspergilum* (E. Perrier) 和缟蚯蚓 *Allolobophora caliginosa* (Savigny) *Trapezoides* (Ant. Deges) 的虫体。前者主产于广东、广西、福建等地，药材称广地龙；后者在全国各地均有分布，药材称土地龙。夏秋捕捉。捕得后用草木灰呛死，去灰晒干，或剖开用温水洗净体内泥土，晒干。生用或鲜用。

【别名】蚯蚓，参环毛蚓（又名亚细亚毛蚓），缟蚯蚓（又名背暗异唇蚓），蟠蚓，附蚓，寒蚓，蟠蟠，曲蟠，寒蟠，曲蟠，蜿蟠，土蟠，土龙，虫蟠，丘蟠，蟠端，坚蚕，赤虫，曲蛇，曲虫，引无，胸胞，地龙子，干地龙，地龙干，曲蟠，白颈蚯蚓，蚯蚓干，干蚯蚓，蚓蟠，千人踏，坚蚕，歌女，螭，蚓，蟹蟠，珠串，地农，虫蟠。

【商品名】广地龙：又名白颈地龙。为动物参环毛蚓的虫体。主产于广东、广西等地。一般认为品质较优，销往全国并且出口。以肥大、肉厚、光亮、干燥、无泥者为佳。

土地龙：为动物螭蚯蚓的虫体。主产于河南、山东、江苏、安徽、福建等地。一般认为品质较次。多自产自销。以条大、完整、不破碎、干燥无泥者为佳。

【处方名】地龙，地龙肉，生地龙，鲜地龙，炒地龙，酒地龙，炙地龙，制地龙，地龙末等。

处方中写地龙、地龙肉指生地龙。为原药洗净，晒干生用入药者。偏于清肝。

鲜地龙为活蚯蚓洗净，趁鲜入药者。清热解痉力强。

炒地龙为净地龙用砂子炒至深黄色入药者。炒后除腥易服。

酒地龙为净地龙用黄酒淋洒，闷透，用文火炒至黄色入药者。通经活血祛风作用增强。

炙地龙又名制地龙。为净地龙用甘草水浸泡后晒干入药者。除腥易服。

地龙末为酒地龙或炙地龙碾成粉末入药者。

【性味归经】咸，寒。归肝、脾、膀胱经。

【功效主治】清热息风，平喘，通络，利尿。主治壮热惊痫抽搐；痰鸣喘息；热痹之关节红肿，屈伸不利；热结膀胱，小便不利，或小便癃闭；肝阳上亢型高血压病；偏瘫；鲜地龙用白糖化水内服治狂躁型精神分裂症；鲜地龙与白糖共捣外敷，可治疗腮腺炎、烫伤和慢性下肢溃疡。

【用量】6~15克。鲜品15~30克。研末吞服每次1~2克。外用适量。

蛇 蜕

出自《神农本草经》。为游蛇科动物黑眉锦蛇 *Elaphe taeniurus* Cope.、锦蛇 *E. carinata* (Guenther)、赤链蛇 *Dinodon rufozonatum* (Cantor) 及乌梢蛇 *Zaoleys dhumnades* (Cantor) 等多种蛇蜕下的皮膜。主产于浙江、广西、四川、江苏、安徽、福建、陕西、云

南等地。全年可收集，3～4月间最多。抖去泥沙，晒干或晾干。

【别名】龙子衣，龙子单衣，弓皮，龙皮，龙单衣，龙之单衣，蛇筋，蛇附，蛇符，蛇皮，蛇衣，龙子皮，蛇蜕皮，蛇壳，蛇退，龙退，龙衣，青龙衣，长虫皮，白龙衣。

【商品名】蛇蜕，蛇退。以条长粗大、皮细、色白、匀整不碎、干燥无泥沙等杂质者为佳。

【处方名】蛇蜕，蛇退，龙衣，酒蛇蜕或酒炒蛇蜕（蛇蜕段加黄酒拌匀，闷透，文火微炒而得的炮制品。炒后可增强祛风作用）。

【注意】本品别名“蛇退”，百合科植物褐黄蜘蛛抱蛋 *Aspidistra lurida* Ker-Gawl. 的根药材名称亦为蛇退，二者名称易混，应引起注意。

【性味归经】甘、咸，平。有毒。归肝、脾经。

【功效主治】祛风，定惊，退翳，消肿，杀虫。主治小儿惊痫，喉风口疮，木舌重舌，目翳内障，疔疮，痛肿，瘰疬，痄腮，痔漏，疥癣等病证。

【用量】2～3克。研末冲服每次0.3～0.6克。外用适量。

【慎忌】孕妇忌用。

罗 布 麻

出自《陕西中草药》。为夹竹桃科多年生草本植物罗布麻 *Apocynum venetum* L. 的全草。主产于我国东北、华北、西北及河南等地。在夏季开花前采集，晒干或阴干，亦可蒸炒揉制后用。夏季割取全草，晒干，切段用。

【别名】红麻，茶叶花，红柳子，野麻，羊肚拉角，泽漆麻，吉吉麻，红花草，野茶，罗布欢的尔（维吾尔族语名），红麻叶，茶叶麻，罗布麻叶。

【商品名】罗布麻。以质嫩、色绿、植株完整，干燥、无泥沙等杂质者为佳。

【处方名】罗布麻。

【注意】在药材商品市场上，同属植物大花罗布麻 *A. hender-*
sonii Hook. f. 的叶，在新疆地区亦作罗布麻入药，但非正品。

【性味归经】淡、涩，微寒。归肝经。

【功效主治】平肝，清热，利水，降血压。主治肝阳上亢或肝火炽盛型高血压病，症见头痛、头晕、烦躁、失眠、目赤等；水肿、小便不利而有热者。

【用量】6～12克。

【禁忌】脾虚水肿忌服。

猪毛菜

出自《河北中药手册》。为藜科植物猪毛菜 *Salsola collina* Pall. 的全草。全国各地均有分布。夏、秋开花时割取地上部分，晒干，切段入药。或用鲜品。

【别名】猪毛蒿，猪毛缨，扎蓬棵，扎蓬蒿，刺蓬，三叉明棵，山叉明棵。

【商品名】猪毛菜。以梗叶肥嫩、植株完整、色绿者为佳。

【处方名】猪毛菜，鲜猪毛菜。

【注意】同属植物大翅猪毛菜(刺沙蓬) *S. rutheanica* Iljin 的全草(分布于东北、华北及甘肃、青海、宁夏、新疆等地)在当地也作猪毛菜入药，但非正品。

【性味归经】甘、淡，凉。归肝经。

【功效主治】降压。主治高血压病。

【用量】10～30克。鲜品加倍。

芹 菜

出自《草药手册》。为伞形科植物芹菜 *Apium graveolens* L.

var. dulce DC的带根全株。我国各地均有栽培。随时采鲜品生用。

【别名】芹，旱芹，旱芹菜，药芹，药芹菜，蒲芹，蒲芹菜。

【商品名】芹菜。以质嫩、香气浓、梗叶肥壮者为佳。

【处方名】芹菜，鲜芹菜。

【注意】本品与同科植物水芹（楚葵、水蘗、水英、芹菜、水芹菜、野芹菜）*Oenanthe javanica* (Bl.) DC. 功效不同。宜区别使用。

【性味归经】甘、微苦，平。芳香。入肝、胃经。

【功效主治】平肝降压，和胃止呕。主治高血压病，反胃呕吐。

【用量】10~20克。鲜品30~60克。

十六、开 窍 药

麝 香

出自《神农本草经》。为鹿科动物林麝 *Moschus berezovskii* Flerov 和 马麝 *M. sifanicus* Przewalski 或 原麝 *M. moschiferus* L. 成熟雄性香囊中的干燥分泌物。产于四川、西藏、云南、陕西、内蒙古等地。野生或饲养。割下香囊，阴干，贮于密闭避光的容器中。

【别名】射香，元寸，当门子，脐香，麝脐香，四味臭，臭子，腊子，香脐子，元寸香，寸香，麝父香，獐香，獐子香，麝香子，林麝香，马麝香，原麝香，蛇头香，香獐子，獐子脐，沙麝香，苏麝香，南麝香，川麝香，云麝香，西麝香，口麝香。

【商品名】毛壳麝香：又名毛麝香、毛香、整麝香。为猎取后

割下香囊阴干者。以皮薄、饱满、有弹性，干燥、香气浓者为佳。

麝香仁：又名麝香肉、散麝香、散香。为剖开香囊，除去皮囊后剩余部分阴干者。以颗粒紫黑色、粉末棕褐色、质柔、油润、香气浓者为佳。

当门子：又名香子。呈颗粒状的优质麝香仁。

元寸：又名元寸香、寸香。为呈粉末状的麝香仁。

黑子麝香：为麝香仁黑色，粉末棕黄，香气浓烈，富有油性者。

【处方名】麝香，射香，元寸，当门子等。

【性味归经】辛，温。归心、脾经。

【功效主治】开窍醒神，活血散结，止痛，催产。主治热入心包所致的神昏痉厥，中风痰厥，惊痫等闭证；心腹暴痛，跌打损伤，痹证疼痛，心绞痛；胎死腹中，胎衣不下，疮疡肿毒。

【用量】0.06~0.1克，入丸散剂，或直接吞服，不宜入煎。外用适量。

【慎忌】孕妇及泄泻、滑精者忌服。

冰 片

出自《新修本草》。为龙脑香科常绿乔木龙脑香*Dryobalanops aromatica* Gaertn. f. 的树干经蒸馏冷却而得的结晶，称“龙脑冰片”，亦称“梅片”。现在主要用松节油、樟脑等为原料，经化学方法合成，称“机制冰片”。或由菊科多年生草本植物艾纳香（大艾）*Blumea balsamifera* DC. 叶的升华物经加工劈削而成，称“艾片”。成品贮于阴凉处，密闭。用时不能经火，研粉用。

【别名】梅片，龙脑冰片，龙脑香，艾纳香，艾片，艾粉，洗片，机片，机梅片，机制梅片，结片，龙脑冰，瑞龙脑，龙脑，脑子，冰花冰片，梅花脑，梅花脑子，梅花片脑，冰片脑，片脑，梅冰，羯布罗香，羯婆罗香，固不婆律，老梅片，老式梅片，婆律

香。

【商品名】龙脑冰片：又名龙脑、龙脑香、龙脑香冰片、龙脑冰、瑞龙脑、脑子、梅花冰片、梅花脑、梅花片脑、冰片脑、片脑、梅片、梅冰、老式冰片，老梅片、天然冰片等名称。为植物龙脑香树的树脂加工提炼而成的结晶体。为冰片正品。品质优良。主产于印度尼西亚。我国台湾、海南等地也有出产。以片大整齐、香气浓烈、无杂质者为佳。

机制冰片：又名机梅片、机片、洗片等名称。为用松节油、樟脑等为原料，经化学方法人工合成的结晶体。为冰片副品。品质较差。主产于上海、南京、广州、天津等地。以片大质薄、色洁白、质松脆、清香纯正者为佳。

艾片：又名艾粉、结片、贵州梅片。为从菊科植物艾纳香的叶中提取升华加工而成的结晶体。主产于贵州、广东、广西、云南等地。为冰片副品。品质稍逊于脑龙冰片，可作为龙脑冰片的替代品。以片大、洁白、质松脆、清香浓烈者为佳。

【处方名】冰片，梅片，梅冰，龙脑，龙脑香，龙脑冰等。

【性味归经】辛、苦，微寒。归心、脾、肺经。

【功效主治】开窍醒神，清热止痛。主治神昏，痉厥，各种疮疡，咽喉肿痛，口疮，目疾。

【用量】0.03~0.1克，入丸散，不宜入煎剂。外用适量。

【慎忌】孕妇慎服。

苏合香

出自《名医别录》。为金缕梅科乔木植物苏合香树 *Liquidambar orientalis* Mill. 的树脂。主产于非洲、印度、土耳其等地。成品置阴凉处，密闭保存。

【别名】苏合油，苏合香油，苏合香胶，流动苏合香，普通苏合香，精制苏合香，帝膏，帝油流。

【商品名】普通苏合香：初夏将树皮割破深达木质部，使香树脂渗入树皮内。到秋季时剥下树皮，榨取香树脂，残渣加水煮后再压榨，榨出的香树脂即为普通苏合香。

精制苏合香：将普通苏合香溶解于酒精中，过滤去渣，再蒸去酒精，则成精制苏合香。

均以色棕黄或暗棕、半透明、无杂质者为佳。

【处方名】苏合香，苏合油，苏合香油等。

【性味归经】辛，温。归心、脾经。

【功效主治】开窍辟秽，止痛。主治中风痰厥，卒然昏倒的寒闭证；胸腹冷痛满闷。

【用量】0.3~1克，入丸剂，不宜入煎剂。

【禁忌】孕妇及久泻滑精者慎服。

安 息 香

出自《新修本草》。为安息香科植物安息香树 *Styrax benzoin* Dryand. 和越南安息香 *S. tonkinensis* (Pier.) Craib 或粉背安息香树 *S. hypoglayca* Perk. 或青山安息香树 *S. macrothyrsus* Perk. 或白叶安息香树 *S. subnivea* Merr. et Chun 的树脂。春、秋二季割取树脂。晾干。

【别名】白花榔，金银香，苏门答腊安息香，越南安息香，白叶安息香，粉背安息香，青山安息香，暹罗安息香。

【商品名】苏门答腊安息香：又名印尼安息香。为植物安息香树的干燥树脂。主产于印度尼西亚。

越南安息香：又名暹罗安息香、泰国安息香。为植物越南安息香的干燥树脂。主产于越南、泰国。

粉背安息香：为植物粉背安息香树的干燥树脂。主产于我国海南、云南、广西、广东等地。

青山安息香：为植物青山安息香树的干燥树脂。主产于我国广

西等地。

白叶安息香：为植物白叶安息香树的干燥树脂。主产于我国广西、广东、海南等地。

进口安息香：指苏门答腊安息香和越南安息香。

国产安息香：指我国生产的粉背安息香、青山安息香和白叶安息香。

均以表面棕黄色、断面乳白色、显油润、香气浓、无杂质者为佳。

【处方名】安息香，安悉香，安西香，酒安息香等。

处方中写安息香、安悉香、安西香为原药粉碎入药者。

酒安息香为安息香加酒和水共煮成膏状，然后晒干入药者。

【性味归经】苦、辛，平。归心、肝、脾经。

【功效主治】开窍，辟秽，行气血。主治卒然昏迷，产后血晕，心腹疼痛，小儿惊痛，风痹腰痛。

【用法】内服研末入丸、散0.3~1.5克。外用适量。

【禁忌】阴虚火旺者慎服。

石 菖 蒲

出自《神农本草经》。为天南星科多年生草本植物石菖蒲 *Acorus gramineus* Soland. 的根茎。主产于四川、浙江、江苏等地。早春采挖，去叶，洗净，晒干；鲜品夏末采挖。生用或鲜用。

【别名】九节菖蒲，菖蒲，菖卜，千石菖蒲，九节菖，寸菖蒲，石菖卜，昌本，昌阳，昌羊，尧韭，尧时韭，木蜡，阳春雪，望见消，水剑草根，苦菖蒲，粉菖蒲，粉菖，剑草根，剑草菖蒲，剑菖、山菖蒲，溪菖，石蜈蚣，野韭菜根，水蜈蚣，香草根，香菖蒲，药菖蒲。

【商品名】九节菖蒲：又名九节菖、寸菖蒲。为生长于山间石缝中，根瘦节密，一寸九节者。传统认为品质最优。

石菖蒲：为各种石菖蒲的统称。以粗壮、条长、坚实而脆、表面色黄、断面色白、粉性足、无须根、干燥无杂质者为佳。

【处方名】石菖蒲，石菖卜，菖蒲，菖卜，九节菖蒲等。

【注意】在药材商品市场上，有一种建菖蒲（又名白菖蒲、水菖蒲、水菖、泥菖蒲、大叶菖蒲、臭蒲根、水见消），是同科植物水菖蒲（白菖）*A. columus* L.的根，功效与石菖蒲不同，不能混用。

目前药材商品中的“九节菖蒲”是毛茛科植物阿尔泰银莲花*Anemone altaica* Fisch.的根茎，称作京菖蒲、细节菖蒲、小菖蒲、外菖蒲、节菖蒲、九节离、鸡爪莲等，亦不应与石菖蒲混淆。

另外还有一种钱菖蒲，又名鲜菖蒲、细叶菖蒲、细节菖蒲。为同属植物钱菖蒲*A. gramineus* Soland var. *pusillus* (Sieb.) Engl.的根，以新鲜品入药。功效与石菖蒲相似，但非正品，可作为石菖蒲的替代品。

【性味归经】辛，温。归心、胃经。

【功效主治】开窍宁神，化温和胃。主治湿浊蒙蔽清窍所致的神志昏乱；健忘，耳鸣；胸腹胀闷疼痛；风寒湿痹，跌打损伤，痈疽疥癩等。

【用量】6～10克。鲜品加倍。外用适量。

十七、补虚药

(一) 补气药

人参

出自《神农本草经》。为五加科多年生草本植物人参 *Panax*

ginseng C. A. Mey.的根。

【别名】人蔞，白参，红参，野山人参，野山参，山参，野参，吉林人参，吉林参，鸿林参，朝鲜参，高丽参，别直参，棒槌，人衔，神草，鬼盖，土精，地精，黄参，血参，孩儿参，海腴，百尺杵，金井玉阑，移山人参，移山参，边条红参，白干参，白杆参，生晒参，掐皮参，白糖参，全须白人参，东洋参，辽东参，力参，皱面还丹。

【商品名】野山参：又名野山人参、野参、山参、吉林野参。为野生之人参。品质优良。以生长年久、浆足、芦长、体丰满、纹细而成螺旋形、须带珍珠疙瘩、坚韧、不易断者为佳。

老人参：野山参中生长数十年乃至数百年者。品质最优。

园参：又名秧参。为人工栽培之人参。

移山参：又名移山人参。将幼小野山参移植于田间，或将幼小园参移植于山野而长成之人参。

池底参：移山参挖取遗漏者又经多年长大之人参。

籽扒参：将园参种子撒于山野，使其自然生长，经过10年后起土挖出之人参。

吉林参：又名吉人参、吉林人参、鸡林人参、鸡林参。为产于吉林之人参。产量大，品质优。

长白参：又名长白人参。为产于长白山之人参。

国产人参：为我国国内生产之人参。

进口人参：为从朝鲜、日本等国进口之人参。

朝鲜参：又名朝鲜人参、高丽人参、高丽参、丽参。为产于朝鲜之人参。多为栽培品。

东洋参：又名日本人参。为产于日本之人参。多为栽培品。

红参：又名生蒸参。为园参经刷洗、笼蒸等加工后，晒干或烘干而成者。以身长、体圆、无抽沟、红棕色、微透明者为佳。

边条红参：又名边多参、条参、石柱参。红参的一种。条形美观，体长，径圆，芦长，身长，腿长，无细支根。原产于辽宁省宽

甸石柱沟，故又名石柱参。

生晒参：又名生晒人参。为人参趁鲜洗净，略晒，用硫磺熏过，再晒干者。以外表灰黄色、断面白色、无破痕者为佳。

全须生晒参：又名全须生晒人参。为须根全部保留的生晒参。

下须生晒参：为除去小须根、保留主根及大支根的生晒参。

白干参：又名白杆参、泡光参。为鲜人参洗净，刮去外表皮，略晒，使其变软，用线绳捆扎成人体形状，再晒干剪去线绳即成。

大力参：为鲜人参洗净，置沸水中煮片刻，晒干或烘干即成。

掐皮参：用骨片将人参表面刺成小凹点，再经加工即成。

皮尾参：为移山人参的幼小者经由加工生晒参的方法制成。

白参：又名白人参。为移山参或较粗大的园参洗净并刮去表面粗皮，在糖水中浸润，然后晒干而成。以个大、色白、皮老而细、纹深、长芦、长须、无破痕、不返糖者为佳。

白糖参：又名糖参。为个体瘦缩、浆汁不足的多种鲜参，经过扎孔、浸糖、烤干等多种工序加工而成。

朝鲜红参：又名别直参。为朝鲜人参加工成红参者。

朝鲜白参：为朝鲜人参加工成白参者。

人参条：为人参根茎上的不定根加工而成。

人参须：又名参须。为人参的细小支根加工而成。

人参片：为人参经焖润、切片、晒干等工序加工而成。

人参粉：为人参洗净，晒干，除去头芦，然后碾成的细粉。

红参须：为按照加工红参的方法制成的人参细支根。

红直须：为红参须中较粗大者。

红弯须：为红参须中较细小者。

红混须：为红直须和红弯须的混合品。亦即未将红直须和红弯须分拣开来的红参须。

白参须：为按照加工白参的方法制成的人参细支根。

白直须：为白参须中较粗大者。

白弯须：为白参须中较细小者。

白混须：为白直须和白弯须的混合品。亦即未将白直须和白弯须分拣开来的白参须。

参须尖：为人参在加工过程中切下的较细碎段。

【处方名】红参，白参，白糖参，白干参，生晒参，别直参，高丽参，东洋参，山参，野山参，参须，参条等。

【性味归经】甘、微苦，微温。归脾、肺经。

【功效主治】大补元气，补脾益肺，生津止渴，安神增智。主治大失血、大吐泻及大病之后出现的元气虚极、气虚欲脱、脉微欲绝之证；倦怠无力、食欲不振、上腹痞满、呕吐泄泻等脾气不足之证；呼吸短促、行动乏力、动辄气喘、脉虚自汗等肺气亏虚之证；口渴、消渴等津伤之证；心神不安、失眠多梦、惊悸健忘等气血亏虚之证；身体虚弱所致的阳痿证等。

【用法】5～10克，宜文火另煎，将参汁兑入其他药汁内饮用。研末吞服每次1～2克。如挽救虚脱，当用大剂量（30～60克）煎汁分数次灌服。

【禁忌】实热证而正气不虚者忌服。反藜芦，畏五灵脂，恶皂莢，不宜与上述药物配伍使用。服人参后不宜喝茶叶水或吃萝卜，以免影响药力。

西 洋 参

出自《本草从新》。为五加科植物西洋参 *Panax quinquefolium* L. 的根。主产于美国、加拿大及法国。我国也有引种。于秋季采挖生长3～6年的根，除去分枝、须尾，晒干。切片入药。

【别名】西洋人参，西参，洋参，佛兰参，正光结参，花旗参，广东人参，美国人参，正面参，顶光参，泡参。

【商品名】粉光西洋参：又名光西洋参、粉光参、去皮参、去皮西洋参。为西洋参采挖后趁鲜撞去外皮，再用硫磺蒸熏，晒干后，色白起粉者。

原皮西洋参：又名面参、原皮参、原皮洋参。为西洋参采挖后连皮晒干或烘干者。

野山洋参：又名野洋参、山洋参。为野生之西洋参。品质优，但产量小，极难得。

种洋参：为人工栽培之西洋参。品质次，但产量大，药材商品市场多为此种。

均以表面淡棕黄色或类白色，有密集细横纹、主根呈圆柱形或长纺锤形者为佳。

【处方名】 西洋参，花旗参，洋参。

【性味归经】 苦、微甘，寒。归心、肺、肾经。

【功效主治】 补气养阴，清火生津。主治阴虚火旺，喘咳痰血，热病气阴两伤，烦倦口渴，津液不足，口干舌燥；肠热便血。

【用量】 6～10克。

【慎忌】 脾胃寒湿者忌服。反藜芦。

党 参

出自《本草从新》。为桔梗科多年生草本植物党参 *Codonopsis pilosula* (Franch.) Nannf. 及同属多种植物的根。春秋两季采挖，以秋季采者为佳。挖出后除去泥沙、茎苗，边晒边搓，使皮部与木质部贴紧，晒干，切段，生用或蜜炙用。

【别名】 西党参，东党参，防党参，防党，上党参，上党，上党人参，潞党参，潞州党，潞州党参，野党参，台党参，台参，野台参，野台党，野台党参，黄参，狮头参，中灵草根，口党，口党参，辽参，三叶菜根，叶子草根，五台党。

【商品名】 野党参：党参野生种的统称。

台党参：产于山西五台山一带的党参。

野台党：又名野台党参。为产于五台山的野党参。个条粗壮，肉质肥厚，味甘清香，品质特优，为党参中之珍品。

防党参：为产于甘肃武都一带的野党参。经酒洒蒸制后内色变黑、皮色黄，横纹类似防风，故名防党参。品质优良。

潞党参：又名上党、上党参、上党人参、白皮党、异条党等。为产于山西长治（秦代称上党郡，隋代称潞州。故有上党参、潞党参之称）一带者。品质最优，为地道药材。多为栽培品。按质量好坏又可分为贡潞、奎潞、秃潞等规格。贡潞品质最优，奎潞次之，秃潞又次之。

文元党：又名汶元党、汶元党参、文元党参。为产于甘肃白龙江流域者。品质亦优。多为栽培品。

东党参：又名东党、吉林党、吉林党参。为主产于我国东北地区者。

西党参：又名西路党、西党、岷党、纹党、文党、晶党、素花党参等。为同属植物素花党参*C. modesta* Nannf.的根。产于陕西凤县和甘肃徽县等地。多为人工栽培。品质亦优。

条党参：又名条党、川党参、川党、单枝党、单枝党参、板桥党、八仙党、八仙党参。为同属植物川党参*C. tangshen* Oliv.的根。主产于湖北、陕西、四川等地。为人工用种子经播种法栽培者。条壮体肥，味甘，糖分充足，品质较优。

白党参：又名白党、甜党、叙党、管花党参等。为同属植物管花党参*C. tubulosa* Kom.的根。主产于四川、云南、贵州等地。质地较硬，糖分较少，色白，品质较次。

绿花党参：又名高山党参。为同属植物绿花党参*C. viridiflora* Maxim.的根。主产于四川。

秦岭党参：为同属植物秦岭党参*C. tsinlingensis* Pax. et K. Hoffm.的根。主产于陕西、甘肃。

新疆党参：又名直立党参。为同属植物新疆党参*C. clematidea* (Schrer.) Clarke的根。主产于新疆。

柴党：为同属植物柴党*C. nervosa* (Chipp.) Nannf.的根。主产于四川、甘肃。

蛇头党参：又名蛇头党、南路蛇头党。为同属植物蛇头党参 *C. subglobosa* W. W. Smith 的根。主产于四川。

灰白叶党参：又名北路蛇头党。为同属植物灰白叶党参 *C. canescens* Nannf. 的根。

小花党参：为同属植物小花党参 *C. micrantha* Chipp. 的根。主产于四川。

大头党参：又名大头党、心叶党。为同属植物大头党参 *C. cordiophylla* Diels 的根。主产于四川。

均以条大粗壮、皮松肉紧、有横纹及狮子盘头芦、质油润、味香甜、嚼之无渣者为佳。

【处方名】 党参，上党，潞党，潞党参，上党参，炒党参，炙党参，蜜炙党参，酒党参。

处方中写党参、上党、上党参、潞党、潞党参等均指生党参。为原药洗净晒干，再润透切片生用入药者。

炒党参为党参片用麸（或米、土、赤石脂等）炒至微黄色，略带焦斑，取出摊晾，而后入药者。健脾和胃功效增强。

炙党参又名蜜炙党参。为党参片用蜂蜜拌匀，再用文火炒至不粘手时取出摊晾，而后入药者。润肺益阴，补中益气功效增强。

酒党参为党参片用黄酒淋喷，闷透，晾干入药者。

【注意】 明党参 *Changini smyrnioides* Wolff (不经水煮直接晒干者称为粉沙参) 味甘微苦而性寒，为润肺化痰和胃止呕之品，属于养阴药，与沙参功效近似，不能作为党参使用。

【性味归经】 甘，平。归脾、肺经。

【功效主治】 补中益气，生津养血。主治中气不足所致的食少便溏、四肢倦怠之证；肺气亏虚所致的气短咳嗽、语言无力、声音低弱之证；热病伤津所致的气短口渴之证；气血不足所致的面色萎黄、头晕心慌之证；气虚外感及里实正虚之证等。

【用量】 10~15克。

【慎忌】 实证、热证而无虚者忌服。反藜芦。

太 子 参

出自《中国药用植物志》。为石竹科多年生草本植物异叶假繁缕 *Pseudostellaria heterophylla* (Miq) Pax ex Pax et Hoffm. 的块根。主产于江苏、安徽、山东等地。大多为人工栽培。于大暑时节前后采挖，除去细小根须，晒干，或先用沸水烫过再晒干，生用。

【别名】孩儿参，童参，双批七，假繁缕，异叶假繁缕。

【商品名】太子参，孩儿参。以粗壮肥润、色黄白、干燥无须根者为佳。

【处方名】太子参，孩儿参，童参。

【注意】古代本草书籍记载之太子参为五加科植物人参之小者。而目前药材商品市场及临床应用之太子参，则为石竹科植物异叶假繁缕的根，与人参非为一种药材。亦即是说，古今所称太子参非为一物。应注意辨别。

人参和太子参都有孩儿参之别名，极易混淆，亦应注意分辨。

同属植物假繁缕(又名棒棒草) *P. maximowicziana* (Franch. et Savat.) Pax ex Pax et Hoffm. 的根，在少数地区也作太子参入药，但使用范围不广。

【性味归经】甘、微苦，平。归脾、肺经。

【功效主治】补气生津。主治脾虚食少，倦怠乏力，心悸自汗，肺虚咳嗽，津亏口渴等。

【用量】10~30克。

灵 芝

出自《滇南本草》。为多孔菌科植物紫芝 *Ganoderma japonicum* (Fr.) Lloyd 及赤芝 *G. lucidum* (Leyss. ex Fr.) Karst. 子实

体全株。分布于河南、山西、河北、陕西、安徽、浙江、江西、湖南、吉林、福建、海南、广西、贵州、云南等地。秋季采集，晾干。

【别名】芝，茵，芮芝，菌灵芝，木灵芝，石灵芝，灵芝草，紫芝，赤芝，潮红灵芝，三秀。

【商品名】灵芝，灵芝草，菌灵芝，潮红灵芝，紫芝，赤芝。以色棕褐、个大匀整、油润光亮者佳。

【处方名】灵芝，灵芝草。

【性味归经】淡、微苦，温。归肝、肺、心经。

【功效主治】滋养强壮，安神，平喘。主治头晕，失眠，神经衰弱，高血压病，冠心病，高血脂症，肝炎，慢性支气管炎，矽肺，哮喘，风湿性关节炎，消化不良，虚劳等。

【用量】研末冲服1.5~3克。或适量浸酒服。

【慎忌】恶常山、茵陈、扁青等。

黄 茜

出自《神农本草经》。为豆科多年生草本植物黄芪（膜莢黄芪、东北黄芪）*Astragalus membranaceus* (Fisch.) Bge. 和内蒙古黄芪（红蓝芪、白皮芪）*A. mongholicus* Bge. 的根。前者主产于山西、甘肃、黑龙江、内蒙古等地；后者主产于内蒙古、吉林、河北、山西等地。春秋两季采挖生长四年以上者，除去地上部分及须根，晒干，润透切片，生用或蜜炙用。

【别名】棉芪，绵芪，绵黄芪，棉黄芪，黄耆，黄耆，箭芪，箭黄芪，内蒙古黄芪，王孙，戴芪，戴糁，戴椹，独椹，蜀脂，百本，百药棉，百药绵，土山爆张根，独根，二人抬，大有芪，蒙芪，元芪，红蓝芪，白皮芪，黑皮芪，膜莢黄芪，东北黄芪，内蒙古黄芪，冲正芪，武川芪，炮台芪，浑源芪。

【商品名】北黄芪：又名北芪、东北黄芪、卜奎芪、关卜奎

芪、关芪、黑皮芪。大部分为植物膜荚黄芪的根，小部分为植物内蒙古黄芪的根。主产于黑龙江、内蒙古等地。质优。因产地不同又分为宁古塔芪、红兰芪、黑石滩芪、正口芪等名称。

北口芪：又名口芪、正口芪、正芪、口黄芪。为植物内蒙古黄芪的根。属北黄芪。旧时多经独石口进关集散，故得此名。

绵黄芪：又名绵芪、棉芪、西绵芪、原生芪、白皮芪、箭黄芪、箭芪。包括大嵒芪、浑源芪、武川芪、壮芪、西黄芪等。指产于山西绵山等地者。大部分为内蒙古黄芪的根，小部分为膜荚黄芪的根。质佳。因其根长，形似箭杆，故有箭芪和箭黄芪之称。

西黄芪：又名西芪。指产于山西浑源、阳交、山阴、天填等地者。质佳。为通用正品。

库黄芪：又名库伦黄芪、库伦芪、库芪。指产于内蒙古库伦一带者。属北黄芪。

红芪：又名晋芪、岩黄芪。为豆科植物岩黄芪 *Hedysarum polybotrys* Hand-Mazz. 的干燥根。主产于甘肃。多为野生。为黄芪副品。按加工方法又可分为冲正芪、正炮台芪、副炮台芪等。

均以根条粗长、皱纹少、粉性足、坚实绵韧、味甘、无空心及黑心者为佳。

【处方名】黄芪，绵芪，棉芪，口芪，北芪，生黄芪，炒黄芪，炙黄芪等。

处方中写黄芪、绵芪、棉芪、口芪、北芪均指生黄芪。为原药材去杂质，润透切片，生用入药者。

炒黄芪为黄芪片用麸炒至深黄色，筛出晾凉入药者。健脾和胃功效增强。

炙黄芪又名蜜炙黄芪、蜜黄芪。为黄芪片用蜂蜜拌匀，炒至不粘手时取出摊晾，而后入药者。补气润肺功效增强。

【注意】在药材商品市场上，黄芪的市售商品除上述品种外，下列同属植物的根，在不同地区也作黄芪入药，但非正品。

黑毛果黄芪（白芪、塘吉耳黄芪）*Astragalus tongolensis*

Uibr. 分布于甘肃、青海、四川。甘肃称白大芪、马芪；青海称土黄芪。当地均作黄芪入药。

金翼黄芪 *A. chrysopterus* Bge. 分布于河北、山西、陕西、甘肃、青海、四川等地。河北称小黄芪、甘肃南部称小白芪。

多花黄芪 *A. floridus* Benth. 分布于甘肃、四川、西藏。四川称川绵芪、白绵芪。

茂汶黄芪 *A. maowenensis* Hsiao. mss 分布于四川茂汶县。

云南黄芪 *A. yunnanensis* Franch. 分布于云南、西藏。西藏作黄芪使用。

梭果黄芪 *A. ernestii* Comb. 四川理塘地区作黄芪使用。称品名称为川黄芪、川芪。

藏黄芪（春黄芪） *A. tibetanus* Benth. ex Bge. 分布于西藏。

弯齿黄芪 *A. camptodontus* Franch. 分布于云南。

阿克苏黄芪 *A. aksuensis* Bge. 分布于新疆。

此外，还有一些地区将豆科植物苜蓿 *Medicago sativa* L. 或草木樨 *Melilotus suaveolens* Ledeb. 或白香草木樨 *Melilotus albus* Desr. 或锦鸡儿 *Caragana sinica* (Buchoz) Rehd. 或蓝花棘豆 *Oxytropis caerulea* (Pall.) DC. 等的根称土黄芪，或直接混称“黄芪”，并误作黄芪入药。这是不对的，应该纠正。因以上这些植物的根与黄芪功效不同，不能混用。

【性味归经】甘，微温。归脾、肺经。

【功效主治】 补气升阳，益卫固表，托毒生肌，利水退肿。主治肺脾气虚所致的食少便溏、气短乏力等证；中气下陷所致的久泻脱肛、子宫脱垂、脏器下垂（胃下垂等）等证；气虚不能摄血所致的便血、崩漏等证；卫气不固所致的表虚自汗；气血不足所致的痈疽不溃或溃久不敛；气虚失运所致的浮肿尿少；气虚血滞所致的肢体麻木、关节痹痛、半身不遂等证；气虚津亏所致的消渴证等。

【用量】 10~30克。大剂量可用60~120克。

【禁忌】 凡表实邪盛、气滞湿阻、食积内停、阴虚阳亢、痈肿

初起或溃后热毒尚盛者均忌服。

白 术

出自《神农本草经》。为菊科多年生草本植物白术 *Attractylodes macrocephala* Koidz. 的根茎。主产于浙江。此外安徽、江西、湖北、湖南、福建等地亦有栽培。于农历十月采挖，去除泥土和地上部分，晒干。经水或米泔水浸软切片。生用或麸炒、土炒用。

【别名】术，于术，冬术，冬白术，浙术，种术，云术，台白术，山薑，天薑，山芥，山姜，山精，山连，杨枹薑，乞力伽，杭白术，广术，杭术，贡术，仙居术。

【商品名】于术：又名于白术、于潜术、烟术。为产于浙江省于潜地区者。品质最优，为地道药材。

野于术：又名天生术。为产于浙江省于潜、昌化、天目山一带的野生白术。

浙白术：为产于浙江者。

坪术：为产于湖南平江者。

种术：为产于安徽者。

徽术：为产于安徽省歙县（旧时徽州）者。品质亦佳。

冬术：又名冬白术。为冬季采挖，拣肥满纤维少者，略蒸后晒干之药材。

晒术：又名生晒术。为霜降至立冬之间采挖，去除残茎及须根，洗净晒干之药材。

烘术：为霜降至立冬期间采挖，去除残茎及须根，洗净烘干之药材。

均以根茎粗大、体实无空心、断面黄白色、干燥、无地上茎者为佳。

【处方名】白术，于术，生白术，炒白术，土白术，土炒白术，焦白术等。

处方中写白术、于术指生白术。为原药材去除杂质，润软切片，生用入药者。

炒白术又名炙白术。为白术片用麸炒至浅黄色入药者。健脾和中功效增强。

土白术又名土炒白术。为白术片用灶心土细粉炒至外面挂有土色，取出摊晾入药者。健脾和胃、止泻止呕作用增强。

焦白术又名焦术、白术炭。为白术片用武火炒至外面黑褐色、里面棕黄色，取出摊晾入药者。收敛止泻作用增强。

【性味归经】苦、甘，温。归脾、胃经。

【功效主治】补气健脾，燥湿利水，止汗安胎。主治脾气虚弱，运化失职所致的食少便溏、脘腹胀满、倦怠无力等证；脾虚所致的痰饮水肿；表虚自汗，易患感冒；脾虚胎动不安等。

【用量】6～15克。

【慎忌】阴虚内热或津亏燥渴者忌服。

山 药

出自《神农本草经》。为薯蓣科多年生蔓生草本植物薯蓣 *Dioscorea opposita* Thunb. 的块根。产于河南温县、武陟、孟县、沁阳一带者品质最佳，称怀山药。河北、山东、山西及中南、西南地区也有栽培。霜降后采挖。除去须根及茎，洗净，加工晒干，切片，生用或炒用。

【别名】薯蓣，蕷，山蕷，土蕷，蕷蕷，蕷薯，署预，诸暑，署豫，山芋，王芋，蛇芋，薯药，山薯，山薯蓣，野白薯，扁子薯，佛掌薯，玉延，延草根，修脆，儿草根，怀山药，怀山，淮山药，淮山，野山豆，山板木，白苕，九黄姜，白药子，白山药，铁拐山药，铁棍山药，山药薯。

【商品名】怀山药：又名淮山药。为产于河南省温县、博爱、孟县、沁阳、武陟一带（旧时怀庆府）者。品质最优，为地道药

材。

毛山药：又名毛条山药。为采挖后洗净泥土，刮去外皮，晒干或烘干之药材。

光山药：又名光条山药。将毛山药浸入清水中，至无干心时取出，用硫黄熏后，再用木板搓成圆柱形，晒干，打光即成。

方山药：为山药加工时切成长方形条状之药材。

西超：为产于山西之山药。

怀超：为产于河南之山药。

脚板薯：为产于江南（主产于广西）之山药。

均以质坚实、粉性足、色洁白、干燥者为佳。

【处方名】 山药，怀山药，淮山药，干山药，生山药，鲜山药，炒山药。

处方中写山药、怀山药、淮山药、干山药均指生山药。为原药材润透切片，生用入药者。偏于养阴、益气、生津。

鲜山药为山药鲜品去皮后入药者。偏于养阴、生津、止渴。

炒山药为干山药片用麸炒至微黄，略带焦斑入药者。偏于健脾、止泻、固精。

【注意】 在药材商品市场上，除上述品种外，下列同属植物的块茎在不同地区也作山药入药，属于山药之副品。

日本薯蓣（又名风车儿、野山药、土山药）*D. japonica* Thunb. 分布于长江以南各地。

三角叶薯蓣*D. deltoidea* Wall. 分布于云南、四川、西藏等地。

【性味归经】 甘、平。归脾、肺、肾经。

【功效主治】 益气养阴，补脾肺肾。主治脾虚气弱所致的食少便溏或泄泻；肺虚喘咳；肾虚尿频、遗精、腰膝酸困无力；妇女白带过多；消渴等。

【用量】 10~30克。大剂量60~200克。

【慎忌】 湿盛中满或内有积滞者不宜服。

扁豆(附：扁豆衣 扁豆花)

出自《名医别录》。为豆科1年生缠绕草本植物扁豆 *Dolichos lablab* L. 的种子。我国南北各地都有栽培，浙江、江苏、安徽、湖南、江西、四川等地甚多。在秋季豆熟时采收，晒干。生用或炒用。

【别名】白扁豆，南扁豆，沿篱豆，蛾眉豆，峨眉豆，凉衍豆，羊眼豆，膨皮豆，茶豆，南豆，小刀豆，树豆，藤豆，火镰扁豆，扁豆子，白眉豆，藉豆，萹豆，白藉豆，鹊豆，白梅豆。

【商品名】白扁豆。以粒大饱满、色白干燥、无杂质者为佳。

【处方名】扁豆，白扁豆，生扁豆，炒扁豆等。

处方中写扁豆、白扁豆均指生扁豆。为原药材去杂质生用入药者。偏于健脾利湿，消暑。

炒扁豆为净白扁豆用文火炒至微黄色，略带焦斑入药者。偏于健脾和胃，止泻。

【性味归经】甘，微温。归脾、胃经。

【功效主治】健脾化湿。主治脾虚湿胜，体倦乏力，食少便溏或泄泻，妇人白带过多；暑湿吐泻，小儿消化不良等。

【用量】10~20克。

附：扁豆衣

扁豆衣为扁豆之干燥种皮。又名白扁豆衣、南扁豆衣、蛾眉豆衣、峨眉豆衣、羊眼豆衣、白眉豆衣、白梅豆衣、萹豆衣等。功效虽逊于扁豆，然无壅滞之弊。多用于脾虚有湿或暑湿吐泻，以及脚气浮肿等证。用量5~10克，煎服。

附：扁豆花

扁豆花为扁豆之花。又名白扁豆花、南扁豆花、南豆花、蛾眉豆花、羊眼豆花、白眉豆花、白梅豆花、萹豆花等。以花朵大、色鲜艳而白、干燥完整、无杂质者为佳。功能消暑化湿，多用于夏伤暑湿、发热泄泻或下痢，并治妇女赤白带下。用量5~10克，煎服。

甘 草

出自《神农本草经》。为豆科多年生草本植物甘草 *Glycyrrhiza uralensis* Fisch. 的根及根茎。主产于内蒙古、山西、甘肃、新疆等地。春秋采挖，除去残茎及须根，或去外皮，切片晒干。生用或蜜炙用。

【别名】国老，国老草，蜜草，蜜甘，美草，棒草，甜甘草，甜草，甜草根，甜根子，红甘草，粉甘草，粉草，蕗草，灵通，主人，大嗽，偷蜜珊瑚肉。

【商品名】目前甘草商品一般分为东甘草和西甘草两种。

东甘草：又名东草。为产于东北、河北、山西等地者。

西甘草：又名西草。为产于甘肃、内蒙古、青海、陕西、新疆等地者。

此外还有以下传统商品名称：

梁外草：产于内蒙古伊克昭盟杭锦旗一带者。

王爷地草：产于宁夏巴盟的阿拉善左旗者。习惯认为梁外草及王爷地草品质最优，为地道药材。

西镇草：产于内蒙古伊克昭盟鄂托克旗及宁夏陶东、平罗一带者。属于西草。

上河川草：产于内蒙古伊克昭盟拉达特旗一带者。属于西草。

边草：产于陕西北部靖边、定边一带者。属于西草。

西北草：产于甘肃尼勤、庆阳、张掖、玉门等地者。属于西草。

下河川草：产于内蒙古包头附近的土默特旗、托克托和林格尔等地者。属于西草。

东北草：产于内蒙古东部、辽宁的昭乌达盟、吉林的哲盟、黑龙江的呼盟等地者。属于东草。

新疆草：产于新疆者。属于西草。

皮甘草：又名带皮甘草、带皮草、皮草。为采收加工后保留栓皮者。

粉甘草：又名刮皮甘草、刮皮草、白粉草、粉草。为采收加工后刮去栓皮，切成长段者。

把甘草：为在加工过程中切成长段、扎成把者。

甘草节：又名粉草节、草节。为甘草根及根茎中充填有棕黑色树脂状物质的部分。

甘草头：又名疙瘩草、疙瘩头。为甘草根茎上端的芦头部分。

甘草梢：又名草梢、生草梢。为甘草根的末梢部分或细根。

均以皮细而紧、质坚体重、红棕色、粉性大、甜味浓、干燥无杂质者为佳。

【处方名】甘草，生草，生甘草，炙草，炙甘草，草梢，甘草梢，生草梢等。

处方中写甘草、生草指生甘草。为原药材除去杂质，洗净，润透切片，生用入药者。偏于清热解毒。

炙草又名炙甘草、蜜甘草、蜜炙甘草。为生甘草片用蜂蜜拌匀，再炒至不粘手取出摊晾，然后入药者。偏于润肺和中。

草梢、甘草梢、生草梢均为甘草根的末梢或细根，洗净，切小段入药者。偏于清热利尿。

【注意】在药材商品中，甘草除上述品种外，下列同属植物的根亦作甘草入药，但品质较次。多混入西甘草中销售。

光果甘草(欧甘草) *G. glabra* L. 分布于新疆。

黄甘草 *G. kansuensis* Chang et Peng 分布于甘肃。

胀果甘草 *G. inflata* Batal. 分布于新疆、甘肃。

在药材商品中还有一种苦甘草，又名苦豆根、金钥匙。是豆科草本植物苦豆子 *Sopora alopecuroides* L. 的干燥根。分布于内蒙古、甘肃、新疆等地，形态与甘草基本相同，但功效大相径庭，绝不相同。与甘草不是一种药材，应提醒注意，不可混用。

【性味归经】 甘，平。归心、肺、脾、胃经。

【功效主治】 补脾益气，润肺止咳，缓急止痛，调和诸药。主治脾胃虚弱，中气不足，气短乏力，食少便溏；咳嗽气喘；痈疽疮毒，食物或药物中毒；脘腹或四肢挛急作痛；缓和药性，调和诸药。

【用量】 3～10克。

【禁忌】 湿盛胸腹胀满者或呕吐者忌服。大剂量久服可致浮肿，故不可长期大剂量服用。反大戟、甘遂、海藻、芫花。

大枣(附：枣树皮)

出自《神农本草经》。为鼠李科落叶灌木或小乔木植物枣树 *Ziziphus jujuba* Mill. var. *inermis* (Bge.) Rehd. 的成熟果实。主产于河南、河北、山东、陕西等省。初秋果实成熟时采收，晒干生用。

【别名】 大红枣，红枣，枣子，干枣，美枣，良枣，刺枣，枣，丹枣。

【商品名】 大枣，红枣。以果大而圆、肉厚核小、甜味浓、干燥、色紫红者为佳。

【处方名】 大枣，红枣，枣。

【性味归经】 甘，温。归脾、胃经。

【功效主治】 补中益气，养血安神，缓和药性。主治中气不

足，脾胃虚弱，倦怠无力，食少便溏；血虚面色萎黄，眩晕，常欲悲哭，缓和药性。

【用量】 3~15枚。

附：枣树皮

枣树皮为枣树的树皮。又名大枣树皮、红枣树皮、枣子树皮、良枣树皮、干枣树皮、美枣树皮、棘枣树皮、刺枣树皮等。性温无毒。有收敛止泻，祛痰镇咳，消炎止血之功效。主治痢疾，肠炎，慢性气管炎，目昏不明，烧烫伤，外伤出血及妇女崩漏下血等。用量10~20克。烧存性研末冲服每次1.5~3克。外用适量。

饴 糖

出自《名医别录》。系以糯米或粳米磨粉煮熟，加入麦芽（搅匀），微火煎熬而成。有软硬两种，软者称胶饴，硬者习称白饴糖。入药以软饴为主。全国各地均产。

【别名】 软饴，胶饴，饧，饧糖，饴糖，软糖，糖饼，糖饧，铺，怅饽，糖稀，饴饧。

【商品名】 软饴糖：又名胶饴糖、胶饴。为粘性很大的黄褐色浓稠液体。药用多用此种。

硬饴糖：又名白饴糖、硬饴。为软饴糖经搅拌混入空气后凝固而成的多孔的黄白色糖饼。

【处方名】 饴糖。

【性味归经】 甘，温。归脾、胃、肾经。

【功效主治】 补脾益气，缓急止痛，润肺止咳。主治劳倦伤脾，气短乏力，饮食减少，虚寒腹痛，喜温喜按；肺虚咳嗽，干咳无痰，气短作喘。

【用量】 30~60克。

【慎忌】湿热内郁，中满吐逆，痰热咳嗽，小儿疳积等证均不宜服用。

蜂 蜜

出自《神农本草经》。为蜜蜂科动物中华蜜蜂 *Apis cerana Fabricius* 或意大利蜂 *A. mellifera L.* 在蜂巢中酿成的糖类物质。我国各地均产，主产于湖北、四川、云南、河南、江西、广东、江苏、浙江等地。原蜜中往往含有水分、尘土、幼虫及蜡屑等杂质，故须制过。通常是加水稀释，煮沸，滤去杂质，再浓缩而成。

【别名】白蜜，白沙蜜，沙蜜，蜜，食蜜，石蜜，石饴，蜂糖，蜜糖，中华蜂蜜，范蜜，蜡蜂蜜，中蜂蜜，百花精。

【商品名】白蜜：为白色或淡黄色的粘稠液体蜂蜜。

黄蜜：为橘黄色或琥珀色的粘稠液体蜂蜜。

此外，还根据蜜蜂采集花卉的不同，分为枣花蜜、桐花蜜、槐花蜜、油菜花蜜、橘花蜜、枇杷花蜜、荔枝花蜜、紫云蜜等种类。

均以水分小、稠如凝脂、甜味纯正、不发酸、有香气、洁净者为佳。

【处方名】蜜，蜂蜜，白蜜，生蜂蜜，生蜜，炼蜜等。

【性味归经】甘，平。归脾、肺、大肠经。

【功效主治】补中缓急，润肺止咳，滑肠通便。主治脾胃虚弱，倦怠食少，脘腹作痛；肺虚久咳，干咳，咽喉干燥；肠燥便秘；解乌头、附子毒。外用治疗疮疡、烫伤。

【用量】15~30克。外用适量。

【慎忌】湿热痰滞，胸脘满闷，便溏或泄泻者均不宜服。

(二) 补阳药

鹿 茸(附：鹿角 鹿角胶 鹿角霜)

出自《神农本草经》。为鹿科脊椎动物梅花鹿 *Cervus nippon* Temminck 或马鹿 *C. elaphus* L. 等雄鹿头上尚未骨化而带毛的幼角。我国东北、西北和内蒙古、新疆及西南山区均有分布，现在不少地区进行人工饲养。夏秋两季雄鹿长出的新角尚未角化时，将角锯下或用刀砍下，称为锯茸或砍茸。在沸水中略为烫过，晾干，再烫，再晾，至积血排尽为度。用时燎去毛，以瓷片或玻璃片刮净后，黄酒润或湿布包润使稍软，切片烘干。

【别名】斑龙珠，毛角，九女春。

【商品名】花鹿茸：又名花草、毛茸、黄毛茸、黄毛鹿茸、梅花鹿茸。为动物梅花鹿雄鹿的幼角。主产于吉林、辽宁、黑龙江及河北等地。

马鹿茸：又名马茸、草茸、赤鹿茸、八岔鹿茸、青毛茸、青毛鹿茸。为动物马鹿雄鹿的幼角。主产于吉林、辽宁、黑龙江、内蒙古及新疆等地。

关鹿茸：又名东鹿茸。习指产于长白山一带者。品质较佳。

西鹿茸：产于西北者。品质较次。

嫩鹿茸：习指质嫩柔软者。质佳。

锯茸：为锯下的雄鹿幼角。幼小雄鹿从第三年开始锯茸。每年可采收一二次。第一次在清明后45~50天采收，习称“头茬茸”。第二次在立秋前后采收，称“二茬茸”。

砍茸：为连同脑盖骨一起砍下的鹿茸。

初生茸：又名初生茸角。为圆柱形或圆锥形的无分岔的幼小鹿茸。

大挺：习称鹿茸的主干为“大挺”。

二杠茸：习称具有一个侧枝的花鹿茸为“二杠茸”。

单门：习称具有一个侧枝的马鹿茸为“单门”。

莲花茸：习称具有二个侧枝的马鹿茸为“莲花茸”。

三岔茸：习称具有2个侧枝的花鹿茸和具有3个侧枝的马鹿茸为“三岔茸”。

四岔茸：习称具有4个侧枝的马鹿茸为“四岔茸”。

以上均以粗壮饱满、质嫩油润者为佳。

鹿茸片：为原药燎去茸毛，刮净，内灌热酒，置火上烘烤至软，或置笼内蒸透，切片，压平晒干者。

黄茸片：为花鹿茸加工而成的鹿茸片。

青茸片：为马鹿茸加工而成的鹿茸片。

鹿茸血片：又名血茸片、血片。为鹿茸顶尖部分按照鹿茸片之加工方法，切片制作者。质嫩，油润如脂，色如蜜蜡，品质最优。

鹿茸粉片：为鹿茸根底部分按照鹿茸片之加工方法切片制作者。质老，油润较差，色白，品质较次。

鹿茸粉：将干燥的鹿茸片碾成细末即成。

除上述梅花鹿和马鹿外，下列同属动物的雄性幼角也作鹿茸入药，但均属野生，数量少，品质亦次。

白唇鹿茸（又名岩茸）：为动物白唇鹿 *C. albirostris* Przewalski的幼角。主产于西藏、云南、青海、四川。

水鹿茸（又名春茸）：为动物水鹿 *C. unicolor* Kerr的幼角。主产于四川、云南、广东、台湾等地。

白鹿茸（又名草茸）：为动物白鹿 *C. macneilli* Lydekker的幼角。主产于四川西部。

【处方名】鹿茸，鹿茸片，茸片，鹿茸粉。

【性味归经】甘、咸，温。归肝、肾经。

【功效主治】补肾阳，益精血，强筋骨。主治肾阳不足，精血亏虚之畏寒肢冷，阳痿早泄，宫冷不孕，小便频数，腰膝酸痛，头

晕耳鸣，精神疲乏；精血不足之筋骨无力，小儿五迟；妇女冲任虚寒，带脉不固，崩漏，白带过多；疮疡久溃不敛，阴疽内陷不起。

【用量】 1～3克，研末冲服。

【慎忌】 阴虚阳亢、血热、痰火、外感热病等均不宜服。

附：鹿角

鹿角为梅花鹿和各种雄鹿已长成骨化的角。又名梅花鹿角、花鹿角、马鹿角、斑龙角、老鹿角、镇山威、鹿角粉、鹿角屑、鹿角片、水鹿角（春角）、白鹿角（草角）、白唇鹿角（岩角）等。以质坚油润者为佳。性味咸温。归肝、肾经。有补肾助阳的功效。可作为鹿茸的代用品，但药力薄弱。兼有活血、散瘀、消肿功效。主治疮疡肿毒，乳痈，瘀血作痛及腰脊筋骨疼痛等证。用量水煎服6～10克，研末冲服每次2～4克。磨汁或研末外用适量。阴虚火旺者忌服。

附：鹿角胶

鹿角胶为鹿角煎熬浓缩而成的胶状物。又名鹿胶、白胶。以切面整齐、平坦、光滑、半透明、色棕黄、味甘、无腥气者为佳。性味甘咸温。归肝、肾经。有补肝肾、益精血、止血之功效。主治肾阳不足，精血亏虚，虚劳羸瘦，吐血、衄血，尿血，崩漏之偏于虚寒者，阴疽内陷等。用量5～10克。用开水或黄酒加温烊化服，或入丸散膏剂。阴虚火旺者忌服。

附：鹿角霜

鹿角霜为鹿角熬膏后剩下的残渣。又名鹿角白霜、鹿角双。以块整匀、色灰白、质酥、不糟朽者为佳。有益肾助阳，收敛止血之

功效。补力虽弱，但不滋腻。主治肾阳不足，脾胃虚寒，呕吐食少便溏，妇女子宫虚冷，崩漏，带下等证。外用可治疗疮疡久不愈合或长流黄水，创伤出血。用量10~15克。外用适量。阴虚火旺者忌服。

鹿 鞭

出自《名医别录》。为脊椎动物鹿科梅花鹿 *Cervus nippon* Temminck 或马鹿 *C. elaphus* L. 等雄鹿的外生殖器。

【别名】鹿肾，鹿阴茎，鹿茎筋，鹿冲，鹿冲肾。

【商品名】鹿鞭：又名鹿肾。将雄鹿宰杀后割取阴茎及睾丸，除净残肉及油脂，固定于木板上风干即成。以粗大、油润、无残肉及油脂、无虫蛀、干燥者为佳。

鹿鞭片：又名鹿肾片。为原药洗净润透，切片晒干入药者。

鹿鞭粉：将鹿鞭片用沙土炒至松泡，然后筛去沙土，碾成细粉入药者。

【处方名】鹿鞭，鹿肾。

【性味归经】甘，平。归肝、肾、膀胱经。

【功效主治】补肾，壮阳，益精。主治阳痿遗精，腰膝酸痛，肾虚耳鸣耳聋，诸虚百损，妇人宫冷不孕等。

【用量】6~10克。鹿鞭粉冲服每次2~3克。

【禁忌】火热内盛者忌服。

巴 戟 天

出自《神农本草经》。为茜草科多年生藤本植物巴戟天 *Morinda officinalis* How. 的根。主产于广东、广西、福建、江西、四川等地。冬天及早春采挖，除去须根，略晒，再压扁晒干。用时润透或蒸过，除去木质心，切片或盐水炒用。

【别名】巴戟，兔子肠，兔仔肠，三蔓草根，不凋草根，鸡眼藤根、黑藤钻根，糠藤根，三角藤根，鸡肠风、肥巴戟，巴吉，巴吉天，连珠巴戟、巴棘，戟天，女木。

【商品名】巴戟，巴戟天。以根条粗壮、呈连珠状、肉厚、木心小、细润、色紫黑、干燥无泥沙者为佳。

【处方名】巴戟，巴吉，巴戟天，巴吉天，肥巴戟，巴戟肉，盐巴戟，炙巴戟，酒巴戟等。

处方中写巴戟、巴吉、巴戟天、巴吉天、肥巴戟均指巴戟肉。为原药材去杂质，洗净，放笼内蒸，趁热抽去木心，切片，晒干入药者。

盐巴戟为巴戟肉用盐水拌匀，待吸尽，用文火炒干入药者。引药入肾，以壮肾阳。

炙巴戟为巴戟肉与甘草水同煮后晒干入药者。缓解毒性，壮阳而不燥。

酒巴戟为巴戟肉用黄酒喷淋，拌匀微闷，晾干入药者。

【注意】在药材商品市场上，福建、江西等部分地区以同属植物羊角藤 *Morinda umbellata* L.的根作巴戟天使用；四川地区以防己科植物木防己（又名青藤香、小青藤、白山番薯、青檀香、青凤藤、小葛藤）*Cocculus trilobus* (Thunb.) DC.的根作巴戟天使用；四川重庆地区以木通科植物白木通（又名八月瓜藤、地海参）*Akebia trifoliata* (Thunb.) Koidz. var. *australis* (Diels) Rehd. 的根作巴戟天使用。以上均属误用，应予以纠正。

【性味归经】辛、甘，微温。归肾经。

【功效主治】补肾助阳，祛风胜湿。主治阳痿，尿频，宫冷不孕，月经不调，少腹冷痛；腰膝冷痛或酸软无力。

【用量】10~15克。

【慎忌】阴虚火旺、内有实热或湿热者忌服。

肉 茄 蓉

出自《神农本草经》。为列当科1年生寄生草本植物肉苁蓉 *Cistanche salsa* (C. A. Mey.) G. Beck 的带鳞叶的肉质茎。主产于内蒙古、甘肃、新疆、青海等地。春季采挖，晒干切片(纵切)入药。

【别名】淡大芸，大芸，大云，淡大云，田大芸，甜大芸，甜大云，肉从容，肉松蓉，苁蓉，纵蓉，地精，金笋，寸芸，寸云，甜苁蓉，碧水龙，察干高牙(蒙族名)。

【商品名】淡大芸：又名淡大云、淡苁蓉、甜苁蓉、甜大芸等。为春季采挖后，半埋于沙土中，待过盛夏后再晒干者。

咸大芸：又名咸大云、盐大芸、盐大云、咸苁蓉、盐苁蓉等。为秋季采挖后，因水分过多不易晒干，为防止霉烂，先投入盐水中浸渍，然后取出晒干者。

均以茎条粗壮、密披鳞片、色棕褐、质柔润者为佳。

【处方名】大云，大芸，寸云，寸芸，肉苁蓉，苁蓉，生肉苁蓉，制肉苁蓉，蒸肉苁蓉，酒肉苁蓉等。

处方中写大芸、大云、寸云、寸芸、苁蓉、肉苁蓉均指生肉苁蓉。为淡大芸或咸大芸(清水浸泡去尽盐分)切片晒干入药者。

制肉苁蓉又名制大芸、制大云。为大芸片用米泔水浸泡后晒干入药者。减缓腻膈之弊。

蒸肉苁蓉又名蒸大云、蒸大芸。为淡大芸或咸大芸(清水浸泡去尽盐分)蒸透切片，晒干入药者。润补作用增强。

酒肉苁蓉又名酒大云、酒大芸。为淡大芸或咸大芸(清水浸泡去尽盐分)洗净晒干后用黄酒喷洒拌匀，稍闷，待酒吸尽，放笼内蒸后切片晒干入药者。温肾壮阳作用增强，润便滑肠作用减弱。

【注意】在药材商品市场上，产于内蒙古的同属植物苁蓉 *C. deserticola* Y. C. Ma 及迷肉苁蓉 *C. ambigua* (Bge.) G. Beck

的肉质茎也作肉苁蓉入药，但品质较次，非肉苁蓉正品。

【性味归经】甘、咸，温。归肾、大肠经。

【功效主治】补肾助阳，润肠通便。主治男子阳痿，妇人不孕，腰膝冷痛或筋骨无力，阳虚便秘。

【用量】10~15克。³

【慎忌】阴虚火旺及大使溏泻者忌服。热结便秘者亦不宜服。

仙 茅

出自《海药本草》。为石蒜科多年生草本植物 *Curculigo orchioides* Gaertn. 的根茎。产于我国西南及长江以南各地。四川产量最大。秋末至春初采挖，除去须根，晒干，切片生用，或经米泔水浸泡后切片用。

【别名】独茅根，独毛根，独茅，独脚仙茅，独脚丝茅，独脚黄茅，独脚绿茅根，茅爪子，仙茅参，仙茅根，黄茅参，婆罗门参，地棕根，小地棕根，天棕，山棕，盘棕，千年棕，蟠龙草，凤苔草，冷饭草，土白芍，平肝薯，山兰花，仙毛。

【商品名】仙茅。以根茎粗壮、坚实，表面色黑、干燥无须根者为佳。

【处方名】仙茅，仙毛，制仙茅，酒仙茅。

处方中写仙茅、仙毛指生仙茅。为原药材除去须根，洗净晒干，润透切片入药者。

制仙茅为净仙茅用米泔水浸泡后切片晒干入药者。缓解毒性。

酒仙茅为净仙茅片用黄酒拌匀，待吸尽，再用文火炒干入药者。祛寒除湿功效增强。

【性味归经】辛，热。有毒。归肾经。

【功效主治】温肾壮阳，祛寒除湿。主治阳痿滑精，小便不禁，心腹冷痛，腰膝冷痛等。

【用量】3~10克。

【慎忌】阴虚火旺及内有实火者忌服。

淫 羊 蕺

出自《神农本草经》。为小檗科多年生草本植物 淫羊藿 *Epinedium grandiflorum* Morr. 和箭叶淫羊藿 *E. sagittatum* (S. et Z.) Maxim. 或心叶淫羊藿 *E. brevicornum* Maxim. 的全草。主产于陕西、四川、湖北、山西、广西等地。春秋采割，晒干，切碎，生用或酥炒用。

【别名】箭叶淫羊藿，心叶淫羊藿，仙灵脾，仙灵毗，放杖草，弃杖草，三枝九叶草，铜丝草，肺经草，三叉骨，三角莲，三叉风，羊角风，牛角花，铁菱角，铁打杵，黄连祖，千鸡筋，千两金，刚前。

【商品名】大叶淫羊藿：又名淫羊藿。为植物淫羊藿的全草。

小叶淫羊藿：又名心叶淫羊藿。为植物心叶淫羊藿的全草。

箭叶淫羊藿：为植物箭叶淫羊藿的全草。

均以梗少叶多、色黄绿、干燥、不破碎者为佳。

【处方名】淫羊藿，淫羊火，羊藿，仙灵脾，炒淫羊藿，酒淫羊藿等。

处方中写淫羊藿、淫羊火、羊藿、仙灵脾均指生淫羊藿。为原药材去杂质，切段生用入药者。

炒淫羊藿为净淫羊藿段用文火微炒后入药者。

酒淫羊藿为净淫羊藿段用黄酒淋洒拌匀，微闷，再用文火炒干入药者。祛风除湿功效增强。

【注意】在药材商品市场上，除上述品种外，下列同属植物的全草在不同地区也作淫羊藿入药，功效相似，但非正品。

尖叶淫羊藿 *E. acuminatum* Franch. 分布于四川、云南、贵州等地。

毛叶淫羊藿 *E. pubescens* Maxim. 分布于陕西、湖北、四川等

地。

长柄淫羊藿 *E. elongatum* Komar. 分布于甘肃、四川等地。

东北淫羊藿 *E. koreanum* Nakai 分布于东北地区

大花淫羊藿 *E. macranthum* Morr. et Decne. 分布于山东、江苏、甘肃、江西、湖南、广西、贵州、四川等地。

【性味归经】辛、甘，温。归肝、肾经。

【功效主治】肾阳不足所致的阳痿、尿频、腰膝无力；风寒湿痹或肢体麻木；冠心病等。

【用量】3～10克。

【慎忌】阴虚火旺及内有实热者忌服。

胡 芦 巴

出自《嘉祐本草》。为豆科1年生草木植物葫芦巴 *Trigonella foenum-grecum* L. 的成熟种子。主产于安徽、河南、江苏、四川等地。主要为人工栽培。夏秋种子成熟时采收，晒干，搓下或打下种于，除去杂质，生用、炒用或盐水炒用。

【别名】芦巴，芦巴子，胡巴，胡巴子，葫芦巴，苦豆，季豆，香豆，香豆子，小木夏，芸香草子，香草子，苦草子，苦朵菜子，香苜蓿子，葫芦巴子，葫芦巴子。

【商品名】葫芦巴，芦巴子。以籽粒饱满、干燥无杂质者为佳。

【处方名】葫芦巴，芦巴子，炒葫芦巴，盐葫芦巴。

处方中写葫芦巴、芦巴子指生葫芦巴。为原药去杂质生用入药者（用时捣碎）。

炒葫芦巴为净葫芦巴用文火炒至黄色入药者。温肾助阳效力增强。

盐葫芦巴又名盐炒葫芦巴。为净葫芦巴用盐水拌匀，待吸尽，再用文火炒至黄色入药者。引药归元，增强温肾效力。

【性味归经】苦，温。归肝、肾经。

【功效主治】温肾阳，逐寒湿。主治肾阳不足，寒湿内盛所致的腹胀满，腰膝冷痛及酸软无力，寒湿脚气，寒疝，少腹疼痛牵引睾丸疼痛，关节肌肉筋骨疼痛等等。

【用量】3~10克。

【禁忌】阴虚火旺、内有实热或湿热者忌服。

杜仲

出自《神农本草经》。为杜仲科落叶乔木植物杜仲 *Eucommia ulmoides Oliv.* 的树皮。主产于四川、云南、贵州、湖北等地。夏秋季采收，去除外表粗皮，晒干，生用或盐水炒用。

【别名】柳，木绵，棉树皮，丝连皮，丝棟皮树，丝棉皮，扯丝皮，玉丝皮，思仙，石思仙，思仲，川杜仲，厚杜仲，乱银丝，鬼仙木。

【商品名】绵杜仲：又名厚杜仲。皮质厚，折断时白丝多而如棉者。质佳。

川杜仲：产于四川大巴山山脉及贵州娄山山脉者。品质最优，为地道药材。

汉杜仲：产于陕西、湖北，而集散于汉口者。品质亦佳。

均以皮厚、块整、干燥、无粗皮、断面白丝多、外表而黑褐色者为佳。

【处方名】杜仲，炒杜仲，盐杜仲，盐水炒杜仲，杜仲炭等。

处方中写杜仲指生杜仲。为原药材去杂质切丝生用入药者。

炒杜仲又名盐杜仲、盐水炒杜仲、炙杜仲、焦杜仲等。为净杜仲丝用盐水淋喷拌匀，待吸尽，再用文火炒至黄褐色入药者。引药走下，补肝肾、壮筋骨作用增强。

杜仲炭为净杜仲丝用武火炒至黑褐色，内里丝断，存性，然后取出，用清水淋洒灭尽火星，晒干入药者。偏于止血。

【注意】在药材商品市场上，广东、广西、湖南、云南、贵州等地的个别地区，以夹竹桃科植物杜仲藤（又名藤杜仲、藤仲、土杜仲、鸡腿藤、牛腿子藤、白胶皮藤、毛杜仲藤）*Parabarium huaitingii* Chun et Tsiang 和白杜仲藤*P. micranthum* (Wall.) Pierre, 或红杜仲藤*P. chunianum* Tsiang Chett. 等的树皮作杜仲使用，称为“土杜仲”或“红杜仲”。折断时亦有软性橡胶丝牵连。有祛风活络，强筋壮骨功效。有小毒，可引起头晕、呕吐等不良反应。非杜仲正品，多数地区不用。

【性味归经】甘，温。归肝、肾经。

【功效主治】补肝肾，壮筋骨，安胎。主治肝肾不足引起的腰膝酸痛或痿软无力，阳痿，尿频，胎动不安，习惯性流产；肝阳上亢引起的头目眩晕等。

【用量】10~15克。

【慎忌】阴虚火旺者忌服。

续 断

出自《神农本草经》。为山萝卜科多年生草本植物续断 *Dipsacus japonicus* Miq. 或川续断 *D. asper* Wall. 的根。主产于四川、湖北等地。7~8月间采根，去芦茎、细须，切片，晒干。生用或酒炒、盐水炒用。

【别名】川断，川续断，川断肉，续断肉，龙豆，属折，接骨，南草根，接骨草根，山萝卜，六汗，六旦，和尚头，鼓槌草根，滋油菜根，小血转，黑老鸦头，恶鸡婆。

【商品名】续断：为植物续断的根。

川续断：又名川断。为植物川续断的根。

均以根条粗壮、质软、干燥、断面绿褐色者为佳。

【处方名】川断，川续断，续断，川断肉，生续断，炒续断，酒续断，盐续断，续断炭。

处方中写川断、川续断、续断、川断肉均指生续断。为原药去杂质，洗净润透，切片晒干，生用入药者。

炒续断为续断片用文火炒至黄色，略带焦斑，取出摊晾入药者。温补肝肾功效增强。

酒续断又名酒炒续断。为续断片用黄酒淋洒拌匀，待吸尽，再用文火炒干入药者。功偏行血脉。

盐续断又名盐炒续断、盐水炒续断。为续断片用盐水淋洒拌匀，待吸尽，用文火炒干入药者。引药走肾，补肾之功增强。

续断炭为续断片用武火炒至焦黑，存性，用清水淋洒灭尽火星，然后取出晾干入药者。功偏止血安胎。

【注意】四川和宁夏个别地区以唇形科植物糙苏 *Phlomis umbrosa* Turcz.的块根误作续断入药，应予以纠正。

【性味归经】苦、甘，温。归肝、肾经。

【功效主治】补肝肾，行血脉，续筋骨。主治腰痛脚弱，遗精，崩漏，胎漏下血，胎动欲坠；跌扑损伤，金疮，痈疽溃疡，乳痈。

【用量】10~20克。外用适量。

狗 脊

出自《神农本草经》。为蚌壳蕨科多年生草本植物金毛狗脊 *Cibotium barometz* (L.) J. Sm.的根状茎。产于福建、四川、云南、浙江等地。秋季采挖，除去细根、叶柄及金黄色柔毛，酒浸一日，蒸后切片，晒干。

【别名】金毛狮子，金毛狗脊，金毛狗，金狗脊，狗脊骨，狗青，黄狗脊，黄狗头，苟青，苟脊，猴毛头，扶盖，扶筋，强筋，百枝，三面青，狗仔毛，毛狗儿，金丝毛，金毛猴，鲸口蕨。

【商品名】金毛狗脊，金狗脊，黄狗脊，狗脊，金毛狗等。以根茎肥大、质坚实、无空心、色黄、干燥者为佳。

【处方名】狗脊，金狗脊，金毛狗，金毛狗脊，蒸狗脊，炒狗

脊，盐狗脊等。

处方中写狗脊、金狗脊、金毛狗、金毛狗脊均指蒸狗脊。为原药材去细根、叶柄及金色柔毛，酒浸一日，再上笼蒸，然后切片晒干入药者。偏于补肝肾，祛风湿。

炒狗脊为原药材去细根、叶柄及金色柔毛，洗净切片，再用沙土炒黄入药者。

盐狗脊为狗脊片用盐水淋洒，拌匀，待吸尽，再用文火炒干入药者。引药入肾，增强补肝肾壮筋骨功效。

【注意】在药材商品市场上，陕个别地区把鱗毛蕨植物 *Polystichum sp.* 的根茎充当狗脊入药，当地习称“黑狗脊”。

《植物名实图考》所载之狗脊，为乌毛蕨科植物狗脊蕨 *Woodwardia japonica* (L. f.) Sm. 的根茎。在湖南、江西、广西的有些地区作狗脊使用；而在华东及四川等地则作贯众使用。

【性味归经】苦、甘，温。归肝、肾经。

【功效主治】补肝肾，强腰膝，祛风湿。主治腰脊强直疼痛，不能弯曲俯仰，足膝软弱；小便不禁，妇女白带过多。

【用量】10~20克。

【慎忌】小便不利而有热者忌服。

骨 碎 补

出自《开宝本草》。为水龙骨科多年生附生蕨类植物槲蕨 *Drynaria fortunei* (Kunze) J. Sm. 的根茎。主产于我国中南、西南及浙江、福建、台湾等地。随时可采，除去叶及鳞片，洗净切片，晒干入药。

【别名】猴姜，毛姜，毛生姜，申姜，猢狲姜，猢狲姜，石毛姜，石岩姜，石良姜，马溜姜，崖姜，岩连姜，爬崖姜，鸡姜，碎补，肉碎补，石碎补，石庵藴，过山龙，毛贺仲，槲蕨，飞天鼠，飞来凤，飞蛾草，牛飞龙。

【商品名】骨碎补，毛姜，申姜，猴姜。以根茎粗大、色棕者为佳。

【处方名】骨碎补，碎补，猴姜，毛姜，申姜，生骨碎补，鲜骨碎补、炒骨碎补等。

处方中写骨碎补、碎补、猴姜、毛姜、申姜均指生骨碎补。为原药去杂质，润透切片，晒干生用入药者。

鲜骨碎补为新鲜药材去杂质，洗净切片，鲜用入药者。

炒骨碎补为干净干燥之骨碎补片用砂子炒至黄色，略带焦斑，取出晾凉入药者。强筋壮骨、祛风胜湿功效增强。

【注意】在药材商品市场上，下列同属或同科植物的根茎，在不同地区亦作骨碎补入药，但非正品。

中华槲蕨（又名华槲蕨、青海骨碎补）*D. baronii* (Christ) Diels分布于陕西、甘肃、青海、宁夏、四川、云南、西藏等地。

石连姜槲蕨（又名近邻槲蕨）*D. propinqua* (Wall.) J. Sm. 分布于四川、云南、贵州、广西等地。

团叶槲蕨 *D. bonii* Christ分布于广西、海南、贵州、云南等地。

栎叶槲蕨（又名树上猴姜、树骨碎补）*D. quercifolia* (L.) J. Smith分布于台湾、贵州等地。

大叶骨碎补（又名硬骨碎补、华南骨碎补）*Davallia orientalis* C. Chr. 分布于广东、广西、台湾、云南等地。

海州骨碎补*Davallia mariesii* Moore分布于云南、贵州、江西等地。

光亮密网蕨（又名光亮费蕨、猪毛蕨、大蕨菜、青竹标、大爬山虎）*Phymatodes lucida* (Roxb.) Ching分布于广东、广西、贵州、云南等地。

崖姜*Pseudodrynaria coronans* (Wall.) Ching分布于云南、台湾、广东、广西等地。

【性味归经】苦，温。归肝、肾经。

【功效主治】 补肾，活血，止血，续伤。主治肾虚腰痛，脚弱，耳鸣，耳聋，牙痛，久泻；骨折，跌扑损伤及刀伤枪伤等。浸酒外擦治疗斑秃。

【用量】 10~20克。外用适量。

【慎忌】 阴虚内热及无瘀血者不宜服。

补骨脂

出自《药性论》。为豆科1年生草本植物补骨脂 *Psoralea corylifolia* L.的种子。分布于陕西、河南、山西、江西、安徽、广东、四川、云南、贵州等地。栽培或野生，以河南、四川等地较多。秋季果实成熟时采收，晒干。生用，炒或盐水炒用。

【别名】 骨脂，故子，故脂子，故之子，故之，故纸，怀故子，破故脂，破故纸，破故子，破骨子，婆固脂，补骨鵠，黑故子，黑故纸，胡故子，胡韭子，吉固子，和兰苋，固子；固脂，川故子，吉故子，破固脂，胡韭子。

【商品名】 补骨脂，破故子。以粒籽饱满、干燥无杂质者为佳。

【处方名】 补骨脂，故脂，故子，故纸，破故纸，生故子，盐故子，炒故子。

处方中写补骨脂、故脂、故子、故纸、破故纸、破故子均指生故子。为原药去杂质生用入药（用时捣碎）者。

炒故子为净故子用文火炒至微黄，有香气，微见迸裂而后入药者。缓其苦燥减其辛窜，增强温阳止泻功效。

盐故子又名盐水炒补骨脂。为净补骨脂用盐水拌匀，待吸尽，再用文火炒干入药者。引药下行，增强补肾效力。

【注意】 药材商品中有一种云故纸，又名木蝴蝶、玉蝴蝶、破布子、白故子、白千层、洋故纸、白玉纸、纸肉、鸭船层纸、千纸肉、千张纸、海船皮、海船果心、三百两银药、朝简、老鸦船。系

紫葳科乔木植物木蝴蝶 *Oroxylum indicum* (L.) Vent. 的果实夹膜片，内服治肝胃气痛，外敷治疮口不敛，与破故纸形态及功效均不相同，不能混用。

【性味归经】苦、辛，大温。归肾、脾经。

【功效主治】补肾壮阳、固精缩尿，温脾止泻。主治腰膝冷痛，阳痿，滑精，遗尿，尿频，脾肾阳虚泄泻；虚寒哮喘等。外用酒精浸液涂擦患处可治疗白癜风。

【用量】5～10克。

【慎忌】阴虚火旺及大便秘结者忌服。

益智仁

出自《本草拾遗》。为姜科多年生草本植物益智 *Alpinia oxyphylla* Miq. 的成熟果实。主产于广东、广西、云南、福建等地。夏季果实由绿转红时采收。晒干。砂炒后去壳取仁，盐水微炒用。

【别名】益智子，益智，智仁，摘芦子。

【商品名】益智仁，益智子，益智。以果大饱满、气味浓、干燥无杂质者为佳。

【处方名】益智仁，益智，智仁，生智仁，炒益智仁，盐益智仁。

处方中写益智仁、智仁、益智均指生益智仁。为原药除去杂质及外皮生用（捣碎）入药者。

炒益智仁又名炒益智。为净益智仁用文火炒至微黄入药者。功偏收摄止涎，健脾止泻。

盐益智仁又名盐智仁、盐益智、盐水炒益智仁，盐炒益智仁等。为净益智仁用盐水拌匀，待吸尽，再用文火炒黄炒干入药者。引药走下，功偏补肾温阳，缩尿固精。

【性味归经】辛，温。归脾、肾经。

【功效主治】温脾健胃摄涎，暖肾固精缩尿。主治脾肾因寒所

致的腹痛吐泻；脾胃虚寒所致的食少流涎；肾气虚寒所致的遗精、遗尿、尿有余沥，夜尿增多等。

【用量】 3～6克。

【慎忌】 阴虚火旺及火热内盛者忌服。

冬 虫 夏 草

出自《本草从新》。为麦角菌科植物冬虫夏草菌 *Cordyceps sinensis* (Berk.) Sacc. 的子座及其寄主蝙蝠蛾科昆虫绿蝙蝠蛾 *Hepialus varians* Staudinger 幼虫的尸体。主产于四川、青海、西藏、云南等地。夏至前后挖取，去泥，晒干或烘干。生用。

【别名】 冬虫草，菌虫草，虫草，夏草冬虫。

【商品名】 冬虫夏草，冬虫草，虫草。以虫身色黄发亮，丰满肥壮、断面类白色、虫草完整、干燥、子座短味香者为佳。

【处方名】 冬虫夏草，冬虫草，虫草。

【注意】 在药材商品市场上有一种“北虫草”，又名蛹草，是蛹草 *Cordyceps militaris* (L.) Link. 的子实体及其寄主的干燥虫体。产于吉林省土门岭。功效是否与冬虫夏草作用相同，值得进一步研究。

【性味归经】 甘，温。归肺、肾经。

【功效主治】 益肾补肺，止血化痰。主治阳痿，遗精，腰膝酸软疼痛，久咳虚喘，痰中带血；诸虚百损，自汗畏寒等。

【用量】 5～10克。

【慎忌】 表证未解者不宜服。

蛤 蛤

出自《雷公炮炙论》。为壁虎科脊椎动物蛤蚧 *Gekko gecko* L. 已除去内脏的干燥体。分布于我国南方及西南地区，主产于广西。

常在夏季捕捉，剖开除去内脏，拭去血液（不经水洗），切开眼睛放出汁液。然后用竹片撑开，烘干保存于干燥处，防蛀。用时去头、足和鳞片，黄酒浸渍后微火焙干。

【别名】蛤蟹，仙蟾，德多，握儿，石牙，大壁虎，蛤蛇，蛤蚧干，多格。

【商品名】蛤蚧，又名蛤蚧干。为动物蛤蚧的去除内脏的干燥全体。以体大、尾粗而长、无虫蛀、干燥者为佳。

蛤蚧尾：为蛤蚧的干燥尾部。品质最优。

【处方名】蛤蚧，生蛤蚧，对蛤蚧，酒蛤蚧，蛤蚧粉，蛤蚧尾。

处方中写蛤蚧、对蛤蚧、生蛤蚧均指成对的生蛤蚧。为原药材去头足（成对成双的），切段或碾粉生用入药者。

酒蛤蚧为净蛤蚧去头足，置黄酒中浸渍后微火焙干入药者。温补肺肾功效增强。

蛤蚧粉为蛤蚧焙干后碾成细粉入药者。

蛤蚧尾为其尾部焙干后入药者。功效最佳。

【性味归经】咸，平。归肺、肾经。

【功效主治】补肺气，助肾阳，定喘嗽，益精血。主治肺虚咳嗽，肾虚作喘，虚劳喘咳，阳痿。

【用量】水煎服每日3～6克。研末服每次1～2克，每日3次。亦可浸酒服用。

【慎忌】风寒或实热喘咳忌服。

胡 桃 肉

出自《开宝本草》。为胡桃科落叶乔木植物胡桃 *Juglans regia* L. 果实的核仁。我国各地广泛栽培，华北、西北、东北地区尤多。9～10月果熟时采收，除去肉质果皮，晒干敲破，取出种仁生用或炒用。

【别名】胡桃仁，核桃仁，核桃肉，胡桃核仁，胡桃，虾蟆，羌桃仁，万岁子仁。

【商品名】胡桃肉，胡桃仁，核桃仁。以个大肉厚、不碎、不泛油、无核皮者为佳。

【处方名】胡桃肉，胡桃仁，核桃仁，炒胡桃仁等。

【性味归经】甘，温。归肺、肾、大肠经。

【功效主治】补肾，温肺，润肠。主治腰痛脚弱，腰间重坠，起坐困难；虚寒喘咳，肺虚久咳；肠燥便秘。

【用量】15~30克。

【禁忌】阴虚火旺、痰热咳嗽及便溏者均不宜服。

紫 河 车

出自《本草拾遗》。为人的胎盘。将健康产妇娩出的新鲜胎盘剪去脐带，洗净附着的血液，反复浸漂，置砂锅内煮至漂浮水面为度；撑开烘干，或研制为粉。贮干燥处保存，防蛀。

【别名】人胞，人胎盘，胎盘，胎胞，胎衣，胞衣，混沌衣，混沌皮，混元丹，混元母，衣胞，京河车，杜河车，河车；仙人衣，佛袈裟，包衣。

【商品名】紫河车，胎盘，人胞。以完整、色黄、血管内无残血者为佳。

【处方名】紫河车，制紫河车，胎盘，胎盘粉。

处方中写紫河车、胎盘为新鲜胎盘剪去四周的膜，除去污血，洗净，焙干入药者。

制紫河车为洗净的新鲜紫河车用川椒水稍煮，略晒后淋酒黄酒拌匀，蒸透后烘干入药者。

胎盘粉为净胎盘烘干碾面入药者。

【性味归经】甘、咸，温。归肺、肝、肾经。

【功效主治】补精，养血，益气。主治肾气不足，精血衰少所

致的阳痿、遗精、腰酸、头晕、耳鸣及女子不孕，气血亏虚所致的消瘦乏力、面色萎黄、癫痫久发不止及妇女产后乳少；肺肾两虚所致的气喘等。

【用量】研末吞服每次1.5~3克。重证加倍。

【禁忌】阴虚火旺者慎服（不宜单独服用）。

菟丝子

出自《神农本草经》。为旋花科1年生寄生性蔓草菟丝子 *Cuscuta chinensis* Lam. 或大菟丝子 *C. japonica* Choisy 的成熟种子。我国大部分地区均有分布。秋季种子成熟时割取其地上部分，晒干，打下种子。生用，或煮熟捣烂作饼用。

【别名】菟丝实，兔丝子，吐丝子，丝子，豆寄生，豆须子，龙须子，萝丝子，缠龙子，黄藤子，黄湾子，黄网子，黄萝卜子，黄丝子，黄丝藤子，金黄丝子，无娘藤米米，无娘藤子，无根草子，玉女，赤网，无根藤子。

【商品名】菟丝子：又名小粒菟丝子、小菟丝子。为寄生性蔓草菟丝子的成熟干燥种子。主产于山东、河北、河南、江苏、黑龙江、内蒙古等地。

大菟丝子：又名大粒菟丝子、金灯藤子、无根藤子、无根草子、日子菟丝子、女萝卜。为寄生性蔓草大菟丝子的成熟干燥种子。主产于云南、贵州、陕西、四川等地。

均以颗粒饱满、干燥无杂质者为佳。

【处方名】菟丝子，兔丝子，炒菟丝子，盐菟丝子。

处方中写菟丝子、兔丝子指生菟丝子。为原药材去杂质，晒干入药者。

炒菟丝子为净菟丝子用文火炒黄入药者。补肾、益精、安胎功效增强。

盐菟丝子又名盐水炒菟丝子。为净菟丝子用盐水拌匀，再用文

火炒干入药者。引药走下，增强补肾养肝功效。

【注意】在药材商品市场上，南菟丝子（又名大豆菟丝子）*Cuscuta australis* R. Brown（产于吉林、河北、山东、甘肃、新疆、浙江、江西、湖北、台湾、广东等地）和欧菟丝子*C. europaea* L.（产于河北、山西、青海、新疆、四川、西藏等地）或展瓣菟丝子*C. reflexa* Roxb.（产于云南）或海滨菟丝子*C. maritima* Mak.在个别地区也作菟丝子入药。非菟丝子正品。

【性味归经】辛、甘，平。归肝、肾经。

【功效主治】补阳益阴，固精缩尿，明目止泻。主治腰膝酸痛，阳痿，滑精，小便频数，白带过多，肝肾不足所致的目暗不明，消渴，胎漏下血，胎动欲坠；脾虚便溏或泄泻。

【用量】10~15克。

【禁忌】阴虚火旺、大便燥结及小便短赤者均忌服。

沙 菟 子

出自《本草衍义》。为豆科1年生草本植物扁茎黄芪*Astragalus complanatus* R. Br.的成熟种子。主产于内蒙古和东北、西北地区。秋末冬初种子成熟时割取或连根拔出，晒干，打下种子，除去杂质。生用或盐水炒过用。

【别名】沙苑蒺藜，沙苑白蒺藜，沙苑蒺藜子，沙蒺藜，潼蒺藜，同州白蒺藜，同蒺藜，夏黄草，扁茎黄芪子，华黄芪子，蔓黄芪子，大沙苑子，沙苑吉利子，沙苑吉利，沙蒺力。

【商品名】潼蒺藜：又名潼沙苑、潼沙苑子、关沙苑、关沙苑子。为植物扁茎黄芪的种子。主产于陕西大荔而集散于潼关。为地道药材，品质最优。

沙苑子：又名沙苑蒺藜。为各种沙苑子的统称。以粒大饱满、色绿褐或灰褐、干燥无杂质者为佳。

【处方名】沙苑子，沙苑蒺藜，潼蒺藜，生沙苑子，炒沙苑

子，盐沙苑子等。

处方中写沙苑子、沙苑蒺藜、潼蒺藜均指生沙苑子。为原药去杂质，淘洗干净，晒干生用入药者。

炒沙苑子为净沙苑子用文火炒至微黄入药者。补肾固精作用增强。

盐沙苑子为净沙苑子用盐水淋洒拌匀，待吸尽，用文火炒干入药者。引药下行，增强补肾固精作用。

【注意】沙苑子主产于陕西，集散于潼关，故名“潼蒺藜”，为药材正品，品质最优。

在药材商品市场上，下列同属植物的种子，在不同地区也作沙苑子入药，功效相似，但非正品。

华黄芪 *A. chinensis* L. 分布于河北、河南、山东、内蒙古和东北地区。

直立黄芪 *A. adsurgens* Pall. 分布于吉林、辽宁、内蒙古、甘肃、宁夏、新疆等地。

除此之外，还有一些系属误用，如江苏等地的药材市场，误将豆科植物紫云英 *Astragalus sinicus* L. 的种子（药材名称草蒺藜，又名红花草子、紫云英子）混作沙苑蒺藜入药；福建等地的药材市场，误将植物猪屎豆 *Crotalaria mucronata* Desv. 的种子，混作沙苑蒺藜入药。这些都是错误的，应该纠正。

宋、元、明时期文献中所载的白蒺藜，多指沙苑蒺藜，而不是现今的白蒺藜（刺蒺藜），应提醒注意。

【性味归经】甘，温。归肝、肾经。

【功效主治】补肾固精，益肝明目。主治肾虚腰痛，阳痿遗精，遗尿，尿频，白带过多，肝肾不足所致的目暗不明，头昏眼花等。

【用量】10~20克。

【慎忌】阴虚火旺及小便短赤涩痛者忌服。

锁 阳

出自《本草衍义补遗》。为锁阳科肉质寄生植物锁阳 *Cynomorium songaricum* Rupr. 的肉质茎。主产于内蒙古、甘肃、青海、新疆等省区。春秋两季均可采收，但以春季采者为佳。除去花序，置沙土中半埋半露，连晒带烫，使之干燥；防霉。切片生用。

【别名】 锁燕，锁严子，锁阳，地毛球，锈铁锤，锈铁棒，不老药，黄骨狼，羊锁不拉，耶尔买他格（维族名），乌兰一告亚（蒙族名），雪央。

【商品名】 锁阳。以粗壮、质硬、体重、断面油润者为佳。

【处方名】 锁阳，不老药。

【性味归经】 甘，温。归肝、肾、大肠经。

【功效主治】 补肾助阳，润肠通便。主治肾阳不足，精血亏虚所致的腰膝痿弱，筋骨无力，男子阳痿，女子不孕，肠燥津枯所致的大便秘结等。

【用量】 10~15克。

【慎忌】 阴虚火旺、脾虚泄泻及热结便秘者均忌服。

黄 狗 肾

出自《神农本草经》。为犬科哺乳动物黄狗 *Canis familiaris* L. 雄性的阴茎和睾丸。全年均可采收。多在冬季将雄狗杀死，取出阴茎和睾丸，去掉周围的肉和脂肪，撑直挂起，晾干或烘干。用时用砂炒至松泡，研末用。

【别名】 狗鞭，狗阴茎，狗精，狗阴，狗肾，家狗肾，牡狗阴茎，犬肾，犬鞭，犬阴茎，家犬肾，黄耳肾，黄耳鞭，黄耳阴茎，地羊肾，地羊鞭，地羊阴茎。

【商品名】 广狗肾：为产于广东、广西、江苏等地者。习以为

佳。

黄狗肾：为各地黄狗肾之统称。以个大、去净肉及脂肪、干燥无虫蛀者为佳。

【处方名】黄狗肾，狗肾，狗鞭。

【性味归经】咸，温。归肾经。

【功效主治】补肾壮阳。主治肾虚阳衰所致的阳痿，阴冷，畏寒肢冷，腰酸尿频，精神萎靡等。

【用量】研末吞服或入丸散每次1.5~3克。

【慎忌】火热内盛者忌服。

海 狗 肾

出自《药性论》。为海狗科动物海狗*Callorhinus ursinus* (L.)或海豹科动物海豹*Phoca vitulina* (L.)的阴茎和睾丸。产于我国渤海、黄海沿岸。割取后去脂肪，烘干，生用或酒炙脆研末用。

【别名】腽肭脐，腽肭兽阴茎，豹兽阴茎，海狗鞭，海狗阴茎，海豹肾，海豹鞭，海豹阴茎。

【商品名】海狗肾，腽肭脐。以个大、去净肉及脂肪、干燥、无虫蛀者为佳。

【处方名】海狗肾，腽肭脐，酒海狗肾，炒海狗肾，油海狗肾等。

处方中写海狗肾、腽肭脐指生海狗肾。为原药材烘干入药者。

酒海狗肾为海狗肾切段，用黄酒喷淋拌匀，待吸尽，再用文火炒至酥脆入药者。

炒海狗肾为原药材切段，用滑石粉或牡蛎粉炒至鼓起入药者。

油海狗肾为海狗肾表面用青油涂擦，置木炭火上烤至鼓起入药者。

【性味归经】咸，热。归肝、肾经。

【功效主治】暖肾壮阳，益精补髓。主治虚损劳伤，阳痿遗

精，早泄，腰膝痿弱等。

【用量】 3～10克。

【慎忌】 同黄狗肾。

海 马

出自《本草拾遗》。为海龙科动物克氏海马 *Hippocampus kelloggi* Jordam et Snyder 和刺海马 *H. hestrix* Kaup 或大海马 *H. kuda* Bleeker 或斑海马 *H. trimaculatus* Leach 或日本海马 *H. japonicus* Kaup 除去内脏的干燥全体。全年均可捕捉，除去内脏，晒干。

【别名】 水马，鯆姑，龙落子，马头鱼，对海马，大海马，三斑海马，斑海马，日本海马、克氏海马，龙落子鱼。

【商品名】 海马：为克氏海马、大海马、斑海马（三斑海马）和日本海马的干燥全体。主产于广东、台湾、福建等地。

刺海马：为刺海马的干燥全体。主产于福建、广东。

海蛆：又名小海驹、小海马。为海马的幼体。形状与海马相似而较小。主产于广东、福建、台湾。

均以个大、色白、体完整、干燥洁净者为佳。

【处方名】 海马，大海马，水马，龙落子，酒炙海马。

处方中写海马、大海马、水马、龙落子均指生海马。为原药用水洗刷干净，切块或打碎入药者。

酒炙海马为净海马用黄酒湿润，微火烘烤至黄色酥松入药者。

【性味归经】 甘，温。归肝、肾经。

【功效主治】 补肾壮阳，调气活血。主治阳痿，遗尿，虚喘，难产，癥积，疔疮肿毒。

【用量】 3～9克。外用适量。

【慎忌】 孕妇及阴虚火旺者忌服。

海 龙

出自《本草纲目拾遗》。为海龙科动物刁海龙 *Solenognathus hardwickii* (Gray) 和拟海龙 *Syngnathoides biaculeatus* (Bloch) 或尖海龙 *Syngnathus acus* L. 的除去内脏的干燥全体。全年皆可捕捉，除去外面黑色皮膜及内膜，晒干。

【别名】水雁，海蛇，杨枝鱼，钱串子，刁海龙，拟海龙，尖海龙，海钻，小海龙，大海龙。

【商品名】刁海龙：又名大海龙。为动物刁海龙的干燥全体。主产于广东。

拟海龙：又名海钻。为动物拟海龙的干燥全体。主产于福建、广东。

尖海龙：又名小海龙。为动物尖海龙的干燥全体。主产于山东。

均以个大、体完整、干燥洁净者为佳。

【处方名】海龙，海蛇，酒制海龙。

处方中写海龙、海蛇均指生海龙。为原药用水洗刷干净，切块或捣碎入药者。

酒制海龙为净海龙用黄酒润透，再用微火烘烤至黄色酥脆入药者。

【注意】在商品药材市场上，广东个别地区有以粗吻海龙（海蛇）*Trachyrhampus serratus* (Temminck et Schlegel) 的全体充当海龙入药者，功效相近，但非海龙正品。

【性味归经】咸、甘，温。归肾经。

【功效主治】补肾壮阳，散瘀消肿。主治阳痿，难产，跌打肿痛，疔疮肿毒。

【用法】3～9克。

【禁忌】孕妇及阴虚火旺者忌服。

韭 子

出自《本草经集注》。为百合科多年生草本植物 韭 *Allium tuberosum* Rottler 的种子。全国各地均有栽培。秋季果实成熟时采收，将果实摘下，晒干，搓出种子。生用或炒用。

【别名】韭菜子，韭菜仁，九菜子，丰本子，草钟乳子，起阳菜子，起阳草子，懒人菜子，长生韭子，壮阳草子，扁菜子。

【商品名】韭子，韭菜子。以粒籽饱满、干燥无杂质者为佳。

【处方名】韭子，韭菜子，炒韭子，盐韭子等。

处方中写韭子、韭菜子指生韭子。为净韭子去杂质，晒干生用入药者。

炒韭子为净韭子经文火炒至微黄入药者。温肾固精作用增强。

盐韭子为净韭子用盐水拌匀，待吸尽，用文火炒干入药者。引药下行，温肾壮阳作用增强。

【性味归经】辛、甘，温。归肝、肾经。

【功效主治】补肝肾，暖腰膝，壮阳固精。主治肾阳虚衰，肝肾不足所致的阳痿、腰膝酸软疼痛；肾气不固所致的遗精、尿频及妇人白带过多等。

【用量】10~15克。

【慎忌】阴虚火旺及火热内盛者忌服。

葱 实

出自《神农本草经》。为百合科植物 葱 *Allium fistulosum* L. 的种子。全国各地均产，山东产量最大。夏、秋采集成熟种子，簸去杂质，晒干。

【别名】葱子，大葱子，大葱实。

【商品名】葱实，葱子。以籽粒饱满、干燥无杂质者为佳。

【处方名】葱子，葱实。

【性味归经】辛，温。归肝、肾经。

【功效主治】温肾，明目。主治阳痿，目眩。解藜芦毒。外用塞耳治疗龋齿。

【用量】6~10克。外用适量。

阳 起 石

出自《神农本草经》。为硅酸盐类矿物阳起石Actinolite或阳起石石棉Actinolite asbestos的矿石。主产于河北、河南、山东、湖北等省。全年可采，挖出后去净泥土及夹杂石块。煅用。

【别名】阳举石，羊起石，石生，白石，阴起石。

【商品名】阳起石，阴起石，羊起石，白石。以针束状、色白、质柔软，易撕碎、无杂质者为佳。

【处方名】阳起石，煅阳起石，煅起石等。

处方中写阳起石指煅阳起石（又名煅起石）。为阳起石块用武火烧至红透，放入黄酒内浸淬，取出晾干入药者。温肾壮阳及收敛作用增强。

【性味归经】咸、微温。归肾经。

【功效主治】温肾壮阳。主治肾阳虚衰所致的男子阳痿，女子宫冷以及下焦虚寒所致的腰膝冷痹等证。

【用量】6~9克。入丸散服每次1.5~3克。

【禁忌】阴虚火旺者忌服。不宜过量过久服用。

(三) 补血药

当 归

出自《神农本草经》。为伞形科多年生草本植物当归 *Angelica sinensis* (Oliv.) Diels. 的根。主产于甘肃省东南部的岷县(秦州)，产量多，质量好。其次陕西、四川、云南、湖北等省也有栽培。秋末采挖，除尽芦头及须根。待水分稍行蒸发后按大小粗细分别捆成小把，用微火缓缓熏干或用硫黄烟熏。防蛀防霉。切片生用。或经酒拌匀后炒用。

【别名】干归，山蕲，白蕲，文无，粉当归，薜根，葫首归，原来头，干白，甘白，蚕头当归。

【商品名】西当归：又名西归、秦当归、秦归、岷当归、岷归，秦州当归。为产于甘肃岷县、宕昌、武都、渭源等地者。

川当归：又名川归。为产于四川者。

云当归：又名云归。为产于云南者。

汶当归：又名汶州当归、汉归。为产于甘肃文县(旧时汶州)者。

滁当归：又名滁州当归、滁归。为产于安徽滁县(旧时滁州)者。

马尾归：又名马尾当归。为产于甘肃宕昌(旧时陇西宕州)一带者。根圆尾多，色紫气青，肥润而质优。

全当归：又名当归全。为当归的整体，包括头、身、尾三部分。以身长腿少、质坚枝大、断面黄白色、气香浓郁、味甘者为佳。

当归头：又名归头、葫首。为当归根部的芦头。偏于止血面上。

行。

当归身：又名归身、当归腿、归腿。为当归主根。即去掉芦头和尾部后剩余部分。偏于养血而守中。

当归尾：又名归尾、归须、当归须。为当归的较细侧根或侧根梢。偏于破血而下行。

常行归：为全当归中不符合等级的较细碎者。品质较次。

【处方名】当归，全当归，当归身，当归尾，油当归，炒当归，土炒当归，酒当归，当归炭等。

处方中写当归指生全当归。为全当归洗净晒干，切片生用入药者。

当归身又称归身。指生当归身。为当归身切片生用入药者。

当归尾又称归尾。指生当归尾。为当归尾切片生用入药者。

油当归为在洗净闷润过程中，挑拣渗出红色油脂者，然后切片入药者。偏于养血润滑。

炒当归为当归片用文火微炒入药者。降低润便滑肠作用。

土炒当归为当归片用伏龙肝细粉微炒入药者。专入脾经且去其润滑之性。

酒当归为当归片用黄酒淋洒拌匀，然后炒干入药者。增强活血作用。

当归炭为当归片用武火炒至焦黑，存性，取出用清水灭尽火星，然后晾干入药者。偏于止血。

【注意】在药材商品市场上，下列植物的根，在少数地区也作当归入药，但品质较次，非当归正品。

东当归(又名日本当归、延边当归)*Angelica acutiloba* (Sieb. et Zucc.) Kitag.吉林省延边地区作当归入药。

粉绿当归(又名野秦归、云南野当归)*Ligusticum glaucescens* Franch.云南宁个别的地区作当归入药。

欧当归(又名九头当归、多头当归)*Levisticum officinale* Koch我国有栽培，曾试代当归入药。其功效与当归不同；为当归伪

品。

【性味归经】甘、辛，温。归肝、心、脾经。

【功效主治】补血，活血，止痛，润肠。主治月经不调，经闭，痛经，虚寒腹痛，瘀血作痛，跌打损伤，痹痛麻木；痛疽疮疡；血虚肠燥便秘及一切血虚证。

【用量】6～15克。

【禁忌】湿盛中满及大便溏泻者忌服。

熟 地 黄

出自《本草图经》。为玄参科多年生草本植物地黄 *Rehmannia glutinosa* (Gaertn.) Libosch. 的根，经加工炮制而成。通常以酒、砂仁、陈皮为辅料，经反复蒸晒，至内外色黑、油润，质地柔软粘腻。切片用。

【别名】熟地，大熟地，九地，九蒸地黄，熟芋，还元大品。

【商品名】熟地黄。以色黑柔润、甘味浓、洁净无杂质者为佳。

【处方名】熟地，大熟地，炒熟地，熟地炭。

熟地又称大熟地、熟地黄。为原药材以酒、陈皮、砂仁为辅料，经反复蒸晒，至内外色黑油润，质地柔软粘腻，然后切片入药者。

炒熟地为熟地黄片用文火炒至微焦入药者。腻性减弱，补血功效增强。

熟地炭为熟地黄片用武火炒成炭，存性，喷洒清水灭尽火星，然后晾干入药者。偏于养血止血。

【性味归经】甘，微温。归肝、肾经。

【功效主治】养血滋阴，补精益髓。主治肾水不足，潮热盗汗，遗精早泄，消渴，腰脚酸软，头晕眼花，耳鸣耳聋，须发早白，血虚面色萎黄，失眠，心悸，月经不调，崩漏等。

【用量】10~20克。

【禁忌】气滞痰多、脘腹胀痛、食少便溏者忌服。

何首乌（附：夜交藤）

出自《开宝本草》。为蓼科多年生草本植物何首乌 *Polygonum multiflorum* Thunb. 的块根。我国大部分地区有出产。秋后茎叶枯萎时或次年未萌芽前掘取其块根，洗净，切片，晒干或微烘干，称为生首乌；若以黑豆煮拌蒸，晒后变为黑色，称为制首乌。

【别名】首乌，赤首乌，地精，赤敛，陈知白，红内消，乌肝石，马肝石，黄花乌根，小独根，野苗根，交茎根，交藤根，夜合根，桃柳藤根，赤葛根，九真藤根，芮草根，蛇草根，伸头草根，多花蓼根，紫乌藤根，山奴，山哥，山伯，山翁，山精，野番薯。

【商品名】何首乌，赤首乌。以质坚体重、粉性足者为佳。

【处方名】首乌，何首乌，干首乌，生首乌，鲜首乌，制首乌，蒸首乌，熟首乌。

处方中写首乌、何首乌、干首乌均指生首乌。为原药材去杂质，洗净润透，切片晒干入药者。偏于润便滑肠，降脂解毒。

鲜首乌为鲜品洗净切片入药者。

制首乌又名蒸首乌、熟首乌。为首乌片或块用黑豆汁及黄酒拌匀，经过蒸晒或隔水炖后入药者。偏于补肝肾，养精血。

【注意】在药材商品市场上，何首乌有赤、白两种。赤首乌为正品，全国通用。白首乌为副品，在少数地区使用，且来源不一，但均属蓼科牛皮消属植物的根。如山东的白首乌为大根牛皮消 *Cynanchum bungei* Decne.，江苏、浙江的白首乌为飞来鹤 *C. auriculatum* Royle，吉林延边地区的白首乌为隔山消 *C. wilfordii* Hemsl.，湖北和云南的白首乌为青洋参 *C. otophyllum* Schneid.。除此之外，蓼科植物朱砂七 *Polygonum ciliinerve* (Nakai) Ohwi 的块根在甘肃个别地区误作何首乌入药，翼蓼（红药子） *Pteroxygo-*

num giraldi Damm. et Diels的块根在甘肃、河南个别地区误作何首乌入药。此属误用，应该纠正。

【性味归经】苦、甘、涩，微温。归肝、肾经。

【功效主治】补益精血，截疟，解毒，润肠通便。主治精血亏虚，头晕眼花，须发早白，腰酸脚软，遗精，崩漏，带下；久疟，痈疽，瘰疬；肠燥便秘；高血脂症，动脉粥样硬化。

【用量】10~80克。

【禁忌】大便溏泻及痰湿内盛者忌服。

附：夜交藤

为何首乌的藤。又名首乌藤、野苗藤、交茎藤、交藤、夜合藤、桃柳藤、赤葛藤、九真藤、茜草藤、蛇草藤、伸头草藤、紫乌藤、何首乌藤、首乌藤、棋藤。性味甘平。归心、肝经。有养心安神、通络祛风之功效。主治失眠、多汗、血虚肢体酸痛。并可煎汤外洗治皮肤疮疹作痒。用量15~30克，煎汤服。外用煎汤洗适量。

藏 角 蒿

出自《西藏常用中草药》。为紫葳科植物藏角蒿*Incarvillea younghusbandii* Sprague的根及种子。分布于西藏等地。7~9月挖根，8~9月采收成熟种子。

【别名】乌确玛尔甲（藏语名），角蒿，角蒿子，藏角蒿子，角蒿根，藏角蒿根。

【商品名】角蒿，藏角蒿。根以条粗长、无泥土者为佳。种子以粒大、饱满、干燥无杂质者为佳。

【处方名】角蒿，角蒿子，角蒿根，藏角蒿子，藏角蒿根。

【注意】同科植物角蒿（又名羊角草、角蒿透骨草、羊角透骨

草、大力草、野芝麻、老鸹嘴棵、憋肚草、独角虎) *Incarvillea sinensis* Lam. 药用地上全草，为祛风湿药，产于淮河以北地区。其产地、形态、功效均与藏角蒿不同，不可混用。

【性味归经】甘、淡，温。归肝经。

【功效主治】滋补强壮。主治产后乳少，身体虚弱，贫血头晕。

【用量】10~15克。

白芍

出自《神农本草经》。为毛茛科多年生草本植物 芍药 *Paeonia lactiflora* Pall. 的根。栽培于浙江、安徽、四川等地。夏秋季采挖，去净泥土和支根，去皮，沸水浸或略煮至受热均匀，晒干。用时润透切片。生用，酒炒或炒用。

【别名】白芍药，芍药，金芍药，离草根，可离根，将离根，余容根，其积根，解仓根，犁食根，铤根，没骨花根，婪尾春根，天斗，玉斗，天魁，玉魁，伏丁，伏贡，伏王，艳友，冠芳，殿春客。

【商品名】杭白芍：又名杭芍、杭芍药。为产于浙江杭州一带者。为地道药材，品质最优。

东白芍：又名东芍、东芍药。为产于浙江东阳一带者。品质亦优。

亳白芍：为产于安徽亳县一带者。质优。

川白芍：又名中江芍、川芍。为产于四川者。

宝鸡白芍：为产于陕西的野生种。品质较次。

以根粗长、质坚实、粉性足、无白心、无裂隙者为佳。

【处方名】白芍，杭芍，大白芍，生白芍，炒白芍，酒白芍，醋白芍，焦白芍，白芍炭等。

处方中写白芍、杭芍、大白芍均指生白芍。为原药去杂质，润透切片，生用入药者。

炒白芍又称炙白芍。为白芍片用麸以文火炒至微黄，略带焦斑，筛去麦麸，晾干入药者。

酒白芍又名酒炒白芍、酒芍。为白芍片用黄酒淋洒拌匀，然后炒干入药者。寒性缓解，活血功效增强。

醋白芍又名醋炒白芍、醋芍。为白芍片用米醋喷淋，用文火微炒入药者。偏于敛肝止痛，养血止血。

焦白芍又名焦芍、白芍炭。为白芍片用武火炒至焦黑，存性，取出用清水灭尽火星，然后晾干入药者。偏于敛血止血。

【注意】芍药分赤、白二种。白芍一般为栽培者，赤芍为野生者。芍药的变种毛果芍药 *Paeonia lactiflora* Pall. var. *trichocarpa* (Bunge) Stern. 的根亦作白芍使用，但非正品，品质较次。

【性味归经】苦、酸，微寒。归肝、脾经。

【功效主治】养血敛阴，柔肝止痛，平抑肝阳。主治月经不调。经行腹痛，崩漏，自汗，盗汗；肝气不和，胁肋脘腹疼痛；四肢拘挛作痛；泄泻，痢疾，腹痛；肝阳上亢所致的头痛眩晕。

【用量】10~30克。

【慎忌】阳衰虚寒之证不宜单独应用。反藜芦。

阿 胶

出自《神农本草经》。为马科动物驴 *Equus asinus* L. 的皮经漂泡去毛后熬制而成的胶块。古时以产于东阿（今山东省东阿县）而得名。以山东、浙江、江苏等地产量较多。以原胶块用，或将胶块打碎，用蛤粉炒成阿胶珠用。

【别名】驴皮胶，傅致胶，盆覆胶，药料胶。

【商品名】东阿胶：又名真阿胶。为以山东东阿县东阿井水熬制者。品质最优。

二泉胶：以无锡二泉水熬制者。

阿胶：原指东阿胶。现泛指全国各地熬制的驴皮胶。以乌黑、

断面光亮、质脆味甘、无腥气者为佳。

【处方名】阿胶，生阿胶，阿胶珠等。

处方中写阿胶指生阿胶。为原药捣碎入药者。

阿胶珠又名炒阿胶、蛤粉炒阿胶。先将蛤粉加热，再放入切好的骰形小块阿胶，炒至阿胶黄软鼓起圆珠状，取出放凉入药者。偏于养阴润肺，化痰止咳。

【性味归经】甘，平。归肺、肝、肾经。

【功效主治】补血止血，滋阴润肺。主治血虚眩晕，心惊，吐血，衄血，便血，崩漏等多种出血证；阴虚失眠，心烦；虚劳喘咳或阴虚燥咳。

【用量】6～12克。

【慎忌】脾胃虚弱，不思饮食或纳食不化，呕吐泄泻者忌服。

鱼 鳔

出自《本草纲目》。为石首鱼科动物大黄鱼 *Pseudosciaena crocea* (Rich.)、小黄鱼 *P. polyactis* Bleeker 和鯷科动物中华鲟鱼 *Acipenser sinensis* Gray、鳇鱼 *Huso dauricus* Georgi 等的鱼鳔。主产于浙江、上海、福建等地。取得鱼鳔后，剖开，除去血管及粘膜，洗净，压扁，晒干用或洗净鲜用。

【别名】鳔，鱼白，鱼胶，鱼脬，鱼肚，鱼肚胶，鱼鳔胶，鱼线胶，鱠鳔，鱠鳔，白鳔，璇胶，鳔胶，鱼白胶，鱠胶，线鱼胶。

【商品名】鳔胶：又名鱼肚、鱼肚胶。将鱼鳔煮沸溶化后，冷凝成的冻胶。以明亮纯净者为佳。

黄唇肚：又名黄鯷胶、鯷鱼胶。为动物鯷鱼、鳇鱼的鳔。

线鱼胶：又名鱼线胶。为切成线条状的鳔胶。

【处方名】鱼鳔，鱼鳔胶，鳔胶，鱼肚，鱼白，鱼胶，线鱼胶，鱼线胶，炒鱼鳔，炒鱼鳔胶，鱼鳔胶珠等。

处方中写鱼鳔、鱼鳔胶、鳔胶、鱼肚、鱼白、鱼胶、线鱼胶、

鱼线胶等均指生鱼鳔胶。为鱼鳔胶烘软，切段入药者。

炒鱼鳔又称炒鱼鳔胶、蛤粉炒鱼胶、鱼鳔胶珠。先将蛤粉炒热，加入鱼鳔，再用文火炒至松泡，然后取出入药者。

【性味归经】甘，平。归肾经。

【功效主治】补肾益精，滋阴养血，止血，散瘀，消肿。主治肾虚滑精，产后风瘫，破伤风，吐血，血崩，肺结核咯血，创伤出血，痔疮。

【用量】6~15克。

【慎忌】痰多食滞者慎服。

龙眼肉

出自《神农本草经》。为无患子科常绿乔木植物龙眼树*Euphorbia longan* (Lour.) Steud. 的成熟果肉。主产于我国南方广东、福建、台湾、广西等地，西南地区也有栽培。于初秋果实成熟时采摘，烘干或晒干，剥开果皮，取肉去核，晒至干爽不粘，贮存备用。

【别名】桂圆肉，桂圆，桂元肉，元肉，圆肉，圆眼，龙眼，龙眼干，龙眼锦，益智，蜜脾，龙目肉，比目肉，荔枝奴，亚荔枝，绣木团，川弹子肉，木弹肉，骊珠肉，丽珠肉，燕卵肉，鲛泪，海珠丛，山龙眼，假种皮，三全，三元。

【商品名】龙眼肉，桂圆肉。以肉厚片大、色棕黄、甘味浓、干燥洁净者为佳。

【处方名】龙眼肉，元肉，桂圆肉，桂元肉等。

【性味归经】甘，温。归心、脾经。

【功效主治】补心脾，益气血。主治心脾两虚，惊悸，怔忡，失眠，健忘，气血亏虚等证。

【用量】10~15克。大剂量30克。

【慎忌】痰湿内阻及内有停饮、实火者忌服。

(四) 补阴药

沙 参

出自《神农本草经》。沙参有南沙参和北沙参两类。南沙参为桔梗科沙参属多年生草本植物 轮叶沙参 *Adenophora tetraphylla* (Thunb.) Fisch. 和杏叶沙参 *A. axilliflora* Borb. 及阔叶沙参 *A. pereskiaefolia* (Fisch.) G. Don 的根。常在秋季采挖，洗净，除去栓皮，切段鲜用，或晒干生用。

北沙参为伞形科多年生草本植物珊瑚菜 *Glehnia littoralis* F. Schmidt ex Miq. 的根。多于夏、秋两季采挖，除去须根，洗净，用开水烫后剥去外皮。润软切片或切段生用。

【别名】海沙参，辽沙参，条沙参，真北沙参，莱阳沙参，莱阳参，银条参，辽条参，北条参，野香菜根，细条参，珊瑚菜根，滨防风，轮叶沙参，杏叶沙参，阔叶沙参，铃儿草，四叶沙参，挺杖沙参，长白沙参。

【商品名】南沙参：又名知母、苦心、识美、虎须、志取、文虎、文希、羊婆奶、面杆杖、桔参、泡沙参、稳牙参、保牙参、土人参、山沙参、白沙参、白参、大沙参、空沙参、泡参、四叶菜。为植物轮叶沙参（铃儿草、四叶沙参）或杏叶沙参（又名挺杖沙参）和阔叶沙参（又名长白沙参）的根。主产于安徽、江苏、四川等地。以根粗长、质坚实、有韧性、去净支根及杂质者为佳。

北沙参：又名辽沙参、东沙参、莱阳沙参、海沙参、北条参、条沙参、海南参、细条参、银条参等。为植物珊瑚菜的根。主产于山东、河北、江苏、辽宁等地。以根条细长、圆柱形、均匀、质坚、味甘、干燥无杂质者为佳。

辽沙参：为产于辽宁的北沙参。

海沙参：又名海南参。为产于山东省即墨县丁字港海南的半岛上的北沙参。为地道药材，品质最优。

莱阳参：为产于山东莱阳地区的北沙参。品质优良。

【处方名】沙参，南沙参，北沙参，辽沙参，海沙参，北条参，鲜沙参，炒沙参，米沙参，蜜炙沙参等。

处方中写沙参、南沙参、北沙参、海沙参、北条参均指生沙参。为原药材去杂质，润透切段或切片，晒干入药者。

鲜沙参一般指南沙参的新鲜品切段入药者。偏于清热养阴生津。

炒沙参为沙参片或段用文火炒至黄色入药者。减缓寒性，养阴而不伤脾胃。

米沙参为沙参片或段用米炒至微黄色，取出晾凉入药者。偏于养阴和胃。

蜜炙沙参又名炙沙参。为沙参片或段用蜂蜜拌匀，再用文火炒至微黄色，不粘手时取出，晾凉入药者。滋阴润肺，调和脾胃功能增强。

【注意】粉沙参是明党参的商品名或处方名，不属沙参药材，应提醒注意。

在药材商品市场上，下列几种桔梗科植物的根也作南沙参同等入药。

线齿沙参 *A. capillaris* Hemsl. 分布于湖北、四川、云南、贵州、陕西等地。

云南沙参 *A. bulleyana* Diels 分布于云南等地。

泡沙参 *A. potaninii* Korsh. 分布于河北、四川、陕西、甘肃、青海、宁夏等地。

川藏沙参 *A. liliifolioides* Pax et Hoffm. 分布于四川、西藏、甘肃等地。

【性味归经】甘，微寒。归肺、胃经。

【功效主治】清肺养阴，益胃生津。主治肺热阴虚所致的燥咳

或劳嗽咯血；热病伤津所致的口干口渴，食欲不振等。

【用量】10～15克。鲜品20～30克。

【慎忌】虚寒证患者忌服。反藜芦。

珠 儿 参

出自《本草从新》。为五加科植物大叶三七 *Panax pseudoginseng* Wall. var. *japonicus* (C. A. Mey.) Hoo & Tseng 的呈串珠状的根茎。主产于云南。秋季采挖，除去茎苗、须根及瘦细的根茎，晾至皮皱，踩去外皮，放锅内煮透，取出晾干或烘干。四川等地产的称钮子七，在春季或秋季采挖，剪除茎苗、须根及瘦细部分后，晒干即可。

【别名】珠参，珠子参，疙瘩七，雪三七，钮子七，扣子七，大叶三七，竹节三七，竹节人参，盘七，明珠参。

【商品名】珠儿参：产于云南者。以个大、饱满、明亮、无竹节纹及粗皮者为佳。质优。

钮子七：产于四川者。表面棕黄色或黄白色，粗糙，有细皱纹及结节，并有瘤状凸起的须根痕。品质较次。

【处方名】珠儿参，珠参，钮子七，扣子七，竹节三七等。

【性味归经】微甘、苦，寒。归肝、胃经。

【功效主治】养阴，清肺，散瘀，止血，定痛。主治热病烦渴，阴虚咳嗽，痨伤吐血，鼻衄，咽痛，胃痛，风湿性关节炎，小儿惊风，跌打损伤。

【用量】6～10克。外用适量。

【慎忌】脾胃虚寒泄泻者慎服。

珠 子 参

出自《滇南本草》。为桔梗科植物珠子参 *Codonopsis convol-*

loulacea Kurz var. *forrestii* (Diels) Tsoong的根。主产于云南、贵州等地。生长于山坡及灌木林下阴湿之处。秋季采挖，洗净，切片，晒干。

【别名】珠儿参，鸡腰参，大金线吊葫芦，白地瓜，珠参。

【商品名】珠子参。以根粗长、饱满、光润者为佳。

【处方名】珠子参，鸡腰参。

【性味归经】甘，平。归脾、肺经。

【功效主治】止血生肌，敛肺止咳。主治刀伤枪伤，外伤出血，肺虚咳嗽。

【用量】15~30克。外用适量。

【慎忌】风寒咳嗽不宜服。

西 瓜(附：西瓜翠衣 西瓜皮 西瓜霜)

出自《日用本草》。为葫芦科植物 西瓜 *Citrullus vulgaris* Schrad.的果瓤。全国各地均有栽培。以河南开封地区最为著名。夏季采收，取瓤鲜用。

【别名】寒瓜，天然白虎汤，天生白虎汤。

【商品名】西瓜，大西瓜。以瓜瓤鲜艳、汁多味甜者为佳。

【处方名】西瓜，西瓜瓤，西瓜汁。

【性味归经】甘，寒。归心、胃、膀胱经。

【功效主治】清热解暑，生津止渴，除烦，利尿。主治中暑，暑热烦渴，温热病热盛伤津，口渴心烦，小便不利，醉酒。

【用量】适量服用。

附：西瓜翠衣

西瓜翠衣为西瓜的中果皮。别名西瓜翠、翠衣。性味归经、功效主治与西瓜略同。清热解暑之力不及西瓜，而利尿之功则较西瓜

为优。并可治疗黄疸水肿等证。用量20~30克。鲜品60~100克。

附：西瓜皮

西瓜皮为西瓜的果皮。别名西瓜衣、西瓜青、碎秋。性味归经、功效主治略同西瓜。偏于利水消肿，治疗肾炎水肿。烧存性研末外用治口舌生疮。用量10~30克。鲜品加倍。外用适量。

附：西瓜霜

西瓜霜为西瓜与皮硝等混合制成的结晶物。宜在中秋节后制取。可分为西瓜白霜和西瓜黑霜两种。

西瓜白霜又名西瓜霜、西瓜硝。选用未熟透的西瓜一个，挖开一小口，取出部分瓜瓤，填入皮硝，再将瓜皮盖好，悬挂在阴凉通风处，约10余天后，瓜皮外面即析出自白霜，将霜陆续扫下，即为西瓜霜。以色白、纯净者为佳。性味咸，寒。归脾、肺经。主治喉风、喉痹、口疮、牙疳、久嗽、咽痛等证。用量内服每次1~3克，外用适量。

西瓜黑霜系选用大西瓜一个，切开蒂部，挖出瓜瓤，装满大蒜瓣，仍以蒂皮盖好，以泥封面，于火中煨一天，取出研成细末，即成西瓜黑霜。性味辛、温，归肝、肾、膀胱经。主治慢性肾炎水肿，肝病腹水等证。用量每服2~3克，日服2次。

甘 蔗

出自《名医别录》。为禾本科植物甘蔗 *Saccharum sinensis* Roxb. 的茎秆。主产于广东、广西、福建、台湾、海南、安徽、江西、浙江、湖南、四川、湖北、云南等地。秋后采收，砍取地上部分，去除叶子。

【别名】薯蔗、干蔗，接肠草，竿蔗，糖梗，甜薯杆子，甜秫杆子，甜秫穗，红甘蔗。

【商品名】甘蔗。以茎干粗长、外表色棕红、断面色白黄、无虫蛀、甜味浓者为佳。

【处方名】甘蔗，甘蔗汁。

【性味归经】甘，寒。归胃、肺经。

【功效主治】清热，生津，下气，润燥。主治热病津伤，心烦口渴，反胃呕吐，肺燥咳嗽，大便燥结。

【用量】甘蔗随意，汁60~120毫升。

【禁忌】脾虚泄泻及糖尿病患者慎服。

麦 门 冬

出自《神农本草经》。为百合科多年生草本植物沿阶草 *Ophiopogon japonicus* Ker-Gawl 或大叶麦冬 *Liriope spicata* Lour. 的须根上的小块根。主产于四川、浙江、湖北等地。夏季采挖，洗净，除去须根，晒干生用。

【别名】麦冬，寸冬，寸麦冬，杭寸冬，浙麦冬，川麦冬，蓼冬，乌韭根，羊韭根，马韭根，羊芥根，爱韭根，禹韭根，忍陵根，忍冬草根，葱冬草根，葱根，不死药，不死草，仆垒，随脂，羊蓍，禹葭，阶前草，书带草，秀墩草，马粪草，家边草，韭叶麦冬，野韭菜根，大麦冬，大叶麦冬，沿阶草根，花园子，提青，青堤，苏大，火冬，甘冬。

【商品名】浙麦冬：又名杭麦冬、笕麦冬。为产于浙江杭州笕桥一带者。后泛指产于浙江者。品质最优，为地道药材。

川麦冬：为产于四川者。产量最大。

连心麦冬：不抽去心者。

去心麦冬：为抽去心者。

均以个大、肥壮、半透明、质柔、色黄白、有香气、嚼之发粘、

干燥无须根者为佳。

【处方名】麦门冬，麦冬，寸冬，炙麦冬，朱麦冬，朱寸冬，辰麦冬，辰寸冬，鲜麦冬等。

处方中写麦门冬、麦冬、寸冬指生麦冬。为原药材去杂质，洗净晒干入药者。

炙麦冬为净麦冬用文火炒至微黄入药者。减缓寒凉，养阴而不腻胃。

朱麦冬又名朱寸冬、辰麦冬、辰寸冬。为净麦冬喷水少许湿润，将朱砂细粉撒布均匀，使朱砂粉与麦冬粘连一块而入药者。偏于镇惊安神。

鲜麦冬为其鲜品洗净入药者。

【注意】在药材商品市场上，下列植物的块根在不同地区也作麦门冬入药，当地称野麦冬、土麦冬。品质较次。

沿阶草属植物中间型沿阶草（蜈蚣七）*Ophiopogon intermedius* D. Don 分布于西藏。

麦门冬属植物阔叶麦门冬*Liriope platyphylla* Wang et Tang 分布于华东、华南和西南等地。

麦门冬属植物小麦冬*L. minor* (Maxim.) Mak. 分布于江苏、浙江。

麦门冬属植物甘肃麦冬*L. kansuensis* (Batal.) C. H. Wright 分布于甘肃。

【性味归经】甘、微苦，微寒。归心、肺、胃经。

【功效主治】润肺养阴，益胃生津，清心除烦。主治劳嗽咯血，肺燥咳嗽粘痰；胃阴不足，口干舌燥，口渴；心烦失眠；阴虚肠燥，大便秘结。

【用量】10~15克。鲜品15~30克。

【禁忌】风寒咳嗽及痰湿壅盛咳嗽忌服；虚寒泄泻者亦忌服。

天 门 冬

出自《神农本草经》。为百合科多年生攀援状草本植物天门冬 *Asparagus cochinchinensis* (Lour.) Merr. 的块根。主产于四川、云南、贵州及长江流域各地。秋季采挖，除去须根，入沸水中煮或蒸过，再浸入清水，去皮，晒干或烘干，用时切片。

【别名】 天冬，明天冬，薯冬，璫蘿，满冬，满冬薯，天文冬，地门冬，肥天冬，大天冬，大当门根，多儿母，万岁藤根，婆罗树根，商棘根，天棘根，颠勒，颠棘根，白罗杉根，八百恩，丝冬，倪铃，赶条蛇，多仔婆，天薯冬，老虎尾巴根，九子十弟，浣草根，女木根，筵门冬，门冬，润天冬，延门冬，无不愈，管松，浣草，绵休，十二根，三百棒。

【商品名】 川天冬：又名川天门冬。为产于云南、贵州而集散于重庆、宜宾者。品质最优。

湖天冬：又名湖天门冬。为产于湖南、湖北者。品质亦优。

温天冬：又名温天门冬。为产于浙江温州、平阳者。品质较差。

均以肥壮、半透明、色黄白、干燥无须者为佳。

【处方名】 天冬，天门冬，炒天冬，炙天冬，朱天冬，鲜天冬等。

处方中写天冬、天门冬指生天门冬。为原药材除去须根，略煮，捞出浸入清水中，去皮晒干，切片入药者。

炒天冬为天冬片用文火微炒入药者。

炙天冬为天冬片用蜂蜜拌匀，再用文火炒至不粘手时取出晾凉入药者。润肺止咳作用增强。

朱天冬为天冬片用清水喷湿，与适量朱砂粉拌匀后入药者。宁心安神作用增强。

鲜天冬为天门冬鲜品洗净去皮，切片入药者。

【注意】在药材商品市场上，下列同属植物的块根，在少数地区亦作天门冬入药，但品质较差，非天门冬正品。

羊齿天门冬（小百部，滇百部，千锤打）*A. filicinus* ex D. Don Ham. 分布于四川、云南。

小茎叶天门冬*A. meioclados* Lev. 分布于云南。

多刺天门冬*A. spinosissimus* Wang et S. C. Chen 分布于西藏。

【性味归经】甘、苦，大寒。归肺、肾经。

【功效主治】清肺降火，滋阴润燥。主治肺阴不足所致的燥咳痰粘，劳嗽咯血；热病伤阴所致的口干口渴；津亏消渴；肠燥便秘等。

【用量】6～15克。鲜品15～30克。

【慎忌】同麦门冬。

石 韸

出自《神农本草经》。为兰科多年生常绿草本植物金钗石斛 *Dendrobium nobile* Lindl. 及同属多种植物的茎。主产于四川、贵州、云南及长江流域各地。多于夏秋间采收，鲜用或晒干切段生用。

【别名】林兰，禁生，杜兰，石遂，石蔚，金钗花，千年润，黄草，吊兰草，金钗石斛，铁皮石斛，长爪石斛，细茎石斛，铜皮石斛，细黄草，重唇石斛，钩状石斛，广东石斛，细叶石斛，罗河石斛，美花石斛，小美石斛，矮石斛，黑节草，枫石斛，木斗，鸡爪兰石斛，金兰石斛，吊兰。

【商品名】铁皮石斛：为植物铁皮石斛 *D. officinale* K. Kimura et Migo 的茎。茎圆，外皮呈铁绿色。质优。主产于安徽、河南、山西、陕西、浙江、云南、贵州、广东、广西、福建等地。

金钗石斛：又名金石斛、扁茎石斛、金斗、金钗、扁金钗、川金钗、边斗、吊兰、蟹爪兰、扁斗、扁草。为植物金钗石斛的茎。

茎扁外皮黄绿色。主产于四川、云南、贵州、湖北、广西、台湾等地。品质亦优。

霍山石斛：又名霍石斛，霍斗。为产于安徽省霍山地区的铁皮石斛。品质最优，为地道药材。适用于老人及虚弱之人。

耳环石斛：又名枫斗、枫石斛。有西枫斗、圆枫斗、结子斗、直条枫斗、葫芦斗、生川斗、广霍斗等规格。为石斛的嫩尖加工而成。生津而不寒凉，可以代茶。以肥满、色鲜艳、有龙头凤尾（茎根部粗，称作龙头；茎末稍细，称作凤尾）、嚼之即碎并发粘者为佳。

西枫斗：耳环石斛的一种。为石斛的嫩尖扭曲成螺旋状或弹簧状者。

圆枫斗：耳环石斛的一种。为石斛的嫩尖卷曲成圆形如钟表发条状者。

结子斗：耳环石斛的一种。为石斛的嫩尖加工成钮结状者。

罗河石斛：为同属植物罗河石斛（又名小黄草）*D. lohohense* Tang et Wang的茎。主产于广西。

美花石斛：为同属植物美花石斛*D. loddigesii* Rolfe的茎。主产于广东、广西、云南等地。

小美石斛：为同属植物小美石斛（又名矮石斛、黑节草）*D. bellatulum* Rolfe的茎。主产于云南。

长爪石斛：为同属植物长爪石斛*D. linawianum* Reichb. f. 的茎。主产于广东、广西、台湾等地。

细茎石斛：为同属植物细茎石斛（又名铜皮石斛、细黄草）*D. moniliforme* (L.) Sw. 的茎。主产于安徽、浙江、广西、云南等地。

重唇石斛：为同属植物重唇石斛*D. hercoglossum* Reichb. f. 的茎。主产于广东、广西等地。

钩状石斛：为同属植物钩状石斛*D. aduncum* Wall. et Lindl. 的茎。分布于广东、福建等地。

广东石斛：为同属植物广东石斛（又名铜皮兰）*D. wilsonii* Rolfe的茎。主产于广东、广西等地。

细叶石斛：为同属植物细叶石斛*D. hancockii* Rolfe.的茎。主产于广西、云南、四川等地。

棍棒石斛：为同属植物棍棒石斛*D. clavatum* Lindl的茎。主产于贵州、云南等地。

黄花棍棒石斛：为同属植物黄花棍棒石斛*D. clavatum* Liadl. var. *aurantiacum* (Rchb. f.) Tang et Wang 的茎。主产于四川等地。

马鞭石斛：为同属植物马鞭石斛（金兰）*D. chryanthum* Wall.的茎。主产于广西、云南、四川等地。

网络唇石斛：为同属植物网络唇石斛（鸡爪兰、小金钗）*D. hercoglossum* Rchb. f. [*D. Wangii* Tso]的茎。主产于广西、广东、贵州、云南等地。

粉花石斛：为同属植物粉花石斛（细黄草）*D. loddigesii* Rolfe的茎。主产于广东、广西、云南等地。

聚石斛：为同属植物聚石斛（金黄泽）*D. aggregatum* Roxb.的茎。主产于广西等地。

瓜石斛：为同属植物瓜石斛*D. plicatile* Lindl.的茎。主产于广西。

黄草石斛：又名圆茎石斛。为铁皮石斛、罗河石斛、广东石斛、细茎石斛等的加工品。

小黄草石斛：为美花石斛、细叶石斛的加工品。

大黄草石斛：又名川石斛。为钩状石斛等的加工品。

中黄草石斛：为细叶石斛、广东石斛的加工品。

细黄草石斛：又名环钗、小环钗、中环钗。为细茎石斛、广东石斛、铜皮石斛的加工品。

爪兰石斛：为黄草石斛的鲜品。外皮黄绿色，茎较瘦长。品质较差。

【处方名】石斛，金石斛，金钗石斛，干石斛，鲜石斛等。

处方中写石斛、金石斛、金钗石斛、干石斛均指干生石斛。为原药材去杂质，晒干切段入药者。

鲜石斛为其新鲜品洗净切段入药者。滋阴清热效果好。

【性味归经】甘，微寒。归胃、肾经。

【功效主治】养胃生津，滋阴清热，明目。主治胃阴不足所致的口干舌燥口渴；阴虚津亏，虚热不退；视力减退；腰膝酸软等。

【用量】6～15克。鲜品15～30克。

【禁忌】无阴虚伤津症状者不宜用。

玉 竹

出自《神农本草经》。为百合科多年生草本植物玉竹（葳蕤）*Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce var. *pluriflorum* (Miq.) Ohwi的根茎。我国大部分地区均有分布，而以河北及江苏产者质量最佳。夏秋两季采挖，除去须根，晒干，或蒸过晒干。切段生用或炙制用。

【别名】萸，葳蕤，萎蕤，委蕤，女萎，萎蕤，王马，节地，虫蝉，乌萎，乌女，青粘，黄芝，地节，马熏，女草，娃草，丽草，葳参，尾参，玉参，玉术，山玉竹，萎香，小笔管菜，十样错，竹七根，竹节黄，黄脚鸡，百解药，山铃子草，铃铛菜，铃当菜，灯笼菜，山苞米，山姜，黄蔓菁，芦荷花，连竹，西竹，甜草根，靠山竹，肥玉竹，明玉竹。

【商品名】玉竹，葳蕤，萎蕤。以根茎粗长、肉厚光润、色黄白、无干姜皮、干燥、不泛油者为佳。

【处方名】玉竹，葳蕤，萎蕤，肥玉竹，明玉竹，生玉竹，蒸玉竹等。

处方中写玉竹、葳蕤、萎蕤、肥玉竹、明玉竹均指生玉竹，为

原药材除去须根，洗净晒干，切段生用入药者。

蒸玉竹又名炙玉竹、制玉竹。为净玉竹反复蒸闷二三次，至内外呈黑色为度，然后切片晒干入药者。

【注意】在药材商品市场上，下列同属植物的根茎，也作玉竹入药，但非正品。

大玉竹（又名长梗玉竹、热河黄精）*P. macropodium* Turcz. 分布于东北、华北等地。

小玉竹（二苞玉竹）*P. involucratum* Maxim. 分布于东北及河北、河南、山东等地。

毛筒玉竹*P. inflatum* Komar. 分布于吉林、辽宁等地。

紫花黄精*P. roseum* (Ledeb.) Kunth 分布于新疆。

此外，同科植物假万寿竹*Disporopsis fusco-picta* Hance 和薄叶假万寿竹*D. leptophylla* Hayata 在广西一些地区误作玉竹入药，应该纠正。

【性味归经】甘，平。归肺、胃经。

【功效主治】滋阴润肺，生津养胃。主治肺胃阴伤，燥热咳嗽，舌燥口渴。

【用量】10~15克。

【禁忌】痰湿内盛者不宜服。

黄 精

出自《名医别录》。为百合科多年生草本植物黄精*Polygonatum sibiricum* Redouté 或囊丝黄精 *P. cyrtonema* Hua. 或金氏黄精*P. kingianum* Coll et Hemsl. 以及同属若干种植物的根。产于河南、河北、内蒙古、山东、山西、江西、福建、四川等地。秋季采挖，除去须根，晒干。生用切片或蒸熟用（蒸至油润为度）。或加酒、黑豆等辅料蒸晒切片，称为制黄精。

【别名】鸡头参，囊丝黄精（白芨黄精），金氏黄精（滇黄精）。

西南黄精、德保黄精、节节高），多花黄精，玉竹黄精，姜形黄精，鸡头黄精，生姜，野生姜，野仙姜，山生姜，老虎姜，山姜，兔竹，鹿竹，仙人余粮，救荒草，黄鸡根，戊己芝，救穷，米铺，黄芝，黄鸡菜，龙衔，太阳草，垂珠，鸡格，苟格，马箭，土灵芝，阳雀蕨，山捣白，白及，笔菜，笔管菜，萎蕤，重楼。

【商品名】长叶黄精：为同属植物长叶黄精*P. multiflorum* L. var. *longifolium* Merr.的根。分布于浙江、福建、广东、广西、湖南、江西、贵州等地。

多花黄精：为同属植物多花黄精*P. multiflorum* L.的根。分布于广西、广东、湖南、湖北、安徽、河南等地。

热河黄精：为同属植物热河黄精（又名多花玉竹）*P. macro-podium* Turcz.的根。分布于东北、河北等地。

滇黄精：为同属植物滇黄精*P. kingianum* Coll. et Hemsl.的根。分布于云南等地。

卷叶黄精：又名老虎姜、钩叶黄精。为同属植物卷叶黄精*P. cirrhifolium* (Wall.) Royle的根。分布于陕西、甘肃、宁夏、湖北、四川、云南等地。

玫瑰红黄精：又名紫花黄精。为同属植物玫瑰红黄精*P. roseum* (Lebed.) Kunth的根。分布于新疆，河北、山西、湖北、四川等地。

甘肃黄精：又名羊角参。为同属植物甘肃黄精*P. verticillatum* (L.) All.的根。分布于我国西北地区。

弯花柱黄精：为同属植物弯花柱黄精*P. curvistylum* Hua的根。分布于宁夏。

红果黄精：为同属植物红果黄精*P. erythrocarpum* Hua的根。分布于青海、甘肃等地。

长梗黄精：为同属植物长梗黄精*P. filipes* Merr.的根。分布于浙江、福建。

深山黄精：为同属植物深山黄精*P. lasianthum* Maxim.的根。

分布于浙江、江西等地。

裸花黄精：为同属植物裸花黄精 *P. moulieri* Hua 的根。分布于四川等地。

对叶黄精：又名棒丝黄精。为同属植物对叶黄精 *P. cathcartii* Bak. 的根。分布于西藏等地。

班茎黄精：为同属植物班茎黄精 *P. marmoratum* Lev. 的根。分布于广西等地。

囊丝黄精：为植物囊丝黄精的根。

金氏黄精：为植物金氏黄精的根。

鸡头黄精：为植物黄精、狭叶黄精的根茎。结节略呈圆锥状，形似鸡头，故名鸡头黄精。

姜形黄精：为植物长叶黄精、多花黄精及卷叶黄精的根茎。结节分枝短而瘦，形似生姜，故名姜形黄精。

玉竹黄精：形似玉竹者。

均以块大肥润、色黄、断面呈角质透明者为佳。

【处方名】生黄精，黄精，熟黄精，甜黄精，制黄精，酒黄精等。

生黄精为原药材去杂质，润透切片入药者。

处方中写黄精指熟黄精，又称制黄精。为净黄精润软反复蒸二三次后晒干切片入药者。

甜黄精又称乌黄精。为净黄精九蒸九晒后入药者。减缓对咽喉刺激，增强补益作用。

酒黄精又称炙黄精。为净黄精加酒和黑豆等辅料蒸后切片晒干入药者。兼有通经络之功。

【注意】黄精和玉竹都有笔管菜、萎蕤之别名。这是由于黄精和玉竹经常混淆造成的。笔管菜和萎蕤本是玉竹的别名，由于把玉竹误作黄精使用，于是也把玉竹的别名带给了黄精。

黄精和天花粉都有“重楼”这一别名，极易混淆，应避免使用。

同科植物假万寿竹和长叶万寿竹（见前玉竹条）在广西个别地区误作黄精入药，应该纠正。

另外，黄精有白及之别名，易与兰科植物白及混淆；黄精还有生姜之别名，易与姜科植物生姜混淆，均应注意鉴别。

【性味归经】甘，平。归脾、肺、肾经。

【功效主治】润肺滋阴，补脾益气。主治肺虚燥咳；肾精亏虚所致的腰酸脚软，头晕眼花；脾胃虚弱所致的倦怠无力，食欲不振；消渴等。

【用法】10~20克。鲜品30~60克。

【禁忌】痰湿内盛及中寒便溏者忌服。

百 合

出自《神农本草经》。为百合科多年生草本植物百合 *Lilium brownii* F. E. Brown var. *colchesteri* Wils. 和细叶百合 *Lilium pumilum* DC. 的肉质鳞茎。全国各地均产。于秋季茎叶枯萎时采挖，洗净，剥取鳞片，沸水烫过，或略蒸过，晒干或烘干。

【别名】细叶百合，线叶百合，麝香百合，卷叶百合，白花百合，白百合，药百合，山百合，家百合，野百合，菜百合，干百合，川百合，甜百合，大百合，新百合，岩百合，红岩百合，百合蒜，蒜脑薯，蒜脑薯，喇叭筒根，韭番，重迈，重箱，重箱，中庭，摩罗，强瞿，强仇，中逢花，夜合花根，卷莲花根，灯伞花根，散莲花根，杜百合，百合，逢花。

【商品名】宣百合：又名南百合、百花百合。为产于安徽宣城一带者。品质最优，为地道产品。

杜百合：为产于浙江一带者。

大百合：又名新百合。为个体色白，肉厚质重，新近采集者。质佳。

百合：又名白花百合。为植物百合的肉质鳞茎。全国各地均有

分布。

细叶百合：又名线叶百合。为植物细叶百合的鳞茎。分布于黑龙江、吉林、辽宁、河北、河南、山东、山西、陕西、甘肃、青海、内蒙古等地。

均以个大、肉厚、质坚、色白、粉性足者为佳。

此外，下列同属植物的肉质鳞茎，也作百合同等入药。

麝香百合（又名红岩百合、岩百合）*L. longiflorum* Thunb. 分布于贵州、广东等地。

轮叶百合*L. distichum* Nakai分布于我国西北和西南地区。

野百合（又名帽子花）*L. martagon* L.分布于新疆等地。

山百合*L. delavayi* Franch.分布于云南等地。

松叶百合*L. cernuum* Kom.分布于我国东北地区。

澜江百合*L. lankongense* Franch.分布于西藏等地。

卓巴百合*L. wardii* Stapf分布于西藏等地。

闪浪花*L. distichum* Ker-Gawl.分布于黑龙江、辽宁等地。

山丹*L. concolor* Salisb.分布于我国东北地区。

卷丹（又名卷莲花）*L. dahuricum* Ker-Gawl.分布于我国东北地区。

高原卷丹（又名西北百合）*L. davidii* Duch.分布于我国西北、西南地区。

渥丹*L. concolor* Salisb. var. *buschianum* Bak.分布于我国东北地区。

赛渥丹*L. concolor* Salisb. Nakai 分布于我国西北、西南地区。

【处方名】百合，生百合，炙百合等。

处方中写百合指生百合。或称百合片、干百合。为原药洗净，剥取鳞片，用沸水烫过或略蒸后，晒干入药者。

炙百合又名蜜炙百合、蜜百合。为百合片用蜂蜜拌匀，微炒至不粘手时取出摊晾，然后入药者。润肺止咳力强。

【注意】另有草药野百合，为兰科植物野百合（又名佛指甲、狸豆、狗铃草、蓝花野百合）*Crotalaria sessiliflora* L.的全草。具有清热利湿解毒之功，应与本品相区别。

【性味归经】甘，微寒。归肺、心经。

【功效主治】润肺止咳，清心安神。主治肺热咳嗽，劳嗽咯血；虚烦惊悸，失眠多梦。

【用量】10~30克。

【慎忌】风寒咳嗽及虚寒便溏者忌服。

荸 荚

出自《日用本草》。为莎草科植物荸荠 *Eleocharis dulcis* (Burm. f.) Trin. ex Henschel 的球茎。主产于长江以南地区。10~12月挖取，洗净，鲜用或风干用。

【别名】芍，马蹄，马薯，鳧茈，蕷茈，薛茹，水芋，乌芋，乌茨，蕷茨，荔荠，荔脐，铁荔脐，黑山棱，地栗，红慈姑，地梨，苾荠，通天草根。

【商品名】马蹄，荸荠。以个大、外皮棕紫色、断面白色、粉性足、甜味浓者为佳。

【处方名】荸荠，荸荠粉，鲜荸荠。

【性味归经】甘，寒。归胃、肺经。

【功效主治】清热，化痰，消积。主治消渴，黄疸，热淋，痞积，目赤，咽喉肿痛，赘疣。

【用量】20~30克。鲜品加倍。外用适量。

【慎忌】脾胃虚寒泄泻者慎服。

黑 脂 麻

出自《神农本草经》。为脂麻科1年生草本植物脂麻 *Sesamum*

ndicum DC.的黑色成熟种子。我国各地普遍有种植。秋季果实成熟时采割植株，晒干，打下种子，除去杂质，再晒干，生用或炒用。

【别名】巨胜子，巨胜，胡麻，胡麻仁，黑芝麻，黑巨胜，狗虱，狗虱子，鸿藏，乌麻，乌麻子，油麻，油麻子，油麻仁，交麻，交麻子，小胡麻，脂麻仁，脂麻，芝麻，方茎子，大胜子，藤弦，钜胜子。

【商品名】黑脂麻，黑芝麻。以粒大饱满、色黑、干燥无杂质者为佳。

【处方名】黑芝麻，黑脂麻等。

【注意】本品在《神农本草经》中原名胡麻，现在药材市场以亚麻科植物亚麻*Linum usitatissimum* L.的种子（商品称胡麻子、亚麻子、壁虱胡麻）作胡麻用。另外，三角胡麻乃茺蔚子的别名。三者不可混为一谈而相互混用。

【性味归经】甘，平。归肝、肾经。

【功效主治】补益精血，润燥滑肠。主治精血不足，须发早白，头晕眼花，肠燥便秘。

【用量】10～30克。

【慎忌】便溏或泄泻者忌服。

亚 麻 子

出自《本草图经》。为亚麻科植物亚麻*Linum usitatissimum* L.的成熟种子。主产于内蒙古、黑龙江、辽宁、吉林等地。8～10月间果实成熟时采集，打取种子，晒干。

【别名】胡麻子，胡麻仁，亚麻仁，壁虱胡麻，壁虱胡麻子，鸦麻子，胡麻饭子，山西胡麻子，山芝麻，胡芝麻，大胡麻，大胡麻子。

【商品名】亚麻子，亚麻仁，胡麻子，胡麻仁。以颗粒饱满、

干燥无杂质者为佳。

【处方名】亚麻子，亚麻仁，胡麻子，胡麻仁，山芝麻，胡芝麻，生亚麻子，炒亚麻子等。

【性味归经】甘，微温。归肝、肾、大肠经。

【功效主治】养血，祛风，润便。主治年老体虚便秘，皮肤干燥起鳞屑，皮肤痒疹，脱发，须发早白，疝气，睾丸炎，慢性肝炎等。

【用量】6～10克。外用适量。

【禁忌】大便滑泻者慎服。

向 日 葵 子

出自《植物名实图考》。为菊科植物向日葵 *Helianthus annuus* L. 的成熟种子。我国各地均有栽培。秋季种子成熟时采收，剥下种子，晒干，生用。

【别名】葵花子，丈菊子，西番菊子，迎阳花子，一丈菊子，草天葵子，向阳花子，太阳花子，望日葵子，朝阳花子，转日莲子。

【商品名】向日葵子，葵花子。以种子饱满、干燥、无杂质、不泛油者为佳。

【处方名】向日葵子，葵花子。

【性味归经】淡，平。归大肠经。

【功效主治】滋阴，止痢，透疹。主治血痢，食欲不振，虚弱头风，麻疹不透。

【用量】6～15克。

【禁忌】孕妇慎服。

龙 葵 子

为茄科植物龙葵的成熟果实。夏秋果实成熟呈紫黑色时采摘。

鲜用或晒干生用。来源同龙葵。

【别名】苦葵子，龙葵果，黑天天果，黑天天豆，天茄果，天天茄果，天泡果，野茄子，黑茄，天地豆，黑蛋蛋果，甜豆茄。

【商品名】龙葵子，龙葵果。以果大、饱满、色黑光亮、甜味浓者为佳。

【处方名】龙葵子，龙葵果，黑天天豆，黑天天果。

【性味归经】甘，温。归肺、肝、肾经。

【功效主治】润肺止咳，温补肝肾。主治肺虚干咳，目昏，性功能低下，腰膝酸软。

【用量】6～15克。鲜品30～60克。

枸 杞 子

出自《神农本草经》。为茄科落叶灌木植物宁夏枸杞 *Lycium barbarum* L. 和枸杞 *L. chinense* Mill. 的成熟果实。以产于宁夏、河北、甘肃、青海等地的质量最好。夏至前后果实成熟时采摘，晾晒干燥。生用。

【别名】枸杞，枸杞果，枸棘子，杞子，枸地芽子，枸杞豆，枸茄茄，枸櫞子，枸忌子，枸乳子，杞果，宁夏枸杞，甘枸杞，甜枸杞，红枸杞，苟起子，甜菜子，枸蹄子，拘蹄子，狗奶子，狗地芽子，地骨子，血枸子，血杞子，红耳坠，红青椒，甜七七芽果，甜葡萄芽果，羊奶子，苦杞子，地筋子，象柴子，纯卢子，仙人仗子，却老子，却暑子，天精子，地仙子，红榴榴棵子，石寿树子，山枸杞，枣杞，贡果。

【商品名】西枸杞：又名宁夏枸杞、宁夏杞子、中宁杞子、西杞子。为产于宁夏者。甘肃也有少量出产。品质最优，为地道药材。

北枸杞：为产于我国北方者。一般认为产于北方者质佳，产于南方者质次。

津枸杞：又名津血杞、杜杞子。为产于我国北方面集散于天津者。

血枸杞：又名血枸子、血杞子、河北枸杞子。为产于河北、山西等地者。质佳。

甘州子：又名甘杞子、甘州枸杞子、甘枸杞。为同属植物土库曼枸杞*L. turcomanicum* Turcz. 和西北枸杞*L. potaninii* Pojark. 的果实。主产于甘肃张掖（旧时甘州）。

古城子：又名新疆枸杞。为同属植物毛蕊枸杞*L. dasystemum* Pojark. 的果实。主产于新疆。

土枸杞：又名杜枸杞。为各地野生枸杞的果实。个小，皮薄，肉少，子多，味酸苦，质次。

均以个大、肉丰、色红、子少、质柔润者为佳。

【处方名】 枸杞，枸杞子，枸杞果，杞果，杞子，西枸杞，北枸杞，甘枸杞等。

【性味归经】 甘，平。归肝、肾、肺经。

【功效主治】 滋补肝肾，明目，润肺。主治肝肾阴虚，头晕目眩，腰膝酸软，遗精消渴，视力减退，阴虚劳嗽等。

【用量】 6～12克。

【慎忌】 脾虚便溏者慎服。

桑 楤

出自《新修本草》。为桑科落叶乔木桑树*Morus alba* L. 的成熟果穗。全国大部分地区均产，以南方育蚕区产量较大。4～6月果穗成熟时采收，洗净，拣去杂质，晒干。生用，或加蜜熬膏用。

【别名】 桑实，桑枣，桑果，桑粒，桑藨，桑葚子，桑椹子，椹，乌椹，文武实，黑椹，黑桑椹，白桑椹，紫桑椹，红桑椹，桑仁，桑果果，桑泡。

【商品名】 黑桑椹：成熟果实呈黑色者。

白桑椹：成熟果实呈白色者。品质优而产量小。

均以果大、饱满、光亮、甜味浓、洁净者为佳。

【处方名】桑椹，桑椹子，桑实，桑果，黑桑椹等。

【性味归经】甘，寒。归心、肝、肾经。

【功效主治】滋阴补血，生津润肠。主治阴虚血亏所致的眩晕，目暗，耳鸣，失眠，须发早白；津伤口渴或消渴；阴亏血虚所致的肠燥便秘。

【用量】10~20克。鲜品30~60克。

【慎忌】脾虚泄泻者忌服。不可多服，多服则引起衄血。

女 贞 子

出自《神农本草经》。为木樨科常绿乔木植物女贞 *Ligustrum ucidum* Ait. 的成熟果实。我国各地均有栽培。冬季果实成熟时采收，蒸熟晒干用。

【别名】女贞实，冬青子，冬青树子，白蜡树子，鼠梓子，爆格蚕，桢木子，女贞木子，蜡树子，小叶冻青子，将军树子，水蜡树子，水瑞香子，冻青树子，大蜡叶树子，水桢子。

【商品名】女贞子。以颗粒大、饱满、黑褐色、干燥无杂质者为佳。

【处方名】女贞子，蒸女贞子，熟女贞子，酒女贞子等。

处方中写女贞子指蒸女贞子或熟女贞子。为净女贞子蒸透晒干入药者。

酒女贞子又名酒制女贞子。为净女贞子用黄酒拌匀蒸熟，晒干入药者。

【注意】在药材商品市场上，同属植物藏女贞 *L. thibeticum* Decne. 的果实在西藏也作女贞子入药，功效相似，但非正品。

【性味归经】甘、苦，凉。归肝、肾经。

【功效主治】补肝益肾，清热明目。主治肝肾阴虚之头晕目

眩，腰膝酸软，须发早白；阴虚发热，肝肾不足之视力减退，目昏不明。

【用量】10～15克。

【慎忌】脾胃虚寒之脘腹疼痛或泄泻者忌服。

橄 榄

出自《日华子本草》。为橄榄科植物橄榄 *Canarium album* (Lour.) Raeusch. 的果实。分布于广东、广西、海南、福建、四川、云南、台湾等地。果实成熟时采摘，晒干或阴干用，亦可用盐水浸渍后晒干用。

【别名】橄榄子，橄榄，忠果，谏果，青果，青子，青橄榄，白榄，黄榄，甘榄，广青果。

【商品名】橄榄，青果。以肉厚、色灰绿、味先涩后甜者为佳。

【处方名】青果，橄榄，盐青果，干青果。

【性味归经】甘、酸、涩，平。归肺、胃经。

【功效主治】清肺，利咽，生津，解毒。主治咽喉肿痛，咳嗽吐血，烦渴，菌痢，癫痫，解河豚毒和酒毒。

【用量】6～15克。

猕 猴 桃

出自《开宝本草》。为猕猴桃科植物猕猴桃 *Actinidia chinensis* Planch. 的果实。主产于河南、陕西、安徽、浙江、四川、湖南、湖北、广西、云南、贵州、广东、福建等地。秋季果实成熟时采摘，鲜用。

【别名】羊桃，阳桃，猕猴梨，毛叶猕猴桃，杨桃，洋桃，山洋桃，狐狸桃，藤梨，猴仔梨，猴子梨，绳梨，金梨，野梨，木子，

大红袍，大零核，白毛桃，毛梨子。

【商品名】猕猴桃。以果大、肉丰，色灰绿、味酸甜者为佳。

【处方名】猕猴桃，阳桃，杨桃，羊桃，洋桃。

【性味归经】甘、酸，凉。归心、胃经。

【功效主治】解热，止渴，通淋。主治烦热，消渴，黄疸，石淋，痔疮，消化不良，食欲不振。

【用量】30~60克。

【慎忌】脾胃虚寒不宜多服。

罗 汉 果

出自《岭南采药录》。为葫芦科植物罗汉果 *Momordica grosvenori* Swingle 的果实。主产于广西。9~10月间果实成熟时采摘，鲜用，或烘干生用。

【别名】拉汗果，拉汉果，假苦瓜，罗汉表，根罗婷表（瑶语名）。

【商品名】罗汉果。以果大、肉丰，甜味浓者为佳。

【处方名】罗汉果，干罗汉果，罗汉干果。鲜罗汉果等。

【性味归经】甘，凉。归肺、脾经。

【功效主治】清肺润肠。主治百日咳，痰火咳嗽，血燥便秘，咽喉炎，扁桃体炎，支气管炎等。

【用量】10~15克。鲜品30~60克。

楮 实

出自《名医别录》。为桑科植物构树 *Broussonetia papyrifera* (L.) Vent. 的果实。全国大部分地区均有分布，野生或栽培。8~10月间当果实成熟呈红色时采摘，鲜用或晒干用。

【别名】楮实子，楮桃，楮桃子，穀实，穀子，角树子，野杨

梅子，构泡，构树子，构树果，构果，穀木子，穀树子，穀树卵子，楮树果，沙纸树果，穀木果，穀浆树果，谷木果，谷浆树果，谷树子，谷桑子，谷桑果，谷实，柘树子，柘树果。

【商品名】楮实，楮实子。以果大、肉丰、色红、甜味浓者为佳。

【处方名】楮实，楮实子，楮桃，楮桃子，干楮实，鲜楮实，谷树子。

【性味归经】甘、寒。归肝、脾、肾经。

【功效主治】滋肾，清肝，明目。主治虚劳，目昏，目翳，水气浮肿。

【用量】10~15克。鲜品加倍。外用适量。

【禁忌】脾胃虚寒者慎服。

枳 楮 子

出自《新修本草》。为鼠李科植物枳椇 *Hovenia dulcis* Thunb. 的果实或种子。主产于安徽、江苏、陕西、浙江、湖北、福建、广东等地。此外江西、河南、湖南、四川、云南、贵州、河北、西藏等地亦产。10~11月果实成熟时采收，将果实连同果柄一起摘下，晒干。或碾碎果壳，筛出种子，晒干。

【别名】木蜜，树蜜，木饧，白石木子，蜜穰子，蜜屈律，鸡距子，癞汉指头，枅枒，背洪子，兼穹，拐枣，拐枣子，天藤，还阳藤，木珊瑚，鸡爪子，鸡橘子，结留子，曹公爪，棘枸，棘枸子，白石枣，万寿果，鸡爪梨，甜半夜，龙爪，碧久子，金钩钩，酸枣，鸡爪果，枳枣，转钮子，转扭子，枸子，枳枸子，枳子，枸骨子，交加枝子，金钩木子，桔枸树子，梨枣，梨枣树子，金果，金果树子，鸡爪树子，鸡脚爪，鸡脚爪果，鸡脚爪子，万字果，橘扭子，九扭子，鸡巨子，金钩梨，金钩子，蜜子梨。

【商品名】枳椇子，枳椇果。以粒大、饱满、色棕红、干燥无

杂质者为佳。

【处方名】枳椇子，枳椇果，万寿果，鸡巨子。

【性味归经】甘、酸，平。归心、脾经。

【功效主治】清热利尿，止渴除烦。主治醉酒，烦热，口渴，呕吐，二便不利。

【用量】9～15克。浸酒或入丸散适量。

【慎忌】脾胃虚寒者慎服。

凤 凰 衣

出自《医学入门·本草》。为雉科动物家鸡 *Gallus gallus domesticus* Brisson的蛋壳内膜。各地均有饲养。春、秋采收，将孵出小鸡后的蛋壳敲碎，剥取内膜，洗净阴干。

【别名】鸡卵中白皮，鸡子白皮，凤凰退，鸡蛋膜衣，鸡蛋衣，鸡蛋壳内膜、鸡蛋壳内衣，鸡蛋膜，蛋膜衣。

【商品名】凤凰衣。以色白、内膜完整、无蛋壳等杂质者为佳。

【处方名】凤凰衣，鸡蛋壳内膜，鸡蛋壳内衣。

【性味归经】淡，平。归肺、胃、脾经。

【功效主治】养阴，清肺，和胃。主治久咳，咽喉疼痛，失音，胃及十二指肠溃疡。外用治疗颈淋巴结结核，溃疡不收。

【用量】作丸散内服 3～6 克。外用适量。

白 木 耳

出自《本草再新》。为银耳科植物 银耳 *Tremella fuciformis* Berk. 的子实体。寄生于腐朽的树木上，分布于四川、贵州、云南、江苏、浙江、广西、福建、湖北、陕西等地。亦可人工繁殖。4～9月间采集，淘净，拣去杂质，晒干或烘干。

【别名】银耳，白耳子，白银耳。

【商品名】银耳，白木耳。以洁白、干燥、完整者为佳。

【处方名】银耳，白木耳。

【性味归经】甘、淡，平。归肺、胃经。

【功效主治】滋阴，润肺，生津，养胃。主治虚劳咳嗽，痰中带血，虚热口渴，大便秘结，高血压病，血管硬化症，吐衄血，崩漏。

【用量】6～15克。

【慎忌】风寒咳嗽慎服。

墨旱莲

出自《新修本草》。为菊科1年生草木植物鳢肠（金陵草）*Eclipta prostrata* L.的全草。我国各省均有出产。初秋割取全草，鲜用或晒干切段用。

【别名】鳢肠，鳢肠草，金陵草，旱莲草，莲子草，旱莲子，白旱莲，猢狲头，蓬草，墨斗草，墨烟草，墨草，墨菜，墨记菜，黑墨草，墨水草，墨汁草，墨汁旱莲草，猪牙草，白花草，白花蟛蜞菊，白花蟛蜞草，野水凤仙，摘头乌，滴落乌，水凤仙草，黑头草，古城墨，水旱莲，冰冻草，节节乌，跳鱼草，假白头花仔，绕莲花，火炭草，金丝麻，莲子草，野向日葵，黑墨菜，乌心草，老鸹筋，蓬子草，止血草，臭脚丫子棵，水葵花，汗淋米（瑶族名），乌墨黑，黑头草，麦兜草。

【商品名】旱莲草，墨旱莲。以肥壮、叶多、色绿、带有花序、干燥无杂质者为佳。

【处方名】旱莲草。

【注意】在药材商品市场上，藤黄科植物黄海棠（一说金丝桃科植物湖南连翘）*Hypericum ascyron* L.的地上全草，在东北、天津、上海、安徽、江苏、浙江等地也作旱莲草入药，商品称为“红

旱莲”。这种药材在广西、湖南个别地区误作“王不留行”入药；在湖南、湖北、安徽个别地区又误作“刘寄奴”入药。在宁夏、内蒙古等地以蔷薇科植物朝天委陵菜 *Potentilla supina* L. 的全草作旱莲草使用。以上均属误用，应予以纠正。

【性味归经】甘、酸，寒。归肝、肾经。

【功效主治】滋阴益肾，凉血止血。主治肝肾阴虚所致之头晕目眩，须发早白；阴虚血热所致之吐衄，尿血，便血，崩漏，月经过多。

【用量】10~15克。鲜品加倍。

【禁忌】脾虚泄泻者忌服。

龟 板

出自《神农本草经》。为龟科动物 乌龟 *Chinemys reevesii* (Gray) 的腹甲。产于浙江、湖北、湖南、安徽、江苏等地。全年均可捕捉。杀死剥去筋肉，取其腹甲，洗净晒干，称为“血板”；如煮死后取出的腹甲，称为“烫板”。以砂炒炮用，或醋炙用。

【别名】乌龟腹甲，龟筒，龟甲，龟版，龟腹甲，元武板，神屋，龟壳，败龟甲，败将，败龟板，龟筒，龟下甲，龟底甲，龟腹甲，坎板，拖泥板，玄武板，下甲，乌龟壳，乌龟板，元绪甲，元绪板，金龟甲，金龟板，水龟甲，水龟板，神龟底壳，玄衣督邮，神龟板，灵龟板，漏天机。

【商品名】血板：又名血龟板。将乌龟杀死，取腹甲剥除筋肉，洗净晒干所得之龟板药材。

烫板：又名汤板，将乌龟煮死所得之龟板药材。

均以去净筋肉、干燥洁净者为佳。

【处方名】龟板，生龟板，炒龟板，炙龟板，醋龟板，龟板胶等。

处方中写龟板指生龟板。为原药材洗净晒干，捣碎入药者。

炒龟板为净龟板片用砂子炒黄入药者。

醋龟板又名炙龟板。为净龟板片用砂子炒黄，趁热浸入醋中，用清水冲洗后晒干入药者。滋阴功效增强。

龟板胶又名龟胶、龟甲胶、龟板膏。为净龟板经煎熬、浓缩制成的胶质块状物，褐色半透明。兼有补血止血之功。

【性味归经】甘、咸，寒。归肝、肾、心经。

【功效主治】滋阴潜阳，益肾强骨，养血补心。主治阴虚阳亢或热病伤阴所致的虚风内动，头晕目眩，心烦恶心，甚则痉厥，阴虚火旺，骨蒸劳热，盗汗遗精，咳嗽咯血；肾虚腰脚痿软，筋骨不健，小儿囟门不合，心虚失眠，健忘，惊悸，血虚血热所致之月经过多或崩漏。

【用量】10~20克。

【慎忌】脾胃虚寒者忌服；孕妇慎服。

鳖 甲

出自《神农本草经》。为鳖科动物鳖 *Amyda sinensis* (Wiegmann) 的背甲。主产于河北、湖南、安徽、浙江等地。全年均可捕捉，去头至沸水中煮 1~2 小时，取出背甲，去净残肉，晒干。以砂炒炮用，或醋炙用。

【别名】上甲，鳖壳，鳖盖，鳖盖子，老鳖盖，脚鱼壳，甲鱼壳，水鱼壳，团鱼壳，团鱼甲，团鱼盖，别甲，必甲，九肋鳖甲，中华鳖甲，王八盖子，王八壳。

【商品名】鳖甲，上甲。以无残肉、无腥臭、干燥洁净者为佳。

【处方名】鳖甲，别甲，生鳖甲，醋鳖甲，炙鳖甲，鳖甲胶等。

处方中写鳖甲、别甲指生鳖甲。为原药去净皮肉，洗净晒干（用时捣碎）入药者。偏于滋阴潜阳。

醋鳖甲又名制鳖甲、炙鳖甲。为净鳖甲用砂子炒至淡黄色，然后取出趁热放入米醋中淬，再取出用清水冲洗，最后晒干入药者。偏于软坚散结。

鳖甲胶为鳖甲经煎熬而制成的半透明胶状物。偏于滋阴养血。

【性味归经】咸，寒。归肝经。

【功效主治】滋阴潜阳，软坚散结。主治热病伤阴，虚风内动，舌燥齿黑，手指颤抖，甚至痉厥；阴虚发热，夜热早凉，形体消瘦，骨蒸盗汗；久疟，疟母，经闭，癥瘕，肝脾肿大等。

【用量】10~30克。研末冲服每次2~3克。

【慎忌】脾胃虚寒者及孕妇均不宜服。

十八、收 涩 药

五 味 子

出自《神农本草经》。为木兰科多年生落叶木质藤木植物北五味子 *Schisandra chinensis* Baill. 和南五味子（华中五味子）*S. sphenanthera* Rehd. et Wils. 的成熟果实。北五味为传统使用的正品。主产于东北、内蒙古、河北、山西等地。南五味子在西南及长江流域以南地区均有出产。秋季果实成熟时采收，除去干枝，晒干。生用或经醋、蜜拌蒸晒干用。

【别名】藤，莖蕘，玄及，会及，五梅子，山花椒，壮味，五味，南五味子，南五味，北五味子，北五味，华中五味子，面藤子，血藤子。

【商品名】

北五味子：又名辽五味子、辽五味、北五味。为北五味子的成

熟果实。主产于黑龙江、辽宁、吉林、河北等地。为传统正品，品质优良。

南五味子：又名南五味、山五味子、西五味、西五味子、川五味、川五味子、华中五味子、红铃子。为植物南五味子的成熟果实。主产于山西、陕西、云南、四川等地。为五味子副品，品质较次。均以粒大肉厚、色紫红、有油性者为佳。

【处方名】五味，五味子，辽五味，北五味子，北五味，辽五味子等。

【注意】在药材商品市场上，下列同属植物的成熟果实在不同地区也作五味子入药，但均非正品，品质较次。

翼梗五味子*S. henryi* Clarke商品亦称“西五味子”、“药五味子”。分布于湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南等地。

圆药五味子*S. sphaerandra* Stapf. f. *pallida* A. C. Smith分布于西藏。当地作五味子用。

【性味归经】酸，温。归肺、肾、心经。

【功效主治】敛肺滋肾，生津敛汗，涩精止泻，宁心安神。主治久咳虚喘，津伤口渴，遗精滑精，久泻不止，心悸，失眠，多梦，慢性肝炎转氨酶升高等。

【用量】4～10克。研末冲服每次1～3克。

【慎忌】痢疾及麻疹初起忌服。

乌 梅

出自《本草经集注》。为蔷薇科植物梅*Prunus mume* (Sieb.) Sieb. et Zucc. 的干燥未成熟果实。主产于四川、浙江、福建、湖南、贵州等地。5月间采摘，焙干。

【别名】梅，梅子，梅实，梅果，梅干，乌梅干，熏梅，酸梅，合汉梅，干枝梅，黄仔，大乌梅，桔梅肉，春梅，合溪梅，梅诸，梅梢，江梅，青梅，黑梅，梅干。

【商品名】梅子：为乌梅的干燥带核果实。

乌梅肉：为乌梅的干燥去核果实。

合溪梅：为产于浙江者。个大肉厚，品质优良。为地道药材。

安吉梅：又名建乌梅、建梅。为产于福建者，个大质优，为地道药材。

红梅：为产于四川者。个小肉薄，外皮略带红色。质次。

岗梅：乌梅中之个小肉薄者。质次。

均以个大肉厚、柔润、味酸、外皮乌黑、无裂隙者为佳。

【处方名】乌梅，乌梅肉，建梅，建乌梅，大乌梅，醋乌梅，蒸乌梅，炒乌梅，乌梅炭。

处方中写乌梅、建梅、建乌梅、大乌梅均指生乌梅。为原药去杂质，洗净后晒干或焙干入药者。

乌梅肉为净乌梅去核取肉晒干入药者。

蒸乌梅为乌梅肉上笼蒸熟后晒干入药者。生津止渴，敛肺止咳作用增强。

醋乌梅为乌梅肉用米醋拌匀，待醋吸尽，再上笼蒸熟晒干入药者。敛肺生津功效增强。

炒乌梅为净乌梅用文火微炒至黄色入药者。收敛固涩功效增强。

乌梅炭为净乌梅用武火炒至焦黑，存性，再用清水喷洒灭尽火星，取出晾干入药者。偏于收敛止血。

【性味归经】酸，涩，温。归肝、脾、肺大肠经。

【功效主治】收敛生津，安蛔驱虫。主治肺虚久咳，虚热烦渴，久泻菌痢，便血尿血，血崩，久疟，牛皮癣，胆道蛔虫症，胆囊炎。

【用量】10~30克。

【慎忌】有实邪者慎服。

五 倍 子

出自《本草拾遗》为漆树科落叶灌木或小乔木植物盐肤木 *Rhus chinensis* Mill. 或同属植物青麸杨 *R. potaninii* Maxim. 等叶上寄生的虫瘿。我国大部分地区均有分布。主产于四川。9~10月摘下虫瘿，煮死内中寄生虫，干燥。敲开，除去杂质，生用。

【别名】文蛤，百虫仓，木附子，五棓子，五钩子，棓子，倍子，蚊阁。

【商品名】角倍：又名菱倍、花倍。为角倍蚜 *Melaphis chinensis* (Bell.) 的虫瘿。多呈不整齐的瘤状突起或角状分枝。

肚倍：又名独角倍。多为倍蛋蚜 *M. paitan* Tsai et Tang 的虫瘿。呈纺锤形或长圆形囊状，无突起和分枝。习以为佳。

【处方名】五倍子，炒五倍子，百药煎。

处方中写五倍子指炒五倍子。为净五倍子用文火微炒入药者。收涩止血功效增强。

百药煎为五倍子同茶叶等经发酵制成的块状物。偏于润肺止咳，生津止渴。

【性味归经】酸、涩，寒。归肺、大肠、肾经。

【功效主治】敛肺降火，涩肠，固精，敛汗，止血。主治肺虚久咳，久泻久痢，遗精滑精，自汗盗汗，崩漏下血。外用可治疮疖肿毒，湿疮流水，溃疡不敛，肛脱不收，子宫脱垂等。

【用量】内服入丸散剂每次1.2~2.4克。外用适量。不宜入煎剂。

【慎忌】风寒咳嗽及湿热泻痢初期忌服。

浮 小 麦(附：小麦)

出自《本草蒙筌》。为禾本科1年生草本植物小麦 *Triticum*

aestivum L. 未成熟的颖果。各地均产。以水淘之，浮起者为佳。

【别名】浮麦，浮水麦，浮麦，麦壳，瘪麦，秕麦，麦壳葵。

【商品名】浮小麦，浮麦。以干瘪、洁净、能浮于水面者为佳。

【处方名】浮小麦。

【注意】在广西个别地区，将燕麦 *Avena sativa* L. 误作为浮小麦使用。二者性味、功效均不相同，不能混用。

【性味归经】甘，凉。归心经。

【功效主治】益气，除热，止汗。主治自汗盗汗，骨蒸劳热。

【用量】15~30克。

附：小麦

即生长成熟的小麦。来源同浮小麦。又名棘、淮小麦、陈小麦等。味甘，性凉。归心经。功能养心除烦。适用于妇女脏躁、悲伤欲哭之证。用量30~60克，煎汤服。

糯稻根须

出自《本草再新》。为禾本科1年生草本植物糯稻 *Oryza sativa* L. 的干燥根须。各省均有栽培。9~10月糯稻收割后，挖起根须，除去泥土，洗净晒干。

【别名】糯谷根须，糯稻草根须，稻根须，糯稻根，糯谷根，穄根须，嘉蔬根须，水稻根须。

【商品名】糯稻根须。以根须细长、干燥、无泥土、无杂质者为佳。

【处方名】稻根须，糯稻根须。

【性味归经】甘，平。归心、肝经。

【功效主治】益胃生津，止汗退热。主治自汗盗汗，虚热不

退。

【用量】15~30克。

麻 黄 根

出自《名医别录》。为麻黄科多年生草本状小灌木植物草麻黄 *Ephedra sinica* Stapf. 或木贼麻黄 *E. equisetina* Bge. 或中麻黄 *E. intermedia* Schrenk et Mey. 的根。立秋后采挖。剪去须根，洗净切段。

【别名】苦椿菜，龙沙根，卑相根，狗骨根，色道麻根，结力根，麻黄草根，草麻黄根，中麻黄根，木贼麻黄根，山麻黄根，川麻黄根，田麻黄根，华麻黄根，木麻黄根，西麻黄根，朱芯麻根。

【商品名】麻黄根。以外皮红棕色、断面黄白色、质坚、干燥无杂质者为佳。

【处方名】麻黄根。

【性味归经】甘，平。归肺经。

【功效主治】止汗。主治自汗盗汗。

【用量】6~10克。研末作扑粉外用适量。

【慎忌】外感未解者忌服。

椿 皮

出自《新修本草》。为苦木科落叶乔木植物臭椿(樗) *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle. 的根皮或树皮。主产于山东、辽宁、河南、安徽等地。全年可采，剥取根皮或干皮，刮去外层粗皮，晒干，切丝生用或炒用。

【别名】椿根白皮，椿根皮，椿树根皮，椿树皮，椿木皮，椿白皮，臭椿皮，樗皮，樗根皮，樗树皮，樗白皮，樗根白皮，樗木皮，苦椿皮，臭樗皮，臭椿根皮，臭椿树皮，臭椿根白皮，臭椿树

白皮。

【商品名】椿根白皮：又名椿根皮。为植物臭椿树根的内皮。

椿树白皮：又名椿木皮、椿树皮。为植物臭椿树干的内皮。

均以肉厚、无粗皮、色黄白、干燥者为佳。

【处方名】椿白皮，樗白皮，椿皮，樗皮，炒椿白皮，炒樗白皮等。

处方中写椿白皮、樗白皮、椿皮、樗皮指生椿皮。为原药除尽栓皮，切丝入药者。

炒椿白皮又名炒樗白皮。为椿皮丝用麸炒至微黄入药者。减缓苦寒之性及臭味。

【注意】古时称臭椿皮为樗皮，香椿皮为椿皮。目前大部分地区椿皮之商品药材多是臭椿皮。部分地区（如四川、贵州等地）以楝科植物香椿 *Toona sinensis* (A. Juss) Roem. 的干皮和根皮入药用。商品名称香椿皮、春颠皮、香椿根皮、香椿树皮、香椿木皮、红椿皮、春阳树皮、春菜树皮、春尖皮、椿芽树皮、白椿皮、香树皮、猪椿皮、香椿芽树皮等。

【性味归经】苦、涩，寒。归大肠、胃、肝经。

【功效主治】清热燥湿，涩肠，止血，止带，杀虫。主治久泻，久痢，便血，崩漏，带下，蛔虫病。外用可治疮癩。

【用量】3～5克。外用适量。

【禁忌】脾胃虚弱者慎服。

石 榴 皮

出自《名医别录》。为石椿科落叶灌木或小乔木植物石榴 *Punica granatum* L. 的果皮。我国大部分地区都有栽培。秋季果实成熟后收集果皮洗净，切小块晒干。

【别名】石榴壳，枯石榴，桉石榴，桉石榴皮，酸石榴皮，酸榴皮，安石榴酸实壳，西榴皮，安石椿皮，珍珠石榴皮，褚榴，丹

若皮，金罍皮，金庞皮，榭榴皮，海石榴皮，安息榴皮，西安榴皮，钟石榴皮，石榴果皮。

【商品名】石榴皮，安石榴皮。以外表整洁、个大皮厚、干燥无杂质者为佳。

【处方名】石榴皮。

【注意】石榴根皮有人也称“石榴皮”，功效不同，不能混用，应注意鉴别。

【性味归经】酸、涩，温。归胃、大肠经。

【功效主治】涩肠止泻，杀虫。主治久泻久痢，湿热痢疾，脱肛，滑精，崩漏，带下，虫积腹痛。外用可治牛皮癣。

【用量】3～10克。外用适量。

【禁忌】脾胃虚弱，恶心呕吐，食欲不振者慎服。

诃 子

出自《药性论》。为使君子科落叶乔木植物诃子 *Terminalia chebula* Retz. 的成熟果实。原产印度、马来亚、缅甸，现我国云南及广东、广西等地也有栽培。于7～8月采收，晒干，生用或煅用。若用果肉则去核。

【别名】诃黎勒，诃黎，诃子肉，柯子，卡匝（朝鲜族名），码漏（佤族名），码蜡（傣族名），阿如拉（蒙族名），阿如热（藏族名），随风子，涩翁，卡梨勒，荷利勒，摆马纳（崩龙族名）。

【商品名】诃黎勒，诃子。以表面黄棕色、微皱、有光泽、肉厚、干燥者为佳。

【处方名】诃子，诃黎勒，大诃子，诃子肉，柯子，呵子，炒诃子等。

处方中写诃子、诃黎勒、大诃子、柯子、呵子均指生诃子。为原药除去杂质晒干入药者。偏于敛肺清火开音。

诃子肉又名诃子皮。为净诃子除去果核，取净诃子果肉入药者。

炒诃子又名炙诃子、煨柯子。为净诃子用麸微炒入药者。偏于涩肠止泻。

【注意】在药材商品市场上，诃子的变种恒河诃子 *Terminalia chebula* Retz. var. *gangetica* Roxb. 也作诃子入药，但非正品，可作替代品。

【性味归经】苦、酸、涩，平。归肺、大肠经。

【功效主治】涩肠，敛肺，下气，利咽。主治久泻，久痢，脱肛，肺虚喘咳，久咳失音。

【用量】4～10克。

【慎忌】外有表邪、内有湿热积滞者忌服。

肉 豆 蔻

出自《药性论》。为肉豆蔻科乔木植物肉豆蔻树 *Myristica fragrans* Houtt. 的成熟种仁。我国广东有栽培，国外印尼以及西印度群岛、马来半岛等地亦产。采收已成熟的果实，除去皮壳后干燥，用时以面裹煨去油。

【别名】肉蔻，肉叩，肉果，玉果，迦拘勒，豆叩，豆蔻，顶头肉，肉豆叩。

【商品名】肉豆蔻：为植物肉豆蔻树的成熟种仁。

长壳玉果：又名长形肉豆蔻。为同属植物长形肉豆蔻 *M. argentea* Warb. 的带皮果实。主产于印度尼西亚。香气较弱，味辣，质次。

均以个大、饱满、坚实、体重、无虫蛀、油性大、香气浓者为佳。

【处方名】肉豆蔻，肉蔻，肉叩，肉扣，肉茚，煨肉蔻，肉蔻霜等。

处方中写肉豆蔻、肉蔻、肉叩、肉扣、肉茴均指煅肉蔻。为净肉蔻用麸炒至黄色入药者。去油后减少对胃的刺激。

肉蔻霜为净肉蔻压去油后碾成细粉入药者，减缓腻胃弊端，增强固肠止泻功效。

【性味归经】辛，温。归脾、胃、大肠经。

【功效主治】温中行气，涩肠止泻。主治久泻不止，虚寒气滞，脘腹胀痛，食少呕吐。

【用量】3～10克。

【禁忌】湿热痢疾忌服。

赤 石 脂

出自《神农本草经》。为单斜晶系的多水高岭土 Halloysite。产于福建、山东、河南等地。全年均可挖采，拣去杂质，研粉水飞或火煅水飞用。

【别名】多水高岭土，红高岭，赤符，赤石土，吃油脂，红土，石脂。

【商品名】赤石脂。以色红、光滑细腻、质软易断、粘性强者为佳。

【处方名】赤石脂，煅赤石脂。

处方中写赤石脂指生赤石脂。为原药赤石脂除去杂质，打碎入药者。

煅赤石脂又名煅石脂。为赤石脂土块用无烟火烧红透，趁热放入米醋中淬，再取出晒干入药者。收敛止血作用增强。

【注意】白石脂系矿物硅酸盐的白陶土(Kaolin)，色白或带淡红、淡黄色，功效与赤石脂类同，亦为涩肠止泻药，现一般作外用吸收剂。

【性味归经】甘、酸、涩，温。归大肠、胃经。

【功效主治】内服涩肠止泻，止血；外用收敛生肌，敛疮。内

服主治泻痢不止，便血脱肛，崩漏带下。外用主治溃疡不敛，湿疮流水，外伤出血等。

【用量】10~20克。外用适量。

【慎忌】孕妇慎服，湿热痢疾忌服。

禹余粮

出自《神农本草经》。为斜方晶系褐铁矿Limonite的一种天然粉末状矿石。主产于浙江、广东等地。研细水飞用。

【别名】禹粮石，余粮石，太一余粮，太一禹余粮，石脑，禹哀，白余粮，余粮。

【商品名】禹余粮，禹粮石。以色棕黄、整匀不碎、无杂质者为佳。

【处方名】禹余粮，禹粮石，余粮，煅禹余粮等。

处方中写禹余粮、禹粮石指生禹余粮。为原药除去杂质和泥土后打碎入药者。

煅禹余粮为净禹余粮在无烟火上煅红，趁热置醋中淬酥，捞出晒干入药者。收涩止血功效增强。

【性味归经】甘、涩，平。归胃、大肠经。

【功效主治】涩肠止泻，收敛止血。主治久泻久痢，崩漏带下。

【用量】10~20克。

【慎忌】湿热痢疾忌服；孕妇慎服。

罂粟壳

出自《开宝本草》。为罂粟壳1年生或2年生草本植物罂粟 *Papaver somniferum* L.的成熟蒴果的外壳。原产于国外，我国部分地区的药物种植场有少量栽培，以供药用。夏季采收，去蒂及种

子，晒干生用，或醋炒或蜜炙用。

【别名】粟壳，米壳，罂子粟，罂子粟壳，御米壳，烟斗斗，鸦片烟果果，米囊，米囊子壳，象谷壳，囊子壳，莺粟壳，大烟壳，大烟膏葵，大烟膏菜。

【商品名】罂粟壳，粟壳，米壳。以壳大、完整、色黄绿、干燥、去净蒂及种子者为佳。

【处方名】米壳，粟壳，罂粟壳，生米壳，炙米壳，醋米壳。

处方中写米壳、粟壳、罂粟壳均指生米壳。为原药材去杂质，润透切丝入药者。

炙米壳又名蜜米壳、蜜炙米壳。为米壳丝用蜂蜜拌匀，再用文火炒至不粘手时取出，晾凉入药者。

醋米壳为米壳丝用米醋拌匀，再用文火微炒入药者。

【性味归经】酸、涩，平。有毒。归肺、大肠、肾经。

【功效主治】敛肺，涩肠，止痛。主治肺虚久咳，久泻不止，虚寒腹痛胃痛，筋骨疼痛，遗精滑泄。

【用量】3～10克。

【慎忌】咳嗽及泻痢初起忌服。不宜过量及持续服用，以免成瘾。

莲 子

出自《神农本草经》。为睡莲科多年生水生草本植物莲 *Nelumbo nucifera* Gaertn. 的成熟种仁。中心部包裹着绿色胚芽，俗称莲子心。主产于湖南、福建、江苏、浙江及南方各地池沼湖塘中。8～9月采收成熟莲房，取出果实，除去果皮晒干。

【别名】菂，菂，藕子，藕实，莲米，莲实，莲蓬子，莲仁，莲肉，莲子肉，泽芝，荷子，荷实，芙渠子，芙渠实，芙蓉子，芙蓉实，水芝子，水芝实，水芝丹。

【商品名】石莲子：又名壳莲子、老莲子、甜石莲、甜莲子、

带皮莲子等。为带有灰黑色坚硬外壳的成熟种子。多由落水下沉或淤入泥中所形成。

石莲肉：又名莲子肉。为除去外壳的成熟种仁。

建莲子：又名建莲。为产于福建、江西者。

湘莲子：又名湘莲。为产于湖南、湖北者。

湖莲子：又名湖莲。为产于江苏、浙江者。

红莲子：又名仁莲。习称未去种皮的莲子为“红莲子”。

白莲子：又名白莲。习称已去种皮的莲子为“白莲子”。

均以粒大、饱满、色白、不破碎、干燥洁净者为佳。

【处方名】莲子，建莲子，建莲米，莲子肉，莲肉，炒莲子等。

处方中写莲子、建莲子、莲子肉、莲肉均指生莲子肉。为原药除去杂质及种皮，生用入药者。

炒莲子为净莲子肉用文火微炒入药者。健脾止泻功效增强。

【注意】商品市场上还有一种苦石莲，为豆科植物南蛇旁（又名啄葵云实、广石莲、青蛇子、老鸦枕头）*Caesalpinia minax* Hance的种子。主产于云南、广西。味苦性寒。有清湿热，散瘀止痛之功效。主治呃逆、痢疾、尿血、淋浊及跌打损伤等证。其性味、功效及来源均与甜石莲不同，不能混用。

【性味归经】甘、涩，平。归脾、肾、心经。

【功效主治】补脾止泻，益肾固精，养心安神。主治脾虚久泻，食欲不振；肾虚遗精滑精；虚烦，惊悸失眠；妇女崩漏，白带过多等。

【用量】6～15克。

【慎忌】湿热痢疾及肠燥便秘者忌服。

莲子心

为莲子中的青嫩胚芽。来源同莲子。

【别名】薏，莲薏，苦薏，莲心，莲子芯，莲米心，莲芯。

【商品名】莲子心，莲心。以色绿、干燥洁净者为佳。

【处方名】莲子芯，莲心，莲子心等。

【性味归经】苦，寒。归心、心包、肾经。

【功效主治】清心除烦，止血涩精。主治高血压病；温热病邪陷心包所致的神昏谵语；心烦不寐；口渴；遗精；吐血衄血；目赤肿痛。

【用量】1.5~3克。

【慎忌】脾胃虚寒，脘腹疼痛及泄泻者忌服。

荷 花

为睡莲科植物莲的花蕾。来源同莲子。

【别名】莲花，水花，菡萏。

【商品名】荷花。以鲜艳、初开或含苞未放者为佳。

【处方名】荷花，莲花，干荷花，鲜荷花等。

【性味归经】甘、苦，凉。归心、肝经。

【功效主治】清暑，止血，散瘀。主治暑热烦渴；咳血；咯血，跌打呕血。鲜用捣烂外敷治天疱湿疮。

【用量】3~5克。鲜品6~10克。外用适量。

【慎忌】脾虚泄泻者慎服。

莲 须

莲须为荷花的干燥雄蕊。来源同“莲子”。

【别名】金樱草，莲花须，莲花蕊，莲蕊须，莲旺，荷花蕊，荷花须，莲蕊，白莲须。

【商品名】杜莲须：为产于浙江者。花蕊长而色黄，品质优良。

客莲须：为产于洪泽湖和微山湖者。花蕊短而色淡。品质稍次。

以花蕊长而色黄、干燥洁净者为佳。

【处方名】莲须，莲花须。

【性味归经】甘、涩，平。归心、肾经。

【功效主治】益肾固精，清心止血。主治遗精，白带，白浊，崩漏，吐血，衄血，泻痢等证。

【用 量】2～4克。

莲 房

为莲的成熟花托，即莲蓬壳。来源同“莲子”。

【别名】莲蓬壳，莲壳，千莲房，莲蓬，陈莲蓬壳，花房，子房，佛座。

【商品名】莲房。以色黄绿、个大、干燥完整者为佳。

【处方名】莲房，莲房炭。

处方中写莲房指生莲房。为原药材去杂质及梗后切丝入药者。偏于祛湿。

莲房炭为原药材用武火炒炭存性，取出淋洒清水灭尽火星，然后晾干入药者。偏于止血。

【性味归经】苦、涩，温。入心、肝经。

【功效主治】散瘀，去湿，止血。主治肠风下血，血痢，血淋，痔疮脱肛，月经过多，崩漏带下，胎漏，产后胎衣不下，瘀血腹痛。

【用 量】5～10克。

荷 叶

为莲的叶片。来源同“莲子”。

【别名】莲叶，藕叶，蘧，蘧叶，荷钱，干荷叶，败荷叶，鲜荷叶，芰荷。

【商品名】荷叶。以色青绿、干燥洁净、完整者为佳。

【处方名】荷叶，莲叶，鲜荷叶，干荷叶，荷叶炭等。

【性味归经】微苦，凉。归心、肝、胃、脾经。

【功效主治】清热解暑，升清止泻。主治暑温余热未清之头胀，湿热泻痢；雷头风，头痛如劈，头大如斗；饮食停滞，腹胀，心烦口渴；眩晕，水气浮肿；吐血衄血，崩漏；便血，产后血晕等。

【用量】4～10克。鲜品15～30克。

荷 梗

为荷的叶柄。来源同“莲子”。

【别名】干荷梗，荷叶梗，寸荷梗，荷梗段，荷草，藕草，藕杆。

【商品名】荷梗。以色绿、梗粗长、干燥洁净者为佳。

【处方名】荷梗，荷草，藕草，干荷梗，鲜荷梗，荷梗段等。

【性味归经】苦、涩，平。归肺、胃经。

【功效主治】通气宽胸。主治夏伤暑湿，胸闷不畅，咽喉不利，梅核气等。

【用量】6～10克。鲜品10～20克。

荷 蒂

为荷叶与荷梗交接的部分。来源同“莲子”。

【别名】荷叶蒂，荷叶鼻，荷鼻。

【商品名】荷蒂。以个大、干燥、均匀、洁净者为佳。

【处方名】荷蒂，荷蒂炭等。

【性味归经】微苦，凉。归心、肝、脾、胃经。

【功效主治】和胃安胎，止血止带。主治胎动不安，崩漏带下，脱肛久泻，子宫脱垂等证。

【用量】4～6克。鲜品6～10克。

芡 实

出自《神农本草经》。为睡莲科1年生水生草本植物芡*Euryale ferox* Salisb.的成熟种仁。主产于湖南、江苏、安徽、山东等地。8～9月采收。除去其外面刺皮，压碎硬壳，取仁晒干；或再去掉红棕色内种皮后晒干。生用或炒用。用时捣碎。

【别名】蔻，鸡头实，鸡头子，鸡头米，鸡头果，鸡头苞，鸡头，鸡痈，鸡嘴莲，雁头，雁啄实，鸿头，鸟头，水鸡头，水流黄，肇实，刺莲藕，刺莲蓬，刺莲蓬实，刀芡实，黄实，苏黄，芡实米，卵菱，荪子，剪芡实。

【商品名】北芡实：为产于山东、苏北、皖北等北方地区者。

南芡实：为产于湖南、苏南、皖南等南方地区者。

苏芡实：为产于江苏撞去红棕色内种皮者。习以为佳。

均以颗粒饱满、均匀、粉性足、无破碎、干燥无杂质者为佳。

【处方名】芡实，芡实米，鸡头米，生芡实，炒芡实。

处方中写芡实、芡实米、鸡头米均指生芡实。为原药除净杂质碾去种壳，生用入药者。

炒芡实为生芡实用麸炒至微黄入药者。健脾止泻功效增强。

【性味归经】甘、涩，平。归脾、肾经。

【功效主治】补脾去湿，益肾固精。主治脾虚久泻，肾虚遗精，小便不禁，白带过多。

【用量】10～15克。

山 茄 黄

出自《神农本草经》。为山茱萸科落叶小乔木植物山茱萸 *Cornus officinalis* Sieb. et Zucc. 除去果核的果肉。主产于浙江、安徽、河南、陕西、山西等地。10~11月间，果实成熟时采摘，用文火烘焙或置沸水中略烫，及时挤出果核，晒干或烘干备用。

【别名】 山萸肉，山芋肉，山于肉，杭芋肉，杭萸肉，山萸，山茱萸肉，蜀枣，蜀酸枣，蕤实，鼠矢，鸡足，实枣儿，肉枣，药枣，寇思，思益，萸肉，净萸肉，于肉，枣皮，芋肉。

【商品名】 杭萸肉：为产于浙江杭州一带者。皮肉厚，色鲜艳，味酸浓，品质最优，为地道药材。

山茱萸：又名山萸。为各地所产萸肉的统称。以皮肉肥厚、色红油润、酸味浓、干燥无核、洁净者为佳。

【处方名】 荚肉，芋肉，于肉，山萸肉，生山萸肉，酒山萸，炙山萸，蒸山萸，枣皮等。

生山萸肉为原药剥取果肉生用入药者。

处方中写萸肉、芋肉、于肉、山萸肉、枣皮均指蒸山萸肉。蒸山萸肉又名制山萸肉、制山萸、制萸肉、蒸山萸、蒸萸肉。为生山萸肉置笼内蒸至紫褐色再晒干入药者。补肝肾功效增强。

酒山萸又名酒萸肉、炙山萸、炙萸肉。为生药用黄酒拌匀，装入容器中密封，隔水炖至酒吸尽，取出晾干入药者。

【注意】 云南地区将鼠李科植物滇刺枣 *Zizyphus mauritiana* Lam. 的果皮作山萸肉使用，商品名为滇枣皮、酸枣皮、西西果皮；四川德昌、会理等地将蔷薇科植物雕核櫻 *Prunus pleiocerasus* Koehne 的果皮作山萸肉使用，商品名称为土枣皮。以上两种均为误用，均非山茱萸正品。

【性味归经】 酸，微温。归肝、肾经。

【功效主治】 补益肝肾，收敛固涩。主治肝肾亏虚，头晕目

眩，腰膝酸软，阳痿，遗精，滑精，小便频数或不禁，虚汗不止，月经过多，崩漏等。

【用量】 6～12克。大剂量可用30克。

【慎忌】 火热内盛者或湿热蕴结膀胱所致之小便不利忌服。

金 樱 子

出自《蜀本草》。为蔷薇科常绿攀缘灌木植物金樱子 *Rosa laevigata* Michx. 的成熟的假果或除去瘦果的成熟花托(金樱子肉)。主产于广东、四川、云南、湖北、贵州等地。9～10月果实成熟时采收，擦去刺，剥去核，洗净晒干。

【别名】 金罂子，金壶瓶，刺榆子，刺橄榄，刺梨子，刺藤棘子，刺郎子，野石榴，小石榴，山石榴，山鸡头子，糖莺子，糖罐，糖罐子，糖橘子，糖刺果，糖果；棠球，螳螂果，黄刺果，黄茶瓶，金茶瓶，灯笼果，槟榔果，藤勾子，白玉带子，下山虎子，三叶荔枝，倒挂金钩，蜂糖罐，金英子，大金英，鸡母卵子，金因子，金婴子。

【商品名】 金樱子：为植物金樱子的成熟假果。

金樱子肉：为金樱子除去外毛及内核后而取得的果肉。

均以果大、色红黄者为佳。

【处方名】 金樱子，金英子，炒金樱子，蜜金樱子，盐金樱子等。

处方中写金樱子、金英子均指生金樱子。为原药材去杂质生用入药者。

炒金樱子为净金樱子用麸炒至黄色入药者。

蜜金樱子为净金樱子用蜂蜜拌匀，再炒至不粘手时取出晾凉入药者。

盐金樱子为净金樱子用盐水拌匀，蒸透晒干入药者。引药走下，增强补肾涩精功效。

【注意】在药材商品市场上，下列同属植物的假果，在不同地区亦作“金樱子”入药，但非正品。

山刺玫(美蔷薇) *Rosa bella* Rehd. et Wils. 分布于河北、山西、吉林、陕西、甘肃等地。河北、山西等地以此代金樱子入药。商品名称玫瑰果。

小果蔷薇 *Rosa Cymosa* Tratt. 分布于福建等地。当地以此代作“金樱子”入药。商品名称为小金英。

大花香薔薇(大花香水月季) *Rosa odorata* Sweet var. *gigantea* Rehd. et Wils. 云南等地以其果实代作金樱子入药，商品名称金樱果。

西北蔷薇 *R. davidii* Crep. 分布于甘肃、宁夏等地。宁夏以此代金樱子入药。

大叶蔷薇 *R. macrophylla* Lindl. 西藏以其果实代金樱子入药。

【性味归经】酸、涩、平。归肾、膀胱、大肠经。

【功效主治】固精，缩尿，涩肠止泻。主治遗精滑精，遗尿尿频，白带过多，久泻久痢，脱肛，子宫脱垂，崩漏等。

【用法】 6~10克。

【慎忌】有实火实邪者忌服。

桑 蠶 蛹

出自《神农本草经》。为螳螂科昆虫大刀螂 *Paratenodera sinensis* Saussure 和小刀螂 *Statilia maculata* Thunb. 或薄翅螳螂 *Mantis religiosa* L. 或巨斧螳螂 *Hierodula patellifera* Serville 的卵鞘。全国大部分地区均产。晚秋至次年早春采收，置沸水中浸杀其卵，或蒸透，晒干。生用或炒用。

消疮疖，蚀肤，蚀疣，夷目，野狐鼻涕。

【商品名】圆螵蛸：又名元螵蛸、团螵蛸、软螵蛸。为昆虫大刀螂的卵鞘。略呈圆形、圆柱形。主产于广西、云南、湖南等地。

长螵蛸：又名硬螵蛸。为昆虫小刀螂的卵鞘。略呈长条形。主产于安徽、浙江、江苏等地。

短螵蛸：又名黑螵蛸。为昆虫巨斧螳螂的卵鞘。略呈平形四边形。主产于河南、河北、山东等地。

均以个大、完整、色黄、卵未孵化、干燥、无树枝等杂质者为佳。

【处方名】桑螵蛸，桑螵蛸，炒桑螵蛸，盐桑螵蛸等。

处方中写桑螵蛸、桑螵蛸指生桑螵蛸。为原药蒸透晒干入药者。

炒桑螵蛸又名炒桑螵蛸、焙桑螵蛸。为净桑螵蛸用麸炒至微黄入药者。缩尿止带功能增强。

盐桑螵蛸又名盐桑螵蛸。为净桑螵蛸用盐水拌匀，文火炒干入药者。引药入肾，缩尿固精功效增强。

【性味归经】甘、咸，平。归肝、肾经。

【功效主治】补肾助阳，固精缩尿。主治遗尿，遗精，滑精，尿频，白带过多，阳痿等。

【用法】3～10克。

【禁忌】阴虚火旺者或膀胱湿热而小便频数者忌服。

覆盆子

出自《名医别录》。为蔷薇科落叶灌木植物掌叶覆盆子 *Rubus chingii* Hu. 的未成熟果实。分布于华北地区。于6～8月果实尚青时采摘，入沸水中略浸过，晒干。

【别名】覆盆，乌藨子，笏藨子，毕楞伽，小托盘，掌叶覆盆子，復盆子，复盆子，华东覆盆子，盆子，缺盆，托盘，木麦毒，西国草，大麦莓。

【商品名】覆盆子。以果大、饱满、完整、色黄绿、洁净、无梗叶等杂质者为佳。

【处方名】覆盆子，复盆子，酒蒸覆盆子等。

处方中写覆盆子、复盆子均指生覆盆子。为原药去杂质生用入药者。

酒蒸覆盆子为净覆盆子用黄酒淋洒拌匀，蒸透晒干入药者。补肾功效增强。

【注意】在药材商品市场上，下列同属植物的果实在不同地区也作覆盆子入药。

插田泡 *R. coreanus* Miq. 《植物名实图考》所载的覆盆子即为此种。使用于陕西、四川。

悬钩子（藨子、沿钩子、掌叶悬钩子、苺、山莓、木莓、树莓、黄莓、槭叶莓、三月藨、对嘴藨、薅秧藨、大麦泡、吊杆泡）
R. corchorifolius L. f. 使用于江苏。

灰毛果莓（硬枝黑锁梅、锁梅、黑锁梅）*R. foliolosus* D. Don 使用于云南。

拟覆盆子（西藏覆盆子）*R. idaeopsis* Focke 使用于西藏。

【性味归经】甘、酸，微温。归肝、肾经。

【功效主治】益肾，固精，缩尿。主治肾虚不固，遗精，滑精，遗尿，尿频，阳痿，目暗不明等。

【用量】3～10克。

【慎忌】阴虚火旺者或膀胱积热引起的小便短涩忌服。

乌 贼 骨

出自《神农本草经》。为乌鲗科动物曼氏无针乌鲗 *Sepiella maindroni* de Rochebrune 或针乌贼 *S. andreana* Steenstrup 或金乌鲗 *Sepia esculenta* Hoyle 的内贝壳。主产于辽宁、江苏、浙江等沿海。4～8月捕捞，取其内壳洗净，日晒夜露至无腥味，生

用。

【别名】海螵蛸，海蛸，海硝，缆鱼骨，柔鱼骨，乌鱼骨，乌贼鱼骨，乌鲗骨，鲗骨，乌则骨，墨鱼盖，墨鱼骨，墨斗鱼骨，曼氏无针乌贼骨，无针乌贼骨，针乌贼骨，金乌贼骨，鱼古，淡鱼古，花拉子骨，麻乌贼骨，麻乌鲗骨，乌贼甲，鱼骨，黑鱼骨。

【商品名】乌贼骨，海螵蛸。以块大、色白、完整、干燥洁净者为佳。

【处方名】乌贼骨，乌则骨，海螵蛸，海硝，海蛸，炒乌贼骨，煅乌贼骨，醋乌贼骨等。

处方中写乌贼骨、乌则骨、海螵蛸、海硝、海蛸指生乌贼骨，为原药材洗净晒干，碾碎生用入药者。

醋乌贼骨为生乌贼骨用米醋拌匀，待吸尽，再用文火炒干入药者。

炒乌贼骨又名炙乌贼骨。为生乌贼骨用麸炒至微黄入药者。收敛止血、固精止带功效增强。

煅乌贼骨为生乌贼骨置瓦罐内密闭，加热煅至黑色存性，然后取出晾凉入药者。偏于止血。

【性味归经】咸、涩，微温。归肝、肾经。

【功效主治】收敛止血，固精止带，制酸止痛，收湿敛疮。主治崩漏下血、肺胃出血，创伤出血；遗精，滑精，带下；胃痛吐酸。外用可治湿疮湿疹及溃疡多脓。

【用量】6～15克。外用适量。

【慎忌】阴虚火旺者慎服。

刺 猬 皮

出自《神农本草经》。为刺猬科动物刺猬 *Erinaceus europaeus* L. 或短刺猬 *Hemichianus dauricus* Sundevall 的皮。主产于河北、江苏、山东、河南、陕西、吉林、湖北等省。全年均可捕捉。捕得

后，用刀纵剖腹部，将皮剥下，翻开，撒上一层石灰，于通风处阴干。切片，炒用。

【别名】 猪皮，仙人衣，刺球子皮，毛刺皮，刺鱼皮，猪鼠皮，短刺猪皮，达乌尔刺猪皮，达呼耳刺猪皮，大耳猪皮，偷瓜畜皮，偷瓜獾皮，刺血儿皮，刺鼠皮，偷瓜婆皮，白刺猪皮，偷瓜蜮皮。

【商品名】 刺猪皮，仙人衣。以张大、刮净脂肉、刺毛整齐、干燥洁净者为佳。

【处方名】 刺猪皮，炒刺猪皮，炙刺猪皮等。

处方中写刺猪皮、炙刺猪皮均指炒刺猪皮。为原药用滑石粉炒至膨酥鼓起，取出晾凉入药者。

【性味归经】 苦，平。归胃、大肠、肾经。

【功效主治】 收敛止血，固精缩尿。主治便血，痔漏，遗精，遗尿，气滞血瘀之胃脘疼痛。

【用量】 3～10克。研末冲服每次1.5～3克。

没 食 子

出自《海药本草》。为没食子科昆虫没食子蜂 *Cynips gallae-infectoriae* Olivier 幼虫寄生于壳斗科植物没食子树 *Quercus infectoria* Olivier 幼枝上所产生的虫瘿。产于伊朗、希腊、土耳其等地。通常于8～9月间采集尚未穿孔的虫瘿，晒干备用。

【别名】 没石子，无石子，无食子，墨石子，麻蔡泽，没实子。

【商品名】 没食子。以个大、尚未穿孔、无树枝等杂质、干燥洁净者为佳。

【处方名】 没食子，无食子，没石子。

【性味归经】 苦，温。归肺、脾、肾经。

【功效主治】 固气，涩精，敛肺，止血。主治大肠虚滑，泻痢

不止，便血，遗精，盗汗，咳嗽咯血，齿痛，外伤出血，疮疡久不敛口。

【用量】煎汤内服4~6克；入丸、散内服每次1~2克。外用适量。

【禁忌】泻痢初起，湿热内郁或有积滞者忌服。

十九、涌 吐 药

瓜 蒂

出自《神农本草经》。为葫芦科1年生草质藤本植物甜瓜 *Cucumis melo* L. 的果蒂。全国各地均产。在甜瓜盛产期，将尚未老熟的果实摘下，切取果蒂，阴干入药。

【别名】瓜丁，苦丁香，甜瓜蒂，瓜丁香，甜瓜把，香瓜蒂，瓜当，青瓜蒂，甘瓜蒂，果瓜蒂，甜瓜疙蒂。

【商品名】瓜蒂。以色绿、鲜艳、干燥、无杂质者为佳。

【处方名】瓜蒂，甜瓜蒂。苦丁香等。

【性味归经】苦，寒。有毒。归胃经。

【功效主治】内服涌吐热痰、宿食；外用研末吹鼻，可去湿热。主治热痰蕴于胸中而致之癫痫，喉痹喘息，烦躁不眠，宿食停留于胃而致之胸脘胀痛；湿热黄疸，湿胜头痛。

【用量】2.5~5克。入丸散内服每次0.3~1克。外用研末吹鼻适量。

【禁忌】体弱、失血及上郁无实邪者忌服。如服药后呕吐不止，可用麝香0.1~0.15克温开水冲服，即可缓解。

常 山

出自《神农本草经》。为虎耳草科落叶小灌木植物常山 *Dichroa febrifuga* Lour. 的根。分布于长江以南各省区和甘肃、陕西及四川等地。秋季挖取根部，除去须根，晒干，切片。生用或酒炒用。

【别名】 鸡骨常山，鸡骨风，黄常山，川常山，恒山，七叶，翻胃木，风骨木，大金刀，互草。

【商品名】 常山，黄常山，鸡骨常山。以质坚体重、断面淡黄色、干燥无杂质者为佳。

【处方名】 常山，生常山，鸡骨常山，黄常山，炒常山，炙常山，酒常山，醋常山，熟常山等。

处方中写常山、鸡骨常山、黄常山指生常山。为原药去杂质，润透切片入药者。长于涌吐。

炒常山又名炙常山。为常山片用文火炒至微黄入药者。

酒常山和醋常山为常山片分别用黄酒或米醋淋喷使匀，稍闷润吸尽，再用文火炒黄入药者。长于截疟。

熟常山为炒常山、酒常山、醋常山的统称。

【注意】 在药材商品市场上，下列植物的根在有些地方亦作常山入药，但非正品。

芸香科植物臭常山（和常山）*Orixa japonica* Thunb.

茜草科植物白常山（玉叶金花）*Mussaenda pubescens* Ait. f.

马鞭草科植物海州常山（臭梧桐）*Clerodendron trichotomum* Thunb.

马鞭草科植物滇常山 *C. yunnanense* Hu ex Hand.-Mazz.

夹竹桃科植物云南鸡骨常山 *Alstonia yunnanensis* Diels

虎耳草科植物土常山（甜茶）*Hydrangea aspera* Don

虎耳草科植物莲绣球 *H. strigosa* Rehd.

薯蓣科植物穿山龙 *Dioscorea nipponica* Makino 商品名称为“山常山”。

小檗科植物小檗 *Berberis* spp. 商品名亦称为“山常山”。

【性味归经】苦、辛，寒。有毒。归肺、心、肝经。

【功效主治】涌吐痰饮，截疟。主治胸中痰饮积聚，疟疾。

【用量】5～10克。

【慎忌】孕妇及体虚者慎服。

蜀 漆

为常山的嫩枝叶。来源同“常山”。

【别名】鸡屎草，鸭屎草。鸡屎草，鸭屎草，常山苗，常山茎，常山枝叶，甜茶，恒山苗，蜀漆叶。

【商品名】蜀漆。以质嫩、色绿、干燥无杂质者为佳。

【处方名】蜀漆，常山苗等。

【性味归经】苦、辛，寒。有毒。归心、肺、肝经。

【功效主治】涌吐痰饮，截疟。主治胸中痰饮，小儿暴惊昏厥，寒多热少之牝疟等。

【用量】3～6克。

【慎忌】孕妇及体虚者慎服。

胆 砥

出自《神农本草经》。为硫化铜矿氧化分解形成或人工制成的含水硫酸铜($CuSO_4 \cdot 5H_2O$)。主产于云南。研末或煅后研末用。

【别名】鸭嘴绿胆矾，鸭嘴胆矾，石胆，蓝矾，翠胆矾，毕石，君石，黑石，基石，立制石，石液，制石液，铜勒，云胆矾。

【商品名】胆矾，石胆，云胆矾，鸭嘴胆矾，鸭嘴绿胆矾。以块大、质脆、透明、深蓝色、无杂质者为佳。

【处方名】胆矾，蓝矾，鸭嘴胆矾等。

【性味归经】酸、辛，寒。有毒。归肝、胆经。

【功效主治】内服涌吐风痰及毒物；外用解毒收湿，去腐蚀疮。主治风痰壅盛，喉痹，癫痫，误食毒物。外用治疗风眼赤烂，口疮，牙疳，肿毒不破或胬肉疼痛。

【用量】温汤化服0.3~0.6克。外用适量。

【禁忌】孕妇及体弱者忌服。

藜 芦

出自《神农本草经》。为百合科多年生草本植物黑藜芦 *Vera-trum nigrum* L. 的根茎。主产于山西、河北、河南、山东、辽宁等省。夏季抽花茎前采挖根部，洗净，晒干入药。

【别名】黑藜芦，葱苒，葱葵，葱蒜，葱荑，葱白藜芦，山葱，鹿葱，葱葱，旱葱，丰芦，葱葵，公苒，梨卢，山棕榈，山白菜，芦莲，药蝇子草，山苞米，人头发，毒药草，七厘丹，大叶藜芦，棕包头，利芦，棕色脚。

【商品名】藜芦，黑藜芦。以根茎肥壮、干燥无杂质者为佳。

【处方名】藜芦，力芦，梨芦，山葱，葱葱等。

【注意】在药材商品市场上，下列同属植物的根，在不同地区亦作藜芦入药，但非正品。

毛穗藜芦（又名马氏藜芦）*V. maackii* Reg. 分布于辽宁、吉林等地。

毛叶藜芦（又名岩棕、小棕）*V. puberulum* Loes. f. 分布于湖北、贵州、四川等地。

兴安藜芦*V. dahuricum* Loes. f. 分布于我国东北及内蒙古、新疆等地。

天月藜芦*V. schindleri* Loes. f. 分布于安徽、江苏、浙江、江西等地。

蒜藜芦 *V. grandiflorum* (Maxim.) Loes.f. 分布于长江流域。

小藜芦(又名小天蒜) *V. mengtzeanum* Loes.f.

大理藜芦(又名披麻草) *V. taliensis* Loes.f. 分布于云南。

此外，华东个别地区将百合科萱草属植物黄花菜 *Hemerocallis flava* L. 误作藜芦入药，应予以纠正。

【性味归经】辛、苦，寒。有毒。归肺、胃、肝经。

【功效主治】涌吐风痰，杀虫。主治风痰涌盛之中风，癫痫，喉痹；误食毒物尚在胃脘者。外用治疗疥癣疮疡；灭虱及蝇蚊等。

【用量】入丸散内服0.3~0.9克。外用适量。

【慎忌】孕妇及体弱无实邪者忌服。反细辛、芍药及人参、丹参、苦参、党参、沙参等诸参。如服药后涌吐不止，饮葱汤可解。

石 蒜

出自《本草图经》。为石蒜科植物石蒜 *Lycoris radiata* (L'Her.) Herb. 的鳞茎。全国大部分地区均产。生长于山地阴湿处或路边林缘。秋后采收，洗净，鲜用或阴干生用。

【别名】乌蒜，老鸦蒜，老鸹蒜，独蒜，九层蒜，鬼蒜，蒜头草，野蒜，银锁匙，龙爪草头，龙爪花根，蟑螂花根，一枝箭根，避蛇生根，水麻，酸头草根，婆婆酸根，新米夜晚花根，毛蟹花根，野水仙，红花石蒜，三十六桶。

【商品名】石蒜。以鳞茎肥壮、无泥土及杂质者为佳。

【处方名】石蒜，鸟蒜，野蒜，鬼蒜，老鸦蒜，鲜石蒜等。

【性味归经】辛，温。有毒。归肺、心经。

【功效主治】祛痰，利尿，解毒，催吐。主治喉风，水肿，痈疽肿毒，疔疮，瘰疬，风湿性关节痛，蛇咬伤。

【用量】1.5~3克。鲜品4~6克。外用适量。

【慎忌】体虚无实邪及素有呕恶者忌服。

二十、外用及其它药

硫 黄

出自《神农本草经》。为天然硫黄矿Sulphur的提炼加工品。主产于山西、山东、河南等省。供内服的硫黄须与豆腐同煮至豆腐呈黑绿色为度，然后除去豆腐，阴干。用时研末。

【别名】石硫黄，石流黄，石留黄，硫磺，昆仑黄，黄牙，黄硇砂，西丁，西土，将军。

【商品名】光明硫磺：为硫黄中色黄、光亮、松脆、无杂质者。品质最优。

舶上硫黄：又名舶硫、舶硫黄、白硫黄。古称倭硫黄。为海外进口硫黄。主产日本、美洲等地。系将硫黄提炼而成。现多国内生产。

硫黄：又名石硫黄、黄牙、黄硇砂。为各种硫黄的统称。

天生黄：为含硫温泉处升华凝结于岩石上者。收集后，先用冷水洗去泥土，再用热水烫10余次，最后放入香油内，捞取浮于表面者即得。

均以光亮、松脆、色黄、无杂质者为佳。

【处方名】硫黄，硫磺，石硫黄，石流黄，生硫黄，制硫黄，鱼子黄等。

生硫黄为原药去杂质敲成小块入药者。

处方中写硫黄、硫磺、石硫黄、石流黄均指制硫黄，或称鱼子黄。为生硫黄与豆腐同煮，至豆腐呈黑绿色时将硫黄取出，用清水冲洗干净，晾干入药者。毒性降低。

【性味归经】酸，温。有毒。归肾、大肠经。

【功效主治】内服壮阳，外用杀虫。内服主治肾阳衰微，下元虚冷所致的寒喘，阳痿，小便频数，腰膝冷痛，虚冷便秘或腹泻；外用可治疥癣，湿疹，皮肤瘙痒等。

【用量】内服1～3克，入丸散剂。外用适量。

【慎忌】孕妇及火热盛者忌服。

雄 黄

出自《神农本草经》。为含砷的结晶矿石雄黄Realgar（二硫化二砷 As_2S_2 ）。主产于湖南、贵州、云南、四川等地。质量最佳者称为“雄精”，其次为“腰黄”。采挖后去杂质，研细或水飞用。

【别名】明雄黄，明雄，雄精，腰黄，黄石，黄金石，天阳石，鸡冠石，石黄，熏黄，臭雄黄，丹山。

【商品名】雄精：赤如鸡冠，光泽鲜艳，明彻不臭者。品质最优。

腰黄：色黄质轻，略透明，有光泽，品质较优，但次于雄精者。

雄黄：色红胜于腰黄，而透明度及光泽又逊于腰黄者。

明雄黄：又名明雄。习指品质优良的雄黄。包括雄精和腰黄两种。销全国，并出口。

刁雄：为雄黄的提炼加工品。色紫红无光泽，呈块状，质坚硬，砸碎断面呈树脂状，微有臭气。主供出口。

苏维黄：又名苏雄黄。雄黄之呈块状者。

苏尖：又名淘尖。雄黄之呈粉末状者。

水窟雄黄：产于武都地区者。

均以块大、色红、光泽鲜艳、透明不臭者为佳。

【处方名】雄黄，明雄，明雄黄，雄精，腰黄等。

【性味归经】辛、苦，温。有毒。归心、肝、胃经。

【功效主治】解毒，杀虫。主治痈疽疔疮，疥癣，虫毒蛇伤，蛔虫病，蛲虫病，钩虫病，绦虫病等肠道寄生虫病；哮喘，疟疾，惊痫等。

【用量】内服0.3~0.6克，入丸散剂。外用适量。

【慎忌】孕妇及体弱者忌服。忌火煅。

砒 石

出自《开宝本草》。为砷矿中的砷华Arsenolite矿石的加工品。主产于湖南、江西、广东、四川等地。除极少部分来自天然砷矿的氧化物外，大多由砷矿石烧炼升华或使雄黄氧化升华而成。商品分“红砒”与“白砒”两种。白砒（砒霜）为较纯的氧化砷(As_2O_3)；红砒尚含有少量硫化砷(As_2S_3)。用时研细，或与绿豆煮后用。

【别名】信石，砒霜，白砒，红砒，砒黄，信州砒黄，信砒，人言，人信，信，自信，红信。

【商品名】红信石：又名红信、红矾、红砒、红砒石。为不规则的块状物。白色，有黄色和红色彩晕。以块状、具晶莹直纹、色红润、无渣滓者为佳。

白信石：又名自信、白砒、白砒石。为不规则块状物。无色或白色。以块状、具晶莹直纹、色白、无渣滓者为佳。

砒霜：系由砒石升华精制而成的三氧化二砷(As_2O_3)，呈白色粉末状，剧毒。

【处方名】红砒，白砒，红信，自信，砒霜，人言，砒石，信石等。

【性味归经】辛，大热。有大毒。归肺、肝经。

【功效主治】内服祛痰平喘，外用蚀疮去腐。内服主治寒痰哮喘，疟疾；外用主治溃疡腐肉不脱，痈疮，瘰疬，牙疳，痔疮等。

【用量】内服每次0.002~0.004克，入丸散剂。外用适量。

【慎忌】孕妇及体虚无实证者忌服。严禁作酒剂服或与酒同服。不能过量服用或持续服用。

水 银

出自《神农本草经》。为液态金属汞Mercury。天然汞不多见。多为辰砂Cinnabar矿石加热蒸馏而得。主产于贵州、广西、云南、湖南、四川等地。

【别名】汞，瀰，白瀰，姹女，铅精，流珠，赤汞，砂汞，灵液，活宝。

【商品名】水银，汞。以银白色、光亮、流动灵活、在纸面上流过无痕迹者为佳。

【处方名】水银，煅水银。

处方中写水银指生水银。为原药去杂质生用入药者。

煅水银为水银倒入溶化的黑铅内，搅拌均匀，倒出待冷，即成酥松块状物，用时研细入药者。

【性味归经】辛，寒。有毒。入心、肝、肾经。

【功效主治】攻毒，杀虫。主治梅毒，疥疮，顽癣，恶疮，痔瘘。

【用量】外用适量。与它药研末调敷。

【慎忌】有大毒，切忌内服。孕妇忌用。

银 朱

出自《本草纲目》。为人工制成的赤色硫化汞。

【别名】灵砂，银硃，心红，猩红，紫粉霜，水华朱，赤色硫化汞，人造朱砂，平口砂，马牙砂。

【商品名】银朱，灵砂，赤色硫化汞。

【处方名】银朱，银珠，灵砂，紫粉霜，平口砂，马牙砂等。以色红、明亮、纯净者为佳。

【性味归经】辛，温。有毒。归心、肺、胃经。

【功效主治】攻毒，杀虫，燥湿，祛痰。主治疥癣恶疮，寒气心腹痛。

【用量】研末入丸散内服微量。外用适量。

【慎忌】有毒，内服宜慎。

轻 粉

出自《本草拾遗》。为水银、明矾、食盐等用升华法制成的汞化合物(Hg_2Cl_2)。主产于山西、陕西、湖南、贵州、四川等地。避光保存。研细用。

【别名】汞粉，水银粉，峭粉，腻粉，银粉，扫盆，甘汞，白雪，白灵砂。

【商品名】轻粉：又名水银粉、汞粉。为用升华法制成的粗制汞化合物。以片大洁白、明亮、有光泽、呈针状结晶、质轻者为佳。

粉霜：又名白粉霜、水银霜。为轻粉的精制品。呈块状，白色而有光泽，质重而脆。

【处方名】轻粉，腻粉，银粉等。

【性味归经】辛，寒。燥烈有毒。归大肠、膀胱经。

【功效主治】内服利水通便，外用攻毒杀虫。内服主治水肿臌胀，二便不利；外用主治梅毒，疥癣，疮疡溃烂。

【用量】内服每次0.1~0.2克，入丸散剂。外用适量。

【慎忌】孕妇及体虚者忌服。不能过量或长期服用。服后漱口，以免口腔糜烂。

升 药

出自《外科图说》。为水银、火硝、明矾各等分混合升华而成。红色者称红升，黄色者称黄升。各地均有生产，以河北、湖北、湖南、江苏等地产量较大。研细末入药，陈久者良。

【别名】升丹，小升丹，三仙丹，三仙散，三白丹，灵药，红升，黄升，红升丹，黄升丹，红粉，三仙红升丹，小金丹，京红粉。

【商品名】红升：又名红升丹、三仙红升丹、小金丹、红粉。为橙红色或橙黄色块片状物或粉末。质重而脆。质佳。以色红、片状、有光泽者为最佳。

黄升：又名黄升丹。为黄色或橙黄色块片状物或粉末。质亦佳。以色黄、片状、有光泽者为佳。

升药底：又名红粉底。为制作升药时，药物升华之后，剩留锅底的药物残渣。质最次。以淡黄色、块状、纯净者较佳。

【处方名】三仙丹，红升丹，小金丹，升药，升丹，小升丹等。

【性味归经】有毒。

【功效主治】拔毒去腐。主治痈疽溃后脓出不畅，或腐肉不去，新肌不生。

【用量】外用适量。多与煅石膏配伍应用，不单独使用。不作内服。

【慎忌】疮疡腐肉已去或脓水已净者不宜用。

白 降 丹

出自《药材资料汇编》。为二氯化汞和氯化亚汞的混合结晶。以硝石、水银、朱砂、硼砂、雄黄、皂矾、食盐为原料，用升华法

(参见“升药”)制得。主产于江西、湖南、湖北等地。

【别名】降丹，降药。

【商品名】白降丹。以色白、条状、有光泽、存储年久者为佳。

【处方名】白降丹。

【性味归经】有毒。

【功效主治】拔毒，消肿，腐蚀。主治痈疽发背，一切肿毒。

【用量】外用适量。

【慎忌】有毒，且有腐蚀性，切忌内服。外用亦宜微量。

铅 丹

出自《神农本草经》。为铅的氧化物(Pb_3O_4)。主产于广东、河南、福建等地。原药用或炒用。

【别名】丹，黄丹，广丹，东丹，朱丹，真丹，红丹，漳丹，彰丹，樟丹，松丹，陶丹，虢丹，国丹，铅黄，铅华，丹粉，朱粉，九光丹，光明丹。

【商品名】铅丹，东丹，黄丹，川丹，广丹等。以纯净无杂质者为佳。

【处方名】铅丹，黄丹，彰丹，广丹，东丹，陶丹等。

【性味归经】辛，微寒。有毒。归心、肝经。

【功效主治】内服截疟，外用解毒止痒，收敛生肌。内服主治疟疾，外用主治黄水湿疮，疮疡溃烂。

【用量】内服入丸散剂每次0.3~0.6克。外用适量。

【慎忌】孕妇及体弱者忌服。不宜过量或持续服用。

铅 粉

出自《开宝本草》。为用铅加工制成的碱式碳酸铅。主产于广

东等地。

【别名】官粉，水粉，胡粉，定粉，锡粉，鹤粉，光粉，白粉，铅白粉，瓦粉，宫粉，粉锡，解锡，流丹，白膏，铅华，铅白，杭粉。

【商品名】铅粉，铅华，官粉。以纯净无杂质者为佳。

【处方名】铅粉，官粉，宫粉，铅白粉等。

【性味归经】甘、辛，寒。有毒。归肾经。

【功效主治】消积，杀虫，解毒，生肌。主治疳积，虫积腹痛，癰瘕，下痢，疟疾，疥癣，痈疽，溃疡，口疮，丹毒，烫伤。

【用量】入丸散内服0.9~1.5克。外用适量。

【禁忌】内服宜慎，用量宜小。孕妇及脾胃虚弱者忌服。不宜与雌黄配伍。

硼 砂

出自《日华子本草》。为硼砂矿石Borax提炼出的结晶体。主产于西藏、青海等地。须置于密闭容器中防止风化。生用或火煅用。

【别名】蓬砂，月石，月石块，鹏砂，月石坠，盆砂，大朋砂，西月石。

【商品名】黄月石：旧时习用硼砂加工再制品。将硼砂加水溶化煮沸后，酌加糖色使之成为黄色者。

白月石：在加工过程中不加糖色使之成为白色者。

月石坠：将煮沸的硼砂溶液倒入缸内，缸上横放数根系着麻绳的木棍，麻绳下端系铁块，使之下沉。待溶液冷却后，缸周、缸底及麻绳上均析出结晶。结于绳上者称月石坠。

月石块：用上述加工法结于缸底和缸周者称月石块。

月石：又名西月石、硼砂。为各种硼砂的统称。以无色透明或白色半透明、体轻质脆、纯净者为佳。

【处方名】硼砂，月石，西月石，煅硼砂等。

处方中写硼砂、月石、西月石均指生硼砂。为原药去杂质研成细粉入药者。

煅硼砂为小块硼砂置锅内加热，炒至鼓起小泡成雪白色结块，取出放凉，研成细粉入药者。

【性味归经】甘、咸，凉。归肺、胃经。

【功效主治】内服清肺化痰，外用清热解毒。内服主治痰火壅滞，痰黄粘稠，咳吐不利；外用主治口舌生疮，咽喉肿痛，目赤翳障等。

【用量】内服1.5~3克。外用适量。

【慎忌】内服宜慎，多作外用。孕妇忌服。

硝 砂

出自《新修本草》。为卤化物类矿物硝砂Sal-Ammoniac的晶体。主产于青海、甘肃、新疆等地。采得后，除去杂质砂石等，或由人工合成。

【别名】赤砂，黄砂，气砂，白硝砂，岩硝砂，北庭砂，淡硝砂，狄砂，狄盐，透骨将军。

【商品名】白硝砂：又名淡硝砂、岩硝砂、岩脑砂。为含氯化铵类矿物硝砂的白色结晶。为硝砂正品。但使用范围小。以块状、色白、断面有光泽、无杂石者为佳。

紫硝砂：又名红硝砂、咸硝砂、碱硝砂、藏脑、藏硝砂、脑砂、紫色石盐。为含有少量硫和锂的暗红色或紫红色石盐结晶。主含氯化钠。为硝砂副品。但使用范围广。以块整匀称、色紫红、断面明亮、无杂石者为佳。

【处方名】白硝砂，紫硝砂，红硝砂，硝砂。

【性味归经】咸、苦、辛，温。有毒。归肝、脾、胃经。

【功效主治】消积软坚，破瘀散结。主治癰瘕痃癖，噎膈反

胃，痰饮，喉痹，积痢，经闭，目翳，息肉，疣赘，疔疮，瘰疬，痈肿，恶疮。

【用量】入丸散内服0.3~1克。外用适量。

【禁忌】孕妇及体虚无实邪积聚者忌服。

明 砯

出自《神农本草经》。为明矾石Alunite的提炼品。主产于湖北、安徽、浙江、福建等地。生用或火煅研末用。

【别名】白矾，雪矾，云母矾，枯矾，矾石，生矾，石涅，羽涅，羽泽，涅石，理石，白君，矾精，柳絮矾。

【商品名】白矾 明矾，矾石。以块大、无色透明、无杂质者为佳。

【处方名】明矾，白矾，生矾，生明矾，枯矾等。

处方中写明矾、白矾、生矾均指生明矾。为原药捣碎或研末生用入药者。

枯矾又称煅白矾、煅明矾。为生白矾置锅内加热熔化，并使之沸腾，逐渐起大泡转呈玉白色，水分蒸发干枯后呈粉白色，取出冷却入药者。收涩燥湿功效增强。

【性味归经】酸，寒。归肺、肝、胃、脾、大肠经。

【功效主治】解毒杀虫，燥湿止痒，止血止泻，清热消痰。内服主治吐血，衄血，便血，泻痢不止，癫痫发狂，咳喘痰盛，湿热黄疸；外用主治疮疡疥癣，湿疹瘙痒。

【用量】内服入丸散每次1~3克。外用适量。

【禁忌】体虚胃弱者及无湿热痰火者忌服。

皂 砯

出自《新修本草》。为硫酸盐类矿物水绿矾Melanterite的矿石或

化学合成品。主产于山东、安徽、河南、湖南、甘肃、新疆、陕西等地。采得后，除去杂质，密闭贮藏，防变色或受潮。生用或醋煅用。

【别名】青矾，绛矾，绿矾，瀽矾，水绿矾，皂莢矾，黑矾，红矾。

【商品名】皂矾，青矾，绿矾。以洁净无杂质者为佳。

【处方名】皂矾，青矾，绿矾，生皂矾，煅皂矾等。

生皂矾为原药打碎生用入药者。对胃、肠有刺激，一般不生用内服。

处方中写皂矾、青矾、绿矾均指煅皂矾。为原药放入铁锅内，加热至熔化，将干时在中间挖成空洞，烧至四边及中间发红时，乘热倒入米醋，拌透焙干，取出放凉入药者。

【性味归经】酸，凉。归肝、脾经。

【功效主治】解毒燥湿，杀虫补血。内服主治黄肿病，钩虫病；外用主治疮毒疥癣。

【用量】内服入丸散剂每次0.5~1.2克。外用适量。

【禁忌】孕妇及胃病患者、呕血患者忌服。服药期间忌茶。

铜 绿

出自《本草纲目》。为铜器表面经二氧化碳和醋酸作用后生成的绿色锈衣。刮取晒干。

【别名】铜青，铜锈。

【商品名】锅绿。以色绿、无杂质者为佳。

【处方名】铜绿。

【性味归经】苦、酸、涩，寒。有毒。归肝、胆经。

【功效主治】解毒，祛腐，杀虫。外用主治鼻息肉，眼睑糜烂，疮疡顽癣，喉痹，牙疳，痔疮，风痰卒中等。

【用量】内服入丸散剂每服0.6~1.5克。外用适量。

【慎忌】体虚者慎服。不可多服。

密 陀 僧

出自《本草纲目》。为粗制氧化铅。主产于湖南、湖北、广东、福建等地。将铅熔化，用铁棍在熔铅中旋转几次，部分熔铅粘附在铁棍上，然后取出放入凉水中，熔铅冷却后变为氧化铅固体，即为密陀僧。研细粉入药。

【别名】陀僧，金陀僧，银陀僧，蜜陀僧，没多僧，银池，淡银，金炉底，银炉底，炉底，金生，丹锭，金密陀僧，银密陀僧。

【商品名】密陀僧。以色黄、有光泽、质坚体重、纯净者为佳。

【处方名】密陀僧。

【性味归经】咸、辛，平。有毒。归肝、脾经。

【功效主治】消肿杀虫，收敛防腐，坠痰镇惊。主治湿疹，疥癣，狐臭，疮疡溃破久不敛口，肿毒，惊痫，久痢。

【用量】入丸、散内服每次0.3~0.6克。外用适量。

【慎忌】体虚者忌服。

无 名 异

出自《雷公炮炙论》。为氧化物类矿物软锰矿的矿石。产于广西、广东、四川、山西、湖北、山东、陕西、青海等地。挖采后拣净碎石及泥砂。

【别名】土子，干子，秃子，铁砂，黑石子，软锰矿石。

【商品名】无名异。以粒大形圆、色棕黑、有光泽、无碎石及泥沙者为佳。

【处方名】无名异。

【性味归经】甘、咸，平。归肝、肾经。

【功效主治】祛瘀止痛，消肿生肌。主治跌打损伤，金疮，痈肿。

【用量】入丸散内服每次2～4克。外用适量。

炉 甘 石

出自《本草纲目》。为天然菱锌矿石 Smithsonite(碳酸锌 $ZnCO_3$)。常存在于铅锌矿的氧化带。主产于广西、湖南、四川等地。采挖后除去泥土杂石，制用，称为“制炉甘石”，有火煅、醋淬及火煅后用三黄汤(黄连、黄柏、大黄)淬等制法，晒干研末，水飞后用。

【别名】甘石，卢甘石，羊肝石，羊甘石，浮水甘石，炉先生，龙脑甘石，炉眼石。

【商品名】炉甘石，甘石。以块大、色白或粉白、体轻浮者为佳。

【处方名】炉甘石，煅炉甘石，飞甘石，制炉甘石，三黄汤水甘石，黄连水甘石等。

处方中写炉甘石、飞甘石均指煅炉甘石。为原药去杂质，在无烟火上烧红，趁热浸入米醋中淬，然后晒干研末，水飞后入药者。

三黄汤水甘石为煅炉甘石用三黄汤(黄连、黄柏、黄芩各等分煎汤)水飞入药者。清火解毒功效增强。

黄连水甘石为煅炉甘石用黄连煎汤拌匀，晒干研极细粉入药者。清火解毒功效增强。

制炉甘石为煅炉甘石、三黄汤水甘石、黄连水甘石等的总称。

【性味归经】甘，平。归肝、胃经。

【功效主治】明目去翳，收湿生肌。主治目赤翳障，烂弦风眼；皮肤湿疮，溃疡不敛。

【用量】外用适量。

【慎忌】禁止内服，只供外用。

石 灰

出自《神农本草经》。为石灰岩Limestone经加热煅烧而成。各地均有出产。

【别名】墨灰，希灰，石墨，染灰，散灰，白灰，味灰，锻石，石锻，矿灰。

【商品名】生石灰：为石灰岩经煅烧后未经吸水的灰白色块状物。成分为氧化钙。以块大、色灰青、遇水即迅速成粉状者为佳。

熟石灰：又名消石灰。为生石灰经吸水后变成的白色粉末。成分为氢氧化钙。以色白、粉细、无石块者为佳。

【处方名】石灰，生石灰，熟石灰等。

【性味归经】辛，温。有毒。归肝、脾经。

【功效主治】燥湿，杀虫，止血，定痛，蚀恶肉。主治疥癣，湿疮，创伤出血，烫火伤，痔疮，脱肛，赘疣。内服治泻痢，崩漏，带下。

【用量】外用适量。

【禁忌】本品有毒和腐蚀性，多供外用，内服宜慎宜少。

毛 萣

出自《本草拾遗》。为毛茛科植物毛茛*Ranunculus japonicus* Thunb. 的全草及根。全国各地均有生长。夏秋采取。一般鲜用。

【别名】老虎脚迹草，老虎脚爪草，老虎草，老虎须，老鼠脚底板，三脚虎，水茛，毛建，毛建草，猴蒜，天灸，自灸，毛堇，犬脚迹，鸭脚板，鹤膝草，瞌睡草，火筒青，野芹菜，毛芹菜，水芹菜，辣子草，辣辣草，山辣椒，千里光，烂肺草，起泡草。

【商品名】毛茛。以肥壮、植株完整、无杂质者为佳。

【处方名】毛茛。

【注意】 在药材商品市场上，下列同属植物的带根全草，在不同地区也作“毛茛”入药，但非正品。

扬子毛茛（又名辣子草、水辣菜）*R. sieboldii* Miq. 分布于长江中下游地区及台湾省。

禹毛茛*R. cantoniensis* DC. 分布于长江中下游地区及南方各省。

兴安毛茛*R. smirnovii* Ovcz. 分布于黑龙江等地。

【性味归经】 辛，温。有毒。

【功效主治】 外用发泡，杀蛆和孑孓。捣烂外敷主治鹤膝风，牙痛，偏头痛，风湿性关节痛，胃痛，疟疾，疥癣等。捣烂撒粪坑内灭蛆，撒坑塘内灭孑孓。

【用量】 外用适量。

【禁忌】 有毒，只供外用，不作内服。

大 蒜

出自《本草经集注》。为百合科多年生草本植物大蒜 *Allium sativum* L. 的鳞茎。全国各地均产。五月叶枯时采挖，晾干入药。

【别名】 蒜，葫，蒜头，胡蒜，独蒜，独头蒜，紫皮大蒜，白皮大蒜，大头蒜，大蒜头。

【商品名】 紫皮大蒜：又名紫皮蒜。鳞茎外皮呈紫色者。抗结核功效好。

白皮大蒜：又名白皮蒜。鳞茎外皮呈白色者。

独头大蒜：又名独头蒜、独蒜。鳞茎不分瓣者。

大蒜：各种大蒜的统称。以鳞茎个大、辛味浓、无杂质者为佳。

【处方名】 大蒜，紫皮蒜，独头蒜等。

【性味归经】 辛，温。归脾、胃、肺经。

【功效主治】 解毒，消肿，杀虫。主治痈疖肿毒，癰疮，肺结

核，百日咳，细菌性痢疾，泄泻，钩虫病，蛲虫病，流行性感冒，蟹中毒。捣烂外敷一定部位发泡可治疗牙痛、头痛等证。

【用量】内服 6～10克。外用适量。

【慎忌】阴虚火旺，目赤肿痛，咽喉疼痛，胃火牙痛等忌服。

雪 上 一 枝 蒿

出自《科学的民间药草》。为毛茛科植物 短柄乌头 *Aconitum brachypodum* Diels 的块根。主产于云南、四川等地。生长于高山草地、山坡及疏林下。夏末秋初挖取块根，去掉苗叶及小根，洗净晒干。

【别名】短柄乌头。

【商品名】短柄乌头，雪上一枝蒿。以块大、粉性足、干燥无杂质者为佳。

【处方名】雪上一枝蒿，炒雪上一枝蒿，制雪上一枝蒿。

【注意】在药材商品市场上，雪上一枝蒿的品种比较混乱。短柄乌头的两个变种疏花短柄乌头 *A. brachypodum* Diels var. *laxiflorum* Fletcher et Lauener (分布于四川、云南) 和伏毛短柄乌头 *A. brachypodum* Diels var. *crispulum* W. T. Wang (分布于四川)，在四川和云南同作雪上一枝蒿入药。

同属植物皱叶乌头 *A. bullatifolium* Lev. 在云南昆明称雪上一枝蒿；铁棒锤 *A. szechuanianum* Gay. 及伏毛铁棒锤 *A. flavum* Hand.-Mazz. 在四川、青海、宁夏等地亦称雪上一枝蒿。在云南的曲靖、宣威等地所用的雪上一枝蒿为 *A. Subrosulatum* Hand.-Mazz. 的块根。在西藏使用的雪上一枝蒿为西藏乌头 *A. kongboense* Lauener 的块根 (分布于西藏)。以上这些品种虽功效近似，但均非雪上一枝蒿正品。

【性味归经】苦、辛，温。有大毒。归肝、脾经。

【功效主治】消炎止痛，祛风除湿。主治跌打损伤，骨折，风

湿骨痛，牙痛，疮疡肿毒。

【用量】研末冲服0.08克。外用适量。

【禁忌】有剧毒，未经炮制不宜内服。孕妇忌服。服药期间忌食生冷、豆类、牛羊肉。

雷 公 藤

出自《中国药植志》。为卫矛科植物雷公藤*Tripterygium wilfordii* Hook. f.的根、叶、花及果实。主产于安徽、浙江、江西、湖南、广东、福建、台湾等地。夏、秋采收。

【别名】黄药，黄藤根，黄藤木，黄藤草，红药，红紫根，水莽草，断肠草，菜虫药，南蛇根，三棱花，旱禾花，黄腊藤。

【商品名】雷公藤：为植物雷公藤的根、叶、花及果。为雷公藤正品。

东北雷公藤：为同属植物东北雷公藤（黑蔓）*T. regelli* Sprague et Takeda的根、叶、花、果。主产并使用于东北地区。为雷公藤副品。

【处方名】雷公藤，水莽草。

【性味归经】苦、辛，凉。有大毒。

【功效主治】杀虫，消炎，解毒，祛风。外用主治风湿性关节炎，皮肤瘙痒，腰带疮等。

【用量】外用适量。

【禁忌】本品有大毒，不宜内服。只宜外用。误服则引起中毒，出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻、血压下降、呼吸困难，最后可因呼吸及心脏抑制而死亡。

木 檉 皮

出自《本草拾遗》。为锦葵科落叶灌木植物木槿*Hibiscus*

syniacus L.的根皮或茎皮。全国各地均有栽培，南方有野生。夏秋剥取根皮。切片，晒干。

【别名】川槿皮，白槿皮，槿皮，槿树皮，槿根皮，木槿树皮，木槿根皮，舜皮，朝菌皮，椴皮，栎皮，日及皮，藩篱草皮，平条树皮，白牡丹皮，清明篱皮，木桂花树皮，菜花树皮，篱沿树皮，篱障皮，金漆树皮，白布篱皮，大碗花皮。

【商品名】川槿皮：产于四川者。

木槿皮：各地所产木槿皮的统称。以片大整匀、肉厚干燥者为佳。

【处方名】木槿皮，川槿皮。

【性味归经】甘、苦，凉。归肺、脾、大肠经。

【功效主治】清热，杀虫，止痒。主治皮肤疥癣，带下，泻痢。

【用量】内服煎汤 4～10克。外用适量。

【慎忌】无湿热者不宜服。

木 芙 蓉 叶

出自《本草图经》。为锦葵科落叶灌木或小乔木植物木芙蓉 *Hibiscus mutabilis* L.的叶（花与根也入药用）。全国各地均有分布，主产于浙江等地。夏秋两季剪下叶片，晒干。研末用或鲜用。

【别名】拒霜叶，芙蓉叶，芙蓉花叶，芙蓉花树叶，芙蓉树叶，铁箇散，三变叶，九头叶，转观叶，清凉膏，地芙蓉叶，七星叶，水芙蓉叶，霜降花叶，木莲叶，桃木叶，桃皮树叶，醉天芙蓉叶，大叶芙蓉叶。

【商品名】木芙蓉叶。以叶片大而完整者为佳。

【处方名】木芙蓉叶，芙蓉叶。

【性味归经】辛，平。归肝、脾经。

【功效主治】凉血解毒，消肿止痛。主治痈疽肿毒，丹毒，烫

伤，跌打损伤。

【用量】外用适量。

【慎忌】阴疽忌用。

丝 瓜 络

出自《本草纲目》。为葫芦科一年生攀援草本植物丝瓜 *Luffa cylindrica* (L.) Roem. 和粤丝瓜(八棱丝瓜) *L. acutangula* Roxb. 的果络(成熟果实中的维管束)。我国各地均有栽培。秋季摘取成熟果实，搓去外皮及果肉，剪去两端，去掉种子，切碎生用。

【别名】丝瓜筋，丝瓜网，丝瓜壳，丝瓜瓤，水瓜筋，水瓜络，瓜络，絮瓜瓤，天罗线，天罗，天罗瓜络，天丝瓜络，天络丝，千层楼，粤丝瓜络，绵瓜络，布瓜络。

【商品名】丝瓜络：为枯老丝瓜除去果皮、果肉及种子者。

丝瓜布：为枯老粤丝瓜果实的整体。即不除去果皮、果肉及种子的枯老粤丝瓜果实。

均以完整、洁白、质柔韧、干燥、无残留果皮及果肉和种子者为佳。

【处方名】丝瓜络。

【性味归经】甘，平。归肝、脾、肺经。

【功效主治】祛风通络，解毒化痰。主治风湿痹痛，筋脉拘挛；胸胁疼痛；血脉阻滞之月经过少，经闭，痛经，乳汁不通；痰多咳嗽；痈疽疮肿等。

【用量】内服煎汤 6～10克。外用适量。

大 风 子

出自《本草衍义补遗》。为大风子科常绿乔木植物泰国大风子 *Hydnocarpus anthelmintica* Pier. 的成熟种子。我国产于台湾。

国外生产于印度、泰国、越南及印尼等地。夏秋果实成熟时采摘，取出种子晒干。生用，或炒炭用，或取油用，为大风子油。

【别名】大枫子，大枫子肉，泰国大风子，麻风子。

【商品名】大风子，大枫子，泰国大风子。以颗粒饱满、油性大、干燥无杂质者为佳。

【处方名】大枫子，大风子，大风子炭，大风子油。

【注意】在药材商品市场上，下列植物的成熟种子也作大风子入药，但非正品。

缅甸大风子 *Taraktochenos kurzii* King (*Hydnocarpus heterophyllus* Kurz.) 主产于印度南部和缅甸。

印度大风子 *Hydnocarpus wightiana* Bl. 主产于印度。

海南大风子（又名龙角、高根、乌壳子）*H. hainanensis* (Merr.) Sleum. 主产于我国海南及广西等地。

【性味归经】辛，热。有毒。归肝、脾、肾经。

【功效主治】祛风燥湿，攻毒杀虫。主治麻风，梅毒，疥癣，外阴湿痒等。

【用量】内服每次0.3~0.6克。外用适量。

【慎忌】本品毒烈，内服宜引起呕吐，恶心，胸腹疼痛，甚或肝肾损伤。故一般只供外用，很少内服。如需内服时，勿过量或持续服用，以防中毒。孕妇及体虚者忌服。

马 钱 子

出自《本草纲目》。为马钱科常绿乔木植物马钱 *Strychnos mucronica* L. 及同科木质大藤本皮氏马钱（云南马钱）*S. pierriana* A. W. Hill 的成熟种子。夏秋摘取成熟果实，取出种子，洗净附着的果肉，晒干，经炮制后入药。

【别名】番木鳖，马前子，马前，马钱，云南马钱子，苦实，苦实把豆儿，火失刻把都，牛银，大方八，方八，马钱藤子，皮氏马钱子。

【商品名】马钱子：又名番木鳖。为植物马钱的成熟种子。主产于印度、越南、泰国等国。

皮氏马钱子：又名云南马钱子、马钱藤子。为植物皮氏马钱的成熟种子。主产于我国云南、海南等地。

均以个大、饱满、质坚、干燥、无杂质者为佳。

【处方名】马钱子，马前子，生马钱子，制马钱子，砂炙马钱子，油炙马钱子，水炙马钱子等。

处方中写马钱子、马前子均指生马钱子。为原药去杂质及毛茸研末入药者。毒性特大，用须格外小心。

砂炙马前子或称炙马前子。为净马钱子用砂子炒至膨胀内部棕黄色时取出入药者。毒性减小。

油炙马钱子又称油马钱子。为净马钱子在植物油中炸至膨胀内部棕黄色时取出入药者。毒性减小。

水炙马前子为净马钱子用水煮沸，水浸后切片晾干入药者。因水煮温度低，不能大大减少其毒性，用量宜小。

制马前子为砂炙、油炙、水炙马前子的统称。

【性味归经】苦，寒。有毒。归肝、脾经。

【功效主治】通络散结，消肿定痛。主治风湿痹痛或拘挛麻木，痈疽或跌打损伤肿痛，多种痛肿。

【用量】作丸散剂内服每次0.3~0.9克。外用适量。

【慎忌】孕妇忌服。注意炮制，勿服过量。

蛇 床 子

出自《神农本草经》。为伞形科1年生草本植物蛇床 *Cnidium monnieri* (L.) Cussor 的果实。我国各地均产，以广东、广西、江苏、安徽等地为多。夏秋季果实成熟时割取全株，晒干，打下果实，筛净。生用。

【别名】野胡萝卜子，野红萝卜子，野茴香，野小茴，气果，

癞头花子，双肾子，蛇床实，蛇床仁，蛇粟，蛇珠，蛇米，薜，吁子，虺床子，马床子，恩益子，绳毒子，枣棘子，墙薜子，秃子花子，秃头花子，建阳八座。

【商品名】蛇床子。以籽粒饱满、干燥无杂质者为佳。

【处方名】蛇床子，蛇常。

【注意】在药材商品市场上，云南地区以云南白芷 *Heracleum scabridum* Franch. 的果实作蛇床子用，此为误用，应该纠正。

【性味归经】辛、苦，温。归肾经。

【功效主治】温肾壮阳，祛风散寒，燥湿杀虫。主治阳痿，宫冷不孕，寒湿带下，湿痹腰痛，外阴湿痒，湿疹，湿疮，疥癣，滴虫性阴道炎等。

【用量】6～15克。外用适量。

【禁忌】阴虚火旺及下焦湿热者慎服。

相思子

出自《新修本草》。为豆科植物相思子 *Abrus precatorius* L. 的种子。主产于福建、台湾、广东、广西、云南、海南等地。夏秋季分批摘取成熟果荚，晒干，打取种子，除去杂质，晒干。

【别名】红豆，云南豆子，红漆豆，相思豆，鸳鸯豆，土甘草豆，郎君豆，鸡母珠，难丹真珠，八重山珊瑚，珊瑚豆，观音子，鬼眼子，黑头小鸡，美人豆，相思藤豆，马料豆，红黑豆，毒红豆，蟹眼豆，海红豆。

【商品名】相思子，相思豆。以粒实饱满、红黑分明、光亮、干燥坚实者为佳。

【处方名】相思子，相思豆。

【注意】本品与赤小豆同有“红豆”之别名，容易混淆，应注意鉴别。

【性味归经】辛、苦，平。有毒。归肝经。

【功效主治】理气，祛痰，杀虫。主治心腹疼，风痰所致之头痛，皮肤疥疮、顽癣。

【用量】外用捣烂涂敷适量。不宜内服。

【慎忌】有毒，不宜内服。

蓖 麻 子

出自《新修本草》。为大戟科植物蓖麻 *Ricinus communis* L. 的成熟种子。全国各地均产。秋季果实变棕黄色、果皮未开裂时分期采摘，晒干，除去果皮，捣烂生用或炒用。

【别名】蓖麻仁，草麻子，草麻仁，大麻子，红大麻子，牛蓖子草子，红蓖麻子，勒菜子，杜麻子，草麻子，贝麻子，八麻子，金豆，天麻子。

【商品名】蓖麻子。以粒实饱满、色黑褐光亮、油性足、干燥无杂质者为佳。

【处方名】蓖麻子，蓖麻仁。

【性味归经】甘、辛，平。有毒。归肺、大肠经。

【功效主治】消肿，排脓，拔毒，通便。主治痈疽肿毒，瘰疬，喉痹，疥癬疥疮，水肿腹满，大便燥结。捣烂外敷百会穴治脱肛、子宫脱垂，外敷涌泉穴治难产、胎衣不下，外敷合谷、下关、颊车等穴（左病敷右，右病敷左）治面神经麻痹。

【用量】内服 3～6 克。外用适量。

【慎忌】孕妇及便溏者忌服。

木 艳 子

出自《开宝本草》。为葫芦科植物木艳子 *Momordica cochinchinensis* (Lour.) Spr. 的成熟种子。主产于广西、四川、湖北。秋季果实成熟时采摘，取出种子，晒干或烘干，去壳取仁。

【别名】木鳖，土木鳖，壳木鳖，木鳖藤子，漏苓子，地桐子，藤桐子，鵝屎瓜子，木鳖瓜子，木鳖瓜，木别子，木必子，杜表，土木别，子文武。

【商品名】木鳖子。以籽粒饱满、外皮坚硬、体重、种仁黄白色、不泛油者为佳。

【处方名】木鳖子，木别子，木必子，炒木鳖子，煅木鳖子，生木鳖子，木鳖子霜等。

处方中写木鳖子、木必子、木别子均指生木鳖子。为原药材去壳取仁，捣烂生用入药者。

炒木鳖子为净木鳖子用砂炒至深黄色入药者。毒性减小。

煅木鳖子为净木鳖子放灰火中烧至外壳开裂，取仁入药者。

木鳖子霜为生木鳖仁压榨去油，然后碾成细末入药者。

【性味归经】苦，温。有毒。归肝、脾、胃经。

【功效主治】消肿散结，解毒止痛。主治痈肿，疔疮，瘰疬，痔疮，无名肿毒，疥疮，风湿痹痛，筋脉拘挛。

【用量】1～1.5克。外用适量。

【慎忌】孕妇及体弱者忌服。

藤 黄

出自《海药本草》。为藤黄科植物藤黄 *Garcinia morella* Desv. 的胶质树脂。主产于印度及泰国。在开花前在茎干皮部作螺旋状割切，刀口内插一竹筒，盛流出的树脂，加热蒸干，用刀刮下，即为藤黄。

【别名】玉黄，月黄，海藤，鸟哥黄。

【商品名】藤黄，玉黄，月黄。以色红黄、断面似蜡质、半透明、无杂质者为佳。

【处方名】藤黄，制藤黄。

处方中写藤黄指制藤黄。为生藤黄在豆腐中蒸后入药者。

【性味归经】酸，涩。有毒。归脾经。

【功效主治】消肿，化毒，止血，杀虫。主治痈疽肿毒，顽癣恶疮，损伤出血，牙疳蛀齿，烫火伤，缘虫症。

【用量】入丸散内服一次量0.3~0.5毫克。外用适量。

【慎忌】本品有毒，多供外用。内服量宜小，过量可中毒致死。孕妇忌服。

松 香

出自《神农本草经》。为松科植物马尾松 *Pinus massoniana* Lamb. 或同属植物树干中取得的油树脂经蒸馏除去挥发油后的遗留物。主产于广东、广西、福建、湖南、江西、浙江、安徽等地。夏秋采收，加水蒸馏，除去杂质，研末用。

【别名】松脂，松肪，松膏，松胶，松脂香，松胶香，明松香，白松香，老松香，嫩松香，沥青，黄香，熟松香，透明松香，马尾松香，山松香，青松香，台湾赤松香，铁甲松香，枞柏松香，油松香，短叶松香，红皮松香，云松香，云南松香，飞松香。

【商品名】松香，透明松香。以块整齐、色淡黄、油性大、气味浓者为佳。

【处方名】松香，黄香，制松香等。

处方中写松香、黄香均指生松香。为原药去杂质打碎入药者。

制松香为生松香打碎，放入葱汤（用大葱切段浓煎取汁）中加热烊化，再倒入凉水中冷却凝结成块，取出晒干入药者。

【性味归经】苦、甘，温。归肝、脾、肺经。

【功效主治】燥湿杀虫，拔毒生肌。外用主治疥癣湿疮，痈疽疖疗；内服主治风湿痹痛，久咳气喘等。

【用量】内服入丸散或浸酒每次0.5~1克。外用适量。

【慎忌】内有实热者忌服。

孩 儿 茶

出自《饮膳正要》。为豆科落叶乔木植物儿茶 *Acacia catechu* (L.) Willd 的枝干及心材煎汁浓缩而成的干燥浸膏。主产于云南西双版纳傣族自治州，广西等地也有栽培。另一种为茜草科常绿藤本植物儿茶钩藤 *Uncaria gambier* Roxb. 的带叶嫩枝煎汁浓缩而成的干燥浸膏。主产于印度尼西亚及中南半岛诸国。用时研细。

【别名】儿茶，儿茶膏，儿茶羔，黑儿茶，方儿茶，棕儿茶，乌爹泥，乌奎泥，乌丁泥，西谢，乌叠泥。

【商品名】黑儿茶：又名儿茶膏、儿茶羔。为植物儿茶的枝干及心材煎汁浓缩而成的块状物。主产于云南。

棕儿茶：又名方儿茶、方茶、甘蜜、干巴儿茶。为植物儿茶钩藤的带叶嫩枝煎汁浓缩而成的块状物。主产于印度尼西亚、印度、马来西亚等国。

老儿茶：为棕儿茶的一种。黑褐色，表面有胶质样光泽。习以为质佳。

新儿茶：为棕儿茶的一种。棕褐色，表面无胶质样光泽，内部浅棕红色。习以为质稍次。

柏勒儿茶：又名柏勒树儿茶。为豆科植物柏勒树 *Dichrostachys glomerata* (Forsk) Chiov. 的树枝煎汁浓缩而成的块状物。主产于广东。为孩儿茶副品。

孩儿茶：又称儿茶。为各种孩儿茶的统称。

以皱缩方块、整洁质硬、表面棕黑色、断而棕红色、细腻、味苦涩稍粘、洁净无杂质者为佳。

【处方名】儿茶，孩儿茶，老儿茶，方儿茶，方茶等。

【性味归经】苦、涩，凉。归肺、肝、脾经。

【功效主治】收湿敛疮，生肌止血。外用主治湿疮流水，溃疡不敛，牙疳口疮，下疳，外伤出血；内服主治肺热咳嗽，暑热伤津口

竭，内伤出血，泻痢不止，跌打损伤，风湿痹痛。

【用量】 内服入丸散剂每次0.3~0.6克。外用适量。

【慎忌】 孕妇慎服。

血 竭

出自《新修本草》。为棕榈科常绿藤木植物麒麟竭 *Daemonerops draco* Bl. 及同属植物的果实和树干渗出的树脂。主产于我国广东、台湾及国外印尼、马来亚等地。夏季果实成熟时采集鳞片间分泌出的树脂，经加热蒸压成团；或煮果实取汁浓缩；或取茎干渗出的树脂，制为成品。用时捣碎研末。

【别名】 血力花，血竭花，血力，麒麟竭，麒麟血，海蜡、木血竭，渴留，血杰，爪儿血，海脂石，朱血竭。

【商品名】 麒麟竭：又名血竭花。为植物麒麟竭的果实及树干中的树脂。主产于印度尼西亚、马来西亚、伊朗。我国广东、海南、台湾等地也有种植。品质优良，为血竭正品。按质量好坏依次分为麒麟牌、手牌、皇冠牌、五星牌四种商品规格。

原庄血竭：为纯用印尼等国进口血竭原料（不加辅料）制作者。表面呈铁黑色。

加工血竭：为用血竭原料掺入辅料原白树脂加工炼制而成者。表面呈暗红色。

牌号血竭：将血竭按质量优劣分成麒麟牌、手牌、皇冠牌、五星牌、AA牌、三A牌，鸡牌、金鱼牌、金星牌、太阳牌等规格者。

均以外色黑似铁、研面红似血、火燃呛鼻者为佳。

【处方名】 血竭，血杰，血力花，血结等。

【注意】 在药材商品市场上，血竭的植物来源除上述正品外，下列植物的树脂也作血竭入药，但均为副品。

龙舌兰科植物龙血树 *Dracaena ombet* Kotschy 的树脂。呈小

泪滴状或碎块状，薄片酒红色。主产于非洲东部。商品名称为索科拉血竭，或称桑吉巴血竭。

植物山铁树（又名柬埔寨龙血树）*Pleomele cambodiana* (Pier. ex Gagn.) Merr. et Chun的树脂。主产于我国云南。

豆科植物龙血紫檀*Pterocarpus draco* L.主产于美洲。

大戟科植物龙血巴豆*Croton draco* Schlecht.主产于墨西哥。

大戟科植物木槿叶巴豆*C. hibiscifolius* Kunth 主产于西班牙。

大戟科植物流脂巴豆 *C. gossypifolius* Vahl [*C. sanguiflum* H. B. et K. Nov.] 主产于新安达拉西亚。

【性味归经】甘、咸，平。归心、肝经。

【功效主治】内服活血散瘀止痛，外用止血生肌敛疮。内服主治跌打损伤，瘀血肿痛，妇女瘀血经闭，痛经，产后瘀阻腹痛，瘀血阻滞之心腹刺痛；外用主治外伤出血，溃疡不敛等。

【用量】内服入丸散每次1.5~3克。外用适量。

【慎忌】无瘀血阻滞者忌服。

樟 脑

出自《本草品汇精要》。为樟科常绿乔木植物樟*Cinnamomum camphora* (L.) Presl的根、干、枝、叶经用水蒸气蒸馏法提取挥发油，再用分馏法从挥发油中提取的樟脑。樟树主产于台湾、长江以南及西南地区。全年皆可采集，加工提取，但叶以秋冬季采者含脑量较高；树干含脑量随年龄而增加，一般选30年以上的老树供提制樟脑用。樟脑为半透明挥发性结晶块，常温下易挥发，应密封保存。

【别名】潮脑，脑子，油樟脑，油脑，杜樟脑，韶脑，樟冰，洋冰，树脑，香通脑，香蕊脑，香樟脑，芳樟脑，乌樟脑，樟木脑，樟公脑，樟脑块，樟脑粉。

【商品名】台冰：产于台湾者。产量最大，品质亦佳。

樟脑：各地所产樟脑的统称。以色白、纯净、透明、颗粒状、无杂质、气味浓者为佳。

【处方名】樟脑，脑冰，潮脑，脑冰等。

【性味归经】辛，热。有毒。归心经。

【功效主治】内服开窍辟秽；外用除湿杀虫，湿散止痛。内服主治神志昏迷及疮脓腹痛；外用主治疥癣，牙痛，跌打损伤。

【用量】内服入丸散或制成酒溶液每次0.1~0.2克。外用适量。

【慎忌】孕妇忌服。内服宜慎，勿服过量，以防中毒。

班 蟑

出自《神农本草经》。为芫青科昆虫南方大斑蝥 *Mylabris phalerata* Pall. 成黄黑小斑蝥 *M. cichorii* L. 的虫体。主产于辽宁、河南、山东、江苏等地。于夏秋在晨露未干时捕捉，置器中闷死，晒干。用时去头、足、翅，生用，或与糯米同炒至黄黑色，去米，研末用。

【别名】南方大斑蝥，大斑的，黄黑小斑蝥，黄斑芫青，小斑蝥，斑蚝，斑猫，斑毛，斑毛虫，斑茅，斑苗，蟹蝥，花斑蝥，花斑毛，花壳虫，花罗虫，毛虎斑毛，放屁虫，小豆虫、羊米虫，龙尾，龙蚝，龙苗，晏青，螣发，章瓦，苦苣斑蝥，斑菌。

【商品名】斑蝥。以虫体大而完整、颜色鲜明、干燥、无败油气味者为佳。

【处方名】斑蝥，斑毛，炒斑蝥。

处方中写斑蝥、斑毛指生斑蝥。为原药去头足及翅膀生用入药者。多供外用。

炒斑蝥又名米斑蝥。为净斑蝥用糯米炒至米呈黄色时，筛去糯米，晾凉入药者。毒性降低。

【性味归经】辛，寒。有毒。归肝经。

【功效主治】攻毒蚀疮，破血散结。主治痈疽，顽癣，瘰疬，狂犬咬伤，经闭，癰瘕，肝癌，胃癌。浸酒擦涂可治斑秃，研末外敷一定部位（或穴位）使发泡，可治疟疾、颜面神经麻痹、过敏性鼻炎、风湿性关节炎等。

【用量】作丸散内服每次0.03~0.06克。外用适量。

【慎忌】孕妇及体弱无实邪者忌服。内服宜慎，不可服用过量。

蟾酥(附：蟾皮)

出自《药性论》。为蟾蜍科动物中华大蟾蜍*Bufo bufo gargarizans* Cantor 和黑眶蟾蜍*B. melanostictus* Schneider 的耳后腺所分泌的白色浆液，经收集干燥而成。全国大部分地区有分布。多在夏季捕捉，采集其腺体中的白色分泌物，涂于玻璃板上晒干贮存。用时以碎块置酒或牛奶中溶化，然后风干或晒干研细。

【别名】蛤蟆酥，蛤蟆浆，癞蛤蟆浆，癞痞疮酥，癞蛤蟆酥，癞蛤蟆浆，蟾蜍酥，中华大蟾蜍酥，黑眶蟾蜍酥，蟾蜍眉脂，蟾蜍眉酥，疥蛤蟆酥，疥都蛤蟆酥，虫酥，光东酥，月魂。

【商品名】片蟾酥：又名片酥。为在玻璃板上摊成薄片晒干者。

团蟾酥：又名团酥、棋子酥。为在油纸上摊成棋子样小圆饼晒干者。

蟾酥：为各种蟾酥的统称。以表面及断面质皆明亮、色紫红、沾水即成乳白色隆起者为佳。

【处方名】蟾酥，虫酥，酒蟾酥，奶蟾酥等。

处方中写蟾酥、虫酥指生蟾酥。为原药研成细粉入药者。

酒蟾酥为蟾酥粉用白酒调和成稠糊状，晾干后碾成细面入药者。

奶蟾酥为蟾酥粉用鲜牛奶调和成稠糊状，晾干后碾成细面入药者。

【性味归经】甘、辛，温。有毒。归脾、胃、肺经。

【功效主治】解毒消肿，止痛开窍。主治痈疽疔疮，咽喉肿痛，龋齿疼痛；急性胃肠炎所致的腹痛吐泻，甚至昏厥。

【用量】入丸散内服每次0.015~0.03克。外用适量。

【慎忌】孕妇忌服。外用不可入目。

附：蟾皮

为蟾蜍的皮。又名癞蛤蟆皮、癞蟆皮、癞疙瘩皮、癞蛤蟆皮、疥蛤蟆皮、蟾蜍皮、中华大蟾蜍皮、黑眶蟾蜍皮、蛤蚆皮等。性味辛凉，微毒。有清热解毒，利水消胀之功效。主治痈疽肿毒。疳积腹胀等证。近人亦有用来治疗喘咳痰多及肿瘤者。内服3~6克，煎汤。外用可剥取蟾皮，以新鲜外皮着肉贴患处。

露 蜂 房

出自《神农本草经》。为胡蜂科昆虫大黄蜂 *Polistes mandarinus saussure* 的巢。我国各地均有，南方地区尤多。随时可采。晒干或略蒸过，取出死蛹、死蜂，剪成小块。生用或炒用。

【别名】蜂肠，蜂勑，蜂房，蜂巢，草蜂子窝，草蜂窠，大黄蜂窠，大黄蜂窝；大黄蜂房，黄蜂窝，马蜂房，马蜂包，马蜂窝，野马蜂窝，野蜂房，野蜂窝，虎头蜂房，纸蜂房，长脚蜂窝，草蜂子窝，百穿，百穿之巢，紫金沙，胡蜂窠，胡蜂房。

【商品名】露蜂房。以单个、桶长、孔小、体轻、微有弹性、色灰白、内无死蜂和死蛹、结巢于露天处者为佳。

【处方名】露蜂房，蜂房，炒蜂房等。

处方中写露蜂房、蜂房指生蜂房。为原药洗净蒸透，剪成小块入药者。多外用。

炒蜂房为净蜂房块用文火炒至微黄色入药者。减轻毒性和腥味。既可外用，亦可内服。

【性味归经】甘，平。有毒。归胃经。

【功效主治】攻毒，杀虫，祛风。主治痈疽，瘰疬，牙痛，癰疮，乳痈，急性及慢性咽炎，风湿痹痛，瘾疹瘙痒，多种癌肿。

【用量】内服煎汤6～12克，研末冲服1.5～3克。外用适量。

【禁忌】孕妇及体虚者慎服。

蜂 蜡

为中华蜜蜂*Apis cerana* Fabr.分泌的蜡质，经精制加工而成。春秋二季，将取去蜂蜜后的蜂巢，入水锅中加热熔化，除去上层泡沫杂质，趁热过滤，放冷，蜂蜡即凝结成块，浮于水面，取出，即为黄蜡。黄蜡再经熬炼、脱色等加工过程，即成白蜡。

【别名】蜡，蜜蜡，蜜蜂蜡，蜜臙，黄蜡，白蜡，白蜂蜡，白蜜蜡，黄占，蜂白蜡，纯蜡，黄蜜蜡，黄蜂蜡。

【商品名】黄蜡：又名黄占。为黄色或棕黄色之蜂蜡。以色黄纯净、质软而有油腻感，显蜂蜜样香气者为佳。

白蜡：又名蜂白蜡。为白色块状之蜂蜡。质纯而气味较弱。

【处方名】蜡，蜂蜡，蜜蜡，白蜡，黄蜡。

【性味归经】甘，微温。归脾、胃、大肠经。

【功效主治】解毒，生肌，定痛。主治急心痛，下痢脓血，久泻不止，胎动下血，疮痈内攻，久溃不敛，水火烫伤，瘰疮。

【用量】熔化冲服4～6克。熬膏外用适量。

【禁忌】湿热痢疾初起者忌服。

壁 虎

出自《本草纲目》。为壁虎科动物无蹼壁虎 *Gekko suinhouna* Günther 或多疣壁虎 *G. japonicus* (Duméril & Bibron) 或无疣壁虎 *G. subpalmatus* Günther 或蹼趾壁虎 *G. chinensis* Gray 等多种壁虎的全体。主产于江苏、安徽、浙江等地。夏秋捕捉，烘干，生用或炒用。

【别名】 天龙，蝎虎，蝎虎子，蜥虎，爬壁虎，爬墙虎，蝘蜓，胪蠵，守宫，壁宫，辟宫子，地塘虫，无蹼壁虎，蹼趾壁虎，无疣壁虎，多疣壁虎。

【商品名】 壁虎，守宫。以个大、完整、干燥洁净者为佳。

【处方名】 守宫，壁虎，炒壁虎，壁虎粉等。

处方中写壁虎、守宫指生壁虎。为原药洗净，晒干或烘干，生用入药者。

炒壁虎为壁虎用大米炒，至米深黄色时筛去米，取出壁虎晾凉入药者。

壁虎粉为炒壁虎研面入药者。

【注意】 壁虎与蜈蚣均有“天龙”之别名，极易混淆，应引起注意。

【性味归经】 咸，寒。有小毒。归肝、脾、胃经。主治瘰疬，痈疮，癌肿，痹痛，瘫痪，惊痫，破伤风等。

【用量】 内服煎汤 2～5 克，研末冲服每次 1～1.5 克。外用适量。

【慎忌】 孕妇及体弱者忌服。不宜过量及持久服用。

壁 钱

出自《本草纲目拾遗》。为壁钱科动物壁钱 *Uroctea compacta*

Lis Koch 的全虫。各地均有。随时可采，用开水烫死，鲜用，或晒干用。

【别名】壁镜，壁虫，壁蝽，蝽子，长踦，蝽蜎，贴墙子，白蝽，白蛛，壁蚕，喜儿，壁钱虫。

【商品名】壁钱，蝽子。以个大、洁净者为佳。

【处方名】壁钱，鲜壁钱。

【性味归经】咸，平。归肝、心经。

【功效主治】清热，解毒，除风，止血。主治喉痹，牙疳，鼻衄，痔疮，中耳炎，金疮出血，小儿急惊风，口舌糜烂等。

【用量】内服每次0.1~0.2克，入丸、散。外用适量，捣汁涂、敷或吹喉。

壁 钱 幕

出自《本草纲目拾遗》。为壁钱科动物壁钱的卵囊。各地均有分布。秋季采集，晒干。

【别名】壁钱茧，壁茧，壁钱窠，白蝽窠，白蛛窠，壁蝽窠，喜儿窠，壁蚕茧。

【商品名】壁钱幕，壁钱茧，壁钱窠。以个大洁净者为佳。

【处方名】壁钱幕。

【性味归经】咸，寒。归肺、胃经。

【功效主治】清热，解毒，降逆，止血。主治烂喉痧，喉痹，乳蛾，牙痛，疔疮，外伤出血，呕逆，咳嗽，口疮。

【用量】入丸散内服每次0.1~0.2克。外用适量。

瓦 楞 子

出自《名医别录》。为蚶科软体动物泥蚶 *Arca granosa* L. 和毛蚶 *A. subcrenata* Lischke. 或魁蚶 *A. inflata* Reeve 的贝壳。主

产于浙江、江苏、山东、广东及辽宁等地的海滨地带。海水退潮时拾取，洗净，入沸水中略煮，去肉留壳，晒干。碾碎生用或煅后碾粉用。

【别名】魁蛤，魁蛤壳，泥蚶壳，毛蚶壳，毛蛤，毛蛤蜊，魁蚶壳，蚶壳，蚶子壳，瓦棱子，瓦楞，瓦棱，瓦垄，瓦垄子，瓦弄子，瓦屋子，瓦垄壳皮，蛤蛤，瓦垄蛤皮，花蚬壳，血蛤皮，蚶子，伏老。

【商品名】瓦楞子，泥蚶壳，魁蛤壳，毛蚶壳。以匀整、洁净者为佳。

【处方名】瓦楞，瓦棱，瓦楞子，生瓦楞子，煅瓦楞子等。

处方中写瓦楞、瓦棱、瓦楞子指生瓦楞子。为原药洗净，晒干，碾碎入药者。偏于消痰散结。

煅瓦楞又名煅瓦棱。为净瓦楞子置无烟火中烧至红透，取出放凉，然后碾碎入药者。偏于制酸止痛。

【性味归经】咸，平。归胃、肺、肝经。

【功效主治】消痰化瘀，软坚散结。主治瘰疬，瘿瘤、癥瘕痞块，肝脾肿大，消化道肿瘤，胃及十二指肠溃疡，胃酸过多，胃脘疼痛等。

【用量】10~30克。外用适量。

象　　皮

出自《医学入门》。为象科动物亚洲象和非洲象的皮。剥取象皮后，去掉筋膜油脂，洗净，切成长块，晒干。来源同“象牙”。

【别名】大象皮，亚洲象皮，印度象皮，非洲象皮，老象皮。

【商品名】象皮。以块大、皮厚、断面灰白色、无虫蛀、无残肉者为佳。

【处方名】象皮，象皮粉，象皮膏。

【性味归经】甘、咸，温。归脾、膀胱经。

【功效主治】止血，敛疮，生肌。主治外伤出血，一切创伤及

溃疡久不敛口。

【用量】外用适量。

【禁忌】疮疡脓毒未尽者忌用。

正名笔画索引

【二画】

- 十大功劳叶 … (124)
 丁香 ………… (265)
 人参 ………… (478)
 人中白 ……… (48)
 人中黄 ……… (133)
 八月札 ……… (294)
 八角茴香 …… (268)
 九香虫 ……… (296)
 了哥王 ……… (110)
 刀豆 ………… (291)

【三画】

- 三七 ………… (333)
 三棱 ………… (348)
 干姜 ………… (256)
 干漆 ………… (379)
 土大黄 ……… (112)
 土牛膝 ……… (366)
 土茯苓 ……… (79)
 土槿皮 ……… (315)
 大枣 ………… (495)
 大蒜 ………… (608)
 大黄 ………… (143)
 大戟 ………… (154)
 大薊 ………… (316)
 大风子 ……… (612)
 大青叶 ……… (70)
 大腹皮 ……… (297)
 大豆黄卷 …… (19)
 万年青 ……… (245)

- 山柰 ………… (270)
 山楂 ………… (298)
 山药 ………… (490)
 山羊角 ……… (455)
 山豆根 ……… (82)
 山茱萸 ……… (582)
 山慈姑 ……… (101)
 川芎 ………… (343)
 川贝母 ……… (405)
 川楝子 ……… (286)
 千年健 ……… (181)
 千里光 ……… (44)
 千金子 ……… (157)
 小麦 ………… (569)
 小薊 ………… (318)
 小茴香 ……… (267)
 飞廉 ………… (126)
 马宝 ………… (446)
 马勃 ………… (83)
 马齿苋 ……… (89)
 马兜铃 ……… (428)
 马钱子 ……… (613)
 女贞子 ……… (557)

【四画】

- 天麻 ………… (462)
 天葵 ………… (122)
 天雄 ………… (255)
 天门冬 ……… (542)
 天仙藤 ……… (190)
 天花粉 ……… (35)
 天竹黄 ……… (408)

- 天南星 ……… (390)
 王不留行 …… (367)
 无花果 ……… (88)
 无名异 ……… (605)
 木瓜 ………… (169)
 木香 ………… (280)
 木贼 ………… (28)
 木通 ………… (218)
 木槿子 ……… (436)
 木槿皮 ……… (610)
 木槿花 ……… (131)
 木鳖子 ……… (616)
 木蝴蝶 ……… (436)
 木芙蓉叶 …… (611)
 五加皮 ……… (173)
 五味子 ……… (565)
 五灵脂 ……… (380)
 五倍子 ……… (538)
 太子参 ……… (485)
 车前子 ……… (215)
 车前草 ……… (216)
 瓦松 ………… (129)
 瓦楞子 ……… (627)
 牛黄 ………… (74)
 牛膝 ………… (365)
 牛筋草 ……… (225)
 牛蒡子 ……… (16)
 毛茛 ………… (607)
 毛冬青 ……… (368)
 升麻 ………… (26)
 升药 ………… (599)
 长春花 ……… (118)

丹参	(349)	石膏	(30)	白茅根	(321)
凤仙花	(357)	石蒜	(593)	白鲜皮	(99)
凤仙草	(357)	石斛	(543)	白降丹	(599)
凤尾草	(244)	石燕	(252)	白僵蚕	(468)
凤凰衣	(561)	石见穿	(372)	白花蛇舌草	(96)
月见草	(195)	石决明	(455)	仙茅	(504)
月季花	(363)	石南藤	(190)	仙人掌	(108)
乌头	(255)	石菖蒲	(477)	仙桃草	(359)
鸟药	(283)	石榴皮	(571)	仙鹤草	(329)
乌梅	(566)	龙齿	(445)	代赭石	(460)
乌梢蛇	(178)	龙骨	(444)	瓜蒌	(404)
乌贼骨	(586)	龙葵	(122)	瓜蒂	(589)
乌蔹莓	(106)	龙眼肉	(534)	瓜子金	(437)
乌柏木根皮	(158)	龙胆草	(54)	瓜蒌子	(434)
巴豆	(153)	龙葵子	(554)	冬瓜子	(230)
巴戟天	(501)	打破碗花花	(316)	冬瓜皮	(230)
水蛭	(383)	四季青	(102)	冬葵子	(236)
水银	(597)	生姜	(4)	冬虫夏草	(514)
水牛角	(53)	生姜皮	(4)	母丁香	(266)
水菖蒲	(247)	生地黄	(58)	丝瓜络	(612)
水莎草	(399)	白及	(330)	玄参	(59)
水蜈蚣	(247)	白术	(489)	玄明粉	(146)
水红花子	(360)	白芍	(531)	玄精石	(47)
六月雪	(246)	白芷	(10)	半夏	(388)
火麻仁	(148)	白果	(430)	半支莲	(118)
		白前	(401)	半边莲	(78)
		白蔹	(98)	半夏曲	(301)

【五画】

玉竹	(546)
玉米须	(239)
甘草	(493)
甘松	(293)
甘蔗	(539)
甘遂	(151)
艾叶	(333)
石韦	(223)
石灰	(607)
石花	(136)

石膏	(30)	白茅根	(321)
石蒜	(593)	白鲜皮	(99)
石斛	(543)	白降丹	(599)
石燕	(252)	白僵蚕	(468)
石见穿	(372)	白花蛇舌草	(96)
石决明	(455)	仙茅	(504)
石南藤	(190)	仙人掌	(108)
石菖蒲	(477)	仙桃草	(359)
石榴皮	(571)	仙鹤草	(329)
龙齿	(445)	代赭石	(460)
龙骨	(444)	瓜蒌	(404)
龙葵	(122)	瓜蒂	(589)
龙眼肉	(534)	瓜子金	(437)
龙胆草	(54)	瓜蒌子	(434)
龙葵子	(554)	冬瓜子	(230)
打破碗花花	(316)	冬瓜皮	(230)
四季青	(102)	冬葵子	(236)
生姜	(4)	冬虫夏草	(514)
生姜皮	(4)	母丁香	(266)
生地黄	(58)	丝瓜络	(612)
白及	(330)	玄参	(59)
白术	(489)	玄明粉	(146)
白芍	(531)	玄精石	(47)
白芷	(10)	半夏	(388)
白果	(430)	半支莲	(118)
白前	(401)	半边莲	(78)
白蔹	(98)	半夏曲	(301)
白薇	(138)		
白木耳	(561)		
白头翁	(89)		
白芥子	(393)		
白花蛇	(177)		
白豆蔻	(206)		
白果叶	(431)		
白松塔	(433)		
白附子	(392)		
白药子	(132)		

【六画】

芒硝	(145)
地龙	(469)
地榆	(322)
地耳草	(242)
地肤子	(229)
地柏枝	(326)
地骨皮	(139)
地锦草	(104)

地醋酸 (398)
 西瓜 (533)
 西瓜皮 (539)
 西瓜霜 (539)
 西洋参 (481)
 西瓜翠衣 (533)
 老鹳草 (185)
 亚麻子 (553)
 百合 (550)
 百部 (419)
 百草霜 (332)
 戎盐 (135)
 过江龙 (197)
 夹竹桃 (249)
 当归 (526)
 肉桂 (257)
 肉苁蓉 (503)
 肉豆蔻 (573)
 朱砂 (441)
 竹叶 (34)
 竹沥 (409)
 竹茹 (409)
 竹叶卷心 (34)
 伏龙肝 (340)
 延胡索 (344)
 自然铜 (387)
 血竭 (620)
 血余炭 (332)
 向日葵子 (554)
 向日葵花托 (237)
 向日葵茎髓 (238)
 全竭 (466)
 合欢皮 (452)
 合欢花 (452)
 寻骨风 (182)
 防己 (164)
 防风 (7)

阳起石 (525)
 红花 (361)
 红藤 (93)
 红豆蔻 (267)
 红娘子 (385)
 红药子 (131)
 刘寄奴 (351)
 阿荆 (239)
 灯心草 (235)
 农吉利 (120)
 羊蹄 (340)
 米口袋 (70)
 冰片 (474)
 决明子 (465)
 安息香 (476)

【七画】

麦芽 (301)
 麦门冬 (540)
 远志 (450)
 菊花 (152)
 菊萸 (312)
 首葵菜 (127)
 花椒 (263)
 花蕊石 (338)
 芦荟 (147)
 芦根 (33)
 苏子 (424)
 苏木 (378)
 苏叶 (4)
 苏梗 (4)
 苏合香 (475)
 苍术 (198)
 苍耳子 (11)
 苍耳虫 (12)
 苍耳草 (12)
 芹菜 (472)

芡实 (581)
 芝麻根 (321)
 赤芍 (62)
 赤小豆 (231)
 赤石脂 (574)
 赤茯苓 (212)
 杏仁 (418)
 杜仲 (507)
 两面针 (109)
 豆蔻壳 (207)
 连翘 (67)
 吴茱萸 (258)
 牡蛎 (456)
 牡丹皮 (60)
 佛手 (277)
 佛手花 (278)
 佛甲草 (119)
 何首乌 (529)
 伸筋草 (182)
 皂矾 (603)
 皂荚 (393)
 皂角刺 (394)
 含羞草 (245)
 龟板 (563)
 角茴香 (87)
 灵芝 (485)
 忍冬藤 (66)
 鸡内金 (303)
 鸡血藤 (373)
 鸡冠花 (327)
 附子 (254)
 阿胶 (532)
 辛夷 (13)
 诃子 (572)
 补骨脂 (512)
 羌活 (9)
 谷芽 (302)

- 谷精草 (39)
 沙参 (535)
 沙苑子 (518)
 沉香 (285)
 没药 (376)
 没食子 (588)

【八画】

- 青皮 (273)
 青蒿 (136)
 青黛 (72)
 青木香 (288)
 青风藤 (188)
 青娘子 (386)
 青葙子 (41)
 玫瑰花 (295)
 苦参 (55)
 苦丁茶 (43)
 苦棟皮 (306)
 茅莓 (127)
 茴麻子 (46)
 松节 (192)
 松香 (618)
 松夢 (115)
 松花粉 (326)
 批杷叶 (427)
 板蓝根 (71)
 刺蒺藜 (463)
 刺猬皮 (587)
 枣树皮 (496)
 郁金 (345)
 郁李仁 (149)
 虎杖 (354)
 虎骨 (175)
 虎耳草 (123)
 昆布 (414)
 明矾 (603)

- 罗布麻 (471)
 罗汉果 (559)
 敝酱草 (94)
 垂盆草 (79)
 知母 (32)
 委陵菜 (91)
 佩兰 (203)
 侧柏叶 (324)
 使君子 (305)
 鱼鳔 (533)
 鱼脑石 (253)
 鱼腥草 (80)
 狗脊 (539)
 狗舌草 (121)
 狗狗秧 (240)
 狗尾草 (42)
 金不换 (341)
 金沸草 (400)
 金果榄 (84)
 金荞麦 (103)
 金钱草 (221)
 金银花 (65)
 金樱子 (583)
 采云曲 (301)
 乳香 (374)
 馄糖 (496)
 建神曲 (301)
 降香 (377)
 细辛 (260)
 夜交藤 (530)
 夜明砂 (42)
 炉甘石 (606)
 卷柏 (325)
 泽兰 (352)
 泽泻 (213)
 泽漆 (232)

【九画】

- 玳瑁 (459)
 珍珠 (457)
 珍珠母 (458)
 草果 (203)
 草豆蔻 (208)
 草珊瑚 (108)
 茯苓 (210)
 茯神 (212)
 茯苓皮 (212)
 茶叶 (396)
 荆芥 (6)
 莴苣 (319)
 草苺 (263)
 草澄茄 (264)
 薯草 (335)
 茵草 (194)
 莲草花 (353)
 荔枝核 (287)
 荠蔚子 (356)
 茵陈蒿 (228)
 相思子 (615)
 枳壳 (276)
 枳实 (276)
 枳椇子 (560)
 梧子 (36)
 柃橘 (280)
 柘杞子 (555)
 柏子仁 (440)
 柳叶 (113)
 柳枝 (113)
 柳根 (114)
 榆柳 (15)
 柿蒂 (292)
 柿霜 (396)
 胡荽 (14)

胡椒 (269)
 胡芦巴 (506)
 胡桃肉 (515)
 胡黄连 (142)
 胡颓子 (304)
 胡颓子叶 (432)
 胡颓子根 (193)
 南瓜 (162)
 南瓜子 (308)
 咸灵仙 (309)
 砥石 (596)
 牵牛子 (155)
 砂仁 (204)
 砂仁壳 (206)
 厚朴 (200)
 厚朴花 (202)
 轻粉 (598)
 鸦片 (440)
 鸦胆子 (93)
 韭子 (524)
 韭菜 (290)
 骨碎补 (510)
 虾虫 (385)
 钩藤 (461)
 钟乳石 (270)
 香附 (282)
 香薷 (5)
 香橼 (278)
 秋石 (46)
 鬼臼 (45)
 鬼羽箭 (129)
 鬼箭羽 (372)
 禺余粮 (675)
 独活 (161)
 食盐 (135)
 急性子 (358)
 胆矾 (591)

胖大海 (416)
 络石藤 (186)
 绞股蓝 (107)
 贯众 (313)
 蚊体 (75)
 孩儿茶 (619)
 扁豆 (492)
 扁豆衣 (492)
 扁豆花 (493)
 神曲 (300)
 前胡 (402)
 姜黄 (347)
 穿山甲 (381)
 穿山龙 (371)
 穿心莲 (73)
 洋金花 (439)

【十画】

秦皮 (92)
 秦艽 (166)
 珠儿参 (537)
 珠子参 (537)
 莲子 (576)
 莲须 (578)
 莲房 (579)
 莲子心 (577)
 荷叶 (579)
 荷花 (578)
 荷梗 (580)
 荷蒂 (580)
 茾术 (347)
 菜菔子 (303)
 荸荠 (552)
 桂枝 (2)
 桃仁 (360)
 桔梗 (395)
 夏天无 (195)

夏枯草 (37)
 柴胡 (24)
 鸭跖草 (38)
 钻地风 (180)
 铁落 (443)
 铁苋菜 (241)
 铁树叶 (354)
 铅丹 (600)
 铅粉 (600)
 蚕沙 (180)
 积雪草 (225)
 透骨草 (183)
 射干 (81)
 臭梧桐 (169)
 徐长卿 (170)
 狼毒 (159)
 狼把草 (111)
 豹骨 (176)
 桑叶 (19)
 桑枝 (171)
 桑椹 (556)
 桑白皮 (425)
 桑寄生 (172)
 桑螵蛸 (584)
 通草 (219)
 荷良姜 (266)
 党参 (482)
 桂参 (77)
 益母草 (355)
 益智仁 (513)
 凌霄花 (364)
 海马 (522)
 海龙 (523)
 海藻 (413)
 海风藤 (187)
 海金沙 (224)
 海狗肾 (521)

海浮石 (410)
 海蛤壳 (411)
 海桐皮 (179)
 海金沙藤 (221)
 浙贝母 (407)
 浮萍 (27)
 浮小麦 (563)
 娑罗子 (203)

【十一画】

黄芪 (486)
 黄芩 (48)
 黄柏 (52)
 黄连 (50)
 黄荆 (438)
 黄精 (547)
 黄藤 (243)
 黄花蒿 (197)
 黄狗肾 (520)
 黄药子 (415)
 菊花 (21)
 菊叶三七 (334)
 草薢 (226)
 蕺菜 (227)
 蕈丝子 (517)
 接骨木 (378)
 磨砂 (602)
 雪上一枝蒿 (609)
 蛇蜕 (470)
 蛇莓 (128)
 蛇床子 (614)
 野菊花 (22)
 常山 (590)
 甜杏仁 (419)
 铜绿 (604)
 银朱 (597)
 银柴胡 (140)

猪苓 (212)
 猪毛菜 (472)
 猪殃殃 (120)
 猪胆汁 (417)
 象牙 (445)
 象皮 (628)
 猫爪草 (37)
 猕猴桃 (558)
 绿豆 (105)
 绿萼梅 (295)
 续断 (508)
 绞草 (124)
 鹿角 (500)
 鹿茸 (498)
 鹿鞭 (501)
 鹿角胶 (500)
 鹿角霜 (500)
 鹿衔草 (370)
 麻黄 (1)
 麻黄根 (570)
 旋复花 (399)
 商陆 (156)
 羚羊角 (454)
 密陀僧 (605)
 密蒙花 (40)
 淡豆豉 (18)
 涕羊藿 (505)

【十二画】

斑蝥 (622)
 琥珀 (448)
 葛花 (24)
 葛根 (23)
 葱白 (14)
 葱实 (524)
 莼草 (243)
 蒜薹 (233)

葫芦 (231)
 落新妇 (30)
 萱草根 (248)
 茅莓子 (426)
 椒目 (263)
 楠实 (559)
 棕榈皮 (331)
 醋浆草 (241)
 喜树 (117)
 款冬花 (423)
 雄黄 (595)
 硫黄 (594)
 紫草 (63)
 紫苏 (3)
 紫菀 (421)
 紫珠 (320)
 紫贝齿 (459)
 紫石英 (443)
 紫河车 (516)
 紫草茸 (134)
 紫荆皮 (114)
 紫荆花 (115)
 紫花地丁 (69)
 蛤蚧 (514)
 黑脂麻 (552)
 喉咙草 (86)
 景天三七 (335)
 筋骨草 (105)
 鹅不食草 (196)
 锁阳 (520)
 猴枣 (447)
 番红花 (353)
 番泻叶 (147)
 犀角 (57)
 寒水石 (31)
 滑石 (217)

【十三画】

- 蒲黄 (337)
 蒲公英 (68)
 蒿头回 (95)
 蔓麻子 (616)
 榆叶 (250)
 榆钱 (453)
 榆白皮 (250)
 槐耳 (323)
 槐花 (327)
 槐角 (329)
 槐枝 (328)
 椿皮 (570)
 珊砂 (601)
 雷丸 (310)
 雷公藤 (610)
 零陵香 (209)
 蜈牛 (116)
 蚊蝎 (487)
 蜂蜡 (625)
 蜂蜜 (497)
 蜈蚣 (447)
 蜀漆 (591)
 蜀羊泉 (86)
 照山白 (433)
 路路通 (369)
 矮地茶 (431)
 锦灯笼 (88)

【十四画】

- 蔊菜 (417)
 蔓荆子 (22)
 蔷薇花 (130)

- 榧子 (312)
 槐榔 (307)
 酸枣仁 (449)
 磁石 (442)
 稀莶草 (157)
 蝉蜕 (17)
 麽栗壳 (575)
 熊胆 (97)
 辣蓼 (193)
 漏芦 (100)
 满山红 (432)

【十五画】

- 橄榄 (553)
 檀脑 (621)
 樱桃核 (29)
 蟑姑 (251)
 暴马子 (434)
 墨旱莲 (562)
 熟地黄 (528)
 鹤虱 (310)
 鹤草芽 (309)

【十六画】

- 薄荷 (15)
 蕤白 (289)
 薏苡仁 (214)
 桔白 (272)
 桔叶 (272)
 桔皮 (271)
 桔红 (272)
 桔络 (272)
 桔核 (272)
 壁虎 (626)

- 壁钱 (626)
 壁钱幕 (627)
 槐苏 (194)

【十七画】

- 蕊本 (11)
 藏青果 (85)
 藏角蒿 (530)
 檀香 (291)
 蟋蟀 (251)
 稻豆衣 (465)
 爵床 (111)
 蠕虫 (382)
 糜谷老 (238)

【十八画】

- 藕节 (342)
 藜芦 (592)
 藤黄 (617)
 覆盆子 (585)
 磁石 (412)
 瞿麦 (234)
 翻白草 (56)

【十九画】

- 藿香 (202)
 蜡皮 (624)
 蜘酥 (623)
 盔甲 (564)

【二十画以上】

- 橘稻根须 (569)
 露峰房 (624)
 蕊香 (473)

正名音序索引

【A】

- a** 安息香 (476)
āi 矮地茶 (430)
ài 艾叶 (338)

【B】

- bā** 巴豆 (153)
 巴戟天 (601)
 八月札 (294)
 八角茴香 (268)
bó 蕺薜 (227)
bái 白术 (489)
 白及 (230)
 白芍 (531)
 白芷 (10)
 白果 (430)
 白前 (401)
 白薇 (98)
 白薇 (138)
 白木耳 (561)
 白头翁 (89)
 白芥子 (393)
 白花蛇 (177)
 白豆蔻 (206)
 白果叶 (431)
 白松塔 (433)
 白附子 (392)
 白药子 (132)
 白茅根 (321)
 白鲜皮 (99)
 白降丹 (599)

- 白僵蚕 (468)
 白花蛇舌草 (96)

- bǎi** 百合 (550)
 百部 (419)
 百草霜 (332)
 柏子仁 (440)
bài 败酱草 (94)
bǎn 板蓝根 (71)
 斑蝥 (622)
bàn 半夏 (388)
 半支莲 (118)
 半边莲 (78)
 半夏曲 (301)
bào 豹骨 (176)
 暴马丁 (434)
bǐ 墓葬 (552)
bì 草薢 (263)
 草澄茄 (264)
 壁钱 (626)
 壁虎 (626)
 壁钱幕 (627)
 草薢 (226)
 蕤麻子 (616)
biǎn 扁豆 (492)
 篓蒿 (233)
 扁豆花 (493)
 扁豆衣 (492)
biē 鳖甲 (564)
bīng 冰片 (474)
 槟榔 (307)
bó 薄荷 (15)
bǔ 补骨脂 (512)

【C】

- cǎi** 采云曲 (301)
cán 蟑沙 (180)
cáng 苍术 (198)
 苍耳虫 (12)
 苍耳子 (11)
 苍耳草 (12)
cāo 糜苏 (194)
cǎo 草果 (208)
 草豆蔻 (208)
 草珊瑚 (108)
cè 侧柏叶 (324)
chá 茶叶 (396)
chái 柴胡 (24)
chán 蟾酥 (624)
 蟾蜍 (17)
cháng 常山 (590)
 长春花 (118)
chē 车前子 (215)
 车前草 (216)
chèn 沉香 (285)
chēng 桤柳 (15)
chì 赤芍 (62)
 赤小豆 (231)
 赤石脂 (574)
 赤茯苓 (212)
chōng 芫蔚子 (356)
chòu 臭梧桐 (169)
chǔ 楮实 (559)
chuǎn 穿山甲 (381)

穿山龙 (371)
 穿心莲 (73)
 川芎 (343)
 川贝母 (405)
 川棟子 (286)
 chuī垂盆草 (79)
 chūn椿皮 (570)
 cī刺猬皮 (587)
 刺蒺藜 (463)
 cī磁石 (442)
 cōng葱白 (14)
 葱实 (524)
 cù酢浆草 (241)

【D】

dǎ打破碗花花 (316)
 dà大枣 (495)
 大黄 (143)
 大薊 (316)
 大蒜 (608)
 大戟 (154)
 大风子 (612)
 大青叶 (70)
 大腹皮 (297)
 大豆黄卷 (19)
 dǎi玳瑁 (459)
 代赭石 (460)
 dān丹参 (349)
 dǎn胆矾 (591)
 dàn淡豆豉 (18)
 dāng当归 (526)
 dǎng党参 (482)
 dǎo刀豆 (291)
 dēng灯心草 (235)
 dì地龙 (469)
 地榆 (322)
 地耳草 (242)

地肤子 (229)
 地柏枝 (326)
 地骨皮 (139)
 地锦草 (104)
 地醋醣 (398)
 dīng丁香 (265)
 dōng冬瓜子 (230)
 冬瓜皮 (230)
 冬葵子 (236)
 冬虫夏草 (514)
 dòu豆蔻壳 (207)
 dú独活 (161)
 dù杜仲 (507)

【E】

ē阿胶 (532)
 ē莪术 (347)
 鹅不食草 (196)

【F】

fān番红花 (363)
 番泻叶 (147)
 翻白草 (56)
 fáng防己 (164)
 防风 (7)
 fēi飞廉 (126)
 fěi榧子 (312)
 fēng蜂蜜 (497)
 蜂蜡 (625)
 fèng凤凰衣 (561)
 凤仙花 (357)
 凤仙草 (357)
 凤尾草 (244)
 fó佛手 (277)
 佛甲草 (119)
 佛手花 (278)
 fú浮萍 (27)

浮小麦 (568)
 伏龙肝 (340)
 茯神 (212)
 茯苓 (210)
 茯苓皮 (212)
 fù附子 (254)
 膏盆子 (585)

【G】

gān干姜 (266)
 干漆 (379)
 甘草 (493)
 甘松 (293)
 甘蔗 (539)
 甘遂 (151)
 gǎn橄榄 (558)
 gāo高良姜 (266)
 gǎo冀本 (11)
 gē葛花 (24)
 葛根 (23)
 蛤蚧 (614)
 gōu钩藤 (461)
 gǒu枸杞子 (555)
 枸橘 (280)
 狗脊 (509)
 狗舌草 (121)
 狗尾草 (42)
 狗狗秧 (240)
 gǔ骨碎补 (510)
 谷芽 (302)
 谷精草 (39)
 guā瓜蒌 (404)
 瓜蒂 (589)
 瓜子金 (437)
 瓜蒌子 (434)
 guàn贯众 (313)
 guī龟板 (563)

guǐ 鬼臼 (45)
 鬼箭羽 (372)
 鬼羽箭 (129)
 guì 桂枝 (2)
 guò 过江龙 (197)

【H】

hái 孩儿茶 (619)
 hǎi 海马 (522)
 海龙 (523)
 海藻 (413)
 海蛤壳 (411)
 海桐皮 (179)
 海浮石 (410)
 海金沙 (224)
 海狗肾 (521)
 海风藤 (187)
 海金沙藤 (224)
 hán 寒水石 (31)
 含羞草 (245)
 hàn 蕺菜 (417)
 hé 河子 (572)
 hé 何首乌 (529)
 合欢皮 (452)
 合欢花 (452)
 荷叶 (579)
 荷花 (578)
 荷蒂 (580)
 荷梗 (530)
 hè 鹤虱 (310)
 鹤草芽 (309)
 hēi 黑脂麻 (552)
 hóng 红花 (361)
 红藤 (93)
 红药子 (131)
 红娘子 (385)
 红豆蔻 (267)

荭草 (194)
 荏草花 (359)
 hóu 喉咙草 (86)
 猴枣 (447)
 hòu 厚朴 (200)
 厚朴花 (202)
 hú 胡椒 (269)
 胡荽 (14)
 胡芦巴 (506)
 胡黄连 (142)
 胡桃肉 (515)
 胡颓子 (304)
 胡颓子叶 (432)
 胡颓子根 (193)
 葫芦 (231)
 hǔ 虎杖 (354)
 虎骨 (175)
 虎耳草 (123)
 琥珀 (448)
 huā 花椒 (263)
 花蕊石 (338)
 huá 滑石 (217)
 huái 槐耳 (328)
 槐花 (327)
 槐角 (329)
 槐枝 (328)
 huáng 黄芩 (48)
 黄柏 (52)
 黄连 (50)
 黄芪 (436)
 黄荆 (433)
 黄精 (547)
 黄藤 (243)
 黄药子 (415)
 黄狗肾 (520)
 黄花蒿 (197)
 huǒ 火麻仁 (148)

藿香 (202)

【J】

jī 积雪草 (225)
 鸡内金 (303)
 鸡冠花 (327)
 鸡血藤 (373)
 jí 急性子 (358)
 jiǎ 荠菜 (319)
 jiā 夹竹桃 (249)
 jiàn 建神曲 (301)
 jiāng 姜黄 (347)
 jiàng 降香 (377)
 jiáo 椒目 (263)
 jiǎo 角茴香 (87)
 绞股蓝 (107)
 jiě 接骨木 (378)
 jié 桔梗 (395)
 jīn 金樱子 (583)
 金银花 (65)
 金钱草 (221)
 金荞麦 (103)
 金果榄 (84)
 金沸草 (400)
 金不换 (341)
 筋骨草 (105)
 锦灯笼 (88)
 jīng 荆芥 (6)
 jǐng 景天三七 (335)
 jiǔ 韭子 (524)
 韭菜 (290)
 九香虫 (296)
 jiā 橘白 (272)
 橘叶 (272)
 橘皮 (271)
 橘红 (272)
 橘核 (272)

橘络 (272)
 菊花 (21)
 菊叶三七 (334)
 juǎn卷柏 (325)
 jué爵床 (111)
 决明子 (465)

【K】

kāng糠谷老 (238)
 kǔ苦参 (55)
 苦丁茶 (43)
 苦棟皮 (306)
 kuǎn款冬花 (423)
 kūn昆布 (414)

【L】

là辣蓼 (193)
 lèi莱菔子 (303)
 láng狼毒 (159)
 狼把草 (111)
 lǎo老鹳草 (185)
 léi雷丸 (310)
 雷公藤 (610)
 lí藜芦 (592)
 lí荔枝核 (287)
 lián连翹 (67)
 莲子 (576)
 莲须 (578)
 莲房 (579)
 莲子心 (577)
 liǎng两面针 (109)
 liǎo了哥王 (110)
 líng凌霄花 (364)
 羚羊角 (454)
 灵芝 (485)
 零陵香 (209)
 lú硫黄 (594)

liú刘寄奴 (351)
 liǔ柳叶 (113)
 柳根 (114)
 柳枝 (113)
 liù六月雪 (246)
 lóng龙齿 (445)
 龙骨 (444)
 龙葵 (122)
 龙葵子 (554)
 龙胆草 (54)
 龙眼肉 (534)
 lóu蝼蛄 (251)
 lòu漏芦 (100)
 露蜂房 (624)
 lù炉甘石 (606)
 芦荟 (147)
 芦根 (33)
 lù鹿角 (500)
 鹿茸 (498)
 鹿鞭 (501)
 鹿角胶 (500)
 鹿角霜 (500)
 鹿衔草 (370)
 路路通 (369)
 lù葎草 (243)
 绿豆 (106)
 绿萼梅 (296)
 稻豆衣 (465)
 luó罗汉果 (559)
 罗布麻 (471)
 luò落新妇 (30)
 络石藤 (186)

【M】

má麻黄 (1)
 麻黄根 (570)
 mǎ马宝 (446)

mǎ勒 (83)
 马齿苋 (89)
 马兜铃 (428)
 马钱子 (613)
 mài麦芽 (301)
 麦门冬 (540)
 mǎn满山红 (432)
 mǎn蔓荆子 (22)
 mǎng芒硝 (145)
 māo猫爪草 (37)
 mǎo毛茛 (607)
 毛冬青 (368)
 茅莓 (127)
 méi玫瑰花 (295)
 méng虻虫 (385)
 礞石 (412)
 mí猕猴桃 (558)
 mǐ米口袋 (70)
 mì密陀僧 (605)
 密蒙花 (40)
 míng明矾 (603)
 mò墨旱莲 (562)
 没药 (376)
 没食子 (588)
 mǔ母丁香 (266)
 牡蛎 (456)
 牡丹皮 (60)
 mù墓头回 (95)
 木瓜 (169)
 木香 (280)
 木通 (218)
 木贼 (28)
 木槿子 (436)
 木槿皮 (610)
 木槿花 (181)
 木鳖子 (616)
 木蝴蝶 (436)

木芙蓉叶 …… (611)	蜣螂 …… (447)	桑白皮 …… (425)
【N】	qíng蔷薇花… (130)	桑寄生 …… (172)
nán南瓜…… (308)	qín秦皮…… (92)	桑螵蛸 …… (584)
南瓜子 …… (309)	秦艽 …… (166)	shā沙参…… (535)
nǎo礞砂…… (602)	芹菜 …… (472)	沙苑子 …… (518)
niú牛黄 …… (74)	qīng青皮 …… (273)	砂仁 …… (204)
牛膝 …… (365)	青蒿 …… (136)	砂仁壳 …… (206)
牛蒡子 …… (16)	青黛 …… (72)	shān山柰 …… (270)
牛筋草 …… (225)	青木香 …… (288)	山楂 …… (298)
nóng农吉利 …… (120)	青风藤 …… (188)	山药 …… (490)
nǚ女贞子 …… (557)	青娘子 …… (386)	山羊角 …… (455)
nuò糯稻根须… (569)	青葙子 …… (41)	山豆根 …… (82)
【O】	轻粉 …… (598)	山茱萸 …… (582)
ču藕节 …… (342)	qǐng苘麻子 … (46)	山慈姑 …… (101)
【P】	qiū秋石 …… (46)	shāng商陆…… (156)
pàng胖大海 … (416)	qū瞿麦 …… (234)	shé蛇莓…… (128)
pèi佩兰 …… (203)	qǔ苜蓿菜 …… (127)	蛇蜕 …… (470)
péng硼砂 …… (601)	quán拳参 …… (77)	蛇床子 …… (614)
pī砒石 …… (596)	全蝎 …… (466)	shè射干… …… (81)
pí枇杷叶 …… (427)	【R】	麝香 …… (473)
pú蒲黄 …… (337)	rén人参… …… (478)	shēn伸筋草 … (182)
蒲公英 …… (68)	人中白 …… (48)	shén神曲 …… (300)
【Q】	人中黄 …… (133)	shēng生姜… …… (4)
qiǎn牵牛子 … (155)	rěn忍冬藤… …… (66)	生姜皮 …… (4)
铅粉 …… (600)	róng戎盐 …… (135)	生地黄 …… (58)
铅丹 …… (600)	ròu肉桂… …… (257)	升麻 …… (26)
千金子 …… (157)	肉苁蓉 …… (503)	升药 …… (599)
千里光 …… (44)	肉豆蔻 …… (573)	shí十大功劳
千年健 …… (181)	rǔ乳香 …… (374)	叶… …… (124)
qián前胡 …… (402)	【S】	石韦 …… (223)
qiè茜草 …… (335)	sān三七… …… (333)	石灰 …… (607)
芡实 …… (581)	三棱 …… (348)	石花 …… (138)
qiāng羌活… …… (9)	sāng桑叶… …… (19)	石膏 …… (30)
	桑枝 …… (171)	石斛 …… (543)
	桑椹 …… (556)	石蒜 …… (593)
		石燕 …… (252)
		石决明 …… (455)

石见穿	……(372)
石南藤	……(190)
石菖蒲	……(477)
石榴皮	……(571)
食盐	……(135)
shǐ使君子	……(305)
shì柿蒂	……(292)
柿霜	……(396)
shòu绶草	……(124)
shú熟地黄	……(528)
shǔ蜀漆	……(591)
蜀羊泉	……(86)
shuǐ水银	……(597)
水蛭	……(383)
水牛角	……(58)
水莎草	……(399)
水菖蒲	……(247)
水蜈蚣	……(247)
水红花子	……(360)
sī丝瓜络	……(612)
sì四季青	……(102)
sōng松节	……(192)
松香	……(618)
松梦	……(115)
松花粉	……(326)
sū苏子	……(424)
苏木	……(378)
苏叶	……(4)
苏梗	……(4)
苏合香	……(475)
suān酸枣仁	……(449)
suō娑罗子	……(293)
suǒ锁阳	……(520)
【T】	
tài太子参	……(485)
tán檀香	……(291)

táo桃仁	……(360)
téng藤黄	……(617)
tiān天麻	……(462)
天葵	……(122)
天雄	……(255)
天门冬	……(542)
天竹黄	……(408)
天仙藤	……(190)
天花粉	……(35)
天南星	……(390)
tián甜杏仁	……(419)
tiě铁落	……(443)
铁树叶	……(354)
铁苋菜	……(241)
tíng葶苈子	……(426)
tōng通草	……(219)
tóng铜绿	……(604)
tòu透骨草	……(188)
tǔ土大黄	……(112)
土牛膝	……(366)
土茯苓	……(79)
土槿皮	……(315)
tù菟丝子	……(517)
【W】	
wǎ瓦松	……(129)
瓦楞子	……(627)
wàn万年青	……(245)
wáng王不留行	……(367)
wēi威灵仙	……(162)
wěi委陵菜	……(91)
wèn问荆	……(239)
wō蜗牛	……(116)
wū乌头	……(255)
乌药	……(283)
乌梅	……(566)

乌梢蛇	……(187)
乌贼骨	……(586)
乌蔹莓	……(106)
乌柏木根皮	……(158)
wú无花果	……(88)
无名异	……(605)
茺蔚	……(312)
吴茱萸	……(258)
蜈蚣	……(467)
wǔ五加皮	……(173)
五倍子	……(568)
五灵脂	……(380)
五味子	……(565)
【X】	
xī西瓜	……(538)
西瓜皮	……(539)
西瓜霜	……(539)
西洋参	……(481)
西瓜翠衣	……(538)
蟋蟀	……(251)
犀角	……(57)
豨莶草	……(167)
xǐ喜树	……(117)
xì细辛	……(260)
xià夏天无	……(195)
夏枯草	……(37)
xiān仙茅	……(504)
仙人掌	……(108)
仙桃草	……(359)
仙鹤草	……(329)
xiāng相思子	……(615)
香附	……(282)
香橼	……(278)
香薷	……(5)
xiàng向日葵子	……(554)
向日葵茎髓	……(238)

向日葵花托	…(237)	yì 蒼苡仁	……(214)	zhào 照山白	…(433)
象皮	……(628)	益智仁	……(513)	zhè 浙贝母	……(407)
象牙	……(445)	益母草	……(355)	蠹虫	……(382)
xǐǎo 小麦	……(569)	yīn 茵陈蒿	……(228)	zhēn 珍珠	……(457)
小蓟	……(318)	yīn 淫羊藿	……(505)	珍珠母	……(453)
小茴香	……(267)	银朱	……(597)	zhī 知母	……(32)
xiè 蕤白	……(289)	银柴胡	……(140)	梔子	……(36)
xīn 辛夷	……(13)	yīng 银粟壳	…(575)	zhī 枫实	……(275)
xìng 杏仁	……(418)	樱桃核	……(29)	枫壳	……(276)
xíng 雄黄	……(595)	yú 鱼鳔	……(533)	枫根子	……(560)
熊胆	……(97)	鱼脑石	……(253)	zhōng 钟乳石	…(270)
xú 徐长卿	……(170)	鱼腥草	……(80)	zhū 猪苓	……(212)
xù 续断	……(508)	榆叶	……(250)	猪毛菜	……(472)
xuān 薰草根	…(248)	榆钱	……(453)	猪秧秧	……(120)
xuán 旋复花	…(399)	榆白皮	……(250)	猪胆汁	……(417)
玄参	……(59)	yǔ 禹余粮	……(575)	朱砂	……(441)
玄明粉	……(146)	yù 玉竹	……(546)	珠子参	……(537)
玄精石	……(47)	玉米须	……(239)	珠儿参	……(537)
xuě 雪上一枝		郁金	……(345)	zhú 竹叶	……(34)
茜	……(609)	郁李仁	……(149)	竹沥	……(409)
xuè 血竭	……(620)	yuán 芫花	……(152)	竹茹	……(409)
血余炭	……(332)	yuǎn 远志	……(450)	竹叶卷心	…(34)
xún 寻骨风	……(182)	yuè 月见草	……(195)	zhù 芝麻根	…(321)

【Y】

yā 鸦片	……(440)
鸦胆子	……(93)
鸭跖草	……(38)
yà 亚麻子	……(553)
yán 延胡索	……(344)
yáng 羊蹄	……(340)
洋金花	……(439)
阳起石	……(525)
yě 野菊花	……(22)
yè 夜明砂	……(42)
夜交藤	……(530)
yí 饴糖	……(496)

【Z】

zàng 藏青果	…(85)	zǐ 自然铜	……(387)
藏角茴	……(530)	zōng 棕榈皮	…(331)
zǎo 枣树皮	……(496)	zuān 钻地风	…(180)
蚤休	……(75)		
zào 皂莢	……(393)		
皂矾	……(603)		
皂角刺	……(394)		
zé 泽兰	……(352)		
泽泻	……(213)		
泽漆	……(232)		
zhōng 樟脑	…(621)		

别名商品名处方名笔画索引

【一画】

- 一活(独活) (161)
- 一见喜(穿心莲) (73)
- 一条香(地耳草) (242)
- 一枝花(泽泻) (213)
- 一枝香(徐长卿) (171)
- 一枝春(茶叶) (397)
- 一枝枪(绶草) (124)
- 一枝梅(刘寄奴) (361)
- 一枝箭(徐长卿)
(石韦) (171)
..... (223)
- 一点红(蒲公英)
(蛇莓) (68)
..... (128)
- 一包针(千年健)
(狼把草) (181)
..... (111)
- 一串钱(金钱草) (221)

- 一把伞(千金子)
..... (153)
- (鬼臼) (45)
- (泽漆) (232)
- 一把抓(卷柏)
..... (325)
- (打破碗花花) (316)
- 一把香(狼毒) (159)
- 一扫光(千里光) (41)
- 一面锣(金钱草) (221)
- 一粒珠(水蜈蚣) (247)
- 一粒雪(水蜈蚣) (247)
- 一窝虎(百部) (420)
- 一兜棕(白芨) (331)
- 一盏灯(筋骨草) (105)
- 一线香(绶草) (124)
- 一碗水(鬼臼) (45)
- 一盘棋(大戟) (154)

- 一丈菊子(向日葵子)
..... (554)
- 一枝黄花(柴胡) (25)
- 一枝箭根(石蒜)
(地榆) (322)
- 一粒子草(水蜈蚣) (247)
- 一把伞根(天南星) (300)
- 一轮贝母(川贝母) (406)
- 一叶一支花(绶草) (124)
- 一丈菊花托(向日葵花
托) (237)
- 乙金(郁金) (345)

【二画】

- 二花(金银花) (65)
- 二丑(牵牛子) (155)
- 二人抬(黄芪) (486)
- 二月花(辛夷)
(瓜子金) (18)
..... (437)

三叶葎(白花蛇舌草)(234)	七叶(常山)(590)
二杠葎(鹿葎)(499)	七庵(刺蒺藜)(464)
二花藤(忍冬藤)(66)	七寸金(地耳草)(242)
二宝花(金银花)(65)	七寸风(威灵仙)(163)
二莖葎(施葎)(498)	七子莲(蚤休)(75)
二泉胶(阿胶)(532)	七爪红(橘红)(273)
二蚕砂(蚕砂)(180)	七叶金(接骨木)(378)
二郎戟(鹅不食草)(196)	七叶胆(绞股蓝)(107)
二宝花藤(忍冬藤)(66)	七箇灯(铁苋菜)(241)
二蕊玉竹(玉竹)(547)	七里光(千里光)(44)
十药(鱼腥草)(81)	七星叶(木芙蓉叶)(611)
十二根(天门冬)(542)	七星草(车前草)(217)
十月红(草珊瑚)(103)	丁香(篇蓄)(233)
十开叩(白豆蔻)(206)	七星剑(石韦)(223)
十开蔻(白豆蔻)(206)	七层塔(蚤休)(75)
十字草(水蜈蚣)(247)	(地耳草)(242)
十样错(玉竹)(546)	七角莲(鬼臼)(45)
十样锦(瞿麦)(234)	七厘丹(藜芦)(592)
十样景(瞿麦)(273)	七麻根(了哥王)	

.....(110)	卜氏谷精草(谷精草)(480)
七粒扣(龙葵)(39)	人参粉(人参)
.....(122)	人交(秦艽)(480)
七叶黄荆(接骨木)(166)	人退炭(血余炭)
.....(378)	人艽(秦艽)(332)
(黄荆)(166)	人胎盘(紫河车)
.....(438)	人苋(铁苋菜)(516)
七叶遮花(蚤休)(241)	人熊胆(熊胆)
.....(75)	人言(砒石)(97)
七星草子(车前子)(596)	人工牛黄(牛黄)
.....(215)	人参(太子参)(74)
七星梅花(蔷薇花)(485)	人工珍珠(珍珠)
.....(130)	人信(砒石)(458)
七制香附(香附)(596)	人参三七(三七)
.....(283)	人微(人参)(333)
七姊妹花(蔷薇花)(479)	人造朱砂(银朱)
.....(130)	人衛(人参)(597)
七角莲根(白芨)(479)	人金(郁金)
.....(98)	人柳(柽柳)(345)
七叶一枝花(蚤休)(15)	入山虎(两面针)
.....(75)	人胞(紫河车)(109)
七叶一盏灯(蚤休)(516)	入地虎(两面针)
.....(75.)	人蔞(人参)(109)
卜子(莱菔子)(479)	入地金牛(两面针)
.....(303)	人丹草(薄荷)(109)
卜可(薄荷)(15)	八角(八角茴香)
.....(16)	人头菌(马勃)(268)
卜荷(薄荷)(83)	八树(鬼箭羽)
.....(16)	人头发(藜芦)(372)
卜黄(蒲黄)(592)	八八打(角茴香)
.....(337)	人发炭(血余炭)(87)
卜公英(蒲公英)(332)	八月札(八月札)
.....(68.)	人参片(人参)(294)
卜奎芪(黄芪)(480)	八月瓜(八月札)
.....(486.)	人参条(人参)(294)
卜地蜈蚣(蒲公英)(480)	八月炸(八月札)
.....(68.)	人参须(人参)(294)

八仙草(猪秧秧)(616)	八角大茴香(八角茴香)(258)
.....(120)			
八仙草(景天三七)(218)	八角兵盘七(鬼白)(45)
.....(335)	(巴戟天)		
八仙党(党参)(501)	八角梧桐叶(臭梧桐)(169)
.....(482)			
八百力(巴豆)(418)	八卦仙桃草(仙桃草)(539)
.....(153)			
八百嵐(天门冬)(335)	八重山珊瑚(相思子)(615)
.....(542)			
八字蓼(蘡草)(433)	儿茶(孩儿茶)(619)
.....(194)			
八角七(鬼臼)(99)	儿草(知母)(32)
.....(45)			
八角乌(鬼臼)(24)	儿卿(薰本)(11)
.....(45)			
八角刺(刺蒺藜)(360)	儿草花(芫花)(152)
.....(423)			
(苦丁茶)(359)	儿草根(山药)(490)
.....(43)			
八角茶(苦丁茶)(268)	儿茶羔(孩儿茶)(619)
.....(43)			
八角珠(八角茴香)(46)	儿茶膏(孩儿茶)(619)
.....(268)			
八角盘(蚤休)(423)	儿鹿草(知母)(32)
.....(75)			
(鬼臼)(45)	九白(薤白)(289)
.....(45)			
八角莲(鬼臼)(268)	九白(鬼臼)(45)
.....(45)			
八角鏡(鬼臼)(169)	九地(熟地黄)(528)
.....(45)			
八卦牛(白蔹)(359)	九菜(韭菜)(290)
.....(98)			
八卦藤(红藤)(99)	九九花(款冬花)(423)
.....(98)			
八麻子(蓖麻子)(498)	九子萍(浮萍)	

.....(27)	九节风(草珊瑚)(491)
九女春(鹿茸)(108)	九扭子(枳椇子)
.....(498)	九节龙(荭草)(560)
九牛力(白薇)(194)	九连灯(槐角)
.....(138)	九节兰(草珊瑚)(329)
九牛子(金果榄)(108)	九连环(金钱草)
.....(84)	九节红(草珊瑚)(222)
九牛草(刘寄奴)(108)	九里光(刘寄奴)
.....(351)	九节花(草珊瑚)(351)
九牛胆(金果榄)(108)(千里光)
.....(84)	九节茶(草珊瑚)(44)
九元蠶(川芎)(108)	九里明(千里光)
.....(343)	九节肿(夹竹桃)(44)
九孔子(路路通)(249)	九里香(金钱草)
.....(369)	九节莲(鱼腥草)(221)
九孔贝(石决明)(80)	九根角(白薇)
.....(455)(万年青)(138)
九孔螺(石决明)(245)	九层风(鸡血藤)
.....(456)	九节离(石菖蒲)(373)
九吉牛(锦灯笼)(477)	九层塔(零陵香)
.....(88)	九节菖(石菖蒲)(209)
九龙光(千里光)(477)	九层楼(蚤休)
.....(41)	九节蒲(草珊瑚)(75)
九龙花(芫花)(108)	九层蒜(石蒜)
.....(152)	九白头(薤白)(523)
九龙明(千里光)(289)	九岭光(千里光)
.....(44)	九丛根(百部)(44)
九龙胆(金果榄)(491)	九空子(路路通)
.....(84)	九头叶(木芙蓉叶)(369)
九龙蛇(绶草)(611)	九草阶(威灵仙)
.....(124)	九头香(水蜈蚣)(162)
九龙根(茜草)(247)	九信草(了哥王)
.....(325)	九头狮(徐长卿)(110)
(虎杖)(170)	九信菜(了哥王)
.....(354)	九光丹(铅丹)(110)
九龙眼(虎杖)(600)	九菜子(韭子)
.....(354)	九虫根(百部)(524)

九黄姜(山药)(170)	刀坝豆(刀豆)
.....(490)	(甘遂)(291)
九道鞭(蚤休)(151)	刀芡实(芡实)
.....(75)	(大戟)(581)
九蓬根(香附)(154)	刀枪药(拳参)
.....(282)	(马齿苋)(77)
九子十弟(天门冬)(89)	刀侠豆(刀豆)
.....(542)	九死还魂草(卷柏)(291)
九孔石决(石决明)(325)	刀培豆(刀豆)
.....(455)	了刁竹(徐长卿)(291)
九孔决明(石决明)(170)	刀剪药(拳参)
.....(455)	了哥王(白花蛇舌草)(77)
九孔海决(石决明)(96)	刀箭药(拳参)
.....(455)	了哥麻(了哥王)(77)
九孔鲍壳(石决明)(110)	(石韦)
.....(455)	了哥王叶(了哥王)(223)
九节龙子(水红花子)(110)	刀螂子(桑螵蛸)
.....(360)	了哥王根(了哥王)(584)
九节龙花(荭草花)(110)	刀螂窝(桑螵蛸)
.....(359)	了哥王根皮(了哥王)(584)
九节菖蒲(石菖蒲)	刀口药(石韦)	刀鞘豆(刀豆)
.....(477)(223)(291)
九肋鳖甲(鳖甲)	(仙鹤草)	刀口药芽(鹤草芽)
.....(564)(329)(309)
九真藤根(何首乌)	刀巴豆(刀豆)	刀瓜山树叶(十大功劳叶)
.....(529)(291)(124)
九眼独活(独活)	刀尖茶(鬼箭羽)	刁安(肉桂)
.....(161)(372)(257)
九蒸熟地(熟地黄)	刀尖药(石韦)	刁铃(马兜铃)
.....(528)(223)(428)
九十九条根(百部)	刀豆子(刀豆)	刁雄(雄黄)
.....(491)(291)(595)
九孔石决明(石决明)	刀豆角(刀豆)	刁海龙(海龙)
.....(455)(291)(523)
九龙吐珠草(地锦草)	刀把豆(刀豆)	力芦(藜芦)
.....(104)(291)(592)
九头狮子草(徐长卿)		力参(人参)

.....(479)	三四风(蛇莓)(170)
力核(荔枝核)(287)(128)	三百棒(景天三七)(333)
乃东(夏枯草)(37)	三爪凤(蛇莓)	(天门冬)(542)
【三画】	三爪龙(蛇莓)	三角子(茺蔚子)(355)
三元(龙眼肉)(534)	三叉凤(淫羊藿)	三角叩(白豆蔻)(206)
三全(龙眼肉)(534)	三叉骨(淫羊藿)	三角刺(刺蒺藜)(463)
三秀(山柰)(270)	三月泡(钻地风)	三角草(芥菜)(319)
三秀(灵芝)(255)(茅莓)	(水蜈蚣)(247)
三柰(山柰)(270)(127)	三角莲(淫羊藿)(505)
三赖(山柰)(270)	三月薰(覆盆子)	三角菜(鸭跖草)(38)
三辣(山柰)(270)(585)	三角蔻(白豆蔻)(206)
三廉(连翫)(67)	三节剑(鹅不食草)	三角酸(酢浆草)(241)
三蘡(山柰)(270)(196)	三角藻(海藻)(413)
三七仔(垂盆草)(79)	三叶老(半夏)	三步跳(半夏)(388)
三七参(三七)(333)(388)	(水蜈蚣)(247)
三七粉(三七)(333)	三叶莓(蛇莓)	三岔茸(鹿茸)(499)
三万花(长春花)(118)(128)	三层草(蚤休)(75)
三牙钻(鹅不食草)(196)	三白丹(升药)	三奈子(山柰)(270)
三牙戟(鹅不食草)(196)(599)	三面青(狗脊)(509)
	三仙丹(升药)	
(599)	
	三仙散(升药)	
(599)	
	三皮风(蛇莓)	
(128)	
	三百根(白薇)	
(138)	
	(徐长卿)	

三春柳(柽柳)(104)	三角蔻壳(豆蔻壳)(206)
三变叶(木芙蓉叶)(611)	三角藤根(巴戟天)(501)
三庚草(青蒿)(136)	三裂半夏(半夏)(388)
三葵草(水蜈蚣)(247)	三叶菜根(党参)(482)
三葵菜(鸭跖草)(38)	三叶酸草(酢浆草)(241)
三点红(蛇莓)(128)	三叶酸浆(酢浆草)(241)
三眼柳(柽柳)(15)	三叶荔枝(金樱子)(533)
三脚虎(毛茛)(607)	三百两银(天仙藤)(190)
	(蛇莓)	三花龙胆(龙胆草)(54)
(123)	三针松果(白松塔)(433)
三棱子(乌梢蛇)(107)	三针松球(白松塔)(433)
三棱环(水蜈蚣)(247)	三针松塔(白松塔)(433)
三棱花(雷公藤)(610)	三角牛虻(虻虫)(385)
三棱草(水莎草)(899)	三角枫果(路路通)(369)
三棒子(天南星)(300)	三角胡麻(茺蔚子)(355)
三箭草(水蜈蚣)(247)		(黑芝麻)
三十六桶(石蒜)(593)	(552)
三人扛珠(水蜈蚣)(247)		(益母草)
三叉明棵(猪毛菜)(472)	三角棱草(水蜈蚣)(355)
三月黄花(地锦草)		三角蒺藜(刺蒺藜)(247)
		(463)
		三角叶黄连(黄连)(512)

.....(50)	干百合(百合)(559)
三角叶薯蓣(山药)(490)	干地龙(地龙)(469)	干葛根(葛根)(23)
三枝九叶草(淫羊藿)(505)	干地黄(生地黄)(58)	干紫苏(紫苏)(3)
三黄汤水甘石(炉甘石)(606)	干吊颤(瓦松)(129)	干滴落(瓦松)(129)
千子(无名异)(605)	干红花(番红花)(363)	干藕节(藕节)(342)
干归(当归)(526)	干芦根(芦根)(33)	干巴儿茶(孩儿茶)(619)
干白(当归)(526)	干鸡筋(淫羊藿)(505)	干石菖蒲(石菖蒲)(477)
干茄(胡颓子)(304)	干青果(橄榄)(558)	干枣树皮(枣树皮)(495)
干枣(大枣)(495)	干荷叶(荷叶)(579)	干罗汉果(罗汉果)(559)
干葛(葛根)(23)	干荷花(荷花)(578)	干番红花(番红花)(363)
干蝎(全蝎)(466)	干荷梗(荷梗)(580)	干藏红花(番红花)(363)
干蔗(甘蔗)(539)	干枝梅(乌梅)(566)	干术(白术)(489)
干山药(山药)(490)	干姜片(干姜)(266)	干肉(山茱萸)(582)
干木瓜(木瓜)(169)	干油菜(蔊菜)(417)	干白术(白术)(489)
干艾叶(艾叶)(338)	干首乌(何首乌)(529)	干潜术(白术)(489)
干叶片(夏枯草)(37)	干莲房(莲房)(579)	土子(无名异)(605)
干石斛(石斛)(543)	干菊花(菊花)(21)	上元(蜃虫)(382)
干生地(生地黄)(58)	干蚯蚓(地龙)(469)	土龙(地龙)(469)
干生姜(干姜)(256)	干橘实(楮实)	土瓜(瓜蒌)(404)

土芋(黄药子)	(沙参)…(535)	土木通(青风藤)
………(415)		………(188)
土芎(藁本)	土人参(大蓟)	(木通)
………(11)	………(316)	………(218)
土虫(蠧虫)	(桔梗)	土木鳖(木鳖子)
………(382)	………(395)	………(616)
土朱(代赭石)	(大戟)	土太片(土茯苓)
………(460)	………(154)	………(79)
土豆(天麻)	土几红(地榆)	土贝母(马兜铃)
………(463)	………(322)	………(428)
土卵(黄药子)	土三七(佛甲草)	土丹参(茜草)
………(415)	………(119)	………(335)
土别(蠧虫)…(382)	(土大黄)	(丹参)
土苓(土茯苓)	………(112)	………(349)
………(79)	(景天三七)	土牛儿(蜗牛)
土狗(蝼蛄)	………(335)	………(116)
………(251)	(垂盆草)	土牛夕(土牛膝)
土参(银柴胡)	………(79)	………(366)
………(140)	(菊叶三七)	土公英(蒲公英)
土菜(翻白草)	………(335)	………(68)
………(56)	土大黄(金不换)	土升麻(升麻)
土硝(芒硝)	………(340)	………(26)
………(145)	(大青叶)	土龙骨(龙骨)
土蕃(山药)	………(70)	………(444)
………(490)	(羊蹄)	土龙根(板蓝根)
土精(人参)	………(340)	………(71)
………(479)	土山薯(穿山龙)	土白术(白术)
土藤(青风藤)	………(371)	………(489)
………(188)	土川连(黄连)	土白芍(仙茅)
土蟶(地龙)	………(51)	………(504)
………(469)	土五加(五加皮)	土冬瓜(商陆)
土鳖(蠧虫)	………(173)	………(156)
………(382)	土木瓜(木瓜)	土母鸡(商陆)
土麝(青木香)	………(169)	………(156)
………(288)	土木别(木鳖子)	土加藤(五加皮)
土人参(翻白草)	………(616)	………(173)
………(56)	土木香(青木香)	土半夏(半夏)
	………(288)	

..... (388)	土附子(乌头) (167)
土百部(百部)	土灵仙(威灵仙)	土茯苓(萆薢)
..... (419) (162) (226)
土地丁(紫花地丁)	土灵芝(黄精)	土茜草(茜草)
..... (69)	土陈皮(橘皮) (335)
土地龙(地龙)	土沉香(沉香)	土茴香(小茴香)
..... (469)	土枣皮(山茱萸)	土虻虫(虻虫)
土地瓜(白蔹)	土狗子(蝼蛄) (385)
..... (98)	土狗崽(蝼蛄)	土香薷(香薷)
土地榆(虎杖)	土知母(射干) (5)
..... (354)	土质汗(益母草)	土首乌(黄药子)
(地榆)	土细辛(细辛) (415)
..... (322) (260)	土洋参(大蓟)
土当归(前胡) (积雪草) (316)
..... (402) (225)	(翻白草)
土防己(防己) (徐长卿) (56)
..... (164) (170)	土柴胡(水蜈蚣)
土防风(地耳草)	土砂仁(砂仁) (247)
..... (242) (204)	(黄荆)
(蜀羊泉)	土砂壳(砂仁壳) (438)
..... (86)	土荆皮(土槿皮)	(柴胡)
土红花(大蓟) (315) (24)
..... (316)	土枸杞(枸杞子)	土狼毒(狼毒)
土麦门(竹叶) (555) (159)
..... (34)	土茵陈(茵陈蒿)	土萸肉(胡颓子)
土麦冬(麦门冬) (228) (304)
..... (540)	土茯虱(豨莶草)	土黄连(地柏枝)
土杜仲(杜仲) (326)
..... (507)		(黄藤)
土豆根(山豆根) (243)
..... (82)		(黄连)
土花椒(花椒) (50)
..... (263)		(萆薢)
土别虫(蠅虫) (226)
..... (382)		土黄芪(冬葵子)
土延胡(延胡索) (236)
..... (344)		

(黄芪)(202)	下甲(龟板)(563)
土黄柏(黄柏)(382)	下山虎(商陆)(156)
(十大功劳叶)(615)	(两面针)(109)
(124)			
土菖蒲(水菖蒲)(43)	下马仙(大戟)(154)
(247)			
土草薢(土茯苓)(159)	下奶药(萱草根)(248)
(79)			
土常山(常山)(41)	下山虎子(金樱子)(583)
(590)			
(黄荆)		下河川草(甘草)(493)
(433)			
土兜铃(马兜铃)(48)	下须生晒参(人参)(480)
(428)			
土银花(金银花)(526)	下须生晒参(人参)(480)
(65)			
土密砂(砂仁)(335)	万斤(照山白)(433)
(204)			
土蓼房(蓼房子)(351)	万年(木通)(218)
(426)			
土紫菀(紫菀)(206)	万丈龙(马兜铃)(428)
(421)			
土犀角(筋骨草)(486)	万年冰(人中白)(48)
(105)			
土棟子(川棟子)(555)	万年青(卷柏)(325)
(286)			
土蟬衣(蟬蛻)(260)	万年松(伸筋草)(182)
(17)			
土澄茄(茅澄茄)(355)	万年草(佛甲草)(119)
(264)		(半支蓮)(118)
土橘皮(橘皮)(185)		
(271)		万年荞(金荞麦)(103)
土薯蕷(草薢)(396)		
(226)		万年蒿(茵陈蒿)	
土藿香(藿香)(190)		

.....(223)	万字金銀(絡石藤)(415)
万年霜(人中白)(43)(186)	大莽(莽草)(319)
万年藤(木通)(218)	万根草根(白茅根)(321)	大药(桔梗)(395)
万岁藤(伸筋草)(182)	万病仙草(穿心莲)(73)	(细辛)(260)
万字果(枳椇子)(530)	大王(大黄)(143)	大挺(鹿茸)(498)
万寿竹(黄精)(547) (白薇)(133)	大云(肉苁蓉)(503)	大适(葶苈子)(426)
万寿果(枳椇子)(560)	大贝(浙贝母)(407)	大室(葶苈子)(426)
万把钩(牛蒡子)(16)	大毛(大腹皮)(207)	大活(独活)(161)
万金子(蔓荆子)(22)	大羌(秦艽)(166)	大盐(食盐)(135)
万经裸(照山白)(433)	大札(益母草)(355)	大桂(肉桂)(257)
万京子(蔓荆子)(22)	大白(槟榔)(307)	大海(胖大海)(416)
万荆子(蔓荆子)(22)	大发(胖大海)(416)	大烟(鸦片)(440)
万荆头(照山白)(433)	大兰(瞿麦)(234)	大菊(瞿麦)(234)
万病草(细辛)(260)	大萼(川芎)(343)	大翘(连翘)(67)
万岁子仁(胡桃肉)(515)	大吉(大戟)(154)	大椒(花椒)(263)
万岁藤根(天门冬)(542)	大芩(黄芩)(48)	大戟(泽漆)(232)
万年青叶(万年青)(245)	大花(丁香)(265)	大嗽(甘草)(493)
万年青根(万年青)(245)	大芸(肉苁蓉)(513)	大薊(小薊)(318)
	大青(大青叶)(70)	(飞廉)(126)
	大苦(黄药子)	

大蓼(葍草)(215)	大叶茶(苦丁茶)(43)
大藻(浮萍)(27)	大叶草(豨莶草)(167)
大八角(八角茴香)(268)	大叶藜(地锦草)(104)
大刀豆(刀豆)(291)	大甲片(穿山甲)(381)
大力子(牛蒡子)(16)	大白片(槟榔)(307)
大力王(飞廉)(126)	大白芍(白芍)(531)
大力草(藏角蒿)(530)	大白模(槟榔)(307)
大力参(人参)(480)	大生地(生地黄)(58)
大土元(蜃虫)(382)	大发汗(石见穿)(372)
大大黄(大黄)(143)	大头花(夏枯草)(37)
大弋豆(刀豆)(291)	大头羌(羌活)(9)
大山楂(山楂)(298)	大头参(天南星)(390)
大川芎(川芎)(343)	大头鬼(羚羊角)(454)
大马勃(马勃)(83)	大头党(党参)(482)
大马蓼(葍草)(194)	大头翁(打破碗花花)(316)
大五爪(楠红)(272)	大头黄(羊蹄)(340)
大天冬(天门冬)(542)	大头蒜(大蒜)(608)
大云苓(茯苓)(210)	大玄参(玄参)(59)
大车前(车前子)(124)	大百合(百合)	

.....(550)	大杏仁(甜杏仁).....(419)(486)
大百砂(白薇)(138)	大李仁(郁李仁).....(149)	大肚瓜(瓜蒌).....(404)
大百部(百部)(419)	大苍术(苍术).....(198)	大皂角(皂荚).....(393)
大百解(大青叶)(70)	大块瓦(山慈姑).....(101)	大皂莢(皂莢).....(393)
大西瓜(西瓜)(538)	大麦毛(麦芽).....(301)	大牡蛎(牡蛎).....(456)
大有芪(黄芪)(486)	大麦牛(王不留行).....(367)	大谷穗(海藻).....(413)
大虫杖(虎杖)(354)	大麦冬(麦门冬).....(540)	大诃子(诃子).....(572)
大虫骨(虎骨)(175)	大麦奶(胡颓子).....(304)	大沙参(沙参).....(535)
大血通(红藤)(93)	大麦芽(麦芽).....(301)	大茴砂(白薇).....(138)
大血藤(海风藤)(187)	大麦泡(覆盆子).....(585)	大良姜(高良姜).....(266)
(红麻)(93)	大麦莓(覆盆子).....(585)	大青木(地骨皮).....(139)
(鸡血藤)(373)	大麦蘖(麦芽).....(301)	大青皮(青皮).....(273)
大红花(红花)(361)	大豆皮(稽豆衣).....(465)	大青草(铁苋菜).....(241)
大红枣(大枣)(495)	大豆衣(稽豆衣).....(465)	大青根(板蓝根).....(71)
大红袍(花椒)(263)	大豆卷(大豆黄卷).....(19)	大青盐(戎盐).....(135)
(丹参)(349)	大豆蘖(大豆黄卷).....(19)	大枝芩(黄芩).....(48)
(猕猴桃)(558)	大花椒(花椒).....(263)	大枝核(荔枝核).....(287)
大关节(车前子)(215)	大芦水(知母).....(32)	大板桂(肉桂).....(257)
大米花(芫花)(152)	大嵒芪(黄芪).....(316)	大刺盖(大薊).....(316)

大枫子(大风子)(612)	大秦艽(秦艽)(416)	大黄菊(菊花)(21)
大枫藤(青风藤)(188)	大桃仁(桃仁)(360)	大黄藤(黄藤)(243)
大金刀(常山)(590)	大恶鸡(大薊)(316)	大菽衣(稻豆衣)(465)
大金英(金樱子)(583)	大砧草(茜草)(335)	大菽皮(稻豆衣)(465)
大朋砂(硼砂)(601)	大牵药(土大黄)(112)	大接骨(豨莶草)(167)
大泽兰(佩兰)(203)	大鸭草(爵床)(111)	(薜草)(194)
大茴香(八角茴香)(268)	大蚌壳(珍珠母)(458)	大救驾(鵝不食草)(196)
(小茴香)(267)	大狼毒(狼毒)(159)	大麻子(火麻仁)(148)
大荔枝核(荔枝核)(287)	大将军(狼毒)(159)	(蓖麻子)(616)
大枳壳(枳壳)(276)	(蜣螂)(447)	大麻仁(火麻仁)(148)
大草蔻(草豆蔻)(203)	大海子(胖大海)(416)	大葱子(葱实)(524)
大砂王(砂仁)(204)	大海马(海马)(522)	大葱白(葱白)(14)
大贯众(贯众)(313)	大海龙(海龙)(523)	大葱实(葱实)(524)
大活血(鸡血藤)(373)	大海决(石决明)(455)	大蒜薹(蒜薹)(233)
(红藤)(93)	大海榄(胖大海)(416)	大戟苗(泽漆)(232)
(虎杖)(354)	大通草(通草)(219)	大戟花(泽漆)(232)
大胡麻(亚麻子)(563)	大通塔(通草)(219)	大翹子(连翹)(67)
大胜子(黑脂麻)(552)	大烟壳(罂粟壳)(575)	大斑蝥(斑蝥)(622)
大洞果(胖大海)				大椒目(椒目)	

.....(263)	大蕨菜(骨碎补)(540)
大紫草(紫草)(63)	大熟地(熟地黄)(528)	大叶枫果(路路通)(369)
大象牙(象牙)(445)	大鹤虱(鹤虱)(310)	大叶青藤(青风藤)(188)
大象皮(象皮)(628)	大蝼蛄(蝼蛄)(251)	大叶茜草(茜草)(385)
大蓝叶(大青叶)(70)	大壁虎(蛤蚧)(514)	大叶贯众(贯众)(313)
大蓝根(板蓝根)(71)	大九股牛(天麻)(462)	大叶钩藤(钩藤)(461)
大薄子(茺蔚)(413)	大子瓜蒌(瓜蒌)(404)	大叶秦艽(秦艽)(166)
大薄片(萹蓄)(233)	大马蹄草(积雪草)(225)	大叶海藻(海藻)(413)
大薊草(大蓟)(316)	大车前子(车前子)(215)	大叶菖蒲(石菖蒲)(477) (水菖蒲)(247)
大薊根(大蓟)(316)	大毛药芽(鹤草芽)(309)	大叶桦皮(秦皮)(92)
大蒜头(大蒜)(608)	大毛蓼子(水红花子)(360)	大叶紫珠(紫珠)(320)
大零桃(猕猴桃)(558)	大毛蓼花(茺草花)(359)	大叶蔷薇(金樱子)(583)
大蜈蚣(蜈蚣)(467)	大风子油(大风子)(612)	大叶蒴藋(接骨木)(378)
大腹子(槟榔)(307)	大牛喳口(大蓟)(316)	大叶糙苏(糙苏)(194)
大腹毛(大腹皮)(297)	大火草根(白头翁)(89)	大叶藜芦(藜芦)(592)
大腹绒(大腹皮)(297)	大叶三七(三七)(333)	大白花蛇(白花蛇)(177)
大蓼子(水红花子)(300)(珠儿参)(537)	大仙藤根(茜草)(335)
大蓼花(荭草花)(559)	大叶石韦(石韦)(223)	
大榧子(榧子)(312)	大叶麦冬(麦门冬)	

大头菜子(薤白)(221)	大果榆糊(茺荑)(312)
.....(289)			
大头党参(党参)(482)	大齿当归(前胡)(402)
.....(482)			
大耳猬皮(刺猬皮)(587)	大金钱草(金钱草)(221)
.....(587)		(积雪草)(225)
大耳鼠兔(五灵脂)(380)	大爬山虎(骨碎补)(510)
.....(380)			
大地毛公(伸筋草)(182)	大闹羊花(洋金花)(439)
.....(182)			
大地风消(矮地茶)(430)	大树紫珠(紫珠)(320)
.....(430)			
大当门根(天门冬)(542)	大胡麻子(亚麻子)(553)
.....(542)			
大瓜蒌根(天花粉)(35)	大威灵仙(草珊瑚)(108)
.....(35)			
大羊角瓢(白薇)(138)	大恶鸡婆(大薊)(316)
.....(138)			
大红袍目(椒目)(263)	大桔楼子(瓜蒌子)(434)
.....(263)			
大麦前果(胡颓子)(304)	大肺筋草(鹿衔草)(370)
.....(304)			
大花丁香(丁香)(265)	大鬼针草(狼把草)(111)
.....(265)			
大花地榆(地榆)(322)	大铁马鞭(萹蓄)(233)
.....(322)			
大花细辛(细辛)(260)	大脑袋花(漏芦)(100)
.....(260)			
大花梔子(梔子)(36)	大狼把草(狼把草)(111)
.....(36)			
大花蒺藜(刺蒺藜)(463)	大海浮石(海浮石)(410)
.....(463)			
大苋菜根(商陆)(156)	大涩拉秧(葎草)(243)
.....(156)			
大连天草(石韦)(223)	大禹良姜(高良姜)	
.....(223)			
大连钱草(金钱草)			

..... (266)	大碗花皮 (木槿皮) (610) (611)
大烟蒂壳 (烟蒂壳) (575)	大颠马卜 (马勃) (83)	大叶青木香 (青木香) (288)
大烟蒂壳 (烟蒂壳) (575)	大腹槟榔 (槟榔) (307)	大叶青绳儿 (青风藤) (188)
大菟丝子 (菟丝子) (517)	大鹤虱根 (白前) (401)	大叶苦柄皮 (秦皮) (92)
大黄头树 (了哥王) (110)	大颠茄花 (洋金花) (439)	大叶刺黄柏 (十大功劳叶) (124)
大黄蜂房 (露蜂房) (624)	大三叶升麻 (升麻) (26)	大叶金钱草 (积雪草) (225)
大理木香 (木香) (280)	大乌壳硬虫 (蟑螂) (447)	（ 金钱草 ） (221)
（ 青木香 ） (288)	大叶刀椒草 (筋骨草) (105)	大叶骨碎补 (骨碎补) (510)
大理藜芦 (藜芦) (592)	大叶马兜铃 (马兜铃) (428)	大叶黄柏叶 (十大功劳叶) (124)
大接骨子 (水红花子) (306)	（ 青木香 ） (288)	大叶接骨木 (接骨木) (378)
大接骨丹 (接骨木) (378)	大叶五爪龙 (草草) (243)	大叶蛇总管 (虎杖) (354)
大接骨花 (蕺草花) (359)	大叶五加皮 (通草) (219)	大叶猫枝箭 (两面针) (109)
大喇叭花 (洋金花) (439)	大叶巴戟子 (胡颓子) (304)	大叶淫羊藿 (淫羊藿) (505)
大眼脑石 (鱼脑石) (253)	大叶双龙眼 (巴豆) (153)	大号七星剑 (石韦) (223)
大猫儿眼 (大戟) (154)	大叶冬青叶 (苦丁茶) (43)	大红黄泡根 (钻地风) (180)
大旋复花 (旋复花) (399)	大叶冬蓝根 (板蓝根) (71)	大花马齿苋 (半支莲) (118)
大麻子花 (洋金花) (439)	大叶竹节参 (三七) (333)	大花甘松香 (甘松) (293)
大散红花 (红花) (361)	大叶伤筋草 (积雪草) (225)	大花罗布麻 (罗布麻) (471)
大碗花根 (白头翁) (89)	大叶芙蓉叶 (木芙蓉叶)	大花香蔷薇 (金樱子) (583)

大花独蒜兰(山慈姑)(335)	寸荷梗(荷梗)(580)
.....(101)		寸菖蒲(石菖蒲)(477)
大花益母草(益母草)(557)	寸八节芽(鹤草芽)(309)
.....(355)		寸干老鸦扇(射干)(81)
大花萱草根(萱草根)(92)	上甲(鳖甲)(564)
.....(248)		上草(黄连)(50)
大花淫羊藿(淫羊藿)(583)	上党(党参)(482)
.....(505)		上山虎(两面针)(109)
大豆菟丝子(菟丝子)(537)	上川连(黄连)(50)
.....(517)		上已菜(芥菜)(319)
大连弯牡蛎(牡蛎)(390)	上天梯(徐长卿)(170)
.....(456)		白薇(138)
大苞栝楼子(瓜蒌子)(253)	上肉桂(肉桂)(257)
.....(434)		上官桂(肉桂)(257)
大枝羚羊角(羚羊角)(554)	上油桂(肉桂)(257)
.....(454)		上树风(石南藤)(190)
大根牛皮消(何首乌)(237)	上党参(党参)(482)
.....(529)		上竹龙根(白蔹)(98)
大翅猪毛菜(猪毛菜)(81)	上河川草(甘草)	
.....(472)			
大赶杖叶根(白鲜皮)(503)		
.....(99)			
大将军草根(白头翁)(540)		
.....(89)			
大离良姜子(红豆蔻)(503)		
.....(267)			
大黄草石斛(石斛)(473)		
.....(543)			
大黄鱼脑石(鱼脑石)(329)		
.....(253)			
大粒车前子(车前子)(177)		
.....(215)			
大粒菟丝子(菟丝子)(540)		
.....(517)			
大麻叶泽兰(佩兰)(242)		
.....(203)			
大锯锯藤根(茜草)(221)		

上树龙花(凌霄花)	山苋(牛膝)	山烟(白薇)
.....(364)(365)(133)
上树蜈蚣(凌霄花)	山连(白术)	山菜(柴胡)
.....(364)(439)(24)
上党人参(党参)	山伯(何首乌)	山萸(山茱萸)
.....(483)(529)(582)
口芪(黄芪)	山林(三棱)	山梨(山楂)
.....(486)(348)(298)
口党(党参)	山柰(山柰)	山葱(藜芦)
.....(432)(270)(592)
口防风(防风)	山楂(梔子)	山棱(三棱)
.....(7)(36)(348)
口党参(党参)	山参(人参)	山椒(两面针)
.....(482)(478)(109)
口黄芪(黄芪)	(丹参)	(花椒)
.....(486)(349)(263)
口麝香(麝香)	山荆(黄荆)	山棕(仙茅)
.....(473)(433)(504)
山丹(百合)	山苣(薰本)	山赖(山柰)
.....(550)(11)(270)
山牛(土茯苓)	山楂(山楂)	山蕗(山药)
.....(79)(298)(490)
山甲(穿山甲)	山梔(梔子)	山蒟(白术)
.....(381)(30)(489)
山冬(竹叶)	山哥(何首乌)	山蒟(石南藤)
.....(34)(529)(190)
山奴(何首乌)	山虾(拳参)	(海风藤)
.....(529)(77)(187)
山兰(泽兰)	山姜(玉竹)	山蜗(蜗牛)
.....(352)(546)(116)
(佩兰)	山姜(黄精)	山蓼(威灵仙)
.....(203)(547)(162)
山芋(山药)	(白术)	山漆(三七)
.....(490)(489)(333)
山芥(白术)	山薜(薜荔子)	山精(何首乌)
.....(489)(585)(529)
	山翁(何首乌)	

(白术)(162)	(白薇)(138)
.....(489)	山丹花(狼毒)(159)	山生姜(黄精)
山蕲(当归)(159)(547)	山冬青(毛冬青)
.....(526)	山乌龟(防己)(164)(368)
山楂(山楂)(164)	(白药子)	山归米(土茯苓)
.....(298)(132)(79)	山兰花(仙茅)
山薯(山药)	山牛蒡(大蓟)(504)	山芝麻(亚麻子)
.....(490)(316)(553)	(糙苏)
山薤(薤白)	山牛膝(夕)(土牛膝)(194)	山莘肉(山茱萸)
.....(289)(336)(582)	山百合(百合)
山橘(降香)	山六麻(了哥王)(550)	山苜根(百部)
.....(377)(110)(419)	山芍药(赤芍)
山人参(细辛)	山玉竹(玉竹)(62)	山地瓜(白薇)
.....(260)(546)(138)	山地豆(大麻)
山刁竹(徐长卿)	山龙胆(龙胆草)(462)	山地栗(土茯苓)
.....(170)(51)(79)	山合花(合欢花)
山芋肉(山茱萸)	山龙眼(龙眼肉)(452)	山竹兰(佩兰)
.....(532)(531)(203)	山防风(防风)
山大王(黄藤)	山石榴(金樱子)(7)	山花七(落新妇)
.....(243)(583)(30)	山花啦(穿山龙)
山大艽(秦艽)	(了哥王)		
.....(466)(110)		
山大黄(大黄)	山田薯(草薢)		
.....(143)(226)		
(土大黄)	山甲片(穿山甲)		
.....(112)(381)		
山川芎(川芎)	山甲珠(穿山甲)		
.....(343)(381)		
山川春(柽柳)	山白菜(败酱草)		
.....(15)(94)		
山川柳(柽柳)	(藜芦)		
.....(15)(592)		
山之一(了哥王)	山白薇(白前)		
.....(110)(401)		
山木瓜(木瓜)			
.....(169)			
山木通(威灵仙)			

.....(371)	山鸡尾(凤尾草)(79)
山花椒(五味子)(565)	山鸡腰(红娘子)(385)	山林果(山楂)(298)
山苍子(革澄茄)(264)	山鸡椒(革澄茄)(264)	山板术(山药)(490)
山苍术(苍术)(198)	山尾草(大青叶)(70)	山松节(松节)(192)
山苏子(夏枯草)(37) (糙苏)(194)	山沙参(沙参)(535)	山松香(松香)(618)
山苏麻(爵床)(111)	山羌子(红豆蔻)(267)	山刺玫(金樱子)(533) (玫瑰花)
山蕷根(蕷麻根)(321)	山苦荬(苣荬菜)(127)	山果子(山楂)(298)
山芫荽(前胡)(402)	山茱米(天南星)(390) (藜芦)	山细辛(细辛)(260)
山芥菜(蔊菜)(417)(592) (玉竹)	山油柑(降香)(377)
山苋菜(牛膝)(365)(546)	山油麻(农吉莉)(120)
山豆了(了哥王)(110)	山茄子(虎杖)(354)	山扁柏(地柏枝)(326)
山杏仁(杏仁)(418)	山茄花(洋金花)(439)	山姜子(革澄茄)(264) (红豆蔻)
山李仁(郁李仁)(149)	山药薯(山药)(490)(267)
山里红(山楂)(298)	山枣仁(酸枣仁)(449)	山姜黄(莪术)(347)
山里果(山楂)(293)	山枣花(蔷薇花)(130)	山茴香(小茴香)(267)
山圓荽(蘿本)(11)	山枣参(地榆)(322)	山茵陈(茵陈蒿)(228)
山牡荆(黄荆)(433)	山枣根(地榆)(322)	山茶根(黄芩)(48)
山鸡茶(草珊瑚)(108)	山奇良(土茯苓)(79)	山茨菰(山慈姑)(101)
	山奇粮(土茯苓)	

山茨姑(山慈姑)(481)	山黄皮(了哥王)(110)
.....(101)			
(金果榄)(558)	山黄连(角茴香)(87)
.....(84)			(瓜子金)
山胡椒(草澄茄)(166)	山黄枝(梔子)(437)
.....(264)			
(鹅不食草)(45)	山黄柏(黄柏)(52)
.....(196)			
(石南藤)(98)	山黄梔(梔子)(36)
.....(190)			
(草珊瑚)(360)	山黄荆(黄荆)(433)
.....(108)			
山挂面(松萝)(547)	山菱角(菱莧)(227)
.....(115)			
山梔子(梔子)(368)	山萝卜(狼毒)(159)
.....(33)			(续断)
山梔仁(梔子)(24)(508)	
.....(36)			(商陆)
山枸杞(枸杞子)(110)(156)	
.....(555)			(天麻)
山柳柳(拳参)(223)(462)	
.....(77)			(委陵菜)
山蚂蚱(银柴胡)(24)(91)	
.....(140)			(大薊)
山虾子(拳参)(438)(316)	
.....(77)			(蔊菜)
山胆草(龙胆草)(332)(417)	
.....(54)			
山独活(独活)(620)	山菖蒲(石菖蒲)(477)
.....(161)			
(前胡)(10)	山萆薢(萆薢)(226)
.....(402)			
山香椒(草澄茄)(325)	山萸肉(山茱萸)(582)
.....(264)			
山络麻(了哥王)(58)	山茱根(银柴胡)	
.....(110)			
山洋参(西洋参)(122)		

.....(140)	山硬硬(土茯苓)(84)
山梧桐(臭梧桐)(169)	山述粮(土茯苓)	山熊胆(毛冬青)(368)
山崩子(满山红)(432)	山紫草(紫草)	山漆叶(大青叶)(70)
山常山(穿山龙)(371)	山紫菀(紫菀)	山薯蓣(山药)(490)
(常山)(590)	山蓝叶(大青叶)	山鞠蕡(川芎)(343)
山梨儿(藜蕡)(227)	山蓝根(大青根)	山鞠穷(川芎)(343)
山梨果(山楂)(298)	山蒲扇(射干)	山鬯麦(瞿麦)(234)
山银花(金银花)(65)	山楂片(山楂)	山大豆根(山豆根)(82)
山猫儿(伸筋草)(182)	山楂子(山杏)	山叉明棵(猪毛菜)(472)
山猪粪(土茯苓)(79)	山楂肉(山楂)	山五味子(五味子)(565)
山麻皮(了哥王)(110)	山楂粒(山楂)	山毛桃仁(桃仁)(310)
山麻根(芝麻根)(321)	山榆子(茺蔚)	山乌龟根(白药子)(132)
山麻黄(麻黄)(1) (铁苋菜)(241)	山榆仁(茺蔚)	山龙草根(茜草)(335)
山棒子(天南星)(390)	山槐根(苦参)	山白菜根(生地)(53)
山棉皮(了哥王)(110)	山蜈蚣(水蜈蚣)	山包谷根(商陆)(156)
山棕榈(椰芦)(592)	山辣椒(龙葵)	山冬青根(毛冬青)(368)
山棘花(蔷薇花)(130)	(毛茛)	山丝苗仁(火麻仁)(148)
山雁皮(了哥王)(110)(607)	山老瓜瓢(白芷)(133)
	山慈姑(黄药子)	山老鼠簕(大蓟)(316)
(415)	
	(金果榄)	

山地贯众(贯众)(372)	山棉花根(白头翁)(89)
.....(313)		(打破碗碗花)(316)
山合欢皮(合欢皮)(452)	山槐子根(苦参)(55)
.....(452)		山槐树根(苦参)(55)
山合欢花(合欢花)(452)	山酸枣仁(酸枣仁)(449)
.....(452)		山櫻桃仁(郁李仁)(149)
山红萝卜(丹参)(349)	山马踏菜根(银柴胡)(140)
.....(322)		山西胡麻子(亚麻子)(553)
山红枣根(地榆)(322)	山地瓜秧根(山豆根)(82)
.....(322)		山茶叶根皮(远志)(450)
山苏子根(丹参)(349)	山胡麻根皮(远志)(450)
.....(349)		山铃铛花根(桔梗)(395)
山芹当归(前胡)(402)	千秋(乌头)(255)
.....(402)		千健(千年健)(181)
山芹菜根(防风)(7)	千人拔(牛筋草)(225)
.....(7)		千人踏(牛筋草)(225)
山芙蓉皮(海桐皮)(179)	山猫宝贝(紫贝齿)(459)
.....(179)		山银柴胡(银柴胡)(469)
山花子根(山豆根)(82)	山麻黄根(麻黄根)(53)
.....(82)			
山杞子皮(地骨皮)(130)		
.....(130)			
山豆秧根(山豆根)(82)		
.....(82)			
山里果子(山楂)(298)		
.....(298)			
山里红果(山楂)(298)		
.....(298)			
山旱烟根(生地黄)(558)		
.....(558)			
山牡丹皮(白鲜皮)(99)		
.....(99)			
山延胡索(延胡索)(344)		
.....(344)			
山鸡头子(金樱子)(583)		
.....(583)			
山鸡条子(鬼箭羽)(570)		
.....(570)			

.....(170)	千里光(决明子).....(465) (石决明).....(455) (毛茛).....(607)(45) 千金藤(白药子).....(132) 千粒米(刘寄奴).....(351)
千斤拔(钻地风).....(180)	千里明(千里光).....(44)	千颗针(千年健).....(181)
千斤草(牛筋草).....(225)	千里急(千里光).....(44)	千锤打(天门冬).....(542) (翻白草).....(56)
千打锤(白花蛇舌草).....(96)	千足虫(蜈蚣).....(457)	千心妓女(地肤子).....(229)
千头子(地肤子).....(229)	千针草(小蘋).....(318)	千年不大(矮地茶).....(430)
千年见(千年健).....(181)	千张纸(补骨脂).....(512) (木蝴蝶).....(436)	千年勿大(六月雪).....(246)
千年冷(金钱草).....(221)	千张树(喜树).....(117)	千层故子(木蝴蝶).....(436)
千年茶(矮地茶).....(430)	千纸肉(木蝴蝶).....(435) (补骨脂).....(512)	千层楼子(千金子).....(157)
千年柏(伸筋草).....(182)	千层皮(鬼箭羽).....(372)	千金子霜(千金子).....(157)
千年健(红藤).....(93)	千层纸(木蝴蝶).....(433)	千金藤仁(郁李仁).....(149)
千年润(石斛).....(543)	千层塔(大戟).....(154)	千金藤根(金不换).....(341)
千年棕(仙茅).....(504) (白芨).....(330)	千层楼(丝瓜络).....(612)	千年不烂心(蜀羊泉).....(86)
千年矮(了哥王).....(110) (矮地茶).....(430)	千金草(牛筋草).....(225) (佩兰).....(203)	千年老鼠屎(天葵).....(122)
千针草(大蘋).....(316)	千金锁(鬼臼).....(489)	千年耗子屎(天葵).....(122)
千两金(千金子).....(157) (溼羊羶).....(505)		千金寨煤珀(琥珀).....(448)
千里及(千里光).....(44)		乞力伽(白术).....(489)

川下(泽泻)(52)	川牛膝(牛膝)(365)
川夕(牛膝)(365)	川升麻(升麻)(26)
川太(草薢)(226)	川丹皮(牡丹皮)(60)
川贝(川贝母)(405)	川乌头(乌头)(255)
川丹(铅丹)(600)	川巴豆(巴豆)(153)
川鸟(乌头)(255)	川方通(通草)(219)
川巴(巴豆)(153)	川甘松(甘松)(293)
川归(当归)(526)	川石斛(石斛)(543)
川芍(白芍)(531)	川四腿(豹骨)(176)
川朴(厚朴)(200)	川白芍(白芍)(531)
川军(大黄)(143)	川白芨(白芨)(330)
川连(黄连)(59)	川白芷(白芷)(10)
川足(蜈蚣)(467)	川芒硝(芒硝)(145)
川谷(薏苡仁)(214)	川芎(川芎)(343)
川芪(黄芪)(486)	川朴花(厚朴花)(202)
川羌(羌活)(9)	川百合(百合)(550)
川若(川棯子)(286)	川当归(当归)(526)
川参(苦参)(55)	川防风(防风)(7)
川柏(黄柏)(365)	川红花(红花)

川厚朴 (厚朴)	川厚朴 (厚朴)	川厚朴 (厚朴)
川江子 (巴豆)	川江子 (巴豆)	川江子 (巴豆)
川麦冬 (麦门冬)	川麦冬 (麦门冬)	川麦冬 (麦门冬)
川赤芍 (赤芍)	川赤芍 (赤芍)	川赤芍 (赤芍)
川扶芎 (川芎)	川扶芎 (川芎)	川扶芎 (川芎)
川杜仲 (杜仲)	川杜仲 (杜仲)	川杜仲 (杜仲)
川吴萸 (吴茱萸)	川吴萸 (吴茱萸)	川吴萸 (吴茱萸)
川佛手 (佛手)	川佛手 (佛手)	川佛手 (佛手)
川附子 (附子)	川附子 (附子)	川附子 (附子)
川君子 (使君子)	川君子 (使君子)	川君子 (使君子)
川羌活 (羌活)	川羌活 (羌活)	川羌活 (羌活)
川郁金 (郁金)	川郁金 (郁金)	川郁金 (郁金)
川金龙 (虎杖)	川金龙 (虎杖)	川金龙 (虎杖)
川使君 (使君子)	川使君 (使君子)	川使君 (使君子)
川泽泻 (泽泻)	川泽泻 (泽泻)	川泽泻 (泽泻)
川枳实 (枳实)	川枳实 (枳实)	川枳实 (枳实)
川枳壳 (枳壳)	川枳壳 (枳壳)	川枳壳 (枳壳)
川故子 (补骨脂)	川故子 (补骨脂)	川故子 (补骨脂)
川厚朴 (厚朴)	川厚朴 (厚朴)	川厚朴 (厚朴)
川独活 (独活)	川独活 (独活)	川独活 (独活)
川秦艽 (秦艽)	川秦艽 (秦艽)	川秦艽 (秦艽)
川桂枝 (桂枝)	川桂枝 (桂枝)	川桂枝 (桂枝)
川桂皮 (肉桂)	川桂皮 (肉桂)	川桂皮 (肉桂)
川桐皮 (海桐皮)	川桐皮 (海桐皮)	川桐皮 (海桐皮)
川党参 (党参)	川党参 (党参)	川党参 (党参)
川狼毒 (狼毒)	川狼毒 (狼毒)	川狼毒 (狼毒)
川黄芪 (黄芪) 商	川黄芪 (黄芪) 商	川黄芪 (黄芪) 商
川黄芩 (黄芩)	川黄芩 (黄芩)	川黄芩 (黄芩)
川黄柏 (黄柏)	川黄柏 (黄柏)	川黄柏 (黄柏)
川黄连 (黄连)	川黄连 (黄连)	川黄连 (黄连)
川萆薢 (萆薢)	川萆薢 (萆薢)	川萆薢 (萆薢)
川常山 (常山)	川常山 (常山)	川常山 (常山)
川绵芪 (黄芪)	川绵芪 (黄芪)	川绵芪 (黄芪)
川续断 (续断)	川续断 (续断)	川续断 (续断)
川麻黄 (麻黄)	川麻黄 (麻黄)	川麻黄 (麻黄)
川断肉 (续断)	川断肉 (续断)	川断肉 (续断)
川椒目 (椒目)	川椒目 (椒目)	川椒目 (椒目)
川雄连 (黄连)	川雄连 (黄连)	川雄连 (黄连)
川箭龙 (虎杖)	川箭龙 (虎杖)	川箭龙 (虎杖)
川棟皮 (苦棟皮)	川棟皮 (苦棟皮)	川棟皮 (苦棟皮)
川棟实 (川棟子)	川棟实 (川棟子)	川棟实 (川棟子)
川蜈蚣 (蜈蚣)	川蜈蚣 (蜈蚣)	川蜈蚣 (蜈蚣)
川锦纹 (大黄)	川锦纹 (大黄)	川锦纹 (大黄)
川槿子 (木槿子)	川槿子 (木槿子)	川槿子 (木槿子)
川槿皮 (木槿皮)	川槿皮 (木槿皮)	川槿皮 (木槿皮)
川槿花 (木槿花)	川槿花 (木槿花)	川槿花 (木槿花)
川藿香 (藿香)	川藿香 (藿香)	川藿香 (藿香)
川麝香 (麝香)	川麝香 (麝香)	川麝香 (麝香)
川八角莲 (鬼臼)	川八角莲 (鬼臼)	川八角莲 (鬼臼)
川天门冬 (天门冬)	川天门冬 (天门冬)	川天门冬 (天门冬)
川五加皮 (五加皮)	川五加皮 (五加皮)	川五加皮 (五加皮)
川五味子 (五味子)	川五味子 (五味子)	川五味子 (五味子)
川使君子 (使君子)	川使君子 (使君子)	川使君子 (使君子)
川金钱草 (金钱草)	川金钱草 (金钱草)	川金钱草 (金钱草)
川鄂独活 (白芷)	川鄂独活 (白芷)	川鄂独活 (白芷)

川弹子肉(龙眼肉)(210)	小瓣(紫菀)
.....(534)	(421)
川绵蕊根(竺麻根)(470)	小丁黄(米口袋)
.....(321)	(70)
川麻黄根(麻黄根)(252)	小儿拳(蜀羊泉)
.....(570)	(86)
川棟白皮(苦棟皮)(372)	小刀豆(扁豆)
.....(306)	(492)
川棟根皮(苦棟皮)(235)	小三棱(香附)
.....(306)	(282)
川藏沙参(沙参)(372)	小山楂(山楂)
.....(535)	(298)
川南马兜铃(青木香)(289)	小马勃(马勃)
.....(288)	(83)
夕白(薤白)(231)	小天蒜(蓼芦)
.....(289)	(592)
夕旬(夏枯草)(393)	小木夏(葫芦巴)
.....(37)	(506)
夕冷(滑石)(260)	小木通(威灵仙)
.....(217)	(162)
久老薯(土茯苓)(221)	(木通)
.....(79)	(218)
么姑虫(红娘子)(267)	小车前(车前子)
.....(385)	(215)
及泻(泽泻)(267)	小牙皂(皂莢)
.....(213)	(393)
个青(青皮)(257)	小贝母(川贝母)
.....(273)	(405)
个苓(茯苓)(592)	小水蛭(水蛭)
.....(210)	(383)
个砂(朱砂)(316)	小牛螺(蜗牛)
.....(441)	(苣荬菜)(116)
个山楂(山楂)(127)	小升丹(升药)
.....(298)	(599)
个青皮(青皮)(289)	小升麻(落新妇)
.....(273)	(30)
个茯苓(茯苓)(590)	小毛茛(猫爪草)

.....(37)	小头红(仙桃草)(149)
小毛药(委陵菜)(91)(359)	小杨叶(柳叶)(113)
小鸟头(天葵)(122)	小百部(百部)(419) (天门冬)(542)	小抚摸(川芎)(343)
小丹参(丹参)(349)	小托盘(覆盆子)(585)	小伸筋(伸筋草)(182) (过江龙)(197)
小凤尾(凤尾草)(244)	小血转(续断)(598)	小皂角(皂莢)(393)
小凤藤(石南藤)(190)	小血藤(茜草)(335)	小皂莢(皂莢)(393)
小巴豆(千金子)(157)	小防己(防己)(164)	小鸡米(竹叶)(34)
小玉竹(玉竹)(546)	小防风(防风)(7)	小鸡根(远志)(450)
小石韦(石韦)(223)	小红根(茜草)(335)	小良姜(高良姜)(266)
小石榴(金樱子)(583)	小红藤(红藤)(93)	小环钗(石斛)(543)
小厄子(梔子)(36)	小麦冬(麦门冬)(540)	小青皮(青皮)(273)
小甲片(穿山甲)(331)	小远志(瓜子金)(437)	小青草(爵床)(111)
小叶榆(榆钱)(453)	小花蛇(白花蛇)(177)	小青藤(巴戟天)(501)
小白及(白及)(330)	小花椒(花椒)(263)	小苦药(绞股蓝)(107)
小白叩(白豆蔻)(206)	小苏椒(花椒)(263)	小苦棟(鸦胆子)(93)
小白蔻(白豆蔻)(206)	小豆虫(斑蝥)(622)	小茴草(猪殃殃)(120)
小白蒿(黄蒿)(436)	小豆蔻(白豆蔻)(206)	小英雄(瓜子金)(437)
小白蒿(茵陈蒿)(228)	小还魂(茅莓)(127)	小刺头(小薊)(318)
小生地(生地黄)(58)	小李仁(郁李仁)	

小刺盖(小薊)(166)	小草薢(萆薢)(226)
.....(318)		小菖蒲(石菖蒲)(477)
小金丹(升药)(183)	小菖蒲(巴戟天)(501)
.....(599)	(凤仙草)	小萍子(浮萍)(27)
小金英(金樱子)(357)	小根菜(薤白)(289)
.....(583)		小圆泻(泽泻)(213)
小金钗(石斛)(289)	小柴胡(柴胡)(24)
.....(543)		小狼毒(狼毒)(159)
小金盆(瓜子金)(213)	小通草(通草)(219)
.....(437)		小海马(海马)(522)
小金钱(金钱草)(221)	小海石(海浮石)(410)
.....(221)		小海龙(海龙)(523)
小泽兰(泽兰)(352)	小海驹(海马)(522)
.....(352)		小拳头(鹅不食草)(196)
小草薢(蛇莓)(123)	小海桐(凤仙草)(357)
.....(123)		小海桐(透骨草)(183)
小梔子(梔子)(35)	小黄花(旋复花)(399)
.....(35)		小黄芪(黄芪)(486)
小枳实(枳实)(275)	小黄草(石斛)(543)
.....(275)		小黄菊(菊花)(21)
小胡麻(茺蔚子)(353)		
.....(353)			
(黑脂麻)			
.....(552)			
小鬼叉(狼把草)(111)		
.....(111)			
小独根(何首乌)(529)		
.....(529)			
小独蒜(薤白)(289)		
.....(289)			
小貫众(貫众)(313)		
.....(313)			
小孩柴(茜草)(335)		
.....(335)			
小活血(茜草)(335)		
.....(335)			
小秦艽(秦艽)			

.....(120)	小叶石韦(石韦)(69)
小酸模(酢浆草)(241)	小叶冬青(四季青)(102)	小灯盏花(金钱草)(221)
小酸茅(酢浆草)(241)	小叶贯众(贯众)(313)	小花杜鹃(照山白)(433)
小鹤虱(鹤虱)(310)	小叶海藻(海藻)(413)	小花党参(党参)(482)
小瓣儿(紫菀)(63)	小田基黄(地耳草)(242)	小佛指甲(佛甲草)(119)
小藜芦(藜芦)(502)	小叶桦皮(秦皮)(92)	小迎风草(金钱草)(221)
小一口血(喉嚨草)(86)	小白花蛇(白花蛇)(177)	小鸡角刺(小刺)(318)
小马蹄草(金钱草)(221)	小禾稼草(猪秧秧)(120)	小鸡腿皮(远志)(450)
小女儿红(茜草)(335)	小母猪藤(乌蔹莓)(106)	小青藤根(防己)(164)
小飞扬藤(猪秧秧)(120)	小对叶草(徐长卿)(170)	小郁李仁(郁李仁)(149)
小飞鼠粪(五灵脂)(380)	小耳朵草(铁苋菜)(241)	小虎耳草(喉嚨草)(86)
小元宝草(地耳草)(242) (金钱草)(221)	小耳挖草(半支莲)(118)	小罗汉松(侧柏叶)(221)
小车前子(车前子)(215)	小地棕根(仙茅)(504)	小果山楂(山楂)(293)
小丹参草(石见穿)(372)	小虫卧草(地锦草)(104)	小果蔷薇(金樱子)(503)
小毛茛根(猪爪草)(37)	小红米果(紫珠)(320)	小狗响铃(农吉利)(320)
小牛扎口(小药)(318)	小红参草(石见穿)(372)	小金钱草(金錢草)(221)
小叶山楂(山楂)(298)	小红筋草(地锦草)(104)	小金樱子(苦樱花)(150)
小叶川芎(川芎)(343)	小红绿豆(赤小豆)(231)	小草鞋皮(远志)(450)
	小米口袋(紫花地丁)	小种三七(景天三七)(335)

小香蒲黄(蒲黄)(322)	小叶淫羊藿(淫羊藿)(505)
.....(337)		小白花地榆(地榆)(322)
小美石斛(石斛)(348)	小老鸹眼根(白薇)(138)
.....(543)		小虫儿卧蛋(地锦草)(104)
小活血龙(茜草)(120)	小苍蝇翅草(地锦草)(104)
.....(335)		小鸡腿根皮(远志)(450)
小秦王草(鹿衔草)(218)	小枝羚羊角(羚羊角)(454)
.....(370)		小金星凤尾(凤尾草)(244)
小恶鸡婆(小薊)(221)	小圆子马勃(马勃)(83)
.....(318)		小黄连树皮(黄柏)(52)
小莲花草(半边莲)(221)	小黄草石斛(石斛)(543)
.....(78)		小黄鱼脑石(鱼脑石)(253)
小桃红子(急性子)(22)	小粒车前子(车前子)(215)
.....(358)		小粒菟丝子(菟丝子)(517)
小桃红花(凤仙花)(242)	小叶龙眼独活(独活)(161)
.....(357)		小叶白蜡树皮(秦皮)(92)
小透骨草(透骨草)(118)	小叶金银花(金银花)(152)
.....(183)		小叶金钱草(金钱草)(152)
小笔管菜(玉竹)(119)	小叶金腰带(了哥王)(352)
.....(546)		小茎叶天门冬(天门冬)	
小菟丝子(菟丝子)(244)		
.....(517)			
小接骨茶(矮地茶)(437)		
.....(430)			
小铜钱草(金钱草)(437)		
.....(221)			
小猪殃参(缓草)(65)		
.....(124)			
小萱草根(萱草根)(557)		
.....(248)			
小葛藤根(防己)(92)		
.....(164)			
小韩信草(半支莲)(65)		
.....(118)			
小紫金牛(矮地茶)(221)		
.....(430)			
小紫草根(地榆)(110)		

.....(542)	马先(茵陈蒿).....(223)(333)
小黄花鱼脑石(鱼脑石).....(253)	马苋(马齿苋).....(89)	马熏(玉竹).....(546)
子元(紫菀).....(421)	马芪(黄芪).....(436)	马箭(黄精).....(547)
子芩(黄芩).....(43)	马疣(马勃).....(83)	马藤(黄荆).....(438)
子菀(紫菀).....(421)	马辛(细辛).....(260)	马薯(荸荠).....(552)
子房(莲房).....(579)	(芥菜).....(319)	马蹄(荸荠).....(552)
子菀(紫菀).....(421)	马草(向荆).....(239)	马蟥(水蛭).....(383)
子木通(木通).....(218)	(败酱草).....(94)	马鳖(水蛭).....(333)
子文武(木鳖子).....(616)	马茸(鹿茸).....(498)	马刀豆(刀豆).....(291)
子母草(仙鹤草).....(329)	马哇(鱼腥草).....(80)	马小莲(农吉利).....(120)
子根蒜(薤白).....(289)	马前(马钱子).....(613)	马子菜(马齿苋).....(89)
子桑叶(桑叶).....(19)	马钱(马钱子).....(613)	马马草(知母).....(32)
子黄芩(黄芩).....(48)	马遂(郁金).....(345)	马马菜(马齿苋).....(89)
子不离母(仙鹤草).....(329)	马蛭(水蛭).....(333)	马不留(王不留行).....(367)
子母草芽(鹤草芽).....(309)	马舄(车前草).....(216)	马木通(木通).....(218)
子不离母芽(鹤草芽).....(309)	马薊(大蓟).....(316)	马牙七(绶草).....(124)
马卜(马勃).....(83)	(苍术).....(198)	马牙砂(银朱).....(597)
马甲(藜葵).....(227)	马蓼(蘋草).....(194)	马牙砂(朱砂).....(441)
马包(马勃).....(83)	马蜞(水蛭).....(457)	马牙珠(珍珠).....(457)

马牙硝(芒硝)(374)	马齿砂(朱砂)(441)
马凤藻(马齿苋)(89)	马齿苋(马齿苋)(89)
马斗令(马兜铃)(428)	马鸣肝(蚕砂)(180)
马斗铃(马兜铃)(428)	马金南(槟榔)(307)
马目公(鬼臼)(45)	马细辛(细辛)(260)
马白薇(白薇)(138)	马屈菜(马齿苋)(89)
马生菜(马齿苋)(89)	马宝粉(马宝)(446)
马舌剪(矮地茶)(430)	马勃绒(马勃)(83)
马加勒(簇葵)(227)	马勃菌(马勃)(83)
马兰花(洋金花)(439)	马响铃(农吉利)(120)
马头鱼(海马)(522)	马韭根(麦门冬)(540)
马舌菜(马齿苋)(89)	马食菜(马齿苋)(89)
马豆皮(稽豆衣)(465)	马结石(马宝)(446)
马豆衣(稽豆衣)(465)	马前子(马钱子)(613)
马苋菜(马齿菜)(89)	马峰七(拳参)(77)
马肝石(何首乌)(529)	马铃果(马兜铃)(428)
马尾归(当归)(526)	马铃草(农吉利)(120)
马尾松(过江龙)(197)	马铃薯(天麻)(462)
马尾香(乳香)	马留枣(猴枣)

.....(447)	马蜂房(露蜂房).....(624)(182)
马料豆(相思子).....(615)	马蜂菜(马齿苋).....(89)	马蹄黄(大黄).....(143)
马脚迹(积雪草).....(225)	马蜂窝(露蜂房).....(624)	马踏菜(马齿苋).....(89)
马兜苓(马兜铃).....(428)	马溜姜(骨碎补).....(510)	马麝香(麝香).....(473)
马兜铃(青木香).....(288) (木通).....(218)	马新蒿(茵陈蒿).....(228)	马氏藜芦(藜芦).....(592)
马兜零(马兜铃).....(428)	马蛔壳(蝉蜕).....(17)	马目公毒(鬼臼).....(45)
马鹿角(鹿角).....(500) (伸筋草).....(182)	马熊胆(熊胆).....(97)	马加刺兜(菝葜).....(227)
马鹿茸(鹿茸).....(498)	马缨子(防风).....(7)	马皮没药(没药).....(376)
马虉草(地锦草).....(104)	马缨花(合欢花).....(452)	马连鞍薯(地榆).....(322)
马舄子(车前子).....(215)	马鞍宫(菝葜).....(227)	马尾大艽(秦艽).....(166)
马粪石(马宝).....(446)	马额皮(桑白皮).....(425)	马尾白薇(白薇).....(138)
马粪包(马勃).....(83)	马蹄子(决明子).....(465)	马尾当归(当归).....(526)
马粪草(麦门冬).....(540)	马蹄金(金钱草).....(221)	马尾松节(松节).....(192)
马蓝叶(大青叶).....(70)	马蹄草(积雪草).....(225)	马尾松香(松香).....(618)
马蓝根(板蓝根).....(71)	(金钱草).....(221)	马尾柴胡(柴胡).....(24)
马蜂包(露蜂房).....(624)	(车前草).....(216)	马齿龙芽(马齿苋).....(89)
马蜂草(荆荆).....(239)	马蹄香(沉香).....(235)	马钱藤子(马钱子).....(613)
	(细辛).....(260)	马料豆皮(稻豆衣).....(465)
	(导骨风).....	马料豆衣(稻豆衣).....(465)

马蛇子菜(马齿苋)(447)	女贞木子(女贞子)
.....(89)	(557)
马兜铃屯(天仙藤)(226)	习见蓼(萹蓄)
.....(190)	(233)
马兜铃根(青木香)(501)	飞帘(飞廉)
.....(288)	(126)
马兜铃藤(天仙藤)(21)	飞轻(飞廉)
.....(190)	(126)
马衔萼苈(川芎)(203)	飞廉(大蓟)
.....(343)	(316)
马猴枣根(地榆)(21)	飞雉(飞廉)
.....(322)	(126)
马蹄大黄(大黄)(546)	飞刀剑(石韦)
.....(143)	(223)
马蹄决明(决明子)(115)	飞天鼠(骨碎补)
.....(465)	(510)
马蹄草子(车前子)(543)	飞天蕊(旋复花)
.....(215)	(399)
马蹄菜子(冬葵子)(218)	飞甘石(炉甘石)
.....(235)	(606)
马蹄紫菀(紫菀)(32)	飞来风(骨碎补)
.....(421)	(510)
马鞭石斛(石斛)(364)	飞来鹤(何首乌)
.....(543)	(529)
马苋长命菜(马齿苋)(32)	(白蔹)
.....(89)	(98)
马齿长命菜(马齿苋)(437)	飞松节(松节)
.....(89)	(192)
马缨花树皮(合欢皮)(285)	飞松香(松香)
.....(452)	(618)
马蹄筋骨草(金钱草)(542)	飞惊草(石韦)
.....(221)	(223)
马蹄踏菜根(银柴胡)(557)	飞廉蒿(飞廉)
.....(140)	(126)
马干铃括楼子(瓜蒌子)(94)	飞滑石(滑石)
.....(434)	(217)
马来西亚猴枣(猴枣)(517)	飞雷子(草豆蔻)

..... (208)	广肉桂(肉桂) (257) (268)
飞蛾叶(白果叶) (431)	广竹黄(天竹黄) (408)	广砂仁(砂仁) (204)
飞蛾草(骨碎补) (510)	广防己(防己) (164)	广柑皮(橘皮) (271)
飞鼠粪(五灵脂) (380)	广防风(豨莶草) (167)	广眉尖(桂枝) (2)
广丹(铅丹) (600)	广豆根(山豆根) (82)	广狼毒(狼毒) (159)
广术(白术) (489)	广佛手(佛手) (277)	广寄生(桑寄生) (172)
(莪术) (347)	广条桂(肉桂) (257)	广犀角(犀角) (57)
广皮(橘皮) (271)	广角介(犀角) (57)	广霍斗(石斛) (543)
广角(犀角) (57)	广角瓣(犀角) (57)	广橘红(橘红) (272)
(土大黄) (112)	广灵香(零陵香) (209)	广藿香(藿香) (202)
广茂(莪术) (347)	广陈皮(橘皮) (271)	广东人参(西洋参) (481)
广砂(砂仁) (204)	广谷草(夏枯草) (37)	广东升麻(升麻) (26)
广三七(三七) (333)	广育果(橄榄) (558)	广东石斛(石斛) (543)
(景天三七) (335)	广杷叶(枇杷叶) (427)	广东紫珠(紫珠) (320)
广木香(木香) (280)	广郁金(郁金) (345)	广西莪术(郁金) (345)
(青木香) (288)	广狗肾(黄狗肾) (520)	(莪术) (347)
广石莲(莲子) (576)	广姜黄(姜黄) (347)	广金钱草(金钱草) (221)
广地丁(紫花地丁) (69)	广泽泻(泽泻) (213)	广零陵香(零陵香) (209)
广地龙(地龙) (469)	广茴香(八角茴香)	广布野豌豆(透骨草) (183)

广东金钱草(金钱草)

.....(221)

广东闹洋花(洋金花)

.....(439)

门冬(天门冬)

.....(542)

门尔哥蝎尾(水蛭)

.....(383)

丫蛋子(鸦胆子)

.....(93)

【四画】

王马(玉竹)

.....(546)

王白(瓜蒌)

.....(404)

王瓜(瓜蒌)

.....(404)

王孙(黄芪)

.....(426)

王茅(山药)

.....(490)

王连(黄连)

.....(50)

王帚(地肤子)

.....(229)

王薺(瓜蒌)

.....(404)

王翁(木通)

.....(218)

王薺(瓜蒌)

.....(404)

王富(百部)

.....(419)

王蒸(木槿花)

.....(131)

王八壳(鳖甲)

.....(564)

王不留(王不留行)

.....(367)

王白子(瓜蒌子)

.....(434)

王白仁(瓜蒌子)

.....(434)

王瓜子(瓜蒌子)

.....(434)

王瓜草(藜蕡)

.....(227)

王瓜酸(酢浆草)

.....(241)

王母牛(王不留行)

.....(367)

王孙枣(猴枣)

.....(447)

王牡牛(王不留行)

.....(367)

王牧牛(王不留行)

.....(367)

王菩子(瓜蒌子)

.....(131)

王菩仁(瓜蒌仁)

.....(424)

王婆奶(胡颓子)

.....(304)

王八盖子(鳖甲)

.....(564)

王不留行(墨旱莲)

.....(552)

王不流行(王不留行)

.....(367)

王爷地草(甘草)

.....(493)

开口箭(万年青)

.....(245)

开心果(婆罗子)

.....(293)

开金锁(金荞麦)

.....(103)

开喉箭(射干)

.....(61)

井茜(凤尾草)

.....(241)

井边茜(凤尾草)

.....(244)

井栏茜(凤尾草)

.....(244)

井栏草(凤尾草)

.....(244)

井阑草(凤尾草)

.....(241)

井口边草(凤尾草)

.....(244)

井边凤尾(凤尾草)

.....(244)

井口鸡胶舌(凤尾草)

.....(244)

井边凤尾草(凤尾草)

.....(244)

无夷(茺蔚)

.....(312)

无义草(山慈姑)

.....(101)

无不愈(大门冬)

.....(542)

无心草(木贼)

.....(28)

无石子(没食子)

.....(588)

无名印(地榆)

.....(322)

无声虎(大黄)

无刺皮(刺猬皮)	无风自动草(仙桃草)	元明粉(芒硝)
.....(587)(350)(146)
无姑子(芫荽)	无针乌贼骨(乌贼骨)	元宝贝(浙贝母)
.....(312)(586)(407)
无食子(没食子)	无刺蔓陀罗(洋金花)	元宝草(王不留行)
.....(588)(439)(367)
无根藤(天仙藤)	无柄果钩藤(钩藤)	(刘寄奴)
.....(190)(461)(351)
无靥螺(蜗牛)	无娘藤米米(菟丝子)	元胡索(延胡索)
.....(116)(517)(344)
无心菜根(半夏)	无梗五加皮(五加皮)	元绪甲(龟板)
.....(388)(173)(533)
无头香附(水蜈蚣)	无梗接骨木(接骨木)	元绪板(龟板)
.....(247)(378)(563)
无花香薷(香薷)	无叶地瓜儿苗(泽兰)	元精石(玄精石)
.....(5)(352)(47)
无钉赭石(代赭石)	元寸(麝香)	元螵蛸(桑螵蛸)
.....(460)(473)(584)
无刺蕷藶(草薢)	元肉(龙眼肉)	元宝贝母(浙贝母)
.....(226)(534)(407)
(土茯苓)	元芩(黄芩)	大丁(皂角刺)
.....(79)(48)(394)
无柄马勃(马勃)	元芪(黄芪)	大斗(白芍)
.....(83)(486)(531)
无柄紫堇(夏天无)	元参(玄参)	天龙(蜈蚣)
.....(195)(59)(437)
无疣壁虎(壁虎)	元胡(延胡索)	(壁虎)
.....(620)(344)(626)
无根草子(菟丝子)	元柏(黄柏)	天冬(天门冬)
.....(517)(53)(542)
无根藤子(菟丝子)	元寸香(麝香)	天瓜(瓜蒌)
.....(517)(48)(404)
无娘藤子(菟丝子)	元英石(玄精石)	飞台(乌药)
.....(517)(47)(283)
无蹼壁虎(壁虎)	元武石(磁石)	天虫(白僵蚕)
.....(626)(442)(468)
	元武板(龟板)	

天竹(徐长卿)(560)	天老星(天南星)
天白(鬼白)(57)	天吊冬(喉咙草)
天豆(槐角)(122)	天师栗(娑罗子)
天秃(泽泻)(542)	天阳石(雄黄)
天谷(薏苡仁)(122)	天灯笼(蜀羊泉)
天社(蜣螂)(88)	天青红(千里光)
天罗(丝瓜络)(489)	天茄子(龙葵)
天灸(毛茛)(594)	天茄果(龙葵子)
天芥(飞廉)(447)	天松散(金荞麦)
天棕(仙茅)(190)	天罗线(丝瓜络)
天雄(附子)(224)	天竺桂(肉桂)
天椒(花椒)(434)	天竺黄(天竹黄)
天蒜(薤白)(434)	天泡草(龙葵)
天薊(白术)(104)	天泡果(龙葵子)
天魁(白芍)(35)	(龙葵)
天蓼(荭草)(283)(122)
天蠟(蠟蟬)(122)	天泽香(乳香)
天蠅(蠅牛)(554)(374)
天蓼(恨根子)(122)	天莽麦(金荞麦)

..... (86)	(瓦松) (592)
(谷精草) (129)	犬仙藤根 (青木香)
..... (39)	天鼠屎 (夜明砂) (288)
天络丝 (丝瓜络) (42)	天丝瓜络 (丝瓜络)
..... (612)	天鼠粪 (夜明砂) (618)
天圆子 (瓜蒌) (42)	天台乌药 (乌药)
..... (404)	天蓼子 (水红花子) (283)
天罡草 (老鹳草) (330)	天全牛膝 (牛膝)
..... (186)	天蓼花 (莼草花) (365)
天荷叶 (虎耳草) (359)	天名精子 (鹤虱)
..... (123)	天精子 (枸杞子) (310)
天梓树 (喜树) (555)	天名精实 (鹤虱)
..... (117)	天精根 (地骨皮) (310)
天麻子 (茜麻子) (139)	天名精根 (茜麻根)
..... (616)	天蝠屎 (夜明砂) (321)
天麻片 (天麻) (42)	天灯笼草 (锦灯笼)
..... (462)	天蝠粪 (夜明砂) (88)
天葵子 (天葵) (42)	天青地白 (委陵菜)
..... (122)	天藕儿 (翻白草) (91)
天葵草 (天葵) (56)	(翻白草)
..... (122)	天螺蛳 (蜗牛) (56)
天葵根 (天葵) (116)	天青地红 (筋骨草)
..... (122)	天蓼冬 (天门冬) (105)
天葵棵 (天葵) (542)	天茄苗儿 (龙葵)
..... (122)	天山贝母 (川贝母) (122)
天落星 (半夏) (405)	天罗丝瓜 (丝瓜络)
..... (338)	天山秦艽 (秦艽) (612)
天棘根 (天门冬) (166)	天圆子仁 (瓜蒌子)
..... (542)	天山紫草 (紫草) (434)
天榔草 (松萝) (63)	天然牛黄 (牛黄)
..... (115)	天王叶根 (羊蹄) (74)
天鵝蛋 (泽泻) (340)	天然冰片 (冰片)
..... (213)	天天茄子 (龙葵子) (474)
(金果榄) (554)	天然珍珠 (珍珠)
..... (84)	天水大黄 (大黄) (457)
天蓬草 (松萝) (143)	天然没药 (没药)
..... (115)	天月藜芦 (藜芦) (376)

天總蠟蝎(蠟蝎)(50)	云南根(青木香)
.....(251)	(288)
天平一枝香(大戟)(186)	云故纸(补骨脂)
.....(154)	(512)
天生白虎湯(西瓜)(210)	(木蝴蝶)
.....(533)	(436)
天育地白草(茅莓)(448)	云胆草(龙胆草)
.....(127)	(54)
天然白虎湯(西瓜)(97)	云胆矾(胆矾)
.....(533)	(591)
天藍小根蒜(薤白)(186)	云前胡(前胡)
.....(289)	(402)
天青地白草根(芝麻根)(169)	云黄连(黄连)
.....(321)	(50)
天香国色根皮(牡丹皮)(280)	云雾草(松萝)
.....(60)	(115)
尖毛(大腹皮)(60)	云雾茶(茶叶)
.....(297)	(396)
尖须(香附)(441)	云豹骨(豹骨)
.....(282)	(176)
尖儿苗(狗狗秧)(51)	云麝香(麝香)
.....(210)	(473)
云丹(络石藤)(603)	云片柏叶(侧柏叶)
.....(186)	(324)
云术(白术)(526)	云母片岩(礞石)
.....(489)	(412)
云归(当归)(7)	云南山楂(山楂)
.....(526)	(173)
云皮(橘红)(82)	云南丹皮(牡丹皮)
.....(272)	(60)
云芎(川芎)(277)	云南丹参(丹参)
.....(343)	(349)
云红(橘红)(331)	云南白芷(蛇床子)
.....(272)	(614)
云花(络石藤)(618)	云南豆子(湘思子)
.....(186)	(615)
云连(黄连)(210)	云南沙参(沙参)

.....(535)	云南鸡骨常山(常山).....(590)	五月霜(零陵香).....(209)
云南青藤(青风藤).....(183)	云南黄皮树皮(黄柏).....(52)	五风草(泽漆).....(232)
云南松节(松节).....(192)	云南紫荆根皮(紫荆皮).....(114)	五方草(马齿苋).....(89)
云南松香(松香).....(618)	五爪(橘红).....(272)	五龙草(乌蔹莓).....(106)
云南草芨(草芨).....(263)	五加(五加皮).....(173)	五叶芍(乌蔹莓).....(106)
云南重楼(蚤休).....(75)	五夹(五加皮).....(173)	五叶草(老鹳草).....(185)
云南黄芪(黄芪).....(486)	五味(五味子).....(565)	五叶参(绞股蓝).....(107)
云南黄连(黄连).....(50)	五香(木香).....(280)	五叶联(老鹳草).....(185)
云南紫草(紫草).....(63)	五畿(金荞麦).....(103)	五甲藤(乌蔹莓).....(106)
云南土木香(青木香).....(288)	五木香(木香).....(280)	五加风(通草).....(219)
云南马前子(马钱子).....(613)	五爪龙(葎草).....(243)	五托香(矮地茶).....(430)
云南牛防风(白芷).....(10)	(乌蔹莓).....(106)	五夹皮(五加皮).....(173)
云南白株树(透骨草).....(183)	(茜草).....(335)	五朵云(喉嚨草).....(86)
云南佛手片(佛手).....(277)	五爪红(橘红).....(272)	(泽漆).....(232)
云南牡丹皮(牡丹皮).....(60)	五爪藤(乌蔹莓).....(106)	五行草(马齿苋).....(89)
云南独蒜兰(山慈姑).....(101)	五斤草(车前草).....(216)	五行菜(马齿苋).....(89)
云南娃儿藤(白薇).....(138)	五月艾(艾叶).....(333)	五花七(红藤).....(93)
云南野当归(当归).....(526)	五月红(茅莓).....(127)	五灵子(五灵脂).....(330)
云南鹿蹄草(鹿衔草).....(370)		五步龙(白花蛇)

.....(177)	五棓子(五倍子).....(565)(93)
五步倒(白花蛇).....(177)	五棱子(使君子).....(305)	五花根皮(五加皮).....(173)
五步蛇(白花蛇).....(177)	五掌菜(昆布).....(414)	五角加皮(通草).....(219)
五步跳(白花蛇).....(177)	五蹄风(仙鹤草).....(329)	五角星草(喉嚨草).....(86)
五钩子(五倍子).....(568)	五瓣花(老鹳草).....(185)	五岳朝天(喉嚨草).....(86)
五齿耙(老鹳草).....(185)	五斤草子(车前子).....(215)	五指柑花(佛手花).....(278)
五佳皮(五加皮).....(173)	五爪龙花(凌霄花).....(364)	五香八角(八角茴香).....(268)
五毒草(金荞麦).....(103)	五爪龙草(乌蔹梅).....(106)	五根草子(车前子).....(215)
五毒根(乌头).....(255)	五爪金龙(乌蔹梅).....(106)	五裂黄连(黄连).....(50)
五指风(黄荆).....(438)	五爪藤根(白蔹).....(138)	五蹄风芽(鹤草芽).....(309)
五指柑(佛手).....(277)	五月薰刺(茅莓).....(127)	五叶木通果(八月札).....(294)
(黄荆).....(438)	五凤灵枝(泽漆).....(232)	五叶路刺皮(五加皮).....(173)
五指掌(凤尾草).....(244)	五风藤果(八月札).....(294)	五加花根皮(五加皮).....(173)
五点草(泽漆).....(232)	五叶木通(海风藤).....(187)	五花眉根皮(五加皮).....(173)
五盏灯(泽漆).....(232)	五叶藤根(茜草).....(335)	木子(猕猴桃).....(558)
五将草(乌蔹莓).....(106)	五灯头草(泽漆).....(232)	木丹(梔子).....(36)
五梅子(五味子).....(565)	五花龙骨(龙骨).....(444)	木斗(石斛).....(543)
五根草(车前草).....(216)	五花血通(红藤).....(93)	木禾(飞廉).....(126)
五累草(爵床).....(111)	五花血藤(红藤).....(93)	木兰(辛夷).....(13)

(厚朴)(169)	木药子(黄药子)(415)	
.....(200)	木头回(墓头回)(95)	木药脂(黄药子)(415)
木惕(枳椇子)(560)	木兰花(辛夷)(13)	
.....(560)	木必子(木鳖子)(616)	木珊瑚(枳椇子)(560)
木李(木瓜)(169)	木芍药(赤芍)(62)	
.....(169)	木血竭(血竭)(620)	木香子(草澄茄)(264)
木芍(赤芍)(62)	木防己(青风藤)(44)	
.....(62)(188)	木桂枝(桂枝)(2)	
木香(沉香)(285)	(防己)(164)	
.....(285)(188)	木贼草(木贼)(28)	
木莓(覆盆子)(585)	(巴戟天)(501)	
.....(585)	木羊乳(丹参)(349)	木笔花(辛夷)(13)
木桂(肉桂)(257)	木麦芽(覆盆子)(525)	
.....(257)	木连子(雷丸)(310)	木通子(八月札)(294)
木桃(木瓜)(169)	木赤芍(赤芍)(62)	
.....(169)	木别子(木鳖子)(616)	木通果(八月札)(294)
木笔(辛夷)(13)	木灵芝(灵芝)(485)	
.....(13)	木附子(五倍子)(568)	木通实(八月札)(294)
木通(通草)(219)	木刺艾(小茴)(318)	
.....(219)	木金草(过江龙)(197)	木桂子(木槿子)(436)
木浦(天麻)(462)	木姜子(草澄茄)(264)	
.....(462)(264)	木桂皮(肉桂)(257)	
木绵(杜仲)(507)	木桂花(木槿花)(131)	
.....(507)	木黄连(十大功劳叶)(124)	木夕草(木贼)(28)
木蜡(石菖蒲)(477)	木弹肉(龙眼肉)(531)	
.....(477)	木麻黄(麻黄)(1)	木瓜干(木瓜)(169)
木蜜(枳椇子)(560)	木落子(杏仁)(169)	
.....(560)(169)(169)	木瓜片(木瓜)	
木蟹(木鳖子)(616)(169)	木瓜实(木瓜)	
.....(616)(616)(169)	木瓜干(木瓜)	
木夕草(木贼)(28)(28)	木瓜片(木瓜)	
.....(28)(28)(28)	木瓜实(木瓜)	
木瓜干(木瓜)(169)(169)	木瓜干(木瓜)	
.....(169)(169)(169)	木瓜片(木瓜)	
木瓜片(木瓜)(169)(169)	木瓜实(木瓜)	
.....(169)(169)(169)	木瓜干(木瓜)	
木瓜实(木瓜)(169)(169)	木瓜片(木瓜)	
.....(169)(169)(169)	木瓜实(木瓜)	

..... (418)	木贼麻黃(麻黃) (1) (35)
木棉皮(海桐皮) (179)	木梓树皮(烏柏木根皮) (158)	支連(黃連) (50)
木筑子(草澄茄) (264)	木麻黃根(麻黃根) (570)	支解香(丁香) (265)
木虧蕊(接骨木) (373)	木腊树皮(烏柏木根皮) (158)	扎蓬蒿(猪毛菜) (472)
大蓝叶(大青叶) (70)	木槿树子(木槿子) (436)	丁克(鱼腥草) (80)
木櫟子(榧子) (312)	木槿树皮(木槿皮) (610)	不留(王不留行) (367)
木贼草(木贼) (28)	木槿根皮(木槿皮) (610)	不死面(茯苓) (210)
木蜜叶(苦丁茶) (43)	木鳖子霜(木鳖子) (610)	不死草(麦门冬) (540)
木蝶花(瞿麦) (234)	木鳖瓜子(木鳖子) (616)	(卷柏) (325)
木蝴蝶(补骨脂) (512)	木鳖藤子(木鳖子) (616)	不出林(矮地茶) (430)
木鳖瓜(木鳖子) (66)	木子树根皮(烏柏木根皮) (153)	不老药(锁阳) (520)
木上蜈蚣(石韦) (223)	木油树根皮(烏柏木根皮) (153)	不死药(麦门冬) (540)
木子树皮(烏柏木根皮) (158)	木桂花树皮(木槿皮) (610)	不食草(鹅不食草) (196)
木瓜海棠(木瓜) (169)	木贼麻黃根(麻黃根) (570)	不留行(王不留行) (367)
木芍药皮(牡丹皮) (60)	木通马兜铃(木通) (218)	不凋根草(巴戟天) (501)
木里木香(木香) (280)	木梓树根皮(烏柏木根皮) (153)	太贝(川贝母) (405)
木油树皮(烏柏木根皮) (153)	木腊树根皮(烏柏木根皮) (153)	太蕺(芥菜) (319)
木骨根皮(五加皮) (173)	木槿叶巴豆(血竭) (620)	太阳花(老鹳草) (185)
木曼陀罗(洋金花) (439)	支子(梔子) (79)	(垂盆草) (79)

太阳草(黄精)(244)	巨胜子(黑脂麻)
.....(547)	尤鲤甲(穿山甲)(552)
太一余粮(禹余粮)(381)	牙皂(皂莢)
.....(575)	车风(夏枯草)(393)
太仓薄荷(薄荷)(37)	牙香(沉香)
.....(5)	车前(车前草)(285)
太白贝母(川贝母)(216)	牙皮湾(藿香)
.....(405)	车车路(老鹳草)(202)
太阳花子(向日葵子)(185)	牙皂角(皂莢)
.....(554)	车苦菜(泽泻)(393)
太阳花托(向日葵花托)(213)	牙刷草(半支莲)
.....(237)	车轮菜(车前草)(118)
太阴玄精(玄精石)(216)	牙烟育(车前草)
.....(47)	车屎客(蜣螂)(216)
太一禹余粮(禹余粮)(447)	牙蛀消(徐长卿)
.....(575)	车前仁(车前子)(170)
太乙玄精石(玄精石)(215)	牙鹰笏(茅莓)
.....(47)	车前实(车前子)(127)
太阴玄精石(玄精石)(215)	牙香树木(沉香)
.....(47)	车前菜(车前草)(285)
犬肾(黄狗肾)(216)	屯绿(茶叶)
.....(520)	车下李仁(郁李仁)(396)
犬鞭(黄狗肾)(149)	戈便外(鱼腥草)
.....(520)	车前草子(车前子)(80)
犬阴茎(黄狗肾)(215)	瓦草(常山)
.....(520)	车轮菜子(车前子)(590)
犬尾曲(狗尾草)(215)	瓦韦(石韦)
.....(42)	车轱辘菜(车前草)(223)
犬尾草(狗尾草)(216)	瓦玉(瓦松)
.....(42)	车轱辘菜子(车前子)(129)
犬脚迹(毛茛)(215)	瓦花(瓦松)
.....(607)	巨麦(瞿麦)(129)
犬尾鸡冠花子(青葙子)(234)	瓦垄(瓦楞子)
.....(41)	巨胜(黑脂麻)(627)
有骨消(豨莶草)(552)	瓦草(白前)
.....(167)	巨句麦(瞿麦)(401)
尤须草(凤尾草)(234)	瓦粉(铅粉)

..... (600)	(墨旱莲) (73)
瓦葱(瓦松) (129)	(仙鹤草)	日本天南星(天南星) (390)
瓦塔(瓦松) (129)	(土大黄)	日本毛女贞(苦丁茶) (43)
瓦棱(瓦楞子) (627)	止血藤(乌蔹莓)	日本旋复花(旋复花) (399)
瓦楞(瓦楞子) (627)	日及子(木槿子)	日子菟丝子(菟丝子) (517)
瓦霜(瓦松) (129)	日及皮(木槿皮)	日本鹿蹄草(鹿衔草) (370)
瓦鬃(瓦松) (129)	日及花(木槿花)	中白(人中白) (48)
瓦子草(翻床) (111)	日日有(六月雪)	中吉(大黄) (143)
瓦那他(车前草) (216)	日日新(长春花)	中药(山豆根) (82)
瓦弄子(瓦楞子) (627)	日吉单(金果榄)	中庭(百合) (550)
瓦垄子(瓦楞子) (627)	日刚子(巴豆)	中心草(徐长卿) (170)
瓦宝塔(瓦松) (129)	日本人参(人参)	中央粉(蒲黄) (337)
瓦屋子(瓦楞子) (627)	日本天剑(狗狗秧)	中白丹(人中白) (48)
瓦莲花(瓦松) (129)	日本当归(当归)	中环钗(石斛) (543)
瓦棱子(瓦楞子) (627)	日本医蛭(水蛭)	中青皮(青皮) (273)
瓦垄壳皮(瓦楞子) (627)	日本海马(海马)	中逢花(百合) (550)
瓦垄蛤皮(瓦楞子) (627)	日本绵马(贯众)	中麻黄(麻黄) (1)
止行(刺蒺藜) (463)	日本薯蓣(山药)	中蜂蜜(蜂蜜) (497)
止血草(紫珠) (320)	日行千里(穿心莲)	中宁杞子(枸杞子) (555)

中亚滨藜(刺蒺藜)(93)	贝母(川贝母)(405)
.....(463)	见血青(筋骨草)(105)	贝齿(紫贝齿)
中华茜草(茜草)(335)	见血散(景天三七)(459)
.....(335)(335)	贝麻子(蓖麻子)(616)
中华蜂蜜(蜂蜜)(497)	见肿消(紫花地丁)	少辛(细辛)
.....(497)(69)(260)	少毛豨莶(豨莶草)
中华槲蕨(骨碎补)(510)	(墓头回)(167)
.....(510)(95)	少毛吴茱萸(吴茱萸)(258)
中华鳖甲(鳖甲)(564)	(瓜子金)	少棘巨蜈蚣(蜈蚣)
.....(564)(437)	(白蔹)(467)
中灵草根(党参)(482)(98)	丰本(韭菜)
.....(482)	(商陆)(290)	牵芦(藜芦)
中国石燕(石燕)(252)(156)	丰本子(韭子)
.....(252)	见根藤(海金沙藤)(224)	丰城鸡血藤(鸡血藤)
中国冬青(四季青)(102)	见水还阳草(卷柏)(373)
.....(102)(325)	手桔(佛手)(277)
中麻黄根(麻黄根)(570)	内金(鸡内金)	手柑(佛手)
.....(570)(303)(277)	手橘(佛手)
中华弓石燕(石燕)(252)	内消(紫荊花)(277)
.....(252)(115)	手巾蛇(白花蛇)(177)
中国冬青叶(四季青)(102)	内虚(黄芩)	手桔花(佛手花)
.....(102)(48)(278)	手柑花(佛手花)
中型滇丁香(丁香)(265)	内蒙黄芪(黄芪)(278)
.....(265)(486)	内蒙古黄芪(黄芪)	手橘花(佛手花)
中黄草石斛(石斛)(543)	内蒙古紫草(紫草)(272)
.....(543)(486)	贝也(萆薢)	毛化(橘红)
中华大蟾蜍皮(蟾皮)(624)(226)	
.....(624)	贝子(紫贝齿)(459)	
中华大蟾蜍酥(蟾皮)(624)	贝父(川贝母)	
.....(624)(405)		
中州茉莉花茶(茶叶)(396)		
.....(396)			
中间南五味子(鸡血藤)(373)		
.....(373)			
中间型沿阶草(麦门冬)(540)		
.....(540)			
见血飞(红藤)			

毛木通(木通)	毛毛通(木通)	毛木通(木通)
毛头(漏芦)	毛毛草(狗尾草)	毛和尚(蜀羊泉)
.....(100)(218)(368)
毛角(鹿茸)	毛风草(寻骨风)	毛知母(知母)
.....(498)(42)(86)
毛建(毛茛)	毛风藤(蜀羊泉)	毛狗儿(狗脊)
.....(607)(182)(32)
毛姑(山慈姑)	毛生姜(骨碎补)	毛建草(毛茛)
.....(101)(86)(607)
毛茸(鹿茸)	毛白榆(榆钱)	毛细辛(细辛)
.....(498)(510)(260)
毛香(麝香)	毛发炭(血余炭)	毛姑姑(狗尾草)
.....(473)(332)(42)
(寻骨风)	毛老人(蜀羊泉)	毛草根(白茅根)
.....(182)(86)(321)
毛胆(熊胆)	毛地锦(地锦草)	毛茨菇(山慈姑)
.....(97)(104)(101)
毛姜(骨碎补)	毛苍耳(苍耳子)	毛贯仲(骨碎补)
.....(510)(11)(510)
毛桃(辛夷)	毛苍术(苍术)	毛须藤(海金沙藤)
.....(13)(198)(224)
毛堇(毛茛)	毛芹菜(毛茛)	毛香附(香附)
.....(607)(607)(282)
毛根(白茅根)	毛卵陀(黄药子)	毛钩藤(钩藤)
.....(321)(415)(461)
毛蛤(瓦楞子)	毛秀才(蜀羊泉)	毛姜黄(姜黄)
.....(627)(86)(347)
毛萎(石南藤)	毛尾薯(土茯苓)	毛将军(仙鹤草)
.....(190)(79)(329)
毛蒟(石南藤)	毛鸡草(仙鹤草)	毛泽兰(爵床)
.....(190)(329)(111)
(海风藤)	毛辛夷(辛夷)	毛根朴(厚朴)
.....(187)(13)(200)
毛硝(芒硝)	毛青藤(青风藤)	毛桃仁(桃仁)
.....(145)(188)(360)
毛山药(山药)	毛棘树(毛冬青)	毛柴胡(金沸草)
.....(490)	(400)

毛脉蓼(黄药子)(62)	毛底海决(石决明)(455)
.....(415)			
毛笔头(辛夷)(13)	毛柄细辛(细辛)(260)
.....(101)			
毛慈姑(山慈姑)(101)	毛脉蚤休(蚤休)(75)
毛蚶壳(瓦楞子)(627)	毛脉蓼根(红药子)(131)
毛脚鸡(仙鹤草)(329)	毛将军芽(鹤草芽)(309)
毛脚齿(仙鹤草)(329)	毛梗豨莶(豨莶草)(167)
毛梨子(猕猴桃)(558)	毛接骨木(接骨木)(378)
毛葫芦(红药子)(131)	毛曼陀罗(洋金花)(439)
毛榆子(茺蔚)(321)	毛脚齿芽(鹤草芽)(309)
毛嘟嘟(狗尾草)(42)	毛脚鸡芽(鹤草芽)(309)
毛锥子(牛蒡子)(16)	毛旋复花(旋复花)(399)
毛熊胆(熊胆)(97)	毛筒玉竹(玉竹)(546)
毛燕子(蜀羊泉)(86)	毛然然子(牛蒡子)(16)
毛麝香(麝香)(473)	毛腺卫矛(鬼箭羽)(372)
毛大丁草(白头翁)(89)	毛櫻桃仁(郁李仁)(149)
(白薇)		毛蕊枸杞(枸杞子)(555)
.....(138)		毛擦拉子(豨莶草)(167)
毛千里光(蜀羊泉)(86)	毛穗蓼芦(蓼芦)(592)
毛叶仙桥(茅莓)(127)	毛蟹花根(石蒜)	
毛叶赤芍(赤芍)(89)		

毛叶乌蔹莓(乌蔹莓)	牛茎(牛膝)	牛不嗅(大薊)
毛叶欧里仁(郁李仁)	牛参(苦参)	牛毛黄(黄众)
毛叶淫羊藿(淫羊藿)	牛胆(猪胆汁)	牛毛粘(水蜈蚣)
毛叶猕猴桃(猕猴桃)	牛虻(虻虫)	牛白藤(五加皮)
毛花曼陀罗(洋金花)	牛扁(漏芦)	牛皮叶(石花)
毛底石决明(石决明)	牛银(马钱子)	牛皮消(何首乌)
毛柱铁线莲(威灵仙)	牛遗(车前草)	牛奶子(胡颓子)
毛脉吴茱萸(吴茱萸)	牛鳥(车前草)	牛奶根(胡颓子根)
毛绿七爪红(橘红)	牛蒡(牛蒡子)	牛头草(仙鹤草)
毛萼忍冬花(金银花)	牛鄰(牛膝)	牛耳青(大青叶)
毛裂蜂头菜(款冬花)	牛蝇(虻虫)	牛耳枫(鸦胆子)
毛蕊老鹳草(老鹳草)	牛鳌(水蛭)	牛舌片(苣荬菜)
毛花柱忍冬花(金银花)	牛入参(茜草)	(羊蹄)
牛时花(佛甲草)	(豨莶草)	牛舌头(苣荬菜)
牛夕(牛膝)	牛大黄(大青叶)	牛舌草(车前草)
牛子(牛蒡子)	(商陆)	牛舌根(羊蹄)
牛至(香薷)	牛口舌(大薊)	牛苍蝇(虻虫)
牛角(水牛角)	牛口刺(大薊)	牛克膝(夕)(土牛膝)
	牛飞龙(骨碎补)	(366)

牛杆草(威灵仙)(233)	牛魔蚊(虻虫)
.....(162)	(385)
牛抵草(夏枯草)(225)	牛儿大黄(羊蹄)
.....(37)	(340)
牛肚根(银柴胡)(156)	牛奶子根(生地黄)
.....(140)	(58)
牛角风(白薇)(16)	牛奶白附(白附子)
.....(138)	(392)
牛角花(淫羊藿)(130)	牛头草芽(鹤草芽)
.....(503)	(309)
牛尾七(万年青)(216)	牛耳大黄(土大黄)
.....(245)	(112)
牛尾参(紫菀)(130)	牛耳朵草(鸭跖草)
.....(421)	(38)
牛闲草(威灵仙)(385)	牛耳朵棵(车前草)
.....(162)	(216)
牛虱子(苍耳子)(215)	牛舌大黄(羊蹄)
.....(11)	(340)
牛虱鬼(百部)(316)	牛舌头根(羊蹄)
.....(419)	(340)
牛枯草(夏枯草)(215)	牛舌头棵(大青叶)
.....(37)	(70)
牛顿草(牛筋草)(335)	(车前草)
.....(225)	(216)
牛虻虫(虻虫)(243)	牛舌草子(车前子)
.....(385)	(215)
牛屎虫(蜣螂)(316)	牛舌菜根(羊蹄)
.....(447)	(340)
牛屎菌(马勃)(340)	牛角胆草(白薇)
.....(83)	(138)
牛屎菇(马勃)(365)	牛尾花子(青葙子)
.....(83)	(41)
牛唇根(泽泻)(365)	牛尾独活(独活)
.....(213)	(161)
牛蚊子(虻虫)(318)	牛刺芍菜(大蓟)
.....(385)	(316)
牛筋草(萹蓄)(233)	牛甜菜子(车前子)

..... (215)	长踦 (壁钱) (363)
牛模头根 (漏芦) (626)	长莎藤 (天仙藤)
..... (100)	长不老 (商陆) (190)
牛腿子藤 (杜仲) (156)	长螵蛸 (桑螵蛸)
..... (507)	长生草 (独活) (584)
牛儿黄草根 (羊蹄) (161)	长爪石斛 (石斛)
..... (340)	(卷柏) (543)
牛甘子树皮 (紫荆皮) (325)	长叶茜草 (茜草)
..... (114)	长生韭 (韭菜) (335)
牛耳朵棵子 (车前子) (290)	长叶地榆 (地榆)
..... (215)	长白参 (人参) (322)
牛舌头棵子 (车前子) (478)	长叶黄精 (黄精)
..... (215)	长虫皮 (蛇蜕) (547)
牛尾巴花子 (青葙子) (470)	长叶紫珠 (紫珠)
..... (41)	长虫草 (半边莲) (320)
牛蓖子草子 (蓖麻子) (78)	长生韭子 (韭子)
..... (616)	长竹叶 (竹叶) (524)
气果 (蛇床子) (34)	长生景天 (景天三七)
..... (614)	长血草 (酢浆草) (335)
气砂 (硇砂) (241)	长白人参 (人参)
..... (602)	长寿菜 (马齿苋) (473)
气萝卜 (地骷髅) (89)	长白沙参 (沙参)
..... (398)	长牡蛎 (牡蛎) (535)
气辣子 (吴茱萸) (456)	长白柴胡 (柴胡)
..... (253)	长皂角 (皂荚) (24)
气布袋棵 (墓头回) (393)	长花细辛 (细辛)
..... (95)	长皂莢 (皂莢) (250)
升丹 (升药) (393)	长壳玉果 (肉豆蔻)
..... (599)	长松萝 (松萝) (573)
升推 (刺蒺藜) (115)	长条水蛭 (水蛭)
..... (463)	(海风藤) (383)
升阳菜 (薄荷) (187)	长条姜黄 (姜黄)
..... (15)	长命苋 (马齿苋) (347)
升药底 (升药) (89)	长尾黄羊 (羚羊角)
..... (599)	长命菜 (马齿苋) (454)
升推炭 (刺蒺藜) (89)	长刺酸模 (羊蹄)
..... (463)	长春花 (月季花) (340)

长果桑叶(桑叶)(75)	片黄芩(黄芩)(48)
长柄石韦(石韦)(223)	片蟾酥(蟾酥)(623)
长柄重楼(蚤休)(75)	片子枳实(枳实)(275)
长须谷芽(谷芽)(302)	片子姜黄(姜黄)(347)
长梗玉竹(玉竹)(546)	片状虫胶(紫草茸)(134)
长梗黄精(黄精)(547)	仁枣(川棟子)(286)
长梗薤白(薤白)(289)	仁莲(莲子)(576)
长脚蜂窝(露蜂房)(624)	仁频(槟榔)(307)
长萼瓜蒌(瓜蒌)(404)	什果枳壳(枳壳)(276)
长萼堇菜(紫花地丁)(69)	什果枳实(枳实)(275)
长叶万寿竹(黄精)(517)	仆垒(麦门冬)(510)
长叶鹿蹄草(鹿衔草)(370)	仆累(蜗牛)(116)
长生不死草(卷柏)(325)	仆公英(蒲公英)(68)
长生景天草(景天三七)(335)	仆公馨(蒲公英)(68)
长花滇紫花(紫草)(63)	化皮(橘红)(272)
长寿仙人柳(怪柳)(55)	化石胆(鸡内金)(303)
长形肉豆蔻(肉豆蔻)(373)	化血莲(土大黄)(112)
长苞香蒲黄(蒲黄)(337)	化骨丹(甘遂)(151)
长药隔重楼(蚤休)(347)	化骨胆(鸡内金)	

化食丹(刘寄奴)	月下红(虎耳草)	丹枣(大枣)
化桔红(橘红)	(石见穿)	丹根(牡丹皮)
化橘红(橘红)	月月开(月季花)	丹粉(铅丹)
化州柚皮(橘红)	月月有(六月雪)	丹珠(朱砂)
化州橘红(橘红)	月月红(月季花)	丹粟(朱砂)
化米先生(神曲)	月月花(月季花)	丹鍊(密佗僧)
反白草(翻白草)	月石坠(硼砂)	丹若皮(石榴皮)
反皮索(绶草)	月石块(硼砂)	丹荔枝核(荔枝核)
反枝苋子(青葙子)	月母草(益母草)	丹药头(荭草)
爪儿血(血竭)	月光花(月季花)	丹棘根(萱草根)
爪兰石斛(石斛)	月季红(月季花)	丹阳木皮(肉桂)
爪哇犀角(犀角)	月贵红(月季花)	丹药头子(水红花子)
月石(硼砂)	月贵花(月季花)	丹药头花(荭草花)
月记(月季花)	月见草根(月见草)	风车(威灵仙)
月季(月季花)	月腺大戟(狼毒)	凤肉(防风)
月桂(肉桂)	丹(铅丹)	凤药(泽兰)
月黄(蓼黄)	丹山(雄黄)	风姜(高良姜)
月魂(蟾酥)	丹皮(牡丹皮)	风草(金钱草)

风藤(络石藤)(219)	凤仙草花(凤仙花)(357)
.....(186)	凤尾连(黄连)(50)	凤尾伸筋(伸筋草)
(海风藤)(187)	凤尾旁(仙人掌)(182)
.....(187)(108)	凤尾贯众(贯众)(313)
(石南藤)	凤尾草(过江龙)(197)	凤尾橘络(橘络)
.....(190)(黄众)(313)(272)
凤化硝(芒硝)(197)	凤眼前子(车前子)(215)
.....(146)	凤尾蕨(凤尾草)(244)	凤眼前仁(车前子)
凤茄花(洋金花)(313)	凤茄花(洋金花)(215)
.....(439)	凤苔草(仙茅)(439)	凤仙透骨草(透骨草)
风枪林(鬼箭羽)(504)	凤眼子(臭梧桐)(183)
.....(372)(169)	凤眼草(铁苋菜)(182)
凤骨木(常山)(241)	凤眼前(车前草)(219)
.....(590)(216)	凤凰爪(苦参)(147)
凤麻花(洋金花)(55)	凤凰草(射干)(菊叶三七)
.....(439)(81)(334)	鸟女(玉竹)
风湿草(豨莶草)(凤尾草)(546)(546)
.....(167)(244)	鸟头(芡实)(附子)
风车草根(茜草)	凤凰退(凤凰衣)(254)(254)
.....(335)(561)	鸟芋(荸荠)(552)
风味团头(砂仁)	凤仙花子(急性子)(158)	鸟白(乌柏木根皮)
.....(204)(358)(111)	鸟阶(狼把草)
凤仙(凤仙草)	凤仙花梗(透骨草)(111)	鸟把(狼把草)
.....(357)(183)(111)	鸟吹(射干)
凤翼(射干)	凤仙花桔(透骨草)		
.....(81)(358)		
凤丹皮(牡丹皮)	凤仙草子(急性子)		
.....(60)(358)		
凤仙子(急性子)	凤仙花梗(透骨草)		
.....(358)(183)		
凤仙花(透骨草)	凤仙花桔(透骨草)		
.....(183)(183)		
凤仙草(透骨草)	凤仙草子(急性子)		
.....(183)(358)		
凤仙梗(透骨草)			
.....(183)			
凤尾丝(通草)			

..... (81)	乌蓼 (薤蕷) (529)
乌泡 (钻地风) (233)	乌龟壳 (龟板)
..... (180)	乌蔹 (射干) (563)
乌药 (附子) (81)	乌龟板 (龟板)
..... (254)	乌覆 (木通) (563)
乌茨 (荩芥) (218)	乌附子 (附子)
..... (552)	乌丁泥 (孩儿茶) (254)
乌绒 (合欢花) (619)	乌附片 (附子)
..... (452)	乌乃巴 (车前子) (254)
乌柏 (乌柏木根皮) (215)	乌尾丁 (毛冬青)
..... (158)	乌子麻 (了哥王) (363)
乌蛇 (乌梢蛇) (110)	乌沙草 (石见穿)
..... (187)	乌元参 (玄参) (372)
乌扇 (射干) (59)	乌疔草 (龙葵)
..... (81)	乌毛蕨 (贯众) (122)
乌菜 (海藻) (313)	乌金黄 (牛黄)
..... (413)	乌风蛇 (乌梢蛇) (74)
乌藜 (玉竹) (187)	乌鱼骨 (乌贼骨)
..... (546)	乌心草 (墨旱莲) (583)
乌蘧 (射干) (562)	乌药个 (乌药)
..... (81)	乌龙茶 (茶叶) (283)
乌麻 (黑脂麻) (396)	乌药片 (乌药)
..... (552)	乌归菜 (龙葵) (283)
乌椑 (柿蒂) (122)	乌药瓜 (乌药)
..... (292)	乌玄参 (玄参) (283)
乌犀 (皂莢) (59)	乌韭板 (麦门冬)
..... (393)	鸟则骨 (乌贼骨) (540)
乌蒲 (射干) (586)	乌绒花 (合欢花)
..... (815)	乌花蛇 (乌梢蛇) (452)
乌蒜 (石蒜) (187)	乌垒泥 (孩儿茶)
..... (93)	乌豆皮 (稗豆衣) (619)
乌椹 (桑椹) (465)	乌柏皮 (乌柏木根皮)
..... (556)	乌豆衣 (稗豆衣) (158)
乌喙 (乌头) (465)	乌峰蛇 (乌梢蛇)
..... (255)	鸟壳子 (大风子) (187)
(附子) (612)	乌贼甲 (乌贼骨)
..... (254)	鸟肝石 (何首乌) (586)

乌爹泥(孩儿茶)(520)	勾勾(钩藤)
.....(619)	(461)
乌桑皮(紫荆皮)(56)	勾扭(钩藤)
.....(114)	(461)
乌桑花(紫荆花)(405)	勾荇(钩藤)
.....(115)	(461)
乌黄精(黄精)(563)	勾链链(老鹳草)
.....(547)	(185)
乌菽衣(稻豆衣)(149)	勾木通(木通)
.....(405)	(218)
乌菽皮(稻豆衣)(452)	父子草(仙鹤草)
.....(465)	(329)
乌梅干(乌梅)(452)	父子草芽(鹤草芽)
.....(566)	(309)
乌蛇肉(乌梢蛇)(158)	介白(薤白)
.....(187)	(289)
乌麻子(黑脂麻)(158)	分水翁(柳根)
.....(552)	(114)
鸟犀尖(犀角)(586)	分离草(天麻)
.....(57)	(462)
鸟犀角(犀角)(401)	分解石(寒水石)
.....(57)	(31)
鸟蔹草(乌蔹莓)(452)	分筋草(伸筋草)
.....(106)	(182)
鸟鱗骨(乌贼骨)(57)	公丁(丁香)
.....(586)	(265)
鸟叠泥(孩儿茶)(84)	公英(蒲公英)
.....(619)	(68)
鸟樟脑(樟脑)(313)	公苒(藜芦)
.....(621)	(592)
鸟墨黑(墨旱莲)(197)	公乳(钟乳石)
.....(562)	(270)
鸟藤菜(刘寄奴)(158)	公丁香(丁香)
.....(351)	(265)
鸟薰子(覆盆子)(530)	公母草(问荆)
.....(585)	(239)
鸟兰一告亚(锁阳)(461)	公防风(防风)

..... (7)	巴戟 (巴戟天) (155)
公道老 (接骨木) (378) (501)	丑蒙子 (吴茱萸) (258)
公孙树叶 (白果叶) (431)	巴不鸣 (车前草) (216)	水马 (海马) (522)
公鱼秧草 (过江龙) (197)	巴青天 (巴戟天) (501)	水玉 (半夏) (388)
公罗锅底 (绞股蓝) (107)	巴豆仁 (巴豆)	水石 (寒水石) (31)
公孙树果仁 (白果) (430) (153)	水白 (浮萍) (27)
公道老树枝 (接骨木) (378)	巴豆肉 (巴豆)	水芋 (荸荠) (552)
刘头茹根 (葛根) (23)	巴豆霜 (巴豆)	水花 (浮萍) (27)
比目肉 (龙眼肉) (534)	巴岩香 (海风藤) (187)	(海浮石) (410)
引无 (地龙) (469) (190)	(荷花) (578)
引线包 (狼把草) (111)	巴椒目 (椒目)	水芹 (芹菜) (472)
巴仁 (巴豆) (153)	巴戟肉 (巴戟天)	水苏 (浮萍) (27)
巴叶 (桃杷叶) (427)	巴天酸模 (土大黄)	水英 (芹菜) (472)
巴吉 (巴戟天) (501)	巴东独活 (独活)	水茄 (龙葵) (122)
巴米 (巴豆) (153)	巴旦杏仁 (甜杏仁)	水菖 (水菖蒲) (247)
巴果 (巴豆) (153)	巴达杏仁 (酸杏仁)	水参 (知母) (32)
巴蕊 (巴豆) (153)	丑牛 (牵牛子)	水帘 (浮萍) (27)
巴棘 (巴戟天) (501)	丑宝 (牛黄)	水泻 (泽泻) (213)
巴椒 (花椒) (263)	丑黄 (牛黄)	水珀 (琥珀) (448)
	丑牛子 (牵牛子)	

水茛(毛茛)(27)	水半夏(半夏)(388)
.....(607)			
水荭(荭草)(382)	水芝子(冬瓜子)(230)
.....(194)			(莲子)
水香(泽兰)(334)	(576)
.....(352)		水芝丹(莲子)(576)
(佩兰)(247)	水芝皮(冬瓜皮)(230)
.....(203)			
水须(知母)(27)	水芝实(莲子)(576)
.....(32)		水耳朵(虎耳草)(123)
水栗(喜树)(28)	水竹子(鸭跖草)(38)
.....(117)		水竹笋(爵床)(111)
水浚(知母)(477)	水竹茹(竹茹)(409)
.....(32)		水竹钵(水蜈蚣)(247)
水菖(石菖蒲)(247)	水华朱(银朱)(597)
.....(477)		水红子(水红花子)(360)
(水菖蒲)(247)	水红花(荭草花)(359)
水萍(浮萍)(247)		(芍草)
.....(27)		(194)
水麻(石蒜)(282)	水防己(防己)(164)
.....(593)		水防风(防风)(7)
水宿(水菖蒲)(368)	水灯心(灯心草)(235)
.....(247)		水芹菜(芹菜)	
水葱(灯心草)(214)		
.....(235)			
水雁(海龙)(249)		
.....(523)			
水硝(芒硝)(54)		
.....(145)			
水痴(水蛭)(401)		
.....(383)			
水蓼(辣蓼)(213)		
.....(193)			
水蘐(芹菜)(612)		
.....(472)			
水薜(浮萍)(612)		

..... (472)	水柳叶(柳叶) (113) (27)
(毛茛)		水流黄(芡实)
(607)		(581)
水旱莲(墨旱莲)	水柳枝(柳枝) (113)	水黄芹(羊蹄)
(562)		(340)
水龟甲(龟板)	水柳须(柳根) (114)	水菖蒲(石菖蒲)
(563)		(477)
水龟板(龟板)	水柳根(柳根) (114)	水萝卜(百部)
(563)		(419)
水鸡头(芡实)	(白前) (401)	(商陆)
(581)		(156)
水状元(紫苏)	水指甲(凤仙草) (357)	水菜根(泽泻)
(3)		(213)
水茅草(灯心草)	(透骨草) (183)	水萍草(浮萍)
(235)		(27)
水金钗(水蜈蚣)	水骨菜(贯众) (313)	水捻子(蔓荆子)
(247)		(22)
水鱼壳(鳖甲)	水蚂蝗(水蛭) (383)	水银粉(轻粉)
(564)		(598)
水细辛(细辛)	水香附(水蜈蚣) (247)	水银霜(轻粉)
(260)		(598)
水线草(白花蛇舌草)	水香草(水蜈蚣) (247)	水盐香(沉香)
(96)		(285)
水泡石(海浮石)	水枯草(牛筋草) (225)	水绿矾(皂矾)
(410)		(603)
水莽草(雷公藤)	水前胡(前胡) (402)	水鹿角(鹿角)
(610)		(500)
水莲花(莲花)	水洋芋(天麻) (462)	水鹿茸(鹿茸)
(359)		(498)
(荭草)	水莎根(香附) (282)	水麻贴(水蛭)
(194)		(383)
水芥菜(芥菜)	水桢子(女贞子) (557)	水葵花(墨旱莲)
(319)		(562)
水梔子(梔子)	水桐树(喜树) (117)	(旋复花)
(36)		(399)
水树皮(土槿皮)	水浮草(鸭跖草) (38)	水晶花(酢浆草)
(315)		(241)
	水浮莲(浮萍)	

水蓬棵(葍草)(92)	水朝阳花(旋复花)(399)
.....(194)		水瑞香子(女贞子)(557)
水荫蘋(芦根)(33)	水蜡树子(女贞子)(557)
.....(33)		水窟雄黄(雄黄)(595)
水槐根(苦参)(55)	水橄榄根(地榆)(322)
.....(55)		水稻根须(糯稻根须)(569)
水蜈蚣(石菖蒲)(477)	水八角草根(水菖蒲)(247)
.....(477)		水面油根皮(五加皮)(173)
水锦花(密蒙花)(40)	水炙马钱子(马钱子)(613)
.....(40)		水狗拉拉蛄(蝼蛄)(251)
水辣菜(毛茛)(607)	水指甲花子(急性子)(358)
.....(607)		水蜡烛蒲黄(蒲黄)(337)
水漠子(喜树)(117)	书带草(麦门冬)(540)
.....(117)		孔公蘖(钟乳石)(270)
水槟榔(地榆)(322)	孔石蓆(昆布)(414)
.....(322)		孔雀毛(地柏枝)(326)
水榴子(地耳草)(242)	孔麻子(荷麻子)(46)
.....(242)		双丁(钩藤)(461)
水横枝(梔子)(36)	双勾(钩藤)	
.....(36)			
水横枢(梔子)(36)		
.....(36)			
水稻芽(谷芽)(302)		
.....(302)			
水藻本(藻本)(11)		
.....(11)			
水鳖虫(蜃虫)(382)		
.....(382)			
水飞石燕(石燕)(252)		
.....(252)			
水飞滑石(滑石)(217)		
.....(217)			
水马香果(马兜铃)(428)		
.....(428)			
水凤仙草(墨旱莲)(562)		
.....(562)			
水曲柳皮(秦皮)			

.....(461)	双钩藤(钩藤)(459)
双叶(桑叶)(461)	文术(莪术)
.....(19)	双桑叶(桑叶)(347)
双皮(桑白皮)(19)	文且(泽泻)
.....(425)	双眼龙(巴豆)(213)
双花(金银花)(153)	文甲(玳瑁)
.....(65)	双眼虾(巴豆)(459)
双芽(薤白)(153)	文希(沙参)
.....(289)	双寄生(桑寄生)(535)
双钩(钩藤)(172)	文虎(沙参)
.....(461)	双瑚草(绶草)(535)
双勾勾(钩藤)(124)	文党(党参)
.....(461)	双叶细辛(细辛)(482)
双白皮(桑白皮)(260)	文蛤(海蛤壳)
.....(425)	双边花粉(天花粉)(411)
双合草(络石藤)(35)	(五倍子)
.....(186)	双角犀角(犀角)(568)
双花藤(忍冬藤)(57)	文大黄(大黄)
.....(66)	双英卜地(蒲公英)(143)
双批七(太子参)(68)	文元党(党参)
.....(485)	双苞花藤(忍冬藤)(482)
双角果(白薇)(66)	文仙果(无花果)
.....(138)	双茎柴胡(柴胡)(88)
双层楼(蚤休)(24)	文先果(无花果)
.....(75)	双穗麻黄(麻黄)(88)
双苞花(金银花)(1)	文武实(桑椹)
.....(65)	双边天花粉(天花粉)(556)
双肾子(蛇床子)(35)	文星草(谷精草)
.....(614)	双边冬瓜皮(冬瓜皮)(39)
双卷朴(厚朴)(230)	文冠果(无花果)
.....(200)	双边栝楼子(瓜蒌子)(88)
双面针(两面针)(434)	文豹骨(豹骨)
.....(109)	双边栝楼根(天花粉)(176)
双面刺(两面针)(35)	文蛤壳(海蛤壳)
.....(109)	文无(当归)(411)
双钩钩(钩藤)(526)	文元党参(党参)
.....(461)	文贝(紫贝齿)(482)

文县大黄(大黄)(369)	方苓(茯苓)(210)
.....(143)			
文章草根皮(五加皮)(241)	方茶(孩儿茶)(619)
.....(173)		方通(通草)(219)
六爪(橘红)(81)	方溃(青蒿)(136)
.....(272)		方儿茶(孩儿茶)(619)
六旦(续断)(241)	方儿草(半支莲)(118)
.....(508)		方山药(山药)(490)
六曲(神曲)(111)	方瓜子(南瓜子)(309)
.....(300)		方块铜(自然铜)(387)
六汗(续断)(43)	方茎子(黑脂麻)(552)
.....(508)		方通草(通草)(219)
六丁曲(神曲)(43)	方解石(寒水石)(31)
.....(300)		方吻犀角(犀角)(57)
六月干(夏枯草)(45)	方梗泽兰(泽兰)(352)
.....(37)		佩兰(203)
六月冷(六月雪)(413)	方解石寒水石(寒水石)(31)
.....(246)		火冬(麦门冬)(540)
六月凌(鬼箭羽)(214)	火杖(益母草)(355)
.....(372)		火参(大黄)	
六月菊(金沸草)(214)		
.....(400)			
(旋复花)(316)		
.....(399)			
六月雪(毛冬青)(300)		
.....(368)			
(刘寄奴)(396)		
.....(351)			
六月棱(鬼箭羽)(111)		
.....(372)			
六月霜(大薊)(356)		
.....(316)			
(刘寄奴)(285)		
.....(351)			
六爪红(橘红)(111)		
.....(272)			
六六路(路路通)(613)		

..... (143)	火山荔枝 (荔枝核) (322)
火珀 (琥珀) (287)	玉斗 (白芍)
..... (448)	火捻树皮 (苦棟皮) (531)
火泉 (竹沥) (306)	玉术 (玉竹)
..... (409)	火镰扁豆 (扁豆) (546)
火荟 (豨莶草) (492)	玉兰 (辛夷)
..... (167)	火刻失把都 (马钱子) (13)
火葱 (葱白) (613)	玉延 (山药)
..... (14)	心红 (银朱) (490)
火硝 (芒硝) (597)	玉米 (薏苡仁)
..... (145)	心黄 (牛黄) (214)
火掌 (仙人掌) (74)	玉果 (肉豆蔻)
..... (108)	心不干 (锦灯笼) (573)
火焰 (仙人掌) (88)	玉金 (郁金)
..... (108)	心叶党 (党参) (345)
火秧草 (豨莶草) (482)	玉参 (玉竹)
..... (167)	心叶大百合 (马兜铃) (546)
火炭草 (墨旱莲) (428)	玉京 (郁金)
..... (562)	心叶淫羊藿 (淫羊藿) (345)
火炭葛 (伸筋草) (505)	玉茜 (海藻)
..... (182)	斗节 (藕节) (413)
火炭酸 (矮地茶) (342)	玉草 (海藻)
..... (430)	斗令 (马兜铃) (413)
火索木 (了哥王) (428)	玉柏 (伸筋草)
..... (110)	斗鸡 (蟋蟀) (182)
火烧草 (佛甲草) (251)	玉珠 (薏苡仁)
..... (119)	斗铃 (马兜铃) (214)
火麻子 (火麻仁) (428)	玉桂 (肉桂)
..... (148)	斗牛儿 (老鹳草) (257)
火筒杆 (升麻) (185)	玉黄 (藤黄)
..... (26)	斗雪红 (月季花) (617)
火筒青 (毛茛) (363)	玉椒 (胡椒)
..... (607)	【五画】	
火焰草 (佛甲草)	玉女 (菟丝子) (269)
..... (119) (517)	玉遂 (伸筋草)
火藤根 (穿山龙)	玉扎 (地榆) (182)
..... (371)		玉魁 (白芍)
	 (531)

玉榧(榧子)(312)	玉燕兔子扇(射干)(81)
玉大石(石膏)(30)	玉露秫秫须(玉米须)(239)
玉山果(榧子)(312)	示姑(半夏)(388)
玉支子(八月札)(294)	未膝(夕)(土牛膝)(366)
玉火石(石膏)(30)	末药(没药)(376)
玉兰花(辛夷)(13)	艾(艾叶)(338)
玉丝皮(杜仲)(507)	艾片(冰片)(474)
玉如意(紫花地丁)(69) (白附子)	艾绒(艾叶)(338)
玉麦须(玉米须)(392)	艾粉(冰片)(474)
玉芙蓉(仙人掌)(108)	艾菊(旋复花)(399)
玉苏子(苏子)(424)	艾蒿(艾叶)(338)
玉身珠(珍珠)(457)	艾蓬(艾叶)(338)
玉菱须(玉米须)(239)	艾三七(菊叶三七)(334)
玉香丝(细辛)(260)	艾冬花(款冬花)(423)
玉桔梗(桔梗)(395)	艾纳香(冰片)(474)
玉秫子(薏苡仁)(214)	艾叶三七(菊叶三七)(334)
玉海草(海藻)(413)	节地(玉竹)(546)
玉棘根(地榆)		节华(菊花)(21)
		节蓼(荭草)	

..... (194)	去白陈皮(橘红) (540)
节节乌(墨旱莲) (562) (272)	甘汞(轻粉) (498)
节节虫(麻虫) (382) (348)	甘泽(甘遂) (151)
节节连(积雪草) (225)	去皮西洋参(西洋参) (481)	甘根(白及) (330)
节节空(白薇) (138)	正马(玄参) (59)	甘菊(菊花) (21)
节节草(木贼) (28) (问荆) (239)	正芪(黄芪) (486)	甘葛(葛根) (23)
节节高(黄精) (547)	正香(藿香) (202)	甘榄(橄榄) (558)
节节寒(爵床) (111)	正口芪(黄芪) (486)	甘蜜(孩儿茶) (619)
节松萝(海风藤) (187) (松萝) (115)	正川芎(川芎) (343)	甘精(菊花) (21)
节股节(木贼) (28)	正牛黄(牛黄) (74)	甘薰(甘遂) (151)
节骨草(木贼) (28)	正面参(西洋参) (481)	甘中黄(人中黄) (133)
节菖蒲(石菖蒲) (477)	正光结参(西洋参) (481)	甘瓜子(冬瓜子) (230)
节节结蕊草(白花蛇舌 草)..... (96)	正坐丹砂(附子) (254)	甘瓜蒂(瓜蒂) (589)
节裂角茴香(角茴香) (87)	正炮台芪(黄芪) (486)	甘竹叶(竹叶) (34)
去水花(芫花) (152)	功劳叶(苦丁茶) (43) (十大功劳叶) (124)	甘竹茹(竹茹) (409)
去皮参(西洋参) (481)	邛巨(大戟) (154)	甘州子(枸杞子) (555)
去心麦冬(麦门冬) (540)	甘石(炉甘石) (606)	甘杞子(枸杞子) (555)
	甘白(当归) (526)	甘松香(甘松) (293)
	甘冬(麦门冬)	甘草节(甘草) (493)

甘草头(甘草)(50)	石血(络石藤)(186)
.....(493)			
甘草黄(入中黄)(456)	石衣(石花)(136)
.....(133)			
甘草梢(甘草)(68)	石决(石决明)(455)
.....(493)			
甘茶蔓(绞股蓝)(555)	石苇(石韦)(223)
.....(107)			
甘枸杞(枸杞子)(562)	石花(海浮石)(410)
.....(555)			
甘菊花(菊花)(50)	(卷柏)(325)
.....(21)			
甘蔗汁(甘蔗)(99)	石肝(夜明砂)(42)
.....(539)			
甘露子(泽兰)(253)	石松(仲筋草)(182)
.....(352)			
甘露秧(泽兰)(531)	石饴(蜂蜜)(497)
.....(362)			
甘肃山楂(山楂)(329)	石乳(钟乳石)(270)
.....(298)			
甘肃贝母(川贝母)(489)	石珀(琥珀)(448)
.....(405)			
甘肃丹参(丹参)(30)	石茶(石韦)(223)
.....(349)			
甘肃麦冬(麦门冬)(45)	石墨(石灰)(607)
.....(540)			
甘肃黄芩(黄芩)(514)	石柏(地柏枝)(326)
.....(48)			
甘肃黄精(黄精)(194)	石胆(胆矾)(603)
.....(547)			
甘州枸杞子(枸杞子)(525)	石剑(石韦)(223)
.....(555)			
甘平十大功劳(十大功 劳叶)(223)	石姜(蠶虫)(382)
古月(胡椒)(223)	石蚕(拳参)(77)
.....(269)			
古连(黄连)(234)	石脑(禹余粮)	

石脂(赤石脂)	石鱗(絡石藤)	石灰菜(筋骨草)
.....(575)(186)(105)
石盐(戎盐)	石箭(天麻)	石竹草(瞿麦)
.....(135)(462)(234)
石羔(石膏)	石蹉(絡石藤)	石竹花(瞿麦)
.....(30)(186)(231)
石涅(明矾)	石韦(石韦)	石防风(前胡)
.....(603)(223)(402)
石黄(雄黄)	石瓣(佩兰)	(防风)
.....(595)(203)(7)
石液(胆矾)	石刁柏(百部)	石牡蛎(牡蛎)
.....(591)(419)(456)
石萎(石南藤)	石大川(石见穿)	石良姜(骨碎补)
.....(190)(372)(510)
石蘧(石斛)	石见穿(拳参)	石谷皮(了哥王)
.....(543)(77)(110)
石榴(石南藤)	石毛姜(骨碎补)	石青子(矮地茶)
.....(190)(510)(430)
石解(防己)	石气柑(絡石藤)	石苔花(石花)
.....(164)(186)(136)
石蓝(白前)	石长生(凤尾草)	石虎子(吴茱萸)
.....(401)(241)(258)
石蒟(石南藤)	石丹药(虎耳草)	石岩姜(骨碎补)
.....(190)(123)(510)
石鼠(蝼蛄)	石龙子(水红花子)	石金花(地柏枝)
.....(251)(360)(326)
石薢(石斛)	石龙花(荭草花)	石灵芝(灵芝)
.....(543)(359)(485)
石锻(石灰)	石龙藤(絡石藤)	石莲子(莲子)
.....(607)(186)(576)
石膏(寒水石)	石打穿(石见穿)	石莲肉(莲子)
.....(31)(372)(576)
石蜜(蜂蜜)	(仙鹤草)	石莲花(卷柏)
.....(497)(329)(325)
石赭(代赭石)	石叶藤(絡石藤)	(瓦松)
.....(460)(186)(129)
	石生蓼(拳参)	

石茶叶(石韦)(510)	石寿树子(枸杞子)
.....(223)	石棉皮(了哥王)(555)
石茅宁(香薷)(110)	石寿树根(地骨皮)
.....(5)	石塔花(瓦松)(139)
石南藤(海风藤)(129)	石板楂片(山楂)
.....(187)	石蕨明(石决明)(258)
石柱花(瞿麦)(455)	石首鱼脑(鱼脑石)
.....(234)	石硫黄(硫黄)(253)
石柱参(人参)(594)	石首鱼蛇(鱼脑石)
.....(478)	石楠藤(石南藤)(253)
石胡荽(鹅不食草)(190)	石脾蔻香(蔻香)
.....(196)	石碎补(骨碎补)(202)
石指甲(垂盆草)(510)	石榴果皮(石榴皮)
.....(79)	石蜈蚣(石菖蒲)(571)
石思仙(杜仲)(477)	石榴根皮(石榴皮)
.....(507)	石榴壳(石榴皮)(571)
石背柳(石韦)(571)	石鱗鱼甲(穿山甲)
.....(223)	石滚子(胡蘿子)(381)
石香薷(香薷)(304)	石下徐长卿(徐长卿)
.....(5)	石燕子(石燕)(170)
石钟乳(钟乳石)(253)	石上瓜子菜(半支莲)
.....(270)	石薜荔(络石藤)(118)
石首骨(鱼脑石)(186)	石子藤石松(过江龙)
.....(253)	石榴皮(秦皮)(197)
石荷叶(虎耳草)(92)	石头鱼头石(鱼脑石)
.....(123)	石髓铅(自然铜)(253)
石豇豆(蔊菜)(387)	石连姜槲蕨(骨碎补)
.....(417)	石蟾蜍(防己)(510)
石留黄(硫黄)(164)	石岩酸角草(老鹳草)
.....(594)	石下长卿(徐长卿)(185)
石流黄(硫黄)(170)	石首鱼头石(鱼脑石)
.....(594)	石山丹参(丹参)(253)
石菖卜(石菖蒲)(349)	石首鱼脑中枕(鱼脑石)
.....(477)	石竹子花(瞿麦)(253)
石盘藤(络石藤)(234)	左力(吴茱萸)
.....(186)	石竹瞿麦(瞿麦)(258)
石庵蘭(骨碎补)(234)	左扭(秦艽)

..... (166)	龙芝(五灵脂) (547)
左壳(牡蛎) (380)	龙解(沉香)
..... (456)	龙舌(仙人掌) (285)
左拧(秦艽) (108)	龙子皮(蛇蜕)
..... (166)	龙衣(蛇蜕) (470)
左牡蛎(牡蛎) (470)	龙子衣(蛇蜕)
..... (456)	龙豆(蝶断) (470)
左拧根(秦艽) (508)	龙井茶(茶叶)
..... (166)	龙尾(乌蔹梅) (396)
左秦艽(秦艽) (106)	龙牙草(委陵菜)
..... (166)	(斑蝥) (91)
左篆藤(海金沙藤) (622)	(仙鹤草)
..... (224)	龙角(芦荟) (329)
左顾牡蛎(牡蛎) (147)	龙牙草(龙齿)
..... (456)	龙角(大风子) (445)
左转藤灰(海金沙) (612)	龙毛龟(獨羊泉)
..... (224)	龙沙(麻黄) (86)
布荆(黄荆) (1)	龙牛膝(牛膝)
..... (438)	龙齿(斑蝥) (365)
布瓜络(丝瓜络) (622)	龙爪菜(菝葜)
..... (612)	龙枣(泽兰) (227)
布荆子(黄荆) (352)	龙目肉(龙眼肉)
..... (438)	龙虱(蜃虫) (534)
布袋口(铁苋菜) (622)	龙头草(仙鹤草)
..... (241)	龙胆(龙胆草) (329)
布靴蛾(车前草) (54)	龙吐珠(蛇莓)
..... (216)	龙退(蛇蜕) (128)
布田蓼草(茅莓) (470)	(水蜈蚣)
..... (127)	龙眼(龙眼肉) (247)
戊己芝(黄精) (534)	龙舌草(白花蛇舌草)
..... (547)	龙蚝(斑蝥) (96)
龙牙(龙齿) (622)	龙血树(血竭)
..... (445)	龙脑(冰片) (620)
龙爪(枳椇子) (474)	龙芽草(仙鹤草)
..... (560)	龙蛇(白花蛇) (329)
龙皮(蛇蜕) (177)	龙尾草(乌蔹梅)
..... (470)	龙衔(黄精) (106)

龙沙根(麻黄根)(127)	龙脑冰片(冰片)(474)
.....(570)			
龙抱柱(绶草)(100)	龙脑薄荷(薄荷)(15)
.....(124)			
龙虎草(泽漆)(522)	龙落子鱼(海马)(522)
.....(232)			
(大戟)(554)	龙牙草根芽(鹤草芽)(309)
.....(154)			
龙单衣(蛇蜕)(124)	龙脑香冰片(冰片)(474)
.....(470)			
龙须子(菟丝子)(147)	东丹(牡丹皮)(60)
.....(517)			
龙须草(松萝)(470)	(铅丹)(600)
.....(115)			
(灯心草)(470)	东芍(白芍)(531)
.....(235)			
龙须菜(白前)(309)	东芩(黄芩)(48)
.....(401)			
龙脑冰(冰片)(593)	东草(甘草)(493)
.....(474)			
龙脑香(冰片)(593)	东查(山楂)(298)
.....(474)			
龙球草(蛇莓)(309)	东胆(熊胆)(97)
.....(128)			
龙眼干(龙眼肉)(620)	东根(知母)(32)
.....(534)			
龙眼草(龙葵)(620)	东党(党参)(482)
.....(122)			
龙眼根(升麻)(94)	东黄(牛黄)(74)
.....(26)			
龙眼锦(龙眼肉)(401)	东楂(山楂)(298)
.....(534)			
龙衔珠(蛇莓)(138)	东山楂(山楂)(298)
.....(128)			
龙船蕨(贯众)(69)	东牛黄(牛黄)(74)
.....(313)			
龙船藨(茅莓)(606)	东丹皮(牡丹皮)	

..... (60)	东胆草(龙胆草) (175)
东方宿(羊蹄) (310)	东洋参(人参) (478)	东北贯众(贯众) (313)
东方蓼(荭草) (194)	东党参(党参) (482)	东北峨参(前胡) (402)
东甘草(甘草) (493)	东黄柏(黄柏) (52)	东北狼毒(狼毒) (159)
东龙胆(龙胆草) (54)	东银花(金银花) (65)	东北黄芪(黄芪) (486)
东北草(甘草) (493)	东绵马(贯众) (313)	东北紫草(紫草) (63)
东白芍(白芍) (531)	东紫草(紫草) (63)	东北鹤虱(鹤虱) (310)
东白薇(白薇) (138)	东鹿茸(鹿茸) (498)	东阳火草(酢浆草) (241)
东芍药(白芍) (531)	东方石竹(瞿麦) (234)	东亚钳蝎(全蝎) (466)
东当归(当归) (526)	东方龙虱(蜃虫) (382)	东北马兜铃(木通) (218)
东瓜子(冬瓜子) (230)	东方蓼子(水红花子) (360)	东北天南星(天南星) (359)
东瓜皮(冬瓜皮) (230)	东方蓼花(荭草花) (359)	东北延胡索(延胡索) (344)
东全虫(全蝎) (466)	东北木通(木通) (218)	东北铁线莲(威灵仙) (162)
东全蝎(全蝎) (466)	东北升麻(升麻) (26)	东北透骨草(透骨草) (183)
东防风(防风) (7)	东北石竹(瞿麦) (234)	东北淫羊藿(淫羊藿) (344)
东阿胶(阿胶) (532)	东北龙胆(龙胆草) (54)	东北黑松节(松节) (192)
东沙参(沙参) (535)	东北杏仁(杏仁) (418)	东北蒲公英(蒲公英) (68)
东波蔻(白豆蔻) (206)	东北细辛(细辛) (260)	东北雷公藤(雷公藤) (610)
东香附(香附) (282)	东北虎骨(虎骨)	东北满山红(满山红) (432)

打卜草(锦灯笼)(355)	卡匣(诃子)(572)
.....(88)			
打不死(卷柏)(405)	卡巴落(车前草)(216)
.....(325)			
(佛甲草)(210)	卡藜勒(诃子)(572)
.....(119)			
打头泡(锦灯笼)(441)	卡氏乳香(乳香)(374)
.....(88)			
打朴草(锦灯笼)(597)	北艾(艾叶)(338)
.....(88)			
打屁虫(九香虫)(215)	北贝(川贝母)(405)
.....(296)			
打鼓子(千金子)(405)	北风(防风)(7)
.....(157)			
打碗花(狼毒)(210)	北瓜(南瓜)(308)
.....(159)			
(木槿花)(430)	北芩(黄芩)(48)
.....(131)			
(狗狗秧)(409)	北芪(黄芪)(486)
.....(240)			
打额泡(锦灯笼)(21)	北姜(干姜)(256)
.....(88)			
打官司草(车前草)(501)	北大力(牛蒡子)(16)
.....(216)			
打砍不死(半支莲)(257)	北大黄(大黄)(143)
.....(118)			
打碗花子(牵牛子)(209)	北口芪(黄芪)(486)
.....(155)			
打官司草子(车前子)(308)	北山楂(山楂)(298)
.....(215)			
扑地锦(地锦草)(215)	北马勃(马勃)(83)
.....(104)			
扑骨风(益母草)(436)	北五加(五加皮)(173)
.....(355)			
扑扑子草(锦灯笼)(610)	北升麻(升麻)(26)
.....(88)			
扒骨风(益母草)(131)	北龙胆(龙胆草)	

..... (54)	北细辛 (细辛) (11)
北乌头 (乌头) (255)	北茵陈 (茵陈蒿) (228)	北马兜铃 (马兜铃) (428)
北玄参 (玄参) (59)	北枸杞 (枸杞子) (555)	北五味子 (五味子) (565)
北芫花 (芫花) (152)	北庭砂 (磨砂) (602)	北五加皮 (五加皮) (173)
北虫草 (冬虫夏草) (514)	北前胡 (前胡) (402)	北方虎骨 (虎骨) (175)
北瓜子 (南瓜子) (309)	北秦皮 (秦皮) (92)	北方秦艽 (秦艽) (166)
北防风 (防风) (7)	北桔梗 (桔梗) (395)	北方蝼蛄 (蝼蛄) (251)
北芥子 (白芥子) (393)	北柴胡 (柴胡) (24)	北丝石竹 (商陆) (156)
北苍术 (苍术) (198)	北桑皮 (桑白皮) (425)	北刘寄奴 (刘寄奴) (351)
北芡实 (荡实) (581)	北黄芪 (黄芪) (486)	北板蓝根 (板蓝根) (71)
北豆根 (山豆根) (82)	北野菊 (野菊花) (22)	北京石韦 (石韦) (223)
北杏仁 (杏仁) (418)	北寄生 (桑寄生) (172)	北洋金花 (洋金花) (439)
北赤芍 (赤芍) (62)	北葛根 (葛根) (23)	北桑寄生 (桑寄生) (172)
北连翘 (连翘) (67)	北紫草 (紫草) (63)	北海当归 (当归) (526)
北条参 (沙参) (535)	北紫菀 (紫菀) (421)	北葶苈子 (葶苈子) (426)
北沙参 (沙参) (535)	北鲜皮 (白鲜皮) (99)	北马兜铃藤 (天仙藤) (190)
北败酱 (芭蕉菜) (127) (败酱草) (94)	北鹤虱 (鹤虱) (310)	北方绵大戟 (大戟) (154)
北岸连 (黄连) (50)	北薜荔 (白鲜皮) (99)	北黄花菜根 (萱草根) (248)
	北藁本 (荀本)	北路蛇头党 (党参) (482)

古地风(钻地风)	田菠草(车前草)	申红(五灵脂)
.....(180)(216)(380)
卢布(钟乳石)	田菠菜(车前草)	申枣(猴枣)
.....(270)(216)(447)
卢会(芦荟)…(147)	田基王(地耳草)	申姜(骨碎补)
卢蟹(蠼虫)(242)(510)
.....(382)	田基苋(地耳草)	四叶厚朴(厚朴)
卢甘石(炉甘石)(242)(200)
.....(606)	田基黄(地耳草)	四开(青皮)
卢都子(胡颓子)(242)(273)
.....(506)	田麻黄(麻黄)	四青(青皮)
卢橘叶(枇杷叶)(1)(273)
.....(427)	田葛菜(蕷菜)	四枣(胡颓子)
目目生珠草(白花蛇草)(417)(304)
.....(96)	田螺草(铁苋菜)	四开青(青皮)
田七(三七)(241)(373)
.....(333)	田芝麻棵(益母草)	四方草(穿心莲)
田萍(浮萍)(355)(73)
.....(27)	田菠草子(车前子)	(半支莲)
田蒲(胡颓子)(215)(118)
.....(304)	田菠菜子(车前子)	四方莲(穿心莲)
田漆(三七)(215)(73)
.....(333)	田麻黄根(麻黄根)	四叶茶(矮地茶)
田三七(三七)(570)(430)
.....(333)	田葛藤根(葛根)	四叶胆(龙胆草)
田大云(肉苁蓉)(23)(54)
.....(503)	甲片(穿山甲)	四叶菜(沙参)
田边菊(地耳草)(381)(535)
.....(242)	甲壳(穿山甲)	四朵梅(木通)
田字草(酢浆草)(381)(218)
.....(241)	甲张(穿山甲)	四花皮(青皮)
田鸡头(黄连)(381)(273)
.....(50)	甲鱼壳(鳖甲)	四花青(青皮)
田黄蒿(前胡)(564)(273)
.....(402)	甲猛草(白花蛇舌草)	四时春(筋骨草)
(小茴香)(96)(105)
.....(267)	由胡(茵陈蒿)	

(长春花)(421)	四川大金钱草(金钱草)
.....(118)	四开青皮(青皮)(221)
四岔茸(鹿茸)(273)	四川小金钱草(金钱草)
.....(498)	四化青皮(青皮)(221)
四轮草(茜草)(273)	四岳近阳草根(茜草)
.....(335)	四方马兰(半支莲)(335)
四味臭(麝香)(118)	四川大叶金钱草(金钱
.....(473)	四方红根(茜草)	草).....(221)
四季花(月季花)(335)	四川小叶金钱草(金钱
.....(363)	四叶沙参(沙参)	草).....(221)
四季春(月季花)(535)	号简草(虎杖)
.....(363)	四叶菜根(桔梗)(354)
四季青(爵床)(395)	只壳(枳壳)
.....(111)	四芝麻棵(积雪草)(276)
四季葱(葱白)(225)	只剩(苍耳草)
.....(14)	四花青皮(青皮)(12)
四京子(槟榔)(273)	只实(枳实)
.....(307)	四轮草根(茜草)(275)
四面戟(鬼箭羽)(335)	史君子(使君子)
.....(372)	四季青叶(四季青)(305)
四面锋(鬼箭羽)(102)	叶下白(翻白草)
.....(372)	四季春草(筋骨草)(56)
四棱草(积雪草)(105)	叶下红(筋骨草)
.....(225)	四制香附(香附)(105)
(益母草)(282)	(矮地茶)
.....(355)	四棱子草(益母草)(430)
四棱茶(鬼箭羽)(355)	叶刺头(胡颓子根)
.....(372)	四棱杆蒿(荆芥)(193)
四棱树(鬼箭羽)(6)	叶底红(矮地茶)
.....(372)	四川牡丹皮(牡丹皮)(430)
四棱麻(豨莶草)(60)	叶紫苏(紫苏)
.....(167)	四川黄花稔(王不留行)(3)
四棱峰(鬼箭羽)(367)	叶下双挑(铁苋菜)
.....(372)	四川鹿蹄草(鹿衔草)(241)
四川大黄(大黄)(370)	叶下珍珠(矮泡茶)
.....(143)	四籽野豌豆(王不留行)(430)
四川橐吾(紫菀)(367)	叶下穿针(两面针)

叶子草根(党参)	出山虎(两面针)	生六曲(神曲)
.....(109)(109)(300)
叶里仙桃(铁苋菜)	生贝(川贝母)	生玉竹(玉竹)
.....(241)(405)(546)
叶里含珠(铁苋菜)	生地(生地黄)	生艾叶(艾叶)
.....(241)(58)(338)
叶里藏珠(铁苋菜)	生竹(徐长卿)	生石灰(石灰)
.....(241)(170)(607)
叫鸡(蟋蟀)	生军(大黄)	生石膏(石膏)
.....(251)(143)(30)
叫出冬(夹竹桃)	生矾(明矾)	生龙齿(龙齿)
.....(249)(603)(445)
叩仁(白豆蔻)	生草(甘草)	生龙骨(龙骨)
.....(206)(493)(444)
叩皮(白豆蔻)	生姜(黄精)	生甲片(穿山甲)
.....(206)(547)(381)
叩米(白豆蔻)	生蜜(蜂蜜)	生白芍(白芍)
.....(206)(497)(531)
叩壳(白豆蔻)	生卜子(莱菔子)	生仙茅(仙茅)
.....(206)(303)(540)
叩球(白豆蔻)	生三七(景天三七)	生冬花(款冬花)
.....(206)(335)(423)
叭杏仁(甜杏仁)	生大黄(大黄)	生半夏(半夏)
.....(419)(143)(388)
叭达杏仁(甜杏仁)	生山药(山药)	生百合(百合)
.....(419)(490)(550)
归头(当归)	生川斗(石斛)	生地龙(地龙)
.....(526)(543)(469)
归身(当归)	生元胡(延胡索)	生地榆(地榆)
.....(526)(344)(322)
归尾(当归)	生贝母(川贝母)	生竹茹(竹茹)
.....(526)(405)(409)
归须(当归)	生内金(鸡内金)	生麦冬(麦门冬)
.....(526)(303)(540)
归腿(当归)	生毛梢(蜀羊泉)	生麦芽(麦芽)
.....(526)(68)(301)
	生乌梅(乌梅)	

生扯拢(石韦)(300)	生僵蚕(白僵蚕)(468)
.....(223)			
(老鹳草)(4)	生藕节(藕节)(342)
.....(185)			
生芦根(芦根)(489)	生蟾酥(蟾酥)(623)
.....(33)			
生远志(远志)(313)	生鳖甲(鳖甲)(564)
.....(450)			
生龟板(龟板)(478)	生山萸肉(山茱萸)(582)
.....(563)			
生皂矾(皂矾)(482)	生山楂肉(山楂)(298)
.....(393)			
生阿胶(阿胶)(159)	生天门冬(天门冬)(542)
.....(532)			
生谷芽(谷芽)(443)	生木鳖子(木鳖子)(616)
.....(302)			
生没药(没药)(486)	生亚麻子(亚麻子)(553)
.....(376)			
生枣仁(酸枣仁)(547)	生肉苁蓉(肉苁蓉)(503)
.....(449)			
生明矾(白矾)(590)	生红药子(红药子)(131)
.....(603)			
生眷花(辛夷)(508)	生鸡内金(鸡内金)(303)
.....(13)			
生草梢(甘草)(594)	生沙苑子(沙苑子)(518)
.....(493)			
生南星(天南星)(459)	生南瓜子(南瓜子)(309)
.....(390)			
生故子(补骨脂)(514)	生晒参(人参)(478)
.....(512)			
生韭子(韭子)(217)	生葶苈子(葶苈子)(426)
.....(524)			
生结香(沉香)(497)	生牛蛋子根(天花粉)(35)
.....(285)			
生首乌(何首乌)(478)	矢甲(蜣螂)(447)
.....(529)			
· 生神曲(神曲)(307)	失刺孙(豹骨)	

..... (176)	仙牛桃 (喉咙草) (221)
禾雀舌 (佛甲草) (86)	仙鹤草根芽 (鹤草芽)
..... (119)	仙巴掌 (仙人掌) (309)
禾雀脚 (佛甲草) (108)	白川 (胡椒)
..... (119)	仙半夏 (半夏) (269)
禾霞气 (地耳草) (388)	白及 (黄精)
..... (242)	仙合草 (仙鹤草) (547)
禾杂竹根 (芦根) (392)	白片 (附子)
..... (33)	仙灵毗 (涕羊藿) (254)
丘螭 (地龙) (505)	白丑 (牵牛子)
..... (469)	仙灵脾 (涕羊藿) (155)
代尾 (玳瑁) (505)	白艾 (艾叶)
..... (459)	仙茅参 (仙茅) (338)
代赭 (代赭石) (504)	白石 (阳起石)
..... (460)	仙茅根 (仙茅) (525)
代代花枳壳 (枳壳) (504)	白叩 (白豆蔻)
..... (275)	仙居术 (白术) (206)
代代橡枳壳 (枳壳) (489)	白芝 (五灵脂)
..... (275)	仙沼子 (八月札) (380)
仙毛 (仙茅) (294)	白芨 (白及)
..... (504)	仙桃草 (地锦草) (330)
仙术 (苍术) (104)	白灰 (石灰)
..... (198)	仙遗粮 (土茯苓) (607)
仙蟾 (蛤蚧) (79)	白扣 (白豆蔻)
..... (514)	仙人杖子 (柿子) (206)
仙人头 (地骷髅) (555)	白芪 (黄芪)
..... (398)	仙人杖根 (地骨皮) (486)
仙人衣 (刺猬皮) (139)	白连 (草薢)
..... (587)	仙人余粮 (黄精) (226)
(蝉蜕) (547)	白君 (明矾)
..... (17)	仙人搭桥 (茅莓) (603)
(紫河车) (127)	白尾 (白薇)
..... (516)	仙鹤草芽 (鹤草芽) (138)
仙山骨 (地骷髅) (309)	白鸡 (白及)
..... (398)	仙露半夏 (半夏) (330)
仙人掌 (射干) (388)	白英 (蜀羊泉)
..... (81)	仙人对坐草 (金钱草) (86)

白菖(山药)(576)	白蒿(茵陈蒿)(228)
白矾(明矾)(603)	白榄(橄榄)(558)
白虎(石膏)(30)	白薇(白薇)(138)
白昌(商陆)(156)	白蔻(白蔻)(206)
白岩(朱砂)(441)	白蜡(蜂蜡)(625)
白参(人参)(748)	白膏(铅粉)(600)
(沙参)(535)	白蜜(蜂蜜)(497)
白草(蜀羊泉)(86)	白蘋(当归)(526)
白药(白药子)(132)	白薯(草薢)(226)
(桔梗)(395)	白薇(白前)(401)
白药(天花粉)(35)	白檀(檀香)(291)
白面(鸦片)(440)	白嫖(壁钱)(626)
白砒(砒石)(596)	白蜡(梔子)(36)
白信(砒石)(596)	白鱠(鱼鱠)(533)
白芨(白及)(330)	白丁香(丁香)(265)
白前(白薇)(138)	白丁香(暴马丁)(434)
白姜(干姜)(256)	白人参(人参)(478)
(草薢)(226)	白大芪(黄芪)(486)
白莲(莲子)(138)	白干参(人参)	

.....(478)	(木通)(470)
白干姜(干姜)(256)(218)	白龙齿(龙齿)(445)
白土茯(土茯苓)(79)	白毛串(筋骨草)(105)	白龙骨(龙骨)(444)
白山药(山药)(490)	白毛姑(山慈姑)(101)	白龙粉(芒硝)(146)
白及片(白及)(330)	白毛根(白茅根)(321)	白节蛇(白花蛇)(177)
白及子(白及)(330)	白毛桃(猕猴桃)(558)	白石枣(枳椇子)(560)
白及粉(白及)(330)	白毛柴(紫珠)(320)	白石脂(赤石脂)(574)
白千层(木蝴蝶)(436) (补骨脂)(512)	白毛藤(蜀羊泉)(86) (寻骨风)(182)	白甘遂(蚕休)(75)
白马尾(白薇)(138)	白牛膝(牛膝)(365)	白叩皮(白豆蔻)(206)
白马骨(六月雪)(246)	白月石(硼砂)(601)	白叶柴(乌药)(383)
白马鬃(白前)(401)	白水石(寒水石)(31)	白瓜子(南瓜子)(309) (冬瓜子)(230)
白云石(花蕊石)(338)	白水罐(白蔹)(98)	白瓜皮(冬瓜皮)(230)
白木香(沉香)(285) (木香)(280)	白玉兰(辛夷)(13)	白皮芪(黄芪)(486)
.....(280) (防己)(164)	白玉花(木槿花)(131)	白皮党(党参)(482)
白木莲(辛夷)(13)	白玉纸(木蝴蝶)(436) (补骨脂)(512)	白皮蒜(大蒜)(608)
白木通(海风藤)(187) (巴戟天)(501)	白古月(胡椒)(269)	白母鸡(商陆)(156)
	白龙皮(天麻)(462)	白头公(白头翁)(89)
	白龙衣(蛇蜕)	白头草(白头翁)(89)

幽头秤(六月雪)(249)	白利壳(海蛤壳)(411)
.....(246)			
白头翁(委陵菜)(91)	白饭花(木槿花)(131)
(翻白草)			
.....(56)		白余粮(土茯苓)(79)
(漏芦)		(禹余粮)	
.....(100)	(575)	
(筋骨草)		白条牙(龙齿)(445)
.....(105)			
白芨片(白及)(330)	白灵砂(轻粉)(598)
白百合(百合)(550)	白附子(附子)(254)
白芍药(白芍)(531)	白附片(附子)(254)
白耳子(白木耳)(561)	白鸡儿(白及)(330)
白耳草(金钱草)(221)	白鸡娃(白及)(330)
白地瓜(珠子参)(537)	白沙参(沙参)(535)
白地草(地肤子)(229)	白沙蜜(蜂蜜)(497)
白地栗(山慈姑)(101)	白苦参(败酱草)(94)
白地茜(鹅不食草)(196)	白苓片(茯苓)(210)
白地榆(地榆)(322)	白苓块(茯苓)(210)
白舌皮(白鲜皮)(99)	白茎根(苦参)(55)
白华芨(凌霄花)(364)	白林皮(紫荆皮)(114)
白灯心(灯心草)(235)	白松香(松香)(618)
白羊桃(夹竹桃)		白松果(白松塔)	
(562)		

..... (433)	白茯苓 (茯苓) (210) (312)
白松球 (白松塔) (433)	白茶菊 (菊花) (21)	白虾蟆 (白药子) (132)
白粉叶 (榆叶) (250)	白药子 (红药子) (131)	白背叶 (黄荆) (438)
白粉皮 (榆白皮) (250)	(山药) (490)	白信石 (砒石) (596)
白粉葵 (榆钱) (543)	白药根 (白药子) (132)	白顺片 (附子) (254)
白粉钱 (榆钱) (543)	白药脂 (白药子) (132)	白胖裸 (辣蓼) (193)
白枝蓼 (辣蓼) (193)	白牵牛 (牵牛子) (155)	白独活 (独活) (161)
白直须 (人参) (478)	白面风 (寻骨风) (182)	白秋霜 (人中白) (48)
白刺皮 (五加皮) (173)	白面花 (木槿花) (131)	白眉豆 (扁豆) (492)
白果仁 (白果) (430)	白南星 (天南星) (390)	白芨草 (车前草) (216)
白岩砂 (朱砂) (441)	白故子 (木蝴蝶) (436)	白蚤休 (蚤休) (75)
白饴糖 (饴糖) (496)	(补骨脂) (512)	白弯须 (人参) (478)
白细辛 (细辛) (260)	白故纸 (木蝴蝶) (436)	白扁豆 (扁豆) (492)
白参须 (人参) (478)	白胡妥 (苍耳草) (12)	白姜虫 (白僵蚕) (468)
白河车 (蚤休) (75) (万年青) (245)	白胡椒 (胡椒) (269)	白姜蚕 (白僵蚕) (468)
白茵陈 (茵陈蒿) (228)	白砂仁 (砂仁) (204)	白首乌 (何首乌) (529)
白草根 (白蔹) (98)	白砒石 (砒石) (596)	白前胡 (前胡) (402)
白茯苓 (茯苓) (210)	白残花 (蔷薇花) (130)	白桑椹 (青蒿) (136)
	白芥子 (芫荽) (576)	白莲子 (莲子) (576)

白莲须(莲须)(177)	白萼根(苦参)(55)
.....(578)		白荳蓄(胡蘋子)(304)
白莲蒿(茵陈蒿)(228)	白葛针(地骨皮)(139)
白藜羹(草薢)(226)	白棣仁(郁李仁)(149)
白桔梗(桔梗)(395)	白棉儿(了哥王)(110)
白根子(银柴胡)(140)	白硫黄(硫磺)(594)
白桃仁(桃仁)(360)	白喉草(筋骨草)(105)
白党参(党参)(482)	白蛛窠(壁钱幕)(627)
白狼毒(狼毒)(159)	白犀角(犀角)(57)
白陶土(赤石脂)(574)	白蒺藜(刺蒺藜)(468)
白桑叶(桑叶)(19)	(沙苑子)(518)
白桑皮(桑白皮)(425)	白楮皮(楮皮)(570)
白桑椹(桑椹)(556)	白槐花(槐花)(327)
白通草(通草)(219)	白槐角(槐角)(329)
白调羹(筋骨草)(105)	白槐枝(槐枝)(328)
白浆罐(白蔹)(98)	白榆叶(榆叶)(250)
白粉草(甘草)(493)	白榆皮(榆白皮)(250)
白粉霜(轻粉)(598)	白榆莢(榆钱)(453)
白菊花(菊花)(21)	白榆钱(榆钱)	
(白花蛇)			

..... (453)	白糖参(人参) (22)
白鼓丁(蒲公英) (68)	白扁豆(扁豆) (492)	白布篱子(木槿子) (436)
白蒺藜(蒺藜) (210)	白藓皮(白鲜皮) (99)	白布篱皮(木槿皮) (610)
白蜈蚣(垂盆草) (79)	白檀木(檀香)	白布篱花(木槿花) (131)
白蜂蜡(蜂蜡) (625)	白檀香(檀香)	白东瓜子(冬瓜子) (230)
白蔻仁(白豆蔻) (206)	白螭窠(壁钱幕) (627)	白东瓜皮(冬瓜皮) (230)
白蔻皮(白豆蔻) (206)	白薤皮(白鲜皮) (99)	白鸟儿头(白及) (330)
白蔻衣(白豆蔻) (206)	白土茯苓(土茯苓) (79)	白皮大蒜(大蒜) (608)
白蔻壳(白豆蔻) (206)	白山番薯(防己)	白奶雪草(紫珠) (320)
白蔹片(白蔹) (98) (164) (巴戟天)	白丝郁金(郁金) (345)
白蔹根(白蔹) (98) (501)	白头漏芦(漏芦) (100)
白模榔(槟榔) (307)	白马里捎(六月雪)	白芨黄精(黄精) (547)
白蜜蜡(蜂蜡) (625)	白木通子(八月札)	白夹竹茹(竹茹) (409)
白槿子(木槿子) (436)	白木通果(八月札) (294)	白羊鲜皮(白鲜皮) (99)
白槿皮(木槿皮) (610)	白毛茛根(白茅根) (321)	白羊藓皮(白鲜皮) (99)
白槿花(木槿花) (131)	白长春花(长春花) (118)	白花木通(木通) (218)
白僵虫(白僵蚕) (468)	白火丹草(狗舌草) (121)	白花丹参(丹参) (349)
白薇根(白薇) (138)	白玉带子(金樱子) (583)	白花百合(百合) (550)
白镜子(照山白) (433)	白石木子(枳椇子) (560)	白花地榆(地榆) (322)
	白布荆子(蔓荆子)	

白花茅根(白茅根)(56)	白骨松果(白松塔)(433)
.....(321)		白骨松球(白松塔)(433)
白花败酱(败酱草)(94)	白骨松塔(白松塔)(433)
.....(426)		白背风子(蔓荆子)(22)
白花草子(蓼房子)(13)	白背丹参(丹参)(349)
白花树花(辛夷)(5)	白背杨子(蔓荆子)(22)
白花香薷(香薷)(402)	白背草子(蔓荆子)(22)
白花前胡(前胡)(401)	白种乳草(泽漆)(232)
白花射干(白前)(401)	白种薄荷(薄荷)(15)
白花堇菜(紫花地丁)(69)	白眉豆衣(扁豆衣)(492)
白芥末子(白芥子)(393)	白眉豆花(扁豆花)(493)
白芷麻根(芷麻根)(321)	白贯草子(车前子)(215)
白豆叩壳(豆蔻壳)(207)	白扁豆衣(扁豆衣)(492)
白豆蔻壳(白豆蔻)(206)	白亮独活(独活)(161)
白杜仲藤(杜仲)(507)	白珠子草(鹅不食草)(196)
白牡丹子(木槿子)(436)	白唇鹿角(鹿角)(500)
白牡丹皮(木槿皮)(610)	白唇鹿茸(鹿茸)(498)
白牡丹花(木槿花)(131)	白夏枯草(筋骨草)(105)
白条龙牙(龙齿)(445)	白根独活(独活)	
白条龙齿(龙齿)(445)		
白鸡爪草(翻白草)(246)		

.....(161)	白皮锦鸡儿(白鲜皮).....(99)(486)
白胶皮藤(杜仲).....(507)	白花十字草(白花蛇舌草).....(96)	白曼陀罗花(洋金花).....(439)
白梅豆衣(扁豆衣).....(492)	白花牛皮消(白薇).....(138)	白羊鲜皮白鲜皮(白鲜皮).....(99)
白梅豆花(扁豆花).....(493)	白花夹竹桃(夹竹桃).....(249)	卮子(栀子).....(36)
白曼陀罗(洋金花).....(439)	白花油麻藤(鸡血藤).....(373)	瓜丁(瓜蒂).....(589)
白颈地龙(地龙).....(469)	白花珍珠草(喉咙草).....(86)	瓜子(冬瓜子).....(230)
白颈蚯蚓(地龙).....(469)	白花穿心莲(穿心莲).....(73)	瓜牛(蜗牛).....(116)
白毫银针(茶叶).....(396)	白花络石藤(络石藤).....(186)	瓜当(瓜蒂).....(589)
白猪母络(苍耳草).....(12)	白花益母草(益母草).....(355)	瓜络(丝瓜络).....(612)
白荳豆花(扁豆花).....(493)	白花曼陀罗(洋金花).....(439)	瓜蒂(丁香).....(265)
白棠子树(紫珠).....(320)	白花蒲公英(蒲公英).....(68)	瓜犀(冬瓜子).....(230)
白痴头婆(苍耳草).....(12)	白花蟛蜞草(墨旱莲).....(562)	瓜瓣(冬瓜子).....(230)
白蜡树子(女贞子).....(557)	白花蟛蜞菊(墨旱莲).....(562)	瓜丁香(瓜蒂).....(589)
白蜡树皮(秦皮).....(166)	白芦刺根皮(五加皮).....(173)	瓜子草(瓜子金).....(437)
白腊滑草(半边莲).....(78)	白沙枇杷叶(枇杷叶).....(427)	(垂盆草).....(79)
白天夭秧根(白蔹).....(98)	白果槲寄生(桑寄生).....(172)	瓜子莲(瓜子金).....(437)
白毛天胡荽(金钱草).....(221)	白背木耳子(蔓荆子).....(22)	瓜子菜(马齿苋).....(89)
白毛夏枯草(筋骨草).....(105)	白背钻地风(钻地风).....(180)	瓜仁草(半边莲).....(78)
白叶安息香(安息香).....(476)	白香草木樨(黄芪)	瓜仁菜(马齿苋).....(89)

瓜石斛(石斛)(445)	冬绿(鹿衔草)(370)
瓜米草(瓜子金)(628)	冬麻(天麻)(462)
瓜里春(九香虫)(377)	冬彭(天麻)(462)
瓜香草(仙鹤草)(57)	冬三七(三七)(333)
瓜蒌仁(瓜蒌子)(447)	冬白术(白术)(489)
瓜蒌全(瓜蒌)(417)	冬瓜仁(冬瓜子)(230)
瓜蒌实(瓜蒌)(207)	冬虫草(冬虫夏草)(514)
瓜蒌根(天花粉)(612)	冬豆皮(稽豆衣)(465)
瓜黑蜻(九香虫)(447)	冬豆衣(稽豆衣)(465)
瓜米细辛(瓜子金)(476)	冬均子(使君子)(305)
瓜蒌仁霜(瓜蒌子)(423)	冬君子(使君子)(305)
印头(黄芩)(313)	冬青子(女贞子)(557)
印木香(木香)(374)	冬青叶(四季青)(102)
印度叩(白豆蔻)(333)	冬前胡(前胡)(402)
印度草(穿心莲)(489)	冬桑叶(桑叶)(19)
印度黄(牛黄)(308)	冬麻子(火麻仁)(148)
印度蔻(白豆蔻)(423)	冬麻仁(火麻仁)(148)
印度牛黄(牛黄)(172)	冬葵子(苘麻子)(46)
印度象牙(象牙)(46)	冬葵实(冬葵子)	

..... (236)	皮弁草(锦灯笼) (88) (340)
冬不凋草(万年青) (245)	皮尾参(人参) (478)	尼泊尔羊蹄根(羊蹄) (340)
冬苋菜子(冬葵子) (236)	皮茯苓(茯苓) (210)	尼泊尔老鹳草(老鹳草) (185)
冬豆子皮(穧豆衣) (465)	皮撮珍珠(铁苋菜) (241)	尼泊尔酸模根(羊蹄) (340)
冬青树子(女贞子) (557)	皮氏马前子(马钱子) (613)	奴会(芦荟) (147)
冬葵苗子(冬葵子) (236)	皮头橙枳壳(枳壳) (276)	奶米(王不留行) (357)
冬葵菜子(冬葵子) (236)	皮头橙枳实(枳实) (275)	奶草(地锦草) (104)
冬寒菜子(冬葵子) (236)	皮氏黄连竹叶(十大功劳叶) (124)	奶儿草(半边莲) (78)
包衣(紫河车) (516)	鸟演(桑螵蛸) (584)	奶头草(鱼腥草) (80)
包谷须(玉米须) (239)	鸟不扑(大蓟) (316)	奶汁草(蒲公英) (58)
包金莲(土大黄) (112)	鸟不宿(苦丁茶) (43)	(地锦草) (104)
包粟须(玉米须) (239)	鸟不踏(虎杖) (354)	奶花草(地锦草) (104)
包头花根(地榆) (322)	鸟哥黄(藤黄) (617)	奶孩儿(泽兰) (352)
包麦米须(玉米须) (239)	鸟藨子(覆盆子) (585)	奶浆果(无花果) (88)
包袱花根(桔梗) (395)	处石(磁石) (442)	奶浆草(地锦草) (104)
皮草(甘草) (493)	处姑(山慈姑) (101)	奶疳草(地锦草) (104)
皮苓(茯苓) (210)	外菖蒲(石菖蒲) (477)	奶糖酥(糖酥) (623)
皮硝(芒硝) (145)	丛柏叶(侧柏叶) (324)	发炭(血余炭) (332)
皮甘草(甘草) (493)	尼泊尔羊蹄(羊蹄) (247)	发汗草(水蜈蚣) (247)

发髦炭(血余炭)(11)	丝瓜筋(丝瓜络)
.....(332)	(612)
发髦炭(血余炭)(565)	丝瓜瓤(丝瓜络)
.....(332)	(612)
加皮(五加皮)(198)	丝丝草(虎耳草)
.....(173)	(123)
加工血竭(血竭)(298)	丝连皮(杜仲)
.....(620)	(507)
边斗(石斛)(11)	丝茅根(白茅根)
.....(543)	(321)
边草(甘草)(192)	丝通草(通草)
.....(493)	(219)
边血草(萹蓄)(313)	丝棱线(千年健)
.....(233)	(181)
边多参(人参)(313)	丝棉皮(杜仲)
.....(478)	(507)
边条红参(人参)(216)	丝毛草根(白茅根)
.....(478)	(321)
辽参(党参)(129)	丝茅草根(白茅根)
.....(482)	(321)
辽山楂(山楂)(517)	丝棟皮树(杜仲)
.....(298)	(507)
辽五味(五味子)(542)	丝棉吊梅(虎耳草)
.....(565)	(123)
辽东参(人参)(15)	母龙精(川贝母)
.....(478)	(405)
辽杏仁(杏仁)(219)	母防风(防风)
.....(418)	(7)
辽条参(沙参)(156)	母佑子(茺蔚)
.....(535)	(312)
辽沙参(沙参)(140)	母猪油(豨莶草)
.....(535)	(167)
辽细辛(细辛)(612)	母猪莲(浮萍)
.....(260)	(27)
辽堇菜(紫花地丁)(612)	母猪藤(乌蔹莓)
.....(69)	(106)
辽藁本(藁本)(612)	母子半夏(天南星)

.....(390)	台乌(乌药)(565)
母鸡带仔(白蔹)(283)	玄石(磁石)
.....(98)	台芎(川芎)(442)
界子(冬葵子)(343)	玄台(玄参)
.....(236)	台参(党参)(59)
圣先子(八月札)(482)	玄胡(延胡索)
.....(294)	台黄(土大黄)(344)
圣知子(八月札)(112)	玄英石(玄精石)
.....(294)	台乌药(乌药)(47)
对月草(徐长卿)(283)	玄武板(龟板)
.....(170)	台白术(白术)(563)
对叶草(地耳草)(489)	玄胡索(延胡索)
.....(242)	台均姜(干姜)(344)
对叶莲(徐长卿)(256)	玄明粉(芒硝)
.....(170)	台党参(党参)(145)
对节草(牛膝)(482)	玄衣督邮(龟板)
.....(365)	台冰(樟脑)(563)
对节莲(徐长卿)(621)	闪浪花(百合)
.....(170)	台湾赤松节(松节)(550)
对坐草(金钱草)(192)	永勿大(六月雪)
.....(221)	台湾赤松香(松香)(246)
对海马(海马)(618)	永宁独活(独活)
.....(522)	台湾地瓜儿苗(泽兰)(161)
对蛤蚧(蛤蚧)(352)	必卜(草芨)
.....(514)	主人(甘草)(263)
对嘴藨(覆盆子)(493)	必下(草薢)
.....(585)	主田(甘遂)(226)
对刀石燕(石燕)(151)	必也(草薢)
.....(252)	主簿虫(全蝎)(226)
对叶百部(百部)(466)	必甲(鳖甲)
.....(419)	立住(车前草)(564)
对叶黄精(黄精)(216)	必提珠(薏苡仁)
.....(547)	立制石(胆矾)(214)
对鸟耳蕨贯众(贯众)(591)	宁古塔芪(黄芪)
.....(313)	立筋草(伸筋草)(486)
台片(乌药)(182)	宁津草子(葶苈子)
.....(283)	玄及(五味子)(426)

宁夏杞子(枸杞子)(225)	头花千金藤根(白药子)
.....(555)	半边菊(半边莲)(132)
宁夏枸杞(枸杞子)(78)	汉归(当归)
.....(555)	半边旗(半边莲)(526)
兰(佩兰)(78)	汉椒(花椒)
.....(203)	半血莲(红藤)(263)
兰华(连翹)(93)	汉三七(三七)
.....(67)	半向花(半支莲)(353)
兰草(泽兰)(118)	汉土元(蠙虫)
.....(352)	半池莲(金钱草)(382)
(佩兰)(221)	汉大力(牛蒡子)
.....(203)	半含春(胡颓子)(16)
兰荪(水菖蒲)(304)	汉防己(防己)
.....(247)	半枝莲(垂盆草)(164)
兰根(白茅根)(79)	汉蒼术(蒼术)
.....(321)	(半支莲)(198)
(板蓝根)(118)	汉杜仲(杜仲)
.....(71)	半枝莲(佛甲草)(507)
兰花草(鸭跖草)(119)	汉麻子(火麻仁)
.....(38)	半春子(胡颓子)(148)
兰紫草(鸭跖草)(304)	汉麻仁(火麻仁)
.....(38)	半面花(半支莲)(148)
兰溪桃仁(桃仁)(118)	汉椒目(椒目)
.....(360)	半夏精(天南星)(263)
兰溪白头翁(翻白草)(390)	汉中防己(防己)
.....(56)	半枝莲子(千金子)(164)
半下(半夏)(157)	(青木香)
.....(388)	头发炭(血余炭)(288)
半支莲(佛甲草)(332)	汉仙桃草(喉嚨草)
.....(119)	头葍草(鹿葍)(86)
半边月(积雪草)(498)	汉先桃草(喉嚨草)
.....(225)	头痛花(芫花)(86)
半边花(半边莲)(152)	汉城细辛(细辛)
.....(78)	头中石蛇(鱼脑石)(260)
半边珠(铁苋菜)(253)	
.....(241)	头序怀苋(牛膝)	
半边钱(积雪草)(365)	

【六画】

芋儿七(莪术)

节根(生地黄)	芝麻(黑脂麻)	老卜子(菜菔子)
.....(347)(552)(303)
芹菜(荠菜)	芝查藤根(威灵仙)	老人头(地骷髅)
.....(319)(162)(398)
芍(荸荠)	芝麻响铃铛(农吉利)	老人参(人参)
.....(552)(120)(178)
芍药(白芍)	吉藜(刺蒺藜)	老儿茶(孩儿茶)
.....(531)(468)(619)
(赤芍)	吉人参(人参)	老山片(檀香)
.....(62)(478)(291)
芨(乌头)	吉吉麻(罗布麻)	老山块(檀香)
.....(255)(471)(291)
苞实(薏苡仁)	吉林参(人参)	老山条(檀香)
.....(214)(478)(291)
芑根(生地黄)	吉林党(党参)	老山檀(檀香)
.....(58)(482)(291)
芎穷(川芎)	吉固子(补骨脂)	老不大(矮地茶)
.....(343)(512)(430)
芎蒡(川芎)	吉故子(补骨脂)	老木香(木香)
.....(343)(512)(280)
芎蔚(川芎)	吉林人参(人参)	老牛拽(牛筋草)
.....(343)(478)(225)
芎藭(川芎)	吉林党参(党参)	老牛挫(飞廉)
.....(343)(482)(126)
芎藭(川芎)	吉林野参(人参)	老牛错(飞廉)
.....(343)(478)(126)
芒子(巴豆)	共石(滑石)	老牛筋(老鹳草)
.....(153)(217)(185)
芒芋(泽泻)	老节(藕节)	老勿大(矮地茶)
.....(213)(342)(430)
芒草(白薇)	老莽(莽草)	老公花(白头翁)
.....(138)(319)(89)
芒消(芒硝)	老姜(生姜)	老公根(积雪草)
.....(145)(4)(225)
芝(灵芝)	老海(鷄片)	老龙角(白薇)
.....(485)(440)(138)
	老翹(连翹)	

老白毛(白头翁)(618)	老鸦珠(薏苡仁)(214)
.....(89)		老鸦胆(鸦胆子)(93)
老瓜蒜(半夏)(325)	老鸦眼(半夏)(388)
.....(388)		老鸦船(补骨脂)(512)
老光珠(珍珠)(313)	(木蝴蝶)(436)
.....(457)		老鸦翎(委陵菜)(91)
老阳子(巴豆)(123)	老鸦蒜(石蒜)(593)
.....(153)		老鸦碗(积雪草)(225)
老苍子(苍耳子)(43)	老鸦糊(紫珠)(320)
.....(11)		老鸦嘴(老鹳草)(185)
老苏叶(苏叶)(316)	老鸦藤(乌蔹莓)(106)
.....(4)		老鸦瓣(山慈姑)(101)
老苏梗(苏梗)(607)	老贯草(老鹳草)(185)
.....(4)		老贯筋(老鹳草)(185)
老芦荟(芦荟)(175)	老冠花(白头翁)(89)
.....(147)		老前婆(豨莶草)(167)
老材香(琥珀)(607)	老莲子(莲子)(576)
.....(448)		老鸽筋(墨旱莲)(562)
老连翘(连翘)(235)	老鴨咀(酢浆草)	
.....(67)			
老谷穗(糠谷老)(162)		
.....(238)			
老君须(松萝)(218)		
.....(115)			
(徐长卿)(547)		
.....(170)			
(海风藤)(316)		
.....(187)			
(白薇)(243)		
.....(138)			
老君扇(射干)(89)		
.....(81)			
老陈婆(豨莶草)(185)		
.....(167)			
老枪谷(糠谷老)(91)		
.....(238)			
老松香(松香)(108)		

..... (241)	老琥珀(琥珀) (448) (474)
老翁花(白头翁) (89)	老紫草(紫草) (63)	老式赭石(代赭石) (460)
老桑叶(桑叶) (19)	老缅瓜(南瓜) (308)	老观花根(白头翁) (89)
老蒙花(密蒙花) (40)	老象牙(象牙) (445)	老虎耳草(虎耳草) (123)
老黄嘴(半夏) (388)	老象皮(象皮) (628)	老虎师藤(威灵仙) (162)
老梅片(冰片) (474)	老鼠花(芫花) (152)	老虎垫坐(伸筋草) (182)
老蛇泡(蛇莓) (128)	老鼠刺(苦丁茶) (43)	老和尚头(半夏) (388)
老蛇盘(黄药子) (415)	老鼠眼(寻骨风) (182)	(白头翁) (89)
老蛇菰(蛇莓) (128)	老鼠嘴(毛冬青) (368)	老面瓜子(南瓜子) (309)
老鸹头(半夏) (388)	老劈柴(羚羊角) (454)	老鸦枕头(莲子) (576)
老鸹草(老鹳草) (185)	老鹤嘴(仙鹤草) (329)	老婆子花(白头翁) (89)
老鸹眼(半夏) (388)	老藕节(藕节) (342)	老萝卜头(地骷髅) (398)
老鸹扇(射干) (81)	老鹳嘴(老鹳草) (185)	老萝卜种(地骷髅) (398)
老鸹蒜(石蒜) (593)	老鳖盖(鳖甲) (564)	老蛇刺古(蛇莓) (128)
老鸹筋(老鹳草) (185)	老人发根(白头翁) (89)	老鸹蕊脐(桑螵蛸) (584)
老鸹窝(土牛膝) (366)	老水牛瓢(白薇) (138)	老鸹嘴草(老鹳草) (185)
老寄生(桑寄生) (172)	老瓜瓢根(白薇) (138)	老鸹嘴棵(藏角蒿) (530)
老婆虫(腐虫) (382)	老式冰片(冰片) (474)	老密蒙花(密蒙花) (40)
老鹿角(鹿角) (500)	老式梅片(冰片) (474)	老缅瓜子(南瓜子) (309)

老鼠瓜薯(白蔹)(122)	地竹(竹叶)(31)
.....(98)			
老鼠尾根(米口袋)(241)	地衣(石花)(136)
.....(70)			
老鼠刺叶(十大功劳叶)(607)	地狗(蝼蛄)(251)
.....(124)			
老鼠屎草(天葵)(16)	地参(知母)(32)
.....(122)		(苦参)(55)
老鼠愁子(牛蒡子)(16)	地茶(矮地茶)(430)
.....(439)			
老鼠愁花(洋金花)(167)	地面(瞿麦)(234)
.....(309)			
老鹤嘴芽(鹤草芽)(95)	地柏(地柏枝)(326)
.....(309)			
老母猪哼哼(牛蒡子)(69)	地骨(地骨皮)(139)
.....(16)	(蒲公英)	(苦参)(55)
老母猪豁子(牛蒡子)(68)	地星(半夏)(388)
.....(16)			
老虎尾巴根(天门冬)(180)	地虾(拳参)(77)
.....(542)			
老虎脚爪草(毛茛)(282)	地脉(地肤子)(229)
.....(607)			
老虎脚迹草(毛茛)(247)	地胆(金果榄)(84)
.....(607)			
老虎狼根皮(五加皮)(388)	地霉(蛇莓)(128)
.....(173)			
老鸦眼睛草(龙葵)(139)	地栗(藏白草)(56)
.....(122)	(玉竹)		
老鸦眼睛藤(乌蔹莓)(546)	地栗(荸荠)(552)
.....(106)			
老鸦酸浆草(龙葵)(229)	地筍(佩兰)(203)
.....(122)		(泽兰)	
老娘脚后根(知母)(469)		
.....(32)			
老娘脚后跟(知母)(63)		
.....(32)			
老鸹眼睛草(龙葵)(229)		

..... (352)	地新 (薤本) (229)
地烟 (马勃) (83)	地蓼 (蓼蕎) (233)	地五加 (乌蔹莓) (106)
地菱 (刺蒺藜) (463)	地熏 (柴胡) (402)	地毛球 (锁阳) (520)
地黄 (生地黄) (58)	地精 (何首乌) (529)	地乌龟 (盛虫) (332)
地菜 (荠菜) (319)	(肉苁蓉) (503)	地乌桃 (猪苓) (212)
地菅 (白茅根) (321)	(人参) (478)	地风消 (瓜子金) (437)
地姑 (蟋蟀) (251)	地噤 (地锦草) (104)	地巴豆 (半夏) (388)
地梨 (荸荠) (552)	(络石藤) (186)	地巴麻 (了哥王) (110)
地蛋 (金果榄) (84)	地鳖 (盛虫) (382)	地节根 (白茅根) (321)
地联 (地锦草) (104)	地髓 (生地黄) (58)	地龙干 (地龙) (469)
地椒 (仙鹤草) (329)	地丁子 (天葵) (122)	地龙子 (地龙) (469)
地铺 (地骨皮) (139)	地丁花 (米口袋) (70)	地龙末 (地龙) (469)
地葵 (苍耳草) (12)	地丁草 (紫花地丁) (69)	地龙肉 (地龙) (469)
(地肤子) (229)	地丁香 (寻骨风) (182)	地龙芽 (升麻) (26)
地筋 (白茅根) (321)	地人参 (薤草根) (248)	地龙骨 (穿山龙) (371)
地楼 (瓜蒌) (404)	地马桑 (地锦草) (104)	地龙胆 (筋骨草) (105)
地锦 (蛇莓) (128)	地马菜 (马齿苋) (89)	地区草 (委陵菜) (91)
(络石藤) (186)	地门冬 (天门冬) (542)	地仙子 (枸杞子) (555)
(地锦草) (104)	地夫子 (地肤子)	地仙草 (仙鹤草) (329)

地仙根(地骨皮)(110)	(鹅不食草)
.....(139)	(196)
地必虫(麻虫)(430)	地枯萝(地骷髅)
.....(382)	(398)
地芝子(冬瓜子)(352)	地骨子(枸杞子)
.....(230)	(555)
地芝皮(冬瓜皮)(84)	地响铃(农吉利)
.....(230)	(120)
地老鼠(白薇)(183)	地胆头(车前草)
.....(98)	(216)
(乌蔹莓)(183)	地胆草(龙胆草)
.....(106)	(54)
地地菜(芥菜)(180)	(蒲公英)
.....(319)	(68)
地地藕(鸭跖草)(186)	地牯牛(夏枯草)
.....(38)	(37)
地耳草(王不留行)(128)	(蝼蛄)
.....(367)	(251)
地扫子(地肤子)(247)	地莲草(地锦草)
.....(229)	(104)
地血根(茜草)(196)	地桐子(木鳖子)
.....(335)	(616)
地红消(矮地茶)(83)	地豇豆(薄菜)
.....(430)	(417)
地羊肾(黄狗肾)(325)	地钱儿(金钱草)
.....(520)	(221)
地羊鞭(黄狗肾)(197)	地钱草(积雪草)
.....(520)	(225)
地米菜(芥菜)(122)	地海参(巴戟天)
.....(319)	(501)
地麦子(地肤子)(79)	(木通)
.....(229)	(218)
地芫荽(鹅不食草)(388)	地浮萍(积雪草)
.....(196)	(225)
地苏木(茜草)(79)	地黄根(生地黄)
.....(335)	(58)
地谷根(了哥王)(86)	地萝卜(商陆)

地菜子(地肤子)	地槐根(苦参)	地仙草芽(鹤草芽)
.....(229)(55)(309)
地梧桐(臭梧桐)	地雷公(半夏)	地地蓼根(香附)
.....(169)(388)(282)
地葫草(龙葵)	地塘虫(壁虎)	地羊阴茎(黄狗肾)
.....(122)(626)(520)
地落艾(益母草)	地蜈蚣(过江龙)	地羊鲜皮(白鲜皮)
.....(355)(197)(99)
地蒲竹(射干)	(金钱草)	地羊羶皮(白鲜皮)
.....(81)(221)(99)
地萹蓄(萹蓄)	(仙鹤草)	地麦苗子(地肤子)
.....(233)(329)(229)
地棉花(芫花)	地鼠尾(丹参)	地芙蓉叶(木芙蓉叶)
.....(152)(349)(611)
地棉根(了哥王)	地溜秧(泽兰)	地胆头子(车前子)
.....(110)(352)(215)
地椒芽(鹤草芽)	地蓼根(香附)	地球半夏(半夏)
.....(309)(282)(388)
地棕根(仙茅)	地蝉虫(廑虫)	地棉根皮(了哥王)
.....(504)(382)(110)
地棠草(积雪草)	地薰叶(番泻叶)	地棉麻树(了哥王)
.....(225)(147)(110)
地筋子(枸杞子)	地籁根(香附)	地棚窝草(伸筋草)
.....(555)(282)(182)
地筋根(地骨皮)	地鵝鵠(半夏)	地刷子石松(过江龙)
.....(139)(388)(197)
地蓬草(地锦草)	地螺丝(白及)	耳朴(厚朴)
.....(104)(330)(200)
地棱子(瓜蒌子)	地藤草(瓜子金)	耳泽(泽泻)
.....(434)(437)(214)
地棱仁(瓜蒌子)	地瓣草(地锦草)	耳片壳(石决明)
.....(434)(104)(455)
地棱根(天花粉)	地鳖虫(廑虫)	耳叶蓼(拳参)
.....(35)(382)(77)
地榆根(地榆)	地瓜儿苗(泽兰)	耳朵红(虎耳草)
.....(322)(352)(123)
	(佩兰)	

耳朵草(虎耳草)(143)	西五味(五味子)(565)
耳环草(鸭跖草)(38)	西竹(玉竹)(546)
耳坠菜(龙葵)(122)	西芪(黄芪)(486)
(蜀羊泉)		西连(黄连)(50)
.....(86)		西羌(羌活)(9)
耳挖草(地耳草)(242)	西参(西洋参)(481)
(半支莲)		西草(甘草)(493)
.....(118)		西茴(小茴香)(267)
耳珰草(苍耳草)(12)	西砂(砂仁)(204)
耳聋草(虎耳草)(123)	西香(乳香)(374)
耳癩草(蒲公英)(68)	西党(党参)(482)
耳朵刷子(谷精草)(39)	西黄(牛黄)(74)
耳环石斛(石斛)(543)	西谢(孩儿茶)(619)
耳蕨贯众(贯众)(313)	西超(山药)(490)
西丁(硫黄)(594)	西大艽(秦艽)(166)
西土(硫黄)(594)	西大活(独活)(161)
西贝(川贝母)(405)	西大黄(大黄)(143)
西归(当归)(526)	西川芎(川芎)(343)
西芎(川芎)(343)	西小茴(小茴香)(267)
(藁本)			
.....(11)			
西青(大黄)			

..... (526)	西枳壳 (枳壳) (60)
西红花 (红花) (361) （ 番红花 ） (363)	西枸杞 (枸杞子) (555)	西北百合 (百合) (550)
西防风 (防风) (7)	西香薷 (香薷) (5)	西北枸杞 (枸杞子) (555)
西庄黄 (大黄) (143)	西秦艽 (秦艽) (106)	西北狼毒 (狼毒) (159)
西赤芍 (赤芍) (62)	西党参 (党参) (482)	西北蔷薇 (金樱子) (583)
西抚芎 (川芎) (343)	西黄芪 (黄芪) (486)	西瓜白霜 (西瓜霜) (539)
西羌活 (羌活) (9)	西绵芪 (黄芪) (486)	西瓜黑霜 (西瓜霜) (539)
西青果 (藏青果) (85)	西鹿茸 (鹿茸) (498)	西宁大黄 (大黄) (143)
西枫斗 (石斛) (543)	西麻黄 (麻黄) (1)	西西果皮 (山茱萸) (582)
西杞子 (枸杞子) (555)	西滑石 (滑石) (217)	西芎藁本 (藁本) (11)
西国草 (覆盆子) (585)	西湖柳 (怪柳) (15)	西安榴皮 (石榴皮) (571)
西细辛 (细辛) (260)	西锦纹 (大黄) (143)	西昌丹皮 (牡丹皮) (60)
西河柳 (怪柳) (15)	西榴皮 (石榴皮) (571)	西南石韦 (石韦) (223)
西茴香 (小茴香) (267)	西镇草 (甘草) (493)	西南细辛 (细辛) (260)
西茵陈 (茵陈蒿) (228)	西潞党 (党参) (482)	西南香圆 (香橼) (278)
西砂仁 (砂仁) (204)	西麝香 (麝香) (473)	西南黄芩 (黄芩) (48)
西砂米 (砂仁) (204)	西天麦须 (玉米须) (239)	西南黄精 (黄精) (547)
西砂壳 (砂仁壳) (206)	西五味子 (五味子) (565)	西洋人参 (西洋参) (481)
	西北丹皮 (牡丹皮)	西陵知母 (知母) (32)

西银柴胡(银柴胡)(462)	亚洲象皮(象皮)
.....(140)	(628)
西麻黄根(麻黄根)(570)	亚洲犀角(犀角)
	(57)
西番麦须(玉米须)(239)	亚细亚毛蚓(地龙)
	(469)
西番菊子(向日葵子)(554)	亚洲委陵菜(翻白草)
	(56)
西藏大黄(大黄)(143)	亚洲蒲公英(蒲公英)
	(68)
西藏木瓜(木瓜)(169)	亚美蹄盖蕨(贯众)
	(313)
西藏鸟头(雪上一枝蒿)(609)	亚历山大番泻叶(番泻叶)
	(147)
西藏红花(番红花)(363)	协铁石(磁石)
	(442)
西藏青果(藏青果)(85)	朴花(厚朴花)
	(202)
西藏秦艽(秦艽)(166)	朴脑(厚朴)
	(200)
西藏紫草(紫草)(63)	朴根(厚朴)
	(200)
西藏紫菀(紫菀)(421)	朴筒(厚朴)
	(200)
西藏鼠兔(五灵脂)(380)	朴硝(芒硝)
	(145)
西藏橄榄(藏青果)(85)	朴硝石(芒硝)
	(145)
西王母杖根(地骨皮)(139)	杬(山楂)
	(298)
西天王草根(茜草)(335)	杬子(山楂)
	(298)
西北草赤芍(赤芍)(62)	杬实(山楂)
	(298)
西南八角莲(鬼臼)(45)	杬果(山楂)
	(298)
西南蟹甲草(天麻)(445)	机片(冰片)

机梅片(冰片)	百节蛇(白花蛇)	百荡草(白薇)
机制梅片(冰片)	百叶草(地柏枝)	百射干(射干)
压惊子(八月札)	(金沸草)	百脚鸡(凤尾草)
百本(黄芪)	百奶根(百部)	百脚草(凤尾草)
百奶(百部)	百虫仓(五倍子)	百部子(百部)
百头(贯众)	百合片(百合)	百部根(百部)
百芨(白及)	百合蒜(百合)	百部袋(百部)
百足(蜈蚣)	百花草(千里光)	百解头(防己)
百步(百部)	百花精(蜂蜜)	百解药(玉竹)
百枝(防风)	百两金(青本香)	百辣云(生姜)
百枝(狗脊)	百足虫(蜈蚣)	百蕊草(透骨草)
(萆薢)	百里香(丁香)	百叶草皮(棕榈皮)
百穿(露蜂房)	百步蛇(白花蛇)	百叶草花(旋复花)
百倍(牛膝)	百条根(百部)	百花百合(百合)
百笠(白及)	(威灵仙)	百花锦蛇(白花蛇)
百脚(蜈蚣)	百草双(百草霜)	百两金皮(牡丹皮)
百蜚(防风)	百药绵(黄芪)	百穿子巢(露蜂房)
百尺杵(人参)	百药棉(黄芪)	百部草根(百部)
	百药煎(五倍子)	

百合马兜铃(马兜铃)(438)	毕解(草薢)
.....(428)	(226)
有柄马卜(马勃)(215)	毕楞伽(覆盆子)
.....(83)	(585)
有柄石韦(石韦)(482)	毕澄茄(草澄茄)
.....(223)	(264)
戎菽须(玉米须)(433)	扣仁(白豆蔻)
.....(239)	(206)
死磁石(磁石)(54)	扣青(青皮)
.....(442)	(273)
夺命丹(仙桃草)(159)	扣子七(珠儿参)
.....(359)	(537)
灰包(马勃)(337)	(白及)
.....(83)	(330)
灰菌(马勃)(26)	扣子漆根(白及)
.....(83)	(330)
灰菇(马勃)(587)	抒抒活(接骨木)
.....(83)	(378)
灰菰(马勃)(587)	托盘(覆盆子)
.....(83)	(585)
灰包菌(马勃)(477)	扫盆(乾粉)
.....(83)	(598)
灰柏皮(黄柏)(477)	扫把藤(海金沙藤)
.....(52)	(224)
灰花蛾(红娘子)(584)	扫帚子(地肤子)
.....(385)	(229)
灰菜子(地肤子)(383)	扫帚苗子(地肤子)
.....(229)	(229)
灰盆草(车前草)(591)	扫帚菜子(地肤子)
.....(216)	(229)
灰鳌虫(蜃虫)(264)	扫天晴明草(过江龙)
.....(382)	(197)
灰毛牡荆(黄荆)(263)	扬子毛茛(毛茛)
.....(433)	(107)
灰毛果莓(覆盆子)(263)	过街(蜃虫)
.....(585)	(382)
灰白黄荆(黄荆)(263)	过山龙(过江龙)

..... (197)	过路黄(仙鹤草) (584)
(伸筋草) (329)	团蟾酥(蟾酥)
..... (182)	(金钱草) (623)
(乌蔹莓) (221)	团叶槲蕨(骨碎补)
..... (106)	过路黄芽(鹤草芽) (510)
(青风藤) (309)	团扇薯蓣(穿山龙)
..... (188)	过路黄荆(六月雪) (371)
(鸡血藤) (246)	因尘(茵陈蒿)
..... (373)	夹竹桃(凤仙草) (228)
(土茯苓) (357)	因陈蒿(茵陈蒿)
..... (79)	(透骨草) (228)
(骨碎补) (183)	曲虫(地龙)
..... (510)	夹竹桃子(急性子) (469)
(茜草) (358)	曲药(羌活)
..... (335)	夹竹桃叶(夹竹桃) (9)
过山香(革澄茄) (249)	曲蛇(地龙)
..... (264)	夹竹桃皮(夹竹桃) (469)
过冈龙(土茯苓) (249)	曲蜒(地龙)
..... (79)	夹竹桃花(凤仙花) (469)
过水龙(绶草) (357)	曲蟮(地龙)
..... (124)	夹板菜根(紫菀) (469)
过血藤(红藤) (421)	曲蟮(地龙)
..... (93)	贞蔚(益母草) (469)
过江龙(茅莓) (355)	曲节草(六月雪)
..... (127)	早人(酸枣仁) (246)
(乌蔹莓) (449)	曲曲菜(小蓟)
..... (106)	团酥(蟾酥) (318)
过沟龙(葎草) (623)	曲药子(吴茱萸)
..... (243)	团鱼甲(鳖甲) (312)
过桥风(络石藤) (564)	曲尾草(灯心草)
..... (186)	团鱼壳(鳖甲) (235)
过筋草(伸筋草) (564)	回生草(卷柏)
..... (182)	团鱼盖(鳖甲) (325)
过墙风(金钱草) (564)	回头参(拳参)
..... (221)	团经药(金钱草) (77)
(络石藤) (221)	回回米(薏苡仁)
..... (186)	团螵蛸(桑螵蛸) (214)

回阳草(卷柏)(573)	虫退(蝉蜕)(17)
.....(325)			
回头青根(香附)(161)	虫胶(紫草茸)(134)
.....(282)			
同型蜗牛(蜗牛)(265)	虫夔(蚤休)(75)
.....(116)			
同葵藜(沙苑子)(383)	虫酥(蟾酥)(623)
.....(518)			
同州白蒺藜(沙苑子)(510)	虫蜕(蝉蜕)(17)
.....(518)			
网络鸡血藤(鸡血藤)(573)	虫蟬(玉竹)(546)
.....(373)			
网络唇石斛(石斛)(221)	虫蟠(地龙)(469)
.....(543)			
肉叩(肉豆蔻)(452)	虫蠚(地龙)(469)
.....(573)			
肉扣(肉豆蔻)(452)	虫见死草花(密蒙花)(40)
.....(573)			
肉红(紫荆皮)(80)	吕宋毛(大腹皮)(297)
.....(114)			
肉枣(山茱萸)(153)	吕宋槟(槟榔)(307)
.....(582)			
肉茆(肉豆蔻)(505)	吊兰(石斛)(543)
.....(573)			
肉果(肉豆蔻)(228)	吊瓜(瓜蒌)(404)
.....(573)			
肉草(铁苋菜)(351)	吊胆(熊胆)(97)
.....(241)			
肉蔻(肉豆蔻)(354)	吊藤(钩藤)(461)
.....(573)			
肉牛膝(牛膝)(37)	吊风藤(钩藤)(461)
.....(365)			
肉从容(肉苁蓉)(17)	吊兰草(石斛)(543)
.....(503)			
肉豆叩(肉豆蔻)(180)	吊杆泡(覆盆子)(585)
.....(573)			
肉松葵(肉豆蔻)(514)	吊柳叶(柳叶)	

.....(113)	光连(黄连)(342)
吊柳枝(柳枝)(113)	光珀(琥珀)(101)
吊柳须(柳根)(114)	光姑(山慈姑)	光藕节(藕节)(342)
吊柳根(柳根)(114)	光粉(铅粉)	光叶海桐(梔子)(36)
吊钩藤(钩藤)(461)	光三棱(三棱)	光叶菝葜(土茯苓)(79)
吊墙花(凌霄花)(364)	光山药(山药)	光皮木瓜(木瓜)(169)
吊藤钩(钩藤)(461)	光木瓜(木瓜)	光皮瓜蒌(瓜蒌)(404)
吊坡胶姿(金银花)(65)	光东酥(蟾酥)	光西洋参(西洋参)(481)
吊柳根须(柳根)(114)	光杏仁(杏仁)	光光叶根(山豆根)(82)
吐丝子(菟丝子)(517)	光明丹(铅丹)	光明硫黄(硫黄)(594)
吐丝草(海金沙藤)(224)	光明砂(朱砂)	光条心药(山药)(490)
吐丝藤(海金沙藤)(224)	光明草(地耳草)	光若竹茹(竹茹)(409)
吐血草(景天三七)(335)	(狗尾草)	光板石韦(石韦)(223)
(土大黄)(112)	光知母(知母)	光果甘草(甘草)(493)
吃油脂(赤石脂)(574)	光泽泻(泽泻)	光底海决(石决明)(455)
吸针石(磁石)(442)	光骨刺(六月雪)	光冠银花(金银花)(65)
吸铁石(磁石)(442)	光香附(香附)	光亮费巖(骨碎补)(510)
吸壁藤(络石藤)(186)	光桃仁(桃仁)	光瓣堇菜(紫花地丁)(69)
鸣烈马(车前草)(216)	光旁节(藕节)	光叶崖豆藤(鸡血藤)(373)

光底石决明(石决明)(119)	朱粉(铅丹)
.....(455)	(600)
光亮密网蕨(骨碎补)(119)	朱寸冬(麦门冬)
.....(510)	(540)
光绿七爪红(橘红)(505)	朱小豆(赤小豆)
.....(272)	(231)
光棍茶根皮(远志)(147)	朱子房(石决明)
.....(450)	(455)
光叶十大功劳(十大功 劳叶).....(124)(92)	朱天冬(天门冬)
光叶七叶一枝花(蚤休)(156)(542)
.....(75)		朱兰根(白及)
尖贝(川贝母)(216)(330)
.....(405)		朱竹叶(铁树叶)
尖芩(黄芩)(173)(354)
.....(48)		朱血竭(血竭)
尖槟(槟榔)(526)(620)
.....(307)		朱灯心(灯心草)
尖刀草(白花蛇舌草)(526)(235)
.....(96)		朱灯芯(灯心草)
尖贝母(川贝母)(526)(235)
.....(405)		朱米雪(六月雪)
尖化红(橘红)(526)(246)
.....(272)		朱麦冬(麦门冬)
尖光头(土茯苓)(526)(540)
.....(79)		朱芯麻(麻黄)
尖吻蝮(白花蛇)(526)(1)
.....(177)		朱辰砂(朱砂)
尖佩兰(佩兰)(215)(441)
.....(203)		朱果核(樱桃核)
尖海龙(海龙)(181)(29)
.....(523)		朱果蒂(柿蒂)
尖槟榔(槟榔)(600)(292)
.....(307)		朱宝砂(朱砂)
尖紫苏子(苏子)(212)(441)
.....(424)		朱砂七(黄药子)
尖叶石指甲(佛甲草)(101)(415)
		(红药子)

..... (131)	乔木紫珠 (紫珠) (108)
(何首乌) (320)	竹节参 (三七)
..... (529)	竹 (萹蓄) (333)
朱砂豆 (赤小豆) (233)	竹节草 (鸭跖草)
..... (231)	竹木 (萆薢) (38)
朱砂莲 (红药子) (226)	(瞿麦)
..... (131)	竹心 (竹叶卷心) (234)
朱茯苓 (茯苓) (34)	(萹蓄)
..... (210)	竹皮 (竹茹) (233)
朱茯神 (茯苓) (409)	竹节菜 (鸭跖草)
..... (210)	竹汁 (竹沥) (38)
朱神砂 (朱砂) (409)	竹节黄 (玉竹)
..... (441)	竹花 (天竹黄) (546)
朱通草 (通草) (408)	竹叶心 (竹叶卷心)
..... (219)	竹针 (竹叶卷心) (34)
朱蕉叶 (铁树叶) (34)	竹叶兰 (鸭跖草)
..... (354)	竹苓 (雷丸) (38)
朱櫻核 (樱桃核) (310)	竹叶草 (鸭跖草)
..... (29)	竹油 (竹沥) (38)
朱橘白 (橘白) (409)	竹叶菜 (鸭跖草)
..... (272)	竹黄 (天竹黄) (38)
朱灯心草 (灯心草) (408)	(萹蓄)
..... (235)	竹膏 (天竹黄) (233)
朱衣茯苓 (茯苓) (408)	竹叶椒 (花椒)
..... (210)	竹糖 (天竹黄) (263)
朱衣茯神 (茯苓) (408)	竹夹菜 (鸭跖草)
..... (210)	竹二皮 (竹茹) (38)
朱芯麻根 (麻黄根) (409)	竹芫荽 (海金沙藤)
..... (570)	竹二青 (竹茹) (224)
朱郁李仁 (郁李仁) (409)	竹鸡蒐 (鸭跖草)
..... (149)	竹七根 (玉竹) (38)
朱樱桃核 (樱桃核) (546)	竹鸡草 (鸭跖草)
..... (29)	竹三七 (天竹黄) (38)
牡蛎 (牡蛎) (408)	竹沥水 (竹沥)
..... (456)	竹节羌 (羌活) (409)
乔木五加 (五加皮) (9)	竹沥油 (竹沥)
..... (173)	竹节茶 (草珊瑚) (409)

竹沥膏(竹沥)(392)	血力(血竭)
.....(409)	(620)
竹苓子(雷丸)(437)	血风(鸡血藤)
.....(310)	(373)
竹林子(雷丸)(7)	血片(鹿茸)
.....(310)	(498)
竹帚子(地肤子)(34)	血师(代赭石)
.....(229)	(460)
竹卷心(竹叶卷心)(38)	血乔(金果榄)
.....(34)	(84)
竹根七(万年青)(170)	血余(血余炭)
.....(245)	(332)
竹格叉(透骨草)(24)	血苔(红药子)
.....(183)	(131)
竹盏花(凤仙花)(388)	血杰(血竭)
.....(357)	(620)
竹根菜(鸭跖草)(358)	血板(龟板)
.....(38)	(563)
竹根薯(穿山龙)(34)	血参(丹参)
.....(371)	(349)
竹铃芝(雷丸)(38)	(人参)
.....(310)	(478)
竹凌霄(白薇)(344)	(三七)
.....(138)	(333)
竹剪草(鸭跖草)(14)	血珀(琥珀)
.....(38)	(448)
竹管草(鸭跖草)(542)	血结(血竭)
.....(38)	(620)
竹节人参(珠儿参)(490)	血通(红藤)
.....(537)	(93)
竹节三七(珠儿参)(526)	血藤(红藤)
.....(537)	(93)
(三七)		(虎杖)
.....(333)	(354)
竹叶水草(鸭跖草)(462)	(鸡血藤)
.....(38)	(373)
竹叶白附(白附子)(334)	血力花(血竭)

..... (620)	血枸杞(枸杞子) (121)
血三七(红药子) (131) (菊叶三七) (334)	血当归(菊叶三七) (334) (土大黄) (112)	血藻子(五味子) (565)
血山草(景天三七) (335)	血龟板(龟板)	血瀉肠(红藤) (93)
血山根(丹参) (349)	血灵脂(五灵脂)	血丝金盆(鬼臼) (45)
血五甲(乌蔹莓) (106)	血冻根(红藤)	血血木皮(乌柏木根皮) (158)
血木通(红藤) (93)	血枫藤(鸡血藤)	血箭草根(地榆) (322)
血见愁(铁苋菜) (241) (猪秧秧) (120)	血参根(丹参)	血血木根皮(乌柏木根皮) (158)
(地锦草) (104) (茜草) (335)	血经基(地锦草)	向天草(瓦松) (129)
血丹参(丹参) (349)	血疙瘩(菊叶三七)	向日葵饼(向日葵花托) (237)
血风草(地锦草) (104)	血茸片(鹿茸)	向日葵盘(向日葵茎髓) (238)
血风藤(鸡血藤) (373)	血茜草(茜草)	向日葵瓢(向日葵茎髓) (238)
血节藤(鸡血藤) (373)	血钩子(枸杞子)	向阳花子(向日葵子) (554)
血布袋(铁苋菜) (241)	血格答(菊叶三七)	向阳花托(向日葵花托) (237)
血龙藤(鸡血藤) (373)	血琥珀(琥珀)	向日葵花盘(向日葵花托) (237)
血生根(丹参) (349)	血蛤皮(瓦楞子)	向日葵茎心(向日葵茎髓) (238)
血杞子(枸杞子) (555)	血筋藤(鸡血藤)	向日葵梗心(向日葵茎髓) (238)
	血竭花(血竭)	休羽(刺蒺藜) (463)
	血瘤草(狗舌草)	优昙钵(无花果) (88)
		伏丁(白芍) (531)

伏王(白芍)(253)	华紫珠(紫珠)
.....(531)	(320)
伏毛(大腹皮)(195)	华槲蕨(骨碎补)
.....(297)	(510)
伏瓜(南瓜)(195)	华中前胡(前胡)
.....(308)	(402)
伏老(瓦楞子)(195)	华东菝葜(威灵仙)
.....(627)	(162)
伏贲(白芍)(609)	华北地黄(土大黄)
.....(531)	(112)
伏花(旋复花)(195)	华北柽柳(柽柳)
.....(399)	(15)
伏灵(茯苓)(105)	华北蝼蛄(蝼蛄)
.....(210)	(251)
伏兔(茯苓)(609)	华州漏芦(漏芦)
.....(210)	(100)
(飞廉)(198)	华防己藤(青风藤)
.....(126)	(188)
伏神(茯苓)(188)	华南龙胆(紫花地丁)
.....(210)	(69)
伏菟(茯苓)(260)	华南地丁(紫花地丁)
.....(210)	(69)
伏猪(飞廉)(352)	华南虎骨(虎骨)
.....(126)	(175)
伏蜻(蝉蜕)(5)	华南鹤虱(鹤虱)
.....(17)	(310)
伏蝎(全蝎)(5)	华黄芪子(沙苑子)
.....(466)	(518)
伏馨(茯苓)(461)	华麻黄根(麻黄根)
.....(210)	(570)
伏瓜子(南瓜子)(75)	华鼠尾草(石见穿)
.....(309)	(372)
伏茜草(茜草)(19)	华中五味子(五味子)
.....(335)	(565)
伏蛇皮(桑白皮)(52)	(络石藤)
.....(425)	(186)
伏辣子(吴茱萸)(1)	华中威灵仙(威灵仙)

华东木蓝根(山豆根)	杂色鮑壳(石决明)	多花黃芪(黃芪)
.....(162)(455)(419)
华东蓼房子(蓼房子)	朵朵花根(丹参)	多花黃精(黃精)
.....(82)(349)(486)
华东蓼房子(蓼房子)	负担(益母草)	多花蓼根(何首烏)
.....(426)(355)(547)
华东蓝刺头(漏芦)	负盘(蟇虫)	多伽罗香(乳香)
.....(100)(382)(529)
华东覆盆子(覆盆子)	负壳蛞蝓(蜗牛)	多枝怪柳(怪柳)
.....(585)(116)(15)
华南谷精草(谷精草)	负壳蜒蚰(蜗牛)	多脉柴胡(柴胡)
.....(39)(116)(24)
华南谷精珠(谷精草)	色姜黃(姜黃)	多疣壁虎(壁虎)
.....(39)(347)(626)
华南骨碎补(骨碎补)	色道麻(麻黃)	多鳞耳蕨(贯众)
.....(510)(1)(313)
华南落新妇(落新妇)	色道麻根(麻黃根)	多水高岭土(赤石脂)
.....(30)(570)(574)
华南十大功劳叶(十大功劳叶)…(124)	鬼茈(荸荠)	多花木蓝根(山豆根)
伊贝(川贝母)(552)(82)
.....(405)	鬼公英(蒲公英)	多花娃儿藤(白薇)
伊贝母(川贝母)(68)(138)
.....(405)	各一旺(牛黄)	多花蔷薇花(蔷薇花)
伊犁贝母(川贝母)(74)(130)
.....(405)	多骨(白豆蔻)	多条金甲带(白花蛇)
伊犁防风(防风)(206)(177)
.....(7)	多儿母(天门冬)	多刺天门冬(天门冬)
后红子(龙葵)(542)(542)
.....(122)	多仔婆(天门冬)	多刺龙须菜(白前)
后庭花(臭梧桐)(542)(401)
.....(169)	多蘿蔔(辣蓼)	多疣天南星(天南星)
后老婆罐(马兜铃)(193)(390)
.....(428)	多叶重楼(蚤休)	多裂蒲公英(蒲公英)
猢蒿(青蒿)(75)(68)
.....(136)	多伦赤芍(赤芍)	多鳞耳蕨贯众(贯众)
肌母螺(蜗牛)(62)(313)
.....(116)	多花百部(百部)	

全皮(地骨皮)(272)(96)
全虫(全蝎)(466)	伞房花耳草(白花蛇舌草)
全当归(当归)(526)(96)
全瓜蒌(瓜蒌)(404)	众挖(车前草)
全没药(没药)(376)	饧(饴糖)
全沉香(沉香)(285)	饧糖(饴糖)
全荆芥(荆芥)(6)(496)
全复花(旋复花)(399)	寻风藤(青风藤)
全栝楼(瓜蒌)(404)(188)
全福花(旋复花)(399)	异翅(连翘)
全蝎末(全蝎)(466)(67)
全毛苍术(苍术)(198)	异条党(党参)
全叶钻地风(钻地风)(180)(482)
全须白人参(人参)(478)	异风颈草(仙鹤草)
全须生晒参(人参)(478)(329)
全须生晒人参(人参)(478)	异叶败酱(墓头回)
会及(五味子)(565)(95)
会皮(橘皮)(271)	异叶柴胡(柴胡)
会红(橘红)	(24)
		异风颈草芽(鹤草芽)
	(309)
		异叶天南星(天南星)
	(390)
		异叶假繁缕(太子参)
	(485)
		异花吴茱萸(花椒)
	(263)
		异苞蒲公英(蒲公英)
	(68)
		异叶马兜铃根(防己)
	(164)
		异形南五味子(鸡血藤)
	(373)
		异型南五味子(海风藤)

..... (187)	阴起石 (阴起石) (367)
异叶三褶脉马兰 (紫菀) (525)	妈妈草 (知母)
阳桃 (猕猴桃) (47)	红粟须 (玉米须)
阳精 (生地黄) (540)	红土 (赤石脂)
阳朴姜 (干姜) (482)	红木 (苏木)
阴春砂 (砂仁) (167)	红升 (升药)
阳春雪 (石菖蒲) (482)	红女 (红娘子)
阳举石 (阳起石) (164)	红卯 (红豆蔻)
阳雀藻 (黄精) (79)	红叶 (铁树叶)
阳春砂仁 (砂仁) (265)	红丹 (铅丹)
阳春砂壳 (砂仁壳) (200)	红皮 (橘皮)
阴成 (菊花) (213)	红芍 (赤芍)
阴土盐 (戎盐) (69)	红扣 (红豆蔻)
阴山红 (矮地茶) (409)	红合 (百合)
阴牛郎 (爵床) (200)	红芪 (黄芪)
阴行草 (刘寄奴) (200)	红苏 (紫苏)
（茵陈蒿） (357)	红豆 (赤小豆)
阴阳虎 (落新妇) (55)	（相思子）
阴阳莲 (虎杖) (147)	（红豆蔻）
（紫苏）	妈不流 (王不留行) (267)

红枣(大枣)(471)	红甘草(甘草)(493)
.....(495)		红甘蔗(甘蔗)(539)
红矾(砒石)(263)	红石头(代赭石)(460)
.....(596)		红石根(紫草)(63)
(皂矾)(383)	红石膏(寒水石)(31)
.....(603)		红龙须(柳根)(114)
红果(山楂)(267)	红芽仁(红豆蔻)(267)
.....(298)		红冬青(四季青)(102)
红参(丹参)(194)	红皮藤(红藤)(93)
.....(349)		红丝草(地锦草)(104)
(人参)(385)	红丝线(猪殃殃)(120)
.....(478)		红丝络(虎耳草)(123)
红草(荭草)(79)	红兰芪(黄芪)(486)
.....(194)		红芍药(赤芍)(62)
红柳(柽柳)(154)	红耳坠(枸杞子)(555)
.....(15)		红地榆(地榆)(322)
红茶(茶叶)(154)	红血藤(红藤)(93)
.....(396)		红血藤(鸡血藤)(373)
红药(红药子)(280)	红灯果(菝葜)	
.....(131)			
(雷公藤)(231)		
.....(610)			
红砒(砒石)(529)		
.....(596)			
红信(砒石)(599)		
.....(596)			
红根(丹参)(319)		
.....(349)			
红柴(苏木)(30)		
.....(378)			
红粉(升药)(26)		
.....(599)			
红娘(红娘子)(升麻)		
.....(385)			
红梅(乌梅)(366)		
.....(566)			
红麻(罗布麻)(154)		

..... (227)	(刘寄奴) (335)
红灯笼 (了哥王) (110) (351)	红茜根 (茜草) (335)
红麦禾 (蜀羊泉) (68)	红饭豆 (赤小豆) (231)	红荆条 (桤柳) (15)
红芽戟 (大戟) (154)	红陈艾 (刘寄奴) (351)	红草子 (水红花子) (360)
红花毛 (红花) (361)	红鸡草 (地柏枝) (326)	红草花 (荘草花) (359)
红花艾 (益母草) (355)	红谷芽 (谷芽) (302)	红药子 (黄药子) (415)
红花草 (罗布麻) (471) (飞廉) (126)	红沙草 (地锦草) (104)	红要子 (红药子) (131)
红花饼 (红花) (361)	红青菜 (丹参) (349)	红梔子 (梔子) (36)
红花椒 (花椒) (263)	红青椒 (枸杞子) (555)	红柳子 (罗布麻) (471)
红苏子 (苏子) (424)	红茎草 (地锦草) (104)	红枸杞 (枸杞子) (555)
红苏木 (苏木) (378)	红直须 (人参) (478)	红砂石 (代赭石) (460)
红苏叶 (苏叶) (4)	红顶果 (蛇莓) (128)	红砒石 (砒石) (596)
红赤七 (了哥王) (110)	红松脂 (琥珀) (448)	红重楼 (蚤休) (75)
红赤豆 (赤小豆) (231)	红果子 (山楂) (298)	红信石 (砒石) (596)
红豆岬 (红豆蔻) (207)	红参须 (人参) (478)	红贯脚 (虎杖) (354)
红杜仲 (杜仲) (507)	红姑娘 (红娘子) (385) (锦灯笼) (88)	红孩儿 (地耳草) (242)
红杜鹃 (满山红) (432)	红线草 (虎耳草) (123)	红蚤休 (拳参) (77)
红旱莲 (墨旱莲) (562)	红线绳 (虎耳草) (123)	红弯须 (人参) (478)
	红茜草 (茜草)	

红莲子(莲子)	(352)
.....	(573)	
红莲草(地锦草)	(296)
.....	(104)	
红桔草(鱼腥草)	(127)
.....	(80)	
红桃仁(桃仁)	(602)
.....	(330)	
红根草(茜草)	(471)
.....	(335)	
红根藤(茜草)	(325)
.....	(335)	
红柴胡(柴胡)	(478)
.....	(24)	
红杏子(五味子)	(418)
.....	(565)	
红狼毒(狼毒)	(428)
.....	(159)	
红娘子(锦灯笼)	(263)
.....	(88)	
红娘虫(红娘子)	(179)
.....	(385)	
红绣球(地榆)	(453)
.....	(322)	
红桑椹(桑椹)	(3)
.....	(556)	
红高岭(赤石脂)	(320)
.....	(574)	
红粉底(升药)	(610)
.....	(599)	
红璇梅(茅梅)	(615)
.....	(127)	
红草薢(萆薢)	(180)
.....	(226)	
(土茯苓)	(15)
.....	(79)	
红梗草(泽兰)	(86)
(红花)	(361)
红蓝芪(黄芪)	(486)
(茜草)	(335)
红蒲根(三棱)	(318)
(樟皮)	(570)
红暖药(丹参)	(349)
(辣蓼)	(193)
红慈姑(荸荠)	(552)
(水红花子)	(360)
红蓼花(荭草花)	(359)
(红豆蔻)	(267)
红漆豆(相思子)	(615)
(土茯苓)	(79)
红大麻子(蓖麻子)	(616)
(瞿麦)	(234)
红牙大戟(大戟)	(154)
(蜀羊泉)	(335)
红毛大戟(大戟)	(154)
(红藤)	(154)

..... (93)	红杜仲藤(杜仲) (616)
红龙须根(茜草) (335) (507)	红模根皮(乌柏木根皮) (158)
红龙盘柱(绶草) (124)	红条紫草(紫草) (63)	红鬚巾根(茜草) (335)
红叶紫珠(紫珠) (320)	红鸡冠花(鸡冠花) (327)	红镜朱砂(朱砂) (441)
红冬青叶(四季青) (102)	红枣树皮(枣树皮) (596)	红毛五加皮(五加皮) (173)
红皮松节(松节) (192)	红果黄精(黄精) (517)	红心刺刁根(两面针) (109)
红皮松香(松香) (618)	红岩百合(百合) (550)	红叶铁树叶(铁树叶) (354)
红皮松塔(白松塔) (633)	红线草根(茜草) (335)	红花夹竹桃(夹竹桃) (249)
红丝线根(茜草) (335)	红须麦须(玉米须) (239)	红花栝楼子(瓜蒌子) (434)
红母猪藤(乌蔹莓) (106)	红肺筋草(鹿衔草) (370)	红花倒水莲(凌霄花) (364)
红耳堕根(地骨皮) (139)	红倒钩簕(两面针) (109)	红花益母草(益母草) (355)
红耳鼠兔(五灵脂) (380)	红铁树叶(铁树叶) (354)	红花鹿蹄草(鹿衔草) (370)
红芽大戟(大戟) (154)	红菊花心(红藤) (93)	红果槲寄生(桑寄生) (172)
红苋菜根(商陆) (156)	红斑鸠窝(地锦草) (104)	红梗玉米膏(益母草) (355)
红花石蒜(石蒜) (593)	红棵子根(茜草) (335)	红梗蒲公英(蒲公英) (68)
红花脬虉(茅莓) (127)	红榴根皮(地骨皮) (139)	红萼月见草(月见草) (195)
红花椒目(椒目) (263)	红紫苏子(苏子) (424)	红榴榴棵子(枸杞子) (555)
红花瞿麦(瞿麦) (234)	红紫苏叶(苏叶) (4)	红榴榴棵根(地骨皮) (139)
红蕓麻根(蕓麻根) (321)	红筋大黄(土大黄) (112)	红石膏寒水石(寒水石) (31)
	红蕓麻子(蕓麻子)	

纤花耳草(白花蛇舌草)(352)	交麻子(黑脂麻)(552)
.....(96)	戏铁石(磁石)(442)	交藤根(何首乌)
纤花雪胆(马兜铃)(428)	观音子(相思子)(529)
.....(28)	观音刺(仙人掌)(615)	交加枝子(枳椇子)
纤细木贼(木贼)(226)	观音茶(草珊瑚)(565)
.....(28)	观音草(爵床)(108)	刘寄奴(茵陈蒿)
纤细草薢(萆薢)(226)	观音柳(怪柳)(228)
.....(226)	观音莲(地耳草)(111)	(墨旱莲)
纤弱木贼(木贼)(30)	观音掌(仙人掌)(562)
.....(28)	庄黄(大黄)(15)	(地耳草)
纤维石膏(石膏)(30)	庄浪大黄(大黄)(242)
巡骨风(寻骨风)(182)	衣胞(紫河车)	刘寄奴草(刘寄奴)
.....(221)(108)(143)(351)
羽泽(明矾)(603)	衣钮草(谷精草)	茺蔚(益母草)
.....(603)(143)	齐女衣(蝉蜕)(355)
羽涅(明矾)(603)	齐苏叶(苏叶)	茺蔚子(茺蔚子)
.....(603)(17)	交时(卷柏)(356)
羽容(凤仙花)(357)	交麻(黑脂麻)	祁艾(艾叶)
.....(357)(325)(552)(388)
羽箭(鬼羽箭)(129)	交茎根(何首乌)	祁红(茶叶)
.....(129)(4)(529)(396)
羽箭草(鬼羽箭)(129)	交脚风(络石藤)	祁菊(菊花)
.....(129)(186)(100)(21)
羽叶三七(三七)(333)	产后草(瓜子金)	祁蛇(白花蛇)
.....(333)		(177)
羽裂地筍(泽兰)(352)		祁白芷(白芷)
.....(352)		(10)
羽裂橐本(前胡)(402)		祁紫菀(紫菀)
.....(402)		(421)
羽叶竹节参(三七)(333)		祁薏仁(薏苡仁)
.....(333)		(214)
羽裂地瓜儿苗(泽兰)			祁薏米(薏苡仁)
		(214)

闭鞘姜(商陆)	(金樱子)	安边桂(肉桂)
.....(437)(583)(89)
闭荆(木贼)	灯笼泡(锦灯笼)	安边桂(肉桂)
.....(156)(88)(257)
闭荆(木贼)	灯笼草(锦灯笼)	安西香(安息香)
.....(28)(88)(476)
闭津(闭荆)	灯笼菜(海藻)	安吉梅(乌梅)
.....(239)(413)(566)
闭荆蝎(全蝎)	(玉竹)	安昌草(茵陈蒿)
.....(466)(546)(228)
灯心(灯心草)	灯笼藻(海藻)	安昌蒿(茵陈蒿)
.....(235)(413)(228)
灯芯(灯心草)	灯伞花根(百合)	安肉桂(肉桂)
.....(235)(550)(257)
灯草(灯心草)	灯盏花子(急性子)	安南子(胖大海)
.....(235)(358)(416)
灯蒲(胡颓子)	灯心草蚤缀(银柴胡)	安茯苓(茯苓)
.....(304)(140)(210)
灯台七(蚤休)	讷会(芦荟)	安卿根(苎麻根)
.....(75)(147)(321)
灯台草(泽漆)	农吉利(农吉利)	安悉香(安息香)
.....(232)(120)(476)
灯芯草(灯心草)	守田(半夏)	安石榴皮(石榴皮)
.....(235)(388)(571)
灯草心(灯心草)	守宫(壁虎)	安阳花粉(天花粉)
.....(235)(626)(35)
灯盏花(木槿花)	宅下(泽泻)	安南肉桂(肉桂)
.....(131)(213)(257)
(凤仙花)	宅夕(泽泻)	安南革麦(革麦)
.....(357)(213)(263)
灯盏菜(积雪草)	宅蒜(薤白)	安息榴皮(石榴皮)
.....(225)(289)(571)
灯盏窝(铁苋菜)	安苓(茯苓)	安阳天花粉(天花粉)
.....(241)(210)(35)
灯笼头(夏枯草)	安桂(肉桂)	安石榴酸实壳(石榴皮)
.....(37)(257)(571)
灯笼果(锦灯笼)	安乐菜(马齿苋)	羊角(决明子)
.....(88)	(465)

羊明(决明子)(330)	羊须草(白花蛇舌草)(96)
.....(465)			
羊胆(猪胆汁)(69)	羊起石(阳起石)(525)
.....(417)			
羊桃(猕猴桃)(505)	羊栖菜(海藻)(413)
.....(558)			
羊棣(山楂)(465)	羊眼豆(扁豆)(492)
.....(298)			
羊薺(麦门冬)(43)	羊惊花(洋金花)(439)
.....(540)			
羊蹄(土大黄)(530)	羊婆奶(沙参)(535)
.....(112)			
(金不换)(547)	羊鲍壳(石决明)(455)
.....(341)			
羊藿(淫羊藿)(186)	羊鲜草(白鲜皮)(99)
.....(505)			
羊开口(八月札)(501)	羊蹄根(羊蹄)(340)
.....(294)			
羊甘石(炉甘石)(410)	羊奶奶草(蒲公英)(68)
.....(606)			
羊仔耳(蜀羊泉)(606)	羊母奶子(胡颓子)(304)
.....(86)			
羊奶子(胡颓子)(447)	羊耳朵花(密蒙花)(40)
.....(304)			
(海藻)(37)	(旋复花)	
.....(413)			
羊奶子(枸杞子)(465)	羊尾豆(决明子)(399)
.....(555)			
(白薇)(139)	羊乳根(地骨皮)(340)
.....(133)			
羊奶奶(胡颓子)(540)	羊角天麻(天麻)(462)
.....(304)			
羊负米(苍耳草)(11)	羊角细辛(白薇)(138)
.....(12)			
羊米虫(斑蝥)(37)	羊肚拉角(罗布麻)(471)
.....(622)			
羊角七(白及)(540)	羊舌头根(羊蹄)(340)
		羊春条花(密蒙花)	

..... (40)	关柏 (黄柏) (214)
羊胡子草 (知母) (52)	关卜奎芪 (黄芪)
..... (32)	关刀豆 (刀豆) (486)
羊胡子根 (知母) (291)	关车前子 (车前子)
..... (32)	关大力 (牛蒡子) (215)
羊眼半夏 (半夏) (16)	关沙苑子 (沙苑子)
..... (388)	关木通 (木通) (518)
羊眼豆衣 (扁豆衣) (218)	关东大麻子花 (洋金花)
..... (492)	关车前 (车前子) (439)
羊眼豆花 (扁豆花) (215)	米仁 (蒙古仁)
..... (493)	关升麻 (升麻) (214)
羊锁不拉 (锁阳) (26)	米壳 (麻壳)
..... (520)	关公须 (紫菀) (575)
羊触足子 (决明子) (421)	米赤 (赤小豆)
..... (465)	关龙胆 (龙胆草) (231)
羊辣罐子 (草房子) (54)	米珠 (珍珠)
..... (426)	关白附 (白附子) (457)
羊蹄大黄 (羊蹄) (392)	米铺 (黄精)
..... (310)	关苍术 (苍术) (547)
羊角透骨草 (透骨草) (198)	米囊 (麻壳)
..... (183)	关防风 (防风) (575)
(藏角蒿) (7)	米口袋 (紫花地丁)
..... (530)	关米仁 (蒙古仁) (69)
羊齿天门冬 (天门冬) (214)	米赤豆 (赤小豆)
..... (542)	关决明 (石决明) (231)
羊齿天门冬 (百部) (455)	米灵脂 (五灵脂)
..... (419)	关远志 (远志) (380)
羊耳朵朵尖花 (密蒙花) (450)	米沙参 (沙参)
..... (40)	关沙苑 (沙苑子) (535)
并头草 (半支莲) (518)	米斑蝥 (斑蝥)
..... (118)	关海决 (石决明) (622)
关车 (车前子) (455)	米筛花 (六月雪)
..... (215)	关黄柏 (黄柏) (246)
关决 (石决明) (52)	米辣子 (吴茱萸)
..... (455)	关鹿茸 (鹿茸) (258)
关芪 (黄芪) (498)	米蒿子 (草房子)
..... (486)	关薏仁 (蒙古仁) (426)

米米蒿子(葶苈子)(31)	兴安藜芦(藜芦)
.....(426)	(戎盐)(592)
米泔苍术(苍术)(135)	兴安白头翁(白头翁)
.....(198)	冰台(艾叶)(89)
米囊子壳(罂粟壳)(338)	兴安杜鹃叶(满山红)
.....(575)	冰片脑(冰片)(432)
米儿茶根皮(远志)(474)	汗椒(花椒)
.....(450)	冰冻草(墨旱莲)(263)
米口袋地丁(米口袋)(562)	汗淋米(墨旱莲)
.....(70)	冰候尉(薍荷)(562)
壮味(五味子)(15)	汗椒目(椒目)
.....(565)	冰球子(白及)(263)
壮芪(黄芪)(330)	江子(巴豆)
.....(486)	(山慈姑)(153)
壮阳草(韭菜)(101)	江车(车前子)
.....(290)	冰粉树(桑寄生)(215)
壮阳草子(韭子)(172)	江珠(琥珀)
.....(524)	冰花冰片(冰片)(448)
冲天七(万年青)(474)	江蚕(白僵蚕)
.....(245)	决明(决明子)(468)
冲天泡(酢浆草)(465)	江梅(乌梅)
.....(241)	(石决明)(566)
冲玉子(茺蔚子)(455)	江离(川芎)
.....(356)	决明子(青葙子)(343)
冲正芪(黄芪)(41)	江蓠(川芎)
.....(486)	兴安毛茛(毛茛)(313)
冲石决(石决明)(607)	江车前(车前子)
.....(455)	兴安升麻(升麻)(245)
冲海决(石决明)(26)	江白菜(昆布)
.....(455)	兴安白芷(白芷)(414)
冲松贝母(川贝母)(10)	江枳壳(枳壳)
.....(405)	(独活)(276)
次生地(生地黄)(161)	江枳实(枳实)
.....(58)	兴安杜鹃(满山红)(275)
冰石(石膏)(432)	江香薷(香薷)
.....(30)	兴安柴胡(柴胡)(5)
(寒水石)(24)	江梁子(牵牛子)

江车前子(车前子)	麦冬(麦门冬)	麦蘧姜(瞿麦)
江良裸子(牵牛子)	麦瓜(南瓜)	麦篮子(王不留行)
江鱼头石(鱼脑石)	麦曲(神曲)	麦穗红(爵床)
江鱼首石(鱼脑石)	麦壳(浮小麦)	麦穗癀(爵床)
江鱼脑石(鱼脑石)	麦榄(胡颓子)	麦加菜子(王不留行)
江南卷柏(地柏枝)	麦蘖(麦芽)	麦珠子根(茜草)
江剪刀草(薅菜)	麦无踪(天葵)	麦蓝菜子(王不留行)
江边一碗水(鬼臼)	麦巨姜(瞿麦)	麦穗夏枯草(夏枯草)
江西金钱草(金钱草)	麦仁珠(茜草)	辰砂(朱砂)
江苏金钱草(金钱草)	麦瓜子(南瓜子)	辰寸冬(麦门冬)
汜水防风(防风)	麦句姜(瞿麦)	辰麦冬(麦门冬)
池菊(菊花)	麦加子(王不留行)	辰砂草(瓜子金)
池底参(人参)	麦壳葵(浮小麦)	辰茯苓(茯苓)
汤板(龟板)	麦连子(王不留行)	辰茯神(茯苓)
	麦果果(胡颓子)	进口砂(砂仁)
【七画】	麦夏枯(夏枯草)	进贤菜(苍耳草)
寿祖(威灵仙)	麦黄草(角茴香)	进口人参(人参)
	麦兜草(墨旱莲)	进口牛黄(牛黄)
弄丸(蜣螂)	麦蒿子(蓼房子)	
弄水香(沉香)		

进口砂仁(砂仁)(576)	芣苡(车前草)
.....(204)	(216)
进口沉香(沉香)(576)	芣苢(车前草)
.....(250)	(216)
进口安息香(安息香)(576)	芣苢子(车前子)
.....(476)	(215)
远志肉(远志)(611)	苣荬菜(苣荬菜)
.....(450)	(127)
远志草(瓜子金)(576)	苣荬菜(败酱草)
.....(437)	(94)
远志骨(远志)(611)	(小茴)
.....(450)	(318)
远志通(远志)(452)	芽茶(茶叶)
.....(450)	(396)
远志梗(远志)(611)	芽桔梗(桔梗)
.....(450)	(395)
远志棍(远志)(452)	芽香树木(沉香)
.....(450)	(250)
远志筒(远志)(312)	芷(白芷)
.....(450)	(10)
远秀卿(沉香)(33)	芮芝(灵芝)
.....(250)	(485)
玛它月印浩莫(卷柏)(33)	芮草根(何首乌)
.....(325)	(529)
芫青(青娘子)(33)	苋陆(商陆)
.....(386)	(156)
芫香(沉香)(272)	苋菜盘(商陆)
.....(250)	(156)
芫荽(胡荽)(272)	苋桥薄荷(薄荷)
.....(14)	(15)
芫蜻(青娘子)(372)	萸母(川贝母)
.....(386)	(405)
芫条花(芫花)(506)	花片(槟榔)
.....(152)	(307)
芫花叶白前(白前)(364)	花奴(木槿花)
.....(401)	(131)
美渠子(莲子)(579)	花红(山楂)

..... (298)	花升麻 (升麻) (26) (500)
花麦 (金荞麦) (103)	花龙骨 (龙骨) (444)	花鹿茸 (鹿茸) (498)
花青 (青黛) (72)	花尔石 (花蕊石) (333)	花商陆 (商陆) (156)
花房 (莲房) (579)	花血藤 (红藤) (93)	花斑毛 (斑蝥) (622)
花草 (通草) (219)	花壳虫 (斑蝥) (622)	花斑竹 (虎杖) (354)
花萆 (鹿茸) (498)	花園子 (麦门冬) (540)	花斑蝥 (斑蝥) (622)
花珀 (琥珀) (448)	花青皮 (青皮) (273)	花槟榔 (槟榔) (307)
花茶 (茶叶) (396)	花松萝 (松萝) (115)	花椒目 (椒目) (263)
花珠 (珍珠) (457)	(海风藤) (187)	花椒刺 (两面针) (109)
花倍 (五倍子) (568)	花罗虫 (斑蝥) (622)	花蛤壳 (海蛤壳) (411)
花粉 (天花粉) (35)	花乳石 (花蕊石) (338)	花榈木 (降香) (377)
花蛇 (白花蛇) (177)	花姑娘 (锦灯籠) (88)	花旗参 (人参) (478)
花婢 (柿蒂) (292)	花南星 (天南星) (390)	花王根皮 (牡丹皮) (60)
花蛤 (海蛤壳) (411)	花桃仁 (桃仁) (360)	花木蓝根 (山豆根) (82)
花大自 (槟榔) (307)	花蚬壳 (瓦楞子) (627)	花叶丁香 (丁香) (265)
花大鸡 (红娘子) (385)	花被单 (地锦草) (104)	花叶细辛 (细辛) (260)
花木瓜 (木瓜) (169)	花菖蒲 (射干) (81)	花心树皮 (苦棟皮) (306)
花木通 (木通) (218)	花梨木 (降香) (377)	花曲柳皮 (秦皮) (92)
花手绢 (地锦草) (104)	花鹿角 (鹿角) (586)	花拉子骨 (乌贼骨) (586)

花相根皮(牡丹皮)(11)	苏莫(苏木)
.....(60)	(378)
花鱼脑石(鱼脑石)(11)	苏夏(半夏)
.....(253)	(388)
花脸细辛(细辛)(11)	苏黄(芡实)
.....(260)	(581)
(山慈姑)		
.....(101)		
花椒地榆(地榆)(11)	苏土元(鹿虫)
.....(322)	(382)
芹(芹菜)(12)	苏子霜(苏子)
.....(472)	(424)
芹决(决明子)(503)	苏木红(土牛膝)
.....(465)	(386)
芡实米(芡实)(255)	苏贝母(浙贝母)
.....(581)	(407)
芪母(知母)(427)	苏方木(苏木)
.....(32)	(378)
芪菜巴巴子(冬葵子)(3)	苏龙胆(龙胆草)
.....(236)	(54)
芥子(白芥子)(540)	苏半夏(半夏)
.....(393)	(388)
芥穗(荆芥)(7)	苏合油(苏合香)
.....(6)	(475)
芥末子(白芥子)(378)	苏花藤(忍冬藤)
.....(393)	(66)
芥菜子(白芥子)(143)	苏芡实(芡实)
.....(393)	(581)
苍子(苍耳子)(595)	苏延胡(延胡索)
.....(11)	(344)
苍耳(苍耳草)(65)	苏杷叶(枇杷叶)
.....(12)	(427)
苍子棵(苍耳草)(4)	苏枋木(苏木)
.....(12)	(378)
苍耳仁(苍耳子)(378)	苏罗子(婆罗子)
.....(11)	(293)
苍刺头(苍耳子)(4)	苏败酱(败酱草)
	(94)
		苏枳壳(枳壳)

..... (276)	苡米(薏苡仁) (33)
苏铁蕨(贯众) (214)	芦莉花(玉竹)
..... (313)	苡仁米(薏苡仁) (546)
苏维黄(雄黄) (214)	芦柴根(芦根)
..... (595)	苡米仁(薏苡仁) (33)
苏雄黄(雄黄) (214)	芦茹根(芦根)
..... (595)	芳香(白芷) (33)
苏噜子(婆罗子) (10)	芦葱根(萱草根)
..... (293)	芳樟脑(樟脑) (248)
苏薄荷(薄荷) (621)	劳伟(芦荟)
..... (15)	芍子(芡实) (147)
苏藿香(藿香) (581)	竺根(竺麻根)
..... (202)	芦巴(葫芦巴) (321)
苏麝香(麝香) (506)	竺麻头(竺麻根)
..... (473)	芦石(钟乳石) (321)
苏门毛道(苏木) (270)	貢术(白术)
..... (378)	芦头(芦根) (489)
苏门犀角(犀角) (33)	貢仔(巴豆)
..... (57)	芦如(桔梗) (153)
苏木蓝根(山豆根) (395)	貢果(枸杞子)
..... (82)	芦莲(藜芦) (555)
苏北桃仁(桃仁) (592)	貢菊(菊花)
..... (360)	芦通(芦根) (21)
苏合香油(苏合香) (33)	貢潞(党参)
..... (475)	芦薺(刲寄奴) (482)
苏合香胶(苏合香) (351)	貢朱砂(朱砂)
..... (475)	芦巴子(葫芦巴) (441)
苏铁脚贯众(贯众) (506)	赤土(代赭石)
..... (313)	芦竹根(芦根) (460)
苏州茉莉花茶(茶叶) (33)	赤木(苏木)
..... (396)	芦芽根(芦根) (378)
苏门答腊安息香(安息香) (33)	赤丹(朱砂)
..... (476)	芦苇根(芦根) (441)
芤白(蕊白) (33)	赤节(萆薢)
..... (14)	芦茅根(芦根) (226)
苡仁(薏苡仁) (33)	赤术(苍术)
..... (214)	芦草根(芦根) (198)

赤芝(灵芝)(111)	赤波藤(乌蔹莓)
赤朴(厚朴)(485)	赤散(何首乌)
赤网(菟丝子)(200)	赤符(赤石脂)
赤虫(地龙)(517)	赤葛(乌蔹莓)
赤苏(紫苏)(469)	赤箭(天麻)
赤豆(赤小豆)(3)	赤丹参(丹参)
赤鸡(槐耳)(231)	赤爪子(山楂)
赤苓(茯苓)(328)	赤爪实(山楂)
赤汞(水银)(210)	赤石土(赤石脂)
赤杨(柽柳)(597)	赤石英(紫石英)
赤果(榧子)(15)	赤芍药(赤芍)
赤参(丹参)(312)	赤地榆(地榆)
赤药(红药子)(349)	赤孙施(酢浆草)
赤柳(柽柳)(131)	赤莞花(莞花)
赤柽(柽柳)(15)	赤苏子(苏子)
赤砂(硇砂)(424)	赤苏叶(苏叶)
赤须(灯心草)(602)	赤沙藤(红藤)
赤胶(紫草茸)(235)	赤枣子(山楂)
赤眼(爵床)(134)	赤油桂(肉桂)
(257)	
		赤波藤(乌蔹莓)
		赤茯苓(茯苓)
		赤柽柳(柽柳)
		赤首乌(何首乌)
		赤铁矿(代赭石)
		赤鹿茸(鹿茸)
		赤葛根(何首乌)
		赤棠棣(柿蒂)
		赤蕨头(贯众)
		赤赭石(代赭石)
		赤箭芝(天麻)
		赤箭脂(天麻)
		赤边水蛭(水蛭)
		赤足蜈蚣(蜈蚣)
		赤锋苍术(苍术)
		赤箭天麻(天麻)
		赤色硫化汞(银朱)
		赤茎威灵仙(威灵仙)
		赤眼老母草(爵床)

汞(水银)	却蝉草根(丹参)	杏李仁(郁李仁)
.....(597)(349)(149)
汞砂(朱砂)	坝芎(川芎)	杏核仁(杏仁)
.....(441)(343)(418)
汞粉(轻粉)	坝川芎(川芎)	杏核仁(杏仁)
.....(598)(343)(418)
壳砂(砂仁)	坎子(杏仁)	杏梅仁(杏仁)
.....(204)(418)(418)
壳蔻(白豆蔻)	坎板(龟板)	杏叶沙参(沙参)
.....(206)(563)(535)
壳木鳖(木鳖子)	均姜(干姜)	李仁(郁李仁)
.....(616)(256)(149)
壳米仁(薏苡仁)	均青皮(青皮)	李仁肉(郁李仁)
.....(214)(273)(149)
壳砂仁(砂仁)	块黄(大黄)	杆升麻(升麻)
.....(204)(143)(26)
壳君子(使君子)	块秋石(秋石)	杜白(全蝎)
.....(305)(46)(466)
壳使君(使君子)	块滑石(滑石)	杜瓜(瓜蒌)
.....(304)(217)(404)
壳莲子(莲子)	块状虫胶(紫草茸)	杜兰(石斛)
.....(576)(131)(543)
忘肉(远志)	块根赤芍(赤芍)	杜芎(川芎)
.....(450)(62)(343)
志取(沙参)	块根老鹳草(老鹳草)	杜莞(茺花)
.....(535)(185)(152)
孝梗(知母)	广龙胆(龙胆草)	杜伯(全蝎)
.....(32)(54)(466)
却老子(枸杞子)	广桑皮(桑皮)	杜表(木鳖子)
.....(555)(425)(616)
却老根(地骨皮)	杏仁(杏仁)	杜狗(蝼蛄)
.....(139)(418)(251)
却暑子(枸杞子)	杏子(杏仁)	杜衡(细辛)
.....(555)(418)(260)
却暑根(地骨皮)	杏仁泥(杏仁)	杜大力(牛蒡子)
.....(139)(418)(56)
	杏仁霜(杏仁)	

杜牛夕(土牛膝)(578)	杨枝鱼(海龙)(523)
杜牛膝(土牛膝)(366)	杨柳叶(柳叶)(113)
杜瓜子(瓜蒌子)(434)	杨柳条(柳枝)(113)
杜瓜仁(瓜蒌子)(431)	杨柳枝(柳枝)(113)
杜百合(百合)(550)	杨柳根(柳根)(114)
杜杞子(枸杞子)(555)	杨柳须(柳根)(114)
杜网草(鹅不食草)(193)	杨枹箭(白术)(489)
杜仲藤(杜仲)(507)	杨树草(金沸草)(400)
杜红花(红花)(361)	杨梅草(水蜈蚣)(247)
杜苏子(苏子)(424)	杨柳根须(柳根)(114)
杜豆豉(淡豆豉)(18)	杨树草花(旋复花)(399)
杜赤豆(赤小豆)(231)	更生(茯苓)(210)
杜灵仙(威灵仙)(162)	豆叩(肉豆蔻)(573)
杜河车(紫河车)(516)	(白豆蔻)(206)
杜枸杞(枸杞子)(555)	豆贲(巴豆)(153)
杜茯苓(茯苓)(210)	豆卷(大豆黄卷)(19)
杜春花(辛夷)(13)	豆砂(朱砂)(441)
杜虹花(紫珠)(320)	豆豉(淡豆豉)(18)
杜莲须(莲须)(413)	豆蔻(草豆蔻)	

..... (208)	豆蔻仁(白豆蔻) (48)
(肉豆蔻)	(206)	丽江麻黄(麻黄)
(573)	豆蔻皮(白豆蔻)	(1)
(白豆蔻)	(206)	豕苓(猪苓)
(206)	豆蔻衣(豆蔻壳)	(212)
豆蔻(大豆黄卷)	(206)	豕胆(猪胆汁)
(19)	豆蔻壳(白豆蔻)	(417)
豆叩仁(白豆蔻)	(206)	豕椒(两面针)
(白豆蔻)	豆瓣砂(朱砂)	(109)
豆叩皮(白豆蔻)	(441)	豕零(猪苓)
(206)	克草(鬼羽箭)	(212)
豆叩壳(豆蔻壳)	(129)	豕橐(猪苓)
(206)	克香(没药)	(212)
(白豆蔻)	(376)	豕胆汁(猪胆汁)
(206)	克氏海马(海马)	(417)
豆须子(菟丝子)	(522)	歼疟草(瓜子金)
(517)	孛孛丁(蒲公英)	(437)
豆黄卷(大豆黄卷)	(68)	还阳草(卷柏)
(19)	孛孛丁菜(蒲公英)	(325)
豆豉草(败酱草)	(68)	还阳藤(枳椇子)
(94)	两头尖(乌头)	(560)
豆豉姜(革澄茄)	(255)	还魂草(卷柏)
(264)	两头粘(茅莓)	(325)
豆渣草(狼把草)	(127)	还瞳子(决明子)
(111)	两边针(两面针)	(465)
(败酱草)	(109)	还元大品(熟地黄)
(94)	两背针(两面针)	(528)
豆寄生(菟丝子)	(109)	医草(艾叶)
(517)	丽参(人参)	(338)
豆槐花(槐花)	(478)	医马草(车前草)
(327)	丽草(玉竹)	(216)
豆槐角(槐角)	(546)	医用蛭(水蛭)
(329)	丽枝核(荔枝核)	(383)
豆槐枝(槐枝)	(287)	医马草子(车前子)
(328)	丽珠肉(龙眼肉)	(215)
豆槐实(槐角)	(534)	医用水蛭(水蛭)
(329)	丽江黄芩(黄芩)	(383)

连(连翹)(248)	折骨草(络石藤)
.....(67)	(186)
连及(白及)(225)	抓肿消(商陆)
.....(330)	(金钱草)(156)
连召(连翹)(221)	抓钩草(老鹳草)
.....(67)	(185)
连母(知母)(67)	抛搘(金银花)
.....(32)	(65)
连乔(连翹)(67)	把儿英(蒲公英)
.....(67)	(68)
连竹(玉竹)(67)	把甘草(甘草)
.....(546)	(493)
连壳(连翹)(540)	扭兰(绶草)
.....(67)	(124)
连饭(上茯苓)(501)	拟海龙(海龙)
.....(79)	(523)
连草(连翹)(325)	拟天南星(天南星)
.....(67)	(390)
连轺(连翹)(343)	拟覆盆子(覆盆子)
.....(67)	(585)
连翹(王不留行)(343)	护生草(荠菜)
.....(367)	(319)
连及草(白及)(448)	护羌使者(羌活)
.....(330)	(9)
连丹皮(牡丹皮)(509)	护房树花(槐花)
.....(60)	(327)
连皮苓(茯苓)(509)	护房树枝(槐枝)
.....(210)	(328)
连召心(连翹)(186)	护房树实(槐角)
.....(67)	(329)
连地稗(鵝不食草)(157)	来丸(雷丸)
.....(196)	(310)
连虫陆(羊蹄)(611)	来莓草(葎草)
.....(340)	(243)
连壳砂(砂仁)(507)	坚蚕(地龙)
.....(204)	(469)
连珠炮(萱草根)(67)	坚龙胆(龙胆草)

坚草根(白茅根)	旱莲子(喜树)	吴萸黄连(黄连)
.....(54)(117)(50)
园参(人参)	(墨旱莲)	呆磁石(磁石)
.....(478)(562)(442)
园荽(胡荽)	旱莲木(喜树)	串山龙(穿山龙)
.....(14)(117)(371)
园麻根(蕓麻根)	旱莲草(墨旱莲)	吟蛩(蟋蟀)
.....(321)(562)(251)
囫囵杏仁(杏仁)	(佩兰)	吹风散(青风藤)
.....(418)(203)(188)
里牛(蜗牛)	旱麦瓶草(银柴胡)	(乌药)
.....(116)(140)(283)
里梅花(木槿花)	旱珍珠子(急性子)	吹血草(半边莲)
.....(131)(358)(78)
旱芹(芹菜)	旱珍珠花(凤仙花)	别甲(鳖甲)
.....(472)(357)(564)
旱草(刺蒺藜)	旱黄铂银(白蔹)	别仙踪(徐长卿)
.....(463)(98)(170)
旱荷(鬼臼)	旱铜钱草(天葵)	别直参(人参)
.....(45)(122)(478)
旱莲(喜树)	吳子(吳茱萸)	別南根(了哥王)
.....(117)(258)(110)
旱葱(藜芦)	吳公(蜈蚣)	兜角(犀角)
.....(592)(467)(57)
旱三七(三七)	吳芋(吳茱萸)	岗松(地肤子)
.....(333)(258)(229)
旱木贼(木贼)	吳蚣(蜈蚣)	岗梅(烏梅)
.....(28)(467)(566)
旱禾花(雷公藤)	吳萸(吳茱萸)	岑皮(秦皮)
.....(610)(258)(92)
旱芹菜(芹菜)	吳子子(吳茱萸)	岑草(鱼腥草)
.....(472)(258)(80)
旱连子(连翘)	吳萸子(吳茱萸)	岑茎根(苦参)
.....(67)(258)(55)
旱珍珠(凤仙草)	吳蕊蕘(薄荷)	肖菝葜(土茯苓)
.....(357)(15)(79)
	吳牡丹皮(牡丹皮)	

牡力(牡蛎)(460)	乱发炭(血余炭)(332)
牡历(牡蛎)(456)	乱头发(海金沙藤)(224)
牡丹(牡丹皮)(60)	乱尾凤(佩兰)(203)
牡荆(黄荆)(438)	乱银丝(杜仲)(507)
牡桂(肉桂)(257)	佐模兴(苏木)(378)
牡蛤(牡蛎)(456)	伸筋草(过江龙)(197)
牡蒿(青蒿)(136)	伸筋藤(黄藤)(243)
(柴胡)(24)	伸头草根(何首乌)(529)
牡蛎壳(牡蛎)(456)	伯芹(贯众)(313)
牡丹根皮(牡丹皮)(60)	伯药(贯众)(313)
牡狗阴茎(黄狗肾)(520)	泊藻(贯众)(313)
针包草(狼把草)(111)	低云(犀角)(57)
针尾凤(佩兰)(203)	低密(犀角)(57)
针线包(狼把草)(111)	低山企边桂(肉桂)(257)
针乌贼骨(乌贼骨)(586)	佛手(香橼)(278)
钉皮(海桐皮)(179)	佛耳(苍耳草)(12)
钉桐皮(海桐皮)(179)	佛柑(佛手)(277)
钉赭石(代赭石)(460)	佛座(莲房)(579)
钉头赭石(代赭石)(460)	佛手草(卷柏)

.....(325)	佛手柑花(佛手花)(390)
佛手柑(佛手).....(277)	佛手香橼(佛手)	返魂草根(紫莞).....(421)
佛手桔(佛手).....(277)	佛手桔花(佛手花)	肝黄(牛黄).....(74)
佛手根(高良姜).....(266)	佛手橘花(佛手花)	肝牛黄(牛黃).....(74)
佛手橘(佛手).....(277)	伽罗(沉香)	肝火草(爵床).....(111)
佛甲草(半支莲).....(118)	伽南沉(沉香)	肝色芦荟(芦荟).....(147)
佛兰参(西洋参).....(481)	伽楠香(沉香)	肚倍(五倍子).....(565)
佛耳草(虎耳草).....(123)	邱葵子(冬葵子)	肚子银花(金银花).....(65)
佛顶珠(谷精草).....(39)	皂丁(皂角刺)	肚里屏风(艾叶).....(333)
佛顶珠(喉咙草).....(86)	皂针(皂角刺)	龟甲(龟板).....(563)
佛柑花(佛手花).....(278)	皂角(皂莢).....(393)	龟壳(龟板).....(563)
佛指甲(白果).....(430)	皂刺(皂角刺).....(394)	龟版(龟板).....(563)
(垂盆草).....(79)	皂角针(皂角刺).....(394)	龟胶(龟板).....(563)
(百合).....(550)	皂莢豆(刀豆).....(291)	龟筒(龟板).....(563)
(佛甲草).....(119)	皂莢刺(皂角刺).....(394)	龟下甲(龟板).....(563)
(农吉利).....(120)	皂莢矾(皂矾).....(603)	龟甲胶(龟板).....(563)
佛指柑(白果).....(430)	近江牡蛎(牡蛎).....(456)	龟板胶(龟板).....(563)
佛袈裟(紫河车).....(516)	近邻槲蕨(骨碎补).....(510)	龟板膏(龟板).....(563)
佛掌薯(山药).....(490)	近缘天南星(天南星).....(413)	龟鱼茜(海藻).....(413)

龟底甲(龟板)(530)	条叶龙胆(龙胆草)
.....(563)	(透骨草)(54)
龟腹甲(龟板)(183)	灸草(艾叶)
.....(563)	鳩酸草(酢浆草)(338)
龟背玄精石(玄精石)(241)	卵葵(芡实)
.....(47)	迎春(辛夷)(581)
角针(皂角刺)(53)	卵叶芍药(赤芍)
.....(394)	迎山红(满山红)(62)
角沉(沉香)(432)	卵叶远志(远志)
.....(285)	迎春花(辛夷)(450)
角参(玄参)(13)	(瓜子金)
.....(59)	迎阳花子(向日葵子)(437)
角倍(五倍子)(554)	卵叶赤芍(赤芍)
.....(568)	迎阳花托(向日葵花托)(62)
角蒿(藏角蒿)(237)	卵状赭石(代赭石)
.....(530)	系系叶(虎耳草)(460)
(透骨草)(123)	卵叶娃儿藤(白薇)
.....(183)	条芩(黄芩)(138)
角因陈(刘寄奴)(43)	卵叶鹿蹄草(鹿衔草)
.....(531)	条羌(羌活)(370)
角针片(皂角刺)(9)	独尾根(黄芩)
.....(394)	条参(人参)(48)
角刺茶(苦丁茶)(478)	狄砂(硇砂)
.....(43)	条参(沙参)(602)
角茵陈(茵陈蒿)(535)	狄盐(硇砂)
.....(228)	条党(党参)(602)
角树子(楮实)(482)	饴惶(饴糖)
.....(559)	条桂(肉桂)(496)
角蒿子(藏角蒿)(257)	饭瓜(南瓜)
.....(530)	条丹皮(丹皮)(308)
角蒿根(藏角蒿)(60)	饭巴铎(藜蕡)
.....(530)	条沙参(沙参)(227)
角角天麻(天麻)(535)	饭瓜子(南瓜子)
.....(462)	条党参(党参)(309)
角状蒲公英(蒲公英)(482)	饭团根(土茯苓)
.....(68)	条黄芩(黄芩)(79)
角蒿透骨草(藏角蒿)(48)	饭赤豆(赤小豆)

饭匙草(车前草)	君山银针(茶叶)	灵脂块(五灵脂)
.....(216)(396)(380)
饭匙草子(车前子)	灵仙(威灵仙)	灵磁石(磁石)
.....(215)(162)(442)
饭锹头草(芥菜)	灵药(升药)	灵台冬花(款冬花)
.....(319)(599)(423)
余粮(禹余粮)	灵砂(朱砂)	屁巴虫(九香虫)
.....(575)(441)(296)
余容根(白芍)	(银朱)	屁板虫(九香虫)
.....(531)(597)(296)
余粮石(禹余粮)	灵脂(五灵脂)	尾连(黄连)
.....(575)(380)(50)
余甘树皮(紫荆皮)	灵通(甘草)	尾参(玉竹)
.....(114)(493)(546)
余甘子树皮(紫荆皮)	灵眼(白果)	尾膝(夕)(土牛膝)
.....(114)(430)(366)
含桃核(樱桃核)	灵液(水银)	尿垢(人中白)
.....(29)(597)(48)
含珠草(铁苋菜)	灵仙板(威灵仙)	尿积(人中白)
.....(241)(162)(48)
希仙(豨莶草)	灵仙藤(威灵仙)	尿渍(人中白)
.....(167)(162)(48)
希灰(石灰)	灵芝草(灵芝)	尿睑(人中白)
.....(607)(485)(48)
坐罗(金果榄)	灵羊角(羚羊角)	尿碱(人中白)
.....(84)(454)(48)
君子(使君子)	灵龟板(龟板)	尿霜(人中白)
.....(305)(563)(48)
君石(胆矾)	灵茵陈(刻寄奴)	尿干子(人中白)
.....(591)(351)(48)
君子仁(使君子)	灵茵陈(茵陈蒿)	尿珠子(薏苡仁)
.....(305)(228)(214)
君子肉(使君子)	灵香草(零陵香)	尿囊垢(人中白)
.....(305)(209)(48)
君魂子(白及)	灵香蒿(零陵香)	尿唧唧(桑螵蛸)
.....(330)(209)(584)
	灵脂米(五灵脂)	

尿盐白(人中白)(572)	陈小麦(小麦)
.....(48)	阿如热(诃子)(569)
尿塘珠(薏苡仁)(572)	陈广皮(橘皮)
.....(214)	阿芙蓉(鸦片)(271)
尿端子(薏苡仁)(440)	陈木瓜(木瓜)
.....(214)	阿根八(落新妇)(169)
尿塘草子(薏苡仁)(30)	陈艾叶(艾叶)
.....(214)	阿胶珠(阿胶)(338)
即子(乌头)(532)	陈芫花(芫花)
.....(255)	阿木阿拉(卷柏)(152)
即藜(刺蒺藜)(325)	陈佛手(佛手)
.....(463)	阿罗汉草(狗尾草)(277)
张国老(商陆)(42)	陈刺波(茅莓)
.....(156)	阿梨诃哖(荜茇)(127)
张果老(商陆)(263)	陈枳壳(枳壳)
.....(156)	阿尔泰紫菀(紫菀)(276)
陆拔(花椒)(421)	陈枳实(枳实)
.....(263)	阿克苏黄芪(黄芪)(275)
陆谷须(玉米须)(486)	陈知泊(何首乌)
.....(239)	阿拉伯绶贝(紫贝齿)(529)
陆拔目(椒目)(459)	陈柑皮(橘皮)
.....(263)	阿拉善地榆(地榆)(271)
陆虎遗生(虎骨)(322)	陈南星(天南星)
.....(175)	阿尔泰狗哇花(紫菀)(390)
阿玉(鱼胆草)(421)	陈香薷(香薷)
.....(80)	阿尔泰银莲花(石菖蒲)(5)
阿片(鸦片)(477)	陈香橼(香橼)
.....(440)	阿拉塔蒙根其其格(金(278)
阿驵(无花果)	银花).....(65)	陈神曲(神曲)
.....(88)	陈皮(橘皮)(300)
阿驿(无花果)(271)	陈桔皮(橘皮)
.....(88)	陈曲(神曲)(271)
阿及艾(艾叶)(300)	陈葫芦(葫芦)
.....(338)	陈茵(茵陈蒿)(231)
阿皮卡(川贝母)(228)	陈棕皮(棕榈皮)
.....(405)	陈棕(棕榈皮)(331)
阿迦拉(诃子)(331)	陈槐米(槐花)

陈橘皮(橘皮)	纯蜡(蜂蜡)	驴儿草(金沸草)
.....(271)(625)(400)
陈极香橼(香橼)	纯卢子(枸杞子)	驴儿菜(金沸草)
.....(278)(555)(400)
陈莲蓬壳(莲房)	纯卢根(地骨皮)	驴扎嘴(大蓟)
.....(579)(139)(316)
陈槐花米(槐花)	纯阳菜(马齿苋)	驴皮胶(阿胶)
.....(327)(89)(532)
附支(木通)	纯幽子(吴茱萸)	驴断肠(透骨草)
.....(218)(258)(183)
附米(杏附)	缠叶决明(决明子)	驴儿草花(旋复花)
.....(232)(465)(399)
附块(附子)	纳子(槟榔)	驴儿菜花(旋复花)
.....(254)(307)(399)
附蚓(地龙)	纸肉(木蝴蝶)	驴耳朵花(旋复花)
.....(469)(436)(399)
附瓣(附子)	(补骨脂)	驴耳朵菜(车前草)
.....(254)(512)(216)
附子瓣(附子)	纸蜂房(露蜂房)	驴耳朵花根(紫菀)
.....(254)(624)(63)
陀僧(密陀僧)	纸背金牛草(鹿衔草)	驴耳朵菜子(车前子)
.....(605)(370)(216)
陀螺艾(益母草)	纶布(昆布)	驴粪蛋子花(漏芦)
.....(355)(414)(100)
忍冬(忍冬藤)	纵蓉(肉苁蓉)	劲直蒿(茵陈蒿)
.....(66)(503)(228)
忍冬花(金银花)	纺车藤(海金沙藤)	鸡头(芡实)
.....(65)(224)(581)
忍陵根(麦门冬)	纹党(党参)	鸡苏(薄荷)
.....(540)(482)(15)
忍冬草根(麦门冬)	纹秦艽(秦艽)	鸡足(山茱萸)
.....(540)(166)(582)
妒妇(黄芩)	纻根(苎麻根)	鸡毒(乌头)
.....(48)(321)(255)
努间努碾(金银花)	驱蛔虫草(零陵香)	鸡胆(猪胆汁)
.....(65)(209)(417)
	驳节茶(草珊瑚)	

鸡姜(骨碎补)(560)	鸡舌草(垂盆草)(79)
.....(510)		(鸭跖草)(38)
鸡格(黄精)(547)	鸡多囊(天麻)(462)
.....(581)		鸡忙头(了哥王)(110)
鸡痈(芡实)(581)	鸡肝根(菝葜)(227)
.....(122)		鸡肚子(鸡内金)(303)
鸡腿(天葵)(453)	鸡角枪(鸡冠花)(327)
.....(110)		鸡卵子(胡颓子)(304)
鸡瘤(榆钱)(453)	鸡针皮(鸡内金)(303)
.....(560)		鸡屎草(蜀漆)(591)
鸡子麻(了哥王)(110)	鸡林参(人参)(478)
.....(560)		鸡枫果(路路通)(369)
鸡巨子(枳椇子)(560)	鸡拍翅(瓜子金)(437)
.....(303)		鸡肾菌(马勃)(83)
鸡内筋(鸡内金)(303)	鸡肫子(鸡内金)(303)
.....(303)		鸡肫皮(鸡内金)(303)
鸡公花(鸡冠花)(327)	鸡肠风(巴戟天)(501)
.....(560)		鸡肠朴(厚朴)(200)
鸡爪子(枳椇子)(560)	鸡肠草(鹅不食草)	
.....(543)			
鸡爪兰(石斛)(543)		
.....(50)			
鸡爪连(黄连)(50)		
.....(329)			
鸡爪沙(仙鹤草)(560)		
.....(560)			
鸡爪果(枳椇子)(560)		
.....(56)			
鸡爪参(翻白草)(56)		
.....(91)			
鸡爪草(委陵菜)(477)		
.....(477)			
鸡爪莲(石菖蒲)(477)		
.....(477)			
鸡爪梨(枳椇子)(477)		
.....(477)			

.....(196)	鸡冠子(青葙子).....(41)(329)
鸡肚腔(鸡内金).....(303)	鸡冠石(雄黄).....(595)	鸡脚骨(六月雪).....(246)
鸡姆刺(大薊).....(316)	鸡冠头(鸡冠花).....(327)	鸡脚菜(芥菜).....(319)
鸡虱草(鱼腥草).....(80)	鸡冠果(蛇莓).....(128)	鸡脚藤(海金沙藤).....(224)
(黄花蒿).....(197)	鸡冠菜(鸭跖草).....(38)	鸡肏壳(鸡内金).....(303)
鸡栖子(皂莢).....(393)	鸡眼草(金钱草).....(221)	鸡颈草(大薊).....(316)
鸡骨风(常山).....(590)	(萹蓄).....(233)	鸡断肠(了哥王).....(110)
鸡骨头(穿山龙).....(371)	鸡胶莽(海金沙藤).....(224)	鸡距子(枳椇子).....(560)
鸡骨香(草珊瑚).....(108)	鸡胶骨(牛膝).....(365)	鸡距草(翻白草).....(56)
鸡骨香(沉香).....(285)	鸡脐根(葛根).....(23)	鸡蛋衣(凤凰衣).....(561)
(佩兰).....(203)	鸡桑叶(桑叶).....(19)	鸡蛋膜(凤凰衣).....(561)
鸡骨柴(六月雪).....(246)	鸡黄皮(鸡内金).....(303)	鸡腿儿(翻白草).....(56)
鸡骨癀(土牛膝).....(366)	鸡掇鼻(土牛膝).....(366)	鸡腿子(翻白草).....(56)
鸡胃皮(鸡内金).....(303)	鸡脚爪(翻白草).....(56)	鸡腿艽(秦艽).....(166)
鸡食皮(鸡内金).....(303)	(枳椇子).....(560)	鸡腿根(翻白草).....(56)
鸡胗皮(鸡内金).....(303)	鸡脚刺(大薊).....(316)	鸡腿藤(杜仲).....(570)
鸡屎草(蜀漆).....(591)	鸡脚草(风尾草).....(244)	鸡腰参(珠子参).....(537)
鸡屎皮(鸡内金).....(303)	(翻白草).....(56)	鸡臊子(鸡内金).....(303)
鸡屎菜(大青叶).....(70)	(仙鹤草)	鸡膝风(草珊瑚).....(108)

鸡橘子(枳椇子)(327)	鸡脚风根皮(五加皮)
.....(560)	(173)
鸡嘴莲(芡实)(41)	鸡蛋壳内衣(凤凰衣)
.....(581)	(561)
鸡鬚花(鸡冠花)(478)	鸡蛋壳内膜(凤凰衣)
.....(327)	(561)
鸡儿苦蕨(子弟王)(94)	鸡膀鱗毛蕨(贯众)
.....(110)	(313)
鸡儿梗衣(车前草)(179)	鸡肫胫里黄皮(鸡内金)
.....(216)	(303)
鸡子白皮(凤凰衣)(501)	辛一(辛夷)
.....(561)	(13)
鸡爪大黄(大黄)(340)	辛荑(辛夷)
.....(143)	(13)
鸡心白附(白附子)(560)	辛矧(辛夷)
.....(392)	(13)
鸡血李仁(郁李仁)(560)	辛夷苞(辛夷)
.....(149)	(13)
鸡爪沙芽(鹤草芽)(402)	辛夷花(辛夷)
.....(309)	(13)
鸡爪枫果(路路通)(561)	辛夷桃(辛夷)
.....(269)	(13)
鸡爪树子(枳椇子)(26)	辛拿叶(番泻叶)
.....(560)	(147)
鸡爪黄连(黄连)(40)	库莼(黄芪)
.....(50)	(486)
鸡心槟榔(槟榔)(246)	库伦莼(黄芪)
.....(307)	(486)
鸡母卵子(金樱子)(590)	库黄芪(黄芪)
.....(583)	(486)
鸡头黄精(黄精)(92)	库页白芷(白芷)
.....(547)	(10)
鸡冠花子(青葙子)(543)	岸伦黄芪(黄芪)
.....(41)	(486)
鸡冠苋子(青葙子)(561)	库鞠恣托(水蜈蚣)
.....(41)	(247)
鸡冠苋花(鸡冠花)(303)	库拉索芦荟(芦荟)

.....(147)	怀超(山药)(340)
庐山朴(厚朴)(490)	灶心黄土(伏龙肝)
.....(200)(340)(340)
庐山石韦(石韦)(365)	灶突中尘(百草霜)
.....(223)(332)(332)
庐山厚朴(厚朴)(490)	灶额上墨(百草霜)
.....(200)(332)(332)
庐山云雾茶(茶叶)(365)	谷老(糠谷老)
.....(396)(238)(238)
序梗女贞(苦丁茶)(365)	谷香(小茴香)
.....(43)(267)(267)
应春花(辛夷)(58)	谷实(楮实)
.....(13)(559)(559)
疗毒草(紫花地丁)(58)	谷菜(蜀羊泉)
.....(69)(86)(86)
疗疮草(苍耳草)(361)	谷蘖(谷芽)
.....(12)(302)(302)
疗疮药(蛇莓)(512)	谷木果(楮实)
.....(128)(559)(559)
疗愁根(萱草根)(21)	谷茴香(小茴香)
.....(248)(267)(267)
弃杖草(淫羊藿)(65)	谷树子(楮实)
.....(505)(559)(559)
忘忧草根(萱草根)(58)	谷莠子(狗尾草)
.....(248)(42)(42)
闷头花(狼毒)(332)	谷桑子(楮实)
.....(159)(559)(559)
(芫花)(340)	谷桑果(楮实)
.....(152)(559)(559)
闹陀罗花(洋金花)(340)	谷精珠(谷精草)
.....(439)(39)(39)
怀山(山药)(332)	谷茬细辛(徐长卿)
.....(490)(170)(170)
怀夕(牛膝)(332)	谷浆树果(楮实)
.....(365)(559)(559)
怀菊(菊花)(332)	良枣(大枣)
.....(21)(495)(495)
灶中黄土(伏龙肝)		

良姜(高良姜)(9)	汪石子(半夏)
.....(266)	(388)
良姜子(红豆蔻)(135)	沐猴枣(猴枣)
.....(267)	(447)
良姜片(高良姜)(9)	沥青(松香)
.....(266)	(618)
良枣树皮(枣树皮)(516)	沙姜(山柰)
.....(496)	(270)
诃黎(诃子)(172)	沙蜜(蜂蜜)
.....(572)	(497)
诃子皮(诃子)(246)	沙飞草(鵝不食草)
.....(572)	(196)
诃子肉(诃子)(557)	沙参儿(银柴胡)
.....(572)	(140)
诃黎勒(诃子)(217)	沙茴香(前胡)
.....(572)	(402)
诃子幼果(藏青果)(81)	沙塔干(水蛭)
.....(85)	(383)
识美(沙参)(81)	沙蒺藜(沙苑子)
.....(535)	(518)
补阴丹(胡颓子)(227)	沙蒺藜(沙苑子)
.....(304)	(518)
补骨脂(补骨脂)(294)	沙罐草(铁苋菜)
.....(512)	(241)
初生茸(鹿茸)(227)	沙麝香(麝香)
.....(498)	(土茯苓)(473)
初生茸角(鹿茸)(79)	沙纸树果(楮实)
.....(498)	(559)
宋半夏(半夏)(79)	沙苑吉利(沙苑子)
.....(388)	(518)
宋制半夏(半夏)(504)	沙苑蒺藜(沙苑子)
.....(388)	(518)
穷膜作车(车前草)(313)	沙油菜根(桔梗)
.....(216)	(395)
羌七(莪术)(147)	沙茜秧根(茜草)
.....(347)	(335)
羌青(羌活)(229)	沙梨寄生(桑寄生)

.....	(172)
沙头老鹳草(老鹳草)(185)
沙苑白蒺藜(沙苑子)(518)
沙苑吉利子(沙苑子)(518)
沙苑蒺藜子(沙苑子)(518)
沃德印地(苏木)(378)
沟子米(薏苡仁)(214)
沟谷刺(菝葜)(227)
没石子(没食子)(588)
没多僧(密陀僧)(605)
没实子(没食子)(588)
没药珠(没药)(376)
没骨花根(白芍)(531)
汝元党(党参)(482)
汝当归(当归)(526)
汝元党参(党参)(482)
汝州当归(当归)(526)
沉花(青黛)(72)
沉水香(沉香)(285)

沉香木(沉香)(285)
【八画】	
青子(橄榄)(558)
青屯(青风藤)(188)
青贝(川贝母)(405)
青术(苍术)(198)
青仔(槟榔)(307)
青虫(青娘子)(386)
青壳(连翘)(67)
青矾(皂矾)(608)
青果(橄榄)(558)
青桂(沉香)(285)
青莞(紫菀)(421)
青盐(戎盐)(135)
青娘(青娘子)(386)
青菀(紫菀)(421)
青萍(浮萍)(27)
青葙(青葙子)(41)
青蛇(乌梢蛇)	
.....(187)	
青粘(玉竹)(546)
青翹(连翹)(67)
青椑(柿蒂)(292)
青梅(乌梅)(106)
青堤(麦门冬)(540)
青椒(花椒)(263)
青蛤(海蛤壳)(411)
青裳(合欢皮)(452)
青蕨(凤尾草)(244)
青藤(青风藤)(188)
青大将(乌梢蛇)(187)
青小豆(绿豆)(106)
青木香(木香)(280)
青贝母(川贝母)(405)
青水胆(打破碗花花)(316)
青毛茸(鹿茸)(498)
青风屯(青风藤)(188)
青风藤(巴戟天)(501)

青半胆(山慈姑)(424)	青洋参(何首乌)(529)
.....(101)		青洋参(白薇)(98)
(金果榄)(4)	青桂香(沉香)(285)
.....(84)		青娘虫(青娘子)(386)
青石藤(筋骨草)(67)	青萎藤(海风藤)(187)
.....(105)		青梢蛇(乌梢蛇)(187)
青龙衣(蛇蜕)(263)	青蛇子(莲子)(576)
.....(17)		青麻子(苘麻子)(46)
青龙齿(龙齿)(445)	青麻根(蕁麻根)(321)
.....(444)		青蛤壳(海蛤壳)(411)
青龙须(柳根)(318)	青蛤粉(青黛)(72)
.....(114)		青蓝根(板蓝根)(71)
青龙胆(万年青)(316)	青藤香(防己)(164)
.....(245)	(青木香)(288)
青龙梗(千里光)(192)(巴戟天)(501)
.....(44)		青藤根(白药子)(132)
青甲子(草珊瑚)(618)	青礞石(礞石)(412)
.....(108)		青橄榄(橄榄)(558)
青皮子(青皮)(318)	青橘皮(青皮)	
.....(273)			
青皮片(青皮)(417)		
.....(273)			
青瓜蒂(瓜蒂)(70)		
.....(589)			
青竹标(骨碎补)(498)		
.....(510)			
青竹茹(竹茹)(273)		
.....(409)			
青竹香(乌药)(273)		
.....(283)			
青防已(青风藤)(401)		
.....(188)			
青防风(防风)(72)		
.....(7)			
青羊角(山羊角)(5)		
.....(455)			
青苏子(苏子)(288)	青橘皮(青皮)	

青檀香(防己)	青种薄荷(薄荷)	苦豆(葫芦巴)
.....(164) (巴戟天)(15)(506)
.....(154)	青盐半夏(半夏)	苦杖(虎杖)
青黛粉(青黛)(388)(354)
.....(72)	青榔木皮(秦皮)	苦苣(败酱草)
青木香藤(天仙藤)(98)	苦茄(蜀羊泉)
.....(190)	青礞朱砂(朱砂)(86)
青毛鹿茸(鹿茸)(441)	苦实(马钱子)
.....(498)	青山安息香(安息香)(613)
青化龙骨(龙骨)(476)	苦草(益母草)
.....(441)	青天白地根(委陵菜)(355)
青风藤根(防己)(91)	(穿心莲)
.....(164)	青丝柳根须(柳根)(73)
青丝柳叶(柳叶)(114)	(筋骨草)
.....(113)	青海骨碎补(骨碎补)(105)
青丝柳枝(柳枝)(510)	苦骨(苦参)
.....(113)	武吉(娑罗子)(55)
青丝柳须(柳根)(293)	苦泽(甘遂)
.....(114)	武川芪(黄芪)(151)
青丝柳根(柳根)(436)	苦荼(茶叶)
.....(114)	武夷岩(茶叶)(396)
青耳环草(鸭跖草)(396)	苦耽(锦灯笼)
.....(38)	武威花(凌霄花)(88)
青州楂片(山楂)(364)	苦斋(败酱草)
.....(298)	环钗(石斛)(94)
青花龙骨(龙骨)(543)	苦菜(败酱草)
.....(444)	玫瑰果(金樱子)(94)
青条龙牙(龙齿)(583)	(川贝母)
.....(445)	玫瑰红黄精(黄精)(405)
青条龙齿(龙齿)(547)	(苣荬菜)
.....(445)	茉莉花茶(茶叶)(127)
青明柳根(柳根)(396)	苦菜(龙葵)
.....(114)	苦心(知母)(122)
青鱼胆草(筋骨草)(32)	苦梗(桔梗)
.....(105)	(沙参)(395)
(535)	
	苦花(川贝母)	

苦蕨(锦灯笼)(368)	苦苣菜(苣荬菜)(127)
.....(88)		苦茅薯(黄药子)(415)
苦葵(龙葵)(35)	苦枥皮(秦皮)(92)
.....(122)		苦弥多(甘松)(293)
苦蒿(青蒿)(243)	苦弥哆(甘松)(293)
.....(136)		苦参子(鸦胆子)(93)
(黄花蒿)		苦草子(茺蔚子)(356)
.....(197)		(葫芦巴)(506)
苦蘋(败酱草)(555)	苦荞头(金荞麦)(103)
.....(94)		苦荬菜(蒲公英)(68)
(锦灯笼)(139)	(墓头回)(95)
.....(88)		(苣荬菜)(127)
苦欒(茶叶)(164)	苦树皮(秦皮)(92)
.....(396)		苦胆草(穿心莲)(73)
苦蘋(莲子心)(409)	(龙胆草)(54)
.....(577)		苦香子(水蜈蚣)(247)
(野菊花)(43)	苦扁桃(杏仁)(418)
.....(22)		苦萸楟(苦参)(55)
苦藤(鸡血藤)(26)	苦桔梗(桔梗)	
.....(373)			
苦丁茶(十大功劳叶)(450)		
.....(124)			
苦丁香(丁香)(393)		
.....(265)			
苦丁香(瓜蒂)(493)		
.....(589)			
苦力菜(升麻)(493)		
.....(26)			
苦大黄(大黄)(82)		
.....(143)			
苦木通(木通)(418)		
.....(218)			
苦石莲(莲子)(351)		
.....(576)			
苦甘草(甘草)(355)		
.....(493)			
苦田螺(毛冬青)(282)		

苦斋公(败酱草)	苦瓜萎根(天花粉)	茏蒿子(水红花子)
.....(94)(35)(360)
苦菖蒲(石菖蒲)	苦老菜根(升麻)	茏蒿花(荭草花)
.....(477)(26)(359)
苦萃花(款冬花)	苦朵菜子(葫芦巴)	茂丹皮(牡丹皮)
.....(423)(506)(60)
苦菜秧(升麻)	苦灯笼草(锦灯笼)	茂纹丹皮(牡丹皮)
.....(26)(88)(60)
苦桶子(枸橘)	苦苣斑蝥(斑蝥)	茂汶黄芪(黄芪)
.....(280)(622)(486)
苦猪菜(败酱草)	苦枥木皮(秦皮)	萍(浮萍)
.....(94)(92)(27)
苦葶苈(葶苈子)	苦荞麦根(金荞麦)	荳子(冬葵子)
.....(426)(103)(236)
苦葛麻(苣荬菜)	苦葶苈子(葶苈子)	苜蓿(黄芪)
.....(127)(426)(486)
苦督邮(黄芩)	苦棟白皮(苦棟皮)	菌(灵芝)
.....(48)(306)(485)
苦葵子(龙葵子)	苦辣树皮(苦棟皮)	苘实(苘麻子)
.....(554)(306)(46)
苦棟子(川棟子)	苦酸浆草(锦灯笼)	(冬葵子)
.....(286)(88)(236)
苦棟实(川棟子)	苦实把豆儿(马钱子)	苘麻(冬葵子)
.....(286)(613)(236)
苦椿皮(椿皮)	苦枥白腊树皮(秦皮)	苘麻子(冬葵子)
.....(570)(92)(236)
苦椿菜(麻黄根)	凌霄(凌霄花)	苘麻实(苘麻子)
.....(570)(364)(46)
苦榛子(鸦胆子)	茏古(荭草)	英生(薄荷)
.....(93)(194)(15)
苦榴皮(秦皮)	茏葛(乌蔹莓)	英硝(芒硝)
.....(92)(106)(145)
苦龙芽菜(升麻)	茏豉(荭草)	英梅仁(郁李仁)
.....(26)(194)(149)
苦龙胆草(龙胆草)	茏古子(水红花子)	英桃草(仙桃草)
.....(54)(360)(359)
	茏古花(荭草花)	

英雄草(徐长卿)	……………(239)	茅柴根(白茅根)
……………(170)	苞谷须(玉米须)	……………(321)
英雄树皮(海桐皮)	……………(239)	芥菜根(茜草)
……………(179)	荸蒲(水菖蒲)	……………(335)
荷(蜀羊泉)	……………(247)	李慈姑(山慈姑)
……………(86)	苓皮(茯苓)	……………(101)
荷蒿(白芷)	……………(210)	岑山苍术(苍术)
……………(10)	苓耳(苍耳草)	……………(198)
荷腐菌(狗狗秧)	……………(12)	李麻根(芭麻根)
……………(240)	茅术(苍术)	……………(321)
苕(凌霄花)	……………(198)	宓夕(草薢)
……………(364)	茅瓜(白蔹)	……………(226)
苕华(凌霄花)	……………(98)	莎莽(荸荠)
……………(364)	茅根(白茅根)	……………(552)
苕之华(凌霄花)	……………(221)	范蜜(蜂蜜)
……………(364)	茅茹(山慈姑)	……………(497)
苔叶细辛(细辛)	……………(101)	范轩肺(金果榄)
……………(260)	茅楂(山楂)	……………(84)
菟(桑寄生)	……………(298)	其积根(白芍)
……………(172)	茅毛根(白茅根)	……………(531)
菟木(桑寄生)	……………(321)	取麻菜(苣荬菜)
……………(172)	茅爪子(仙茅)	……………(127)
苟青(狗脊)	……………(504)	耶尔买他格(锁阴)
……………(509)	茅瓜根(天花粉)	……………(520)
苟脊(狗脊)	……………(35)	直立白薇(白薇)
……………(509)	茅苍术(苍术)	……………(138)
苟格(黄精)	……………(198)	直立百部(百部)
……………(547)	茅茅根(白茅根)	……………(419)
苟起子(枸杞子)	……………(321)	直立党参(党参)
……………(555)	茅草根(白茅根)	……………(182)
苟起根(地骨皮)	……………(321)	直条枫斗(石斛)
……………(139)	茅萝卜(蒲公英)	……………(543)
苟杞根皮(地骨皮)	……………(68)	直立黄芪子(沙苑子)
……………(139)	茅根肉(白茅根)	……………(518)
苞米须(玉米须)	……………(321)	画石(滑石)
……………(239)	茅柴赤(赤小豆)	……………(217)
苞谷须(玉米须)	……………(231)	雨师(槿柳)

雨前(茶叶)	枝朴(厚朴)	构拿车(车前草)
.....(15)(200)(216)
雨前茶(茶叶)	枝芩(黄芩)	枫斗(石斛)
.....(396)(48)(543)
雨前茶(茶叶)	枝香(藿香)	枫叩(白豆蔻)
.....(396)(202)(206)
坪术(白术)	枝核(荔枝核)	枫苓(猪苓)
.....(489)(287)(212)
坤草(益母草)	枝花头(蚤休)	枫果(路路通)
.....(355)(75)(269)
坤草子(茺蔚子)	枢木叶(苦丁茶)	枫实(路路通)
.....(356)(43)(269)
坡地石防风(前胡)	槐木叶(木芙蓉叶)	枫蔻(白豆蔻)
.....(402)(611)(206)
杰里花(仙鹤草)	槐皮树叶(木芙蓉叶)	枫木祟(路路通)
.....(329)(611)(269)
杰里花芽(鹤草芽)	板贝(浙贝母)	枫石斛(石斛)
.....(309)(407)(543)
桥拱(枳椇子)	板桂(肉桂)	枫头棵(飞廉)
.....(560)(257)(126)
枉开口(佛甲草)	板薯(黄药子)	枫茄花(洋金花)
.....(119)(415)(439)
(垂盆草)	板兰根(板蓝根)	枫草儿(地耳草)
.....(79)(71)(242)
林兰(石斛)	板桥党(党参)	枫树果(路路通)
.....(543)(482)(369)
(辛夷)	板蓝叶(大青叶)	枫树球(路路通)
.....(13)(70)(369)
林下竹(竹叶)	板蓝根叶(大青叶)	枫香果(路路通)
.....(34)(70)(369)
林兰子(梔子)	构泡(楮实)	枫球子(路路通)
.....(36)(559)(369)
林茜草(茜草)	构果(楮实)	枫宸果(路路通)
.....(335)(559)(369)
林麝香(麝香)	构树子(楮实)	枫蔻壳(豆蔻壳)
.....(373)(559)(207)
枝子(梔子)	构树果(楮实)	
.....(36)		

枫木上球(路路通)(618)	枫柏松香(松香)(618)
.....(369)			
枫仔树果(路路通)(210)	粉叶(榆叶)(250)
.....(369)			
松元(白松塔)(324)	粉皮(榆白皮)(250)
.....(433)			
松贝(川贝母)(210)	粉荑(榆钱)(453)
.....(405)			
松丹(铅丹)(405)	粉钱(榆钱)(453)
.....(600)			
松节(茯苓)(396)	粉白皮(榆白皮)(250)
.....(210)			
松花(松花粉)(192)	粉榆叶(榆叶)(250)
.....(326)			
松苓(茯苓)(618)	粉榆皮(榆白皮)(250)
.....(210)			
松果(白松塔)(618)	粉榆荑(榆钱)(453)
.....(433)			
松肪(松香)(326)	粉榆钱(榆钱)(453)
.....(618)			
松实(白松塔)(224)	粉榆白皮(榆白皮)(250)
.....(433)			
松球(白松塔)(224)	枪谷(糠谷老)(238)
.....(433)			
松胶(松香)(405)	枪刀菜(小薊)(316)
.....(618)			
松黄(松花粉)(115)	枪谷老(糠谷老)(238)
.....(326)			
松脂(松香)(550)	枪子枳实(枳实)(275)
.....(618)			
松落(松萝)(96)	枪头菜根(苍术)(198)
.....(115)			
松塔(白松塔)(7)	杷叶(枇杷叶)(427)
.....(433)			
松腴(茯苓)(118)	枇杷花蜜(蜂蜜)(497)
.....(210)			
松膏(松香)(192)	枇杷寄生(桑寄生)	

杭术(白术)	枕瓜皮(冬瓜皮)	刺盖(飞廉)
杭芍(白芍)	枕头草(茅菜)	刺蓬(猪毛菜)
杭菊(菊花)	枣(大枣)	刺薊(大薊)
杭粉(铅粉)	枣仁(酸枣仁)	刺楸(五加皮)
杭寸冬(麦门冬)	枣子(大枣)	刺儿叶(小薊)
杭甘菊(菊花)	枣仁(酸枣仁)	刺儿草(小薊)
杭白术(白术)	枣皮(山茱萸)	刺儿菜(小薊)
杭白芍(白芍)	枣杞(枸杞子)	(大薊)
杭白芷(白芷)	枣儿红(地榆)	刺儿棵(蒼耳草)
杭白菊(菊花)	枣儿槟(槟榔)	刺儿薑(小薊)
杭芋肉(山茱萸)	枣花蜜(蜂蜜)	刺三甲(五加皮)
杭芍药(白芍)	枣棘子(蛇床子)	刺五甲(五加皮)
杭麦冬(麦门冬)	枣槟榔(槟榔)	刺五加(五加皮)
杭萸肉(山茱萸)	枣儿槟榔(槟榔)	刺五夹(五加皮)
杭菊花(菊花)	枣子树皮(枣树皮)	刺打草(飞廉)
杭黄菊(菊花)	刺花(蔷薇花)	刺杀草(小薊)
杭薄荷(薄荷)	刺枣(大枣)	刺红花(红花)
枕瓜子(冬瓜子)	刺通(海桐皮)	(蔷薇花)
.....(230)	刺菜(小薊)(180)

刺杆菜(小薊)(318)	刺尖头草(小薊)(318)
刺刺菜(小薊)(318)	刺枣树皮(枣树皮)(496)
刺角芽(小薊)(318)	刺莲蓬实(芡实)(581)
刺角菜(小薊)(318)	刺球子皮(刺猬皮)(587)
刺针草(千年健)(181)	刺黄檗叶(十大功劳叶)(124)
(豨莶草)		刺盖连(黄连)(50)
.....(167)		刺梅花(蔷薇花)(100)
刺沙蓬(猪毛菜)(472)	刺榆子(金樱子)(583)
刺玫瑰花(蔷薇花)(100)	刺梨子(金樱子)(583)
(玫瑰花)		刺薊菜(小薊)(318)
.....(295)		刺蒺藜(沙苑子)(518)
刺鱼皮(刺猬皮)(587)	刺楸皮(海桐皮)(179)
刺郎子(金樱子)(583)	刺酸枣(酸枣仁)(449)
刺桐皮(海桐皮)(179)	刺鼠皮(刺猬皮)(587)
刺莲蓬(芡实)(581)	刺橄榄(金樱子)(583)
刺莲藕(芡实)(581)	刺蘼花(蔷薇花)(100)
刺通皮(五加皮)(173)	刺几棵子(苍耳子)(11)
刺海马(海马)(522)	刺五加果(娑罗子)(293)
刺萝卜(小薊)(318)	刺血几皮(刺猬皮)(587)
(大薊)			
刺菜芽(小薊)(316)		

.....(149)	押不芦(肖金花)(453)
郁苏参(翻白草)(429)	披针叶钩藤(钩藤)
.....(56)	拐夕(牛膝)(461)
郁李肉(郁李仁)(365)	抽贝罗香(安息香)
.....(149)	拐枣(枳椇子)(476)
郁里仁(郁李仁)(560)	拉站(蝼蛄)
.....(149)	拐膝(牛膝)(251)
郁臭苗(益母草)(365)	拉瓜瓢(白薇)
.....(355)	拐牛膝(牛膝)(138)
郁臭草(益母草)(365)	拉汗果(罗汉果)
.....(355)	拐角七(打破碗花花)(559)
矾石(明矾)(316)	拉拉古(蝼蛄)
.....(603)	拐枣子(枳椇子)(251)
矾精(明矾)(560)	拉拉狗(蝼蛄)
.....(603)	拖泥板(龟板)(251)
码蜡(诃子)(563)	拉拉秧(葎草)
.....(572)	抱木神(茯苓)(242)
码漏(诃子)(210)	(猪秧秧)
.....(572)	抱母鸡(商陆)(120)
矿灰(石灰)(156)	拉拉蔓(葎草)
.....(607)	抱茯神(茯苓)(243)
顶头肉(肉豆蔻)(210)	拉拉藤(猪秧秧)
.....(573)	抱木茯神(茯苓)(120)
顶光参(西洋参)(210)	(葎草)
.....(481)	抱灵居士(香附)(243)
顶珠草(碳魄草)(232)	拉狗蛋(葎草)
.....(86)	拘那夷(夹竹桃)(835)
顶棍草(水蜈蚣)(249)	(葎草)
.....(247)	拘擎儿(夹竹桃)(243)
拔(乌蔹莓)(249)	拉静反(金果榄)
.....(106)	拘蹄子(枸杞子)(84)
抽葫芦(葫芦)(555)	拉拉豆根(茜草)
.....(231)	披麻草(藜芦)(335)
抽筋草(伸筋草)(592)	拉拉藤根(茜草)
.....(182)	披锡炭(血余炭)(335)
拈拈草根(茜草)(332)	拉拉罐子(蓼房子)
.....(335)	披针叶榆(榆钱)(426)

拉拉秧子根(茜草)(162)	轮叶沙参(沙参)
.....(335)	(535)
拦路枝(瓜子金)(496)	轮伞五加(五加皮)
.....(437)	(173)
拦路虎(刺蒺藜)(217)	卧蛋草(地锦草)
.....(463)	(104)
鵝尾(射干)(24)	欧甘草(甘草)
.....(81)	(493)
鵝头鸡(拳参)(63)	欧地筭(泽兰)
.....(77)	(352)
转丸(蜣螂)(421)	欧当归(当归)
.....(447)	(526)
转观叶(木芙蓉叶)(186)	欧李仁(郁李仁)
.....(611)	(149)
转扭子(枳椇子)(463)	欧梨仁(郁李仁)
.....(560)	(149)
转钮子(枳椇子)(584)	欧石头花(银柴胡)
.....(560)	(140)
转日莲子(向日葵子)(161)	欧菟丝子(菟丝子)
.....(554)	(517)
转日莲花托(向日葵花 托)(237)	欧蔓陀罗(洋金花)
	(439)
斩蛇剑(万年青)(245)	欧地瓜儿苗(泽兰)
	(352)
(穿心莲)(605)	欧洲鳞毛蕨(贯众)
.....(73)	(313)
软饴(饴糖)(439)	欧洲鳞毛蕨贯众(贯众)
.....(496)	(313)
软糖(饴糖)(104)	虎爪(虎骨)
.....(496)	(175)
软石膏(石膏)(44)	虎兰(泽兰)
.....(30)	(352)
软白前(白前)(318)	虎杖(地榆)
.....(401)	(322)
软防风(防风)(75)	虎卷(贯众)
.....(7)	(313)
软灵仙(威灵仙)(550)	虎珀(琥珀)

..... (448)	虎波草(茅莓) (399)
虎须(沙参) (535)	虎咬红(半支莲)	齿瓣延胡索(延胡索) (344)
虎荟(豨莶草) (167)	虎胫骨(虎骨)	非洲象牙(象牙) (445)
虎麻(落新妇) (30)	虎须花(款冬花)	非洲象皮(象皮) (628)
虎葛(乌蔹莓) (106)	虎须草(灯心草)	非洲犀角(犀角) (57)
虎掌(天南星) (390)	虎酒草(灯心草)	非洲蝼蛄(蝼蛄) (251)
虎蒲(泽兰) (352)	虎麻根(苦参)	肾气草(农吉利) (120)
虎薊(大薊) (316)	虎四肢骨(虎骨)	肾叶紫菀(紫菀) (421)
虎魄(琥珀) (448)	虎四腿骨(虎骨)	肾叶橐吾(紫菀) (421)
虎膏(天南星) (390)	虎皮贝母(川贝母)	肾叶鹿蹄草(鹿衔草) (370)
(豨莶草) (167) (405)	固子(补骨脂) (512)
虎牙草(墓头回) (95)	虎皮松果(白松塔)	固脂(补骨脂) (512)
虎爪菜(委陵菜) (91)	虎皮松球(白松塔)	固不婆律(冰片) (474)
虎皮贝(川贝母) (405)	虎皮松塔(白松塔)	国马(槟榔) (307)
虎头骨(虎骨) (175)	虎头蜂房(露蜂房)	国丹(船丹) (600)
虎全骨(虎骨) (175)	虎掌半夏(天南星)	国老(甘草) (493)
虎邦骨(虎骨) (175)	虎掌南星(天南星)	国老草(甘草) (493)
虎身骨(虎骨) (175)	卓巴百合(百合)	国产人参(人参) (478)
虎茄花(洋金花) (439)	齿果酸模(羊蹄)	国产牛黄(牛黄) (74)
	齿叶旋复花(旋复花)	

国产沉香(沉香)	果裸子(瓜蒌)	罗鬼菜根(前胡)
.....(285)(434)(402)
国产安息香(安息香)	果裸仁(瓜蒌子)	罗布欢的尔(罗布麻)
.....(476)(434)(471)
昌支(知母)	果瓢实(瓜蒌)	味灰(石灰)
.....(32)(404)(607)
昌本(石菖蒲)	禹毛茛(毛茛)	味连(黄连)
.....(477)(607)(50)
昌阳(石菖蒲)	患果(橄榄)	味牛膝(夕)(土牛膝)
.....(477)(558)(366)
昌羊(石菖蒲)	罗勒(零陵香)	味辣子(荜澄茄)
.....(477)(209)(264)
昆仑(白蔹)	(佩兰)	呵子(诃子)
.....(98)(203)(572)
昆仑黄(硫黄)	罗卜子(莱菔子)	呼雷泡(马勃)
.....(594)(303)(83)
昆仑草子(青葙子)	罗汉表(罗汉果)	鸣蝉壳(蝉蜕)
.....(41)(559)(17)
昆明鸡血藤(鸡血藤)	罗罔藤(海金沙藤)	鸣蜩壳(蝉蜕)
.....(373)(224)(17)
果负(乌头)	罗帏花(芦荟)	明月(珍珠)
.....(255)(147)(457)
果黄(牛黄)	罗帏草(芦荟)	明石(络石藤)
.....(74)(147)(186)
果麻(荭草)	罗罗葱(漏芦)	明前(茶叶)
.....(194)(100)(396)
果榄(金果榄)	罗布麻叶(罗布麻)	明雄(雄黄)
.....(84)(471)(595)
果裸(瓜蒌)	罗汉干果(罗汉果)	明天冬(天门冬)
.....(404)(559)(542)
果羸(瓜蒌)	罗汉竹茹(竹茹)	明天麻(天麻)
.....(404)(409)(462)
果瓜蒂(瓜蒂)	罗河石斛(石斛)	明玉竹(玉竹)
.....(589)(543)(546)
果麻子(水红花子)	罗定砂仁(砂仁)	明日果(无花果)
.....(360)(204)(88)
果麻花(荭草花)		明白及(白及)

明附片(附子)	败龟甲(龟板)	岩地芨(地榆)
.....(254)(563)(322)
明附片(附子)	败龟板(龟板)	岩防风(防风)
.....(254)(563)(7)
明没药(没药)	败荷叶(荷叶)	岩连姜(骨碎补)
.....(376)(579)(510)
明松香(松香)	败毒菜根(羊蹄)	岩败酱(墓头回)
.....(618)(340)(95)
明乳香(乳香)	帕米尔假紫草(紫草)	(败酱草)
.....(374)(63)(94)
明玳瑁(玳瑁)	虮(水蛭)	岩柏枝(地柏枝)
.....(459)(383)(326)
明前茶(茶叶)	岩风(前胡)	岩柏草(地柏枝)
.....(396)(402)(326)
明珠母(珍珠母)	岩角(鹿角)	岩桐子(臭梧桐)
.....(458)(500)(169)
明珠参(珠儿参)	岩柏(地柏枝)	岩磁砂(磁砂)
.....(537)(326)(602)
明党参(沙参)	岩松(瓦松)	岩脑砂(磁砂)
.....(535)(129)(602)
明党参(党参)	(卷柏)	岩浮石(海浮石)
.....(482)(325)(410)
明雄黄(雄黄)	岩茸(鹿茸)	岩黄芪(黄芪)
.....(595)(498)(486)
明铫草(金钱草)	岩盐(戎盐)	岩黄连(黄连)
.....(221)(135)(50)
盯子(蛇床子)	岩笋(瓦松)	岩野菊(野菊花)
.....(614)(129)(22)
败华(茺花)	岩棕(藜芦)	岩银花(金银花)
.....(152)(592)(05)
败花(茺花)	岩川芎(前胡)	岩棕根(前胡)
.....(152)(402)(402)
败将(龟板)	岩风根(前胡)	岷贝(川贝母)
.....(563)(402)(405)
败酱(败酱草)	岩见愁(青风藤)	岷归(当归)
.....(94)(188)(526)
	岩百合(百合)	

岷党(党参)(535)	制地龙(地龙)(469)
岷贝母(川贝母)(405)	制全虫(全蝎)(466)
岷当归(当归)(526)	制全蝎(全蝎)(466)
岷县大黄(大黄)(143)	制远志(远志)(450)
岭南莞花(了哥王)(110)	制豆卷(大豆黄卷)(19)
垂珠(黄精)(517)	制苍术(苍术)(198)
垂丝柳(柽柳)(15)	制附子(附子)(254)
垂柳叶(柳叶)(113)	制没药(没药)(376)
垂柳条(柳枝)(113)	制郁金(郁金)(345)
垂柳枝(柳枝)(113)	制松香(松香)(618)
垂柳须(柳根)(114)	制乳香(乳香)(374)
垂柳根(柳根)(114)	制南星(天南星)(390)
垂杨柳叶(柳叶)(113)	制复花(旋复花)(399)
垂序商陆(商陆)(156)	制香附(香附)(282)
垂柳根须(柳根)(114)	制首乌(何首乌)(529)
垂穗石松(伸筋草)(182)	制萸肉(山茱萸)(582)
迭罗黄(旋复花)(399)	制黄精(黄精)(547)
知贝(川贝母)(405)	制硫黄(硫黄)(594)
知母(沙参)(419)	制僵蚕(白僵蚕)	

制鳖甲(鳖甲)	委萎(玉竹)	钩钩藤(钩藤)
.....(564)(546)(461)
制山萸肉(山茱萸)	委陵菜(白头翁)	钓滚菜(海藻)
.....(582)(89)(413)
制马钱子(马钱子)	(翻白草)	钓鱼竹茹(竹茹)
.....(613)(56)(409)
制天南星(天南星)	和姑(半夏)	竺黄(天竹黄)
.....(390)(388)(408)
制白附子(白附子)	和兰蒐(补骨脂)	笏菜(大薊)
.....(392)(512)	笏藨子(覆盆子)
制肉苁蓉(肉苁蓉)	和尚头(漏芦)(316)
.....(503)(100)	使君子(使君子)
制禹白附(白附子)	(续断)(305)
.....(392)(508)	使君肉(使君子)
制炉甘石(炉甘石)	和常山(常山)	使君子仁(使君子)
.....(606)(590)(305)
制益母草(益母草)	和尚头花(蔷薇花)	使君子肉(使君子)
.....(355)(130)(305)
制旋复花(旋复花)	和尚头草(蜀羊泉)	侧子(附子)
.....(399)(86)(254)
制紫河车(紫河车)	和尚花根(桔梗)	侧柏(侧柏叶)
.....(516)(395)(324)
物象珀(琥珀)	和事草白(葱白)	侧耳根(鱼腥草)
.....(448)(14)(80)
刮丹皮(牡丹皮)	和胶毒草(筋骨草)	侧李仁(郁李仁)
.....(60)(105)(149)
刮皮草(甘草)	和尚头花根(桔梗)	侧柏子(柏子仁)
.....(493)(395)(440)
刮皮甘草(甘草)	芥麦蘖(麦芽)	侧柏仁(柏子仁)
.....(493)(301)(440)
刮皮赤芍(赤芍)	忝仔草(牛筋草)	佩兰(泽兰)
.....(62)(225)(352)
季豆(葫芦巴)	钩钩(钩藤)	佩兰叶(佩兰)
.....(506)(461)(208)
季季草(凤仙花)	钩藤(钩藤)	
.....(357)(461)	
	钓鱼竿(徐长卿)	

货母(知母)(224)	肥猪苗(豨莶草)
.....(32)		
的(莲子)(626)	肥猪菜(豨莶草)
.....(576)		
的哇三陆(卷柏)(17)	肥鼠子(巴豆)
.....(325)		
迫水龙(大戟)(26)	肥猪菜根(商陆)
.....(151)		
卑相(麻黄)(26)	鱼古(乌贼骨)
.....(1)		
卑盐(麻黄)(143)	鱼白(鱼鳔)
.....(1)		
卑相根(麻黄根)(232)	鱼肚(鱼鳔)
.....(570)		
盲蟹(腐虫)(162)	鱼骨(乌贼骨)
.....(382)	(草珊瑚)(586)
彼子(榧子)(103)	鱼胶(鱼鳔)
.....(312)		
爬山虎(络石藤)(151)	鱼胆(猪胆汁)
.....(186)		
(穿山龙)(371)	鱼花(筋骨草)
	(417)
爬古藤(海金沙藤)(37)	鱼脬(鱼鳔)
.....(224)		
爬岩香(海风藤)(493)	胀饱草(夏枯草)
.....(187)	(533)
(石南藤)(542)	鱼藤(红藤)
爬爬草(筋骨草)(501)	胀果甘草(甘草)
.....(105)	(93)
爬崖姜(骨碎补)(546)	鱼子兰(草珊瑚)
.....(510)		
爬墙虎(壁虎)(419)	肥天冬(天门冬)
(络石藤)	(108)
.....(186)		肥巴戟(巴戟天)
爬墙藤(海金沙藤)(594)(594)
		肥玉竹(玉竹)
	(533)
		肥百部(百部)
	(253)
		肥江子(巴豆)
	(533)
		肥知母(知母)
	(78)
		爬墙虎(海金沙藤)
		肥枕石(鱼脑石)

鱼枕骨(鱼脑石) (253)	兔子肠(巴戟天) (501)	狗骨(麻黄) (520)
鱼线胶(鱼鳔) (533)	兔仔肠(巴戟天) (501)	狗椒(花椒) (1)
鱼骨刺(六月雪) (246)	兔丝子(菟丝子) (517)	狗椒(花椒) (263)
鱼胆草(瓜子金) (437)	兔耳草(紫花地丁) (69)	(两面针) (109)
鱼胆根(了哥王) (110)	（寻骨风） (182)	狗膏(豨莶草) (167)
鱼腥草(鱼腥草) (80)	兔儿草子(王不留行) (367)	狗精(黄狗肾) (520)
鱼首石(鱼脑石) (253)	免子油草(知母) (32)	狗鞭(黄狗肾) (520)
鱼翅草(射干) (81)	免子拐杖(瓦松) (129)	狗儿秧(狗狗秧) (240)
鱼眼草(谷精草) (39)	忽雷炮(马勃) (83)	狗山药(穿山龙) (371)
鱼脑骨(鱼脑石) (253)	饴锡(饴糖) (496)	狗子耳(苍耳草) (12)
鱼新草(鱼腥草) (80)	狙猴(猴枣) (447)	(鱼腥草) (80)
鱼鳞胶(鱼鳔) (533)	狐狸桃(猕猴桃) (558)	狗天天(白蔹) (93)
鱼鱗草(鱼腥草) (80)	狐尾蓼(拳参) (77)	狗牙齿(垂盆草) (79)
鱼鳔胶珠(鱼鳔) (533)	狐狸尾子(青葙子) (41)	狗牙草(垂盆草) (79)
鱼木果树皮(紫荆皮) (114)	狗阴(黄狗肾) (520)	狗牙瓣(佛甲草) (119)
鱼鳞真珠草(鱼腥草) (80)	狗尾(狗尾草) (42)	(垂盆草) (79)
兔竹(黄精) (547)	狗脊(狗脊) (509)	狗毛尾(狗尾草) (42)
兔子耳(寻骨风) (182)	狗虱(黑脂麻) (552)	狗仔毛(狗脊) (509)
	狗肾(黄狗肾) (555)	狗奶子(枸杞子) (555)

狗头黄(大黄)(166)	(菊叶三七)
狗耳菜(鱼腥草)(120)(334)
狗老薯(土茯苓)(550)	狗地芽子(枸杞子)
狗朗头(土茯苓)(139)	狗地芽皮(地骨皮)
狗芋头(半夏)(79)	狗地芽根(地骨皮)
狗脊骨(狗脊)(139)	狗耳朵草(苍耳草)
狗阴茎(黄狗肾)(509)	狗耳朵子(牵牛子)
狗尾巴(狗尾草)(509)	狗舌子草(狗舌草)
狗尾羌(秦羌)(313)(121)
狗没药(没药)(110)	狗舌头草(狗舌草)
狗青芳(苦丁茶)(294)(121)
狗拉秧(狗狗秧)(80)	狗尾巴花(荭草)
狗乳草(蒲公英)(97)(194)
狗虱子(黑脂麻)(79)	狗尾巴花(荭草花)
狗贴耳(鱼腥草)(119)(359)
狗熊胆(熊胆)(42)	狗尾半支(狗尾草)
狗牙半支(垂盆草)(97)	狗尾苋子(青葙子)
狗信药(了哥王)(41)(41)
狗信蔃(了哥王)(41)	狗尾花子(青葙子)
狗屎豆(决明子)(240)	狗狗秧根(狗狗秧)
狗娃秧(狗狗秧)(240)	狗驼子胆(熊胆)
狗秦羌(秦羌)(376)(97)
		狗绳子草(鱼腥草)
	(80)
		狗葡萄根(山豆根)
	(82)
		狗牙半支莲(佛甲草)
	(119)
		狗奶子根皮(地骨皮)

狗尾巴花子(水红花子) (139)	炙冬花(款冬花) (423)	炙桃仁(桃仁) (402)
狗秋芽根皮(地骨皮) (330)	炙水蛭(水蛭) (383)	炙党参(党参) (360)
狗脊蕨贯众(贯众) (139)	炙百合(百合) (550)	炙桑皮(桑白皮) (425)
狗骨豆瓣绿(筋骨草) (105)	炙百部(百部) (419)	炙黄芪(黄芪) (486)
狗脊蕨贯众(贯众) (313)	炙地龙(地龙) (469)	炙黄精(黄精) (547)
狗噶子根皮(地骨皮) (139)	炙米壳(罂粟壳) (357)	炙萸肉(山茱萸) (582)
炙草(甘草) (439)	炙麦冬(麦门冬) (540)	炙常山(常山) (590)
炙鼠(蝼蛄) (251)	炙远志(远志) (450)	炙紫苑(紫苑) (421)
炙卜子(莱菔子) (303)	炙杏仁(杏仁) (418)	炙蒺藜(刺蒺藜) (463)
炙山甲(穿山甲) (381)	炙杜仲(杜仲) (507)	炙僵蚕(白僵蚕) (468)
炙山萸(山茱萸) (582)	炙乳香(乳香) (374)	炙鳖甲(鳖甲) (564)
炙川芎(川芎) (343)	炙龟板(龟板) (563)	炙马前子(马钱子) (613)
炙天冬(天门冬) (542)	炙诃子(诃子) (572)	炙马兜铃(马兜铃) (428)
炙元胡(延胡索) (344)	炙谷芽(谷芽) (302)	炙乌贼骨(乌贼骨) (586)
炙巴戟(巴戟天) (501)	炙沙参(沙参) (535)	炙鸡内金(鸡内金) (303)
炙玉竹(玉竹) (546)	炙没药(没药) (376)	炙鸡中金(鸡内金) (303)
炙白术(白术) (489)	炙杷叶(枇杷叶) (427)	炙刺猬皮(刺猬皮) (587)
炙白芍(白芍) (531)	炙复花(旋复花) (399)	炙莱菔子(莱菔子) (303)
炙白前(白前) (401)	炙前胡(前胡)	

炎复花(旋复花)(558)	金古榄(金果榄)
.....(399)	金椒(两面针)(84)
金生(密陀僧)(109)	金石斛(石斛)
.....(605)	金榄(金果榄)(543)
金瓜(南瓜)(84)	金冬瓜(南瓜)
.....(308)	金精(菊花)(308)
金兰(石斛)(21)	金丝草(虎耳草)
.....(543)	金蕊(荷花)(123)
金刚(萆薢)(21)	金丝葵(蔊菜)
.....(226)	金七娘(商陆)(417)
金衣(蝉蜕)(156)	金丝毛(狗脊)
.....(17)	金山黄(牛黄)(509)
金灯(山慈姑)(74)	金丝麻(墨旱莲)
.....(101)	金不换(三七)(502)
(锦灯笼)(333)	金芍药(白芍)
.....(88)	(土大黄)(531)
金豆(蓖麻子)(112)	金耳环(细辛)
.....(616)	金毛狗(狗脊)(200)
金花(金银花)(509)	金耳钩(穿心莲)
.....(65)	金毛猴(狗脊)(75)
金果(枳椇子)(559)	(豨莶草)
.....(560)	金凤花(凤仙花)(167)
金珀(琥珀)(357)	金因子(金樱子)
.....(448)	金牛儿(蝉蜕)(533)
金鵝(乌头)(17)	金因花(金银花)
.....(255)	金牛公(两面针)(65)
金胆(熊胆)(109)	金刚头(菝葜)
.....(97)	金牛草(喉咙草)(227)
金球(枳壳)(86)	金刚刺(菝葜)
.....(276)	(水蜈蚣)(227)
金玲(牵牛子)(247)	金刚树(菝葜)
.....(155)	(瓜子金)(227)
金畚(铁苋菜)(437)	金刚骨(菝葜)
.....(241)	金牛胆(金果榄)(227)
金笋(肉苁蓉)(84)	(穿山龙)
.....(503)	金巴豆(菝葜)(371)
金梨(猕猴桃)(227)	金刚根(菝葜)

..... (227)	金鸡姆(商陆) (560)
金刚鞭(菝葜) (156)	金钩藤(钩藤)
..... (227)	金沙粉(海金沙) (560)
金刚藤(菝葜) (224)	金线风(海金沙藤)
..... (227)	金沙蕨(海金沙藤) (224)
金瓜米(南瓜子) (224)	金线草(松萝)
..... (309)	金沙藤(海金沙藤) (115)
金竹叶(竹叶) (224)	金线莲(虎耳草)
..... (34)	金苦榄(金果榄) (123)
金竹花(竹茹) (84)	金线藤(海金沙藤)
..... (409)	金英子(金樱子) (224)
金竹茹(竹茹) (583)	金沸花(旋复花)
..... (409)	金果兰(金果榄) (399)
金灯草(锦灯笼) (84)	金炉底(密陀僧)
..... (88)	金果榄(山慈姑) (605)
金灯笼(锦灯笼) (101)	金茶瓶(金樱子)
..... (88)	金松皮(土槿皮) (583)
金花藤(忍冬藤) (315)	金茶匙(石韦)
..... (66)	金枪药(佛甲草) (223)
金佛草(金沸草) (119)	金桔叶(橘叶)
..... (400)	金狗胆(金果榄) (272)
金龟甲(龟板) (84)	金挖耳(金钱草)
..... (563)	金狗脊(狗脊) (221)
金龟板(龟板) (599)	(鹤虱)
..... (563)	金金藤(海金沙藤) (310)
金陀僧(密陀僧) (224)	(半支莲)
..... (605)	金钗花(石斛) (118)
金汤匙(石韦) (543)	金星草(石韦)
..... (223)	金钗草(千里光) (223)
金鸡爪(凤尾草) (44)	金星砂(朱砂)
..... (224)	金钩子(枳椇子) (441)
金鸡舌(半边莲) (560)	金香附(香附)
..... (78)	金钩草(钩藤) (282)
金鸡米(竹叶) (461)	金香草(穿心莲)
..... (34)	金钩钩(枳椇子) (73)
金鸡尾(凤尾草) (560)	金盆草(细辛)
..... (244)	金钩梨(枳椇子) (260)

金纽子(水蜈蚣)(513)	金蝉草(蛇莓)(128)
.....(247)		金蝴蝶(射干)(81)
金纽草(水蜈蚣)(247)	金樱果(金樱子)(583)
金钥匙(金钱草)(221)	金樱草(莲须)(578)
(甘草)		金橘叶(橘叶)(272)
.....(493)		金礞石(礞石)(412)
金绞剪(射干)(81)	金藤花(金银花)(65)
金庞皮(石榴皮)(571)	金簪草(蒲公英)(68)
金扁柏(地柏枝)(326)	金山牛黄(牛黄)(74)
金盏花(旋复花)(399)	金井玉闌(人参)(478)
金荞仁(红药子)(131)	金毛三七(落新妇)(30)
金壺瓶(金樱子)(583)	金毛狗脊(狗脊)(509)
金钱艾(金钱草)(221)	金毛狮子(狗脊)(509)
金钱花(旋复花)(399)	金氏黄精(黄精)(547)
金钱草(积雪草)(225)	金凤花子(急性子)(358)
金钱菊(旋复花)(399)	金乌贼骨(乌贼骨)(536)
金钱蛇(白花蛇)(177)	金叶松皮(土槿皮)(315)
金铃子(川楝子)(286)	金冬瓜子(南瓜子)(309)
金陵草(墨旱莲)(562)	金边土鳖(蜃虫)	
金桑叶(桑叶)(19)		
金黄泽(石斛)(17)		

..... (382)	金松根皮(土槿皮) (315) (105)
金边蚂蟥(水蛭) (383)	金金菜根(萱草根) (248)	金盏银台(王不留行) (367)
金丝吊蛋(黄药子) (415)	金钗石斛(石斛) (543)	金盏银盘(狼把草) (111)
金丝吊鳖(防己) (164)	金狗尾草(狗尾草) (42)	金耗子屎(天葵) (122)
(白药子) (132)	金背茶匙(石韦) (223)	金钱荷叶(虎耳草) (123)
金丝杜鹃(半支莲) (118)	金线草根(茜草) (335)	金钱松皮(土槿皮) (315)
金丝荷叶(虎耳草) (123)	金线重楼(蚤休) (75)	金钱豹骨(豹骨) (176)
金丝橘络(橘络) (372)	金沸草花(旋复花) (399)	金钱葵子(冬葵子) (236)
金兰石斛(石斛) (543)	金药树枝(槐枝) (328)	金钱蟒蛇(白花蛇) (177)
金头蜈蚣(蜈蚣) (467)	金药树实(槐角) (329)	金钱薄荷(薄荷) (15)
金刚树根(菝葜) (227)	金药树花(槐花) (327)	(金钱草) (221)
金红小豆(赤小豆) (231)	金挖耳草(半支莲) (118)	金黄丝子(菟丝子) (517)
金针菜根(萱草根) (248)	金星八角(鬼臼) (45)	金黄柴胡(柴胡) (24)
金沙重楼(蚤休) (75)	金星石韦(石韦) (223)	金盘托珠(蚤休) (75)
金灯藤子(菟丝子) (517)	金钟茴陈(茴陈蒿) (228)	金剪刀草(王不留行) (367)
金顶龙芽(仙鹤草) (329)	(刘寄奴) (351)	金密陀僧(密陀僧) (605)
金顶龙芽(鹤草芽) (309)	金钩不子(枳椇子) (560)	金蛤蜊皮(石决明) (455)
金果树子(枳椇子) (560)	金纽子草(水蜈蚣) (247)	金锁银开(金荞麦) (103)
金松树皮(土槿皮) (315)	金疮小草(筋骨草) (358)	金童花子(急性子) (358)

金漆树子(木槿子)(132)	乳头香(乳香)
.....(436)	(374)
金漆树皮(木槿皮)(415)	乳香末(乳香)
.....(610)	(374)
金漆树花(木槿花)(86)	乳香米(乳香)
.....(131)	(374)
金樱子肉(金樱子)(177)	乳香珠(乳香)
.....(533)	(374)
金翼黄芪(黄芪)(315)	乳香藤(金钱草)
.....(436)	(221)
金山老鹤草(老鹤草)(315)	乳痈泡(茅莓)
.....(185)	(127)
金毛狗尾草(狗尾草)(99)	乳浆草(泽漆)
.....(42)	(232)
金毛狮子草(伸筋草)(75)	建下(泽泻)
.....(182)	(213)
金叶松树皮(土槿皮)(241)	建池(泽泻)
.....(315)	(213)
金叶松根皮(土槿皮)(221)	建泻(泽泻)
.....(315)	(213)
金边地鳖虫(蜃虫)(164)	建莲(莲子)
.....(382)	(576)
金丝吊芙蓉(虎耳草)(86)	建梅(乌梅) ... (566)
.....(123)		建乌梅(乌梅)
金丝吊蛤蟆(白药子)(236)(566)
.....(132)		建方通(通草)
金丝两重楼(蚤休)(439)(219)
.....(75)		建吊子(使君子)
金线吊乌龟(白药子)(349)(305)
.....(132)		建君子(使君子)
金线吊虾蟆(黄药子)(136)(305)
.....(415)		建陈皮(橘皮)
金线吊葫芦(翻白草)(232)(271)
.....(56)		建青黛(青黛)
金线吊葫芦(金果榄)(374)(72)
.....(84)		建使君(使君子)
(白药子)(186)(305)

建泽泻(泽泻)(377)	贯渠(贯众)(313)
.....(213)			
建莲子(莲子)(573)	贯锁(老鹳草)(185)
.....(576)			
建莲米(莲子)(419)	贯众炭(贯众)(313)
.....(576)			
建菖蒲(石菖蒲)(231)	贯樟根(胡颓子根)(193)
.....(477)			
建阳八座(蛇床子)(12)	贯叶柴胡(柴胡)(24)
.....(614)			
建使君子(使君子)(68)	贝母血藤(鸡血藤)(373)
.....(305)			
建设菜子(地肤子)(88)	线芥(荆芥)(6)
.....(229)			
屈人(刺蒺藜)(88)	线金胶(鱼鳔)(533)
.....(463)			
屈据(茜草)(312)	线柳叶(柳叶)(113)
.....(335)			
屈膝仔(爵床)(104)	线柳枝(柳枝)(113)
.....(111)			
刷把头(大蓟)(236)	线柳须(柳根)(114)
.....(316)			
(大黄)(175)	线柳根(柳根)(114)
.....(143)			
陕西木蓝根(山豆根)(313)	线麻根(苎麻根)(321)
.....(82)			
降丹(白降丹)(313)	线香草(徐长卿)(170)
.....(599)			
降药(白降丹)(343)	线麻子(火麻仁)(148)
.....(599)			
降真(降香)(313)	线麻仁(火麻仁)(148)
.....(377)			
降龙草(地耳草)(509)	线叶百合(百合)(550)
.....(242)			
降香檀(降香)(313)	线叶荞麦(荞麦)(234)
.....(377)			
降真香(降香)(313)	线形地榆(地榆)	

.....(322)	细叶艾(艾叶).....(338)(127)
线形瞿麦(银柴胡)(140)	细叶青(毛冬青)(368)	细紫草(紫草)(63)
线茶根皮(远志)(450)	细叶黄(地耳草)(242)	细节菖蒲(石菖蒲)(477)
线齿沙参(沙参)(535)	细叶蒿(青蒿) (茵陈蒿)(136)	细叶小蘖(地骨皮)(139)
线柳根须(柳根)(114)	细生地(生地黄)(228)	细叶石斛(石斛)(543)
线麻子花(仙鹤草)(329)	细竹草(水蜈蚣)(247)	细叶冬青(毛冬青)(368)
线萼辛夷(辛夷)(13)	细竹茹(竹茹)(409)	细叶地榆(地榆)(322)
线叶旋复花(旋复花)(399)	细米草(半边莲)(78)	细叶防风(防风)(7)
线麻子花芽(鹤草芽)(309)	细条参(沙参)(535)	细叶远志(远志)(450)
练习(川楝子)(286)	细沙扭(翻白草)(56)	细叶青蒿(茵陈蒿)(228)
细石(石膏)(30)	细青皮(青皮)(273)	细叶柳子(白花蛇舌草)(96)
细身(细辛)(260)	细青蒿(青蒿)(136)	细叶茜草(猪殃殃)(120)
细参(细辛)(260)	细齿草(猪殃殃)(120)	细叶香桂(肉桂)(257)
细茶(茶叶)(396)	细香葱(葱白)(14)	细叶香薷(香薷)(5)
细草(细辛)(260)	细桂枝(桂枝)(2)	细叶费菜(景天三七)(335)
细木通(木通)(218)	细黄草(石斛)(543)	细叶柴胡(柴胡)(24)
细丹皮(牡丹皮)(60)	细理石(石膏)(30)	细叶菖蒲(石菖蒲)(477)
细牙皂(皂莢)(393)	细蛇迹(茅莓)	细叶槐花(槐花)(327)
细牙家(六月雪)(246)		细叶槐枝(槐枝)(328)

细叶槐角(槐角)(465)	京芎(川芎)(343)
.....(329)		京夏(半夏)(388)
细白花草(刘寄奴)(348)	京大吉(大戟)(154)
.....(351)		京大戟(大戟)(154)
细花百部(百部)(65)	京三棱(三棱)(348)
.....(419)		京川贝(川贝母)(405)
细茎石斛(石斛)(87)	京牛黄(牛黄)(74)
.....(543)		京甘遂(甘遂)(151)
细草根皮(远志)(383)	京半夏(半夏)(388)
.....(450)		京红粉(升药)(599)
细黑豆皮(稽豆衣)(173)	京赤芍(赤芍)(62)
.....(465)		京杏仁(甜杏仁)(419)
细黑豆衣(稽豆衣)(543)	京苍术(苍术)(198)
.....(465)		京知母(知母)(32)
细三角藤根(白药子)(124)	京河车(紫河车)(516)
.....(132)		京法夏(半夏)(388)
细叶凤尾草(凤尾草)(124)	京茅术(苍术)(198)
.....(244)		京菖蒲(石菖蒲)(477)
细叶白头翁(白头翁)(236)	京管牛黄(牛黄)	
.....(89)			
细叶芝麻铃(农吉利)(48)		
.....(120)			
细叶角茴香(角茴香)(321)		
.....(87)			
细叶刺针草(豨莶草)(478)		
.....(167)			
(千年健)			
.....(181)			
细叶青萎藤(石南藤)(333)		
.....(190)			
细叶青萎藤(海风藤)(341)		
.....(187)			
细叶香蒲黄(蒲黄)(478)		
.....(337)			
细叶铁线莲(透骨草)(62)		
.....(183)			
细叶猪屎豆(决明子)(469)		
(22)		

..... (74)	夜合花根 (百合) (77)
变叶赤芍 (赤芍) (62)	夜合草子 (决明子) (465)	疙瘩草 (甘草) (493)
变色白薇 (白薇) (138)	夜合树花 (合欢皮) (452)	疙瘩菜子 (牛蒡子) (16)
兗州卷柏 (地柏枝) (326)	夜关门子 (决明子) (465)	疙瘩皮树花 (密蒙花) (40)
育沛 (琥珀) (448)	夜花老皮 (合欢皮) (452)	放杖草 (淫羊藿) (505)
夜干 (射干) (81)	夜来香根 (月见草) (195)	放屁虫 (斑蝥) (622)
夜光 (地锦草) (104)	夜游将军 (蟼螂) (447) (296)
夜呼 (商陆) (156)	夜合欢树皮 (合欢皮) (452)	放棍行 (接骨木) (378)
夜合皮 (合欢皮) (452)	夜合花树皮 (合欢皮) (452)	於菟骨 (虎骨) (175)
夜合米 (合欢花) (452)	底珍 (无花果) (88)	刻叶黄荆 (黄荆) (438)
夜合花 (合欢花) (452)	底线补 (白薇) (138)	刻叶刺儿菜 (大蓟) (316)
夜合根 (何首乌) (529)	底野迦 (鸦片) (440) (小蓟) (318)
夜来香 (月见草) (195)	痘子花 (木槿花) (131)	闹鱼花 (芫花) (152)
夜拉子 (决明子) (465)	疮疾草 (水蜈蚣) (247)	闹虱药 (百部) (419)
夜鸣虫 (蟋蟀) (251)	(鹅不食草) (196)	怕丑草 (含羞草) (245)
夜牵牛 (紫菀) (421)	疙瘩七 (珠儿参) (537)	怕羞草 (含羞草) (245)
夜息花 (薄荷) (15)	疙瘩头 (甘草) (493)	炎凉小子 (生姜) (4)
夜摩草 (水蜈蚣) (247)	疙瘩羌 (羌活) (9)	炉贝 (川贝母) (405)
夜叉头干 (牛蒡子) (16)	疙瘩参 (拳参)	炉底 (密陀僧) (605)

炉贝母(川贝母)(331)	空心通草(通草)
.....(405)	(219)
炉先生(炉甘石)(600)	空心柴胡(柴胡)
.....(606)	(24)
炉眼石(炉甘石)(257)	空桐树皮(海桐皮)
.....(606)	(179)
房木(辛夷)(402)	穹穷(川芎)
.....(13)	(343)
房图(桔梗)(248)	宛童(桑寄生)
.....(395)	(172)
郎头花(漏芦)(82)	实白薇(白前)
.....(100)	(401)
郎君豆(相思子)(67)	(白薇)
.....(615)	(138)
郎耶草(狼把草)(48)	实枣儿(山茱萸)
.....(111)	(582)
试剑草(鹿衔草)(405)	实心通草(通草)
.....(370)	(219)
宝贝(浙贝母)(67)	卷丹(百合)
.....(407)	(550)
(紫贝齿)(408)	卷耳(苍耳草)
.....(459)	(12)
宝珠草(蛇莓)(239)	卷葵(大豆黄卷)
.....(128)	(19)
宝鼎香(姜黄)(74)	卷子根(乌柏木根皮)
.....(347)	(158)
宝鸡白芍(白芍)(401)	卷根皮(乌柏木根皮)
.....(531)	(153)
定粉(铅粉)(535)	卷叶贝母(川贝母)
.....(600)	(405)
定元根(了哥王)(179)	卷叶百合(百合)
.....(110)	(550)
定海根(马兜铃)(398)	卷叶黄精(黄精)
.....(428)	(547)
定风草根(天麻)(46)	卷莲花根(百合)
.....(462)	(550)
定海针皮(棕榈皮)(48)	卷根白皮(乌柏木根皮)

单芽狗脊蕨(贯众)(388)
法半夏(半夏)(388)
单门(鹿茸)(498)
净芒硝(芒硝)(145)
单勾(钩藤)(461)
净米仁(薏苡仁)(214)
单片芽(半边莲)(78)
净杏仁(杏仁)(418)
单叶草(石韦)(223)
净没药(没药)(376)
单枝党(党参)(482)
净肠草(芥菜)(319)
单卷朴(厚朴)(200)
净钩钩(钩藤)(461)
单钩藤(钩藤)(461)
净萸肉(山茱萸)(582)
单桃仁(桃仁)(360)
净蒲黄(蒲黄)(337)
单子麻黄(麻黄)(1)
净蝉衣(蝉脱)(17)
单枝党参(党参)(482)
净藁本(藁本)(11)
单药败酱(败酱草)(94)
河车(紫河车)(516)
单穗升麻(升麻)(26)
河柳(柽柳)(15)
单叶铁线莲(威灵仙)(162)
河蛤壳(海蛤壳)(411)
(木通)	
河州大黄(大黄)(143)
.....(218)	
单叶蔓荆子(蔓荆子)(22)
河朔荛花(荛花)(152)
单边冬瓜皮(冬瓜皮)(230)
河北枸杞子(枸杞)(556)
单芽狗脊蕨(贯众)(313)
法下(半夏)(388)
单列刺赖毛子(鹤虱)(310)
法夏(半夏)(273)
油桂(肉桂)(257)
油胆(熊胆)(97)
油脑(樟脑)(621)
油麻(黑脂麻)(552)
油跋(天南星)(390)
油葱(芦荟)(147)
油木通(木通)(218)
油叶树(四季青)(102)
油水蛭(水蛭)(383)
油肉桂(肉桂)(257)
油当归(当归)(526)
油瓜蒌(瓜蒌)(404)
油松节(松节)(192)
油松香(松香)(618)
油虎骨(虎骨)(175)
油草子(豨莶草)(167)
油茶柑(青皮)(273)

油面风(地柏枝)(535)	波叶大黄(土大黄)
.....(326)	(西洋参)(112)
油桂通(肉桂)(481)	(大黄)
.....(257)	泡姜(干姜)(143)
油桔楼(瓜蒌)(256)	(羊蹄)
.....(404)	泡通(通草)(340)
油耙菜(益母草)(219)	波叶鸭跖草(鸭跖草)
.....(355)	泡三棱(三棱)(38)
油豹骨(豹骨)(348)	泥菖(水菖蒲)
.....(176)	泡子草(锦灯笼)(247)
油麻子(黑脂麻)(88)	泥精(寒水石)
.....(552)	泡光参(人参)(31)
油麻仁(黑脂麻)(478)	泥冰子(山慈姑)
.....(552)	泡竹叶(番泻叶)(101)
油滴菜(败酱草)(147)	泥宾子(山慈姑)
.....(94)	泡远志(远志)(101)
油樟脑(樟脑)(450)	泥蜡壳(瓦楞子)
.....(621)	泡花桐(臭椿桐)(627)
油马钱子(马钱子)(169)	泥菖蒲(石菖蒲)
.....(613)	泡沙参(沙参)(477)
油茶寄生(桑寄生)(535)	(水菖蒲)
.....(172)	泡泡草(锦灯笼)(247)
油柑树皮(紫荆皮)(88)	治茜(菊花)
.....(114)	沿钩子(覆盆子)(21)
油菜花蜜(蜂蜜)(585)	泽下(泽泻)
.....(497)	沿壁藤(络石藤)(213)
油海狗肾(海狗肾)(186)	泽夕(泽泻)
.....(521)	沿篱豆(扁豆)(213)
油葫芦草(牛筋草)(492)	泽巨(瓜蒌)
.....(225)	沿阶草根(麦门冬)(404)
油甘子树皮(紫荆皮)(540)	泽兰(佩兰)
.....(114)	渡猴帽(卷柏)(203)
油炙马钱子(马钱子)(325)	泽芝(泽泻)
.....(613)	添(贯众)(213)
泗水草菱(草菱)(313)	泽芝(莲子)
.....(263)	波扣(白豆蔻)(576)
泡参(沙参)(206)	泽芬(白芷)

泽洽(瓜蒌)	泻痢草芽(鹤草芽)	春麻(天麻)
.....(404)(309)(462)
泽败(败酱草)	【九画】	春蝎(金蝎)
.....(94)	毒公(乌头)(466)
泽姑(瓜蒌)(255)	春三七(三七)
.....(401)	毒红豆(相思子)(353)
泽泄(泽泻)(615)	春牛头(商陆)
.....(213)	毒鱼子(巴豆)(158)
泽蒜(薤白)(153)	春尖皮(椿皮)
.....(289)	毒鱼草(芫花)(570)
泽漆(泽泻)(152)	春桔梗(桔梗)
.....(213)	毒鱼藤(了哥王)(395)
泽巨子(瓜蒌子)(110)	春砂仁(砂仁)
.....(434)	毒药草(藜芦)(204)
泽巨仁(瓜蒌子)(592)	春砂壳(砂仁壳)
.....(434)	毒除根(了哥王)(206)
泽兰叶(泽兰)(110)	春柴胡(柴胡)
.....(352)	春七(三七)(24)
泽光砂(朱砂)(333)	春黄芪(黄芪)
.....(441)	春花(辛夷)(486)
泽治子(瓜蒌子)(13)	春榆叶(榆叶)
.....(434)	春角(鹿角)(250)
泽治仁(瓜蒌子)(500)	春榆皮(榆白皮)
.....(431)	春荼(茶叶)(250)
泽姑子(瓜蒌子)(396)	春榆英(榆钱)
.....(431)	春胡(柴胡)(453)
泽姑仁(瓜蒌子)(24)	春榆钱(榆钱)
.....(431)	春茸(鹿茸)(453)
泽漆麻(罗布麻)(498)	春颠皮(椿皮)
.....(471)	春草(白薇)(570)
泻叶(番泻叶)(138)	春阳树皮(椿皮)
.....(147)	春柳(柽柳)(570)
泻叶茶(番泻叶)(15)	春莲秋柳(穿心莲)
.....(147)	春砂(砂仁)(73)
泻痢草(仙鹤草)(204)	春莲夏柳(穿心莲)
.....(329)	春梅(乌梅)(73)

春菜树皮(椿皮)(570)	珍珠层粉(珍珠母)(239)	黄蒿(防风)(7)
春榆白皮(榆白皮)(250)	珍珠石榴皮(石榴皮)(458)	菊根(商陆)(156)
春榆根白皮(榆白皮)(250)	珍珠透骨草(透骨草)(571)	菊苣(鹤虱)(310)
玳瑁片(玳瑁)(459)	玲珑霍去病(藿香)(183)	奎藉(五味子)(565)
玳瑁粉(玳瑁)(459)	琥珀留(卷柏)(202)	革拔(革麦)(263)
玳玳花枳壳(枳壳)(276)	荆子(蔓荆子)(22)	革拔(革麦)(263)
玳玳橡枳壳(枳壳)(276)	荆条(黄荆)(438)	革茄(革澄茄)(264)
珊瑚豆(相思子)(615)	荆三棱(三棱)(348)	革拔梨(革麦)(263)
珊瑚架(锦灯笼)(83)	荆竹茹(竹茹)(409)	革茂穗(革麦)(263)
珊瑚柳(锦灯笼)(83)	荆芥穗(荆芥)(6)	芥果蕨(贯众)(313)
珊瑚配(接骨木)(373)	荆条子(蔓荆子)(22)	芥果蕨贯众(贯众)(313)
珊瑚菜根(沙参)(535)	荆桃核(樱桃核)(29)	茱萸(花椒)(263)
珍珠贝(川贝母)(405)	荆树皮(土槿皮)(315)	茈(紫草)(63)
珍珠风(紫珠)(320)	荆桑叶(桑叶)(19)	茈草(紫草)(63)
珍珠草(铁苋菜)(241) (谷精草)	荆树根皮(土槿皮)(315)	茈胡(柴胡)(24)
珍珠粉(珍珠)(39)	菖片(鹿茸)(498)	茈姜(干姜)(256)
珍珠贝壳(珍珠母)(457)	茜米(海藻)(413)	茈菀(紫菀)(421)
珍珠米须(玉米须)(458)	茜根(茜草)(335)	茈莫(紫草)(63)
				茈蕨花(凌霄花)	

..... (364)	草三棱 (三棱) (208)
草乌 (乌头) (348)	草豆蔻 (草果)
..... (255)	草芍药 (卷柏) (208)
草节 (甘草) (325)	草灵脂 (五灵脂)
..... (493)	草木樨 (地肤子) (380)
草叩 (草豆蔻) (229)	草附子 (香附)
..... (208)	(佩兰) (282)
草扣 (草豆蔻) (203)	草青蒿 (青蒿)
..... (208)	(黄芪) (136)
草兵 (巴豆) (486)	草杨莓 (茅莓)
..... (153)	草乌头 (乌头) (127)
草角 (鹿角) (255)	草果子 (草果)
..... (500)	草龙牙 (仙鹤草) (208)
草果 (草豆蔻) (329)	草果仁 (草果)
..... (208)	草龙胆 (龙胆草) (208)
草茸 (鹿茸) (54)	草珊瑚 (威灵仙)
..... (498)	草甘遂 (蚤休) (162)
草姜 (射干) (75)	草金丹 (杏仁)
..... (81)	草叩仁 (草豆蔻) (418)
草稍 (甘草) (208)	草金铃 (牵牛子)
..... (493)	草白前 (白前) (155)
草蓬 (艾叶) (401)	草鱼胆 (猪胆汁)
..... (338)	草芍药 (赤芍) (417)
草蒿 (茵陈蒿) (62)	草河车 (蚤休)
..... (228)	草血竭 (地锦草) (75)
(青蒿) (104)	(拳参)
..... (136)	草红花 (红花) (77)
(黄花蒿) (361)	草泽兰 (泽兰)
..... (197)	草决明 (决明子) (352)
草摄 (鱼腥草) (465)	草钟乳 (韭菜)
..... (80)	(青葙子) (290)
草蔻 (草豆蔻) (41)	草珠儿 (薏苡仁)
..... (208)	草远志 (远志) (214)
草大麦 (麦芽) (450)	草珠子 (薏苡仁)
..... (301)	草赤芍 (赤芍) (214)
草大戟 (大戟) (62)	草珠兰 (草珊瑚)
..... (154)	草豆叩 (草豆蔻) (108)

草鵝头(貫众)(79)	茴香八角珠(八角茴香)
.....(313)	(268)
草麻子(蓖麻子)(524)	茧北(卷柏)
.....(616)	(325)
草麻黃(麻黃)(40)	翦子(附子)
.....(1)	(254)
草蕘藜(沙苑子)(241)	茱萸子(吳茱萸)
.....(518)	(258)
草蒿子(青葙子)(214)	莽根(大戟)
.....(41)	(154)
(青蒿)		莽子根(薤白)
.....(136)	(289)
草蔻仁(草豆蔻)(624)	莽壳草(地耳草)
.....(208)	(242)
草蒲花(蒲黃)(237)	莽蔓头(红药子)
.....(337)	(231)
草蒲黃(蒲黃)(325)	莽麥三七(金莽麥)
.....(337)	(103)
草莞苔(黃藥子)(228)	莽麥叶大百合(馬兜鈴)
.....(415)	(428)
草莞薯(黃藥子)(228)	茯毛(大腹皮)
.....(415)	(297)
草鞋刺(大薊)(136)	茯灵(茯苓)
.....(316)	(210)
草大青叶(大青叶)(228)	茯免(茯苓)
.....(70)	(210)
草大青根(板藍根)(7)	茯神(茯苓)
.....(71)	(210)
草天葵子(向日葵子)(268)	茯菟(茯苓)
.....(554)	(210)
草虫負蠶(蟻蟲)(小茴香)	茯菟个(茯苓)
.....(332)	(210)
草决明子(決明子)(267)	茯苓皮(茯苓)
.....(465)	(210)
草地烏头(秦艽)(7)	茯苓块(茯苓)
.....(166)	(210)
草禹余粮(土茯苓)(236)	茯苓草(翻白草)

茯背虫(全蝎)	茶喂(鱼腥草)	蒸橘(羌荑)
………(466)	………(80)	………(312)
茯神木(茯苓)	………(41)	蒸瑞子(羌荑)
………(210)	茶叶麻(罗布麻)	………(312)
茯神心(茯苓)	………(41)	茹草(柴胡)
………(210)	茶色蛭(水蛭)	………(241)
茯神块(茯苓)	………(383)	茹根(白茅根)
………(210)	茶婆虫(盛虫)	………(321)
茯神心木(茯苓)	………(382)	茹蕙(茜草)
………(210)	茶辣子(吴茱萸)	………(335)
桂子(苏子)	………(258)	菟薈(黄芩)
………(424)	茶叶冬青(毛冬青)	………(48)
(紫苏)	………(368)	萱蓼(荭草)
………(3)	茶叶棵子(刘寄奴)	………(194)
庭葵菜(胡荽)	………(351)	茺蔚子(水红花子)
………(14)	瓠(瓜蒌)	………(360)
薤葛草(胡荽)	………(404)	茺蓼子(水红花子)
………(14)	瓠子(瓜蒌子)	………(360)
茗(茶叶)	………(434)	茺蓼花(茺草花)
………(396)	贲仁(瓜蒌子)	………(359)
舜(茶叶)	………(434)	药王(徐长卿)
………(396)	荔枝仁(荔枝核)	………(170)
茎皮(地骨皮)	………(287)	药本(五灵脂)
………(136)	荔枝核(荔枝核)	………(380)
荼(茶叶)	………(287)	药瓜(瓜蒌)
………(396)	荔枝奴(龙眼肉)	………(404)
荼蕡(蘋本)	………(534)	药芹(芹菜)
………(11)	荔枝(支)红(土牛膝)	………(472)
荼豆(扁豆)	………(366)	药沉(沉香)
………(492)	荔枝花蜜(蜂蜜)	………(285)
荼芽(茶叶)	………(497)	药茴(马勃)
………(396)	菟葵(荸荠)	………(83)
荼砖(茶叶)	………(552)	药茶(海藻)
………(396)	蓖苈(荸荠)	………(413)
荼菊(菊花)	………(552)	药枣(山茱萸)
………(21)	荼子(吴茱萸)	………(582)

药实(川贝母)(21)	茺玉子(茺蔚子)(356)
药菖蒲(菊花)(405)	药菖蒲(石菖蒲)(477)
药渠(贯众)(21)	药锁匙(金果榄)(84)
药渠(贯众)(313)	药五味子(五味子)(565)
药藻(贯众)(313)	药用大黄(大黄)(143)
药藤(白芷)(10)	药用光蠧(蠧虫)(382)
药大黄(大黄)(143)	药胶香树(乳香)(374)
药山楂(山楂)(298)	药蝇子草(藜芦)(592)
药王草(威灵仙)(162)	蕓菜(苜蓿菜)(127)
药百合(百合)(550)	莽(莽菜)(319)
药玉米(薏苡仁)(214)	(蒺藜)(463)
药瓜子(瓜蒌子)(434)	莽虉(桔梗)(395)
药瓜仁(瓜蒌子)(434)	莽只菜(芥菜)(319)
药芹菜(芹菜)(472)	莽茅毛(小蓟)(318)
药狗丹(天南星)(390)	莽莽菜(莽菜)(319)
药狗蛋(半夏)(388)	(小蓟)(318)
药鱼花(茺花)(152)	莽菜杷杷子(冬葵子)(236)
药虱药(百部)(419)	茭白(薤白)(289)
药料胶(阿胶)(532)	茺蔚(益母草)(355)
药菊花(菊花)			

南藤(石南藤)(190)	南苍术(苍术)(198)	南椒目(椒目)(263)
南大黄(大黄)(143)	南杏仁(甜杏仁)(419)	南鹤虱(鹤虱)(310)
南大戟(大戟)(154)	南豆花(扁豆花)(493)	南橘叶(橘叶)(250)
南山楂(山楂)(298)	南豆根(山豆根)(82)	南橘核(橘核)(272)
南马勃(马勃)(83)	南沙参(沙参)(535)	南薤白(薤白)(289)
南木香(木香)(280)	南败酱(败酱草)(94)	南薄荷(薄荷)(15)
南五加(五加皮)(173)	南岸连(黄连)(50)	南藕节(藕节)(342)
南五夹(五加皮)(173)	南细辛(细辛)(260)	南藿香(藿香)(202)
南五味(五味子)(565)	南草根(续断)(508)	南麝香(麝香)(473)
南丹参(丹参)(349)	南香附(香附)(282)	南川大黄(大黄)(143)
南白前(白前)(401)	南香薷(香薷)(5)	南天竺草(瞿麦)(234)
南瓜仁(南瓜子)(309)	南扁豆(扁豆)(492)	南五加皮(五加皮)(173)
南百合(百合)(550)	南前胡(前胡)(402)	南五味子(五味子)(565)
南全虫(全蝎)(466)	南海决(石决明)(455)	南方虎骨(虎骨)(175)
南全蝎(全蝎)(466)	南桔梗(桔梗)(395)	南方蝼蛄(蝼蛄)(251)
南红花(红花)(361)	南柴胡(柴胡)(24)	南石防风(前胡)(402)
南芡实(芡实)(531)	南蛇旁(莲子)(576)	南刘寄奴(刘寄奴)(351)
南芫花(芫花)(152)	南蛇根(雷公藤)(610)	南根蓝根(板蓝根)(71)
	南银花(金银花)	

南京梧桐(高树)(512)	胡故子(补骨脂)(512)
南岭荛花(了哥王)(110)	胡韭子(补骨脂)(512)
南扁豆衣(扁豆衣)(492)	胡须泡(海藻)(413)
南扁豆花(扁豆花)(493)	胡狲姜(骨碎补)(510)
南洋金花(洋金花)(439)	胡桃仁(胡桃肉)(515)
南菟丝子(菟丝子)(517)	胡麻子(黑脂麻)(552)
南葶苈子(葶苈子)(426)	(亚麻子)(553)
南方大斑蝥(斑蝥)(622)	胡麻仁(亚麻子)(553)
南昌金钱草(金钱草)(221)	(黑芝麻)(552)
南京地皮风(钻地风)(180)	胡椒笏(两面针)(109)
南路蛇头党(党参)(482)	胡蜂房(露蜂房)(624)
南五味子根皮(紫荆皮)(114)	胡蜂窠(露蜂房)(624)
南瓜叶马兜铃(青木香)(288)	胡蜣螂(蜣螂)(447)
故子(补骨脂)(512)	胡颓叶(胡颓子叶)(432)
故之(补骨脂)(512)	胡鞬子(苍耳子)(11)
故纸(补骨脂)(512)	胡薄荷(金钱草)(221)
(木蝴蝶)(436)	胡燕脂(冬葵子)(236)
故脂(补骨脂)(512)	胡王使者(白头翁)(89)
故之子(补骨脂)(439)	(羌活)	

..... (9)	枯芩 (黄芩) (280)
葫芦巴子 (胡芦巴) (506)	枯矾 (明矾) (48)	(香橼) (278)
胡桃核仁 (胡桃肉) (515)	枯草 (益母草) (603)	枳枣 (枳根子) (560)
胡麻饭子 (亚麻子) (553)	枯蝉 (蝉蜕) (355)	枳实片 (枳实) (275)
带皮草 (牡草) (493)	枯石榴 (石榴皮) (17)	枳枸子 (枳根子) (560)
带壳蔻 (白豆蔻) (206)	枯草穗 (夏枯草) (571)	枳枸果 (枳根子) (560)
带心连翘 (连翘) (67)	枯桑叶 (桑叶) (37)	柚 (枳实) (275)
带皮三棱 (三棱) (348)	枯黄芩 (黄芩) (48)	(香橼) (278)
带皮甘草 (甘草) (493)	枯萝卜 (地骷髅) (398)	柚皮 (橘红) (272)
带皮莲子 (莲子) (576)	柯子 (河子) (572)	柚类橘红 (橘红) (272)
带褐茜草 (茜草) (335)	柄果花椒 (花椒) (263)	柏子 (柏子仁) (440)
要高藿香 (蕃香) (202)	柄扁桃仁 (郁李仁) (140)	柏仁 (柏子仁) (440)
柬埔寨龙血树 (血竭) (620)	柘树子 (楮实) (559)	柏叶 (侧柏叶) (324)
革蜂窠 (露蜂房) (624)	柘树果 (楮实) (559)	柏皮 (黄柏) (52)
革蜂子窝 (露蜂房) (624)	相思子 (赤小豆) (231)	柏麦 (柏子仁) (440)
勃氏黎豆藤 (鸡血藤) (373)	相思虫 (青娘子) (386)	柏实 (柏子仁) (440)
栈香 (沉香) (285)	相思豆 (相思子) (615)	柏子霜 (柏子仁) (440)
柑皮 (橘皮) (271)	相思藤豆 (相思子) (615)	柏树叶 (侧柏叶) (324)
柑子皮 (橘皮) (271)	枳 (柚橘)	柏树枝 (侧柏叶) (324)

柏子仁霜(柏子仁)(275)	枸杞根白皮(地骨皮)
.....(440)	(139)
柏子树叶(侧柏叶)(560)	枸杞菜根皮(地骨皮)
.....(324)	(139)
柏勒儿茶(孩儿茶)(43)	柳条(柳枝)
.....(619)	(十大功劳叶)(113)
柏勒树儿茶(孩儿茶)(124)	柳青(琥珀)
.....(619)	(448)
拘子(枳椇子)(43)	柳须(柳根)
.....(560)	(114)
枸杞(枸杞子)(280)	柳桂(桂枝)
.....(555)	(枸杞子)(2)
枸桔(枸橘)(555)	柳叶桃(夹竹桃)
.....(280)	(249)
枸根(地骨皮)(139)	柳叶蓼(辣蓼)
.....(139)	(193)
枸橼(枳实)(139)	柳枝蠧(徐长卿)
.....(275)	(170)
(枳壳)		柳树叶(柳叶)
.....(276)	(113)
(香橼)		柳树根(柳根)
.....(278)	(114)
枸杞豆(枸杞子)(275)	柳寄生(桑寄生)
.....(555)	(172)
枸杞果(枸杞子)(280)	柳榆子(茺蔚)
.....(555)	(312)
枸杞根(地骨皮)(555)	柳絮矾(明矾)
.....(139)	(603)
枸忌子(枸杞子)(278)	柳叶牛膝(土牛膝)
.....(555)	(366)
枸忌根(地骨皮)(278)	柳叶牛膝(土牛膝)
.....(139)	(366)
枸茄茹(枸杞子)(278)	柳叶白前(白前)
.....(555)	(401)
枸枳壳(枳壳)(555)	柳叶细辛(徐长卿)
.....(276)	(170)
枸枳实(枳实)(139)	柳叶蚂蟥(水蛭)

柱腺独行菜(葶苈子)(248)
柳叶栎叶(夹竹桃)	面参(西洋参)
.....(249)(481)
柳叶紫花(瓜子金)	面杆杖(沙参)
.....(437)(535)
柳树根须(柳根)	面其菜(昆布)
.....(114)(414)
栎叶槲蕨(骨碎补)	面根藤(狗狗秧)
.....(510)(240)
槐子(吴茱萸)	面藤子(五味子)
.....(258)(565)
被子(榧子)	面条棵子(王不留行)
.....(312)(367)
柽(柽柳)	咸(玄参)
.....(15)(59)
树豆(扁豆)	咸鹾(食盐)
.....(492)(135)
树挂(松萝)	咸大云(肉苁蓉)
.....(115)(503)
树莓(覆盆子)	咸大芸(肉苁蓉)
.....(585)(503)
树脑(樟脑)	咸全蝎(全蝎)
.....(621)(466)
树蟹(枳椇子)	咸苁蓉(肉苁蓉)
.....(560)(503)
树地瓜(无花果)	咸附子(附子)
.....(88)(254)
树顶子(四季青)	咸秋石(秋石)
.....(102)(46)
树上猴姜(骨碎补)	咸硝砂(硝砂)
.....(510)(602)
树骨碎补(骨碎补)	咸匏头(胡颓子)
.....(510)(304)
柱角(犀角)	咸酸草(酢浆草)
.....(57)(241)
柱果铁线莲(威灵仙)	咸骨(虎骨)
.....(162)(175)
柠檬萱草(萱草根)	

厚皮(厚朴)(204)	挟剑豆(刀豆)(291)
厚杜仲(杜仲)(507)	砂米(砂仁)(204)
厚叶木香(青木香)(288)	砂壳(砂仁)(204)
虱(全蝎)(466)	砂汞(水银)(597)
虱尾虫(全蝎)(466)	砂果(砂仁)(204)
奎潞(党参)(482)	砂仁壳(砂仁)(204)
奎砂仁(砂仁)(204)	砂药草(鹅不食草)(196)
牵牛(牵牛子)(155)	砂蓝刺头(漏芦)(100)
牵牛仁(牵牛子)(155)	砂炙马钱子(马钱子)(613)
牵巴巴(老鹳草)(185)	残飞坠(蒲公英)(68)
牵牛花子(牵牛子)(155)	残竹草(萹蓄)(233)
耐冬(络石藤)(186)	残猪草(萹蓄)(233)
耐旱菜(马齿苋)(89)	虺床子(蛇床子)(614)
砒黄(砒石)(596)	挂兰青(鸭跖草)(38)
砒霜(砒石)(596)	挂拉豆(茜草)(335)
研螺(紫贝齿)(459)	挂金灯(锦灯笼)(88)
砍茸(鹿茸)(498)	挂钩藤(钩藤)(461)
砂王(砂仁)(204)	挂鼠屎(夜明砂)(42)
砂头(砂仁)		挂鼠粪(夜明砂)(42)

指甲桃棵 (凤仙草)	点椒 (花椒)	竖毛鸡眼草 (萹蓄)
..... (357) (263) (233)
挖耳草 (半支莲)	点地梅 (喉胧草)	胃焦 (桑螵蛸)
..... (118) (86) (584)
（鹤虱）	点椒目 (椒目)	星大海 (胖大海)
..... (310) (263) (416)
挖耳朵草 (谷精草)	点儿猴皮 (蝉蜕)	星宿草 (金钱草)
..... (39) (17) (221)
枳 (连翘)	点地梅草 (喉胧草)	显脉旋复花 (威灵仙)
..... (67) (86) (162)
轻马勃 (马勃)	点燎子皮 (蝉蜕)	赤履支 (胡椒)
..... (83) (17) (269)
轻圆炭 (灯心草)	点花滇龙胆 (龙胆草)	煅参 (三七)
..... (235) (54) (333)
鸦胆 (鸦胆子)	背阴草 (凤尾草)	满山红 (满山红)
..... (93) (244) (432)
鸦柏 (乌柏木根皮)	背荫草 (凤尾草)	（矮地茶）
..... (158) (244) (430)
鸦柏根皮 (乌柏木根皮)	背洪子 (枳椇子)	映日果 (无花果)
..... (158) (530) (88)
鸦葱 (漏芦)	背暗异唇蝎 (地龙)	映山红果 (山楂)
..... (100) (469) (298)
鸦旦子 (鸦胆子)	韭 (韭菜)	晖叶荷草 (瓦松)
..... (93) (290) (129)
鸦蛋子 (鸦胆子)	韭蓬 (知母)	品仙果 (无花果)
..... (93) (32) (88)
鸦麻子 (亚麻子)	韭番 (百合)	莺结兜 (马兜铃)
..... (553) (550) (428)
鸦雀草 (鸭跖草)	韭菜子 (韭菜)	咽喉草 (角茴香)
..... (38) (524) (87)
鸦鹊板 (紫珠)	韭菜仁 (韭菜)	响亮草 (农吉利)
..... (320) (524) (120)
鸦衔草 (紫草)	韭叶麦冬 (麦门冬)	响铃子 (锦灯笼)
..... (63) (540) (88)
鸦片烟果果 (罂粟壳)	韭叶柴胡 (柴胡)	（农吉利）
..... (575) (24) (120)
	临时救 (金钱草)	

响铃草(农吉利)(158)	蚂蚱腿(柴胡)(24)
.....(120)			
思仙(杜仲)(158)	蚂蝗蜞(水蛭)(383)
.....(507)			
思仲(杜仲)(223)	虻(川贝母)(405)
.....(507)			
思益(山茱萸)(77)	贴墙子(壁钱)(626)
.....(532)			
思益子(蛇床子)(515)	贴梗海棠(木瓜)(169)
.....(614)			
毗陵茄子(革澄茄)(167)	炭包包(刘寄奴)(351)
.....(264)			
贵老(橘皮)(216)	省藤(红藤)(93)
.....(271)			
贵州龙胆(龙胆草)(216)	省头草(佩兰)(203)
.....(54)			
贵州梅片(冰片)(224)	削尖都尉(三棱)(348)
.....(474)			
骨皮(地骨皮)(215)	看灯花(款冬花)(423)
.....(139)			
骨美(白薇)(215)	看园老(千金子)(157)
.....(138)			
骨脂(补骨脂)(359)	看谷老(糠谷老)(238)
.....(512)			
骨丹皮(牡丹皮)(316)	拜药乳香(乳香)(374)
.....(60)			
骨爪钩(虎骨)(383)	毡毛石韦(石韦)(223)
.....(175)			
骨风消(草珊瑚)(383)	氟石(紫石英)(443)
.....(108)			
骨藓皮(白鲜皮)(383)	短蓖陀香(木香)(280)
.....(99)			
虹胜(黄芩)(382)	重台(蚤休)(75)
.....(48)			(玄参)
虹树皮(乌柏木根皮)(233)	蚂蚁菜(马齿苋)(59)
.....(158)			
虹模皮(乌柏木根皮)(89)	重皮(厚朴)	

重迈(百合)	钝叶决明(决明子)	香子(麝香)
.....(550)(465)(473)
重泽(甘遂)	钝齿龙牙草(仙鹤草)	(小茴香)
.....(151)(329)(267)
重药(鱼腥草)	钝齿红紫珠(紫珠)	香元(香橼)
.....(80)(320)(278)
重藉(百合)	钟乳(钟乳石)	香艾(艾叶)
.....(550)(270)(333)
重楼(拳参)	钟石榴皮(石榴皮)	香芋(黄药子)
.....(77)(571)(415)
(蚤休)	钟乳糖管石(钟乳石)	香戎(香薷)
.....(75)(270)(5)
重楼(黄精)	钢拳头(水蜈蚣)	香苏(爵床)
.....(547)(247)(111)
重藉(百合)	钢橘子(枸橘)	(豨莶草)
.....(550)(280)(167)
重台草(蚤休)	钩丁(钩藤)	香豆(葫芦巴)
.....(75)(461)(506)
重唇石斛(石斛)	钩耳(钩藤)	香松(甘松)
.....(543)(461)(293)
重楼金钱(蚤休)	钩钩(钩藤)	香果(川芎)
.....(75)(461)(343)
重齿毛当归(独活)	钩藤钩(钩藤)	香草(佩兰)
.....(161)(461)(203)
重瓣曼陀罗(洋金花)	钩叶黄精(黄精)	(零陵香)
.....(439)(547)(209)
复花(旋复花)	钩状石斛(石斛)	(地耳草)
.....(399)(543)(242)
复带蛇(虻虫)	钩藤钩子(钩藤)	香茹(香薷)
.....(385)(461)(5)
复盆子(覆盆子)	钩头橙枳壳(枳壳)	香草(香薷)
.....(585)(276)(5)
复箬碗草(积雪草)	钩头橙枳实(枳实)	香柰(山柰)
.....(225)(275)(270)
炬胜子(黑脂麻)	钯子草(老鹳草)	香结(大黄)
.....(552)(185)(143)
	钮子七(珠儿参)	

香萎(胡荽)(161)	香佩兰(佩兰)
.....(14)	(203)
香圆(香橼)(143)	香附子(香附)
.....(278)	(282)
香菜(香薷)(203)	香附米(香附)
.....(5)	(282)
香菜(胡荽)(293)	香谷芽(谷芽)
.....(14)	(302)
(香薷)		香青蒿(青蒿)
.....(5)	(136)
香堇(紫花地丁)(264)	香苦草(青蒿)
.....(69)	(136)
香豉(淡豆豉)(10)	(黄花蒿)
.....(18)	(197)
香葱(葱白)(138)	香枫果(路路通)
.....(14)	(369)
香椒(花椒)(173)	香泽兰(泽兰)
.....(263)	(352)
香椿(白芷)(136)	香泡果(香橼)
.....(10)	(278)
香柴(沉香)(197)	香草子(葫芦巴)
.....(285)	(506)
香蒿(黄花蒿)(589)	香草根(石菖蒲)
.....(197)	(477)
(青蒿)		香芥菜(芥菜)
.....(136)	(319)
香缘(香橼)(319)	香荆芥(荆芥)
.....(278)	(6)
(青皮)		香柏子(柏子仁)
.....(273)	(440)
香橼(枸橘)(424)	香柏仁(柏子仁)
.....(280)	(440)
香藤(天仙藤)(4)	香柏叶(侧柏叶)
.....(190)	(324)
(石南藤)		香独活(独活)
.....(190)	(161)
香大独(独活)(18)	香前胡(前胡)

..... (402)	香榧子 (榧子) (276)
香树皮 (椿皮) (312)	香樟枳实 (枳实)
..... (570)	香稻芽 (谷芽) (275)
香桂樟 (乌药) (302)	香叶子树根 (乌药)
..... (283)	香獐子 (麝香) (283)
香柴子 (草澄茄) (473)	香花岩豆藤 (鸡血藤)
..... (264)	香蕊脑 (樟脑) (373)
香柴胡 (柴胡) (621)	香花崖豆藤 (鸡血藤)
..... (24)	香樟脑 (樟脑) (373)
香脐子 (麝香) (621)	香花崖豆藤 (络石藤)
..... (473)	香薷本 (薷本) (186)
香娘子 (廑虫) (11)	香丽假人参 (三七)
..... (382)	香椽片 (香椽) (333)
香通脑 (樟脑) (278)	香椿芽树皮 (椿皮)
..... (621)	香椽皮 (香椽) (570)
香粉子 (草澄茄) (278)	秕麦 (浮小麦)
..... (264)	香橼柑 (香橼) (538)
香料娘 (芥菜) (278)	种术 (白术)
..... (319)	香丝菜子 (小茴香) (489)
香菖蒲 (石菖蒲) (267)	种田蒲 (茅莓)
..... (477)	香头草根 (香附) (127)
香根芹 (鹤虱) (282)	种洋参 (西洋参)
..... (310)	香首蓿子 (胡芦巴) (481)
香椒子 (花椒) (506)	秋叶 (臭梧桐)
..... (263)	香圆枳壳 (枳壳) (169)
香犀角 (犀角) (276)	秋虫 (蟋蟀)
..... (57)	香圆枳实 (枳实) (251)
香善菜 (芥菜) (275)	秋蒿 (黄花蒿)
..... (319)	香浆巴子 (锦灯笼) (197)
香蒲黄 (蒲黄) (88)	秋榆 (榆钱)
..... (337)	香椿木皮 (椿皮) (453)
香椿皮 (椿皮) (570)	秋虫干 (蟋蟀)
..... (570)	香椿树皮 (椿皮) (251)
香椿柳 (柽柳) (570)	秋丹石 (秋石)
..... (15)	香椿根皮 (椿皮) (46)
香摇边 (徐长卿) (570)	秋石霜 (秋石)
..... (170)	香橼枳壳 (枳壳) (46)

秋白霜(人中白)(535)	禹孙(泽泻)
.....(48)	(213)
秋打尾(鱼腥草)(60)	禹白芷(白芷)
.....(80)	(10)
秋丹皮(漏芦)(251)	禹余粮(土茯苓)
.....(100)	(79)
秋桔梗(桔梗)(13)	禹南星(天南星)
.....(395)	(390)
秋柴胡(柴胡)(282)	禹州天南星(天南星)
.....(24)	(390)
秋蝉壳(蝉蜕)(596)	鬼丑(甘遂)
.....(17)	(151)
科氏鼠兔(五灵脂)(596)	鬼目(羊蹄)
.....(380)	(340)
竿蔗(甘蔗)(596)	鬼虱(鹤虱)
.....(539)	(310)
笃卡苦(车前草)(596)	鬼脚(藁本)
.....(216)	(11)
顺片(附子)(402)	鬼扇(射干)
.....(254)	(81)
顺风旗(半边莲)(396)	鬼盖(人参)
.....(78)	(478)
顺江龙(芦根)(301)	鬼蒜(石蒜)
.....(33)	(593)
顺筋枝(接骨木)(575)	鬼箭(鬼箭羽)
.....(378)	(372)
便牵牛子(牛蒡子)(510)	鬼藏(玄参)
.....(16)	(59)
便婆茄子(紫葵仁)(392)	鬼见羽(鬼箭羽)
.....(214)	(372)
修脆(山药)(540)	鬼见愁(鬼箭羽)
.....(490)	(372)
修边丝(通草)(575)	鬼目花(凌霄花)
.....(219)	(364)
修边通草丝(通草)(392)	鬼目草(蜀羊泉)
.....(219)	(86)
保牙参(沙参)(100)	鬼目菜(蜀羊泉)

..... (86)	追风散 (青风藤) (335)
鬼仙木 (杜仲) (507)	追风箭 (墓头回)	狭叶蚤休 (蚤休) (75)
鬼芝麻 (刘寄奴) (351)	追地风 (钻地风)	狭叶柴胡 (柴胡) (24)
鬼羽愁 (鬼箭羽) (372)	追地枫 (钻地风)	狭叶蒲黄 (蒲黄) (337)
鬼灯火 (大青叶) (70)	追罗花 (凌霄花)	狭苞橐吾 (紫菀) (421)
鬼灯笼 (蒲公英) (68) （ 锦灯笼 ） (88)	追骨风 (青风藤)	狭翅秦艽 (秦艽) (166)
鬼灯檠 (山慈姑) (101)	追风使皮 (五加皮)	狭叶八月瓜 (八月札) (294)
鬼系腰 (络石藤) (186)	追风草子 (水红花子)	狭叶白鲜皮 (白鲜皮) (99)
鬼针草 (狼把草) (111)	追风草花 (茵草花)	狭叶向天葍 (半支莲) (118)
鬼油麻 (漏芦) (100)	须丸 (代赭石)	狭叶竹节参 (三七) (333)
鬼眼子 (相思子) (615)	须须药 (海金沙藤)	狭叶败酱草 (败酱草) (94)
鬼蒟蒻 (天南星) (390) (224)	狭叶岐繁缕 (银柴胡) (140)
鬼督邮 (徐长卿) (170) （ 天麻 ） (462)	匍匐苗 (狗狗秧)	狭叶韩信草 (半支莲) (118)
鬼籠子 (鬼箭羽) (372)	狭叶艾 (刘寄奴)	狭叶番泻叶 (番泻叶) (147)
鬼珠箭子 (蒿苡仁) (214)	狭叶牛夕 (土牛膝)	狭叶地瓜儿苗 (泽兰) (352)
鬼脸升麻 (升麻) (26)	狭叶牛膝 (土牛膝)	狭叶十大功劳叶 (十大 功劳叶) ... (124)
追风草 (茵草) (194)	狭叶白及 (白及)	狮子耳 (虎耳草) (123)
	狭叶百部 (百部)	狮子尾 (蛇莓) (128)
	狭叶赤芍 (赤芍)	（ 伸筋草 ） (182)
	狭叶茜草 (茜草)	

狮子草(伸筋草)(608)	独摇根(天麻)
.....(182)	独行虎(紫花地丁)(462)
(虎耳草)(69)	独薯根(了哥王)
.....(123)	独行根(青木香)(110)
(马齿苋)(288)	独头大蒜(大蒜)
.....(89)	独角牛(蜣螂)(608)
狮头参(党参)(447)	独行木香(青木香)
.....(482)	独角仙(蜣螂)(288)
狮岳菜(马齿苋)(447)	独行菜子(茅房子)
.....(89)	独角虎(蜣螂)(426)
狮子毛草(伸筋草)(447)	独角莲根(白附子)
.....(182)	(藏角蒿)(392)
狮子耳草(虎耳草)(530)	独角将军(蜣螂)
.....(123)	独角莲(鬼臼)(447)
独毛(仙茅)(45)	独角犀角(犀角)
.....(504)	(天南星)(57)
独茅(仙茅)(390)	独角蜣螂(蜣螂)
.....(504)	独角倍(五倍子)(447)
独活(白芷)(568)	独帚苗子(地肤子)
.....(10)	独茅根(仙茅)(229)
独根(黄芪)(504)	独脚仙茅(仙茅)
.....(486)	独采芝(天麻)(504)
独滑(独活)(462)	独脚丝茅(仙茅)
.....(161)	独荷草(鬼臼)(504)
独蒜(大蒜)(45)	独脚黄茅(仙茅)
.....(608)	独荷莲(鬼臼)(504)
(石蒜)(45)	独叶一枝花(蚤休)
.....(593)	独根菜(蔊菜)(75)
独椹(黄芪)(417)	(鬼臼)
.....(486)	独脚莲(蚤休)(45)
独毛根(仙茅)(75)	独叶一枝枪(天南星)
.....(504)	(鬼臼)(390)
独叶草(细辛)(45)	独花山牛蒡(漏芦)
.....(260)	独摇芝(天麻)(100)
独白草(乌头)(462)	独角蜣螂虫(蜣螂)
.....(255)	独摇草(独活)(447)
独头蒜(大蒜)(161)	独角绿茅根(仙茅)

..... (504)	胎胞(紫河车) (187)
独角蟾蜍根(防己) (164)	胎盘(紫河车)	剑草菖蒲(石菖蒲) (477)
胆仁(熊胆) (97)	胎盘粉(紫河车)	剑脊乌梢(乌梢蛇) (187)
胆草(龙胆草) (54)	肺砂(朱砂)	剑脊乌蛇(乌梢蛇) (187)
胆星(天南星) (390)	肺风草(金钱草)	剑脊乌枯蛇(乌梢蛇) (187)
胆黄(牛黄) (74)	肺心草(石韦)	剑脊乌梢蛇(乌梢蛇) (187)
胆牛黄(牛黄) (74)	肺形草(金不换)	盆子(覆盆子)
胆南星(天南星) (390) (341) (585)
胆草根(龙胆草) (54)	(鱼腥草)	盆砂(硼砂) (601)
胆制南星(龙胆草) (54)	肺金草(石韦)	盆消(芒硝) (145)
胜春(月季花) (363)	肺经草(淫羊藿)	盆裸(墓头回) (95)
胜舄(车前草) (216)	肺筋草(瞿麦)	盆硝(芒硝) (145)
胜杖草(绶草) (234)	盆秋石(秋石) (46)
..... (124)	(石韦)	盆桂皮(秦皮) (92)
胜舄子(车前子) (215)	急解索(半边莲)	盆覆胶(阿胶) (532)
胜芻菜(车前草) (216)	蚀胱(桑螵蛸)	盆草细辛(细辛) (260)
胜芻菜子(车前子) (215)	蚀疣(桑螵蛸)	盆甄草子(牵牛子) (155)
胸膈(地龙) (469)	叙党(党参)	食蜜(蜂蜜) (497)
胞衣(紫河车)	剑菖(石菖蒲)	食用槐木(独活) (101)
..... (516)	剑草根(石菖蒲)	郤蝉草根(丹参) (349)
胎衣(紫河车) (516)	剑脊蛇(乌梢蛇)	

屋松(瓦松)(402)	绒蒿(茵陈蒿)
.....(129)	妹子草(萹蓄)(228)
屋葵子(薏苡仁)(233)	绒树皮(合欢皮)
.....(214)	姚丹(牡丹皮)(452)
屋上无根草(瓦松)(60)	绒树花(合欢花)
.....(129)	姹女(水银)(452)
眉皂(皂莢)(597)	绒根七(三七)
.....(393)	孩儿(王不留行)(333)
眉毛蒿子(茅苈子)(367)	绒毛胡椒(石南藤)
.....(426)	孩儿参(太子参)(190)
眉眉蒿子(茅苈子)(485)	绒花树皮(合欢皮)
.....(426)	(人参)(452)
屏风(防风)(478)	绒花树花(合欢花)
.....(7)	孩儿草(爵床)(452)
屎瓜根(天花粉)(111)	绒根三七(三七)
.....(35)	孩儿菊(佩兰)(333)
屎坷螂(蜣螂)(203)	绒毛龙牙草(仙鹤草)
.....(447)	(泽兰)(329)
屎咯螂(蜣螂)(352)	绕莲花(墨旱莲)
.....(447)	孩儿掏伞(蚤休)(562)
屎蜣螂(蜣螂)(75)	绎矾(皂矾)
.....(447)	结片(冰片)(603)
屎蝌螂(蜣螂)(474)	绎晨伏胎(茯苓)
.....(447)	结力根(麻黄)(210)
退血草(筋骨草)(1)	络石(络石藤)
.....(105)	(麻黄根)(186)
退风使者(羌活)(570)	络石草(络石藤)
.....(9)	结子斗(石斛)(186)
既济公(升麻)(543)	络石藤(石南藤)
.....(26)	结香花(密蒙花)(190)
娃草(玉竹)(40)	绞吉兰(绞股蓝)
.....(546)	结留子(枳椇子)(107)
娃娃拳(茜草)(560)	绞骨兰(绞股蓝)
.....(335)	结猪苓(猪苓)(107)
姨妈菜(前胡)(212)	绞股兰(乌蔹莓)
.....(402)	绒花(合欢花)(106)
姨妈菜根(前胡)(452)	(绞股蓝)

绞剪草(射干)	帝油流(苏合香)	炮附片(附子)
.....(107)(475)(254)
骄槐根(苦参)	疥蛤蟆皮(蟾皮)	炮掌根(生地黄)
.....(55)(624)(58)
梔耳(苍耳草)	疥蛤蟆酥(蟾酥)	烂石(礞石)
.....(12)(623)(412)
柔鱼骨(乌贼骨)	旃檀(檀香)	烂心子(黄芩)
.....(586)(291)(48)
柔枝槐根(山豆根)	施州龙牙草(仙鹤草)	烂皮蛇(地柏枝)
.....(82)(329)(326)
蚤休(拳参)	施州龙牙草芽(鹤草芽)	烂肠草(泽漆)
.....(77)(309)(232)
弯子(草豆蔻)	闽粤马尾藻(海藻)	烂肺草(毛茛)
.....(208)(413)(607)
弯巴钩子(牛蒡子)	恒山(常山)	烂蛇腰(伸筋草)
.....(16)(590)(182)
弯齿黄芪(黄芪)	恒山苗(蜀漆)	烂心草根(黄芩)
.....(486)(591)(48)
弯花挂黄精(黄精)	恒河诃子(诃子)	冠芳(白芍)
.....(547)(572)(531)
弯唇马兜铃(青木香)	炼蜜(蜂蜜)	冠唇花(藿香)
.....(288)(497)(202)
亭历(蓼苈子)	炮甲(穿山甲)	扁斗(石斛)
.....(426)(381)(543)
亭灵独生(母丁香)	炮姜(干姜)	扁竹(射干)
.....(266)(256)(81)
亮帽英(角茴香)	炮干姜(干姜)	(萹蓄)
.....(87)(256)(233)
亮叶岩豆藤(鸡血藤)	炮山甲(穿山甲)	扁荻(萹蓄)
.....(373)(381)(233)
帝力(蓼苈子)	炮甲片(穿山甲)	扁草(石斛)
.....(426)(381)(543)
帝秋(乌头)	炮甲珠(穿山甲)	(牛箭草)
.....(255)(381)(225)
帝膏(苏合香)	炮台芪(黄芪)	扁柏(侧柏叶)
.....(475)(486)(324)
	炮杖草(夏枯草)	

扁胆(熊胆)(524)	神投时(卷柏)
.....(97)	(325)
扁菜(韭菜)(290)	神龟板(龟板)
.....(233)	(563)
扁符(贯众)(313)	神草根(天麻)
.....(233)	(462)
扁蓄(萹蓄)(312)	神砂草(瓜子金)
.....(233)	(437)
扁蔓(萹蓄)(197)	神箭根(贯众)
.....(233)	(313)
扁辨(萹蓄)(114)	神龟底壳(龟板)
.....(233)	(563)
扁心草(过江龙)(115)	神仙对座草(金钱草)
.....(197)	(221)
扁竹牙(萹蓄)(543)	宣木瓜(木瓜)
.....(233)	(169)
扁竹兰(白前)(399)	宣百合(百合)
.....(401)	(550)
(射干)(518)	宣州木瓜(木瓜)
.....(81)	(169)
扁竹草(萹蓄)(478)	宫粉(铅粉)
.....(233)	(600)
扁竹梁(射干)(563)	客莲须(莲须)
.....(81)	(578)
扁竹蓼(萹蓄)(441)	突蝉子(蟋蟀)
.....(233)	(251)
扁豆子(扁豆)(372)	穿山龙(常山)
.....(492)	(590)
扁松叶(侧柏叶)(413)	(伸筋草)
.....(324)	(182)
扁柏子(柏子仁)(19)	穿山虎(大戟)
.....(440)	(154)
扁柏仁(柏子仁)(108)	穿山骨(穿山龙)
.....(440)	(371)
扁柏叶(侧柏叶)(300)	穿山鼠(白薇)
.....(324)	(138)
扁菜子(韭菜)		穿山藤(青风藤)

..... (188)	姜虫 (白僵蚕) (438)
穿龙骨 (穿山龙) (371)	姜衣 (生姜皮)	姜南星 (天南星) (390)
穿地节 (寻骨风) (182)	姜芥 (荆芥)	姜梔子 (梔子) (36)
穿地龙 (知母) (32) (穿山龙) (371)	姜连 (黄连)	姜厚朴 (厚朴) (200)
穿地筋 (寻骨风) (182)	姜夏 (半夏)	姜黄连 (黄连) (50)
穿尖龙 (红藤) (93)	姜蚕 (白僵蚕)	姜五加皮 (五加皮) (173)
穿肠草 (葎草) (243)	姜黄 (郁金)	姜形黄精 (黄精) (547)
穿根藤 (络石藤) (186)	姜子叶 (黄荆)	姜炙杷叶 (枇杷叶) (427)
穿墙草 (金钱草) (221)	姜天麻 (天麻)	姜草果仁 (草果) (208)
穿壁风 (石南藤) (190)	姜白附 (白附子)	姜制天南星 (天南星) (390)
穿山老鼠 (白蔹) (98)	姜半夏 (半夏)	姜制五加皮 (五加皮) (173)
穿山薯蓣 (穿山龙) (371)	姜朴花 (辛夷)	姜苏制厚朴 (厚朴) (200)
穿心梅仁 (郁李仁) (149)	姜虫草 (水蜈蚣)	美枣 (大枣) (495)
穿骨草根 (茜草) (335)	姜竹茹 (竹茹)	美草 (甘草) (493)
窃衣子 (鹤虱) (310)	姜苏朴 (厚朴)	美赭 (代赭石) (460)
姜 (生姜) (4)	姜花子 (牵牛子)	美人豆 (相思子) (615)
姜皮 (生姜皮) (4)	姜芽草 (水蜈蚣)	美亲吻 (金银花) (65)
姜朴 (厚朴) (200)	姜草果 (草果)	走商陆 (商陆) (156)
	姜荆叶 (黄荆)	美蔷薇 (金樱子) (588)

美花石斛(石斛)	籽扒参(人参)	活血丹(茜草)
.....(543)(473)(335)
美丽赤芍(赤芍)	刺头草(络石藤)	(景天三七)
.....(62)(186)(335)
美枣树皮(枣树皮)	将军(大黄)	(虎杖)
.....(496)(143)(354)
美国人参(西洋参)	(硫黄)	(金钱草)
.....(481)(594)(221)
美蒂乳香(乳香)	(蟋蟀)	(仙桃草)
.....(374)(251)(359)
差真潮(车前草)	将军干(蟋蟀)	活血龙(虎杖)
.....(216)(251)(354)
养鸡草(垂盆草)	将军虫(蟋蟀)	活血连(虎杖)
.....(79)(251)(354)
(佛甲草)	将军草(大戟)	活血草(猪殃殃)
.....(119)(154)(120)
养殖珍珠(珍珠)	(大蓟)	(筋骨草)
.....(457)(316)(105)
进榆子(茺蔚)	将离根(白芍)	活血根(丹参)
.....(312)(531)(349)
前仁(车前子)	将军虫干(蟋蟀)	活血藤(红藤)
.....(215)(251)(93)
前皮(地骨皮)	将军树子(女贞子)	活芦根(芦根)
.....(139)(557)(33)
首乌(何首乌)	洪雅连(黄连)	活磁石(磁石)
.....(529)(50)(442)
类钩藤(钩藤)	洞庭(枳实)	活水芦根(芦根)
.....(461)(275)(33)
迷身草(竹叶)	活石(滑石)	活血草根(茜草)
.....(34)(217)(335)
迷果芹(防风)	活虱(鹤虱)	活血接骨丹(仙桃草)
.....(7)(310)(359)
迷离网(海金沙藤)	活宝(水银)	洗片(冰片)
.....(224)(597)(474)
迷肉苁蓉(肉苁蓉)	活莞(通草)	洗草(狗尾草)
.....(503)(219)(42)
迷延胡索(延胡索)		洗碗藤(海金沙藤)

津柴胡(柴胡)(439)
洗瘴丹(槟榔)(224)
.....(307)(24)
泊夫兰花(番红花)(363)
.....(21)(439)
洛阳花(瞿麦)(234)
洛阳花根皮(牡丹皮)(60)
.....(486)(166)
染灰(石灰)(607)
.....(161)(526)
染指甲草(透骨草)(183)
.....(凤仙草)(166)
.....(357)	秦爪(秦艽)
染绛草根(茜草)(335)
.....(621)	秦归(当归)
染绯草根(茜草)(335)
.....(481)	秦纠(秦艽)
染蛋草根(茜草)(335)
.....(558)(166)
染指甲花子(急性子)(338)
.....(291)	秦尖(刺蒺藜)
染指甲草子(急性子)(358)
.....(134)(463)
染指甲草花(凤仙花)(357)
.....(441)	桑茱(花椒)
津姑(蟂姑)(251)
.....(436)(263)
津血杞(枸杞子)(555)
.....(512)	秦胶(秦艽)
津苍术(苍术)(198)
.....(156)(166)
津枸杞(枸杞子)(555)
.....(235)	秦椒(花椒)
津秦艽(秦艽)(166)
.....(306)(263)
.....(306)	秦木皮(秦皮)
.....(436)(92)
津柴胡(柴胡)(24)
.....(21)	秦白皮(秦皮)
津当归(当归)(92)
.....(526)	秦当归(当归)
津血竭(血竭)(526)
.....(482)	秦椒目(椒目)
津商陆(商陆)(156)
.....(370)	秦州当归(当归)
津脾洞(灯心草)(235)
.....(482)	秦岭党参(党参)
津花森皮(苦楝皮)(306)
.....(92)	秦王试剑草(鹿衔草)
津喇叭花(洋金花)(612)
.....(612)	秦岭白蜡树皮(秦皮)
.....(612)	泰国大风子(大风子)

泰国安息香(安息香)(118)	莲实(莲子)
.....(476)	(576)
素花党参(党参)(459)	莲草(墨旱莲)
.....(482)	(562)
珠子(珍珠)(202)	莲蓬(莲房)
.....(457)	(579)
珠贝(浙贝母)(312)	莲蕊(莲须)
.....(407)	(578)
珠母(珍珠母)(268)	莲薏(莲子心)
.....(458)	(577)
珠串(地龙)(26)	莲子肉(莲子)
.....(469)	(576)
珠牡(珍珠母)(156)	莲子芯(莲子心)
.....(458)	(577)
珠参(珠儿参)(263)	莲子草(墨旱莲)
.....(537)	(562)
(珠子参)(263)	(地锦草)
.....(537)	(104)
珠草(豨莶草)(258)	莲米心(莲子心)
.....(167)	(577)
珠粉(珍珠)(576)	莲花茸(鹿茸)
.....(457)	(498)
珠儿参(珠子参)(577)	莲花须(莲须)
.....(537)	(578)
珠子母(珍珠母)(579)	莲花蕊(莲须)
.....(458)	(578)
珠子参(珠儿参)(576)	莲绣球(常山)
.....(537)	(590)
珠贝母(浙贝母)(576)	莲蓬子(莲子)
.....(407)	(576)
珠半夏(半夏)(578)	莲蓬壳(莲房)
.....(358)	(579)
珠芽蓼(拳参)(577)	莲蕊须(莲须)
.....(77)	(578)
珠珠米(薏苡仁)(579)	蕸(白芷)
.....(214)	(10)
珠芽半支莲(半支莲)(578)	莱阳参(沙参)

莱阳沙参(沙参)	荷鼻(荷蒂)	暮萎(瓜萎)
.....(535)(580)(404)
荸荠粉(荸荠)	荷卜草(锦灯笼)	茶(茶叶)
.....(552)(88)(404)
堇根(羊蹄)	荷叶梗(荷梗)	葵(胡荽)
.....(340)(580)(14)
莳萝(小茴香)	荷叶蒂(荷蒂)	葱根(麦门冬)
.....(267)(580)(540)
茴(川贝母)	荷叶鼻(荷蒂)	葱冬草根(麦门冬)
.....(405)(580)(540)
莠(狗尾草)	荷包叶(车前草)	菱(胡荽)
.....(42)(216)(14)
莠草(狗尾草)	荷包草(金钱草)	蘭(佩兰)
.....(42)(221)(203)
莠子草(狗尾草)	荷花须(莲须)	蕓根(防风)
.....(42)(578)	荪香(小茴香)
莪术(郁金)	荷花蕊(莲须)(267)
.....(345)(578)	荪香子(小茴香)
莪苓(郁金)	荷利勒(诃子)(267)
.....(345)(572)	葛(附子)
莪蓬(莪术)	荷承草(农吉利)(254)
.....(347)(120)	莺爪风(钩藤)
莪羊菜根(商陆)	荷猪草(农吉利)(461)
.....(156)(120)	莺粟壳(罂粟壳)
莪曲森得莫(卷柏)	荷梗段(荷梗)(575)
.....(325)(580)	莞花(莞花)
荷子(莲子)	荷包叶子(车前子)(152)
.....(576)(215)	莞香(沉香)
荷朴(锦灯笼)	荷花丁香(暴马丁)(285)
.....(88)(434)	莞荽(胡荽)
荷实(莲子)	荷花蔷薇花(蔷薇花)(14)
.....(576)(130)	莞条花(莞花)
荷钱(荷叶)	筱子(薤白)(152)
.....(579)(289)	莎罗子(娑罗子)
荷葶(荷梗)	茭(芡实)(293)
.....(580)	蕃(瓜萎)	

莎草核(香附)(164)	盐乌药(乌药)
.....(282)	(283)
莎草根(香附)(127)	盐巴戟(巴戟天)
.....(282)	(501)
莎结根(香附)(180)	盐半夏(半夏)
.....(282)	(388)
莎婆子(婆罗子)(203)	盐地榆(地榆)
.....(293)	(322)
莎草疙瘩(香附)(190)	盐全蝎(全蝎)
.....(282)	(466)
莎莎草根(香附)(110)	盐杜仲(杜仲)
.....(282)	(507)
莎薄(知母)(110)	盐苁蓉(肉苁蓉)
.....(32)	(503)
盍旦(五灵脂)(438)	盐附子(附子)
.....(380)	(254)
盍合子(八月札)(135)	盐故子(补骨脂)
.....(294)	(512)
匏卢(葫芦)(31)	盐青果(橄榄)
.....(231)	(558)
赶山鞭(半支莲)(31)	盐知母(知母)
.....(118)	(32)
赶条蛇(天门冬)(311)	盐狗脊(狗脊)
.....(542)	(509)
起目(薏苡仁)(145)	盐泽泻(泽泻)
.....(214)	(213)
起实(薏苡仁)(31)	盐砂仁(砂仁)
.....(214)	(204)
起阳草(韭菜)(303)	盐茴香(小茴香)
.....(290)	(267)
起泡草(毛茛)(503)	盐韭子(韭子)
.....(607)	(524)
起阳草子(韭子)(503)	盐桑螵蛸(桑螵蛸)
.....(524)	(584)
起阳菜子(韭子)(365)	盐益智(益智仁)
.....(524)	(513)
载君行(防己)(365)	盐续断(续断)

..... (508)	恶实(牛蒡子) (13)
盐智仁(益智仁) (513)	恶客(洋金花) (439)	桂尖(桂枝) (2)
盐蒺藜(刺蒺藜) (463)	恶鸡婆(续断) (508)	桂桂(紫苏) (3)
盐精石(寒水石) (31)	(大蓟) (316)	桂圆(龙眼肉) (534)
盐车前子(车前子) (215)	恶菜根(羊蹄) (340)	桂通(肉桂) (257)
盐水泽泻(泽泻) (213)	索子果(使君子) (305)	桂楠(肉桂) (257)
盐沙苑子(沙苑子) (518)	索罗果(娑罗子) (293)	桂丁香(丁香) (265)
盐金樱子(金樱子) (583)	索河花(喉嚨草) (86)	桂元肉(龙眼肉) (534)
盐鱼子柴(乌药) (283)	索瞿香(丁香) (265)	桂木皮(肉桂) (257)
盐炒元胡(延胡索) (344)	索马里乳香(乳香) (374)	桂木枝(桂枝) (2)
盐葫芦巴(葫芦巴) (506)	索科拉血竭(血竭) (620)	桂尔通(肉桂) (257)
盐莱菔子(莱菔子) (303)	耿子(乌头) (255)	桂竹草(鸭跖草) (38)
盐桑螵蛸(桑螵蛸) (584)	晋芪(黄芪) (486)	桂枝木(桂枝) (2)
盐益智仁(益智仁) (513)	哥哥啼草(鸭跖草) (38)	桂枝尖(桂枝) (2)
盐菟丝子(菟丝子) (517)	桂(肉桂) (257)	桂枝段(桂枝) (2)
盐葶苈子(葶苈子) (426)	桂木(桂枝) (2)	桂郁金(郁金) (345)
盐制红药子(红药子) (131)	桂心(肉桂) (257)	桂树皮(肉桂) (257)
埃及番泻叶(番泻叶) (147)	桂皮(肉桂) (257)	桂树枝(桂枝) (2)
埃塞俄比亚乳香(乳香) (374)	桂兰(辛夷)	桂莪述(莪术) (347)

桂圆肉(龙眼肉)(534)	柏子树根皮(乌柏木根皮)(158)
桂竹糖芥(荸房子)(426)	格别石燕(石燕)(252)
桂珠黍子(薏苡仁)(214)	移椽(山楂)(298)
桂竹香糖芥(荸房子)(426)	栓翅卫矛(鬼箭羽)(372)
桔叶(橘叶)(272)	桧怪柳(柽柳)(15)
桔仁(橘核)(272)	桧叶怪柳(柽柳)(15)
桔白(橘白)(272)	栎子(吴茱萸)(258)
桔皮(橘皮)(271)	桃实(桃仁)(360)
桔丝(橘络)(272)	桃仁泥(桃仁)(360)
桔红(橘红)(272)	桃仁霜(桃仁)(360)
桔米(橘核)(272)	桃核仁(桃仁)(360)
桔参(沙参)(534)	桃木寄生(桑寄生)(172)
桔络(橘络)(272)	桃叶桃皮(夹竹桃)(249)
桔核(橘核)(272)	桃叶藤根(何首乌)(529)
桔筋(橘络)(272)	杼木皮(秦皮)(92)
桔子叶(橘叶)(272)	根朴(厚朴)(200)
桔子核(橘核)(272)	根生地(生地黄)(58)
桔梅肉(乌梅)(566)	根头菜(委陵菜)(91)
桔构树子(枳椇子)		根罗啼表(罗汉果)	

.....(559)	夏枯球(夏枯草)(376)
根异名广三七(景天三 七)(335)	夏蚕沙(蚕沙)	真珠子(珍珠)
脑冰(樟脑)(180)(457)
.....(621)	夏黄草(沙苑子)	真珠母(石决明)
核桃仁(胡桃肉)(518)(455)
.....(515)	夏天无草(夏天无)	(珍珠母)
核桃肉(胡桃肉)(195)(458)
.....(515)	夏天无根(夏天无)	真海决(石决明)
核桃楸皮(秦皮)(195)(455)
.....(92)	夏草冬虫(冬虫夏草)	真寄生(桑寄生)
样藜仁(郁李仁)(514)(172)
.....(149)	真丹(铅丹)	真橘皮(橘皮)
栟榈皮(棕榈皮)(600)(271)
.....(331)	真朱(朱砂)	真檀香(檀香)
栟榈木皮(棕榈皮)(441)(291)
.....(331)	(珍珠)	真北沙参(沙参)
棱石榴(石榴皮)(457)(535)
.....(571)	真珠(珍珠)	真白芥子(白芥子)
棱石榴皮(石榴皮)(457)(398)
.....(571)	真香(檀香)	真五加皮(五加皮)
夏石(钟乳石)(291)(173)
.....(270)	真海(牡蛎)	真珠贝壳(珍珠母)
夏菊(旋复花)(456)(458)
.....(399)	真菊(菊花)	真菌竹黄(天竹黄)
夏无踪(夏天无)(21)(408)
.....(195)	真檀(檀香)	厝莲(瓦松)
(天葵)(291)(129)
.....(122)	真川芎(川芎)	原云连(黄连)
夏乳石(钟乳石)(343)(50)
.....(270)	真牛黄(牛黄)	原丹皮(牡丹皮)
夏枯头(夏枯草)(74)(60)
.....(37)	真朱母(珍珠母)	原生地(生地黄)
夏枯花(夏枯草)(458)(58)
.....(37)	真阿胶(阿胶)	原生芪(黄芪)
夏枯草(益母草)(532)(486)
.....(355)	真没药(没药)	原皮参(西洋参)
	(481)

原杏仁(杏仁)(512)	破茎松萝(松萝)
.....(418)	(木蝴蝶)(115)
原来头(当归)(436)	烈朴(厚朴)
.....(520)	破血丹(茜草)(200)
原豆蔻(白豆蔻)(335)	捕斗蛇草(泽兰)
.....(206)	(筋骨草)(352)
原乳香(乳香)(105)	捆石龙(络石藤)
.....(374)	(鹿衔草)(186)
原油茴(八角茴香)(370)	损白(槟榔)
.....(268)	破血珠(矮地茶)(307)
原砂仁(砂仁)(430)	捉嘴豆子(半夏)
.....(204)	破网巾(海金沙藤)(388)
原蚕矢(蚕沙)(224)	哲磨(紫草)
.....(180)	破伤药(拳参)(63)
原蚕沙(蚕沙)(77)	捣花(荭草花)
.....(180)	破岩尖(金果榄)(359)
原蚕屎(蚕沙)(84)	(荭草)
.....(180)	破固脂(补骨脂)(194)
原麝香(麝香)(512)	捣花子(水红花子)
.....(473)	破草子(鹤虱)(360)
原皮赤芍(赤芍)(310)	热皮(蝉蜕)
.....(62)	破故子(补骨脂)(17)
原皮洋参(西洋参)(512)	热草(鱼腥草)
.....(481)	破故纸(补骨脂)(80)
原庄血竭(血竭)(512)	热加巴(狼毒)
.....(620)	破故脂(补骨脂)(159)
原皮西洋参(西洋参)(512)	热沾粘(豨莶草)
.....(620)	破骨子(补骨脂)(167)
逐马(玄参)(512)	热河黄芩(黄芩)
.....(59)	破桃仁(桃仁)(48)
(丹参)(360)	热河黄精(玉竹)
.....(349)	破铜钱(积雪草)(546)
破门(大黄)(225)	(黄精)
.....(143)	(老鹳草)(547)
破石珠(金果榄)(185)	热河藁本(藁本)
.....(84)	破血草根(茜草)(11)
破布子(补骨脂)(335)	热河蒲公英(蒲公英)

..... (68)	圆肉 (龙眼肉) (140)
较剪兰 (射干) (81)	圆眼 (龙眼肉) (534)	圆叶金果榄 (金果榄) (84)
较剪草 (射干) (81)	圆蛤 (海蛤壳) (411)	圆叶牵牛子 (牵牛子) (155)
顿牟 (琥珀) (448)	圆决明 (决明子) (465)	圆叶鹿蹄草 (鹿蹄草) (370)
致神 (桑螵蛸) (584)	圆豆蔻 (白豆蔻) (206)	圆角金果榄 (金果榄) (84)
桌面草 (萹蓄) (233)	圆枫斗 (石斛) (543)	圆药五味子 (五味子) (565)
柴草 (柴胡) (24)	圆草决 (决明子) (465)	圆锥须药草 (穿心莲) (73)
柴桂 (肉桂) (257)	圆麻根 (苎麻根) (321)	啄葵云实 (莲子) (576)
柴党 (党参) (482)	圆蛤壳 (海蛤壳) (411)	喉声嘈 (鱼腥草) (80)
柴米米花 (蔷薇花) (130)	圆螺虫 (蜗牛) (116)	唧唧 (蟋蟀) (251)
蚕蚕 (地龙) (469)	圆螵蛸 (桑螵蛸) (584)	唧了皮 (蝉蜕) (17)
蚩休 (蚤休) (75)	圆穗蓼 (拳参) (77)	唧唧皮 (蝉蜕) (17)
峭粉 (轻粉) (598)	圆子瓜蒌 (瓜蒌) (404)	唧猴皮 (蝉蜕) (17)
峨眉豆 (扁豆) (492)	圆叶细辛 (细辛) (260)	唧嫖皮 (蝉蜕) (17)
峨眉连 (黄连) (50)	圆叶锦葵 (冬葵子) (236)	晏青 (斑蝥) (622)
峨眉三七 (三七) (333)	圆茎石斛 (石斛) (543)	晒术 (白术) (489)
峨眉野连 (黄连) (50)	圆梗泽兰 (佩兰) (203)	鸭胆 (猪胆汁) (417)
峨眉黄皮树皮 (黄柏) (52)	圆叶马兜铃 (马兜铃) (428)	鸭脚 (白果叶) (431)
峻 (大黄) (143)	圆叶丝石竹 (银柴胡)	鸭子草 (鸭跖草) (38)

鸭子菜(鸭跖草)(38)	鸭掌树果仁(白果)(430)
.....(38)	(牛筋草)(430)	
鸭公青(大青叶)(225)	鸭嘴绿胆矾(胆矾)(591)
.....(70)	鸭蛋子(鸦胆子)(591)	
鸭旦子(鸦胆子)(93)	蚯孙(蟋蟀)(251)
.....(93)	鸭跖草(竹叶)(251)	
鸭舌草(地肤子)(34)	蛟(水蛭)(383)
.....(229)	鸭鹤草(鸭跖草)(383)	
鸭角育(鸭跖草)(38)	蚬草(铁苋菜)(241)
.....(38)	鸭屎瓜子(瓜蒌子)(241)	
鸭尿草(蜀漆)(434)	蚌珠(珍珠)(457)
.....(591)	(木鳖子)(457)	
鸭胆子(鸦胆子)(616)	蚌壳草(铁苋菜)(247)
.....(93)	鸭屎瓜仁(瓜蒌子)(247)	
鸭食草(鸭跖草)(434)	蚌珠母(珍珠母)(458)
.....(38)	鸭船层纸(木蝴蝶)(458)	
鸭娃根(寻骨风)(436)	蚝壳(牡蛎)(456)
.....(182)	(补骨脂)(456)	
鸭屎瓜(瓜蒌)(512)	蚝蒲(牡蛎)(456)
.....(404)	鸭脚板子(车前子)(456)	
鸭屎草(蜀漆)(215)	蟅母(知母)(32)
.....(591)	鸭脚板草(鸭跖草)(32)	
鸭脚七(前胡)(38)	蛤蛇(蛤蚧)(514)
.....(402)	鸭脚果仁(白果)(514)	
鸭脚子(白果)(430)	蛆(地龙)(469)
.....(430)	鸭脚前胡(前胡)(469)	
鸭脚叶(白果叶)(402)	蝴蝶(地龙)(469)
.....(431)	鸭脚葵子(冬葵子)(469)	
鸭脚板(前胡)(434)	蚊阁(五倍子)(568)
.....(402)	鸭蛋藤根(茜草)(568)	
(车前草)(335)	蚊子草(鹅不食草)(196)
.....(216)	鸭掌树叶(白果叶)(196)	
(毛茛)(431)	(香薷)(5)
.....(607)	鸭嘴胆矾(胆矾)(5)	
鸭脚参(翻白草)(591)	蚊子柴(黄荆)(438)
.....(56)	鸭脚老鹤草(老鹤草)(438)	
鸭脚草(鸭跖草)(185)	蚊母草(仙桃草)	

..... (359)	(金钱草) (180)
蚊枝叶(黄荆) (438)	(筋骨草)	蚕莓(蛇莓) (128)
蚊烟柴(黄荆) (438)	透明芦荟(芦荟)	蚕粪(蚕沙) (180)
蚊榔树(榆钱) (453)	透明松香(松香)	蚕头当归(当归) (526)
逍遙竹(徐长卿) (170)	透骨白花(凤仙花)	钱串子(海龙) (523)
艳友(白芍) (531)	透骨红花(凤仙花)	钱串草(车前草) (216)
艳雪红(月季花) (363)	透骨草子(急性子)	钱贯草(车前草) (216)
耗子花根(白头翁) (89)	透骨将军(硝砂)	钱柴头(乌药) (283)
耗子尾巴花(白头翁) (89)	秤钩风(青风藤)	钱菖蒲(石菖蒲) (477)
杷子草(老鹳草) (185)	秤星树皮(秦皮)	钱掌口(积雪草) (225)
缺盆(覆盆子) (585)	秧参(人参)	钱凿王(金钱草) (221)
透血红(土牛膝) (366)	秧草(灯心草)	钱凿草(金钱草) (221)
透鬼消(金荞麦) (103)	秧菜(海藻)	钱榆叶(榆叶) (250)
透骨凤(金钱草) (221)	秧李仁(郁李仁)	钱榆皮(榆白皮) (250)
透骨白(凤仙草) (357)	秧薄荷(薄荷)	钱蜞柴(乌药) (283)
透骨红(凤仙草) (357)	蚕矢(蚕沙)	钱串草子(车前子) (215)
透骨草(接骨木) (378) (凤仙草) (357)	蚕羌(羌活)	钱贯草子(车前子) (215)
透骨消(金荞麦) (103)	蚕砂(蚕沙)	钱榆白皮(榆白皮) (250)
	蚕屎(蚕沙)	钳蝎(全蝎) (466)

钵怛罗香(薺香)(443)	铁灯台(蚤体)(75)
.....(202)	铁菜(蔊菜)(417)	铁灯盏(积雪草)
钹儿草(金钱草)(417)	铁液(铁落)(225)
.....(221)(443)	铁蛾(铁落)	(蚤体)
钻天柳(柽柳)(443)(75)(15)
.....(423)	铁丁菜(海藻)(413)	铁灯碗(铁苋菜)
钻冻花(款冬花)(413)	铁片草(萹蓄)(241)
.....(423)(233)	铁苏子(苏子)	(老鹳草)
钻骨风(石南藤)	铁乌散(了哥王)(424)(185)
.....(190)(110)	铁花麦(金荞麦)(103)
钻天榆叶(榆叶)	铁火钳(落新妇)	铁杆蒿(茵陈蒿)(228)
.....(250)(39)	铁连草(铁树叶)(354)
钻天榆皮(榆白皮)	铁石子(金荞麦)	铁角牛(蜣螂)(447)
.....(250)(103)	铁灵仙(威灵仙)(162)
钻天榆萸(榆钱)	铁石茶(照山白)	铁刺苓(蕤蕤)(227)
.....(453)(433)	铁罗汉(菊叶三七)(334)
钻天榆钱(榆钱)	铁打杵(涅羊藿)	铁刷子(蕤蕤)(227)
.....(453)(503)	铁线风(瓜子金)(437)
钻天榆白皮(榆白皮)	铁甲片(穿山甲)	铁线草(透骨草)(183)
.....(250)(381)(络石藤)(186)
铁石(磁石)	铁丝根(威灵仙)	铁线根(威灵仙)(162)
.....(442)(162)	铁屎(海金沙藤)(227)
铁朱(代赭石)	铁老鼠(白蔹)(334)(334)
.....(460)(98)	铁扫帚(威灵仙)(227)
铁花(铁落)(162)	铁色花(夏枯草)(437)
.....(443)	铁色草(夏枯草)	铁观音(茶叶)(183)
铁苋(铁苋菜)(37)(396)(186)
.....(241)	铁胆(熊胆)	铁灯心(灯心草)(162)
铁砂(无名异)(37)(235)(227)
.....(605)	铁屎(海金沙藤)(络石藤)(186)
铁胆(熊胆)(97)(334)(227)
.....(443)(396)(183)(186)
铁屎(铁落)(443)(162)(162)
铁屑(铁落)(235)(227)(227)

.....(224)	铁菱刚(草薢)(229)
铁指甲(佛甲草)(119)(226)	铁血藤根(茜草)(335)
铁胡蜂(仙鹤草)(329)	铁菱角(淫羊藿)(505)	铁杆木香(木香)(280)
铁骨伞(泽漆)(232)	(藜蕡)(227)	铁杆升麻(落新妇)(30)
(了哥王)(110)	铁脚仙(海金沙藤)(224)	铁杆赤芍(赤芍)(62)
铁骨散(接骨木)(378)	铁脚鸡(凤尾草)(244)	铁杆菌陈(刘寄奴)(351)
铁洗帚(瓜子金)(437)	铁脚梨(木瓜)(196)	铁苗柴胡(柴胡)(24)
铁扁担(射干)(81)	铁散仙(乌蔹莓)(106)	铁拐山药(山药)(490)
(青木香)(288)	铁勒脐(荸荠)(552)	铁线夏枯(夏枯草)(37)
(万年青)(245)	铁棒锤(雪上一枝蒿)(609)	铁胡蜂芽(鹤草芽)(309)
铁柴胡(银柴胡)(140)	铁撮帚(威灵仙)(162)	铁脚灵仙(威灵仙)(162)
铁秤陀(黄药子)(415)	铁蒲扇(土大黄)(112)	铁塔草根(茜草)(335)
铁称陀(乌蔹莓)(106)	铁箭风(瓜子金)(437)	铁棍山药(山药)(490)
铁称铊(白药子)(132)	铁箍散(木芙蓉叶)(611)	铁蜈蚣子(千金子)(157)
铁扇子(桑叶)(19)	铁甲松节(松节)(192)	铁篱笆果(枸橘)(280)
铁拳头(金荞麦)(103)	铁甲松香(松香)(618)	铁篱寨果(枸橘)(280)
(鹅不食草)(196)	铁甲将军(蜣螂)(447)	铁玉蜀黍子(薏苡仁)(443)
(卷柏)(325)	铁皮石斛(石斛)(543)	铁甲将军草(金荞麦)(103)
铁根薯(穿山龙)(371)	铁丝灵仙(威灵仙)(162)	铁杆威灵仙(威灵仙)(162)
	铁扫把子(地肤子)	

铁角牛根皮(牡丹皮)(395)	倒竹伞(钻地风)
.....(60)	(180)
铁线马齿苋(地锦草)(540)	倒地拱(防己)
.....(104)	(164)
铁线透骨草(透骨草)(80)	倒花草(爵床)
.....(183)	(111)
铁脚威灵仙(威灵仙)(547)	倒毒伞(泽漆)
.....(162)	(232)
铅白(铅粉)(239)	倒挂刺(钩藤)
.....(600)	(木贼)(461)
铅华(铅丹)(28)	倒钩草(土牛膝)
.....(600)	(366)
(铅粉)(239)	倒根草(拳参)
.....(600)	(77)
铅黄(铅丹)(28)	倒根蓼(拳参)
.....(600)	(77)
铅精(水银)(28)	倒盖菊(鹤虱)
.....(597)	(310)
铅白粉(铅粉)(547)	倒筑伞(茅莓)
.....(600)	(127)
铃儿草(沙参)(124)	倒挂金钟(凌霄花)
.....(535)	(364)
(锦灯笼)(307)	倒挂金钩(金樱子)
.....(88)	(583)
铃子香(零陵香)(332)	(钩藤)
.....(209)	(461)
铃当菜(玉竹)(332)	倒钩刺花(蔷薇花)
.....(546)	(130)
铃茵陈(刘寄奴)(219)	倭瓜(南瓜)
.....(354)	(308)
铃铛草(农吉利)(454)	倭瓜子(南瓜子)
.....(120)	(309)
铃铛香(零陵香)(127)	倭硫黄(硫黄)
.....(209)	(594)
铃柴胡(徐长卿)(366)	倪钤(天门冬)
.....(170)	(542)
铃铛花根(桔梗)(366)	候莎根(香附)

倍子(五倍子)	臭大姐(九香虫)	臭菜叶(大青叶)
.....(568)(296)(70)
臭子(麝香)	臭巴虫(九香虫)	臭菖蒲(水菖蒲)
.....(473)(296)(247)
臭虫(九香虫)	臭瓜蛋(马兜铃)	臭常山(常山)
.....(296)(428)(590)
臭杞(枸橘)	臭虫母(廣虫)	臭脚跟(墓头回)
.....(280)(382)(95)
臭草(鱼腥草)	臭芙蓉(臭梧桐)	臭猪巢(鱼腥草)
.....(80)(169)(80)
(益母草)	臭芫荽(芫荽)	臭葫芦(马兜铃)
.....(355)(312)(428)
臭荆(黄荆)	臭灵丹(鱼腥草)	臭雄黄(雄黄)
.....(433)(80)(595)
臭桐(臭梧桐)	臭牡丹(鱼腥草)	臭蒲根(水菖蒲)
.....(169)(80)(247)
臭菜(鱼腥草)	臭青蒿(青蒿)	(石菖蒲)
.....(80)(136)(477)
臭菖(水菖蒲)	臭质草(鱼腥草)	臭椿皮(椿皮)
.....(247)(80)(570)
臭秽(益母草)	臭泡子(吴茱萸)	臭腥草(鱼腥草)
.....(355)(258)(80)
臭棘(枸橘)	臭荞麦(鱼腥草)	臭鼻孔(鱼腥草)
.....(280)(80)(80)
臭蒲(水菖蒲)	臭星草(鱼腥草)	臭辣子(吴茱萸)
.....(247)(80)(258)
臭蒿(茵陈蒿)	臭积草(鱼腥草)	臭樟子(革澄茄)
.....(228)(80)(264)
(黄花蒿)	臭屎婆(莪术)	臭樗皮(椿皮)
.....(197)(347)(570)
臭蕺(鱼腥草)	臭桐柴(臭梧桐)	臭橘壳(枳壳)
.....(80)(169)(276)
臭橘(枸橘)	臭铃铛(马兜铃)	臭薄荷(薄荷)
.....(280)(428)(15)
臭大青(大青叶)	臭梧桐(常山)	臭罐罐(马兜铃)
.....(70)(590)(428)
	臭根皮(白鲜皮)	

臭虫母子(腹虫)(138)	胶都颠(金银花)
.....(382)	(透骨草)(63)
臭牡丹根(赤芍)(183)	胶质没药(没药)
.....(62)	殷桺(柽柳)(376)
臭拉秧子(天仙藤)(15)	胶质紫草茸(紫草茸)
.....(190)	殷柳(柽柳)(134)
臭青龟虫(九香虫)(15)	脐香(麝香)
.....(296)	殷蘖(钟乳石)(473)
臭草天麻(益母草)(270)	脑子(冰片)
.....(355)	殷柳条(柽柳)(474)
臭梧桐叶(臭梧桐)(15)	(樟脑)
.....(169)	留石(滑石)(621)
臭椿树皮(椿皮)(217)	脑朴(厚朴)
.....(570)	留公乳(钟乳石)(200)
臭椿根皮(椿皮)(270)	脑冰(樟脑)
.....(570)	留行子(王不留行)(621)
臭拉秧子(马兜铃)(367)	脑砂(硇砂)
.....(428)	留求子(使君子)(602)
臭拉秧子根(青木香)(305)	狸豆(百合)
.....(288)	留球子(使君子)(550)
臭脚丫子棵(墨旱莲)(305)	(农吉利)
.....(562)	胭脂麻(败酱草)(120)
臭椿树白皮(椿皮)(94)	狼目(路路通)
.....(570)	胭脂花根(白蔹)(369)
臭椿根白皮(椿皮)(98)	狼眼(路路通)
.....(570)	脂麻(黑脂麻)(369)
射干(蒲菜)(552)	狼牙草(仙鹤草)
.....(233)	脂麻仁(黑脂麻)(329)
射罔(乌头)(552)	狼爪子(瓦松)
.....(255)	脆石(滑石)(129)
射香(麝香)(217)	狼头花(漏芦)
.....(473)	胶饴(饴糖)(100)
射香菜(前胡)(496)	狼把草(豨莶草)
.....(402)	胶饴糖(饴糖)(167)
徐长卿(白前)(496)	狼尾棵(狼把草)
.....(401)	胶念珠(薏苡仁)(111)
(白薇)(294)	狼尾蒿(艾叶)

..... (338)	皱紫苏叶(苏叶) (173)
狼牙草芽(鹤草芽)	豺狗刺(葵藜)	(227)
..... (309)	豺漆皮(五加皮)	(173)
狼爪瓦松(瓦松)	豹足(卷柏)	(325)
..... (129)	豹头骨(豹骨)	(176)
狼巴巴草(老鹳草)	豹身骨(豹骨)	(176)
..... (185)	豹四肢骨(豹骨)	(176)
狼尾巴花(薤草花)	豹四腿骨(豹骨)	(176)
(薤草)	展瓣兔丝子(菟丝子)	(517)
..... (191)	陵苕(瞿麦)	(234)
狼尾巴果(青葙子)	陵泽(甘遂)	(151)
..... (41)	陵草(零陵香)	(209)
狼毒大戟(狼毒)	陵游(龙胆草)	(54)
..... (159)	陵舄(车前草)	(216)
狼牙草根芽(鹤草芽)	陵螺(蜗牛)	(116)
..... (309)	陵蘡(甘遂)	(151)
狼尾巴花子(水红花子)	陵时花(凌霄花)	(364)
..... (360)	陵郎根(苦参)	(55)
逢花(百合)	陵苕花(凌霄花)	(364)
..... (550)		
皱紫苏(紫苏)		
..... (3)		
皱叶乌头(雪上一枝蒿)		
..... (609)		
皱叶酸模(羊蹄)		
..... (310)		
(土大黄)		
..... (112)		
皱皮木瓜(木瓜)		
..... (169)		
皱皮瓜蒌(瓜蒌)		
..... (404)		
皱面还丹(人参)		
..... (478)		
皱紫苏子(苏子)		
..... (424)		

陵苕花(凌霄花)(172)	通大海(通草)
.....(364)	(219)
陵舄子(车前子)(584)	(胖大海)
.....(215)	(416)
陵居腹花(车前子)(556)	通天穹(鹅不食草)
.....(215)	(196)
陶丹(铅丹)(556)	通经草(半支莲)
.....(600)	(118)
绣竹(瞿麦)(19)	通性草(瓜子金)
.....(234)	(437)
绣木团(龙眼肉)(425)	通草丝(通草)
.....(534)	(219)
绣球藤(木通)(556)	通草梗(通草)
.....(218)	(219)
绣团铁线莲(威灵仙)(556)	通幽草(番泻叶)
.....(162)	(147)
豨休(天门冬)(172)	通脱木(通草)
.....(542)	(219)
骊珠肉(龙眼肉)(402)	通筋草(伸筋草)
.....(534)	(182)
桑仁(桑椹)(425)	通天柱杖(牛膝)
.....(556)	(365)
桑生(桑寄生)(19)	通天根草(荸荠)
.....(172)	(552)
桑皮(桑白皮)(584)	通花五加(通草)
.....(425)	(219)
桑枣(桑椹)(620)	预知子(八月札)
.....(556)	(294)
桑果(桑椹)(120)	能消(威灵仙)
.....(556)	(162)
桑泡(桑椹)(219)	难丹真珠(相思子)
.....(556)	(615)
桑实(桑椹)(218)	高根(大风子)
.....(556)	(612)
桑粒(桑椹)(147)	高丽参(人参)
.....(556)	(478)
桑寄(桑寄生)(219)	高凉姜(高良姜)

高搜山(射干)(81)	疳积药(萹蓄)(233)	畜糞子(八月札)(294)
高岭石(滑石)(217)	疳积草(半边莲)(78)	烘术(白术)(489)
高山党参(党参)(482)	(爵床)(111)	烧节(卷柏)(325)
高丽人参(人参)(478)	病桔子(使君子)(305)	烧酒壺根(丹参)(349)
高良姜子(红豆蔻)(267)	痈树(毛冬青)(368)	烟术(白术)(489)
高原卷丹(百合)(550)	旃檀(檀香)(291)	烟斗斗(罂粟壳)(575)
高脚贯众(贯众)(313)	旃那叶(番泻叶)(147)	烟盒草(荠菜)(319)
高山企边桂(肉桂)(257)	旃檀香(檀香)(291)	烟煤精(琥珀)(448)
高脚瓜子草(瓜子金)(437)	旁风(防风)(7)	烟管薊(大蓟)(316)
高鼻羚羊角(羚羊角)(454)	旁其(乌药)(283)	眼袋锅花(细辛)(260)
高山块根老鹳草(老鹳草)(185)	旁通(刺蒺藜)(463)	煽石(磁石)(442)
毫菊(菊花)(21)	离母(天麻)(462)	扇子薯(山药)(490)
毫升麻(升麻)(26)	离娄(茜草)(335)	扇把草(射干)(81)
亳白芍(白芍)(531)	离草(天麻)(462)	诸药(山药)(490)
毫桑皮(桑白皮)(425)	离南(通草)(219)	调羹花(厚朴花)(202)
毫紫菀(紫菀)(421)	离子核(荔枝核)(287)	调睡参军(酸枣仁)(449)
唐橘(枸橘)(280)	离枝核(荔枝核)(287)	祥谷菜根(薤白)(289)
唐古特大黄(大黄)(143)	离草根(白芍)(531)	羞天花(鬼臼)(45)
	畜辩(萹蓄)	

羞寒花(鬼臼)(248)	粉沙参(沙参)
.....(45)	(535)
羞热马鬃(金银花)(321)	粉乳草(白头翁)
.....(65)	(89)
拳参(地榆)(560)	粉灵仙(威灵仙)
.....(322)	(162)
(蚤休)		粉草节(甘草)
.....(75)	(493)
拳头草(卷柏)(493)	粉前胡(前胡)
.....(325)	(402)
瓶匏(胡颓子)(89)	粉桔梗(桔梗)
.....(301)	(395)
益米(薏苡仁)(477)	粉菖蒲(石菖蒲)
.....(214)	(477)
益母(益母草)(23)	粉萆薢(萆薢)
.....(355)	(226)
益明(益母草)(600)	(穿山龙)
.....(355)	(371)
(地肤子)(598)	粉猪苓(猪苓)
.....(229)	(212)
益智(益智仁)(164)	粉葛根(葛根)
.....(513)	(23)
(龙眼肉)		粉颗粒(葛根)
.....(534)	(23)
益母子(茺蔚子)(60)	粉花石斛(石斛)
.....(356)	(543)
益母艾(益母草)(444)	粉背薯蓣(萆薢)
.....(355)	(226)
益母蒿(益母草)(233)	粉绿当归(当归)
.....(355)	(526)
益智子(益智仁)(493)	粉光西洋参(西洋参)
.....(513)	(481)
益母草子(茺蔚子)(481)	粉质青木香(青木香)
.....(356)	(288)
益母夏枯(益母草)(526)	粉背安息香(安息香)
.....(355)	(476)
益男草根(萱草根)(164)	粉背崖爬藤(白蔹)

..... (98)	宽叶香蒲黄(蒲黄) (453)
粉绿延胡索(延胡索) (344)	宽叶独行菜(葶苈子) (426)	家榆钱(榆钱) (453)
料吊(徐长卿) (170)	宽体金线蛭(水蛭) (383)	家蓼子(水红花子) (360)
料刁竹(徐长卿) (170)	家艾(艾叶) (338)	家蓼花(荭草花) (359)
凌水石(寒水石) (31)	家连(黄连) (50)	家薄荷(薄荷) (15)
紫巴子(锦灯笼) (88)	家菊(菊花) (21)	家薺本(薺本) (11)
紫米草(胡颓子) (304)	家蓼(荭草) (194)	家苎麻根(苎麻根) (321)
资木瓜(木瓜) (169)	家犬肾(黄狗肾) (520)	家榆白皮(榆白皮) (250)
资丘独活(独活) (161)	家边草(麦门冬) (540)	家樱桃核(樱桃核) (29)
害母草(鬼臼) (45)	家百合(百合) (550)	宾门(槟榔) (307)
宽肠(通草) (219)	家狗肾(黄狗肾) (520)	宾门药钱(槟榔) (307)
宽水蛭(水蛭) (383)	家桑叶(桑叶) (19)	窄叶香薷(香薷) (5)
宽筋草(伸筋草) (182)	家菖蒲(水菖蒲) (247)	窄叶野豌豆(王不留行) (367)
宽筋藤(伸筋草) (182)	家紫苏(紫苏) (3)	麻木(苏木) (378)
宽叶甘松(甘松) (293)	家槐实(槐角) (329)	凉黄(大黄) (143)
宽叶远志(远志) (450)	家槐花(槐花) (327)	凉伞草(泽漆) (232)
宽叶羌活(羌活) (9)	家榆叶(榆叶) (250)	凉衍豆(扁豆) (492)
宽瓣重楼(蚤休) (75)	家榆皮(榆白皮) (250)	凉粉草(六月雪) (246)
宽叶甘松香(甘松) (293)	家榆萸(榆钱) (104)	凉帽草(地锦草)

凉州大黄(大黄)(531)	酒秦艽(秦艽)(166)
.....(143)			
凉伞盖珍珠(矮地茶)(504)	酒党参(党参)(482)
.....(430)			
酒芍(白芍)(173)	酒黄连(黄连)(50)
.....(531)			
酒军(大黄)(469)	酒黄精(黄精)(547)
.....(143)			
酒芩(黄芩)(526)	酒萸肉(山茱萸)(582)
.....(48)			
酒连(黄连)(466)	酒常山(常山)(590)
.....(50)			
酒大云(肉苁蓉)(466)	酒续断(续断)(508)
.....(503)			
酒大芸(肉苁蓉)(50)	酒蛤蚧(蛤蚧)(514)
.....(503)			
酒大黄(大黄)(162)	酒蜈蚣(蜈蚣)(467)
.....(143)			
酒山萸(山茱萸)(380)	酒醉花(洋金花)(439)
.....(582)			
酒川芎(川芎)(273)	酒蟾酥(蟾酥)(623)
.....(343)			
酒元胡(延胡索)(225)	酒女贞子(女贞子)(557)
.....(344)			
酒木香(木香)(221)	酒车前子(车前子)(215)
.....(280)			
酒巴戟(巴戟天)(345)	酒五加皮(五加皮)(173)
.....(501)			
酒牛膝(牛膝)(354)	酒肉苁蓉(肉苁蓉)(503)
.....(365)			
酒牛膝(牛膝)(296)	酒安息香(安息香)(476)
.....(365)			
酒丹参(丹参)(197)	酒炙海马(海马)(522)
.....(349)			
酒乌药(乌药)	(青蒿)	酒制海龙(海龙)(523)
.....(284)(136)		
酒白芍(白芍)(190)	酒壶花根(生地黄)	

..... (58)	消石朴 (芒硝) (523)
酒海狗肾 (海狗肾) (521)	消石灰 (石灰) (607)	海蛆 (海马) (522)
酒益母草 (益母草) (355)	消结草根 (白前) (401)	海蛎 (牡蛎) (456)
酒淫羊藿 (淫羊藿) (505)	海末 (芒硝) (145)	海硝 (乌贼骨) (586)
酒制女贞子 (女贞子) (557)	海石 (海浮石) (410)	海蛤 (海蛤壳) (411)
酒盐盐花根 (生地黄) (58)	海红 (山楂) (298)	海腴 (人参) (478)
酒蒸覆盆子 (覆盆子) (585)	海羊 (蜗牛) (116)	海蛸 (乌贼骨) (586)
浙贝 (浙贝母) (407)	海芋 (狼毒) (159)	海蜡 (血竭) (620)
浙术 (白术) (489)	海草 (海藻) (413)	海藤 (藤黄) (617)
浙苓 (茯苓) (210)	海茜 (海藻) (413)	海大麦 (海藻) (413)
浙白术 (白术) (489)	海带 (昆布) (414)	海马蔺 (昆布) (414)
浙白芷 (白芷) (10)	海蒟 (凤仙草) (357) (透骨草)	海风藤 (松萝) (115) (石南藤) (190)
浙白前 (白前) (401)	海桐 (臭梧桐) (183)	海芥菜 (昆布) (414)
浙玄参 (玄参) (59)	海钻 (海龙) (523)	海石花 (海浮石) (410)
浙麦冬 (麦门冬) (540)	海菜 (海藻) (413) (昆布)	海白菜 (昆布) (414)
浙茯苓 (茯苓) (210)	海萝 (海藻) (414)	海皮硝 (芒硝) (145)
浙独活 (独活) (161)	海蛇 (海龙) (413)	海地丁 (紫花地丁) (69)
涅石 (明矾) (603)		海红豆 (相思子) (615)
消山药 (丁哥王) (110)		

海决明(石决明)(190)	海螺七(蚤休)
.....(455)	(75)
海沙参(沙参)(307)	海螵蛸(乌贼骨)
.....(535)	(586)
海汤草(海藻)(413)	海藿香(藿香)
.....(413)	(202)
海良姜(高良姜)(584)	海石榴皮(石榴皮)
.....(266)	(571)
海枫藤(海风藤)(124)	海金沙草(海金沙藤)
.....(187)	(224)
海昆布(昆布)(456)	海鱼脑石(鱼脑石)
.....(414)	(253)
海金沙(海金沙)(358)	海南沉香(沉香)
.....(224)	(285)
海狗鞭(海狗肾)(357)	海南砂仁(砂仁)
.....(521)	(204)
海乳石(海浮石)(357)	海南砂壳(砂仁壳)
.....(410)	(206)
海砂仁(砂仁)(620)	海南槟榔(槟榔)
.....(204)	(307)
海砂壳(砂仁壳)(521)	海南藿香(藿香)
.....(206)	(202)
海南子(槟榔)(521)	海州常山(常山)
.....(307)	(590)
海南石(海浮石)(413)	海洲香薷(香薷)
.....(410)	(5)
海南决(石决明)(413)	海洲常山(臭梧桐)
.....(455)	(169)
海南沉(沉香)(512)	海蚌含珠(铁苋菜)
.....(285)	(241)
海南参(沙参)(436)	海豹阴茎(海狗肾)
.....(535)	(521)
海南砂(砂仁)(411)	海蛎子皮(牡蛎)
.....(204)	(456)
海南香(沉香)(413)	海蛎子壳(牡蛎)
.....(285)	(456)
海南蒟(石南藤)(413)	海船果心(补骨脂)

..... (512)	泥拉秧(猪秧秧) (542)
(木蝴蝶)	(葎草)	浣草根(天门冬)
(436)	(243)	(542)
海州骨碎补(骨碎补)	涩萝蔓(葎草)	【十一画】
(510)	(243)	球子草(水蜈蚣)
海底藏珍珠(铁苋菜)	涩疙瘩秧(葎草)	(247)
(241)	(243)	(鹤不食草)
海南大风子(大风子)	涩涩草根(茜草)	(196)
(612)	(335)	球头草(水蜈蚣)
海滨石灰华(海浮石)	溶香(檀香)	(247)
(410)	(291)	球山蓝叶(大青叶)
海滨菟丝子(菟丝子)	(乳香)	(70)
(517)	(374)	球形莎草(水莎草)
浮麦(浮小麦)	浴檀(檀香)	(399)
(568)	(291)	球花漏芦(漏芦)
浮萍(浮萍)	流丹(铅粉)	(100)
(27)	(600)	球药隔重楼(蚤休)
浮椒(胡椒)	流珠(水银)	(75)
(269)	(597)	理石(明矾)
浮水石(海浮石)	流尿狗(桑螵蛸)	(603)
(410)	(584)	理三棱(三棱)
浮水麦(浮小麦)	流星草(谷精草)	(348)
(568)	(39)	理光乌药(高良姜)
浮海石(海浮石)	流苏瓦松(瓦松)	(266)
(410)	(129)	琐阳(锁阳)
浮萍草(浮萍)	流脂巴豆(血竭)	(520)
(27)	(620)	菱草(瞿麦)
浮水甘石(炉甘石)	流动苏合香(苏合香)	(234)
(606)	(475)	菱倍(五倍子)
浮胀草花(芫花)	润天冬(天门冬)	(568)
(152)	(542)	菱角伞(鸭跖草)
烫板(龟板)	润玄参(玄参)	(38)
(563)	(59)	菱角菜(芥菜)
涩翁(诃子)	娑罗果(娑罗子)	(319)
(572)	(293)	黄牙(硫黄)
涩地榆(地榆)	浣草(天门冬)	(594)

黄丹(铅丹)(347)	黄根(山豆根)
.....(600)	(穿山龙)(82)
黄升(升药)(371)	黄菊(菊花)
.....(599)	黄实(芡实)(21)
黄斤(葛根)(581)	黄翘(连翘)
.....(23)	黄泡(钻地风)(67)
黄风(防风)(180)	黄犊(蜗牛)
.....(7)	黄卷(大豆黄卷)(116)
黄文(黄芩)(19)	黄蛤(海蛤壳)
.....(48)	黄柏(黄柏)(411)
黄石(雄黄)(52)	黄蜜(蜂蜜)
.....(595)	黄药(黄药子)(491)
黄占(蜂蜡)(415)	黄蒿(黄花蒿)
.....(625)	(雷公藤)(197)
黄仔(乌梅)(610)	黄榄(橄榄)
.....(566)	黄草(石斛)(558)
黄芝(黄精)(543)	黄蓍(黄芪)
.....(547)	(艾叶)(486)
(玉竹)(388)	黄蜞(水蛭)
.....(546)	黄砂(硝砂)(383)
黄瓜(瓜蒌)(603)	黄蜡(蜂蜡)
.....(404)	黄梔(梔子)(625)
黄羊(羚羊角)(36)	黄薯(蕷薯)
.....(454)	黄虻(川贝母)(226)
黄远(射干)(405)	黄檀(降香)
.....(81)	黄香(松香)(377)
黄沉(沉香)(618)	(檀香)
.....(285)	黄独(黄药子)(291)
黄良(大黄)(415)	黄檗(黄柏)
.....(143)	黄钟(黄众)(52)
黄参(人参)(313)	黄鞭(穿山龙)
.....(478)	黄结(山豆根)(371)
(党参)(82)	黄蘖(黄柏)
.....(482)	黄莓(覆盆子)(52)
黄郁(郁金)(585)	黄七爪(橘红)
.....(345)	黄耆(黄芪)(272)
黄姜(姜黄)(486)	黄山茶(茶叶)

..... (396)	黄瓜子(瓜蒌子) (242)
黄山药(白药子) (132) (434)	黄花母(千里光) (44)
黄山姜(草薑) (226)	黄瓜仁(瓜蒌子) (434)	黄花杆(连翘) (67)
黄天竹(十大功劳叶) (124)	黄瓜香(地榆) (322)	黄花条(连翘) (67)
黄木香(寻骨风) (182)	黄瓜萎(瓜萎) (404)	黄花苗(蒲公英) (68)
黄升丹(升药) (599)	黄丝子(菟丝子) (517)	黄花郎(蒲公英) (68)
黄毛茸(鹿茸) (498)	黄耳肾(黄狗肾) (520)	黄花草(蒲公英) (68)
黄斤根(葛根) (23)	黄耳鞭(黄狗肾) (520)	(败酱草) (94)
黄月石(硼砂) (601)	黄地榆(地榆) (虎杖)	黄花草(仙鹤草) (329)
黄风梢(乌梢蛇) (187) (354)	(千里光) (44)
黄风蛇(乌梢蛇) (187)	黄网子(菟丝子) (517)	(地耳草) (242)
黄甘草(甘草) (491)	黄华蘋(凌霄花) (364)	(角茴香) (87)
黄甘菊(菊花) (21)	黄防风(防风) (7)	(金沸草) (400)
黄甘遂(甘遂) (151)	黄阳花(蕘花) (152)	(酢浆草) (241)
黄石砂(钟乳石) (270)	黄寿丹(连翘) (67)	(豨莶草) (167)
黄龙牙(仙鹤草) (329)	黄芫花(芫花) (152)	黄花梅(酢浆草) (241)
..... (鵝草芽) (309)	黄花艾(艾叶) (338)	黄花菜(藜芦) (592)
黄龙尾(仙鹤草) (329)	黄花仔(豨莶草) (167)	黄花蒿(茵陈蒿) (228)
黄叶下(梔子) (36)	(仙鹤草) (329)	(青蒿) (136)
	(地耳草)	

黄花演(千里光)(93)	黄波椤(黄柏)
.....(44)	(52)
黄花瓣(连翘)(67)	黄法夏(半夏)
.....(67)	(388)
黄芥子(白芥子)(210)	黄荆子(黄荆)
.....(393)	(438)
黄芩茶(黄芩)(345)	黄荆木(黄荆)
.....(48)	(438)
黄芩瓣(黄芩)(81)	黄荆叶(黄荆)
.....(48)	(438)
黄茅参(仙茅)(415)	黄荆条(黄荆)
.....(504)	(蒲公英)(438)
黄豆卷(大豆黄卷)(68)	黄荆根(黄荆)
.....(19)	(狗脊)(438)
黄连须(黄连)(509)	黄茸片(鹿茸)
.....(50)	(498)
黄连祖(淫羊藿)(509)	黄荑子(梔子)
.....(505)	(36)
黄连翘(连翘)(438)	黄茶瓶(金樱子)
.....(67)	(583)
黄连藤(黄藤)(595)	黄药子(威灵仙)
.....(243)	(162)
黄刺果(金樱子)(84)	(红药子)
.....(583)	(131)
黄柏栗(黄柏)(438)	黄药根(黄药子)
.....(52)	(415)
黄饭花(密蒙花)(84)	黄药脂(黄药子)
.....(40)	(415)
黄附片(附子)(48)	黄茨果(桔梗)
.....(254)	(180)
黄鸡子(梔子)(224)	黄梔子(梔子)
.....(36)	(36)
黄鸡菜(黄精)(230)	黄树皮(黄柏)
.....(547)	(52)
黄鸡根(黄精)(19)	黄省藤(红藤)
.....(547)	(93)
黄鸡藤(红藤)(52)	黄骨狼(锁阳)

..... (520)	黄眼藤(乌蔹莓) (257)
黄蚂蚁(同荆) (106)	黄零草(零陵香)
..... (239)	黄常山(常山) (209)
黄虾蟆(黄药子) (590)	黄蜂窝(露蜂房)
..... (415)	黄猪母(豨莶草) (624)
黄香蒿(黄花蒿) (167)	黄蜂蜡(蜂蜡)
..... (197)	黄脚鸡(玉竹) (625)
黄独根(黄药子) (546)	黄蔓菁(玉竹)
..... (415)	黄麻子(火麻仁) (546)
黄秦艽(秦艽) (148)	黄鲟胶(鱼鳔)
..... (166)	黄麻仁(火麻仁) (533)
黄唇肚(鱼鳔) (148)	黄熊胆(熊胆)
..... (533)	黄寄生(桑寄生) (97)
黄根子(地榆) (172)	黄蜜蜡(蜂蜡)
..... (322)	黄葛根(葛根) (625)
黄铁矿(自然铜) (23)	黄熟花(旋复花)
..... (387)	黄硇砂(硫黄) (399)
黄脂沉(沉香) (594)	黄橘皮(橘皮)
..... (285)	黄柴胡(银柴胡) (271)
黄桑叶(桑叶) (140)	黄檀香(檀香)
..... (19)	(金沸草) (291)
黄疸草(金钱草) (400)	黄螟叶(车前草)
..... (221)	黄蛤壳(海蛤壳) (216)
黄座勒(黄药子) (411)	黄檗皮(黄柏)
..... (415)	黄猴枣(猴枣) (52)
黄海棠(墨旱莲) (447)	黄藤子(菟丝子)
..... (562)	黄腊蕨(雷公藤) (517)
黄黄蒿(黄花蒿) (610)	黄藤木(雷公藤)
..... (197)	黄湾子(菟丝子) (610)
黄萝卜(菟丝子) (517)	黄藤草(雷公藤)
..... (517)	黄蒿子(葶苈子) (610)
黄菊花(菊花) (426)	黄藤通(木通)
..... (21)	黄蓝花(红花) (218)
黄萆薢(萆薢) (361)	黄藤根(雷公藤)
..... (226)	黄榆子(茺蔚) (610)
黄梗藤(红藤) (312)	黄藤根(钻地风)
..... (93)	黄瑶桂(肉桂) (180)

黄山毛峰(茶叶)(94)	黄金萱根(萱草根)
.....(396)	(248)
黄天竹叶(十大功劳叶)(309)	黄鱼脑石(鱼脑石)
.....(124)	(253)
黄毛鹿茸(鹿茸)(56)	黄泡刺根(钻地风)
.....(498)	(蒲公英)(180)
黄心柏叶(侧柏叶)(68)	黄草石斛(石斛)
.....(324)	(543)
黄古头草(水蜈蚣)(44)	黄荆树条(黄荆)
.....(247)	(438)
黄龙尾芽(鹤草芽)(94)	黄柏树叶(十大功劳叶)
.....(309)	(124)
黄皮树皮(黄柏)(309)	黄种薄荷(薄荷)
.....(52)	(15)
黄丝郁金(郁金)(248)	黄铁矿石(自然铜)
.....(345)	(387)
黄丝藤子(菟丝子)(48)	黄斑羌青(斑蝥)
.....(517)	(622)
黄耳胡茎(黄狗肾)(248)	黄链条花(连翘)
.....(520)	(67)
黄瓜子草(垂盆草)(81)	黄锁梅根(钻地风)
.....(79)	(180)
黄瓜仁草(瓜子金)(63)	黄瑶肉桂(肉桂)
.....(437)	(257)
黄芽大戟(大戟)(60)	黄蟆叶子(车前子)
.....(154)	(215)
黄花三七(蒲公英)(82)	黄蟆龟草(车前草)
.....(68)	(216)
黄花大戟(大戟)(152)	黄十大功劳(十大功劳叶)
.....(154)	(124)
黄花瓦松(瓦松)(192)	黄山云雾茶(茶叶)
.....(129)	(396)
黄花乌头(白附子)(36)	黄瓜鱼脑石(鱼脑石)
.....(392)	(253)
黄花乌根(何首乌)(415)	黄州白头翁(委陵菜)
.....(529)	(91)
黄花龙芽(败酱草)(48)	黄花长春花(长春花)

	羹(泽泻)(303)
黄花鱼头石(鱼脑石)(213)	萝卜芫(秦芫)
(253)(166)
黄花铁线莲(透骨草)(213)	萝卜奇(土大黄)
(183)(112)
黄花野百合(农吉莉)(355)	萝卜种(地骷髅)
(120)(398)
黄花萱草根(萱草根)(318)	萝寅子(菜菔子)
(248)(303)
黄连水甘石(炉甘石)(318)	萝卜地丁(米口袋)
(606)(70)
黄苞天南星(天南星)(41)	茴桂(肉桂)
(390)(257)
黄果槲寄生(桑寄生)(136)	菌虫草(冬虫夏草)
(172)(514)
黄波罗树皮(黄柏)(15)	菌灵芝(灵芝)
(52)(485)
黄黑小斑蝥(斑蝥)(465)	萎香(玉竹)
(622)(546)
黄蟆龟草子(车前子)(465)	萎蕤(玉竹)
(215)(546)
黄花棍棒石斛(石斛)(19)	萎蕤(玉竹)
(543)(546)
黄花醉鱼草花(密蒙花)(477)	(黄精)
(40)(547)
速药(莪术)(257)	蕉蕘(益母草)
(347)(355)
蕲蓂(败酱草)(247)	菂(莲子)
(94)(576)
(葶苈子)(477)	草芨(革芨)
(426)(263)
(芥菜)(565)	草菝(革菝)
(319)(263)
菘蓝叶(大青叶)(552)	革麻子(蓖麻子)
(70)(616)
菘蓝根(板蓝根)(614)	革麻仁(蓖麻子)
(71)(616)
	萝卜子(菜菔子)	

萸肉(山茱萸)(288)	营蒡(川芎)(343)
萸连(黄连)(50)	菅实花(蔷薇花)(130)
萸黄连(黄连)(50)	萤石(紫石英)(443)
菊婢(凤仙花)(357)	萤火虫草(铁苋菜)(241)
菊三七(菊叶三七)(334)	(鸭跖草)(38)
菊菊苗(白头翁)(89)	草(蓼房子)(426)
菊叶三七(金不换)(341)	草蒿(蓼房子)(426)
(三七)(333)	萍(浮萍)(27)
菟葵(天葵)(122)	萍子草(浮萍)(27)
菟丝实(菟丝子)(517)	菹菜(鱼腥草)(80)
菟核根(白蔹)(98)	域枣(猴枣)(447)
菟奚花(款冬花)(423)	基石(胆矾)(591)
菟冀花(款冬花)(423)	堇(乌头)(255)
菟槐根(苦参)(55)	堇草(乌头)(255)
蘋(黄芩)(48)	堇堇菜(紫花地丁)(69)
菜伪(角腥草)(80)	堇菜地丁(紫花地丁)(69)
菜花(木槿花)(131)	曹公爪(枳椇子)(560)
菜胆(熊胆)(97)	漆茎(泽漆)(213)
菜木香(青木香)(214)	梦花(密蒙花)	

.....(40)	梅桃仁(郁李仁)(287)
葵尾春根(白芍)(149)	勒菜子(蓖麻子)
.....(531)	梅花片脑(冰片)(616)
梗草(桔梗)(474)	豉(淡豆豉)
.....(395)	梅花冰片(冰片)(18)
梧鼠(蝼蛄)(474)	副炮台芪(黄芪)
.....(251)	梅花脑子(冰片)(486)
桦皮(秦皮)(474)	副本一粒红(白附子)
.....(92)	梅花鹿角(鹿角)(392)
桦木皮(秦皮)(500)	聋婆蛇(白花蛇)
.....(92)	梅花鹿茸(鹿茸)(177)
梅(乌梅)(498)	蜜蛤(瓦楞子)
.....(566)	柠檬子(八月札)(627)
梅干(乌梅)(294)	瓠子(葫芦)
.....(566)	梗皮(肉桂)(231)
梅子(乌梅)(257)	瓠瓜(葫芦)
.....(566)	梗枝(桂枝)(231)
梅片(冰片)(2)	瓠匏(葫芦)
.....(474)	梭罗子(娑罗子)(231)
梅花(绿萼梅)(293)	匏(葫芦)
.....(293)	梭草根(香附)(231)
梅冰(冰片)(282)	匏瓜(葫芦)
.....(474)	梭椤子(娑罗子)(231)
梅果(乌梅)(293)	盛槿(旋复花)
.....(566)	梭果黄芪(黄芪)(399)
梅实(乌梅)(486)	盍沉(沉香)
.....(566)	梯枯皮(海桐皮)(285)
梅梢(乌梅)(179)	盍沉香(沉香)
.....(566)	桫椤子(娑罗子)(285)
梅渚(乌梅)(293)	硕鼠(蝼蛄)
.....(566)	勒泡(月季花)(251)
梅薛(石花)(363)	硃砂(朱砂)
.....(136)	勒草(葎草)(441)
梅花脑(冰片)(243)	排风(蜀羊泉)
.....(474)	勒党(花椒)(86)
梅杏仁(甜杏仁)(263)	排草(零陵香)
.....(419)	勒荔枝核(荔枝核)(209)

排风藤(蜀羊泉)(387)	雪央(锁阳)
.....(86)	(520)
(青风藤)		雪矾(明矾)
.....(188)	(603)
排香草(藿香)(437)	雪三七(珠儿参)
.....(202)	(537)
推丸(蜣螂)(103)	雪山贝(川贝母)
.....(447)	(405)
推车虫(蜣螂)(239)	雪风藤(松萝)
.....(447)	(115)
推车客(蜣螂)(359)	雪如来(白及)
.....(447)	(330)
推车郎(蜣螂)(378)	雪里开(金果榄)
.....(447)	(84)
推粪虫(蜣螂)(179)	雪里青(角茴香)
.....(447)	(87)
推粪爬(蜣螂)(108)	(筋骨草)
.....(447)	(105)
掐皮参(人参)(239)	雪里珠(矮地茶)
.....(478)	(430)
捻捻草(茜草)(115)	雪梨梢(檀香)
.....(335)	(291)
接骨(续断)(359)	雪豹骨(豹骨)
.....(508)	(176)
接力草(狼把草)(508)	雪藕节(藕节)
.....(111)	(342)
接古草(泽兰)(359)	雪里开花(筋骨草)
.....(352)	(105)
接肠草(甘蔗)(108)	虚中(钟乳石)
.....(539)	(270)
接骨木(草珊瑚)(547)	悬刀(皂莢)
.....(108)	(393)
接骨风(接骨木)(122)	悬石(络石藤)
.....(378)	(186)
接骨丹(接骨木)(112)	悬钩子(覆盆子)
.....(378)	(585)
(自然铜)(547)	鄂羌(羌活)

鄂李仁(郁李仁)	野连(黄连)	野大黄(土大黄)
.....(149)(50)(112)
鄂羌活(羌活)	野苓(茯苓)	野山豆(山药)
.....(9)(210)(490)
曼陀罗(洋金花)	野姑(苍耳草)	野山参(人参)
.....(439)(12)(479)
曼陀罗花(洋金花)	(蜀羊泉)	野山药(穿山龙)
.....(439)(86)(371)
曼氏无针乌贼骨(乌贼骨)	野参(人参)	野山楂(山楂)
.....(586)(478)(298)
越叶甘松(甘松)	野菊(野菊花)	野小茴(蛇床子)
.....(293)(22)(614)
匙叶甘松香(甘松)	野梨(猕猴桃)	野木瓜(八月札)
.....(293)(558)(294)
晚蚕矢(蚕沙)	野麻(罗布麻)	野木香(青木香)
.....(180)(471)(288)
晚蚕沙(蚕沙)	野葱(薤白)	野天麻(益母草)
.....(180)(289)(355)
晚桑叶(桑叶)	野薑(大薑)	野升麻(地榆)
.....(19)(316)(322)
晚红瓦松(瓦松)	野蒜(薤白)	野牛夕(土牛膝)
.....(129)(289)(366)
眼明草(千里光)	(石蒜)	野牛膝(土牛膝)
.....(44)(593)(366)
略石(络石藤)	野蓼(知母)	野毛豆(农吉利)
.....(186)(32)(120)
野艾(艾叶)	野薤(薤白)	野毛蛋(八月札)
.....(388)(289)(294)
野兰(漏芦)	野丁香(丁香)	野水仙(石蒜)
.....(100)(265)(593)
野麦(瞿麦)	野人杖(白头翁)	野六麻(铁苋菜)
.....(234)(89)(241)
野芹(败酱草)	野于术(白术)	野石榴(金樱子)
.....(94)(489)(543)
野茶(罗布麻)	野丈人(白头翁)	野白头(薤白)
.....(471)(89)(289)
	野大黄(羊蹄)	

野白薯(山药)(98)	野芭蕉(喜树)
.....(490)	(117)
野仙姜(黄精)(373)	野枣子(胡颓子)
.....(547)	(304)
野冬青(四季青)(482)	野枣仁(酸枣仁)
.....(102)	(449)
野生姜(黄精)(482)	野杉子(榧子)
.....(547)	(312)
野兰蒿(茵陈蒿)(235)	野刺菜(大蓟)
.....(228)	(316)
(青蒿)(455)	野园荽(鹅不食草)
.....(136)	(196)
野半夏(白附子)(540)	野牡丹(商陆)
.....(392)	(156)
野芋头(半夏)(34)	(王不留行)
.....(388)	(367)
(天南星)(196)	野鸡爪(牛筋草)
.....(390)	(225)
野百合(百合)(221)	野鸿坝(翻白草)
.....(550)	(56)
(农吉利)(11)	野鸡尾(凤尾草)
.....(120)	(244)
野芍药(赤芍)(607)	野青豆(决明子)
.....(62)	(465)
野芝麻(豨莶草)(472)	野苦瓜(瓜蒌)
.....(167)	(404)
(玄参)(417)	野苦草(青蒿)
.....(59)	(136)
(农吉利)(424)	(黄花蒿)
.....(120)	(197)
(藏角蒿)(221)	野苦荬(苣荬菜)
.....(530)	(127)
野红花(小蓟)(农吉利)	野苦菜(败酱草)
.....(318)(120)(94)
(大蓟)(80)	(苣荬菜)
.....(316)	(127)
野红薯(白蔹)(263)	野苦麻(铁苋菜)

野茴根(何首乌)	野胡椒(草澄茄)	野菊花(千里光)
.....(529)(264)(44)
野茄子(苍耳子)	野香蕉(八月札)	野菜花(薅菜)
.....(11)(294)(417)
野茄子(龙葵)	野络麻(铁苋菜)	野梨子(枸橘)
.....(122)(241)(280)
(龙葵子)	野洋参(西洋参)	野猪食(猪苓)
.....(554)(481)(212)
野竺麻(芝麻根)	野秦归(当归)	野猪粪(猪苓)
.....(321)(526)(212)
野枇杷(胡颓子)	野荸荠(胡颓子)	野麻子(苏子)
.....(304)(304)(424)
野杨莓(蛇莓)	野蔚蓝(羊蹄)	野麻朴(了哥王)
.....(128)(340)(110)
野党参(党参)	野桃仁(桃仁)	野麻草(铁苋菜)
.....(482)(360)(241)
野油花(旋复花)	野胭脂(商陆)	野麻黄(铁苋菜)
.....(399)(156)(241)
野油菜(蔊菜)	野脂麻(玄参)	野葡萄(龙葵)
.....(417)(59)(122)
野油麻(益母草)	野席草(灯心草)	寄萱花(射干)
.....(355)(235)(81)
野茴香(蛇床子)	野海椒(龙葵)	野落苏(苍耳草)
.....(614)(122)(12)
(角茴香)	野黄花(败酱草)	野棉花(铁苋菜)
.....(87)(94)(241)
(小茴香)	野黄连(虎仗)	(漏芦)
.....(267)(354)(100)
野荞子(金荞麦)	(黄连)	野橙子(枸橘)
.....(103)(50)(280)
野荞麦(金荞麦)	野黄麻(茺蔚子)	野紫苏(紫苏)
.....(103)(356)(3)
野荞菜(积雪草)	野菱角(刺蒺藜)	野紫菜(苍耳草)
.....(225)(463)(12)
野南芥(金荞麦)	野萝卜(羊蹄)	野番薯(何首乌)
.....(103)(340)(529)
	(商陆)	

野箇蒿(黄花蒿)(15)	野冬苋菜(积雪草)
.....(197)	(金钱草)(225)
(青蒿)(221)	野冬青叶(四季青)
.....(136)	野燕麦(瞿麦)(102)
野蒜头(薤白)(231)	野鸟头子(天葵)
.....(289)	野藻本(藻本)(122)
野蓬头(艾叶)(11)	野台党参(党参)
.....(333)	野藿香(藿香)(482)
野慈姑(白附子)(202)	野老鹳草(老鹳草)
.....(392)	野三角麦(金荞麦)(185)
野蕘蕘(土大黄)(103)	野花生子(决明子)
.....(112)	野丁香花(芫花)(465)
野槐根(苦参)(152)	野花椒皮(白鲜皮)
.....(55)	野万年青(爵床)(99)
野蜂房(露蜂房)(111)	野芹菜根(前胡)
.....(624)	野山人参(人参)(402)
野蜂窝(露蜂房)(478)	野芥菜子(葶苈子)
.....(621)	野山洋参(西洋参)(426)
野蠍丝(苍耳草)(481)	野苏子根(丹参)
.....(12)	野马蜂窝(露蜂房)(349)
野碱谷(牛筋草)(624)	野芝麻根(芝麻根)
.....(225)	野王瓜草(酢浆草)(321)
野辣子(龙葵)(241)	野牡丹皮(牡丹皮)
.....(122)	野天门冬(百部)(60)
野辣菜(前胡)(419)	野鸡冠子(青葙子)
.....(402)	野木香果(马兜铃)(41)
野辣椒(龙葵)(428)	野鸡膀子(委陵菜)
.....(122)	野毛耳朵(蜀羊泉)(91)
野豌豆(王不留行)(86)(贯众)
.....(367)	野水凤仙(墨旱莲)(313)
(农吉利)(562)	野杨梅子(楮实)
.....(120)	野水葡萄(胡颓子)(559)
野靛青(鸭跖草)(304)	野青旋叶(大青叶)
.....(38)	野向日葵(墨旱莲)(70)
野薤白(薤白)(562)	野苦瓜子(瓜蒌子)
.....(289)	(豨莶草)(434)
野薄荷(薄荷)(167)	野苦瓜仁(瓜蒌子)

野苦荬菜(蒲公英)	野棉花根(打破碗花花)	蜘蛛虫(魔虫)
.....(68)(316)(332)
野苧麻子(苘麻子)	(白头翁)	蛎壳(牡蛎)
.....(46)(89)	蛎房(牡蛎)
野枇杷叶(矮地茶)	野雪里蕻(蔊菜)	蛎蛤(牡蛎)
.....(430)(417)(456)
(胡颓子叶)	野葡萄根(白蔹)	蜥蜴(壁虎)
.....(432)(98)(626)
野夏枯草(半支莲)	野葡萄藤(乌蔹莓)	蚱蜢腿(爵床)
.....(118)(106)(111)
野韭菜根(石菖蒲)	野蕙麻花(洋金花)	蚱蝉皮(蝉蜕)
.....(477)(439)(17)
(麦门冬)	野槐树叶(大青叶)	蚱蠐螬皮(蝉蜕)
.....(540)(70)	蚯蚓(地龙)
野香菜根(沙参)	野蔷薇花(蔷薇花)(469)
.....(535)(130)	蚯蚓干(地龙)
野独行菜(蓼房子)	野辣椒树(龙葵)	蜗羸(蜗牛)
.....(426)(122)(116)
野狐鼻涕(桑螵蛸)	野刀板藤豆(刀豆)	蛾虫(魔虫)
.....(584)(291)(382)
野虹头根(山豆根)	野红萝卜子(蛇床子)	蛇皮(蛇蜕)
.....(82)(614)(470)
野铁扫把(萹蓄)	野鸡冠花子(青葙子)	蛇芋(天南星)
.....(233)(41)(390)
野鹿衔花(筋骨草)	野胡萝卜子(鹤虱)	(山药)
.....(105)(310)(490)
野料豆衣(稽豆衣)	野胡萝卜子(蛇床子)	蛇衣(蛇蜕)
.....(465)(614)(470)
野料豆皮(稽豆衣)	野葡萄秧根(白蔹)	蛇米(蛇床子)
.....(465)(98)(614)
野黄杨树(六月雪)	蝎子(瓦楞子)	蛇壳(蛇蜕)
.....(246)(627)(470)
野菠菜根(羊蹄)	蝎壳(瓦楞子)	
.....(340)(627)	
野棉花子(苘麻子)	蝎子壳(瓦楞子)	
.....(46)(627)	
	蜡壳草(积雪草)	

蛇附(蛇蜕)(390)	蛇泡草(茅莓)(127)
蛇罔(金荞麦)(130)	蛇泡簕(茅莓)(127)
蛇草(徐长卿)(170)	蛇疙瘩(仙鹤草)(329)
蛇草(马齿苋)(89)	蛇波藤(蛇莓)(128)
蛇胆(猪胆汁)(417)	蛇草根(何首乌)(529)
蛇退(蛇蜕)(470)	蛇枕头(蛇莓)(128)
蛇珠(蛇床子)(614)	蛇食草(爵床)(111)
蛇常(蛇床子)(614)	蛇总管(白花蛇草)(96)
蛇符(蛇蜕)(470)	蛇利草(半边莲)(78)
蛇粟(蛇床子)(614)	蛇针草(白花蛇舌草)(96)
蛇筋(蛇蜕)(470)	蛇床仁(蛇床子)(614)
蛇藨(蛇莓)(123)	蛇床实(蛇床子)(614)
蛇八瓣(蛇莓)(128)	蛇果草(蛇莓)(128)
蛇王草(泽兰)(352)	蛇果藤(蛇莓)(128)
蛇王菊(泽兰)(352)	蛇参果(马兜铃)(428)
蛇不见(蛇莓)(128)	蛇参根(青木香)(288)
蛇木芋(天南星)(390)	蛇泡果(茅莓)(127)
蛇六谷(天南星)(390)	蛇泡簕(茅莓)(127)
蛇包谷(天南星)		蛇蜕皮(蛇蜕)	

蛇叶柴胡(柴胡)	常山苗(蜀漆)	雀扑拉(地锦草)
.....(24)(591)(104)
蛇皮松果(白松塔)	常山茎(蜀漆)	雀头香(香附)
.....(433)(591)(282)
蛇皮松球(白松塔)	常行归(当归)	雀舌草(地耳草)
.....(433)(526)(242)
蛇皮松塔(白松塔)	常吴萸(吴茱萸)	雀李仁(郁李仁)
.....(433)(258)(149)
蛇头党参(党参)	常春藤(络石藤)	雀林草(酢浆草)
.....(482)(186)(241)
蛇挖瘩芽(鹤草芽)	(青风藤)	雀脑芎(川芎)
.....(309)(188)(343)
蛇倒退芽(鹤草芽)	常思菜(苍耳草)	雀儿卧单(地锦草)
.....(309)(12)(104)
蛇头天南星(天南星)	常绿榆(榆钱)	雀儿卧蛋(地锦草)
.....(390)(453)(104)
蛇首眼球贝(紫贝齿)	常蓼根(商陆)	甜艾(艾叶)
.....(459)(156)(338)
崖香(沉香)	常山枝叶(蜀漆)	甜草(甘草)
.....(285)(591)(493)
崖姜(骨碎补)	常绿油麻藤(鸡血藤)	甜荞(金荞麦)
.....(510)(373)(103)
崖椒(花椒)	常春藤叶牵牛子(牵牛子)	甜茶(常山)
.....(263)(155)(590)
崖柏叶(侧柏叶)	雀脑(川芎)	(蜀漆)
.....(324)(343)(591)
崩大碗(积雪草)	雀儿草(酢浆草)	甜根(白茅根)
.....(225)(241)(321)
崩口碗(积雪草)	雀儿麻(了哥王)	甜党(党参)
.....(225)(110)(482)
常羊(蠉虫)	雀儿酥(胡颓子)	甜菊(菊花)
.....(382)(304)(21)
常思(苍耳草)	雀儿酸(酢浆草)	甜橙(枳壳)
.....(12)(241)(276)
常枲(苍耳草)	雀子麻(了哥王)	(香橼)
.....(12)(110)(278)
	雀不站(钻地风)	

甜橘(枳实)(321)	甜秫杆子(甘蔗)
.....(275)	(玉竹)(539)
甜大云(肉苁蓉)(546)	甜酒棵根(生地黄)
.....(503)	(甘草)(58)
甜大芸(肉苁蓉)(493)	甜葶苈子(葶苈子)
.....(503)	甜莲子(莲子)(426)
甜牛夕(牛膝)(576)	甜薯杆子(甘蔗)
.....(365)	甜桔梗(桔梗)(539)
甜牛膝(牛膝)(395)	甜七七芽果(枸杞子)
.....(365)	甜秫稽(甘蔗)(555)
甜甘草(甘草)(539)	甜杞杞芽根(地骨皮)
.....(493)	甜菜子(枸杞子)(139)
甜石莲(莲子)(555)	甜菜芽根皮(地骨皮)
.....(576)	甜菊花(菊花)(139)
甜半夜(枳根子)(21)	甜薑芽根皮(地骨皮)
.....(560)	甜根子(甘草)(139)
甜地丁(米口袋)(493)	甜薑芽果(枸杞子)
.....(70)	甜黄精(黄精)(555)
(紫花地丁)(547)	瓢瓠(瓜蒌)
.....(69)	甜梗子(芦根)(404)
甜百合(百合)(38)	梨芦(藜芦)
.....(550)	甜紫菀(紫菀)(592)
甜瓜把(瓜蒂)(421)	梨枣(枳根子)
.....(404)	甜葶苈(葶苈子)(560)
甜瓜蒂(瓜蒂)(426)	梨芦(藜芦)
.....(404)	甜棒棰(胡颓子)(592)
甜远志(远志)(304)	梨枣树子(枳根子)
.....(450)	甜瓠(葫芦)(560)
甜苁蓉(肉苁蓉)(281)	犁头尖(山慈姑)
.....(503)	甜橙皮(青皮)(101)
甜杏子(甜杏仁)(273)	(半夏)
.....(419)	甜瓜疙蒂(瓜蒂)(388)
甜豆茄(龙葵子)(404)	犁头草(紫花地丁)
.....(554)	甜豆茄棵(龙葵)(69)
甜果儿(胡颓子)(122)	犁食根(白芍)
.....(304)	甜齿芽根(地骨皮)(531)
甜草根(白茅根)(139)	犁头尖根(白附子)

移草(豨莶草)	(积雪草)	(605)
移山参(人参)	(虎耳草)	(140)
移星草(谷精草)	(喉咙草)	(598)
移山人参(人参)	铜钱柴(乌药)	(441)
铜芸(防风)	(金果榄)	(597)
铜青(铜绿)	(月季花)	(437)
铜罗(拳参)	铜锤草(豨莶草)	(66)
铜草(香薷)	(徐长卿)	(321)
铜胆(熊胆)	铜皮石斛(石斛)	(431)
铜勒(胆矾)	(狗舌草)	(430)
铜锈(铜绿)	铜筋铁骨草(虎杖)	(177)
铜甲片(穿山甲)	(玉竹)	(535)
铜皮兰(石斛)	矮根(白芍)	(605)
铜丝草(淫羊藿)	铧头草(紫花地丁)	(177)
铜交杯(狗舌草)	铨水大黄(大黄)	(605)
铜斑道(墓头回)	银耳(白木耳)	(321)
铜钱花(金钱草)	银花(金银花)	(593)
铜钱草(金钱草)	银杏(白果)	(152)
	银池(密陀僧)	(221)
	银胡(银柴胡)	
	银粉(轻粉)	
	银硃(朱砂)	
	(银朱)	
	银不换(瓜子金)	
	银花藤(忍冬藤)	
	银竺根(竺麻根)	
	银杏叶(白果叶)	
	银杏仁(白果)	
	银报应(白花蛇)	
	银条参(沙参)	
	银陀僧(密陀僧)	
	银环蛇(白花蛇)	
	银炉底(密陀僧)	
	银麻根(竺麻根)	
	银锁匙(石蒜)	
	银腰带(芫花)	
	银蹄草(金钱草)	

银杏树叶(白果叶)(531)(65)
银钱豹骨(豹骨)(176)	偶子(草豆蔻)
银密陀僧(密陀僧)(605)(208)
银毛委陵菜(地榆)(322)	偷粪虫(蜣螂)
铲络(橘络)(272)(447)
牻牛儿苗(老鹳草)(185)	偷瓜畜皮(刺猬皮)
笼草(乌蔹莓)(106)(587)
符蘚(桔梗)(395)	偷瓜婆皮(刺猬皮)
假苏(荆芥)(6)(587)
假萎(石南藤)(190)	偷瓜瓞皮(刺猬皮)
假蒟(石南藤)(190)(587)
假贝母(浙贝母)(407)	偷蜜珊瑚肉(甘草)
假水菜(芥菜)(319)(493)
假地豆(农吉利)(120)	偏莲(半边莲)
假花生(金钱草)(221)(78)
假君子(牵牛子)(155)	偏头草(半支莲)
假苦瓜(罗汉果)(559)(118)
(葎草)(243)	(半边莲)
假种皮(龙眼肉)	(118)
		偏竹梁(射干)
	(81)
		偏叶天南星(天南星)
	(390)
		兜朴(厚朴)
	(200)
		兜铃(木蝴蝶)
	(436)
		(马兜铃)
	(428)
		兜铃屯(天仙藤)
	(190)
		兜铃苗(天仙藤)
	(190)
		兜铃香(青木香)
	(288)

兜铃根(青木香)(124)	豚榆系(地榆)(322)
兜铃藤(天仙藤)(240)	脱石(滑石)(217)
兜零根(青木香)(455)	脱力草(仙鹤草)(329)
兜婆婆香(藿香)(65)	(银柴胡)(140)
徘徊花(玫瑰花)(132)	脱桃仁(桃仁)(360)
御米壳(罂粟壳)(285)	脱力草芽(鹤草芽)(309)
御米须(玉米须)(594)	脱皮马勃(马勃)(83)
御麦须(玉米须)(268)	蟹蠚(地龙)(469)
盘七(珠儿参)(594)	猪胆(猪胆汁)(417)
盘蛇(白花蛇)(268)	猪耳(苍耳草)(12)
盘棕(仙茅)(594)	猪麻(益母草)(355)
盘龙七(三七)(240)	猪椒(两面针)(109)
盘龙花(绶草)(240)	猪大肠(防己)(164)
盘龙参(绶草)(240)	猪牙皂(皂莢)(393)
盘龙草(伸筋草)(95)	猪牙齿(佛甲草)(119)
(绶草)(490)	猪牙参(绶草)(124)
.....(225)(564)	猪牙草(墨旱莲)(562)
盘龙根(绶草)(417)	(萹蓄)(233)
武龙箭(绶草)(417)	猪毛蒿(猪毛菜)	

..... (472)	猪姆耳(鱼腥草) (80) (218)
(茵陈蒿) (228)	猪姆刺(大蓟) (316)	猪鬃草(荆荆) (239)
猪毛纊(猪毛菜) (472)	猪油花(木槿花) (131)	猪鞭草(缓草) (124)
猪毛蕨(骨碎补) (510)	猪屎豆(决明子) (465)	猪牙皂角(皂莢) (393)
猪耳草(车前草) (216)	(沙苑子) (518)	猪牙皂莢(皂莢) (393)
(虎耳草) (123)	猪屎苓(猪苓) (212)	猪耳朵草(车前草) (216)
猪矢草(灯心草) (235)	猪屎青(大青叶) (70)	猪耳朵胡(车前草) (216)
猪心姑(山慈姑) (101)	猪屎草(鵝不食草) (196)	猪耳朵棵(车前草) (216)
猪仔螺(紫贝齿) (459)	猪屎潺(鵝不食草) (196)	猪耳朵穗(车前草) (216)
猪辽参(缓草) (124)	猪圈草(萹蓄) (233)	猪耳草子(车前子) (215)
猪母菜(马齿苋) (89)	猪婆藤(鸡血藤) (373)	猪肚菜子(车前子) (215)
(豨莶草) (167)	(乌蔹莓) (106)	猪姆耳根(商陆) (156)
猪血藤(鸡血藤) (373)	猪椿皮(椿皮) (570)	猪波罗花(洋金花) (439)
猪妈菜(大蓟) (316)	猪鼻孔(鱼腥草) (80)	猪冠麻叶(豨莶草) (167)
猪肝赤(赤小豆) (231)	猪熊胆(熊胆) (97)	猪屎蓝豆(决明子) (465)
猪肚子(天麻) (462)	猪脊草(豨莶草) (167)	猪通草茹(香附) (232)
猪肚菜(车前草) (216)	猪脊莓(豨莶草) (167)	猪颠茄花(洋金花) (439)
猪苦胆(猪胆汁) (417)	猪潦子(缓草) (124)	猪耳朵胡子(车前子) (215)
猪骨明(决明子) (465)	猪棗藤(木通)	猪耳朵棵子(车前子) (215)

猪耳朵藨子(车前子)(232)	堕胎花(凌霄花)(364)
.....(215)			
猫爪(猫爪草)(151)	随脂(麦冬)(540)
.....(37)		随风子(河子)(572)
猫沙(鵝不食草)(15)(藏青果)(85)
.....(196)		随碱片(穿山甲)(381)
猫香(寻骨风)(89)	随阳给事中(甘遂)(151)
.....(182)		蛋吉(大黄)(143)
猫蔚(小蔚)(399)	蛋膜衣(凤凰衣)(561)
.....(318)		婵人防(金银花)(65)
猫儿头(十大功劳叶)(182)	绩竺根(竺麻根)(321)
.....(124)		绩独活(独活)(161)
猫儿刺(苦丁茶)(123)	续毒(狼毒)(159)
.....(43)		续断(楂苏)(194)
猫儿卵(白蔹)(159)	续骨木(接骨木)(378)
.....(98)		续根草(香附)(282)
猫儿眼(泽漆)(232)	续随子(千金子)(157)
.....(232)		续断肉(续断)(508)
猫头草(瓦松)(232)	续随子霜(千金子)(157)
.....(129)		绳梨(猕猴桃)	
猫耳朵(虎耳草)(123)		
.....(123)			
猫耳根(寻骨风)(159)		
.....(182)			
猫眼草(泽漆)(417)		
.....(232)			
.....(铁苋菜)(447)		
.....(241)			
猫眼菜(铁苋菜)(558)		
.....(241)			
猫眼根(狼毒)(153)		
.....(159)			
猫脚印(老鹳草)(224)		
.....(186)			
猫藤草(伸筋草)(186)		
.....(182)			
猫儿眼草(泽漆)(521)		

绵毛马兜铃	(寻骨风)	绵须姜	(206)
绳毒子(蛇床子)(558)	绿须姜(细辛)(260)
.....(614)	绵团铁线莲(威灵仙)	绿荟草(豨莶草)(167)
缠春花(月季花)(162)	绿梅花(绿萼梅)(296)
.....(363)	绵糊条子花(密蒙花)	绿蒂菊(菊花)(21)
绵蕊(黄芪)(40)	绿豨莶(豨莶草)(167)
.....(486)	绵毛酸模叶蓼(辣蓼)	绿毛伸筋(伸筋草)(182)
绵陈(茵陈蒿)(193)	绿毛筋草(伸筋草)(182)
.....(228)	绶贝(紫贝齿)	绿头猛钻(虻虫)(385)
绵大戟(狼毒)(459)	绿仙人掌(仙人掌)(108)
.....(159)	绿刺(络石藤)	绿丝郁金(郁金)(345)
(大戟)(186)	绿色升麻(升麻)(26)
.....(154)	绿柿(柿蒂)	绿衣枳壳(枳壳)(276)
绵瓜络(丝瓜络)(292)	绿衣枳实(枳实)(275)
.....(618)	绿矾(皂矾)	绿花党参(党参)(482)
绵杜仲(杜仲)(603)	绿壳砂仁(砂仁)(204)
.....(507)	绿茶(茶叶)	绿豆升麻(升麻)(26)
绵枣儿(薤白)(396)	绿背浮萍(浮萍)(27)
.....(289)	绿黄(莪术)	绿萼梅花(绿萼梅)(296)
绵茵陈(茵陈蒿)(347)		
.....(228)	绿藤(石南藤)		
绵黄芪(黄芪)(190)		
.....(486)	绿天麻(天麻)		
绵萆薢(萆薢)(462)		
.....(226)	绿升麻(升麻)		
绵绵牛(老鹳草)(26)		
.....(185)	绿水桂(肉桂)		
绵蜂草(半边莲)(257)		
.....(78)	绿当归(土大黄)		
绵马羊齿(贯众)(112)		
.....(313)	绿芫青(青娘子)		
绵马贯众(贯众)(386)		
.....(313)	绿壳砂(砂仁)		
绵条子花(密蒙花)(204)		
.....(40)	绿豆青(大青叶)		
绵马鱗毛蕨(贯众)(70)		
.....(313)	绿砂壳(砂仁壳)		

绿叶绿叶草(泽漆)(321)	麻蝴蝶皮(蝉蜕)(17)
.....(282)			
绿泥石片岩(礞石)(392)	庵摩勒树皮(紫荆皮)(114)
.....(412)	(半夏)		
绿油伽楠香(沉香)(388)	庵摩落迦果树皮(紫荆皮)(114)
.....(285)	麻芋果(半夏)		
毫笔花(白头翁)(388)	鹿列(知母)(32)
.....(89)	麻芋根(半夏)		
麻子(火麻仁)(338)	鹿竹(黄精)(547)
.....(148)	麻丢失(马兜铃)		
麻仁(火麻仁)(42)	鹿冲(鹿鞭)(501)
.....(148)	麻花艽(秦艽)		
麻巴(竹茹)(166)	鹿肠(玄参)(59)
.....(409)	麻草子(半夏)		
麻虫(苍耳虫)(388)	(败酱草)(94)
.....(12)	麻黄草(麻黄)		
麻实(火麻仁)(1)	鹿肾(鹿鞭)(501)
.....(148)	麻黄绒(麻黄)		
麻药(鬼箭羽)(1)	鹿虻(虻虫)(385)
.....(372)	麻惹泽(没食子)		
麻了皮(蝉蜕)(588)	鹿首(败酱草)(94)
.....(17)	麻儿鸟皮(蝉蜕)		
麻子仁(火麻仁)(17)	鹿胶(鹿角胶)(500)
.....(148)	麻乌贼骨(乌贼骨)		
麻子草(铁苋菜)(586)	鹿葱(藜芦)(592)
.....(241)	麻乌鲗骨(乌贼骨)		
麻牛夕(牛膝)(586)	鹿酱(败酱草)(94)
.....(365)	麻花头根(升麻)		
麻牛膝(牛膝)(26)	鹿子草(甘松)(293)
.....(365)	麻花秦艽(秦艽)		
麻风子(大风子)(166)	鹿阴茎(鹿鞭)(501)
.....(612)	麻蝴蝶皮(蝉蜕)		
麻玉果(半夏)(17)	鹿安茶(鹿衔草)(370)
.....(388)	麻黄草根(麻黄根)		
麻甲头(草薢)(570)	鹿冲肾(鹿鞭)(501)
.....(226)	麻雀蓑衣(地锦草)		
麻仔根(苎麻根)(104)	鹿寿草(鹿衔草)	

..... (370)	鹿角白霜(鹿角霜) (500) (86)
鹿寿茶(鹿衔草) (370)	鹿角柔须(玉米须) (239)	望江南(决明子) (465)
鹿角片(鹿角) (500)	鹿茸血片(鹿茸) (498)	(含羞草) (245)
鹿角双(鹿角霜) (500)	鹿茸粉片(鹿茸) (498)	望春花(辛夷) (13)
鹿角尖(海藻) (413)	鹿韭根皮(牡丹皮) (60)	望日葵子(向日葵子) (554)
鹿角草(络石藤) (186)	狼芋头(狼毒) (159)	望日葵瓤(向日葵茎髓) (238)
鹿角屑(鹿角) (500)	痒辣菜(天仙藤) (190)	望果树皮(紫荆皮) (114)
鹿角粉(鹿角) (500)	痒辣菜果(马兜铃) (428)	望日葵花托(向日葵花托) (237)
鹿尾菜(海藻) (413)	痒辣菜根(青木香) (288)	章瓦(斑蝥) (622)
鹿筋(鹿鞭) (501)	旋风草(益母草) (355)	章柳根(商陆) (156)
鹿肾片(鹿鞭) (501)	旋鸡头(凤尾草) (244)	章蒲根(商陆) (156)
鹿茸片(鹿茸) (498)	旋复秆(金沸草) (400)	商六(商陆) (156)
鹿茸粉(鹿茸) (498)	旋复草(金沸草) (400)	商草(川贝母) (405)
鹿含草(鹿衔草) (370)	旋复梗(金沸草) (400)	商棘根(天门冬) (542)
鹿葱根(葱草根) (243)	旋福花(旋复花) (399)	阔鸡尾(凤尾草) (244)
鹿蹄草(鹿衔草) (370) (山慈姑) (101)	旋覆花(旋复花) (399)	惊风草(瓜子金) (437)
鹿鞭片(鹿鞭) (501)	旃(檀香) (291)	涼果(橄榄) (558)
鹿鞭粉(鹿鞭) (501)	望见消(石菖蒲) (477)	谖草根(萱草根) (248)
	望冬红(蜀羊泉)	漱口药(白及) (330)

寇思(山茱萸)(289)	剪绒花(瞿麦)(234)
.....(582)			
寇通(通草)(382)	剪刀草根(白附子)(392)
.....(219)			
寇脱(通草)(454)	剪刀牛膝(夕)(土牛膝)(366)
.....(219)			
寄生(桑寄生)(454)	剪口三七(三七)(333)
.....(172)			
寄奴(刘寄奴)(454)	粘草(茜草)(335)
.....(351)			
寄屑(桑寄生)(454)	粘不扎(豨莶草)(167)
.....(172)			
寄生草(桑寄生)(454)	粘仓子(牛蒡子)(16)
.....(172)		(豨莶草)(167)
寄生树(桑寄生)(454)	粘鱼须(威灵仙)(162)
.....(172)			
寄居花童(桑寄生)(454)	粘珠子(鹤虱)(310)
.....(172)			
宿芩(黄芩)(69)	粘粘葵(苍耳草)(12)
.....(48)	(瞿麦)		
密二花(金银花)(234)	粘强子(豨莶草)(167)
.....(65)			
密砂壳(砂仁壳)(81)	粘糊草(豨莶草)(167)
.....(206)			
密香薷(香薷)(69)	粘糊菜(豨莶草)(167)
.....(5)			
密银花(金银花)(81)	粘毛黄芩(黄芩)(48)
.....(65)			
密花豆藤(鸡血藤)(333)	粘委陵菜(委陵菜)(91)
.....(373)			
密花香薷(香薷)(50)	粘榔树叶(榆叶)(250)
.....(5)			
密花柴胡(柴胡)(581)	粘榔树皮(榆白皮)(250)
.....(24)			
密密蒿子(茅蒿子)(367)	粘榔树莢(榆钱)	
.....(426)			
密花小根蒜(薤白)(367)		

.....(453)	断肠草(狼毒)(86)
粘蓼草根(茜草)(159)	清明草(芥菜)
.....(335)	(乌头)(319)
粘柳树白皮(榆白皮)(255)	消骨风(寻骨风)
.....(250)	(雷公藤)(182)
粘柳树根白皮(榆白皮)(610)	清夏片(半夏)
.....(250)	饴糖(饴糖)(388)
粗糠仔(紫珠)(496)	清凉膏(木芙蓉叶)
.....(320)	粒状虫胶(紫草茸)(611)
粗糠花(千里光)(131)	清化玉桂(肉桂)
.....(44)	兽魄(琥珀)(257)
粗糠草(紫珠)(448)	清化肉桂(肉桂)
.....(320)	盜庚(旋复花)(257)
粗毛牛膝(夕)(土牛膝)(399)	清水大黄(大黄)
.....(366)	清下(半夏)(143)
粗皮香圆(香橼)(388)	清水半夏(半夏)
.....(278)	清夏(半夏)(388)
粗皮香橼(香橼)(388)	清水豆卷(大豆黄卷)
.....(278)	清藤(青风藤)(19)
粗吻海龙(海龙)(188)	清明柳叶(柳叶)
.....(523)	清风屯(青风藤)(113)
粗茎秦艽(秦艽)(188)	清明柳枝(柳桂)
.....(166)	清风藤(青风藤)(113)
粗糙龙胆(龙胆草)(188)	清明柳须(柳根)
.....(54)	清化桂(肉桂)(114)
粗糙独活(白芷)(257)	清明篱子(木槿子)
.....(10)	清半夏(半夏)(436)
粗毛娃儿藤(白薇)(388)	清明篱皮(木槿皮)
.....(138)	清远志(远志)(610)
粗毛夏枯草(夏枯草)(450)	清明篱花(木槿花)
.....(37)	清豆卷(大豆黄卷)(131)
粗叶梵天花(王不留行)(19)	清明柳根须(柳根)
.....(367)	清豆豉(淡豆豉)(114)
粗茎鳞毛蕨(贯众)(18)	鸿头(芡实)
.....(313)	清明子(胡颓子)(581)
断肌甲(白花蛇)(394)	鸿荟(薤白)
.....(177)	清明花(喉咙草)(289)

鸿翥(雀草)(365)	婆婆针线包(白薇)
.....(194)	(138)
鸿藏(黑脂麻)(365)	液石(滑石)
.....(552)	(217)
鸿翥子(水红花子)(58)	淡竹(竹沥)
.....(360)	(409)
鸿翥花(蔻草花)(361)	淡芩(黄芩)
.....(359)	(48)
渠母(贯众)(65)	淡伯(厚朴)
.....(313)	(200)
混元丹(紫河车)(595)	淡柏(厚朴)
.....(516)	(200)
混元母(紫河车)(505)	淡姜(干姜)
.....(516)	(256)
混沌皮(紫河车)(493)	淡豉(淡豆豉)
.....(516)	(18)
混沌衣(紫河车)(512)	淡银(密陀僧)
.....(516)	(605)
淮山(山药)(474)	淡大云(肉苁蓉)
.....(490)	(503)
淮夕(牛膝)(63)	淡大芸(肉苁蓉)
.....(365)	(503)
淮通(木通)(223)	淡干姜(干姜)
.....(218)	(256)
(青木香)(419)	淡全虫(全虫)
.....(288)	(466)
淮膝(牛膝)(504)	淡全蝎(全蝎)
.....(365)	(466)
淮山药(山药)(542)	淡竹叶(鶗鴂草)
.....(490)	(38)
淮山薯(黄药子)(58)	(竹叶)
.....(415)	(31)
淮小麦(小麦)(53)	淡竹米(竹叶)
.....(569)	(34)
淮木通(木通)(426)	淡竹沥(竹沥)
.....(218)	(409)
淮牛夕(牛膝)(593)	淡竹茹(竹茹)

淡豆卷(大豆黄卷)	琴叶独行菜(蓼子)	班龙角(鹿角)
.....(19)(426)(500)
淡苁蓉(肉苁蓉)	琪瑜(沉香)	班龙珠(鹿茸)
.....(503)(285)(498)
淡吴萸(吴茱萸)	琥珀末(琥珀)	班龙紫(虎杖)
.....(258)(448)(354)
淡附子(附子)	琥珀面(琥珀)	斑皮柴(乌药)
.....(254)(448)(283)
淡附片(附子)	琥珀屑(琥珀)	班地锦(地锦草)
.....(254)(448)(104)
淡鱼古(乌贼骨)	琼树皮(乌柏木根皮)	班庄根(虎杖)
.....(580)(158)(354)
淡秋石(秋石)	琼树根皮(乌柏木根皮)	班羊角(山羊角)
.....(46)(158)(455)
淡海藻(海藻)	斑毛(斑蝥)	班杖根(虎杖)
.....(413)(622)(354)
淡黄芩(黄芩)	班苗(斑蝥)	班鳩台(萹蓄)
.....(48)(622)(233)
淡硝砂(硇砂)	班杖(虎杖)	班鳩草(酢浆草)
.....(602)(354)(241)
淡婆婆(大背叶)	(天南星)	班鳩窝(海金沙藤)
.....(70)(390)(224)
淡竹叶菜(鸭跖草)	班荪(斑蝥)	(地耳草)
.....(38)(622)(242)
淡竹皮茹(竹茹)	班草(虎杖)	(地锦草)
.....(409)(354)(104)
淡黄花蒲公英(蒲公英)	班菌(斑蝥)	班鳩酸(酢浆草)
.....(68)(622)(241)
深山黄精(黄精)	班蚝(斑蝥)	班枣子(刺寄奴)
.....(547)(622)(351)
淀花(青黛)	班根(虎杖)	班海马(海马)
.....(72)(354)(522)
【十二画】		
琴严扁(金银花)	班猫(斑蝥)	班羚羊(羚羊角)
.....(65)(622)(454)
	班楂(胡颓子)	班纹芦荟(芦荟)
(304)(147)
	班毛虫(斑蝥)	

斑真竹茹(竹茹)(552)	葛麻如(葛根)(23)
.....(409)			
斑茎黄精(黄精)(552)	葛葎草(葎草)(243)
.....(547)			
薜(柔椹)(88)	葛葎蔓(葎草)(243)
.....(556)			
蓄藤(木通)(71)	葛藤根(葛根)(23)
.....(218)			
鬯尧(远志)(546)	茆姑(荸荠)(552)
.....(450)			
葫(大蒜)(546)	萼果香薷(香薷)(5)
.....(608)			
葫首(当归)(162)	葵(胡荽)(14)
.....(526)			
葫芦草(积雪草)(162)	葱子(葱实)(524)
.....(225)			
葫芦七(紫菀)(122)	葱苒(藜芦)(592)
.....(421)			
葫芦巴(葫芦巴)(32)	葱草(通草)(219)
.....(506)			
葫芦斗(石斛)(156)	葱莢(藜芦)(592)
.....(543)			
葫芦瓜(葫芦)(291)	葱葵(藜芦)(592)
.....(231)			
葫芦壳(葫芦)(23)	葱蘋(藜芦)(592)
.....(231)			
葫芦草(蜀羊皮)(23)	葱白头(葱白)(14)
.....(86)			
葫芦罐(马兜铃)(351)	葱茎白(葱白)(14)
.....(428)			
葫首归(当归)(24)	葱白藜芦(藜芦)(592)
.....(526)			
葫芦巴子(葫芦巴)(23)	蘋子(鱼腥草)(80)
.....(506)			
葫芦桑叶(桑叶)(243)	葭根(芦根)(33)
.....(19)			
蒟蒻(荸荠)(243)	薜(白薇)	

.....(138)	萹草(牛筋草)(67)
薺耳实(苍耳子)(11)	萹蓄(萹蓄)	落马衣(豨莶草)(167)
葵子(冬葵子)(236)	萹蓄(瞿麦)	落水沉(沉香)(285)
葵房(向日葵花托)(237)	萹豆衣(扁豆衣)	落豆秧(透骨草)(183)
葵花子(向日葵子)(554)	萹豆花(扁豆花)	落帚子(地肤子)(229)
葵花托(向日葵花托)(237)	萹蓄草(萹蓄)	落得打(积雪草)(225)
葵花盘(向日葵花托)(237)	苤(芥菜)	落新妇(升麻)(26)
葵花瓢(向日葵茎髓)(238)	苿(覆盆子)	落地杨莓(蛇莓)(128)
葵菜子(冬葵子)(236)	(地肤子)	(水蜈蚣)(247)
葵蓬菜(积雪草)(225)	(车前草)	落地金钱(金钱草)(221)
葵叶大黄(大黄)(143)	蒌子(瓜蒌子)	落地梅花(积雪草)(225)
葶苈(葶苈子)(426)	蒌仁(瓜蒌子)	蠍(全蝎)(466)
葶苈子(葶苈子)(426)	蒌实(瓜蒌)	喜儿(壁钱)(626)
施(蒼耳草)(12)	蒌粉(天花粉)	喜柏(侧柏叶)(324)
箇茹(茜草)(335)	蒌根(天花粉)	喜儿窠(壁钱幕)(627)
萹竹(萹蓄) (射干)(81)	蒌仁霜(瓜蒌子)	喜松叶(侧柏叶)(324)
萹豆(扁豆)(492)	萱根子(甘遂)	喜柏叶(侧柏叶)(324)
蒲荷(貫众)(313)	落首(海藻)	喜树果(喜树)(117)
	落翹(连翹)	喜树根(喜树)(117)

喜树根皮(喜树)(157)	戟天(巴戟天)(501)
.....(117)		戟叶翠头尖(半夏)(388)
喜马拉雅梧桐子(瓜蒌子).....(434)		朝简(补骨脂)(512)
喜马拉雅旌节花(通草).....(219)		(木蝴蝶)(436)
款冬(款冬花).....(423)		朝天子(木槿子)(436)
款花(款冬花).....(423)		朝天罐(商陆)(156)
款冻花(款冬花).....(423)		朝菌子(木槿子)(436)
塔干(水蛭).....(383)		朝菌皮(木槿皮)(610)
塔冉(车前草).....(216)		朝菌花(木槿花)(131)
塔松(瓦松).....(129)		朝鲜参(人参)(478)
越桃(梔子).....(36)		朝阳花子(向日葵子)(554)
越木香(木香).....(280)		朝阳花托(向日葵花托)(237)
越西木香(木香).....(280)		朝鲜人参(人参)(478)
越南草芨(草芨).....(263)		朝鲜白参(人参)(478)
越隽木香(木香).....(280)		朝鲜红参(人参)(478)
越南安息香(安息香).....(476)		朝鲜苍术(苍术)(198)
超雄(附子).....(254)		朝天委陵菜(墨旱莲)(562)
煮甘遂(甘遂).....(151)		朝开暮落花(木槿花)(131)
蛩(蟋蟀).....(251)		朝鲜天南星(天南星)	
联步(千金子)(251)		

..... (390)	楷蝉(蝉蛻) (154)
朝鲜白头翁(白头翁) (89)	楷榴(石榴皮) (571)	棉条花(茺花) (152)
朝鲜地瓜儿苗(泽兰) (352)	橘乳子(枸杞子) (555)	棉苍狼(豨莶草) (167)
棒草(甘草) (493)	橘乳根(地骨皮) (139)	棉树皮(杜仲) (507)
棒植(人参) (478)	棋楠(沉香) (285)	棉黄芪(黄芪) (486)
棒子毛(玉米须) (239)	棋子酥(蟾酥) (623)	棉草薢(萆薢) (226)
棒头柱(夏枯草) (37)	棋盘蛇(白花蛇) (177)	棉榔榆(榆钱) (453)
棒棒木(暴马子) (434)	森树皮(苦棟皮) (306)	棉黍棵(豨莶草) (167)
棒棒草(太子参) (485)	椒子(吴茱萸) (258)	棉螳螂(苍耳子) (11)
棒槌草(夏枯草) (37)	(椒目) (263)	棉团铁线莲(威灵仙) (162)
棒子毛缨(玉米须) (239)	椒皮(花椒) (263)	樟柿(柿蒂) (292)
棒丝黄精(黄精) (547)	椒红(花椒) (263)	楂桃(梔子) (36)
棒状虫胶(紫草茸) (134)	椒壳(花椒) (263)	楠圆叶鹿衔草(鹿衔草) (370)
棒柱头花(夏枯草) (37)	椒聊(花椒) (263)	樟树核桃(白松塔) (433)
楮桃(楮实) (559)	棍子(枳椇子) (560)	楂子(五倍子) (568)
楮实子(楮实) (559)	模那卫(夹竹桃) (249)	榔干(槟榔) (307)
楮树果(楮实) (559)	棍棒石斛(石斛) (543)	榔玉(槟榔) (307)
楮桃子(楮实) (559)	棉芪(黄芪) (486)	榔榆(榆钱) (453)
棱砂贝母(川贝母) (405)	棉大戟(大戟)	榔头花(漏芦) (100)

棕木(苏木)(575)	雁来红(长春花)
.....(378)	(118)
棕毛(棕榈皮)(302)	雁啄实(芡实)
.....(331)	(581)
棕皮(棕榈皮)(225)	雁翎茶(鬼箭羽)
.....(331)	(372)
棕灰(棕榈皮)(239)	硬饭(土茯苓)
.....(331)	(79)
棕板(棕榈皮)(302)	硬饴(饴糖)
.....(331)	(496)
棕骨(棕榈皮)(225)	硬白薇(白薇)
.....(331)	(138)
棕榈(棕榈皮)(449)	(白前)
.....(331)	(401)
棕儿茶(孩儿茶)(450)	硬饭头(藜羹)
.....(619)	(227)
棕包头(藜芦)(449)	硬饭团(草薢)
.....(592)	(226)
棕色角(藜芦)(560)	硬防风(防风)
.....(592)	(7)
棕树皮(棕榈皮)(450)	硬阿魏(前胡)
.....(331)	(402)
棕熊胆(熊胆)(130)	硬饴糖(饴糖)
.....(97)	(496)
棕衣树皮(棕榈皮)(449)	硬骨柴(六月雪)
.....(331)	(246)
椭子树皮(乌柏木根皮)(560)	硬柴胡(柴胡)
.....(158)	(24)
椭子树根皮(乌柏木根皮)(496)	硬紫草(紫草)
.....(158)	(63)
逼拔(革苈)(466)	硬紫菀(紫菀)
.....(263)	(421)
酥酥石(礞石)(68)	硬筋藤(海金沙藤)
.....(412)	(224)
粟芽(谷芽)(241)	硬滑石(滑石)
.....(302)	(217)
粟壳(罂粟壳)(581)	硬蒺藜(刺蒺藜)

..... (463)	雄丁香(丁香) (265) (239)
硬蝶蜻(桑蝶蜻) (584)	雄黄连(黄连) (50)	雅连(黄连) (50)
硬板头薯(土茯苓) (79)	(红药子) (131)	雅黄(大黄) (143)
硬苗前胡(前胡) (402)	裂刀菜(半夏) (388)	雅葱(漏芦) (100)
硬苗柴胡(柴胡) (24)	裂叶橐吾(紫菀) (421)	雅川连(黄连) (50)
硬苗紫草(紫草) (63)	裂叶牵牛子(牵牛子) (155)	雅木草(紫珠) (320)
硬骨碎补(骨碎补) (510)	裂叶苣荬菜(苣荬菜) (127)	雅且子(鸦胆子) (93)
硬毛忍冬花(金银花) (65)	裂叶犁头尖(半夏) (388)	雅目草(紫珠) (320)
硬枝黑锁梅(覆盆子) (585)	擦耳草(虎耳草) (123)	雅胆子(鸦胆子) (93)
硬骨凌霄花(凌霄花) (364)	提母(知母) (32)	盐(食盐) (135)
硬毛果野豌豆(王不留行) (367)	提青(麦门冬) (540)	盐(食盐) (135)
硝石(芒硝) (145)	提萎(泽兰) (352)	龄(食盐) (135)
硝石朴(芒硝) (145)	搅谷恋(葎草) (243)	紫贝(紫贝齿) (459)
硝酸钾(芒硝) (145)	插田泡(覆盆子) (585)	紫丹(紫草) (63)
硫磺(硫黄) (594)	搜山虎(石南藤) (190)	紫叩(白豆蔻) (206)
硫酸钠(芒硝) (145)	(大戟) (164)	紫朱(代赭石) (460)
雄片(附子) (254)	握儿(蛤蚧) (514)	紫芝(灵芝) (485)
雄姜(穿山龙) (371)	揆葵子(冬葵子) (236)	紫朴(厚朴) (200)
雄精(雄黄) (595)	接骨草(问荆) (63)	紫茉(紫草) (63)

紫菀(紫菀)(30)	紫苏叶(苏叶)(4)
.....(421)			
紫矿(紫草茸)(377)	紫苏杆(苏梗)(4)
.....(134)	(檀香)	紫苏茎(苏梗)(4)
紫参(拳参)(291)	紫苏梗(苏梗)(4)
.....(77)		紫芫花(芫花)(152)
紫荆(紫珠)(265)	紫豆叩(白豆蔻)(206)
.....(320)		紫豆蔻(白豆蔻)(206)
紫桂(肉桂)(331)	紫连草(半支莲)(118)
.....(257)		紫良姜(射干)(81)
紫株(紫珠)(316)	紫矿茸(紫草茸)(134)
.....(320)		紫茉莉(天麻)(462)
紫情(紫菀)(518)	紫金牛(矮地茶)(430)
.....(421)		(射干)(81)
紫胶(紫草茸)(497)	紫金龙(虎杖)(354)
.....(134)		紫金皮(紫荆皮)(114)
紫铆(紫草茸)(134)	紫金沙(露蜂房)(624)
.....(134)		紫参草(石见穿)(372)
紫萍(浮萍)(372)	紫降香(降香)(377)
.....(27)		紫油朴(厚朴)	
紫堇(紫花地丁)(349)		
.....(69)			
紫根(紫草)(603)		
.....(63)			
紫萁(贯众)(330)		
.....(313)			
紫葳(凌霄花)(69)		
.....(364)			
紫蛤(海蛤壳)(185)		
.....(411)	(地榆)		
紫蒨(紫菀)(322)		
.....(421)			
紫蔻(白豆蔻)(134)		
.....(206)			
紫蕺(鱼腥草)(424)		

紫油桂(肉桂)	豆蔻衣(豆蔻壳)	紫金盘花(紫荆花)
.....(200)(207)(114)
紫草茸(紫草)	紫蔻壳(豆蔻壳)	紫金盘花(紫荆花)
.....(63)(207)(115)
紫草根(紫草)	紫蔻根(白及)	紫背三七(菊叶三七)
.....(63)(330)(334)
紫独活(独活)	紫藤香(降香)	紫背天葵(天葵)
.....(161)(377)(122)
紫珠叶(紫珠)	紫乌藤根(何首乌)	紫背金盘(筋骨草)
.....(320)(529)(105)
紫珠草(紫珠)	紫皮大蒜(大蒜)	紫背浮萍(浮萍)
.....(320)(608)(27)
紫真檀(檀香)	紫色马勃(马勃)	紫菀千花(紫菀)
.....(291)(83)(421)
紫党参(丹参)	紫色石盘(硝砂)	紫萁贯众(贯众)
.....(349)(602)(313)
紫桑椹(桑椹)	紫花树皮(苦棟皮)	紫羚羊角(羚羊角)
.....(556)(306)(454)
紫浮萍(浮萍)	紫花香薷(香薷)	紫蓉三七(菊叶三七)
.....(27)(5)(334)
紫粉霜(银朱)	紫花前胡(前胡)	紫颓马勃(马勃)
.....(597)(402)(83)
紫菀头(紫菀)	紫茎独活(独活)	紫薇树皮(紫荆皮)
.....(421)(161)(114)
紫菀茸(紫菀)	紫油厚朴(厚朴)	紫朵苗子根(地榆)
.....(421)(200)(322)
紫硇砂(硇砂)	紫荆木皮(紫荆皮)	紫花曼陀罗(洋金花)
.....(602)(114)(439)
紫羚羊(羚羊角)	紫荆树花(紫荆花)	紫茉莉花根(白蔹)
.....(454)(115)(98)
紫葳花(凌霄花)	紫荆根皮(紫荆皮)	紫背天葵子(天葵)
.....(364)(114)(122)
紫蛤壳(海蛤壳)	紫花黄精(黄精)	紫背天葵根(天葵)
.....(411)(547)(122)
紫蔻皮(豆蔻壳)	(玉竹)	紫背金牛草(鹿衔草)
.....(207)(546)(370)
	紫金盘皮(紫荆皮)	紫背鱼腥草(鱼腥草)
	(80)

紫背鹿衔草(鹿衔草)(86)	蛤蚧尾(蛤蚧)(514)
.....(370)		蛤蚧粉(蛤蚧)(514)
紫油伽楠香(沉香)(285)	蛤蚆皮(蚆皮)(624)
紫斑牡丹皮(牡丹皮)(60)	蛤蜊壳(海蛤壳)(411)
紫葳凌霄花(凌霄花)(364)	蛤壳粉(海蛤壳)(411)
鼎擦藤(海金沙藤)(224)	蛤蟆草(委陵菜)(91)
晶党(党参)(482)	蛤蟆浆(蛤酥)(623)
景天三七(三七)(333)	蛤蟆酥(蚆酥)(623)
(金不换)		蛤蟆藤(海金沙藤)(224)
.....(341)		蛤蟆草子(车前子)(215)
哽哽草虫(廣虫)(382)	黑川(胡椒)(269)
喇叭花(木槿花)(131)	黑片(附子)(254)
喇叭花子(牵牛子)(155)	黑丑(牵牛子)(155)
喇叭筒根(百合)(550)	黑石(胆矾)(591)
喷水草(铁苋菜)(241)	黑连(胡黄连)(142)
喷雪花(六月雪)(246)	黑尾(威灵仙)(162)
喝呼草(含羞草)(245)	黑矾(皂矾)(603)
喝起草(苍耳草)(12)	黑茄(龙葵)(122)
喉桃(辛夷)(13)	(龙葵子)	
喉毒药(毛冬青)(368)		
喉蛾草(喉咙草)(514)		

黑参(玄参)	黑三棱(三棱)	黑古月(胡椒)
.....(554)(348)(543)
黑姜(干姜)	黑干漆(干漆)	黑石子(无名异)
.....(59)(379)(605)
黑茜(威灵仙)	黑大艽(秦艽)	黑龙骨(茅莓)
.....(256)(166)(127)
黑茜(威灵仙)	黑大黄(大黄)	黑白丑(牵牛子)
.....(162)(143)(155)
黑草(葎草)	黑山棱(荸荠)	黑皮芪(黄芪)
.....(243)(552)(486)
(鬼羽箭)	黑山楂(山楂)	黑玄参(玄参)
.....(129)(298)(59)
黑梔(梔子)	黑天夭(龙葵)	黑头草(墨旱莲)
.....(36)(122)(562)
黑药(羌活)	黑天棵(龙葵)	黑芝麻(黑脂麻)
.....(9)(122)(552)
黑胆(熊胆)	黑元参(玄参)	黑防己(青风藤)
.....(97)(59)(188)
黑香(没药)	黑木通(威灵仙)	黑花蛇(乌蛇)
.....(376)(162)(187)
黑梅(乌梅)	黑牛儿(蜣螂)	黑苏子(苏子)
.....(566)(447)(424)
黑蛇(乌梢蛇)	黑升麻(升麻)	黑豆皮(稽豆衣)
.....(187)(26)(405)
黑椹(桑椹)	黑风子(牛蒡子)	黑豆衣(稽豆衣)
.....(556)(16)(465)
黑蒿(青蒿)	黑风蛇(乌蛇)	黑豆芽(大豆黄卷)
.....(133)(187)(19)
黑塌(乳香)	黑乌梢(乌蛇)	黑灵仙(威灵仙)
.....(374)(187)(162)
黑蔓(雷公藤)	黑乌蛇(乌蛇)	黑附子(附子)
.....(610)(187)(254)
黑薇(威灵仙)	黑心姜(莪术)	黑附片(附子)
.....(162)(347)(254)
(徐长卿)	黑巨胜(黑芝麻)	黑附块(附子)
.....(170)(552)(254)
黑儿茶(孩儿茶)	黑节草(石斛)	
.....(619)		

黑茵陈(茵陈蒿)(162)	黑槐角(槐角)(323)
.....(228)			
黑郁金(郁金)(129)	黑槐枝(槐枝)(328)
.....(345)			
黑昆布(昆布)(282)	黑熊胆(熊胆)(97)
.....(414)			
黑鱼骨(乌贼骨)(254)	黑墨草(墨旱莲)(562)
.....(586)			
黑狗脊(贯众)(162)	黑墨菜(墨旱莲)(562)
.....(313)			
(狗脊)		黑螵蛸(桑螵蛸)(584)
.....(509)			
黑姑娘(龙葵)(224)	黑藜芦(藜芦)(592)
.....(122)			
黑故子(补骨脂)(224)	黑大豆皮(稽豆衣)(465)
.....(512)			
黑荆芥(荆芥)(556)	黑大豆衣(稽豆衣)(465)
.....(6)			
黑荆条(黄荆)(465)	黑小豆皮(稽豆衣)(465)
.....(438)			
黑梔子(梔子)(465)	黑小豆衣(稽豆衣)(465)
.....(33)			
黑故纸(补骨脂)(24)	黑子麝香(麝香)(473)
.....(512)			
黑胡椒(胡椒)(17)	黑天天豆(龙葵子)(554)
.....(269)			
黑南星(天南星)(26)	黑天天果(龙葵子)(554)
.....(390)			
黑面风(石见穿)(212)	黑天天棵(龙葵)(122)
.....(372)			
黑牵牛(牵牛子)(448)	黑天地棵(龙葵)(122)
.....(155)			
黑砂星(夜明砂)(585)	黑石滩茜(黄芪)(486)
.....(42)			
黑星星(龙葵)(57)	黑白飞鼠(五灵脂)(380)
.....(122)			
黑骨头(威灵仙)(327)	黑头小鸡(相思子)	

.....(615)	棠球(金樱子).....(583)(50)
黑老鸦头(续断).....(508)	棠球子(山楂).....(298)	短裂藁本(防风).....(7)
黑果茜草(茜草).....(335)	棠棣子(山楂).....(298)	短叶水蜈蚣(水蜈蚣).....(247)
黑牵牛子(牵牛子).....(155)	掌叶大黄(大黄).....(143)	短柱鹿蹄草(鹿衔草).....(370)
黑料豆皮(稽豆衣).....(465)	掌叶半夏(半夏).....(388)	短嘴老鹳草(老鹳草).....(185)
黑料豆衣(稽豆衣).....(465)	掌叶半夏(天南星).....(390)	短叶马尾松节(松节).....(192)
黑浜珊瑚(海浮石).....(410)	掌叶悬钩子(覆盆子).....(585)	短脚白花蛇舌草(白花蛇舌草).....(96)
黑蛋蛋果(龙葵子).....(554)	掌叶复盆子(覆盆子).....(585)	智仁(益智仁).....(513)
黑蛋蛋棵(龙葵).....(122)	掌裂草葡萄(白蔹).....(98)	铺地红(地锦草).....(104)
黑瞎子胆(熊胆).....(97)	敞子(苍耳子).....(11)	铺地参(狗狗秧).....(240)
黑藤钻根(巴戟天).....(501)	短叶蒿(茵陈蒿).....(228)	铺地莲(酢浆草).....(241)
黑毛果黄芪(黄芪).....(486)	短螵蛸(桑螵蛸).....(584)	铺地锦(地锦草).....(104)
黑皮油松节(松节).....(192)	短叶松节(松节).....(192)	铺银草(了哥王).....(110)
黑翅红娘子(红娘子).....(385)	短叶松香(松香).....(618)	铺筋草(伸筋草).....(182)
黑脚威灵仙(威灵仙).....(162)	短刺猬皮(刺猬皮).....(587)	铺地金牛(地柏枝).....(326)
黑眶蟾蜍皮(蟾皮).....(624)	短茎独活(独活).....(161)	铺地凉伞(矮地茶).....(430)
黑眶蟾蜍酥(蟾酥).....(623)	短柄乌头(雪上一枝蒿).....(609)	铺地蜈蚣(伸筋草).....(182)
帽子花(百合).....(550)	短梗重楼(蚤休).....(75)	铺地蜈蚣七(石韦).....(223)
(鸭跖草).....(38)	短萼黄连(黄连).....(332)	锅灰(百草霜).....(332)

锅底灰(百草霜)(16)	鹅管白前(白前)
.....(332)	(401)
锅底墨(百草霜)(176)	鹅儿不食草(鹅不食草)
.....(332)	(196)
锅烟子(百草霜)(569)	鹅绒藤根皮(白鲜皮)
.....(332)	(99)
锅煤子(百草霜)(209)	筒朴(厚朴)
.....(332)	(200)
锁梅(覆盆子)(33)	筒桂(肉桂)
.....(585)	(257)
锁燕(锁阳)(196)	筒筒草(铁苋菜)
.....(520)	(241)
锁地风(钻地风)(39)	筵门冬(天门冬)
.....(180)	(542)
锁严子(锁阳)(231)	筋条七(三七)
.....(520)	(333)
锁梅根(钻地风)(401)	筋骨草(伸筋草)
.....(180)	(182)
锈铁垂(锁阳)(98)	
.....(520)		(夏枯草)
锈铁棒(锁阳)(414)(37)
.....(520)		筋条三七(三七)
锈毛泡桐花(凌霄花)(414)(333)
.....(364)		筋骨柱子(葵葜)
锉草(木贼)(43)(227)
.....(28)		傅延(菊花)
锐齿凤仙花(凤仙花)(270)(21)
.....(357)		傅致胶(阿胶)
犄角花(白头翁)(196)(532)
.....(89)		脾号血竭(血竭)
鸽壳(枳壳)(231)(620)
.....(276)		粤丝瓜络(丝瓜络)
鸽虱(鹤虱)(156)(612)
.....(310)		焦术(白术)
鸽泻(泽泻)(275)(489)
.....(213)		焦芍(白芍)
黍粘子(牛蒡子)(454)(531)
		焦楂(山楂)

..... (293)	腊茶(茶叶) (390)
焦大白(槟榔) (396)	象耳朵子(牛蒡子)
..... (307)	腊肾草(凤尾草) (16)
焦山楂(山楂) (244)	猢狲枣(猴枣)
..... (298)	脾家瑞气(白豆蔻) (447)
焦六曲(神曲) (205)	猢狲头(墨旱莲)
..... (300)	腋花蓼(萹蓄) (562)
焦白术(白术) (233)	猢狲姜(骨碎补)
..... (489)	皤发(斑蝥) (510)
焦白芍(白芍) (622)	猢狲头草(地锦草)
..... (531)	象贝(浙贝母) (104)
焦苍术(苍术) (407)	猩红(银朱)
..... (198)	象胆(芦荟) (597)
焦麦芽(麦芽) (147)	猥皮(刺猬皮)
..... (301)	象牙末(象牙) (587)
焦杜仲(杜仲) (445)	猾鼠皮(刺猾皮)
..... (507)	象牙屑(象牙) (587)
焦谷芽(谷芽) (445)	猴丹(猴枣)
..... (302)	象牙粉(象牙) (447)
焦苡仁(薏苡仁) (445)	猴姜(骨碎补)
..... (214)	象贝母(浙贝母) (510)
焦梔子(梔子) (407)	猴结(五灵脂)
..... (36)	象皮面(象皮) (380)
焦枳壳(枳壳) (628)	猴蒜(毛茛)
..... (276)	象皮粉(象皮) (607)
焦神曲(神曲) (628)	猴竭(五灵脂)
..... (300)	象谷壳(罂粟壳) (380)
焦槟榔(槟榔) (575)	猴楂(山楂)
..... (307)	象柴子(枸杞子) (298)
焦薏仁(薏苡仁) (555)	猴儿包(桑螵蛸)
..... (214)	象柴根(地骨皮) (584)
復盆子(覆盆子) (139)	猴儿草(寻骨风)
..... (585)	象鼻草(芦荟) (182)
腊子(麝香) (147)	猴三七(三七)
..... (473)	象鼻莲(芦荟) (333)
腊瓜(八月札) (147)	猴子毛(茵陈蒿)
..... (294)	象天南星(天南星) (228)

猴子枣(猴枣)(377)	犀黄(牛黄)(74)
.....(447)			
猴子草(过江龙)(308)	犀牛角(犀角)(57)
.....(197)			
猴子梨(猕猴桃)(280)	犀牛黄(牛黄)(74)
.....(558)			
猴毛头(狗脊)(613)	犀角片(犀角)(57)
.....(509)			
猴仔梨(猕猴桃)(56)	犀角末(犀角)(57)
.....(558)			
猴头草(仙鹤草)(309)	犀角尖(犀角)(57)
.....(329)			
猴耳草(寻骨风)(361)	犀角花(犀角)(57)
.....(182)			
猴血七(红药子)(239)	犀角条(犀角)(57)
.....(131)			
猴竹根(虎杖)(308)	犀角面(犀角)(57)
.....(354)			
猴枣粉(猴枣)(15)	犀角粉(犀角)(57)
.....(447)			
猴板栗(婆罗子)(309)	犀角屑(犀角)(57)
.....(293)			
猴子尾巴(过江龙)(309)	强仇(百合)(550)
.....(197)			
猴头三七(三七)(436)	强膂(狗脊)(509)
.....(333)			
猴王牌茉莉花茶(茶叶)(610)	强瞿(百合)(550)
.....(396)			
然铜(自然铜)(131)	隔山香(前胡)(402)
.....(387)			
番石(滑石)(182)	隔山消(何首乌)(529)
.....(217)			
番瓜(南瓜)(197)	(白蔹)(98)
.....(308)			
番沉(沉香)(378)	隔年红(草珊瑚)(108)
.....(285)			
番降(降香)(508)	疏毛龙牙草(仙鹤草)	

疏毛吴茱萸(吴茱萸)	瘤子草(地耳草)	祿步香(藿香)
.....(258)(242)(202)
疏花短柄乌头(雪上一枝蒿)	童参(太子参)	祿步藿香(藿香)
.....(609)(485)(202)
紫瓜瓠(丝瓜络)	童木通(木通)	裙带菜(昆布)
.....(612)(218)(414)
缅甸大风子(大风子)	童秋石(秋石)	裕米(薏苡仁)
.....(612)(46)(214)
缆鱼骨(乌贼骨)	童桑叶(桑叶)	寒瓜(西瓜)
.....(586)(19)(538)
缘毛紫菀(紫菀)	童男发炭(血余炭)	寒盐(戎盐)
.....(421)(332)	寒蚓(地龙)
编竹(萹蓄)	童子益母草(益母草)(469)
.....(233)(355)	寒浆(锦灯笼)
登仓胆(熊胆)	阔叶沙参(沙参)(88)
.....(97)(535)	寒蟻(地龙)
蚕姜(高良姜)	阔瓣蚤休(蚤休)(469)
.....(266)(75)	寒不凋(密蒙花)
蜜楂(木瓜)	阔叶麦门冬(麦门冬)(40)
.....(169)(540)	寒气草(水蜈蚣)
蜜子草(金钱草)	阔叶十大功劳叶(十大功劳叶)(247)
.....(221)(124)	寒水石(石膏)
蜜子梨(枳椇子)	焙桑蛸(桑螵蛸)(30)
.....(560)(584)	寒草根(白茅根)
痨海(鸦片)	遍地香(金钱草)(321)
.....(440)(221)	寒热草(铁苋菜)
痢止草(徐长卿)(积雪草)(241)
.....(170)(225)	寒筋草(水蜈蚣)
痢疾草(委陵菜)	遍地黄(金钱草)(247)
.....(91)(221)	寒雀粪(五灵脂)
(铁苋菜)	遍地生金(绞股蓝)(380)
.....(241)(107)	寒号鸟粪(五灵脂)
痧药(青木香)	遍地金钱(金钱草)(380)
.....(288)(221)	寒号虫粪(五灵脂)
痧药草(鹅不食草)	遍地金钱草(积雪草)(380)
.....(196)(225)	
	祿白根(苦参)	

寒热头草(水蜈蚣)(233)	湖天冬(天门冬)(542)
寒搭拉虫粪(五灵脂)(136)	湖丹皮(牡丹皮)(60)
割人藤(薜草)(395)	湖鸡腿(翻白草)(56)
割孤露泽(胡黄连)(367)	湖莲子(莲子)(576)
畜子(狗狗秧)(48)	湖天门冬(天门冬)(542)
畜富苗(狗狗秧)(241)	湖北山楂(山楂)(298)
畜富苗根(狗狗秧)(447)	湖北胡椒(石南藤)(190)
富贵花根皮(牡丹皮)(104)	湖南连翘(墨旱莲)(562)
寓木(桑寄生)(447)	(刘寄奴)(351)
窝瓜(南瓜)(202)	湖北秋牡丹(打破碗花	花.....(316)
窝丢(鱼腥草)(202)	温朴(厚朴)(200)
窝瓜子(南瓜子)(597)	温天冬(天门冬)(542)
善然效(金银花)(576)	温郁金(郁金)(345)
普贴(薜荔)(188)	(莪术)(347)
普洱(茶叶)(276)	温厚朴(厚朴)(200)
普通苏合香(苏合香)(576)	温莪术(莪术)(347)
普通鹿衔草(鹿衔草)(60)	温益金(郁金)(345)
道人头(苍耳草)(457)	温天门冬(天门冬)(542)
道生草(萹蓄)(576)	湿红花(番红花)	

..... (363)	游龙花(荭草花) (359) (340)
湿萝卜(商陆) (156)	滋油菜根(续断) (508)	蓬虆根(商陆) (156)
湿生扁蓄(龙胆草) (54)	【十三画】	蓝青(青黛) (72)
湿苋菜根(商陆) (156)	瑞玳(玳瑁) (459)	蓝矾(胆矾) (591)
湿番红花(番红花) (363)	璋瑁(玳瑁) (459)	蓝根(板蓝根) (71)
湿藏红花(番红花) (363)	瑞香(天花粉) (25)	蓝靛(青黛) (72)
渴留(血竭) (620)	瑞雪(天花粉) (35)	蓝露(青黛) (72)
滑虫(盛虫) (282)	瑞龙脑(冰片) (474)	蓝藤(石南藤) (190)
滑石块(滑石) (217)	瑞香狼毒(大戟) (154)	蓝龙根(板蓝根) (71)
滑石粉(滑石) (217)	(狼毒) (159)	蓝刺头(漏芦) (100)
滑菜子(冬葵子) (236)	蒜(大蒜) (608)	蓝花草(瓜子金) (437)
滑肠菜子(冬葵子) (236)	蒜头(大蒜) (608)	蓝花菜(鸭跖草) (38)
渥丹(百合) (550)	蒜头草(石蒜) (593)	蓝姑草(鸭跖草) (38)
滁当(当归) (526)	蒜脑薯(百合) (550)	蓝荞头(金荞麦) (103)
滁菊(菊花) (21)	蒜脑薯(百合) (550)	蓝靛叶(大青叶) (70)
滁当归(当归) (526)	蒜藜芦(藜芦) (592)	蓝靛根(板蓝根) (71)
滁州当归(当归) (526)	蒜瓣子草(知母) (32)	蓝头漏芦(漏芦) (100)
游龙(荭草) (194)	茺蔚(葫荽) (14)	蓝花山蒜(薤白) (289)
游龙子(水红花子) (360)	蓬根(羊蹄)	蓝花姑娘(鸭跖草) (38)

蓝花棘豆(黄芪)(335)	蒸肉苁蓉(肉苁蓉)(503)
.....(486)			
蓝花水竹草(鸭跖草)(227)	蒿(青蒿)(136)
.....(38)			
蓝花野百合(百合)(347)	蒿子(青蒿)(136)
.....(550)			
(农吉利)			
.....(120)			
墓头灰(墓头回)(347)	薄荳(花椒)(263)
.....(95)			
墓头茴(墓头回)(285)	薑藜目(椒目)(263)
.....(95)			
倩草根(茜草)(32)	蒺藜(刺蒺藜)(463)
.....(335)			
倩藤根(茜草)(413)	蒺藜子(刺蒺藜)(463)
.....(335)			
薊(大蓟)(503)	蒺梨子(刺蒺藜)(463)
.....(316)			
薙薢(萆薢)(503)	蒺藜子(刺蒺藜)(463)
.....(226)			
蓖麻仁(蓖麻子)(582)	蒺藜角(刺蒺藜)(463)
.....(616)			
蓬术(莪术)(566)	蒺藜狗(刺蒺藜)(463)
.....(347)			
蓬砂(硼砂)(546)	蒺藜拉子(刺蒺藜)(463)
.....(601)			
蓬花(百合)(430)	蒺藜荷英(刺蒺藜)(463)
.....(550)			
蓬莪(莪术)(419)	蓄根(羊蹄)(340)
.....(347)			
蓬蘧(莪术)(509)	薔薇(萹蓄)(233)
.....(347)			
蓬大海(胖大海)(529)	蓄鬚子(八月札)(294)
.....(416)			
蓬子草(墨旱莲)(582)	蓏子(冬瓜子)(230)
.....(562)			
蓬子菜(茜草)(557)	蓏皮(冬瓜皮)(230)
		蒟蒻(草芙蓉)	

..... (263)	蒲芦 (葫芦) (214)
茅翁菜子 (牛蒡子) (16)	蒲蒼 (了哥王) (110)	蒲厘花粉 (蒲黄) (337)
蕷蕷 (山药) (490)	蒲公丁 (蒲公英) (68)	蒲棒花粉 (蒲黄) (337)
蕷薯 (山药) (490)	蒲公草 (蒲公英) (68)	蒸 (虎杖) (354)
藜实 (茄麻子) (46)	蒲地虎 (过江龙) (197)	鼓椎 (大蓟) (316)
蒙花 (密蒙花) (40)	蒲瓜酸 (醉浆草) (241)	鼓子皮 (海桐皮) (179)
蒙芪 (黄芪) (486)	蒲米仁 (蔷薇仁) (214)	鼓子花 (旋复花) (399)
蒙桂 (肉桂) (257)	蒲苇根 (芦根) (33)	鼓头灰 (墓头回) (95)
蒙花珠 (密蒙花) (40)	蒲芹菜 (芹菜) (472)	鼓桐皮 (海桐皮) (179)
蒙桑叶 (桑叶) (19)	蒲草黄 (蒲黄) (337)	鼓槌草 (谷精草) (39)
蒙古鼠兔 (五灵脂) (380)	蒲栗子 (胡颓子) (304)	鼓槌草根 (续断) (508)
蒙古鹤虱 (鹤虱) (310)	蒲剑根 (水菖蒲) (247)	塌香 (乳香) (374)
蒙自肉桂 (肉桂) (257)	蒲黄粉 (蒲黄) (337)	塘葛菜 (薯菜) (417)
蒙古白头翁 (白头翁) (89)	蒲棒粉 (蒲黄) (337)	塘舌耳黄芪 (黄芪) (486)
蒙古香蒲黄 (蒲黄) (337)	蒲蒲丁 (蒲公英) (68)	鹤石 (寒水石) (31)
蒙古原羚羊 (羚羊角) (454)	蒲颓子 (胡颓子) (304)	鹤豆 (扁豆) (492)
蒴树枝 (接骨木) (378)	蒲颓叶 (胡颓子叶) (432)	鹤粉 (铅粉) (600)
蒲花 (蒲黄) (337)	蒲蝇花 (荠菜) (319)	靴朴 (厚朴) (200)
蒲芹 (芹菜) (472)	蒲薏仁 (蔷薇仁)	靴角朴 (厚朴) (200)

勤母(川贝母)(367)	楸叶常山(臭梧桐)(169)
勤人墙(金银花)(367)	槐子(槐角)(329)
勤娘子(牵牛子)(472)	槐米(槐花)(327)
椿木皮(椿皮)(286)	槐豆(槐角)(329)
椿白皮(椿皮)(306)	槐鸡(槐耳)(329)
椿树皮(椿皮)(286)	槐实(槐角)(329)
椿根皮(椿皮)(306)	槐通(木通)(218)
椿芽树皮(椿皮)(306)	槐菌(槐耳)(328)
椿树白皮(椿皮)(306)	槐鵠(槐耳)(328)
椿树根皮(椿皮)(306)	槐蚁(槐耳)(328)
椿根白皮(椿皮)(306)	槐蕊(槐花)(327)
槭仁(酸枣仁)(319)	槐瘤(槐耳)(329)
槭枣仁(酸枣仁)(73)	槐花米(槐花)(327)
槭枣实(酸枣仁)(436)	槐花蜜(蜂蜜)(497)
椹圣(草茨)(610)	槐连灯(槐角)(329)
楂肉(山楂)(131)	槐连豆(槐角)(329)
楂核(枳椇子)(402)	槐角子(槐角)(329)
禁生(石斛)(298)	槐角豆(槐角)(329)
禁官花(王不留行)(169)	槐树花(槐花)	

槐蓝叶(大青叶)	楼仁(瓜蒌子)	摆马纳(诃子)
槐嫩蕊(槐枝)	楼仁霜(瓜蒌子)	摆倒瓶(虎杖)
榆子(榆钱)	酪奴(茶叶)	摇边竹(徐长卿)
榆仁(榆钱)	赖毛子(鹤虱)	摇竹消(徐长卿)
榆皮(榆白皮)	赖屁郎(桑螵蛸)	雷矢(雷丸)
榆实(榆钱)	赖橘红(橘红)	雷实(雷丸)
榆果(榆钱)	感米(薏苡仁)	雷丸草(天葵)
榆英(榆钱)	感应草(含羞草)	雷丸粉(雷丸)
榆树叶(榆叶)	感冒草(豨莶草)	雷公头(香附)
榆树皮(榆白皮)	碎补(骨碎补)	雷公草(水蜈蚣)
榆树莢(榆钱)	碎秋(西瓜皮)	雷公菜(飞廉)
榆根皮(榆白皮)	碎片黄(牛黄)	雷公根(积雪草)
榆树白皮(榆白皮)	碎骨子(竹叶)	雷公箭(地耳草)
榆根白皮(榆白皮)	碎骨风(凌霄花)	雷公薯(黄药子)
槲(木瓜)	碎香附(香附)	雷振子(白附子)
様子(木槿子)	鹤子嘴草(老鹳草)	雷震子(蝉蜕)
様皮(木槿皮)	摄石(磁石)	雾水沙(鹤不食草)
様花(木槿花)	摄摄果(路路通)	雾灵蒲公英(蒲公英)
	摆子草(墓头回)	

零羊角(羚羊角)(454)	蜀桔(代赭石)(460)
零余薯(黄药子)(415)	蜀五加(五加皮)(173)
零榆叶(榆叶)(250)	蜀椒目(椒目)(263)
零榆皮(榆白皮)(250)	蜀黍须(玉米须)(239)
零榆钱(榆钱)(453)	蜀漆叶(蜀漆)(591)
零榆莢(榆钱)(453)	蜀酸枣(山茱萸)(582)
零榆白皮(榆白皮)(250)	股东大会(茯苓)(210)
髦炭(血余炭)(332)	蜣壳(蝉蜕)(17)
髦炭(血余炭)(332)	蜈蚣(壁虎)(626)
照山海(照山白)(433)	蜈蚣七(石韦)(223)
照白杜鹃(照山白)(433)	署预(麦门冬)(540)
暗色藜蓼(土茯苓)(79)	蜈蚣末(蜈蚣)(467)
暗紫贝母(川贝母)(405)	蜈蚣草(金钱草)(221)
路柳(萹蓄)(233)	徐长卿(徐长卿)(170)
路边鸡(仙鹤草)(329)	地锦草(地锦草)(104)
(六月雪)(246)	蜈蚣藤(伸筋草)(182)
路边金(六月雪)(246)	蜈蚣松萝(松萝)(115)
路边刷(藜蓼)(227)	蜗羸(蜗牛)(116)
路边荆(六月雪)(263)	蛾眉豆(扁豆)	

.....(492)	蜜壳刺(菝葜)(600)
蛾眉蕨(贯众)(313)	蜜壳藤(菝葜)	锣槌草(夏枯草)(37)
蛾眉豆衣(扁豆衣)(492)	矮茶(矮地茶)	锦文(大黄)(143)
蛾眉豆花(扁豆花)(493)	矮樟(乌药)	锦纹(大黄)(143)
蛾眉蕨贯众(贯众)(313)	矮山茶(矮地茶)	锦鸡儿(黄芪)(486)
蜂肠(露蜂房)(624)	矮石斛(石斛)	(白鲜皮)(99)
蜂勑(露蜂房)(624)	矮茶子(矮地茶)	锦纹大黄(大黄)(143)
蜂巢(露蜂房)(624)	矮茶风(矮地茶)	锥花丝石竹(银柴胡)(140)
蜂糖(蜂蜜)(497)	矮茶荷(矮地茶)	锯茸(鹿茸)(498)
蜂斗菜(款冬花)(423)	矮郎伞(矮地茶)	锯锯藤(葎草)(243)
蜂白蜡(蜂蜡)(625)	矮桐子(臭梧桐)	锯子草(猪秧秧)(120)
蜂糖罐(金樱子)(583)	矮脚茶(矮地茶)	锯耳草(猪秧秧)(120)
蜉蝣(蜣螂)(447)	矮脚草(矮地茶)	锯锯藤(猪秧秧)(120)
蛹草(冬虫夏草)(514)	矮脚樟(矮地茶)	锯子草根(茜草)(335)
螂螂猴皮(蝉蜕)(17)	矮麻黄(麻黄)	锯锯草根(茜草)(335)
蜣娘(蜣螂)(447)	矮牡丹皮(牡丹皮)	锯头草(夏枯草)(37)
蜣螂虫(九香虫)(296) (蜣螂)(447)	矮脚白花蛇利草(白花 蛇舌草) ... (96)	穆子草(牛筋草)(225)
耋圭草(积雪草)(225)	雉麻(升麻)	箠桂(肉桂)(257)
	锡粉(铅粉)	箠片茅(半边莲)(78)

催生子(薏苡仁)(111)	膈肭兽阴茎(海狗肾)
.....(214)	(521)
催米虫壳(蝉蜕)(413)	腹毛(大腹皮)
.....(17)	(297)
魅实(山茱萸)(557)	腹皮(大腹皮)
.....(582)	(297)
魁蛤(瓦楞)(120)	腹水草(大戟)
.....(627)	(154)
魁蚶壳(瓦楞)(16)	(半边莲)
.....(227)	(78)
魁蛤壳(瓦楞)(185)	腺梗豨莶(豨莶草)
.....(627)	(167)
鼠矢(山茱萸)(119)	腺叶忍冬花(金银花)
.....(582)	(65)
鼠尾(革芨)(16)	腺茎独行菜子(葶苈子)
.....(263)	(426)
鼠兔(五灵脂)(322)	崩砂(硼砂)
.....(380)	(601)
鼠法(夜明砂)(60)	猫子菜(大青叶)
.....(42)	(70)
鼠实(荆芥)(16)	彘胆(猪胆汁)
.....(6)	(417)
鼠粘(牛蒡子)(118)	彘椒(两面针)
.....(16)	(109)
鼠粪(荆芥)(119)	彘胆汁(猪胆汁)
.....(6)	(417)
鼠楂(山楂)(185)	解毒(山豆根)
.....(298)	(82)
鼠尖子(牛蒡子)(11)	(鬼臼)
.....(16)	(45)
鼠尾红(爵床)(598)	解锡(铅粉)
.....(111)	(600)
鼠尾花(芫花)(231)	解离(防己)
.....(152)	(164)
鼠尾芩(黄芩)(595)	解蠡(薏苡仁)
.....(48)	(214)
鼠尾癀(爵床)(521)	解仓根(白芍)

解苦棟(鴉胆子)	廉珠(珍珠)	新疆貝母(川貝母)
解苦棟(鴉胆子)	鹿藿(葛根)	新疆防風(防風)
解苦棟(鴉胆子)	痴頭獮(蒼耳子)	新疆皂莢(皂莢)
解苦棟(鴉胆子)	痴頭婆(蒼耳草)	新疆枸杞(枸杞子)
鮑魚片(石決明)	新雉(辛夷)	新疆黨參(黨參)
鮑魚片(石決明)	新兒茶(孩兒茶)	新疆柴胡(柴胡)
鮑魚皮(石決明)	新山楂(楂香)	新疆紫草(紫草)
鮑魚皮(石決明)	新木香(木香)	新疆白頭翁(白頭翁)
鮑魚壳(石決明)	新百合(百合)	新疆假紫草(紫草)
鮑魚壳(石決明)	新光珠(珍珠)	新疆藍刺頭(漏芦)
鮑達乳香樹(乳香)	新會皮(橘皮)	新米夜晚花根(石蒜)
鮑達乳香樹(乳香)	新芦薈(芦薈)	煤珀(琥珀)
遙竹道(徐長卿)	新蒙花(密蒙花)	煨姜(生姜)
遙竹道(徐長卿)	新桑葉(桑葉)	煨天麻(天麻)
群虎草(白薇)	新港珠(珍珠)	煨木香(木香)
群虎草(白薇)	新疆貝(川貝母)	煨生姜(生姜)
群蘭敗毒草(仙鶴草)	新疆草(甘草)	煨肉蔻(肉豆蔻)
群蘭敗毒草芽(鶴草芽)	新式赭石(代赭石)	煨河子(河子)
群蘭敗毒草芽(鶴草芽)	新疆大黃(大黃)	

娘草果(草果)(547)	滇龙胆(龙胆草)
.....(208)	(54)
娘木鳖子(木鳖子)(320)	滇白芷(白芷)
.....(616)	(10)
娘草果仁(草果)(442)	滇白前(白前)
.....(208)	(401)
娘石膏(石膏)(409)	滇白珠(透骨草)
.....(30)	(183)
娘龙齿(龙齿)(409)	滇百部(天门冬)
.....(445)	(542)
娘龙骨(龙骨)(267)	滇刺枣(山茱萸)
.....(444)	(582)
娘白矾(明矾)(267)	滇育蕨(青凤蕨)
.....(603)	(188)
娘紫贝(紫贝齿)(438)	滇枣皮(山茱萸)
.....(459)	(582)
福临(茯苓)(104)	滇南星(天南星)
.....(210)	(390)
福寿柑(佛手)	(马齿苋)	滇常山(常山)
.....(277)(89)(590)
福音草(绞股蓝)(89)	滇前胡(前胡)
.....(107)	(402)
福泽泻(泽泻)(89)	滇黄芩(黄芩)
.....(213)	(48)
福橘白(橘白)(224)	(秦艽)
.....(272)	(166)
福氏鼠兔(五灵脂)(26)	滇黄精(黄精)
.....(380)	(547)
福州薯蓣(草薢)(333)	滇紫草(紫草)
.....(226)	(63)
福寿柑花(佛手花)(396)	滇白药子(白药子)
.....(278)	(132)
福州茉莉花茶(茶叶)(453)	滇地海棠(山楂)
.....(396)	(298)
裸子芽(谷芽)(75)	滇刺黄柏(十大功劳叶)
.....(302)	(124)
裸花黄精(黄精)(349)	滇樱桃仁(郁李仁)

..... (149)	满冬薰 (天门冬) (48)
滇藏木兰 (辛夷) (13) (542)	溺桶盖 (人中白)
滇藏玉兰 (辛夷) (13)	满江红 (茜草) (335) (43)
滇橄榄树皮 (紫荆皮) (114)	满堂红 (凤仙草) (357)	滩贝母 (川贝母)
满冬 (天门冬) (542) (透骨草) (183) (405)
满山星 (六月雪) (246)	满山红叶 (满山红) (432)	滩板救 (千金子)
满山香 (草珊瑚) (108)	满条红皮 (紫荆皮) (114) (157)
..... (透骨草)	满条红花 (紫荆花) (115)	滨蒿 (青蒿)
..... (183)	满堂红子 (急性子) (358) (136)
..... (零陵香)	满堂红花 (凤仙花) (357)	（茵陈蒿）
..... (209)	滥矾 (皂矾) (603) (223)
..... (革澄茄)	溪荪 (水菖蒲) (247)	滨防风 (沙参)
..... (264)	溪柳 (徐长卿) (170) (535)
满天飞 (木蝴蝶) (436)	溪麻 (益母草) (355)	【十四画】
满天云 (海金沙藤) (224)	溪菖 (石菖蒲) (477)	碧久子 (枳椇子)
满天星 (六月雪) (246)	溪河柳 (柽柳) (15) (560)
..... (酢浆草)	溪边黄芩 (半支莲) (118)	碧玉草 (灯心草)
..... (241)	溪瓢羹根 (白前) (401) (235)
..... (鹅不食草)	溺茎 (人中白) (48)	碧水龙 (肉苁蓉)
..... (196)	溺白茎 (人中白) (503)
..... (旋复花)		碧竹子 (鸭跖草)
..... (399)	 (38)
..... (胡荽)		碧竹草 (鸭跖草)
..... (14)	 (38)
..... (金钱草)		碧蝉花 (鸭跖草)
..... (221)	 (38)
满天香 (石南藤) (190)		碧蝉蛇 (鸭跖草)
	 (38)
		碧螺春 (茶叶)
	 (396)
		碧蟾蜍 (鸭跖草)
	 (38)
		瑞丹 (牡丹皮)
	 (60)
		瑶山竹 (徐长卿)
	 (170)

瑞丹皮(牡丹皮)(11)	截形榆叶梅(郁李仁)
.....(60)	(149)
寐(小麦)(355)	穀子(楮实)
.....(569)	(559)
蕘(益母草)(231)	穀实(楮实)
.....(355)	(559)
蓴佳(益母草)(214)	穀木子(楮实)
.....(255)	(559)
蕘堇(益母草)(70)	穀木果(楮实)
.....(355)	(559)
蕘雛(益母草)(426)	穀树子(楮实)
.....(355)	(559)
蔓椒(两面针)(206)	穀树卵子(楮实)
.....(109)	(559)
蔓京子(蔓荆子)(206)	穀浆树果(楮实)
.....(22)	(559)
蔓青子(蔓荆子)(206)	聚石斛(石斛)
.....(22)	(543)
蔓荆实(蔓荆子)(206)	櫟子(路路通)
.....(22)	(369)
蔓蔓藤(海金沙藤)(206)	槚(茶叶)
.....(224)	(396)
蔓生白薇(白薇)(450)	槚(茶叶)
.....(138)	(396)
蔓生百部(百部)(15)	榧实(榧子)
.....(419)	(312)
蔓草百郁(百部)(130)	榧子仁(榧子)
.....(419)	(312)
蔓黄芪子(沙苑子)(130)	榧子肉(榧子)
.....(518)	(312)
葭莽(莽菜)(614)	榧树子(榧子)
.....(319)	(312)
蘋蘋(瓜蒌)(335)	榄子(吴茱萸)
.....(404)	(258)
蔸朴(厚朴)(50)	樹榴皮(石榴皮)
.....(200)	(571)
蔚香(蕨本)(569)	榧桃仁(桃仁)

..... (360)	歌女(地龙) (469) (149)
楠(檀香) (291)	酸苋(马齿苋) (89)	酸丹参(丹参) (349)
模楂(木瓜) (169)	酸秆(虎杖) (354)	酸甲藤(乌蔹莓) (106)
模楂(木瓜) (169)	酸秆(虎杖) (354)	酸母草(酢浆草) (241)
槟玉(槟榔) (307)	酸杖(虎杖) (354)	酸芝草(酢浆草) (241)
槟楠(槟榔) (307)	酸枣(枳椇子) (560)	酸尖菜(蜀羊泉) (86)
槟榔干(槟榔) (307)	(山楂) (298)	酸批子(酢浆草) (241)
槟榔子(槟榔) (307)	(酸枣仁) (449)	酸里红(山楂) (298)
槟榔仁(槟榔) (307)	酸草(酢浆草) (241)	酸汤秆(虎杖) (354)
槟榔毛(大腹皮) (297)	酸梅(乌梅) (566)	酸汤梗(虎杖) (354)
槟榔玉(槟榔) (307)	酸通(虎杖) (354)	酸枣子(酸枣仁) (449)
槟榔皮(大腹皮) (297)	酸益(败酱草) (94)	酸枣皮(山茱萸) (258)
槟榔尖(槟榔) (307)	酸浆(酢浆草) (241)	酸枣核(酸枣仁) (449)
槟榔衣(大腹皮) (297)	(锦灯笼) (88)	酸味木(毛冬青) (368)
槟榔壳(大腹皮) (297)	酸塔(瓦松) (129)	酸味草(酢浆草) (241)
槟榔果(金樱子) (583)	酸楂(山楂) (298)	酸味菜(马齿苋) (89)
槟榔钻(红藤) (93)	酸箕(酢浆草) (241)	酸树芭(络石藤) (186)
槟榔钱(槟榔) (307)	酸赭(地榆) (322)	酸荞麦(金荞麦) (103)
槟榔果皮(大腹皮) (297)	酸丁仁(郁李仁) (241)	酸饺草(酢浆草) (241)

酸梅子(山楂)(88)	蜚虻(虻虫)(385)
.....(298)			
酸梅草(酢浆草)(276)	颤冬(款冬花)(423)
.....(241)		颤冻花(款冬花)(423)
酸桶笋(虎杖)(275)	嗽药(百部)(419)
.....(354)		(白前)(401)
酸得溜(酢浆草)(513)	蜻翼(蟋蟀)(251)
.....(241)		蜻蜓草(爵床)(111)
酸浆果(锦灯笼)(562)	蜞(水蛭)(383)
.....(88)		蜡(蜂蜡)(625)
酸浆草(酢浆草)(602)	蜡珀(琥珀)(448)
.....(241)		蜡树子(女贞子)(557)
酸浆稞(锦灯笼)(68)	蜡树皮(秦皮)(92)
.....(88)		蜡蜂蜜(蜂蜜)(497)
酸斑苋(酢浆草)(131)	蜡子树皮(乌柏木根皮)(158)
.....(241)		蜡烛树皮(乌柏木根皮)(158)
酸酢草(酢浆草)(442)	蜡子树根皮(乌柏木根皮)(158)
.....(241)		蜡烛树根皮(乌柏木根皮)(158)
酸啾啾(酢浆草)(442)	螺羸(蜗牛)(116)
.....(241)		蝇子草(银柴胡)	
酸筒秆(虎杖)(442)		
.....(354)			
酸溜溜(瓦松)(212)		
.....(129)			
酸石榴皮(石榴皮)(417)		
.....(571)			
酸榴根(虎杖)(167)		
.....(354)			
酸酸草(酢浆草)(109)		
.....(241)			
酸石榴皮(石榴皮)(167)		
.....(571)			
酸头草根(石蒜)(417)		
.....(593)			
酸迷迷草(酢浆草)(135)		
.....(241)			
酸浆巴子(锦灯笼)(382)		

……………(140)	罂子粟壳(罂粟壳)	……………(74)
蜘蛛草(八角茴香) ……………(268)	……………(575)	管花党参(党参) ……………(482)
蝴蝶皮(蝉蜕) ……………(17)	锻石(石灰) ……………(607)	鼻折草(鳴跖草) ……………(38)
蝉蛸(桑蛸) ……………(584)	熏草(零陵香) ……………(209)	鼻涕团(山楂) ……………(298)
蝎甲(蝉蜕) ……………(17)	熏香(零陵香) ……………(209)	膜果麻黄(麻黄) ……………(1)
蝴蝶退皮(蝉蜕) ……………(17)	熏黄(雄黄) ……………(595)	膜荚黄芪(黄芪) ……………(486)
螂蛆(蜈蚣) ……………(467)	熏梅(乌梅) ……………(566)	膜缘木香(青木香) ……………(288)
蟾端(地龙) ……………(469)	熏陆香(乳香) ……………(374)	膜缘柴胡(柴胡) ……………(24)
蝉皮(蝉蜕) ……………(17)	熏乳香(乳香) ……………(374)	獐香(麝香) ……………(473)
蝉衣(蝉蜕) ……………(17)	熏陆乳香(乳香) ……………(374)	獐子香(麝香) ……………(473)
蝉壳(蝉蜕) ……………(17)	稳牙参(沙参) ……………(535)	獐子脐(麝香) ……………(473)
蝉退(蝉蜕) ……………(17)	稳齿菜(荆芥) ……………(6)	鲗骨(乌贼骨) ……………(586)
蝉退壳(蝉蜕) ……………(17)	箬兰根(白芨) ……………(330)	鲟鱼胶(鱼鳔) ……………(533)
蝉蜕壳(蝉蜕) ……………(17)	箩筐树皮(紫荆皮) ……………(114)	皱纹(龙眼肉) ……………(534)
蝉肚姜黄(姜黄) ……………(347)	箩筐树花(紫荆花) ……………(115)	鲜子(梔子) ……………(36)
螭蟻(地龙) ……………(469)	箇桂(肉桂) ……………(257)	鲜支(梔子) ……………(36)
黑子(榧子) ……………(312)	管仲(贯众) ……………(313)	鲜姜(生姜) ……………(4)
黑胆(熊胆) ……………(97)	管松(天门冬) ……………(542)	鲜大青(土大黄) ……………(112)
罂子粟(罂粟壳) ……………(575)	管黄(牛黄) ……………(74)	鲜大薊(大薊) ……………(316)
	管牛黄(牛黄)	

鲜土苓(土茯苓)(33)	鲜楮实(楮实)
.....(79)	(559)
鲜山药(山药)(277)	鲜葎草(葎草)
.....(490)	(243)
鲜山楂(山楂)(535)	鲜榆钱(榆钱)
.....(298)	(453)
鲜小薊(小薊)(427)	鲜槟榔(槟榔)
.....(318)	(307)
鲜飞廉(飞廉)(203)	鲜壁钱(壁钱)
.....(126)	(626)
鲜天冬(天门冬)(113)	鲜藕节(藕节)
.....(542)	(342)
鲜公英(蒲公英)(319)	鲜藿香(藿香)
.....(68)	(202)
鲜石斛(石斛)(290)	鲜万年青(万年青)
.....(543)	(245)
鲜石蒜(石蒜)(529)	鲜千里光(千里光)
.....(593)	(44)
鲜生姜(生姜)(162)	鲜木槿花(木槿花)
.....(4)	(131)
鲜白薇(白薇)(4)	鲜水蜈蚣(水蜈蚣)
.....(138)	(247)
鲜地龙(地龙)(4)	鲜毛冬青(毛冬青)
.....(469)	(368)
鲜地黄(生地黄)(579)	鲜牛筋草(牛筋草)
.....(58)	(225)
鲜竹叶(竹叶)(578)	鲜凤尾草(凤尾草)
.....(34)	(244)
鲜竹沥(竹沥)(580)	鲜乌蔹莓(乌蔹莓)
.....(409)	(106)
鲜竹茹(竹茹)(552)	鲜乌蔹莓(乌蔹莓)
.....(409)	(106)
鲜麦冬(麦门冬)(477)	鲜节节草(问荆)
.....(540)	(239)
鲜芹菜(芹菜)(227)	鲜石胡荽(鹅不食草)
.....(472)	(196)
鲜芦根(芦根)(14)	鲜仙人掌(仙人掌)

.....(108)	鲜夹竹桃叶(夹竹桃).....(249)(48)
鲜白果叶(白果叶).....(431)	鲜胡颓子叶(胡颓子叶).....(432)	嫩羚羊(羚羊角).....(454)
鲜白茅根(白茅根).....(321)	鲜夏天无草(夏天无).....(195)	嫩鹿茸(鹿茸).....(498)
鲜半支莲(半支莲).....(118)	鲜夏天无根(夏天无).....(195)	嫩羚羊角(羚羊角).....(454)
鲜农吉利(农吉利).....(120)	鲜鹅不食草(鹅不食草).....(196)	樱花(合欢花).....(452)
鲜鸡冠花(鸡冠花).....(327)	馒头菊(菊花).....(21)	樱花树皮(合欢皮).....(452)
鲜苣荬菜(苣荬菜).....(127)	嫩芩(黄芩).....(48)	璇胶(鱼鳔).....(533)
鲜枇杷叶(枇杷叶).....(427)	嫩白薇(白薇).....(138)	缩砂(砂仁).....(204)
鲜虎耳草(虎耳草).....(123)	嫩头子(草珊瑚).....(108)	缩沙蜜(砂仁).....(204)
鲜罗汉果(罗汉果).....(559)	嫩竹茹(竹茹).....(409)	缩砂仁(砂仁).....(204)
鲜狗舌草(狗舌草).....(121)	嫩苏叶(苏叶).....(4)	缩砂壳(砂仁壳).....(206)
鲜胡颓子(胡颓子).....(304)	嫩诃子(藏青果).....(85)	缩砂蜜(砂仁).....(204)
鲜夏天无(夏天无).....(195)	嫩松香(松香).....(618)	翠衣(西瓜翠衣).....(538)
鲜铁树叶(铁树叶).....(354)	嫩钩钩(钩藤).....(461)	翠树皮(苦楝皮).....(306)
鲜积雪草(积雪草).....(225)	嫩钩钩(钩藤).....(461)	翠胆矾(胆矾).....(591)
鲜猪毛菜(猪毛菜).....(472)	嫩前胡(前胡).....(402)	翠蝴蝶(鸭跖草).....(38)
鲜猪殃殃(猪殃殃).....(120)	嫩桂枝(桂枝).....(2)	熊胆仁(熊胆).....(97)
鲜淡竹叶(竹叶).....(24)	嫩桑叶(桑叶).....(19)	熊胆子胆(熊胆).....(97)
鲜辣蓼草(辣蓼).....(193)	嫩黄芩(黄芩)	膏链(络石藤).....(186)

膏凉姜(高良姜)(426)	赛谷精草(谷精草)
.....(266)	(39)
銮豆(巴豆)(360)	赛加羚羊角(羚羊角)
.....(153)	(454)
腐肠(黄芩)(359)	察干高牙(肉苁蓉)
.....(48)	(503)
瘦客(月季花)(193)	蓼刁竹(徐长卿)
.....(363)	(170)
瘦香娇(丁香)(607)	蜜(蜂蜜)
.....(265)	(497)
瘙櫞(木瓜)(426)	蜜甘(甘草)
.....(169)	(493)
韶脑(樟脑)(426)	蜜果(无花果)
.....(621)	(88)
彰丹(铅丹)(426)	蜜草(甘草)
.....(600)	(493)
端(玄参)(581)	蜜香(沉香)
.....(59)	(285)
辣子(吴茱萸)(202)	(木香)
.....(258)	(280)
辣桂(肉桂)(202)	蜜脾(龙眼肉)
.....(257)	(534)
辣蓼(茺蔚)(349)	蜜蜡(蜂蜡)
.....(191)	(625)
辣子草(鱼腥草)(387)	蜜(蜂蜜)
.....(80)	(497)
(毛茛)(296)	蜜蠟(蜂蠟)
.....(607)	(625)
辣母藤(益母草)(385)	蜜甘草(甘草)
.....(255)	(493)
辣米菜(蔊菜)(470)	蜜百合(百合)
.....(417)	(550)
辣菜子(白芥子)(84)	蜜冬花(款冬花)
.....(393)	(423)
辣椒藤(威灵仙)(204)	蜜白前(白前)
.....(162)	(401)
辣蕓子(葶苈子)(550)	蜜米壳(罂粟壳)

蜜杏仁(杏仁)	蜜郁李仁(郁李仁)	漂甘遂(甘遂)
.....(418)(149)(151)
蜜远志(远志)	蜜罗柑花(佛手花)	漂人中白(人中白)
.....(450)(278)(48)
蜜陀僧(密陀僧)	蜜炙杷叶(枇杷叶)	漏芦(白头翁)
.....(605)(427)(89)
蜜罗柑(佛手)	蜜金樱子(金樱子)	漏蔻(草豆蔻)
.....(277)(583)(208)
蜜屈律(枳椇子)	蜜萼苈子(葶苈子)	漏天机(龟板)
.....(560)(426)(563)
蜜砂仁(砂仁)	蜜箫柑花(佛手花)	漏芦果(萱草根)
.....(204)(278)(248)
蜜前胡(前胡)	蜜蜜罐板(生地黄)	漏芦根(萱草根)
.....(402)(58)(248)
蜜桃仁(桃仁)	蜜蜜罐棵根(生地黄)	漏苓子(木鳖子)
.....(360)(58)(616)
蜜黄芪(黄芪)	精芒硝(芒硝)	漏蓝子(附子)
.....(486)(145)(254)
蜜蒙花(密蒙花)	精制苏合香(苏合香)	漏芦根果(萱草根)
.....(40)(475)(248)
蜜紫菀(紫菀)	粽子菜(芥菜)	滚北(卷柏)
.....(421)(319)(325)
蜜槐角(槐角)	漆头(茜草)	滚子花(夏枯草)
.....(329)(335)(37)
蜜蜂草(香薷)	漆柿(柿蒂)	滚屎虫(蜣螂)
.....(5)(292)(447)
蜜蜂蜡(蜂蜡)	漆底(干漆)	漳丹(铅丹)
.....(625)(379)(600)
蜜箫柑(佛手)	漆脚(干漆)	滴乳(乳香)
.....(277)(379)(374)
蜜棱橄(枳椇子)	漆渣(干漆)	滴香(乳香)
.....(560)(379)(374)
蜜罐头(丹参)	漆滓(干漆)	滴乳石(钟乳石)
.....(349)(379)(270)
蜜马兜铃(马兜铃)	漆辣子(吴茱萸)	滴乳香(乳香)
.....(428)	(374)

滴乳珠(乳香)	(80)
	(374)
滴金卵(延胡索)	(344)
	
滴落乌(墨旱莲)	(562)
	
滴滴金(旋复花)	(399)
	

【十五画】

蓼根(三棱)	(348)
	
蓼根草(三棱)	(348)
	
薰草(零陵香)	(209)
	
蕙葵(藜芦)	(592)
	
藤茎(远志)	(450)
	
蕨心藤(红藤)	(93)
	
蕨苗参(地榆)	(322)
	
蕨薇菜根(贯众)	(313)
	
蒟(连翘)	(67)
	
蕺(鱼腥草)	(80)
	
蕺子(鱼腥草)	(80)
	
蕺菜(鱼腥草)	(80)
	
蕺儿根(鱼腥草)	(80)
	
蕺足根(鱼腥草)	

蕷(荷叶)	(579)
	
蕷叶(荷叶)	(579)
	
蕊(白芷)	(10)
	
蕣根(泽泻)	(213)
	
槿皮(土槿皮)	(610)
	
槿树子(木槿子)	(436)
	
槿树皮(木槿皮)	(610)
	
槿树花(木槿花)	(610)
	
槿根皮(木槿皮)	(610)
	
樗皮(椿皮)	(570)
	
樗鸡(红娘子)	(385)
	
樗木皮(椿皮)	(570)
	
樗白皮(椿皮)	(570)
	
樗树皮(椿皮)	(570)
	
樗根皮(椿皮)	(570)
	
蕲(川芎)	(343)
	
蕲蛇(白花蛇)	(177)
	
蕲艾叶(艾叶)	(338)
	
蕲菜子(冬葵子)	(236)
	
蕲蛇棍(白花蛇)	(177)
	
蕲蛇鲞(白花蛇)	(177)
	
蒲(泽泻)	(213)

樊楓皮(秦皮)	赭丹(马宝)(575)
.....(92)(446)	醋红花(红花)
樊鸡木皮(秦皮)	赭石(代赭石)(361)
.....(92)(460)	醋灵脂(五灵脂)
橄欖(橄榄)	塙(食盐)(380)
.....(558)(135)	醋龟板(龟板)
橄欖子(槟榔)	鞋底片(车前草)(563)
.....(307)(216)	醋青皮(青皮)
(橄榄)	鞋底片子(车前子)(273)
.....(558)(215)	醋郁金(郁金)
橄欖子树皮(紫荆皮)	醋芍(白芍)(345)
.....(114)(531)	醋虎骨(虎骨)
櫻(花椒)	醋浆(锦灯笼)(175)
.....(263)(88)	醋香附(香附)
樟(杜仲)	醋三棱(三棱)(282)
.....(507)(348)	醋莪术(莪术)
樟木(接骨木)	醋山甲(穿山甲)(347)
.....(378)(381)	醋狼毒(狼毒)
樟丹(船丹)	醋元胡(延胡索)(159)
.....(600)(344)	醋豹骨(豹骨)
樟冰(樟脑)	醋水蛭(水蛭)(176)
.....(621)(383)	醋常山(常山)
樟木脑(樟脑)	醋乌梅(乌梅)(590)
.....(621)(566)	醋鳖甲(鳖甲)
樟公脑(樟脑)	醋艾叶(艾叶)(564)
.....(621)(338)	醋川楝子(川楝子)
樟柳头(商陆)	醋艾绒(艾叶)(286)
.....(156)(338)	醋乌贼骨(乌贼骨)
樟脑块(樟脑)	醋甲片(穿山甲)(586)
.....(621)(381)	醋炒没药(没药)
樟脑粉(樟脑)	醋白芍(白芍)(376)
.....(621)(531)	醋炒乳香(乳香)
樟寄生(桑寄生)	醋母草(醋浆草)(374)
.....(172)(241)	醋制红药子(红药子)
樟木树枝(接骨木)	醋地榆(地榆)(131)
.....(378)(322)	醉心花(洋金花)
	醋米壳(罂粟壳)(439)

醉仙花(洋金花)(607)	蝎虎子(壁虎)(626)
.....(439)			
醉仙桃花(洋金花)(385)	蝙蝠刺(牛蒡子)(16)
.....(439)			
醉天芙蓉叶(木芙蓉叶)(385)	蝙蝠屎(夜明砂)(42)
.....(611)			
藤(绶草)(385)	蝙蝠粪(夜明砂)(42)
.....(124)			
撒法即(番红花)(459)	蝙蝠葛根(山豆根)(82)
.....(363)			
撒花料淡(龙胆草)(214)	蝙蝠藤根(山豆根)(82)
.....(54)			
撒馥兰花(番红花)(459)	蝼空(蝼蛄)(251)
.....(363)			
撮斗珍珠(铁苋菜)(81)	蝼蛄(蝼蛄)(251)
.....(241)			
撮斗装珍珠(铁苋菜)(436)	蝼蜮(蝼蛄)(251)
.....(241)			
撮斗撮金珠(铁苋菜)(17)	墨草(墨旱莲)(562)
.....(241)			
撚撚草根(茜草)(626)	墨胆(熊胆)(97)
.....(335)			
播田花(茅莓)(32)	墨菜(墨旱莲)(562)
.....(127)			
播娘蒿子(葶苈子)(466)	墨水草(墨旱莲)(562)
.....(426)			
震天雷(大戟)(466)	墨斗草(墨旱莲)(562)
.....(154)			
麌羈炭(血余炭)(466)	墨石子(没食子)(588)
.....(332)			
暴马丁香(暴马子)(466)	墨汁草(墨旱莲)(562)
.....(434)			
遏罗角(犀角)(466)	墨记菜(墨旱莲)(562)
.....(57)			
遏罗安息香(安息香)(388)	墨鱼骨(乌贼骨)(586)
.....(476)	(景天三七)		
瞌睡草(毛茛)(335)	墨鱼盖(乌贼骨)	

.....(586)	箭芪(黄芪)(517)
墨烟草(墨旱莲)(486)	鲤鱼草(绶草)
.....(562)	箭草(千里光)(124)
墨斗鱼骨(乌贼骨)(44)	鲫鱼藤(乌蔹莓)
.....(586)	箭头风(墓头回)(106)
墨汁旱莲草(墨旱莲)(95)	騎角草(翻白草)
.....(562)	箭头草(紫花地丁)(55)
镇山威(鹿角)(69)	虢丹(铅丹)
.....(500)	(土大黄)(600)
镇头迦萼(柿蒂)(112)	剪砂(朱砂)
.....(292)	箭豆草(半边莲)(441)
镇头迦蒂(柿蒂)(78)	愍葱(藜芦)
.....(292)	箭黄芪(黄芪)(592)
靠山竹(玉竹)(486)	熟片(附子)
.....(546)	箭戟蕨(石韦)(254)
靠山红(丹参)(223)	熟地(熟地黄)
.....(349)	箭镞砂(朱砂)(528)
(满山红)(441)	熟军(大黄)
.....(432)	箭叶青牛胆(金果榄)(143)
黎子(青葙子)(84)	熟芋(熟地)
.....(41)	箭叶淫羊藿(淫羊藿)(528)
稷子草(牛筋草)(505)	熟薯(丁哥王)
.....(225)	僵虫(白僵蚕)(110)
稻芽(谷芽)(468)	熟大黄(大黄)
.....(302)	僵蚕(白僵蚕)(143)
稻蘖(谷芽)(468)	熟石灰(石灰)
.....(302)	僵蚕末(白僵蚕)(607)
稻谷芽(谷芽)(468)	熟石膏(石膏)
.....(302)	德儿(杏仁)(30)
稻根须(糯稻根须)(418)	熟白果(白果)
.....(569)	德多(蛤蚧)(430)
籍军(大黄)(514)	熟附片(附子)
.....(143)	德菊(菊花)(254)
籍黄(大黄)(21)	熟枣仁(酸枣仁)
.....(143)	德昌香薷(香薷)(449)
箱菊(菊花)(5)	熟松香(松香)
.....(21)	德保黄精(黄精)(618)

熟首乌(何首乌)(200)	靛沫(青黛)
.....(529)	(72)
熟桃仁(桃仁)(200)	靛根(板蓝根)
.....(361)	(71)
熟黄精(黄精)(223)	靛青叶(大青叶)
.....(547)	(70)
熟常山(常山)(621)	靛青根(板蓝根)
.....(590)	(71)
熟女贞子(女贞子)(485)	靛沫花(青黛)
.....(557)	(72)
摩罗(百合)(432)	靛蓝花(青黛)
.....(550)	(72)
摩勒香(乳香)(304)	靛蓝粉(青黛)
.....(374)	(72)
瘪麦(浮小麦)(264)	靛青花草(鸭跖草)
.....(538)	(38)
瘪谷香(小茴香)(264)	燕石(石燕)
.....(267)	(252)
瘪角茴香(小茴香)(218)	燕麦(瞿麦)
.....(267)	(234)
鹤草(银柴胡)(518)	(浮小麦)
.....(140)	(568)
鹤舌草(白花蛇舌草)(518)	燕草(零陵香)
.....(96)	(209)
鹤虱子(鹤虱)(518)	燕面(夏枯草)
.....(310)	(37)
鹤膝草(毛茛)(550)	燕蓑(木通)
.....(607)	(218)
羯布罗香(冰片)	【十六画】	燕子石(石燕)
.....(474)	(252)
羯婆罗香(冰片)(72)	燕子尾(半夏)
.....(474)	(388)
憋肚草(藏角落)(70)	燕卵肉(龙眼肉)
.....(530)	(534)
察刁竹(徐长卿)(72)	燕含珠(水蜈蚣)
.....(170)	(247)
潜山朴(厚朴)(72)	燕尾香(佩兰)

..... (203)	薜根(当归) (15)
燕茜子(八月札) (526)	薄荷草(薄荷)
..... (291)	薅田藨(茅莓) (15)
燕蝙蝠屎(夜明砂) (127)	薄荷梗(薄荷)
..... (42)	薅秧泡(茅莓) (15)
燕子草根皮(远志) (127)	薄橘红(橘红)
..... (453)	薅秧藨(茅莓) (272)
薤根(薤白) (127)	薄叶黄芩(黄芩)
..... (289)	(覆盆子) (48)
薤白头(薤白) (535)	薄叶假万寿竹(玉竹)
..... (289)	薏(莲子心) (546)
蕗草(甘草) (577)	罄(蟠螭)
..... (493)	薏仁(薏苡仁) (251)
薯药(山药) (214)	樾子(吴茱萸)
..... (490)	薏米(薏苡仁) (258)
薯蓣(山药) (214)	橘仁(橘核)
..... (490)	薏苡(薏苡仁) (272)
薯蔗(甘蔗) (214)	橘丝(橘络)
..... (539)	薏仁米(薏苡仁) (272)
碧瓜乳藤根(黄药子) (214)	橘米(橘核)
..... (415)	薏米仁(薏苡仁) (272)
蘘(蘘)芥(芥菜) (214)	橘筋(橘络)
..... (319)	薏米须(玉米须) (272)
蘘芥(芥菜) (239)	橘子仁(橘核)
..... (319)	薏苡米(薏苡仁) (272)
菂(莲子) (214)	橘子叶(橘叶)
..... (576)	薏珠子(薏苡仁) (272)
薇草(白薇) (214)	橘子皮(橘皮)
..... (134)	薏黍子(薏苡仁) (271)
荳(豆)贯众(贯众) (214)	橘子核(橘核)
..... (313)	薄虫(金蝎) (272)
蕨蕷(韭荑) (466)	橘花蜜(蜂蜜)
..... (312)	薄苛(薄荷) (497)
薜荔(石南藤) (15)	橘扭子(枳椇子)
..... (190)	薄桂(肉桂)) (560)
(王不留行) (257)	橘筋络(橘络)
..... (367)	薄荷叶(薄荷) (272)

橘类橘红(橘红)(382)	镜面砂(朱砂)
.....(272)	(441)
橙皮(橘皮)(125)	箇桂(肉桂)
.....(271)	(257)
橙足鼯鼠粪(五灵脂)(135)	箇其柴(鬼箭羽)
.....(380)	(372)
橐石花(款冬花)(135)	箇梳风(鬼箭羽)
.....(423)	(372)
橐吾花(款冬花)(135)	箇障皮(木槿皮)
.....(423)	(610)
整顿香(麝香)(135)	箇障花(木槿花)
.....(473)	(131)
瓢瓜(葫芦)(421)	箇沿树子(木槿子)
.....(231)	(616)
瓢里珍珠(铁苋菜)(421)	箇沿树皮(木槿皮)
.....(241)	(610)
醒心杖(远志)(313)	箇沿树花(木槿花)
.....(459)	(131)
醒头草(佩兰)(467)	蟹螯(斑蝥)
.....(203)	(622)
颠勒(天门冬)(251)	膨大海(胖大海)
.....(542)	(416)
颠棘根(天门冬)(584)	膨皮豆(扁豆)
.....(542)	(492)
颠茄花(洋金花)(584)	膨胀草(大戟)
.....(439)	(154)
狼猪粪(猪苓)(116)	雕核樱(山茱萸)
.....(212)	(582)
鳖菜(益母草)(251)	鲮石(络石藤)
.....(355)	(186)
霍斗(石斛)(467)	鲮鲤甲(穿山甲)
.....(543)	(381)
霍石斛(石斛)(320)	鲮鲤角(穿山甲)
.....(543)	(381)
霍山石斛(石斛)(457)	鲸口蕨(狗脊)
.....(543)	(509)
翼地鳖(廑虫)(68)	鳅黑胆(熊胆)

壁虫(壁钱) (97)	懒人菜(韭菜) (290)	糖橘子(金樱子) (583)
壁茧(壁钱幕) (626)	懒人菜子(韭子) (524)	糖藤根(巴戟天) (501)
壁官(壁虎) (627)	懒老婆屎(五灵脂) (380)	糖罐子(金樱子) (583)
壁蚕(壁钱) (626)	褶叶萱草根(萱草根) (248)	糖罐头(胡颓子) (304)
壁镜(壁钱) (626)	糙苏(续断) (508)	潞州党(党参) (482)
壁螭(壁钱) (626)	(豨莶草) (167)	潞党参(党参) (482)
壁蚕茧(壁钱幕) (627)	糙叶白芷(白芷) (10)	濂珠(珍珠) (457)
壁虎粉(壁虎) (626)	糙叶败酱(墓头回) (95)	濂珠母(珍珠母) (458)
壁钱虫(壁钱) (626)	糙叶五加皮(五加皮) (173)	【十七画】
壁钱茧(壁钱幕) (267)	糖果(金樱子) (583)	藏脑(硇砂) (602)
壁钱窠(壁钱幕) (627)	糖参(人参) (478)	藏大蓟(大蓟) (316)
壁嬉窠(壁钱幕) (627)	糖饼(饴糖) (496)	藏女贞(女贞子) (557)
壁虱胡麻(亚麻子) (553)	糖梗(甘蔗) (539)	藏飞廉(飞廉) (126)
(黑脂麻) (552)	糖稀(饴糖) (496)	藏木香(青木香) (283)
壁蛇生根(石蒜) (593)	糖罐(金樱子) (583)	藏红花(番红花) (363)
壁虱胡麻子(亚麻子) (553)	糖瓜蒌(瓜蒌) (404)	藏珠草(铁苋菜) (241)
磨石头根(山豆根) (82)	精灵脂(五灵脂) (380)	藏桃仁(桃仁) (360)
磨盘树子(苘麻子) (46)	糖刺果(金樱子) (583)	
	糖莺子(金樱子) (583)	

藏黄芪(黄芪)(39)	霜降花叶(木芙蓉叶)(611)
藏硇砂(硇砂)(602)	箇草(银柴胡)(140)
藏麻黄(麻黄)(1)	鹽(食盐)(135)
藏羚羊(羚羊角)(454)	鞠蕘(川芎)(343)
藏角蒿子(藏角蒿)(530)	棲落(柽柳)(15)
藏角蒿根(藏角蒿)(530)	椒(花椒)(263)
璠薜(天门冬)(542)	楓目(椒目)(263)
薰衣草(零陵香)(209)	檐老鼠屎(夜明砂)(42)
藉豆(扁豆)(492)	檀香木(檀香)(291)
蘡(紫草)(63)	鱉(金蝎)(466)
薺芨(薺本)(11)	槃梅(山楂)(298)
薺板(薺本)(11)	礞胆(猪胆汁)(417)
薸(浮萍)(27)	礞胆汁(猪胆汁)(417)
藻(海藻)(413)	鵝哥舌(白花蛇舌草)(96)
戴芪(黄芪)(486)	鵝哥利(白花蛇舌草)(96)
戴椹(黄芪)(486)	麝珀(琥珀)(448)
(旋复花)(399)	擦草(木贼)(28)
戴糁(黄芪)(486)	霜苍术(苍术)(198)
戴星草(谷精草)		霜桑叶(桑叶)(19)

蟑螂花根(石蒜)	爵梅仁(郁李仁)	藕实(莲子)
.....(593)(149)(576)
螭(地龙)	檗木(黄柏)	藕荷(荷叶)
.....(469)(52)(579)
稽豆皮(稽豆衣)	檗皮(黄柏)	藕莢(荷梗)
.....(465)(52)(580)
筠草(葎草)	翼蓼(白药子)	藕节疤(藕节)
.....(243)(132)(342)
篾草(芦荟)	(红药子)	簷茹(茜草)
.....(147)(131)(335)
繁露子(冬葵子)	(何首乌)	藜子(地肤子)
.....(236)(529)(229)
繁穗苋子(青葙子)	囊梗五味子(五味子)	藜芦(漏芦)
.....(41)(565)(100)
黛灯心(灯心草)	瓣子芫(秦艽)	蘋子(蘿白)
.....(235)(166)(289)
黛灯芯(灯心草)	瓣紫菀(紫菀)	蘋头(蘿白)
.....(235)(421)(289)
黛灯心草(灯心草)	糠古老(糠谷老)	藤仲(杜仲)
.....(235)(238)(507)
微术(白术)	糠桂皮(肉桂)	藤豆(扁豆)
.....(489)(257)(492)
徵菊(菊花)	糠桂枝(桂枝)	藤芸(黑脂麻)
.....(21)(2)(552)
蝦姑(海马)	濮瓜子(冬瓜子)	藤通(木通)
.....(522)(230)(218)
蝮鱼甲(石决明)	濮瓜皮(冬瓜皮)	藤梨(猕猴桃)
.....(455)(230)(558)
爵耳(苍耳子)	涿州零陵香(零陵香)	藤五加(五加皮)
.....(11)(209)(173)
爵犀(鬼臼)	【十八画】	
.....(45)	藕子(莲子)	藤勾子(金樱子)
爵卿(爵床)(576)(583)
.....(111)	藕叶(荷叶)	藤吊丝(海金沙藤)
爵李仁(郁李仁)(579)(224)
.....(149)	藕杆(荷梗)	藤防己(防己)
	(164)

藤杜仲(杜仲)	(585)
藤罗花(凌霄花)	(507)
藤桐子(木鳖子)	(364)
藤黄连(黄藤)	(616)
藤商陆(商陆)	(243)
藤萝草花(凌霄花)	(156)
藤藤侧耳根(金钱草)	(364)
藨(茅莓)	(221)
藨子(覆盆子)	(茅莓)
蕪子(吴茱萸)	(127)
蕪煎(吴茱萸)	(585)
潭(海藻)	(258)
藩水葛(葛蕕)	(258)
藩蕕竹(葛蕕)	(233)
藩蕕花(木槿花)	(233)
藩蕕草皮(木槿皮)	(131)
鞭枣胡子根(地榆)	(610)
覆子(八月札)	(322)
覆盆(覆盆子)	(294)
覆瓦叶金果榄(金果榄)	(533)
鹹(食盐)	(84)
瞿麦穗(瞿麦)	(135)
瞿陵花(凌霄花)	(234)
嬉しい(壁钱)	(364)
螅姑(蝼蛄)	(626)
蠅蛉(蝼蛄)	(251)
蟠龙草(仙茅)	(251)
蟠桃草(仙桃草)	(504)
蟠龙正春砂(砂仁)	(359)
鷺鸶花(金银花)	(204)
鷺嘴草(老鹳草)	(65)
鷺鸶花藤(忍冬藤)	(185)
馥草(玄参)	(66)
簪头菊(菊花)	(59)
镰刀草(绶草)	(21)
镰刀黄皮树皮(黄柏)	(124)
鈍鱗(鱼螺)	(52)
鰐鰐(鱼螺)	(533)
膀胱(乌药)	(283)
翻白草(白头翁)	(89)
翻白菜(委陵菜)	(委陵菜)
翻胃木(常山)	(91)
翻树枝(接骨木)	(91)
鹰爪风(钩藤)	(590)
鹰爪连(黄连)	(461)
鹰爪筍(茅莓)	(50)
鹰爪黄连(黄连)	(127)
癞头花(芫花)	(50)
癞痴茶(白蔹)	(152)
癞蟆皮(蟾皮)	(98)
癞头花子(蛇床子)	(624)
癞汉指头(枳椇子)	(614)
癞痞疤皮(蟾皮)	(560)
癞痞疤酥(蟾酥)	(624)
癞蛤蟆浆(蟾酥)	(623)

癞蛤蟆皮(蟾皮)	曝牙郎(了哥王)	麒麟竭(血竭)	
.....(624)(110)(620)	
癞蛤蟆浆(蟾酥)	蟾蜍皮(蟾蜍)	麝药(土大黄)	
.....(623)(624)(112)	
癞蛤蟆酥(蟾酥)	蟾蜍草(车前草)	麝根草(羊蹄)	
.....(623)(216)(340)	
【十九画】			
藿香叶(藿香)	蟾蜍薯(防己)	瓣芩(黄芩)	
.....(202)(164)(48)	
藿香梗(藿香)	蟾蜍草子(车前子)	爆卜草(锦灯笼)	
.....(202)(215)(88)	
莲麦(瞿麦)	蟾蜍眉脂(蟾蜍)	爆格蚤(女贞子)	
.....(234)(623)	羹匙菜(天南星)	
蘧荔(商陆)	蟾蜍眉酥(蟾蜍)	鳖壳(鳖甲)	
.....(156)(623)(564)	
蘧麦花(凌霄花)	蠚(廑虫)	鳖盖(鳖甲)	
.....(364)(382)(564)	
蘑菇头(犀角)	蹼趾壁虎(壁虎)	鳖甲胶(鳖甲)	
.....(57)(626)(564)	
蘑菇藤(海金沙藤)	蹲倒驴(牛筋草)	鳖盖子(鳖甲)	
.....(224)(225)(564)	
藻纹梅花衣(石花)	簸箕虫(廑虫)	鳖鲤片(穿山甲)	
.....(136)(382)(381)	
攀谷藤(海金沙藤)	鳔(鱼鳔)	鳖血丹参(丹参)	
.....(224)(533)(349)	
攀枝花皮(海桐皮)	鳔胶(鱼鳔)	鳖血青蒿(青蒿)	
.....(179)(533)(136)	
攀茎钩藤(钩藤)	蟹爪兰(石斛)	【二十画】	
.....(461)(543)	蘖木(黄柏)	
慙炭(血余炭)	蟹壳草(虎耳草)(52)	
.....(332)(123)	蘖皮(黄柏)	
礮(食盐)	蟹眼豆(相思子)(52)	
.....(135)(615)	蘖米(谷芽)	
醣(食盐)	麒麟片(穿山甲)(302)	
.....(135)(381)		
	麒麟血(血竭)		

灌耳草(谷精草)(227)
.....(39)	
蠟山(牡蛎)(108)
.....(456)	
蠟壳(牡蛎)(38)
.....(456)	
蠟莆(牡蛎)(247)
.....(456)	
薰虻(虻虫)(236)
.....(385)	
鼯鼠糞(五灵脂)(135)
.....(380)	
鱗片(穿山甲)(562)
.....(381)	
鱗毛蕨(狗脊)(562)
.....(509)	
鱗鰭甲(穿山甲)(562)
.....(381)	
糯米青(狗舌草)(253)
.....(121)	
糯谷根(糯稻根须)(253)
.....(569)	
糯稻根(糯稻根须)(569)
.....(569)	
糯稻根须(糯稻根须)(473)
.....(569)	

【二十一画】

蘿(蘿)(白芷)(10)
.....(214)	
蠻虫(蠻虫)(473)
.....(382)	
霸王(仙人掌)(473)
.....(108)	
霸王引(藜蕘)(473)
.....(316)	

霸王樹(仙人掌)(227)
.....(108)	
露草(鴨跖草)(38)
.....(247)	
露水草(水蜈蚣)(236)
.....(135)	
鱗腸(墨旱蓮)(562)
.....(253)	
鱗腸草(墨旱蓮)(562)
.....(253)	
鱗首石(魚腦石)(253)
鱗腦石(魚腦石)(253)
鱗胶(魚螵)(533)
鱗鰭甲(穿山甲)(381)
麝男(甘松)(293)
麝父香(麝香)(473)
麝香子(麝香)(473)
麝香仁(麝香)(473)
麝香肉(麝香)(473)
麝脐香(麝香)(473)
麝香飛廉(大薑)(473)
.....(316)	

麝香百合(百合)(550)
.....(248)	

【二十二画】


藨蕘(川芎)(343)
蕡(苦參)(55)
囊子壳(罂粟壳)(575)
囊丝黄精(黄精)(547)
囊花马兜铃(马兜铃)(428)
蠶牛(蜗牛)(116)
蠶蠃(蜗牛)(116)

【二十三画】

蘋子(吳茱萸)(258)
罐儿茶(刘寄奴)(351)

【二十四画】

蘿米(薏苡仁)(214)
蘿珠(薏苡仁)(214)
櫟(狼把草)(111)
囊心宝(桑寄生)(172)
鹽(食盐)	



别名商品名处方名音序索引

【A】

ài 埃………(858)
 āi 爹………(931)
 ài 艾………(713)
 爱………(870)
 ān 安………(769)
 庵………(884)
 庵………(902)
 桉………(860)
 鹤………(929)
 àn 暗………(930)
 āo 蝥………(950)
 ào 凹………(723)

【B】

bā 八………(647)
 巴………(706)
 叭………(725)
 扒………(721)
 芭………(776)
 bá 拔………(805)
 拔………(799)
 跋………(884)
 bǎ 把………(782)
 耙………(864)
 bà 坝………(779)
 霸………(956)
 bái 白………(727)
 bǎi 百………(751)
 伯………(781)
 柏………(836)

摆………(929)
 bài 拜………(841)
 败………(809)
 bān 班………(855)
 班………(907)
 搬………(929)
 蟹………(950)
 bǎn 板………(801)
 bàn 半………(740)
 瓣………(955)
 bàng 蚌………(863)
 蒡………(927)
 棒………(911)
 bāo 包………(737)
 胞………(848)
 苞………(800)
 bǎo 宝………(825)
 保………(845)
 bào 抱………(805)
 鮑………(933)
 暴………(946)
 曝………(955)
 爆………(955)
 豹………(870)
 bēi 卑………(812)
 běi 北………(721)
 bèi 贝………(695)
 贝………(774)
 孛………(781)
 培………(923)
 背………(840)
 倍………(868)

榆………(911)
 bēn 奔………(804)
 běn 本………(715)
 bēng 崩………(894)
 bēng 迸………(853)
 bēi 遍………(912)
 bí 莓………(856)
 荔………(908)
 鼻………(939)
 bǐ 比………(706)
 彼………(812)
 秕………(844)
 妣………(838)
 笔………(867)
 bì 必………(739)
 闭………(769)
 毕………(752)
 苾………(800)
 革………(829)
 蕈………(884)
 蒐………(926)
 辟………(933)
 碧………(935)
 釐………(946)
 薜………(949)
 籜………(950)
 壁………(951)
 biān 边………(738)
 萹………(909)
 编………(923)
 犏………(946)
 牻………(954)

biǎn 篓………(952)
 biàn 变………(824)
 扁………(850)
 便………(845)
 遍………(923)
 编………(950)
 辨………(953)
 biāo 薰………(954)
 biào 鳜………(955)
 biē 憋………(948)
 蹩………(955)
 bié 别………(783)
 biě 懈………(948)
 bīn 宾………(874)
 滨………(935)
 摈………(937)
 嫔………(950)
 bīng 冰………(772)
 冰………(860)
 bǐng 柄………(836)
 bìng 并………(771)
 病………(872)
 bō 波………(827)
 玻………(829)
 钵………(865)
 播………(946)
 bō 婺………(872)
 勃………(836)
 驳………(789)
 钹………(865)
 謁………(950)
 薄………(949)
 鹁………(912)
 舶………(898)
 bǒ 簸………(955)
 穧………(953)
 bǔ 卜………(647)

补………(794)
 捕………(861)
 铺………(870)
 bù 不………(692)
 布………(718)

[C]
 cā 擦………(952)
 cài 菜………(885)
 cān(shēn) 参
 ………(823)
 cán 蚕………(864)
 残………(839)
 cǎn 稔………(931)
 cāng 苍………(776)
 cāo 糟………(951)
 cáo 曹………(886)
 槽………(944)
 cǎo 草………(830)
 cè 侧………(811)
 薌………(831)
 cén 岑………(783)
 chā 叉………(682)
 插………(913)
 chá 茶………(832)
 搽………(913)
 (tú) 瘤………(936)
 察………(942)
 chà 差………(853)
 姥………(849)
 chái 柴………(862)
 豺………(870)
 蚕………(839)
 薺………(909)
 chǎi(zhǐ) 蔽
 ………(855)
 chán 蝉………(900)

缪………(896)
 缠………(933)
 蟬………(939)
 蟻………(955)
 chǎn 产………(768)
 铲………(897)
 chāng 昌………(808)
 菖………(884)
 cháng 长………(700)
 常………(894)
 chěng 敝………(919)
 chāo 超………(910)
 cháo 朝………(910)
 潮………(948)
 chē 车………(693)
 chě 扯………(782)
 chén 沉………(795)
 辰………(773)
 陈………(788)
 (qín) 稷………(886)
 檼………(929)
 chéng 承………(821)
 橙………(838)
 程………(920)
 澄………(948)
 橙………(950)
 chèng 秤………(864)
 chī 吃………(755)
 蚩………(862)
 豨………(871)
 痴………(933)
 chí 茛………(829)
 池………(773)
 匙………(888)
 chǐ 齿………(807)
 跛………(886)
 chì 赤………(777)

chōng 充 …… (768)	cū 粗 …… (905)	dào 盗 …… (905)
冲 …… (772)	cù 促 …… (845)	道 …… (924)
芫 …… (833)	醋 …… (945)	稻 …… (947)
chóng 虫 …… (754)	cuī 催 …… (932)	dé 德 …… (947)
chōu 抽 …… (805)	cuì 脆 …… (869)	dé(dí dì) 的
chóu 绸 …… (901)	翠 …… (941)	…… (812)
chǒu 丑 …… (706)	cún 蹤 …… (955)	dēng 灯 …… (769)
chòu 臭 …… (868)	cùn 寸 …… (664)	登 …… (923)
chū 出 …… (725)	cuò 搞 …… (946)	dǐ(dǐ) 底 …… (736)
初 …… (791)	撮 …… (955)	低 …… (784)
樗 …… (944)	cuò 厥 …… (860)	滴 …… (943)
濂 …… (925)	慥 …… (920)	dí 狄 …… (786)
chǔ 楮 …… (911)	【D】	髢 …… (930)
楚 …… (928)	dá 达 …… (752)	dǐ 底 …… (824)
(chù) 处 …… (737)	dǎ 打 …… (720)	dì 地 …… (744)
chù 蓄 …… (872)	dà 大 …… (657)	菂 …… (884)
chuān 川 …… (672)	dài 呆 …… (783)	帝 …… (850)
葬 …… (832)	dài 代 …… (727)	弟 …… (794)
穿 …… (851)	带 …… (836)	dīan 滇 …… (934)
chuàn 串 …… (783)	玳 …… (829)	顛 …… (950)
chuī 吹 …… (783)	璫 …… (925)	dīǎn 点 …… (840)
chuí 垂 …… (810)	躄 …… (946)	草 …… (885)
chūn 春 …… (828)	戴 …… (952)	dīān 堆 …… (839)
椿 …… (928)	黛 …… (953)	淀 …… (907)
chún 纯 …… (789)	dān 丹 …… (702)	殿 …… (933)
chuō 截 …… (954)	单 …… (826)	靛 …… (948)
cī 刺 …… (803)	dǎn 胆 …… (848)	蔽 …… (949)
cí 慈 …… (833)	dàn 蛋 …… (900)	diāo 刁 …… (650)
慈 …… (934)	淡 …… (906)	雞 …… (950)
磁 …… (938)	dāng 当 …… (756)	diào 吊 …… (754)
cì 次 …… (772)	铛 …… (896)	钓 …… (811)
刺 …… (803)	荔 …… (855)	diē 跌 …… (916)
cōng 荰 …… (776)	dǎng 挞 …… (936)	dié 迭 …… (810)
枞 …… (802)	dāo 刀 …… (650)	dīng 丁 …… (646)
葱 …… (908)	dǎo 倒 …… (867)	钉 …… (784)
cōng 丛 …… (737)	捣 …… (861)	dǐng 顶 …… (805)
cōu 裳 …… (950)		鼐 …… (916)

dìng 定………(825)

dōng 东………(719)

冬………(736)

dòng 冻………(794)

洞………(853)

dǒu 兜………(897)

兜………(936)

dòu 斗………(712)

豆………(780)

dū(dōu) 都…(857)

dú 毒………(828)

独………(847)

dǔ 笃………(845)

dù 杜………(779)

肚………(785)

妒………(789)

蠹………(957)

duān 端………(942)

duǎn 短………(919)

duàn 断………(905)

椴………(928)

煅………(934)

锻………(939)

duì 对………(739)

dūn 颓………(862)

钝………(842)

duō 多………(761)

duó 夺………(752)

duǒ 朵………(761)

duò 堕………(900)

【E】

ē 阿………(788)

ē 裳………(856)

峨………(862)

鵝………(920)

蛾………(931)

è 噩………(834)

(wù) 恶………(858)

餒………(870)

鄂………(888)

萼………(908)

ér 儿………(648)

耳………(747)

尔………(736)

èr 二………(646)

械………(928)

【F】

fā 发………(737)

法………(826)

fān 番………(922)

藩………(954)

翻………(954)

fán 犹………(805)

樊………(945)

蕃………(944)

繁………(953)

蠻………(956)

fǎn 反………(702)

返………(785)

fàn 饭………(786)

范………(800)

fāng 方………(711)

芳………(777)

fáng 防………(763)

房………(825)

fǎng 纺………(789)

fàng 放………(824)

fēi 飞………(682)

非………(807)

fēi 肥………(812)

fěi 榕………(936)

蜚………(938)

fèi 肺………(843)

fēn 分………(705)

fēn 粉………(802)

fěn 粪………(873)

fèn 肥………(924)

fēng 半………(695)

风………(702)

枫………(801)

蜂………(931)

féng 逢………(870)

fèng 凤………(703)

fó 菩………(774)

fū 夫………(688)

肤………(812)

fú 伏………(759)

凫………(761)

芙………(774)

扶………(782)

佛………(784)

苻………(800)

茯………(831)

氣………(842)

菟………(832)

浮………(878)

符………(897)

桴………(886)

菡………(908)

福………(934)

蜉………(931)

fǔ 抚………(782)

(fù) 父………(705)

釜………(870)

腐………(942)

fù 负………(761)

附………(789)

臤………(812)

贲………(832)

复	副	割	歌	谷
				(793)
蝶		革		鼓
				(927)
傅		格		穀
				(936)
富		葛		蠶
				(952)
復		隔		固
				(807)
腹		各		故
				(835)
覆		个		瓜
				(735)
蝮		蛤		栝
				(859)
馥		根		刮
				(811)
覆		更		蓏
				(936)
【G】		耿		挂
				(829)
gài 盖		耿		拐
				(805)
gān 干		梗		关
				(771)
甘		工		观
				(768)
肝		弓		官
				(825)
(gǎn) 杆		公		莞
				(856)
竿		功		管
				(939)
柑		宫		贯
				(821)
疳		汞		冠
				(850)
gǎn 赶		恭		灌
				(956)
感		共		罐
				(936)
橄		贡		光
				(755)
鳜		沟		广
				(683)
gāng 刚		勾		归
				(725)
钢		沟		龟
				(785)
gǎng 岗		(gǒu jǔ) 拘		鬼
				(845)
杠		钩		贵
				(841)
gāo 烙		苟		桂
				(858)
高		狗		桧
				(859)
膏		拘		滚
				(943)
gǎo 缟		沟		棍
				(911)
薰		姑		过
				(752)
gē 戈		骨		锅
				(920)
疙		鼙		国
				(807)
哥		古		虢
				(947)
				果
				(808)
				梆
				(911)

蝶………(939)

【H】

hái 孩………(849)

hǎi 海………(876)

hài 害………(874)

hān 蝙………(892)

憨………(947)

hán 含………(787)

寒………(923)

hàn 汉………(740)

汗………(772)

旱………(783)

菡………(885)

萏………(936)

héng 杠………(802)

hāo 蒜………(926)

薅………(949)

háo 号………(724)

蚝………(863)

毫………(902)

耗………(864)

濠………(953)

壕………(956)

hǎo 好………(763)

hē 呵………(808)

河………(794)

喝………(916)

hé 禾………(726)

合………(762)

河………(826)

和………(811)

荷………(856)

核………(860)

盍………(857)

hè 褐………(942)

鹤………(948)

hēi 黑………(916)

hén 痕………(903)

héng 恒………(850)

hōng 烘………(872)

hóng 红………(763)

洪………(853)

虹………(841)

荭………(832)

鸿………(906)

hóu 侯………(845)

候………(868)

喉………(916)

猴………(921)

螽………(931)

hòu 后………(761)

厚………(839)

hū 呼………(808)

胡同………(783)

胡………(835)

狐………(813)

壶………(857)

湖………(924)

蝴蝶………(946)

槲………(945)

猢狲………(921)

鹄………(920)

葫………(908)

hǔ 虎………(806)

琥珀………(907)

hù 互………(693)

茕茕………(740)

护………(782)

瓠………(886)

huā 花………(774)

huá 华………(760)

铧………(896)

滑………(925)

huà 画………(800)

化………(701)

桦………(801)

huái 怀………(793)

荪………(856)

淮………(906)

槐………(928)

槐………(950)

huán 还………(781)

环………(797)

huàn 涣………(878)

huáng 黄………(879)

huī 灰………(752)

徽………(953)

huí 回………(753)

茴………(831)

huǐ 鬼………(839)

榧………(952)

huì 会………(762)

秽………(896)

蕙………(944)

蠭………(954)

浑………(854)

混………(906)

(huān) 蕙………(944)

huó 活………(853)

huǒ 火………(711)

huò 货………(812)

霍………(950)

櫟………(952)

虧………(955)

【J】

jié 节………(741)

机………(751)

肌………(761)

鸡………(789)

枅	jié 夹	(753)	椒	jiāo 焦	(911)
基	jiāi 贻	(829)	焦	jiāo 焦	(921)
绩	jiǎ 甲	(723)	跤	jiāo 跤	(930)
犄	jiāng 槁	(936)	皎	jiǎo 皎	(939)
觭	jiāo 假	(897)	角	jiǎo 角	(786)
𠂔	jiān 尖	(756)	绞	jiǎo 绞	(849)
及	jiān 斫	(781)	脚	jiǎo 脚	(898)
吉	jiān 坚	(782)	搅	jiǎo 搅	(913)
急	jiān 兼	(873)	叫	jiào 叫	(725)
即	jiān 莞	(856)	茱	jiū 茱	(829)
唧	jiān 缢	(933)	较	jiào 较	(862)
螂	jiān 薜	(909)	嘉	jiā 嘉	(953)
羨	jiǎn 茹	(831)	阶	jiē 阶	(763)
棘	jiǎn 杋	(836)	接	jiē 接	(887)
載	jiǎn 蜜	(862)	节	jié 节	(713)
棘	jiǎn 窓	(867)	杰	jié 杰	(801)
載	jiǎn 碱	(938)	结	jiē 结	(849)
𦵯	jiǎn 简	(932)	桔	jú 桔	(859)
𧈧	jiǎn 剪	(904)	羯	jié 羯	(948)
芰	jiàn 见	(695)	截	jié 截	(926)
莽	jiàn 建	(820)	蛬	jié 蛛	(916)
济	jiàn 剑	(848)	解	jiě 解	(832)
洎	jiàn 精	(903)	介	jiè 介	(705)
既	jiàn 箭	(947)	芥	jiè 芥	(776)
冀	jiāng 江	(772)	疥	jiè 疥	(850)
卿	jiāng 姜	(852)	趼	jiè 跋	(863)
稷	jiāng 将	(853)	金	jīn 金	(816)
薺	jiāng 浆	(874)	津	jīn 津	(854)
载	jiāng 僵	(947)	筋	jīn 筋	(920)
寄	jǐng 精	(950)	瑾	jǐn 瑾	(885)
季	jǐng 降	(821)	锦	jǐn 锦	(931)
𢙏	jǐng 绳	(849)	槿	jǐn 槿	(944)
(xié)	jǐng 酱	(934)	蠉	jǐn 蠉	(952)
家	jiāo 交	(768)	进	jìn 进	(773)
葭	jiāo 荆	(833)	劲	jìn 劲	(789)
嘉	jiāo 骄	(850)	近	jìn 近	(785)
蝦	jiāo 胶	(869)	晋	jìn 晋	(858)

禁	(928)	juǎn 卷	(825)	寇	(904)
jīng 京	(823)	juàn 腾	(921)	蔻	(936)
茎	(800)	jué 决	(772)	枯	(836)
经	(823)	蕨	(944)	楛	(911)
荆	(829)	爵	(953)	苦	(797)
惊	(903)	櫻	(957)	暮	(856)
晶	(916)	jūn 君	(787)	窟	(934)
精	(943)	均	(779)	库	(792)
鲸	(951)	菌	(884)	块	(779)
jǐng 井	(684)	皲	(904)	宽	(874)
景	(916)	jùn 峻	(862)	款	(910)
jìng 净	(826)	菌	(939)	矿	(805)
镜	(950)			犷	(811)
jīng 鸡	(786)			虧	(779)
櫟	(945)	kǎ(qiǎ) 卡	(721)	盔	(886)
jǐu 九	(648)	kāi 开	(684)	奎	(839)
久	(674)	kǎn 坎	(779)	葵	(909)
灸	(786)	砍	(839)	揆	(913)
韭	(840)	kān 看	(841)	魁	(932)
酒	(875)	kōng 空	(953)	坤	(801)
jǐu 柏	(859)	kào 靠	(947)	昆	(808)
救	(887)	kē 科	(845)	髡	(930)
jù 拒	(782)	柯	(836)	捆	(861)
狙	(813)	蚘	(892)	虧	(923)
拘	(805)	渴	(925)	虧	(916)
楨	(838)	頰	(938)	虧	(895)
鞠	(952)	隘	(946)	(guǎ) 蕉	(936)
jú 橘	(949)	kě 可	(715)		
菊	(885)	kè 克	(781)		
jǔ 矩	(842)	刻	(824)	拉	(805)
棋	(911)	客	(851)	喇	(916)
蒟	(927)	kōng 空	(825)	腊	(921)
jù 巨	(693)	kǒng 孔	(709)	蜡	(938)
苴	(774)	kǒu 茄	(777)	辣	(942)
矩	(842)	kǒu 口	(665)	来	(782)
锯	(931)	kǒu 扣	(752)	菜	(856)
聚	(936)	叩	(725)	熟	(936)

lài 赖	（929）	léi 簠	（950）	léi 脆	（833）
癞	（954）	藜	（953）	寥	（942）
lán 兰	（740）	薰	（956）	寮	（948）
拦	（806）	蠟	（956）	liǎo 了	（650）
婪	（886）	狸	（869）	蓼	（936）
蓝	（925）	里	（783）	鶴	（952）
澜	（948）	李	（779）	liào 料	（874）
lán 檬	（928）	理	（898）	烈	（861）
缆	（923）	鲤	（947）	莉	（829）
懒	（951）	醴	（756）	裂	（913）
làn 烂	（850）	立	（739）	lín 林	（801）
滥	（935）	力	（650）	临	（840）
láng 狼	（869）	利	（784）	麟	（956）
郎	（825）	沥	（794）	líng 灵	（787）
(liáng) 莠	（856）	丽	（781）	菱	（800）
榔	（911）	栎	（838）	玲	（829）
螂	（939）	荔	（832）	凌	（874）
榔	（931）	蛎	（892）	陵	（870）
láo 劳	（777）	粒	（905）	铃	（867）
痨	（923）	瘤	（923）	皎	（950）
虧	（930）	lián 连	（782）	菱	（878）
lǎo 老	（741）	莲	（855）	弄	（904）
酩	（929）	联	（910）	龄	（913）
lè 乐	（738）	廉	（933）	零	（930）
(jìn) 犯	（811）	濂	（951）	líng 岭	（810）
勒	（953）	餗	（954）	领	（900）
(lēi) 勒	（886）	蠛	（955）	liú 刘	（768）
éi 雷	（929）	lián 练	（850）	流	（878）
lèi 类	（853）	棟	（928）	留	（869）
éng(líng) 棱		炼	（822）	硫	（913）
		liáng 良	（793）	蟠	（950）
lěng 冷	（794）	凉	（874）	liǔ 柳	（837）
lí 离	（872）	梁	（906）	liù (lù) 六	（711）
骊	（871）	liǎng 两	（781）	lóng 龙	（718）
梨	（895）	liàng 亮	（860）	茏	（799）
犁	（895）	liáo 辽	（738）	笼	（897）
黎	（947）	疗	（793）	聋	（886）

lěng 蟾………(886)
 lóu 楼………(913)
 líu 萎………(909)
 楼………(929)
 蝼………(946)
 liú 漏………(943)
 lú 卢………(723)
 芦………(777)
 庐………(793)
 炉………(825)
 胪………(892)
 lù 鹿………(902)
 禄………(923)
 路………(930)
 蕗………(949)
 濂………(951)
 鹭………(954)
 露………(956)
 陆………(788)
 lǚ 裂………(909)
 驴………(789)
 lǚ 吕………(754)
 稽(稽)………(953)
 蕙………(953)
 lǜ 绿………(901)
 luān 奄………(942)
 luǎn 卵………(786)
 luàn 亂………(784)
 luè 略………(888)
 lún 轮………(806)
 lún 绡………(789)
 luó 罗………(803)
 夢………(884)
 锣………(931)
 箩………(839)
 螺………(952)
 luǒ 裸………(934)

luò 淈………(827)
 洛………(854)
 络………(849)
 (là) 落………(909)

【M】
 mā 妈………(763)
 mǎ 麻………(902)
 mǎ 马………(679)
 吗………(756)
 玛………(774)
 码………(805)
 妈………(841)
 mǎo 骂………(841)
 mǎi 卖………(833)
 mài 麦………(773)
 mó 蛮………(923)
 漫………(941)
 mǎn 满………(935)
 mǎn 曼………(888)
 蔓………(936)
 máng 芒………(741)
 穉………(897)
 mǎng 莽………(855)
 māo 猫………(900)
 máo 毛………(695)
 茅………(800)
 mǎo 有………(693)
 mào 苗………(790)
 冒………(840)
 帽………(919)
 撲………(929)
 méi 玫………(797)
 眉………(849)
 梅………(886)
 煤………(933)
 měi 美………(852)

mèi 昧………(840)
 mēn 闷………(793)
 mén 门………(684)
 贊………(957)
 mēng 蒙………(927)
 méng 蒙………(841)
 萌………(856)
 萌………(884)
 měng 猛………(900)
 mèng 孟………(821)
 梦………(886)
 mǐ 莜………(909)
 mí 猕………(900)
 靡………(956)
 迷………(853)
 mǐ 米………(771)
 mì 蜜………(942)
 密………(904)
 mián 缠………(901)
 棉………(911)
 撋………(945)
 婳………(946)
 miǎn 缅………(923)
 miàn 面………(838)
 miǎo 蕴………(952)
 miè 猥………(936)
 襪………(949)
 餚………(953)
 mínl 峴………(809)
 mǐn 闽………(850)
 míng 明………(803)
 鸣………(808)
 mó 模………(937)
 茗………(832)
 mó 膜………(939)
 摩………(948)
 mó 磨………(951)

藉………(955)
 mò 没………(795)
 墨………(946)
 末………(713)
 茉………(797)
 mǔ 母………(738)
 牡………(784)
 mù 木………(690)
 沐………(794)
 目………(723)
 苗………(799)
 墓………(926)

【N】

ná 拿………(870)
 nà 纳………(789)
 纳………(900)
 nǎi 乃………(651)
 奶………(737)
 nài 奈………(804)
 耐………(839)
 nán 南………(834)
 nàn 难………(871)
 náng 裳………(956)
 nǎo 脑………(869)
 nǎo 揪………(825)
 nè 讷………(769)
 nèi 内………(695)
 nèn 嫩………(941)
 néng 能………(871)
 ní 尼………(737)
 泥………(827)
 倪………(868)
 nǐ 拟………(782)
 nì 溺………(935)
 溺………(932)
 niǎn 掇………(805)

撻………(946)
 nián 年………(756)
 niān 廿(廿)
 …………(656)
 niǎn 捻………(887)
 niǎo 鸟………(737)
 鸟………(800)
 niào 尿………(787)
 niè 涅………(876)
 蔡………(955)
 níng 宁………(739)
 柠………(838)
 niú 牛………(698)
 niǔ 扭………(782)
 钮………(842)
 nóng 农………(769)
 浓………(854)
 nòng 弄………(773)
 nú 奴………(737)
 nǔ 努………(789)
 nǚ 女………(682)
 nüè 疙………(824)
 nuò 懂………(956)

【O】

ò (ō è) 噢
 …………(862)
 ōu 欧………(806)
 ōu 蘑………(953)
 偶………(897)

【P】

pá 杷………(802)
 爬………(812)
 趴………(864)
 馑………(842)
 pà 怕………(825)

帕………(809)
 pái 徨………(898)
 牌………(920)
 pǎi 排………(887)
 pān 潘………(948)
 攀………(955)
 pán 盘………(898)
 蟠………(954)
 páng 旁………(872)
 螺………(950)
 膞………(954)
 pāo 抛………(782)
 pāo 袍………(886)
 pào 泡………(827)
 炮………(850)
 pèi 佩………(811)
 pēn 噴………(916)
 pén 盆………(848)
 péng 朋………(812)
 蓬………(926)
 鹏………(932)
 膨………(950)
 pī 披………(805)
 硏………(939)
 pí 皮………(737)
 批………(802)
 啼………(841)
 蝶………(939)
 黑………(939)
 椅………(911)
 脾………(921)
 蟠………(892)
 pǐ 嫒………(947)
 pì 屁………(787)
 piān 偏………(897)
 piān 片………(701)
 piāo 漂………(948)

蝶	(952)	qí 齐	(768)	焚	(776)
藻	(952)	奇	(804)	蒨	(926)
píao 飘	(950)	其	(800)	qiāng 羌	(794)
pǐn 品	(841)	芪	(776)	枪	(802)
pīn 牝	(757)	祁	(768)	蜣	(931)
píng 平	(721)	脐	(869)	qiáng 强	(922)
坪	(801)	蛟	(863)	墙	(936)
苹	(799)	(wāi kuí) 蜈(909)	璫	(952)
屏	(849)	棋	(911)	qiāo 雀	(894)
瓶	(873)	琪	(907)	qiáo 乔	(757)
萍	(885)	(jī) 魑	(932)	莽	(831)
pō 泼	(827)	蜞	(938)	qiào 峭	(862)
坡	(801)	蕲	(944)	(ké) 壳	(779)
pó 婆	(906)	麒	(955)	qié 伽	(785)
婆	(936)	(jī) 蕉	(926)	qiè 窃	(852)
pò 朴	(750)	乞	(671)	鄒	(820)
迫	(812)	企	(762)	qīn 棋	(886)
破	(861)	芑	(741)	qín 芹	(776)
pū 扑	(721)	杞	(780)	秦	(854)
铺	(919)	起	(857)	荟	(885)
(pú) 仆	(701)	气	(700)	琴	(907)
pú 匍	(846)	弃	(793)	孳	(944)
匐	(893)	掐	(887)	勤	(928)
(bèi) 褐	(885)	千	(670)	qīng 青	(795)
蒲	(927)	芊	(741)	轻	(840)
濮	(953)	牵	(839)	清	(905)
pǔ 普	(924)	挺	(839)	蜻	(938)
蹊	(955)	扦	(752)	qǐng 镶	(885)
(bù) 埔	(857)	铅	(867)	蒜	(927)
pù (bào) 曝	(955)	蔞	(884)	苘	(799)
【Q】					
qǐ 七	(646)	前	(853)	邛	(714)
黍	(886)	钳	(865)	穷	(794)
萋	(881)	钱	(864)	穹	(825)
漆	(943)	潜	(948)	琼	(907)
械	(944)	茜	(829)	蛩	(910)
		纤	(768)	蟾	(950)
				丘	(727)

邱	（785）	rǎo	绕	（849）	sè	色	（761）
蚯	（892）	rě	惹	（908）	zhuì	涩	（878）
秋	（845）	rè	热	（861）	sēn	森	（911）
械	（928）	rén	人	（647）	shā	沙	（794）
qiú 求	（782）		仁	（701）		砂	（839）
机	（750）	rěn	忍	（789）		痧	（923）
茵	（799）		葱	（856）		栎	（859）
球	（878）		荏	（832）		葵	（832）
qiú 萍	（855）	rì	日	（694）	shài	晒	（862）
qū 屈	（821）	róng	戎	（752）	shǎi (tóu)	骰	
驱	（789）		茸	（829）			（930）
蟠	（916）		荣	（833）	shān	山	（665）
qú 胸	（848）		绒	（849）		珊	（829）
渠	（906）	róu	柔	（850）	shǎn	闪	（739）
蘧	（955）	ròu	肉	（754）		陕	（821）
瞿	（954）	rú	如	（763）	shàn	扇	（872）
qǔ 曲	（753）		茹	（832）		善	（924）
取	（800）		乳	（820）	shāng	商	（903）
苣	（774）	rù	入	（647）	shàng	上	（664）
qù 去	（714）	ruǎn	软	（806）	shāo	烧	（872）
quān 橙	（912）	ruì	芮	（774）	sháo	芍	（741）
quán 泉	（845）		锐	（920）		茗	（800）
拳	（873）		瑞	（925）		翫	（942）
荃	（832）	rùn	润	（878）	shǎo (shǎo)	少	
铨	（896）	ruò	若	（939）			（695）
蟠	（939）		若	（911）	shé	蛇	（892）
全	（762）				shè	蔑	（833）
quǎn 犬	（693）					(xǔ) 蕉	（856）
quē 缺	（864）	sā	撒	（946）		射	（869）
què 鹊	（927）	sài	赛	（912）		摄	（929）
却	（779）		塞	（934）		栎	（936）
qún 裙	（923）	sān	三	（651）		麻	（956）
群	（933）	snǎ	伞	（762）	shēn	伸	（723）
		sàn	散	（910）		伸	（784）
		sāng	桑	（871）		参	（823）
		sǎo	扫	（752）		深	（907）
			癌	（942）	shén	神	（861）

(shí) 什 … (701)	柿 … … … (838)	sī 恩 … … … (841)
shěn 莎 … … (857)	shǒu 热 … … (947)	丝 … … … (738)
shèn 肾 … … (807)	shǒu 手 … … (695)	斯 … … … (910)
榦 … … … (928)	守 … … … (769)	(cí) 犄 … (937)
(rèn) 蕾 … (908)	首 … … … (853)	sǐ 死 … … … (752)
shēng 生 … … (725)	shòu 寿 … … (773)	sì 四 … … … (723)
升 … … … (700)	兽 … … … (905)	汜 … … … (773)
shéng 绳 … … (901)	绶 … … … (901)	泗 … … … (827)
shěng 省 … … (341)	瘦 … … … (942)	兜 … … … (783)
shèng 圣 … … (739)	shū 书 … … (709)	sōng 松 … … … (802)
胜 … … … (848)	姝 … … … (849)	菘 … … … (884)
盛 … … … (886)	枢 … … … (801)	sòng 宋 … … … (794)
shī 失 … … (726)	舒 … … … (922)	sōu 搜 … … … (913)
虱 … … … (821)	疏 … … … (923)	sòu 噎 … … … (938)
蓬 … … … (908)	蔬 … … … (944)	sū 苏 … … … (776)
狮 … … … (847)	菽(赤) … (884)	酥 … … … (912)
(chí) 驰 … (946)	shú 熟 … … (947)	sù 素 … … … (855)
湿 … … … (925)	shǔ 孺 … … (920)	粟 … … … (912)
施 … … … (850)	属 … … … (922)	(xiǔ xiù) 宿
旆 … … … (909)	鼠 … … … (932)	… … … (904)
shí 十 … … … (646)	譖 … … … (927)	suān 酸 … … … (937)
石 … … … (715)	蜀 … … … (930)	suàn 箔 … … … (867)
识 … … … (794)	署 … … … (930)	蒜 … … … (925)
实 … … … (825)	薯 … … … (949)	suī 萎 … … … (856)
食 … … … (849)	shù 树 … … (838)	萎 … … … (856)
蚀 … … … (848)	(zhú) 术 … … (715)	蕪 … … … (908)
蔚 … … … (856)	竖 … … … (840)	suí 随 … … … (900)
眞 … … … (956)	(lù) 蓼 … … (884)	suì 碎 … … … (929)
shǐ 矢 … … (726)	shuā 刷 … … (821)	sǔn 损 … … … (861)
史 … … … (724)	shuān 栓 … … (859)	筭 … … … (867)
豕 … … … (781)	shuāng 双 … … (709)	suō 娑 … … … (878)
使 … … … (811)	霜 … … … (952)	梭 … … … (886)
屎 … … … (849)	shuǐ 水 … … (706)	杪 … … … (886)
shǐ 士 … … (656)	shùn 顺 … … (845)	缩 … … … (941)
示 … … … (713)	舜 … … … (922)	(shā) 莎 … (857)
试 … … … (825)	shuò 硕 … … (886)	suǒ 索 … … … (858)
(zhè) 艳 … (952)	蒴 … … … (927)	琐 … … … (878)

锁	tiǎn	忝	𠙴
【T】	tiáo	条	蓆
tā 塌	(diào)	调	调
tā 塔	tiào	跳	跳
(tā) 蕃	tiē(tiě)	贴	贴
tāi 胎			(786)
tái 台	tiě	铁	豚(肫)
tài 太	tíng	厅	厅
泰	tíng	亭	脱
tān 滩	tǐng	挺	脱
tán 潭	tōng	通	陀
檀	tóng	同	橐
tǎn(xún) 蘑(蓆)		桐	椭
.....		童	(911)
tàn 炭		童	
tāng 汤		铜	
tāng 搪		潼	
tāng 唐	tǒng	筒(箫)	窟
蕃		挖
塘		箫	娃
糖	tōu	偷	瓦
棠	tóu	头	腽
蠟		骰	外
tàng 烫	tòu	透	弯
táo 桃	tū	秃	蜿
胸		突	(蜿)
胸	tú	荼	宛
téng 藤		稌	晚
tī 梯		蕪	万
tí 提		榦	汪
蹄	tǔ	土	王
tì 剃		吐	蛭
tiān 天	tù	菟	枉
tiān 田		兔	网
甜	tuān	团	忘
	tuī	推	望
			威

(wěi) 委……(811)	wú 无……(684)	郤 (隙)……(849)
焜……(933)	芜……(774)	蕡……(944)
葳……(908)	吴……(783)	槃……(952)
微……(932)	蜋……(930)	xiā 虾……(841)
薇……(949)	梧……(886)	瞎……(946)
(huài) 蔽……(956)	鼯……(956)	蝦……(953)
wéi 蔚……(950)	wǔ 午……(698)	狹……(846)
(wěi) 萎……(884)	五……(689)	遽……(944)
醜……(955)	武……(797)	霞……(952)
wěi 芳……(777)	wù 戊……(718)	xià 下……(656)
苇……(774)	物……(811)	夏……(860)
尾……(787)	雾……(929)	xiān 仙……(727)
wèi 卫……(674)	【X】	
未……(713)	xī 夕……(674)	鲜……(939)
昧……(808)	西……(748)	暹……(946)
蘖……(884)	吸……(755)	纤……(767)
蔚……(936)	希……(787)	xián 咸……(838)
猾……(921)	奚……(870)	涎……(854)
wēn 温……(924)	菥……(884)	xiǎn 显……(840)
韞……(950)	犀……(922)	蚬……(863)
wén 文……(710)	稀……(920)	xiān 觅……(774)
纹……(789)	锡……(931)	线……(821)
蚊……(863)	溪……(935)	腺……(932)
wěn 稳……(939)	豨……(933)	xiāng 香……(842)
wèn 问……(769)	蟋……(953)	(xiāng) 相……(836)
汝……(795)	xí 习……(682)	湘……(824)
wēng 翁……(870)	蔽……(949)	箱……(947)
wō 倭……(867)	xǐ 洗……(854)	xiáng 样……(873)
窩……(924)	枲……(850)	xiǎng 响……(841)
蜗……(931)	蕡……(909)	xiàng 向……(759)
wò 沃……(795)	喜……(909)	象……(921)
卧……(806)	螭……(954)	蠟……(954)
握……(913)	xì 戏……(768)	削……(841)
渥……(925)	系……(786)	消……(876)
wū 乌……(703)	细……(822)	逍……(864)
蔚……(855)	(qiè) 鄙……(820)	硝……(913)
尾……(849)		龌……(938)
		梢……(911)

蟠	(952)	xú 徐	(869)	yà 亞	(750)
蘿	(956)	xǔ 蕭	(856)	研	(839)
xǐo 小	(674)	xù 序	(793)	yān 咽	(841)
肖	(783)	叙	(848)	烟	(872)
xìo 孝	(779)	翼	(884)	膾	(869)
笑	(867)	续	(900)	閼	(903)
xiē 蝋	(946)	絮	(923)	yán 炎	(825)
xié 協	(750)	蓄	(926)	严	(779)
鞋	(945)	xuān 宣	(851)	(yuán) 荑	(774)
燭	(872)	萱	(909)	延	(758)
xiè 泻	(828)	谖	(904)	沿	(827)
蟹	(955)	xuán 玄	(739)	岩	(809)
榭	(937)	悬	(887)	莲	(832)
薤	(949)	(xuàn) 旋	(903)	盐	(867)
xīn 心	(712)	xuǎn 癜	(955)	檐	(952)
辛	(792)	xuǎn 缠	(941)	塙	(952)
新	(933)	xuē 靴	(927)	塈	(946)
xìn 信	(845)	xuě 雪	(887)	筵	(920)
狹	(761)	xuè 血	(758)	艇	(916)
xīng 星	(840)	xūn 薰	(939)	塈	(913)
(xīng) 兴	(772)	薰	(952)	yān 窓	(824)
猩	(921)	xún 寻	(762)	蠅	(946)
钖	(762)	巡	(768)	眼	(888)
xǐng 醒	(950)	鲟	(939)	yàn 艳	(864)
xìng 杏	(779)	浔	(859)	晏	(862)
xiōng 莩	(741)	蓆	(926)	雁	(912)
xióng 雄	(913)	【Y】		燕	(948)
熊	(941)	yā 丫	(684)	yāng 秧	(864)
xiū 休	(759)	压	(751)	yáng 羊	(769)
修	(845)	押	(805)	阳	(763)
羞	(873)	鴟	(840)	扬	(752)
xiù 秀	(784)	鵠	(863)	杨	(780)
绣	(871)	yá 牙	(693)	洋	(854)
锈	(920)	芽	(774)	yǎng 养	(853)
xū 眇	(809)	崖	(894)	痒	(903)
须	(846)	yǎ 雅	(913)	yàng 样	(860)
虚	(887)			yǎo 腰	(932)

么	………(674)	异	………(762)	yōu	优	………(759)
喫	………(916)	益	………(873)	yóu	尤	………(693)
要	………(908)	葵	………(856)	由	………(723)	
yáo	瑶	鵠(鶴)	………(946)	油	………(826)	
遥	………(933)	蕙	………(949)	莜	………(856)	
谣	………(932)	翳	………(952)	游	………(925)	
摇	………(929)	翼	………(953)	yǒu	有	………(752)
尧	………(752)	蕤	………(954)	莠	………(856)	
姚	………(849)	蘋	………(956)	yòu	幼	………(738)
yāo	要	yīn	因	抽	………(836)	
药	………(832)	茵	………(831)	yú(yú)	於	………(824)
yē	耶	阴	………(763)	纤	………(763)	
yě	也	殷	………(869)	yú	余	………(787)
野	………(888)	yín	吟	于	………(653)	
yè	夜	银	………(896)	鱼	………(812)	
叶	………(724)	淫	………(906)	禺	………(808)	
腋	………(921)	yǐn	引	薁	………(885)	
液	………(906)	虯	………(863)	榆	………(929)	
yī	一	螭	………(953)	蕘	………(944)	
衣	………(768)	yìn	印	羽	………(768)	
伊	………(761)	yīng	应	禹	………(845)	
医	………(781)	英	………(799)	雨	………(800)	
蟒	………(916)	莺	………(856)	yù	玉	………(712)
yí	夷	墨	………(939)	芋	………(740)	
宜	………(825)	纓	………(941)	育	………(824)	
饴	………(813)	樱	………(944)	郁	………(804)	
姨	………(849)	鹰	………(954)	浴	………(878)	
移	………(859)	yíng	迎	预	………(871)	
移	………(896)	荧	………(833)	椿	………(859)	
精	………(905)	萤	………(885)	薜	………(884)	
蛺	………(950)	营	………(885)	蜮	………(885)	
yǐ	乙	蠅	………(939)	御	………(898)	
蔽	………(777)	yìng	映	裕	………(923)	
倚	………(867)	硬	………(912)	寓	………(924)	
蚁	………(841)	yōng	痈	yuān	鼋	………(806)
yǐ	刈	永	………(739)	鸳	………(870)	
蔚	………(776)	蛹	………(931)	(yuǎn)	螽	………(936)

yuán 元………(685)
 圆………(783)
 圆………(862)
 原………(860)
 原………(925)
 缘………(923)
 yuǎn 远………(774)
 yuè 月………(702)
 粤………(920)
 越………(910)
 榆………(949)
 yún 云………(688)
 芸………(774)
 匀………(705)

【Z】

zā 扎………(692)
 zá 杂………(761)
 zāi 栽………(857)
 zài 再………(750)
 (zài) 载………(857)
 zān 簪………(954)
 zān 饰………(950)
 zàng 藏………(951)
 zǎo 早………(753)
 枣………(803)
 蚢………(850)
 簇………(952)
 藻………(955)
 zào 灶………(793)
 皂………(785)
 燥………(956)
 zé 泽………(828)
 则………(754)
 zéi 鳌………(939)
 zhā(cha) 植………(928)
 zhǎ 鳅………(933)

zhà 蚝………(892)
 (zhā) 菘………(832)
 zhāi 摘………(933)
 zhái 宅………(769)
 zhǎi 窄………(874)
 zhān 毡………(842)
 (nián) 粘………(904)
 旗………(872)
 纓………(903)
 搞………(937)
 蟾………(956)
 zhǎn 斩………(806)
 展………(870)
 zhàn 占………(722)
 样………(836)
 湛………(924)
 鮳………(913)
 zhāng 张………(788)
 章………(786)
 (yàng tāng) 肴
(908)
 猪………(939)
 潼………(943)
 彰………(942)
 樟………(945)
 蟬………(953)
 zhǎng 长………(700)
 掌………(919)
 zhàng 丈………(664)
 胀………(812)
 zhāo 朝………(910)
 昭………(840)
 zhǎo 爪………(702)
 zhào 照………(930)
 肇………(942)
 zhē 折………(782)
 猥(猥)………(952)

zhě 茶………(945)
 稠………(951)
 zhè 柘………(836)
 浙………(876)
 zhēn 贞………(753)
 针………(784)
 真………(860)
 檳………(859)
 蔴………(908)
 zhěn 枕………(803)
 珍………(829)
 zhèn 震………(946)
 镇………(947)
 zhēng 正………(714)
 蒸………(926)
 zhěng 整………(950)
 zhī 支………(692)
 巍………(735)
 只………(724)
 芝………(741)
 知………(810)
 枝………(801)
 脂………(869)
 蚱………(863)
 蜘………(939)
 zhí 直………(800)
 zhǐ 止………(694)
 正………(774)
 纸………(789)
 枢………(840)
 枢………(836)
 指………(839)
 横………(928)
 zhì 至………(752)
 志………(779)
 治………(827)
 炙………(815)

制	………(810)	憾	………(954)	自	………(758)
致	………(862)	zhǔ 主	………(739)	zōng 棕	………(912)
智	………(919)	煮	………(910)	(cōng) 窜	………(955)
蛭	………(916)	zhù 芝(荸)	………(777)	纵	………(789)
雉	………(931)	纻	………(789)	粽	………(943)
(zì) 窜	………(932)	紵	………(823)	菹	………(885)
zhōng 中	………(694)	苧	………(800)	菹(菹)	………(909)
忠	………(808)	桂	………(838)	zuān 钻	………(865)
钟	………(842)	zhuā 抓	………(782)	zuì 醉	………(946)
终	………(823)	zhuǎn (zhuàn) 转	………(806)	zuō 酢(醢)	………(954)
葬	………(885)	zhuāng 庄	………(768)	(jí) 茱	………(908)
zhǒng 肿	………(812)	zhuàng 壮	………(772)	zuó 昨	………(840)
种	………(844)	zhuī 追	………(846)	zuǒ 左	………(717)
zhòng 众	………(762)	锥	………(931)	佐	………(784)
(chóng) 重	………(842)	zhuō 卓	………(807)	zuò 坐	………(787)
zhōu 周	………(812)	拙	………(505)		
zhǒu 帛	………(821)	捉	………(861)		
zhòu 皱	………(870)	桌	………(862)		
zhū 朱	………(756)	zhuó 啄	………(862)		
茱	………(831)	(zhào) 獐	………(900)		
珠	………(855)	zī 资	………(874)		
硃	………(887)	滋	………(925)		
诸	………(872)	zǐ 子	………(679)		
猪	………(898)	(cí) 茬	………(830)		
zhú 竹	………(757)	籽	………(853)		
竺	………(811)	紫	………(913)		
逐	………(861)				
蘧	………(925)				

【查无读音字】

畀	………(739)
炳	………(850)
黄(蕡)	………(829)
櫟	………(860)
璫	………(912)
蔞	………(936)
釐	………(952)
箇	………(950)
饗	………(957)

制	………(810)	憾	………(954)	自	………(758)
致	………(862)	zhǔ 主	………(739)	zōng 棕	………(912)
智	………(919)	煮	………(910)	(cōng) 窜	………(955)
蛭	………(916)	zhù 芝(荸)	………(777)	纵	………(789)
雉	………(931)	纻	………(789)	粽	………(943)
(zì) 窜	………(932)	紵	………(823)	菹	………(885)
zhōng 中	………(694)	苧	………(800)	菹(菹)	………(909)
忠	………(808)	桂	………(838)	zuān 钻	………(865)
钟	………(842)	zhuā 抓	………(782)	zuì 醉	………(946)
终	………(823)	zhuǎn (zhuàn) 转	………(806)	zuō 髯(齶)	………(954)
葬	………(885)	zhuāng 庄	………(768)	(jí) 茱	………(908)
zhěng 肿	………(812)	zhuàng 壮	………(772)	zuó 昨	………(840)
种	………(844)	zhuī 追	………(846)	zuǒ 左	………(717)
zhòng 众	………(762)	锥	………(931)	佐	………(784)
(chóng) 重	………(842)	zhuō 卓	………(807)	zuò 坐	………(787)
zhōu 周	………(812)	拙	………(505)		
zhǒu 帽	………(821)	捉	………(861)		
zhòu 皱	………(870)	桌	………(862)		
zhū 朱	………(756)	zhuó 啄	………(862)		
茱	………(831)	(zhào) 獐	………(900)		
珠	………(855)	zī 资	………(874)		
硃	………(887)	滋	………(925)		
诸	………(872)	zǐ 子	………(679)		
猪	………(898)	(cí) 茬	………(830)		
zhú 竹	………(757)	籽	………(853)		
竺	………(811)	紫	………(913)		
逐	………(861)				
蘧	………(925)				

【查无读音字】

畀	………(739)
炳	………(850)
黄(蕡)	………(829)
櫛	………(860)
璫	………(912)
蔞	………(936)
釐	………(952)
箇	………(950)
饗	………(957)

制	………(810)	憾	………(954)	自	………(758)
致	………(862)	zhǔ 主	………(739)	zōng 棕	………(912)
智	………(919)	煮	………(910)	(cōng) 窜	………(955)
蛭	………(916)	zhù 芝(荸)	………(777)	纵	………(789)
雉	………(931)	纻	………(789)	粽	………(943)
(zì) 窜	………(932)	紵	………(823)	菹	………(885)
zhōng 中	………(694)	苧	………(800)	菹(菹)	………(909)
忠	………(808)	桂	………(838)	zuān 钻	………(865)
钟	………(842)	zhuā 抓	………(782)	zuì 醉	………(946)
终	………(823)	zhuǎn (zhuàn) 转	………(806)	zuō 酢(醢)	………(954)
葬	………(885)	zhuāng 庄	………(768)	(jí) 茱	………(908)
zhěng 肿	………(812)	zhuàng 壮	………(772)	zuó 昨	………(840)
种	………(844)	zhuī 追	………(846)	zuǒ 左	………(717)
zhòng 众	………(762)	锥	………(931)	佐	………(784)
(chóng) 重	………(842)	zhuō 卓	………(807)	zuò 坐	………(787)
zhōu 周	………(812)	拙	………(505)		
zhǒu 帽	………(821)	捉	………(861)		
zhòu 皱	………(870)	桌	………(862)		
zhū 朱	………(756)	zhuó 啄	………(862)		
茱	………(831)	(zhào) 獐	………(900)		
珠	………(855)	zī 资	………(874)		
硃	………(887)	滋	………(925)		
诸	………(872)	zǐ 子	………(679)		
猪	………(898)	(cí) 茬	………(830)		
zhú 竹	………(757)	籽	………(853)		
竺	………(811)	紫	………(913)		
逐	………(861)				
蘧	………(925)				

【查无读音字】

畀	………(739)
炳	………(850)
黄(蕡)	………(829)
櫛	………(860)
璫	………(912)
蔞	………(936)
釐	………(952)
箇	………(950)
饗	………(957)