《中药材及饮片原色图鉴》编审委员会

主　编　张贵君

副主编（以姓氏笔画为序）

孔增科　田中俊弘　刘　琦　纪俊元　张淑芝
金哲雄　倪国成　盖　锋　廉立华　翟延君
缪细泉

分卷副主编　于立河　史艳香　李一奎

编著者（以姓氏画划为序）

丁志建　于立河　山本洋一　王　静　王汉章
王荣祥　孔增科　田中俊弘　史艳香　刘　力
刘　捷　刘　琦　刘振亚　纪士超　纪俊元
李一奎　吴　谦　宋庆平　张贵君　张崇宁
张淑芝　张景龙　金哲雄　竺叶青　贾天柱
倪国成　钱　海　盖　锋　程　强　程瑞生
廉立华　褚小兰　翟延君　缪细泉

主　审　徐国钧　王孝涛　范崔生

顾　问　栗德林　邓明鲁　高士贤　张　政　李鸿超
陈瑞华　水野瑞夫

总　　目

前言 …… (2)
序言 …… (3)
致读者 …… (4)
凡例 …… (5)
中药名细目 …… (7)
正文 …… (14)
附录　中药材的采收、产地加工与炮制 …… (532)
中文名索引 …… (538)
药材拉丁名索引 …… (551)
药材汉语拼音索引 …… (558)
动植物学名索引 …… (565)
药材英文名索引 …… (575)
药材日文名索引 …… (582)

前　言

中药是人类医疗保健事业中不可缺少的重要组成部分，是中国药学之精华。随着科学的发展和时代的变迁，中药已为世人所瞩目。

由于中药的来源和产地广泛，以及其流通领域的不断扩大，中药材的品种及商品鉴定日趋复杂，对中药材及其饮片采用图文并重的鉴定方法极为必要。然而，在国内已出版的中药鉴定书籍中，以标准原色图鉴为内容的尚见一斑。

本书的出版，对中药材及其饮片的鉴别、澄清中药混乱品种，促进中药材商品化和国际化，将起到积极的作用。

《中药材及饮片原色图鉴》广收中药材及其饮片几千种，以彩图和文字描述，通俗而真实地反映了其鉴定特征。为了比较鉴定和使中药统一化，其中附载了部分日本等国所产的常用中药。

本书由黑龙江中医学院、辽宁中医学院、长春中医学院、上海中医药大学、江西中医学院、黑龙江商学院、中国药科大学、中国中医研究院、邯郸市药品检验所、通化东宝药业集团、哈尔滨市药材公司、佳木斯市中医院等单位参加编纂，并特邀日本岐阜药科大学水野瑞夫学长、田中俊弘助教授、日本制药山本洋一先生等近40名专家、学者通力合作完成。本书所载药材品种均系选择具有代表性的药材及饮片进行实物拍摄和描述的，并注重了商品流通中的不同规格和某些道地药材的收载。每个品种的文字叙述包括名称（中文名、汉语拼音、拉丁名、日文名和英文名）、来源、产地加工、炮制、性状和功效，简明扼要。所收彩图一般均为一名一图。本书是一部大型的中药鉴定专著，是中医药人员和广大群众的必备参考书。

协助本书编写的还有黑龙江中医学院（91）资源专业学生李影、顾剑昆、张生军、康永弟、刘玉斌、沙延生、徐艳君以及黑龙江商学院刘建君等。编著者宋庆平、程强为摄影工作者。

本书在编写过程中，得到了国内参编单位和日本大阪、名古屋生药界人士的大力支持，黑龙江中医研究院傅克治研究员的指导，在此，一并致以衷心地感谢和崇高的敬意。我们也热切地希望广大医药界同仁在使用本书过程中不吝指教。

张贵君

1994年8月于哈尔滨

序　　言

中药是人类医疗保健事业中的重要组成部分，是中国医药学的精华。随着祖国医药科学的发展，世人越来越重视用中药防治疾病。中药包括中药材和中成药（成方制剂）。中药材既是制成饮片，供医疗配方应用，又是生产制剂或提取有效化学品的原料药。中药材种类繁多，产地广泛，各地用药习惯有别，流通领域不断扩大，致使其品种和商品规格的鉴定日趋复杂。对中药材及其饮片采用图文并茂的描述和鉴定方法，至为必要。

由黑龙江中医学院张贵君先生等30余名专家编著的《中药材及饮片原色图鉴》，收载中药材及饮片4 000余种，通过原色图片和文字描述，简明而正确地反映出其鉴别特征。所观察和研究的实物，均系选取具有代表性的药材及饮片。并注重道地药材和商品流通中不同规格的样品收载。

本书集药材及饮片鉴定之大成，是一部大型中药图鉴专著，是《常用中药鉴定大全》的姊妹作，所载全新图片真实可靠，具有较高的学术性，很有实用价值，是中医药人员必备的参考书和工具书。本书还收载了日本等国产的部分药材，这将为中药材商品的标准化和国际化起到积极的推动作用。

徐国钧

1995年1月于中国药科大学

致 读 者

中药材是中医用来治疗疾病的主要工具之一，来源于植物、动物或矿物的全体或某一部分。由于物种繁多、品类复杂，给商贸交流和医疗保健的具体应用带来诸多不便。药材的真伪优劣直接影响着医疗效果，甚至危及到生命的安全，这是当前广大医药卫生人员十分关切的一件大事。《中药材及饮片原色图鉴》一书正是为帮助解决上述问题而编著出版的。

全书收载中药材及其饮片 4 000 余种，其中包括部分日本国生产的常用中药。由于中药材及其饮片的色泽、性状受产地的土壤、气候、采集时间、加工方法、贮藏条件等诸多因素的影响而变化，选择一种可供鉴别用的标准品是一件十分复杂而艰巨的工作。著作者将分散在全国各大药材集散地和部分高等院校、科研机关、药检部门标本室的样品，经过较长时间的精选而拍照的这些彩图，生动逼真，反映了当前中药材及其饮片的生产实际，具有较高的学术水平和实用价值。本书的出版，对澄清中药材混乱品种，促进中药材商品标准化起着推动作用，并为教学、科研、中药材生产和加工、商贸交流、药品检验等部门提供了一部极有价值的参考书。

长春中医学院院长、教授 **邓明鲁**

1995 年 1 月于长春

凡　例

本卷共收载常用中药500种，中药饮片近2 000余种，并附载部分日本产常用生药，以供比较鉴定。卷末设有附录，包括中药材的采收、产地加工与炮制及6种索引。

1. 中药名细目

本书按中药名称的笔画顺序排列。每味中药名称前按其所排顺序标以阿拉伯数字。

2. 正文中的文字部分

(1)名称　包括中文名、汉语拼音、药材拉丁名、日文名和英文名。中文名为常用名称，以《中国药典》、《中药大辞典》和《中药志》为依据，除特殊情况外，均为一药一名。药材拉丁名按《中药鉴定学》所载规则命名。汉语拼音依据《中华字典》标注。日文名称均采用片假名标注，除已有的译名外，均按日语中的汉字音读通译。英文名参照《汉英(拉)中药名称及鉴别加工术语词典》，该书没有收载的英文名均采用汉语拼音通译。

(2)来源　包括动物或植物的科名、中文名、学名和药用部位，以及矿物药的来源，原矿物的拉丁名或英文名。部分列有与产地有关的常见名称。

(3)产地加工　包括采收时间和加工方法。

(4)炮制　包括各种炮制品的名称及炮制方法。

(5)性状　按药材和饮片分别叙述，药材项下均注有质量优劣的标志。药材及其饮片的形态描述，按常规方法记载。

(6)功效　包括味、性及主要功用。

3. 正文中的图版部分

正文中的图版均为典型的、具有代表性的样品原色图。每味药的原色图均标1个图注号。其图注号与药名序号一致。

4. 附录

附录中收载了中药材的采收、产地加工与炮制。

(1)采收　按植物药类、动物药类和矿物药类，分别叙述其一般采收时间和主要采收方法。

(2)产地加工　包括一般处理和干燥的基本方法。

(3)炮制　包括炮制目的和炮制方法两部分。炮制方法归纳为修制和炮制两类，叙述了常规炮制方法。

5. 索引

本书索引包括中文名索引、药材拉丁名索引、药材汉语拼音索引、动植物学名索引、药材英文名索引、药材日文名索引6种。中文名按笔画顺序排列，其他均按字母顺序排列。

中药名细目

1. 一叶萩 …… (14)
2. 一枝黄花 …… (14)
3. 一枝蒿 …… (16)
4. 丁公藤 …… (16)
5. 丁香 …… (18)
6. 八仙花(甘茶) …… (18)
7. 八角茴香 …… (20)
8. 人中白 …… (20)
9. 人参 …… (22)
10. 人参叶 …… (28)
11. 人参芦 …… (28)
12. 人参须 …… (30)
13. 儿茶 …… (30)
14. 九香虫 …… (32)
15. 刀豆 …… (32)
16. 了哥王 …… (34)
17. 三七 …… (34)
18. 三分三 …… (36)
19. 三疣梭子蟹 …… (36)
20. 三棱 …… (38)
21. 干姜 …… (38)
22. 干蟾 …… (40)
23. 土大黄 …… (40)
24. 土木香 …… (42)
25. 土牛膝 …… (42)
26. 土荆皮 …… (44)
27. 土茯苓 …… (44)
28. 土党参 …… (46)
29. 土鳖虫 …… (46)
30. 大丁草 …… (48)
31. 大血藤 …… (48)
32. 大良姜 …… (50)
33. 大枣 …… (50)
34. 大菟丝子 …… (52)
35. 大黄 …… (52)
36. 大腹皮 …… (58)
37. 山芝麻 …… (58)
38. 山豆根 …… (60)
39. 山药 …… (60)
40. 山柰 …… (64)
41. 山银柴胡 …… (64)
42. 山溪鲵 …… (66)
43. 山慈菇 …… (66)
44. 千斤拔 …… (66)
45. 千屈菜 …… (68)
46. 川木香 …… (68)
47. 川木通 …… (70)
48. 川贝母 …… (70)
49. 川乌 …… (72)
50. 川芎 …… (72)
51. 广防己 …… (74)
52. 广金钱草 …… (74)
53. 广藿香 …… (76)
54. 小灵丹 …… (76)
55. 小茴香 …… (78)
56. 小果蔷薇根 …… (78)
57. 小通草 …… (80)
58. 小蓟 …… (80)
59. 飞扬草 …… (82)
60. 马儿 …… (82)
61. 马尾连 …… (84)
62. 马宝 …… (84)
63. 马兜铃 …… (86)
64. 马槟榔 …… (86)
65. 马蹄螺 …… (88)
66. 云母石 …… (88)
67. 无花果 …… (90)
68. 天冬 …… (90)
69. 天花粉 …… (92)
70. 天竺黄 …… (92)
71. 天麻 …… (94)
72. 木瓜 …… (94)
73. 木香 …… (96)
74. 木贼 …… (96)

75. 木蝴蝶…… (98)
76. 木鳖子…… (98)
77. 瓦楞子 …… (100)
78. 王不留行 …… (100)
79. 五谷虫 …… (102)
80. 五灵脂 …… (102)
81. 五倍子 …… (104)
82. 午前草 …… (104)
83. 瓦子 …… (106)
84. 化橘红 …… (106)
85. 手掌参 …… (108)
86. 毛冬青 …… (108)
87. 毛茛 …… (110)
88. 牛黄 …… (110)
89. 牛蒡子 …… (112)
90. 牛膝 …… (112)
91. 牛鞭 …… (114)
92. 升麻 …… (114)
93. 长石 …… (116)
94. 片姜黄 …… (116)
95. 乌梢蛇 …… (118)
96. 乌梅 …… (118)
97. 丹参 …… (120)
98. 风轮菜 …… (120)
99. 方解石 …… (122)
100. 火炭母…… (122)
101. 巴豆…… (124)
102. 巴戟天…… (124)
103. 水牛角…… (126)
104. 水半夏…… (126)
105. 水红花子…… (128)
106. 水栀子…… (128)
107. 水蛭…… (130)
108. 功劳木…… (130)
109. 功劳叶…… (132)
110. 打破碗花花…… (132)
111. 平胸龟…… (134)
112. 玉…… (134)
113. 玉竹…… (136)
114. 玉葡萄根…… (136)
115. 仁草…… (138)
116. 甘遂…… (138)
117. 东风菜…… (140)
118. 东方后片螺…… (140)
119. 东方蝾螈…… (142)
120. 石决明…… (142)
121. 石南藤…… (144)
122. 石莲子…… (144)
123. 石菖蒲…… (146)
124. 石斛…… (146)
125. 石硫黄…… (148)
126. 石楠叶…… (148)
127. 石蚵…… (150)
128. 石榴皮…… (150)
129. 石膏…… (152)
130. 石燕…… (152)
131. 石蟹…… (154)
132. 龙血树血竭…… (154)
133. 龙齿…… (156)
134. 龙虱…… (156)
135. 龙骨…… (158)
136. 龙胆…… (158)
137. 龙涎香…… (160)
138. 龙眼肉…… (160)
139. 北沙参…… (162)
140. 皂角…… (162)
141. 田螺…… (164)
142. 凹甲陆龟…… (164)
143. 代赭石…… (166)
144. 仙茅…… (166)
145. 冬虫夏草…… (168)
146. 白及…… (168)
147. 白术…… (170)
148. 白石英…… (172)
149. 白石脂…… (172)
150. 白芍…… (174)
151. 白豆蔻…… (176)
152. 白芷…… (178)
153. 白苏子…… (178)
154. 白附子…… (180)

155. 白茅根……（180）
156. 白矾……（182）
157. 白果……（182）
158. 白降丹……（184）
159. 白药子……（184）
160. 白芷……（186）
161. 白礞砂……（186）
162. 白鲜皮……（188）
163. 白僵蚕……（188）
164. 白鲢……（190）
165. 白螺蛳壳……（190）
166. 瓜蒌……（192）
167. 玄参……（192）
168. 玄精石……（194）
169. 半夏……（194）
170. 对虾……（198）
171. 丝瓜络……（198）
172. 丝瓜藤……（198）
173. 地丁（紫花地丁）……（200）
174. 地不容……（200）
175. 地龙……（202）
176. 地骨皮……（202）
177. 地黄……（204）
178. 地榆……（206）
179. 地锦草……（206）
180. 朴硝……（208）
181. 芒硝……（208）
182. 老鹳草……（210）
183. 西红花……（210）
184. 西洋参……（212）
185. 百合……（212）
186. 百里香……（214）
187. 百部……（214）
188. 白鲜藤……（216）
189. 当归……（216）
190. 当药……（218）
191. 光慈菇……（218）
192. 肉苁蓉……（220）
193. 肉豆蔻……（220）
194. 竹节参……（222）
195. 竹茹……（222）
196. 朱砂……（224）
197. 朱砂根……（224）
198. 伏龙肝……（226）
199. 伊贝母……（226）
200. 华山参……（228）
201. 延胡索……（228）
202. 自然铜……（230）
203. 血余炭……（230）
204. 血散薯……（232）
205. 血竭……（232）
206. 全叶青兰……（234）
207. 全蝎……（234）
208. 合欢皮……（236）
209. 问荆……（236）
210. 安息香……（238）
211. 关木通……（238）
212. 羊肝……（240）
213. 农吉利……（240）
214. 阳起石……（240）
215. 阴起石……（242）
216. 防己……（242）
217. 防风……（244）
218. 红大戟……（246）
219. 红旱莲……（246）
220. 红药子……（248）
221. 红粉……（248）
222. 红娘子……（250）
223. 红管药……（250）
224. 红藁犹螺……（252）
225. 玛瑙……（252）
226. 麦冬……（254）
227. 麦饭石……（256）
228. 远志……（256）
229. 杜仲……（258）
230. 杜仲叶……（258）
231. 杜衡……（260）
232. 杨梅皮……（260）
233. 芜荑……（260）
234. 芸香草……（262）

235. 花椒……（262）
236. 花蕊石……（264）
237. 苍术……（264）
238. 苍耳子……（266）
239. 苘耳草……（266）
240. 茺蔚……（268）
241. 芦荟……（268）
242. 芦根……（270）
243. 苏木……（270）
244. 赤石脂……（272）
245. 赤芍……（272）
246. 还魂草……（274）
247. 连钱草……（274）
248. 牡丹皮……（276）
249. 牡蛎……（276）
250. 何首乌……（278）
251. 伸筋草……（278）
252. 佛手……（280）
253. 佛手花……（280）
254. 皂荚……（280）
255. 谷精草……（282）
256. 龟板……（282）
257. 龟板胶……（284）
258. 龟鱼皮……（284）
259. 辛夷……（284）
260. 沙苑子……（286）
261. 没药……（286）
262. 沉香……（288）
263. 沉香曲……（288）
264. 羌活……（290）
265. 河子……（292）
266. 补骨脂……（292）
267. 灵砂……（294）
268. 诃利藤……（294）
269. 诃胶……（296）
270. 诃藤……（296）
271. 附子……（298）
272. 忍冬藤……（300）
273. 鸡内金……（300）
274. 鸡血藤……（302）
275. 鸡骨草……（302）
276. 鸡冠花……（304）
277. 驴肾……（304）
278. 青木香……（304）
279. 青皮……（306）
280. 青葙子……（306）
281. 青蒿……（308）
282. 青黛……（308）
283. 青礞石……（310）
284. 枇杷叶……（310）
285. 板蓝根……（312）
286. 松香……（312）
287. 刺五加……（314）
288. 刺老鸦……（314）
289. 刺猬皮……（316）
290. 刺獾胆……（316）
291. 茉莉花……（316）
292. 苦丁茶……（318）
293. 苦木……（318）
294. 苦竹叶……（320）
295. 苦杏仁……（320）
296. 苦树皮……（322）
297. 苦葵菜……（322）
298. 苦楝皮……（324）
299. 茅莓……（324）
300. 郁金……（326）
301. 斩龙草……（326）
302. 斩龙剑……（328）
303. 轮环藤……（328）
304. 欧当归……（330）
305. 虎杖……（330）
306. 虎仁……（330）
307. 虎骨……（332）
308. 虎斑游蛇……（332）
309. 虎掌南星……（334）
310. 虎筋……（334）
311. 虎颜……（334）
312. 明党参……（336）
313. 岩白菜……（336）
314. 岩羊角……（336）

315. 岩松鼠鲁……（338）
316. 罗布麻叶……（338）
317. 牧马豆 ……（338）
318. 知母……（340）
319. 使君子……（340）
320. 侧柏叶……（342）
321. 佩兰……（342）
322. 乳香……（342）
323. 金牛草……（344）
324. 金佛草……（344）
325. 金环蛇……（346）
326. 金果榄……（346）
327. 金鱼……（346）
328. 金荞麦……（348）
329. 金钱白花蛇……（348）
330. 金钱草……（350）
331. 金银花……（350）
332. 金锦香……（352）
333. 金箔……（352）
334. 金精石……（354）
335. 金樱子……（354）
336. 金礞石……（356）
337. 狗舌草……（356）
338. 狗尾草……（358）
339. 狗肾……（358）
340. 狗宝……（360）
341. 狗脊……（360）
342. 狗茸……（362）
343. 肺形草……（362）
344. 肥皂子……（362）
345. 兔儿伞……（364）
346. 鱼腥草……（364）
347. 鱼鳔……（366）
348. 京大戟……（366）
349. 夜明砂……（368）
350. 炉甘石……（368）
351. 泡桐花……（370）
352. 泡桐果……（370）
353. 泽兰……（370）
354. 泽泻……（372）
355. 官桂……（372）
356. 降香……（374）
357. 细辛……（374）
358. 玳瑁……（376）
359. 珍珠……（376）
360. 珍珠母……（378）
361. 珍珠梅……（378）
362. 珊瑚……（380）
363. 枳壳……（380）
364. 枳实……（382）
365. 栀子仁……（384）
366. 栀子……（384）
367. 枸橘……（386）
368. 枸橘叶……（386）
369. 胡子鲶……（386）
370. 胡桃仁……（388）
371. 胡黄连……（388）
372. 胡椒……（388）
373. 荆芥……（390）
374. 南山楂……（390）
375. 南天竹叶……（392）
376. 茜草……（392）
377. 草血竭……（394）
378. 茵陈……（394）
379. 伏苓……（396）
380. 茯神……（396）
381. 荜茇子……（398）
382. 荔枝草……（398）
383. 砗磲……（398）
384. 砒石 ……（400）
385. 砂仁……（400）
386. 牵牛子……（402）
387. 厚朴……（402）
388. 厚朴花……（404）
389. 虻虫……（406）
390. 钟乳石……（406）
391. 香巴戟……（408）
392. 香附……（408）
393. 香茶菜……（410）
394. 香橼……（410）

395. 禹余粮……（412）
396. 鬼针草……（412）
397. 鬼箭羽……（414）
398. 独活……（414）
399. 胆矾……（416）
400. 胆南星……（416）
401. 疣荔枝螺……（418）
402. 前胡……（418）
403. 穿山甲……（420）
404. 穿心莲……（420）
405. 穿破石……（422）
406. 姜石……（422）
407. 姜黄……（424）
408. 扁青……（424）
409. 蚤缀……（426）
410. 络石藤……（426）
411. 绞股蓝……（428）
412. 蚕茧……（428）
413. 秦艽……（430）
414. 桂枝……（430）
415. 桔梗……（432）
416. 桦树皮……（432）
417. 桃仁……（434）
418. 莱菔子……（434）
419. 荜子……（436）
420. 莲房……（436）
421. 莪术……（438）
422. 荷梗……（440）
423. 柴胡……（440）
424. 党参……（444）
425. 鸭肫衣……（446）
426. 鸭跖草……（446）
427. 蚬壳……（446）
428. 铁丝威灵仙……（448）
429. 积雪草……（448）
430. 透骨草……（450）
431. 倒扣草……（450）
432. 射干……（452）
433. 臭牡丹……（452）
434. 臭梧桐叶……（454）
435. 徐长卿……（454）
436. 狼毒……（456）
437. 脐带……（456）
438. 高良姜……（458）
439. 浙贝母……（458）
440. 海马……（460）
441. 海月……（460）
442. 海风藤……（462）
443. 海石鳖……（462）
444. 海龙……（464）
445. 海参……（466）
446. 海胆……（466）
447. 海浮石……（468）
448. 海麻雀……（468）
449. 海燕……（470）
450. 海螵蛸……（470）
451. 海螺……（472）
452. 海藻……（472）
453. 浮石……（474）
454. 益母草……（474）
455. 益智……（476）
456. 拳参……（476）
457. 桑白皮……（478）
458. 桑枝……（478）
459. 桑寄生……（480）
460. 桑螵蛸……（480）
461. 梧桐叶……（482）
462. 决明……（482）
463. 菟丝子……（484）
464. 菊三七……（484）
465. 菊花……（486）
466. 黄牛角……（488）
467. 黄石脂……（488）
468. 黄羊角……（488）
469. 黄芩……（490）
470. 黄芪……（492）
471. 黄连……（492）
472. 黄连花……（496）
473. 黄柏……（496）
474. 黄荆子……（500）

475. 黄喉水龟…… (500)
476. 黄精…… (502)
477. 黄颡鱼…… (504)
478. 雪上一支蒿…… (504)
479. 雪莲花…… (506)
480. 接骨木…… (506)
481. 雀瓮…… (508)
482. 常山…… (508)
483. 常春藤…… (510)
484. 眼镜王蛇…… (510)
485. 鹿尾…… (512)
486. 鹿角…… (512)
487. 鹿角胶…… (514)
488. 鹿角霜…… (514)
489. 鹿茸…… (514)
490. 鹿筋…… (518)
491. 鹿鞭…… (518)
492. 藁黄…… (520)
493. 羚羊角…… (522)
494. 蛤士蟆…… (522)
495. 蛤仔…… (524)
496. 蛤蚧…… (524)
497. 蛤蟆油…… (526)
498. 猴枣…… (526)
499. 犀角…… (526)
500. 槟榔…… (528)

1. 一叶荻

Yiyeqiu **Radix et Ramulus Securinegae Suffruticosae**

イチヨウシュウ **Twig and Root of Suffrutescent Securinega**

【来源】 本品为大戟科植物一叶荻 *Securinega suffruticosa* (Pall.) Rehd. 的干燥根及嫩枝叶。

【产地加工】 根全年可采。嫩枝叶春末至秋末均可采收，割取带叶的绿色嫩枝，扎成小把，阴干。

【炮制】 (1)一叶荻片　取根原药材，除去泥沙，洗净，润软，切片晒干，通称"一叶荻片"。

(2)一叶荻段　取嫩枝叶原药材，除去杂质，淋润至透，切段，干燥，通称"一叶荻段"。

【性状】 (1)药材　①根　呈不规则分枝的圆柱形，表面红棕色，有细纵皱，疏生突起的小点或横向皮孔。质脆。断面不整齐，木部淡黄白色。气微，味淡、涩(图1－1)。

②嫩枝　呈圆柱形，略具棱角，长30～40cm，粗端直径约0.20cm。表面暗绿黄色，有的略带红色，具纵向细纹理。质脆。气微，味微辛而苦(图1－2)。

根以粗大、表面红棕色者为佳。嫩枝以枝条嫩、表面暗绿黄色者为佳。

(2)饮片　①一叶荻片　呈类圆形片，表面红棕色，断面木部淡黄白色。气微，味淡、涩。

②一叶荻段　嫩枝断面四周纤维状。中央白色。叶多皱缩破碎。气微，味微辛而苦(图1－3)。

【功效】 味辛、苦，性温。活血舒筋，健脾益肾。

2. 一枝黄花

Yizhihuanghua **Herba Solidagnis**

イッシオウカ **Herb of Common Goldenrod**

【来源】 本品为菊科植物一枝黄花 *Solidago decurrens* Lour. 的干燥全草。

【采收加工】 夏、秋2季，开花结果时采挖，除去泥沙，晒干。

【炮制】 取原药材，拣去杂质，下段浸水，上段喷淋清水，使柔润，切长2～3cm段，干燥，筛去灰屑。

【性状】 (1)药材　长30～100cm，根茎短，细根淡黄色，簇生；茎圆柱形，直径0.2～0.5cm，黄绿色或暗紫红色，有纵棱，质脆，易折断，断面纤维性，具髓。单叶互生，叶片多皱缩、破碎，完整叶片展平后呈卵形或披针形，长1～9cm，宽0.3～1.5cm；先端稍尖或钝，全缘或有不规则疏锯齿，基部下延。头状花序排成总状，苞片3层，卵状披针形。瘦果细小，冠毛黄白色。气微香，味微苦、辛(图2)。

(2)饮片　为根、茎、叶切断后的混合物。

【功效】 味辛、苦，性凉。清热解毒，消肿止痛。用于感冒发热、咽喉肿痛、毒蛇咬伤、痈疮等症。

1—1

1—2

1—3



2

3. 一枝蒿

Yizhihao Herba Achilleae Alpiniae

イッシコウ Herb of Alpine Yarrow

【来源】 本品为菊科植物蓍草 *Achillea alpinia* L. 的全草。

【采收加工】 夏、秋2季，割取全草，拣去杂草，晒干或鲜用。

【炮制】 取原药材，快洗，润软，切碎。

【性状】 (1)药材 全草长达100cm。茎圆柱形，疏生贴伏长柔毛。叶互生，叶片皱缩，破碎，完整者展开，叶片呈长线状披针形，长6～10cm，宽0.7～1.5cm，羽状深裂，裂片线形，末端尖锐，有锯齿，近无毛。头状花序排成复伞房状，总苞钟形，总苞片3层，托片和总苞片相似，宽披针形；舌状花和筒状花均为白色。气微，味辛、苦。

(2)饮片 为切碎后的茎、叶、花序混合物，片长5mm 左右(图3)。

【功效】 味辛、苦，性平。有小毒。清热解毒，活血通经。用于经闭腹痛、肠胃炎、跌打损伤、毒蛇咬伤等症。

4. 丁公藤

Dinggongteng Caulis Erycibes

チョウコウトウ Branch of Clovetree

【来源】 本品为旋花科植物丁公藤 *Erycibe obtusifolia* Benth. 的干燥藤茎。

【采收加工】 全年可采，洗净，切成斜片或长3～5cm 的短段，隔水蒸2～4小时，取出，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，润透，蒸至透心，晒干或烘干。

【性状】 (1)药材 为斜切的片或段，直径0.5～4.0cm。表面灰黄色、灰褐色或浅棕色，有不规则纵裂纹或浅沟；皮孔点状，黄白色；老的栓皮可呈片状剥落。切面椭圆形，浅黄棕色或黄褐色，木部宽，有不规则花纹(异型维管束)，导管孔明显，中心有髓。质坚，不易折断，断面纤维性。气微，味淡、微涩。

(2)饮片 横切片厚3～4mm。表面灰褐色，稍粗糙，皮孔点状，黄白色；切面皮部黄褐色，木部黄棕色，有不规则花纹，中心髓部不明显。质地坚硬。气微，味淡(图4－1)。

【功效】 味辛，性温。有小毒。祛风除湿，消肿止痛。用于风湿痹痛、半身不遂、跌打肿痛等症。

附：光滑丁公藤 *Erycibe laevigata* Wall. 茎横切片(图4－2)。



3

4—1

4—2

5. 丁 香

Dingxiang Flos Caryophylli

チョウコウ Clove

【来源】 本品为桃金娘科植物丁香 *Eugenia caryophyllata* Thunb. 的干燥花蕾。

【产地加工】 当花蕾由绿色转红时采摘，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，筛去灰屑。

【性状】 (1)药材 略呈研棒状，长1～2cm。花冠圆球形，直径0.3～0.5cm，花瓣4，复瓦状抱合，棕褐色至褐黄色，花瓣内为雄蕊和花柱，搓碎后可见众多黄色细粒状的花药。萼筒圆柱状，略扁，有的稍弯曲，长0.7～1.4cm，直径0.3～0.6cm，红棕色或棕褐色，上部有4枚三角状的萼片，十字状分开。质坚实，富油性。气芳香浓烈，味辛辣、有麻舌感(图5－1，坦桑尼亚产)。

以完整、朵大、色紫红、油性足、香气浓郁者为佳。

【功效】 味辛，性温。温中降逆，补肾助阳。

附：丁字柄 为丁香的花梗。功效和丁香类似(图5－2)。

6. 八仙花(甘茶)

Baxianhua (Gancha) Folium Hydrangeae Macrophyllae

アマチャ Leaf and Twig of Largeleaf Hydrangea

【来源】 本品为虎耳草科植物甘茶 *Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Seringe *var. thunbergii* (Sieb.) Makino 的干燥叶及小枝。

【产地加工】 在叶生长茂盛期采收(约9月中旬)，晒干。

【炮制】 取干叶，用水喷雾，发酵1昼夜即可。

【性状】 (1)药材 叶呈皱缩状，弯曲不直，叶柄及叶脉明显，有的带有嫩枝。暗绿色至暗黄绿色、绿黑褐色或棕绿色。质硬、脆，易折碎。微具辛辣气，味稍甜。用水浸泡后，叶片呈披针形或卵形，先端锐尖，长约12cm，宽约5cm，叶缘有锯齿，基部下延呈翼状，两面具少数粗毛，叶脉处尤多，侧脉于叶缘处弯曲并互相联结。叶柄短，约为叶片的1/5。气微香，味甜(图6－1)。

以叶形完整、色泽光亮、无杂质、味甜者为佳。

(2)饮片 为皱缩、卷缩成团的小段，不规则形，长约0.5cm 左右。表面皱缩或呈片状，棕绿色。有的叶主脉明显，淡黄色或黄棕色。质脆，手碾易碎，微具香气，味稍甜。有的具嫩枝，略呈4棱形或扁圆柱形，表面有纵皱，棕褐色；质脆，易折断，断面常呈灰褐色或淡黄色。气微，味微甜(图6－2)。

【功效】 味苦、微辛，性寒。有小毒。治疟疾，心热惊悸，烦躁。



5—1



5—2

6—1

6—2

历代中医书籍大全分享

你好，我是逢原，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com
二、加我 **QQ/微信：2049346637**
三、关注微信公众平台——**逢原中医**，经常有中医文章更新。
四、关注我的**空间**：**http://user.qzone.qq.com/2049346637**

不管哪种方式，看到你的信息我会第一时间回复，尽全力帮您！

加微信可以扫描以下二维码加我！

私人微信号：2049346637

公众平台：逢原中医

7. 八角茴香

Bajiaohuixiang　　Fructus Anisi Stellati

ハッカクウイキョウ　　Staranise

【来源】 本品为木兰科植物八角茴香 *Illicium verum* Hook. f. 的干燥成熟果实。

【产地加工】 8～11月或次年2～3月采收成熟果实，晒干或文火烤干，或用开水烫后晾干。

【炮制】 将原药筛去灰屑，拣去果柄及杂质。

【性状】 (1)药材　多由8个蓇葖果放射排列于果柄顶端，直径3～4cm，果柄弯曲，长3～4cm。单个蓇葖果上缘开裂，呈小艇状，先端钝尖，内含种子1枚；外表面棕褐色，具不规则皱纹，内表面淡红棕色，有光泽。种子扁卵形，种皮红棕色或黄棕色，平滑而有光泽；质脆，胚乳白色，油性。香气浓郁，味微甜(图7)。

(2)饮片　特征与药材特征相近，但果柄多已除去。

【功效】 味辛，性温。温中散寒，理气止痛。用于胃寒呕吐、食欲不振、寒气腹痛、腰痛等症。

8. 人中白

Renzhongbai　　Calamitas Urinae Hominis

ジンチュウハク　　A White Sediment Naturally Forming by People Urine

【来源】 本品为年久尿壶便桶中的人尿自然沉结的固体物。

【产地加工】 铲取年久的尿壶、小便桶等内面沉结的尿垢，除去杂质，晒干。

【炮制】 (1)人中白　取原药材，置清水中漂洗4～7天，经常换水，取出，刮去杂质，日晒夜露15天，每日上下翻动1次，以无臭为度，晒干，称为“人中白”。

(2)煅人中白　取净人中白置坩锅内，炭火煅至红色，取出，放凉，习称“煅人中白”。

(3)飞人中白　取净人中白研成细末，再水飞至几声为度，习称“飞人中白”。

【性状】 (1)药材　呈不规则的块片状，大小、厚薄不等，一般厚0.3～0.5cm。外表灰白色，光滑或有瘤状突起；有的一面平滑，另一面松泡而凹凸不平。质坚硬而脆，易碎断，断面起层。有尿臊气(图8－1)。

以干燥、色灰白、质坚、无杂质者为佳。色灰黑、有砖屑杂质者不堪入药。

(2)饮片　①煅人中白　性状同原药材，但色较深。呈淡灰色，质松脆(图8－2)。

③飞人中白　为白色粉末。

【功效】 味咸，性寒。清热，降火，消痰。

7



8—1

8—2

9. 人　参

Renshen　Radix Ginseng
ニンジン　Ginseng

【来源】 本品为五加科植物人参 *Panax ginseng* C. A. Mey. 的干燥根。栽培者为“园参”，野生者为“山参”。

【产地加工】 (1)园参　栽种5～6年后，于秋季(白露至秋分)采挖，除去地上部分及泥土，称“园参水子”。鲜参进行加工，其加工品主要有以下几类：

①生晒参类　取洗净的鲜参，除去支根，晒干，称“生晒参”；鲜参不除去支根晒干的叫“全须生晒参”。主要产品还有：白干参、皮尾参、白参须。

②红参类　将鲜参刷洗干净，除去不定根(芋)和支根，蒸3小时左右，取出晒干或烘干。鲜参的支根及须根用此法加工，即为红参须(红直须、红弯须、红混须)。主要产品还有：边条红参、大力参(亦有归入其他类的)等。

③白参(糖参)类　将鲜参刷洗干净，置沸水中浸烫3～7分钟，用特制的针沿参体平行与垂直方向刺小孔，再浸入浓糖液中2～3次，每次10～12小时，取出晒干。主要产品有：白参、白糖参、糖参须。

④活性参类　鲜参洗刷干净，一支一支地摆入盘内，放入冷冻室中，进行真空冷冻干燥。主要产品还有咀嚼片。

⑤罐藏人参类　取洗净鲜参，置100℃水中漂烫2分钟，取出，沥干水分，称重，装罐。用漂烫人参的沸水溶化砂糖，配制成浓度为35%的糖液并趁热(90℃以上)注入罐内。

(2)山参　随时可采，以果实成熟或落下时采收较好。采收时应注意拨动泥土挖取，避免支根或须根受损伤，挖出后将参用青苔和树皮裹好带回。新鲜山参称“野山参水子”。山参只加工成生晒参和白参。

【炮制】 各种人参均去芦头。

(1)园参类

①生晒参片　取生晒参，蒸软或稍浸后烤软，切薄片，干燥，称“生晒参片”。

②咀嚼片　取鲜参，洗净，蒸30分左右，放凉，切薄片，真空冷冻干燥，称“咀嚼片”。

③红参片　取红参，蒸软或稍浸后烤软，切薄片，干燥，称“红参片”。

④白参片　取白参，烘软，趁热切横片或顺片，干燥，称“白参片”。

(2)山参类　用时粉碎或捣碎。

【性状】 (1)药材　①生晒参　主根呈纺锤形或圆柱形，长3～15cm，直径1～2cm。表面灰黄色，上部或全体有疏浅断续的粗横纹及明显的纵皱，下部有侧根2～3条，并着生多数细长的须根，须根上偶有不明显的细小疣状突起。根茎长1～4cm，直径0.3～1.5cm，多拘挛而弯曲，具不定根(芋)和稀疏的凹窝状茎痕(芦碗)。质较硬，断面淡黄白色，显粉性，有1明显的棕黄色环纹，皮部有黄棕色的点及放射状裂隙。气特异，味微苦、甜(图9－1)。

以体轻饱满、去净干须(全须生晒参要芦、须全)、深土黄色、皮细、无破疤者为佳。

②白干参(生晒参类)　略似生晒参，因已刮去表皮，颜色较白，环纹已不明显，纵皱少或无，质较生晒参略坚实。断面白色，显菊花纹。气微，味甜、微苦(图9－2)。

③皮尾参(园参的不定根，属生晒参类)　呈长条圆柱形，上端有茎痕而不带芦，下部不带须根。



9—1

9—2

9—3



9—4

9—5



9—6

长3～6cm，直径0.5～1.0cm。表面土黄色，多数带有褐色环纹及不规则的纵向抽皱。质较轻泡，断面白色显菊花纹。气味与生晒参同。

④红参　全长6～17cm，主根长3～10cm。表面半透明，红棕色，偶有不透明的暗褐色斑块，俗称“黄马褂”。具纵沟、皱纹及细根痕，上部可见环纹，下部有2～3条扭曲交叉的侧根。根茎上有茎痕及1～2条完整或折断的不定根。质硬而脆，断面平坦，角质样，有光泽，显菊花纹。气微，味甜、微苦（图9－3）。

以体质坚实、条粗、无黄皮及破疤者为佳。

⑤边条红参　全长13～20cm，中部直径0.8～2.0cm。芦长2.5～4.0cm，直径0.4～0.7cm，黄色略紫质；顶端芦碗稍大，凹陷较深，中下端略圆形有节状棱纹。本品特点为3长，即芦长、身长、腿长。余同红参。

⑥大力参（红参类）　体形、气味与红参相同，唯颜色呈淡黄白色，半透明状。

⑦白　参　主根长3～15cm，直径0.7～3.0cm。表面淡黄白色，上端有较多断续的环纹，全体可见加工时针刺的点状针痕。下部有2～3条支根或不等。断面白色，有菊花纹。气微香，味较甜、微苦，嚼之无渣感。

⑧白糖参（白参类）　常缺芦、破皮，吃糖较重，表面上常析出糖结晶颗粒。余同白参（图9－4）。

⑨活性参　体形与生晒参相同，唯表面黄白色，主根有极少纵皱纹。断面呈放射状纹理，有细裂隙。质稍硬而轻浮于水面。气特异清香，先甜后甚苦，嚼之更浓（图9－5、图9－6）。

⑩山　参　主根短粗，与根茎等长或较短，多具2个主要支根，形似人体，上端有细而深的螺旋纹，根茎细长，上部多扭曲，芦碗多而密集，芦头上生2～3个枣核状艼，参腿多为2条，参须细长，清晰不乱，其上有明显的珍珠疙瘩。参须全用线缠绕。质较硬，断面皮部显裂隙，形成层明显。气微香，味微苦、甜（图9－7、图9－8、图9－9）。

⑪艼变山参　山参在生长的过程中，其主根因某种原因遭到破坏或烂掉（野兽踩踏、鼠咬、虫食掉主体或咬伤，或受病虫害的影响），其艼继续生长，成为无主根的艼变山参。主要特征为参形特异。芦头大，多数偏斜不正。由多条艼组成，无主体。艼多为顺体，细柳肩，大艼上可生长有横纹，其纹粗浅不连续。只有1条参腿（艼之尾部）。皮嫩而有光泽。须有少量的珍珠疙瘩。余同山参。

⑫籽种山参（籽海、野籽）　是用山参的种子，经人工种植于林中后而自然长成的人参。主要特征是形状与山参略同。芦头多为线芦、竹节芦，芦头较长，也偶有马牙芦或圆芦。艼很少见，为毛毛艼、顺体艼，少见枣核艼。艼向下，不旁斜、上翘者少，均为互生，尾部呈尖尾形。参体横灵体、短体、菱体、长顺等体均有。参腿2～3条，略呈八字分岔。皮黄白色，较细嫩，不紧，无粗皮，有光泽。横纹不明显。参须柔软细嫩、短，珍珠点小，口嚼则出现碎末及少量纤维。味苦，有清香气，但不及山参。余同山参。

⑬池底参、扒货参　在种植园中的园参被起走后，遗留下的参籽或园参秧，在园参畦中的自然条件下生长多年，称为“池底参”。人工将参籽播到池畦中，在人工管理时只做锄草、施肥，不做倒茬，任其自然生长，约在20年左右挖出加工，称为“扒货参”。这2种参性状特征基本一致。主要特征：芦头旋转生长，芦碗较大，芦碗边有芦棱。艼粗大、齐头，虽然有的艼上部稍细，但不像枣核尖端之形，如同顺体艼，形成一头粗，一头细。生2枚艼者，多对生（猪脖子艼），很少互生。艼的生形不是顺体下伸，而是多向上生、旁生或翘生斜上，高于芦头。艼有的3～5枚。艼重于参体，有的重于参体几倍。参体多为顺体，横灵体者甚少，有的虽有横灵体，但亦艼大于体。腿粗细不一，2～3条或更多，有“八字分岔”的体形。皮黄白色，粗糙而疏松。横纹浅或断续，无螺旋纹，有的一纹到底，也有半环纹者，状似园参。参须较嫩，易折断，蓬乱不清晰，珍珠点疏而小。

9—7



9—8



9—10



9—9



9—11

9—12

⑭移山参　有2种。一是采挖山参时，将发现的小形参移至安善的地方种植，待以后接近长成时，再行挖出；二是将园参小者移植到山林中任其自然生长，待接近成熟时挖出。主要特征：芦碗略显长而稀疏。芦头常骤然变细或变粗，不形成对花芦而呈转芦，常出现线芦或竹节芦。芦多为顺长体，但生长年久者也有的为枣核丁；有时出现下粗上细的形状（即搭脖子丁），其略向斜旁伸出，上翘者多，有时丁体超过主体。参体有横灵体、顺笨体，以顺笨体为多见，参肩膀呈圆形。参腿较顺长，1～3条或多条，多为3条。分杈不呈八字形。皮质略泡，粗糙，嫩而不结，不光润。纹粗而浅，并有稀疏不紧密的横纹，常一纹到底。参须细嫩而短，下端分叉较多，不清疏，珍珠疙瘩较稀而小（图9－10）。

（2）饮片　①生晒参片　呈圆形、类圆形或长圆形。直径0.9～2.5cm，厚1～4mm。表面类白色，可见有1个不规则的棕色或浅棕色环纹，环纹处显密集的条形纹理，其外侧可见1～2轮明显的棕红色小点。外皮浅黄白色或黄白色，可见棕红色斑点或须根痕。质地致密者棕色环纹不明显，多数外层质密，内层质松而显裂隙。质脆或稍韧，易折断，略呈粉质。具特异的土腥气，味淡（图9－11）。

②俎圈片　为圆形或类圆形薄片，表面灰黄色，体轻质稍硬，断面呈放射状纹理，有细裂隙。气特异清香，先甜后苦，嚼之无渣感（图9－12）。

③白参片　为横切片或顺片，外皮松泡，白色，质嫩而薄，断面黄白色。气微香，味甜，嚼之无渣感（图9－13）。

④红参片　呈圆形、类圆形或长圆形，少数为长椭圆形（纵切片）。直径0.5～1.5cm，厚1.5～2.0mm。表面红棕色，可见有1个不规则的深色环圈，环圈及其内部有条点状放射纹理，少数略具白心。纵切片可见有条纹。外皮浅黄棕色，周边具大小不等的皱褶或扭沟。角质状，半透明，质硬而脆，折断面现白碴；易遇潮回软，受潮者质较韧。微具土腥气，味微甜（图9－14）。

【功效】 味甘、微苦，性温。大补元气，强心固脱，安神生津。

附：日本人参 *Radix Ginseng*

【来源】 本品为五加科植物人参 *Panax ginseng* C. A. Mey. 干燥的除去细根的根。

【产地加工】 秋季挖取4～6年生的根，刮去粗皮，晒干。

【性状】 （1）药材　呈细长的圆柱形或纺锤形，通常有2～5个侧根，长5～20cm，主根直径为0.5～3.0cm。表面淡黄褐色至灰褐色，有纵皱及细根痕。根头部具有略扭曲的短小根茎。折断面平坦，淡黄褐色，近形成层处呈褐色。气特异，味先微甜而后苦（图9－15）。

以色类白色、光润、质重、味甜而后苦者为佳。

（2）饮片　粉末　呈淡黄白色至淡黄褐色。气特异，味先甜而后微苦。

日本红参 *Radix Ginseng Rubra*

【来源】 本品为五加科植物人参 *Panax ginseng* C. A. Mey. 的根蒸制后的加工品。

【炮制】 取生长6～7年的根，洗净，阴干，再蒸熟，晒干或烘干。

【性状】 药材　呈细长圆柱形或纺锤形，常具有2～5条侧根，长5～25cm，主根直径为0.5～3.0cm。表面呈淡黄褐色或红褐色，半透明状，有纵皱。根头部有短小的根茎。质硬，折断面平坦，角质样。具特异香气，味初微甜而后苦。

香港红参（图9－16）；**韩国白人参**（图9－17）；**生晒参出口品**（9－18）。



9—14

9—13

9—15

9—16



9—17

9—18

10. 人参叶

Renshenye Folium Ginseng

ニンジンヨウ Ginseng Leaf

【来源】 本品为五加科植物人参 *Panax ginseng* C. A. Mey. 的干燥叶。

【产地加工】 秋季采挖人参时采摘，除去杂质，晒干。

【炮制】 拣去杂质，切宽丝，筛去灰屑。

【性状】 (1)药材 为带有长柄的掌状复叶，小叶5枚(偶有3枚)，呈卵形或倒卵形；复叶基部的小叶长2～3cm，宽1.0～1.5cm，复叶上部的小叶长4～15cm，宽2～4cm，基部楔形，先端渐尖，边缘有细锯齿，纸质；黄绿色，卷缩状，有时破碎。气清香，味微苦而带甜。

以黄绿色、卷缩状、无破碎、气清香、味苦而甜者为佳。

(2)饮片 呈不规则的丝状，纸质，易碎，黄绿色。气清香，味微苦而带甜(图10)。

【功效】 味苦、微甘，性温。补中益气，生津液，解酒毒。

11. 人参芦

Renshenlu Rhizoma Ginseng

ニンジンロ Ginseng Rhizome

【来源】 本品为五加科植物人参 *Panax ginseng* C. A. Mey. 的干燥根茎。

【产地加工】 秋季采挖人参，剪下根茎，除去泥土，干燥。

【炮制】 取原药材，除去灰屑，洗净，干燥。

【性状】 药材 呈圆柱形，长1～4cm，直径0.3～1.5cm，多拘挛而弯曲，具不定根(习称芋)和稀疏的凹窝状茎痕(习称芦碗)。质硬，断面淡黄白色。气微香而特异，味微苦、甜(图11)。

【功效】 味甘、苦，性温。涌吐，升阳。



10



11

12. 人参须

Renshenxu　　Radices Ginseng

ニンジンシュ　　Fibrous Root of Ginseng

【来源】 本品为五加科植物人参 *Panax ginseng* C. A. Mey. 的细支根及须根。

【产地加工】 秋季采挖人参，刷洗干净，剪下的支根，搓去外皮，晒干，称“白直须”；剪下的须根，晒干，称“白弯须”；剪下的支根，蒸3小时左右，取出晒干或烘干，称“红直须”；剪下的须根，蒸3小时左右，取出晒干或烘干，称“红弯须”；剪下的支根，置沸水中浸烫3～7分钟，再浸入浓糖溶液中2～3次，每次10～12小时，取出晒干，称“糖参须”。

【炮制】 取原药材，除去杂质。

【性状】 (1)药材　①白直须　为较粗长的支根，长8～15cm。表面黄白色，有光泽，多数已无外皮。断面类白。气香，味苦(图12－1)。

②白弯须　多为须根，常团成饼状。表面黄白色。气香，味苦(图12－2)。

③红直须　为较粗的细支根，长8～15cm。表面棕红色，有光泽，半透明状。体表有纵皱及须根脱落痕，少数有栓皮剥落现象。断面棕红色，平坦，类圆形，边缘弯曲成波状。质坚脆。气香，味苦(图12－3)。

④红弯须　根须呈条形弯曲状，粗细不均。表面橙红色或棕黄色，有光泽，呈半透明状。气香，味苦(图12－4)。

⑤糖参须　为较粗的细支根。性状同红直须，表面和断面均为白色。味甜，微苦。

【功效】 味甘、微苦，性温。大补元气，强心固脱，安神生津。

附：日本人参须(图12－5)。

13. 儿　茶

Ercha　　Catechu

ジチヤ　　Catechu

【来源】 本品为豆科植物儿茶 *Acacia catechu* (L.) Willd. 的去皮枝、干的干燥煎膏和茜草科植物钩藤儿茶 *Uncaria gambier* Roxb. 的带叶嫩枝的干燥煎膏。前者习称“儿茶膏”(黑儿茶)，后者习称“方儿茶”(棕儿茶)。

【产地加工】 (1)儿茶膏　一般在12月至次年3月采收儿茶的树干，剥去外皮，砍成碎片，加水煎熬后，滤过，浓缩，直至变为糖浆状，冷却，倾于特制的模型中，阴干。

(2)方儿茶　割取带叶小枝，放入铜锅中，加水煮沸6～8小时，并经常搅拌，使叶破碎，待叶变黄色时，取出枝叶，将药液滤过，浓缩成糖浆状，倒入木盘中，冷却后凝固，切成方块状，干燥。

【炮制】 拣去杂质，刷去灰土，切成0.6～0.9cm见方小块或研成细粉备用。

【性状】 (1)药材　①儿茶膏　呈方块状或不规则块状，大小不一。表面黑色或棕黑色，平滑而稍具光泽，有时可见裂纹。质硬易碎，断面不整齐，具光泽，有细孔。气微，味涩、苦回甜(图13－1)。

以黑色略带红色，不烟不碎、尝之收涩性强者为佳。

②方儿茶　呈方块状，每边长约2cm，各边均凹缩，棱角多偏斜或破碎。表面暗棕色至黑褐色，多平坦无光泽，偶见裂纹。质坚实或较松脆，断面浅棕色至浅棕红色。气微，味苦、涩(图13－2)。

以黑褐色、较性大、味涩者为佳。

(2)饮片　不规则的块状或颗粒状，表面黑褐色，有胶质亮光。有粘性，质地坚或较松。无臭，味苦、涩。

【功效】 味苦、涩，性微寒。内服清热，生津，化痰；外用收涩，敛疮，止血。

12—1

12—2



12—3

12—4

12—5

13—1

13—2

14. 九香虫

Jiuxiangchong Aspongopus

キュウコウチュ Stink Bug

【来源】 本品为蝽科昆虫九香虫 *Aspongopus chinensis* Dallas 的干燥体。

【产地加工】 11月至次年3月间捕捉后，置于适宜容器内，加酒少许，盖紧，将其闷死，取出阴干，或置沸水中烫死，取出，干燥。

【炮制】 (1)九香虫 取原药材，除去杂质，筛去灰屑，称"九香虫"。

(2)炒九香虫 取净九香虫置锅内，文火加热，炒至香气逸出时，取出放凉，通称"炒九香虫"。

【性状】 (1)药材 呈六角状扁椭圆形，长1.6～2.0cm，宽约1cm。表面棕褐色或棕黑色，略有光泽。头部小，呈类三角形，复眼卵圆状，突出，单眼1对，1对触角各5节，多脱落。背具翅2对，外面的1对基部较硬，内部1对膜质、透明；胸部有足3对，多数脱落。腹部棕红色至棕黑色，每节近边缘处有突起的小点。质脆，折断后腹内有浅棕色的内含物。有特异的腥臭气，味微咸(图14－1)。

以个完整均匀、色棕褐发亮、油性大、无虫蛀者为佳。

(2)饮片 炒九香虫 形如九香虫，微显光泽，微有腥气而带焦香气(图14－2)。

【功效】 味咸，性温。理气止痛，温中助阳。

15. 刀 豆

Daodou Semen Canavaliae

トウズ Jack Bean

【来源】 本品为豆科植物刀豆 *Canavalia gladiata* (Jacq.) DC. 的种子。

【产地加工】 秋季采收成熟果实，剥取种子，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，用时捣碎。

【性状】 (1)药材 本品呈扁卵形或扁肾形，长2.0～3.5cm，宽1～2cm，厚0.5～1.2cm。表面淡红色至红紫色，微皱缩，略有光泽。边缘具眉状黑色种脐，长约2cm，上有白色细纹3条。质硬，难破碎。种皮革质，内表面棕绿色而光亮；子叶2，黄白色，油润。气微，味淡，嚼之有豆腥味(图15)。

以粒大、饱满、色淡红者为佳。

(2)饮片 呈不规则的碎块，表面淡红色至红紫色，碎断面呈黄白色，油润。气微，味淡，嚼之有豆腥味。

【功效】 味甘，性温。温中，下气，止呕。用于虚寒呃逆、呕吐。

14—1



15



14—2

16. 了哥王

Liaogewang　　Radix Wikstroemiae Indicae

リョウカオウ　　Root of Indian Stringbush

【来源】 本品为瑞香科植物南岭荛花 *Wikstroemia indica* (L.) C. A. Mey. 的干燥根。

【采收加工】 全年可采挖根部，洗净，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净切片，晒干或烘干。

【性状】 (1)药材　长圆柱形，略弯曲，老根常有分枝，直径0.5～3.0cm。表面黄棕色或暗棕色，具不规则浅纵皱和少数横裂纹。质坚韧，不易折断，断面强纤维性，易与木质部分离，切面皮部类白色，木部淡黄色。气微，味微苦甜，入口尝有持久的灼热不适感。

(2)饮片　类圆形或椭圆形薄片，直径0.5～3.0cm。表面黄棕色，具浅纵皱，切面皮部类白色，常有绵毛状纤维露出，木部淡黄色，导管孔细微。气微，味微苦、甜，口尝后有持久灼热不适感(图16)。

【功效】 味苦、辛，性寒。有毒。清热解毒，消肿散结，止痛。用于瘰疬、痈肿、风湿痛、跌打损伤等症。

17. 三　七

Sanqi　　Radix Notoginseng

サンシチ　　Pseudo-ginseng

【来源】 本品为五加科植物三七 *Panax notoginseng* (Burk.) F. H. Chen 的干燥根。

【产地加工】 种后第3～4年秋季开花前采挖的称为“春七”，根饱满，质较好；11月种子成熟后采挖的称为“冬七”，根较松泡，质较次。将挖出的根除去地上茎及泥土，并将芦头、侧根、须根剪下，分别晒干，作为不同的商品规格，分别称“剪口”、“筋条”、“绒根”。主根晒至半干，再反复搓揉，使发汗析出水分，晒干后置适当容器内，加入适量蜡块，往返振荡，使表面光亮呈棕黑色。

【炮制】 (1)三七　取原药材，除去杂质，商品称“三七”。

(2)三七粉　取净三七，碾成细粉可称“三七粉”。

【性状】 (1)药材　①三七　呈圆锥形或纺锤形，长1～6cm，直径1～4cm。表面灰褐色或灰黄色，有纵皱纹及支根痕。顶端有茎痕，周围有瘤状突起。体重，质坚实；击碎后皮部与木部常分离。断面灰绿、黄绿或灰白色，木部微呈放射状排列。气微，味苦回甜(图17)。

以个大、体重质坚、表面光滑、断面灰绿或黄绿者为佳。

②剪口　呈不规则的皱缩块状及条状，表面有数个明显的茎痕及环纹。气微，味苦回甜。

③筋条　呈圆柱形，长2～6cm，上端直径约0.8cm，下端直径约0.3cm。气微，味苦回甜。

④绒根　呈细圆柱形，有的扭曲，直径约0.2cm。气微，味苦回甜。

(2)饮片　三七粉　为灰白色或灰黄色粉末。气微，味苦回甜。

【功效】 味甘、微苦，性温。散瘀止血，消肿镇痛。

16

17

18. 三分三

Sanfensan **Radix Anisodii Acutanguli**

サンブンサン **Root of Common Scopolia**

【来源】 本品为茄科植物三分三 *Anisodus acutangulus* C. Y. Wu et C. Chen 的干燥根。

【采收加工】 秋季，采集叶（另用），挖取根，去净泥沙，阴干或晒干；或切成厚0.5～2.0cm 的块片，晒干。

【炮制】 用时制粗粉。

【性状】 (1)药材 为圆形、椭圆形或不规则形块片，直径2～12cm，厚0.5～2.0cm。表面棕褐色，具皱纹；切面灰白色或灰黄色，可见放射状纹理及数个同心性环纹。质坚实，断面颗粒状。气微，味微苦、麻舌。

(2)饮片 为灰黄色的粗颗粒。味微苦，有麻舌感（图18）。

【功效】 味苦、辛，性温。有大毒。解痉止痛。用于胃、十二指肠溃疡，胆绞痛、肾绞痛、肠痉挛、震颤麻痹、风湿痹痛等症。

【注】 作三分三药用的还有丽江山莨菪 *Anisodus luridus* Link. et Orto *var. fischeriamis* (Pasch.) C. Y. Wu et C. Chen、赛莨菪 *Scopolia carmiolicoides* C. Y. Wu et C. Chen 等植物的根部。

19. 三疣梭子蟹

Sanyousuozixie **Portunus Tritubercutatus**

サンユウサシカイ **Blue Crab Carapace**

【来源】 本品为梭子蟹科动物三疣梭子蟹 *Portunus tritubercutatus* (Miers)的干燥体壳。

【产地加工】 春、夏2季捕捞，取壳，洗净，晒干。

【性状】 药材 头胸甲呈梭形，稍隆起，表面具分散的颗粒。在鳃区的较粗而集中，此外又有横行的颗粒隆线3条，胃区、鳃区各1条。疣状突起共3个，胃区1个，心区2个。额分两锐齿，较眼窝背缘的内齿略小，眼窝背缘的外齿相当大，眼窝腹缘的内齿长大而尖锐，向前突出。口上脊露出在2个额齿之间。前侧缘包括外眼窝齿共具9齿，末齿长大，呈刺状。螯足发达，长节呈梭状形，前缘具4锐刺，腕节的内、外缘末端各具1刺，后侧面具3条颗粒隆线，掌节背面两隆脊的前端各具1刺，外基角具1刺。第4对步足桨状，长、腕节均宽而短，前节与指节扁平，各节边缘具短毛（图19）。

【功效】 活血散瘀，止痛消肿，清热解毒。

18

19

20. 三 棱

Sanleng **Rhizoma Sparganii**

サンリョウ **Rhizome of Common Burreed**

【来源】 本品为黑三棱科植物黑三棱 *Sparganium stoloniferum* Buch.-Ham. 的干燥块茎。

【产地加工】 冬季至次春采挖，洗净，削去外皮，晒干。

【炮制】 (1)三棱片 取原药材，除去杂质，大小个分开，浸泡至6～7成透时，捞出，闷润至透，切薄片，干燥，称“三棱片。”

(2)醋三棱 取三棱片，用米醋拌匀，稍闷，用文火加热，炒干，取出放凉，称“醋三棱”。

【性状】 (1)药材 呈圆锥形，略扁，长2～6cm，直径2～4cm。表面黄白色或灰黄色，有刀削痕，小点状须根痕略呈横向环状排列。体重，质坚实。气微，味淡，嚼之微有麻辣感。

(2)饮片 ①三棱片 为类圆形的薄片，表面灰白色或黄白色，粗糙，有多数明显的细筋脉点，周边灰棕色，有残留须根或疣状突起的须根痕。质坚。气微，味淡，嚼之微有麻辣感(图20)。

②醋三棱 形如三棱片，表面灰黄色，偶见焦黄斑，微有醋气。

【功效】 味辛、苦，性平。破血行气，消积止痛。

21. 干 姜

Ganjiang **Rhizoma Zingiberis**

カンキョウ **Dried Ginger**

【来源】 本品为姜科植物姜 *Zingiber officinale* Rosc. 的干燥根茎。

【产地加工】 秋、冬2季采挖，除去须根及泥沙，晒干或阴干。

【炮制】 (1)干姜 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片或切段，干燥。

(2)炮姜 取净干姜段，用砂炒至发泡鼓起，手捏有弹性，表面微黑色，内部棕褐色为度，筛去沙，摊晾。

(3)炮姜炭 取净干姜段，炒至微鼓起，表面呈焦黑色，内部发松呈棕褐色，存性为度，喷淋少量清水，灭尽火星，取出，摊晾。

【性状】 (1)药材 呈扁平不规则块状，具指状分枝，长3～7cm，直径1.5～2.0cm。表面灰黄色或灰棕色，具纵皱纹及明显的环节；分枝处有鳞叶残存，分枝顶端有茎痕或芽。质坚韧，折断面颗粒状，淡黄色，可见纤维状、点状的维管束及黄色油室小点。气特异芳香，味辛辣(图21—1)。

(2)饮片 ①干姜 为不规则形的厚片或段片。表面灰棕色或浅黄棕色，粗糙；切面黄白色或灰白色，内皮层环明显，具筋脉点。质坚脆。香气特异，味辛辣(图21—2、图21—3)。

②炮姜 为短扁圆柱状段片。表皮鼓起，微黑色，内部棕褐色。质地疏松。气香，辛辣味稍减。

③炮姜炭 形如炮姜，表面焦黑色，内部棕褐色。体轻，质松脆，微具焦香辣味。

【功效】 味辛，性热。干姜温中散寒，回阳通脉，燥湿消痰。炮姜温中散寒，温经止血。炮姜炭温血分之寒而止血。

21—1



20

21—2



21—3

22. 干 蟾

Ganchan　　Bufo Siccus

カンセン　　Dried Toad

【来源】 本品为蟾蜍科动物中华大蟾蜍 *Bufo bufo gargarizans* Cantor 的干燥全体。

【产地加工】 4～8月份捕捉后洗净，杀死，晒干；或剖去内脏，晒干（名蟾皮）。

【炮制】 取原药材，刷净灰土，割去头、爪，切成方块。将铁砂倒入锅内烧热，将切好的干蟾块放入拌炒，至微焦发泡时取出，筛去铁砂，放冷。

【性状】 (1)药材　带后腿长约10cm，背面通体有散在小黑点，并带有瘰疣。腹面土褐色，并有黑斑（图22—1）。

(2)饮片　炒干蟾　表面微焦发泡，质酥松，其他与干蟾同（图22—2）。

【功效】 解毒，杀虫，定痛，消肿。

23. 土大黄

Tudahuang　　Radix Rumicis Obtusifolii seu Chalepensis

ドダイオウ　　Root of Garden Sorrel

【来源】 本品为蓼科植物钝叶酸模 *Rumex obtusifolius* L. 和红丝酸模 *Rumex chalepensis* Will. 的干燥根及根茎。

【产地加工】 秋季采挖，除去杂质，洗净，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切片，晒干。

【性状】 (1)药材　呈类圆锥形，长10～20cm，直径1.0～2.5cm。表面棕红色、棕灰色或黄棕色。根茎部顶端有茎基残痕，具棕色鳞片状物及须毛状纤维。根部有分枝，表面具纵皱纹，并散在横长皮孔样疤痕及点状须根痕。质硬脆，易折断。断面黄色或棕黄色，形成层环棕色。气微，味稍苦而涩（图23—1）。

以质实、色黄、气味浓者为佳。

(2)饮片　土大黄片　呈圆形、类圆形或长圆形片，略翘起，直径0.5～2.5cm，厚0.3～0.5cm。切面棕黄色或黄棕色，形成层成环，放射状纹理明显；周边棕红色、棕黄色或黄棕色，有纵皱纹及横长皮孔。质硬脆，易折断，断面略呈纤维性。气微，味苦略涩（图23—2）。

【功效】 味辛、苦，性凉。清热解毒，止血，杀虫，破瘀消肿。



22—1

22—2

23—1

23—2

24. 土木香

Tumuxiang　　Radix Inulae

ドモッコウ　　Root of Elecampane Inula

【来源】 本品为菊科植物土木香 *Inula helenium* L. 的干燥根。

【产地加工】 秋季挖取根，切去地上茎，除去泥沙，趁鲜截成短段或对剖为2片，晒干。

【炮制】 (1)木香片　取原药除去杂质，于水中略浸，洗净泥沙，捞起，继续淋水以润软，切薄片。晒干或60℃以下低温烘干，筛去灰屑。

(2)炒木香　取净木香片，用麸皮拌炒至黄色，筛去麸皮。

【性状】 (1)药材　圆柱形或长圆锥形，稍弯曲，少数为不规则纵切块片，长10～20cm，直径0.5～2.0cm；根头部稍膨大，有纵切面或截形斜切面，边缘稍向外反卷。表面深棕色，常具斜向纵皱纹及横向皮孔，顶端有稍凹陷的茎痕及棕红色叶柄残基。质坚硬，不易折断，断面不平坦，灰白色至浅黄棕色，稍呈现角质状，形成层环纹明显。气微香，味微苦而辛，入口有灼烧感。

以根粗壮、质地坚实、香气浓郁者为佳。

(2)饮片　①木香片　为椭圆形或不规则形薄片，直径0.5～2.0cm。表面暗棕色，具纵皱，有时可见横向皮孔；切面灰白色，形成层环明显，木部微现放射状纹理。质硬脆，易折断。气微香，味微苦而辛辣(图24)。

②炒木香片　切面色较深，焦黄，余同木香片。

【功效】 味辛、苦，性温。健脾和胃，行气止痛。

25. 土牛膝

Tuniuxi　　Radix Achyranthis Longifoliae

ドゴシツ　　Root of Willowleaf Achyranthes

【来源】 本品为苋科植物柳叶牛膝 *Achyranthes longifolia* Mak. 及粗毛牛膝 *Achyranthes aspera* L. 的干燥根。

【产地加工】 冬春季之间或秋季采挖，除去茎叶及须根，晒干，或用硫黄熏后晒干。

【炮制】 取柳叶牛膝及粗毛牛膝原药材，除净杂质，润透切段，分别称“柳叶牛膝段”及“粗毛牛膝段。”

【性状】 (1)药材　①柳叶牛膝　根4～9条，扭曲，长10～20cm，直径0.4～1.2cm，向下渐细。表面灰黄褐色，具细密的纵皱纹及除去须根后的痕迹。质硬而稍有弹性，易折断。气微，味初微甜而后涩(图25—1)。

以皮细、色灰黄褐者为佳。

②粗毛牛膝　根呈细长圆柱形，长8～10cm，直径0.2～0.5cm，略弯曲。表面灰棕色，有细浅的纵皱纹。质坚硬，易折断。气微，味淡(图25—2)。

(2)饮片　①柳叶牛膝段　呈短圆柱形，长0.3～0.6cm，直径0.4～1.2cm。表面灰黄褐色，可见细密纵皱纹。断面皮部淡灰褐色，略光亮，可见多数点状散布的维管束。气微，味初微甜而后涩(图25—3)。

②粗毛牛膝段　呈圆柱形小段，长0.3～0.5cm，直径0.2～0.5cm。表面灰棕色。断面灰青色至灰白色，纤维性。气微，味淡(图25—4)。

【功效】 味苦、酸，性平。活血散瘀，祛湿利尿，清热解毒。



24

25—1

25—2

25—3



25—4

26. 土荆皮

Tujingpi　　Cortes Pseudolaricis

ドケイヒ　　Bark of Golden Larch

【来源】 本品为松科植物金钱松 *Pseudolarix kaempferi* Gord. 的干燥根皮或近根部的树皮。

【产地加工】 于春、冬2季剥取根皮，除去外粗皮和泥沙，晒干。

【炮制】 将原药材用清水洗净泥屑，置竹篓中润6～8小时至软，先切成3cm宽的长条，再切成0.3cm宽的丝，晒干。

【性状】 (1)药材　①根皮　呈不规则条片，扭曲，稍为卷，厚0.2～0.5cm。外表面灰黄色，粗糙，灰白色皮孔横长，粗皮常呈鳞片状剥落，显红棕色；为表面黄棕色至红棕色，有细纵向纹理。质韧，断面层片状。气微，味苦而涩。

②树皮　板片状，厚约0.8cm，粗皮较厚。外表面龟裂状，内表面稍粗糙(图26)。

(2)饮片　呈丝状，长3cm，宽0.3cm。外表面灰黄色或红棕色，较粗糙，内表面红棕色。气微，味苦而涩。

【功效】 味辛，性温。有毒。杀虫止痒。用于疥癣、瘙痒等症。

27. 土茯苓

Tufuling　　Rhizoma Smilacis Glabrae

ドブグリヨウ　　Rhizome of Glabrous Greenbrier

【来源】 本品为百合科植物光叶菝葜 *Smilax glabra* Roxb. 的干燥根茎。

【产地加工】 于秋、冬2季采挖，除去须根，洗净，干燥；或趁鲜切成薄片，干燥。

【炮制】 取原药材，除去杂质，大小个分开，浸泡，洗净，润透，切薄片，干燥，称“土茯苓片”。

【性状】 (1)药材　呈圆柱形，稍扁或呈不规则条块，有结节状隆起，具短分枝，长5～22cm，直径2～5cm。表面黄棕色或灰褐色，凹凸不平，有坚硬的须根残基，分枝顶端有圆形芽痕，有的外皮现不规则裂纹，并有残留的鳞叶；质坚硬。断面类白色至淡红棕色，粉性，可见点状维管束及多数小亮点；质略韧，折断时有粉尘飞扬，以水湿润后有粘滑感。无臭，味微甜、涩(图27—1)。

以粉性足、筋脉少、断面色淡棕色者为佳。

(2)饮片　土茯苓片　为不规则的类圆形薄片，厚0.1～0.5cm，边缘不整齐，断面白色至淡红棕色，粉性，可见多数小亮点。气微，味微甜、涩(图27—2)。

【功效】 味甘、淡，性平。除湿，解毒，通利关节。

26

27—1

27—2

28. 土党参

Tudangshen　Radix Campanumoeae

ドトウジン　Root of Java Campanumoea

【来源】 本品为桔梗科植物大花金钱豹 *Campanumoea javanica* Bl. 和金钱豹 *Campanumoea javanica* Bl. *var. japonica* (Makino) Hong 的干燥根。

【产地加工】 于秋、冬2季采挖，除去须根，洗净，干燥。

【炮制】 取原药材，除去芦头，洗净，润透，切厚片，干燥，称"土党参片"。

【性状】 (1)药材　略呈圆柱形，具棱，稍弯曲，根头部有短根茎，下部有分枝；长8～20cm，直径0.5～2.0cm。表面灰黄色，有不规则纵皱及多数疙瘩状突起。质硬，易折断。气微，味微甜(图28—1)。

以条粗壮、质柔润、味微甜者为佳。

(2)饮片　土党参片　呈类圆形的厚片，直径0.5～2.0cm，厚0.3～0.5cm。表面灰黄色，粗糙。断面不平坦，类白色或黄色。气微，味微甜(图28—2)。

【功效】 味甘、微苦，性温。健脾胃，补肺气，祛痰止咳。

29. 土鳖虫

Tubiechong　Eupolyphaga seu Steleophaga

ドベツチュウ　Ground Beetle

【来源】 本品为鳖蠊科昆虫地鳖 *Eupolyphaga sinensis* Walker 或冀地鳖 *Steleophaga plancyi* (Boleny)的雌虫干燥体。

【产地加工】 于夏、秋2季捕捉后，置沸水中烫死，晒干或烘干。

【炮制】 (1)土鳖虫　取原药材，除去杂质，洗净，或筛去灰屑，干燥，通称"土虫"。

(2)炒土鳖虫　取净土鳖虫置锅内，文火加热，炒至微焦，取出放凉，称为"炒土鳖虫"。

【性状】 (1)药材　①地鳖　呈扁平卵圆形，长1.3～3.0cm，宽1.2～2.4cm。前端较窄，后端较宽，背部紫褐色，有光泽，无翅。背部有胸背板3节，前胸背板较发达，盖住头部；腹背板9节，覆瓦状排列。腹面红棕色，头部较小，具丝状触角1对，多脱落。胸部具足3对，上有细毛和刺。腹部有横环节，质松脆，易碎。气腥臭，味微咸(图29—1)。

②冀地鳖　呈长椭圆形，长2.2～4.0cm，宽1.5～2.5cm。背部黑棕色，通常在边缘带有淡黄褐色斑块及黑色小点(图29—2)

均以完整、色紫褐者为佳。

(2)饮片　炒土鳖虫　形如土鳖虫，色泽稍深(图29—3地鳖、图29—4冀地鳖)。

【功效】 味咸，性寒。有小毒。破瘀血，续筋骨。

28—1



28—2

29—1

29—3

29—2

29—4

30. 大丁草

Dadingcao　　Herba Leibnitziae

ダイテイソウ　　Herb of Common Leibnitzia

【来源】 本品为菊科植物大丁草 *Leibnitzia anandria* (L.) Turcz. 的干燥全草。

【产地加工】 于夏、秋2季采收，去净泥土，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，稍润，切段，干燥，称“大丁草段”。

【性状】 (1)药材　花茎呈圆柱形，表面有白色蛛丝毛。叶椭圆形，先端圆钝，基部心脏形，叶上表面绿色，背面密被白色蛛丝毛。头状花序单生，直径2cm，苞片约3层，舌状花紫红色。瘦果，冠毛长0.4～0.5cm。气微，味辛辣(图30—1)。

以质嫩、叶多、被白色蛛丝毛者为佳。

(2)饮片　大丁草段　呈不规则的小段，花茎、叶、头状花序混合。叶多破碎。气微，味辛辣(图30—2)。

【功效】 味苦，性平。祛风湿，解毒。

31. 大血藤

Daxueteng　　Caulis Sargentodoxae

ダイゲットウ　　Stem of Sargentgloryvine

【来源】 本品为木通科植物大血藤 *Sargentodoxa cuneata* (Oliv.) Rehd. et Wils. 的干燥藤茎。

【产地加工】 于秋、冬2季采收，除去侧枝，截段，干燥。

【炮制】 取原药材，除去杂质，稍浸，洗净，润透，切厚片，干燥，称“大血藤片。”

【性状】 (1)药材　呈长圆柱形，略弯曲，长30～60cm，直径1～3cm。表面黄棕色，粗糙，外皮常呈鳞片状剥落，剥落处显暗红棕色，有的可见膨大的节及略凹陷的枝痕或叶痕。质硬，不易折断，体轻。气微，味微涩(图31—1)。

以条匀、切面色黄白、无黑心者为佳。

(2)饮片　大血藤片　呈圆形，直径2～4cm，厚0.2～0.4cm，断面红棕色，有数处向内嵌入木部，木部黄白色，有多数细孔状导管，射线呈放射状排列。气微，味微涩(图31—2)。

【功效】 味苦，性平。清热解毒，活血，祛风。

30—1

30—2



31—2

31—1

32. 大良姜

Daliangjiang **Rhizoma Galangae**

ダイリョウキョウ **Rhizome of Galanga Galangal**

【来源】 本品为姜科植物大高良姜 *Alpinia galanga* (L.) Willd. 的干燥根茎。

【产地加工】 秋季采挖，除去地上部分及须根，切段，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片，晒干。

【性状】 (1)药材 呈圆柱形长段，多有分枝。长5～10cm，直径1.5～3.0cm。表面红棕色至棕褐色，有黄棕色的波状环节及纵皱纹。质坚韧，不易折断。断面纤维性，黄棕色，皮层约占直径的2/3。气香，味辛辣(图32—1)。

以表面红棕色、断面黄棕色、气味浓者为佳。

(2)饮片 呈圆形、长圆形或不规则形块片，直径1～3cm，厚0.2～0.5(～1)cm；斜切片长达8cm。切面淡黄色至淡黄棕色，纤维性强，片面偶有橙黄色圆点状根痕切迹2～3个，横切面中柱明显，约占直径的1/4，颜色略浅。周边棕红色或棕黄褐色，光滑或少有纵纹，偶见浅土黄色的波状环节与圆形鳞毛状根痕残迹。质坚而疏松。易折断，断面纤维性并粉性。香气较弱，味微辛辣(图32—2)。

【功效】 味辛，性热。散寒，暖胃，止痛。

33. 大 枣

Dazao **Fructus Jujubae**

タイソウ **Jujube**

【来源】 本品为鼠李科植物枣 *Zizyphus jujuba* Mill. *var. inermis* (Bge.) Rehd. 的干燥成熟果实。

【产地加工】 秋季果实成熟时采收，晒干或烘熟后晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，用水快速洗净，晒干或烘干。

【性状】 (1)药材 呈类球形或椭圆形，长2.0～3.5cm，直径1.5～2.5cm。表面暗红色，微有光泽和不规则皱纹。柱基和基部均凹陷。外果皮薄；中果皮肉质，棕黄色；果核纺锤形，两端锐尖，质地坚硬。气微香，味甜(图33—1、图33—2大泡枣)。

(2)饮片 呈不整齐的条形或不规则碎块状，大小不等，最长1.5cm，果肉和果核混合，常粘结成块。果肉外皮皱缩不平，枣红色，有光泽；中层黄棕色或色稍浅，似软木状，较软，果核呈梭形，完整者长约1.5cm 左右，表面棕红色，常粘有果肉，坚硬，切断面有中隔，内表面淡绿黄白色。气微香，味甜(图33—3)。

【功效】 味甘，性温。补中益气，养血安神。用于脾虚食少，乏力便溏，妇人脏躁等症。

32—1

32—2

33—3

33—1

33—2

34. 大菟丝子

Datusizi **Semen Cuscutae Japonicae**

ダイトシシ **Seed of Japanese Dodder**

【来源】 本品为旋花科植物金灯藤 *Cuscuta japonica* Choisy 的成熟干燥种子。

【产地加工】 秋季果实成熟时采收，晒干，打下种子，除去杂质。

【炮制】 (1)大菟丝子 取原药材，除去杂质，筛去灰屑，统称“大菟丝子”。

(2)盐大菟丝子 取净大菟丝子，用盐水拌匀，置锅内，用文火加热，炒至有爆裂声时，取出放凉，称“盐大菟丝子”。

【性状】 (1)药材 呈类球形或三棱形，直径0.2～0.3cm。表面淡黄色、黄棕色或棕褐色，中心微凹陷；种脐圆形，色较淡。质坚硬，不易以指甲压碎。气微，味微涩，嚼之微有粘滑感(图34－1)。

以颗粒饱满、表面淡黄色、无杂质者为佳。

(2)饮片 盐大菟丝子 形如大菟丝子，表面色较深，有的种皮破裂，露出浅黄白色的胚。质酥脆。气微，味微涩(图34－2)。

【功效】 味甘、辛，性平。补肝肾，益精髓，明目，安胎。

35. 大 黄

Dahuang **Radix et Rhizoma Rhei**

ダイオウ **Rhubarb**

【来源】 本品为蓼科植物掌叶大黄 *Rheum palmatum* L.、唐古特大黄 *Rheum tanguticum* Maxim. ex Balff. 或药用大黄 *Rheum officinale* Baill. 的干燥根及根茎。前2种主产于甘肃和青海，分别称为“铨水型大黄”、“西宁型大黄”，统称为“北大黄”；后1种主产于四川，称为“川大黄”或“马蹄型大黄”，又统称为“南大黄”。

【产地加工】 秋末茎叶枯萎或次春发芽前采挖，除去细根，刮去外皮，切瓣或段，或加工成卵圆形或圆柱形，用羊毛绳串起，悬挂屋檐下阴干、晒干，或用暗火烟熏干燥。也有的干后放于竹笼中撞光。

【炮制】 (1)大黄片 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片或块，晾干，统称“大黄”或“大黄片”。

(2)蛋吉 挑选原药材中的块大者，置竹笼中撞光，并加工成卵圆形，称“蛋吉”。

(3)中吉、苏吉、小吉 挑选原药材中的较大块，置竹笼中撞光，切段，按大小不同挑选分等，分别称为“中吉”、“苏吉”、“小吉”。

(4)蛋片吉 取“蛋吉”纵切成瓣，称为“蛋片吉”。

(5)水根 取大黄主根及支根，撞去外皮，称“水根”。

(6)南大黄 取药用大黄的根与根茎，切段，晾干，称“南大黄”。

(7)酒大黄 取大黄片，加酒拌匀，闷透，置锅内，用文火炒干，取出，放凉，称“酒大黄”。

(8)熟大黄 取大黄块，加酒拌匀，炖或蒸至内外均呈黑色，称“熟大黄”。

(9)醋大黄 取大黄片，用米醋拌匀，闷润至透，置锅内，用文火加热，炒干，取出，放凉，称为

34—1



34—2

35—1

35—2

35—4

35—3

“醋大黄”。

(10)大黄炭　取大黄或大黄片，置热锅中，炒至表面焦黑色，内部焦褐色，称“大黄炭”。

(11)清宁片　取大黄，置锅内，加水漫过药材，用武火加热，煮至熟时(约2小时)，加入黄酒(100∶30)搅拌，再煮成泥状，取出晒干。粉碎，过100目筛，取细粉再与黄酒、炼蜜混合成团块状，置笼屉内蒸透(约2小时)，取出揉匀，搓成直径约1.5cm的圆条，置于50～55℃低温下干燥，烘至七成干时，装入容器内，闷约10天至内外温度一致，手摸有挺劲，取出，切厚片，晾干，称“清宁片”。

【性状】　(1)药材　呈类圆柱形、圆锥形、卵圆形或不规则块状，长3～17cm，直径3～10cm。除尽外皮者表面黄棕色至红棕色。有的可见类白色网状纹理及星点散在，外皮残留处棕褐色，多具绳孔及粗皱纹。质坚实，有的中心稍松软，断面淡红棕色或黄棕色，显颗粒性；根茎髓部宽广，星点环列或散在；木部发达，具放射状纹理，形成层环明显，无星点。气清香，味苦而微涩，嚼之粘牙，有砂粒感(图35－1、图35－2唐古特大黄、图35－3掌叶大黄)。

①北大黄　蛋吉　呈圆锥形或腰鼓形，长5～17cm，直径3～10cm。外皮黄棕色或红棕色，有类白色菱形的网状纹理和菊花状螺旋形“星点”，一端常有绳孔。质坚实，横断面黄棕色，显颗粒性，微有油性，近外围有时可见暗色形成层及橘红色射线，髓部有紫褐色星点，紧密排列成环状。气清香，味苦、微涩(图35－4)。

中吉　呈圆柱形，长5～12cm，直径3～10cm。表面黄棕色，有网状纹理及刀削痕。质坚实，横断面黄棕色，显颗粒性，具放射状纹理，髓部有星点环列。气清香，味苦、微涩(图35－5)。

苏吉　呈不规则圆柱形，长4～10cm，直径3～8cm。表面黄棕色。体重质坚，断面淡红棕色或黄棕色，具放射状纹理及明显环纹，红肉白筋。髓部有星点环列或散在的颗粒。气清香，味苦、微涩(图35－6)。

小吉　呈短圆柱形，长3～7cm，直径2～5cm。表面黄棕色，质坚略重，断面黄棕色或淡红棕色，具放射状纹理及环纹。气清香，味苦、微涩(图35－7)。

蛋片吉　为纵切成瓣的略呈半圆形块，一面圆凸，一面略平坦，直径8～15cm。表面黄棕色，断面淡红棕色或黄棕色，具放射状纹理及明显环纹，髓部有星点环列或散在颗粒。气清香，体重质坚。味苦、微涩(35－8)。

水根　呈长圆锥形或长条形，长4～12cm，直径1.5～2.0cm。表面棕色或黄褐色，间有未除净的栓皮。质坚而脆，易折断。断面淡红色或黄褐色，具放射状纹理。气清香，味苦、微涩(图35－9)。

②南大黄　呈类圆柱形，一端稍大，形如马蹄，长5～15cm，直径3～10cm。表面黄褐色或棕色，有微弯曲的棕色线纹。横断面黄褐色，多有孔隙，星点断续排列成环状。质较疏松，富纤维性。气微清香，味涩而苦(图35－10)。

均以身干、质坚实、断面显锦纹、稍有油性、气清香、味苦而微涩者为佳。

(2)饮片　①大黄片　为类圆形或不规则形厚片，厚2～4mm，直径3～10cm，斜切片长至15cm。切面黄棕色或黄褐色，颗粒性；若为根茎则髓部较大，其中有星点环列或散在，放射状纹理不明显；若为根则木质部发达，具明显的放射状纹理，射线红色，无髓，无星点。周边黄棕色至红棕色，可见类白色网状纹理或残存有红棕色至黑棕色外皮。质轻脆，易折断。气清香，味苦、微涩，嚼之粘牙，有砂粒感(图35－11)。

②酒大黄　形如大黄，表面深褐色，偶有焦斑。略有酒气(图35－12)。

③熟大黄　形如大黄，表面黑褐色。味微苦，有特异香气(图35－13)。

④醋大黄　形如大黄，表面深棕色至棕褐色，偶有焦斑。略有醋酸气(图35－14)。

⑤大黄炭　形如大黄，表面焦黑色，断面焦褐色。质轻而脆，无臭，味微苦(图35－15)。

35—5

35—6

35—7



35—8

35—9

35—10

35—11

35—12

⑥清宁片　为圆形厚片，直径约1.2cm，厚约2mm，表面乌黑色，质细，坚硬。有香气（图35—16）。

【功效】 味苦，性寒。泻热通肠，凉血解毒，逐瘀通经。生大黄长于攻下。酒大黄擅清上焦血分热毒。熟大黄泻下力缓，偏于泻火解毒。醋大黄消积作用较强。大黄炭凉血化瘀止血。清宁片泻热通便。

附：中吉加工品（日本）

呈不规则的颗粒状，最大直径约1.5cm 左右。颗粒有棱角，黄棕色，可见棕红和灰白相间的大理石样花纹或点痕。质硬，难折断，折断面棕红和灰白相间的纹理极明显。气香，味苦、涩，嚼之唾液染成黄色（图35—17）。

甘肃锦纹大黄（图35—18）。

35—13



35—16

35—15

35—14



35—18

35—17

36. 大腹皮

Dafupi　　Pericarpium Arecae

タイフクヒ　　Areca Peel

【来源】 本品为棕榈科植物槟榔 *Areca catechu* L. 的干燥果皮。

【产地加工】 冬季至翌年春季，采收未成熟的槟榔果实，低温下烘干，或用水煮后低温烘干，纵剖成2瓣，除去种子，即为“大腹皮”。如采摘成熟果实，低温烘干或煮后烘干，剥取果皮，打松，用水浸泡，晒干，再打松，除去硬皮壳，即得“大腹毛”。

【炮制】 取原药材，有硬壳的先用棒敲软，再用清水淘净，捞起，晒干，冻去杂质，筛去灰屑。大腹毛直接用清水淘净，捞起，晒干，筛去灰屑。

【性状】 (1)药材　①大腹皮　呈长椭圆形或长卵形，外凸内凹，长4～7cm，宽2.0～3.5cm，厚0.2～0.5cm。外表面深棕色至近黑色，有不规则纵皱或横纹，有些光滑而显光泽，顶端有柱基痕，另端有果柄；中层黄白色至灰黄色，疏松，纤维多呈纵向排列，内表面凹陷，黄褐色或深褐色，光滑壳状。体轻，质硬，易纵向剥裂。气微，味淡而稍涩。

②大腹毛　为疏松纤维，多呈纵向排列或松散状，长4～7cm，粗0.1mm左右，黄白色或淡棕色，间有粘附外果皮、内果皮碎片或中果皮的小颗粒。体轻松，质柔韧(图36－1)。

【功效】 味辛，性微温。下气宽中，行气利水。用于胸腹胀满、水肿、尿少便秘等症。

附：台湾产大腹皮(图36－2)。

37. 山芝麻

Shanzhima　　Radix Helicteris

サンシマ　　Root of Narrowleaf Screwtree

【来源】 本品为梧桐科植物山芝麻 *Helicteres angustifolia* L. 的干燥根。

【产地加工】 全年可采，以夏、秋2季采收为好，挖取根，除去须根及泥土，干燥。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切成2cm长的段块，晒干，称“山芝麻段”。

【性状】 (1)药材　呈圆柱形，略扭曲，头部常带有结节状的茎枝残基，长15～25cm，直径为0.5～1.5cm。表面灰黄色至灰褐色，栓皮粗糙，有纵斜裂纹，老根栓皮易片状剥落。质坚硬。气微香，味苦、微涩(图37－1)。

(2)饮片　山芝麻段　呈2cm长的段块，断面皮部较厚，暗棕色或灰黄色，强纤维性，易与木部剥离并撕裂；木部黄白色，具微密放射状纹理。气微香，味苦、微涩(图37－2)。

【功效】 味辛、微苦，性凉。解表清热，消肿解毒。

36—1

36—2

37—2

37—1

38. 山豆根

Shandougen **Radix Sophorae Tonkinensis**

サンズコン **Rhizome and Root of Tonkin Sophora**

【来源】 本品为豆科植物越南槐 *Sophora tonkinensis* Gapnep. 的干燥根及根茎。

【产地加工】 秋季挖取根及根茎，除去茎叶和须根，洗净泥土，晒干。

【炮制】 将原药材除去杂质，分档，水浸2～6小时，洗净，捞起，继续淋水润软，截去残茎，切极薄片，晒干，筛去灰屑。

【性状】 (1)药材 根茎呈不规则结节状，顶端常残留茎基，其下生根数条。根为长圆柱形，略弯曲，常分枝，直径0.3～1.5cm，表面灰褐色至棕褐色，有纵皱及横长皮孔。质坚硬，不易折断，断面平坦，皮部淡黄色，木部黄白色。微有豆腥气味，味极苦(图38－1)。

以根条粗壮、表面棕褐色、质坚、味苦者为佳。

(2)饮片 多为类圆形或斜切薄片，直径0.3～1.5cm。表面灰褐色至棕褐色，切面皮部淡黄色，木部黄白色，有放射状花纹。入口咀嚼有豆腥气，味极苦(图38－2、图38－3)。

【功效】 味苦，性寒。清热解毒，消肿止痛。

39. 山 药

Shanyao **Rhizoma Dioscoreae**

サンヤク **Rhizome of Common Yam**

【来源】 本品为薯蓣科植物薯蓣 *Dioscorea opposita* Thunb. 的干燥根茎。

【产地加工】 冬季地上苗枯萎后采挖，切去根头，洗净泥土，用竹刀或铜刀削净外皮及须根，用硫磺熏后，干燥，即为“毛山药”。选择肥大顺直的“毛山药”，用水浸润，闷透，用硫磺熏后，削去疙瘩，然后用木板搓揉，使成圆柱形，切齐两端，干燥打光，即为“光山药”。

【炮制】 (1)山药片 取原药材，除去杂质，大小条分开，浸泡到3～4成透，捞出，闷润至透，切厚片，及时干燥，称“山药片”。

(2)麸炒山药 取麸皮撒入热锅内，用中火加热，待冒烟时，投入山药片，拌炒至黄色，取出，筛去焦麸放凉(每100kg 山药，用麦麸10kg)，称“麸炒山药”。

(3)土炒山药 取伏龙肝粉置锅内，用文火加热，加入山药片，拌炒至表面挂土色，取出筛去土，放凉(每100kg 山药，用伏龙肝粉30kg)，称“土炒山药”。

【性状】 (1)药材 ①毛山药 略呈圆柱形，稍扁而弯曲，长15～30cm，直径1.5～5.0cm。表面黄白色或棕黄色，有明显纵皱及少数须根痕。质坚实，不易折断。气微，味甜、微酸，嚼之发粘(图39－1)。

②光山药 呈圆柱形，两端平齐，长9～18cm，直径0.9～3.0cm。表面光滑，白色至黄白色。余同毛山药(图39－2)。

以质坚实、粉性足、色白者为佳。

(2)饮片 ①山药片 呈圆形厚片，直径1.5～5.0cm，厚0.2～0.4cm。表面白色或淡黄色。断面白色至黄白色，光滑而平坦。质地坚脆，粉性。气微，味甜、微酸(图39－3)。

38—1

38—2

39—1

38—3



39—3

39—2

②麸炒山药　形如山药片，表面淡黄色，偶有焦斑，略具焦香气(图39－4)。

③土炒山药　形如山药片，表面土红色，粘有土粉，略具焦香气(图39－5)。

【功效】 味甘，性平。补脾养胃，生津益肺，补肾涩精。

附：山药丁(日本加工品)

呈长方形或不规则形的小立方块状，大小在0.4～1.5cm之间。白色，极少数带有黄白色皮，具棱角，表面有粉尘，略显不平。质脆，粉性，折断后内外颜色一致。气微，味淡，嚼之略显粘性(图39－6)。

出口品(图39－7毛山药、图39－8山药片)。



39—4



39—5

39—8



39—7

39—6

40. 山 柰

Shannai **Rhizoma Kaempfferiae**

サンナ **Rhizome of Galanga Resurrectionlily**

【来源】 本品为姜科植物山柰 *Kaempferia galanga* L. 的干燥根茎。

【产地加工】 冬季地上茎叶枯萎时采挖洗净泥土，除去须根，切厚片，干燥。

【炮制】 取原药材，除去杂质，筛去灰屑。未切片者，洗净，润软，切厚片，干燥，称“山柰片”。

【性状】 (1)药材 根茎呈块状，单个或数个相连。直径1.2cm，长3～6cm。表面淡绿色或绿白色，具不规则的皱褶，有的可见根痕及残存的须根。质地坚脆，易折断。气芳香，味辛辣(图40－1)。

以质脆、易折断、气芳香、味辛辣、粉性足、饱满者为佳。

(2)饮片 山柰片 呈不规则的圆形横切片，直径在1～2cm，通常厚3～5mm；少数为纵切片或斜切片。外皮浅褐色或淡绿色，有皱褶。切面类白色，富粉性。有时可见内皮层环纹，中柱常略凸起，习称“缩皮凸肉”。质坚脆。气芳香，味辛辣(图40－2)。

【功效】 味辛，性温。行气温中，消食，止痛。

41. 山银柴胡

Shanyinchaihu **Radix Arenariae seu Silenii**

サンギンサイコ **Root of Oldham Gypsophila**

【来源】 本品为石竹科植物灯心蚤缀 *Arenaria juncea* Bieb. 及旱麦瓶草 *Silene jenisseensis* Willd. 的干燥根。

【产地加工】 春、秋2季采挖，除去残茎、泥土等杂质，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片，晒干。

【性状】 (1)药材 ①灯心蚤缀 略呈圆锥形，长6～18cm，直径1～3cm。近根头处有细环纹及须根痕，根头部有多数地上茎的残基，呈分枝状。表面淡棕黄色或灰黄色，粗糙，有纵皱纹及支根痕，栓皮脱落处显黄色。质轻松，易折断。断面黄白色，有放射状纹理。气微，味甜、微苦(图41－1)。

以粗大、条长、皮细、表面淡棕黄色者为佳。

②旱麦瓶草 呈圆柱形，长7～20cm，直径0.5～2.0cm。根头部粗大，常有2～8个地上茎的残基，表面有细横纹及多数疣点状突起。表面黄褐色或黄棕色，有纵纹。体轻，质脆，易折断。断面黄白色，多裂隙。气微，味微甜、辛(图41－2)。

以根粗、皮细、表面黄棕色、断面黄白色者为佳。

(2)饮片 ①灯心蚤缀片 呈圆形片，厚0.2～0.3cm，直径0.5～1.5(～3.0)cm。切面黄白色，木质部灰黄色，射线白色，呈放射状。形成层浅棕色，皮部白色；周边灰棕色或淡灰褐色，有纵皱纹，有时可见横环纹。体轻，质脆，易纵向折断。气微，味甜、微苦(图41－3)。

②旱麦瓶草片 呈圆形或类圆形片，厚0.2～0.3cm，直径0.5～2.0cm。切面黄白色，木质部有明显的裂隙，导管呈放射状，皮部类白色；周边黄色或黄棕色，有纵皱纹。体轻，质脆。气微，味微甜、辛(图41－4)。

【功效】 味甘、苦，性寒。清热凉血，理气止咳，除蒸截疟。



40—2

40—1

41—1

41—2

41—3

41—4

42. 山溪鲵

Shanxini Batrachuperus Pinchonii

サンジニ Alpine Salamander

【来源】 本品为小鲵科动物山溪鲵 *Batrachuperus pinchonii* (David)的全体。

【产地加工】 夏、秋2季捕捉，然后用酒闷死，晒干或微火烘干，也可鲜用。

【性状】 药材 呈干瘪状，长15cm左右，头圆，尾扁，四肢多完整，脊背可见明显的脊椎骨棱，腹面皱缩。全体黑褐色(图42)。

【功效】 续断接骨，行气止痛。

43. 山慈菇

Shacigu Pseudobulbus Cremastrae Appendiculatae

サソジコ Pseudobulb of Appendiculate Cremastra

【来源】 本品为兰科植物杜鹃兰 *Cremastra appendiculata* (D. Don) Makino 的干燥假鳞茎。

【产地加工】 7～8月份挖取假鳞茎，除去茎叶、泥沙，晒干，或蒸透后晒干或烘干。

【炮制】 除去杂质，分档，水浸1～3小时，捞起摊放，继续泅水润软后切片，晒干或烘干，筛去灰屑。

【性状】 (1)药材 呈圆锥形，直径1～2cm，顶端有茎痕，基部脐状，有须根痕，表面黄棕色、灰棕色，有纵皱和2～3条横向环节，节上有鳞叶痕，质坚实。断面粉性或角质(经蒸透后晒干)。气微，味淡，沾水后有粘滑感。

(2)饮片 切片类圆形或类三角形，片厚2～3mm。表面黄棕色，有纵皱和2～3条突起的横纹，切面黄白色，角质，或粉性，有筋脉纹。气微，味淡。入口咀嚼有粘滞感(图43)。

【功效】 味辛、甘，性寒。有小毒。消肿散结，清热解毒。

44. 千斤拔

Qianjinba Radix Moghaniae

センキンバツ Root of Philippine Flemingia

【来源】 本品为豆科植物千斤拔 *Moghania phulippinensis* (Merr. et Rolfe) Li 的干燥根。

【产地加工】 秋后采挖，除去须根及茎苗，干燥。

【炮制】 取原药材，除去杂质，大小分开，抢水洗净，稍润，切斜片，干燥。

【性状】 (1)药材 根呈圆锥形，长15～30cm，根头部较膨大。表面棕红色，皮孔明显，皮部易剥落。质坚硬，断面白色，粉性，呈菊花心。气微，味淡，有豆腥气(图44－1)。

(2)饮片 千斤拔片 为类圆形斜片，表面淡棕红色；切面白色，有菊花心。气微，味淡，有豆腥气(图44－2)。

【功效】 味甘、辛，性温。祛风利湿，消瘀解毒。

43

42

44—1

44—2

45. 千屈菜

Qianqucai **Herba Lythri Salicariae**

セソクツサイ **Herb of Spiked Loosestrife**

【来源】 本品为千屈菜科植物千屈菜 *Lythrum salicaria* L. 的干燥全草。

【产地加工】 秋季采收，除去杂质，晒干。

【炮制】 取原药材，洗净，稍润，切段，干燥，称“千屈菜段”。

【性状】 (1)药材 茎多分枝，有4棱，被毛。叶互生，一回或二回羽状分裂，裂片倒卵形。淡绿色或黄绿色。质轻脆，易破碎。气微，味苦、涩(图45 1)。

以质嫩、叶多、黄绿色、无杂质者为佳。

(2)饮片 千屈菜段 呈不规则的小段，茎、叶混合。茎有4棱，被毛。叶多破碎，完整者呈一回或二回羽状分裂，裂片倒卵形，淡绿色或黄绿色。质轻而脆，气微，味苦、涩(图45—2)。

【功效】 味苦，性寒。清热，凉血。

46. 川木香

Chuanmuxiang **Radix Vladimiriae**

セソモッコウ **Root of Common Vladimirio**

【来源】 本品为菊科植物川木香 *Vladimiria souliei* (Franch.) Ling 或灰毛川木香 *Vladimiria souliei* (Franch.) Ling *var. cinerea* Ling 的干燥根。

【产地加工】 冬季采挖，去净泥土、须根及地上茎，切段，粗大的纵剖成瓣，干燥。

【炮制】 取原药材，除去杂质，削去黑色油头(根头上的胶状物)，刮去粗皮，洗净，润透，切厚片，低温干燥。

【性状】 (1)药材 呈圆柱形，或有纵槽，长10～30cm，直径1～3cm。表面黄褐色或暗褐色，外皮脱落处有丝瓜络状细筋脉，根头偶有黑色的胶状物，习称“糊头”或“油头”。体较轻，质脆，易折断。断面黄色，散有稀疏黄色油点及裂隙，木部较宽，有放射状纹理；有的中心呈腐朽状。气微香，味苦，嚼之粘牙(图46—1)。

(2)饮片 川木香片 为类圆形的厚片，直径1.5～2.5cm。表面淡黄色，散有棕黄色稀疏油点及裂隙，有的中心呈枯朽状，木部呈菊花形放射状纹理，周边有一明显的环纹，外皮黄褐色或棕褐色。气微香，味苦(图46—2)。

【功效】 味辛、苦，性温。行气，止痛，消胀。

45—2

45—1

46—1

46—2

47. 川木通

Chuanmutong **Caulis Clematidis Armandii**

セソモクツウ **Stem of Armand Clematis**

【来源】 本品为毛茛科植物小木通 *Clematis armandii* Franch. 或绣球藤 *Clematis montana* Buch.-Ham. 的干燥藤茎。

【产地加工】 于秋、冬2季采收，除去粗皮，干燥。

【炮制】 取原药材，除去杂质及粗皮，洗净，润透，切斜薄片，干燥。

【性状】 (1)药材 藤茎呈长圆柱形，略扭曲，长50～101cm，直径2.0～3.4cm。表面黄棕色或黄褐色，有纵向凹沟及棱线。节处多膨大，有侧枝痕及叶痕。质坚硬，不易折断。横切面边缘不整齐，木部浅棕色或浅黄色；布满小孔，髓部类白色或黄棕色。无臭，味淡(图47－1)。

(2)饮片 川木通片 为椭圆形斜薄片，短径2.0～3.5cm。切面边缘不整齐。黄棕色或黄褐色；木部浅黄棕色或浅黄色，有黄白色放射状纹理及裂隙，其间布满导管孔；髓部较小，类白色或黄棕色，偶有空腔。质坚硬，不易折断。无臭，味淡(图47－2、图47－3)。

【功效】 味淡，性寒。清热利尿，通利血脉。

48. 川贝母

Chuanbeimu **Bulbus Fritillariae Cirrhosae**

セソバイモ **Bulb of Tendrilleat Fritillary**

【来源】 本品为百合科植物川贝母 *Fritillaria cirrhosa* D. Don.、暗紫贝母 *Fritillaria unibracteata* K. C. Hsia、甘肃贝母 *Fritillaria przewalskii* Maxim. 或梭砂贝母 *Fritillaria delavayi* Franch. 的干燥鳞茎。前3者按药材性状不同分别习称“松贝”、“青贝”，后者习称“炉贝”。

【产地加工】 于夏、秋2季采挖，除去须根、粗皮及泥沙，干燥。

【炮制】 取原药材，除去杂质，用时捣碎或研成细粉。

【性状】 (1)药材 ①松贝 为类圆锥形或近球形，高0.3～0.8cm。直径0.3～0.9cm。表面类白色，外层鳞叶2瓣，大小悬殊，大瓣紧抱小瓣，未抱部分呈新月形，习称“怀中抱月”；顶部闭合，内有圆柱形、顶端稍尖的心芽和小鳞叶1～2枚；先端钝圆或稍尖，底部平，微凹入，中心有1灰褐的鳞茎盘，偶有残存须根。质硬而脆，断面白色，富粉性。气微，味微苦(图48－1、图48－2)。

②青贝 为类扁球形，高0.4～1.4cm，外层鳞叶2瓣，大小相近，相对抱合，顶部开裂，内有心芽和小鳞叶2～3枚及细圆柱形的残茎(图48－3)。

③炉贝 为长圆锥形，高0.7～2.5cm，表面类白色或浅棕黄色，有的具棕色斑点。外层鳞叶2瓣，大小相近。顶部开裂而略尖，基部稍尖或较钝(图48－4)。

【功效】 味苦、甘，性微寒。清热润肺，化痰止咳。

47—1

47—3



47—2



48—1



48—2

48—4



48—3

49. 川 乌

Chuanwu **Radix Aconiti**
センウ **Mother Root of Common Monkshood**

【来源】 本品为毛茛科植物乌头 *Aconitum carmichaeli* Debx. 的干燥母根。

【产地加工】 6月下旬至8月上旬采挖，除去子根、须根及泥沙，晒干。

【炮制】 (1)生川乌 取原药材，除去杂质，用时捣碎。

(2)制川乌 取净川乌，大小个分开，用清水浸泡至内无干心，取出，置锅内，煮4～6小时或置蒸笼内蒸6～8小时，至取大个及实心者切开内无白心、口尝微有麻舌感时，取出晾至6成干，切厚片，干燥。

取净川乌，大小分开，用水漂1～2周(每天换水2次)，至内无干心，取出，加生姜、甘草和皂角，用宽水煮3～5小时，切开内无白心，再换水煮1～2小时，口尝微有麻舌感时，取出晾至6成干，切片，干燥。每川乌100kg，用生姜2kg、甘草5kg、皂角1kg。

【性状】 (1)药材 生川乌 呈圆锥形，中部多向一侧膨大，顶端有残存的茎基，长2.0～7.5cm，直径1.5～4.0cm。外表棕褐色，较皱缩，有瘤状侧根及除去子根后的痕迹。质坚实，不易折断。横切面灰白色，粉质，可见多角形的环纹(形成层)。气微，味辛辣而麻舌。有大毒(图49－1)。

(2)饮片 制川乌 为三角形薄片，长2.0～7.5cm，厚0.1～0.3cm。表面黑棕色或黄棕色，有光泽，可见多角形形成层环纹。无臭，微有麻舌感(图49－2)。

【功效】 味辛、苦，性热。有毒。祛风除湿，温经止痛。

50. 川 芎

Chuanxiong **Rhizoma Chuanxiong**
センキュウ **Rhizome of Szechwan Lovage**

【来源】 本品为伞形科植物川芎 *Liguticum chuanxiong* Hort. 或茶芎(抚芎)*Ligusticum sinense* Oliv. *cv. chaxiong* Mss. 的干燥根茎。川芎主产于四川等省；茶芎主产江西省。

【产地加工】 川芎于夏季茎上的节盘显著突出，并略带紫色时采挖；茶芎于秋季地上部分枯黄时采挖，除去茎叶及泥土，晒至半干再炕干，撞去须根。

【炮制】 (1)川芎片 取原药材，除去杂质，大小分开，略浸，洗净，润透。纵切薄片，干燥。

(2)酒炒川芎 取川芎片，用酒喷洒拌匀，稍闷，置锅内用文火加热，炒干，取出放凉。每川芎100kg，用酒10～15kg。

【性状】 (1)药材 ①川芎 呈不规则结节状团块，表面皱缩，顶端有类圆形凹窝的茎痕，下侧有多数小瘤状根痕，质坚实。不易折断，断面黄白色或灰黄色，可见波状环纹，散有黄棕色小油点。有特殊浓郁的香气，味苦、辛，稍有麻舌感，后微甜(图50－1)。

②茶芎 药材性状与川芎类似，惟顶端的茎痕呈乳头状，不具凹窝(图50－2)。

(2)饮片 ①川芎片 为不规则蝴蝶形薄片，长2.5～5.0cm，厚0.15～0.20cm。外表黄褐色；切面黄白色或灰黄色，可见波状环纹或不规则纹理，并散有多数黄棕色小油点，切面光滑，周边粗糙不整齐。质坚而脆，香气浓而特异，味苦辛、微回甜，稍有麻舌感(图50－3)。

②酒川芎 形如川芎片，色泽加深，略有酒香气。

【功效】 味辛、微苦，性温。活血行气，祛风止痛。

附：日本川芎 *Rhizoma Cnidii*

【来源】 本品为伞形科植物日本川芎 *Cnidium officinale* Makino 的干燥根茎。

【产地加工】 于植株生长的第2年秋天挖取地下部分，除去须根，洗净泥土，晒干或烘干。

【性状】 (1)药材 呈不规则团块状，有的纵向剖开，长5～10cm，直径3～5cm。表面灰褐色至暗褐色，有隆起的轮节。纵断面边缘不整齐呈分枝状，内面灰白色至灰褐色，部分呈半透明角质状。质密，坚实。有特异香气，味微苦(图50－4、图50－5)。

以肥大、外表暗褐色、内面黄白色、香气浓烈者为佳。

(2)饮片 ①粉末 呈灰色至淡灰褐色。具特异香气，味微苦。

②呈不规则形的角质块状，最大长度1.2cm左右。黄棕色或淡黄白色，多具外皮。外皮皱缩不平，棕褐色或黑褐色。有棱角，质坚硬难折断。气香，味微苦、辣(图50－6)。

【功效】 味辛，性温。镇静，止痛，消炎排脓。

川芎出口品切片(图50－7)。

49—1



49—2

50—2



50—3

50—4

50—1

50—5

50—7

50—6

51. 广防己

Guangfangji **Radix Aristolochiae Fangchi**

コウボウイ **Fangchi Root**

【来源】 本品为马兜铃科植物广防己 *Aristolochia fangchi* Y. C. Wu ex L. D. Chow et S. M. Hwang 的干燥根。

【产地加工】 于秋、冬2季采挖，洗净，切段，将粗根纵切2瓣，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质粗皮，稍浸，洗净，润透，切厚片，干燥。

【性状】 (1)药材 呈圆柱形或半圆柱形，略弯曲，长6～18cm，直径1.5～4.5cm。表面灰棕色，粗糙，有纵沟纹，弯曲处有深陷横沟；除去粗皮后呈淡黄色，有刀刮的痕迹。体重，质坚实，不易折断。横断面显粉性，有灰棕色与类白色相间的连续排列的放射状纹理；纵剖面灰白色或淡棕黄色，并有浅棕色不规则的纵向、横向交叉或弯曲的纹理。无臭，味苦。

以块大、粗细均匀、粉性大者为佳。

(2)饮片 广防己片 呈半圆柱形块瓣或圆柱形段块，长0.6～2.0cm，直径1.5～3.0cm。横切面灰白色或淡棕黄色，皮部薄，形成层环明显，木部宽广，具灰棕色与类白色相间连续排列的放射状纹理。纵剖面有浅棕色不规则的纵向、横向或弯曲的线纹。周边带栓皮者棕色。有凹陷的轮线痕及横向缺裂。栓皮刮去者呈灰黄色，较光滑。体重而硬，不易折断，断面粉性，有筋脉纹。气微香，味微苦而涩(图51)。

【功效】 味苦、辛，性寒。祛风止痛，清热利水。

52. 广金钱草

Guangjinqiancao **Herba Desmodii Styracifolii**

コウキンセンソウ **Herb of Snowbelleaf Tickclover**

【来源】 本品为豆科植物广金钱草 *Desmodium styracifolium* (Osb.) Merr. 的干燥地上部分。

【产地加工】 于夏、秋2季采割，除去杂质，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，切段，晒干。

【性状】 (1)药材 茎呈圆柱形，长达100cm，表面密被黄色伸展的短柔毛；质稍脆，断面中部有髓。叶互生，小叶1～3枚，圆形或矩圆形，直径2～4cm；先端微凹，基部心形或钝圆，全缘；上表面黄绿色或灰绿色，无毛，下表面具灰白色紧贴的绒毛，侧脉羽状；叶柄长1～2cm；托叶1对，披针形，长约0.8cm。气微香，味微甜(图52－1)。

以色黄绿、叶完整、气微香者为佳。

(2)饮片 广金钱草段 为茎、叶、花混合的不规则段片，长1.0～1.5cm。茎呈圆柱形，密被黄色伸展的短绒毛，质轻脆，切面中部有髓，完整的叶圆形或矩圆形，先端微凹，基部心形，全缘。上表面黄绿色或灰绿色，无毛，下表面具灰白色紧贴的绒毛，侧脉羽状。气微香，味微甜(图52－2)。

【功效】 味甘、淡，性凉。清热除湿，利尿通淋。

51

52—1

52—2

53. 广藿香

Guanghuoxiang　　Herba Pogostemonis

コウカッコウ　　Herb of Cablin Potchouli

【来源】 本品为唇形科植物广藿香 *Pogostemon cablin* (Blanco) Benth. 的干燥地上部分。主产于广东和海南，因产地不同常分为"石牌广藿香"和"海南广藿香"。

【产地加工】 于5～6月和9～10月间、枝叶繁茂时采割，日晒夜闷，反复至干。

【炮制】 取原药材，除去残根及杂质，先抖下叶，筛净；茎洗净，润透，切段，晒干，再与叶混匀。

【性状】 (1)药材　茎略呈方柱形，多分枝，枝条稍扭曲，长30～60cm，直径0.2～0.7cm；表面被柔毛；质脆，易折断，断面中部有髓；老茎类圆柱形，直径1.0～1.2cm，被灰褐色栓皮。叶对生，皱缩成团，展开后叶片呈卵圆或椭圆形，长4～9cm，宽3～7cm，两面均被灰白色茸毛；先端短尖或钝圆，基部楔形或钝圆，边缘具大小不规则的钝齿；叶柄细，长2～5cm，被柔毛。气香特异，味微苦。

①石牌广藿香　枝条较瘦小，表面皱缩。灰黄色或灰褐色，节间长3～7cm，叶痕较大而凸出，中部以下被栓皮，纵皱较深，断面渐呈类圆形，髓部较小。叶片较小而厚，暗绿褐色或灰棕色(图53)。

②海南广藿香　枝条较粗壮，表面较平坦，灰棕色至浅紫棕色，节间长5～13cm，叶痕较小，不明显凸出，枝条近下部始有栓皮，纵皱较浅，断面呈钝方形。叶片较大而薄，浅棕褐色或浅黄棕色。

均以茎枝粗壮、色青绿或暗绿、叶多、香气浓者为佳。

(2)饮片　广藿香段　为茎、叶混合的不规则段片，长1.0～1.5cm。茎略呈方形，外表灰黄色、灰褐色、灰棕色或浅紫棕色，被柔毛；切面中部有白色的髓。叶皱缩，多破碎，暗绿色、灰棕色、浅黄棕色或浅棕褐色，两面均被灰白色绒毛。气香特异，味微苦。

【功效】 味辛，性微温。芳香化浊，开胃止呕，发表解暑。

54. 小灵丹

Xiaolingdan　　Vulcanzing Agenf

ショウレイタン　　Xiaolingdan

【来源】 本品系由硫黄 Sulfur 与雄黄 Realgar 经升华制成的非晶质砷硫化合物。

【产地加工】 将硫黄、雄黄分别研末，混匀(硫黄：雄黄＝1：4)，装于陶瓷罐中，罐口用装凉水的碗盖严，封闭，加热5～6小时，离火待凉，揭开碗底，凝结物应为橘黄色粉末或呈玻璃状薄片。

【炮制】 将净小灵丹捣为细粉。

【性状】 药材　无定形块状体，橘红色，无层次，透明至半透明，玻璃光泽。质坚硬而重、脆，易打碎。碎块呈橘红色，仍为致密块。断口贝壳状。硬度大于指甲、小于小刀(≈3～5)。条痕为橘黄色。气无，味淡(图54)。

以色橘红、透明或半透明、有玻璃光泽者为佳。

【功效】 味淡，性温。散寒止痛。

53

54

55. 小茴香

Xiaohuixiang **Fructus Foeniculi**

ショウウイキョウ **Fennel Fruit**

【来源】 本品为伞形科植物茴香 *Foeniculum vulgare* Mill. 的干燥成熟果实。

【产地加工】 秋季果实初熟时采割植株，晒干，打下果实，除去杂质。

【炮制】 (1)小茴香 取原药材，除去杂质，通称"小茴香"。

(2)盐小茴香 取净小茴香，用盐水拌匀，闷润至透，置锅内，用文火加热，炒干，并有香气外逸时，取出放凉，称"盐小茴香"。

【性状】 (1)药材 呈稻谷状小粒，长 0.4～1.0cm，宽 0.2～0.4cm。基部有的带小果柄，顶端残留有黄棕色突起的花柱基。表面黄绿色或淡黄色，光滑无毛。果实极易分离成 2 个小分果。分果呈长椭圆形，背面有 5 条隆起的纵棱线，腹面稍平，断面边缘波状而较硬，中心灰白色，有油性。气特异芳香，具甜香气，压碎时更显著，味微甜(图 55－1)。

以颗粒均匀、色黄绿、气味浓者为佳。

(2)饮片 盐小茴香 形如小茴香，微鼓起，色泽加深，偶有焦斑，味微咸(图 55－2)。

【功效】 味辛，性温。散寒止痛，理气和胃。

56. 小果蔷薇根

Xiaoguoqiangweigen **Raidx Rosae Multiflorae**

ショウカショウビコン **Root of Japanese Rose**

【来源】 本品为蔷薇科植物野蔷薇 *Rose multiflora* Thunb. 的干燥根。

【采收加工】 全年可采挖，除去泥沙，砍去茎和细根，洗净，轧成碎块，晒干。

【炮制】 取原药材，拣去杂质，洗净，淋水润软后，切成厚 2～3mm 的小片，晒干，筛去灰屑。

【性状】 (1)药材 呈不规则的块段状，粗细不匀。外皮棕褐色，易剥离，脱落处显出黄白色木部，有明显的条纹。质坚硬，断面黄白色，有时带红色，具放射状纹理和密集的导管孔。气微，味苦涩。

(2)饮片 为不规则小薄片，其余特征同药材(图 56)。

【功效】 味苦、涩，性寒。清热化湿，顺气和胃。用于暑湿、寒热往来、呕吐不食、脘腹烦闷、妇女气郁、月经不调、经期腹痛、吐血口渴、鼻衄、夏天热疖等症。

55—2

55—1

56—1

57. 小通草

Xiaotongcao **Medulla Stachyuri**

ショウツウソウ **Pith of Himalayan Stachyurus**

【来源】 本品为旌节花科植物喜马山旌节花 *Stachyurus himalaicus* Hook. f. et Thoms.、中国旌节花 *Stachyurus chinensis* Franch. 或山茱萸科植物青荚叶 *Helwingia japonica* (Thunb.) Dietr. 的干燥茎髓。

【产地加工】 秋季割取茎，截成段，趁鲜取出髓部，理直，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，切段，称"小通草段"。

【性状】 (1)药材 ①旌节花茎髓 呈圆柱形，长 30～50cm，直径 0.5～1.0cm。白色或淡黄色，表面无纹理。体轻，质松软，捏之能变形，有弹性，易折断，无空心，显银白色光泽。水浸后有粘滑感。气微，味淡。

②青荚叶茎髓 表面有浅纵条纹。质较硬，捏之不易变形。水浸后无粘滑感(图 57－1)。

以条匀、色白者为佳。

(2)饮片 ①旌节花茎髓段 呈圆柱形小段，白色或淡黄色，断面实心，质松软，捏之能变形。水浸后有粘滑感。气微，味淡。

②青荚叶茎髓段 呈圆柱形小段，质较硬，捏之不易变形。水浸后无粘滑感。其余特征同上(图 57－2)。

【功效】 味甘、淡，性寒。清热，利尿，下乳。

58. 小 蓟

Xiaoji **Herba Cephalanoploris**

ショウケイ **Herb of Common Cephalanoplos**

【来源】 本品为菊科植物刺儿菜 *Cephalanoplos segetum* (Bge.) Kitam. 的干燥地上部分。

【产地加工】 于夏、秋 2 季花开时采割，除去杂质，晒干。

【炮制】 (1)小蓟段 取原药材，除去杂质，抢水洗净，稍润，切段，干燥，称"小蓟段"。

(2)小蓟炭 取小蓟段置锅内，用中火加热，炒至焦褐色，喷淋清水少许，灭尽火星，取出凉透，称"小蓟炭"。

【性状】 (1)药材 茎呈圆柱形，有的上部分枝，长 5～30cm，直径 0.2～0.5cm；表面灰绿色或带紫色，具纵棱及白色柔毛；质脆，易折断，断面中空。叶互生，无柄或有短柄；叶片皱缩或破碎，完整者展平后呈长椭圆形或长圆状披针形，长 3～12cm，宽 0.5～3.0cm；全缘或微齿裂至羽状深裂，齿尖具针刺；上表面绿褐色，下表面灰绿色，两面均具白色柔毛，头状花序单个或数个顶生；总苞钟状，苞片 5～8 层，黄绿色；花药紫色。气微，味微苦。

以叶多、色绿者为佳。

(2)饮片 ①小蓟段 呈不规则的小段，叶、茎、花混合，灰绿褐色。茎圆柱形，表面绿色或带紫色，具纵棱及白色柔毛，质脆。叶多皱缩或破碎，具针刺，叶两面均具白色柔毛。花球形或椭圆形。总苞钟状，黄绿色，花紫红色。气微，味微苦(图 58)。

②小蓟炭 形如小蓟段，外表黑褐色，内黄褐色。

【功效】 味甘、苦，性凉。凉血止血，祛瘀消肿。



57—2



57—1

58—1

59. 飞扬草

Feiyangcao **Herba Euphorbiae Hirtae**

ヒヨウソウ **Herb of Garden Euphorbia**

【来源】 本品为大戟科植物飞扬草 *Euphorbia hirta* L. 的干燥全草。

【产地加工】 于夏、秋2季采收全草，洗净，晒干或鲜用。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，切段，干燥。

【性状】 (1)药材 全草长15～50cm，全株被粗毛。根细长弯曲，表面土黄色。茎圆柱形，直径0.1～0.3cm；表面土黄色或红褐色；质脆，折断面中空。叶对生，叶片呈椭圆状卵形，长1～4cm，宽0.6～1.7cm，灰绿色至褐绿色，先端急尖，基部偏斜，边缘有细锯齿。杯状聚伞花序密集，呈头状，腋生。蒴果。无臭，味淡、微涩(图59－1)。

(2)饮片 为段片，茎圆柱形，直径0.1～0.3cm，土黄色或红褐色，叶卷缩或破碎，灰绿色至褐绿色，杯状花序密集呈头状。蒴果。无臭，味淡、微涩(图59－2)。

【功效】 味酸、苦，性寒。清热解毒，杀虫止痒。

60. 马 刀

Madao **Concha Cuneopsis**

バトウ **Shell of Razor Calm**

【来源】 本品为竹蛏科动物长竹蛏 *Solen gouldi* Conrad、大竹蛏 *Solen grandis* Dunker 的贝壳。

【产地加工】 全年均可捕捉，在海水退潮时，到有竹蛏生活的地方，用铁锹挖取或用铁钩钩取，捕后用海水洗净泥沙，去肉，将贝壳收集起来，晒干。

【性状】 (1)药材 ①长竹蛏 贝壳很长，壳质薄，两壳不等。背腹缘几乎平行，壳的前端呈截形，后端圆。壳表面光滑，被有黄褐色外皮长成的老个体，壳顶的外皮常脱落而呈白色，生长线明显，呈弧形。壳内面白色或淡黄色。表面有黑白相间的花纹(图60－1)。

②大竹蛏 贝壳延长，两壳抱合成竹筒状，前后端开口，一般壳长为壳高的4～5倍，壳顶位于最前端，壳的背腹缘平行。贝壳表面突出，被有一层发亮的黄褐色外皮，壳表面平滑无放射肋，生长线明显，有时有淡红色的彩色带。贝壳内面白色或可见到淡红色的彩带。左右壳各具1个主齿(图60－2)。

【功效】 味咸，性凉。散结消痰，通淋。

59—2

59—1

60—1

60—2

61. 马尾连

Maweilian　　Radix et Rhizoma Thalictri

バビレン　　Root and Rhizome of Baikal Meadowrue

【来源】 本品为毛茛科植物金丝马尾连 *Thalictrum glandulosissimum* (Fin. et Gagn.) W. T. Wang et S. H. Wang、高原唐松草 *Thalictrum cultratum* Wall. 和多叶唐松草 *Thalictrum foliolosum* DC. 的根和根茎。

【产地加工】 9～11月至次年1～2月采挖，洗去泥土，剪除茎苗，晒干。

【炮制】 取整株药材，除去杂质，洗净，润透，切段片，晒干。

【性状】 (1)药材　①金丝马尾连　根茎由数个或10余个结节连生，呈疙瘩状，下面着生多数须根。根长10～20cm，直径0.1cm，表面棕色或棕褐色，栓皮脱落处呈金黄色，光滑。质脆，易折断，断面平坦。气微，味苦，嚼之粘牙(图61－1)。

②高原唐松草　根茎由数个结节合生，细根多条，密生于根茎。根长5～10cm，直径0.1cm；表面棕色，栓皮脱落处呈浅棕色。质脆，易折断，断面略呈纤维性。气微，味苦(图61－2)。

③多叶唐松草　根茎横生，由数个至10余个结节连生，每个结节上面具圆形空洞状的茎痕，直径约1cm。细根数条至十数条密生于根茎下侧，直径0.2～0.3cm；表面灰棕色。质硬，易折断，断面中心有圆形金黄色木心。气微，味稍苦。

均以须根密集、味苦、无杂质者为佳。

(2)饮片　为细条形小段或不规则厚片。茎片厚0.2～0.5cm；根的段片长0.8～1.5cm；切面灰黄色，有的具金黄色木心；周边棕色、棕褐色或灰棕色，栓皮脱落处显金黄色或浅棕色。质硬脆。气微，味苦(图61－3)。

【功效】 味苦，性寒。清热燥湿，消肿解毒。

62. 马　宝

Mabao　　Caculus Equi

バホウ　　Horse Bezoar

【来源】 本品为马科动物马 *Equus caballus* (L.) 胃肠道中的结石。

【产地加工】 全年均可采收，宰杀马时注意其胃、肠道有无硬块，如发现结石，取出用清水洗净，晾干。

【炮制】 取原药材，敲碎，研成细粉，过80目筛。

【性状】 药材　完整马宝呈圆球形、卵圆形或扁圆形，大小不等，一般直径6～20cm，重250～2 500g，也有小如豆粒者。表面粉白色、灰白色或蛋青色，光滑或凹凸不平。质坚重如石。剖面灰白色而有同心层纹，俗称"涡纹"，微具玻璃样光泽，中心常见有金属或树枝等异物。剖开后气臭，味淡而微咸(图62)。

以个大、质坚实、光滑、色灰白、剖面有层纹者为佳。

【功效】 味甘、咸，性凉。镇惊化痰，清热解毒。

61—2

61—1

61—3



62

63. 马兜铃

Madouling **Fructus Aristolochiae**

バトウレイ **Dutchmanspipe Fruit**

【来源】 本品为马兜铃科植物北马兜铃 *Aristolochia contorta* Bge. 或马兜铃 *Aristolochia debilis* Sieb. et Zucc. 的干燥成熟果实。

【产地加工】 秋季果实由绿变黄时采收，干燥。

【炮制】 (1)马兜铃片 取原药材，除去杂质，搓碎，筛去灰屑，称"马兜铃"或"马兜铃片"。

(2)蜜马兜铃 取炼蜜，用适量开水稀释后，加入净马兜铃碎片内拌匀，稍闷，置锅内，用文火加热，炒至不粘手为度，取出放凉(每 100kg 马兜铃，用炼蜜 25kg)，习称"蜜马兜铃"。

【性状】 (1)药材 ①北马兜铃果实 呈卵圆形或长卵形，基部连有细果柄。表面呈灰绿色或灰黄色，通常沿腹缝线自下而上开裂成 6 果瓣，果柄也裂成线状，种子多数。气微，味苦。

②马兜铃果实 与上种相似，但果实较小而稍圆，长 2.0～3.5cm，宽 2.3～3.0cm(图 63－1)。均以个大、饱实、饱满、色黄绿、不破裂者为佳。

(2)饮片 ①马兜铃片 呈不规则的碎片，表面灰黄色有波状棱线。种子扁平而薄，钝三角形或扇形。种仁乳白色，有油性。气微，味苦(图 63－2)。

②蜜马兜铃 形如马兜铃碎片，表面深黄色，略有光泽，带有粘性。味微甜(图 63－3)。

【功效】 味苦，性微寒。清肺降气，止咳平喘，消肿消痔。

64. 马槟榔

Mabinglang **Semen Capparis**

バビンロウ **Seed of Masaikai Caper**

【来源】 本品为白花菜科植物马槟榔 *Capparis masaikai* Levl. 的干燥成熟种子。

【产地加工】 冬季采收成熟果实，除去果皮，收集种子，干燥。

【炮制】 取原药材，除去杂质，晒干。

【性状】 药材 呈不规则扁圆形，直径 1～2cm，棕褐色，常有黑褐色果肉残留，边缘有鸟嘴状突起，凹入处有三角形种脐。剥开种皮，可见胚乳膜质，表面有弯月形、紫棕色的种脊斑痕，种仁黄白色，胚轴长，子叶折叠后盘旋卷曲如蜗牛状。气微，味涩、腥、甜(图 64)。

【功效】 味苦、甘，性寒。清热解毒。用于热病所致烦渴、咽喉肿痛、疮疡肿毒等症。

63—1

63—2

63—3

64

65. 马蹄螺

Matiluo　　Concha Chlorostomae

バテイラ　　Matiluo

【来源】 本品为马蹄螺科动物锈凹螺 *Chlorostoma rusticum* (Gmelin.)、黑凹螺 *Chlorostoma nigerrima* (Gmelin.)的贝壳。

【产地加工】 四季均可捕捉，捕后去肉，洗净，清水浸泡1周，晾干。

【性状】 (1)药材　①锈凹螺　贝壳坚厚、塔形，螺层5½层。壳顶尖，有时被磨损，壳表各层都有细弱的旋形肋和生长线。壳表面还有不太整齐的纵列隆起，黄褐色，染有密布的铁锈斑纹。壳口斜，马蹄形，内面灰白色，有珍珠光泽(图65--1)。

②黑凹螺　贝壳坚厚，呈塔状。螺层6层，壳顶3层较小，下面3层突然增大，壳基较平整。壳表面灰黑色，有灰黑色花纹和自壳面引伸而来的肋痕。壳口斜形，内面有珍珠光泽和环形细纹数条(图65－2)。

【功效】 平肝潜阳。

66. 云母石

Yunmushi　　Muscovitum

ウンモセキ　　Muscovite

【来源】 本品为硅酸盐类矿物白云母 Muscovite 的矿石，主要含有含水铝硅酸钾 $KAl_2[Si_3AlO_{10}]$。

【产地加工】 全年均可采挖，采得后洗净泥土，除去杂石。

【炮制】 ①云母石　取原药材，除去杂质，洗净，干燥，撕成薄片。

②煅云母石　取净云母，置适宜的容器内，用无烟武火加热，煅至红透，取出，放凉，研粉。

【性状】 (1)药材　呈不规则片状、板片状，由多数薄片叠成，一般长1～7cm。无色透明或呈白色、浅褐色，具玻璃－珍珠光泽。质韧，不易折断，可片片剥离，薄片表面平滑，透明如玻璃纸，可弯曲，有弹性，硬度3.0～2.5；相对密度2.78～2.88。有泥土气，无味(图66－1)。

以易剥离、片大、透明者为佳。

除HF外，不溶于酸类，加碳酸钾烧后能溶解。

(2)煅云母石　色泽变暗，失去光泽，质地几无变化；内层和表层色泽基本相同，或表面有黄红色斑纹(图66－2)。为灰白色或灰棕色。微有焦土气，无味。

【功效】 味甘，性平。纳气坠痰，止血敛疮。

65—1



65—2

66—2



66—1

67. 无花果

Wuhuaguo **Syconium Fici Caricae**

イチジクジツ **Fig**

【来源】 本品为桑科植物无花果 *Ficus carica* L. 的近成熟干燥的肉质花序托。

【产地加工】 秋季采摘接近成熟的果实，置沸水中焯过，捞起，晒干。

【炮制】 取原药材，除去果柄、杂质，切纵向厚片，筛去灰屑，干燥。

【性状】 (1)药材 呈倒圆锥形或类圆球形，长 2～3cm，直径 1.5～2.5cm，淡黄棕色至暗棕色，少数为青黑色。顶端稍平截，中央有圆形脐状孔隙，孔缘突起，不整齐，表面具不规则纵向棱条，基部较细，带残存果柄或苞片。质坚硬。剖断面果肉黄白色，内表面着生众多细小瘦果，近顶端处尚见枯萎雄蕊。瘦果卵形或三棱状卵形。长 1～2mm，淡黄色，外有宿萼包被。气微，味甜。

(2)饮片 呈倒三角形的厚片，中间中空。表面淡黄棕色或暗棕色，有细纵皱，果肉黄白色。内表面着生众多小瘦果。气微，味甜(图 67)。

【功效】 味甘，性平。健脾益胃，消肿解毒，润肺止咳。用于食欲不振、脘腹胀痛、痔疮便秘、咽喉肿痛、带症，热痢、咳嗽多痰等症。

68. 天 冬

Tiandong **Radix Asparagi**

テンドウ **Root of Cochinchinese Asparagus**

【来源】 本品为百合科植物天门冬 *Asparagus cochinchinensis* (Lourero) Merrill 的干燥块根。

【产地加工】 于秋、冬 2 季挖取根部，洗净，剪去两端须根，分档，置沸水中煮至水再次沸腾，捞出。浸于清水中，趁热剥去或用刀刮去外皮，再用清水漂洗。此后的加工方法有 3 种。一是漂洗干净后，捞起，摊开晾去水气，晒干或小火烘干。二是漂洗后捞起，先用硫黄熏约 10 小时，用火烘至 9 成干时，再用硫黄熏 24 小时，烘至干。三是在漂洗液中加明矾(100kg 水用明矾 75～100g)，漂约 30 分钟，捞起，晒干或烘干。

【炮制】 (1)天冬片 取原药材，拣去杂质和发黑油只，根据产地加工不同而分别炮制。已去皮的用清水稍浸，润软，切片。未去皮的先在加明矾的水中浸泡约 1 小时，取出，剥去外皮，淘净，切片，晒干或烘干。

(2)炒天冬 取净天冬片清炒至微焦，取出凉透。

【性状】 (1)药材 块根纺长纺锤形，常弯曲，长 4～10cm，直径 0.5～1.5cm。表面黄棕色至肉红色，光滑，半透明，具纵皱纹，少数表面残存灰棕色外皮。质硬，断面角质，平坦，中心有中柱。气微，味微甜，有粘性(图 68－1)。

(2)饮片 ①天冬片 横切薄片，厚 1～4mm，表面黄棕色或棕色，有纵皱，切面黄白色或棕色，半透明，皮部厚，木心小。

②炒(炙)天冬片 表面和切面有焦斑(图 68－2)。

【功效】 味甘、苦，性寒。滋阴，清热，润燥。用于虚劳咳喘、吐血、低热不退、热病口渴、津枯便秘等症。

附：香港天冬(图 68－3)。

68—1

67

68—3



68—2

69. 天花粉

Tianhuafen **Radix Trichosanthis**
テンカフン **Snakegourd Root**

【来源】 本品为葫芦科植物栝楼 *Trichosanthes kirilowii* Maxim. 或日本栝楼 *Trichosanthes japonica* Regel 的干燥根。

【产地加工】 于秋、冬2季采挖，洗净泥土，刮净外皮，切段，较粗者纵剖成瓣，干燥。

【炮制】 取原药材，除去杂质，大小分开，浸泡3～4成透，取出，闷润，切厚片，干燥，分别称“栝楼根片”、“日本栝楼根片”。

【性状】 (1)药材 ①栝楼根 呈不规则圆柱形、瓣块状，长8～16cm，直径1.5～5.5cm。已去皮，表面白色或黄白色，可见黄色脉纹及略凹陷的横长皮孔痕。质坚实。气无，味微苦(图69－1)。

②日本栝楼根 呈不规则圆柱形，去皮者表面色稍深，黄白色或淡黄色至浅灰黄色。其余特征同栝楼根。

以色洁白、粉性足、体肥满者为佳。

(2)饮片 ①栝楼根片 呈类圆形或不规则形的厚片，直径1.5～5.5cm，厚0.3～0.6cm。断面白色或淡黄色，富粉性，可见棕黄色导管小孔，略呈放射状排列；纵切面可见黄色筋脉纹。气微，味微苦(图69－2)。

②日本栝楼根片 呈不规则形或圆形厚片，直径1.5～5.5cm，厚0.3～0.6cm。断面及周边颜色均较栝楼根片稍深，淡黄色至浅灰黄色，可见棕黄色导管小孔，呈放射状排列。质硬，显粉性。气微，味微苦。

【功效】 味甘、微苦，性微寒。清热生津，消肿排脓。

70. 天竺黄

Tianzhuhuang **Concretio Silicea Pambusae**
テンジクオウ **Concretion in Bamboo Stem**

【来源】 (1)广竺黄 为禾本科植物青皮竹 *Bambusa textilis* Mclure 或思劳竹 *Schizostachyum chinense* Rendle 等秆内分泌物干燥凝结而成的块状物。

(2)合成竺黄 是用硅酸等化工原料人工合成的结晶体。

(3)洋竺黄 是从印度、印度尼西亚、马来西亚、越南等国进口的天然产品或人工制品。

【产地加工】 全年可采，天然品多在竹器加工时发现而收集，晾干。

【炮制】 取原药材，除去杂质和灰屑。

【性状】 药材 ①广竺黄 为不规则块、片或大小不等的颗粒，洁白色、灰蓝色、灰黄色或灰白色。半透明，略现光泽。体轻，质硬而脆，光洁，无粉状物粘附。吸湿性强，置水中易产生气泡。气微，味淡(图70－1)。

②合成竺黄 为不规则多面体形的结晶颗粒，直径0.8～2.0cm，本白色，光洁，无粉尘粘附。质轻，易碎断，但不成粉末，用手力握，有沙沙声响。气微，味淡(图70－2)。

③洋竺黄 外形与广竺黄相似，但晶状颗粒较多、较粗，碎末较少，质地较硬。

【功效】 味甘，性寒。清热豁痰，清心定惊。用于热病神昏、中风痰迷、小儿痰热惊痫、抽搐、夜啼等症。

69—2

69—1

70—2

70—1

71. 天 麻

Tianma **Rhizoma Gastrodiae**

テンマ **Tuber of Tall Gastrodia**

【来源】 本品为兰科植物天麻 *Gastrodia eleta* Bl. 的干燥块茎。

【产地加工】 立冬后至次年清明前采挖，立即洗净，蒸透，低温干燥。

【炮制】 (1)天麻 取原药材，用温水浸约 1 小时，洗净，闷润 3～5 天，至有弹性时，横切或纵切薄片，阴干。

(2)姜天麻 取原药材，除去杂质，大小分开，洗净，加入姜汁，闷润至内无干心，取出，蒸透，晾至 7 成干，刨或纵切薄片，晒干。每天麻 100kg，用生姜 12kg。

【性状】 (1)药材 呈长椭圆形，扁缩而稍弯曲，长 5～13cm，宽 2～6cm，厚 1～3cm。一端有棕红色干枯芽苞，习称"鹦哥嘴"或"红小辫"，或为残留茎基；另一端有自母麻脱落后的圆脐形疤痕。外皮剥落或部分残存，表面黄白色或淡黄棕色，具环节，有点状退化的须根痕或膜质鳞叶，有纵皱纹。质坚实，半透明，不易折断，断面较平坦，角质样。气特异，味甘、微辛(图 71－1)。

(2)饮片 ①天麻片 为长椭圆形或扁圆形的薄片，周边呈波浪形。表面黄白色至淡黄棕色，角质样，半透明，有的中间具裂隙。质坚硬。气微，味甜，久嚼微有粘性(图 71－2、图 71－3)。

②姜天麻 为纵切薄片。有光泽，断面平坦，有姜辣味。

【功效】 味甘，性平。平肝息风，止痉。

72. 木 瓜

Mugua **Fructus Chaenomelis**

モッカ **Fruit of Common Floweringquince**

【来源】 本品为蔷薇科植物贴梗海棠 *Chaenomeles speciosa* (Sweet.) Nakai 及木瓜(模植) *Chaenomeles sinensis* (Thouin) Koehne 的干燥成熟果实。前者习称"皱皮木瓜"，后者习称"光皮木瓜"。

【产地加工】 于夏、秋 2 季果实绿黄时采摘，皱皮木瓜置沸水中烫至外皮显灰白色，对称纵剖后晒干；光皮木瓜纵剖 2 或 4 瓣，置沸水中烫后晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，略泡，蒸透，趁热切薄片，干燥，分称"皱皮木瓜片"和"光皮木瓜片"。

【性状】 (1)药材 ①皱皮木瓜 呈卵圆形或长圆形，多纵剖为 2 瓣，长 4～9cm，宽 2～5cm。外表棕红或紫红色，有多数不规则的深褶和皱纹。剖面边缘向内卷曲，果肉红棕色，细腻，中心有凹陷的子房室。气微，味酸、涩(图 72－1)。

②光皮木瓜 呈长椭圆形或卵圆形，多纵剖为 2～4 瓣。表面红棕或棕褐色，无皱纹。剖面果肉粗糙，显颗粒性。气微，味微酸、涩，嚼之有砂粒感(图 72 2)。

以皮皱、质坚实、味酸者为佳。

(2)饮片 ①皱皮木瓜片 呈月牙形薄片，长 4～9cm，宽 2～5cm。表面棕红色，有皱纹；断面质地细腻。气微，味酸、涩(图 72－3)。

②光皮木瓜片 呈半椭圆形薄片，长 4～9cm，宽 3.5～4.5cm。表面红棕或棕褐色，光滑无皱；断面果肉粗糙。气微，味微酸、涩(图 72－4)。

【功效】 味酸，性温。平肝舒筋，和胃化湿。

附：日本木瓜(图 72－5)；**韩国木瓜**(图 72－6)。

71—1

71—3

71—2

72—1

72—6

72—2

72—5

72—3

72—4

73. 木　香

Muxiang　　Radix Aucklandiae

モッコウ　　Costus-root

【来源】 本品为菊科植物木香 *Aucklandia lappa* Decne. 的干燥根。进口品习称“广木香”，云南产者习称“云木香”。

【产地加工】 于秋、冬2季采挖，除去泥沙及须根，切段，大者纵剖成瓣，干燥后撞去粗皮。

【炮制】 (1)木香片　取原药材，除去杂质，洗净，稍浸，闷透，切薄片，晾干。

(2)煨木香　取未干燥的木香片，于铁丝匾中，铺一层以水湿润的草纸，再铺一层木香，照此平铺数层，置炉火旁煨烤至纸表面焦黑为度，取出。

(3)　酒洗木香　取原药材，除去杂质，大小分开，用清水洗净，加白酒及适量水浸润，至“药透水尽”，取出，切或刨斜薄片或长薄片，晾干。每木香100kg，用白酒10kg。

【性状】 (1)药材　略呈圆柱形，枯骨形或为纵剖片，长5～15cm，直径0.5～0.6cm。表面黄棕色，栓皮多已除去，纵沟及侧根痕显著，或有不规则菱形网纹。质坚实，体重，不易折断，断面略平坦，黄白色至棕黄色，有一棕色环及放射状纹理，并有散在的褐色油点。老根中心常呈枯木状。气特芳香，味苦、辛(图73－1)。

(2)饮片　①木香片　为不规则形的斜或纵薄片，短径0.5～3.0cm。切面灰褐色至暗褐色，散有棕褐色油点，中心有明显的菊花心。质坚而韧。香气特异，味微苦、辛(图73－2)。

②煨木香　形如木香，色泽加深，香气减弱。

③酒洗木香　为斜或纵薄片，色泽转深，微有酒香气。

【功效】 味辛、苦，性温。行气止痛，健脾消食。

附：木香块(日本加工品)

呈不规则的碎块状，大小不等，最大者径长1cm左右，棕褐色、灰棕色或淡黄棕色，色浅者可见棕色油点，常带有棕褐色或焦糊状外皮，部分可见外皮脱外的网脉，质硬，有粘手感。气香，味辣(73－3)。

74. 木　贼

Muzei　　Herba Equiseti Hiemalis

モクゾク　　Herb of Common Scouring Rush

【来源】 本品为木贼科植物木贼 *Equisetum hiemale* L. 的干燥地上部分。

【产地加工】 夏、秋2季采割，除去杂质，晒干或阴干。

【炮制】 取原药材，除去枯茎及残根，喷淋清水，稍润，切段，干燥，称“木贼段”。

【性状】 (1)药材　呈长管状，不分枝，长40～60cm，直径0.2～0.7cm。表面灰绿色或黄绿色，有18～30条纵棱，棱上有多数细小光亮的疣状突起；节明显，节间长2.5～9.0cm，节上着生筒状鳞叶，鞘基部和鞘齿黑棕色。体轻，质脆，易折断。气微，味淡、微涩，摸之有砂粒感(图74－1)。

以粗长、色绿、不脱节者为佳。

(2)饮片　木贼段　呈小段状，多有节。表面灰绿或黄绿色，有多数纵棱。断面中空，周边有多数圆形的小空腔。气微，味淡，微涩(图74－2)。

【功效】 味甘、苦，性平。散风热，退目翳。

73—1

73—3

73—2



74—2

74—1

75. 木蝴蝶

Muhudie　　Semen Oroxyli

モクコチョウ　　Seed of Indian Trumperflower

【来源】 本品为紫葳科植物木蝴蝶 *Oroxylum indicum* (L.) Vent. 的干燥成熟种子。

【产地加工】 于秋、冬2季采摘成熟果实，曝晒至果实开裂，取出种子，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，筛去灰屑。

【性状】 药材　蝶形，薄片状，有薄翅，长5～8cm，宽3.5～4.5cm。表面浅黄白色，翅半透明，有绢丝样光泽和放射状纹理，边缘多破裂。体轻。剥去种皮可见1层薄膜状的胚乳。紧裹于胚外，子叶2枚，蝶形，黄绿色或浅黄色。气微，味微苦(图75)。

【功效】 味苦，性凉。清肺利咽，疏肝和胃。用于肺热咳嗽、喉痹、音哑、肝胃气痛。

76. 木鳖子

Mubiezi　　Semen Momordicae

モクベツシ　　Seed of Cochinchia Momordica

【来源】 本品为葫芦科植物木鳖子 *Momordica cochincinensis* (Lour.) Spr. 的干燥成熟种子。

【产地加工】 于秋、冬2季果实成熟时采摘，剖开，晒至半干，剥取种子，或将果实放入盆钵内，拌以草木灰，烂去果肉，用清水淘洗，取出种子，晒干或烘干。

【炮制】 (1)木鳖子　取原药材，拣尽杂质，筛去灰屑。

(2)木鳖子霜　取净木鳖子破壳取仁，炒熟，碾成末，用草纸包裹数层，外用麻布包紧，压榨去油，反复数次，直至纸上不出现油迹，粉末由黄色变为灰白色、松散状时，研细。

【性状】 (1)药材　呈鳖形，黑褐色或灰褐色，一面平坦而有不规则凹陷，另一面稍隆起，周边有6至多个小突起，排列似鳖的头尾及四足。种皮坚硬，不易破碎。剖开可见黄绿色子叶2枚。肥厚，显油性。气微，味苦(图76)。

(2)饮片　木鳖子霜　为白色或灰白色的松散粉末。气微，味苦。

【功效】 味苦、微甘，性温。有毒。散结消肿，攻毒疗疮。用于疮疡肿毒、乳痈、瘰疬、痔漏、干癣、秃疮等症。



75



76

77. 瓦楞子

Walengzi **Concha Arcae**

ガロウシ **Ark Shell**

【来源】 本品为蚶科动物毛蚶 *Arca subcrenata* Lischke、泥蚶 *Arca granosa* Linnaeus 或魁蚶 *Arca inflata* Reeve 的贝壳。

【产地加工】 于秋、冬2季至次春捕捞，洗净，置沸水中略煮，去肉，干燥，或收集加工蚶干及食用后的外壳干燥。

【炮制】 (1)瓦楞子 取原药材，洗净，晒干，碾碎，称“瓦楞子”或“生瓦楞子”。

(2)煅瓦楞子 取净瓦楞子置适宜容器内，置无烟炉火中煅至酥脆，取出放凉，碾碎，通称“煅瓦楞子”。

【性状】 (1)药材 ①毛蚶 略呈三角形或扇形，长4～5cm，高3～4cm。壳外面隆起，有棕褐色茸毛或已脱落，壳面灰棕色、白色或淡粉色相间。壳顶突出，向内卷曲；自壳顶至腹面有延伸的放射肋30～34条。壳内面白色，平滑，壳缘有与壳外面直楞相对应的凹陷，铰合部具1列小齿。质坚。无臭，味淡(图77－1)。

②泥蚶 长2.5～4.0cm，高2～3cm。壳外面无棕褐色茸毛，放射肋18～21条，肋上有颗粒状突起。

③魁蚶 长7～9cm，高6～8cm。壳外面放射肋42～48条(图77－2)。

均以个均匀、洁净、无残肉，无沙土者为佳。

(2)饮片 ①瓦楞子(生瓦楞子) 呈粗粉状或细粉状，灰白色，较大碎块仍可见瓦楞线。无臭，味淡(图77－3)。

②煅瓦楞子 状如瓦楞子，青灰色或深灰色。无臭，无味(图77－4)。

【功效】 味咸，性平。消痰化瘀，软坚散结，制酸止痛。煅瓦楞子制酸止痛。

78. 王不留行

Wangbuliuxing **Semen Vaccariae**

オウフルギョウ **Seed of Cowherb**

【来源】 本品为石竹科植物麦蓝菜 *Vaccaria segetalis* (Neck.) Garcke 的干燥成熟种子。

【产地加工】 夏季种子成熟，果皮尚未开裂时割取全株，干燥，打下种子，除去枝叶等杂质，再干燥。

【炮制】 (1)王不留行 取原药材，除去杂质，洗净，干燥。

(2)炒王不留行 取净王不留行置锅内，用中火加热，炒至大多数爆裂成白花时，取出放凉。

【性状】 (1)药材 呈小圆球形，直径约0.2cm。表面鸟黑色或红黑色，微有光泽，有1条半圆形的线沟和小白点。质坚硬。种仁白色，粉性。气微，味淡(图78－1)。

以子粒均匀、充实饱满、鸟黑色者为佳。

(2)饮片 炒王不留行 呈球形爆花状，直径约0.35cm，表面白色，质轻泡。气微，味淡(图78－2)。

【功效】 味苦，性平。活血通经，下乳消肿。

77—1

77—2



77—4



77—3

78—2



78—1

79. 五谷虫

Wuguchong **Larva Chrysomyiae**
ゴコクチュウ **Larva of Oriental Latrine Fly**

【来源】 本品为丽蝇科昆虫大头金蝇 *Chrysomyia megacephala* (Fab.)或其他近缘昆虫的干燥幼虫。以湖北产量大，浙江常山所产体轻、洁白、纯净，品质较好，名"常谷虫"。

【产地加工】 7～9月间收集，装入布袋，在流水中反复漂洗至虫体内容物排除尽净，晒干。

【炮制】 取原药材拣净杂质，簸净泥土，文火炒至微黄色，称"五谷虫"或"炒五谷虫"。

【性状】 (1)药材 呈扁圆柱形，头部较尖，长1.0～1.5cm，宽0.2～0.3cm。黄白色，有的略透明，全体有14个环节，无足。质松脆，易碎，断面多空泡，气微臭(图79－1)。

以体轻、色淡黄白、无臭味者为佳。

(2)饮片 炒五谷虫 形如原药材，色泽加深(图79－2)。

【功效】 味咸，性寒。清热解毒，消积滞。

80. 五灵脂

Wulingzhi **Faeces Trogopterori**
ゴレイシ **Trogopterus Dung**

【来源】 本品为鼯鼠科动物复齿鼯鼠 *Trogopterus xanthipes* Milne -Edwards 的干燥粪便。

【产地加工】 全年均可采收，采得后，拣净杂质，干燥。

【炮制】 (1)五灵脂 取原药材，除去杂质及灰屑，将块大者砸成小块，称"五灵脂"。

(2)醋灵脂 取净五灵脂，置锅内，用文火加热，微炒，随即喷醋，炒至微干，并呈焦黑色有光泽时，取出晾干，称"醋灵脂"。

(3)酒灵脂 取净五灵脂，置锅内，用文火炒至有腥气溢出，色黄黑时立即取出，趁热均匀喷酒，晾干，称"酒灵脂"。

【性状】 (1)药材 根据药材外形不同常分为灵脂块和灵脂米。①灵脂块 又称"糖灵脂"，系由尿液和粪粒混合凝结而成。呈不规则块状，大小不一。表面黑棕色、红棕色或灰棕色，凹凸不平，有的兼有树脂样物质，不平坦。气腥臭，味苦(图80－1)。

灵脂块以黑棕色、有油润光泽者为佳。

②灵脂米 是干燥颗粒状粪便，呈长椭圆形颗粒，长5～15mm，直径3～6mm。表面灰棕色、黑棕色或红棕色，较平滑或粗糙，常可见淡黄色的纤维，有的略具光泽。体轻，质松，易折断，断面黄绿色或黄褐色，不平坦，纤维性。气微(图80－2)。

以体轻、黑棕色、断面黄绿色者为佳。

(2)饮片 ①醋灵脂 形如灵脂块或灵脂米，表面灰褐色微有焦斑，稍有光泽，略有醋气(图80－3)。

②酒灵脂 呈黄黑色，略具酒气(图80－4)。

【功效】 味咸、甘，性温。活血化瘀，止痛。

79—1

79—2

80—1



80—3



80—2



80—4

81. 五倍子

Wubeizi　　Galla Chinensis
ゴバイシ　　Chinese Nut-gall

【来源】 本品为漆树科植物盐肤木 *Rhus chinensis* Mill.、青麸杨 *Rhus potaninii* Maxim. 或红麸杨 *Rhus punjabensis* Stew. *var. sinica* (Diels.) Rehd. et Wils. 叶上的虫瘿，主要由五倍子蚜 *Melaphis chinensis* (Bell.) Baker 寄生而形成。根据外形不同，分为"肚倍"和"角倍"2 种。

【产地加工】 5～6 月采摘肚倍，9～10 月采摘角倍，置沸水中略煮或蒸至表面呈灰色，杀死蚜虫，取出，干燥。

【炮制】 取原药材，敲开，除去杂质。

【性状】 (1)药材　①肚倍　呈长圆形或纺锤形囊状，长 2.5～9.0cm，直径 1.5～4.0cm。表面灰褐色或灰棕色，微有柔毛。质硬而脆，易破碎，断面角质样，有光泽，壁厚 0.2～0.3cm，内壁平滑，有黑褐色死蚜虫及灰色粉状排泄物。气特异，味涩(图 81　1)。

②角倍　呈不规则菱形囊状，具若干瘤状突起或角状分枝，长 4～7cm，直径 1.5～3.0cm。表面黄棕色或灰棕色，密被灰白色绒毛。断面角质样，有光泽，壁厚 0.1～0.2cm(图 81—2)。

均以个大、完整、壁厚，色灰褐色者为佳。

(2)五倍子片　呈破碎状不规则的角质样碎片，有光泽，表面显刮毛后痕迹。气特异，味涩(图 81—3、图 81—4 煅五倍子)。

【功效】 味酸、涩，性寒。敛肺降火，涩肠止泻，敛汗止血，收湿敛疮。

82. 车前草

Cheqiancao　　Herba Plantaginis
シャゼンソウ　　Plantain Herb

【来源】 本品为车前科植物车前 *Plantago asiatica* L. 或平车前 *Plantago depresse* Willd. 的干燥全草。

【产地加工】 夏季采挖，除去泥沙，晒干

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，稍润，切段，干燥。

【性状】 (1)药材　①车前　须根丛生。叶片皱缩，展平后呈卵状椭圆形或宽卵形，表面灰绿色或污绿色，具明显弧形脉，先端钝或短尖，基部楔形。穗状花序数条，花葶长。蒴果周裂，萼宿存。气微香，味微苦。

②平车前　主根直而长。叶片较狭，长椭圆形或椭圆状披针形，长 5～14cm，宽 2～3cm(图 82—1)。

以叶片宽、完整、色灰绿者为佳。

(2)饮片　为不规则的小段，根、叶、花混合。叶片皱缩、破碎或卷曲，表面灰绿色或污绿色，纵脉明显，穗状花序。气微，味苦而有粘性(图 82—2)。

【功效】 味甘，性寒。清热，利尿，凉血，祛痰。

附：　日本车前草　*Herba Plantagonis*

【来源】 本品为车前科植物车前 *Plantago asiatica* L. 的干燥带花全草。

【产地加工】 在花期叶生长茂盛时采集，洗净泥土，除去枯叶，阴干。

【性状】 为叶、花葶、花和果序切段的混合物，长短不等，最长段达 6cm 左右。叶上表面棕绿色；下表面灰绿色，叶脉明显，皱缩不平，有的具有扁片状的长叶柄，叶柄棕色或灰绿色。质脆，吸潮后稍柔。花葶棕褐色或棕绿色，表面有明显的纵纹，中空，穗状花序，可见绿色花萼包有黄棕色小花，可见较细长的花柱呈红棕色，伸出花冠外。果序上的种子多三棱落，宿萼呈钟状，膜质状，有 4 个锥形的花萼；果序轴皱缩，有纵沟，呈淡紫色或暗绿色，常扭曲。具草腥气，味淡(图 82—3)。



81—2

81—1

81—4

81—3

82—1

82—3

82—2

83. 贝 子

Beizi Concha Monetariae

ベイシ Cypraea Shell

【来源】 本品为宝贝科动物货贝 *Monetaria moneta* (L.)、环纹货贝 *Monetaria annulus* (L.) 的贝壳。

【产地加工】 夏季捕捉，去肉，洗净，晒干。

【炮制】 (1)贝齿 取原药材，洗净，捣碎，称"贝齿"。

(2)煅贝齿 取洗净的贝齿，置坩埚中，入炉火煅红，取出放凉，捣碎，称"煅贝齿"。

【性状】 (1)药材 ①货贝 贝壳较小，略呈龟形，前端宽，后端窄，两侧有钝的结节。壳表光泽，呈美丽的黄色，有的贝壳有橙色的环轮，背部有1条不明显的绿色带。壳口狭长(图83－1)。

②环纹货贝 贝壳小型，椭圆状，表面乳白或象牙色，背部为蓝灰色，有一金黄色的环轮。壳口狭长，内、外两唇周缘各有12～14个白色的齿(图83－2)。

(2)饮片 煅贝齿 呈灰白色碎块或粉状，壳内面呈紫白色(图83－3)。

【功效】 味咸，性凉。清热，利尿。

84. 化橘红

Huajuhong Exocarpium Citri Crandis

カキッコウ Pummelo Peel

【来源】 本品为芸香科植物化州柚 *Citrus grandis* Tomentosa 或柚 *Citrus grandis* (L.) Osbek. 的近成熟的干燥外层果皮，前者习称"毛橘红"，后者习称"青光橘红"。

【产地加工】 5～6月摘取未成熟果实，置沸水中烫至果皮柔软，捞起后稍晾干，用刀均匀地把果皮划成5～7裂直至基部1/3处。由划开处剥下果皮瓣平成星状，用铲刀铲去部分白色中果皮，烘烤或晒至半干，将裂片先端向内折叠，使成5瓣花状；7裂者宜折呈交错的山字形，再用木板压平，晒干。前者即为商品大五爪，后者为七爪红。商品六爪毛化红是化州柚的较幼嫩果实，划6裂，先端内折约2cm，呈截角的6瓣花状。3种化橘红商品常每10片扎成1把。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切丝或块，晒干。

【性状】 (1)药材 呈5瓣、6瓣花状或划开而成的山字形。展平后直径15～28cm。外表面黄绿色，密被茸毛，具多数小油室；内表面黄白色或淡黄棕色，海绵状。质坚脆，易折断，断面不整齐，外缘有1～3列下陷小油室。气香，味苦、微辛(图84－1)。

青光橘红外表面无毛，余同毛橘红。

(2)饮片 除已切成不规则的丝状、片状外，其余特征同药材(图84－2)。

【功效】 味辛、苦，性温。散寒，燥湿，利气，消痰。用于风寒咳嗽、食积伤酒、呕恶，痞闷等症。

83—1

83—2



83—3

84—2

84—1

85. 手掌参

Shouzhangshen **Rhizoma Gymnadeniae**

シュシヨウジン **Rhizome of Conic Gymnadenia**

【来源】 本品为兰科植物手掌参 *Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br. 的干燥块茎。

【产地加工】 于春、秋2季采挖。去净茎叶及须根，洗净，晒干，或用开水烫过再晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切片，干燥，称"手掌参片"。

【性状】 (1)药材 块茎形如手掌，指状分裂，通常4～6裂不等，稍扁，长2.5～3.5cm，直径2.0～2.5cm。表面皱缩，淡黄色，有时茎痕周围有1褐色环。质坚硬。气特异，味淡(图85－1)。以完整、质硬、色淡黄者为佳。

(2)饮片 手掌参片 呈不规则形片厚0.3cm左右。表面淡黄色，皱缩，断面白色胶质状，质地坚硬。气特异，味淡(图85－2)。

【功效】 味甘，性平。补益气血，生津止渴。

86. 毛冬青

Maodongqing **Radix Ilicis Pubescentis**

モウドウセイ **Root of Pubescent Holly**

【来源】 本品为冬青科植物毛冬青 *Ilex pubescens* Hook. et Arn. 的干燥根。

【产地加工】 全年均可采挖根部，除去泥沙，晒干或切成块片后晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，先在水中浸泡2～6小时，洗净，捞起，淋水数次，直至润透。切片，干燥，筛去灰屑。

【性状】 (1)药材 根呈圆柱形，稍弯曲，分枝少，长短不一，直径1～4cm。表面灰褐色，根头部有残留茎枝，外皮稍粗糙，有纵向细皱纹及横向皮孔。质坚实，不易折断。断面皮部菲薄，木部发达，土黄色或灰白色，有放射状纹理及环纹。气微，味苦、涩而后甜。

(2)饮片 块片状，片厚0.5～1.0cm。表面稍粗糙，具细皱纹及横向皮孔，切面皮部薄，土黄色，具环纹和致密放射纹(图86)。

【功效】 味苦，性寒。清热解毒，活血通脉。用于冠心病、血栓闭塞性脉管炎、脑血管意外所致偏瘫。

85—1

85—2

86

87. 毛 茛

Maogen **Herba Ranunculi Japonici**

モウロウ **Herb of Japanese Buttercub**

【来源】 本品为毛茛科植物毛茛 *Ranunculus japonicus* Thunb. 的干燥或新鲜的带根全草。

【产地加工】 于夏、秋2季采集，一般鲜用。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，切段，称“毛茛段”。

【性状】 (1)药材 须根多数，肉质，细柱状。茎直立，高50～90cm，基生叶具叶柄，叶片掌状或近五角形，常作3深裂，裂片椭圆至倒卵形，中央裂片又3裂，侧裂片又作大小不等的2裂，先端齿裂，具尖头；茎生叶具短柄或无柄，3深裂，裂片倒卵形至菱状卵形，两面均有紧贴的灰白色细长柔毛。花与叶相对侧生。聚合瘦果近球形或卵圆形，淡褐色。气微，味微苦、辛(图87－1)。

以完整、鲜嫩、无杂质者为佳。

(2)饮片 毛茛段 呈不规则的小段，根、茎、叶、花或果混合。根细柱状，茎被白色细长毛，叶多破碎。气微，味微苦、辛(图87－2)。

【功效】 味辛，性温。清热解毒，祛风湿，止痛。

88. 牛 黄

Niuhuang **Calculus Bovis**

ゴオウ **Cow-bezoar**

【来源】 本品为牛科动物黄牛 *Bos taurus donesticus* Gmelin 干燥的胆结石(少数为胆管、肝管结石)。国产牛黄全国大部分地区有产，主产于北京、天津、内蒙，辽宁、吉林、黑龙江、陕西、甘肃等地，通称“京牛黄”或“西黄”、“东黄”。由加拿大进口者习称“金山牛黄”。由印度进口者习称“印度牛黄”。

【产地加工】 宰牛时检查胆囊、胆管及肝管，如有结石，即滤去胆汁，将牛黄取出，除去外部薄膜，阴干。胆囊中的结石称“蛋黄”；胆管及肝管中的结石称“管黄。

【炮制】 取原药材，除去杂质，研成细粉，称“牛黄”。

【性状】 (1)药材 ①蛋黄 多呈卵形、不规则球形、方圆形或三角形，直径1～3cm。表面金黄色至棕黄色，细腻而稍有光泽，有的外部挂有一层黑色光泽的薄膜，习称“乌金衣”，有的粗糙具裂纹。体轻，质松脆，断面黄色，可见紧密细腻的同心层纹。气清香，味先苦而后微甜，有明显的清凉感，嚼之不粘牙，其水液可使指甲染黄，习称“挂甲”(图88－1)。

②管黄 呈管状，表面不平或有横曲纹，或破碎为小片，长约3cm，直径1.0～1.5cm。表面红棕色或棕褐色，有裂纹及小突起。断面有较少的层纹，有的中空，色较深(图88－2)。

以完整、色棕黄、质松脆、断面层纹清晰而细腻者为佳。

(2)饮片 牛黄粉 为棕黄色或红棕色细粉(图88－3)。

【功效】 味苦、甘，性凉。清心，豁痰，开窍，凉肝，息风，解毒。

附：印度牛黄 蛋黄(图88－4)、蛋黄断面(图88－5)、管黄(图88－6)。

87—1

87—2

88—2

88—1

88—3

88—5

88—4

88—6

89. 牛蒡子

Niubangzi **Fructus Arctii**
ゴボウシ **Ackene of Great Burdock**

【来源】 本品为菊科植物牛蒡 *Arctium lappa* L. 的干燥成熟果实。

【产地加工】 秋季果实成熟时采收果序，晒干，打下果实，除去杂质，再晒干。

【炮制】 (1)牛蒡子 取原药材，除去杂质，洗净，干燥称"牛蒡子"。

(2)炒牛蒡子 取净牛蒡子置锅内，用文火加热，炒至鼓起，有爆裂声，表面微显焦斑，有香气逸出时，取出，放凉，称"炒牛蒡子"。

【性状】 (1)药材 呈长倒卵形，略扁，微弯曲，长 0.5～0.7cm，宽 0.2～0.3cm。表面灰褐色，带紫黑色斑点，有数条纵棱，通过中间 1～2 条较明显。顶端钝圆，稍宽，顶面有圆形环，中间具点状花柱残迹；基部略窄，着生面色较淡。果皮较硬，破开后可见子叶 2 片，淡黄白色，富油性。气微，味苦、后微辛而稍麻舌(图 89－1)。

以粒大、饱满、色灰褐者为佳。

(2)饮片 炒牛蒡 形如牛蒡子，色泽加深，质脆。微有香气(图 89－2)。

【功效】 味辛、苦，性寒。散风热，利咽，透疹，消肿解毒。

90. 牛 膝

Niuxi **Radix Achyranthis Bidentatae**
ゴシツ **Root of Twotooth Achyranthes**

【来源】 本品为苋科植物牛膝 *Achyranthes bidentata* Bl. 的干燥根。习惯认为主产河南省怀庆者质量最佳，故有"怀牛膝"之称。

【产地加工】 冬季茎叶枯萎时采挖，除去须根及泥沙，捆成小把，晒至干皱后，用硫黄熏 2 次，将横端切齐，晒干。

【炮制】 (1)牛膝段 取原药材，除去杂质，洗净，润透，除去残留芦头，切段或片，晒干，称"牛膝(段)"。

(2)酒牛膝 取牛膝段。加酒拌匀，闷透，置锅内，用文火炒干，取出，放凉，称"酒牛膝"。

【性状】 (1)药材 呈细长圆柱形，有的稍弯曲，上端稍粗，下端较细，长 15～50(～90)cm，直径 0.4～1.0cm。表面灰黄色或淡棕色，有略扭曲而细微的纵皱纹、横长皮孔及稀疏的细根痕。质硬而脆，易折断。断面平坦，黄棕色或浅黄白色，微呈角质样而油润，中心维管束木部较大，黄白色，其外围散有多数点状的维管束，排列成 2～4 轮。气微，味微甘而稍涩(图 90－1)。

以身干、皮细、条长、色灰黄、味甘者为佳。

(2)饮片 ①牛膝段 为类圆形厚片或呈圆柱形的段，长 0.5～1.5cm，直径 0.2～1.0cm。切面淡棕色或棕色(久放者颜色加深)，略呈角质样而油润。中心木心浅黄色或黄白色。其外围散有多数筋脉点(维管束)排列成 2～4 轮。周边灰黄色或淡棕色，有微细的纵皱纹及横长皮孔。质硬，吸潮后变柔软。气微，味微甜而稍涩(图 90－2)。

②酒牛膝 形如牛膝段，颜色较深，呈棕色，偶有焦斑，味微甜稍涩，微有酒气(图 90－3)。

【功效】 味苦、酸，性平。补肝肾，强筋骨，逐瘀通经，引血下行。

附：牛膝片(日本加工品) 呈圆形或类圆形的片状，少数为针片。径 0.3～0.7cm，厚 1.0～1.5mm。表面棕色或黄棕色，中心有黄白色木心，木心外周隐约可少数或众多的黄白色小点，周边有细纵皱，棕黄色或分染黄棕色。质稍软，呈角质样。气微，味稍甜(图 90－4)。

出口品 **牛膝斜片**(图 90－5)。



89—1

89—2

90—1

90—4

90—2

90—3

90—5

91. 牛 鞭

Niubian **Penis et Testis Bovis**
ギュウベン **Plenis and Testes of Ox**

【来源】 本品为牛科动物黄牛 *Bos taurus domesticus* Gmelin 或水牛 *Bubalus bubalis* L. 的干燥阴茎及睾丸。

【产地加工】 全年均可采收，杀牛后，剖腹割取阴茎及睾丸，去净附着的肌肉及油脂，拉直，干燥。

【性状】 药材 为圆柱形长条，或稍弯曲，前端锥形。表面棕黄，有纵行的皱沟。睾丸2枚，椭圆形(图91)。

以粗壮、条长、无残肉及油脂者为佳。

【功效】 味甘、咸，性温。补肾气，益精。

92. 升 麻

Shengma **Rhizoma Cimicifugae**
シヨウマ **Rhizome of Largetrifolious Bugbane**

【来源】 本品为毛茛科植物大三叶升麻 *Cimicifuga heracleifolia* Kom.、兴安升麻 *Cimicifuga dahuica* (Turcz.) Maxim. 或升麻 *Cimicifuga foetida* L. 的干燥根茎。药材依次习称“关升麻”、“北升麻”及“西升麻”。

【产地加工】 秋季采挖，除去泥沙，晒至须根干时，用火燎去须根，晒干。

【炮制】 (1)升麻片 取原药材，除去杂质，浸泡至3～4成透时取出，润透，切厚片，干燥，通称“升麻片”。

(2)蜜升麻 取炼蜜用适量开水稀释后，加入升麻片拌匀，闷透，置锅内，用文火加热，炒至稍粘手时，取出放凉，称“蜜升麻”。

(3)升麻炭 取升麻片置锅内，用武火加热，炒至表面焦黑色，内部棕褐色，喷淋清水少许，灭尽火星，取出晾干，称“升麻炭”。

【性状】 (1)药材 ①关升麻 呈不规则长块状，多短分枝或结节状，长8～20cm，直径1.5～2.5cm，表面暗棕色或黑棕色，有时皮部脱落可见网状筋脉，上有数个圆洞状茎基，直径为0.5～2.5cm，两侧及下面有少数细根断痕。质坚而轻。断面黄白色，皮部薄，木部呈放射状或网状条纹(纵切面)。气微，味微苦(图92－1)。

②北升麻 呈不规则形，多分支，结节状，多空洞或窟窿状。长9～18cm，直径1.0～1.5cm，茎基较密，断面微带绿色。

③西升麻 呈不规则块状，分枝较多，直径0.7～6.0cm，茎基直径0.4～1.0cm，细根较多，断面灰绿色。

均以体大、质轻、外皮黑褐色、断面黄绿色、无须根者为佳。

(2)饮片 ①升麻片 为不规则的薄片，直径1.5～3.5cm，表面黄白色至淡棕黑色，有裂隙，纤维性，皮部很薄，中心有放射状网状条纹，髓部有空洞，质脆。味苦(图92－2)。

②蜜升麻 形如升麻片，黄棕色或棕褐色，味甜(图92－3)。

③升麻炭 形如升麻片，表面黑色，折断面黑褐色。

【功效】 味微甘、苦，性微寒。散风热，透疹，升提中气。



91

92—2

92—1

92—3

93. 长 石

Changshi Anhydritum

チョウセキ Anhydrite

【来源】 本品为以硫酸盐类矿物硬石膏 Anhydrite ($CaSO_4$)或透石膏($CaSO_4 \cdot 2H_2O$)为主要组分，含石膏、方解石、高岭石等其他组分的矿石。

【产地加工】 采挖后，除去杂石，挑选灰白色者入药。

【炮制】 研细，水飞用。

【性状】 (1)药材 ①硬石膏质长石 为不规则的纤维、致密粗粒状结晶集合体，偶见厚板状、板状晶体，无色如玉，玻璃-珍珠光泽，无色、白色至暗灰色或带紫、红、褐的灰色。质重脆，碎块片片横碎，呈方块状(直角裂块)。断面显颗粒性。条痕白、灰白。硬度 3.0～3.5，相对密度 2.8～3.0。气味均九(图 93－1)。

以色泽如玉、碎块呈方块者、亮星多者为佳。

②透石膏质长石 多为板柱状晶体的集合体，无色透明或近透明，白色或灰白色，质较重，易打碎，常顺纵纹裂开，碎片呈板片状(直角及斜角裂片)，长条形断面可分层，有光泽。条痕白色。硬度 2，相对密度 2.3。气味均无(图 93－2)。

以色白、透明、碎块呈板片状、有玻璃光泽者为佳。

(2)饮片 制长石粉 呈白、灰白色粉末，有光泽(图 93－3)。

【功效】 味辛，性寒。除热，利尿，通血，理气。

94. 片姜黄

Pianjianghuang Rhizoma Curcumae Wenyujin

ヘンキョウオウ Wenyujin Rhizome

【来源】 本品为姜科植物温郁金 *Curcuma wenyujin* Y. H. Chen et C. Ling 的根茎。

【产地加工】 11 月至次年 2 月，挖出根茎后，除去须根等杂质，洗净泥沙，趁鲜纵切成厚片，晒干，或用沸水烫过后晒干。

【炮制】 取原药材，洗去杂质，用清水快洗，捞起，泅润软，切 1.5cm 长的片块，晒干或烘干，筛去灰屑。

【性状】 (1)药材 不规则纵切片，长 3～7cm，厚 1～4mm。表面灰黄色，糙粗，皱缩，有明显的须根痕，切面黄白色，平滑，粉性，具筋脉纹。水烫过的切片，切面略显角质。质坚脆，难折断。气芳香，味辛、微苦。

(2)饮片 呈条片状或不规则小块。其余特征同药材(图 94)。

【功效】 味辛、微苦，性温。行气活血，通经止痛。用于风寒湿痹、肢体酸痛、损伤瘀痛等症。

93—2

93—1

93—3

94

95. 乌梢蛇

Wushaoshe Zaocys

ウショウダ Black-snake

【来源】 本品为游蛇科动物乌梢蛇 *Zaocys dhumnades* (Cantor)的干燥体。

【产地加工】 于夏、秋2季捕捉，剖开腹部，除去内脏，卷成圆盘状(称"盘蛇")，干燥。

【炮制】 (1)乌梢蛇 取原药材，除去杂质、头、鳞片及灰屑，切段，称"乌梢蛇"。

(2)乌梢蛇肉 取净乌梢蛇，用黄酒浸润，闷透后，取出，除去皮骨，切段，晒干，称"乌梢蛇肉"。

(3)酒乌梢蛇 取净乌梢蛇段，喷淋黄酒，拌匀，闷透后置锅内，用文火加热，炒至微黄色，取出放凉，称"酒乌梢蛇"(每乌梢蛇100kg，用黄酒20kg)。

【性状】 (1)药材 ①盘蛇 呈圆盘状，盘径约16cm。表面乌黑或黑褐色，密被菱形细鳞，背鳞行数为偶数，头在中央，扁圆形，口内有多数刺状牙齿，脊部高耸成屋脊状；腹部剖开边缘向内卷曲，内面黄白色或淡棕色，可见排列整齐的肋骨。尾部渐细而长。质坚硬。气腥，味淡(图95—1)。

②乌梢蛇 呈段状，长约3cm，表皮乌黑色，切面黄白色或灰棕色。质坚硬。气腥，味淡(图95—2)。

(2)饮片 ①乌梢蛇肉 呈段片状，长2～3cm，无皮骨，黄白色或灰黑色。质韧。气腥，略有酒气(图95—3)。

②酒乌梢蛇 形如乌梢蛇段，色泽加深，略有酒气。

【功效】 味甘，性平。祛风，通络，止痉。

96. 乌蔹梅

Wulianmei Herba Cayratiae Japonicae

ウレンバイ Herb of Japanese Cayratia

【来源】 本品为葡萄科植物乌蔹梅 *Cayratia japonica* (Thunb.) Gagn.的全草。

【产地加工】 于夏、秋2季，采收带根全草，洗净泥沙，晒干。

【炮制】 取原药材，拣去杂质，喷水润软，切1.5～2.0cm短段，晒干，筛去灰屑。

【性状】 (1)药材 茎草，暗绿色。茎细长，直径1～3mm，暗绿色或黄绿色，有纵棱，具卷须。叶互生，叶柄长3～8cm，叶片膜质，复状5小叶，小叶片倒卵形至长椭圆形，先端尖或钝，基部钝，叶缘具粗锯齿，顶端小叶柄较长，两侧较短。花淡绿色，簇生，聚伞状。浆果卵形，熟时紫黑色。气微，味微酸、苦。

(2)饮片 为切断的根、茎、叶混杂物。根微黄白色，切面黄白色，可见维管束点；茎黄绿色，有纵棱，切面维管束点排列不整齐；节上生叶，叶腋有卷须，叶片膜质，叶缘有锯齿；花淡绿色，小，排成聚伞状；浆果绿色，皱缩，或者为紫黑色，极皱缩(图96)。

【功效】 味酸、苦，性寒。凉血解毒，利小便，消肿散肿。用于烫伤溃烂，小儿疳积，三赤生翳，毒蛇咬伤等症。

95—1

95—2

95—3

96

97. 丹 参

Danshen Radix Salviae Miltiorrhizae

タンジン Dan-shen

【来源】 本品为唇形科植物丹参 *Salvia miltiorrhiza* Bge. 或南丹参 *Salvia bowleyana* Dunn. 的干燥根及根茎。

【产地加工】 于春、秋2季采挖，除去泥沙，干燥。

【炮制】 (1)丹参 取原药材，除去杂质及残茎、须根，洗净，润透，切厚片，干燥。

(2)酒丹参 取丹参片，用酒拌匀，闷润至透，置锅内，用文火炒干，取出放凉。每丹参100kg，用酒10kg。

【性状】 (1)药材 根茎粗壮，根数条，长圆柱形，略弯曲，有的分枝并具须状细根，长10～20cm，直径0.3～1.0cm；表面棕红色或暗棕红色。粗糙，具纵皱纹。老根外皮疏松，常呈鳞片状脱落，质硬而脆，断面疏松，有裂隙，皮部棕红色，木部灰黄色或紫褐色，可见黄白色点状维管束。气微，味微苦、涩(图97－1)。

(2)饮片 ①丹参片 为不规则的斜厚片，短径0.5～1.5cm。外表面棕红色或暗红棕色，具纵皱纹；切面皮部红色或棕红色，可见黄白色点状维管束，显菊花纹。质脆。气微，味微苦(图97－2)。

②酒丹参 形如丹参，色泽加深，微有酒香气。

【功效】 味苦，性微寒。祛瘀止痛，活血通经，清心除烦。

附：丹参片出口品(图97－3)。

98. 风轮菜

Fengluncai Herba Clinopodii Chinensis

フウリンサイ Herb of Chinese Clinopodium

【来源】 本品为唇形科植物风轮菜 *Clinopodium chinense* (Benth.) Kuntze 的干燥全草。

【产地加工】 于秋季采收，去净泥土，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，稍润，切段，干燥，称“风轮菜段”。

【性状】 (1)药材 茎四方形，多分枝，全体密被柔毛。叶对生，卵形，基部楔形，边缘有锯齿。花腋生呈轮伞状，花冠唇形，淡红色或紫红色。小坚果宽卵形，棕黄色。气微香，味苦(图98－1)。

以质嫩、叶多者为佳。

(2)饮片 风轮菜段 呈不规则的小段，茎、叶、花混合，多破碎，质轻脆，断面有白色髓(图98－2)。

【功效】 味苦、辛，性凉。疏风清热，解毒消肿。

97—1

97—2

98—1

97—3

98—2

99. 方解石

Fangjieshi Calcitum

ホウカイセキ Calcite

【来源】 本品为碳酸盐类矿物方解石 Calcite 矿石，主含碳酸钙($CaCO_3$)。

【产地加工】 采得后，除去泥土杂石。

【炮制】 (1)方解石 取原药材，洗净，晒干，砸成小块。

(2)制方解石 将净方解石捣为细末，水飞用。

【性状】 (1)药材 呈粗粉、解理块状或不规则块状，个体呈菱面体结晶为的主碎或斜角的扁方块，常有棱角，白色、微透明，表面平滑，有玻璃样光泽。质脆，易打碎。硬度 3，相对密度 2.71～2.93。气无，味淡(图 99－1、图 99－2)。

以色白、透明、易碎者为佳。遇冷稀盐酸(HCl)强烈泡沸。

(2)饮片 制方解石 为白色粉末(图 99－3)。

【功效】 味苦、辛，性大寒。主治胸中留热结气，黄疸，通血脉。

100. 火炭母

Huotanmu Herba Polygoni Chinensis

カタンボ Herb of Chinese Knotweed

【来源】 本品为蓼科植物火炭母 *Polygonum chinense* L. 或粗毛火炭母 *Polygonum chinense* L. *var. hispidum* Hak. f. 的干燥全草。

【产地加工】 于夏、秋 2 季采挖，洗净，晒干。

【炮制】 取原药材，洗净，切段，干燥。

【性状】 (1)药材 根呈须状，茎细长，圆柱形，有分枝，长 30～100cm，表面淡绿色或棕褐色，略具棱沟，节处膨大。叶互生，托叶鞘筒状，叶片多皱缩，黄绿色或暗绿色，卵形或矩圆状卵形，长为 5～10cm，宽 3～6cm，全缘，嫩枝紫红色，常见紫黑色“V”形斑块。花白色、淡红色或紫色。小坚果具 3 棱。粗毛火母线茎叶习见黄色短毛。气微，味甜、涩(图 100－1)。

(2)饮片 火炭母片 为不规则的小段。茎、叶混合。茎呈圆柱形，节处膨大。叶多皱缩，完整叶片呈卵形或矩圆状卵形，全缘，上面暗绿色，下面色较浅。花白色、淡红色或紫色。小坚果具 3 棱。气微，味甜、涩(图 100－2)。

【功效】 味酸、涩，性凉。清热利湿，解毒止痒，明目退翳。

99—1

99—2

99—3

100—1

100—2

101. 巴 豆

Badou **Fructus Crotonis**
ハズ **Croton Seed**

【来源】 为大戟科植物巴豆 *Croton tiglium* L. 的干燥成熟果实。

【产地加工】 秋季果实成熟时采收，堆置 2～3 天，摊开，干燥。

【炮制】 (1)生巴豆 取原药材，去壳取仁。

(2)巴豆霜 取净仁，碾成细末或捣烂如泥，用草纸包裹，压去大部分油，反复换纸吸去油；或压榨去油，至松散成粉不再粘结为度。

【性状】 (1)药材 为卵圆形，具 3 棱，一端平截，一端有果柄残痕。外表黄白色，有 6 条纵棱，3 室，每室含种子 1 粒。种子为略扁的椭圆形或卵形。外皮灰棕色，略粗糙，有微突起的纵纹或网纹。横断面略呈方形。种仁外面包有一层薄膜，为黄白色，富油性。无臭，味辛辣(图 101－1)。

(2)饮片 ①生巴豆 种子呈椭圆形，略扁。表面棕色或灰棕色，有隆起的种脊，外种皮薄而脆，内种皮呈白色薄膜，种仁黄白色，富油质。味辛辣(图 101－2)。

②巴豆霜 为淡黄色粉末，性滑腻，微显油性，味辛辣。

【功效】 味辛，性热。有大毒。峻下寒积，逐水退肿。

102. 巴戟天

Bajitian **Radix Morindae Officinalis**
ハゲキテン **Root of Medicinal Indianmulberry**

【来源】 本品为茜草科植物巴戟天 *Morinda officinalis* How. 的干燥根。

【产地加工】 秋、冬季采挖，洗净，除去须根，晒至 6～7 成干，轻轻捶扁，晒干。

【炮制】 (1)巴戟天 取原药材，除去杂质，通称“巴戟天”。

(2)巴戟肉 取原药材，除去杂质，洗净，泡至 3～4 成透后，蒸透，趁热除去木心，切段，干燥，称“巴戟肉”。

(3)盐巴戟天 取原药材，用盐水拌匀，闷至盐水被吸尽，蒸透，趁热除去木心，切段，干燥，称“盐巴戟天”。

(4)制巴戟天 取甘草捣碎，加水煎汤，去渣，加入净巴戟大拌匀，置锅内煮透，取出，趁热除去木心，切段，干燥，称“制巴戟天”。

【性状】 (1)药材 呈扁圆柱形，长 5～13cm，直径 0.5～2.0cm。表面灰黄色或暗红色，具纵纹及横裂纹，有的皮部断离露出木部。质韧，肉厚易剥落，断面皮部厚，紫色或淡紫色，易与木部剥离。木部坚硬，黄棕色或黄白色，直径 0.1～0.5cm。无臭，味甜而微涩(图 102－1)。

以条大肥壮、肉厚色紫者为佳。

(2)饮片 ①巴戟肉 为扁平的段或块，长 1.0～1.5cm，宽 0.5～1.5(～2)cm，厚 0.2～0.4cm；有的纵向断裂为 2 瓣，成条状。切面紫色或淡紫色，略呈颗粒性，中心有拇取木心的圆形或扁圆形小孔；表面(周边)暗灰色、灰紫色，具纵向纹理或横裂纹；裂为 2 瓣者纵裂面参差不齐，中间拇去木心处呈凹槽状。质坚硬。无臭，味甜而微涩(图 102－2)。

②盐巴戟天 形如巴戟天，气微，味咸(图 102－3)。

③制巴戟天 形如巴戟天，气微，味甜(图 102－4)。

【功效】 味甘、辛，性微温。补肾阳，强筋骨，祛风湿。

101—2

101—1

102—1

102—2

102—3

102—4

103. 水牛角

Shuiniujiao　　Cornu Bubali

スイギュウカク　　Water Buffalo Horn

【来源】 本品为牛科动物水牛 *Bubalus bubalis* L. 的角。

【产地加工】 全年均可采收，宰牛后，取下角，水煮，除去角塞，干燥。

【炮制】 取原药材，洗净，用温水浸泡，捞出镑片或洗净干燥后锉成粗粉。

【性状】 (1)药材　呈锥形，稍扁平而弯曲，长短不一。表面棕黑色或灰黑色，一侧有数条横向的沟槽，另一侧有密集的横向凹陷条纹。上部渐尖，有纵纹，基部略呈三角形，中空。角质，坚硬，不易劈开。气微腥，味淡(图 103－1)。

(2)饮片　①水牛角片　为不规则的薄片，切面平坦或卷曲，灰黑色或棕黑色，有纹理，横断面观梭形纹理平行排列(图 103－2)。

(2)水牛角粉　灰褐色粉末(图 103－3)。

【功效】 味苦咸，性寒。清热凉血，解毒。

104. 水半夏

Shuibanxia　　Rhizoma Typhonii Flagelliformis

スイハンゲ　　Rhizome of Whipformed Typhonium

【来源】 本品为天南星科植物鞭檐犁头尖 *Typhonium flagelliforme* (Lodd.) Blume 的干燥块茎。

【产地加工】 于秋、冬 2 季采挖，除去外皮及须根，洗净，晒干。一种方法是把挖出的块茎放在竹筐内，用扎盖稻草的木棒在流水中反复推搓，除去外皮，冲洗干净，晒干。另一种方法是把挖取的块茎放在缸内，加入适量清水，加玉米心碎块拌匀后，用木棒反复搅拌，去净外皮，冲洗干净，晒干。

【炮制】 取原药材，洗净，干燥。

【性状】 (1)药材　呈尖圆锥形或椭圆形、卵形，直径 0.5～1.5cm，高 0.8～3.0cm。表面类白色或淡黄色，具细皱纹和隐约可见的须根痕。一端类圆形，常有偏斜而凸起的叶痕和芽痕，另端略尖。质坚实，断面白色，粉性。气微，味辛辣，麻舌刺喉(图 104)。

【功效】 味辛，性温。有毒。燥湿，化痰止咳。用于咳嗽痰多、支气管炎等症。

103—2

103—1



103—3

104

105. 水红花子

Shuihonghuazi　　Fructus Polygoni Orientalis

スイコウカシ　　Fruit of Prince's Feather

【来源】 本品为蓼科植物红蓼 *Polygonum orientale* L. 的干燥成熟果实。

【产地加工】 秋季果实成熟时割取果穗，干燥，打下果实，除去杂质。

【炮制】 (1)水红花子　取原药材，除去杂质及灰屑，称"水红花子"。

(2)炒水红花子　取净水红花子置锅内，用文火加热，炒至爆裂，有香气逸出为度，取出放凉，称"炒水红花子"。

【性状】 (1)药材　呈扁圆球形，直径 0.20～0.35cm，厚 0.10～0.15cm。表面棕黑色或红棕色，有光泽，两面微凹，中部略有纵向隆起。顶端有短突尖，基部有浅棕色略突起的果梗痕。质硬。气微，味淡(图 105－1)。

以粒大、饱满、色棕黑者为佳 。

(2)饮片　炒水红花子　形如水红花子，鼓起爆裂，裂断面粉白色。有香气，味淡(图 105－2)。

【功效】 味咸，性微寒。散血消积聚，消积止痛。

106. 水栀子

Shuizhizi　　Fructus Grandiflorae

スイシシ　　Fruit of Fortune Cape Jasmine

【来源】 本品为茜草科植物大花栀子 *Gardenia jasminoides* Ellis *var.* grandiflora (Lour.) Makino 的果实。

【产地加工】 于 8～11 月份采摘成熟果实，晒干或烘干。

【炮制】 取原药材，拣去枝、叶等杂质。

【性状】 (1)药材　果实呈倒卵形或长椭圆形，长 3～7cm，直径 1.0～1.5cm。表面黄色，具较高纵棱和宿存花萼。质坚脆，断面果皮较厚，种子多数。种子红棕色，呈扁椭圆形。气微香，味酸、苦(图 106－1)。

【功效】 味苦，性寒。散热毒，活血化瘀，祛湿。用于扭伤、跌伤，多外用。主要用作黄色染料。

附：台湾产水栀子(图 106－2)。

105—1

105—2

106—1

106—2

107. 水 蛭

Shuizhi Hizudo

スイテツ Leech

【来源】 本品为水蛭科动物蚂蟥 *Whitmania pigra* Whitman、水蛭 *Hirudo nipponica* Whitman 或柳叶蚂蟥 *Whitmania acranulata* Whitman 的干燥体。药材习称“宽水蛭”、“长条水蛭”、“水蛭”。

【产地加工】 于夏、秋 2 季捕捉，洗净，用沸水烫死，晒干或低温干燥。

【炮制】 取原药材，洗净，切段，干燥。取滑石粉或砂子置锅内，文火炒热后，加入净水蛭，拌炒至微鼓起，取出，筛去滑石粉或砂子，放凉，称“烫水蛭”或“制水蛭”。

【性状】 (1)药材 ①蚂蟥（宽水蛭） 呈扁平纺锤形，长 4～10cm，宽 0.5～2.0cm。背部黑棕色或黑褐色，略隆起，有许多黑色斑点排成 5 条纵纹；腹面平坦，与两侧均呈棕黄色。全体由多数环节组成，前端稍尖，吸盘不明显；后端钝圆，吸盘较大。质脆，易折，断面胶质状，有光泽。气微腥（图 107－1）。

②水蛭 呈扁长圆形，长 2～5cm，宽 0.2～0.3cm。体多弯曲扭转，折断面不平坦，无光泽（图 107－2）。

③柳叶蚂蟥（长条水蛭） 呈长条形（因加工时拉长），长 5～12cm，宽 0.1～0.5cm。两端稍细，背腹两面均呈黑棕色。折断面不平坦，无光泽。

以条粗、整齐、色黑褐、有光泽。

(2)饮片 烫水制（制水蛭） 为不规则小段，长 10～15cm，呈黑褐色，滑石粉烫者上附白粉，表面鼓起。质松脆，易碎。气微腥，味咸苦（图 107－3、图 107－4）。

【功效】 味咸、苦，性平。有毒。破血，逐瘀，通经。

108. 功劳木

Gonglaomu Caulis Mahoniae

コウロウモク Mahonia Stem

【来源】 本品为小檗科植物阔叶十大功劳 *Mahonia bealei* (Fort.) Carr. 或细叶十大功劳 *Mahonia fortunei* (Lindl.) Fedde 的干燥茎。

【产地加工】 全年均可采收，截段，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，镑片或劈成小碎块，称“功劳木块”。”

【性状】 (1)药材 呈圆柱形，长短及粗细不一。表面灰褐色，有明显的纵沟纹及横向细裂纹，有的外皮较光滑，有光泽，或有叶柄残基。质硬而较重，不易折断。截断面可见刀痕，皮部呈棕褐色，木心为黄色。气微，味苦（图 108－1）。

以条均、整齐无杂质、质坚者为佳。

(2)饮片 功劳木块 呈不规则的块片，大小不等。切面皮部窄，棕褐色，木部黄色，可见数个同心性环纹及排列紧密的放射状纹理，髓部色较深。质硬。气微，味苦（图 108 2）。

【功效】 味苦，性寒。清热燥湿，泻火解毒。



107—1



107—2



107—3

107—4

108—1

108—2

109. 功劳叶

Gonglaoye　　Folium Ilicis Cornutae

コウロウヨウ　　Leaf of Chinese Holly

【来源】 本品为冬青科植物枸骨 *Ilex cornuta* Lindl. 的干燥叶。

【产地加工】 于秋季采收，除去杂质，干燥。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，稍闷，切丝，干燥，称"功劳叶丝"。

【性状】 (1)药材　呈矩圆状方形，长 3.0～7.5cm，宽 1～3cm，边缘卷曲，先端有 3 个等大的硬尖刺，中间的 1 个常向下反卷，基部亦有同样的刺 1～2 个，有的叶中间各有 1 刺尖。叶上表面黄绿色而有光泽，可见羽状叶脉延伸至叶缘，中脉常凹陷；下表面灰黄色或暗灰色；叶柄极短，硬革质。气微，味苦(图 109－1)。

以叶大、叶表面黄绿色而有光泽者为佳。

(2)饮片　功劳叶丝　呈不规则的丝状，多卷曲，叶上表面黄绿色而有光泽，主脉明显，下表面灰绿色。叶缘带刺，叶片硬革质。气微，味微苦(图 109－2)。

【功效】 味苦，性微寒。滋阴清热，退骨蒸。

110. 打破碗花花

Dapowanhuahua　　Herba Anemones Hupehensis

ダハワンカカ　　Herb of Hupeh Anemone

【来源】 本品为毛茛科植物打破碗花花 *Anemone hupehensis* Lem. 的干燥或新鲜全草。

【产地加工】 于夏、秋 2 季，茎叶茂盛时采挖，除去泥沙及杂质，阴干或鲜用。

【炮制】 取原药材，洗去杂质，切碎，筛去灰屑。

【性状】 (1)药材　全草长达 100cm。根呈长圆柱形，平直或弯曲，直径 0.5～2.0cm；表面灰棕色，质坚硬，不易折断。根茎部有 1 个至数个茎基。基生叶为单叶或 3 出复叶。茎纤细，长 40～80cm，基部直径约 4cm，表面密生短柔毛。茎生叶为单叶，少数为 3 出复叶，叶片上表面深绿色，下表面灰绿色，均被细茸毛，叶缘有锯齿。聚伞花序顶生，2～3 回分枝。

(2)饮片　为根、茎、叶切碎后的混合物。根圆柱形，表面灰棕色，切面黄白色。茎表面灰绿色，具纵皱和短柔毛。叶片草质，上表面深绿色，下表面灰绿色，被细毛茸，叶缘有锯齿(图 110)。

【功效】 味苦，性凉。有小毒。清热，杀虫。用于顽癣、秃疮等症，还可用于灭蛆、杀孑孓。

109—2

109—1

110

111. 平胸龟

Pingxionggui　　Platysternon Megacephalum

ヘイキョウキ　　Big-headed Turtle Meat

【来源】 本品为龟科动物平胸龟 *Pltysternon megacephalum* Gray 甲、肉及全体。

【产地加工】 每年6～9月天气干旱时，到山涧、溪流、水坑边捕捉。甲、肉、全体均可应用。斩头杀死后，去掉甲和内脏，洗净，放烘箱中烘干，用时研粉服。全龟又可煎制成膏用。酌加适量糖、酒及苯甲酸钠、尼泊金等防腐剂。

【性状】 药材　头部很大，不能缩入头内。头部覆盖着整块的角质鳞。背甲扁平，背棱不明显。颈角板很小，椎角板5块，肋角板每侧4块，缘角板每侧11块，形状大小不一，臀角板较小。腹甲甚小，颐角板短而宽，肱角板和股角板比胸角板和腹角板长，肛角板较小。腹甲与背甲的缘角板之间有韧带相连，有下缘角板。背面棕褐色或褐色，腹面黄白色，有黑斑，前肢5指，后肢4趾，指、趾有锐利的长爪。尾长，约等于腹甲(图111－1、图111－2)。

【功效】 滋阴潜阳，宁心补肾。

112. 玉

Yu　　Nepheritum

ギョク　　Nepherite Grains

【来源】 本品为硅酸盐类矿物透闪石 Tremolite 质软玉 Nepherite，主要含有硅酸钙镁 $Ca_2Mg_5[Si_4O_{11}]_2[OH]$。

【产地加工】 采挖后，除去杂质，挑选洁净者入药，或收集琢磨玉器的下脚料。

【炮制】 拣净杂质，砸成小颗粒或研磨成细粉。

【性状】 (1)药材　呈不规则隐晶质块体，大小不一，浅绿色或白色，表面色泽较均匀，光洁，微透明，显玻璃－油脂状光泽，或有晕彩。质硬而韧，难打碎，断面密布毛刺，色泽变白。硬度近6(大于小刀)。条痕白色，相对密度3.1～3.3。气无，味淡(图112)。

以质坚、色白、微显碧绿、断面刺状者为佳。

(2)饮片　玉粉　白色粉末。

【功效】 味甘，性平。润心肺，清胃热，止渴，明目。



111—1



111—2

112

113. 玉 竹

Yuzhu **Rhizoma Polygonati Odorati**

ギョクチク **Rhizome of Fragrant Solomoseal**

【来源】 本品为百合科植物玉竹 *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce 的干燥根茎。

【产地加工】 于春、秋2季采挖，除去须根，洗净，晒至柔软后，反复揉搓，晾晒。至无硬心时，晒干；或蒸透后，揉至半透明时，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，闷润至透，切厚片，干燥，称"玉竹片"。

【性状】 (1)药材 呈细长圆柱形或略扁，多不分枝。粗细均匀，长4～18cm，直径为0.3～1.6cm。表面淡黄色或淡黄棕色，半透明，具纵皱及微隆起的环节，节上残留白色圆形小点(须根痕)，偶有圆盘状的地上茎痕。质硬而脆，易折断，断面角质样。气微，味甜有粘性(图113－1)。

以条长、肉厚、黄白色、光洋柔润者为佳。

(2)饮片 玉竹片 呈不规则的厚片或薄片，直径0.3～1.6cm。表面淡黄色或淡黄棕色，可见纵皱及微隆起的环节。断面黄白色或棕黄色，显颗粒性或角质性。质硬而脆或稍软。气微，味甜有粘性(图113－2)。

【功效】 味甘，性微寒。养阴润燥，生津止渴。

114. 玉葡萄根

Yuputaogen **Radix Ampelopsis Delavayanae**

ギョクブドウコン **Root of Delaray Ampelopsis**

【来源】 本品为葡萄科植物三裂叶蛇葡萄 *Ampelopsis delavayana* (Franch.) Planch. 的干燥根。

【产地加工】 于秋、冬2季采挖根部，洗净泥土，晒干，或趁鲜时抽去木心。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，捞起，淋水润软，切片，晒干。

【性状】 (1)药材 呈圆柱形，略弯曲，长13～30cm，直径0.5～1.5cm。表面暗褐色，具纵皱。质硬而脆，易折断。断面皮部较厚，红褐色，木部淡红色，纤维性，皮部与木部易分离。气微，味涩(图114－1)。

(2)饮片 为类圆形或椭圆形薄切片。表面棕褐色，有纵皱纹。切面皮部较厚，木部淡红色，具放射状纹理，皮木易分离。气微，味涩(图114－2)。

【功效】 味涩、微苦，性温。散瘀止痛，消炎止血。用于肠炎腹泻，跌打损伤，外用治烧伤、烫伤、外伤出血、骨折等症。

113—1

113—2

114—1

114—2

115. 甘　草

Gancao　Radix Glycyrrhizae
カンゾウ　Liquorice Root

【来源】 本品为豆科植物甘草 *Glycyrrhiza uralensis* Fisch.、胀果甘草 *Glycyrrhiza inflata* Bat. 或光果甘草 *Glycyrrhiza glabra* L. 的干燥根及根茎。

【产地加工】 于春、秋 2 季采挖，除去须根，晒干。

【炮制】 (1)甘草片　取原药材，除去杂质及芦头，大小条分开，浸泡至 3～4 成透、闷润至透，切厚片，干燥，通称“甘草片”。

(2)蜜甘草　取炼蜜用适量开水稀释，加入甘草片内拌匀，闷润，置锅内，用文火加热，炒至表面棕黄色，不粘手为度，取出放凉，称“蜜甘草”。

【性状】 (1)药材　①甘草根及根茎　根呈圆柱形，长 25～100cm，直径 0.6～3.5cm。外皮松紧不一。表面红棕色或灰棕色，具显著的纵皱纹、沟纹、皮孔及稀疏的细根痕。质坚实，断面略显纤维性，黄白色，粉性，形成层环明显，射线放射状，有的有裂隙。根茎呈圆柱形，表面有芽痕，断面中部有髓。气微，味甜而特殊。甲级甘草(图 115－1)、去皮甘草(图 115－2)和节甘草(图 115－3)。

②胀果甘草根及根茎　木质粗壮，有的分枝，外皮粗糙，多灰棕色或灰褐色。质坚硬，木质纤维多，粉性小。根茎不定芽多而粗大(图 115－4 新疆条草、图 115－5 条草)。

③光果甘草根及根茎　质地较坚实，有的分枝，外皮不粗糙，多灰棕色，皮孔细而不明显。(图 115－6 阿富汗产、图 115－7 伊朗产)。

(2)饮片　①甘草片　为类圆形或椭圆形的厚片，或呈碎块状。表面黄白色，略显纤维性，中间有 1 较明显的环及放射状纹理，有裂隙。周边外皮松紧不一，粗糙，具细纵皱纹，棕红色、棕色或灰棕色。质坚，有粉性。气微，味甜而特殊(图 115－8、图 115－9 梁外草)。

②蜜甘草　形如甘草片，表面黄色和棕黄色，微有光泽。略带粘性。

【功效】 味甘，性平。补脾益气，清热解毒，祛痰止咳，缓急止痛，调和诸药。

附：甘草片出口品(图 115－10)

116. 甘　遂

Gansui　Radix Kansui
カンズイ　Gansui Root

【来源】 本品为大戟科植物甘遂 *Euphorbia kansui* T. N. Liou ex T. P. Wang 的干燥块根。

【产地加工】 春季开花前或秋末茎叶枯萎后采挖，放在筐内置水中，加稻谷皮或石渣，用力撞去外皮，用硫黄熏后，晒干。

【炮制】 (1)生甘遂　取原药材，除去杂质，洗净，晒干，称“生甘遂”。

(2)醋甘遂　取生甘遂，加醋拌匀，闷透，置锅中炒干，称“醋甘遂”。

【性状】 (1)药材　呈长纺锤形、椭圆形或长圆柱形，中间有时缢缩呈连珠状，长 1～8cm，直径 0.5～2.5cm。表面类白色或黄白色，凹陷处有棕色栓皮残留。质脆，易折断，断面粉性，白色，木部微显放射状纹理。气微，味微甜而辣，有刺激性(图 116－1)。

以肥大饱满、色洁白、粉性足者为佳。

(2)饮片　醋甘遂　形如甘遂，表面棕黄色或浅棕黄色，偶有焦斑，略有醋酸气(图 116－2)。

【功效】 味苦，性寒。有毒。泻水逐饮，消肿散结。

115—1

115—2

115—3

115—4

115—5

115—6

115—7



115—8

115—9

115—10

116—2

116—1

117. 东风菜

Dongfengcai **Herba Doellingeriae**

トウフウサイ **Herb of Scabrous Doellingeria**

【来源】 本品为菊科植物东风菜 *Doellingeria scaber* (Thunb.) Nees 的干燥全草。

【产地加工】 十夏、秋 2 季采挖，除去地下部分，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，切段，干燥，称“东风菜段”。

【性状】 (1)药材 茎直立，圆形，基部光滑，上部渐有毛，嫩枝顶端毛较密。叶互生；叶基部心脏形，长 9～24cm，宽 6～18cm，先端尖，边缘有锯齿或重锯齿，上表面绿色，下表面的灰白色，两面有短毛，具窄翼；茎上部叶卵状三角形，先端锐尖，基部心形或截形，柄较短。头状花序集成疏松的伞房状。气微，味苦(图 117-1)。

以质鲜嫩、完整、无杂者为佳。

(2)饮片 东风菜段 呈不规则的小段，茎、叶混合。茎圆柱形，嫩枝可见毛茸；叶互生，多卷曲或破碎，黄绿色，叶缘可见锯齿。质脆而轻。气微，味苦(图 117—2)。

【功效】 味甘，性寒。治跌打损伤、蛇咬伤等症。

118. 东方后片蠊

Dongfanghoupianlian **Opisthopatia Orientalis**

トウホウゴヘンレン **Dongfanghoupianlian**

【来源】 本品为姬蠊科动物东方后片蠊 *Opisthopatia orientalis* Burm. 雌虫的干燥全体。

【产地加工】 十夏、秋 2 季捕捉，多在仓房、厨房、酱坊、油坊、碾磨坊等各种糠堆、麸等底下用翻捕，也可在夜间用灯光诱捕，捕后用沸水烫死，晒干或烘干备用。

【性状】 药材 虫体大形，长卵形而扁，漆黑色而有光泽。雌虫体长 3.5～4.5cm(雄虫体长 2.5～3.5cm)。头部棕褐色，头部完全隐藏于前胸背板之下，细小，头宽仅及前胸背板宽的 1/4。前胸背板宽发达，完全盖过头部，其前缘及侧缘有黄色镶边；中胸背板长宽仅及前胸背板之半。足棕褐色(图 118)。

【功效】 活血祛瘀，消肿止痛，通经下乳。

117—2

117—1

118

119. 东方蝾螈

Dongfangrongyuan　Cynops Orientalis
トウホウエイゲン　Salmander

【来源】 本品为蝾螈科动物东方蝾螈 *Cynops orientalis* (David)的全体。
【产地加工】 春至秋捕捉，捕后除去内脏，晒干，微火焙焦，研末备用。
【性状】 药材　体形小，全长 7cm 左右。头部扁平，尾部侧扁，尾梢钝圆，头部长大于宽，吻端钝圆，鼻孔极近吻端。头、背部、体侧、尾两侧满布小痣粒(图 119)。
【功效】 消积，清热解毒。

120. 石决明

Shijueming　Concha Haliotidis
セキケツメイ　Sea-ear Shell

【来源】 本品为鲍科动物杂色鲍(九孔鲍)*Haliotis diversicolor* Reeve、皱纹盘鲍(盘大鲍)*Haliotis discus hannai* Ino、羊鲍 *Haliotis ovina* Gmelin、澳洲鲍 Haliotis ruber (Leach)、耳鲍 *Haliotis asinina* Linnaeus、白鲍 *Haliotis laevigata* (Donovan)、美德鲍 *Haliotis midae* Linne. 等的贝壳。杂色鲍的贝壳又称"光底石决明"，皱纹盘鲍、羊鲍的贝又称"毛底石决明"。
【产地加工】 捕得后去肉，洗净，干燥。
【炮制】 (1)石决明　取原药材，除去杂质，洗净，干燥，捣碎。
(2)盐石决明　取净石决明置适宜容器内，煅至酥脆，取出，喷淋盐水，干燥，碾碎(石决明 100kg，食盐 2kg)。
(3)煅石决明　取净石决明，砸成小块，置无烟的灯火上或置适宜的容器内，煅至酥脆，取出，放凉，碾碎。
【性状】 (1)药材　①杂色鲍(光底石决明)　呈长卵圆形，内面观略呈耳形，长 3～9cm，宽为 2～6cm，高约 2cm。表面淡红色、灰棕色或绿棕色，有多数不规则的螺肋和细密生长线，螺旋部小，体螺部大，从螺旋部顶部开始向右排列有 20 余个疣状突起，末端 6～9 个开孔，孔口与壳面平。内面光滑，具珍珠样彩色光泽。壳较厚，质坚硬，不易破碎。无臭，味微咸(图 120－1)。
②皱纹盘鲍(毛底石决明)　呈长椭圆形，内面观呈耳状。长 5～14cm，宽 3～9cm，高为 2～3cm。壳外表面灰棕色。常附有苔藓类杂质，凹凸不平，粗糙，肋状纹理不明显，从近壳顶处向右排列有 20 余个椭圆形突起，末端常见 4～5 个开孔，孔口突出壳面，壳较薄(图 120－2)。
③羊鲍(毛底石决明)　近圆形，长 4～8cm，宽 2.5～6cm，高 0.8～2.0cm。壳顶位于近中部而高于壳面，螺旋部与体旋部各占 1/2，从螺旋部边缘有 2 行整齐的突起，尤以上部较为明显，末端为 4～5 个开口，呈管状。
④澳洲鲍(大石决明)　呈扁平卵圆形，长 13～17cm，宽 11～14cm，高 3.5～6.0cm。表面砖红色，螺旋部约为壳面的 1/2，螺肋和生长线呈波状隆起，疣状突起 30 余个，末端 7～9 个开孔，孔口突出壳面(图 120－3)。
⑤耳鲍(小石决明)　壳较小而薄，习称"小石决明"。长 5～8cm，宽 2.5～3.5cm，高约 1cm，狭长，呈耳状。外表草绿色、灰绿色或黄褐色，散有不规则的云状斑纹，光滑美丽，边缘有 4～7 个开孔，孔口与壳面平(图 120－4)。
⑥白鲍　呈卵圆形。长 11～14cm，宽 8.5～11.0cm，高 3.0～6.5cm。表面砖红色，光滑，壳顶高于壳面，生长线颇为明显，螺旋部约为壳面的 1/2，疣状突起 30 余个，末端 9 个开孔，孔口与壳平。
⑦多变鲍　贝壳椭圆形，内面观呈耳状，较厚，螺层约 3 层，壳顶稍高于壳面，从第 2 螺层至体螺层边缘有 1 列整齐小而呈管状的吸水孔，开孔 4～6 个。壳面暖绿色，杂有红褐色，通常有白色和黑色斑带，贝壳颜色多变化，壳内为银白色的珍珠光泽。壳口广，内唇有较发达的片状遮缘。
均以壳厚、内面光彩鲜艳者为佳。
⑧美德鲍　略呈耳形或卵圆形，长 13～18cm，宽 11～15cm，高 3～5cm。表面灰褐色或灰绿色，壳顶平，螺旋部小，螺肋不明显，螺体宽大，生长线呈波状或疣状突起于壳面，较粗糙。从近壳顶处向右排列有 30 多个由小到大的椭圆形突起物，末端 9～11 个呈孔状，孔口突出于壳面与壳体平行。壳内面具彩色光泽，中间有一明显的闭壳肌痕(图 120－5)。
(2)饮片　①生石决明　呈不规则碎块状，灰白色，有珍珠样光泽，质重。无臭，味微咸。
均以壳厚、内面光彩鲜艳者为佳。
②煅石决明　呈不规则小碎块或细粉状，灰白色无光泽，质酥(图 120－6)。
③盐石决明　形如煅石决明。无臭，味咸。
【功效】 味咸，性寒。平肝潜阳，清肝明目。

119

120—1



120—2



120—3

120—4

120—6

120—5

121. 石南藤

Shinanteng Caulis Piperis

セキナントウ Stem and Leaf of Briar

【来源】 本品为胡椒科植物巴岩香 *Piper wallichi* (Miq.) Hand. -Mazz. *var. hupehense* (DC.)Hand.-Mazz. 的干燥带叶茎枝。

【产地加工】 秋季割取带叶的茎枝，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，淋水润透，切小段，晒干。

【性状】 (1)药材 茎枝圆柱形，长可达数米，常缠绕成长团。表面灰棕色，节部稍膨大。质轻脆，断面中心有灰褐色的髓。叶互生，叶片椭圆形，灰绿色，皱缩破碎。气清香，味辛辣。

(2)饮片 呈不规则小段，茎叶相混，余同原药材(图 121)。

【功效】 味辛，性温。祛风湿，强腰膝，止痛，止咳。用于风湿痹痛、扭挫伤、腰膝无力、痛经、风寒感冒、咳嗽气喘等症。

122. 石莲子

Shilianzi Fructus Nelumbinis

セキレンシ Lotus Fruit

【来源】 本品为睡莲科植物莲 *Nelumbo nucifera* Gaertn. 的干燥成熟果实。

【产地加工】 秋末冬初采收，洗净泥土，晒干。

【炮制】 (1)石莲子 取原药材，除去杂质，通称“石莲子”。

(2)石莲肉 取石莲子，砸开，除去壳及心，称“石莲肉”。

【性状】 (1)药材 呈卵圆形或椭圆形，两端略尖，长 1.5～2.0cm，直径 0.8～1.3cm。表面灰黑色或灰棕色，平滑，顶端有圆孔状柱迹或残留柱基，基部有果柄痕。果皮极坚硬，砸碎果皮后，有卵形或椭圆形种子 1 粒，种皮红棕色，子叶 2 枚，肥厚，淡黄白色，显粉性，中间有绿色或暗绿色胚芽 1 枚。气弱，子叶味微甜，胚芽味苦，果皮味涩(图 122－1)。

以表面灰黑色、内仁饱满、质重、气味浓者为佳。

(2)饮片 石莲肉 呈半椭圆形或不规则形碎块，完整者半椭圆形，长 1.2～1.5cm，宽 0.6～0.8cm，厚约 0.5cm。外表面红棕色或棕色，具细纵纹理，一端边缘凹下，中央具凸出的棕色种脐；内表面黄白色，中间具除去心芽的纵沟。质坚硬，粉性。气微香，味微甜、涩(图 122－2)。

【功效】 味甘、涩，性平。清利湿热，开胃健脾，清心除烦。

121



122—1

122—2

123. 石菖蒲

Shichangpu Rhizoma Acori Graminei

セキショウブ Rhizome of Grassleaf Sweet Flag

【来源】 本品为天南星科植物石菖蒲 *Acorus gramineus* Soland. 的干燥根茎。

【产地加工】 于秋、冬2季挖取根茎，除去残茎和须根，洗净，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，淋水润透，切0.4～0.6cm厚片，晒干。

【性状】 (1)药材 扁圆柱形，稍弯曲，常分枝，长3～20cm，直径0.3～1.0cm。表面灰棕色或棕褐色，环节明显，节间有细纵纹，节上有点状须根痕或残留须根，叶痕三角形，左右交互排列，有时有鳞叶残留，呈须毛状。质坚硬，不易折断，断面纤维性。平整切面类白色或微红色，内皮层环状。气芳香，味苦、微辛(图123－1)。

(2)饮片 横切短段，长0.4～0.6cm，表面棕褐色，粗糙，切面淡红色或类白色，环纹圆形或椭圆形(图123－2)。

【功效】 味辛、苦，性温。开窍宁神，化湿开胃。用于脘痞不饥、噤口下痢、神昏癫痫、健忘耳聋等症。

124. 石 斛

Shihu Herba Dendrobii

セッコク Dendrobium Stem

【来源】 本品为兰科植物环草石斛 *Denrobium loddigesii* Rolfe.、马鞭石斛 *Dendrobium fimbriatum* Hook.、黄草石斛 *Dendrobium chrysanthum* Wall.、铁皮石斛 *Dendrobium candidum* Wall. ex Lindl. 或金钗石斛 *Dendrobium nobile* Lindl. 新鲜或干燥茎。

【产地加工】 全年均可采收，以春末夏初和秋季采收者为佳。鲜用者除去根及泥沙；干用者采收后，除去杂质，用开水略烫或烘软，再边搓边烘晒，至叶鞘搓净，干燥。铁皮石斛剪去部分须根后，边炒边扭成螺旋形或弹簧状，烘干，习称"耳环石斛"或"枫斗"。

【炮制】 (1)鲜石斛 取原药材，洗净泥沙。用时剪成长段。

(2)石斛 取原药材，除去杂质及残根，洗净，稍润，切长段，干燥。

【性状】 (1)药材 ①干石斛 茎扁圆柱形。略呈微波状弯曲，长30～40cm，直径为0.7～1.2cm。表面金黄色而带绿，有光泽，具纵沟纹，节棕色而稍膨大，节上有灰白色膜质叶鞘。质韧，折断面疏松，黄白色，显纤维性。味微苦，嚼之有粘性(图124－1金钗石斛、图124－2小石斛)。

②鲜石斛 为圆柱形或扁圆柱形的长段，表面黄绿色，光亮，有纵纹；节明显，色较深，节上有膜质叶鞘。肉质，多汁，易折断。气微，味微苦而回甜，嚼之有粘性。

(2)饮片 ①石斛片 为圆柱形或扁圆柱形小段，长约3cm，直径0.1～0.8cm。表面黄绿色或金黄色至暗黄，具纵沟，节明显，有光泽。质实而柔韧。气微，味微苦(图124－3)。

②枫斗 呈螺旋形或弹簧状，多加工成2～4个旋纹，茎拉直后长3.5～8.0cm，直径为0.2～0.3cm。表面黄绿色，有细纵皱纹；一端可见茎基部留下的短须根。质坚实，易折断，断面平坦。嚼之有粘性(图124－4)。

【功效】 味甘，性微寒。益胃生津，滋阴清热。

123—1

123—2

124—1

124—2

124—3



124—4

125. 石硫黄

Shiliuhuang Sulfur

セキリュウオ Crude Slphur

【来源】 本品为自然元素类矿物自然硫未经加工的矿石。

【产地加工】 采得后，除去杂质。选带有硫黄气者入药。

【炮制】 (1)石硫黄 取原矿石，击成碎块。

(2)天生黄 将石硫黄提炼以后生成的黄色粉末。

【性状】 药材 ①石硫黄 晶体为锥柱状、板柱状、板状，多为粒块状、被膜或隐晶质块。全体呈黄绿色，微显黄、浅黄、淡绿、灰黄或黑色等的花纹或呈层状。质酥，轻打可碎，断面颜色鲜艳，呈金刚或树脂样光泽。块体紧握手中可听到爆裂声。硬度1～2，相对密度2.05～2.08。条痕白色或带浅黄色。有明显硫黄气，用火点燃之放出SO_2，火焰呈蓝色。不溶于水及盐酸(图125－1)

以黄绿色、质地酥者为佳。

②天生黄 粉末黄色，有光泽，有硫黄气(图125－2)。

【功效】 味酸，性温。有毒。解毒杀虫，助阳通便。

126. 石楠叶

Shinanye Folium Photiniae

セキナンヨウ Leaf of Chinese Photinia

【来源】 本品为蔷薇科植物石楠 *Photinia serrulata* Lindl. 的干燥叶。

【产地加工】 全年可采，但以收集春天自然脱落的红叶质量较好。摘下后晒干，扎成小把。

【炮制】 取原药材，除去枝梗等杂质，洗净，润后切丝，干燥。

【性状】 (1)药材 叶片长椭圆形或长倒卵形，长8～16cm，宽3～6cm，先端短尖，基部宽楔形，叶缘有细密锯齿，上表面浅绿色或紫棕色，下表面色较浅。质脆。气微，味苦、涩。

(2)饮片 为横切的碎叶片，淡棕褐色，两面均光滑无毛，中脉在背面突起。余同药材(图126)。

【功效】 味辛、苦，性平。祛风，通经，益肾。用于风痹腰痛肾酸、肾虚脚弱、偏头痛、风疹等症。

125—1

125—2

126

127. 石 蜐

Shijie **Musculus Mitellae**

セキキョウ **Mitella**

【来源】 本品为铠茗荷儿科动物石蜐 *Mitella mitella* (Linnaeus)的肉。

【产地加工】 到海浪冲击很大的沿岸高潮地带，在海水澄清的岩石缝隙中采集，洗净用。

【性状】 药材 为大型的有柄蔓足类。雌雄同体。体分头状部和柄部，全形很像龟脚。头状部宽 3cm，高 2cm，由 8 块大的主要壳板及基部 24 片小型壳板所组成。每壳的表面都有明显的生长线，小壳板片数随个体而增减。柄部长宽各约 3cm，黄褐色，外表被细小的石灰质鳞片，排列紧密，全体以腹面向上，头部皮肤呈折皱状，伸长以包体部，形成外套。胸部有显著的胸肢 6 对，顶端弯曲如蔓(图 127)。

【功效】 味甘、咸，性平。滋补，利小便。

128. 石榴皮

Shiliupi **Pericarpium Granati**

セキリュウヒ **Pomegranate Rind**

【来源】 本品为石榴科植物石榴 *Punica granatum* L. 的干燥果皮。

【产地加工】 秋季果实成熟后收集果皮，晒干。

【炮制】 (1)石榴皮 取原药材，除去杂质，洗净，切块，干燥，称“石榴皮”。

(2)石榴皮炭 取石榴皮，置热锅中，用武火炒至表面焦黑色，内部棕褐色，喷淋清水少许，熄灭火星，取出，晾干，称“石榴皮炭”。

【性状】 (1)药材 呈不规则的片状或瓢状，大小不一，厚 0.15～0.30cm。外表面红棕色、棕黄色或暗棕色，略有光泽，粗糙，有多数疣状突起。有的有突起的筒状宿萼及粗短果柄或果柄痕。内表面黄色或红棕色，有隆起呈网状的果蒂残痕、隔瓤及种子脱落后的凹坑，凹凸不平。质硬而脆，易碎，断面黄色，略显颗粒状。无臭，味苦、涩(图 128－1)。

以身干、个大、皮厚、外表整洁者为佳。

(2)饮片 ①石榴皮(块) 为小方块或不规则的碎块。外表面红棕色、棕黄色或暗棕色，内表面黄色或红棕色。质硬而脆，断面黄色。无臭，味苦、涩(图 128－2)。

②石榴皮炭 形如石榴皮块，表面黑褐色，断面焦黄色(图 128－3)。

【功效】 味酸、涩，性温。涩肠止泻，止血，驱虫。石榴皮炭止血作用增强。

127

128—1

128—2

128—3

129. 石 膏

Shigao Gypsum Fibrosum

セッコウ Gypsum

【来源】 本品为硫酸盐类矿物石膏，主含含水硫酸钙($CaSO_4 \cdot 2H_2O$)。

【产地加工】 采挖后，去净泥土及杂石。

【炮制】 (1)石膏 取原药材，洗净，晒干，敲成小块，除去杂石。

(2)煅石膏 取净石膏块，置无烟炉火或适宜的容器中，用武火加热，煅至微红，取出，凉后碾细。

【性状】 (1)药材 为单斜板柱状或纤维状晶体的集合体。呈长块状、板块状或不规则的块状。无色透明或白色、灰白色、淡黄色，层间或隙缝处常夹有灰褐色泥岩。质较重，易打碎。常顺纵纹裂开，断面层纹明显，板状晶体以及解理片裂处具珍珠样光泽。针柱、纤维状集合体呈绢丝样光泽；条痕白色。硬度1.5～2.0，相对密度2.314～2.328。气、味皆无(图129－1)。

以色白、透明、纵断面如丝者为佳。

(2)饮片 煅石膏 颜色、光泽均无，崩裂处表面变暗。粉末白色，几不透明，手捻细腻而粘指(图129－2)。

【功效】 味苦、辛，性大寒。生用清热泻火，除烦止渴。煅用收湿，生肌，敛疮，止血。

130. 石 燕

Shiyan Fossilia Spiriferis

セキエン Fossil Shell of Spirifer

【来源】 本品为石燕科动物中华弓石燕 *Cyrtiospirifer sinensis* (Graban)或弓石燕 *Cytiospirifer sp.* 及近缘动物的化石。主要组分为方解石、磷灰石(量较少)。

【产地加工】 挖出后，洗净泥土。

【炮制】 (1)净石燕 取原药材，除去杂质，洗净，干燥，捣碎或水飞。

(2)煅石燕 取净石燕，捣碎，置适宜的容器内，用无烟武火加热，煅至红透，取出，放冷，研成细粉。

(3)醋石燕 取净石燕，置适宜的容器内，用武火加热，煅至红透取出后立即投入醋中，捞出，干燥，研细(石燕：醋＝100：30)。

【性状】 (1)药材 略呈肾脏形或瓦楞状，长2～3cm，宽1.5～4cm。一面中央隆起，另一面有同形状的凹窝，两侧均有从顶到底的、细的放射状纹理，外表暗灰或钢灰色。质坚而脆，断面灰色、灰黄色，较粗糙，有闪耀的亮星。粉末呈土黄色。气微，味淡(图130－1)。

以状如蚶、色青黑、质坚硬、无杂石者为佳。不溶于水。溶于酸，产生大量二氧化碳气泡，溶液浑浊，并有残渣。

(2)饮片 ①煅石燕 表面有一层白色光泽的薄膜，极易脱落，脱去此层，为朱红灰色或棕褐灰色，断面灰白色而粗糙。粉末为青灰色或褐灰色。

(3)醋石燕 为灰褐色细粉，质酥松，具醋气(图130－2)。

【功效】 味咸，性凉。除湿热，利小便，退目翳。

129—1

130—1

129—2

130—2

131. 石 蟹

Shixie Fossilia Brachyurae

セキカイ Fossil Crab

【来源】 本品为节肢动物弓蟹科动物石蟹 *Macreophtalmus latreilti* Edw. 或 *Telphusa sp.* 及其他近缘动物的化石。主组分为方解石，尚有石英、云母等陆源碎屑充填蟹体中。

【产地加工】 采得后，洗净，晒干。

【炮制】 (1)石蟹 取原药材，除去杂质，洗净，干燥，捣碎。

(2)醋石蟹 取净石蟹置适宜的容器内，用无烟武火加热，煅至红透，取出放凉。或煅至红透后趁热投入醋中淬酥，取出晾干，捣碎(石蟹：醋＝100：20)

【性状】 (1)药材 形如螃蟹，通常为扁椭圆形，或因留有螯及步脚而呈不规则形，长 3～7cm，宽 3～13cm，厚约 1.8cm，钢灰色。背面土棕色至深棕色，光滑或具稀疏点状突起，有时尚留有蟹背出之纹理；腹面不平坦，浅灰色。质较坚硬而脆，断面粗糙，色泽不均匀，可见散在亮星。条痕灰白色。硬度 3。气无，嚼之有牙碜感，味淡(图 131－1)。

以体完整、色青灰、质坚者为佳。

(2)饮片 ①石蟹 碎块呈多角形、不规则形，灰白色或土棕色，光滑而有点状小突起，断面灰棕色或略显层纹(图 131－2)。

②醋石蟹 为不规则细粒或粗粉，瓦灰色或褐灰色，质酥松(图 131－3)。

【功效】 味咸，性寒。清肝明目，解毒消肿。

132. 龙血树血竭

Longxueshuxuejie Resina Draconis

リュウケツジュケッケツ Dragon's Blood

【来源】 本品为龙舌兰科植物柬埔寨龙血树 *Dracaena cambodiana* Pierre.、剑叶龙血树 *Dracaena cochinchinensis* (Lour.) S. C. Chen 的含脂木材提制的干燥树脂。根据产地不同，前者称“云南血竭”，后者称“广西血竭”。

【产地加工】 全年可采，砍取树的紫红色木质部，粉碎后，用乙醇提取，滤过，回收乙醇，干燥。

【炮制】 取原药材，除去灰尘，敲成小块或研细成细粉。

【性状】 (1)药材 ①云南血竭 略呈类圆四方形或半圆形，直径 10cm，高 7～8cm，顶面钝圆，底部平整。表面黑紫色，具光泽，有的局部粘附紫红色粉末。质脆，易碎。断面平整，有玻璃样光泽。无臭，味微涩，嚼时有粘齿感(图 132－1)。

以表面黑紫色、具光泽、研粉紫红色者为佳。

②广西血竭 为长方形或不规则形块状，长 7～10cm，宽 3～7cm，厚 1.0～1.5cm。表面红棕色或黑棕色，有光泽。有的粘附少量红棕色粉末。质脆易碎，断面红棕色，有空隙。气特异，略清香，味淡微涩。嚼之有砂粒感并微粘齿(图 132－2)。

以表面黑棕色、具光泽、粉末砖红色者为佳。

(2)饮片 呈不规则碎块状或细粉。碎块呈黑紫色或红棕色，有光泽。质硬而脆。粉末呈紫红色或砖红色。气特异，略清香，味淡，嚼之微粘齿(图 132－3)。

【功效】 味甘、咸，性平。活血祛瘀，消肿止痛，收敛止血。

131—1

131—2

131—3

132—1

132—2

132—3

133. 龙 齿

Longchi Dens Draconis

リュウシ Dragon's Teeth

【来源】 本品为古代哺乳动物如象、犀牛、三趾马、骆驼、羚羊等的牙齿化石 *Dens Draconis*。主要组分为磷灰石 $Ca_5[PO_4]_3(OH,F,Cl)$。

【产地加工】 挖出后，除去泥土，敲去牙床。

【炮制】 (1)龙齿 将原药材除去杂质，打碎，研粉。

(2)煅龙齿 取净龙骨，置无烟炉火上或适宜的容器内，用无烟武火加热，煅至红透，取出放凉，碾碎，研粉。

【性状】 (1)药材 多为齿化石的碎块，少数呈牙齿状。犬齿呈圆锥形，前端较细或略弯曲，长约 7cm，直径 0.5～3.5cm，近尖端处中空。臼齿呈圆柱形或方柱形，略弯曲，一端较细，一般长 2～20cm，直径 1～9cm，多有深浅不同的棱。表面为白色(习称"白龙齿")、青灰色或暗棕色(习称"青龙齿")，粗糙，白垩质稍显珐琅质光泽。或有灰白、灰、黄褐、蓝青色环带，似油脂状、珐琅状光泽。断面凸凹不平或有不规则的凸起棱线。有吸湿性，齿冠呈丘状脊形。质坚硬，较重，可打碎，碎块可见石化的牙髓等。断面微吸舌。气味均无。(图 133－1 青龙齿，上：臼齿，下：犬齿；图 133－2 白龙齿)。

以青褐色、不带牙床、断面吸湿力强者为佳。

(2)饮片 煅龙齿 多呈碎块状，表面灰白或白色。原有的颜色环带加深，具蓝、绿、灰、红条斑。体较轻，质地变酥，无光泽，吸舌力增强。粉末色泽稍加深，颗粒表面纹理略呈裂隙状(放大 10×10)(图 133－3)。

【功效】 味甘、涩，性凉。镇惊安神，除湿热。

134. 龙 虱

Longshi Cybister Tipunctatus

リュウシツ Smaller Diving Beetle

【来源】 本品为龙虱科动物三星龙虱 *Cybister tripunctatus orientalis* Gschew.、黄边大龙虱 *Cybister japonicus* Sharp 的干燥成虫。

【产地加工】 春至秋季捕捉后用沸水烫死，晒干或焙干。

【性状】 药材 ①三星龙虱 体长圆形，前狭后宽。背面黑绿色，腹面黑色或黑红色，有时部分棕黄色，体翅周边有黄带。头部近扁平，中央微隆起，两侧有浅凹陷及小刻点。触角黄褐色。复眼突出，黑色。前胸背板横阔，有细纵沟。鞘翅有 3 行不明显点线。腹下第 3～5 节两侧各有横斑 1 个。足黄褐色，生有金色长毛；后足胫节短阔，胫端两侧生刺(图 134－1)。

②黄边大龙虱 形态与三星龙虱近似，但体较大，长 3.5～4.0cm，前胸及鞘翅两侧黄条斑中间夹有 1 条黑色斑纹。雌虫鞘上密布沟纹或皱纹，仅端部及中缝处无纹(图 134－2)。

【功效】 味甘，性平。滋补强壮，活血祛瘀，固肾缩尿。

133—1

133—2

134—1

133—3

134—2

135. 龙 骨

Longgu Os Draconis
リュウコツ Dragon's Bone

【来源】 本品系古代哺乳动物如三趾马、象类、犀牛类等的骨骼化石或象类门齿的化石，前者习称"龙骨"，后者习称"五花龙骨"。主要组分为磷灰石 $Ca_5[PO_4]_2(OH,F,Cl)$、方解石及少量粘土矿物。

【产地加工】 挖出后，除去泥土及杂质。五花龙骨质酥脆，出土后，露置于空气中极易碰碎，当用毛边纸粘贴。

【炮制】 (1)龙骨 取原药材，除去杂质及灰骨，捣碎。

(2)煅龙骨 取净龙骨，置无烟炉火上或适宜容器内，用武火加热，煅至红透，取出放凉，碾碎。

【性状】 (1)药材 ①龙骨 呈骨骼状，或骨骼的碎块。表面黄白色、灰白色或黄褐色，附有细粉末染指。较光滑，有的具纹理、裂隙或具棕色条纹和斑点。质硬而酥松，易打碎，断面骨腔部分疏松，呈蜂窝状小孔，吸湿性强。无臭无味(图 135－1、图 135－2 内蒙白龙骨)。

以质硬、色黄白、吸湿性强者为佳。

②五花龙骨 呈不规则块状，表面有瓷釉状光泽和黄白色、白色、蓝灰色、红褐色花纹，可见层状结构。硬而脆易碎，易片状剥薄，吸湿性强。硬度大于指甲、小于小刀(H=3)(图 135－3、图 135－4)。

以体轻、质硬而脆、分层、有蓝灰、红褐、白等的花纹、吸湿性强者为佳。

(2)饮片 煅五花龙骨 呈不规则小块状，具蓝、绿、红的花纹或条纹，质较酥，有时可见裂隙，吸湿性更强(图 135－5)。

【功效】 味甘、涩，性平。镇惊安神，收敛涩精。外用生肌敛疮。

136. 龙 胆

Longdan Radix Gentianae
リュウタン Chinese Gentian

【来源】 本品为龙胆科植物条叶龙胆 *Gentiana manshurica* Kitag.、龙胆 *Gentiana scabra* Bge.、三花龙胆 *Gentiana triflora* Pall. 或坚龙胆 *Gentiana rigescens* Franch. 的干燥根及根茎。前 3 种习称"龙胆"，后 1 种习称"坚龙胆"。

【产地加工】 于春、秋 2 季采挖，除去茎叶，洗净泥土，干燥。

【炮制】 (1)龙胆段 取原药材，除去杂质及残茎，洗净，闷润至透，切成小碎段，干燥，分别称"龙胆段"、"坚龙胆段"。

(2)酒龙胆 取龙胆段，喷淋黄酒拌匀，稍闷后，置锅内，用文火加热，炒干，取出放凉(每 100kg 龙胆，用黄酒 10kg)，称"酒龙胆"。

【性状】 (1)药材 ①龙胆 根茎呈不规则的块状，长 1～3cm，直径 0.3～1.0cm；表面暗灰棕色或深棕色，上端有茎痕或残留茎基，周围和下端着生多数细长的根。根呈圆柱形，略扭曲，长 10～20cm，直径 0.2～0.5cm；表面淡黄或黄棕色，上部有显著的横皱纹；质脆，易折断。气微，味极苦(图 136－1)。

以根条细长、色黄或黄棕者为佳。

②坚龙胆 表面无横皱纹，纵皱较明显，外皮膜质，易脱落；质坚脆，易折断，略显角质性，木质部黄白色易与皮部分离。气微，味苦(图 136－2)。

(2)饮片 ①龙胆段 呈不规则的圆柱形小段，直径 0.2～1.0cm，长 0.2～0.5cm。表面多具横环纹，暗灰棕色或深棕色；切面中心有隐现的筋脉点及裂隙，断面略平坦，皮部黄白色或淡黄棕色，木质部色较淡。气微，味极苦(图 136－3)。

②坚龙胆段 表面无横皱纹，纵皱较多，表皮膜质，淡黄或灰黄色。断面略显角质性，可见一明显的木心，黄白色。气微，味苦(图 136－4)。

③酒龙胆 形如龙胆段，色泽加深，微有酒气(图 136－5)。

【功效】 味苦，性寒。清热燥湿，泻肝胆火。

135—3

135—1

135—2

135—4

136—1

135—5



136—3

136—2

136—4



136—5

137. 龙涎香

Longyanxiang **Ambra Grisea**

リュウゼンコウ **Ambergris**

【来源】 本品为抹香鲸科动物抹香鲸 *Physeter catodon* Linnaeus 的肠内分泌物。

【产地加工】 捕获杀死抹香鲸后，收集其肠中分泌物，经干燥后，即成蜡状硬块。肠内分泌物也能排出体外，飘浮于海面，故有时也可从海面上捞取龙涎香。

【性状】 干燥品为不透明的蜡状胶块，色黑褐或具有五色斑纹，质脆而轻，嚼之如蜡，能粘齿。相对密度 0.7～0.9，熔点为 60℃，可溶于纯酸中。燃烧时发蓝焰，香气四溢，酷似麝香(图 137)。

【功效】 味甘、酸，性平。行气开窍，活血，散结，止痛，利水通淋。

138. 龙眼肉

Longyanrou **Arillus Longan**

リュウガンニク **Longan Pulp**

【来源】 本品为无患子科植物龙眼 *Euphoria longan* Lam. 的假种皮。

【产地加工】 7～9 月间，当果实成熟时采摘，晒干或烘干。取干果除去壳和核，剥取假种皮晒至干爽不粘。亦可取鲜果，去果皮及核，取假种皮直接晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质、残留的壳和核。

【性状】 药材 常相互粘结成团，棕褐色至棕黑色。单个呈不规则块片或半球形块片，片长 1.0～1.5cm，宽 1～4cm，厚约 1mm。棕红色，半透明，有细纵皱纹。质柔润，有粘性。气微，味甜(图 138－1)。

【功效】 味甘、性温。补心益脾、养血安神。用于气血不足、心悸怔忡、健忘失眠、血虚萎黄等症。

附：台湾产龙眼肉(图 138－2)；**泰国产龙眼肉**(图 138－3)。

137

138—1

138—2



138—3

139. 北沙参

Beishashen **Radix Glehniae**

ホクシャジン **Root of Coastal Glehnia**

【来源】 本品为伞形科植物珊瑚菜 *Glehnia littoralis* Fr. Schmidt ex Miq. 的干燥根。

【产地加工】 于夏、秋2季采挖，除去残茎、须根，洗净，放在沸水中烫片刻，取出浸凉水中，剥去外皮，晒干或烘干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切片，晒干。

【性状】 (1)药材 呈细长圆柱形，长15～45cm，直径0.4～1.2cm。表面淡黄白色，具细纵皱纹、细纵沟和点状细根痕突起。质脆，易折断。断面皮部浅黄白色，木部淡黄色，角质。气特异，味甜(图139－1)。

(2)饮片 为横切0.3～0.5cm的片段，表面粗糙，淡黄白色，切面角质，半透明，皮部乳白色，木部淡黄色，微具放射状纹理(图139－2)。

【功效】 味甘、微苦，性微寒。清肺养阴，益胃生津。用于肺热咳嗽、劳嗽痰血、热病伤津、口渴等症。

附：北沙参出口片(图139－3)。

140. 田皂角

Tianzaojiao **Herba Aeschynomene Indicae**

テンソウカク **Herb of Common Aeschynomene**

【来源】 本品为豆科植物合萌 *Aeschynomene indica* L. 的干燥全草。

【产地加工】 在夏季开花时，割取全草，晒干。

【炮制】 取原药材，拣去杂质，淋水润软，切0.5cm长的厚片。

【性状】 (1)药材 全草长约80cm。茎圆柱形，少分枝，绿色，无毛。叶互生，偶数羽状复叶，常破碎脱落，完整者小叶20～35对，小叶片线形或线状椭圆形，基部不对称，全缘。花淡黄色，蝶形，腋生。荚果，节裂，4～8个节荚。

(2)饮片 为茎、叶切碎品。鉴别特征同药材(图140)。

【功效】 味苦、涩，性凉。祛风化痰，托毒生肌，止血明目。用于风热感冒、黄疸、痢疾、胃炎、腹胀、淋病、痈肿、皮炎、湿疹等症。



139—1



139—2

139—3



140

141. 田 螺

Tianluo **Cipangopaludina**

テンラ **River-snail**

【来源】 本品为田螺科动物中国圆田螺 *Cipangopaludina chinensis* (Gray)、中华圆田螺 *Cipangopaludina cathyensis* (Heude)的干燥贝壳。

【产地加工】 捕捉后，去除肌肉，洗净，干燥，碾碎。

【炮制】 (1)田螺 将净田螺洗净，干燥。

(2)煅田螺 取净田螺置适宜容器内，于无烟炉火中，用武火加热，煅至酥脆时取出放凉，碾碎。

【性状】 (1)药材 ①中国圆田螺 贝壳大，呈长圆锥形，质薄而坚。螺层 6～7，螺旋部发达。体螺层膨大，缝合线深，壳面黄褐色或深褐色，壳口卵圆形。周缘有黑色框边。厣角质为一黄褐色的卵圆形薄片，有环纹(图 141－1)。

②中华圆田螺 贝壳大，呈卵形或卵圆形，壳质薄而坚实，螺层 6～7，各层表面膨大，螺层在宽度上增长快，螺旋部较短而宽，体螺层膨大，壳顶尖锐，缝合线深。表面呈绿褐色或黄褐色。壳口为卵圆形。周缘有黑色框边。外唇简单，内唇肥厚，遮盖脐孔，脐口呈缝状。

以完整、色绿褐或黄褐、坚实者为佳。

(2)饮片 煅田螺 呈不规则小碎块或细粉状，灰白色(图 141－2)。

【功效】 味甘、咸，性寒。清热，利尿。

142. 凹甲陆龟

Aojialugui **Carapax et Plastrum Testudonis Impressae**

オウコウリクキ **Aojialugui**

【来源】 本品为龟科动物凹甲陆龟 *Testudo impressa* (Guenther)的甲。主要以腹甲代龟板用，背甲亦可用。

【产地加工】 多在夏秋季捕捉，处死，取其龟板，漂洗，去净筋肉，晒干备用。

【性状】 药材 腹甲的颌角板较小，肱角板比胸角板大，腹角板比股角板大，肛角板排列成凹形腹板(图 142)。

【功效】 滋阴潜阳，补肾健骨。

141—2

141—1



142

143. 代赭石

Daizheshi Haematitum

タイシヤセキ Hematite

【来源】 本品为氧化物类矿物赤铁矿 *Haematitum*，主含三氧化二铁(Fe_2O_3)，或混有氢氧化物矿物赤铁矿－水针铁矿($FeOOH \cdot nH_2O$)。前者习称“钉头代赭石”，后者习称“无钉头代赭石”。

【产地加工】 采挖后，除去杂石，选取表面有乳头状突起部分。

【炮制】 (1)赭石 取原药材，除去杂质，砸碎，碾细。

(2)醋赭石 取净赭石碎块，置无烟炉火上或适宜的容器中，用无烟武火加热煅至红透，取出立即倒入醋内淬酥。如此反复煅淬数次，直至酥脆，取出(赭石：醋＝100：30)。

【性状】 (1)药材 ①钉头代赭石 为鲕状、豆状、肾状集合体，多呈不规则的扁平块状。暗棕红色或灰黑色，半金属光泽，不透明。一面密集浮瓯状小突起，习称“钉头”，另一面与突起对应处有同样大小的凹窝。体重，质硬，断面显层叠状，层间有时夹有黄色粘土质物质。硬度 5.5～6.0，相对密度 4.0～5.3，条痕红至砖红色。气微，味淡(图 143－1)。

以色红、断面层次明显、表面有“钉头”者为佳。

1990 年版《中国药典》规定，本品含铁(Fe)不得少于 45%。

②无钉头代赭石 为鲕状、块状集合体，表面呈棕红色但不均匀，常有大小不等的红黄色或紫褐色斑点，表面和断面均不平坦而粗糙。质坚硬而脆，不易砸碎，粉末沾指。条痕红褐色(图 143－2)。

以棕红色、质坚硬、粉末沾指者为佳。

(2)饮片 ①煅钉头代赭石 暗褐色或暗红棕色，体重，质疏松，略有醋气(图 143－3)。

②煅无钉头代赭石 色泽加深或变浅不均，质稍酥脆，轻打可碎，或有醋气(图 143－4 右：煅，左：生)。

【功效】 味苦，性寒。平肝潜阳，降逆，止血。

144. 仙 茅

Xianmao Rhizoma Curculiginis

セッボウ Rhizome of Common Curculigo

【来源】 本品为石蒜科植物仙茅 *Curculigo orchioides* Gaertn. 的干燥根茎。

【产地加工】 于秋、冬 2 季采挖，除去须根和根头，洗净泥土，干燥。

【炮制】 (1)仙茅段 取原药材，除去杂质，洗净，稍润，切段，干燥，称“仙茅段”。

(2)酒仙茅 取净仙茅，喷淋黄酒拌匀，稍闷后，置锅内，用文火加热，炒干，取出放凉(每仙茅 100kg，用黄酒 10kg。)，习称“酒仙茅”。

【性状】 (1)药材 呈圆柱形，略弯曲，长 3～10cm，直径 0.4～0.8cm。表面黑褐色或棕褐色，粗糙，有纵抽沟及横皱纹与细孔状的粗根痕。质硬脆，易折断。气微香，味微苦、辛(图 144－1)。

以条粗、质坚、外表黑褐色者为佳。

(2)饮片 ①仙茅段 呈圆柱形小段，断面不平坦，呈角质状，淡褐色或棕褐色，近中心外色较深，并有 1 深色环。气微香，味微苦、辛(图 144－2)。

②酒仙茅 形如仙茅，色泽加深，微有酒气(图 144－3)。

【功效】 味辛，性热。补肾阳，强筋骨，祛寒湿。

143—1

143—2

143—3

143—4

144—1

144—2



144—3

145. 冬虫夏草

Dongchongxiacao **Cordyceps**

トウチュウカソウ **Chinese Caterpillar Fungus**

【来源】 本品为麦角菌科真菌冬虫夏草 *Cordyceps sinensis* (Berk.) Sacc. 寄生在蝙蝠蛾科昆虫蝙蝠蛾 *Hepialus armoricanus* Oberthiir 幼虫上的子座及幼虫尸体的复合体。

【产地加工】 初夏子座出土、孢子未散发时挖取，晒至 6～7 成干，除去似纤维状的附着物及杂质，晒干或加温干燥。

【炮制】 取原药材，除去杂质。

【性状】 药材 为虫体及从虫头部长出的真菌子座相连而成。虫体似蚕，长 3～5cm，直径 0.3～0.8cm。表面深黄色至黄棕色，有环纹 20～30 个，近头部环纹较细。头部红棕色，足 8 对，中部 4 对较明显。质脆，易折断，断面略平坦，淡黄色。子座细长圆柱形，长 4～7cm，直径约 0.3cm；表面棕褐色，有细纵皱纹。气微腥，味微苦(图 145)。

【功效】 味甘，性平。补肺益肾，止血化痰。

146. 白 及

Baiji **Rhizoma Bletillae**

ヒャクキュウ **Tuber of Common Bletilla**

【来源】 本品为兰科植物白及 *Bletilla striata* (Thunb.) Reichb. f. 的干燥块茎。

【产地加工】 于夏、秋 2 季挖取，除去须根，洗净，置水中煮或蒸至无白心，晒至半干，除去外皮，晒干。

【炮制】 取原药材，洗净，润透，切薄片，晒干，称“白及片”。

【性状】 (1)药材 呈不规则扁圆形，多有 2～3 个爪状分枝，长 1.5～5.0cm，厚 0.5～1.5cm。表面灰白色或黄白色，有数圈同心环带和棕色点状须根痕，上面有凸起的苇痕，下面连接另一块茎的痕迹。质坚硬，不易折断，断面类白色，角质样。无臭，味苦，嚼之有粘性(图 146－1)。

以身干、个大、色白、质坚实、无须根者为佳。

(2)饮片 为类三角形、长三角形或不规则形的薄片，厚 0.1～0.2cm。表面类白色，角质样，微显筋脉小点。气微，味淡微苦、嚼之有粘性(图 146－2)。

【功效】 味苦、甘、涩，性微寒。收敛止血，消肿生肌。

145

146—1

146—2

147. 白　术

Baizhu　　Rhizoma Atractylodis Macrocephalae

ビャクジュツ　　Rhizome of Largehead Atractylodes

【来源】 本品为菊科植物白术 *Atractylodes macrocephala* Koidz. 的干燥根茎。

【产地加工】 冬季下部叶枯黄、上部叶变脆时采挖，除去泥沙，烘干或晒干，再除去须根。烘干者称“烘术”，晒干者称“生晒术”。

【炮制】 (1)白术　取原药材，除去杂质，洗净，称“白术”。

(2)白术片　取白术，润透，切厚片，称“白术片”。

(3)土白术　取白术片，用伏龙肝细粉炒至表面挂有土色，筛去多余的土，称“土白术”。

(4)炒白术　将蜜炙麸皮撒入热锅内，待冒烟时加入白术片，炒至焦黄色，有焦香气逸出时，取出，筛去麸皮，称“炒白术”。

(5)焦白术　取生白术片，用大火加热炒至表面显焦黄色，透香气，喷淋清水少许，灭净火星取出，称“焦白术”。

【性状】 (1)药材　略呈圆柱状块或不规则的肥厚团块，下部两侧膨大，长 3～13cm，直径为 1.5～7.0cm。表面灰黄色或灰棕色，有瘤状突起及断续的纵皱纹和须根痕，顶端有残存茎基和根痕。质坚实，不易折断，断面不平坦，黄白色至淡棕色，有棕黄色的点状油室散在。“烘术”断面角质样，色较深或有裂隙。气清香，味甜、微辛，嚼之略带粘性(图 147－1)。

以个大、完整、体重质实、表面灰棕色或黄褐色、断面黄白色、香气浓郁、甜味浓、辣味少者为佳。

(2)饮片　①白术片　呈纵切或斜切的不规则形片，长 3～8cm，宽 2～4cm，厚 0.3～0.5cm。切面黄白至淡棕色，木质部较小，多呈窄条形或成空洞，有众多的散在朱砂点和裂隙。周边土黄色或灰褐色，有多数疣状突起及纵皱纹。质坚硬，易折断，断面不平坦，角质或带粉性。气清香特异，味甜微辛，嚼之略有粘性(图 147－2)。

②土白术　形如白术片。切面土黄色、土黄褐色或黄棕色，有散在的焦斑。质硬脆。气香特异(图 147－3)。

③炒白术　形如白术片。切面黄棕色至棕褐色，偶粘带麸末。质坚硬、略脆，易折断。有麸皮的焦香气(图 147－4)。

④焦白术　形同白术片，表面显焦黄色或焦黑色，断面显棕褐色。质松脆，微有焦香气，味焦苦(图 147－5)。

【功效】 味苦、甘，性温。健脾益气，燥湿利水，止汗，安胎。土白术健脾，和胃，安胎。炒白术益气，燥湿，开胃，止汗。

附：日本白术加工品(图 147－6)。

147—1

147—2

147—3

147—4

147—5

147—6

148. 白石英

Baishiying　　Quartz Album

ハクセキエイ　　Quartz

【来源】 本品为氧化物类矿物石英 *Quartz album* 的矿石，主含二氧化硅(SiO_2)。

【产地加工】 采得后，拣选纯白色的石英入药。

【炮制】 (1)白石英　取原药材，除去杂质，洗净，干燥，敲碎，如黄豆大小。

(2)煅白石英　取净白石英粒，置锅内，用武火煅至红透。

(3)醋白石英　取净白石英，捣成小块，置适宜容器内，用武火加热，煅至红透，取出后立即倒入醋内淬酥，捞出，干燥，粉碎成粉末(白石英：醋＝100：30)。

【性状】 (1)药材　白石英　为六方柱状或带棱面体(锥状)的柱体，晶体碎块颗粒，具棱角，大小不一。白色或乳白色，有的微带黄色。表面不平坦，有脂肪样光泽或玻璃样光泽，半透明至不透明。质坚硬而重，砸断面不整齐，边缘较锋利。硬度 7。相对密度为 2.65。条痕白色，气味均无(图 148－1)。加等量的碳酸钠烧之能熔成玻璃状的小球。除氢氟酸外，在其他酸中皆不溶解。

以色白、明洁、有光泽、无杂色、无杂质者为佳。

(2)饮片　①煅白石英　为不规则的碎块状或细粉，表面洁白或黄红色，质坚硬(图 148－2)。

②醋白石英　呈细粉状，色黄白，质重，具醋气(图 148－3、图 148－4)。

【功效】 味甘，性温。镇静安神，止眩降逆。

149. 白石脂

Baishizhi　　Kaolinitum

ハクセキシ　　White Halloysite

【来源】 本品为硅酸盐类矿物高岭石 Kaolinite 为主组分的一种白色块状物。

【产地加工】 挖出后，拣去杂石，洗净泥土。

【炮制】 (1)白石脂　拣净杂质，打成小块。

(2)醋白石脂　取净白石脂，碾成细粉，再用米醋和匀，做成饼状，置铁锅内，用无烟武火烧至红透，取出晾凉，碾碎或捣碎(白石脂：醋＝100：25)。

【性状】 (1)药材　呈不规则土状块体，多具棱角，表面白色，间有黄斑，土状光泽，致密时呈蜡状、油脂状光泽，显颗粒性。体重，轻打可碎，断面颗粒更明显。硬度 1.0～2.5，相对密度 2.5～2.8，条痕白至灰白色。具滑腻感和土腥气，吸水、可塑性，粘舌(图 149－1、图 149－2 高岭石)。

以色白、细腻、无杂质者为佳。

(2)饮片　煅白石脂　呈不规则小块，颜色变深，浅棕或棕色，质坚硬，难打碎，断面灰色，吸舌力更强(图 149－3)。

【功效】 味甘、酸，性平。涩肠止血。

148—1

148—2

148—3

148—4

149—1

149—2

149—3

150. 白　芍

Baishao　　Radix Paeoniae Alba

ハクシャク　　White Peony Root

【来源】 本品为毛茛科植物芍药 *Paeonia lactiflora* Pall. 的干燥根。产于浙江者，习称“杭白芍”或“东芍”；产于四川者，习称“川白芍”，产于安徽者，习称“亳白芍”。

【产地加工】 于夏、秋2季采挖，洗净，除去头尾和须根，刮去外皮，置沸水中略煮，捞起放入冷水中片刻后，取出晒干；或煮后再刮去外皮，晒干。

【炮制】 (1)白芍片　取原药材，洗净，切顶头薄片或横切薄片，先晾干后再晒干。

(2)炒白芍　取净白芍片，置炒锅内，文火加热，炒至表面显微黄色时，取出放凉。

(3)酒白芍　取净白芍片，喷淋黄酒(每100kg白芍片用黄酒10kg，拌匀，稍闷，置炒锅内炒至表面微黄色，手触微干时，取出放凉至干。

(4)醋白芍　取净白芍片，喷淋米醋(每100kg白芍片，用醋15kg)，拌匀，稍闷，用微火炒至表面显淡黄色，手触微干时取出放凉至干。

【性状】 (1)药材　呈圆柱形，长5～20cm，直径1～3cm。表面粉白色或浅红色，光滑，皮孔横生，隐约可见。质坚实，不易折断。断面类白色或粉红色。横环纹明显，木部有放射纹，略突起。气微香，味微苦而酸涩。

①杭白芍　表面多浅红色至淡棕色，未去净栓皮处呈棕褐色斑，因有须根痕，纵皱而显稍粗糙(图150－1)。

②亳白芍　圆柱形稍有弯曲，表面黄白色或淡粉红色，不光润。断面淡黄色或粉红色。

③川白芍　外形同亳白芍，表面粉红色，光滑无纵皱，皮孔和须根痕稍下陷。

(2)饮片　①白芍片　为类圆形或长方形薄片，厚0.6～2.0mm，直径1～3cm。表面类白色或淡红色，切面平滑角质状，横环纹(长方形饮片为2条纵向直线)明显，环外淡棕红色或粉白色，中央类白色。有菊花心样花纹。质坚脆(图150－2)。

②炒白芍　表面、切面显微黄色，偶见焦黄斑(图150－3)。

③酒白芍　微有酒气，余同炒白芍(图150－4)。

④醋白芍　微有酸气，余同炒白芍(图150－5)。

【功效】 味苦、酸，性微寒。养血敛阴，柔肝止痛，平抑肝阳。用于头痛眩晕、胁痛、腹痛、四肢挛痛、血虚萎黄、月经不调、自汗、盗汗。白芍片多用于平肝；炒白芍多用于养血和肝；酒白芍多用于养血调经；醋白芍则多用于柔肝止痛。

附：日本白芍(生白芍加工品)

【性状】 (1)药材　呈圆柱形，部分一端或两端稍细，长6～16cm，直径1～2cm。表面棕黄色或粉棕黄色，具不规则的纵皱纹，可见横长的皮孔或棕褐色斑痕；去皮者表面粗糙，灰黄棕色，可见皮孔和根痕，少数残留有棕褐色皮斑。质硬，折断面黄白色，外圈色深，带皮者两端的皮部和木部常呈分离状。气微，味微苦(图150－6、图150－7带皮白芍)。

(2)饮片　为大小不等的不规则小块，最长1.2cm。黄白色或类白色，略具颗粒性，表面稍呈颗粒性，纵面常可见黄色条状纤维。外皮棕黄色，有纵皱纹，部分带有棕色斑块和根痕，皮呈红棕色，质硬，略具粉性。气微，味淡(图150－8)。

韩国白芍片(图150－9)。**白芍片出口品**(图150－10)。

150—1

150—2

150—3

150—4

150—5

150—10

150—6

150—8

150—7



150—9

151. 白豆蔻

Baidoukou　　Fructus Amomi Rotundus

ビャクズク　　Fruit of Round Cardamon

【来源】 本品为姜科植物白豆蔻 *Amomum kravanh* Pirre ex Gagnep. 或爪哇白豆蔻 *Amomum compactum* Soland ex Maton 的干燥成熟果实。按产地不同分为“原豆蔻”和“印尼白蔻”。

【产地加工】 于每年7月至翌年4月果实呈黄绿色尚未开放时采收，除去残留的果柄，晒干。

【炮制】 (1)净豆蔻　取原药材，除去杂质，筛去灰屑，称“净豆蔻”。

(2)豆蔻仁　取净豆蔻，除去杂质及果壳，取净仁，称“豆蔻仁”。

(3)豆蔻皮　取净豆蔻，除去杂质，剥取果皮，称“豆蔻皮”。

【性状】 (1)药材　①原豆蔻　呈类球形，直径1.2～1.8cm。表面黄白色至淡黄棕色，有3条较深的纵向槽纹，顶端有突起原豆蔻的柱基，基部有凹下的果柄痕，两端均具有浅棕色绒毛。果皮体轻，质脆，易纵向裂开，内分3室，每室含种子约10粒。气芳香，味辛凉略似樟脑(图151－1)。

②印尼白蔻　类似原豆蔻，个略小。表面黄白色，有的微显紫棕色，果皮较薄，种子瘦瘪，气味较弱(图151－2)。

以个大、饱满、果皮薄而完整、皮色洁白，气味浓者为佳。

(2)饮片　①豆蔻仁　为除去果皮的种子团和散落的种子。种子团呈不明显的3瓣状，中有白色隔膜，每瓣有种子7～10粒。种子呈不规则的多面体，背面略隆起，直径0.3～0.4cm，表面暗棕色或灰棕色，有皱纹，并被有残留的假种皮。质坚硬。断面白色，粉质，有油性。气芳香，味辛凉(图151－3)。

②豆蔻皮　略呈弧状不规则形薄片，外表面黄白色至淡黄棕色，内表面类白色，光滑。体轻，质脆。气微香，味辛(图151－4)。

【功效】 味辛，性温。化湿消痞，行气温中，开胃消食。

151—2

151—1

151—3



151—4

152. 白　芷

Baizhi　　Radix Angelicae Dahuricae
ヒャクシ　　Root of Dahuriae Angelica

【来源】 本品为伞形科植物白芷 *Angelica dahurica* (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. 或杭白芷 *Angelica dahurica* (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. *var. formosana* (Boiss.) Sham et Yuan 的干燥根。

【产地加工】 在夏末秋初叶黄萎时挖取根，除去残留须根和泥沙，晒干或低温干燥。浙江杭州在除去须根、泥沙后，再用 2～5%石灰粉拌匀，在长形竹篓中顺势推出，使表皮渗透石灰，加速水分吸收，随即摊晒至半干，再分大、小枝，继续晒至干燥。

【炮制】 取原药材，拣去杂质，大小分开，清水泡后洗净，捞起润透，稍凉，切厚片，晒干。

【性状】 (1)药材　①白芷(禹白芷，祁白芷)　呈圆锥形，长 10～20cm，直径 2～4cm，茎痕圆形，稍下陷。表面土黄色，具纵皱沟纹，皮孔小，凸起。质较轻泡，断面白色，粉性。形成层环圆形，棕灰色，皮部有棕色油点。气芳香，味微辛、苦。

②杭白芷　以产地不同分为川白芷和杭白芷。川白芷　呈圆锥形，近根头部略显方棱，体顺长，长 10～20cm，直径 2～5cm，茎痕圆形，略下凹。表面灰褐色或棕褐色，有纵向细皱纹，横长皮孔较多，凸起较小，排列不整齐。质坚实，断面粉白色或微黄色，皮部有棕色油点，形成层环类圆形，棕色。气芳香，味微辛、苦。

杭白芷　呈圆锥形，头大尾细，长 10～15cm 中部直径 2～5cm。根头部方圆形，皮孔排列成四行(俗称"疙瘩丁")。质坚实，断面粉性，白色或灰白色，皮部有棕黄色油点，形成层环类方形，棕色。

(2)饮片　①白芷(禹白芷，祁白芷)　呈圆形成类圆形片，片厚约 3mm，表面土黄色，切面类白色，粉性，光滑，皮部宽，具众多棕色油点，环纹棕色，圆形(图 152)。

②川白芷　为圆形或类方形厚片，片厚约 3mm，表面灰褐色，切面白色或微黄色，粉性，形成层环类圆形，棕色。环外有多数油点。

③杭白芷　为类方形或类圆形厚片，大小悬殊，大者多为类方形。表面灰褐色，皮孔分布于四角，凸起，切面平滑，粉性，形成层环类方形。直径小者为类圆形，皮孔小不明显，形成层环类圆形。气芳香，味微辛、苦。

【功效】 味辛，性温。解表，祛风燥湿，消肿排脓，通窍止痛。用于感冒头痛、眉棱骨痛、鼻塞、鼻渊、白带、疮疡肿毒等症。

153. 白苏子

Baisuzi　　Fructus Perillae Frutescentis
ハクソシ　　Fruit of White Perilla

【来源】 本品为唇形科植物白苏 *Perilla frutescens* (L.) Britton 的果实。

【产地加工】 秋季果实成熟时，割取全草，打下果实，除去杂质，晒干。

【炮制】 (1)白苏子　取原药材，除去杂质，洗净，晒干。

(2)炒白苏子　取净白苏子用文火炒至爆裂有香气逸出时，取出放凉，称"炒白苏子"。

【性状】 (1)药材　呈卵形或略呈三角形圆锥体状，长径 0.25～0.35cm，短径 0.20～0.25cm。表面灰白色至黄白色，有隆起的网纹。果皮质脆，易压碎。种仁黄白色，富油质。气微香，嚼之有油腻感(图 153－1)。

以粒大、饱满、无杂质者为佳。

(2)饮片　炒白苏子　形如白苏子，外表灰黄，有细裂口，具焦香气(图 153－2)。

【功效】 味辛，性温。下气，消痰，润肺，宽肠。



152



153—1

153—2

154. 白附子

Baifuzi　　Rhizoma Typhonii

ビャクブシ　　Tuber of Giant Typhonium

【来源】 本品为天南星科植物独角莲 *Typhonium giganteum* Engl. 的干燥块茎。

【产地加工】 秋季采挖，除去须根及外皮，用硫黄熏 1～2 次，晒干。

【炮制】 (1)生白附子　取原药材，除去杂质，称“生白附子”。

(2)制白附子　取净白附子，大小分开，用清水浸泡数日，再用白矾水泡，然后用生姜、白矾与白附子同煮至透心。取白附子切厚片，干燥，称“制白附子”。

【性状】 (1)药材　呈椭圆形或卵圆形，长 2～5cm，直径 1～3cm。表面白色至黄白色，略粗糙，有环纹及须根痕，顶端有茎痕或芽痕。质坚硬，断面白色，粉性。无臭，味淡，麻辣刺舌(图 154－1)。

(2)饮片　制白附子　呈类圆形片状，直径 2～5cm，厚 0.1cm。切面黄白色至淡黄棕色，边缘灰棕色；角质，半透明。周边灰棕色，粗糙，偶见点状须根痕。无臭，味淡、微涩(图 154－2)。

【功效】 味辛，性温。祛风痰，定惊搐，解毒散结，止痛。生白附子祛风痰，止痉作用较强，多用于口眼歪斜、抽搐、呕吐。制白附子祛寒湿作用较强，用于寒湿头痛及湿痰头痛。

155. 白茅根

Baimaogen　　Rhizoma Imperatae

ビャクボウコン　　Rhizome of Lalang Grass

【来源】 本品为禾本科植物白茅 *Imperata cylindrica* Beauv. *var. major* G. E. Hubb. 的根茎。

【产地加工】 全年均可采收，在春、秋 2 季采的质量较好。除去泥土及外部鳞叶后晒干。

【炮制】 (1)净白茅根　取原药材，拣去杂质，洗净，切约 1.5cm 长的短段，晒干或烘干。鲜药用清水洗净，切段。

(2)茅根炭　取净白茅根，置炒锅内清炒至外焦黑内方呈棕褐色为度，称“茅根炭”。

【性状】 (1)药材　呈细长圆柱形，少分枝。表面乳白色或浅黄色，有光泽，具不明显的纵皱纹，节明显，细环状，稍隆起，节上有残留鳞叶、须根和芽痕。质柔韧，味微甜。

(2)饮片　①净白茅根　为长约 1.5cm 的短段，表面乳白色或浅黄色，具节。切面乳白色，中央有髓(图 155)。

②茅根炭　形状与净白茅根相同，表面焦黑色。折断面棕褐色，纤维性。

【功效】 味甘，性寒。泻火，凉血，止血。用于热病烦躁口渴、吐血、鼻血、尿血、麻疹不透等症。

154—2

154—1

155

156. 白 矾

Baifan Alumen

ハクベソ Alum

【来源】 本品为硫酸盐类矿物明矾石 *Alumen* 经加工提炼制成的结晶。主要含有硫酸铝钾[$KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$]。

【产地加工】 采得后，打碎，用水溶解，收集溶液，蒸发浓缩，放冷后即析出结晶。

【炮制】 (1)白矾 取原药材，除去杂质，用时捣碎。

(2)枯矾 取净白矾敲成小块，置锅内，用武火加热至熔化，继续煅至膨胀松脆、完全干燥，停火，取出放凉，研成细粉，过 60 目筛。

【性状】 (1)白矾 呈六面体、八面体块状或粒状，多具棱角，白色或淡黄白色，透明或半透明。表面略平滑或凹凸不平，具细密纵棱，有玻璃样光泽。质硬而脆，易碎。硬度 2.0～2.5，相对密度为 1.757。气微，味酸、微甜而涩(图 156 左)。

以无色透明、不夹石块者为佳。

《中国药典》1990 年版规定，本品含硫酸铝钾[$KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$]不得少于 99.0%。

(2)枯矾 为无水明矾 [$KAl(SO_4)_2$]，白色疏松块体或细粉，微显颗粒性，不透明，有光泽，粗糙而带粉性；呈片状者似海绵体。质轻，性酥，味淡或微酸，嚼之有颗粒感(图 156 右)。

【功效】 味酸、涩，性寒。外用解毒杀虫，燥湿止痒；内服止血止泻，祛除风痰。枯矾收湿敛疮、止血化腐。

157. 白 果

Baiguo Semen Cinkgo

ハクカ Ginkgo Seed

【来源】 本品为银杏科植物银杏 *Ginkgo biloba* L. 的干燥成熟种子。

【产地加工】 在秋季种子成熟时采收，把种子堆放地上或浸入水中，使肉质外种皮烂去，洗净(注意戴手套，以防皮肤直接接触种皮而中毒，损伤皮肤)，晒干。亦可先将去肉质种皮的种子于沸水中稍煮后捞起，晒干。

【炮制】 (1)白果 取原药材，除去杂质，筛去灰屑。

(2)白果仁 取净白果，除去硬壳。

(3)熟白果 取净白果，用文火加热，炒至表面显黄色，取出放凉，去壳，或先把砂炒热，加入净白果，再炒，直至白果表面显黄色，取出，筛去砂子，放凉去壳；也可取白果仁，置蒸笼内蒸透，取出晒干或烘干。

【性状】 (1)药材 呈椭圆形，长 1.5～2.5cm，宽 1.0～1.5cm，厚约 1.0cm。表面黄白色，平滑，一端稍尖，另一端钝，边缘有棱线。壳坚硬，敲开硬壳，可见淡黄色种仁，宽卵形或椭圆形，横断种仁，断面外层黄色，内部淡黄色，粉性，中间有空隙。无臭，味甜、微苦(图 157)。

(2)饮片 ①白果仁 宽卵形或椭圆形，表面有细皱纹，淡黄色或淡黄棕色，横切可见外层黄色，内部淡黄色或淡绿色，粉性。气、味同白果。

②熟白果 与白果仁相似，但质硬。

【功效】 味甘、苦、涩，性平。有小毒。敛肺定喘，止带下，缩小便。用于痰多咳喘、带下白浊、遗尿、尿频。

156

157

158. 白降丹

Baijiangdan **Crystallus Hydrargyrum Bichloratum et Hydrargyrum Chloratum**

ビヤクコウタン **Crystal of Mercuric Chloride and Mercurous Chloride**

【来源】 本品系人工炼制的二氯化汞($HgCl_2$)和氯化亚汞(Hg_2Cl_2)的混合结晶物。

【产地加工】 (1)降法 取硝石、皂矾、食盐各45g，研细，加入水银30g，共研至不见星为度，再与朱砂、雄黄细粉各6g，硼砂15g混匀。置瓦研罐底后，停止搅拌，用微火烘干，谓"结胎"。将稍大的瓷碗覆盖于罐上，接口处用韧纸浸湿围严，再用煅石膏粉调成糊状密封。另取与瓷碗口直径相等之盆，盛满冷水，将罐碗置水盆上。在罐的周围罩一铁皮圈，罐与铁皮圈之间加入炭火，先用武火烧炼1小时，续用文火烧炼2小时，停火冷却，启罐，刮取白色结晶，即为白降丹。

(2)升法 如上法结胎后，在罐上放一光底大碗(碗口向上)，罐碗接合处如上法封。碗内盛满冷水，然后将罐移置火上烧炼，碗内频换冷水，约烧2小时，去火待冷，启罐取用。

【炮制】 取原药材，拣去杂质，研成极细粉。

【性状】 药材 呈白色薄片、晶簇状集合体。依皿底结晶生长的白色针柱状个体多垂直向上或斜嵌于其它个体间，长0.1cm左右。皿底结晶块带微黄色，透明或微透明，有光泽。质重，易碎，硬度近2.5，相对密度5.4。气无，味淡，久则似甜(有毒，不可尝)(图158)。

以色白、针条状、有光泽、陈久者为佳。

【功效】 味辛，性热。有大毒。败毒消肿，化腐生肌。仅供外用。

159. 白药子

Baiyaozi **Radix Stephaniae Cepharanthae**

ハクヤクシ **Root of Oriental Stephania**

【来源】 本品为防己科植物头花千金藤 *Stephania cepharantha* Hayata 的干燥块根。

【产地加工】 9～10月间叶落时挖取块根，洗去泥沙，或切成厚片后晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，润软后切2～3mm厚的薄片，晒干。

【性状】 (1)药材 呈不规则块片，圆柱形或半圆柱形，长2～9cm，直径不等，多少弯曲，并有缢缩的横沟，有时成数个串连的念珠。表面棕色，皮孔横长。质坚实，断面粉性。气微，味苦。

(2)饮片 为不规则横向或纵向切片，表面棕色或暗棕色，有细皱纹，切面类白色，粉性，有点状或环形排列的筋脉纹(图159)。

【功效】 味辛、苦，性凉。清热消肿，凉血解毒，止痛。用于咽痛喉痹、咳嗽、吐血、衄血、金疮出血、热毒痈肿、瘰疬等症。

158

159

160. 白 垩

Bai'e **Chalk**

ビャクシン **Chalk**

【来源】 本品为以硅酸盐类矿物多水高岭石 *Kaolinite* $Al_4[Si_4O_{10}](OH)_8$ 为主组分的多矿物集合体白土、方解石质白土或由方解石质等生物化学的沉积碎屑，也有少数地区（如吉林等省），以硅藻土入药。药材名分别为“高岭石质白垩”、“方解石质白垩”“硅藻土质白垩”，以高岭石质白垩为正品。

【产地加工】 挖取后，去尽杂质。

【炮制】 (1)古代炮制记载 凡使，勿用色青并底白者，先单捣令细，三度筛过，又入钵中研之，将盐汤飞过，晾干。每修事白垩100g，用白盐5g，投入斗水中，用铜器物煮沸10余分钟，用此沸水飞过白垩。

(2)煅白垩 将白垩置适宜容器内，煅至红透，取出入醋内，以醋干为度（白垩：醋 =1：1）。

【性状】 (1)药材 ①多水高岭石质白垩 呈不规则块状，白色，土状—蜡状光泽，体较重，硬度低，可切割。具滑感，微有土腥味，吸水粘舌，遇水不膨胀（图160—1）。

②方解石质白垩 为白色、淡黄色之无晶形粉末或土状结块。表面粗糙，体轻疏松，易打碎。置之似细腻的土，微有土腥味。不粘舌，相对密度2.6～2.8。遇冷HCl强烈起泡。

③硅藻土质白垩 呈不规则厚板块状，两面均较平坦，断面显层理，全体呈均匀的浅灰白色。瓷状、土状光泽。硬度大于（或近于）小刀。体轻疏松。易打碎。气微，置之似细腻的土，微有土腥气（图160—2）。

以色白、有土状光泽、无杂质者为佳。

(2)饮片 煅白垩 形如白垩，色变深，质稍疏松。

【功效】 味苦，性温。温中涩肠，止血敛疮。

161. 白硇砂

Bainaosha **Sal Ammoniac**

ビヤクノウサ **Sal Ammonite**

【来源】 本品为卤化物类氯化铵矿物硇砂 *Sal Ammoniac* 的晶体。主含氯化铵（NH_4Cl）。

【产地加工】 采得后除去杂质；或由人工合成。

【炮制】 将原药除去杂质，砸成小块。

【性状】 药材 为白色结晶体，呈不规则的块状或粒状，底层致密呈纤维状，上层呈乳状凸起。大小不一。白色或显淡黄色。质坚，稍轻而脆，易碎，硬度1.5～2.0。相对密度1。断面洁白色，显束状、柱状或粒状纹理，有光泽。气微，味咸、苦，有刺舌感（图161）。

以色白、有光泽、无杂质者为佳。

【功效】 味咸、苦、辛，性温。消积滞，止咳定喘。

160—1

160—2



161

162. 白鲜皮

Baixianpi **Cortex Dictamni**

ハクセンピ **Root-bark of Densefruit Pittany**

【来源】 本品为芸香科植物白鲜 *Dictamnus dasycarpus* Turcz. 的干燥根皮。

【产地加工】 于春、秋2季采挖根部，除去泥沙及粗皮，纵向剖开，剥取根皮，干燥。

【炮制】 取原药材，除去杂质及残留木心，洗净，润透，切厚片，干燥，称“白鲜皮片”。

【性状】 (1)药材 呈卷筒状，长5～15cm，直径0.5～1.5cm，厚0.2～0.3cm。表面黄白色至淡棕色，稍光滑，有的可见纵纹及须根痕。内表面淡黄色。质松脆，易折断，折断时有白粉飞扬。有羊膻气，味微苦(图162－1)。

以条大、肉厚、色类白色者为佳。

(2)饮片 白鲜皮片 呈圆形厚片，外表面灰白色或淡灰黄色，内表面类白色，断面乳白色。质松脆，折断时有白粉飞扬。有羊膻气，味微苦(图162－2)。

【功效】 味苦，性寒。清热燥湿，祛风解毒。

163. 白僵蚕

Baijiangcan **Bombyx Batryticatus**

ビャクキョウサン **Corpse of Silkworm**

【来源】 本品为蚕蛾科昆虫家蚕 *Bombyx mori* L. 的4～5龄幼虫因感染(或人工接种)白僵菌 *Beauveria bassiana* (Bals.) Vuill. (*Batrytis bassiana* Bals.)致死的后干燥虫体。

【产地加工】 多在夏季将感染白僵菌病死的蚕晒干或微火烘干。

【炮制】 (1)僵蚕 取原药材，除去杂质蚕丝，习称“僵蚕”。

(2)麸炒僵蚕 取麸皮置热锅内，武火加热，待冒烟时，加入净僵蚕，拌炒至表面黄色，取出，筛去麸皮，放凉，通称“麸炒僵蚕”。炒至色深者，亦称“炙僵蚕”

【性状】 (1)药材 呈类圆柱形，多弯曲而皱缩，长2～5cm，直径0.4～0.7cm。表面灰白或黄白色，被白色粉霜(气生菌丝和分生孢子)。头部较圆，黄棕色，体腹面有足8对，呈突起状；体节明显，尾部略呈二歧状。质硬而脆，易折断，断面平坦，外层白色，中间棕黑色，有光泽，内有4个亮圈(丝腺环)。气微腥，味微咸(图163－1)。

以条粗、质硬、色白、断面光亮者为佳。表面无白霜、中空者不可入药。

(2)饮片 ①麸炒僵蚕 形如僵蚕，表面黄色(图163－2)。

②炙僵蚕 表面黄至黄褐色(图163－3)。

【功效】 味辛、咸，性平。祛风解痉，化痰散结。

162—1



162—2

163—1

163—2

163—3

164. 白　鲢

Bailian　　Musculus Hypophthalmichthyis Molitricis

ビャクレン　　Meat of Silver Carp

【来源】 本品为鲤科动物白鲢 *Hypophthalmichthys molitrix* (Cuvier et Valenciennes)的肉。

【产地加工】 常年均可捕捞，捕获后去鳞，剖腹除去内脏，洗净，鲜用。

【性状】 药材　体侧扁，稍高，腹部狭窄，腹棱自胸鳍直达肛门。体各部分比例随个体大小不同变异幅度很大。头大约为体长的1/4。吻宽钝，眼小，口宽大，体被小圆鳞。侧线鳞108～120，广弧形下弯。背鳍3，7，无硬刺，较短，其起点距吻端与尾鳍基约相等。臀鳍32～13，中等长，起点在背鳍基部后下方。胸鳍7，8，下侧位，可伸达或略超过腹鳍基部。腹鳍1，7～8，起点距胸鳍比距臀鳍为近，长不达肛门。尾鳍深叉状。体背侧面暗灰色，下侧银白色，各鳍淡灰色(图164)。

【功效】 补中益气，利水。

165. 白螺蛳壳

Bailuoshiqiao　　Concha Bellamyae

ビャクラシコク　　Shell of Bellamya Purificata

【来源】 本品为田螺科动物方形环棱螺 *Bellamya quadrata* (Benson)、梨形环棱螺 *Bellamya purificata* (Heude)的贝壳。

【产地加工】 于水域边缘或破败土堆、螺壳堆积处，收集年久色白者，洗净，晒干。

【炮制】 (1)白螺蛳壳　取原药材，洗净，晒干，碾成粉块，称“白螺蛳壳”。

(2)煅螺蛳壳　取净螺蛳壳，置坩埚内，煅至红透，取出，放凉，碾末，称“煅螺蛳壳”。

【性状】 (1)药材　①方形环棱螺　螺壳圆锥形，坚厚，壳高约3cm，螺层7层。壳表黄褐色或深褐色，有明显的生长纹及较粗的螺棱。壳口卵圆形，边缘完整。厣角质，黄褐色，卵圆形，其上有同心环状的生长纹(图165－1)。

②梨形环棱螺　本种为大型环棱螺，全体呈梨形，故名。壳高可达3.9cm，壳宽一般为2.4～2.6mm。螺层6～7层，自上而下缓慢增长，缝合线明显(图165－2)。

(2)饮片　煅螺蛳壳　呈灰白色碎块或粉状，质地松脆，无臭(图165－3)。

【功效】 味甘、淡，性平。化痰，散结，止痛，敛疮。



164



165—1

165—3



165—2

166. 瓜 蒌

Gualou Fructus Trichosanthis

カロウ Snakegourd Fruit

【来源】 本品为葫芦科植物栝楼 *Trichosanthes kirilowii* Maxim. 或双边栝楼 *Trichosanthes uniflora* Hao 的成熟果实。

【产地加工】 在秋季果实成熟时连柄摘下，挂于通风处，阴干。

【炮制】 取原药材，拣去杂质，剪去果柄，用时敲碎 。

【性状】 药材 ①栝楼 类球形，长 7～15cm，直径 6～10cm。表面浅棕色，皱缩或光滑，一端有圆形花柱残基，另端有残留果柄。剖开，可见果皮内表面黄白色，果瓤橙黄色，与多数种子粘结成团。种子扁平椭圆形，长 1.2～1.5cm，宽 0.6～1.0cm，厚约 0.35cm，表面浅棕色至棕褐色，平滑，沿边缘有一圈沟纹，有种脐一端较尖。具焦糖气，味微酸甜。种仁味淡。

②双边栝楼 果实外形特征与栝楼相近。种子较大而扁，长 1.5～1.9cm，宽 0.8～1.0cm，厚约 0.25cm。表面棕褐色，沟纹明显靠内，种脐一端较宽(图 166)。

【功效】 味甘、苦，性寒。宽胸散结，润肺滑肠。

167. 玄 参

Xuanshen Radix Scrophulariae

ゲンジン Figwort Root

【来源】 本品为玄参科植物玄参 *Scrophularia ningpoensis* Hemsl. 的干燥根。

【产地加工】 冬季挖取根，除去芦头、须根、泥沙，晒至半干，堆放 3～6 天，用麻袋或草包盖严实，使其内部变黑色，再晒干或烘干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片或薄片，晒干。

【性状】 (1)药材 呈圆锥形或纺锤形，长 6～20cm，直径 1～3cm。表面灰黄色或灰褐色，有不规则纵皱纹和横裂纹，皮孔横长。质坚韧，不易折断，断面乌黑色，点状维管束放射状排列。气特异，略似焦糖气，味甜、微苦。浸泡水中，水染成黑色(图 167－1)

(2)饮片 切片表面灰褐色，有纵沟纹和须根痕，边缘不整齐，切面有光泽和花纹。质坚韧，有焦糖气(图 167－2)。

【功效】 味甘、苦、咸，性微寒。滋阴降火，润燥生津，消肿解毒。用于热病伤阴、舌烽烦渴、温毒发斑、津伤便秘、骨蒸劳嗽、目赤、咽喉肿痛、痈肿瘰疬等症。

166

167—1

167—2

168. 玄精石

Xuanjingshi　　Glauberitum

ゲンセイセキ　　Selenite

【来源】 本品为硫酸盐类矿物钙芒硝 *Glanberitum* 和小龟板形片状透明石膏 *Selenitum*。主组分为钙芒硝[$Na_2Ca(SO_4)_2$]。前者称“钙芒硝质玄精石”，后者称“石膏质玄精石”。经研究，以前者为正品药材，后者为地方品种。

【产地加工】 采挖后，除去泥土及杂石。

【炮制】 (1)玄精石　洗净泥土，晒干，用时捣碎或研细。

(2)煅玄精石　取洁净药材装砂锅，置烈火中煅至红透，取出晾凉，用时捣碎或研细。

【性状】 (1)药材　①钙芒硝质玄精石　为粒状、板状、聚晶粒块状，多呈黄白色条柱状，无色透明(表面常因风化成白色不透明粉末，状似芒硝)。质粒轻、性酥，断面菱形，贝壳状断口。呈玻璃或蜡状光泽。味咸(图 168－1)。

②石膏质玄精石　为粒块状、致密块状集合体，多呈椭圆状六边形、棱形或各种不规则的薄片状，边薄中厚，习称“龟背”形，长 0.3～2.0cm，宽 0.4～0.6cm，厚 0.2～0.4cm。表面灰白色、灰绿色或略带浅灰棕色，有的中间显黑色。半透明，质硬而脆，易砸碎而成不整齐的棱形或柱状小块，断面似玻璃光泽。略带土腥气，味微咸(图 168－2)。

以片如龟甲、尖角端正、叩之则折、色灰黄白、质轻性脆、火中烧之能解体、层层剥落为片状，呈瓷白色者为佳。杂有白黑点者为次。

(2)饮片　煅玄精石　颜色变深，透明度变低，质酥脆(图 168－3、图 168－4)。

【功效】 味甘、咸，性寒。滋阴，降火，软坚，消痰，益精，解肌，止痛。

169. 半　夏

Banxia　　Rhizoma Pinlliae

ハンゲ　　Pinellia Tuber

【来源】 本品为天南星科植物半夏 *Pinellia ternata* Breit. 的干燥块茎。

【产地加工】 于夏、秋 2 季采挖，洗净，除去外皮及须根，晒干。

【炮制】 (1)生半夏　取原药材，除去杂质。用时捣碎。

(2)清半夏　取生半夏，大小分开，用 8%的白矾溶液浸泡，至内无干心，口尝微有麻舌感，取出，洗净，切厚片，干燥。每 100kg 半夏，用白矾 20kg。

(3)姜半夏　①取生半夏，用水漂 3 天，再加甘草、皂角水漂 7～10 天，捞起，用生姜、皂角、甘草在宽水中煮约 4 小时，至内无白心时，去辅料，加清水煮约 2 小时，取出，晒至 7～8 成干，切薄片，干燥。每 100kg 半夏，用生姜 20kg、皂角 8kg、甘草 5kg。

②取生半夏，大小个分开，用清水浸泡，如起泡沫时加白矾适量，泡至内无干心时，另取生姜切片煎汤，加白矾与半夏共煮透，取出，晾至半干，切薄片，干燥。每 100kg 半夏，用生姜 25kg、白矾 12.5kg。

168—1

168—2



168—4

168—3

169—1

(4)法半夏 ①取生半夏，大小分开，加皂角、甘草漂2～3周，至内无干心、口尝麻辣味减至轻度时，取出；再加白矾粉，反复搅拌，腌8小时，然后加入清水至没过药面约10cm。注意不使白矾粉冲沉缸底，继续腌2天，至口尝无或微有麻舌感时，取出，洗净，切厚片，干燥。每100kg半夏，用皂角5kg、甘草6kg、白矾1kg。

②取生半夏，大小个分开，用清水浸泡至无干心，去水，加甘草、石灰液(取甘草加适量水煎2次，合并煎液，倒入加适量水制成的石灰液中)浸泡，每日搅拌1～2次，并保持pH12以上，至口尝微有麻舌感，切面黄色均匀为度，取出，洗净，阴干或烘干。每100kg半夏，用甘草15kg、生石灰10kg。

【性状】 (1)药材 呈类球形，有的稍偏斜，直径1.0～1.5cm，表面白色或浅黄色，顶端有凹陷的茎痕，周围密布麻点状根痕，下面钝圆，较光滑。质坚实，断面洁白，富粉性。气微，味辛辣，麻舌而刺喉(图169－1)。珍珠半夏(图169－2)。

(2)饮片 ①清半夏 为类圆形或椭圆形厚片。白色，味微辣、涩。

②姜半夏 为圆形薄片。表面有光泽，透明。质脆，淡黄色，微有辣味(图169－3)。

③法半夏 为类圆形或椭圆形厚片。粉性足，质较松，淡黄白色。味淡(图169－4)。

【功效】 味辛，性温。有小毒。燥湿化痰，降逆止呕，消痞散结。姜半夏多用于降逆止呕，消痞散结。法半夏多用于燥湿化痰。半夏曲化痰止咳，消食积。

附：日本半夏 *Rhizoma Pinelliae*

【来源】 本品为天南星科植物半夏*Pinellia ternata* Breit.除去外皮的干燥块茎。

【产地加工】 立夏后采集块茎，洗去泥沙，用3%的盐水浸泡，除去黑褐色外皮、须根，清水漂去盐分，晒干。

【性状】 (1)药材 呈略扁的球形或不规则形，直径0.7～2.5cm，高0.7～1.5cm。表面白色或灰白黄色，上部有凹陷的茎痕，周边有细点状根痕。质坚实。断面白色。粉性。气微，味淡，嚼之略有粘性，后有较强的刺激味。

以个大、色白、质实、刺激味强者为佳。

(2)饮片 呈圆形或类圆形片状，部分呈不规则形，直径0.7～1.9cm，厚1～2mm。类白色或白色，表面略平滑，稍有粉尘，部分中心部位可见棕黄色小点。部分切片可见棕色针眼和茎痕凹窝，外皮浅黄白色。质脆，易折断，粉性。气微，味淡(图169－5)。



169—2



169—3

169—5



169—4

170. 对 虾

Duixia Penaeus
タイカ Prawn

【来源】 本品为对虾科动物对虾 *Penaeus orientalis* Kishinouye 的肉。

【产地加工】 于春季捕捞，洗净去壳，取肉鲜用，或煮熟晒干备用。

【性状】 药材 形体长大而侧扁，甲壳甚薄，表面光滑。额角细长，平直前伸，顶端稍超出第 2 触角鳞片的末缘。头胸甲具眼眶触角沟，颈沟及额角侧沟，以及触角刺、肝刺及胃上刺。腹部第 4～6 节背面中央具有纵脊，第 6 节长约为高的 1.5 倍。尾节长度微短于第 6 节，其末端甚尖，两侧无活动刺。步足较小，前 3 对步足皆呈钳状，后两对步足呈爪状。5 对步足皆具短小的外肢(图 170)。

【功效】 补肾壮阳，健胃化痰。

171. 丝瓜络

Sigualuo Retinervus Luffae Fructus
シカラク Vegetable Sponge of Luffa

【来源】 本品为葫芦科植物丝瓜 *Luffa cylindrica* (L.) Roem. 的干燥成熟果实的维管束。

【产地加工】 于夏、秋 2 季，果实成熟、果皮变黄、内部干枯时采收。除去外皮和果肉，洗净，晒干，除去种子。

【炮制】 取原药材，除去残留种子及外皮，切段。

【性状】 (1)药材 为丝状维管束交织而成。长纺锤形或长圆筒状，稍弯曲，长 30～70cm，直径 7～10cm。淡黄白色，疏松。体轻，质坚韧，有弹性，不能折断。横切可见子房 3 室。空洞状。气微，味淡。

(2)饮片 为长 2～3cm 的段块，表面淡黄白色，其余特征与药材同(图 171)。

【功效】 味甘，性平。通络，活血，祛风。用于痹痛拘挛，胸胁胀痛，乳汁不通。

172. 丝瓜藤

Siguateng Caulis Luffae
シカトウ Luffa Stem

【来源】 本品为葫芦科植物丝瓜 *Luffa cylindrica* (L.) Roem. 或粤丝瓜 *Luffa acutangula* Roxb. 的藤茎。

【产地加工】 于夏季生长旺盛时采收，鲜用或晒干备用。

【炮制】 取原药材，除去杂质，切段。

【性状】 (1)药材 茎藤圆柱形，长短不等，直径 0.2～1.0cm。表面黄绿色、黄棕色，有不明显的棱和纵皱，节明显，节上有叶痕、卷须或卷须脱落痕。质坚韧，不易折断，断面纤维性。气微，味苦。

(2)饮片 短圆柱形，长约 1cm，表面黄绿色或灰棕色。粗糙，切面黄棕色，有白色维管束点，其余鉴别特征同药材(图 172)。

【功效】 味苦，性寒。有小毒。舒筋，活血，健脾，杀虫。用于腰膝酸痛麻木、月经不调、水肿、鼻渊等症。



170



171

172

173. 地　丁(紫花地丁)

Diding (Zihuadiding)　　Herba Violae

ジチョウ(シカジチョウ)　　Violet Herb

【来源】 本品为堇菜科植物紫花地丁 *Viola yedoensis* Makino 的干燥全草。

【产地加工】 于春、秋 2 季采收，除去杂质，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，抢水洗净，切碎，干燥。

【性状】 (1)药材　多皱缩成团。主根长圆锥形，直径 0.1～0.3cm；淡黄棕色，有细纵皱纹。叶基生，灰绿色，展平后叶片呈披针形或卵状披针形，长 1.5～6.0cm，宽 1～2cm；先端钝，基部截形或稍心形，边缘具钝锯齿，两面有毛；叶柄细，长 2～6cm，上部具明显狭翅。花茎纤细；花瓣 5，紫堇色或淡棕色；花距细管状。蒴果椭圆形或 3 裂，种子多数，淡棕色。气微，味微苦而稍粘(图 173－1)。

以色绿者为佳。

(2)饮片　为不规则的小段。根、茎、叶、花、果混合，表面黄绿色，叶片卷缩，微具毛茸。花黄棕色，花瓣 5 片。小蒴果椭圆形或 3 裂，内含淡棕色圆形种子。气微，味微苦而稍粘(图 173－2)。

【功效】 味苦、辛，性寒。清热解毒，凉血消肿。

174. 地不容

Diburong　　Radix Stephaniae Delavayi

ジフヨウ　　Root of Delavay Stephania

【来源】 本品为防己科植物地不容 *Stephania delavayi* Diels 的块根。

【产地加工】 全年可采，但以秋季采者质量较佳，洗净泥沙，晒干。

【炮制】 取原药材，拣去杂质，切片。

【性状】 (1)药材　多为横切或纵切片，直径 2～7cm，厚 0.3～1.0cm。表面棕黄色，切面灰黄色，有不规则皱纹。横切片可见维管束点排列呈同心环状，纵切片可见筋脉纹数条。质坚脆，断面粉性。气微，味苦。

(2)饮片　为不规则切片，厚约 0.3cm，其余鉴别特征同药材(图 174)。

【功效】 味苦，性寒。有小毒。清热解毒，截疟，镇痛。用于痈疽肿痛、喉闭、疟疾、胃痛等症。

173—1

173—2



174

175. 地　龙

Dilong　　Lumbricus

ジリュウ　　Earth Worm

【来源】 本品为蚯蚓科动物参环毛蚓 *Pheretima aspergillum* (Perrier)或缘虫蚓 *Allolobophora caliginosa* (*Savigny*) *trapezoides* (Ant. Deges)的干燥体。前者习称"广地龙"，后者习称"土地龙"。

【产地加工】 捕捉后，及时剖开广地龙腹部，洗去内脏及泥沙，晒干或低温干燥；用草木灰吸死土地龙后，去灰晒干或低温干燥。

【炮制】 (1)地龙　取原药材，除去杂质，洗净，切段，干燥。土地龙：筛去土，碾碎。

(2)酒地龙　取净地龙段，另入黄酒拌匀，置锅内，用文火加热，炒至表面呈棕色时，取出，放凉(地龙：黄酒＝100.0：12.5)

【性状】 (1)药材　①广地龙　呈长条状薄片，弯曲，边缘略卷，长10～20cm，宽1～2cm。全体具环节，背部棕褐色至紫灰色，腹部浅黄棕色；第14～16环节为生殖环带，习称"白颈"，较光亮。雄生殖孔可见。体前端稍尖，尾端钝圆，刚毛圈粗糙而硬，色稍浅。体轻，略呈革质，不易折断。气腥，味微咸(图175－1)。

以条长、肥壮、不碎、无泥土者为佳。

②土地龙　呈弯曲的圆柱形，长5～10cm，直径0.3～0.7cm。外皮灰褐色或灰棕色，多皱缩不平，生殖环带多不明显。体轻脆，易折断，断面肉薄，体腔充满泥土。

均以条大、肉厚者为佳。

(2)饮片　酒地龙　形如广地龙或土地龙小段，表面色泽加深，具焦斑，略具酒气(图175－2)。

【功效】 味咸，性寒。清热定惊，通络，平喘，利尿。

附：泰国产地龙(图175－3)。

176. 地骨皮

Digupi　　Cortex Lycii

ジコッピ　　Root-bark of Chinese Wolfberry

【来源】 本品为茄科植物枸杞 *Lycium chinense* Mill. 或宁夏枸杞 *Lycium barbarum* L. 的干燥根皮。

【产地加工】 春初或秋后采挖根部，洗净，剥取根皮，干燥。

【炮制】 取原药材，除去杂质及残留木心，洗净，晒干。

【性状】 药材　呈筒状、槽状或不规则卷片，长3～10cm，直径0.5～1.5cm，厚0.1～0.3cm。外表面灰黄色至棕黄色，粗糙，具纵横皱纹或裂纹，易成鳞片状剥落。内表面黄白色或灰黄色，有细纵纹。体轻，质脆，易折断。折断面不平坦，外层黄棕色，内层灰白色。气微，味微甜而后苦(图176－1、图176－2碎段)。

以块大、肉厚、无木心者为佳。

【功效】 味甘、淡，性寒。清虚热，凉血。

175—1

175—2

175—3

176—1



176—2

177. 地　黄

Dihuang　　Radix Rehmanniae

ジオウ　　Rhizome of Rehmannia

【来源】 本品为玄参科植物地黄 *Rehmannia glutinosa* Libosch. 的新鲜或干燥块根。

【产地加工】 于秋季采挖，除去芦头、须根及泥沙，鲜用，或将地黄缓缓烘焙至约 8 成干。前者习称“鲜地黄”，后者习称“生地黄”或“干地黄”。

【炮制】 (1)鲜地黄　取原药材的新鲜块根，去掉须根，洗净泥土，称“鲜地黄”。

(2)生地黄　取原药材，洗净，润透，切厚片，晒干，称“生地黄”。

(3)酒熟地黄　取生地黄，加黄酒拌匀，隔水加热炖透，或置适宜容器内蒸透至表黑润，至黄酒完全被吸尽，取出，切厚片，干燥，称“酒熟地黄”。

(4)蒸熟地黄　取生地黄，置适当容器内，加热蒸至黑润，取出，切厚片，干燥，称“蒸熟地黄”。

(5)生地黄炭　取生地黄，加入锅内，用武火加热，炒至发泡鼓起，表面焦黑色，内部焦褐色，喷淋清水少许，灭尽火星，取出，凉透晾干，称“生地黄炭”。

(6)熟地黄炭　取熟地黄，按生地黄炭法制炭，称“熟地黄炭”。

【性状】 (1)药材　①鲜地黄　为纺锤形或条形，长 9～15cm，直径 1～6cm。外皮薄，浅红黄色，具弯曲的皱纹及横长皮孔。肉质，易折断。断面皮部类黄白色，可见橘红色油点，木部有放射状纹理。气微，味微甜、微苦(图 177－1)。

以粗壮、色红黄者为佳。

②生地黄　呈不规块状或长纺锤形，长 6～12cm，直径 2～6cm。有的细小，稍偏而扭曲。表面灰黑色或棕灰色，极皱缩，具不规则的横纹。体重，质较软，易折断。断面略平坦，灰黑色、棕黑色或棕灰色，极皱缩，具不规则的横纹。体重，质较软，易折断。断面略平坦，灰黑色、棕黑色或乌黑色，微有光泽，具粘性。气微，味微甜(图 177－2、图 177－3 生地节)。

以块大、体重、断面乌黑色者为佳。

(2)饮片　①生地黄　为不规则类圆形厚片，直径 3～6cm，厚 0.2～0.4cm。切面棕黑色或乌黑色，有光泽，油润粘性，中间隐现菊花心纹理。周边灰黑色或棕灰色，皱缩，质柔软，坚实。气特异，味微甜(图 177－4)。

②酒熟地黄、蒸熟地黄　形如生地黄，表面乌黑发亮，质滋润而柔软，易粘连。味甜，或有酒香气(图 177－5)。

③生地黄炭　形如生地黄，表面焦黑色，质轻松鼓胀，外皮焦脆，中心部棕黑色，并有蜂窝状裂隙。有焦苦味(图 177－6)。

④熟地黄炭　形如生地黄炭，色泽加深而光亮(图 177－7)。

【功效】 鲜地黄味甘、苦，性寒。清热生津，凉血，止血。生地黄炭味甘，性寒。清热凉血，养阴生津。

熟地黄味甘，性微温。滋阴补血，益精填髓。生地黄炭凉血，止血。熟地黄炭补血、止血。

附：生地黄出口片(图 177－8)，**熟地黄出口片**(图 177－9)。

177—1



177—3

177—2

177—6

177—5

177—4

177—7

177—8



177—9

178. 地 榆

Diyu **Radix Sanguisorbae**
ジユ **Root of Garden Burnet**

【来源】 本品为蔷薇科植物地榆 *Sanguisorba officinalis* L. 或长叶地榆 *Sanguisorba officinalis* L. *var. longifolia* (Bert.)Yu et Li 的干燥根。后者习称"绵地榆"。

【产地加工】 春季发芽或秋季植株枯萎后采挖，除去须根，洗净，干燥。

【炮制】 (1)地榆片 取原药材，除去杂质，洗净，除去残茎，稍浸，润透，切厚片，干燥，分别称"地榆片"、"绵地榆片"。

(2)地榆炭 取地榆片置锅内，用武火加热炒至表面焦黑色，内部棕褐色，喷淋清水少许，灭尽火星，取出凉透，习称"地榆炭"。

【性状】 (1)药材 ①地榆根 呈圆柱形或不规则纺锤形，稍弯曲，长 5～20cm，直径 0.3～2.0cm，表面棕至暗棕紫色，粗糙，具纵皱纹。质硬脆。气微，味微苦而涩(图 178－1)。

以条粗、质硬、断面色红者为佳。

②绵地榆 呈长圆柱形，表面红棕或棕紫色，有细纵皱纹及横裂纹。质坚韧，不易折断。其余特征同地榆根。

(2)饮片 ①地榆片 呈不规则圆形厚片，直径 0.3～2.0cm，厚 0.2～0.4cm。断面粉红或淡黄色，木部有放射状纹理。质硬脆。气微，味微苦而涩(图 178－2)。

②绵地榆片 呈不规则圆形厚片，直径 0.4cm～2.0cm，厚 0.2cm～0.4cm。表面红棕或棕紫色，断面黄棕色或红棕色，皮部有多数絮状纤维。其余特征同地榆片。

③地榆炭 形如地榆片，表面焦黑色，内部棕褐色。质坚脆。气微苦而涩(图 178－3)。

【功效】 味苦、酸、涩，性微寒。凉血止血，解毒敛疮。

179. 地锦草

Dijincao **Herba Euphorbiae Humifusae**
ジキンソウ **Herb of Spottedleaf Euphorbia**

【来源】 本品为大戟科植物地锦 *Euphorbia humifusa* Willd. 或斑地锦 *Euphorbia maculata* L. 的干燥全草。

【产地加工】 于夏、秋 2 季采收，除去杂质，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，抢水洗净，切段，干燥，称"地锦草段"。

【性状】 (1)药材 ①地锦 常皱缩卷曲，根细小。茎细，呈叉状分枝；表面带紫红色，光滑无毛或疏生白色细柔毛；质脆，易折断，断面黄白色，中空。单叶对生，具淡红色短柄或几无柄；叶片多皱缩或已脱落，展平后呈长椭圆形，长 0.5～1.0cm，宽 0.4～0.6cm，绿色带紫红色，通常无毛或疏生细柔毛，先端钝圆，基部偏斜，边缘具小锯齿或呈微波状。杯状聚伞花序腋生，较小。蒴果 3 棱状球形，表面光滑。种子细小，卵形，褐色。气微，味微涩(图 179－1)。

②斑地锦 叶上表面具红斑，蒴果被稀疏白色短柔毛。余同地锦。

以茎粗、叶多、色绿者为佳。

(2)饮片 地锦草段 为不规则的小段，茎、叶、花混合。茎表面带紫红色，质脆易折断。切面带白色，中空。叶卷曲皱缩，绿色。斑地锦叶表面有红斑。偶见 3 棱状球形蒴果及褐色卵形种子。气微，味微涩(图 179－2)。

【功效】 味辛，性平。清热解毒，凉血止血。

178—1

178—2

178—3



179—1

179—2

180. 朴 硝

Poxiao **Mirabiliti**

ボクショウ **Mirabilite**

【来源】 本品为硫酸盐类矿物芒硝 *Natrium sulfuricum* 加工而得的粗制结晶。

【制法】 同芒硝。均为下层的结晶。

【炮制】 原药材为制芒硝原料，可原品入药，或用甘草水或萝卜汁制，取其下部结晶。

【性状】 药材 为细片状疏松集合体，呈小块片粒状，不成条，略透明，玻璃光泽，白色。相对密度 1.49。性脆，极易吸湿潮解，与空气接触极易风化。在阳光下可见多量灰屑等杂质。质脆，易碎裂。单体呈针状、马齿状，无色。气无，味苦咸(图 180 左：含水，右：煅)。

以结晶粒大、白色略透明者为佳。

【功效】 味辛、苦，性大寒。主五脏积聚，久热胃闭，除邪气，破留血，通经脉，利大小便。本品一般不内服。外用略有调节局部渗透压作用。

181. 芒 硝

Mangxiao **Natrii Sulfas**

ボウショウ **Mirabilite**

【来源】 本品为硫酸盐类矿物芒硝族芒硝 *Natrium sulfuricum* 经加工精制而成的结晶体。主含含水硫酸钠($Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$)。

【产地加工】 将天然产品加热水溶解过滤，除去泥沙及不溶性杂质，将滤液静置，析出结晶；或取天然芒硝，经煮炼，过滤，冷却后，取上层细如锋芒的结晶为芒硝。

【炮制】 取萝卜洗净切片，置锅内加水煮透后，加入原药材共煮，至全部溶化，取出过滤，滤液置适宜容器内，放冷后芒硝逐渐析出，捞出晶体，余汁经浓缩，放冷再结晶，捞出晾干(芒硝：萝卜＝10：2)。

【性状】 (1)药材 棱柱状、长方形或不规则块状及粒状。无色透明或类白色半透明，暴露空气中则表面渐风化而覆盖一层白色粉末(无水硫酸钠)，有时为白色及带浅黄、浅蓝、浅绿等色调。通常呈致密粒状集合体，具玻璃样光泽。质脆，易碎，硬度 1.5～2.0，相对密度 1.48，条痕白色。断口贝壳状。无臭，味苦凉、咸。在火焰中燃烧，焰呈黄色(图 181－1)。

以无色、透明、条块状结晶者为佳。《中国药典》1990 年版规定本品按干燥品计算，含硫酸钠(Na_2SO_4)不得少于 99.0%。

(2)饮片 制芒硝 为白色粉末，无色透明。棱柱状或长方形结晶。气无，味苦咸而有清凉感(图 181－2)。

【功效】 味咸、苦，性寒。泻热通便，润燥软坚，清火消肿。外用治乳痈，痔疮肿痛。孕妇禁用。

180

181—1

181—2

182. 老鹳草

Laoguancao **Herba Erodii seu Geranii**

ロウカンソウ **Heroubill or Geranium**

【来源】 本品为牻牛儿苗科植物牻牛儿苗 *Erodium stephanianum* Willd. 或老鹳草 *Geranium wilfordii* Maxim. 的干燥地上部分。前者习称"长嘴老鹳草"，后者习称"短嘴老鹳草"。

【产地加工】 于夏、秋2季之间果实，近成熟时采割，捆成把，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质及残根，抢水洗净，稍润，切段，干燥，称"老鹳草段"。

【性状】 (1)药材 ①长嘴老鹳草 茎长30～50cm，直径0.3～0.7cm，分枝多，节膨大；表面灰绿色或带紫色，有纵沟纹及稀疏茸毛；质脆，断面黄白色，有的中空。叶对生，具细长叶柄；叶片卷曲皱缩，质脆易碎，完整者为2回羽状深裂，裂片披针线形。果实长圆形，长0.5～1.0cm，宿存花柱长2.5～4.0cm，形似鹳喙，有的裂成5瓣，呈螺旋形卷曲。气微，味淡(图182－1)。

②短嘴老鹳草 茎较细，略短。叶片圆形，3或5深裂，裂片较宽，边缘具缺刻。果实球形，长为0.3～0.5cm。花柱长1.0～1.5cm，有的5裂向上卷曲呈伞形。余同长嘴老鹳草(图182－2)。

以色灰绿、果实多者为佳。

(2)饮片 老鹳草段 为不规则的小段，茎、叶混合。茎表面灰绿色或灰褐色，质坚脆，切面黄白色。叶卷曲皱缩，灰褐色。质脆易碎。偶有未切碎的叶展开可见2回羽状深裂，裂片披针线形。果实长圆形者为长嘴老鹳草。叶片圆形，3或5深裂；果实球形者为短嘴老鹳草。气微，味淡(图182－3长嘴老鹳草段、图182－4短嘴老鹳草段)。

【功效】 味辛、苦，性平。祛风湿，通经络，止泻痢。

附：日本老鹳草段(图182－5)。

183. 西红花

Xihonghua **Stigma Croci**

セイコウカ **Saffron**

【来源】 本品为鸢尾科植物番红花 *Crocus sativus* L. 的干燥柱头。

【产地加工】 开花期晴天的早晨采花，摘取柱头，摊放在竹匾内，上盖1张薄吸水纸后晒干，在40～50℃烘干或在通风处晾干，为干红花。如再加工使之油润光亮，则为湿红花。

【性状】 (1)药材 ①干红花 为弯曲的细线形，橙红色，无光泽或微有光泽。柱头红棕色，长2.5～3.0cm，基部窄，向上则稍宽大并内卷成筒，直径约0.15cm，边缘不整齐，呈纸齿状，内方有1裂缝长1.5～2.0cm。有时带有部分橙黄色花柱。质轻，易折断。入水则柱头膨胀，呈长喇叭状，散出橙黄色色素，染水成黄色。有特异香气，味微苦(图183)。

②湿红花 常呈疏松团块，由众多扁平柱头压集而成。红棕色，有油润光泽。

以柱头色紫红、色泽鲜艳、黄色花柱少者为佳。

【功效】 味苦，性平。活血，养血，化瘀生新。



182—1

182—2



182—3



182—4

182—5



183

184. 西洋参

Xiyangshen **Radix Panacis Quinquefolii**

セイヨウジン **American Ginseng**

【来源】 本品为五加科植物西洋参 *Panax quinquefolium* L. 的干燥根。

【产地加工】 秋季地上部分将枯萎时，选取3～6年生的根采挖，除去分枝、须尾，晒干或烘干，称“原皮西洋参”。喷水湿润，撞去外皮，再用硫黄熏之，晒干后色白起粉者，称“粉光西洋参”。

【炮制】 取原药材，用清水喷淋，润透，切片，干燥。

【性状】 (1)药材 ①原皮西洋参 呈圆柱形而略带纺锤状，长2～6cm，直径0.5～1.0cm。外表有细横纹及不规则的纵皱，顶端细纹较密而呈环状。断面平坦，淡黄色，有暗色形成层环，并散有多数红棕色树脂道及细管，呈点状。气香，味微甜带苦(图184－1)。

②粉光西洋参 表面色白而光，但可见不明显的横纹。余同原皮西洋参。

均以条匀、质硬、体轻、表面横纹紧密、气清香、味浓者为佳。

(2)饮片 西洋参片 为圆形或椭圆形薄片，直径0.5～1.0cm，厚0.1～0.2cm。表面土黄色，偶见横纹。切面淡黄色，有暗色形成层环及红棕色的树脂道、细管，呈点状。气香，味微甜带苦(图184－2)。

【功效】 味甘、微苦，性凉。益肺阴，清虚火，生津止渴。

185. 百 合

Baihe **Bulbus Lilii**

ビャクゴウ **Lily Bulb**

【来源】 本品为百合科植物卷丹 *Lilium lancifolium* Thunb.、百合 *Lilium brownii* F. E. Brown *var. viridulum* Baker 或细叶百合 *Lilium pumilum* DC. 的干燥肉质鳞叶。

【产地加工】 秋季采挖，洗净，剥取鳞叶，置沸水中略烫，干燥。

【炮制】 (1)百合片 取原药材，除去杂质，称“百合片”。

(2)蜜百合 取炼蜜用适量开水稀释后，加入净百合拌匀，闷透，置锅内，用文火加热，炒至不粘物为度，取出放凉，称“蜜百合”。

【性状】 (1)药材 呈长椭圆形，长2～5cm，宽1～2cm，中部厚0.13～0.4cm。表面类白色，淡棕黄色或微带紫色，有数条纵直平行的白色维管束。顶端稍尖，基部较宽，边缘薄，微波状，略向内弯曲。质硬而脆，断面较平坦，角质样。气微，味微苦(图185－1)。

以肉厚、质硬、色白者为佳。

(2)饮片 蜜百合 形如百合片，表面黄色，偶见黄焦斑，略带粘性。味甜(图185－2)。

【功效】 味甘，性寒。养阴润肺，清心安神。

184—1



184—2

185—2

185—1

186. 百里香

Bailixing　　Herba Thymi

ヒャクリコウ　　Thyme

【来源】 本品为唇形科植物百里香 *Thymus mongolicus* Ronn. 的干燥全草。

【产地加工】 于夏季枝叶茂盛时采收，拔起全株，剪去根部，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，稍闷，切段，干燥，称“百里香段”。

【性状】 (1)药材　茎匍匐，4棱形，多分枝，灰褐或灰棕色。叶小，对生，有短柄，叶片近草质，椭圆披针形或卵状披针形，全缘，侧脉2～3对，质轻脆。气香，味涩(图186－1)。

以质嫩、完整、叶多、洁净无杂者为佳。

(2)饮片　百里香段　呈不规则的小段，茎、叶混合。茎有4棱，灰褐或灰棕色。叶片小，近革质，椭圆披针形或卵状披针形，叶全缘，侧脉2～3对明显。质轻脆。气香，味涩(图186－2)。

【功效】 味辛，性微温。祛风解表，行气止痛，止咳，降压。

187. 百　部

Baibu　　Radix Stemonae

ビャクブ　　Stemona Root

【来源】 本品为百部科植物直立百部 *Stemona sessilifolia* (Miq.)、蔓生百部 *Stemona japonica* (Bl.)Miq. 或对叶百部 *Stemona tuberosa* Lour. 等的干燥块根。

【产地加工】 于春、秋2季挖取根，除去茎及须根，在沸水中烫或蒸至无白心，取出，晒干。

【炮制】 (1)百部片　取原药材，除杂质和黑色油支，切去芦，洗净，润软，切薄片，干燥，筛去灰屑。

(2)蒸百部　取净百部片，置蒸笼内蒸1小时(上气后算起)，取出，干燥。

(3)蜜炙百部　取净百部片，用炼蜜20%拌炒，至蜜汁吸尽。

【性状】 (1)药材　①直立百部　块根单个或数个簇生，纺锤形，长5～12cm，直径为0.5～1.0cm。表面淡棕黄色，具不规则纵向沟纹，少数横皱纹。质坚，断面黄白色，微带角质，不规则环纹明显。气微，味先甜后苦。

②蔓生百部　断面环纹明显而稍宽，余同直立百部。

③对叶百部　块根较粗大，长12～25cm，直径0.8～2.0cm，表面灰棕色，纵皱较浅。质坚实，断面黄白色，环纹较大，髓部浅白色。

(2)饮片　①百部片　为长0.5cm左右的短圆柱形片，黄白色或灰棕色，表面具纵沟，切面黄白色，微带角质，中柱扁缩不规则，余同药材(图187－1、图187－2)。

②蒸百部片　质较韧。

③蜜炙百部　表面棕褐色，粘滞，味稍甜。

【功效】 味甘、苦，性微温。润肺止咳，杀虫。用于新久咳嗽、肺结核、百日咳、蛲虫病等症；外用灭虱。



186—1

186—2

187—1

187—2

188. 百解藤

Baijieteng **Radix Cycleae Hypoglaucae**
ヒャクカイトウ **Baijieteng**

【来源】 本品为防己科植物粉背轮环藤 *Cyclea hypoglauca* (Schauer) Diels 的根。
【产地加工】 全年可采，洗净泥沙，除去细根和茎叶，切碎。
【炮制】 取原药材，除去杂质，淋水，润透，切薄片，晒干或烘干。
【性状】 (1)药材 根细长弯曲，长 12～20cm，直径 0.6～2.0cm。表面灰棕色，具缩缩的横沟纹和纵皱，皮部脱落处常露出弯曲的筋脉纹。质坚脆，断面浅黄棕色，具菊花纹。气微，味苦。
(2)饮片 为类圆形或椭圆形薄片，厚约 3mm。表面灰棕色，具纵皱，切面浅黄棕色，粉性，具菊花纹(图 188)。
【功效】 味苦，性寒。清热解毒，祛风止痛。用于风热感冒、咽喉肿痛、牙痛、气管炎、肠炎、痢疾、尿路感染、风湿痛、毒蛇咬伤、疮疡肿毒等症。

189. 当 归

Danggui **Radix Angelicae Sinensis**
トウキ **Chinese Angelica**

【来源】 本品为伞形科植物当归 *Angelica sinensis* (Oliv.) Diels. 的干燥根。甘肃产者习称“秦当归”。
【产地加工】 于秋末采挖，除去须根及泥沙，待水分稍蒸后，捆成小把，用烟火慢慢熏干。
【炮制】 (1)当归片 取原药材，除去杂质，抢水洗净，润透，切薄片，晒干。亦有分为当归首：取根头部分横切 4～6 片；归身：取主根部分纵切为薄片；归尾：取支根部分横切为薄片；全归：取全当归纵切，包括归首、归身、归尾全身的薄片。
(2)酒炒当归 取当归片，用酒喷洒拌匀，稍润，用文火微炒，取出，放凉。每 100kg 当归，用酒 10kg。
(3)当归炭 取当归片，炒至外表焦黑色、内部棕褐色，喷淋清水少许，火尽火星，取出，摊凉。
【性状】 (1)药材 根略呈圆柱形，根上端称“归头”，主根称“归身”，支根称“归尾”，全体称“全归”。全归长 15～25cm，外皮细密，黄棕色至深褐色，有纵皱纹及横长皮孔，根上端膨大，钝圆，有残留的叶鞘及茎基。主根粗短，长 1～3cm，直径 1.5～3.0cm。下部有支根 3～5 条或更多，上粗下细，多扭曲，质柔韧，断面黄白色或淡黄棕色，形成层呈黄棕色环状；根茎部分断面中心有髓和空腔。香气浓郁，味甜、辛，微苦(图 189－1)。
秦当归根头大而圆，主根粗长，油润，外皮色黄棕，断面色黄白，气味浓厚，质优。
(2)饮片 ①当归片 为类圆形的薄片，直径至约 4cm。表面黄棕色至深褐色，外皮细密；切面黄白色或淡黄色，有浅棕色形成层环纹，皮部厚，散有棕色油点，木质部色较淡。质柔韧，油润。有浓郁香气，味甜、辛、微苦(图 189－2，出口饮片图 189－3)。
②酒当归 形如当归，呈老黄色，微具焦斑。略具酒香气。
③当归炭 形如当归，表面焦黄色至焦黑色，内部棕褐色。质松脆。具焦气，味苦、辛。
【功效】 味甘、辛，性温。补血活血，调经止血，润肠通便。
附：日本当归 *Radix Angelicae Acutilobae*
【来源】 本品为伞形科植物东当归 *Angelica acutiloba* Kitagawa 的干燥根。
【产地加工】 于 11～12 月叶变黄时挖取地下根部，晒干，或在 40～50℃水中浸泡 5 分钟，除去泥土，整形使其柔软，阴干。
【性状】 (1)药材 短小的主根常有众多的支根，呈纺锤形，长 10～25cm。外表面暗褐色至红褐色，有纵皱及横向突起的细根痕。根头部有少许叶柄残基。折断面暗褐色至黄褐色，略平坦。具特异香气，味微甜而后麻辣(图 189－4)。
以肥大、柔软、香气浓者为佳。
(2)饮片 ①粉末 呈淡灰褐色。具特异香气，味微甜而后辛辣。
②碎块或切片 呈不规则小块状或段状，最长段 1.5cm 左右。小块断面呈黄白或黄棕色。横断面外侧黄白色，内侧有 1 棕色环，中心浅黄色。大多数带有外皮，具深浅不等的皱褶，棕褐色或褐色，可见突起的横向皮孔。质硬或韧，折断后皮部可见棕色小点。气辛香，味微甜(图 189－5)。

188

189—1



189—2

189—3

189—5

189—4

190. 当　药

Dangyao　　Herba Swertiae

トウヤく　　Herb of False Japanese Swertia

【来源】 本品为龙胆科植物当药 *Swertia japonica* Makino 的干燥带花全草。

【产地加工】 于花盛开期，采集全草，除去泥沙，晒干。

【性状】 (1)药材　具有花、对生的叶、茎和短小的木质根，植株长达 20cm。茎方柱形，直径约 0.2cm，常有分枝。叶与茎均呈暗绿色、暗紫色或黄褐色；花白色或类白色；根黄褐色。水浸后叶伸展呈线形或狭披针形，长 1～4cm，宽 0.1～0.5cm，全缘，无柄。花冠 5 深裂，裂片狭长椭圆形，扩大镜下可见内侧基部有 2 枚椭圆形的蜜腺并立，周边呈松毛状；雄蕊 5 枚，生于花冠筒上，与花冠裂片相间排列。花梗明显。微有香气，味极苦，口嚼有残渣(图 190)。

以植株高 20cm 左右、具花蕾、叶多、味极苦者为佳。

(2)饮片　粉末　呈灰黄绿色至黄褐色。微有香气，味极苦，口嚼有残渣。

191. 光慈菇

Guangcigu　　Bulbus Tulipae

コウジコ　　Bulb of Edible Tulip

【来源】 本品为百合科植物老鸦瓣 *Tulipa edulis* (Miq.) Baker 的干燥鳞茎。

【产地加工】 于春、夏 2 季采挖，除去须根，擦去外皮，洗净，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，晒干，用时打碎。

【性状】 药材　呈卵状圆锥形，顶端渐尖，基部圆平，中央微凹入，高 1～2cm，直径为 0.5～1.0cm。表面类白色，光滑，一侧有纵沟。质硬而脆，断面呈白色，富粉性，内有 1 个圆锥形心芽。气微，味淡(图 191)。

【功效】 味辛、甘，性寒。有小毒。消肿散结，清热解毒。治痈疽疔肿、瘰疬结核、蛇虫咬伤等症。

190

191

192. 肉苁蓉

Roucongrong　　Herba Cistanches
ニクジュヨウ　　Desertliving Cistanche

【来源】 本品为列当科植物肉苁蓉 *Cistanche deserticola* Y. C. Ma 的干燥带鳞叶的肉质茎。

【产地加工】 在春季苗未出土或刚出土时采挖，除去花序，切段，晒干。

【炮制】 (1)肉苁蓉　取原药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥，称“肉苁蓉”。

(2)酒苁蓉　取肉苁蓉片，加入黄酒拌匀，置炖罐内，密闭，隔水加热炖透，或置于适宜容器内，蒸透，至酒完全吸尽，表面黑色时取出，干燥，称“酒苁蓉”。

【性状】 (1)药材　呈扁圆柱形，稍弯曲，长 3～25cm，直径 2～8cm。表面棕褐色或灰棕色，密被覆瓦状排列的肉质鳞叶，通常鳞片先端已断或鳞片脱落而留有横长的短线状鳞叶痕。体重，质硬，微有柔性，不易折断。断面棕褐色或暗棕色，有淡棕色点状维管束，排列成波状环纹，有时中空。气微，味甜、微苦(图 192－1)。

以色黑质糯、密被鳞片、条粗壮、体扁圆者为佳。

(2)饮片　①肉苁蓉片　呈不规则的类圆形厚片，直径 2～8cm。切面棕褐色或灰棕色，中间有淡棕色点状维管束，排列成波状环纹。周边呈灰黑色鳞片状。质坚脆。气微，味甜、微苦(图 192－2、图 192－3)。

②酒苁蓉　形如肉苁蓉片，切面黑色或黑棕色，质柔润。味微甜，微有酒气(图 192－4)。

【功效】 味甘、咸，性温。补肾阳，益精血，润肠通便。

193. 肉豆蔻

Roudoukou　　Semen Myristicae
ニクズク　　Nutmeg

【来源】 本品为肉豆蔻科植物肉豆蔻 *Myristica fragrans* Houtt 的干燥种仁。

【产地加工】 每年 4～6 月份及 11～12 月份采收。早晨采摘成熟果实，将肉质果实纵剖开，把包围种子的红色网状假种皮剥下，敲脱壳状的种皮，取种仁用石灰乳浸后，文火焙干。或不浸石灰乳直接烘干。

【炮制】 (1)肉豆蔻　取原药材，除去杂质，洗净，干燥。

(2)煨肉豆蔻　取净肉豆蔻，用面粉加适量水拌匀，逐个包裹或用清水将肉豆蔻表面湿润后，如水浸丸法包裹面粉 3～4 层，稍晾，倒入已炒热的滑石粉或砂子中，拌炒至面皮呈焦黄色时，取出，剥去面皮，放凉，称“煨肉豆蔻”。

【性状】 (1)药材　呈卵圆形或椭圆形，长 2～3cm，直径 1.5～2.5cm。表面灰棕色或灰黄色，有时外被白色石灰粉末。全体有浅色纵行沟纹及不规则网状沟纹。种脐位于宽端，呈浅色圆形突起，狭端有暗色凹陷，为原合点部位。种脊呈纵沟状，连接两端。质坚硬，难破碎，断面不平坦，纵剖面可见表层暗棕色的外胚乳向内伸入，与类白色的内胚乳交错，形成类似槟榔样花纹，宽端可见干燥皱缩的胚，富油性。气香浓烈，味辛(图 193－1)。

以个大、体实、表面光滑、气芳香者为佳。

(2)饮片　煨肉豆蔻　形如肉豆蔻，表面棕黄色或淡棕色，显油润。质硬而脆。香气浓郁，味辛微(图 193－2)。

【功效】 味辛，性温。温中行气，涩肠止泻，消食止呕。煨肉豆蔻长于涩肠止泻。

192—1

192—2

192—4

193—1



193—2

194. 竹节参

Zhujieshen **Rhizoma Panacis Japonici**
チクセツニンジン **Japanese Ginseng**

【来源】 本品为五加科植物竹节参 *Panax japonicus* C. A. Meyer 的干燥根茎。

【产地加工】 秋季采挖，除去须根，洗净，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。

【性状】 (1)药材 根茎呈竹鞭状，扁圆柱形，稍弯曲，长 5～22cm，直径 0.8～2.5cm，节密集，节间长 0.8～2.0cm，每节上方有一圆形深陷的茎痕。外表面灰棕色或黄棕色，粗糙，有致密的皱纹及明显的节。质硬而脆，折断面黄白色至淡黄色，可见淡黄色点状维管束排列成圈。气微香，味苦、微甜(图 194－1 生长状态、图 194－2)。

(2)饮片 竹节参片，多为扁圆形的厚片，直径 0.8～2.5cm。外表面灰棕色或黄棕色，粗糙，节明显，切面黄白色至淡黄棕色，可见点状维管束排列成圈。质硬而脆。气微，味苦、微甜。

【功效】 味甘、微苦，性寒。活血去瘀，滋补强壮。

附：日本竹节人参 *Rhizoma Panacis Japonici*

【来源】 本品为五加科植物竹节人参 *Panax japonicus* C. A. Meyer 的干燥根茎。

【产地加工】 9～11 月份挖取地下部分，除去须根，洗净泥土，晒干。

【性状】 呈弯曲的圆柱形结节状，少有分枝或呈不规则结节状，长 2～20cm，直径 0.3～2cm。表面棕黄色、浅棕黄色或浅黑褐色，有明显的纵皱纹及凹窝状茎痕，茎痕周边有均匀分布的小孔，节明显，双环状，节间长 1～2cm，有时可见残留的尾状支根或瘤状突起的支根痕。多数呈皱缩状，少数略饱满，带有较大的块根，色较深。质硬脆，易折断。折断面黄白色或浅灰褐色，可见外侧有黄色环纹，较细者中心呈灰白色，角质样，略显颗粒性。折断后可嗅到人参样特异气，味淡、微苦(图 194－3)。

【功效】 健胃，镇咳祛痰。

195. 竹 茹

Zhuru **Caulis Bambusae in Taeniam**
チクジョ **Bamboo Shavings**

【来源】 本品为禾本科植物青秆竹 *Bambusa breviflora* Munro. 大头典竹 *Sinocalamus beecheyanus* (Munro)Mcclure *var. pubescens* P. F. Li 或淡竹 *Phyllostachys nigra* (Lodd.) Munro *var. henonis* (Mitf.) Stapf. ex Rendle 茎的干燥中间层。

【产地加工】 全年均可采制，以当年新竹较好，先刮去外层青皮，再刮取中间层，晒干或低温焙干。

【炮制】 (1)生竹茹 取原药材，除去杂质、硬梗及灰屑，切段或揉成小团。

(2)姜竹茹 取净竹茹，用鲜姜汁(100kg 竹茹，用鲜生姜 25kg)均匀地洒在竹茹上，置炒锅内，炒至微焦，取出摊凉至完全冷却。

【性状】 (1)药材 为不规则的扁薄丝条，卷曲成团，浅绿色或黄绿色，体轻质软富弹性。气微，味淡(图 195－1)。

(2)饮片 ①生竹茹 切短段或揉成小团，其余鉴别特征同药材。

②姜竹茹 焦褐色，有姜辣味。

【功效】 味甘、性寒。清热止呕，化痰。用于胃热呕吐、呃逆、肺热咳嗽、吐血、衄血、崩漏、妊娠恶阻、胎动不安等症。

附：竹茹出口品(图 195－2)。



194—1



194—2

194—3

195—1

195—2

196. 朱 砂

Zhusha **Cinnabaris**

シュシャ **Cinnabar**

【来源】 本品为硫化物类矿物辰砂 *Cinnabaris*，主含硫化汞(HgS)。

【产地加工】 采得后，选择纯净者，用水淘去杂石、泥沙，并用磁铁吸去铁质。

【炮制】 取原药材，除去杂质，用磁铁吸去铁屑，加适量水共研至细粉，再加多量水，搅拌，倾取混悬液。下沉部分再如上法，反复操作多次，除去杂质，合并混悬液，静置后分取沉淀，晾干。忌干研。

【性状】 药材 ①朱砂矿石 呈多个菱面体组成的尖锥状单晶分散于脉石中，或为细粒状浸染在矿化岩石里，有时富集成辰砂细脉或粒块。朱红色，表面或因风化呈暗黑铅色，半透明(裂隙处颜色浅)。条痕红，金刚光泽。质脆，易碎裂成片。硬度 2.0～2.5。相对密度 8.1 左右(图 196－1)。

②朱砂 本品为大小不一的 3 个菱面体厚板状、粒块状或块状集合体，呈颗粒状或块片质状。鲜红色或暗红色，条痕红色至朱红色，解理 3 组完全，硬度 2.0～2.5。具金刚光泽。体重，质脆而酥，易研细，研至很细时易飞扬。气无，味淡(图 196－2)。镜面砂(图 196－3)。豆瓣砂(图 196－4)。

以色鲜红、有光泽、体重、质脆者为佳。《中国药典》(1990 年版)规定，本品含硫化汞(HgS)不得少于 96%。

③水飞朱砂 为红色不规则颗粒状，少部分半透明，多具棱角，边缘不整齐(放大 10×10)，体重。无臭，无味(图 196－5)。

【功效】 味甘，性微寒。有毒。清心镇惊，安神解毒。不宜大量久服。不宜火烘。

197. 朱砂根

Zhushagen **Radix Ardisiae Crenatae**

シュシャコン **Root of Coral Ardisia**

【来源】 本品为紫金牛科植物朱砂根 *Ardisia crenata* Sims 的根。

【产地加工】 于秋、冬 2 季挖取根，洗净泥沙，除去须根等杂质，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，水洗，润软，切片，晒干。

【性状】 (1)药材 根茎短，根圆柱形，数个簇生于根茎上，根长 5～25cm，直径 0.2～1.0cm。表面灰棕色或暗紫褐色，具多数纵皱纹、环状或横向断裂纹。质坚脆，断面皮部厚，易与木部分离，类白色或浅红色，木部占断面 1/2，灰黄色。气微，味微苦、辛(图 197)。

(2)饮片 多为根的横切片，厚约 3mm，表面灰棕色或暗紫褐色，具纵皱，切面皮部与木部的比为 1∶1，木部菊花状花纹明显，与常皮部分离。

【功效】 味苦、辛，性平。清热解毒，消肿止痛，活血散瘀，祛风除湿。用于咽喉肿痛、跌打损伤、风湿痹痛等症。

196—1



196—2

196—3

196—4

196—5

197

198. 伏龙肝

Fulonggan **Terra Flava Usta**

ブクリュウカン **Furnace Soil**

【来源】 本品为硅酸盐类粘土矿物久经柴草熏烧的灶底中心的土块。主要矿物组分为高岭石类粘土 Kaolinite、石英 Quartz、褐铁矿 Plagioclase、斜长石等。

【产地加工】 从年久烧柴草灶中将烧结的土取下，用刀削去焦黑部分及杂质，露出红色坚硬部分，刷净用，又称为“灶心土”。或取黄土，用柴草火反复烧煅至红透，至色变红，坚硬为度，称“原土”。

【炮制】 取灶心土，拣尽杂质，筛选干净用。或用水泡搅匀，澄清，取上清液煎药用。

【性状】 (1)药材 ①灶心土 呈不规则块状，裂块直径约 1cm 大小。全体呈橙黄色，体轻，较坚硬，可砸碎。断面呈颗粒状。有土腥气，略吸舌(图 198－1)。

②原土 为不规则土状块体，红褐、黑褐色，土状光泽。全体致密，局部疏松多孔。或有龟裂纹。硬度小于 3，密度不均一(2.2～2.6)。味淡，有土腥气(图 198－2)。

以块大、色红褐、质细软者为佳。

(2)饮片 煅伏龙肝 形似伏龙肝，多碎成小块，黄棕至灰棕色(图 198－3)。

【功效】 味辛，性温。温中燥湿，止呕止血。

199. 伊贝母

Yibeimu **Bulbus Fritillariae**

イバイモ **Bulb of Siberian Fritillary**

【来源】 本品为百合科植物新疆贝母 *Fritillaria walujewii* Regel 和伊犁贝母 *Fritillaria pallidiflora* Schrenk 的干燥鳞茎。

【产地加工】 在 6～7 月份采挖，晒或烘至上粉后，装入新麻袋内，撞去须根和泥土，再晒至全干。

【炮制】 (1)伊贝母片 取原药材，除去杂质，快洗，润软，切极薄片，干燥。

(2)伊贝母粉 取净药材，研成细粉，过 60 目筛。

【性状】 (1)药材 呈卵圆形、扁圆形或者卵状圆锥形，高 1.0～2.8cm，直径 1.0～2.5cm，大小和形态不整齐，外层鳞片一般大小相近，紧靠。顶端平展，开口或大小悬殊而紧密抱合，顶端稍尖，不开裂，内包小鳞片和茎残基。表面灰黄色，或有深黄色斑点。质脆，断面白色，粉性。气微，味微苦(图 199)。

(2)饮片 ①伊贝母片 为极薄片，切面白色，粉性。

②伊贝母粉 为白色细粉末。气微，味微苦。

【功效】 味苦、甘，性微寒。清热散结，化痰止咳。用于阴虚咳嗽、咯痰带血等症。

198—1

198—2

198—3

199

200. 华山参

Huashanshen **Radix Physochlainae**

カサンジン **Root of Funneled Physochlaina**

【来源】 本品为茄科植物华山参 *Physochlaina infundibularis* Kuang 的干燥根。

【产地加工】 早春出芽或初夏地上部分枯萎时采挖，除去须根，洗净，晒干。

【炮制】 取原药材，洗净，润透，切厚片，晒干。

【性状】 (1)药材 呈长圆锥形或圆柱形，略弯曲，顶端有短的根茎。长 5～20cm，直径 0.5～2.5cm。根头部有横向的细环纹。表面棕褐色或棕色，具明显皱纹及黄白色横长皮孔，上部有密集的环纹；栓皮脱落后呈黄白色。质略硬而脆，折断面不平坦，皮部甚窄，类白色，木部宽广，淡黄色，有细密的放射状纹理。气微，味微苦、稍麻舌(图 200－1)。

以体充实、断面色白者为佳。

(2)饮片 呈圆形或长圆形片，厚 0.2～0.4cm，直径 0.5～2.5cm。切面黄白色，皮部类白色，木部淡黄色，有细密的放射状纹理。周边棕褐色或黄白色，具明显的皱纹，有的具横环纹。质脆，易掰断。气微，味微苦、稍麻舌(图 200－2)。

【功效】 味甘、微苦、涩，性热。有毒。定喘，温中，安神。

201. 延胡索

Yanhusuo **Rhizoma Corydalis**

エンゴサク **Corydalis Rhizome**

【来源】 本品为罂粟科植物延胡索 *Corydalis turtschaninovii* Bess. *f. yanhusuo* Y. H. Chou et C. C. Hsu 的干燥块茎。

【产地加工】 立夏前后，当植株地上部分枯萎时采收，入竹筐中淘洗，擦去外皮，按大小分级(1.2cm)，置沸水中煮，至切面黄色，中心黄白色时捞起，摊开晒干。

【炮制】 (1)延胡索 将原药材除去杂质，分级，洗净，润透，切薄片，干燥，筛去灰屑。

(2)醋延胡索 取捣碎的延胡索或原只净延胡索，用米醋(每 100kg 延胡索，用米醋 20～25kg)拌匀，置锅内，加水与药面平，用文火煮至汁水吸净，取出，放凉略干，切薄片，干燥。已捣碎的延胡索，取出后晾干。

(3)酒延胡索 取延胡索片或碎块，喷淋黄酒 (每 100kg 延胡索，用黄酒 20～25kg)，拌匀闷透，置炒锅中用文火加热，炒干。

【性状】 (1)药材 呈不规则扁圆形、倒圆锥形，直径 0.5～2.0cm。表面灰黄色或黄棕色，有不规则的网状皱缩。上端凹陷，有茎痕，底部脐状，有须根痕。质坚实，破断面黄棕色或金黄色，角质状。气微，味极苦(图 201－1)。

(2)饮片 ①延胡索 多为圆形薄片，或为不规则的碎颗粒，表面黄褐色，具细网纹，切面或断面黄色，角质，具蜡样光泽。气微，味苦(图 201－2)。

②醋延胡索 除略有醋酸气外，与延胡索相同。

③酒延胡索 除略有酒气外，与延胡索相同。

【功效】 味辛、苦，性温。活血，利气，止痛。用于胸胁及脘腹疼痛、闭经、痛经、产后瘀阻、跌打肿痛等症。

200—1

200—2

201—1

201—2

202. 自然铜

Zirantong Pyritum
シゼンドウ Pyrite

【来源】 本品为硫化物类矿物黄铁矿 *Pyritum*，主组分为二硫化铁(FeS_2)。

【产地加工】 采挖后，除去杂质。

【炮制】 (1)自然铜 取原药材，除去杂质，大者捣碎，洗净，干燥。

(2)醋自然铜 取净自然铜置无烟炉火上或适宜容器内，用武火加热煅至暗红色，取出后放入醋中浸淬，如此反复煅淬数次，至黑褐色，表面光泽消失并酥松，取出，晒干(自然铜：醋＝100：30)。

【性状】 (1)药材 多呈立方形晶体或单晶，大小不一，粒径 0.3～2.0cm 左右。表面平坦，青黄色，有金属光泽，酷似黄铜块；有时表面呈棕褐色，无光泽，系因氧化而成褐铁矿。质重坚硬，但易砸碎。断面不平坦，黄白色，有强金属光泽。硬度 6.0～6.5，相对密度 4.9～5.2。条痕绿黑色。烧之有硫黄气。无臭，无味(图 202－1 右)。

以晶体呈方块形、颜色黄亮、不含岩石杂质者为佳。

(2)饮片 煅自然铜 为不规则的碎粒，有明显裂隙，灰黑色、红黑色，无金属光泽，质酥脆，断面褐色，可见银白色亮星，略有醋气(图 202－2 上)。粉末呈绿黑色(图 202－3 上；黄铁矿，中：黄铜矿，下：褐铁矿)。

【功效】 味辛，性平。散瘀止痛，接骨续筋。外用研末调敷。

注：此外，尚有黄铜矿、褐铁矿化黄铁矿自然铜入药者。《中国药典》(1990 年版)以黄铁矿质自然铜为正品。

附：(1)褐铁矿质自然铜 呈立方体状，略呈方块形，粒径 0.5～1.5cm，表面褐黄色、灰褐色或微黄色，土状光泽，质较重而硬，断面中心偶见黄铜色放射状纹理、光泽强(即残留的黄铁矿)。硬度小于小刀(呈褐色处)，条痕褐至黄褐色。燃之几乎无硫黄气(图 202－1 左)。

(2)煅褐铁矿质自然铜 有明显裂隙，色泽变红或黑。质较酥脆，断面呈红或黑色，略有醋气(图 202－2 下)。粉末呈褐黄色(图 202－3 下)。

(3)黄铜矿质自然铜 呈不规则块状，具棱角，铜黄色，具金属光泽，共存矿物呈灰色(方解石或石英)。质较硬脆，可打碎，断面色泽更鲜艳。条痕绿黑色。硬度 3.5～4.0。以 HCl 浸湿后烧时火焰呈蓝绿色(图 202－1 中)。

(4)煅黄铜质自然铜 表面呈绿黑至黑绿色，间有亮星，质酥，微有裂隙，略有醋气(图 202－2 中)。粉末呈绿黑色(图 202－3 中)。

203. 血余炭

Xueyutan Crinis Carbonisatus
ケツヨタン Charred Human Hair

【来源】 本品为人发制成的炭化物。

【产地加工】 取健康人头发，除去杂质，碱水洗去油垢，清水漂净，晒干。

【炮制】 取加工后净头发置煅锅内，上面覆盖一锅，两锅接合处用黄泥封固，上压重物，用文武火煅至贴在锅盖底上的白纸显焦黄色为度，挡住火门，待凉后，取出，折成小块。或取头发用文火炒至半小时，至头发缩成团，浓烟渐淡时为度。

【性状】 药材 呈不规则块状，乌黑光亮，有多数细孔。体轻，质脆。用火烧之有焦发气，味苦。(图 203)。

以乌黑不亮、有细孔、体轻质脆者为佳。《中国药典》(1990 年版)规定：本品酸不溶性灰分，不得超过 10.0%。

【功效】 味苦，性平。止血，化瘀。

202—1

202—2

202—3



203

204. 血散薯

Xuesanshu　　Radix Stephaniae Dielsianae

ケツサンシヨ　　Xuesanshu

【来源】 本品为防己科植物血散薯 *Stephania dielsiana* Y. C. Wu 的块根。

【产地加工】 全年可采挖，除去须根，洗净，切片，晒干。

【炮制】 取原药材，拣去杂质，切片或打粗粉。

【性状】 (1)药材　多为横切块片，直径 3～7cm，厚 2～5cm。表面深棕色，具突起皮孔，切面边缘略为卷曲，黄白色，点状维管束排成 3～4 个同心环纹。气微，味苦。

(2)饮片　切片形同药材。颗粒直径约 3mm，黄白色，粉性足。气微，味苦(图 204)。

【功效】 味苦，性寒。清热解毒，散瘀止痛。用于胃痛、神经痛、牙痛、胃肠炎、咽喉炎、上呼吸道感染、跌打损伤等症。

205. 血　竭

Xuejie　　Resina Draconis

ケッケツ　　Dragon's Blood

【来源】 本品为棕榈科植物麒麟竭 *Daemonorops draco* Bl. 果实中渗出的树脂。

【产地加工】 采集成熟的果实，充分晒干，加贝壳同入笼中强力振摇，使松脆的树脂块脱落，筛去果实鳞片等杂质，用布包起树脂，入热水中使软化成团，取出放冷。

【炮制】 取原药材，除去灰尘，敲成小块，或研成细粉。

【性状】 (1)药材　为类圆形块状，直径 6～15cm，厚 5～10cm。表面暗红色或黑红色，有光泽，附有因摩擦而成的红粉。底部平圆，中央贴有印刷或用金粉打印的商标牌号，顶端有包扎成型时所成的纵褶纹。体坚质脆，破碎面黑红色，研为粉末呈血红色。无臭，味淡(图 205－1)。

以外色黑似铁、研粉红如血、火燃呛鼻者为佳。

(2)饮片　呈不规则碎块状或细粉，碎块呈赤褐色或紫褐色，有光泽，质硬而脆。粉末为鲜艳的深红色。无臭，味淡，嚼之有砂样感(图 205－2)。

【功效】 味甘、咸，性平。散瘀生新，活血止痛，敛疮生肌，止血。

204

205—1



205—2

206. 全叶青兰

Quanyeqinglan **Herba Dracocephali Integrifolii**

ゼンヨウセイラン **Dragonhead Herb**

【来源】 本品为唇形科植物全叶青兰 *Dracocephalum integribolium* Bge. 的干燥全草。

【产地加工】 在夏季，割取地上部分，除去杂质，晒干。

【炮制】 取原药材，拣去枯叶等杂质，切长为 1.5cm 的片，筛去灰屑，晒干。

【性状】 (1)药材 全草长 20～60cm。茎方柱形，直径 2～3mm，表面黄棕色或红棕色，质脆，易折断，断面中空。叶对生，展平后，叶片呈狭披针形，长 1～3cm，宽 1～4mm，叶缘反卷，上表面绿色，下表面淡绿色，有棕色腺点。轮伞花序顶生，花小，花萼 5 齿裂，花冠暗紫红色，二唇形。气香，味微苦。

(2)饮片 茎方柱形，表面黄棕色至红棕色，有纵棱条；切面中空，略呈方形；叶破碎，全缘；花冠暗紫红色，二唇形。气香，味微苦(图 206)。

【功效】 味苦，性温。祛痰，止咳，平喘。用于慢性气管炎、咳嗽、痰喘等症。

207. 全 蝎

Quanxie **Scorpio**

ゼンカツ **Scorpion**

【来源】 本品为钳蝎科动物东亚钳蝎 *Buthus martensii* Karsch. 的干燥体。产于河南者习称“南全蝎”；产于山东者习称“东全蝎”。

【产地加工】 春末至秋初捕捉，入清水中待其吐出泥土，取出置沸水(淡全蝎)或沸盐水中(咸全蝎)，煮至身挺腹硬，脊背抽沟，捞出，置通风处阴干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净或漂洗，干燥。

【性状】 本品头胸及前腹部呈扁平长椭圆形，后腹部呈尾状，皱缩弯曲，完整者体长约 6cm。头胸部呈绿褐色或黑棕色，前端可见 1 对较短小的螯肢及 1 对较大的钳状脚须，形似蟹螯，背面覆有梯形背甲；腹面有足 4 对，均为 7 节，末端各具 2 爪钩；前腹部由 7 节组成，背甲上有 5 条脊线。背面绿褐色，腹面棕黄色；后腹狭，具环节，棕黄色，节上均具纵沟，末节有锐钩状毒刺向上弯曲。前腹部折断后，内有黑色或棕黄色物质，后腹部折断中空。气微腥，味咸。淡全蝎背(图 207－1)，淡全蝎腹(图 207－2)，咸全蝎(图 207－3)。

以完整、色黄褐、盐霜少者为佳。

【功效】 味辛，性平。有毒。息风止痉，攻毒散结，通络止痛。

206

207—1

207—2

207—3

208. 合欢皮

Hehuanpi Cortex Albizziae

ゴウカンヒ Bark of Silktree Albizzia

【来源】 本品为豆科植物合欢 *Albizzia julibrissin* Durazz. 的干燥树皮。

【产地加工】 于夏、秋2季，剥取茎或枝的皮，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，略浸，捞起后淋水润软，切薄片，晒干，筛去灰屑。

【性状】 (1)药材 浅槽状或卷筒状，长40～80cm，厚1～3mm。外表面灰绿色或灰棕色，有纵皱，皮孔横长；内表面淡黄棕色，有细纵皱纹。质硬而脆，易折断，断面纤维性，裂片状。气微，味微涩，稍刺舌，喉头有不适感。

(2)饮片 略弯曲的条状横切片，外表面粗糙，皮孔圆点状或椭圆状；切面平坦，放大镜下可见纤维丝众多。余同药材(图208)。

【功效】 味甘，性平。安神，活血，消痈。用于失眠、肺胶疡、痈肿等症。

附：山合欢皮 为同科植物山合欢 *Albizzia ralrora* (Roxb.) Prain 的树皮，其区别点为：饮片表面极粗糙，有纵向裂隙，木栓层厚，易剥落，皮孔隐约可见。切面平坦。气微，味淡，稍有刺舌感。

209. 问 荆

Wenjing Herba Equiseti Arvensis

スギナ Herb of Bottle Brush

【来源】 本品为木贼科植物问荆 *Equisetum arvense* L. 的干燥全草。

【产地加工】 5～7月间割取全草，阴干。

【炮制】 取原药材，去净杂质，洗净，润透，切段，干燥，称“问荆段”。

【性状】 (1)药材 茎呈圆柱形，长15～60cm，直径0.1～0.5cm。表面浅绿色，有纵纹，节间长，每节上有退化的鳞片叶，呈鞘状，先端有齿裂，硬膜质。小枝轮生，梢部渐细，基部有时带有部分黑褐色的根。气微，味淡(图209－1)。

以茎粗、色绿、不带根者为佳。

(2)饮片 问荆段 为不规则的小段，长约1cm，表面淡绿色，有纵纹，节上退化的鳞片叶呈鞘状。切面绿色，中空。气微，味淡(图209－2)。

【功效】 味苦，性凉。清热，凉血，止咳，利尿。

208

209—1

209—2

210. 安息香

Anxixiang Benzoinum

アンソクコウ Benzoin

【来源】 本品为安息香科植物白花树 *Styrax tonkinensis* (Pierre) Craib et Hart. 和安息香树 *Styrax benzoin* Dryard 的干燥香树脂。主产于泰国、越南、老挝、印度尼西亚等地，前者习称“泰国安息香”，后者习称“苏门答腊安息香”。我国广西省、广东省和云南省亦产。

【产地加工】 树干经自然损伤或于夏、秋 2 季割裂树干，收集流出的树脂，阴干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，捣碎。

【性状】 (1)药材 ①泰国安息香 呈大小不等的块、片状，大者长达 5cm，厚 1cm。表面黄白色至浅黄棕色，不透明，部分外表常带有透明状树脂层。质脆，易碎，断气白色，平坦。气芳香，味淡(图 210－1)。

②苏门答腊安息香 为大小不等的颗粒结成的团块，直径 3～6cm。表面粗糙不平坦，多为红棕色，团块中嵌有乳白色颗粒。质脆，易碎，断面平坦，白色。气芳香浓烈，味淡(图 210－2)。

③国产安息香 性状与泰国安息香近似。

均以表面黄棕色、断面乳白色、具蜡样光泽、质脆易碎、香气浓、嚼之有砂粒感者为佳。

(2)饮片 为不规则形状的扁平小块，表面黄白色、浅黄棕色、红棕色或橙黄色，具蜡样光泽。质脆易碎，破碎面平坦，白色。气芳香，味微辛，嚼之有砂粒感(图 210 3)。

【功效】 味辛、苦，性平。开窍醒神，行气，活血，止痛。

211. 关木通

Guanmutong Caulis Aristolochiae Manshuriensis

カンモクツウ Stem of Manchurian Dutchmanspipe

【来源】 本品为马兜铃科植物东北马兜铃 *Aristolochia manshuriensis* Kom. 的干燥藤茎。

【产地加工】 于秋、冬 2 季采收，除去粗皮，晒干。

【炮制】 取原药材，洗净，略浸，润透，切薄片，干燥，通称“关木通片”。

【性状】 (1)药材 呈长圆柱形，稍扭曲，长 1～2m，直径 1～6cm。表面灰黄色，有浅纵沟及棕褐色残余粗皮的斑点。节部稍膨大，有 1 枝痕。体轻，质硬，不易折断，断面黄色或淡黄色，皮部薄，木部宽广，有多层整齐环状排列的导管，射线放射状，髓部不明显。摩擦残余粗皮，有樟脑样臭。气微，味苦(图 211—1)。

以断面鲜黄色者为佳；断面颜色变黑者不可供药用。

(2)饮片 关木通片 为圆形薄片，表面黄色或黄白色，木部宽广，有多层排列成环状的小孔及放射性纹理，髓部不明显，皮部薄。周边灰黄色或淡棕黄色，粗糙。体轻，质硬。气微，味苦(图 211—2)。

【功效】 味苦，性寒。清心火，利小便，通经下乳。

210—1

210—3

210—2



211—2

211—1

212. 羊 肝

Yanggan **Hepar Caprae seu Ovis**
ヨウカン **Sheep Liver**

【来源】 本品为牛科动物山羊 *Capra hircus* Linnaeus、绵羊 *Ovis aries* Linnaeus 的肝脏。
【产地加工】 全年均可采收。杀羊时，取肝脏，去掉胆囊，放凉水中浸泡 1 小时，取出切片，晒干或烘干，或鲜用。
【性状】 药材 干燥品呈片状，大小不一，表面皱缩不平，紫黑色，具光泽。质脆，易折断，断面紫黑，无光泽。气腥(图 212)。
【功效】 味甘、苦，性凉。滋补强壮，明目。

213. 农吉利

Nongjili **Herba Crotalariae**
ノウキチリ **Herb of Purpleflower Crotalaria**

【来源】 本品为豆科植物野百合 *Crotalaria sessiliflora* L. 的干燥全草。
【产地加工】 于夏、秋 2 季采收地上部分，除去杂质，晒干或鲜用。
【炮制】 取原药材，拣去杂质，快洗，捞起，润软后切 1.5cm 左右的长片，晒干，筛去灰屑。
【性状】 (1)药材 全草长 20～100cm，全体密被茸毛。茎圆柱形，有分枝，表面灰绿色，质脆，断面纤维性。单叶互生，叶片多皱缩，完整者线形或线状披针形，暗绿色，全缘。荚果，长圆柱形，花萼宿存，5 裂，被棕黄色长柔毛。种子细小，肾形，成熟者棕色而有光泽。气无，味淡。
(2)饮片 为茎、叶切碎的混合物。茎圆柱形，表面灰绿色，被白色茸毛，切面可见一环纹，中心髓部中空。叶片全缘，略皱缩，被白色茸毛。荚果短，圆柱形。种子小，肾形，黄棕色或棕色，有光泽。气微，味淡(图 213)。
【功效】 味淡，性平。解毒，抗癌。用于疮疖、癌肿等病症。

214. 阳起石

Yangqishi **Actinolitum**
ヨウキセキ **Actinolite**

【来源】 本品为硅酸盐类矿物阳起石 Actinolite，含硅酸钙镁[$Ca_2(Mg,Fe)_5(Si_4O_{11})_2(OH)_2$]。
【产地加工】 采挖后，除去泥沙及杂石。
【炮制】 (1)阳起石 将原药材除去杂质，洗净，干燥，碾碎。
(2)煅阳起石 取净阳起石小块，置无烟炉火上或置适宜的容器中，用武火加热，煅至红透，取出，放冷，碾碎。
(3)酒阳起石 取净阳起石小块，置无烟炉火上或置适宜的容器内，用武火加热，煅至红透后，倒入黄酒中浸淬，取出晾干，碾碎(阳起石：黄酒＝100：20)。
【性状】 (1)药材 呈大小不一的单斜柱状、针柱扁块状，常成纤维状或呈致密的柱状、粒状、叶片状、刀片状等的集合体。灰白色、暗灰色或暗绿、浅绿色，多夹有浅黄棕色条纹，具丝绢样光泽。体重而较坚硬，可打碎，断面纤维更明显，可纵向散开，呈丝状纤维，稍有光滑腻指感，易碾成粉。硬度 6，相对密度 3.0～3.4，条痕白色或浅绿色。解理纹清晰，味淡(图 214—1)。
本品少量置火焰中烧之变为红色而不熔，取出离火后颜色略发黄。以针刺状、色灰白、有光泽、纤维纵裂、质松软者为佳。
(2)饮片 ①煅阳起石 色青灰，纤维明显分离，质较酥，用手可捻碎，纤维有光滑感，无光泽。气、味皆无(图 214—2)。
②酒阳起石 为黄灰色粉末，质松，略有酒气(图 214—3)。
【功效】 味咸，性温。温肾，壮阳。

212

213

214—1



214—2

214—3

215. 阴起石

Yinqishi Actinolitum Brevifibrum

インキセキ Actinolite Brevifibre

【来源】 本品为硅酸盐类矿物滑石片岩 *Actinolitum brevifibrum*、绿泥石阳起石片岩、滑石—水镁石片岩等多种矿物集合体。

【产地加工】 挖出后，除去杂石及表面泥土。

【炮制】 (1)阴起石 取原药材，除去杂质，碾碎。

(2)酒阴起石 取净阴起石块，置适宜容器中，用无烟武火加热，煅至红透，取出，立即倒入黄酒中淬酥，晾干，碾碎(阴起石：黄酒＝100：20)。

【性状】 (1)药材 ①滑石片岩质阴起石 不规则碎块，呈片状、鳞片状，银灰色或白色、灰绿、黑绿、稍带绿色相间，具丝绢状光泽，表面光滑而不平坦，带有水纹纹理，酷似鱼鳞状。质软而酥松，易碎，捻之成薄鳞片状，或短纤维状，硬度低，触手有滑腻感。气微，味淡(图 215—1 上)。

②滑石—水镁石片岩 不规则块状，白至淡绿、黄绿等色或有红褐等深色斑纹。有珍珠或丝绢状、蜡状光泽。质较硬，性脆，易打碎，断面显层，碎块仍呈条状。解理完全片裂。整体有成束的纤维针状。手搓成针状闪光的结晶粉末。滑润发痒感。气微，有湿土味(图 215—1 下、图 215—2 粉末)。

以色银灰、有光泽、断面层纹明显、捻之成薄鳞片状者为佳。。

(2)饮片 酒阴起石 呈灰色粉末。

【功效】 味咸，性温。补气，祛寒。

216. 防 己

Fangji Radix Stephaniae Tetrandrae

ボウキ Root of Fourstamen Stephania

【来源】 本品为防己科植物粉防己 *Stephania tetrandra* S. Moore 的干燥根。

【产地加工】 在秋、冬、春 3 季均可采挖，洗净泥土，晒半干时截成 6～10cm 的段块，有的还可以纵剖为 2 瓣，再晒干或烘干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，淋水润透，切 2～3mm 厚的片，干燥。

【性状】 (1)药材 呈不规则圆柱形、半圆柱形块片，弯曲，结节状。刮去栓皮者表面黄白色，弯曲深陷处残留灰褐色栓皮。体坚重，断面平坦，黄白色，富粉性，具菊花心。气微，味苦(图 216—1)。

(2)饮片 为圆形、半圆形或不规则形厚片，表面黄白色，切面形成层环纹明显，皮部薄，木部导管群呈放射状排列，粉性(图 216—2)。

【功效】 味苦，性寒。利水消肿，祛风止痛。用于水肿脚气、小便不利、湿疹疮毒、风湿痹痛、高血压等症。

附：日本防己 *Caulis et Rhizoma Sinomenii*

【来源】 本品为防己科植物青藤 *Sinomenium acutum* Rehder et Wilson 的干燥藤茎或根茎。

【性状】 药材 为圆形或椭圆形切片，厚 0.2～0.4cm，直径 1.0～4.5cm。切面的皮部呈淡褐色或暗褐色，木质部灰褐色的导管与暗褐色的射线交互呈放射状排列。侧面暗灰色，有纵皱及小突起。气微，味苦(图 216—3)。

以横断面菊花纹理暗褐色、味苦者为佳。

215—2

215—1



216—1



216—3



216—2

217. 防　风

Fangfeng　　Radix Saposhnikoviae

ボウフウ　　Root of Divaricate Saposhnikovia

【来源】 本品为伞形科植物防风 *Saposhnikovia divaricata* (Turcz.) Schischk. 的干燥根。

【产地加工】 于春、秋2季采挖未抽花茎植株的根，除去须根及泥沙，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，切厚片，干燥，通称“防风片”。

【性状】 (1)药材　呈长圆锥形或长圆柱形，下部渐细，有的略弯曲，长15～30cm，直径0.5～2.0cm。表面灰棕色，粗糙，有纵皱纹、多数横长皮孔及点状突起的细根痕。根头部有明显密集的环纹，有的环纹上残存棕褐色毛状叶基。体轻，质松，易折断，断面不平坦，皮部浅棕色，有裂隙，木部浅黄色。气特异，味微甜(图217－1)。

以条粗壮、断面皮部色浅棕、木部色浅黄者为佳。

(2)饮片　防风片　为圆形或长圆形的厚片，表面黄白色或浅黄色，木部圆形，有的可见小形髓部，形成层环色深，皮部棕色，有多数放射状裂隙及众多细小油点。质松软。气芳香特异，味微甜(图217－2)。

【功效】 味辛、甘，性温。解表，散风胜湿。

附：防风节(出口品)

呈大小不等的圆形或长圆形片，直径0.4～2.2cm，厚1.5～2.0mm。表面外层棕色或浅棕色，内层黄色或黄白色，中心色浅(白色髓)，有的可见棕色环，具弯曲不直的裂隙，外层裂隙较大，内层裂隙较小。少数中心部枯朽并形成空洞。外皮较粗糙，灰黑色或灰棕色。质较软，易折断，松泡，折断时易呈片状。气微香，味淡(图217－3)。

出口防风片(图217－4斜片、图217－5段)。

日本滨防风　*Radix et Rhizoma Glehniae*　ハマボウフウ

【来源】 本品为伞形科植物珊瑚菜 *Glehnia littoralis* Fr. Schmidt ex Miq. 的干燥根及根茎。

【产地加工】 挖取生长2年以上植株的根，洗净，置通风处阴干。或晒1日后，阴干。

【性状】 (1)药材　呈圆柱形或细长圆柱形，长10～20cm，直径0.5～1.5cm。表面淡黄褐色或红褐色。根茎通常较短，具细密的环节，根具纵皱及多数暗红褐色瘤状小突起或横长的隆起。质脆，极易折断。横断面白色，粉性，放大镜下可见褐色小点状油管散在。气微香，味微甜(图217－6)。

以新鲜、质润者为佳。

(2)饮片　呈不规则的碎块状(图217－7)。

【功效】 止渴，发汗，解热，镇痛，祛痰止咳。

217—1

217—2

217—3

217—4

217—5

217—7

217—6

218. 红大戟

Hongdaji Radix Knoxiae

コウダイゲキ Knoxia Root

【来源】 本品为茜草科植物红大戟 *Knoxia valerianoides* Thorel et Pitard. 的干燥块根。

【产地加工】 于春、秋2季采挖，除去须根和残茎，洗净，晒干，或略用沸水烫后晒干。

【炮制】 (1)红大戟片 取原药材，除去须根、残茎等杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。

(2)醋红大戟 取净红大戟置锅内，加米醋(每100kg红大戟，用米醋20～25kg)和适量水(与药平)，浸润1～2小时后，用文火煮至药液吸尽，取出，晾至6～7成干时，切厚片，干燥。

【性状】 (1)药材 呈纺锤形或长圆柱形，不分枝而扭曲，长3～10cm，直径0.5～1.2cm。表面红褐色至红棕色，粗糙，具纵皱纹，质坚实而脆，易折断。断面皮部红褐色，木部棕黄色。用水湿之显粘性。气微，味辣刺喉。

(2)饮片 ①红大戟片 为不规则长圆形成圆形厚片，表面具纵皱和皮孔，切面皮部红褐色，木部棕黄色，导管孔细小，不易察见(图218)。

②醋红大戟 形状似红大戟片，而色泽较深，微有醋香气。

【功效】 味苦，性寒。有小毒。泻水逐饮，攻毒消肿，散结。用于胸腹积水、二便不利、痈肿疮毒、瘰疬痰核等症。

219. 红旱莲

Honghanlian Herba Hyperici

コウカンレン Herb of Giant st. John's Wort

【来源】 本品为藤黄科植物黄海棠 *Hypericum ascyron* L. 的干燥全草。

【产地加工】 7～8月果实成熟时，割取地上部分，用热水泡过，在阳光下晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切段，干燥，称"红旱莲段"。

【性状】 (1)药材 干燥全草，叶通常脱落，茎红棕色，中空，节处有叶痕，顶端具果实3～5个。果实圆锥形，长约1.5cm，径约0.8cm，外表红棕色，顶端5瓣裂，裂片先端细尖，坚硬，内面灰白色，中轴处着生多数种子。种子红棕色，圆柱形，细小。气微香，味微苦、涩(图219－1)。

以去根、有叶、茎红棕色、种粒饱满者为佳。

(2)饮片 红旱莲段 呈不规则的小段，茎、叶、果实混合。茎4棱形，中空，红棕色，节处有叶痕。叶无柄，长圆形或倒状披针形。果实圆锥形，长约1.5cm，直径约0.8cm，外表红棕色，顶端5瓣裂，质硬。种子多数，圆柱形，红棕色。气微香，味微苦、涩(图219－2)。

218

219—2

219—1

220. 红药子

Hongyaozi　　Radix Polygoni seu Pteroxygoni

コウヤクシ　　Root of Hairyvein Knotweed

【来源】 本品为蓼科植物毛脉蓼 *Polygonum cillinerve* (Nakai) Ohwi、翼蓼 *Pteroxygonum giraidii* Drammer et Diels. 的干燥块根。

【产地加工】 于春、秋 2 季采挖，除去茎叶及须根，洗净，晒干，块根大者，切块片，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片，晒干。

【性状】 (1)药材　①毛脉蓼　呈不规则块状或略呈圆柱形，长 8～20cm，直径 3～7cm。表面棕黄色或棕褐色，有残存须根或须根痕，根头部有多数茎基呈疙瘩状。质极坚硬，难折断。剖面深黄色或黄褐色，粗糙，纤维状木质部浅黄色呈环状，近髓部有分散的木质束。气微，味苦(图 220－1)。

以块大、质坚、表面棕黄色、断面深黄色者为佳。

②翼蓼　略呈圆柱形，长约 10cm，直径 2～8cm。根头部留有突起的茎基或支根，凹凸不平。表面棕红色、棕色至棕黑色，光滑或皱缩。有的已切成块片，断面浅红褐色，粉性，有隐约可见的黄棕色环纹。质坚硬，难折断。气微，味苦。

以块大质坚、表面棕红色、断面红褐色、粉性大者为佳。

(2)饮片　呈类圆形或不规则形块片，厚 0.5～1.3(～2.0)cm，直径 3～8cm，切面红棕色或浅棕红色，维管束密集呈朱砂点状或为凸出表面的放射纹，边缘突出。周边凹凸不平，粗糙，棕黄色、棕红色至棕色，栓皮脱落处显红棕色或浅棕红色。质硬，难掰断，断面浅红色，粉性。气微，味苦、微涩(图 220－2)。

【功效】 味苦、微涩，性凉。清热解毒，凉血止血。

221. 红　粉

Hongfen　　Hydrargyri Oxydum Rubrum

コウフン　　Red Oxide of Mercury

【来源】 本品为水银、硝酸等为原料炼制的红氧化汞(HgO)。

【产地加工】 用水银 500g，硝酸 650～700g 为原料。将硝酸放入耐酸容器内，加入水银，静止使其反应至不冒棕红色烟后，倒入不锈钢盘内。砂浴加热(温度控制在 120℃以内)，使其分解，约 1～2 小时即得。

【炮制】 用时研成细粉，过 100 目筛。

【性状】 药材　为橙红色片状或粉末状结晶，片状的一面光滑略具光泽，另一面较粗糙，呈蜂窝状，块片厚 1～2mm。粉末橙色。质重而脆。无臭，遇光颜色逐渐变深(图 221)。

以色红、块片不碎、有光泽者为佳。

《中国药典》(1990 年版)规定：本品含 Hg 不得少于 99.0%。

【功效】 味辛，性热。有大毒。拔毒，除脓，去腐，生肌。本品去毒，只可外用，不可内服(外用亦不可大量久用)。

220—1

220—2

221

222. 红娘子

Hongniangzi Huechys

コウジョウシ Huechys Sanguinea

【来源】 本品为蝉科昆虫红娘子 *Huechys sanguinea* De Geer 的干燥全虫。

【产地加工】 夏季捕捉，早晨露水未干时，带好手套及口罩，进行捕捉，捕后置沸水中烫死或置纱笼内蒸死，取出，干燥。

【炮制】 (1)红娘子 取原药材，除去头、足、翅，称“红娘子”。

(2)米炒红娘子 取净红娘子与米置锅内，文火加热，拌炒至米呈老黄色，取出，筛去米粒，摊晾(每 100kg 红娘子，用米 20kg)，称“米炒红娘子”。

【性状】 (1)药材 虫体呈长圆形，尾部较狭，似蝉而形较小，长 1.5cm～2.5cm，宽 0.5～0.7cm。头黑，嘴红，复眼大而突出，颈部棕黑色，两肩红色，背部有 2 对黑棕色的膜质翅，内翅较薄而透明，均有明显的细纹。质脆易碎，胸部棕黑色，有足 3 对，商品多已脱落。腹部红色，具 8 个环节，尾部尖，质松而轻，剖开后可见体内呈淡黄色。气微(图 222－1)。

以身干、翅黑、腹红、色鲜艳、完整不碎、新鲜者为佳。

(2)饮片 ①生红娘子 为除去头、足、翅的干燥体，可见除去头、足、翅的残痕，其余性状同原药材(图 222－2)。

②米炒红娘子 形如红娘子，表面呈老黄色(图 222－3)。

【功效】 味苦、辛，性平。有毒。攻毒，通瘀，破积。

223. 红管药

Hongguanyao Herba Asteris Ageratoidis

コウカンヤク Herb of Threevein Aster

【来源】 本品为菊科植物三脉紫菀 *Aster ageratoides* Turcz. 的干燥全草。

【产地加工】 于夏、秋 2 季，茎、叶茂盛，花开放时采收全株，洗净泥土，鲜用或晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切段，晒干。

【性状】 (1)药材 根茎横生，须根多数。茎呈圆柱形，直径 0.1～0.4cm，下部茎是暗紫色，上部多分枝，呈暗绿色；质脆，易折断，髓部黄白色。叶互生，叶片皱缩或破碎，完整叶长椭圆状披针形，长 2～12cm，宽 2～5cm，灰绿色，边缘具疏锯齿，具明显离基 3 出脉。头状花序顶生，舌状花白色、青紫色或淡红色，管状花黄色。瘦果椭圆形，冠毛污白色或褐色。气微香，味微苦。鲜品(图 223－1)，干品(图 223－2)。

(2)饮片 红管药片 为段片，根、茎、叶、花、果混合。根茎横生，须根细小。茎圆柱形，下部呈暗紫色，上部暗绿色。叶皱缩，灰绿色，完整叶长椭圆状披针形，离基 3 出脉明显。头状花序顶生，瘦果椭圆形。气微香，味微苦。

【功效】 味微苦、辛，性微温。镇咳祛痰。

222—1

222—2

222—3

223—1

223—2

224. 红瘰疣螈

Hongleiyouyuan Tylototriton Verrucosus

コウライユウゲン **Hongleiyouyuan**

【来源】 本品为蝾螈科动物红瘰疣螈 *Tylototriton verrucosus* Anderson 的全体。

【产地加工】 春至秋捕捉，捕后除去内脏，晒干，微火焙焦，研末备用。

【性状】 药材 体形小，全长 12cm 左右，头部扁平，尾部侧扁，鼻孔极近吻端，背中棱脊突出，有数节。头、背部、体侧、尾两侧满布小疣粒(图 224)。

【功效】 消积，清热解毒。

225. 玛 瑙

Manao Achates

メノウ **Agate**

【来源】 本品为氧化物类矿物石英 *Achatum* 的隐晶质变种之一。主含二氧化硅 SiO_2。主矿物组分为石髓与石英或蛋石的集合体。

【产地加工】 全年均可采挖，采得后，拣净杂质。

【炮制】 砸碎，研为细粉或水飞用。

【性状】 (1)药材 ①红玛瑙 呈不规则的隐晶块体，具锋利棱角，大小不一，灰白、红、橙红色至深红色，及绿黄、灰黑等色。具同心环状色带，半透明至透明，表面呈油脂—蜡状—玻璃体样光泽。体较软而质硬，不易砸碎，断面略光滑。硬度 6.5～7.0，相对密度 2.60～2.74。气无，味淡(图 225－1)。

②灰玛瑙 呈较均匀的灰白色，略有棕红色色带，余同红玛瑙(图 225－2 上、图 225－3 下)。以质坚、近透明、色红润者为佳。

(2)饮片 制玛瑙 呈细粉状，浅红色或橙红色，具光泽(图 225－4)。

【功效】 味辛，性寒。清热明目。

225—1

224



225—2

225—4

225—3

226. 麦 冬

Maidong Radix Ophiopogonis

バクドウ Tuber of Dwarf Lilyturf

【来源】 本品为百合科植物沿阶草 *Ophiopogon japonicus* (Thunb.) Ker -Gawl. 的干燥块根。

【产地加工】 于夏季采挖，洗净，反复曝晒、堆置，至7～8成干，除去须根，干燥。

【炮制】 (1)麦冬 取原药材，除去杂质，洗净，晒干。

(2)朱麦冬 取净麦冬，置容器内，喷水少许，拌匀使微润，加朱砂细粉撒布均匀，随时翻动，至麦冬表面挂匀朱砂为度，取出，晾干，称"朱麦冬"。

【性状】 (1)药材 呈纺锤形，两端略尖，长1～3cm，直径0.3～0.6cm。表面黄白色、淡黄色或淡黄棕色，具细纵皱纹。质柔韧，断面黄白色或淡棕色，角质样，半透明，中柱细小。气微香，味甜，微苦，嚼之发粘(图226－1、图226－2四川产、图226－3广东产)。

以个肥大、表面黄白色者为佳。

(2)饮片 朱麦冬 形如麦冬，外被朱红色朱砂细粉，味甜(图226－4)。

【功效】 味甘、微苦，性微寒。养阴生津，润肺止咳。朱麦冬滋养心阴，除烦安神。

附：韩国大麦冬(图226－5)。

日本麦冬 *Radix Ophiopogonis*

【来源】 本品为百合科植物沿阶草 *Ophiopogon japonicus* (Thunb.) Ker -Gawl. 或同属其他种植物的块根。

【产地加工】 于秋末春初采收，洗净，晒干。

【性状】 (1)药材 呈纺锤形，长1.0～2.5cm，直径0.3～0.5cm，一端渐细，另一端稍膨大。表面淡黄色或淡黄褐色，有大小不等的纵皱。折断时皮层柔软，木心较硬，皮层断面淡黄褐色，略半透明并富粘性。气微，味微甜，有粘性。

以新鲜、滋润、淡黄色、柔软、肥厚者为佳。

(2)饮片 为横切碎段或碎渣状，小段呈短圆柱形或圆锥形。黄白色或红棕色，外皮有细皱，断面角质半透明状，可见白色木心。质软韧，折断时易抽出木心。气微，嚼之发粘，味淡(图226－6)。

226—1



226—2

226—3

226—4

226—5

226—6

227. 麦饭石

Maifanshi Igneous Rock

バクハンセキ Maifanshi

【来源】 本品为火山岩、灰火山岩类及其蚀变岩石。主要为石英斑岩 Quartz porphyrite、花岗岩 Granito、花岗闪长岩 Granodiorite 等的石块。

【产地加工】 采得后，洗净泥土，除去杂石。

【炮制】 (1)麦饭石 将原药材洗净，干燥，研末生用。

(2)煅麦饭石 将原药材，置适宜容器内，煅至红透，趁红放入醋中，待凉，层层剥离后碎成细粉用。

【性状】 (1)药材 呈不规则致密块状，具锋利棱角，通常斑状结构，以石英、斜长石、钾长石、角闪石、黑云母为主组分，含粘土质风化物。表面为黑、暗红、黄、白、灰等斑点状花纹，相互交错，似杂色米饭团。体重质坚，难打碎，断面不平坦。粉末黄褐色或褐灰色，不透明。气无，味淡(图 227－1)。

(2)饮片 煅麦饭石 呈不规则小块状，具锋利的棱和角，色稍红或稍加深，质坚硬稍易打碎，余同原药材(图 227－2)。

以块大、呈点状色斑之风化矿石为佳。

【功效】 味甘，性温。无毒。解毒，生肌去腐，健身益寿。

228. 远 志

Yuanzhi Radix Polygalae

オンジ Root of Thinleaf Milkwort

【来源】 本品为远志科植物远志 *Polygala tenuifolia* Willd. 或卵叶远志 *Polygala sibirica* L. 的干燥根。

【产地加工】 于春、秋 2 季采挖，除去须根及泥沙，晒干。

【炮制】 (1)远志片 取原药材，除去杂质，略洗，润透，去心，切段，干燥，通称“远志片”。

(2)制远志 取甘草，加适量水煎汤，加入净远志，用文火煮至汤被吸尽，取出干燥，称“制远志”。

(3)蜜远志 取炼蜜，用适量开水稀释后，加入远志段拌匀，闷透，置锅内，用文火加热，炒至不粘手为度，取出，放凉，称“蜜远志”。

(4)朱远志 取制远志加水湿润后，撒入朱砂细粉，拌匀，晾干，称“朱远志”。

【性状】 (1)药材 呈圆柱形，略弯曲，长 3～15cm，直径 0.3～0.8cm。表面灰黄色至灰棕色，有较密并深陷的横皱纹、纵皱纹及裂纹，老根的横皱纹较密更深陷，略呈结节状。质硬而脆，易折断，断面皮部棕黄色，木部黄白色，皮部易与木部剥离。气微，味苦、微辣，嚼之有刺喉感(图 228－1)。

(2)饮片 ①远志片 为小圆筒形结节状小段，长约 1.5cm，外皮灰黄色，有横皱纹。质脆，易折断，切面黄白色。气微，味苦、微辣，嚼之有刺喉感(图 228－2)。

②制远志 形如远志段，味微甜(图 228－3)。

③蜜远志 形如远志段，色泽加深，味甜(图 228－4)。

④朱远志 形如远志段，外被朱砂细粉。

【功效】 味苦、辛，性温。安神益智，祛痰，消肿。

227—1

227—2



228—1

228—2

228—3



228—4

229. 杜 仲

Duzhong Cortex Eucommiae

トチュウ Eucommia Bark

【来源】 本品为杜仲科植物杜仲 *Eucommia ulmoides* Oliv. 的干燥树皮。

【产地加工】 4～6月份剥取树皮，刮去粗皮，堆置"发汗"，至内皮呈紫褐色，晒干。

【炮制】 (1)杜仲 取原药材，除去杂质及粗皮，洗净，润透，刮去粗皮，切方块，干燥。

(2)盐水炒杜仲 取杜仲块，用盐水拌匀，吸尽后，置锅内炒至颜色加深或用砂炒至焦黑色，易断丝为度。

【性状】 (1)药材 呈板片状，少数两边稍向内卷曲。外皮平坦或粗糙，呈淡棕色或灰棕色，具有明显的纵皱纹及纵裂槽。内表面暗紫色，光滑。质脆，易折断，断面有银白色丝状物相连，细密，略有伸缩性。微臭，味稍苦，嚼之有胶状残余物(图 229－1)。

(2)饮片 ①杜仲片 为略平坦的块片。外表面灰褐色或淡棕色，内表面暗紫色，光滑。质脆，易折断，断面有细密、银白色、富弹性的橡胶丝相连。气微，味稍苦(图 229－2)。

②盐水炒杜仲 形如杜仲片，表面焦黑色，胶丝易断，微有焦气，味微咸。

【功效】 味甘，性温。补肝肾，强筋骨，安胎。盐水炒用可增强入下焦补肝肾的功能。

230. 杜仲叶

Duzhongye Folium Eucommiae

トチュウヨウ Eucommia Leaf

【来源】 本品为杜仲科植物杜仲 *Eucommia ulmoides* Oliv. 的干燥树叶。

【产地加工】 于春、夏2季采收，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，切丝，晒干。

【性状】 (1)药材 叶展平后呈椭圆形或椭圆状卵形，长 6～18cm，宽 3.0～7.5cm，先端长渐尖，基部圆形或宽楔形，边缘有锯齿，上表面黄绿色，较光滑，下表面色较浅，脉上有毛；叶柄长 1～2cm。纸质而脆，断面有白色的胶丝相连。气微，味淡。

(2)饮片 杜仲叶片 为不规则丝，多皱缩，上表面黄绿色，下表面色较浅，质脆易碎。气微，味淡(图 230－1)。

【功效】 味甘、微辛，性微温。补肝肾，强腰膝，降血压。

附：日本杜仲叶 完整叶(图 230－2)，药材(图 230－3)。

229—1



229—2

230—3

230—1



230—2

231. 杜 衡

Duheng Herba Asari Forbesii
トコウ Herb of Forbes Wildginger

【来源】 本品为马兜铃科植物杜衡 *Asarum forbesii* Maxim. 的干燥全草。

【产地加工】 4～6月份，挖取全草，除去泥沙，阴干，扎成小把。

【炮制】 取原药材，拣去杂质，用手掰开细根，拍净泥沙，干切成长约1.5cm的厚片，筛去灰屑。

【性状】 (1)药材 常曲卷成团，根状茎短，圆柱形，长约1cm，直径1～3mm；表面灰黄色或浅棕色，节密集，下生多数细根。根长约7cm，直径1～2mm，表面淡棕色或灰白色，有细皱纹；质脆，易折断，断面黄白色。叶灰绿色，多皱缩，完整叶片展平后呈宽心形，先端钝或圆，基部心形，叶柄长，可达15cm。花1～2朵，腋生，暗紫色，常皱缩。气香，味辛。

(2)饮片 为根、根茎、叶切碎的混合物，片长约1.5cm，根茎段表面多环节，根段表面具纵皱，切面粉性，黄白色。叶片展平上表面可见浅黄色斑纹，全缘。气芳香，味辛(图231)。

【功效】 味辛，性温。祛风散寒，下气，消痰，行水，破血，止痛。用于风寒头痛、胃痛、关节酸痛、痰饮喘咳、跌打损伤、口舌生疮、齿痛、毒蛇咬伤等症。

232. 杨梅皮

Yangmeipi Cortex Myricae
ヨウバイヒ Bark of Chinese Waxmyrtle

【来源】 本品为杨梅科植物杨梅 *Myrica rubra* Siebold et Zuccarini. 的干燥树皮。

【产地加工】 春初剥取树皮，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，切成碎块。

【性状】 药材 呈卷筒状、半卷筒状或板片状，厚1～5mm。外表面灰褐色，附有白色或灰绿色的地衣斑，具浅纵裂纹及纵列的小皮孔；内表面深褐色，光滑。易折断，折断面红褐色，颗粒状。气微，味苦、涩(图232－1)。

以新鲜、皮厚、粉末入鼻腔有强烈刺激性者为佳。

(2)饮片 为不规则的小碎块。余同药材(图232－2)。

【功效】 味苦、辛、涩，性温。止泻痢，退目翳，止痛。用于痢疾、跌打损伤、目翳、牙痛、烫火伤、恶疮疥癣。

注：本品为日本产生药。

233. 芜 荑

Wuyi Fructus Ulmi Macrocarpae Preparatae
ブイ Prepared Fruit of Bigfruit Elm

【来源】 本品为榆科植物大果榆 *Ulmus macrocarpa* Hance. 的果实加工品。

【产地加工】 春末夏初，榆树开花结果时，采集花和果实及嫩叶，加水混合成糊状，有时尚混入少量泥土，让其腐烂发酵数日，作成块状，晒干。

【炮制】 取原药材，拣去杂质，劈切成蚕豆大小的小块。

【性状】 (1)药材 方块状，表面褐黄色，有多数小孔。体轻，质疏松。断面黄黑色，易成鳞片状剥离，碎片中可见铜钱状翅果和叶片。气特臭，味微酸、涩。

(2)饮片 为切成1.5～2.0cm大小的小块，表面和切面均具小孔和翅果。其余特征同药材(图233)。

【功效】 味辛，性平。杀虫消积。用于虫积腹痛等症。



231

232—1

233

232—2

234. 芸香草

Yunxiangcao Herba Cymbopogonis

ウンコウソウ Herb of Remote Lemongrass

【来源】 本品为禾本科植物芸香草 *Cymbopogon distans* (Nees) A. Camus 的干燥全草。

【产地加工】 于夏、秋 2 季在开花前割取地上部分，晾干或晒干。

【炮制】 取原药材，拣去杂质，干切成长约 1.5cm 的片段，筛去灰屑。

【性状】 (1)药材 干燥全草。茎纤细，长 40～110cm；表面灰绿色或深绿色，节部膨大，质脆，易折断，断面纤维性。叶狭条形，长 30～70cm，宽 1～6mm，叶鞘抱茎，基部常破裂；尖部叶鞘短于节间，叶舌钝圆，长 2～4mm，膜质。气香而特异，味辛辣，嚼之有麻舌的清凉感。

(2)饮片 为茎、叶切碎的混合物，片长约 1.5cm。茎表面 灰绿色，节膨大，节间常压扁有纵皱，切 面中突。叶卷缩，叶脉平行，全缘。气香，味辛辣而清凉(图 234)。

【功效】 味辛、苦，性温。散寒利湿，行气宽中，止咳平 喘。用于风寒感冒、风湿骨痛、胸腹胀满、慢性气管炎等症。

235. 花 椒

Huajiao Pericarpium Zanthoxyli Schinifoli

カショウ Chinese Pricklyash

【来源】 本品为芸香科植物青椒 *Zanthoxylum schinifolium* Sieb. et Zucc. 或花椒 *Zanthoxylum bungeanum* Maxim. 的干燥成熟果皮。

【产地加工】 秋季采收成熟果实，晒干，除去种子及杂质。

【炮制】 (1)花椒 取原药材，拣去椒目及果柄等杂质。

(2)炒花椒 取净花椒，用文火炒至有爆烈声、具香气，取出，摊凉。

【性状】 (1)药材 ①青椒 多为 2～3 个上部离生的小蓇葖果，集生于小果梗上，蓇葖果球形，沿腹缝线开裂，直径 0.3～0.4cm。外表面灰绿色或暗绿色，散有多数油点及细密的网状隆起 的皱纹；内表面类白色，光滑。内果皮与外果皮常由基部分离。气香，味微甜而辛。

②花椒 蓇葖果多单生，直径 0.4～0.5cm。外表面紫红色或棕红色，散有多数疣状突起的油点，直径 0.5～1.0mm，对光观察半透明；内表面淡黄色。香气浓，味麻辣而持久(图 235－1)。

(2)饮片 炒花椒 外表颜色加深，香气浓。

【功效】 味辛，性温。温中止痛，杀虫止痒。

附：山椒 即日本产花椒。青椒(图 235－2)，花椒(图 235－3)。

234

235—1

235—2

235—3

236. 花蕊石

Huaruishi Ophicalcitum

カスイセキ Ophicalcite

【来源】 本品为变质岩类岩石蛇纹大理岩 Ophicalcite 的石块。主要组分为方解石($CaCO_3$)及蛇纹石[$Mg_6(Si_4O_{10})(H_2O)_8$]。

【产地加工】 采挖后，敲去杂石，选取有淡黄色或黄绿色彩晕的小块。

【炮制】 (1)净花蕊石 取原药材，除去杂质，洗净，干燥，敲碎。

(2)煅花蕊石 取净花蕊石粒，置无烟炉火上或适宜容器内，用武火加热，煅至红透，取出放凉。碾碎。

【性状】 (1)药材 为不规则的块状，具棱角。表面较粗糙，类白色或黄白色，有黄色和黄绿色花纹相夹其间，习称"彩晕"，对光观察有闪星状亮光。蛇纹石具蜡质光泽。体重，质硬，不易破碎。断面亦有黄色斑点和散在亮星。硬度 2.5～3.5，相对密度 2.5～3.6(蛇纹石部分)。无臭，味淡(图 236－1)。

以色白、莹润、质重、块大、彩晕多者为佳。本品不溶于水，易溶呈酸，产生多量气泡。

(2)饮片 煅花蕊石 形如花蕊石，色泽变暗，黄色斑点变浅，质地稍酥脆。粉末呈无色透明具棱角颗粒，有少部分颗粒呈黄红色(图 236－2)。

【功效】 味酸、涩，性平。化瘀止血。

237. 苍 术

Cangzhu Rhizoma Atractylodis

ソウジュツ Atractylodes Rhizome

【来源】 本品为菊科植物茅苍术 *Atractylodes lancea* (Thunb.) DC. 或北苍术 *Atractylodes chinensis* (DC.) Koidz. 的干燥根茎。

【产地加工】 于春、秋 2 季，挖取根茎。除去茎、叶、根和泥沙等杂质，晒干，撞去须根。

【炮制】 (1)苍术 取原药材，拣取杂质，洗净，淋水润透，切薄片，晒干。

(2)炒苍术 取净苍术片，用麸皮拌炒至微黄色，筛去麸皮。

(3)制苍术 取原支苍术，润透，置蒸笼内蒸至表面黑色，内部棕黑色，取出，晒至半干，切薄片，将蒸锅内的汁水拌入，使之吸净，晒干。

(4)米泔水苍术 取原支净苍术，用米泔水浸约 10 分钟，捞起，洗净，润软，切薄片，干燥。

【性状】 (1)药材 ①茅苍术 呈不规则连珠状或结节状圆柱形，稍弯曲，长 3～10cm，直径 1～2cm。表面灰棕色，有皱缩纹和横缢纹，可见茎痕和残留须根。质坚实，断面黄白色，有众多棕红色油点，有时可见析出的白毛状结晶。有特异香气，味微甜、辛、苦。

②北苍术 略呈疙瘩状或结节状，长 4～9cm，直径 1～4cm。表面棕黑色，断面棕黄色，较疏松，油点较少。香气淡，味辛、苦(图 237－1)。

(2)饮片 ①苍术片 为类圆形、椭圆形或不规则形薄片，表面有皱纹。切面环纹和油点明显，散在。茅苍术片(图 237－2)，北苍术片(图 237－3)。

②炒苍术 切面微黄色，油点散在，可察见。

③制苍术 表面棕黑色，切面棕褐色，油点难察见(图 237－4)。

④米泔水苍术 鉴别特征同苍术片。

【功效】 味辛、苦，性温。燥湿健脾，明目。用于脘腹胀满、吐泻、水肿、痰饮、肢体关节酸重、夜盲症等。

附：出口苍术片(图 237－5)。

236—1

236—2

237—1



237—2

237—3



237—5



237—4

238. 苍耳子

Cangerzi **Fructus Xanthii**

ソウジシ **Fruit of Siberian Cocklebur**

【来源】 本品为菊科植苍耳 *Xanthium sibiricum* Patr. 的干燥成熟带总苞的果实。

【产地加工】 秋季果实成熟时采收，干燥，除去梗、叶等杂质。

【炮制】 (1)苍耳子 取原药材，除去杂质，通称“苍耳子”。

(2)炒苍耳子 取苍耳子置锅内，用文火炒至表面深黄色或黄褐色，有香气逸出时，取出，放凉，去刺筛净，称“炒苍耳子”。

【性状】 (1)药材 呈纺锤形或卵圆形，长 1.0～1.5cm，直径 0.4～0.7cm。表面黄棕色或黄绿色，全体有钩刺。顶端有 2 枚较粗的刺，分离或相连，基部有果柄痕。体轻质坚，横切面中间有一纵向隔膜，分为 2 室，内各有 1 枚瘦果。瘦果略呈纺锤形，一面较平坦，顶端具一突起的花柱基，果皮薄，灰黑色，具纵纹。种皮膜质浅灰色，子叶 2 枚，有油性。气微，味微苦(图 238－1)。

以粒大、饱满、色黄绿者为佳。

(2)饮片 炒苍耳子 形如苍耳子，表面焦黄色，具香气(图 238－2)。

【功效】 味辛、苦，性温。有毒。散风湿，通鼻窍。炒苍耳子主散风湿。

239. 苍耳草

Cangercao **Herba Xanthii**

ソウジソウ **Herb of Siberian Cocklebur**

【来源】 本品为菊科植物苍耳 *Xanthium sibiricum* Patr. 的干燥地上部分。

【产地加工】 于夏、秋 2 季开花或带有幼果时采割，除去杂质，晒干。

【炮制】 (1)苍耳草 取原药材，除去杂质及枯萎枝叶，称“苍耳草”。

(2)苍耳草片 取苍耳草，除去杂质及老茎，洗净，润软，切厚片，晒干，称“苍耳草片”。

【性状】 (1)药材 呈分枝状全草，长 30～100cm，全株密被白色短毛。茎稍扁，粗糙，具纵纹，上部有分枝；表面棕黄色或棕褐色，散布黑褐色斑点；质脆，断面黄白色，髓部疏松，类白色。叶互生，叶片多皱缩，展平后呈卵状三角形，长 6～10cm，宽 5～10cm；先端尖，基部浅心形，边缘 3～5 浅裂，有不规则粗锯齿；上表面灰绿色，下表面色较淡，均被白色糙伏毛；叶柄长 3～11cm。头状花序几无梗，顶生或腋生。瘦果 2，倒卵形，包藏在外生钩刺的总苞内。气微，味淡(图 239　1)。

以身干、整洁、叶表面灰绿色、无杂质者为佳。

(2)饮片 苍耳草片 呈茎、叶、花及果混合的不规则厚片，片厚 0.2～0.5cm。茎片扁圆柱形，切面黄白色，髓部类白色、疏松；周边棕黄色或棕褐色，具纵纹，散布黑褐色斑点。叶片皱缩，多破碎，灰绿色或灰黄绿色，边缘有锯齿，两面被白色糙伏毛。偶见破碎的花序与瘦果。质柔略脆。气微、味淡(图 239－2)。

【功效】 味辛，性平。祛风散热，通鼻窍，解毒杀虫。

238—1

238—2

239—1

239—2

240. 芡 实

Qianshi Semen Euryales

ケンジツ Seed of Gordon Euryale

【来源】 本品为睡莲科植物芡 *Euryale ferox* Salisb. 的干燥成熟种仁。

【产地加工】 于秋末冬初，采收成熟果实。除去果皮，取出种子，洗净，再除去硬壳，晒干。

【炮制】 取原药材，拣去残留硬壳等杂质。

【性状】 (1)药材 完整种仁类球形，商品多破粒，直径 5～8mm。表面棕红色(内种皮)，一端黄白色，有凹点状种脐痕，除去内种皮后显白色。质较硬，断面白色，粉性。气微，味淡。

(2)饮片 特征与药材相同(图 240)。

【功效】 味甘、涩，性平。益肾固精，补脾止泻，祛湿止带。用于梦遗滑精，遗尿尿频，脾虚久泻等症。

241. 芦 荟

Luhui Aloe

ロカイ Aloes

【来源】 本品为百合科植物库拉索芦荟 *Aloe vera* L.、好望角芦荟 *Aloe ferox* Miller 或其他同属近缘植物叶的液汁浓缩的干燥物。前者习称“老芦荟”，后者习称“新芦荟”。

【产地加工】 全年皆可割取。将割取的叶片排于木槽两侧，使液汁经水槽流入容器，然后放入铜锅中加热蒸发至稠膏状，倾入容器中，逐渐冷却凝固。

【炮制】 取原药材，除去杂质，砍成小块或捣碎。

【性状】 (1)药材 ①老芦荟 呈不规则块状，常破裂成多角形，大小不一。表面呈暗红褐色或深褐色，无光泽。体轻，质硬，不易破碎，断面粗糙或显麻纹，富吸湿性。具不愉快的臭气，味极苦(图 241－1)。

②新芦荟 形状、气味与老芦荟相同，表面呈暗褐色，略显绿色，有光泽。体轻，质松，易碎，断面如玻璃样而有层纹(图 241－2)。

以表面黑绿色、有光泽、质脆、气味浓、溶于水后无杂质及泥沙者为佳。

(2)饮片 为不规则形的碎块，表面暗红色、咖啡色、棕褐色或墨绿色。质轻松脆，断面光滑，有玻璃样光泽或无光泽。有特异样臭气，味极苦(图 241－3)。

【功效】 味苦，性寒。清热凉肝，通便，杀虫。



240

241—3

241—1

241—2

242. 芦 根

Lugen Rhizoma Phragmitis

ロコン Reed Rhizome

【来源】 本品为禾本科植物芦苇 *Phragmites communis* Trin. 的新鲜或干燥根茎。

【产地加工】 全年均可采挖，除去须根、芽及膜状叶，鲜用或晒干。

【炮制】 (1)鲜芦根 取新鲜的药材，除去杂质及须根，洗净，切段，称“鲜芦根”。

(2)干芦根 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切段，干燥，称“干芦根”。

【性状】 (1)药材 ①鲜芦根 呈长圆柱形，有的略扁，长短不一，直径 1～2cm。表面黄白色，有光泽，外皮疏松可剥离。节呈环状，有残根及芽痕。体轻，质韧，不易折断。切断面黄白色，中空，壁厚 0.1～0.2cm，有小孔排列成环。无臭，味甜(图 242－1)。

②干芦根 呈扁圆柱形。节处较硬，节间有纵皱纹(图 242－2)。

均以条粗、表面黄白色、有光泽者为佳。

(2)饮片 ①鲜芦根 呈长圆筒状小段，有的略扁，长 1.0～2.5cm，直径 1～2cm。切面黄白色，壁厚 0.1～0.2cm，有小孔排列成环状，髓大，中空。周边黄白色，有光泽。体轻，质韧。无臭，味甜(图 242－3)。

②干芦根 呈扁圆筒形的小段，长 1～2cm。切面黄白色，髓大，中空。周边黄白色或淡黄色，有光泽，具纵皱纹。体轻，质韧。气微，味甜(图 242－4)。

【功效】 味甘，性寒。清热生津，除烦，止呕，利尿。鲜芦根清热力强。

243. 苏 木

Sumu Lignum Sappan

ソボク Sappan Wood

【来源】 本品为豆科植物苏木 *Caesalpinia sappan* L. 的干燥心材。

【产地加工】 秋季采伐，除去白色边材，干燥。

【炮制】 取原药材，除去杂质，锯成长约 30cm 的段，镑片或劈成小碎块，称“苏木片”或“苏木块”。

【性状】 (1)药材 呈长圆柱形或对剖的半圆柱形，长 10～100cm，直径 3～12cm。表面黄红色至棕红色，具刀削痕和枝痕，常见纵向裂缝。横断面略具光泽，年轮明显，有的可见暗棕色、质松、带亮星的髓部。质坚硬。气微，味微涩(图 243－1)。

以粗大、质坚、色红者为佳。

(2)饮片 ①苏木片 为不规则的长形极薄片，厚约 0.5cm，宽窄不一，通常宽约 1cm 左右，全体呈红黄色或棕红色，少数带有黄白色的边材，表面有纵纹。质脆，易断。气微，味微涩(图 243－2)。

②苏木块 为长方形小块，长 3～5cm，厚 0.5～1.0cm。表面黄红色，有刀痕，常见纵向裂缝。横断面有明显年轮，偶有暗棕色、带亮星的髓部。质硬。气微，味微涩(图 243－3)。

【功效】 味甘、咸，性平。行血祛瘀，消肿止痛。

附：泰国产苏木(图 243－4)。

242—1

242—2

242—3

242—4

243—1



243—4

243—2



243—3

244. 赤石脂

Chishizhi Halloysitum Rubrum

シャクセキシ Red Halloysite

【来源】 本品为硅酸盐类矿物多水高岭石族多水高岭石 Halloysite，主要含有含水硅酸铝[$Al_4(Si_4O_{10}(OH)_8 \cdot 4H_2O)$]。

【产地加工】 采得后，选择红色滑腻的块状体，除去杂石、泥土。

【炮制】 (1)赤石脂 取原药材，除去杂质，捣碎或研粉。

(2)煅赤石脂 取净赤石脂，置无烟炉火上，用武火加热，煅至红透，取出，放凉，捣成粗末。

(3)醋赤石脂 取净赤石脂，碾成细粉，用醋及适量清水调匀，搓条，切段，干燥。置无烟炉火上，用武火加热，煅至红透，取出，放凉，研粉(赤石脂：醋＝100：30)。

【性状】 (1)药材 赤石脂 为块状集合体，呈不规则的块状，大小不一。粉红色、红色至紫红色，深浅不一，或有红白相间的花纹。光滑油腻，质软，易粉碎。断面深浅色层相间，有大理石样花纹，具蜡样光泽，有吸水性，舌触之有吸附性。硬度 2.0～2.5，相对密度 2.6，条痕砖红色。具粘土气，味淡，嚼之无砂粒感(图 244－1)。

以色红、光滑细腻、粘度力强、质松、易断者为佳。

(2)饮片 ①煅赤石脂 全体呈饼状，土红色，细颗粒明显，质重坚硬，难打碎，吸舌力增强(图 244－2)。

②醋赤石脂 为深红色或红褐色细粉。

【功效】 味甘、酸、涩，性温。涩肠，止血，生肌敛疮。

245. 赤 芍

Chishao Radix Paeoniae Rubra

セキシャク Red Peony Root

【来源】 本品为毛茛科植物芍药 *Paeonia lactiflora* Pall. 或川赤芍 *Paeonia veitchii* Lynch 的干燥根。

【产地加工】 于春、秋 2 季采挖，除去根茎、须根及泥沙，晒干。

【炮制】 (1)赤芍片 取原药材，除去杂质，分开大小条，洗净，润透，切薄片，干燥，通称“赤芍片”。

(2)炒赤芍 取赤芍片置锅内，用文火加热，炒至颜色加深，偶有焦斑，取出放凉，称“炒赤芍”。

【性状】 (1)药材 呈圆柱形，稍弯曲，长 5～40cm，直径 0.5～3.0cm。表面棕褐色，粗糙，有纵沟及皱纹，并有须根痕及横向凸起的皮孔，有的外皮易脱落。质硬而脆，易折断，断面粉白色或粉红色，皮部窄，木部放射状纹理明显，有的显裂隙。气微香，味微苦、酸涩(图 245－1)。

(2)饮片 ①赤芍片 为椭圆形薄片，表面粉白色或粉红色，中心有放射状纹理，皮部窄，周边灰褐色。质硬而脆。气微香，味微苦(图 245－2)。

②炒赤芍 形如赤芍片，色泽加深。

【功效】 味苦，性微寒。清热凉血，散瘀止痛。

附：赤芍片出口品(图 245－3)。

日本赤芍(商品) 药材呈圆柱形，常弯曲不直或扭曲，有的一端较细，长约 15cm，直径为 0.5～1.5cm。表面棕褐色或红褐色，具纵皱和横长皮孔，并可见少数支根或根痕。质硬，折断面外层黄白色，内层浅棕色，略呈角质样。气微，味微淡(图 245－4)。



244—1

244—2

245—1



245—2

245—4

245—3

246. 还魂草

Huanhuncao Herba Selaginellae

カンコンソウ Herb of Tamariskiod Spikemoss

【来源】 本品为卷柏科植物卷柏 *Selaginella tamariscina* (Beauv.) Spring 的干燥全草。

【产地加工】 全年可采，以秋季采收者质较好。剪去须根，除去泥沙，晒干。

【炮制】 (1)卷柏 取原药材，拣去杂质，抖净泥灰，干切，或用清水喷淋润软后切片，片长约1.5cm，晒干或烘干，筛去灰屑。

(2)卷柏炭 取净卷柏置炒锅中，清炒至团块表面焦黑色，内部黄绿色，取出，晾干。

【性状】 (1)药材 全草卷缩呈拳状，基部簇生多数须根或剪去后残留的基部，茎短，枝丛生，扁而有分枝，向内卷曲，枝上密生鳞片状小叶，叶端锐尖并具长芒，叶基平截，边缘膜质状，全缘或具细锯齿，灰绿色或棕黄色，光滑无毛，质厚而稍硬，无柄。气微，味淡。

(2)饮片 ①卷柏 为全草的切碎品，根茎段常带灰棕色须根短段。茎扁平，多分枝，枝上密生复瓦状排列的小鳞叶，黄绿色，叶缘膜质，质脆，易折断(图 246)。

②卷柏炭 根部呈团块状，茎枝多破碎，表面焦黑色或黄绿色(未碰到锅的部分)，具枯焦气。余同卷柏。

【功效】 味辛，性平。活血止血。生用活血，炒用止血。用于经闭癥瘕、跌打损伤，炒炭用于咯血、吐血、便血、尿血、月经过多、创伤出血等症。

247. 连钱草

Lianqiancao Herba Glechomae

レンセンソウ Herb of Longtube

【来源】 本品为唇形科植物活血丹 *Glechoma longituba* (Nakai) Kupr. 的干燥地上部分。

【产地加工】 春至秋季采收，除去杂质，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，抢水洗净，沥去水，切段，干燥，称“连钱草段”。

【性状】 (1)药材 长 10～20cm，全体疏被短柔毛。茎呈方柱形，细而扭曲；表面黄绿色或紫红色，节上有不定根；质脆，易折断，断面常中空。叶对生，叶片多皱缩，展平后呈肾形或近心形，长为1～3cm，宽 1.5～3.0cm，灰绿色或灰褐色，边缘具圆齿；叶柄纤细，长 4～7cm。轮伞花序腋生，花冠二唇形，长达 2cm。小坚果长圆形，褐色。搓之气芳香，味微苦(图 247 1)。

以叶多、色绿、香气浓者为佳。

(2)饮片 连钱草段 为不规则的小段，茎叶、花混合。茎呈方形，表面黄绿色或紫红色，质脆，断面中空。叶片多皱缩，灰绿色或灰褐色，叶缘圆齿状。偶见腋生的轮伞花序及唇形花。并可见褐色、长圆形的小坚果。气香，味微苦(图 247－2)。

【功效】 味辛、微苦，性微寒。利湿通淋，清热解毒，散瘀消肿。

附：台湾产连钱草(图 247－3)，**日本产连钱草**(图 247 4)。

246

247—1

247—2

247—3

247—4

248. 牡丹皮

Mudanpi **Cortex Paeoniae Suffruticosae**

ボタンピ **Tree Peony Bank**

【来源】 本品为毛茛科植物牡丹 *Paeonia suffruticosa* Ander. 的干燥根皮。

【产地加工】 于秋、冬2季，挖取根，除茎苗和须根，剥取根皮，晒干，称“原丹皮”；刮去外皮，晒干，称“刮丹皮”。

【炮制】 (1)丹皮片　取原药材，洗去杂质，快洗，润软，切片，长约4mm，晒干或低温烘干。

(2)炒丹皮　取净丹皮片置炒锅内，用文火清炒至微焦。

(3)丹皮炭　取净丹皮片置炒锅内，清炒至外表面呈焦黑色。

【性状】 (1)药材　①原丹皮　呈筒状或半筒状，1侧有纵剖的缝，直径0.5～1.2cm，厚约2mm。外表面灰褐色，有多数横长的皮孔和须根痕，栓皮脱落处显粉红色；内表面淡灰黄色，具明显的细纵纹。质硬而脆，断面平坦，粉性，粉红色。有特异香气，味微苦而涩。

②刮丹皮　外表面稍粗糙，呈粉红色至淡棕红色，余同原丹皮(图248－1)。

(2)饮片　①丹皮片　为片长3mm左右的薄片，切面平坦，具弧形裂隙，余同药材(图248－2)。

②炒丹皮　形同丹皮片，触锅处微焦。

③丹皮炭　形同丹皮片，表面焦黑色，断面微黄色。

【功效】 味苦、辛，性微寒。清血热，散瘀血。用于热病发斑、发疹、吐血、衄血、潮热、痛经、经闭、痈肿等症。

附：凤丹皮(出口品，一级)　为筒形、半圆形、卷筒状横片，少数破碎成槽形，直径0.5～1.5cm，厚约2mm。表面粉白色或灰白色，切片近外皮处粉色明显；外皮棕褐色，略显纵皱，有的可见皮孔；皮内表面略光滑，具细纵纹，棕黄色。质脆，易折断，折断时常有粉尘。具丹皮酚香气，味稍涩(图248－3)。

249. 牡　蒿

Muhao **Herba Artemisiae Japonicae**

ボコウ **Herb of Japanese Wormwood**

【来源】 本品为菊科植物牡蒿 *Artemisia japonica* Thunb. 的干燥全草。

【产地加工】 于夏、秋2季间采收全草，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，稍闷，切段，干燥，称“牡蒿段”。

【性状】 (1)药材　茎圆柱形，直径0.1～0.3cm，表面黑棕或棕色；质坚硬，折断面呈纤维状，黄白色，中央有白色疏松的髓。残留的叶片黄绿色至棕黑色，皱缩卷曲，质脆易脱。花序黄绿色，苞片内可见长椭圆形褐色种子数枚。气香，味微苦(图249－1)。

以质干、无杂者为佳。

(2)饮片　牡蒿段　呈不规则的小段，茎、叶混合。茎圆柱形，具白色髓。叶多破碎不全，黄绿至棕黑色。种子长椭圆形，褐色。质松脆。气香，味微苦(图249－2)。

【功效】 味苦、微甘，性寒。解表，清热，杀虫。

248—1

249—1

248—2

249—2



248—3

250. 何首乌

Heshouwu Radix Polygonii Multiflori

カシュウ Root of Tuber Fleeceflower

【来源】 本品为蓼科植物何首乌 *Polygonum multiflorum* Thunb. 的干燥块根。

【产地加工】 于春、秋2季，挖取块根，除去茎苗和细根，洗去泥沙，晒干或低温烘干。

【炮制】 (1)鲜何首乌 取原药材，洗净，拭干，切厚片。

(2)干何首乌 取原药材，除去杂质，分档，浸12～24小时，洗净，捞起，大只劈开，中途淋水，润透，切薄片，晒干或低温烘干，筛去灰屑。

(3)制何首乌 取原生干何首乌，拣去杂质，按大小分档，水浸12～24小时，洗净，大只劈开，中途淋水，润透，置蒸笼内，每天蒸足8小时(以上汽后算起)，焖过夜，翌晨上下翻动1次，再蒸，反复4次，至内外都呈滋润黑色。取出，晒至半干，切薄片，蒸时所得原汁拌入使之吸尽，继续晒至干，筛去灰屑。

【性状】 (1)药材 呈团块状或不规则纺锤形，大小不一。表面褐色或红棕色，有5棱或凹凸不平的纵沟及不规则皱缩纹，皮孔横长，两端均有明显根痕，露出粗硬的纤维束。质坚实，不易折断，横断面黄棕色，中央为一较大木心，外侧皮部散有云锦状花纹。气微，味稍苦、涩。

(2)饮片 ①生何首乌片 为厚0.3cm的薄片，横切片多呈钝的五角星形；纵切片常呈不规则形。表面褐色或红棕色，有皱缩纹，切面红棕色，中央为较大木心，周边散有多个云锦花纹(图250－1)。

②制何首乌 片厚0.3cm左右，滋润，乌黑色，木心和云锦花纹处稍突起(图250－2)。

【功效】 味苦、甘、涩，性温。生首乌润肠解疮毒。用于肠燥便秘，痈疽，瘰疬等症；制首乌补肝肾，益精血，壮筋骨。用于头晕耳鸣，头发早白，腰膝酸软，肢体麻木，高血脂症等。

251. 伸筋草

Shenjincao Herba Lycopodti

シンキンソウ Herb of Common Clubmoss

【来源】 本品为石松科植物石松 *Lycopodium japonicum* Thunb. 的干燥全草。

【产地加工】 于夏、秋2季茎叶茂盛时采收，除去杂质，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，稍润，切段，干燥，称"伸筋草段"。

【性状】 (1)药材 匍匐茎呈细长圆柱形，略弯曲，长可达200cm，直径0.1～0.3cm，其下有黄白色细根。直立茎作2叉分枝状。叶密生茎上，螺旋状排列，皱缩弯曲，线形成针形，长0.3～1.5cm，黄绿色至淡黄棕色，无毛，先端芒状，全缘，易碎断。质柔软，断面皮部浅黄色，木部类白色。气微，味淡(图251－1)。

以茎长、色黄绿者为佳。

(2)饮片 伸筋草段 为不规则的全草小段。细根黄白色，外皮多脱落，露出黄色木心。茎表面黄绿色，切面黄白色。鳞叶皱缩而弯曲，密生，黄绿色或淡黄棕色。质柔而韧，不易折断。气微，味淡(图251－2)。

【功效】 味微苦、辛，性温。祛风除湿，舒筋活络。

250—1

250—2

251—1



251—2

252. 佛 手

Foshou **Fructus Citri Sarcodactylis**
ブッシュ **Finger Citron**

【来源】 本品为芸香科植物佛手 *Citrus medica* L. *var. sarcodactylis* Swingle 的干燥果实。
【产地加工】 秋季果实充分成长，将要变黄或变黄时采收，纵切成薄片，晒干或低温烘干。
【炮制】 (1)广佛手 取原药材，除去杂质，干切或喷润软，切丝，晒干或低温烘干。
(2)川佛手 除去杂质后，切极薄片。
【性状】 (1)药材 为卵圆形或类椭圆形的薄片，长 6～10cm，宽 3～7cm，厚 0.2～0.4cm。顶端稍宽，常有 3～5 个指状裂瓣，基部稍窄，有的具果柄痕。表面黄绿色或橙黄色，有皱纹和油点。果肉浅黄白色，具线状或点状维管束。质硬而脆，吸潮后柔韧。气香，味微甜后苦。
(2)饮片 ①广佛手 丝状，宽为 3～5mm。表面黄绿色或橙黄色，有油点。切面浅黄白色，有线状维管束和油点。
②川佛手 为厚 2～3mm 的薄片，切面浅黄白色，其余特征与广佛手同(图 252)。
【功效】 味辛、苦、酸，性温。舒肝理气，和胃止痛。用于肝胃气滞、胸胁胀痛、胃脘痞满、食少呕吐。

253. 佛手花

Foshouhua **Flos Sarcodactyli**
ブッシュカ **Flower of Fleshfingered**

【来源】 本品为芸香科植物佛手柑 *Citrus medica* L. *var. sarcodactylis* Swingle 的将开放的花或已开放的花。
【产地加工】 川佛手花在花未全开放时采摘；浙江采摘已开放的花；广东、云南收集落地花朵，拣去杂质，晒干。
【炮制】 取原药材，拣去杂质，筛去灰屑。
【性状】 (1)药材 未开放的花蕾倒长卵形，基部有果柄，花萼杯状。开放的花，花瓣 4 枚，线状矩圆形，外表面有多数窝点，质地较厚，二边向内卷曲；雄蕊多数，着生于花盘周围。气微，味微苦(图 253)。
【功效】 味辛、微苦，性温。理气开郁。用于肝胃气痛。

254. 皂 荚

Zaojia **Fructus Gleditsiae**
ソウキョウ **Fruit of Chinese Honeylocust**

【来源】 本品为豆科植物皂荚 *Gleditsia sinensis* Lamarch 的干燥果实。
【产地加工】 秋末冬初，采摘成熟果实，晒干。
【炮制】 取原药材，拣去杂质，洗净，晒干，锤松。
【性状】 (1)药材 呈长条状或刀鞘形，稍向一方弯曲，表面光滑，紫褐色，有突起的种子痕迹数个，先端较尖，基部钝圆，剖开后可见种子数个。质坚。味辛辣，闻之呛鼻，易引起喷嚏。
(2)饮片 为锤击而破碎的果皮、种子混合物，部分已呈粉末状。果皮外表紫褐色，内表面灰白色，均现光滑微带光泽，种皮常有横裂纹，种仁肥厚，粉性。其余特征同药材(图 254)。
【功效】 味辛、咸，性温。有小毒。通窍，消痰，涌坚，搜风。用于中风口噤、急喉痹塞、风痫、痰喘肿满等症。

252

253

254

255. 谷精草

Gujingcao Flos Eriocauli

コクセイソウ Flower of Buerger Pipewort

【来源】 本品为谷精草科植物谷精草 *Eriocaulon buergerianum* Koern. 的干燥带花茎的头状花序。

【产地加工】 秋季采收，将花序连同花茎拔出，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，切段，筛去灰屑，称"谷精草段"。

【性状】 (1)药材 头状花序呈半球形，直径 0.4～0.5cm；底部有苞片层层排列，苞片淡黄绿色，有光泽，上部边缘密生白色短毛；花序顶部灰白色，揉碎花序，可见多数黑色花药及细小黄绿色未成熟的果实。花茎纤细，长短不一，直径不及 0.1cm，淡黄绿色，有数条扭曲的棱线。质柔软。气微，味淡(图 255－1)。

以珠大而紧、色灰白、花茎短、色淡黄者为佳。

(2)饮片 谷精草段 小段长约 1cm。头状花序呈半球形，直径 0.4～0.5cm，顶部灰白色。花茎纤细，淡黄绿色，有光泽，质柔软。气微，味淡(图 255－2)。

【功效】 味辛、甘，性平。疏散风热，明目，退翳。

256. 龟 板

Guiban Carapax et Plastrum Testudinis

キバン Tortoise Plastron

【来源】 本品为龟科动物乌龟 *Chinemys reevesii* (Gray)的腹甲及背甲。

【产地加工】 全年均可捕捉，以秋、冬 2 季为多，捕后杀死或置沸水中烫死，剥取腹甲和背后甲，除去残肉，干燥。2 种加工品分别称为"血板"和"烫板"。

【炮制】 (1)龟板 取原药材，用水浸泡，置蒸锅内，蒸 45 分钟，取出，放入热水中，立即用硬刷除净皮肉，洗净，晒干，通称"龟板"。

(2)醋龟板 取砂子置锅内，武火炒热，加入净龟板片，拌炒至表面黄色，酥脆时，取出，筛去砂子，立即投入醋中淬之，捞出，干燥，称"醋龟板"，每龟板片 100kg，用醋 20kg。

【性状】 (1)药材 背甲及腹甲由甲桥相连，背甲稍长于腹甲(图 256－1)。

①腹甲 略呈板片状，近长方椭圆形，边缘板附于二侧，略呈翼状。长 10～20cm，宽 5～8cm，厚约 0.5cm。外表面黄棕色至棕色，有时具紫棕色纹理，内表面黄白色至灰白色。由 12 块腹鳞甲相对嵌合而成，嵌合处呈锯齿状缝，前端较宽，略呈圆形或截形，后端较狭且内陷，呈"V"形缺刻，二侧的边板由 4 对边鳞甲合成，在其两端往往留有一块残缘鳞甲。"血板"(图 256－2)，表面光滑，外皮残存，有时略带血痕。烫板(图 256－3)，无光泽，皮已脱落。质坚硬，断面外缘为牙白色，坚实，内为乳白色、肉红色或红棕色。气腥，味微咸(图 256－4)。

②背甲 呈长椭圆形拱状，前部略窄于后部。外表面棕褐色或黑色，前端有颈角板 1 块，脊背中央有椎角板 5 块，二侧各有对称肋角板 4 块，边缘每侧具缘角板 11 块，尾部具臀角板 2 块。

以块大、无残肉、板有血迹者为佳。

(2)饮片 ①龟板 为不规则的龟板小碎块，表面淡黄色或黄白色，有放射状纹理。内面黄白色，边缘呈锯齿状，质坚硬，可自骨板缝处断裂。气微腥，味微咸。

②醋龟板 形如龟板块，表面黄色，质松脆，略有醋气(图 256－5)。

【功效】 味咸、甘，性寒。滋阴潜阳，益肾强骨，养血补心。



255—1



255—2

256—1

256—2

256—5

256—4

256—3

257. 龟板胶

Guibanjiao **Carapacis et Colla Plastri Testudinis**
キバンキョウ **Glue of Tortoise Plastron**

【来源】 本品为龟板经煎煮、浓缩制成的固体胶。

【产地加工】 取漂泡后的净龟板，分次水煎，滤过，合并滤液（或加入明矾细粉少许），静置，滤取胶液，用文火浓缩（或加黄酒适量）至稠膏状，冷凝，切块，阴干。

【炮制】 取原药材洗净入药，习称“龟板胶”。

【性状】 药材 呈长方形或方形的扁块，深褐色。质硬而脆，断面光亮，对光照视透明。气微腥，味淡（图 257）。

以松脆、透明者为佳。

【功效】 味咸、甘，性平。滋阴，养血，止血。

258. 龟鱼皮

Guiyupi **Corium Diodontis**
キギョヒ **Balloonfish Skin**

【来源】 本品为鲀科动物六斑刺鲀 *Diodon holacanthus* Linnaeus、九斑刺鲀 *Diodon novemaculatus* Bleeker 的皮。

【产地加工】 捕获刺鲀后，将鱼皮剥下，晒干。

【性状】 药材 呈类扁盘状，全体被长棘，外表面周边灰褐色，中间黄白色，有蜂窝状小孔。内表面棘交互密集排列，黄白色，边缘薄略透明（图 258）。

【功效】 滋补肝肾，润肺止咳。

259. 辛 夷

Xinyi **Flos Magnoliae**
シンイ **Magnolia Flower Bud**

【来源】 本品为木兰科植物望春花 *Magnolia biondii* Pamp.、辛夷 *Magnolia liliflora* Desr.、湖北木兰 *Magnolia sprengeri* Pamp. 或玉兰 *Magnolia denudata* Desr. 的干燥花蕾。

【产地加工】 于冬末春初花未开放时采收，除去枝梗及杂质，阴干。

【炮制】 取原药材，拣去杂质，剪去花梗，筛去灰屑。

【性状】 (1)药材 ①望春花 呈毛笔头形或长卵形，长 2.0～3.8cm，直径 1.0～1.8cm，基部常具木质花梗。外方苞片 2～3 片，内侧有 1 鳞芽，苞片外表面密被淡黄色或灰白色长柔毛，内表面无毛；剥去苞片，可见 3 枚线形萼片和 6 枚花瓣，轮状排列，每轮 3 枚；中央为多数棕黄色雄蕊和雌蕊。质轻。气香，味辛而稍苦。

②辛夷 花被 6 枚，紫色，萼片披针形。

③湖北木兰 花被 12 枚，粉红色，萼片和花瓣形相似。

④玉兰 花被片 9 枚，白色萼片和花瓣相似（图 259－1）。

【功效】 味辛，性温。散风寒，通肺窍。用于感冒头痛、鼻塞、流脓浊涕、齿痛等症。

附：日本辛夷 *Flos Magnoliae*

【来源】 本品为木兰科植物田虫叶 *Magnolia salicifolia* Maximowcz、古不之 *Magnolia kobus* Decandolle、望春花 *Magnolia biondii* Pamp. 及其近缘植物的干燥花蕾。

【性状】 (1)药材 呈纺锤形，长 1.5～3.0cm，中部直径 0.7～1.5cm，基部常带有木质的花梗。外层苞片通常为 3 枚，密被灰白色或淡黄褐色毛，外皮毛脱落处呈褐色至暗褐色，内面平滑呈暗褐色。内部为 9 枚花被片，雄蕊以及雌蕊多数。质脆。具特异香气，味辛、稍苦（图 259－2）。

以灰褐色、绢样有光泽、毛密生、花梗少、且破碎后有芳香气者为佳。

(2)饮片 呈不规的碎块状，余同药材（图 259－3）。



257

258

259—1

259—3

259—2

260. 沙苑子

Shayuanzi　Semen Astragali Complanati

ジャエンシ　Seed of Flatstem Milkvetch

【来源】 本品为豆科植物扁茎黄芪 *Astragalus complanatus* R. Br. 的干燥成熟种子。

【产地加工】 秋末冬初果实成熟尚未开裂时采割植株，晒干，打下种子，除去杂质，再晒干。

【炮制】 (1)沙苑子　取原药材，除去杂质，筛去灰屑，洗净，干燥，通称"沙苑子"。

(2)盐沙苑子　取净沙苑子加入盐水拌匀，稍闷后置锅内，用文火加热，炒至深黄色，鼓起，有香气逸出时，取出放凉，称"盐沙苑子"。

【性状】 (1)药材　呈肾形而稍扁，长 0.20～0.25cm，宽 0.15～0.20cm，厚约 0.1cm。表面光滑，褐绿色或灰褐色，边缘一侧微凹处具圆形种脐。质坚硬，不易破碎。子叶 2，淡黄色，胚根弯曲，长约 0.1cm。气微，味淡，嚼之有豆腥味(图 260—1)。

以粒饱满、色绿褐者为佳。

(2)饮片　盐沙苑子　形如沙苑子，表面鼓起，色泽加深，微有咸味(图 260—2)。

【功效】 味甘，性温。温补肝肾，固精，缩尿，明目。

261. 没　药

Moyao　Myrrha

モツヤク　Myrrh

【来源】 本品为橄榄科植物没药树 *Commiphora myrrha* Engl. 的干燥油胶树脂。

【产地加工】 采取自然渗出的树脂；或 6～7 月将树皮割破，使树脂渗出，11 月至次年 2 月采收，阴干。

【炮制】 (1)生没药　取原药材，除去杂质，捣碎或研碎，称"生没药"。

(2)炒没药　取净的没药片按大小分开，置锅内用文火加热，炒至冒烟，表面显油亮光泽时，取出放凉，称"炒没药"。

(3)醋没药　取净没药大小分开，置锅内用文火加热，炒至冒烟，表面微熔，喷淋米醋，再炒至表面显油亮光泽时，取出，放凉，称"醋没药"。每没药 100kg，用米醋 5kg。

【性状】 (1)药材　呈不规则颗粒状或粘结成块，大小不一，直径 1～10cm。红棕色或黄棕色，表面粗糙，覆有粉尘。质坚脆，破碎面呈不规则颗粒状，带棕色油样光泽，并伴有白色小点或线纹，薄片半透明。与水共研成黄色乳状液。气香，味苦、微辣(图 261—1)。

以表面光亮、颗粒完整者为佳。

(2)饮片　①炒没药　呈小碎块状或类圆颗粒状，表面黑褐色或棕黑色，有光泽，无粉尘，半透明。余可生没药。气微香，味辛(图 261—2)。

②醋没药　呈小碎块状或圆颗粒状，表面黑褐色或棕褐色，油样光亮，半透明，略具醋气(图 261—3)。

【功效】 味苦，性平。活血止痛，消肿生肌。

260—1



260—2

261—1

261—2



261—3

262. 沉 香

Chenxiang Lignum Aquilariae Resinatum

ジンコウ Wood of Chinese Eaglewood

【来源】 本品为瑞香科植物白木香 *Aquilaria sinensis* (Lour.) Gilg. 和沉香 *Aquilaria agallocha* Roxb. 含有树脂的木材。前者主产于广东、广西，称“国产沉香”；后者主产于印度尼西亚、马来西亚、越南，称“进口沉香”。

【产地加工】 全年皆可采收，采取含树脂的沉香树干或根部，用刀削去不含树脂的部分，阴干。

【炮制】 取原药材，除去枯废白木，刷净，镑片或劈成小块。

【性状】 (1)药材 ①国产沉香 呈不规则块状或片状，长 3～15cm，直径 3～6cm。表面凹凸不平，有加工的刀痕，偶有孔洞，可见黑褐色树脂与黄白色木部相间的斑纹。孔洞及凹窝表面多，呈朽木状。质较坚实，折断面刺状。多不能沉水，有特殊香气，味苦(图 262—1)。

②进口沉香 呈盔帽状、棒状或片状，大小不一，长 7～20cm，直径 1.5～6.0cm。表面黄褐色至棕褐色，含树脂多的则呈黑褐色，并见有光泽的膏质状物凝集，常有黑色与黄色交错的纹理，平滑光润，时可见在加工时除去腐朽部分后所形成的沟、槽和空洞与刀痕。质坚实、沉重，不易折断。用刀劈开，破开面呈灰褐色，能沉于水或半沉半浮。有特殊香气，味苦(图 262—2)。

均以体重、色棕黑、油润、火燃有油渗出、香气浓烈者为佳。

(2)饮片 ①国产沉香 为不规则的极薄片或小碎块。表面可见黑褐色与黄色交错的纹理。质较轻。有特殊香气，味苦(图 262—3)。

②进口沉香 为不规则的碎块或薄片。表面可见黑色与黄色交错的纹理，破断面木纹整齐而有光泽。有特殊香气，味苦(图 262—4)。

【功效】 味辛、苦，性微温。行气止痛，温中止呕，纳气平喘。

263. 沉香曲

Chenxiangqu Lignum Aquilariae Resinatum Fermentata

ジンコウキク Leaven of Chinese Eaglewood's Wood

【来源】 本品为沉香、木香、柴胡、厚朴、白豆蔻、砂仁等 24 种药物加工而成的曲剂。

【产地加工】 将沉香、木香、柴胡、厚朴等 24 种药物，混合粉碎，过筛，混匀。每 100g 药粉加麦粉 45g，制成稀糊，搅匀，制成曲块，低温干燥。

【炮制】 取沉香曲块，用前捣碎。

【性状】 (1)药材 呈长方形小块，表面黄棕色，稍粗糙。质脆易断，断面淡黄色。具沉香等特异香气，味苦、辣(图 263—1)。

以块大小均匀、色黄棕、气香味浓者为佳。

(2)饮片 为黄棕色或淡黄色不均匀颗粒，少有碎末。具沉香等特异香气，味苦、辣(图 263—2)。

【功效】 味苦、辛，性平。解表和胃，理气疏肝。

262—1

262—2

262—3

262—4

263—1

263—2

264. 羌 活

Qianghuo **Rhizoma seu Radix Notopterygii**

キョウカツ **Rhizome and Root of Incised Notopterygium**

【来源】 本品为伞形科植物羌活 *Notopterygium incisum* Ting ex H. T. Chang 或宽叶羌活 *Notopterygium forbesii* Boiss. 的干燥根茎及根。

【产地加工】 于春、秋2季采挖，除去须根及泥沙，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片。

【性状】 (1)药材 ①羌活 为园柱状略弯曲的根茎，长 4～13cm，直径 0.6～2.5cm。顶端具茎痕。表面棕褐色至黑褐色，外皮脱落处呈黄色，节间缩短，呈紧密隆起的环状，形似蚕(习称"蚕羌"，图 264—1)；或节间延长，形如竹节状(习称"竹节羌"，图 264—2)。节上有多数点状或瘤状突起的根痕及棕色破碎鳞片。体轻，质脆，易折断。断面不平整，有多数裂隙，皮部黄棕色至暗棕色，有棕色油点，木部黄白色，射线明显，髓部黄色至黄棕色。气香，味微苦而辣。

②宽叶羌活 为根茎及根。根茎类圆柱形，顶端具茎及叶鞘残基；根类圆柱形，有纵皱纹及皮孔。表面棕褐色，近根茎处有较密集的环纹，长 8～15cm，直径 1～3cm(习称"条羌"。有的根茎粗大，呈不规则结节状，顶端具数个茎基，根较细(习称"大头羌")。质松脆，易折断。断面略平坦，皮部浅棕色，木部黄白色。气香，味微苦、辣(图 264—3)。

以根茎粗壮、横环纹密集、表面棕褐色、断面油点多、香气浓者为佳。

(2)饮片 为不规则类圆形厚片，直径 0.5～2.0cm，厚 0.2～0.4cm。切面边缘棕褐色至棕黑色，皮部棕黄色至暗棕色，有多数黄棕色油点(朱砂点)，木部黄白色，放射状，髓部黄色或黄棕色。周边暗棕色或黑棕色，有隆起的环节及须根痕。体轻质脆。气香，味微苦而辣(图 264—4)。

【功效】 味辛、苦，性温。散寒，祛风，除湿，止痛。

附：四川产羌活(图 264—5)。

264—1

264—2

264—3

264—5

264—4

265. 诃 子

Kezi Fructus Chebulae

カシ Fruit of Medicine Terminalia

【来源】 本品为使君子科植物诃子 *Terminalia chebula* Retz. 或绒毛诃子 *Terminalia chebula* Retz. *var. tomentella* Kurt. 的干燥成熟果实。

【产地加工】 于秋、冬2季果实成熟时采收，除去杂质，晒干。

【炮制】 (1)诃子 取原药材，除去杂质，洗净，干燥，通称“诃子”。

(2)诃子肉 取诃子，稍浸，闷润，去核，干燥，称“诃子肉”。

(3)炒诃子肉 取诃子肉置锅内，用文火炒至表面深黄色，取出，放凉，称“炒诃子肉”。

【性状】 (1)药材 ①诃子 呈长圆形或卵圆形，长2～4cm，直径2.0～2.5cm。表面黄棕色或暗棕色，略具光泽，有5～6条纵棱线及不规则的皱纹，基部有圆形果梗痕。质坚实。果肉易从果核上剥离，厚0.2～0.4cm，黄棕色或黄褐色，果核纺锤形，长1.5～2.5cm，直径0.8～1.5cm，浅黄色，粗糙，坚硬。种子1粒，狭长纺锤形，长约1cm，直径0.2～0.4cm，膜质种皮，黄棕色，子叶2枚，白色，相互重叠卷旋。无臭，味酸、涩、后甜(图265－1)。

以身干、肉厚、表面黄棕色、微皱、有光泽者为佳。

(2)饮片 ①诃子肉 为不规则块片状，有的为半个诃子去核后的形状，肉厚0.2～0.4cm。外表面黄褐色至深褐色，略具光泽，可见纵棱及皱纹；内表面粗糙，颗粒性。质坚实。微有酸气，味酸涩而后甜(图265－2)。

②炒诃子肉 形如诃子肉，表面深黄褐色，有火斑，微有焦香气(图265－3)。

【功效】 味苦、酸、涩，性平。涩肠敛肺，降火利咽。炒诃子肉涩肠力强。

附：印度产诃子(图265－4)。

266. 补骨脂

Buguzhi Fructus Psoraleae

ホコツシ Fruit of Malaytea Scurfpea

【来源】 本品为豆科植物补骨脂 *Psoralea corylifolia* L. 的干燥成熟果实。

【产地加工】 秋季果实成熟时采收果序，晒干，搓出果实，除去杂质。

【炮制】 (1)生补骨脂 取原药材，除去杂质，洗净，晒干，称“生补骨脂”。

(2)盐补骨脂 取净补骨脂，加入盐水拌匀，闷润后，置锅内用文火加热，炒至微鼓起、有香气逸出时，取出放凉。用时捣碎，称“盐补骨脂”。

【性状】 (1)药材 呈肾形，略扁，长0.3～0.5cm，宽0.2～0.4cm，厚约0.15cm。表面黑色、黑褐色或灰褐色，具细微波状皱纹。顶端圆钝，有1小突起，凹侧有果梗痕。质硬。果皮薄，与种子不易分离；种子1枚，子叶2，黄白色，有油性。气香，味辣、微苦(图266－1)。

以颗粒饱满、黑褐色者为佳。

(2)饮片 盐补骨脂 形如生补骨脂，微鼓起，色泽加深，有香气，略带咸味(图266－2)。

【功效】 味辛、苦，性温。温肾助阳，纳气，止泻。

265—1

265—2

265—3

265—4



266—1

266—2

267. 灵 砂

Lingsha **Artificiel Cinnabar**
レイシャ **Artificial Cinnabar**

【来源】 本品是以水银、硫黄为原料，经加热升华而成。

【产地加工】 采得水银、硫黄，经加工而得。

【制法】 水银 50g，硫黄 6 铢，先炒作青砖头，后入火炉抽之，如束针级者即成。

【炮制】 水飞入药。

【性状】 (1)药材 全体呈厚片状、柱状晶簇。个体断面 0.1mm 者柱长近 1cm，柱状—针状结合体。表面见龟裂，底面有与器皿接触痕迹(略圆而光滑)，鲜红色或暗朱红色，条痕朱红，金刚光泽。质重性脆，易打碎；易沿解理片裂，碎块呈条状，断面呈直立纤维柱状，习称"马牙柱"，有似水银样光泽。气无，味淡(图 267－1)。

以色红、有光泽、质重者为佳。本品含硫化汞(HgS)在 99%以上。

(2)粉末 呈红色或深红色长柱状颗粒，少数呈不规则状，多具棱角，透明度好于朱砂(放大 10×10)(图 267－2 左：水飞灵砂，右：灵砂粉)。

【功效】 味甘，性微寒。镇惊，安神，解毒。本品不宜多服、久服，以免慢性汞中毒。肝、肾功能不正常者慎用。

268. 阿利藤

Aliteng **Herba Alyxiae Sinensis**
アリトウ **Herb of Chinese Alyxia**

【来源】 本品为夹竹桃科植物链珠藤 *Alyxia sinensis* Champ. ex Benth. 的干燥全草。

【产地加工】 全年可采，细茎卷成盘状或扎成束状，粗茎趁鲜切段，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，稍泡，闷透，切成段或片，晒干，称"阿利藤"段。

【性状】 (1)药材 茎常扎成把、卷成盘状或束状。弯曲不直，常扭曲、下部多分枝，节常膨大，有轮生或对生枝，直径 0.4～2.0cm。老茎表面灰褐色至灰棕黄色，有土黄色椭圆形突起的皮孔，节部常有残枝折断的痕迹，外皮有时呈二层状，断裂或脱落，露出灰白色内皮和白毛状物。嫩茎灰棕色，表面有条纹，外皮脱落处呈绿色，弯曲时皮部多处断裂。质坚韧，难折断，折断时外皮呈小片状破裂。折断面不整齐，类白色，中间有淡黄色髓。叶对生或 3 枚轮生。叶片卵形或长椭圆形，边缘内卷，长 1.5～4.0cm，宽 1.0～2.0cm；上表面黄绿色或暗绿色，略有光泽；下表面绿色，中脉突出，侧脉清晰可见，嫩叶叶脉稍不清晰；叶端尖，全缘，基部楔形，近无柄，革质。叶轴三棱形，有糙手感。花序无柄或具短柄。果实卵形或呈荚果状。气微香，味微苦、涩(图 268－1 老茎、图 268－2 嫩茎、图 268－3 叶)。

以茎粗壮、色黄绿、叶多、气香者为佳。

(2)饮片 常茎、叶、花、果实混合，呈碎段状。茎段呈短圆柱形，长短不等，直径 0.4～2.0cm。两端多为斜切面，断面黄白色或浅棕黄色(放置日久)，髓明显，外皮灰褐色或灰黑色，稍有光泽，可见大小不等的棕黄色皮孔(图 268－4 茎)。

【功效】 味苦、辛，性温。有小毒。祛风利湿，活血通络。



267—1

267—2

268—3

268—2

268—1

268—4

269. 阿 胶

Ejiao **Colla Corii Asini**

アキョウ **Ass-hide Glue**

【来源】 本品为马科动物驴 *Equus asinus* L. 的皮，经煎熬浓缩而成的干燥胶块。

【产地加工】 四季均可采收，将驴皮漂泡，去毛，切成小块，再漂洗洗净，分次水煎，滤过，合并滤液，用文火浓缩（或加适量黄酒、冰糖、豆油）至稠膏状，冷凝，切块，阴干。

【炮制】 (1)阿胶丁 取阿胶块，置文火上烘软，切成小方块，称“阿胶丁”。

(2)蛤粉炒阿胶 取适量蛤粉，置炒药锅内，加热至灵活状态，投入阿胶丁，不断翻动，至鼓起成圆球形，内无硬心时取出，筛去蛤粉，放凉，称“蛤粉炒阿胶”或“珂胶珠”。

(3)蒲黄炒阿胶 将蒲黄置炒药锅内，加热至稍微变色，投入阿胶丁，至鼓起成圆球形，内无硬心时取出，筛去蒲黄，放凉，称“蒲黄炒阿胶”或“珂胶珠”。

【性状】 (1)药材 呈长方形或方形块，黑褐色有光泽，对光透视显棕色半透明，质硬而脆，断面光亮。气微，味微甜（图 269－1）。

(2)饮片 ①阿胶丁 呈碎块状，余同药材（图 269－2）。

②蛤粉炒阿胶（阿胶珠） 呈圆球形，质松泡，表面粗糙，外表灰白色或灰褐色。破面呈蜂窝状。气微弱，味微甜（图 269－3）。

③蒲黄炒阿胶 外表呈棕褐色，其余同蛤粉炒品（图 269－4）。

【功效】 味甘，性平。补血滋阴，润燥，止血。

270. 阿 魏

Awei **Resina Ferulae**

アギ **Chinese Asafetida**

【来源】 本品为伞形科植物阿魏 *Ferula assafoetida* L.、新疆阿魏 *Ferula sinkiangensis* K. M. Shen 或阜原阿魏 *Ferula fukanensis* K. M. Shen 的树脂。前者称“进口阿魏”，后二者称“新疆阿魏”。

【产地加工】 春末夏初花盛期至果初期，分次由茎上部往下斜割，收集渗出的乳状树脂，阴干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，剁成小块。

【性状】 (1)药材 ①进口阿魏 呈球粒状或不规则状团块，大小不等。表面粗糙或光滑，颜色不一，由白色、黄色、暗黄色、棕色或红棕色相间而成，无光泽。断面乳白色或浅黄棕色，在空气中渐变成红色或红棕色。有强烈持久的蒜臭，味微辣而苦，嚼之粘牙（图 270－1）。

②新疆阿魏 呈不规则块状或脂膏状，灰白色至浅黄棕色。质地似蜡，体轻，断面稍现孔隙。具强烈持久的蒜臭，味辛辣，嚼之粘牙，并有强烈的刺激性的烧灼感（图 270－2）。

以凝块状、表面具彩色、断面乳白色或稍带微红色、气味浓厚、无杂质者为佳。

(2)饮片 呈不规则小块状或脂膏状，颜色深浅不一。可见乳白色、浅黄棕色或红棕色交错，通称“五彩阿魏”。有强烈持久的蒜样特异臭气，味辛辣，嚼之有烧灼感（图 270－3）。

【功效】 味苦、辛，性温。消积，散痞，杀虫。



269—1



269—2

269—3

269—4

270—1

270—2



270—3

271. 附　子

Fuzi　Radix Aconiti Lateralis Preparatae

ブシ　Prepared Daughter Root of Common Monkshood

【来源】 本品为毛茛科植物乌头 *Aconitum carmichaeli* Debx. 侧根(子根)的加工品。

【产地加工】 于夏、秋2季采挖，摘取子根，除去泥沙、须根，习称"泥附子"，再按大小分类，加工成下列品种。

(1)盐附子　将大个的子根放入盐卤（食用胆巴）水溶液中过夜，再加食盐，继续浸泡，每日取出晒晾，至子根表面出现大量盐霜，质地变硬。

(2)黑顺片　选中等大小的子根，浸入盐卤液中数日，连同浸液煮至透心为度，捞出，用清水漂洗，纵切成约0.5cm的厚片，再用水浸漂加红糖和菜油炒成的调色液，使附片染成茶褐色，取出蒸透，烘至半干，再晒干。

(3)白附片　加工方法与黑顺片略同，但不加调色液，煮至透心后剥去黑褐色的外皮，纵切成约0.3cm的薄片，用清水浸漂，蒸透，晒至半干后，用硫黄熏后晒干。

(4)黄附片　加工方法略同黑顺片。但需刮去外皮横切，并用甘草、红花、生姜、去油牙皂加水熬成染汁，将其染成黄色，烘干。

(5)附子瓣　将较小的子根洗净后，刮去外皮，纵切2瓣，放入氯化镁溶液中，浸泡数日，加热煮沸2～3分钟，取出后用清水漂洗干净，用黄糖及菜油制成调色剂，使之染成浓茶色，再用清水漂洗至不麻舌时取出蒸熟，炕半干后再晒干。

【炮制】 附片可直接入药。

(1)炒附片　取白附片，用砂炒至体积膨胀、表面黄白色为度，取出，筛去砂，放凉。

(2)熟附片　取盐附子，用清水漂3天，每天换水2～3次，至盐分去尽后，用刀刮去外皮，清水漂尽，横切0.3～0.5cm厚片；再用米泔水漂1天，清水漂2～3天，放入水甑内，大片放木甑中间，小片放木甑周围，蒸6～8小时，至表面露出油质，倒入竹席内，平铺，用风吹至其表面"结面"，用文火烘干。

(3)煨附子　取盐附子，洗净，用清水浸漂7～10天，每天换水2～3次，至盐分去尽，取出，晾干。然后均匀铺在干净烧过的细糠灰中，上面覆盖一层净生姜片，生姜片上平覆盖2张草纸，纸上再铺一层净细糠灰，约4～5cm厚，灰上平铺少量稻草、干糠壳。然后再于四角点火引燃，约2～3天后，待糠煨灰冷，取出附子，再蒸8～10小时，至口尝无或微有麻舌感时，取出，日摊夜闷至半干，切纵薄片，晾晒干。每盐附子100kg，用生姜12kg。

【性状】 (1)药材　盐附子　呈倒圆锥形，长4～8cm，直径3～5cm。表面灰黑色，附有盐霜，顶端有凹陷的芽痕，周围有瘤状突起的支根或支根痕。质重，横切面灰棕色，形成层环多角形。气微，味咸而麻，刺舌。

(2)饮片　①黑顺片　为不规则的纵切厚片，上宽下窄，长1.7～5cm，宽0.9～3cm，厚0.2～0.5cm。外表面黑褐色，切面暗黄色，油润光泽，略透明，并有纵向脉纹。质硬而脆，断面角质样。气微，味淡(图271－1)。

②白附片　为横切厚片。无外皮，全体黄白色，半透明。中央可见多角形环纹(图271－2)。

③炒附片　形如白附子，表皮鼓起，质松脆。

④熟附片　为类圆形横切厚片。黄色，半透明，具光泽，中央可见多角形环纹。质坚硬，不易折断。气微，味淡。

⑤煨附片　为不规则薄片。灰棕色，半透明，断面光滑平整，微有光泽，具孔隙。质脆。无臭，味微咸。

⑥黄附片　呈圆形或不规则圆形片，黄色，半透明状。断面可见环纹或花纹(图271－3)。

⑦附子瓣　呈瓣状。切面边缘凸翘而中心凹陷，内外均呈淡棕色。质坚硬，角质状，半透明。剖面具纵筋线(图271－4)。

【功效】 味辛、甘，性大热。有毒。回阳救逆，补火助阳，逐风寒湿邪。

271—2

271—1

271—4

271—3

272. 忍冬藤

Rendongteng **Caulis Lonicerae**

ニンドウトウ **Honeysuckle Stem**

【来源】 本品为忍冬科植物忍冬 *Lonicera japonica* Thunb. 的干燥茎枝。

【产地加工】 于秋、冬2季采割，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，稍浸，润透，切段，干燥。

【性状】 (1)药材 呈长圆柱形，多分枝，常缠绕成束，直径0.15～0.6cm。表面棕红色至暗棕色，有的灰绿色，光滑或被茸毛；外皮易剥落。枝上多节，节间长6～9cm，有残叶及叶痕。质脆，易折断，断面黄白色，中空。气微，老枝味微苦，嫩枝味淡(图272—1)。

以表面棕红色、质嫩者为佳。

(2)饮片 忍冬藤段 为不规则的小段。表面棕红色或暗棕色。切片黄白色，中空。偶有残叶，褐绿色，略有绒毛。气微，味淡(图272—2)。

【功效】 味甘，性寒。清热解毒，疏风通络。

附：忍冬藤段 日本加工品(图272—3)。

273. 鸡内金

Jineijin **Endothelium Corneum Gigeriae Galli**

ケイナイキン **Membrane of Chicken Gizzard**

【来源】 本品为雉科动物家鸡 *Gallus gallus domesticus* Brisson 的干燥砂囊内壁。

【产地加工】 全年均可收集。杀鸡时，取出鸡肫，趁热剖开，剥取内壁，洗净，晒干。

【炮制】 (1)鸡内金 取原药材，除去杂质，用水漂去沙石，洗净，干燥，称“鸡内金”。

(2)制鸡内金 取砂子置锅内，用中火炒热至滑利容易翻动时，加入大小一致的鸡内金，拌炒至鼓起卷曲，酥脆，取出，筛去砂子，称“制内金”。

(3)焦鸡内金 取鸡内金整碎分开，置锅内，用中火加热，炒至表面呈焦黄色，取出，放凉，称“焦鸡内金”。

(4)醋鸡内金 取净鸡内金，压碎，置锅内用文火加热，炒至发泡卷曲，均匀喷洒醋液，再略炒干，取出，放凉，称“醋鸡内金”。

【性状】 (1)药材 呈不规则囊片状，完整者长约5cm，宽约3cm，厚约5mm。表面黄色、黄绿色或黄褐色，有多数条棱状皱纹，呈波浪形。质脆，易碎，断面角质样，有光泽。气微腥，味微苦(图273—1)。

以色黄、完整少碎者为佳。

(2)饮片 ①制鸡内金 表面灰黄色，发泡卷曲，质酥脆，呈焦香气(图273—2)。

②焦鸡内金 炒焦后，色变焦黄，焦香气加重，微鼓起，质松脆，易碎(图273—3)。

③醋鸡内金 表面褐黄色，略有醋气(图273—4)。

【功效】 味甘，性平。健胃消食，涩精止遗。



272—1

272—2

272—3

273—1

273—3

273—2

273—4

274. 鸡血藤

Jixueteng **Caulis Spatholobi et Millettiae**

ケイケットウ **Stem of Suberect Spatholobus**

【来源】 本品为豆科植物密花豆 *Spatholobus suberectus* Dunn. 和香花崖豆藤 *Millettia dielsiana* Harms ex Diels 的干燥藤茎。

【产地加工】 于秋、冬2季，采收茎藤，除去小枝和叶，切片，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，分档，浸12～24小时，洗净，置蒸笼内蒸至上气，趁热切薄片，烘干，筛去灰屑。

【性状】 (1)药材 ①密花豆 呈扁圆柱形或厚约0.5cm的斜切片。表面灰棕色，栓皮脱落处呈红褐色，有浅纵沟；切面髓小，偏向1侧，木部淡红色，皮部有红褐色树脂状分泌物，与木部相间排列成偏心性环。质坚硬，断面呈不整齐的裂片状。气微，味涩。

②香花崖豆藤 呈圆柱形或不规则切片。表面灰黑色，切面髓部小而居中，皮部有黑棕色树脂状物，木部淡黄色，年轮明显。

(2)饮片 ①密花豆 类圆形或椭圆形薄切片，表面粗糙，灰棕色；切面呈3～8个偏心性半圆环，木心偏在一侧，韧皮部有树脂状物，木部导管小孔不规则排列。余同药材。

②香花崖豆藤 切面无异常构造形成的花纹。表面具不规则裂纹，灰黑色。余同药材(图274)。

【功效】 味甘、涩，性平。活血，补血，通络。用于肢体麻木、腰膝酸痛等症。

275. 鸡骨草

Jigucao **Herba Abri Cantoniensis**

ケイコツソウ **Herb of Chinese Prayer-beads**

【来源】 本品为豆科植物鸡骨草 *Abrus cantoniensis* Hance 和毛鸡骨草 *Abrus mollis* Hance 的干燥全草。

【产地加工】 全年均可采挖，除去荚果、种子和泥沙，晒干。

【炮制】 取原药材，拣去荚果等杂质，快洗，捞起，润软，切碎，晒干，筛去灰屑。

【性状】 (1)药材 ①鸡骨草 全长40～100cm。根多呈圆锥形，末端常分枝，直径3～15mm，表面灰棕色，粗糙，常见瘤状突起，质硬。根状茎结节状。茎丛生，直径约2mm，灰棕色至紫褐色，小枝纤细，疏被毛茸。偶数羽状复叶，互生，小叶片长圆形，常脱落，下面有毛。气微，味微苦。

②毛鸡骨草 与鸡骨草的区别在于根多呈细长圆柱形，质地坚脆，折断时有粉尘飞出；小枝及叶片密被毛茸。

(2)饮片 鸡骨草和毛鸡骨草饮片均为根和茎切碎后的混合物，鉴别特征同药材。两饮片的区别是：毛鸡骨草的切面上大的导管孔在木部中、外侧，小孔密集，较鸡骨草多(图275)。

【功效】 味微苦，性凉。清热解毒，舒肝止痛。用于急慢性肝炎、乳腺炎等。

274



275

276. 鸡冠花

Jiguanhua　Flos et Semen Celosiae Cristatae
ケイカンカ　Cockscomb Flower

【来源】 本品为苋科植物鸡冠花 *Celosia cristata* Linne. 的干燥花序和种子。

【产地加工】 9～10月份种子成熟时，连花轴割下，晒干。

【炮制】 取原药材，拣去杂质，切成小块。

【性状】 (1)药材　花序常呈鸡冠状，或为倒圆锥状，表面暗红色。淡红色或黄白色，全体密生小花。每朵小花均被膜质灰白色苞片及花被片，内藏果实，为胞果。轻轻敲击，即有黑色细小种子散出。气微，味淡。

(2)饮片　为直径约2cm的不规则小块，表面暗红色、淡红色或黄白色，上面密生小花，轻击，即有细小黑色光亮的种子落下(图276)。

【功效】 味甘，性凉。清热止血。用于痢疾、痔血、便血、尿血和带下等症。

277. 驴　肾

Lushen　Testis et Peins Equi
ロジン　Testes and Penis of a Donkey

【来源】 本品为马科动物驴 *Equus asinus* L. 的阴茎及睾丸。

【产地加工】 全年均可采收，杀驴后，割下阴茎及睾丸，剔净残肉，洗净，拉直，悬挂于通风处阴干或晒干。

【炮制】 取原药材洗净煮熟，切成薄片，晒干，入热锅内用净砂炒烫至黄色，取出筛去砂子，放凉，称"炙驴肾"。

【性状】 (1)药材　呈长圆柱形，长约30cm，直径3～4cm。前端呈圆形，较大，常常皱缩。前端黑色，其余皆为黄白色，基部两侧各有1个大型睾丸，类圆形，扁平状。质坚硬，不易折断。气腥，味咸(图277)。

【功效】 味甘、咸，性温。益肾强筋。

278. 青木香

Qingmuxiang　Radix Aristolochiae
セイモッコウ　Dutchmanspipe Root

【来源】 本品为马兜铃科植物马兜铃 *Aristolochia debilis* Sieb. et Zucc. 的干燥根。

【产地加工】 于春、秋2季采挖，除去须根及泥沙，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片，晒干。

【性状】 (1)药材　呈圆柱形或扁圆柱形，略弯曲，长3～15cm，直径0.5～1.5cm。表面黄褐色或灰棕色，粗糙不平，有纵皱纹及须根痕。质脆，易折断，断面不平坦，皮部淡黄色，木部宽广，射线类白色，放射状排列，形成层环明显，黄棕色。气香特异，味苦(图278－1)。

以条粗、质坚实、香气浓者为佳。

(2)饮片　为圆形或扁圆形厚片，表面黄白色，有类白色与黄棕色相间排列的放射状纹理，皮部与木部间有1明显的黄棕色环纹。周边黄色或黄棕色。气香特异，味苦(图278－2)。

【功效】 味辛、苦，性寒。平肝止痛，解毒消肿。

277

276



278—2

278—1

279. 青 皮

Qingpi **Pericarpium Citri Reticulatae Viride**

セイヒ **Green Tangerine Peel**

【来源】 本品为芸香科植物橘 *Citrus reticulata* Blanco 及其栽培变种的干燥幼果或未成熟的果皮。

【产地加工】 5～6月收集自落幼果，晒干，习称“个青皮”；7～8月采收未成熟果实，在果皮上纵剖成4瓣至基部，除尽瓤瓣，晒干，习称“四花青皮”。

【炮制】 (1)青皮 取原药材，除去杂质，抢水洗净，略润，切厚片或丝，晒干。

(2)醋炒青皮 取青皮或丝，用醋喷洒拌匀，待醋液被吸尽后，用麦麸炒至微黄色为度。每青皮100kg，用醋15kg、麦麸约10kg。

【性状】 (1)药材 ①四花青皮 果皮多剖成4瓣。裂片长椭圆形，长2.5～5cm，宽为1.5～2.5cm，皮厚0.1～0.3cm。外表面青灰色或橙棕色，内表面类白色或黄白色。气微香，味苦、辛辣(图279－1)。

②个青皮 呈类球形或横剖成2瓣，直径0.3～2.0cm。外表面黑绿色，有细密的小凹油点，顶端有稍突起的花柱残基，基部有圆形的果柄痕。横剖面果皮黄白色或黄棕色，中央有瓤瓣7～13瓣。气清香，味苦、辛辣。

(2)饮片 ①青皮片 为不规则厚片或丝片。外表面青绿色或灰绿色，密生多数油室；内表面黄白色，粗糙。质硬，易折断，断面外缘有油室1～2列。气清香，味苦、辣(图279－2)。

②醋炒青皮 表面颜色加深，辛香气浓，略有醋气。

【功效】 味苦、辛，性温。疏肝破气，消积化滞。

280. 青葙子

Qingxiangzi **Semen Celosiae**

セイショウシ **Flower of Feather Cockscomb**

【来源】 本品为苋科植物青葙 *Celosia argentea* L. 的干燥成熟种子。

【产地加工】 秋季果实成熟时采割植株或摘取果穗，晒干，收集种子，除去杂质。

【炮制】 (1)青葙子 取原药材，除去杂质，筛去灰屑，通称“青葙子”。

(2)炒青葙子 取净青葙子置锅内，用文火炒至有爆裂声，香气逸出时，取出，晾凉，称“炒青葙子”。

【性状】 (1)药材 呈扁圆形，直径0.10～0.15cm。表面黑色或红黑色，平滑而有光泽，中间微隆起，侧边微凹处为种脐，解剖显微镜下观察，表面具细网状花纹。种皮薄而脆，除去种皮后可见类白色胚乳，胚弯曲于种皮和胚乳之间。无臭，无味(图280－1)。

以颗粒饱满、色黑光亮者为佳。

(2)饮片 炒青葙子 呈类圆球形或扁圆形，直径0.1～0.2cm。表面焦黑色或黑、白色相间，开裂处露出白色膨松的胚乳。质松脆。气香，味淡(图280－2)。

【功效】 味苦，性微寒。清肝明目，退翳。

279—1

279—2



280—1



280—2

281. 青 蒿

Qinghao Herba Artemisiae Annuae

セイコウ Herb of Sweet Wormwood

【来源】 本品为菊科植物黄花蒿 *Artemisia annua* L. 的干燥地上部分。

【产地加工】 秋季花盛开时采割，除去老茎，阴干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，阴干。

【性状】 (1)药材 茎呈圆柱形，上部多分枝，长 30～80cm，直径 0.2～0.6cm；表面黄绿色或棕黄色；具纵棱线；质略硬，易折断，断面中部有髓。叶互生，暗绿色或棕绿色，卷缩易碎，完整者展平后为 3 回羽状深裂，裂片及小裂片矩圆形或长椭圆形，两面被短毛。气香特异，味微苦。

以色绿、叶多、香气浓者为佳。

(2)饮片 为不规则的小段，茎、叶、花蕾混合。茎呈圆柱形，表面黄绿色或棕黄色，具纵棱线。质硬，切面中部有髓。叶多皱缩，破碎，叶缘深裂，两面无毛。气香特异，味微苦(图 281)。

【功效】 味苦、辛，性寒。清热解暑，除蒸，截疟。

282. 青 黛

Qingdai Indigo Pulverata Levis

セイタイ Natural Indigo

【来源】 本品为十字花科植物菘蓝 *Isatis tinctoria* L.、爵床科植物马蓝 *Baphicacanthus cusia* (Nees) Bremek. 和蓼科植物蓼蓝 *Polygonum tinctorium* Ait. 等的叶或茎叶，经加工制取的干燥末。

【产地加工】 于夏、秋 2 季，当植物茎叶茂盛时，割取茎叶，置大缸或木桶中，加清水浸泡 2～3 昼夜，至叶烂、茎脱皮，捞去茎叶，加入石灰(每 100kg 茎叶加石灰 8～10kg)，充分搅拌，待浸出液显紫红色时，捞取液面泡沫状物，置竹筛中晒干。

【炮制】 取原药材，筛去粗硬渣。

【性状】 (1)药材 为极细的深蓝色粉末，或多孔性疏松团块，质轻，易飞扬。微有草腥气，味淡(图 282)。

【功效】 味咸，性寒。清热解毒，凉血。用于温热发病、斑疹不透、腮腺炎、口疮等症。



281



282

283. 青礞石

Qingmengshi **Lapis Chloriti**
セイモウセキ **Chlorite-schist**

【来源】 本品为绿泥石化黑云母碳酸盐片岩或绿泥石化黑云母片岩。
【产地加工】 采挖后，除去泥沙和杂石。
【炮制】 (1)青礞石 取原药材，除去杂质，砸碎。
(2)煅青礞石 取净青礞石，置适宜容器内，用九烟武火加热煅至红透，取出放凉，碾细。
(3)火硝制青礞石 取青礞石，加等量 KNO_3 混合，置坩埚内烧煅至烟尽为度，用水飞法制成细粉。
【性状】 (1)药材 ①绿泥石化黑云母碳酸盐片岩 为片状和粒状集合体，外形呈不规则的扁块或长斜块状，黑灰色或绿灰色，夹有银色或淡黄色鳞片，具玻璃样光泽，触摸有光滑感。质酥，易碎，断面呈层状，碎后亦呈薄的斜片状鳞片，绿黑色(绿泥石化云母片)和颗粒(主为碳酸盐)。片状者具星点样闪光。条痕土黄色。气无，微牙碜(图 283－1)。
②绿泥石化黑云母片岩 主为片状或细小鳞状集合体。呈不规则扁块状或长斜块状。无明显棱角。褐黑色或绿黑色，具玻璃光泽。质软，易碎，断面呈较明显的层片状。碎粉主为绿黑色鳞片(黑云母)，有似星点样的闪光。硬度 2.0～2.5，相对密度 2.68～3.00。条痕绿灰或灰绿色。气无，味淡(图 283 2)。
以色青、块整、断面有亮星点者为佳。
(2)饮片 ①火硝煅制青礞石 呈金黄色。质酥软，轻打可碎。部分呈团块状。气无，稍有火硝味(图 283－3)。
②煅青礞石 呈粉末状，青黄色，闪金星更明显。无臭，无味(图 283－4)。
【功效】 味甘、咸，性平。消积化痰，止嗽定喘，平肝镇惊。

284. 枇杷叶

Pipaye **Folium Eriobotryae**
ビワヨウ **Loquat Fruit**

【来源】 本品为蔷薇科植物枇杷 *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl. 的干燥叶。
【产地加工】 全年均可采收，晒至 7～8 成干时，扎成小把，再晒干。
【炮制】 (1)枇杷叶 取原药材，除去杂质、梗枝和绒毛，打碎或喷水使潮，润软，切丝，干燥，筛去灰屑。
(2)蜜炙枇杷叶 取净枇杷叶丝，用炼蜜(100kg 枇杷叶丝，用炼蜜 20kg)拌炒，至蜜吸尽。
(3)炒枇杷叶 取枇杷叶净片，置炒锅内炒至微焦。
【性状】 (1)药材 呈长圆形或倒卵形，长 12～30cm，宽 4～9cm。先端尖，基部楔形，叶缘有疏锯齿，近基部全缘；上表面灰绿色、黄棕色，脉下陷；下表面密被黄色绒毛，主脉凸起明显。叶柄短，被棕黄色绒毛。革质，易折断。气微，味微苦。
(2)饮片 ①枇杷叶 片宽约 1cm，主脉切面有环状维管束环，表面光滑，有光泽，背面柔毛已除去，主脉凸起，侧脉斜向伸出。其余特征同药材。
②清炒枇杷叶 色焦黄。
③蜜炙枇杷叶 叶面棕黄色，稍有粘性，有蜜味(图 284－1)。
【功效】 味苦，性微寒。清肺止咳，降逆止呕。用于肺热咳嗽、气逆喘急、胃热呕逆、烦热口渴等症。

附：日本枇杷叶 *Folium Eriobotryae*
【来源】 本品为蔷薇科植物枇杷 *Eryobotrya japonica* (Thunb.) Lindl. 的干燥叶。
【产地加工】 摘取长成的叶，除去包裹的柔毛，洗净，阴干。
【性状】 (1)药材 呈长椭圆形或广披针形，长 12～30cm，宽 4～9cm，先端尖，基部楔形，具短叶柄，叶缘有粗锯齿。上表面绿色或绿褐色，下表面淡绿褐色，具有淡褐色的绵毛，叶脉呈淡黄褐色，突出于下表面。气微，几无味。
以新鲜、色绿者为佳。
(2)饮片 呈切段的长条形，长短不等，宽 0.2～0.5cm。叶上表面绿色，少数呈棕褐色，叶脉微凸似小颗粒状，略有光泽。叶背面灰绿色，叶脉明显突出，呈棕黄色，密被棕黄色茸毛，叶脉处尤为明显。革质。叶主脉较粗，中部有黄白色环，与外部分离，中心常空。气微，味淡(图 284－2)。

283—1

283—2

283—3



283—4



284—1

284—2

285. 板蓝根

Banlangen　　Radix Isatidis

ベンランコン　　Indigowoad Root

【来源】 本品为十字花科植物菘蓝 *Isatis indigotica* Fort. 的干燥根。

【产地加工】 秋季采挖，除去泥沙，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥，通称“板蓝根片”。

【性状】 (1)药材　呈圆柱形，稍扭曲，长 10～20cm，直径 0.8～1.0cm。表面淡灰黄色，粗糙，有纵皱纹及横生皮孔，并有支根或支根痕，根头部略膨大，顶端有一凹窝，周围边缘有暗绿色的叶柄残基，较粗的根并现密集的疣状突起及轮状排列的棕色叶柄痕。质坚实而脆，断面皮部黄白色至浅棕色，木质部黄色。气微，味微甜后苦、涩(图 285－1)。

以条长、粗大、体实者为佳。

(2)饮片　板蓝根片　为圆形薄片或斜片，皮部表面黄白色至浅棕色，可见纵皱纹及横斑痕，木质部黄色，根头部片可见叶柄残基。气微，味微甜(图 285－2 出口片)。

【功效】 味苦，性寒。清热解毒，凉血利咽。

286. 松　香

Songxiang　　Resina Pini

ショウコウ　　Colophong

【来源】 本品为松科植物马尾松 *Pinus massoniana* Lamb.、油松 *Pinus tabulaeformis* Carr. 或云南松 *Pinus yunnanensis* Franch. 树干中取得的油树脂，经蒸馏除去挥发油后的遗留物。

【产地加工】 夏季采收，在松树干上用刀挖成 V 字形或螺旋纹槽，使边材部的油树脂自伤口流出，收集后，加水蒸馏，松节油馏出，剩下的残渣冷却凝固后即为松香。

【炮制】 (1)松香　取原药材，除去杂质，置锅内用文火加热，熔化后倾入水中，放凉，取出晾干，捣碎，称“松香”。

(2)制松香　取葱煎汁，去渣，加入净松香及适量水，加热煮至松香完全熔化，倒入冷水中，待凝固后，取出晾干，称“制松香”。

【药材】 (1)松香　呈不规则半透明块状，大小不一。表面淡黄色，常有 1 层黄白色霜粉。常温时质坚而脆，易碎，断面光亮，似玻璃状。具有松油香气，味苦。加热则较软化，然后熔化。燃烧时产生棕色浓烟(图 286)。

(2)饮片　制松香　形如松香，颜色加深，味微苦。

【功效】 味苦、甘，性温。燥湿祛风，生肌止痛。

285—1

285—2

286

287. 刺五加

Ciwujia　Radix Acanthopanacis Senticosi

シゴカ　Root of Manyprickle Acanthopanax

【来源】 本品为五加科植物刺五加 *Acanthopanax senticosus* (Rupr. et Maxim.) Harms 的干燥根及根茎。

【产地加工】 于春、秋 2 季采挖，洗净，干燥。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，润透后，切段，干燥。

【性状】 (1)药材　根茎呈结节状不规则圆柱形，直径 1.4～4.2cm。根呈圆柱形，多扭曲不直，长 3.5～12.0cm，直径 0.3～1.5cm；表面灰褐色或黑褐色，粗糙，有细纵沟及皱纹，皮较薄，有的剥落，剥落处呈灰黄色。质硬，断面黄白色，纤维性。有特异香气，味微辣、稍苦、涩。根茎(图 287－1)，皮(图 287－2)。

以香气浓者为佳。

(2)饮片　为不规则厚片，表面灰褐色或黑褐色，皮部与木部较易分离。质硬，切断面黄白色，纤维性。有特异香气，味微辣、稍苦涩。

【功效】 味辛、微苦，性温。益气健脾，补肾安神。

288. 刺老鸦

Cilaoya　Cortex Araliae

シロウア　Root-bark of Japanese Aralia

【来源】 本品为五加科植物辽东楤木 *Aralia elata* (Miq.) Seem. 的根皮或树皮。

【产地加工】 春季采收，晒干。

【炮制】 将原药材拣净杂质，抢水洗净泥屑，稍润，切 0.5～1.0cm 长的段片或 0.3cm 卷丝片，晒干。

【性状】 (1)药材　①根皮　呈筒状、单卷或双卷筒状，或中部以下有分枝，微弯曲或不规则扭曲。一般长 15～36cm，皮厚 0.15～0.30cm。表面浅灰棕色至暗灰褐色，有的外层栓皮呈剥离鳞屑状，栓皮剥落处可见纵皱纹。皮孔呈圆点至椭圆点状突起或横生。内表面暗棕黄色至黄白色。质脆，易折断，断面不平坦，浅黄白色至类白色，在紫外线下显浅蓝色荧光。气微，味先微涩而后苦，口嚼无纤维渣感。根(图 288－1)、根皮(图 288－2)。

②茎干下部的树皮(包括根状茎)　大多呈卷曲不紧的单卷或双卷筒状，较直，少数弯曲，多数长 10～15cm，皮厚 0.15～0.20cm。表面具迭积状皱裂，粗糙。内表面与根皮相似。质硬脆，易折断，断面纤维性，在紫外线下亦显浅蓝色荧光。气味同上，口嚼有粗糙感。茎(图 288－3)、茎皮(图 288－4)。

(2)饮片　为不规则的槽状或半卷筒状的丝片。外表面浅灰棕色至暗灰棕色，有的外层栓皮呈剥离鳞屑状，为表面暗棕黄色至黄白色。质脆，切面浅黄白色。气微，味先微涩而后苦，口嚼无纤维渣感。

【功效】 味辛，性平。有小毒。补气安神，强精滋肾，祛风活血。

287—1

287—2

288—1

288—2

288—3

288—4

289. 刺猬皮

Ciweipi Corium Erinacei
シワイヒ Hedgehog Skin

【来源】 本品为刺猬科动物刺猬 *Erinaceus europaeus* L.、短刺猬 *Hemiechianus dauricus* Sundevall 或大耳刺猬 *Hemiechinus auritus* Gmelin 的干燥外皮。

【产地加工】 全年均可捕捉，于冬眠时捕获更易。捕得后，用刀纵剖腹部，将皮剥下，除去肉脂，翻开，撒上一层石灰，于通风处阴干。

【炮制】 (1)刺猬皮 取原药材，稍浸，刷去杂质，剁成约 3.3cm 的小块，晒干，称“刺猬皮”。

(2)制刺猬皮 取适量滑石粉置炒药锅内，用文火炒热后，将滑石粉炒轻松时，加入净刺猬皮块，拌炒至皮刺卷曲而秃，表面显黄色，鼓起，取出，筛去滑石粉放凉，称“制刺猬皮”。

【性状】 (1)药材 为密生硬刺的不规则小块，多呈板刷状或筒状，刺长 1.5～2.0cm，坚硬如针，外表面灰白色、黄色或灰褐色，皮内面灰白色或棕褐色，在腹部的皮上多有灰褐色软毛。有特殊腥臭气(图 289－1)。

以张大、刮净肉脂、刺毛整洁者为佳。

(2)饮片 制刺猬皮 形如生刺猬皮，硬刺多卷曲而秃，黄色，皮部边缘向内卷曲，皮稍鼓胀，显灰白色，附有黄白粉，易折断。微有腥臭味(图 289－2)。

【功效】 味苦，性平。凉血止血，降气止痛，固精缩尿。

290. 刺猬胆

Ciweidan Fel Erinacei seu Hemiechini
シワイタン Hedgehog Gall

【来源】 本品为刺猬科动物刺猬 *Erinaceus europaeus* L.、短刺猬 *Hemiechainus dauricus* Sundevall 的干燥胆囊。

【产地加工】 四季皆可捕捉，捕得后剖腹取胆囊。用线扎紧囊口，悬挂阴凉通风处干燥即得。

【性状】 药材 干燥胆囊呈卵形至三角形，上部狭细，下部膨大呈囊状，大小不一，一般长度 3.0～3.5cm，囊底膨大处宽 0.5～1.0cm，囊皮薄，皱缩，黑色或灰褐色，有的显光泽。囊内藏有干燥的胆汁(图 290)。

【功效】 清热明目，解毒。

291. 茉莉花

Molihua Flos Jasmini Sambac
マツリカ Flower of Arabian Jasmine

【来源】 本品为木犀科植物茉莉 *Jasminum sambac* Aiton 的干燥花。

【产地加工】 7月前后，花初开时采摘。用文火烘干或摊于席上翻晒至干。经茶厂制茶用过的茉莉花多呈锈黄色。

【炮制】 取原药材，拣去杂质。

【性状】 (1)药材 花长 1.5～2.0cm，淡棕色至棕色。花瓣裂片椭圆形，先端短尖状，表面光滑无毛，基部连合，长管状；花萼基部连合，上部细长，裂片 8～10 个，线形。花蕾极少，顶部呈圆球形。气香，味涩(图 291)。

【功效】 味辛，性热。利胃行气。用于痢疾腹痛。

289—1

289—2

290

291

292. 苦丁茶

Kudingcha **Folium Cornutae et Latifoliae**

クチョウチャ **Leaf of Broadleaf Holly**

【来源】 本品为冬青科植物大叶冬青 *Ilex latifolia* Thunb. 的叶。

【产地加工】 全年均可采摘叶片，晒干。

【炮制】 取原药材，拣去杂质。

【性状】 药材 卵状长椭圆形，革质，不皱缩，稍卷曲，先端尖，基部钝，叶缘有疏锯齿。表面黄绿色或灰绿色，有光泽，下表面黄绿色。气微，味苦(图 292)。

【功效】 味甘、苦，性大寒。散风热，清头目，除烦渴。用于头痛、齿痛、目赤、耳聋、热病烦渴、痢疾等症。

注：亦有用枸骨(*Ilex cornuta* Lindl.)叶做苦丁茶药用的。

293. 苦 木

Kumu **Ramulus et Folium Picrasmae**

ニガキ **Twig and Leaf of Indian Quassiawood**

【来源】 本品为苦木科植物苦木 *Picrasma quassioides* (D. Don) Benn. 的干燥茎枝及叶。

【产地加工】 于夏、秋 2 季采收，除去杂质，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切片或劈为丝片；叶喷淋清水，稍润，切丝，晒干。

【性状】 (1)药材 ①茎枝 呈圆柱形，长短不一，直径 0.5～2.0(～9.0)cm。表面灰绿色、棕绿色或灰褐色，有细密的纵纹及多数横向皮孔。质脆，易折断，断面不平整，淡黄色或黄色，嫩枝色较浅且髓部较大。老茎可见年轮。气微，味苦。药材(图 293－1)，断面(图 293－2)。

②叶 为单数羽状复叶，小叶卵状长椭圆形或卵状披针形，近无柄，长 4～16cm，宽 1.5～6.0 cm；先端钝尖，基部偏斜或稍圆，边缘具钝齿；两面通常绿色，有的下表面淡紫红色，沿中脉有柔毛。气微，味极苦。

以茎枝断面淡黄色、叶绿色、气味浓者为佳。

(2)饮片 ①茎枝 呈圆形厚片或丝片。厚片直径 0.5～2.0cm，厚 0.2～0.4cm。切面淡黄色，髓部较大；周边灰绿色或棕绿色。丝片呈不规则长条形，长 3～5cm，厚 0.3～0.5cm，剖片浅黄色，纹理致密。质硬。气微，味极苦。

②叶 丝片宽 0.5～1.0cm，多卷曲，绿色或紫红色。质轻略脆。气微，味苦。

【功效】 味苦，性寒。有小毒。解毒消肿，祛湿，杀虫。

附：日本苦木加工品

(1)苦木片 为茎或木的斜片，片长 2～5cm，形状不一，木呈黄白色或绿黄白色，横切面可见数轮黄色同心性环纹，纵切面可见黄条纹和纤维。常带有黑褐色外皮，可见众多棕色、横长的皮孔。偶带有心材部分，呈黄棕色。木质，难折断，斜片易纵向折断。气微，味微苦(图 293－3)。

(2)苦木块 为不规则的小块状，最大长度在 1cm 左右，黄白色或黄棕色。横断面可见细小的导管孔，常有层状裂隙；纵断面有明显的纵纹，易纵向折断。部分小块带有黑褐的外皮。气微，味微苦(图 293－4)。



292

293—1

293—2

293—3

293—4

294. 苦竹叶

Kuzhuye　　Folium Pleioblasti

クチクヨウ　　Leaf of Bitter Bamboo

【来源】 本品为禾本科植物苦竹 *Pleioblastus amarus* (Keng) Keng 的干燥嫩叶。

【产地加工】 全年均可摘取嫩叶，晒干。

【炮制】 取原药材，除去老叶、枝等杂质，切丝。

【性状】 (1)药材　叶片披针形，长 8～20cm，宽 1.0～2.8cm，有纵脉约 10 条，横脉细小。质轻，不易折断。气微，味苦。

(2)饮片　为叶片横切的丝，片宽 1～2cm，其余鉴别特征同药材(图 294)。

【功效】 味苦，性寒。清热除烦。用于热病烦渴不眠、口疮、目痛等症。

295. 苦杏仁

Kuxingren　　Semen Armeniacae Amarum

クキョウニン　　Bitter Apricot Seed

【来源】 本品为蔷薇科植物山杏 *Prunus armeniaca* L. *var. ansu* Maxim.、西伯利亚杏 *Prunus sibirica* L.、东北杏 *Prunus mandshurica* (Maxim.) Koehne 或杏 *Prunus armeniaca* L. 的干燥成熟种子。

【产地加工】 夏季采收成熟果实，除去果肉及核壳，取出种子，晒干。

【炮制】 (1)苦杏仁　取原药材，除去杂质、残留的硬壳及霉烂者，筛去灰屑，称“苦杏仁”。

(2)燀苦杏仁　取净苦杏仁，置沸水锅中略烫，至外皮微胀时，捞出，用凉水稍浸，搓去种皮，晒干后簸净，取仁。

(3)炒苦杏仁　取燀苦杏仁置锅内，用文火加热，炒至表面微黄色，取出放凉，称“炒苦杏仁”。

【性状】 (1)药材　呈心脏形，略扁，长 1.0～1.9cm，宽 0.8～1.5cm。表面黄棕色或深棕色，有微细纵皱，顶端尖，底部钝圆肥厚，左右不对称，尖端一侧有短线形种脐，圆端合点处散出多数脉纹，种仁 2 瓣，乳白色。富油性。气微，味苦，有特殊的香气(图 295-1)。

以粒饱满、完整者为佳。

(2)饮片　①燀苦杏仁　形如苦杏仁，或分离为单瓣，无种皮。表面乳白色，有特殊的香气，味苦。

②炒苦杏仁　形如燀苦杏仁，表面微黄色，偶带焦斑，有香气(图 295－2)。

【功效】 味苦，微温。有小毒。降气，止咳，平喘，润肠通便。

附：苦杏仁(日本加工品)

为不规则的切碎状，种子、种仁、种皮混合。种皮较少脱落，种皮外表面深棕黄色或浅棕黄色，脉纹明显，略显粗糙；种皮内表面灰黄棕色，微有光泽，未见外胚乳贴伏，微呈半透明状。子叶淡黄白色，外表有明显的皱纹，接合面光滑，微凹，横切面 2 子叶间呈裂缝状或不明显。种子先端尖，种脐、种脊、合点等可见。质脆，易折断。折断面略呈角质状。气微，味微苦，具较浓的氢氰酸气(图 295－3)。

294



295—1



295—2

295—3

296. 苦树皮

Kushupi Cortex Picrasmae

クジュピ Bark of Indian Quassiawood

【来源】 本品为苦木科植物苦木 *Picrasma quassioides* (D. Don) Benn. 的树皮和根皮。

【产地加工】 全年均可采收，剥取树皮晒干，但以夏、秋2季采收的质量较好。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净泥沙，润软，切丝，晒干。

【性状】 (1)药材 呈槽状或卷筒状，长20～40cm，厚0.2～0.5 cm。外表面灰绿色、灰棕色或灰黑色，具不规则裂纹，皮孔明显；内表面淡黄色，具细纵皱，质坚，不易折断，断面不平坦。味苦，性寒。

(2)饮片 丝状，宽0.3～0.4cm，其他特征同药材(图296)。

【功效】 味苦，性寒。有小毒。祛湿解毒。用于感冒、喉炎、痢疾、湿疹、毒蛇咬伤等症。

297. 苦荬菜

Kumaicai Herba Ixeritis Denticulatae

クバイサイ Herb of Denticulate Ixeris

【来源】 本品为菊科植物苦荬菜 *Ixeris denticulata* (Houtt.) Stebb. 的干燥或新鲜全草。

【产地加工】 春季采收，阴干或鲜用。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，稍润，切段，干燥。

【性状】 (1)原植物 多年生草本，高30～70cm，含乳汁。茎直立，无毛，上部分枝。基生叶倒卵状披针形或匙形，长5～10cm，宽2～4cm，先端钝圆，边缘羽状分裂，有时为琴状羽裂、有不规则尖锯齿；茎生叶无柄，基部耳状。头状花序长约0.5cm，多数集成聚伞花序；花冠长0.6～0.8cm，舌状，黄色，花舌长0.4～0.6cm，有5齿。瘦果成熟时暗褐色，冠毛白色 。气微，味苦，微酸、涩。

(2)药材 茎呈圆柱形，长30～70cm，直径0.5～1.0cm；表面紫红色，具纵沟；质脆易折断，断面平坦。叶片皱缩或破碎，绿褐色。茎生叶无柄，基部抱茎，边缘有不规则的锯齿。头状花序，苞片绿色，花黄色；瘦果黑褐色 ，纺锤形。气微，味苦(图297－1)。

以色绿、叶多、无杂质者为佳。

(3)饮片 苦荬菜段 为不规则小段，茎、叶、花混合。切面平坦，叶多皱缩，花黄色，瘦果黑褐色，纺锤形。气微，味苦(图297－2)。

【功效】 味苦，性凉。清热解毒，消肿祛瘀。

296

297—2

297—1

298. 苦楝皮

Kulianpi Cortex Meliae

クレンピ Bark of Szechwan Chinaberry

【来源】 本品为楝科植物川楝 *Melia toosendan* Sieb. et Zucc. 和楝树 *Melia azedarach* L. 的干燥树皮和根皮。

【产地加工】 全年可采，川楝皮以冬季采者最好，楝树皮以春、夏2季采收为宜。先刮去粗皮再剥皮，晒干或低温烘干。

【炮制】 取原药材，刮去外表粗皮，快洗，淋水润软，切丝或段，晒干或烘干。

【性状】 (1)药材 ①川楝皮 呈不规则的长片状或槽状卷曲，大小不等，厚2～6cm。未除去粗皮处，粗糙，灰棕色或灰褐色，皮孔点状，栓皮呈鳞片状。除去外皮者，表面淡黄色。内表面类白色或浅黄色。质坚韧，难折断，断面纤维性，片状，层层黄白相间。气微，无味。

②楝树皮 与川楝树皮相似(图298－1)。

(2)饮片 丝宽为3～4mm的薄片，厚2～6mm，亦有呈段状者。表面灰棕色，有时具有光泽的栓皮，内表面浅黄色。切面具放射纹和黄白相间的层纹。其余鉴别特征与药材同(图298－2段)。

【功效】 味苦，性寒。有小毒。驱虫，清热燥湿。用于蛔虫病等。

299. 茅 莓

Maomei Herba Rubi Parvifolii

ボウバイ Herb of Japanese Raspberry

【来源】 本品为蔷薇科植物茅莓 *Rubus parvifolius* L. 的全草。

【产地加工】 于春、夏2季，植株开花时割取地上部分，除去杂质，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，淋水稍润，切段，晒干。

【性状】 (1)药材 茎细长圆柱形，直径1～4mm，表面暗绿色或红棕色，散生皮刺，质坚脆，断面黄白色，中央有髓。叶多皱缩，破碎，完整者为奇数羽状复叶，小叶片3～5，展平后为宽卵形或椭圆形，上表面黄绿色，下表面灰白色，密被茸毛。枝端或叶腋有聚伞状圆锥花序，小花棕黄色，花瓣、花萼均5数，雄蕊多数，有离生心皮数10枚。气微，味微苦、涩。

(2)饮片 为茎、叶、花序切成短段后的混合物，长约1cm，鉴别特征同药材(图299)。

【功效】 味苦、涩，性微寒。清热解毒，活血消肿，祛风湿。用于跌打损伤、风湿痹痛、疮痈肿毒等症。



298—1

298—2

299

300. 郁　金

Yujin　　Radix Curcumae

ウコン　　Turmeri

【来源】 本品为姜科植物郁金 *Curcuma wenyujin* Y. H. Chen et C. Ling (*Curcuma aromatica* Salisb.)(习称"温郁金"或"黑郁金")、广西莪术 *Curcuma kwangsiensis* S. Lee et C. F. Ling(习称"桂郁金"或莪苓")、姜黄 *Curcuma longa* L.(习称"黄丝郁金")和莪术 *Curcuma aeruginosa* Roxb.(*Curcuma zedoaria* Rosc.)(习称"绿丝郁金")的干燥块根。

【产地加工】 冬季，地上部分枯萎后采挖，除去泥沙，切去细根，取块根蒸或煮至透心，取出晒干或低温烘干。

【炮制】 取原药材，按大小分档。用清水浸 2～3 小时，洗净捞起，淋水润透，切片，晒干或烘干；亦可取原药材，拣去杂质后打碎，如赤豆大小。

【性状】 (1)药材　①温郁金　呈长纺锤形或长圆形，少数稍压扁，两端渐尖，长 3～7cm，直径 1.0～1.5cm。表面灰棕色，有不规则纵皱。质坚硬，断面棕黑色，有蜡样光泽，内皮层明显。气微，味微苦。

②桂郁金　形同温郁金，表面浅棕黄色，纵皱纹纸质。质较硬，断面颗粒状或角质状，浅灰棕色，内皮层明显。气微，味淡。

③黄丝郁金　形同温郁金，少数一端肥大而呈圆锥形，长 2～4cm，直径 1.1～1.8cm。表面黄灰色，有细皱纹。质坚硬，断面略呈透明状，外周深黄色，为心金黄色。气清香而味辛辣。

④绿丝郁金　形同温郁金，略扁，长 2.0～4.5cm，直径 1.0～1.5cm。表面皱纹稍粗糙。质坚硬，断面半角质，少透明。味辛。

(2)饮片　多为类圆形或椭圆形，片厚 3～4mm。鉴别特征同药材。温郁金片(图 300－1)，黄丝郁金片(图 300－2)。绿丝郁金片(图 300－3)。

【功效】 味辛、苦，性寒，解郁，行气，止痛，化瘀，利胆，清心。用于胸闷胁痛、月经失调、湿热黄疸、吐血尿血、癫痫等症。

301. 斩龙草

Zhanlongcao　　Herba Senecionis Argunensis

ザンリュウソウ　　Herb of Argun Groundsel

【来源】 本品为菊科植物羽叶千里光 *Senecio argunensis* Turcz. 的干燥全草。

【产地加工】 于夏季采收，去净泥土，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，稍润，切段，干燥，称"斩龙草段"。

【性状】 (1)药材　根多数呈簇状，弯曲，表面灰褐色，质坚脆。茎圆柱形，有纵细纹，黄绿色，光滑无毛或稍有白色细毛　叶上面深绿色，背面黄绿色，基生叶有叶柄，卵状椭圆形，边缘具圆钝或尖锐锯齿；中部叶无柄，椭圆形，羽状深裂，裂片边缘缺刻状或齿状；头状花序多数，花黄色。瘦果椭圆形，平滑。气微，味苦(图 301－1)。

以质嫩、无杂质、黄绿色者为佳。

(2)饮片　斩龙草段　呈不规则的小段，根、茎、叶混合。叶多皱缩，茎断面有白色髓(图 301－2)。

【功效】 味苦，性寒。有毒。清热解毒。

300—1

300—2

300—3

301 —1

301—2

302. 斩龙剑

Zhanlongjian **Herba Veronicastri Sibirici**

ザンリョウケン **Herb of Siberian Veronicastrum**

【来源】 本品为玄参科植物轮叶婆婆纳 *Veronicastrum sibiricum* (L.) Pennell 的干燥全草。

【产地加工】 于夏、秋 2 季采收，去泥土，打捆，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，稍闷，切段，干燥，称“斩龙剑段”。

【性状】 (1)药材 茎直立，圆柱形。叶轮生，叶片广披针形或长椭圆形，先端渐尖，基部楔形，边缘有锯齿。花序狗尾状，花小，紫棕或紫褐色。蒴果卵状圆锥形，两面有沟。质轻而脆。气微，味甜、微苦(图 302－1)。

以质嫩、叶多、无杂质者为佳。

(2)饮片 斩龙剑段 呈不规则的小段状，茎、叶、花混合。茎呈圆柱形；叶轮生；叶片多破碎，完整者呈广披针形或长椭圆形，边缘有锯齿，小花紫棕或紫褐色。蒴果卵状圆锥形，两面有沟。质轻脆。气微，味甜、微苦(图 302－2)。

【功效】 味微苦，性寒。清热解毒，祛风除湿。

303. 轮环藤

Lunhuanteng **Radix Cycleae Racemosae**

リンカントウ **Lunhuanteng**

【来源】 本品为防己科植物轮环藤 *Cyclea racemosa* Oliv. 的干燥根。

【产地加工】 全年均可采收，但以秋季采者质较好，洗净，晒干或鲜用。

【炮制】 取原药材，水浸 3～6 小时，取出，中途淋水，润透，切片，晒干或烘干。

【性状】 (1)药材 根细长，波状弯曲，长 2～4cm，直径 0.5～3.0cm。表面灰棕色或灰褐色，具纵向沟纹和侧根痕，缢缩处有横向裂纹。质坚实，断面粉性，木质部偏心性，导管群放射状排列。气微，味苦。

(2)饮片 为类圆形横向切片或椭圆形片，片厚 2～4mm，表面灰棕色或灰褐色，具沟纹，切面粉性，木质部偏心性，车轮纹明显(图 303)。

【功效】 味苦，性寒。有小毒。清热解毒，理气止痛。用于急性胃肠炎、胃痛、腹痛、风湿痛等症。

302—1

302—2

303

304. 欧当归

Oudanggui Radix Levistii
オウトウキ Root of Garden Lovage

【来源】 本品为伞形科植物欧当归 *Levisticum officinale* Koch. 的干燥根。

【产地加工】 于秋季采收，除净泥土，晒干或烘干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。

【性状】 (1)药材 呈圆锥形，主根较短而粗，长 10～15cm，直径 1.7～3.5cm。表面灰棕色或灰黄色，有纵皱纹及横长皮孔状疤痕，根头部有明显的叶鞘残基，下面着生多数支根。质柔韧，断面黄白色或棕黄白色。具特异香气，味微甜而麻舌(图 304－1)。

以主根粗长、断面黄白色者为佳。

(2)饮片 呈圆形或类圆形薄片，直径 0.8～1.2(～2.0)cm，厚 0.15～0.30cm。切面灰黄色或黄白色，多平坦。形成层环明显，棕色，皮部灰黄色或黄白色，质较疏松，有裂隙，靠近形成层环周围棕色条线与黄白色皮部相间排列成放射状，棕色油点散在，较少，木部黄色，导管群棕黄色与褐色的射线相间排列成车轮状。周边灰棕黄色至棕黄褐色，纵沟纹较密，具细微的横向环纹，偶见突出表面的横长皮孔与支根痕，质柔韧略脆，易折断，断面略平坦。气清香特异(图 304－2)。

【功效】 味甘、辛，性温 驱风健胃，利尿，通经。

305. 虎 杖

Huzhang Rhizoma Polygoni Cuspidati
コジョウ Rhizome of Giant Knotweed

【来源】 本品为蓼科植物虎杖 *Polygonum cuspidatum* Sieb. et Zucc. 的干燥根茎。

【产地加工】 二春、秋 2 季采挖，除去须根，洗净，趁鲜切短段或厚片，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片，晒干。

【性状】 (1)药材 多为圆柱形短段或不规则厚片，长 1～7cm，直径 0.5～2.5cm。外皮棕褐色或棕红色，有纵皱纹及须根痕。切面皮部较薄，木部宽广，棕黄色，射线放射状，皮部与木部较易分离，断面中央有髓或呈空洞状。质坚硬。气微，味苦、涩。

以根茎粗壮、外皮棕褐色者为佳。

(2)饮片 为不规则厚片或圆柱形短段，直径 1～3cm，厚 0.4～0.8cm。切面棕黄色，皮部较薄，木部宽广，有放射状纹理，皮部与木部较易分离，根茎髓中有隔或呈空洞状。周边棕褐色，有纵皱纹及须根痕。质坚硬。气微，味微苦、涩。

【功效】 味微苦，性微寒。祛风利湿，散瘀定痛，止咳化痰。

306. 虎 肚

Hudu Gaster Tigris
コト Tiger Tripe

【来源】 本品为猫科动物虎 *Panthera tigris* L. 的胃。

【产地加工】 四季均可捕获，猎捕后剖取虎肚后，洗净，切块，烘干。

【性状】 药材 为块状物，表面棕黄色，一面有皱褶，一面平整，质地如皮状，有腥气(图 306)。

【功效】 治反胃吐食。

304—1

304—2

305



306

307. 虎 骨

Hugu Os Tigris

ココツ Tiger Bone

【来源】 本品为猫科动物虎 *Panthera tigris* L. 的干燥骨骼。

【产地加工】 全年均可捕捉，捕获后，剥去皮肉，仅留脚上的皮毛和爪。再剔净残余的筋肉，阴干。

【炮制】 (1)虎骨 取原药材，用水浸泡，除去残余筋肉，洗净，阴干，锯段，或用时捣碎，称“虎骨”。

(2)醋虎骨 取砂子置锅内，武火加热至砂滑利容易翻动时投入虎骨段，拌炒至表面黄色时取出，筛去砂子，趁热投入醋液中淬酥，取出晾干，捣碎，称“醋虎骨”。

(3)油制虎骨 取净虎骨段置沸麻油锅内，用文火加热，炸至酥脆，捞出沥去油；或取净虎骨，用麻油涂抹后，在无烟火上烤至黄酥。捣碎，称“油制虎骨”。

【性状】 药材 头骨较圆，背腹面侧扁，吻部短，额骨平，前额上部有一浅槽，顶骨后面常有1脊棱，颧骨粗大。上颌骨生有门齿3对，犬齿1对，臼齿4对，下颌骨生门齿3对，犬齿1对，臼齿3对，共有牙齿30个(图307－1)。

颈椎7节(图307－2)。胸椎13节(图307－3)。腰椎7节(图307－4)。

前肢上节为肱骨1根，其中段呈筒状，两端膨大而光滑，下端靠近骨环处内侧有一椭圆形孔，习称“风眼”。下节两骨并立，尺骨较长，桡骨较短(图307－5)。

后肢上节为股骨1根(大腿骨，习称“棒骨”)，上端有一向内侧突出半球形的股骨头，下端有长圆形凹槽，为髌骨所在处；髌骨习“虎脐”，略呈圆形，内面光滑，厚而坚重。下节两骨并列，胫骨较粗大，三棱柱形，习称“正骨”；腓骨较细，习称“邦骨”(图307－6)。

虎骨表面均呈黄白色，细腻而稍显油性。质坚而重。

【功效】 味辛，性温。祛风定痛，强筋健骨，镇惊。

308. 虎斑游蛇

Hubanyoushe Natrix Tigbina Laterulis

コハンエウダ Water Snake

【来源】 本品为游蛇科动物虎斑游蛇 *Natrix tigrina laterlis* (Berthord)的干燥全体。

【产地加工】 于春季至秋季捕捉，捕后放坛内饿2～3天，然后处死，尽快干燥，研粉。

【性状】 药材 头扁平阔，眶前鳞2枚，眶后鳞3枚，上唇鳞7枚，第3、4枚入眶。下唇鳞9枚，前5片向后逐渐增大。正对颅顶鳞间中线的项背正脊有浅纤颈沟，长15个鳞片。体鳞19－19－17行，起棱。腹鳞148～154枚，肛鳞2枚，尾下鳞60～73对。体色美丽，背色猎绿，从颈部起体之两侧有红色和黑色斑点交互排列，达体之中部后红色渐灰消失(图308)。

【功效】 解毒，祛风湿，止痛。

307—1

307—2

307—3

307—4



307—5

307—6

308

309. 虎掌南星

Huzhangnanxing **Rhizoma Pinelliae Pedatisectae**
コショウナンショウ **Rhizome of Pedate Pinellia**

【来源】 本品为天南星科植物虎掌 *Pinellia pedatisecta* Schott 的干燥块茎。

【产地加工】 秋季采挖出块茎，去掉茎苗及须根，刮去外皮或用筐撞去外皮，晒干或烘干，常晒至半干时用硫磺熏1次，则色白易干。

【炮制】 同天南星。

【性状】 (1)药材 扁平不规则形，由主块茎及多数附着的小块茎组成，形如虎脚掌，直径为1.5～5.0cm，每一块茎中心都有一茎痕，周围有麻点状根痕。质坚硬，断面色白，粉性。气微辛，味麻辣(图309)。

(2)饮片 制虎掌南星 为类圆形薄片。断面角质状，半透明，质脆易碎，色黄白，微臭。

【功效】 味苦、辛，性温。有毒。燥湿化痰，祛风止痉，散结消肿。

310. 虎 筋

Hujin **Ligamentum Tigris**
コキン **Tiger Sinew**

【来源】 本品为猫科动物虎 *Panthera tigris* L. 的脚筋。

【产地加工】 全年均可采收。取虎的四肢，抽出足筋，阴干。

【炮制】 取原药材，用温水略洗，置炭火上烘软，切成小段，称“虎筋片”。

【性状】 (1)药材 呈长条状，侧扁。表面金黄或棕黄色，有光泽而透明，质坚韧。气微腥(图310－1)。

以身干、条长、粗大、金黄色、有光泽者为佳。

(2)饮片 虎筋片 黄白色，略透明，有光泽(图310－2)。

【功效】 治风湿性关节炎。

311. 虎 鞭

Hubian **Penis et Testis Tigris**
コウベン **Penis and Testes of Tiger**

【来源】 本品为猫科动物虎 *Panthera tigris* L. 的干燥阴茎及睾丸。

【产地加工】 全年均可采收，猎捕后，剖腹割取阴茎及睾丸，去净附着的肌肉及油脂，拉直，干燥。

【炮制】 将原药材洗净、烘软，切厚片，干燥，筛去灰屑。

【性状】 药材 呈长条状，表面棕色。中部有睾丸1对(此标本取出1枚)，椭圆形，略扁，皱缩。质坚韧。气微腥(图311)。

以粗壮、条长、无残肉及油脂者为佳。

【功效】 治瘰疬。

310—1

309

311

310—2

312. 明党参

Mingdangshen **Radix Changii**
ミントウジン **Root of Medicinal Changium**

【来源】 本品为伞形科植物明党参 *Changium smyrnioides* Wolff. 除去外皮的干燥根。

【产地加工】 春季挖取根，除去须根，洗净，入沸水中煮至无白心，取出，刮去外皮，晒干。

【炮制】 取原药材，拣去杂质，分档，略浸，润软，切 2～3mm 厚的薄片，晒干。

【性状】 (1)药材 呈长圆柱形、纺锤形或不规则条块状，长 6～20cm，直径 0.5～2.0cm。表面黄白色，光滑或有纵向沟纹。质坚实而脆，断面角质样，皮部黄白色，本部类白色，有时中心有空隙。气微，味淡。

(2)饮片 厚约 2mm，直径 0.5～2.0cm，黄白色角质样的薄片，鉴别特征同药材(图 312)。

【功效】 味甘、微苦，性微寒。滋阴润肺，化痰止咳，和胃止呕。用于肺燥咳嗽，呕逆等症。

313. 岩白菜

Yanbaicai **Rhizoma Bergeniae**
ガンビャクサイ **Rhizome of Purple Bergening**

【来源】 本品为虎耳草科植物岩白菜 *Bergenia purpurascens* (Hook. f. et Thams.) Engl. 和厚叶岩白菜 *Bergenia crassifolia* (L.) Fritsch. 的干燥根茎。

【产地加工】 于秋、冬 2 季，挖取根茎，除去泥沙、杂质及残叶，晒干。

【炮制】 取原药材，拣去杂质，除去须根，切片，筛去灰屑。

【性状】 (1)药材 ①岩白菜 根茎呈类圆柱形，稍弯曲，长 10～30cm，直径 1～2cm。表面棕灰色至棕黑色，环节密集隆起，节间长 1～6～11mm，节上常残留棕黑色叶基和凹点状或突起的根痕。质坚实而脆，易折断，断面类白色或粉红色，粉性，白色维管束点排列成环，有时有棕黑色斑块于髓部出现。气微，味苦、涩。

②厚叶岩白菜 特点是节间较长 3～5～15mm，其余特征同岩白菜。

(2)饮片 为根茎横切片，片厚 2～4mm，表面棕灰色至棕黑色，有皱缩纹，切面类白色或粉红色，粉性，近边缘有类白色点状维管束环列，一侧点稍大，对侧较小，中央是宽阔的髓部(图 313)。

【功效】 味甘、涩，性凉。清热解毒，收敛止血。用于咳嗽、吐血、咯血、淋浊、白带、慢性气管炎等症。

314. 岩羊角

Yanyangjiao **Cornu Pseudoidis Nayauris**
ガンヨウカク **Bharal Horn**

【来源】 本品为牛科动物岩羊 *Pseudois nayaur* (Hodgson)的角。

【产地加工】 四季均可捕捉，取角烧成炭，研细。

【性状】 药材 角粗而短，角基始向外分歧而不增高，角尖略微偏向上方，角弯度不大，最长约 60cm。雌岩角短小。角表面光滑。且角尖端部之内侧，有极微的小棱，但不形成环棱(图 314)。

【功效】 味咸，性寒。清热解毒。

312

313

314

315. 岩松鼠骨

Yansongshugu **Os Sciurotamiatis**

ガンショウソコツ **Chinese Rock Squirrel Bone**

【来源】 本品为松鼠科动物岩松鼠 *Sciurotamias davidianus* Milne -Edwards 的骨骼。

【产地加工】 四季均可猎捕。捕后杀死，剥皮，剔净肌肉取骨，置通风干燥处干燥。

【性状】 药材 头骨、躯干骨、四肢骨表面均呈黄白色，四肢骨有时残留毛。表面显油性，不光滑(图 315)。

【功效】 活血祛瘀，镇痛。

316. 罗布麻叶

Luobumaye **Folium Apocynii Venetii**

ラフマヨウ **Dogbane Leaf**

【来源】 本品为夹竹桃科植物罗布麻 *Apocynum venetum* L. 的干燥叶。

【产地加工】 夏季采叶，除去枝条等杂质，晒干。

【炮制】 取原药材，拣去硬梗、杂质，筛去泥屑。

【性状】 (1)药材 多皱缩、卷曲或破碎。完整叶片展平后呈椭圆状披针形，长 2～5cm，宽 0.5～2.0cm，淡绿色，无毛；叶端具小芒尖，基部楔形，全缘或具细齿，叶柄短，约 4mm。气微，味淡。

(2)饮片 鉴别特征同药材(图 316)。

【功效】 味淡、涩，性凉。清热利水，平肝安神。用于高血压、头晕、心悸、失眠等症。

317. 牧马豆

Mumadou **Herba Thermopsis Lanceolatae**

ボクバズ **Herb of Lanceleaf Thermopsis**

【来源】 本品为豆科植物披针叶黄华 *Thermopsis lanceolata* R. Br. 的干燥全草。

【产地加工】 7～9 月份结果时收割，晒干或风干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，稍润，切段，干燥，称“牧马豆段”。

【性状】 (1)药材 茎圆柱形，表面有细纵纹。叶多卷曲，小叶片倒卵状长圆形或倒披针形。荚果条形，种子肾形，黑褐色，有光泽。气微，味苦(图 317- 1)。

以完整、质干、无杂质者为佳。

(2)饮片 牧马豆段 呈不规则的小段，茎、叶、果实混合。茎表面具细纵纹，叶多破碎，荚果多断裂，种子肾形，黑褐色，有光泽。气微，味苦(图 317- 2)。

【功效】 味甘，性微温。有毒。祛痰，止咳。

315

316

317—1

317—2

318. 知 母

Zhimu Rhizoma Anemarrhenae

チモ Rhizome of Common Anemarrhena

【来源】 本品为百合科植物知母 *Anemarrhena asphodeloides* Bge. 的干燥根茎。

【产地加工】 于春、秋2季采挖，除去须根及泥沙，晒干，习称“毛知母”；除去外皮，晒干，习称“知母肉”。

【炮制】 (1)知母 取原药材，除去杂质及毛须，洗净，润透，切厚片，干燥，筛去毛屑，称“知母”。

(2)盐知母 取知母片，用盐水拌匀，稍闷，置锅中用文火加热，炒干或先将知母片置锅中，边拌炒边喷洒盐水，炒干，取出，放凉，称“盐知母”。

【性状】 (1)药材 ①毛知母 呈长条状，微弯曲，略扁，少有分枝，长3～15cm，直径0.8～1.5cm。顶端有残留的浅黄色叶痕及茎痕，习称“金包头”；上面有1凹沟，具紧密排列的环节，节上密生黄棕色的残存叶基，由两侧向根茎上方生长；下面较皱缩，并有凹陷或突起的点状根痕。质硬，断面黄白色。气微，味微甜、略苦，嚼之带粘性(图318—1)。

②知母肉 表面黄白色，有扭曲的沟纹，有的可见叶痕及根痕(图318—2)。

以条肥大、质硬、断面黄白者为佳。

(2)饮片 ①知母片 为不规则的类圆形厚片，表面黄白色，周边黄棕色至棕色(毛知母)或黄白色(知母肉)。气微，味微甜、略苦，嚼之带粘性(图318—3)。出口片(图318—4)。

②盐知母 形如知母片，色泽加深，味微咸。

【功效】 味苦、甘，性寒。清热泻火，生津，润燥。

319. 使君子

Shijunzi Fructus Quisqualis

シクンシ Fruit of Rangooncreeper

【来源】 本品为使君子科植物使君子 *Quisqualis indica* L. 的干燥成熟果实。

【产地加工】 秋季果实变紫黑时采收，除去杂质，晒干或微火烘干。

【炮制】 (1)使君子 取原药材，除去杂质。用时捣碎。

(2)使君子仁 取净使君子，除去外壳，称“使君子仁”。

(3)炒使君子仁 取使君子仁置锅内，用文火炒至表面现焦火色，有香气逸出时，取出，晾凉，称“炒使君子仁”。

【性状】 (1)药材 呈卵形或卵圆形，形似橄榄状。具5条纵棱，偶有4～9条棱者，长2.5～4.0cm，直径1.5～2.0cm。表面黑褐色或紫黑色，光滑，微有光泽。顶端狭尖，基部钝圆，有明显的圆形果柄痕。质坚硬，横切面多呈五角星形，棱角外壳较厚，中间呈类圆形空腔。除去外壳，内有长椭圆形或纺锤形种子1粒，长约2cm、直径0.6～1.0cm；表面棕褐色或黑褐色，有纵皱纹；种皮薄，易剥离；子叶2片，黄白色，有油性。气微香，味微甜(图319—1)。

以身干、个大、种仁饱满、色黄白者为佳。

(2)饮片 ①使君子仁 呈长椭圆形或纺锤形，长1～2cm，直径0.6～1.0cm。表面棕色或棕褐色，皱缩，有纵皱纹，种皮薄脆，易剥落而露出黄白色子叶，子叶2片，肥厚，边缘不整齐，胚根细小成点状。气微香，味微甜(图319—2)。

②炒使君子仁 形如使君子仁，表面微现焦黄色。气香，味微甜(图319—3)。

【功效】 味甘，性温。杀虫消积。

318—1

318—2

318—4



318—3

319—3

319—1

319—2

320. 侧柏叶

Cebaiye　　Cacumen Biotae
ソクハクヨウ　　Lesfy Twigs of Chinese Arborvitae

【来源】 本品为柏科植物侧柏 *Biota orientalis* (L.) Endl. 的干燥枝梢及叶。

【产地加工】 全年均可采收，常于夏、秋2季采收嫩枝叶，阴干。

【炮制】 (1)侧柏叶　取原药材，拣去杂质，搓去粗梗。

(2)侧柏叶炭　取净侧柏叶，清炒至外呈焦褐色，取出，晾干，称"侧柏叶炭"。

【性状】 (1)药材 带叶枝梢多分枝，小枝扁平，长短不一。叶细小，鳞片状，贴伏于扁平枝上，交互对生，黄绿色或深绿色。质脆，易折断，断面黄白色。气清香，味苦涩、微辛。

(2)饮片 ①侧柏叶　多为短嫩带叶小枝，片长0.2～2.0cm，其他特征同药材。

②侧柏叶炭 多呈焦褐色，余同侧柏叶(图320)。

【功效】 味苦、涩，性寒。凉血止血。用于咳血、吐血、鼻血、尿血、便血等症。

321. 佩　兰

Peilan　　Herba Eupatorii
ハイラン　　Herb of Fortune Eupatorium

【来源】 本品为菊科植物佩兰 *Eupatorium fortunei* Turcz. 的干燥全草。

【产地加工】 于夏季开花前，割取地上部分，拣去杂草，晒干或阴干。

【炮制】 取原药材，拣去杂草，切去根，下半段略浸水，上部喷清水，润软，切片，晒干。

【性状】 (1)药材 全草长100cm左右。茎平直圆柱形，直径0.15～0.40cm，分枝少；表面黄绿色或略带紫色，具细纵皱，节明显；质脆，易折断，断面纤维状，类白色，木部有疏孔，髓部占切面1/2。叶对生，叶柄短，叶片多皱缩，破碎或脱落，绿褐色或微带黄色，完整者展开呈3深裂，中裂片长圆形或长圆状披针形，叶缘有锯齿，背面有疏毛。气香，味微苦。

(2)饮片　为全草的切碎品，片长约0.5cm，其他特征同药材(图321)。

【功效】 味辛，性平。化湿醒脾，祛暑湿。用于暑湿发热、胸闷、反胃口臭、口中甜腻等症。

322. 乳　香

Ruxiang　　Olibanum
ニュウコウ　　Frankincense

【来源】 本品为橄榄科植物卡氏乳香树 *Boswellia carterii* Birdw. 的干燥胶树脂。

【产地加工】 春、夏2季均可采收，春季为盛产期。采收时可先在树干皮部由下向上作一切口，使树脂渗出，数日后凝固即可采取，干燥，置密闭、阴凉处贮存。

【炮制】 (1)生乳香　取原药材，除去木屑等杂质，捣碎，称"生乳香"。

(2)炒乳香　取净乳香置锅内，用文火加热，炒至冒烟，表面黑褐色显油亮光泽，取出放凉，称"炒乳香"。

(3)醋乳香　取净乳香置锅内，用文火加热，炒至冒烟，表面微熔，喷淋米醋，再炒至表面光亮，取出放凉，称"醋乳香"。每100kg乳香，用醋5kg。

【性状】 (1)药材 多呈小乳头状、泪滴状颗粒或不规则小块，长0.5～3.0cm。淡黄色或棕红色，半透明。表面有1层类白色粉尘，除去粉尘的无光泽。质坚脆，断面蜡样，无光泽。气香，味微苦(图322—1)。

以乳头状、淡黄色、半透明者为佳。

(2)饮片 ①炒乳香　形如乳香，表面深黄色，略透明，质坚脆。有香气(图322—2)。

②醋乳香 形同乳香，表面深黄色，油亮，略具醋气(图322—3)。

【功效】 味辛、苦，性温。活血止痛，消肿生肌。

320

321

322—1

322—2

322—3

323. 金牛草

Jinniucao Herba Polygalae Telephioidis seu Polygalae Chinensis
キンゴソウ Herb of Smallflower Milkwort

【来源】 本品为远志科植物小花远志 *Polygala telephioides* Willd. 和华远志 *Polygala chinensis* L. 的干燥全草。小花远志习称"小金牛草"，华远志习称"大金牛草"。

【产地加工】 于夏、秋2季，连根挖起小草，除去泥沙及杂质，扎成小把，晒干。

【炮制】 取原药材，拣去杂质，快洗，捞起，润软，切片，晒干，筛去灰屑。

【性状】 (1)药材 ①小金牛草 全草长5～20cm，全体被柔毛。根细小，淡黄色，质硬，断面黄白色。茎细弱，少分枝，表面棕黄色，质硬脆，折断面中空。叶无柄，互生，叶片多皱缩或脱落，展平后呈卵形或长圆形，长约1.5cm，宽达0.6cm，叶端有一小突尖，在叶腋有时可见花及果实。蒴果近扁圆心形，顶端有缺刻，萼片宿存。气无，味淡。

②大金牛草 全草较长，6～40cm。叶片展平后长可达6cm，宽达2cm。蒴果长约0.4cm。

(2)饮片 为茎和叶切片的混合物，鉴别特征同药材(图323)。

【功效】 味辛，性平。活血祛瘀，化痰止咳，解毒。用于咳嗽胸痛、肺结核、肝炎、跌打损伤、毒蛇咬伤等症。

324. 金佛草

Jinfocao Herba Inulae
キンブツソウ Inula Herb

【来源】 本品为菊科植物条叶旋覆花 *Inula linariifolia* Turcz. 或旋覆花 *Inula japonica* Thunb. 的干燥地上部分。

【产地加工】 于夏、秋2季采割，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，切段，干燥。

【性状】 (1)药材 ①条叶旋覆花 茎呈圆柱形，上部分枝，长30～70cm，直径0.2～0.5cm；表面绿褐色或棕褐色，疏被短柔毛，有多数细纵纹；质脆，断面黄白色，髓部中空。叶互生，叶片条形或条状披针形，长5～10cm，宽0.5～1.0cm；先端尖，基部抱茎，全缘，边缘反卷；上表面近无毛，下表面被短柔毛。头状花序顶生，直径0.5～1.0cm，冠毛白色，长约0.2cm。气微，味微苦。

②旋覆花 叶片椭圆状披针形，宽1.0～2.5cm，边缘不反卷。头状花序较大，直径1～2cm，冠毛长约0.5cm(图324—1)。

以绿褐色、无杂质者为佳。

(2)饮片 金佛草段 为不规则小段，茎、叶、花混合。茎呈圆柱形，长约1cm。表面绿褐色或紫褐色，疏被短柔毛。质坚实而硬，切面黄白色，髓白色或中空。叶全缘，边缘不反卷，黑绿色。花黄色。气微，味微苦(图324—2)。

【功效】 味苦、辛、咸，性温。降气，消痰，行水。

324—1

323

324—2

325. 金环蛇

Jinhuanshe　　Musculus et Os Bungari Fasciati

キンカンダ　　Gold-banded Krait

【来源】 本品为眼镜蛇科动物金环蛇 *Bungarus fasciatus* (Scheneider)除去内脏的干燥全体。

【产地加工】 于夏、秋2季捕捉，捕得后，剖腹除去内脏，剔去牙齿，焙干或趁鲜直接浸酒。

【性状】 药材　全长70～180cm。头细小，略带椭圆形。眼小，椭圆形。鼻鳞2枚，上唇鳞7枚，眶前鳞1枚，眶后鳞2枚，前颞鳞1枚，后颞鳞2枚，无颊鳞。体鳞光滑无棱，背鳞15行。腹鳞214～216枚，肛鳞单一，尾下鳞单列。头背黑色，有∧形黄纹斜达颈侧。躯干和尾部有黑黄相兼的宽环纹绕周身，两者的宽度相近，占3～5枚鳞片，黄色环纹数20～28＋3～5个。贴腹部色较淡(图325)。

【功效】 味咸，性温。活血通络，祛风镇痛。

326. 金果榄

Jinguolan　　Radix Tinosporae

キンカラン　　Root of Hairystalk Tinospora

【来源】 本品为防己科植物青牛胆 *Tinospora sagittata* (Oliv.) Gagnepo. 或金果榄 *Tinospora capillipes* Gagnepo. 干燥块根。

【产地加工】 于秋、冬2季，挖取块根，切去须根，洗净，晒干或烘干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，浸泡，洗净，取出，润透，切片，晒干或烘干。

【性状】 (1)药材 呈不规则团块状，长5～10cm，直径3～6cm。表面棕黄色或淡褐色，粗糙，具深纵皱。质坚硬，不易破碎，断面淡黄白色，具深色花纹，粉性。气微，味苦。

(2)饮片 为类圆形或不规则形薄片，片厚约3mm，其余特征同药材(图326)。

【功效】 味苦，性寒。清热解毒，利咽。用于咽喉肿痛、风热咳嗽、痈疖等症。

327. 金　鱼

Jinyu　　Carassiuss Auratus

キンギヨ　　Goldfish

【来源】 本品为鲤科动物金鱼 *Carassius auratus* (L.)的肉或全体。

【产地加工】 随用随取，去内脏，鲜用或焙干。

【性状】 药材　为鲫鱼的变种。经人工养殖后，体型变异甚大。体长一般在6～10cm；头腹俱大，而显粗短；尾分单尾与双尾。头部变化大，有平头、狮头、鹅头及绒球等多种，除平头外，多生有草莓状瘤；眼凸出，眼球膨大，其形状有龙眼、朝天眼、水泡眼等，鳃有正常鳃和反鳃。除正常鳞外，鳞片尚有透明鳞和珍珠鳞，侧线鳞22～28。鳍大，背鳍有或无；臀鳍有单鳍和双鳍；尾鳍多分为3叶或4叶而披散。体的颜色变化大，有灰、黑、白、紫、蓝、橙红、古铜、杂斑、五花等色(图327)。

【功效】 清热，利水，解毒。

325

326

327

328. 金荞麦

Jinqiaomai **Rhizoma Fagopyri Cymosi**

キンチョウバク **Rhizome of Wild Buckwheat**

【来源】 本品为蓼科植物野荞麦 *Fagopyrum cymosum* (Trev.) Meisn. 的干燥根茎。

【产地加工】 于秋、冬2季采挖，除去须根，洗净，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质及残留须根，水浸1～2小时，洗净，润透，切厚片，干燥。

【性状】 (1)药材 呈不规则块状或圆柱状，稍有分枝，分枝基部呈瘤状，长3～15cm，直径1～4cm。外表面深棕褐色，有纵皱纹；切面木部黄白色或淡棕红色，有放射状纹理，髓棕褐色。质坚硬。气微，味微涩(图328—1)。

(2)饮片 金荞麦片 为类圆形的厚片。表面深棕褐色，切面木部黄白色或淡棕红色，有放射状纹理，髓部棕褐色。质硬。气微，味微涩(图328—2)。

【功效】 味微辛、涩，性凉。清热解毒，排脓祛瘀。

329. 金钱白花蛇

Jinqianbaihuashe **Bungarus Parvus**

キンセンビャッカダ **Little Silver-banded Krait**

【来源】 本品为眼镜蛇科动物银环蛇 *Bungarus multicinctus multicinctus* Blyth. 除去内脏的幼蛇干燥体。

【产地加工】 于夏、秋2季捕捉幼蛇，如人工饲养则取孵化出1～3周的小蛇，剖腹除去内脏，擦净血迹，用乙醇浸泡处理后，以头为中心盘成圆盘状，用竹签横穿固定，晒干或烘干。

【炮制】 取原药材除去灰屑，切段，称“金钱白花蛇段”。

【性状】 (1)药材 呈圆盘状，头在中央，尾细常纳于口内。盘径3～15cm，蛇体直径0.3～2.0cm。背部黑色或灰黑色，有光泽，有多数白色环纹，并有1条显著突起的脊棱，鳞片细密。腹部黄白色，鳞片稍大。内表面黄白色。气微腥，味微咸(图329—1)。

以头尾齐全、肉色黄白、盘径小者为佳。

(2)饮片 金钱白花蛇段 呈小段状，可见黑色或灰黑色鳞片间有白色环纹，内表面黄白色(图329—2)。

【功效】 味甘、咸。性温。有毒。祛风，通络，止痉。

329—1

328—1

328—2

329—2

330. 金钱草

Jinqiancao　　Herba Lysimachiae

キンセンソウ　　Herb of Christing Loosestrife

【来源】 本品为报春花科植物过路黄 *Lysimachia christinae* Hance 的干燥全草。

【产地加工】 于夏、秋2季采收，除去杂质，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，抢水洗净，沥去水，切段，干燥。

【性状】 (1)药材 常缠绕成团，无毛或被疏柔毛。茎扭曲，表面棕色或暗棕红色，有纵纹，下部茎节上有时具有须根，断面实心。叶对生，多皱缩，展平后呈宽卵形或心形，长1～4cm，宽1～5cm，基部微凹，全缘；上表面灰绿色或棕褐色，下表面色较淡，主脉明显突起；用水浸后，对光透视可见黑色或褐色条纹；叶柄长1～4cm。有的带花，花黄色，单生叶腋，具长梗 。蒴果球形。气微，味淡(图330—1)。

以叶大、须根少者为佳。

(2)饮片 金钱草段 为不规则的小段，根、茎、叶、花混合。根纤细，淡黄色。茎细，有纵纹，表面棕色或暗棕色。叶多皱缩，上表面灰绿色或棕褐色，下表面色较浅，主脉明显突起。花棕色，蒴果球形。气微，味淡(图330—2)。

【功效】 味甘、咸，性微寒。清热利湿，通淋，消肿。

331. 金银花

Jinyinhua　　Flos Lonicerae

キンギンカ　　Honeysuckle Flower

【来源】 本品为忍冬科植物忍冬 *Loniera japonica* Thunb.、红腺忍冬 *Lonicera hypoglauca* Miq.、山银花 *Lonicera confusa*(*Sweet*) DC. 或毛花柱忍冬 *Lonicera dasystyla* Rehd. 的干燥花蕾或带初开的花。

【产地加工】 夏初花开放前采收，干燥；或用硫黄熏后干燥。

【炮制】 取原药材，除去杂质，筛去灰屑，称“生金银花”。

【性状】 (1)药材 ①忍冬花蕾 呈棒状，上粗下细，略弯曲，长2～3cm，上部直径0.3cm，下部直径约0.15cm。表面黄白色或绿白色，贮久色渐深，密被短柔毛。偶见叶状苞片。花萼绿色，先端5裂，裂片有毛，长约0.2cm。开放者花冠筒状，先端二唇形，上唇不裂，下唇4裂；雄蕊5个，附于筒壁，黄色；雌蕊1个，子房无毛。气清香，味淡、微苦(图331)。

以花蕾多、色黄白、条长、气清香者为佳。

②红腺忍冬花蕾 长2.5～4.5cm，直径0.08～0.20cm。表面黄白色至黄棕色，无毛或疏被毛。萼筒无毛，先端5裂，裂片长三角形，被毛。开放者，花冠下唇反转。花柱无毛。气香，味淡。

③山银花花蕾 长1.6～3.5cm，直径0.05～0.20cm。萼筒和花冠密被灰白色毛，子房有毛。气微，味淡。

④毛花柱忍冬花蕾 长2.5～4.0cm，直径0.10～0.25cm。表面淡黄色，微带紫色，无毛。花萼裂片短三角形。开放者花冠上唇常不整齐，花柱下部多密被长柔毛。气微，味淡。

【功效】 味甘，性寒。清热解毒，凉散风热。

330—1

330—2

331

332. 金锦香

Jinjinxiang Herba Osbeckiae

キンキンコウ Herb of Chinese Osbeckia

【来源】 本品为野牡丹科植物金锦香 *Osbeckia chinensis* L. 的干燥带根全草。

【产地加工】 于夏、秋2季采挖，除去杂质，洗净泥土，晒干，或鲜用。

【炮制】 取原药材，拣净杂质，水洗，稍润，切段，晒干。

【性状】 (1)药材 全草长达90cm。根圆柱形或锥状圆柱形，直径0.4～1.2cm，灰褐色，木质，较硬脆。茎方柱形，老茎类圆柱形，直径0.2～0.4cm，黄绿色至紫褐色，密被黄色糙伏毛，质脆易折，断面中空或具白色髓心。叶对生，有短柄，叶片线形或线状披针形，长1～5cm，宽0.2～0.6cm，先端尖，基部钝圆，上表面黄绿色，下表面淡绿色，两面均被糙伏毛，基出脉3～5条。花头状簇生枝顶，萼黄棕色，花冠多脱落。蒴果钟状，宿萼杯状，浅棕色至棕黄色。气微，味涩而微甜(图332—1)。

以叶多、色绿、带果者为佳。

(2)饮片 为段片。根、茎多切成段，叶多切成不规则碎片，少有完整者，其他性状与原药材相同(图332—2)。

【功效】 味甘、淡，性凉。祛风除湿，止咳平喘，止血消瘀。

333. 金 箔

Jinbo Aurum

キンパク Gold Foil

【来源】 本品为自然金属元素自然金 Native gold 或炼制纯金轧制的纸状薄片。

【产地加工】 取金之块片，置于专用“薄皮”间锤击至薄而得。“薄皮”为一种坚韧轻薄之皮革，是牛盲肠之外层薄膜。

【炮制】 原品入药。

【性状】 药材 ①自然金 呈不规则团块状、薄片状、粒状、鳞片状、网状、树枝状、纤维状集合体。金黄色，强金属光泽，相对密度为15.6～18.3，纯金为19.3。无解理。富延展性(50g黄金能抽出70km左右长的细丝，能轧成只有10^{-6}mm厚的薄片)。硬度2～3。条痕金黄色。在空气中不氧化，化学性质稳定(只溶于王水)。

②金箔 呈薄片状，边缘不整齐，面积大小不等；或为3～5cm的圆形薄片，或为长2cm、宽1cm的长方形薄片，或为8cm²正方形薄片，或为不规则碎片。亮金黄色，表面光滑，有强金属光泽。质菲薄，易漂浮。无气，无味(图333)。

以色亮黄、质菲薄、易漂浮者为佳。

【功效】 味辛、苦，性平。镇心，安神，解毒。

332—2

332—1



333

334. 金精石

Jinjingshi Vermiculitum

キンセイセキ Vermiculite

【来源】 本品为硅酸盐类矿物水化金云母质蛭石及水金云母 Vermiculite。本品主含 $Mg_x(H_2O)_4Mg_{2-x}[AlSi_3O_{10}][OH]_2$。

【产地加工】 采收后，除去泥沙、杂石，洗净，干燥。

【炮制】 (1)金精石 取原药材，除去杂质，洗净，干燥，砸碎。

(2)煅金精石 取净金精石，置适宜的容器中，用无烟武火加热，煅至红透，取出，放凉。

【性状】 (1)药材 呈不规则片状，系多数薄片叠成，大小不一，一般长 2～6cm，厚约 0.5cm。色金黄或暗褐黄色至墨绿褐色，表面光滑，有网状纹理，玻璃一油脂状、腊状光泽，解理完全，碎成小片。质稍柔软，有韧性，硬度大于或等于 2。水化严重者 烧之卷曲膨胀，似水蛭状，显黄白色。断面显层状，可单层剥离，薄层具可塑性，可随意挠屈、撕断。气微，味淡(图 334－1)。

以块大、色金黄、质柔软、分层多者为佳。

(2)饮片 煅金精石 形如金精石，表面有黄色无光的斑点，全体呈疏松片裂块体。体轻，质酥松，无光泽。粉末呈不规则的薄片状，黄色透明、稍厚者显层状(放大 100×)(图 334－2)。

【功效】 味咸，性寒，有小毒。去翳明目。

335. 金樱子

Jinyingzi Fructus Rosae Laevigatae

キンオウシ Fruit of Cherockee Rose

【来源】 本品为蔷薇科植物金樱子 *Rosa laevigata* Michx. 的干燥成熟果实。

【产地加工】 10～11 月份果实成熟变红时采收，晒干后放入桶内，以棍棒搅动，除去毛刺。

【炮制】 (1)金樱子 取原药材，除去杂质，洗净，晒干。

(2)金樱子肉 取净金樱子，略浸润透，纵切两瓣，除去毛、核，晒干。

(3)蜜金樱子 取金樱子肉，用适量开水稀释后的蜂蜜拌匀，闷透，置锅内，用文火加热，炒至表面红棕色，不粘手为度，取出放凉，

【性状】 (1)药材 呈倒卵形略似花瓶，长 2.0～3.5cm、直径 1～2cm。表面红黄色或红棕色，有突起的棕色小点。顶端有宿存花萼如盘状，中央有黄色柱基，基部渐尖，质硬。切开后，花托壁厚 0.1～0.2cm，内有多数坚硬的小瘦果，内壁及瘦果均有淡黄色绒毛。无臭，味甜、微涩(图 335－1)。

以个大、表面红黄色者为佳。

(2)饮片 ①金樱子肉 呈倒卵形纵向剖开的果瓣，长 1.5～3.0cm，宽 0.8～1.8cm，厚 0.3～0.4cm。切面淡黄色，颗粒性；果瓣为壁凹窝状，具稀疏的淡黄色柔毛，外壁中间钝凸，呈半圆形，红黄色或红棕色、略具光泽，具多数突起的棕色小点，质硬。无臭，味甜、涩(图 335－2)。

②蜜金樱子肉 形如金樱子，表面略棕色，味甜，有焦香气(图 335－3)。

【功效】 味酸、甘、涩，性平。固精缩尿，涩肠止泻，益肾止带。蜜金樱子补脾止泻。

334—1

334—2

335—3

335—1

335—2

336. 金礞石

Jinmengshi **Lapis Micae Aureus**
キンモウセキ **Micae-schist**

【来源】 本品为变质岩类蛭石片岩或水化黑云母片岩 *Lapis micae aureus* 的石块或碎粒。

【产地加工】 采挖后，除去杂石及泥沙。

【炮制】 (1)生金礞石 取原药材，除去杂质，砸碎，碾成约 4.5mm 的小碎片。

(2)煅金礞石 取净金礞石，置适宜容器中，用无烟武火加热煅至红透，除尽泥沙，取出放凉，碾细。

(3)火硝煅金礞石 取金礞石与火硝等量间层放在砂坛中，每层约寸许，装 3～4 层，用武火烧成金黄色，取出，碾细水飞，取含细粉之上层沉淀后干燥。或取净金礞石，加等量的火硝置适宜容器内，煅至烟尽取出，晾凉。

【性状】 (1)药材 水化黑云母片岩主为鳞片状集合体。呈不规则块状、粉状或碎片状，块状者无明显棱角。棕黄色或黄褐色，带有金黄色或银白色光泽。质脆，易碎，用手捻之易成金黄色闪光小片(水化黑云母石或蛭石)。具滑腻感，硬度近于指甲，粉末灰黄至灰白色。裂片具挠性，集合体蓬松，灼烧崩裂而无明显胀裂。条痕土黄色。气微，味淡。水化黑云母(图 336—1)，蛭石片岩(图 336－2)。

以块整、色黄者为佳。

(2)饮片 ①生金礞石 呈不规则小薄片状或碎粒状，似麦麸。全体呈棕黄色，带有耀眼的金黄色光泽，半透明至透明，体轻质疏松，易碎(图 336－3)。

②火硝煅金礞石 加火硝煅制的金礞石凝成疏松块状。金黄色，光泽比生品强。质地酥松，手可捻碎。碎片亦为麦麸状。气、味皆无。

③煅金礞石 呈小薄片状，稍厚者显层，部分颗粒中间有裂纹黄褐色，闪金星更明显。无臭，无味(图 336－4)。

【功效】 味甘、咸，性平。坠痰下气，平肝镇惊。

337. 狗舌草

Goushecao **Herba Senecionis Fauriei**
クゼツソウ **Herb of Kirilow Groundsel**

【来源】 本品为菊科植物狗舌草 *Senecio integrifolius* (L.) Clairvill *var. fauriei* (Levl. et Vant.) Kitam. 的干燥全草。

【产地加工】 于夏、秋 2 季采收，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净润闷，切段，干燥，称“狗舌草段”。

【性状】 (1)药材 根多数，细索状。茎单一，直立，草质，被白绒毛。基部叶莲座状，具短柄，椭圆形或近匙形，边缘具浅齿或近全缘，叶两面均被绒毛。中部叶卵状椭圆形，无柄，基部半抱茎；顶端叶披针形或线状披针形，先端长尖，基部抱茎。头状花序呈伞房状或假伞形排列。气微，味苦(图 337－1)。

以质嫩叶多、无杂者为佳。

(2)饮片 狗舌草段 呈不规则的小段，根、茎、叶混合。根细索状，圆柱形。茎草质，被白绒毛。基部叶莲座状，叶多破碎，顶端叶基部抱茎，黄绿色。质脆。气微，味苦(图 337 2)。

【功效】 味苦，性寒。清热，利水，杀虫。

336—1

336—2



336—3

336—4

337—1

337—2

338. 狗尾草

Gouweicao Herba Setariae Viridis

クビソウ Herb of Green Bristlegrass

【来源】 本品为禾本科植物狗尾草 *Setaria viridis* (L.) Beauv. 的干燥全草。

【产地加工】 于夏、秋2季采收，去净泥土，干燥。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，稍润，切段干燥。

【性状】 (1)药材 长30～100cm。茎圆柱形，有节，表面光滑，淡黄绿色，断面中空。叶线状披针形，有的皱缩卷曲，长5～35cm，宽0.2～2.0cm，上表面稍粗糙或略被短柔毛。叶鞘缘无边毛或具柔毛，叶舌有纤毛，表面黄绿色，叶脉平行。圆锥花序紧密呈柱状，长2～15cm，小穗长0.20～0.25cm，基部具刚毛1～6条。体质轻，柔韧。气微，味淡(图338－1)。

以质嫩、叶多、色黄绿者为佳。

(2)饮片 狗尾草段 为不规则小段，茎、叶混合，茎表面光滑，淡黄绿色；切面中空。花序小穗长0.20～0.25cm。气微，味淡(图338－2)。

【功效】 味淡，性平。除热，去湿，消肿。

339. 狗 肾

Goushen Testis et Penis Canitis

クジン Testes and Penis of a Dog

【来源】 本品为犬科动物雄性狗 *Canis familiaris* L. 的干燥阴茎和睾丸。

【产地加工】 全年均可采收。杀狗时割取阴茎及睾丸，去净附着的肌肉及油脂，拉直，晾干或烘干。

【炮制】 (1)狗肾 取原药材，用碱水洗净，再用清水洗涤，润软，切成小段或片，干燥。

(2)滑石粉炒狗肾 将滑石粉置锅中加热呈灵活状态，投入狗肾段或片，炒至松泡，呈黄褐色时取出，筛去滑石粉，放凉，碾碎。

【性状】 (1)药材 呈直棒状，长约10cm，直径2cm左右，先端稍尖，另一端有细长的输精管连接睾丸。睾丸呈椭圆形，长3～4cm，宽约2cm，全体淡棕色，表面光滑。阴茎部分质坚硬，不易折断。气腥(图339－1)。

以色淡黄、带红筋、条长大、粗壮、带有睾丸者为佳。

(2)饮片 ①狗肾片 呈圆柱状小段或圆形片状，黄棕色，直径约2cm，有少许毛粘附，微透明，中间有裂隙，质地坚韧。有腥臭味(图339－2)。

(3)滑石粉炒狗肾 质地松泡，呈黄褐色，腥臭味较弱(图339－3)。

338—1

338—2

339—2

339—1

339—3

340. 狗 宝

Goubao Calculus Canitis

クホウ Dog Stone

【来源】 本品为犬科动物狗 *Canis familiaris* L. 的胃中结石。

【产地加工】 全年均可采收，杀狗时剖腹开胃，如发现胃结石，取出，除去皮膜，洗净，阴干。

【炮制】 取原药材，刷净，敲碎，除去核心中异物，研成细粉，过 80 目筛。

【性状】 药材 呈类圆球形，大小不一，一般直径在 1.5～5.0cm 左右。表面白色或灰白色，略有光泽，有多数类圆形突起。质重、坚实而细腻，指甲刻划可见划痕。断面不平坦，有同心环状层纹，近中心较疏松，常可见核心。气微腥，味微甜，嚼之有粉性而无砂性感觉(图 340－1)。断面(图 340－2)。

以色白、细腻、指甲划之留有痕迹、断面有层纹者为佳。

【功效】 味咸，性平。降逆气，开郁结，解毒。

341. 狗 脊

Gouji Rhizoma Cibotii

クセキ Rhizome of Scythian Lamb

【来源】 本品为蚌壳蕨科植物金毛狗脊 *Cibotium barometz* (L.) J. Sm. 的干燥根茎。

【产地加工】 于秋末冬初挖取根茎，削去硬根和地上叶柄，除去泥沙，晒干；趁鲜切片，晒干，称为“生狗脊片”；或沸水煮或蒸，取出晒至 6～7 成干，再切片晒干，称为“熟狗脊片”。

【炮制】 (1)生狗脊 取原药材，刮去毛或用火燎去毛，浸水 6～12 小时，捞起，润软，切薄片，晒干。

(2)制狗脊 取已去毛的原支狗脊，浸 6～12 小时，捞起，润透，置蒸笼内蒸至外黑内棕褐色，取出，晒至半干，切薄片，晒干。

【性状】 (1)药材 呈不规则长块状，长 10～30cm，直径 2～10cm。表面深棕色，密被金黄色茸毛，有多个棕红色木质叶柄，下部丛生多数棕黑色细根。质坚硬，难折断。气微，味淡、微涩。

①生狗脊片 不规则长条形或圆形纵片，长 5～20cm，宽 2～5cm，厚 1.5～5.0cm；边缘不整齐，表面深棕色，偶有未去尽的金黄色茸毛；切面浅棕色，近边缘 2～5mm 处有 1 条明显隆起的棕黄色内皮层环纹，中心满布浅黄色或棕色小点。质坚脆，易折断。

②熟狗脊片 全体呈黑棕色，内皮层环纹明显。

(2)饮片 ①生狗脊 薄片厚约 2mm，特征与药材相同。

②制狗脊 表面黑色，切面棕褐色，其余特征同生狗脊(图 341)。

【功效】 味苦、甘，性温。补肝肾，强筋骨，祛风湿。用于腰脊酸痛、下肢无力、肌肉及关节疼痛、白带等症。

340—1

340—2

341 —1

342. 狍 茸

Paorong Cornu Capreoli Pantotrichum
ホウジョウ Roe Deerhorn of Hairy

【来源】 本品为鹿科动物狍 *Capreolus capreolus* (Linnaeus)的未骨化带毛茸的角。

【产地加工】 于春季锯取，洗去茸毛上附着的污物，吸出内部一部分血液，然后在锯口处用线缝好，周围钉上4个小钉，缠上麻绳，固定在架上，置沸水中煮沸5～6小时，取出晾干，再用沸水煮沸，如此进行数次后，自然风干。

【炮制】 取原药材，喷酒，放火上烤软，切片或研成粉末。

【性状】 药材 锯狍茸呈圆柱状，锯口直径为2cm左右。外表红棕色或棕色，密布灰黄色细茸毛，茸毛较鹿茸毛长，体轻(图342)。

【功效】 生精补髓，强筋健骨，温肾壮阳。功效稍逊于鹿茸。

343. 肺形草

Feixingcao Herba Tripterospermi
ハイケイソウ Herb of Common Tripterospermum

【来源】 本品为龙胆科植物肺形草 *Tripterospermum affine* (Wall.) H. Smith. 的干燥全草。

【产地加工】 于夏、秋2季采挖，洗净，晒干。

【炮制】 取原药材，拣去杂质，切段。

【性状】 (1)药材 全株长60～80cm，稀达1m以上或50cm以下，极少仅具4枚基生叶。茎纤细，绿褐色，上部叶对生，叶皱缩，展平后基生叶呈卵圆形，长4～11cm，宽2～7cm，无柄，上表皮灰绿色至绿褐色，间有绿黑色网状脉，下表皮常为紫色；茎生叶卵状披针形，长4～10cm，宽1～3cm，先端渐尖，基部钝圆，具短柄。叶片的3条主脉尤明显。根纤细，着生于茎生叶下方短根基端，表面黄棕色至黄褐色。花黄棕色，狭钟状。质脆，易碎。气微香，味微辛(图343—1)。

以完整、色绿、气味浓者为佳。

(2)饮片 为段片。根纤细，长2cm左右，表面黄棕色至黄褐色。茎细瘦，长约2cm左右，多为绿褐色，时可见对生叶序。叶为长2cm左右的块片，宽窄不一，上表面灰绿色至绿褐色，间有绿黑色网脉，下表面灰绿色或紫红色，全缘或微波状，3主脉明显。有时可见黄棕色狭钟状花冠。气微香，味微辛(图343—2)。

【功效】 味辛、苦，性寒。清热解毒，祛痰止咳。

344. 肥皂子

Feizaozi Semen Gymnocladi Chinensis
ヒソウシ Seed of Chinese Coffeetree

【来源】 本品为豆科植物皂荚 *Gymnocladus chinensis* Bailion 的干燥成熟种子。

【产地加工】 10～12月，采集成熟果实，晒干，敲破果壳，取出种子，除去杂质。

【炮制】 (1)肥皂子 取原药材，拣去杂质，筛去泥屑，打碎。

(2)肥皂子炭 取打碎的净肥皂子，置炒锅内炒至外焦黑，内部棕褐色，取出放凉。

【性状】 (1)药材 种子呈类球形，一端略狭尖，长1.5～2.0cm，宽1.5～1.8cm，厚1.0～1.2cm。种皮表面黑色，光滑，尖的一端有种脐，呈棕色点状。剖开种皮，可见子叶2片，白色。气微，味辛，有刺激性。

(2)饮片 ①肥皂子 为直径0.3～0.5cm的小颗粒，种皮和子叶常分离，种皮外表面黑色，光滑。子叶白色，油性。

②肥皂子炭 色焦褐，其余特征与肥皂子同(图344)。

【功效】 味辛，性温。祛痰利水。用于痢疾、小便不利、风湿、疮癣等症。

342

344

343—1

343—2

345. 兔儿伞

Tuersan **Radix Aconitifoliae**
トジサン **Root of Aconiteleaf Syneilesis**

【来源】 本品为菊科植物兔儿伞 *Syneilesis aconitifolia* Maxim. 的干燥根。

【产地加工】 于春、秋2季采挖根，去净泥土，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，稍润，切段干燥，称"兔儿伞段"。

【性状】 (1)药材 呈圆柱形，细长，多数，呈不规则弯曲，直径0.1～0.4cm。表面灰黄色或淡棕色，有微细纵纹，节部具绒毛。断面黄白色，中央有棕黄色小点(油室)。气特异，味微苦(图345－1)。

以干燥、无杂质者为佳。

(2)饮片 兔儿伞段 呈不规则小段，断面有棕黄色油室(图345－2)。

【功效】 味苦、辛，性温。有毒。祛风除湿，解毒活血，消肿止痛。

346. 鱼腥草

Yuxingcao **Herba Houttuyniae**
ギョセイソウ **Herb of Heartleaf Houttuynia**

【来源】 本品为三白草科植物蕺菜 *Houttuynia cordata* Thunb. 的干燥地上部分。

【产地加工】 于夏、秋2季茎叶茂盛，花穗多时采割，除去杂质，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，抢水洗净，切段，晒干。

【性状】 (1)药材 茎呈扁圆柱形，扭曲，长20～35cm，直径0.2～0.3cm；表面棕黄色，具纵棱数条，节明显，下部节上有残存须根；质脆，易折断。叶互生，叶片卷折皱缩，展平后呈心形，长3～5cm，宽3.0～4.5cm；先端渐尖，全缘；上表面暗黄绿色至暗棕色，下表面灰绿色或灰棕色，叶脉网状，背面稍突起；叶柄细长，基部与托叶合生成鞘状。穗状花序顶生，黄棕色。搓碎有鱼腥气，味微涩(图346－1)。

以茎叶完整、色灰绿、有花穗、鱼腥气浓者为佳。

(2)饮片 为茎、叶、花混合的不规则的小段，棕黄色或灰绿色。叶多皱缩破碎，花序穗状，揉搓有鱼腥气，味微涩(图346－2)。

【功效】 味辛，性微寒。清热，解毒，消痈排脓，利水通淋。用于肺痈吐脓、痰热喘咳、热痢、热淋、痈肿疮毒。

附：日本鱼腥草(十药) *Herba Houttuyniae*

【来源】 本品为三白草科植物蕺菜 *Houttuynia cordata* Thunb. 带花的干燥地上部分。

【产地加工】 在5～6月花盛开期采收地上部分，晒干。叶可随时采收。

0**【性状】** (1)药材 茎生叶互生并有花穗。茎淡褐色，有纵纹，节膨大。水浸后叶伸展呈广卵状心脏形，长3～8cm，宽3～6cm，淡绿褐色，全缘，先端锐尖；叶柄长，叶基部呈膜质状。花穗长1～3cm，上着生众多无花被的淡黄褐色的小花，基部有长卵圆形、淡黄褐色的总苞4枚。微有香气，无味。

以色绿、叶及花穗多、无根及根茎者为佳。

(2)饮片 为茎、叶、花混合的碎段。茎呈长段状，大小不等，最长达9cm左右，呈抽皱的棱柱状，有纵沟和细纵纹，少数扭曲，黄棕色或绿黄棕色；节稍膨大，呈肘状弯曲，常常有薄质的托叶鞘，完整的叶鞘略呈三角状。叶呈不规则的段状，灰绿色或绿棕色，叶基心形或楔形，具扭曲的长叶柄；叶先端渐尖；网状叶脉，叶背面黄棕色叶脉明显突出，自基部呈掌状射出，中脉常在叶的1/3处或近基部又分2条明显的侧脉。花序较少，穗状，棕褐色，长1.5～2.0cm，弯曲，中空，常两侧壁紧贴。微具鱼腥气，味淡(图346－3)。

345—1



345—2

346—1

346—3

346—2

347. 鱼　鳔

Yubiao　　Ingluvies Piscis

ギョヒュ　　Swim Bladder of Yellow Croaker

【来源】 本品为石首鱼科动物大黄鱼 *Pseudosciaena crocea* (Rich.)、小黄鱼 *Pseudosciaena polyactis* Bleeker 或鲟科动物中华鲟 *Acipenser sinensis* Gray、东北鲟 *Acipenser schrenski* (Brandt)、达氏鲟 *Acipenser dabryanus* Dumeril、鳇鱼 *Huso dauricus* Georgi 等的鱼鳔。鲟鱼、鳔鱼的鳔称为"黄唇肚"或"黄鲟胶"。

【产地加工】 取得鳔后，剖开，除去血管及粘膜，洗净，压扁，晒干；或洗净鲜用。溶化后，冷凝成的冻胶，称为"鳔胶"。有切成线条状的称为"线鱼胶"。

【炮制】 (1)生鱼鳔　取原药材，除去杂质，剁成约 1.5cm 的小碎片。

(2)制鱼鳔　取蛤粉或滑石粉置锅内，用文火炒热，放入鱼鳔胶块，拌炒至鼓胀松泡时，取出，筛去蛤粉或滑石粉，放凉(鱼鳔：蛤粉 =4：1)。

【性状】 (1)药材　为淡灰白色、半透明、坚韧角质性的膜状物，或为无色透明带光泽的叶片状。黄鱼的鳔较小；鲟鱼、鳇鱼的鳔大，并附有垂带 2 条。质坚韧，不易撕裂，裂断处呈纤维状。入水易膨胀，煮沸则几乎溶，浓溶液却后凝成胶冻，粘性强。气微腥，味淡(图 347－1)。

以淡灰白色、半透明、完整者为佳。

鱼鳔胶　呈小方块状，黄白色角质样，半透明。质韧。气微腥，味淡(图 347－2)。

(2)饮片　制鱼鳔胶　表面鼓胀发泡，黄色，质酥脆。气微香(图 347－3)。

【功效】 味甘、咸，性平。补肾益精，滋养筋脉，止血，散瘀，消肿。

348. 京大戟

Jingdaji　　Radix Euphorbiae Pekinensis

キョウダイゲキ　　Root of Peking Euphorbia

【来源】 本品为大戟科植物大戟 *Euphorbia pekinensis* Rupr. 的干燥根。

【产地加工】 于秋、冬 2 季采挖，洗净，晒干。

【炮制】 (1)大戟片　取原药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥，称"大戟片"。

(2)醋大戟片　取原药材置锅内，用米醋和适量水浸拌 1～2 小时，再用文火加热，煮至醋液被吸尽时，取出，晾至 6～7 成干，切厚片，干燥，称"醋大戟片"。每大戟 100kg，用米醋 30kg。

【性状】 (1)药材　呈不规则的长圆锥形，略弯曲，常有分枝，长 10～20cm，直径 1.5～4.0cm。表面灰棕色或棕褐色，粗糙，有纵皱纹、横向皮孔及支根痕，顶端略膨大，有多数茎基及芽痕。质坚硬，不易折断，断面类白色或淡黄色，纤维性。气微，味微苦、涩。

以根条粗壮、质坚者为佳。

(2)饮片　①大戟片　为不规则长圆形或圆形厚片，表面棕黄色或类白色，纤维性。周边灰棕色，质坚硬。气微，味微苦、涩(图 348)。

②醋大戟片　形如大戟片，色泽加深，微有醋气。

【功效】 味苦，性寒。有毒。泻水逐饮。

347—2

347—1

347—3



348

349. 夜明砂

Yemingsha **Faeces Vespertilionis**
ヤミョウシヤ **Bat Dung**

【来源】 本品为蝙蝠科动物东方蝙蝠 *Vespertilio superans* Thomas 等多种蝙蝠的干燥粪便。

【产地加工】 全年均可采收，以夏季为宜。从山洞中将蝙蝠粪便扫起，去净砂石、泥土等杂质及灰屑。

【性状】 药材 呈颗粒状，长椭圆形，两头稍尖，长 5～7mm，直径 0.2mm。表面粗糙，棕褐色或灰棕色。质松易碎，破碎者呈小颗粒状或粉末状，有时可见昆虫的头、足、鞘翅等破碎残骸。气无，味微苦、辛（图 349）。

以质干、无沙土、色棕褐、质坚、嚼之无砂感、有小亮点者为佳。

【功效】 味辛，性寒。清热明目，散血消积。

350. 炉甘石

Luganshi **Calamina**
ロカンセキ **Calamine**

【来源】 本品为碳酸盐类菱锌矿 *Smithsonitum* ($ZnCO_3$) 或水锌矿 [$Zn_5(CO_3)_2(OH)_6$] 的集合体。

【产地加工】 挖出后，去尽杂石。

【炮制】 (1)炉甘石 拣去杂质，打碎。

(2)煅炉甘石 取净炉甘石，置耐火容器内，放无烟炉火中，煅至红透，取出，立即倒入水中浸淬、搅拌，倾取混悬液，未透者沥干后，再煅烧，反复浸淬 3～4 次。合并混悬液，静置，倾去上层清水，干燥研散。

(3)制炉甘石 ①黄连汤制炉甘石 用黄连煎汤，过滤去渣，加入煅炉甘石细粉中拌匀，吸尽后干燥。

②二黄汤制炉甘石 取黄芩、黄连、黄柏煎汤，过滤去渣，加入煅炉甘石细粉中拌匀，吸尽后干燥（净炉甘石：黄连：黄柏：黄芩＝100：12.5：12.5：12.5）

【性状】 (1)药材 ①菱锌矿质炉甘石 三方菱面体，块状、肾状、葡萄状、钟乳状、皮壳状和土状集合体。灰白色或有浅黄、淡黄、淡绿、浅褐、淡红色等色调。表面粉性，凹凸不平，多孔似蜂窝状。稍有光泽，质轻而稍硬，易打碎，断面灰白色或淡棕色，有吸湿性。硬度 5，相对密度 4.0～4.5。条痕白色。气无，味淡，有土腥味（图 350－1）。

以体轻、质松、色白者为佳。

②水锌矿质炉甘石 皮壳或钟乳状，聚集体或肾状块体，具细纤维及弓心环带（俗称“云头花层状”），白色或黄褐色，丝绢至土状光泽，致密处蜡状，瓷状光泽。质轻松，断面土白或白色。硬度为 2.0～2.5，相对密度 3.6～3.8。气无，味淡（图 350－2）。

以体轻、质松、色白者为佳。《中国药典》(1990 年版) 规定，本品（按干燥品计算）含氧化锌 (ZnO) 不得少于 40%。

(2)饮片 ①煅炉甘石 呈灰白色或白色。质轻松（图 350－3）。煅菱锌矿（图 350－4），煅水锌矿（图 350－5），水飞炉甘石（图 350－6）。

②黄连水制炉甘石 呈黄色细粉，质轻松，味苦。二黄汤制炉甘石（图 350－7）。

以体轻、质松、色白者为佳。

【功效】 味甘，性平。解毒明目，退翳，收湿止痒，敛疮。



350—2

350—1

349

350—3

350—4

350—5

350—6

350—7

351. 泡桐花

Paotonghua **Flos Paulowniae**
ホウトウカ **Flower of Fortune Paulownia**

【来源】 本品为玄参科植物泡桐 *Paulownia fortunei* (Seem.) Hemsl. 和毛泡桐 *Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steud. 的干燥花。

【产地加工】 于春季花开放时采摘，晒干。

【炮制】 取原药材，拣去杂质。

【性状】 (1)药材 ①泡桐花 花萼钟形，5齿裂，表面黄绿色，被星状毛或不被毛；花冠漏斗状，黄白色或紫棕色，5裂，上方2裂片较小，下方3裂片较大，裂片类圆形，外被星状毛；雄蕊4，2枚较长；子房上位，胚珠多数。气微，味苦。

②毛泡桐花 花形与泡桐花相似，区别在花萼5裂直至中部以下，外表面被星状毛；花冠长5～7cm，浅紫色，内表面有黑点和黄色斑纹(图351)。

【功效】 味苦，性寒。止咳祛痰。用于慢性气管炎等症。

352. 泡桐果

Paotongguo **Fructus Paulowniae**
ホウトウカ **Fruit of Royal Paulownia**

【来源】 本品为玄参科植物毛泡桐 *Paulownia tomentose* (Thunb.) Steud. 的干燥近成熟果实。

【产地加工】 8～11月份果实近成熟、渐变黄褐色时采收，晒干或烘干。

【炮制】 取原药材，拣去杂质，摘去果柄，筛去灰屑。

【性状】 药材 果实呈卵圆形，长3～4cm，直径2～3cm。表面红褐色或黑褐色，上部尖嘴状，基部近圆形，常沿纵棱线裂成两瓣，每瓣中央各有纵沟1条；内表面淡棕色。各有一纵隔。果皮硬而脆，木质。宿萼5裂，五角星形，裂片三角形。种子多数，细小，扁而有翅。气微，味微甜、苦(图352)。

【功效】 味淡、微甘，性温。止咳平喘，祛痰。用于咳喘痰多、慢性支气管炎等症。

353. 泽 兰

Zelan **Herba Lycopi**
タクラン **Herb of Shiny Bugleweed**

【来源】 本品为唇形科植物毛叶地瓜苗 *Lycopus lucidus* Turcz. *var. hirtus* Regel 的干燥地上部分。

【产地加工】 于夏、秋2季茎叶茂盛时采割，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，略洗，润透，切段，干燥，称“泽兰段”。

【性状】 (1)药材 茎呈方柱形，少分枝，四面均有浅纵沟，长50～100cm，直径0.2～0.6cm；表面黄绿色或带紫色，节处紫色明显，有白色茸毛；质脆，断面黄白色，髓部中空。叶对生有短柄；叶片多皱缩，展平后呈披针形或长圆形，长5～10cm；上表面黑绿色，下表面灰绿色，密具腺点，两面均有短毛；先端尖，边缘有锯齿。花蕊生叶腋成轮状，花冠多脱落，苞片及花萼宿存，黄褐色。气微，味淡(图353－1)。

以叶多、色绿、质嫩者为佳。

(2)饮片 泽兰段 呈不规则的小段，茎、叶、花混合。茎方形，表面黄绿色，节处有白色茸毛，质脆。切面黄白色，髓部中空。叶皱缩，破碎，上表面黑绿色，下表面灰绿色，两面均有短毛，边缘有锯齿。气微，味淡(图353－2)。

【功效】 味苦、辛，性微温。活血化瘀，行水消肿。

351

352

353—1



352—2

354. 泽　泻

Zexie　　Rhizoma Alismatis

タクシャ　　Rhizome of Oriental Waterplantain

【来源】 本品为泽泻科植物泽泻 *Alisma orientalis* (Sam.) Juzep. 的干燥块茎。

【产地加工】 冬季采挖，除去茎叶、须根，削去粗皮，洗净，炕干；或装在竹筐中撞去须根及粗皮，再用硫黄熏白，晒干。

【炮制】 (1)泽泻片　取原药材，除去杂质，大小分开，温水浸泡并稍浸，捞取，润透，切片，干燥。

(2)盐水炒泽泻　取生泽泻片，用盐水喷洒拌匀，闷润过夜，用麦麸或谷糠炒至表面黄色为度。每100kg泽泻片，用2kg食盐、50kg麦麸或谷糠。

【性状】 (1)药材　为类圆、长圆或卵圆球形，直径3～6cm。表面淡黄白色或黄棕色，具刀削痕或环节，节上具多数点状须根痕。质坚实，破面淡黄白色，显颗粒性。气微，味极苦(图354－1)，四川产品(图354－2)。

以个大、色黄白、粉性足者为佳。

(2)饮片　①生泽泻片　为顶头园厚片，直径3～5cm。外表黄白色或棕黄色，切片黄白色，显粉性，具多数细孔，质坚实，气微。出口品(图354－3)。

②盐水炒泽泻　形同生泽泻片，切面及表面均比生泽泻片黄。气微香，味微苦、咸(图354－4)。麸炒泽泻(图354－5)。

【功效】 味甘，性寒。利小便，清湿热。盐水炒后能引药下行，增强泻热、利水作用；传统用药一般不生用，生泽泻片切割主要是为了便于炒制和配方。

355. 官　桂

Guangui　　Cortex Cinnamoni Mairei

カンケイ　　Best-quality Cinnamon

【来源】 本品为樟科植物银叶桂 *Cinnamomum mairei* Levl. 的干燥树皮。

【产地加工】 夏至前后剥取树皮，阴干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切丝片，干燥。

【性状】 (1)药材　呈板片状，槽状或卷筒状，长短不一，厚0.2～0.6cm。外表面灰褐色或棕褐色，有斜皮孔散布，有时具灰白色地衣斑；内表面棕褐色，较平滑，有纵纹。质硬而脆，易折断，断面不平坦，微显颗粒性。气微香，味辛、凉，嚼之起涎(图355－1)。

以呈板片状、外表面灰褐色、内表面棕褐色、气味浓者为佳。

(2)饮片　丝片长条形或微弧形，长1～5cm，宽0.2～0.5cm，厚0.2～0.6cm。切面棕色至棕褐色，微显颗粒性；外表面灰褐色或棕褐色，内表面棕褐色，有纵纹。质脆，易折断。有樟木香气，味辛、凉，嚼之起涎(图355－2)。

【功效】 味辛，性温。散寒止痛。

354—1

354—2

354—3

354—5



354—4

355—2

355—1

356. 降 香

Jiangxiang **Ligum Dalbergiae Odoriferae**
コウシンコウ **Rosewood**

【来源】 本品为豆科植物降香檀 *Dalbergia odorifera* T. Chen 树干和根的干燥心材。

【产地加工】 将树干削去外皮和白色木部，锯成段或将根部挖出后，削去外皮，锯成段，阴干。

【炮制】 取原药材，除去杂质及边材，劈成小碎块、镑片或碾成细粉。

【性状】 (1)药材 呈圆柱形、类圆柱形或不规则块状。表面紫红色、棕紫色或红褐色，有刨削痕迹，切面有致密纹理。体重，质硬，有油性。气微香，味微苦(图 356－1)。

以色红紫、质坚实、油润、香气浓者为佳。

(2)饮片 为不规则的薄片、小碎块或细粉。薄片长约 5cm，宽 2～4cm，厚 0.5cm；小碎块大小不一。表面紫红色或红褐色，有致密的纹理。质硬，有油性。粉末紫红色或紫褐色。气香，味微苦(图 356－2、图 356－3)。

【功效】 味辛，性温。行气活血，止痛，止血。

357. 细 辛

Xixin **Herba Asari**
サイシン **Herb of Manchurian Wildginge**

【来源】 本品为马兜铃科植物北细辛 *Asarum heterotropoides* Fr. Schimidt *var. mandshuricum* (Maxim.) Kitag.、汉城细辛 *Asarum sieboldii* Miq. *var. seoulense* Nakai 或华细辛 *Asarum sieboldii* Miq. 的干燥全草。前 2 种习称"辽细辛"。

【产地加工】 于夏季果熟期或初秋采挖，除去泥沙，阴干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，抢水洗净，稍晾，切段，晾干。

【性状】 (1)药材 ①北细辛 常卷缩成团。根茎横生呈不规则圆柱形，具短分枝，长 1～10cm，直径 0.2～0.4cm；表面灰棕色，粗糙，有环形的节，节间长 0.2～0.3cm，分枝顶端有碗状的茎痕。根细长，密生节上，长 10～20cm，直径 0.1cm；表面灰黄色，平滑或具纵皱纹。有须根及须根痕。基生叶 1～3 枚，具长柄，表面光滑；叶片多破碎，完整者心形至肾状心形，全缘，先端急尖，基部深心形，长 4～10cm，宽 6～12cm，表面淡绿色。有的有花，多皱缩，钟形，暗紫色，花被裂片由基部反卷与花被筒几全部相贴。果实半球形。气辛香，味辛辣，麻舌(图 357－1)。根及根茎(图 357－2)。

②汉城细辛 根茎直径 0.1～0.5cm，节间长 0.1～1.0cm。基生叶多为 2，叶柄有毛，叶片较厚。花被裂片开展。果实半球形。

③华细辛 根茎长 5～20cm，直径 0.1～0.2cm，节间长 0.2～1.0cm，基生叶 1～2 枚，叶片较薄，心形，先端渐尖。花被裂片开展。果实近球形。气味较弱。

(2)饮片 为不规则的小段，茎、叶、花混合。地下根状茎呈不规则圆柱形，细而弯曲，表面粗糙，有环形节，上生有细根。质脆，切面黄白色。叶具长柄，柄有纵纹，叶片心脏形，多皱缩，破碎，灰绿色。花暗褐色，钟形。有香气，味辛辣而麻舌(图 357－3)。

【功效】 味辛，性温。祛风散寒，通窍止痛，温肺化饮。

附：朝鲜产细辛

呈短圆柱状小段，根和根茎混合。长 0.1～1.5cm，直径 0.5～3.0mm，根的直径一般均在 1mm 以下。黄棕色或棕褐色，部分呈淡黄色。根表面光滑，根茎常有节及纵皱。根断面类白色，隐约可见黄色木心，质脆，易折断。根茎质硬，较难折断。具辣气，味辛有麻舌感和刺舌感(图 357－4)。



356—1

356—2

356—3

357—1

357—2

357—3

357—4

358. 玳　瑁

Daimao　Carapax Eretmochelydis

タイマイ　Hawksbill Shell

【来源】 本品为海龟科动物玳瑁 *Eretmochelys imbricata* (Linnaeus)的干燥背甲。

【产地加工】 多在春末夏初捕捉，用沸水烫后、或将玳瑁倒悬，用沸醋浇泼，使甲片脱落，洗净，干燥。

【炮制】 (1)玳瑁丝和玳瑁粉　取原药材，刷净，用温水浸软，切成细丝，干燥或研成细粉，分别称为"玳瑁丝"或"玳瑁粉"。

(2)制玳瑁　取滑石粉置锅内，用文火炒热，加入净玳瑁丝，拌炒至表面微黄色并鼓起，取出筛去滑石粉，放凉，通称"制玳瑁"。

【性状】 (1)药材　为近圆形、三角形或多角形的板片，长 10～20cm，厚 1.5～3.0mm。边缘较薄，中央稍厚。表面暗褐色，平滑而光洋，为半透明体，可见暗褐色与乳黄色的花纹；内面密布白色的条纹或斑点，并有纵横交错的沟纹。质坚韧，不易折断，断面角质。无臭，无味(图 358－1)。

以片厚、花纹明显、半透明者为佳。

(2)饮片　①玳瑁丝　呈不规则的细丝状，外表面淡黄棕色，光滑，内表面有白色沟纹，切面角质，对光照视可见紧密透明小点。质坚韧，不易折断。气微腥，味淡(图 358－2)。

②玳瑁粉　为灰黄色粉末，气微腥，味淡(图 358－3)。

③制玳瑁　形如玳瑁丝，表面深黄色，鼓起，质脆(图 358－4)。

【功效】 味甘，性寒。镇心，平肝，清热，解毒。

359. 珍　珠

Zhenzhu　Margarita

チンジュ　Pearl

【来源】 本品为珍珠贝科动物马氏珍珠贝 *Pteria martensii* (Dunker)、蚌科动物三角帆蚌 *Hyriopsis cumingii* (Lea.)或褶纹冠蚌 *Cristaria plicata* (Leach)等双壳类动物受刺激而形成的珍珠。

【产地加工】 全年均可采收，捞起珠蚌，剖取珍珠，洗净，干燥。

【炮制】 (1)珍珠　取原药材，除去杂质，洗净，捣碎，习称"珍珠"。

(2)珍珠粉　取净珍珠置乳钵内，加入适量水研细，再加多量的水，搅拌，倾出混悬液，下沉部分再按上法反复操作数次，直至研细，合并混悬液，静置后，分取沉淀，干燥，研散。或取净珍珠，捣碎，研成极细粉，习称"珍珠粉"。

【性状】 (1)药材　呈类球形、卵圆形、长圆形或棒形，直径 0.15～0.80cm。表面类白色、浅粉红色、浅黄绿色或浅蓝色，半透明，平滑或微有凹凸，有特殊的彩色光泽。质地坚硬，剖开断面，可见层纹。无臭，味淡(图 359－1)。

以纯净、质坚、有彩光者为佳。

(2)饮片　珍珠粉　呈细粉状，类白色，细粉中无光点，手捻无砂粒感。无臭，无味(图 359－2)。

【功效】 味甘、咸，性寒。安神定惊。明目消翳，解毒生肌。

358—1



358—2

359—1

358—3

359—2

360. 珍珠母

Zhenzhumu **Concha Margaritifera Usta**

チンジュボ **Mother of Pearl**

【来源】 本品为蚌科动物三角帆蚌 *Hyriopsis cumingii* (Lea.)(图 360－1、图 360－2)、褶纹冠蚌 *Cristaria plicata* (Leach)(图 360－3)的蚌壳或珍珠贝科动物马氏珍珠贝 *Pteria martensii* (Dunker)的贝壳。

【产地加工】 全年均可采收，用碱水煮过，漂净，干燥。

【炮制】 (1)珍珠母 取原药材，除去杂质及灰屑，打碎，称为"珍珠母"。

(2)煅珍珠母 取净珍珠母至适宜容器内，用武火加热，煅至酥脆，取出放凉，打碎或研粉，通称"煅珍珠母"。

【性状】 (1)药材 呈不规则的薄片，凹凸不平，大小不一，厚 0.1～0.5cm。表面乳白色、淡黄褐色或银灰白色，常具光彩，习称"珠光"。凸面可见生长层纹，凹面较平滑。质松脆，可层层剥离，薄片半透明。无臭，味淡(图 360－4)。

以块大、色白、有"珠光"者为佳。

(2)饮片 珍珠母 呈不规则块状，白色或灰白色，有光泽。质硬而重。无臭，味淡。

②煅珍珠母 呈不规则碎块状或粉状，青灰色，微显光泽。质酥脆，易碎。无臭，味微咸(图 360－5)。

361. 珍珠梅

Zhenzhumei **Cortex Sorbariae Arboreae**

チンジュバイ **Bark of Tree Falsespiraea**

【来源】 本品为蔷薇科植物东北珍珠梅 *Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Br. 的干燥茎皮。

【产地加工】 于秋、冬 2 季采收，剥取茎皮，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质及残留木心，洗净，润透，切段，干燥，称"珍珠梅段"。

【性状】 (1)药材 呈筒状或槽状，长短不一。外表灰棕色或灰褐色，内表面黄白至灰黄色，较平坦。质轻脆。气微，味涩(图 361－1)。

以皮厚、条大而匀、无杂者为佳。

(2)饮片 珍珠梅段 呈不规则的小段，有的稍扭曲。外表皮灰棕色或灰褐色；内表皮黄白至灰黄色，较平滑。体轻，质脆。气微，味涩(图 361－2)。

【功效】 味苦，性寒。活血祛瘀，消肿止痛。

360—1

360—2

360—3

360—4

360—5

361—1

361—2

362. 珊　瑚

Shanhu　　Os Corallii

サンゴ　　Coral

【来源】 本品为矾花科动物桃色珊瑚 *Corallium japonicum* Kishinouye、珊瑚 *Corallium elatius* Pidley 等珊瑚虫分泌的碳酸钙。

【产地加工】 从海底采收，洗净，晾干。

【炮制】 (1)珊瑚　取原药材，除去杂质，洗净，干燥，研成细粉。

(2)制珊瑚　取原药细粉，按水飞法制成极细粉末。

【性状】 (1)药材　完整者呈管状一分枝状。药用者多呈断碎的树枝状，长 1.0～1.5cm，直径 0.2～0.6cm，表面具明显的细密纵沟，较光滑。红色，部分带黄色的油脂光泽，外壁微略带晶质的玻璃光泽，透明度较好；内部有致密坚硬的碳酸钙质柱，颜色稍浅。坚硬而脆，不易折断，断面同心环状、放射状。显见晶粒时具解理纹。硬度 3。加盐酸起泡(图 362－1)。

以内外皆红、体重、坚脆、粗壮者为佳。

(2)饮片　制珊瑚　为淡粉红色粉末。无臭，无味。珊瑚粉(图 362－2)，水飞珊瑚粉(图 362－3)。

【功效】 味甘，性平。去翳明目，安神镇惊。

363. 枳　壳

Zhiqiao　　Fructus Aurantii

キコク　　Bitter Orange

【来源】 本品为芸香科植物酸橙 *Citrus aurantium* L. 及其栽培变种的干燥未成熟果实。

【产地加工】 于 7 月(小暑至大暑前后)，果皮尚为绿色时采摘，自中部横切为两半，仰晒切面，白天晒，晚上晾至家中。遇阴雨天可低温炕，至 7～8 成干后，则切面、果皮面交叉晒或烘干。

【炮制】 (1)枳壳片　取原药材，除去杂质，洗净，润透，切薄片晒干；筛去碎落的瓤核。或取原药材挖去内瓤，洗净，润软，向内对折，用枳壳夹压扁，再入枳壳榨内榨紧定形 3～4 天，至表皮近干燥，两边紧为度，与对折线近垂直切制成“人”字形薄片，晒干，前者通称“枳壳片”，后者习称“凤眼枳壳片”。

(2)麸炒枳壳　取枳壳片或凤眼枳壳片，用麦麸或谷糠炒至色转微黄为度。每 100kg 枳壳片，用 20kg 麦麸或谷糠。

【性状】 (1)药材　似半园球形，翻口似盆状，直径 4.5～6.0cm。外表绿褐色至青绿色或棕褐色，具多数油点及皱纹。中果皮黄白色，厚 0.6～1.2cm。中部具瓤囊 10～13 瓣，各囊有种子数粒。果皮质坚硬，不易折断。气香，味苦而微酸(图 363－1)。

以外表色绿褐、中果皮厚、色白、质坚硬、香气浓者为佳。

(2)饮片　①枳壳片　为不规则弧形条状(枳壳片)或人字形(凤眼枳壳片)薄片，厚为 0.1～0.3cm。无瓤核，外表皮绿褐色或棕褐色，切面黄白色。质脆。气清香，味苦、微酸(图 363－2)。

②麸炒枳壳　表面黄色偶有焦斑，质脆易折断。气香，味较弱(图 363－3、图 363－4)。

【功效】 味苦、辛、酸，性微寒。理气宽中，行滞消胀。麸或谷糠炒制后，能降其燥性，防止上窜伤膈，更好发挥消积除胀等作用。

362—3



363—4

363—2



362—1

363—1

363—3

362—2

364. 枳　实

Zhishi　Fructus Aurantii Immaturus

キジツ　Immature Bitter Orange

【来源】 本品为芸香科植物酸橙 *Citrus aurantium* L. 及其栽培变种的干燥幼果。

【产地加工】 于5～6月份收集自落的幼果，直径1cm以上者，自中部横切为两半，直径小于1cm者则不切，晒干或低温干燥。完整者按大小分为"鹅眼枳实"和"鸡眼枳实"，统称"完枳实"；切片者按大小分为"大片枳实"、"中片枳实"和"小片枳实"现多统称"片枳实"。

【炮制】 (1)枳实片　取原药材，除去杂质，大不分档，洗净，润透，切薄片，晒干即得"枳实片"。

(2)麸炒枳实　取枳实片，用麸炒至色转黄为度。每100kg枳实片，用20～30kg麦麸。

【性状】 (1)药材　呈半球形，直径1.0～2.5cm(片枳实)；或近球形，直径一般为0.5～1.0cm(完枳实)。外表面灰绿色或黑绿色，具颗粒状突起及皱纹，片枳实切面中果皮略隆起，光滑，黄白色，中部有紫黑色瓤，呈菊花瓣状。质坚硬。气清香，味苦而微酸。大片、中片(图364－1)，小片和完整果实(图364－2)。

以外表黑绿色的"完整枳实"为优，尤以"鹅眼枳实"为佳。

(2)饮片　①枳实片　为不规则的弧形薄片。外表灰绿色、黑绿色，切面黄白色，质脆。气清香，味苦、微酸。

②麸炒枳实　切面呈黄色，香气浓。

【功效】 味辛、苦、酸，性微寒。破气消积，化痰散痞。

附：日本枳实　*Fructus Aurantii Immaturus*

【来源】 本品为芸香科植物玳玳花 *Citrus aurantium* L. *var. daidai* Makino、枣柑 *Citrus natsudaidai* Hayata 或其他近缘植物未成熟果实或其对剖的加工品。

【产地加工】 摘取未成熟的果实，晒干；或将其对剖后晒干。

【性状】 (1)药材　呈球形或半球形，球形者直径1～2cm，半球形者直径1.5～4.5cm。外表面深绿褐色或褐色，可见多数油室小点密布。横切面周边(外果皮与中果皮)厚约0.4cm，近表皮部位有8～16个瓤囊呈放射状排列，各囊室均呈褐色，有时含有未成熟的种子。具特异的香气，味苦(图364－3)。

以芳香气浓、皮厚、味苦者为佳。

(2)饮片　①枳实片　呈半圆球形、四切的橘瓣形、圆片状，直径2.0～4.5cm。外皮黑绿色、褐绿色、黄绿色，少数呈棕黄色，具密集的凹点，顶端具花柱基，底部常可见果柄痕；中果皮黄白色，较小者厚，常向外反卷，近外果皮处可见明显的油点或环状排列，中部可见浅黄棕色脉纹或筋脉点；中心瓤囊呈车轮状，棕褐色。气微香，味微苦(图364－4)。

②枳实块　呈不规则碎块状，大小在1cm以下，棱角明显，黄白色或淡黄色；外皮棕黄色、黑绿色或褐绿色，具众多凹陷油点，外皮下切面可见明显的凹陷油点。瓤囊壁膜质半透明状。质硬，难折断。气微香，味微苦(图364－5)。

364—1



364—4



364—2



364—3

364—5

365. 柏子仁

Baiziren **Semen Biotae**
ハクシジン **Seed of Chinese Arborviae**

【来源】 本品为柏科植物侧柏 *Biota orientalis* (L.) Endl. 的干燥成熟种仁。

【产地加工】 于秋、冬2季采收成熟种子，晒干，除去种皮，收集种仁。

【炮制】 (1)柏子仁 取原药材，除去杂质及残留的种皮，筛去灰屑，通称"柏子仁"。

(2)炒柏子仁 取净柏子仁置锅内，用文火炒至油黄色，有香气逸出时，取出，晾凉，称"炒柏子仁"。

(3)柏子仁霜 取净柏子仁，碾成泥状，用布包严，经加压后，压去油脂，碾细，称"柏子仁霜"。

【性状】 (1)药材 呈长卵形或和椭圆形，长0.4～0.7cm，直径0.15～0.30cm。表面淡黄棕色或黄白色，外包膜质的内果皮。顶端略尖，有深褐色小点；基部钝圆。质软油润，断面黄白色，富油性。气微香，味淡(图365－1)。

以种仁饱满、表面黄白色者为佳。

(2)饮片 ①炒柏子仁 形如柏子仁，表面油黄色，偶见焦斑，具焦香气(图365－2)。

②柏子仁霜 为松散状粉末。淡黄色，气微香(图365－3)。

【功效】 味甘，性平。养血安神，止汗，润肠。炒柏子仁药性缓和，免滑肠致泻；柏子仁霜减滑肠作用，适用于脾虚患者。

366. 栀 子

Zhizi **Fructus Gardeniae**
シシ **Fruit of Cape Jasmine**

【来源】 本品为茜草科植物栀子 *Gardenia jasminoides* Ellis. 的干燥成熟果实。

【产地加工】 于9～11月份果实成熟呈红黄色时采收，除去果梗及杂质，蒸至上汽或置沸水中略烫，取出，干燥。

【炮制】 (1)生栀子 取原药材，除去枝梗等杂质，洗净，干燥，称"生栀子"。

(2)炒栀子 取净生栀子打碎(称"栀子碎片")，置锅内用文火加热，炒至深黄色，取出，放凉，称"炒栀子"。

(3)焦栀子 取栀子碎片，置锅内用中火加热，炒至焦黄色，取出，放凉，称"焦栀子"。

【性状】 (1)药材 呈长卵形或椭圆形，长1.5～3.5cm，直径1.0～1.5cm。表面红黄色或棕红色，具6条翅状纵棱，棱间常有1条明显的纵脉纹，并有分枝。顶端残存萼片，基部稍尖，有残留果梗。果皮薄而脆，略有光泽；内表面色较浅，有光泽，具2～3条隆起的隔膜。种子多数，扁卵圆形，集结成团，深红色或红黄色，表面密具细小疣状突起。气微，味微酸而苦(图366－1)。

以皮薄、饱满、色红黄者为佳。

(2)饮片 ①栀子碎片 为不规则碎片状，种子团多数散开，种子扁卵圆形，深红色。果皮表面红黄色。气微，味微酸而苦。

②炒栀子 形同栀子碎片，外表颜色加深，略挂火色。气香，味苦(图366－2)。

③焦栀子 形同栀子碎片，表面焦黄色。有焦香气，味苦、涩(图366－3)。

【功效】 味苦，性寒。泻火除烦，清热利尿，凉血解毒。焦栀子凉血止血。

附：日本山栀子 *Fructus Gardeniae* サンシシ

【来源】 本品为茜草科植物栀子 *Gardenia jasminoides* Ellis. 或同属他种植物的干燥成熟果实。

【产地加工】 待果实完全成熟后采收，一般在11月霜降前后。采后置阴凉通风处干燥。

【性状】 (1)药材 呈长卵形或卵形，长1～5cm，宽1.0～1.5cm。表面为黄褐色至黄红色，有5～7个明显的棱线，通常为6个。一端有宿存的花萼，另一端具有果柄痕。果皮内表面黄褐色，平滑，有光泽。果实内具2室，胎座上的种子团块呈黄红色或暗红色。种子略呈圆形而扁平，长约0.5cm，黑褐色或黄红色，微有香气，味苦(图366—4)。

以形小如丸、内部色黄红色者为佳。

(2)饮片 粉末呈黄褐色。气微香，味苦。

365—1

365—2

365—3

366—1

366—2



366—3

366—4

367. 枸 橘

Guoju **Fructus Ponciri**

クキツ **Immature Fruit of Trifoliate**

【来源】 本品为芸香科植物枸橘 *Poncirus trifoliata* Rafinesque -Schmaltz 的未成熟果实。

【产地加工】 7～11 月份采摘未成熟果实，在水泥场地上晒 20 天左右即干。

【炮制】 取原药材，稍浸，取出，切成 4 片，晒干。

【性状】 ①药材 圆球形，直径 2.0～3.5cm。表面黄色或黄绿色，具隆起的细小皱纹和众多细小油点，密被短柔毛。顶端有圆形柱基，基部有短果柄或果柄痕。质坚硬，断面果皮厚 0.2～0.3cm，黄白色，外缘有黄色油点，中央果瓤 6～8 瓣，每瓤内有种子数枚。香气浓烈，味酸、苦。

(2)饮片 类圆形或半圆形，片厚约 0.3cm。表面黄色或黄绿色，密被短毛，切面果肉黄白色，外缘有黄色油点，中央有 6～8 果瓤，种子常脱落(图 367)。

【功效】 味辛、苦，性温。理气止痛。用于胃脘胀痛，睾丸胀肿，疝痛等症。

368. 枸橘叶

Guojuye **Folium Ponciri**

クキツヨウ **Leaf of Trifoliate Orange**

【来源】 本品为芸香科植物枸橘 *Poncirus trifoliata* Rafinesque -Schmaltz 的干燥叶。

【产地加工】 全年均可采摘，晒干。

【炮制】 取原药材，拣去杂质。

【性状】 (1)药材 由 3 小叶组成的复叶，叶柄有狭翅，小叶片微内卷，上表面黄绿色或灰绿色，下表面浅黄绿色，顶端钝形成微凹，基部渐狭。揉碎时有香气，味苦。

(2)饮片 特征与药材相似，或已散为小叶(图 368)。

【功效】 味辛、苦，性温。理气止痛。用于胃脘胀痛、胸胁疼痛等症。

369. 胡子鲸

Huzinian **Clarias Fuscus**

コシネ **Huzinian**

【来源】 本品为胡子鲸科动物胡子鲸 *Clarias fuscus* (Lacepeda)的全体或肉。

【产地加工】 全年可捕，捕后鲜用。

【炮制】 取原药材，除去内脏，洗净。

【性状】 药材 体延长，前部平扁，后部侧扁。头扁而宽，顶被有皮膜。口阔，下位，吻宽短，突出。眼小，有活动的眼睑。鼻孔每侧 2 个。上颌突出。唇厚，口角唇褶发达。触须 4 对：鼻须 1 对，较短，伸达鳃孔后方；上颌须 1 对和额须 2 对，较长，均伸达胸鳍基部或后方。背鳍 58～62，九硬刺，基部甚长，末端几与尾鳍相连。胸鳍 1.7～8，圆形，有 1 根硬刺，其为外侧均具锯齿。腹鳍 6，中达臀鳍起点。臀鳍 39～43，起点紧接肛门，基部甚长，末端与背鳍相连。尾鳍圆扇形。体光滑无鳞，有侧线。体棕黑色，各鳍灰黑色(图 369)。

【功效】 补血，滋肾，调中，助阳。

367

368

369

370. 胡桃仁

Hutaoren **Semen Juglandis**
コトウニン **Seed of English Walnut**

【来源】 本品为胡桃科植物胡桃 *Juglans regial* L. 的种仁。
【产地加工】 9～10月份采收成熟果实，除去果皮，敲破果核（内果皮），取出种仁。
【炮制】 取原药材，除去杂质，筛净，干燥。
【性状】 药材 由2片呈脑状的子叶构成，完整者可见一端有三角状突起的胚根，大多2瓣裂或破碎成不规则块状。完整者类球形，直径1～3cm，凹凸不平，表面淡棕色或深棕色，种皮菲薄，有深色脉纹，破断后内部乳白色或黄白色，富油质。味微香甜，种皮微涩。
以色黄、个大、饱满、断面色白者为佳（图370）。
【功效】 味甘，性温。补肾固精，温肺定喘，润肠。

371. 胡黄连

Huhuanglian **Rhizoma Picrorhizae**
コオウレン **Rhizome of Figwortflower Picrorhiza**

【来源】 本品为玄参科植物西藏胡黄连 *Picrorhiza scrophulariifolia* Pennell 的干燥根茎。
【产地加工】 秋季地上部分枯萎时采挖，去净地上部分及泥土，洗净，晒干。
【炮制】 取原药材，拣去杂质，快洗或不洗喷潮，润软，切3mm左右薄片，晒干或烘干，筛去灰屑。
【性状】 （1）药材 呈圆柱形，稍弯曲，长3～12cm，直径0.3～1.0cm。表面灰棕色，粗糙，有环纹及纵皱，顶端常带有叶柄残基，密集成鳞片状，少数根基有残留须根，外皮易剥落。体轻，质脆，断面暗棕色，稍平坦，点状木质部导管群放射状排列，髓部灰黑色。气微，味极苦。
（2）饮片 为厚约3mm，直径0.3～1.0cm的类圆形片。表面灰棕色，切面灰黑色，花白点状木质部束4～7个。其余特征同药材（图371）。
【功效】 味苦，性寒。清湿热，退虚热。用于低热、巨赤、痢疾、黄疸、疳积、痔疮等症。

372. 胡 椒

Hujiao **Fructus Piperis**
コショウ **Black Pepper**

【来源】 本品为胡椒科植物胡椒 *Piper nigrum* L. 的干燥近成熟或成熟果实。
【产地加工】 秋末到次春果实呈暗绿色时采收，晒干，为黑胡椒；果实变红时采收，用水浸渍数日，擦去果肉，洗净，晒干，为白胡椒。
【炮制】 取原药材，除去杂质及灰屑。
【性状】 （1）药材 ①黑胡椒 呈球形，直径0.35～0.50cm。表面黑褐色，具隆起的网状皱纹，顶端有细小花柱残迹，基部有自果轴脱落的疤痕。质硬，外果皮可剥离，为果皮灰白色或淡黄色。质硬脆。断面黄白色，粉性，中有小空隙。气芳香，味辛辣（图372—1）。
以粒大、色黑、气味浓者为佳。
②白胡椒 呈圆球形，顶端略扁微凹，基部隆起略尖，直径0.3～0.5cm。表面灰白色至淡黄白色，平滑，顶端与基部之间有多数浅色线状条纹。内果皮极薄，破开后可见种子浅黄色或黄白色，带粉性，中央有小空隙。气芳香，味辛辣（图372－2）。
以粒大、色白、气味浓者为佳。
【功效】 味辛，性热。温中散寒，下气，消痰。

370



371



372—1



372—2

373. 荆 芥

Jingjie **Herba Schizonepetae Tenuifoliae**

ケイガイ **Herb of Fineleaf Schizonepeta**

【来源】 本品为唇形科植物荆芥 *Schizonepeta tenuifolia* Briq. 的干燥带花穗嫩枝。

【产地加工】 春播者在7～8月份花全部开出时割取地上部分，阴干或晒干。8月份播种者在11月份采收。

【炮制】 (1)荆芥片 取原药材，拣取杂质、泥屑，切去老梗和根，淋湿，切厚片，晒干，筛去灰屑。

(2)炒荆芥 取荆芥净片，清炒至微焦。

(3)荆芥炭 取荆芥净片，清炒至焦褐色。

【性状】 (1)药材 呈方柱形，淡紫红色或淡绿色，疏被柔毛。质坚脆，断面纤维性，髓部色灰白。叶片多脱落。枝顶穗状轮伞花序长2～8cm，花萼宿存，钟形，淡棕色，被短柔毛，内藏棕黑色小坚果。气芳香，味微涩而辛凉。花穗(图373)。

(2)饮片 ①荆芥片 长约0.5cm，淡绿色或淡紫红色，其余鉴别特征同药材。

②炒荆芥 表面微焦，余同荆芥片。

③荆芥炭 表面焦褐色，余同荆芥片。

【功效】 味辛，性微温。生用解表散风，透疹；炒炭止血。用于感冒、头痛、麻疹不透、疮疡等症；炒炭治便血、崩漏等症。

374. 南山楂

Nanshanzha **Fructus Crataegi Cuneatae**

ナンサンサ **South Hawthorn Fruit**

【来源】 本品为蔷薇科植物野山楂 *Crataegus cuneata* Sieb. et Zucc. 的干燥成熟果实。

【产地加工】 于秋季果实成熟时采摘，置沸水中略烫后晒干或直接晒干。

【炮制】 (1)南山楂 取原药材，除去杂质，洗净，压扁，簸去核，晒干，通称“南山楂”。

(2)炒南山楂 取净南山楂置锅内，用文火加热，炒到表面颜色变深时，取出放凉，称“炒南山楂”。

(3)焦南山楂 取净南山楂置锅内，用中火加热，炒到表面焦褐色，内部黄褐色，取出放凉，称“焦南山楂”。

【性状】 (1)药材 呈类球形或扁圆形饼状，直径0.8～1.4cm。表面棕红色或灰红色，有细皱纹，顶端凹陷，有花萼残基，基部有果柄或果柄痕，质硬核大，果肉薄。无臭，味微酸、涩(图374—1)。以个大、肉厚、表面棕红色者为佳。

(2)饮片 ①炒南山楂 形如南山楂，表面显微黄色。质硬脆，气微香，味微酸、涩(图374—2)。

②焦南山楂 形如南山楂，表面显焦黑色。质脆，断面内部显焦褐色。气微，味微涩(图374—3)。

【功效】 味酸、甘，性微温。行气散瘀，收敛止泻。焦南山楂收敛作用增强。



374—1

373

374—2



374—3

375. 南天竹叶

Nantianzhuye　　Folium Nandianae

ナンテンチクヨウ　Leaf of Common Nandina

【来源】 本品为小檗科植物南天竹 *Nandiana domestica* Thunb. 的干燥叶。

【产地加工】 全年均可采收，除去杂质，晒干。

【炮制】 取原药材，拣去杂质，洗净，略润，切制成 2～3cm 长的段片。

【性状】 (1)药材　为 2～3 回羽状复叶，各级羽叶均对生，叶轴细长，完整叶片长达 30cm，总叶柄基部扩大呈鞘状。小叶片椭圆状披针形至卵形，长 3～10cm，全缘，两面均为淡绿色、棕黄色至棕红色。质脆。气弱，味微苦(图 375—1)。

(2)饮片　为 2～3cm 长的段片，叶柄、叶片仍均具有药材之特征(图 375—2)。

【功效】 味苦，性寒。清热解毒，散结，明目。

376. 茜　草

Qiancao　　Radix Rubiae

センソウ　　Root of India Madder

【来源】 本品为茜草科植物茜草 *Rubia cordifolia* L. 的干燥根及根茎。

【产地加工】 于春、秋 2 季采挖，除去泥沙，干燥。

【炮制】 (1)茜草片　取原药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片或段，干燥，称“茜草片”。

(2)茜草炭　取茜草片或段置锅内，用武火加热，炒至表面焦黑色，内部棕褐色，喷淋少许清水，灭尽火星，取出晾干，称“茜草炭”。

【性状】 (1)药材　根茎呈结节状，丛生粗细不等的根。根呈圆柱形，略弯曲，长 10～25cm，直径 0.2～1.0cm。表面红棕色或棕色，具细纵皱纹及少数细根痕。皮部脱落处呈黄红色。质脆，易折断。断面平坦，皮部狭，紫红色，木部宽广，浅黄红色，导管孔多数。气微，味微苦，久嚼刺舌(图 376—1)。

以条粗长、外皮色红棕、断面黄红色者为佳。

(2)饮片　①茜草片　为不规则的厚片或小段，表面红色，有多数散在的小孔，周边红棕色；体轻。气微，味微苦(图 376—2)。

②茜草炭　形同茜草片，表面焦黑色，内部棕褐色(图 376—3)。

【功效】 味苦，性寒。凉血，止血，祛瘀，通经。

375—1

375—2

376—1

376—3

376—2

377. 草血竭

Caoxuejie **Rhizoma Polygoni Paleacei**

ソウケッケツ **Rhizome of Paleaceous Knotweed**

【来源】 本品为蓼科植物草血竭 *Polygonum paleaceum* Wall. 的干燥根茎。

【产地加工】 于秋、冬2季，挖取根茎，除去细根，洗净，晒干或切片后晒干。

【炮制】 取原药材，拣去杂质，淋水润软，切片，晒干。

【性状】 (1)药材 扁圆柱形，多弯曲，长2～6cm，直径0.8～2.0cm。表面紫褐色或黑褐色，一面隆起，另面有凹槽，具粗环纹，残留细根或痕迹。质硬，断面三角状肾形，颗粒性，红棕色，维管束点黄白色，25～40个，排列呈环状。气微，味涩、微苦。

(2)饮片 多为横切薄片，厚约3mm。表面紫褐色，有细根痕，切面三角状肾形，红棕色或灰棕色，有白色点状维管束25～40个排成环状(图377)。

【功效】 味苦、涩，性微温。破瘀，调经，止血，消食。用于跌扑损伤、血瘀经闭、食积胃痛等症。

378. 茵 陈

Yinchen **Herba Artemisiae Scopariae**

インチン **Seeding of Virgate Wermwood**

【来源】 本品为菊科植物滨蒿 *Artemisia scoparia* Waldst. et Kit. 或茵陈蒿 *Artemisia capillaris* Thunb. 的干燥地上部分。

【产地加工】 春季幼苗高6～10cm时采收，或秋季花蕾长成时采割，除去杂质及老茎，晒干。春季采收的习称“绵茵陈”，秋季采割的称“茵陈蒿”。

【炮制】 取原药材，除去残根、老茎及杂质，搓碎，筛去灰屑。

【性状】 药材 ①绵茵陈 多卷曲成团状，灰白色或灰绿色，全体密被白色茸毛，绵软如绒。茎细小，长1.5～2.5cm，直径0.10～0.12cm，除去表面白色茸毛后可见明显纵纹；质脆，易折断。叶具柄，展平后叶片呈1～3回羽状分裂，叶片长1～3cm，宽约1cm；小裂片卵形或稍呈倒披针形、条形，先端尖锐。气清香，味微苦(图378—1)。

②茵陈蒿 茎呈圆柱形、多分枝，长30～100cm，直径0.2～0.8mm；表面淡紫色或紫色，有纵条纹，被短柔毛；体轻，质脆，断面类白色。叶密集或多脱落。下部叶2～3回羽状深裂，裂片条形或细条状，两面密被白色柔毛；茎生叶1～2回羽状全裂，基部抱茎，裂片细丝状。头状花序卵形，多数集成圆锥状，长0.12～0.15cm，直径0.10～0.12cm，有短梗；总苞片3～4层，卵形，苞片3裂；外层雌花6～10个，可多达15个，内层两性花2～10个。瘦果长圆形，黄棕色。气芳香。味微苦(图378—2)。

【功效】 味苦、辛，性微寒。清湿热，退黄疸。



377

378—1



378—2

379. 茯　苓

Fuling　　Poria

ブクリョウ　　Indian Bread

【来源】 本品为多孔菌科真菌茯苓 *Poria cocos* (Schw.) Wolf 的干燥菌核。

【产地加工】 多于秋季采挖，除去泥沙，堆置"发汗"后，摊开晾至表面干燥，再"发汗"，反复数次至表面现皱纹，内部水分大部散失后，阴干，称"茯苓个"。去净外皮后，切下外层的淡红色部分，称为"赤茯苓"；切去赤茯苓后的白色部分称为"白茯苓"，通称"茯苓"。

【炮制】 (1)茯苓个　取原药材，除去杂质，称"茯苓个"。

(2)茯苓片　取原药材，大小个分开，浸泡，洗净，润透，稍蒸后切皮，趁热切块或切厚片，干燥，前者称"茯苓块"，后者称"茯苓片"。

(3)朱茯苓　取茯苓块或茯苓片，喷淋热水，闷润至外部变软，均匀散布一定量的水飞朱砂，反复翻动，使外表粘满朱砂粉末，晾干，称"朱茯苓"。

【性状】 (1)药材 茯苓个　呈类球形、椭圆形、扁圆形或不规则团块，大小不一。表面棕褐色至黑褐色，薄而粗糙，有明显的皱缩纹理。体重质坚实，不易破开，断面不平坦，颗粒性，有的具裂隙，外层淡棕色或淡粉红色；内部白色，少数淡棕色或淡粉红色。有的中间抱有松根。无臭，味淡，嚼之粘牙(图 379－1)。

以体重坚实、外皮色棕褐、无裂隙、断面色白细腻、嚼之粘性强者为佳。

(2)饮片　①茯苓块　为方形或不规则形块。方形块长宽 4～5cm；不规则形块大小不一，切面颗粒性，白色、淡红色或淡棕色。体重，质实。无臭，味淡，嚼之粘牙(图 379－2)。

②茯苓片　为不规则形厚片，大小不一，厚 0.2～0.4cm，切面白色、淡红色或淡棕色，颗粒性。周边不整齐。体重，质坚实。无臭，味淡，嚼之粘牙(图 379－3)。

③朱茯苓　形如茯苓块或茯苓片，表面朱红色(图 379－4)。

【功效】 味甘、淡，性平。利水渗湿，健脾宁心。朱茯苓长于宁心安神。

附：茯苓白碎(日本加工品)

呈不规则碎块状，大小不等，最长块约 1.5cm。类白色或浅棕白色，表面显颗粒性，有棱角，握之有糙手感。质硬，可折断，断面显颗粒性。气微，味淡，嚼之有砂粒感(图 379－5)。

380. 茯　神

Fushen　　Sclerotium et Lignum Poriae

ブクシン　　Indian Bread with Pine-root

【来源】 本品为多孔菌科真菌茯苓 *Poria cocos* (Schw.) Wolf 的干燥菌核去净外皮后带有松根的部分。

【产地加工】 取"茯苓个"，剥净外皮，将有松根的部分切成扁平方块。

【炮制】 (1)茯神　取原药材，除去杂质，称"茯神"。

(2)朱茯神　取茯神，喷淋热水，闷润至外部变软，加一定量水飞朱砂，散布均匀，并随时翻动，至茯神外面均匀粘满朱砂，晾干，称"朱茯神"。

【性状】 (1)药材　为扁方形块状或不规则碎块，长宽 4～5cm，厚 0.4～0.6cm。切面多为白色，少有淡红色，颗粒状或粉质。切断的松根直径不超过 1.5cm，切面棕黄色，有圈状纹理。不规则碎块，大小不一，长宽在 1.5cm 以上。质坚实。气微，味淡(图 380)

(2)饮片　朱茯神　形如茯神，表面朱红色。

【功效】 味甘、淡，性平。宁心安神。用于心悸失眠。

379—1

379—2



379—3

379—4

379—5



380

381. 茺蔚子

Chongweizi **Fructus Leonuri**

ジュウイシ **Motherwort Fruit**

【来源】 本品为唇形科植物益母草 *Leonurus heterophyllus* Sweet 的干燥成熟果实。

【产地加工】 秋季果实成熟时采割地上部分，晒干，打下果实，除去杂质。

【炮制】 (1)生茺蔚子 取原药材，除去杂质，洗净，干燥，称"生茺蔚子"。

(2)炒茺蔚子 取净茺蔚子置锅内，用文火加热，炒至鼓起、色泽加深、爆鸣声减弱、有香气逸出时，取出放凉，称"炒茺蔚子"。

【性状】 (1) 药材 呈3棱形，长0.2～0.3cm，宽约0.15cm。表面灰棕色至灰褐色，有深色斑点，一端稍宽，平截状，一端渐窄而钝尖。果皮薄，子叶类白色，富油性。气微，味苦(图381—1)。

以颗粒饱满者为佳。

(2)饮片 炒茺蔚子 形同茺蔚子，表面微鼓起，色泽变深，断面深黄白色。气微香，味苦(图381—2)。

382. 荔枝草

Lizhicao **Herba Salviae Plebeiae**

レイシソウ **Herb of Common Sage**

【来源】 本品为唇形科植物荔枝草 *Salvia plebeia* R. Br. 的干燥全草。

【产地加工】 5～6月，开花前后均可割取全草，除去杂草，阴干或晒干。

【炮制】 取原药材，拣去杂质，抖去灰屑，切片。

【性状】 (1)药材 全草长15～90cm，黄绿色或黄褐色。茎方形，多分枝，具倒向疏柔毛。根出叶有炳，叶片皱缩而破碎，完整者展平后呈椭圆形或披针形，叶缘有锯齿，上表面极皱缩，下表面有腺点；茎生叶对生，长2～6cm，两面被疏毛。轮伞花序集成顶生假总状花序或圆锥花序，花萼钟形，外被腺毛如长柔毛，花冠淡红色至蓝紫色。气香，味辛。

(2)饮片 为切碎的茎、叶、花序的混合物。茎段长约5mm，表面有纵棱和倒向柔毛，切面中部有髓，方形。叶皱缩。气香，味辛(图382)。

【功效】 味辛，性凉。利尿，清热，消肿。用于腹水肿胀、肾炎水肿、咽喉肿痛、急性乳腺炎和宫颈炎等症。

383. 砗　磲

Chequ **Concha Tridacnae**

シャキョ **Shell of Giant Clam**

【来源】 本品为砗磲科动物鳞砗磲 *Tridacna* (*Chamestrachea*) *squamosa* (Linnaeus)或其同属动物的贝壳。

【产地加工】 四季采捕，取壳，洗净，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质。

【性状】 药材 贝壳卵圆形，壳质厚重而坚实，壳顶位于贝壳中央。腹缘弯曲呈波状。外表面黄白色，生长轮脉细密，具有4～6条较大的放射肋，肋上有宽而翘起的大鳞片，肋间沟具有宽的放射肋纹。内面白色，具光泽。气微，味淡(图383)。

【功效】 镇静，解毒。

381—1

381—2

383

382

384. 砒　石

Pishi　　Arsenicum Sublimatum
ヒセキ　　Arsenic

【来源】 本品为氧化物类矿物砷华 Arsenolite 矿石；或由毒砂 Arsenopyrite（硫砷铁矿，FeAsS）、雄黄加工制造而成。

【产地加工】 少数为选取天然的砷华矿石。多数为由毒砂、雄黄加工而成，加工方法如下：

（1）老法　将毒砂砸成小块，除去杂石，与煤、木炭或木材烧炼，然后升华，即为砒石。

（2）新法　选取纯净的雄黄，砸成 $10cm^3$ 以上的块，点燃，使雄黄燃烧，生成气态的三氧化二砷及二氧化硫，然后通过冷凝管，使三氧化二砷得到充分冷凝，即为砒石。二氧化硫另从烟道排出。

【炮制】 取原药材，拣去杂质，选洁净品，用时研细。或取净药材，砸碎，装入砂罐内，用泥将口封严，置炉火中煅红，取出放凉，研为细粉。

【性状】 商品分红信石及白信石 2 种，红白信石仍少见，药用以红信石为主。

药材　（1）信石（红砒、红矾）　为不规则块状，表面粉红色、黄色与红色彩晕，略透明或不透明，具玻璃光泽或无光泽。质脆，易砸碎，断面凹凸不平或呈层状纤维样结构。无臭（稍加热则有蒜和硫黄样臭气）。本品极毒，不能口尝（图 384）。

以块大、色白或无色、有晶莹直纹、无渣者为佳。

（2）自然砒石（砷华 As_2O_3）　集合体呈钟乳状、皮壳状和土状。通常为无定形的粒状、块状及粉末状。无色至灰白色，常带灰蓝色、黄或红色色调。条痕白色或淡黄色。玻璃至金刚光泽，无晶面可见为油脂、丝绢光泽。质脆，硬度 1.5。缓慢溶解于水，有剧毒。

以红、黄、白色均匀，半透明、断面有光泽者为佳。

【功效】 味辛，性热。有大毒。去痰截疟，杀虫，蚀恶肉。用时宜慎，体虚及孕妇忌服。忌食猪肉。

385. 砂　仁

Sharen　　Fructus Amoni
シャジン　　Fruit of Villous Amomus

【来源】 本品为姜科植物阳春砂 *Amomum villosum* Lour.、海南砂 *Amomum longiligulare* T. L. Wu 或绿壳砂 *Amomum villosum* Lour. *var. xanthioides* T. L. Wu et Senjen 的成熟干燥果实。

【产地加工】 于夏、秋 2 季果实成熟的采收，晒干或低温干燥。

【炮制】 取原药材，除去杂质。用时打碎。

【性状】 药材　①阳春砂　呈椭圆或卵圆形，有不明显的三棱，长 1.5～2.0cm，直径 1.0～1.5cm。果皮薄而软，表面棕褐色，密生刺状突起。种子团具三钝棱，由白色隔膜分成 3 瓣。每瓣种子 6～15 枚。种子为不规则多面体，直径 0.2～0.3cm，表面棕红色或暗褐色，有细皱纹，外被淡棕色假种皮；质硬；胚乳近白色。气香而浓烈，味辛苦、有凉爽感（图 385－1）。

②海南砂　与阳春砂主要区别是果实稍瘦，直径 0.8～1.2cm；果皮厚而硬，表面具片状分枝软刺；种子团较小，每瓣有种子 5～17 枚，种子直径 0.1～0.2cm。气味稍淡。

③绿壳砂　主要特征是：果实稍短而圆，果皮外表面黄棕色至棕色，密具刺片状突起。种子团较圆，种子表面灰棕色至棕色，外被一层不易擦落的白霜。气味较淡（图 385—2）。

【功效】 味辛，性温。化湿开胃，温脾止泻，理气安胎。

384

385—2

385—1

386. 牵牛子

Qianniuzi **Semen Pharbitidis**

ケンゴシ **Pharbitis Seed**

【来源】 本品为旋花科植物裂叶牵牛 *Pharbitis nil* (L.) Choisy 或圆叶牵牛 *Pharbitis purpurea* (L.) Voight 的干燥成熟种子。

【产地加工】 秋末果实成熟，果壳未开裂时采割植株，晒干，打下种子，除去杂质。

【炮制】 (1)生牵牛子 取原药材，除去杂质，洗净，晒干，用称"生牵牛子"。

(2)炒牵牛子 取净牵牛子置锅内，用中火加热，炒至鼓起、颜色加深时，取出，称"炒牵牛子"。

【性状】 (1)药材 形似橘瓣状，长 0.4～0.8cm，宽 0.3～0.5cm。表面灰黑色(黑丑)或淡黄色(白丑)。背面有 1 条浅纵沟，腹面棱线的下端有 1 点状种脐，微凹。质硬。横切面可见淡黄色或黄绿色皱缩折叠的子叶，微显油性。气微，味辛、苦，有麻感。黑丑(图 386—1)，(图 386—2)白丑。

以颗粒饱满者为佳。

(2)饮片 炒牵牛子 形如牵牛子，表面稍鼓起，有焦香味

【功效】 味苦，性寒。有毒。泻火通便，消痰涤饮，杀虫攻积。

387. 厚 朴

Houpo **Cortex Magnoliae Officinalis**

コウボク **Bark of Officinal Magnolia**

【来源】 本品为木兰科植物厚朴 *Magnolia officinalis* Rehd. et Wils. 及凹叶厚朴 *Magnolia officinalis* Rehd. et Wils. *var. biloba* Rehd. et Wils. 的干燥干皮、根皮及枝皮。

【产地加工】 4～6 月份剥皮，切成 20～30cm 的皮段，根皮及枝条皮直接阴干，干皮置沸水中微烫后，堆置阴湿处或置地窖中，上盖稻草"发汗"，至内表面变紫褐色或棕褐色时，再蒸软，取出，卷成筒状，干燥。药材近根部的干皮，下端连有部分根皮，形如靴状，习称"靴筒朴"；根皮及枝皮则分别称为"根朴"和"枝朴"。

【炮制】 (1)厚朴片 取原药材，除去杂质，洗净，稍浸，捞取润透，切片，干燥。靴筒朴及筒朴在润透后尚须刮去粗皮，再切制成丝片或"肚片"；根朴润透后切制成丝片或"指甲片"；枝朴润透后切制成丝片。切制后通称"厚朴片"。

(2)制厚朴片 取切制的厚朴片，加姜汁拌匀，待吸尽后，用文火炒至黄色为度。每 100kg 厚朴片，用 10kg 生姜。

【性状】 (1)药材 ①靴筒朴 厚 3～8mm，外表上端灰褐色，下部灰棕色，表面粗糙，具鳞片状栓皮，除去栓皮者表面较平坦，显黄棕色；内表面紫棕色或深褐色，刻之显油痕。质坚硬，断面外部灰棕色，颗粒性；内部紫褐色或棕色，富油性，有时可见多数发亮的细小结晶。气香，味苦，带辛辣感(图 387—1,1)。



386—1



386—2

387—2

387—2

②筒朴 厚 2～7mm，外表均为灰褐色。其他与靴筒朴略同（图 387—1,2；图 387—2）。

③根朴 呈单筒状或不规则块状，时呈撕裂状，厚 1～3mm。表面灰棕色，有横纹及纵皱纹，裂开处呈纤维状。质硬，易折断，嚼之残渣较多。余略同干皮（图 387—1,4）。

④枝朴 呈单筒状，较薄，厚 1～2mm。外表皮灰褐色，具皱纹，内表皮棕黄褐色。质脆，易折断，断面纤维性。嚼之渣多（图 387—1,3）。

其中靴筒朴和筒朴以皮厚、内表面紫棕色、油性足、断面有小亮晶、香气浓者为佳。

(2)饮片 厚朴片 为丝片、肚片或为指甲片，厚 1～8mm。切片形态、厚薄、内外色泽等均依原药材不同而有别。姜汁炒制后，色泽加深，微有姜的辛辣气味（图 387—3）。

【功效】 味苦、辛，性温。燥湿消痰，下气除满。姜汁炒后，可增强其温中和胃除满、燥湿化痰之功。

附：和厚朴 *Cortex Magnoliae* ワコボク

【来源】 本品为木兰科植物厚朴 *Magnolia obovata* Thunberg 的干燥树皮。

【产地加工】 在春末夏初间剥取树皮，晒干。

【性状】 (1)药材 呈板片状或半卷筒状，厚 2～5mm。外表面灰白色至灰褐色，常附有地衣斑；内表面淡褐色至褐色，常附有地斑。折断面强纤维性，淡红褐色。微有香气，味苦（图 387—4）。

以新鲜品气浓、皮厚质坚实、味苦辛者为佳。

(2)饮片 呈碎块状（图 387—5）。

【功效】 味苦、辛，性温。利尿，祛痰，镇咳。

388. 厚朴花

Houpohua **Flos Magnoliae Officinalis**

コウボクカ **Flower Bud of Officinal Magnolia**

【来源】 本品为木兰科植物厚朴 *Magnolia officinalis* Rehd. et Wills. 及凹叶厚朴 *Magnolia officinalis* Rehd. et Wils. *var. biloba* Rehd. et Wils. 的干燥花蕾或花。

【产地加工】 春末夏初采摘花蕾或初开的花，入蒸笼中蒸至上汽后 8～10 分钟，取出晒干或文火烘干。亦有不经蒸而直接烘干者。

【炮制】 取原药材，拣去杂质，去净花梗，筛去泥屑。

【性状】 (1)药材 干燥花蕾形似毛笔状，长 4～7cm，直径 2～3cm。外表棕褐色或棕红色，顶部尖或钝圆，底部稍圆，有花柄；柄长短不一，径约 5mm，上有环节（托叶痕）及小苞毛；花瓣层层覆盖，花蕾多完整。已开者，中央夹有短柱状花蕊（着生多数雄蕊和雌蕊的柱状花托）；花瓣肉质，较厚，匙形，有油点，折之易碎。气香（图 388）。

以含苞未放、身干、完整、柄短、色棕红、香气浓者为佳。

(2)饮片 花蕾形似原药材，仅底部花梗短或无；已开者常常有花瓣。

【功效】 味苦、辛，性温。理气，化湿。

387—3

387—4



387—5

388

389. 虻 虫

Mengchong **Tabanus**
ボウチュウ **Gadfly**

【来源】 本品为虻科昆虫复带虻 *Tabanus bivittus* Matsumura 的雌性全虫。

【产地加工】 于夏、秋2季捕捉后，用线穿起，晒干或阴干。

【炮制】 (1)生虻虫 将原药材拣去杂质，除去足、翅，筛去灰屑，称"生虻虫"。

(2)炒虻虫 取净虻虫置锅内，文火加热，微炒，取出放凉，通称"炒虻虫"。

(3)米炒虻虫 取净虻虫与米置锅内，文火加热拌炒至米呈深黄色为度。取出，筛去米粒，摊凉，通称"米炒虻虫"。每虻虫100kg，用米20kg。

【性状】 (1)药材 呈长椭圆形，长1.5～2.0cm，宽0.7～1.0cm。头部呈黑褐色或黑棕色，有光泽，复眼1对，大而凸出。胸部黑褐色，背部呈壳状而光亮，其两侧生有两对透明薄膜状翅，翅长超过尾；胸部下面突出，黑棕色，具足3对。腹部棕黄色，具6个体节。质松而脆，易破碎。有臭气，味苦咸(图389)。

以个大、完整、无杂质者为佳。

(2)饮片 ①生虻虫 形如原药材，但无足、翅。

②炒虻虫 形如虻虫，表面色泽加深。

③米炒虻虫 形如虻虫，表面色泽加深。

【功效】 味苦，性凉。逐瘀，破积，通经。

390. 钟乳石

Zhongrushi **Stalactitum**
ショウニュウセキ **Stalactite**

【来源】 本品为碳酸盐类矿物方解石的钟乳状或管状集合体，主含碳酸钙($CaCO_3$)。前者习称"钟乳石"，后者习称"滴乳石"。

【产地加工】 钟乳石常见于石灰岩山洞中。系含碳酸钙的水溶液在石灰岩溶洞中从岩石裂隙滴下，过饱和再析出的方解石沉淀，自上而下逐渐增长，倒垂于洞顶。采得后，除去杂石，晒干。粗如酒杯的称"钟乳石"，细如管状的称"滴乳石"。

【炮制】 (1)钟乳石 取原药材，除去杂质，洗净，干燥，捣成小块。

(2)煅钟乳石 取净钟乳石，置适宜的容器中，用武火加热，煅至红透，取出放凉，碾碎或捣成碎块，研粉用。

【性状】 (1)药材 ①钟乳石 略呈圆锥形、圆柱状或钟乳状，大小不一，长5～15cm，直径2～7cm。白色、灰白色或深灰色，粗糙，凸凹不平。有颗粒状突起。体重，质硬，不易打碎。断面对光观察显闪烁的亮光，中心带有1圆孔；圆孔周围有多数浅黄色同心环状环纹。每环层均由纤维状物组成。硬度3，条痕白色。无臭，味微咸(图390—1、图390—2)。本品遇稀盐酸，发生强烈气泡。

以色灰白、形如钟乳状、有光泽、多层纹，带晶片闪光者为佳。《中国药典》(1990年版)规定，本品含碳酸钙($CaCO_3$)不得少于95%。

②滴乳石 呈笔管状或圆柱状，中空，稍弯曲，长3～9cm，直径1.0～2.5cm。表面平滑，乳白色或灰黄色，半透明。质硬而脆，易折断，断面具玻璃样光泽，空洞较大，有的可见环形层纹。气无，味微咸(图390—3)。

以色白、管细中空、有光泽者为佳。

(2)饮片 ①煅钟乳石 表面略显层状纹理，灰白色或灰黄色，透明度降低。质酥脆，易碎。断面失去光泽(图390—4)。

②煅钟乳石粉 灰白色，微失去光泽(图390—5)。

【功效】 味甘，性温。温肺，助阳，平喘，制酸。

389



390—1

390—2

390—3

390—4

390—5

391. 香巴戟

Xiangbaji　　Radix Schisandrae Propinquae

コウハッキ　　Root-bark of Ceylon Houndstongue

【来源】 本品为木兰科植物铁箍散 *Schisandra propinqua* (Wall.)Baill *var. sinensis* Oliv. 的干燥根。

【产地加工】 全年均可采挖，洗净，除去须根及杂质，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片，晒干。

【性状】 (1)药材　呈圆柱形，多弯曲，长 20～40cm，直径 0.4～1.2cm。表面褐色、灰褐色、棕红色或棕褐色，有纵皱纹及环状裂纹。皮部厚，多横向断裂呈连珠状。质坚韧，折断面平坦，微呈颗粒状，皮部灰白色，有众多棕红色小点，木部灰棕色，皮部与木部之间有紫棕色环。气芳香，味辛、凉，嚼之有粘性(图 391—1)。

以粗壮、质实、断面灰白色、有紫红色小点、气味浓者为佳。

(2)饮片　呈圆形或椭圆形厚片或段片，厚 0.2～0.4cm，直径 0.4～1.0cm。切面皮部灰白色或浅紫灰色，颗粒性，有棕红色小点，与木部相连处有紫棕色环，木部灰棕色或灰黄色，木心脱落处具小孔。周边褐色至棕褐色，具纵皱纹、横裂纹与圆点状须根痕。质硬，气芳香。味辛凉，嚼之有粘液感(图 391—2)。

【功效】 味辛、苦，性微温。通经活血，强筋壮骨，祛风湿。

392. 香　附

Xiangfu　　Rhizoma Cyperi

コウブ　　Rhizome of Nutgrass

【来源】 本品为莎草科植物香附 *Cyperus rotundus* L. 的干燥根茎。

【产地加工】 秋季挖取块茎，燎去须毛，晒干或用沸水稍煮或蒸透后晒干。

【炮制】 (1)生香附　取原药材，拣去杂质，洗净，润透，切薄片，晒干。或低温烘干。

(2)制香附　取净香附置锅内，加黄酒、醋(每 100kg 香附，用黄酒、米醋各 10kg)和水，使之与香附平，用文火煮透，待汁吸尽。取出置蒸笼内，蒸至外表面黑色，内部深褐色，取出摊晒至半干。切薄片，再将蒸时所得原汁拌入，使之吸尽，晒干，筛去灰屑。

【性状】 (1)药材　①毛香附　纺锤形，长 2.0～3.5cm，直径 0.5～1.0cm。表面棕褐色，具环节，节上密生众多毛须、根痕和芽痕。质坚实，断面色白，粉性，环纹明显，环内色较深，有点状维管束。气芳香，味微苦(图 392—1)。

②光香附　表面毛须已被除去，较光滑，环节不甚明显，断面黄棕色或红棕色，微显角质。

(2)饮片　①生香附　为类圆形薄片，片厚约 2mm。表面棕褐色，切面白色，粉性，内皮层环纹明显，余同药材(图 392—2)。

②制香附　与生香附不同在于表面色深，切面黄棕色或红棕色，角质。

【功效】 味辛、微苦、微甘，性平。理气解郁，调经止痛。用于胸、胁、脘、腹疼痛，痛经，月经不调。

391—1

391—2



392—1

392—2

393. 香茶菜

Xiangchacai **Herba Isodonis Glaucocalycis**

コウチャサイ **Herb of Blue-calyx Rabdosia**

【来源】 本品为唇形科植物蓝萼香茶菜 *Isodon glaucocalys* (Maxim.) Kudo 的干燥全草。

【产地加工】 于秋季采收，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，稍润，切段，干燥，称"香茶菜段"。

【性状】 (1)药材 茎直立，4棱形，微被毛。单叶对生，有柄，阔卵形，先端渐尖或锐尖，基部楔形，边缘具粗大锯齿。圆锥花序腋生或顶生，唇形花冠。果实为4枚小坚果，小坚果椭圆形，稍扁。气微，味涩(图393--1)

以质嫩、叶多、色灰绿者为佳。

(2)饮片 香茶菜段 呈不规则的小段状，茎、叶、花混合。茎4棱形，微被毛。叶有柄，多破碎，完整者呈阔卵形，先端渐尖，叶片边缘具粗大锯齿。花唇形。小坚果椭圆形，稍扁。质轻。气微，味涩(图393—2)。

【功效】 味苦，性凉。清热解毒，健脾活血。

394. 香 橼

Xiangyuan **Fructus Citri**

コウエン **Citron Fruit**

【来源】 本品为芸香科植物枸橼 *Citrus medica* L. 或香圆 *Citrus wilsonii* Tanaka 的干燥成熟果实。

【产地加工】 于秋季果实成熟时采收，趁鲜切片，晒干或低温干燥。香圆亦可整个或对剖两瓣后，晒干或低温干燥。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片或对剖2瓣，干燥。

【性状】 (1)药材 ①枸橼 为圆形或类圆形片，直径4～10cm，厚0.2～0.5cm。横切片切面不平坦，边缘多呈波状，散有凹入的油点；中果皮厚1～3cm，黄白色或淡棕黄色，有不规则网状隆起的维管束；瓤囊10～17室。纵切片中心生较粗长。外果皮黄色或绿黄色，皱缩，散有许多凹入的油点。质柔韧。气清香，味微甜而后苦(图394 -1)。

②香圆 为类球形、半球形或圆片，直径4～7cm，表面黄棕色或墨绿色，密被凹陷的小油点及网状隆起的皱纹，顶端有花柱残痕及隆起的环圈，习称"金钱环"。基部有果梗残痕。切面边缘油点明显呈凹窝状，中果皮宽0.5～0.8cm，瓤囊9～11室，棕色或淡红棕色，间或有黄白色种子。气香，味酸苦而苦(图394—2)。

以个大、皮粗、表面黑绿色，切面黄白色、香气浓者为佳。

(2)饮片 为不规则的丝片。外果皮黄色、黑绿色或棕色，散有凹入的小油点。中果皮黄白色或淡红棕色，有不规则、稍突起的网状维管束。质柔韧。气清香，味苦(图394 -3，1：枸橼，2：香圆)。

【功效】 味辛、苦、酸，性温。舒肝理气，宽中，化痰。



393—1



393—2



394—1

394—2

394—3

395. 禹余粮

Yuyuliang Limonitum
ウヨリョウ Limonite

【来源】 本品为氢氧化物类矿物褐铁矿的矿石 Limonite(胶态结核、风化结核),主含碱式氧化铁[FeO(OH)]。

【产地加工】 采得后,去净杂石。

【炮制】 (1)禹余粮 取原药材,除去杂质,打碎。

(2)煅禹余粮 取净禹余粮,置适宜的容器内,用无烟武火加热,煅至红透,取出,放凉,碾碎或捣碎。

(3)醋禹余粮 取净禹余粮,捣碎,置适宜的容器内,用无烟武火加热,煅至红透,取出,立即投入醋中淬酥,取出,干燥,碾粉(禹余粮:醋=100:30)。

【性状】 (1)药材 ①胶态结核 呈不规则斜方块状、肾状、钟乳状、葡萄状、似胶带条状(胶态结核褐铁矿)或蜂窝状(风化结核褐铁矿),长 5～10cm,厚 1～3cm。表面黄褐色、红褐色、灰褐色,多凹凸不平或附有黄色粉末。断面呈不规则同心环及局部放射状纹,显褐、褐红色(含水赤铁矿多的部位)与黄、黄褐色(含水针铁矿或水纤铁矿多的部位)相间的层纹,中间有一核心,似鸡蛋黄。各层硬度不同,深褐红部分质坚硬,断面不整齐而光滑;浅黄褐色部分质较松,指甲可划动。半金属光泽或土状光泽。亦有断面无同心性环纹者,则有许多蜂窝状小孔,不透明。硬度 3.0～5.0,相对密度 3.3～4.3。条痕黄褐或褐红色。无臭,无味,嚼之无砂粒感(图 395—1)。

②风化结核 呈结核状,多呈扁圆形或中空,含赭黄色粉末(石中黄)者称"禹粮石"。表面不平坦,有似刀削痕,橙黄色。质重而坚硬,不易打碎,断面粗糙,呈色泽不均匀的层状。气无,有牙碜感(图 395—2)。

(2)饮片 ①煅禹余粮 以断面层纹明显、棕褐色、有"石中黄"者被称为精品。层间色泽分明不同,呈铁黑色处失去光泽。表面粉性消失。质较酥脆,轻弹即碎,染指不明显。气、味皆无(图 395—3)。

②醋禹余粮 呈细粉状,黄褐色或褐色,具醋气(图 395—4)。

【功效】 味甘、涩,性寒。涩肠止泻,收敛止血。

396. 鬼针草

Guizhencao Herba Bidentis Bipinnatae
キシンソウ Herb of Spanishneedles

【来源】 本品为菊科植物鬼针草 *Bidens bipinnata* L. 的干燥全草。

【产地加工】 于夏、秋 2 季采收地上部分,晒干。

【炮制】 取原药材,去净杂质,洗净,润透,切段,干燥,称"鬼针草段"。

【性状】 (1)药材 茎略呈方形,幼茎有短柔毛。叶纸质而脆,多皱缩,破碎,常脱落。茎顶常有扁平盘状花托,着生 10 余个呈针束状、有 4 棱的果实,有时带有头状花序。气微,味淡(图 396—1)。

(2)饮片 鬼针草段 为不规则小段,茎、叶、花、果实混合。茎呈方形,略带淡紫色,断面白色。叶纸质,多皱缩,偶有未切碎的针状、具 4 棱的果实。气微,味淡(图 396 -2)。

【功效】 味苦,性平。清热,解毒,散瘀,消肿。

395—1

395—2

395—4

396—2

395—3



396—1

397. 鬼箭羽

Guijianyu **Ramulus Euonymi**

キセンウ **Twig of Winged Euonymus**

【来源】 本品为卫矛科植物卫矛 *Euonymus alatus* (Thunb.) Sieb. 的具翅状物的枝条或翅状附属物。

【产地加工】 全年可采，割取枝条后，除去嫩枝及叶，晒干。

【炮制】 拣去杂质，用水浸透，捞出，切段，晒干。

【性状】 (1)药材 干燥枝条呈细长圆柱形，多分枝，长 40～50cm 左右，直径 0.4～1.0cm。表面灰绿色，有纵皱纹，四面生灰褐色片状翅，形似箭羽。枝坚硬而韧，难折断，断面淡黄白色，粗纤维性。翅质轻而脆，易折断，断面较平坦，暗红棕色，细颗粒性。气微，味微苦、涩(图 397—1)。

以枝条均匀、翅状物齐全者为佳。

(2)饮片 为圆柱形小段或厚片，表面灰绿色，有纵皱纹，四面生有灰褐色片状羽翼，形如箭羽。质松脆，易切断或剥落，断面呈棕色。枝条木质，质硬，切面黄白色。气微，味微苦、涩(图 397—2)。

【功效】 味苦，性寒。破血，通经，杀虫。

398. 独 活

Duhuo **Radix Angelicae Pubescentis**

ドッカツ **Root of Doubleteeth Pubescent Angelica**

【来源】 本品为伞形科植物重齿毛当归 *Angelica pubescens* Maxim. *f. biserrata* Shan et Yuan 的干燥根。

【产地加工】 秋末老叶枯萎后或者春初苗刚发芽时采挖，除去须根及泥沙，烘至半干后堆置 2～3天，待其变软后再烘烤至全干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，大小分开，抢水洗净，稍润，横切薄片，晒或低温烘干。

【性状】 (1)药材 主根略呈圆柱形，下部 2～3 分枝或者有较多分枝，长 10～30cm。根头略膨大，圆锥形，有多数横皱纹，直径 1.5～3.0cm，顶端有茎、叶残基或凹陷，表面灰褐色或棕褐色，有纵向皱纹、横长皮孔及稍凸起的细根痕。质较硬，通常受潮变软，断面皮部灰白色，有散在的棕色油点，木部灰黄色至黄棕色，形成层环棕色。气香而异，味苦、辛，微麻舌(图 398—1)。

以条粗、油润、香气浓者为佳

(2)饮片 为类圆形的薄片，直径 0.5～3.0cm，厚为 0.5～2.0mm。表面灰褐色或棕褐色，其纵皱至切面边缘凹凸不平；皮部灰白色，可见多数散在的棕色油点；木部灰黄色至黄棕色；皮部与木部之间有棕色形成层环。有特异香气，味苦、辛，微麻舌(图 398—2、图 398—3)。

【功效】 味辛、苦，性微温。祛风除湿，通痹止痛。

397—1

397—2



398—1

398—2

398—3

399. 胆　矾

Danfan　　Chalcanthitum

タンバン　　Chalcanthite

【来源】 本品为硫酸盐类矿物胆矾 Chalcanthite 的晶体，或为人工制成的含水硫酸铜($CuSO_4 \cdot 5H_2O$)。

【产地加工】 全年可采制，天然者可在开采铜、铅、锌矿时选取蓝色半透明的结晶；或用硫酸作用于铜片、氧化铜而人工制得。

【炮制】 拣净杂质，筛簸干净，用时捣碎或研细。

【性状】 (1)药材　呈不规则状块结晶体，大小不一。深蓝色或淡蓝色，表面常附有白色粉霜。半透明至透明，具玻璃样光泽。在空气中易缓缓风化。体较重，质脆，易碎，断面蓝色具较强光泽。碎块呈棱柱状。硬度 2.5，相对密度 2.1～2.3，条痕无色或带浅蓝，断口贝壳状。无臭，味酸、涩(图 399—1)。

(2)饮片　胆矾粉　淡蓝色。呈不规则颗粒，多数吸湿溶蚀呈类似圆球形。为无色或微蓝色透明块状体(放大 100×)(图 399—2)。

以块大、色深蓝、质脆、半透明者为佳。

【功效】 味酸、辛，性寒。有毒。涌吐风痰，收敛，祛腐，解毒。

400. 胆南星

Dannanxing　　Arisaema cum Bile

タンナンショウ　　Process Rhizome of Jackinthepulpit

【来源】 本品为制天南星的细粉与牛、羊或猪胆汁经加工而成，或为生天南星细粉与牛、羊或猪胆汁经发酵加工而成。

【产地加工】 取制南星细粉，加入净胆(或胆膏粉及适量水)拌匀，蒸 60 分钟至透，取出放凉，制成小块，干燥。或取生南星粉，加入净胆汁(或胆膏粉及适量水)，搅拌均匀，放温暖处，发酵 7～15 天后，再连续蒸或隔水炖 9 昼夜，每隔 2 小时搅拌 1 次，除去腥臭气，至呈黑色浸膏状，口尝无麻味为度，取出，晾干。再蒸软，趁热切成小块或厚片。

【性状】 药材　呈小方块状或圆形厚片。小方块每边长约 0.5cm；厚片直径 1～3cm，厚 0.2～0.4cm。表面棕黄色、灰棕色或棕黑色，断面色较浅。质硬。气微腥，味苦(图 400—1、图 400—2)。

以色黑、油润、腥之微腥、味不麻辣者为佳。

【功效】 味苦、微辛，性凉。清热化痰，息风定惊。

399—1

399—2

400—1

400—2

401. 疣荔枝螺

Youlizhiluo　　Concha Purpurae

ユウレイシラ　　Dogwinkle Shell

【来源】 本品为骨螺科动物疣荔枝螺 *Purpura clavigera* Kuster 的贝壳。

【产地加工】 于春季至秋季，潮水退后，在沙滩上捕捉，捕后置沸水中烫死，去肉，取壳备用。

【性状】 药材　壳为小纺锤形，壳质极坚厚。螺层约 6 层，自上而下迅速增宽。缝合线极浅，不易辨认。壳塔呈低圆锥形，其高度仅约为全壳高度的 1/3。壳顶极尖细，常呈破蚀状态。体螺层显著膨胀。壳表面具有旋形疣肋，壳塔之各螺层肩部和下部各有 1 条较明显的疣肋。肩部较粗大，由连续的粒状突起构成；下部恰在缝合线上，较细弱。体螺层有 5 条旋形疣肋。壳面为灰绿色或黄褐色，常杂以白色的纵行条纹；壳内面黄白色或粉黄色。壳口卵圆形。后沟呈缺刻状；前沟则短而开张。外唇边缘薄，向内增厚。壳高一般为 2.5cm，宽为 1.6cm，大者壳高可达 0.3cm，壳宽为 1.9cm（图 401）。

【功效】 软坚散结，清热解毒。

402. 前　胡

Qianhu　　Radix Peucedani

ゼンコ　　Root of Whiteflower Hogfennel

【来源】 本品为伞形科植物白花前胡 *Peucedanum praeruptorum* Dunn. 或紫花前胡 *Peucedanum decursivum* (Miq.) Maxim. 的干燥根。

【产地加工】 冬季至翌春茎叶枯萎或未抽花茎时采挖，除去须根，洗净，晒干或低温烘干。

【炮制】 (1)前胡片　取原药材，除去杂质，洗净，润透，切薄片，晒干。

(2)蜜前胡　取前胡片，加入适量水稀释后的炼蜜，拌匀，闷透，置锅内，用文火加热，炒至不粘手，取出放凉，称“蜜前胡”。

【性状】 (1)药材　①白花前胡根　呈不规则的圆柱形、圆锥形或纺锤形，稍扭曲，下部有少数分枝，长 3～15cm，直径 1～2cm。根头部粗短，多有茎痕及纤维状叶鞘残基，上端具密集的细环纹，下部有纵沟、纵皱纹及横向皮孔。表面黑褐色、棕褐色或灰黄色。质柔软或硬脆，折断面不整齐，淡黄白色，皮部散有多数棕黄色油点，形成层环纹浅棕色，木部黄色或棕黄色，射线放射状。气芳香，味微苦、辣（图 402—1）。

②紫花前胡根　圆柱形或圆锥形，有少数支根，长 3～15cm，直径 0.8～1.7cm。根头顶端有的有残留茎基，茎基部周围常有膜状叶鞘基残留。表面棕色至黑棕色，有浅直细纵皱纹、灰白色横向皮孔及点状须根痕。断面类白色，皮部较窄，散有黄色油点，木部黄白色。香气浓，味微甜后苦（图 402—2）。

均以条粗壮、质柔软、香气浓者为佳。

(2)饮片　①前胡片　为不规则类圆形薄片，直径 1～2cm，厚 0.1～0.2cm。切面淡黄白色或类白色，形成层环纹棕色或浅棕色，射线放射状，皮部散在多数棕黄色油点。周边黑褐色或灰黄色。气芳香，味微苦、辛（图 402—3）。

②蜜前胡　形如前胡片，切面深黄色，略有光泽，味微甜、略辛（图 402—4）。

【功效】 味苦、辛，性微寒。散风清热，降气化痰，止咳。

401

402—1

402—3



402—4

402—2

403. 穿山甲

Chuanshanjia　　Squama Manitis

センザンコウ　　Angolin Scales

【来源】 本品为鲮鲤科动物穿山甲 *Manis pentadactyla* Linnaeus 的鳞片。

【产地加工】 全年均可捕捉，杀死后置沸水中略烫，取下鳞片，洗净，晒干。

【炮制】 (1)穿山甲　取原药材，除去杂质及残肉，洗净，晒干，称"穿山甲"。

(2)醋山甲　取砂子置锅内，用武火加热至滑利容易翻动时，投入大小一致的穿山甲片，不断翻动，炒至鼓起，边缘向内卷曲，表面呈金黄色时取出，筛去砂子，放凉，称"炮山甲"或"炮甲珠"。或趁热投入醋液中稍浸，捞出干燥，称"醋山甲"。

【性状】 (1)药材　呈扇面形、三角形或瓦形，大小不一，中央厚，边缘薄。外表面淡棕色或黑棕色，宽端有数十条排列整齐的纵纹及数条横纹，窄端光滑，为表面色淡。前半部光滑，中部有1条明显突起的弓形横向棱线，自棱线至底部有数条与棱线平行的皱纹。角质，微透明，坚韧而有弹性，不易折断。气微腥，味淡(图403—1)。

以片色棕黑或棕黄、不带皮肉者为佳。

(2)饮片　①炮山甲　形如醋山甲，金黄色，质酥脆，易碎。气微腥，味咸(图403—2)。

②醋山甲　全体膨胀呈卷曲状，黄色，质松脆。易碎，有醋味(图403—3)。

【功效】 味咸，性微寒。通经下乳，消肿排浓，搜风通络。

404. 穿心莲

Chuanxinlian　　Herba Andrographitis

センシンレン　　Herb or Common Andrographis

【来源】 本品为爵床科植物穿心莲 *Andrographis paniculata* (Burm. f.) Nees 的干燥地上部分。

【产地加工】 于夏、秋2季生长茂盛时采割，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，水洗净，切段，干燥。

【性状】 (1)药材　茎方形，节膨大，分枝多，长40～70cm，表面绿色；质脆，易折断，断面有白色髓部。叶对生，易脱落；叶片皱缩，完整叶片用热水浸润展开，呈卵状矩圆形至矩圆状披针形，长3～12cm，宽0.5～2.5cm，先端渐尖，全缘或微波状，叶柄短或无；上表面绿色，下表面灰绿色，两面光滑；质脆，易碎。气微，味极苦(图404　1)。

以色绿、叶多者为佳。

(2)饮片　为段片。茎呈方柱形，长2～3cm，节稍膨大，表面绿色；质脆，中央有白色髓。叶多切成碎片，边全缘或波状，上表面绿色，下表面灰绿色，两面光滑。质脆，易碎。气微，味极苦(图404—2)。

【功效】 味苦，性寒。清热解毒，凉血，消肿。

403—1

403—2

403—3

404—2

404—1

405. 穿破石

Chuanposhi **Radix Cudraniae**

センハセキ **Root of Cudrania**

【来源】 本品为桑科植物构棘 *Cudrania cochinchinensis* (Lour.) Kudo et Masam. 或柘树 *Cudrania tricuspidata* (Carr.) Bur. 干燥根。

【产地加工】 全年可采。采挖后，削去支根，洗净，截成长段，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，润透，斜切成薄片，干燥。

【性状】 (1)药材 本品为圆柱形，长短不一，直径可达 6cm。外表栓皮橙红至橙黄色，有细密横纹，菲薄，极易脱落；栓皮脱落后表面呈灰黄色，并有棕黄色或橙黄色斑块。质韧，不易折断。切面皮部薄，纤维性，木部发达，黄色，有细小密集的针孔(导管)，中心时有小髓。气微，味微苦(图 405—1)。

以皮色黄、根条匀、无须根者为佳。

(2)饮片 为椭圆形的斜薄片或厚片，短径可达 6cm。外表栓皮常脱落，脱落后表面呈灰黄色；栓皮橙红或橙黄色，菲薄。切面皮部薄，纤维性；木部发达，黄色，有细小密集针孔状导管，中心无或有小髓。气微，味微苦(图 405—2)。

【功效】 味淡、微苦，性凉。祛风利湿，活血通经。

406. 姜 石

Jiangshi **Concretion**

キョウセキ **Loess**

【来源】 本品为石灰岩风化淋滤形成的钙质结核或黄土中的钙质结核。后者称“黄土小僧”。主矿物组分是方解石 Calcite[$Ca(CO_3)$]或高岭石 Kaolinite[$Al_4(Si_4O_{10})(OH)_8$]。

【产地加工】 从深层黄土中挖出，取浅黄或浅灰色、坚硬的结核体，去尽表面泥土，晒干。

【炮制】 (1)姜石 取原药材，洗净，干燥，捣碎，水飞用。

(2)煅姜石 取姜石，置适宜容器内，武火煅至红透，趁热投入醋中，因有屑落醋里，频烧，淬石至尽，取屑曝干，捣碎。

【性状】 (1)药材 呈不规则块状、结核状(多呈瘤状)，整块者似生姜，表面不平坦，灰黄、黄褐色，或有灰白、灰黑斑，土状光泽，质较重且坚硬，易砸碎。断面较粗糙，无规则断口，碎后呈土状颗粒，口嚼略有砂粒感。气无略吸舌。加盐酸起泡(图 406—1 黄土结核)。

以色微白、断面颗粒性、土状光泽者为佳。

(2)饮片 煅姜石 颜色黄褐色，质较酥脆，有醋味(图 406—2)。

【功效】 味咸，性寒。理气，解毒。主治热豌豆疮、疔毒肿痈、产后气噎。

405—2

405—1

406—1



406—2

407. 姜 黄

Jianghuang **Rhizoma Curcumae Longae**

キョウオウ **Turmeric**

【来源】 本品为姜科植物姜黄 *Curcuma longa* L. 的干燥根茎。

【产地加工】 冬季茎枯萎时，挖取根茎，洗净，蒸或煮至透心，晒干，去须根。

【炮制】 取原药材，除去杂质，大小分档，略泡，洗净，润透，切薄片或厚片，干燥。

【性状】 (1)药材 根据根茎的老、嫩及其形态可分为“圆形姜黄”(主根茎)及“长形姜黄”(侧生根茎)。

①圆形姜黄 呈卵圆形至纺锤形，长 3～4cm，直径 2～3cm。表面棕黄色至淡棕色，有多数点状下陷的须根或少数圆形侧生根茎痕。质坚体重，击破面深黄棕色至红黄色，角质状，具蜡样光泽，有点状维管束及内皮层环。香气特异，味辛，微苦。

②长形姜黄 呈圆柱或稍扁柱形，长 2.5～5.0cm，直径 0.8～1.5cm，略弯曲，一端钝圆，另一端为断面，表面有纵皱纹和明显环节，侧面常有短分枝。断面棕黄至金黄色(图 407—1，1)。

以质坚实、断面金黄、气味浓者为佳。

(2)饮片 为圆形或稍扁圆形薄片或厚片，直径 0.8～3.0cm。外表面深黄色，粗糙，可见环节，下陷根痕及皱纹。切面棕黄至金黄色，角质状，有蜡样光泽，具散在维管束小点及明显内皮层环。质坚脆。香气特异，味苦、辛(图 407 1，2)。

【功效】 味辛、苦，性温。破血行气，通经止痛。

附注： 中药尚有“片姜黄”，系同属植物温莪术根茎横切片，切勿混淆。详见“莪术”条。

印度产姜黄(图 407—2)。

408. 扁 青

Bianqing **Azuritum**

ヘンセイ **Azurite**

【来源】 本品为碳酸盐系类物蓝铜矿 Azurite $Cu_2(CO_3)_2(OH)_2$。其他组分尚有孔雀石、方解石或粘土。

【产地加工】 采挖后，除去杂石，挑选深蓝色者。

【炮制】 取原药材，先捣碎，再以水飞极细，晾干，再研细。

【性状】 (1)药材 晶体呈菱形粒状、板—板柱状、钟乳状、皮壳状的集合体，全体呈扁平块状。表面靛蓝、蓝色或与绿色相间，或附有白色土状物。性脆，可打碎，断面片状纹理明显，蓝色与绿色相间排列。硬度 3.5～4.0。相对密度 3.7 ～3.9。条痕蓝、浅蓝色，玻璃光泽至金刚光泽，多组解理。气、味均无(图 408—1)。

以色深蓝、形扁、断面呈扁形片状、有光泽者为佳。

(2)饮片 制扁青 呈蓝、浅蓝色粉末，质细腻(图 408— 2)。

【功效】 味酸、咸，性平。有小毒。祛痰，催吐，破积，明目。

407—1



407—2

408—1



408—2

409. 蚤 缀

Zaozhui **Herba Arenariae**

ソウテイ **Zaozhui**

【来源】 本品为石竹科植物蚤缀 *Arenaria serphllifolia* L. 的干燥全草。

【产地加工】 三夏、秋 2 季果实成熟时采收，除去杂质，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，稍闷，切段，晒干。

【性状】 (1)药材 为纤细的草本植物，茎簇生，呈圆柱形，直径约 0.1cm；表面黄绿色或浅黄绿色，节稍膨大，节间长 1～2cm；有分枝。叶对生，无柄；叶片卵形，长 0.3～0.7cm，宽 0.2～0.3cm。蒴果卵状圆锥形，长 0.3～0.4cm，宽 0.20～0.25cm，表面浅黄棕色。种子极小，肾形，黑色。质轻而脆。无臭，味淡(图 409—1)。

以整齐、果多、茎叶表面浅黄绿色、无杂质者为佳。

(2)饮片 为茎、叶、果实混合的不规则段片。长 1.0～1.5cm。茎片圆柱形，切面黄白色，周边黄绿色或浅黄绿色。叶片多卷曲，浅黄绿色。蒴果断片多见。气无，味淡(图 409—2)。

【功效】 味苦，性凉。清热明目，解毒。

410. 络石藤

Luoshiteng **Caulis Trachelospermi**

ラクセキトウ **Stem of Confederate-jasmine**

【来源】 本品为夹竹桃科植物络石 *Trachelospermum jasminoides* (Lindl.) Lem. 的干燥带叶藤茎。

【产地加工】 深秋至次年早春采割，除去杂质，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，稍润，切段，干燥。

【性状】 (1)药材 藤茎呈圆柱形，弯曲，多分枝，直径 0.1～0.5cm；表面红褐色或褐色，具点状皮孔，侧面具不定根；质硬，断面淡黄白色，常中空。叶对生，叶片椭圆形或卵状披针形，长 1.5～8.0cm，宽 0.7～3.5cm，具短柄，全缘，略反卷；上表面暗绿色或棕绿色，下表面淡绿色；革质，质脆。气微，味微苦(图 410—1)。

以叶多、色绿者为佳。

(2)饮片 为段片。茎呈短圆柱形，长 1～2cm，直径 0.1～0.5cm；表面红褐色或褐色，具点状皮孔及不定根，并可见对生叶痕，不时留有对生叶柄或部分叶片；切面淡黄白色，常中空；质硬。叶多切成不规则碎片，上表面暗绿色或棕绿色，背面为淡绿色，叶缘整齐，略反卷；少有完整，形为椭圆或卵状披针形叶片，革质。气微，味微苦(图 410—2)。

【功效】 味苦，性微寒。祛风通络，活血消肿。

409—2

409—1

410—1

410—2

411. 绞股蓝

Jiaogulan Herba Gynostemae

キョウコラン Jiaogulan

【来源】 本品为葫芦科植物绞股蓝 *Gynostema pentaphyllum* (Thunb.) Makino. 的干燥全草。

【产地加工】 于夏、秋2季生长茂盛时采集，除去杂质，干燥。

【炮制】 取原药材，除去杂质及泥土，喷淋稍润，切段。

【性状】 (1)药材 茎细弱，有棱，长短不一，表面暗绿色；叶互生，叶腋有卷须；质脆，易折断，断面中空。叶皱缩，绿色，叶柄长2～4cm，被柔毛；完整叶展开为鸟趾状复叶，小叶5，少为3或7，小叶片长椭圆形或卵状椭圆形，长4～8cm，宽2～3cm，先端钝圆或短尖，背面脉上有短柔毛，边缘具浅波状锯齿，基部楔形；质薄而脆，易碎。气微。味微甜，微苦(图411—1)。

以色绿、叶多完整者为佳。

(2)饮片 为段片。茎细柱状，长1～2cm，稍弯曲，有棱，具节，节上时留有短叶柄及卷须，切断面中空。叶皱缩，绿色，多切碎；完整者展开，呈鸟趾状，具3～7枚小叶，多为5枚，小叶长椭圆或卵状椭圆形，先端钝圆或短尖，叶缘具浅波状锯齿，基部楔形，具2～4cm长的柄，柄上及背面叶脉被柔毛；中央叶片较大，长4～8cm，宽2～3cm；两侧小叶片较小，成对，2枚同着生于1短柄上；叶片薄而脆，易碎。气微，味微甜、微苦(图411—2)。

【功效】 味甘、苦，性寒。清热解毒，止咳祛痰。近年来作为补益剂用于临床。

412. 蚕 茧

Canjian Serica Gluma

サンケン Silk Cocoon

【来源】 本品为蚕蛾科昆虫家蚕 *Bombyx mori* Linnaeus 的茧壳。

【产地加工】 取蚕茧剪开或置沸水中烫死后，去蛹干燥，或取蚕蛾羽化后的茧壳。

【炮制】 取净蚕茧壳，置煅锅内，密封，煅煅至透，冷却后取出。

【性状】 (1)药材 呈长椭圆形，网络状，长3～4cm，直径1.7～2.1cm。表面黄白色，略显光泽，质轻松易碎(图412—1)。

以个大完整、质轻松者为佳。

(2)饮片 煅蚕茧 表面黑色，余同生蚕茧(图412—2)。

【功效】 味甘，性温。收涩，止血，止渴，缩尿。



411—1

411—2

412—1

412—2

413. 秦 艽

Qinjiao **Radix Gentianae Macrophyllae**
シンギョウ **Root of Gentian**

【来源】 本品为龙胆科植物秦艽 *Gentiana macrophylla* Pall.、麻花秦艽 *Gentiana straminea* Maxim.、粗茎秦艽 *Gentiana crassicaulis* Duthie ex Burk. 或小秦艽 *Gentiana dahurica* Fisch. 的干燥根。前1种按性状不同分别习称"秦艽"和"麻花艽"，后者习称"小秦艽"。

【产地加工】 于春、秋2季采挖，除去泥沙。秦艽及麻花艽晒软，堆置"发汗"至表面呈红黄色或灰黄色时，摊开晒干；或不经"发汗"，直接晒干。小秦艽趁鲜时搓去黑皮，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片，晒干。

【性状】 (1)药材 ①秦艽 呈类圆柱形，上粗下细，扭曲不直，长7～30cm，直径1～3cm。表面黄棕色或灰黄色，有纵向或扭曲的纵皱纹。顶端有残存茎基及纤维状叶鞘。质硬而脆，易折断，断面皮部黄色或黄棕色，木部黄色。气特异，味苦、微涩(图413－1)。

②麻花艽 呈类圆锥形，多由数个小根纠聚而膨大，直径可达7cm。表面棕褐色，粗糙，有裂隙呈网状孔纹。质松脆，易折断，断面多呈枯朽状。气特异，味苦、微涩(图413－2)。

③小秦艽 呈长纺锤形或类圆柱形，长8～15cm，直径0.2～1.0cm。表面棕黄色或棕褐色，有纵向或扭曲的沟纹。主根通常1个或分成数支残存的茎基纤维状叶鞘。质松脆，易折断，断面黄白色。气特异、较弱，味苦、微涩(图413－3)。

均以质地坚实、表面棕黄色、气味浓者为佳。

(2)饮片 呈类圆形或多角形不规则的厚片或段片，直径0.2～1.0cm，厚0.2～0.4cm，小段长0.7～1.2cm。切面皮部棕黄色、淡黄色或浅棕色，木部黄色或浅黄色。数束根纠结而成的切面具2至多个木心，呈十字形或不规则花纹状。周边棕黄色、灰黄色或棕褐色，有的具扭曲的纵皱纹。气特异，味苦、微涩(图413－4、图413－5斜片)。

【功效】 味辛，苦，性平。祛风湿，清湿热，止痹痛。

414. 桂 枝

Guizhi **Ramulus Cinnamomi**
ケイシ **Cassia Twig**

【来源】 本品为樟科植物肉桂 *Cinnamomum cassia* Presl. 的干燥嫩枝。

【产地加工】 于春、夏2季采收嫩枝，除去叶片，切成30～60cm长的段，干燥。

【炮制】 取原药材，除去杂质，粗细分开稍浸，洗净，润透，切斜薄片，晾干或低温干燥。

【性状】 (1)药材 呈圆形，外皮棕红色或紫红色，存久则变黑，有小疙瘩、纵棱线及顺纹，并常有横纹。质硬而脆，易折断，断面外边棕红色，中心棕黄色，粗枝断面黄白色，木质状。有特殊清香气，味甜微辛，皮部味较浓(图414－1)。

(2)饮片 桂枝片 为类圆形或类方形的斜薄片，短径0.3～1.0cm。表面棕色至红棕色，有纵棱线和细皱纹，切面皮部红棕色，木部黄白色至浅黄棕色，髓部略呈方形。质硬而脆。香气特异，味甜、微辛，皮部味较浓(图414－2)。

【功效】 味辛、甘，性温。发汗解肌，温通经脉，助阳化气，平冲降逆。

413—1

413—2

413—3

413—4

413—5

414—1



414—2

415. 桔 梗

Jiegeng Radix Platycodi

キキョウ Balloonflower Root

【来源】 本品为桔梗科植物桔梗 *Platycodon grandiflorum* (Jacq.) A.DC. 的干燥根。

【产地加工】 于春、秋2季采挖，洗净，除去须根，趁鲜剥去外皮或不去皮，干燥。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥，称"桔梗片"。

【性状】 (1)药材 呈圆柱形或略呈纺锤形，下部渐细，有的有分枝，略扭曲，长7～20cm，直径0.7～2.0cm。表面淡白色或淡黄白色，不去外皮的表面黄棕色至灰棕色；具扭皱纵沟，并有横长的皮孔样斑痕及支根痕，上部有横纹。有的顶端有较短的根茎或不明显，其上有数个半月形茎痕。质脆，断面不平坦，形成层环棕色，皮部类白色，有裂隙，木部淡黄白色。气微，味微甜后苦(图415－1)。

以条粗长、色白者为佳。

(2)饮片 桔梗片 为不规则的圆形薄片，表面白色或淡黄白色，有1浅棕色环；周边呈淡黄白色，有皱纹。气微，味微甜而后苦(图415－2)。

【功效】 味苦、辛，性平。宣肺，利咽，祛痰，排脓。

附：桔梗出口片(图415－3)。

416. 桦树皮

Huashupi Cortex Betulae Platyphyllae

カジュヒ Bark of Asian White Birch

【来源】 本品为桦木科植物白桦 *Betula platyphylla* Suk. 或华北白桦 *Betula platyphylla* Suk. *var. japonica* (Sieb.) Hara 的干燥树皮。

【产地加工】 剥取伐下桦木柔软的外皮，晒干。

【炮制】 取原药材，润软，切宽丝，干燥。

【性状】 (1)药材 呈大张反卷筒状，树皮表面灰白色而微带红，上有疙瘩样的枝痕，黑棕色；内表面淡黄棕色，有深色横条纹。质柔韧，折断面略平坦，可成层片状剥落。气微香，味苦(图416－1)。

以色灰白、未离层者为佳。

(2)饮片 桦树皮丝 呈弯曲或平直的丝状片，长10～20cm，宽0.5～1.0cm。外表面灰白色，内表面浅黄棕色。断面较平坦，并呈层片状(图416－2)。

【功效】 味苦，性寒。清热利湿，祛痰止咳，消肿解毒。

415—1

415—2

415—3



416—2

416—1

417. 桃 仁

Taoren Semen Persicae

トウニン Peach Seed

【来源】 本品为蔷薇科植物桃 *Prunus persica* (L.) Batsch 或山桃 *Prunus davidiana* (Carr.) Franch. 的干燥成熟种子。

【产地加工】 果实成熟后收集果核，除去果肉及核壳，取出种子，晒干。

【炮制】 (1)生桃仁 取原药材，除去杂质及残留的硬壳，筛去灰屑。用时捣碎，称"生桃仁"。

(2)焯桃仁 取净桃仁置沸水锅中，煮至外皮由皱缩至舒展，能搓去种皮时，捞出，放在冷水中浸泡，搓去种皮，捞出晒干，簸净，称"焯桃仁"。

(3)炒桃仁 取去皮桃仁置锅内，用文火加热炒至微黄色，取出放凉，称"炒桃仁"。

【性状】 (1)药材 ①桃的种子 呈扁长卵形，长 1.2～1.8cm，宽 0.8～1.2cm，厚 0.2～0.4cm。表面黄棕色至红棕色，密布颗粒状突起。一端尖，中部膨大，另端钝圆稍偏斜，边缘较薄。尖端一侧有短线形种脐，圆端有颜色略深不甚明显的合点，自合点处散出多数纵向维管束。种皮薄。子叶 2，类白色，富油性。气微，味微苦(图 417－1)。

②山桃种子 呈类卵圆形，较小而肥厚，长约 0.9cm，宽约 0.7cm，厚约 0.5cm。余同上种。

以颗粒饱满者为佳。

(2)饮片 ①焯桃仁 形如桃仁，去皮后呈乳白色，表面有细皱纹。余同桃仁(图 417－2)。

②炒桃仁 形如桃仁，微黄色，略具焦斑，有焦香气，味微苦。余同桃仁(图 417－3)。

【功效】 味苦、甘，性平。活血祛瘀，润肠通便。

附：四川产桃仁(图 417－4)，**云南扁桃仁**(图 417－5)，**日本加工品**(图 417－6)。

418. 莱菔子

Laifuzi Semen Raphani

ライフクシ Radish Seed

【来源】 本品为十字花科植物萝卜 *Raphanus sativus* L. 的干燥成熟种子。

【产地加工】 于夏季果实成熟时采割植株，晒干，搓出种子，除去杂质，再晒干。

【炮制】 (1)生莱菔子 取原药材，除去杂质，洗净，干燥，称"生莱菔子"。

(2)炒莱菔子 取净莱菔子，置锅内，用文火加热，炒至微鼓起，内部深黄色，有香气逸出，取出，放凉，称"炒莱菔子"。

【性状】 (1)药材 呈类卵圆形或椭圆形，稍扁，长 0.25～0.40cm，宽 0.2～0.3cm。表面黄棕色、红棕色或灰棕色，一端有深棕色圆形种脐，一侧有数条纵沟。种皮薄而脆，子叶 2，黄白色，有油性。气微，味辣(图 418－1)。

以颗粒饱满、无杂质者为佳。

(2)饮片 炒莱菔子 形如莱菔子，表面鼓起，呈深棕色。断面深黄色。质酥脆，具焦香气，味辛辣。余同莱菔子(图 418－2)。

417—1



417—2

417—3

417—4



417—5

418—1

418—2

417—6

419. 莲 子

Lianzi Semen Nelumbinis

レンシ Lotus Seed

【来源】 本品为睡莲科植物莲 *Nelumbo nucifera* Gaertn. 的干燥成熟种子。

【产地加工】 于秋季果实成熟时采割莲房，取出果实，趁鲜除去果皮，干燥。

【炮制】 (1)莲子 取原药材，除去杂质及残存果皮，称“莲子”。

(2)莲肉 取莲子，用清水略浸，润透，切开去心，干燥，称“莲肉”。

(3)炒莲肉 取净莲肉置锅内，用文火加热，炒至微黄色并有香气逸出时，取出放凉，称“炒莲肉”。

【性状】 (1)药材 略呈椭圆形或类球形，长 1.2～1.8cm，直径 0.8～1.4cm。表面浅黄棕色至红棕色，有细纵纹和较宽的脉纹。一端中心呈乳头状突起，深棕色，多有裂口，其周围略下陷。质硬，种皮薄，紧贴子叶，不易剥离。子叶 2，黄白色，肥厚，显粉性，中心凹入呈槽形，具绿色莲子心。气微，种皮味涩，子叶微甜(图 419－1)。

以个大饱满、无皱缩、无破碎者为佳。

(2)饮片 ①莲肉 呈半椭圆形，长 1.2～1.6cm，宽 0.6～1.2cm，厚 0.4～0.6cm。外表面红棕色或棕黄色，具细纵纹及脉纹，一端具突起的种脐，内表面白色，中间具凹槽。质坚硬，有粉性。气微，味甜、微涩(图 419－2)。

②炒莲肉 形如莲肉。外表颜色加深，内表面呈微黄色。气微香，味甜、微涩(图 419－3)。

【功效】 味甘、涩，性平。补脾止泻，益肾涩精，养心安神。

420. 莲 房

Lianfang Receptaculum Nelumbinis

レンボウ Lotus Seedpot

【来源】 本品为睡莲科植物莲 *Nelumbo nucifera* Gaertn. 的干燥花托。

【产地加工】 于秋季果实成熟时采收，除去果实，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质及灰屑，切碎。取净莲房碎块，置铁锅内，上面扣一口径较小的锅，锅上贴一白纸条，或放数粒大米，两锅接合处用盐泥封固，上压重物，用文武火加热，煅至贴在盖底上的白纸或大米显焦黄色，停火，待凉后取出。或置锅内，用武火加热，炒至表面焦黑色，内部焦褐色，喷洒清水，熄灭火星，取出晾干，称“莲房炭”。

【性状】 (1)药材 呈倒圆锥状或漏斗状，直径 5～8cm，高 4.5～6.0cm。表面灰棕色至紫棕色，具细纵纹及皱纹，或局部表面破裂呈纤维状。顶面有多数圆形孔穴，为果实着生处，向下渐收缩。基部有花柄残基。质疏松，纵向破开多裂隙似海绵，棕色。气微，味微涩(图 420－1)。

(2)饮片 ①莲房块 呈不规则形的小块。切面疏松，淡棕色，有的具圆形、椭圆形孔洞或凹槽。表面灰棕色至紫棕色，具细纵纹及皱纹。质疏松，破裂处似海绵样。气微，味微涩(图 420－2)。

②莲房炭 形如莲房块，表面焦黑色，内部焦褐色(图 420－3)。

【功效】 味苦、涩，性温。化瘀止血。莲房炭收敛止血力强。

419—1

419—2

419—3

420—1

420—2

420—3

421. 莪 术

Ezhu Rhizoma Zedoariae

ガジュツ Zedoray

【来源】 本品为姜科植物蓬莪术 *Curcuma phaeocaulis* Valeton、广西莪术 *Curcuma kwangsiensis* S. G. Lee et C. F. Liang 或温郁金 *Curcuma wenyujin* Y. H. Chen et C. Ling 的干燥根茎。

【产地加工】 冬季茎叶枯萎后采挖，洗净，蒸或煮至透心，晒干或低温干燥后，除去须根及杂质。

【炮制】 (1)莪术 取原药材，除去杂质，大小个分开，略泡，洗净，蒸软，切薄片，干燥，称“莪术”。

(2)醋莪术 取净莪术，置锅中，加米醋与适量水浸没，煮至醋液被吸尽，切开无白心时，取出，稍晾，切厚片，干燥，称“醋莪术”。

【性状】 (1)药材 ①蓬莪术 呈卵圆形、长卵形、圆锥形或长纺锤形，顶端多钝尖，基部钝圆，长 2～8cm，直径 1.5～4.0cm。表面灰黄色至灰棕色，上部环节凸起，有圆形微凹的须根痕或残留须根，有的两侧各有一列下陷的芽痕和侧生根茎痕。体重，质坚实，断面灰褐色至绿褐色，蜡样，常附有灰棕色粉末，皮层与中柱易分离，内皮层环纹棕褐色。气微香，味微苦、辛(图 421－1)。

②广西莪术 呈长卵形、卵形或纺锤形，长 4～8cm，直径 2.5～4.5cm。顶端长尖，基部钝圆或钝尖。表面深棕色或灰棕色，环节稍凸起。体重，质坚实。断面黄棕色至棕色，角质样，内皮层环纹黄白色，常附有淡黄色粉末。气香，味辛、苦(图 421－2)。

③温莪术(温郁金根茎) 呈长圆形或卵圆形，长 2～5cm，直径 1.5～2.0cm。表面土黄色至灰黄色，环节明显。体重，质坚实。断面黄棕色至棕褐色，常附有淡黄色至棕黄色粉末。气微香，味辛(图 421－3)。

均以个大、体重、质坚实、断面淡绿色、气味浓者为佳。

(2)饮片 ①莪术片 为类圆形或椭圆形片，直径 1.5～4.0cm，厚 0.1～0.3cm。切面黄绿色至棕褐色，蜡样，内皮层环黄白色，皮层有时可见少数筋脉点，中柱内有多数筋脉点散在；周边灰黄色或黄棕色，有时可见环节、须根痕或残留的须根。质坚实而脆，易折断，断面有蜡样光泽。气微香，味微苦而辛(图 421－4)。

②醋莪术 形如莪术片，切面色泽较暗，微黄色，偶有焦斑，断面角质样，具蜡样光泽。质坚脆，略有醋气(图 421－5)。

【功效】 味辛、苦，性温。行气破血，消积止痛。

421—1

421—2

421—3

421—4

421—5

422. 荷 梗

Hegeng Petiolus Nelumbinis

カコウ Lotus Petiole

【来源】 本品为睡莲科植物莲 *Nelumbo nucifera* Gaertn. 的干燥叶柄。

【产地加工】 于夏、秋2季采收，鲜用或晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，切段，晒干。

【性状】 (1)药材 呈近长圆柱形，长40～80cm，直径0.8～1.5cm。表面棕黄色或黄褐色，有2～10余条深浅不等的纵沟纹及多数颜色稍浅的细小刺状突起。体轻，质脆，易折断，断面可见数个大小不等的孔道。气微，味淡(图422—1)。

以身干、条长、径粗、棕黄色、无泥土及杂质者为佳。

(2)饮片 呈圆柱形段，长1.0～1.5cm，直径0.8～1.5cm。切面淡粉红色或淡棕黄色，粉质，具数个小孔。周边棕黄色或黄褐色，具纵沟纹及细小刺状突起。体轻，质脆。气微，味淡(图422—2)。

【功效】 味苦，性平。清热解暑，通气行水。

423. 柴 胡

Chaihu Radix Bupleuri

サイコ Root of Chinese Thorowax

【来源】 本品为伞形科植物柴胡 *Bupleurum chinense* DC. 或狭叶柴胡 *Bupleurum scorzonerifolium* Willd. 的干燥根。按来源不同，分别习称“北柴胡”及“南柴胡”。

【产地加工】 于春、秋2季采挖，除去茎叶及泥沙，干燥。

【炮制】 (1)柴胡片 取原药材，除去杂质及残茎，洗净，润透，切厚片，干燥，称“柴胡片”。

(2)醋柴胡 取柴胡片加米醋拌匀，闷润至透，置锅内，用文火加热炒干，取出放凉，称“醋柴胡”。

(3)酒柴胡 取柴胡片用黄酒拌匀，闷润至透，置锅内，用文火炒干，取出放凉，称“酒柴胡”。

(4)鳖血柴胡 取柴胡片用鳖血及适量清水拌匀，稍闷，置锅内，用文火加热炒干，取出放凉，称“鳖血柴胡”。

【性状】 (1)药材 ①北柴胡 呈圆柱形或长圆锥形，长6～15cm，直径0.3～0.8cm。根头膨大，顶端残留3～15个茎基或短纤维状叶基，下部分枝。表面黑褐色或浅棕色，具纵皱纹、支根痕及

422—1

422—2

423—1

皮孔。质硬而韧，不易折断，断面显片状纤维性，皮部浅棕色，木部黄白色。气微香，味微苦(图 423—1)。

②南柴胡　根较细，圆锥形，顶端有多数细毛状枯叶纤维，下部多不分枝或稍分枝。表面红棕色或黑棕色，靠近根头处多具紧密环纹。质稍软，易折断，断面略平坦，不显纤维性。具败油气(图 423—2)。

均以条粗长、须根少者为佳。

(2)饮片　①柴胡片　为不规则的厚片，表面粗糙，黄白色，纤维性，周边灰棕色或黑褐色，有纵皱纹及支根痕，质硬。气微香，味微苦(图 423—3)。出口片(图 423—4)。

②醋柴胡　形如柴胡片，色泽加深，具醋气。

③酒柴胡　形如柴胡片，色较深，具酒气。

④鳖血柴胡　形如柴胡片，色泽加深，有腥气。

【功效】 味苦，性微寒。疏散退热，舒肝，升阳。

附：日本柴胡　*Radix Bupleuri*

【来源】 本品为伞科植物三岛柴胡 *Bupleurum falcatum* Linne. 或其变种的干燥根。

【产地加工】 于 11 月份挖取 2 年生以上的根，除去茎及细根，洗净，干燥。

【性状】 药材　呈细长的圆锥形或圆柱形，单一或有分枝，长 10～20cm，直径 0.5～1.5cm，根头部有残留的茎基。表面淡褐色至褐色，有深纵皱纹。易折断，折断面呈纤维性。具特异香气，味微苦(图 423—5)。

以表面暗褐色、断面黄白色、油润、味香者为佳。

423—2

423—3

423—5

423—4

424. 党　参

Dangshen　Radix Codonopsis
トウジン　Tangshen

【来源】 本品为桔梗科植物党参 *Codonopsis pilosula* (Franch.) Nannf.、素花党参 *Codonopsis pilosula* Nannf. *var. modesta* (Nannf.) L. T. Shen 或川党参 *Codonopsis tangshen* Oliv. 的干燥根。

【产地加工】 秋季采挖，洗净，晒干。

【炮制】 (1)党参片　取原药材，除去杂质，去掉芦头，洗净，润透，切厚片，干燥，称"党参片"。

(2)蜜党参　取炼蜜用少量开水稀释后，加入党参片拌匀，润透，置锅内，用文火加热，炒至焦黄色，不粘手时，取出，放凉，称"蜜党参"。每 100kg 党参片，用炼蜜 20kg。

(3)米党参　取大米置锅内，用文火加热，倒入党参片，炒至大米呈老黄色时，取出，筛去米，放凉，称"米党参"。每 100kg 党参片，用大米 20kg。

【性状】 (1)药材　①党参根(党参)　呈长圆柱形，稍弯曲，长 10～35cm，直径 0.4～2.0cm。表面黄棕色至灰棕色，根头部有多数疣状突起的茎痕及芽，俗称"狮子盘头"，每个茎痕的顶端呈凹下的圆点状；根头部有致密的环状横纹，向下渐稀疏，有的达全长的一半，栽培品环状横纹少或无；全体有纵皱纹及散在的横长皮孔，支根断落处有黑褐色胶状物。质稍硬或略带韧性，断面稍平坦，有裂隙或放射状纹理，皮部淡黄白色至淡棕色。木部淡黄色。有特殊香气，味微甜(图 424－1)。

以条粗壮、质柔润、味甜者为佳。

②素花党参根(西党参)　类圆柱形，末端较细，长 10～35cm，直径 0.5～2.5cm。根头部有许多疣状突起的茎痕，俗称"狮子盘头"，每个茎痕呈凹下点状。表面灰黄色或浅棕色，有明显纵沟，近根头处有紧密的环状皱，逐渐稀疏约占全体之半。皮孔横长，明显，略突出，长 0.3～0.8cm。支根脱落处常见黑褐色胶状物，系内部乳汁溢出干燥所成。质稍 坚脆，易折断。断面皮部白色，有裂隙，木部淡黄色。气香，味甜。

③川党参根(川党)　类圆柱形，末端稍细，很少分枝，长 15～35cm，直径 0.5～2.5cm。根头部呈"狮子盘头"状。表面灰黄色，有明显纵皱沟，遍体或只顶端有较稀的横纹。支根脱落处有溢出乳汁而凝成的黑褐色类胶状物。质较坚实，易折断。断面裂隙少，木部黄色，其外围有一圈浅棕色环，皮部淡黄色。气香，味甜。

④东党参　类圆柱形，常分枝，长 12～25cm，直径 0.5～2.2cm。根头大而明显，根外皮黄色及灰黄色，粗糙，有明显纵皱。皮孔短而突出，呈点状突起。质疏松，易折断。断面皮部黄色，木部黄白色，皮部占木部的 1/3，皮部有横向裂隙。气微，味甜。

⑤潞党　类扁圆柱形，单一，长 8～22cm，直径 0.7～1.0cm，个别有较长大者。根头部无明显"狮子盘头"。表面浅灰棕色，有深而不规则的纵皱沟，近根头处有较稀横纹。质较轻，易折断，断面不规则。气微，味甜。

(2)饮片　①党参片　为椭圆形或类圆形的厚片或段，皮部表面灰黄色或浅棕黄色，有明显纵皱，个别可见环纹及横生皮孔。切面皮部白色，有裂隙，木部淡黄色，有"菊花纹"。形成层明显，导管呈小孔状。气香，味甜(图 424－2、图 424－3)。

②蜜党参　形如党参片，表面焦黄色，显光泽，稍粘，气芳香，味甜(图 424－4)。

③米党参　形如党参片，表面老黄色，具焦香气，味甜。

【功效】 味甘，性平。补中益气，健脾益肺。

424—1



424—2

424—4

424—3

425. 鸭肫衣

Yazhunyi　Endothelium Corneum Gigeriae Anatis
ヤジュンイ　Internal Membrane of Duck Gizzard

【来源】 本品为鸭科动物家鸭 *Anas platyrhynchos domestica* (Linnaeus)砂囊的角质内壁。

【产地加工】 将鸭杀死后，取出鸭肫，剖开，剥取内壁，洗净，晒干。

【性状】 药材　呈类圆形碟片状，如鸡内金而较厚，表面黑绿色或紫黑色，稍有皱纹。质松，断面角质。气腥，味微苦(图 425)。

【功效】 治诸骨鲠，噎膈翻胃。

426. 鸭跖草

Yazhicao　Herba Commelinae
ヤシソウ　Herb of Common Doyflower

【来源】 本品为鸭跖草科植物鸭跖草 *Commelina communis* L. 的干燥地上部分。

【产地加工】 于夏、秋 2 季采收，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，切段，晒干。

【性状】 (1)药材　长 30～60cm，黄绿色或黄白色，较光滑。茎圆柱形，有纵棱，直径约 0.2cm。节稍膨大，常有分枝或生有不定根，节间长 3～9cm；质柔软，断面中央有髓。叶互生，较厚，微革质，多皱缩、破碎，展平后完整叶片呈卵状披针形或披针形，长 3～9cm，宽 1.0～2.5cm，先端尖，全缘，基部下延成膜质叶鞘，抱茎，叶脉平行。花多脱落，总苞佛焰苞状，绿色，心状卵形，折合状，两边不相连；花瓣皱缩，蓝色。气微，味淡(图 426－1)。

以色黄绿者为佳。

(2)饮片　为茎、叶、花的混合段片。茎的段片呈圆柱形，有纵棱，长 1.0～1.5cm，直径约 0.2cm，淡黄绿或黄白色，节处稍膨大，常有须根及膜质叶鞘。叶的段片绿色，微革质，叶脉平行。花具总苞，花瓣皱缩，蓝色。气微，味淡(图 426－2)。

【功效】 味甘、淡，性寒。清热解毒，利水消肿。

427. 蚬　壳

Xianqiao　Concha Corbiculae
シジミカク　Corbicula Shell

【来源】 本品为蚬科动物河蚬 *Corbicula fluminea* (Muller)的贝壳。

【产地加工】 全年可捕，捕后用沸水烫死，去肉取壳，洗净，晒干。

【性状】 药材　全体呈三角形，左右两壳相等。壳顶膨起，位于背缘中部，壳外被有暗褐色的壳质，有时稍带黄色。表面生长纹轮状。较老个体壳顶常脱落而露出石灰质。壳内面紫白色。铰合部有主齿 3 枚，中央者最大(图 427)。

【功效】 味咸，性温，除湿，化痰。

425



426—1

426—2



427

428. 铁丝威灵仙

Tiesiweilingxian **Radix et Rhizoma Smilacis**

テッシイレイセン **Root and Rhizome of Broadsheath Greenbrier**

【来源】 本品为百合科植物短梗菝葜 *Smilax scobinicaulis* C. H. Wright、华东菝葜 *Smilax sieboldii* Miq. 的干燥根及根茎。

【产地加工】 秋季采挖，除去茎、叶及泥土，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切段片，晒干。

【性状】 (1)药材 根茎呈不规则块状，略横向延长而弯曲，有针状小刺，下侧着生许多细长的根。根长 20～60cm，直径 0.1～0.2cm；表面灰褐色、灰棕色或黑褐色，平滑，有细小的钩状刺及须根。质硬而韧，不易折断。断面外圈为浅棕色环，同侧有一圈排列均匀的小孔。气无，味淡(图 428－1)。

以根粗长、质坚实、有韧性、除去须根者为佳。

(2)饮片 根茎为不规则厚片或块片，厚 0.2～0.4cm。切面灰白色，周边灰棕褐色，有须根、须根痕及小针状刺。根为不规则圆柱形小段，稍弯曲，长 1.0～1.5cm，直径 0.1～0.3cm；切面类白色，外缘浅棕色，内有一圈排列均匀的小孔，周边灰褐色或灰棕色，平滑，有细小的钩刺。质柔韧，有弹性，不易折断。气微，味淡(图 428－2)。

【功效】 味苦、辛，性平。祛风除湿，散瘀，解毒。

429. 积雪草

Jixuecao **Herba Centellae**

セキセツソウ **Herb of Asiatic Pennywort**

【来源】 本品为伞形科植物积雪草 *Centella asiatica* (L.) Urb. 的干燥全草。

【产地加工】 于夏、秋 2 季采收，洗去泥沙，除去杂草等杂质，晒干。

【炮制】 取原药材，除净杂质，洗净，切段，晒干。

【性状】 (1)药材 全草常卷曲成团。茎弯曲细长，黄棕色，有细纵皱，节上常有须根或须根残迹，以及丛生叶数枚。根圆柱形，直径 1.0～1.5mm，表面淡黄或灰黄色。叶片多皱缩破碎，完整者展平为近圆形或肾形，直径 1～4cm，灰绿色，边缘有粗钝齿，基部有扭曲的细长叶柄，叶柄基部扩大呈鞘状。基部可见短小伞形花序及细小双悬果。质脆，易碎。气微，味淡(图 429－1)。

以叶多、色绿者为佳。

(2)饮片 为段片。茎细圆柱形，长 2～3cm，稍弯曲，有纵皱，切面中央中空；若为有节者，节上有须根残迹及叶柄基。须根段片呈细小短圆柱形，长 1～3cm，直径 1.0～1.5cm，表面浅黄或灰黄色。叶片灰绿色，皱缩破碎，完整者平展后呈近圆形或肾形，直径 1～4cm。边缘有粗钝齿。基部时有细小伞形花序及双悬果。气微，味淡(图 429－2)。

【功效】 味苦、辛，性寒。清湿热，解毒消肿。

428—2

428—1

429—1

429—2

430. 透骨草

Tougucao **Herba Speranskiae Tuberculatae ,Caulis Impatientis**
トウコツソウ **Herb of Tuberculate Speranskia**

【来源】 本品为大戟科植物地构叶 *Speranskia tuberculata* (Bge.) Baill. 或凤仙花科植物凤仙花 *Impatiens balsamina* L. 的干燥地上部分，前者习称“珍珠透骨草”，后者习称“凤仙透骨草”。

【产地加工】 地构叶在夏、秋2季采收，割取带花果的全草，晒干。凤仙花在夏、秋2季采收，除去叶及花果，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切段，干燥，称“透骨草段”。

【性状】 (1)药材 ①珍珠透骨草 茎圆柱形，长10～20cm，下端直径0.1～0.2cm；表面淡绿至灰绿色，被有灰白色柔毛；质坚硬，易折断，断面黄白色。叶多卷曲皱缩，灰绿色，被灰白色柔毛；质脆，易脱落。有时花序上留有圆形小花和果实。气微，味淡(图430－1)。

②凤仙透骨草 呈长圆柱形，长30～60cm，下端直径1～2cm，多皱缩，具纵棱。表面黄棕色或淡棕色，节部膨大，有叶痕及芽痕，或少有分枝。质轻脆，易折断，断面中空，或有白色膜质状髓。气微，味酸(图430－2)。

珍珠透骨草以色绿、枝嫩、带有珍珠状果实者为佳。凤仙透骨草以茎长、色绿、无叶者为佳。

(2)饮片 ①珍珠透骨草段 为不规则的小段，茎被毛，灰褐色。叶片皱缩破碎，上部全缘，下部具牙齿，叶背密被柔毛。并可见三角状倒卵形、绿色种子。气微，味微苦(图430－3)。

②凤仙透骨草段 为不规则小段，茎呈圆形，黄白色，有纵棱，切片中空，髓部白色。气微，味酸(图430－4)。

【功效】 味辛、苦，性温。散风祛湿，解毒止痛。

431. 倒扣草

Daokoucao **Herba Achyranthis**
トウコウソウ **Herb of Common Achyranthes**

【来源】 本品为苋科植物粗毛牛膝 *Achyranthes aspera* L. 的干燥全草。

【产地加工】 夏秋间连根挖取，洗净，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，润软，切段。

【性状】 (1)药材 根圆柱形，弯曲，有分枝，表面灰黄色，有不规则细纵皱。根茎圆柱形，节较密且膨大。茎呈4棱形，有分枝，长40～100cm，直径2～8cm；老茎表面褐绿色，嫩茎淡绿色并被柔毛，质脆，易折断，断面黄绿色。叶对生，有柄，叶片皱缩卷曲，常破碎，完整者展开成卵圆或长椭圆形，长3～10cm，宽1～4cm，先端急尖，基部宽楔形，全缘或稍呈波状，上表面绿色，下表面淡灰色或带褐色，两面均被柔毛。花序细长穗状，花反折。胞果卵形，黑色。气微，味微甜(图431 -1)。

以根粗、茎粗壮、叶多色绿、带花者为佳。

(2)饮片 为段片。根短柱形，表面灰黄色，有不规则细纵皱，切面中央具类白木质心。茎短类方柱或4棱形，有的有膨大的节，节上常可见对生叶柄；表面褐绿色至淡绿色，切面黄绿色，中央质松或空洞。叶多切碎，全缘，上表面绿色，下表面灰绿色或褐绿色，两面均被柔毛，叶端急尖，基部楔形。穗状花序之段片尚附有反折的花，胞果常脱落。气微，味微甜(图431－2)。

【功效】 味辛、甘、淡，性凉。解表，清热，利湿，活血。

430—1

430—2

430—4



430—3

431 —1

431—2

432. 射 干

Shegan **Rhizoma Belamcandae**

ヤカン **Rhizome of Blackberrylily**

【来源】 本品为鸢尾科植物射干 *Belamcanda chinensis* (L.) DC. 的干燥根茎。

【产地加工】 春初刚发芽或秋末茎叶枯萎时采挖，除去须根及泥沙，干燥。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切薄片，晒干。

【性状】 (1)药材 呈不规则结节状，长 3～10cm，直径 1～2cm。表面黄褐色、棕褐色或黑褐色，皱缩，有排列较密的环纹。上面有数个圆盘状凹陷的茎痕，偶有茎基残存；下面有残留细根及根痕。质硬，断面黄色，颗粒性。气微，味苦、微辛(图 432－1)。

以身干、肥壮、断面色黄、无须根及泥土者为佳。

(2)饮片 为类圆形、长圆形或不规则分枝状薄片，直径 1～2cm，长至 5cm，厚 0.10～0.15cm。切面黄色或浅黄色，颗粒性。周边黄褐色、棕褐色或黑褐色，皱缩，具环纹，偶见突起的圆点状根痕。质硬脆，易折断。气微，味苦、微辣(图 432－2)。

【功效】 味苦，性寒。清热解毒，消痰，利咽。

433. 臭牡丹

Choumudan **Folium Clerodeadrii Bungei**

シュウボタン **Stem and Leaf of Rose Glorybower**

【来源】 本品为马鞭草科植物臭牡丹 *Clerodendron bungei* Steud. 的干燥叶。

【产地加工】 于夏季采取，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，切丝，晒干。

【性状】 (1)药材 叶片广卵形，长 10～20cm，宽 8～18cm。上表面深绿色，粗糙，具密集短毛；下表面淡绿色，惟脉上有短柔毛。先端尖，边缘有锯齿而稍呈波状，基部浅心形或近截形；叶柄长约 8cm。质脆，易碎。揉之有特异臭气，味苦。时带有嫩茎及花序，嫩茎表面具稍纵向延长小点状皮孔(图 433－1)。

以色绿、无杂质者为佳。

(2)饮片 为不规则丝片，多皱缩，上表面深绿色，密集短毛，下表面淡绿色，仅叶脉上有短柔毛，边缘锯齿或稍呈波状。气特异，味苦(图 433－2)。

【功效】 味辛，性平。活血散瘀，消肿解毒。

432—2

432—1

433—1

433—2

434. 臭梧桐叶

Chouwutongye **Folium Clerodendrii**

シュウゴトウヨウ **Leaf of Harlequin Glorybower**

【来源】 本品为马鞭草科植物臭梧桐 *Clerodendron trichotomum* Thunb. 的干燥叶。

【产地加工】 夏季开花前采摘，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，切丝，晒干。

【性状】 (1)药材 叶片多皱，展平后呈广卵形或卵状椭圆形，长 9～15cm，宽 6～12cm，黄绿色至淡黄棕色，背面色较浅。先端尖或急尖，基部宽楔形或截形，具长柄，叶全缘或波状。嫩叶两面密生短柔毛。质脆，易碎。气特异，味苦、涩(图 434－1)。

以色绿、无杂质者为佳。

(2)饮片 为不规则丝片，皱缩不平。表面黄绿色至淡黄棕色，背面色浅。叶缘全缘或波状，基部宽楔形或截形，有的丝片两面密生短柔毛。气特异，味苦、涩(图 434－2)。

【功效】 味甘、苦，性平。祛风湿，降血压。

435. 徐长卿

Xuchangqing **Radix Cynanchi Paniculati**

ジョチョウゴウ **Root of Paniculate Swallowwort**

【来源】 本品为萝藦科植物徐长卿 *Cynanchum paniculatum* (Bge.) Kitag. 的干燥根及根茎。

【产地加工】 于秋季采挖，除去泥沙及地上茎叶，阴干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，抢水洗净，切段，阴干。

【性状】 (1)药材 根茎呈不规则圆柱形，长 0.5～3.5cm，直径 0.2～0.4cm；黄褐色；有的顶端带有残茎，细圆柱形，长约 2cm，直径 0.1～0.2cm，断面中空；根茎节处周围着生多数根。根呈细长圆柱形，微弯曲，长 10～16cm，直径 0.10～0.15cm。表面淡黄白色或淡棕黄色，具纵皱。质脆，易折断。断面粉性，皮部类白色或黄白色，形成层环淡棕色，木部细小，黄棕色。气香，味微辛凉(图 435－1)。

以根粗长、色棕黄、气味浓者为佳。

(2)饮片 为不规则的小段，长约 1.5cm。根茎类圆柱形，直径 0.2～0.4cm，有的有线状环节。根段直径 0.10～0.15cm，表面淡褐色或淡棕黄色，具细微的皱纹；切面皮部黄白色，木部细小，黄棕色，有粉性。质脆。气香，味微辛凉(图 435－2)。

【功效】 味辛，性温。祛风化湿，止痛止痒。

附：徐长卿全草(图 435－3)，部分地区以全草入药。

435—2

435—3

435—1

434—1

434—2

436. 狼 毒

Langdu **Radix Euphorbiae Fischerianae**
ロウドク **Root of Fischer Euphorbia**

【来源】 本品为大戟科植物狼毒大戟 *Euphorbia fischeriana* Stead. 或月腺大戟 *Euphorbia ebiacteolata* Hayata. 的干燥根。

【产地加工】 于春、秋2季采挖，除去茎、叶，洗净，切厚块，晒干。

【炮制】 (1)生狼毒片 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥，称“生狼毒片”。

(2)醋狼毒片 取净狼毒片，加入米醋，拌匀后，闷润至透，置锅内，文火加热炒干，取出，放凉，称“醋狼毒”。每100kg狼毒片，用米醋30kg。

【性状】 (1)药材 ①狼毒大戟根 为类圆形或长圆形的块片，直径4～7cm，厚0.5～3.0cm，偶有达7cm者。表面黄棕色或淡棕色，栓皮成重叠的薄片状，易剥落。切面不平坦，有暗棕色与黄白色相间的明显同心环，偶有环纹不显著者。质轻，易折断，断面粉性。水浸后有粘性，撕开可见粘丝。气微，味微辣(图436－1)。

②月腺大戟根 为类圆形或长圆形的块片，直径1.5～8.0cm，厚0.3～4.0cm。外皮薄，黄棕色或灰棕色，易剥落而露出黄色皮部。切面黄白色，有黄色不规则大理石样纹理或环纹。体轻，质脆，易折断，断面有粉性。气微，味微辣。

均以片大、粉性足者为佳。

(2)饮片 ①狼毒片 为两种狼毒的改刀产品，除了片较薄外，余均与两种狼毒药材相同(图436－2)。

②醋狼毒 形如狼毒片，表面有焦斑，略具醋气(图436－3)。

【功效】 味辛，性平。有毒。逐水祛痰，破积杀虫。

437. 脐 带

Qidai **Umbilicus**
セイタイ **Umbilical Cord**

【来源】 本品为初生婴儿的干燥脐带。

【产地加工】 四季均可采收，孕妇产下胎儿后，从胎盘上取下脐带，挤去积血，沸水略烫，整条或纵剖开，平摊，烘干。

【炮制】 (1)脐带片 取干燥脐带，洗净，用湿纸包裹，置火中煨软，或用文火烘软，切片，干燥，称“脐带片”。

(2)砂炒脐带 取脐带片，置热砂中，用武火炒至发泡、质酥时取出，筛去砂，放凉，碾为细粉，称“砂炒脐带”。

【性状】 (1)药材 呈细长条状，淡黄或黑棕色，有光泽，扭曲或平坦，长10～15cm，内有2个明显的动脉管和1个静脉管，大多数向外凸出。质坚韧，气微腥(图437－1)。

以条长、淡黄色、内九瘀血者为佳。

(2)饮片 ①脐带片 呈不规则的片状，边缘波曲。

②砂炒脐带 表面发泡，质酥(图437－2)。

【功效】 定喘，敛汗。

436—1

436—2

436—3

437—1

437—2

438. 高良姜

Gaoliangjiang **Rhizoma Alpiniae Officinarum**

コウリョウキョウ **Rhizome of Lesser Galangal**

【来源】 本品为姜科植物高良姜 *Alpinia officinarum* Hance 的干燥根茎。

【产地加工】 于夏末秋初采挖，除去须根及残留的鳞片，洗净，切段，晒干。

【炮制】 取原药材，洗净，润透，切片，晒干。

【性状】 (1)药材 呈圆柱形，多弯曲，有分枝，长 5～9cm，直径 1.0～1.5cm。表面棕红色至棕褐色，有细密的纵皱纹及灰棕色的波状环纹，每节长 0.2～1.0cm，下面有圆形的根痕。质坚韧，不易折断，断面灰棕色或红棕色，纤维性，显粉质，中柱约占断面的 1/3，形成层环纹明显。气香，味辛辣(图 438－1)。

以分枝少、色棕红、气味浓者为佳。

(2)饮片 为类圆形、长圆形或不规则形薄片，直径 0.7～2.0cm，厚 0.2～0.3cm。切面红棕色或灰棕色，纤维性，形成层环深棕色，中柱为直径的 1/3。周边暗红棕色或暗褐色，具细密的纵皱纹及较密集的灰棕色波状环纹。质坚硬略脆，易掰断，断面纤维性，显粉质。气香，味辛辣(图 438－2)。

【功效】 味辛，性热。温胃散寒，消食止痛。

439. 浙贝母

Zhebeimu **Bulbus Fritillariae Thunbergii**

セツバイモ **Bulb of Thunberry Fritillary**

【来源】 本品为百合科植物浙贝母 *Fritillaria thunbergii* Miq. 的干燥鳞茎。

【产地加工】 立夏前后植株枯萎时采挖，洗净。大小分开，直径在 3.5cm 以上者，摘去心芽，加工成“大贝”；直径在 3.5cm 以下者，不去心芽，加工成“珠贝”。分别撞擦除去外皮，拌以煅制的贝壳粉或熟石灰吸去撞擦出的浆汁后，再干燥。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥，习称“浙贝母”。或用时打成碎片。

【性状】 (1)药材 ①大贝 为单瓣鳞叶，略成新月形，肥厚，高 1～2cm，宽 2.0～3.5cm。表面类白色至淡黄白色，被有白粉。质脆易折，断面白色至淡黄白色，富粉性。气微，味微苦(图 439－1)。

②珠贝 呈扁圆球形，高 1.0～1.5cm，直径 1～3cm。外层 2 枚鳞叶肥厚，略呈肾形，抱合；内有小鳞叶 2～3 枚及残茎。其他性状同大贝(图 439－2)。

均以鳞叶肥厚、质坚实、粉性足、断面色白者为佳。

(2)饮片 浙贝片 为新月形的厚片，宽 1.0～1.5cm，高 1～2cm，厚 2.5mm 左右。切面白色或淡棕色，富粉性。质脆，易断折，断面富粉性。打碎者，为不规则碎块，色白，富粉性。气微，味微苦(图 439－3)。

【功效】 味苦，性寒。清热化痰，开郁散结。

438—1

439—2

438—2

439—1

439—3

440. 海 马

Haima Hippocampus

カイバ Sea-horse

【来源】 本品为海龙科动物线纹海马 *Hippocampus kelloggi* Jordan et Snyder.、刺海马 *Hippocampus histrix* Kaup.、大海马 *Hippocampus kuda* Bleeker.、三斑海马 *Hippocampus trimaculatus* Leach 或小海马(海蛆)*Hippocampus japonicus* Kaup 的干燥体。

【产地加工】 于夏、秋2季捕捞，捕后洗净，晒干；或除去外部灰黑色皮膜及内脏，洗净，将尾盘卷晒干。

【炮制】 (1)海马 取原药材，除去灰屑，通称"海马"。用时捣碎或碾粉。

(2)酒炙海马 将海马置黄酒中浸渗，微火烘烤至黄色松脆即可；或用黄酒喷淋后，稍闷，待吸干，置锅内炒至微黄，取出待凉后收藏，通称"酒炙海马"。每海马100kg，用黄酒15kg。

【性状】 (1)药材 ①线纹海马 体呈扁长形而弯曲，体长约30cm，黄白色。头略似马头，有冠状突起，前方有1管状长吻，口小，无牙，两眼深陷。躯干部7棱形，尾部4棱形，渐细卷曲，体具瓦楞形的节纹并具短棘。体轻，骨质，坚硬。气微腥，味微咸。

②刺海马 体长15～20cm，黄白色头部及体上环节间的棘纸而尖(图440－1)。

③大海马 体长20～30cm，黑褐色。

④三斑海马 体侧背部第1、4、7节的短棘基部各有1黑斑(图440－2)。

⑤小海马(海蛆) 体形小，长7～10cm，黑褐色节纹及短棘均较细小(图440－3)。

均以条大、坚实、头尾齐全者为佳。

(2)饮片 酒炙海马 形如海马原药材，质较松脆，色泽加深(图440－4刺海马)。

【功效】 味甘，性温。温肾壮阳，散结消肿。

441. 海 月

Haiyue Concha Placunae

カイゲツ Meat of Window Shell

【来源】 本品为不等蛤科动物海月 *Placuna placenta* (Linnaeus)的壳贝。

【产地加工】 四季均可采捕，一般退潮后在海滩上捕捉，将壳肉分开，洗净，晾干。

【性状】 药材 贝壳圆形，极扁平，壳质薄而透明，边缘容易破碎。左壳较凸起，右壳平。放射肋及同心的生长线都极细密，近腹缘的生长线略呈鳞片状，壳面白色，壳顶微紫色。壳内面白色，具有云母光泽。右壳有2枚大度不等的齿尖，作倒"V"字形排列，左壳相应的部位形成2条凹陷，闭壳肌痕圆形，位于中央(图441)。

【功效】 味辛，性平。解毒，消积。

440—1



440—3

440—2



440—4

441

442. 海风藤

Haifengteng **Caulis Piperis Kadsurae**

カイフウトウ **Stem of Kadsura Pepper**

【来源】 本品为胡椒科植物风藤 *Piper kadsura* (Choisy) Ohwi. 的干燥藤茎。

【产地加工】 于夏、秋2季采割藤茎后，除去根、叶，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片，晒干。

【性状】 (1)药材 呈扁圆柱形，略弯曲，长15～60cm，直径0.3～2.0cm。表面灰褐色或褐色，粗糙，有纵向棱状纹理及明显的节。节间长3～12cm，节部膨大，上生不定根。体轻，质脆，易折断，断面不整齐，皮部宽广，灰黄色，导管孔多数，射线灰白色，放射状排列，皮部与木部交界处常有裂隙，中心有灰褐色髓。气香，味微苦、辣(图442－1)。

(2)饮片 为不规则扁圆形的厚片，直径0.3～2.0cm，厚0.2～0.4cm。切面有灰黄色木部与灰白色射线相间排列的放射状纹理，边缘可见导管孔断续成环，髓部灰褐色。周边灰褐色或褐色，有纵向棱状纹理。体轻，质脆。气香，味微苦、辣(图442－2)。

【功效】 味辛、苦，性微温。祛风湿，通经络，止痹痛。

443. 海石鳖

Haishibie **Acanthochiton seu Ischnochiton**

カイセキベツ **Sea-chiton**

【来源】 本品为隐板石鳖科动物红条毛肤石鳖 *Acanthochiton rubrrolineatus* (Lischke)的全体。

【产地加工】 四季均可捕捉，多于海水退潮时在海滩或岩石缝捕捉，捕后洗净，置沸水中略烫，取出于阴凉通风处干燥，用时置瓦片上焙干，研末。

【性状】 药材 全体卵圆形，体长约0.28cm，体宽约0.19cm，背面有八块呈复瓦状排列的石灰质的壳片。头壳片半圆形，表面具有颗粒状突起，中间壳片长宽略相等，峰部有纵肋，翼部有较大的颗粒状突起，尾壳片较小，前缘中央微凹，后缘弧形，表面有颗粒突起，全部壳片8块，其周围有18丛棘束，暗绿色壳片中夹有3条红色色带(图443)。

【功效】 软坚散结，活血止痛，清热解毒。

442—1

442—2

443

444. 海　龙

Hailong　　Syngnat Hus

カイリュウ　　Pipe Fish

【来源】 本品为海龙科动物刁海龙 *Solenognathus narduickii* (Gray)、拟海龙 *Syngnathoides biaculeathus* (Bloch)或尖海龙 *Syngnathus acus* Linnaeus、粗吻海龙 *Trachyrhamphus serratus* (Temminck seu Schlegel)的干燥体。前二者为药典收载之正品，后二者为地方习用药品。

【产地加工】 捕捞后，刁海龙、拟海龙除去皮膜及内脏，洗净，晒干；尖海龙直接洗净，晒干。

【炮制】 (1)酒制　①酒淬　取海龙，刷去灰尘，用微火烘烤，不时翻动，干脆后，淬入酒为，冷后取出，再烘再淬，如此反复数次，至海龙松脆并呈焦黄色时，晾凉。

②酒炒　在热锅内加入海龙，炒至黄色，洒入少许米酒拌匀，再用微火炒干研细。

③酒烘　取海龙用黄酒浸1夜，取出放烘筒中，置火上烘至质变松脆，并带焦黄色为度。

(2)酥油制　取酥油少放，抹满海龙，用文火烤成黄色；或入酥油中炸成黄色，用时捣碎。

(3)乳油制　取净海龙，涂上一层乳油，在无烟火上燥烤，并勤加翻动，至酥。

(4)滑石粉制　取滑石粉置锅中，用文火炒热，放入海龙段，不断翻动，烫至微黄色，取出，筛去滑石粉，晾凉。用时捣碎。

【性状】 (1)药材　①刁海龙　体狭长侧扁，全长30～50cm。表面黄白色或灰褐色。头部前方具1管状长吻，口小，无牙，两眼圆而深陷，头与体轴略呈钝角。躯干部宽约3cm，5棱形，尾部前方6棱形，后方渐细，4棱形，尾端卷曲。背棱两侧各有1列灰黑色斑点状色带，全体被以具花纹的骨环及细横纹，各骨环为有突起粒状棘。胸鳍短宽，背鳍较大，有的不明显，无尾鳍。骨质，坚硬。气微腥，味微咸(图444－1)。

②拟海龙　体细长，平扁，呈鞭状，躯干部略呈4棱形，全长20～22cm。表面灰黄色，头常与体轴成一直线(图444　2)。

③尖海龙　体细长而略弯曲，呈鞭状，全长10～30cm，未去皮膜。表面黄褐色，有的腹面可见育儿囊，有尾鳍。质较脆弱，易撕裂(图444　3)。

④粗吻海龙　呈细长方柱形，长22～28cm，直径0.5～0.8cm。表面灰棕色，背部色深，全体有10数个颜色较深的横斑。吻呈短管状。躯干部为7棱形，尾长约为躯干的2倍。尾鳍小(图444－4)。

均以体完整、饱满、色黄白或黄褐色者为佳。

(2)饮片　酒制海龙　形似海龙，色深，有酒气。

【功效】 味咸、甘，性温。温肾壮阳，散结消肿。

444—1

444—2

444—4

444—3

445. 海 参

Haishen **Stichopus**

カイジン **Sea Cucumbers**

【来源】 本品为刺参科动物刺参 *Stichopus japonicus* Selenk 的干燥全体。

【产地加工】 于春、秋 2 季捕捞，捕后从腹面剖一裂口，取出内脏，置沸海水内煮一下，捞出加盐搅拌，腌藏 5～20 天，再把腌海参的卤汁倒入锅内，继续煮 1～2 小时，捞出，放入拌灰槽内，加松木炭灰搓拌，晒干。

【炮制】 原品入药。

【性状】 (1)药材 体呈长筒状，长 20～40cm，宽 3～6cm，腹面平坦。表面黑褐色，有明显的钝刺，具纵沟纹，背面钝刺大小不等排成 4～6 纵行。口位于腹面前端，周缘围生具分枝的触指 20 个，先端稍膨大呈乳头状。质稍硬，断面略呈四角形。气微腥，味甜微咸(图 445－1、图 445－2)。

(2)饮片 为皱缩的长椭圆形个体或厚片、小段。表面黑褐色，有大小不等的钝刺。质硬，断面略呈四角形。气微腥，味甜、微咸。

以个大、饱满、刺明显、黑褐色者为佳。

【功效】 味咸，性温。补肾益精，养血润肠。

446. 海 胆

Haidan **Os Hemicentroti seu Temnopreuri**

カイタン **Bone of Sea Urchim**

【来源】 本品为球海胆科动物马粪海胆 *Hemicentrotus pulchrrimus* (A. Agassiz)、光棘球海胆 *Strongylocentrotus nudus* (A. Agassiz)或刻肋海胆科纸雕刻肋海胆 *Temnopleurus toreumaticus* (Leske)、北方刻肋海胆 *Temnopleurus hardwickii* (Gray)等的石灰质骨壳。

【产地加工】 于夏季捕捉，除去肉和棘刺，洗净，晒干。

【炮制】 取原药材，去净杂质，捣碎，称“海胆”。

【性状】 (1)药材 呈中空的半球形，直径 3～4cm，厚 2～3cm。较扁平的一面为黄棕色，中央有圆形口孔，围口部略向内凹下，口内边缘着生 5 个 U 字形互相连接的薄片状齿。背面棕色，隆起，其中心有 1 个十角星状的孔，孔的外围有石灰质骨板辐射状排列成 10 带，颇有规则，其中 5 带较狭，疣状突起较小，其外侧有无数细孔的为步带区，与步带区间隔排列的 5 带有较大的疣状突起，而无细孔的为间步带区。质坚硬而轻，不易折断，断面呈淡蓝色。气微，味辛。马粪海胆(图 446－1)。

(2)饮片 为不规则扁片，外表具近平行的凸突，内表面平滑(图 446－2)。

【功效】 味咸，性平。软坚散结，化痰消肿。



445—1



446—1



445—2

446—2

447. 海浮石

Haifushi **Lapis Pumicis, Os Costaziae**
カイフセキ **Pumice**

【来源】 本品是以方解石为主组分的生物碳酸岩。①石花 为胞孔科动物脊突苔虫 *Costazia aculeata* Canu et Bassler、瘤苔虫 *Costazia costazii* Audouin 的干燥骨骼或珊瑚虫的基座和骨骼，习称“石花”、“海石”。

②晕石(小海浮石) 以贝壳碎屑为核心沉积形成的结核。

【产地加工】 多在夏、秋 2 季采收，洗净，晒干。

【炮制】 (1)海浮石 取原药材，拣尽杂质，洗净，晒干，用时打碎，研粉。

(2)煅海浮石 取净海浮石置砂罐内，置炉火中煅透，取出，放凉，碾碎。

【性状】 (1)药材 ①晕石(小海浮石) 呈不规则类圆球形，直径 1～2cm。表面灰白色或灰黄色，有多个空洞而无细孔，凹凸不平，凸处较平滑。质实体重，可打碎，断面成层状，似绵，中心部常以贝壳为核心。无臭，味淡(图 447－1)。

以灰白色、断面成层状似海绵者为佳。

②石花(又称“海石”) 呈珊瑚样的不规则块状，略呈扁圆形或长圆形，大小不等，直径 2～5cm。表面灰白色或灰黄色，一面略平坦，另一面多突起呈叉状分枝，中部交叉如网状，叉状小枝先端多折断。体轻，质硬而脆。表面与断面均具细小孔道。入水不沉。气微腥，味微咸。

以色浅灰白，体较重而硬、断面似海绵、成层状者为佳。

珊瑚虫骨质群体，呈珊瑚状，似一朵花，全体呈灰白色或灰黄色，直径 2cm 左右。基部略平坦，质较硬，断面呈蜂窝状(图 447－2)。

③小石花 瘤苔虫骨骼 为不规则块状，直径 1～3cm，多为碎块。表面灰黄色或灰黑色。珊瑚状分枝短而较粗，直径约 0.4cm，先端钝圆，极少折断。气微腥，味微咸(图 447－3)。

均以体完整、色灰黄或灰白者为佳。

(2)饮片 煅海浮石 形如海浮石，色灰白，质酥脆，表部多见粉状物。

【功效】 味咸，性寒。清肺化痰，软坚通淋。

448. 海麻雀

Haimaque **Pegasus**
カイマシャク **Sea Dragon**

【来源】 本品为海蛾鱼科动物海蛾鱼 *Pegasus laternarius* (Cuvier)、飞海蛾 *Pegasus volitans* Cuvier 的干燥全体。

【产地加工】 捕后去内脏，用淡水洗净，晒干，备用。

【性状】 药材 ①海蛾鱼 体平扁。被以骨板，躯干部密接，圆盾状，尾部短，4 棱形，尾环 11，体宽大于体高。吻突出，雌体吻较短小，三角形，雄体吻突较大，短柄状。两侧和背腹面共有 4～6 条隆起脊，脊上有细锯齿。眼较大，侧位，凹陷。躯干背方具 4 列隆起脊。背鳍与臀鳍完全相对，胸鳍呈翼状，鳍条棘状，第 5 鳍条较硬强大，尾鳍截形，体绿褐色(图 448－1)。

②飞海蛾 体平扁，被骨板，吻部细长，头部很短，吻部特别突出延长，呈一扁平的长柄，两侧具细锯齿。背部具 4 条隆起棱脊。尾环 12。鳍条不分枝。背鳍 5。胸鳍发达，侧位，与体侧下缘在同一水平上。腹鳍腹位。臀鳍 5，与背鳍相对。体背面和背、胸、尾鳍的鳍条上散布有细小绿褐色斑点(图 448－2)。

【功效】 化痰止咳，消瘿散结，止泻。

447—1



447—2

447—3



448—1



448—2

449. 海 燕

Haiyan Drepanis

カイエン Betrel

【来源】 本品为海燕科动物海燕 *Patiria pectinifera* (Muller et Troschel)的干燥全体。

【产地加工】 于夏、秋2季当海水退潮时，在岩底捕捉，晒干。

【炮制】 取原药材，用时切碎。

【性状】 (1)药材 体为扁平五角星状，中央部称为体盘，其背面向上部分为反口面，有覆瓦状排列的骨板。反口面通常呈深蓝色和丹红色交杂排列。腹面向下的部分称为口面，呈橘黄色，中央有口。体盘四周有短腕5条。各腕中央稍隆起，盘的边缘较薄；腕的腹面有开放的步带沟，沟内列生管足2行，管足上有吸盘。质韧，不易折断，断面纤维性。气腥，味甜、微咸(图449)。

以个大、体饱满、色红或灰蓝者为佳。

(2)饮片 呈大小不等的厚片，表面有覆瓦状排列的骨板，为丹红色或灰蓝色。断面纤维性，质韧。气腥，味甜、微咸。

【功效】 味咸、性温。和胃止痛，制酸，止泻，镇静。

450. 海螵蛸

Haipiaoxiao Os Sepiae seu Sepiellae

カイヒョウショウ Luttlebone

【来源】 本品为乌贼科动物无针乌贼 *Sepiella maindroni* de Rochebrune 或金乌贼 *Sepia esculenta* Hoyle 的干燥内壳。

【产地加工】 将乌贼鱼的骨状内壳洗净，干燥。

【炮制】 (1)海螵蛸 取原药材，除去杂质，用清水漂洗至无明显咸味，干燥，去硬壳。砸成小块。

(2)炒海螵蛸 取净海螵蛸小块置锅内，用文火加热，炒至表面微黄色，取出，放凉。

【性状】 (1)药材 ①无针乌贼 呈扁长椭圆形，中间厚，边缘薄，长9～14cm，宽2.5～3.5cm，厚约1.3cm。背面有做白色脊状隆起，两侧略显微红色，有不甚明显的细小疣点；腹面白色，自尾端到中部有细密波状横层纹；角质缘半透明，尾部较宽平，无骨针。体轻，质松，易折断，断面粉质，显疏松层纹。气微腥，味微咸。

②金乌贼 长13～23cm，宽约至6.5cm。背面疣点明显，略呈层状排列；腹面的细密波状横层纹占全体大部分，中间有纵向浅槽；尾部角质缘渐宽，向腹面翘起，末端有1骨针，多已断落(图450－1)。

以色白、洁净者为佳。

(2)饮片 炒海螵蛸 多为不规则形或类方形小块，类白色或微黄色，味淡(图450－2)。

【功效】 味咸、涩，性温。收敛止血，涩精止带，制酸，敛疮。



449

450—1

450—2

451. 海 螵

Hailuo **Concha Rapanae**

カイラ **Meat of Red-mouthed Purpura**

【来源】 本品为骨螺科动物红螺 *Rapana renosa* (Valenciennes)或其他螺类的贝壳。

【产地加工】 于春、秋2季捕后放沸水中烫死，取其肉供食用，将贝壳晒干，生用或煅用。

【炮制】 (1)海螵 取原药材，洗刷干净，干燥，粉碎。

(2)煅海螵 将海螵装入砂罐内，置火炉中煅红，取出，放凉。用时捣碎。

【性状】 (1)药材 壳极坚厚，螺体上部尖细，下部膨大，约分6层，每层宽度自上而下迅速增长。表面粗糙，具有排列整齐而平的螺旋形肋和细海纹。壳面黄褐色，具棕褐色斑点。壳口大。外唇厚，边缘具有与螺肋相当的缺刻。壳口内面杏红色，有珍珠光泽(图451－1 红螺)。

以壳完整、坚厚、壳面黄褐色、壳口有珍珠光泽者为佳。

(2)饮片 煅海螵 形似海螵，色较深，质酥脆(图451－2)。

【功效】 味咸，性温。化痰消积，镇肝熄风，和气清神。

452. 海 藻

Haizao **Sargassum**

カイソウ **Seaweed**

【来源】 本品为马尾藻科植物海蒿子 *Sargassum pallidum*(Turn.) C. Ag. 或羊栖菜 *Sargassum fusiforme* (Harv.) Setch. 的干燥藻体。前者习称“大叶海藻”，后者习称“小叶海藻”。

【产地加工】 于夏、秋2季自海中采捞，除去杂质，淡水洗净，干燥。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，晾至半干，切段，干燥。

【性状】 (1)药材 ①大叶海藻 全体卷曲皱缩，暗褐色，多被白霜，长30～60cm。主干圆柱形，两侧有羽状分枝，分枝的叶腋生有小分枝，具短小的刺状突起。初生叶披针形或倒卵形，长5～7cm，宽约1cm，全缘或具粗锯齿；次生叶条形或披针形，叶腋着生多数具有丝状突起的小枝。气囊生于最终分枝上，黑褐色，球形或卵圆形，有的有柄，顶端圆或有细尖状突起。质脆，潮润时柔软。气腥，味微咸(图452－1)。

②小叶海藻 全体较小，长15～40cm，棕黑色或黑棕色，表面具白色盐霜。主干直立，圆柱形，直径0.2～0.4cm，表面粗糙，分枝互生，无刺状突起。叶条形或细匙形，先端稍膨大，中空。气囊腋生，纺锤形或球形。质较硬。气腥，味微咸(图452－2)。

均以色黑褐、白霜少者为佳。

(2)饮片 ①大叶海藻片 为不规则的小段，卷曲状，长1～2cm，表面黑褐色，主干和幼枝可见短小的刺状突起，叶缘偶见粗锯齿。质脆，近革质。气囊黑褐色，球形或卵圆形，有的顶端有细尖状突起。气腥，味微咸(图452－3)。

②小叶海藻片 为不规则的小段，卷曲状，长1～2cm。表面棕黑色或黑褐色。主干圆柱形，表面粗糙，无刺状突起，叶呈线形或纸匙形，先端中空。气囊纺锤形或球形，柄较长。质较硬，类革质。气腥，味微咸(图452－4)。

【功效】 味苦、咸，性寒。软坚散结，消痰，利水。



451—1

451—2

452—1

452—2

452—3

452—4

453. 浮 石

Fushi Pumex

フセキ Pumice

【来源】 本品为火山作用喷出的岩浆凝固形成的多气孔质熔岩浮石 *Pumex*。以火山玻璃和长石等为主组分，主含二氧化硅(SiO_2)，商品习称“大海浮石”。

【产地加工】 于夏、秋2季，从海中捞出，晒干。

【炮制】 (1)浮石 取原药材，除去杂质，洗净，干燥。

(2)煅浮石 取净浮石，置适宜容器中，用无烟武火加热，煅至红透，取出放凉，捣碎，用时研粉。

【性状】 (1)药材 呈类圆球形或不规则块状，表面粗糙，具无数大小不等的小孔。灰白色、黄褐色或灰黄色，大小不一，直径2～7cm或更大。质硬而脆，断面疏松似海绵状，多数小孔，常有玻璃或绢丝样光泽。体轻，投入水中浮而不沉。气微，味淡(图453－1、图453－2、图453－3)。

以体轻、色灰白者为佳。

(2)饮片 煅浮石 形如浮石，质松脆，色灰白，表面粉末状(图453－4)。

【功效】 味咸，性寒。清肺化痰，软坚化结。

454. 益母草

Yimucao Herba Leonuri

ヤクモソウ Motherwort Herb

【来源】 本品为唇形科植物益母草 *Leonurus heterophyllus* Sweet 的干燥全草。

【产地加工】 于夏、秋2季当茎叶生长茂盛、花刚开放时，割取茎的上部，阴干或晒干。

【炮制】 (1)益母草段 取原药材，除去杂质，切去残根，洗净，润透，切段，干燥，通称“益母草段”。

(2)酒益母草 取益母草段，喷洒黄酒拌匀，闷润至透，置锅内用文火加热，炒干，通称“酒益母草”。每100kg益母草段，用黄酒15kg。

【性状】 (1)药材 茎方柱形，直径约0.5cm；表面灰绿色或黄绿色，上端有柔毛；体轻，质韧，断面中部有白色髓。叶多皱缩，破碎，易脱落，灰绿色。轮伞花序腋生，苞片刺状，萼宿存，上端5尖齿，花冠常已脱落。气微，味微苦(图454－1)。

以质嫩、叶多、色灰绿者为佳。质老、枯黄、无叶者不可供药用。

(2)饮片 ①益母草段 呈不规则的段状，茎、叶、花混合。茎方形，长1cm，灰绿色或黄绿色(图454－2)。

②酒益母草 形如益母草段，色泽加深，偶见焦斑，微具酒气(图454－3)。

【功效】 味苦、辛，性微寒。活血调经，利尿消肿。



453—2

453—3

453—1

453—4

454—2

454—3

454—1

455. 益 智

Yizhi **Fructus Alpiniae Oxyphyllae**

ヤクチ **Fruit of Sharpleaf Galangal**

【来源】 本品为姜科植物益智 *Alpinia oxyphylla* Miq. 的干燥成熟果实。

【产地加工】 于夏、秋2季间果实由绿变红时采收，晒干或低温干燥。

【炮制】 (1)益智 取原药材，除去杂质，筛去灰屑，通称"益智"。

(2)益智仁 取益智，除去杂质及外壳，称"益智仁"。

(3)盐益智仁 取益智仁，用盐水拌匀，闷润，置锅内，用文火加热炒干，取出放凉，称"盐益智仁"。

【性状】 (1)药材 呈椭圆形，两端略尖，长1.2～2.0cm，直径1.0～1.3cm。表面棕色或灰棕色，有纵向凹凸不平的突起棱线13～20条，顶端有花被残基，基部常残存果梗。果皮薄而稍韧，与种子紧贴，种子集结成团，中有隔膜将种子团分为3瓣，每瓣有种子6～11粒。质钝而硬。有特异香气，味辛、微苦(图455－1)。

以个大、饱满、气味浓者为佳。

(2)饮片 ①益智仁 种子常集结成椭圆形种子团，有的散落成单粒种子。种子团分为3瓣，中间有隔膜隔开，每瓣有种子6～11粒，2～3列纵向排列。种子呈不规则的扁圆形，直径0.2～0.3cm；表面灰褐色至棕黑色，颗粒状，外被灰黄棕色假种皮；质硬，破开后种仁白色，有粉性。气香而特异，味辛、微苦(图455－2)。

②盐益智仁 形如益智仁，色稍深，偶见焦火色斑纹。味咸(图455－3)。

【功效】 味辛，性温。温脾止泻摄唾，暖肾固精缩尿。

456. 拳 参

Quanshen **Rhizoma Bistortae**

ゲンジン **Rhizome of Bistort**

【来源】 本品为蓼科植物拳参 *Polygonum bistorta* L. 的干燥根茎。

【产地加工】 于春、秋2季挖取根茎，除去茎叶及泥沙，晒干，再去须根。

【炮制】 取原药材，除去杂质，略浸，洗净，润透，切薄片，干燥，通称"拳参片"。

【性状】 (1)药材 呈扁圆柱形，常卷曲，长6～13cm，直径1.0～2.5cm。表面紫褐色，粗糙，一面隆起，一面稍平坦或略具凹槽，全体具密而粗的环纹及根痕。质硬，断面近肾形，浅棕红色至棕红色，具环状排列的黄白色小点(维管束)。气微，味苦、涩(图456－1)。

以个大、质硬、断面浅红棕色者为佳。

(2)饮片 拳参片 为不规则圆形薄片，表面棕红色或赤褐色，近边缘有一圈浅棕色小点状维管束，周边紫褐色。气微，味苦、涩(图456－2)。

【功效】 味苦、涩，性微寒。清热解毒，消肿，止血。

455—1

455—2

456—1

455—3



456—2

457. 桑白皮

Sangbaipi　　Cortex Mori

ソウハクヒ　　Root-bark of White Mulberry

【来源】 本品为桑科植物桑 *Morus alba* L. 的干燥根皮。

【产地加工】 于春初秋末采挖根部，刮去黄棕色粗皮，纵剖开，剥取根皮，晒干。

【炮制】 (1)桑白皮　丝取原药材，除去杂质，洗净，稍润，切丝，干燥。

(2)蜜桑白皮　取炼密，加适量开水稀释后，加入净桑白皮丝，拌匀，闷透。置锅内，用文火炒至不粘手取出，放凉，称"蜜桑白皮"。

【性状】 (1)药材　呈扭曲的槽状或板片状，长短宽窄不一，厚 0.3～0.6cm。外表面淡黄白色或白色，偶有残留的红黄色或黄棕色粗皮斑块；内表面黄白色或灰黄色，具细纵纹。体轻，质柔韧，纤维性极强，难折断，易纵向撕裂，撕裂时有白色粉尘飞出。气微，味甜、微苦，久嚼后发粘(图 457－1)。

以皮厚、色白、质柔韧者为佳。

(2)饮片　①桑白皮丝　呈丝状，宽 0.3～0.5cm。外表面淡黄白色或白色，较平坦。内表面黄白色或灰黄色，有细纵纹。质柔韧，强纤维性，撕裂时有白色粉尘飞出。气微，味甜、微苦。

②蜜桑白皮　形如桑白皮丝，表面呈深黄色，略有光泽，质滋润。微有蜜香气，味甜。

【功效】 味甘，性寒。泻肺平喘，利水消肿。蜜桑白皮止咳平喘力强。

附：桑白皮块(日本加工品)

呈横切的碎块状，片宽 0.5cm 左右，常为破碎不整的纤维状碎块混合物，有时可见橙黄色外皮。外皮呈层状，有光泽，黄白色或色稍深，整齐。横切面可见放射状纹理，棕、白相间，纹理弯曲不直。皮的外表面黄白色，略显颗粒状，内表面色稍深，具细纵条纹。易纵向撕裂，显强纤维性。气微，味淡(图 457－2)。

458. 桑　枝

Sangzhi　　Ramulus Mori

ソウシ　　Mulberry Twig

【来源】 本品为桑科植物桑 *Morus alba* L. 的干燥嫩枝。

【产地加工】 于春、夏 2 季采割嫩枝，除去叶，晒干；或趁鲜切片，晒干。

【炮制】 (1)桑枝片　取原药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片，晒干。

(2)炒桑片　取桑枝片置锅内，用文火加热，炒至微黄，偶有焦斑时，取出，放凉，称"炒桑枝"。

【性状】 (1)药材　呈长圆柱形，少有分枝，长短不一，直径 0.5～1.5cm。表面灰黄色至黄褐色，有多数黄褐色点状皮孔及细纵纹，可见灰白色半圆形或卵圆形的叶痕和棕黄色簇芽。质坚韧，有弹性，较难折断。断面黄白色，纤维性，中心有细小绵软的髓。有青草气，味淡，嚼之有粘液感。

以枝细、质嫩、断面黄白色、嚼之发粘者为佳。

(2)饮片　①桑枝片　呈长椭圆形片，长径 1.5～3.0cm，短径 0.5～1.5cm，厚 0.2～0.5cm。切面皮部较薄，木部黄白色，射线放射状，皮部与木部交界处具棕色小孔，排列成环，中央具白色或黄白色绵软的髓，直径 0.2～0.4cm。周边灰黄色或黄褐色。质硬略韧。微有青草气，味淡(图 458－1)。斜片(图 458－2)。

②炒桑枝　形如桑枝片，表面微黄色，偶有焦斑。气微香，味淡。

【功效】 味微苦，性平。祛风湿，利关节。

457—1

457—2



458—2



458—1

459. 桑寄生

Sangjisheng **Ramulus Taxilli**

ソウキセイ **Twig and Leaf of Chinese Taxillus**

【来源】 本品为桑寄生科植物桑寄生 *Taxillus chinensis* (DC.) Danser 的干燥带叶茎枝。

【产地加工】 冬季至次年春季采割，除去粗茎，小捆、大把直接干燥，切段干燥或蒸后再干燥。

【炮制】 取原药材，拣去杂物，洗净，润透，切厚片或段片，干燥，为"生桑寄生片"。取生桑寄生片，用酒喷洒(100kg 桑寄生片，用酒 10kg)，拌匀，至药透入尽，用文火炒至深黄色为度，即得"酒炒桑寄生"。

【性状】 (1)药材 茎枝呈圆柱形，长 30～40cm(切段者长 3～4cm)，直径 0.1～1.0cm；表面红褐色至灰褐色，具细纵纹及多数细小凸起的棕色皮孔，嫩枝时可见棕褐色茸毛；质坚硬，断面不整齐，皮部红棕色，木部色较浅。叶多卷曲，展平后呈卵形或椭圆形，长 3～8cm，宽 2～5cm；表面黄褐色，幼叶被细茸毛，先端钝圆，基部为圆形或宽楔形，具短柄，全缘(切段叶多破碎)；革质。无臭，味涩(图 459－1)。

以枝嫩、色红褐、叶多者为佳。

(2)饮片 ①生桑寄生片 为椭圆形厚片或段片，直径 0.1～0.2cm。表面红褐或灰褐色，具细纵纹，并有多数细小凸起的棕色皮孔。嫩枝片有的可见棕褐色茸毛。切面观皮部红棕色，木部色较浅。叶多呈卷曲碎片，表面黄褐色，幼叶被细茸毛，革质。无臭，味涩(图 459－2)。

②酒炒桑寄生 形如生桑寄生片，色深黄，微有酒香气。

【功效】 味苦、甘，性平。补肝肾，强筋骨，祛风湿，安胎元。

注： 采收时应注意，凡生于巴豆、乌桕、马桑等有毒植株上者，勿采割入药。

460. 桑螵蛸

Sangpiaoxiao **Ootheca Mantidis**

ソウヒョウショウ **Mantis Egg-case**

【来源】 本品为螳螂科昆虫大刀螂 *Tenodera sinensis* Saussure、小螳螂 *Statilia maculata* (Thunberg)或巨斧螳螂 *Hierodula patellifera* (Serville)的干燥卵鞘。分别习称"团螵蛸"、"长螵蛸"及"黑螵蛸"。

【产地加工】 深秋至次春采收，除去杂质，蒸死虫卵，干燥。

【炮制】 (1)桑螵蛸 取原药材，除去杂质，用清水洗净泥屑，置蒸具内用武火蒸约 1 小时，取出干燥，称"桑螵蛸"。

(2)盐桑螵蛸 取净桑螵蛸，加入盐水拌匀，闷润后置锅内，用文火加热，炒至有香气逸出时，取出放凉，称"盐桑螵蛸"。

【性状】 (1)药材 ①团螵蛸 略呈圆柱形或半圆形，长 2～3cm，厚 1.5～2.0cm。表面浅黄褐色，上面微有隆起，底面平坦。体轻，质松而韧，横断面外层为海绵状，内层有许多放射状排列的小室，室内各有 1 细小椭圆形卵。气微腥，味淡或微咸(图 460－1)。

②长螵蛸 略呈长条形，一端较细，长 2.5～5.0cm，宽 1.0～1.5cm，厚约 1cm。表面灰黄色，上面一带状隆起，带的两侧各有 1 条暗棕色浅沟及斜向纹理，质硬而脆(图 460－2)。

③黑螵蛸 略呈平行四边形，长 2～4cm，宽 1.5～2.0cm，厚 1.0～1.5cm。表面灰褐色，上面带状隆起明显。质硬而韧(图 460－3)。

均以身干、个大、完整、幼虫未出、色黄、体轻而带韧性、无杂质者为佳。

(2)饮片 盐桑螵蛸 形如桑螵蛸，表面焦黄色，略具焦斑，味咸(图 460－4)。

【功效】 味甘、咸，性平。益肾固精，缩尿，止浊。

459—1

459—2

460—1

460—2

460—3

460—4

461. 梧桐叶

Wutongye Folium Firmianae

ゴトウヨウ Leaf of Phoenix Tree

【来源】 本品为梧桐科植物梧桐 *Firmiana simplex* (L.) W.F. Wight 的干燥叶。

【产地加工】 于夏季采摘，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，切丝。

【性状】 (1)药材 叶片皱缩，时有破碎，完整者展平为单叶，3～5 掌状深裂至中裂，长 15～30cm，宽 10～25cm，裂片先端渐尖，基部心形，叶柄与叶片等长。表面淡黄色，上表面光滑，少有毛，下表面灰黄色，被星状毛，掌状脉明显凸出。纸质，较厚，脆而易碎。气微，味微苦(图 461－1)。

以片大、色黄褐、无杂质者为佳。

(2)饮片 为丝片，皱缩，色黄褐，上表面光滑，下表面有凸起皱纹，用放大镜观察可见星状毛。气微，味微苦(图 461－2)。

【功效】 味苦，性寒。祛风湿，解热毒，止刀伤出血。

462. 荠 苨

Ximing Herba Thlaspis

セキメイ Herb of Boor's Mustard

【来源】 本品为十字花科植物荠苨 *Thlaspi arvense* L. 和干燥全草。

【产地加工】 5～6 月间待果实成熟时采收，除去杂质，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切段，干燥，通称“荠苨段”。

【性状】 (1)药材 茎呈圆柱形，长 20～30cm，直径 0.2～0.5cm；表面黄绿色或灰绿色，有细棱线；质脆，易折断，断面中央有白色髓。叶互生，多脱落。顶生总状果序，果实扁椭圆形，直径 0.5～1.3cm，灰绿色或灰黄色，中部略突起，边缘有翼，先端凹陷，两面中间各有 1 条纵棱线，果实 2 室，每室种子 5～7 粒。种子卵圆形，极小，棕黑色，两面均有同心性环纹。气微，味淡(图 462－1)。

以色黄绿、带果者为佳。

(2)饮片 荠苨段 呈不规则的段状，茎、少数叶、果混合。茎圆柱形，长 1cm，黄绿色。果实扁椭圆形，灰绿色。种子扁卵圆形，棕黑色。气微，味淡(图 462－2)。

【功效】 味苦，性平。清肝明目，和中解毒。

462—1

461—1

461—2

462—2

463. 菟丝子

Tusizi Semen Cuscutae

トシシ Dodder Seed

【来源】 本品为旋花科植物菟丝子 *Cuscuta chinensis* Lam. 的干燥成熟种子。

【产地加工】 秋季果实成熟时采收植株，晒干，打下种子，除去杂质。

【炮制】 (1)菟丝子 取原药材，除去杂质，洗净，晒干，通称“菟丝子”。

(2)盐菟丝子 取净菟丝子用盐水拌匀，稍闷，置锅内，用文火加热炒干，称“盐菟丝子”。

(3)炒菟丝子 取净菟丝子置锅内，用文火加热炒至微黄，有爆裂声时，取出放凉，称“炒菟丝子”。

(4)酒菟丝子饼 取净菟丝子置锅内，加适量水煮至开裂，不断翻动，待水被吸尽呈稠粥状时，加入黄酒拌匀，取出，压成大片，切成长方块，干燥，称“酒菟丝子饼”。

【性状】 (1)药材 呈类球形或卵圆形，膨大部分稍扁，直径 0.10～0.15cm，一端略呈喙状突出偏向一侧，微凹处有浅色圆点。中央有条形的种脐。表面灰棕色或黄棕色，解剖显微镜下观察，可察见突起的小点。质坚实，不易以指甲压碎。气微，味淡(图 463－1)。

以颗粒饱满、无杂质者为佳。

(2)饮片 ①盐菟丝子 形如菟丝子。表面颜色加深，有裂口。气微，味微咸(图 463－2)。

②炒菟丝子 形如菟丝子，表面黄棕色，有裂口。气香，味淡(图 463－3)。

③酒菟丝子饼 呈长方形块状，长 1.8～2.0cm，宽 1.3～1.5cm，厚 0.5～1.0cm。表面灰褐色或棕黄色，略具酒气(图 463－4)。

【功效】 味甘，性温。滋补肝肾，固精缩尿，安胎，明目，止泻。

464. 菊三七

Jusanqi Radix Gynurae Segeti

キクサンシチ Root of Gynura

【来源】 本品为菊科植物菊三七 *Gynura sagetum* (Lour.) Merr. 的干燥根。

【产地加工】 秋后地上部分枯萎时挖取，除去残存的茎、叶及泥土，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切片，干燥，通称“菊三七片”或“生菊三七”。

【性状】 (1)药材 呈拳形肥厚的团块状，长 3～6cm，直径约 3cm。表面灰棕色或棕黄色，全体多有瘤状突起及断续的弧状沟纹，在突起物顶端常有茎基或芽痕，下部有须根或已折断，质坚实而重，不易折断，断面不平坦，淡黄色，有菊花心。气微，味淡后微苦(图 464－1)。

以干燥、整齐、质坚、无杂质、断面明亮者为佳。

(2)饮片 菊三七片 为不规则的厚片，表面灰棕色，体重质坚(图 464－2)。

【功效】 味甘、苦，性温。破血散瘀，止血，消肿。



463—1



463—2



463—3

463—4

464—1

464—2

465. 菊　花

Juhua　Flos Chrysanthemi

キクカ　Chrysanthemum

【来源】 本品为菊科植物菊 *Chrysanthemum morifolium* Ramat.的干燥头状花序。按产地和加工方法不同，分为“亳菊”、“滁菊”、“贡菊”、“杭菊”等。

【产地加工】 9～11月份花盛开时分批采收，阴干，晒干或焙干。

【炮制】 (1)菊花　取原药材，除去杂质及残留的梗叶，筛去灰屑。

(2)菊花炭　取净菊花，置锅内，用中火加热炒至焦褐色，喷淋清水，灭尽火星，取出干燥，称“菊花炭”。

【性状】 (1)药材　①亳菊　呈倒圆锥形或圆筒形，有的稍压扁呈扇形，直径1.5～3.0cm，离散。总苞碟状，总苞片3～4层，卵形或椭圆形，草质，草绿色或褐绿色，外面被柔毛，边缘膜质。花托半球形，外围舌状花数层，雌性，类白色，长1.8cm，宽约0.3cm，纵向皱缩，散生金黄色腺点。管状花两性，多数。位于中央，为舌状花所隐藏，黄色，顶端5齿裂。瘦果不发育，无冠毛。体轻，质柔润，干时松脆。气清香，味甜、微苦(图465－1)。

②滁菊　不规则球形或扁球形，直径1.5～2.5cm，舌状花白色，长约1.5cm，宽约0.3cm，不规则扭曲，内卷，边缘皱缩，有时可见淡褐色腺点。中央管状花黄色，大多隐藏。气清香，味甜、微苦(图465－2)。

③贡菊　呈扁球形或不规则球形，直径1.5～2.5cm。舌状花白色或类白色，长1.0～1.2cm。宽约0.2cm，斜升，上部反折，边缘稍卷而皱缩，中央有少数管状花，外露，金黄色。气清香，味甜、微苦(图465－3)。

④杭菊　呈不规则压扁状，朵大，瓣宽而疏，直径2.5～4.0cm，常数个相连成片，舌状花较小，长约2.2cm，宽约0.6cm，平展或微折叠，彼此粘连。灰白色、黄白色者为“杭白菊”，黄色或淡棕色者为“杭黄菊”。管状花外露，深黄色。清香，味甜、微苦(图465－4)。杭白菊(图465－5)，杭黄菊(图465－6)。

均以身干、完整、色鲜艳、气清香浓郁者为佳。

(2)饮片　菊花炭　形如菊花，花瓣呈焦褐色。质轻而脆，有焦香气(图465－7)。

【功效】 味甘、苦，性微寒。散风清热，平肝明目。

附：河南产怀菊花(图465－8)。

465—1

465—2

465—3

465—4

465—5

465—6

465—7

465—8

466. 黄牛角

Huangniujiao Cornu Bovis
オウギュウカク Cattle Horn

【来源】 本品为牛科动物黄牛 *Bos taurus donesticus* Gmelin 的角。
【产地加工】 全年皆可采收，宰牛取角，去掉角鞘，热水浸润，锉丝备用。
【炮制】 取原药材或丝，制成粉末。
【性状】 (1)药材 角的大小、长短随牛的品种而异，一般略弯曲，中空。尖部光滑，表面灰白色，质地坚硬(图 466－1)。
(2)饮片 粉末 灰白色，体轻，角质，略有光泽。气微，味淡(图 466－2)。
【功效】 清热凉血，解毒。

467. 黄石脂

Huangshizhi Halloysitum Flarum
オウセキシ Halloysite

【来源】 本品为次生粘土矿物的多矿物聚集体。主矿物组分为多水高岭石 Halloysite、水云母，其他矿物组分为石英、方解石等。
【产地加工】 挖出后，去尽杂石。
【炮制】 (1)黄石脂 取原药材拣尽杂质，刷净表面，用时捣碎或研细，水飞用。
(2)煅黄石脂 取洁净药材粉做成饼状晒干，置无烟火上煅至红透，立即投入醋里淬，取出晾凉，用时捣碎或研细(药：醋＝10：4)。
或取黄石脂粉末(过 100 目筛)用醋做成饼状，煅法同上(药：醋＝10：1～3)，用时捣碎或研细粉，水飞用。
【性状】 (1)药材 呈不规则土状块体，全体呈浅黄至褐黄色，略带深黄色至米黄色花纹或斑点。质较硬，但轻打可碎，断面不平坦，显层状，摸之光滑。条痕无色至浅黄。吸水无可塑性及膨胀性，微粘舌、有土腥味(图 467－1)。
以色黄褐、微粘舌、断面有层纹者为佳。
(2)饮片 ①煅黄石脂 略呈饼状或不规则碎块，褐黄色，质较轻、酥，易碎且易层层脱落，微吸舌(图 467－2)。
②粉末 色泽褐黄或浅黄，颗粒较均匀。
【功效】 味甘，性平。养脾、调中，止泄，消肿。用于黄疸泄利、肠癖脓血、恶疮、头疡、疥搔。

468. 黄羊角

Huangyangjiao Cornu Procaprae Gutturosae
オウヨウカク Horn of Mongolian Gazelle

【来源】 本品为牛科动物黄羊 *Procapra gutturosa* Pallas 的角。
【产地加工】 四季均可采收，猎捕后，将角从基部锯下，干燥备用。
【炮制】 取原药材，洗净，用温水浸泡，捞出，镑片或洗净干燥后锉成粗粉。
【性状】 (1)药材 呈长圆锥形，长20cm左右，呈弓形弯曲，表面黑褐色，不甚光滑，具纵向裂隙。角上除尖端外，有等距的椭圆形环脊。内有骨心。不透明。气味弱(图468－1)。
(2)饮片 黄羊角粉 粉末状，灰白色(图468－2)。
【功效】 平肝熄风，清热解毒。

466—1

466—2

467—1

468—1

468—2

467—2

469. 黄　芩

Huangqin　　Radix Scutellariae

オウゴン　　Root of Baikal Skullcap

【来源】 本品为唇形科植物黄芩 *Scutellaria baicalensis* Georgi 的干燥根。

【产地加工】 于春、秋2季采挖，除去须根及泥沙，晒后撞去粗皮，晒干。

【炮制】 (1)黄芩　取原药材，除去杂质，置沸水中煮10分钟或蒸30分钟，取出闷透趁热切薄片，通称“黄芩”。

(2)酒黄芩　取黄芩片用黄酒拌匀，闷润至透，置锅内，用文火加热，炒至深黄色时，取出放凉，称“酒黄芩”。

(3)黄芩炭　取黄芩片置锅内，用武火加热，炒至黑褐色时，喷淋清水少许，灭尽火星，取出凉透，称“黄芩炭”。

【性状】 (1)药材　呈扭曲的圆柱形，长8.0～25cm，直径1～3cm。表面棕黄色或深黄色，有稀疏的疣状细根痕。上部较粗糙，有扭曲的纵皱或不规则的网纹。下部有顺纹和细纹。质硬而脆，易折断，断面黄色，中间红棕色或暗棕色、棕黑色，老根中间枯朽状或已成空洞。气微，味苦(图469－1)。黄芩尖(图469－2)，黄芩瓣(图469－3)。

以条长、质坚实、断面色黄者为佳。

(2)饮片　①黄芩片　为长圆形、圆形或不规则形片，直径0.5～2.0(～3.0)cm，厚0.1cm。切面黄色或深黄色，中间红棕色或呈棕黑色枯朽状。周边棕黄色或深黄色，具纵向皱纹或不规则网纹与疣状根痕。质硬而脆，易折断。气微，味苦(图469－4)。出口片(图469－5)。

②酒黄芩　形如黄芩片，切面深黄色或棕黄色，略有酒气(图469－6)。

③黄芩炭　形如黄芩片，表面黑褐色，断面中心棕黄色，有焦炭气(图469－7)。

【功效】 味苦，性寒。清热燥湿，泻火解毒，止血，安胎。生黄芩清热泻火、解毒力强；酒黄芩可助药力上行，清除上焦湿热力大；黄芩炭即可清热，又可止血。

附：日本产黄芩(图469－8)。

469—1

469—2

469—3

469—4

469—5

469—8

469—6

469—7

470. 黄 芪

Huangqi **Radix Astragali**

オウギ **Root of Membranous Milkvetch**

【来源】 本品为豆科植物蒙古黄芪 *Astragalus membranaceus* Bge. *var. mongholicus* (Bge.) Hsiao (*A. mongholicus* Bge.)及膜荚黄芪 *Astragalus membramaceus* (Fisch.) Bge. 的干燥根。

【产地加工】 于春、秋 2 季采挖，切去根头，除去须根，泥土，晒干。

【炮制】 (1)生黄芪 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥，通称“黄芪片”或“生黄芪”。

(2)蜜黄芪 取炼蜜加适量开水稀释后，加入黄芪片拌匀，稍闷，置锅内，用文火加热，炒至深黄色，不粘手为度，取出放凉，称“蜜黄芪”。每 100kg 黄芪片，用炼蜜 25kg。

【性状】 (1)药材 呈圆柱形，极少有分枝，上粗下细，长 10～90cm，直径 1.0～3.5cm。表面灰黄色或淡棕褐色，有纵皱纹及横向皮孔。质硬略韧，断面纤维性，并显粉性，皮部黄白色，木部淡黄色，有菊花心，显放射状纹理及裂隙。气微，味微甜(图 470－1)。

以条粗长、断面色黄白、味甜、有粉性者为佳。

(2)饮片 ①黄芪片 为类圆形或椭圆形的厚片，表面黄白色，中心黄色，质硬而韧，嚼之微有豆腥气(图 470－2)。出口片(图 470－3)，斜片(图 470－4)。

②蜜黄芪 形如黄芪片，表面深黄色，有光泽。略带粘性。味甜，具蜜香气(图 470－5)。

【功效】 味甘，性温。补气固表，利尿托毒，排脓，敛疮生肌。

471. 黄 连

Huanglian **Rhizoma Coptidis**

オウレン **Coptis Root**

【来源】 本品为毛茛科植物黄连 *Coptis chinensis* Franch.、三角叶黄连 *Coptis deltoidea* C. Y. Cheng et Hsiao、云南黄连 *Coptis teetoides* C. Y. Cheng 或峨嵋野连 *Coptis omeiensis* (Cheng) C. Y. Cheng 的干燥根茎。分别称之为“味连”、“雅连”、“云连”、“峨嵋野连”。

【产地加工】 秋季采挖，除去茎叶，须根及泥沙，干燥后，再撞去残留须根。

【炮制】 根据临床用药要求，通常有如下 4 种炮制方法。

(1)黄连片 取原药材，除尽杂质及须根，抢水洗净，润透，切成薄片，晾晒至干。

(2)酒炒黄连 取黄连片，用酒(100kg 黄连片，用酒 12.5kg)拌匀，待吸尽后，用文火炒干，取

470—1



470—2



470—3

470—5



470—4

471—1

出摊凉。

(3)姜汁炒黄连　取黄连片，用姜汁(100kg 黄连片，用 12.5kg 生姜取汁)喷洒拌匀，待吸尽后，用文火炒干，取出摊凉。

(4)吴萸水炒黄连　先取吴萸(100kg 黄连片，用 10kg 吴萸)加适量水，煎煮取汁，再将吴萸水加于黄连片中，拌匀，吸尽后，用文火炒干。

【性状】 (1)药材　味连多枝聚生成簇，常弯曲，形如鸡爪；雅连多单枝，两端的节密集，中间常有细长光滑的"过桥杆"；云连多单枝，细小，弯曲成钩状；峨眉野连多单枝，常留有部分叶柄，根茎下端弯曲，形似虾状。味连(图 471－1)，雅连(图 471－2)，云连(图 471－3)，峨嵋野连(图 471－4)。

(2)饮片　①黄连片　为不规则形薄片，直径 0.2～1.0cm，外表面黄褐色或棕黄色，粗糙；横切面皮部暗棕至黄棕色，木部色较黄，具放射纹，髓心棕红色，时中空。质坚脆。气微，味极苦。味连片(图 471－5)。

②酒炒黄连　形如黄连片，略有酒香气。

③姜汁炒黄连　形如黄连片，稍有姜辣气味。

④吴萸水炒黄连　形似黄连片，微有吴萸的辛辣气味。

【功效】 味苦，性寒。清热燥湿，泻火解毒。酒炒黄连善清上焦火；姜汁炒黄连长于清胃热，和胃止呕；吴萸水炒黄连有舒肝、和胃、止呕作用。

附：日本黄连　*Rhizoma Coptidis*

【来源】 本品为毛茛科植物日本黄连 *Coptis japonica* Makinō 除去根的干燥根茎。

【产地加工】 秋季或春季开花前挖取根茎，除去须根，晒干。须根称"黄连渣"。

【性状】 (1)药材　呈不整齐的圆柱形，长 2～4cm，有的可达 10cm，直径 0.2～0.7cm，多少弯曲，有的有分枝。表面呈灰黄褐色，节明显，可见多数的残基。一端常有叶柄残基。折断面呈纤维性，木栓层呈淡灰褐色，皮部黄褐色，木部黄色，髓部黄褐色。气微弱，味极苦，口嚼有残渣，唾液可染成黄色(图 471－6)。

以地上残茎少、质坚实、鲜黄色、味苦者为佳。

(2)饮片　①粉末　呈黄褐色至灰黄褐色，气微弱，味极苦，口嚼有残渣，唾液可染成黄色。

②黄连片　呈圆形、长椭圆形的薄片，直径 0.2～0.7cm，厚 1mm 左右，少有斜片。表面皮部和髓部呈橙黄色、棕红色，木质部呈鲜黄色，多数中空，部分中心枯朽者，皮部呈棕黑色，且木部色亦较浅。外皮棕褐色，粗糙。多数具刺状的根痕。质硬，易折断，有刺手感。气微，味极苦(图 471－7)。

471—2



47 —3

471—4

47 —6

471—5

471—7

472. 黄连花

Huanglianhua Herba Lysimachiae Davuricae

オウレンカ Herb of Dahurian Loosestrife

【来源】 本品为报春花科植物黄连花 *Lysimachia vulgaris* L. *var*. *davurica* (Ledeb.) R. Kunth 的干燥全草。

【产地加工】 于春、秋2季采全草，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切段，干燥，通称“黄连花段”。

【性状】 (1)药材 茎圆柱形，表面及花序均有锈褐色毛，灰绿色。叶皱缩，两面均有黑色腺点。体轻质韧，断面中部有白色髓。圆锥花序顶生，边缘有黑色腺毛，花黄色，蒴果球形，直径0.4cm。气微，味微苦(图472－1)。

以质嫩、叶多、色灰绿者为佳。

(2)饮片 黄连花段 呈不规则的段状，茎、叶、花混合。茎圆柱形，灰绿色，有毛(图472－2)。

【功效】 味苦、涩，性寒。镇静，降压，消炎，止血。

473. 黄 柏

Huangbai Cortex Phellodendri

オウバク Bark of Chinese Corktree

【来源】 本品为芸香科植物黄皮树 *Phellodendron chinense* Schneid. 或黄柏 *Phellodendron amurense* Rupr. 的干燥树皮。前者习称“川黄柏”，后者习称“关黄柏”。

【产地加工】 3～6月间采收，选10年左右的树，剥去一部分树皮，晒至半干，压平，刮净粗皮至显黄色，不可伤入内皮，刷净晒干，置干燥通风处，防霉变。

【炮制】 (1)黄柏丝 取原药材，除去杂质，抢水洗净，润透，切丝，干燥，称“黄柏丝”。

(2)盐黄柏 取黄柏丝，用盐水拌匀，润透，置锅内，用文火加热，炒干，取出放凉，称“盐黄柏”。

(3)酒黄柏 取黄柏丝，用黄酒拌匀，润透，置锅内，用文火加热，炒干，取出放凉，称“酒黄柏”。

(4)黄柏炭 取黄柏丝置锅内，用武火加热，炒至表面焦黑色，内部焦褐色，喷淋清水，灭尽火星，取出晾干，称“黄柏炭”。

【性状】 (1)药材 ①川黄柏 呈板片状或浅槽状，长宽不一，厚0.3～0.6cm。外表面黄褐色

472—1

472—2

473—1

473—2

或黄棕色，平坦或具纵沟纹，有的可见皮孔及残存的灰褐色粗皮，内表面暗黄色或淡棕色，具细密的纵棱纹。体轻，质硬，断面纤维性，呈裂片状分层，深黄色。气微，味甚苦，嚼之有粘性（图 473－1）。

②关黄柏　厚 0.2～0.4cm。外表面黄绿色或淡棕黄色，较平坦，有不规则的纵裂纹，皮孔小而少见，偶有灰白色的粗皮残留。内表面黄色或黄棕色。体轻，质较硬，断面鲜黄色或黄绿色（图 473－2）。

均以皮厚、断面色黄者为佳。

（2）饮片　①川黄柏丝　呈微卷曲的丝状，外表面黄褐色或黄棕色，内表面暗黄色或淡棕色，具细密的纵棱纹。体轻，质硬，切面呈纤维性。气微，味甚苦。

②关黄柏丝　呈丝状，外表面黄绿色或淡棕黄色，气微，味苦（图 473－3）。

③盐黄柏　形如黄柏丝，深黄色，偶有焦斑，略具咸味（图 473－4）。

④酒黄柏　形如黄柏丝，深黄色，偶有焦斑，略具酒气（图 473－5）。

⑤黄柏炭　形如黄柏丝，表面焦黑色，内部焦褐色，质轻而脆，味微苦、涩。

【功效】 味苦，性寒。泻火解毒，清湿热。

附：日本黄柏 *Cortex Phellodendri*

【来源】 本品为芸香科植物黄柏 *Phellodendron amurense* Rupr. 或同属他种植物的树皮除去栓皮的部分（内皮）。

【产地加工】 于春、夏、秋 3 季剥取树皮，除去栓皮，晒干。

【性状】 （1）药材　呈长短不等的板片状，厚 0.1～0.4cm。外表面棕黄色或黄棕色，可见有大小不等黑色或黑棕色的凹陷皮斑；可见众多棕色小点，似呈颗粒性；内表面棕褐色，平滑，微显纵纹，并可见深棕色的细小斑点。质硬，易折断。折断面纤维性，常呈层片状分离，层片黄色或棕黄色，黄色者可见明显的棕色小点；切断面棕黄色。气微，味苦，嚼之呈片状，略有粘滑感（图 473－6）。

（2）饮片　呈长方形或不规则形片状，长 0.5～1.5cm，宽约 0.5cm，厚 1.5～4.0mm。外皮黄棕色，内表面浅黄棕色，并可见众多细密的棕色小点。切面黄色或稍绿黄色。折断纵剖面呈纤维性或层状，且呈鲜黄色，质硬。气微，味苦（图 473－7）。

473—3

473—4

473—5

473—6

473—7

474. 黄荆子

Huangjingzi　　Fructus Viticis Negundo

オウセイシ　　Fruit of Negundo Chastetree

【来源】 本品为马鞭草科植物黄荆 *Vitex negundo* L.、牡荆 *Vitex negundo* L. *var*. *cannabifolia* Hand.-Mazz. 和条荆 *Vitex negundo* L. *var*. *heterophylla* Rehd. 带宿萼的干燥成熟果实。

【产地加工】 于秋季果实成熟时采收，用手搓后晒干，扬净。

【炮制】 (1)黄荆子　取原药材，除去杂质，筛去灰屑，称“黄荆子”。

(2)炒黄荆子　取黄荆子，置入锅内，用文火炒至香气逸出，取出，放凉，称“炒黄荆子”。

【性状】 (1)药材　呈类球形，上端略大而平圆，有花柱脱落的凹痕，下端稍尖，长 0.20～0.35 cm，直径 0.15～0.30cm。宿萼灰褐色，密被灰白色或棕黄色细绒毛，包被整个果实的 2/3 或更多，萼筒顶端 5 齿裂，外面有 5～10 条明显的脉纹。果实表面棕褐色。质坚硬，不易破碎。断面果皮较厚，灰棕色或棕黄色，4 室，每室有黄白色或黄棕色种子 1 枚或不育。气香，味苦、涩(图 474－1)。

以颗粒饱满、身干、无杂质者为佳。

(2)饮片　炒黄荆子　形如黄荆子，宿萼多碎断。质硬脆。气香，味微苦涩(图 474－2)。

【功效】 味辛、苦，性温。散风，祛痰止咳平喘，理气和胃，止痛。黄荆子长于散风，祛痰，止咳平喘；炒黄荆子偏于理气和胃，止痛。

475. 黄喉水龟

Huanghoushuigui　　Carapax et Plastrum Clemmydis

オウコウスイキ　　Huanghoushuigui

【来源】 本品为龟科动物黄喉水龟 *Clemmys mutica* (Cantor)的甲。主要以其腹甲作为龟板用，背甲亦可使用。

【产地加工】 多在夏、秋季捕捉，处死后取其龟板，漂洗，去净筋肉，晒干备用。

【性状】 药材　颈角板短而宽；椎角板 5 块，第 1 块前端宽；肋角板每侧 4 块；缘角板每侧 11 块，中段的角板狭长。背脊中央的纵棱极明显，两侧的纵棱较弱(图 475)。

【功效】 滋阴潜阳，补肾，退虚热。

474—1



474—2

475

476. 黄　精

Huangjing　　Rhizoma Polygonati

オウセイ　　Rhizome of Solomonseal

【来源】 本品为百合科植物黄精 *Polygonatum sibiricum* Red.、多花黄精 *Polygonatum cyrtonema* Hua 或滇黄精 *Polygonatum kingianum* Coll. et Hemsl. 的干燥根茎，因药材形状不同，习称“鸡头黄精”、“姜形黄精”、“大黄精”。

【产地加工】 于春、秋 2 季挖取根茎，除去地上茎及须根，洗净，置沸水中略烫或蒸至透心，晒干或烘干。

【炮制】 (1)黄精片　取原药材，洗净，略润，切厚片，干燥，通称“黄精片”。

(2)酒黄精　取净黄精，用黄酒拌匀，置炖药罐内，密闭，隔水加热或用蒸汽加热，至酒被吸尽或置适宜容器内，蒸至内外滋润、色黑，取出，晒到外皮稍干时，切厚片，干燥，称“酒黄精”。每黄精 100kg，用黄酒 20kg。

(3)蒸黄精　取净黄清，洗净，蒸至色棕黑滋润时取出，切厚片，干燥，称“蒸黄精”。

【性状】 (1)药材　①鸡头黄精　呈不规则的圆锥形，头大尾细，形似鸡头，长 3～10cm，直径 0.5～1.5cm。表面黄白色至黄棕色，半透明，全体有细皱纹及稍隆起呈波状的环节，地上茎痕呈圆盘状，中心常凹陷，根痕多呈点状突起。断面淡棕色，稍带角质。并有多数黄白色点状筋脉。气微，味甜、有粘性(图 476－1)。

②姜形黄精　呈结节状，分枝粗短，形似生姜，长 2～18cm，宽 2～4cm，厚 1.0～2.5cm。表面较粗糙，有明显疣状突起的须根痕。茎痕呈凹陷的圆盘状(图 476－2)。

③大黄精　呈肥厚块状或串珠状，长达 10cm 以上，宽 3～6cm、厚 2～3cm。每一结节有茎基，呈凹陷的圆盘状。

均以块大、肥润、色黄、断面透明者为佳。

(2)饮片　①黄精片　为不规则的厚片，表面淡黄色，半透明，较皱缩，偶见盘状茎痕，质稍硬而韧，粘性(图 476—3)。

②酒黄精　形如黄精片，表面黑色，有光泽，中心深褐色。味甜，微有酒气(图 476—4)。

③蒸黄精　形如黄精片，表面棕黑色，有光泽、质柔软(图 476－5)。炒黄精(图 476－6)。

【功效】 味甘、性平。补气养阴，健脾，润肺，益肾。

476—1

476—2



476—3



476—4



476—5

476—6

477. 黄颡鱼

Huangsangyu Pelteobagrus Fulvidraco

オウソウギョ Pelteobagrus Fulvidraco

【来源】 本品为鲿科动物黄颡鱼 *Pelteobagrus fulvidraco* (Richardson)的全体。

【产地加工】 四季捕捉，捕后去内脏，鲜用。

【性状】 药材 体长，光滑无鳞。头中等大，扁宽而平坦。眼侧上位，两眼之间有一纵沟。前鼻孔呈管状，后鼻孔位于鼻须后面。口中等大，下位。头部具4对须，上下颌各2对，上颌须最长，达到胸鳍基部。背鳍2个，第1背鳍具强大锯齿形的硬棘，第2背鳍为脂鳍，起于臀鳍垂直线的后方，其末端游离。臀鳍与脂鳍相对。胸鳍具有一强棘，棘的外缘有一对锯齿，较细小，但内侧有强大的锯齿。胸鳍与肩带有活动关节。腹鳍小，尾鳍叉状。全体灰黄色，背部色较浅，腹部鲜黄色，体侧有绿灰色的暗斑及灰褐色的切痕状斑点(图477)。

【功效】 祛风，解毒，利水。

478. 雪上一支蒿

Xueshangyizhihao Radix Aconiti Brachypodi

セツジョウイッシコウ Root of Shortstalk Monkshood

【来源】 本品为毛茛科植物短柄乌头 *Aconitum brachypodum* Diels、铁棒槌 *Aconitum pendulum* Busch 或宣威乌头 *Aconitum subrosullatum* H.-M. 的干燥块根。

【产地加工】 深秋至初冬间采挖，除去残茎、须根及泥沙，晒干。

【炮制】 用清水浸7～9天，每天换水1～2次，待浸至无干心而且质软后，切成薄片，即"生一支蒿片"；取生片至蒸笼中蒸2～3小时，取出晒干，再用熟猪油拌和炒透，即"制一支蒿"；或用湿纸包裹，置于母火中或炭火旁煨透，去纸，入童便中浸1昼夜，取出，漂净，晒干，即得"童便制一支蒿"。

【性状】 (1)药材 呈圆柱形或长圆锥形，长2.0～7.5cm，直径0.5～1.5cm。表面灰棕色至暗棕色，光滑或稍有纵皱及侧根痕，顶端有茎基及茎痕。质硬而脆，断面较平坦，类白色，具粉性，形成层环纹明显或不明显，母根中央时有裂隙。气微，味麻(图478－1)。

(2)饮片 ①生一支蒿片 为圆形、椭圆形或长椭圆形薄片，短茎0.5～1.5cm；表皮灰棕色至暗棕色，切面类白色，具粉性。其他性状同原药材(图478－2,3)。

②制一支蒿片 形如生一支蒿片，表皮深棕色至棕黑色，切面角质状。气微，味微麻。

③童便制一支蒿片 性状与制一支蒿片略同，气微，微麻并有微弱咸味。

【功效】 味苦、辛，性温。有大毒。祛风镇痛。生品浸酒外擦或研末调敷患处，不宜内服。

477

478

479. 雪莲花

Xuelianhua Herba Saussureae Medusae

セツレンカ Herb of Snow Lotus

【来源】 本品为菊科植物水母雪莲花 *Saussutea medusa* Maxim. 的干燥全草。

【产地加工】 5～6月份采收，将花未开放的全株拔起，抖净泥沙，晾干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，切段片。

【性状】 (1)药材 略呈圆锥形的绒团，长10～25cm，全株淡灰白色。根弯曲。茎单一，基部有褐色的枯叶柄，中部及上端叶常皱缩破碎，并密被白色长绵毛。头状花序形如绒球，由多数筒状小花密集而成，花周围有细长的苞片，密被黄白色细短茸毛。质轻泡，气微，味略苦、酸(图479—1)。

以体完整、密被茸毛、气味浓者为佳。

(2)饮片 呈绒状段片，长1.0～1.5cm。叶片多皱缩破碎，密被白色长绵毛。小花筒状，苞片密被黄白色短茸毛。质轻泡。气微，味略苦、酸(图479—2)。

【功效】 味甘、微苦，性温。益气补血，补肾壮阳，安神调经。

480. 接骨木

Jiegumu Ramulus Sambuci Williamsii

セツコツボク Twig of Williams Elder

【来源】 本品为忍冬科植物接骨木 *Sambucus williamsii* Hance 的干燥茎枝。

【产地加工】 全年可采，砍下茎枝，除去叶片，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切薄片，干燥，称“接骨木片”。

【性状】 (1)药材 呈圆柱形，皮部完整或剥落，外表棕褐色，具不规则的纵条纹、纵裂纹及棕黑点状突起的皮孔，有的皮孔呈纵长椭圆形，约1cm长左右。质轻而坚硬。气微，味微苦(图480—1)。

以较整洁、外表绿褐或棕褐者为佳。

(2)饮片 接骨木片 呈斜向横切的长椭圆形薄片，厚约3mm。断面黄白色，年轮呈环状，极明显；髓部多为褐色或棕色，有的枯心成空洞或呈海绵状，易开裂。质地细腻。气微，味微苦(图480—2)。

【功效】 味甘、苦，性平。有小毒。祛风利湿，活血止痛。

附：接骨木碎块(日本加工品)

为不规则形的小碎块，段长0.5cm左右。呈黄白色或色稍深。纵面可见纤维状条纹；横切面常有裂隙，易分成不规则的小片，木质，难折断。气微，味稍涩(图480—3)。



479—1

479—2

480—3

480—1

480—2

481. 雀 瓮

Queweng **Larva Cnidocampae Flavescentis**

シャクオウ **Silk of Oriental Moth**

【来源】 本品为刺蛾科动物黄刺蛾 *Cnidocampa flavescens* (Walker)的带有石灰质硬壳的蛹。

【产地加工】 冬、春2季由树上取下，鲜用。

【性状】呈椭圆形，长1.10～1.45cm，灰白色，上有数条宽褐纵纹，质地坚硬，形似雀蛋(图481)。

【功效】 清热止惊，散风解毒。

482. 常 山

Changshan **Radix Dichroae**

ジョウザン **Root of Antifebrile Dichroa**

【来源】 本品为虎耳草科植物常山 *Dichroa febrifuga* Lour. 的干燥根。

【产地加工】 秋季采挖，除去须根，洗净，晒干。

【炮制】 (1)常山 取原药材，除去杂质，浸泡，润透，切薄片，晒干，通称“常山”。

(2)酒常山 取常山片用黄酒拌匀，闷润至透，置锅内，用文火加热，炒干，取出，放凉，称“酒常山”。

【性状】 (1)药材 呈圆柱形，常弯曲扭转，或有分枝，长9～15cm，直径0.5～2.0cm。表面棕黄色，具细纵纹，外皮菲薄易剥落，剥落处露出淡黄色木部，枯瘦光滑如鸡骨状。质坚硬，不易折断，折断时有粉尘飞扬，断面黄白色，呈放射状。无臭，味苦(图482—1)。

以质坚实而重、表面光滑、断面色黄白者为佳。

(2)饮片 ①常山片 为不规则形片，直径0.5～2.0cm，有的斜切片稍大，厚0.2～0.4cm。切面黄白色，射线细密，类白色，呈放射状；有的可见年轮环纹。周边棕黄色，剥落菲薄的外皮后呈淡黄色，有细纵皱纹。质坚硬而脆，掰断时有粉尘飞扬。无臭，味苦(图482 2)。

②酒常山 形如常山片，色深黄，略有酒气(图482—3)。

【功效】 味苦、辛，性寒。有毒。截疟，祛痰。酒常山有消除呕吐的作用。

481

482—2

482—3

482—1

483. 常春藤

Changchunteng **Caulis Hederae Sinensis**

ジョウシュントウ **Stem of Chinese Ivy**

【来源】 本品为五加科植物常春藤 *Hedera nepalensis* K. Koch *var. sinensis* (Tobl.) Rehd. 的干燥带叶茎藤。

【产地加工】 秋季采收，除去杂质，晒干。

【炮制】 取原药材，除尽杂质，水洗并润透，切段，晒干。

【性状】 (1)药材 茎藤为圆柱形，直径 0.3～1.0cm。表面光滑，老茎暗绿色，两侧有多数气生根或根痕；嫩茎绿色，时有鳞片状柔毛。质地坚硬，断面皮薄，木部淡黄色至棕黄色，中央具白色髓心或成空洞。叶互生，营养枝上叶片为三角状卵形至三角长圆形，长 2～6cm，宽 1～8cm，果枝上的叶片椭圆菱状卵形至椭圆状披针形，长 5～12cm，宽 2～6cm，全缘，表面光滑，绿色至淡绿色；质较厚，草质。无臭，味微苦、涩(图 483—1)。

以叶多、色绿者为佳。

(2)饮片 为段片。茎为短柱状，老茎暗绿者，两侧具多数气生须根或根痕，切面皮薄，木部棕黄色，中心常中空；嫩茎表面绿色，光滑，少有气生根，切面木部淡黄色，中央具髓心。叶多切成不规则碎片，少数尚完整，性状同原药材。气微，味微苦、微涩(图 483—2)。

【功效】 味苦，性凉。祛风，利湿，平肝，解毒。

484. 眼睛王蛇

Yanjingwangshe **Ophiophagus Hannah**

ガンキョウオウダ **King Cobra**

【来源】 本品为眼睛蛇科动物眼睛王蛇 *Ophiophagus hannah* (Cantor)的全体。

【产地加工】 清明后到冬季入穴冬眠前均可捕获，以立冬前后捕获者最佳，捕得后，剖腹去内脏，擦净血迹，烘干或鲜用。

【性状】 药材 为毒蛇中体形最大的一种，全长可达 380cm 以上。头部椭圆形。颈部膨扁，在颈背有"∧"形斑；顶鳞之后有一对大的枕鳞；颊鳞缺，上唇鳞 7(2～2～3)；下唇鳞 8，前 4(3)片切前颏片；眼前鳞 1，眼后鳞 3，颞鳞 2+4(3)；背鳞平滑有金属光泽，斜行，19(17)～15～15 行；腹鳞雄性 235～249，雌性 250～265；尾下鳞前段单片后段双片，雄性 83～95，雌性 77～79；肛鳞完整(图 484)。

【功效】 味甘，性平。通经络，祛风湿。

483—1

484

483—2

485. 鹿 尾

Luwei Cauda Cervi

ロクビ Deer Tail

【来源】 本品为鹿科动物梅花鹿 *Cervus nippon* Temminck 或马鹿 *Cervus elaphus* L. 的干燥尾巴。

【产地加工】 四季均可采收，将鹿尾由尾椎骨处割下，挂起阴干；或将割下的带毛鹿尾入水中浸润，取出，除去根部残肉、油脂，剪去毛茸及外面老皮，再用海浮石搓光，用线穿挂通风处阴干，后置干燥处，宜多翻晒。前者称“带毛鹿尾”；后者称“不带毛鹿尾”。

【炮制】 取原药材，洗净，切片，焙干。

【性状】 药材 略呈圆柱形，粗短，先端钝圆，基部稍宽，割断面不规则。带毛者长约 15cm，外有棕黄色毛，并带有一部分白毛；不带毛者较短，外面紫红色至紫黑色，平滑有光泽，常带有少数皱沟。质坚硬，气微腥。梅花鹿尾瘦小（图 485—1），以马鹿尾（图 485—2）为好。

以粗壮、黑亮、不带毛、完整者为佳。

【功效】 味甘、咸，性温。暖腰膝，益肾精。

486. 鹿 角

Lujiao Cornu Cervi

ロクカク Deerhorn

【来源】 本品为鹿科动物梅花鹿 *Cervus nippon* Temminck 或马鹿 *Cervus elaphus* L. 已骨化的角或锯茸后翌年春季脱落的角基，分别习称“梅花鹿角”、“马鹿角”、“鹿角脱盘”。

【产地加工】 退角多在春季自然脱落，以春末拾取新脱落的角为佳。砍角、锯角一般在冬季或早春将角连脑骨砍下，或自基部锯下，风干。

【炮制】 取原药材，洗净，用温水浸泡 4～6 天，每天换水，捞出，锯片，干燥；或锉成粗粉末。

【性状】 (1)药材 ①梅花鹿角 呈分枝状，三岔或四岔，长 30～60cm，直径 2.5～5.0cm。主枝稍向后弯曲，基部具盘状突起，习称“珍珠盘”，侧枝多向两旁伸展，主枝末端分成两小枝。表面黄棕色，枝端浅黄白色，具疣状突起，习称“骨钉”，骨钉断续排成纵棱，顶部灰黄色，有光泽。质硬。气无，味微咸（图 486—1）。

以质坚、全体有骨钉、有光泽者为佳。

②马鹿角 呈分枝状，通常分成 4～6 枝，全长 50～120cm，主枝弯曲，直径 3～6cm，侧枝多向一面伸展，表面灰褐色或灰黄色，有光泽，角尖平滑，中下部常具骨钉，并有纵棱。

以粗壮、坚实、无枯朽者为佳。

③鹿角脱盘 呈盔状或扁盔状，直径 3～6cm，高 1.5～4cm。表面灰褐色或灰黄色，有光泽，中部具蜂窝状小孔，珍珠盘周边常有细小的孔洞。上面略平或呈不规则的半球形（图 486—2）。

(2)饮片 鹿角粉 呈粉末状，白色或灰白色，无臭，味微咸（图 486—3 梅花鹿角粉）。

【功效】 味咸，性温。行血，消肿，益肾。

486—1

485—2

485—1

486—3

486—2

487. 鹿角胶

Lujiaojiao **Colla Cornis Cervi**

ロクカクキョウ **Deer Horn Glue**

【来源】 本品为鹿科动物梅花鹿 *Cervus nippon* Temminck 或马鹿 *Cervus elaphus* L. 的角经水煎熬浓缩制成的固体胶。

【产地加工】 多在11月至翌年3月间熬制。将鹿角锯成长6～10cm的段，置水中浸漂，每日搅动，并换水1～2次，漂至水清，取出，分次水煎，将煎出的液滤过，合并滤液（或加入明矾细粉少量），静置，滤取胶液，用文火浓缩（或加适量豆油、冰糖、黄酒）至稠膏状，冷凝，切块，阴干。

【性状】 药材 呈扁方块状，长3～4cm，厚约0.6cm。表面黄棕色或红棕色，半透明，有的一侧有黄白色泡沫层，系冷却时浮在上面的泡沫干燥而成。质坚而脆，断面玻璃状。气微，味微甜（图487）。

以切面整齐、平滑、棕黄色、半透明、无腥臭气者为佳。

【功效】 味甘、咸，性温。温补肝肾，益精养血。

488. 鹿角霜

Lujiaoshuang **Cornu Cervi Degelatinatum**

ロクカクソウ **Refuse of Deer Horn Glue**

【来源】 本品为鹿科动物梅花鹿 *Cervus nippon* Temminck 或马鹿 *Cervus elaphus* L. 的角熬制鹿角胶后剩余的角渣。

【产地加工】 于春、秋2季生产，将鹿角熬去胶质，取出角块，干燥。

【炮制】 取原药材，用时捣碎。

【性状】 药材 呈圆柱形或不规则的块状，大小不一，一般马鹿角的霜块较粗大，花鹿角的霜块较细小。表面灰白色，显粉性，常具纵棱。体轻，质酥，断面外层较致密，白色或灰白色，内层有蜂窝状小孔，灰褐色或灰黄色，有吸湿性。气微，味淡，嚼之有粘牙感（图488）。

以色白、体轻、质酥者为佳。

【功效】 味咸，性温。温肾助阳，收敛止血。

489. 鹿　茸

Lurong **Cornu Cervi Pantotrichum**

ロクジョウ **Hairy Deerhorn**

【来源】 本品为鹿科动物梅花鹿 *Cervus nippon* Temminck 或马鹿 *Cervus elaphus* L. 的雄鹿



487

488

489—1

489—2

489—4

489—3

未骨化密生茸毛的幼角。前者习称“花鹿茸”，后者习称“马鹿茸”。根据产地不同，马鹿茸又分为“东马鹿茸”和“西马鹿茸”，东北产者习称“东马鹿茸”，西北产者习称“西马鹿茸”。

【产地加工】 于夏、秋2季锯取鹿茸。一般分锯茸和砍茸2种采收方法。

(1)锯茸 一般从第3年的鹿开始锯茸，第1次在清明后45～50天(头茬茸)，采后50～60天采第2次(二茬茸)，将茸迅速锯下后，应立即进行烫炸等加工，阴干或烘干。

(2)砍茸 将鹿头砍下，再将茸连脑盖骨锯下，刮净残肉，绷紧脑皮，进行烫炸等加工，阴干。

【炮制】 (1)鹿茸片 取原药材，燎去茸毛，刮净，以皮带缠绕茸体，从锯口面小孔不断灌入热白酒，至灌满，浸润至透。稍蒸，横切薄片，压平，干燥，称“鹿茸片”。

(2)鹿茸粉 取原药材，燎去茸毛，刮净，劈成碎块，研成细粉，称“鹿茸粉”。

【性状】 (1)药材 ①梅花鹿锯茸 呈圆柱状分枝，具一个分枝者习称“二杠”，主枝长17～20cm，离锯口约1cm分出侧枝，长9～15cm，直径略细于主枝。外表红棕色或棕色，多光润，表面密生红黄色或棕黄色绒茸毛，上部毛密，下部较疏。锯口面黄白色，有蜂窝状细孔。体轻。气微腥，味微咸(图489—1)。具2个分枝者习称“三岔”，主枝长23～33cm，直径较二杠细，略呈弓形，微扁，枝端略尖，下部多有纵棱筋及突起疙瘩；皮红黄色，茸毛较稀而粗(图489—2)

②梅花鹿砍茸 为带头骨的茸，茸形与锯茸同，二茸相距约7cm，脑骨前端平齐，后端有一对弧形骨分列两旁，习称“虎牙”。外附脑皮，皮上密生茸毛。二杠(图489—3)，三岔(图489—4)。

均以粗壮、主枝圆、顶端丰满、质嫩毛细、皮色红棕、有油润光泽者为佳。

③马鹿茸锯茸 与花鹿茸近似，但较粗大，分枝较多，侧枝一个者习称“单门”，2个者习称“莲花”，3个者习称“三岔”，4个者习称“四岔”或更多。

东马鹿茸 主枝长25～27cm，直径约3cm。外皮灰黑色，茸毛灰褐色或灰黄色，下部有纵棱(图489—5)。

西马鹿茸 主枝长30～100cm，表面有棱，多扭缩干瘪，分枝较长且弯曲，茸毛粗长，灰色或黑灰色，锯口色较深，常见骨质。稍有腥气，味微咸。

以饱满、体轻、毛色灰褐、下部无棱线者为佳。

(2)饮片 ①花鹿茸片 中上部习称“血片”、“蚱片”。为圆形薄片，表面浅棕色或浅黄白色，半透明，微显光泽，外皮无骨质，周边粗糙，红棕色或棕色，质坚韧。气微腥，味微咸(图489—6)。

下部习称“老角片”。为圆形或类圆形厚片，表面粉白色或浅白色，中间有蜂窝状细孔，外皮无骨质或略具骨质，周边粗糙，红棕色或棕色，质坚脆。气微腥，味微咸(图489—7)。

②马鹿茸片 血片、蚱片为圆形薄片，表面灰黑色，中央米黄色，半透明，微显光泽，外皮较厚无骨质，周边灰黑色，质坚韧，气微腥，味微咸。血片(图489—8)，血、蚱片(图489—9)。

粉片、老角片为圆形或类圆形厚片，表面灰黑色，中央米黄色，有细蜂窝状小孔，外皮较厚，无骨质或略具骨质，周边灰黑色，质坚脆。气微腥，味微咸。老角片(图489—10)。

③花鹿茸粉 为灰白色或米黄色粉末，气微腥，味微咸(图489—11)。

【功效】 味甘、咸，性温。壮肾阳，益精血，强筋骨，调冲任，托疮毒。

489—5



489—6



489—7



489—8



489—11

489—10

489—9

490. 鹿　筋

Lujin　　Ligamentum Cervi

ロクキン　　Deer Sinew

【来源】 本品为鹿科动物梅花鹿 *Cervus nippon* Temminck 或马鹿 *Cervus elaphus* L. 干燥的四肢筋。

【产地加工】 全年均可采收，宰鹿时，取鹿的四肢，抽出足筋，保留蹄部，阴干。

【炮制】 取原药材，斩去蹄甲后，用湿水略洗，置炭火上烘软，切成小段。

【性状】 (1)药材　呈细长条状，表面金黄或棕黄色，有光泽而透明。长 45～65cm，粗 1.5～2.0cm。上部带肉质，下部有半圆形黑色蹄甲 2 个，亦有带 4 个小块蹄骨者，蹄甲处略带皮，有棕色或浅棕色短毛。质坚韧，气微腥(图 490—1)。

以身干、条长、粗大、金黄色有光泽者为佳。

(2)饮片　鹿筋段　棕黄，半透明，有光泽(图 490—2)。

【功效】 味淡、微咸，性温。壮筋骨。

491. 鹿　鞭

Lubian　　Penis et Testis Cervi

ロクベン　　Testes and Penis of Deer

【来源】 本品为鹿科动物梅花鹿 *Cervus nippon* Temminck 或马鹿 *Cervus elaphus* L. 雄性的干燥阴茎和睾丸。

【产地加工】 四季均可采收，宰鹿后，割取阴茎及睾丸，除净残肉及油脂，用凉水润软，拉直，固定于木板上，干燥。

【炮制】 (1)鹿鞭片　将鹿鞭洗净，温水浸润，切片晒干或烘干，称“鹿鞭片”。

(2)鹿鞭粉　将鹿鞭片入炒热的砂子中，炒至松泡，取出碾粉，称“鹿鞭粉”。

【性状】 药材　①梅花鹿鞭　阴茎部分为长条形，略扁，有纵行沟纹，长 15～45cm，直径 1～2cm，顶部微尖，常带黄色或灰黄色毛，基部有睾丸 2 枚，呈椭圆形，干枯，阴茎及睾丸外表均呈棕褐色。气腥，味咸(图 491—1)。

②马鹿鞭　长 45～60cm，直径 2.0～2.5cm，顶部钝圆，近顶部下端稍膨大，其他同梅花鹿鞭(图 491－2)。

【功效】 味甘、咸，性温。补肾，壮阳，益精。

490—1

490—2

491—1

491—2

492. 麻　黄

Mahuang　Herba Ephedrae

マオウ　Ephedra

【来源】 本品为麻黄科植物草麻黄 *Ephedra sinica* Stapf.、中麻黄 *Ephedra intermedia* Schrenk et C. A. Mey. 或木贼麻黄 *Ephedra equisetina* Bga. 的干燥草质茎。

【产地加工】 秋季采割绿色草质茎，置通风处晾干或晾至 6 成干时，再晒干。

【炮制】 (1)麻黄段　取原药材，除去杂质，洗净，稍润，切段，晒干。

(2)蜜麻黄　取用适量开水稀释后的炼蜜，与麻黄段拌匀，闷透，置锅内，用文火炒至不粘手，取出放凉，称“蜜麻黄”。

(3)麻黄绒　取麻黄段，碾成绒状，筛去细粉，称“麻黄绒”。

(4)蜜麻黄绒　取用适量开水稀释后的炼蜜，与麻黄绒拌匀，闷透，置锅内用文火炒至深黄色，不粘手，取出放凉，称“蜜麻黄绒”。

【性状】 (1)药材　①草麻黄　呈细长圆柱形，少分枝；长短不一，直径 0.1～0.2cm。有的带少量木质茎。表面淡绿色至黄绿色，有细纵棱线，触之有粗糙感。节明显，节间长 2～6cm。节上有膜质鳞叶，长 3～4mm；裂片 2(3)，锐三角形，先端反曲，上部灰白色，下部棕色，联合成筒状。体轻，质脆，易折断，折断时有粉尘飞出，断面略呈纤维状，外层绿黄色，髓部红棕色，髓近圆形。气微香，味涩、微苦(图 492－1)。

②中麻黄　多分枝，直径 0.15～0.30cm，具纵棱线 18～20 条，触之有粗糙感。节间长 2～6cm。膜质鳞叶长 2～3mm。裂片 3(2)，上部约 1/3 分离，尖端锐尖，不反曲。断面髓部呈三角状圆形。气微香，味涩、微苦(图 492—2)。

③木贼麻黄　分枝较多，直径 0.1～0.2cm，棱线 13～14 条，触之无粗糙感。节间长 1.5～3.0cm。膜质鳞叶长 0.1～0.2cm；裂片 2(3)，上部约 1/4 分离，呈短三角形，灰白色，尖端多不反曲，基部棕红色至棕黑色。气微香，味涩、微苦(图 492—3)。

均以身干、茎粗、淡绿色、内心充实、味苦涩者为佳。

(2)饮片　①麻黄段　呈细圆柱形小段，长 1～2cm，直径 0.1～0.2cm。表面黄绿色，多粗糙，有细纵棱线。节明显，节上有细小膜质鳞叶。切面外层绿黄色，髓部红棕色，粉性。质脆，易折断。气微香，味涩、微苦(图 492—4)。

②蜜麻黄　形如麻黄段，表面黄绿色，微显光泽。有蜜香气，味甜、微涩、苦(图 492—5)。

③麻黄绒　呈黄绿色松散的绒状，气微香，味微涩、微苦。

④蜜麻黄绒　呈松散粘结的纤维绒状，深黄色。有蜜香气，味甜、后微苦、微涩。

【功效】 味辛、微苦，性温。发汗散寒，宣肺平喘，利水消肿。蜜麻黄润肺止咳。麻黄绒宣肺平喘。

附：麻黄段(日本加工品)

为长短不等的圆柱状小段，最长达 1.5cm，直径 0.1～0.15cm。黄绿色或绿黄色，表面棱线明显。质脆，易折断，断面稍整齐，折断时皮部易和木部撕离，断面周围黄绿色，中心红棕色，节棕红色，常可见有灰白色的膜质小鳞片，鳞片三角形，先端反卷，2 枚对生。具草腥气，嚼之麻舌及唇稍辣(图 492－6)。

492—2



492—6

492—4

492—5

492—3

493. 羚羊角

Lingyangjiao Cornu Saigae Tataricae

レイヨウカク Antelope's Horn

【来源】 本品为牛科动物赛加羚羊 *Saiga tatarica* Linnaeus 雄羊的角。

【产地加工】 猎取后锯取其角，晒干。

【炮制】 (1)羚羊角 取原药材，除去骨塞，用温水浸润，镑或纵切薄片，晾干。或者锉碎，研成细粉，称"羚羊角粉"。

(2)制汁 临用时用陶器磨盘(特制)，加水 30～50ml，用力环磨至成乳汁，1 小时约得 0.75g。

【性状】 (1)药材 呈长圆锥形，略呈弓形弯曲，长 15～33cm，类白色或黄白色，基部稍呈青灰色。嫩枝透视有"血丝"或紫黑色斑纹，光润如玉，无裂纹，老枝则有细纵裂纹。除尖端部分外，有 10～16 个隆起环脊，间距约 2cm，用手握之，四指正好嵌入凹处。角的基部横截面圆形，直径 3～4cm，内有坚硬质重的角柱，习称"骨塞"，骨塞长约占全角的 1/2 或 1/3，表面有突起的纵棱与其外面角鞘内的凹沟紧密嵌合，从横断面观，其结合部呈锯齿状。除去"骨塞"后，角的下半段呈空洞状，全角半透明，对光透视，上半段中央有一条隐约可辨的细孔道直通角尖，习称"通天眼"。质坚硬。气无，味淡(图 493—1)。嫩枝(图 493—2)。

以质嫩、色白、光润、有血丝、无裂纹者为佳。

(2)饮片 ①羚羊角片 为纵向薄片，类白色或黄白色，表面光滑，半透明，有光泽。无臭，味淡(图 493—3、图 493—4)。

②羚羊角粉 为乳白色的细粉，无臭、味淡(图 493 -5)。

【功效】 味咸，性寒。平肝息风，清肝明目，散血解毒。

494. 蛤士蟆

Hashima Rana Temporaria Chensinensis

コウシマ Dried Chinese Forest Frog

【来源】 本品为蛙科动物中国林蛙 *Rana temporaria chensinensis* David 除去内脏的全体。

【产地加工】 于"白露"前后捕捉。捕得雄蛙后即剖腹去内脏洗净，挂起风干或晒干；若捕得雌蛙，先取出输卵管，再除去其他内脏，然后晒干。

【性状】 药材 干燥的蛤士蟆全身僵直，有紫褐色斑点，腹部黄白色，微带红色，腹中空虚，后肢腹面常呈淡红色。肉质干枯，体轻松，气腥(图 494)。

以体大、腹面色泽黄红、身干者为佳。

【功效】 味咸，性凉。养肺滋肾。

493—1

493—2

493—4

493—3

493—5

494

495. 蛤 仔

Gezi Concha Venerupis

ゴウシ Venerupis Shell

【来源】 本品为帘蛤科动物蛤仔 *Venerupis philippinarum* (Adams et Reeve) 的贝壳。

【产地加工】 四季均可捕捉，煮熟去肉，将贝壳收起，洗净，晒干，生用或煅用。

【炮制】 (1)蛤仔 取原药材，洗净，干燥，碾碎或碾粉，称“蛤仔”。

(2)煅蛤仔 取净蛤仔，置无烟炉火上或置适宜的容器内，煅至酥脆，取出放凉，打碎，称“煅蛤仔”。

【性状】 (1)药材 贝壳卵圆形，膨胀。壳顶先端尖，稍向前方弯曲，位于背缘的靠前方。贝壳前端边缘椭圆，后端边缘略呈截形。贝壳表面灰黄或灰白色，有的具带状花纹或斑点。壳面有细密的放射肋，与自壳顶同心排列的生长线交错形成布纹状。贝壳内面灰黄色，略带紫色(图 495－1)。

(2)饮片 煅蛤仔 呈灰白色碎块或粉状，质地疏脆，无臭，味微咸(图 495－2)。

【功效】 清热解毒，生肌敛疮。

496. 蛤 蚧

Gejie Gecko

ゴウカイ Tokay

【来源】 本品为壁虎科动物蛤蚧 *Gekko gecko* Linnaeus 的干燥体。

【产地加工】 全年均可捕捉，用铁器击其头部，使之昏死。剖腹后除去内脏，用布拭净腹腔血液(不可水洗)，以竹片从横面撑开，使全体呈扁平顺直，再用 1 条长竹撑着下腭至尾末，文火烘干，每 2 条捆扎成对即可。

【炮制】 (1)蛤蚧块 取原药材，除去鳞片及头爪，切成小块，称“蛤蚧块”。

(2)酒蛤蚧 取蛤蚧块，用酒浸润后，烘干，称“酒蛤蚧”(每蛤蚧 100kg，用黄酒 220kg)。

【性状】 (1)药材 呈扁片状，全长 20～30cm，头颈部及躯干长 9～18cm，尾长 6～12cm，腹背横宽 6～11cm。全体密被细鳞，头略呈扁三角形，两眼多凹陷呈窟窿状，无眼睑，口内有锯齿状细齿，生于颚的边缘，无大牙。背部灰黑色或银灰色，有类圆形紫褐色或灰绿突起的疣鳞，沿肋骨横向排列成行。脊椎骨及两侧肋骨突出，腹面浅灰色，散有粉红色斑点。4 足均具 5 趾，趾间具蹼，足趾底有吸盘，瓜短，呈钩状。尾渐细，微现骨节，颜色同背部，有 7 个明显的银灰色环带，质坚韧。气腥，味微咸(图 496－1)。

以体大、尾全、不破碎者为佳。

(2)饮片 蛤蚧块 ①为不规则的片状小块，表面灰黑色或银灰色，有黄棕色或灰棕色的斑点及鳞甲脱落之痕迹。切面黄白色或灰白色。脊椎骨及肋骨突起清晰。稍具腥气，味微咸(图 496－2)。

②酒蛤蚧 形如蛤蚧块，稍具酒气，味微咸(图 496－3)。

【功效】 味咸，性平。补肺益肾，纳气定喘，助阳益精。

495—1

495—2



496—1

496—2

496—3

497. 蛤蟆油

Hamayou　　Uviductus Ranae

コウマユ　　Dried Oviduct Fat of Chinese Forest Frog

【来源】 本品为蛙科动物中国林蛙 *Rana temporaria chensinensis* David 或黑龙江林蛙 *Rana amurensis* Boulenger 雌蛙的输卵管，经采制干燥而得。

【产地加工】 选肥大的雌蛙，用麻绳从口部穿过，挂于露天处风干，再用热水浸润，立即捞出，闷润一夜，次日剖开腹皮，取出输卵管，去净卵子及其内脏，置通风处阴干。

【炮制】 取原药材，除去杂质及卵子，剥去膜衣。

【性状】 药材　本品呈不规则块状，弯曲面重叠，长 1.5～2.0cm，厚 1.5～5.0cm。表面黄白色，呈脂肪样光泽，偶有带灰白色薄膜状干皮，摸之有滑腻感。在温水中浸泡体积可膨胀 10～15 倍。气腥，味微甜，嚼之有粘滑感（图 497）。

以块大、肥厚、黄白色、有光泽、无皮膜、无血筋及卵子者为佳。《中国药典》（1990 年版）规定：本品的膨胀度不得低于 55。

【功效】 味甘、咸，性平。补肾益精，养阴润肺。

498. 猴　枣

Houzao　　Calculus Gasteris Macacae

コウソウ　　Bezoar from Monkey

【来源】 本品为猴科动物猕猴 *Macaca mulatta* Zimmermann 等内脏的结石。

【产地加工】 全年均可采收，将捕获的病猴剖腹取出内脏的结石，漂净，晾干即得。

【炮制】 取原药材，打碎，拣去核，研极细用。

【性状】 药材　呈椭圆形，略似小枣，大小相差悬殊，大者如鸡卵，小者仅如黄豆，一般如莲子大。表面青铜色或绿黑色，平滑而有光泽。质硬而脆，击之易碎，断面灰黄色，有层次，可剥离，粗糙，灰绿色，无光泽，中央有核。气微香，味微苦、涩，嚼之有砂性（图 498）。

以个大、色深、有光泽、质脆、体轻者为佳。

【功效】 味苦、微咸，性寒。消痰镇惊，清热解毒。

499. 犀　角

Xijiao　　Cornu Rhinocerotis

サイカク　　Rhinoceros Horn

【来源】 本品为犀科动物大独角犀（印度犀）*Rhinoceros unicornis* L.、小独角犀（爪哇犀）*Rhinoceros sondaicus* (Desmarest)、双角犀（苏门答腊犀）*Rhinoceros sumatrensis* (Fischer) 的角。因二者均产于亚洲，故习称“亚洲犀角”，亦称“暹罗角”。

497



498

499—2

499—1

【产地加工】 捕杀后，割下犀角，剔除皮肉，晾干即可。

【炮制】 (1)犀角片 将原药材劈成指粗的长条瓣，用热水浸泡3～5小时，镑或刨成极薄片，干燥，习称“犀角片”。

(2)犀角粉 取原药材，用钢锉锉成粗末，再用乳钵研成极细粉，通称“犀角粉”。

【性状】 (1)药材 ①长角 呈圆锥形，顶端钝圆，稍向后弯曲，长10～33cm。表面乌黑或黑棕色。上部光滑且有细纵纹；中部有纵裂纹及坚硬刺手的疏毛，习称“钢毛”。角前部有一纵长凹沟，长9～15cm，深宽2～3cm，俗称“天沟”。底盘部长圆形，前窄后宽，长径约20cm，横径约14cm，形如龟背，俗称“龟背盘”，置平面上能坐平放稳。与“天沟”相对的底面上有长6～7cm，高1～2cm的脊状隆起，习称“地岗”。底面凹入3～6cm，习称“窝子”，其上布满细孔，习称“砂底”。底盘周边凹凸不平呈钝齿状，习称“马牙边”。

②短角 不具天沟、地岗。角质坚硬，可纵向劈开，劈时脆而易裂。纵剖面有明显的粗纵纹，形如粘合的猪鬃，纹理粗而清晰，无裂丝牵连。气微，沸水中微浸则有清香气，味微咸(图499－1)。小犀角(图499－2)。

以个大、角尖粗、乌黑光润显顺纹，中部少裂隙、沟及岗明显、底盘长圆形、内部灰黑色、布满鬃眼、纵剖面丝粗顺直者为佳。

(2)饮片 ①犀角片 为卷曲不平的极薄片，表面灰白色，有芝麻花点或短线纹。气微者清香而不腥，味稍咸(图499－3、图499－4)。

②犀角粉 为淡灰白色细粉，气微清香，味稍咸。

【功效】 味咸，性寒。凉血止血，清心安神，泻火解毒。

500. 槟 榔

Binglang　　Semen Arecae

ビンロウ　　Betel Nut

【来源】 本品为棕榈科植物槟榔 *Areca catechu* L. 的干燥成熟种子。

【产地加工】 春末至秋初采收成熟果实，用水煮后，除去果皮，取出种子，干燥。

【炮制】 (1)槟榔片 取原药材，除去杂质，浸泡，润透，切薄片，阴干，称“槟榔片”或通称“槟榔”。

(2)炒槟榔 取槟榔片，置锅内，用文火加热，炒至切面微黄色时，取出放凉，称“炒槟榔”。

(3)焦槟榔 取槟榔片置锅内，用文火加热，炒至切面呈焦黄色时，取出放凉，称“焦槟榔”。

【性状】 (1)药材 呈扁球形或圆锥形，高1.5～3.5cm，底部直径1.5～3.0cm。表面淡黄棕色或淡红棕色，具稍凹下的网状沟纹，底部中心有圆形凹陷的珠孔，其旁有一明显的疤痕状种脐。质坚硬，不易破碎，断面可见棕色种皮与白色胚乳相间的大理石样花纹。气微，味涩、微苦(图500－1)。

以个大、体重、质坚、断面色鲜艳者为佳。

(2)饮片 ①槟榔片 为圆形或类圆形薄片，直径1.5～3.0cm。切面呈棕、白色相间的大理石样花纹；周边淡黄棕色或淡红棕色，偶可见有圆形凹陷珠孔的果实底部切片。质坚脆，易碎。气微，味涩、微苦(图500－2)。出口片(图500－3)。

②炒槟榔 形如槟榔，切面微黄色或紫棕色，偶见焦黄斑块。质脆。气微香，味涩、微苦(图500－4)。

499—3



499—4

500—1



500—2

③焦槟榔　形如槟榔，切面焦黄色至焦褐色。质脆酥。气微，味涩、略苦（图500－5）。

【功效】 味苦、辛，性温。杀虫消积，降气，行水，截疟。炒槟榔杀虫力小，长于消导和胃；焦槟榔偏于消食导滞。

附：印尼槟榔（图500－6）。

500—3

500—4

500—5

500—6

附录

中药材的采收、产地加工与炮制

1. **采收**

中药材主要来源于天然的植物、动物和矿物。中药材的采收是否适宜，直接影响到药材质量。不合理的采收方式，还会严重损害药材资源。古代医家十分重视对药材的采收，元代王好古引《用药法象》中指出："凡诸草木昆虫，产之有地，根叶花实，采之有时，失其地则性味少异，失其时则性味不全"。可见历代医药家在这方面积累了许多宝贵的知识和经验。

现代研究表明，中药的品质好坏，决定其有效成分的含量，有效成分的含量不同，药效的强弱差异较大。有效成分的含量高低除受产地影响外，与采收时间和方法有着十分密切的关系。药材的采收，应该在有效成分含量最高的时候进行。目前，绝大多数常用中药有效成分在体内的消长规律还不清楚，通常只以入药部位的成熟程度和化学成分在动、植物体内的一般消长规律作为采收的依据。每种类中药材都有一定的采收季节以及方法。一般原则如下：

(1)植物药类　由于药用部位不同，采收时间也不同。

①根及根茎类　根及根茎类药材，多数需要生长2～5年后才能供药用。一般多在早春、深秋及冬季植物地上部分将枯萎、枯萎及春初发芽前或刚露苗时采收。因为，此时根和根茎中贮藏的营养物质丰富。一般地说，其有效成分的含量也相应地比较高，如防风、葛根、天麻、大黄等。此外，少数药材如太子参、半夏等则应在夏季采收，因为它们植株枯萎的时间较早；延胡索宜在谷雨和立夏之间采挖。总之，根和根茎类中药宜在植物地上部分生长停止、花叶凋谢的休眠期或春季发芽前期采集。

一般均采用挖掘法采收，但要注意保护药材的完整，还要注意避免损坏留种的根及根茎。

②茎、木类　一般在秋、冬2季采收，如与叶同用，则应在生长最旺盛时采收，如忍冬藤、大血藤等。也可结合树木采伐时采收，如松节等。

③皮类　通常在春季和夏初时采收，此时树皮内养料丰富，浆汁充足，并容易剥离，如杜仲、黄柏等。另有某些根皮则以秋后采取为宜，如牡丹皮、地骨皮。有些因木材而得树皮的药材如椿根皮等，则依其树木的采伐时间，当树木砍断后，即挖根取皮。

皮类药材多为木本植物的干皮或根皮，一般均须生长多年后才可采收入药，有的要生长10～20年才能开始采收，如杜仲。

采收皮类药材的方法各有不同，干皮一般在树干上以刀横划一不完整的环切口，再在其上一定距离另划1环切口，在二环切口间再纵切而取皮。但要注意不能将树干的整个1圈树皮全部剥下，这样，由于破坏了茎干的输导系统，会导致树木死亡。根皮可以锤后剥取。

④叶类　通常在花蕾将开放或花盛开时采收，此时植物生长茂盛，性味完全，药力雄厚，如大青叶、紫苏叶等。个别经冬不凋的耐寒植物，或药用特殊者，则须在秋、冬采集，如桑叶、功劳叶等。

在采集贵重的叶时，需用手摘取，一般者可连枝折下或连根拔起，晒干后再打下叶片。用落叶者可在秋季落叶后收集。

⑤花类　一般在花含苞待放或花初开时采收。这时的花水分少、香气足，如金银花、辛夷等。有的则需要在花朵开放后采摘，如菊花、洋金花等。有极少数完全是未开放的花蕾，如丁香、槐米等。

花类的采集宜选择晴天，上午露水初干时进行，多数用手摘花，由于花朵次第开放，可分次进行。极少数将植株割取后，干燥，摘取花。

⑥果实类　一般在果实已经成熟或近成熟时采收。少数药材在未成熟时采收，如青皮、枳实等。

多汁的浆果易于腐烂，宜及时采收。某些干果和蒴果成熟后容易散落或开裂，应在成熟前及时采收。

⑦种子类 在完全成熟后采收。一般先收取果实，干后，打碎，收取种子。

⑧全草类 多在植物充分生长，茎叶茂盛或在开花时采收。有的在初春采其嫩苗，如茵陈。采收时割取地上部分、带花枝梢或全株拔起。

(2)动物药类 其采收因药材的种类而异。

①昆虫类 必须掌握季节，因昆虫的孵化发育皆有定时，如桑螵蛸(卵鞘入药)应在三月中旬前采收，过时就已孵化；以成虫入药的，可在活动期或刚开始活动期捕捉；有翅的昆虫多在早晨露水未干时捕捉，因其栖息于植物上，此时不易起飞，很容易捕捉，如斑蝥。

②两栖动物类 于秋末当其进入"冬眠期"时捕捉，如蛤士蟆。

③生理产物和病理产物 注意在捕捉后或在屠宰场采收。

其他习因物而异，如鹿茸需在清明后45～60天(5月中旬到7月上旬)锯取，过时则骨化。

(3)矿物药类 随时可采收，也可结合开采矿物进行。

2. 产地加工

药材采收后，一般都必须进行加工处理，这不但是保证药材质量的重要一环，也是药材贮存前的重要处理措施。因药材的种类繁多，且各产地的习惯不同，其加工方法亦有差异。常采用的方法如下：

(1)一般处理 包括洗净泥土、除去残杂物和非药用部位等。如沙参、桔梗等需削去外皮；百部应置沸水中浸润；太子参应置沸水中泡至无"白心"为度；姜黄、莪术宜采后蒸煮；关黄柏应削去栓皮；厚朴应热闷发汗；叶类药材宜捆扎成一定规格。有些药材采收后需直接切片，如地榆、枳壳等。

(2)干燥 药材经过一般处理后，应及时干燥，干燥的方法根据药材的性质不同，有晒干、阴干、烘干和冷冻干燥等方法。

①晒干 即将药材摊放在阳光下晒，使其干燥。此法主要适用于根及根茎、皮类、种子类等药材。但含挥发油、受光照射后易变色，晒后易暴裂的药材不宜用此法，如丁香、厚朴、大黄、郁金等。

②阴干 即将药材放在阴凉通风干燥处，避免阳光直晒，使之逐渐干燥。此法主要适应于花类、全草、叶类、具有芳香气味的各类药材、动物药和不宜日晒的药材。

③烘干 即将药材放在加温干燥室内或烘箱中干燥。此法适用干燥各类药材，不受天气变化的影响，尤其适用于浆果类、动物脏器类药材。采用烘干法干燥药材时，要根据药材的性质调节温度，以防止破坏药材中的有效成分。

④冷冻干燥 即将药材放在冷冻干燥室内或冷冻干燥箱中干燥。此法适用于各类药材，对于保证药材的质量效果最佳，但造价较高。

此外，对一些含水份少、体积小、易变色的贵重药材，亦可使石灰干燥器干燥。

一般药材干燥至含水量在8%左右即可，少数药材可根据规定进行。干燥后的药材必要时应置密闭的容器中保存，以防吸潮。

3. 炮制

中药炮制是根据中医中药理论，按照医疗、调配、制剂的不同要求，以及药材的自身性质，所采取的一项专门的制药技术，又称"炮炙"。中药材中绝大部分必须经过特定的炮制处理，才能符合治疗需要。炮制是否得当直接影响到临床疗效，对少数毒性药和烈性药来说，合理炮制，更是确保用药安全的重要措施。

(1)炮制的目的 炮制的目的是多方面的，通常一种炮制方法或者炮制一种药物同时具有几方面的目的，这些虽有主次之分，但彼此之间又有密切的联系。炮制的主要目的可以归纳为以下几点：

①降低或消除药物的毒性或副作用 有的药物虽有较好的疗效，但因毒性或副作用太大，临床应用不安全，需通过炮制降低其毒性或副作用，使服用后不致产生不良反应。如大戟醋制后，能使其毒性大大降低；常山用酒炒后，可减轻其催吐的副作用。

②改变或缓和药性，使之更能适合病情的需要 不同的药物，各有其性能，性味偏盛的药物在临床应用上会带来副作用。如太寒伤阳，太热伤阴，过酸损齿伤筋，过苦伤胃耗液等。为了适应不同的病情和体质的需要，可经过炮制，以改变其性能。如地黄生用味甘性寒，滋阴凉血，若制熟则性转

微温而以补血见长；麻黄生用辛散解表作用较强，蜜制后辛散作用缓和，止咳平喘作用增强；生姜煨熟后则其发散力减缓，而温中之效增强；生蒲黄行血破瘀，炒炭后偏于止血。

③提高疗效　中药除了通过配伍提高其疗效外，亦可通过炮制去提高疗效。如蜜炙款冬花，可增强其润肺止咳的作用；羊脂炙淫羊藿，可增强其治疗阳萎的效能。

④改变或增强药物作用的部位和趋向　中医对药物作用的趋向通常以升、降、浮、沉来表示。通过炮制可引药入经，改变作用部位及趋向。如大黄本为下焦药，酒制后能在上焦产生清降火邪的作用；柴胡、香附醋制后有助于引药入肝，更有效地治疗肝经疾病；小茴香、橘核等经盐制后，有助于引药入肾，能更好地发挥治疗肾经疾病的作用。

⑤便于调剂和制剂　某些植物药经过加工处理后切成段、丝、片、块等饮片，可以分剂量及配方，便于制剂及调配；矿物及介壳类药物，质地坚硬，很难粉碎，不便制剂和调剂，在短的时间内也不容易把有效成分煎煮出来，因此，必须经过炮制。如自然铜、穿山甲、牡蛎等。

⑥保证药物净度　除去杂质和非药用部分，使药物纯净，才能用量准确或利于服用。如一般植物药的根和根茎常留有残茎，皮类带有粗皮，动物药类的头、足等，均应除尽。

⑦利于贮藏　药材经过加工热处理可以进一步干燥或杀死虫卵，有利于贮藏。有些含有酶类成分的药物，经加热处理，能使其中与酶共存的酶失去活性，可以久藏而不变质。

⑧有利于服用　某些动物类或其他具有特殊臭味的药，往往在服用时易引起呕恶等反应，为了利用服用，常将这些药材采用酒炙、蜜炙、醋炙、麸炒、水漂、炒黄等法处理，以达到矫味矫臭的目的。

(2)炮制的方法　一般根据操作工序，分为修制和炮炙2大类。

①修制　即净选加工和切制。药材在炮炙、调配或制剂前，均应选取规定的药用部位，除去非药用部分、杂质、霉变品、虫蛀品或灰屑等，有的需切制成一定规格的片、段、块、丝等。经过修制处理后的药材通称为“净药材”。

[净制]　即根据药材的特点不同，选用挑、筛、洗、刷、剪、刮、劈、搕、碾、燎等简单加工方法以除去杂质和非药用部位，使药材清洁纯净和便于进一步加工炮制。

挑选：分离不同药用部分和杂质，或将药材按大小、粗细等要求分等。

筛选：选用适宜大小孔径的筛，除去药材中的异物；亦可用于果实或种子类药材的分等。

风选：根据药材与杂质的重量不同，利用风力使其分开。

淘洗：利用清水荡洗去药材表面附着的泥土或杂质。洗时勿使药材在水中浸泡过久。

浸漂：将药材置入较多量的水中浸泡或翻动，多换水以漂去药材某些毒质或盐分。

刷：利用刷子除去药材表面的绒毛或杂质。

刮：利用刮刀除去药材表面的粗皮或杂质。

剪：利用剪刀除去残留的非药用部位。

去油：取净药材碾碎如泥状，经加热后，除去部分油脂，制成符合一定要求的松散粉末。

燎：取药材在火焰上短时间灼烧，使其表面或毛茸、毛须等迅速受热焦化而内部不受影响。

压碾：碾去药材外附的非药用部位，或将药材碾成粗粒。

水飞：系取规定处理后的矿物或贝壳药材，用适量水共研细，再加多量的水，搅拌，倾出混悬液，下沉部分再按上法反复操作数次，除去杂质。合并混悬液，静置后，分取沉淀，干燥，研散。

[切制]　将经过净选的药材，进行软化处理后，按其质地软硬和个体大小、厚薄等不同，切制成一定规格的片型。

切片分手工切与机器切2种。手工切是将浸、润透的药材用药刀切成不同规格的饮片。机器切常采用圆盘式切药机、多刀式切药机和刨片机等。药材切成饮片后，必须及时进行干燥。切制方法如下：

软化、浸润：取药材于清水中短时浸泡，使其柔润软化。制作时先将药材按大小、粗细、软硬等分等处理。浸润时以少泡多润为原则，并注意气温、水量、时间，防止霉变。

取药材用清水稍浸湿或喷淋清水后，置适宜的容器内，保持湿润状态，使水分渗入药材内部而达到软化。

切片：根据最后成品的不同情况，切制类型可分为下列几种。

片，极薄片，厚 1mm 以下，薄片厚 1～2mm；厚片厚 2～4mm。传统的切片有顶头片，即横切的片子，又称为横片；排骨片，即切成长方形的片子，一般是先切成长段，再纵切成薄片；马蹄片，又称斜片，即切成斜形的片子，介于顶头片与排骨片之间；镑片或刨片，是镑或用刨子将木类或角类药材制成极薄片。

段，为长 10～15mm 的小段，亦称咀子。

块，为边长 8～12mm 的立方块，亦称丁子。

丝，又称丝状片，常横切成狭长的条子，适用于叶类和皮类药材，亦称其为顶头片的 1 种。皮类饮片丝宽为 2～3mm；叶类饮片丝宽为 5～10mm。

碾碎块　为大小不等砸碎的小块，用于不能切片的种子、果实、矿石、贝壳等药材。

干燥：饮片干燥温度，除另有规定外，一般不超过 80℃，含挥发油者不超过 60℃。含水量 10%～12%。其干燥方法按下面规则进行或标注。

凡烘干、晒干、阴干都可以并不影响质量的用“干燥”。

不宜用较高温度烘干的用“晒干”或“低温干燥”(不超过 60℃)。

烘干、晒干均不适宜的用“阴干”或“晾干”。

需要短时间内干燥的用“曝晒”或“及时干燥”。

[炮炙]　可分为火制和水火共制。

火制：常用有如下方法：

炒　炒制分清炒和加辅料炒。炒时应火力均匀并不断翻动，注意掌握加热温度、炒制时间和程度的要求。

清炒，根据药物受热程度不同，又分为炒黄、炒焦、炒炭 3 种。炒黄、炒焦使药材易于粉碎加工，并缓和药性；炒炭能缓和药物的烈性、副作用或增强其收敛止血的功效。

炒黄，是将药材用文火炒至表面微黄，或发泡鼓起，或种皮爆裂，并能嗅到药材固有的气味，取出，放凉。炒黄的药材多为果实种子类，故有“逢子必炒”之说。

炒焦，将药材用文火或中火炒至表面焦黄或焦褐色，并透出焦香气，取出，放凉。炒焦的药材多有健脾消导的功效，并有“焦香可以醒脾健胃”之说。

炒炭，将药材用中火或武火炒至表面呈焦黑色，内部为焦黄色或焦褐色，并喷洒清水适量，灭尽火星，晾干。中药炒炭后虽大部分炭化，但仍保留药物固有的性味，并不同程度地保存了原有的化学成分，即“炒炭存性”之意。

加辅料炒，主要有土炒、麸炒、米炒和盐炒等，此种制法可减少药物的刺激性，增强疗效。

土炒，取灶心土细粉，置锅内用中火翻炒至土呈疏松状态时，加入净药材或生片，翻炒置药材表面显土色，并透出药材固有香气时，取出，筛去土，放凉。药材经土炒能增强和中安胃、止呕止泻的功用，还能减少对胃肠道的刺激性。

麸炒，将蜜炙麸皮或清麸皮撒入锅内，待麸皮冒烟时投入净药材，迅速翻动，炒至药材表面呈黄色或微黄色时，取出，筛去麸皮，放凉。麸炒常用于有补益脾胃作用或有腥气的药材。药材经麸皮炒后可起增强药效、缓和药性、矫味矫臭的作用。麦麸受热能产生甘芳焦香气味，随同浓烟而炒黄药物，合药物气变焦香而增强健脾效用。《本草蒙筌》中有“麦麸皮制抑酷性勿伤上漏”的记载。

米炒，将定量大米和净药材，撒入加热的炒药锅内，轻翻炒至药材变黄，米焦黄为度，取出，放凉，筛去米。药材经米炒能加强补中益气功能或降低毒性。米炒多用于某些昆虫类毒性药物和某些补益脾胃药物。

盐炒，即用普通食盐拌炒药材。常用于炒牛膝，1kg 药材用食盐 200g。

烫　取净药材或生片置于加热的净砂子、蛤粉、滑石粉中拌炒至药材表面鼓起或酥脆为度。烫的操作方法与炒法基本相同，但温度比炒法高，药物经烫后可使质地酥脆，便于粉碎和煎煮，也可降低毒性。烫法分砂烫、滑石粉烫、蛤粉烫等。

砂烫，将粗细均匀的净砂置锅内，用武火炒至疏松而易翻动时投入药材，翻烫至药材酥脆而鼓

起，或外表呈黄色时取出，筛去砂，放凉。亦有的烫后趁热投入醋液中稍浸，捞出，干燥。本法适用于部分质地坚硬的药材。

滑石粉烫，将滑石粉置锅内用文火加热，至滑石粉呈灵活状态时投入药材，翻烫至药材鼓起，酥脆时取出，筛去滑石粉，放凉。

蛤粉烫，将蛤粉置锅内用文火加热，至蛤粉呈灵活状态时投入药材，翻烫至药材鼓起、泡酥时取出，筛去蛤粉，放凉。

炙　是将药材与液体辅料拌炒使辅料渗入药材组织内部，以改变药性，增强疗效或减少副作用。炙法与炒法在操作方法上基本相同，所不同的是炒法用固体辅料，而炙法用液体辅料。炙法因所用的辅料不同，又分为蜜炙、酒炙、醋炙、姜汁炙、盐水炙等。

蜜炙，先将炼熟的蜂蜜，习称“炼蜜”，加适量的开水稀释后，加入净药材拌匀，闷润至蜜被吸尽后，置锅内用文火炒至药材表面呈老黄色，且不粘手时取出，放凉。亦可将稀释后的炼蜜加热至沸后投入药材，用文火炒至表面呈老黄色，不粘手时取出，放凉。本法多用于补中益气、润肺止咳的药物。蜜的用量，除另有规定外，每净药材 100kg，用炼蜜 25kg。

酒炙，取净药材或生片，加黄酒拌匀，闷润至酒被吸尽后，置锅内用文火炒至表面呈微黄色或色泽加深，取出，放凉。除另有规定外，每净药材 100kg，用黄酒 10kg。药材酒炙后可起缓和药性、增强疗效、矫臭解腥的作用。

盐水炙，先将食盐加适量清水溶解后，过滤。取净药材或生片，置锅内用文火炒至药材表面呈黄色或焦黄色，取出，放凉。除另有规定外，每净药材 100kg，用食盐 2kg。盐炙多用于补肾、泻相火、治疝、利尿的药材，中医有“盐制走肾而下行”之说。

醋炙，取净药材或生片，加醋拌匀，闷润至醋被吸尽后，置锅内用文火炒至药材表面干燥、微焦，取出，放凉。树脂类和动物粪便类药材如乳香等，则须先炒至药材表面发亮时再喷醋，炒至微干，出锅后需继续翻炒至凉，避免粘结成块。除另有规定外，每净药材 100kg，用米醋 20kg。醋制后可引药入肝，增强活血止痛作用，中医有“醋制注肝而止痛”之说。

姜汁炙，应先将生姜捣烂，加水适量，压榨取汁，姜汁再加水适量，重复压榨 1 次，合并汁液，即为姜汁。如用干姜，捣碎后加水煎煮 2 次，取汁。

取净药材或生片，加姜汁拌匀，润至姜汁被吸尽后，置锅内用文火炒至药材表面呈黄色，取出，放凉。除另有规定外，每净药材 100kg，用生姜 10kg 或干姜 3kg。姜汁炙多用于祛痰止咳、降逆止呕的药材。

羊脂炙，先取羊脂于锅中加热熔化，加入净药材共炒至油吸尽为度，取出，放凉。

油炙，通常用麻油，也可用豆油。将上述食用植物油于锅中加热至沸后，加净药材置沸油中炸至酥黄。取出药材沥尽油，再用纸将油吸干即得。

米泔水制，取净药材或生片与米泔水拌匀，稍闷后，置炒药锅内用文火加热，炒至表面显微黄色为度。

煅　将药物小块用猛火直接或间接煅烧，即用高温（一般在 700℃）加热处理药材的方法。煅制可改变药性、增强药效、使药材质地松脆便于粉碎与煎煮以及减少副作用等。煅法适用于矿物类、贝壳类及质地轻松而煅炭的药材。根据药材的性质，煅法分下列几种：

明煅法，取净药材，砸成小块，直接放在无烟炉火上或置适宜的容器内煅至酥脆红透，取出，放凉后粉碎。含有结晶水的盐类药材，不要求煅红，但须使结晶水完全蒸发或形成全部呈蜂窝状的固体块。

煅淬法，将药材按明煅法煅至红透时，立即投入规定的液体辅料中，淬酥（如不符合标准，可反复煅淬至酥），取出，干燥，打碎或碾粉。

闷煅法，将药材置锅内，上盖一较小的锅，两锅接口处用湿纸条粘紧，再用盐黄泥密封，上压一重物，然后置炉火上先文火后武火煅透，停火，待完全冷却后，取出。闷煅是在高温缺氧条件下煅烧成炭的一种方法，亦称煅炭。

煅制药材亦有按使用的工具不同分为铁锅煅、铁锅闷煅、坩锅煅、灰火闷煅、炉火闷煅、直火煅

等，根据药材的性质不同选用。

煨：将净药材或生片用湿面粉或湿纸包裹，或将药材与吸油纸均匀地隔层分放，埋在火灰内或置文火上烘烤，以纸或面糊的表面焦黑为度，冷却后剥除纸或面糊即得。此法利用纸或面糊除去药材中部分挥发性及刺激性成分，可达缓和药性，减少副作用的目的。

水火共制：即将药材通过水、火共同处理的方法。主要有下列几种：

煮：取净药材，投入清水或液体辅料中共煮，煮至液体完全吸尽或切开无白心为度。煮可降低药物的毒性和副作用。辅料煮时，辅料的用量同蒸项下。

蒸：将药材洗净润透或与辅料拌匀，置适宜的容器内，利用水蒸汽或隔水加热药物，蒸至所需程度，取出。有些药材需经反复蒸、晒，才能获得适合医疗需要的作用。蒸可改变药性，减少副作用，易于切片和贮存。加辅料蒸有酒蒸、醋蒸、盐水蒸等。酒蒸每净药材 100kg，种子类用黄酒 20kg；根及根茎类用黄酒 30kg。醋蒸每净药材 100kg，用米醋 20kg，必要时加适量水稀释。盐水蒸每净药材 100kg，用食盐 2kg。

此外，尚有豆腐制，即取净药材，置规定量豆腐中，然后蒸制（亦可煮制）。

炖：取净药材或生片，按照规定的数量加入流体辅料，置炖药罐内或适宜的容器内，密闭，加热炖透或至辅料完全吸尽时，取出干燥。常用的为酒炖法，黄酒的用量与蒸法同。

焯：将药物投入沸水中短暂滚过，捞出。常用于种子类药材的去皮和肉质多汁药材的干燥处理。一般将种子类药材投入沸水中，翻动至外皮由皱缩至舒展，能搓去种皮时捞起，放冷水中浸泡，除去种皮，干燥。

［其他制法］ 常用的有发芽法、发酵法、制霜法、提净法、染衣法、复制法、法制法、腌制法、胆汁制等。

发芽：即在适宜的温度下，将某些种子类药材湿润后，使其发芽。发芽可增强药材的健脾和胃、助消化、解表邪等作用。如谷芽、麦芽等。

发酵：将药材在一定温度和湿度条件下，利用霉菌的作用，使其发酵。发酵可以改变药物原有的性能，并可产生新的疗效。能加强药物健脾胃、助消化、散风寒等作用。如曲类，按配方，将药材分别或混合研成粉末（略粗），用面粉调糊做粘合剂，制成小方块，然后按上法发酵，即得，常见的有神曲、半夏曲等。另有在制造过程中，不用面粉，而利用五倍子粗粉等药材发酵制得，如百药煎。

制霜：药材通过去油制成松散粉末或析出细小结晶的方法称为制霜。

去油制霜，将含油脂的药材，通过压榨、加热压榨或乙醚回流提取除去部分油脂，常需几次反复操作，至无油为度，所得粉末为之"霜"。去油可降低药材的毒性和副作用，缓和其峻泻作用或减少滑肠之弊。

析出结晶成霜，如西瓜霜，即西瓜与芒硝经加工而由西瓜皮外渗出的白色粉霜。

提净：药材通过重结晶处理除去杂质的方法称为提净。常将药材置规定的热溶剂中溶解，过滤，静置，冷却后析出晶体；或将其热溶剂浓缩，随时捞出晶体。如玄明粉、硇砂等。

染衣：在药材的外表，拌上另一种药粉，以加强其作用。如朱砂拌茯神，青黛拌灯心草等。

复制：将药材加入不同辅料，按操作程序反复炮制的方法称为复制。复制能降低药物的毒性和副作用，并能改变药效。

法制：用多种配料来制一种药材，以改变其药性。如法半夏等。

腌制：将药材与姜（或其他辅料）共在缸中腌渍，在放时应层层相间排列。在腌时一般有一段时间中不换水，为了防腐，可加矾同腌。腌制一定的时期后再加工。

胆汁制：利用胆汁来降低药材的毒性，并增加其他性能。如胆南星。

中文名索引

一画

一叶萩 …… (14)
一叶萩片 …… (14)
一叶萩段 …… (14)
一枝黄花 …… (14)
一枝蒿 …… (16)

二画

[一]

丁公藤 …… (16)
丁字柄 …… (18)
丁香 …… (18)

[丿]

八仙花 …… (18)
八角茴香 …… (20)
人中白 …… (20)
人工朱砂 …… (224)
人参 …… (22,28,30)
人参叶 …… (28)
人参芦 …… (28)
人参须 …… (30)
儿茶 …… (30)
九香虫 …… (32)
九斑刺鲀 …… (284)

[ㄱ]

刁海龙 …… (464)
刀豆 …… (32)
了哥王 …… (34)

三画

[一]

三七 …… (34)
三分三 …… (36)
三花龙胆 …… (158)
三角叶黄连 …… (492)
三角帆蚌 …… (376,378)
三星龙虱 …… (156)
三脉紫菀 …… (250)
三疣梭子蟹 …… (36)
三裂叶蛇葡萄 …… (136)
三棱 …… (38)
三斑海马 …… (460)
干地黄 …… (204)
干芦根 …… (270)
干姜 …… (38)
干蟾 …… (40)
土大黄 …… (40)
土大黄片 …… (40)
土木香 …… (42)
土牛膝 …… (42)
土炒山药 …… (60)
土荆皮 …… (44)
土茯苓 …… (44)
土党参 …… (46)
土党参片 …… (46)
土鳖虫 …… (46)
大丁草 …… (48)
大丁草段 …… (48)
大刀螂 …… (480)
大三叶升麻 …… (114)
大片干实 …… (382)
大叶冬青 …… (318)
大头典竹 …… (222)
大耳刺猬 …… (316)
大竹蛏 …… (82)
大血藤 …… (48)
大血藤片 …… (48)
大花金钱豹 …… (46)
大花栀子 …… (128)
大良姜 …… (50)
大果榆 …… (260)
大金牛草 …… (344)
大金头蝇 …… (102)
大枣 …… (50)
大独角犀 …… (526)
大高良姜 …… (50)
大高良姜片 …… (50)
大海马 …… (460)
大黄 …… (52)
大黄片 …… (52)
大黄鱼 …… (366)
大菟丝子 …… (52)
大戟 …… (366)
大腹皮 …… (58)

[丨]

山杏 …… (320)
山芝麻 …… (58)
山芝麻段 …… (58)
山合欢 …… (236)
山羊 …… (240)
山银花 …… (350)
山豆根 …… (60)
山参 …… (22)
山药 …… (60)
山药片 …… (60)
山柰 …… (64)
山桃 …… (434)
山银柴胡 …… (64)
山溪鲵 …… (66)
山慈菇 …… (66)

[丿]

千斤拔 …… (66)
千屈菜 …… (68)
千屈菜段 …… (68)
川大黄 …… (52)
川木香 …… (68)
川木香片 …… (68)
川木通 …… (70)
川木通片 …… (70)
川贝母 …… (70)
川乌 …… (72)

川白芍 …… (174)
川白芷 …… (178)
川贝 …… (72)
川贝片 …… (72)
川赤芍 …… (272)
川佛手 …… (280)
川党参 …… (444)
川黄柏 …… (496)

[丶]

广木香 …… (96)
广防己 …… (74)
广西血竭 …… (154)
广西莪术 …… (326,438)
广佛手 …… (280)
广金钱草 …… (74)
广金钱草段 …… (74)
广藿香 …… (76)
广藿香段 …… (76)

[ㄱ]

小木通 …… (70)
小毛贡 …… (110)
小片枳实 …… (382)
小花远志 …… (344)
小灵丹 …… (76)
小茴香 …… (78)
小果蔷薇根 …… (78)
小独角犀 …… (526)
小秦艽 …… (430)
小海马 …… (460)
小海浮石 …… (468)
小通草 …… (80)
小通草段 …… (80)
小黄鱼 …… (366)
小蓟 …… (80)
小螳螂 …… (480)
飞人中白 …… (20)
飞扬草 …… (82)
飞海蛾 …… (468)
弓石燕 …… (152)
卫矛 …… (414)
马 …… (84)
马刀 …… (82)
马氏珍珠贝……
…… (376,378)
马尾连 …… (84)
马尾松 …… (312)
马宝 …… (84)
马兜铃 …… (86,304)
马兜铃片 …… (86)
马鹿 …… (512)
马鹿尾 …… (512)
马鹿角 …… (512)
马鹿茸 …… (516)
马鹿茸锯茸 …… (516)
马鹿鞭 …… (518)
马粪海胆 …… (466)
马蓝 …… (308)
马槟榔 …… (86)
马鞭石斛 …… (146)
马蹄螺 …… (88)
马蹄型大黄 …… (52)

四画

[一]

不带毛鹿尾 …… (512)
云木香 …… (96)
云母石 …… (88)
云连 …… (492)
云南松 …… (312)
云南黄连 …… (492)
无钉头代赭石 …… (166)
无花果 …… (90)
尤针乌贼 …… (470)
天门冬 …… (90)
天冬 …… (90)
天花粉 …… (92)
天竺黄 …… (92)
天麻 …… (94)
天麻片 …… (94)
木瓜 …… (94)
木香 …… (96)
木香片 …… (96)
木香块 …… (96)
木贼 …… (96)
木贼麻黄 …… (120)
木蝴蝶 …… (98)
木鳖子 …… (98)
瓦楞子 …… (100)
王不留行 …… (100)
五谷虫 …… (102)
五灵脂 …… (102)
五倍子 …… (104)
五倍子碎片 …… (104)
车前 …… (104)
车前草 …… (104)
巨斧螳螂 …… (480)

[丨]

中片枳实 …… (382)
中华大蟾蜍 …… (40)
中华鲟 …… (366)
中华弓石燕 …… (152)
中华圆田螺 …… (164)
中国林蛙 …… (522)
中国旌节花 …… (80)
中麻黄 …… (520)
贝子 …… (106)
贝齿 …… (106)
日本人参 …… (26)
日本川贝 …… (72)
日本山栀子 …… (384)
日本车前草 …… (104)
日本白芍 …… (176)
日本白芷 …… (178)
日本半夏 …… (196)
日本红参 …… (26)
日本防己 …… (242)
日本当归 …… (216)
日本竹节人参 …… (222)
日本赤芍 …… (272)
日本麦冬 …… (254)

日本辛夷 …… (284)
日本枇杷叶 …… (310)
日本枳实 …… (382)
日本栝楼 …… (92)
日本柴胡 …… (442)
日本黄连 …… (494)
日本滨防风 …… (244)

[丿]

化州柚 …… (106)
化橘红 …… (106)
爪哇白豆蔻 …… (176)
爪哇犀 …… (526)
手掌参 …… (108)
手掌参片 …… (108)
毛山药 …… (60)
毛叶地瓜苗 …… (370)
毛冬青 …… (108)
毛花柱忽多 …… (350)
毛鸡骨草 …… (302)
毛泡桐 …… (370)
毛知母 …… (340)
毛莨 …… (110)
毛莨段 …… (110)
毛蚶 …… (100)
毛脉蓼 …… (248)
牛黄 …… (110)
牛黄粉 …… (110)
牛蒡 …… (112)
牛蒡子 …… (112)
牛膝 …… (112)
牛膝片 …… (112)
牛膝段 …… (112)
牛鞭 …… (114)
升麻 …… (114)
升麻片 …… (114)
升麻炭 …… (114)
长石 …… (116)
长叶地榆 …… (206)
长竹蛏 …… (82)
长条冰蛏 …… (130)
长嘴老鹳草 …… (210)
长螺蛸 …… (480)
片姜黄 …… (116)
乌头 …… (72,298)
乌龟 …… (282)
乌梢蛇 …… (118)
乌菝葜 …… (118)
丹参 …… (120)
丹腺大戟 …… (456)
风轮菜 …… (120)
风轮菜段 …… (120)
风藤 …… (462)
凤仙花 …… (450)

[丶]

六斑刺鲀 …… (284)
火炭母 …… (122)
火炭母片 …… (122)
方解石 …… (122)

[ㄱ]

双边栝楼 …… (192)
双角犀 …… (526)
巴豆 …… (124)
巴豆霜 …… (124)
巴戟天 …… (124)
巴戟肉 …… (124)
水牛 …… (114,126)
水牛角 …… (126)
水半夏 …… (126)
水母雪莲花 …… (506)
水红花子 …… (128)
水栀子 …… (128)
水蛭 …… (130)

五画

[一]

功劳木 …… (130)
功劳木块 …… (130)
功劳叶 …… (132)
功劳叶丝 …… (132)
打破碗花花 …… (132)
平车前 …… (104)
平胸龟 …… (134)
玉 …… (134)
玉竹 …… (136)
玉葡萄根 …… (136)
甘肃贝母 …… (70)
甘草 …… (138)
甘茶 …… (18)
甘遂 …… (38)
东马鹿茸 …… (516)
东风菜 …… (140)
东风菜段 …… (140)
东方后片螈 …… (140)
东方蝙蝠 …… (368)
东方蝶螈 …… (142)
东北马兜铃 …… (238)
东北杏 …… (320)
东北珍珠梅 …… (378)
东北鲟 …… (366)
东当归 …… (216)
东芎 …… (174)
石决明 …… (142)
石松 …… (278)
石南藤 …… (144)
石莲子 …… (144)
石莲肉 …… (144)
石菖蒲 …… (146)
石斛 …… (146)
石斛片 …… (146)
石牌广藿香 …… (76)
石硫黄 …… (148)
石楠 …… (148)
石楠叶 …… (148)
石羚 …… (150)
石榴 …… (150)
石榴皮 …… (150)
石膏 …… (152)
石燕 …… (152)
石蟹 …… (154)
龙血树血竭 …… (154)

龙齿 …… (156)
龙虱 …… (156)
龙骨 …… (158)
龙胆 …… (158)
龙胆段 …… (158)
龙涎香 …… (160)
龙眼 …… (160)
龙眼肉 …… (160)
[丨]
归头 …… (216)
归尾 …… (216)
归身 …… (216)
北大黄 …… (52)
北马兜铃 …… (86)
北方刻肋海胆 …… (466)
北苍术 …… (264)
北沙参 …… (162)
北细辛 …… (374)
北柴胡 …… (440)
卡氏乳香树 …… (342)
田皂角 …… (162)
田螺 …… (164)
凹甲陆龟 …… (164)
凹叶厚朴 …… (402)
[丿]
代赭石 …… (166)
仙茅 …… (166)
仙茅段 …… (166)
印度牛黄 …… (110)
印度犀 …… (526)
冬虫夏草 …… (168)
生川乌 …… (72)
生瓦楞子 …… (100)
生半夏 …… (194)
生白附子 …… (180)
生地黄 …… (204)
生地黄炭 …… (204)
生竹茹 …… (222)
生红娘子 …… (250)
生金礞石 …… (356)
生何首乌片 …… (278)
生没药 …… (286)
生补骨脂 …… (292)
生狗脊 …… (360)
生狗脊片 …… (360)
生栀子 …… (384)
生牵牛子 …… (402)
生莞蔚子 …… (398)
生虻虫 …… (406)
生桃仁 …… (434)
生晒参 …… (22)
生晒参片 …… (22)
生狼毒 …… (456)
生莱菔子 …… (434)
生菊三七 …… (484)
白及 …… (168)
白及片 …… (168)
白干参 …… (22)
白木香 …… (288)
白术 …… (170)
白术片 …… (170)
白石英 …… (172)
白石脂 …… (172)
白芍 …… (174)
白芍片 …… (174)
白苏 …… (178)
白苏子 …… (178)
白豆蔻 …… (176)
白芷 …… (178)
白花树 …… (238)
白附子 …… (180)
白花前胡 …… (418)
白茅 …… (180)
白茅根 …… (180)
白参 …… (22)
白参片 …… (26)
白矾 …… (182)
白果 …… (182)
白直须 …… (30)
白降丹 …… (184)
白药子 …… (184)
白垩 …… (186)
白鸸须 …… (30)
白茯苓 …… (396)
白桦 …… (432)
白硇砂 …… (186)
白鲜 …… (188)
白鲜皮 …… (188)
白僵蚕 …… (188)
白鲢 …… (190)
白糖参 …… (22)
白螺蛳壳 …… (190)
瓜蒌 …… (192)
好望角芦荟 …… (268)
[丶]
玄参 …… (192)
玄精石 …… (194)
宁夏枸杞 …… (202)
半夏 …… (194)
汉城细辛 …… (374)
[𠂇]
对叶白部 …… (214)
对虾 …… (198)
丝瓜 …… (198)
丝瓜络 …… (198)
丝瓜藤 …… (198)
边条红参 …… (22)
辽东楤木 …… (314)
头花千金藤 …… (184)

六画

[一]
地丁 …… (200)
地丁片 …… (200)
地不容 …… (200)
地龙 …… (202)
地构叶 …… (450)
地骨皮 …… (202)
地黄 …… (204)
地榆 …… (206)

地榆片 …… (206)
地榆炭 …… (206)
地锦 …… (206)
地锦草 …… (206)
地鳖 …… (46)
芍药 …… (208)
芦荟 …… (208)
老芦荟 …… (268)
老鸦瓣 …… (218)
老鹳草 …… (210)
老鹳草段 …… (210)
西马鹿茸 …… (516)
西牛黄 …… (110)
西升麻 …… (114)
西宁型大黄 …… (52)
西红花 …… (210)
西伯利亚杏 …… (320)
西洋参 …… (212)
西洋参片 …… (212)
西藏胡黄连 …… (388)
亚洲犀牛 …… (526)
耳环石斛 …… (146)
灰玛瑙 …… (252)
达氏鲟 …… (366)
百合 …… (212)
白里香 …… (214)
百部 …… (214)
百部片 …… (214)
百解藤 …… (216)
过路黄 …… (350)
芍药 …… (174,272)
[丨]
尖海龙 …… (464)
当归 …… (216)
当归片 …… (216)
当归炭 …… (216)
当药 …… (218)
光叶拔葜 …… (44)
光果甘草 …… (138)
光感石决明 …… (142)
光棘球海胆 …… (466)
光慈菇 …… (218)
团螺蚬 …… (480)
肉苁蓉 …… (220)
肉苁蓉片 …… (220)
肉豆蔻 …… (220)
肉桂 …… (430)
[丿]
竹节人参 …… (222)
竹节参 …… (222)
竹节参片 …… (222)
竹茹 …… (222)
朱远志 …… (256)
朱砂 …… (224)
朱砂根 …… (224)
伏龙肝 …… (226)
伊贝母 …… (226)
伊犁贝母 …… (226)
华山参 …… (228)
华东菝葜 …… (448)
华北白蜡 …… (432)
华远志 …… (344)
华细辛 …… (374)
延胡索 …… (228)
自然铜 …… (230)
血余炭 …… (230)
血散薯 …… (232)
血散薯片 …… (232)
血竭 …… (232)
血竭碎块 …… (232)
全叶青兰 …… (234)
全当归 …… (216)
全须生晒参 …… (22)
全蝎 …… (234)
合欢 …… (236)
合欢皮 …… (236)
合萌 …… (162)
多叶唐松草 …… (84)
多花黄精 …… (502)
多变鲍 …… (142)
卵叶远志 …… (256)
[丶]
问荆 …… (236)
问荆段 …… (236)
灯心蚤缀 …… (64)
安息香 …… (238)
安息香树 …… (238)
关木通 …… (238)
关木通片 …… (238)
关升麻 …… (114)
关黄柏 …… (496)
关黄柏丝 …… (498)
羊肝 …… (240)
羊栖菜 …… (472)
兴安升麻 …… (114)
米党参 …… (444)
米炒红娘子 …… (250)
农吉利 …… (240)
[ㄱ]
阳春砂 …… (400)
阳起石 …… (240)
阴起石 …… (242)
防己 …… (242)
防风 …… (244)
防风节 …… (244)
防风片 …… (244)
红大戟 …… (246)
红丝酸模 …… (40)
红条毛肤石鳖 …… (462)
红旱莲 …… (246)
红玛瑙 …… (252)
红直须 …… (22,30)
红参须 …… (220)
红雪纹 …… (22,30)
红药子 …… (248)
红粉 …… (248)
红氧化汞 …… (248)
红娘子 …… (250)
红腺忍冬 …… (350)
红蓼 …… (128)

红管药 …… (250)
红管药片 …… (250)
红藁疣螺 …… (252)
红螺 …… (472)

七画

[一]

玛瑙 …… (252)
麦冬 …… (254)
麦饭石 …… (256)
远志 …… (256)
远志片 …… (256)
进口沉香 …… (288)
进口阿魏 …… (296)
杜仲 …… (258)
杜仲片 …… (258)
杜仲叶 …… (258)
杜仲叶片 …… (258)
杜鹃兰 …… (66)
杜衡 …… (260)
杨梅 …… (260)
杨梅皮 …… (260)
贡菊 …… (486)
芫荽 …… (260)
芸香草 …… (262)
花椒 …… (262)
花鹿茸 …… (514)
花蕊石 …… (264)
苍术 …… (264)
苍耳 …… (266)
苍耳子 …… (266)
苍耳草 …… (266)
苍耳草片 …… (266)
芡 …… (268)
芡实 …… (268)
芦竹 …… (270)
芦荟 …… (268)
芦根 …… (270)
苏门答腊犀 …… (526)
苏门答腊安息香… (238)
苏木 …… (270)
苏木片 …… (270)
苏木块 …… (270)
赤石脂 …… (272)
赤芍 …… (272)
赤芍片 …… (272)
赤伏苓 …… (396)
杏 …… (320)
拟海龙 …… (464)
还魂草 …… (274)
连钱草 …… (274)
连钱草段 …… (274)

[丨]

园参 …… (22)
园参水子 …… (22)
坚龙胆 …… (158)
旱麦瓶草 …… (64)

[丿]

牡丹 …… (276)
牡丹皮 …… (276)
牡荆 …… (500)
牡蒿 …… (276)
牡蒿段 …… (276)
何首乌 …… (278)
伸筋草 …… (278)
佛手 …… (280)
佛手花 …… (280)
佛手柑 …… (280)
皂荚 …… (280)
谷精草 …… (282)
谷精草段 …… (282)
龟板 …… (282)
龟板胶 …… (284)
龟甲皮 …… (284)
条叶龙胆 …… (158)
条叶旋覆花 …… (344)

[丶]

辛夷 …… (284)
怀牛膝 …… (112)
沙苑子 …… (286)
没药 …… (286)
没药树 …… (286)
沉香 …… (288)
沉香曲 …… (288)
羌活 …… (290)
河子 …… (292)
河子肉 …… (292)
补骨脂 …… (292)
库拉索芦荟 …… (268)

[乙]

灵砂 …… (294)
阿利藤 …… (294)
阿利藤叶 …… (294)
阿利藤茎 …… (294)
阿利藤段 …… (294)
阿胶 …… (296)
阿胶丁 …… (296)
阿胶珠 …… (296)
阿魏 …… (296)
附子 …… (298)
忍冬 …… (300,350)
忍冬藤 …… (300)
忍冬藤段 …… (300)
鸡内金 …… (300)
鸡头黄精 …… (502)
鸡血藤 …… (302)
鸡骨草 …… (302)
鸡冠花 …… (304)
驴 …… (296,304)
驴肾 …… (304)

八画

[一]

青贝 …… (70)
青木香 …… (304)
青牛胆 …… (346)
青皮 …… (306)
青皮竹 …… (92)
青秆竹 …… (222)
青葙叶 …… (80)

青椒 …… (262)
青葙 …… (306)
青葙子 …… (306)
青蒿 …… (308)
青蒿段 …… (308)
青黛 …… (308)
青礞石 …… (310)
枇杷 …… (310)
枇杷叶 …… (310)
枸棘 …… (422)
板蓝根 …… (312)
松贝 …… (70)
松香 …… (312)
杭白芍 …… (174)
杭白芷 …… (178)
杭菊 …… (486)
刺儿菜 …… (80)
刺五加 …… (314)
刺五加片 …… (314)
刺老鸦 …… (314)
刺参 …… (466)
刺海马 …… (460)
刺猬 …… (316)
刺猬皮 …… (316)
刺猬胆 …… (316)
枣 …… (50)
枣柑 …… (382)
直立百部 …… (214)
茉莉 …… (316)
茉莉花 …… (316)
苦丁茶 …… (318)
苦木 …… (318,322)
苦木片 …… (318)
苦竹 …… (320)
苦竹叶 …… (320)
苦杏仁 …… (320)
苦树皮 …… (322)
苦葵菜 …… (322)
苦葵菜段 …… (322)
苦楝皮 …… (324)
茅苍术 …… (264)
茅莓 …… (324)
环纹货贝 …… (106)
环草石斛 …… (146)
郁金 …… (326)
披针叶黄华 …… (338)
抹香鲸 …… (160)
斩龙草 …… (326)
斩龙草段 …… (326)
斩龙剑 …… (328)
斩龙剑段 …… (328)
轮环藤 …… (328)
欧当归 …… (330)

[丨]

虎 …… (330)
虎杖 …… (330)
虎杖片 …… (330)
虎肚 …… (330)
虎骨 …… (332)
虎斑游蛇 …… (332)
虎掌 …… (334)
虎掌南星 …… (334)
虎筋 …… (334)
虎筋片 …… (334)
虎鞭 …… (334)
呋连 …… (492)
明矾石 …… (182)
明党参 …… (336)
岩白菜 …… (336)
岩羊 …… (336)
岩羊角 …… (336)
岩松鼠 …… (338)
岩松鼠骨 …… (338)
罗布麻 …… (338)
罗布麻叶 …… (338)
国产沉香 …… (288)

[丿]

和厚朴 …… (404)
贷贝 …… (106)
牧马豆 …… (338)
牧马豆段 …… (338)
知母 …… (340)
知母片 …… (340)
知母肉 …… (340)
制水蛭 …… (130)
制巴戟天 …… (124)
制方解石 …… (122)
制白附子 …… (180)
制芒硝 …… (208)
制鸡内金 …… (300)
制苍术 …… (264)
制远志 …… (256)
制玛瑙 …… (252)
制炉甘石 …… (368)
制松香 …… (312)
制狗脊 …… (360)
制刺猬皮 …… (316)
制虎掌南星 …… (334)
制首乌 …… (278)
制玳瑁 …… (376)
使君子 …… (340)
侧柏 …… (342,384)
侧柏叶 …… (342)
侧柏叶炭 …… (342)
佩兰 …… (342)
乳香 …… (342)
金山牛黄 …… (110)
金牛草 …… (344)
金乌贼 …… (470)
金丝马尾连 …… (84)
金灯藤 …… (52)
金毛狗脊 …… (360)
金佛草 …… (344)
金佛草段 …… (344)
金环蛇 …… (346)
金果榄 …… (346)
金钗石斛 …… (146)
金鱼 …… (346)
金荞麦 …… (348)
金钱白花蛇 …… (348)

金钱白花蛇段 …… (348)
金钱松 …… (44)
金钱草 …… (350)
金钱草段片 …… (350)
金钱豹 …… (46)
金银花 …… (350)
金锦香 …… (352)
金酒 …… (352)
金精石 …… (354)
金樱子 …… (354)
金樱子肉 …… (354)
金礞石 …… (356)
狗 …… (358)
狗舌草 …… (356)
狗尾草 …… (358)
狗尾草片 …… (358)
狗肾 …… (358)
狗宝 …… (360)
狗脊 …… (360)
狗脊 …… (362)
朐形草 …… (362)
胀果甘草 …… (138)
肥皂子 …… (362)
肥皂子炭 …… (362)
兔儿伞 …… (364)
兔儿伞段 …… (364)
炙驴肾 …… (304)
炙僵蚕 …… (188)
鱼腥草 …… (364)
鱼鳔 …… (366)

[丶]

京大戟 …… (366)
京牛黄 …… (110)
卷丹 …… (212)
夜明砂 …… (368)
炒儿香虫 …… (32)
炒干蟾 …… (40)
炒土鳖虫 …… (46)
炒干不留行 …… (100)
炒五谷虫 …… (102)
炒丹参 …… (120)
炒木香片 …… (96)
炒牛蒡子 …… (112)
炒丝瓜络 …… (198)
炒白术 …… (170)
炒白芍 …… (174)
炒诃子肉 …… (292)
炒鸡内金 …… (300)
炒苍术 …… (264)
炒苍耳子 …… (266)
炒赤芍 …… (272)
炒没药 …… (286)
炒阿胶 …… (296)
炒苦杏仁 …… (320)
炒使君子仁 …… (340)
炒乳香 …… (342)
炒枇杷叶 …… (310)
炒青葙子 …… (306)
炒栀子 …… (384)
炒柏子仁 …… (384)
炒南山楂 …… (390)
炒牵牛子 …… (402)
炒荆芥 …… (390)
炒莱菔子 …… (398)
炒桃仁 …… (434)
炒桑枝 …… (478)
炒莱菔子 …… (434)
炒海螵蛸 …… (470)
炒菟丝子 …… (484)
炒黄荆子 …… (500)
炒槟榔 …… (528)
炉甘石 …… (368)
法半夏 …… (194)
油松 …… (312)
沿阶草 …… (254)
泡桐 …… (370)
泡桐花 …… (370)
泡桐果 …… (370)
泥鳅 …… (100)
泽兰 …… (370)
泽兰段 …… (370)
泽泻 …… (372)
官桂 …… (372)
卷柏 …… (274)

[ㄱ]

降香 …… (374)
线纹海马 …… (460)
降香檀 …… (374)
细叶十大功劳 …… (130)
细辛 …… (374)
细雕刻肋海胆 …… (466)

九画

[一]

玳玳花 …… (382)
玳瑁 …… (376)
玳瑁丝 …… (376)
玳瑁粉 …… (376)
珍珠 …… (376)
珍珠母 …… (378)
珍珠透骨草 …… (450)
珍珠粉 …… (376)
珍珠梅 …… (378)
珍珠梅段 …… (378)
珊瑚 …… (380)
珊瑚菜 …… (162)
柘树 …… (422)
枳壳 …… (380)
枳壳片 …… (380)
枳实 …… (382)
枳实片 …… (382)
柚 …… (106)
柏子仁 …… (384)
栀子 …… (384)
枸杞 …… (202)
枸橘 …… (386)
枸橘叶 …… (386)
枸橼 …… (410)
柳叶牛膝 …… (42)
柳叶牛膝段 …… (42)

胡子鲶 …… (386)
胡桃 …… (388)
胡桃仁 …… (388)
胡黄连 …… (388)
胡椒 …… (388)
柬埔寨龙血树 …… (154)
荆芥 …… (390)
荆芥片 …… (390)
荆芥炭 …… (390)
南大黄 …… (52)
南山楂 …… (390)
南山楂炭 …… (390)
南天竹 …… (392)
南天竹叶 …… (392)
南丹参 …… (120)
南柴胡 …… (440)
南全蝎 …… (234)
南岭荛花 …… (34)
茜草 …… (392)
茜草片 …… (392)
茜草炭 …… (392)
草血竭 …… (394)
草麻黄 …… (520)
茴香 …… (78)
茵陈 …… (394)
茵陈蒿 …… (394)
茯苓 …… (396)
茯苓个 …… (396)
茯苓片 …… (396)
茯苓块 …… (396)
茯神 …… (396)
荜茇子 …… (398)
荔枝草 …… (398)
砗磲 …… (398)
砒石 …… (400)
砂仁 …… (400)
牵牛子 …… (402)
厚叶岩白菜 …… (336)
厚朴 …… (402)
厚朴花 …… (404)
带毛鹿尾 …… (512)

[丨]

虻虫 …… (406)
蚂蟥 …… (130)
思劳竹 …… (92)
贴梗海棠 …… (94)

[丿]

钟乳石 …… (406)
钩藤儿茶 …… (30)
香巴戟 …… (408)
香花崖豆藤 …… (302)
香附 …… (408)
香茶菜 …… (410)
香茶菜段 …… (410)
香圆 …… (410)
香橼 …… (410)
重齿毛当归 …… (414)
复齿鼯鼠 …… (102)
复带虻 …… (406)
禹白芷 …… (178)
禹余粮 …… (412)
剑叶龙血树 …… (154)
狭叶柴胡 …… (440)
独角莲 …… (180)
独活 …… (414)
鬼针草 …… (412)
鬼箭羽 …… (414)
胆矾 …… (416)
胆南星 …… (416)

[丶]

活血丹 …… (274)
活性参 …… (24)
狐荔枝螺 …… (418)
前胡 …… (418)
宣威乌头 …… (504)
穿山甲 …… (420)
穿心莲 …… (420)
穿破石 …… (422)
姜 …… (38)
姜石 …… (422)
姜汁炒黄连 …… (492)
姜半夏 …… (194)
姜竹茹 …… (222)
姜形黄精 …… (502)
姜黄 …… (326,424)
茴青 …… (424)
籽种山参 …… (24)

[ㄱ]

蚤缀 …… (426)
绒毛河子 …… (292)
络石 …… (426)
络石藤 …… (426)
绞股蓝 …… (428)

十画

[一]

蚕 …… (188)
蚕茧 …… (428)
秦当归 …… (216)
秦艽 …… (430)
泰安国息香 …… (238)
素花党参 …… (444)
桂枝 …… (430)
桔梗 …… (432)
桔梗片 …… (432)
栝楼 …… (92,192)
桦树皮 …… (432)
桃 …… (434)
桃仁 …… (434)
桃色珊瑚 …… (380)
根朴 …… (402)
莱菔子 …… (434)
莲 …… (436)
莲子 …… (436)
莲房 …… (436)
莪术 …… (326,438)
荷梗 …… (440)
盐水炒杜仲 …… (258)
盐巴戟天 …… (124)
盐石决明 …… (142)

盐附子 …… (298)
盐沙苑子 …… (286)
盐补骨脂 …… (292)
盐知母 …… (340)
盐益智仁 …… (476)
盐黄柏 …… (496)
盐桑螵蛸 …… (480)

[丨]

柴胡 …… (440)
柴胡片 …… (440)
党参 …… (444)
党参片 …… (444)
鸭跖衣 …… (446)
鸭趾草 …… (446)
蚬壳 …… (446)
峨嵋野连 …… (492)
圆叶牵牛 …… (402)

[丿]

钙叶酸模 …… (40)
铁丝威灵仙 …… (448)
铁皮石斛 …… (146)
铁棒槌 …… (504)
铁箍散 …… (408)
积雪草 …… (448)
透骨草 …… (450)
倒扣草 …… (450)
射干 …… (452)
臭牡丹 …… (452)
臭梧桐 …… (454)
臭梧桐叶 …… (454)
徐长卿 …… (454)
徐长卿片 …… (454)
狼毒 …… (456)
狼毒大戟 …… (456)
狼毒片 …… (456)
脐带 …… (456)
脐带片 …… (456)
皱纹盘鲍 …… (142)

[丶]

高良姜 …… (458)
高原唐松草 …… (84)
亳白芍 …… (174)
亳菊 …… (486)
酒川芎 …… (72)
酒大黄 …… (52)
酒丹参 …… (120)
酒牛膝 …… (112)
酒白芍 …… (174)
酒龙胆 …… (158)
酒当归 …… (216)
酒阴起石 …… (242)
酒炒黄连 …… (492)
酒炙海马 …… (460)
酒洗木香 …… (96)
酒益母草 …… (474)
酒柴胡 …… (440)
酒黄芩 …… (490)
酒黄柏 …… (496)
酒黄精 …… (502)
酒蛤蚧 …… (524)
酒熟地黄 …… (204)
浙贝母 …… (458)
海马 …… (460)
海月 …… (460)
海风藤 …… (462)
海风藤片 …… (462)
海石鳖 …… (462)
海龙 …… (464)
海参 …… (466)
海南沙 …… (400)
海胆 …… (466)
海浮石 …… (468)
海蛇 …… (460)
海麻雀 …… (468)
海蒿子 …… (472)
海蛾鱼 …… (468)
海燕 …… (470)
海螵蛸 …… (470)
海螺 …… (472)
海藻 …… (472)
浮石 …… (474)
烫水蛭 …… (130)
烫板 …… (282)
粉防己 …… (242)
粉背轮环藤 …… (216)
益母草 …… (398、474)
益母草段 …… (474)
益智 …… (476)
宽水蛭 …… (130)
宽叶羌活 …… (290)
家鸡 …… (300)
家蚕 …… (428)
家鸭 …… (446)
拳参 …… (476)
拳参片 …… (476)

[ㄱ]

桑 …… (478)
桑白皮 …… (478)
桑白皮丝 …… (478)
桑白皮块 …… (478)
桑枝 …… (478)
桑枝片 …… (478)
桑寄生 …… (480)
桑寄生片 …… (480)
桑螵蛸 …… (480)
绣球螺 …… (88)
绣球藤 …… (70)

十一画

[一]

麸炒山药 …… (60)
梧桐 …… (482)
梧桐叶 …… (482)
梅花鹿 …… (512)
梅花鹿尾 …… (512)
梅花鹿角 …… (512)
梅花鹿鞭 …… (518)
梭砂贝母 …… (70)
菝葜 …… (308)
萝藦 …… (482)

萝卜 …… (434)
菟丝子 …… (484)
菊 …… (486)
菊三七 …… (484)
菊三七片 …… (484)
菊花 …… (486)
菊花炭 …… (486)
黄边大龙虱 …… (156)
黄牛 …… (110,114,488)
黄牛角 …… (488)
黄皮树 …… (496)
黄石脂 …… (488)
黄羊 …… (488)
黄羊角 …… (488)
黄连 …… (492)
黄连花 …… (496)
黄芪 …… (492)
黄花蒿 …… (308)
黄芩 …… (490)
黄芩片 …… (490)
黄芩炭 …… (490)
黄刺蛾 …… (508)
黄草石斛 …… (146)
黄柏 …… (496)
黄柏丝 …… (496)
黄柏炭 …… (496)
黄荆 …… (500)
黄荆子 …… (500)
黄海棠 …… (246)
黄喉水龟 …… (500)
黄精 …… (502)
黄颡鱼 …… (504)
雪上一支蒿 …… (504)
雪莲花 …… (506)
接骨木 …… (506)
接骨木片 …… (506)
接骨木碎块 …… (506)

[丨]

雀瓮 …… (508)
常山 …… (508)
常山片 …… (508)
常春藤 …… (510)

[丨フ]

眼镜土蛇 …… (510)
野山楂 …… (390)
野百合 …… (240)
野荞麦 …… (348)
野蔷薇 …… (78)

[丿]

银叶桂 …… (372)
银杏 …… (182)
银环蛇 …… (348)
铁水型大黄 …… (52)
移山参 …… (24)

[丿丨]

盘大鲍 …… (142)
猕猴 …… (526)
鲍蛸 …… (100)

[丶]

旋覆花 …… (344)
望春花 …… (284)
鹿尾 …… (512)
鹿角 …… (512)
鹿角胶 …… (514)
鹿角脱盘 …… (512)
鹿角霜 …… (514)
鹿茸 …… (514)
鹿茸片 …… (516)
鹿茸粉 …… (516)
鹿筋 …… (518)
鹿筋段 …… (518)
鹿鞭 …… (518)
麻花秦艽 …… (430)
麻黄 …… (520)
麻黄段 …… (520)
清半夏 …… (194)
淡竹 …… (222)
羚羊角 …… (522)
羚羊角片 …… (522)
羚羊角粉 …… (522)
粗毛牛膝 …… (42,450)
粗毛火炭母 …… (122)
粗吻海龙 …… (464)
粗茎秦艽 …… (430)
蜜花豆 …… (302)

[フ]

绵羊 …… (240)

十二画

[一]

喜马山旌节花 …… (80)
越南槐 …… (60)
裂叶牵牛 …… (402)
雅连 …… (492)

[丨]

紫花地丁 …… (200)
紫花前胡 …… (418)

[丨丶]

阔叶十大功劳 …… (130)
蛤士蟆 …… (522)
蛤仔 …… (524)
蛤蚧 …… (524)
蛤蚧块 …… (524)
蛤蟆油 …… (526)
黑三棱 …… (38)
黑凹螺 …… (88)
黑龙江林蛙 …… (526)
黑鳔鲿 …… (480)

[丿]

短刺猬 …… (316)
短柄乌头 …… (504)
短梗菝葜 …… (448)
焦鸡内金 …… (300)
焦栀子 …… (384)
焦南山楂 …… (390)
焦槟榔 …… (528)
链珠藤 …… (294)

[丿丶]

番红花 …… (210)

[丶]

燀苦杏仁 …… (320)
湖北木兰 …… (284)
温郁金 …… (116,438)
滁菊 …… (486)

[ㄗ]

犀角 …… (526)
犀角片 …… (526)
犀角粉 …… (526)

十三画

[一]

蓍草 …… (16)
蓝萼香茶菜 …… (410)
蓬莪术 …… (438)
蒙古黄芪 …… (492)
靴筒朴 …… (402)

[丨]

猪紫贝母 …… (70)

[丿]

筒朴 …… (402)

[丶]

新芦荟 …… (268)
新疆贝母 …… (226)
新疆阿魏 …… (296)
煨木香 …… (96)
煨附子 …… (298)
煅人中白 …… (20)
煅钉头代赭石 …… (166)
煅无钉头代赭石 …… (166)
煅云母石 …… (88)
煅五花龙骨 …… (158)
煅瓦楞子 …… (100)
煅石决明 …… (142)
煅白矾 …… (182)
煅龙齿 …… (156)
煅龙骨 …… (158)
煅白垩 …… (186)
煅玄精石 …… (194)
煅石膏 …… (152)
煅石燕 …… (152)
煅田螺 …… (164)
煅伏龙肝 …… (226)
煅阳起石 …… (240)
煅赤石脂 …… (272)
煅花蕊石 …… (264)
煅炉甘石 …… (368)
煅金精石 …… (354)
煅珍珠母 …… (378)
煅浮石 …… (474)
煅海浮石 …… (468)
煅海螵 …… (472)
煅蛤仔 …… (524)
滇黄精 …… (502)
滨蒿 …… (394)

十四画

[一]

槟榇 …… (94)
槟榔 …… (58,528)
槟榔片 …… (58)
夏生百部 …… (214)
蓼蓝 …… (308,312)
蒸白部 …… (214)
蒸白部片 …… (214)
蒸黄精 …… (502)
蒸熟地黄 …… (204)
酸橙 …… (380,382)

[丿]

膜荚黄芪 …… (492)
鲜地黄 …… (204)
鲜何首乌 …… (278)
鲜芦根 …… (270)

[丶]

蜜马兜铃 …… (86,304)
蜜升麻 …… (114)
蜜甘草 …… (138)
蜜百合 …… (212)
蜜远志 …… (256)
蜜炙百部 …… (214)
蜜金樱子 …… (354)
蜜枇杷叶 …… (310)
蜜桑白皮 …… (478)
蜜柴胡 …… (440)
蜜党参 …… (444)
蜜黄芪 …… (492)
蜜麻黄 …… (520)
蜜旋覆花 …… (344)
赛加羚羊 …… (522)
缩砂 …… (400)

十五画

[一]

醋大黄 …… (52)
醋大戟 …… (366)
醋白芍 …… (174)
醋石燕 …… (152)
醋石蟹 …… (154)
醋红大戟 …… (246)
醋赤石脂 …… (272)
醋龟板 …… (282)
醋没药 …… (286)
醋虎骨 …… (332)
醋乳香 …… (342)
醋菜 …… (364)

[丨]

蝙蝠蛾 …… (168)

[丶]

熟大黄 …… (52)
熟地黄炭 …… (204)
熟附片 …… (298)
澳洲鲍 …… (142)

十六画

橘 …… (306)
薯蓣 …… (60)
冀地鳖 …… (46)
褶纹冠蚌 …… (376,378)

十七画

翼蓼 …… (248)
鳇鱼 …… (366)

十八画

鞭檐犁头尖 …… (126)

十九画

鳖血柴胡 …… (440)

二十画

麒麟血竭 …… (232)
鳞痒藻 …… (398)

药材拉丁名索引

A

Acanthochiton seu Ischnochiton …… (462)
Achates …… (252)
Actinolitum …… (240)
Actinolitum Brevififrum …… (242)
Aloe …… (268)
Alumen …… (182)
Ambra Grisea …… (160)
Anhydritum …… (116)
Arillus Longan …… (160)
Arisaema cum Bile …… (416)
Arsenicum Sublimatum …… (400)
Artificiel Cinnabar …… (294)
Aspongopus …… (32)
Aurum …… (352)
Azuritum …… (424)

B

Batrachuperus Pinchonii …… (66)
Benzoinum …… (238)
Bombyx Batryticatus …… (188)
Bufo Siccus …… (40)
Bulbus Fritillariae …… (226)
Bulbus Fritillariae Cirrhosae …… (70)
Bulbus Fritillariae Thunbergii …… (458)
Bulbus Lilii …… (212)
Bulbus Tulipae …… (218)
Bungarus Parvus …… (348)

C

Caculus Equi …… (84)
Cacumem Biotae …… (342)
Calamina …… (368)
Calamitas Urinae Hominis …… (20)
Calculus Gasteris Macacae …… (526)
Calcitum …… (122)
Calculus Bovis …… (110)
Calculus Canitis …… (360)
Carapacis et Colla Plastri Testudinis … (284)
Carapax Eretmochelydis …… (376)
Carapax et Plastrum Clemmydis …… (500)
Carapax et Plastrum Testudinis …… (282)
Carapax et Plastrum Testudonis Impressae …… (164)
Carassius Auratus …… (346)
Catechu …… (30)
Cauda Cervi …… (512)
Caulis Aristolochiae Manshuriensis …… (238)
Caulis Bambusae in Taeniam …… (222)
Caulis Clematidis Armandii …… (70)
Caulis Erycibes …… (16)
Caulis Hederae …… (510)
Caulis Impatientis …… (450)
Caulis Lonicerae …… (300)
Caulis Luffae …… (198)
Caulis Mahoniae …… (130)
Caulis Spatholobi et Millettiae …… (302)
Caulis Piperis …… (144)
Caulis Piperis Kadsurae …… (462)
Caulis Sargentodoxae …… (48)
Caulis Trachelospermi …… (426)
Chalcanthitum …… (416)
Chalk …… (186)
Cinnabaris …… (224)
Cipangopaludina …… (164)
Clarias Fuscus …… (386)
Colla Corii Asini …… (296)
Colla Cornis Cervi …… (514)
Concha Arcae …… (100)
Concha Bellamyae …… (190)
Concha Chlorostomae …… (88)
Concha Corbiculae …… (446)
Concha Cuneopsis …… (82)
Concha Haliotidis …… (142)

Concha Margaritifera Usta …… (378)
Concha Monetariae …… (106)
Concha Placunae …… (460)
Concha Purpurae …… (418)
Concha Rapanae …… (472)
Concha Tridacnae …… (398)
Chonca Venerupis …… (524)
Concretion …… (422)
Concretio Silicea Pambusae …… (92)
Cordyceps …… (168)
Corium Bovis …… (488)
Corium Diodontis …… (284)
Corium Erinacei …… (316)
Cornu Bubali …… (126)
Cornu Capreoli Pantotrichum …… (362)
Cornu Cervi …… (512)
Cornu Cervi Degelatinatum …… (514)
Cornu Cervi Pantotrichum …… (514)
Cornu Procaprae Gutturosae …… (488)
Cornu Pseudoidis Nayauris …… (336)
Cornu Rhinocerotis …… (526)
Cornu Saigae Tataricae …… (522)
Cortex Albizziae …… (236)
Cortex Araliae …… (314)
Cortex Betulae Platyphyllae …… (432)
Cortex Cinnamoni Mairei …… (372)
Cortex Dictamni …… (188)
Cortex Eucommiae …… (258)
Cortex Lycii …… (202)
Cortex Magnoliae Officinalis …… (402)
Cortex Meliae …… (324)
Cortex Mori …… (478)
Cortex Myricae …… (260)
Cortex Paeoniae Suffruticosae …… (276)
Cortex Phellodendri …… (496)
Cortex Picrasmae …… (322)
Cortex Pseudolaricis …… (44)
Cortex Sorbariae Arboreae …… (378)
Crinis Carbonisatus …… (230)
Crystallus Hydrargyrum Bichloratum et Hydrargyrum Chloratum …… (184)
Cybister …… (156)
Cynops Orientalis …… (142)

D

Dens Draconis …… (156)
Drepanis …… (470)

E

Endothelium Corneum Gigeriae Anatis …… (446)
Endothelium Corneum Gigeriae Galli … (300)
Eupolyphaga seu Steleophaga …… (46)
Exocarpium Citri Grandis …… (106)

F

Faeces Trogopterori …… (102)
Faeces Vespertilionis …… (368)
Fel Erinacei seu Hemiechini …… (316)
Flos Caryophylli …… (18)
Flos Chrysanthemi …… (486)
Flos Eriocauli …… (282)
Flos et Semen Celosiae …… (304)
Flos Jasmini …… (316)
Flos Lonicerae …… (350)
Flos Magnoliae …… (284)
Flos Magnoliae Officinalis …… (404)
Flos Paulowniae …… (370)
Flos Sarcodactyli …… (280)
Folium Apocynii Venetii …… (338)
Folium Cornutae et Latifoliae …… (318)
Folium Clerodendrii …… (454)
Folium Clerodeadrii Bungei …… (452)
Folium Eriobotryae …… (310)
Folium Eucommiae …… (258)
Folium Firmianae …… (482)
Folium Ginseng …… (28)
Folium Hydrangeae Macrophyllae …… (18)
Folium Ilicis Cornutae …… (132)
Folium Nandianae …… (392)
Folium Photiniae …… (148)
Folium Pleioblasti …… (320)
Folium Ponciri …… (386)

Fossilia Brachyurae …… (154)
Fossilia Spiriferis …… (152)
Fructus Alpiniae Oxyphyllae …… (476)
Fructus Amomi …… (400)
Fructus Amomi Rotundus …… (176)
Fructus Anisi Stellati …… (20)
Fructus Arctii …… (112)
Fructus Aristolochiae …… (86)
Fructus Aurantii …… (380)
Fructus Aurantii Immaturus …… (382)
Fructus Chaenomelis …… (94)
Fructus Chebulae …… (292)
Fructus Citri …… (410)
Fructus Citri Sarcodactylis …… (280)
Fructus Crataegi Cuneatae …… (390)
Fructus Crotonis …… (124)
Fructus Foeniculi …… (78)
Fructus Gardeniae …… (384)
Fructus Gleditsiae …… (280)
Fructus Grandiflorae …… (128)
Fructus Jujubae …… (50)
Fructus Leonuri …… (398)
Fructus Nelumbinis …… (144)
Fructus Paulowniae …… (370)
Fructus Perillae Frutescentis …… (178)
Fructus Piperis …… (388)
Fructus Polygoni Orientalis …… (128)
Fructus Ponciri …… (386)
Fructus Psoraleae …… (292)
Fructus Quisqualis …… (340)
Fructus Rosae Laevigatae …… (354)
Fructus Trichosanthis …… (192)
Fructus Ulmi Macrocarpae Preparatae …… (260)
Fructus Viticis Negundo …… (500)
Fructus Xanthii …… (266)

G

Galla Chinensis …… (104)
Gaster Tigris …… (330)
Gecko …… (524)
Glauberitum …… (194)
Gypsum Fibrosum …… (152)

H

Haematitum …… (166)
Halloysitum Flarum …… (488)
Halloysitum Rubrum …… (272)
Hepar Caprae seu Ovis …… (240)
Herba Abri Cantoniensis …… (302)
Herba Achilleae Alpiniae …… (16)
Herba Achyranthis …… (450)
Herba Aeschynomene Indicae …… (162)
Herba Alyxiae Sinensis …… (294)
Herba Andrographitis …… (420)
Herba Anemones Hupehensis …… (132)
Herba Arenariae …… (426)
Herba Artemisiae Annuae …… (308)
Herba Artemisiae Japonicae …… (276)
Herba Artemisiae Scopariae …… (394)
Herba Asari …… (374)
Herba Asari Forbesii …… (260)
Herba Asteris Ageratoidis …… (250)
Herba Bidentis Bipinnatae …… (412)
Herba Cayratiae Japonicae …… (118)
Herba Centellae …… (448)
Herba Cephalanoploris …… (80)
Herba Cistanches …… (220)
Herba Clinopodii Chinensis …… (120)
Herba Commelinae …… (446)
Herba Crotalariae …… (240)
Herba Cymbopogonis …… (262)
Herba Dendrobii …… (146)
Herba Desmodii Styracifolii …… (74)
Herba Doellingeriae …… (140)
Herba Dracocephali Integrifolii …… (234)
Herba Ephedrae …… (520)
Herba Equiseti Arvensis …… (236)
Herba Equiseti Hiemalis …… (96)
Herba Erodii seu Geranii …… (210)
Herba Eupatorii …… (342)
Herba Euphorbiae Hirtae …… (82)

Herba Euphorbiae Humifusae …… (206)
Herba Glechomae …… (274)
Herba Gynostemae …… (428)
Herba Houttuyniae …… (364)
Herba Hyperici …… (246)
Herba Inulae …… (344)
Herba Isodonis Glaucocalycis …… (410)
Herba Ixeritis Denticulatae …… (322)
Herba Leibnitziae …… (48)
Herba Leonuri …… (474)
Herba Lycopi …… (370)
Herba Lycopodti …… (278)
Herba Lysimachiae …… (350)
Herba Lysimachiae Davuricae …… (496)
Herba Lythri Salicariae …… (68)
Herba Osbeckiae …… (352)
Herba Plantaginis …… (104)
Herba Pogostemonis …… (76)
Herba Polygalae Telephioidis seu Polygalae Chinensis …… (344)
Herba Polygoni …… (122)
Herba Ranunculi Japonici …… (110)
Herba Rubi Parvifolii …… (324)
Herba Salviae Plebeiae …… (398)
Herba Saussureae Medusae …… (506)
Herba Schizonepetae Tenuifoliae …… (390)
Herba Selaginellae …… (274)
Herba Senecionis Argunensis …… (326)
Herba Senecionis Fauriei …… (356)
Herba Setariae Viridis …… (358)
Herba Solidagnis …… (14)
Herba Speranskiae Tuberculatae …… (450)
Herba Swertiae …… (218)
Herba Thermopsis Lanceolatae …… (338)
Herba Thlaspis …… (482)
Herba Thymi …… (214)
Herba Tripterospermi …… (362)
Herba Veronicastri Sibirici …… (328)
Herba Violae …… (200)
Herba Xanthii …… (266)
Hippocampus …… (460)
Hizudo …… (130)
Huechys …… (250)
Hydrargyri Oxydum Rubrum …… (248)

I

Igneous Rock …… (256)
Indigo Pulverata Levis …… (308)
Ingluvies Piscis …… (366)

J

Jecur Caprae seu Ovis …… (240)

K

Kaolinitum …… (172)

L

Lapis Chloriti …… (310)
Lapis Micae Aureus …… (356)
Lapis Pumicis …… (468)
Larva Chrysomyiae …… (102)
Larva Cnidocampae Flavescentis …… (508)
Ligamentum Cervi …… (518)
Ligamentum Tigris …… (334)
Lignum Aquilariae Resinatum …… (288)
Lignum Aquilariae Resinatum Fermentata …… (288)
Lignum Dalbergiae Odoriferae …… (374)
Lignum Sappan …… (270)
Limonitum …… (412)
Lumbricus …… (202)

M

Margarita …… (376)
Medulla Stachyuri …… (80)
Mirabiliti …… (208)
Muscovitum …… (88)
Musculus et Os Bungari …… (346)
Musculus Hypophthalmichthyis Molitricis …… (190)
Musculus Mitellae …… (150)
Myrrha …… (286)

N

Natrii Sulfas …… (208)
Natrix Tigbina Laterulis …… (332)

Nepheritum …… (134)

O

Olibanum …… (342)
Ootheca Mantidis …… (480)
Ophicalcitum …… (264)
Ophiophagus Hannah …… (510)
Opisthopatia Orientalis …… (140)
Os Corallii …… (380)
Os Draconis …… (158)
Os Hemicentroti seu Temnopreuri …… (466)
Os Sciurotamiatis …… (338)
Os Tigris …… (332)

P

Pegasus …… (468)
Pelteobagrus Fulvidraco …… (504)
Penaeus …… (198)
Penis et Testis Bovis …… (114)
Penis et Testis Cervi …… (518)
Penis et Testis Tigris …… (334)
Pericarpium Arecae …… (58)
Pericarpium Citri Reticulatae Viride … (306)
Pericarpium Granati …… (150)
Pericarpium Zanthoxyli Schinifoli …… (262)
Petiolus Nelumbinis …… (440)
Platysternon Megacephalum …… (134)
Poria …… (396)
Portunus Tritubercutatus …… (36)
Pseudobulbus Cremastrae Appendiculatae …… (66)
Pumex …… (474)
Pyritum …… (230)

Q

Quartz Album …… (172)

R

Radices Ginseng …… (30)
Radix Acanthopanacis Senticosi …… (314)
Radix Achyranthis Bidentatae …… (112)
Radix Achyranthis Longifoliae …… (42)
Radix Aconiti …… (72)
Radix Aconiti Brachypodi …… (504)
Radix Aconitifoliae …… (364)
Radix Aconiti Lateralis Preparatae …… (298)
Radix Angelicae Sinensis …… (216)
Radix Anisodii Acutanguli …… (36)
Radix Ampelopsis Delavayanae …… (136)
Radix Angelicae Dahuricae …… (178)
Radix Angelicae Pubescentis …… (414)
Radix Ardisiae Crenatae …… (224)
Radix Arenariae seu Silenii …… (64)
Radix Aristolochiae …… (304)
Radix Aristolochiae Fangchi …… (74)
Radix Asparagi …… (90)
Radix Astragali …… (492)
Radix Aucklandiae …… (96)
Radix Bupleuri …… (440)
Radix Campanumoeae …… (46)
Radix Changii …… (336)
Radix Codonopsis …… (444)
Radix Cudraniae …… (422)
Radix Curcumae …… (326)
Radix Cycleae Hypoglaucae …… (216)
Radix Cycleae Racemosae …… (328)
Radix Cynanchi Paniculati …… (454)
Radix Dichroae …… (508)
Radix et Ramulus Securinegae Suffruticosae …… (14)
Radix et Rhizoma Rhei …… (52)
Radix et Rhizoma Smilacis …… (448)
Radix et Rhizoma Thalictri …… (84)
Radix Euphorbiae Fischerianae …… (456)
Radix Euphorbiae Pekinensis …… (366)
Radix Gentianae …… (158)
Radix Gentianae Macrophyllae …… (430)
Radix Ginseng …… (22)
Radix Glehniae …… (162)
Radix Glycyrrhizae …… (138)
Radix Gynurae Segeti …… (484)
Radix Helicteris …… (58)
Radix Ilicis Pubescentis …… (108)
Radix Inulae …… (42)

Radix Isatidis …… (312)
Radix Kansui …… (138)
Radix Knoxiae …… (246)
Radix Levistii …… (330)
Radix Moghaniae …… (66)
Radix Morindae Officinalis …… (124)
Radix Notoginseng …… (34)
Radix Ophiopogonis …… (254)
Radix Paeoniae Alba …… (174)
Radix Paeoniae Rubra …… (272)
Radix Panacis Quinquefolii …… (212)
Radix Peucedani …… (418)
Radix Physochlainae …… (228)
Radix Platycodi …… (432)
Radix Polygalae …… (256)
Radix Polygoni Multiflori …… (278)
Radix Polygoni seu Pteroxygoni …… (248)
Radix Rehmanniae …… (204)
Radix Rosae Multiflorae …… (78)
Radix Rubiae …… (392)
Radix Rumicis Obtusifolii seu Chalepensis …… (40)
Radix Salviae Mitiorrhizae …… (120)
Radix Sanguisorbae …… (206)
Radix Saposhnikoviae …… (244)
Radix Schisandrae Propinquae …… (408)
Radix Scrophulariae …… (192)
Radix Scutellariae …… (490)
Radix Sophorae Tonkinensis …… (60)
Radix Stemonae …… (214)
Radix Stephaniae Cepharanthae …… (184)
Radix Stephaniae Delavayi …… (200)
Radix Stephaniae Dielsianae …… (232)
Radix Stephaniae Tetrandrae …… (242)
Radix Tinosporae …… (346)
Radix Trichosanthis …… (92)
Radix Vladimiriae …… (68)
Radix Wikstroemiae Indicae …… (34)
Ramulus Cinnamomi …… (430)
Ramulus et Folium Picrasmae …… (318)
Ramulus Euonymi …… (414)
Ramulus Mori …… (478)
Ramulus Sambuci Williamsii …… (506)
Ramulus Taxilli …… (480)
Rana Temporaria Chensinensis …… (522)
Receptaculum Nelumbinis …… (436)
Resina Draconis …… (154,232)
Resina Ferulae …… (296)
Resina Pini …… (312)
Retinervus Luffae Fructus …… (198)
Rhizoma Acori Graminei …… (146)
Rhizoma Alismatis …… (372)
Rhizoma Alpiniae Officinarum …… (458)
Rhizoma Anemarrhenae …… (340)
Rhizoma Atractylodis …… (264)
Rhizoma Atractylodis Macrocephalae …… (170)
Rhizoma Belamcandae …… (452)
Rhizoma Bergeniae …… (336)
Rhizoma Bistortae …… (476)
Rhizoma Bletillae …… (168)
Rhizoma Chuanxiong …… (72)
Rhizoma Cibotii …… (360)
Rhizoma Cimicifugae …… (114)
Rhizoma Coptidis …… (492)
Rhizoma Corydalis …… (228)
Rhizoma Curculiginis …… (166)
Rhizoma Curcumae Longae …… (424)
Rhizoma Curcumae Wenyujin …… (116)
Rhizoma Cyperi …… (408)
Rhizoma Dioscoreae …… (60)
Rhizoma Fagopyri Cymosi …… (348)
Rhizoma Galangae …… (50)
Rhizoma Gastrodiae …… (94)
Rhizoma Ginseng …… (28)
Rhizoma Gymnadeniae …… (108)
Rhizoma Imperatae …… (180)
Rhizoma Kaempferiae …… (64)
Rhizoma Panacis Japonici …… (222)
Rhizoma Phragmitis …… (270)

Rhizoma Picrorhizae …… (388)
Rhizoma Pinelliae …… (194)
Rhizoma Pinelliae Pedatisectae …… (334)
Rhizoma Polygonati …… (502)
Rhizoma Polygonati Odorati …… (136)
Rhizoma Polygoni Cuspidati …… (330)
Rhizoma Polygoni Paleacei …… (394)
Rhizoma Seu Radix Notopterygii …… (290)
Rhizoma Smilacis Glabrae …… (44)
Rhizoma Sparganii …… (38)
Rhizoma Typhonii …… (180)
Rhizoma Typhonii Flagelliformis …… (126)
Rhizoma Zingiberis …… (38)

S

Sal Ammoniac …… (186)
Sargassum …… (472)
Sclerotium et Lignum Poriae …… (396)
Scorpio …… (234)
Semen Arecae …… (528)
Semen Armeniacae Amarum …… (320)
Semen Astragali Complanati …… (286)
Semen Biotae …… (384)
Semen Canavaliae …… (32)
Semen Capparis …… (86)
Semen Celosiae …… (306)
Semen Cuscutae …… (484)
Semen Cuscutae Japonicae …… (52)
Semen Euryales …… (268)
Semen Ginkgo …… (182)
Semen Gymnocladi Chinensis …… (362)
Semen Juglandis …… (388)
Semen Momordicae …… (98)
Semen Myristicae …… (220)
Semen Nelumbinis …… (436)
Semen Oroxyli …… (98)
Semen Persicae …… (434)
Semen Pharbitidis …… (402)
Semen Raphani …… (434)
Semen Vaccariae …… (100)
Sepiae seu Sepiellae …… (470)
Serica Gluma …… (428)
Squama Manitis …… (420)
Stalactitum …… (406)
Stichopus …… (466)
Stigma Croci …… (210)
Sulfur …… (148)
Syconium Fici Caricae …… (90)
Syngnat Hus …… (464)

T

Tabanus …… (406)
Terra Flava Usta …… (226)
Testis et Penis Canitis …… (358)
Testis et Penis Equi …… (304)
Tylototriton Verrucosus …… (252)

U

Umbilicus …… (456)
Uviductus Ranae …… (526)

V

Vermiculitum …… (354)
Vulcanzing Agenf …… (76)

Z

Zaocys …… (118)
Zedoariae …… (438)

药材汉语拼音索引

A

Aliteng …… (294)
Anxixiang …… (238)
Aojialugui …… (164)
Awei …… (296)

B

Badou …… (124)
Baibu …… (214)
Baidoukou …… (176)
Bai'e …… (186)
Baifan …… (182)
Baifuzi …… (180)
Baiguo …… (182)
Baihe …… (212)
Baiji …… (168)
Baijiangcan …… (188)
Baijiangdan …… (184)
Baijieteng …… (216)
Bailian …… (190)
Bailixiang …… (214)
Bailuoshiqiao …… (190)
Baimaogen …… (180)
Bainaosha …… (186)
Baishao …… (174)
Baishiying …… (172)
Baishizhi …… (172)
Baisuzi …… (178)
Baixianpi …… (188)
Baiyaozi …… (184)
Baizhi …… (178)
Baizhu …… (170)
Baiziren …… (384)
Bajiaohuixiang …… (20)
Bajitian …… (124)
Banlangen …… (312)
Banxia …… (194)
Baxianhua …… (18)
Beishashen …… (162)
Beizi …… (106)
Bianqing …… (424)
Binglang …… (528)
Buguzhi …… (292)

C

Caihu …… (440)
Cangercao …… (266)
Cangerzi …… (266)
Cangzhu …… (264)
Canjian …… (428)
Caoxuejie …… (394)
Cebaiye …… (342)
Changchunteng …… (510)
Changshan …… (508)
Changshi …… (116)
Chenxiang …… (288)
Chenxiangqu …… (288)
Cheqiancao …… (104)
Chequ …… (398)
Chishao …… (272)
Chishizhi …… (272)
Chongweizi …… (398)
Choumudan …… (452)
Chouwutongye …… (454)
Chuanbeimu …… (70)
Chuanmutong …… (70)
Chuanmuxiang …… (68)
Chuanposhi …… (422)
Chuanshanjia …… (420)
Chuanwu …… (72)
Chuanxinlian …… (420)
Chuanxiong …… (72)
Cilaoya …… (314)
Ciweidan …… (316)
Ciweipi …… (316)
Ciwujia …… (314)

D

Dadingcao …… (48)
Dafupi …… (58)
Dahuang …… (52)
Daimao …… (376)
Daizheshi …… (166)
Daliangjiang …… (50)
Danfan …… (416)
Danggui …… (216)
Dangshen …… (444)
Dangyao …… (218)
Dannanxing …… (416)
Danshen …… (120)
Daodou …… (32)
Daokoucao …… (450)
Dapowanhuahua …… (132)
Datusizi …… (52)
Daxueteng …… (48)
Dazao …… (50)
Diburong …… (200)
Diding(Zihuadiding) …… (200)
Digupi …… (202)
Dihuang …… (204)
Dijincao …… (206)
Dilong …… (202)
Dinggongteng …… (16)
Dingxiang …… (18)
Diyu …… (206)
Dongchongxiacao …… (168)
Dongfanghoupianlian …… (140)
Dongfangrongyuan …… (142)
Dongfengcai …… (140)
Duheng …… (260)
Duhuo …… (414)
Duixia …… (198)
Duzhong …… (258)
Duzhongye …… (258)

E

Ejiao …… (296)
Ercha …… (30)
Ezhu …… (438)

F

Fangfeng …… (244)
Fangji …… (242)
Fangjieshi …… (122)
Feixingcao …… (362)
Feiyangcao …… (82)
Feizaozi …… (362)
Fengluncai …… (120)
Foshou …… (280)
Foshouhua …… (280)
Fuling …… (396)
Fulonggan …… (226)
Fushen …… (396)
Fushi …… (474)
Fuzi …… (298)

G

Gancao …… (138)
Ganchan …… (40)
Ganjiang …… (38)
Gansui …… (138)
Gaoliangjiang …… (458)
Gejie …… (524)
Gezi …… (524)
Gonglaomu …… (130)
Gonglaoye …… (132)
Goubao …… (360)
Gouji …… (360)
Goushecao …… (356)
Goushen …… (358)
Gouweicao …… (358)
Gualou …… (192)
Guangcigu …… (218)
Guangfangji …… (74)
Guanghuoxiang …… (76)
Guangjinqiancao …… (74)
Guangui …… (372)
Guanmutong …… (238)
Guiban …… (282)
Guibanjiao …… (284)

Guijianyu …… (414)
Guiyupi …… (284)
Guizhencao …… (412)
Guizhi …… (430)
Gujingcao …… (282)
Guoju …… (386)
Guojuye …… (386)

H

Haidan …… (466)
Haifengteng …… (462)
Haifushi …… (468)
Hailong …… (464)
Hailuo …… (472)
Haima …… (460)
Haimaque …… (468)
Haipiaoxiao …… (470)
Haishen …… (466)
Haishibie …… (462)
Haiyan …… (470)
Haiyue …… (460)
Haizao …… (472)
Hamayou …… (526)
Hashima …… (522)
Hegeng …… (440)
Hehuanpi …… (236)
Heshouwu …… (278)
Hongdaji …… (246)
Hongfen …… (248)
Hongguanyao …… (250)
Honghanlian …… (246)
Hongleiyouyuan …… (252)
Hongniangzi …… (250)
Hongyaozi …… (248)
Houpo …… (402)
Houpohua …… (404)
Houzao …… (526)
Huajiao …… (262)
Huajuhong …… (106)
Huangbai …… (496)
Huanghoushuigui …… (500)
Huangjing …… (502)
Huangjingzi …… (500)
Huanglian …… (492)
Huanglianhua …… (496)
Huangniujiao …… (488)
Huangqi …… (492)
Huangqin …… (490)
Huangsangyu …… (504)
Huangshizhi …… (488)
Huangyangjiao …… (488)
Huanhuncao …… (274)
Huaruishi …… (264)
Huashanshen …… (228)
Huashupi …… (432)
Hubanyoushe …… (332)
Hubian …… (334)
Hudu …… (330)
Huhuanglian …… (388)
Hugu …… (332)
Hujiao …… (388)
Hujin …… (334)
Huotanmu …… (122)
Hutaoren …… (388)
Huzhang …… (330)
Huzhangnanxing …… (334)
Huzinian …… (386)

J

Jianghuang …… (424)
Jiangshi …… (422)
Jiangxiang …… (374)
Jiaogulan …… (428)
Jiegeng …… (432)
Jiegumu …… (506)
Jiguanhua …… (304)
Jigucao …… (302)
Jinbo …… (352)
Jineijin …… (300)
Jinfocao …… (344)
Jingdaji …… (366)
Jingjie …… (390)

Jinguolan …… (346)
Jinhuanshe …… (346)
Jinjingshi …… (354)
Jinjinxiang …… (352)
Jinmengshi …… (356)
Jinniucao …… (344)
Jinqianbaihuashe …… (348)
Jinqiancao …… (350)
Jinqiaomai …… (348)
Jinyingzi …… (354)
Jinyinhua …… (350)
Jinyu …… (346)
Jiuxiangchong …… (32)
Jixuecao …… (448)
Jixueteng …… (302)
Juhua …… (486)
Jusanqi …… (484)

K

Kezi …… (292)
Kudingcha …… (318)
Kulianpi …… (324)
Kumaicai …… (322)
Kumu …… (318)
Kushupi …… (322)
Kuxingren …… (320)
Kuzhuye …… (320)

L

Laifuzi …… (434)
Langdu …… (456)
Laoguancao …… (210)
Lianfang …… (436)
Lianqiancao …… (274)
Lianzi …… (436)
Liaogewang …… (34)
Lingsha …… (294)
Lingyangjiao …… (522)
Lizhicao …… (398)
Longchi …… (156)
Longdan …… (158)
Longgu …… (158)
Longshi …… (156)
Longxueshuxuejie …… (154)
Longyanrou …… (160)
Longyanxiang …… (160)
Lubian …… (518)
Luganshi …… (368)
Lugen …… (270)
Luhui …… (268)
Lujiao …… (512)
Lujiaojiao …… (514)
Lujiaoshuang …… (514)
Lujin …… (518)
Lunhuanteng …… (328)
Luobumaye …… (338)
Luoshiteng …… (426)
Lurong …… (514)
Lushen …… (304)
Luwei …… (512)

M

Mabao …… (84)
Mabinglang …… (86)
Madao …… (82)
Madouling …… (86)
Mahuang …… (520)
Maidong …… (254)
Maifanshi …… (256)
Manao …… (252)
Mangxiao …… (208)
Maodongqing …… (108)
Maogen …… (110)
Maomei …… (324)
Matiluo …… (88)
Maweilian …… (84)
Mengchong …… (406)
Mingdangshen …… (336)
Molihua …… (316)
Moyao …… (286)
Mubiezi …… (98)
Mudanpi …… (276)
Mugua …… (94)

Muhao …… (276)
Muhudie …… (98)
Mumadou …… (338)
Muxiang …… (96)
Muzei …… (96)

N

Nanshanzha …… (390)
Nantianzhuye …… (392)
Niubangzi …… (112)
Niubian …… (114)
Niuhuang …… (110)
Niuxi …… (112)
Nongjili …… (240)

O

Oudanggui …… (330)

P

Paorong …… (362)
Paotongguo …… (370)
Paotonghua …… (370)
Peilan …… (342)
Pianjianghuang …… (116)
Pingxionggui …… (134)
Pipaye …… (310)
Pishi …… (400)
Poxiao …… (208)

Q

Qiancao …… (392)
Qianghuo …… (290)
Qianhu …… (418)
Qianjinba …… (66)
Qianniuzi …… (402)
Qianqucai …… (68)
Qianshi …… (268)
Qidai …… (456)
Qingdai …… (308)
Qinghao …… (308)
Qingmengshi …… (310)
Qingmuxiang …… (304)
Qingpi …… (306)
Qingxiangzi …… (306)
Qinjiao …… (430)
Quanshen …… (476)
Quanxie …… (234)
Quanyeqinglan …… (234)
Queweng …… (508)

R

Rendongteng …… (300)
Renshen …… (22)
Renshenlu …… (28)
Renshenxu …… (30)
Renshenye …… (28)
Renzhongbai …… (20)
Roucongrong …… (220)
Roudoukou …… (220)
Ruxiang …… (342)

S

Sanfensan …… (36)
Sangbaipi …… (478)
Sangjisheng …… (480)
Sangpiaoxiao …… (480)
Sangzhi …… (478)
Sanleng …… (38)
Sanqi …… (34)
Sanyousuozixie …… (36)
Shancigu …… (66)
Shandougen …… (60)
Shanhu …… (380)
Shannai …… (64)
Shanxini …… (66)
Shanyao …… (60)
Shanyinchaihu …… (64)
Shanzhima …… (58)
Sharen …… (400)
Shayuanzi …… (286)
Shegan …… (452)
Shengma …… (114)
Shenjincao …… (278)
Shichangpu …… (146)
Shigao …… (152)
Shihu …… (146)

Shijie …… (150)
Shijueming …… (142)
Shijunzi …… (340)
Shilianzi …… (144)
Shiliuhuang …… (148)
Shiliupi …… (150)
Shinanteng …… (144)
Shinanye …… (148)
Shixie …… (154)
Shiyan …… (152)
Shouzhangshen …… (108)
Shuibanxia …… (126)
Shuihonghuazi …… (128)
Shuiniujiao …… (126)
Shuizhi …… (130)
Shuizhizi …… (128)
Sigualuo …… (198)
Siguateng …… (198)
Songxiang …… (312)
Sumu …… (270)

T

Taoren …… (434)
Tiandong …… (90)
Tianhuafen …… (92)
Tianluo …… (164)
Tianma …… (94)
Tianzaojiao …… (162)
Tianzhuhuang …… (92)
Tiesiweilingxian …… (448)
Tougucao …… (450)
Tubiechong …… (46)
Tudahuang …… (40)
Tudangshen …… (46)
Tuersan …… (364)
Tufuling …… (44)
Tujingpi …… (44)
Tumuxiang …… (42)
Tuniuxi …… (42)
Tusizi …… (484)

W

Walengzi …… (100)
Wangbuliuxing …… (100)
Wenjing …… (236)
Wubeizi …… (104)
Wuguchong …… (102)
Wuhuaguo …… (90)
Wulianmei …… (118)
Wulingzhi …… (102)
Wushaoshe …… (118)
Wutongye …… (482)
Wuyi …… (260)

X

Xiangbaji …… (408)
Xiangchacai …… (410)
Xiangfu …… (408)
Xiangyuan …… (410)
Xianmao …… (166)
Xianqiao …… (446)
Xiaoguoqiangweigen …… (78)
Xiaohuixiang …… (78)
Xiaoji …… (80)
Xiaolingdan …… (76)
Xiaotongcao …… (80)
Xihonghua …… (210)
Xijiao …… (526)
Ximing …… (482)
Xinyi …… (284)
Xixin …… (374)
Xiyangshen …… (212)
Xuanjingshi …… (194)
Xuanshen …… (192)
Xuchangqing …… (454)
Xuejie …… (232)
Xuelianhua …… (506)
Xuesanshu …… (232)
Xueshangyizhihao …… (504)
Xueyutan …… (230)

Y

Yanbaicai …… (336)
Yanggan …… (240)

Yangmeipi …… (260)
Yangqishi …… (240)
Yanhusuo …… (228)
Yanjingwangshe …… (510)
Yansongshugu …… (338)
Yanyangjiao …… (336)
Yazhicao …… (446)
Yazhunyi …… (446)
Yemingsha …… (368)
Yibeimu …… (226)
Yimucao …… (474)
Yinchen …… (394)
Yinqishi …… (242)
Yiyeqiu …… (14)
Yizhi …… (476)
Yizhihao …… (16)
Yizhihuanghua …… (14)
Youlizhiluo …… (418)
Yu …… (134)
Yuanzhi …… (256)
Yubiao …… (366)
Yujin …… (326)
Yunmushi …… (88)
Yunxiangcao …… (262)
Yuputaogen …… (136)
Yuxingcao …… (364)
Yuyuliang …… (412)
Yuzhu …… (136)

Z

Zaojia …… (280)
Zaozhui …… (426)
Zelan …… (370)
Zexie …… (372)
Zhanlongcao …… (326)
Zhanlongjian …… (328)
Zhebeimu …… (458)
Zhenzhu …… (376)
Zhenzhumei …… (378)
Zhenzhumu …… (378)
Zhimu …… (340)
Zhiqiao …… (380)
Zhishi …… (382)
Zhizi …… (384)
Zhongrushi …… (406)
Zhujieshen …… (222)
Zhuru …… (222)
Zhusha …… (224)
Zhushagen …… (224)
Zirantong …… (230)

动植物学名索引

A

Abrus cantoniensis Hance …… (302)
Abrus mollis Hance …… (302)
Acacia catechu (L.) Willd …… (30)
Acanthochiton rubrrolineatus (Lischke) …… (462)
Acanthopanax santicosus (Rupr. et Maxim.) Harms …… (314)
Achillea allpina L. …… (16)
Achyranthes aspera L. …… (42,450)
Achyranthes bidentata Bl. …… (112)
Achyranthes longifolia Mak. …… (42)
Acipenser dabrganus Dumeril …… (336)
Acipenser schrenski (Brandt) …… (336)
Acipenser sinensis Gray …… (336)
Aconitum brachypodum Diels …… (504)
Aconitum carmichaeli Debx. …… (72,298)
Aconitum pendulum Busch …… (504)
Aconitum subrosullatum H. -M. …… (504)
Acorus gramineus Soland. …… (146)
Aeschynomene indica L. …… (162)
Ahstolochia debilis Sieb. et Zucc. …… (304)
Albizzia julibrissin Durazz. …… (236)
Albizzia ralrora (Roxb.) Prain …… (230)
Alisma orientalis (Sam.) Juzep. …… (372)
Allolobophora caliginosa (*Savigny*) *trapezoides* (Ant. Deges) …… (202)
Aloe feror Miller …… (268)
Aloe vera L. …… (268)
Alpinia galanga (L.) Willd. …… (50)
Alpinia officinarum Hance. …… (458)
Alpinia oxyphylla Miq. …… (476)
Alyxia sinensis Champ. ex Benth. …… (294)
Amomum compactum Soland et Maton …… (176)
Amomum kravanh Pirre ex Gagnep. … (176)
Amomum longiligulare T. L. Wu …… (400)
Amomum villosum Lour. …… (400)
Amomum villosum Lour. *var. xanthiodes* T. L. Wu et Senjen …… (400)
Ampelopsis delavayana (Franch.) Planch. …… (136)
Anas platyrhynchos domestica (Linnaeus) …… (446)
Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees …… (420)
Anemarrhena asphodeloides Bge. …… (340)
Anemone hupehensis Lem. …… (132)
Angelica acutiloba Kitagawa …… (216)
Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. …… (178)
Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. *f. var. formosana* (Boiss.) Sham et Yuan …… (178)
Angelica pubescens Maxim. *f. biserrata* Shan et Yuan …… (414)
Angelica sinensis (Oliv.) Diels. …… (216)
Anisodus acutangulus C. Y. Wu et C. Chen …… (36)
Anisodus luridus Link. et Orto *var. fischeriamis* (Pasch.) C. Y. Wu et C. Chen …… (36)
Apocynum venetum L. …… (338)
Aquilaria agallocha Roxb. …… (288)
Aquilaria sinensis (Lour.) Gilg. …… (288)
Aralia elata (Miq.) Seem. …… (314)
Arca granosa Linnaeus …… (100)
Arca inflata Reeve …… (100)
Arca subcrenata Lischke …… (100)
Arctium lappa L. …… (112)

Ardisia crenata Sims …… (224)
Areca catechu L. …… (58,528)
Arenaria juncea Bieb. …… (64)
Arenaria serphllifolia L. …… (426)
Aristolochia contorta Bge. …… (86)
Aristolochia debilis Sieb. et Zucc. ……
…… (86,304)
Aristolochia fangchi Y. C. Wu ex Chow et S. M. Wang …… (74)
Aristolochia manshuriensis Kom. …… (238)
Artemisia annua L. …… (308)
Artemisia capillaris Thunb. …… (394)
Artemisia japonica Thunb. …… (276)
Artemisia scoparia Waldst. et Kit. …… (394)
Asarum forbesii Maxim. …… (260)
Asarum heterotropoides Fr. Schimidt *var. mandshuricum* (Maxim.) Kitag. …… (374)
Asarum sieboldii Miq. …… (374)
Asarum sieboldii Miq. *var. seoulense* Nakai …… (374)
Asparagus cochinchinensis (Lourero) Merrill …… (90)
Aspongopus chinensis Dallas …… (32)
Asterage ratoides Turcz. …… (250)
Astragalus complanatus R. Br. …… (286)
Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge. …… (492)
Astragalus membranaceus Bge. *var mongholicus* (Bge.) Hsiao …… (492)
Atractylodes chinensis (DC.) Koidz. … (264)
Atractylodes lancea (Thunb.) DC. …… (264)
Atractylodes macrocephala Koidz. …… (170)
Aucklandia lappa Decne. …… (96)

B

Bambusa breviflora Munro …… (222)
Bambusa textilis Mclure …… (92)
Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek. …… (308)
Batrachuperus pinchonii (David.) …… (66)
Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. …… (188)
Belamcanda chinensis (L.) DC. …… (452)
Bellamya purificata (Heude) …… (190)
Bellamya quadrata (Benson) …… (190)
Bergenia purpurascens (Hook. f. et Thams.) Engl. …… (336)
Betula platyphylla Suk. …… (432)
Betula platyphylla Suk. *var. japonica* (Sieb.) Hara …… (432)
Bidens bipinnata L. …… (412)
Biota orientalis (L.) Endl. …… (342,384)
Bletilla striata (Thunb.) Reichb. f. … (168)
Bombyx mori L. …… (188,428)
Bos taurus domesticus Gmelin……
…… (110,114,488)
Boswellia carterii Birdw. …… (342)
Bubalus bubalis L. …… (114,126)
Bufo bufo gargarizans Cantor …… (40)
Bungarus fasciatus (Scheneider) …… (346)
Bungarus multicinctus multicinctus Blyth. …… (348)
Bupleurum chinense DC. …… (440)
Bupleurum falcatum Linne. …… (442)
Bupleurum scorzonerifolium Willd. …… (440)
Buthus martensii Karsch. …… (234)

C

Caesalpinia sappan L. …… (270)
Campanumoea javanica Bl. …… (46)
Campanumoea javanica Bl. *var. japonica* (Makino) Hong …… (46)
Canavalia gladiata (Jacq.) DC. …… (32)
Canis familiaris L. …… (358,360)
Capparis masaikai Levl. …… (86)
Capra hircus Linnaeus …… (240)
Capreolus capleolus Linnaeus …… (362)
Carassius acuratus (L.) …… (346)
Cayratia japonica (Thunb.) Gagn. …… (118)
Celosia argentea L. …… (306)
Celosia cristata Linne. …… (304)
Centella asiatica (L.) Urb. …… (448)

Cephalanoplos segetum (Bge.) Kitam. …… (80)
Cervus elaphus L. …… (512,514,518)
Cervus nippon Temminck …… (512,514,518)
Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne …… (94)
Chaenomeles speciosa (Sweet.) Nakai … (94)
Changium smyrnioides Wollf. …… (336)
Chinemys reevesii (Gray) …… (282)
Chlorostoma nigerrima (Gmelin) …… (88)
Chlorostoma rusticum (Gmelin) …… (88)
Chrysanthemum morifolium Ramat. …… (486)
Chrysomyia megacephala (Fab.) …… (102)
Cibotium baromeitz (L.) J. Sm. …… (360)
Cimicifuga dahurica (Turcz.) Maxim. …… (114)
Cimicifuga foetida L. …… (114)
Cimicifuga heracleifolia Kom. …… (114)
Cinnamomum cassia Presl. …… (430)
Cinnamomum mairei Levl. …… (372)
Cipangopaludina cathynensis (Heude) …… (164)
Cipangopaludina chinensis (Gray) …… (164)
Cistanche deserticola Y. C. Ma …… (220)
Citrus aurantium L. …… (380,382)
Citrus aurantium L. *var. daidai* Makino …… (382)
Citrus grandis (L.) Osbeck. …… (106)
Citrus grandis Tomentosa …… (106)
Citrus medica L. …… (410)
Citrus medica L. *var. sarcodactylis* Swingle …… (280)
Citrus milsonii Tanaka …… (410)
Citrus natsudaidai Hayata …… (382)
Citrus reticulata Blanco …… (306)
Clarias fuscus (Lacepeda) …… (386)
Clematis armandii Franch. …… (70)
Clematis montana Buch -Ham. …… (70)
Clemmys mutica (Cantor) …… (500)
Clerodendron bungei Steud. …… (452)
Clerodendron trichotomum Thunb. …… (452)
Clinopodium chinensis (Benth.) Kuntze …… (120)
Cnidium officinale Makino …… (72)
Cnidocampa flavescens (Walker) …… (508)
Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf …… (444)
Codonopsis pilosula Nannf. *var. modesta* L. T. Shen …… (444)
Codonopsis tangshen Oliv. …… (444)
Commelina communis L. …… (446)
Commiphora myrrha Engl. …… (286)
Coptis chinensis Franch. …… (492)
Coptis deltoidea C. Y. Cheng et Hsiao …… (492)
Coptis japonica Makino …… (494)
Coptis omeiensis (Cheng) C. Y. Cheng …… (492)
Coptis teetoides C. Y. Cheng …… (492)
Corallium elatius Pidley …… (380)
Corallium japonicum Kishinouye …… (380)
Corbicula fluminea (Muller) …… (446)
Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc. …… (168)
Corydalis turtschaninovii Bess. *f. yanhusuo* Y. H. Chou et C. C. Hsu …… (228)
Crataegus cuneata Sieb. et Zucc. …… (390)
Cremastra appendiculata (D. Don) Makino …… (66)
Cristaria plicata (Leach) …… (378)
Crocus sativus L. …… (210)
Crotalaria sessiliflora L. …… (240)
Croton tiglium L. …… (124)
Cudrania cochinchinensis (Lour.) Kudo et Masam. …… (422)
Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur. …… (422)
Curculigo orchioides Gaertn. …… (166)
Curcuma aeruginosa Roxb. …… (326)
Curcuma aromatica Salisb …… (326)
Curcuma kwangsiensis S. Lee et C. F. Ling …… (326,438)

Curcuma longa L. …… (326,424)
Curcuma phaeocaulis Valeton …… (438)
Curcuma wenyujin Y. H. Chen et C. Ling …… (116,326)
Curcuma zedoaria Rosc. …… (326)
Cuscuta chinensis Lam. …… (484)
Cuscuta japonica Choisy …… (52)
Cybister japonicus Sharp …… (156)
Cybister tripunctatus orientalis Gschew. …… (156)
Cyclea racemosa Oliv. …… (328)
Cyclea hypoglauca (Schauer) Diels …… (216)
Cymbopogon distans (Nees) A. Camus …… (262)
Cynanchum paniculatum (Beg.) Kitag. …… (454)
Cynops orientalis (David) …… (142)
Cyperus rotundus L. …… (408)
Cyrtiospirifer sinensis (Graban) …… (152)
Cyrtiospirifer sp. …… (152)

D

Daemonorops draco Bl. …… (232)
Dalbergia odorifera T. Chen …… (374)
Dendrobium candidum Wall. ex Lindl. …… (146)
Dendrobium chrysanthum Wall. …… (146)
Dendrobium fimbriatum Hook. …… (146)
Dendrobium loddigesii Rolfe. …… (146)
Dendrobium nobile Lindl. …… (146)
Desmodium styracifolium (Osb.) Merr. …… (74)
Dichroa febrifuga Lour. …… (508)
Dictamnus dasycarpus Turcz. …… (188)
Diodon holacanthus Linnaeus …… (284)
Diodon novemaculatum Bleeker …… (284)
Dioscorae opposita Thunb. …… (60)
Doellingeria scaber (Thunb.) Nees …… (140)
Dracaena cambodiana Pierre. …… (154)
Dracaena cochinchinensis (Lour.) S. C. Chen …… (154)
Dracocephalum integribolium Bge. …… (234)

E

Ephedra equisetina Bga. …… (520)
Ephedra intermedia Schyenk. et C. A. Mey. …… (520)
Ephedra sinica Stapf. …… (520)
Equisetum arvense L. …… (236)
Equisetum hiemale L. …… (96)
Equus asinus L. …… (296,304)
Equus caballus (L.) …… (84)
Eretmochelys imbricata Linnaeus …… (376)
Erinaceus eucopaeus L. …… (316)
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. …… (310)
Eriocaulon buergerianum Koern. …… (282)
Erodium stephanianum Willd. …… (210)
Erycibe obtusifolia Benth. …… (16)
Eucommia ulmoides Oliv. …… (258)
Eugenia caryophyllata Thunb. …… (18)
Euonymus alatus (Thunb.) Sieb. …… (414)
Eupatorium fortunei Turcz. …… (342)
Euphorbia ebiacteolata Hayata. …… (456)
Euphorbia fischeriana Stead. …… (456)
Euphorbia hirta L. …… (82)
Euphorbia humifusa Willd. …… (206)
Euphorbia kansui T. N. Liou ex T. P. Wang …… (138)
Euphorbia maculata L. …… (206)
Euphorbia pekinensis Rupr. …… (366)
Euphoria longan Lam. …… (160)
Eupolyphaga sinensis Walker …… (46)
Euryale ferox Salisb. …… (268)

F

Fagopyrum cymosum (Trev.) Meisn. …… (348)
Ferula assafoetida L. …… (296)
Ferula fukanensis K. M. Shen …… (296)
Ferula sinkiangensis K. M. Shen …… (296)
Ficus carica L. …… (90)
Firmiana simplex (L.) W. F. Wight

…… (482)
Foeniculum vulgare Mill. …… (78)
Fritillaria cirrhosa D. Don …… (70)
Fritillaria delavayi Franch. …… (70)
Fritillaria pallidiflora Schrenk …… (226)
Fritillaria przewalskii Maxim. …… (70)
Fritillaria thunbergii Miq. …… (458)
Fritillaria unibracteata K. C. Hsiao …… (70)
Fritillaria walujewii Regel …… (226)

G

Gallus gallus domesticus Brisson …… (300)
Gardenia jasminoides Ellis. …… (384)
Gardenia jasminoides Ellis. *var. grandiflora* (Lour.) Makin …… (128)
Gastrodia elata Blume …… (94)
Gekko gecko (Linnaeus) …… (524)
Gentiana crassicaulis Duthie ex Burk. …… (430)
Gentiana dahurica Fisch. …… (430)
Gentiana macrophylla Pall. …… (430)
Gentiana manshurica Kitag. …… (158)
Gentiana rigescence Franch. …… (158)
Gentiana scabra Bge. …… (158)
Gentiana straminea Maxim. …… (430)
Gentiana triflora Pall. …… (158)
Geranium wilfordii Maxim. …… (210)
Ginkgo biloba L. …… (182)
Glechoma longituba (Nakai) Kupr. …… (274)
Gleditsia sinensis Lamarch …… (280)
Glehnia littoralis Fr. Schmidt ex Miq. …… (162)
Glycyrrhiza glabra L. …… (138)
Glycyrrhiza inflata Bat. …… (138)
Glycyrrhiza uralensis Fisch. …… (138)
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. …… (108)
Gymnocladus chinensis Baillon …… (362)
Gynostema pentaphyllum (Thunb.) Makino …… (428)
Gynura sagetum (Lour.) Merr. …… (484)

H

Haliotis asinina Linnaeus …… (142)
Haliotis discus hannai Ino …… (142)
Haliotis diversicolor Reeve …… (142)
Haliotis ovina Gmelin …… (142)
Haliotis ruber (Leach) …… (142)
Hedera nepalensis K. Koch *var. sinensis* (Tobl.) Rehd. …… (510)
Helicteres angustifoia L. …… (58)
Helwingia japonica (Thunb.) Dietr. … (80)
Hemicentrotus pulcherrimus (A. Agassiz) …… (466)
Hemiechianus auritus Gmelin …… (316)
Hemiechianus dauricus Sundevall …… (316)
Hepialus armoricanus Oberthiir …… (168)
Hierodula patellifera (Serville) …… (480)
Hippocampus histrix Kaup. …… (460)
Hippocampus japonicus Kaup …… (460)
Hippocampus kelloggi Jordan et Snyder. …… (460)
Hippocampus kuda Bleeker. …… (460)
Hippocampus trimaculatus Leach …… (460)
Hirudo nipponica Whitman …… (130)
Houttuynia cordata Thunb. …… (364)
Huechys sanguinea De Geer …… (250)
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Seringe. *var. thunbergii* Makino … (18)
Hypericum ascyron L. …… (246)
Hypophthalmichthys molitrix (Cuvier et Valenciennes) …… (190)
Hyriopsis cumingii (Lea.) Valenciennes …… (378)

I

Ilex cornuta Lindl. …… (132,318)
Ilex latifolia Thunb. …… (318)
Ilex pubescens Hook. et Arn. …… (108)
Illicium verum Hook. f. …… (20)
Imperata cylindrica Beauv. *var. major* G. E. Hubb. …… (180)
Inpatiens balsamina L. …… (450)
Inula helenium L. …… (42)

Inula japonica Thunb. …… (344)
Inula linariifolia Turcz. …… (344)
Isatis indigodica Fort. …… (312)
Isatis tinctoria L. …… (308)
Isodon glaucocalys (Maxim.) Kudo … (410)
Ixeris denticulata (Houtt.) Stebb. …… (322)

J

Jasminum sambac Aiton …… (316)
Juglans regial L. …… (388)

K

Kaempferia galanga L. …… (64)
Knoxia valerianoides Thorel et Pitard. …… (246)

L

Lapis micae Aureus …… (356)
Leibnitzia anandria (L.) Turcz. …… (48)
Leonurus heterophyllus Sweet …… (398,474)
Levisticum officinale Koch. …… (330)
Ligusticum chuanxiong Hort. …… (72)
Ligusticum sinensis Oliv. *cv. chaxiong* Mss. …… (72)
Lilium brownii F. E. Brown *var. viridulum* Baker …… (212)
Lilium lancifolium Thunb. …… (212)
Lilium pumilum DC. …… (212)
Lonicera confusa (Sweet) DC. …… (350)
Lonicera dasystyla Rehd. …… (350)
Lonicera hypoglauca Miq. …… (350)
Lonicera japonica Thunb. …… (300,350)
Luffa acutangula Roxb. …… (198)
Luffa cylindrica (L.) Roem. …… (198)
Lycium barbarum L. …… (202)
Lycium chinense Mill. …… (202)
Lycopodium japonicum Thunb. …… (278)
Lycopus lucydus Turcz. *var. hirtus* Regel …… (370)
Lysimachia christinae Hance …… (350)
Lysimachia vulgaris L. *var. davurica* (Ledeb.) R. Knuth …… (496)
Lythrum salicaria L. …… (68)

M

Macaca mulatta Zimmermann …… (526)
Macreophtalmus latreilli Edw. …… (154)
Magnolia biondii Pamp. …… (284)
Magnolia denudata Desr. …… (284)
Magnolia kobus Decandolle …… (284)
Magnolia liliflora Desr. …… (284)
Magnolia officinalis Rehd. et Wils. …… (402,404)
Magnolia officinalis Rehd. et Wils. *var. biloba* Rehd. et Wils. …… (402,404)
Magnolia salicifolia Maximowicz …… (284)
Magnolia sprengeri Pamp. …… (284)
Mahonia bealei (Fort.) Carr. …… (130)
Mahonia fortunei (Lindl.) Fedde …… (130)
Manis pentadactyla Linnaeus …… (420)
Melia azedarach L. …… (324)
Melia toosendan Sieb. et Zucc. …… (324)
Mellettia dielsiana Harms ex Diels …… (302)
Mitella mitella (Linnaeus)…… (150)
Moghania philippinensis (Merr. et Rolfe) Li …… (66)
Momordica cochinchinensis (Lour.) Spr. …… (98)
Monetaria annubus (L.) …… (106)
Monetaria moneta (L.) …… (106)
Morinda officinalis How. …… (124)
Morus alba L. …… (478)
Myrica rubra Siebold et Zuccarini …… (260)
Myristica fragrans Houtt …… (220)

N

Nandiana domestica Thunb. …… (392)
Natrix tigrina laterlis (Berthord) …… (332)
Nelumbo nucifera Gaertn. …… (144,436,440)
Notopterygium forbesii Boiss …… (290)
Notopterygium incisum Ting ex H. T. Chang …… (290)

O

Ophiophagus hannah (Cantor) …… (510)

Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker-Gawl. …… (254)
Opisthopatia orientalis Burm. …… (140)
Oroxylum indicum (L.) Vent. …… (98)
Osbeckia chinensis L. …… (352)
Ovis aries Linnaeus …… (240)

P

Paeonia lactiflora Pall. …… (174,272)
Paeonia suffruticosa Ander. …… (276)
Paeonia veitchii Lynch …… (272)
Panax ginseng C. A. Mey. …… (22,26,28,29)
Panax japonicus C. A. Mayer …… (222)
Panax notoginseng (Burk. F. H. Chen …… (34)
Panax quinquefolium L. …… (212)
Panthera tigris L. …… (330,332,334)
Patiria pectinifera (Muller et Troschel) …… (470)
Paulownia fortunei (Seem.) Hemsl. … (370)
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. …… (370)
Pegasus laternarius (Cuvier) …… (468)
Pegasus volitans Cuvier …… (468)
Pelteobagrus fulvidraco (Richardson) …… (504)
Penaeus orientalis Kishinouye …… (198)
Perilla frutescens (L.) Britton …… (178)
Peucedanum decursivum (Miq.) Maxim. …… (418)
Peucedanum praeruptorum Dunn. …… (418)
Pharbitis nil (L.) Choisy …… (402)
Pharbitis purpurea (L.) Voight …… (402)
Phellodendron amurense Rupr. …… (496,498)
Phellodendron chinense Schneid. …… (496)
Pheretima aspergillum (Perrier) …… (202)
Photinia serrulata Lindl. …… (148)
Phragmites communis Trin. …… (270)
Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro *var. henonis* Mitf. Stapf. ex Rendle … (222)
Physeter cotodon Linnaeus …… (160)
Physochlainia infundibularis Kuang … (228)
Picrasma quassioides (D. Don) Benn. …… (318,322)
Picrorhiza scrophulariifolia Pennel …… (388)
Pinellia pedatisecta Schott …… (334)
Pinellia ternata Breit. …… (194,196)
Pinus massoniana Lamb. …… (312)
Pinus tabulaeformis Carr. …… (312)
Pinus yunnanensis Franch. …… (312)
Piper kadsura (Choisy) Ohwi. …… (462)
Piper nigrum L. …… (388)
Piper wallichi (Miq.) Hand. Mazz. *var. hupehense* (DC.) Hand.-Mazz. … (144)
Placuna placenta (Linnaeus) …… (460)
Plantago asiatica L. …… (104)
Plantago depresse Willd. …… (104)
Platicodon grandiflorum (Jacq.) A. DC. …… (432)
Pleioblastus amarum (Keng) Keng f. …… (320)
Pltysternon megacephallum Gray …… (134)
Pogostemon cablin (Blanco) Benth. …… (76)
Polygala chinesis L. …… (344)
Polygala sibirica L. …… (256)
Polygala telephioides Willd. …… (344)
Polygala tenufolia Willd. …… (256)
Polygonatum cyrtonema Hua …… (502)
Polygonatum kingianum Coll. et Hemsl. …… (502)
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce …… (136)
Polygonatum sibiricum Red. …… (502)
Polygonum bistorta L. …… (476)
Polygonum chinense L. …… (122)
Polygonum chinense L. *var. hispidum* Hook. f. …… (122)
Polygonum cillinerve (Nakai) Ohwi … (248)
Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc. …… (330)

Polygonum multiflorum Thunb. …… (278)
Polygonum orientale L. …… (128)
Polygonum paleaceum Wall. …… (394)
Polygonum tinctorium Ait. …… (308)
Poncirus trifoliata Rafinesque -Schmaltz …… (386)
Poria cocos (Schw.) Wolf …… (396)
Portunus trituberculatus (Miers) …… (36)
Procapra gutturosa Pallas …… (488)
Prunus armeniaca L. …… (320)
Prunus armeniaca L. *var. ansu* Maxim. …… (320)
Prunus davidiana (Carr.) Franch. …… (434)
Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne …… (320)
Prunus persica (L.) Batsch …… (434)
Prunus sibirica L. …… (320)
Pseudois nayaur (Hodgson) …… (336)
Pseudolarix kaempferi Gord. …… (44)
Pseudosciaena crocea (Rich.) …… (366)
Pseudosciaena polyactis Bleeker …… (366)
Psoralea corylifolia L. …… (292)
Pteria martensii (Dunker) …… (376,378)
Pteroxygonum giraldii Drammer et Diels. …… (248)
Punica granatum L. …… (150)
Purpura clavigera Kuster …… (418)

Q

Quisqualis indica L. …… (340)

R

Rana amurensis Boulenger …… (526)
Rana temporaria chensinensis David …… (522,526)
Ranunculus japonicus Thunb. …… (110)
Rapana renosa (Valenciennes) …… (472)
Raphanus sativus L. …… (434)
Rehmannia glutinosa Libosch. …… (204)
Rheum officinale Baill. …… (52)
Rheum palmatum L. …… (52)
Rheum tanguticum Maxim. ex Balff. … (52)
Rhinoceros sondaicus Desmarest …… (526)
Rhinoceros sumatrensis (Fisch.) …… (526)
Rhinoceros unicornis L. …… (526)
Rhus chinensis Mill. …… (104)
Rhus potaninii Maxim. …… (104)
Rhus punjabensis Stew. *var. sinica* (Diels.) Rehd. et Wils. …… (104)
Rosa laevigata Michx. …… (354)
Rosa multiflora Thunb. …… (78)
Rubia cordifolia L. …… (392)
Rubus parvifolius L. …… (324)
Rumex obtusifolius L. …… (40)

S

Saiga tatarica L. …… (522)
Salvia bowleyana Dunn. …… (120)
Salvia miltiorrhiza Bge. …… (120)
Salvia plebeia R. Br. …… (398)
Sambucus williamsii Hance …… (506)
Sanguisorba officinalis L. …… (206)
Sanguisorba officinalis L. *var. longifolia* (Bert.) Yu et Li …… (206)
Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk. …… (244)
Sargassum fusiforme (Harv.) Setch. …… (472)
Sargassum pallidum (Turn.) C. Ag. …… (472)
Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils. …… (48)
Saussutea medusa Maxim. …… (506)
Schisandra propinqua (Wall.) Baill *var. sinensis* Oliv. …… (408)
Schizonepeta teniufolia Briq. …… (390)
Schizostachyum chinense Rendle …… (92)
Sciurotamias davidianus Milne. -Edwards …… (338)
Scrophularia ningpoensis Hemsl. …… (192)
Scutellaria baicalensis Georgi …… (490)
Securinega suffruticosa (Pall.) Rehd. … (14)
Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring

…… (274)
Senecio argunensis Turcz. …… (326)
Senecio integrifolius (L.) Clairvill. *var. fauriei* (Levl.) et Vant. Kitam. …… (356)
Sepia esculenta Hoyle …… (470)
Sepiella maindronide Rochebrune …… (470)
Setaria viridis (L.) Beauv. …… (358)
Silene jenisseesis Willd. …… (64)
Sinocalamus beecheyanus (Munro) Mcclure *var. pubescens* P. F. Li …… (222)
Sinomenium actum Rehder et Wilson …… (242)
Smilax glabra Roxb. …… (44)
Smilax scobinicaulis C. H. Wright. …… (448)
Smilax sieboldii Miq. …… (448)
Solen gouldi Conrad …… (82)
Solen grandis Dunker …… (82)
Solenognathus narduickii (Gray) …… (464)
Solidago decurrens Lour. …… (14)
Sophora tonkinensis Gapnep. …… (60)
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. …… (378)
Sparganium stoloniferum Buch.-Ham. …… (38)
Spatholobus suberectus Dunn. …… (302)
Speranskia tuberculata (Bge.) Baill. … (450)
Stachyurus chinensis Franch. …… (80)
Stachyurus himalaicus Hook. f. et Thoms. …… (80)
Statilia maculata (Thunberg) …… (480)
Steleophaga plancyi (Boleny) …… (46)
Stemona japonica (Bl.) Miq. …… (214)
Stemona sessilifolia (Miq.) …… (214)
Stemona tuberosa Lour. …… (214)
Stephania cepharantha Hayata …… (184)
Stephania delavayi Diels …… (200)
Stephania dielsiana Y. C. Wu …… (232)
Stephania tetrandra S. Moore …… (242)
Stichopus japonicus Selenk …… (466)
Strongylocentrotus nudus (A. Agassiz) …… (466)
Styrax benzion Dryard …… (238)
Styrax tonkinensis (Pierre) Craib ex Hart. …… (238)
Swertia japonica Makino …… (218)
Syneilesis aconitifolia Maxim. …… (364)
Syngnathoides biaculeathus (Bloch) …… (464)
Syngnathus acus Linnaeus …… (464)

T

Tabanus bivittus Matsumura …… (406)
Taxillus chinensis (DC.) Danser …… (480)
Telphusa sp. …… (154)
Temnopleurus hardwickii (Gray) …… (466)
Temnopleurus toreumaticus (Leske) …… (466)
Tenodera sinensis Saussure …… (480)
Terminalia chebula Retz. …… (292)
Terminalia chebula Retz. *var. tomentella* Kurt. …… (292)
Testudo impressa (Guenther) …… (164)
Thalictrum cultratum Wall. …… (84)
Thalictrum foliolosum DC. …… (84)
Thalictrum glandulosissimum (Fin. et Gagn.) W. T. Wang et S. H. Wall. …… (84)
Thermopsis lanceolata R. Br. …… (338)
Thlaspi arvense L. …… (482)
Thymus mongolicus Ronn. …… (214)
Tinospora capillipes Gagnepo. …… (346)
Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnepo. …… (346)
Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. …… (426)
Trachyrhamphus serratus (Temminck seu Schlegel) …… (464)
Trichosanthes japonica Regel …… (92)
Trichosanthes kirilowii Maxim. …… (92,192)
Trichosanthes uniflora Hao …… (192)
Tridacna (Chamestrachea) squamosa (Linnaeus) …… (398)
Tripterospermum affine (Wall.) H. Smith.

…… (362)
Trogopterus xanthipes Milne -Edwards …… (102)
Tulipa edulis (Miq.) Baker …… (218)
Tydhonium giganteum Engl. …… (180)
Tylototriton verrucosus Anderson …… (252)
Typhonium flagelliforme (Lodd.) Blume …… (124)

U

Ulmus macrocarpa Hance. …… (260)
Uncaria gambier Roxb. …… (30)

V

Vaccaria segetalis (Neck.) Garcke …… (100)
Venerupis philippinarum (Adams et Reeve) …… (524)
Veronicastrum sibiricum (L.) Pennell …… (328)
Vespertilio superans Thomas …… (368)
Viola yedoensis Makino …… (200)
Vitex negundo L. …… (500)
Vitex negundo L. *var. cannabifolia* Hand.-Mazz. …… (500)
Vitex negundo L. *var. heterophylla* Rehd. …… (500)
Vladimiria souliei (Franch.) Ling …… (68)
Vladimiria souliei (Franch.) Ling *var. cinerea* Ling …… (68)

W

Whitmania acranulata Whitman …… (130)
Whitmania pigra Whitman …… (130)
Wikstroemia indica (L.) C. A. Mey. … (30)

X

Xanthium sibiricum Patr. …… (266)

Z

Zanthoxylum bungeaum Maxim. …… (262)
Zanthoxylum schinifolium Sieb. et Zucc. …… (262)
Zaocys dhumnades (Cantor) …… (118)
Zingiber officinale Rosc. …… (38)
Zizyphus jujuba Mill. *var. inermis* (Bge.) Rehd. …… (50)

药材英文名索引

A

Ackene of Great Burdock …… (112)
Actinolite …… (240)
Actinolite Brevifibre …… (242)
Agate …… (252)
A Khite Sediment Naturally Forming by People Urine …… (20)
Aloes …… (268)
Alpine Salamander …… (66)
Alum …… (182)
Ambergris …… (160)
American Ginseng …… (212)
Angolin Scales …… (420)
Anhydrite …… (116)
Antelope's Horn …… (522)
Areca Peel …… (58)
Ark Shell …… (100)
Arsenic …… (400)
Artificial Cinnabar …… (294)
Ass-hide Glue …… (296)
Atractylodes Rhizome …… (264)
Azurite …… (424)

B

Balloonfish Skin …… (284)
Balloonflower Root …… (432)
Bamboo Shavings …… (222)
Bark of Asian White Birch …… (432)
Bark of Chinese Corktree …… (496)
Bark of Chinese Waxmyrtle …… (260)
Bark of Golden Larch …… (44)
Bark of Officinal Magnolia …… (402)
Bark of Silktree Albizzia …… (236)
Bark of Szechwan Chinaberry …… (324)
Bark of Tree Falsespiraea …… (378)
Bat Dung …… (368)
Benzoin …… (238)
Best-quality Cinnamon …… (372)
Betel Nut …… (528)
Betrel …… (470)
Bezoar from Monkey …… (526)
Bharal Horn …… (336)
Big-headed Turtle Meat …… (134)
Bitter Apricot Seed …… (320)
Bitter Orange …… (380)
Black Pepper …… (388)
Black-snake …… (118)
Blue Crab Carapace …… (36)
Bone of Sea Urchim …… (466)
Branch of Clovetree …… (16)
Bulb of Edible Tulip …… (218)
Bulb of Siberian Fritillary …… (226)
Bulb of Tendrilleat Fritillary …… (70)
Bulb of Thunberry Fritillary …… (458)

C

Calamine …… (368)
Calcite …… (122)
Carapax et Plastrum Testudonis Impressae …… (164)
Cassia Twig …… (430)
Catechu …… (30)
Cattle Horn …… (488)
Chalcanthite …… (416)
Chalk …… (186)
Charred Human Hair …… (230)
Chinese Angelica …… (216)
Chinese Asafetida …… (296)
Chinese Caterpillar Fungus …… (168)
Chinese Gentian …… (158)
Chinese Nut-gall …… (104)
Chinese Pricklyash …… (262)
Chinese Rock Squirrel Bone …… (338)
Chloride …… (184)
Chlorite-schist …… (310)
Chrysanthemum …… (486)

Cinnabar …… (224)
Citron Fruit …… (410)
Clove …… (18)
Cockscomb Flower …… (304)
Colophong …… (312)
Concretion in Bamboo Stem …… (92)
Coptis Root …… (492)
Coral …… (380)
Corbicula Shell …… (446)
Corpse of Silkworm …… (188)
Corydalis Rhizome …… (228)
Costus-root …… (96)
Cow-bezoar …… (110)
Croton Seed …… (124)
Crude Slphur …… (148)
Crystal of Mercuric Chloride and Mercurous Chloride …… (184)
Cypraea Shell …… (106)

D

Dan-shen …… (120)
Deerhorn …… (512)
Deer Horn Glue …… (514)
Deer Sinew …… (518)
Deer Tail …… (512)
Dendrobium Stem …… (146)
Desertliving Cistanche …… (220)
Dodder Seed …… (484)
Dogbane Leaf …… (338)
Dog Stone …… (360)
Dogwinkle Shell …… (418)
Dragonhead Herb …… (234)
Dragon's Blood …… (154,232)
Dragon's Bone …… (158)
Dragon's Teeth …… (156)
Dried Chinese Forest Frog …… (522)
Dried Ginger …… (38)
Dried Oviduct Fat of Chinese Forest Frog …… (526)
Dried Toad …… (40)
Dutchmanspipe Fruit …… (86)
Dutchmanspipe Root …… (304)

E

Earth Worm …… (202)
Ephedra …… (520)
Eucommia Bark …… (258)
Eucommia Leaf …… (258)

F

Fangchi Root …… (74)
Fennel Fruit …… (78)
Fibrous Root of Ginseng …… (30)
Fig …… (90)
Figwort Root …… (192)
Finger Citron …… (280)
Flower Bud of Officinal Magnolia …… (404)
Flower of Arabian Jasmine …… (316)
Flower of Buerger Pipewort …… (282)
Flower of Feather Cockscomb …… (306)
Flower of Fleshfingered …… (280)
Flower of Fortune Paulownia …… (370)
Fossil Crab …… (154)
Fossil Shell of Spirifer …… (152)
Frankincense …… (342)
Fruit of Cape Jasmine …… (384)
Fruit of Cherockee Rose …… (354)
Fruit of Chinese Honeylocust …… (280)
Fruit of Common Floweringquince …… (94)
Fruit of Fortune Cape Jasmine …… (128)
Fruit of Malaytea Scurfpea …… (292)
Fruit of Medicine Terminalia …… (292)
Fruit of Negundo …… (500)
Fruit of Prince's Feather …… (128)
Fruit of Rangooncreeper …… (340)
Fruit of Round Cardamon …… (176)
Fruit of Royal Paulownia …… (370)
Fruit of Sharpleaf Galangal …… (476)
Fruit of Siberian Cocklebur …… (266)
Fruit of Villous Amomus …… (400)
Fruit of White Perilla …… (178)
Furnace Soil …… (226)

G

Gadfly …… (406)
Gansui Root …… (138)
Ginkgo Seed …… (182)
Ginseng …… (22)
Ginseng Leaf …… (28)
Gingseng Rhizome …… (28)
Glue of Tortoise Plastron …… (284)
Gold-banded Krait …… (346)
Goldfish …… (346)
Gold Foil …… (352)
Green Tangerine Peel …… (306)
Ground Beetle …… (46)
Grystal of Mercuic Chloride and Mercurous Chloride …… (184)
Gypsum …… (152)

H

Hairy Deerhorn …… (514)
Halloysite …… (488)
Hawksbill Shell …… (376)
Hedgehog Gall …… (316)
Hedgehog Skin …… (316)
Hematite …… (166)
Herb of Alpine Yarrow …… (16)
Herb of Argun Groundsel …… (326)
Herb of Asiatic Pennywort …… (448)
Herb of Blue-calyx Rabdosia …… (410)
Herb of Boor's Mustard …… (482)
Herb of Bottle Brush …… (236)
Herb of Cablin Potchouli …… (76)
Herb of Chinese Alyxia …… (294)
Herb of Chinese Clinopdium …… (120)
Herb of Chinese Knotweed …… (122)
Herb of Chinese Prayer-beads …… (302)
Herb of Chinese Osbeckia …… (352)
Herb of Christing Loosestrife …… (350)
Herb of Common Achyranthes …… (450)
Herb of Common Aeschynomene …… (162)
Herb of Common Andrographis …… (420)
Herb of Common Cephalanoplos …… (80)
Herb of Common Clubmoss …… (278)
Herb of Common Doyflower …… (446)
Herb of Common Goldenrod …… (14)
Herb of Common Leibnitzia …… (48)
Herb of Common Sage …… (398)
Herb of Common Scouring …… (96)
Herb of Common Tripterospermum … (362)
Herb of Dahurian Loosestrife …… (496)
Herb of Denticulate Ixeris …… (322)
Herb of False Japanese Swertia …… (218)
Herb of Fineleaf Schizonepeta …… (390)
Herb of Forbes Wildginger …… (260)
Herb of Fortune Eupatorium …… (342)
Herb of Garden Euphorbia …… (82)
Herb of Giant st. John's Wort …… (246)
Herb of Green Bristlegrass …… (358)
Herb of Heartleaf Houttuynia …… (364)
Herb of Hupeh Anemone …… (132)
Herb of Japanese Buttercub …… (110)
Herb of Japanese Cayratia …… (118)
Herb of Japanese Raspberry …… (324)
Herb of Japanese Wormwood …… (276)
Herb of Kirilow Groundsel …… (356)
Herb of Lanceleaf Thermopsis …… (338)
Herb of Longtube …… (274)
Herb of Manchurian Wildginge …… (374)
Herb of Purpleflower Crotalaria …… (240)
Herb of Remote Lemongrass …… (262)
Herb of Scabrous Doellingeria …… (140)
Herb of Shiny Bugleweed …… (370)
Herb of Siberian Cocklebur …… (266)
Herb of Siberian Veronicastrum …… (328)
Herb of Smallflower Milkwort …… (344)
Herb of Snowbelleaf Tickclover …… (74)
Herb of Snow Lotus …… (506)
Herb of Spanishneedles …… (412)
Herb of Spiked Loosestrife …… (68)
Herb of Spottedleaf Euphorbia …… (206)
Herb of Sweet Wormwood …… (308)
Herb of Tamariskiod Spikemoss …… (274)
Herb of Threevein Aster …… (250)

Herb of Tuberculate Speranskia …… (450)
Hernal Membrane of Duck Gizzard …… (446)
Heroubill or Geranium …… (210)
Honeysuckle Flower …… (350)
Honeysuckle Stem …… (300)
Horn of Mongolian Gazelle …… (488)
Horse Bezoar …… (84)
Huechys Sanguinea …… (250)

I

Igneous Rock …… (256)
Immature Bitter Orange …… (382)
Immature Fruit of Trifoliate …… (386)
Indian Bread …… (396)
Indian Bread with Pine-root …… (396)
Indigowoad Root …… (312)
Internal Membrane of Duck Gizzard … (446)
Inula Herb …… (344)

J

Jack Bean …… (32)
Japanese Ginseng …… (222)
Jujube …… (50)

K

King Cobra …… (510)
Knoxia Root …… (246)

L

Larva of Oriental Latrine Fly …… (102)
Leaf and Twig of Largeleaf Hydrangea …… (18)
Leaf of Bitter Bamboo …… (320)
Leaf of Broadleaf Holly …… (318)
Leaf of Chinese Holly …… (132)
Leaf of Chinese Photinia …… (148)
Leaf of Common Nandina …… (392)
Leaf of Harlequin Glorybower …… (454)
Leaf of Phoenix Tree …… (482)
Leaf of Trifoliate Orange …… (386)
Leaven of Chinese Eaglewood's Wood …… (288)
Leech …… (130)
Lesfy Twigs of Chinese Arborvitae …… (342)
Lily Bulb …… (212)
Limonite …… (412)
Liquorice Root …… (138)
Little Silver-banded Krait …… (348)
Loess …… (422)
Longan Pulp …… (160)
Loquat Fruit …… (310)
Lotus Fruit …… (144)
Lotus Petiole …… (440)
Lotus Seed …… (436)
Lotus Seedpot …… (436)
Luffa Cylindrica …… (198)
Luttlebone …… (470)

M

Magnolia Flower Bud …… (284)
Mahonia Stem …… (130)
Mantis Egg-case …… (480)
Meat of Red-mouthed Purpura …… (472)
Meat of Silver Carp …… (190)
Meat of Window Shell …… (460)
Membrane of Chicken Gizzard …… (300)
Micae-schist …… (356)
Mirabilite …… (208)
Mitella …… (150)
Mother of Pearl …… (378)
Mother Root of Common Monkshood … (72)
Motherwort Fruit …… (398)
Motherwort Herb …… (474)
Mulberry Twig …… (478)
Muscovite …… (88)
Myrrh …… (286)

N

Natural Indigo …… (308)
Nepherite …… (134)
Nutmeg …… (220)

O

Ophicalcite …… (264)
Opisthopatia Orientalis …… (140)

P

Peach Seed …… (434)

Pearl …… (376)
Pelteobagrus Fulvidraco …… (504)
Penis and Testes of Ox …… (114)
Penis and Testes of Tiger …… (334)
Pharbitis Seed …… (402)
Pinellia Tuber …… (194)
Pipe Fish …… (464)
Pith of Himalayan Stachyurus …… (80)
Plantain Herb …… (104)
Platysternon Megacephalum …… (134)
Pomegranate Rind …… (150)
Prawn …… (198)
Prepared Daughter Root of Common Monkshood …… (298)
Prepared Fruit of Bigfruit Elm …… (260)
Process Rhizome of Jackinthepulpit … (416)
Pseudobulb of Appendiculate Cremastra …… (66)
Pseudo-ginseng …… (34)
Pumice …… (468,474)
Pummelo Peel …… (106)
Pyrite …… (230)

Q

Quartz …… (172)
Quassiawood …… (322)

R

Radish Seed …… (434)
Red Halloysite …… (272)
Red Oxide of Mercury …… (248)
Red Peony Root …… (272)
Reed Rhizome …… (270)
Refuse of Deer Horn Glue …… (514)
Rhinoceros Horn …… (526)
Rhizome and Root of Incised Notopterygium …… (290)
Rhizome and Root of Tonkin Sophora …… (60)
Rhizome of Bistort …… (476)
Rhizome of Blackberrylily …… (452)
Rhizome of Common Anemarrhena …… (340)
Rhizome of Common Burreed …… (38)
Rhizome of Common Curculigo …… (166)
Rhizome of Common Yam …… (60)
Rhizome of Conic Gymnadenia …… (108)
Rhizome of Figwortflower Picrorhiza …… (388)
Rhizome of Fragrant Solomoseal …… (136)
Rhizome of Galanga Galangal …… (50)
Rhizome of Galanga Resurrectionlily … (64)
Rhizome of Giant Knotweed …… (330)
Rhizome of Glabrous Greenbrier …… (44)
Rhizome of Grassleaf Sweet Flag …… (146)
Rhizome of Lalang Grass …… (180)
Rhizome of Largehead Atractylodes … (170)
Rhizome of Largetrifolious Bugbane … (114)
Rhizome of Lesser Galangal …… (458)
Rhizome of Nutgrass …… (408)
Rhizome of Oriental Waterplantain …… (372)
Rhizome of Paleaceous Knotweed …… (394)
Rhizome of Pedate Pinellia …… (334)
Rhizome of Purple Bergening …… (336)
Rhizome of Rehmannia …… (204)
Rhizome of Scythian Lamb …… (360)
Rhizome of Solomonseal …… (502)
Rhizome of Szechwan Lovage …… (72)
Rhizome of Whipformed Typhonium …… (126)
Rhizome of Wild Buckwheat …… (348)
Rhizome or Herb of Purple Bergening …… (336)
Rhubarb …… (52)
River snail …… (164)
Roe Deerhorn of Hairy …… (362)
Root and Rhizome of Baikal Meadowrue …… (84)
Root and Rhizome of Broadsheath Greenbrier …… (448)
Root-bark of Ceylon Houndstongue … (408)
Root-bark of Chinese Wolfberry …… (202)
Root-bark of Densefruit Pittany …… (188)

Root-bark of Japanese Aralia …… (314)
Root-bark of White Mulberry …… (478)
Root of Aconiteleaf Syneilesis …… (364)
Root of Antifebrile Dichroa …… (508)
Root of Baikal Skullcap …… (490)
Root of Chinese Thorowax …… (440)
Root of Coastal Glehnia …… (162)
Root of Cochinchinese Asparagus …… (90)
Root of Common Scopolia …… (36)
Root of Common Vladimirio …… (68)
Root of Coral Ardisia …… (224)
Root of Cudrania …… (422)
Root of Dahuriae Angelica …… (178)
Root of Delaray Ampelopsis …… (136)
Root of Delavay Stephania …… (200)
Root of Divaricate Saposhnikovia …… (244)
Root of Doubleteeth Pubescent Angelica …… (414)
Root of Elecampane …… (42)
Root of Fischer Euphorbia …… (456)
Root of Fourstamen Stephania …… (242)
Root of Funneled Physochlaina …… (228)
Root of Garden Burnet …… (206)
Root of Garden Lovage …… (330)
Root of Garden Sorrel …… (40)
Root of Gentian …… (430)
Root of Gynura …… (484)
Root of Hairystalk Tinospora …… (346)
Root of Hairyvein Knotweed …… (248)
Root of India Madder …… (392)
Root of Indian Stringbush …… (34)
Root of Japanese Rose …… (78)
Root of Java Campanumoea …… (46)
Root of Shortstalk Monkshood …… (504)
Root of Manyprickle Acanthopanax … (314)
Root of Medicinal Changium …… (336)
Root of Medicinal Indianmulberry …… (124)
Root of Membranous Milkvetch …… (492)
Root of Narrowleaf Screwtree …… (58)
Root of Oidham Gypsophila …… (64)
Root of Oriental Stephania …… (184)
Root of Paniculate Swallowwort …… (454)
Root of Peking Euphorbia …… (366)
Root of Philippine Flemingia …… (66)
Root of Pubescent Holly …… (108)
Root of Thinleaf Milkwort …… (256)
Root of Tuber Fleeceflower …… (278)
Root of Twotooth Achyranthes …… (112)
Root of Whiteflower Hogfennel …… (418)
Root of Willowleaf Achyranthes …… (42)
Rosewood …… (374)

S

Saffron …… (210)
Sal Ammonite …… (186)
Salmander …… (142)
Sappan Wood …… (270)
Scorpion …… (234)
Sea-chiton …… (462)
Sea Cucumbers …… (466)
Sea Dragon …… (468)
Sea-ear Shell …… (142)
Sea-horse …… (460)
Seaweed …… (472)
Seeding of Virgate Wermwood …… (394)
Seed of Chinese Arborviae …… (384)
Seed of Chinese Coffeetree …… (362)
Seed of Cochinchia Momordica …… (98)
Seed of Cowherb …… (100)
Seed of English Walnut …… (388)
Seed of Flatstem Milkvetch …… (286)
Seed of Gorden Euryale …… (268)
Seed of Indian Trumperflower …… (98)
Seed of Japanese Dodder …… (52)
Seed of Masaikai Caper …… (86)
Selenite …… (194)
Sheep Liver …… (240)
Shell of Bellamya Purificata …… (190)
Shell of Giant Clam …… (398)
Shell of Razor Calm …… (82)
Silk Cocoon …… (428)

Sike of Oriental Moth …… (508)
Smaller Diving Beetle …… (156)
Snakegourd Fruit …… (192)
Snakegourd Root …… (92)
South Hawthron Fruit …… (390)
Stalactite …… (406)
Staranise …… (20)
Stem and Leaf of Briar …… (144)
Stem and Leaf of Rose Glorybower …… (452)
Stem of Armand Clematis …… (70)
Stem of Chinese Ivy …… (510)
Stem of Confederate-jasmine …… (426)
Stem of Kadsura Pepper …… (462)
Stem of Manchurian Dutchmanspipe … (238)
Stem of Sargentgloryvine …… (48)
Stem of Suberect Spatholobus …… (302)
Stemona Root …… (214)
Stink Bug …… (32)
Swim Bladder of Yellow Croaker …… (366)

T

Tangshen …… (444)
Testes and Penis of a Dog …… (358)
Testes and Penis of a Donkey …… (304)
Testes and Penis of a Deer …… (518)
Thyme …… (214)
Tiger Bone …… (332)
Tiger Sinew …… (334)
Tiger Tripe …… (330)
Tokay …… (524)
Tortoise Plastron …… (282)
Tree Peony Bank …… (276)
Trogopterus Dung …… (102)
Tuber of Common Bletilla …… (168)
Tuber of Dwarf Lilyturf …… (254)
Tuber of Giant Typhonium …… (180)
Tuber of Tall Gastrodia …… (94)
Turmeri …… (326)
Turmeric …… (424)
Twig and Leaf of Chinese Taxillus …… (480)
Twig and Leaf of Indian Quassiawood …… (318)
Twig and Root of Suffrutescent Securinega …… (14)
Twig of Williams Elder …… (506)
Twig of Winged Euonymus …… (414)

U

Umbilical Cord …… (456)

V

Vegetable Sponge of Luffa …… (198)
Venerupis Shell …… (524)
Vermiculite …… (354)
Violet Herb …… (200)

W

Water Buffalo Horn …… (126)
Water Snake …… (332)
Wenyujin Rhizome …… (116)
Whiter Halloysite …… (172)
White Peony Root …… (174)
Wood of Chinese Eaglewood …… (288)

Z

Zedoray …… (438)

药材日文名索引

ア

アギ……（296）
アキョウ……（296）
アリトウ……（294）
アマチャ……（18）
アンソクコウ……（238）

イ

イチジクジツ……（90）
イチヨウシュウ……（14）
イッシオウカ……（14）
イッシコウ……（16）
イバイモ……（226）
インキセキ……（242）
インチン……（394）

ウ

ウコン……（326）
ウシヨウダ……（118）
ウヨリョウ……（412）
ウレンバイ……（118）
ウンコウソウ……（262）
ウンモセキ……（88）

エ

エンゴサク……（228）

オ

オウギ……（492）
オウギュウカク……（488）
オウコウスイキ……（500）
オウコウリクキ……（164）
オウゴン……（490）
オウセイ……（502）
オウセイシ……（500）
オウセキシ……（488）
オウソウギョ……（504）
オウトウキ……（330）
オウバク……（496）
オウフルギョウ……（100）
オウヨウカク……（488）
オウレン……（492）
オウレンカ……（496）
オンジ……（256）

カ

カイエン……（470）
カイゲツ……（460）
カイジン……（466）
カイセキベツ……（462）
カイソウ……（472）
カイタン……（466）
カイバ……（460）
カイヒョウショウ……（470）
カイフウトウ……（462）
カイフセキ……（468）
カイマシャク……（468）
カイラ……（472）
カイリュウ……（464）
カキッコウ……（100）
カコウ……（440）
カサンジン……（228）
カシ……（292）
カシュウ……（278）
カジュツ……（438）
カジュヒ……（432）
カショウ……（262）
カズイセキ……（264）
カタンボ……（122）
カロウ……（192）
ガロウシ……（100）
カンキョウ……（38）
ガンキョウオウダ……（510）
カンケイ……（372）
カンコンソウ……（274）
ガンショウソコツ……（338）
カンズイ……（138）
カンセン……（40）
カンゾウ……（138）

ガンピャクサイ …… (336)
カンモクツウ …… (238)
ガンヨウカク …… (336)

キ

キキョウ …… (432)
キギョヒ …… (284)
キクカ …… (486)
キクサンシチ …… (484)
キコク …… (380)
キジツ …… (382)
キシンソウ …… (412)
キセンウ …… (414)
キバン …… (282)
キバンキョウ …… (284)
キュウコウチュ …… (32)
ギュウベン …… (114)
キョウオウ …… (424)
キョウカツ …… (290)
キョウコラン …… (428)
キョウセキ …… (422)
キョウダイゲキ …… (366)
ギョク …… (134)
ギョクチク …… (136)
ギョクブドウコン …… (136)
ギョセイソウ …… (364)
ギョヒュ …… (366)
キンオウシ …… (354)
キンカラン …… (346)
キンカンダ …… (346)
キンギョ …… (346)
キンギンカ …… (350)
キンキンコウ …… (352)
キンゴソウ …… (344)
キンセイセキ …… (354)
キンセンソウ …… (350)
キンセンピャッカダ …… (348)
キンチョウバク …… (348)
キンパク …… (352)
キンブツソウ …… (344)
キンモウセキ …… (356)

ク

クキツ …… (386)
クキツヨウ …… (386)
クキョウニン …… (320)
クジュピ …… (322)
クジン …… (358)
クセキ …… (360)
クゼツソウ …… (356)
クチクヨウ …… (320)
クチョウチャ …… (318)
クバイサイ …… (322)
クビソウ …… (358)
クホウ …… (360)
クレンピ …… (324)

ケ

ケイガイ …… (390)
ケイカンカ …… (304)
ケイケットウ …… (302)
ケイコツソウ …… (302)
ケイシ …… (430)
ケイナイキン …… (300)
ケッケツ …… (232)
ケツサンショ …… (232)
ケツヨタン …… (230)
ケンゴシ …… (402)
ケンジツ …… (268)
ゲンジン …… (192)
ゲンジン …… (476)
ゲンセイセキ …… (194)

コ

コウエン …… (410)
ゴウカイ …… (524)
コウカッコウ …… (76)
ゴウカンヒ …… (236)
コウカンヤク …… (250)
コウカンレン …… (246)
コウキンセンソウ …… (74)
ゴウシ …… (524)
コウジコ …… (218)
コウシマ …… (522)

コウジョウシ …… (250)
コウシンコウ …… (374)
コウソウ …… (526)
コウダイゲキ …… (246)
コウチャサイ …… (410)
コウハツキ …… (408)
コウブ …… (408)
コウフン …… (248)
コウベン …… (334)
コウボウイ …… (74)
コウボク …… (402)
コウボクカ …… (404)
コウマユ …… (526)
コウセクシ …… (248)
コウライユウゲン …… (252)
コウリョウキョウ …… (458)
コウロウモク …… (130)
コウロウヨウ …… (132)
ゴオウ …… (110)
コオウレン …… (388)
コキン …… (334)
コクセイソウ …… (282)
ゴコクチュウ …… (102)
ココツ …… (332)
ゴシツ …… (112)
コシネ …… (386)
コショウ …… (388)
コジョウ …… (330)
コショウナンショウ …… (334)
コト …… (330)
コトウニン …… (388)
ゴトウヨウ …… (482)
ゴバイシ …… (104)
コハンユウダ …… (332)
コボウシ …… (112)
ゴレイシ …… (102)

サ

サイカク …… (526)
サイコ …… (440)
サイシン …… (374)
サンギンサイコ …… (64)
サンケン …… (428)
サンゴ …… (380)
サンジコ …… (66)
サンシチ …… (34)
サンジニ …… (66)
サンシマ …… (58)
サンズコン …… (60)
サンナ …… (64)
サンブンサン …… (36)
サンヤク …… (60)
サンユウサシカイ …… (36)
ザンリュウソウ …… (326)
サンリョウ …… (38)
ザンリョウケン …… (328)

シ

ジオウ …… (204,206)
シカトウ …… (198)
シカラク …… (198)
ジキンソウ …… (206)
シクンシ …… (340)
シゴカ …… (314)
ジコッピ …… (202)
シシ …… (384)
シジミカク …… (446)
シゼンドウ …… (230)
ジチャ …… (30)
ジチョウ(シカジチョウ) …… (200)
ジフヨウ …… (200)
ジャエンシ …… (286)
シャキョ …… (398)
シャクオウ …… (508)
シャクセキシ …… (272)
シャジン …… (400)
ジャゼンソウ …… (104)
ジュウイシ …… (398)
シュウゴトウヨウ …… (454)
シュウボタン …… (452)
シュシャ …… (224)
シュシャコン …… (224)

シュシヨウジン …… (108)
ショウウイキョウ …… (78)
ショウカショウヒコン …… (78)
ショウケイ …… (80)
ショウコウ …… (312)
ジョウザン …… (508)
ジョウシュントウ …… (510)
ショウッウソウ …… (80)
ショウニュウセキ …… (406)
ショウマ …… (114)
ショウレイタン …… (76)
ジョチョウゴウ …… (454)
ジリュウ …… (202)
シロウア …… (314)
シワイタン …… (316)
シワイヒ …… (316)
シンイ …… (284)
シンギョウ …… (430)
シンキンソウ …… (278)
ジンコウ …… (288)
ジンコウキク …… (288)
ジンチュウハク …… (20)

ス

スイギュウカク …… (126)
スイコウカシ …… (128)
スイシシ …… (128)
スイテツ …… (130)
スイハンゲ …… (126)
スギナ …… (236)

セ

セイコウ …… (308)
セイコウカ …… (210)
セイショウシ …… (306)
セイタイ …… (308,456)
セイヒ …… (306)
セイモウセキ …… (310)
セイモッコウ …… (304)
セイヨウジン …… (212)
セキエン …… (152)
セキカイ …… (154)
セキキョウ …… (150)
セキケツメイ …… (142)
セキシャク …… (272)
セキショウブ …… (146)
セキセツソウ …… (448)
セキナントウ …… (144)
セキナンヨウ …… (148)
セキメイ …… (482)
セキリュウオ …… (148)
セキリュウヒ …… (150)
セキレンシ …… (144)
セッコウ …… (152)
セッコク …… (146)
セツコツボク …… (506)
セツジョウイツシコウ …… (504)
セツバイモ …… (458)
セツレイカ …… (506)
センウ …… (72)
ゼンカツ …… (234)
センキュウ …… (72)
センキンバツ …… (66)
センクツサイ …… (68)
ゼンコ …… (418)
センザンコウ …… (420)
センシンレン …… (420)
センソウ …… (392)
センバイモ …… (70)
センハセキ …… (422)
センボウ …… (166)
センモクツウ …… (70)
センモッコウ …… (68)
ゼンヨウセイラン …… (234)

ソ

ソウキセイ …… (480)
ソウキョウ …… (280)
ソウケッケツ …… (394)
ソウシ …… (478)
ソウジソウ …… (266)
ソウジュツ …… (264)
ソウジシ …… (266)

ソウテイ……（426）
ソウハクヒ……（478）
ソウヒョウショウ……（480）
ソクハクヨウ……（342）
ソボク……（270）

タ

ダイオウ……（52）
タイカ……（198）
ダイゲットウ……（48）
タイシャセキ……（166）
タイソウ……（50）
ダイテイソウ……（48）
ダイトシシ……（52）
ダイフクヒ……（58）
タイマイ……（376）
ダイリョウキョウ……（50）
タクシャ……（372）
タクラン……（370）
タクシャ……（372）
タクラン……（370）
ダハワンカカ……（132）
タンジン……（120）
タンナンショウ……（416）
タンバン……（416）

チ

チクジョ……（222）
チクセツニンジン……（222）
チモ……（340）
チユ……（206）
チヨウコウ……（18）
チョウコウトウ……（16）
チョウセキ……（116）
チンジュ……（376）
チンジュバイ……（378）
チンジュボ……（378）

テ

テッシイレイセン……（448）
テンカフン……（92）
テンジクオウ……（92）
デンソウカク……（162）
テンドウ……（90）
テンマ……（94）
テンラ……（164）

ト

トウキ……（216）
トウコッソウ……（450）
トウコウソウ……（450）
トウジン……（444）
トウズ……（32）
トウチュウカソウ……（168）
トウニン……（434）
トウフウサイ……（140）
トウホウエイゲン……（142）
トウホウゴヘンレン……（140）
トウヤク……（218）
ドケイヒ……（44）
トコウ……（260）
ドゴシツ……（42）
トジサン……（364）
トシシ……（484）
ドダイオウ……（40）
トチュウ……（258）
トチュウヨウ……（258）
ドッカツ……（414）
ドトウジン……（46）
ドブクリョウ……（44）
ドベツチュウ……（46）
ドモッコウ……（42）

ナ

ナンサンサ……（390）
ナンテンチクヨウ……（392）

ニ

ニガキ……（318）
ニクジュヨウ……（220）
ニクズク……（220）
ニュウコウ……（342）
ニンジン……（22）
ニンジンシュ……（30）
ニンジンヨウ……（28）
ニンジンロ……（28）

ニンドウトウ……（300）

ノ

ノウキチリ……（240）

ハ

ハイケイソウ……（362）
バイシ……（106）
ハイラン……（342）
ハクカ……（182）
ハクシジン……（384）
ハクシャク……（174）
ハクセキエイ……（172）
ハクセキシ……（172）
ハクセンピ……（188）
ハクソシ……（178）
バクドウ……（254）
ハクバン……（182）
バクハンセキ……（256）
ハクベソ……（182）
ハクヤクシ……（184）
ハゲキテン……（124）
ハズ……（124）
ハチセンカ……（18）
ハッカクウイキョウ……（20）
バテイラ……（88）
バトウ……（82）
バトウレイ……（86）
バビレン……（84）
バビンロウ……（86）
バホウ……（84）
ハンゲ……（194）
バンランコン……（312）

ヒ

ヒセキ……（400）
ヒソウシ……（362）
ヒャクカイトウ……（216）
ビャクキュウ……（168）
ビャクキョウサン……（188）
ビャクゴウ……（212）
ビャクコウタン……（184）
ヒャクシ……（178）
ビャクシン……（186）
ビャクシュツ……（170）
ビャクズク……（176）
ビャクノウサ……（186）
ビャクブ……（214）
ビャクブシ……（180）
ビャクボウコン……（180）
ビャクラシコク……（190）
ヒャクリコウ……（214）
ビャクレン……（190）
ヒヨウソウ……（82）
ビワヨウ……（310）
ビンロウ……（528）

フ

ブイ……（260）
フウリンサイ……（120）
ブクシン……（396）
ブクリュウカン……（226）
ブクリョウ……（396）
ブシ……（298）
フセキ……（474）
ブッシュ……（280）
ブッシュカ……（280）

ヘ

ヘイキョウキ……（134）
ヘンキョウオウ……（116）
ヘンセイ……（424）

ホ

ホウカイセキ……（122）
ボウキ……（242）
ボウショウ……（208）
ホウジョウ……（362）
ボウチュウ……（406）
ホウトウカ……（370）
ボウバイ……（324）
ボウフウ……（244）
ホクシャジン……（162）
ボクショウ……（208）
ボクバズ……（338）
ボコウ……（276）

ホコツシ……(292)
ボタンピ……(276)
マ
マオウ……(520)
マツリカ……(316)
ミ
ミントウジン……(336)
メ
メノウ……(252)
モ
モウドウセイ……(108)
モウロウ……(110)
モクコチョウ……(98)
モクゾク……(96)
モクベツシ……(98)
モッカ……(94)
モッコウ……(96)
モツヤク……(286)
ヤ
ヤカン……(452)
ヤクチ……(476)
ヤクモソウ……(474)
ヤシソウ……(446)
ヤジュンイ……(446)
ヤミョウシャ……(368)
ユ
ユウレイシラ……(418)
ヨ
ヨウカン……(240)
ヨウキセキ……(240)
ヨウバイヒ……(260)
ラ
ライフクシ……(434)
ラクセキトウ……(426)
ラフマヨウ……(338)
リ
リュウガンニク……(160)
リュウケツジュケッケツ……(154)
リュウコツ……(158)
リュウシ……(156)
リュウシッ……(156)
リュウゼンコウ……(160)
リュウタン……(158)
リョウカオウ……(34)
リュウカンニク……(160)
リンカントウ……(328)
レ
レイシソウ……(398)
レイシャ……(294)
レイヨウカク……(522)
レンシ……(436)
レンセンソウ……(274)
レンボウ……(436)
ロ
ロウドク……(456)
ロウカンソウ……(210)
ロカイ……(268)
ロカンセキ……(368)
ロクカク……(512)
ロクカクキョウ……(514)
ロクカクソウ……(514)
ロクキン……(518)
ロクジョウ……(514)
ロクビ……(512)
ロクベン……(518)
ロコン……(270)
ロジン……(304)

历代中医书籍大全分享

你好，我是逢原，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com
二、加我 **QQ/微信：2049346637**
三、关注微信公众平台——**逢原中医**，经常有中医文章更新。
四、关注我的**空间**：**http://user.qzone.qq.com/2049346637**

不管哪种方式，看到你的信息我会第一时间回复，尽全力帮您！

加微信可以扫描以下二维码加我！

私人微信号：2049346637

公众平台：逢原中医