

据中医研究院图书馆
藏明崇祯五年刻本影
印原书板框高一一九
毫米宽一二五毫米

前言

《伤寒六书纂要辨疑》四卷，原书扉页作《太医院纂要陶节庵伤寒六书》，明童养学（壮吾）纂辑。童氏认为陶节庵《伤寒六书》辨阴阳有径，表里有症，虚实有脉，临病制方服药有法，井井有条，且辨叔和之谬，正无己之讹，足补仲景书之未备。惜其立论见之《琐言》者，复见之《家秘》，见之《续言》，见之《截江》，见之《捷法》，不免层见叠出。由于陶氏六书成非一时，故有重复及后先倒置之处，因此，在原书基础上去其繁芜，补其阙略，删繁就简，重为詮次而成本书。

本书流传甚少，据一九六一年出版之《中医图书联合目录》

著录，国内刻本仅存四部，中医研究院图书馆藏有明崇祯五年（一六三二）壬申金陵原版（附《伤寒活人指掌补注辨疑》三卷）。

惟原书印刷较晚，版已漫涣，卷二尚缺一页，其内容为「三阳传变论」后半段，「三阴无传经论」、「阴症论」全篇及「阴毒论」篇目，现据清嘉庆二年（一七九七）丁巳刻本补抄，俾成全帙。

《伤寒活人指掌补注辨疑》（原书序文作《伤寒补注辨疑》）三卷，童氏以元·吴恕《伤寒活人指掌图》「不论天时，不察虚实，不分感冒，直以麻黄桂枝治冬月之正伤寒者，通治三时之寒」，又以直中混传经，杂病混伤寒，论证用药多有错乱，因而为之补注辨疑。卷一卷二系据吴书「活人指掌赋」分句详析，

卷一论述六经传变之正伤寒，卷二论述伤寒变为杂病者，其卷二论及诸方则列之卷三。原书缺序文最后一页，现据大梁周氏醉畊堂刻本补抄。

童养学，字壮吾，福州人。生卒年月及生平事迹无可考。

现据中医研究院图书馆藏明崇祯五年金陵原版影印。付印前另编目录，以便于检索。

中医古籍出版社

一九八三年十二月

出版说明

中医古籍，卷帙浩繁，有待于系统整理研究。其中尚有不少孤本、秘本，尤须及早印布，以广流传。随着医疗保健事业的发展，中医学日益受到国际学术界的密切注视，广大读者对于中医古籍的整理出版呼声日高，期望甚切。为了进一步发掘中医药伟大宝库，满足不断增长的中医临床、教学和科研工作的需要，我社将陆续辑印以《中医珍本丛书》为题的系列医书，主要收入近代未行于世的有价值的中医孤、善本古籍，包括中医理论和临证各科，以及本草、方剂、医史、医案、医话等方面论著。为便于广大医务工作者及研究人员参考原著，本丛书将一律保存原貌，影印出版，酌加前言或内容提要，以期达到承先启后、古为今用的目的。

目 录

六书纂要辨疑序·····	一	浮脉形状指法主病·····	四九
原目录·····	七	中脉形状指法主病·····	五〇
首卷		沉脉形状指法主病·····	五一
启蒙论·····	一九	三阴三阳经脉症·····	五四
辨张仲景伤寒方论·····	二四	太阳经见症法·····	五五
伤寒论·····	三三	阳明经见症法·····	五七
脉要上·····	三六	少阳经见症法·····	五七
脉要下·····	四〇	太阴经见症法·····	五八
阴阳表里脉症论·····	四三	本经用药法·····	五九
伤寒脉症指法·····	四七	少阴经见症法·····	六〇

本经用药法……………六〇 二卷

厥阴经见症法……………六一 伤寒两感论……………八一

本经用药法……………六二 伤寒传足不传手经论……………八三

合病并病论……………六三 伤寒言症不言病论……………八六

三阳合病……………六四 正伤寒及温暑暴寒劳力时

风伤卫寒伤荣辩……………六六 疫治各不同辩……………八九

时行为病论……………六七 伤寒寒热论……………九二

伤寒不拘日数论……………六九 热在皮肤寒在骨髓论……………九三

伤寒识症内外辩……………七〇 脏腑表里论……………九四

伤寒看证法则……………七三 三阳传经论……………九六

贯珠篇……………七六 三阴无传经论……………九七

阴症论·····	九七	正治逆治从治反攻寒热	
阴毒论·····	九八	辨·····	一二五
伤寒伏脉辨·····	一〇〇	论阴分发热为反并用温	
阳厥阴厥辨·····	一〇二	汗法·····	一二六
寒热二厥辨·····	一〇三	急下急温法·····	一二〇
伤寒变温热病论·····	一〇五	伤寒见坏症辨·····	一二二
温病论·····	一〇六	用药大略·····	一二四
暑病论 即热病 ·····	一〇八	表里虚实用药寒温法·····	一二七
伤寒标本论·····	一〇九	伤寒用药三法·····	一二〇
伤寒六经变症·····	一一二	用药法则·····	一二二
伤寒见症识病法·····	一二三	按症治病法·····	一二三

论妇人伤寒与男子不同

治法……………一三七

论妊妇伤寒与前症异

治……………一三九

论产后伤寒治法……………一四〇

热入血室……………一四〇

附妊娠及月水不利脉法……………一四二

三卷

伤风见寒伤寒见风……………一四五

风温……………一四五

湿温……………一四六

风湿……………一四七

温毒中暍……………一四八

发热……………一四九

头痛……………一五〇

项强……………一五一

恶寒……………一五二

恶风……………一五三

背恶寒……………一五四

寒热……………一五四

潮热……………一五六

似疟……………一五六

无汗·····一五八	咳嗽·····一七〇
自汗·····一五九	喘·····一六八
战汗·····一五九	气逆·····一六八
头汗·····一六一	短气·····一六九
手足汗·····一六一	口干·····一七〇
盗汗·····一六二	渴·····一七一
烦热·····一六二	胸胁满·····一七二
烦燥·····一六三	结胸·····一七二
懊恼·····一六五	痞·····一七四
身痛·····一六五	腹满·····一七五
拘急·····一六六	腹痛·····一七六

小腹痛……………一七	呕吐……………一六	干呕……………一六	哕……………一八	咳逆……………一八	下利……………一八	便脓血……………一四	厥逆……………一五	四逆……………一六	不大便……………一七	谵语……………一八

郑声……………一九〇	小便不通……………一九〇	小便自利……………一九一	舌胎……………一九二	脏结……………一九三	咽痛……………一九三	头眩……………一九四	鼻衄……………一九五	吐血……………一九六	心悸……………一九七	发黄……………一九八

发斑·····	一九九	瘕痕·····	二一〇
发狂·····	二〇一	二瘕·····	二一一
肉眇筋惕·····	二〇二	战慄·····	二二三
拂鬱·····	二〇三	霍乱·····	二二三
瘥后昏沉·····	二〇三	百合·····	二二三
劳后食复·····	二〇四	狐惑·····	二二四
动气·····	二〇五	虺厥·····	二二五
不仁·····	二〇六	类伤寒四症	
阴阳易阴阳交·····	二〇七	痰症·····	二二五
不眠·····	二〇八	伤食·····	二二六
多眠·····	二〇九	虚烦·····	二二六

脚气……………二二七

四卷

伤寒劫病十三法……………二二九

秘用三十七方就注三十七

捷法……………二二六

升麻发表汤……………二二七

疏邪实表汤……………二二八

羌活冲和汤……………二二九

柴葛解肌汤……………二二二

柴胡双解散……………二二三

桂枝大黄汤……………二二三

加味理中汤……………二三四

茵陈将军汤……………二二六

导赤散……………二二六

六乙顺气汤……………二二七

如神白虎汤……………二二九

三黄石羔汤……………二四〇

三黄巨胜汤……………二四一

冲和灵宝饮……………二四二

桃花承气对子……………二四三

消斑青黛散……………二四四

生地芩连汤……………二四五

加味犀角地黄汤·····二四六	导赤各半汤·····二五九
回阳救急汤·····二四七	益元汤·····二六〇
回阳反本汤·····二四八	桂苓饮·····二六一
温经益元散·····二四九	当归活血汤·····二六二
柴胡百合汤·····二五一	加味导痰汤·····二六三
如圣饮·····二五二	加减调中饮·····二六四
逍遥散·····二五三	加减续命汤·····二六六
升阳救火汤·····二五五	芩连消毒汤·····二六七
再造散·····二五六	六神通解散·····二六八
黄龙汤·····二五七	续补七方
调荣养卫汤·····二五八	小柴胡汤又名和解散·····二六九

人參敗毒散·····	二七一	序·····	一
五積散·····	二七二	原書目錄·····	九
葛根湯·····	二七三	首卷	
升麻湯·····	二七五	活人指掌賦六經傳變正傷寒	
牡蠣湯·····	二七六	方附·····	一九
解肌湯·····	二七六	二卷	
制藥法·····	二七七	活人指掌賦傷寒變為雜病方	
煎藥法·····	二七八	載後卷·····	六五
解藥法·····	二八〇	三卷	
傷寒活人指掌補注辨疑		大陷胸湯·····	三〇
		大陷胸丸·····	三〇

小陷胸汤……………	二三	麻黄杏仁甘草石膏汤……………	二七
三物白散……………	二三	滚痰丸……………	二八
枳实理中汤……………	二三	小青龙汤……………	二八
小半夏茯苓汤……………	二四	竹叶石膏汤……………	二九
半夏泻心汤……………	二四	桃仁汤……………	二九
三黄石膏汤……………	二五	黄连犀角汤……………	二九
柴胡桂枝汤……………	二五	雄黄锐散……………	三〇
犀角地黄汤……………	二六	遇仙丹……………	三〇
桃仁承气汤……………	二六	干姜理中汤……………	三一
五苓散……………	二六	升麻犀角汤……………	三一
泻肺汤……………	二七	小续命汤……………	三一

甘草泻心汤……………一三七	防己黄芪汤……………一三七	知母葛根汤……………一三六	汉防杞汤……………一三六	黑锡丹……………一三五	当归四逆汤……………一三四	生地芩连汤……………一三四	防风通圣散……………一三三	黄芩芍药汤……………一三三	人参败毒散……………一三三	玄参升麻汤……………一三三

人参白虎汤……………一四二	藿香正气散……………一四一	枳壳枝子加大黄汤……………一四一	补中益气汤……………一四一	麦门冬汤……………一四〇	桂枝加大黄汤……………一四〇	桂枝加芍药汤……………一四〇	羌活附子汤……………一三九	麻黄桂枝各半汤……………一三九	赤石脂禹餘粮汤……………一三八	生姜泻心汤……………一三八

真武汤·····	一四三	三物桃花汤·····	一四八
柴胡龙骨牡蛎汤·····	一四三	清胃散·····	一四九
辰砂五苓散·····	一四四	厚朴半夏甘草人参汤·····	一四九
朱砂安神丸·····	一四四	桔梗半夏汤·····	一四九
大青龙汤·····	一四五	枝子厚朴汤·····	一五〇
黄连鸡子汤·····	一四五	凉膈散·····	一五〇
人参三白汤·····	一四六	葛根葱白汤·····	一五〇
双解散·····	一四六	连须葱白汤·····	一五一
通圣散·····	一四七	白芷石羔汤·····	一五一
瓜蒂散·····	一四七	黑膏·····	一五一
柴胡枳梗汤·····	一四八	人参羌活散·····	一五二

紫雪……………一五二	荆防解毒散……………一五三	柏皮汤……………一五四	黄连阿胶汤……………一五四	三黄泻心汤……………一五五	猪肤汤……………一五五	甘桔汤……………一五五	十枣汤……………一五六	黄连解毒汤……………一五六	黄芪建中汤……………一五七	温胆汤……………一五七

枝子豆豉汤……………一五七	旋覆代赭汤……………一五八	四物汤……………一五八	烧棍散……………一五九	豶鼠粪汤……………一五九	白头翁汤……………一五九	二香散……………一六〇	调中益气汤……………一六〇	柴胡升麻汤……………一六一	百合知母汤……………一六一	百合地黄汤……………一六二

百合洗法……………	一六二	茯苓桂甘大枣汤……………	一六八
葳蕤汤……………	一六三	祛疟丸……………	一六九
葛根龙胆汤……………	一六三	八物汤……………	一六九
酸枣汤……………	一六三	术附汤……………	一六九
牛蒡根散……………	一六四	脾约麻仁丸……………	一七〇
金沸草散……………	一六四	赤石脂丸……………	一七〇
香薷散……………	一六五	干姜黄连黄芩人参汤……………	一七一
苏合香丸……………	一六五	青黛一物汤……………	一七一
六和汤……………	一六七	犀角大青汤……………	一七一
阴阳汤……………	一六七	大青四物汤……………	一七二
桂枝加桂汤……………	一六八	硝黄解毒汤……………	一七二

正阳汤……………二七二

阴毒甘草汤……………二七三

六書纂要辨疑序

余嘗苦夫傷寒者苦無至理之書傳之已久遺帙頗多不可
景之書傳之已久遺帙頗多不可
為要也審矣嗣是而叔和之詮次
未免有鑿非無已之註釋蓋無正
訛少為無乎即古之聖神見微九

天學貫千古此不各持其性矣
但專內傷者不專外感專傷暑者
不專傷寒可為要乎惟因氏之六
書要矣辨陰陽有經表裏有症虛
實有脉臨病製方服藥有法并
乎有條且辨叔和之謬正無已之

訛足補仲景書之未備惜乎主論
見之瑣言者復見之家秘見之續
言見之截江見之提金見之樞法
不免層見疊出此差要而未集辨
而未明也余曾下闢十有餘載集
吾書矣有它本初集矣再集矣至

集從未確也及見中書劉先生之
集乃欣我曰此集真爲約要然孫
仍六書之舊戰汗之條未載痞結
之症多舛又爲集之闕典余從而
纂之辨之去其繁蕪補其闕畧刻
其正訛而纂要辨疑乃成于是求

至粹於趙師有光

號劍南福州人師復云

此一集也真仁者壽考之術苦心
極矣彼蒼有知諒不令苦心之人
至於湮沒知言哉知言哉

崇禎五年季冬月望日

邵武縣儒學訓導童養學題



新刻傷寒六書纂要

首卷

啟蒙論

辭張仲景傷寒方論

傷寒論

脉要上

脉要下

陰陽表裏脉症論

傷寒脉症指法

浮脉形狀指法主病

中脉形狀指法主病

沉脉形狀指法主病

三陰三陽經脉症

大陽經見証法

陽明經見証法

少陽經見症法

中醫研究
院善本書

太陰經見症法

本經用藥法

少陰經見症法

本經用藥法

厥陰經見症法

本經用藥法

合病併病論

三陽合病

風傷衛寒傷榮辨

時行爲病論

傷寒不拘日數論

傷寒症內外辨

傷寒看証法則

貫珠篇

二卷

傷寒兩感論

傷寒傳足不傳手經論

傷寒言症不言病論

正傷寒

及溫暑暴寒勞力時疫治各不同辨

傷寒寒熱論

熱在皮膚寒在骨髓論

臟腑表裏論

三陽傳經論

三陰無傳經論

陰症論

陰毒論

傷寒伏脉辯

陽厥陰厥辯

寒熱二厥辯

傷寒變溫熱病論

溫病論

暑病論

傷寒標本論

傷寒六經變症

傷寒見症識病法

王治逆治

從治反更
寒熱辨

論陰分發熱爲反併

用溫
汗法

急下急溫法

傷寒見壞症辨

用藥大畧

表裏虛實用藥寒溫法

傷寒用藥三法

用藥法則

按症治病法

論婦人傷寒與男子不同

治法

論妊娠傷寒

與前症
異治

論產後傷寒治法

熱入血室

附妊娠及月水不利脉法

三卷

傷風見寒傷寒見風

風溫

濕溫

煩溫

溫毒中暈

發熱

頭痛

項強

惡寒

惡風

背惡寒

寒熱

潮熱

似瘥

無汗

目汗

戰汗

頭汗

手足汗

盜汗

煩熱

煩燥

懊憹

身痛

拘急

咳嗽

喘

氣逆

短氣

口乾

渴

胸脇滿

結胸

痞

腹滿

腹痛

小腹痛

嘔吐

乾嘔

噦

咳逆

下利

便膿血

厥逆

四逆

不大便

譫語

鄭聲

小便不通

小便自利

舌胎

臍結

咽痛

頭眩

鼻衄

吐血

心悸

發黃

發斑

發狂

肉瞶筋惕

拂鬱

瘥後昏沉

勞復食復

動氣

不仁

陰陽易陰陽交

不眠

多眠

瘕瘕

二症

戰慄

霍亂

百合

狐惑

虺厥

類傷寒四症

痰症

傷食

虛煩

脚氣

四卷

傷寒却病十三法

秘用三十七方就註三十七槌法

升麻發表湯

疎邪實表湯

羌活沖和湯

柴葛解肌湯

柴胡雙解散

桂枝大黃湯

加味理中湯

茵陳將軍湯

導赤散

六乙順氣湯

如神白虎湯

三黃石膏湯

三黃巨勝湯

冲和靈寶飲

朮花承氣對子

消斑青黛散

生地芩連湯

加味犀角地黃湯

回陽救急湯

回陽反本湯

溫經益元散

柴胡百合湯

如聖飲

逍遙湯

升陽救火湯

再造散

黃龍湯

調榮養衛湯

導赤各半湯

益元湯

桂苓飲

當歸活血湯

加味導痰湯

加減調中飲

加減續命湯

苓連消毒湯

六神通解散

續補七方

小柴胡湯

又名和
解散

人參敗毒散

五積散

葛根湯

升麻湯

獨活湯

解肌湯

製藥法

煎藥法

解藥法

新刻傷寒六書纂要辨疑卷之一

邵武縣學訓導 童養學莊吾父

中醫研究所
纂輯

本序 余 璟景玉父 較閱

啟蒙論

凡初學醫者先熟藥性次明經絡再識病名講解脉理以証其所生之病乃可爲醫病家云發熱惡寒頭項痛腰脊強則知病在太陽經也身熱目痛鼻乾不得眠則知病在陽明經也胸脇痛耳聾口苦舌乾往來寒熱而嘔則知病在少陽經也腹痛咽乾手足自溫或自利不渴或腹滿時

痛則知病在太陰經也。引衣嚔卧惡寒或舌乾口燥則知病在少陰經也。煩滿囊縮則知病在厥陰經也。潮熱自汗譫語發渴不惡寒反惡熱揭去衣被揚手擲足或發斑黃狂亂五六日不大便則知病在正陽明胃腑也。設若脉症不明誤用麻黃令人汗多亡陽誤用承氣令人大便不禁誤用姜附令人失血發狂。正爲寒涼耗其胃氣辛熱損其汗液燥熱助其邪熱庸醫殺人莫此爲甚。蓋傷寒之邪實無定體或入陽經氣分則太陽爲首其脉必浮輕手便得或入陰經血分則少陰爲先其脉必沉重手方得浮而有

力無力則知表之虛實。沉而有力無力則知裏之寒熱。中而有力無力則知表裏緩急。脉有浮沉虛實。症乃傳變。非常治之之法。先分表裏寒熱陰陽虛實。標本先病爲本。次病爲標。先治其急者。此爲上工。問症以知其外。察脉以知其內。全在活法。不可拘於日數。但見太陽症在直攻太陽。見少陰症在直攻少陰。見真寒症在直救真寒。此爲活法。若同而異者。明之似實而非者。辨之在表者。汗之散之。在裏者。下之利之。在上者。因而越之。下陷者。升而舉之。從乎中者。和解之。直中陰經者。溫補之。若解表不開。不可攻裏。

日數雖多再宜發汗此事不明攻之爲逆經云一逆尚引
日再逆促命期若表証解而裏症具者不可攻表日數雖
少急當下之此事不明禍如反掌經曰邪熱未除復加燥
熱抱薪救火矣如直中陰經真寒症無熱惡寒不渴急宜
溫補切禁寒涼此事不明殺人甚速陰症似陽者溫之
症本無熱反發熱有陽症似陰者下之傷寒死病本難陽
似陽症者法當溫之
發熱不發熱反惡寒有似陰症者法當下之
陽毒者分輕重下之陰毒者分緩
急溫之陽狂者下之陰厥者溫之濕熱發黃者利之下之
血症發黃者清之下之發斑者清之利之謏語者下之溫

之痞滿者消之瀉之結胸者解之下之太陽証似少陰者

汗之少陰症似太陽者溫之

傷寒先入太陽陰症直中少陰此言少陰直中証也非傳

經之少陰也衄血者解之止之發喘者汗之下之咳嗽者利之

解之正傷寒者大汗之大下之感冒暴寒者微汗之微下

之勞力感寒者溫散之溫極病者微解之大下之此經常

之大法也有病一經已用熱藥而又用寒藥如少陰症用

白虎湯四逆散寒藥者少陰症用四逆湯真武湯熱藥者

庸醫狐疑莫能措手不知寒藥治少陰乃傳經熱症也熱

藥治少陰乃直中陰經之寒症也辨名定經明脉識証驗

症用藥辛熱之劑投之不差寒涼之藥用之必當病奚逃乎須分輕重緩急老少虛實久病新發婦人胎產室女經水治各不同久病者過經不解壞症也新發者始病也老者血氣衰少者血氣壯緩者病之輕急者病之重寒藥熱服熱藥涼服中和之劑溫而服之雖曰發蒙實登仲景之階梯也勉旃小子尚其勗之

辯張仲景傷寒方論

或問曰仲景立法之祖也今觀桂枝麻黃二湯服之而愈者總一二不愈而變重者第八九何如荅曰善哉問經云

冬氣嚴寒萬類潛藏君子固密不傷於寒。休虛之人。觸冒之者。乃名傷寒耳。其傷於四時之氣。皆能爲病。而傷寒爲毒者。以其最成殺厲之氣。中而卽病。名曰傷寒。不卽病者。寒毒藏於肌膚。至春變爲溫病。夏變爲暑病。暑病者。熱極重於溫也。以此言之。傷寒者。乃冬時感寒卽病之名。桂枝麻黃二湯。爲當時傷寒設。與過時溫暑何預焉。夫受病之原則同。故均謂之傷寒。所發之時既異。治之則不可混也。夫春溫夏熱秋涼冬寒者。四時之正氣。風亦因之而成溫涼寒熱也。故氣候嚴寒。風亦凜烈。天道和煦。風亦溫暖。冬

時腎與膀胱用事。水冰地凍。風寒相傳。人觸冒之。腠理鬱
塞。乃有惡風惡寒之症。其餘時月。則無此症也。仲景知傷
寒非比他病。可緩。故特詳於此書。不幸書傳久遠。遺帙頗
多。晉太醫令王叔和得於散亡之餘。詮次流傳。未免穿鑿。
成無已順文註釋。並無正誤之言。以致將冬時傷寒之方。
通解溫暑遺禍無窮。蓋傷寒之初。中人必先入表。表者何。
卽足太陽寒水之經。此經行身之後。自頭貫脊。乃有頭痛。
脊強惡寒之症。在他經則無此症矣。况此經乃一身之綱。
維爲諸陽之主氣。治之一差。變不可勝言矣。故宜二湯發

散表中寒邪。若以此湯通治溫暑之病。則誤矣。曰邪之在表。爲太陽經也。一經有二藥之分。又何如。曰在經雖一。而榮衛之傷則殊。寒傷榮。症乃惡寒發熱而無汗。其脉浮。紫。浮爲在表。紫爲惡寒。宜麻黃輕揚之劑。發之。寒邪退而汗出。表和而愈矣。風傷衛。衛傷則自汗。緣太陽受風。不能衛護。腠理疎而汗泄。脉見浮。緩。宜桂枝辛溫之劑。解之。腠理閉而汗止。表和而愈矣。又有榮衛俱傷者。二湯難用也。故設大青龍湯。然此藥大峻。非庸俗所識也。曰溫暑既無方治之。奈何。脉症與傷寒何以別。曰溫暑雖殊。亦冬時感受。

寒邪而不即散。伏藏人身。歷二三時之久。天道大變。寒化爲熱。人在氣交之中。亦隨天地之氣而化。治之之方。亦因時用辛涼。苦寒之藥。安得藥用冬時辛溫之方乎。夫溫病欲出。值天時和煦。自內達表。脉反見於右關。不(浮)緊而微(微)。數曰惡寒。否乎。曰。傷寒自冬月風寒而成。外則有惡風惡寒之症。既名爲溫。則無此症矣。曰。子之言何據乎。曰。經云。太陽病發熱。不惡寒。而渴者。溫病也。不惡寒。則病非因外來。渴則自內達表。曰。春夏之病。亦有頭痛惡寒。脉(浮)緊者何也。曰。此非冬時所受之寒。乃冒非時暴寒之氣耳。或溫

暑將發又受暴寒雖有惡寒脉浮之症未若冬時之甚也
宜辛涼之藥以通其內外而解之斷不可用桂枝之劑矣
曰傷寒之在三陽則爲熱邪既傳三陰則爲陰症矣陰症
法以熱治固其宜也三陰篇以四逆散涼藥治四逆大承
氣治少陰何耶嗚呼此王叔和以殘缺之經作全書詮次
將傳經陰症與直中陰經之陰症混同立論所以遺禍至
今未已也姑畧陳之蓋風寒之初中人也入於陽則太陽
爲之首入於陰則少陰爲之先或入於陰或入於陽皆無
定体非但始太陽終厥陰也或自太陽始日傳一經一日

太陽二日少陽三日陽明四日少陰五日太陰六日厥陰六日至厥陰邪氣衰不傳而愈者。或有不罷再傳者。或有間經而傳者。或有傳至二三經而止者。或有始終只在一經者。或有越經而傳者。或有初入太陽不作鬱熱便入少陰而成真陰症者。或有直中陰經而成寒症者。或有症變者。或有脈變者。或有取症不取脈者。或有取脈不取症者。緣經無明文。後人有妄治之失。夫自三陽傳次三陰之陰症。外雖有厥逆。內則熱邪耳。若不發熱。四肢便厥冷而惡寒者。此則直中陰經之寒症也。蓋太陽受邪。行盡三陽氣。

分傳次三陰血分。則熱入深矣。熱入既深。表雖厥冷。眞熱邪也。經云。元則售。承乃制。熱極反兼寒化也。若先熱後厥者。傳經之陰症也。經云。厥深熱亦深。厥微熱亦微。是也。故宜四逆散。承氣湯。看微甚而治之。如初病便厥。但寒無熱。此則直中陰經之寒症也。急宜四逆輩以溫之。經云。發熱惡寒者。發於陽。乃傳經之傷寒也。無熱惡寒者。發於陰。乃直中之陰症也。傷寒又有日傳二經者。兩感者。傳經未終而斃矣。傷中不同。溫涼迥異。可槩治乎。日嘗讀劉守真書云。傷寒無陰症。入傷於寒。則爲熱病。熱病乃汗病也。汗液

乃陽氣也。又遍考靈樞諸書，並無陰症。陰症乃雜病也。救和誤入之耳。守真私淑仲景者，而談論之異，何耶？曰：守真因傷寒論，以桂枝麻黃湯，通治溫暑之誤，而有是說。故叮嚀云：天道溫熱之時，用桂枝湯，必加涼藥於其中，免致黃生班出之患。若知此湯爲冬時卽病之傷寒，設不爲過時之溫暑，設則無此論矣。觀其晚年悟道著病机保命集，其中用羌活湯、辛涼之藥，以治非時傷寒，其妙如神。是可補仲景之遺亡。見何高哉！夫內經言傷寒爲熱病而無寒者，語其常也。仲景之論有寒有熱者，言其變也。合常變而無

遺所謂並行不悖。而反相爲用也。此所以爲萬世醫家之準繩歟。

傷寒論

嘗觀庸醫治傷寒。一二日不問屬虛屬實。使用麻黃桂枝之類。汗之三四日不問在經在腑。使用柴胡之類。和之五六日不問在表在裏。使用承氣之類。下之。以致內外俱虛。變証蜂起。大抵病人表裏虛實不同。邪之傳變亦異。豈可以日數拘哉。故善治病者在得其傳受。但見太陽症直攻太陽。見少陰症直攻少陰耳。仲景又云。日數雖多。但有表

症而脉浮者。

尤宜汗之。日數雖少。但有裏症而脉沉者。日尤宜下之。切不可執定一二日發。表三四

和解。五六日方下之說。務俾審脉驗症。辯名定經。方可下

手。真知其爲表邪而汗之。真知其爲裏邪而下之。真知其

爲直中而溫之。如此而汗。如彼而下。又如彼而溫。桂枝承

氣投之不差。姜附理中。發而必當。無無實實虛虛之誤矣。

仲景取方。立論甚嚴。曰可溫。曰可汗。曰可下。曰和解。曰急

下。曰急溫。曰少與。與夫先溫其裏。乃攻其表。先解其表。乃

攻其裏。得其緘領。不難矣。嗟夫。常病用常法。誰人不知。設

有感冒非時暴寒。而誤作正傷寒者。有勞力感寒。誤作真

傷寒者。有雜症類傷風。誤認作傷寒者。有直中陰經真寒症。誤作傳經之熱症者。有溫熱誤作傷寒者。有暑症誤作傷寒者。有如狂。誤作發狂者。有血症發黃。誤作濕熱發黃者。有蚊迹。誤作發斑者。有動陰血。誤作鼻衄者。有譫語。誤作狂言者。有獨語。誤作鄭聲者。有女勞復。誤作陰陽易者。有短氣。誤作發喘者。有痞滿。誤作結胸者。有心下硬痛下利。純清水。而俗呼爲漏底者。有噦而誤認乾嘔者。有併病而認作合病者。有正陽明肝病。而認作陽明經病者。有太陽症無脈。而認作死症者。有裏惡寒。誤作表惡寒者。有表

熱誤作裏熱者。有陰症發燥。誤作陽症者。有少陰症發熱。而誤作太陽症者。有標本全不曉者。比比然也。若不解明症脉。因病立方。但同庸俗一槩妄治。此殺人不用刃耳。戒之戒之。

脉要上

或問曰。治傷寒。先明脉症。脉症不明。取方無法。夫脉之一字。實先天後天之造化。何爲先天。何爲後天。何爲脉也。答曰。人之陰陽。卽爲先天。人之血氣。卽爲後天。脉者非血非氣。乃氣血之先。卽榮衛之道路也。故持脉之要。曰舉。曰按。

曰尋。三字不明。則表裏虛實。何以別之。曰持脉者。輕手尋之曰舉。重手取之曰按。不輕不重。委曲求之曰尋。初持輕手候之脉。見皮膚之間。便得曰浮。是太陽經脉也。有力者主寒邪在表。無汗爲寒傷榮血。表實者宜汗之。無力者主風邪在表。有汗爲風傷衛氣。表虛者宜實之。重手候之脉。附於肌肉之下。筋骨之間而得曰沉。是三陰經脉也。三陰經俱是沉脉。妙在指下有有力無力。中分有力者主熱邪在裏。爲裏實。宜下之。無力者主寒邪中裏。爲裏虛。宜溫。不輕重中而取之脉。應於血肉之間。陰陽相半得之曰中。若見

微洪是陽明經脉也。主邪在表多裏少宜解肌。若見弦數是少陽經脉也。主邪在半表半裏宜和解。蓋陰陽表裏虛實寒熱俱在浮中沉三脉。有力無力中分有力者爲陽爲實爲熱。無力者爲陰爲虛爲寒。若浮中沉之不見則委曲求之。若隱若見則陰陽伏匿之脉也。三部皆然曰若君之了然非庸俗能識也。然三脉中有進退焉。有伏脉焉。有可解不可解焉。有欲至焉。有燥亂焉。請脩言之。曰脉大者爲病進。大則邪氣勝而正氣無權。脉緩者爲邪退。緩則胃氣和而邪氣無梯。何謂伏脉。一手無脉曰單伏。兩手無脉曰

(雙伏)若病初起頭痛發熱惡寒而脉伏者緣陰邪隔於陽中不得越發此欲汗而當攻之使邪氣退而正氣復脉自至而病自除如欲雨則天鬱熱晴霽天乃反涼可見若七八日以來別無刑尅症候或昏冒不知人事或脉全無者此欲汗而勿攻之如六合陰晦雨後庶物皆甦換陽之吉兆也何謂可解不可解脉浮緊在表者以汗解之脉沉實(在裏者)以下解之脉沉遲而無力者以溫解之然又有浮宜下沉宜汗者其故何也口浮而下者因大便難也設使大便不難豈敢下乎沉而汗者因表有熱也設使身不發

熱豈敢汗乎何謂歇至如寒邪直中陰經溫之而斷續者
爲歇至何謂燥亂因汗下後脉當靜今反盛者曰燥亂大
因之兆也客問之欣然起謝

脉要下

傷寒之病非比雜科脉理精微甚所難明原傷寒之脉浮
(大)(動)(數)(滑)爲陽(沉)(澁)(弱)(弦)(微)爲陰其弦(緊)(浮)(滑)(沉)(澁)六者
爲殘賊之脉故諸脉作病夫春(弦)夏(洪)秋(毛)冬(石)土(緩)爲
四時之正脉(浮)(沉)(遲)(數)爲客主左爲人迎右爲氣口呼由
心肺爲陽吸入腎肝爲陰一呼一吸爲一息寸口爲陽人

澤爲陰。中爲關界。陽主氣。陰主血。血爲榮。氣爲衛。寒則傷榮。風則傷衛。理自然也。蓋傷寒之病。從淺入深。先入皮膚肌肉。次入筋骨腸胃。專以浮中沉遲數。辨其陰陽寒熱。及表裏虛實而斷之。諸浮爲在表。屬陽。諸沉爲在裏。屬陰。諸遲爲在臟。屬寒。諸數爲在腑。屬熱。雜病以弦爲陽。傷寒以弦爲陰。雜病以緩爲弱。傷寒以緩爲和。傷寒以大爲病進。以緩爲邪退。以緩爲胃脈。有胃氣曰生。胃氣少曰病。無胃氣曰死。傷寒病中有神脈。如脈中有力。卽爲有神。神者氣血之先也。寸口陽脈中。或見沉細無力者。爲陽中伏陰。尺

部陰脉中。或見沉數有力者。爲陰中伏陽。寸口數大有力。爲重陽。尺部微而無力。爲重陰。寸口細微如絲。爲脫陽。尺部細微無力。爲脫陰。寸脉浮而有力。主寒邪表實。宜汗。浮而無力。主風邪表虛。宜實。尺部沉而有力。主陽邪在裏。爲實。宜下。無力。主陰邪在裏。爲虛。宜溫。寸脉弱而無力。切忌發汗。尺脉弱而無力。切忌輕下。初按來疾去遲。名曰內虛。外實。去疾來遲。名曰內實。外虛。尺寸俱同名曰緩。緩者和而生也。寸關尺大小浮沉遲數同等者。此陰陽和平。雖據當愈。汗下後脉靜者生。躁亂身熱者死。乃邪氣勝也。溫之。

後脈來歇止者正氣脫而不復生也。純弦之脈名曰負負者死。按之解索名曰陰陽離離者死。陰病見陽脈者生陽病見陰脈者死。寸脈下不至關爲陽絕尺脈上不至關爲陰絕此皆不治。脈來蕩蕩如車蓋者名曰陽結。脈來累累如循長竿者名曰陰結。脈腎腎如羹上肥者名曰陽氣微。脈索索如蜘蛛絲者名曰陰氣衰。脈綿綿如瀉漆之絕者亡其血。脈來緩時一止復來者名曰結。脈來數時一止復來者名曰促。陽盛則促陰盛則結此皆病脈。

陰陽表裏脈症論

傷寒汗下溫之法最不可輕。據脈以驗症。問症而對脈。太陽者陽症之表也。陽明者陽症之裏也。少陽者三陽三陰之間。太陰少陰厥陰又居於裏。總謂之陰症也。發於外則太陽爲之首。發於內則少陰爲之先。太陽惡寒。少陰亦惡寒。但太陽之脈多浮。少陰之脈沉細。與他症狀自異。發熱惡寒。身體疼痛。或自汗。或無汗。是爲表症。可汗。不惡寒。反惡熱。口燥咽乾。壯熱腹滿。小便如常。大便秘結。是爲裏症。可下。厥冷囊拳。自利煩燥。而無身熱頭痛。是爲陰症。可溫。
(浮洪)緊數此表病之脈。
(沉實)滑數此裏病之脈。
(微細)緩弱

此陰病之脉。在表者。邪傳於榮衛之間。在裏者。邪入於胃。腑之內。胃腑之下。少陽居焉。若傳之陰。則爲邪氣入臟矣。夫榮與衛固爲表也。胃腑亦可以爲表。然以腑臟面分表裏。則在腑爲之表。在臟爲之裏。若合榮衛腑臟面分之。則表者。榮衛之所行。裏者。胃腑之所主。而臟則又深於裏矣。審脉問症。辨名定經。方可用藥。大抵治傷寒。有法投劑。少差。死生立見。可不慎哉。經云。傷寒六七日。日中不了了。無表症。脉雖浮。亦有可下者。少陰病二三日。無裏症。亦有可汗者。陰症四逆法。當用溫。而四逆散性寒。豈可用乎。曰。醫

在九流之中。非員机之士。不足爲也。脉雖浮。而亦有可下者。無表症。六七日不大便。借使大便不難。其敢輕下乎。少陰病亦有發汗者。少陰本無熱。反發熱而表猶未解。故用溫藥。微取其汗也。借使身不發熱。其敢輕汗乎。四逆湯用姜附。四逆散用枳柴。一寒一熱。並主四逆。固不侔矣。然傳經之邪。與陰經受邪。初病便厥者不同。四逆散用藥寒。主先陽後陰也。四逆湯用藥熱。主陽不足而陰有餘也。至於陽極發厥。陰極發燥。陰症似陽。陽症似陰。差之毫厘。謬以千里。學者當深思之。

傷寒脈証指法

夫風寒初入。或先太陽寒水之經。此經本寒標熱。便有惡風惡寒。頭痛脊強。發熱之症。若在他經。則無此症矣。若無頭痛惡寒。脈又不浮。此爲表症罷。而在(中)者。何。即半表半裏之間。乃陽明少陽之分也。蓋二經不從標本。從乎中也。過此則邪入裏爲熱實。脈不(浮)而(沉)。按至筋骨之間。方得。如脈來(沉)(實)(有力)。外症則不惡風寒。而反惡熱。譫語大渴。或潮熱自汗。或揚手擲足。揭去衣被。五六日不大便是邪熱傳入胃腑。屬裏而有燥屎也。宜大柴胡湯下之。而愈。

矣。若脉來沉遲無力。此爲直中陰經。真寒症之陰脉。其症無頭痛。無身熱。初起怕寒。手足厥冷。或戰慄踈卧不渴。或腹疼嘔吐泄瀉。或口出涎沫。面如刀刮。乃陰經自中之寒。不從陽經傳入。故不在傳經熱症治例。更當看外症如何。若腹滿咽乾。屬太陰。舌乾口燥。屬少陰。煩滿囊縮。屬厥陰。此三者。俱是陽經傳入陰經之熱症。脉沉實有力。急當攻裏。下之。如下後利不止。身疼痛。脉反沉細無力。又當救裏溫之。此權變之法也。三陰傳經熱症與三陰直中寒症。脉雖沉。而有力無力。要當分別。証異而治各不同矣。今將浮

中沉三脉。列其於左。使因脉以知症。緣症以明治。庶可以爲後人之法程云。

浮脉形狀指法主病

浮初排指於皮膚之上。輕手按之。便得曰浮。此爲寒邪初入足太陽經。病在表之標。可發而去之。雖然治之。則有二焉。寒傷榮則無汗惡寒。用麻黃湯。風傷衛則有汗惡風。用桂枝湯。一通一塞。不可同也。

浮緊有力。無汗惡寒。頭項痛。腰脊強。發熱。此爲傷寒在表。表實宜發表。冬用麻黃湯。春夏秋用羌活沖和湯。一方

去地黃加紫蘇藿香湯加石羔知母無渴不必加

(汗)緩無力有汗惡風頭項痛腰脊強發熱此爲傷風在表

表虛宜實表冬用桂枝湯餘三時用加減中和湯腹痛

小建中湯甚者以^{大黃湯}止汗退邪必加涼藥於中

免斑出黃生之患此謂無伐天和也

(中)脈形狀指法主病

(中)畧重指按至皮膚之下肌骨之間乃得曰(中)謂之半表

半裏症也然亦有^仁焉蓋陽明少陽二經不從標本從

乎中也

(長)而(有力)卽(微洪)脉也。此爲陽明在經其症微有頭疼眼
脰痛鼻乾不得眠發熱無汗用葛根解肌湯若渴而有
汗不解或經汗過渴不解者用白虎湯加人參無渴不
可服此藥爲大忌。

(弦)而(數)此爲少陽經脉其症胸脇痛耳聾寒熱嘔而口苦。
兩陽交中故名曰少陽俱用小柴胡湯加減或兩經合
病則脉(弦)而(長)此湯加葛根芍藥綠膽無出入有三禁。
止宜和解表裏。

(沉)脉形狀指法主病

沉重指按至肌肉之下。筋骨之間。此爲沉脉。亦有二焉。陰陽寒熱在沉脉中分。若沉而有力。則爲陽。爲熱。沉而無力。則爲陰。爲寒也。

沉數有力。則爲陽明之本。表証解而熱入於裏。惡寒頭疼悉除。反覺怕熱。欲揭衣被。揚手擲足。譫語狂妄。燥渴或潮熱自汗。五六日不大便。輕則大柴胡湯。重則三承氣湯選用。泄去胃中燥屎。則愈。

沉遲無力。爲寒。外症無身熱。無頭痛。不渴。初起怕寒。厥冷踈卧。兼或腹滿脹痛。吐瀉。或戰慄面如刀刮。或口吐白

沫冷涎或小便清白或大小腹痛皆是陰經自中真寒
症輕則理中湯重則姜附四逆湯溫之

傷寒至沉脉方分陰陽仔細體認下藥不可造次倘有差
失咎將歸已悔無及矣

九診脉須分三部九候每部必先浮診三候候三動也中
診三候沉診三候三三而成九候然後知病之深淺表
裏以爲處治之標的明脉識症辯名定經得心應指如
此而治無枉死者矣若脉症不明處方無法狂妄行醫
視人命如草芥他日不受天殃吾不信也

三陰三陽經脈証

仲景云。尺寸俱浮者。太陽受病也。當一二日發。以其脈上連風府。故頭項痛。腰脊強。傷寒則發熱惡寒。傷風則鼻塞惡風。然傷風有汗。傷寒無汗。

尺寸俱長者。陽明受病也。當二三日發。以其脈夾鼻絡於目。故身熱目痛。鼻乾不得卧。又曰。不惡寒而作渴。爲在經。不惡寒反惡熱。自汗出。大便難。爲在腑。

尺寸俱弦者。少陽受病也。當三四日發。以其脈循脇絡於耳。故胸脇痛。面耳聾。口苦咽乾。目眩。往來寒熱。面嘔。

此三經皆受病。未入於腑者。可汗而已。

尺寸俱沉。細者。太陰受病也。當四五日發。以其脉布胃中。絡於嗇。故腹滿而咽乾。直中者。或腹痛自利。不渴。

尺寸俱沉者。少陰受病也。當五六日發。以其脉貫腎。絡於肺。繫舌本。故口燥舌乾而渴。直中者。則惡寒。口中和。默默欲寐。腹痛。或咽痛。

尺寸俱微緩者。厥陰受病也。當六七日發。以其脉循陰器。絡於肝。故煩滿囊縮。直中者。則唇青舌卷。筋急不飲食。或吐衄。

此三經皆受病。已入於腑者可下。直中者可溫。

已上三陰之症。乃自陽經傳來。故宜下。非若陰經自中
之寒。則爲真陰症也。宜用四逆之類。脉(微)浮爲欲愈。不
浮爲未愈。小建中湯。脉(沉)短者。藥必縮。爲毒氣入臟。承
氣湯下之。利不止。四逆湯溫之。

太陽經見証法

頭項痛。腰脊強。發熱惡寒。是足太陽膀胱經受症。假如先
起惡寒者。本病已後發熱者。標病。然是經非發汗。則不
能愈。若有一毫頭痛惡寒。身熱不拘日數多少。便宜發

散。自然熱退身涼。有何變症。

陽明經見証法

目痛鼻乾不眠。微惡寒者。是足陽明胃經受症。然是經非通泄不能痊。必用大黃芒硝。以疎利陽熱。假令先起目痛惡寒身熱者。陽明經本病已後潮熱自汗譫語發渴大便實者。正陽明胃腑標病。本宜解肌。標宜急下。當以脉消息之。脉見微洪有力爲經病。沉數有力爲腑病。

少陽經見症法

耳聾脇痛寒熱嘔而口苦。是足少陽膽經受症。假如先起

惡寒身熱耳聾脇痛者木病已後嘔而舌乾口苦者標病緣膽無出入病在半表半裏之間止宜小柴胡湯如減小柴胡能利能汗和解表裏再無別湯若治之得法有何壞症

已上三陽經用藥俱載於前不復重錄

太陰經見症法

腹滿自利津不到咽手足溫者是足太陰脾經受症假如先起腹滿咽乾者本病已後身目黃者標病至陰經則難拘定法或可溫或可下當分直中者寒症傳經者熱

症。腹滿咽乾發黃者。屬臟熱。自利不渴。或嘔吐者。屬臟寒。

本經用藥法

太陰脾土。惟惡寒濕。非乾姜白朮。不能燥濕。如腹滿咽乾。手足溫。腹痛身無熱。脉沉有力者。是熱邪傳入太陰裏症也。宜加減桂枝大黃湯下之。如腹滿自利不渴。或嘔吐惡寒。手足厥冷。脉沉無力者。是太陰自受寒症也。非從三陽經傳入者。宜加減理中湯。重則回陽急救湯。溫之。

少陰經見症法

舌乾口燥。是足少陰腎經受病。假如先起舌乾口燥者。本病已後。譫語大便實者。標病。六經中惟此一經難治。大要以口燥而渴。大便實。脉實有力者。知其熱傳經之少陰也。嘔吐瀉利不渴。脉沉遲無力者。知其寒直中陰也。

本經用藥法

此經惟惡寒燥。非附子不能溫潤。如口燥咽乾。渴而譫語。大便實。或遶臍硬痛。或下利純清水。心下硬痛。脉來沉實有力者。是邪熱傳入少陰裏症也。急用六一順氣湯。

三承氣湯。分輕重下之。如身無熱。惡寒厥冷。踰卧不滿。或腹痛嘔吐。瀉利沉重。或陰毒。手指甲唇青。嘔逆絞痛。身如被杖。面如刀刮。戰慄。脉來沉遲無力者。是少陰直中真寒症也。宜用回陽急救湯溫之。

厥陰經見症法

煩滿囊拳者。是足厥陰肝經受症。假如先起消渴煩滿者。本病已後。舌蹇囊縮者。標病亦有寒熱兩端。不可驟作熱治。大要煩滿囊拳消渴者。屬熱。口吐涎沫。不渴厥冷者。屬寒。若似瘧不嘔清便者。必自愈。

本經用藥法

此經藏血榮筋。非芍藥甘草不能滋養。如消渴煩滿。舌蹇囊縮。大便實。手足乍冷乍溫。脈來沉實者。外雖微冷。內有實熱。是熱邪傳入厥陰之症也。宜用承氣湯下之。如口吐涎沫。或四肢厥冷。不溫。過乎肘膝。不渴。小腹絞痛。嘔逆自利。怕寒肢痛。小便清利。脈來沉遲者。是厥陰目申真寒症也。急用茱萸四逆湯溫之。即回陽救急湯。日有加減法。

合病併病論

趙嗣真曰。愚嘗疑合病併病之難明也。久矣。今始釋之。合病者。二陽經。或三陽經。同受病。病之不傳者也。併病者。一陽經先病。又過一經。病之傳者也。且如太陽陽明併病一症。若併而未盡。是傳之未過。尚有表症。仲景所謂太陽症不罷。面色赤。陽氣拂鬱在表。不得發越。煩燥短氣。是也。猶當汗之。麻黃桂枝各半湯。若併之已盡。是爲傳過。仲景所謂太陽症罷。潮熱。手足汗出。大便硬而譫語者是也。法當下之以承氣湯。是知傳則入腑。不傳則不入腑。所以仲景論太陽陽明合病。止出三症如前。於

太陽陽明併病。則言其有傳變如此也。又三陽互相合病。皆自下利。仲景謂太陽陽明合病。則主以葛根湯。太陽少陽合病。主以黃芩湯。少陽陽明合病。主以承氣湯。至於太陽少陽併病。其症頭項強痛。目眩。如結胸。心下痞硬。當刺大椎。肺。臑。肝。臑。不可汗下。但三陽合病。仲景無背強惡寒語句。雖別有口燥渴。心煩背微惡寒。乃屬太陽症。而非三陽合病也。三陽若與三陰合病。卽是兩感。所以三陰無合病例也。

三陽合病

太陽陽明者。本太陽病。若汗若下。若利小便。無津液。胃中燥。轉屬陽明。大便難。爲脾約是也。若惡寒。升麻湯。不惡寒。反惡熱。白虎湯。譫語者。調胃承氣湯。噤而胸滿者。不可下。麻黃湯。

太陽少陽者。本太陽病。不解。轉入少陽。頭項強急。脇下硬。滿。乾嘔。不能食。目眩。往來寒熱。脈沉緊者。小柴胡湯。少陽陽明者。本少陽病。因發汗利小便後。胃中燥實。大便難。屬調胃承氣湯。

正陽陽明者。乃胃家風盛氣實也。大柴胡湯。大小承氣湯。

選用

三陽合病。腹滿身重。難以轉側。譫語遺尿。口中不仁。白虎湯。口乾舌燥。不仁。背惡寒。同太陽陽明。少陽陽明。正陽陽明。無表症者。俱可下。惟惡寒者。爲太陽陽明合病。未過經爲屬表。可發汗。蓋在經則汗。過經則下也。

陽明少陽合病。必下利。其脈不負者順。負者逆也。互相剋賊。名曰負。脈滑而數者。有宿食也。當下之大承氣湯。

風傷衛寒傷榮辯

風則傷衛。氣寒則傷榮。血者。緣氣本屬陽。風屬陽。陽則從

陽。故傷衛氣。陽主開泄。皆令自汗。故用桂枝湯。辛耳溫之劑。以實表。血本屬陰。寒屬陰。陰則從陰。故傷榮血。陰主閉藏。皆令無汗。故用麻黃湯。輕揚之劑。以發表。正所謂水流濕。而火就燥。雲從龍。而風從虎。各從其類者是也。

時行爲病論

時行者。春應暖而反大寒。夏應熱而反大涼。秋應涼而反大熱。冬應寒而反大溫。此非其時而有其氣。是以一歲之中。長幼病多相似。此皆時行不正之氣使然。名曰疫。

病。春感寒邪在肝。升麻葛根解肌湯。夏感寒邪在心。調中益氣湯。秋感濕邪在肺。白虎加蒼朮湯。發黃茵陳五苓散。冬感寒邪在腎。名曰冬溫。括葉湯。溫疫通用人參敗毒散。

春分以至秋分節前。天有暴寒者。皆爲時行寒疫。宜用升麻葛根湯。

又有四時之正氣本邪爲病。如春傷於風。夏必發泄。夏傷於暑。秋必瘧痢。秋傷於溫。冬必咳嗽。冬傷於寒。春必溫病。皆當臆脈看症。按時令而治之。

傷寒不拘日數論

初得傷寒一二日至十三日。若有一毫頭痛惡寒者。每日如此。不論日數多少。尚有表症未解。猶當微汗。不可攻裏。若攻之。則爲結胸等症。

一二日頭痛惡寒。皆除。便覺胸中連臍痛。腹滿悶。大便閉。渴而不惡寒。反怕熱。潮熱自汗。譫語。揭去衣被。揚手擲足。發狂。脉沉有力。是熱入裏也。不拘日數。便可用通利下藥無疑。

五六日但頭汗出。身無汗。齊頸而還。小便自利。渴飲水漿。

此瘀血症也。宜犀角地黄湯。桃仁承氣湯。抵當湯。看上下虛實。犀角地黄湯。治上。桃仁承氣湯。治中。抵當湯。治下。

七八日未得汗。大便閉。發黃生瘡。譫語而渴。越婢承氣湯主之。

八九日已經汗下。脉尚洪。數。兩目如火。五心煩熱。狂叫欲走。三黃石膏湯主之。

傷寒識症內外篇

大抵治傷寒。必須識症。先察陰陽表裏虛實寒熱親切。後

審汗吐下溫和解之法治之庶無差誤。

先看兩目。如目眇黃必爲欲愈之病。眼胞忽陷目睛直視者難治。開目欲見人屬陽。閉目不欲見人屬陰。目睛不明神水已竭不能照物者難治。

次看口舌有無胎狀。如見舌滑白色者邪未入裏。屬半表半裏。症爲熱宜小柴胡和解。舌上黃胎者胃腑邪熱甚也。宜下之調胃承氣湯。大便燥實脉沉有力而大渴者方可下。便不實脉不沉微渴者未可下。宜小柴胡湯。舌上黑胎生芒刺者是邪熱已極。腎水尅心火十有九死。

急用大承氣湯下之無疑

又次以手按其心胸至小腹有無痛處。若按之當心下硬痛手不可近。燥渴譫語。大便實。脉來沉實有力。爲結胸症。急用大陷胸湯。加枳殼下之。量人元氣虛實。宜從緩治。若按之心胸雖滿悶不痛。尚爲在表。未入乎腑。乃邪氣壅乎胸中。小柴胡加枳桔以治其悶。如未效。本方對小陷胸。一服如神。若按之當心下脹滿而不痛者。宜瀉心湯。加枳桔治痞滿。若按之小腹痛。小便自利。大便黑。或身黃。譫語燥渴。脉沉實者。爲畜血。桃仁承氣下盡黑。

物則愈。若按之小腹脹滿不硬痛。小水不利。五苓散加
減利之。不可大利。恐耗津液。若按之小腹連臍硬痛。渴
小水短赤。大便實者。有燥屎也。大承氣湯下之。

再後問其大小便若何。及服過何藥。方知端的。務使一一
明白。症脈相對。然後下藥無差。

傷寒看症法則

凡看傷寒。尺脈(弱而無力)。切忌汗下。寸脈(弱而無力)。切忌
發吐。俱宜小柴胡湯和之。陽毒傷寒。服藥不效。斑爛皮
膚。手足皮俱脫。身如塗漆。眼珠如火。燥渴欲死。脈洪大

有力。昏不知人。宜三黃石羔湯主之。

凡看傷寒。如煩渴欲飲水者。因內水消竭。欲得外水自救。大渴欲飲一升。止可與一碗。常令不足。不可太過。若然飲過量。使水停心下。則爲水結胸等症。射於肺爲喘。爲咳。留於胃爲噎。爲噦。溢於皮膚爲腫。留於下焦爲癰。滲於腸間則爲利下。皆飲水多之過也。又不可不與。亦不可強與。李知幾云。若還不與。非其治。強飲須教別病生。正謂此也。

凡看傷寒。須問病人所苦。所欲飲食大便。若見吐衄者。雖

有大熱忌下涼藥。犯之必死。蓋胃中有寒。則蛔入上脘。大凶之兆。急用炮乾姜理中湯。加烏梅二十個。花椒十粒。煎服。蛔安。却以小柴胡湯退熱。蓋蛔性聞酸則靜。見苦則安也。

凡看傷寒。若經十餘日以上。尚有表症。宜汗者。與羌活沖和湯微汗之。十餘日。若有裏症。宜下者。可與大柴胡湯下之。若表症尚未除。而裏症又急。不得不下者。以大柴胡通表裏而緩治之。又老弱及血氣兩虛之人。有下症者。亦用大柴胡湯下之。不傷元氣。如年壯力盛者。不在

禁例。

凡看傷寒。若汗下後。不可偏用參芪太補。宜用小柴胡加
減和之。若太補。使邪氣得補而熱愈甚。復變生他症矣。
所謂治傷寒無補法也。如曾經汗下後。果是虛弱之甚。
脉見無力者。方可用甘溫之劑補之。其勞力感寒之症。
不在禁補之例。從病制宜。

凡看傷寒。惟陰症最難識。自然陰症。人皆可曉。及至反常。
則不能知。如初病身不熱。頭不痛。就便怕寒。手足厥冷。
好靜沉默。不渴嘔吐。泄利腹痛。脉來沉細無力。人共知。

爲直中陰症矣。至於發熱面赤煩燥不安揭去衣被飲
冷脉大無力人皆不識認作陽症誤投寒藥死者多矣。
不知陰症不分熱與不熱須憑脉下藥至爲切當。不問
浮沉大小但指下無力按至筋骨全無力者必有伏脉。
不可與涼劑服之必死。急與五積散一服通解表裏之
寒。隨手而愈。若內有沉寒必須姜附以溫之。切忌發泄。
脉雖洪大按之無力重按全無便是陰症。若用寒藥治
之則渴愈盛而燥愈急豈得生乎。此取脉不取症也。極
要仔細。

凡看傷寒，有口沃白沫，或唾多流冷涎，俱是有寒。吳茱萸湯、理中、真武湯之類，看輕重用。切忌涼藥。雖病亦然。或用甘溫藥補元氣，四君子湯加附子一片。血虛用仲景八味丸。

凡看傷寒，且要識各經中死症。死脉親切，須一一理會。免致臨病疑惑。但見死症，便以脉參之。如果有疑，切莫下藥，不可強治。若不量力，見利而動，齒牙用藥，視人命若弁毛，決有天災。極當戒之，戒之。

貫珠篇

交霜降至春分。冬月發病者。爲正傷寒。表症見者。用辛熱之藥。大發汗。裏症見者。用寒涼之藥。急攻下。此與非時傷寒不同。

交春分至夏至前。有頭痛發熱。不惡寒而渴者。名溫病。用辛涼之藥。微解肌。不可大發汗。裏症見者。用寒涼之藥。急攻下。若誤下之。未必爲害。誤汗之。變不可言。

交夏至後至交秋前。有頭痛發熱。不惡寒而渴。名溫病。愈加熱者。名熱病。止用辛涼之藥。微解肌。不宜大發汗。裏症見者。用大寒之藥。急攻下。

交秋後至霜降前有頭疼發熱不惡寒身體痛小便短者
名溫病亦用辛涼之藥加燥劑以解肌亦不宜大發汗
裏症見者用寒涼之劑急攻下

其春夏秋三時有患頭疼身熱亦有惡寒者卽是冒風非
時暴寒之輕非比冬時正傷寒之重俱用辛涼之劑小
發汗裏症見者用寒涼之藥急攻下表症不與正傷寒
同治法

新刻傷寒六書纂要辯疑卷之二

傷寒兩感論

趙嗣真曰仲景論兩感爲必死之症而復以治有先後發表攻裏之說繼之者蓋不忍坐視而欲覩其萬一之可活也活人書云宜先救裏以四逆湯後救表以桂枝湯殊不知仲景云太陽與少陰俱病則頭疼爲太陽邪盛於表口乾而渴爲少陰邪盛於裏也陽明與太陰俱病則身熱譫語爲陽明邪盛於表不欲食腹滿爲太陰邪盛於裏也少陽與厥陰俱病則耳聾爲少陽邪盛於表囊縮爲厥陰邪

盛於裏也。三陽之頭疼身熱耳聾。救表也。不可汗乎。三陰之腹滿咽乾。口渴囊縮而厥。救裏也。不可下乎。活人書引下利身疼。痛虛寒。救裏之例。而欲施於煩渴腹滿譫語囊縮熱實之症。然乎否乎。蓋仲景所謂發表者。葛根麻黃是也。所謂救裏者。調胃承氣是也。活人書却謂救裏則是四逆。救表則是桂枝。今以救爲攻。豈不相悖。若用四逆湯。是以火濟火。而腹滿囊縮等証。何由而除。臟腑何由而通。榮衛何由而行。大凡死者。可坐而待也。吁。兩感病故爲不治之症矣。然用藥之法。助正除邪之理。學者不素定法於胸

中而徒執活人一書則害人矣。

傷寒傳足不傳手經論

傷寒傳足經不傳手經者。俗醫之謬論也。蓋人之克滿一身。無非血氣使然。自平旦會於臍中。朝行於手太陰肺經。以次分布諸經。行三百六十五骨節。明日寅時復會於手太陰也。血亦隨氣流布。運行不息。榮衛一身。所以一脈愆和。則百脉皆病。理固然也。彼云傳足不傳手者。何據哉。請言其故。蓋傷寒者。乃冬時感寒。卽病之名也。冬乃坎水用事。其氣嚴寒。時則足太陽少陰正司其令。觸冒之者。則二

經受病。其次則足少陽厥陰繼冬而司春令。而亦受傷。河也。蓋風木之令。起於大寒節。正當十二月中至春分。後方行溫令。故風寒亦能傷之。足陽明太陰中土也。與冬時無預。而亦傷之。何也。曰。土無定位。寄旺於四季。能終始萬物。則四時寒熱溫涼之氣。皆能傷之也。況表邪傳裏。必歸於脾胃。而成燥糞。用承氣湯下之。則胃氣和矣。手之六經。主於夏秋。故不傷之。足之六經。蓋受傷之方分境界也。若言傷足不傷手。則可以爲傳足不傳手。則不可也。况風寒之中人。榮衛晝夜循環。無所不至。豈間於手經哉。嘗觀此事。

難知。日傷寒至五六日間漸變神昏不語或睡中獨語一
二句。目赤唇焦舌乾不飲水稀粥與之則噤不與則不思
六脉沉數而不洪。心下不痞腹中不滿大小便如常或傳
至十日以來形如醉人此熱傳于少陰心經也。然未知自
何經而來。曰本太陽傷風風爲陽邪陽邪傷衛陰血自燥
熱蓄膀胱壬病逆於丙丙丁兄妹由是傳心心火自上而
逼肺所以神昏也。枝子黃芩黃連湯。若在丙者導赤散在
丁者瀉心湯。若脉浮沉俱有力是丙丁中俱有熱用導赤
瀉心各半服之。此膀胱傳丙足傳手經也。又謂之肺傳脾

也。下傳上也。表傳裏也。王傳丁者。乃次傳離也。名曰越經傳。氣逆而喘者。非肺經乎。如謂不然。何仲景桂枝麻黃二湯。乃心肺藥也。

傷寒言症不言病論

夫傷寒言証不言病者。症之一字。有明証見証對証之義存焉。蓋人之心。肝脾肺腎。在人身中。藏而不見。若口鼻耳目。則露而其見者也。五臟受病。人焉能知之。蓋有諸中必形諸外。肝有病則目不能視。心有病則舌不能言。脾有病則口不知味。肺有病則鼻不聞香。腎有病則耳不聽聲。以

此言之。則症亦親切矣。况風寒之中。人受之。必有經絡部
分。一或傷之。本經之症見矣。更能以脉察之。庶無差忒也。
吾故曰傷寒言症耳。如太陽傷寒。爲表之標。其經行身之
後。從頭下至足。則頭項痛。腰脊強之症。見於項背也。惡寒
症亦在表。蓋傷寒惡寒。傷風惡風。太陽爲寒水之經。凡見
惡寒。便爲在表。最爲的當。傳至陽明之經。則不惡寒。便不
宜發表。如有一毫頭痛惡寒。尚在太陽。便是表症未罷。不
可攻裏。故戒曰。發表不開。不可攻裏。此事不明。殺人甚速。
友曰。凡嘔者不可下。經曰。嘔多雖有陽明症。不可攻。攻之

爲逆。心下硬者不可下。切宜仔細。陽明經爲表之裏。其經行身之前。夾鼻絡於目。故目痛鼻乾不眠。少陽經行身之側。爲半表半裏。始於目銳眥。循脇絡於耳。交於膺中兩耳正中。故胸脇痛而耳聾。此三經病之易見。蓋如此更當診脉。參之。若太陽經則有二証。一爲傷寒。一爲傷風。通宜發而散之。若在陽明。則脉微洪而長。此非表非裏。而爲在經。宜解肌。少陽經則脉弦數。不浮不沉。在半表半裏之間。宜從中治。若脉不浮而沉實有力。此爲表証罷而裏証具。熱入陽明之本。宜泄去其胃中實熱而愈矣。若老弱產虛。或

帶表症必須下者用大柴胡湯若脉沉遲微弱無力則又爲陰症宜溫而不宜下也謹之慎之

正傷寒及溫暑暴寒勞力時疫治各不同辨

夫傷寒者因冬時觸冒寒邪卽病之名爲正傷寒乃有惡寒頭痛發熱之症故用桂麻二湯發散表中寒邪而愈如表症除而反怕熱譫語燥渴大便閉者以法下之大便通而愈矣其餘春夏秋三時雖有惡寒身熱頭痛亦微卽爲感冒非時暴寒之輕非若冬時正傷寒之重也如冬時感寒而不卽病至三時各隨時氣變而爲溫爲熱者因溫暑

將發。又受暴寒。故春變爲溫病。既變之後。不得復言爲寒矣。所以仲景有云。發熱不惡寒而渴者。溫病也。暑病亦然。比之溫病。尤加熱焉。治溫暑者。大抵不宜發汗。過時而發。不在表也。其伏寒至夏。又感暴寒。變爲暑病。暑病者。卽熱病也。夏火當權而言暑字。緣溫熱二症。從冬時伏寒所化。摠曰傷寒。所發之時既異。治之不可混也。此三者皆宜用辛涼之劑以解之。辛涼者。羌活沖和湯是也。兼能代大青龍湯。治傷寒見風。傷風見寒。爲至穩。又傷寒汗下後。過經不愈者。亦溫病也。已經汗下。亦不在表。隨病制宜。又有辛

苦勞役之人。有患頭痛惡寒。身熱加之。骨腿酸痛微渴。自汗。脉浮大而無力。此爲勞力感寒。用補中益氣兼辛溫之劑。爲良。經云。溫能除大熱。正此謂也。若當和解者。卽以小柴胡加減和之。切忌大發汗下。証見者。卽以本方加大黃微利之。切勿過用猛烈。其害非細。疫癘者。乃時行不正之氣。老幼相染。緣人正氣既虛。邪得乘機而入。與前溫暑治又不同。表証見者。人參敗毒散。半表半裏者。小柴胡湯。裏証具者。大柴胡湯下之。兼以脉診。以平爲期。與夫癰疽疔証亦時疫也。照常法例治之。

傷寒寒熱論

趙嗣真曰。明理論云。往來寒熱者。邪正分爭也。邪氣之入者。正氣不與之爭。則但熱而無寒。若邪正分爭。於是寒熱作也。蓋寒邪爲陰。熱邪爲陽。裏分爲陰。表分爲陽。邪之客於表也。爲寒邪與陽爭。則爲寒矣。邪之入於裏也。爲熱邪與陰爭。則爲熱矣。若邪在半表半裏之間。外與陽爭而爲寒。內與陰爭而爲熱。表裏之不拘。內外之無定。由是寒熱且往且來。日有至于三五發甚者。十數發也。若以陰陽二氣相勝。陽不足。則先寒後熱。陰不足。則先熱後寒。此則論

雜病。陰陽二氣自相乘勝然也。非可以語傷寒也。

熱在皮膚寒在骨髓論

按河澗言惡寒爲寒在表。或身熱惡寒爲熱在皮膚。寒在骨髓者皆誤也。活人書亦以此爲表裏言之。故趙氏曰。詳仲景論止分皮膚骨髓而不曰表裏者。蓋以皮膚肉筋骨五者。素問以爲五臟之合。主於外而充於身也。惟曰臟曰腑。方可言表裏。可見皮膚卽骨髓之上。外部浮淺之分。骨髓卽皮膚之下。內部深沉之分。與經絡屬表。臟腑屬裏之例不同。况仲景出此例。症與太陽首篇其爲表症明矣。是

知虛弱素寒之人。感邪發熱。熱邪浮淺。不勝沉寒。故外怯而欲得近衣。此所謂熱在皮膚。寒在骨髓。藥用溫辛。至於壯盛素熱之人。或酒客。感邪之初。寒未變熱。陰邪蔽其伏熱。陰凝於外。熱蓄於內。故內煩而不得近衣。此所謂寒在皮膚。熱在骨髓。藥用溫涼必矣。一發之餘。表解裏和。此仲景不言之妙。若以皮膚爲表。骨髓爲裏。則麻黃湯症。骨節疼痛。其可名爲有表復爲有裏之症耶。

臟腑表裏論

上云曰臟曰腑。可言表裏。皮膚骨髓。不可分表裏然矣。不

知表者陽也。外也。頭也。上也。裏者陰也。內也。腹也。下也。何言之。夫人之一身。負陽抱陰而生。故太陽行乎身之背。故見証則頭痛脊強。其屬表不待言矣。少陽行乎身之側。故見証則耳聾脇痛。屬半表半裏之間。至於陽明則行乎身之前矣。上絡乎目鼻。故見証則鼻乾不眠。是爲初陽明在經。明其未入乎腑也。下貫乎腹。故見証則內實。是爲正陽明在腑。明其未入乎臟也。是以均謂之表也。夫一陽明也。有在經在腑之異者。陽得兼陰也。陽明在腑。卽爲傳少陰之本。一傳少陰卽爲入臟矣。入臟卽屬乎陰矣。方可謂之

論學 卷一
裏矣。表裏豈以皮膚骨髓分哉。

三陽傳經論

內經云：太陽則頭痛，身熱，脊強，即續之曰陽明，則目痛，鼻乾不眠。後乃曰少陽，則耳聾，脇痛，寒熱，嘔而口爲之苦。是三陽傳經。先太陽，次陽明，後少陽也。古今論傷寒者，皆宗焉。未有矯其非者。夫太陽行乎身之後，陽之表也。陽明行乎身之前，陽之裏也。少陽行乎身之側，半表半裏也。如前所云：先太陽，次陽明，後少陽，然則傳經次第焉有傳裏已後方傳於半表半裏者哉。大槩人身經絡，由表而裏，病之

見症由淺而深必先太陽次少陽後陽明自表而漸入於裏自然之次第也若入裏後復傳於半表半裏者豈理也哉余固不敢云內經所云者非是但求之吾心覺有未安故不得不據人身之經絡從而正之但不知世之論者以余之言為然耶否耶

三陰無傳經論

凡三陽邪熱自三陽傳至三陰臟腑入裏為盡無所復傳故言無傳經也如再傳者是足傳手經也

陰症論

初病無熱便四肢厥冷或胸腹中滿或嘔吐腹滿痛下利
脉細無力此自陰經受邪即真陰症非從陽經傳來便宜
溫之不宜少緩經云發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒者
發於陰也治宜四逆湯

凡腹滿嘔吐腹痛皆是陰症只有微甚不同治難一槩腹
痛不大便桂枝芍藥湯腹痛甚桂枝大黃湯若自利腹痛
小便清白便當溫之理中四逆看微甚用輕者五積散重
者四逆湯無脉者通脉四逆湯使陰退而陽復也

陰毒論

王海藏曰陰毒本因腎氣虛寒。復因慾事。或食生冷物而後伏陰。內既伏陰。外又傷寒。或先感外寒。而後伏陰。內外皆陰。則陽氣不守。遂發陰毒。身重眼睛疼。身體倦怠。四肢厥逆冷。額上及身背冷汗不止。或多煩渴發熱。精神恍惚。如有所失。二三日間。或可起行不甚重。診之則六脉沉細而疾。尺部短小。寸口或無。若服涼藥。則渴轉甚。燥轉急。有此症者。極是難認。極宜仔細。急服還陽退陰之藥。則安。惟補虛和氣而已。陰症不宜發汗。如氣正脉大。身熱未瘥。用藥發汗無妨。

陰毒病手足指甲皆青。脉沉細而急者。四逆湯。無脉者通脉四逆湯。陰毒甘草湯。臍中以葱熨氣海關元。着艾灸三十壯。仍用溫和補氣之藥。通其內外以復陽氣。若俱不效。死証也。

氣海穴在臍下一寸五分。治陰厥脉微絕者。

關元穴在臍下三寸。治臟結不可攻者。及陰汗不止。腹脹腸鳴。面黑指甲青者。宜灸百壯。

傷寒伏脉辨

夫頭痛發熱惡寒。或一手無脉。或兩手全無者。庸俗以爲

陽症得陰脉便呼爲死証。不治。不知此因寒邪不得發越。便爲陰伏。故脉伏必有邪汗也。當攻之。又有傷寒病至六七日以來。別無刑尅症候。或昏沉冒昧。不知人事。六脉俱靜。或至無脉。此欲正汗也。勿攻之。當攻者發汗。冬用麻黃湯。三時羌活沖和湯。勿攻者止汗。五味子湯。遇此症者。還當視其人之精神何如耳。

陽厥陰厥辨

陰陽二厥治之一差。死症立判。夫陽厥者。先自三陽經氣分。因感寒邪。起於頭疼發熱惡寒。已後傳入三陰血分。大

便燥實譫語發渴揚手擲足不惡寒反怕熱脉沉有力此是傳經熱証人人知之。至於陽極發厥不惡熱反怕寒四肢厥冷。或時乍溫者。謂之陽厥。卽陽厥似陰也。外雖有厥冷。內有熱邪耳。蓋因大便秘結實失下。使血氣不通。故手足乍冷乍溫也。如火煉金。熱極金反化水。厥微熱亦微。宜四逆散。厥深熱亦深。宜大承氣湯。正謂亢則害其物。承乃制其極也。若醫人不知。疑是陰厥。復進熱藥。殆如抱薪救火矣。陰厥者。因三陰經血分自受寒邪。初病無身熱無頭疼。就便惡寒。四肢厥冷。直至臂脛以上過乎肘膝不溫。引衣

蹇卧。不渴。兼或腹疼吐瀉。或戰慄。面如刀刮。口吐涎沫。脉
(沉)(遲)(無力)此爲陰經直中。眞陰寒症。不從陽經傳入。謂之
陰厥也。輕則理中湯。重則四逆湯。溫之。切勿誤也。

寒熱二厥辯

或曰。人之手足。乃胃土之末。凡脾胃有熱。手足必熱。脾胃
有寒。手足必冷。理之常也。惟傷寒。乃有厥深熱亦深。厥微
熱亦微之論。何也。曰。胃寒則手足冷。胃熱則手足熱。此病
之常也。若亢極則變。不可以常道拘也。蓋亢則害。承乃制。
火氣亢極。反兼水化。故有此象耳。陰陽反覆。病之逆從。未

可以常理論也。凡經言厥逆厥冷。厥寒手足寒冷。非語皆變文耳。不可以論輕重。若言四肢則有異也。亦未可純爲寒証。若厥冷直至臂脛以上。則爲真寒無疑矣。急用姜附并藥溫之。少緩則難療矣。謂其寒上過乎肘。下過乎膝。非內有真寒達於四肢而何。然更當以脉并所兼之症參之。庶無誤也。凡看傷寒。不可以厥逆便斷爲寒。必須以脉兼症參之。方知端的。如手足厥逆兼以腹痛。腹滿泄利清白。小便亦清。口不渴。惡寒戰慄。面如刀刮。皆寒症也。若腹痛後重泄利稠粘。小便赤澀。渴而好飲。皆熱症也。宜詳審之。

傷寒變溫熱病論

趙嗣真曰。按仲景論。謂冬月冒寒。伏藏於肌膚而未卽病。因春溫氣所變。則爲熱。夫變者。改易之義也。至此則伏寒各隨春夏之氣。改變爲溫。爲熱。既變之後。不得復言其爲寒也。仲景所謂春分已後。秋分節前。天有暴寒。爲時行寒疫是也。三月四月。其時陽氣尚弱。爲寒所折。病熱則輕。五月六月。陽氣已盛。爲寒所折。病熱則重。七月八月。陽氣已衰。爲寒所折。病熱亦微。是知時行寒疫與溫熱二病。所論陽氣盛衰。時月則同。至於論暴寒之寒。與伏寒已變之寒。

自是相違名不正則言不順矣。仲景又云其病與溫及暑病相似。但治有殊者。要在辯其病源。寒熱溫三者之殊。則用藥之冷熱判然矣。

溫病論

問曰傷寒溫病可以脉辯。答曰溫病乃是冬時感寒所得也。至春變爲溫病耳。傷寒汗下不愈而過經其症尚在而不除者亦溫病也。經曰溫病之脉行在諸經不知何經之動隨其經之所在而取之。如太陽症頭痛惡寒汗下後過經不愈診得尺寸俱浮者太陽病溫也。如身熱目疼汗下

後過經不愈。診得尺寸俱_(長)者。陽明病溫也。如胸脇痛。汗下後過經不愈。診得尺寸俱_(弦)者。少陽病溫也。如腹滿咽乾。診得尺寸俱_(沉細)過經不愈者。太陰病溫也。如口燥舌乾而渴。診得尺寸俱_(沉)過經不愈者。少陰病溫也。如煩滿囊縮。診得尺寸俱_(微緩)過經不愈者。厥陰病溫也。是故隨其經而取之。隨其症而治之。如發斑乃溫毒也。治溫大抵不宜發汗。過時而發不在表也。已經汗下。亦不在表也。經日發熱不惡寒而反渴者。溫病也。其熱自內達外。無表症明矣。

暑病論 卽熱病

傷暑與傷寒俱有熱。若誤作傷寒治之。則不可。蓋寒傷形。熱傷氣。傷寒則外惡寒。而脉浮緊。傷暑則不惡寒。而脉虛。此爲異耳。經曰脉盛身寒。得之傷寒。脉虛身熱。得之傷暑。治宜小柴胡湯。渴加知母石膏。或人參白虎湯。天从淫雨。湿令大行。蒼朮白虎湯。若元氣素弱而傷之重者。清暑益氣湯治之。

傷寒標本論

病有標本。標本不明。處方何據。原夫六氣爲本。三陰三陽

經爲標。病氣爲本。臟腑經絡受病爲標。先受病爲本。次受病爲標。且如尺寸俱(浮)者。太陽受病也。其經標本。膀胱小腸也。膀胱寒水爲本。其脈循脊上連風府。故頭痛脊強。小腸爲標。主發熱。其正冬月時。在本者麻黃湯。在標者桂枝湯。餘三時。坤和湯。尺寸俱(長)者。陽明受病也。其經標本。大腸與胃也。大腸爲本。胃爲標。大腸與肺爲表裏。但發熱解肌湯。本脈絡鼻循目。故目痛鼻乾不眠。虛則汗解。實則大柴胡承氣湯。選用。尺寸俱(弦)者。少陽受病也。其經標本。三焦與膽也。三焦相火本也。遊行一身。故微熱足膽標也。其

脉循膈絡耳。故耳聾脇痛。寒熱嘔而口苦。緣膽無出入之路。故從中治。用小柴胡和解而愈。尺寸俱沉者。太陰受病也。其經標本。肺與脾也。肺標脉循咽。脾本濕土。故腹滿咽乾。當從本治。宜泄。大柴胡承氣湯。尺寸俱微沉者。少陰受病也。其經標本。心與腎也。君火爲本。心苗在舌。故舌燥標。腎脉循肺主口乾。故口乾舌燥。在標者故身冷。治主姜附。在本者宜下。三一承氣看微甚而用之。尺寸俱微緩者。厥陰受病也。其經標本。肝與心胞絡也。風木爲本。下循陰器。故囊縮標。心胞絡繫舌。故舌卷。大抵溫之四逆輩。其三陰

經若從陽分傳來者下之。庶不誤也。

傷寒六經變症

夫六經傳變所由。必須朝夕記誦。庶不差謬。且如鄭聲者。手足鄭重。冷而爲虛也。譫語有虛有實。虛則失血亡陽。實則內熱便閉。脾約者。大便硬而小便利。水谷不化。腸寒也。久利不止曰腸癖。傷寒十三日不好曰過經。吐長蛇曰虺厥。陰厥發燥曰陰燥。陰症似陽也。手足冷者謂之厥。指頭微寒清之踪。汗吐下溫不好曰壞症。又若何爲逆。逆變有四。或變爲溫瘧。或變爲風溫。或變爲溫毒。或變爲瘟疫。此

四者是也。發汗出不止曰漏風。亦爲亡陽。大下損血爲亡陽。陽症汗出不止曰亡陽。大鯁取汗發譫者曰亡陽。大抵背無汗。其有汗者曰亡陽。三月至夏方發爲脫發。冬感寒而春發者曰溫病。非時暴寒伏於少陰之經。咽痛下利名曰腎傷寒。發汗後身灼熱者曰風溫。名中腸。感四時不正之氣。老幼相似者爲疫癘。病瘥後勞傷而發者曰勞復。病瘥後多食而發者曰食復。病瘥後餘熱未去者曰遺熱。吐利交作曰霍亂。鼻中出血曰衄。逆咳者曰嗽。乾嘔者曰噦。大便挾寒下利曰腸垢。大便堅硬曰鞭。心振寒而動曰悸。

渴飲水而吐曰水逆。心中惱亂不安而悶者曰懷懊。皮膚
不知疼痛者曰不仁。振掉而動曰肉潤。筋惕臍下有動氣
曰奔豚。上有吐者曰湧之。下利者曰洩之。手足攣摘者曰
瘰癧。四肢風病曰末疾。厥而下利當不食反能食者曰除
中。三陰無合病。三陽俱病者曰合病。二陽先病後一陽自
病曰併病。奏泄之所曰腠曰理。

傷寒見証識病法

傷寒之病從表入裏。裏必達外。見証識病。庶可無誤。且如
頭痛項強者。太陽症也。頭搖者。裏病也。頭汗者。裏有瘀血

必發黃也。面戴陽者，下虛也。面慘不光，傷寒也。面光不慘，傷風也。面上乍黑乍白，唇口生瘡，狐惑也。面如錦紋者，陽毒也。口難言，血少也。舌上有白胎，黃胎，內熱也。或黑者，熱極也。鼻燥，漱水不下，或目瞑，溺血也。目睛黃，小腸熱也。懷懊者，胃虛也。喜惡如狂，畜血也。肉瞶筋惕，汗下虛也。身如被杖，陰毒也。一身盡痛，多眠，或微腫難轉者，風濕也。身目俱黃，濕熱疸病也。身如虫行，表虛也。背惡寒，陰勝寒也。不眠，因汗下多而神虛也。坐而伏者，短氣也。下利清谷，內寒也。咽中生瘡，上實下虛也。舌上生刺，熱甚也。利者，熱盛也。

又手冒心。因汗多而血虛也。腹滿手足溫者邪入太陰也。舌蹇囊縮邪入厥陰也。

正治逆治從治反攻寒熱辯

寒熱真假不可不知。正治逆治豈可不辯。假如熱病服寒藥而熱不退。後用熱藥而熱方退。寒病服熱藥而寒不退。後用寒藥而寒方退。此爲從治也。從治者反攻也。治熱病以寒藥而愈。治寒病以熱藥而愈。此爲逆治也。逆治者正治也。且反攻之法。人亦難曉。假如寒病服寒藥而愈者。此陽極變陰。熱極反得水化也。熱病服熱藥而愈者。此陰極

變陽寒極反得火化也。蓋物極則反也。

論陰分發熱爲反併用溫汗法

趙嗣真曰。詳仲景發汗湯劑。各輕重不同。如麻黃桂枝青龍各半越婢并湯。各有差等。至於少陰發汗。二湯雖同用麻黃附子。亦有加減輕重之別。故以加細辛爲重。加甘草爲輕。辛散甘緩之義也。其第一症。以少陰本無熱。今發熱。故曰反也。其發熱爲邪在表而當汗。又兼脉沉。屬陰而當溫。故以附子溫經。麻黃散寒。而熱須汗解。故加細辛。是汗劑之重者。第二症既無裏寒。之可溫。又無裏熱。之可下。其

所以用麻黃附子之義。則是脉亦沉。方可名曰少陰病。身亦發熱。方可行發表藥。又得之二三日。病尚淺。比之前証亦稍輕。故不重言脉症。而但曰微發汗。所以去細辛加甘草。是汗劑之輕者。向使脉不沉。身不熱。又無他症。是無病人也。又何藥焉。仲景本分作兩症。以別汗劑之輕重。活人書却於第二症中。除去無症兩字。改作當見少陰熱無陽症者。如經云。心中煩不得眠。或咽瘡。聲不出者。或欬而嘔渴。或口燥咽乾。或腹脹不大便數症。皆是也。夫豈麻黃附子甘草湯發汗劑。所可治耶。抑又有聞焉。麻黃附子細辛

湯爲治少陰病。脉沉反發熱者用也。而仲景又有四逆湯治太陽病之發熱反脉沉者。均謂之反也。仲景云病發熱頭痛脉反沉若不瘥身軀疼痛者當救其裏宜四逆湯。此症出太陽篇。又云少陰病始得之反發熱脉沉者麻黃附子細辛湯。此症出少陰篇。切詳太陽病發熱頭痛法當脉浮今反沉少陰脉沉法當無熱今反熱仲景於此兩症各言反者謂反常也。蓋太陽病脉似少陰少陰病証似太陽所以謂之反而治之當異也。今深究其旨均是脉沉發熱以其有頭痛故謂太陽病陽症當脉浮今反不能浮者以

裏虛。久寒正氣衰微所致。又身體疼痛。故宜救裏。使正氣內強。逼邪外出。乾姜生附。亦能出汗而解。假使裏不虛寒。則當見脉浮。而正屬太陽。麻黃症也。均是脉沉。發熱。以其無頭痛。故名少陰病。陰病當無熱。今反熱。寒邪在表。未傳在裏。但皮膚腠理鬱閉爲熱。而在裏無熱。故用麻黃細辛。以發表。間之熱附子。以溫少陰之經。假使寒邪入裏。則外必無熱。當見吐利厥逆等証。而正屬少陰。四逆湯症也。由此觀之。表邪浮淺。發熱之反。猶輕。正氣衰微。脉沉之反。爲重。此四逆湯爲劑。不爲不重於麻黃附子細辛湯也。又可

見熟附配麻黃。發中有補。生附配乾姜。補中有發。仲景之旨微矣。嗟夫。常病用常法。夫誰不知。設有症變者。或脉變者。往往疑似參差。必欲以常法例治之。惑矣。如仲景所論太陽少陰兩証。脉沉發熱。雖同。而受病與用藥自別。此實症治之奇異。匪法之玄微。故併及之。

急下急溫法

凡言急下急溫者。蓋病勢已迫。將有變也。非若常病可緩。如少陰屬腎水。若口燥咽乾而渴。乃熱邪內炎。腎水將絕。故當急下。以救將絕之水。陽明病腹脹硬痛不大便。土勝

水也。當急下之。陽明屬土。汗多熱盛。恐胃汁乾。急下以存津液。腹滿痛。爲土實。急當下之。熱病目不明。熱不止者死。目睛不明。腎水已竭。不能照物。則危矣。急須下之。少陰急溫有二症。內寒已甚。陽和之氣欲絕。宜急溫之。無疑也。隔上有寒。飲乾嘔。不可吐。急溫之。四逆湯。脉沉微。急溫之。少陰病。自利。純清水。心下硬痛。口燥渴者。急下之。俱大承氣湯。

傷寒見壞症辯

傷寒死症。一一須明。生死不明。將何措手。且赤斑者五死。

五生黑斑者十死一生。陽症熱不退見陰脉者死。發少陽汗動。厥陰血者。厥竭而死。發左右動氣汗者死。發風濕者死。發陰陽毒。過六七日死。大發濕家汗成。症熱而痊者死。發熱發少陽汗。譫語者死。發溫家汗。爲重。喝者死。兩感傷寒者死。大汗後身熱愈甚。爲陰陽交者死。結胸症。悉具煩燥者死。狂言不食者死。發厥肌冷。而發燥無時得安者。曰臟厥而死。結胸舌上生胎。爲臟結者死。上氣咳逆不止。脉散者死。舌卷囊縮者死。少陰吐利煩燥四逆者死。少陽與陽明合病。下利脉長而大。名曰負負者死。目亂無神氣目

無精光者死。男子病新瘥，婦人與之交，曰陽易。婦人病新瘥，男子與之交，曰陰易。男子陰腫，小腹痛，嬾人裏急，連腰股，眼昏，四肢拘急，爲女勞復者死。厥利本不能食，反能食，曰除中者死。傷寒七八日，大發熱，汗出不止，如貫珠，此本氣衰者死。瓜甲青爲陽衰者死。循衣摸床，撮空，衛氣絕者死。唇反青，四肢濊濊，汗出漿習，乃肝絕也。死，環口，黎黑，柔汗發黃，脾脉絕也。死，陽反獨，晉，体如烟薰，直視，搖頭，心絕也。死，面黑，狂言，直視，遺尿，腎絕也。死，汗出，髮潤，声如鼻鼾，肺絕也。死，身体如疆，正氣脫也。死，喘而不休，邪氣勝也。

死。米漿不下。胃氣絕也。死。身體不仁。榮衛不行。脉浮而洪。身汗如油。乍靜乍亂。命絕也。夫。

用藥大畧

凡症有頭疼惡寒。皆是傷寒。無則否也。何則。蓋傷寒惡寒。傷食惡食。理自然也。冬時天氣嚴凝。風寒猛烈。人觸冒之。惡寒殆甚。故以桂枝等湯治之。其餘時月。雖有惡寒。頭疼之症。未若冬時之甚。皆宜辛涼之劑。通表裏和之。則愈矣。辛涼者何。羌活沖和湯是也。嗚呼。此一方者。可代三方。危儉之藥。如坦夷。其神乎。過此則少陽陽明二經。在半表半

裏肌肉之間。脉亦不浮不沉。外症在陽明。則有目眦鼻乾。不得眠之症。脉似洪而長。以葛根湯解肌。湯升麻湯之類。治之。在少陽則胸脇痛而耳聾。脉見弦數。以小柴胡湯加減和之。此二經不從標本從乎中治。余嘗以小柴胡加葛根芍藥。治少陽陽明合病。如拾芥。過此則傳陽明之本爲入裏。大便燥實。其外症悉罷。謂無頭痛惡寒也。脉見沉實。不浮。謔語惡熱。六七日不大便。口燥咽乾而渴。輕則大柴胡湯。重則三一承氣湯選用。病有三焦俱傷者。則痞滿燥實俱全矣。宜大承氣湯。厚朴苦溫以去痞。枳實苦寒以泄。

金匱要略卷之六
三
浦。芒硝鹹寒以潤燥。軟堅。大黃苦寒以泄實去熱。病斯愈矣。邪在中焦。則有燥實堅三症。故用調胃承氣湯。以甘草和中。芒硝潤燥。大黃泄實。不用枳實厚朴。以傷上焦虛無。氤氲輕清之元氣。調胃之名。於此立矣。上焦受傷。則爲痞。實。用小承氣湯。枳實厚朴除痞。大黃泄實。去芒硝則不傷下焦血分之真陰。謂不伐其根也。若夫大柴胡湯。則有表邪尚未除。而裏証又急。不得不下。只得以此湯通表裏而緩治之。若老弱及血氣兩虛之人。不宜用此。三陽之邪在裏爲患。春夏秋有不頭痛惡寒而反渴者。此則溫病也。暑

病亦然。比之溫病，尤加熱焉。治宜加減小柴胡湯。蓋此湯春可治溫，夏可治暑，秋能潤肺，又宜升麻葛根湯解肌，湯敗毒散，中暑而渴者，小柴胡石羔湯。人參白虎湯看渴微甚而用之，無不效矣。若夫陰症，則別有治法，不在此例。

表裏虛實用藥寒溫法

四十八難曰：病之虛實出者爲虛，入者爲實。蓋表之真陽既虛，故陰邪已盛，出而乘陽，是以脉浮於外，其病在表，法當汗之。當其陰邪出表，脉浮於外之時，不可自惑以爲陽脉盛也。裏之真陰既虛，故陽邪已盛，入而乘陰，是以脉入

於內其病在裏。法當下之。當其陽邪入裏。脉實於內之時。亦不可自惑。以爲陰脉盛也。是說非古人之言也。蓋使人知如此之爲陰盛。則抑陰而助陽。如彼之爲陽盛。則抑陽而助陰。陰盛則邪出於外者。發表之藥當性溫。以助陽氣。如桂枝湯之類是也。陽盛則邪入於內者。攻裏之藥當性寒。以抑陽氣。如承氣湯之類是也。或曰陰出而乘於外。是陽之不足也。陽病則當實表而汗之。何哉。是不然。陰邪傳於外。不汗之則邪何由而去。桂枝之性溫溫之。乃所以助陽。陽有所助而長。則陰邪所由以消。辛甘發散爲陽者。此

也。張氏所謂承氣入胃陰盛乃亡者。正恐陰盛出外而誤以承氣下之。安得而不亡。或曰陽入而乘於內。是陰之不足也。陰病則當溫裏而下之。何哉。是又不然。陽邪入於內。不下之則邪從何而出。承氣之性寒。寒之乃所以抑陽。陽受其抑。則微而真陰所由以長。酸苦湧泄爲陰者。此也。張氏所謂桂枝下咽。陽盛則斃。正恐陽盛入內而誤以桂枝汗之。安得而不死。觀古人發表之藥多溫。攻裏之藥多寒。則知陰陽虛實之意微。非止爲汗下設矣。嗚呼。表裏虛實寒熱殊途。用藥一差。死生立判。醫者可不謹哉。

傷寒用藥三法

夫發表之藥用溫。攻裏之藥用寒。溫裏之藥用熱者。何也。蓋表既有邪。則爲陽虛陰盛。溫之乃所以爲陽。陽有所助。而長則陰邪所由以消。故用辛甘溫之劑。發散爲陽。此發表之藥用溫者明矣。裏既有邪。則爲陰虛陽盛。寒之乃所以助陰。而抑陽。陽受其抑。則微而真陰所由以長。故用酸苦之劑。湧泄爲陰。此攻裏之藥用寒者明矣。陰經自受寒邪。則爲臟病。主陽不足而陰有餘。故用辛熱之劑。以助陽抑陰。此溫經之藥用熱者明矣。表有邪不汗。其邪何從而

去。裏有邪不下，其邪何從而出？臟有寒不溫，其寒何自而除？此三者所謂用藥寒溫辯也。

用藥法則

五劑之藥，醫所當識。且如表汗用麻黃，無葱白不發；吐痰用瓜蒂，無豉不湧；去實熱用大黃，無枳實不通；溫經用附子，無乾姜不熱。甚則以泥清水加葱白煎之，竹瀝無姜汁不能行經絡，蜜導無皂角不能通秘結，非半夏姜汁不能止嘔吐，非人參竹葉不能止虛煩，非小柴胡不能和解表裏，非五苓散不能通利小便，非天花粉乾葛不能消渴解。

肌非人參麥門冬五味子。不能生脉補元非犀角地黄湯。
不能止上焦之吐衄。非薤白承氣。不能破下焦之瘀血。非
黃芪桂枝。不能實表間虛汗。非茯苓白朮。不能去濕助脾。
非茵陳柏皮。不能除黃疸。非大承氣。不能制發狂。非枳桔。
不能除痞滿。非陷胸湯。不能開結胸。非羌活沖和。不能治
四時之感冒身痛。非人參敗毒散。不能治春溫。非四逆湯。
不能救陰厥。非人參白虎。不能化斑。非理中烏梅。不能治
虢厥。非桂枝麻黃。不能治冬月之惡寒。熱隨汗解。非姜附
湯。不能止陰寒之泄利。非大柴胡。不能去實熱之妄言陰。

陽咳嗽。上氣喘急。用加減小青龍分表裏而汗下。此用藥之大法也。

按症治病法

一傷寒先起頭痛發熱惡寒。已後傳裏頭疼惡寒皆除。而反怕熱發渴譫語。或潮熱自汗大便不通。或揭去衣被。揚手擲足。或發黃斑狂亂。此爲陽經自表傳入陰經之熱症。俱當攻裏下之。或當下失下。而變出手足乍冷乍溫。因陽極發厥。卽陽症似陰。名陽厥急當下之。此與陰厥不同治。

一傷寒失於汗下。或本陽症。誤投熱藥。使熱毒入深。陽氣獨盛。陰氣喘絕。登高而歌。棄衣而走。踰垣上屋。罵詈詈喊。燥渴欲死。面赤眼紅。身發斑黃。或下利赤黃。大脉(有力)。名陽毒發斑証。用酸苦之藥。令陰氣復而大汗解矣。如大便實者。又當用大寒之藥下之。此與發狂不同治。

一初病起無頭疼身熱。便怕寒。厥冷腹痛。嘔吐瀉利。不渴。蹇卧。沉重戰慄。脉(沉細)。此爲直中陰經真寒症。不從陽經傳來。當用熱藥溫之。如寒極手足厥冷過膝肘者。因

寒極發厥名陰厥當急救裏溫之此與陽厥不同治

一初病起外感寒邪內傷生冷內既伏陰內外皆寒或本
真陰誤投涼藥以故病起手足厥冷腰背強重頭目眩
痛嘔吐煩悶下利腹疼身如被杖六脉沉細湯飲不下
已後毒氣漸深入腹攻心咽喉不利腹痛轉甚心下脹
滿結硬如石燥渴欲死冷汗不止或時鄭聲指甲面色
青黑速灸關元氣海須服大熱之劑溫之此名陰毒令
陽氣復而大汗解矣若見舌卷囊縮者不治

一夏月大發熱頭疼燥渴背惡寒微汗脉虛無力口齒燥

者名中暑用寒涼劑清之。

一病人身微熱煩燥面赤戴陽欲坐卧於泥水井中脉來
沉細無力此陰症發燥名陰燥當用辛熱之藥溫之不
宜涼劑誤用之燥急渴甚必死。

一病人身冷脉**沉細而疾**雖燥煩不欲傾水入口此名陰
盛格陽用大熱之劑溫之如見厥冷下利譫語者不治
一少陰症惡寒發熱無頭痛誤大發汗使血從耳目口鼻
中出者名陰血多不治此與鼻衄陽血不同治。

一傷寒失於汗下邪熱傳裏使水涸糞燥大便不通必發

謔語或心下硬痛下利純清水燥渴口出無倫凡此皆實當寒涼之劑下之又有汗多亡陽或下後利不止身疼痛或自利清谷謔語者凡此皆虛當辛熱之劑溫之此與狂言不相類

一傷寒餘熱不除蘊在心胞使精神短少冒昧昏沉睡中言語一二句者名獨語宜涼劑清之此與謔語不相類

論婦人傷寒與男子不同治法

天地陰陽各有分位傷寒雜病豈無各科男婦胡可全治也男子調氣爲主女子養血爲先蓋女子血畜則血室不

虛榮衛和平。諸病不生。一有凝結。水火相刑。凡氣口緊盛者。卽宜下。人迎緊盛者。卽宜汗。但煩人左關浮緊者。不可下。當發汗以救血室。榮衛得和。津液得行。浹然汗出而解矣。若行陽達則熱入胃。令津液燥。中焦上焦不榮。成血結胸。須針期門可也。但煩人傷寒發熱惡寒。四肢拘急。口燥舌乾。經脈凝滯。不得往來。桂枝紅花湯。若傷寒口燥咽乾。不思飲食。黃芩芍藥湯。若傷寒喘急煩燥。戰而作寒。陰陽俱虛。不可下也。小柴胡湯。若傷寒瘥後。猶有餘熱不去。謂之遺熱。宜地黃湯。

論妊婦傷寒與前症異治

內經曰有故無殞也大積大聚不可犯也損其大半而止過則殺也且妊婦傷寒保胎宜阿膠散大抵孕婦傷寒仲景無治法最宜避忌諸藥不可以尋常例視之

凡孕婦傷寒先用安胎次散寒邪以白朮湯妊婦增寒壯熱宜發汗以芍藥湯孕婦或中時行晒晰寒熱作寒振慄而悸如噦者宜蘇木湯妊婦傷寒默默欲眠不欲食脇下痛嘔逆痰氣及產後病傷風熱入胸中寒熱如瘧并經水適來適斷病後勞復餘熱不解以黃龍湯孕婦頭目眩疼

壯熱心燥以旋覆花湯紅娘發班以枝子大青湯

論產後傷寒治法

且產婦始生血氣俱虛外失衛護內無主持最宜調養設受風寒豈能救治故與胎前不同且產後十數日不解頭痛惡寒時時有熱心下堅乾嘔汗出以陽旦湯產後無津液大便多秘或譫語煩燥宜服神功丸產婦頭疼身熱氣腹內拘急疼痛以桂心牡蠣湯產婦傷風發熱面赤而喘頭痛以竹葉防風湯

熱入血室

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除脉遲身涼胸脇滿如結胸狀譫語者此爲熱入血室當刺期門隨其實而瀉之。

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語如見鬼狀此爲熱入血室無犯胃氣及上中二焦必自愈。

婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此爲熱入血室其血必結故如瘡狀小柴胡湯。

陽明病下血譫語此爲熱入血室但頭汗出者刺期門隨其實而瀉之。濺然汗出則愈。

婦人熱入血室有二。經水適來二條不言藥者，蓋以經血方來，熱氣乘虛而入，經血止則熱亦出矣。故不可用汗下藥犯其胃氣。及上中二焦如胸滿譫語，此內實也。刺期門以瀉之。若經水適斷，續得寒熱，其血必結，故用小柴胡湯。若陽明熱入血室，此男子失血之症，但當刺以瀉熱也。

附妊娠及月水不利脉法

內經曰：婦人陰搏陽別，謂之有子。又曰：婦人手少陰脉動甚者，妊子也。脉經曰：妊娠初時寸微，小呼吸五至三月而尺數也。脉滑疾重，以手按之散者，胎已三月也。脉重

手按之不散但疾不滑者五月也。三部脉沉浮正等按之不絕者妊娠也。寸微關滑尺數流利往來雀喙者爲有妊也。妊娠四月欲知男女法左疾爲男右疾爲女俱疾爲生二子。又法人脉左偏大爲男右偏大爲女左右俱大產二子。大者如實狀。婦人懷妊離經其脉浮設腹引腰痛爲欲生也俱離經者不病。又法婦人欲生其脉離經半夜覺日中則生。婦人已產脉宜小實沉細緩滑微小忌浮虛實大弦急牢緊。脉經曰婦人寸關調如故而尺脉絕不至者月水不利當患小腹引腰痛氣滯上攻。

胸臆也。尺脉來而斷絕者，月水不利。脉來狀如琴弦，若小腹痛，主月水不利，孔竅至瘡。尺脉滑，血氣實，月水不利。

傷寒六書纂要辨疑卷之三

○傷風見寒傷寒見風

熱盛而煩手足自溫風症脉浮而緊寒脉此傷風見寒也。
不煩少熱四肢微厥寒症脉浮而緩風脉此傷寒見風也。
二者爲榮衛俱病。法用大青龍湯。此藥峻險。不可輕用。須
風寒俱盛。又加煩燥。方可與之。不若羌活沖和湯爲神藥
也。

○風溫

風從熱故身發熱。風與熱搏故自汗。

風溫尺寸俱浮素傷於風因時傷熱風與熱搏卽爲風溫。



其外症四肢不收身熱自汗頭痛喘息發渴昏睡或體重不仁慎不可汗。汗之則譫語煩擾目亂無睛光病在少陰厥陰二經。萎蕤湯小柴胡選用。未醒者柴胡桂枝湯發汗後復身灼熱知母葛根湯渴者瓜蒌根湯脉浮身重防已湯。

濕溫

濕從寒故身惡寒濕與熱搏故自汗

濕溫寸濡而弱尺小而急素傷於濕因時中暑濕與熱搏即爲濕溫其狀胸腹滿目痛壯熱妄言自汗兩脛逆冷倦怠惡寒慎不可汗若發其汗使人不能言耳聾不知痛處

其身青面色變。是醫殺之耳。濕溫在太陰。蒼朮白虎湯加桂。濕氣勝。一身盡痛。發熱身黃。小便不利。大便反快。五苓散加茵陳。臍虛自利。附子理中湯。

風濕

風濕脉浮。先傷濕而後傷風也。其症身體腫痛。不能轉側。額上微汗。惡寒不欲去衣。大便難。小便利。熱至日晡而劇。治法但微解肌。若止發汗。則風去濕在。非徒無益而又害之。羌活中和湯。咽渴小便不利者。五苓散。外不熱。內不渴。小便利。木附湯。熱而煩渴者。小柴胡加天花粉。中濕小便

不利。一身盡痛身黃。大便快。茵陳五苓散。

○溫毒中腸

中腸註云中暑

溫毒者。冬月感寒毒異氣。至春始發也。表症未罷。毒氣未散。故有發斑之候。心下煩悶。嘔吐咳嗽。後必不利。寸脈洪數。尺脈實大。爲病則重。以陽氣盛故耳。通用玄參升麻湯。或黑膏主之。中暑脈虛而伏。身熱面垢。自汗煩燥。大渴毛聳。背惡寒。昏倦。身不痛。與傷寒諸証大不同。內外俱熱。口燥煩渴。四肢微冷。身不痛。白虎湯。痰逆惡寒。橘皮湯。熱悶不惡寒。竹葉石膏湯。中暑小柴胡加香薷最良。脈遲酒然。

毛聳。口齒燥。人參白虎湯。霍亂煩燥大渴。腹痛厥冷轉筋。黃連香薷湯。類冷服之。如熱服反爲吐瀉矣。凡中暑自汗者。不可用藥止汗。以暑當與汗而俱出也。內經曰。因於暑。體若燔炭。汗出而散。

○發熱

夫翕翕然而熱者。表熱也。蒸蒸然而熱者。裏熱也。屬表者。風寒客於皮膚。邪氣拂鬱於外。表熱而裏不熱也。屬裏者。陽氣下陷入陰中。裏熱甚而達於表也。其在半表半裏者。以表熱未罷。邪氣傳裏。裏未作實。則表裏俱熱。而但輕於

純在裏也。太陰厥陰皆不發熱。惟少陰有之。但其脈沉。或下利手足冷爲異耳。雖然傷寒發熱病之常也。脈陰陽俱虛熱不止者。汗後復發熱。脈燥。疾下利者。皆不易治。

凡大汗則損氣。氣損則陽微。故脈虛而惡寒。大下則傷血。血傷則陰弱。故脈澀而發熱。故曰陽虛生外寒。陰虛生內熱。誤汗誤下。皆有此耳。且陰以陽爲主。陽以陰爲根。下之亡陰。陰無所主。邪氣搏之。血虛乃發熱也。

○頭痛

頭痛者。寒邪入足太陽經。上攻於頭。此表症也。脈浮。無

汗惡寒可發汗。脉浮緩有汗惡風宜解肌。照時令用藥。陽明病不惡寒而反惡熱。五六日不人便。胃實燥渴。熱氣上攻頭目。脉實者調胃承氣湯。少陽頭痛者小柴胡湯。濕家鼻塞頭痛。瓜蒂散搐鼻。黃水出即愈。痰涎頭痛胸滿寒熱。瓜蒂散吐之。厥陰乾嘔吐涎沫頭痛者。吳茱萸湯主之。三陽雖有頭痛不若太陽專主也。三陰無頭痛。惟厥陰有頭痛。脉係絡於項顛也。若痛連於胸手足俱青爲真頭痛必死矣。

○項強

項強者太陽感邪表症也。發散則解。結胸項強。大陷胸湯。
陰毒初得病。項背強。咽痛心腹痛。盛氣厥逆。吐利。身如被
杖。附子湯。正陽湯。天行復作熱。至晚則腰痛。頭項強。身重。
葛根生薑豉湯。

惡寒

惡寒者。不見風亦惡寒。身雖熱不欲去衣。被寒邪客於榮
衛。陰氣上入陽中。則洒淅而惡寒也。經曰。發熱惡寒者。發
於陽也。無熱惡寒者。發於陰也。謂如或已發熱。或未發熱。
必先惡寒而繼之。以發熱。此則發於陽也。若初病惡寒而

蹠脉(沉細而緊)此則發於陰也。在陽則發汗。在陰則溫裏。或下症悉具而微惡寒者是表猶未解。當先解表後攻裏。若少陰病惡寒而蹠手足厥冷。自利煩燥脉不至者不治。

○惡風

惡風者見風則怯。密室之中無所惡也。風傷衛氣衛虛則腠理不密。由是而惡矣。悉屬於陽。非比惡寒有陰陽之別。若無汗而惡寒者爲傷寒。當發汗。汗出而惡風者則爲傷風。當解肌。不可更發汗。若裏症甚惡風未罷者。當先解其表。汗不止惡風煩燥不得卧。先防風白朮牡蠣湯。次小建

中湯。風溫惡風。不欲去衣。骨節煩疼。不得屈伸。汗出短氣。小便不利。或身微腫。甘草附子湯。

○背惡寒

背爲陽。腹爲陰。背惡寒。陽不足也。陽不足則陰氣盛。陰氣盛者。口中和。附子湯。陽氣內陷者。口乾燥。白虎湯。汗後惡寒。脈細數。浮遲。嘔不止。理中丸。少陰病。脈沉細。惡寒者。四逆湯。若下利惡寒而踰。手足溫者。小建中湯。若惡寒而踰。時自寒不欲厚衣。大柴胡湯。

○寒熱

往來寒熱者。陰陽相勝。邪正分爭也。屬少陽。半表半裏証。
蓋陽不足。則陰邪出表而與之爭。故陰勝而爲寒。陰不足。
則陽邪入裏而與之爭。故陽勝而爲熱。邪居表多則多寒。
邪居裏多則多熱。邪在半表半裏。則寒熱相半。乍往乍來。
而間作也。小柴胡專主往來寒熱。寒多者加桂。熱多者加
黃芩。太陽症八九日如瘧狀。一日二三度發。不嘔。清便。脈
(浮)緩者爲自愈。不(浮)緩爲未愈。柴胡桂姜湯。病至十餘日。
熱結在裏。大渴大便實。往來寒熱。大柴胡湯。若往來寒熱。
胸脇滿而不痛者。半表半裏証。未入乎腑。小柴胡加枳桔。

婦人申風七八日。續得寒熱。發作有時。經水適斷。爲熱入血室。小柴胡湯。

○潮熱

潮熱者。屬正陽明胃腑。旺於未申。一日一發。日晡而作。如潮水之有信也。專主胃中實熱。燥糞使然。宜下之。如熱不潮。大便不實而脈浮者。表症尚在。未可與承氣湯。候大便硬而燥渴。與自汗譫語者。急當下之。若潮於寅卯。則屬少陽。潮於巳午。則屬太陽。是又不可不辨。

○似瘧

似瘧者。一名瘧狀。作止有時。非若寒熱往來之無定也。太陽病似瘧。脉浮洪。桂枝湯清便自可。不嘔。一日二三度發。桂麻各半湯。陽明似瘧。煩熱汗出。日晡發熱。脉浮。桂枝湯。脉實。承氣湯。婦人熱入血室。其血必結。亦如瘧狀。小柴胡湯。熱多寒少。陽勝陰也。尺脉遲者。建中湯。尺脉不遲。小柴胡和之。溫瘧脉和。平身無寒。但熱。骨節煩痛。時嘔。白虎湯加桂。渴者。小柴胡加瓜蒌根。厥陰脉浮。緩。囊不縮。必發熱。惡寒似瘧。爲欲愈。如脉不浮。面赤。色有熱者。以其不能得小汗。身必痒。用桂麻各半湯。

無汗

無汗者。寒邪中經。腠理固密。津液內滲而無汗也。風暑濕皆令有汗。惟寒邪獨無汗出。太陽症無汗者。冬用麻黃湯。春秋用和湯。夏月用神木湯。項背強兀兀無汗者。葛根湯。陽明無汗而喘者。麻黃湯。脉(弱)(無)(力)難作汗者。血虛也。黃芪建中加木附湯。若當汗之證。與發汗劑二三貼。汗不出者。難治。

自汗

自汗者。衛爲邪干。不能固密。腠理疎而汗出。有表裏虛實。

之分。若惡風寒自汗者。表症未解也。冬桂枝湯。餘月加減。中和湯。若汗後惡風寒。皆爲表虛。汗不止。黃芪建中湯。太陽症發汗。遂漏不止。爲亡陽。未附湯。若自汗出不惡風寒。是表症罷而裏症實也。用承氣湯。若小便自利。汗出者。津液少也。急下之。汗出而渴。小便難者。五苓散。或汗出如油。貫珠不流。喘而不休者。衛氣絕矣。皆不治。

戰汗

戰汗四症。有戰汗出而解者。有不戰汗出而解者。有振慄作寒汗出而解者。有蒸蒸發熱汗出而解者。

病有戰而汗出得解者。其脉(浮)而(緊)按之反(扎)此人本虛。故當發戰。脉(浮)故當汗出也。病有不戰汗出而解者。其脉(浮)而(數)按之不(扎)此人本實。以正勝邪。作戰不成。但汗出而解矣。病有振慄而汗者。太陽病未解。脉陰陽俱停。雖劇當愈。必先振慄汗出而解矣。陽脉微者。先汗出而解矣。陰陽俱停。謂無偏勝。寸關尺(大)(小)(浮)(沉)(遲)(數)同等也。脉微者是胃氣回。不再受邪也。病有蒸蒸振汗者。小柴胡症具而以他藥下之。柴胡症仍在者。復與柴胡湯。此雖已下之不爲逆。得湯必蒸蒸而振。發熱汗出而解矣。

頭汗

頭汗者邪搏諸陽之首。則汗見於頭至頸而還也。若遍身自汗出。謂之熱越。今熱不得越。而陽氣上騰。津液上涸。故汗出於頭。夫裏虛不可下。內澗不可汗。既頭有汗。不可再汗也。其或實熱在內。小便利。大便黑。爲畜血。頭汗出者。輕則犀角地黄湯。重則桃仁承氣湯。熱入血室。有半表裏症。頭汗出者。小柴胡湯。發黃。頭汗出。小便難。渴飲水漿者。濕也。輕則茵陳五苓散。重則茵陳大黃湯。

手足汗

手足汗者手足乃諸陽之本熱聚於胃腑則津液傍達於四肢也。蘊熱則燥煩譫語手足汗出者大承氣湯下之。然寒則水谷不分手足汗出者理中湯溫之。

盜汗

盜汗者睡中則出醒則止矣。雜病則責於陽虛傷寒責在半表半裏故知膽有熱也。專主小柴胡湯爲當。

煩熱

煩熱者邪熱傳裏不經汗吐下則爲煩熱與發熱有異也。經曰病人煩熱汗出則解如未作膈實但當和解而已。若

心下滿而煩。則有吐下之殊。先煩而悸者爲實。先悸而煩者爲虛。虛謂心中欲嘔欲吐之貌。陽明病。心煩喜嘔。壯熱往來。心下悸。小便難。小柴胡加茯苓。發汗後解。十日許。脉浮數。可更發汗。汗後晝煩夜靜。不嘔渴。無表症。脉微沉。乾姜附子湯。大汗後六七日不大便。煩而不解。腹滿痛。有燥屎也。大承氣湯下之。

煩燥

煩爲擾亂。燥爲憤怒。有陰陽虛實之別。心熱則煩。陽實陰虛。腎熱則燥。陰實陽虛。煩爲熱輕。燥爲熱重。煩燥者。先發

煩而漸至燥。燥煩者。先發燥而復發煩。太陽中風不得汗。
煩燥者。此邪在表。用和湯。太便不通六七日。連臍痛煩燥。
而渴者。大承氣湯。太陽不得汗。醫以火劫取汗。火熱入胃。
此劫令煩燥也。小柴胡加牡蠣湯。微發汗。燥不得眠。與大
下後復發汗。晝煩夜靜。身無大熱。不渴不嘔。無表症。脉沉。
微乾。姜附子湯。又有不煩便作燥悶者。此陽盛格陰。一云陰盛
拒欲於泥水井中卧。飲水不入口者。四逆湯。其結胸煩燥。
及吐利四逆而煩燥。下利厥逆而煩燥。惡寒。脉不出。
而煩燥者。皆不治。

懊懣

懊懣者鬱悶不舒之貌。蓋表症誤下。正氣內虛。陽邪內陷。於心胸之間。則爲結胸。邪在心胸宜吐。熱結胃腑宜下。發汗吐下後。虛煩不得眠。懊懣者。與短氣而渴。胸中懊懣者。梔子豉湯。陽明病下後。懊懣而煩。胃中有燥屎。承氣湯下之。陽明無汗。小便不利。心下懊懣者。必發黃。茵陳湯利之。舌上白胎。飢不食。虛煩不眠。頭汗出。懊懣者。梔子豉湯。

身痛

身體痛者。雖曰太陽表邪未解。又有溫經發汗不同。如發

熱惡寒、頭痛、身體痛、脉浮者，表未解也。冬月麻黃湯餘
月羌活、坤和湯，或下利、脉沉、身痛，如被杖者，爲陰寒症，宜
四逆湯溫之。發汗後身痛、脉沉遲，桂枝爲藥。人參湯一身
盡痛，發熱面黃，七八日熱結在裏，有瘀血也。桃仁承氣湯
下之。如身痛、其身重者，屬手陽明有風也。葛根湯主治。

拘急

拘急者，手足不能自如，屈伸不便，如蹇卧惡風之貌。四肢
諸陽之本，因發汗亡陽，陽虛而有此症。自汗、脉浮、小便數，
心煩惡寒，手足攣拳，拘急爲藥。甘草湯。太陽病發汗遂漏

不止。惡風小便難。拘急者桂枝加附子湯。吐利後汗出發熱惡寒。四肢拘急手足厥冷者四逆湯。

咳嗽

咳者俗呼爲嗽。肺爲邪所乘。氣逆不干。故令咳嗽。有肺寒而咳。有停飲而咳。有邪在半表半裏而咳。治各不同。太陽病身熱咳嗽乾嘔微喘而利。小青龍湯。身涼咳嗽乾嘔微利。心下滿引脇痛。十棗湯。四肢重痛腹疼下利。咳嗽或嘔。真武湯。少陰病咳嗽四逆湯。少陽病往來寒熱胸滿而咳。小柴胡湯。

喘

喘者。有邪在表而喘。有邪在裏而喘。有水氣而喘。在表者。心腹濡而不堅。外証無汗。法當汗。在裏者。心腹脹滿。外証有汗。法當下。水氣喘者。心下怔忡。青龍加杏仁湯。太陽陽明合病。脉促。有汗而喘。葛根黃芩湯。經云喘而汗出。宜利之。汗不出而喘。宜發之。若宜視證。語汗出如油。喘而不休。死症也。

氣逆

氣逆者。氣自腹中時逆上衝也。因太陽病下之。表邪乘虛

傳裏裏不受邪則氣逆上行邪仍在表當復汗之厥陰客熱氣上衝心此熱在裏也太柴胡湯下之病緩虛癰少氣氣逆上衝欲吐者竹葉石膏湯有動氣因發汗而氣上衝者李根湯。

短氣

短氣者呼吸短促不相接續也。內經曰短氣不足以息者實也。大抵心腹脹滿而短氣者邪在裏而爲實宜下之。承氣湯。心腹濡滿而短氣者邪在表而爲虛也宜解之。桂枝湯。食少飲多水停心下而短氣者小半夏湯。風濕相搏汗

出短氣。小便不利。惡風不欲去衣。邪氣在表者。甘草附子湯。

口乾

口乾者。邪熱聚胃。消耗津液。故口乾熱而渴也。經曰少陰病口燥咽乾。急下之。若不口燥咽乾。脈沉者。急溫之。又有漱水不下咽者。若元表症。必衄。爲邪熱在經緣陽明血氣俱多。經中熱甚迫血妄行。犀角地黄湯。口乾身大熱。背惡寒者。人參白虎湯。有無表症。胸腹滿如狂者。畜血也。桃仁承氣湯。少陽口乾。小柴胡湯和之。

渴

渴者。裏有熱也。津液

爲熱所耗。故令渴也。傷寒傳至厥陰

爲消渴者。謂飲水多

而小便少。乃熱能消水也。脈浮而渴

屬太陽。小青龍去生

是加花粉。有汗而渴。屬陽明。人參白

虎湯。便實者宜下之。

脈沉而渴。屬少陰。大承氣湯。至於厥

陰。又熱之極矣。俱當

下之。無疑。太陽無汗。喜渴。忌白虎。以

汗故也。宜小柴胡湯。陽

明汗多而渴。戒五苓。以汗多故也。宜竹葉

石膏湯。先嘔後渴。此

爲欲解。當與水解。先渴後嘔。爲水停

心下。赤茯苓湯。小便

不利而渴。五苓散。中暑脈虛。身熱而

渴者白虎人參湯。

胸脇滿

胸滿者。胸間氣塞滿悶也。非心下滿。脇滿者。脇筋下氣填脹滿也。非腹中滿。蓋邪自表傳裏。必先胸脇。以至心腹入胃。是以胸滿多帶表症。宜微汗。惟脇滿多帶半表半裏。小柴胡加枳桔和之。胸中痰實者。湧之。胸中結實燥渴大便閉者下之。

結胸

經曰。病發于陽而反下之早。熱入因作結胸。活人註曰。發

熱惡寒者發於陽也。此說非也。陶節庵云。風屬陽。風傷衛氣。太陽傷風。當用桂枝湯。止汗散邪。反誤下之。故成結胸耳。非曰發熱惡寒者發於陽之謂也。如傷寒陽經當汗。且不可下。况曰早乎。若脉(浮)(大)。若表症。若水氣。俱不可下。亦有不因下而心下硬滿者。經曰。病人手足厥。脉乍(緊)邪結胸中。心滿而煩。飢不欲食。當吐之。是病在胸中也。經曰。陽明心下硬滿不可下。下之利不止而死。是邪氣自表傳裏。留于心下。未全爲實。法當吐之。故有此戒。若寸脉(浮)。關尺皆(沉)(緊)。宜下。若脉(浮)(大)。或有表症。先用小柴胡以解表。外

症強項心下滿硬而痛此實邪在裏當下之大結胸不按而痛連臍腹硬不可近者大陷胸湯或太峻用丸小結胸按之痛心下硬小陷胸湯熱實結胸懊憹煩渴心下痛少與大陷胸湯寒實結胸無熱症枳實理中丸心下怔忡頭汗出無大熱爲水結胸若結胸症煩燥悉具者必死矣。

痞

經曰病發於陰而反下之早因作痞氣活人註云無熱惡寒者發于陰也此論非也陶節庵云寒屬陰寒傷榮血太陽傷寒當用麻黃湯發汗散邪反誤下之故成痞耳非曰

無熱惡寒者發于陰之謂也。如傷寒傳經之陰。決當分輕重而下之。胡云下之早乎。則知無熱惡寒乃真中陰也。非傳經之陰也。若惡寒汗出痞滿者。附子瀉心湯服後小便不利者。五苓散表未解。心下妨悶者。曰支結。柴胡桂枝湯。

腹滿

腹滿者邪入太陰脾上也。若痛爲裏實。瀉下之。承氣湯。時減者爲裏虛。當溫之。理中湯。若表解內不消。非大滿。猶生寒熱亦未可下。是邪全未入腑。若太滿大實。堅有燥屎。雖日數少亦當下之。謂邪已入腑也。太陽病誤下腹滿而痛。

桂枝加芍藥湯。甚者桂枝加大黃湯。陽明病發熱腹滿。微喘口乾。不大便。小柴胡湯。噦而小便難。加茯苓。三陽合病。腹滿身重難轉側。譫語。口中不仁。小柴胡湯。太陰腹滿。吐食不下。枳梗理中湯。少陰咽乾腹滿。不大便。急下之。承氣湯。大抵陽熱爲邪。則腹滿而咽乾。陰寒爲邪。則腹滿而吐利。食不下。若曾經吐汗下後腹滿者。治各不同。

腹痛

腹痛者。緣邪氣入裏。與正氣相搏。則爲腹痛。如陽邪傳裏而痛者。其痛不常。用辛溫之劑和之。小建中湯。陰寒在內。

而痛者。痛無休止。常欲作利。以理中湯溫之。有燥屎宿食而痛者。則煩而不大便也。大承氣湯下之。少陰下利清穀。脈欲絕。腹痛者。通脈四逆湯。腹痛小便不利者。真武湯。實痛而閉。脈實者。桂枝加大黃湯。經云。諸痛爲實。則痛隨利減。是治痛大法也。

小腹滿

小腹滿者。臍下滿也。若胸滿心下滿。腹中滿。皆爲邪氣而非物。今小腹滿。則爲有物而非氣。若小便利者。則爲畜血之形。小便不利。乃溺澁症也。滲利之劑。宜分兩途。太陽病

不解熱結膀胱。其人如狂。小腹急滿。結痛者。桃仁承氣湯。
下盡黑物則愈。太陰身黃。脉沉。小腹滿。小水不利者。五苓
散利之。經曰。病人素有痞氣。連在臍傍。痛引小腹。入陰筋
者。名臟結死也。病者手足厥冷。真武湯。不結胸。小腹滿。按
之痛者。此冷結在膀胱。關元宜灸關元穴。

嘔吐

嘔者。聲物俱出。吐者。無聲而但出物也。較其輕重。則嘔甚
於吐。蓋表邪傳裏。氣上逆故嘔吐。水谷不下也。有胃熱
脉弦數。口苦煩渴。有胃寒脉弦遲。逆冷不食。小便利有水

氣先渴後嘔。膈間怔忡。有膿血。喉中腥。奔道一衝。不須治之。嘔膿盡自愈。四者不可不辨。大抵邪在半表半裏。則多嘔吐。若裏熱而嘔吐者。亦有之。經曰。嘔多雖有陽明症。不可攻。爲其氣逆未收。飲爲實也。或嘔而脈弱。小便利。身熱。而見厥者。難治。太陽少陽合病。自利而嘔。黃芩加半夏生姜湯。太陽陽明合病。當自利。若不利。但嘔。葛根加半夏湯。太陽病發熱汗出。心下煩。鬱痞硬而嘔吐者。大柴胡湯。三陽發熱而嘔逆。小柴胡。嘔而渴者。猪苓湯。五苓散。少陰病又吐。但欲寐。五六日自利而渴。小便色白。四

逆湯。先嘔後渴。此爲欲解。宜與水解。先渴後嘔。爲水停心下。赤茯苓湯。

乾嘔

乾嘔者。空嘔而無物出也。大抵熱在胃脘。與谷氣併熱氣上薰。心下痞結。則有此症。太陽汗出乾嘔。桂枝湯。少陰下利乾嘔。姜附湯。厥陰吐涎沫乾嘔。吳茱萸湯。又有水氣二症。太陽表不解。心下有水氣。身熱乾嘔。微喘或自利。小青龍湯。不發熱。只惡寒。脇痛。咳而利。乾嘔者。亦水氣也。十棗湯。

噦

噦卽乾嘔之甚也。蓋因胃氣本虛。汗下太過。或恣飲冷水。水寒相搏。虛逆而成也。又有熱氣壅鬱。上下不通而噦者。輕則和解。疎利。重則溫散。噦而腹滿。大便不利。先用半夏。生姜湯。次用小承氣。小便不利者。猪苓湯。噦不止者。乾姜。橘皮湯。噦家若不尿而噦者。則病篤矣。

咳逆

咳逆者。俗謂逆忒是也。總發聲於咽喉。則遽止。軋然連續數聲。然而短促不長。古謂之噦。非也。噦與乾嘔無異。但噦

則聲濁惡而長。比之迄忒。大有逕庭矣。若脉實有力者。少與承氣湯微利之。若便軋脉來無力。瀉心湯如脉散者。難治。

下利

傷寒下利多因於熱。邪傳裏。虛助熱。乃爲下利。三陽下利。手足溫。少陰厥陰下利。身涼無熱。此大槩耳。夫白利清穀不渴。小便色白。厥冷惡寒。脉沉遲無力。此寒症也。加湯欲飲水。溺色如常。泄下黃赤。發熱後重。此熱症也。寒者理中。四逆湯。熱者小柴胡。猪苓湯。寒因直中陰經。熱因風

邪入胃。木來侮土。故人暴下。或溫或攻。或清下焦。或利小
便。隨症施治。太陽。明合病。下利。脈浮。葛根湯。太陽。少陽
合病。下利。乾嘔。脈浮。弦。黃芩湯。少陽。明合病。下利。身熱。
脈長。大而弦者。爲負。者死。長大不弦。爲順。大承氣湯。太
陰。自利。不渴。與夫厥逆。無脈而利者。四逆湯。少陰。咽痛。下
利。胸滿。心煩。脈微者。猪膚耳。枳湯。渴而自利。純清水。心下
硬痛。口乾者。此不可溫。急用大承氣湯下之。下利。清谷。身
痛者。急當救裏。四逆湯。清便自調。急當救表。桂枝湯。下利。
譫語。脈沉有力。急當下之。大承氣湯。腸鳴。腹痛。下利。脈沉。

遲無力急當溫之。小建中湯。若下利譫語目直視下利厥
冷燥不眠下利發熱厥而自汗下利厥冷無脈灸之不溫
脈不至者下利一日十數行脈反實者皆不治。

便膿血

衝脈爲血之海。卽血室也。男女均有此血氣。亦均有此衝
脈。衝脈得熱血必妄行。在男子則爲下血譫語。在婦人則
爲寒熱似瘧。皆爲熱入血室。逼血下行。則血熱而利也。挾
血之脈。乍溢乍數。或伏或沉。血熱交併。則脈洪盛。大抵男
多于左手。女多于右手見之。又有陰寒爲痢下利便膿血。

者。乃下焦虛寒。腸胃堅固。清濁不分。而利下膿血也。二者一爲挾血。一爲陰寒。臨病最宜精別。陽明病下血譫語。胸脇滿如結胸。夜則見鬼。此爲熱入血室。小柴胡湯。少陰病下利便膿血者。薤白湯。腹滿身熱下如魚腦。曰濕毒。地榆散。黃連阿膠湯。下後無表裏症。脈數不解。消谷易飢。多日不大便。此爲瘀血。薤白承氣湯。或小柴胡加薤白大黃。

厥逆

陽氣伏藏。陰氣越出。陰陽不相順接。所以厥也。若先熱而

後厥者。乃熱邪伏于內也。先厥而後熱者。乃陰退而陽得復也。若初得病便厥者。是陽不足而陰勝也。熱伏于內者。其脈沉而數。狂言發渴。露手揭衣。燥不得眠。或大便閉。初病便厥者。其脈沉遲而弱。醒而靜。惡寒引衣。或下利清谷。其或惡寒。踰卧煩燥。下利不知人。皆爲惡候。仍灸太谿穴。

四逆

四逆者。手足厥冷不溫。蓋邪在表則手足熱。邪在半表裏則手足溫。至于邪傳少陰則手足冷逆也。然自熱而至溫。

由溫而至厥。乃傳經之邪。輕則四逆散。重則承氣湯下之。若初得病便厥者。輕則理中湯。重則四逆湯溫之。此是陰經受邪。乃陽不足而陰有餘也。若或惡寒。厥逆。踰臥煩燥。吐利而脈不至者。皆惡候。

不大便

不大便者。因發汗利小便過多。耗損津液。以致腸胃乾燥。故也。經曰其脈浮而數。能食不大便。此爲實。名曰陽結。宜大柴胡湯。若不了了得屎而解。其脈沉而遲。不能食。身體重。大便難。名曰陰結。宜金液丹。若陽明病汗多。或已經

發汗。利小便而大便不通者。此津液枯竭。宜蜜漿通之。

譫語

經曰。邪氣盛則實。精氣奪則虛。故實則譫語。虛則鄭聲。蓋胃中實熱。上乘于心。輕則睡中呢喃。重則不睡亦語。有譫語者。有獨語者。有語不休者。有言亂者。此數者。熱之輕重所致也。大抵熱入于胃。水涸燄燥。必發譫語。爲實也。有被火劫取汗而譫語者。有亡陽而譫語者。有下利清谷不渴。譫語者。此爲虛也。或脈來沉實。洪數有力。大便不通。小水赤燥。渴而譫語者。或潮熱自汗。或下利純清水。心腹硬痛。

譫語者皆裏症邪熱燥屎也。俱大承氣下之。下後利不止。與喘滿氣逆上奔自利氣脫而下奪皆爲逆也。三陽合病。身重脉實難以轉側。口中和而面垢遺尿白虎湯。或大便結大熱乾嘔錯語呻吟不眠。犀角解毒湯。初得病無熱狂言煩燥不安。精采不與人相當。與五苓散三錢。以新汲水探吐一法。用桂苓湯。狂言嗽水不欲嚥。大便黑。小水自利。身黃腹滿。此因當下失下。是瘀血譫語。桃仁承氣下盡黑物則愈。婦人經水適來適斷。續得寒熱。此爲熱入血室。譫語小柴胡湯。

鄭聲

鄭聲者。如鄭衛之音。轉不正也。蓋汗下後。若病久。本音失。而正氣虛。則語散。不知高下。乃精氣奪之候。其脉(微細)大。小便自利。小柴胡湯。

小便不通

小便不利者。邪氣聚于下焦。結而不散。甚則小腹硬滿而痛。大抵有所不利者。滲利之。若引飲過多。下焦多熱。或中濕發黃。水飲停滯。皆以利小便爲先。惟汗後亡津液。胃中乾。與陽明汗多者。則以利小便爲戒。或小便不利而頭汗。

田者。乃陽脫閉格。其病篤矣。引飲過多。小便不利。下焦蓄熱。脈浮者。五苓散。脈沉。猪苓湯。太陽病。身黃。脈沉。小腹硬。小便不利者。知無血也。與陽明無汁。小便不利。心中懊懣者。必發黃。茵陳五苓散。黃自退而小便清矣。

小便自利

小便自利者。爲津液偏滲。大便必硬。宜下之。太陰病。當發身黃。其小便自利者。則濕熱內泄。不能發黃。惟血症。小腹急如狂。小便自利者。腎與膀胱虛。而不能約制水液。菴仁承氣下之。

舌胎

舌乃心之苗。色應南方火。邪在表則未生胎。邪入裏津液結搏則生胎。其胎白而滑。小柴胡湯。熱氣漸深。其胎燥而澁。熱聚于胃。其胎必黃。宜承氣湯下之。若舌上黑胎者。則熱已甚。病已篤。經曰。熱病口中乾。舌黑者死。乃腎水刑心火也。脉浮陰陽俱紫。口中氣出。舌中乾燥。蹇卧足冷。鼻涕。舌上滑胎。勿妄治也。到七八日以來。微發熱。手足溫者。爲欲解。若七八日以上。反大發熱者。難治。設有惡寒者。小柴胡加乾姜服之。

臟結

臟結者。臟氣閉結而不流布也。外症如結胸狀。但欲食。腹滿如故。時時下利。舌上白胎者。爲異。其脈寸浮。關沉。緊。痛引陰筋。臍腹脹痛者。難治。

咽痛

咽喉不利。或痛或痒。不能納食。皆毒氣上衝所致。經曰。太陽病下之。脈紫者。必咽痛。以太陽之邪傳于少陰也。少陰之脈循喉嚨挾舌本。少陰咽痛。脈浮遲。厥冷。或吐利並不可汗下。用茸桔湯。猪膚湯。甚則半夏散。通脈四逆湯。去芍

藥加桔梗。咽中生瘡。不能言聲不出者。苦酒湯。咽中閉塞。烏扇湯。口瘡赤爛。蜜浸黃柏。噉咽痛甚者。升麻六物湯。若傷寒六七日。大下後。寸脈沉遲。尺脈不至。咽喉不利。唾膿血。手足厥利不止。難治。

頭眩

頭眩者。少陽半表半裏之間。表邪傳裏。表中陽虛故眩。小柴胡湯。少陰病。下利止而頭眩。時時自冒。此虛極而脫也。風家亦有頭眩者。此風氣運旋故也。太陽病。若下之復發汗。表裏俱虛。其人必眩冒。胃家汗自出而愈。陽明病。頭眩。

不惡寒能飲食而咳。茯苓白朮甘草生姜湯。少陽病。口苦目眩。小柴胡湯。汗吐下後。虛煩而脈沉數。心下痞。腸痛咽喉不得息。身振搖。筋肉惕。久則成痿。茯苓白朮桂枝甘草湯。

鼻衄

經絡熱甚。迫血妄行于鼻者。爲鼻衄。是雖熱甚。邪猶在經。不可發汗。衄血故爲欲解。若衄不止。而頭面汗出。其身無汗。及發汗不至足者。難治。太陽症衄血。及服桂枝湯後。致衄者。爲欲解。犀角地黄湯。衄而不止。茅花湯。若血而成流。

者。不須服藥。少刻自解。若點滴不成流者。必服藥無疑。經曰。奪血者無汗。奪汗者無血。俗以血爲紅汗。厥有旨哉。厥家不可大汗。汗之必額上陷。脉緊。目直視。不能盼。不眠。芍藥地黃湯。陽明嗽水。不欲嚥。犀角地黃湯。卽而煩渴欲水。水入卽吐。先服五苓散。次服竹葉石膏湯。若少陰但厥無汗。強發之。必動其血。或從口鼻耳目中出。名下厥上竭爲難治。當歸四逆湯。仍灸太谿湧泉。

吐血

吐血者。諸陽受熱。其邪在表。當汗不汗。致使熱毒入臟。積

畜于內遂成吐血。凡見眼閉目紅。神昏語短。咳胃迷妄。煩燥嗽水。驚狂譫語。鼻衄唾紅。背冷足寒。四肢厥逆。胸腹急滿。大便黑。小便頻數。皆瘀血症也。不必悉具。但見一二。便作血症主治。初得此症。急宜治之。犀角地黄湯。吐者其後必吐膿血。三黃瀉心湯。血熱者黃連阿膠湯。

心悸

心悸者。築築然動。怔怔忡忡。不能自安是也。其証有二。有氣虛有停飲。氣虛者。陽氣內弱。心中空虛而爲悸。又有汗下後。正氣內虛。亦令人悸。與氣虛而悸者。則又甚法當定。

治其氣也。其停飲者。由飲水過多。水停心下。心火惡水。不能自安。雖有餘邪。必先治悸與水也。如小便利者。茯苓桂枝白朮湯。小便少者。猪苓湯。

發黃

內經曰。濕熱交併。民多病瘵。者。瘵。陽而無陰也。太陰脾土濕熱所蒸。色見于外。必發黃。濕氣勝則如薰黃而晦。熱氣勝則如橘黃而明。傷寒發黃。熱勢已極。與畜血相類。但小便不利。大便實者。爲發黃。輕則五苓散。重則茵陳湯。小便自利。大便黑者。爲畜血。輕則犀角地黄湯。重則桃仁承

氣湯。濕家爲病。一身盡痛。發熱。身如薰黃。小便不利者。五苓散。小便自利。無黃者。木附湯。若形如烟煤。搖頭。目視。環口。紫黑。舉身發黃者。此皆臟也。

發斑

發斑者。大熱則傷血。血熱不散。裏實表虛。熱氣乘虛。出於皮膚。而爲斑也。輕則如疹子。重則如錦紋。或木屬陽。誤投熱藥。或當汗不汗。當下不下。或汗下未解。皆能致此。有兩症。一曰溫毒。卽冬時觸寒。至春發。汗下不解。邪氣不散。故也。一曰熱病。因冬時溫暖。感乖癘氣。遇春暄熱而發也。慎

不可發汗。若汗之重，令開泄，更增斑爛矣。然斑之方萌，與蚊跡相類。發斑多見于胸腹，蚊跡只見于手足。陽脉洪大，病人昏憤，先紅後赤者，斑也。脉不洪大，病人自靜，先紅後黃者，蚊跡也。其或大便自利，或短氣，燥屎不通，黑斑如果實，醫者盧醫不能施其巧矣。凡汗下不解，足冷耳聾，煩悶咳嘔，便是發斑之候。溫毒發斑，咳而心煩，下利嘔吐，下部并口有瘡者，黃連橘皮湯。陽毒斑如錦紋，面赤咽痛，脉洪大，不知人者，三黃石膏湯。便實燥渴者，調胃承氣下之。發斑通用升麻犀角湯。熱多者，玄參升麻黃連一物湯。凡

赤斑五死一生。黑斑不救。

發狂

難經曰：重陽者狂。傷寒熱毒在胃，併入于心，遂使神不寧，志不定，始得少卧不飢，謔語妄笑。甚則登高而歌，棄衣而起，踰垣上屋，罵詈不避親疎，皆獨陽亢盛，不大下之，何能止也。若因當汗不汗，瘀熱在裏，下焦畜血如狂，大小便不利，雖時如狂，未至于狂耳。栝仁承氣下之，重陽即陽毒，麻(洪大)面赤咽痛，潮熱發狂，或下利黃赤陽毒，升麻湯不效者，三黃石膏湯。大便實者，調胃承氣湯。經曰：太陽病不解

熱結膀胱其人如狂而血下者愈若外症已解但小腹急結與夫脉沉身黃唇燥嗽水小水自利者亦是血症如狂輕則犀角地黄湯重則桃仁承氣下之若狂言直視便溺自遺與汗後大熱脉燥狂言不能食者此爲可慮也

肉瞶筋惕

內經曰陽氣者精則養神柔則養筋發汗過多津液涸少陽氣偏枯筋肉失所養故惕然動瞶然跳也非溫經助陽之藥何以愈乎故設真武湯以救之虛者去芍藥有熱者去附子或因汗吐下後表裏俱虛而有此症者此逆

之甚也。

拂鬱

拂鬱者。乃陽氣蒸越。形於頭面。腠膚之間。聚而不散也。其症不同。如大便硬而氣短。燥渴者。實也。大柴胡。汗下後有此症。飲水而噦者。胃虛也。桂枝人參湯加茯苓。初得病發汗不徹。併於陽明。續自微汗出。面色赤者。陽氣拂鬱也。解肌湯。或汗不徹。其脉(浮緊)者。麻黃湯。或小便不利。時有微熱。大便乍難。拂鬱不得卧。此有燥屎作實也。承氣湯下之。

瘥後昏沉

瘧後或半月。或十餘日。終不惺惺。錯語少神。或寒熱似瘧。或潮熱。此因發汗不盡。餘熱在心。包絡間故也。知母麻黃湯微汗之。若胃口有熱。虛煩而嘔者。竹葉石膏湯加生姜。嘔吐不已。膈上有寒。理中湯。從腰以下有水。牡蠣澤瀉散。日暮微煩。以病方瘧。強與谷食不消也。損谷則愈矣。

勞復食復

病新瘧後。因勞動再發。爲勞復。緣氣血未平。餘熱未盡。一或有勞熱氣。遂還于經絡而復發也。小柴胡湯加減治之。表者汗之。裏者下之。病新瘧後。而多食復發者。爲食復。緣

土虛不能勝谷氣也。合損谷則愈。輕則消化。重則吐下。如
閉脉實大熱煩渴譫語腹痛大便實急下之不可緩也。

動氣

動氣者。臟氣不調。築也然跳動。隨所主而形見于臍之左
右上下也。其人先有痞氣。而先感傷寒。醫人不知痞積在
內。妄施汗下吐法。致動其氣。故曰動氣。凡汗吐下不可輕
然傷寒。看外症爲當者。蓋不在脉之可見。必待問症之爲
得。又有真氣內虛。水結不散。氣與之搏。即發奔豚。以其走
動衝突如豚奔也。皆不宜汗下。通用理中去白朮加桂因。

白木燥腎閉氣故去之桂能泄奔豚故加然不言當臍有動氣者脾爲中州以行津液妄施汗下必先動脾氣是以不言也臍之左右上下動氣且不宜汗下況中州之氣豈敢輕動之乎

不仁

不仁者謂不柔和痛痒不知鍼灸不知也經曰諸虛乘寒爲瞽目不仁蓋其血氣虛弱不能周流于一身于是正氣爲邪氣所伏故肢躄頑麻不仁厥如死屍用桂麻各半湯不愈者補中益氣湯入姜汁若身體如油喘而不休水漿

不入者。此爲命絕也。

陰陽易陰陽交

陰陽易者。如換易之易。以其邪毒之氣。交相易換也。男子病新瘥。婦人與之交動。淫慾而得病者。婦人病新瘥。男子與之交動。淫慾而得病者。其候身重氣乏。小便絞痛。頭不能舉。足不能移。四肢拘急。百節解散。眼中生花。熱氣衝胸。在男子則陰腫。入小腹。攻刺在婦人則裏急。連腰膝重。引腹內痛。若手足攣拳。其脉離經者。皆不治。若不因易而自病復發。爲女勞復。通用逍遙散加減治之。

陰陽交者汗病不得發汗。又之復生大熱狂言不食其脈
燥疾者不治。若脈浮數表症猶在可再汗之。若脈沉實則
爲胃實。又當下之後復熱者同此法。再汗用桂枝湯再下
用承氣湯

不眠

不得眠者陽盛陰虛則晝夜不得眠。蓋夜以陰爲主陰氣
盛則目閉而卧安。若爲陽所勝故終夜煩擾而不得寧所
謂陰虛則與夜爭也。汗出鼻乾不得眠者邪在表耳。葛根
肌湯。若胃有燥屎大熱錯語及大汗胃中乾不得眠者邪

在裏也。宜大承氣湯下之。胃不和則卧不安。故宜微熱和胃也。若汗下後虛煩不得眠。枝子豉湯。咳而嘔。心煩悶不得眠者。水氣也。猪苓湯。吐下後心中懊憹不得眠者。枝子豉湯。陽勝陰。狂言不得眠。心煩乏氣者。酸棗湯。陰勝陽。則驚悸昏沉。錯語呻吟不眠者。犀角地黃湯。汗出脉虛不眠者。小建中湯。

多眠

夫衛氣者。晝則行陽。夜則行陰。行陽則寤。行陰則寐。陽氣虛。陰氣盛。則目瞑。故多眠。乃邪傳于陰。而不在陽也。昏昏

閉目者陰自闔也。默不言者陰至靜也。太陽病十餘日。
脉(浮)細嗜卧者外已解。神將復也。設胸滿脇痛鼻乾不眠
者風熱內攻不得汗者。小柴胡湯。脉(浮)者差。活中。和湯。冬
用麻黃湯。少陰病但欲寐。尺寸俱沉(沉)者四逆湯。少陰病
欲吐不吐欲嘔不嘔。心煩多寐五六日自利而渴小便白
者。四逆湯。若復煩熱不得卧者不治。三陽合病欲眠目合
則汗譫語者有熱也。小柴胡湯。

痙瘓

痙瘓者。痙則急而縮。瘓則緩而伸。熱則生風。主乎動。故

筋脉相引而伸縮。傷寒至此症。可謂危矣。能以去風滌熱之劑。間有生者。是其幸也。治法與瘧病同。

二瘧

瘧者。先太陽中風。重感于寒。無汗爲剛瘧。重感于濕。有汗爲柔瘧。俱身熱足冷。頸項強急。惡寒。頭熱。面紅。眼赤。獨頭掣卒。口噤。背反張。手足攣搐。皆瘧病也。傷風頭痛。常自汗出。而嘔。若汗之。必發瘧。大發濕家汗。亦作瘧。新瘥血虛。汗出。當風。亦成瘧。若脉沉而遲。或緊。或散。干指外者。皆死症也。有汗加減。冲和湯。無汗者。羌活冲和湯。口噤咬牙者。大

承氣湯下之。

戰慄

戰慄者。陰陽相爭。故身爲之戰慄也。邪氣外與正氣爭。則爲戰。內與正氣爭。則爲慄。戰者。正氣勝。故有得汗而解。慄則不戰。而但鼓額。遂成寒症矣。此陰氣內熱。正不勝邪。經曰。陰中于邪。必內慄也。又云。邪中下焦。陰氣爲慄。足膝逆冷。便溺妄出。皆此類耳。宜姜附四逆湯。加灼艾。若復燥而不得卧者。不治。

霍亂

霍亂者。上吐下利。揮霍擾亂也。因邪氣飲食所傷。邪在中焦。既吐且利。邪在上焦吐而不利。邪在下焦利而不吐。俱用正氣散。加半夏生姜汁治之。如吐利不止者。理中湯。如上下不通。腹痛甚而頭痛發熱者。桂枝大黃湯。此爲乾霍亂。因所傷之物不得出。壅塞正氣。陰陽隔絕。死者多矣。先用吐法。

百合

百合者。百脉一宗。舉身皆受病。無復所謂經絡傳次也。大病虛勞之後。臟腑不平。變成此症。似寒無寒。似熱無熱。欲

食不食。欲卧不卧。欲行不行。口苦便赤。藥入即吐利也。其脉微。数。每尿则頭痛者。六十日愈。不頭痛但淅然惡寒者。四十日愈。若尿则快然。但頭眩者。二十日愈。俱用百合知母湯。地黃湯。滑石代赭湯。

狐惑

狐惑者。猶豫不決。進退之義也。狐惑失鑒。皆虫症。蓋腹中有熱。食入無多。腸胃虛空。三虫求食。而食人五臟。其候四肢沉重。惡聞食氣。默默欲眠。目閉舌口齒。兩面日間赤白。黑色變易無常。虫食下部爲狐。下唇有瘡。其咽乾。虫食其

臟爲感。上唇有瘡。其聲啞。二者通用黃連犀角地黃湯加
炙仁。越人望而畏之。

蛇厥

蛇厥者。厥陰病人。素有寒。妄發其汗。或汗後身有熱。又復
汗之。以致胃中虛冷。飢不能食。亡即吐蛔。乍靜乍煩。蛇或
上或下。蛇聞食臭必出。所以食即吐蛇也。先用理中湯。次
用烏梅丸。若誤下之。利不止。四逆湯。

類傷寒四症

疹症

痰症憎寒壯熱惡風自汗胸滿氣上衝咽不得息但身不痛項不強若涎多者亦隱々頭疼脉有寸(浮)者亦有寸(伏)者以意參之柴胡半夏湯金沸草散氣上衝者瓜蒂散吐之

傷食

傷食亦頭疼惡寒身熱少但左手脉(平)和右手脉(緊)盛知爲傷食也大橘皮湯二陳湯心腹滿痛大柴胡湯下之胸滿嘔吐瓜蒂散吐之

虛煩

諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒頭不痛身不痛爲異耳
表既虛不可汗裏不實不可下叔和云虛煩有熱不可攻

脚氣

傷寒傳足不傳手所以寒濕之氣發于足則類傷寒其症
頭疼身熱肢節痛大便閉或嘔但初病時起于脚膝屈伸
不能移動爲異耳感于寒所患必冷越婢小續命湯入生
姜汁最妙感于暑所患是熱小續命去附子減桂一半脚
腫木瓜散檳榔散大便閉脾約丸

傷寒纂要辨疑卷之三

多
少
節
分

傷寒六書纂要辨疑卷之四

傷寒劫病十三法

一傷寒發狂奔走人難制伏先於病人處生火一盤用醋
一碗傾于火上其烟冲鼻入內即安方可察其陽狂陰
燥親切用藥庶無差也若初病起頭痛發熱惡寒方除
以後登高而歌棄衣而走大渴欲死脉來有力者乃因
邪熱傳裏陽盛發狂此爲陽狂當用寒藥下之凡見舌
捲囊縮者不治若初病起無頭疼身微熱面赤戴陽煩
燥脉來沉微無力欲坐卧於泥水中者乃因寒極而發

燥即陰症似陽此爲陰燥當用熱藥溫之凡見厥冷下利譫語者不治醫者不看脉之(虛實)妄以爲虛陽上膈而燥誤爲實熱反與涼藥使渴愈甚燥愈急則氣消而成大害矣須詳脉來有(有力無力)此爲良法

一傷寒腹中痛甚將凉水一盞與病人飲之其痛稍可者屬熱痛當用涼藥清之清之不已或遶臍硬痛大便結實煩渴屬燥屎痛急用寒藥下之若食積痛同治法如小腹硬痛小水自利大便黑身目黃者屬蓄血痛用寒劑加行血藥下盡黑物則愈此三者皆痛隨利減之法

也。若飲水後愈加作痛。屬寒痛。當用溫藥和之。不
已。或四肢厥冷。腹痛嘔吐瀉利。急用熱藥救之。

一傷寒直中陰經。真寒症甚重而無脈。或吐瀉脫元而無
脈。將好酒姜汁各半盞。與病人服之。其脈來者可治。當
察其脈用藥不拘。脈浮沉大小。但指下出見者生。如用
此法。脈不至者死。又當問病人有何痛處。若有痛症。要
知痛甚者。脈必伏。宜隨病制宜。如無痛症。用此法。而脈
至者。乃爲吉兆。尤當問病人若平素原無正取脈。須用
覆手取之。脈必見也。此屬反關脈診法。與正取法同。若

平素正取有脉。後因病診之無脉者。亦當覆手取之。取之而脉出者。陰陽錯亂也。宜和其陰陽。如覆取正取俱無脉者。必死。

傷寒舌上生胎。不拘滑白黃黑。俱用井水浸青布片於舌上洗淨。後用生姜片子時。又浸水刮之。其胎自退。凡見舌生黑胎芒刺者。必死。此熱毒入深。十有九死。是腎水尅心火也。若發黃者。用生姜時時遍身擦之。其黃自退。若心胸脇下有邪氣結實滿悶硬痛。法用生姜一斤搗查去汁炒微燥帶潤。用絹包於患處。敷又壓之。稍可。

又將查和勻煎汁炒乾再熨許久令其豁然寬快此爲良法。

一傷寒鼻衄成流久不止者將山梔子炒黑爲細末吹入鼻內外將水濕紙搭于鼻中其血自止若點滴不成流者其邪在經未解照後秘方用藥不在此法。

一傷寒熱邪傳裏服轉藥後用鹽炒麥皮一升將絹包於病人腹上灸又熨之使藥氣得熱而行大便易通矣。
一傷寒吐血不止用韭汁磨京墨呷之其血見黑必止如無韭汁用雞子清亦可。正謂赤屬火而黑屬水也。

一傷寒直中陰經真寒症。或陰毒証。身如被杖。腹中絞痛。嘔逆沉重。不知人事。四體堅冷如石。手指甲唇青。藥不得入口。六脉沉細。或無脉欲絕者。將葱縛一握切去根。葉取白三寸許。搗如餅。先用射香半分填于臍中。後放葱餅臍上。以火熨之。連換二三餅。稍醒。灌入生姜汁煎服回陽救急湯。如不醒。再灸關元氣海二三十壯。使熱氣通其內。逼邪出于外。以復陽氣。如用此法。手足溫和。汗出即醒者生也。若用此法。手足不溫。汗不出。不省人事者必死。

一傷寒熱病熱邪傳裏亢極無解用黃連煎水一盞放井中頃冷浸青布搭在胸中徐換之待熱勢稍退即除不可久漬夏天用此法冬不宜用

一傷寒服藥轉吐出不納者隨用竹管重條內閉後將生姜自然汁半盞熱服其吐即止大凡服寒藥熱飲熱藥寒飲中和之劑溫和服之如要取汗雖辛甘之劑亦宜熱服如要止汗雖辛甘溫之劑亦宜溫服

一中風痰厥昏迷卒倒不省人事欲絕者先用皂莢末搥紙燒烟冲入鼻中有嚏可治隨用吐痰法將皂莢末五

分。半夏白礬各三分爲細末。姜汁調服。探吐後服導痰湯。加減治之。無噤不可治。

一治乾霍亂不得吐者。用滾湯一碗。入皂莢末三分。鹽一撮。調服。探吐。莫與米湯。設若與之。卽死。是谷氣反助邪氣也。

一中寒卒倒昏迷不省者。先用熱酒姜汁各半盞灌入。稍醒後服。加味理中湯。如不飲酒者。止用姜汁灌之。依法調治。此症冬月有之。餘月少也。

秘用三十七方就註三十七槌法

升麻發表湯 卽麻黃湯加減

治冬月正傷寒頭痛發熱惡寒者強脉(浮)無汗爲表症此足太陽膀胱經受邪當發汗如頭如斧劈身如火熾者宜用。

麻黃 四分

桂枝

甘草 各三分

杏仁 去皮尖

白芷

防風 各八分

升麻 五分

羌活

川芎 各一錢

發熱惡寒頭痛無汗而喘者加乾葛去升麻身軀痛加蒼朮芍藥去杏仁。

身痒面赤者以不得小汗出去白芷杏仁加柴胡芍藥
胸中飽滿者加枳壳桔梗

感寒甚重服不作汗宜再服二三劑汗仍不出者必死
水二鍾姜三片葱白二莖槌法加豆豉一撮煎之執服取
汗宜厚被覆首若中病即止不得多服多則加別病
踈邪實表湯 即桂枝湯加減

治冬月正傷風頭痛發熱惡寒脊強脉(浮)(緩)自汗爲表
症此足太陽膀胱經受邪當實表散邪無汗者不可服

白朮

赤芍 各一錢

桂枝 三分

防風

川芎

羌活 各八分
甘草 二分

如汗不止加黃芪。喘加柴胡杏仁。

水二鍾。姜三片。棗二枚。槌法加膠飴二匙煎之溫服。

羌活冲和湯 以代桂枝麻黃青龍各半等湯此太陽經

之神藥也治春夏秋感冒暴寒頭痛發熱惡寒脊強無

汗脉浮宜發散不與冬時正傷寒同治法此易非獨

治三時暴寒春可治溫夏可治熱秋可治濕治雜症亦

有神効。

川芎

防風

蒼朮 各八分
羌活

黃芩

地黃

各一錢 白芷八分

甘草

細辛

各三分

胸中飽滿加枳殼桔梗去地黃。

夏月加石膏知母名神木湯。如服此湯不作汗加蘇葉。
喘加杏仁地黃。汗後不解宜再服。汗下蕪行加大黃釜
底抽薪之法。

其春夏秋感冒非時傷風亦有頭痛惡寒少熱自汗。脉

浮緩宜實表去蒼朮細辛。加白朮。若汗不止加黃芪考

藥

水二鍾。姜三片。棗二枚。煎至一鍾。槌法加葱白搗汁五匙。入藥再煎一二沸。如發汗用熱服。止汗溫服。

柴葛解肌湯 卽葛根湯加減。

治足陽明胃經受邪。目痛鼻乾不眠。頭痛眼眶痛。脈來微洪。宜解肌。屬陽明經病。其正陽明腑病別有治法。

柴胡

乾葛

黃芩

芍藥 各一錢

羌活

白芷

各八分

桔梗

七分

甘草

三分

無汗惡寒甚者。去黃芩。加麻黃。冬月宜加。春宜少。夏秋去之。加蘇葉。

水二鍾。姜三片。枣二枚。槌法加石膏末一錢。煎熟服。

柴胡雙解飲 即小柴胡湯加減。

治足少陽胆經受症耳聾脇痛寒熱嘔而口苦脉來弦
(數)属半表半裏症宜和解用此。

柴胡 分一錢二 黃芩 一錢 陳皮 八分 芍藥

人參 半夏 各五分 甘草 三分

小便不利加茯苓 脇痛加青皮。

寒熱似瘧加桂枝 痰多加瓜蒌仁貝母。

渴加天花粉知母 齒燥無津液加石膏。

咳嗽加五味。金沸草。虛煩加竹葉炒粳米。

少陽與陽明合病加葛根芍藥如拾芥。

婦人熱入血室加當歸紅花。

男子熱入血室加生地黃。嘔者入姜汁竹瀝。

傷寒無表症熱勝者加大黃甚者加芒硝。

水二鍾姜一片棗二枚槌法入生艾汁三匙煎溫服。

桂枝大黃湯 卽桂枝湯加減。

治足大陰脾經受症腹滿而痛咽乾而渴手足溫脈來

沉而有力此因邪熱從陽經傳入陰經也。

柴胡

大黃

芍藥 各一錢
桂枝

甘草 各五分
枳實 八分

腹滿不惡寒而喘者加大腹皮去甘草

水二鍾姜一片棗一枚煎臨服槌法入檳榔磨水三匙熱服

加味理中湯 即理中湯加減

治足太陰脾經受症自利不渴手足溫身無熱脈來沉而無力此屬臟寒

乾姜

肉桂 各四分
白朮 一錢

人參

陳皮

茯苓

各八分

甘草

三分

厥冷消渴。氣上衝心。飢不欲食。又即吐衄。腹痛大便實者。加大黃蜜少許利之。

腹濡滿時減者。去甘草。

嘔吐入半夏姜汁。踰卧沉重。利不止。少加附子。利後身躰痛者。急溫之。加附子。

自利腹痛。入木香。磨姜汁調服和之。

水二鍾。姜一片。枣二枚煎。臨服槌法入炒陳壁土一匙調服。取土氣以助胃氣。

茵陳將軍湯 卽茵陳湯加減。

治足太陰脾經。腹滿身目發黃。小水不利。大便實。發渴。或頭汗至頸而還。脉來沉實者。宜用。

大黃

山梔

黃芩 各一錢
茵陳

厚朴

枳實 各八分
甘草 三分

大便自調者。去大黃厚朴。加大腹皮。利小便。清爲効。
水二鍾。姜一片。梔法加灯心一握煎之。熱服。

導赤散 卽五苓散加減。

治小水不利。小腹滿。或下焦畜熱。或引飲過多。或小便

赤澁而渴。脉(沉)(數)者宜用。惟汗後亡津液。與陽明汗多者。不宜服。

茯苓

梔子

白朮

各一錢

澤瀉

猪苓

各八分

甘草

桂枝

各三分

滑石

半錢

身目黃者。加茵陳。

水結胸證。加木通。灯心。

得病起無熱。但譫語煩燥不安。精采不與人相當。此湯治之。

水二鍾。姜一片。灯心二十莖。槌法入。鹽二字調服。

六乙順氣湯

治傷寒熱邪傳裏。大便結實。口燥咽乾。怕熱譫語。揭衣
狂妄。揚手擲足。斑黃陽厥。潮熱自汗。胸腹滿硬。遶脐疼
痛等症。悉皆治之。能代大小承氣。三乙承氣。調胃承氣。
大柴胡。大陷胸等湯。神效藥也。

大黃

一錢二分

枳實

黃芩

厚朴

柴胡

芒硝

芍藥

各一錢

甘草

三分

凡傷寒過經。及老弱。并血氣兩虛之人。或婦人產後有
下症。或下後不解。或表症未除。裏症又急。不得不下者。
用此湯。去芒硝下之。則吉。蓋恐硝性燥急。故有此戒。凡

傷寒邪熱傳裏結實。須看熱氣淺深用藥。經云轉藥就緊。有芒硝者緊也。大承氣最緊。小承氣次之。調胃承氣又次之。大柴胡又次之。大柴胡加大黃。小柴胡加芒硝。方爲轉藥。蓋爲病輕者設也。仲景又云。蕩滌傷寒熱積。皆用湯液。切禁丸藥。不可不知。

水二鍾。先煎滾三沸。後入藥煎至八分。梔法臨服入鉄繡水三匙調服。立効。取其沉重之義。最能墜熱。開結有神。此千金不傳之秘。

如神白虎湯。卽白虎湯加減。

治身熱渴有汗不解或經汗過渴不解脉來微洪宜用

石膏 二錢

麥門冬

知母

梔子 各一錢

人參 五分

甘草 三分

五味子 九粒

心煩加竹茹。大渴背惡寒去梔子加花粉無渴不加

水二鍾姜一片枣一枚髓法加淡竹葉十片煎熱服

三黃石膏湯

治陽毒發斑身黃如塗朱眼珠如火狂叫欲走六脉洪
太燥渴欲死鼻乾面赤齒黃過經不解已成壞症表裏
皆熱欲治其內表尤未解欲發其表裏症又急不能措

手不知熱在三焦閉塞經絡津液榮衛不通遂成此症
又治汗下後三焦生熱脉(洪)謔語晝夜喘息鼻時加衄
身目俱黃狂叫欲走通用此湯治之如神

石膏 三錢

麻黃

香豉 各五分
黃連

黃柏

黃芩

梔子 各一錢

水二鍾姜三片枣一枚槌法入細茶一撮煎熱服

三黃豆勝湯

治陽毒發斑狂亂妄言大渴叫喊目赤脉(數)大便燥實
上氣喘急舌卷囊縮難治者權以此湯劫之 三黃石

膏湯內去麻黃香豉加大黃芒硝是也

水二鍾姜一片枣二枚煎槌法臨服入泥漿清水二匙
坤和靈寶湯

治兩感傷寒起于頭痛惡寒發熱口燥舌乾以陽先受
病多者以此湯探之病即愈

羌活

黃芩

柴胡 各一錢

白芷

防風

甘草

川芎 各八分

地黃

石膏

各一錢五分

甘草

細辛

各三分

水二鍾姜三片枣二枚槌法入黑豆一撮煎之溫服取微

汗可愈。如不愈。表症多。而甚急者。方可用麻黃葛根湯。
解之。表解。如裏症多。而甚急者。先以調胃承氣湯攻之。
如陰經自中。病發熱下利。身疼痛。脉沉細無力。不渴。倦
卧昏重者。又當先救裏溫之。回陽救急湯。分表裏寒熱
而治。此權變大法也。古云。兩感雖爲死症。猶有可救之
理。若發表攻裏一誤。則枉死者多。良可痛哉。

桃仁承氣對子 卽桃仁承氣湯加減。

治熱邪傳裏。熱畜膀胱。其人如狂。小水自利。大便黑。小
腹滿痛。身目黃。譫語燥渴。爲畜血症。脉沉有力。宜服此。

湯下盡黑物。則愈。未服前而血自下者。爲欲愈。不宜服。

桃仁

去皮尖

大黃

芒硝

柴胡

各一錢

芍藥

枳實

當歸

各八分

青皮

五分

桂枝

甘草

各三分

水二鍾。姜三片煎。臨服。槌法入蘇木煎汁三匙調服。

消斑青黛飲

治熱邪傳裏。又實表虛。血熱不散。熱氣乘于皮膚。而爲

斑也。輕則如疹子。重則如錦紋。重甚則斑爛皮膚。俱宜

此湯治之。

人參

青黛

黃連

各五分

犀角

磨

知母

柴胡

玄參

山梔

地黃

各一錢

石膏

一錢五

甘草

三分

大便實者。去人參。加大黃。

水二鍾。姜二片。棗二枚。煎。槌法。臨服入苦酒一匙。調服。

生地。芩。連。湯。

治鼻衄。成流。久不止者。或熱毒入深。吐血不止者。或去血過多。錯語失神。撮空閉目。不知人事者。宜用。

地黃

一錢五

黃芩

黃連

山梔

柴胡 各一錢

桔梗

芍藥

川芎 各八分

犀角 磨

甘草 三分

鼻衄外用却法。水濕紙札于鼻中。

水二鍾。東一枚。煎至八分。槌法臨服入茅根搗汁。磨京墨調服。如無茅根。以藕搗汁亦可。

加味犀角地黄湯

治煩燥。漱水不下咽者。屬上焦有瘀血。宜用。

犀角

磨無以升麻代

生地黄

一錢五分

芍藥

桔梗

當歸

陳皮

各六分

甘草

紅花

各三分

牡丹皮

去骨
八分

水二鍾，姜三片煎，臨服搗法入生藕節，搗汁三匙溫服。
回陽救急湯 即四逆湯加減。

治寒邪直中陰經，真寒症，初病無身熱，無頭疼，止惡寒，四肢厥冷，戰慄腹痛，吐瀉不渴，引衣自蓋，踰卧沉重，或手指甲唇青，口吐涎沫，或至無脈，或脈來沉遲（無力者）宜用。

熟附子

乾姜

人參

各五分

茯苓

白朮

各一錢

官桂

四分

甘草

三分

陳皮

半夏 各七分 五味子 九粒

無脈者加豬胆汁一匙。泄瀉不止加升麻黃芪嘔吐
涎沫或小腹痛加鹽炒茱萸。

嘔吐不止加姜汁。

水二鍾姜三片煎。槌法隨服入射三厘調服。以手足溫和
即止。不得多服多則加別病如止後可用前理中飲加
減治之。

回陽及本湯

治陰盛格陽陰極發燥微渴面赤欲坐卧于泥水井中。

脉來無力。或脉全無欲絕者宜用

熟附子

乾姜

人參各五分 臘茶

甘草

各三分

五味子

九粒

麥門冬

去心一錢

陳皮

七分

面戴陽者下虛也。加葱七莖黃連少許。

澄清泥漿水一鍾煎。槌法臨服入蜜五匙頓服之。取汗爲効。

溫經益元散

治因汗後太虛。頭眩振又欲避地。并肉潤筋惕。及發汗太多。衛虛亡陽。汗出不止。或下後利不止。身軀疼痛者。

悉宜用。

人參

肉桂

甘草

各四分

熟地

生地

白朮

當歸

各一錢

白芍

陳皮

黃耆

茯苓

各八分

飽滿。加枳殼去地黃。

利不止。加炒白朮。升麻陳壁土去地黃當歸。

嘔吐。加姜汁製半夏。

汗後惡風寒。去肉桂。生地黃。加桂枝膠胎。

頭痛。加川芎羌活。

有熱去肉桂。瘦人去芍藥。

水二鍾。姜三片。棗一枚。槌法加糯米一撮煎溫服。

柴胡百合湯

治瘥後昏沉發熱。口渴錯語失神。及食復勞復。百合等症。悉宜治之。

柴胡

生地

黃芩各一錢知母

百合

陳皮

人參各八分甘草三分

頭微痛加羌活川芎

胸中煩燥加梔子

嘔吐入姜汁炒半夏

食復加枳實黃連

瘥後乾嘔錯語失神呻吟睡不安者加黃連犀角
心驚悸爲血少加當歸茯苓遠志

咳嗽加杏仁百合。痰甚加瓜蒌仁貝母

勞復時熱不去加葶藶烏梅生姜汁

虛汗加黃芪酸枣仁。胸中虛煩加竹茹竹葉

脾倦加白朮。腹如雷鳴加煨生姜

水二鍾姜三片枣二枚槌法醋煮薑甲煎之溫服

如聖飲

治劉柔二症頭搖口噤身反張手足攣搐頭面赤煩

急與痙瘓等症宜用。

羌活

防風

川芎

白芷

為藥

當歸

各八分

烏藥

七分

柴胡

黃芩

各一錢

半夏

甘草

各四分

有汗是柔痊加白朮桂枝。

無汗是剛痊加麻黃蒼朮。

口噤咬牙大便實者加大黃。

水二鍾。姜三片煎之。槌法臨服入姜汁竹瀝溫服。

逍遙散

治傷寒瘥後血氣未平。勞動助熱復還于經絡。因與歸

人交而復發者謂之勞復。因交淫慾而無病人反得病者謂之陰陽易。予曾見舌出數寸而死者多矣。此症最難治。宜用此湯。

人參

知母

地黃

柴胡 各一錢

甘草

薤根 各三分

黃連 五分

犀角 磨

活石 一錢五分

竹青

如卵縮腹痛。倍加黃連。

水二鍾。姜三片。棗二枚。煎之。槌法。臨服入燒裊襠末一錢。半調服。有黏汗出爲效。如無則再服。以小水和。陰頭腫。

即愈。

升陽散火湯

治叉手冒胸。尋衣摸床。譫語昏沉。不醒人事。名曰撮空。症小便利者可治。如不利者難治。

人參

當歸

芍藥

各八分

黃芩

麥門冬

白朮

柴胡

各二錢

陳皮

茯神

各八分

甘草

三分

有痰加姜汁炒半夏。大便燥。譫語發渴加大黃。水二鍾。姜二片。枣二枚。槌法入金首飾煎之。熱服。

再造散

治頭痛發熱。項脊強。惡寒無汗。用發汗藥二三劑。汗不出者。庸醫不論時令。遂以麻黃重藥。及火劫取汗。誤死者多。不知陽虛不能作汗。故有此症。名曰無陽症。

黃耆

人參 各一錢

桂枝

熟附

細辛

甘草

煨姜

各三分

防風

川芎

羌活

各八分

夏月加黃芩石羔。冬不必加。

水二鍾。東二枚。煎一鍾。槌法加炒芍藥一撮。煎三沸服。

黃龍湯

治心下硬痛。下利純清水。譫語發渴。身熱。此利因熱邪傳裏。胃中燥。屎結實使然。非內寒而利。乃日逐自飲湯藥所致也。宜急下之。名曰熱結利症。身有熱者宜用。無熱者用前六乙順氣湯。

大黃

芒硝 各一錢 厚朴

人參

枳實

當歸 各八分 甘草 三分

年老氣血虛者。去芒硝。

水二鍾。姜二片。棗二枚。煎之。槌法再加桔梗。煎一沸。熱服。

爲度。

調榮養衛湯 卽補中益氣湯加減。

治頭痛身熱惡寒微渴。然汗出身痛脚腿酸疼。無力沉倦。脉空(浮而無力)庸醫不識大發其汗。輕變重矣。不知勞力內傷氣血外感寒邪名曰勞力感寒症宜少辛甘溫之劑則愈。有下症者大柴胡下之則緩。

人參

黃芪

當歸

羌活

防風

白朮

陳皮

柴胡

地黃

各一錢

甘草

細辛

各三分

川芎

七分

元氣不足者。須知至陰之下。求其升。加升麻少許。口渴

加天花粉知母。

喘嗽加杏仁。去升麻。

汗不止。加芍藥。去升麻細辛。

飽悶加枳殼桔梗。去地黃甘草黃耆。

痰盛加瓜麥仁貝母。去防風細辛。

腹中痛。去芪朮加白芍和之。

水二鍾。姜三片。棗二枚。槌法入葱白一莖。煎之。溫服。

導赤各半湯

治傷寒後。心下不硬。腹中不滿。大小便如常。身無寒熱。

漸變神昏不語或睡中獨語一二句目赤唇焦舌乾不
飲水稀粥與之則嚥不與則不思形如醉人此熱傳手
少陰心也心火上而通肺所以神昏各越經症

人參

黃連

茯神

各六分

山梔

黃芩

麥門冬

知母

各一錢

甘草

三分

滑石

一錢五分

犀角

所

水二鍾姜枣煎之。施法加灯心一握煎三沸熱服。

益元湯

治有身熱無頭痛不煩梗作燥悶面赤飲水不得入口

庸醫不識呼爲熱症。而用涼藥誤死者多。不知元氣虛弱。是無根虛火泛上。名曰戴陽症。

熟附

乾姜

黃連

人參

各五分

甘草

艾 各三分

知母

麥冬

各一錢

五味子

九粒

水二鍾。姜一片。葱二莖。東二枚煎。臨服。槌法入童便三匙。

冷服。

桂苓飲

治初得病無熱。諸語煩燥不安。精米不與人相當。庸醫

呼爲發狂。誤用下藥死者多矣。不知此因熱結膀胱。名曰如狂症。

猪苓

澤瀉

白朮

黃柏

各八分

甘草

桂枝

蘼蕪

各三分

山梔

知母

各一錢

水二鍾。姜三片。煎至一鍾。槌法加活石一錢。煎三沸。溫服。取微汗爲效。

當歸活血湯

治無頭疼。無惡寒。止身熱發渴。小便利。大便黑。口出無

偷語庸醫不知。認作熱症。而用涼劑。誤人多矣。不知內傳心脾二經。使人昏迷沉重。名挾血如見祟症。

當歸

人參

柴胡 各八分 地黃 一錢

赤芍

枳殼

桃仁泥 紅花

乾姜

甘草

桂心 各三分

三貼後。去桃仁紅花乾姜。桂加白朮茯苓。

水二鍾。姜一片。煎之。槌法入酒三匙調服。

加味導痰湯

治痰症。憎寒壯熱。頭疼。昏沉迷悶。上氣喘急。口出涎沫。

此因內傷七情。以致痰迷心竅。神不守舍。出合空。又則痰生也。名曰挾痰。如鬼祟痰症。類傷寒。與此同治法。

茯苓

白朮

桔梗

各八分

南星

枳實

各七分

半夏

陳皮

黃連

瓜蒌仁

貝母

各五分

黃芩

一錢

甘草

三分

年力壯盛。先用吐痰法。次服此湯。

水二鍾。姜三片。棗二枚。煎臨服。棗法入竹瀝。姜汁溫服。

加減調中飲

治食積類傷寒。頭痛發熱惡寒。氣口脈（緊盛）。但身不痛。

爲異耳。經云飲食自倍，腸胃乃傷。輕則消化，重則吐下。

蒼朮

厚朴

陳皮

枳實

白朮

神麴

山楂

各八分

黃連

五分

草薢

四分

甘草

乾姜

各三分

腹痛加菴仁。痛甚大便實，加大黃。去白朮、乾姜、草薢、山

楂、神麴。

心中兀々欲吐者，與乾霍亂同吐法。用滾水一碗入鹽

一撮，皂莢末五分，探吐。

水一鍾，姜一片煎之。餽法：臨服用木香磨汁入藥服。

加減續命湯

治脚氣類傷寒。頭痛身熱惡寒。肢節痛。便閉嘔逆。脚軟。屈弱不能轉動。禁用補劑及淋洗。

防風

蒼朮

白朮

川芎

防己

羌活

各八分

麻黃

四分

白芍

一錢

桂枝

甘草

各三分

暑中三陰患必熱。脉來數。去麻黃。桂枝加黃芩。黃柏。柴胡。

寒中三陽患必冷。脉來遲。加附子。

起于濕者。脈來^(弱)。加牛膝木瓜。

起于風者。脈來^(浮)。加獨活。

元氣弱。加人參少許。大便實。加大黃。

水二鍾。姜一片。棗二枚。燈心二十莖。煎。槌法入姜汁服。

芩連消毒湯

治天行大頭病。發熱惡寒。頭項腫痛。脈來^(洪)。喉痺痰熱。

黃芩

柴胡

各一錢

桔梗

川芎

防風

羌活

枳殼

各八分

甘草

三分

連翹

射干

白芷

黃連

各七分

荆芥

先服加大黃利一二次後去大黃加人參當歸。

水二鍾。姜三片。煎至一鍾。鼠粘子一撮。再煎一沸。槌法入竹瀝姜汁調服。

六神通解散

治時行三月後。謂之晚發。頭痛身熱惡寒。脈洪數。先用中和湯不愈後服此。

麻黃

四分

甘草

細辛

各三分

石膏

活石

黃芩

各一錢

川芎

羌活

蒼朮

〇八分

水二鍾。姜三片。槌法入豆豉一撮。芎藭一莖。煎之。熱服。

續補七方

小柴胡湯 又名和解散。

治傷寒五六日身熱惡風。往來寒熱。胸脇苦痛。默々不欲食。心煩喜嘔。或煩渴不吐。腹中痛。或脇下痞硬。或心下悸。小便不利。或不渴。身有微熱。婦人中風七八日。續得寒熱發作。有時經水適斷。甚者熱入血室。俱此湯主之。

柴胡 三錢

黃芩 二錢

甘草 五分

人參

半夏

錢各一

頭痛加羌活防風。渴去半夏。

胸滿咽痛加枳殼桔梗。脇痛加芍藥石菖蒲。

腹痛加枳殼大黃。咳嗽加杏仁五味。去人參。

嘔逆加姜九片陳皮一錢。

春溫病時行加生地黃川升麻。

夏中暑頭痛身熱加黃連。

汗下後病不解加芩連梔枳。結胸加瓜蒌子。

發黃加茵陳黃柏

發黃有血症加桃仁當歸

狂亂加大黃朴硝

衄血下血加黃連

小便不利心下悸加茯苓

瘡疾或先寒後熱或先熱後寒加川芎山尖檳榔各末

發二時前服

水二鍾姜四片棗二枚煎溫服

人參敗毒散

治傷風瘟疫風濕頭目昏眩四肢疼痛憎寒壯熱項強
目睛疼鼻塞風眩拘急

集方卷之六

柴胡 一錢

人參 五分

前胡

川芎

茯苓

桔梗

羌活 各八分
獨活

枳殼 各七分
甘草 二分

咳嗽加半夏杏仁。

熱加芩連枝栢。

口乾舌燥加黃芩。

風熱加荆芥防風各荆防敗毒散。

消風散相合各消風敗毒散。

水二鍾姜三片葱三莖煎至一鍾熱服取微汗中病即止。

五積散

治感冒寒邪。頭痛身疼。項強拘急。惡寒嘔吐。腹痛及傷寒發熱。頭痛惡風。內傷生冷。外感風寒。并寒濕客于經絡。腰脚痠疼。及婦人經脉不調。腹痛帶下等症。

白芷

陳皮

厚朴

各六分

桔梗

川芎

芍藥

當歸

茯苓

各八分

蒼朮

枳殼

各七分

半夏

麻黃

各四分

乾姜

三分

甘草

肉桂

各三分

有汗去蒼朮麻黃。

氣虛去枳殼加參朮。

婦人調經入艾醋。

腹痛挾氣加吳茱萸。

四肢逆冷嘔吐加附子。

乳癰初作加牛膝生地。

半身不遂遍身麻痺加麝少許。

有熟料五積即本方除白芷肉桂二味外十三味入淡醋用慢火炒令色變攤冷入桂芷和勻產後寒熱去麻黃加烏藥尋常冬月感寒無汗量用麻黃其十三味藥仍行乾炒。

水二鍾姜五片葱二莖全煎熱服。

葛根湯

治太陽病。項背強急。無汗惡風。脈帶弦。浮發熱。又治太陽與陽明合病。必自利。此湯並主之。

葛根

二錢

甘草

五分

麻黃

六分

水二鍾。姜四片。棗二枚。煎服。微覆取汗。

升麻湯

治傷寒中風。頭痛增寒。壯熱。肢體疼痛。發熱惡寒。鼻中乾。不得卧。兼治寒暄不時。人多痰。瘧。乍寒脫衣。及暴熱之頃。忽然變寒。身體疼痛。頭重如石。

升麻

甘草

芍藥

葛根

各等分

水一鍾煎至七分不拘時服寒多即熱服熱多即溫服若

老人去芍藥加柴胡茯苓人參各一錢

獨活散

治傷風溫熱等病。

羌活 一錢

獨活

枳殼

防風 各八分

人參

麻黃

湯泡二

茯苓 七分

細辛

菊花

甘草

各三分

蔓荊子 五分

水二鍾。生姜三片。薄荷五葉。全煎。

解肌湯

治瘟病大行。頭痛壯熱。春感青邪發熱而渴。不惡寒。

葛根 一錢

桂枝 三分

黃芩

芍藥 各一錢

麻黃 四分

甘草 三分

水二鍾。煮二枚。煎服。如不解。再服。取汗。

製藥法

用附子。去皮臍。先將鹽水姜汁各半盞。用砂鍋煮七沸。後入黃連甘草各半兩。再加童便半盞。再煮七沸。住火良久。撈起。入磁器盛貯。伏地氣一晝夜。取出曬乾。以備後用。庶無毒害。頂圓臍正一兩一枚者佳。

用川大黃須錦紋者佳。剉成飲片。用酒和勻。炒乾。以備後用。庶不傷陰血。如年壯實熱者。生用。不須製之。

一用麻黃去節。先以滾醋湯畧浸片時。撈起。以備後用。庶免大發。如冬月嚴寒。腠理至密。當生用者。不須製之。

一用吳茱萸將鹽水拌勻。炒燥。以備後用。庶無小毒。

煎藥法

一用發汗藥。先煎麻黃一二沸。後入餘藥同煎。

一用止汗藥。先煎桂枝一二沸。後入餘藥同煎。

一用和鮮藥。先煎柴胡一二沸。後入餘藥同煎。

用下藥先煎滾水入枳實煎一二沸後入餘藥同煎

用溫藥先煎乾姜一二沸後入餘藥同煎

用行血藥先煎桃仁一二沸後入餘藥同煎

用利水藥先煎猪苓一二沸後入餘藥同煎

用消渴藥先煎大花粉一二沸後入餘藥同煎

用止瀉藥先煎炒白朮一二沸後入餘藥同煎

用止痛藥先煎白芍藥一二沸後入餘藥同煎

用發黃藥先煎茵陳一二沸後入餘藥同煎

用發斑藥先煎青黛一二沸後入餘藥同煎

一用發狂藥。先煎石羔一二沸後入餘藥同煎。

一用嘔吐藥。先煎半夏一二沸後入餘藥同煎。

一用勞力感寒藥。先煎黃芪一二沸後入餘藥同煎。

一用感冒傷寒藥。先煎羌活一二沸後入餘藥同煎。

一用暑症藥。先煎香薷一二沸後入餘藥同煎。

一用風病藥。先煎防風一二沸後入餘藥同煎。

一用濕症藥。先煎蒼朮一二沸後入餘藥同煎。

一用腹如雷鳴藥。先煎煨生薑一二沸後入餘藥同煎。

解藥法

一用附子後身日紅者乃附毒之過用蘿蔔搗水濾汁二大盞入黃連甘草各半兩犀角三錢煎至八分飲服以解附毒其紅即除如解遲則血從耳目口鼻出必死無蘿蔔用蘿蔔子搗水取汁亦可如無蘿蔔子用澄清泥漿水亦可此爲良法。

一用大黃後瀉利不止者用烏梅二個炒粳米一握乾姜三錢人參炒白朮各半兩生附子皮一錢半甘草一錢升麻少許灯心一握水二大鍾去渣後入炒陳壁土一匙調服即止取土氣以助胃氣也此爲良法。

一用麻黃後汗出不止者將病人髮披水盆中足露出外用炒糯米半升龍骨牡蠣各一兩研爲細末週身撲之隨後秘方用藥免致亡陽而死此爲良法。

傷寒補註辨疑序

補註辨疑者何夫傷寒仲



其書不可槩見而特見之活人指
掌故今之業傷寒者宗焉夫指掌
豈仲景之全書哉活人此書害人
亦此書故不得不補註辨疑也何

也風寒暑濕各一其門傷中感冒
各一其病傷寒者蓋冬寒凜冽為
毒特甚觸之即病者迺謂傷寒非
三時感冒之寒化也今活人書不
論天時不察虛實不分感冒直以
麻黃桂枝治冬月之正傷寒者通

治三時之寒人之蒙其害者多矣
不特此也傷寒有傳經無直中直
中者迺中寒之真陰証也今活人
書論三陰曰自利曰可溫是以直
中混傳經矣傷寒在表則汗在裏
則下此定局也今活人書論兩感

救裏以四逆湯是抱薪救火以攻
為救矣論證用藥錯亂若此人之
蒙其害者多矣不特此也傷寒自
為傷寒雜病自為雜病皆判若黑
白毫不容紊也今活人一書以正
傷寒六經列之於首而內以雜病

實之納垢藏汙諸病淵藪未入其
門者只婦人小兒兩科然則雜病
皆傷寒乎致令理傷寒者如理亂
繩莫尋頭緒人之蒙其害者抑又
多矣昔者楊墨塞路孟氏辭而闕
之廓也余恐雜病之附於傷寒猶

楊墨之附吾儒也故不得已而為
之補註辨疑辨其此為正傷寒此
為類傷寒此為傷寒而變雜病此
為雜病而非傷寒註其此為傳經
此為直中此為風溫此為暑溫辨
風溫暑濕之為雜病漢辨風溫暑

濕之非傷寒補註辯疑既明治斯
不惑訂訛摘繆活人書當以壯吾
氏為忠臣夫醫乃仁術欲活人尚
不足以活人欲指掌尚不足以指
掌然則余之補註辯疑豈盡當乎
猶俟汝之明者復正吾之是非錄

為吾之補注辯疑

崇禎辛未年童養學題

新刻傷寒活人指掌補註辯疑目錄

首卷

六經傳變

二卷

結胸

痞氣

發狂

發黃

微喘喘滿

微煩煩極

狐惑

蛇厥

渴

斑

陽明寒熱

剛柔二症

衄血厥竭

厥利除中

陰厥

中醫研究
院藏書

陽厥

風濕

胸痞

併病

戰汗

咳逆

腹痛

短氣

勞復食復

背惡寒

筋肉惕

頭汗

亡陽

水入卽吐

水入不下

風寒

潮熱

煩燥

嘔噦

痰涎

膿血

腹脹

頭疼

溫毒

赤斑

吐血

咽痛

寒結胸

痞滿

錯語乾嘔

熱多寒少

動悸

懊懣

痞噫

身疼

勞復

腸垢

疫癘

百合

多眠

不眠

李搖

嗽痰

不可汗

不可下

濕症

霍亂

溫病

奔豚

似瘥

臍結

口燥咽乾

肉瞤筋惕

日負

不
上
口
辛
大

日遺

亡陽

陰毒

脾約

協熱

嘔吐

譫語

陽毒

陰毒

臟氣厥

陰陽交

總論

三卷

大陷胸湯

大陷胸丸

小陷胸湯

三物白散

枳實理中湯

半夏茯苓湯

半夏瀉心湯

三黃石膏湯

柴胡桂枝湯

犀角地黄湯

爽仁承氣湯

五苓散

瀉肺湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

滾痰丸

小青龍湯

竹葉石膏湯

薤白湯

黃連犀角湯

雄黃鉅散

遇仙丹

乾姜理中湯

升麻犀角湯

玄參升麻湯

小續命湯

人參敗毒散

黃芩芍藥湯

防風通聖散

生地芩連湯

當歸四逆湯

黑錫丹

漢防杞湯

知母葛根湯

防已黃芪湯

升草瀉心湯

生姜瀉心湯

赤石脂禹餘糧湯

麻黃桂枝各半湯

羌活附子湯

桂枝加芍藥湯

桂枝加大黃湯

麥門冬湯

補中益氣湯

枳殼枝子加大黃湯

藿香正氣湯

人參白虎湯

真武湯

柴胡龍骨牡蠣湯

辰砂五苓散

硃砂安神丸

大青龍湯

黃連鷄子湯

人參三白湯

雙解散

通聖散

瓜蒂散

柴胡枳椇湯

三物菴花湯

清胃散

厚朴半夏甘草人參湯

桔梗半夏湯

枝子厚朴湯

涼膈散

葱白葛根湯

連翹葱白湯

白芷石膏湯

黑膏

人參羌活湯

紫雪

荆防解毒散

栝皮湯

黃連阿膠湯

三黃瀉心湯

豬膚湯

甘桔湯

十棗湯

黃連解毒湯

黃芪建中湯

溫膽湯

枝子豆豉湯

旋覆代赈湯

四物湯

燒裨湯

獬鼠糞湯

白頭翁湯

二香散

調中益氣湯

柴胡升麻湯

百合知母湯

百合地黄湯

百合洗法

葳蕤湯

葛根龍膽湯

酸棗湯

牛蒡根散

金沸草散

香薷散

蘇合香丸

六和湯

陰陽湯

桂枝加桂湯

茯苓桂枝大棗湯

祛癰丸

八物湯

朮附湯

脾約麻仁丸

赤石脂丸

乾姜黃連黃芩人參湯

青黛一物湯

犀角大青湯

大青四物湯

硝黃解毒湯

正陽湯

陰毒甘草湯

目錄畢

新刻傷寒活人指掌補註辯疑卷之首

邵武縣學訓導

童養學壯吾父

中醫研究
院善本書
纂輯

本庠

余

璟景玉父

較閱

活人指掌賦

六經傳變正傷寒方附

傷寒爲病。反復變遷。賴先師究詳之遺旨。成後學診病之良詮。

內經云。人傷於寒。則爲熱病。又云。未滿三日者。汗之而已。其滿三日者。泄之而已。夫謂之曰泄。則便實可知。茲太陰經以自利。混便實。謂之曰泄。則藥之寒涼可知。茲

又以可溫混可下。賦此者考究未詳致後學模稜兩端。未得要領似此之類不可枚舉余不得不爲之補註。太陽則頭疼身熱脊強。

太巨也。陽氣盛大故曰太陽。內經云傷寒一日巨陽受之。巨陽脉從頭項行于腰背故頭項痛腰脊強。頭疼身熱脊強此足太陽膀胱經受証屬表也。有傷風傷寒之異不可混治。

假如先起惡寒者爲本病。已後發熱者爲標病。

辯症法

頭疼身熱脊強傷風傷寒俱有此症。

但見表虛自汗者爲風傷衛氣宜實表。

但見表實無汗者爲寒傷榮血宜發表。

診脉法

脉浮緊有力爲傷寒。

脉浮緩無力爲傷風。

用藥法

冬月正傷寒用麻黃湯。今易升陽發表湯。

冬月正傷風用桂枝湯。今易疎邪實表湯。

春秋無汗用羌活冲和湯發表。有汗用加減冲和湯實表。

夏月無汗用神术湯。有汗用加減冲和湯。

藥方

麻黃湯

麻黃

桂枝

杏仁

甘草

升陽發表湯 卽麻黃湯加減。

麻黃

桂枝

杏仁

甘草

加升麻

川芎

防風

白芷

羌活

喘去升麻加葛根 飽悶加枳殼桔梗

桂枝湯

桂枝 白芍 甘草

疎邪實表湯 卽桂枝湯加減

桂枝 白芍 甘草 防風 川芎

羌活 白朮

汗不止加黃芪 喘加柴胡杏仁

羌活沖和湯 卽九味羌活湯 此可代桂枝麻黃膏

龍各半湯 此湯非獨治三時暴寒春可治溫夏可

治熱利可治濕治雜病亦有神也

羌活

防風

蒼朮

黃芩

川芎

白芷

甘草

生地

細辛

飽悶去生地加枳殼桔梗

加減冲和湯

卽羌活冲和湯加白朮黃芪去蒼朮

神朮湯

卽羌活冲和湯內加石膏知母

服此不作汗加蘇葉 汗下兼行加大黃

總論

夫麻黃桂枝治冬月之正傷寒也。今活人書不辯天時。凡遇發表卽用麻黃桂枝。以治冬月正傷寒之藥。通治三時之寒。夫三時之寒。特感冒耳。豈若冬寒凜冽所傷之重哉。夫寒症傷者重。感者輕。而冒者尤輕。後學求其說而不得。致疑麻黃桂枝二湯之難用。遂製十神香蘇升麻葛根等湯以代之。夫十神香蘇升麻葛根等湯皆麻黃桂枝之變方也。余特表而出之。難者曰。然則六月無傷寒與。余曰。六月豈無傷寒。但傷寒者必頭疼。否則

非正傷寒也如遇頭疼身熱脊強之正傷寒卽當用麻黃桂枝無疑。但天時甚熱猶當濟之以涼藥。故劉守真代之以九味羌活何其高哉。

陽明則目痛鼻乾不眠。

明、燿也。夾於二陽之中。兩陽合明。故曰陽明。壯。吾僭易之曰。陽明者陽之盛也。陽之將變而爲陰也。且日月爲明。陰陽合也。故有在經在腑之異。乃陽之得兼乎陰也。內經云。二日陽明受之。陽明主內。其脈俠鼻絡于目。故身熱目痛而鼻乾不得眠也。日疼鼻乾不眠此足陽明。

胃經受症。屬表也。然亦有在經在腑之異。在經者。謂之陽明在。腑者。謂之正陽明。不可混治。假如先起。目痛惡寒。身熱者。陽明經本病。宜解肌。已後潮熱自汗。譫語發渴。大便實者。正陽明胃腑標病。宜下之。

辯症法

目疼鼻乾。微惡寒。身熱者。病在經。

潮熱自汗。譫語發渴。便實。不惡寒者。病在腑。

診脉法

脉見微洪者爲經病。
脉見沉數者爲腑病。

用藥法

微惡寒目疼鼻乾不眠者用葛根湯。今易柴葛解肌湯。
渴而有汗者用白虎湯。今易如神白虎湯。潮熱自汗譫
語發渴。揭去衣被。揚手擲足。斑黃狂亂。不惡寒反怕熱。
大便實者。輕則大柴胡湯。重則三承氣湯。選用。今俱用
六一順氣湯。內加減治之。

藥方

葛根湯

麻黃

桂枝

芍藥

葛根

甘草

柴胡解肌湯 卽葛根湯加減治陽明經病。

柴胡

乾葛

芍藥

黃芩

甘草

羌活

白芷

桔梗

無汗寒甚者去黃芩。春加麻黃。夏秋加蘇葉。

白虎湯 無渴者服此爲大忌。

石膏

知母

甘草

如神白虎湯

石膏

知母

甘草

加人參

門冬

山枝子

五味子

心煩加竹茹。

大渴心煩背惡寒者去山枝加天花

粉。

大柴胡湯

柴胡

黃芩

芍藥

半夏

大黃

枳實

大承氣湯

厚朴

枳實

大黃

朴硝

小承氣湯

厚朴

枳實

大黃

調胃承氣湯

大黃

朴硝

甘草

六一順氣湯

以代大承氣小承氣調胃承氣三乙承

氣大柴胡大陷胸葶湯之神藥也。治正陽明胃腑病。

大黃

朴硝

柴胡

黃芩

枳實

厚朴

芍藥

甘草

總論

太陽者陽之始也。陽明者陽之盛也。太陰者陰之始也。厥陰者陰之盡也。夫陰陽各一其經。獨陽明謂有陽明在經者。有正陽明在腑者。在經者宜辨。凡在腑者宜下。此何以故。余嘗求其說而不得。求之內經。求之經絡。其脉俠鼻絡于目。故目痛鼻乾。屬表。當解肌下。隔入胃絡脾宮。故入裏便實當下。有表復有裏。故也。夫三陽切也。何陽明有表復有裏。不知人之一身。身前爲陰。爲裏。身後爲陽。爲表。太陽脉行乎身後。故爲表。少陽脉行乎身之側。故爲半表半裏。若陽明則行乎身前。陽得兼陰。故

亦謂之裏然所謂裏者非對表而言乃陽中之陰表中
之裏也但其不可以裏名故以在腑別之明其將傳脾
未入脾猶在腑未入臟也若已傳脾則爲太陰而在臟
矣奚以在腑明之若夫經之由淺及深亦猶時辰之交
由淺及深也一時八刻人謂前爲初四刻後爲正四刻
故陽明一經前爲初陽明後爲正陽明亦若是而已矣
少陽耳聾脇痛寒熱嘔而口爲之苦

少初也初出之氣故曰少陽內經云三日少陽受之少
陽主膽其脈循脇絡于耳故胸脇滿而耳聾夫耳聾脇

痛寒熱嘔而口苦。此足少陽膽經受病。屬半表半裏也。假如先起惡寒身熱耳聾脇疼者。本病。

已後嘔而舌乾口苦者。標病。

緣膽無出入病在半表半裏之間。此經有三禁。不可汗吐下也。不從標本從乎中治。止宜小柴胡一湯加減和解表裏而治之。若治之得法。何有壞症。

辯証法

耳聾脇痛寒熱嘔而口苦舌乾便屬半表半裏之証。

診脈法

脉見弦數本經症。

用藥法

耳聾脇痛。寒熱嘔而口苦者。用小柴胡湯。今日勿柴胡雙解散。

藥方

小柴胡湯

柴胡

黃芩

人參

半夏

甘草

柴胡雙解散 卽小柴胡湯加減。

柴胡

黃芩

人參

半夏

甘草

加陳皮 芍藥

小便不利加茯苓。

嘔者入姜汁竹茹。

脇痛加青皮。

痰多加瓜蒌仁貝母。

寒熱似瘧加桂枝。

渴者加天花粉知母。

齒燥無津液者加石膏。

壞症加鱉甲。

嗽者加五味子金沸草。

未經下而飽悶者加枳殼桔梗。

總論

小柴一症。乃傷寒之傳症也。雖在半表半裏之間。然寒

多則屬表。熱多則屬裏。尤當分多寡而治之。雖然。又有論焉。小柴胡爲少陽之要領。大柴胡行陽明之秘堅。以經論少陽。雖居陽明之後。以藥論小柴。實行大柴之前。余謂小柴與解肌彷彿。陽明秘堅與太陰便實彷彿。治者當會其意可也。

太陰腹滿自利。尺寸沉而津不到咽。

內經無自利字。傷寒傳入三陰。必然便實。

當改作便實二字爲安。

陰氣盛大。故曰太陰。內經云。四日太陰受之。太陰脉布胃中。絡于嗌。故腹滿而嗌乾。

腹滿自利。津不到咽者。是足太陰脾經受病。屬裏也。

有直中傳經之異。直中者。內寒。傳經者。內熱。不可混治。假如先起腹滿咽乾者。本病。已後身目黃。標病。此傷寒症。傳經者。寒自三陽經。傳入三陰經者。謂之傳經。傳經之寒。外雖厥逆。內實熱耳。此正傷寒也。直中者。寒不從三陽經傳入。直中三陰經者。謂之直中。直中之寒。不發熱。四肢厥冷而惡寒者。此真陰症也。豈傷寒哉。

辨症法

大要腹滿舌乾發黃者。傳腑熱。

傳經之症。

須知自利不渴或嘔吐者屬臟寒。直中之症。

診脉法

脉見沉而有力當下。傳經之脉。

脉見沉而無力當溫。直中之脉。

用藥法

腹滿咽乾手足溫腹疼者桂枝大黃湯。今用加減桂枝湯。身目黃者茵陳湯。今用茵陳將軍湯。此傳經之藥。

自利不渴或嘔吐者理中湯。今用加味理中湯。重則四逆湯。今用回陽救急湯。此直中之藥。

藥方

桂枝大黃湯

桂枝

芍藥

甘草

大黃

加減桂枝湯

桂枝

芍藥

甘草

加

大黃

枳實

柴胡

茵陳湯

茵陳

大黃

山枝

茵陳將軍湯

卽茵陳湯加減

茵陳

大黃

山枝

加

甘草

厚朴

枳殼

黃芩

大便秘調者去大黃厚朴加大腹皮

理中湯

乾姜

白朮

人參

甘草

加味理中湯

乾姜

白朮

人參

甘草

加

肉桂

陳皮

茯苓

踴臥沉重體痛利不止加附子

自利腹痛者入木香磨姜汁調服和之。

四逆湯

熟附子

乾姜

甘草

回陽救急湯 卽四逆湯加減。

熟附子

乾姜

甘草

肉桂

人參

五味子

白朮

陳皮

半夏

茯苓

嘔吐涎沫。或小腹疼。加鹽炒茱萸。

無脉加豬膽汁一匙。嘔吐加姜汁

瀉泄不止。加升麻黃連。

總論

劉守真云傷寒無陰症人傷於寒則爲熱病熱病乃汗病也造化汗液皆陽氣也。徧考內經靈樞諸篇並無寒症陰症乃雜病也直中之寒乃中陰之陰証耳與傷寒傳入陰經之症有何與哉經云三日已滿泄之而已又云五六日便實方可議下傷寒傳陽明已便實可下矣。况太陰乎茲云自利是以直中混傳經以陰症雜傷寒也夫陰症亦別有科業醫者當熟之傷寒門外。按戴元禮云以五行生尅論謂陽主生則水生木太陽

膀胱陽水合。傳之少陽膽木。兼太陽在表。少陽在表裏之間。陽明在裏。自外漸入于內。次第相傳。理當如此。果如傷寒論中所說。一日太陽。二日陽明。三日少陽。豈有第二日病在裏。而第三日方在半表半裏者乎。愚故不敢輒反其說。然于心終未安。

少陰舌乾口燥。

陰氣初出。故曰少陰。內經云。五日少陰受之。少陰脉貫腎。絡于肺。係舌本。故口燥舌乾而渴。

舌乾口燥。是足少陰腎經受病。偏裏也。舌乾口燥。乃

傷寒傳經之証與直中全無相干。但足少陰有直中。故此經言有直中傳經之異。直中者內寒傳經者內熱。不可混治。

假如先起舌乾口燥者。本病。已後譫語便實者。標病。俱傷寒症。

六經中惟此一經難治。

傳經者。口燥舌乾。譫語大便實。爲傳經之熱。

直中者。嘔吐瀉利。不渴無熱惡寒。爲直中之寒。

辯症法

大要曰燥舌乾謔語大便實者知其熱傳經之症須要
嘔吐瀉利不渴或惡寒腹痛者別其寒直中之症

診脉法

脉見沉實有力者當下。傳經之脉。

脉見沉遲無力者當溫。直中之脉。

用藥法

口燥咽乾渴而謔語大便實或遶臍硬痛或下利純清
水心下硬痛是熱邪燥屎使然即用六一順氣湯分輕
重下之傳經之藥。

無熱惡寒。厥冷踈卧。不渴。或腹痛。嘔吐瀉利。沉重。或陰毒。指甲唇青。嘔逆絞痛。身如被杖。面如刀刮。戰慄者。俱是寒邪中裏。使然。用回陽救急溫之。直中之藥。

藥方

六一順氣湯。方見前陽明經下。

回陽救急湯。方見前太陰經下。

總論

舌乾口燥。乃傷寒傳入三陰經之症也。與直中又何與哉。若直中陰症。則口不渴而中和矣。焉有是症。或難之。

曰舌乾口燥非直中陰症既聞命矣然則傷寒者往往先入太陽中陰者往往直中少陰此又何說耶余應之曰太陽屬膀胱少陰屬腎膀胱與腎相爲表裏皆寒水之經此寒邪之所易乘也但體實者寒傷太陽作熱則爲傷寒體虛者中寒不作熱直入少陰卽直中陰症也或又難之曰人謂直中陰症得之房勞與此說何如答曰此固然矣焉有休虛房勞而不謂之陰症乎焉有休虛中寒而不謂之陰症乎受証不同陰症則一治者不可分而爲二也

厥陰煩滿囊拳

厥盡也。兩陰交盡。故曰厥陰。內經云。六日厥陰受之。厥陰脉循陰器而絡于肝。故煩滿囊縮。囊者。陰囊也。拳。縮也。在男子則囊拳。在女子則庭孔急痛。痛引小腹。庭孔者。陰之深處也。

煩滿囊拳。此足厥陰肝經受症。屬裏也。亦有直中傳經之異。直中者。內寒。傳經者。內熱。不可混治。

假如先起消渴煩滿者。本病。傳經者。乃有此症。已後舌蹇囊縮者。標病。傳經直中者。俱有此症。

辨症法

傳經者。煩滿囊拳。消渴者屬熱。

直中者。口吐涎沫。厥冷者屬寒。

似瘧不嘔。清便者必自愈。此傳經者。

診脉法

傳經者。脉沉實當下。

直中者。脉沉遲當溫。

傳經者。脉浮緩病自愈。

用藥法

傳經者消渴煩滿舌卷囊縮大便實手足乍冷乍溫者
六一順氣湯下之。

直中者口吐涎沫或四肢厥冷不溫過平時膝不渴小
腹絞痛嘔逆者用吳茱萸四逆湯溫之卽回陽救急湯
亦可。

藥方

六一順氣湯見前陽明經下。

吳茱萸四逆湯

附子

乾姜

甘草

加吳茱萸

回陽救急湯見前太陰經下

總論

凡看傷寒。不可以厥逆便斷爲寒。必須以脉與症參之。方知端的。如初起無頭痛。無身熱。便惡寒。四肢厥冷。過乎肘膝。不渴吐利。脉沉(逆)(無力)此爲直中真陰寒症也。謂之陰厥。法當溫之。若陽厥者。自三陽經氣分。因感寒起。有頭疼發熱惡寒。已後傳至三陰血分。變出四肢厥冷。乍溫便實。脉沉有力。此傳經熱症。謂之陽厥。卽陽症似陰也。外雖厥冷。內實熱邪。所謂厥深熱亦深。厥淺熱

亦淺者此也。豈可復進以熱藥哉。余恐醫者之未識。故因厥陰而及之。

一日二日。可發表而散。

邪在表。宜發以麻黃桂枝芎湯。

三日四日。宜和解而痊。

邪在半表半裏。宜和解以解肌。小柴胡芎湯。

五六日。便實。方可議下。

邪在裏。宜下。以承氣等湯。夫傷寒自三陽經氣分。傳至三陰經血分。便實乃可下也。若直中陰經之寒症。或有

自汗者。豈可下哉。

前自太陽至厥陰。言傷寒之症。一二日至此五六日。言傷寒之治法。已後言傷寒再傳兩感。

附脉雖浮亦有可下者。脉雖沉亦有可汗者。

經曰。傷寒六七日。目中不了了。無表症。脉雖浮。亦有可下者。少陰病二三日。無裏症。亦有可汗者。此何以解。脉雖浮。而亦有可下者。謂表症六七日不大便。故用寒藥微下之也。借使大便不難。其敢下乎。少陰病亦有發汗者。少陰本無熱。反發熱。而表猶未解。故用溫藥微汗之。

也。借使身不發熱，其敢輕汗之乎？此又医者所當知。

總論

經言一二日三四日五六日，不過言病有陰陽表裏分別先後淺深耳。豈可拘定日數哉？余見今之庸俗治傷寒，一二日不問屬虛屬實，使用麻黃桂枝之類汗之；三四日不問在經在腑，使用柴胡之類和之；五六日不問在表在裏，使用承氣之類下之。以致內外俱虛，變症蜂起。大抵病人表裏虛實不同，邪之傳變有異，豈可以日數爲准？蓋風寒初中人無常，或入于陰，或入于陽，非必

始太陽終厥陰也。或有自太陽始日傳一經六日傳至厥陰邪氣衰不傳而愈者。或有不罷再傳者。或有間經而傳者。或有傳至二三經而止者。或有始終止在一經者。或有越經而傳者。或有初入太陽不作鬱熱使人少陰而成真陰症者。或有直中陰經而成寒症者。或有症變者。或有脉變者。或有取症不取脉者。或有取脉不取症者。豈可執定一二日發表三四日和解五六日可下。如庸醫執死法哉。務要審脉驗症辨名定經。但見太陽症直攻太陽。但見少陰症直攻少陰。此活法也。仲景云。

日數多。但見表症。而脉（沉）者。尤宜下之。此確論也。活法也。

七八日不解。又復再傳。

傷寒七日。法當少愈。或猶不解者。六日足六經傳盡而傳入手六經。則七日太陽病衰。頭痛少愈。八日陽明病衰。身熱少愈。九日少陽病衰。耳聾微聞。十日太陰病衰。腹減如故。則思飲食。十一日少陰病衰。渴止。不滿舌乾。已而噤。十二日厥陰病衰。囊縱。少腹微下。邪氣皆去。病自已矣。

日傳二經病名而感經傳六日應無一痊。

常病日傳一經至六日爲傳經徧當愈不愈而兩感于寒者半屬於陰半屬於陽臟腑俱受病。

一日太陽與少陰俱病則頭痛口乾而煩滿二日則陽明與太陰俱病則腹滿身熱不欲食譫言三日則少陽與厥陰俱病則耳聾目赤而厥至此則病篤也若水漿不入不知人者胃氣不通三日六經俱病榮衛之氣不行于內外臟腑之氣不通于上下至六日臟腑之氣俱盡榮衛之氣俱絕則死也。

長沙公無治法。後人以意消息之。太陽先受病在表。先解表。少陰先受病在裏。先救裏。先表者裏不可緩。先裏者表亦不可緩也。此通變權輿之論也。

人書謂下利清穀。身熱。痛急。當救裏。用四逆湯。又痛。清便自調。急當救表。宜桂枝湯。却引下利。身疼痛。虛寒。救裏之例。而欲施于煩渴腹滿。譫語囊縮。實熱之症。是以火濟火也。寧不速其死哉。

今權輿以備覽。一日太陽與少陰俱病不死。五苓散主之。二日太陽傳陽明。少陰傳太陰。俱病不死。大柴胡主之。

之三。日陽明傳少陽。太陰傳厥陰。俱病則危矣。或用大承氣。大柴胡。庶幾有可生者。此亦僥倖于萬一也。醫者猶細思而斟酌之。

太陽無汗。麻黃爲最。太陽有汗。桂枝可先。

無汗服麻黃。傷寒症有汗服桂枝。傷風証。

小柴胡爲少陽之要領。大柴胡行陽明之秘堅。

膽爲清淨之府。煎小柴須去滓。再煎服之。宜澄清則能入膽也。

至三陰則難拘定法。或可溫而或可下。宜數變以曲全生。

意或可方而或可圓。

可溫者直中之症可下者傳經之証傷寒有傳經無直中然則可溫者非傷寒也茲日可溫又日可下不幾混哉欲業此者當以內經爲準經云未滿三日汗之而已其滿三日泄之而已觀此則知三陰惟有下法安謂難拘定法耶此賦斷七乎知其謬妄余故忘其固陋僭而易之賦具于後。

童壯吾先生賦云太陽頭痛身熱脊強陽明日痛鼻乾不眠少陽耳聾脇痛寒熱嘔而口爲之苦太陰腹滿便

實尺寸沉而津不到咽。少陰舌乾口燥。厥陰煩滿囊拳。一二日可發表而散。三四日宜和解而痊。五六日便實方可議下。七八日不解。又復再傳。日傳二經。病名兩感。經傳六日。應無一痊。治六經確有定法。陽可汗而陰可泄。倘傷寒變爲雜病。醫雜病不匡傷寒。傷寒全憑活法。不比雜病用方。此乃老夫卓見。本之內經非狂。

經云。未滿三日。汗之而已。其滿三日。泄之而已。觀而已之詞。則知其確有定法。夫傷寒只傳六經耳。決不傳爲雜病。雜病者。乃傷寒之變也。既爲雜病。卽當以雜病醫。

之雜病用方可執成方也。非若傷寒六經有表裏有汗下之法也。故曰傷寒全憑活法。不比雜病用方者。以此

傷寒雜病辨

或問傷寒無直中。直中真寒。乃陰症也。陰症乃雜病也。然則風暑濕亦雜病否。亦有中有傷否。余應之曰。天有四時。春爲風。冬爲寒。夏爲暑。秋爲濕。風寒暑濕之各一其病。亦猶春夏秋冬之各一其時也。豈容混哉。風暑濕決不可于傷寒門求之。其爲雜病也的矣。若論或傷或中。非獨傷寒有也。有傷風者。有中風者。有傷暑者。有中

暑者有傷濕者有中濕者但傷暑中暑傷濕中濕俱傷
暑濕之門但有輕重之分耳若中風者不與傷風同門
亦猶傷寒之門無中寒此又一門分而爲二者也醫者
不可不知

新刻傷寒活人指掌補註簡疑卷之二

邵武縣學訓導

童養學壯吾父

纂輯

本序

余

崇景王父

較閱

活人指掌賦

傷寒變爲雜病方載後卷

且如陽症下之早者，乃爲結胸。陰症下之早者，因成痞氣。此陰陽以風寒言，風屬陽，寒屬陰也，非言表裏之陰陽，寒熱之陰陽也。

結胸者，蓋風屬陽，風傷衛氣，太陽傷風自汗，當用桂枝湯，而誤下之，故成結胸耳。非曰發熱惡寒者，發于陽之

謂也。痞者蓋寒，屬陰寒，傷榮血。太陽傷寒，無汗，當用麻黃湯，而誤下之，故痞耳。非曰無熱惡寒者，發于陰之謂也。

有熱惡寒者，發于陽，謂初病，卽發熱惡寒，卽傷寒也。內經曰：傷寒，乃熱病，熱病者，汗病也。汗液乃造化之陽氣，故屬之陽耳。若初起，卽無熱惡寒，乃直中陰經，真寒証也。與傷寒何預乎？劉守真曰：傷寒，無陰症，真確言也。如以無熱惡寒，發于陰之陰，卽傷寒，傳經之陰，彼傷寒傳至三陰，當下無疑，何云下之早乎？傳至三陰，有熱無寒。

卽外無熱實裏熱也何云無熱惡寒乎。予業傷寒之門。讀傷寒之賦。不得不依陶節庵之說。而正之。活人書解之非是。

○結胸証有五

不按自痛者。大結胸。用大陷胸湯。或恐太峻用丸。按之方痛者。小結胸。用小陷胸湯。懊憹須渴。心下痛者。熱結胸。少與大陷胸湯。懊憹滿悶。身無熱者。寒結胸。用三物白散。枳實理中丸。心下怔忡。頭汗出。無大熱者。水結胸。用半夏茯苓湯。已經下者爲結胸。未經下

者非結胸也。屬半表半裏。用小柴胡湯加枳殼桔梗以和之。又婦人有血結胸。用小柴胡湯。

○痞症

胸滿而硬。大柴胡湯。胸滿而濡。並用半夏瀉心湯。加枳桔。次以小柴合二陳。加枳桔。飲水過多成肢結者。半夏茯苓湯。

發狂爲血畜于內。又大便秘之極實。

發狂者由熱毒入胃。併入于心。遂使神志不定而發狂也。其症始則妄言妄笑。甚則登高而歌。棄衣而走。皆極

熱所致。宜三黃石羔湯。三承氣湯。

如狂者。經曰。太陽病不解。熱結胸臆。其人如狂。皆由天行時熱。當汗不汗。嘔熱在裏。下焦畜血。如狂者。小便利。大便黑。雖曰如狂。未至于狂。爾與發狂不同。若外不解。柴胡桂枝湯。若外已解者。輕則犀角地黃湯。重則朮仁承氣湯。

發黃。乃熱積于中。兼小便之不利。

黃者。土之正色也。脾土爲濕熱所蒸。色見于外。必發身黃。

溫氣勝則如薰黃而煤。熱氣勝則如橘黃而明。殺疸
黃症腹滿小便難用五苓散加茵陳。腹滿小便難潮熱
用柴胡湯加茯苓。黃疸症頭面汗出渴飲水漿大小
便秘輕則五苓散重則茵陳湯。濕黃症濕家爲病一
身盡疼發熱小便不利薰黃五苓散。畜血發黃如狂。
見前如狂同。

微喘緣表之未解喘滿而不惡寒者當下而痊

發喘有邪在表者在裏者有水氣者。在表者太陽無
汗發熱頭疼而微喘者麻黃湯。無大熱汗出而微喘者。

麻黃杏仁甘草石羔湯。或瀉肺湯。在裏者喘滿而不惡寒。以大柴加厚朴杏仁枝子。次用瀉肺湯加厚朴及滾痰丸之類。或大承氣加杏仁枝子。水氣喘咳。乃汗後飲水過多。而水停心下。小青龍湯去麻黃加杏仁。微煩爲陽之相勝。煩極而反發厥者。乃陰所致。

心熱則煩。腎熱則燥。煩乃熱之輕者。燥乃熱之甚者。微煩而大便實者。大柴胡湯。大便不實而渴者。白虎湯加枝苓。有嘔者。竹葉石羔湯加姜汁。

煩極者。熱之極也。陰所勝則脉沉有力。身熱而反發厥。

物極則反也。大承氣湯。或六一順氣。看徵甚而下之。
狐惑蓋緣失汗。蟲食臟及食肛。

此証殺人甚速。因其死生難決。故曰狐惑。狐惑者。猶豫
不決之義也。其人素有重病。始因失汗。汗氣薰蒸。交腸
胃空虛。故亟求食。而食人之五臟也。亟食其肛門爲狐
下唇有瘡。其咽乾。亟食其臟爲惑。上唇有瘡。其声啞。越
人望而畏之。通用奔仁湯。黃連犀角湯。雄黃銳散。
體實之人。先用遇仙丹一服。取其亟積。次則調理。
鮑厭却緣多饑。蟲攻咽及攻胃。

蛔厥。卽蛇厥俗。以此爲消食重者非也。其人素有蛇重。
妄發其汗。以致胃中虛冷。飢不能食。卽吐其蛇。乍靜乍
煩。乍動乍止。吐蛇者。雖有大熱。忌下涼藥。犯之必死。
蓋胃中有寒。則蛇上入膈。大內之兆。急泡乾姜理中湯。
去甘草。加烏梅。川椒。名安蛇散。蛇安却。以小柴胡退熱。
蓋蛇性聞酸則靜。見苦則安。故也。

渴乃煩多。斑爲熱熾。

與後散赤斑當行
紫雪條同看。

渴者。裏有熱也。津液爲熱所耗。故也。傷寒六七日。傳
至厥陰。爲消渴。渴飲水多。而小便少。乃熱能消水也。

太陽無汗而渴。忌白虎湯。宜柴胡湯。陽明多汗而渴。戒五苓。宜竹葉石膏湯。白虎湯。至于厥陰脉沉而渴。熱之極矣。大承氣下之。

發斑者。大熱則傷血。氣熱乘虛出於皮膚。而爲斑也。輕

則爲疹子。甚則爲錦紋。然斑之方萌。與蚊迹相類。發

斑多見于胸腹。先紅後赤者是也。蚊迹只在于手足。先

紅後黃者是也。通用犀角地黄湯。升麻犀角湯。玄參

升麻湯。或加黃芩赤芍。蟬蛻柴草。荆芥防風連翹之類。

陽明內實。則爲寒熱往來。

陽明內實。裏熱已極矣。宜下之以大柴胡。加蘇葉青皮。或小柴胡加朴硝。

太陽中風。因作劉柔二症。

並小續命湯。劉症去附子。柔症去麻黃。並加羌活獨活。家葛。大便利而厥逆者。加白朮。則以熟附子佐之。

其間一症。身熱譫語。口渴。手足反微寒。大便反滑泄。此爲劉柔不分之症。用生附白朮。入小續命湯。無汗倍麻黃。有汗倍桂枝。

其若痰盛。則南星半夏。白附白茯苓。以消其痰。枳實陳皮。

升
甘草紫蘇以順其氣。痰消則風止。氣順則神醒。治法先
與消痰順氣爲上。然後詳其輕重。熱輕則敗毒。重則小
柴胡。壯熱胸滿口噤咬牙便秘者。是爲裏實。大承氣湯
下之。

衄血雖爲欲解。動陰血爲厥竭之憂。

衄血雖熱盛邪猶在經。然亦不可發汗。若衄而成流
不須服藥。少刻自解。若點滴不成流者。黃芩芍藥湯。
表裏皆實者。防風通聖散。大便不實者。生地芍藥湯。
少陰病。但厥無汗。強發之必動其血。從口鼻耳目中出。

名下厥上竭乃死症爲難治當歸四逆湯仍灸太谿三陰交。一法用黑錫丹。

厥利雖若尋常反能食有除中之忌。

厥者四肢厥冷也利者大便自利也。中者胃氣也除中言邪氣太盛除去胃氣不治。厥而利者腹中當冷。冷不消散則不能食反能食者除中不治。

厥有二端治非一類。

厥有二端但問大小便秘利初起有熱無熱察脉驗舌則陰陽二厥不差。

陰厥脉(沉)而(細)初緣利過陽厥脉(滑)而(沉)始因便秘治陽則芒硝大黃治陰則附子姜桂。

陰厥者因三陰經血分自受寒邪初病無身熱無頭痛便惡寒四支厥冷直至掌脛過乎肘膝不溫踈卧不渴或腹痛吐瀉戰慄向如刀刮口吐涎沫脉(沉)無力此爲陰症直中眞陰寒症不從陽經傳入謂之陰厥也理中四逆溫之。

陽厥者先自三陽氣分因感寒邪初病有頭痛有熱惡已後傳至三陰血分變出四支厥冷乍溫便實脉(沉)

(有力)此傳經熱症。謂之陽厥。卽陽症似陰也。外雖厥冷。內實熱耳。大承氣下之。

死生係反掌之間。脉藥可折肱而治。

楚辭云。三折肱。九折臂。而成醫。今傳又云。三折肱。知爲良醫。言三折肱而療之。乃爲良醫也。

因知風溫汗不休。當用漢防已。

後風溫可用
萎藥條同看

風溫尺寸俱浮。素傷於風。因而傷熱。風與熱搏。卽爲風溫。其症身熱自汗。頭痛喘息。發渴昏睡。脉浮。身重。漢防已湯。發汗復身灼熱。亦名風溫。知母葛根湯。

不口喜矣

則譖語煩燥。

誤汗風溫防已黃芪湯。

胸痞利不止。宜服禹餘糧。

服湯藥利不止。心下痞硬。甘草瀉心湯。生姜瀉心湯。

他藥下之利不止。醫者以理中與之。利益盛。理中者。理中焦也。此利在下焦。宜赤石脂禹餘糧湯。又不止。利小便。五苓散。

便五苓散

併病歸于一經邪不傳兮表解卽愈。

併病者。始于二陽。合病後。併于一經。又有一陽經先病。

又過一經傳者爲併病。且如太陽陽明併病一証。若併而未盡。是傳未過。尚有太陽表証法。當汗之。以麻黃桂枝各半湯。若併之已盡。是爲傳過陽明法。當下之以承氣湯。若併于少陽法。當和解以小柴胡湯。戰汗分爲四症。陽勝陰兮。熱退身涼。戰者陰陽相爭。正氣欲復。邪氣欲出。邪與正爭。其人本虛。是以發戰。

戰汗四証。

有戰而汗出而解者。有振慄作寒汗出而解者。有

不戰汗出而解者。有蒸_匕發熱汗出而解者。病有
戰而汗得解者。其脉浮而緊按之反_芤。此人本虛。故當
戰而汗出也。何者。其人本虛。故當發戰。脉浮故當汗出
也。病有不戰汗出而解者。其脉浮而數按之不_芤。此
人本實。以正勝邪。作戰不成。但汗出而解矣。病有振
慄而汗者。太陽病未解。脉陰陽俱停。雖劇當愈。必先振
慄汗出而解矣。陽脉微者先汗出而解矣。陰陽俱停。謂
無偏勝也。寸關尺大小浮沉遲數同非也。脉微者是胃
氣回不再受邪也。病有蒸_匕振汗者。小柴胡証具而

以他藥下之。柴胡証仍在者。復與柴胡湯。此雖已下之。不爲逆。得湯必蒸。而振發熱汗出而解矣。
咳逆者。羌活附子。

咳逆者。俗謂吃忒是也。氣自臍下直衝于胸。嗌間而上。氣逆也。其症纔發聲于喉間。則遽止。吼吼然連續數聲。然短促而不長。古人謂之噦者。非也。此由誤用涼藥過多。冷極于下。迫其相火。火上冲于胸。而爲吃忒。病人煩燥。自覺甚熱。他人按其肌膚則冷。此爲無根失守之火。散亂爲熱。非寔熱也。乃水極似火。陰証類陽也。治用

卷活附子湯急溫其下。真陽既回則陰火乃降。吃忒漸止也。

腹痛者桂枝大黃。

本太陽病表邪未罷。醫反下之。乘虛傳于太陰。裏氣不和。小腹滿而時痛。桂枝加芍藥湯。小寔小滿而痛者。桂枝加大黃湯。易老云此非本有是症。由其誤下。邪傳于胃故也。沉數而洪者裏寔也。大柴胡和之。浮數而洪者表裏俱寔也。桂枝加大黃湯和之。

微虛相搏則爲短氣。

陽脉微浮而緊緊爲寒微爲虛微虛相搏則爲短氣短氣者呼吸短促不足以息也大抵腹濡滿而短氣者邪在表爲虛也桂枝湯腹痛滿而短氣者邪在裏而爲實也大柴胡湯小承氣湯

勞食再復乃成內傷

病新差後勞力再復熱實者麥門冬湯虛者補中益氣湯

病新差後勞食再復熱實者枳殼枝子大黃湯虛者藿香正氣散

陽明背惡寒而唇口燥。懸知白虎爲最。

背負陽而腹抱陰。背惡寒。此乃陽氣弱而陰氣乘于陽也。必兼口燥者。用人參白虎湯。

少陰身體痛。口筋肉惕。乃聞真武至強。

內經云。陽氣者。精則養神。柔則養筋。發汗過多。筋肉失養。故矐然而跳。惕然而動也。非溫經助陽之藥。何有愈乎。

應發汗而腹中左右有動氣者。不可汗。汗則筋肉惕。

並用真武湯。羸人去芍藥。有熱去附子。並加人參當歸。

若發汗過多而惕者。用人參當歸白芍半夏白茯苓
作劑。以靈脂爲佐。入生姜烏梅煎服。生血養筋。其牖自
止。或大便硬。加大黃以導之。血脈一和。不反掌而安矣。
將欲發黃。先出頭汗。

頭汗出至項而還。發黃症也。茵陳湯。

始因火迫。終至亡陽。

傷寒症。若汗未至。以火迫取汗。以致亡陽。柴胡龍骨牡
蠣湯。辰砂五苓散。朱砂安神丸。

渴欲飲水。水入卽吐者。五苓散。

飲水即吐者名水逆。

小便不利者五苓散。大便不利身熱煩渴者大柴胡湯。

二便如常身熱而渴者竹葉石膏湯。

燥欲漱水水入不下者犀角湯。

陽明症水不欲嚥者內有瘀血故也。有瘀血畜血二症。

陽明有表症口燥欲漱水水入不咽者必衄黃芩芍藥湯。

一云犀角地黄湯

陽明無表症。口燥欲漱水。水入不咽者。此畜血如狂症。輕則犀角地黄湯。甚則桃仁承氣湯。

况乃大青龍兼理風寒。

熱盛而煩。手足自溫。脉浮而緊。此傷風証。見傷寒脉也。不煩少熱。四肢微厥。脉浮而緩。此傷寒証。見傷風脉也。二者榮衛俱傷。法用大青龍湯。

然亦不可輕用。必須風寒俱盛。又加煩燥者。方可與之。假令証脉未明。又不若用九味羌活湯之爲猶穩也。

小承氣正蠲潮熱。

微實者。小承氣合小柴胡湯。大滿實者。大承氣合大柴胡湯。

次用小柴合小陷胸湯。加枳殼桔梗。

不得眠而煩燥甚。鷄子入於黃連。

煩燥者。心熱則煩。腎熱則燥。燥者熱之甚也。一云火入于肺則煩。火入于腎則燥。煩燥俱在上者。腎子通于肺母也。

少陰病脉沉而實。厥冷自利。煩燥不得眠者。黃連鷄子

湯。脉沉而濡者。人參三白湯。

太陽煩燥者。大青龍加枝子黃芩。

陽明煩燥者。白虎湯加枝子黃芩。

少陽煩燥者。小柴胡湯加枝子大青。

表熱煩燥者。雙解散。裏熱煩燥者。大柴胡湯。

表裏俱見者。通聖散。

但有熱而嘔噦頻。姜汁加於竹葉。

凡有熱而嘔噦及嘔而渴。常欲飲水。水入卽吐者。竹葉

石膏湯加姜汁。便秘者。大柴胡湯加石膏。家葛知母

麥門冬、淡竹葉或小柴。本草謂熱嘔者加烏梅爲良。

一七瓜蒂散吐傷寒中脘痰涎。

瓜蒂乃絲瓜蒂也俗名藤蘿

中脘痰涎宜瓜蒂散或瓜蒂豆豉枝子瓜萆常山半夏
桔梗甘草煎服以手探吐次用小柴胡湯合小陷胸湯
爲良。

三物菴花湯理少陰下利膿血。

少陰病脉沉濡四支厥下利膿血宜三物菴花湯次用

四君合四物湯去甘草熟地加肉桂粟米名胃風湯却
以黃連茱萸同以酒浸炒各揀開若微有熱更加茱萸

炒黃連微有寒却以黃連炒茱萸爲良。膏粱積熱者。
宜清胃散。

厚朴半夏治腹脹爲偏宜。

太陽已汗表解而腹脹者厚朴半夏甘草人參湯。太陽
未汗表未解而腹脹者桂枝湯加厚朴枝子。病後腹脹
者桔梗半夏湯。合枝子厚朴湯。腹脹大便不通者小
承氣湯。小便不通者五苓散。

二便不通者涼膈散加枳殼木通。

葱白麻黃理頭痛爲至截。

已汗不解。頭痛如破者。葱白葛根湯。連翹葱白湯。太陽
頭疼麻黃湯。陽明頭疼。白芷石膏湯。少陽頭疼。小
柴胡加川芎。三陽俱頭疼。前三方合而用之。

調溫毒可用黑膏。散赤斑當行紫雪。與前班爲
熱熾同看

發斑有二症。一曰溫毒。卽冬月感寒。至春發。或失于
汗下。或汗下不解。毒氣不散。故發斑也。

曰陽毒。卽熱病。乃冬溫。暖感乖厲之氣。遇春熱而發
斑。二者慎不可汗。誤汗增斑爛也。輕則爲疹子。重
則爲斑。脩載前班爲熱熾條。此不再述。溫毒發斑。黑膏

主之。通用人參羌活散加防風荆芥黃芩赤芍玄參升麻蟬蛻紫草生地或磨石硃服之其效如神。

陽毒發斑紫雪主之。傷風傷寒有熱發斑者雙解散。

去麻黃加玄參知母升麻及荆防敗毒散加知母石膏黃芩赤芍玄參升麻或升麻葛根湯加知母石膏玄參黃芩連翹枝子黃連生地三方選用。

吐血者須煎黃連栝皮。

吐血諸陽受熱其邪在表當汗不汗致使熱毒入臟積瘀于內遂成吐血也。胸腹急滿大便黑小便數皆瘀。

血症。熱毒入深。吐血者。栝皮湯。犀角地黃湯。黃連阿膠湯。三黃瀉心湯。

經日。脈桂枝湯吐者。其後必吐膿血。犀角地黃湯。加黃芩。黃連。炒枝子。大黃。鬱金。側柏葉。藕節。生地。

咽痛者。通用猪膚甘桔。

咽痛者。咽喉不利。熱毒上衝也。經曰。太陽病下之。脉紫者。咽痛。以太陽之邪。轉于少陰也。何也。少陰之脉循喉嚨。挾舌本故也。通用猪膚湯。甘桔湯。主之。後却以荊防敗毒散。合升麻葛根。加玄參。黃芩。青木香。

三物白雖云頗峻散結胸寒實中焦

此渴多渴而熱者爲熱實結胸宜大陷胸湯或以大柴
合承氣湯加桔梗甘遂貝母爲穩無熱不渴者爲寒
實結胸宜三物白湯及枳實理中丸

十棗湯固非泛常治痞滿痛連兩脇

心下痞硬脇滿乾嘔短氣汗出不惡寒用十棗湯或以
大柴胡加桔梗青皮炒枝子

加以大熱錯語呻吟乾嘔者黃連解毒

傷寒已得汗解因飲酒後劇煩悶錯語呻吟乾嘔不得

有
卧。宜黃連解毒湯。或合小柴胡及白虎湯。

脉遲。熱多寒少。血弱者。黃耆建中。

傷寒似瘧。乃有此症。宜黃芪建中湯。或柴胡桂枝湯。加當歸芪朮。

汗之過多。動悸而惕。

汗爲心液。汗多則心空而動惕。宜小柴胡合溫膽湯。加茯神遠志酸棗仁麥門冬。當歸。

下之先時。懊懣在胸。

懊懣者。心中懊懣也。鬱悶不舒之貌。蓋由表未解而誤下。

之。引邪胸中。故爲懊憹。甚則爲結胸也。

熱在心胸則宜吐。熱結胃腑則宜下。此又不可不知也。
心胸懊憹。以枳子豉湯微吐之。或柴胡枳桔湯加枳子
香豉。

旋覆代赭。理心痞而噫不息。

噫。飽後出息也。傷寒汗吐下後。心下痞。乃有此症。旋覆
代赭湯。

桂麻各半。瘥身癢而汗不通。

太陽病。面有熱色。表未解。未得汗也。故身癢。宜麻黃桂

枝各半湯。若血虛挾風身癢者，四物湯加羌活防風酒浸黃芩煎調，紫浮萍效。

勞復身熱湯名殺鼠糞。

女勞復者，傷寒瘥後交接淫慾，自病復發者，名女勞復。陰陽易者，如換易之易，傷寒病瘥後而交接淫慾，邪毒之氣交相換易，無病者反得病，故名陰陽易也。

女勞復與陰陽易不同，而治法同。通用燒裊散殺鼠糞湯，或合小柴胡湯加麥門用竹茹。或單竹茹煎服，或以柴胡青皮荔枝核爲末，以竹濃煎湯調下。

腸垢臍熱藥用白頭翁

腸垢協熱而引臍下熱。宜用白頭翁湯。或五苓散加解毒湯。

疫癘者。春夏秋冬各有法。用須十全九症

疫癘者。乃時行不正之氣。春應煖而反大冷。夏應熱而反大涼。秋應涼而反大熱。冬應寒而反大溫。非其時而有其氣。是以一歲之中。長幼之病多相似。此卽疫癘也。難經曰。上工者。十全九症各有治法。通用人參敗毒散。升麻葛根湯。隨加減。經云。春感清邪在肝。神

木鼓加紫蘇柴胡。或升麻葛根湯。夏感寒邪在心。三香散加細辛獨活。或調中益氣湯。秋感熱邪在肺。柴胡升麻湯。加白芷。葱白。感濕白虎湯。加蒼朮。發黃茵陳五苓散。冬感溫邪在腎。名曰冬溫。九味羌活湯。加桂枝獨活。

百合者。行住坐卧皆不定。號爲百脉一宗。

百脉一宗。舉身皆病。不能行住坐卧。似寒似熱。藥入卽吐。有如鬼神。俱用百合知母湯。百合地黃湯。滑石代赭湯。百合洗方選用。

嘗謂多眠身猶灼熱風溫可用萎蕤

與前風溫汗不併條同看

此名風溫病在少陰厥陰二經萎蕤湯及人參敗毒散葛根龍膽湯小柴胡湯選用未醒者柴胡桂枝湯

發汗後身熱復灼熱用知母葛根湯

不眠心蘊虛煩歛汗必須酸棗

陽虛多眠陰虛不眠夫夜以陰為主陰盛則目閉而卧安若陰爲陽所勝故終夜煩擾而不得眠所謂陰虛則夜爭是也汗吐下後晝夜不得眠心蘊虛煩有汗者酸棗湯有熱者合小柴胡湯有痰二陳合小柴加炒枝

黃連麥門冬酸棗茯神遠志。

手足攣搐當求牛蒡根。

汗出時蓋覆不周致腰背手足搐搦牛蒡根散及人參
羌活散加防風荆芥牛蒡根。風邪所勝小續命湯加
羌活獨活鈞鈞藤。

咳嗽生痰宜行金沸草。

咳嗽生痰金沸草散加黃芩杏仁風化硝桔梗枳殼。

若

邪則防敗毒散加芩連杏仁瓜蒌。

不可汗本有數種動氣與風濕脉虛。

不可汗本有數種。脉（遲弱虛細）。動氣。婦人經癸
適下。亡陽。咽中閉塞。咽喉乾燥。風溫。濕溫。
溫毒。陽毒。發斑。瘡家。淋瀝。衄血。邪盛
於裏。中濕。

不可下自非一端。動氣與陽浮在表。

不可下自非一端。脉（虛細浮大）。咽中閉塞。嘔吐。

結胸。短氣。動氣。邪盛于表。

濕症不可汗傷。

中濕。風濕。濕溫。

霍亂多緣熱腦。

霍亂者。上吐下利。多因天暑地沸。陰陽揮霍而撩亂也。乃邪氣飲食所傷。邪在上焦吐而不利。邪在下焦利而不吐。邪在中焦既吐且利。胃氣爲邪氣所傷。陰陽乖隔故也。

有乾霍亂。濕霍亂之異。乾霍亂者多死。濕霍亂者多生。濕霍亂者上吐下利。則所傷之物得以泄出故生。若乾霍亂則上不得吐。下不得利。所傷之物不得泄出。壅閉正氣。陰陽懸隔。喘脹而死。其或用吐法。或有

可生之理也

吐利交作。熱多而渴者。香薷散。五苓散。

口渴而煩者。竹葉石膏湯。

口渴而厥者。白虎湯加人

參。

口不渴而四肢厥者。理中湯。蘇合香丸。或六和湯。

藿香正氣散。

吐利交作後發熱腹疼。口渴欲水。水入卽吐卽利。吐利

不休而吐利反無所出者。此陰陽不和也。煎陰陽湯。時

時少呷之。屢效。

溫病發於春夏。要須柴葛以解肌。

溫病者多發於春三月夏至前是也。

微熱者升麻葛根湯。解肌湯。微熱不渴者小柴胡湯。

加桂枝。脉實煩渴大便難者大柴胡湯。虛煩者竹

葉石膏湯。俱用羌活湯解之爲當渴加知母石膏。

奔豚協逐寒邪多用桂苓爲可保。

傷寒或因燒針腎氣逆上發如奔豚從小腹上衝心者。

此寒邪協逐也。桂枝加桂湯。或發汗後動悸欲作奔

豚者茯苓桂甘大棗湯。有熱者小柴胡湯加炒枝枳

實山查清水香青皮川練子小茴香荔枝核竹茹。

蓋聞乍寒微熱名似瘧不嘔清便必自愈

或一日一發或兩三發此名似瘧不嘔清便者此邪在表也桂麻各半湯熱甚合小柴嘔吐合二陳二
七日後症候少減邪氣已衰兼以祛瘧丸間服寒熱乃
止若久而胃氣弱者難以截之又當以壯胃為主
臍痛引陰名臍結下利白胎不可醫

狀如結胸時自下利舌上白胎臍疼引陰筋者名臍
結死不治

口燥咽乾雖少陰下不可緩

少陰之病。二三日口燥咽乾者。急下之。大承氣。小承氣。大柴胡。涼隔散之類。如大便不實。只以涼隔散和之。尤穩。

肉瞶筋惕。發動氣汗。以致羸。

經曰。動氣在左。不可發汗。發汗則肉瞶筋惕。以八物湯。去地黃。白朮。加半夏。靈脂。生姜。烏梅。有獨手足掣動者。此肝木侮脾土也。宜補中益氣湯。人參。羌活。散並可。加釣鈎。籐。

陽明與少陽合病。脉弦者。名曰負。

陽明與少陽合病。脉(長)者爲順。脉(弦)者爲負。負者死。蓋(弦)者少陽之脉也。少陽屬木。陽明屬土。少陽之木尅陽明之土。此賊邪所勝。不可治也。

傷寒與熱病將痊。食多者號曰遺。

與字當作爲字。內經云。人之傷於寒者。則爲熱病也。

此遺字註解多不同。活人註謂便不禁也。或云遺者亡也。其人必下利不禁也。此皆非是。余謂遺者。如以物遺人之遺。卽司馬光所謂積德以遺後人之遺是也。內經帝曰。熱病當何禁之。岐伯曰。熱病少愈。食肉則復。多食

則遺此其禁也。言傷寒爲熱病。當少愈之時。邪氣未盡去。胃氣未盡。復食肉多食。在所禁也。如或不禁。則反助邪氣。肉食者。其後復病。多食者。其後遺病。將痊而不得痊矣。余見病後食肉而復病者。多食而復病者。往往有之。

自汗有風溫濕溫。若亡陽則未附可用。

風溫濕溫不宜汗。汗多曰亡陽。發汗後汗不止曰亡陽。太陽桂枝誤投麻黃。汗不止曰亡陽。尺寸脈緊主無汗。反有汗曰亡陽。陰病無汗。反有汗曰亡陽。

房勞得病服麻黃汗不止日亡陽並宜朮附湯合黃芪建中湯加當歸人參。

身痛有表症裏症若陰毒則四逆尤遲。

○按陰毒添青厥逆同看

太陽身痛表証也麻黃湯九味羌活湯可發汗而愈。

陰毒身痛裏症也陰毒乃中陰之寒証身疼如被杖厥逆下利內實真寒也卽用四逆湯回陽救急湯猶恐其遲矣。

脾約者大便難而小便數治用大黃枳殼。

太陽病發汗過多大利小便胃中燥大便難小便數此

表解裏病其脾爲約老人津液少大便澀亦名脾約宜
脾約麻仁丸作湯亦可

協熱者小便澀而大便利須用黃連當歸

經云諸出爲虛大便利大腸虛也小便澀小腸實也此
因虛挾熱而利白頭翁湯或五苓散加黃連當歸下利
不止者赤石脂丸

嘔吐有寒有熱寒則當溫熱當以解

嘔吐有熱者寸口脉(數)手心熱煩渴而吐熱在胃脘也

五苓散加家葛人參麥門冬

嘔吐有寒者。曾經汗下。開脉(遲)胃中虛冷而吐也。乾姜黃連黃芩人參湯。

譫語有虛有實。實則可下。虛不可爲。

經曰邪氣盛則實。精氣奪則虛。故實則譫語。虛則鄭聲。譫語者。語出無倫也。蓋心中熱盛則神識昏迷妄有所見而言也。此譫語也。對鄭聲言。則譫語爲實。以譫語言。則譫語自有虛實之分。大抵熱入於胃。水涸屎燥而譫語爲實也。諸承氣湯選用之。有被火劫而譫語者。有下陽譫語者。有下利清穀不渴而譫語者。皆爲虛也。

或柴胡桂枝湯白虎湯解毒湯小柴胡湯選用之。又有瘀血狂言譫語者。煩人熱入血室譫語者。

鄭聲者鄭重之音也。本音失而正氣虛乃精氣奪之候也。不治。或用小柴胡湯。

陽毒則狂斑煩亂以大青升麻可迴困篤。

與前散赤斑當行紫雪同看與

前發狂爲血
毒于內參看

陽毒者乃熱病之極脉洪而實乃發狂斑爛煩亂也。青

黛一物湯升麻葛根湯犀角大青湯大青四物湯硝黃

解毒湯。

陰毒則唇青厥逆以正陽甘草或拯顛危

頃前若陰毒則四逆猶違同看

陰毒乃中陰之寒症也脉(沉)(遲)(細)欲絕則唇青厥逆用正陽湯陰毒甘草湯回陽救急湯

發厥時胸煩猶甚此臟氣厥而精神散

發厥時膚冷而煩燥不已此乃陰勝于陽物極則反也此名臟厥不治

評熱論云發熱脉躁狂言不能食謂之三死

活人指掌賦總論

是賦也自結胸至陰陽離皆雜病也余固不能悉具且

如風溫溫溫果傷寒乎。非傷寒則爲雜病。固不待辯。其間有失汗誤汗。失汗誤下。以傷寒而變爲雜病者。則亦雜病而已。奚問傷寒之六經。余故曰。活人指掌一賦。以傷寒六經列之于首。而內以雜病實之。此之謂也。

嗟夫生死之閑。陰陽是主。陽脉見于陰經。其生也可知。陰脉見于陽經。其死也可許。

大抵傷寒之病。邪在表則見陽脉。邪在裏則見陰脉。

陰病見陽脉則生也。邪氣自裏出表。欲汗而解。如厥陰中風脉微浮爲欲愈也。陽病見陰脉則死也。邪氣自

未入裏。正氣虛而邪氣勝。如譫語脉沉細者死也。金匱所謂諸病邪出外者可治。入裏者不可治。卽此義也。土衰水旺則爲賊。能無尅制之災。

少陽陽明合病。脉當長而弦。少陽膽木也。陽明胃土也。陽明脉不旺。獨見弦急之脉。此木尅土也。爲鬼賊之脉。名曰負。負者。相負也。不治。

水升火降則爲和。會見歡欣之舉。

水屬腎。火屬心。病將愈。心火下降。則手足溫而外無熱。腎水上升。則精液生而精神回。此生意復回效也。故曰

會見歡欣之舉。

緣傷寒傳變之不常。非雜病徑直而可取。是用潛養心補
洞窺臟腑。推惻隱之端。以濟乎今。拯疲癯之疾。以遵乎古。
庶幾可登仲景之堂。不負乎諄諄之語。

新刻傷寒活人指掌補註府刻方九卷之三

邵武縣學訓導 童養學壯吾父 輯方

木庠 余 璟景玉父 較閱

藥方

此藥得之古方古今分兩輕重不同不宜同施醫者要自變通

大陷胸湯 治汗下後不大便大結胸從心至小腹脹滿

痛不可近脉沉(緊)滑(數)

大黃 參錢 芒硝 參錢 甘遂 五分

右剉分二服水煎

大陷胸丸 治發熱下之大早熱入因作結胸者項亦強

如柔瘕狀下之則和也

大黃

伍錢

芒硝

貳錢五分

杏仁

拾貳隻去皮尖

葶藶

叁錢微炒

右大黃爲末下葶藶杵羅研杏仁硝如泥和丸彈大每

服一丸入甘遂末少分白蜜半匙水一鍾煮溫服以利

爲度

小陷胸湯 治小結胸心下按之疼脉浮而滑

半夏

四錢湯洗

生姜

貳錢

黃連

貳錢

栝蒌實

伍錢剉其壳子不剉

右水三鍾煮栝蒌汁鍾半納藥至一鍾絞汁溫服以微

吐黃涎爲愈

三物白散

治傷寒實結胸

貝母

桔梗

各參錢

巴豆

壹錢

右二味爲散，納巴豆研和，以白飲和服，強人五分，弱人減之。

枳實理中丸 治傷寒曾經吐利後，胸痞欲絕，膈高起急，痛不安者。

枳實

茯苓

人參

白朮

乾姜

甘草

炙各等分

右爲末，蜜和一兩，作四丸，米湯下。渴加栝蒌根利加

牡礪。

小半夏茯苓湯 治水結胸。

半夏 伍兩 茯苓 叁兩

每服八錢水一盞半煎至一盞入姜汁更煎一二沸熟服。

半夏瀉心湯 治心下痞滿軟而不痛。

半夏 貳錢 甘草 叁錢 黃芩 貳錢 乾姜 貳錢 人參 貳錢

黃連 壹錢

右姜三片棗二枚水煎服。

三黃石膏湯 治傷寒身熱煩燥不得汗脉洪大四五日
不便發狂者表裏俱熱也

黃連

黃芩

黃柏

各貳錢

麻黃

壹錢自汗者去之

石膏

伍錢

香豉

叁錢

右水煎服。

柴胡桂枝湯

治傷寒發熱脉弦自汗或渴或利此太陽

例少陽經藥也。

桂枝

貳錢

黃芩

人參

白芍

各四錢

甘草

炙壹錢

半夏

柴胡

各壹錢

右棗二枚姜三片水煎服。

犀角地黄湯

犀角

白芍各錢

牡丹皮

生地

酒浸各壹錢

右爲末每服四五錢水煎服。

桃仁承氣湯

治瘀血在裏。

大黃

四錢

桃仁

叁錢

桂枝

芒硝

各貳錢

甘草

壹錢

右水煎服。

五苓散

治中暑煩渴身熱頭痛霍亂瀉泄小便少心神

恍惚

猪苓

澤瀉

各壹錢

白朮

茯苓

各壹錢半

肉桂

五分

右水煎服。

瀉肺湯

治肺實胸滿。上氣喘逆。身體面目俱浮腫。

葶藶

叁錢

大棗

拾枚

右水煎服。

麻黃杏仁甘草石膏湯

治汗下後。汗出而喘。身無大熱者。

者。

麻黃

叁錢

杏仁

壹錢半

甘草

壹錢

石膏

伍錢

右水煎服。

滾痰丸 治千般怪症如神。惟孕婦產後禁服。

大黃

酒蒸

黃芩

各八兩

沉香

伍錢

礞石

壹兩同礞石貳兩搗碎入小碓內以

鉄物片蓋之鉄線縛定鹽泥固濟晒乾火煨通紅候冷取出

右爲細末水丸如菉豆大每服四五十九量虛實加減一方加硃砂貳兩研細爲衣

小青龍湯

治太陽表未解心下有水氣乾嘔發熱而欬

或嘔或喘

麻黃

芍藥

細辛

乾姜

甘草

桂枝

各壹兩

五味

半夏

各八分

右水三鍾。先煮麻黃去上沫。再納諸藥煎溫服。

竹葉石膏湯 治陽明汗多而渴。欲飲水。水入卽吐。

石膏

貳錢

麥門冬

去心

半夏

各壹錢

青竹葉

五片

人參

甘草

各壹錢

右生姜三片。粳米百餘粒。水煎服。

薤仁湯

治傷寒不發汗。變狐惑。唇瘡。聲啞。

薤仁

槐子

艾

各五錢

棗

十五枚

水二大鍾。半煎至一盞。半分二服。

黃連犀角湯

治狐惑

黃連

五錢

烏梅七個

木香

壹分

犀角

壹兩如無以升麻代之

右水煎服。

雄黃銳散

治狐惑症。重食上下者金宜。

雄黃

青箱子

苦參

黃連

各壹兩半

桃仁

壹錢

右爲末。生艾搗汁和如小指尖大綿裹納下部肛門內。

遇僊丹

治停積腹脇脹滿。水腫氣滯等証。

黑豆

貳兩

茵陳

七錢

枳櫚

莢木

各貳兩

皂角

木香

各叁錢

青皮

五錢

萊頭子

炒貳兩

右爲末。煎萊頭子湯。打糊爲丸。如桐子大。每服七十九

白湯下。

乾姜理中湯

本方內去甘草加烏梅川椒名安蛇散。

升麻犀角湯 治胃經風毒氣血凝滯麻痺不仁鼻衄牙痛。

犀角

七分半

升麻

白芷

防風

川芎

白附子

羌活

黃芩

各五分

甘草

壹分

右水煎服。

小續命湯 二症通用。

麻黃

人參

黃芩

白芍

甘草

炙

川芎

白朮

防杞

肉桂

各參錢

防風

四錢

附子

五錢生用
去皮臍

右水煎服。

桑瘧自汗。去麻黃。劉瘧無汗。去附子。

玄參升麻湯

治發斑咽疼。

升麻

玄參

甘草

各五分

右水煎服。

人參敗毒散

治疫癘四時通用。

柴胡

甘草

炙

桔梗

人參

羌活

芎藭

茯苓

枳殼

前胡

獨活

并分

每服三錢。水一盞。姜三片。薄荷少許。同煎溫服。

黃芩芍藥湯

黃芩

芍藥

各壹兩

甘草

五錢

右每服五錢煎服。

防風通聖散 又名雙解散。

防風

川芎

白芍

當歸

大黃

薄荷

麻黃

連翹

芒硝

各五錢

石膏

黃芩

桔梗

各壹兩

滑石

甘草

各三兩

荆芥

白朮

枝子

各三錢半

右爲末，每服三錢，水一盞，生姜三片，煎溫服。

生地芩連湯

生地

川芎

當歸

各七分

赤芍

山枝

黃芩

黃連

各三分

防風

式分

右水煎服

當歸四逆湯 治下之厥逆。

當歸

桂枝

芍藥

細辛

各壹兩

甘草

通草

各六錢
式字

一方加茱萸

三錢

生姜

六錢

水六鍾煎取三鍾分三服。

黑錫丹 治痰氣壅塞上氣下虛心火炎熾腎水枯竭及婦人血海久冷或赤白帶下並宜服之。

肉桂

去粗皮半兩

肉豆蔻

麩暴

葫蘆芭

酒浸

破故紙

炒

蒲香

船上一者妙妙

陽起石

研細水飛

金鈴子

蒸去皮核

木香

沉香

附子

炮去皮臍各壹兩

硫黃

黑錫

用硫黃炒成砂子各貳兩

右用鉄盞或新鉄銚內如常法結黑錫硫黃砂子地上出火毒研令極細餘藥並杵羅爲末一處和勻自朝至暮必研令黑光色爲度酒糊爲丸如桐子大陰乾入布

袋內擦令光瑩。每服四十粒。空心鹽姜湯下。女人棗湯下。

漢防杞湯 治姙娠通身浮腫滿如水氣喘促不利俗呼爲琉璃腫是也。

防杞

貳錢七分

桑白皮

赤茯苓

紫蘇

各叁錢大分

木香

九分

右作二貼水煎服。

知母葛根湯 治風溫身灼熱。

知母

壹錢半

乾葛

四錢

石膏

叁錢

萎蕤

貳錢半

甘草

木香

升麻

黃芩

南星

羌活

麻黃

各壹錢

右水煎服。

防已黃芪湯

治諸風諸濕。

防杞

黃芪

各貳錢

白朮

壹錢半

甘草

七分

右水一鍾姜三片棗一枚煎服。

甘草瀉心湯

治傷寒傷風醫反下之下利日數十行。穀

不化腹鳴。心下痞滿乾嘔心煩。

半夏

貳錢半

甘草

四錢

黃芩

各貳錢

乾姜

各貳錢

黃連

壹錢

人參

各錢五分

右姜三片。水一鍾。棗二枚煎服。

生姜瀉心湯。治汗出後。胃中不和。心下痞。噫氣食息。或
膈下有水氣。腹鳴泄瀉。

生姜

半夏

各錢

人參

乾姜

黃連

甘草

各壹錢

黃芩

五分

右棗二枚。水煎服。

赤石脂禹餘糧湯。治心痞硬。

赤石脂

禹餘糧

各錢

右水煎服。

麻黃桂枝各半湯 治傷寒見風脉發熱自汗或無汗。

桂枝

貳錢

杏仁

拾壹隻

生姜

甘草

炙

白芍

麻黃

各壹錢

右棗二枚水煎服 按此足太陽手太陰手少陰經藥。

出太陽例治風寒之劑也。

羌活附子湯 治陰症內寒厥而嘔逆。

乾姜

壹兩

茴香

羌活

丁香

各五錢

附子

生去皮剉細切

一枚

右每服三錢水一鍾煎食前溫服。

桂枝加芍藥湯 卽建中湯

桂枝 叁錢 芍藥 四錢 甘草 壹錢

右姜三片。棗一枚水煎服。

桂枝加大黃湯

桂枝 六錢 白芍 四錢 甘草 貳錢半 大黃 貳錢

右姜五片。棗二枚水煎服。

麥門冬湯 治寒前後發熱。

麥門冬 各貳錢 甘草 壹錢 竹葉 十五片

右粳米湯一盞棗二枚水煎服

補中益氣湯

黃芪

壹錢

甘草

炙

人參

升麻

柴胡

陳皮

當歸身

白朮

各叁分

右水煎溫服。

枳殼枝子加大黃湯

治食後發熱。

枳殼

壹枚

肥枝子

叁枚

豆豉

壹兩

大黃

如梧子大五六枚

右水煎服。

藿香正氣散

治傷寒頭疼。胸中作熱。上喘咳嗽。及胃嘔。

惡氣泄瀉霍亂山嵐瘴氣

大腹皮

白茯苓

白芷

各壹兩

白朮

甘草

炙

厚朴

半夏

湯泡七次

桔梗

紫蘇

各貳兩

藿香

陳皮

各叁兩

右姜三片棗一枚水煎熱服。

人參白虎湯

治發熱自汗表虛者。

石膏

五錢

甘草

七分

人參

壹錢

知母

貳錢

右水煎服。

真武湯

治陰症脉沉

身痛發汗過多筋惕肉瞤少陰腫

痛小便不利。

白茯苓

白芍

生姜

白朮

各壹兩

附子一枚

右水煎服。欬者加五味細辛乾姜。小便利者去茯苓。下利者去芍藥。加乾姜。嘔者去附子。加乾姜。

柴胡龍骨牡蠣湯 治傷寒八九日。下之胃滿。小便不利。

譫語。火邪驚狂。身痛等証。

柴胡

壹兩

龍骨

桂枝

鉛丹

人參

黃芩

茯苓

牡蠣

生姜

各五錢

半夏

四錢

大黃

六錢

大棗

六枚

右水煎服。

辰砂五苓散 治傷寒表裏未解及瘧瘧煩悶諸熱。

辰砂

白朮

猪苓

澤瀉

各壹兩

肉桂

六錢

赤茯苓

壹兩

右為細末每服二錢沸湯調服中暑煩悶小便赤澀新水調下。

硃砂安神丸 治勞神過度以致心神煩亂怔忡兀兀欲

吐氣亂而熱似懊憹狀。

黃連

生地

當歸身

甘草

炙各壹錢半

硃砂

一錢另研爲衣

右爲末蒸餅丸黍米大每服十五丸或二十九唾津下。

大青龍湯

麻黃

三錢

桂枝

式錢

杏仁

一錢半

石膏

四錢

甘草

一錢

右姜三片棗二枚水煎服。

黃連鷄子湯

卽黃連阿膠湯

治少陰煩燥不得卧下

利濃血

黃連

一錢半

黃芩

阿膠

白芍

各一錢

右水一鍾煎熟去渣入阿膠令融化少溫入鷄子黃半

枚攪勻溫服。

人參三白湯 治太陽症誤下誤汗表裏俱虛以致鬱冒得汗自愈

人參

白朮

白茯苓

白芍

各一錢半

柴胡

三錢

川芎

一錢

天麻

五分

右水煎服

雙解散 治風寒暑濕飢飽勞役內外諸邪所傷以致氣血拂鬱變成積熱發汗雜病但覺不快便可用此通解小兒瘡疹此解尤快 自利去大黃芒硝自汗去麻黃

卽防風通聖散。

右水二鍾。姜三片。葱白一莖。豆豉一撮。去渣熱服。

通聖散 治身有惡瘡。或水洗。或薰。以致毒入腹而腫。本

方加金銀花升麻乾葛木通。

蒼朮

一斤 泔水浸

熟地

斤

五味子

半斤

乾姜

春秋用七分 炒冬用一兩

錢 夏五

右爲細末。煮棗肉爲丸。如梧桐子大。每服一百丸。米湯下。

瓜蒂散 治傷寒表症罷邪入裏結於胸中煩滿四肢微

厥脉微浮或大以此吐之亡血體虛者禁服

瓜蒂

炒黃即綠瓜蒂俗名蘇羅

赤小豆

等分

右爲末豆豉半合同水煎湯調服

柴胡桔梗湯

卽柴胡湯加桔梗

三物桃花湯

赤石脂

五兩三錢一半全用一半爲末

糯米

三合

乾姜

三錢

右水二升二合煮米熟去渣溫服二合半內赤石脂末

方寸

清胃散

治胃經膏梁積熱吐衄牙宣或唇口腫痛或上

下牙齦潰爛焮痛連及頭面惡寒發熱

黃連

炒一錢半

當歸

牡丹皮

地黃

各一錢

升麻

一錢

右水煎冷服。

厚朴半夏甘草人參湯

治汗後腹脹滿而痛。

厚朴

三錢

半夏

一錢

人參

一錢

甘草

五分

右姜三片水煎服。

桔梗半夏湯

治產後調和陰陽腰脹嘔逆。

桔梗

半夏

陳皮

各五分

右姜三片水煎服

枝子厚朴湯 治傷寒下後心煩腹滿

山枝

一錢半

厚朴

三錢

枳實

三錢

右水煎服得吐即止。

涼隔散

大黃

朴硝

甘草

枝子仁

黃芩

薄荷

各一兩

連翹

四錢

右爲末每二錢加竹葉蜜少許煎服。

葛根葱白湯 治已汗未汗頭痛

葛根

白芍

知母

各錢

川芎

六分

葱白

一握

生姜

六分

右水煎服

連翹葱白湯

治太陽已汗未汗。頭疼如破。

生姜

一兩

連翹葱白

十四莖

右葱姜共搗破水煎服。

白芷石膏湯

黑膏

治溫毒發斑嘔逆。

生地

六兩

淡豆豉

一兩

猪脂

十兩

右和勻露一宿煎至三分減一攄去滓入雄黃末五分麝香五分攪勻白湯下。從皮中出則愈矣忌蕪荑。

人參羌活散

羌活

獨活

柴胡

人參

白茯苓

川芎

枳殼

各參

前胡

桔梗

天麻

地骨皮

甘草

各一兩五錢

右加麻黃薄荷葱白煎服。

紫雪 治內外煩熱不解口中生瘡狂易叫走解諸熱

小兒驚癇百病

黃金

十兩

寒水石

石羔

各五兩已上用水煮去滓

甘草

錢八

青木香

沉香

丁香

各五錢

犀角屑

羚羊角屑

各壹兩

升麻

剉壹斤一兩六錢已上再煮至一斗八下藥

硝石

貳斤芒硝

亦可用此即不必朴硝

朴硝

四兩乾淨者已上入煎藥汁微火煎柳條不住手撓候有七斤撓放水巾

半日欲凝入下藥攪令勻

當門子

八煎藥撓

硃砂

各三錢

右藥成雪紫色每服一錢冷水調下食前服。

荆防解毒散

治一切風熱。

柴胡

甘草

炙

桔梗

人參

羌活

芎藭

白茯苓

枳殼

前胡

獨活

荊芥

防風

牛旁子

薄荷

各等分

右姜三片水煎服。

栝皮湯

栝皮

黃連

黃芩

各等分

右水煎服。

黃連阿膠湯

治傷寒熱毒攻胃流入大腸所下必紅赤

成流。

山枝

黃連

阿膠

黃栝

各等分

右水煎服。

三黃瀉心湯 治心下痞硬內實熱盛不大便。閉脉（浮者）可服。惡寒者勿服。卽附子瀉心湯去附子。

大黃

三錢

黃芩

黃連

各壹錢

右用百沸湯浸之以物蓋定。候一飯久稍冷。去滓溫服。猪膚湯 治少陰下利咽痛。胸滿而煩。

猪膚

壹兩。膚者皮上之薄皮。各膚也。卽膚受膚見之膚。諸家之議非是。

右水一鍾煎至五分。入白蜜一合。白粉半合。熬香熟和勻服之。

甘桔湯

甘草

桔梗 各半分

一方加麻黃杏仁。

右水煎服。

十棗湯 治太陽中風下利嘔逆短氣不惡寒熱兼水腫

脹酒食積大小便不通小兒熱積諸毒。

芫花

漫火
變色

大戟

甘遂

各半分

右爲末水一鍾棗十枚切開煮取汁半鍾調藥末壯人
一錢半。弱人一錢。平旦溫服後以糜粥養之。

黃連解毒湯

黃連

壹兩

黃柏

活人書
用黃連

黃芩

各四錢

枝子

四枚

石水煎服。

黃芪建中湯 治傷寒身痛尺脉遲汗後身疼脉弱

黃芪

肉桂

各壹錢半

白芍

三錢

甘草

右姜三片。棗二枚。水煎去滓。入稠飴一大匙。再煎服。

溫膽湯 治心膽虛怯。觸事多驚。

半夏

枳殼

白茯苓

各五錢

橘紅

七分

甘草

炙

青竹茹

壹兩

右姜三片。棗二枚。水煎服。

枝子豆豉湯 治汗吐下後胸滿痛。頭微汗。虛者不眠。心

內懊憹乃燥熱拂鬱氣不宜通故也。

大枝子

七枚

豆豉

半合

右剉先煮枝子。再納豆豉絞汁服。

旋覆代赭湯 治傷寒發汗若吐下解後心下痞硬噫氣不除。

旋覆花

參兩

代赭石

壹兩

甘草

炙參兩

人參

貳兩

半夏

泡半斤

生姜

五兩

右大棗十二枚每服一兩水煎服。

四物湯

白芍

當歸

川芎

各式錢

熟地

各式錢半

右水煎服。

燒視散

取近陰處視襠一塊。方員四五寸。男用女視。女

用男襠。燒存性。溫水調服。

獾鼠糞湯

治男子陰易及勞役。

韭根

一大把

獾鼠矢

十四枚兩頭尖者是

右二味水煎溫服取汗。

白頭翁湯

治脇下熱下利後重而渴。

白頭翁

黃芩

秦皮

黃連

各壹錢

右水煎服。

二香散 治四時感冒冷濕寒暑嘔惡泄利瘴氣及南方風土暑月傷風。

蘇莖葉

陳皮

蒼朮

香薷

各壹兩

厚朴

甘草

扁豆

各五錢

香附

壹兩

右姜葱煎服。加木瓜二片更妙。

調中益氣湯

橘紅

升麻

甘草

柴胡

蒼朮

黃芪

木香

人參

各非分

右水煎服

柴胡升麻湯

治時行瘟疫壯熱惡風頭疼體疼鼻塞咽

乾痰盛咳嗽涕淫稠粘

柴胡

前胡

乾葛

荆芥

赤芍

石焦

炒各壹兩

升麻

五錢

桑白皮

黃芩

各六錢半

右每服五錢姜三片豉十余粒水煎熟服。

百合知母湯 治汗後

百合

七枚

知母

壹兩

右先以水洗百合漬一宿去白沫另水煎去滓又知母

利
另水煎去滓。汁勻再煎溫服。

百合地黄湯 治不經吐下者。

百合 七枚製法如前

右用地黃二兩搗汁一盞和百合汁再煎溫服大便當下如漆中卽止。

百合洗法

百合一升以水十盞漬一宿通身洗之洗已淡食將息弗與鹽豉。

葦蕤湯

葳蕤

式錢半

石羔

羌活

白薇

杏仁

青木香

川芎

甘草

各壹錢

麻黃

壹錢式分

葛根

式錢

右水煎服。

葛根龍膽湯

治風濕脉浮身重汗出。

石羔

萎蕤

各壹兩

葛根

二兩

生姜

升麻

大青

龍膽草

桂枝

甘草

麻黃

白芍

各五錢

右水煎服。

酸棗湯

治汗吐下後晝夜不眠。

酸棗仁

人參

各一錢半

石羔

一錢半

茯苓

知母

甘草

各壹錢半

桂心

伍分

右姜三片水煎臨卧服。

牛蒡根散

牛蒡子

十條

麻黃

牛膝

天南星

各六錢

右剉細於石盆內研細用好酒一升同研以新布摠取汁後用炭火半秤燒一地坑子內通赤去心掃淨投藥汁坑內再燒令黑色取出於乳钵內細研每服五分。

金沸草散

治傷寒咳嗽生痰

金沸草

前胡

各壹兩

半夏

伍錢

赤茯苓

大錢

赤芍

甘草

各叁錢

荆芥穗

壹兩半

右姜三片水煎服

香薷散

治吐利腹疼發熱頭痛或霍亂轉筋拘急

香薷

貳錢

白扁豆

厚朴

姜製

茯苓

各壹錢

右水煎冷服連進二三劑加黃連名黃連香薷散

蘇合香丸

治傳尸骨蒸肺痿卒心痛霍亂吐利時氣赤

白暴利瘀血月閉驚癇及小兒吐乳大人狐惑等証

白朮

青木香

硃砂

研水飛

烏犀屑

沉香

麝香

研

丁香

訶梨勒

煨取

息香

另為末用無灰酒并熬蒸

華撥

香附

白檀香

各三兩

薰陸香

另研即乳香

龍腦

研

蘇合香油

人安息香內各壹兩

右為末研勻用安息香膏并煉白蜜和劑每服旋丸如

梧桐子大取井水冷溫任意下四丸老人小兒每服一

丸酒下。中風痰涎壅上喉中有聲不能下者用青州

白丸子同丸生薑自然汁化下。產婦中風小兒驚風

牙關緊硬不開及不省者擦牙即開後以風藥治之。

小兒驚癇用生薑葱白自然汁化開白湯調灌。心腹

絞痛中滿嘔吐及傷風咳嗽姜蔥湯下。失志狂亂如見鬼者白湯下。

六和湯 治夏月霍亂轉筋嘔逆寒熱倦怠嗜卧伏暑煩悶小便赤澀或利渴中酒婦人胎前產後

砂仁 半夏 杏仁 人參 白朮

甘草 藿香 木瓜 厚朴 扁豆

赤茯苓 各等分

右姜棗水煎服。

陰陽湯

清泉水煎嫩湯半盞入清泉水半盞用茶匙時時少呷之甚效

桂枝加桂湯 治奔豚衝心

赤芍

生姜

壹兩半

甘草

壹兩

肉桂

六錢

桂枝

石水煎服

茯苓桂枝大棗湯 治汗吐下後東虛氣急逆上衝心腹

痞滿

茯苓

四錢

桂枝

三錢

白朮

二錢

甘草

一錢

大棗

五枚

右水煎服

祛癰丸

五月五日取獨蒜不拘多少。春爛入好黃丹并春乾濕
適均手搓爲丸如圓眼核大晒乾收貯。但瘡疾二三發
後臨發日鷄鳴時以藥一丸畧搗碎取并花面東服之。
八物湯 治血氣俱虛

人參 一錢

白朮

茯苓

白芍

當歸

川芎

各二錢

熟地

二錢半

甘草

六分

右姜三片棗一枚水煎服

木附湯

治風濕小便自利溫濕

白朮

六錢

甘草

二錢

附子

生薑

各五錢

右棗二枚水煎服。

脾約麻仁丸

治小便數大便難此丸通腸潤燥。

大黃

枳殼

厚朴

白芍

各五錢

杏仁

二錢

麻仁

三錢

右爲末蜜丸棗豆大每服三十丸溫湯下未利再服得

快方止。

赤石脂丸

治小便澀大便利協熱而利者。

赤石脂

乾姜

各二兩

黃連

當歸

各二兩

右爲末蜜丸梧桐子大每服三十九米飲下

乾姜黃連黃芩人參湯 治上寒血吐下寒氣內格食入
卽吐

乾姜

黃芩

黃連

人參

各三錢

水一鍾半煎至八分服。

青黛一物湯 治發赤斑。

青黛如棗大水研服。

犀角大青湯 治斑瘡出頭疼。

犀角

二錢

大青

三分

枝子

拾枚

豆豉

叁撮

右水煎服。

大青四物湯 治壯熱煩渴燥脉洪盛遍身斑出如火色

大青 壹兩 阿膠 二錢 甘草 乙錢 豆豉 乙合

右水煎服。

硝黃解毒湯

解毒散加硝黃。

正陽湯 治陰毒額汗頤痛面青舌黑口張出氣煩渴心

下硬滿肢冷多腫。

附子 乙兩 良姜 甘草 各伍錢 皂莢 壹挺 麝 乙分

右爲末每服二錢水煎入蜜熱服

陰毒甘草湯 治陰毒畏寒身痛腹疼背強咽痛噎逆

恍惚失驚神氣短瓜甲青手足冷頭面熱等証

甘草

升麻

當歸

枝枝

各乙雄黃

川椒

各乙鱉甲 二錢

右水煎服

三卷終

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名 = 伤寒六书纂要辨疑

作者 = (明) 童养学纂辑

页数 = 4 5 5

S S 号 = 1 0 3 8 6 7 3 6

出版日期 = 1 9 8 4 年 0 1 月第 1 版